

醫學綱目

三十二之三十三

傷寒部

合病併病行下吐後等病
盜汗
驚
煩
噫
動氣
短氣
瘕
疔復
秋瘧疾
妊娠傷寒
溫中法

面赤
悸
煩躁
噦
鼻衄
心痛
痲
陰陽易
溫疫
產後傷寒
灰包熨法

喘
壞病
臟結結胸痞氣同異
欬
汗
下血
除中
狐惑
四時傷寒不同
風濕
小兒傷寒

身重
戰慄振搖
小便不利
瘧狀
唾血
下重
百合病
久傷寒
濕
溫病

難轉側
筋惕肉瞤
結胸
小便難
頭汗
畜血
身熱惡寒身涼
春溫病
瘧
傷寒拾遺辨法和解因時法

友暑病

婦人傷寒熱入血室

內閣文庫	
番號	漢 12491
冊數	23 (19)
函號	301 20

遺尿
又并胃



醫學校
典藉方



醫學綱目卷之三十二

傷寒部

合病併病汗下吐後等病 喘 身重

難轉側 遺尿 盜汗 面赤 壞病

戰慄振搖 筋惕肉瞤 叉手冒心

驚悸 藏結 結胃痞氣同異 結胃

痞煩 煩躁 欬 小便不利

小便難 尸厥 鬱冒 噫 噦 無汗

瘧狀 頭汗 舌白胎 動氣

鼻衄 下血 唾血 畜血 吐血

短氣 心痛 除中 下重 身熱惡

寒身寒惡熱 瘧 斑 狐惑 百合

○合病併病汗不吐後等病
太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

病宜

卷之三十二

葛根加半夏湯主之

宜和 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半

夏湯生薑湯主之

宜下 陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之

宜大承氣湯

論見下利

併病宜汗

二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽

宜下

症不罷面赤燥煩短氣者更發汗則愈

太陽與少陽併病項強眩冒心下硬如結胃者刺胃脘肝

脘論見 喘

表裏 太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下麻黃湯主之

喘發熱

託有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊強

乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利

根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以

麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯論見發熱

陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯論見大便 喘家有汗桂

枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝去皮

芍藥各一兩

甘草

厚朴各六錢

杏仁去皮尖二

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚劈破

同煎至八分溫服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯論見欬

喘潮熱腹滿大便小便秘脈沉為

陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯論見

裏

不大便註云在裏而喘者小便不利大便乍難乍易微

熱喘冒不能臥者大承氣湯脈沉喘滿反發汗大便難者

裏實論見

汗後而喘

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃

杏仁甘草石膏湯

麻黃兩

杏仁五十

甘草二

石膏半

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮

取二升去查溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦

浮後脈沉喘滿大

便難譫語者裏實論見

下後而喘

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃

杏仁甘草石膏湯

下後利不止脈促而喘汗者葛根黃

芩黃連湯論見

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏仁湯主之

許有武臣為寇執置舟中艤板下數日得脫乘飢恣食良

久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而膈不利一醫作傷食而

下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘

息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏

仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漿

汗出至晚身涼脈已和矣醫曰某平生不曾用仲景方

不知其神捷如此

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘

直視脈弦者生澁者死論見濕家下後額汗微喘大

小便利者死論見

少陰病息高者死論見

厥冷

無脈灸之不還反微喘者死論見直視譫語喘滿者死

論見

脈浮其汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

齊寧綱目卷三十一

三

喘續法

陰喘

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳

陰毒

飲水喘

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚衆當以五苓散或隔胃丸主之方見湯及結胃

身重

身重面垢

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白

虎湯主之

身重脈浮多眠

風溫為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見風溫宜

身重脈浮紫

陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身

重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗謂云此証宜和解之

身重腹滿乾

陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大

承氣湯

論見不大便

風濕脈浮

身重汗出惡風者宜

防已黃芪湯

防已刀

甘草半

白木七錢

黃芪去芦

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盞半煎八分

溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐

被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥喘者加麻黃

半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三

分下有沉寒者加細辛三分

中暑身重

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下

鍼宜瓜蒂散白虎湯論見中暑

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大

青龍湯

身重无汗

身重下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見

身重陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花

者燒褫湯論見陰陽

四肢重少陰病腹痛小便不利四肢沉重痠痛下利者真武湯論見

身重

○難轉側

熱濕風三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見下後

胃滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡礪湯

論見風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮

虛而澁者桂枝附子湯論見

○遺尿

腹滿三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論見

多眠風溫病脈浮汗出者身重多眠若下之則小便不利直視

失溲論見

寸口脈微而澁微者衛氣不行澇者榮氣不逮榮衛不能

相將三焦無所仰身体痺不仁榮氣不足則煩疼口難言

衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞

酢中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則迂洩

汗欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷

太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便

不得反嘔而失溲者此為欲解也論見遺洩狂言口反

直視者此為腎絕論見

○盜汗

三陽合病脈浮大見閔上但欲眠睡目合則汗陽明病

脈但浮者必盜汗出論見胃實成无已云陽明病當作裏

盜汗脈
浮邪在
半表半
裡

故也 太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也 論見 結胃

成傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則邪氣浸行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣其證悉當和表而已

○百病

面赤燥 煩短氣 脈滿者 汗不節 二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下之 下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱不得越表當解之薰之若發汗不出不足言陽氣怫鬱不得越表當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之

不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何

以知汗出不徹以脈澁故知也 因發不透徹而亦躁煩 短氣者不足言陽氣怫鬱

止是當汗不汗也 故更發汗則 脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱

者瘥遲為無陽不能作汗其身必痒也 太陽病如瘥狀

若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小

汗之 論見 發熱

身熱足寒面赤卒口噤背反張者瘥病

陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者宜升麻鱉甲湯

方論見 陽毒 少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤

色者通脈四逆湯加蔥白 論見 下利 下利清穀脈沉遲面少

赤手足微厥者必鬱胃汗出解 論見 下利

而赤下 利脈微 為陰 照厥者

身痒脈 浮遲者 陽虛

口赤身 張者瘥 亦壯者 用毒

而赤下 利脈微 為陰 照厥者

面赤

陽明病面合赤色者不可攻之論見便難

壞病

太陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

山治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服

海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

韓產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是容熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則

上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近

証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多蹇足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧

宜羊肉湯主之

當歸

白芍藥

黑附子

龍骨

生薑

牡礪

桂枝

右為籠末每服一兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛以水五升一升八之大蓋也熬至一半以來瀘絞去查分三

服服之

戰慄振搖

虛成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振
為虛

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊
發汗則動經身為振振搖者宜

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

桂枝

白朮

甘草

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動
振振欲躄地者真武湯主之

孫太乙官道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰

掉欲倒地眾醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者

病皆不除召孫至口太陽經病得汗早欲解不解者因太

陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉

遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白

朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽

乾涸血液爾仲景云尺脈不足芤氣不足不可以汗以此

知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者

子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗

遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤

振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微

汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟

真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病火熨其

背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄言下利者此為

未汗戰
振為欲

解也

論見
譫語

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮

解

為在表故當汗出解也

論見大法

太陽病脈陰陽俱停等必

戰慄汗出而解

論見

凡柴胡症下之若柴胡症不能者

復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解

而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也

論見往來尋也

脈浮

作汗其身必痒也

論見而赤

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰而慄也陰中

於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

虛

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲蹶地者及服大青龍湯後

麻逆者俱宜直武湯

方見戰掉及發也

若動氣在左頭汗不止

者活人用防風白朮牡研次服建中湯

論見重寒

身

汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩而色青黃者難治

論見

若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿

叉手冒心

虛

發汗過多叉手冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯

論見

驚悸

證

少陽耳聾目赤曾滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

論見

下后驚

傷寒八九日下之曾滿煩驚小便不利譫語一身尽重不

可轉側者宜

柴胡加龍骨牡研湯

半夏

大棗

柴胡

生薑

人參

龍骨

鉛丹

桂枝

茯苓

大黃

牡研

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

火逆驚

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯主之活人云無以火於臥床下或周身用而成功邪氣去也

桂枝蜀漆牡礪龍骨救逆湯

桂枝去皮二兩

甘草炙二兩

生薑切三兩

牡礪炒五兩

龍骨四兩

大棗十二枚

蜀漆洗去腥三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚癇時瘕瘵論見風溫 陽明病

脈浮噤口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠論見自汗

驚悸續法

傷寒后

海茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸

吸短氣

茯神

麥門冬去心

熟地各一兩

牡丹皮

人參

黃芪各七兩

桂枝

甘草炙

牛膝

澤瀉各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏執在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑半兩

茵陳蒿半七錢

茯苓二兩

芍藥

生地焙二兩

麥門冬去心

山梔半兩

右咬咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬去心

赤茯苓去皮

知母焙

芎藭

甘草炙

酸棗仁微炒

陳皮去白

檳榔各

宜直已
禁溫

右收吐每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服
少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎吹心
故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡
候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯溫之者
為心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去終至於
斃故不敢溫之溫之則壞矣

○悸

汗后心

汗後心下悸若頭眩身瞤動振振欲僻地者真武湯也論見
戰若叉手自冒心者後條桂枝甘草湯也若語胃不
和煩悸者活人用調胃承氣湯也論見若臍下悸者後
條茯苓桂枝甘草大棗湯也發汗過多其人叉手自冒
心心下悸欲得按者宜

桂枝甘草湯

桂枝四錢

甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去渣溫服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢

甘草二錢

桂枝四錢

大棗一枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮
取一盞去渣溫服日三作甘爛水法取水斗許置大盆
中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗
常自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津
液自和便自汗出愈少陽病耳聾胃滿不可吐下吐下
則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胸脇滿脹下悸而小
便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯方論見後

停飲心太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必若裏

急也

停氣虛心傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 傷寒脈結

代心動悸宜

炙甘草湯

甘草炙

生薑三

人參半

生地一

桂枝去

麥門冬

去心各

麻仁合

阿膠

右咬咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去查

納阿膠溶盡溫服日三

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

霍亂心手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四

散加桂枝

臟結與結胃痞氣大曰小異

寸浮關問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關

利為結脈沉名曰結胃也何謂臟結答曰如結胃狀飲食如故時

寸浮關時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者

飲食如難治土朝奉云可臟結無陽症不往來寒熱其人反靜

結為藏舌上滑胎者不可攻也王朝奉云可刺關病胃中素有

痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以下之大早故也 傷寒五六日

嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者

復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗

出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但

滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

病發於
陰下之
成第胃
病發於
陰下之
成痞氣

寸浮關
利為結
飲食如
結為藏

○結胃

大結胃
不按而
痛

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴口
晡所有潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主
之 太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛
數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫
反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁
煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主
之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身
必發黃也丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁
傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞅者大
陷胃湯主之 云岐云三症陷
胃皆曰西湖述

○大陷胃湯

大黃一斤半去皮為
末細絞者佳

芒硝一斤

甘遂一斤

為細

右水二盞煮大黃至八分去渣下硝一沸下甘遂未溫
服得快利止後服

小結胃
按之則
痛

○小陷胃湯

半夏湯洗
二月

黃連一斤

瓜蒌一枚用
分之二

右咬咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎
取八分去渣溫服未和再服微解下黃連便安也

○孫

工部郎中鄭忠厚因患傷寒胃腹滿面黃如金色諸翰
林醫官商議畧不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛召孫至
曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有一二服
藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色
改白京城人稱服

執實結胃熱傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

水結胃熱但結胃無大熱者此為水結在胸膈也但頭微汗出者大

頭汗无陷胃湯主之活人云水結胃小半夏加茯苓

大括病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不

得去弥更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散

寒熱結胸天也若不瘥者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃

湯此三物白散亦可

桔梗三分 巴豆一分去皮尖 貝母三分

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人

半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱

粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥

一兩

右執實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

用法用枳實理中丸應手而愈

結胃項亦強如柔瘥狀下之則和宜

大陷胃丸

大黃二 葶藶 芒硝 杏仁各二分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大

後用其遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服

宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽入

本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也大陷

胃治熱實大陷胃丸兼喘小陷胃治

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩暈者刺大椎肝膈若

汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯方論

若婦人經水來執除澹語者刺期門論見

診 太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本

有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此

作協熱利也四日復下之 太陽病下之脈浮者必結胃

也論見 太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利

不止水漿不下其人心煩 結胃症悉且煩躁者亦死

結胃續法

活若誤下了初未成結胃者急煩與理中湯自然解了更

不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因

人消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃

中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣下之

蓋前來下之未是故也

西晉崔衍功云傷寒結胃欲絕心膈高起于不得近用人

陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小

氣毒相結於胃者當用枳實理中丸先理其氣少瘥

疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

枳實十六片 茯苓 人參 白朮

乾薑炮已上 甘草炮已上

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進

二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡礪

二兩煨過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 瓜蒌 牡礪

甘草炙各 乾薑炒白 枳實炒二十 黃芩去枯

右為細末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不效復與

之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

加瓜蒌根有汗加牡斫

以半下
結

活水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡斫主之

按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以爲溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身汗若有食心滿頭並得有汗若言是表身又不疼不惡寒表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯

氣寒不
通宜穿

穿結散大膏天滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆另研
少許

右并研過至細以乳汁爲丸如黍米大每服二丸用薑

不時服

婦人傷寒血結胃脇揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤

滑石

甘草炙各
一兩

芒硝半

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胃膈血散膈中血聚則小腸壅小腸壅膈中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑有之

灸
治結胃灸法

巴豆十四
箇

黃連七寸去
皮用

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

摘傷寒結胃 先使人心散骨下正痛處左畔揉之以毫
針刺左畔支溝穴正坐側臂取之二分次刺左間使名口雙關刺次
左行間以取之針入六分此支溝行間穴下針至分數內
吸訖長呼一口氣出針即左畔一壁結胃立效右畔
依上刺之慢七呼吸停針用針獲時而愈无有不效

傷寒結胃痞氣
胸中結痞湧泉 太溪 中衝 太陵
心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 太衝并上下中腕瀉之
通玄 結胃身黃 湧泉

摘 血結胃面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍
期門 太陵 關元姪娠不得刺關元胎死

集 傷寒胸膈痛 期門 太陵
活 近世治結胃多用金針并川硫黃陽起石者若寒實結

胃或有瘰者若熱實結胸必死也

○痞

心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之活人
濡關脈浮者大黃黃連瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連各二 黃芩一

右咬咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去渣分溫再服

惡寒汗出加附子 心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯

大黃 黃連 黃芩各一 附子一枚炮

破別煮取汁

右咬咀百沸湯一大盞熱漬之一時久絞去渣納附子

汁分温再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞
當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃
連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支
結柴胡桂枝湯主之胃膈滿微結小柴胡加乾
薑牡蠣湯主之

心下痞
硬閉脈
沉者半
夏瀉心

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症且而以他藥下之若心下滿
而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胃
痞同異

半夏瀉心湯

半夏湯洗七 黃芩 人參 甘草各一

右吹咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣温服半夏
瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利
也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞嘔噦噦氣下利也

後者加
下早

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷
鳴心下痞鞅而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不
盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故
使鞅也宜

甘草瀉心湯

甘草炙二 黃芩 乾薑各一 半夏各一

大棗六 黃連半 人參一

右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣温服活人
云伊尹湯液論其草瀉心
七味同本无人參

痞硬未
下

傷寒發熱汗出不解心中痞鞅嘔吐而下利者大柴胡湯
主之

痞鞅表
解身涼
脇痛

心下痞硬嘔逆下利若表解身涼脇痛十寒湯主之方論
並見

利痞硬下

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下存水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑二

黃芩

甘草炙

人參各一

乾薑半

半夏一

黃連半

大棗六

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服

太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下

下後表裡不解者桂枝

痞鞭表裏不解者宜

桂枝人參湯

桂枝另

甘草炙各一錢

人參

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更者取七分

去渣溫服日再服夜一服

傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噫氣不除者旋覆代

痞硬者旋覆

赭石湯主之

活人云有旋覆代赭石湯証其人或欬逆氣虛者先服四逆湯胃虛者先服理中丸次服

旋覆代赭石湯

旋覆花一

人參半

生薑一

代赭石三

甘草炙

半夏湯

大棗六

右咬咀每服五錢水一盞煎至八分去渣溫服 病解

後心下痞噎噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也

若下利者前條生薑瀉心湯也

痞硬氣上冲咽

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛

氣上衝咽眩暈者成痙方論並見

服瀉心痞不解

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥

小便不利者五苓散主之

心下支結似痞
表未解

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也

心下滿
必痞手
是冷

心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯

診

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚潤者難治今色微黃手足溫易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞

耳

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈甚汗少則便難若脈進尚未可攻 陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之

活潑法

虛滯

活傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙綠桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼 煨炒去穢 各二兩

右咬咀以水二盞煎至一盞去渣分二服

煩

汗吐下
後懊憹
虛煩

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反戾顛倒心中懊憹者梔子豉湯主之 若少氣者梔子甘草豉湯主之 若嘔者梔子生薑豉湯主之 陽明病下之其外有執手足溫不結胃心下懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之 陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

懷舌上白胎者宜梔子豉湯論見下利後煩燥之心下
濡者為虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子四箇香豉半

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去查溫服
得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得
吐止服 梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二

錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主
之

梔子四箇乾薑半

右二味以水一盞半煎取八分去查溫服得吐者止後

服

發汗吐下後心中惶懼而煩者無燥屎大便溼者此條梔

子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

胃實而煩

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小

承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿

初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯方見

若不吐不下者調胃承氣也

証有人病傷寒八九日身熱無汗時譫語時因下後大

便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中

無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予

診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊
懣微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便乍難乍
易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云
胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大
便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非
痛所以心中懊懣也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱
也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也
不得眠而煩論見不

胃滿而煩胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯方論見往
兼下利咽痛者猪膚湯方論見若汗下後往來寒熱者
柴胡桂枝薑湯方論見往兼身重不可轉側者柴胡龍
骨牡礪湯方論見發汗若下之而煩熱胃中窒者梔子豉湯主之

心下滿而煩

心下鞅滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心
湯脇痛氣衝咽胃敗者成痙方論若滿痛下利不止
水漿不下者併病方論

心煩滿臥起不安

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜
梔子厚朴湯

梔子去殼

厚朴薑製

枳實切

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止
後服

腹滿而煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便溏胃痛
欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見

吐後入而煩

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為
吐之內煩也脈之微數不可灸灸則煩逆論見

嘔時煩鬱

嘔時鬱七微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也

脈浮數而煩

病欲解者必當先煩乃有汗而解論見太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈傷

寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

主之

脈三後煩者損谷

病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈吐利汗後脈平小

煩者以胃虛不勝穀氣也論見

先煩後悸為逆

心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃

承氣湯論見

先博後項為虛

若二三日心中悸而煩者宜小建中湯論見心煩而渴

方論

便微煩

少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用

湯論見

下利脈逆而煩

若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁

惡寒而煩手足厥而煩

若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但欲寐

手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜

瓜蒂散吐之

若

若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也

方論並見下利

若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見下利

煩躁

如躁有表逆宜汗

煩躁有表証發熱惡寒体病脈浮緊者大青龍湯也方論見發

後

若發汗不徹太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗

則愈論見短氣

煩燥无
表証宜
下宜温

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞭至四五日
雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭
鞭後必溏未定成鞭攻之必溏瀕小便利尿定鞭乃可攻
之宜大承氣湯証云云太陽証為无表証也煩躁不
大便續臍痛發作有時者有燥屎也下之後復發汗日
夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無
大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑一

附子生用一枚

石一味以水三升煮取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱
服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消

如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水
服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬
如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜

茯苓四逆湯

茯苓二

人參六錢

附子一枚生用去皮臍

作八片只用二片

甘草二錢

乾薑各二錢

石剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查温服

煩躁心
下鞭

煩躁心下鞭若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承
氣少少微和之也若已曾下心下鞭痛短氣躁煩者大陷
胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見

火逆煩
躁

火逆下之因燒鍼煩躁者宜

桂枝甘草龍骨牡蛎湯

醫方類聚卷之三十一

三十一

桂枝去皮 甘草炙 牡礪炙 龍骨各一

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名為火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也論見

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見 若不煩而躁四逆脈不至死也論見 不得臥者死也論

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而後遇復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也

先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此為陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭臂

如灯將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩

後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治也 臟厥方論 躁無暫定而

厥者為臟厥靜而復煩吐衄而厥者為虵厥烏梅丸主之方論 熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若

欲食者愈若厥而嘔胃脘煩滿者便血論見 少陰病但欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見

煩躁續法

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火醜散丹砂丸並主

煩躁不飲水為陰盛隔陽

之丹砂丸並主見活人云

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子

一枚炮熟取用令灰搗
研入真葛茶二錢和勻

右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙
放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

如燥渴
為上世
下寒

海已寒九此九不僭上陽生於下治陰症服四逆輩胃中
發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此九上不躁大
小便自利

肉桂

茯苓各五錢

良薑

烏頭炮各七錢

附子

乾薑炮

芍藥

芍香一枚名

右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七
十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

陰中
陽伏

本破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏方論見
頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

力頭疼身溫煩躁指末皆冷胃中滿惡心更兩醫矣皆不
識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此
証世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能
導引真陽反生客熱用冷藥則所伏真火愈見消燼非其
治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得
汗而解矣予授此藥二百粒作一服冷煎湯下不時煩躁
狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定
畧睡身已中汗自昏達旦方止身涼而病除矣

○欬

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎
或小便不利少腹滿或喘者宜

表不解
而發屬
太陽

小青龍湯

麻黃

芍藥各三錢

五味子半

乾薑

甘草

細辛

桂枝去皮

半夏各三錢

右咬咀每服五錢水盞半煎八分去查溫服 若微利

者去麻黃加芫花如彈子大煑赤色 若渴者去半夏

加瓜蒌根三分 若噎者去麻黃加附子一錢五分炮

若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩 若喘

者去麻黃加杏仁三分去皮尖

欬而往來寒熱胃滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑朮加

五味乾薑也方論見從來寒熱

欬而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥

者必頭痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛論見胃實

欬而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四肢重痛

者用真武湯加五味子細辛乾薑也 若下利六七日變

次嘔渴不得眠者猪苓湯也 若下利譫語小便難者彼

火氣劫也

若四逆者用四逆散加五味子乾薑也並見

欬

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也 欬而大小

便者不可發汗汗出則四肢厥冷論見迂尿

欬續法

丹崇慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡

黃芩

白朮

陳皮

桔梗

木通各二錢

人參

麻黃各一錢半

甘草三錢

右分三貼水煎服

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參一兩

五味子五錢

桑白皮二兩

欬冬花

蛤蚧一對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

肺虛氣
之宜補

內傷外
感而
散之

此中
扶而
偏少
實而
弱明
但欲
而欲
利偏
少

傷寒汗下後咳嗽肺虛声音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷

阿膠炒

五味子

麥門冬法

白朮各一

乾薑炮

桂枝各二

杏仁去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯澁邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗

桑白皮各一 甘草

貝母

訶黎勒各五

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

○小便不利

小便不利表不解若乾嘔發熱而欲少腹滿者小青龍湯

去麻黃加茯苓也方論 若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮方論見

小便不利身重者助滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩

加茯苓汗下後者加柴胡桂薑方論見 若煩驚譫語

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也論見

小便不利大便乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯論見

小便不利而渴若脈浮發熱者五苓散加猪苓湯方論

若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯方論見

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬

風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也方論見

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也方論見

頭汗脇滿

小便不利

若發黃者茵陳蒿湯也

小便不利身發黃方論俱見發黃

下後無

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便

治他症勿

利必自愈活人云若大渴引飲須利之

但欲寐者明症

小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花

湯腹痛下利四肢重痛者用真武湯也方論早下利若四

逆者用四逆散加茯苓方論見但欲寐

陽明病小便不利濇然汗出者若欲食者愈不能食者欲

作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法

活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷

滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論見陰毒返明丹

集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

○小便難

汗後小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四

肢難屈伸宜桂枝附子湯也方論若太陽症中風以火

劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小

便難也方論見若少陰以火劫汗者則欬而下利譫語

小便難也論見

下後小便

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身

黃項強小便難也見腹若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊

下之者則腹滿小便難也論見

脇痛身黃

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下

後不食項強者忌柴胡論見

○尸厥鬱冒

少明脈不至尸

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽汗下後發

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃

胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復

下利清谷

下之得裏和三字中間必有衍文脈簡得字當字若字之誤裏和當是裏卡和蓋脈一木字也下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱胃汗出解

論見

喘逆

小便不利大便乍難乍易喘胃不能臥者大承氣湯論見

胃寒

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也論見

心下硬眩暈

眩暈心下鞭若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

腧肝腧論見

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿論見少陰病且

欲保下利止而眩暈者死論見

尸厥鬱胃續法

熱

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二

句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六

脈細數而不共大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳

至十口已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下

之則誤矣蓋不知此執傳手少陰心經也然又未知自何

經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱

畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火白上迫

熏肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有火邪故令神昏

宜梔子黃芩黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心

湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑

有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說

若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉
 心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳
 上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者良之離也越經傳者
 又為腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言
 不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或
 止傳一經或開傳三經不可一途取之但視其脈與外證
 治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者
 以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必
 矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也
 脈在丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

噫

溫痰

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉
 湯也力論
 見痞

噫續法

水火相傳噫

傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經
 至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜
 如聖加枳實湯

甘草

桔梗各五錢

枳實炒二錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後喘而噫

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各
 分右剉細每服五錢水煎服

噦

汗下吐後噦

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復
 與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也
 胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉
 矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦論見
 熱
 本渴而飲水嘔者噦食穀者噦論見
 脇痛陽明病胃實不能

飲水而噦

食者攻其熱必噦論見 温家頭汗出背強惡寒欲栗被

向火者下之早則噦論見

火劫汗

太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語

甚者至噦捻衣摸床小便利者可治論見

歲潮下

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

陽明胃實脈弱浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有

潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噦者不治論

夫

噦續法

寒也異

活噦胃寒所二橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退

陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦

則屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹

湯方見雜

橘皮乾薑湯

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草冬三

人參二

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去渣温服日三

羌活附子散方見雜

半夏生薑湯治噦欲死

半夏

生薑二

右水二盞煎至八分去渣温服

海傷寒欬逆脈散死 仲景之言不虛偽 大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內 便軟惟宜用瀉心 便硬尤

宜大承氣 二藥神工作詐 東垣潔古為良劑

潔欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘

者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不
 內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽
 而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左
 浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強
 右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓
 散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌燥語言不正而
 反昏胃與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈
 浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦
 然即非表也邪入已深矣因熱當沉反浮陽極復之表也
 陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已
 病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲
 盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱似人
 按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

身大
渴不飲
近水為
明

用丁香乾薑之類執藥溫胃其火自下
 裏寒
 勾氣散

川烏頭 大者三个炮
裂去皮脐

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調
 乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑 附子已炮 肉桂

芍藥 半夏 炙甘草 吳茱萸

陳皮 各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去
 查溫服

肉苳薹湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉苳薹个 石蓮肉炒 茴香各一 人参

丁香各半 枇杷葉五片拭去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去渣空心温服分二服

良薑湯

橘皮 良薑 桂枝 當歸各一

麻黃半斤 杏仁二十个 甘草半斤 檳榔三个另

右咬咀用水四盞薑十片枣三枚同煎至二盞去渣下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服瓦老云傷寒

吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無依止宜服此方

○無汗

太陽發熱惡風寒休痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也 若項背強者葛根湯也方論

若小便少氣衝胃口禁者為剛痺亦葛根湯也論

若自汗者必自愈論見

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之

類小便利而厥者寒邪宜温之小便不利發黃者於熱宜茵陳利之也論見

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各半湯也方論見 若脈浮遲而赤戰惕發熱者遲為無陽

不能作汗也論見 若陽明胃實身如虫行者久虛也論見

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或懊懣者宜

茵陳湯方論見 若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者柴胡湯方論見 若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

无汗小 便不利 脇痛心 下滿

无汗身 痒為虛

无汗刀 大便屬 陽明

无汗身 痒為虛 太陽

苓白朮也方論見

無汗禁忌若浮緊身痛者忌桂枝論見脈浮發熱表不

解者忌白虎論見若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也論見凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯

與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也

論見

無汗續法

針灸摘傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮

合谷五分候遍身汗出即復溜瀉

雲又法 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經榮皆可刺

摘傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際散脈中二

渠內庭應時出汗

○瘧狀

太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便

者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半

也方論見服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前

法若形如瘧日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃二錢 大枣二

生薑五錢 杏仁去皮尖甘草半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查温服

病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實

者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂

枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

日晡所發者宜下和宜汗宜

日二三發者宜桂枝各半湯

使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之論見婦人傷寒

○頭汗

小便不利頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂枝湯也方論見往來寒熱

胃實頭汗

陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜刺期門論見

宜梔子豉湯方論見若被火額上汗出小便不利者必發

黃也方見胃實

心下滿頭汗

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大便鞭者小柴胡湯論見厥性來寒熱

診

若水結胃無大熱者大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯
太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治 關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死 濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死 下利不止者亦死 濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦胃滿小便不利舌上白胎也論見身痛

頭汗續法

診

孫凡水結胃脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂之重虛

成頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭也

海頭汗出劑頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯

論見胃實

若下後心中懊懣者梔子豉湯

方論見煩

若下後噦

而胃滿小便利者丹田有熱胸中有寒也

論見牙疼

診心

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出

舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者

此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治設使惡寒

者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

海藏云惡寒必欲嘔者小柴胡湯腹中痛者理

中臟結如結胃狀飲食如故時上下利寸脈浮關脈小

細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其

人反靜者不可攻也

論見臟結

舌胎續法

邪淺黃深者邪

成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後

舌上有膜白滑如胎甚者或燥澁黃黑是數者熱氣淺深

之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏

則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熟或在半表或在半裏

或邪氣客於胃中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎

者以丹田有熱胃上有寒邪初傳入裏也陽明病脇下硬

滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表

半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣

舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胃中也若病在臟宜

若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熟猶帶表

寒故也

濕者白

及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澁也經曰傷寒七

八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水救升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

黃者宜若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要略曰舌黃木下者下之黃自去

黑者宜若舌上黑色者又為熱之極也鐵經曰熱病口乾舌黑者死以心為君主之官開竅於舌是為腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

知方下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中有寒勿用之曾有微寒加辛熱之劑立效舌燥澀如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搽之其刺立消神效無薄苛蜜治舌上白胎乾澀語話不真先以生薑厚片蘸蜜水揩洗有用薄苛自然汁與白蜜等分調勻傅之良

○動氣

成動氣者為築築然動跳於腹者是也動氣在右不可

發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水活人云先服五苓散三服次服竹葉湯動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

活人云先服防風白朮湯動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端活人云宜服李根湯方見氣上衝動氣在下不可

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反吐穀不能進活人云先服大橘皮湯吐止後服小建中湯動氣在右不可下

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則

欲蹠動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水白灌動氣在下不可下下之則腹脹滿

卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

動氣續法

滯五

傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵一

木香不見

柴胡

黃芩各半

右剉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼燒炒

赤茯苓

當歸

三稜炮

木香

訶黎勒各五錢

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡

赤茯苓

大腹皮

人參各五錢

木香

檳榔

大黃各三錢

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓

檳榔

桂心

大腹皮

川茴香炮

良薑各五錢

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

表

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯太陽病脈浮緊無汗發熱身

疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其

人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃

湯主之不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

便清而衄者桂枝湯也論見 太陽病脈浮緊發熱無汗

而衄者愈也論見 太陽病以火切發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰

虛則小便難論見 少陰病但厥無汗而強發之必動其

血或從口鼻出或從目中出者難治論見 動氣發汗則

衄而渴飲水就吐論見 脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲

漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊直視不能瞬不得眠衄家不可發汗者為無脈若浮紫

鼻衄續法

衄仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯

浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黄湯主之衄家不可發汗汗出必額上陷脈紫直視不能瞬不得

脈微不可汗也若脈浮緊及得緩者皆當發之是也

傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黄湯主之

犀角地黄湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐

血面黃大便黑此方王消化瘀血

芍藥一 生地半 牡丹皮二錢 犀角二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加

黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不

用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一

盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

本治傷寒衄血滑石丸

滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十九微嚼破新

水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯暎叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫和藥以調其衛終見鮮血急以此藥治之

○下血

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熏汗不得汗其人必躁而滑血論見林家

不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少

厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈論見

胃腸煩滿者必便血也

○唾血

咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鱉甲湯方論見

若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯方論見

脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血論見服桂枝湯吐者必

吐膿血論見

○畜血

身黃如狂屎黑喜忘者為畜血 太陽病表証在而發熱惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之論見抵當湯

少腹結

胃實譫

汗下後

診

血論見

論見

論見

陽明毒

下後好

灸後汗

太陽毒

見下

論見

論見

水蛭十箇去子竹 蜜十枚去足 大黃一兩湯浸去皮 桃仁七枚去

右咬咀作一服水一盞煎七分去渣溫服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭五枚

蜜五枚

大黃三枚

桃仁六枚

右為末煉蜜和作一丸以水一盞煎至七分頓服醉時

當下血不下再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者宜攻之

桃仁承氣湯王注承氣方有薑七片桂枝各三錢

桃仁十二枚去皮尖

大黃一兩

桂枝炙

桂枝

芒硝半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣入硝化開令

後服

陽明畜血

陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵

當湯論見

澀初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤

重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色久

則漸變而為黑色即此意也當詳察之

許血在上則喜忘在下則發狂

下後畜血

病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已

下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血

宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而便膿血也

成常不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞭

滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

口燥渴水不欲咽有瘀血在胸

病者胃滿痞痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不咽胸中氣滯牛之者批仁承病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衄血吐血畜血續注

血分上中下三部

衄血症古人用藥雖有輕重之殊而無上中下之別今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部衄血吐血為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥宜隨其輕重也

上部血

汗多為衄血脈浮灸之咽燥為唾血當汗不流熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃是太陰所主脾所不暴越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胃中 頭痛身痛欬水不咽者衄無熱胃滿漱水不欲咽者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

桃仁承氣湯主之

下部血

畜血下焦 其人發狂小腹滿硬小便自利大便反黑及

血分輕重

臍下攻者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑

者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別

桃仁大黃等分水蛭虫多者作湯三之二者作丸丸之

名取其救少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表証不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈

微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證

諦也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁

承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物為效按太陽病畜血

今云无表証者但誤

得明畜血為未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者

輕也

生地黄丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或

狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼

氣虛弱者宜此方主之

生地黄 白然汁一升如無生地黃只用生乾地黃二升 乾漆 半升炒

生藕 白然汁半升如无藕用刺藟汁一升半 藍葉 一握切細乾者用末半升

虫虫 二十个去翅足楚內炒黃 水蛭 十个炒 大黃 一升剉

桃仁 研碎半升

右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投

一服至半日許血未下再投之此地黄湯比抵當湯丸

其勢甚輕如無地黄與藕汁升數添水同煎抵當丸恐

用之太過不止損血故以此湯主之

吐血續法

垣治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居病室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒瀉裏裏熱火邪不得舒伸液血出於口因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃一錢去桂枝半錢補白芍藥錢黃芪一錢去
耳草一錢五味五粒安門冬三分保人參三分益
不足而當端五分和
其表血分益
咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

執毒入裏者抵當桃仁

入餘藥同煎至一盞去查執服臨臥一服愈觀此足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也
活傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗執毒入經結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃丸

短氣

短氣表症
短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見短氣腹滿脇痛其人若脈弦浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯也論見胃實方
若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見潮
若表解心下痞鞭乾嘔短氣者宜十棗湯方論見上

短氣裏症

短氣汗不徹

短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤

短氣心硬痛

者為併病更發汗則愈論見若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胃湯論見

跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也論見

○心痛

下後心中結痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也

脈弦脇及心痛

梔子豉湯主之陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗

嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者

心痛續法

熱寒傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘

海二穴如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三陽

○除中

診傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與

黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除

中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中

口雖欲言舌不能語 凡手足厥冷而利不當食而食者

恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論見

○下重

泄利下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱

脈浮誤灸下重

者曰頭翁湯方論見脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食脇痛身黃項

強小便難復與柴胡湯必下重論見脇痛

診下利脈沉弦者下重也論見下重

○身熱惡寒身寒惡熱

診治

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先

以桂枝湯治寒次以小身大寒反不欲近衣者寒在皮

膚熱在骨髓也活人云先與白虎湯加以參除熱

柴胡加桂以溫其表活人云先與白虎湯加以參除熱

膚熱在骨髓也次以桂枝麻黃各半湯以解其外

續增症

射干兩

半夏二兩

杏仁兩半去

生薑兩

橘皮

肉桂

枳實各二枚

當歸

獨活

麻黃已上

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

○續增斑

海陽症癸斑有四有溫毒癸斑有熱病癸斑有時氣癸斑

有傷寒癸斑已上四斑活人有治法見後

斑斑如錦紋或癸之四末或癸之面部或癸之胃背色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感

熱病而癸也宜用玄參升麻湯白虎等藥王朝奉云赤斑出五死一生黑

溫毒斑

癸

音癸

陽斑如

錦紋

斑

能陽

斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青

龍湯兼與紫雪散大妙可下者調胃承氣湯

活溫毒癸斑者初春病人肌肉癸斑癰疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始癸初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此癸斑宜用黑膏主之

又有冬月溫煖人感垂戾之氣冬末解病至春或被積寒

所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之

黑膏方療溫毒發斑

生地半斤 好豉升一
右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄黃麝香如荳大為末同藥煎服之其毒便從皮中出者則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癰疹如錦紋而咳心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根 橘皮 杏仁去皮 知母
黃芩 麻黃湯泡 甘草炙各半
右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

時發

熱病發癍與時氣發癍並同夫病人或未發汗或已經發汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發癍瘡癰疹如錦紋俗名謂之麩瘡素問謂之疹大抵發癍不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癍爛也宜用玄參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯選用之

玄參 升麻 甘草炙各半
右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出

大青 阿膠 甘草各半 豆豉各一

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

溶服

猪膽雞子湯治五六日斑出

猪膽三枚

鷄子一枚

苦酒三合

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒癰在面

陽毒升麻湯治癰出面方見陽毒

海消毒飲子治癰

黍粘子六分

荆芥

防風各二

甘草一分

右咬咀水煎服

陰癰如蚊咬狀

陰癰癰出背又出手足亦稀少而微紅者若作執症

投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胃中上獨熏肺

傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦也

宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯之

類其斑白退可謂治本而不治標也

海藏云陽癰發於皮膚有紅點如斑出於皮膚

毛之問者宜白虎湯心等藥當審之

大建中湯方見治惡寒門

陰毒升麻鱉甲

湯治陰癰陰毒方見

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥

陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯

陽易若只與燒裊散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一

大服調燒裊散連進二服出大汗兩晝夜而愈

丹癰似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

○欲眠目不閉聲啞為狐惑為蠱

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默

欲眠目牽不得閉臥起不安虫蝕於喉咽為惑蝕於陰肛

為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

虫蝕上為狐虫蝕下為惑

官心

則聲啞甘草瀉心湯主之方見 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方未考究

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日赤如鳩眼七八日目四眦一本皆黑若能食者膿已成也

赤苳當歸散主之方見下血

狐惑續法

淫痰 一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽覺中有汁腹鳴即日閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

活狐或傷

濕霍皆虫証初得狀如傷寒或因傷寒

成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛二虫行作求食

蝕五臟及下部為蠹虫病其候齒無色舌上盡白甚者

唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死

當數看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其

肛殺人甚急多因下痢而得治蠹桃仁湯黃連犀角湯雄

黃銳散主之

治蠹桃仁湯

生艾

菝仁去虫尖炒

槐花子碎各一丹

大棗十五个去核

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有蠹出下部者

黃連半

犀角一

烏梅七

沒藥分

上唇有瘡蝕下唇有瘡蝕肛

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部腫瘡

雄黃 苦參 青箱子 黃連各

桃仁去皮尖一分

左為散以生艾搗汁為丸如棗核大綿裹納下部匾竹葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

○百合病

日脈一宗悉改其病

診

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈

或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月

見者各隨其症治之活人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平後亦成奇疾也

百合病發汗後宜服

百合知母湯

百合七枚 知母三兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水

二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞

去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇 滑石三兩碎 代赭石如彈大一枚綿裹

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出水更以井水二

升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同煎取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合七枚

雞子黃一枚

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二

升煎取一盞去查納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黄湯

百合七箇

生地黄汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎

取一升去查納地黃汁煎取一升五合分溫再服中病

勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升

以水一斗漬之一宿洗身已食煮餅勿以鹽豉食之

百合病渴不瘥者宜

括萎牡礪散

括萎根

牡礪炒各等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病變發熱者一作發熱

宜用

百合滑石散

百合一斤

滑石三斤

右為散飲服方寸七日三服當微利止服熱則除

宜息 百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見

陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆

也

醫學綱目卷之三十三

傷寒部

勞復門 陰陽易

仲景主於攻邪

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實四枚

梔子十四枚

豉一兩

有食者小引

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取

八分下豉更煮五六沸去查溫服若令取微汗若有宿

食內大黃量虛實加減

有熱者柴胡

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉

實者以下解之

有水氣者滲之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣熬

澤瀉

蜀漆洗去

商陸熬

海藻洗

括萎根

葶藶各等分

右為散水服方寸七小便利止後服日二

胃有寒者溫之

大病瘥後喜睡久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜

氣逆欲吐者抑之

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

把二石膏

半斤生夏

三人參

麥門冬

把四甘草

一斤嘔者加生姜

半

右咬咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分米熟湯成去渣溫服

診風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

後發主於補虛

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此為有形病也但見外證則謂之復病亦為勞也如再感風寒是也

虛勞補其母

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得

勞當補其子

寧直勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其功而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎雜經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受陰同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也
補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

人參

白朮

甘草

橘皮夫白

青皮去白

乾姜各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

海治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬一斤

甘草二兩

粳米

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯

一小盞半入藥五錢七葉二枚去核新竹葉一十五片

同煎至一盞去查溫服不能服者綿滴口中又治小兒

不能灌藥者宜用此綿滴法 此方不用石膏以其三

焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏

若加人參大妙

外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛

乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多服十日

服不住佳

肝治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鱉甲服方寸

七

活雄鼠屎湯治勞復

梔子十四箇

雄鼠屎二十七枚兩頭尖者是

枳殼三枚炒

右為細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十

粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成

此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連

乾葛

新豉半

生姜切一

麥門冬去心

熟地三

流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去查分二服漸漸服之取

汗

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸朮加發散之劑汗之為的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘牽熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裊散主之

燒裊散取婦人中裊近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裊襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調燒裊散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

陰陽易續法

寒熱

治熱者寒

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹身痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為陰陽易也其男子病瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便恍恍翁翁氣力轉小着床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒裊散猥鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾姜湯當歸白朮湯選用之海藏云熱者燒裊散竹皮湯至於枝正方妙香丸條下治雜病陰陽易中有牛黃腦射之類是治其熱症也竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

用水三升煮取一升絞去渣分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致執氣衝胸手足拘急搖擗如中風狀宜此湯

瓜蒌根兩 青竹茹剉半升

右以水二升煮取一升二合去渣分二三服

妙香丸方見積熱條

治寒者熱

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕或到數條絞取汁服之良

海若陰陽易果得陰脈當隨症用之 若脈在厥陰當歸

四逆湯送下燒裨散 若脈在少陰通脈四逆湯送下燒

裨散 若脈在太陰四順理中丸送下燒裨散所用之藥

各隨其經而效自速也

猴鼠糞湯療傷寒病後男子陰易

韭白根把 猴鼠糞十四粒月頭尖者是

右二味以水五升煮取半升去渣再煎三沸溫服得效

未汗再服亦理諸般勞復

當歸白朮湯治婦人未平復因有所動小腹急滿腰膝四

肢不任舉動無力發熱者

白朮 當歸 桂枝 附子生

甘草 芍藥 黃芪 人參各二

生姜升

右咬咀水煎服食頃再服溫取微汗瘥

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰虛與神木加乾姜湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重日眩曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

加芍藥茴香等九五六服三日內約服九六七百丸服復生又用大建中按之大汗作而解

因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒烹下瀝酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧 一歲長幼病相似為溫疫 多眠多汗脈浮為風溫 一身及痛為濕 身反張為瘥

四時傷

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此四時正氣之序也冬時嚴寒方類深藏若能固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病惟傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病者為傷寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏

瘟疫

為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前日有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治有殊者要在辨其病原寒熱溫二者之異則用藥冷熱之品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同

冬溫應常紀者有三歲少陰同

天之政五之氣陽明司天之政終之氣厥陰司天之政終
之氣皆病冬溫其不應常紀而反常者則不可候之而隨
時變也 氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或
有至而太過者皆成病氣也

丹溪用補中益

氣通治四時傷

寒海虛用神木白

木通治濕冷渴

同傷寒方中寒不

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯
氣虛者四君子湯加參散劑血虛者四物湯加參散劑東
垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏
治風濕無汗者用神木湯有汗者用白米湯治剛瘧用神
木湯加羌活麻黃治柔瘧用白米湯加桂心苾米治風濕
用白米湯隨證加藥治中弱脈弦細乾遲者用黃芪湯此
皆與仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒同意也

丹仲景論傷寒而未及乎中寒先哲治冒大寒昏中者用
附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同
者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌
腠自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂
枝輩微表而安以病休不甚虛也若中寒則倉卒感受其
病即發而暴因其腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可
發溫補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如
中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

傷寒

冬為傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒即病者
謂之傷寒也 治法除濕暑瘧疾外皆傷寒法也

春為溫病

溫病

從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有壯熱為病者
此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變為溫病 春溫應常紀者有四歲少
陽司天之政初之氣太陽司天之政初之氣陽明司天之
政終之氣太陰司天之政二之氣皆病溫其不應常紀而

反常者不可候之
而隨時變易也

冬傷於寒春必溫病全文見

太陽病發熱而渴不惡寒

者為溫病治見

溫毒

陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒論見大法治見

春發班咳
嗽為溫毒

風溫

發汗不解身灼熱為風溫其證脈浮汗出身重多眠蓋其

病不獨見於春間故另立風溫門

診

尺膚熱甚脈盛躁者病溫也全文見夫精者身之本也故

藏於精者春不病溫

鑿

凡治溫病可刺五十九穴成註云所謂五十九穴者刺

兩手內外側各三九十二痛五指間各一九八痛足亦如

之頭入髮際一寸傍三分各三九六痛鬚上一顛會一髮

際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口靜人迎躁者取

也人迎謂結
喉動脈也

王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也

謂頭中行上呈顛會前頂百
會後項五穴頭第二行兩傍

五穴承光通大絡却王柳十穴第三行
兩傍陷泣目窓正營承靈腦空一穴也

大杼膺俞缺盆

背俞此八者以瀉胸中之熱也

氣衝三里巨虛上下兼

此八者以瀉胃中之熱也

雲門髃骨委中髓空此八者

以瀉四肢之熱也

五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱

也謂背第五行兩傍髃戶神
堂竟門意舍志室十穴也

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮紫者溫病也春

月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋

因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不

同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之

不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

煩躁發渴脈實大便秘澁者大柴胡湯微利之虛煩用竹葉湯次第服之

仲景活人論溫病不同

仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒各不同當以仲景為正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根升一

黃芩

芍藥各半

甘草炙

桂心各一分

麻黃三分去節湯泡

右咬咀每服五升水一盞半棗子一枚煮八分日三服

三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

汗下後過經不為解亦為溫病

傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也

經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而

取之如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽

陽溫病也如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺脈

俱長者陽明溫病也如胸脇痛汗下後過經不愈診得

尺寸脈俱弦者少陽溫病也如腹滿噤乾診得尺寸脈

俱沉細過經不愈者太陰溫病也如口燥舌乾而渴診

得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也如煩滿囊縮診

得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而

取之隨其症而治之如發斑乃溫毒也

夏為暑病

太陽中暍者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細訖遲小便

已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥

若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

太陽中熱暍者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯

主之活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面垢手

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

中暍忘汗下溫針

惡寒身熱而渴者白虎加人參者一物

瓜蒂

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七七箇以水一升煮取五合去查頓服

右瓜蒂湯後資罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

暑病有

中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以

此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以

脈虛 又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪或用清暑益氣湯

脈其身

活夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病

為熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗

宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月

藥性須帶涼不可大溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至

前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一

兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處

非西北之北夏月服之必有發黃班出之失熱病三日外

與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝

石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可

代麻黃青龍証用也若二月至夏為晚發傷寒梔子升麻

湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊

為麻黃青龍證

桂枝半兩

石膏一兩

黃芩兩

甘草兩

梔子錢 白芍藥 升麻 乾葛

生姜三分

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去查食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地切碎 梔子銜 升麻一兩 柴胡

石膏略半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更作

服虛身 熱惡寒 為中暑

恒靜而得之為中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納涼於深堂大厦得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也海藏云

暑惡寒 脈沉細靜而濕勝傷形者白虎加蒼朮湯主之 頓散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也

動而得之為中熱中熱者陽證為熱傷原氣非形體受病也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必

苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之海藏云 暑身熱脈洪大動而火勝傷 氣者白虎加人參易主之

困中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重其脈微弱按之無力白虎湯主之方見 發熱

困有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷者又云其脈弦細芤遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱麗亦云中暑脈微弱則虛可知

海脈虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之方見
酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發
渴者

黃連酒浸以無灰

右為末糊丸熱水下二十九胸膈涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮二兩 生姜兩 棗子五枚 甘草炙半兩

人參錢 竹茹升

右分五服每服水一盞二分煮取八分去渣熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒方見

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快方見

海若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生姜湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

莖中痛宜服下方

蒲黃紅 滑石伍 生甘草一

中暈脈弦細扎遲黃芪湯主之

人參 黃芪 白朮 甘草

茯苓 芍藥各等分

右咬咀每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分去渣
溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴

予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛

遂以人參竹葉作湯調辰砂四苓散八貼而安

雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥

不能治當灸大椎穴

脛冷腹滿頭痛

活濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛言其人常傷於

渴而死
熱者濕

濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗亡出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼木湯主之

本癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷謔語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼木湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪悞用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑

而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中暑逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漿未嘗乾每服此藥二三盞即愈海濕溫汗少者白虎加蒼木汗多者白虎加桂枝白虎加桂枝方見

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷平膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力眾醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥子用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之白虎加蒼朮湯是也

蒼朮兩半

石膏錢

知母半錢

甘草錢

右咬咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜枯

梗散此非濕溫証乃熱病也

桔梗散

薄荷

黃芩

甘草

梔子各一錢

桔梗三錢

連翹二錢

右判毋服五錢水煎加竹葉如大便澀加大黃半兩

消暑丹

半夏斤

茯苓斤

生甘草半斤

右以醋五升煮半夏盡醋熬乾姜汁作糊無見生水為丸每服五十九丸熟水咽下精意修治用之極效 中暑

為患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此 若痰飲停節並用生姜湯下入夏之後不可缺此

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

藜蘆粉四兩

石膏四兩

白礬一兩

硫黃各一兩

水浸餅為丸彈于大辰砂為衣用姜汁醋點新汲水化開服之

丹暑風挾痰挾火實可用吐法

玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃

硝石

滑石

明礬各一兩

用無根水調九

秋為瘧

百傷於暑秋必病瘧治法見

診脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧

歲長幼疾狀相似為瘟疫

春應煖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非

其特而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時

行瘟疫病也論見

瘟疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則特行之氣俗謂之天

行是也老君神明散務成子螢火九聖散子收毒散不拘

日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也

升時之老君神明散治瘟疫

白朮

桔梗

細辛

附子

烏頭四刀炮
去皮尖

石五味為粗末縫絹袋繫帶之居閭里皆無病若有疫

癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄

三寸匕以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書特毒流行用聖散子者

一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫

之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時氣不

入

草豈蔻十箇剉裹
煨去皮

猪苓去

石薑蒲

茯苓

良姜

獨活去

附子炮製去
皮

麻黃根

厚朴去皮
姜製

藁本

芍藥

枳殼去穰
去炒

柴胡

澤瀉

細辛

醫方類聚

五

防風去

白朮

藿香

半夏

吳茱萸湯洗

蒼朮

甘草各半

右咬咀每服五錢水一盞半煎取八分去查熱服餘查再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

非時之
挽者寒

汗衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

人中黃

滑石

香附

蒼朮

右麩糊爲丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣

虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳

湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本藥清臘月截淡竹去青皮浸透取汁治天行熱狂熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少

酒取無灰酒一處研去查溫服須更大瀉毒亦隨出雖十

分渴亦不可飲水飲水難救

右三方熱多裏多者宜之

雄黃丸治疫不相染

法

雄黃研

赤小豆炒

丹參

鬼箭羽

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服空心以溫水下五

丸可與病同床共衣亦不相染矣

活務成子螢火是主辟疫疾惡氣百鬼虺狼蛇虺蜂蠆諸

毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽去

蒺藜去

雄黃

雌黃各二

礬石汁 蠶 羚羊角

鍛龍灰

鐵錘柄入銀處燒用一分半

右九味搗為散以雞子黃并雞冠一具和之如杏仁大作三角縫囊盛五九帶左臂上仍可掛於戶上

春涼

春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之溫病

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射干湯半夏

夏水

桂枝甘草湯選用之

調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯

熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈闕脈數

宜下之

大黃去皮

黃芩

芍藥

葛根

桔梗

茯苓去皮

藁木擇真者不見

白朮

甘草炙已上各半斤

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之

快利便止小兒減與服虛冷不壯熱但下利或霍亂者不宜服此

射干湯見

半夏桂枝甘草湯方見

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯方見

汁調五苓散白虎蒼朮湯見

丹冬溫為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閑藏

而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於

中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用

治瘟毒用此藥一味入補藥帶表同煎服之

活冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜姜桂湯方見

多眠多汗脈浮為風溫

陽脈浮滑陰脈懦弱更遇於風變為風溫論見

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗

診

出身重多眠睡鼻息必齟語言難出若被下者小便不禁
直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時痰癡若火
蕪之一逆而引日再逆促命期經云傷寒發汗已則身涼
若發汗已身灼熱者非湯
寒乃風
溫也

風溫續法

風溫忌
食八
活風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必
喘四肢不收嘿上但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即
譖言獨語內煩躁不得臥若驚癇目亂無精如此死者醫
殺之耳 風溫忌發汗宜萎蕤湯身灼熱者知母乾葛湯
如渴甚者括蕞根湯脈沉身重汗出者漢防已湯
萎蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱領眩痛
喉咽乾舌強曾內疼痞腰背強

葛根三

萎蕤三

石膏一斤
碎

白芷半

麻黃用沸湯
泡半日

羌活去芦
一兩

川芎三

甘草炙
兩

杏仁去皮尖
仁者半日

青木香一

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母乾葛湯治風溫身體灼熱甚者

知母三

葛根八

石膏六

甘草

黃芩

木香

升麻各一

萎蕤三

南星二錢
主

人參

川芎各

麻黃去
煎

防風

杏仁

羌活各二

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去查服

防已湯治風溫脈浮身重汗出一方无
人參

防已三

甘草

黃芪各一

生姜二

白朮三

人參一

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去查飲訖仍

坐被中汗出如虫行或被臥取汗出許李士云風溫誤汗用防已黃芪湯

海歲以日木加蕤代萎

海治風溫活人本方萎蕤湯以有麻黃不敢用宜白木湯

主之方見前太陽病發熱續注若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡礪

若腰背強硬者加羌活若舌乾發渴者加人參若身

灼熱甚者加知母若身體重多汗者加黃芪若內傷

冷者不加

○一身盡痛為濕

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身痛脈

沉為中濕脈浮為風濕亦通治法見太陽病本論

○身反張為瘧

有汗為柔瘧無汗為剛瘧治法見本論

○婦人傷寒熱入血室娠後

○熱入血室

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲

身涼胸膈下滿如結胸狀謔語者此為熱入血室也

期門隨其實而瀉之東垣云妄見妄聞夜夢亡人皆肝木火盛而為邪也刺期門與此義同

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣

藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲

不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可矣予不能針請

善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸

也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水

適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受

邪則謔語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦

人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以

為月水既妊則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳

血結胸者刺期門

血熱

濕病有

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於臆中結於乳下故
手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

書明了
夜譫語
胡者小柴

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀
者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈活人云小柴胡知之

○犯胃氣謂下之犯
上二焦謂發汗也

衍有一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而滑寸稍
大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經
水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按
其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂乾姜一
日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛
痊身漸涼脈漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云
我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日
又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢
攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中
有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘
虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味
子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為
熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之
熱入血室續法

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室經脈傷
寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之
婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐
熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝半 芍藥半 生姜半 大棗六

預防
熱入
血室

右劉細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱人血室宜麻黃加生地黄湯

麻黃二兩 桂枝半兩 甘草半兩 生地黄一斤

杏仁二十五箇 去皮尖

右咬咀每服五錢水煎

活婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘡狂言見鬼宜用乾姜柴胡湯

柴胡四兩 括蕪根半兩 桂枝半兩 牡礪兩

乾姜各 甘草各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服初服微煩再服汗出而愈

羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來

日明夜則謔語如見鬼神亦治產後惡露方

柴胡一兩 人參二兩 黃芩各 甘草各

半夏湯洗七次 生地黄各七錢

右為粗末生薑一片棗二枚同煎

雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二兩 黃芩七錢 人參二兩 半夏六錢

大棗三枚 甘草各七錢 牡丹皮二兩

右劉細每服一兩生薑同煎

桃仁承氣湯方見畜血

加稍黃

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而得於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡二

黃芩七錢

半夏五錢

甘草五錢

大黃

芒硝各七

大棗三

生姜七錢

右剉每服一兩生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若脈不沉數即不可下

哮喘者
先化
後除熱

本辛亥中寓居毗陵太守官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此血室之證也仲景云婦人正風發熱惡寒經水適來晝則

明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室證也

不脫以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上院喘急息高昏

冒不知人事當先化其痰後除其熱予急以一呷散投之

兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黃湯二服

而熱除不汗而自解矣

雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標

病少陽本病經水適斷桂枝加附紅花湯

桂枝二兩

芍藥

生姜各一

甘草一兩

附子炮

紅花各五

右剉細各每服一兩水三盞煎服

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水

過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草

芍藥

生地

川芎各一

表除汗
解經多
者甘草
地芎

自汗身
涼給附
者桂枝
花

右吹咀每服一兩水三盞煎至一盞半去渣入髮灰五錢調勻温服不止者刺隱白

續增妊娠傷寒

潔黃芪解肌湯治婦人妊娠傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎

甘草炙五錢 芍藥六錢 加蒼朮生地亦可

右為粗末每服五錢水煎温服無時

海若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮

而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯四 桂枝 地骨皮各七錢

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯四 麻黃 細辛各半

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛有太陽

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯四 防風 蒼朮各七錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如綿紋宜升麻六合湯

四物湯四 升麻 連翹各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少湯症也宜柴胡六合湯

四物湯四 柴胡 黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本

病也急下之宜大黃六合湯

四物湯四 大黃五錢 桃仁去皮尖十箇

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四 人參五錢 五味子五錢

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯四 厚朴 枳實各五錢

大法以參芪回汗下之藥佐之

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯加 梔子 黃芩各五錢

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯加 石膏 知母各五錢

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯加 茯苓 澤瀉各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯加 琥珀 茯苓各五錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯加 阿膠 艾各五錢 一方加甘草同

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲小病也宜附子六合湯

四物湯 附子 桂

若始娠傷寒畜血證宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

之 四物湯加 生地 大黃酒浸各五錢

婦人始娠或畜血當桃仁勿妄施要教子母俱無損太

黃四物對服之

安胎方

丹施孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩蓋其性急又當臨月

黃芩半錢 陳皮 白木各一錢 蘇梗三錢

木通 枳殼炒各五分 麻黃二分 甘草炙二分

桔梗 蒼朮各半錢 水煎服無時

雲婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸湯

桂枝 芍藥 當歸各一兩

右剉細末服一兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰病也
宜芍藥湯

芍藥

白朮

甘草

茯苓各一

右如前修服

治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參

白茯苓

阿膠炒

桑寄生

白朮各等分

右搗羅為細末糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散

白朮

黃芩各等分新

右為末每服三錢水一鍾生姜三片大棗一枚擘破同

煎至七分去渣溫服但覺頭眩從熱便可服二三服

瘧惟四肢厥冷陰症見者不可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白十

生姜二刀

右剉水二盞煎至一盞連服取汁

海葱白一物湯用葱白二把以水一升煮熟取汁令食盡

亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥心不離大黃黃芩 若月經適來適斷者不

離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩 若

發汗者不離葱豉生薑麻黃旋覆 若頭痛者不離石膏

山梔前胡 若傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏 若滿

悶者不離枳實陳皮 若胎氣不安者不離黃芩麥門冬
人參 若斑發黑者不離黃芩梔子升麻

雜方

大治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細未調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方 井中泥塗乾即易之 二方出本草有效

又方 浮萍 朴硝 蛤粉 藍根 大黃微

右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

治妊娠霍亂二方 附少陰吐利

治妊娠發狂變為黑色宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁各二 大青

杏仁各十

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白二寸煎至一盞

去查溫服

產後傷寒

一

產後中風數十日不解頭微痛惡寒時有熱心下悶乾

嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯 即杜枝湯方見大陽病

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉一 葛根三 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草各 附子一枚

右咬咀每服五錢棗一枚姜五片水一盞半煎一盞去

查服溫覆使汗出若頭項強用大附子半錢煎藥湯去

沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷寒宜補

丹產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈

不足補氣 惡寒發熱又腹痛當去惡血 惡寒發熱乳

汁不通及臃者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四

服調下 有子當下用木通七草猪蹄汁調煎服

忌發表 忌苦寒

大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

腹痛者 去酒血

大凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是

血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或

四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏

之類竟不救者多矣

乳不通 皆宜厚 忌三引

玉露散治產後乳脈不行身體壯熱疼頭痛目昏痛大便 澀滯悉治之涼膈壓熱下乳

人參 茯苓 甘草各半 苦梗炒

川芎 白芷各一 當歸一 芍藥三

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚

便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

潔傷寒表裏攻發 有表證惡風惡寒者當發表每歲一

白木散惡寒 者神木湯 如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

春主溫屬木身溫當發汗海藏云神木湯 夏主長屬火身熱而

煩躁合大發散海藏云神木湯 長夏主化屬土及居四季

同當調其飲食海藏云四君子湯 秋主收屬金身涼內溫今微

下海藏云通瀉丸金花丸 冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而

寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外海藏云熱在內者調胃承氣湯

寒在內者 謂中湯丸

潔凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升

浮則順發之氣收藏則下之 有汗發熱惡風脈浮緩者

風傷衛桂枝湯 無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮

緊者寒傷榮麻黃湯 有汗發熱惡風脈浮紫無汗發熱

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱淺深而治之有汗四肢厥脈沉微者名陰厥四逆湯無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉如四肢不斂身熱內外皆陽不動三焦宜涼藥三五服下之黃芩甘草湯黃芩白朮湯黃芩蒼朮湯黃芩梔子湯連翹飲子小柴胡湯八正散涼膈散白虎湯五黃散此上中下三焦藥宜選用之中暑脈虛皆惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脈緊熱在內者急下之口燥咽乾不大便是也無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏有汗身大熱者桂枝湯桂枝散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之發汗者宜用時暄暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之

錢傷風貪睡口中氣熱可欠煩悶當發散與大青膏也素古推道云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛也口中氣熱者當發散秋冬用溫熱藥春夏用涼寒藥

大青膏
天麻錢一 白附子生一錢半 蝎尾去毒生半錢 硃砂研一字七
青黛研一錢 天竺黃一字七 麝香一字七 烏梢蛇肉浸酒
焙乾取末半斤

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲
雄黃小束大研 蘿蔔根水 甘草末 川甜硝各三分
寒水石研細五分 腦子一字七 硃砂分五
石研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏發散貪睡口氣熱呵欠煩悶表症者蓋為二
歲已下小兒未能言者設也

尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之方見

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛

瓜蒌桔梗各一分生姜薄荷煎或加防風川芎各一分內

有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼

者加麥門冬傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防

風等分細辛羌活減半同煎

涎咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛体疼

壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

- 羌活
- 獨活
- 柴胡
- 人參
- 芍藥
- 枳殼炒
- 甘草炙各二兩
- 前胡

- 桔梗
- 天麻酒洗
- 地骨皮
- 白芷

右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服不拘時候

七宝散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

- 紫蘇葉
- 香附炒各三兩
- 陳皮
- 甘草炙

- 桔梗
- 白芷各一兩
- 川芎各一兩

右吹咀姜棗煎服

海麻黃上芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

- 麻黃
- 赤芍
- 黃芩炒
- 甘草

- 桂枝各二錢半

右為粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

- 升麻
- 葛根
- 黃芩
- 芍藥各五錢半

甘草一錢

右吹咀每服二錢水煎温服

右惺七散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋為三

歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而

知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗

惡寒第六方治有汗惡風

裏証

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水

不止而善食者可微下餘不可下也此裏症也緊古補遺云大熱飲水非食不

大便用大黃丸作散于子服之如清便自調貴不可妄下恐外熱遂於內而變結胸危証多第

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止有

下證者宜服之

川芎兩半

黑牽牛半斤

半斤

大黃兩

甘草半

大小便秘能食飲水為裏証

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十丸温蜜水下

乳後服以漉利為度未利加丸數

沉頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱回順散連翹飲

三黃丸主之回順飲連翹飲三黃丸並見痘門 身體潮熱頭目昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之洗心散見痘門

頭額身體温熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

之方見食之

潔如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝

濕藥白朮茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤熱者導赤散

錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則喘亂喘息哽氣長出氣

嗽兼腎則畏明各隨補毋藏虛見故也

大便白而酸臭為食積

小使不利宜利小便

傷風兼藏

兼用則傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發
散大青膏主之此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥无汗脈

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發散
大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服
溫驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去
脹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉治見吐瀉門治吐瀉用益黃
湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

薄荷葉半羌活 全蝎 麻黃味
甘草半 天竺黃 姜蚕 白附子炮各一分
右為細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝許

外

小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚風而
氣本實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發
之宜大青膏

肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後
發散風冷散肺瀉白散風大青膏主之若止傷寒則不
胸滿

腎虛則畏明宜補腎地黄丸有表者間用大
傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生
胃中津液多服白朮散 小兒結熱於口乾而渴身黃
體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯
大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之

右三方白朮散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白

嗽分虛實

虎湯

為未經下而能食不大便者設也

潔傷寒咳嗽吐清

氣長出氣是肺之不足也合用阿

膠散面白如枯骨

身熱咳嗽吐痰者常用備

銀丸

方見咳

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為哽氣長出氣者設也

編銀丸治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒

而嗽者常用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是

也

陰厥陽厥見大法條

厥分陰陽

潔身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘔門

湯傷寒嘔者枳殼半夏湯

枳殼

半夏各半

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉

厚朴製

半夏製

甘草炙

陳皮

蒼朮各等分

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚煎至二分去

查溫服

潔大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱見癖門

潮熱

有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸方見小兒積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有

表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘

二方治表寒而吐也

自汗為虛

湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參

地黃

黃芪兩

白芍三

甘草

人參

右咬咀每二錢水半盞煎至三分去查服

診 小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘

息 兩手脈洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口鼻

水 眼赤黃 口乾澁 咳嗽 山根青色 噴嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱

為斑疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與

傷寒表證同治者悞也當作功疹治之

○溫病 溫病者春日之溫病而不一也

田春日溫病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不

解煩渴用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七

大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

○傷寒拾遺

○和解因時法

○溫中法

○灰包熨法

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表

散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻

黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於

韓祗和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時

之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之

末也韓祗和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今

編祗和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云

脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

祗和改
用仲景
法因時
世

寸脈定
發表隨
氣候立
方

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳

關力齊等未可發表

病人二三月已前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症為先脈為後治傷寒病以脈為先證為後

不見此症

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若關前寸脈力小關後尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之調脈湯

葛根兩一

防風

前胡去苗三分

甘草炙半兩

右為粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前方小加葱三箇同煎

葛根柴胡湯

葛根一兩半

柴胡去芦一兩

芍藥

桔梗

甘草炙各二分

右咬咀每服一錢水一盞生姜二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前方小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯

人參

桔梗各三分

麻黃去節一兩

石膏兩三

甘草炙三分

見中風
脈未見
中風症
亦宜和

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如
寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

病人兩手脈浮數而緩名口中風若寸脈力小尺脈力大
雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和
之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主
之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋
已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷兩

葛根兩

人參二分

甘草炙半兩

防風去芦十兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五
服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風去芦一兩

桔梗錢

甘草炙半兩

旋覆花兩

厚朴分

右咬咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五服

寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香芎湯

川芎分

石膏兩

升麻兩

甘草炙半兩

厚朴製半兩

右咬咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸
脈力尚小加細辛二分同煎

前一段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病
三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見
而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

寸小於
尺宜消
陰助陽
表涼

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此
名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也
素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以
治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節一兩

葛根七錢

人參五錢

甘草錢五

蒼朮七錢

右咬咀每服三錢水一盞煮二枚煎七分熱服如三五

服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風猶

汗者加丁香皮半兩一方又加荆芥七錢

七物柴胡湯

柴胡二兩

蒼朮

荆芥

麻黃兩

甘草錢七

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊棗三枚同煎七分熱

服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如二五服

後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯

麻黃去節一兩

蒼朮兩

人參

當歸各半兩

甘草錢三

丁香皮分

右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊棗三枚同煎至七

分去查熱服如二五服汗未止猶惡風者加桂枝三分

如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

小大於尺豆消

陽助陰表藥

病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者

此名陽盛陰虛也若發胃悶口燥咽乾者乃是邪氣在表

消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯

主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至

立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參兩

芍藥分

石膏兩

柴胡

甘草錢三

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五

前胡湯

芒種

後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祗和方補之傷寒便覽有前胡湯方用石膏一兩前胡半兩竹茹

黃芩知母山梔大青各三錢姜葱煎服疑卽是此

石膏湯

石膏三兩

芍藥一兩

升麻三

黃芩三

柴胡一兩

甘草三

右咬咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三

五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

尺寸俱

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此

是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可

川葉平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明

已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋

宜知母湯主之

石膏一兩

麻黃三

甘草三

升麻各半

右咬咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去查熱

服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯

甘草各半

芍藥一兩

石膏三

荆芥穗一兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜一塊煎至七分去查熱

服如三五服後猶惡風者每服加生姜一塊同煎服

知母湯

知母

石膏

麻黃

升麻各一

甘草各半

右咬咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去

查溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩

前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈

症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

中風傷
寒作一
法治

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此
二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨
髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外
傷風而引內邪出及乎內邪既出而為病一也古人云立
此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒
脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也
病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依
脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病症甚
可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如
症依前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出
勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

海藏云韓氏微旨可汗一篇和解因時法言傷寒之脈
頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思川保命新書亦分及

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈
俱浮而緩緊則為傷寒無汗緩則為傷風白汗又有傷寒
有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣
惟韓李所言頭小尾大即為傷寒尾小頭大即為傷風人
病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述為和解因時法也
又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數
條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時
故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之
平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗
一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也
又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷
寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷
寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若欲冷舉按全無也若果寸口舉按全無即不可解表只宜溫中不可不知

○韓氏溫中法

陰死
夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其餘目自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及為則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方總見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多對證不可不傳焉
病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之若立春已後至清明已前宜溫中湯主之清明已後芒種已前宜陳皮湯主之芒種已後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

丁香兩一

乾姜炮

白朮

陳皮

丁香各二錢

厚朴制一兩

右為細末每服二錢水一盞葱白三寸荊芥五穗煎至七分去渣熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜各二錢

陳皮湯

陳皮兩一

藿香錢三

白朮

葛根各二錢

厚朴製一兩

右為末每服一錢水一盞姜一塊同煎至七分去渣熱服如三服不快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂枝各半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸

白朮錢五

乾姜錢二

人參錢七

桔梗錢七

乾葛錢七

藿香葉錢五

甘草錢二

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九水一盞煎八分分查熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生薑各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也更不須候寸脈短治之或胃膈滿悶身體拘急疼痛手足逆冷速宜溫中藥和之若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之清明已後至芒種已前宜白朮湯主之芒種已

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸兩半

丁香兩半

厚朴製一兩

細辛二錢

人參七錢

甘草半兩

乾姜炮半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸煎至六分和查熱

服三服後脈尚細及寸脈尚細無力者每服加葱白三

寸同煎服

白木湯

白木

半夏

當歸

厚朴製

乾姜炮各半兩

丁香七

右為末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱

服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服

加葱白三寸同煎服

橘皮湯

橘皮酢

藿香

葛根

半夏

厚朴製各半兩

右為末每服三錢水一盞生姜如東天同煎至七分

查熱服三五服後脈尚小手足逆冷者加細辛半兩

病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是

停飧宜二苓湯

赤茯苓

木猪苓

白木各半兩

滑石一兩

通草

白芷各二錢半

丁香七錢

陳皮兩半

桂枝錢五

右為末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未

快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏半兩浙浙惡寒甚每

服加葱白三寸

灰包熨法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過

上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消遂得上焦

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用
溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二
三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹
置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛為
度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰
包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是
陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此為陰盛當用藥以
消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參

白朮

厚朴

陳皮

藜香

當歸

細辛

水湯亦同治陰躁而渴不可慢用涼藥若熱藥冷湯

有伏陽則可若脈已虛按之全無力或病人素無食
只可溫服

內閣文庫			
三〇	二	二四九	漢
函	二	九	書
二	三	一	
架	冊	號	類