婦人方全良方 二十二之二十四

拾意堂藏

新編婦人大全良方卷之二十二

粘連書籍

產後傷寒方論第一

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作祟血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必效如玉露散（方見十八卷第三論）或四物湯加北柴胡等分煎服或以生地黃易熟地黃人參輕骨散（人參當歸散秦艽鱉甲散不學無聞總見產後發熱不退便以為熱入血室便以小柴胡湯竟不救者亦有用竹葉石膏湯而死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度枉

傷人命殊不知此等疾狀是產後去血過多而陰虛発熱亦有寒極生熱但以上件之藥以脉證選用無不獲安若是陰陽不和作寒作熱宜增損四物湯如敗血不散者宜奪命丼大調經散五積散加醋煎却放（詳見三十二論）王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰陽俱虛亦有時気之類雖當發汗如麻黃證不可用取汗毋勞過多以意斟酌夫人觸冒寒気而為病者謂之傷寒產婦血気俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則淅淅惡寒翕翕發熱頭項肩背節皆痛至七八日乃差也婦人產後之血汙多故名鬱冒其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而心冒冒家欲解必大汗出所以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以為產婦血汙出者亡陰血陽気猶盛故當汗出陰陽乃復方可用小柴胡湯加生薑芎藭甘草人參輕骨散神仙百解散（並見和劑局方）

人參當歸散　治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱曰煩其證心胸煩悶吸吸短気頭痛悶乱骨節疼痛晡時轉甚與大病虛煩相類急宜治之

人參　當歸　桂心　麥門冬去心各一兩　生乾地黃

白芍藥二兩

右㕮咀每服四大錢水二盞先將粳米一合淘竹葉十片煎至一盞去米竹葉入藥并棗二枚煎至七分去滓溫服虛甚者用熟地黃治婦人草蓐中傷風四肢若煩熱頭疼與小柴胡湯若頭不疼但煩者三物黃芩湯

黃芩半兩　苦參一兩　生乾地黃

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服虛甚者發寒熱一飲食少腹脹等疾

增損柴胡湯　治婦人產後虛羸發寒熱一飲食少腹

柴胡二兩　人參　芍藥

半夏　甘草　橘紅

川芎各一分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分去滓溫服

竹葉防風湯　治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭痛宜服

淡竹葉半把　防風　人參

桂枝　甘草各半兩

葛根一兩半　若梗三兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分去滓溫服使汗出頭項強用附子炮去皮臍剉如豆大朮一錢同煎嘔者加半夏煎服

陽旦湯　治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡

寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

桂枝 芍藥各三兩 甘草各二兩 黃芩二兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服無時候自汗者去桂加枳實附子一枚渴者去桂加括樓根三兩下痢者去芍藥加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩

虛勞裏急者正陽且湯主之並時入膠飴為佳

若脈浮緊無汗發熱者莫與也

治產後惡露方下忽聞耳斷絕晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由為熱入血室不即治之諸變不測宜服柴胡地黃湯方見第六卷論中

四物湯

加北柴胡

芍藥湯 翼子金 療產後內拘急疼痛

桂心 三兩 牡蛎 白芍藥各七兩

黃芩二兩 千金翼云若通身熱加黃芩 生乾地黃五兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

千金蜀漆湯 產後療虛熱往來心胷煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆五兩 生地黃一方蜀漆栗 桂心 甘草 黃芩各一兩 知母 芍藥各二兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服

産後頭痛方論第二

夫人頭者諸陽之會也凡産後五藏皆虚胃気弱飲食不充穀気尚全則令虚熱陽気不守上湊於頭陽實陰虚則令頭痛也○又有産後歇血頭痛不可不知黒散丹言之甚詳

川芎散 治産後頭痛

川芎等分

右為細末每服三錢秤錐淬酒調服

芎附散 治産後歇血作梗頭痛諸藥不効者 徐仲先生傳

大附子一枚臘醋一椀用火四畔炙透蘸醋去盡去皮臍川芎為細末每服二錢水一盞煎七分調下

一奇散 治産後頭疼

取當帰川芎為細末每服二錢茶清温服

産後咳嗽方論第三

夫肺者主気因産後血虚肺経一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或湿皆令人咳嗽也○若産後哮喘太早而咳嗽者難治産後血気不通咳嗽者何若曰産後咳嗽多因食熱麪塵網或熱痛或有気塊発時衝心痛気急咳

嗽四肢寒热心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸気虚
肢體無力宜服前方真[黒神散]五積散加棗煎服
二母散 治産後悪露上攻流入於肺経咳嗽宜服
此藥如傷風疾嗽却以尋常傷風藥主治
集驗療産後感風傷寒咳嗽多疾唾粘睡宝
知母 貝母各半 人參 桔梗各半 桃仁 杏仁並生去皮各一分
甘草 生麥門冬 生地黄各十分 款冬花四分
右為細末每服三錢水一盞半煎至八分無時
温服如覺腹痛脅脇痛者加芍藥之有神效
[敖]二合 [無]忌白芍藥

右咬咀每二升煮取七合去滓食後分二服
経効療咳嗽多疾唾粘気息
前胡 五味子 紫苑
貝母各六分 桑白皮
茯苓各八分 淡竹葉二十片
右咬咀水二升煎取八合去滓食後分両服
療産後咳嗽気喘
百部根 苦梗各六分
乾百合 赤茯苓各八分
右咬咀水二升煮取七合去滓食後分両服
産後喉中気息喘促方論第四
論曰産後喉中気息喘促者何若曰榮者血也衛

者气也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛
曰產門下過多榮血暴竭衛气無主猶聚肺中故
令喘也此名孤陽絶陰為難治若惡露不快敗血
停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹方見十八卷第四論
中血去喘自定
評曰產後急回可畏若是敗血上熏於肺猶
可責効奪命丹若感風寒或因憂怒飲食醎冷
等奪命丹未可均治況孤陽絶陰子若榮血暴
絶宜大料煑芍藥湯亦自可救傷風寒宜旋覆
花湯性理欝發宜小調絰散用桑白皮杏仁煎
湯調下傷食宜服見現圓五積散
芍藥湯方見第二卷第十五論又名佛手散

旋覆花湯治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿瘧涎
壅盛坐卧不寧
旋覆花　赤芍藥　前胡
半夏麴　荆芥穗　甘草
茯苓　五味子　杏仁
麻黄各等分
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎
至七分去滓食前温服有汗者莫服

小調絰散方見第十卷第一論
五積散方見和劑見現圓方見十一卷
參蘇飲治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者
甜氏

人參（一兩別本作末）　蘇木二兩

右以水兩碗煮取一碗以下去滓調參末隨時加減服神效不可言

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五

產後口鼻黑氣起及鼻衄者何若曰陽明者胃脉之海起於鼻交頞中還出頰曰交人中左之右右之左產後氣泊血散榮衛不理散亂入於諸絡却還不得故令口鼻黑起及竅鼻衄此緣產後虛熱氣生此證其疾不可治故不出方

經驗方云遇有此疾急取緋線一條并產婦項心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可療亦厭穰之一端也

海上方治產後鼻衄中風以荊芥為末童子小便調下二錢匕　第六

產後咳嗽方論第六

夫肺主於氣五藏六腑俱稟於氣產後則氣血傷虛腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛襲冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不噯則咳嗽也脾者主中焦為三焦之關五藏之倉廩貯損水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也絡云吃嗽者胃寒所生服藥無効者矣胡門三壯必愈胡門穴見六卷

丁香散治產後心煩咳嗽不止　第十論

丁香
右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散 出婦人經驗方 治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思飲食
石蓮肉炒 白茯苓 丁香 各半兩
鄰柱心半兩 生薑汁二合
右同煎取二合以大先多者摩令有熱時塗菓產竇瘡產後咳逆三日不止欲死
汁盡妙
產後咳逆方

乾柿一箇
右切碎以水一盞煎至六分熱呷
又方古鏡黨三四箇水一小瓶煎至一半熱服並產出
羌活散 治欬逆出肘後方
羌活 附子炮 茴香炒各半兩
木香 白薑炮各一分
右五味為末每服二錢水一盞鹽一捻煎一二十沸熱服一服止
產後血崩方
論曰產後血崩者何若曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸醎不

節傷盡榮衛气血衰弱亦衰崩中若小腹滿痛肝
經已壞為難治急服固絰圓以止之

固絰圓方

芡葉　赤石脂煅　神骨脂
赤贓兩各半　附子炮一箇

右為末陳米飲和圓如梧桐子大食前温酒下
二十圓米飲亦可許詳曰血崩不是輕病況產後
有此是謂重傷恐不止鹹醎不節而貯致之多
因驚憂恚怒臟气不平或產後服澁血藥早致
惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經圓自難責
效不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證
諸藥治之為得

芎藭湯加芍藥方

芎藭　當歸　芍藥等分

右㕮咀每服四錢水盞半煮取七分出滓無時
撚服

熟乾地黃散　治產後崩中頭目旋運神思昏迷四
肢煩亂不知人事

熟乾地黃　伏龍肝　黃耆
赤石脂各一兩　阿膠　甘草
白朮　芡葉炒　川芎
人參各半兩　當歸三分

右㕮咀每服三錢姜三片煎至七分去滓温服
白芍藥散　治產後崩中下血淋瀝不絶黃瘦虛損

宜服

白芍藥　乾姜
熟乾地黃　黃耆
烏賊骨　龍骨 酌一
鹿角膠

右為末食前溫酒調下二錢

又方

熟地黃　赤石脂 各一兩
牡蠣　鹿茸
桂心　當歸 各半兩
鹿角膠

右為細末食前粥飲調二錢

阿膠圓　治產後崩中血不止虛羸無力

阿膠　赤石脂 各一兩半　續斷
川芎　當歸　甘草

丹參 各一兩
烏賊骨
龍骨　鹿茸 酌多
鼈甲 一多兩各

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下二三十圓

菖蒲酒　治產後崩中不止下血

菖蒲一兩半

右細剉以酒二盞煮取一盞去滓分溫三服食前

瑞蓮散　治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 百枝燒存性
桂心 兩各一
槐膠 燒存性
當歸
鯉魚鱗 燒
川芎 各三分

檳榔 三枚

右為細末每服三錢煨姜酒調下如未止更進一服或非時血崩無藥可治但進三服即止

產後月水不調方論第八

夫產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於絡脉冷則血涸故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也

琥珀散 治產後絡脉不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

琥珀 當歸各一兩 牛膝 生乾地黃 桃仁 赤芍藥各半兩

右為粗末每服三錢水一盞姜三片煎至六分去滓溫服

薑黃圓 治產後虛乏不足胞心短氣腹內擊急腰背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃 當歸 熟地黃 牡丹皮 桂心 川芎 續斷 桃仁 赤芍藥 木香各一分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大食前溫酒下三十圓

產後月水不通方論第九 論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷

所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故今月水不通也凡血結月水不通則血結成瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也但於第一卷等十七論中求方

夫婦人衝任之脉為經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或一歲之內而月經未行此是常候即非病也何必通之諺云好婦產五箇月便絕行者皆是少壯血盛之人注受極易產乳必衰其子失乳必四肢低羸肚大青筋顯大

髮焦好吃泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脉虛氣血衰少而不能行者但服建脾胃資氣血之藥自然通行若以牛膝紅花蘇木乾漆蚯蚓等藥以通之則為害滋大經水枯竭則血以滋養其肉行乎初虛也所謂譬猶索禹金於乞丐之手雖挫楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之 自明補註

產後四肢浮腫方論第十

論曰產後四肢浮腫者何若曰產後數血乘虛停積於五臟循經流入四肢留注日深却墨不得腐壞如水故今面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣

治之凡治水氣多用導水藥極虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但服小調絰散血行腫消則愈

小調絰散方

芎藭　琥珀　桂心
芍藥　當歸烙一　細辛
麝香少許　蓽茇各半錢匕薑汁溫酒各少許調停
右為細末每服半錢匕產後浮腫多端有自懷胎腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血与氣搏留滯絡氣勿血勿不可不辨要當隨所因脈證治之宜得其情小調絰

治血勞固勿但力淺難憑不若吳茱萸湯扶湯奪魂散大調絰散皆要藥也

絰云產後肌冷拂皮酒服

加減吳茱萸湯

治婦人藏氣本虛宿挾風痰胸膈滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄不止少氣羸困及因生產藏氣暴虛邪冷內膲宿疾轉增

吳茱萸一兩半　乾姜
甘草　麥門冬　防風
半夏　細辛　當歸
赤茯苓　牡丹皮　桂心烙半
右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去滓食

前胜服
扒术汤治心腹坚大如盘边如旋盘水饮所作名曰气分

枳实一两　白术三两

右㕮咀每服四钱水一盏半煎至七分去滓温服中软即当散也

夺魂散　治产后虚腠喘促利小便则愈

生姜三两取汁　白芍三两　半夏七个

右以生姜汁搜芍药半夏为七饼干及焦熟为末水调一饼小便利为效

大调经散　最治产后腠满喘急烦渴小便不利妨

二十一卷第三十论中

又论曰夫产后劳伤血气腠理虚则为风邪所乘邪搏于气气腠也若皮厚如熟李状则觉为水腠气腠者发汗即愈水腠有利小便差也

溪防己散　治产后风虚气壅上攻头面浮腠

溪防己　桑白皮各一两　右为粗末每服四钱水盏半煮三片煎至七分去滓温服空心

扒散　治产后遍身青腠疼痛产后血水疾出妇人良方

乾漆　右各为细末以新瓦罐干中铺一重麦蘖一重

扒指方　南陆　甘草各三分

乾漆如此填滿用塩泥固濟火煅通赤
為散但是產後諸疾熱酒調下二錢
張氏方治產後血虛風腫水腫
澤蘭葉 防己 等分
右為末每服二錢温酒調下不能飲者醋湯調
亦可

產後腹痛及瀉痢方論第十一

論曰產後腹痛及瀉痢者何者曰產後腸胃虛怯
寒邪易侵若未滿月飲食當風乘虛襲留於肓膜
散於腹腸故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸
水穀不化洞泄腸鳴或下赤白脂膿腹脹或痛走
不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之禍
不旋踵謹之謹之

調中湯方

高良姜
芍藥
甘草 半兩
右為粗末每服三錢七水三盞煎至一盞去滓
熱服

當歸 桂心
附子 炮 川芎 各一兩

許曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既
云飲食當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜
怒憂思逕從自性況勞逸飢飽皆能致病若其
洞泄可服調中湯
類別有正方今錄桃膠散白薇翁湯以備用餘

從滯下門匿之

枇膠散 治產後痢下赤白裏急後重疳刺疾痛等證

枇膠（炙令焦）　沉香　蒲黃（炒令黑）　等分

右為末每服二錢食前陳米飲調下

白薇菊湯 治產後下痢虛極

白薇　菊花　阿膠（炙令燥）　各二兩

黃連（去鬚）　藥皮　秦皮　各三兩

右㕮咀每服四錢水盞半煎至七分去滓空心服

張氏方的奇散 治產後泄瀉不行此詮血滲入大腸為瀉分遍則血雖洞泄不禁下青黑色物亦驗因氣傷動用調中湯

荊芥穗者四五箇於盞內燃火燒成灰不得犯油次入麝香少許研滿湯一兩呷調下此藥雖微能治大病但勿急之

產後諸痢方

羹薤白食之

又方

羊腎脂炒薤白空腹食尤佳

又方

多肥羊肉食之

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十

論曰產後痢疾者由產勞傷脾臟不足日月未滿
虛之未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早
則外傷風冷亲虛入於腸胃若誤食生冷難化之
物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血
滲入大腸則為血痢難治泄謂之產于痢是也得
冷則白或如魚腦得熱則赤黃或膿血相雜若下痢青色則極
冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛
更加久痢不止無力瘦之甚見羸弱謂之虛羸下
痢又有產後气宇不順而下痢赤白謂之气痢治
之之法熱則凉之若則温之冷熱相搏則調之滑
者洪之虛羸者補之小數不分者當利小便若產
婦性情執著不能寬解須當順其気未有不安者
也治之各有方

深師療產後冷熱痢 萱連圓

黃連 六兩　烏梅 三兩　乾姜 二兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下三
十圓忌猪肉

經效治產後赤白痢腑下气痛

厚朴 八分　當歸　枳殼
訶子肉 各十枚　甘草 二分　肉豆蔻 五箇
薤白 三合

右水一升煮取九合空心分為三服

張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連四兩　阿膠　蒲黃
芍藥四兩　當歸一兩半　黃芩二兩
乾地黃四兩　艾葉二合
地榆四兩　當歸二兩
雞子黃二枚　酸榴皮三兩
右㕮咀以水六升煮取一升去滓內膠令消小冷內雞子黃攪令相得分六服日三夜一立瘥血止痢
赤白痢腹中絞痛
阿膠　艾葉各二兩
當歸　芍藥各四兩
右㕮咀以水五升煮取二升去滓內膠令消小冷內雞子黃攪令相得分三服日三夜一立瘥血止痢
赤白痢腹中絞痛
阿膠　艾葉各二兩
當歸　芍藥各四兩
乾地黃四兩
右㕮咀以水五升煮取二升去滓內膠令消小冷內雞子黃攪令相得分三服日三夜一立瘥血止痢
赤白痢腹中絞痛
阿膠　艾葉各二兩
當歸　芍藥各四兩
乾地黃四兩
地榆四兩
雞子黃二枚
右㕮咀以水六

黄連 六分　阿膠 六分　赤茯苓
當帰　黄蘗 各四
右為末煉蜜圓如梧桐子大粥飲吞下二十圓
空心
療産後下痢赤白有血
赤石脂　地楡 各六分
當帰四分　黄連
乾薑　甘草 各三分
右水二升煎取六合空心分作兩服
人參　葶藶 各八分
茯苓
甘草　橘紅
黄芩 各六分　當帰
赤石脂 三兩　甘草
白朮　當帰
秦皮 各二兩　黄連
乾姜
川椒　附子 各一兩
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二十圓
日三良忌猪肉冷水海藻菘菜
深師療産後下痢膿蠟湯
阿膠　當帰 各六分
粳米一合　蠟一枚如雞子大
黄連十分

又療産後下痢赤石脂圓　大治冷痢色青鴈溏
右為細末以飲調下方寸匕至七半日三

右細切以水六升先煮米令蟹目沸去米內藥煮取二升入阿膠蠟煮令烊分溫三服

千金療產後下痢腹痛當歸湯

當歸　龍骨各三兩　乾姜　甘草各二兩　附子　白朮二兩　川芎二兩

右八味細切以水五升煮取二升半去滓分為三服日三二日令盡忌猪肉冷水桃李雀肉毒物

廣濟療產後赤白痢腰下絞痛

當歸　芍藥　龍骨　黃連　地榆　艾葉

甘草　乾姜各六分　厚朴八分　黃芩

右㕮咀以水八升煮取二升半去滓分溫三服即差忌生冷油膩鹹海藻菘菜猪魚肉

又療產後赤白痢腰下氣痛

當歸八分　厚朴　黃連各十分　肉豆蔻五枚　甘草六分

右㕮咀以水五升煮取二升去滓分溫三服

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行服

痛時時下血桂枝湯

桂心　乾姜　甘草各二兩　赤石脂十兩　當歸三兩　附子一兩炮

療産後水痢
枳殻 四分
黄連 各六分
右水三升煮取八合空心分為三服
療産後水痢
黄連 六分
赤石脂
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲下
三十圓
療産後血痢
艾葉 三分
芍藥
阿膠 十分
黄蘗 八
黄連 七分
甘草 各六分
厚朴
當帰 三分
烏梅 五分
石榴皮
當帰 各四分
乾薑 三分
芍藥
厚朴 各三両
芍藥
不分
黄連
黄蘗 各二両
右水六升煮取二升分温二服
治産後羸困赤白痢疾心腹絞痛
薤白
當帰 二両
石榴皮
地榆 三分
黄連
右水七升煮取二升半分為三服
療産後気痢不止方
青木香 三分
訶子 敲 黄去核 八分
右為細末空心米飲調下方寸匕一方右縮砂
仁三味等分為細末入蜜一匙米飲調下二銭

療產後水痢　枳殼四分　芎朴　茯苓　黃連各六分　當歸三分

右水一升煮取八合空心分為三服

療產後水痢　黃連六分　烏梅十三分　石榴皮　赤石脂　當歸各四分　乾薑十分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲下三十圓

療產後血痢　芍藥三分　阿膠十分　黃連七分　黃檗　甘草各六分

右為細末粥飲調下方寸七

療產後下痢膿血相雜　赤石脂　五色龍骨　黃連各十分　阿膠　黃耆各六分

白朮五分　黃檗四分

右為細末飲服方寸七

砌砂煎圓　治一切積滯化氣消養補益真氣產後逐敗血補虛至善　砌砂揀通明無石者別研如粉　天雄用無灰酒煮五七百許候軟去皮　巴戟去皮　木香　檳榔　肉豆蔻炮　金鈴子去核　當歸各淨秤二兩　舶茴香炒　沉香各一兩

阿膠 半兩 米醋磨成膏入
右為細末以無灰酒煮白麪糊圓始梧桐子大每服三十圓空心日午温酒下此方家家有子家婦人常病蓐中下痢日久甚困篤百方不差士人李潛善醫曰蓐中痢与他痢不同常痢可用苦澁藥止之蓐中痢生於血不足投澁藥則血愈不行痢當更甚為子作硇砂法云此藥最能治產後痢先以桂圓小下之次投硇砂圓日九十圓利頓減半次日遂愈硇砂圓產後雖無疾亦宜服之能養血氣去積滯

桂圓方 沈內翰方

硇砂 桂心 甘遂

丁香 木香 巴豆 去心皮不去油減半 芫花 以硇砂炒焦已上等分

右為細末麪糊圓如菉豆大每服二圓三圓温水下加減更量虚實潛名醫也云此圓取積最勝不以久近皆能治酒化

又許仁則秘方

神麪末 五合 炒 人參 四分 枳殼 赤石脂 十分 白朮 各六分

右為細末米飲調下方寸匕

續命湯 療產後驟血不止

白蜜 一匙 生薑 一斤

右同煎候蜜色赤投童子小便一升去姜更煎

兩沸分為三次頓服之
療產後血痢小便不通腑腹痛
生馬藍莧
右擣取汁三大合煎一沸下蜜一合調頓服
療產後血痢不止
臭樗根 六分
又右為末水和圓如棗核大麪捏作餌飢無度者炙
二七箇熱吞之
療產後下血不止
桑耳 炙
茜根 炙
艾葉
苟藥 炙
地榆
牛角鰓
阿膠 各六分
雞蘇 各四分
白龍骨 十二分
右㕮咀以水二升煮取八合分三服

新編婦人大全良方卷之二十三

六日

產後痢疾作渴方論第一

產後痢疾作渴者水數之精化為血氣津液
論曰產後下痢作渴者水數之精化為血氣津液
以養臟腑腑臟虛燥故痢而渴若引飲則難止反
溢水氣脾胃既虛不能克水水自流溢浸漬皮膚
則令人腫但止其渴痢則自差
必加療產後痢而渴飲無度數

麥門冬十二分　烏梅二十箇

右細剉以水一升煮取七合細呷
經效療產後久痢津液竭渴不止

乾葛十二分　厚朴

黃耆　茯苓

麥門冬　各八分

生薑六分　右六味十四箇並細剉

右水一大升煮取七合空心分兩服

古今錄驗療產後劑曰久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜一枚

右以黃泥裹厚五寸煨令爛熟去皮攪汁服之

差

產後大便秘澁方論第二

產後大便秘澁者何咎曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日腹中悶脹者此有燥屎在臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁圓以潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

麻仁圓方

麻仁　杏仁　大黃二兩　芍藥　枳實　厚朴各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下二十圓未通漸加圓數不可大過

許曰產後不得利利者百無一生去血過多藏燥大便秘澁則固當滑之去黃似難輕用唯葱涎調膩粉為圓猴以葱茶下之必通

僕常以局方四物湯以生乾地黃易熟地黃加青皮去白芍藥服效

瘴產後五七日不大便切不宜妄服藥若宜用

麥蘗散方

大麥芽 炒 多少以

右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服

阿膠散圓 治產後虛羸大便秘澁

阿膠

右為末煉蜜圓如梧桐子大別研滑石末為衣

温水下二十圓半日以來未通再服

許學士三婦人產後有三種疾鬱冒則多汙汗則

大便秘故難於用藥唯麻仁蘇子粥最佳穩當

紫蘇子

大麻子仁

右二味各二合淨洗研令極細用水再研取汁

一盞分二次煮粥吸之此粥不惟產後可服大

抵老人諸虛風秘皆得力

千金療產後熱結伏倒不通蜜煎法

白蜜蜜香油慢火煎令稠硬鶴頂投卷承冷良久

取出搓如指長二寸內穀道中即通

產產後大便不通論第三

論曰產後大便不通者腸胃本挾熱因產血

水俱下津液燥竭腸胃痞澁熱結糞燥大

大便不通也

葵根湯 治產後淋瀝

葵根 乾者 通草各二兩 車前子一升

右九味㕮咀以水七升煮取二升半去滓下滑石

未寿云服以渫愚考之既有大黄亦可治大便不通故録于此更宜斟量虚實而投之

集驗療產後淋瘀燥須大小便不通

以為藥

右為細末煉蜜圓如梧子大每服十五圓圓方有甘草山梔仁、

桃花散治產後大小便秘澁

桃花

檳榔等方

檳榔柳等子 滑滑石

右為細末每服錢白湯空心調下

千金療產後遺糞方第四

廣濟療產後遺糞方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半錢亦治

男子

集驗方

礬石 枯

牡蠣 熬

右等方為末酒服方寸匕日三亦治男子

又療產後遺糞不知出時方

白斂

右各等方為末酒服方寸匕

千金方論第五

產後諸淋方

論曰產後諸淋因產有虛氣客於脬中內虛則起數熱則小便洪痛故謂之淋

又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血血即流滲於胞中故血瘀小便出而為血淋淋者如雨之淋也

三因論曰治諸產前後淋和其法不同產前當安胎產後當去血如其治熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之矍麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要

茅根湯 治產後諸淋血淋血問治熱膏石氣結悉主之

白茅根 八兩　瞿麥穗 白茯苓 各四兩　葵子 人參 各二兩　桃膠 滑石 各一兩　紫貝 燒十箇　石首魚頭中石 二十箇燒　甘中 各一兩

右㕮咀散每服四大錢水一盞半姜三片燈心二十莖煎至七分去滓溫服亦可為末水通煎湯調下二錢如氣壅閉未通搞皮煎湯調服

集驗療產後患淋小便痛

通草 三兩　大棗 二十枚　葵子 一升

白朮 一兩　榆白皮 五兩　石葦

黃芩 各二兩

右以水八升煮取二升半空心服溫呷千金有甘草生姜

療產後小便淋澁不通

葵子 一合　朴消 八分

右水二升煮取八合下硝分兩服

滑石散 十合 療產後淋

滑石 五分研 通草 車前子 葵子 各四分

右為末以漿水調服方寸匕至二匕為妙

療產後小便不通張不思方

陳皮一兩去白

右為末空心溫酒調二錢匕服便通

右炒為末和飲頓服立通

古今錄驗療產後勞傷熱大小便赤澁

雞蘇一方 通草 葵子 各八分

為藥

生地黃 十二分 滑石

右水三升煮取八合下芒硝空心分三服

療胵轉小便不通

滑石十二分 寒水石八分

右水二升煮取八合空心分三服

紙效療氣結氏淋小便熱淋引痛或如豆汁面色

瘕黃

貝齒 三箇 葵子 一合碎 石膏 十二分

滑石 八分

右水一升煮取八合下猪膽汁半枚合煎三四

沸空心溫服

療產後小便澁痛或血淋者

瞿麥　通草三兩　右以水七升煮取二升半分作兩服

療產後血淋

車前子　鼈甲末一兩　右水六升煮取二升下鼈甲末分三服

廣濟療產後卒患淋小便磣痛及主尿血

冬葵子一升　石葦去毛三兩　右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪醋物

療產後淋小便痛及血淋

白茅根五兩　冬葵子二合　瞿麥　車前子各二兩　右水二升煮取一升入滑石末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用塩於產腑中積可噢腑平却用葱白剝去麁皮十餘根作一縛切作一指寧安塩上用大艾柱滿葱餅子大小以火炙之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述出產乳集

通草三兩　大棗十二枚　冬葵子各二兩　黃芩　瞿麥各四兩　黃芩三兩

鯉魚齒一百箇　車前子各二兩

木通散 治産後小便不通

木通　大麻仁　葵子
滑石　檳榔　枳實　各半兩

右為粗末每服三大錢水盞半煎至七分去滓温服

産後小便數方論第六

夫産後小便數者此由胜内宿有冷気因産後發動冷気入腹虚弱不能致其小便故数也

桑螵蛸散 方十二重

桑螵蛸　三十箇
牡蠣　煆
鹿茸　酥炙
人參　黄耆　各三兩
厚朴

赤石脂　各二兩
右為末空心粥飲調下二錢外臺方無厚朴石脂有甘草生姜

桂枝湯 集驗療産後小便數無渴

桑螵蛸　甘草　並炙　黄連　各二兩
生姜　桂枝　根　人參　各三兩
大棗

右細切以水七升煮取二升半分三服忌猪肉冷水

産後小便不禁方論第七

廣濟療産後小便不禁

以雞尾毛燒作灰細研温酒調方寸匕服日

又方

桑螵蛸半两炒　龙骨一两

右为细末食前粥饮调下二钱

千金翼療產後遺尿不知出

白薇

右等分為細末以酒服方寸匕日三服

固脬散　治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

黄絲絹自然汁煮黄者不用染成者三尺以炭灰極化烟用清水洗去灰令尽入

黄蠟半两　察一枚　鳥尿勃一合　末二钱

右用水一升煎至一盞空心頓服服時飲气服之不得作声聲如作聲無效

夫產後損於血气血气虚而挾於热血得热則流散滲於脬内故血隨小便出

治小便利血方　亂髮淨洗燒成灰研細　右米飲調服方寸匕一方有滑石等分每服一錢生地黄汁調下

療產後大小便不利下血

車前子　蒲黄

三月生地黄　牡蛎　等藥各六分

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

崔氏療產後血滲入大小腸

車前子草汁一升

右相和煮一沸分為兩服

產後陰脫玉門不開方論第九 分八卷 第十八論通用

三因論曰婦人趣產勞力努嚱太過致陰下脫若脫肛狀及陰挺下出逼迫腰痛舉動房勞能發作清水續々小便淋露

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊骨 各半兩 五味子 一分 千金翼用

右為細末研令極細摻患處日三易

當歸散 治陰下脫 方見第十八卷 千金方 產後陰下脫

以鐵精粉上推內之又灸臍下橫之二七壯

廣濟療產後陰腫下脫內出玉門不閉 產寶只有此一方無論

石灰 一升 灼令赤 鉏燒草

右熬湯二升拉灰中湯適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須平復如故

當歸散 治產後陰下脫方 傳心方

當歸 黃芩 牡蠣 燒各二兩 蜀椒皮 燒存性半兩 蔓菜 一兩一分

右為細末每服二錢空心溫酒調服米飲調服亦可忌登高舉重

集驗療婦人產後虛冷方 千金同

玉門不閉寬冷方 千金同

蛇床子　硫黄　各四分　兎絲子十分

吳茱萸六分

右為細末以湯一升投藥方寸匕以洗玉門日再用

陳氏玉龍湯治婦人產後用力太過產門惡出以四物湯入真龜骨末少許煎空心連進二服麻油湯熏洗

熨法集驗療婦人產後陰下脫方

單炒蛇床子一升秉熱以帛裹熨患處亦治產後陰中痛

挑仁膏治產後陰脫妊娠陰門挑仁去皮尖別研為膏　挑礬　五倍子

右等分為細末以膏子拌均傅之

撈枝散治產後子腸下出不能收拾不論年深者皆治之

撈枝取皮焙乾一握

右用水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三升去滓熏候通手淋洗加冶傾入五升瓶內再煎一沸依前用一服可作五度用洗了睡少時忌鹽藏鮓醬濕麪發風毒物及用心力房勞等事

古今錄驗療產後陰下脫方

鼈頭一箇　陰乾　葛根一斤當作一兩

右二味為末酒服方寸七日三服

皂角散 治產後雕陰下脫方

皂角樹皮 川練樹皮 各半斤

皂角核一合 石蓮一百枚去心

右為粗末用水煎湯柒拾以物圍定熏通手洗於淨房中就熏洗處鋪薦席縱熏洗了以帛捲乾便哭玉露通真圓熱酒下二圓便仰睡方見卷通用方中第二

古今錄驗療產後陰下脫方

川椒一升 吳茱萸二升 戎鹽半雞子大

右為末以綿裹如半雞子大內陰中日一易二十日愈

婦人陰蝕五痔方論第十

凡婦人女陰脈數而滑者陰中必生瘡名曰匿瘡或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃外以熏洗坐導藥治之乃可千金療陰蝕瘡方

當歸 芎藭各二兩 芍藥 地榆各三兩

右細切以水五升煮取二升去滓熏洗日三夜一止

又方

蒲黃一升 水銀一兩

右二味研均以敷之

又方

肥猪肉三十斤

右以水三碗煮熟去肉入盆中浸之冷即易不過三兩度

崔氏療陰蝕洗揣湯方

乾漆酪一兩　黃芩

甘草　乾地黃

當歸　芍藥各二兩

龜甲七兩

右細切以水七升煮取一半去滓以綿帛內湯中以揣瘡處良久即易日二度每揣湯可行十里許即裹乾若取甘濕散薄傳瘡上使遍可經半日又以湯揣揣訖如前付藥

（朱家甘草湯方仍以自處蝕瘡深半寸余於沿中得此蛇膽散不經七日瘡乃平）

（朱家婢患此疾患不差後得此蛇膽散摩瘡上即流入手下即愈者請廣布傳之）

甘濕散又名蚺蛇膽散摩瘡蟲陰蝕方

蚺蛇膽真者　青木香末　石硫黃

麝香各四分臨時分之多少用

鐵精　麝香碎此蛇毒若入元

（先以和如蛇膽即魚也舊用五月五日蝦蟆力）

右六味等分為末更細研有患取如三棊子和井花水日再服訖先在便利了即以後方洗

枝熏下部訖然後取藥如棊子安竹管裏吹入下部中亦日再度老少量減其熏法每日一度不用再為之良

又瘴疰蟲食下部及五臟方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿纏之又
搗石硫黃為末將此綿纏桃枝燃轉之令末少
停又截一短竹筒先內下部中仍以所燃藥桃
枝熟然熏之

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆

右等分為末傳瘡上良

狼牙湯 古今錄 療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭穢

狼牙 三兩

右㕮咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如鷄

于中黃大沸湯一盃消盡夜適寒溫以綿纏筋
頭大如棗濡湯以瀝瘡中日四五度即差

產後乳汁或行或不行方論第十五

論曰凡婦人乳汁或行或不行者皆由气血虛弱
經絡不調所致也乳汁勿令拉於地蟲蟻食之令
乳無汁若乳盈溢可發康壁上佳或有產後血有
乳若乳雖脹而產後發作者此羊少之人初經產
乳有風熱耳腹服清利之藥則乳行若累經產而
無乳者亡津液故也腹服滋益之藥以動之若雖
有乳又却不甚多者腹服通經之藥以動之仍以
羹臛引之孟婦人之乳資於衝脈與胃經通故也
有屢經產而乳汁常多者亦婦人血气不衰使然

也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色常黃所生之子怯弱而多疾

三因論曰產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱而不行者虛當補之盛當除之盛者當用通草漏蘆土瓜根薤虛者當用成煉鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬隨可見矣

漏蘆散 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然消乳汁通行

漏蘆 二兩半 去蘆 蛇蛻十條 炙 瓜摟十箇 燒令焦 存性

右為末溫酒調下二錢無時候服藥後即以豬蹄羹投之經驗有方有牡蠣並燒存性 一方只用牡蠣燒為末酒調下二錢

又方

萎菜子 炒香 縮砂仁 各等分

右為細末每服二錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行津液上榮張不恩方常用極有驗

療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絶少

成煉鍾乳粉 研 濃煎漏蘆湯調下二錢

產寶療產後乳無汁

土瓜根 漏蘆 各三兩 通草四兩 甘草二兩

右水八升煎取二升分溫三服忌如常法

一方加柱心垂為末飲服方寸匕
一方
以猪脂如食法煮清粥食之驗
靈苑方下乳汁立效方
搜未 搗未 各半合 蒿苣子一合 並淘淨
生甘草半兩
右煎汁一升研前藥令細去滓分作三服立下
又方
滿廬一方 蝤蠐各三 蛴螬各三
土瓜根二方各四方
右為細末酒調方寸匕日三服
一方無土瓜根有鍾乳汁搗水調服
瓜摟根

又方
通草 一方
右為細末食後酒服方寸匕日三服
方同有理石二方出 鍾乳粉 麥門冬 各六方
一方 土瓜根為末酒調方寸匕日三兩服効千金
一方
猪蹄一隻 通草四兩
右以水一斗煮作羹食之最妙
湧泉散 療乳無汁成都教授單釀方亦治乳結癰腫
穿山甲洗一兩炙令燥

右為細末酒調服方寸匕

下乳方

大麻仁 去殼二合 生鰕三枚

右同研爛去滓用酒水各一盞瓦罌煇至一盞半有飢食後臨卧温服仍用被覆睡乳即通流

劉溪柳傳

又方

必用方云漏蘆栝樓皆要葉或云多食猪蹄羹攤混令白色研為細末温酒調下一錢服了合面卧少時未効再作一方瓜樓一枚熬搗以白酒一斟煮取四升去

滓温飲一升日三

崔氏療乳汁不下鼠肉五兩

右三物作臛啖之勿令飢者知

漏蘆湯 子金療乳無汁

漏蘆 赤未一升

右先將米漬一宿研取汁三升煮菓三四沸去滓作飲食任心錄同東荊布田產前食素得疾已七日服諸菜無赤豆豬肉食之當夜乳脉通行閉牢

通草 各六分

羊肉六兩 麋肉八兩

鍾乳四方

論曰產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之若乳多温滿急痛者温帛熨之產室有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可亦有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未曾論及

產後吹奶方論第十三

夫產後吹奶者因兒啼哭呼气不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通脅結疼痛亦有不痛腫硬如石名曰吹奶若不急治腫甚成癰產後吹奶最宜急治不爾結癰速至死者速與腋皂角散括樓散傳以天南星散以手捋之則散矣出指迷方

括樓散方

乳香一錢研

右研令均温酒調二錢服

括樓根末一兩

天南星散

天南星為末用温湯調以鵝翎塗之

皂角散方

謂曰婦人吹奶意如何皂角燒灰蛤粉和須臾揉散笑呵呵

治奶結硬疼痛出經驗方

百葉煎為細末每服三錢酒一盞並數沸熱服

療乳硬作痛

嫩桑葉生採研以米飲調攤紙花貼病處

產後婦乳方論第十四　婦人乳頭生瘡捷之黃

出方　附汁

夫婦乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢痛拏痛手不得近是也初覺便以手助捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰也吮好婦乳乳癰其實則一只分輕重而已輕則為瘡產後吮婦乳童則為癰雖有專門不可不錄

治瘡產後吮婦乳成癰

葵葉五升

右搗篩為散酒服方寸匕即愈

又方

雞屎為末酒服方寸匕漸吏三服愈

又方

皂莢十條以酒一升採取汁硝石半兩煎成膏傳之

瘡產婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜樓一箇半生半炒　大黃一兩生　蜜一兩半生半煨

右同對用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一會不可忍即搜去敗乳腦卧再一服順所患處乳側卧於床上令其瘡乳腫次第結成癰方瘡故也

右以馬溺淫之立愈

婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出方附

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫為長白癰瘡不差者動經年月名為如乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論苟抄乳是也宜以赤龝皮湯及天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傳以洗黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳

赤龝皮湯方

槲皮切三升

右以水一斗煮五升夏冷用水秋冬溫之分以洗乳亦洗諸淫敗爛久瘡洗畢傳膏散千金同

天麻草湯方

天麻草切五升

右以水一斗半煎取一斗澄寒溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傳膏散千金同

飛烏膏散方

用燒朱砂作水銀上黑煙名液物者三兩熬令焦燥

礬石二兩燒物

右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傳乳瘡日三作欲者不須和有汁自著可用散亦傳諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡蛮瘡丈夫陰蝕痒濕諸

小兒頭瘡疳蝕口瘡肥瘡蝎瘡等並以此傳之

千金同

又黃連胡粉散膏方

黃連二兩　胡粉十分　水銀一兩同研令消散

右三味擣黃連為末三物相和合皮裹熬按之自和合也縱不成一家旦得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸濕瘍黃爛肥瘡若著甲煎為膏

千金同

乳癰方論第十五

夫婦人乳癰者由乳腫經聚皮薄以澤是成癰也足陽明之經脉血渋不通其血又婦之气積不散故結聚成癰千金云年四十以下治之多愈年五十以上宜速治之即差若不治者多死中年又懷胎發乳癰腫及體結癰此亦無害也蓋懷胎之癰病起於陽明陽明者胃之脉也主肌肉不傷藏故無害也診其右手關上脉沉則為陰虛者則病癰乳癰久不差則變為瘻

開慶間淦川　嘉林會都運蔡人吳氏年已五十而病妳癰後果不起以此知聖賢不妄說也

產寶論曰產後宜勤去乳汁不宜蓄積不出惡汁內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其妳手近不得若成膿者名妳乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱毒外以赤小豆末水調塗之便愈或數捏去乳汁或以小兒吮之或大人含水嗍之摩動之或大人含水嗍之

原件短缺

得汁吐之其汁狀如膿若產後不嘗乳兒蓄積乳汁亦結成癰

連翹湯 療產後妒乳并癰

連翹半斤　升麻　芒硝各十分　玄參　芍藥　白斂　防巳　射干各八分　大黃十二分　甘草六分　杏仁八十枚去皮尖

右以水九升煎取三升大黃次下硝分三服

又方

蒲黃草

右熬搗傅腫上日三度易之并葉煎汁飲之亦佳妒乳及癰並差

以醋煮水服之亦得集驗方以指餵下清汁

張氏橘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者藥下即不疫神驗不可云喻因小兒吹妳變成斯疾者並皆治之

陳皮浸去白眼乾麴炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發覺赤腫疼痛一服見效每服有效

療乳癰諸般癰癰疽

橘紅半兩　阿膠炒粉草各一兩

右㕮咀分為二服每服用泉水一椀半煎至盞半去滓溫服

療妳癰并無名癰癤

鼠糞不以多少炷存性二分入輕粉二十文
研停麻油調塗如有頭即潰無頭即消又療
療乳頭裂破
以丁香為末米
汁新水調傳立愈又以蛤粉胭脂等
陳日華方一畔膏
治妒癰
石膏不以多少煆通赤取放地上捥覆出火
盡細研每服三錢温酒調下添酒盡醉睡覺
再進一服千金療乳無汁以水煮服
金黄散 治妒癰 出婦人經驗方
川大黄 粉草 各一兩
右為細末以好酒熬成膏傾在盡中放冷攤紙
上貼痛處仰面臥至五更未貼時先用温酒調
一大匙就患處臥明日取下惡物相度強弱用
藥麤弱不宜服
療發背乳癰四肢虛熱大渴
生地黄六兩 黄芩 芍藥
人參 知母 甘草 各二兩
升麻 桔梗 各三兩
右以竹葉切三升以水一斗二升煮取九升去
竹葉肉藥煮取三升渴則飲之
療婦人發乳犬夫發背爛生膿血後虛成氣疾
黄耆 麥門冬 地黄

人參　升麻　茯苓　各二兩
當歸　芍藥　遠志
甘草　各一兩
大棗十箇
右水二升煮取一升分温三服若有是證初中
排膿内補十宣散
以芙蓉花爛研如癡若魚花只取根上皮先
用竹刀刮去麤皮但用内一層嫩白皮研如
癡却入窜方許調停看瘡大小如未穿即留
中孔如已穿未穿出膿大止痛斂瘡口
不使頻頻更換其孔其膿根自然湧出盡
見神効膿出盡却用後藥傳
此方大治一切癰疽發背乳

乾膿散　又斂瘡口

烏賊骨　黃丹　天竺黃　各二錢
輕粉　二錢　龍骨　三錢　天竺黃　各二錢
麝香　一字　龍骨　三錢　露蜂房　各一錢
右研為細末乾摻瘡口不數日乾

又方

摻本作糝非也下同

黃下露恐衍

輕粉　各少許
麝香
右為末乾摻

又方

降真節　一錢
沒藥　黃丹　各一錢
乳香　真坩子　三枚　血竭　半錢
乳骨　二枚
麝香　一字
降真節　一枚

右為細末乾摻
產竇瘡乳癰方
黃蘗一分
右為細末以雞子白調停塗之乾則易之愈
又方
萍根搗傅之愈
丹參膏 此效方 療婦人乳癰
丹參
右吹咀以苦酒淹絰宿以豬脂半斤微火煎之
白芷黃芩度膏成去滓傳之
治效發痛不可忍 先約人同器放方
水揚抑根新採者一握搥碎以好酒同甘草

烏梅煇至七分去滓時時温服
治婦人乳疽孀勞 神效瓜樓散 李絅立方
瓜樓一箇去皮用只爛研 焙研為末如麪子多者有力
生粉草 當歸酒洗去蘆焙各半兩
乳香一錢 通明沒藥一分二味并剉研
右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清汁分作三服食後良久服如有孀勞便服此藥可杜絶病根如毒氣已成膿為黃水毒未成即於大小便中通利疾甚再合服以退為妙婦人乳癰方甚多獨此一方神效無比萬不失一矣亥年僕處五羊趙絰略廳荊閫夫人年七十一歲隔一年左乳房上有一塊如鵝卵大今忽作楚一石年該藥僕云楊孫真人云婦人年五十歲已上乳房不宜見癰見

則不可療矣幸而未破恐是氣瘤設以五各連翹湯去大黃煎服時時再合服必消減矣

五香連翹湯方 見二十卷論三

新編婦人大全良方卷之二十三

新編婦人大全良方卷之二十四

指遺方

烏喙圓 治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不榮繫瘕內著惡氣乃起其生也始如雞卵久久乃成狀如懷胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治乳癰疾大小便不利并食有伏蟲臚脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙炮去皮二錢 半夏湯洗七次四錢 石膏粗

蔥蘆炒 牡蒙 葳蕤酒浸各一錢

乾薑炮 桂心各一錢 巴豆六七箇研膏三字

右為末蜜圓如菉豆大每服三五圓食後酒飲任下亦治男子疝痛

木香散 治婦人脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香 泥香研 乳香研 川芎 胡椒 甘草炙各一分 人參 陳皮 桂心 青橘皮各半兩 乾姜炮 縮砂各一兩 天茄者乾末一兩 右洗焙為末空心日午溫酒調下二錢忌羊肉

石葦散 治婦人血結脬門或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿膿急如石水狀俗謂之血蠱

石葦一兩 當歸尾 馬鼈草 烏梅肉略炒半兩 蓬莪茂 紅花炒 三棱並炮 蘇木節 沒藥 琥珀別研各一分 官桂去粗一分 右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒棗煎湯調亦得

大腹皮散 治婦人血癥單單腹膨

大腹皮 檳榔 木通 防己 陳皮 青皮 五味子各等分 桑白皮炙 大黃蒸 枳殼麩炒 赤茯苓去皮 黃芪

右㕮咀每服秤一兩水一碗煎至六分盞去滓入酒一分溫服不以時候

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦敦狀小便微難

而不渴由產後為水與血並結在血室也

大黃（四兩） 甘遂（炒各二兩） 阿膠（炒各二兩）

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服其血當下

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 白芍藥 熟地黃（各三兩） 人參

當歸 桔梗 川芎

甘草（炙） 桂心（各一兩）

右㕮咀每服四錢水一大盞煎至七分去滓不以時服

膏髮煎 治婦人穀氣實胃氣下泄陰吹而正喧陰中出血

頭髮灰 豬脂

右調停綿裹如棗按大納陰中

瓜子湯 治產後腸頭如針刺連穀道又如痔痛小便如淋狀或寒熱此產時用力氣併腸間亦由陰虛陽邪乘之毒氣攻衝恐成腸癰

薏苡仁（四兩） 桃仁（去皮尖） 牡丹皮

瓦㕮咀（各一兩）

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

固真丹 治元臟久虛及小腸腎餘膀胱疝氣五般淋疾精滑精漏小便白濁及婦人赤白帶下漏下血崩子宮血海虛冷等疾並皆治之高司法方

續添

製蒼朮法 洗去泥土浸五日換新泔春夏三日如秋七日冬十日切作片干焙乾拌一斤炒四兩

蒼朮四兩 同入茴香一兩炒令朮黃為度

蒼朮四兩 同入川烏一兩炮裂去皮尖切作片子一兩和灰焙乾為度

蒼朮四兩 入紅椒一兩去目并合口者破同炒令朮黃為度

蒼朮四兩 用好醋一升半煮一炷香取朮焙乾

右一處為末用煮棗酒醋打麵糊為圓如梧子大每服二十圓男子溫酒或鹽湯下空心食前

婦人醋湯下藥性溫無毒小便頻數為効

大効内補圓 治受氣虛弱及五勞七傷臟腑積冷疾癖癥塊腫脹或經脉不調痃冷赤白帶下口苦舌乾面色萎黃黑黯心煩驚悸頭目旋暈不美飲食痰疾涕唾粘涎手足百節熱疼無力那肉消瘦子息斷絕服一月當妊娠百病皆愈

菓蘗四兩 牛膝五加皮各二兩 白朮 寶川烏炮各一兩 丼參各一兩

右為細末煉蜜圓如梧子大溫酒下二十圓空心日午晚食前各進一服

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕腑下冷痛小便白濁以上疾

諸皆孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百
眸肉常服除宿血生新血令人有孕及生子充實
亦治男子七血諸疾

桃仁 去皮尖炒 當歸 炒 木香 炮 茯苓 甘草
京墨 燒各一兩 人參 蒲黃 燒 藁本 各二兩 石斛 酒浸炒
桂心 乾姜 炮 川芎 各半兩 細辛 川椒 去目及閉口炒出汗
牡丹皮 去心 山藥 各三兩 熟地黃 蒸焙 當歸 洗酒
香附子 炒去毛四兩 蒼朮 米泔浸去皮 木瓜 卷炒半兩各
糯米 炒一升

右為細末煉蜜圓每兩作六圓每服一圓細嚼
温酒送下淡醋湯調亦可空心食前服

治面部生瘡或鼻腮赤風刺粉刺用盡藥不効者
惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨卧時洗
面令淨如面油用之數日間瘡瞤處自平赤亦消
如風刺粉刺一夕見效但塗藥勿近眼處

生硫黃 香白芷 瓜蔞子仁 臘粉 各半錢重 全蝎 七枚去足 蟬蜕 二十枚去洗

芫青 各七枚去翅足

右為細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬溶
取下離火入諸藥在內每用少許塗面上林提
點方

烏雞煎　治婦人百病

吳茱萸　良姜　白芷
當歸　赤芍藥　延胡索
川椒　生乾地黃
破故紙　蓬莪茂　橘紅
劉寄奴　川芎　略一　荷葉灰四兩
青皮

熟艾二兩

右為末醋麪糊圓如梧子大每服三五十圓
湯使手後
月經不通紅花蘇木酒下
白帶牡蠣粉調酒下
乎宮久冷白茯苓煎湯下

赤帶建茶清下
血崩豆淋酒調綿灰下
胎不安童和酒下
腸風陳米飲調百草霜下
心疼菖蒲煎酒下
漏胎下血烏梅湯下
耳聾蟬黙荄下
胎死不動班猫三十箇煎酒下
腳膝痛當歸酒下
胎衣不下芸臺研水下
頭風薄荷黙荄下
血風眼黑豆茸草湯下

生瘡地黃湯下未調酒下

身體疼痛黃者未調酒下
四肢浮腫臟香湯下

咳嗽喘滿杏仁桑白皮湯下

腹痛芍藥調酒下

產前後痢白者乾姜湯下赤者甘艸湯下赤白
雜者一宜湯下常服溫酒醋湯任下並空心食
前服

產乳集將護嬰兒方論

凡新生兒坐婆急以綿纏手指繳去兒口中惡物
令尽不可逞若嚥入腹中必生諸疾（聖惠方謂之玉鑑方謂之玉衡）
疾先斷兒臍帶可只留二寸許更看帶中如有小
出急撚去之留之必生異病或以綿繫扎定（須是坐婆收生）後
洗兒不然則濕气入腹必作臍風之疾（諸練收生
方得其宜）既綁畢了取生甘草一寸搥剉用水一
合煎濃汁用綿纏干蘸令兒咂之當吐出惡汁盡
半合不妨（干蘸令人止濃煎也）下謂之臍屎此好屎（甘草汁以綿纏
乃忌吐之臍故也）砂一字研細以熟蜜調置兒口
中吮之以去舊邪空後飼乳自此飼乳之後須依時
量多寡與之勿令太飽恐成哺癖久則吐嫩不可
節也三朝洗兒可用虎頭骨挑拄猪膽金銀並湯
洗之則兒少驚（尋常澡用猪膽汁治即不生瘡疥每日）頻就無
風處看兒上腭并兩頰內有白泡如膜起者速以
指甲刮破更生更去之（保童必効謂之鵝口無即不須忘動）更看舌

下恐生重舌皆由兒在胎中母喫炙煿肥膩飲酒
服熱藥所致（保童秘訣自有菜治之方）三日烙臍帶或灸之外
不可別加火艾恐成驚癇（舊者灸兒臍有二七壯今以七壯為中）又
天寒時兒用父母常著舊衣作衣服不可用新綿
絹只用舊者若大溫煖則令兒筋骨軟弱若天色
和煖無風可令妳婆抱裸兒頻見風日則血壯氣
則肌體硬密堪耐風寒不致疾病又擇乳母須猜
神爽健情性和悅肌肉充肥無諸疾病知寒温之
宜能調節乳食嫡汁濃白則可以飼兒不得與妳
母大段酸鹹飲食仍忌絶衝寒或衝熱未便餵兒
嫡如此則必成好癖或驚痼瀉刹之疾切須忌之
夜間不得令兒枕臂須作一二三袋令兒抱無左

右附之可迭乳母側盖寢衣衾須露兒頭面一
向仰卧恐成驚疾須時復回動之夏月須凉如
夜間餧妳須妳母起身坐地抱兒餵之如陰陽交
媾之際切不可餧兒妳此正謂之交嫡也必生癖
或換易衣綢三月房中不可太煖妳母不可頻喫
酒恐兒作瘥嗽驚熱香脏之疾至於寖蓋次第嫡
乳所傷啼潮熱之類自有專於小方脉者此略
見之若能調和妳食并看承愛護如法則別無疾
病亦不須令兒常服湯藥此尤宜審之也（見楊氏嬰兒論）

巢氏病源嬰童寶鑑方程甫備安方

初生浴兒良日

壬申丁巳癸巳大凶

寅卯酉日大吉

才仏圓　療児初生下口中穢悪不盡入喉中即便吐自後絶啼聲一發則又嗌下用生異疾矣

木仏　　木香　　麝香　　臙粉

右小麪糊圓如小菫黍米大每服一二圓五章

延胡索散　療児初生下盤腸剌痛面青色啼哭不止

延胡索一錢　乳香　木香　各半錢

右為細末水一大錢煎七分無時與服少許

新編婦人大全良方卷之二十四終

右婦人大全良方陳氏真本也從幸脩堂所藏朝鮮治字鈔而借寫起於文化庚午冬十一月十日終於十二月初五下晡

松章撰之識