

醫方類聚卷之五十二

傷寒門 二十六

聖惠方 七

治熱病大便不通諸方

夫熱病經發汗汗出多則津液少

津液少則

胃中乾結熱在胃所以大便不通又有腑藏
自生於熱者此由三焦否隔脾胃不和稽熱
在內亦大便不通也

治熱病惡寒壯熱大便不通宜服犀角散方

犀角屑一兩 大麻人一兩 麥門冬一兩半 黃芩一兩

一兩 土瓜根一兩 白鮮皮一兩 梔子人一兩 川大黃一兩

二兩 甘草半兩 碎微赤

右件藥搗篩為散每服四錢水一中盞煎

至六分去滓不計時候溫服

治熱病大便澁滯妄語心煩宜服大黃散方

川大黃一兩 醋炒 枳實半兩 梨炒 羚羊角屑一兩

一兩 川朴消一兩 黃芩一兩 甘草半兩 微赤

右件藥搗麤羅為散每服五錢用水一大

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病腸胃壅熱大便不通宜服羚羊角散

方

羚羊角屑一兩 麥門冬壹兩半 梔子人一兩

瓜根一兩 川大黃一兩 碎微炒 甘草半兩 微赤

右件藥搗篩為散每服四錢水一中盞煎

至六分去滓不計時候溫服

治熱病大便不通宜服大麻人丸方

大麻人二兩 研入 郁李人二兩 湯浸 川大黃二兩

微炒判碎羚羊角屑壹兩木通壹兩

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜
印丸如梧桐子大每服不計時候以溫水
下三十丸

治熱病若十餘日不大便者服承氣丸方

川大黃二兩判碎微炒郁李人壹兩湯浸枳實壹兩

製炒令黃色川芒消二兩大麻人一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以溫水一

未利再服

熱大便不通宜服三黃丸方

鬚川大黃壹兩判碎微炒黃芩一兩

搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

不計時候以溫水下三十丸

後風氣壅滯胃膈聚痰大便不通

牽牛子丸方

牽子牛八兩四兩生四兩微炒搗羅取末四兩木通壹兩青

橘皮去白剉桑根白皮三分

右件藥搗羅爲末入牽牛子末都研令勻
鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服
不計時候以溫水下三十丸以得通爲度
治熱病小便不通諸方

夫熱病毒氣未除表裏不解熱在膀胱則流
於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通
也

治熱病熱毒氣壅心腹脹滿小便不通宜服
滑石散方

滑石二兩 甜葶藶一合隔紙 漢防已壹兩 木通
半兩 猪苓一兩去黑皮 甘草半兩炙炒赤剉

右件藥搗羅爲散每服四錢以水一中
盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病小便不通或淋瀝疼痛宜服木通散
方

木通一兩剉 枳實半兩麩炒微黃色 琥珀壹兩 赤芍藥

半兩 茅根半兩剉 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病小便不通小腸中疼痛宜服當歸散方

當歸叁分剉子芩半兩葵子半兩車前子半兩榆

白皮半兩剉

右件藥擣細羅為散每服用煖生地黃汁一小盞調下二錢不計時候服

治熱病小便不通宜服石韋散方

石韋壹兩去毛木通半兩剉蘧麥壹兩甘草半兩炙微赤剉

葵子叁兩子芩半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病小便赤澁不通宜服冬葵子散方

冬葵子二兩滑石二兩赤茯苓一兩木通一兩茅

根一兩剉石韋壹兩去毛子芩一兩川朴消壹兩

右件藥擣羅羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病小便不通淋瀝如血方

大麻根二亂髮灰二錢

右件藥先將麻根以水一大盞煎至六分

去滓下髮灰調令勻頓服

又方生乾地黃參蒲黃半鬱金半兩

右件藥搗細羅為散每服濃煎葵根湯

治熱病痢下膿血諸方

治熱病熱毒痢下赤白腹中疝痛宜服當歸

散方

當歸二兩剉炒甘草一兩炙微赤剉黃連二兩去鬚微炒黃蘗

一兩微炙乾薑一兩炮裂阿膠二兩搗碎醋石

榴皮二兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病毒氣攻腸胃大便或時瀉血煩悶妄

語升麻散方

川升麻一兩川大黃半兩剉微炒地榆半兩當歸

參赤芍藥半兩枳殼半兩剉微黃芩半兩甘草

半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病下痢膿血不止宜服茜根散方

茜根壹兩黃芩叁分梔子人壹兩阿膠半兩搗碎

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後熱毒入腸胃下黃赤汁及爛肉等
方

赤石脂二兩鼓一合薤白叁莖梔子人七枚

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計
時候分溫三服

治熱病卒下膿血無度方

黃連二兩去鬚微炒鼠尾草二兩地榆三兩

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中
盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病下痢膿血宜服石脂散方

白石脂一兩燒過烏梅肉半兩黃連半兩去鬚微炒胡
粉半兩炒微黃檳榔兩訶梨勒半兩用皮甘草半兩

炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二錢不計時候服

治熱病六七日後毒氣不散下膿血不止宜

服鹿角膠散方

鹿角膠壹兩搗碎黃芩半兩去鬚黃連半兩去鬚

微炒令黃燥梔子人兩龍骨兩甘草兩

炒胡粉半兩微赤剉

右件藥搗細羅為散每服以冷粥飲調下

二錢不計時候服

治熱病毒痢下膿血腰臍下痛宜服黃連散

方

黃連壹兩去鬚微炒龍骨壹兩當歸牛黃一分

細麝香一錢細研

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二

錢不計時候服

治熱病壯熱頭痛四肢煩疼下痢黃赤色日夜十餘行及嘔吐不下食宜服地榆散方

地榆青兩龍骨兩一陳橘皮去白一兩湯浸人參一兩

去蘆醋石榴皮兩一黃芩兩一厚朴皮塗二兩生薑

汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二

錢不計時候服

治熱病熱毒攻藏腑痢下雜膿血煩渴不止

宜服犀角散方

犀角屑參分黃連參分去去赤芍藥參分黃芩參分

側柏葉參分阿膠參分搗碎烏梅肉微甘

草參分灸微赤剉

右件藥搗羅為散每服以粥飲調下二錢

不計時候服

治熱病卒痢膿血無度方

黃連參分龍骨四兩阿膠二兩搗碎去鬚炒令黃燥

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下一

錢不計時候服

治熱病熱毒攻腸胃下黃赤汁及爛肉壯熱

腹痛方

梔子人叁七枚 豉二合 薤白壹握切

右件藥以水二大盞煎至一盞去滓不計時候分爲二服

治熱病後虛勞諸方

夫熱病新差藏腑猶虛血氣未復若食過度喜怒無恒澡浴梳頭言語思慮則生寒熱四肢不舉口苦舌乾心煩盜汗不能飲食肌體羸瘦此由勞動太早不能節宜寒熱之氣入於經絡傳於藏腑變動多端故成虛勞之候

也

治熱病後體氣尚虛用力太早遂生寒熱四肢乏力宜服鼈甲飲子方

鼈甲半兩塗醋炙令改黃去裙襴 柴胡一兩去苗 人參一兩片 頭壹 甘草半兩炙對 豉壹合 白朮壹分 雄鼠糞七枚微炒

研別

右件藥剉剉拌令勻分爲二服每服以水二大盞入生薑一分葱白三莖煎至一盞去滓入研了鼠糞攪勻不計時候分温二

服

治熱病後體虛成勞氣力羸弱或寒或熱狀如瘧四肢煩悶宜服黃耆散方

黃耆三分知母一分桑根白皮一分鼈甲一分

炙令黃甘草壹分陳橘皮三分湯浸白

去裙襴微赤白術

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入葱白三莖生薑半分煎至五分去滓不

計時候溫服

治熱病後虛勞煩熱四肢疼痛小便赤黃不欲飲食宜服柴胡散方

柴胡一兩生乾地黄一兩黃連去鬚地骨皮

一分枳殼一分炒赤茯苓甘草半兩

鼈甲三分塗醋炙知母半兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病後虛勞氣發作寒熱乍進乍退頭痛眼睛疼口苦不思食宜服虎頭骨散方

虎頭骨 一兩半塗酥炙令黃 白茯苓 兩 白朮 兩 人參

參分去 麥門冬 一兩半去心 赤芍藥 兩 桂心 兩

黃耆 一兩到 柴胡 一兩去苗 陳橘皮 參分湯洗去白 當

歸 半兩 沉香 兩 五味子 兩 甘草 半兩微赤到 桃人

半湯浸去皮尖 雙人麩炒微黃

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡卧四肢煩

痛舌乾卷澁宜服人參散方

人參 一兩去蘆頭 麥門冬 一兩半去心焙 赤芍藥 兩 柴

胡 壹兩去苗 白茯苓 兩 黃耆 一兩到 牡蠣 為粉

甘草 半兩炙到 鼈甲 一兩塗醋炙令微黃去裙襴

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後虛勞四肢無力或時寒熱盜汗心

中虛悸不能飲食日漸瘦羸宜服黃耆丸方

黃耆 壹兩到 人參 壹兩去蘆頭 知母 分 白芍藥 分

茯神分參 牡蠣一兩 鬼箭羽兩半 木香分參 白朮
 一兩 陳橘皮去白 湯浸五分 五味子分參 地骨皮分參
 麥門冬一兩 沉香兩一 甘草兩半 牛黃一分
 麝香半兩 鼈甲半兩 犀角一分
 右件藥搗羅為末入牛黃麝香研令勻鍊
 蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食
 前以溫酒下三十九丸如不飲酒用粥飲下
 亦得

治熱病後虛勞及骨蒸日漸黃瘦四肢羸瘁

不思飲食獼肝丸方

獼肝一兩 柴胡參分 川升麻兩半 黃連去鬚
 天靈蓋一兩 塗酥一分 枳殼微黃 犀角屑
 一金薄五十片 銀薄五十片 牛黃半兩 麝
 香半兩 栝脂細研
 右件藥搗羅為末入金銀薄牛黃麝香栝
 脂等鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大
 每服食前以童子小便三合浸豉取汁下
 二十九丸

藥茶諸方

治傷寒頭痛壯熱葱豉茶方

葱白叁莖 豉半兩 荆芥壹分 薄荷叁分 梔子十枚
去鬚去 兩兩 茶末叁錢 紫紫 上上

右以水二大盞煎取一大盞去滓下茶末

更煎四五沸分二度服

治傷寒頭疼煩熱石膏茶方

石膏二兩 紫笋茶末 碾碾為末

右以水一中盞先煎石膏末三錢煎至五

分去滓點茶服之

治傷寒鼻塞頭痛煩躁薄荷茶方

薄荷六分 生薑壹分 人參半兩 石膏一兩
葉去 分分 人人 參參 薑薑 石石 膏膏 擣擣碎

麻黃半兩 根去

右件藥剉先以水一大盞煎至六分去滓

分二服點茶熱服之

四時纂要

歲旦投麻子二七粒小豆二七粒於井中辟

滌七日上會日可齋戒早起男吞小豆七

粒女二七粒一年不病

廁前草正月初上寅日燒中庭令人一家不著天行

端午日以艾蒜為人安門上辟温

共工氏有不才子以冬至日死為疫鬼畏赤

小豆故冬至日以赤小豆粥厭之

茵陳丸治瘴疫時氣温黃等若嶺表行往此藥常須隨身

茵陳

四兩 大黃 五兩 ○運化

鼓心

五合 ○玄

恒山梔子人

熟 芒消杏人

去皮尖熟研後入之已上各參

兩 鼈甲

二兩去膜酒及醋塗炙

巴豆

一兩別熬研入用

右件九味擣羅為末鍊蜜為丸初得時氣

三日旦飲服五丸如梧桐子大如行十里

許或痢或汗或吐如不吐不汗不痢更服

一丸五里久不覺即以熱飲促之老小以

意酌度凡黃病痰癖時氣傷寒瘧疾小兒

熱欲發癩服之無不差療瘴神驗赤白痢

亦妙春初一服一年不病忌人葷蘆笋猪

肉已前諸藥臘月合收瓶中以蠟紙固口
置高處逐時減出可二三年一合

辟溫法養生術云臘夜持椒三七粒附井傍
勿與人言投椒井中除溫疫病

神明散

蒼朮 桔梗 附子炮各二兩 烏頭炮四兩 細辛

右擣篩為散絳囊盛帶之方寸匕一人帶
一家不病有染時氣者新汲水調方寸匕

服之取汗便差春分後宜施之

和劑局方

人參敗毒散治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡

寒身體煩疼及寒壅欬嗽鼻塞聲重風痰頭

痛嘔噦寒熱並皆治之醫方大成集成有北
經驗方袖珍方永類

熱口舌乾燥者加黃芩

人參去蘆洗焙 茯苓去皮 芎藭簡易方得効方赤
經驗秘方白茯苓

甘草燼 前胡去苗洗焙 芎藭 羌活去蘆 獨活去苗

桔梗 柴胡去苗洗焙 枳殼水浸去穢剉麩
炒黃色各等分

右為細末每服二錢經驗良方四錢簡水易方吹咀四錢

一盞生薑薄荷各少許煎七分秘方龍末每服三錢

水二盞生薑三片去滓溫服不拘時御藥院寒多方同

則熱服熱多則溫服○得効方右對散每

服四錢水一盃半生薑三片薄荷葉五皮

同煎熱服不拘時候傷濕腰疼加白朮木

瓜各等分脚痛加天麻一兩脚氣壅盛多

熱赤腫加大黃炒蒼朮各等分不過一二

服立愈痘傷寒頭痛目昏發熱增寒脚

腰疼甚多風多痰多氣或處卑濕脚弱亦

効傷寒鼻衄加白茅根生地黃各一兩瘡

癩癰疹加蟬蛻十箇去足防風五錢癰疽

初發赤腫寒熱用升麻葛根湯方見前合和

加生地黃紅內消麥門冬去心各一半煎

熱服立散尋常風寒濕氣流入經絡腰脚

疼痛或痺弱五積散方見後對合加木瓜川

牛膝去骨檳榔切碎各一半煎立効冬合寒

而溫煖春發殭疫大効大成右吹咀每服

三錢水一盞姜三片薄荷少許同煎七分
去滓不拘時集成經驗方袖珍方鈔方同秘方又云若
咳嗽加製半夏桑白皮五味少許風腫濕
痛遍身不能舉動者加大黃濕紙裹燒罇
酌一兩藥加一兩大黃簡易方初虞世究
其方知出道藏乃敘云自非異人傑出志
與神會則莫之敢爲良可歎服煙瘴之地
或瘟疫流行或人多風多痰多氣或處卑
濕脚弱此藥不可闕也世人不師古嘗務

作新奇蔽於俗學故備論之

小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強
急胷滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃
小便不利大便秘澁或過經未解或潮熱不
除及瘥後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩
熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷
風頭痛煩熱並宜服之

柴胡

去蘆半斤

黃芩

人參

去蘆

甘草

炙各半

半夏

湯洗七次焙乾貳兩半

右為麤末每服三大錢水盞半醫方大成

經驗方袖珍生薑五片棗一箇擘破同煎方水一盞

七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二服

更量大小加減御藥院方同

林禽散治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱

惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩

渴

山梔子去皮麻黃去節乾葛 川大黃 蒼朮

去肉桂皮石膏各一兩半木通 當歸去蘆洗

甘草炙瞿麥 川芎 前胡去蘆各一兩藿香

葉 川烏頭炮裂去皮

右為麤末每服貳錢水一錢一本入林檎

糝拾數片新者亦得煎柒分稍熱服不拘

時相次再服衣被盖汗出為度一本無

柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體

疼鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽

涕唾稠粘

桑白皮 黃芩各叁兩半升麻各叁錢半

驗良方各三錢半

二十五兩○石膏煨前胡去苗赤芍藥乾
良方二錢半○葛去苗柴胡○良方各五錢荆芥穗去土三
○良方參錢半○

右為麤末每服貳錢水壹錢生薑參片淡
豉拾粒煎七分去滓稍熱服小兒分作參
服量大小加減不拘時候○簡易方石膏
柴胡前胡乾葛赤芍藥各七兩升麻五兩桑白
皮黃芩各七兩半荆芥穗去土七兩四錢右咬咀每服
參錢水二盞生薑三片淡豉十餘粒煎七

分去滓熱服小兒作三服得効方赤芍藥
五兩桑白皮錢半石膏煨柴胡去蘆前胡片
乾葛各五兩升麻二兩五錢黃芩去枯心三兩七錢荆芥
穗去土三兩五錢右剉散每服三錢水貳錢半生
薑三片淡豉拾餘粒煎七分去渣熱服小
兒作三服

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘
滿無汗

麻黃去節杏仁七十枚去皮尖肉桂去麤皮貳

兩甘草炙一兩

右為麤散入杏仁膏令勻每服三錢聖濟總錄

每服水壹盞半煎八分去滓溫服汗出為醫方大

度若病自汗者不可服不拘時候成同

小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔

發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆

倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷一本肺

經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

麻黃去節芍藥 細辛去葉乾薑炮甘草剉炒

肉桂去麤皮五味子二兩半夏湯洗切

右為麤散入半夏令勻每服參錢水壹盞

半煎至壹錢醫方大成集去滓食後溫服

王氏集驗方南北○簡易方右剉如麻豆

大每抄五錢用水盞半煎至八分去滓服

加減法 若微利去麻黃加薤花如雞子

大半塊熬令赤色 渴者去半夏加括蕢

根一兩半 噎者去麻黃加附子半枚炮

小便不利小腹滿去麻黃加茯苓二兩

兩甘草炙一兩

右為麤散入杏仁膏令勻每服三錢聖濟總錄

每服五錢水壹盞半煎八分去滓溫服汗出為

度若病自汗者不可服不拘時候醫方大成同

小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔

發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆

倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷一本腸肺

經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

麻黃去根節芍藥 細辛去葉乾薑炮甘草剉炒

肉桂去麤皮各叁兩五味子二兩半夏湯洗切二兩半

右為麤散入半夏令勻每服叁錢水壹盞

半煎至壹錢醫方大成集去滓食後溫服

王氏集驗方南北○簡易方右剉如麻豆

大每抄五錢用水盞半煎至八分去滓服

加減法 若微利去麻黃加薤花如雞子

大半塊熬令赤色 渴者去半夏加栝蘆

根一兩半 噎者去麻黃加附子半枚炮

小便不利小腹滿去麻黃加茯苓二兩

喘者去麻黃加杏仁一兩一分去皮尖
 張仲景治中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛
 不汗出而煩躁者宜服 脉微弱汗出惡
 風者不可服服則厥逆筋惕肉擗此為逆
 也用麻黃參兩桂枝一兩杏仁二十枚甘草
炙一兩石膏如半雞子右剉如麻豆大每服
 五錢水盞半生薑棗同煎至八分去滓溫
 服汗出為度名大青龍湯

聖散子治傷寒時行疫厲風溫濕溫一切不

問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒
 內熱頭項腰背拘急疼痛發熱惡寒肢節疼
 重嘔逆喘欬鼻塞身重一本聲重及飲食生冷傷
 在胃腕臂膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足
 逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不
 利並宜服之○三因方東坡敘云昔嘗觀千
 金方三建散於病無所不治而孫思邈者論
 以謂此方用藥節度不近人情至於救急其
 驗特異乃知神物効靈不拘常制至堪關感

智不能知今予所得聖散子殆此類也自古
論病唯傷寒至爲危急表裏虛實日數證候
應汗應下之法差之毫釐輒至不救無求子活人書
此下有若時而用聖散子者一切不問陰陽
二感男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗
出氣通飲食漸進神宇完復更不用諸藥連
服取差其餘輕者額微汗正尔無恙藥性小
熱而陽毒發狂之類入口卽覺清涼此殆不
可以常理詰也時疫流行平旦輒煮一釜不

問老少良賤各飲一大盞則時氣不入其門
平居無病能空腹一服則飲食快美百疾不
生真濟世衛生之寶也其方不知所從來故
巢君數世寶之以治此疾百不失一余旣得
之謫居黃州連歲大疫所全活者至不可數
巢君所甚惜此方指江水爲盟約不信人余
切隘之乃以傳蘄水龐君安常龐以醫聞於
世又善著書故授之且使巢君之名與此方
同不朽也用藥于后

草荳蔻仁去皮拾箇○無求石菖蒲 高

白蒿參因方猪苓去皮蒼朮參因方茯苓去

皮芍藥 獨活去蘆附子炮去麻黃去根厚

朴薑去蘆皮藁本去上枳殼去穢炒柴胡去蘆澤瀉

防風去蘆藿香去土及吳茱萸湯先半夏湯先

七次薑 吳白朮各半甘草炙剉細辛半兩

求子活人書南陽活人書無蒼朮吳茱萸

右為鑪散每服肆錢水盞半煎取壹盞去滓熱服不拘時取遍身微汗即愈時氣不

和空腹飲之辟邪疫○三因方右為剉散

每服五錢水盞半煎七分無求子活人書八分去滓

熱服空腹無求子活人書餘滓兩服此藥

似治寒疫因東坡作序天下通行辛未年

永嘉瘟疫被害者不可勝數往往項時寒

疫流行其藥偶中抑未知方土有所偏宜

未可考也東坡便謂與三建散同類一切

不問似太不近人情夫寒疫亦能自發狂

蓋陰能發躁陽能發厥物極則反理之常

然不可不知今錄以備療寒疫用之宜審
 之不可不究其寒溫二疫也辛巳年余嘗
 作指治至癸巳復作此書見石林避暑錄
 亦曰宣和間此藥盛行於京師太學士信
 之尤篤殺人無數醫頓廢之然不妨留以
 備寒疫無使偏廢也

五積散調中順氣除風冷詹寮方作濕化痰飲治

脾胃宿冷腹脇脹痛胃膈停痰嘔逆惡心或
 外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩

背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦
 人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通

並宜服之醫方大成集成南北經驗方袖珍方治傷寒頭痛發熱惡寒

陳橘皮去穢枳殼去穢麻黃去根節白芍藥

川芎洗當歸去蘆甘草炙茯苓去皮半夏湯

七肉桂去麩白芷各厚朴去麩乾薑炮

四桔梗去蘆藥院方一十壹兩蒼朮淨洗去皮

右除肉桂枳殼外別為麤末外壹拾叁味

同為麤末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂

枳殼末令勻每服參錢水壹盞半生薑叁片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及疰癖癥瘕膀胱小腸氣痛卽入煨生薑叁片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強痛入葱白叁寸鼓柴粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷卽入炒茱萸柴粒鹽少許同煎如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎婦人產難

入醋壹合同煎並不拘時候

王氏集驗方同

○得

効方調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹滿胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏暈肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通及口中冷背心惡寒並宜服之除麻黃又名異功散白芷壹兩陳皮夫白叁兩厚朴去皮切薑汁桔梗去蘆枳殼去穢三川芎

甘草炙 白茯苓去皮各 蒼朮十二兩米泔

赤當歸去蘆尾 麻黃去根節 楊芍藥壹兩

乾薑兩 半夏湯洗七次 肉桂壹兩半 右

除白芷肉桂二味為散另入外一十三味

同為到散慢火炒令色轉攤冷次入肉桂

白芷令勻每服三錢水一盃半入生薑參

片煎至一中盃去滓稍熱服如冷氣奔衝

心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清穀

及疝癰癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑

參片塩少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼

惡風發熱項背強痛入葱白參寸豉七粒

同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急

手足厥冷即入炒茱萸七粒塩少許同煎

如寒熱不調咳嗽喘滿入棗二枚煎風寒

溫氣交互頸項強直或半身偏疼或復麻

痺及卒中風重者多加麝香末寒濕腰痛

每服加桃仁七枚去皮尖滿身疼加白膠

香太陰經傷寒手足逆冷或積聚腹痛及

虛汗不止脉細疾而青嘔吐加熟附子數
片炒茴香壹捻冷氣煨薑三片捻少許煎
婦人經候不調或腹中血塊如酸米醋一
合難產亦加米醋一合脚氣冷者每服加
茱萸十粒木瓜三片大便秘加大黃二錢
脚氣下疰掀然赤腫增寒壯熱亦加大黃
一錢利之久虛羸泄傷食腹痛冷瀉不止
每用略炒過加陳米一撮烏梅壹箇煎名
和氣散特效心腹膨脹不食亦效乳癰初

作加川牛膝生地黃各二根產後或尋常
血氣痛並加木香玄胡索半錢醋炒陳艾
葉七皮烏藥半錢婦人體虛脚疼加生川
烏去皮臍切四片麝香少許夏合熱寒氣
折之秋發寒疫大効澹寮方陳皮去麻黃
根蒼木淨洗去皮米枳殼去白芍藥白芷
川芎當歸去蘆酒浸甘草炙肉桂去皮半夏湯洗
白茯苓去皮各桔梗去蘆十厚朴姜乾薑
炮各右咬咀每服肆錢水壹盞半薑參

片葱白連根叁寸煎至六分去滓食前熱服尋常被風寒濕氣交互爲病頸項強直或半身偏疼或復麻痺宜用此藥加麝香少許煎服寒濕腰疼每服加桃仁柒枚去皮尖微炒碎之同煎服婦人經候不調心腹撮痛或閉壅不通加醋一合腹中血塊尤宜服此簡易方尋常被風寒溫氣交互爲病頸項強直或半身偏疼或復麻痺及卒中風病重宜用此藥煎時多加麝香末

進連數服卽差

寒濕腰疼每服加桃仁

七枚去皮尖煎服

手足逆冷面青嘔吐

者宜加熟附子煎服

疝癖癥瘕膀胱小

腸氣痛每服加炒柒莢七粒塩一捻煎服

定齋云如患冷氣加煨薑三塊塩一捻

煎服傷寒用葱白豆豉煎服

惡寒厥冷

加附子數片柒莢七粒煎服

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發未發疑貳之間並

宜服之。○經驗良方治大人小兒云云並宜服之。今人妄議升麻乾葛有寒涼之性不宜服。餌謹按本草升麻上品上藥味甘苦平解百毒辟瘟疫瘴癘邪氣治小兒風驚時氣熱疾風壅癰腫豆瘡鬼附啼泣葛根中品之上藥也味甘平主消渴身熱嘔吐療傷寒中風頭痛解肌發表出汗解酒毒芍藥味苦酸平益氣通順血脉強五臟補腎氣又能治風補勞甘草上品之上藥也四者合和何寒之有

故併述之

升麻 王氏易簡方五兩 葛根 一本十五兩○易簡方七兩半

芍藥 易簡方五兩 甘草 炙各一兩○易簡方五兩加桂一兩

右為麤末每服三錢 簡易方管見大全良方四錢良方三四錢

水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不拘時候日二三服以病身清涼為度小兒量歲數加減與服○王氏集驗方右等分

咀每服五錢水一盞半生薑三片葱白三
 根煎至一錢熱服余嘗治傷寒但覺頭疼
 身痛發熱項強先用此藥與服不問斑疹
 已發未發皆可服之蓋此藥解肌發汗若
 風盛加荆芥穗熱盛加黃芩頭疼加川芎
 白芷發汗加麻黃如寒邪已入經絡則又
 隨証按法而治之也醫方大成川升麻白
 芍藥甘草各十兩葛根十五兩右咬咀每服參
 錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時醫方集成

南北經驗方 補珍 得効方傷寒時疫頭痛
方永類鈐方同

增寒壯熱肢體痛發熱惡寒鼻乾不得睡
 小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治寒
 暄不時人多疾疫乍暖脫衣及暴熱之次
 忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒
 膈熱口瘡咽疼升麻兩一白芍藥兩一甘草兩一
 葛根兩二右剉散每服四錢水壹盞半不拘
 時潮熱頭痛生薑三片葱白二根煎咳嗽
 涎盛生薑三片桑白皮七寸煎上膈熱薄

苛黃芩各少許煎班瘡未出加紫草楂根
 各半錢葱白二根煎挾熱酒後傷風感寒
 痰盛氣促金沸草散方見後合和生薑三
 片薄荷七葉桑白皮七寸烏梅一箇煎小
 兒量度多少老人加人參倍白芍藥各五
 錢大段寒即熱服熱即溫服近人以藥性
 寒涼不肯輕服然治證相對服之何妨
 葛根解肌湯治傷寒瘟病時行寒疫頭痛項
 強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛

胃脘煩悶

葛根四兩 麻黃去根節 黃芩 芍藥 甘草

炙各 肉桂去麤皮

右為籠末每服叁錢水壹觔半醫方大成

經驗方袖珍方 棗子壹枚煎至八分去滓

承類鈔方一蓋 稍熱服不拘時候取汗出為度○王氏易

簡方云二方一治溫疫一治寒疫蓋以解

肌湯中有麻黃桂枝故也活人方無黃芩

既欲治寒疫不用黃芩極為有理溫疫取

其平解寒疫取其汗解二者不同惟惡寒不同耳

金沸草散治風化痰醫方大成集成玉機微義作治肺經受風除

頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼胃

膈滿悶痰涎不利欬嗽大成集成微義咳嗽聲重喘滿涕

唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荆芥穗四兩前胡去蘆麻黃去根節旋覆花各三兩

方去梗○澹煎甘草剉少○得半夏湯洗七

察方各二兩浸○王氏集赤芍藥各一兩○澹煎

驗方姜炒

右為麤末每服參錢水一錢半大成集成南北經

方袖珍方永類鈐方一盞生薑叁片棗一枚同煎八分

去澤溫服不拘時有寒邪則汗出如風盛

則解利御藥院方同○微義云活人書減麻黃

赤芍藥加細辛赤茯苓得効方右剉散每

服參錢水一盞半入生薑三片桑白皮七

寸烏梅壹箇煎頭疼柚葉半皮牙疼熟煎

灌嗽諸風及大腑風秘左脇刺痛每料加

枳殼壹兩去穢風熱結在臟腑煩燥氣壅

腹痛大便秘以葱白研爛微火炒過布巾
盛熨臍後加大黃朴消薄芎各五錢服速
効諸風發散並用妊婦傷寒頭痛旋疼肚
熱心燥加白朮人參黃芩生石膏各一兩
熱嗽加甜葶藶馬兜鈴薄荷生桑白皮各
半兩烏梅四錢仍就吞半夏圓方見後咳
嗽類咽喉焦燥加朴消五錢食后服

大柴胡湯治傷寒拾餘日醫方大成集成邪
氣結在裏寒熱往來大成集或作身熱煩燥大便秘澀

腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大
便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧
日晚發熱得効方此云或發熱汗出或六
證身微熱兼臟腑實脉有力者可服之
者裏實也得効方此
下云輕則柴
胡重則承氣

柴胡去蘆黃芩聖濟總錄赤芍藥各叁大
黃二湯洗七次切作片枳實去穢
兩半夏子焙乾二兩半
○總錄
四枚

右為麤末入半夏令勻每服叁錢一本及得効方

三大錢總水一盞半大成集成南北經生

薑五片得効方參片棗一枚總錄參枚去

加苦竹葉十片煎至一中盞去滓溫服食後臨卧

得効方食後臨睡服此藥治傷寒內熱裏

實若身體疼痛是表證未解不可服之得効

方此下云春合溫而清涼夏發燥疫此方効

木附湯治風濕相搏身體煩疼不能轉側不

嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩

重甚者不知食味

白朮四兩附子炮去皮臍細切一兩半甘草剉炒二兩

右為麤末入附子令勻每服參錢水一盞

半生薑五片棗一枚同煎壹盞去滓溫服

食前此藥暖肌補中助陽氣止自汗御藥院方

防已黃耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡

重四肢少力關節煩疼時自汗出洒淅惡風

不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上輕下

重不能屈伸

防已四兩 黃耆五兩 甘草炙五兩 ○一本及白朮三兩 御藥院方二兩

右為麤末每服參錢水壹盞半生薑叁片棗壹箇煎至壹盞稍熱服不拘時蓋覆温卧合微汗瘥

薑附湯治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脉候沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰水心腹冷痛

霍亂轉筋一切虛寒並皆治之醫方大成集

方袖珍方治傷寒自利六脉沉伏手足厥冷

乾薑為薑末一兩 ○附子生去皮臍

右合勻每服參錢水壹盞半煎至壹盞去滓温服食前

竹葉石膏湯治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胃煩滿或得汗已解內無津液虛羸少氣胃中煩悶氣逆欲吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛脉不緊數即

不可汗下宜服此藥

石膏 一斤〇經驗良 半夏 湯洗七次 甘草

方一兩半〇 人參 去蘆二兩〇 麥門冬 去心五兩

良方各二錢 錢五

右為籠末入半夏 得效方 令勻每服三錢

簡易方得 水貳盞 醫方大成集或南北入

青竹葉 良方入淡竹 生薑各五六片煎至

壹盞半 大成集或經驗方 去滓入粳米百

餘粒平煎米熟去米溫服不拘時

五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱

口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不

利及汗出表解煩渴不止又治 王氏集驗方

虛身霍亂吐利躁渴引飲 醫方大成集或南

治傷寒汗後發

澤瀉 二十五兩〇得效方 猪苓 去赤茯苓

去白朮 去蘆各十五兩〇得 肉桂 去蘆皮

〇良方七錢半得

右為細末每服貳錢熱湯調下不拘時服

訖多飲熱湯有汗出即愈 又治瘧熱在

裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服疸

病發渴及中暑引飲亦可用水良方可用新汲水

調服御藥院方同小兒加白朮末少許如發虛

熱加絲黃耆人參末少許集驗方此下云挾熱利加黃連

腹痛加芍藥

○良方又云咬咀生料尤妙一方去桂加

生薑叁片甘草少許生料煎服頭痛身熱

如生葱三根

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胃大

煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解

熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾

躁而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中

暑毒汗出惡寒身熱而渴得效方此下云及治

惡寒效參陽合病腹滿身重面垢譫語遺溺並不可汗下但少與服之效

石膏二十斤洗研○一本及醫方大知

母一伯五十五兩○一本及集甘草盤七

一本及大成集成三十
七兩半得効方二兩

右為細末大成集每服叁錢水一盞半大成

集或人粳米御藥院叁拾得効方五餘粒

前至一盞大成集去滓溫服小兒量力

與之或加入參少許同煎亦得食後服此

藥立夏後立秋前可服春月及立秋後并

十血虛家並不可服得効方此下云不惡

者亦服大成又云如煩渴不已者加入參

服之身或南北經緯方袖珍片與大成同

○簡易方石膏兩知母六日草三右為細末每服四錢水盞半入粳米三十餘粒煎

至一盞去滓溫服小兒加減與服或加入

參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立

秋前可服宣明論治傷風自汗桂枝證表

未解半入於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自

汗脉滑數而實表裏俱熱三陽合病腹滿

身重口燥而垢譫語發黃厥逆自汗和解

兩感解頭痛止自汗雜病時疫未瀉發斑

兼豆疱瘡疹伏熱知母一兩甘草一兩粳

米一合石膏四兩右剉如麻豆大抄五錢水

一盞煎至六分去滓溫服無時候日三四服或眩欬嘔者加半夏兩半紅皮兩半每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼朮半兩名蒼朮白虎湯或汗吐下後煩渴口乾脉洪大加人參半兩名人參白虎湯賈同知石膏四兩知母一兩甘草一兩劉庭瑞知母一兩半石膏崔宣武知母一兩石膏參兩甘草一兩半右為末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六分未曾下胃熱發班兼豆疱如液虛瘦加人參半兩白朮半

兩頭疼加川芎荆芥各三錢咳欬加半夏三錢桔梗一兩恍惚加人參三錢茯苓半兩經驗良方石膏研二兩半知母一兩甘草半兩米即白晚米百餘粒右為細末每服四錢水一盞半人粳米一撮煎至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參少許同煎不拘時候香需散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾

胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃
虛弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹
疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而
先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而
復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉
筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷
而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能
主之

香薷

一斤

白扁豆

一本

厚朴

去麤皮姜汁
塗炙令黃各

半斤

右麤末每服三錢水一盞酒一分同煎七

分去滓水中沉冷連喫二服立効不拘時

活人書方不用白扁豆加黃連四兩剉生

薑汁同研勻炒黃色名黃連香薷散○經

驗良方又云今人以香薷散香蘇散打和

治傷寒傷暑尤妙名二香散

僧伽應夢人參散治傷寒體熱頭痛風壅痰

嗽咯血等疾

人參 白芷 乾薑 炮 桔梗 一本青皮

白朮 各等分○一本有甘草乾葛

右為細末每服貳錢水一錢薑二片棗二

箇煎七分通口服如傷寒入淡豉同煎熟

進神効不拘時○三因方白芷乾葛青皮

桔梗 炒 白朮 人參 各三分 甘草 炙 兩 乾姜 炮

錢三 右為末每服二錢水一盞姜三片棗

二枚煎七分通口服如傷寒入豉數粒同

煎熱服大有効不拘時崇寧癸未米芾為

太常博士始造待漏冒寒得疾痰嗽如膠

有血更三醫不退一日謁太尉蔡元度取

人參散一貼并棗見授繼歸有客承議郎

薛道至留食藥熟進一服良久痰嗽立止

而客怪曰公氣色頓快何藥也為道其由

求方蔡公又送一貼越三日病全除往見

蔡公公曰此藥僧伽也元祐中泗守劉士

彥病八日不汗女求僧伽甚確夜夢告曰

翌日塔中取藥遂於大聖鉢中取得此藥

題印云太平州楊家人參散今太醫局中

亦賣無甘草乾葛兼無分兩疑非真方簡

方醫方大成甘草炙六人參桔梗青皮白

芷乾葛白朮各三乾姜炮五右咬咀每服

三錢水一盞姜一片棗二枚煎七分去滓

熱服不拘時如傷寒加豆豉煎醫方集成

方袖珍方承

香蘇散治四時瘟疫傷寒○澹寮方治四時

痘疫傷寒應大人小兒初感風寒陰陽未分

皆可服之經驗良方治四時瘟疫傷寒頭痛

發熱惡寒腰脊疼痛心滿嘔逆中外諸邪所

傷

陳皮二兩○一本及御藥院方管見大全

白香附子良方澹寮方王氏集驗方良方不去

右為麤末每服叁錢水壹盞大令良方一

煎七分去滓熱服不拘時日叁服若作

細末只服二錢入塩點服嘗有白髮老人

授此方與一當人家其家合施當大疫城

中病者皆愈其後疫鬼問當人當人以質告鬼曰此老教三人矣稽顙而退大全良方同

○大全良方又云若作細末只服二錢入

搥點服身熱頭痛加帶鬚葱白三寸同煎

連進數服即愈一方用白芍藥一兩升麻

乾葛甘草紫蘇陳皮香附子川芎白芷各

兩青皮七錢右咬咀水煎去滓熱服蓋覆

微出汗如不熱不須蓋覆只溫服又治初

感風寒頭痛項強乃葛根湯香蘇散二藥

合和外增芎芷青皮輩名十神湯一方去

青皮用麻黃選奇方名太乙流金散究原

方名香葛湯簡易方同澹寮方又云欲發汗則

加生薑葱白一頭同煎熱進如頭疼加川

芎香白芷薑葱煎服名六味香蘇散於六

味中加升麻芍藥葛根青皮等分咬咀每

服四錢水一盞半薑叁片棗一箇煎服名

太乙十神湯四時瘟疫者服之如感風咳

嗽痰多鼻涕聲重者宜加人參五味子桔

梗桑白皮半夏杏仁如陳皮之數名加味

香蘇散醫方大成治四時傷寒頭痛發熱

惡寒紫蘇香附各二兩陳皮一兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜葱煎七分空

心熱服如頭疼加川芎白芷名芎芷香蘇

散醫方集成南北經驗方急救仙方治四

時瘟疫方註云昔城中大疫有白髮老人

教一富人家合施城中病者皆愈其後疫

鬼問其富人家富人遂以質告鬼相顧曰

此老教三人矣遂稽顙而退凡服此藥戒

食葷腥酒肉無不應效又前元時江西吉

安太和縣瘟疫大作有鑿者視病中夜而

回忽遇神人騎馬導從而來醫知非人忙

拜伏於地神至叱云汝何人也答曰某鑿

人也神曰汝今鑿病用何藥答云隨病冷

熱輕重用藥治之神曰不然只一類用香

蘇散好醫者歸明日遂如其言試之皆効

醫道大行因獲福利終身敬祀其神併記

于此香附子炒去毛紫蘇葉各四兩陳皮一兩
 甘草炙一兩剉為粗末每服三錢水壹盞煎
 至七分去滓熱服不拘時日三服臞仙活
 人心治四時傷寒瘟疫頭疼寒熱往來不
 問兩感內外之證並皆治之春月探病宜
 用此方蘇葉四錢香附子五錢陳皮五錢甘
 草二錢右每用的効潮熱加入參黃芩咳嗽
 加桔梗五味子頭疼加川芎細辛白芷疹
 豆未成加升麻乾葛瘧痢加枳殼黃連去

甘草水瀉即脾泄加藿香肉豆蔻惡寒潮
 熱加桂枝麻黃身疼加赤芍藥官桂心氣
 痛加玄胡索烏藥茴香久瀉加木香訶子
 瘧疾加檳榔草果胸膈痞滿加枳實半夏
 脚膝拘攣加木瓜檳榔牛膝羌活又名檳
 蘇散潮熱往來加和正氣散嘔逆加丁香
 軍薑腹痛加赤芍藥白朮
 加減三五七散方見諸風門
 大已寒圓治傷寒積冷藏腑虛弱心腹疴痛

脇肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽
氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏
脉短四肢怠惰並宜服之

高良薑 乾薑 炮各六斤 肉桂 去麤皮 華撥 各四斤

右為末水煮麵糊圓梧桐子大每貳十圓
米飲下食前

太陽丹治頭疼傷寒感風氣積徧正夾腦一
切頭痛每服一粒薄荷茶嚼下風壅痰盛咽
膈不利亦宜服之

川烏 大者炮去皮臍 川芎 白芷 甘草 炙各一斤 石

膏 二斤別研 腦子 二兩

右為細末蜜同麵糊為圓每兩作壹十八
粒朱砂為衣

和解散治四時傷寒頭痛增寒壯熱煩燥自
汗欬嗽吐痢

蒼朮 去皮 藁本 桔梗 甘草 各半斤 厚朴

去皮薑汁炙炒 陳皮 去白各四兩

右為麤末每服參錢水一盞半生薑炙片

棗貳枚煎七分不拘時熱服醫方大成集

類鈐方同

正氣散治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷胃

膈噎寒脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水

欬逆怠惰嗜臥不思飲食

白木 陳皮 藿香大梗各甘草炒七半

夏 厚朴同半夏各三兩為末上薑

右為細末每服二錢生薑參片棗一枚水

一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘧疾

膈氣心痛日進參服常服順氣寬中辟除
瘟疾

十華散治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘

急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉

四肢冷麻兼解二毒傷寒療脚氣流注腫痛

行步不得及虛勞等疾並治之

五加皮 陳皮去乾薑炮甘草燼各十六

各六大川烏參附子六桔梗炒肉桂去

皮兩蘇黃耆去蒼朮去羌活各八兩

右為細末每服貳錢水一盞薑二片棗一枚煎六分不拘時熱塩酒調服亦得

到散治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱體虛多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤 荆芥穗 前胡生薑製炒 乾葛 青

蒿子炒 桑白皮炒 麻黃去根 桔梗 香附

子炒 陳橘皮 柴胡 蒼朮炒各十斤 白芍藥

茴香炒 秦艽 半夏為麤末薑汁製 川羌活 黃

耆 藁本 川芎各二斤半 白芷炒 厚朴去皮薑製

甘草炒 肉桂去麤皮 各五斤

右為麤末每服參大錢水一盞半入生薑

烏梅棗煎至七分去滓溫服併兩滓作壹

服煎

辰砂五苓散治傷寒表裏未解頭痛發熱心

胃鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見

鬼神及瘴瘧煩悶不省者

木猪苓去黑皮 白朮洗去蘆 澤瀉洗 赤茯苓去皮

辰砂研各十兩 肉桂去皮 八兩

右為細末每服二錢沸湯點服不拘時珍

方如中暑發渴小便赤澀川新汲水調下

小兒五心煩熱焦燥多哭咬牙上攢欲為

驚狀每服半錢溫熟水調下

消風百解散治四時傷寒頭疼項強壯熱惡

寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及塞壅咳

嗽鼻塞聲重涕唾稠黏痰涎壅盛氣急滿悶

並宜服之

荆芥 陳皮洗去白 白芷 蒼朮 麻黃節去

各四兩 甘草炙二兩

右為末每服二大盞水壹大觥薑叁片烏

梅壹箇同煎七分不拘時溫服或用茶酒

調下仍欲發散風邪入連鬚葱白三寸同

煎○醫方大成石叻咀每服叁錢水一盞

姜三片葱白三箇煎七分不拘時如欬嗽

加烏梅煎醫方集成南北經驗方補珍

人參順氣散治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不

和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急

手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澀或脾胃不和心腹刺痛胃膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

川芎去蘆白朮去蘆麻黃節去厚朴去蘆皮苦楝

去蘆陳皮白甘草炙白芷各四兩乾薑人參

各一兩乾葛去蘆皮

右為末每服二錢水壹盞薑參片棗一枚薄荷五七葉煎八分不拘時傷風感冷頭

疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎一方人參

順氣散治證服法並上同人參去蘆桔梗

去蘆甘草炙麻黃去根節乾葛一兩乾薑

一兩白朮一兩白芷一兩

保真湯治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾

作急服立効

川芎去蘆藁本各四兩甘草炒二蒼朮剉

六兩右咬咀為麤末每服參錢水一盞半生薑

參片同煎七分去滓熱服不拘時神效不可具述○是齋醫方治傷寒疫氣不拘陰陽證但初覺不快速進三服立愈葛丞相鏤板印施甚妙蒼木剉作散子塊米泔水和炒候楚赤色為度次用新藁本四兩淨罈布袋筒去楚皮取淨一斤藁本洗日乾甘草二兩川芎四兩不見火右四味剉為麤末每服二大錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓熱服

柴胡升麻湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體

疼鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

桑白皮 黃芩去皮各六兩半升麻五兩荆芥去梗赤芍藥 前胡去蘆柴胡去蘆石膏煨乾葛各十兩

右咬咀每服參大錢水一盞半醫方大成集成袖珍方永類鈔方每服三錢水一盞生薑三片豉十餘粒同煎一盞去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減○南北經驗方柴胡去蘆前胡去蘆黃芩

去支各荆芥去梗七赤芍藥去蘆石膏各十

升麻五兩桑白皮乾葛右咬咀每服三錢水

一盞姜三片豉十餘粒煎熟服玉機微

人參養胃湯易簡方名治外感風寒內傷生

冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒

二證醫方大成集成此下云夾食停痰及內

外之殊均可治療先用厚被蓋睡連進此數

服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗濺濺然

俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若

元有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱以參

蘇飲欬欬調之或尚頭疼則濃煎生薑葱白

湯下聖餅子三證既除不必服藥但節其飲

食適其寒溫自然平治大抵感冒古人不敢

輕發汗者止由麻黃能開腠理用或不能得

宜則導泄真氣因而致虛變生他證此藥乃

平和之劑上能溫中解表而已不致妄擾也

兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴去麤皮蒼朮米泔浸半夏洗七次藿

香葉洗草果大成去殼一本去皮膜茯苓去黑人參

去蘆甘草錢多二橘紅七錢半

右為咬咀每服四錢衛生寶水一盞半易

方一薑七片烏梅一箇煎至七分一本及

大成去滓熱服兼治飲食傷脾發為痰瘧

或脾胃中脘虛寒嘔逆惡心皆可易簡方

佐以紅圓子服之或發寒瘧寒疫及惡寒

者並加附子足為十味不換金散畫正

氣散皆此藥也然化之或發寒瘧寒疫及

不若此方之備

惡寒者並加附子名十味不換金散醫方

集

南此經驗方袖珍方○得効方右劉散每

服叁錢水一盃生薑叁片紅棗二枚煎

空心熱服虛寒加炮附子數片體虛寒瘧

加肉桂炮附子各一錢重兼紅圓子每服

三十五粒方見痰

參蘇飲治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼

以為熱並宜服之若因感冒發熱亦如服養

胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即愈尚有

餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱

但連日頻進此藥以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此母以性涼為疑一切發熱皆能取効不必拘其所因也小兒室女亦宜服之○醫方大成治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大解肌熱寬中快膈或慾或勞瘵潮熱往來並能治之類鈴方同

陳皮去穢枳殼去穢桔梗去蘆甘草炙木香各
 兩○大成此半夏湯洗薑製○一本紫蘇一味叁分
 用乾葛洗前胡去苗人參去蘆茯苓去皮各叁秘方各叁錢
 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎六分去滓微熱服不拘時易簡不用木香只拾味大成集成南北經驗方袖珍方鈐方皆云易簡方以氣盛者不用○得効方治一切發熱頭疼體痛木香者不用服之皆効不必拘其所因小兒室女尤得

其宜用藥致和而且平故也痰飲停積中
 腕閉塞眩暈嘈煩忪悸愼懣嘔逆不食有
 如氣隔痰氣停滯關節不利手足躄曳筋
 脉攣急類乎中風食已即吐發熱頭痛百
 節煩疼狀似傷寒但連日頻進此藥以病
 退為期不可預止蓋本方乃集二陳湯半
 夏茯苓湯枳實半夏湯也人參去蘆白茯苓
 去紫蘇葉半夏湯洗七次乾葛去皮前胡去蘆各
 積殼去穢炒陳皮去白桔梗去蘆粉草各半兩石到

散每服四錢水一盞半生薑參片紅棗二
 枚同煎熱服不拘時候發熱頭疼每服加
 川芎半錢葱白二根咳嗽加五味子七粒
 桑白皮七寸煩燥麥門冬二十粒去心痰
 嘔口燥咽乾烏梅一箇男子婦人虛勞發
 熱加麥門冬二十粒去心氣盛或氣虛人
 痰氣上壅咽喉不利哮喘有聲氣息短急
 上盛下虛加木瓜半錢北五味子五粒乾
 桑白皮七寸尋常感冒風寒鼻塞流清涕

頭目昏重加川芎白芷各一錢葱白二莖
疝氣初發必先增寒壯熱甚者嘔逆惡心
每用此藥加木香半錢寒熱必退腹痛加
楊芍藥壹錢

神木散治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身
體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之

藁本去土羌活去蘆細辛去土香白芷下川芎

甘草炙各一兩蒼朮五兩一本及得效方是

泔浸一宿切焙齊醫方醫方大成集成米

右為細末每服叁錢水一盞生薑叁片葱
白叁寸煎七分溫服不拘時如覺傷風鼻

塞只用葱茶調下簡易方未氏集驗方得

驗方袖珍方永類鈞方○是齋方又云或

作麤末煎服尤快微覺傷風鼻塞只用葱

茶調下一方蒼朮半斤去皮川芎三兩藁

本去苗土洗三兩甘草炙二兩細辛去苗

不一兩

對金飲子治諸疾無不愈者常服固元陽益

氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵療四時傷寒極有效

陳皮去白炒蒼朮米泔浸厚朴去蘆皮汁

草炙各

右爲麤末每服叁錢空心水一盞薑二片如茶法煎取八分滓再煎兩度服瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五莖豉叁十粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞

七傷脚手心熱煩燥不安肢節酸疼加柴胡去蘆同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時瀉瀉加肉豆蔻風疾加荆芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地骨皮腿痺加兔絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加一銖此藥不問老

少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼
昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼婦人宮
藏久冷月水不調若能每日空心壹服卽
出顏容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快
心胷神效莫述○臞仙活人心右依此方
治療神效有瘟疫時氣二毒傷寒頭疼加
撫芎葱白三莖煎服五勞七傷有熱加黃
芩柴胡手足酸疼加烏藥檳榔痰嗽發瘧
加草果烏梅冷熱氣痛加茴香木香水氣

腫滿加桑白皮木通婦人赤白帶下加黃
耆當歸酒傷脾胃加丁香砂仁傷食加良
薑白豆蔻四時泄瀉加肉豆蔻訶子風痰
加荆芥北細辛腿膝冷痛加牛膝乳香腿
痺加兔絲子羌活渾身拘急有熱加地骨
皮麥門冬白痢加吳茱萸赤痢加黃連去
甘草頭風加藁本白芷有氣加茴香氣塊
加三稜莪朮頭疼加茱萸軍薑婦人腹痛
加香附子烏藥眼熱加大黃荆芥冷泪加

木賊夏枯草腰痛加杜仲八角茴香

劫勞散治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時

行疫癘心神煩悶口苦舌乾增寒壯熱頭疼

鼻寒腰脚酸倦背脊強急渾身疼痛

當歸七兩香附子炒去毛蒼朮浸甘草燻

參兩荆芥夫前胡各二兩七錢肉桂去皮

一本一兩橋紅各一兩川芎二兩二苦梗

三錢半天仙藤二兩半一地骨皮二錢

麻黃去根白芷各四錢石膏九錢

右為細末每服貳錢水一盞烏梅半箇入
搥同煎如要出汗加葱白薑錢煎連參服
溫鹽酒調熱搥湯亦得

人參輕骨散解利四時傷寒頭痛壯熱項背
拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不
調小便赤澁嘔逆煩渴或傷風感寒頭痛體
熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫
癘潮熱往來及瘵五勞七傷中脘氣滯心腹
痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻疰刺痛及婦人

血氣揚痛經候不調

貝母去心茯苓焙白半夏煮各人參 白朮

白芷不見陳皮白赤芍藥 秦艽去蘆

附桔梗去蘆厚朴去皮甘草燼各麻黃去節

柴胡去蘆枳殼去穰當歸焙川芎

肉桂去乾薑兩蒼朮六兩

右為末每服參錢水一盞生薑叁片同煎

至七分稍熱服身體倦怠如烏梅一箇咳

嗽加棗貳枚同煎不拘時

葱白散解四時傷寒頭痛壯熱筋背拘急骨

節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便

赤澀嘔逆煩渴不思飲食又治傷風感寒頭

痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時

行疫癘並皆治之

川芎 蒼朮米泔白朮各二麻黃去根節

甘草燼石膏煨乾葛各一

右為末醫方大成集成南北經驗每服貳

錢水一盞生薑三片葱白二寸煎七分熱

服不拘時如要出汗併煎參服被蓋出汗
為度鈐方此下云即活

不換金正氣散治四時傷寒瘴疫時氣頭疼
壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往
來五膈氣噎咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐
瀉藏腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴去皮薑製藿香去枝陳皮去白半夏煮○經

數沸蒼朮米泔浸○甘草燻各

右為剉散每服參錢秘方水壹盞半生薑

參片秘方棗子貳枚煎入分醫方大成集

方袖珍去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒

物若四方人不伏水土宜服之常服能辟

嵐氣調和脾胃美食飲得効方此下云○

澹寮方治四時傷寒五積膈氣和脾胃止

吐瀉溫中下痰飲止腹痛脹滿吞酸噎痞

疴塞乾嘔惡心內受寒濕外感風邪身體

沉宜肢節酸疼頭昏鼻塞未分陰陽之間

尤重服之則氣自正而病自退及能止汗

解山嵐瘴氣八般瘧疾遍身浮腫五勞七傷或風氣所灌手足腫痛全不思飲食孕婦產前後皆可服餌又治霍亂吐瀉心腹疼痛脾氣虛弱臟腑時鳴小兒脾胃不和時氣諸疾及治四方不伏水土凡過嶺南此藥不可闕厚朴去麤皮剉如韭須長大一寸以生薑自然汁淹一宿半夏湯洗七次以生薑四兩取橘紅廿草剉藿香葉取葉水洗蒼朮去皮米泔浸一菓子去麤皮用右六味先用砂礪炒厚朴各三兩

令香次入蒼朮炒令紫色又入半夏炒香熟又入甘草炒黃又入橘紅炒破方始將藿香葉二兩幹開衆藥安藿香葉在中心用藥遍蓋罨定少時約藿香葉乾方可取出却入草菓仁同為麤散每服二大錢水一大盞生薑五片棗子一枚煎至七分去滓空心服亦可常服和一切氣永無瘟疫此乃不換金真方也煎時不得犯銅鐵器臞仙活人心治四時傷寒頭疼發熱惡寒

身體痛潮熱往來咳嗽痰逆嘔噦惡心及

山嵐瘴氣一切並皆治之蒼朮米泔浸陳皮

去白各重藿香二錢半夏泡七次甘草二錢

厚朴姜製四錢右依此修合每服薑五片葱

一根煎服頭疼加川芎白芷潮熱加黃芩

前胡口燥心煩加乾葛柴胡冷瀉不止加

木香訶子肉豆蔻瘧疾加常山檳榔草果

咳嗽加杏仁五味子桔梗喘急加麻黃蘇

子桑白皮身體疼痛加桂枝麻黃赤芍藥

感寒腹痛加軍薑官桂嘔逆加丁香砂仁

足浮腫兩脚加大腹皮木瓜五加皮氣塊

加枳殼檳榔茴香三稜熱極大腑不通加

朴硝大黃腹脹加香附子枳殼白豆蔻胸

膈脹滿加枳實莪朮砂仁痢疾加黃連枳

殼去甘草

川芎茶調散治丈夫婦人諸風上攻頭目昏

重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼

肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴

疼但是感風氣悉皆治之

白芷 甘草燼羌活各二兩荆芥去梗川芎各

兩細辛去蘆一兩防風一本一兩半薄荷葉

見火八兩一本有香附子炒八兩

右為細末每服二錢食後茶清調下玉機微義

常服清頭目

滲濕湯治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小

便或游或出管見大全大便溏泄皆因坐卧

濕處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷鬱久

久得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不
腫小便利反不渴悉能主之

蒼朮大全良方甘草炙○大全良方無白朮各一

方二兩伏苓去皮○大全良方赤茯苓乾薑炮各二兩橘紅

丁香各一分○大全良方各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半棗一枚薑參

片煎七分食前溫服大全良方空心熱服

神仙百解散一名神仙截傷寒治傷寒遍身

疼痛百節拘急頭目昏痛肢體勞倦壯熱增

寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服辟瘟疫治
勞倦

山茵陳 柴胡去蘆 前胡生薑汁炒 升麻 白

芍藥 防風去苗 蒼朮米泔浸炒 白朮 藿香

葉一本 藁本去苗 半夏薑汁製 羌活 獨活

人參去蘆 甘草炙 乾葛各一兩

立春已後不加減立夏已後壹料加

赤茯苓 當歸各半兩 柴胡一分

立秋已後減柴胡壹分不用當歸茯苓

只加

麻黃去節 肉桂去麩皮 乾薑炮各一分

立冬已後並無加減一方無當歸有黃

芩去蘆

右為細末每服叁錢水壹盞半薑叁片棗

二枚煎一盞熱服不計時併進二服如要

表散加葱白三寸淡豉三十粒同煎服以

衣被蓋覆汗出而愈○管見大全良方治

傷寒無問陰陽二證所用藥味四時加減

各隨經絡治病如傷寒在表未傳入經發熱惡寒腰脊強痛連進二服汗出而愈若已傳經絡胃滿氣逆肢體煩疼目痛耳聾口燥咽乾或渴不渴手足自溫或肢厥自利或不自利小使反快速進數服則調中順氣祛逐寒邪如首會感風風傷腠理頭痛項強表裏傷風憎寒頭痛鼻流清涕咳嗽痰涎風濕相搏關節煩疼一身盡重酒淅惡風時自汗出此藥大能調順三焦扶

表救裏溫潤經絡正四時之氣升降陰陽進美飲食和解發散涼汗清肌退熱固表止九種自汗治七般無汗不問傷寒傷風中暑中暈食蒸頭疼氣逆胃滿失飢吐逆眩暈又已經汗之不解下之當吐不中病並皆治之此藥清而不涼溫而不壅無問老人虛人大人小兒婦人姪婦一切宜服專一連進無不取効常服春免瘟疫夏不中暑暍秋無瘧痢冬不感寒毒功效不可

具述真神仙衛生之寶陳總領真方人參
 防風羌活獨活藁本北柴胡並去蘆甘草炙
 蒼朮泔浸切焙白朮白芍藥半夏炮七次切升麻乾
 葛藿香葉已上並各等分立冬至立春以後依正
 方立夏後加茯苓當歸北柴胡等分煎立
 秋後減柴胡半除當歸茯苓加麻黃節去干
 姜桂心等分煎右為細末每服參錢水一
 盞薑三片棗一枚煎至七分去滓熱服無
 時候併進二服如要表散加葱白淡豉煎

服以被蓋出汗

八解散治四時傷寒頭痛壯熱感風醫方大成集成
 惡多汗及瘵勞傷過度骨節酸疼飲食無味
 四肢疼倦行步喘乏面色痿黃怠惰少力咳
 嗽寒熱羸弱自汗胃膈不快嘔逆惡心
 人參去蘆陳皮去白半夏湯洗七次甘草炙藿香去土
 白米各一厚朴二兩薑汁製
 右為細末吹每服二錢大成水一盞生
 薑叁片棗一枚葱白叁寸同煎七分溫服

不拘時

南北經驗方袖珍方
永類鈐方與大成同

白朮散治傷寒

醫方大成病後

氣脉不和增寒壯熱

鼻塞腦悶涕唾稠粘痰嗽壅滯或冒涉風濕

增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大

病後將理失宜食復勞復病證如初又治五

勞七傷氣虛頭暈精神恍惚睡卧不寧肢體

倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不

美口吐酸水藏腑滑泄腹內虛鳴反胃吐逆

心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促

坐卧不安或飲食所傷胃膈痞悶腹脇膨脹

婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不

省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫

神効不可具述

白朮

四兩○三因方三兩
得効方去蘆一兩

乾薑

炮二兩○
三因方得

荻苓

去皮○三因方
得効方白荻苓

甘草

三因方得
効方炒

青皮

去毛○三因方
得効方白香附子

白芷

各一兩

右為末

得効方

每服二錢

大成水壹盞薑

右為末

得効方

每服二錢

大成水壹盞薑

叁片棗一枚木瓜乾一片柴蘇叁葉煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒勞復得効方入薄荷膈氣入木通叁寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入京芥霍亂入藿香煎氣厥人塩湯調下簡易方同醫方集成南北經驗方袖珍方永類

鈞方與大成同

三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦欬嗽多痰胃

滿氣短

麻黃不去杏仁不去皮尖甘草生用各等分

右為麤末每服五錢水壹盞半薑五片同煎至一盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗為度

荆芥散治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾胃膈滿悶頭痛如破者

天南星一本浸洗生薑自然汁煮軟切焙乾草烏頭去一木地荆芥穗各半石膏一兩

右為細末每服二錢陳茶末一錢生薑自然汁半呷薄荷三葉水貳盞同煎八分通口服

來蘇散解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澀嗜卧少力不思飲食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴癘寒熱往來並皆治之

荆芥穗 肉桂 不見火 桔梗 防風
五加皮 各一兩 柴胡 去蘆 甘草 炙 乾薑 各二兩 陳

橘皮 一本 麻黃 去節 芍藥 半兩 黃耆 一分
浸 炙

右為細末每服二錢水一盞薑三片同煎八分熱服不拘時常服和順三焦辟瘴氣進飲食

十神湯治時令不正瘟疫妄行此藥不問陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之

陳橘皮 去白 麻黃 節 川芎 甘草 炙 香附
子 去毛 經 驗 紫蘇 去蘆 白芷 升麻

赤芍藥各四兩○良方四兩錢玉機微義白芍乾葛良方十四兩○
半

右為細末每服三大錢微義每服半兩水一

盞半生薑五片煎七分去滓熱服不拘時

如發熱頭痛加連翹葱白參莖如中滿氣

實加枳殼數片同煎雖產婦嬰兒老人皆

可服如傷寒不分表裏以此導引經絡不

致變動功效非淺○得効方治時令不正

瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問

陰陽兩感風寒並宜服之川芎甘草炙麻

黃去根乾葛升麻去蘆赤芍藥白芷陳皮香附

子炒去毛紫蘇各四兩○永類鈐方此下云

本夾食去麻一本麻黃二兩赤芍六兩一

黃加青皮右剉散每服參錢水蒸半姜

五片煎七分去渣熱服不以時候如發熱

頭痛加連須葱白中滿氣實加枳殼煎醫方

大成集成南北經臞仙活人心治傷寒時

令不正之氣瘟疫不問陰陽二證及內外

兩感風寒腰脚疼濕痺頭疼咳嗽並皆治

之陳皮去白二錢重麻黃去節三錢重川芎二錢半香

附子三錢蘇葉二錢白芷三錢升麻三錢赤芍藥三錢

乾葛甘草各二錢重右依方修合每服生薑五

片煎服潮熱加黃芩麥門冬咳嗽加五味

子桔梗頭疼加細辛石膏心胃脹滿加枳

實半夏飲食不進加砂仁白豆蔻嘔逆加

丁香草果鼻衄出不止加烏梅乾葛腹脹

疼痛加白朮軍薑冷氣痛加良薑軍薑玄

胡索大便秘澁加大黃朴硝有痢加枳殼

當歸泄瀉加藿香肉豆蔻疹毒加官桂人

參茯苓

藿香正氣散治傷寒頭疼增寒壯熱得效方作熱

上喘欬嗽五勞七傷八般風痰五般疝氣心

腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂藏腑虛鳴山嵐

瘴癘遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小

兒疳傷並皆治之

大腹皮去白茯苓去白白芷去白紫蘇各一兩陳橘

皮去白苦梗去白白朮去白厚朴去白薑汁製半夏

麴各二兩甘草炙二兩藿香去土

右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗一

枚煎七分熱服如要出汗衣被蓋再煎併

服○得効方大腹皮洗一兩藿香洗去土厚

朴去麩皮切白朮去蘆各陳皮去白白芷

一兩苦梗去蘆白茯苓去皮甘草炙二兩半夏

湯洗七次紫蘇去土各右到散每服叁錢水一

盃半生薑三片紅棗一枚同煎熱服如欲

出汗加葱白二根以衣被蓋再煎服冷嗽

喘滿每服加人參一錢塩梅一箇杏仁七

粒去皮尖北五味子十粒就吞青州白圓

子三十五粒効氣促氣壅加人參一錢沉

香半錢心腹痛加木香半錢玄胡索七粒

切碎嘔惡甚加生薑五片木瓜二片痰嘔

加烏梅一箇寒濕腰痛腹心膨滿加生薑

三片木瓜二片蒼朮切炒枳殼煨去穰切

各半錢檳榔半箇切片一方治憂怒鬱氣

流走遍體刺痛緊滿加木香一錢縮砂五

粒名增減順氣木香散醫方大成治傷寒
 頭疼增寒壯熱或感濕氣霍亂泄瀉常服
 除山嵐瘴氣大腹皮白芷茯苓去皮紫蘇去
各二兩。永類鈐方各乙兩醫方三
集成南比經發方抽珍方各三兩藿香兩
 厚朴去皮白朮陳皮去苦梗半夏麴各
兩甘草炙二兩半。右咬咀每服二錢玉
機微義水壹盞姜三片棗一枚煎熱服
 香薷湯寬中和氣調榮衛治飲食不節饑飽
 失時或冷物過多或硬物壅駐或食畢便睡

或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾
 胃不和三腕痞滯內感風冷外受寒邪增寒
 壯熱通體疼痛自鬲滿悶霍亂嘔吐脾疼翻
 胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進參服得汗
 即愈常服益脾胃散宿痰停飲能進食辟風
 寒暑濕霧露之氣

香薷去土甘草炙白蘊豆炒厚朴去皮
二兩兩兩兩

扶神各一兩

右為末每服貳錢沸湯入塩點服不拘時

候

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並宜服之

縮砂仁 湯泡七次 杏仁 去皮尖 人參 去蘆 甘

草 各一兩 赤茯苓 去皮 藿香葉 拂去塵 白扁豆 薑汁

略木瓜 各二兩 香薷 厚朴 薑汁製各四兩

右剉每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至八分去滓不拘時候服

大全本草

外臺祕要傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始

得一二日者取真砂一兩以水一斗煮取

一升頓服覆衣被取汗忌生血物

又方斷瘟疫上等朱砂一兩細研以白蜜和

丸如麻子大常以大歲日平旦一家大小

勿食諸物面向東立各吞三七丸勿令近

齒

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用猪膽相和塗瘡上立効

張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黃額上黑及足下熱因作黑瘰大便必黑腹臃脹滿如水狀大便消者女勞得之非水也腹滿者難療消石礬石散主之消石熬黃礬石燒令汁盡二物等之合袂絹篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病

隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分

傷寒類要治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核內溺孔中

圖經曰劉禹錫傳信方著崔中丞鍊塩黑丸方塩一升擣末內麤甕瓶中實築泥頭訖初以煑火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹塩如水汁卽去火其塩冷卽凝破瓶取

之豉一升熬焦桃仁一大兩和麩熬令熟
巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須生
熟得所熟卽少力生又損人四物各用研
搗成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服叁丸
皆平旦時服天行時氣豉汁及茶下並得
服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便
止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘧茶飲
下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸
稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日

忌口兩日吐痢若多卽煎黃連汁服止之
平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇
殺藥人卽更服一兩丸投之其藥冬中合
臘月尤佳堯合子中盛貯以臘紙封之勿
令洩氣清河崔能云合得一劑可救百人
天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時或
在道途或在村落無諸藥可求但將此藥
一刀圭卽敵大黃朴消數兩曾試有效宜
行於閭里間及所使輩若小兒女子不可

服多被攪作耳唐方又有藥鹽法出於張
文仲唐之士大夫多作之

外臺秘要治天行後兩脇脹滿熬塩熨之如
小便澀亦用熨臍下

正月朝早將物去塚頭取古塼一口將呪要
斷一年無時疫懸安大門也

梅師方治時氣病骨中熱生疱瘡豌豆瘡飲
鐵漿差

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍升舶上硫黃

一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼
記箇數用二升鐺子一口先將硫黃鋪鐺
底次用巴豆安硫黃上以醞米醋半升已
來澆之蓋子蓋合令緊密更以醋紙周回
固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文
武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲約
可一半爲度急將鐺子離火便入臼中急
擣令細再以醋兩茶脚洗鐺中藥入白旋
入去皮蒸餅擣丸如雞頭大若是陰毒用

椒四十九粒葱白二莖水一盞煎至六分
 帶熱吞下一元陽毒用豆豉四十九粒葱
 白二莖水一盞同煎吞下不得嚼破患經
 五六日方可服之食前喫切在度其病勢
 可下卽與雖及日數病未傳入或未及其
 日病先在臟亦不可拘制矣有孕婦人亦
 許服或吐或瀉爲候不可喫熱食或覺心
 頭空以溫白粥或服調氣湯散補之合時
 忌婦人猫狗見

百一方天行病小腹滿不得小便細末雌黃

蜜丸如棗核大內湯孔中令入半寸亦以

竹管挂陰令痛啣之通

陳藏器云土消主傷寒時氣黃疸病煩熱湯

淋取汁頓服之莊子云蝓蟻轉丸是也

藏在土中掘地得之正圓如人捻作彌久

者佳

陳藏器云凡初覺傷寒三日內但以熱湯飲

之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差重

者亦減半
孫真人食忌主一切傷寒甘草如中指長灸
細判取童子小便一升和煎取七合空心
服日再服之
傷寒新要治傷寒三二日咽痛者與甘草二
兩炙水三升煮取一升半服五合日三
又方傷寒脈結代者心悸動方甘草二兩水
三升煮取升半服七合日三
外臺秘要比歲有病天行發斑瘡頭面及身

須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨
生不治數日必死治後瘡盤黯一歲方減
此惡毒之氣所爲以水煮升麻絲露洗之
苦酒煮彌佳但躁痛不可忍也

梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二
味同煎叁沸半服半傳瘡

梅師方傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連四
兩水三升煎取一升去滓分服之

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二

升煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

必効方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節絲裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷熱表發疸宜之則愈冬月用酒春宜川水煮之良

圖經曰治傷寒時疾發瘡癰不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡者紫草湯飲後人相承用之其効尤速
藥性論云前胡能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳

傷寒類要蠶虫蚘下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌缸中壹頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作罌口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良

治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草壹兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差

圖經曰崔元亮海上方治壹切天行取白藥研如麵漿水壹大盞空腹頓服之便仰臥壹食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疔刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥

時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度卽喫冷粥壹碗止之不喫卽困人圖經曰治傷寒欬瘧日夜不定者其方以葦澄茄三分高良薑三分二物搗羅爲散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

圖經曰治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連壹兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味搗羅爲末用猪腸

汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅壹箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十九臨卧再服甚効

治天行病心悶水中細苔擣絞汁服

經驗後方治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入塩一錢水二升煎一升溫服立効

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾

薑等分右爲麤散炒令轉色放冷再搗爲細散每壹錢水壹盞塩壹撮煎取半盞溫服

續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不主悟人急者用大附子壹箇可半兩者立劈作四片生薑壹大塊立劈作三片如中指長糯米壹撮三味以水一升煎取六合去滓如人體溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定卽別服水解散大白通關散之類

不得與冷水如渴更將滓煎與喫令人多
用有効故詳著之

圖經曰傷寒方用半夏壹升洗去滑焙乾擣
末小麥麵壹升合和以水溲令熟丸如彈
丸以水煮令麵熟則藥成初吞四五枚日
二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺病減欲
更重合亦佳禁食餻與羊肉

深師方治傷寒病嘔不止半夏熟洗洗乾末
之半薑湯服壹錢匕

圖經曰張仲景治傷寒用處尤多又有三物
備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒
暴百病其方用大黃乾薑巴豆各壹兩須
精新好者擣篩蜜和更擣壹千杵丸如小
豆服三丸老少斟酌量之爲散不及丸也若
中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣
急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若
不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與
三丸腹當鳴轉卽吐下便愈若口已噤亦

須折齒灌之藥入喉卽差

傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫真藺茹瓜甲
大內口中嚼汁嚥當微覺爲佳

傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自
然汁搗絞一斗煎取五斗稍稍飲之

圖經曰張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治
陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒
一斗乾薑一斗桂一斗凡四物咬咀著清
酒中解絮一斤細白布四丈皆并內酒中

置馬矢煨中善封塗勿使泄氣五日五夜
出布懸絮暴乾復浸之以盡其汁每漬必
晬其日乃出布絲乾之并用滓與絮複布
爲巾其布長五七尺爲六七巾卽用之生
桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至
於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗
出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無
見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨
也

傷寒類要治天行病辟瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

傷寒類要大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕

深師方療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上籠皮取裏好處薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胸中熱有瘡時飲三五合尤佳

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁

香壹兩乾柿蒂壹兩焙乾搗羅爲散每服壹錢煎人參湯下無時服

外臺秘要近効天行後兩脇脹滿臍下如水腫以穀枝汁隨意服愈

傷寒類要治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮青竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服

李畋該聞集云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家爲山魘所崇擲瓦石開戶墻不自安叟求

禱之以佛經報謝以妖祟彌盛敗謂其叟
曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿
叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止

梅師方治熱病新差早起及多食復發以梔
子十枚水三升煎取一升去滓溫服臥令
微汗若食不消加大黃三兩

又方治傷寒差後交接發動因欲死眼不開
不能語梔子三十枚水三升煎取壹升服
孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下硬者

虛煩也梔子十四枚擘鼓四合右二味以
水四升煎梔子取二升半內鼓更煎取壹
升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者
不可服嘔膿盡乃愈

濟衆方治傷寒後卒胃膈閉痛枳實壹味剉
麩炒黃爲末服二錢米飲調下壹日二服
張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主
之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各壹兩以水
四升煮四物取二升內膠每服七合日三

嘔而思水者亦主之

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

飯蘿燒作灰主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂筐也

故木砧一名百味主人病後食勞復取發當時來叅病人行止脚上下如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無卽以鼠

屑三七煮服之神効

孫真人傷寒無問陰陽神驗方以皂莢一挺肥者燒令赤爲末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

傷寒類要治黃取髮髮燒灰水服一寸七日三

外臺祕要傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子飲服一丸

傷寒類要傷寒天行病後勞復含頭垢如棗

核大一丸

人屎主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之

陶隱居云近城寺別寒空罍口入糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差

唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最効須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬

飲彌善

日華子云糞清冷臘月截苦竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡篳毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癩癩言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多小入大罐內以泥固濟大火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麵新汲水調

下三錢或未退再作差

傷寒類要治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合

又方治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕

梅師方治丈夫熱病差後交接後發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣爲灰熟水調方寸匕服

扁鵲云治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水

服方寸匕

外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡蟻者多下或張口吐舌呵呿目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

梅師方治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

外臺秘要崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎
煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱
腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾

又方救急治天行後嘔逆不下食食入卽出
取羊肝如食法作生淡食不過三度卽止
食療傷寒熱毒下血羚羊角末服之卽差
孟詵云東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治
毒黃熱病

傷寒類要治黃百藥不差煮驢頭熟以薑蘘

噉之并隨多少飲汁

食療煮獺肉汁主治時疫及牛馬疫皆煮汁
停冷灌之

圖經曰主傷寒勞復見深師方取雞子空殼
碎之熬合黃黑擣篩熱湯和一合服之溫
臥取汗山愈

外臺秘要主天行嘔逆不可食食卽出以雞
卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熱
則吞之良

廣利方治熱病後毒氣衝目痛蜂房半雨水
二升煮取一升重濾洗目日三四度治赤
白翳

蟾蜍主溫病身斑者取一枚生搗絞取汁服
之亦燒末服主狂犬咬發狂欲死

外臺秘要治勢復方用鼠屎頭尖者二十枚
豉五合水二升煮取一升并服

梅師方臆月鼠向正旦朝所居處理之辟溫
疫

百一方治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞
痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

梅師方治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛
烏梅十四箇塩五合水一升煎取一半服
此之

外臺秘要主發熱口乾小便澀取甘藷去皮
盡令喫之咽汁若口痛搗取汁服之

圖經曰張文仲治天行有支太醫桃葉湯熏
身法水一石煮桃葉取七斗以爲鋪席日

圍衣被蓋上安桃湯於床簣下乘熱自熏
停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并
灸大椎則愈陳廩丘蒸法經云連發汗汗
不出者死可蒸之如中風法以問張苗苗
曾有疲極汗出卧單簣中冷但苦寒倦四
日凡八過發汗汗不出燒地排葉蒸之則
得大汗被中傅粉極燥便差後用此發汗
得出蒸法者燒地良久掃除去火可以水
小洒取蠶沙若桃葉柏葉糠及麥麩皆可

趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取桃
葉欲落時可益收乾之以此等物著火處
令厚一三寸布席坐上溫覆用此汗出若
過熱當審細消息大熱者重席汗出周身
便止溫粉粉之勿令過此法舊云出院河
南也

傷寒類要治天行蠶下部生瘡濃煮桃皮如
糖以內下部中若口中有瘡含之

又方治溫令不相染方桃樹蠱矢末水服方

寸七

又方凡天時疫癘者常以東行桃枝細剉煮浴佳

又方治溫病食勞以杏人五兩酢二升煮取一升服之取汗差

圖經曰壓取胡麻油主天行熱祕腸結服一合則快利

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二十七麻子家人頭少許髮合麻子豆著井中

祝勅并吏其家竟年不遭傷寒辟五溫鬼外臺秘要治傷寒三五日忽有黃則宜服此取生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和之熟攪令相勻一服令盡

食療云傷寒大毒嗽飴糖於蔓菁薤汁中煮一沸頓服之

圖經曰江南人作豆豉自有一種刀豆甚佳古今方書用豉治病最多葛洪肘後方云療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥

兼療若初覺頭痛肉熱脈洪起一二日便
作此加減葱豉湯葱白一虎口豉一升懸
裹以水三升煮取一升頓服取汗若不汗
更作加葛根三兩木五升煮取二升分再
服必得汗卽差不汗更作加麻黃三兩去
節諸名醫方皆用此更有加減法甚多今
江南人凡得時氣必先用此湯服之往往
便差

傷寒類要辟溫病以新布盛大豆一斗內井

中一宿出服七粒佳

又方傷寒後男子陰易丹黍米三兩煮薄飲
酒和飲之發汗出愈隨人加減

又方治傷寒飲食勞復以麴一餅煮汁汁飲
之

藥性論云傷寒暴痢腹痛者豉一升薤白一
握切以水三升先煮薤白內豉更煮湯色黑
去豉分爲二服不差再服

梅師方治傷寒汗出不解已三四日胃中悶

吐方鼓一升塩一合水四升煎取一升半分服當吐

又方辟溫疫法熬鼓和白朮浸酒常服之

簡要濟衆主傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫鼓酒方鼓五合微炒以酒一半同煎五七沸任性稍熱服

傷寒類要治傷寒熱病後攻目生醫者燒鼓二七枚末以管吹之

又方治急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘

籠眼黃但有一候相當則以瓜蒂二小合熬赤小豆二合爲末煖漿水五合服方寸匕一炊久當吐不吐再服五分匕亦減之若吹鼻中兩三黑豆許黃水出歇

又方辟溫病菘菜如粟米酒服方寸匕日三辟五年溫

張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極効又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之

治不對病不去問之食不減尋與此藥服
 五日病減三分之一十日減三分之二二
 十日病悉去方用山茵陳山梔子各三分
 澹寮方秦艽升麻各四錢末之每用三錢
 各三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以知為
 度

葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生
 汁飲一合愈

醫方類聚卷之五十二