

7903/1383 (9)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY  
HARVARD-YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

卷三九

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher.

景岳全書

卷之九

雜證



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '雜證' and '景岳全書'.

贊

生

景岳全書卷之二十明集

雜證謨

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯

超

謙菴訂

嘔吐

嘔吐

經義

至真要大論曰諸痿喘嘔皆屬於上○諸逆衝上皆屬於火○諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

脉解篇曰太陰所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也○少陰

所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

經脈篇曰足太陰之脈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫○足厥陰肝所生病者胸滿嘔逆

舉痛論曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

六元正紀大論曰少陽所至爲嘔涌○厥陰所至爲噦痛嘔泄邪氣臟腑病形篇曰膽病者善太息口苦嘔宿汁○肝脈緩甚爲善嘔○腎脈微緩爲洞洞者食不化下嗝遺出

四時氣篇曰善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽刺禁論曰刺中膽一日半死其動爲嘔

診要經終論曰太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤

五味論曰苦走骨多食之令人變嘔

論證 共四條

嘔吐一證最當詳辨虛實實者有邪去其邪則愈虛者無邪則全由胃氣之虛也所謂邪者或暴傷寒涼或暴傷飲食或因

胃火上衝或因肝氣內逆或以痰飲水氣聚於胸中或以表邪傳裏聚於少陽陽明之間皆有嘔證此皆嘔之實邪也○所謂虛者或其本無內傷又無外感而常爲嘔吐者此旣無邪必胃虛也或遇微寒或遇微勞或遇飲食少有不調或肝氣微逆卽爲嘔吐者總胃虛也凡嘔家虛實皆以胃氣爲言使果胃強脾健則凡遇飲食必皆運化何至嘔吐故雖以寒熱飢飽犬有所傷亦不能動而茲略有所觸使不能勝使非胃氣虛弱何以若此此虛實之原所當先察庶不致誤治之害

一凡胃氣本虛而或停滯不行者是又虛中有實不得不暫從清理然後可以培補○又或雖有停滯而中氣虛困不支者是又所急在虛不得不先顧元氣而略兼清理此中本末先後自有確然之理所以貴知權也

一嘔家雖有火證詳列後條然凡病嘔吐者多以寒氣犯胃故胃寒者十居八九內熱者十止一二而外感之嘔則尤多寒邪不宜妄用寒涼等藥使非真有火證而誤用之胃強者猶或可支胃弱者必遭其虐觀劉河間曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也此言過矣若執而用之其害不小又孫真人

日嘔家聖藥是生薑此的確之見也勝於河間遠矣  
一仲景曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之此但以傷寒爲言  
也然以余之見則不但傷寒而諸證皆然何也蓋雜證嘔吐  
尤非傷寒之比其在傷寒則猶有熱邪但以熱在上焦未全  
入府則下之爲逆故不可下也若雜證之嘔吐非胃寒不能  
化則脾虛不能運耳脾胃既虛其可攻乎且上下之病氣或  
無涉而上下之元氣實相依此嘔吐之所以不可攻者正恐  
病在上而攻其下下愈虛則上愈困耳

虛嘔證治

共三條

凡胃虛作嘔者其證不一當知所辨若胃脘不脹者非實邪也  
胸膈不痛者非氣逆也內無熱躁者非火證也外無寒熱者  
非表邪也無食無火而忽爲嘔吐者胃虛也嘔吐無常而時  
作時止者胃虛也食無所停而聞食則嘔者胃虛也氣無所  
逆而聞氣則嘔者胃虛也或身背或食飲微寒卽嘔者胃虛  
也或吞酸或噯腐時苦惡心兀兀然泛泛然冷噦靡寧者胃  
虛也或因病誤治妄用克伐寒涼本無嘔而致嘔者胃虛也  
或朝食暮吐暮食朝吐食入中焦而不化者胃虛也食入下  
焦而不化者土母無陽命門虛也凡此虛證必皆宜補是固

然矣。然胃本屬土，非火不生，非煖不化，是土寒者即土虛也。土虛者即火虛也。故曰脾喜煖而惡寒，土惡濕而喜燥。所以東垣脾胃論特著溫補之法，蓋特爲胃氣而設也。庸可忽哉。第在河間則言嘔因胃火，是火多實也。茲余言嘔因胃寒，是寒多虛也。一熱一寒，若皆失中和之論，不知嘔因火者，余非言其必無，但因火而嘔者少，因寒而嘔者多耳。因胃實而嘔者少，因胃虛而嘔者多耳。故不得不有此辨。

一虛嘔之治，但當以溫胃補脾爲主。宜人參理中湯爲正治，或溫胃飲、聖木煎、參薑飲之類，亦可酌用。或黃芽丸尤爲最妙。

○若胃口寒甚者，宜附子理中湯，或四味回陽飲，或一炆丹主之。○若虛在陰分，水泛爲痰而嘔吐者，宜金水六君煎。虛甚者，宜理陰煎，或六味回陽飲。○若久病胃虛不能納穀者，俱當以前法酌治之。○若胃氣微虛而兼痰者，宜六君子湯主之。

一凡中毒而吐者，當察其所中者何物。蓋中熱毒而吐者，宜解以苦寒之劑。中陰寒之毒而吐瀉不止者，宜解以溫熱之劑。若因吐瀉而脾胃致虛者，非大加溫補不可。○此證有中寒毒吐瀉，治按在後，當並閱之。

實嘔證治 共九條

凡實邪在胃而作嘔者必有所因必有見證若因寒滯者必多  
疼痛因食滯者必多脹滿因氣逆者必痛脹連於脇肋因火  
鬱者必煩熱燥渴脉洪而滑因外感者必頭身發熱脉數而  
緊如無實證實脉而見嘔吐者切不可實邪論治

一寒邪犯胃而作嘔者其證有三○一以食飲寒涼或誤食性  
寒生冷等物致傷胃氣因而作嘔若果寒滯未散而兼脹兼  
痛者宜溫中行滯以大小和中飲神香散或二陳湯加薑桂  
之類主之或和胃飲亦佳○一以陰寒氣令或雨水沙氣及

水土寒濕之邪犯胃因而作嘔作泄若寒滯未散而或脹或  
痛者宜溫中散寒以平胃散神香散加減二陳湯除濕湯局  
方四七湯大七香丸之類主之○一以風寒外感或傷寒或  
疹癘凡邪在少陽表邪未解而漸次入裏所以外為寒熱內  
為作嘔蓋少陽之經下胸中貫膈而然此半表半裏證也治  
宜解表散寒以柴陳煎小柴胡湯正柴胡飲之類主之若微  
嘔微吐者邪在少陽若大嘔大吐者此又邪在陽明胃家病  
也宜二陳湯或不換金正氣散藿香正氣散之類主之若胃  
虛兼寒者惟理中湯溫胃飲之類為宜



一飲食傷胃而作嘔者。如果留滯未消。而兼脹痛等證。宜大和中飲。排氣飲。神香散之類。主之。或啓脾丸。亦可酌用。○如食已消。而嘔未止者。宜溫胃飲。主之。

一火在中焦。而作嘔者。必有火證。火脈。或爲熱渴。或爲燥煩。脈必洪數。吐必湧猛。形氣聲色。必皆壯麗。若察其真有火邪。但降其火。嘔必自止。○火微兼虛者。宜外臺黃芩湯。或半夏瀉心湯。○火甚者。宜抽薪飲。或大小分清飲。○若暑熱犯胃。多渴多嘔。氣虛煩燥。而火有不清者。竹葉石膏湯。○若熱甚嘔吐不止。而火在陽明。兼頭痛者。白虎湯。或太清飲。或六一散。

○若胃暑嘔吐。而火不甚者。宜香薷飲。或五物香薷飲。○此有胃火。治按在後。

一痰飲留於胸中。或寒濕在胃。水停中脘。而作嘔吐者。宜和胃。二陳煎。苓朮二陳煎。或小半夏加茯苓湯。橘皮半夏湯之類。皆可酌用。

一氣逆作嘔者。多因鬱怒。致動肝氣。胃受肝邪。所以作嘔。然胃強者。未必易動。而易動者。多因胃虛。故凡治此者。必當兼顧胃氣。宜六君子湯。或理中湯。主之。○若逆氣未散。或多脹滿者。宜二陳湯。或橘皮半夏湯之類。主之。或神香散。亦佳。

一瘧痢作嘔者其在瘧疾則以表邪內陷凡邪在少陽陽明太陰者皆能作嘔但解去表邪嘔必自止○其在痢疾之嘔則多因胃氣虛寒蓋表非寒邪無以成瘧裏非寒邪無以成痢而病不知本尚何醫云二證方論具載本門

一朝食午吐午食晚吐或朝食暮吐詳後反胃門

一方治嘔吐之極或反胃粥湯入胃卽吐垂死者用人參煮粥食之卽不吐水一升煮四合熱服日再進兼以人參煮粥食之卽不吐

### 吐蚘

凡吐蚘者必因病而吐蚘非因蚘而致吐也故不必治其蚘而

但治其所以吐則蚘自止矣○有因胃火而吐蚘者以內熱之甚蚘無所容而出也但清其火火清而蚘自靜輕者抽薪飲甚者萬應丸之屬是也○有因胃寒而吐蚘者以內寒之甚蚘不能存而出也但溫其胃胃煖而蚘自安仲景烏梅丸之屬是也○有因胃虛無食而吐蚘者以倉廩空虛蚘因求食而上出也此胃氣大虛之候速宜補胃溫中以防根本之敗如溫胃飲理中湯聖木煎之屬是也○以上三者固皆治蚘之法然蚘有死者有活者若吐死蚘則但治嘔如前可也若活蚘上出不已則不得不有以逐之蓋蚘性畏酸畏苦但

加烏梅爲佐使則虻自伏也若胃實火盛者可加苦楝根或黃連亦善○其有未盡者俱詳列諸蟲本門及後條吐虻治按中

○○治嘔氣味論

凡治胃虛嘔吐最須詳審氣味蓋邪實胃強者能勝毒藥故無論氣味優劣皆可容受惟胃虛氣弱者則有宜否之辨而胃虛之甚者則於氣味之間關係尤重蓋氣虛者最畏不堪之氣此不但腥臊耗散之氣不能受卽微香微郁并飲食之氣亦不能受而其他可知矣胃弱者最畏不堪之味此非惟至

苦極劣之味不能受卽微鹹微苦并五穀正味亦不能受而其他可知矣此胃虛之嘔所以最重氣味使或略有不投則入口便吐終無益也故凡治陽虛嘔吐等證則一切香散鹹酸辛味不堪等物悉當以己意相測測有不妥切不可用但補其陽陽回則嘔必自止此最確之法不可忽也余嘗見一沈姓者素業醫極多勞碌且年及四旬因患癩疔下墜欲提使上升自用鹽湯吐法不知胃虛畏鹹遂致吐不能止湯水皆嘔如此者一日一夜忽又大便下黑血一二碗而脉則微渺如毛幾如將絕此蓋吐傷胃氣脾虛之極兼以鹽湯走血

故血不能攝從便而下余令其速用人參薑附等劑以回垂絕之陽庶乎可療忽又一醫至曰諸逆衝上皆屬火也大便下血亦因火也尚堪用參附乎宜速飲童便則嘔可愈而血亦止矣其人以為有理及童便下咽即嘔極不堪名狀嘔不止而命隨繼之矣嗚呼夫以胃強之人亦且聞尿欲嘔况嘔不能止而復可加以尿乎此不惟死者堪憐而妄用若此者尚敢稱醫誠可惡可恨也故筆之於此并以徵氣味之證○又別有氣味治按在小兒門嘔吐條中所當參酌

述古 共五條

王太僕曰內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也

金匱要畧曰先嘔却渴者此為欲解先渴卻嘔者為水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲○問曰病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者何也曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之今脉反弦故名曰虛○病人欲吐者不可下之○嘔而胸滿者茱萸湯主之○嘔而吐涎沫頭痛者茱

黃湯主之。○嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之。○乾嘔而利者黃芩半夏生薑湯主之。○諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之。○嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之。○嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治。○四逆湯主之。○嘔而發熱者小柴胡湯主之。○胃反嘔吐者大半夏湯主之。○食已即吐者大黃甘草湯主之。○胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之。○乾嘔吐逆吐涎沫者半夏乾薑散主之。○病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈者生薑半夏湯主之。○乾嘔噦若手足

厥者橘皮湯主之

朱丹溪曰胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生薑。○有久病嘔者胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白木香附之類。○嘔吐朱奉議以半夏橘皮生薑為主。○劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳。○有痰膈中焦食不得下者。○有氣逆者。○有寒氣鬱於胃口者。○有食滯心肺之分新食不得下而反出者。○有胃中有火與痰而嘔者。○嘔吐藥忌瓜蒌杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆能作吐。○肝火出胃逆上嘔吐者柳青丸。○夏月嘔吐不止五苓散加薑汁。○吐虫用炒錫

灰、檳榔末、米飲服。○胃中有熱者，二陳湯加薑、芩、連。○惡心  
有熱有痰有虛，皆用生薑入藥。

薛立齋曰：若脾胃氣虛，而胸膈不利者，用六君子湯，壯脾土，生  
元氣。○若過服辛熱之劑，而嘔吐噎膈者，用四君子加芎歸。  
蓋脾土以抑陰火。○胃火內格而飲食不入者，用六君子加  
芩、連，清熱養胃。○若病嘔吐，食入而反出者，用六君子加木  
香、炮薑，溫中補脾。○若服耗氣之劑，血無所生，而大便燥結  
者，用四君子加芎歸，補脾生血。○若火逆衝上，食不得入者，  
用四君子加山梔、黃連，清熱養血。○若痰飲阻滯，而食不得

入者，用六君子加木香、山梔，補脾化痰。○若脾胃虛寒，飲食  
不入，或入而不化者，用六君子加木香、炮薑，溫補脾胃，更非  
慎房勞，節厚味，調飲食者，不治。年高無血者，亦不治。

徐東臯曰：胃虛嘔吐惡食，不思食，兼寒者惡寒，或食久還吐，或  
朝食暮吐，暮食朝吐，脉遲而微瀯，此皆虛寒者也。宜藿香安  
胃散，理中湯，甚者丁香煮散，溫補。○胃中鬱熱，飲食積滯，而  
嘔者，則惡食惡寒，煩悶膈滿，或渴喜涼，聞食則吐，服藥亦吐。  
脉洪大而數，此皆實熱者也。宜竹茹湯、麥門冬湯清之。若食  
積多者，用二陳加神麩、麥芽、黃連、保和丸之類消導之。

中寒毒吐瀉脹滿新按

凡胃寒者多爲嘔吐而中寒毒者又必吐而兼瀉余在燕都嘗治一吳參軍者因見鮮蘑菇肥嫩可愛令庖人買而羹之以致大吐大瀉延彼鄉醫治之咸謂速宜解毒乃以黃連黑豆桔梗甘草枳實之屬連進之而病益甚遂至胸腹大脹氣喘水飲皆不能受危窘已甚延救於余投以人參白朮甘草乾薑附子茯苓之類彼疑不敢用曰腸脹氣急口乾如此安敢再服此藥乃停一日而病愈劇若朝露矣因而再懇與藥如前彼且疑且畏而決別於內閫曰必若如此則活我者此也

殺我者亦此也余之生死在此一舉矣遂不得已含淚吞之一劑而嘔少止再劑而脹少殺隨大加熱地黃以兼救其瀉亡之陰前後凡二十餘劑復元如故彼因問曰余本中毒致病鄉人以解毒而反劇先生以不解毒而反愈者何也余曰毒有不同豈必如黃連甘桔之類乃可解耶卽如蘑菇一物必產於深坑枯井或沉寒極陰之處乃有之此其得陰氣之最盛故肥白最嫩也公中此陰寒之毒而復解以黃連之寒其謂之何茲用薑附非所以解寒毒乎用人參熱地非所以解毒傷元氣乎然則彼所謂解毒者適所以助毒也余所謂

不解毒者正所以解毒也。理本甚明，而人弗能辨。凡諸病之誤治者，無非皆此類耳。公頓首愀然嘆曰：信哉！使非吾丈幾為舍寃之魄矣。祈壽諸梓，以為後人之鑑云。

胃火上衝嘔吐新按

一金宅少婦宦門女也。素任性，每多胸脇痛及嘔吐等證。隨調隨愈。後於秋盡時，前證復作，而嘔吐更甚。病及兩日，甚至厥脫不省，如垂絕者。再後延予至，見數醫環視，僉云：湯飲諸藥皆不能受，入口卽嘔，無策可施。一醫云：惟用獨參湯，庶幾可望其生耳。余因診之，見其脈亂數甚，而且煩熱躁擾，莫堪名。

狀意非陽明之火，何以急劇若此？乃問其欲冷水否，彼卽點頭。遂與以半鍾，惟此不吐，且猶有不足之狀。乃復與一鍾，稍覺安靜。余因以太清飲投之，而猶有謂此非傷寒。又值秋盡，能堪此乎？余不與辨。及藥下咽，卽酣睡半日，不復嘔矣。然後以滋陰輕清等劑調理，而愈。大都嘔吐多屬胃寒，而復有火證。若此者，經曰：諸逆衝上，皆屬於火。卽此是也。自後凡見嘔吐，其有聲勢湧猛，脈見洪數，證多煩熱者，皆以此法愈之。是又不可不知也。

吐衄新按



一胡宅小兒年甫三歲偶因飲食不調延幼科診治所用之藥無非清火化滯等劑因而更損胃氣反致嘔吐溏泄復加清利遂致吐虻初止數條漸至數十條細如燈草甚至成團攪結而出早晚不絕所下者亦如之羸困至極求治於予因與溫胃飲二三劑其虫朝夕不止其多如故初不識其何所從來而神化之速一至如此乃翁切懇曰止此一兒死生在公矣萬望先逐此虫虫不盡則病日甚其能生乎予弗之聽但以前藥倍加人參仍加附子二三劑而嘔吐漸稀瀉亦隨止瀉止後乃以理陰煎溫胃飲出入間用十餘日而虫漸少一

**因**月餘而飲食進肌肉生復元如故矣其翁積誠稱謝因問曰小豚之病誠然危矣今何以不治虫不治嘔泄而三者俱愈可聞教乎予曰公之所畏者虫也予之所畏者胃氣也且凡逐虫之藥無有不傷胃氣者向使胃氣再傷非惟不能逐虫而命必隨之矣其害孰甚故保生之權全在知本知末但使脾胃日強則拔去化虫之源而三病同歸一得矣尙何虫瀉之敢橫哉聞者嘆服因祈著按於此

又一王宅少婦年未二旬素喜瓜果生冷因常病心腹疼痛每發必數日不食後及二旬之外則每發必至吐虻初吐尙

少自後日甚日多每吐必一二十條每發必旬日不食所經諸醫但知攻虫旋去旋生百藥不效予為診視脉證并察病因知其傷於生冷以致脾胃虛寒陰濕氣聚故為此證使不溫養脾胃以杜寒濕化生之源而但事攻虫虫去復生終無濟也因製溫臟丸與之藥未完而病隨愈矣後因病愈而少年任意仍耽生果舊病復作再製丸服乃得全愈○觀此二證如前之小兒乃因涼藥傷脾所以生虫後之女人乃因生果傷胃所以生虫可見陰濕內淫而脾胃虛寒是即生虫之由也故凡治虫之法但察其別無疝熱等證者悉當以溫補脾胃為主

嘔吐論列方

二陳湯 和一

理中湯 熱一

附子理中湯 熱二

理陰煎 新熱三

四君子湯 補一

加減二陳湯 和一

溫胃飲 新熱五

六君子湯 補五

金水六君煎 新和一

聖木煎 新熱二五

神香散 新和二十

四逆湯 熱十四

黃芽丸 新熱二一

四味回陽飲 新熱一

參薑飲 新熱八

啓脾丸 和八六

和味飲 新和五

平胃散 和十七

六味回陽飲 新熱二

五苓散 和一八二

橘皮湯 和十一  
熱五七

和胃二陳煎 新和三

一炁丹 新熱二二

除濕湯 和一七七

苓朮二陳煎 新和四

排氣飲 新和六

茱萸湯 熱一三八

生薑半夏湯 熱五三

猪苓散 和一二五

竹茹湯 和一二一

半夏乾薑散 熱五四

保和丸 小三五

萬應丸 攻九九

茯苓澤瀉湯 熱七五

六一散 寒百十二

香薷飲 和一六九

五物香薷飲 和百七十

白虎湯 寒二

六清飲 新寒十三

藿香安胃散 熱七二

抽薪飲 新寒三

黃芩湯 和一九八

藿香正氣散 和二十

柴陳煎 新散九

柳青丸 寒一四九

橘皮半夏湯 和十二

大半夏湯 和十

小半夏湯 和八

半夏瀉心湯 寒二八

大分清飲 新寒五

小分清飲 新和十

局方四七湯 和九七

大和中飲 新和七

竹葉石膏湯 寒五

正柴胡飲 新散六

麥門冬湯 寒四四

大黃甘草湯 攻十三

不換金正氣散 和二一

黃芩半夏生薑湯 和十六

論外備用方

獨參湯 補三六

小和中飲 新和八

小柴胡湯 散十九

仲景烏梅丸 和三二二三

丁香煮散 熱六二

大七香丸 和一三一

小半夏茯苓湯 和九

參朮湯 補四一

參苓白朮散 補五五

參附湯 補三八

五味異功散 補四

金匱大建中湯 補二三  
寒上衝

大建中湯 補二五  
寒嘔

香砂六君湯 補七

二木二陳湯 和四  
吐清水

益黃散 和十九  
脾寒氣滯

治中湯 熱十  
中氣不和

茯苓半夏湯 和十二  
水氣嘔

葛花解醒湯 和一二四

青州白丸子 和百十二

半夏丁香丸 和百三十  
寒滯

檳榔煎 和二三六  
寒濕瘴

保和湯 和四七  
散邪順氣

丁香半夏丸 和一二九  
寒痰

陳皮湯 和百二十  
和胃

六和湯 和一二七  
和胃

橘半胃苓湯 和一九

旋復花湯 散八三

胃愛散 熱七一  
虛寒滯

理中加丁香湯 熱四  
中寒

甘露湯 熱七四  
和胃

丁附散 熱六三  
胃寒

丁香溫中湯 熱十一  
和胃

安脾散 熱六八  
冷痰飲

倍木丸 熱百五  
飲嘔

丁香茯苓湯 熱六四  
溫中行滯

養胃湯 熱七十  
虛寒氣滯

補脾湯 熱六九  
虛滯

理中化痰丸 熱九  
虛痰

養正丹 熱一八九  
氣壅不降

八味理中丸 熱七  
虛寒

五味沉附湯 熱百十七  
胃寒

吳茱萸湯 熱一三八  
頭痛嘔

胡椒理中湯 熱六  
虛寒

橘皮乾薑湯 熱五六  
胃寒嘔

七味人參丸 熱七三  
虛寒

甘艸乾薑湯 熱五五  
脾寒

藿香安胃散 熱七三  
寒滯

草豆蔻湯 熱七七  
調氣

丁香柿蒂散 熱六五  
胃寒

# 霍亂

經義

經脈篇曰足太陰厥氣上逆則霍亂

氣交變大論曰歲土不及民病飧泄霍亂

六元正紀大論曰不遠熱則熱至熱至則身熱吐下霍亂○太

陰所至爲中滿霍亂吐下。○士鬱之發爲嘔吐霍亂。

論證 共三條

霍亂一證以其上吐下瀉反覆不寧而揮霍撩亂故曰霍亂此寒邪傷臟之病也蓋有外受風寒寒氣入臟而病者有不慎口腹內傷食飲而病者有傷飢失飽飢時胃氣已傷過飽食不能化而病者有水土氣令寒濕傷脾而病者有旱潦暴雨清濁相混誤中沙氣陰毒而病者總之皆寒濕傷脾之證邪在脾胃則中焦不能容受故從上而出則爲吐從下而出則爲瀉且凡邪之易受者必其脾氣本柔而既吐既瀉則脾氣

一不無更虛矣故凡治霍亂者必宜以和胃健脾爲主健者培補之謂因其邪氣已去而胃氣受傷故非培補不可也和者調和之謂以其胃氣雖傷而邪猶未盡故非察其邪正而酌爲調和不可也若其寒少滯多則但以溫平之劑調之可也若滯因於寒則非溫熱之劑不能調也而諸家有言爲火者謂霍亂之病多在夏秋之間豈得爲之傷寒乎吁謬亦甚矣不知夏秋之交正多臟寒之病蓋一以盛暑將殺新涼初起天人易氣寒之由也一以酷暑當令生冷不節疾病因時寒之動也人以夏秋之外熱易見而臟腑之內寒難見故但知

用熱遠熱而不知用寒遠寒見之淺陋多有如此此所以多致誤也學者於此當熟察之

一轉筋霍亂證以其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸痛迫小腹最爲急候此足陽明厥陰氣血俱傷之候也觀河間曰轉筋經云反戾也熱氣燥爍於筋則攣而痛火主燔燥燥動故也或以爲寒客於筋者誤也蓋寒雖主於收引然止爲厥逆禁固屈伸不便安得爲轉筋也所謂轉者動也陽動陰靜熱證明矣丹溪亦曰轉筋屬血熱余謂此二子之言總屬一偏之見不可從也試以內經質之不有曰經筋之病寒則

反折筋急熱則筋弛縱不收此轉筋者謂非反折筋急之病乎而何以謂之熱也夫所謂轉者以其堅強急痛有如扭轉之狀是謂轉筋今西北方以轉字作去聲者卽其義也而河間曰轉者動也則不爲強矣且凡患轉筋者必於大吐大瀉之後乃有此證未聞於吐瀉之前而先見轉筋者也若轉於吐瀉之前而謂之火猶可云因火而病也既轉於吐瀉之後則上下皆已火去豈因吐瀉而反生火耶又何以吐瀉之前火不轉耶河間其何以解之蓋陽明爲五臟六腑之海主潤宗筋此證以陽明血氣驟損筋急而然本非火也觀無擇陳

氏曰轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐下津液頓  
亡外感四氣內傷七情攻閉諸脉枯削於筋宗筋失養必致  
攣縮甚則卵縮舌卷爲難治此說始爲切當若從河間而作  
火治能無誤乎余故曰不可從也

一夏秋新涼之交或疾風暴雨或乍寒乍煖之時此皆陰陽相  
駁之際善養生者最於此時宜慎凡外而衣被內而口腹宜  
增則增宜節則節略爲加意則卻疾亦自不難其或少有不  
調而爲微寒所侵則霍亂吐瀉攪腸腹痛瘧痢之類頃刻可  
至此其所忽者微而所害者大也且膏粱與藜藿不同薄弱  
與強壯迥異矧強者猶不可恃強而弱者顧可以忘弱耶此  
自珍者之不可忽也

論治 共七條

一霍亂初起當陰陽擾亂邪正不分之時惟宜以薑鹽淡湯徐  
徐與之令其徐飲徐吐或以二陳湯探吐之則吐中自有發  
散之意必俟滯濁大出胃氣稍定乃察其有無泄瀉有無脹  
滿有無嘔惡以辨邪正虛實然後隨其證而調理之自無不  
愈者但於吐瀉擾亂之後胃氣未清邪氣未淨之時凡一切  
食飲之類寧使稍遲切不可急與粥湯以致邪滯復聚則爲



害不小也。不可不慎。亦不可妄用涼藥。

一霍亂初起。胃口不清。邪氣未淨。或脹或痛。而嘔惡不止。察其邪甚於上者。宜和胃飲。神香散。或平胃散。擇而用之。邪甚於下者。宜五苓散。胃苓湯。或苓朮二陳煎之類。主之。

一霍亂無脹無痛。而但嘔惡不寧者。此脾胃受傷。虛寒證也。若胃氣微虛兼滯者。宜六君子湯。或溫胃飲。主之。○若但虛無滯者。宜理中湯。或五君子煎。主之。○若虛而無寒者。止用四君子湯。或五味異功散。亦可。○若虛在陰分。水中無火。因瀉而嘔惡不已。胸腹膨脹者。必用理陰煎。或去當歸。加入參。主之。○若吐利。四肢拘急。脈沉而遲。此脾腎證也。宜四君子加薑附厚朴。或理陰煎。主之。

一霍亂雜證。凡霍亂後身熱不退。脈數無汗者。宜酌其虛實。於前治法中。加柴胡。主之。寒邪甚者。宜用麻黃。○吐利。脈浮自汗者。宜四君子。加桂枝。主之。○吐利。頭痛。身熱而渴者。宜五苓散。○吐利。因於過食。或瓜果生冷。以致食留不化。遂成痞隔。霍亂者。宜大小和中飲。或六和湯。主之。若生冷寒勝者。宜加炮薑。肉桂。吳茱萸之類。○元戎曰。大陰證。霍亂者。理中加橘紅。名治中湯。若吐下心腹作痛。手足逆冷。理中去白朮。加

熱附子名四順湯若吐利後轉筋者理中加火煨石膏一兩  
一轉筋腹痛者因胃氣暴傷以致陽明厥陰血燥筋攣而然法  
當養血溫經乃爲正治若邪滯未清者或先宜和胃飲加肉  
桂木瓜主之○若氣虛者宜四君子湯加當歸肉桂厚朴木  
瓜之類○陰虛少血者宜理陰煎加肉桂木瓜主之○又治  
轉筋法男子以手挽其陰女子以手揪兩乳此千金法也

一乾霍亂證最爲危候其證則上欲吐而不能出下欲瀉而不能  
能行胸腹攪痛脹急悶亂此必內有飲食停阻外有寒邪閉  
遏蓋邪淺者易於行動故卽見吐利邪深者陰陽格拒氣道

不通故爲此證若不速治多致暴死宜先用鹽湯探而吐之

一以去其滯隔一以通其清氣但使清氣得升然後濁氣得  
降從瀉而出斯不致害藥以溫中散滯破氣等劑庶乎胃氣  
可舒而邪隨以散宜排氣飲加減主之或神香散或局方七  
氣湯亦可酌用○向余荆人患此幾致不救有治按在腹痛  
門

一霍亂之後多有煩渴者此以吐利亡津腎水乾涸故渴欲飲  
水勢所必然但宜溫煖調脾以止吐瀉脾氣得和渴將自止  
或以獨參湯徐徐與之最妙法也○其有本以陽臟而因瀉

亡陰或見火盛喜冷內熱脈洪者宜益元散或竹葉石膏湯之類甘涼以濟之亦無不可

述古 共三條

仲景曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之○

寒多不欲水者理中丸主之○若臍上築者腎氣動也去朮

加桂四兩

此下即理中湯加減法

○吐多者去朮加生薑三兩○下多

者還用朮○悸者加茯苓二兩○渴欲得水者加朮足前成

四兩半○腹中痛者加人參足前成四兩半○寒者加乾薑

足前成四兩半○腹滿者去朮加附子一枚○服湯後如食

須飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被○吐利止而身痛不

休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之○吐利汗出發熱

惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之○即吐且利小便

復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主

之○吐已下斷汗出而厥四肢拘急而解脈微欲絕者通脈

四逆加豬膽汁湯主之○吐利發汗脈平小煩者以新虛不

勝穀氣故也

巢氏病源曰霍亂吐瀉皆由溫涼不調陰陽殺混二氣相干致

脾胃受傷變為霍亂寒氣客於脾則瀉客於胃則吐亦由飲

酒食肉腥膾生冷過度或因坐卧濕地當風取涼使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷水穀不消皆成霍亂

陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐利並作甚至轉筋入腹霍亂惡證無越於斯蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逸治之惟宜溫煖更詳別三因以調之○外因諸風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重著傷暑則熱煩○內因九氣所致鬱聚痰涎痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利○不內外因或諸飽食膾炙

恣飲乳酪永脯寒漿旨酒胃既臙脹脾臟停凝內鬱必遂發成吐利當從不內外因也

### 鍼灸法

刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今西北人凡病傷寒熱入血分而不解者悉刺兩手臙中出血謂之打寒蓋寒隨血去亦卽紅汗之類也故凡病受寒霍亂者亦宜此法治之今東南人有括沙之法以治心腹急痛蓋使寒隨血聚則邪達於外而臟氣始安此亦出血之意也

霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈

霍亂危急將死用鹽填臍中灸二七壯立愈  
轉筋十指拘攣不能屈伸灸足外踝骨尖上七壯

霍亂論列方

四君子湯 補一  
五君子煎 新熱六

六君子湯 補五  
大和中飲 新和七

小和中飲 新和八  
二陳湯 和一

神香散 新和二十  
平胃散 和十七

和胃飲 新和五  
溫胃飲 新熱五

胃苓散 和百九十  
五苓散 和一八二

四逆湯 熱十四  
理中湯 熱一

理陰煎 新熱三  
獨參湯 補三六

六和湯 和一二七  
排氣飲 新和六

益元散 寒百十二  
理中丸 熱一

桂枝湯 散九  
五味異功散 補四

苓朮二陳煎 新和四  
局方七氣湯 和五十

竹葉石膏湯 寒五  
四逆加豬膽汁湯 熱十六

論外備用方

人參散 和一二六  
縮脾飲 和一七三  
胃寒 暑毒

藿香正氣散 和二十 風寒

丁香散 和一二八 氣逆

治中湯 熱十 中氣不和

吳茱萸湯 熱一三九 陰暑

木瓜湯 熱八三 轉筋

大順散 熱七八 寒濕

薑附湯 熱三二 厥冷轉筋

冷香湯 熱八二 生冷滯

霍亂三方 熱八五

乾霍亂二方 熱八七

養正丹 熱一八九 氣壅滯

訶子散 熱八四 老幼皆宜

四順附子湯 熱九七 陰寒

冷香飲子 熱八一 陰暑

千金霍亂方 熱八六

附子粳米湯 熱八十 四逆乾嘔

# 惡心噯氣

經義

宣明五帝篇曰五氣所病心為噯

脉解篇曰大陰所謂上走心為噯者陰盛而上走於陽明陽明

絡屬心故曰上走心為噯也

經脉篇曰足太陰病則舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噯得後

與氣則快然如衰

口問篇曰人之噯者何氣使然曰寒氣客於胃厥逆從下上散

復出於胃故爲噫

陰陽別論曰二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥痺論曰心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘噤乾善噫

三部九候論曰若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦噫

至真要大論曰歲厥陰在泉風淫所勝民病隔咽不通食則嘔

腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重○太陽司天寒

淫所勝民病胸脇胃脘不安面赤目黃善噫噤乾甚則色炁

渴而欲飲病本於心○少陰之復燠熱內作外爲浮腫爲噦

噫

四時刺逆從論曰刺五臟中心一日死其動爲噫

診要經終論曰大陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔

惡心證治

內經無惡心之說凡嘔吐證即其類也經義詳見本門

共三條

惡心證胃口泛逆兀兀不寧之病凡惡心欲吐口必流涎噦之

不下愈噦愈惡而嘔吐繼之亦有不嘔吐而時見惡心者然

此雖曰惡心而實胃口之病非心病也此證之因則有寒有

食有痰飲有穢氣有火邪有陰濕傷胃或傷寒瘧痢諸邪之

在胃口者皆得有之若欲察之但當察其虛實寒熱則盡之

矣蓋實邪惡心者邪去則止其來速其去亦速虛邪惡心者

必得胃氣大復其病方愈且此證惟虛寒者十居八九卽有實邪嘔惡者亦必其脾氣不健不能運化而然此所以凡治惡心者必當知其實中有虛勿得妄行攻擊而胃氣不可不顧也

一虛寒惡心其證最多若非猝暴而常見或形氣不足之輩悉以胃氣弱也故凡治此者多宜以溫補爲主○若脾胃微虛生痰或兼吞酸噯腐欬嗽惡心者宜六君子湯○若脾腎虛寒痰滯欬嗽而惡心者金水六君煎○若脾胃虛寒或太陰自利腹痛嘔吐惡心者溫胃飲或理中湯聖水煎○若脾腎

虛寒上下不能運行或脹滿或嘔吐或傷寒陰證寒邪滲入三陰而惡心嘔吐不止者理陰煎或溫胃飲

實邪惡心以一時邪滯犯胃得吐則滯去滯去則惡心自解若有除邪如法治之○若惡心多痰及風寒欬嗽或傷生冷或飲酒過多脾胃不和者二陳湯或橘皮半夏湯○若脾胃多滯或寒濕傷脾惡心者平胃散○若胃寒多滯或傷生冷或寒痰不清吞酸脹滿惡心者和胃飲或和胃二陳煎○若受穢濁寒邪脹滿腹痛惡心者調氣平胃散○若感冒暑熱火盛煩燥惡心者仲景竹葉石膏湯○若中藥毒或諸毒而



惡心者速宜於諸毒門求法治之

噯氣證治 共三條

噯氣者卽內經之所謂噫也。此實脾胃之氣滯起自中焦而出於上焦。故經曰上走心爲噫也。據丹溪曰噯氣以胃中有痰有火。愚謂此說未必皆然。蓋噯氣多由滯逆滯逆多由氣不行氣逆不行者多寒少熱可皆謂之火耶。故凡人之飲食太飽者多有此證。及飲食不易消化者亦有此證。但太飽作噯者此係胃氣虛寒治宜溫補。若痰火作噯者亦或有之。但停痰必以胃弱胃弱多因無火。此當詳辨脈證而酌治之也。

一治噯之法。凡胃虛兼滯而作噯者宜十味保和湯或枳殼散。若胃寒氣滯作噯者和胃煎。若胃寒生痰嘔惡噯氣者宜和胃二陳煎。若胃氣虛寒飲食難化時常虛飽噯氣者宜溫胃飲或養中煎。理中湯。若脾腎虛寒命門不煖陰邪不降則寒滯上焦而痞滿噯氣者理陰煎。加減治之。

一丹溪曰噯氣以胃中有痰有火宜用半夏南星香附軟石膏梔子或湯或丸服。○按此治必真有火邪者乃可用否則恐滯於中而噯愈甚。

惡心論列方

理中湯 熱一

溫胃飲 新熱五

金水六君煎 新和一

聖木煎 新熱二五

理陰煎 新熱三

養中煎 新熱四

和胃二陳煎 新和三

二陳湯 和

和胃飲 新和五

橘皮半夏湯 和十三

枳殼散 和一四六

平胃散 和十七

十味保和湯 和一四八

六君子湯 補五

調氣平胃散 和十八

竹葉石膏湯 寒六

論外備用方

胃愛散 熱七一

祛痰丸 和百三

香砂六君子湯 補七

香齋六君子書

蕭子

胃受錯

燕子

蘇燕丸

味百三

論水齋用六

景岳全書卷之二十一明集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

# 吞酸

經義

至真要大論曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱○少陽之勝嘔

酸善饑

辨證

共五條

吐酸一證在河間言其爲熱在東垣言其爲寒夫理有一定奚  
容謬異若此豈理因二子可以易乎必二子於理有一悖耳  
此余之不能無言者乃以東垣爲是而以河間爲非也何以  
見之蓋河間之說實本內經經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬  
於熱故河間病機悉訓爲火而甚以主寒者爲非不知內經  
此論乃以連氣所屬概言病應非以嘔吐注泄皆爲內熱病  
也如果言熱則何以又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而  
嘔也又曰太陽之復心胃生寒胸中不和唾出清水及爲噦  
噫此言嘔吐之有寒也豈皆熱耶又曰太陽之勝寒入下焦

傳爲濡泄此言泄瀉之有寒也豈亦熱耶由此觀之則其此  
處言熱而被復言寒豈非自相矛盾能無謬乎不知內經之  
理圓通詳悉無不周備故有此言其常而被言其變者有此  
言其順而被言其逆者有此篇未盡而足之他論者有總言  
所屬而詳言所病者此內經之玄所以不易窮也故凡善觀  
此者務宜悟其源流察其分合其傳也必爛其爲千爲萬其  
約也必貫其總歸一理夫如是斯足稱明眼人矣倘不能會  
其顛末而但知管測一斑又烏足以盡其妙哉矧復有不明  
宗旨悖理妄談謬借經文證已偏見者尙難枚舉無暇辨也

茲因二子之論故并及之而再悉於左觀者其加政焉

一辨河間吐酸之論爲非據河間曰酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易於酸矣或言吐酸爲寒者誤也所以妄言爲寒者但未多傷生硬粘滑或傷冷物而爲噫酸吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知經言人之傷於寒也則爲病熱故凡內傷冷物者或卽陰勝陽而爲病寒者或寒熱相擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者亦有內傷生冷而反病熱得大汗熱泄身涼而愈也若久喜酸而不已則不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散

熱去則氣和也凡此皆河間之說余每見之未嘗不反復切

嘆觀其所言病機則由火及金由金及木由木及脾所以爲

酸若發微談理果可轉摺如此則指鹿爲馬何患無辭惟其

執以爲熱故不得不委曲若此若余言其爲寒則不然也夫

酸本肝木之味何不曰火衰不能生土則脾氣虛而肝邪侮

之故爲酸也豈不於理更爲明切而何以曲折強解有若是

乎又若內經所言人之傷於寒也則爲病熱此言傷寒證寒

邪在表則爲三陽之發熱及其傳裏則爲陽明之內熱豈以

內傷冷物而亦云病熱者耶又豈有內傷冷物而可以汗解

者耶卽以氣血強盛之人偶傷生冷久留不去而鬱爲熱者此以鬱久化熱或亦有之豈果因生冷而反熱耶矧內經本以外感言而河間引以証內傷謬亦甚矣此不惟大害軒岐之旨而致後人執以藉口其害又將何如也

一辨東垣吐酸之論爲是據發明曰內經言諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔仲景以生薑半夏治之以雜病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心其次則吐出酸水令上下牙酸澁不能相對以大辛熱藥療之必減也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子子能合

母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱爲之佐而瀉肺之實病機作熱攻之誤矣蓋雜病醋心濁氣不降欲爲中滿寒藥豈能治之乎此東垣之說也余謂其最爲得理但其立言太諱如所云收氣及西方金旺水爲金子等義人有未達每多忽之卽在丹溪亦曰東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法爲未合經意也因考丹溪治法則用茱連丸二陳湯且曰宜用炒吳茱萸順其性而折之乃反佐之法也必用黃連爲君以治之此丹溪之意亦主

於熱正與東垣相反而欲以芩連治吐酸則不可不辨也故  
余以東垣之說請爲之疏焉夫所謂收氣者金氣也卽秋氣  
也內經曰秋氣始於上蓋陰盛之漸必始於秋以陽氣之將  
退也寒肅之漸必始於上以陽氣之日降也其云金旺者非  
云肺氣之充實正言寒氣之有餘也其云子令母實者以寒  
在上焦則收氣愈甚故治用鹹熱等劑以瀉其子亦無非扶  
陽抑陰之道最切當也丹溪未達其意而反以非之抑又何  
也卽如丁香氣味辛爽無毒凡中焦寒滯氣有不順者最其  
所宜又何至以犯字相戒而使後人畏之如虎耶蓋丹溪但  
知丁香不可犯而不知黃連黃芩又豈吞酸證所宜輕犯者  
哉然說雖如此而說有未盡則云寒云熱猶不無疑謹再竟  
其說如左

一吐酸證諸言爲熱者豈不各有其說在劉河間則曰如飲食  
熱則易酸矣在戴原禮則曰如穀肉在器濕熱則易爲酸也  
又有相傳者曰觀之造酒者涼作則甘過熱則酸豈非酸由  
熱乎諸說如此宛然可信而欲人不從不可得也凡諸似是  
而非者正以此類譬之射者但能不離於前後左右便云高  
手不知犯此四字尙足以言射乎而諸家之說亦猶是耳何

以見之。蓋察病者當察以理。察理者當察以真。卽如飲食之酸由乎熱。似近理矣。然食在釜中。使能化而不能酸者。此以火力強而速化無留也。若起置器中。必久而後酸。此停積而酸。非因熱而酸也。嘗見水漿冷積既久。未有不酸者。此豈熱耶。因不行也。又云造酒者。熱作則酸。亦似近理。然必於二三日之後。鬱熱不開。然後成酸。未有熱作及時而遂致酸者。且人之胃氣。原自大熱。所以三餐入胃。俱能頃刻消化。此方是真陽火候之應。若如造酒者。必待竟日而後成。則日不再餐。胃氣能無憊乎。若必如冷作之不酸。方云無火。則飲食之化

亦須旬日。此其胃中陽氣不已竭乎。是可見胃氣本宜煖。稍涼不可也。酒甕本宜疏鬱。悶不可也。故酒甕之化。亦安能如胃氣之速。而胃氣之健。又安可同酒甕之遲乎。此其性理相懸。奚啻十倍。有不待辨也。明矣。且人之飲食在胃。惟速化爲貴。若胃中陽氣不衰。而健運如常。何酸之有。使火力不到。則其化必遲。食化既遲。則停積不行。而爲酸。爲腐。此酸卽敗之漸也。故凡病吞酸者。多見飲食不快。自食有不快。必漸至中滿痞隔泄瀉等證。豈非脾氣不強。胃脘陽虛之病。而猶認爲火能無誤乎。余向在燕都。嘗治一縉紳。患此而求治者。余告



以寒彼執爲熱堅持造酒之說以相問難莫能與辨竟爲苓  
連之屬所斃而終不能悟豈非前說之誤之也耶亦可哀矣  
余故曰人之察理貴察其真若見理不真而疑似固執以致  
釀成大害者無非此類此似是而非之談所以不可不辨也  
一吞酸之與吐酸證有三種凡喉間噯噫卽有酸水如醋浸心  
膈雜不堪者是名吞酸卽俗所謂作酸也此病在上脘最高  
之處不時見酸而泛泛不寧者是也其次則非如吞酸之近  
不在上脘而在中焦胃脘之間時多嘔惡所吐皆酸卽名吐  
酸而溼溼不行者是也又其次者則亦無吞酸吐酸等證惟

或偶因嘔吐所出或酸或苦及諸不堪之味此皆腸胃中痰  
飲積聚所化氣味每有濁惡如此此又在中脘之下者也但  
其順而下行則人所不覺逆而上出則礙口難堪耳凡此三  
者其在上中二脘者則無非脾胃虛寒不能運化之病治此  
者非溫不可其在下脘偶出者則寒熱俱有但當因證以治  
其嘔吐嘔吐止則酸苦無從見矣雖然此亦余之論證故不  
得不曲盡其說若以實理言之則凡胃強者何暇及於酸苦  
其有酸苦者必其停積不行而然此宜隨證審察若無熱證  
熱脈可據而執言濕中生熱無分強弱惟用寒涼則未有不

悞者矣

論治 共七條

一治吞酸吐酸當辨虛實之微甚年力之盛衰實者可治其標  
虛者必治其本

一凡胃氣未衰年質壯盛或寒或食偶有所積而爲酸者宜用  
行滯溫平之劑以二陳湯平胃散和胃飲之類主之○中氣  
微寒者宜加減二陳湯或橘皮湯甚者宜溫胃飲○氣微虛  
者宜藿香安胃散此皆治標之法也

一脾胃氣虛及中年漸弱而飲食減少時見吞酸吐酸者惟宜  
溫補脾胃以理中湯溫胃飲聖木煎之類主之切不可用清  
涼消耗等藥○若虛在陰分下焦不煖而水邪上泛爲酸者  
宜用理陰煎最妙

一丹溪曰治酸必用吳茱萸順其性而折之及反佐之法也不  
知此實正治非順性也蓋其性熱最能煖中下二焦其味辛  
苦最能勝酸澁之味謂之反佐見之過矣

一用黃連爲君以治吐酸乃丹溪之法也觀其治案有一人酸  
塊自胸直上咽喉甚惡以黃連濃煎冷候酸塊欲上與數點  
飲之卽下蓋味苦沉降故酸得苦而卽下此亦揚湯止沸之

法耳若年壯氣強偶有所積及酒濕不行而酸楚上泛者或  
用此法未必卽傷胃氣而亦可墜引下行卽權宜用之亦無  
不可然終非治本之道也若氣體畧有虛弱及內傷年衰之  
輩而患吐酸者必不可妄用芩連再殘陽氣雖暫得苦降之  
力而胃氣愈傷則病必日甚而無可爲矣  
一嘔吐清水古法以二朮二陳湯或六君子湯本皆正治之法  
然余嘗治水泛爲飲者覺自臍下上衝而吐水不竭以理陰  
煎治之其妙如神故此三方皆宜酌用  
一凡肌表暴受風寒則多有爲吞酸者此其由息而入則臟氣

通於鼻由經而入則臟俞係於背故凡寒氣一入則胃中陽  
和之氣被抑不舒所以滯濁隨見而卽刻見酸此明係寒邪  
犯胃也今以訛相傳者皆云肌表得風寒則內熱愈鬱而酸  
味刺心何其謬也夫因鬱成熱者必以漸久而成或一日或  
二日然後鬱而爲熱也今凡受寒吞酸者無不隨寒而酸見  
在卽刻豈卽刻便成鬱熱耶惟其非熱所以卻之之法亦惟  
肌表宜溫煖藥劑宜香燥此自寒者熱之之正治而說者必  
欲執言爲熱故爾強解所謂道在邇而求諸遠凡屬謬妄者  
何非此類

述古

薛立齋曰吐酸吞酸大畧不同吐酸者濕中生熱吞酸者虛熱  
內鬱皆屬脾胃虛寒中傳末證故內經以為火者指其病形  
而言也東垣以為胃寒者指其病本而言也凡患此者先當  
辨其吞吐而治以固本元為主若服寒涼復傷胃氣則實實  
虛虛者矣復審其脾胃氣虛而飲食不能輸化濁氣不能下降  
者須用六君子湯補養脾胃為主少佐越鞠丸以清中故東  
垣先生云邪熱不殺穀若誤認為實熱而妄用寒涼必變敗  
證

吞酸論列方

二陳湯 和一

平胃散 和十七

六君子湯 補五

溫胃飲 新熱五

和胃飲 新和五

加減二陳湯 和二

聖水煎 新熱二五

理中湯 熱一

理陰煎 新熱三

二朮二陳湯 和四

橘皮湯 和十一

越鞠丸 和一五四

藿香安胃散 熱七二

論外備用方

麴木丸 和百十宿食

沉香降氣散 和四十氣滯

半夏丁香丸 和百三十寒滯

茱連丸 寒一五三濕熱

安脾散 熱六八胃寒

丁香茯苓湯 熱六四溫胃行滯

倍木丸 熱百五飲

# 反胃

## 論證

反胃一證本屬火虛蓋食入於胃使果胃煖脾強則食無不化何至復出今諸家之論有謂其有痰者有謂其有熱者不知

痰飲之留正因胃虛而完穀復出豈猶有熱觀王大僕日內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也此一言者誠盡之矣然無火之由則猶有上中下三焦之辨又當察也若寒在上焦則多為惡心或泛泛欲吐者此胃脘之陽虛也若寒在中焦則食入不化每食至中脘或少頃或半日復出者此胃中之陽虛也若寒在下焦則朝食暮吐或暮食朝吐乃以食入幽門丙火不能傳化故久而復出此命門之陽虛也故凡治此者使不知病本所在混行猜摸而妄祈奏效所以難也

論治 共七條

一治反胃之法當辨其新久及所致之因或以酷飲無度傷於酒濕或以縱食生冷敗其真陽或因七情憂鬱竭其中氣總之無非內傷之甚致損胃氣而然故凡治此者必宜以扶助正氣健脾養胃為主但新病者胃氣猶未盡壞若果飲食未消則當兼去其滯若有逆氣未調則當兼解其鬱若病稍久或氣體稟弱之輩則當專用溫補不可標本雜進妄行峻利開導消食化痰等劑以致重傷胃氣必致不起也

一虛在上焦微寒嘔惡者惟薑湯為最佳或橘皮湯亦可○若

氣虛為寒所侵而惡心嘔食者宜黃芽丸或橘皮乾薑湯之類主之○若寒痰勝者宜小半夏湯或大半夏湯之類主之一虛在中焦而食入反出者宜五君子煎理中湯溫胃飲聖朮煎之類主之○若胃虛甚者宜四味回陽飲或黃芽丸主之○若兼寒痰者宜六君子湯或理中化痰丸之類主之○或水泛為痰者宜金水六君煎主之○若胃不甚寒而微虛兼滯者宜五味異功散主之

一虛在下焦而朝食暮吐或食入久而反出者其責在陰非補命門以扶脾土之母則火無以化土無以生亦猶釜底無薪

不能腐熟水穀終無濟也宜六味回陽飲或人參附子理陰煎或右歸飲之類主之此屢用之妙法不可忽也

一及胃初起而氣體強壯者乃可先從清理如二陳湯橘皮半夏湯之類皆可清痰順氣○平胃散不換金正氣散五苓散之類皆可去濕去滯○半夏乾薑散仲景吳茱萸湯橘皮湯之類皆可去寒○然此惟真有邪滯乃可用之若病稍久而胃氣涉虛者則非所宜

一及胃證多有大便閉結者此其上出固因下之不通也然下之不通又何非上氣之不化乎蓋脾胃氣虛然後治節不行

而無以生血血涸於下所以結閉不行此真陰枯槁證也必使血氣漸充臟腑漸潤方是救本之治若徒為目前計而推之逐之則雖見暫通而真陰愈竭矣故治此之法但見其陰虛兼寒者宜以補陽為主而大加當歸肉蓯蓉菲汁薑汁之屬陰虛兼熱者宜以補陰為主而加乳汁童便酥油蜂蜜豕膏諸血之屬然此等證治取效最難萬毋欲速非加以旬月功夫安心調理不能愈也其有糞如羊矢或年高病此者尤為難治

一及胃由於酒濕傷脾者宜葛花解醒湯主之○若濕多成熱

而見胃火上衝者宜黃芩湯或半夏瀉心湯之類主之

述古 共三條

仲景曰病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之今脉反弦故名曰虛○跌陽脉浮而濇浮則爲虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿食不化名曰胃反脉緊而濇其病難治

巢氏病源曰營衛俱虛氣血不足停水積飲在胃皖則臟冷臟冷則脾不磨脾不磨則宿食不化其氣逆而成反胃也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往來寒熱甚者食已卽吐其脉緊而弦緊則爲寒弦則爲虛虛寒相搏故食已則吐名爲反胃

戴原禮曰翻胃證血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物爲主氣虛者四君子爲主熱以解毒爲主痰以二陳爲主

簡易方



一方 用甘蔗汁二分薑汁一分和勻每服半碗或一碗日三服則止。

一方 用人參見嘔吐門。

炙法

上脘 中脘 下脘 各二七壯 天樞 三七壯

反胃論列方

理中湯 熱一 溫胃飲 新熱五

橘皮乾薑湯 熱五六 聖木煎 新熱二五

黃芽丸 新熱二一 五君子煎 新熱六

四味回陽飲 新熱一 六君子湯 補五

四君子湯 補一 六味回陽飲 新熱二

右歸飲 新補三 五味異功散 補四

人參附子理陰煎 新熱三 橘皮湯 熱五七

小半夏湯 和八 金水六君煎 新和一

二陳湯 和一 大半夏湯 和十

理中化痰丸 熱九 五苓散 和一八二

平胃散 和十七 橘皮半夏湯 和十三

豕膏 新因二九 黃芩湯 和一九八

半夏瀉心湯 寒二八

葛花解醒湯 和一二四

半夏乾薑散 熱五四

吳茱萸湯 熱一三八

不換金正氣散 和二一

論外備用方

獨參湯 補三六

二汁飲 和一二三

丁香半夏丸 和一九二

大七香丸 和一三一

丁香散 熱六三

茯苓澤瀉湯 熱七五

甘露湯 熱七四

胃變散 熱七一

丁香煮散 熱六二

# 噎膈

## 經義

陰陽別論曰一陽發病其傳為隔○三陽結謂之隔

邪氣臟腑病形篇曰脾脉微急為膈中食飲入而還出後沃沫

大奇論曰胃脉沉鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆隔偏枯

通評虛實論曰隔則閉絕上下不通則暴憂之病也

風論曰胃風之狀頸多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失

衣則臙脹食寒則泄診形瘦而腹大

血氣形志篇曰形苦志苦病生於咽嗑治之以苦藥  
本神篇曰憂愁者氣閉塞而不行

舉痛論曰恐則精卻卻則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣  
不行矣○思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結  
矣

上膈篇帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣蟲為下  
膈下膈者食晬時乃出余未得其意願卒聞之岐伯曰喜怒  
不適食飲不節寒溫不時則寒汗流於腸中流於腸中則蟲  
寒蟲寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛氣不營邪氣居之

人食則蟲上食蟲上食則下管虛下管虛則邪氣勝之積聚  
以留留則癰成癰成則下管約其癰在管內者即而痛深其  
癰在外者則癰外而痛浮癰上皮膚熱○帝曰刺之奈何曰微  
按其癰視氣所行先淺刺其傍稍內益深還而刺之毋過三  
行察其浮沉以為淺深已刺必熨令熱入中日使熱內邪氣  
益衰大癰乃潰伍以參禁以除其內恬憺無為乃能行氣後  
以鹹苦化穀乃下矣

論證 其四條

噎膈一證必以憂愁思慮積勞積鬱或酒色過度損傷而成蓋

憂思過度則氣結氣結則施化不行酒色過度則傷陰陰傷則精血枯涸氣不行則噎膈病於上精血枯涸則燥結病於下且凡人之臟氣胃司受納脾主運化而腎為水火之宅化生之本今既食飲停膈不行或大便燥結不通豈非運化失職血脈不通之為病乎而運行血脈之權其在上者非脾而何其在下者非腎而何矧少年少見此證而惟中衰耗傷者多有之此其為虛為實槩可知矣故凡治此者欲舍根本而言捷徑又安望其有成功也

一噎膈反胃一證丹溪謂其名雖不同病出一體若乎似矣然而實有不同也蓋反胃者食猶能入入而反出故曰反胃噎膈者隔塞不通食不能下故曰噎膈食入反出者以陽虛不能化也可補可溫其治猶易食不得下者以氣結不能行也或開或助治有兩難此其輕重之有不同也且凡病反胃者多能食病噎膈者不能食故噎膈之病病於胸臆上焦而反胃之病則病於中下二焦此其見證之有不同也所以反胃之治多宜益火之源以助化功噎膈之治多宜調養心脾以舒結氣此其證候既有不同故診治亦當分類也

一噎膈證多有便結不通者內經曰三陽結謂之隔張子和曰

三陽者大腸小腸膀胱也。結謂熱結也。小腸熱結則血脈燥。大腸熱結則不圍。膀胱熱結則津液涸。三陽既結則前後閉。瀉下既不通必反上行。所以噎食不下。縱下而復出。此陽火不下。推而上行也。愚按此說則大不爲然。夫結之爲義。內經原非言熱。如本篇曰。陰陽結邪。多陰少陽。曰石水。又舉菴論曰。思則氣結。是豈以結爲熱耶。且熱則流通。寒則凝結。此自陰陽之至理。故凡霜凝冰結。惟寒冽有之。而熱則無也。此天道之顯然可見者。人身陰陽之理無非是耳。惟人不能知。所以多誤也。矧內經之言三陽結者。乃止言小腸膀胱。全與大

腸無涉。蓋三陽者太陽也。手太陽小腸也。足太陽膀胱也。小腸屬火。膀胱屬水。火不化則陽氣不行。而傳導失職。水不化則陰氣不行。而清濁不分。此皆致結之由也。子和不察而遂以三陽之結。盡言爲熱。以致後世悉傳爲火。豈理也哉。然人之病結者。本非一端。蓋氣能結。血亦能結。陽能結。陰亦能結。余非曰結必皆寒。而全無熱也。但陰結陽結。證自不同。有不可不辨耳。夫陽結者熱結也。因火盛燠陰。所以乾結。此惟表邪傳裏及陽明實熱者。乃有之。然熱結者。必有煩渴發熱等證。洪大滑實等脈。最易辨也。若下有結閉。而上無熱。證此陰

結耳安得謂之熱耶蓋陰結者正以命門無火氣不化精所以凝結於下而治節不行此惟內傷血氣敗及真陰者乃有之卽噎膈之屬是也夫噎膈之證人皆知爲內傷也內傷至此其臟氣之健否爲何如而猶云爲熱豈必使元陽盡去而別有生生之道乎噫此余之所不解也不得不辨

一噎膈證古人多認爲寒自劉河間治膈氣噎食用承氣三湯張子和以三陽之結盡論爲熱且云人之溢食初未遽然也或傷酒食或胃熱欲吐或冒風欲吐醫者不察本原投下香桂胡椒丁香之屬設如傷酒傷食正可攻逐豈可言虛便將

熱補素熱之人三陽必結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔鍼灼艾三陽轉結歲月彌深遂成噎膈余味此言不能無惑蓋噎膈由於枯槁本非實熱之證承氣三湯尙可用乎此河間之見有弗確也矧酒肉過多者未必遂成噎膈而噎膈之病又豈皆素熱之人乎此子和之見有未然也自後丹溪遂承二子之說而大辟局方之非謂氣之初病或飲食不謹或外冒風雨或內感七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒肝火上炎以致津液不行氣爲之病或痞或痛或噫腐氣或吞酸或餽雜或膨滿不求

原本便認爲寒，遽以辛香燥熱之劑投之，數貼時暫得快，以爲神方。厚味仍前，不節七情，反復相仍，舊病被劫，暫開濁液，易於攢聚。或半月或一月，前病復作。醫者不察，猶執爲冷，翻思前藥，隨手得快，顛俟久服，可以溫脾壯胃，消積行氣，以冀一旦豁然，不思胃爲水穀之海，清和則能受，脾爲消化之器，清和則能運。今反得香熱之偏助，劫之而愈，復作復劫，延綿至久而成噎膈，展轉深痼，良可哀憫。此丹溪之說也。使後人見之，無不以爲至論。卽余初年亦未嘗不加欽服。而今則日見其非矣。何也？試觀所叙病原，其有然者，有不然者，顧難縷

指而辨也。第以此證而力指爲熱，能無謬乎？且旣云燥熱之劑，隨手得快，則固非無效也。夫燥熱已能奏效，豈真火證而燥熱能效乎？蓋脾土惡濕，故燥之可也。火能生土，故熱之亦可也。溫燥扶陽，此自脾家正治，而必欲非之，以致後人之疑似屬矯矣。若謂厚味七情仍前不節，以致愈而復作，此誰之咎也？而亦可歸之藥誤乎？又如脾胃清和，能受能運之說，此實至理。誰不云然？第余之所謂清和者，則與丹溪不同。抑又何也？蓋丹溪所言者，惟恐火之盛，余之所言者，惟恐陽之衰。異同若此，人將焉信？請以天人之理證之，何如夫？天人之所

同賴者惟此陽氣而已故經曰天氣清靜光明者也又曰陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以日光明由此言之則六合清和止此太陽為之用故陽氣勝則溫煖光明而萬類咸亨非清和乎陰氣勝則風霾晦暝而升沉閉塞非不清和乎且春夏萬物之盛非陽盛之化乎秋冬萬物之衰非陽衰之兆乎人之所賴以生者亦惟此耳故人於飲食朝入口而午化盡午入胃而暮化盡此其中焦之熱亦何異大烹之鼎必如是者纔是清和是即平人之常乃正所為胃氣也使朝食而午不饑午食而晚不饑飲食化遲便是陽

虧之候而矧乎全不能行全不能化者醫且猶云有火豈必并此化源盡行撲滅而後可亦堪嗟矣夫天下之理本無二三而或是或非何多朱紫余每欲言未嘗不知自反第於最疑處則不得不呈其醜又安得軒岐再起以為我一正哉嘗聞之康節先生曰欲為天下屠龍手肯讀人間非聖書其感慨淡矣豈不信然豈不信然

論治 共七條

凡治噎膈大法當以脾腎為主蓋脾主運化而脾之大絡布於胸膈腎主津液而腎之氣化主乎二陰故上焦之噎膈其責



在脾下焦之閉結其責在腎治脾者宜從溫養治腎者宜從滋潤舍此二法他無捷徑矣然泰交之道天居地下故必曰陽出土而後萬物由之可見脾土之母由下而升褚侍中曰外病療內上病救下辨病藏之虛實通病藏之子母斯言得矣不可忽也

一治噎膈之法凡氣血俱虛者宜五福飲及十全大補湯○脾虛於上者宜四君子湯○脾虛兼寒者宜五君子煎○脾肺營虛血燥者宜生薑汁煎○陰虛於下者宜左歸飲大營煎○陰中之陽虛者宜右歸飲加當歸或右歸丸八味地黃丸

之類皆治本之法也

一噎膈初起微虛者宜溫胃飲加當歸厚朴○如果痰氣不清上焦多滯者宜二陳湯加厚朴或六安煎亦可○如氣有不順或兼胸腹微痛者宜加減二陳湯暫解之○凡初覺飲食微有不行而年不甚衰者宜速用大健脾丸或木香人參生薑枳朮丸以調脾氣爲上策或芍藥枳朮丸亦可

一噎膈便結者但察其無火無滯而止因血燥陰虛者宜五福飲或大營煎加酒洗肉蓯蓉二三錢同煎服○或以豕膏漸潤其下而以調脾等劑治其上最爲良法○或多服牛羊乳

全書卷二十一  
雜言  
酥之類以滋其精液使之漸潤毋欲速也○如果氣血未至甚損而下焦脹閉之甚者則不得不為暫通輕則玉燭散人參利膈丸或搜風順氣丸甚則大黃甘草湯酌宜用之

一用溫補以治噎膈人必疑其壅滯而且嫌迂緩不知中氣敗證此其為甚使非速救根本則脾氣何由再健設用溫補而噎塞愈甚則不得不曲為加減然必須千方百計務從元氣中酌其所宜庶可保全也若用補之後雖或未見功效但得全無窒碍便是藥病相投且此病最不易治既能受補必須多服方得漸效以收全功不可性急致疑一暴十寒以自悞

也若急啣目前之快但使行滯開胃而妄用大黃芒硝三稜莪木瓜萎桃仁滾痰丸之屬非惟不能見效必致胃氣日敗萬無生理矣此徒速其亡不可不省也

一諸家治噎古法用人參黃芪以補元氣御米粟米以解毒實胃竹瀝以清痰散結乾薑以溫中生薑以去穢牛羊乳以養血潤液蜜汁當歸以潤燥用此數者為主治其餘因證而增減之俱是良法○凡肥胖之人鮮有噎證間或有之宜用二陳加人參白朮之類○血虛瘦弱之人用四物合二陳加桃仁紅花韭汁童便牛羊乳之類○七情鬱結而成噎膈者二

陳合香附撫芎木香檳榔瓜蒌砂仁之類○飲酒人患噎膈以二陳加黃連砂仁砂糖之類○胸膈有熱者加黃連黃芩桔梗瓜蒌之類○脾不磨者加神麩砂仁麥芽之類以助消化○噎膈大便燥結之甚者必用大黃或用二陳湯加酒蒸大黃桃仁以潤之乃急則治標之法也或用四物湯加桃仁童便韭汁多飲牛羊乳爲上策○按古人治噎之法大畧已盡於此雖其中有宜有不宜者亦并錄之以備採擇

丹溪治法云用童便韭汁竹瀝薑汁牛羊乳氣虛入四君子血虛入四物有痰用二陳入氣血等藥中用之切不可用香燥

### 藥宜薄滋味

#### 噎膈不治證

凡年高患此者多不可治以血氣虛敗故也○糞如羊矢者不可治大腸無血也○吐痰如蟹沫者不可治脾氣敗也○腹中疼痛雜如刀割者不可治營虛之極血竭於中也

#### 述古 共五條

巢氏病源曰陰陽不和則三焦隔絕三焦隔絕則津液不利故令氣塞不調是以成噎此由憂患所致憂患則氣結氣結則不宜流而使噎塞不通也

張鷟峰云。膈噎是神思間病。惟內觀自養者可治。此言深中病情。

嚴氏云。五膈五噎。由喜怒太過。七情傷於脾胃。鬱而生痰。痰與氣搏。升而不降。飲食不下。蓋留於咽嗑者。則成五噎。結於胃膈者。則爲五膈。其病令人胸膈痞悶。嘔逆噎塞。妨礙飲食。治法宜調陰陽。化痰下氣。陰陽平勻。氣順痰下。則病無由作矣。劉宗厚曰。夫治此疾也。咽嗑閉塞。胸膈痞悶。似屬氣滯。然有服耗氣藥過多。中氣不運。而致者。當補氣而自運。大便燥結。如羊屎。似屬血熱。然服通利藥過多。致血液耗竭。而愈結者。當

補血潤血。而自行。有因火逆衝上。食不得入。其脉洪大有力。而數者。或痰飲阻滯。而脉結澁者。當清痰泄熱。其火自降。有因脾胃陽火亦衰。其脉沉細而微者。當以辛香之藥。溫其氣。仍以益陰養胃爲之主。非如局方之惟務燥烈也。若夫不守戒忌。厚味房勞之人。及年高無血者。皆不能療也。

陳無擇三因方曰。五膈者。思憂喜怒悲也。五噎者。憂思氣勞食也。○思膈則中脘多滿。噫則醋心。飲食不消。大便不利。○憂膈則胸中氣結。津液不通。飲食不下。羸瘦短氣。○喜膈則五心煩熱。口苦生瘡。倦甚體痺。胸痛引背。食少入。○怒膈則胸

膈逆滿噎塞不通嘔則筋急惡聞食氣○悲膈則心腹脹滿  
欬嗽氣逆腹中雷鳴透臍痛不能食○憂噎胸中痞滿氣逆  
時嘔食不下○思噎心悸喜忘目視慌慌○氣噎心下痞噎  
噦不食胸背痛天陰手足冷不能自溫○勞噎氣上膈胸中  
塞噎肢滿背痛○食噎食急多胸中苦痛不得喘息

灸法

膏肓

百壯以  
多為佳

膻中

七壯

中腕

七壯

膈俞

七壯

心俞

七壯

天府

七壯

乳根

七壯

三里

三七壯

噎膈論列方

四君子湯

補一

五君子煎

新熱六

十全大補湯

補二十

生薑汁煎

補九五

五福飲

新補六

八味地黃丸

補一二二

左歸飲

新補二

右歸飲

新補三

加減二陳湯

和二

右歸丸

新補四

大營煎

新補十四

人參利膈丸

和一六六

溫胃飲

新熱五

大健脾丸

和八五

芍藥枳朮丸

新和十六

四物湯

補八

六安煎

新和二

搜風順氣丸

和三四三

二陳湯 和一

豕膏 新因二九

人參生薑枳朮丸 和八二

玉燭散 攻二四

滾痰丸 攻七七

大黃甘草湯 攻十三

論外備用方

神香散 新和二  
氣膈

五漏散 和一五六

五噎散 和一五九

五膈寬中散 和一五七

十膈散 和一五八

利膈丸 和一六五  
胸痺

人參利膈丸 和一六六

大七香丸 和一三一  
寒逆

草豆蔻丸 和一六七  
酒膈

人參豆蔻湯 和一六一

嘉禾散 和百六十  
痰氣

紫蘇子飲 和一六一

補氣運脾湯 和一六四  
中虛氣逆

枇杷葉散 和一六三  
五噎

木香寬中飲 和五五  
行氣

胡椒理中湯 熱六  
胃虛寒

理中湯 熱一  
中寒

透膈湯 攻三十  
逐痰滯

青木香丸 攻八六  
氣滯痰逆

饋雜

論證

饋雜一證或作或止其為病也則腹中空空若無一物似饑非

饑似辣非辣似痛非痛而胸膈懊懣莫可名狀或得食而暫止或食已而復餽或兼惡心而漸見胃脘作痛此證有火餽有痰餽有酸水浸心而餽大抵食已卽饑或雖食不飽者火餽也宜兼清火痰多氣滯似饑非饑不喜食者痰餽也宜兼化痰酸水浸心而餽者戚戚膨膨食少無味此以脾氣虛寒水穀不化也宜溫胃健脾又有誤用消伐等藥以致脾胃虧損血少餽雜中虛則煩雜不饑脾弱則食不逆化此宜專養脾胃總之餽雜一證多由脾氣不和或受傷脾虛而然所以治此者不可不先顧脾氣然古人於此悉以痰火論治予恐專用寒涼則胃氣虛寒不健者反以日甚而漸至惡心噯氣反胃噎膈之類將由此而起矣

論治 共二條

一痰火餽雜等證如脾虛微火多痰而餽雜者宜和中湯或三聖丸或木連丸○若中焦火盛兼痰而餽雜者宜軟石膏丸○若宿食畱飲痰滯不清而餽雜者宜麴朮丸○若三焦火盛濕痰氣滯而餽雜者宜三補丸加半夏蒼朮香附之類一脾胃虛寒餽雜者必多吞酸或兼惡心此皆脾虛不能運化滯濁而然勿得認爲火證妄用寒涼等藥○若多痰飲或兼

嘔惡而饋雜者宜二陳湯或二朮二陳湯○若寒痰停蓄胸膈或為脹滿少食而為饋雜者宜和胃二陳煎或和胃飲○若脾胃虛寒停飲作酸饋雜者宜溫胃飲或六君子湯○若脾腎陰分虛寒水泛為飲作酸饋雜者宜理陰煎或金水六君煎

饋雜論列方

二陳湯 和一

和胃飲 新和五

六君子湯 補五

理陰煎 新熱三

和中湯 寒五入

金水六君煎 新和一

溫胃飲 新熱五

三聖丸 寒一七一

和胃二陳煎 新和三

麴朮丸 和百十

朮連丸 寒一七二

二朮二陳湯 和四

三補丸 寒一六二

軟石膏丸 寒一七三





書

施惠當也款受仰品厥信厥利厥時

叙前疏厥匡帥長高測樂已公鳴

聯濟施厥思大新地性非

經時以時

其

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...

... 卷之四 ...