


聖王濟總錄

百箇

庫文閣内	
三〇〇	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (182)
函號	300212



大正十一年四月二十一日

心算練習

一、九九表

二、九九表

三、九九表

四、九九表

五、九九表

六、九九表

大學東
校典藉
局之印

日
占
同

中
府
香

同
書

石
發
動
門

大德重校聖濟總錄卷第一百八十四

乳石發動門

乳石發身體腫

乳石發上氣喘嗽

乳石發嘔逆

乳石發霍亂轉筋

乳石發痞結羸瘦

乳石發心腹脹滿

乳石發下利

乳石發淋瀝

乳石發大小便不通

服乳石備飲食常法

乳石發諸藥不治者

厚不致稍凝不散

厚不致大小動不安

厚不致不散

厚不致不散

厚不致不散

厚不致不散

厚不致不散

大論重對聖藥

乳石發身體腫

論曰石發而身體腫者以食飲過溫不能勞動致熱氣
稽壅於肌肉不得宣散故也亦有外感風濕內有停水
與石勢相薄其氣滯塞致浮腫者然食飲過溫不自勞
動其為腫也但體熱虛腫而已若風濕停水而發腫則
必心中煩滿小便澀不可不辨也

治乳石發熱腫初覺壅宜服升麻湯方

升麻

大黃

黃芩

枳實

芍藥

甘草

當歸

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服

治乳石熱腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 淡竹葉壹握切碎 白朮

甘草炙 枳實去穢炒 人參

梔子人各壹兩 大黃剉炒 黃芩去黑心

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治鍾乳發寒熱胸中壅塞面腫手足煩疼生麥門冬湯方

方

生麥門冬去心焙 白朮微炒 白芍藥微炒

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞葱白三莖拍碎

同煎至六分去滓空心溫服

治乳石發熱堅腫芍藥湯方

芍藥 枳實去穢炒 大黃剉炒

升麻各貳兩 當歸切焙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七分去

滓溫服空心食前日午各一服

治服石人水氣內積面目骸膝腫鞭小便澀木通湯方

木通剉 桑根白皮炙剉各

桔梗剉

赤芍藥各參分

葶藶子隔紙炒

白茅根微炒各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空腹溫服日再

治服石人風濕外搏水飲內停身面微腫小便澀紫蘇子丸方

紫蘇子微炒壹合半

陳橘皮去白焙

杏仁去皮尖雙入炒

赤茯苓去黑皮

防己各壹兩

葶藶隔紙炒參分

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十五丸加至三十丸空心用桑白皮赤小豆煎湯下日再

治服石人水氣內積面腫赤茯苓散方

赤茯苓去黑皮

牽牛子炒各壹兩半

枳殼去瓤麤炒

陳橘皮去白皮

甘草炙各參分

右五味搗羅爲散每服二錢匕如茶點服不拘時

治乳石發動上攻頭面浮腫消石湯方

消石

葶藶

防風去

黃連去須炒

大黃剉炒

甘草炙剉

枳殼去瓤麤炒

地榆剉

羌活去蘆頭

龍骨

代赭煨

桑根白皮剉焙各壹兩半

桂皮去麤皮

黃芩去黑心各半兩

石韋去毛貳兩

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑
三片同煎至八分去滓溫服

治乳石發熱初欲作腫石鷲子淋洗方

石鷲子

柴枚

右一味麤搗篩以水三升煮取二升頻淋洗癰腫處
以差爲度

治乳石發動周體患腫不能回轉者爲久坐不行又飲
酒藥氣滯在皮膚之內血脉不通也

右宜飲酒冷水洗自勞卽差若不能行者遣人扶持
強行使支節調暢乃止亦不得過度使反發熱儻反

熱者還當洗之

治乳石發動四肢面目浮腫者爲飲食溫久不自勞力
藥與正氣相隔也

右但飲熱酒冷食自勞及洗浴卽差

治乳石發動腹背熱如手如杯如盤許大者方
右但以冷石隨熱處熨之

乳石發上氣喘嗽

論曰乳石之發如火炎上熱氣騰湧熏蒸胸膈人於肺
中氣壅不散使人胸滿短氣上喘欬嗽不得安臥

治乳石發肺脹氣急呀嗽喘羸不得安臥紫苑湯方

紫苑

去苗土壹兩半

甘草

炙半兩

赤茯苓

去黑皮壹兩半

檳榔

剉伍枚

葶藶子

紙上炒壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治乳石發熱衝頭面口乾喘嗽麥門冬湯方

生麥門冬

去心焙

萎蕤

去根

石膏

碎各兩

葛根

剉參兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三莖

切同煎至一盞去滓入生地黃汁二合更煎三兩沸

食後分溫二服日再

治乳石發上氣肺熱呀嗽多涕唾貝母湯方

貝母

去心壹兩

麥門冬

去心焙參兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒貳拾

枚

生薑

焙切

石膏

碎各壹兩

黃芩

去黑心半兩

甘草

炙兩

五味子

白朮

剉各半兩

淡竹葉

壹握切

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓下蜜二錢攪勻空心溫服若取利入芒消一字

湯成下

治乳石上氣呀嗽不得臥臥即氣絕葶藶丸方

葶藶子

紙上微炒半兩

芸薹子

揀淨

馬兜零

剉

紫苑去苗土

人參各壹兩

杏人湯去皮尖雙

皂莢

酥炙去黑皮并子半兩

白前

甘草炙

防己各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗令熟丸如梧桐子大空心米飲下二十九

治乳石發定肺氣止喘嗽天門冬煎方

天門冬

去心絞汁貳兩 生地黄絞汁肆兩

生薑去皮絞汁貳兩

杏人湯去皮尖雙人研如膏貳兩

白蜜貳兩

牛酥兩

百部

款冬花

紫苑去苗土

麻黃去根節別升麻兩

甘草炙貳兩

右一十二味將後六味各搗為末先以水五盞煎麻

黃末三錢匕去沫下五藥末五錢匕煎至四盞絞去

滓澄瀘於銅器中以微火煎至三盞次下天門冬汁

地黄汁各二合更煎減至二盞下薑汁二合更煎減

至一盞下杏人膏酥蜜等各半合攪令勻稠置不津

器中每服取半雞子殼許含化嚥津日四五服

治乳石發熱喘嗽方

鼓貳合

右以水三盞漬取汁分溫三服早晨日午晡時各一

服服訖臥少時更服食三服早服凡服藥者
乳石發嘔逆

論曰石性勇悍凡服食過度將適失宜而又脾胃不和
穀不能勝則其氣上攻所以發嘔逆也
治乳石發動熱氣上攻脾胃不和嘔逆食不下茯苓湯

方

赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙 黃耆剉

枳實去毛微炒 前胡去蘆頭

大黃剉 蘆根剉

麥門冬去心焙 甘草炙

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五
片青竹茹一分煎至八分去滓食後臨臥溫服

治乳石發結熱癖心下腫胸中痞塞嘔逆不止鴈肪湯

方

鴈肪壹斤先煮過 當歸切 大黃剉

桂去麤皮 芍藥壹兩 人參

石膏研 甘草炙 桃人去皮尖

右九味除鴈肪外麤搗篩先將鴈肪以水七盞煎取

汁五盞去鴈肪每服用汁二盞藥末四錢匕更入桃

人七枚棗一枚拍碎煎至一盞去滓入芒消少許更煎三兩沸空心溫服日午再服若熱盛者日四服如無鴈以白鴨代之如無白鴨以烏雞代之

治乳石發動嘔服藥不効三黃湯方

豉參合新綿裹線纏作袋子 梔子人兩 枳實去瓢炒貳兩

甘草炙 前胡去蘆 大黃剉炒各壹兩

右六味除豉外麤搗篩每服四錢匕水二盞和豉子同煮至一盞後入芒消一錢匕再煎一二沸去滓

空心溫服

治乳石發動虛熱痰飲嘔逆飲食不下栝樓根湯方

栝樓根 麥門冬去心焙 人參

甘草炙 黃芩去黑心各半兩 半夏湯洗去滑

蘆根剉各壹兩 前胡去蘆頭參分

右八味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

五片煎至八分去滓溫服不拘時候

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參 白朮 栝樓根

甘草炙剉各貳兩 黃芩去黑心壹兩

右五味麤搗篩每四錢匕水二盞煎至一盞去滓分

溫二服早晚食前各一

治乳石發熱乾嘔煩熱半夏湯方

半夏湯洗去滑切焙壹兩 白薇炒貳兩 乾薑炮

甘草炙剉各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕苦酒一盞煎至五分去

滓溫服

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參 甘草炙剉 麥門冬去心焙

黃芩去黑心 蘆根去土剉焙 栝樓剉炒各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治乳石發嘔不止食不下薤白飲方

鼓微炒肆合 陳橘皮湯浸去白焙壹兩

麥門冬去心焙貳兩 粟米半合

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入薤白二莖拍

碎煎至一盞去滓溫服早晚各一盞

治乳石發動乾嘔枳殼湯方

枳殼去瓤炒伍兩 梔子人柒枚 豉微炒貳合

大黃剉炒貳兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服空心晚後各一強壯者加大黃一兩

治乳石發嘔不息方

薤白壹握

右一味碎切以水三盞煎至一盞去滓溫服

治乳石發嘔逆咽喉中傷清血出者此因臥溫及食熱

所致方

右以冷水飲之或以冷石熨咽喉即差

治乳石發胸脇滿氣上逆此因失飢不食藥氣上衝所

致方

右速與冷水洗之或以冷飯食之即差

治石發霍亂轉筋

論曰乳石發霍亂轉筋者以服食失度陰陽不和清濁相干也蓋服石之人府藏多熱熱即引飲及其飢飽食又過多水穀既傷腸胃不納下為泄利上為吐逆又為臍脹吐利不止寒氣益甚則為轉筋食飲藥劑當調以溫和使石熱平息氣道下降則病可愈

治乳石發霍亂轉筋不止香薷湯方

香薷參分

木瓜

乾者去瓤

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙熱各壹兩

桂去麤皮半兩

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分

切煎取八分去滓溫服不計時候

治乳石發霍亂吐利轉筋木瓜湯方

木瓜

大者壹枚
去瓤薄切

倉粳米壹合

右二味以水二盞煎取一盞去滓時時溫服一合

治乳石發霍亂吐利不止及轉筋糯米飲方

糯米

淘淨
參合

右一味細研以少許清水攪如乳狀頓服立止

治乳石發霍亂轉筋及心腹痛高良薑湯方

高良薑

剉半
兩

桂

去麤皮
壹兩

木瓜

乾者去
瓤貳兩

右三味麤擗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服不計時

治乳石發霍亂吐利轉筋棠梨木瓜湯方

棠梨枝

壹握

木瓜

大者壹
枚去瓤

右二味細剉分四服每服以水一盞入生薑五片煎

取七分去滓熱服不計時

治乳石發轉筋不吐不下氣急桑葉飲方

桑葉

切貳
兩

右一味以水五盞煎至一盞半去滓分溫二服早晚

各一

治乳石發吐利轉筋氣急高良薑飲方

高良薑劉伍兩

右一味麤搗篩每服三錢匕以酒一盞煎至六分去

滓溫服早晚食前各一亦療暴腹痛惡血氣急

治乳石發霍亂轉筋氣急木瓜飲方

木瓜壹枚去皮子切焙乾

右一味剉如麻豆大每服三錢匕以水一盞半煎至

八分去滓溫服飲盡更作無木瓜只以枝葉并根代

之

治乳石吐利不止轉筋入腹欲死方

生薑半兩切

右一味以酒一盞煎五七沸去滓頓服之

治乳石發動霍亂疔痛不可忍方

食茱萸淘淨炒香貳兩

右一味以酒三盞煎至一盞半分爲二服得下利即

差空腹食前各一

治乳石發霍亂轉筋入腹方

雞屎白兩半

右一味搗羅爲末每服二錢匕空腹以溫水半盞調

頓服之良

治乳石發痞結羸瘦

論曰陰氣積於下陽氣盛於上升降不時則成痞結羸瘦况服乳石者飲食不節將適失度熱氣熾於上陰陽隔而不通水穀之氣不能潤養肌體則肌肉枯燥胸膈痞塞腸胃脹滿久則正氣衰微日益羸瘦固其宜也治法當升降痞膈調適陰陽如此則痞者通石勢息也
治乳石熱盛虛弱痞結羸瘦調順陰陽去熱益氣黃耆湯方

黃耆剉

人參

生乾地黄焙

甘草炙

白芍藥各二兩

桂去麤皮

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮升麻各壹兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半棗三枚擘破生薑三片同煎數沸次下竹葉七片更煎三二沸去滓取一盞空心溫服日再

治乳石發後虛熱羸乏胸膈痞滯心腹脹滿或腰脚痛腎瀝當歸湯方

當歸焙切

甘草炙

芎藭

遠志去心

麥門冬去心

芍藥

赤茯苓去黑皮

生乾地黄焙肆兩

黃芩去黑心

桂去麤皮

五味子各壹兩

右一十一味麤擣篩每五錢匕先以水五盞入白羊

腎一隻去筋膜切煎至三盞去腎下藥入生薑一棗
大拍碎大棗三枚擘破更煎至二盞去滓分溫二服
空心食前

治乳石發體黃瘦不能飲食心腹痞結起居腰背急痛
嗜臥半夏湯方

半夏湯浸洗 黃芩去黑心 土瓜根各貳兩

赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 枳殼去麤皮

白朮各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍
碎煎至一盞去滓空心溫服日再

治乳石發動因服冷藥大過致心膈痞滿腹內疼痛不
思飲食日漸羸瘦枳實湯方

枳實麤炒 赤芍藥 青橘皮湯浸去白焙

當歸切炒 大腹皮各參分 前胡去蘆頭

白朮兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑一棗大拍
碎棗二枚擘煎至八分去滓溫服不拘時

治乳石發動心膈痞滿喘息微促腹脇妨悶疼痛大腹
湯方

大腹皮壹兩 木香 枳殼去麤皮

赤芍藥

甘草

炙剉各半兩

前胡

去蘆

陳橘皮

湯浸去白焙

赤茯苓

去黑皮各參分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至七分去滓溫服不拘時

治乳石發動心膈痞滿腹內妨痛不思飲食桔梗湯方

桔梗

剉炒

枳實

炒

白朮

各貳兩

梔子人

兩

甘草

炙剉各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

乳石發心腹脹滿

論曰乳石發心腹脹滿者以飲食居處皆犯溫煥石勢

壅遏不得宣通故府藏之間熱氣相搏而心腹脹滿也

又有腹脹欲斷衣帶者亦以寢處之溫失食失洗不時

動役之過但能冷食冷洗當風而立則脹滿自消

治乳石發心腹脹滿導氣丸方

牽牛

兩

一味搗羅為末用生薑自然汁煮麩糊和丸梧桐

子大每服五十九生薑湯下

治乳石發大熱心腹滿脹石膏湯方

石膏

大青

各參兩

黃芩

去黑心

升麻

芍藥各二兩

右五味麤搗篩每用五錢匕水一盞半煎至一盞去滓分溫二服如腹痛加續斷二兩

治乳石發動腹脹頭痛先有癰實不消或飲酒食肉所致時苦心急痛者黃芩湯方

黃芩

去黑心

甘草

炙

大黃

剉炒各二兩

麥門冬

去心

梔子

八枚

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓下芒消一錢匕再煎三兩沸溫服早晨晚後各一服

服

治乳石發動上氣熱實心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胸口焦燥目赤痛大黃湯方

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

黃連

去須

甘草

炙

麥門冬

去心

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓內芒消一錢匕再煎三兩沸溫服早晨近晚各一服

通利即愈

治乳石發動心胸痞脹熱毒萎蕤湯方

萎蕤

黃芩

去黑心

升麻

乾薑

炮

芫胡

去苗各二兩

芍藥

黃連去須各壹兩

石膏肆兩

梔子八枚

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一分拍碎并豉少許同煎至六分去滓下芒消半字令沸溫服如人行十里許再服日二快利即止

治乳石發內有虛熱胸腹痞滿外風濕不解肌肉拘急香豉湯方

豉貳合

梔子人拾肆枚

葱白壹握切

黃芩去黑心參兩

右四味除葱豉外麤搗篩每服先以水三盞煮葱豉至一盞半下藥四錢匕更煎至八分去滓溫服

治乳石發內熱結不除或已飲酒冷食澡洗猶不解或腹脹頭痛眼目疼或先有癰實不消或連飲不食或時作心痛甘草湯方

甘草貳兩

黃芩去黑心

大黃剉炒各貳兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服早晨晚後各一服

治乳石發心腹脹痛冷熱相搏桔梗湯方

桔梗剉炒參兩

甘草貳兩

白朮

枳實去瓤炒

梔子人各貳兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服早晨晚後各一服

治乳石發心痛脹滿飲熱酒不解葱豉酒方

葱壹握切 豉伍合綿裹

右二味以水三盞煎至一盞去滓分三服熱飲之早

晨日午近晚各一

治乳石發動腹脹欲裂者為久坐下熱及衣溫失食所

致

右宜數冷食冷飲洗當風取冷須臾即愈

乳石發下利

論曰乳石之性剛猛氣多炎上理之傷溫則火轉為熾

內煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過多則液腸胃胃得水

則吐腸得水則寒而腸雖寒火炎不滅水漸流下而為

行潦遂變下痢胃氣虛冷水穀不消在陽則益熱不食

在陰則腸鳴而洩也

治乳石發動煩熱腹痛變為下痢不欲飲食地榆散方

地榆壹兩 木香半兩 萎蕤參分

當歸參分剉 黃芩參分

右五味搗篩為散每服四錢匕水一中盞煎至六分

去滓溫服不計時候

治乳石發動解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連

湯方

黃連壹升

白粱米貳合

右二味水五升煮取二升分三服一日盡

治乳石發下痢梔子人湯方

梔子人貳拾壹枚

甘草炙令赤色貳兩 人參貳兩

黃連去須貳兩

右四味麤擣篩每服四錢匕用水二盞煎至一盞去

滓溫服早晨日午晚後食前各一

治乳石發下痢香鼓飲方

鼓伍合

葱白壹握切

乾薑

炮裂擣末壹兩

甘草

微炙剉搗末壹兩

右四味先以水三盞入甘草乾薑二味末各二錢匕

煎水至二盞去滓下碎葱一合鼓一合更煎至一盞

去滓分爲三服早晨午時日晚各一

治乳石發下痢黃連湯方

黃連

去須壹兩

鼓伍合

烏梅

取肉拾枚

右三味剉碎以水三盞入童子小便一盞薤白三莖

拍碎同煎至二盞去滓分溫三服空心日午晚後各

一

治乳石發夾時行兼有客熱下血痢止血破棺起死黃

藥湯方

黃蘗微炙到 黃連去須 乾薑炮裂

石榴皮炙到碎 阿膠炙令燥 芍藥兩

梔子人拾伍

右七味麤搗篩每服四錢匕以水二盞煎至一盞去

滓溫服日再

治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢不斷梁米湯方

梁米壹 黃連去須到

右二味麤搗篩以水四盞煎至一盞半分三服去滓

食前溫服一日令盡

治乳石發白痢黃連湯方

黃連去須綿 蜜壹 童子小便貳

右三味以水二盞與小便漬藥一宿煎至一盞半去

滓分為二服弱人三服早晨日午晚後溫服

治乳石發赤白痢兼熱煩悶梔子湯方

梔子人拾 薤白切壹 鼓壹

右三味以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服弱人

即分為三服食前服

治乳石下痢及常服壓石方

鼓兩

右一味炒令黃香候冷搗篩為末每服二錢匕以冷水調下

解乳石痢方

紫箏茶貳兩

右一味搗羅為末每服三錢匕以水一盞煎至七分和滓服之早晨日午晚後食前各一

解石痢方

右淡煮真好芥濃汁服二三盞重者三服輕者一二服差

乳石發淋瀝

論曰乳石發動小便淋瀝者石勢歸腎熱氣所致也蓋腎主水而惡燥水行小腸入胞為溲便腎氣和平則溲便順流腎氣宿虛復困石熱將溫過度虛熱相搏則溲便數而澁且痛也數為虛澁為熱澁甚而痛故為淋瀝治乳石發動患淋積年或數日輒發滑石散方

滑石貳兩

冬葵子壹兩

赤茯苓去黑皮

芍藥

黃芩去黑心

蒲黃微炒

芒消各壹兩半

瞿麥穗壹兩

石韋去毛壹兩半

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕煎後方桑白皮飲

調服空心食前日二服漸加至三服取利為度
下前藥桑白皮飲方

桑根白皮剉壹兩半木通剉貳兩白茅根剉貳兩半

百合貳兩甘草炙滑石各壹兩

右六味細剉如麻豆大每服五錢匕水三盞煎至二盞去滓每用半盞調前散如口乾即食前更服此飲

治乳石發動淋瀝滑石木通湯方

滑石伍兩木通剉參兩石韋去毛

瞿麥總各貳兩冬葵子伍合

右五味麤搗篩每五錢匕水三盞入茺根少許剉碎

同煎至一盞半去滓更下芒消少許煎三兩沸分溫
二服空心一服如兩食久再服微利為度

治乳石發動熱結小便淋瀝小腹大黃湯方

大黃剉芍藥一兩赤茯苓去黑皮各壹兩

大麻人半升別研每服旋入壹合

右四味除麻人外麤搗篩每服五錢匕水三盞入麻人一合同煎至一盞半去滓分溫二服空心一服日

午再服

治乳石發動熱結小便淋瀝小腹痛蠓蛸湯方

桑蠓蛸炙黃貳拾枚黃芩去黑心壹兩

右三味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓分
作二服空心溫服日午再服

治乳石發動熱淋澀痛車前湯方

人車前草去根一匙剉洗令淨切片葵根暴乾各貳兩

木通剉壹兩半

右三味麤擣篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去

滓入芒消末半錢匕更煎一兩沸溫服日再取利為

治乳石發動血淋不止雞蘇湯方

雞蘇壹握去根剉暴石膏碎貳兩竹葉壹握

石膏碎貳兩

竹葉壹握

葵子別為末壹兩葵子為末每服壹錢

右五味除葵子外麤擣篩每服二錢匕水一盞半煎

至一盞去滓下葵子末一錢匕更煎至八分溫服日

二

治乳石發卒患淋方

缸底青苔壹塊如鴨子大

右一味以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服空心

日午各一

治乳石發熱淋茅根湯方

白茅根淨洗剉暴乾半斤

右一味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服食前日二

治乳石石淋狀如碎砂石下者方

車前子壹升絹囊盛

右一味以水五盞煎至二盞經宿勿食頓服之須臾

砂石自下

治乳石發熱小便數少如淋葵子湯方

冬葵子棟伍合如無子切陳根壹兩亦得

右一味麤搗篩每服四錢匕水二盞半煎至八分去

滓溫服日三

乳石發大小便不通

論曰乳石發大小便不通以石勢乘於大小腸故也蓋石氣慄悍方其將適得宜飲食有節則慄悍之氣沉潛而不作將適失宜食飲不節沉潛者於是騰躍而四達乘於腸間則津液內燥而為結澁此大小便所以不通也

治乳石發熱四體煩滿脉至急數大小便不通升麻湯

方

升麻兩

黃蘗微炙

黃連去須

芍藥各壹兩

甘草炙令赤

黃芩去黑心

白鴨屎

淡竹葉

切各貳兩

梔子人

拾肆枚

右九味除竹葉鴨屎外麤擣篩先以水三升煮竹葉鴨屎去滓至一升半每服取一盞入藥四錢匕煎至七分去滓溫服早晨日午晚後各一若上氣加杏人五合石膏三兩

治乳石發動氣上不得食嘔逆大小便不通氣滿煩悶折熱下氣前胡湯方

前胡去蘆頭

黃芩去黑心

甘草炙令微赤

赤茯苓

去黑皮各貳兩

杏仁

湯浸去皮尖炒令黃肆拾枚

枳殼

去瓤麩炒令黃壹兩

大黃

剉炒令香壹兩半

梔子人拾枚

右八味麤擣篩每服五錢匕水三盞入生薑一分拍

碎同煎至一盞半去滓分溫三服早晨日午晚食前

各一服訖如利多喫酢飯止之不可頻服隔三兩日

即更服

治乳石發動煩熱身體微腫不能食飲小便不利茯苓

飲方

赤茯苓

去黑皮貳兩

白朮

炒令香

甘草

炙令赤

栝樓根

剉心日人參

桂

去麤皮各壹兩

黃芩

去黑心貳兩

枳殼

去瓤麩炒令黃壹兩半

右八味麤搗篩每五錢匕水三盞煎至一盞半去滓
分溫二服空心日晚食前各一

治乳石發動上氣熱實不解心腹滿悶大小便不通口
燥目赤者芒消湯方

芒消 須去 黃芩 去黑心

甘草 炙令赤 各壹兩 梔子 人 大黃 剉炒各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服日二早晨日晚各一

治乳石發動大小腸壅滯臍腹妨悶赤茯苓散方

赤茯苓 去黑皮 木通 剉各參分 葵子 半兩

惡實 炒 枳殼 去瓢 炒 大黃 剉碎微炒 各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕煎紫蘇湯調下如人
行十里再服以利為度

治乳石發動致人虛勞下焦有熱骨節煩疼肌急內痞
小便不利大便澁難口乾舌燥氣乏少力折石敗熱大
麻人飲方

大麻人 伍合研爛 絞取汁 豉 參合以綿裹作袋子

右二味以水四盞將麻人研爛絞取汁并豉袋子與
水同煎至二盞去滓分為四服早晨日午晚食前各
一夜更一服

治乳石發動大小腸壅滯不通枳實湯方

枳實去瓢麩炒令黃 前胡去蘆頭 檳榔剉

木通剉各壹兩 甘草炙半兩 大黃壹兩半剉炒

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分煎

取六分去滓不計時候溫服

治乳石發熱口乾小便澀方

萎蕤伍兩

右一味搗碎每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫

服但得微利即差

治乳石發熱口乾小便澀方

甘蔗剉去皮

右一味嚼嚙汁如口痛不能嚼者取汁飲之先曾利

即勿服

治乳石發熱體氣昏濁不痛不痒小便赤澀方

生茅根貳斤

右一味搗令爛以新布絞汁細細飲之

治乳石發虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利

大便數少吸吸少氣折石敗熱方

大麻子參合

右一味研令極爛以水三盞煮至一盞半分二服早

晨日午各一
治乳石發動大便難腹中堅脹者爲積久腹中有乾糞
不去方

右宜銷酥及蜜并石膏末和服令滋潤腹中卽下若
不下更服大黃朴消等下之便差

服乳石備飲食常法

論曰服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲食有
所宜者有所當忌慎者有不可不預備而防其疾之將
然者今特叙之服乳石之人所宜飲食方

右取豬脂并豬肉可一月三五度食之佳以水牛頭

蹄及白羊頭蹄豬肉作薑豉隨意食之果實宜食梨
柿等凡欲服熱羊肉麪食之類宜先食三五匙冷飯
卽不妨熱食訖仍速以冷飯壓之行步釋散乃善服
石人有性喜麪嗜酢不能禁慎者宜食冷淡糠酢百
沸紫麪及水模餅卽無妨冷韭羹大補時時宜食之
又服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失食味失
食味則不能食不能食則令人虛熱虛熱則令石數
發惡寒况又損石力謂酒能壓石令人風虛腰脚弱
若能飲又能食大佳

又服石忌慎方

又右凡服石飲食切忌熱麪白酒陳臭酢醬雞犬羖羊
牛肉鮑魚鮑臭魚脯血羹冷酒有灰酒蕎麥小豆胡
麻動作切忌乘飢灸灼熱湯沐浴夏月空腹念恚及
過市鄺入喪家并哭泣衝熱忍飢登甚穢廁親不潔
婦人蔬菜忌芸薑胡荽荳蔻芥菜大蒜果實忌
梅杏桃李藥物忌烏頭附子天雄蒼耳等悉宜消息
以取安平且服石將慎至難不能將息不若勿服蓋
背折腦裂發乳體腫之疾往往因此得之故耳
服乳石後將慎紫麪食方
右取烏豆不拘多少煮取濃汁代水和麪依常法作

麪食還向此豆汁中熟煮乾則添豆汁勿加水候熟
入豬羊藜豆等臠食之和山芋作麵尤佳

又水摸餅方

右作餅欲上鏃時以水塗摸生餅上表裏燂之切勿
食胡餅燒餅等大壅熱故也

又宜食麵餅方

右取麵拌如常餅法細切如小豆大以麪於簸中拌
令如丸煮極熟乾漉出置冷水中又漉出置盤中以
粉再拌麪圓內鑄中煮令極熟乘熱任以五味汁及
諸肉臠食之大涼補腰脚於藥無犯

又方

右取新大麥爲麩和肉汁及作餅食甚良又大麥熟蒸爲餅和黑豆相拌食良憂日旨熱遠行食晚失飢石必發動宜作大麥餅將行飢卽食之壓石藥飢甚妙

治乳石發動寒慄顫掉不自支持者爲食少藥氣溢於肌膚五藏失序百脉搖動與正氣相競方

又右宜強飲熱酒以和其脉藥食以定其藏強行以調其關節強洗以宜其壅滯

乳石發諸藥不治者

論曰乳石發動各有方劑以對病證固有疾勢異常諸藥所不能治者廼別叙備用之法

治乳石發動諸藥不効宜服菱蕤酒方

菱蕤

升麻

薺芫

人參各參兩

犬黃判炒貳兩

黃芩去黑心

葛根判

紫草去蘆頭

犀角鑄各肆兩

梔子人

芒消各貳兩

銀屑貳兩半

豬脂

臘月者參兩

露蜂房伍兩

甘草炙判貳兩

大豆

浸壹宿暴乾炒去皮壹合

右一十六味除豬脂銀屑外搗羅爲細末以無灰酒

二升密封漬經一宿次將豬脂用好酒一升鍊開以銀屑相和研入前藥酒內更浸一宿每服取酒一二盞飲之

治乳石發動諸藥不治單服豆豉酒方

醇酒升壹

豉伍

右二味同煮沸熱澄清旋飲一盞

治乳石發諸藥療不差方

消石

明白者壹塊如杏子大

右一味不拘時逐旋含化嚥津

治一切石發胡豆汁方

胡豆

升半

右一味以水五盞與胡豆同研生絹絞取汁每服半

盞不拘時服

治乳石發大麥麩方

大麥

搗去皮淨以水淘染徧漉出蒸令香熟焙乾令更炒香壹升

右一味搗羅為細麩每服三錢匕化蜜水調服早晨

日午晚後各一

治乳石熱氣結滯經年數發胡荽飲方

胡荽

五月五日採預收陰乾半斤春夏採葉秋冬採根

右一味以水七升煮取一升半去滓每服一盞不計

時候日三水引代茶服一伏半去新時服一匙不消

治乳石發動口乾寒熱似鬼為病諸藥不治者麥門冬

丸方治乳石發動口乾寒熱似鬼為病諸藥不治者麥門冬

麥門冬剉分 五加皮 犀角屑

黃芩各肆分 萎蕤兩肆 梔子肆分

升麻肆分 大黃伍分 芍藥肆分

大青參各分 甘草參各分 苦參陸分

右一十二味搗為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十

五丸至二十九食後蜜水送下日三以意加減服半

治乳石發熱困諸藥不効者方

豬脂伍合成鍊者 芒消肆分 葱白伍合切

豉心參合

右四味以水三升煮葱豉取一升半瀝去滓下豬脂

芒消二味再煎一沸分五服以差為度

治丹石發方

河中石兩壹

右一味燒令通赤投於童子小便一盞內候溫去石

飲之

治一切丹石發方

寒水石壹塊

右一味如杏子許大含之以差為度

治一切丹石發方

黃連去須貳兩

右一味搗羅為細末以水三盞浸經一宿漉去滓每服半盞時時飲之

治一切石發方

生冬瓜去皮研爛肆兩

右一味以水五升煮至三升去滓分溫三服早晨日午近晚各一

治乳石發枸杞煮汁方

大南枸杞白皮半斤剉碎

右一味以水五升煮取三升空心任意飲之

治乳石發煮薺苳汁方

薺苳半斤細剉

右一味以水五升煮取三升空心飲之

治諸乳石散發不可忍欲下之方

肥豬肉貳斤

葱白

薤白各肆兩

右三味切一處蒸令熟空心食盡良未少頃再食

本三洲世一區著令機空心合蓋貝木少即再食

志唯隨因論 慈日 藤白 雜


併備其不道醫不可必於下之衣

林一和以本正長意取三長堅

管款 補

禁於下發案轉紙背衣

亦一製以木正代燕取三代空心合蓋者衣



大德重校聖濟總錄卷第一百八十四

