

欽定四庫全書

普濟方卷二百

諸癘門

久癘

附論

明周王朱禔撰

久癘者癘久不瘥發汗吐下過甚真氣虛邪氣深先以內導衝氣不應故積歲月而難治也雖有虛痞不可攻治當先其發時動湯液以發汗益浸漬薰蒸而邪氣方

出出則微汗小便利者表裏俱和久瘧自瘥矣

方

龍骨丹 出聖惠方 治瘧久不瘥或止或發繼月連年諸藥

無效者

狗頭骨 鼠頭骨 牛頭骨 虎頭骨 兔頭骨

狸頭骨 龍角 狢猴頭骨 馬頭骨 天靈蓋

鼈甲 龜甲 阿魏 細研 麝香 細研各半兩 鹿頭骨 一枚

雄黃 一兩細研 硃砂 一兩細研

右為末入研了藥更研令勻以軟飯和丸如雞頭大

以青絹裏男左女右中指上繫一丸未定即以醋茶

下一丸

烏梅丸 出聖濟總錄 治諸瘧久不瘥發動無節日漸虛困

羸瘦

烏梅肉 微炒一兩半 鼈甲 酒浸去暴爛炙令黃色一兩 天靈蓋 塗酥炙一兩

虎頭骨 酒浸炙黃一兩 常山 細剉一兩 柴胡 去苗一兩 蜀漆葉 燒灰三分

肉蓯蓉 去皺皮酒浸炙黃一兩 知母 焙乾剉三分 甘草 炙三分 升麻

分三 **大黃** 剉半兩 **豉** 炒令黃半兩 **桃仁** 二十九枚湯浸去皮尖雙仁生用

右除桃仁外為細末與桃仁相和煉蜜丸如梧桐子大每日空腹未發前以枳殼桑根白皮湯下二十九漸加至三十九四十九後覺冷損憊即加生乾地黄防風黃耆桂各一兩香豉減半日一服

**鼈甲丸** 出聖濟總錄

治瘧不瘥

**鼈甲** 酒浸炙令黃色去裏爛一兩 **虎頭骨** 酒浸炙令黃色研三分 **烏梅肉** 炒令乾三分 **麥門冬** 去心焙一兩 **石膏** 研碎三分 **常山** 細剉一兩 **白薇**

半兩 **姜蕤** 半兩 **升麻** 三分 **人參** 一兩 **知母** 剉焙乾三分 **地骨皮** 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大未發前米飲服二十九明日早晨再服二十九如人行十里即食一碗白粥至臨發時又服二十九不吐不利瘥後三日內將息如常法

**驅瘧湯** 出聖指方 治諸瘧久瘥不瘥

**草果仁** **青皮** **陳皮** **人參** **茯苓** **半夏** 製  
**厚朴** 製 **蒼朮** 炒 **雞心檳榔** **白朮** **甘草** 炙各半兩 **良**



薑一分

右對散每服三錢薑五片棗二枚烏梅一枚空心煎服

常山飲出聖濟總錄治一切瘧疾經久不瘥

常山 鼈甲去羸爛醋炙各一兩 白頭翁 知母炒 甘草炙

柴胡去苗各三分 青蒿一握 桃枝 柳枝各一握 桂去蘆皮半兩

右麓搗篩每服四錢酒一盃半入葱白薤白各三寸切浸一宿煎取八分溫服去滓欲發前再服

烏梅從蓉丸一名烏梅丸 治瘧久不瘥方見本門足少陰腎瘧類

肉從蓉丸 治久瘧不瘥羸瘦無力寒熱不能飲食

烏梅肉微炒 恒山剉 附子炮製去皮臍 桂心各一兩 虎頭骨

一兩半塗 桃仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒 香豉一合炒乾 麝香細研

肉從蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心以粥飲下三十九丸晚食前再服

綾鯉甲酒出聖濟總錄 治瘧久不瘥



綾鯉甲 酒浸炙令黃色半兩 常山 三分 鼈甲 去裏襖醋炙黃半兩 烏賊魚

骨 去甲三分 烏梅肉 一分 竹葉 握一 桃仁 去皮尖雙仁二十四枚湯浸

豉 一合 葱白 七莖一切

右剉如豆大用生絹袋盛以酒三升浸經一宿每日空腹溫服半盞良久取吐如不吐至巳午時再服三兩服如不瘥隔日更依前服之

又方 出經驗良方

草果 去皮膜七枚 肥棗 烏梅 各五枚 甘草 三寸 大半夏 湯炮

青皮 各四枚 生薑 四塊如指大

右為麤末用水一大碗入瓦瓶中濕紙密封煎至半碗每日天明服

烏梅丸 一名菴蓉丸 療瘡無問年月遠近並瘡 方見本門足少陰腎瘡類

治久瘡方 出聖惠方

狐糞 雄黃 阿魏 黃丹 硃砂 丁香 末各一分

麝香 一分

右同搗為細末醋煮麵糊和丸如雞頭大以緋帛裹

藥一丸男左女右繫在背上

又方 出聖惠方

道人頭 一兩 雄黃 三分 砒霜 一分 香豉 一合 荷葉 七枝

甘草 三分 生用

右為末研藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大發前令醋

湯下一丸忌食熱物

鼈甲白朮散 出楊氏家藏方 治久瘡寒熱相等汗多腰重

痛

鼈甲 醋炙 恒山 醋炙 白芍 柴胡 各一兩 白朮 二兩 牡蠣 半兩

煨

右以咀每服五錢水二鍾薑五片煎至一鍾去滓溫服

不拘時候

六物湯 治久瘡不已寒少熱多

嫩常山 二錢 柴胡 雞心檳榔 青皮 去白各三錢 草

果仁 甘草 各一錢

右剉分三服以大軟烏梅三枚過夏好酒一啜許新

水二盞煎半盞隔宿露空以紗蓋之次早黎明服若寒熱等加製厚朴二錢畧暖服是日飲食物皆用熱車前草湯 治久瘡日多增寒壯熱不止渴飲水

車前草 半兩 常山 半兩 升麻 半兩 白粳米 半兩 豉 半兩 甘草 半兩

草 生半兩

右簾搗篩每用三錢以水一盞半隔宿浸藥置於星月下橫一小刀子於藥上五更煎取七分去滓分溫二服空腹未發前一服相次再服良久得吐定即得

食漿水粥

常山散 療患瘡經久者不過五六服

常山 三分 乾漆 三兩 牡蠣 一兩 桂心 二兩 橘皮 二兩

仁 二兩 皮 去 熬

右為散一服方寸匕先發熱米飲服若先寒清酒和服之空腹未發前一服服藥日唯須晚食七日內慎如前法忌生葱生菜

大效瘡丹 治久瘡疾



雄黃另研 淡豆豉後研 飛羅白麩各半 乳香二錢半

黃丹一兩炒 桃仁一百個  
黑色 去皮尖

右為細末用獨顆蒜研如泥新布中絞過和藥丸如雞頭肉大硃砂為衣須要五月五日午時面東北方合藥忌婦人雞犬孝子僧道見每一丸當發日面東北以溫酒或無根井花水下孕婦不可服

此方活人多矣如君子以天地之心為心至日誠心修合廣施於人其陰德不淺蓋藥有神效故勉

之今所載傷寒證候治方皆法於仲景其錄諸方新用得效故敢言之

交加飲子 治久瘡不已山嵐瘴氣及脾胃氣弱陰陽

相傷發為痰瘧一名生熟飲

肉苳菹七箇麩裹燒 草果二枚一熟 厚朴二寸一半生一半熟用生薑製

過生薑二塊如東大紙裹煨半生半熟 甘草二寸半一半生用一半熟用

右為末每服分一半水一碗銀石器內煎至一大盞去滓溫服發日空心服未愈再服一方無生薑名反

解飲忌葷腥未效用附子七棗湯或人參建中湯不用薑棗煎只作生料添棗大瓦銚多煎日飲數盞以敵諸瘧奏效甚多又屈第五指下二節反紋側外向紋曲盡處灸三壯男左女右儒門事親當發日早灸地骨皮湯 治久瘧不瘥發不一時或朝或夜肌瘦食少

地骨皮 升麻 犀角 元參 常山 右麓搗篩每服三錢以水一鍾煎至七分去滓空腹

各三分 常山一兩 細剉

未發前溫服欲吐真忍候不能禁即吐如此吐可即瘥

黃耆散 治久瘧四肢虛汗不止

黃耆 去苗細剉一兩 牡蠣 燒研如粉一兩 麻黃根 一兩 知母 剉焙乾一兩 人參 一兩

右為極細末每服三錢用河水煎小麥湯未發前調下未瘥再服

松蘿飲 治瘧久不瘥發歇無時漸至黃黑枯瘁成癆

松蘿 甘草 生半兩 常山 細剉半兩 竹葉 切半兩 鼈甲 去襴

浸炙令黃二分

右麓搗每服五錢以水一鐘半煎至一鐘去滓空心未發前溫服以吐為瘥

柴胡飲 治久瘧不瘥將成骨蒸勞寒熱無時

柴胡 去苗半兩 常山 三分 甘草 生半兩 附子 炮製去皮臍半兩 乾薑

炮製一分

右剉如麻豆每服五錢酒一盞半煎至一盞去滓分

二服空心未發時一服食後再服

神功丸 治久瘧不瘥惡寒壯熱百節疼痛面色黃瘦

阿魏 研 丹砂 研 雄黃 研各一兩 麝香 研一錢 臘月狐肝 研

二兩

右為末重午日未出時粽子丸如梧桐子大每病者以緋線繫一丸男左女右中指上未瘥桃仁湯下一丸合時北面勿令雞犬婦人見

治久瘧



半夏湯炮七次 陳皮舊者各半兩 白茯苓三錢 甘草一錢 旋覆

花兩半

右為麤末每服四錢水一盞半薑七片煎七分去滓細細啜服不拘時一日四服如是虛弱泄瀉之人間服果附湯一二

常山散 治久瘧連綿積年不瘥

常山一兩半 羚羊角炙令黃 烏梅肉炙令燥各二兩 黃芩二兩 甘草

右為散以竹葉煮飲取六七合飲及熱用調常山散三方寸匕未發前一服若不瘥臨欲發又進二寸匕老小以意量之忌海藻菘菜生葱菜等物

治遠年勞瘧不瘥出聖惠方

恒山剉 附子炮製去皮臍 薄荷根各半兩 麝香一錢細研 阿魏

一分麩裏煨麩燕為度

右為末和阿魏麝香同研勻煉蜜丸如梧桐子大每於食前溫酒下十五丸

治瘡久不瘥 出聖 惠方

蜘蛛 五枚大者去 脚研如膏 蛇蜕皮 一條全 者燒灰 蝙蝠 一枚炙 微焦 麝

香 半兩 細研 鼈甲 一枚塗醋炙 黃去 展爛

右為末入研藥令勻五月五日午時以蜘蛛膏入藥

煉蜜同和丸如麻子大每服空心温酒下五丸小兒

茶下二丸

又方 出聖 惠方 治瘡久不瘥或止或發繼月連年諸藥無

效者

川大黃 末一兩 砒霜 菜豆粉 阿魏 麝香 各半兩

右細研勻以軟飯和丸如小豆大用醋茶下一丸當

吐即瘥

又方 出聖 惠方 治久瘡

砒霜 半兩 阿魏 一分 川大黃 半兩對 硃砂 一分 菜豆 十二

八粒

右為末入研藥令勻用醋飯為丸如梧桐子大臨發

前冷水下一丸忌食熱物

梔子湯

出千金方

治瘡經數年不瘥者

梔子

十四枚

秫米

十四粒或作粳米

恒山

三兩

車前葉

二十七枚炙乾

右以咀以水九升煮取三升分三服未發一服發時

一服發後一服以吐利四五行為度不止冷飯止之

龍骨丸

治療久瘡不斷者

龍骨

一兩常山

三兩

大黃

二兩附子

二分炮

右為末以雞子黃丸如梧桐子大先發前臨發各飲

服五丸常將服之療三十年瘡

治瘡累年不瘥者

出聖惠方

安息香

白芥子

道人頭

各一兩

桃仁

二十七枚

右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大但於發時

男左女右手把一丸

虎睛丸

出聖惠方

治久瘡

虎睛

一對生用

狗膽汁

一枚

天靈蓋

一分生用

麝香

半分細研

右為末入麝香同研勻以狗膽汁和丸如梧桐子大

以緋帛裹一丸男左女右手中指繫之如患多時生



薑湯下一丸

熊膽丸 出聖惠方

治久瘡

熊膽 五靈脂 恒山 野雞糞

雄者各半兩

右為末以醋煮麩糊和丸如黑豆大正發時冷水下

一丸

南斗散

常山 白芷 南星 煨

右等分每服三大錢水一盞酒半盞薑三片煎去滓

發日五更服

雄黃散 出保命集

治久瘡不能食胃中鬱鬱欲吐而不吐

此藥吐之

雄黃 瓜蒂 赤小豆 各一錢

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

治久瘡方 出本一事方

粉霜 硃砂 各二錢 菜豆粉 七錢

右為末米糊為丸如梧桐子大每服一丸冷水五更

初時下忌生冷

久瘡丸 治瘡百方不瘥宜服

砒霜 一錢 研 乳香 半兩 研 半夏 湯洗七遍 焙 乾稱一兩

又重午日合同為末正午時粽子尖和丸如皂子大發時以湯下一丸更不再服如非重午日合藥須兩

服瘥

又方 出聖 惠方 治久瘡

蝦蟆 大者一枚 主用 砒霜 黃丹 各一分

右將二味內蝦蟆腹中用鹽泥固濟燒令通赤取去研為末醋煮糊為丸如梧桐子大每服令醋湯下三丸忌食熱物

恒山丸 出聖 惠方 治瘡疾積年者不過兩服新者一服實

愈判自服有驗

用恒山不拘多少雞骨者為細末以雞子一枚入蜜一匙許于飯甑上蒸或慢火熬熟以搜和常山末丸如梧桐子大每服十五丸當日空心冷酒或粥飲或

竹葉湯吞下忌熱物一日不吐不瀉一方無蜜

純舍方同

黃連酒

出肘後方

治久瘧宜服有熱當吐冷當下三十年

者可治

黃連

去須一兩

常山

細剉一兩

右以酒一升半浸經宿將發前煎一盞分二服臨發

更一服

辰砂丸

出厄氏方

凡瘧之為苦異于諸疾世人治之不過

常山砒霜之類發吐取涎而已雖無所損傷氣多矣宜

急服此藥最為穩當

辰砂

有牆壁光明者

阿魏

真者各一兩

右研勻和稀米糊丸如皂角子大空心濃煎人參湯

下一丸一方加雄黃夔州譚達病瘧半年前入瘧之

為病雖在忌醫之列但用之畧盡皆不能效邂逅故

友竇藏叟先生口授此方遂愈瘧之為病雖在忌醫

之列但體認得所因真的按方用藥無不見効

又方



白茯苓 甘草 各三錢

右以咀分二服水一鍾煎臨發時頓服

治多年瘡 用牡蠣驢脂和烏梅為丸未發時二三十

丸

又方 取軸垢水洗和麩為彈丸大作燒餅未發時食

一枚發時又食一枚不問久近皆安又以驢皮覆身妙

治久病瘡疾連年不瘥 用生人膽一箇裝糯米滿入

麝香少許陰乾一半青者治瘡一半黑色者治噎食病

證為末每服一十五粒瘡疾陳皮湯下噎食通草湯送

下隨收得裝滿煙頭上陰乾

斷瘡 出楊氏家藏 治久瘡不愈

以五月五日蝦蟇曬乾紙裏封絳囊盛之男左女右

繫背上勿令病者知

又方 出楊氏家藏

花蜘蛛五月五日取曬乾依上用之一方蜘蛛一枚

著飲中合丸吞之又法于蘆管中塞以管縮頸上過

發時乃解去也

神屋散

出海上名方

石龜殼燒灰研細酒調下服方寸七

露薑飲

出澹療方

治脾胃聚痰發寒熱

右生薑四兩連皮搗爛上用自然汁約明日當發隔夜安排將紗片遮蓋露一宿五更初攪動澄清以上吞喫或有吐任之安或微利亦安醫稱瘧為鬼疾論其條去條來也世不知察遂謂鬼物為祟蓋寒涎以

時而朝故寒熱以時而作彭氏云幼喜嗽近歲發瘧以藥得大吐而後止一日道中病作或者授此方至今不發蓋薑能發散寒涎露氣極寒以類導之故其效也速所謂以所喜者誘之以所惡者攻之也

治久瘧痰瘧

用猪膏草搗絞汁服得吐出痰也

祛瘧神應丸

出德生堂

治久瘧及諸瘧疾

用三姓人家寒食日食用乾麩每一家取一匙為細

末五月五日午時採青蒿插取自然汁和前麩為丸  
如菜豆大每服一丸當發日早晨取無根井水送下  
一方用黃丹一匙炒過與麩一處碾和勻

荊蘆散 出保命集

治久瘧不能飲食胸中鬱鬱如欲吐不

能吐者宜吐則已

大荊蘆 末半錢

右溫蘘水調下以吐為度

蒼朮湯 出保命集

蒼朮 四兩 草烏頭 一錢 杏仁 三十箇

右為蘆末都作一服水三升煎至一半均作三服一

日服盡迎發而服局方中七宣丸治瘧之聖藥也

生熟飲子 出衛生家膏方 治久患瘧一二服瘥

烏梅 半炮半生 厚朴 半生半薑製 草果子 半炮半生 甘草 半炙半生 陳

皮 半生半炒 半夏 半炒半薑製

右等分剉碎每服五大錢生薑七片棗子五枚水二

盞煎至八分去滓熱服



立效散 出總七方

治久瘧

硫黃 辰砂

石為末每服一錢參湯下或加黃丹倍之大凡寒多易治熱多難治燥甚者白虎湯加桂但寒不熱者朴附湯但熱不寒由傷寒而得者小柴胡湯胃溼而得者因浴而得者苓朮湯餘皆究原而治之

碧霞丹 出經驗良方

專治遠年日久瘧疾

東方甲乙木巴豆 取肉去油 南方丙丁火官桂 去皮 西方

庚辛金白礬 北方壬癸水青黛 中央戊己土

硫黃 揀去炒各半兩五味各研為細末

右於五月旦修治了用紙各裹作五包盤盛依方位排定五方勿令雞犬婦人見安佛前每日念觀音菩薩慈號一百八遍至初五日午時以五家粽尖搗碎和藥令勻得所可丸為度如梧桐子大有患者以新綿裹一粒男左女右塞耳中凡婦人有患男子與安未發前一日用藥約於每日所發過一兩時久未發

取去如夜瘡須候隔日未發取出如病又甚者隨左

右耳鼻皆塞病去依前法除去

朴附湯 出澹療方

治久發虛瘡寒熱

大附子

生去皮用剪作散子生薑自然汁炒乾

川厚朴

去皮剪作散子塊用生薑

自然汁三浸三炒二味等分

右剉散病輕者每服四錢水二大盞生薑七片棗七

枚同煎至七分重者加之發日早晨併三服

秦朮散

出如宜方

治久瘡似成勞瘵少飲食寒熱往來

北柴胡

常山

各一兩

秦朮

甘草

炙各半兩

右以咀酒水童便各半盞煎當發日五更服

星星散

出如宜方

治已表解寒熱各服前藥未效合截

半夏

製

南星

常山

草果

陳皮

製

檳榔

秦朮

柴胡

蒼朮

烏梅

良薑

各等分

右以咀酒水各一盞桃柳枝各七寸甘草一寸煎去

滓露一宿發日雞鳴服又方用常山生煨草果各一

錢東方桃枝七寸煎入生薑汁半盞露一宿五更服



如瘡無甚熱先與藿香正氣散草果平胃散 驅逐  
 外邪溫胃氣有疾服二陳湯加白朮草果薑棗煎冷  
 服真武湯加草果虛人截藥不用常山 如熱非柴  
 胡黃芩秦艽石膏不能退冷非乾薑附子肉桂川烏  
 良薑不能溫疾非南星半夏烏梅茯苓陳皮青皮不  
 能下通用宜常山草果檳榔草豆蔻厚朴白朮人參  
 知母蒼朮甘草能者用 以上二十四五味藥中選  
 用最為中矣蓋瘡痢無正方故一一述于後衛生者

幸詳擇焉

大安散 治久瘡不瘥不拘寒熱多少

鼈甲 一枚重二兩好醋煮一時辰令展爛自脫 大

草果 五枚去皮 半夏 五枚 生薑 五塊如拇指大連皮用 甘草 五寸大

棗 五枚去核

右六味同搗爛併作一服以無字白紙數重裹之水  
 溫透入湯炭火內煨令香熟取出以水五盞煎一盞  
 須隔夜一更時煎至中夜至一盞去滓再以水二盞



煎至一盞連前者和勻分二服每服發日五更暖服

一盞至欲發時再暖服一盞輕者當日即止

蒼耳丸

出朱氏集驗方

治久瘡不瘥

蒼耳草

子根莖皆可用

右剉碎焙乾為末酒煮麩糊為丸隨時服

治久瘡不瘥

出本草

以雞子黃加常山末為丸竹葉煎

湯下

治久瘡

出本草

用馬鞭草作煎如糖酒服

祛瘡餅子

出揚氏家藏方

治久新瘡疾不問先寒後熱先熱

後寒

砒霜

二錢別研細放露下三宿

白茯苓

去皮

菜豆粉

石菖蒲

甘草

四味並生用各一兩

右搗為細末研勻煮麩糊為丸作一百二十餅子每

餅子用竹刀切十字不可切斷曬乾每服一餅子先

用冷茶清半盞浸餅子在內臨卧時調勻服

勞瘧 附論

勞瘧者以久瘧不瘥氣血皆虛病雖間歇勞動則發故謂之勞瘧邪氣日深真氣愈耗表裏既虛故食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也

烏梅丸 出聖惠方

治勞瘧連年不瘥

烏梅肉 微炒

鼈甲 塗醋炙令黃色去裏襴

虎頭骨 塗醋炙令黃

恒山

塗醋炙令黃

肉蓯蓉 剉酒浸一宿

知母 剉去皮

川升麻

柴胡 去苗

漆 剉

枳殼 剉去穰

黃連 去鬚

地骨皮 木香 檳榔

梔子仁

川大黃 剉碎微炒

甘草 炙微

猪苓 去皮

黑

麝香 細研各半兩

鼓 炒乾

犀角屑 半兩

桃仁 四十九枚湯浸去皮尖雙

仁 麩炒

微黃

石為末入麝香研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧

桐子大每日空心煎桑根白皮湯下三十九晚食前

再服

鼈甲煮散

出楊子建護命方

治勞瘧毛髮枯焦寒熱不定飲

食減少肌肉消瘦面色青黑兩足無力非時足冷小便

頻數大便不調夢泄精

鼈甲去展欄醋炙半兩 羌活去蘆頭 柴胡去苗各一分 黃耆剉半兩

赤茯苓去黑皮 生乾地黄焙 木香各一分 牛膝酒浸切焙 天

靈蓋醋炙 續斷 兔絲酒焙別搗各半兩 芎藭 藿香葉

陳橘皮湯浸去白焙 山茱萸各一兩 麝香研一分 獨活去蘆

頭一分

右為散每服一二錢水一盞入鹽少許同煎七分空心  
和滓服或煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九

亦得若大腑祕骨蒸熱勿服

烏梅丹砂丸出聖濟總錄 治勞瘵瘴瘧積年不瘥

烏梅肉半兩炒 丹砂研 鼈甲去展欄醋浸炙各半兩 知母焙常

山焙 石膏碎 甘草炙 升麻 蜀漆葉 白薇 地

骨皮 姜蕤各一分 牛黃研半兩 豉炒一分 麥門冬 青

萬乾者半兩 麝香研細半兩

右除研藥之外為末研勻煉蜜丸如梧桐子大每服  
空心溫酒下二十九未發前再服漸加至三十九或



吐痰即安

阿魏丸 出聖濟總錄

治勞久瘧連年不瘥

阿魏 麝香 雄黃 丹砂 四味並研各半兩 鼠骨 牛

骨 虎骨 兔骨 龍骨 蛇骨 馬骨 羊骨

猴骨 雞骨 犬骨 猪骨 十三味並酒浸同炙為末各一分

右搗研為末和勻取辰日於北斗下以阿魏水煮糊

丸如小豆大每服十五丸温酒下空心服

烏梅丸 出千金方 治寒熱勞瘧久不瘥形體羸瘦痰結胸

堂食飲減少或因行遠久經勞後患之積年不瘥

烏梅肉 豆豉 各一兩 升麻 地骨皮 柴胡 鼈

甲 恒山 前胡 各一兩 肉蓯蓉 元參 百合

蜀漆 桂心 人參 知母 各半兩 桃仁 八十枚

右為末蜜丸空心煎細茶下三十九日二服老少孩

童量力通用無所忌

烏梅五補丸 出聖濟總錄 治勞瘧累服藥不瘥經年羸劣

狀如勞疾

烏梅肉兩 熬三 肉蓯蓉去皺皮 酒浸切焙 黃耆焙 對 桂去蘆皮 各一兩

生乾地黄焙 柴胡去苗 常山 桃仁去皮尖 雙仁炒研 當歸

切培 人參 赤茯苓去黑皮 各一兩 甘草炙對一兩半 豉心一合炒

麝香別研 半兩 升麻一兩

右除研外為末入麝香桃仁合研勻煉蜜和丸如梧

桐子大每服空心酒下二十九加至三十九

蜀漆丸出聖 患方 治勞瘧并治積勞寒熱發作有時瘧者及

痰瘧連年不瘥

蜀漆 麥門冬 知母 白薇 地骨皮 升麻

各三 甘草 鼈甲 烏梅肉 姜蕤各一兩 恒山一兩

半 石膏二兩 一合

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九日再服之

稍加至二三十丸一方加光明硃砂一兩麝香半兩

溫酒下

人參丸 治勞瘧方見本門 手大陰肺瘧類

烏梅丸出聖 患方 治勞瘧及瘴鬼等瘧悉治之

烏梅微炒肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾鼈甲塗醋炙令黃去

恒山對川升麻 人參去蘆頭甘草炙微赤對知母 桂

心各三兩桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃香豉一合炒乾麝香半兩

研細

右為末入麝香研勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐

子大每未發前空心以溫酒下三十九至發又服三

十九每日服以瘥為度

恒山飲子出聖惠方 治勞瘧四肢羸瘦不思飲食

常山三分烏梅七枚微炒豉心半兩桃枝一握鼈甲三分塗醋炙令黃去

晨虎頭骨三分塗醋炙令黃柳枝一握乾棗三枚桃花三七枚湯浸去

皮尖雙仁麩炒黃生薑半兩

右細剉以酒四大盞浸一宿明晨煎取二盞去滓空

心分為三服

硃砂丸出聖惠方 治勞瘧發渴寒熱體瘦四肢疼痛或時

煩渴

砒霜半兩硃砂 雄黃 阿魏 虎頭骨塗醋炙黃蛇骨



酒浸炙微黃恒山剉猢猻頭骨炙黃各一分麝香三分天靈蓋

一枚燒令白色上用硃砂點作七星取五月一日夜作

右初一夜人靜茶牀上安排用香一爐淨水一盞於北斗下露之纔明收之候五月初五日午時搗羅為末用醋煮糊和丸如小豆大患者以一九男左女右把之差帶之亦差以醋湯發前服一九亦差挿在耳內鼻裏亦差服藥即忌食熱物

露星飲出仁存方治久瘡成勞

白茯苓 檳榔 恒山 秦艽 柴胡 黃芩

甘草 半夏 桂 白朮

右等分每服三錢酒水各半盞露一宿次早溫去滓服

大安散出百一選方治一切寒熱久病而成勞瘵者

烏梅七枚棗子七枚草果子三枚青皮一錢陳皮三錢大

甘草三寸生薑一兩鼈甲半兩大川烏三錢半夏半

十四箇湯浸七次

右以咀作一服用皮紙裏之凡四重外再以濕紙裏用慢火微煨聞藥香即取出用水二盞煎至一碗熱服如病未久可去鼈甲川烏二味

豉心飲 出聖惠方

治勞瘡發渴不常日漸羸瘦

豉心 五十粒

甘草 生用一分

鼈甲 去裏爛脂浸炙黃

柴胡 去苗各半兩

梔子 去皮一分

烏梅肉 一枚

桃枝心 七枝

柳枝心 七枝

生地黄

汁一合

雄鼠糞 炒為末半錢

右除地黃鼠糞外麤搗篩用童子小便一盞半浸藥

一宿明早煎取一盞去滓下糞末半錢地黃汁一合生薑汁一合分為兩服空心一服欲發前一服

紅英丹 出聖惠方

治勞瘡

雄黃 細研

硃砂 細研

硫黃 細研

丁香

天雄 生用去皮臍

虎頭

骨 生用 赤小豆 各一錢

麝香 一分細研

黃丹 一分

右為末入研了藥令勻取甲子日合用粟米飯和丸如小豆大男左女右以緋絹繫一丸於中指上合時勿令婦人師僧孝子雞犬等見之即無效落地上者



亦不堪用

鼈甲散 出聖濟總錄

治勞瘧久病不已日致憔悴勢漸危

困

鼈甲 去晨醋浸炙 常山 剉 蜀漆葉 烏賊魚骨 去甲 附子

炮製去皮 齊各半兩 知母 切 蜀椒 去目及開口炒 黃耆 剉 柴

胡 去苗各三分

右為散每服三錢以酒盞漬一宿平旦服未發前一服均宜溫

祛勞湯 一名柴胡散 出聖濟總錄

治勞瘧經久不瘥寒熱痿瘦及

瘴瘧氣

柴胡 去苗 常山 剉 鼈甲 去晨醋浸炙 知母 切 青蒿 乾 甘草

炙枳殼 去穰炒 桂 去蘆皮 木香 半兩

右簾搗篩每服五錢水一盞半入柳枝心七枝葱白三寸煎至一盞去滓空腹溫服一方無木香有桃枝

薤白烏梅忌生冷油膩果子

烏梅丸 出肘後方 治積年勞瘧不瘥顏色羸瘦無力



烏梅肉

炒

甘草

炙

升麻

人參

桂

去

各

半

兩

肉桂

蓉

酒浸

切焙

桃仁

湯浸

去皮

炙炒

別研

常山

對

各

三分

豉

微炒

一合

右除桃仁外為末入桃仁再研勻煉蜜丸如梧桐子

大每服二十九空腹溫米飲下發前再服漸加至三

十九一方加知母牡丹烏頭皮平旦四十九欲發四

十九不發日空腹四十九晚三十九無不瘥除服後

十餘日食肥肉發之也

桂參丸

出聖濟

總錄

治勞瘵

桂

去

一

兩

肉桂

酒浸

切

豉

微炒

一

合

麝香

研

一

錢

桃仁

酒浸

去皮

烏梅肉

炒

常山

對

各

三分

人參

各

三

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹米飲下十九

未發時再服漸加至三十九

芎歸鼈甲散

出直

指方

治表裏俱虛真元未復疾雖暫止

小勞復發

當歸

川芎

白茯苓

去

皮

青皮

去

白

陳皮

去

白

半夏

湯

浸

七次 鼈甲

去

裏

爛

芍藥

各

二

錢

普濟方

三五

右判散每服三錢薑五片棗三枚烏梅一枚水煎不

拘時服熱多加柴胡寒多加草果少許

蜀漆湯出聖惠方 治勞瘧發渴不常日漸羸瘦

蜀漆 甘草各半 天靈蓋一兩塗醋炙令黃 生黑豆一分 桃

仁酒浸去皮 烏梅肉七枚 竹葉握

右細判以水三大盞煎取一盞半去滓分為三服空

心服未發一服發時一服

秦艽酒出聖濟總錄 治勞瘧

秦艽去苗土 柴胡去苗 甘草炙 鼈甲去展襴醋炙各半兩 常山

葱白各二分 豉一分

右判如麻豆大用無灰酒三升浸一宿於近火處動常令微灰每服一盞未發時不拘時服既服又添酒

一盞於藥中再添至三升即止

柴胡枳殼湯出聖濟總錄 治勞瘧久不瘥焮焮發熱骨節

痛不下食小便赤漸瘦弱

柴胡去苗 枳殼去穰 升麻 麥門冬去心 甘草炙 鼈

甲 醋浸炙令 桃仁 湯浸去皮尖雙

右簾搗篩每服三錢水煎至七分去滓未發前不拘

時候溫服

知母湯 出聖濟 治勞瘧熱多寒少

知母 切 常山 細切 桔梗 去蘆頭切炒 松蘿 柴胡 去苗 鼈甲

醋浸炙令 橘葉 各二分

右簾搗篩每服五錢水一盞柳枝心七枝童子小便半盞煎至七分去滓未發前溫服

鼈甲酒 療勞瘧

鼈甲 二兩炙 常山 三兩 蜀漆 三兩 附子 一兩 烏賊魚骨 一兩

知母 二兩 椒 一兩微炒去汁

右切以酒三升漬一宿平旦服一合稍稍加至二合

日三四服忌菹菜生葱生菜猪肉

常山飲 出三方 治勞瘧虛人老人皆可服

常山 川山甲 醋炙 木通 秦艽 各一分 辰砂 半分 甘

草 炙半分



右為剉散作一劑水三盞烏梅棗子各七枚煎半盞再入酒一盞煎至八分去滓入辰砂溫服發日更早先刮沈底辰砂食次剉喫棗子數枚却服藥丸用常服無如此一方屢投屢效

柴胡湯 出聖濟總錄 治勞瘵

柴胡 去苗一兩 人參 栝蔞根 黃芩 去黑心 甘草 炙 剉黃

者 剉各半兩

右簾搗篩每服五錢水一盞半生薑半分切棗兩枚

去滓煎至一盞去滓溫服空腹欲發前各一服

又方

甘草 炙三分 蜀漆葉 半兩 天靈蓋 醋炙一兩 黑豆 生 桃仁 湯浸

研去皮 烏梅肉 炒各一分

右簾搗篩每服三錢水一盞入竹葉三片煎至七分去滓空腹未發前一服臨發時再服

豆桂丸 出聖濟總方 治勞瘵

巴豆 去皮生研 桂 去蘆皮 澱花 研 阿魏 醋花作餅炙 安息香

普濟方

十五

入胡桃仁  
研各一分

右除研藥外為末再研勻用麩糊丸如梧桐子大每用綿裹一九香煙上度七遍安耳內男左女右又帶之

五勞丸

指出直  
指方

治勞瘡瘡久病

嫩黃常山

三兩

桃仁

去皮尖炒  
一兩二錢

辣桂

去蘆皮  
七錢半

淡豉

三兩  
烏梅肉

三兩

右曬乾為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十四十九

空心温酒下不飲酒者熱水入些少酒下

治久患勞瘡

出本  
事方

柴胡

恒山

各一兩

秦艽

甘草

各半兩

右以咀每服五錢酒水各一小盞童便半盞同煎至五分當發日五更初西北服

又方

出聖  
惠方

砒霜

阿魏

天靈蓋

炙微黃  
各一錢

右為末以粳米飯和丸如梧桐子大發前以温水下

五九忌食熱物

百草霜散

出海上名方

治勞瘵

百草霜

黃丹

等分煨研細

右每服二錢用米飲調發日空心服一方溫酒調小

兒半錢

勝金丸

一名靈應丹出廣南衛聖方

治久患勞瘵瘡等病

寒水石

三分細研

砒霜

一兩細研

右以厚紙兩重糊黏于銚子底將砒安下次寒水石

蓋上以匙緊按將蓋子蓋又以糊紙數重黏四圍令縫不得通氣以竹柴火燒令下面紙黃焦為候待冷再研於地上出火毒一週時以粟米飲為丸如大麻實大發日以冷醋湯下五丸如年深者先以五丸將熱茶下吐却痰後再以冷醋湯下三丸兼治積年心痛發時冷薑醋湯下七丸立瘥一法更別丸小者一等俟小兒服之以飛過辰砂為衣候乾入磁合中盛於發日早冷膈茶清下一丸日內不得喫熱物合時



須五月五日午時先灑掃一淨室中合時不得見猫

犬婦人雞鼠等服時亦然如婦人患令男左指放在

口中服

牛膝湯

出千金方

治勞瘵積久不斷衆治無效者

用生長大牛膝二握切以水六升煮取二升分再服

第一服取未發前頓第二服取臨發時

鼈甲散

治久患勞瘵瘴等疾

方見本門寒瘵類

又方

出聖惠方

用白狗糞燒為灰研令極細於發前以水調二錢服之

又方

出聖惠方

用野狐肝一具陰乾於重五日更初往北斗下受氣搗羅為末以粳米飲和丸如菘豆大用緋帛裹一丸男左女右手中指上繫之

大柴胡鼈甲散

出王氏博濟方

治勞瘵及五勞

柴胡去蘆 秦艽

常山

貝母

甘草

烏梅山

梔 豉心 鼈甲醋炙 黃芩各一兩 生薑 大黃各半兩

桃枝 柳枝 葱白 薤白 糯米合半

右剉散分作大帖每帖水一升酒一盞同煎至八分作一服早午晚合一服

治久患勞瘡瘴瘧方出本草

用鼈甲三兩塗醋炙令黃去裏爛為末臨發時溫酒調下二錢

治瘴勞瘧劣弱出本草

烏梅十四枚 豆豉二合 桃柳枝各一把 甘草三寸 生薑一塊

右以童子小便二升煎七合溫服

鬼瘡附論

夫鬼瘡者外邪之所入也人真氣內虛神守不固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒其發作無時或一日三兩度或兩日一度寒則顛掉不停熱則燥渴不止或瘥而復作或減而更增經久不瘥連綿歲月若有所持也法宜禳去之而兼以祛邪安神之劑

方

神效手把丸 出聖 惠方

治鬼瘡

狗獠頭骨 虎頭骨 猫兒頭骨 各半 砒霜 細研恒

山 剉 硃砂 細研 乳香 細研 麝香 細研 白芥子 阿魏 細研 蜈蚣 一枚

一枚

右為末研勻取五月五日午時煉蜜和搗三五百杵  
丸如皂角子大以緋絹裹一九男左女右臂上繫之  
發時於淨室內焚香恭信解下男左女右以手把之

時時就鼻嗅之四五度效一九可治百人

治鬼瘡神效方 出聖 惠方

砒霜 硃砂 乳香 細研各半兩 麝香 阿魏 細研 安息

香 菘豆末 狗獠頭骨 虎糞中骨 各一分

右為末研勻以蒸餅和丸如梧桐子大未發前男左  
女右手把一九便卧一炊久便瘥

治鬼瘡內藥鼻中立效方 出聖 惠方

天靈蓋 狗獠頭骨 梟黃 細研 阿魏 乳香 藜



蘆去蘆頭黃丹各七分麝香一錢

右為末以醋煮麪糊和丸如豇豆大欲發前先以綿裹一丸內鼻中差

麝香丸出聖惠方治鬼瘧發動無時寒熱不定

麝香細研各三分砒霜細研恒山剉鼈甲醋塗炙

晨調虎頭骨塗醋炙甘草生用各半兩川大黃生用各半兩

右為末研入前三味令勻五月五日以粽子丸如梧桐子大臨發時以溫酒下三丸得吐瀉為度

輔正丸出聖濟總錄治鬼瘧

天靈蓋醋炙砒霜研丹砂研麝香研虎頭骨酒炙狗獾

頭骨酒炙菜豆粉各半兩

右為細末用粟米飲和丸如梧桐子大每服一丸未發前新汲水下或以手握之有孕婦人不得服小兒只可半丸以菜豆汁下其藥以五月五日合面東搗之

虎睛丸出聖濟總錄治鬼瘧

虎睛一對酒浸 丹砂研 麝香研 雄黃研 砒霜研 安息

香入胡桃仁和丸 阿魏研 天靈蓋醋炙各一兩

右為細末用燒餅和丸如小豆大每用一九未發前男左女右手把之一丸可治十人

丹雄丸出聖濟總錄 治鬼瘧

丹砂研一錢 膩粉三錢 巴豆七粒去皮心槌去油 乳香研 麝香研

雄黃研 砒霜研各半錢

右為細末水浸炊餅心和丸如梧桐子大每服一九

發前新汲水下

萬安丸出聖濟總錄 治鬼瘧

虎頭骨酒炙三兩 藜蘆六兩 雄黃研 鬼臼 天雄炮製去皮

蕪荑炒 皂角莢醋炙去皮子各一兩

右除雄黃外為末入研者雄黃和勻煉蜜丸如彈子大令患者頭上戴一九立瘥若除伏屍於房四角燒四粒除疫氣於牀前燒一粒或渡江海男左女右臂上帶一粒得渡不溺

鬼白丸 出聖濟總錄

治鬼瘡

鬼白 常山

甘草 末 芡豆粉 各一兩

砒霜 半兩

鼈甲 醋炙去裏爛三分

雄黑豆 二百五十粒湯浸去皮焙

右為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服一丸日未出面東用桃心七枝同新汲水下

又方 出聖惠方

雄黃 細研 丹砂 細研

虎頭骨 塗醋炙令黃色各半兩

砒霜 細研 麝香

阿魏 細研各一分

右研令細用菜豆麩糊丸和如豇豆大擬發前先以冷醋湯下一丸忌食熱物

治鬼瘡或發或止經久不瘥 出聖惠方

野猫肝 一具用磁瓦瓶盛內熟豬血浸封口懸放別處待血乾取肝用之 狗猴頭

骨 狗頭骨 虎頭骨 各一兩 麝香 一分細研

右為末入麝香研令勻以醋煮麩糊和丸如雞頭實大男左女右以緋帛於中指上繫一丸即瘥如未瘥即以醋茶任下一丸甚妙



經效瘡丹方

一名神妙瘡丹出三因方

柳枝

各長一尺七莖

雄黃

通明好者半兩別研

辰砂

一錢別研留一半

右為末重午日以五家棕角為丸如梧桐子大辰砂

所留一半為末遇發時用淨器水磨一丸塗鼻中央

并人中未退以冷水服一丸合時須用五月五日一

方無柳枝用稀麩糊為丸人參煎湯候冷空心服瘡

瘡桃枝煎湯冷服臨發磨一丸傅鼻頭口畔

阿魏丸

出聖濟總錄

治鬼瘡

阿魏

研

砒霜

研

丹砂

研合皂角子大

畫鍾馗紙燒灰

二錢

右為細末用寒食飯丸如小豆大每服一丸發時冷

水下宜用正月十五日五月五日合

丹砂丸

出聖濟總錄

治鬼瘡

丹砂

研

阿魏

研各半錢

砒霜

研一錢

豉

四十九粒湯浸去皮研

右再同研為末滴水丸分作四十九丸每服一丸如

脾寒取東南樹上桃心柳心各七枝煎湯放冷面南

吞之尋常瘡發時面北新汲水下

神效丸 出聖 患方

治鬼瘡進退不定

入膽

硃砂

雄黃

麝香

各等分

右研細以醋煮麪糊和丸如菉豆大每用綿裹一丸  
內鼻中即瘥每丸可治二人

乾桃丸

出聖 濟 總錄

治鬼瘡

樹上自乾桃子

二十七枚

右為末滴冷水丸如梧桐子大丹砂為衣每服一丸  
清晨面東并花水吞下

三聖丸

出聖 濟 總錄

治鬼瘡

雄黃

研

雌黃

研

大黃

生為細末 各一兩

右再研為細末水浸炊餅為丸如梧桐子大每服二  
丸發日早晨面向東北新汲水下宜五月五日午時

合

袪除丸

出聖 濟 總錄

治鬼瘡

雄黃

研半兩

雄黑豆

小者用一百二十粒醋浸三日去皮研為膏

砒霜

研一錢

右除黑豆外研令極細與黑豆膏同研丸如梧桐子

大丹砂為衣用素絹袋子盛掛於神室前有患者取  
 二丸未發時服一丸面東新汲水下臨發時更服一  
 丸婦人患即男子與藥男子患即婦人與藥仍令患  
 者閉目服須是端午日合若緩急即八節日合亦得  
 合藥時不得見雞犬婦人服了藥一日內不得食熱  
 物

鬼箭羽散

出聖濟總錄

治鬼瘡寒熱日發

鬼箭羽

一分為細末

砒霜

研一錢

五靈脂

研一兩

右再同研細每服半錢臨發時冷茶清調下

治鬼瘡連年不瘥方

出聖惠方

恒山

一分

硃砂

半兩細研

黃丹

炒令紫色半兩

右以水一大盞浸用刀子攪三二十下橫刀子於藥  
 上置於星月下宿一宿至發日平明以刀攪冷服半盞  
 至發時前又服半盞候藥力散即得食

一字散

出聖濟總錄

治鬼瘡

鬼箭羽

鮫鯉甲

燒存性各一分



右為細末每服一字搗在鼻中臨發時用

又方 出聖惠方

砒霜 一分 蜘蛛 三枚

右同研為丸如梧桐子大每用綿裹一九男左女右

內耳中

又方 出聖惠方

阿魏 一錢 野狐肝 一具并膽收於新瓦罐內貯陰乾

右研勻用醋煮麩糊和丸如雞頭實大男左女右手

把一九如未瘥即以緋絹帛繫中指上不佳嗅之

又方 出聖惠方

雄野狐糞 蝙蝠糞 各一分

右為末用醋煮麩糊和丸如雞頭實大臨發時男左

女右手把一九嗅之

又方 出聖惠方

砒霜 半兩 五方桃心 一握

右先東次北逆取五方定於砂盆內研令細次下砒

霜相和研勻丸如梧桐子大臨發前以新汲水下二  
丸忌食熱物

治鬼瘧進退不定出聖惠方

右用猢猻頭骨一枚燒灰空心温酒下一丸臨發再  
一服

治寒熱鬼瘧發作無時

用狸糞燒灰水服方寸匕如無以家猫糞亦好

又方出聖惠方

用桃心一大握搗絞取汁分為二服於發日早以井  
花水半盞調服至臨發前再服

瘧母附論

夫瘧母者病瘧不瘥結為癥瘕是也邪伏于陰故久而  
形不堪矣其母雖或時瘧已而復發其本未除故也治  
宜以破削癥之以削除其病本

方

雄黃丸出聖濟總錄

治一切遠年瘧結成癥瘕

雄黃 研 丹砂 研 麝香 各半 木香 鼈甲 醋炙去

甲 脆 炙 虎頭骨 酒炙 羚羊角 銹屑 犀角 銹屑 白薇 元

參 當歸 焙切 知母 焙 防風 去義 麻黃 去節 龍膽 去根 牡

癘 赤燒 猪苓 去黑皮 柴胡 去苗 茯苓 去木 升麻 檳榔 剉地

骨皮 赤芍藥 梔子仁 黃連 去須 烏梅肉 炒 阿

魏 研 桃仁 湯浸去皮尖 安息香 研 姜蕤 龍齒 各

分

右除別研外為細末合研勻煉蜜為丸如梧桐子大

每服二十九白粥飲下未發前服

鼈肉煎丸 出干 治久瘡不瘥結為癥瘕名曰瘡母

生鼈肉 半斤亦 黃芩 去黑皮 柴胡 去苗 蜣螂 去翅頭足

鼠婦 炒去足 乾薑 炮 大黃 生 海藻 洗去鹽 葶藶

子 紙上 桂 去麤皮 牡丹皮 厚朴 去蘆皮生 紫葳 切

瞿麥 去梗 半夏 湯浸去 人參 大戟 磨蟲 炒 射干

炮 阿膠 炙 桃仁 湯浸去皮尖 石韋 去毛 赤芍藥 各一

桑螵蛸 炒一兩一 方作蜂窠



右為細末取竈下灰三升酒二升淋灰取汁先煮鼈肉令爛絞去鼈肉後入諸藥末內鼈肉汁更煎成膏可丸即止如梧桐子大每服二十九未發前溫酒下老瘡飲出聖因方治久瘡結成癥瘕在腹脇諸藥不去並治瘡瘡

蒼朮

浸泔

草果

去皮

桔梗

青皮

陳皮

良薑

各半兩

白芷

茯苓

半夏

湯浸去滑

枳殼

麩炒去穰

甘草

炙

桂心

乾薑

炮各三錢

紫蘇葉

川芎

各二錢

右為剉散每服四大錢水二盞鹽少許煎七分去滓

空心服日三夜一仍吞下後服胃瘡肉紅九子

鼈甲飲子

出仁存方

治瘡久不愈脇下痞滿病人形瘦腹

中結塊時發寒熱名曰瘡母

鼈甲

醋炙

白朮

黃耆

去蘆

草果仁

檳榔

芎藭

橘紅

白芍藥

甘草

炙

厚朴

薑製炒

右等分以咀每服四錢水一盞半生薑七片棗二枚

烏梅少許煎至七分去滓溫服不拘時候

丹砂丸 一名截瘡丹 出直指方

治瘡母精志修合

丹砂 研 菜豆粉 去皮 研 砒霜 各半 兩

右於端午日靜室內面向東南用乳鉢先將菜豆細研入砒霜丹砂研一千通用稀米粥丸如梧桐子大陰乾每服一九未發前五更時井花水面北嚙下少頃方可食

如聖丸 出聖濟總錄

治瘡疾結成癥瘕

巴豆 三粒 去殼 黑豆 四十粒 砒霜 研半兩

右將巴黑豆用米醋浸一宿去皮膜入乳鉢內順研一百匝入砒霜又逆研一百匝丸如小豆大丹砂為衣每服一九取嫩桃葉七片水一盞煎數沸頃入盞內用醋一二滴打勻通口令病人面向東方吞下如無桃葉以桃枝七寸煎湯代之

經效瘡丹 治瘡母結癖寒熱無已 方見本門 鬼瘡類

二黃丸 出聖濟總錄 治瘡母

以生砒霜豆黃末各一兩以驪醋二升一處煎成膏



可丸取出別入丹砂雄黃麝香各一錢研細和摻衆手為丸如菜豆大每服五丸未發前煎生薑湯下

至妙瘡丹 出王氏傳信方 治瘡母

砒霜 研半兩 寒水石 研一兩

右先研砒在生鐵鉢內用寒水石末覆之以瓷碗合定濕紙封於碗上燒候煙出薰紙黃色即止取出以紙襯於地上出火毒須臾細研為末入研了丹砂龍腦麝香各半錢許和勻湯浸炊餅丸如梧桐子大以

丹砂作衣每服一丸於未發前早晨面北用井花水下忌喫熱物一時辰并忌食魚麪五果十數日永瘥此藥合時須五月五日午時忌婦人雞犬及孝子見女人患男子拈入口中令服立效此藥並不吐不瀉患者只要一服必瘥

治老瘡 出肘後方

用龍骨末方寸匕先發前一時酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汗



鹽津丸 治五瘡八痞

方見本門 諸瘡類

治老瘡久不斷者

出本草

取牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止崔元亮海上方治瘡用水煎牛膝根未發前服

治老瘡發無時者

亦名鬼瘡又呼為妖瘡出本草

取瘡關燒作灰飲服一二錢當微利取頭燒服稱佳亦候發時煮為沸湯坐浸身亦懸安病人卧處

此物生高

山石下身偏頭大嘴如鷄鳥亦呼為鷄

治老瘡

出本草

炙鼈甲杵為末服方寸七至時令三服盡用大炙無不斷

治老瘡丹

出澹泰方

桃仁

去皮尖 畧炒

鼈甲

醋炙

恒山

酒煮

豆豉

和梅蒸或發而研

右等分蒸爛烏梅肉研膏為丸每服三十丸不拘時白湯吞下連日十數服忌口如常艾府幹者在

封川作瘴瘧初時正熱瘴也愚用和解散及南人桃  
草子法漸輕以藥分和之而一日一大作用截瘴散  
效數日病發如前依舊用分解藥二日一發用截瘴  
丹效又數日又作且苦於正氣羸弱身熱如火愚一  
味守沈虛熱續真元之法為作冷附湯吞靈砂靈砂  
服至二三百粒附三隻熱漸減仍用冷附湯及四獸  
飲兩日後分作三日一發然當發日午後先寒繼以  
極熱至明日午熱方漸退第三日早方甦醒午後用

當發作時便沈者枕蓆不能畧起擡身則戰掉不堪  
便溺飲食俱不便也為進黃芽丹每服九粒至數服  
及連朝為煎七棗湯以其熱瘴亦畧露之契三隻附  
方漸漸不寒熱猶于當發日作戰不能起仍與七棗  
湯丹劑之類漸安自來瘴疾既分為間日則未有如  
此甚者然據指要云寒熱不斷者亦是瘧益瘴瘧亦  
不過寒熱相搏而已要之四時常飲亦是治瘴之妙  
藥艾之證乃瘴瘧也非江洲尋常之瘧爾紀效



消癰丸 指出直指方

治瘡母停水結癰腹脇堅痛

芫花 炒 硃砂 研等分

右為末煉蜜丸小豆許每服十九濃煎棗湯下去癰須用芫花大戟破水之劑下後即愈然後用養胃湯

瘡痢 附論

夫瘡痢者瘡久不瘥寒熱邪氣內傳腸胃也其病寒熱往來痢下濃血赤白相雜腹中切痛隨其陰陽而治之前胡丸 治瘡氣急黃并痢

前胡 去蘆頭 赤茯苓 去黑皮 芍藥 枳殼 去穢炒 黃芩 去黑

心各半兩 大黃 生一兩 大麻仁 一兩半細研

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十九午食前以米飲下

又方

蟲蟲 去翅足炒 黃耆 薄切 天門冬 去心焙 鼈甲 去麤爛醋

炙 生乾地黄 焙各二兩 赤茯苓 去黑皮 人參 各半兩

右為細末與前藥末相和煉蜜丸如梧桐子大每服



二十九漸加至三十九空心地黄酒下

黃連丸 治瘡痢無度赤白相雜

黃連去鬚黃蘗去蘆皮羚羊角屑艾葉炒赤芍藥各二

兩當歸切培

右為末煉蜜丸和搗三百杵丸如梧桐子大每服三

十九粥飲下不拘時候

地榆湯 治瘡痢挾熱下血腹痛

地榆剉黃連去鬚黃芩去黑心犀角屑各一兩升麻 茜

根各半兩

右簾搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不拘時候

黃連犀角丸出肘後方 治瘡兼痢無問赤白水殼鮮血皆

主之

黃連去鬚犀角屑 豉炒各二兩龍骨四兩牡蠣熬半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下

日三

常山丸 治瘧兼痢不止 方見山嵐瘴氣瘧類

烏梅飲 治瘧痢苦渴 方見本門瘧病發渴類

黃連散 一名黃連湯 治瘧痢 方見本門手太陰肺瘧類

牡蠣散 一名恒山散 治瘧痢 方見山嵐瘴氣類

桂枝散 出廣南四時傳方 治時疾瘧痢

官桂 甘草 炮 青橘皮 去穢 乾薑 炮 牽牛子 生用以上各等分

右為散每服一錢水一盞煎至七分熱喫早晨常一服諸疾不生如患者逐日自早夜五服取安為度莫

忌頻頻服

瘧病發渴 附論

內經謂諸瘧皆得之於夏傷于暑以熱氣盛藏於皮膚之內腹胃之謂此禁氣之所舍也陽盛則外熱陰虛則內熱熱則喘而渴故欲冷飲也

方

蘆根湯 治瘧發熱者骨節痛口乾煩渴 方見本門足少陽膽瘧類

生薑飲 治瘧止渴

生薑 大棗 甘草微炒 草苴寇去皮 木通各一分

右吹咀如麻豆水二盞煎至一盞半去滓分三服溫飲之

常山湯 治瘧病發渴及寒熱攻作

常山 蜀漆燒灰 甘草炙剉各二兩 淡竹葉切一分 大黃

生剉三兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

妙應丸一名辟邪丹 治瘧疾發渴引飲煩燥方見本門諸瘧類

常山散 治瘧病發渴飲水不止

常山三兩 石膏八兩 白朮二合

右吹咀每服五錢以水一盞半入竹葉十片煎取八分去滓溫服平旦一服欲發再服正發時又一服

烏梅飲 治瘧病苦渴

用烏梅二十枚擘破以水二盞煎至一盞半去烏梅和蜜一匙分作二服細啜之

柴胡栝萎根湯出千金方 治瘧病發渴



柴胡 黃耆 人參 甘草 生薑 大棗

枚 栝萎根 兩四

右以咀水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日三

寒熱往來 附論

夫寒熱往來者陰陽虛實更勝也夫陰實生內寒陽虛生外寒皆為陰勝陽實生外熱陰虛生內熱皆為陽勝陰陽相勝故寒熱互作而往來治法宜使陰陽和平氣

無相勝則病可愈

方

常山飲 出聖濟總錄

治瘧先寒後熱四肢黃瘦頭痛

常山 一兩 豉 一合 葛根 剉 柴胡 去苗 升麻 牡蠣 煮 大黃

剉 前胡 去蘆頭 知母 焙 山梔子仁 枳殼 去穰麩炒

夏 湯浸七遍 麥門冬 桃仁 去皮尖 甘草 炙 犀角 半兩

各半兩

右以咀如麻豆大每用五錢水一盞入葱白薤白各

三寸切碎煎取一盞去滓分二服發前及發時熱服之

柴胡湯 治寒熱往來夜卧盜汗四肢無力飲食苦口

上氣咳嗽

柴胡 去苗一兩半 五味子 桔梗 焙 熟乾地黄 焙 白茯苓

苓 去黑皮 麥門冬 去心焙 紫苑 去苗 人參 地骨皮 黃

耆 剉 白朮 桂 去原皮 牡蠣 研粉各一兩 半夏 去滑湯洗七遍 甘

草 炙各三分

右簾搗篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎棗三枚

擘破煎至六分去滓溫服不拘時候

黃耆湯 治寒熱不能飲食羸瘦少力

黃耆 剉一兩 白茯苓 去黑皮切一兩 柴胡 去苗 當歸 切焙各半兩 白

朮 一兩 桂 去簾皮半兩 甘草 各半兩 枳殼 去穰麩炒 桔梗 剉 桃仁

各半兩湯浸去皮  
夫雙仁麩炒黃

右簾搗篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎棗三枚

擘破煎至六分去滓不計時候溫服



烏梅丸 出聖惠方

治往來寒熱瘧經年不瘥痲瘧及勞瘧

川大黃

剉碎 微炒

烏梅肉

微炒

川升麻

甘草

生用 去心 焙

天靈蓋

塗醋炙黃 各一兩

柴胡

鼈甲

塗醋炙 去裏爛

虎頭骨

各一兩 塗醋炙黃

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每于食

前用粥飲下三十九

麻黃湯

出聖濟總錄

治諸瘧病先熱後寒頭痛四肢煩倦

麻黃

去根 節

烏梅肉

炒

秦艽

去苗

柴胡

甘草

炙

麥門

冬

去心 焙

犀角

各 三分

青蒿子

一兩 半

常山

右麤搗篩每用五錢水一盞半入挑柳枝心各七枚

細剉豉五十粒煎至一盞入朴硝少許更煎一二沸

服去滓分二服早晨及卧温服之

鼈甲湯

出聖惠方

治瘧壯熱增寒大便秘澀

鼈甲

炙去 裏爛

赤芍藥

桃仁

去皮 炙雙

大青

天

靈蓋

醋炙黃 研末

知母

焙各 三分

乾薑

炮半

牽牛子

半熱



右除天靈蓋外麓搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓調天靈蓋末一錢未發前溫服仍留其滓重煎若先自痢者去牽牛子

鼈甲大黃丸 出聖濟總錄

治寒熱往來瘧久不瘥

鼈甲 去展爛醋炙令黃

大黃 生剉

常山

人參

蜀漆

甘

草 剉 附子 炮製去臍皮

白薇 各等分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸淡竹葉湯下平旦一服食後良久再服

丹砂丸 出聖濟總錄

治瘧疾寒熱

丹砂 雄黃 各一兩

砒霜 半兩

桃仁 去皮尖雙仁麩炒二十一粒

麝

香 阿魏 各一錢 安息香 一分

右研極細再合研勻用糯米粥和丸如雞頭實大每服半丸細嚼新汲水下吐即愈

常山飲 出聖濟總錄

治諸瘧寒熱不已日漸萎黃

常山 半兩 烏頭 炮製去皮臍七枚

甘草 生用

蒜一顆 八瓣

糯米

炒一鼓 合炒一甌帶 三寸

右搗麤篩以酒一升二合浸月下露一夜橫刀一口置藥上候天明煎取五合去滓空心服良久吐出惡痰即愈如吐不已煮漿水粥止之

地骨皮湯 治寒熱往來久成勞瘵

地骨皮

知母

焙

柴胡

去苗

枳殼

去穰麩炒

鼈甲

去

去

去

爛醋炙二分

赤茯苓

去黑皮二分

虎頭骨

一兩酒塗炙焦

右麤搗篩分為五帖以水三盞煎取一盞下地黃汁一合更煎三五沸去滓分溫二服食後良久相繼服

日一帖

桔梗湯 治寒熱似瘧

桔梗

剉炒一兩

甘草

炙半兩

知母

焙半兩

柴胡

去苗兩半

大黃

兩半

剉炒半兩

鼈甲

去裏爛塗醋炙二兩

右剉如麻豆分為六帖每帖用童子小便二盞葱白三莖豉半合浸食頃煎至一盞去滓食後分溫二服

日一帖

虎骨湯 治寒熱乍進乍退



虎頭骨 一兩酒炙為末 甘草 一分 知母 兩焙半 葱白 七莖 鼈甲 去

襴醋炙

右細剉如麻豆大用水三盞煎至二盞下童子小便半盞和煎數沸去滓食後良久分溫三服

虎骨丸 出聖惠方 治往來寒熱瘧經年不瘥瘦弱及勞瘧

虎頭骨 塗醋炙黃 鼈甲 塗醋炙黃 牡蠣 炒為粉 桃仁 湯浸去皮

夫麩炒微黃各三兩 香豉 二合炒乾

右為末和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以

粥飲下三十九

猪膏丸 出聖惠方 治瘧寒熱發渴往來不定

臘月猪脂 二兩 獨顆蒜 一顆 薑蔥 一握細切 獨角仙 一枚 五月

五日三家粽子尖

右於五月五日五更初淨房內修合勿令婦人見露

頭赤脚舌柱上膠回面向北搗一千杵為度有患者

用新線子穿一丸如皂莢子大男左女右繫於手臂

上



砒霜丸 出聖惠方 治瘡往來寒熱發渴無時

砒霜 一生研 天靈蓋 一兩生用為末 猢猻頭骨 一枚燒灰 硃砂 半兩

研細 東南桃柳枝 各七莖長三寸

右取五月五日午時為末取粽子角和丸如梧桐子

大男左女右手把一丸預先喫之一丸可醫五七人

人參湯 出聖惠方 治瘧寒熱作時面色黃

人參 常山各半兩 甘草 生三分 陳橘皮 湯浸去白炙乾一分

右麤搗篩為末每服五錢水一盞半入茶末半錢燈

心五莖煎至七分去滓入酒半盞和勻候溫未發前頓服取吐如未吐再服以痰出盡為度

附子丸 出聖惠方 治諸瘧寒熱往來

附子 炮製去皮臍 大黃 剉炒各三分 常山 蜀漆 各一分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸米飲下未發一服臨發再一服

硝石膏 出聖惠方 治瘧寒熱往來

砒黃 半兩 硝石 白礬 各一分 膩粉 一分

右細研用漿水一大盞調成稀糊入鐺中以慢火煎  
又用冷醬水一升候沸即旋添添盡將乾取出曬乾  
若來日發今日初夜以冷醋湯下一棗豆大來日早  
晨再一服一日內不得食熱物

逐邪丸 出聖惠方

治瘧往來寒熱發渴無時

溫生蟲 四十枚

百節蟲 四十枚

砒霜 三分

細研

糞子角 十七枚

右於五月五日未出時東南方上尋取兩般蟲去  
足至午時面向南都研不令雞犬婦人師僧孝子見

丸如小豆大每患者於發前男左女右手把一丸喫  
七遍立效

常山散 出聖濟總錄

治諸瘧寒熱往來止而復發

常山 末一兩

砒霜 研一分

丹砂 研一分

右研勻入白麪糊和作餅子油內煎焦黑為度再研  
極細每服半錢夜半冷茶清調下

丹砂丸 出經方濟世方

治瘧疾寒熱相半者兼治間日瘧

丹砂 各一錢

人參 一枚

附子 一枚半



右為細末蜜丸如梧桐子大煎竹葉湯吞下二三十丸未發前三服中病即止

已已歲七月初十日予得瘧疾連日發作呻吟宛轉一榻間殆無生意如是者已兩旬平昔號為得效之藥服之已遍畧無所知教授龐國器出此方且云今公之病寒熱交戰者蓋陰陽之氣不分也龐安常有治瘧方寒熱相半所謂丹砂丸者公所宜服也其說適契予心即合此服之二日而即愈矣八月一日

記

蜜煎主寒熱方

蜜五合 恒山 甘草各二兩

右三味取二味吹咀以水二斗煮取二升去滓內蜜五合溫服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水一方用甘草半兩

常山甘草湯出肘後方 治寒熱日再三發可服

常山三兩 甘草二兩



右切以水四升煎煮一升半分三服相去五里久進一服忌海藻菘菜生葱生菜一方水酒合煮服

又方

蜜二合醋八合

右調和平旦頓服須臾泛泛然欲吐擿之若意中不盡明旦更服無不大嘔安穩

柴胡栝蒌根湯

治瘧疾往來寒熱引飲

方見本門手少

陰心瘧類

治瘧往來寒熱發渴無時

出聖惠方

用竹漆末每服以溫水調下一錢

草菓湯

出御藥院方

治寒熱往來煩渴頭痛或寒多熱少

草菓子仁四枚人參去蘆頭

半兩

甘草

炙半錢

半夏

十三枚聖實者

薑湯浸洗七次

大棗

烏枚

去核三枚

生薑

三十塊

右件七味咬咀用水一大碗煎至一盞去滓五更時

溫服

七寶劉散

出廣南衛生方

常山 懷中懷 乾生用 檳榔 秦艽 洗去土 甘草 炙

右等分為麤末每服藥三錢入桃柳枝各七寸烏梅三枚水二盞煎至一盞於未發日前臨卧放極溫冷進一服當發日絕早空心旋煎又溫冷進一服忌熱物半日以上即飲食皆無忌服藥時須是放溫冷細細呷喫

療寒熱 出本草方

以鳧葵搗汁服

瘧病發熱身黃小便不利 附論

夫寒熱凌虐於人名為瘧而發熱小便不利者身必發黃此蓋熱氣不散入於小腸水道既溢故小便不利也

知母湯 治瘧病發熱煩渴咽乾口燥身黃怠惰小便澀滯

知母 地骨皮 升麻 犀角屑 人參 麥門冬

去心 柴胡 去苗各一兩 石膏 鼈甲 醋炙令黃去 甘草



生到赤茯苓 去黑皮

右麤搗每服四錢水一盞半入香豉五十粒煎至八

分去滓不拘時候溫服

常山飲 出聖

惠方 治瘧病手足苦煩發熱渴燥通身悉黃

小便不利

常山 柴胡 去苗 甘草

炙微 梔子仁 各一

赤茯苓 去黑

皮 石膏

蜀漆

鼈甲

塗醋炙令黃去 羶爛各三兩

右麤搗每服五錢水一盞半入竹葉二十七片豉五十粒

煎至八分去滓不計時候溫服一方無赤茯苓有烏

梅肉三七枚微炒

升麻湯 治瘧病發熱身體皆黃小便不利

升麻 柴胡

去苗各

桂 去麤

人參

常山

甘草

炙各 大黃 炒半

石麤搗篩每服三錢水一盞煎八分去滓溫服不拘

時候

茯苓湯 治瘧病發熱燥身黃面黃小便不利



赤茯苓 去麁皮 桂 去麁皮 黃芩 去黑心 升麻 常山

蜀漆 甘草 炙 剉 各半兩

右麁搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

柴胡湯 出聖惠方 治瘧病大渴煩燥引飲不止身體皆黃

小便不利煩熱嘔逆

柴胡 去苗 二兩 甘草 炙 微 赤 剉 半兩 知母 人參 麥門冬 去心

焙 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃 各一兩

右麁搗篩每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時

候溫服

麥門冬湯 出聖惠方 治瘧病發熱煩燥體黃小便不利令

人虛驚如有見者

麥門冬 去心 焙 犀角屑 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃 常山

剉 甘草 炙 微 赤 剉 各半兩 糯米 八十粒

右麁搗篩以水五盞煎至三盞去滓分為五服於發

時煎溫服之

蜀漆湯 治瘧發熱身黃小便不利

蜀漆 常山 人參 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 各一兩

右麤搗每服三錢水一盞入生薑五片棗三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時候

常山散 治瘧病身黃小便不利

常山 鼈甲塗醋炙令黃去麤襴 升麻 赤茯苓去黑皮 梔子

仁 人參各一兩

右為散每服二錢溫水調服不拘時候

升麻丸 治瘧病身黃發熱小便不利

升麻二兩 常山 檳榔各三分 鼈甲塗醋炙黃去麤襴 知母

生地黃各一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入葱白三寸豉三十粒同煎至八分去滓溫服不拘時候

常山散 治瘧病頭痛發熱身黃色小便不利

鼈甲去麤襴塗醋炙令黃 甘草生用各一兩 冬瓜汁四合 車前葉一握

無葉收 常山半兩 子二合



右麤搗篩漿水二盞并瓜汁隔宿浸欲發日五更初

以急火煎取一盞半去滓分為二服五更一服取扶

吐三五度至發時又服又取吐三五度過時便得喫

漿水粥補之

茯苓散 治瘧病但熱不寒遍身發黃小便澀滯

赤茯苓 去黑皮 桂皮 麤 麻黃 去節 甘草 炙剉各

右為散每服三錢新汲水調服不拘時候

常山丸 治瘧瘡發熱身面皆黃小便不利

常山 赤茯苓 去黑皮 黃芩 去黑心 香豉 炒乾 二合

右為末以粟米飲和丸如梧桐子大每服三十九溫

酒下不拘時候

茯苓湯 治瘧病發熱身黃小便不利

赤茯苓 去皮 白芍藥 瞿麥穗 各一兩 白朮 三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半入葱白五寸生薑一

分拍碎同煎至七分去滓食前溫服



普濟方卷二百

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官檢討臣李鼎元

謄錄監生臣張鵬程