

禮

10398

重刊萬方類纂

卷

(326)

(326)

(326)

重刻萬方類纂

哮喘	吞酸	嘔吐	諸汗	中暑	痼冷	傷風	霍亂	瘧疾	卷一
雜音	嘈雜	翻胃	消渴	發熱	麻木	中寒	瘟疫	痢疾	通治
臥床	呃逆	噎膈	欬嗽	煩躁	諸火	中濕	傷寒	泄瀉	上第一

重刻萬方類纂叙

瀕湖李氏增益證類本草爲綱目蒐采奧博考證精
審是爲有明醫宗三書之一自王元美以次皆以爲
集本草之大成無異辭也及近世專推神農本經之
徒乃稍事譏病而亦無以易之蓋專門之學決非一
隅之見所能排擯者如此綱目所載諸方亦皆憲章
證類復傳以子史百家之所紀山陰蔡烈先苦其浩
博難窮乃作萬方針線以貫之同縣宋穆氏猶以爲
非學者所便復本蔡氏之說備錄諸方別爲一書名
曰萬方類纂由是瀕湖所錄古今諸方皆別行於世

且部居州處條理秩然使學者得以按圖索驥無復
鹵莽捍格之弊亦可謂湯液之鴻寶矣余夙好方劑
頗欲上繼長沙之盛軌以勞心政刑遂無餘暇嘗以
爲診疾不若傳方傳流俗之方尤不若傳近古之名
方光緒戊戌秋王道農司馬以是書見示謂得之山
陰婁氏其原板久付劫灰矣旣嘉其書爲近古名方
之總匯且惋其不獲彰灼於世因屬道農昆季悉心
校讐重付剞劂越年乃就學者得是以羽翼經方徧
拯疾沴庶幾活人之術靡所不具蓋不獨推闡三家
饌次之功已也夫醫爲仁術之首漢魏以來諸名方

尤活人之利器學者苟能抱利器以運仁術乃足祛
金元諸家古方不治今病之邪說而其學益神此則
余所以傳播是書之意豈無謂哉若操術者囿於俗
見仍執固陋之陳言爲下士之聞道則宜質諸四聖
遺訓及張喻徐黃諸君子有非余之所敢知已

光緒二十五年四月臨桂謝元福饌於清江浦之道
署

原叙

人之所病病疾多而醫之所病病道少則知方之不可不詳也扁鵲言醫爲方者宗而受禁方於長桑君以故能生死人太倉公幼喜方初受於公孫光光曰吾方盡矣尋與見乘陽慶慶悉以禁方予之以故意之治病近於鵠晉抱朴子唐孫真人醫仙也而金匱萬卷龍宮千金方之重也且如此以故陸宣公晚年家居聞有秘方必手自鈔錄曰此亦活人之一術也自本草綱目出而所載之方獨詳願其方繫於藥品下檢閱爲難萬方針線則未臚其方本草類方又多

舛其類譬之倉公所云臣意不能全也頃予自四明
歸見同里宋賓於先生手輯本草萬方類纂一書以
類爲綱而以方爲目方既悉備類更靡遺按症求方
朗若列眉瞭如指掌心竊好之亟慫湏壽之梨棗先
生以自備檢閱爲辭不欲質諸世予思古今集驗之
方夥矣尠有詳明若此者第以卷帙浩博難於開雕
爰謀諸同人醵金而剞劂之以公同好先生原非若
長桑君曰公毋泄公孫光曰毋以教人也是書出勿
論醫家固便於檢閱卽不省醫者家置一册亦得因
症覓方而活人無算功德豈出陸宣公下哉或曰金

張元素治病不用古方其說曰運氣不齊古今異軌
古方新病不相能也遂自爲家法而元素傳載其初
學醫無所知名夜夢有人用大斧長鑿鑿心開竅納
書數卷於其中自是洞徹其術殆卽長桑君子扁鵲
方忽然不見之類與特南唐時予宗人廷紹爲太醫
令烈祖喉痒進楮實湯服之頓愈宰相馮延巳病腦
痛進薑豆湯一服立差羣醫默志其方他日以楮實
治喉痒以薑豆治腦痛皆無效或問其故廷紹曰烈
祖嘗餌金石吾故以木之陽實勝之木王則金絕矣
馮公嗜山雞鷓鴣二鳥皆食烏頭半夏薑豆乃解其

毒耳羣醫大服信是說也勿泥其方當通其症病萬
變藥萬變方亦萬變而謂古方之必不可用不拘於
醫者意也之一言乎先生爲人如宋令艾年老手錄
書不釋且心如髮細以故是書校正三四過鮮舛訛
夫世之病者必求醫醫者必切脈安得如鵲之言曰
越人之爲方也不待切脈望色聽聲寫形言病之所
在決者至衆卽如鵲也然亦曾受方方之不可已也
如此則是書之出將醫不病其道少而人不病其疾
多幸何如之儻據素問勞佚有常飲食有節八言勝
於服藥直以是書爲妙取筌蹄棄高宜百萬層微特

先生與予之所甚樂抑亦扁鵲之所無庸仰天嘆也
雕成附記數言於簡末

嘉慶二十二年歲在疆梧赤奮若塞陽之月五岳注
生籍日象中吳國柱書於圍青軒

蘇玉局有言藥雖進於醫手方多傳於古人方之重
於醫也稔矣予不知醫而好集古方每見有人試驗
者輒抄錄爲枕中秘及閱本草綱目而凡所謂秘方
者率出於此緣散載諸藥品下不能按病而稽未免
望洋而嘆嗣見萬方鍼線一書將本草所有各方分
門別類逐條臚列按症稽方頗稱簡捷然僅標其目
而不載其方而綱目卷帙浩繁若遇一症仍須逐卷
繙查亦非易易復見本草類方一書雖將各方逐條
細載而所列門類又不及針線之清晰檢尋每致遺
錯夫針一線萬線旣苦其多而方以類聚類又防其

溷予不揣樛昧特照針線門類將本草各方全行錄出而鍼線內亦間有舛誤之處並有一條而應分作數條有數條而可併作一條者悉爲釐正閱一載而錄成庶因症尋方因方對症開卷了然而無慮本草之浩如烟海也名之曰萬方類纂萬方從針線也類纂從類方也其卽藥進醫手方傳古人之意乎然未敢謂若已經效於世間不必皆從於已出則醫者必有其道矣而予則聊以便已之繙閱云爾

嘉慶歲在柔兆困敦夏五枳田宋穆書

萬方類纂原例

一是集門類大概仿萬方針線之例排列間有挪前移後之處或有一條而分數條者有數條而併作一條者亦視其治症之同異而分合之翻查略較清晰非擅變前人成法也

一古方銖兩與今異制有稱一字者二分半也稱銖者以六銖爲一分卽二錢半也四分爲一兩刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度一撮者四刀圭也少許者些子也又古之一兩今用

一錢可也古之一升今之二合半也此本草綱目所載如此併錄之以備查考

一見坊本各項方書多分行開列茲全抄本草爲目之方數且逾萬若亦分行開列未免卷帙浩繁故一症有數方者俱聯綴接書每一方錄竟則隔一空以清眉目旣易於檢尋而板用袖珍書分六集則出門亦便於攜帶也

一集內所載各方已與綱目校對再四宜無舛訛第原本翻板居多魯魚亥豕在所不免雖集數部互相考訂有彼是而此非者已酌其是者載

人若彼此相同則無從查對穆不敢擅改姑仍其舊然其錯處亦屬易曉俟得有善本再當更定閱者諒之

一穆於醫學素未究心而性頗喜方又以健忘爲患年來家居無事手緝是編聊以便已繙查非敢出而問世比緣同里吳子象中見而好之卽爲醵金付梓開雕既促糾謬未遑所望深於醫者匡其不達則幸甚矣

光緒己亥夏

萬方類纂

桂林毓蘭書屋重刊

萬方類纂總目

卷一 通治上弟一

瘧疾

痢疾

泄瀉

霍亂

瘟疫

傷寒

傷風

中寒

中濕

痼冷

麻木

諸火

中暑

發熱

煩躁

諸汗

消渴

欬嗽

嘔吐

翻胃

噎膈

吞酸嘈雜

呃逆

哮喘

聲音

臥床

卷二

通治下弟二

諸氣

痰飲

虛損

癆瘵

失血

健忘怔忡

鬱症

結核

痞積

癥瘕

脹滿

水腫

黃疸

丹毒

脾胃

傷酒

傷食

諸風

癩癩

邪祟

奇異

卷三 外科第三

癰疽

疔毒

諸瘡

外傷諸瘡

癩癧癭瘤

疹癩斑癩

折傷跌撲

杖傷

金鏃竹木傷蟲獸傷

治蟲獸

諸毒

諸物哽咽

卷四 婦科弟四

調經婦人諸病附 崩漏 帶下 妊娠

胎產 產後 乳病 女陰

卷五 幼科弟五

小兒諸病 小兒諸瘡 驚癇 諸疳

吐瀉 痘疹

卷六 上部弟六

頭病 眼目 面病 鼻病

耳病 口舌 牙齒 鬚髮

咽喉

卷七 中部第七

心氣

腹痛

腋氣

胸脇

腰痛

項背

手臂

諸蟲

卷八 下部第八

關格

結燥

腸風臙毒

肛門

痔漏

不禁

小閉

諸淋

濁遺

癩疝

男陰

脚氣

足趾

煉服

製造

萬方類纂卷第一

山陰宋穆饌次

臨桂謝元福審正

通治上弟一

瘡疾

寒熱瘡疾

秋後霜一錢半熱酒服之
黃丹百草霜等分為末發日空心米飲服

三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效
飛炒黃

丹一兩恒山末三兩蜜丸梧子大每服五十丸温

酒下平旦及未發將發時各一服無不效
端午

日用黃丹炒二兩獨蒜一百个搗丸梧子大每服

九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦

治痢疾黃丹炒建茶等分為末温酒服二錢

黃丹飛焙麵糊丸芡子大每棗子一枚去核包一

丸紙裏煨熟食之信砒二兩研粉寒水石三兩

別搗末用生鐵鈔一个鋪石末後鋪砒在上又以

石末蓋之厚蓋覆定醋糊紙條密封十餘重炭火

一斤燉之待紙條黑時取出候冷刮盡上砒末乳
細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用三四丸小兒

一二丸發日早以臘茶清下一日不得食熱物男
人患女人著藥入口中女人患男人著藥入口中

人言一錢綠豆末一兩為末無根井水丸綠豆
大黃丹為衣陰乾發日五更冷水下五七丸

剪金用人言醋煮硫黃綠豆等分為末每一豆許
用紅絹包之采絲扎定每剪下一粒新汲水空心

吞下治瘡聖藥也 九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫
河車各一錢為末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥

和丸梧子綠豆黍米三樣大每服一二丸發日
五更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒

也 不二散用砒一錢麩二兩和勻香油一斤煎
黃色以草紙壓去油入茶三兩為末每服一錢發

日早冷茶下 明礬枯過為末飛羅麩醋打糊丸
梧子大每服二三十丸東南桃心七個煎湯下

礬紅獨蒜頭煨等分搗丸芡子大每白湯嚼下
一丸端午日合之 赤麻馬蘭搗汁入水少許發

日早服或入少糖亦可 青蒿一握水二升擣汁
服之 五月五日天未明時采青蒿陰乾四兩桂

△

心一兩為末未發前酒服二錢 端午日采青蒿

陰乾桂心等分為末每服一錢先寒用熱酒先熱

用冷酒發日五更服之切忌發物 牡蒿根滴滴

金根各一把搗生酒一鐘未發前服以渣傳寸口

男左女右二日便止 馬鞭草搗汁五合酒二合

分二服 附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各

一錢為末煉蜜丸梧子大每服二十丸未發前連

進三服中病則吐或身體麻木未中病來日再服

煮鼓湯飲數升得大吐即愈 獨頭蒜炭上燒

之酒服方寸七 馬齒莧搗扎手寸口男左女右

桃仁半片放內關穴上將獨蒜搗爛罨之縛住

男左女右即止鄰嫗用此治人屢效 端午日取

獨頭蒜煨熟入礬紅等分搗丸芡子大每白湯嚼

下一丸 翻白草根五七个煎酒服之 桃仁一

百枚去皮尖乳鉢內研成膏不得犯生水入黃丹

三錢丸梧子大每服三丸當發日面北溫酒吞下

五月五日午時合之忌雞犬婦人見 青皮一兩

燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服 瓜蒂

二枚水半盞浸一宿頓服取吐愈 牡蠣粉杜仲

等分為末蜜丸梧子大每服五十丸溫水下 天

葛方須纂一瘧疾二

二

靈蓋煨研末水服一字取效 日一發或二三發
或二三日一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一

錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下即
止久瘡亦用此方神效方也 脾胃聚痰發為寒

熱生薑四兩搗自然汁一酒盃露一夜于發日五
更面北立飲即止未止再服 猪膏丸治瘡疾發

渴往來不定臘猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一
個樓葱一握五月五日三家糶尖于五月五日五

更時淨處露頭赤脚舌拄上齧回面向北搗一千
丸皂子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右

鼠負四枚餽裹為丸水下便斷 鼠負豆豉各十
四枚搗丸芡子大未發前日湯服二丸將發時再

服二丸
便止

脾寒瘡疾

先寒後熱名寒瘡但寒不熱面色黑者名
厥瘡寒多熱少面黃腹痛名脾瘡三者並

宜服此用之二十年累試有效不蛀草烏頭削去
皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧

子大每服三十丸薑十片棗三枚葱三根煎湯清
早服以棗壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯

便不發也 五臟氣虛陰陽相勝發為痲瘡寒多
熱少或但寒不熱宜七束湯主之用附子一枚炮
七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一碗生薑
七片棗七枚煎七分露一宿發日空心溫服未久
再進一服凡寒痰宜附子風痰宜烏頭若用烏頭
則寒多者火炮七次熱多者湯泡七次去皮焙乾
如上法用烏頭性熱炮多則熱散也 寒多熱少
或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用熟附
子去皮草果仁各二錢半水三盞薑七片棗二枚
煎一盞發日早溫服 一方臨發時以醋和附子
塗于背上 寒多熱少飲食不思用高良薑麻油
炒乾薑炮各一兩為末每服五錢用猪胆汁調成
膏于臨發時熱酒調服以胆汁和丸每服四十九
酒下亦佳大抵寒發于胆用猪胆引二薑入胆去
寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以作效也一
方只用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮三錢為
末每服二錢猪腎煮酒下一方用二薑等分為末
每服一錢水一盞煎至七分服又乾薑炒黑為末
臨發時以溫酒服三錢七 石胡荽
一把杵汁半盞入酒半盞和服甚效

久瘡不止

用硫黃硃砂等分為末每服二錢臘茶清發日五更服當日或大作或不作皆其效

也寒多倍硫黃熱多倍砂 硫黃臘茶等分為末發

日早冷水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶

蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒

服三十九丸日二服生者搗汁服亦可 蒴藿一大

握炙令赤色以水濃煎一盞欲發前服 荳蔻根

燒灰水服一合量人強弱用 大麻葉不問榮枯

鍋內文武火慢炒香取起以紙蓋之令出汗盡為

末臨發前用茶或酒下移病人原睡處其狀如醉

醒即愈又火麻葉如上法為末一兩加縮砂丁香

陳皮亦各半兩酒糊丸梧子大每用酒茶任下五

七丸能治諸瘡壯元氣 桃花為末酒服方寸七

良 真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子

大每空心人參湯化服一丸即愈一云以無根水

下 故鞋底去兩頭燒灰并華水服之 不拘久

近車軸垢水洗下麩和丸彈子大作燒餅未發時

食一枚發時又食一枚 白蠟蠶直者一個切作

七段綿裹為丸硃砂為衣作一服日未出時面向

東用桃李枝七寸煎湯吞下 龜板燒存性研末

酒服方寸七雄野鷄屎熊胆五靈脂恆山等分

為末醋糊丸黑豆大正發時冷水下一丸蝙蝠

七個去頭翅足擣干下丸梧子大每服一丸清湯

下鷄鳴時一丸日中一丸伏翼丸蝙蝠一枚炙

蛇蛻皮一條燒蜘蛛一枚去足炙鼈甲一枚醋炙

麝香半錢為末五月五日午時研勻入煉蜜和丸

麻子大每温酒下五丸

老瘡不斷牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有

方寸七先發一時酒一升半煮

三沸及熱服盡温覆取汗即效

疥瘡邪熱

冬葵子陰乾為末酒服二錢午日取花按手亦去瘡蜀葵花白者陰乾為末服之

午日取花按手亦能去瘡阿魏臙脂各一

新久瘡疾

用葛葎草一握去兩頭秋冬用乾者恆山

末等分以淡漿水二大盞浸藥星月下露

一宿五更煎一盞分二服當吐痰愈諸瘡久瘡

用三姓人家寒食麩各一合五月五日午時采青

蒿搗自然汁和丸綠豆大臨發日早無根水一丸
一方加炒黃丹少許脾寒諸瘡不拘老少孕婦
只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一
指銀器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔年青
州棗十個水一盞煎半
蓋發前服以棗下之

五種瘡疾

桃奴十四枚巴豆七枚黑豆一兩研勻以
冷水和丸梧子大硃砂為衣發日五更念

藥王菩薩七遍并華水下一丸立瘥不過二次妙
不可言五瘡不止用夜明砂末每冷茶服一錢

效立

瘡發無時

胡椒吳茱萸高良薑各二錢為末以猪脾
一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以墨

記定並作餛飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼下一
服效經久不瘥用蝙蝠糞五十粒硃砂半兩麝
香一錢為末糯米飯丸小
豆大未發時白湯下十九丸

老瘡勞瘡

用蠶甲醋炙研末酒服方寸匕隔夜一服
清早一服臨時一服無不斷者入雄黃少

許更
佳

勞瘡積久

不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時

一服白狗糞燒灰發前冷水服二錢一人久病瘡熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚

一醫投小柴胡湯熱減十之九三服脫然此名勞瘡熱從髓出加以剛劑氣血愈虧蓋熱有在皮膚

在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減故三服乃效也勞瘡劣弱烏梅

十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服即止

食瘡積瘡

巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸綠豆大一服丸冷湯下

寒瘡積瘡

巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧子大清旦先發時

各服一丸
白湯下

寒瘡冷痢

端午日以獨頭蒜十個黃丹二錢搗丸梧子大每服九丸長流水下甚妙

瘡疾五

五

虛寒瘧疾

黃狗肉煮臠入五味食之 羊肉
作臠餅飽食之更飲酒暖卧取汗

虛瘧

發熱人參二錢二分雄黃五錢為末端午日用
糲尖搗丸梧子大發日侵晨井華水吞下七丸

發前再服忌諸般熱物立效一方加神麩等分
自汗不止用草果一枚麩裏煨熟連麩研入平胃

糝二錢
水煎服

溫瘧

不止當歸一兩水煎飲日一服又黃丹炒半兩
青蒿童尿浸二兩為末每服二錢寒多酒服熱

多茶服 熱多者恆山一錢小麥三錢淡竹葉二
錢水煎五更服甚良 痰甚但熱不寒用青蒿二

兩童子小便浸焙黃丹半兩
為末每服一錢白湯調下

鬼瘧

寒熱樹上自乾桃子二七枚為末滴水丸梧子
大硃砂為衣每服一丸侵晨面東井華水下良

又雄狐屎蝙蝠屎各一分為末醋糊丸芡子大發
時男左女右手把一丸嗅之又野狐肝胆一具新

瓶內陰乾阿魏一分為末醋糊丸芡子大發時男
左女右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指

貓屎燒灰水服治寒熱鬼瘡發無期度者極驗
進退不定用猢猻頭骨一枚燒研空心温酒服

一錢臨發再服又人胆硃砂雄黃麝香等分爲末

醋糊丸綠豆大每綿裹一丸納鼻中卽瘥男左女

右一丸可治二人來去者畫鍾馗紙燒灰二錢

阿魏砒霜月砂各一皂子大爲末寒食麩和丸小

豆大每服一丸發時冷水下正月十五日五月初

五日修合經久或發或止者野貓肝一具瓶盛

熱猪血浸之封口懸乾去血取肝研末猢猻頭骨

虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分爲末醋糊丸芡

子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫中

指上日發不止鬼箭羽卽衛矛鮫鯉甲燒灰二

錢半爲末每以一字發時嗜鼻又鬼箭羽末一分

砒霜一錢五靈脂一兩爲末發時冷水服一錢又

白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四兩菉豆三分雄

黃一分硃砂半分研丸梧子大未發平旦冷水服

三九卽止七日忌油

邪瘡

用隔年全厯端午午時燒灰糊丸梧子大發日
早用無根水下五十九丸時作者生虎睛一枚

臘月猪血少許硃砂阿魏各一分為末端午日取
糶尖七枚和丸黍米大每綿包一丸塞耳中男左

女右 黑牛尾燒末酒服方寸七日三服
牯牛陰毛七根黃荆葉七片縛內關上亦效

牝瘡多寒

雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥等分為
散未發前漿水服半錢 獨寒不熱者用

蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二錢為末每服半錢
臨發日旦一服發前一服酢漿水調下温瘡又加

蜀漆一錢

牡瘡獨熱

不冷者蜀漆一錢半甘草一錢麻黃二錢
牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫

入藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止 穿山
甲一兩乾棗十個同燒存性杵為末每服二錢發

日五更井華水服
翹搖杵汁服之

少陰瘡疾

嘔吐綠礬一錢乾薑泡半夏薑製半
兩為末每服半錢發日早以醋湯下

厥陰肝瘡

寒多熱少喘息如死狀或少腹滿小便如
膿不問久近不吐不泄如神恆山一兩醋

浸一夜瓦器煮乾每用二錢
水一盞煎半盞五更冷服

太陰肺癆

痰聚胸中病至令人心寒寒甚乃熱熱閒
善驚如有所見恆山三錢甘草半錢秫米

三十五粒水二鍾煎一
鍾發日早分三次服

少陰腎癆

淒淒然寒手足寒腰脊痛大便難目眴眴
然恆山二錢半豉半兩烏梅一錢竹葉一

錢半葱白三根水一升
半煎一升發前分三服

瘴癘

寒熱相思子十四枚水研服取吐立瘥又常山
一寸草果一枚熱酒一盃浸一夜五更望東服

之蓋卧醒即愈又常山栝榔甘草各二錢黑豆一
百粒水煎服之又常山黃連香豉各一兩附子炮

七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲服四丸欲發時三
丸至午後乃食冷脹寒熱往來頭痛身疼嘔痰

或汗多引飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子
一枚四破每以一片水一盞生薑十片煎七分温

服此方極妙嶺南以啞瘴為危急不過一二日而
死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得

非以熱攻熱而散寒邪乎真起死回生之藥也
發熱連項背者茴香子搗汁服之 野狐肝一具

陰乾重五日五更初北斗下受氣為末粳米作丸
菘豆大每以一九緋帛裹繫手中指男左女右勞

瘧並治 無問新久童便一升入白蜜二匙攪去
白沫頓服取吐碧綠痰出為妙若不終不除也

二百粒飲九月九日取米饊角陰乾半兩寒食飯
浸一夜五更煎至一盞頓服當下利為度 熱少

寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草果仁熟附子
等分水一盞薑七片棗一枚煎半盞服名果附湯

蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內
上以盞蓋六一泥固濟煨至藥升在盞刮下為末

米饊糊丸菘豆大雄黃為衣每服一九黑豆研水
五更送下並治鬼瘧食瘧 久不愈

者用白狗糞燒灰發前冷水服二錢
痰瘧積瘧 藜蘆皂莢炙各一兩巴豆二十五枚熬黃

痰瘧積瘧

研末蜜丸小豆大每空心服一九未發時

一丸臨發時又服一丸勿用飲食 久瘧痰多不
食欲吐不吐藜蘆末半錢溫薑水調下探吐 溫

瘡痰甚但熱不寒者見上温瘡條痰瘡不止取
活狗蠅一枚去翅足麩裹為丸衣以黃丹發日早

米飲吞之得吐即止
或以蠟丸酒服亦可

疔疾疲瘵 有人病此夢白衣婦人云食蔗可
愈及旦買蔗數挺食之翌日疾愈

瘡疾渴甚 童便和蜜
煎沸頓服

諸瘡煩熱太燥 取生地龍四條洗淨研如泥入生薑
汁少許蜜一匙薄荷汁少許調服甚

效亦治
瘡瘡

瘡後怪症 口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十
日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食

煎澤瀉湯日飲三
盞連服五日愈

久瘡成癖 以醉魚草花填鱖魚腹中濕紙裹煨熟空
心食之仍以花和海粉搗貼便消 結癖

在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢為末蜜丸
梧子大每服十九棗湯下有母木鼈子穿山甲

炮等分爲末每服
三錢空心温酒下

久瘡發歇無時

用百節蟲四十九枚溼生蟲四十九枚
砒霜三錢糲子角七枚五月五日

日未出時于東南上尋取兩般蟲至午時向南研
勻丸小豆大每發日早男左女右手把一九嗅之
七遍立效修時忌孝子婦人師尼鷄犬見之名
逐邪丸大抵毒物止可外用不敢輕入丸散中

久瘡連年 噎食不下

用生人膽一個盛糯米令滿
入麝香少許突上陰乾一半

青者治瘡一半黑者治噎並爲末每服
十五粒瘡用陳皮湯下噎用通草湯下

斷截瘡疾

邪瘡取燒尸場上帶黑土同葱搗作丸塞
耳或繫膊上即止男左女右熱瘡用五

月五日午時取虹蚓糞以麪和丸梧子大硃砂爲
衣每服三丸無根水下忌生冷即止皆效或加菖
蒲末獨頭蒜同丸燕屎方寸七發日平旦和酒
一升令病人兩手捧任吸氣慎勿入口害人用
蜘蛛一枚同飯搗丸吞之 蜘蛛一枚著蘆管中
密塞絛項上勿令患人知之 蜘蛛三五枚綿包

繫寸口上 大蜘蛛三枚信砒一錢雄黑豆四十

九粒為末滴水為丸碗豆大先夜以丸獻于北

斗下次早紙裏插耳內立見神聖一丸可醫二人

五月五日取花蜘蛛曬乾絳囊盛之臨期男左

女右繫臂上勿令知之 小蒜不拘多少研泥入

黃丹少許丸如芡子大每服一丸面東新汲水下

至妙 紫葢一名魚鯉草一握搗爛絹包周身摩

擦得睡有汗即愈臨發前一時作之 旱蓮草即

鯉腸搗爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛

繫任良久起小泡謂之天灸其瘡即止甚效 五

月五日收大蝦蟆曬乾紙封絳囊貯之男左女右

繫臂上勿令知之 執棗一枚咒曰吾有棗一枚

一心歸大道優他或優降或劈火燒

之念七遍吹棗上與病人食之即愈

狐膽丸 治邪瘡發作無時狐胆一個硃砂砒霜各半

兩阿魏麝香黃丹棗豆粉各一分為末五月

五日午時糲子尖和丸梧子大空

心及發前冷醋湯服二丸忌熱物

截瘡諸湯 常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欬

發前頓服取吐 常山一兩秫米一百粒

萬方頁裏一瘡疾九

水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡
驅癩湯云用此四十年奇效不能盡述切勿加減
萬一無吐者常山酒煮曬乾知母貝母草果各一
錢半水一鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前
服

截癩諸酒

常山一兩酒一升漬二三日分作三服平
旦一服少頃再服臨發又服或加甘草煮

服之

醇醪湯治間日癩甚驗恆山一錢二分大

黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半日

醇發日五更溫服再水一盞煎減半日醪未發

時溫服治久癩不止常山一錢半檳榔一錢丁

香五分烏梅一個酒一盞浸一宿

五更飲之一服便止永不復發

截癩諸丸

治數年不瘥者兩劑瘥一月以來者一劑
瘥恆山三兩研末鷄子白和丸梧子大瓦

器煮熟殺腥氣則取曬乾收之每服二十九竹葉

湯下五更一服天明一服發前一服或吐或否即

止丹砂丸恆山搗末三兩真丹一兩研白蜜和

杵百下丸梧子大先發時三丸少頃再服三丸臨

時服三丸酒下無不斷者 黃丹丸治大小久瘡
恆山三兩黃丹半兩烏梅連核瓦焙一兩為末糯
米粉糊丸梧子大每服三五十九丸涼酒下隔一夜
一服平旦一服午後方食 恆山三兩知母一兩
甘草半兩搗末蜜丸梧子大先發時服十九丸次服
七丸後服五六丸以瘡為度 瞻仰丸治一切瘡
常山四兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸
梧子大每卧時冷酒服五十九丸五更再服忌鷺羊
熱物 勝金丸治一切瘡胸膈停痰發不愈者常
山八兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大
如上述法服 二聖丸治諸瘡不拘遠近大小鷄骨
恆山鷄心檳榔各一兩生研鱖鯉甲煨焦一兩半
為末糯粉糊丸菉豆大黃丹為
衣每服三五十九丸如上法服

三十年老瘡

及積年久瘡常山黃連各一兩酒三升
漬一宿以瓦釜煮取一升半發日早服

五合發時再服熱當吐冷當利無不瘡者 恆山

一兩半龍骨五錢附子炮二錢半大黃一兩為末

鷄子黃和丸梧子大未發時五丸將發

時五丸白湯下此方神驗無不斷者

紫雪

治温瘧見傷寒門

米餅

山

胡頭

痢疾

赤白下痢

葱白一握細切和米煮粥日日食之薤白亦可金剛根即菝葜蠟茶等分爲末白

梅肉搗丸芡子大每服五七丸小兒三丸白痢甘

草湯下赤痢烏梅湯下山豆根末蜜丸梧子大

每服二十九空腹白湯下三服自止赤石脂末

飲服一錢訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲末米

飲每服二錢白礬飛過爲末好醋飛羅麵爲丸

梧子大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下十二月猪

胆百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰乾每用五

七粒爲末生薑湯調服獵猪骨燒存性研末温

酒調服三錢臘月狗胆一百枚每枚入黑豆充

滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送

下白雄雞一隻如常作臠及餛飩空心食雞

卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一

錢匕生雞子一個取白攤連紙上日乾摺作四

重包肥烏梅十個安熨斗中以白炭燒存性取出

碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒

分三服空心并華水調下如覺微利不須再服

臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內
餅固濟煨存性研末以好酒煮黃蠟百沸取蠟和

丸梧子大每服一二十九紅痢甘草白痢乾薑湯
下真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子

大每服一丸以黃連本香湯下水獺屎燒末清
旦飲服一小蓋三服愈赤用赤糞白用白糞 訶

子十二個六生六煨去核焙為末赤痢生甘草湯
下白痢炙甘草湯下不過再服 胡荽子一合炒

搗末每服二錢赤痢沙糖水下白痢薑湯下生
薑細切與真茶等分新水濃煎服之薑助陽茶助

陰並能消暑解酒食毒且一寒一熱調平陰陽不
問赤白冷熱用之皆良若熱痢留薑皮冷痢去皮

荷葉燒研每服二錢紅痢蜜白痢沙糖湯下
荔枝殼椽斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分每以

半兩水一盞半煎七分溫服日二服 鴉片木香
黃連白朮各一分研末飯丸小豆大壯者一分老

幼半分空心米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麵無
不止者口渴畧飲米湯 罌粟花未開時外有兩

片青葉包之花開即落收取為末每米飲服一錢
神效赤痢用紅花者白痢用白花者 五月五日

采青蒿艾葉等分同豆豉搗作餅日乾名蒿豉母
每用一餅以水一盞半煎服陰陽交滯不問赤

白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑
雞冠花煎酒服赤用紅白用白蒼耳草不拘

多少洗淨用水煮爛去渣入蜜用武火熬成膏每
服一二匙白湯下藍姑草即淡竹葉菜即鴨跖

草煎湯日服之龍牙草即馬鞭草五錢陳茶一
撮水煎服神效用甘草一尺炙劈破以淡漿水

蘸水一升半煎取八合服之立效甘草一兩炙
肉豆蔻七個煨剉以水三升煎一分服黃丹

炒紫黃連炒等分爲末以糊丸麻子大每服五十
丸生薑甘草湯下蜜陀僧三兩燒黃色研粉每

服一錢醋茶下日三服乾薑好墨各五兩爲末
醋漿和丸梧子大每服三四十九米飲下日夜六

七服愈罌粟子炒罌粟壳炙等分爲末煉蜜丸
梧子大每服三十九米飲下有人經驗酢榴根

東生者一握炙乾水二大盞濃煎一盞空心服之
胡椒菜豆各一歲一粒爲末糊丸梧子大紅用

生薑白用米湯下午日午時取完好勃薺洗淨
拭乾勿令損破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封

高方頁集一痢疾

收貯遇有患者取二枚
細嚼空心用原酒送下

久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰紫笋茶末一兩為
末每服二錢米飲下破故紙炒一兩栗殼炙四

兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸薑棗同水煎服
馬糞一丸燒灰水服不拘大人小兒用新糲

皮一斤去黑皮切以水一斗煎取五升去滓煎膏
和酒服積年不愈飲調雲母粉方寸七服二服

立見神效並無寒熱只日久不止用黃連四十
九個鹽梅七個入新瓶內燒煙盡熱研每服二錢

鹽米湯下五六年者荆瀝每日服五合久熱
痢取蚯蚓泥一升炒煙盡沃汁半升濾淨飲之

諸藥服遍久不瘥轉為白膿用訶黎勒三枚兩炮
一生並取皮末之以沸漿水一合服之若只水痢

加一錢七甘草末若微有膿
血加三七血多亦加三七

骨立者地榆一斤水三升煮一升半去渣
再煎如稠錫絞濾空腹服三合日再服

腰痛用猪腎二枚研爛入陳
皮椒醬作餛飩空心食之

暴痢如鷺鴨肝者痛不可忍用黃連黃芩各一兩水二升煎一升分三次熱服

赤白禰痢困重者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分爲末每服三錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下名

二靈

散

頻數腸痛定粉一兩雞子清

和炙焦爲末冷水服一錢

水穀不消以麴熬粟米粥服方寸七日四五服

腹痛食不消化者用醋榴皮炙黃爲末棗肉或粟

米飯和丸梧子大每空腹米飲服三十丸日三服

以知爲度如寒滑加附子赤石脂各一倍一方用

皮燒存性爲末每米飲服方寸七日三服效乃止

脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用吳茱萸黃連

白芍藥各一兩同炒爲末蒸餅丸梧子

大每服二三十丸米飲下名戊己丸

腹痛腸滑後重大黃煨半兩葦蓉子炒黑一撮爲

末每服一錢米飲下腸胃氣虛冷熱不調下痢

赤白裏急後重腹痛小便不利用阿膠炒過水化

成膏一兩黃連三兩茯苓二兩爲末搗丸梧子大

每服五十丸粟米湯下日三
入腸胃之閒便痢赤白臍腹疔痛裏急後重煩渴
張滿不進飲食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜
炒四兩為末煉蜜丸芡子大每服一丸水一盞煎
化熱服

治赤白痢日夜無度及腸風下血用川黃連二兩
吳茱萸二兩湯泡七次同炒香揀出各自為末粟

米飯丸梧子大另收每服三十丸赤痢甘草湯下
黃連丸白痢乾薑湯下茱萸丸赤白痢各用五十

丸米湯下甚效
治痢及水泄腸風用吳茱萸二
兩黃連二兩同炒香各自為末以百草霜末二兩

同黃連作丸以白芍藥末二兩同茱萸作丸各用
飯丸梧子大各收每服五十丸赤痢烏梅湯下連

霜丸白痢米飲下茱萸丸赤
白痢各半服之名二色丸

熱毒下痢

赤白下痢以好茶一斤炙搗末濃煎一二
盞服久患痢者亦宜服之
用蠟茶赤痢

以蜜水煎服白痢以連皮自然薑汁同水煎服二
三服即愈
用蠟茶二錢湯點七分入麻油一瓊

殼和服須臾腹痛大下即止一少年用之有效
蠟茶末以白梅肉和丸赤痢甘草湯下白痢烏梅

湯下各百丸一方建茶合醋煎熱服即止蒲根
二兩粟米二合水煎服日二次協熱下痢赤白

用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧子大每服十五丸
米飲下協熱下痢膿血竈突中墨黃連各一兩

為末每酒下二錢日二服積熱下痢柴胡黃芩
等分半酒半水煎七分浸冷空心服之熱痢腹

痛胡黃連末飯丸梧子大每米湯下三十九丸熱
瀉下痢五倍子一兩枯礬五錢為末糊丸梧子大

每服五十丸米湯送下濕熱泄痢用六一散加
炒紅麴五錢為末蒸餅和丸梧子大每服五七十

丸白湯下日三服積熱瀉痢冬瓜葉嫩心拖麵
煎餅食之熱痢不止車前葉搗汁入蜜一合煎

溫服熱病下痢困篤者用大青四兩甘草赤石
脂三兩膠二兩豉八合水一斗煮三升分三服不

過二劑瘥又欲死者龍骨半斤研水一
斗煮取五升候極冷稍飲得汗即愈效

下痢腹痛

羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之
狗肝一具切入米一升煮粥合五味食

方頁集一痢疾四

一人年五十餘病下痢腹痛垂死用延胡索末
 三錢米飲服之痛即減十之五調理而安赤白
 痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍腹
 絞痛以黃連一升酒五升煮取一升半分再服當
 止絞痛也禁口痢下
 有兼治痢後腹痛二條

下痢裏急

穿山甲蛤粉等分同炒研末每服一錢空
 心溫酒下裏急後重不蛭皂角子米糠

炒過枳壳炒等分爲末飯丸梧子大每米飲下三
 十丸熱痢裏急大黃一兩浸酒半日煎服取利

赤白重下

豆豉熬小焦搗服一合日三或炒焦以水
 浸汁服亦驗豉心炒爲末一升分四服

酒下入口
 即斷也

冷痢寒痢

久冷下痢或不痢腰腹苦冷用蜀椒三升
 酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不

過三升瘥冷痢端午日以獨頭蒜十個黃丹二
 錢搗丸梧子大每服九丸長流水下甚妙冷勞

泄痢漏盧一兩艾葉炒四兩爲末米醋三升入藥
 末一半同熬成膏入後末和丸梧子大每溫水下

三十丸又食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具
去脂醎醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服二十

丸米飲下早夜各一服冷痢腹痛下白凍如魚
腦桃花丸赤石脂煨乾薑炮等分為末蒸餅和丸

量大小服日三服腹痛不能食者肉豆蔻一兩
去皮醋和麵裹煨搗末每服一錢粥飲調下冷

痢白凍五月五日采麻葉陰乾為末每服二錢冷
水調下勿喫熱物令人悶倒只喫冷物小兒半錢

冷痢不止生薑煨研為末共乾薑末等分以醋
和麵作餛飩先以水煮又以清飲煮過停冷吞二

七枚以粥送下日一度大腸冷痢半牛角腮燒
灰飲服二錢日三次冷痢厥逆六脈沉細人參

大附子各一兩半每服半兩生薑十片丁香十五
粒粳米一撮水二盞煎七分空心溫服冷疝痢

下莨菪子為末臘猪脂和丸綿裹棗許導下部因
痢出更納新者不過三度瘥冷滑下痢不禁虛

羸用縮砂仁熬為末以羊子肝薄切摻之瓦上焙
乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四十丸

白湯下日二服又縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘
皮等分為末飯丸梧子大每服四十丸米飲下日

萬方頁真一痢疾四

二服 食湖蟹致患冷痢用新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈 水泄寒痢大草烏一兩以一半

生研一半燒灰醋糊和丸菜豆大每服七丸并華水下忌生冷魚肉 寒痢白色炒麵每以方寸匕

入粥中食之能療日瀉百行師不救者 寒痢青色乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累

用得效 虛寒下痢硫黃半兩蓖麻仁七個為末填臍中以衣隔熱湯熨之止乃已又腸滑不禁鍼

砂七錢半官桂一錢枯礬一錢為末以涼水調難臍上下縛之當覺大熱以水潤之可用三四次名

玉胞

胃寒下痢 羊肉一片葦蓉子末一兩和以綿裹納下部二度瘥

血痢 楮樹皮荆芥等分為末冷醋調服一錢 烏梅肉胡黃連竈下土等分為末茶調服有痢血百

餘日醫不能療者用鹽水梅肉一枚研爛合蠟茶入醋服之一啜而安蓋血得酸則斂得寒則止得

苦則瀉故也 冬葵子為末每服二錢入蠟茶一錢沸湯調服日三 用平胃散一兩入川續斷末

米飲下	錢空	子大	調粥	煨醋	煮汁	飯丸	乳腐	捻頭	地榆	寸匕	服三	服三	菜豆	放冷	末每	米飲	血痢	服之	二錢
下	心	每服	吃三	淬研	服之	小豆	一兩	煎湯	晒研	溫水	十丸	十丸	空心	為末	服一	下	不止	皆效	每服
		十五	四	末每	薄荷	大每	漿水	送下	每服	調下	鹽湯	鹽湯	食極	每服	錢食	橡實	白紙	三錢	二錢
		丸米	次即	服三	葉煎	食前	一鍾	一方	二錢	下	下	下	效	一錢	前烏	二兩	三張	七錢	水煎
		飲下	止也	錢米	湯常	米飲	煎服	以地	錢摻	鳳尾	木賊	鼓大	米飲	梅湯	兩楮	裹鹽	三錢	研末	即愈
			苦參	下	服	下五	沒石	地榆	在羊	草根	五錢	蒜等	下神	調下	葉炙	一匙	米泔	水調	時行
			炒焦	白鹽	蛇含	十丸	子一	煮汁	肉上	即貫	水煎	分杵	效	乾薑	一兩	燒赤	水調	痢疾	小兒
			為末	紙包	石二	荷葉	兩為	似錫	炙熟	眾五	煎溫	丸梧	神效	燒黑	砂仁	研末	服即	服即	愈
			水丸	燒研	枚火	帶水	末	每服	食之	錢煎	服一	子大	乾薑	存性	半兩	分三	服	服	愈
			梧					三合	以	酒服	日一	每	性	為					

腹痛者膩粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和丸菜豆大每服七丸或十丸艾一枚水一盞

煎湯下 日夜不止以芸臺葉搗汁二合入蜜一合溫服

血痢連年秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎取汁銅器重釜煎成丸如梧子大每服五六丸日二服

稍增以知為度亦可煎飲 十年者石灰三升熬黃水一斗投之澄清一服一升日三服

熱毒血痢宣黃連一兩水二升煮取半升露一宿空腹熱服少臥將息一二日即止又忍冬藤濃煎

飲又卮子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服三丸日三服大效亦可水煎服 協熱血痢猪大腸

一條入芫荇在內煮食又猪臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸又猪臟入槐花

末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧子大每服二十丸溫酒下 血痢內熱海蛤末蜜水調服二錢

二日

血痢瀉血烏藥燒存性研陳米飯丸梧子大每米飲下三十丸 臘月日未自時

根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每二兩入寒

食麵一兩新汲水丸梧子大陰乾每服三十丸水

煮滾傾出溫水送下忌見日則無效 木耳炒研

五錢酒服即可亦用井花水服或以水煮鹽醋食

之以汁送下 熱痢便血粟殼醋炙一兩陳皮半

兩為末每服三錢烏梅湯下 痢及瀉血烏龜肉

以沙糖水拌椒和炙 煮食之多度即愈

血痢如刺以豉一升水漬相淹 煎兩沸絞汁頓服不瘥再作

赤痢不止 鯽魚鮓二瓣切秫米一把薤白一虎口切

和丸梧子大每服七十丸烏梅湯下 胡桃仁枳

壳各七個皂角不蛀者一挺新瓦上燒存性研為

細末分作八服每臨臥時一服二更一服五更一

服荆芥茶下 薤同黃蘗煮汁服之 以大麻子

水研濾汁煮菘豆食之極效粥食亦可 經年不

愈菘豆菹蒸熟隨意食之良 累治不瘥黃連一

兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升漫火煎

成膏每服半合溫米飲下一方只以雞子白和丸

服

熱毒赤痢黃連二兩切瓦焙合焦當歸一兩
焙為末入麝香少許每服二錢陳米飲下

腹痛真茶陳白梅蜜水各半煎飲之
黃連各四兩為末煉蜜丸梧子大每米飲服二十

丸日三服 臍痛菜
黃合黑豆湯吞之良

赤痢熱躁粳米半升水研取汁入油瓷瓶中
蠟紙封口沉井底一夜平旦服之曾用有效

禁口痢疾

臘肉脯煨熟食之妙 雞內金焙研乳汁
服之 黃肥雌雞一隻如常為臛作濕餽

飽空心食之 大田螺二枚搗爛入麝香三分作

餅烘熱貼臍間半日熱氣下行即思食矣甚效

紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麵餅二個蘸末食

之肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少

許入白米粥內食之即效 沙糖半斤烏梅一個

水二碗煎一碗時時飲之 山藥半生半炒為末

每服二錢米飲下 蘿蔔搗汁一小盞蜜一盞水

一盞同煎早一服午一服日補米飲亦可

粒如無蘿蔔以子搗汁亦可一方加桔礬七分同煎一方只用蘿蔔茶煎湯日日飲之蘿蔔片不拘新舊染蜜噙之嚙汁味淡再換覺思食以肉煮粥與食不可過多上方兼治痢後腹痛大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中糯穀一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒為末每服一匙湯下三服即止蕎麥麵每服二錢砂糖水調下木鼈仁六個研泥分作二分用麵燒餅一個切作兩半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其痢即止遂思飲食獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細細呷之或加薑汁炒黃連三錢毒痢禁口水蛙一個并腸肚搗碎瓦烘熱入麝香五分作餅貼臍上氣通即能進食也下痢禁口雖是脾虛亦熱氣閉隔心胃所致俗用木香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲粳米飲調下或用參苓石蓮肉少入菖蒲服胃次一開自然思食久痢禁口石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米調下便覺思食甚妙加入香連丸尤妙病勢欲死用金絲

鯉魚一尾重一二斤者如常治淨用鹽醬葱必入

胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連

湯食一飽病即

除根屢治有效

血痢禁口用活鮑魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬

末二錢以樓包紙裏煨存性研末每服二錢米飲

下每日

二服

久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用

破故紙炒一兩粟殼炙四兩為末煉蜜丸彈子大

每服一丸薑棗同水煎服艾葉陳皮等分煎湯

服之亦可為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下二三十

丸川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟

研丸茶豆大每服五丸黃連湯下並治水泄川

烏頭一個灰火燒烟盡取出地上蓋蓋良久研末

酒化蠟丸如大麻子大每服三丸赤痢黃連甘草

黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷吞如

瀉及肚痛以水吞下並空心服之忌熱物罌粟

殼醋炙為末蜜丸彈子大每服一丸

片煎八分温服又粟殼十兩去膜分作三分一分
 醋炒一分蜜炒一分生用並爲末蜜丸芡子大每
 服三十丸米湯下百中散粟殼蜜炙厚朴薑製
 各四兩爲細末每服一錢米飲下忌生冷阿芙蓉
 蓉小豆許空心温水下日一服忌葱蒜漿水若
 渴飲蜜水解之薺菜花陰乾研末棗湯日服二
 錢 茄根燒灰石榴皮等分爲末以沙糖水服之
 烏梅三兩燒存性爲末醋煮米糊和丸梧子大
 每空心米飲服二十九日三並治酒痢 腸垢已
 出時後用烏梅肉二十個水一盞煎六分食前分
 二服 烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少
 許杵丸梧子大每服二三十九丸茶湯下日三用
 酸石榴一個煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴
 一塊煎湯服神效無比炭火燒存性亦得每服一
 錢 陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲下
 患二三年或二三月百方不效者服之便止不可
 輕忽之也 楊梅燒研每米飲服二錢日二服
 槲白皮薑汁炙五次一兩乾薑炮半兩爲末每服
 二錢米飲酒下 吳茱萸湯泡過炒猪臟半條去
 脂洗淨裝滿紮定文火煮熟搗丸梧子大每服五

十九丸米飲下日二服 罌粟殼醋炒金櫻花葉及

子等分爲末蜜丸芡子大每服五七丸陳皮煎湯

化下 五倍子一兩半生半燒爲末糊丸梧子大

每服三十丸紅痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯

下 五倍子醋炒七次爲末米飲送下 金星地

鱔卽金蛇醋炙鉛丹白礬燒各五錢爲末每服二

錢米飲下日二 皂角子瓦焙爲末米糊丸梧子

大每服四五十九丸陳茶下諸藥不效服此三服宿

垢去盡卽變黃色屢驗 變種種痢兼脫肛菘蓉

丸用葺宕子一升淘去浮者煮令芽出曬乾炒黃

黑色青州棗一升去皮核釀醋二升同煮搗膏丸

梧子大每服二十九丸食前米飲下 脾泄久痢五

倍子炒半升倉米炒一升白丁香細辛木香各三

錢花椒五錢爲末每服一錢蜜湯下日二服忌生

冷魚

下痢休息

杏仁去皮麩炒研以豬肝一具切片水洗

童便二升同煎乾放冷任意食之 重杏仁鋪盡以

臭不可近臍腹撮痛用椿根白皮可 日夜無度腥

母丁香三十個為末醋糊丸梧子大每服五十九
米飲下又椿根白皮東南行者長流水內漂三日
去黃皮焙為末每一兩加木香二錢粳米飯為丸
每服一錢二分空腹米飲下久痢者鼠尾草花
搗末飲服一錢又白豆腐醋煎食之即愈又龍骨
四兩打碎水五升煮取二升半分五服冷飲仍以
米飲和丸每服十丸又熟附子半兩研末雞子白
二枚搗和丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩
服米飲下經年不愈取虎骨炙黃焦搗末飲服
方寸七日三取效五十日以上一二年不瘥變
成疔下如泔淀者用生羊肝一具切絲入三年醋
中吞之心悶則止不悶更服一日勿食物或以薑
蕪同食亦可不過二三具經一二年不瘥羸瘦
衰弱砒霜成塊者為末黃丹各半兩化蠟入砒以
柳條攪焦則換至七條取起收之每
旋丸梧子大冷水送下小兒黍米大

水穀痢疾

牛骨灰六月六日麴炒等分為末飲服方
寸七乃御傳方也櫻櫚皮燒研水服方

寸匕韭葉作羹粥煉炒任食之良小豆一合
鎔蠟三兩頓服取效日夜百餘行者橡實二兩

楮葉炙一兩為末每服一錢食前烏梅湯調下
久不瘥者厚朴三兩黃連三兩水三升煎一升空
心細服及每至立秋前後即患痢兼腰痛取檣
根一大兩擣篩以好麩捻作餠如皂子大水煮
熟每日空心服十
枚並無禁忌神良

暑痢連月不瘥

虞雍公患此夢壁間有藥方云暑毒
在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘥

獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯公依方
用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸
梧子大每甘草湯下
七丸日三服果愈

脾虛洩痢

青梁米半升神麴一合日日煮粥食即愈
用黃雌雞一隻炙以鹽醋塗煮熟食之

日夜不止野雞一隻如食法入橘皮葱椒五味
和作餠餉煮空心食之脾洩久痢五倍子炒半

斤倉米炒一升白丁香細辛木香各三錢花椒五
錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉

諸痢脾洩黃連半斤去毛切裝猪大腸內入砂鍋
以水酒煮爛取連焙研末搗陽和丸

百丸米湯
下極效

脾虛下白

脾胃虛冷停水滯氣凝成白涕下出船上
硫黃一兩研末炒麩一分同研滴冷熱水

丸梧子大每米
湯下五十九

氣痢

牛乳半斤華菱三錢同煎減半空腹頓服唐太
宗患此服之立愈後疾復發復進之又平巴

石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡其色
如雪謂之巴石取一兩研末熟豬肝作丸梧子大

空腹量人加減水牛肝更佳如素食人以蒸餅為
丸或云白礬中青黑者名巴石老人氣痢虛冷

赤石脂五兩水飛白麩六兩水煮熟葱醬作臠
空心食三四次即愈脾泄氣痢豆蔻一顆米醋

調麩裏煨合焦黃和麩研末更以欖子炒研末一
兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以二錢煎

作飲調前二味三錢旦暮各一服便瘥不止者
寒食一百五日采木天蓼暴乾用時為末粥飲服

一錢後重裏急或下泄薑連散用宣連一兩乾
薑半兩各為末收每用連一錢薑半錢和勻空心

葛方頁纂一痢疾十一

三

温酒下或米飲下神妙又秘傳香連丸用黃連四
 兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上
 鋪香新汲水三碗煮焙研醋調倉米糊為丸如常
 日服五次氣痢赤白巴豆一兩去皮心熬研以
 熟猪肝丸菜豆大空心米飲下三四丸量人用
 氣痢水瀉訶黎勒十枚麩裏糖火煨熟去核研末
 粥飲頓服亦可飯丸服一加木香又長服方訶黎
 勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每服
 二三十丸
 白湯下

一切痢下

桑葉微炙和桑衣煎服 初起者大黃煨
 熟當歸各二三錢壯人各一兩水煎服取

利或加檳榔 初起一服如神名鉄刷丸百草霜

三錢金墨一錢半夏七分巴豆煑十四粒研勻黃

蠟三錢同香油化開和成劑量大小每服三五丸

或四五十九薑湯下 不拘丈夫婦人小兒木香

一塊方圓一寸黃連半兩二味用水半升同煎乾

去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘

皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下有一

婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈

<p>一切積痢靈砂丹用礞砂硃砂各二錢半為末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內重湯煮一伏時候豆紫色為度去二七粒止將一七粒同二砂研勻鎔蠟和收每旋丸菜豆大或三九五</p>	<p>丸淡薑湯下 砒霜黃丹等分蠟和收旋丸菜豆大每米飲下三九</p>	<p>一切惡痢襍下及休息痢百歲丸用漏藍子一個大者阿膠木香黃連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧</p>	<p>子大每一歲一丸米飲下</p>	<p>一切泄痢白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯淪過和小猪脊脂肉一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以淪豆花汁和麩包作小餛飩炙熟食之</p>	<p>新久洩痢乾木耳一兩炒鹿角膠二錢半炒為末每服三錢溫酒調下日二</p>	<p>泄瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭三個去皮尖以一個火炮一個醋煮一個燒灰為末醋糊丸菜豆大每服二十丸水瀉流水下赤痢甘草湯下白痢薑</p>	<p>湯下忌魚鯉生冷</p>
---	-----------------------------------	---	-------------------	---	--------------------------------------	--	----------------

一切瀉痢脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止
巴豆皮楮葉同燒存性研化蠟丸茶豆大每廿

草湯下五丸暴作瀉痢百草霜末米飲調下二
錢歐陽公常得暴下病醫不能治買市人藥一

帖進之而愈叩其方則車前子一味為末米飲服
二錢七云此藥利水道而不動氣水道利則清濁

分而穀藏
自止矣

積滯泄痢腹痛裏急杏仁去皮尖巴豆去皮心各
四十九個同燒存性研泥鎔蠟和丸菜豆大每服

二三丸煎大黃湯下間日
一服一加百草霜三錢

洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取
乾黃土水煮三五沸絞去滓暖服一二升

泄瀉下痢赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各皂子大
粳米飯一團和丸彈子大鐵線穿於燈上

燒過為末米飲服之明礬枯過為末飛羅麩醋
打糊丸梧子大每服二三丸白痢薑湯下赤痢

甘草湯下泄瀉米湯下泄痢不固白麩二斤炒
焦黃每日空心溫水服一二匙

食世

白茯苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木瓜湯下二錢又蒼朮二兩川椒一兩為末醋糊丸梧子大每服二十丸食前溫水下惡痢久者加桂下痢水泄吳茱萸泡炒黃連炒各二錢水煎服未止再服

泄瀉暴痢大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中

水痢百病

用馬藷子以六月六日麩熬各等分為末空心米飲服方寸匕如無六月六日麩常

麩亦可牛骨灰亦可一方用六月六日麩炒黃以

牛骨灰代馬藷子又馬藷子乾薑黃連各等分為

散熟湯服二方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用

神效不得輕之忌猪肉冷水水痢不止大豆一

升炒白米半兩為末每服三錢米飲下林

檣半熟者十枚水二升煎一升并林檎食之

五色痢疾

獾皮燒灰酒服二錢返魂丹用零陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木

香一錢半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通

了三四次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一

味久痢五色大熟瓜萹一個煨存性出火毒為

末作一服溫酒服之一人患痢半年一道人傳此

而愈 痢血五色或膿或水冷熱不調酸
石榴五枚連子搗汁二升每服五合神妙

五疳八痢

見諸疳條

下痢鮮血

卮子仁燒灰水服一錢匕 犀角地榆生
地黃各一兩為末煉蜜丸彈子大每服一

丸水一升煎五合去滓溫服 下痢清血腹中刺
痛椿根白皮洗刮晒研醋糊丸梧子大每空心米

飲下三四十九一
加蒼朮枳殼減半

便痢膿血

烏梅一兩去核燒過為末每服二錢米飲
下立止 毒痢膿血六脉微小並無寒熱

宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三銖
為末每服二錢水一盞煎八分和滓服 昔有男

子病膿血惡痢痛不可忍
以水浸甜瓜食數枚即愈

痢下腸蠱

凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱
牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每飲

一兩五日三服 蠱痢下血凡男子婦人小兒大
腹下黑血茶脚色或膿血如定色百葉苦

與黃連同煎
為汁服之

傷風下痢

風傷久不已而下痢膿血日數十度用皂
角刺枳實麩炒槐花生用各半兩為末煉

蜜丸梧子大每服三
十丸米湯下日二服

老人虛痢不止

不能飲食上黨人參一兩鹿角去皮
炒研五錢為末每服方寸匕米湯調

下日
三服

虛痢危困

因血氣衰弱者鹿茸酥炙一兩為末入麝
香五分以燈心煮棗肉和丸梧子大每空

心米飲下
三五十九丸

虛痢腹痛

食茱萸肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米
一分同兩味炒黃為末一分生碾為末粟

米粥丸梧子大每陳米
飲下五十九丸日三服

老少下痢食入即吐

用白蜜蠟方寸七雞子黃一個
石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞

子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二日服盡神效無比此方服之屢經

效驗

老少瘴痢

日夜百餘度取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末

納肛中利出即止

下痢咽腫

春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木香二兩水五升煎一升半分三服

下痢咳逆

脉沉陰寒者退陰散主之用川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞鹽

一撮煎取半盞温服一人病此不止服此兩服而愈

下痢口渴

引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十個細剉以水一升煮取七合細細呷之

泄痢口渴烏梅煎湯日飲代茶渴利不止羊肺一具入少肉和鹽鼓作羹食不過三具愈

下痢轉白

訶子三個二炮一生為末沸湯調服水痢加甘草末一錢

老小白痢

艾薑丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸梧子大每服七十九空心

米飲下甚有奇效久下白痢虛寒者秋月小

久痢成疳

葛勒蔓末以管吹入肛門中不過數次如神胡粉和水及雞子白服以糞黑為度

為其殺蟲而止痢也

三十年痢

赤松上蒼皮一斗為末麩粥和服一升日三不過一斗救人

濕驢下痢

不止乾嘔羸瘦多睡面赤以猪胆汁和薑汁醞醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃

止當下五色惡物及蟲而愈也

洞注下痢

羊骨灰水服方寸匕炒陳倉米研末飲服

熱痢吐食

因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨晒乾為末每服一錢米飲下

臟毒下痢赤白

用香椿洗刮取皮日乾為末飲下一錢立效

酒痢

木饅頭燒存性襍欄皮燒存性烏梅去核粉草
炙等分爲末每服二錢水一盞煎服烏梅三

兩燒存性爲末醋煮米糊和丸梧子大每空心米
飲服二十九日三下血者百藥煎五倍子陳槐

花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十九米飲
送便血腹痛或如魚腦五色者乾絲瓜一枚連

皮燒研空心酒服二錢一方煨食之俗名魚鱔是
也酒積下痢石灰五兩水和作團黃泥包煨一

日夜去泥爲末醋糊丸梧子
大每服三十丸薑湯空心下

順氣止痢

枳壳炒二兩四錢甘草六
錢爲末每沸湯服二錢

白頭翁湯

治熱痢下重用白頭翁二兩黃連黃蘗秦
皮各三兩水七升煮二升每服一升不愈

更服婦人產後痢虛極
者加甘草阿膠各二兩

黑牛散

治赤白痢禁口痢及泄瀉用黑牛兒卽蜚蜋
一名鐵甲將軍燒研每服半錢或一錢燒酒

調服小兒以
黃酒服立效

胡洽九蓋湯

治下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半

龍骨如棊子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水五合着銅器中去火三寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可得一升頓服即止

治痢香連丸

治赤白諸痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服

二三十九丸空腹飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰孺皆效治小兒冷熱

痢加煨熟訶子肉治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖治久痢加龍骨

治禁口痢加石連肉治痢渴加烏梅肉以阿膠化和丸易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麩煨一

兩粟米飯丸

調氣飲

治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同鎔化入黃

連末五錢攪勻分
三次熱服神妙

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢用蠟二棊子
大阿膠一錢當歸二錢半黃連三錢黃

藥一錢陳廩米半升水三鍾煮米至
一升去米入藥煎至一鍾溫服神效

紫參湯

治痢下紫參半斤水五升煎二升
入甘草二兩煎取半升分三服

猪脰酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌
上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時

時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦
人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫疰瘕兩肋

虛脹變為水氣服之皆效此法出于傳尸方取猪
脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微

火溫之藥熟納脰中使消盡又取桂心末一小兩
內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌

麩抽膩
等食

白朮膏

止久泄痢
見泄瀉門

泄瀉

水泄

神聖香黃散宣連一兩生薑四兩同以文火炒至薑脆各自揀出為末水泄用薑末脾洩用連

末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾破故紙炒一兩粟殼炙四兩為末煉蜜丸彈

子大每服一丸薑棗同水煎服訶黎勒炮二分肉豆蔻一分為末米飲每服二錢水洩不止罌

粟殼一枚去蒂膜烏梅肉大棗肉各十枚水一盞煎七分溫服又殺羊角一枚白礬末填滿燒存性

為末每新汲水服二錢水洩不化日夜不止白聖煨乾薑炮各一兩楮葉生研二兩為末糊丸棗

豆大每米飲下二十丸腹鳴如雷有火者石膏火煨倉米飯和丸梧子大黃丹為衣米飲下二十

丸不二服效

暑月水泄

五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷葉煎水下即時見效白朮車前子等分炒

為末白湯下二三錢並治濕瀉暑月暴瀉飲食所傷宜壯脾溫胃麴朮丸用神麴炒蒼朮米泔浸

一、夜焙等分爲末糊丸。梧子大每服三五十九丸。米飲下。暴瀉引飲。秦芫二兩。甘草炙半兩。每服三

錢水煎服。

伏暑水泄

滑石火煨過一兩。硫黃四錢爲末。麩糊丸。伏暑泄瀉。白礬煨爲末。醋糊爲丸。量大小用木瓜湯下。

伏暑瀉痢及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者不過三服。消石舶上硫黃各一兩。白礬滑石

半兩。飛麩四兩爲末。滴水丸。梧子大每新汲水下

三五十九丸。名甘露丸。

夏月濕瀉

川椒炒取紅肉。豆蔻煨各一兩爲末。粳米飯丸。梧子大每量人米飲服百丸。

夏月冷瀉

及霍亂用胡椒研末飯丸。梧子大每米飲下四十丸。

中寒水瀉

乾薑炮研末。粥飲服二錢。卽效。有人內寒暴洩。如注令食煨栗二三枚頓愈。

老人泄瀉

乾糕一兩。藟勒煨七錢。半爲末。米飲服二

錢取愈 老人常瀉白朮二兩黃土拌蒸焙乾去
土蒼朮五錢泔浸炒茯苓一兩為末米糊丸梧子
大每米湯下
七八十丸

老人虛瀉

肉豆蔻三錢麩裏煨熟去麩研乳香一兩
為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十丸

米飲下 虛洩不禁熟附子一兩赤石脂一兩為
末醋糊丸梧子大每飲下五十丸 又見臍寒脾
條世

老小洩瀉

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二
兩醋二升煮醋盡慢火焙乾碾末蠶器貯

之每服二錢七酒及米飲下 老小滑瀉白朮半
斤黃土炒過山藥四兩炒為末飯丸量人大小
湯服或加
人參三錢

驟然水瀉

日夜不止欲死不拘男婦用五月五日采
麻葉陰乾為末每服二錢冷水調下勿喫

熱物令人悶倒只
喫冷物小兒半錢

水瀉不止

用獐猪肚一枚入蒜煑爛搗膏丸梧子大每米飲服三十丸有次日五更必水瀉一

次百藥不效者用此方入平胃散末三兩丸服遂安木鼈仁五個母丁香五個麝香一分研末米

湯調作膏納臍中貼之外以膏藥護住風化石灰一兩白茯苓三兩為末糊丸梧子大每服二三

十丸空心米飲下日久者青州乾棗十個去核入葦蓉子填滿札定燒存性每粟米飲下一錢

夏月水瀉不止巴豆一粒針頭燒存性化蠟和作一丸倒流水下

久瀉不止

仍用酸石榴一個煨煙盡出火毒一夜研末

焙研細末每服二錢米飲下患二三年或二三月百方不效者服之便止肉豆蔻煨一兩木香二

錢半為末棗肉和丸米飲服四五丸又肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服四五丸

又肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋糊丸米飲服四五十丸久瀉虛痢腹痛食菜莢肉豆蔻各一兩

陳米一兩半以米一分同二味炒黃為末一分生碾為末粟米粥丸梧子大每陳米飲下五十九日

服三

泄瀉不止

白龍骨白石脂等分爲末水丸梧子大紫蘇木瓜湯下量大人小兒用

或瀉或止

久而不愈用黃連黃蘗末各一兩以猪胆煑熟和丸如茶豆大量兒大小每米飲服

之

脾濕水瀉

注下困弱無力水穀不化腹痛甚者蒼朮二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢每

服一兩水一盞半煎一盞溫服脉弦頭微痛去芍藥加防風二兩脾惡濕濕則濡困困則不能治

水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升蕤瓶中慢火燒

爲熟水時呷之便已也

中滿洞瀉

厚朴乾薑等分爲末蜜丸梧子大每服五十九米飲下

脾虛洩瀉

白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨爲末米飯丸梧子大每米飲下五十九日

高方頁養一泄瀉三

元

二服 黃連半斤去毛切裝肥猪大腸內紮定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和丸梧子

大每服百丸米湯下極效并治諸痢及臟毒下血又水泄條下神聖香黃散 脾洩腸滑石蓮肉炒

為末每服二錢陳倉米調下加入香蓮丸尤妙 脾虛漏洩烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果

二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之 多年脾洩老人多此謂之水土同化吳茱萸三錢

炮過入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固他

藥雖熱不能分解清濁也 脾腎虛瀉二神丸用破故紙炒半斤肉豆蔻生用

四兩為末肥棗肉研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十丸一方加

木香二兩名三神丸 臟寒脾泄及老人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩

煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥丸 梧子大每服八十九蓮肉煎湯下 治脾胃虛冷

大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同

大棗二升于石器內以水煮一日常令水過兩指取出每個切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗肉和丸梧子大每空心米飲服三四十九

臟寒泄瀉

倦怠減食吳茱萸湯泡過炒豬臟半條去脂洗淨裝滿紮定文火煮熟擣丸梧子大

每服五十九丸米飲下日二服

極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大每服五丸新汲水

下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下元臟久冷腹

痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細

研以蒸餅丸菜豆大每服五

丸空心熱酒下以食壓之

冷氣洞泄

生川烏頭一個木香半兩為末醋糊丸梧子大每陳皮湯下二十九

冷勞腸泄

不止禹餘糧四兩火煨醋淬烏頭一兩冷水浸一夜去皮臍焙為末醋糊丸梧子大

每食前溫水下五丸

風寒泄瀉

治風氣行於腸胃泄瀉火欬草為末醋糊丸梧子大每服三十九白湯下即豨薟也

高方頁裏一泄瀉四

飲以藁本湯而止蓋藁本能去風濕故耳

寒濕泄瀉

小便清者以頭燒酒飲之即止

濕熱虛泄

山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜

脾積食泄

川黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子大每服五十九丸白湯下

大腸冷滑

不止鍾乳粉一兩肉豆蔻煨半兩為末棗肉丸梧子大每服七十九丸空心米飲下

寒滑小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩為末醋和丸梧子大每空心米飲下五七十九丸

人病此熱藥服至一斗二升不效或教服此終四劑而愈

暴泄不止

陳艾一把生薑一塊水煎熱服神麴炒二兩茱萸湯泡炒半兩為末醋糊丸梧子

大每服五十九丸米飲下身冷自汗甚則欲嘔小便清脉微弱宜已寒丸治之葶芩肉桂各二錢半

高良薑乾薑各三錢半為末糊丸梧子大每服三十九丸薑湯下有人內寒暴洩如注令食煨栗二

三十枚頓愈腎主大便栗能通腎于此可驗氣
虛暴泄日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急
最妙用硫黃二兩枯礬半兩研細水浸蒸餅丸梧
子大硃砂為衣每服十五丸至二十九丸溫水下或
鹽湯任下

久瀉滑腸

白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩為末棗肉拌食或丸服之

久泄久痢

白石脂乾薑等分研百沸湯和麩為稀糊搜之併手丸梧子大每米飲下三十丸

久泄不止

猪腎一個批開摻骨碎補末煨熟食之神效

泄瀉無度

諸藥不效針砂醋煮炒乾猪苓生地龍各三錢為末葱涎研和傅臍中約一寸厚縛

之待小便多為度日二易之

五更腎洩

凡人每至五更即溏泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡

而困困則不能治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自

止矣五味去梗二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末每旦陳米飲服二錢

久泄胃弱

黃米炒為粉每用數匙砂糖拌食

久洩食減

懷慶山藥一兩每日清晨用半盞入糯米一升水浸一宿瀝乾慢炒熟磨篩入

二匙胡椒末少許以極滾湯調食其味極佳大有滋補久服令人精暖有子秘方也

腹脹忽瀉

日夜不止諸藥不效此氣脫也

餐瀉不化

及久痢川椒一兩炒蒼朮二兩土炒碾末醋糊丸梧子大每米飲服五十丸

肚痛作瀉

肚腹微微作痛出即瀉瀉亦不多日夜數行用消食化氣藥俱不効用蕎麥麩作飯

連食三四次即愈

久病滑瀉

一婦滑瀉數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時以棘針刺取數十萼勿犯

人手下如傾六七日行至數百行昏困惟飲凉水而瀉

平

喫飯直出

厄子二十個微炒去皮水煎服

白朮膏

服食滋補止久泄痢上好白朮十斤切片入瓦鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁

入器內以渣再煎如此三次乃取前後汁同熬成膏入器中一夜傾去上面清永收之每服二三匙

蜜湯

調下

海

運

海運
海運者一也
海運者二也
海運者三也
海運者四也
海運者五也
海運者六也
海運者七也
海運者八也
海運者九也
海運者十也

白

白...
白...
白...
白...
白...
白...
白...
白...
白...
白...

海

海...
海...
海...
海...
海...
海...
海...
海...
海...
海...

霍亂

此病勿食熱物

霍亂吐瀉

勿食熱物飲冷水一盃仍以水一盆浸兩
足立止飲地漿一升妙酸漿水煎乾

薑屑呷之釜底墨煤半錢竈額上墨半錢百滾

湯一盞急攪數千下以盥覆之通口服一二口即

止屋上倒掛塵滾湯泡澄清服即止硫黃一

兩胡椒五錢為末黃蠟一兩化丸皂子大每涼水

下一丸枯白礬末一錢百沸湯調下火炙高

良薑令焦香每用五兩以酒一升煮三四沸頓服

亦治腹痛中惡東壁土新汲水攪化澄清服之

即止此治脾胃濕多吐瀉霍亂者肉豆蔻為末

薑湯服一錢扁竹入豉汁中下五味煮羹食

山豆根末橘皮湯下三錢防己白芷等分為末

新汲水服二錢菜豆粉白糖各二兩新汲水調

服即愈豌豆三合香薷三兩為末水三盞煎一

盞分二服扁豆香薷各一升水六升煮二升分

服鹽醋煎服甚良芥子擣細水和傅臍上

鹽梅煎湯細細飲之梨枝煮汁飲胡椒三十九

粒以飲吞之胡椒四十九粒菜豆一百四十九

萬方真纂一霍亂一

粒共研勻木瓜湯服一錢生藕搗汁服偷本

人頭縉以百沸湯泡汁服一呷勿令知之

旁破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盃滾服之

即愈蠟一彈丸熱酒一升化服即止尿管舊

板煎水服山村宜之不止者以艾一把水三升

煮一升頓服又附子重七錢者炮去皮臍為末每

服四錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立止又用鳥

牛齡草一團人參生薑各三錢甜漿水一升半煮

汁五合服又四肢逆冷用黃牛屎半升水二升煮

二沸服半升止又烏牛糞絞汁一合以百日兒乳

汁一合和溫服煩躁不止人參二兩橘皮三兩

生薑一兩水六升煮三升分三服煩渴欲絕用

粳米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓

服垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水

二盞煎一盞溫服不拘男女但有一點胃氣存

者服之再生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二

盞煎一盞時時溫服又陳橘皮末二錢湯點服不

省者權之仍燒磚沃醋布裏磚安心下熨之便活

霍亂煩悶 槐葉桑葉各一錢炙甘草二分水煎服之

安 蘆根三錢 麥門冬一錢 水煎服 人參五錢 桂心半錢 水二盞 煎服 向陽壁土煮汁服

霍亂煩滿 氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石燉阿 魏半兩 巴豆去心杏仁去皮各二十五個

為末栗飯丸櫻桃大穿一孔每服一丸 燈上燒烟盡研末薑湯下以利為度

霍亂煩躁 氣急嚼木瓜核七粒溫水嚥之 坐臥不 安 葱白二十莖 大棗二十枚 水三升 煎二

升分服 黃梁米粉半升 水升半和絞如白粉頓服

霍亂煩渴 生藕汁一盞 薑汁半盞 和勻飲 藜子一 兩 香薷二兩 每服一錢 水煎服 草豆蔻

黃連各一錢 半烏豆五十粒 生薑三片 水煎服之 不止者糯米三合 水五升 蜜一合 研汁分服 或

煮汁服 腹脹蘆葉一握 水煎服 又蘆葉五錢 糯米二錢 半竹茹一錢 水煎入薑汁 蜜各半合 煎兩

沸時時 呷之

霍亂心煩 蘆根炙一兩 半水萍焙人參 枳葉炙各 一兩 每服五錢 入薤白四寸 水煎溫服

高方頁纂一霍亂二

言

霍亂不止 一白梁米五合水

霍亂脹痛 大豆生研水服方寸匕 生菖蒲剉四兩

升橘皮五兩水入升煎三分 蘆根一升生薑一

乾霍亂病 心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末

一枚去皮心熱水研服得吐利即定也又地漿三

五盞服即愈大忌米湯 脹滿煩躁亂髮一團燒灰

水煎濃汁頓服二升 末以沸湯一升和之頓服不瘥更作又用生蘇擣

汁飲之佳乾蘇煮汁亦可又小蒜一升水三升煮

千年石灰沙糖水調服二錢或淡醋湯亦可名落

蓋湯用蜘蛛生斷脚吞之愈 用鹽一大匙熬

好苦酒三升飲之吐之甚良 煩脹未得吐下以

入腹取屠兒几垢一雞子
大温酒調服得吐即愈

霍亂乾嘔不止

吳茱萸泡炒乾薑炮等分水煎服之
取薤一虎口以水三升煮取一半

頓服不過
三作即已

霍亂腹痛

厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五
枚生薑二兩六升煎取二升分三服此

方不惟治霍亂凡諸病皆治
厚朴薑汁炙研末
新汲水服二錢如神
木瓜五錢桑葉三片棗肉

一枚水煎服
桃葉三升切水五升煮一升分二
服高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半去滓

入粳米一合煮粥食之便止
炒鹽一
包熨其心腹令氣透又以一包熨其背

霍亂轉筋

以器盛湯熨之仍令蹋器使足底熱徹冷
則易
青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅

炒五枚水二盞煎分温服
蓼葉一升水三升煮
取汁二升入香豉一升更煮一升半分三服
白

扁豆為末醋和服
木瓜一兩酒一升煎服不飲
酒者煎湯服仍煎湯浸青布裹其足
栝葉搗爛

裹脚上及煎汁淋之 以煖物裹脚後以栢木片

煮湯淋之 皂角末吹豆許入鼻取嚏即安 改

麻鞋底燒赤投酒中煮取汁服 腹痛者木香末

一錢木瓜汁一盞入熱酒調服 又以苦酒煮絮裹

之 心腹脹滿未得吐下 卮子二七枚燒研熱酒

服之立愈 垂死者敗蒲席一握切漿水一盞煮

汁温服 欲死氣絕腹有煖氣者以鹽填臍中灸

鹽上七壯即甦 身冷心下微温者珠砂研二兩

蠟三兩和丸着火籠中熏之 周圍厚覆勿令烟洩

兼牀下著火令腹微煖良久當汗出而甦 令烟洩

霍亂轉筋用大蒜 乾濕

搗塗足心立愈

入腹煩悶桑葉一握

煎飲一二服立定

入腹無可奈何者以酢

煮青布搽之冷則易

入腹痛用敗木梳一枚燒灰酒

服永瘥 車轂中脂塗足心

入腹殺人以小蒜鹽各一

兩擣傳臍中灸七壯立止

入腹欲死生薑三兩搗酒一升
煮三兩沸服仍以薑搗貼痛處

轉筋入腹

即安 茱萸炒二兩酒二盞煎一錢
分二服得下 其人臂脚

直其脉上下微弦用雞矢為末水六合方寸匕
温服愈 後有肝虛轉筋條 編薦索燒研酒服

二指撮

霍亂欲死

生薑五兩牛兒屎一升水
四升煎二升分再服即止

伏暑霍亂

傷冷吐利煩濕水浸丹用巴豆二十五個
去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃

蠟和丸棗豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲
水吞下 胃暑霍亂小便不利頭暈引飲三白散

用澤瀉白朮白茯苓各三錢水一
盞薑五片燈心十莖煎八分温服

暑月吐瀉

滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末
每服一二錢浙米泔調服 陳倉米二升

麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙研為末水丸梧
子大每服百丸白湯送下 伏暑或吐或泄或瘧

小便赤煩渴玉液散用桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢為末米湯服二錢伏熱吐瀉用硫黃半兩水銀一錢研墨薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四十九丸名陰陽丸傷暑吐瀉硫黃滑石等分為末每服一錢米飲下即止

霍亂嘔惡

人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白一枚再煎溫服一加丁香嘔甚不止用高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定

霍亂厥逆

服烏牛尿一升

霍亂困薦

童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕百方不瘥者用之雞蘇三兩水二升煎一升

分三服

霍亂吐逆

不問虛實冷熱一氣散一名青金丹用水銀硫黃等分研不見星每服一字至半錢

生薑湯調下

霍亂成痢

劉寄奴草煎汁飲

霍亂及瘧

用滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢為末米湯服二錢

吐利卒死

及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘息急用女青末納口中酒送下

吐泄不止

四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回名回陽散天南星為末每服三錢京棗三枚

水二鍾

煎八分溫服未省再服

又方醋調南星末貼足心

霍亂大渴

不止多飲則殺人黃梁米五升水一斗煮清三升稍稍飲之或用黃倉米三升煮汁

澄清飲

亦可

霍亂不通

脹悶欲死因傷飽取涼者用雄雀蜚二十一粒研末溫酒服未效再服

中惡霍亂

海桐皮煮汁服之麝香一錢醋半盞調服

風痰霍亂

食不消大便瀉訶黎三枚取皮為末和酒頓服三五次妙

萬方頂纂一霍亂五

冷熱霍亂

分利陰陽玄精石半夏各一兩硫黃三錢為末麪糊丸梧子大每飲服三十九

霍亂不能納食及藥

危甚者飲生熟湯數口即定

肝虛轉筋

肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之吐

瀉者赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合分二服

烏沉湯

治吐瀉轉筋見諸氣門

瘟疫

辟禳瘟疫

冬至日取赤雄雞作腊至立春日煮食至盡勿分他人以絳囊盛馬蹄屑佩之男

左女右馬骨亦可每臘月二十四日五更取第

一汲井水浸乳香至元旦五更溫熱從小至大每

人以乳一塊飲水三呷則一年無時災此乃宣聖

之方孔氏七十餘代用之也立春後遇庚子日

溫蔓菁汁合家大小並服之不限多少一年可免

時疾麻子仁赤小豆各二七枚除夜着井中飲

水良一云正月朔旦及十五日以赤小豆二七枚

麻子七枚投井中辟瘟疫甚效正月七日新布

囊盛赤小豆置井中三日取出男吞七枚女吞三

七枚竟年無病也豉和白朮浸酒常服之正

月上寅日搗女青末三角絳囊盛繫帳中大吉

上品硃砂一兩細研蜜和丸麻子大常以太歲日

平旦一家大小勿食諸物向東各吞三七丸勿令

近齒永無瘟疫臘旦除夕以小豆川椒各七七

粒投井中勿令人知能却瘟疫元旦以大麻子

三七粒投井中六月六日采馬齒莧晒乾元旦

煮熟同鹽醋食之可解疫癘氣 辟禳時氣以新
布盛大豆一斗納井中一宿取出每服七粒佳
半天河水飲之 正旦朝所居處理鼠辟瘟疫
五月一日取塚上土或磚石入瓦器中埋著門外
階下合家不患時氣又正旦取古
塚磚塊懸大門上一年無疫疾

斷瘟不染

以繩度所住戶中壁屈繩結之即不染也
鮑魚頭燒灰方寸匕合小豆末七枚米

飲服之令瘟疫氣不相染也 五月五日午時多
采蒼耳嫩葉陰乾收之臨時為末冷水服二錢或
水煎舉家皆服能辟邪惡 以糶米為末頓服之
取初病人衣服于甌上蒸過則一家不染 桃
蠹蟲糞為末
水服方寸匕

辟厭疾病

正月元旦面東以蠶水吞赤小豆三七枚
一年无諸疾 七月立秋日面西以井華

水吞赤小豆七枚一秋不犯痢疾 立秋日

五更井華水長幼各飲一盃能却瘧痢百病

天行時疾

生牛蒡根搗汁五合空腹分為二服服訖
取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓

服取汗無葉用枝
菖蒲以酒服之

天行疫癘

常以東行桃枝煎熬湯浴之佳
細切酒服方寸七日三服能辟五年瘟
松葉

天行熱病

見發熱門

時行熱毒

心神煩躁用藍澱一匙新汲水一盞服
凝雪湯治天行毒病七八日熱積胞中煩

亂欲死用芫花一斤水三升煮取一升半漬故布
薄胃上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也

時氣溫病

頭痛壯熱脈大初得即以小蒜一升杵汁
三合頓服不過再作便愈初得一日用

生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合
煎汁每服八合取瘥始得一日者比輪錢一百

五十七文水一斗煮取七升服汁須臾復以水五
升更煮一升以水二升投中合得三升出錢飲汁

當吐毒
出也

天行嘔逆

食入即吐雞子一枚水煮三五沸冷水浸
少頃吞之天行病後嘔逆食即反出用

青羊肝作生淡食不
過三度食不出矣

瘟病發噦

見嘔吐門

時氣欲死

大錢百文水一斗煮入升入麝香
末三分稍飲至盡或吐或下愈

天行熱毒

攻手足腫痛欲斷用母猪蹄一具去毛以
水一斗葱白一握煮汁入少鹽漬之又

手
臂
門

天行發斑

赤黑色青木香一兩
水二升煮一升服

天行斑瘡

須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣也高宗永
徽四年此瘡自西域東流于海內但煮葵

菜葉以蒜齏啖之則止 又名豌豆斑瘡頭面及
身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不

治數日必死瘥後癩點彌歲方減此惡毒之氣所

為云昔元帝時此病自西北流起名邊瘡以蜜煎

升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗

之 屋上敗茅和醬十展博又見諸書門

溫毒發斑 嘔逆生地黃二兩六錢二字半好豆豉一

煎三分之一絞去滓入雄黃麝香如豆大攪勻分

作三服毒從皮中出則愈忌蕪荑 溫病發斑困

篤者蟾蜍去腸生搗食一二枚無不

瘥者一云搗爛絞汁飲或燒末服

時疾發黃 見黃疸門

時氣頭痛 發熱者以連根葱白二十根和米煮粥入

燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和服之

先以暖水淋浴後服藥取汗即愈 壯熱者生葛

根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去滓分服汗

出即瘥未汗再服若心熱加梔子仁十枚 朴消

末二兩生油 調塗頂上

時氣煩渴 生藕汁一盞生蜜 一合和勻細服

時氣煩躁 五六日不解青竹瀝半盞 煎熱數數飲之厚覆取汗

萬方頁纂一瘟疫三

巨

時疾陰腫

囊及莖皆熱腫以羊尿黃蘗煮汁洗之

疫癘發腫

大黑豆二合炒熟炙甘草一錢水一盞煎汁時時飲之靖康時京師大疫有異人書

此方于壁間用之立驗也

陽毒溫毒

熱極發狂發斑大渴倍常者用黑奴丸水化服一丸汗出或微利即愈其方用小麥

奴梁上塵釜底煤竈突墨同黃芩麻黃硝磺等分為末蜜丸彈子大蓋取火化者從治之義也麥乃心之穀屬火而奴則麥實將成為濕熱所蒸上黑黴者與釜煤竈墨同一理也一名麥奴丸又名高堂丸水解丸誠救急良方也

卒暴諸病

凡中風中暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童尿服亦可解散蓋

薑能開痰下氣童便降火也

天行不解

已汗者用新生雞子五枚傾盞中入水一升攪渾以水一升煮沸投入納少醬炙

之令汗
出愈

天行病後脹滿

兩脇刺脹臍之下如水腫以構
樹枝汁隨意服之小便利即消

天行勞復

含頭垢棗核大一枚良
食勞復以飯籬燒取方寸匕水服
時行病後

時氣瘴疫

社中西南栢樹東南枝取暴乾碾
末每服一錢新水調下日三四服

熱瘴昏迷

煩悶飲水不止至危者一服見效
根生薄荷葉等分搗爛取自然汁入麝香

少許井華水調下覺
心下頓涼勿再服

朴蛇瘴

嶺南朴蛇瘴一名瑣喉瘴項大腫痛連
喉用赤足蜈蚣一二節碾細水下即愈

瘴氣成塊

在腹不散用華芩一兩大黃一兩並生為
末入麝香少許煉蜜丸梧子大每冷酒服

三十
丸

山嵐瘴氣

犀角磨水服之良
羚羊角末水服一錢
水服麝香三分解之
生熟大蒜各七

萬方頁纂一瘟疫四

片共食之少頃腹鳴或
吐血或大便泄即愈

霧露瘴毒

頭痛心煩項強顫掉欲吐用新猪
屎二升酒一升絞汁暖服取汗瘥

辟瘴不染

生葛搗汁一小盞服去熱毒氣也
升麻丸升麻犀角黃芩朴消厄子大黃各
七物

二兩豉二升微熬同搗末蜜丸梧子大覺四肢大
熱大便難即服三十九丸取微利為度若四肢小熱
只食後服二十九非

但辟瘴甚能明目

辟瘴正陽

丹砂三兩水飛每
服半錢温蜜湯下

預辟瘴癘

桃仁一斤吳茱萸青鹽各四兩同炒熟以
新瓶密封一七取出揀去茱鹽將桃仁去

皮尖每嚼一二十
枚山居尤宜之

蝦蟇瘟

時行面赤項腫名蝦蟇瘟以金線鼃
搗汁水調空腹頓飲極效曾活數人

蘇合香丸

治傳尸骨蒸殭肺痿疰忤鬼氣卒心痛
霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴前

月閉痲癩丁腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐
狸等病用蘇合油一兩安息香末二兩以無灰酒
熬成膏入蘇合油內白朮香附子青木香白檀香
沉香丁香麝香畢撥訶黎勒煨去核硃砂烏犀角
鎊各二兩龍腦薰陸香各一兩為末以香膏加煉
蜜和成劑蠟紙包收每服旋丸梧子大早朝取井
華水溫冷任意化服
四丸老人小兒一丸

紫雪

療溫瘧瘴疫毒
癘見傷寒門

紅雪

治溫瘧見
傷食門

碧雪

治天行時疾發狂
昏憤見發熱門

烏沉湯

治天行瘴疫
見諸氣門

萬
力
新
集
卷
之
一

三

傷寒

傷寒初起

取熱湯飲之候吐則止初起無藥便飲

太和湯盃許或酸薑汁亦可手揉肚覺恍

惚再飲再揉至無所容探吐汗出則已不問陰

陽以皂角一挺肥者燒赤為末以水五合和頓服

傷寒發汗

神白散又名聖僧散治時行一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之用

白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚

豉五十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘

日未得汗者皆可服之此藥可卜人之好惡也如

煎得黑色或誤打翻即難愈如煎得黃色無不愈

者煎時要至誠忌婦人雞犬見傷寒時氣瘟疫

頭痛壯熱脈盛始得一二日者取真丹一兩水一

斗煮一升頓服覆被取汗忌生血物又用真丹末

酒調遍身塗之向火坐得汗愈傷寒有數種庸

人卒不能分別今取一藥兼治天行時氣凡初覺

頭痛身熱脈洪一二日者葛根四兩水二升入豉

一升煮取半升服生薑汁尤佳又葱豉湯用葱白

一虎口豉一升綿裹水三升煮一升頓服取汗更

作加葛根三兩再不汗加麻黃三兩又用葱湯煮
米粥入鹽豉食之取汗又用豉一升小男溺三升
煎一升分服取汗又連根葱白二十根
和米煮粥入醋少許熱食取汗即解

傷寒無汗
代赭石乾薑等分爲末熱醋調塗兩手心
合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈

傷寒頭痛
如破者連鬚葱白半斤生薑二兩水煮熟
服二三日發熱者葛根五兩香豉一升

以童子小便入升煎取二升分三服食葱粥取汗
壯熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四枚鹽五

合水一升煎半升溫
服取吐吐後避風良

傷寒時氣
溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升水一
斗煮一升頓服取汗又用生蘘荷根葉合

搗絞汁服三四升
已發未發用梨木皮大甘草
各一兩黃稊穀一合爲末鍋底煤一錢每服三錢

白湯下日二服取愈
猪膏

如彈丸溫水化服日三次

四時傷寒不正之氣

用水香薰為末熱酒調服一二錢取汗

傷寒不止不解

已三四日胸中悶惡者用豉一升鹽一合水四升煮一升半分服取吐此

秘法也

傷寒譫語

蚯蚓尿涼水調服

傷寒呃逆

聲聞四隣四花青皮全者碾末每服二錢白湯下及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂

焙一兩為末每服一錢煎人參湯下
半兩木香一錢為末每日湯服一錢未知再服

傷寒欬逆

日夜不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打碎麝香半錢酒一鍾煎半鍾熱服及呃噦

日夜不定者用畢澄茄高良薑各等分為末每服二錢水六分煎十沸入酢少許服之服藥無效

雄黃二錢酒一盞煎七分乘熱嗅其氣即止

陰症呃逆

乳香同硫黃燒烟嗅之

急傷寒病

半夏四錢生薑七片酒一盞煎服

傷寒狐惑

蟲飣下部痛痒不止雄黃半兩燒于瓶中熏其下部食肛者蕙草黃連各四兩

咀以白酸漿一斗漬一宿煮取二升分三服

惑病脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初得三四

日目赤如鳩七八日目四眦黃黑若能食者膿已

成也赤豆當歸散主之赤小豆三升水浸令芽出

當歸三兩為末漿水服方寸匕日三服

傷寒陽毒

狂言妄語亂走毒氣在臟也鐵粉二兩龍胆草一兩為末磨刀水調服一錢小兒五

分奔走不定宣黃連寒水石等分為末每服三

錢濃煎甘草湯下狂亂甚者青布一尺浸冷水

貼其

胷前

傷寒發狂

煩躁熱極吞生雞子一枚效六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑劈斷四

寸一束以酒五合水一升煮半升去滓頓服當吐

下青黃汁數升即瘥驚怖光忽用昏工

水一盞浸一夕服之天方國人所傳
草龍胆為末入雞子清白蜜化涼水服二錢
水石二錢黃連一錢為末煎甘草冷服名鵲石散
又發熱
門
玄明粉二錢硃砂一錢末之冷水服

傷寒衄血

滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新
水燕下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗

所致其血紫黑時不以多少不可止之且服溫
和藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也

傷寒咽痛

少陰証甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙
水二升煮一升半服五合日二服

作腫真間茹瓜甲大納口嚼汁嚥之當微覺為佳
咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去

滓每噲棗許取瘥咽
喉門有少陰咽痛二條

傷寒煩渴

心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大盞煎六
分分作二服
栝樓根三兩水五升煮一

升分二服先以淡竹瀝一斗水二升煮好銀二兩
半冷飲汁然後服此傷寒口乾生藕汁生地黃

寫方頁裏一傷寒三

汁童子小便各半盞煎溫服之
口渴邪在臟也
猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以

水四升煮取二升每服七合
日三服嘔而思水者亦主之

傷寒心悸
脉結代者甘草二兩水三升煮一半服七合日一服

傷寒腹脹
陰陽不和也桔梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

傷寒目翳
燒鼓三七枚碾末吹之

傷寒肢痛
手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之
瘥乃止或和猪膏塗之亦佳

乾嘔脇痛
傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔
短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗

湯主之芫花熬甘遂大戟各等分為散以大棗十
枚水一升半煮取八合去滓納藥強人服一錢羸

人半錢平旦服之當下利
病除如不除明旦更服

傷寒舌出
巴豆一粒去油取霜以紙撚卷納入鼻中
舌即收上過寸者每粒半

摻之隨
手即愈

傷寒熱結 六七日狂亂見鬼欲走以大蚘半斤
去泥用人溺煮汁飲或生絞汁亦可

傷寒血結 胸脹痛不可近仲景無方宜海蛤散主之
并刺期門穴用海蛤滑石甘草各一兩芒

消半兩為末每服二錢雞子清調服更服桂枝紅

花湯發其汗則愈蓋臈中血聚則小腸壅小腸壅

則血不行服此則小腸通血流行而胃膈利矣

傷寒後卒胸膈閉痛枳實麩炒為末米飲服二錢

日二服

傷寒結胸 心腹硬痛用牽牛頭末一錢白糖化湯調
下天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參

一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐即愈天

行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗良已經

汗下後者檳榔二兩酒二盞煎一盞分二服小

結胃痛正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯

主之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一個水六

升先煮栝樓至三升去滓內二味煮取二升分三

服陽毒結胸按之極痛或通而復結喘促大躁
狂亂取生地龍四條洗淨碾如泥入生薑汁少許
蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服若熱熾者加片
腦少許即與揉心下片時自然汗出而解不應再
服一次
神效

夾驚傷寒

紫背浮萍一錢犀角屑半錢釣藤鈎三七
個為末每服半錢蜜水調下連進三服出

汗為度

傷寒喘急

防己人參等分為末桑白湯服二錢不拘
老小氣喘不止用赤蘇一把水三升煮

一升稍
稍飲之

傷寒乾嘔

半夏熟洗碾末生薑湯服一錢匕

傷寒厥逆

身有微熱煩躁六脉沉細微弱此陰極發
躁也無憂散用人參半兩水一鍾煎七分

調牛膽南星末
二錢熱服立甦

傷寒壞證

凡傷寒時疫不問陰陽老幼妊婦誤服藥餌困重垂死脉沉伏不省人事七日以後

皆可服之百不失一此名奪命散又名復脉湯人參一兩水二鍾紫火煎一鍾以井水浸冷服之少

頃鼻梁有汗出脉復立瘥此方已救數十人

傷寒搐搦

傷寒出汗不徹手脚搐搦者用海蛤川烏頭各一兩穿山甲二兩為末酒丸如彈子大

捏扁置所患足心下別擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中熱水浸脚至膝上水冷又添候遍身汗出

為度凡三日一作以知為度汗後覆蓋不密致

腰背手足搐搦者牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢剉于盆內碾細好酒一升

同碾以新布絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一錢温酒下日三服

傷寒懊憹

吐下後心中懊憹大下後身熱不去心中痛者並用卮子豉湯吐之肥卮子十四枚

水二盞煮一盞入豉半兩同煮至七分去滓服得吐止后服

傷寒尿瀝

小腹脹滿石燕為末葱白湯調半錢脹通為度

傷寒癍出

用猪胆汁苦酒各三沸分服汗出即愈

赤斑青黛二錢水碾

服

傷寒熱病後口乾咽痛

喜唾大棗二十枚烏梅十枚搗入蜜丸含一杏仁嚥汁甚

效

傷寒餘熱

傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱宜推陳致新解利之時氣伏暑倉卒並治不論長幼

柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎服

傷寒下痢

用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三服不能食者黃連一斤烏

梅二十枚去核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧子大一服二十九日三服又黃連二兩

熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓服立止不止心下痞鞭利在下焦者赤石脂禹餘糧各

一斤並碎之水六升煮取一升去滓分再服便
膿血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一
半末用乾薑一兩粳米半升水七升煮米熟去滓
每服七合納末方寸匕日三服愈乃止暴痢以
豉一升薤白一握水三升煮薤熟納豉更煮色黑
去豉分爲二服傷寒八九日至十餘日大煩渴
作熱三焦有瘡蠶下痢或張口吐舌目爛口舌生
瘡不識人用此除熱毒止痢龍骨半斤水一斗煮
四升沉之井底冷服五合漸漸進之

傷寒下蠶生瘡

以蛇莓汁服二合日三服仍水漬烏梅令濃入崖蜜飲之生下部者烏

梅肉三兩炒爲末煉蜜丸梧子大以石榴根皮煎湯食前下三十九傷寒變蠶四肢煩疼不食多

睡羊桃十斤擣熟浸熱湯三斗日正午時入坐一炊久不過三次愈

傷寒毒攻手足腫痛

見手臂門

傷寒動氣

傷寒汗下後臍左有動氣用防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半

煎八分
温服

傷寒脫陽

小便不通用茴香末以生薑自然汁調
傳腹上用茴香末入益元散服之

傷寒痞滿

病發于陰而反下之心下滿而不痛按之
濡此為痞也大黃黃連瀉心湯主之

二兩黃連一兩以麻沸湯一升漬之須臾絞汁分
作二次温服陰病下早成痞按之虛軟而不痛

檳榔枳實等分為末每服二錢黃連煎湯下一方
用枳殼每服三錢傷寒汗吐下後心下痞鞭噫

氣不除者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭
石一兩人參二兩生薑五兩甘草三兩半夏半斤

大棗十二枚水一斗煮六升去
滓再煎三升温服一升日三服

傷寒發躁

傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜
而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大

熱者乾薑附子湯温之乾薑一兩生附子一
枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服

陰症傷寒

腹痛厥逆煩躁腹無脉危甚者
冷厥逆煩躁腹無脉危甚者
上疏黃極

爲末艾湯服三錢
就得睡汗出而愈

陰毒傷寒

藥子一合煮濃汁服一升良
腹中煎三五沸服

一大盞汗出陽回即瘥
心結按之極痛大小便

閉但出氣稍緩者急取巴豆十粒研入麩一錢捻

作餅安臍內以小艾炷灸五壯氣達即通此太師

陳北山方也房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手

足厥逆脉息沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏

頭乾薑等分切炒放冷爲散每服一錢水一盞鹽

一撮煎取半盞溫服得汗解玉女散治陰毒心

腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切晒

紙裹收之遇有患者取爲末一錢入鹽八分水一

盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似再進一服

回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一

切冷氣大附子二枚炮裂去皮臍爲末每服三錢

薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如火暖爲度

煩躁迷悶急者用半兩重附子一個生破作四

片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六

合溫服暖臥或汗出或不出候心定則以水解散

萬方頂纂一傷寒七

之類解之不得與冷水如渴更煎滓服屢用多效

散 生草烏頭為末以葱頭蘸藥納穀道中名提盆

蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累有效

危薦者用黑豆炒乾投酒熱飲

或灌之吐則復飲汗出為度

夾陰傷寒 先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脉沉伏

無以回陽人參乾薑炮各一兩生附子一枚破

作八片水四升半煎一升頓服脉出身温即愈

陰盛格陽 傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脉

沉手足厥逆者此證也霹靂散用大附

子一枚燒存性為末蜜水調服逼散

寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

少陰傷寒 初得二三日脉微細但欲寐小便色白者

兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻

黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗少

陰病始得反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯發其

汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻

黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗少

汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻

一斗先煮麻黃去沫乃納
二味同煮三升分三服

少陰下利

不止厥逆無脉乾嘔欲飲水者以白通湯
加猪膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生附

子一枚水三升煮一升入人尿五合猪胆汁一合

分服 咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之用猪膚一

斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬

香分六服猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加

白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也 下利清

穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其

人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出

者通脉四逆湯用大附子一個去皮生破八片甘

草炙二兩乾薑三兩水三升煮一升分温再服其

脉即出者愈面赤加葱九莖腹痛加芍藥二兩嘔

加生薑二兩咽痛加桔梗一

兩利止脉不出加人參二兩

陰病惡寒

傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘
草附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附

子炮去皮一枚水五升

煮取一升五合分服

傷寒勞復

用雄鼠屎二十枚豉五合水二升煮一升頓服 葵子二升梁米一升煮粥食取汗

立安

馬屎燒灰冷酒服方寸匕便驗 雞子殼

抱出者

熬令黃黑為末熱湯和一合服取汗出即愈

愈

勞復發熱用雄鼠屎二七枚卮子十四枚枳

壳三枚為粗末水一盞葱白二寸鼓三十粒煎一

盞分三服

身熱大小便赤如血色用胡黃連一

兩山卮子二兩去殼入蜜半兩拌和炒令微焦為

末用猪胆汁和丸梧子大每服十九丸用生薑二片

烏梅一個童子小便三合浸半日去滓食後暖小

便令溫吞之臥時再服甚效

因交接者腹痛卵

腫用葱白搗爛苦酒一盞和服之

猴鼠屎十四

枚韭根一大把水二盞煮七分去滓再煎二沸溫

服得汗愈未汗再服 傷寒後交接勞復卵腫股

痛竹皮一升水三升煮五沸服汁又或縮入

腹痛蓼子一把水按汁飲一升又男陰門

傷寒食復

柑皮濃煎汁服 麴餅煮汁飲之良

勞復食復

人屎燒灰酒服方寸匕 篤病初起受勞傷食致復欲死者鼈甲燒研水服方寸匕

又水服胡粉少許又蘇葉煮汁二升飲之亦可入
生薑豆豉同煮飲又以蘆根煮濃汁飲病後勞
復或因梳頭或食物復發
取洗手足水一合飲之效

預防勞復

傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒碾水丸
梧子大飲服一丸取女中下裳帶一尺

燒碾米飲服
即免勞復

傷寒發黃

川大黃五兩剉炒微赤為散用臘雪水五
升煎如膏每服半匙冷水下生烏麻油

一盞水半盞雞子白一枚和攪服盡傷寒熱甚

發黃身面悉黃者用山茵陳山梔子各三分秦艸

升麻各四錢為散每用三錢水四合煎二合去滓

食後溫服以知為度有因傷寒後發汗不徹有留

熱面身皆黃多熱期年不愈與此藥服二十日病

悉去髮髮燒碾水服一寸匕日三傷寒黃疸

表熱者麻黃一把去節綿裹美酒五升

煮取半升頓服取小汗春月用水煎

百合病

治傷寒後百合病行住坐臥不定如有鬼神
狀已發汗者用百合七枚以泉水浸一宿明

萬方頁裏一傷寒九

旦更以泉水煮取一升卻以知母三兩同泉水二升煮一升同百合汁再煮取一升半分服已經吐後者不用知母于百合汁內入雞子黃一個分再服已經下後者以代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一升同百合汁再煮取一升半分再服未經汗吐下者于百合汁內入生地黄汁一升同煎取一升半分再服

百合變渴

病已經月變成消渴者百合一升水一斗漬一宿取汁温浴病人浴畢食白湯餅

傷寒傳成百合病如寒無寒如熱無熱欲臥不臥欲行不行欲食不食口苦小便赤色得藥則吐利變成渴疾久不瘥者用牡蠣熬二兩栝樓根二兩為細末每服方寸匕用米飲調下日三服取效

百合變熱者

用百合一兩滑石三兩為末飲服方寸匕微利乃良

百合腹滿作痛

用百合炒為末每飲服方寸匕日二

橘皮湯

治男女傷寒並一切襍病嘔噦手足逆冷者用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升餘

即止

文蛤散

傷寒病在陽當以汗解反以冷水噴之或灌

兩為末每服方寸匕沸湯下甚效

正陽丹

治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精

石消石硫黃各二兩礞砂一兩細研入甕瓶

固濟以火半斤周一寸煖之約近半日候藥青紫

色住火待冷取出用臘月雪水拌勻入罐于中屋

後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研麪糊

和丸雞頭子大先用熱水浴後以艾湯碾下一丸

以衣蓋汗出為瘥

紫雪

療傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘴疫毒

癘卒死腳氣五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解

諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇

百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤

搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木

香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八

兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊
朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳
木不住攪至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香
一兩二錢半朱砂末三兩攪勻收之每服一二錢
涼水服臨時加
減甚者一兩

紅雪

兼治傷寒狂躁胃
爛發班見傷食門

茵陳羹

除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小
便以茵陳細切煮羹食之生食亦宜

傷寒雪煎

麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一
斤十二兩先以雪水五碩四斗漬麻黃于

東向竈釜中三宿後納大黃攪勻桑薪煮至二碩
去滓納杏仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更

以雪水三斗合煎令得三斗四升藥成丸如彈子
大有病者以沸白湯五合碾一丸服之立汗出不

愈再服一丸封
藥勿令洩氣

傷風

一切風邪

白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗煎服取汗不汗

再服

風寒流涕

香白芷一兩荆芥穗一錢為末蠟茶點服二錢

偶感風寒

脂麻炒焦乘熱搗酒飲之暖臥取微汗出良

感冒風寒初起

即用葱白一握淡豆豉半合泡湯服之取汗

風秘氣秘

蘿蔔子炒一合搗水和皂莢末二錢服立通

初感風寒

頭痛憎寒者用水七盃燒鍋令赤投水于內取起再燒再投如此七次名沸湯乘熱

飲一盃以衣被覆頭取汗神效初起無藥便飲太和湯盃許或酸薑汁亦可以手揉肚覺恍惚再

再飲再揉至無所容探吐汗出則已

風寒無汗

發熱頭痛核桃肉葱白細茶生薑等分
搗爛水一鍾煎七分熱服覆衣取汗

風寒咳嗽

杏仁水煎服

風寒鼻塞

辛夷花水煎服

風寒頭痛

薄荷水煎服

風寒泄瀉

白朮水煎服

再題

一四風浪

此方治風浪... 宜用... 煎服...

國風

中寒

中寒昏困

薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩

去皮臍乾薑炮一兩每服三錢水二鍾煎一鍾溫服

感寒上氣

蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服

感寒無汗

水調芥子末填臍內以熱物隔衣熨之取汗出妙

發散寒邪

胡椒丁香各七粒碾碎以葱白搗膏和塗兩手心合掌握定夾于大腿內側溫覆取

汗則愈

冬月感寒

吳茱萸五錢煎湯服之取汗

虛寒積癖

見項背門

寒澀宿食不消

見傷食門

內傷寒中

一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水

兼懷怫鬱因病右腰一點脹痛牽引右腋上至胸

口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登園小便

長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或

得酒少止或得熱稍止但受寒食寒或勞役或入

房或怒或飢即時舉發一止則諸證泯然如無病

人甚則日發數次此乃飢飽勞逸內傷元氣清陽

陷遏不能上升所致也用升麻葛根湯合四君子

湯加柴胡蒼朮黃芪煎服後仍飲酒一二盃助

之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足和煖

頭目精明神采迅發諸證如掃每發一服即止神

驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效便遲大抵

人年五十以後其氣消者多長者少降者多升者

少秋冬之令多而春夏之令少若稟受

弱而有前諸證者並宜此藥活法治之

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑

數小便白渾六脉沉微除固冷扶元氣及傷

寒陰毒用烏頭附子天雄並炮裂去皮臍等分

咬咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分温服

中濕

中濕骨痛

尤一兩酒三盞煎一盞
頓服不飲酒以水煎之

濕氣作痛

白朮切片煎汁熬膏白湯點服
痛蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點

服

濕氣中滿

足脛微腫小便不利氣急欬嗽黑牽牛末
一兩厚朴製半兩為末每服二錢薑湯下

或臨時水丸每
棗湯下三十九

濕熱氣

旱芹菜日乾為末糊丸梧子大每服
四十九空溫酒下大殺百蟲毒

濕熱水病

黃連末蜜丸梧子大每服二
丸至四五丸飲下日三四服

濕熱眩運

不可當者酒炒大黃為末茶
清服二錢急則治其標也

風濕痺痛諸疾

見諸
風門

固真丹

燥濕養脾助胃固真茅山蒼朮刮淨一斤分

一分川棟子一兩炒一分青鹽一兩炒一分小茴香破故紙各一兩
炒並揀朮碾末酒煮麩糊丸梧子大每空心米飲

下五
十九丸

痼冷

一切冷氣

搶心切痛發即欲死久患心腹痛時發者此可絕根蓬莪茂二兩醋煮木香一兩煨

為末每服五分淡醋湯下

積塊作痛硫黃煨消

各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末糊丸梧子大

每空心米飲下三十丸去風痰定遍身疼痛益

元氣強力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五

升大甕鉢子盛以童便浸七日逐日添令溢出揀

去壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次

乃浸之日日換水日足取焙為末酒煮麩糊丸棗

豆大每服十九丸空心鹽湯下少粥飯壓之心腹

脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不消用了香枝杖七斤

肉豆蔻麩煨八斤白麩炒六斤甘草炒十一斤炒

鹽中三斤為末日日點服紫蘇子高良薑

橘皮等分蜜丸梧子大每服十九丸空心酒下

元臟傷冷

用附子炮去皮臍為末以水二盞入藥二錢鹽葱薑棗同煎取一盞空心服去積冷

暖下元肥腸益氣酒食無礙二虎丸補元臟進

飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醃醋浸三宿切

作片子掘一小坑炭火燒赤以醋三升同藥傾入坑內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒赤黃色為末醋打麩糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸婦人亦宜 腹冷及開胃香附子炒為末每用二錢 薑鹽同煎服

冷勞久病

茅香花艾葉四兩燒存性碾粟米飯丸梧子大初以蛇床子湯下二十九至三十九

微吐不妨後用棗湯下立效 冷勞減食漸至黑瘦用桃仁五百顆吳茱萸黃三兩同入鐵鑊中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃色即漸加火待微烟出即乘熱收入新瓶內厚紙封住勿令洩氣每日空心取桃仁二十粒去皮嚼之 以溫酒下至重者服五百粒愈

虛冷短氣

川椒三兩去日并合口者以生絹袋盛浸無灰酒五升中三日隨性飲之

宿冷惡病

苦參二斤童子小便一斗二升煎取六升和糯米及麴如常法作酒服但腹中諸疾

皆治酒放二三年不壞多作救人神效

諸冷極病

醫所不治者馬蘭子九升洗淨空腹服一合酒下日三服

下焦冷氣

乾陳橘皮一斤為末蜜丸梧子大每食前温酒下三十九

腹中虛冷

見腹痛門

腹中冷癖

見癥瘕門

腎臟虛冷

見男陰門

薏苡仁飯

治冷氣用薏苡仁春熟炊為飯食氣味欲如麥飯乃佳或煮粥亦好

快膈湯

治冷膈氣見脹滿門

烏沈湯

治一切冷見諸氣門

三建湯

除痼冷見中寒門

麻木

麻木疼痛

萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯

麻痺疼痛

仙桃丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃肭痛不可忍生川烏不

去皮五靈脂各四兩威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸至十九丸鹽湯下忌茶此藥常

服其效如神

風寒濕痺麻木不仁

見諸風門

年久麻痺

或歷節走氣疼痛不仁不拘男女用草烏頭半斤去皮為末以袋一個盛豆腐半袋

入烏末在內再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出晒乾為末冷風濕氣以生薑

湯下麻木不仁以葱白湯下之每服五分

十指疼痛麻木

見手臂門

寫方類纂

一麻木

一

手足麻木

不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗 風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈脂二兩

沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮為末滴水丸如彈子犬每用一丸生薑溫酒磨服

手足麻痺

時發疼痛或打撲傷損痛不可忍或癱瘓等症威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各

四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶

腹皮麻痺

不仁者多煮葱白食之即自愈

身體麻木

芥菜子末醋調塗之

面上木痺

牛皮膠化和桂末厚塗一二分良

項強身急

取活鼠去五臟乘熱貼之即瘥也

風痰麻木

凡手及十指麻木大風麻木皆是濕痰死血用橘紅一斤逆流水五盞煮爛去渣再

煮至一盞頓服取吐乃吐痰聖藥也不吐加瓜蒂末

風病麻木

麻花四兩草烏一兩炒存性為末
煉蜜調成膏每服三分白湯調下

烏沉湯

治冷風麻痺
見諸氣門

諸火

肝火為痛

黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三
十丸白湯下左金丸用黃連六兩茱萸

一兩同炒為末神麴糊丸梧
子大每服三四十九丸白湯下

肺中有火

清金丸用片苓炒為末水丸梧
子大每服二三十丸白湯下

陰火為病

大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒褐為末水丸
梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下

陰虛火動

有痰不堪用燥劑者天門冬一斤水浸洗
去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸

去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸
梧子大每服二十九丸茶下日三服

三補丸

治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃蘗等分
為末蒸餅丸梧子大每白湯下二三十丸

碧雪

治胃火諸病
見發熱門

中暑

暑月喝死

飲地漿一升妙以熱湯徐徐灌之小舉其頭令湯入腹即甦以土積心口少冷

即易氣通則甦亦可以熱土圍臍旁令人尿臍中

仍用熱土大蒜等分搗水去滓灌之即活取車

輪土五錢水調澄清服一盃即甦屋上兩畔瓦

熱熨心頭冷即易之井水和麩一大抄服之

中喝昏悶

夏月人在途中熱死急移陰處就搗道上熱土擁臍上作窩令人溺滿透臍即甦乃

服地漿蒜水等藥此出自張仲景其意殊絕實救急之大術也蓋臍乃命蒂暑喝傷氣溫臍所以接

其元氣之意地

黃汁一盞服之

太陽中喝

身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中所致瓜蒂二七個水一升煮五合頓

服取吐

中暑

地衣草碾末新汲水服之中暑發昏小青葉井水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌之中暑

不省皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水

調一錢灌之中暑毒人爛嚼大蒜三兩瓣溫水

送之下咽即知一人暑月馳馬忽臥地欲絕用大

蒜及道上熱土各一握碾爛以新汲水一錢和取

汁決齒灌之少頃即甦中暑毒死用新胡麻一

升微炒令黑攤冷為末新汲水調服三錢或丸彈

子大
水下

暑月吐瀉

冒暑霍亂

俱見霍亂門

伏暑發熱

作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤

切以好酒二升半煮乾焙碾糊丸梧子大每服五十丸熟水下日三服

一切傷暑

香薷飲治暑月臥濕當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心

腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並

主之用香薷一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半

斤剉散每服五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉

冷連進二服立效活人書去扁豆入黃連四兩薑

汁同炒
黃色用

伏暑引飲

脾胃不利用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤為末薑汁麩糊丸梧子大每服

五十九

熱湯下

熱渴心悶

溫水一盞調麩一兩飲之

大熱心悶

槐子燒末酒服方寸匕

大熱狂渴

乾陳人尿為末于陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙于坑中以新汲水調

勻良久澄清細細與飲
即解世俗謂之地清

伏暑傷冷

二氣交錯中脘痞結或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分碾末石器炒成

沙再碾糯米糊丸梧子大
每服四十九丸新井水下

暑月解毒

桂苓丸用肉桂去粗皮不見火茯苓去皮等分為細末煉蜜丸龍眼大每新汲水化

服一丸

消暑止渴

百藥煎蠟茶等分爲末烏梅肉搗和丸芡子大每含一丸名水瓢丸

飲水停滯

大熱行極飲水過多停滯在胸見痞積門

桂漿渴水

夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗入新瓷

瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去紙一重七日開之氣香味美

格韻絕高今人多作之

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫瀉飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗

後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癩

瘰煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋瀝瀉痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸癖下痢赤白除煩

熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙齦齒疳此

藥大養脾胃之氣通九竅六腑去留結益精氣壯
筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定
魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙
藥也白滑石水飛過六兩粉甘草一兩爲末每服
三錢蜜少許溫水調下實熱用新汲水下解利用
葱豉湯下通乳用猪肉麩湯調下催生用香油漿
下凡難產或死胎不下皆由風熱燥滯結滯緊歛
不能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而瘥矣

發熱

寒熱注病

有婦人病經年十一月華陀令坐石槽中

欲死灌者懼欲止陀不許灌至八十熱氣乃蒸出

以粉撲之而愈

驚癩發熱

少許服之

熱厥氣痛

元明粉三錢

發熱口乾

小便澇用菱蕤五兩煎汁飲之

火黃身熱

見黃疸門

骨蒸發熱

雄黃末一兩入小便一升碾如粉乃取黃

圍住勿令洩氣三五度瘥芒消末水服方寸匕

萬方類纂一發熱一

音

日二神良 桃仁一百二十枚留尖去皮及雙仁
杵為丸平旦井花水頓服之令盡量飲酒至醉仍

須任意吃水隔日一劑百日不得食肉 多取諸
朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入

棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸
令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心

悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食
豉粥 三歲童便五升煎取一升以蜜三匙和之

每服二碗半日更服此後常取自已小便服之輕
者在身常出十步內聞病人小便臭者瘡也有人

病此自服神驗 時珍曰子年二十時因感冒咳
嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐

痰盈許暑月煩渴寢食既廢六脉浮洪遍服柴胡
麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇先君偶思李東垣治

肺熱如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也宜一
味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片苓一

兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆
愈

愈

積熱

漸漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓空腹分為二服如人行五

再服

骨節積熱漸黃瘦黃連四分切以童

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二

煎煩熱

青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十個去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫

服及

一切虛勞煩熱大病後煩熱並用地仙散

地骨皮二兩防風一兩甘草炙半兩每用五錢生

薑五片

水煎服

骨蒸鬼氣

童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛

火煎取三大斗去滓漑釜令淨再以微火煎可二

大斗入猪胆一枚同煎一大斗半去火待冷以瓷

器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以煎

和搗干杵為丸空腹粥飲下二十九漸增至三十

丸

止

三消骨蒸

黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒乾又浸
如此七次為末以冬瓜汁和丸梧子大每

服三四十九丸大麥湯下
尋常渴只一服見效

虛損骨蒸

見虛損門

骨蒸勞熱

用生地黃一升搗三度絞盡分再服若利
即減之以涼為度久嗽者用石膏紋如

束針者一斤粉甘草一兩細碾如麩日以水調三
四服無毒有大益乃養命上藥不可忽其賤而疑
其寒有女病骨蒸內熱外寒眾醫不瘥用此方而
體遂涼此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也
若衰暮及氣虛血虛
胃弱者恐非所宜

骨蒸熱勞

取人屎乾者燒令外黑納水中澄清每旦
服一小升薄晚服童便一小升以瘥為度

既常服可就作坑燒屎三升夜以水三升漬
之稍稍減服此方神妙非其人莫浪傳之

勞極骨蒸

亦名伏連傳尸此方甚驗用人屎小便各
一升新粟米飯五升六月六日麴半餅以

瓶盛封密室中二七日並消亦無惡氣每旦服一合午再服之神効

骨蒸勞瘦

用鰻鱺魚二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之

骨蒸欬嗽潮熱

用團魚一個柴胡前胡貝母知母杏仁各五錢同煮待熟去骨甲裙再煮

食肉飲汁將藥焙碾為末仍以骨甲裙煮汁和丸梧子大每空心黃芪湯下三十九丸日二服服盡仍

治參芪藥調之

骨蒸肺痿

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微

火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮

生薑各十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汗乃瘥

虛勞發熱

柴胡人參等分每服三錢薑棗同水煎服下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利

大便數少氣吸吸口燥熱淋用大麻仁五合碾水二升煮減半分服四五劑瘥虛勞客熱枸杞根

萬方真寶一發熱三

為末白湯調服有痼疾人勿服又麥門冬煎湯頻飲

骨蒸勞病

外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味

或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩碾如乳粉水和服方寸匕日再以身涼為度

骨蒸勞傷猪脊髓一條猪胆汁一枚童便一蓋柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎

七分温服不過三服其效如神

骨蒸久冷

羊肉一斤山藥一斤各爛煮碾如泥下米煮粥食之

骨蒸傳尸

用羊肉一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鐺內煮三五沸去滓入黑錫一

兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效

卒熱勞疾

皂莢續成一尺以土酥一大兩微塗緩炙酥盡搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十

五丸漸增至二十九重者不過兩劑愈熱勞如燎地骨皮二兩柴胡一兩為末每服二錢麥門冬

湯下

急勞煩熱體瘦

三皂丸皂莢皂莢樹皮皂莢刺各一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此

三五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸

痛用秦芩柴胡一兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下

婦人骨蒸

煩熱寢汗口乾引飲氣喘天門冬十兩麥門冬八兩並去心為末以生地黃三斤取

汁熬膏和丸梧子大每服五十丸以逍遙散去甘草煎湯下

虛熱作渴

桃膠如彈丸大含之佳

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無

力此血虛之候也得于飢困勞役證象白虎但脈不長實為異耳若誤服白虎湯即死宜此主之當

歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服

高方頁纂一發熱四

三

脾勞發熱

有蟲在脾中為病令人好嘔見諸蟲門

上氣發熱

因奔趨走馬後飲冷水所致者竹葉三片橘皮三兩水一斗煎五升細服三日一劑

飲酒發熱

瓜萸仁青黛等分碾末薑汁蜜碾膏日食數匙一男子年二十病此服之而愈

沙證壯熱

江有沙證狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人先用

蠶蛻紙剪碎安于瓮中以碟蓋之滾湯沃之封固良久乘熱服暖臥取汗

心病邪熱

菴珠丸用猪心血一個淀花末一匙硃砂末一兩同碾丸梧子大每酒服二十九丸

身體發熱

不拘大人小兒用雞卵三枚白蜜一合和服立瘥

五心煩熱

胡黃連末米飲服一錢熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為二服

三焦積熱

元參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三四十九白湯下小兒丸粟米大

心經實熱

用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫服小兒減之

心經留熱

小便赤澀用去皮梔子火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢服無不利

虛火背熱

虛火上背內熱如火炙者附子末津調塗涌泉穴

天行熱病

白藥為末漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴疔痛當吐利數行如不止

喫冷粥

一盃止之初起一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓着米一匙及

豉為稀粥

先以湯浴後乃食粥厚覆取汗即愈

天行熱狂

芭蕉根搗汁飲之伏熱頭目不清神

志昏塞

及諸大毒以船底苔五兩和酥餅末一兩

半麩糊丸

梧子大每溫酒下五十九諸汗門浮

萍發汗

一條

治時行熱病

熱病發狂

奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以泥固濟煨半

日去火毒

碾末新汲水服三錢未退再服傷寒

時氣溫病

六七日熱氣發狂見鬼欲走取白狗從

背破取血

乘熱攤膏上冷乃去之此治垂死者亦

活無白犬

但純色者亦可不避水火苦參末蜜

寫方頁集一發熱五

卷

高才類集一
丸梧子大每服十九薄荷湯
下亦可為末二錢水煎服

熱病譫狂
川大黃五兩剉炒微赤為散用臘雪
水五升煎如膏每服半匙冷水下

時氣餘熱不退
煩躁發渴四肢無力不能飲食
用牛蒡根搗汁服一小盞效

熱氣結滯
經年數發者胡荽半斤五月五日采陰乾
水七升煮取一升半去滓分服未瘥再服

春夏用葉秋
冬用根莖

風熱汗出
水和雲母粉服三
錢不過再服立愈

風熱心躁
口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日
淨地坑內盆合四面濕土擁起經宿取出

入甘草末天竺黃各二兩龍腦二
分糯米糕丸彈子大蜜水磨下

體如蟲行
風熱也鹽一斗水一石煎湯
浴之三四次亦療一切風氣

風熱驚狂
治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥
不效粉霜一兩以白麩六錢和作餅子炙

熟同碾輕粉半兩鉛白霜二錢半為末滴水丸梧子大每服十丸至十五丸米飲下

風熱瘰癧

及驚癇瘰癧紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分咬咀

水一升煎去三分食後温呷無不效者

風熱毒氣

煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服

風熱痛

用雄黃乾薑各等分為末啣鼻左痛啣右右痛啣左

風熱上衝

頭目運眩或胸中不利川芎槐子各一兩為末每服三錢用茶清調下胸中不利以

水煎服

風熱衝頂

熱悶訶黎二枚為末芒硝一錢同入醋攪令消磨塗熱處

肺勞風熱

止渴去熱天門冬去皮心煮食或曝乾為末蜜丸服尤佳亦可洗面

胃虛風熱

不能食用薑汁半盃生地黃汁少許蜜一匙水二合和服之

風熱邪病

蠶墓燒灰硃砂等分為末每服一錢酒服日三甚有神驗

老人風熱

內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎

石膏竹葉去滓取二盞煮粥入糖食

熱病生蠱

下部有瘡熬鹽熨之不過三次蝕蠱上下用猪胆一枚醋一合煎沸服蠱立死也

風熱上壅

咽喉不利白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半為末防風末三兩和勻每茶

服一錢

預防熱病

急黃賊風葛粉二升生地黃一升香豉半升為散每食後米飲服方寸匕日三服有

病五服

肺臟壅熱

煩悶欬嗽者新百合四兩蜜和蒸軟時時含一片吞津

熱病發黃

瓜蒂為末以大豆許吹鼻中輕則半日重則一日流取黃水乃愈

熱病吐下

及下利身冷脉微發躁不止者附子炮一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎

半升温服立效

熱病發斑

赤色煩痛大青四物湯用大青一兩阿膠甘草各二錢半豉二分三服每用水一

盞半煎一盞入膠烱化服又犀角大青湯用大

青七錢半犀角二錢半梔子十枚豉二撮分二服

每服水一盞半

煎八分温服

發斑怪證

有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結于下焦也白礬滑石各一

兩為末作一服水三盞

煎減半不住服盡即安

熱病食復

及交接後發動欲死不能語梔子三十枚水三升煎一升服令微汗

熱病勞復

丈夫熱病後交接復發忽卵縮入腸腸痛欲死燒女人月經赤衣為末熟水服方寸

七即定

諸虛寒熱

冷痰虛熱冷香湯用沈香附子炮等分水一盞煎七分露一夜空心温服

消毒解熱

生犀角尖磨濃汁頻飲之

熱氣濕痺

腹內激熱用龜肉同五味煮食之微泄為效

碧雪

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病

朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手

攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每含嚥或吹之或水調服二三錢欲通

利則熱水服一兩

紫雪

治一切積熱煩熱見傷寒門

仙乳丸

治上焦熱晝常好瞑用伏翼五兩重一枚連腸骨炙燥雲實炒五兩威靈仙三兩牽牛炒

莧實各二兩丹砂鉛丹各一兩臍粉半兩為末蜜丸茶豆大每服七丸木通湯下以知為度

三補丸 治上焦積熱 見諸火門

酸漿實丸 治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用酸漿實五兩莧實三兩馬藷子炒大鹽榆白皮

炒二兩柴胡黃芩栝樓根藺茹各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸木香湯下

紅半夏法 消風熱見痰飲門

茵陳羹 除大熱見傷寒門

桑椹酒 四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半入白

蜜二合酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力

愈佳

煩躁

服藥過劑

犀角燒末水服方寸匕 白鴨屎為末水服二錢效 悶亂者水和胡粉服之又豉

汁飲之又粳米瀋飲之又飴餹食之又地漿飲之

卒嘔不已飲新汲水一升 煩悶東流水飲一

二升 苦煩生葛汁飲之乾者煎汁服

煩悶及中毒煩悶欲死搗藍汁服數升

熱渴煩悶

地漿一盞飲之 煩躁熱渴葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜漉出拌勻煮熟以

糜飲和食

膈上煩熱多渴

利九竅滑石二兩搗水三大瓊煎二盞去滓入粳米煮粥食

胸膈煩悶

白朮末水服方寸匕

急勞煩熱

見發熱門

心腹煩悶

用苔脯以冷水碾如泥飲之即止

萬方類纂一煩躁

諸汗

自汗不止

鬱金末臥時調塗于乳上
白朮末飲服
方寸七日二服
防風去蘆為末每服二

錢浮麥煎湯服
防風用麩炒猪皮煎湯下
何

首烏末津調封臍中
糯米小麥麩同炒為末每

服三錢米飲下或煮猪肉點

食粳米粉絹包頻頻撲之

心虛自汗

不睡者用獾猪心一個帶血破開入人參
當歸各二兩煮熟去藥食之不過數服即

愈

諸虛自汗

夜臥即甚久則枯瘦黃芪麻黃根各一兩
牡蠣米泔浸洗煨過為散每服五錢水二

蓋小麥百

粒煎服

虛瘡自汗不止

見瘡疾門

盜汗不止

樹上乾桃子一個霜梅二個葱根七個燈
心二莖陳皮一錢稻根大麥芽各一撮水

二鍾煎服 椒目微炒碾細半錢以生猪上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水

蠱也 經霜桑葉碾末米飲服止盜汗 以鼓一升微炒香清酒三升漬三日取汁冷暖任服不瘥

更作三兩劑即止 麻黃根椒目等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根故蒲扇爲末撲之

熟艾二錢白茯苓三錢烏梅三個水一鍾煎八分臨臥溫服 太平白芷一兩辰砂半兩爲末每服

二錢溫酒下屢驗 婦人小兒一切盜汗又治傷寒後盜汗不止龍膽草碾末每服一錢猪胆汁三

兩點入溫酒少許調服

脾虛盜汗 白朮四兩切片以一兩同牡蠣炒一兩同石斛炒一兩同麥麩炒揀朮爲末每服三

錢食遠粟米湯下日三服 此條原本有遺舛處

夜出盜汗 韭根四十九根水二升煮一升頓服 麥麩作彈丸空心臥時煮食之次早服妙香

散 寐中盜汗五倍子末蕎麥麩等分水作餅 喂熟夜臥待飢時乾喫二三個勿飲茶水甚妙

防風二兩芎藭一兩人參半兩為末每服三錢臨臥飲下

氣虛盜汗 牡蠣粉杜仲等分為末每酒服方寸七

虛勞盜汗 牡蠣粉麻黃根黃芪等分為末每服二錢水二盞煎七分溫服日一煩熱口乾用

青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門冬末各一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲服二十九丸名

煎青蒿

病後虛汗 及目中流汗杜仲牡蠣等分為末臥時水服五七不止更服口乾心躁熟地黃五

兩水三盞煎一盞半分三服一日盡傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁用黃雌雞一隻去腸

胃治淨麻黃根一兩水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉苳蓉酒浸一宿刮淨一兩牡蠣煨粉二

兩煎取一盞半一日服盡

虛汗無度 麻黃根黃芪等分為末飛麩糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以止為度

葛方頁纂一諸汗二

老小虛汗

白朮五錢小麥一撮水煮乾去麥為末用黃芪湯下一錢

盜汗陰汗

麻黃根牡蠣粉為末撲之治陰汗先以湯浴了用沒石子燒灰布裏撲之甚良

自汗盜汗

常出為自汗睡中出為盜汗用五倍子碾末津調填躋中縛定一夜即止也每夜

臥時帶飢喫蒸餅一枚不過數日即止

虛汗盜汗

浮小麥文武火炒為末每服二錢半米飲下日三服或煎湯代茶飲一方以豬嘴唇

煮熟切片蘸食亦良

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調茯苓末日服一錢

皮膚血汗

郁李仁去皮碾一錢鷺梨搗汁調下又失血門

身熱多汗

胡粉半斤雷丸四兩為末粉身

心悶汗出

不識人新汲水和蜜飲之甚效

濕温多汗

妄言煩渴石膏炙甘草等分為末每服二錢匕漿水調下

卒汗不止

牛羊脂温酒頻化服之

食即汗出

乃脾胃虛也猪肝一斤薄切瓦焙乾為末煮白粥布絞汁眾手丸梧子大空心飲下

五十九

日五

出汗不滴

瘦却腰脚并耳聾者米醋浸荆三稜夏四日冬六日為末醋湯調下二錢即瘥

汗後奔豚

發汗後臍下悸欲作奔豚者茯苓一兩炙甘草二錢半桂枝三錢大棗二枚以甘爛

水二升煮茯苓減半服之日再

盜汗遺精

見濁遺門

風熱汗出

見發熱門

睡中汗出

見臥寐門

浮萍發汗

治時行熱病用浮萍一兩四月十五日采之麻黃去根節桂心附子炮裂去臍皮各

半兩四物搗細篩每服一錢以水一中盞生薑半分煎至六分和滓熱服汗出乃瘥浮萍性輕浮入

肺經達皮膚所以能發揚邪汗也

桃葉蒸汗

治天行病用水二石煮桃葉取七斗安床簀下厚被蓋臥床上乘熱熏之少時當雨

汗汗遍去湯速粉之并炙大椎穴則愈連發汗

汗不出者死可蒸之如中風法燒地令熱去火以

少水洒之布乾桃葉於上厚二三寸安蓆葉上臥

之溫覆得大汗被中傳粉極燥便瘥也凡栢葉麥

麩蠶沙皆可如此法用有人疲極汗出臥簟受冷

但苦寒倦四日凡入發汗汗不出用此法而瘥

熱湯取汗

熱湯能通經絡患風冷氣痺人以湯淋脚至膝上厚覆取汗周身然別有藥亦假陽

氣而行爾

消渴

消渴飲水

用五靈脂黑豆去皮等分爲末每服三錢
冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二服不可

更服熱藥宜入味丸去附子加五味子若小渴者
二三服即止 牛鼻拳煎汁服或燒灰酒服用

鯽魚一枚去腸留鱗以茶葉填滿紙包煨熟食之
不過數枚即愈 浮石蛤粉蟬蛻等分爲末以鯽

魚胆七枚調服三錢神效 泥鱧魚十頭陰乾去
頭尾燒灰乾荷葉等分爲末每服二錢新汲水調

下日三名沃焦散 臘日或端午日用黃泥固濟
牡蠣煨赤碾末每服一錢用活鯽魚煎湯調下只

二三服愈 五倍子爲末水服方寸七日止
晚蠶沙焙乾爲末每用冷水下二錢不過數服

桑葉煎汁代茗 牛鼻木二個男用牝牛女用牡
牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一個水四盃煎

三盃熱服甚妙 用香水梨或鵝梨或江南雪梨
皆可取汁以蜜湯熬成瓶收無時以熱水或冷水

調服愈乃止 韭苗日用三五兩或炒或作羹勿
入鹽入醬無妨喫至十斤即住極效過清明勿吃

萬方原纂一消渴一

三

有人病此引飲无度得此方而愈 用出了子蘿

葡萄三枚洗淨切片日乾為末每服二錢煎猪肉湯

澄清調下日三服漸增至三錢生者搗汁亦可或

以汁煮粥食之 乾生薑末一兩以鯽魚胆汁和

丸梧子大每服七丸米飲下 糯米三合水五升

蜜一合碾汁分服或煮汁服 取稻穰中心燒灰

每以湯浸一合澄清飲之 薏苡仁煮汁飲并煮

粥食之 烏豆置牛膽中陰乾百日吞盡即瘥

菘豆煮汁并作粥食 白扁豆浸去皮為末以天

花粉汁同蜜和丸梧子大金箔為衣每服二三十

丸天花粉汁下日二服忌炙燂酒色次服滋腎藥

凌霄花一兩搗碎水一盞半煎一盞分二服

取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出

搗碾濾過澄粉晒乾每服方寸七水化下日三服

亦可入粥及乳酪中食之 栝樓根薄切炙取五

兩水五升煮四升隨意飲之 生栝樓根三十斤

以水一碩煮取一斗半去滓以牛脂五合煎至水

盡用煖酒先食服如雞子大日三服最妙 栝樓

根黃連三兩為末蜜丸梧子大每服三十九日二

服又用栝樓人參等分為末蜜丸梧子大每服三

服

十丸麥門冬湯下 雹瓜去皮每食後嚼二三兩

五七度瘥 燕窠中草燒灰一兩牡蠣煨二兩白

羊肺一具切晒碾末每新汲水下三錢 甘遂麩

炒半兩黃連一兩為末蒸餅丸菜豆大每薄荷湯

下二丸忌甘草 用上元板橋麥門冬鮮肥者二

大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節

小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩拭秤

之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心

即于白中擣爛納黃連末和丸并手丸如梧子大

食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定若重

者即初服一百五十九日二日服一百二十九日

一百丸四日八十九日五日五十九日合藥要天氣淨

明之夜方浸藥須淨處忌雞犬婦人見之如覺可

時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治

淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲之勿

食肉勿入鹽不過三劑平復也 虎杖燒過海浮

石烏賊魚骨丹砂等分為末渴時以麥門冬湯服

二錢日三次忌酒色魚麩鮮醬生冷 白芍藥甘

草等分為末每用一錢水煎服日三服有人患此

九年服藥止而復作授此方服之七日頓愈古人

處方殆不可曉不可以平易而忽之也 人參為

末雞子清調服一錢日三四服 人參一兩粉草

二兩以雄猪胆汁浸炙腦子半錢為末蜜丸芡子

大每嚼一丸冷水下 人參一兩葛粉二兩為末

發時以燐猪湯一升入藥三錢蜜二兩漫火熬至

三合狀如黑飭以瓶收之每夜以一匙合嚙不過

三服取效也 無名異一兩黃連二兩為末蒸餅

丸棗豆大每服百丸以茄根蠶繭煎湯送下 浮

石船上青黛等分麝香少許為末温湯服一錢

湯瓶內鱸葛根水萍焙等分每服五錢水煎服

湯瓶內鱸菝蕒根炒各一兩烏梅連核二兩焙為

散每服二錢水一盞石器煎七分温呷日一服

瓦窰突上黑煤乾似鉄尿者半斤為末入生薑四

兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲五合 蜜陀僧

二兩碾末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎蠶繭鹽湯或

茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至三十丸止

不可多服五六服後以見水惡心為度

惡心時以乾物壓之日後自定甚奇

日至一石者菠菱根雞內金等分為末米飲服一

錢日三又浮萍搗汁服之又乾浮萍栝樓根等分

為未人乳汁和丸梧子大空腹

飲服二十丸三年者數日愈

日夜飲水數斗者用雄猪肚一枚煮取汁入少豉

渴即飲之肚亦可食煮粥亦可又雄猪肚一枚入

黃連末五兩栝樓根白梁米各四兩知母三兩麥

門冬三兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十九

米飲下 日至數斗小便赤澀用秋麻子仁

一升水三升煮三四沸飲汁不過五升瘥

小便數者以黃雌雞煮汁冷飲并作羹食肉 野

雞一隻五味煮取三升已來汁飲之肉亦可食甚

效 日夜不止小便數者用田螺五升水一斗浸

一夜渴即飲之每日一換水及螺或煮食飲汁亦

妙 又用糯米二升煮稀粥一斗冷定入田中活

螺三升在內待食粥盡吐沫出乃收飲之立效

小便不利葵根五兩水三大盞煮汁平旦服日一

服 消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗

猪苓茯苓尤各三兩澤瀉五分桂二分細搗

篩水服方寸匕日三多飲暖水汗出即愈

不知足用白花鵝一隻切

作小片以上蘇煎含咽

累年不愈莎草根一兩白茯苓半兩為末每陳粟
米飲服三錢日二烏驢頭肉煮汁服二三升無

不瘥者

因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿
以麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下

蓋麝香敗酒壞果

枳椇亦敗酒也

消渴重者眾人溺坑中水取一
盞服之勿令病人知三度瘥

消渴不止

兔絲子煎汁任意飲之以止為度
菝葜

冬瓜一枚削皮埋濕地中一月取出破開取清

水日飲之或燒熟絞汁飲之
用蝸牛十四枚形

圓而大者以水三合密器浸一宿取水飲之不過

一劑愈蝸牛焙半兩蛤粉龍膽草桑根白皮炒

各二錢半碾末每服一錢楮葉湯下
生栝樓根

切十片以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃牛脂

一合慢火熬成膏瓶收每酒服一盃日三
小甕

多用乾冬瓜子麥門冬黃連各二兩水煎次

瓜苗葉俱治消渴不拘新乾下元虛損牛膝五兩為末生地黄汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度

蜜丸梧子大每空心溫酒下三十丸

久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

消渴無度

乾猪胞十個剪破去蒂燒存性為末每溫酒服一錢用燂雄雞水濾澄服之不過

一雞之水愈神效雄猪胆五個定粉一兩同煎成丸芡子大每含化二丸嚥下日二生津丸治

消渴飲水無度以黃頰魚涎和青蛤粉滑石末等分丸梧子大每粟米湯下三十丸

消渴尿多

薔薇根一把水煎日服之非淋也用榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服

三合日三服入地三尺桑根剝取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之亦可入少米勿用鹽

竹瀝恣飲數日愈黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下黃連半斤酒一升浸重湯內煮一

伏時取晒為末水丸梧子大每服五十丸溫水下黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下

日夜尿七八升冬葵根五斤水五斗煮三斗每日旦服二升尿多能食黃檗一斤水一升煮三

五沸渴即飲之恣飲數日即止 小便滑數如油
黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大

每牛乳下五十九日
二服忌冷水猪肉

消渴心煩

用小麥作飯及粥食 煩躁取十家井索
近瓶口結處燒灰新汲水服一錢不過三

五服

煩悶黑鉛水銀等分結如泥常含豆許吞津 烏
梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎一盞去

澤入豉二百粒
煎至半盞温服

煩亂黃丹新汲水服一錢以蕎麥粥壓之 黃栝
樓一個酒一盞洗去皮子取瓢煎成膏入白礬末

一兩丸梧子大每米飲下十九丸 冬瓜瓢乾者一
兩水煎飲 蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大

盞同煮一
中盞温服

煩熱鉛白霜枯白礬等分為末蜜丸 芡子大綿裹
含化嚥汁 鉛白霜一兩根黃硝石各一兩為末

每冷水服一錢 水銀一兩鉛一兩結砂皂莢一
挺酥炙麝香一錢 爲末每服半錢白湯下 骨節

煩熱用生芭蕉根
搗汁時飲一二合

煩渴不止

糯米泔任意飲之即定碾汁亦可
口中乾燥煩渴無津見口舌門

除煩止渴

生葡萄搗濾取汁以瓦器熬稠
入熟蜜少許同收點湯飲甚良

腎虛消渴

難治者黑大豆炒天花粉等分爲末糊丸
梧子大每黑豆湯下七十九日二 上盛

下虛心火炎燥腎水枯涸不能交濟而成渴症白
茯苓一斤黃連一斤爲末熬天花粉作糊丸梧子

大每温湯
下五十九丸

下虛消渴

心脾中熱下焦虛冷小便
多者牛羊乳每飲三四合

胃虛消渴

羊肚爛煮
空腹食之 胃熱消渴 以陳粟米炊
飯乾食之良

積熱消渴

白瓜去皮每食後喫
三二兩五七度良

強中消渴

見男
陰門

高子頁纂一消渴五

消渴羸瘦

用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴即飲之極重者不過二兔

消渴骨蒸

大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安瓮內待瓜消盡同碾丸梧子大每服三四十九丸

煎冬瓜湯下

消渴有蟲

苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二盞煎至一碗空心飲之雖困頓不妨下蟲

如虵而紅色其渴自止消渴有蟲人所不知

老人消渴

鹿頭一個去毛煮爛和五味空心食以汁嚙之

老人煩渴

寒食大麥一升水七升煎五升入赤錫二合渴即飲之

虛勞苦渴

骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三升小麥二升水二斗煮至麥熟去

滓每服一升渴即飲虛勞口乾見虛損門

隔消飲水

雞內金洗晒乾栝樓根炒五兩為末糊丸梧桐子大每服三十丸溫水下日三

乳石發渴

寒水石一塊含之以瘥為度

消渴變水

服此令水從小便出用紫蘇子炒三兩薤藟子炒三兩為末每服二錢桑根白皮煎

湯服日三次

消渴利水

羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合白麩二兩同鹽葱炒食

三消渴疾

用猪脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水

五椀同煎取汁渴則飲之糯穀炒出白花桑根白皮等分每用一兩水二椀煎汁飲之鮎魚涎

和黃連末為丸烏梅湯每服五七丸日三服効

遠行止渴

遠行無水止渴用水花即浮石和苦栝樓為丸每旦服二十九永無渴也

止渴急方

大豆苗嫩者三五十莖塗酥炙黃為末每服二錢人參湯下

百合變渴

見傷寒門

虛熱作渴

見發熱門

夏月渴死

濃煮麥汁一盞服

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癰或先癰疽

而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃芪箭筈者去蘆六兩一

半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃為末每服二錢白湯

點服早晨日午各一服亦可煎服名黃芪六一湯

補下治渴

麻子仁一升水三升煮四

二黃丸

兼治消渴見癆瘵門

忍冬圓

治消渴愈後預防發癰疽先宜服此用忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰

好酒浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許碾為細末以浸藥酒打麩糊丸梧子大每服五十丸

至百丸湯酒任下此藥
不特治癰疽大能止渴

聖惠水蛇丸

治消渴四肢煩熱口乾心躁水蛇一條
活者剝皮炙黃爲末蝸牛五十個水浸

五日取涎入天花粉末煎稠入麝香一
分粟飯和丸菜豆大每服十丸薑湯下

欬嗽

卒得欬嗽

猪腎二枚乾薑三兩水七升煮二升稍服
取汗白雞一隻苦酒一斗煮取三升分

三服并淡食雞

烏雄雞一隻治如食法酒漬半

日飲之

屋上白螺或白蜆殼搗為末酒服方寸

匕

桃仁三升去皮杵着器中密封蒸熟日乾絹

袋盛浸二斗酒中七日可飲日飲四五合

好梨

去核搗汁一碗入椒四十粒煎一沸去滓納黑飴

一大兩消訖細細含嚥立定用梨一顆刺五十

孔每孔納椒一粒麩裏灰火煨熟停冷去椒食之

又方去核納酥蜜麩裏燒熟冷食又方切片酥煎

食之又方搗汁一升入酥蜜各一兩地黃汁一升

煎成含嚥凡治嗽須喘息定時冷食之若熱食反

傷肺令嗽更劇不可救也若反可作羊肉湯餅飽

食之即佳百部根漬酒每温服一升日三服

百部生薑各搗汁等分煎服二合

百部藤根搗

自然汁和蜜等分沸湯煎膏噉嚥

芫花一升水

三升煮汁一升以棗十四枚煮汁乾日食五枚必

愈白善土粉白礬一兩為末薑汁糊丸梧子大

臨臥薑湯服二十丸 釜月土一分豉七分搗丸

梧桐子大每飲下四十丸 爐中鉛屑桂心皂莢

等分為末蜜丸如梧子大每飲下十五丸忌葱

老小暴嗽石灰一兩蛤粉四錢為末蒸餅丸豌豆

大焙乾每服三十丸溫薑汁下 卒嗽不止用白

蜆殼搗為細末以熟米飲調每服一錢日三服甚

效 卒欬不止用百部根懸火上炙乾每含嚙汁

勿令人知 卒寒欬嗽皂莢燒碾豉湯服二錢

卒嗽有痰芫花一兩炒水一升煮四沸去

滓白糖入半斤每服棗許勿食酸醎物

久嗽不止

栗殼去筋蜜炙為末每服五分蜜湯下穀
氣素壯人用之即效 馬勃為末蜜丸梧

子大每服二十丸白湯下即愈 猪腎二枚入椒

四七粒水煮啖之 紫苑欬冬花各一兩百部半

兩搗羅為末每服三錢薑三片烏梅一個煎湯調

下日二甚佳 核桃仁五十個煮熟去皮人參五

兩杏仁三百五十個麩炒湯浸去皮碾勻入煉蜜

丸梧子大每空心細嚼一丸人參湯下臨臥再服

雞子白皮炒十四枚麻黃三兩焙為末每服方寸

匕飲下日二 經年者阿膠炒人參各二兩為末

每用三錢鼓湯一盞葱

白少許煎服日三次

十年欬嗽

或二十年醫不效者生龜三枚治如食法
去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四

升如常飲之令盡永不發又方用生龜一枚着

坎中令人溺之浸至三日燒碾以醇酒一升和末

如乾飯頓服須臾大吐嗽囊出則愈小兒減半

二十年嗽猪脰三具大棗百枚酒五升漬之秋冬

七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽卅年呷

嗽熏黃木香荳蔻子等分爲末羊脂塗青紙上以

未鋪之竹筒燒烟吸之三十年嗽百部根二十

斤搗取汁煎如飴服方寸匕日三一方加蜜二斤

一方加飴一斤遠年欬嗽羊脰三具大棗百枚

酒五升漬七日飲之欬嗽多年自汗用罌粟殼

二兩半去蒂膜醋炒取一兩烏梅半兩焙

爲末每服二錢臥時白湯下名百勞散

久嗽欲死

用厚榆皮削如指大長尺餘納
喉中頻出入當吐膿血而愈

久嗽氣急

知母去毛切五錢隔紙炒杏仁薑水泡去
皮尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠温

萬方類纂一欬嗽二

服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸薑湯下以絕病根

久咳喘急

猪蹄甲四十九枚以瓶子盛之安天南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出爲度取出入

款冬花半兩麝香龍腦少許碾勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散

欬嗽氣喘

用鯉魚一頭去鱗紙裹炮熟去刺碾末同糯米煮粥空心食

久嗽痰喘

蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸麻子大每服三五丸時時津嚥

氣嗽日久

生訶黎一枚含之嚥汁瘥後口爽不知食味却煎檳榔湯一椀服立便有味經年

者橘皮神麴生薑焙乾等分爲末蒸餅和丸梧子大每服三五丸食後夜臥各一服有人患此服

之兼舊患膀胱氣皆愈也

欬嗽不止

浮石末湯服或蜜丸服生薑五兩錫半升火煎熟食盡一人用之有效蝙蝠去

翅足燒碾爲末一錢食後白湯下黃明膠炙碾每服一錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許煎

沸嗽時温呷
三五口即止

老嗽不止

故茅屋上塵年久着烟火者和石黃欵冬
花婦人月經衣帶為末水和塗茅上待乾

入竹筒中燒烟
吸燕無不瘥也

久欵不止

烏梅肉微炒罌粟殼去筋膜蜜炒等分為
末每服二錢睡時蜜湯調下
五味子五

錢甘草一錢

半五倍子風化硝各二錢為末乾噉
五味子一兩真茶四錢晒碾為末以甘草五錢

煎膏丸茶豆大每服三十丸沸湯下數日即愈也
羸弱者九尖拒霜葉即芙蓉葉為末以魚鮮蘸

食屢效熱欵不止用濃茶湯一鍾蜜一鍾大熟
瓜蕪一個去皮將瓢入茶蜜湯洗去子以碗盛于

飯上蒸至飯熟取出時挑三四匙燕之
漸成勞瘵鳳尾草為末用魚鮮蘸食之

久患欵噫

匙煎温呷三服愈
生薑汁半合蜜一

久嗽暴嗽

金粟丸用葉子雌黃一兩碾以紙筋泥固
濟小合子一個令乾盛藥水調赤石脂封

高方頁纂一欵嗽三

卷

口更以泥封待乾架在地土炭火十斤簇煨候火消三分之一去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細碾蒸餅丸粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久

積年欬嗽

呀呷作聲用鯊魚殼半兩貝母煨一兩桔梗一分牙皂一分去皮酥炙為末煉蜜丸

彈子大每含一丸嚥汁服三丸即出惡涎而瘥

欬嗽吐血

人參黃耆飛羅麩各一兩百合五錢為末水丸梧子大每服五十九丸食前茅根湯下

人參乳香辰砂等分為末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服甚者殿鮮桑根白皮

一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下勞瘦骨蒸日晚寒熱

者生地黃汁三合煮白粥臨熟入地黃汁攪勻空心食之欬嗽有血小兒胎髮灰入麝香少許酒

下每個作一服男用女用男久嗽唾血白前桔根桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升

分三服忌猪肉菘菜欬喘上氣喘急嗽血吐血脈無力者人參末每服三錢雞子清調之五更初

服便睡去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者服盡一兩甚好一方以烏雞子水磨千遍自然化

作水調藥尤妙忌醋醃腥醬麪鮓醉飽將息乃佳

欬嗽膿血

咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃芪四兩甘草一兩為末每服二錢點湯服

一切肺病咳嗽膿血不止用上好酥五十斤煉三遍當出醞翻每服一合日三服以瘥為度神效年

深欬嗽出膿血貫眾蘇方木等分每服三錢水一盞生薑三片煎服日二服

久嗽不止有膿血

葇荑子五錢淘去浮者煮令芽出炒碾真酥一雞子大大棗七枚同

煎令酥盡取棗日食三枚又方葇荑子三撮吞之日五六度神驗

心虛嗽血

沉香末一錢半夏七枚入猪心中以小便濕紙包煨熟去半夏食之

欬嗽肺脹

皴肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個栢子仁半兩碾勻滴水和丸小豆大每服二十

丸甘草湯下久欬肺脹五味二兩粟殼白錫炒過半兩為末白錫丸彈子大每服一丸水煎服

萬方頁纂一欬嗽四

肺癰欬嗽

久嗽不愈肺積虛熱成癰欬出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠鹿

角膠生犀角羚羊角各二錢半用河水三升銀石器內文火熬至半升濾汁時時仰臥細呷日一服

有人病此服之遂愈 欬唾膿血腥臭不問膿成未成用栝耳一兩碾末同百齒霜二錢糊丸梧子

大米飲下三十九丸效甚捷 煩滿微熱心胸甲錯用葦莖切二三升水二斗煮汁五升入桃仁五十枚

薏苡仁瓜瓣各半斤煮取二升服當吐出膿血而愈 宵滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久

久吐膿如粳米粥者桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分溫再服朝暮吐膿血則瘥

肺癰咳唾心胸甲錯者以瀉苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服肺有血當吐出愈

肺癰咯血

薏苡仁三合搗爛水二大盞煎一盞入酒少許分二服

肺痿欬嗽

吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴生天門冬搗汁一斗酒一斗節一升紫苑四合銅器

煎至可丸每服杏仁大一丸日三服 大人小兒欬逆短氣胷中吸吸欬出涕吐嗽出臭膿用淡竹

瀝一合服之日三五次以愈為度
漢防已末二錢漿水一盞煎七分細呷
喘嗽

久嗽肺痿

作燥用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩和勻灌肺中白

水煮食之涕唾多骨節煩悶時時寒熱以甘草

三兩炙搗為末每日取小便三合調甘草末一錢

服之又頰赤氣急用童便去頭尾少許五合取大

粉甘草一寸四破浸之露一夜去甘草平旦頓服

或入甘草末一錢同服亦可一日一劑童

子忌食五辛熱物肺痿欬嗽並同此方

肺痿欬血

不止用栝樓五十個連瓢瓦焙烏梅肉五

用一捻以猪肺一片切薄摻末入內炙熟冷嚼咽

之日二服蘿蔔和羊肉或鯽魚煮熟頻食咯

血多痰者漢防已葶藶等分為末糯米飲每服一

錢咳唾膿血薏苡仁十兩杵破水三升煎一升

酒少許

服之

肺虛欬嗽

立效丸治肺虛膈熱咳喘氣急煩滿咽乾
燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音

萬方真纂一欬嗽五

嘶不出黃蠟溶濾令淨漿水煮過八兩再化作一
 百二十丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃
 半個細嚼溫水下即臥閉口不語日二久嗽木
 鼈子款冬花各一兩為末每用三錢焚之吸烟良
 久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥一方
 用木鼈子一個雄黃一錢久咳人參末二兩鹿
 角膠炙碾一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱少
 許入銚子煎一二沸傾入盞內遇咳時溫呷三五
 口甚佳

肺勞咳嗽 雌黃一兩入瓦合內不固濟坐地上以火
 焙之厚二寸以炭一斤簇定頂火煨三分
 去一退火出毒為末糖酥和丸粟
 米大每日空心杏仁湯下三丸

肺氣欬嗽 猪脰一具苦酒煮食不過二服 南向柔
 桑條一束寸折以水五盃煎至一盃盛瓦
 器中渴即飲
 之一月愈

肺傷欬嗽 紫苑五錢水一盞煎
 七分溫服日三次

肺熱欬嗽

沙參半兩水煎服之
一兩半太陰元精石二兩甘草炙半兩貝

母一兩半天南星白礬水煮過半兩為末每服半錢薑湯下
一婦人患肺熱久嗽身如火炙肌瘦

將成勞以枇杷葉木通款冬花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訖為末蜜丸櫻桃大食

後夜臥各含化一丸末終劑而愈

肺燥欬嗽

用松子仁一兩胡桃仁二兩碾膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服

肺熱痰咳

胸膈塞滿用瓜蒌仁半夏湯泡七次焙碾各一兩薑汁打麩糊丸梧子大每服五十

丸食後薑湯下或白湯下或以栝樓瓢煮熟丸

肺痰欬嗽

萊菔子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和丸芡子大綿裹含之嚥汁甚妙

欬嗽有痰

熟瓜蒌十個明礬二兩搗和餅陰乾碾末糊丸梧子大每薑湯下五七十九丸痰欬

不止瓜蒌仁一兩文蛤七分為末以薑汁澄濃脚丸彈子大噙之

寫方頃纂一欬嗽六

采

痰飲咳嗽

用真蚌粉新瓦炒紅入青黛少許用淡薑水
滴麻油數點調服三錢徽宗妃病痰嗽

終夕不寐面浮如盤服此是夕嗽止比曉面消
胡桃肉三顆生薑三片臥時嚼服即飲湯兩三呷

又再嚼桃薑如前數即
靜臥及旦痰消嗽止

濕痰欬嗽

面黃體重嗜臥驚悸兼食不消脉緩者白
朮丸用半夏南星各一兩白朮一兩半為

末薄糊丸梧子大每服五七十九薑湯下
州葶薏子一兩紙襯炒令黑知母一兩貝母一兩

為末棗肉半兩砂糖一兩半和丸彈丸大每
以新綿裹一丸含之嚥津甚者不過三丸

氣痰欬嗽

玉粉丸南星麴半夏麴陳橘皮各一兩為
末自然薑汁打糊丸如梧子大每服四十

丸薑湯下寒痰去橘皮加官桂半兩凡面白氣促
洒浙惡寒愁憂不樂脉濇者用此方 痰氣欬嗽

用香欒去核切砂瓶內浸酒封
固一夜煮爛蜜拌勻時時含嚥

痰哮欬嗽

芋根煨存性為末生豆腐蘸三五錢食即
效未全可以肥猪肉二三片蘸食甚妙

熱痰欬嗽

煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半為末薑

汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十丸食後薑湯下痰熱喘嗽痰涌如泉石膏寒水石各五錢為末

每人參湯服三錢

寒痰欬嗽

燒酒四兩猪脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取效

又見上氣痰欬嗽條

寒嗽痰喘

白果七個煨熟以熟艾作七丸每果入艾一丸紙包再煨香去艾喫

寒熱痰嗽初起者

燒薑一塊含嚥之

欬嗽寒熱

旦夕加重少喜多嘆面色不潤忽進忽退積漸少食脉弦緊者杏仁半斤去皮尖童

子小便浸七日漉出温水淘洗砂盆內碾如泥以小便三升煎如膏每服一錢熟水下婦人室女服

之尤妙

酒痰欬嗽

用此救肺瓜萆仁青黛等分碾末薑汁蜜丸芡子大每噉一丸 酒後欬嗽白殭蠶

焙碾末每茶服一錢

痰喘欬嗽

用白蜆殼多年陳者燒過存性為極細末以米飲調服一錢日三服 長皂莢三條

去皮子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用薑汁制杏仁麻油制巴豆蜜制半

夏一處火炙黃色為末每用一字安手心臨臥以薑汁調之喫下神效 夜不能臥白僵蠶炒碾好

茶末各一兩為末每用五錢臥時泡沸湯服 哮喘嗽銀杏五個麻黃二錢半甘草炙二錢水一

鍾半煎八分臥時服 痰嗽并喘五味子白礬等分為末每服三錢以生豬肺炙熟蘸末細嚼白湯

下一人病此百藥不效服此兩服病遂不發 痰嗽喘急桔梗一兩半為末用童子小便半升煎四

合去渣溫服 上夜不能臥一條治風痰喘嗽者

久近痰嗽

自宵膈下塞停飲至于臍臍用知母貝母各一兩為末巴豆三十枚去油碾勻每服

一字用薑三片二面蘸藥細嚼燕下便睡次早必
瀉一行其嗽立止壯人乃用之一方不用巴豆

痰嗽帶血

青州大柿餅飯上蒸熟批開每用一枚
真青黛一錢臥時食之薄荷湯下款冬

花百合蒸焙等分爲末蜜丸龍
眼大每臥時嚼一丸薑湯下

痰嗽骨蒸

見發熱門

喉痺痰嗽

杏仁去皮熬黃三分和桂
末一分碾泥裏含之嚥汁

化痰治嗽

人參末一兩明礬二兩以醞醋二升熬礬
成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大一丸

取舌下其嗽即止痰自消
丸梧子大每睡時茶下二三十九丸又明礬半生半

燒山卮子炒黑等分爲末薑汁糊爲丸如服又
白明礬建茶等分爲末糊丸服大肥栝樓洗取

子切焙半夏四十九個湯洗十次搥焙等分爲末
用洗栝樓水并瓢同熬成膏和丸梧子大每薑湯

下三五十九丸良絲瓜燒存性爲末棗肉和丸彈
子大每服一丸溫酒化下百藥煎片黃芩橘紅

萬方頁纂一 嗽八

甘草各等分共為細末蒸餅丸菜豆大時時乾嚥數丸佳

歛肺劫嗽

百藥煎訶黎勒荆芥穗等分為末薑汁入蜜和入芡子大時時嚥之

風痰咳嗽

大天南星一枚炮裂碾末每服一錢水一盞薑三片煎五分溫服每日早午晚各一

服

上焦新痰咳嗽

制過半夏一兩片黃芩末二錢姜汁打糊丸菜豆大每服七十丸食後淡

薑湯下

三焦欬嗽

腹滿不飲食氣不順仙靈脾覆盆子五味子炒各一兩為末煉蜜丸梧子大每薑茶

下二
十九丸

咳嗽遺矢

大腸咳則遺矢赤石脂禹餘糧各一斤並碎之水六升煮取一升去滓分再服

一切勞嗽

胃膈痞滿用鷺管石雄黃佛耳草款冬花等分為末每用一錢安香爐上焚之以筒

吸烟入喉中日二次 久勞吐臭痰者尋水邊蚰
吞青鼃末嚙者連蛇打死黃泥固濟煨碾空心酒
服一二錢至效忌生冷五七日永不發也 急勞
欬嗽煩熱桃仁三兩去皮尖豬肝一枚童便五升
同煮乾于木臼內搗爛入蒸餅
和丸梧子大每溫水下三十九

冷氣欬嗽

結脹者乾姜末熱酒調服半錢或錫糖丸噙

氣熱欬嗽

石葦檳榔等分為末薑湯服二錢 肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱瀉白散用桑

白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服一
二錢入粳米百粒水煎食後溫服若肺虛而小便

利者不宜用之

虛熱欬嗽

天花粉一兩人參三錢為末每服一錢米湯下 口乾涕唾用甘蔗汁一升半青梁

米四合煮粥日食二次極潤心肺

瘦病欬嗽

豬胆和人溺薑汁橘皮同煮汁飲之

高方頁纂一欬嗽九

老人喘嗽

氣促睡臥不得胡桃肉去皮杏仁去皮尖生薑各一兩碾膏入煉蜜少許和丸彈子

大每臥時嚼一丸薑湯下立定

老小欬嗽延胡

索一兩枯礬二錢半為末每服二錢軟錫一塊和

含之 老人痰氣喘嗽胸滿懶食不可妄投燥利

之藥處 三子養親湯治之白芥子白色主痰下氣

寬中紫蘇子紫色主氣定喘止嗽蘿蔔子白種者

主食開痞降氣各微炒碾破看所主為君每劑不

過三四錢用生絹袋盛入煮湯飲之勿煎太過則

味苦辣若大便素實者入蜜一匙冬月加薑一片

尤良

喘嗽面浮

并四肢浮者蛤蚧一雌一雄頭尾全者清酒和蜜塗之炙熟紫團人參似人形者半

兩為末化蠟四兩和作六餅每煮糯米

薄粥一盞投入一餅攪化細細熱呷之

喘嗽失音

暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴乾令病人以薦自裹春令灰飛揚入

其七孔中當眼淚出口鼻皆辣待芫根盡乃止病

即愈 欬嗽失聲白果仁四兩日茯苓桑白皮二

兩烏豆半升沙蜜半斤煮熟日乾為末以乳汁半
盞拌濕九蒸九晒丸如菉豆大每服三五十九白

湯下
神效

熱盛喘嗽

石膏二兩甘草炙半兩為末每服三錢生薑蜜調下

久患嘔呷欬嗽

喉中作聲不得眠取白前焙搗為末每溫酒服二錢

乾欬無痰

熟瓜萋搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頻含嚥汁

久欬熏法

每旦取欬冬花如雞子許少蜜拌花使潤納一升鐵鑊中又用一瓦盃鑽一孔孔內

安一小筆管以麩泥縫勿令漏氣鑊下着炭火少

時烟從筒出以口含吸嚥之如胸中稍悶須舉頭

即將指頭按住筒口勿使漏至烟盡乃止如是五

日一為之待至六日飽食羊肉鱠飴一頓永瘥

有人病嗽多日或教然欬冬花三兩于無風處以

筆管吸其烟滿口則嚥之數日果效 三奇散治

一切欬嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文

款冬花二百文熟地黃二兩焙碾末每用二錢于

萬方頂真一欬嗽十

爐中燒之以筒吸烟嚙下有涎吐去 熏黃一兩
以蠟紙調捲作筒十枚燒烟吸嚙取吐止一日一

熏惟食白粥七日
後以羊肉羹補之

上氣欬嗽 猪肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之
蕎麥粉四兩茶末二錢生蜜二兩水一椀

順手攪千下飲之良久下氣不止即愈 用合州

乾薑炮皂莢炮去皮子及蛀者桂心紫色者去皮

並擣篩等分鍊白蜜和搗三千杵丸梧子大每飲

服三九嗽發即服日三五服禁食葱麩油膩其效

如神凡人患嗽多進冷藥此方用藥熱燥人見之

必不肯服故每治人而不出方但出藥即多效也

煩滿者用猪肉切作錐子猪脂煎熟食之 積

年垂死用荳莢子炒熟羊肺切曝等分為末以七

月七日醋拌每夜服二方寸匕粥飲下隔日一服

腹滿羸瘦者楸葉三斗水二斗煮三十沸去滓

煎至可丸如棗大以筒納人下部中立愈 不得

臥或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之葶藶子

三升微火熬碾以絹袋盛浸清酒五升中冬七日

夏三月初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二

夏三月初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二

量其氣力取微利下為度如患急者不待日滿亦可絞服呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍葉水浸

搗汁一升空腹頓服須臾以杏仁碾汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥胸滿氣

喘桃仁三兩去皮尖以水一大升碾汁和粳米二合煮粥食之傷中筋脉急上氣欬嗽者用棗二

十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中泣盡酥取收之常含一枚微微嚙之取瘥

肺欬上氣脉沉者澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升去滓入半夏半升紫參白前生薑

各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日三服

久欬上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫苑半夏

各三兩大戟七合以水一斗漬一宿煮取三升分作數服禁食羊肉錫糖大佳十年二十年諸藥

不效用蝮蝠除翅足燒焦碾末米飲服之

上氣痰嗽喘促唾膿血以萊菔子一合碾細煎湯食上服之

上氣欬逆

砂仁洗淨炒碾生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡服紫蘇子入水碾濾汁同粳米

煮粥食不拘大人小兒以杏仁三升去皮尖炒黃礬膏入蜜一升煮熟每食前含之嚥汁唾濁

不得臥用皂莢炙去皮子碾末蜜丸梧子大每服一丸棗膏湯下日三夜一服

補肺丸

治欬嗽用杏仁二大升山中者不用去雙仁者以童子小便二斗浸之春夏七日秋冬二

七日連皮尖於砂盆中碾濾取汁煮令魚眼沸候軟如麪糊即成以粗布攤曝之可丸即丸服之食

前後總須服三五十九茶酒任下忌白水粥

百祥膏

治嗽而吐青綠水者見痘疹門

鹿髓煎

治肺痿欬嗽傷中脉絕用鹿髓生地黄汁各七合酥蜜各一兩杏仁桃仁各三兩去皮炒

酒一升同搗取汁先煎杏仁桃仁地黃汁減半入三味煎如稀餲每含一匙嚥下日三

咳逆短氣

紫蘇莖葉二錢人參一錢水一鍾煎服

肺痿吐涎沫

頭眩小便數而不欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩

水三升煮一升五合分服

肺痿吐涎沫

頭眩小便數而不欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩

水三升煮一升五合分服

嘔吐 有物無聲曰吐有聲無物曰噦有物有聲

暴得吐逆 水服仍以細麪半盞押定

吐逆不止 用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤

每服七丸醋湯下 不拘男女連日粥飲湯藥不

能下者即効五靈脂治淨為末狗胆汁和丸茈子

大每服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不得噦口

嘔逆不止 麻仁杵熬水碾取汁着少鹽喫立效

嘔噦不止 醋和麪作彈丸二三枚以沸湯煮熟瀉

再吞未定至晚再吞 厥逆者蘆根三斤切水煮

濃汁頻飲二升必效若以童子小便煮服不過三

嘔哕不止

白油麻一大合清油半斤煎取三合去麻
温服 嘔哕厥逆萆莢藤即野葡萄煎汁

呷之

卒哕不止香蘇濃煮頓服

三升良

棗米粉并華水服之良

嘔吐不止

生薑一兩醋醬二合銀器煎取四合連滓
呷之又殺腹內長蟲 嘔吐痰水白檳榔

一顆烘熱橘皮二錢半炙為末水一盞煎半盞温

服 上氣嘔吐芥子末蜜丸梧子大并華水寅時

下七丸申時再服 嘔吐胃滿用吳茱萸一升棗

二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三

升每服七合日二服 嘔吐陽

厥卒死者飲新汲水三升佳

嘔吐不藥

凡人嘔吐服藥不納者必有蛔在膈間蚘
聞藥則動則藥出而蚘不出但于嘔吐藥

中加炒川椒十粒良蓋蚘見椒則頭伏

也故蚘厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也

頭運吐逆

胃冷生痰也
見頭病門

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一
合頓服未定更服之

胃弱嘔逆 不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩力一
蓋煮取汁入生薑汁半合和白麩作撥刀

以羊肉臠汁煮
熟空心食之

胃冷嘔逆 氣厥不通母丁香三個陳橘
皮一塊去白焙水煎熱服

痰壅嘔逆 心胸滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁
炙黃為末非時米飲調下二錢匕

嘔逆不食 詞黎勒皮二兩炒碾糊丸梧子
大空心湯服二十九日三服

嘔逆厥逆 內有寒痰半夏一升洗滑焙碾小麥麩一
升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三

服稍增至十五枚旋煮旋吞
覺病減再作忌羊肉錫糖

虛寒嘔噦 飲食不下細辛去葉半兩丁香一
錢半為末每服一錢柿蒂湯下

心痞嘔噦 見痞積門

嘔噦眩悸 穀不得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑
半斤茯苓三兩切以水七升煎一升半分

萬方類纂一嘔吐二

卷

温服之

胃寒噦逆

停痰留飲藿香半夏湯用半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁皮半兩每服四錢水

一盞薑七分煎服

噦逆欲死

半夏生薑湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服 噦逆不止

石蓮肉六枚炒赤黃色碾末冷熟水半盞和服便止

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤並宜

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服

胃冷有痰

脾弱嘔吐生附子半夏各二錢薑十片水二盞煎七分空心温服一方並泡熟加木

香五分

温病冷哕

因熱甚飲水成暴冷哕者茅根切枇杷葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升去滓

稍稍飲之

温病熱嘖

乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則嘖或大下胃中虛冷亦致嘖也茅根切葛根切

各半斤水三升煎一升半每温飲一觔嘖止即停

天行嘔逆

食入即吐見瘟疫門

食入即吐

人參一兩半夏一兩五錢生薑十斤水一斗以揚二百四十遍取三升入白蜜三合

煮一升半分服

食已即吐

胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水一升煮半升温服

食後喜嘔

鹿角燒末二兩人參一兩為末薑湯服方寸匕日三

口吐清水

乾蘄艾煎湯啜之

乾嘔不息

蔗汁温服半升日三次入薑汁更佳葛根搗汁服一升瘥乾嘔厥逆頻嚼生薑

寫方頭裏一嘔吐三

卷

嘔家聖藥也

乾嘔脇痛傷寒門

嘔吐反胃反胃門

肺癰得吐黃芪二兩為末每服二錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

腎氣上噦見男陰門

諸藥引吐噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附

尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆則吐風痰治噦逆甚效

諸病應吐病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞噎氣上衝咽喉不得息者此為胸中

有寒也當吐之太陽中喝身熱疼重而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發

寒熱脈緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸熱鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利

日十餘行寸口脉微弦者當吐之懊懣煩躁不得
 眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在上皖者
 當吐之並宜以瓜蒂散主之惟諸亡血虛家不可
 與瓜蒂散也難經云上部有脉下部無脉其人
 當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰
 風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂
 木鬱則達之也吐去上焦有形之物則木得舒暢
 天地交而萬物通矣若尺脉絕者不宜用此恐損
 真元令人胃氣不復也瓜蒂乃陽明經除濕熱
 之藥故能引去胸皖痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃
 疸濕熱諸證凡胃弱人
 及病後產後皆宜加慎

瓜蒂散

治證見土其方用瓜蒂二錢半熬黃赤小豆
 二錢半為末每用一錢以香豉一合熱湯七

合煮糜去滓和服少
 少加之快吐乃止

翻胃

翻胃吐食

梁上塵黑驢尿調服之
為末米飲服三錢經驗

竈中土年久者
取螺螄一斗水

浸取泥晒乾每服一錢火酒調下
雌黃一分甘

草生半分為末飯丸梧子大以五葉草糯米煎湯

每服四丸絕好赤石脂為末蜜丸梧子大每空

腹薑湯下一二九先以巴豆仁一枚勿令破以

津吞之後乃服藥百麩二斤半蒸作大饅頭一

個頭上開口刺空將皂礬填滿以新瓦圍注鹽泥

封固空土窰安放文武火燒一日夜取出碾末棗

肉為丸梧子大每服二十九丸空心酒湯任下忌酒

色火杵草焙為末蜜丸梧子大每沸湯下五十

丸馬鬣兒燈上燒存性一錢入好大棗肉平胃

散末二錢酒服食即可下透骨草獨科蒼耳生

牡蠣各一錢薑三片水煎服用白罌粟米二合

人參末三大錢生山芋五寸細切碾三物以水二

升三合煮取六合入生薑汁及鹽花少許和勻分

服不計早晚亦不妨別服湯丸芥子末酒服方

寸七日三服大棗一枚去核用班蝥一枚去頭

翅入在內煨熟去蝨空心食之白湯下良棠梨

葉油炒去刺為末每旦酒服一錢乾柿三枚連

蒂搗爛酒服甚效切勿以它藥襍之有人三世

死于反胃病至孫得一方用乾柿餅同乾飯日日

食之絕不用水飲如法食之其病遂愈真橘皮

以日照西壁土炒香為末每服二錢生薑三片棗

肉一枚水二鍾煎一鍾溫服用胡椒醋浸日乾

如此七次為末酒糊丸梧子大每服三四丸醋

湯下胡椒七錢半煨薑一兩水煎分二服胡椒

椒半夏湯泡等分為末薑汁糊丸梧子大每薑湯

下三十丸石蓮肉為末入少肉豆蔻末米湯調

服之松節煎酒細飲之母丁香一兩為末以

鹽梅入搗和丸芡子大每噙一丸母丁香神麴

炒等分為末米飲服一錢千葉白椹花陰乾為

末陳糯米湯調送三五口不轉再服千椹花一

枚燒碾酒服即鑿朽木蠶繭十個煮汁烹雞子

三枚食以無灰酒下日二服神效或以纒絲湯煮

粟米粥食之鯉魚一頭童便浸一夜炮焦碾末

同米煮粥食之大鯽魚一尾去腸留鱗入綠礬

末令滿泥固煨存性碾末每米飲服一錢日二

心沸湯調下	後用屢驗	有食止吐	後食止吐	候絕旦夕	胃每食羹	服一分桃	刀切與食	雞一隻與	胫一隻燒	參當歸食	內烹食二	之烏雄雞	調服亦可	末每服二	搗和為丸	泥中者各	米醋同調	用真正蚌	
一斤入棗	羊胛子乃	不可過多	半哺時再	忽有一人	粥諸物須	桃仁湯下	待雞下糞	水飲勿與	存性酒調	鹽各半兩	隻愈以反	雞一隻治	凡覺心腹	錢用人參	再入砂合	等分炒成	送下用黃	粉每服稱	
肉平胃散	羊腸內草	須熱飲之	服二合食	云服驢小	與吐諸醫	五七服即	取陰乾為	食四五日	服男用雌	再同煮爛	毛雞一隻	如食法入	痛將發反	縮砂湯調	子內蓋定	灰每二兩	殼并田螺	過二錢搗	
貓胞衣燒	積塊也煨	病深者七	粥便定此	便極驗遂	不能療漸	末水丸粟	為末水丸	將五蒲蛇	用雄以烏	食之至盡	煮爛去骨	胡荽子半	胃即以此	下不然用	泥固煨存	兩入白梅	殼並取久	生薑汁一	
灰入硃砂	每服一錢	日當效	物稍	服二合	疲困	米大每	粟米大每	二條竹	雞臍	入腹	斤在腹	此藥治	陳米飲	性碾細	肉四個	在	在	在	在

萬行頌纂一翻胃二

三

男婦皆治	錢半炮為末每服一錢調下服至一斤以上為妙	一升淬之再煨再淬醋乾為度取一兩碾乾薑二	半自然薑汁調作一處服白善土煨赤以米醋	硫黃五錢官桂一錢為末每服六錢一錢半結砂船	轉食者水不能停黑鉛水銀各一錢半結砂船	忌煎燂酒醋椒薑熱物一二服其效如神治反胃	木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根水調服	腸甚者難治常食兔肉則便自行地龍糞一兩	猬皮燒灰酒服或煮汁或五味淹炙食反胃結	服入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效	性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效	再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一	醋盡為度碾末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之	旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬	去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時	正胃散方于異人十痊八九方用白水牛喉一條	七八日大便不通如此者必死昔金州周禪師得	滓分三服反胃吐食藥物不下結腸三五日至	下甚效羊糞五錢童子小便一大盞煎六分去
------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

脂末黃狗胆汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞
 磨化服不過三服即效 朝食暮吐丁香十五個
 碾末甘蔗汁薑汁和丸蓮子大噙嚥之 朝食暮
 吐暮食朝吐旋食旋吐者用甘蔗汁七升生薑汁
 一升和勻日日細呷之 脾胃氣弱食不消化湯
 飲不下用粟米半升杵粉水丸梧子大七枚煮熟
 入少鹽空心和汁吞下或云納醋中吞之得下便
 已 飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人參
 三大兩拍破水一大升煮取四合熱服日再兼以
 人參汁入粟米雞子白薤白煮粥與噉有人患此
 兩月餘諸方不瘥與此方當時便定 吐出黑汁
 治不愈者用畢澄茄為末米糊丸梧子大每薑湯
 下三四十九日一服愈後服平胃散三百帖 翻
 胃嘔吐白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分
 為末麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸又白礬枯
 三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸 甘
 露湯治反胃嘔吐不止服此利胸膈養脾胃進飲
 食用乾錫糟六兩生薑四兩二味同搗作餅或焙
 或晒入炙甘草末二兩鹽少許點湯服之 嘔吐
 反胃半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升

和揚之一百廿遍煮取三升半
溫服一升日再亦治膈間支飲

反胃嘔噦

乾棗葉一兩藿香半兩丁香二錢半每服
二錢薑三片水一盞煎服 枇杷葉去毛

炙丁香各一兩人參二兩每
服三錢水一盞薑三片煎服

反胃欬噫

生薑四兩搗爛入藷香葉一兩椒末一錢
鹽和麩四兩裏作燒餅煨熟空心喫不過

兩三度效反胃
入甘蔗汁和之

反胃嘔噎

田螺洗淨水養待吐出泥澄取晒半乾丸
梧子大每服三十丸藿香湯下爛穀碾服

亦可

反胃噎疾

蘿蔔蜜煎浸
細細嚼嚥良

反胃噎膈

牛轉草杵頭糠各半斤糯米一升為末取
黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖

二兩尤妙

一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰和胃

牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剝酒三
盃自后食必屈曲下膈硬瀆微痛右脉甚瀆關脈沉
此汚血在胃脘之口氣因鬱而成痰隘塞食
道也遂以韭汁半棧細細冷呷盡半斤而愈

反胃關格

氣噎不通丁香木香各一兩每服四錢水
一盞半煎一盞先以黃泥做成盃濾藥干
內食前服曾試有效
土碗取其助脾也

反胃轉食

藥物不下用大雪梨一個以丁香十五
粒刺入梨內濕紙包四五重煨熟食之

反胃膈氣

不下食者大倉散用倉米或白米日西時
以水微拌濕自想日氣如在米中次日晒

乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之即時便
下又陳倉米炊飯焙碾每五兩入沉香末半兩和

勻每米飲服二三錢地塘蟲即壁虎也七個砂
鍋炒焦木香人參砂各一錢半乳香一錢為末

蜜丸梧子大每服七丸木香湯下早晚各一服
狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶

五錢為末以雞卵一枚去白雷黃和藥攪勻紙封
泥固煨火煨半日取出碾細每服五分燒酒調服

不過三服見效

反胃上氣 白芥子末酒服一二錢 食入即吐蘆根茅根各二兩水四升煮二升分服或頓服

得下

脾虛反胃 白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土碾細薑汁和丸梧子

大每服百丸薑湯下

脾疼反胃 靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒為末自然薑汁煮半夏粉糊丸

梧子大薑湯下二十九丸

虛寒反胃 神麴六兩麥蘖炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩為末蜜丸梧子大每米飲服五

十丸日三服 羊肉去脂作生以蒜薤空腹食之立效

久冷反胃 大附子一個生薑一片剉細同煮碾如麪糊每米飲化服一錢 用薑汁打糊和附

子末爲丸大黃爲衣每溫水服十九
子一個坐于磚上四面着火漸逼以生薑自然汁

碎之依前再逼再淬約薑汁盡半碗乃止碾末每服
一錢粟米飲下不過三服瘥或以豬腰子切片炙

熟蘸食用大附子一個切下頭子剉一竅安丁
香四十九個在內仍合定線紫入砂銚內以薑汁

浸過文火熬乾爲末每挑少許置
掌心舐喫日十數次忌毒物生冷

血風反胃

香白芷一兩切片五炒黃爲末用豬血
切片沸湯泡七次蘸末食之日一次

反胃惡心

藥食不下京三稜炮一兩半丁香
三分爲末每服一錢沸湯點服

反胃羸弱

用母薑二斤擣汁作粥食生薑切
片麻油煎過爲末軟柿蘸末嚼嚥

反胃吐痰

柳樹葦五七個
煎湯服即愈

反胃止瀉

厚朴薑汁炙焦黑爲末以陳
米飲調服二錢七日三服

反胃氣逆

胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩
以丹礬碾勻入坩鍋內以炭半斤煨赤更

養一夜出毒兩日入亭脂同碾粟米飯和丸綠豆大每日米飲下十五丸

反胃噦逆

黑鉛化汁以柳木槌碾成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許搗丸小豆

大每服一丸薑湯下

多年反胃不止

紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五兩燒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒煖

起挑於水上煖止碾勻蒸餅和丸梧子大每服二十九煎石蓮乾柿湯下

一切反胃

虎脂半斤切清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫

服以擦為度油盡再添

脾虛吐食 胃熱吐食

俱見脾胃門

噎膈

噎疾

古塚內罐罌中水但得飲之即愈極有神效
婦病噎用四物湯加驢尿與服以防其生蟲

數十帖

而愈

噎膈

用蛇含蜚蟄泥包燒
存性碾末米飲服

噎膈拒食

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜
子揀者等分為細末無灰酒一盞隔湯頓

熱徐嚙初服二分次日四分三日五分不食黃

犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗

米粟令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入沉香末

二錢食之噎膈吐食蛇含蝦蟇泥包煨存性碾

末每服一

錢酒下

膈氣噎塞

飲食不下用確背上細糠蜜丸彈子大時
時含嚙津液威靈仙一把醋蜜各半盞

煎五分服之吐出宿痰愈巧婦鳥巢一枚燒灰

酒服或一服三錢神驗膈氣哽噎甘遂麩煨五

錢南木香一錢為末壯者一錢弱者五分水酒調下
噎食膈氣馬蹄香四兩為末好酒三升熬膏
每服二匙好酒調下日三服 膈氣不食天靈蓋
七個每個用黑豆四十九粒層層隔封水火升降
楊梅色冷定取出去豆不用碾末每服一錢溫酒
下 膈氣吐食用地牛兒二個推屎蟲一公一母
同入罐中待蟲食盡牛兒以泥裹煨存性用去白
陳皮二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及蟲為末
每用一二分吹入咽中吐痰三四次即愈又大鯽
魚去腸雷鱗以大蒜片填滿紙包十重泥封晒半
乾炭火煨熟取肉和平胃散末一兩杵丸梧子大
密收每米飲服三十九丸 有一貧叟病噎膈食入
即吐胸中刺痛或令取韭汁入鹽梅鹵汁
少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈

膈氣 生桑寄生搗汁一盞服之

五噎膈氣 阿魏五錢五靈脂炒烟盡五錢為末以黃
雄狗胆汁和丸黍米大空心唾津送下三

十九忌羊 肉醋麩

五噎吐逆

心膈氣滯煩悶不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓溫服

噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用即急性子

也 人屎入蘿蔔內火煉三炷香取碾每服三分

黃酒下三服效 用生人胆一個盛糯米令滿入

麝香少許突上陰乾一半青者治瘡一半黑者治

噎並為末每服十五粒瘡用陳皮湯下噎用通草

湯下 華陀見一人病噎食不得下令取餅店家

蒜壘大飲二升立吐一蛇 赤稻細稍燒灰滾湯

一碗隔絹淋汁三次取汁入丁香一枚白荳蔻半

枚米一盞煮粥食神效 噎食不納畢澄茄白荳

蔻等分為

漠乾舐之

噎不下食

一僧病此數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胸喉視有何物苦我如此及死其徒

依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉

是肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味皆化為水又

投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投

之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾

蓋本于此今方上或以染甌水
飲人治噎膈皆取其殺蟲也

噎食病

蕎麥稽燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢碾末每酒服半錢白鷺尾毛燒

灰米湯每服一錢取鵬鳥未生毛者一對用黃

泥固濟煨存性為末每服一匙以溫酒服數月

不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩鹽

二錢搗如泥將水一鍾攪勻去滓調服日二不過

三日愈後

服補劑

老人噎食

不通黃雌雞肉四兩切茯苓二兩白麩六兩作餛飩入鼓汁煮食三五服效

卒然食噎

橘皮一兩湯浸去瓢焙為末以水一大盞煎半盞熱服取祀竈飯一粒食之即下

食哽

鷹糞燒灰水服方寸匕

噎塞不通

羚羊角屑為末飲服方寸匕并以角摩噎上寡婦木梳一枚燒灰煎鎖匙湯調下

二錢

氣噎不通

雞嗉兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和

丸梧子大每汁下三九

膈氣疼痛

用壁上陳白螺螄燒碾每服一錢酒下甚效

噎膈反胃

用糯米末以牛涎拌作小丸煮熟食香牛飲用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱

先以帛緊束胃腕令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食千轉丹用牛涎好蜜各半斤木

鯨仁三十個碾末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服用北庭砂二錢水和蕎麥麪包之煨

焦待冷取中間濕者焙乾一錢入檳榔二錢丁香二個碾勻每服七厘燒酒送下日三服愈即止後

喫白粥半月仍服助胃丸藥用北庭砂二兩一兩用人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取

出燈盞上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升過取末用桑灰霜一兩碾勻每服三分燒酒

下愈即止平胃散各一錢入硃砂生薑各五分為末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗秋

石每用一錢白湯下妙 諸藥不效真阿魏一錢
野外乾人屎三錢爲末五更以薑片蘸食能起死
人

吞酸嘈襍

嘈雜吐水

真橘皮去白為末五更安五分子掌心
舐之即睡三日必效皮不真則不驗

食物醋心

胡桃爛嚼以生薑湯下立止

醋心吐水

檳榔四兩橘皮一兩為末每服方寸匕空心生薑湯調下

醋心上攻

如濃酸用茱萸一合水三盞煎七分頓服
近有人心如蜚破服此二十年不發也累

用有一效

食已吞酸

胃氣虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑泡
等分為末湯服一錢 一婦病吞酸諸藥

不效偶食魚鱸其疾遂愈

噫吐酸漿

漿水煎頭垢豆許服一盃效

胃冷口酸

流清水心下連臍痛用葶芩半兩厚朴薑汁浸炙一兩為末入熟鮑魚肉碾和丸綠

萬方真集一吞酸嘈襍一

豆大每米飲下
二十九丸立效

呃逆

欬逆打呃

硫黃燒烟嗅之立止

諸氣呃噫

橘皮二兩去穰水一升煎五合頓服或加枳殼尤良

呃逆不止

黃蠟燒烟熏二三次即止 荔枝七個連皮核燒存性為末白湯調下立止 川椒

四兩炒

碾麩糊丸梧子大每服十丸醋湯下神效 柿蒂散治欬逆胸滿用柿蒂丁香各二錢生薑

五片水煎服或為末白湯點服一方加人參一錢 治虛人欬逆一方加良薑甘草等分一方加青皮

陳皮一方加半夏生薑

胃冷久呃

沉香紫蘇白豆蔻仁各一錢為末每柿蒂湯服五七分

陰證呃逆

乳香同硫黃燒烟嗅之

傷寒呃逆

見傷寒門

病後飢逆

也

不止聲聞隣家或令取刀豆子燒存性調服二錢即止此取其下氣歸元而逆自止

呃因痰怒

一女子性躁味厚暑月因怒而病呃每作則舉身跳動昏冒不知人其形氣俱實乃

痰因怒鬱氣不得降非吐不可遂以人參蘆半兩逆流水一盞半煎一大盃飲之大吐頑痰數盃大

汗昏睡一日而安

暴逆氣上

嚼薑兩三片屢效

噫不下食

取崖蜜含微微嚥下

哮喘

陽虛氣喘

自汗盜汗氣短頭暈人參五錢熟附子一兩分作四帖每帖以生薑十片流水二盞

煎一盞食遠溫服

喘急欲絕

上氣鳴息者人參末湯服方寸匕日五六服效忽喘悶絕不能語言涎流吐逆牙

齒動搖氣出轉大絕而復甦名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩水二盞煎一盞熱服可安 韭汁

飲一升效

上氣喘急

故錦一寸燒灰茶服神效杏仁桃仁各半兩去皮尖炒碾用水調生麩和丸梧子

大每服十九丸薑蜜湯下微利為度時有欬嗽茶子百合等分為末蜜丸梧子大每服七丸新汲水

下相和慢煎二十沸每嚙半匙取效沙糖薑汁等分

酒一盞半煎入分服

肺虛喘急連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯甑內蒸熟碾九梧子大每溫水下

丸一

肺壅喘急不得卧葶藶炒黃搗末蜜丸彈丸大每用

一丸更煎取一升頓服亦主支飲不得息

肺氣喘急馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盞內拌

水一盞煎六分溫呷或噙之久患者杏仁去皮

尖二兩童子小便浸一日一換夏月三四換滿半

月取出焙乾碾細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞

子大水一鍾煎七分食後溫服至效甚者不過二

劑永瘥忌腥物

風痰喘急用半夏湯洗七個甘草炙皂莢炒各一寸

薑三片水一盞煎七分溫服風痰喘逆

兀兀欲吐眩暈欲倒半夏一兩雄黃三錢為末薑

汁浸蒸餅丸梧子大每服三十九薑湯下已吐者

加櫛

傷水喘急

因年少飲冷水驚恐所致者古文錢七枚洗淨白梅七個水一鍾同浸三宿空心一

得吐效

肺濕痰喘

甜葶藶炒為末棗肉丸服

肺熱氣喘

生茅根一握咬咀水二盞煎一盞食後溫服甚者三服止肺熱悶喘急客熱往來

欲死不堪服藥者用桃皮芫花各一升以水四升煮取一升以故布納汁中取薄胸口溫四肢盈數

刻即止

痰喘氣急

栝樓二個明礬一棗大同燒存性碾末以熟蘿蔔蘸食藥盡病除梨剉空納小黑

豆令滿留蓋合住繫定糠火煨熟搗作餅每日食之至效生山藥搗爛半椀入甘蔗汁半椀和勻

頓熱飲之立止

痰氣喘息

蘿蔔子炒皂莢燒存性等分爲末薑汁和煉蜜丸梧子大每服五七十九白湯下

高年氣喘

蘿蔔子炒碾末蜜丸梧子大每服五十九白湯下

喘促浮腫

小便淋瀝用杏仁一兩去皮尖熬碾和米煮粥空心喫二合妙

諸喘不止

用椒目炒碾二錢白湯調服二三服以上劫之後乃隨痰火用藥

定喘化痰

用猪蹄甲四十九個洗淨每甲納半夏白錢七每用糯米飲下半錢定喘下氣補心腎用白仙茅半兩米泔浸三宿晒炒團參二錢半阿膠

一兩半炒雞臄脰一兩燒爲末每服二錢糯米飲空心下日二

蘇烏梅肉焙碾等分水煎服之

肺風喘促

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺竅

齁喘痰積

久積冷痰遇陰氣觸動則發也此服

即愈服至七八次即出惡痰數升藥性亦隨而出即斷根矣用江西淡豆豉一兩蒸搗如泥入砒霜

末一錢枯白礬三錢丸綠豆大每用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兒五丸即高枕仰卧忌食熱物

齁喘痰促 遇厚味即發者蘿蔔子淘淨蒸熟晒碾薑汁浸蒸餅丸綠豆大每服三十丸以津嚥

下日三服
名清金丸

齁喘咳嗽 蓖麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服見效終身不可食炒豆 齁喘痰嗽用九尖

蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉四兩薄批摻藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以白湯送

下名九仙散 哮喘痰嗽鴨掌散用銀杏五個麻黃二錢半甘草炙二錢水一鍾半煎八分卧時服

治效嗽涎喘不問年深日近用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩為末蜜丸彈子大每

服一丸白湯化下日一服 喘嗽齁胎不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口

服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次絕根屢驗

萬方類纂一哮喘三

三

肺氣齟喘

猪爪甲二枚燒灰碾入麝香一分同碾搗服寒痰齟喘野園萎碾汁和酒服即住

鹽哮痰喘

相樹皮去粗搗汁和飛麩作餅烙熟早辰與兒喫三四個待吐下鹽涎乃佳如不行

熱茶催之

齟喘不止

榆白皮陰乾焙為末每日旦夜用水五合末二錢煎如膠服

年深哮喘

雞子畧敲損浸尿缸中三四日煮食能去風痰金陵一鋪治哮喘白果定喘散服

之無不效者其人以此起家其方用白果二十一

個炒黃麻黃三錢蘇子二錢欵冬花法制半夏桑

白皮蜜炙各二錢杏仁去皮尖黃芩微炒各一錢

半甘草一錢水三鍾煎二鍾隨時分作二服不用

薑

痰氣齟喘

馬蹄香焙碾每服二三錢正發時淡醋調下少頃吐出痰涎為驗苦丁香三個為

末水調服

吐痰即止

聲音

卒然失音

用生大豆一升青竹筍子四十九枚長四寸潤一分水煮熟日夜三服瘥杏仁去

皮熬黃三分和桂末一分碾泥裹含之燕汁橘皮半兩水煎徐呷

失音不語

人乳竹瀝各二升溫服 蘿蔔生搗汁入薑汁同服失音不語病吃者梭頭刺手心

令痛即語 男左女右

卒風不語

穀枝葉剉細酒煮沫出隨多少日日飲之

中風失音

見諸風門

卒不得語

煮豉汁加入美酒服之 人乳半合美酒半升和服

暗風失音

生梨搗汁一瓊飲之日再服

聲失不出

馬竅勃馬牙硝等分碾末沙糖和丸茨子大噙之

萬方類纂

聲音一

靈

喘嗽失音

見咳嗽門

肺熱聲啞

人參一兩訶子一兩為末噉燕猪脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨令

定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺

肺壅失音

杉木燒炭入盃中以小盃覆之用湯淋下去盃飲水不愈再作音出乃止

風令失聲

咽喉不利藁荷根二兩搗絞汁入酒一大盞和勻細細服取瘥

口卒噤瘖

卒忤停尸並用附子末吹入喉中瘥

驚忤不語

打撲驚忤血入心竅不能言語朱砂為末以雄猪心血和丸麻子大每棗湯下七丸

嬰孩驚瘖

小兒癇瘖見驚瘖門

驚氣入心絡

瘖不能言語者用蜜陀僧末一匕茶調服即愈屢用有驗蓋驚則氣亂蜜陀僧

之重以去怯而平肝也

舌蹇語吃川椒以生麩包丸每服十粒醋湯送下

小兒就瓢及瓶飲水令語訥

小史與禮文錄類本合編

言家語類

臥寐

夜不得眠

衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰陽

既通其臥立至方用流水千里者八升揚之萬遍取清五升煮之炊以葦薪大沸入秫米一升半夏

五合煮一升半飲汁一盃日三以知為度病新發者覆杯則臥汗出則已久者三飲而已夜不合

眼難睡燈心煎湯代茶飲即得睡

煩悶不眠

大棗十四枚葱白七莖水三升煮一升頓服

虛煩不眠

酸棗仁湯用酸棗仁二升蜩毋乾薑茯苓芎藭各二兩甘草炙一兩以水一斗先煮

棗仁減三升乃同煮取三升分服

振悸不眠

用酸棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩水八升煮三升分服

膽虛不眠

心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二錢竹葉湯調下

葛粉煎

臥寐

薑

辰砂半兩乳香二錢半煉蜜丸服用馬頭骨灰
乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒服

骨蒸不眠心煩用酸棗仁一兩水二盞碾絞取汁下
粳米二合煮粥候熟下地黃汁一合再煮

食勻

虛勞不眠乾薑為末湯服
三錢取微汁出

晝夜不眠以新布火炙熨目并蒸大豆更番囊
盛枕之冷即易終夜常枕之即愈

房勞黃病體重不眠見黃疸門

穀勞嗜臥飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重嘿嘿
欲臥食畢輒甚用大麥蘖一升椒一兩並

炒乾薑三兩搗末每服
方寸匕白湯下日三

人眈睡臥花穀葉晒碾末湯服一二錢取瘥止
頭骨燒灰水服方寸匕日三夜一令人不馬

睡作枕亦良

膽風沉睡

膽風毒氣虛實不調昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全挺蠟茶二兩以生薑汁塗炙

微焦為散每服二錢水七分煎六分溫服

膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸竹葉

湯下

目澁好眠

取鼠目一個燒碾和魚膏點入目皆兼以絳囊盛兩枚佩之

睡死不寤

蠹實根一握杵爛以水絞汁稍稍灌之

臥忽不寤

若以火照之則殺人但睡其面痛齧其踵及大趾甲際即活以犀角為枕即令不魘

又或再以井底泥塗其目令人垂頭入井中呼其姓名便甦也勿以火照之但痛齧拇指甲際而

唾其面則活取韭擣汁吹入鼻中冬月則用韭根

多忘喜臥

人心昏塞多忘喜臥取商陸花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事

即于眠中醒悟也

神困多睡

膈上虛熱咽喉噎塞小便赤澹神困多睡用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥門冬

黃芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分為末蜜丸梧子大每服二十九麥門冬湯下

一切鼻齁

盧州瓷器為末發時用二錢以手指點津液蘸藥點舌下嚥之即效

去熱少睡

龍葵菜同米煮作羹粥食之

令臥不起

東行白馬蹄下土合三家井中泥置人臍下即臥不能起也

人好魘寐

桃仁熬去皮尖三七枚以小便服之以赤欄一尺枕之即安

卒魘不寤

以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活 皂莢末刀圭吹之能起死人 卒魘死昏東門

上雞頭為末酒服之

夜臥魘死
勿用火照急取梁塵納鼻中即活 又見邪崇門

夜臥禁魘
凡臥時以鞋一仰一覆則無魘及惡夢 又見邪崇門

夜多惡夢
通宵不寐戴辰砂如箭鏃者涉旬即驗

入夜讖語
靈床上果子食之即止

睡中汗出
酸棗仁人參茯苓等分為末每服一錢米飲下

補遺

瘡疾門

斷絕瘡疾

竹紙包犬毛
燒末酒服

痢疾門

赤白下痢

苧麻子炒研為末每蜜湯服一錢
者馬鞭草根焙搗羅末每米飲服一錢
初起

無所忌
一宿空腹和醬食一頓即瘥

下痢休息

狗骨燒灰
米飲日服

便痢膿血

下痢膿血後重枸橘葉草薺等
分炒存性研每茶調二錢服

霍亂門

霍亂轉筋

單煮香薷服之若四肢煩冷
汗出而渴者加麥子同煮服

萬方類纂一補遺

裏

吐利後轉筋白扁豆葉生搗一
入少酢絞汁服立瘥

瘟疫門

辟禳瘟疫

赤朮同猪蹄甲燒烟辟一切惡氣

傷寒門

春為溫夏為熱秋為瘧冬為寒四時天行為疫癘

傷寒食復

寒食飯燒研米飲服二三錢效

勞復食復

凡病後食勞復取當時來參病人行止脚

鼠頭一枚或鼠屎三七粒煮服神效

陰陽易病

見男陰門

婦人勞復

見調經門

發熱門

黑奴丸

治熱極發狂發斑見瘟疫門陽毒溫毒條

諸汗門

盜汗不止

敗蒲扇燒灰酒服一錢

陰汗

又見男陰門

身熱多汗

敗蒲扇灰和粉粉身止汗彌敗者佳

夏月止汗

麻黃根節杵末襍粉撲之

服麻黃自汗不止

以冷水浸頭髮仍用撲法即止麻黃根節止汗以故竹扇杵末同

撲之

消渴門

上消少食中消多食下消小便如膏油

消渴飲水

黃絲絹煮汁服 燻猪湯瀝飲一碗勿令病人知之 消渴消中皆脾弱腎敗土不

制水而成疾若脾脈實而腎氣不衰當由果實酒物過度積熱在脾所以食多而飲水飲既多溺

不得不多非
消非渴也

消渴不止

田字草曝乾栝樓等
分爲末人乳和丸服

消渴羸瘦

小便不禁兔骨和
大麥苗煮汁服效

欬嗽門

欬嗽吐血

璠玉膏見
健忘門

肺虛欬嗽

猪肺一具以竹刀切片麻油炒熟同粥
食嗽血者猪肺煮蘸薏苡仁末食之

喘嗽失音

蘿藦同皂
莢煎服

上氣欬嗽

胸脇支滿多唾者每用
温酒吞白芥子七粒

熱欬咽痛

見咽
喉門

哮喘門

寒齁氣喘

及瘧疾寒熱半邊蓮同雄黃各二錢搗泥
盃內覆之待色青以飯丸梧子大每服九

丸空心
鹽湯下

聲音門

啞病

蟬蛻一錢
井華水服

臥寐門

夜不得眠

木槿皮并根或葉炒煎
作飲服之令人得睡

虛勞不眠

膽熱虛勞不眠榆葉酸
棗仁等分蜜丸日服

風濕臥床不起

見諸
風門