

增注類證活人書卷十一

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極惡仲景經中  
不載孫真人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其  
狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆爲噦耳大抵  
咳逆者古人所謂噦是也哕者今人所謂乾嘔是  
也

八十七 問咳逆

咳逆者仲景所謂噦者是也

乙芮切  
逆氣

噦胃寒所生傷

寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復發  
汗者其人外怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以

今在哕逆別  
於咳噦令人  
易曉胃寒宜  
楊皮乳薑湯  
陸皮乳薑湯  
中本通云

薑黃 炙 炙 炙

冬 桂 枝 去 核

胃 熱 甚 呃 逆

宜 三 黃 湯

右 黃 芩 半 斤 黃 連 七 分

炙 甘草 五 兩

竹 葉 青 有 根 亦

然者胃中寒故也橘皮乾薑湯雜方羗活附子散雜

半夏生薑湯雜方退陰散主之雜方若服藥不差者

灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指為率正以男左女

右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脈處是然亦有陽證咳逆者小柴胡

湯三九橘皮竹茹湯雜方仲景又云傷寒噦而腹滿

視其前後知何部不利利之即愈仲景無方前部宜猪苓湯五十七後部

宜調胃承氣湯五十三○扁鵲中藏經治傷寒咳逆丁香散丁香

穉蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱

猛喫極效○三因第十一卷又有竹茹湯等方亦丁

香散方竹茹湯治陽證也○本事方第八卷治傷寒

候咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥  
若陽證不可用○凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼  
藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大  
熱以涼藥下之想大甚咳逆四五日竟至於服丁香  
稊蒂而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后  
蓋有身熱不解○治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋  
山周先生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩  
細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒  
藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細  
旋呷服○一方單用香附子末○又方大蒜頭二箇

煨動研爆入白薑末

丸得為度

研和如梧桐子大搗蕤菜

自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

八十八

問發黃

病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與

宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃

漢贊南方暑濕近夏瘴熱蓋瘴者黃也古

人以黃為瘴濕熱相薄民多病瘴甚為跗腫也

然發黃與瘀血外證及脉俱

相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃

之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血

證即如狂大便必黑此為異耳凡病人身體發熱頭

面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利如此

必發黃茵陳蒿湯<sub>芩三</sub>加五苓散<sub>芩六</sub>也茵陳蒿湯十分五苓

散五分三件拌和每服一錢溫水調下日三服病人服湯得小便利如皂莢

汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不

利小便非其治也大抵發黃者癉熱在裏由小便不利而致之也梔子蘘皮

湯<sub>芩三</sub>麻黃連翹赤小豆湯<sub>芩三</sub>可選而用之又方

傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗即用茵陳蒿湯調五苓散服之最良

○又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不

發黃荅曰白虎與發黃證相近遍身汗出此為熱越

白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也○又

問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之第八卷第十○又問病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳嗽者何也少陽中風也小柴胡湯主之五

八十九 問發狂

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脉皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如

此辨陽毒發狂

及血疾蕙狂最

當而血滲無表

證不寒熱不欲

飲水脉微而沈

粗二無不和其

為癍內伏大熱

之病身冷以氣

血之藥次石膏

黃芩等白茯苓也

推之小腹硬滿

中便利大便黑

見鬼狀此陽毒也治藥方在病入無表證不發寒熱

唇燥但欲嗽水不欲入咽其脉微而沈小腹鞭滿小

便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也病人如熱

燥其脉反無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽

病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不

解者尚未可攻當先解其表宜桂枝湯正二外已解

但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之正十四

大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化為血其人喜忘

而如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯

羌上抵當圓芍藥輕者桃仁承氣湯正十四犀角地黃

湯雙共須取盡黑物為效

夫血熱畜在膀胱經若用

抵當湯更須仔細審其有

無表證若有畜血證而外不解亦未可用抵當湯

須登舌人書十一

四

即石慈狂而微  
常熱心是蓄血  
澄宜厚菊地黄  
湯加薄荷桃仁  
蘇木或加風桃  
仁承氣湯去黃芩  
風化硝石甘竹亦  
陳皮多事松元京  
桃仁厚蘇木亦

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧

起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方十

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方十四主之凡灸及燒鍼後證似火劫者並用切

法治之金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷

九十一 問發班

發班有兩證温病發班熱病發班温毒發班者冬月觸冒寒毒

至春始發或已汗下表證未除毒氣未解故發班黑

膏主之難主或冬月温暖人感乖戾之氣至春初爲

積寒所折毒氣未得泄迨天氣暄暖温毒始發肌肉



班爛癩疹如錦紋而咳心悶嘔清汁葛根橘皮湯夔

齒屢用之驗黃連橘皮湯亦佳夔三五廣州諸倅子班如壞梨醬熱病

發班者與時氣發班同或未汗下或已汗下熱毒不

散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發班瘡癩疹如

錦紋俗呼瘡麩素問謂之胗發班者下之太早熱氣乘虛故也下之太遲熱

留胃中赤發班服熱藥過多亦發班微者赤班出五死一生劇者黑班出十死一生大抵發班

不可用表藥表虛裏實若發汗開泄更增班爛也皆

當用化班湯夔三玄參升麻湯夔五阿膠大青湯夔

去猪膽梔子湯夔或與紫雪大妙可下者與調胃

承氣湯五十三暑月陽氣重者常宜體候○又有陽毒

發班見十九問二十一問宜參酌之

五十二 問讖語

病人有讖語有鄭聲二證鄭聲爲虛當用溫藥白通湯主之〔五十七〕讖語爲實當須調胃承氣湯主之〔五十三〕服調胃承氣而讖語止或更衣者停後服不爾再與之仲景云實則讖語虛則鄭聲鄭重也重語也世多不別然讖語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脈別之若大小便利手足冷脈微細者必鄭聲也大便秘小便赤手足溫脈洪數者必讖語也以此相參然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗卽讖語仲景云傷寒四五日

脉沈而喘滿沈為在裏反發其汗津液  
越出大便為難表虛裏實實則讖語  
讖語屬胃和

中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有三陽

合病讖語者三陽合病腹滿身重難以轉側口中不  
仁面垢讖語遺溺其脉必滑實不可汗

下宜白虎湯有胃實譫語者病人身熱汗出大便硬為  
胃實宜調胃承氣湯

大承氣湯或發汗多亡陽讖語者發汗多  
亡陽讖語者不可下此為津液不和與柴胡桂枝湯

亡陽讖語者不可下此為津液後自愈恐人作燥屎攻之

慎不可有下利讖語者下利讖語有燥屎也調胃承  
氣湯

有下後讖語者傷寒八九日下之胸滿煩驚小  
便不利讖語身重不可轉側者

柴胡加龍骨有婦人熱入血室讖語者婦人傷寒發  
熱經水適來

晝日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室無

犯胃氣及上二焦速用小柴胡湯主之三十九若行湯

遲熱入胃合津燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當  
針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來入血室也  
當刺期門隨其實而取之已上二焦熱結在期門也  
若犯胃氣晝夜讖語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯  
證中  
○又問仲景云無犯胃氣何也荅曰熱因經水  
適來乘虛入室故血室有熱遂合讖語當以小柴胡  
解之三九卽與胃實讖語不同胃實有燥糞故宜調  
胃承氣湯下之四五若血實有熱讖語非胃家實仲  
景恐人作胃實攻之故曰無犯胃氣也大抵讖語是  
熱屬陽而反見陰證者逆

九十二 問吐血

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗

熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者  
抵當圓芍朮輕者桃仁承氣湯齒齒兼服犀角地黃  
湯雞六三黃圓雞六

九十三

問腹痛

腹脹滿附

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛是有表復有裏  
仲景所以用桂枝加芍藥湯主之芍三痛甚者加大

黃

正方十三

桂枝加芍藥即是小建中也太陰脈弱自利  
設當行大黃芍藥者宜減之其人胃虛陽氣易動

故也

下利者先

煎芍藥十餘沸難經云痛爲實大抵痛宜下

仲景云發汗不

解腹

滿痛者急下之宜大承氣湯正方十一又曰  
腹中滿痛此爲實當下之屬大柴胡湯正方三

腹痛有

二證有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛

也小建中湯主之三十七仲景云陽脉濇陰脉弦法當

腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯

小柴胡去

黃芩加芍藥

陰證腹痛卽四逆散三十八通脉四逆加芍

藥湯三十九腹痛小便不利者真武湯四十關脉實腹

滿大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯四十一

黃連湯四十二大承氣湯主之四十三○又問腹脹滿者

何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良四十四仲景論太

陽證發汗後腹脹滿也厚樸生薑半夏甘草人參湯

四十五下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚樸湯四十六

吐後腹脹滿者與調胃承氣湯四十七少陰病六七日

腹脹不大便者急下之宜承氣湯苦

卒四 問煩躁

傷寒煩躁太陽與少陰經為多蓋太陽與少陰為表裏陽明經

或因不大便中有燥屎故煩躁耳仲景云病人不大便五六日遶臍痛

煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯大抵得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭小便利尿

定鞭以小承氣湯十三少少與微利之然有病已差尚微煩必大便鞭當問其小便日幾行若小便少津

液當還入胃大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽不須攻也

經傷風多煩而躁也仲景云太陽傷風服桂枝湯正一

枝湯又云太陽傷風脈浮發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁者大青龍湯主之三五五又云傷寒二三日心

中悸而煩者小建中湯主之三五七又云傷風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐五苓

散主之（五十六）又云傷寒得病無熱但狂言煩躁不安  
精氣不與人相當但與五苓散二大錢服之當與新  
汲井水飲一升許卽以指刺喉去之隨手愈然而太  
陽證自汗心煩若小便數者又不可用桂枝表也

陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱爲陰所乘而躁故少陰

病亦煩躁少陰病二三日已上心煩不得卧黃連阿

躁欲死者吳茱萸湯主之（五十四）少陰病吐利手足逆冷煩

滿心煩者猪膚湯主之（五十三）少陰下利六七日欬而

嘔渴煩不得眠猪苓湯主之（五十二）少陰病惡寒

而蹇時時自煩欲去衣被大柴胡湯下之（五十一）學者

當以外證與脉別之也寸關浮數身熱而煩者屬太陽

煩者屬然有汗之而煩者仲景云大陽病發汗後大

少陰也汗出胃中乾煩躁不得眠

欲得飲水者少少與之令胃中和則愈若脉有下之

浮小便不利微熱消渴五苓散主之（五十六）有下之

而煩者仲景云下之後發汗晝日煩躁不得眠夜而

安靜不嘔乃渴無表證脉沈微者乾薑附子



湯主之正七十三又云發汗吐下後虛煩不得眠心中懊  
懣者梔子豉湯主之正五十五發汗若下之病仍未解煩  
躁者茯苓四逆湯主之正方七十八又有病已解而反微煩者此由病新

差不勝穀損穀則愈先用小柴胡湯正三十九和其榮衛

中然後以調胃承氣湯正方四十三

### 九十五 問下利者

傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互三陽下利則

利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別之大抵下

利挾太陽脈證便不得用溫藥俗醫但見下利便作

陰證用溫熱藥鮮不發黃生斑而死也太陽陽明合病必下利葛根湯

正六十六主之下利而頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾其脈浮大而長者是其證也太陽少陽

合病自下利黃芩湯主之正六十五若嘔者黃芩湯加半

夏生薑也正八六下利而頭疼胸滿或口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脉浮大而弦者是其證也

陽明少陽合病必下利其脉不負者順也負者失也

互相尅賊名為負也下利而身熱胸脇病滿乾嘔或往來寒熱其脉長大而弦者是

其證也蓋陽明者土其脉長大少陽者木其脉弦若合病土被木賊更下利為胃已困若脉不弦者順也

為土不負自利不渴屬太陰四逆湯主之自利而

渴屬少陰白通湯白通加猪膽湯正八十八通脉四逆湯

加人參湯其餘下利皆因汗下後證也大抵傷

寒下利須看脉與外證下利而脉大者虛也脉微弱

者為自止下利日十餘行脉反實者逆下利脉數而

滑者有宿食也下之愈脉遲而滑者實也其利未得

便止更宜下之下利三部脉皆平按其心下硬者急

下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁

垢膩

謂之腸垢

寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大便或黃

白或青黑或下利清穀濕毒氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有熱也下

利讖語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯芫五理中

湯芫四白通湯加附子芫七四逆散加薤白芫六主

之協熱利者黃芩湯芫五白頭翁湯芫三三黃熟艾

湯薤方薤白湯薤百赤石脂圓薤百濕毒下膿血者

桃花湯芫九地榆散薤百黃連阿膠湯薤百雖然自

利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也

三陰下利宜溫之然少陰自利清水心下痛口乾燥

者却宜下之此又不可不知也少陰泄利下重不可投熱藥先濃煎薤白

湯雜二百內四逆散緣四逆散用枳實芍藥之類又尋常胃中不和腹中腸鳴下利生薑瀉心湯最妙正六十三

此二法不特傷寒證也

### 九十六 問小便不利小便難

傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便不利

醫見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾則無

小便慎不可利故仲景云下之後復發汗小便不利

者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脉浮

者五苓散〔五十六〕脉沈者猪苓湯也〔五十七〕表不解心下

有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青龍湯去麻

黃加茯苓也〔五十八〕傷寒無汗翕翕發熱頭項強痛小

便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也〔五十九〕嘔而發

熱胸脇滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩

加茯苓〔六十〕少陰病小便不利者四逆散加茯苓也

〔七十一〕傷寒有所不利者行之取其溲泄也有渴而飲

停者有躁而煩渴者有病氣去而水氣不得行者其

表裏得見煩躁口燥欲飲水水入即吐病名水逆及

霍亂頭痛發熱身疼痛欲飲水者有發熱汗出復惡

寒不嘔但心下痞者並宜五苓散其脉浮發熱渴欲

飲水小便不利少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩

不得眠者宜與猪苓湯其大病差後從腰已下有

水氣者牡蠣澤瀉散〔七十四〕此利水道溲泄之義也大

抵中濕與發黃以利小便爲先陽明汗多以利小便爲戒○又問小便難何也陰虛故也陰虛者陽必湊之爲陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥滑石之類瀉之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之正六陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓主之正五

九十七

問小便自利小便數

太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反

利者下血證也抵當湯主之〔五十二〕陽明證自汗出應  
小便少而小便自利者津液內竭也屎雖硬不可攻  
也當用蜜煎導之〔五十三〕少陰證四逆而小便自利者  
虛寒證也四逆湯〔五十四〕真武湯去茯苓主之〔五十五〕○  
又問小便數者何也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之  
也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小  
便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也診其趺  
陽脉數胃中熱卽消穀引飲大便必硬小便卽數也  
太陽病自汗四支拘急難以屈伸心煩微惡寒腳攣  
急若小便數者慎不可行桂枝也宜與甘草乾薑湯

〔五十五〕芍藥甘草湯也〔五十七〕大抵洩數則大便難仲景云趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇卽小便數浮濇相薄大便則鞭其脾爲約麻子仁圓主之〔五十三〕太陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯〔五十二〕和之愈○又云傷寒脉浮自汗小便數若胃中不和讖語者少與調胃承氣湯〔五十三〕

〔五十八〕

問有數日不大便有  
大便難有  
大便鞭有  
燥屎有  
大便濇

傷寒數日不大便大便鞭及有燥屎皆知用大柴胡

〔五十三〕大承氣〔五十二〕小承氣〔五十三〕攻之然仲景論大便



不通亦有數種不可攻者

在第三卷第三問中詳言之矣

○仲景又

有陽結陰結之論不可不別也其脉浮而數能食不大便此爲實名曰陽結宜用小柴胡湯三十九所謂和其榮衛以通津液縱不了了得屎而解也其脉沈而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用金液丹所謂陽盛則促陰盛則結促結同也○又問大便澹者何也古人云歲火不及寒乃大行民病鶩澹大率病人腸中有寒卽大便鴨澹蓋澹者胃中冷水穀不別故也華佗云寒卽澹熱卽垢仲景說初鞭後澹有二證小便不利小便少皆水穀不分耳

九十九

問病人默默欲眠目不能閉起居不安其

聲啞或咽乾

啞所訝切  
聲破也

此名狐惑傷寒也狐惑與濕匿皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目不能閉起居不安蟲蝕其喉爲惑其聲啞蟲食下部爲狐其咽乾狐惑之病並惡飲食面目乍赤乍白乍黑是其證也大抵傷寒病腹內熱入食小腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部爲蠹病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四支沈重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲食其臟

也下唇有瘡蟲食其肛也殺人甚急多因下利而得  
治蜜桃仁湯雜豆黃連犀角湯雜豆雄黃銳散主之

雜豆

一百

問病人欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不收飯時如強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入卽吐利

此名百合傷寒也百脉一宗悉致其病無復經絡也其狀欲食復不能食常默默欲得卧復不能卧欲出

行復不能行飲食或有美時或有不炊飯時如強健  
人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦  
小便赤百合之病諸藥不治藥入卽吐利如有神靈  
此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也百  
合知母湯雞豆滑石代赭湯雞豆雞子湯雞豆百合  
地黃湯雞豆百合洗方雞豆栝樓牡礪散雞豆滑石  
散雞豆主之

增注類證活人書卷十一終

增注類證活人書卷十二

此一卷說藥證并藥方加減法所謂藥證者藥方前有證也如某方治某病是也傷寒有證異而病同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審知某證者某經之病某湯者某證之藥然後用之萬全矣又況百問中一證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是治下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以對

治之則無不中矣所謂藥方并加減法者仲景傷寒方一百十三道病與方相應乃用正方科有差別卽隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳爲名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取效速一服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓利水故腎氣動者去白朮小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病須是隨證加減今於逐

桂枝湯倍芍

加能糖黃芪名

黃芪建中湯治

虛勞燮裏虛

方下說病證用藥加減庶幾修合之際便見治法

兼古方凡稱呔咀者直云劉如麻豆大云一升者

只用一大白蓋以古准今易曉而通用也尋常疾

勢輕者只抄龕末五錢匕水一盞半入薑棗煮七

八分去滓服之未知再作病勢重者當依古劑法

古之三兩卽今之一兩也二兩卽今之六錢半也古之三勝卽今之一勝也料例大者只合三分之

一是也

桂枝湯一 太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴

乾嘔者宜服之○太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜

服之○太陽病下之後其氣上衝者宜服之○桂枝

虛諸不足千金

去能加膏湯治

婦人諸虛怯

去甘草加此芪

名黃芪湯治血

痺因風所傷臂

痛金鎚以治風

中經絡喝斜偏

廢

本爲解肌若脈浮緊發熱汗不出者不可與之。○太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯。○服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯。○服桂枝湯大汗出大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之。○服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急與桂枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之厥愈更作芍藥甘草湯與之其腳伸若胃氣不和與



調胃承氣湯若重發汗如燒鍼者四逆湯主之。○太  
陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜服。○太陽病  
外證未解不可下也下之爲逆解外宜服。○太陽病  
先發汗不解復下之脉浮者不愈浮爲在外而反下  
之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜服  
○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧也  
以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脉中衛行脉外  
復發其汗榮衛和則愈宜服。○病人藏無他病時發  
熱自汗出而不愈者衛氣不和也先其時發汗則愈  
宜服。○傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小

便清者知不在裏當發汗宜服。○傷寒發汗解半日許復熱煩浮數者可更發汗宜服。○傷寒醫下之清穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯。○太陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜服。○傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯。○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈。○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈。○太陽病不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯其解外宜服。已上屬太

陽○陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜服○病

人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脉實者宜大承氣

湯脉浮虛者宜服已上屬陽明○太陰病脉浮可發汗宜

服屬太陰○下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫

裏宜四逆湯攻表宜服屬厥陰○吐利止身痛不休宜

桂枝湯小和之屬霍亂

桂枝

芍藥各參兩

甘草貳兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水壹盞半入生薑

五片棗子貳枚煎至壹盞去滓溫服須臾飲熱稀

粥壹盞以助藥力溫覆令一時許遍身絜絜微似

有汗者佳○

加減法

桂枝湯自西北二方居人四時

行之無不應驗江淮間唯冬及春可行之自春末

及夏至已前桂枝證可加黃芩一分謂之陽旦湯

夏至後有桂枝證可加知母半兩石膏一兩或加

升麻一分若病人素虛寒者正用古方不在加減

也○戒曰桂枝最難用雖云表不解脉浮可發汗

宜桂枝湯須是病人常自汗出小便不數手足溫

和或手足指稍作微冷少頃却溫身雖微似煩而

又增寒始可行之若病人身無汗小便數或手足

冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也

仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與

桂枝麻黃各半湯二 太陽病得之八九日如瘧狀發

熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日三二

度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱

虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲

解也以其不能得小汗出身必痒宜服屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

炙各八錢

麻黃

半兩湯泡焙秤

杏仁

一十二箇湯浸去皮尖兩仁者

右劉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服又見辯誤

桂枝二麻黃一湯三服桂枝湯大汗出脉洪大者與

桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜

服屬太

桂枝八錢

芍藥五錢

杏仁八箇沸湯浸去皮尖

甘草二分

麻黃三錢一字湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分温服以微汗爲度又見辨誤

桂枝二越婢一湯四太陽病發熱惡寒熱多寒少脉

微弱者此無陽也不可發汗宜服之屬太

桂枝

芍藥

甘草各半兩

石膏

六錢  
搗碎

麻黃

半兩湯泡去  
黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見  
辯誤

桂枝加桂湯五燒鍼合其汗鍼處被寒核起而赤者

必發奔豚氣從小腹上衝心者炙其核上各一壯與

此藥

屬太  
陽

桂枝五兩

芍藥三兩

甘草炙二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝湯加桂以  
桂能泄奔豚之

也氣

桂枝加附子湯 六 太陽病發汗遂漏不止其人惡風

小便難四支微急難以屈伸者宜服之 屬太陽

桂枝 去皮 芍藥 各一兩半 甘草 一兩

附子 炮去皮用半箇

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝去芍藥湯 七 太陽病下之後脈促胸滿者宜服

之 屬太陽

桂枝 一兩半去皮 甘草 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一



枚水一盞半煮至八分去滓溫服

芍藥味酸脈促胸滿恐成結胸

故去芍藥佐則單用  
辛甘發散毒氣也

桂枝去芍藥加附子湯

八

太陽病下之後脈促胸滿

者桂枝去芍藥湯主之若微寒者宜服之

屬太陽

桂枝

一兩半  
去皮

甘草

一兩  
炙

附子

去皮尖  
半箇炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去桂加茯苓白朮湯

九

服桂枝湯或下之仍頭

項強痛翕發熱無汗心下滿微疼小便不利者此

主之

屬太陽

蜀漆大常山苗服

之必吐止陽參用

吐法必是誤宜數

不可用桂枝參作

能補心陽則妙法

也

芍藥

茯苓

白朮

各一兩半

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯十傷寒脈浮

醫火劫之亡陽必驚狂卧起不安者此主之

桂枝

蜀漆

各一兩半

甘草

一兩炙

牡礪

二兩半

龍骨

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯十一發汗後身疼痛

脈沈遲氣血虛

按加參考差以

補之

脈沈遲者此主之

屬太陽

桂枝

人參 各一兩半

芍藥 二兩

甘草

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥湯 十二 太陽病反下之因腹滿痛屬太

陰此主之

桂枝 三兩

甘草 二兩

芍藥 六兩下利者先煎芍藥三四沸

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

太陽未罷故用

桂芍味痛屬

熱故加芍藥

大黃分

因燒鍼驚志陽  
以桂枝甘味補之  
虎牡飲神視

桂枝加大黃湯 十三 太陽病反下之因腹滿痛屬太

陰桂枝加芍藥湯主之大實痛者此主之

桂枝 六分 去皮

芍藥 三兩

甘草 一兩 炙

大黃 二兩

痛甚者加大黃

大實痛者加一兩半羸者減之

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服 又見辯誤

桂枝甘草龍骨牡礪湯 十四 火逆下之因燒鍼煩躁

者此主之 屬太陽

桂枝 半兩 去皮

甘草 炙

牡礪 熬

龍骨 各一兩

六銖桂枝三錢  
甘味甘溫合即  
峻補心陽向切  
此也

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

桂枝甘草湯十五

發汗過多其人叉手自冒心心下

悸欲得按者此主之

屬太陽

桂枝

二兩  
去皮

甘草

一兩  
炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

桂枝人參湯

十六

太陽病外證未除而數下之遂協

熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者此主之

桂枝

一兩  
三錢

甘草

一兩三  
錢炙

乾薑

炮

人參

白朮各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服日再夜一服

桂附湯十七

傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者此主之若其人大

便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

屬太陽

桂枝

一兩三錢若大便鞭小便自利者去桂加白朮一兩三錢

附子

一箇炮去皮

甘草

三分炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服日三服

項強八八筋受

熱燥也故用芍

根以太陽傷風

自汗故用桂枝

陽加麻黃者

謬也亦有汗无用

麻黃淫

下之動其肺氣

而上喘加杏仁

苦辛以浮氣太

陽未罷仍用桂

枝湯

桂枝加葛根湯

十八

太陽病項強几几反汗出惡風

者此主之

伊尹湯液論桂枝湯中加葛根今監本用麻黃誤矣

桂枝

甘草

炙

芍藥

各六錢三字

葛根

一兩三錢

麻黃

一兩一錢本無

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓服覆取微汗

桂枝加厚樸杏子湯

十九

太陽病下之微喘者表未

解故也此主之

屬太陽

桂枝

去皮

芍藥

各一兩

甘草

六錢三字炙

杏仁

去皮尖十七箇

厚樸

去皮薑汁炙六錢三字

嶺南人脈理  
既傷寒即未

出汗以桂枝方

風擇一味微發

之其汗即出不

必麻桂合用也

故麻黃湯是嶺

南人禁劑

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚煎至八分去滓溫服覆取微汗

麻黃湯 二十 太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘

者宜服○太陽陽明合病喘而胸滿不可下宜服○

太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸

滿者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與服之○太陽

病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在

此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脈浮

緊不發汗因衄此主之已上屬太陽○陽明病脈浮無汗



而喘發汗則愈宜服○脉但浮無餘證者與服若不

瀉腹滿加噦者不治已上屬陽明

甘草

半兩炙

桂枝

一兩

杏仁

三十五箇去皮尖

麻黃

一兩半去節百沸湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服覆取微汗不須嚙粥加減法傷寒熱病

藥性須涼不可太溫夏至後麻黃湯須加知母半

兩石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏月服之

有發黃斑出之失唯冬及春與病人素虛寒者乃

用正方不在加減

汗出而喘乃風熱  
 乘肺之淺竅由人  
 宜石膏在在麻  
 判者言為不須用  
 麻黃也。常天士  
 治風熱咳嗽用  
 而在甘石加乘  
 葉連翹化裁獨  
 妙

麻黃杏子甘草石膏湯 二十一 發汗後不可更行桂枝

湯汗出而喘無大熱者可與此服之 屬太陽

甘草 一兩 炙 石膏 四兩 碎 綿裏 杏仁 二十五箇 去皮尖

麻黃 二兩 去節 湯泡 去黃汁 焙乾 秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

麻黃附子甘草湯 二十二 少陰病得之二三日可與此

藥微發汗 以二三日無證故 微發汗也屬少陰

麻黃 二兩 去節 湯泡 去黃汁 焙乾 秤 甘草 二兩 炙

附子 一枚 炮去 皮破 八片

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓温服相次二兩服以身微汗爲度

麻黃細辛附子湯 二十三 少陰病始得之反發熱脉沈

者此主之 屬少陰

麻黃 二兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

細辛 二兩

附子 一枚炮去皮破八片

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓温服

麻黃連翹赤小豆湯 二十四 傷寒瘀熱在裏身必黃此

主之 屬陽明

因傷寒汗故

用麻黃葶藶

因痰熱成疸故

去豆在仁連翹  
甘味梓皮今無  
梓皮以海桐皮代  
之

此論方切不可解  
乃後人竄入者  
柯韻伯以辨而  
斥之矣

麻黃

一兩去節湯泡  
去黃汁焙乾秤

甘草

一兩  
炙

赤小豆

半升  
杏仁二十枚  
去皮尖

生梓白皮

兩  
切一

連翹

一兩或作半  
兩連翹根是

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃升麻湯

二十五

傷寒六七日大下後寸脈沈而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止

者爲難治此主之

屬厥  
陰

麻黃

二兩半去節湯泡  
去黃汁焙乾秤

升麻

當歸

各一兩  
一分

知母

黃芩

萎蕤各三分

芍藥

麥門冬去心

桂枝去皮

茯苓

甘草炙

乾薑炮

石膏碎綿裹

白朮各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服相次一炊久進一服汗出愈

葛根湯二十六 太陽病項背強几几無汗惡風又太陽

與陽明合病者必自利此並主之屬太陽

葛根二兩

桂枝去皮

甘草炙

芍藥各一兩

麻黃一兩半去節湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

者根最清頭腦  
之熱頭痛宜之  
或生者煎服尤  
良

雜澄熱下痢  
宜之並下瘀血  
加燕白豆豉阿  
膠別芥

枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取汗為度

葛根加半夏湯二十七 太陽與陽明合病不下利但嘔

者此主之屬太陽

葛根四兩或作一兩 半夏六錢一字 麻黃三分去節湯泡去黃汁焙乾秤

甘草炙 桂枝去皮 芍藥各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取微汗

葛根黃芩黃連湯二十八 太陽病桂枝證醫反下之利

遂不止脈促者表未解也喘而汗出者此主之

葛根四兩 黃芩一兩 黃連六兩或又作一兩半

滋熱裏急後重

下紅白痢加檳榔

木香湯尾降赤

陳皮第一帖加大

黃芩半

婦人熱入血室

澹滄如見鬼狀

用小柴切加雲

苓生地丹皮牡

蠣治之則效

甘草 二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

滓溫服日進二三服

小柴胡湯 二十九

太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者

外已解設胸滿痛與服脈但浮者與麻黃湯○傷寒

五六日中風往來寒熱胸脇苦痛默默不欲食心煩

喜嘔或胸煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或

心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者此主之

○血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相薄結於脇

下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏

冬令春令瘧

瘧名凡瘧宜

加減生方

柴胡黃芩湯及

生薑炙甘草皮

枳實蘇葉丹皮

版兩帖未愈加

常山葉連錢半

以此之

府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此主之○服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者此主之○傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者此主之○太陽病過經十餘日發汗吐下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之卽愈○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀此主之○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大



便鞭脉細者爲陽微結必有表復有裏也脉沈亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在表也脉雖沈緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也。可與服此設不了了者得屎而解。○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而腹痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

已上屬太陽

○陽明病發潮熱大便溏小

便自可胸脇滿不去者與服之。○陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液得下胃氣因和身澱然汗出而解。○陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦身前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者與此藥主之。已上屬陽明 ○太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不得食往來寒熱尙未吐下脉沈緊者此主之若已吐下發汗温鍼讖語小柴胡湯證罷此爲壞證知犯何逆以法治之。已上屬少陽 ○嘔而發熱者宜

服○傷寒差已後更發熱此主之脉浮者以汗解之

脉沈實者以下解屬辨陰陽易差後勞復病脉證

黃芩一兩半若腹中痛者去黃芩加芍藥一兩半芍藥或作三分若心下悸小便不利者

去黃芩加茯苓二兩

人參一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂枝一兩半温覆微汗愈若欬嗽者去人參

并棗子加五味子一兩一分乾薑一兩

棗子六枚若脇下痞去棗子加牡礪二兩熬牡礪或作一兩

半夏一兩一分湯洗若胸中煩不嘔者去半夏人參加栝樓實一枚用四分之一若渴者

去半夏更加人參三分栝樓根二兩

柴胡四兩去盧

甘草一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三  
枚水一盞半煮至八分去滓溫服日三服

增注類證活人書卷十三

大柴胡湯 三十 太陽病過十餘日發汗吐下之後四

五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止 一云嘔心

下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而不利者此主之 上已

屬太 陽 ○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此為實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○

即中柴胡湯去參  
枳加枳實黃芩  
同

柴胡三黃芩不  
法及未枳實不

生薑去大老異

去黃芩枳實果

夏令瘧重下

痢者用上方

傷寒後脈沈者內實也下之解宜服○傷寒六七日  
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實  
也急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脈陰  
陽俱停必先振慄汗出而解但陰脈微者下之而解  
宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可  
下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧  
狀日晡所發熱者屬陽明脈實者可下之大柴胡大  
承氣湯主之屬可下  
病脈證

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

各一兩半

半夏

一兩一分洗

枳實

二枚去穢炒千金云枳實去穢一分準二枚

白判如麻豆太每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服以利爲度未利

再服本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯三十一傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

頭疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太陽○發

汗多亡陽讖語者不可下與此藥和其榮衛以通津

液後自愈屬發汗後病脈證

柴胡一兩桂枝去皮

人參三錢芍藥各半黃芩

甘草三錢半夏四錢

右劉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯

三十二

傷寒五六日已發汗而復下

之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也宜服之屬太陽

柴胡

四兩

桂枝

去皮

黃芩

各一兩半

牡蠣

熬

甘草

炙

乾薑

各一兩

栝樓根

二兩

右劉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服食頃再服



柴胡加龍骨牡礪湯

三十三

傷寒八九日下之胷滿煩

驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此主之

屬太

陽

柴胡

黃芩

龍骨

各一兩

鈆丹

人參

桂枝

各三分

牡礪

一分半熬

茯苓

半夏

半合洗

大黃

半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三枚水一盞半煮至八分下大黃煎一二沸去滓温

服

又見辯誤

柴胡加芒硝湯

三十四

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔

日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以此主之

柴胡

一兩  
三錢

黃芩

甘草

炙

人參

各半  
兩

半夏

四錢  
一字洗

芒硝

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑二片棗子二枚水一盞半煮至八分去滓下硝更上火二三沸

溫服

大青龍湯

三十五

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛

徐靈胎按第二

條必有誤脉浮

緩非輕易散身

不疼外非已退下

有耗時病未入陰

別參少陰等法

病中之最輕者何

必授以青知漢峻之劑

即麻黃湯加石膏

也今堂麻黃是九

飲西北人腠理堅

寒閉故用此方顧

南人無是證勿

不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡

風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也○傷

寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青

龍湯發之

麻黃

三兩去節湯泡  
去黃汁焙乾秤

桂枝

一兩  
去皮

甘草

一兩  
炙

杏仁

二十枚  
去皮尖

石膏

如雞子大一  
塊碎綿裹

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三

枚水一盞半煮至八分去滓温服取微似汗不須

汗多恐亡陽故也若汗多不止用温粉撲之

温粉方

誤用是方

三汗用麻黃粵

人作風寒咳嗽

用小青龍宜去

麻黃但用桂枝

去二錢自考三錢

去甘味銀半兩

一錢花薑一錢

白朮

藁本

川芎

白芷

各等分

右搗羅爲細末每末一兩八米粉三兩和之粉撲  
周身止汗無藁本亦得若汗已出後盡劑服汗多  
亡陽遂逆惡風煩躁不得眠也

小青龍湯

三十六

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之○傷寒表不  
解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小  
便不利小腹滿或喘者此主之

芍藥

桂枝 去皮

乾薑 炮

此字子死法夏三錢

治寒飲咳嗽加

皂花炭

甘草炙

細辛

各一兩半

五味子

一兩別本或加一分

半夏

一兩半湯洗若渴者去半夏加栝樓根一兩半

麻黃

一兩半微利者去麻黃加薤花如一彈子熬令赤色若噎者去麻黃加附子半箇泡若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓二兩若喘者去麻黃加杏仁一兩半去皮尖麻黃湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

杏仁半夏二味或各作一兩一分

小建中湯

三十七

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛

脾氣虛寒痛用

理中湯脾虛

寒凝結作痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三

用中建中湯注

家多未能分析

也後世以參朮

者草加膏湯

姜棗六小連

中湯之意歟

芍藥 三兩

甘草 一兩

桂枝 一兩半  
去皮

膠飴

半升舊有微溏或嘔者去膠飴局方加黃耆一兩半為黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再

煎化溫服日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑加

黃耆末一錢

### 煎造膠飴法

糯米

一升揀淘淨

大麥蘖末

六兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入

藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却

入盆子內都以蘖末拌和入一甃罐子可容五升許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐子內約內面飯上湯三指許卽得布并紙三五重蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏卽溫和至一宿見米浮在水面上卽以布絞裂取清汁銀石器內煎至面上有膜卽以木篋不住手攪至稀糊以甃器收夏月置井中庶不酸

大陷胷湯

三十八

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則

爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中

空虛、客氣動膈、短氣躁煩、心中懊懣、陽氣內陷、心下  
因鞭、則爲結胃、大陷胃湯主之。若不結胃、但頭汗出、  
餘處無汗、劑頸而還、小便不利、身必發黃。○傷寒六  
七日、結胸熱實、脈沈而緊、心下痛、按之石鞭者、宜服  
○傷寒十餘日、熱結在裏、復往來寒熱者、與大柴胡  
湯、但結胸、無大熱者、此爲小結在胸脇也、但頭微汗  
出者、此主之。○太陽病、重發汗而下之、不大便五六  
日、舌上燥而渴、日晡所、小有潮熱、從心下至小腹、鞭  
滿而痛、不可近者、此主之。○傷寒五六日、嘔而發熱  
者、柴胡湯證具、而以他藥下之、柴胡證仍在者、復與



柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也此主之

屬太陽

大黃

一兩半去皮  
錦文者爲末

甘遂

一字赤連珠  
者細羅爲末

芒硝

五分

右以水二盞先煮大黃至一盞去滓下消一沸下甘遂末溫服得快利止後服

又大陷胃湯方

桂枝

一兩

甘遂

一兩或  
作半兩

大棗

一兩或  
作三枚

人參

一兩

栝樓實

一枚去皮只  
用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服胃中無堅物勿服之

大陷胸圓

三十九又見辯誤

病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之

一作汗出

因作痞也所以成結胸

者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痙狀下之

則和宜此藥主之

屬太陽

大黃

二兩或作四兩

芒硝

三分

杏仁

三分去皮尖熬黑

苦葶藶子

三錢熬

右搗羅二味內杏仁芒硝合研如脂丸如彈子大

每服一丸抄甘遂末半錢匕白蜜一合水二盞煮

雜證疫火、倍于  
腸間者、最宜是  
方、

取一盞頓服一宿乃下如不下再服

甘遂性猛宜  
斟量虛實服

之

小陷胃湯

四十又  
見辯誤

小結胃病正在心按之則痛脉浮

滑者此主之

屬太  
陽

半夏

湯洗秤  
一兩半

黃連

一兩

栝樓

一枚去皮  
或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮栝樓至一盞半下諸藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃涎便安

大承氣湯

四十一

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足澀然汗出者此大便已鞭也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也。桂枝湯其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下。○陽明病潮熱大便微鞭者可與此藥

不鞭者不可與之。○傷寒若吐若下後不解不大便

五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微

喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱譫語者此主

之若一服利則止後服。○陽明病譫語有潮熱反不

能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳

宜服。○陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗

出者刺期門隨其實而瀉之澌然汗出則愈汗出讖  
語者以爲有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃  
可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之  
愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳  
汗出大便難而讖語者下之則愈宜服○陽明病下  
之心下懊懜而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭  
鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱  
汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實  
者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜  
桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者

此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也。宜服。○傷寒六七日，目中不了了，睛不和，無表裏證，大便難，身微熱者，此爲實也。急下之。宜服。○陽明病發熱，汗多者，急下之。宜服。○得病二三日，脈弱，無太陽柴胡證，煩燥，心下鞭，至四五日，雖能食，以小承氣湯，少少與，微和之，令小安。至六日，與承氣一升。若不大便，更六七日，小便少者，雖不大便，但初頭鞭，後必溏，未定成鞭，攻之必溏。須小便利，屎定鞭，此主之。○發汗不解，腹滿痛者，急下之。宜服。○腹滿不減，減不足言，當下之。宜服。○病人小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘

胃不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下利其脉不負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負也脉滑而數者有宿食也當下之宜服已上屬陽明○少陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服○少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服○少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服已上屬少陰○下利三部脉皆平按之心下鞭者急下之宜服○下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服○寸口脉浮而大按之反濇尺中微而濇故知有宿食當下之宜服○下利不欲食者以有宿食故也當下

今用大黃、芒硝各

二錢、厚朴三錢、枳

實四錢

四味清湯散治

燥熱大便難

大黃二錢、高麗

二錢、生地黃

各三錢、加麻仁

五錢、枳實二錢

之宜服。○下利差至其年月日時復發者以病不盡

故也。當下之。此主之。○下利脉反滑當有所去。下乃

愈。此主之。○脉雙弦而遲者必心下鞭。脉大而緊者

陽中有陰也。可下之。宜服。○病腹中滿痛者此為實

也。當下之。宜服。此主之。已上屬可下病脉證

大黃二兩錦文者去皮生用酒洗過枳實四枚或作三枚去穢炒淨秤用半兩

厚樸四兩去皮薑汁炙芒硝二兩或作一合半朴消有蘆頭者亦得

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水二盞先煮厚樸

枳實至一盞餘下大黃煎取六分去滓入芒硝煎

二沸放溫服以利為度未利再與一服



小承氣湯

四十三

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承

氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎  
欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有  
燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必  
澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水  
則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯  
和之不轉失氣者不可攻也○陽明病脉遲雖汗出  
不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此爲外  
欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便鞭大承氣  
湯主之若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿

令大泄下○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則讖語此藥主之若一服讖語止者更莫後服○陽明病讖語潮熱脉滑而疾者此藥主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不可更與承氣湯○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便鞭者與小承氣湯和之愈○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安下利讖語者有燥屎也此主之

食滯腹痛下之

亦宜是方用大

黃二錢厚朴錢

半枳實二錢

大黃

四兩去皮

厚樸

二兩去皮薑汁炙

枳實

四枚或作三枚去穰炒淨秤半兩也

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一大盞半煎

至八分去滓溫服以利爲度初服湯更衣者止後

服不爾者再服之

調胃承氣湯

四十三

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱

者實也當和胃氣此主之○太陽病未解脈陰陽俱

停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗之而解但

陰脈微者下之而解若欲下之宜服○傷寒脈浮自

汗出小便數心煩微惡寒腳攣急與桂枝湯欲攻其

表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其腳卽伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯○傷寒十三日過經讖語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此爲內實也此主之○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與服之若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

今宜用大味一  
錢大黃二錢送  
硝錢半

○陽明病不吐不下心煩者可與服○太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者屬胃也此主之○傷寒吐後腹脹滿者與服已上屬陽明

甘草 一兩

大黃 二兩 去皮

芒硝 一兩三分 或作一兩一分

右剉如麻豆大每服五錢以水一大盞煎至七分去滓下硝更上火二三沸溫頓服之

桃核承氣湯 四十四

太陽病不解熱結膀胱其人如狂

血自下下者愈其外不解者尙未可攻當先解其外外解已但少腹結者乃可攻之宜用此藥

大黃 四兩

桂枝 二兩 去皮

甘草 二兩 炙

今人用乳梔子  
服之不吐雜證  
胸中煩熱痞痛  
用梔鼓加水薑  
皮水薑仁杏仁  
目毋松羌治之

芒硝 二兩

桃仁

去皮尖雙仁者  
五十箇搥碎

右劉如麻豆大每服五錢匕以水二大盞煎至八  
分去滓下硝煎化溫服以微利爲度未利移時再  
服

梔子鼓湯

四十五

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必

反覆顛倒心中懊懣此主之○發汗若下之而煩熱

胃中窒者此主之○仲景云凡用梔子湯病人舊微

瀉者不可與服之○傷寒五六日大下之後身熱不

去心中結痛者未欲解也此主之

已上屬  
太陽

○陽明病

脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反

軌驗也。湯上焦

之主也。後世以黃

芩連翹以葉梔

子甘竹庶膈同

其用意故亦多

效耳

熱結上焦胸膈

痞痛治以梔散

杏仁枳壳瓜蒌

皮水姜仁等不

惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讖語若加溫鍼必

怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心

中懊懣舌上胎者此主之○陽明病下之外有熱手

足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者此主

之○下利後更煩按之心下濡者為虛煩也此主之

陰屬厥

香豉二兩

肥梔子

十六箇擘碎或作十四箇

右剉如麻豆大每服五錢水二盞先煮梔子至一

盞八豉煎至七分去滓溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯

四十六

發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊懣梔子鼓湯主之若少氣者

此主之

屬太陽

梔子 七枚

甘草

鼓 各一兩

右分二服以水二盞先煎梔子甘草至一盞內鼓

同煎取七分去滓溫服得快吐止後服

梔子生薑豉湯

四十七

發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊懣梔子鼓湯主之若嘔者當

主之

屬太陽

梔子 七枚

生薑 二兩半

鼓 一兩

右分二服以水二盞先煮梔子生薑至一盞內鼓



同煎至七分去滓溫服得快吐止後服

增注類證活人書卷十三終

以爲通部人書卷十三終

通部人書

卷五

口

成結

石分三味以水三匙煮煎爲漿行氣至一匙內食

一匙取之爲六洋溫狀物快吐止後服

藥子其藥性味甘性平後隨病不同服法

其性味甘性平性溫味甘性平後隨病不同服法

其性味甘性平性溫味甘性平後隨病不同服法

其性味甘性平性溫味甘性平後隨病不同服法

同類至方外法字區讀份非知止爲題

雜澄、濕熱胸

痞、亦宜用是

方、加瓜蒌根

瓜蒌仁、各三錢

杏仁、三錢、陳皮

一錢

增注類證活人書卷十四

梔子厚樸湯 四十八 治傷寒下後心煩腹滿卧起不安

者 屬太陽

梔子 大者七枚擘碎 厚樸 去皮薑汁炙二兩 枳實 二枚取去穰麩炒秤一分

右剉如麻豆大分作二服以水二盞半煎至八分

去滓溫服得吐止後服

梔子乾薑湯 四十九 治傷寒醫以丸藥下之身熱不去

微煩者 屬太陽

梔子 七枚 乾薑 一兩

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去

雜證濕熱發

黃宜是方加

茵陳、厚朴、澤

瀉、白朮、陳皮

厚朴

滓溫服得吐止後服凡用梔子湯病人舊微澹者不可與之

梔子蘖皮湯五十治傷寒身黃發熱屬太陽

梔子八枚黃蘖一兩甘草半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓溫服

茯苓桂枝甘草大棗湯五十一治發汗後其人臍下悸

者欲作奔豚屬太陽

桂枝二兩甘草一兩茯苓去皮六兩

右剉如麻豆大每服五錢棗二箇用甘爛水一盞

半煎至八分去滓溫服作甘爛水法用水二斗置大盆中以杓揚之上有珠

子五六千顆有珠相逐取用

茯苓桂枝白朮甘草湯

五十二

治傷寒若吐若下後心

水逆振搖者

下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沈緊發汗則動經身

用是方重者用

為振振搖者

屬太陽

真武湯加川椒

茯苓 二兩

桂枝 一兩半

甘草 炙

白朮 一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

茯苓甘草湯

五十三

傷寒汗出而渴者五苓散主之不

此有瀉文汗出而

渴者此主之

屬太陽

利四字方合中便

桂枝 去皮

茯苓 各二兩

甘草 炙一兩

不利六不渴者用

此方但用桂葉

他水為差沈澁

此方乃輕劑而

去其枝重也

此方合蘆根

桃仁、杏仁、杏仁

仁、丹皮、金銀花

治肺癰大效

此方加欬者花

小茴、橘皮、治

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片

煎至八分去滓溫服

甘草湯五十四少陰病二三日咽痛者可與服不差者

與桔梗湯

甘草二兩

右剉如麻豆大每服四錢匕水一盞煎至六分去

滓溫服日二服

甘草乾薑湯五十五傷寒脈浮自汗出小便數心煩微

惡寒腳攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥

咽中乾煩躁吐逆者宜此藥屬太陽

肺虛寒咳嗽  
軌遺溺

脈結代心動悸  
心成虛二成魚  
氣虛也故峻補  
心虛葉中倍差  
桂以補血若雜  
澄信血虛者  
減差桂加白  
芍首烏

甘草 四兩 炙

乾薑 二兩 炮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

炙甘草湯 五十六

治傷寒脈結代心動悸

屬太陽

甘草 二兩 炙

人參 一兩

生地黃 八兩

桂枝 一兩半 去皮

麻仁 一分

麥門冬 一分 去心

右剉如麻豆大每服五錢匕入薑五片棗一枚水

一盞半入酒半盞煎至八分去滓內阿膠一片膠

烱盡溫服日三服

芍藥甘草湯 五十七

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微

誤服桂枝湯  
傷液液者乃  
以粳米湯救之  
可知此兩味甚  
甘相合乃滋  
液之良藥也  
今用桂枝湯  
多三錢、薑、芍  
雜證氣虛服脹  
者亦可用是方  
參薑草以益胃  
氣、樸、半以消脹

惡寒腳攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥  
咽乾煩躁逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥  
愈足溫者更與此藥屬太陽

甘草

白芍藥

各二兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煮至八分

去滓溫服

厚樸生薑半夏人參湯

五十八

治發汗後腹脹滿者

屬太陽

厚樸

四兩去皮

半夏

一兩一分

甘草

一兩

人參

半兩



滿也

此治傷寒熱治

胸痞及誤下後

汗而痞者

金匱以是方治

胃佛熱吐與今用

大黃、鈔半、黃連

各五分、二兩

加生地、羅生

以茹三錢

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片

煮至八分去滓溫服

大黃黃連瀉心湯

五十九

治心下痞按之濡其脈關土

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解

也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝

湯攻痞宜服此藥

屬太陽

大黃二兩

黃連一兩

黃芩

各一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕以百沸湯二大盞熱

漬之一時久絞去滓煖動分二服

附子瀉心湯

六十

治心下痞而復惡寒汗出者

屬太陽

大黃 二兩

黃連

黃芩 各一兩

附子

一枚炮去皮  
破別煮取汁

右三味剉如麻豆大每服五錢以百沸湯二大盞

熱瀆之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯

六十一

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯

證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此

雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若

心下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胸湯主之但滿

而不痛者此為痞柴胡不中與之宜服此

屬太陽

黃連 半兩

黃芩

乾薑 炮

此治柴胡證誤下而成痞者

下而成痞者

本連合丸蓋若

燥殊甚實強者

服之生別種大

熱證如遇此種

胸痞以二陳加

杏仁枳殼黃芩

可也古方不可

治也

此治傷寒誤下成  
痞後誤下而痞  
甚者

人參

甘草

炙各一兩半

半夏

一兩一分湯洗七遍

右剉如麻豆大每服五錢匕大棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服

甘草瀉心湯

六十二

傷寒中風醫反下之其人下利日

數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜服此

甘草

二兩炙

乾薑

炮

黃芩

各一兩半

人參

黃連

各半兩

大棗

六枚

半夏

一兩一分洗

此治傷寒解後

胃不和有水氣

之病、冬連薑半

若辛以洩痞、參

辛扶薑、辛甘以

益胃、但薑連合

用、成苦燥、質強

扶火者、每難受

此、倘遇胸痞、乾

噫、食具、胸脇有水

亦用二陳湯、加薑

右劉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

生薑瀉心湯

六十三

治傷寒汗出解之後胃中不和心

下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

屬太

陽

黃芩

甘草

炙

人參

各一兩半

乾薑

炮

黃連

各半兩

半夏

一兩一分泡

右劉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑七片

棗子二枚煎至一盞去滓溫服

白虎湯

六十四

治傷寒脈浮滑者表裏有熱○又三陽

者草朴澤瀉黃  
杏枳壳可也

在今日大煩渴

不解可加薑參

六錢乾茅根二兩

炭末與通烏

得有遺參大為

堂參高時天生

有人形後以人

力裁種則三人

形凡漢方用人

參今皆以堂

合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讖語遺尿  
發汗則讖語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出  
者○傷寒脉滑而厥者裏有熱並主之

知母 三兩

甘草 一兩

石膏 八兩碎

粳米 三合

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

取米熟爲度去滓温服

白虎加人參湯

六十五

服桂枝湯大汗出大煩渴不解

脉洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱時時惡寒大渴舌上乾燥而煩欲飲水

卷代之可也

今用石膏八錢

知母三錢、炙甘草

粳米五錢

加薑棗四錢

五苓減桂枝、名

四苓散加梔子

自芍、甘草、連翹

治高熱、小便

不便甚驗

數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者並

主之

人參二分

知母一兩半

甘草炙二兩或作半兩

粳米一合半

石膏四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

取米熟為度去滓溫服

五苓散六十六太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不

得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉

浮小便不利微熱消渴者○發汗已脉浮數煩渴者

○傷寒汗出而渴者不渴者與茯苓甘草湯○中風發熱六七

日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆者○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也欲飲水少少與之但以法救之或渴者○霍亂頭痛發熱身疼熱多飲水者並主之

澤瀉

一兩一分

猪苓

去黑皮秤

茯苓

去皮秤

白朮

各三分

桂枝

去皮半兩不見火

右搗篩為散拌和每服抄三錢白湯調下此藥須

各自事持秤見分兩然後合

猪苓湯 六十七 陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利

者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

並主之

猪苓 去皮

茯苓

阿膠 炙過

澤瀉

滑石 各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去

滓溫服

附子湯 六十八

少陰病得之一二日口中和背惡寒者

熱淋亦可因是  
本能清膀胱液  
熱而熱津也  
血淋加生地丹  
皮、芍、菴根、竹  
茹、  
合用、猪苓、茯苓、  
澤瀉、滑石、各  
三錢、阿膠三錢、



此温補少陰之

主方而回逆湯

等熱飲者又

有別後人不和

是方竟以和

水之八味丸為

温補命府之

主方則誤也

桂薑以逐風濕

甘味和之立顯

律也附桂合以

治虛

當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者並

宜服之

藜藜苓

芍藥

人參

各一兩半

水白朮

附子

一枚炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓温服日三服

桂枝附子湯

六十九

治傷寒八九日風濕相薄身體疼

煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者

屬太陽

桂枝

二兩

甘草

一兩

附子

一枚半炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四

脾胃陽虛之  
證宜用是方  
兩溫之後人  
借用八味丸  
誤也并治一  
切寒痛

片棗子一枚煎至八分去滓溫服

木附湯

七十

傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

屬太陽

白朮

二兩

甘草

一兩

附子

一箇半  
炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕生薑五片大棗一枚  
水一盞半煎至七分去滓溫服日三服一服覺身

痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿恠也卽  
是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之耳  
法當加桂一兩其大便堅小便自利故不加桂也

外風內溢宜用

是方若老人氣

血虛寒凝治

週身痺痛以

此治之必不效

宜參桂枝湯

極茂玉桂葉

氣

發汗後惡寒

為陽虛故用附

甘草附子湯

七十一

治風濕相薄骨節疼煩掣骨痛不

得屈伸近則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去

衣或身微腫者

屬太陽

甘草

炙

白朮

各一兩

附子

一枚炮去皮

桂枝

三兩或作二兩身腫者加防風二兩  
溼氣小便不利者加茯苓一兩半

右判如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓溫服汗出即解

芍藥甘草附子湯

七十二

發汗病不解反惡寒者虛故

也此主之

芍藥

三兩

甘草

三兩炙

附子

一枚炮去皮

子登汗則傷液  
故以考老救液

煩燥、陽外熱也、

身有小熱、無大熱、

陽外熱、而表止也、

在屬陰、陽得陰

和而安靜、在靜、

知其陰、是故生

方用不灸、甘味、專以

蓋附補湯

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓溫服

乾薑附子湯七十三下之後復發汗晝日煩躁不得眠

夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者此

主之屬太陽

乾薑一兩 附子一枚生用去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓溫服未知再服

理中圓七十四霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者此主之○大病差後喜

丸以備急故

製之若曰丸

不如湯可和

丸不足重必

服丸三四枚飲

以熱粥令入腹

中丸二三枚又

不啜粥大失平

意

唾久不了了胃中有寒當以丸藥溫之宜服此屬陰陽差

後勞復病脈證

乾薑炮

甘草炙

人參腹痛者倍之

白朮各一兩

右搗篩煉蜜和丸如雞子黃許大以湯數合和一

圓研碎溫服之日三夜二服腹中未熱益至三四

圓熱粥飲之微自溫覆勿揭衣然不及湯又方

人參 乾薑炮

甘草炙

白朮各三兩

腹痛者加人參一兩半寒者加乾薑一兩半渴欲

得水者加白朮一兩半臍上築者腎氣動也去朮

後人以是方加  
炮味子浪及令  
虛寒霍亂輒  
效

加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用  
朮悸者加茯苓二兩或四肢拘急腹滿下利或轉  
筋者去白朮加附子一枚生用

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分  
去滓溫服日三服

四逆湯

七十五

傷寒醫下之續後下利清穀不止身疼

痛急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏

宜四逆湯救表宜桂枝湯

屬太陽

○自利不渴者以其

藏有寒故也當溫之宜服

屬太陽

○傷寒脈浮自汗出

小便數心煩微惡寒腳攣急與桂枝湯得之便厥咽

乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之厥愈更作芍藥甘  
草湯與之其腳伸若胃氣不和與調胃承氣湯若重  
發汗加燒鍼者或脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者  
此並主之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐  
復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實不可  
下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫  
之或脈沈者急溫之並宜服屬少陰○大汗若大下利  
而厥冷者或大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利  
厥逆而惡寒者或下利腹滿身疼痛者先溫裏乃攻  
表溫裏宜四逆湯  
攻表宜桂枝湯或嘔而脈弱小便復利身有微熱

今用炙甘草四錢  
乾薑三錢炮附  
子五錢

見厥難治此並主之

並屬厥陰

○吐利汗出發熱惡寒四

肢拘急手足厥冷者吐利小便復利而大汗出下利

清穀內寒外熱脈微欲絕者此主之

甘草

二兩炙

附子

一箇生用

乾薑

一兩半炮

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至七分去

滓溫服○強人加附子半箇乾薑加一兩半

四逆散

七十六

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不

利或腹中痛或泄利下重者此主之

屬少陰

甘草

炙

柴胡

枳實

去白穰炒黃

芍藥

已上各一兩



後人以是方加

紫明、香附、名茶

胡疏肝湯、仲臣

樓、信、氣、痛、

寒利久、西、傷、陰

者、六、宜、是、方、以

人、參、救、津、液、因

止、血、故、用、參、余、以

治、婦、人、血、崩、加、蘇

石、脂、黃、蘗、救

右搗篩為細散米飲調下二錢日三服欬者加五

味子乾薑各半兩下利悸者加桂半兩小便不利

者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮裂泄利

下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸

溫服

四逆加人參湯

七十七

惡寒脉微而利利止者亡血也

此主之

屬霍亂

甘草 二兩

人參 一兩

附子 一枚生  
去皮

乾薑 一兩  
半炮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

發汗動其腎

水故以在卷救

之因汗下傷陰

故治以人參

今用高歸三錢

桂枝白芍各二

錢炙甘草半

木通一錢知母一錢

大棗四枚

去滓溫服日三服

茯苓四逆湯

七十八

治發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓二兩

人參半兩

甘草一兩  
炙

乾薑七錢

附子半箇生  
去皮

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

滓溫服

當歸四逆湯

七十九

治手足厥寒脈細欲絕者

屬厥陰

當歸洗

桂枝

芍藥

細辛各一兩半

通草

甘草各一兩  
炙

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半棗子一枚

治是方加生薑、  
治唐寒、宗師  
縮入濟生方也、  
并治一切陰疽、  
流注、鶴膝風、  
風寒、滋之痺、  
痛、前人未經  
道及也。

煎至八分去滓溫服

當歸四逆加茱萸生薑湯 八十 有當歸四逆湯證若

其人內有久寒者宜服 屬厥陰

當歸 洗

桂枝 去皮

芍藥

細辛

各一兩半

甘草 炙

木通

各一兩

茱萸 五兩

右剉如麻豆大每服五錢匕生薑四片大棗一枚

水一盞半煎至八分去滓溫服日進三服

增注類證活人書卷十四終

...

水一匙半煎至八分去對臨服日服三服

白睡服和豆大每服在藥上坐蓋四升大黃一炒

榮莖正兩

除等兩中

甘草美

木銀兩

...

...

...

...

...

...

身及不惡寒、乃  
唐陽外越、而赤  
為唐陽上反、故  
用乳薑倍于炙  
棗比四逆湯更  
峻

增注類證活人書卷十五

通脉四逆湯 八十一 少陰病下利清穀裏寒外熱手足

厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或

乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之 屬少

陰 ○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯

屬厥陰

甘草 二兩

乾薑 三兩

附子 大者一枚去皮破八片生用

面赤者加連鬚葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二

兩嘔者加生薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利

止脉不出者去桔梗加人參二兩

加豬胆汁以引

虛陽乃反治之

法

吐利皆止獨手足拘急則用是方

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服未差急更作一劑其脉續續出者愈

通脉四逆加豬膽湯

八十二

吐已下斷汗出而厥四肢

拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加豬膽湯主之

霍亂

甘草

二兩

乾薑

三兩

附子

大者一枚  
生去皮

豬膽汁

半合

右三味剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半

煎至八分去滓內豬膽汁溫服其脉即來

黃連湯

八十三

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲

嘔者黃連湯主之屬太陽

甘草 三兩 炙

黃連 三兩

乾薑 三兩 炮

人參 二兩

半夏 二兩 半

桂枝 三兩

非氣者水氣也  
桂及薑逐水人  
參益胃而甘連  
以去胸中之熱

右剉如麻豆大每服抄五錢匕棗二枚以水三盞

煎取一盞半去滓分二服

黃連阿膠湯 八十四

少陰病得之二三日已上心中煩

不得卧黃連阿膠湯主之

黃連 一兩

阿膠 三分

黃芩 一分

芍藥 半兩

雞子黃 半箇

右剉如麻豆大每半劑以水二盞煎取一盞去滓

乃善甘益陰  
之法也。推之肝  
腎陰虛不成  
寐可減連苓  
加熟地首烏等

厚朴、杏仁、石膏

五錢

黃芩、白芍、澤瀉

下必傷陰、以甘

草大棗救逆

凡溫病宜治以

此方、清熱、兼養

陰、徑至上脘者

水、故加薑、及

大腸、痢、下、痢、吐

熱、而渴、是方加

內膠消盡、內雞子黃攪令勻、溫服、日二服

黃芩湯 八十五 太陽與少陽合病、自下利者、與黃芩湯

若嘔者、黃芩加半夏生薑湯主之。○傷寒、脈遲、六七

日而反與黃芩湯、徹其熱、脈遲為寒、今與黃芩湯、復

除其熱、腹中應冷、當不能食、今反能食、此名除中、必

死 屬厥陰

黃芩 一兩 芍藥 一兩 甘草 一兩

右剉如麻豆大、每服五錢、棗子一枚、以水一盞半

煎至八分、去滓、溫服

黃芩加半夏生薑湯 八十六 太陽與少陽合病、自下利



香根、白根、花粉

二錢、五分、一錢

乳芽根、一刃

文蛤即五粒

子也酸而心渴

者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之屬太陽

黃芩 三分

半夏 二分

芍藥 二分

甘草 二分

右剉如麻豆大每服五錢生薑四片大棗子一枚

以水二盞煎至八分去滓溫服

文蛤散

八十七

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若

灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲

水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結

胃無熱證者與三物白散龐安常云小陷胃湯非也

文蛤 一兩

右一味爲散沸湯和服方寸匕

三物白散

八十八

寒實結胃無熱證者與三物白散

屬太

陽

貝母

三分

桔梗

三分  
去蘆

巴豆

去心皮熬黑  
研如脂一分

右爲散內巴豆研勻以白飲和服彊人半錢匕羸人可減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一楮身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水噀之洗之益令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩

如上法

十棗湯未可投  
用、誤服殺人

十棗湯

八十九

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之

其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下  
痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也以十  
棗湯主之

芫花

熬炒赤

甘遂

大戟

各等分

右各等分異篩秤末合和之入臼中再杵治三百  
下先以水一升半煎肥棗子一十枚煎取八合去  
滓內藥末強人一錢匕羸人可半錢再單飲棗湯  
送下平旦服若下少病不除者明日更服加半錢  
利後糜粥自養合下不下令人脹滿通身浮腫而

水蛭製法甚美

傷寒論原文三

此法乃是缺點

死

抵當丸

九十

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利

者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

屬太陽

水蛭

五箇熬去子杵碎水蛭再生化為

桃仁

四箇去皮尖

大黃

三分去皮淨

蝨蟲

五箇去翅足熬

右搗篩只為一丸以水一大白盞煎至七分頓服

晬時當下血不下更作之

抵當湯

九十一

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反

不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹鞭滿小便自

利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故

也抵當湯主之。○太陽病身黃脉沈結小腹鞭小便不利者爲無血也。小便自利其人如狂者血證諦也。抵當湯主之。○傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當湯。已上屬太陽

○陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑者宜抵當湯下之。○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯主之。已上屬陽明

水蛭

十枚熬去子杵碎水蛭入腹再生化爲害尤甚須判斷用石灰炒過再熬

蟲蟲即蚊也

即小承氣湯加麻仁杏仁白芍

大黃一兩去皮酒洗

蟲蟲十枚去翅足熬

桃仁七枚去皮尖搥碎用

右剉如麻豆出作二服以水二盞煎至七分去滓

溫服之

麻仁丸九十二 跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便

數浮濇相搏大便則鞭其脾為約麻子仁丸主之屬陽

麻仁五兩

芍藥四兩

厚樸五寸半去皮薑汁炙

枳實四兩炙

杏仁二兩半去皮尖

大黃八兩去皮淨

右為散蜜和為丸如桐子大飲下十丸未知益之

日進三服

腹微滿故當下之

茵陳蒿湯九十三陽明病發熱汗出者此為熱越不能

發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引

水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之○

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者以

茵陳蒿湯主之屬陽明

茵陳蒿嫩者一兩

大黃三錢半去皮

梔子大者三枚

右剉如麻豆大以水二大盞先煎茵陳減半盞

次內二味煎八分去滓溫服日三服小便當利尿

如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便中去也

牡蠣澤瀉散九十四大病差後從腰以下有水氣者牡

此湯水良方今用  
澤瀉牡蠣海藻  
水莖根多一兩  
葶藶高陸各

五錢、常山、葉石、  
畏而松去、腥三錢、  
右為散、每服二錢、

蠟澤瀉散主之

陰陽易差後  
勞復病脉證

牡蠣煨

澤瀉

蜀漆

洗去

商陸熬

葶藶熬

海藻

洗去

栝樓根

各等分

右為散飲服方寸匕小便利止後服

竹葉石膏湯

九十五

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹

葉石膏湯主之

陰陽易差後  
勞復病脉證

淡竹葉

半把

半夏

六錢

石膏

四字

四兩  
杵碎

人參

半兩

甘草

半兩

麥門冬

一兩

一分  
去心

嘔者加生薑一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半八生薑

竹葉石膏湯

蓋胃陰一方參麥地

性玉竹花粉



勞則動以生者

神之愚也其上

焦之熱

不利脉微已用白

通者無脉仍與以

白通者脉去而不

出則死今用炮附

子薑乾薑三不葱

四片粳米百餘粒煎取八分米熟湯成去滓温服

枳實梔子湯九十六大病差後勞復者枳實梔子湯主

之

枳實一枚去穰 梔子三枚半肥者

鼓一兩五錢綿裹

右以清漿水二盞半空煮退八分內枳實梔子煎

取九分下鼓再煎五六沸去滓温服覆令汗出若

有宿食內大黃如博棋子五六枚同煎

白通湯九十七少陰病下利脉微白通湯主之屬少陰

附子一枚生用 乾薑一兩炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入葱白

白四條

乳嘔煩渴加脫  
而上熱也加胆汁  
及溺以引渴渾  
陰此亦非備一法  
此證多不流矣

此虛寒證陰下血  
也故治以乳薑之  
辛溫糯米之甘

四寸煮至七分去滓溫服

白通加猪膽汁湯九十八少陰病下利脉微者與白通

湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主

之服湯脉暴出者死微續者生

猪膽半合 乾薑半兩 葱白四莖

溺二合 附子半箇生

右以水一盞煎至五分去滓內尿膽汁和相得分

溫再服

桃花湯九十九少陰病下利膿血者桃花湯主之○

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止

溫而石脂以飲

瀉之。雜證脈

微弱，下利便膿血

即是少陰病宜用

是方加參朮牡蠣

薑黃大半參朮

大甘半甘合四脾

胃溫煖夫乳嘔

吐涎頭痛肝經

寒氣上逆也少

陰吐利而煩燥以

步厥陰大藥吳

便膿血者桃花湯主之

屬少陰

赤石脂

四兩一半碎一半篩末用

乾薑

一分炮

右剉如麻豆大每服四錢入糯米一撮水一盞半

煎至一盞去滓再入赤石脂末一方寸匕服日進

三服若一服愈勿再服

吳茱萸湯

一百

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之

得湯反劇者屬上焦也

屬陽明

○少陰病吐利手足逆

冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之乾嘔吐涎沫頭痛者

吳茱萸湯主之

屬少陰

人參

一兩去蘆

吳茱萸

一兩六錢五分湯洗三遍

黃湯治胃腑寒

及厥陰肝寒者

也若本陰脾寒

別用理中湯

傷寒傳中陰燥

熱下利火上升而為

咽痛故用米粉煮

湯和猪膚以養

潤之。推之雜證

傷燥候病可食

猪肉粥

右剉如麻豆大每服四錢生薑四片棗子一枚以

水二盞半煎至八分去滓分二服

猪膚湯

一百一

少陰下利咽痛胃滿心煩猪膚湯

屬少陰

猪膚

二兩陸錢半

右一味以水二大盞半煮取一盞許去滓加白

蜜一合半白粉一合相和溫服

桔梗湯

一百二

少陰病二三日咽痛與甘草湯不差與

桔梗湯

屬少陰

桔梗

一兩

甘草

二兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫之再服

半夏散及湯

一百三

少陰病咽中痛半夏散及湯

屬少陰

半夏

湯洗

桂枝

去皮

甘草

炙

右等分各別搗篩已令和治之每服三錢水一大

盞煎至八分令冷少少嚥之

苦酒湯

一百四

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出

者苦酒湯主之

半夏

洗碎如棗核十四枚

雞子

一枚去黃內苦酒著雞子殼中

右二味內半夏着苦酒中以雞子殼置刀環中安

火上令二三沸去滓少少含嚥之不差再服

雜證喉生瘡  
可用此方

悸眩身瞤動

陽虛而水飲

內作散用其

此湯養難痊不

悸眩惡寒身

瞤動宜桂苓甘

麻湯和陳皮法

夏根蓋澤瀉

千古注家未明

厥原因糊塗說去

夫蛇虫之卵寄于

葉粟之類未煮

真武湯

一百五

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心

下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之

屬太陽

○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四

肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或咳或小

便利或下利或嘔者真武湯主之

屬少陰

茯苓

三分小便利者去茯苓

芍藥

三分下利者去芍藥加乾薑二分

白朮

二分

附子

一枚炮去皮破八片用二片嘔者去附子加八生薑二兩

若咳者加五味子三分細辛一分乾薑一分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片水一盞

半煎至八分去滓溫服日進三服

透而食外卵入

臟腑而生虫焉

肝臟有害生虫

因傷寒而發厥

而吐虵非本臟自

病也用若辛散之

忌自他殺虫妙丸

中蓋附椒辛則太

燥矣服之多生熱

病謂臟寒生虵

忌水也虫卵多生

滋熱之物入人脾

烏梅丸

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁

無暫安時者此為臟厥非虵厥也虵厥者其人當吐

虵令病者靜而復時煩者此為臟寒虵上入其膈故

煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人常

自吐虵虵厥者以烏梅丸主之

屬厥陰

烏梅 七十枚

細辛 一兩

乾薑 二兩

黃連 四兩

當歸 一兩

附子 一兩半  
炮去皮

蜀椒 出汗

人參 一兩

桂枝 一兩半  
去皮

黃蘗 一兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

臘寒藏熱也舍

製核棟殺虫湯

治虫甚效不必用

烏梅丸耳方以左

核棟、文川棟子外

洋皮、羊建夏、元

使君子、元部、元

木香、元部、元

蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內白中

與蜜杵二千下桐子大先食飲服十丸日進三服

稍加至二十九禁生冷滑物等

乾薑黃芩黃連人參湯

一百七

傷寒本自寒下醫復吐

下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃芩黃連

人參湯主之

屬厥陰

乾薑 三分炮

黃芩 三分

黃連 三分

人參 三分

右剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煎至八分

去滓溫服



此派嚴法純

熱下利與今

日逆熱下利

裏重後重不

同治時痢宜

幸方加積榔

未香湯稍

寒痢收理

中不愈者必

宜是方

白頭翁湯 熱利下重者白頭翁湯主之。○下利

欲飲水者以有熱也白頭翁湯以上屬厥陰

白頭翁 一兩 黃蘗 一兩半

秦皮 一兩半 黃連 一兩半

右剉如麻豆大分五服以水二大盞煎至八分去

滓溫服不差再服

赤石脂禹餘糧湯一百九傷寒服湯藥下利不止心下

痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中

與之利益甚理中治中焦此利在下焦赤石脂禹餘

糧湯主之復不止者當利其小便屬太

喻嘉言借是方以治胃反嘔

赤石脂

四兩

禹餘糧

四兩

右剉碎每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓

溫服

旋復代赭湯

一百十

傷寒發熱若吐若下解後心下痞

鞭噫氣不除者旋復代赭湯主之

屬太陽

旋覆花

三分

人參

半兩

代赭石

一分

甘草

三分

半夏

湯洗三分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚煎至八分去滓溫服

瓜蒂散

一百十二

如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮

余以常山藥  
鐵甘草八分代  
瓜蒂散至捷

胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此爲胃有寒也當吐之宜瓜蒂散主之屬太陽

瓜蒂熬黃

赤小豆各半兩

右各搗篩已合治之取一錢匕豉一合湯七合先漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

蜜煎導湯

一百十二

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導

蜜四兩

右一味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦着欲可丸捻作挺如指許長二寸當熱時急作令頭銳內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

### 豬膽汁方

用大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道中如有一食頃當大便

燒裊散

一百十三

傷寒陰易之爲病其人身體重少氣少

腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裊散

主

婦人

視

襠

燒灰

右一味

以水和服方寸匕小便利陰頭腫即愈

活人書卷十五終