


聖濟總錄

百五九

庫文閣内	
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (157)
函號	300 212



大學東  
校典藉  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百五十九  
逆產門

逆產

產難

子死腹中

息胞



總錄一五十九

大樹重對聖高醫藥卷一百五十六										



逆產

論曰逆產者蓋因妊婦初覺腹痛產時未至驚動傷早  
 兒廻轉未竟使用力產之即令逆也又或安產之處及  
 坐臥須順四時方面并避五行禁忌若觸犯者多致災  
 禍水旺則難產火旺則小產風旺則逆產土旺則胎前  
 治難產或經數日或生不以理橫逆艱難百方千計終  
 不平安者急服此藥在兒身上立生若妊娠入月便服  
 臨產則易不覺兒出胎膏方

真牛酥壹斤 秋葵子壹斤 白蜜半斤

大豆黃卷貳兩 滑石貳兩 蓮麥壹兩

右六味先將藥四味為末次取酥於慢火中煎化後下蜜攪勻將藥投入調和得所以瓷合盛每服一匙溫酒調下加至二匙

治橫產及倒生胎斃腹中及衣不出母欲絕半夏散方

半夏為末用生薑汁製白歛壹兩

右二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下產難一服

橫產二服倒生三服胎斃衣不出四服此方加瞿麥

一兩煎服尤佳

治逆產不正小麥飲方

小麥 小豆各棟淨炒

右二味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服

治婦人橫產倒生死胎在腹脹爛不出催生柞木葉飲

方

柞木葉壹把圍參寸長并細枝子剉甘草壹莖長壹握如小柞指拍

右二味用水三升半慢火同煎至一升半去滓用瓷

瓶盛紙封瓶口於產婦房內慢火煨先服一小盞少

頃心頭快更服一小盞不間服數三四盞內惡物下

尋常催生甚驗

治橫生倒產子死腹中胎衣不下烏金散方

當歸酒浸切焙 沒藥研別 生乾地黃焙

蒲黃生用 芍藥炒 紅藍花炒各壹兩

鯉魚鱗臘月者佳 桂去麤皮各貳兩 血餘小兒胎髮真者貳枚

右九味將血餘鯉魚鱗二味用銷銀鍋子先以炭火

燒為灰沒藥別研餘藥搗羅為末和勻每服二錢匕

溫酒調下不拘時

治難產經三四日或橫倒不出垂死滑胎煎方

瞿麥取穗壹兩 酥伍兩 滑石

葵子各貳兩 黑豆皮壹合 白蜜肆兩

天牛膠去苗壹兩

右七味除酥蜜外搗羅為末將酥蜜鍊熟入諸藥末

及牛乳汁五兩煎成煎以瓷器盛每服半匙溫酒或

湯化下不拘時

治橫產倒生安胎酸漿飲方

五葉酸漿草不拘多少

右一味取自然汁半盞酒半盞染煙脂末半錢匕和

勻溫飲之未効再服

治逆產法

大蒜柴顆去皮 生薑兩半 葱白去青參拾莖各拍碎

右三味置在一盆子中以百沸湯五椀乘熱投於盆中速扶產婦於盆上坐候冷易之凡三易則胎正

又法

右取竈底心黃土細研五合以生薑汁煎令熱調如麪糊塗產母臍中以熟帛繫之頻換

又法

右取鹽和胡粉醋調塗兒兩足下即順

又法

右取蒲黃用水調塗兒足心底

又法

右取丹砂末半錢匕蜜調塗兒足底又以丹砂筆書兒兩足底左作千字右作里字即順

又法

右取三家鹽熬令黃研末以津唾調塗兒足底次取三家飯置產婦手中

又法

右以父名書兒足底即順

又法

右取車釭中膏書兒足底作出字

又法

又右以鍼刺兒先出足底兒足痛驚還即順手出如刺

足法

又法

右以中指取釜底墨煤交書兒足下即順

治逆產及子死腹中艾葉湯方

三生艾伍兩

右一味以清酒一升煮取七合旋服之則順或不飲

酒用水煮之

又方

大麻人淨搥研爛半兩

又方

石一味以水二盞同煎至一盞去滓溫服

又方

右取牛齡涎絞以溫酒和服之

又方

右燒錢七枚令赤投一盞酒中去錢飲之

又方

葵花焙乾葵子亦得參兩

又右一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調服

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

右取竈屋上黑塵以溫酒服二錢匕

又方

右取彈子二枚擣羅為散以溫酒調服二錢匕

又方

右取甌帶燒灰研散溫酒調服二錢匕

又方

右取蛇蛻皮燒灰研末溫酒調服一錢匕面東向服

一方取蛇皮灰豬脂丸如梧桐子大每服五丸面東

吞之

又方

右取晚蠶子紙一幅燒灰研末米飲調服

又方

右取夫十指甲燒灰研末以酒溫調服

又方

右取梁上塵三指撮以煖酒調服之

又方

右取菟絲子搗為末溫酒調服二錢匕

又方

右取車前子搗為末溫酒調服二錢匕



又方取車前子... 末... 溫酒調服

又方當歸切焙壹兩

右一味搗羅為末每服二錢匕溫酒調服

又方

大豆五合二餅以... 溫服之

又右一味以苦酒二升煮減半分溫服之

產難... 論曰臨產或難蓋為和氣動亂心氣不寧所致也古人

有預備方法臨月服滑胎散并日行一二千步貴使血

氣下順至產無留難之慮欲產先須看產圖及催生湯

藥無致喧雜驚忙又須產閣溫暖或遇嚴寒之日四圍

燒火及備熱湯爇諸異香常令香火湯氣及身惟諳事

人看候產婦纔覺腹痛速與食飲令飽無或困乏飢以

雌雞煮粥湯以蠟蜜煎湯悶以新汲冷水少飲或空痛

經日而胎未動者宜安心熟忍以薦蓆鋪地就上安產

免為地氣所侵又就上行三五百匝或困於行暫且扶

立須更又行如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆也諸

餘法度宜次序行之

治難產不下經日車前子散方

車前子微炒半兩 榆白皮刮淨剉碎壹兩 滑石半兩

總錄一百五十九

總錄一百五十九

總錄一百五十九

總錄一百五十九

總錄一百五十九

當歸切焙 瞿麥穗壹兩

右五味搗羅為散每服三錢七用酒調下溫湯亦得

如血水未下用大黃二錢煎湯一盞分作三服調前

藥下又下破血水與不礙料又煎油煎去之

治產難催生如意膏方計三五日而愈因外行曾且於

蓖麻子參柴粒去 丹砂半錢

右二味一處和研勻用油單一片方圓如盞口大將

藥攤之當臍下少腹間貼之外以帶帛繫令固候產

罷并胞衣下畢速去之稍緩即脫人氣血此藥覺腹

痛便宜用之

治難產經日未生牛酥煎方

真牛酥兩 秋葵子壹合 白蜜貳兩

滑石 瞿麥穗 大豆黃卷各壹兩

右六味先以清酒一升研細葵子內酥蜜中微火令

銷後即下諸藥慢火煎常如魚眼沸約強半如膏成

則將瓷器中以綿濾之用溫酒調初服半匙漸加至

一匙

治難產車前子煎方

車前子壹升 以布裹於水中熟接漉出日暴乾

生地黄汁壹升 白蜜壹升 好酥伍合

右四味相和微火煎常令如魚眼沸起卽瀉於瓷器  
中每服半匙以沸湯調通口服之  
治難產數日不下蛇蛻皮丸方

蛇蛻皮壹條 燒灰 臘月兔腦髓壹枚 車脂棗許大 暴乾

右三味除兔髓外擣羅爲末以兔髓揆和爲丸如梧  
桐子大每服二十九溫酒下

治難產滑胎貝母散方

貝母壹兩半 去心秤 槐子十月上巳日採 之能壹兩半

右二味擣羅爲散每服三錢匕以熱水調服未生更

服

治難產產乳論云三十後嫁者謂之晚嫁也少嫁則筋  
骨軟懦易產也晚嫁則筋骨堅強所以難產入月宜常  
服苧麻根飲方

乾苧麻根新者刮削 淨到碎

陳橘皮湯浸去 白焙

甘草炙

生乾地黄燒

烏梅去核 取肉

人參各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕以水一盞生薑二片同  
煎至七分去滓溫服日夜各一

治腹痛雖甚二三日不產蒲黃散方

蒲黃壹合 研

槐子微炒 半兩

右二味搗研為細散每服二錢匕以溫酒調服須臾即生

治難產如覺痛甚服此散即覺平安馬齒莧散方

馬齒莧

常莧各暴乾參兩重午日採

右二味搗羅為散每服二錢匕新汲水調服宜頻服

之

治難產燒弓絃散方

弓絃

伍寸剉碎

箭箠

伍寸剉碎

右二味同燒作灰研為細散作一服以溫酒調下其子即出未効再燒服

治數日不產胎上衝心欲死牛酥飲方

牛酥

兩

冬葵子

淨淘微炒壹合

石參

右三味以二味搗羅為末和牛酥置生絹袋內盛之

用酒一升煎至七合去藥袋子令溫每服半盞一二服如未下更服之

治難產生地黃飲方

生地黃汁

壹盞

生薑汁

貳分

右二味同煎至一盞分四服每以湯或酒和服胎則生也

治難產催生芍藥散方

赤芍藥兩

瀝麻頭壹握揀擇淨剉碎

芎藭

當歸切

茯神去木

甘草微炙

陳橘皮湯浸去白焙各貳兩

亂髮灰壹分

右八味搗羅為散臨臥時溫酒調下二錢匕頻服之

立生

治難產蟹爪飲方

蟹爪

剉壹合

甘草

微炙半兩

阿膠

炙合燥壹兩

右三味咬咀如麻豆每服三錢匕以東流水一盞煎

至七分去滓溫服如未產更一二服

治難產澤瀉湯方

澤瀉

壹兩

瞿麥

去根剉碎貳兩半

榆白皮

剉淨剉碎貳兩

甘草

炙令赤壹兩半

桂皮

去麤皮

木通

剉碎

牛膝

酒浸半日切焙壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半入生薑二

片同煎至一盞去滓溫服一服未產更服

治難產腹痛胎不轉動甘草湯方

甘草

微炙半兩

榆白皮

剉淨剉碎壹兩桂心半

葵子

壹合

滑石

參分

右五味搗篩為麤末每服四錢匕以水一中盞煎至

六分去滓溫服

治難產催生抵聖散方

紅藍花六月六日取 蜀葵花五月五日採 桃花三月三日採

凌霄花七月七日採 大麥七月十五日採

右五味依時採取擣羅為細散每服三錢匕以熱酒

調下立產

又方

蛇蛻皮壹條全者取端午日置於沙羅中用紙壹張

右一味蛇皮用水浸於日煎之候乾收此紙有難產者剪三小片子如蛇形新汲水吞之立產或每片紙

子內拌牛糞中豆與吞亦神効此男左女右手內把

出藥也

又方

蘧麥兩半 桂心貳錢 蟹爪半合

牛膝酒浸半日切焙半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服如未產更服

治難產疑胎斃腹中試驗當歸湯方

當歸貳兩切焙 芍藥兩切

右二味麤擣篩每服五錢匕以水一盞煎至六分去

滓溫服如胎活則便安如胎斃即下又一法苦酒調下亦驗

治產難數日不出或子死腹中母氣欲絕桂心湯方

桂去麤皮壹兩半 瞿麥取穗 木通剉碎

牛膝酒浸半日切焙 榆白皮剉淨剉碎各貳兩

右五味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分

去滓溫服如未生更服又一方單煮瞿麥服之亦出

治婦人血氣不調心腹疔痛或月閉不通每有妊娠多難產易生湯方

蒼朮淨洗去皮拾貳兩 桔梗陸 枳殼去瓢麤炒

麻黃去根節 附子炮裂去皮臍 陳橘皮湯去白焙各參兩

芍藥 白芷 芎藭 甘草剉 桂去麤皮

半夏湯洗柒次 赤茯苓去黑皮各壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙 乾薑炮各貳兩

右一十六味除桂枳殼二味別為麤末外一十四味同為麤末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻

每服三錢匕水一盞半醋一合入生薑三片煎至一中盞去滓稍熱服不拘時候

治婦人難產及橫逆生神聖散方

總錄一百五十九

十四

國立公文書館 National Archives of Japan

乾豬胎及酥鯉魚皮及酥女人亂髮參味各壹兩入

燒令焦子內醋度錙墨細研各半兩伏龍肝細研各半兩

墨煨醋淬當歸焙切桂去麩皮

芍藥未對白殭蠶炒白芷炒

白附子炮芎藭各壹兩

右一十三味搗羅為散再研細每服三錢匕熱酒調

下臨產腹痛時便子母俱無恙產後每日空心一服

治月內諸血疾

治滑胎易產車前子散方

車前子各壹兩滑石各壹兩阿膠炙燥壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕蜜湯調下不拘時服  
治難產及已產胞衣不下或墮胎後血不下瞿麥湯方

瞿麥穗消石黃連去須

滑石炙各壹兩王不留行

延胡索當歸切大黃剉炒各壹兩

生乾地黄焙連皮大腹剉鬼箭羽

射干威靈仙去土雷丸

檳榔剉京三稜剉郁李人炒各壹兩半

吳茱萸湯洗焙牽牛子炒

右二十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五



片同煎至八分去滓溫服不拘時

又方

真珠研半兩

伏龍肝壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治婦人臨產胞傷風冷腹痛煩併不能分免催生湯方

王不留行

京三稜煨

牽牛子炒

百合

當歸焙切

威靈仙各壹兩半

雷丸

大黃剉

天雄炮裂去皮

桂去麩皮

甘草炙各一分

大腹剉

右二十二味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓溫服

治妊娠難產方

水銀壹分

膩粉壹分

兔腦拾貳月者

右三味研以免腦和為丸如梧桐子大不計時候以

溫水下五丸

治產難多時不下垂困宜服此七聖煎方

蘧麥

滑石各壹兩

牛乳

黑豆黃

酥參味各貳兩

冬葵子壹合

白蜜貳合

右四味搗篩為細末以乳酥蜜調藥令勻慢火熬成

稀膏每服一匙熱酒調下  
治難產勝妙寸金散方

敗筆頭

壹枚 燒灰

右一味細研為散取生藕汁一盞調下立產若產母  
虛弱者恐藕汁冷動氣即於銀器內重湯溫過與服  
大妙

治難產方

右取蓮花葉一片書作人子字吞之立產

治婦人諸般惡產滑胎散方

槐子

炒

麥蘖

炒

當歸

切

滑石

右四味等分搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘

時服

治難產催生二聖丹方

丹砂

未盡四兩

乳香

各壹兩

右二味同研如粉用倒流水和凡如雞頭實大慢火  
焙乾產婦腹痛時用秤錐一枚洗淨濃研丹砂筆於  
秤錐周回書金木水火土五字以炭火燒令通赤取  
出投於酒內將酒下藥一丸立產如是取死胎用水  
銀一皂子大蒜白一莖研如泥及當歸末一錢匕同

以熱酒半盞作一服下藥一丸并酒飲盡不飲酒用  
酒少許和醋湯下

治產難氣欲絕及橫生者黑神散方

欬鎗墨

研壹兩

白芷

為末貳兩

右二味研令極細每服三錢匕童子小便酒醋共一  
盞調下未產再服

催產桂膏貼足方

桂

去麤皮為末

雄黃末

壹錢匕

右二味以蓖麻子三七枚去皮爛研入二味同研如  
膏紙上攤於兩足心貼之纔產訖急去藥

催產聖散子方

黃蜀葵子

貳柒枚

赤小豆

柒枚生用

右二味同研細以童子小便三分調頓服立下

催產蠶退散方

蠶退紙

壹大張燒作灰研

右一味以酸漿草爛擣絞取自然汁三分許酒三分  
許同微煖調下

治難產酸漿酒方

酸漿

接自然汁

右一味每服半盞煖酒半盞調之頓服立出

治難產橫生倒長困頓不省人事聖功散方

蜀葵子陳者不拘多少

右一味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下如口噤幹

開灌之

治二三日不產雞子酒方

雞子壹枚去清

右一味以苦酒半盞投雞子於酒中飲之立產

催產馬齒莧酒方

右以馬齒莧搗絞取自然汁三分入酒二分微煖服

之立產

治產難腹痛不可忍以致疲頓胎不能下催生丹方

右取十二月兔腦髓一枚入乳香一分母丁香一錢

麝香少許研令細勻丸如菉豆大溫水下一丸生男

則左手握下女則右手握下

催產石燕酒方

右取石燕子以童子小便三分摩取自然汁微煖下

赤小豆七粒立產

治難產方

右吞大豆三枚至七枚立產

治難產方

右吞槐子三枚立產

又方 桑子三枚立產

右取梁上塵竈突煤各等分以三指撮溫酒調服

又方 小豆小珠立產

右取春杵頭上糠為末溫水調服方寸匕

又方 不詳

於臨月帶水馬子一枚良

治難產痛悶方 合麻白朮芍藥豆大散水下一其土也

知母焙乾

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫

水嚼下痛未止再服

治難產并胞衣不出方

大麻根參本

又右一味以水一升煎取三合頓服之立下

又方 一合

以兩手各把石燕一枚立產

又方

取兔皮并毛燒灰酒和兩錢匕服

又方

右取牛糞中大豆一粒分開一片書父入字一片書

子出字吞之  
又方

右燒龜甲屑服方寸七  
又方

羚羊角不拘多少

右一味研細以酒三合和方寸七頓服

又方  
令人含醋噴面悶即解

子死腹中不出

論曰胞衣未出急於胎之未降子死腹中危於胞之未

下蓋胞胎未下子與母氣通其呼吸若子死腹中胞藏氣寒胎血凝聚洩於死子氣不升降所以難下觀古之方論多以行血順氣之藥及消石水銀礪砂之類且胎死則軀形至冷血凝氣聚復以至寒之藥不惟無益而害母命者有矣然古人用藥不能無意但後學不分爾子死理有二端用藥寒溫各從其宜有妊娠胎漏血盡子死者有墜墮攔撲內傷子死者有緣久病胎萎子死者若此之類遂令坐人提挈妊婦使身體平正仍以裊褥自腰抵定令仰坐開足向地如欲產勢便進附子湯三服方見後即以衣裹溫瓦數片三二人不住手自臍腹

腰脇左右周回熨之使胞藏溫煖凝血流動蓋附子湯  
內能破寒墮胎服之少頃覺腹內痛陣連作惡血漸動  
良久必產此用溫藥之意也有妊娠因傷寒熱病溫瘧  
之類胎受邪熱毒氣內外攻逼因致死胎不卽下留於  
胞藏古人慮胎受毒氣必致脹大所以用消石水銀礪  
砂之藥者蓋消石水銀礪砂之性不惟使胎不脹又能  
使胎化爛副以行血順氣之藥胎無不下此用寒藥之  
意也臨產更令坐人以手體候胎有橫有逆有脹有爛  
以意治之庶免留難凡生產之理胎活則所生在子日  
月已周臍繫不養所以自下猶之果實旣熟不俟剪伐

帶彙自分子死腹中所生在母日月未足臍繫尚固猶  
之果實未熟枝末雖枯不折不離所以在母行之有法  
用之有度斯無虞矣凡審死胎當宜熟辨有妊婦緣病  
胎隱伏不動難認存亡者宜先令坐人以煖手就臍下  
款款按至胎處覺冷應手是胎已死稍溫卽非更看妊  
婦外證面青舌冷舌下脉青黑者皆子死之候也  
治子死腹中產宮氣寒胎血凝沍死子難下破寒墮胎  
附子湯方

附子

端正緊實大者壹枚生  
去皮臍切作壹拾片

右一味不得搗碎都用水二盞生薑五片同煎取一

盪去滓不用將藥汁瀉清分溫二服如經時不下更服後桂心湯

治胎死腹中桂心湯方

桂去麤皮不得見火

烏頭大者炮去皮臍各壹兩

右二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服須臾連三服

治妊娠因天行熱病烝損胞胎致子死腹中不出速服

此救生散方

桂去麤皮半兩不見火燒為末

水銀壹分

右二味相和研勻分三服每服用溫酒七分調下連

進須臾未下卽服後方粉霜散

治子死腹中或漸脹滿粉霜散方

粉霜

消石各半兩

蛇蛻灰貳錢

右三味各研細和勻每服二錢匕溫酒調下醋湯亦得漸漸連併三兩服如更未下卽服丹砂散

治妊娠因傷寒熱病瘧疾邪毒攻胎致令子死不出丹

砂散方

丹砂壹兩

右一味研令極細每服一錢匕煎水酒各三分稍熱

調下連三二服未下再服



治妊娠子死腹中未久急服此瞿麥湯方

瞿麥用穗子 貳兩

右一味搗為麤末每服五錢匕水一盞半煎七分去滓溫服連三二服未下再服

治妊娠因漏血傷胎子死未久地黃酒方

生地黄洗切 貳斤

右一味搗取自然汁每服用七分盞酒三分盞同煎纔沸稍熱便服連三二服未下再服

治子死腹中氣血凝結致子難下牛膝湯方

牛膝去苗酒浸切焙 朴消別研各參分 生乾地黄焙壹兩半

桂去麤皮 芎藭 大黃剉碎微炒

蒲黃各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中三二日不出母氣欲絕瞿麥湯方

瞿麥去梗壹兩半 牛膝去苗切焙 榆白皮各壹兩細切

桂去麤皮 木通剉各參分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中滑氣血破胞胎或死子已久壞爛母欲悶

絕者牛膝湯方

牛膝去苗切壹兩 生地黄汁壹

當歸切

桂去麤皮

芎藭

蒲黃各半

瞿麥去根

消石別研各

右八味除地黄汁外擣為麤末每服五錢匕水一盞  
半煎至一盞去滓再煎入地黄汁三分盞打轉煎沸  
稍熱服三兩服內惡血下即子出也或胎已損亦下  
更令坐人以手子細探之勿致腐肉瘀在腹內如得  
出畢更一二服逐穢惡餘血免生他病

治妊娠五六月子死腹中不出地黄湯方

生乾地黄切焙壹兩 牛膝去苗

芎藭

桂去麤皮

朴消別研各

當歸切

蒲黃別研各

右七味麤搗篩每服三錢匕水酒各半盞同煎七分  
去滓稍熱服連三五服

治子死腹中氣血凝滯不下豬脂酒方

豬肝壹兩

白蜜半

酒壹盞

右三味相和同煎沸熟分作三服未下再依前法製  
服

治子死腹中滑胞胎順氣血葵子湯方

葵子炒

阿膠炒燥各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三二服未下再服

治子死腹中氣血凝冷難下薑汁酒方

生薑汁

陸分盞作參服

雞子黃

參攷作參服

右二味先用酒三分盞醋二分盞同煎沸入薑汁二分盞又煎令沸傾出用雞子黃一枚乘熱打轉稍熱服之須臾未下盡此三服

治妊娠顛撲內損致子死腹中速服滑氣血甘草湯方

甘草炙

桂去麤皮各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中血氣不滑當歸湯方

當歸切

芎藭剉焙各壹兩

右二味搗為麤末每服五錢匕以酒醋水共一盞半煎七分去滓溫服連三二服須臾未下再服

治子死腹中未下甘草湯方

甘草剉壹兩

桂去麤皮半兩

香豉炒貳兩

右三味搗為麤末每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓用雞子一枚取清打轉入藥內再同煎七分稍

熱服須臾未下再作服

治子死腹中不下芎藭湯方

芎藭

當歸各壹兩  
生切

瞿麥去根  
參分

右三味搗為麤末每服三錢匕水一盞醋少許同煎

七分去滓連三二服必下

治子死腹中溫氣滑血黑豆湯方

黑豆搗碎  
半升

生薑細切  
肆兩

右二味以童子小便三椀同煎取二椀去滓每服一

盞溫服連三二盞未下再服

治產難或子死腹中不下龜甲湯方

龜甲醋炙

當歸切炒各  
半兩

亂髮壹塊雞子大  
取產多者婦

人髮於瓦  
上燒灰

右三味先細研髮灰次入當歸末以水一大盞半煎

取八分然後下龜甲末煎五七沸分為三服服後如

人行四五里更服

治妊娠子死腹中不出水銀丸方

水銀兩半

硫黃壹分與水銀  
結為砂子

白礬灰兩半

硃砂兩半

右四味搗研令細煮棗肉和丸如棗豆大每服煎榆

白皮酒下五丸如覺似腹內痛者即便子下

又方

水銀壹分以少棗肉研令星盡

雄黃壹分

右三味同研令細煮棗肉和丸如菉豆大不計時候

以槐子湯下五丸

又方

榆皮切壹斤

赤熟珠壹兩

右二味以苦酒五升煮取一升頓服之

治妊娠子死腹內不下方

皂莢子黃肆兩

米醋貳升多

又方

右二味用五升瓶盛文火煨熱用紙蓋瓶口將向婦

人面前去紙取氣薰少時即下

又方

右取利斧頭燒令通赤置於酒中待微溫令飲之其子便下

又方

蘇枋木壹斤細

槌綿裝

水銀壹兩

右二味以水五升大盞煎蘇木至一大盞每服取二分

下水銀一分如人行三五里再服死胎當化為水下

下後三日須食暖物若食冷物即惡血不盡

治子死腹中不下方

下朴消研細

右一味為末每服二錢溫童子小便調下

治胎死不出方

赤小豆一升

右一味醋煮令熟分二服死兒立出

又方

芎藭壹兩

右一味擣羅為末米飲調服一錢匕

治倒產子死腹中方

當歸切

右一味擣羅為末酒調服方寸匕立出

又方

艾葉肆兩

右一味以清酒二升煮取一升去滓分溫三服水煮

亦得

又方

右取醞醋一升格口灌之

又方

榆白皮剉貳兩

右一味以水三盞煎取一盞半頓服之

治子死腹中不出者

右取牛尿塗母腹上立出

治妊娠六七月子死腹中不出方

黑豆合參

右一味以醋一大升煎取六合去滓空腹分溫三服

如人行六七里再服

治妊娠子死腹中不出方

雄鼠糞參柴 枚炒

右一味以水二升煎取一升半去滓下米作粥食即

出

治子死腹中悶絕方

水銀貳兩

右一味幹開口灌下口不開即自鼻中灌下立出

又方

取竈中黃土三指撮和苦酒服之立出

息胞

論曰凡產子母已分而胞衣未下謂之息胞蓋由欲產之時用力太過產罷復被風寒冷氣所侵血氣凝滯乏

提挈產婦使形體平正息氣少時可以運動及以壯氣益血湯散助之俾氣血滑利其胞可下矣兼初生產婦未能諳練見胞衣未下恐妨兒體輒便剪臍或誤牽斷或執握不固其胞直上掩心使不盡天年者多矣昔人剪臍之法必欲慣熟坐人先備金銀銅鐵秤錘之類用軟熟衣帶一條就一頭縮定仍留一頭纔下臍即將臍帶與衣帶相聯結定以緊牢爲度所貴胞不上掩心也產後胞衣不下或被風寒所侵血氣凝澁或氣力疲乏不能運用胞衣停息宜服壯氣益血湯方

生乾地黃

焙

人參

切

當歸

切焙各壹兩

代赭別研半兩 木香壹分  
右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓不拘時溫服以胞下爲度  
治產胞衣不出瞿麥湯方

瞿麥穗

貳兩

牛膝

去苗酒浸切焙

桂

去麤皮

木通

剉碎各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服不拘時未下再服

治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下數日不產血氣上衝牛膝湯方



牛膝去苗酒浸切 葵子炒 榆白皮剉各參兩

右四味除地黄汁外麤搗篩每服三錢匕水一大盞入地黃汁一合同煎至七分去滓溫服不拘時

治胞衣不出槐子湯方

槐子如無子用枝細切壹兩 牛膝去苗酒浸切焙壹兩半

木通剉 榆白皮剉 瞿麥穗各貳兩

麻子人貳

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時服以下為度

治胞衣不出爛胞滑石湯方

滑石壹兩 牛膝去苗酒浸切焙壹兩半

當歸焙切 甘草炙各壹兩 葵子炒貳合

瞿麥穗壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時服以下為度

治產五六日胎衣不出地黃湯方

生地黄焙切 牛膝去苗酒浸切焙 桂去麤皮

芍藥 大黃剉炒各壹兩 蒲黃炒參分

朴消壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分去滓不拘時服以下為度

治胞衣不出令胞爛桂心湯方

桂參去麤皮 牛膝去苗酒浸壹兩 滑石

不當歸切焙各壹兩 瞿麥穗壹兩 葵子炒貳合

甘草炙半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黃半合同煎至七分去滓不拘時溫服以下為度

治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下數日不產血氣上衝牛膝飲方

牛膝去苗酒浸切焙 葵子各參兩 榆白皮剉

瞿麥穗各貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黃一分拍破同煎至七分去滓溫服不拘時以下為度

治產後胞衣不下當歸湯方

當歸切焙 芍藥剉 桂去麤皮各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治胎死腹中若子已出胞衣不下腰背痛蒲黃散方

蒲黃炒微 甘草炙 桂去麤皮

陳橘皮

湯浸去白

牛膝

去苗酒浸切焙壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時以下為度

治產困乏腹痛目有所見兒及衣俱不下蒺藜子散方

蒺藜子

少去

貝母

去心各貳兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下未下再服

以下為度熟水調亦得

治胞衣不下氣血衝心迷悶欲死松葉散方

松葉

炙

墨

研細

紫葛

各半兩

右三味搗研為散每服二錢匕溫水調下不拘時

治胞衣不出芎藭散方

芎藭

當歸

切焙各半兩

榆白皮

剉壹兩

右三味搗羅為散每服三錢匕用生地黄汁溫調下未下再服以下為度

治胞衣不出及惡血不行乾漆散方

乾漆

碎炒令煙

當歸

切焙壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕用荆芥酒調下時一服以下為度

治惡血不下盛於衣中方

鹿角

鈔不計多少

右一味搗羅爲散每服一錢匕溫酒下未下再服  
治產難胞衣不下心腹痛香墨丸方

麝香各壹錢同研細

右二味以臘月兔腦丸如梧桐子大每服三丸以溫酒下不拘時以下爲度

治胞衣不出葱油方

葱白參以麻油合

右三味先研葱白汁少許入油相和服之未下再一服

治產難胞衣不出兒橫及死腹中悶絕者半夏散方

半夏湯洗去滑柴編生薑汁製 白欬各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下胞衣不下一服橫生二服倒生三服子死四服一方用代赭瞿麥各一兩添入亦佳

治胞衣不出伏龍肝散方

伏龍肝 蒲黃炒研各壹兩

右二味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時以下爲度

治胞衣不出令胞爛牛膝散方

牛膝去苗壹兩

右一味細剉以水三盞煎至一盞半去滓分作三服  
治惡血不下盛於衣中方

右取竈突中煤為末每服三錢匕以水或溫酒調服  
之二物

又方  
右取蓖麻子二七枚去殼研塗脚心衣纔下速去之

又方  
右取葱葉細切用三指撮以熱酒沃之去葱服立下

又方  
右取敗簾箕舌燒作灰細研每服三錢匕酒服之

治胞衣不下法

右以炊箆當戶前燒之

又法  
右用小豆溫水或酒吞下如生男者一七枚生女二

七枚  
又法  
右取夫單衣蓋井口立出

又法  
以苦酒服真珠末一錢匕亦出

又法

又右取皂莢末吹鼻中令嚏即下

又法

又右以棗肉丸水銀一皂子大酒服立下

治胞衣不出麥豆湯方

又方小麥

小豆各壹合

右二味以水五盞煮取二盞去豆麥分溫二服

又方

又方牛膝去苗

葵子各壹兩

右二味剉令勻每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓溫服

治胞衣不出令胞爛丹砂散方

丹砂研半兩

右一味每服一錢匕溫酒調下未下再服

又方

葵子

阿膠炒令燥

牛膝酒浸

當歸切焙各參分

右四味搗羅為散每服五錢匕溫酒調下

續金一十三

又法

治本因利佛羅益... 正給... 監所... 下

當... 小豆...

右... 以水五...

又法

本一... 卷... 一... 卷... 下



大德重校聖濟總錄卷第一百五十九

