

醫宗必讀

五

傷寒

漢書門類	一四七三	一八	一	一
類	號	函	架	冊

內閣文庫	漢書
四七三	函
七〇三	冊
架	號

內閣文庫	
番號	漢 1473
冊數	10 (5)
函號	301 42



醫宗必讀卷之

雲間李中梓士林父著

門人黃寅錫清伯父參

姪孫李廷芳蘅伯父訂

傷寒

黃帝曰熱病者皆傷寒之類也其死皆以六七

日之間其愈皆十日以上者何也冬寒之氣感而即病名曰

傷寒不即病者寒毒藏于肌膚至春變為溫病至夏變為暑病岐伯對曰巨陽

者諸陽之屬也巨太也太陽為六經之長統攝陽分故諸陽皆其所屬其

傷寒

脉運于風府。故為諸陽主氣也。風府督脉穴。太陽經脈。覆于巔。

背之表。故王人之傷于寒也。則為病熱。熱雖甚。

不死。寒邪束于肌表。則玄府閉。陽氣不得散。越鬱而為熱。寒散則熱退。故雖甚不死。其

兩感于寒而病者。必不免于死。兩感者。陰陽俱傷。表裏同病也。

太陽與少陰同病。則頭痛。與口乾。煩滿。陽明與太陰同病。則身熱。譫言。與腹滿。不欲食。少陽與厥陰同病。則耳聾。與囊縮。而厥。三陰三陽俱受病。水漿不入。昏不知人。六日當死也。傷寒

一日。巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。是太陽為三

連風府。故傷寒者。多從太陽始。太陽之經。後二

頭項。下肩髃。挾脊。扭腰中。故其見病如此。

日。陽明受之。陽明主肉。其脉俠鼻。絡於口。故身

熱。目疼。而鼻乾。本得臥也。胃不和。則臥不安也。三日。少陽

受之。少陽主膽。其脉循脇。絡於耳。故胸脇痛。而

耳聾。邪傳少陽者。三陽已盡。將入太陰。故為半表半裏之經。仲景曰。脉弦細。頭痛發熱者。

屬少陽。口苦咽乾。脇下硬滿。乾嘔不能食。往來寒熱。蓋邪在陰則寒。在陽則熱。在半表半裏。故


寒熱俱見也。三陽經絡皆受其病。而未入于藏者。故

可汗而已。三陽為表。屬府。邪未入藏。可汗而解。四日。太陰受之。太

陰脉布胃中。絡於嗑。故腹滿而嗑乾。邪在三陽。失于汗解。

則傳三陰。自太陰始也。仲景曰。脉浮而緩。手足自溫。繫在太陰。腹滿而吐。食不下。自利。益甚。腹

時痛也。五日。少陰受之。少陰脉貫腎。絡于肺。繫舌



本故口燥舌乾而渴。腎屬水而蒸邪涸之故燥

細但欲寐也。六日厥陰受之。厥陰脉循陰器而絡于

肝。故煩滿而囊縮。至厥陰而六經傳徧邪熱甚

為病氣上撞心心中痛饑不欲食食則吐衄下

之利不止。按傷寒傳變先自三陽後入三陰

此常序也。東垣曰太陽經病若渴者自入于本

也。名曰傳木。太陽傳陽明者名巡經傳。太陽傳

少陽者名越經傳。太陽傳少陰者名表裏傳。太

陽傳太陰者名誤下傳。太陽傳厥陰者名巡經

得度傳。陶節庵曰或自太陽始日傳一經六

日至厥陰而愈者或不罷再傳者或間經傳者

或傳二三經而止者或始終只在一經者或越

經而傳者或初入太陽不發熱便入少陰而成

陰證者或直中陰經者有兩經或三經齊病不

傳者為合病。有一經先病未盡又過一經之傳

者為併病。有太陽陽明合病。有太陽少陽合病。

有少陽陽明合病。有三陽合病。若三陽與三陰

合病。即三陰三陽五藏六府皆受病。營衛不行

是兩感。三陰三陽五藏六府皆受病。營衛不行

五藏不通則死矣。傳經已徧邪當漸解若過經


則深至于藏故五藏六府皆病邪盛于外則營

衛不行氣竭于內則五藏不通所謂其死皆以

于寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病
衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太
陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰
渴止不滿舌乾已而噎十二日厥陰病衰囊縱
少腹微下大氣皆去病日已矣。所謂其愈者十
日以上者如此
有言傷寒以不服藥為中醫者其說本于此
不知經文為氣實者言也若正虛邪勝則死譬
如人溺洪溝不為援手而
棄其自渡全活者幾希矣帝曰治之奈何岐伯
曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日
者可汗而已其滿三日者可泄而已。各通者言
各明經脉

隨證施治也未滿三日其邪在表汗之而愈滿
三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳
正理論云脉大浮數在表可汗脉實沉數在裏
可下故曰數雖多在表證者必汗數雖少在
裏證者必下第當以表裏
為辨不可以日數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷于
寒固密者毋勞爾形毋搖爾神形神並守偕行
于閉蟄封藏之本者也一有不謹而犯寒威則
殺厲之毒乘于肌體冬月即發名正傷寒伏而
不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞
治之或差反掌生殺自仲景以來名賢代起立



言不患不詳。患其多而惑也。陶節菴曰。得其要領。易于拾芥。脉證與理而已。求之多岐。則支離繁碎。如涉海問津矣。脉證者。表裏陰陽。虛實寒熱也。理者。知其常。通其變也。多岐者。蔓衍之方書也。余有感于斯言。約六法以盡之。曰汗吐下。溫清補汗者。治在表也。而汗法有三。一曰溫散。寒勝之時。陰勝之藏。陽氣不充。則表不解。雖身有大熱。必用辛溫。一曰涼解。炎熱熾盛。表裏枯涸。陰氣不營。亦不能汗。宜用辛涼。一曰平解。病

在陰陽之間。既不可溫。又不可涼。但宜平用。期於解表而已。吐者。治在上也。吐中有發散之意。可去胸中之實。經曰。在上者。因而越之。是也。下者。攻其裏也。而下法有五。痞滿在氣。燥實在血。四證具者。攻之宜峻也。但見滿燥實者。攻之稍緩。但見痞實者。攻之宜緩。或行血畜。或逐水停。輕重緩急。隨證靈通也。溫者。溫其中也。藏有寒邪。不溫則死。夫氣爲陽。氣虛則寒。故溫卽是補。又名救裏者。以陽虛可危。亟當救援也。清者。清

其熱也。有熱無結。本非下證。若不清之。熱何由散。下後餘邪。亦宜清也。補者。救其虛也。古人言之已詳。今人畏而不用。使傷寒犯虛者。坐而待斃。大可憾已。如屢散而汗不解。陰氣不能達也。人知汗屬於陽。升陽可以解表。不知汗生于陰。補陰可以發汗也。又如內熱不解。屢清而火不退。陰不足也。人知寒涼可以去熱。不知壯水可以制火也。又如正虛邪熾。久而不痊。補正則邪自除。溫中則寒自散。此必見衰微之陰脈者也。

傷寒論曰。陰證得陽脈者生。陽證得陰脈者死。人皆奉其言。未知繹其義。夫正氣實者多見陽脈。正氣虛者多見陰脈。證之陽者。假實也。脈之陰者。真虛也。陳氏曰。凡察陰證。不論熱與不熱。惟憑脈用藥。至爲穩當。不論浮沉大小。但指下無力。重按全無。便是伏陰。然則沉小者。人知爲陰脈。不知浮大者。亦有陰脈也。是知傷寒雖具萬變。虛實二字。可以提綱。正勝則愈。邪勝則死。正氣實者。雖感大邪。其病亦輕。正氣虛者。雖感

微邪其病亦重。氣實而病者。攻之即愈。雖不服藥。經盡即安。何足慮也。所可慮者。惟挾虛耳。柰何庸淺之輩。不察虛實。但見發熱。動手便攻。虛而攻之。無不死者。且曰傷寒無補法。謬之甚矣。獨不觀仲景立三百九十七法。而治虛寒者。一百有奇。垂一百一十三方。而用人參桂附者。八十有奇。東垣丹溪節庵。亦有補中益氣。回陽返本。溫經益元等湯。未嘗不補也。而謂傷寒無補法。可乎。夫實者不藥可愈。虛者非治弗痊。能察其虛而補救者。即握傷寒之要矣。又何必求之多岐也哉。

傷寒十六證 傷寒者。寒傷營血。脉浮而緊。頭痛

發熱。無汗惡寒。傷風者。風傷衛氣。脉浮而緩。


頭痛發熱。有汗惡風。傷寒見風者。既傷于寒。

復感風邪。惡寒不躁。其脉浮緩。傷風見寒者。

既傷于風。復感寒邪。惡風煩躁。其脉浮緊。以上

皆冬月 溫病者。冬受寒邪。來春乃發。發熱頭疼。四證

即病者 不惡寒而渴。脉浮數。溫瘧者。冬受寒邪。復感



春寒 風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱

目汗身重。嘿嘿欲眠。語言難出。四肢不收。尺寸

俱浮。溫疫者冬受寒邪復感春溫時行之氣。

溫毒者冬受寒邪春令早熱復感其邪。以上

皆冬傷于寒而病發于春皆有溫之名也。熱病者冬傷于寒至夏乃

發。頭疼身熱惡寒其脉洪盛。傷暑者暑熱為

邪自汗煩渴身熱脉虛。傷濕者感受濕邪身

重而痛自汗身不甚熱兩脛逆冷四肢沉重胸

腹滿悶。風濕者既受濕氣復感風邪肢體重

痛額汗脉浮。瘧者身熱足寒頭項強急而赤

日赤口噤頭搖角弓反張若先受風邪復感于

寒無汗惡寒為剛瘧先受風邪復感于濕惡風

有汗為柔瘧。

傷寒 一日痰中脘停痰憎寒發熱自汗

胸滿但頭不痛項不強與傷寒異耳。一日食積

胃中停食發熱頭痛但身不痛氣口緊盛與傷

寒異耳。一日虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不

痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳。一日脚

氣足受寒濕頭痛身熱肢節痛便閉嘔逆但脚
痛或腫滿或枯細與傷寒異耳一日內癰脉浮
數當發熱而惡寒若有痲處飲食如常畜積有
膿也胸中痛而欬脉數咽乾不渴濁唾腥臭肺
癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮
甲錯腹皮腫急脉滑而數腸癰也胃脘痛手不
可近胃脉細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而
候認傷寒禁其飲食必死

表證 發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻

乾不眠胸脇痛耳聾寒熱嘔脉浮而大或緊或

緩有汗脉浮緩無力表虛也無汗脉浮緊表實也

裏證 不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞞滿

大便不通腹痛腹鳴自利小便如常譫語潮熱

咽乾口渴舌乾煩滿囊縮而厥唇青舌卷脉沉

細或沉實腹鳴自利不渴唇青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脉沉微裏虛也腹中

鞞大便閉譫語潮熱腹滿不惡寒反惡熱譫語

屬半表半裏表裏俱無不可汗下小柴胡湯隨證加減

陰證 身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸


不入水漿不入二便不禁面如刀割色青黑或不喜向壁臥閉目不欲見人鼻氣自冷唇口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也。陰毒者腎本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六脈沉微或尺衰寸盛五日可治六七日不可治。陰

證似陽者煩躁而赤身熱咽痛煩渴脈浮微手足冷大便洩小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛于內真陽失守也。

陽證

身動氣高而喘目睛不了了呼吸能性能來。

口鼻氣熱面赤唇紅口乾舌燥譫語能飲凉水身輕如常小便赤大便閉手足溫指甲紅。陽毒者邪熱深重失汗失下或誤服熱藥熱毒散漫舌卷焦黑鼻中如烟煤咽喉痛甚身面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌弃衣而走脈洪



大滑促五日可治。六七日不可治。或昏噤咬牙見鬼神吐膿

血藥入陽證似陰者。手足冷。大便閉。小便赤。煩

悶昏迷不眠。身寒却欲衣。口渴。指甲紅。脉沉

滑。或四肢厥冷。陰厥脉沉弱。指青而冷。此陽陽厥脉沉滑。指紅而溫。

極于內。真陰失守也。

六經治法 足太陽勝膀胱。此經從頭頂貫腰脊。故

頭痛惡寒。發熱脊強。然風與寒常相因。寒則傷

營。惡寒。頭痛。脉浮緊而無汗。用麻黃湯。開發腠

理。以散寒得汗而愈。風則傷衛。惡風。頭痛。脉浮

緩而有汗。用桂枝湯。充塞腠理。以散風止汗而

愈。若夫風寒兼受。營衛俱傷。用大青龍湯。此三

湯者。冬月天寒。腠密。非辛溫不能發散。故宜用

也。若春溫夏熱之證。皆用羌活沖和湯。辛涼解

之。傳至陽明。則日痛。鼻乾。不眠。以葛根湯升麻


湯治之。此經有在經在府之別。如日痛鼻乾。微惡寒。身熱。脉浮洪。病在經也。潮熱自汗。

譫語發渴。大便閉。樹去衣。被手揚足。傳至少

發。班發黃。狂亂惡熱。脉沉數。病在府也。傳至少

陽。則寒熱而嘔。胸痛脇痛。口苦耳聾。此為半表

半裏之經。表證多者。小柴胡湯。裏證急者。大柴



胡湯過此不已。則傳陽明之府。表證悉罷。名爲
入裏。惡熱譫語。口燥咽乾。不大便。脉沉實。如痞
滿燥實四證皆具。三焦俱傷。宜大承氣湯。但見
痞燥實三證。邪在中焦。宜調胃承氣湯。不用枳
朴。恐傷上焦之氣也。但見痞實二證。邪在上焦。
宜小承氣湯。不用芒硝。恐傷下焦之血也。小腹
急。大便黑。小便不利。如狂喜忘。畜血證也。宜桃
仁承氣湯。傳至三陰。四肢厥冷。腸痛吐瀉。口噤
冷。凝畏寒戰慄。齒如刀割。引衣蹠臥。脉見遲軟。
急宜溫之。輕者理中湯。重者四逆湯。或初病起
不發熱。便見寒證者。名爲直中陰經。亦以二湯
主之。以上各經治法。一見表證。卽與汗之。一見
裏證。卽與下之。一見虛寒。卽與溫補。但當以脉
證爲據。不可以日數爲拘也。

頭痛項強。肢節腰背俱強。身疼拘急。惡寒。
發熱無汗。脉浮數。或浮緊。皆可汗。若汗後不解。
仍發熱。脉浮。頂再汗之。

無表證者不可汗。脉沉不可汗。尺

脉遲不可汗 脉微弱者雖惡寒不可汗 咽

中閉塞者不可汗 諸動氣者不可汗 淋家

不可汗 亡血虛家不可汗 厥者不可汗

汗家不可重汗 太陽與少陽併病頭項強痛

或眩暈心下痞不可汗 脉弦細頭痛而熱屬

少陽不可汗 管范雲患傷寒時武帝有九錫之命謂徐文伯曰可速愈乎文伯曰

其易但元氣不足恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣况二年乎遂以蒸法取汗而愈後二年果卒虛

者其可暫汗哉 柄在膈上者可吐 汗下後虛煩懊憹者

可吐

不可吐 脉虛不可吐 厥逆者不可吐 膈上

寒乾嘔者宜溫不宜吐

可下 汗後不解邪傳胃府可下 潮熱腹痛脉

實者可下 陽明多汗譫語有燥糞可下 潮

熱手足腋下汗出譫語者可下 吐後腹滿者

可下 凡臍腹硬或痛不可按者可下 下後

不解臍腹硬痛者可再下 結胸脉不浮可下

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾者

可下 太陽證。熱結膀胱。小便不利。小腹急結。其人如狂者。血畜也。可下。陽明證。其人喜忘。大便黑。必有闕血。可下。陽明無汗。小便不利。心中懊憹。必發黃。可下。

不可下 表未解者不可下。腹脹可按而減者不可下。諸虛者不可下。陽微者不可下。

咽中閉塞者不可下。諸動氣者不可下。脈弱者不可下。脈浮大者不可下。小便清白者不可下。陽明病。面赤。心下雖鞭滿。不可下。

用火 以火烧地。布桃葉。栝葉亦可設席。置病人于上。即汗出。或醋炒香附。熱熨胸背。即汗。或

置火于牀下。或艾灸。

用水 傷寒。思飲水為欲愈。若不與。則不愈。若恣飲。則水停。宜以新汲水。少與之。待再思再與。

熱甚者。以青布浸新汲水中。置病人胸前。熱則易之。甚者置病人于水中。或浸手足。或漱口。

若表未解。及陰證似陽者。忌之。

蒸 翁翁而熱者。表也。羌活中蒸蒸而熱者。裏

也。輕者大柴胡湯。重者承氣湯。半表半裏者。表裏俱熱。而輕

于純在裏也。小柴胡湯。至于三陰發熱。則有腹痛肢

冷。脉沉下利為異。四逆湯。潮熱屬陽明。一日一發。

日晡而作。陽明內實也。大便秘者。承氣湯。表未罷

者。小柴胡湯。煩熱兼渴者。竹葉石膏湯。心煩不眠。酸棗仁湯。煩

而心悸。小建中湯。煩而悶者。梔子豉湯。熱者。白虎湯。寒者。附子湯。

惡寒。無熱惡寒者。陰也。理中湯。下證悉具。微惡寒者。羌活湯。

表未解也。先解表而後攻裏。下後不解。發熱

而渴。惡寒。白虎湯。惡寒而嘔心下痞者。五苓散。汗後

惡寒。虛也。芍藥附子湯。背惡寒。表未解也。葛根湯。背

惡寒而潮熱。柴胡加桂湯。口渴心煩。背微惡寒。白虎加人

參湯。背惡寒。潮熱腹滿。小承氣湯。少陰病。口中和。背惡

寒。附子湯。汗後不解。反背惡寒者。虛也。芍藥甘草湯。

有汗。桂枝湯。吐下後不解。表裏俱熱。時時惡風。燥

渴而煩。白虎加人參湯。汗多亡陽。惡風者。桂枝湯。

惡風寒者。桂枝湯。惡寒自汗。表虛也。小建中湯。

惡風。惡風者。桂枝湯。惡寒自汗。表虛也。小建中湯。

惡風者。桂枝湯。惡寒自汗。表虛也。小建中湯。

者建中湯。自汗不惡風寒。表證罷。裏證實也。承氣湯汗

多小便利。必津液竭。大便雖硬。不可攻。宜蜜導。

用蜜于銅器中。微火煎。稍凝攪之。勿令焦。皂角末。少許和之。乘熱捻作棗子樣。冷納谷道中。欲大便。急去之。自汗而渴。小便難。五苓散汗多不止。日亡

陽。桂枝附子湯。外用白朮。藁本。川芎。白芷。各一兩。牡蠣粉。米粉。各二兩。細末。紗囊。周身撲之。

盜汗。在半表半裏。膽有熱也。胡柴湯頭汗者。熱不

得越。陽氣上騰。譫語。承氣湯心下滿。頭汗出。水結

胸也。小半夏湯頭汗出。齊頸而還。發黃也。茵陳五苓散

頭汗出。小便難者死。手足汗大。便燥。譫語。承大

湯寒不能食。小便不利。水穀不分。手足汗者。湯中

頭痛。太陰少陰。有身熱而無頭痛。厥陰。有頭痛。而無身熱。又頭痛。屬陽經也。頭

痛發熱。無汗惡寒。麻黃湯大便六七日不通。頭痛

有熱。小便清者。不在裏。仍在表也。羌活沖和湯頭痛

甚者必衄。葛根蔥白湯少陽頭痛。小柴胡湯頭痛寒

熱。寸脉大。痰厥也。瓜蒂散厥陰頭痛。嘔而吐沫。吳茱萸湯

黃厥陰頭痛。脉微遲。為欲愈。如不愈。小建中湯陽明

頭痛。不惡寒。微惡熱。不大便。調胃承氣湯

身痛。太陽脉浮。身痛無汗。麻黃湯陽明于證已見。

身痛。太陽脉浮。身痛無汗。麻黃湯陽明于證已見。

身痛。太陽脉浮。身痛無汗。麻黃湯陽明于證已見。

身痛。太陽脉浮。身痛無汗。麻黃湯陽明于證已見。

但身痛者。表未解也。麻黃湯發熱。有汗。身痛。桂枝湯

陽明脉浮。身痛。葛根湯汗後脉沉遲。身痛。血虛也。

黃耆建中湯陰毒。嘔逆。下利。身痛。如被杖。唇青面黑。

甘草四逆湯一身盡痛。發熱惡寒。面寒。桂枝湯一身盡

痛。發熱。面黃。二便反利。甘草附子湯一身盡痛。發熱

發黃。頭汗出。背強。小便不利。濕也。茵陳五苓散一身

盡痛。發熱。面黃。熱結瘀血也。抵當湯

筋惕肉瞤汗多亡陽。筋肉失養。故惕惕瞤動。瞤動兼肢冷者。真武湯

輕者茯苓桂枝甘草白朮湯。汗吐下後見此者。先服防風白朮湯

牡蠣湯次服 小建中湯

胸滿胸滿多表證。葛根湯喘而胸滿。麻黃杏仁石膏湯

脇下痞鞭。冲和湯去棗加牡蠣胸脇俱滿。或鞭痛。或嘔。或

不大便。舌上白胎。俱小柴胡湯邪在胸。汗下之而煩

熱。乾子胸中痞鞭。氣上冲喉。寒也。瓜蒂散陽明少

陽合病。下利。身熱。脇痛。大柴胡湯汗後頭痛。心痞。脇

滿。十棗湯

結胸病發于陽而反于陰。熱入裏。作結胸。脉浮者。先以小柴胡解

表。然後下之。按之則痛。小結胸也。小陷胸湯不按

傷寒

醫宗必讀 卷之三

亦痛。大結胸也。大陷胸湯。懊憹躁渴。實熱結胸也。三

瀉心。血結胸者。小腹滿。小便不利。抵當湯。飲水不

散。水結胸也。小半夏湯。用陷胸等藥不效者。枳實

九。煩亂欲死。宜水漬法。凝雪湯。漬布薄。

痞。滿而不痛。病名。曰痞。病發。輕者。通用。枳桔。胸

滿。脈濡。心湯。手足溫。按之濡。關上浮者。黃連。胸

湯。乾嘔。有水氣。心湯。下利腹鳴。心湯。胃寒

欬逆。理中。關脈沉緊。大柴胡湯。腹滿

大腹滿。六七日不大便。腹滿常痛者。承氣湯。腹滿

時痛者。桂枝芍藥湯。腹滿吐食。枳桔理中丸。汗後脹滿。厚

半夏甘草。腹滿漉漉有聲。水與氣也。半夏茯苓

少腹滿。臍下滿也。胸腹滿為。小腹痛。小便利。畜

血也。重者桃仁承氣湯。小腹痛。小便自利。發

狂者。抵當湯。小腹滿。手足厥冷。真武湯。不結胸。小腹

滿。按之痛。冷結也。灸關元穴。

腹痛。陰邪痛者。其痛不常。按而痛甚。為實。右

關脈實。腹痛使閉。承氣湯。下之早。因而腹痛。小建

陽脈濡。陰脈弦。腹痛洩利。建中湯。或桂枝。少陰厥

醫宗必讀 卷之三 八

醫宗必讀 卷之五

逆。或利而欬。四逆加五味子乾薑湯厥陰小腹痛。當歸四逆湯

咽痛少陰證也不可汗。不可下。甘桔湯為陰陽通用之藥脈陰陽

俱緊。主無汗。有汗曰亡陽。屬少陰。當咽痛。猪膚湯

陽毒咽痛。口瘡赤爛。升麻六物湯或蜜浸黃連汁噉非時暴寒。

附于少陰之經。脈弱咽痛。必下利。先用半夏桂湯。次服四逆湯。

逆。下利咽痛。手足微冷。無熱證者。理中湯

脇痛往來寒熱。脇痛。胸痛。小柴胡湯身涼。表證

罷。乾嘔。脇痛。有水也。十棗湯

呃逆仲景作欬逆即此證也。切勿誤作咳。脈微細。呃逆。胃寒也。橘

乾薑半夏生薑湯。丁香。柿蒂湯。脈洪大而呃。心火上奔。肺不得

納。甘草瀉心湯。服藥無效。用輿法。硫黃乳香等分。為末。酒煎。輿之。失

下呃逆。大便實者。小承氣湯

嘔吐嘔者。聲物俱出。吐者。無聲出物。噦者。有

聲。無物。太陽陽明合病。當自利。若不利。但嘔。

葛根加半夏湯少陽有嘔證。小柴胡湯嘔而渴者。猪苓湯先

渴後嘔。水停心下。赤茯苓湯先嘔後渴。此為欲解。當與

飲。水。瘥後餘熱在胃而嘔者。竹葉加薑汁湯太陽少陽合

病。自利而嘔。黃芩半夏生薑湯寒厥嘔而不渴。薑附湯嘔

而發熱。心下急。微煩。大柴胡湯胸中有熱。胃中有邪。

陰陽不交。腹痛欲吐。黃連湯黃連湯。三陽發熱。

而吐。俱用小柴胡湯發熱六七日不解。煩渴欲飲。水入

即吐。五苓散虛熱少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯寒多而

吐。理中湯不飲而吐。理中湯去薑。汗下後。胃虛冷吐。

乾薑黃連黃芩少陰吐者。真武湯去附子。吐逆。二便秘。

厥逆無脈。大承氣湯心下有水氣。乾嘔。身熱微喘。或

自利。小青龙湯不發熱。不惡寒。肋痛乾嘔。十棗湯自汗。

頭痛。乾嘔。桂枝湯乾嘔自利。黃芩半夏湯裏寒外熱。

脈微欲絕。乾嘔。通脈四逆湯太陽證罷。表未解。心下有

水氣。乾嘔發熱而咳。小青龙湯太陽發熱咳嗽。上方同

太陽發熱。嘔噦而咳。小柴胡湯少陽寒熱往來。咳嗽。

胸脇滿。或泄利。小柴胡湯去參棗。少陰咳嗽。真武湯

少陰腹痛。小便不利。四肢沉重。咳嗽者。水氣也。

真武湯加五味子。細辛。乾薑。

喘 太陽無汗而喘。太陽陽明合病。胸滿而喘。

俱麻黃湯邪氣壅盛而喘。雖汗而喘不已。宜再發之。

醫宗心法卷之五 二子 易寒

麻黃杏子 誤下太陽利不止喘而有汗脉促葛根

石骨湯 太陽汗後飲多水停而喘小青龍去麻黃加杏仁小

腹滿加 太陽下之微喘表未解也桂枝湯加厚朴杏仁水

茯苓 停心下腎氣乘心為悸為喘五苓散陰喘脉伏而

逆理中湯喘而氣促腹滿大柴胡湯

煩躁 太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛無汗煩

躁大青龍湯煩躁消渴辰砂五苓散下利咳嘔煩躁猪苓湯

下利咽痛胸滿而煩猪膚湯自汗煩躁小便多芍藥湯

甘草 少陰心煩不臥黃連雞子湯少陰吐利手足厥

冷煩躁欲死吳茱萸湯下後復發汗晝則煩躁夜則

安靜不渴無熱乾薑附子湯六七日無大熱陰盛

隔湯身冷脉細煩躁不飲水霽靈散陰躁欲坐井

中薑附湯

懊懣 懊者煩惱懣者鬱悶比之煩躁殆有其焉汗吐下後虛煩不眠

甚則懊懣梔子鼓湯陽明脉浮咽燥腹滿而喘發熱

汗出惡熱懊懣梔子鼓湯陽明病下後懊懣有燥屎

承氣 短氣煩躁懊懣大陷胸湯陽明無汗小便不利

懊懣發黃茵陳蒿湯

必前...者之五

戰慄

戰者身動。慄者。慄而不戰。陰盛陽虛。薑附酒

悸

心中築築然。動。怔忡不安。脉結代。心悸。炙甘草湯傷寒三四日。

心悸而煩。

小建中湯汗發過多。心悸喜按。桂枝甘草湯心

神不寧。怔忡不臥。

安神丸少陰病厥逆。心下悸。四逆散

散加

飲水多而悸。雖有他邪亦先治水。茯苓甘草湯

寒熱心悸。小便不利。心煩喜嘔。

小柴胡湯少陽發汗。

譫語悸動。

小柴胡湯

渴

或因熱耗津液。太陽脉弦而渴。小柴胡加天花粉太

陽表不解。有水氣而渴。

小青龍去半夏加瓜蒌湯脇下痛。手

足溫而渴。

小柴胡去半夏加人參天花粉厥陰病消渴。氣上冲

心。

茯苓白朮甘草桂枝四物湯汗下後寒熱。胸脇滿。小便不利。

頭汗心煩。渴而不嘔。

柴胡桂枝乾薑湯太陽脉浮而渴。

桂枝

脉浮發熱渴欲飲水。小便不利。猪苓湯少陰

下利。咳而嘔。渴煩不得眠。

猪苓湯多不可服。汗吐下後。

六七日不解。表裏俱熱。惡風。大渴。

白虎加人參湯汗後

脉大而渴。

白虎加人參湯夏至左右。虛煩而渴。發熱不

惡寒。

竹葉石膏湯小便不利而渴。必發黃。茵陳五苓散少

陰自利而渴。小便清利。下焦虛寒。

甘草乾薑湯心煩

傷寒

傷寒

傷寒

傷寒

但欲寐。或自利而渴。少陰也。理中湯 陽明脉長而

實。有汗而渴。承氣湯 脉沉滑熱實。煩躁而渴。大陷胸湯

口燥咽乾引飲日燥乾。少陽邪在中焦。口苦舌

乾。不甚渴。脉弦。小柴胡湯 口乾。脉浮緊微數。白虎加人參湯

陽明無大熱。背惡寒。口燥咽乾。上方同 少陰病二

三日。口燥咽乾。急下之。大承氣湯

微瀲水不欲嚥。必發衄。犀角地黄湯 外證無寒

熱。瀲水不欲嚥。必發狂。此畜血也。桃仁承氣湯

六七日未得汗。脉洪數。面赤目脹。大熱煩躁。狂

言欲走。葶藶苦酒湯 陽毒發狂。斑爛譫語。升麻火劫

汗多亡陽。煩躁驚狂。金匱風引湯 柴胡

極脉大身熱。渴而狂。黃連解毒湯 甚者承氣湯

湯加辰砂 陽毒發狂。眼赤脉洪。口渴。三黃石 血上逆

則喜忘。血下畜則如狂。輕者犀角湯 脉弦長

而狂。調胃承氣湯 陽勝陰絕。發狂羞妄。面赤咽痛。發

斑。脉洪實。或滑促。宜酸苦之藥。收陰抑陽。大汗

而解。葶藶苦酒生艾湯

胃熱乘心神譫昏冒妄言不休實則譫語

虛則鄭聲譫語者數變更端聲高脈實鄭聲者只將一事一語鄭重譫復聲低脈微極當明辨已發汗身和譫語

桂枝湯 婦人經水適來熱入血室譫語小柴胡湯 譫語

不惡寒反惡熱。白虎湯 煩躁不眠。白虎加梔子湯 三陽合

病腹滿身重口中不和面垢譫語遺尿脈滑實

不可下。白虎湯 腹滿微喘口乾咽爛或不大便譫

語是因火劫。白虎湯 身熱汗出胃實譫語或下利

譫語。調胃承氣湯 下利譫語必有燥屎。承氣湯 譫語小

便利大便實小腹滿手不可近為瘀血。抵當湯 鄭

聲脈微自利厥逆。白通湯 氣虛獨言脈細弱者。理中湯

自利 太陽與陽明合病自利。葛根湯 嘔

少陽合病自利。黃芩湯 自利而渴屬少陰。白虎自

利下血。柏皮湯 少陰腎虛客熱下利咽痛胸滿心

煩。猪膚湯 協熱自利臍下必熱。白頭翁湯 溫毒下利膿

血。桃花湯 下後脈數不解自利不止必協熱當便

膿血。犀角地黃湯 自利不渴屬太陰。理中湯 自利清穀

脈微。白通湯 自利腹寒痛手足冷。理中湯 或自

醫宗必讀 卷之五 二五 傷寒

利不止裏寒下脫。桃花湯赤石脂禹餘糧湯

鬱胃鬱結而氣不舒。昏胃而神不清。太陽誤下利不止復發汗。

表裏俱虛鬱胃。瀆形為汗吐下後復發汗又與水噦

而胃。理中湯熱而鬱胃不得臥有燥屎。調胃承氣湯

瘈瘲熱極生風。風主動。故瘈瘲。瘈則筋急而縮。瘲則筋緩而伸。或縮或伸動而不定。汗

出時蓋覆不周腰背手足搐搦。牛旁根湯脉浮數有

風熱。防風通聖散血不養筋。大秦

動氣藏氣不調。肌膚間築築跳動。隨藏所主。而見于臍之左右上下。獨不言當臍者。脾為

中州。以行四藏之津液。左右上下皆。不宜。下。何况中州。其敢輕動乎。此證須手

探之。切勿忽也。四旁有動氣。保命四氣散

剛瘕柔瘕太陽中風。重感寒濕而致也。大發濕

成瘕。傷寒頭痛。汗出而嘔。若汗之。必發瘕。經曰

身熱足寒。頭項強急。惡寒。頭熱面赤。背反張。口

噤。脉沉細。如發瘕狀是也。若先受風。復感寒。無

汗惡寒。為剛瘕。先受風。復感熱。惡風。有汗為柔

瘕。仰面開目。為陽。合向閉目。為陰。燥渴為陽。口

中和為陰。脉浮緊數為陽。沈細澀為陰。陽瘕易

治。陰瘕難治。通用。小續命湯。剛瘕去。陰瘕厥逆。筋脉

拘急。汗多。桂心白朮散。閉目合眼。附子防風散。胸滿口噤。

臥不着席。咬牙攣急。大承氣湯頭項強。小腹滿。小便

不利。五苓散風盛血燥。防風當歸散

手足厥逆

四肢冷謂之四逆。即各為厥也。厥逆。脉沉細。踈臥惡

寒。引衣自覆。不飲水。下利清穀。四逆湯。脉不至者。

通脉四逆湯。脉遲弱。理中湯。手足指微冷。謂之清。理中湯

寒熱而厥。面色不澤。用綿衣包手足。溫。大汗而

解。急服。五味子湯。少陰病。吐利厥逆。煩躁欲死。吳茱萸湯

厥而有熱。黃耆人參建中湯。厥而渴者。白虎湯。厥而悸。先

治其水。茯苓甘草湯。厥而惡熱。不眠譫語。白虎湯。諸陽

受氣于胸。邪客則陽氣不施。手足厥逆。脉乍緊。

心滿而煩。病在胸中。當吐之。瓜蒂散。先發熱而後

厥者。手揚足擲。煩躁飲水。畏熱。大便秘。小便赤。

佛鬱。大抵熱深。厥亦深。脉沉滑。頭面有汗。指甲

溫。皆伏熱也。大小承氣湯

頭眩上虛則眩。半表半裏。表申陽虛。目眩。葛根湯。風家

多頭眩。葛根湯。口苦咽乾。頭眩。小柴胡湯。陽明頭眩。不

惡寒。能食而欬。茯苓白朮甘草湯。太陽病。發汗汗不

止。眩。胃身。瞶動。振振欲僻地。真武湯

鼻衄鼻血出也。太陽病。衄血。及服桂枝後。衄者。為欲

解。犀角地黃湯。脉浮大。發熱下利。鼻衄。乾嘔。黃芩芍藥湯

嘔。煩渴欲飲水。水入即吐。先服五苓散。次服竹葉石膏湯。自利

而嘔。麻黃升麻湯。少陰病。但厥無汗。而強發之。必嘔。

名下厥。上竭。為難治。當歸四逆湯。黑錫丹。汗後熱退。鼻衄

不止。新汲井水。草紙數層貼頂上。及項脊。溫則

易必止。

亡血 當汗不汗。熱毒深入。故吐血。內有瘀積。桃

承氣湯。服桂枝後。吐血。犀角地黃湯。血紫黑成

塊。脉遲細。口不渴。小便清。理中湯。加丹皮。

蓄血 太陽病不解。熱結膀胱。發狂。血自下。桂枝

熱在干焦。少腹急滿。小便自利。其人如狂。桃仁

湯抵當湯

下血 太陽病不解。其人如狂。熱結膀胱。血自下

者愈。若不愈。桂枝湯。小腹急滿。抵當湯。少陰下血。桃

湯。腹滿身熱。下膿血。黃連阿膠湯。地榆散。

小便不利 已汗復下。小便不利。心煩。小柴胡湯。太陽

汗後。脉浮。小便不利。微熱而渴。五苓散。身黃。小便

不利。腹微滿者。茵陳蒿湯。小便不利。大便乍難乍易。

微熱。有燥屎也。承氣湯。潮熱。大便泄。小便不利。柴

湯 風濕自汗身重小便不利。其草湯 熱鬱不通。

田螺搗杵硝少加 寒鬱不通。妙鹽炙

小便自利 太陽病小便自利以飲水多心下悸。

桂枝茯苓 身黃小便當不利今反自利其人如

比草湯 狂下焦畜血。抵當 熱而小腹滿應小便不利今

反自利畜血也。抵當 二便俱利脉沉遲。四逆

小便數 煩來而 太陽汗吐後小便數譫語。調胃

短少也 太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒小便數。甘草

乾薑湯

發黃 發熱一身盡痛面目俱黃太陽中濕。連翹

湯 熱不去瘀血在裏而黃小便微利。赤小豆湯

往來寒熱一身盡痛發黃。小柴胡加 發熱頭汗。

渴欲飲水小便利大便快發黃。五苓散加 小便

不利四肢沉重似瘧不欲飲。茵陳五 傷冷脉虛。

小便如常變為陰黃。茵陳湯 下之太過脾虛津

竭飲水自傷此陰濕變黃。茵陳茯苓湯

發斑 熱甚傷血裏實表虛 發為斑也。斑見紫黑

者十死一生或陽證誤溫或當汗失汗當 陽毒結熱舌

入胃或下遲熱蓄胃中皆發斑。

卷焦黑。鼻如烟煤。狂言見鬼。面赤錦斑。陽毒升

赤斑咽痛。玄參升表證多者。防風通聖散。去豬

斑出咽痛。豬胆雞子湯。紫赤斑。大青四通用升

湯。犀角地黃湯。冬煖受邪至春發班。溫毒也。黑

化毒丹。已溫毒。煩渴便實。腹痛赤班。承氣汗下。

虛極發班。白虎湯。加

狐惑。失汗所致。食少胃空。蟲嚙五藏。故唇口生

則下唇生瘡為狐。其候齒燦聲啞。惡食。面口生

赤乍白乍黑。舌上白胎。唇黑。四肢沉重。喜眠。

清熱。黃連犀聲啞。桃仁殺蟲。雄黃銑散。為

多眠。太陽病。脉細多眠。外已解也。小柴尺寸沉

細。但欲寐者。少陰證也。四逆湯。脉浮滑。陰脉濡

弱。多汗。或發汗後。身猶灼熱。喘息多眠。風溫也。

不得眠。眠者。安吐下後。不眠。酸棗吐下後。懊懷

不眠。梔子大熱嘔。錯語不眠。黃連解少陰病。二

三口已上。心煩不眠。黃連雞太陽大汗。胃乾不

眠。欲飲水者。少少與之。下後渴而不眠。猪苓

脉浮。小便不利。不眠。五苓散。下後復發汗。不眠。無

表證。脉沉。乾薑附子湯

短氣。呼吸短促。不能接續。似喘。汗出不徹。故短氣。葛根加人參湯。腹滿短氣。邪在表為虛。甘草附子湯。風濕

相搏。汗出短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。甘草附子湯

水停心下短氣。五苓散。乾嘔短氣。汗出不惡寒。

此表解裏未和。十棗湯。太陽下之早。心下硬。結胸

短氣。大陷胸湯

吐厥。藏寒。故食即吐。吐也。胃中虛冷。理中丸。或四逆湯。吐

而渴。理中湯。并大黃。人蜜利之。

百合病。似寒無寒。似熱不熱。欲食不食。欲卧不卧。欲行不行。嘿嘿。不知所苦。如見鬼狀。小便赤。病後失調。攻下非法。故成百合病。通用。小柴胡湯。加百合。血

熱。百合地。一川不解而渴。百合一宿。煮熱浴身。黃湯。

陰陽易。男病新瘥。女與之交。日陰易。細考之。即女勞復也。有謂男病愈後。因交而女病。女病愈後。因交而男病。于理未然。古今未嘗見此證也。證狀。體重

少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上冲。通用。胸。頭重。不欲舉。眼中生花。膝脛拘急。

散。取女人視。稽近隱處。剪燒灰。水調。方寸匕。日三服。女病用男視。新瘥後大虛。

因交復作。垂死。獨參湯。調燒視散。多有古用。鼠

糞寒者。當歸白木湯。

湯。

湯。

湯。

湯。

湯。

湯。

復 非但強力持重若梳木。微勞及七情皆復也。脉虛者。補中益氣湯。麥門冬。

挾外證者。則謂之復。非為勞也。胡柴湯

復 新瘥胃虛。食稍多則腹滿。脉實。煩熱便秘。

大柴胡湯。輕者二陳湯。消導後熱不退。補中益氣湯

加山查。麥。萊。砂。仁。神。麩。消導後熱不退。補中益氣湯

過經不解 則再傳。是為過經。潮熱者。實也。先與小柴

胡。外。已。解。嘔。微。煩。大。柴。過。經。謔。語。脉。實。當。下。調

加芒硝。承氣湯。嘔。微。煩。大。柴。過。經。謔。語。脉。實。當。下。調

汗後不解。或表邪未盡。或邪傳裏。或邪氣乘虛內客。汗後。脉大。如瘧

狀。再汗之。麻黃湯 汗後。心下痞鞭。嘔吐不和。大柴胡湯

大汗大渴。煩而脉大。白虎加人參湯 汗後惡熱。脉實。調

承氣湯。汗後不可更行桂枝。汗出而喘。無大熱者。

麻黃杏仁甘草湯。太陽大汗出。胃乾不眠。欲飲水者。少

少與之。若脉浮。小便不利。微熱。消渴。五苓散 汗後

脉洪數。煩渴。五苓散 汗後脹滿。厚朴生薑人參湯 汗過多。

心悸發顫。桂枝甘草湯 汗後惡寒。表虛也。脉細神倦。

芍藥甘草湯。太陽汗出不解。發熱。心悸肉瞤。真武湯

汗後身痛。脉沉。桂枝加芍藥人參湯 汗後熱不去。內拘急。

四肢疼。下利惡寒。四逆湯 汗後臍下悸。欲作奔豚。

桂枝甘草湯
大棗湯

下後熱不去

心中結痛。梔子厚朴湯下後心

煩腹滿臥起不安。梔子厚朴湯太陽桂枝證誤下之。

利不止脉促喘而汗出表未解。葛根湯陽明

下之心下懊憹。梔子厚朴湯有燥屎。大承氣湯太陽下後脉

促胸滿。桂枝芍藥湯大下後脉沉遲厥逆下利咽喉

不利吐膿血難治。麻黃升麻湯

不和謔語遺尿不可汗下。白虎湯太陽陽明合病

脉浮長大便秘小便不利。白虎湯不惡寒

反惡熱。大便秘通者白虎湯喘而胸滿不可

下。麻黃湯嘔不下利。葛根湯太陽少陽合病脉浮

弦脇下鞭往來寒熱。小柴胡湯自下利者。黃芩湯嘔者

黃芩加芍藥湯少陽陽明合病脉弦長因發汗因利

小便胃中燥實。調胃承氣湯脉長自利者為順滑而

數者為負有宿食。大承氣湯負

辨病一經先病未盡又過一經之傳者為併病

或始則二陽合病後則一陽病衰一陽邪

盛歸併于一經太陽陽明併病太陽病發汗不

徹轉屬陽明。續自微汗出，不惡寒。若面色怫鬱，痛無常處，是陽明復併歸太陽。當再汗之。麻黃湯

太陽證未罷。桂枝麻黃各半湯太陽證罷，但見陽明證

者下之。大承氣湯太陽少陽併病，頭痛，太陽眩冒，心下

痞。當刺肺俞、肝俞、大椎。慎勿下。太陽不勝，陽明不負，不

相尅為順。少陽脉勝，陽明脉負，鬼賊相尅為

逆。

二經二經，陰陽俱病也。表裏不和，氣實而感之淺者，猶或可治。活湯東垣以

舌胎那在表者，舌上無胎。半表半裏，白胎而滑，傳裏則乾燥。熱深則黃，熱極則黑也。陽

明病，脇下鞅滿而喘，發熱汗出，不大便而嘔，舌

上白胎者。小柴胡湯脉陰陽俱緊，舌上滑胎。小柴胡

加人參、括、蕪、湯熱聚于胃，則舌黃。承氣湯舌純黑

有二種，皆死證也。有火極似水者為熱極。大承

有水來尅火者為寒極。脉證必寒。附子理中湯七八

日不解，熱結在裏，表裏俱熱，時時惡風，舌燥欲

飲水數升。白虎湯加人參。

發汗因發汗不透，餘毒在心胞絡也。發汗出時，蓋覆不周。

則汗出不均。腰背手足搖擗。或冷或熱。牛旁根散 瘥後。腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散


摘陶氏十法

發狂難制。以醋炭氣入鼻即定。方可察其陰陽。初病起。頭痛發熱。傳裏時。熱極發狂。當下之。初病起。頭不痛。身微熱。面赤煩躁。欲坐臥涼水中。陰極似陽。當溫之。須察脉來有力無力。此為良法。

腹中痛甚。將凉水一碗與病人飲之。其痛稍減者。屬熱。當涼之。涼之不愈。渴而大便實者。下之。若小腹痛。大便秘。小便利。身目黃者。畜血也。行血藥下之。若飲水痛增者。屬寒。當溫之。須察脉來有力無力。此為良法。

寒證脉伏。或吐瀉脫而無脉。以薑汁好酒各半盞。與病人服。脉出者生。不出者死。更覆手取之。而無脉。則絕矣。

舌上有胎。不拘何色。用井水浸新青布。拭淨後。用生薑浸水刮之。或以薄荷為末。入蜜少許。



刷牙擦之。若發黃者。生薑渣。周身擦之。即退。

鼻衄不止。山梔炒黑為末。吹入鼻中。外用濕草紙。搭于鼻冲。其血自止。

熱邪傳裏。服藥後。將鹽炒麩皮一升。絹包于病人腹上熨之。藥氣得熱則行。大便秘通。

吐血不止。韭汁磨墨呷之。如無韭汁。鷄子清亦可。赤屬火。黑屬水。有相制之理也。

陰毒昏不知人。四肢如冰。唇青甲黑。藥不得入。將葱一握束縛。切去根。藥醋白三寸如餅。先

將麝香半分。填于臍內。後加葱餅于上。以火熨之。爛即易。約三餅後稍醒。先灌薑汁。後服

薑附湯。如不醒。再灸關元穴三十壯。不醒者必死。

熱邪亢極。黃連一兩。煎水一碗。放井中待冷。浸新青布搭胸上。稍熱即易。熱勢稍減即止。夏

月方用此法。服藥即吐者。將生薑汁半盞熱飲。吐即止。大

抵服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫飲

傷寒死候

陽證見陰脉者死。陰陽毒過六七

日者死。脉浮而滑身汗如油水漿不入喘息

不休身體不仁者死。咳逆上氣脉散者死。

陽反獨雷體如烟薰直視搖頭心絕。汗出髮

潤而喘肺絕。唇吻反青四肢汗出肝絕。環

口黧黑虛寒發黃脾絕。脉緊盛汗出不解者

死。尺寸俱虛熱不止者死。身熱喘急脉陽

而躁者死。大發濕家汗則瘥熱而瘥者死。

發少陽汗則譫語發少陰汗則動血謂之下厥

上竭者死。發動氣汗者死。發風溫汗者死。

發濕溫汗曰重暈死。汗後不為汗衰謂之

陰陽交者死。不得汗者死。發熱脉躁疾狂

言不能食謂之三死。咳逆不止者死。藏結

者死。結胸證舌有白胎也舌卷囊縮者死。脉代者死。

少陰吐利煩躁四逆者死。結胸證悉具煩躁

者死。發厥至七八日膚冷而躁無時暫安日


藏厥死。少陽與陽明合病脉長大而弦曰負

者死。陰陽易病。頭重眼花。四肢拘急。小腹絞痛。手足攣痛。離經脉見者死。厥而下利。當不能食。反能食者除中死。少陰病。厥逆無脉。與白通猪胆湯。脉暴出者死。脉陰陽俱虛。熱不止者死。七八日以上。大發熱者死。

脉候

浮濇而緊為傷寒。浮而緊者表實可汗。浮而緩弱表虛宜救。沉數或疾滑或沉實裏實可下。沉細微遲軟表虛可溫。中候而數為胃實。中候而遲為胃虛。寸口沉細無力為陽中伏陰。尺部沉數有力為陰中伏陽。寸部數大有力為重陽。尺部遲細無力為重陰。寸脉微細為脫陽。尺部無力為脫陰。寸脉弱者忌吐。尺脉弱者忌下。純弦之脉名曰負。死脉也。陰病見陽脉者生。浮數動

陽病見陰脉者死。沉濇、弱、弦、微、結、促、濡、緩、緊、遲、孔、散、革、代、



社友韓茂遠。傷寒九日以來。口不能言。目不能視。體不能動。四肢俱冷。舉皆曰陰證。比余診之。

〇〇

六脉皆無。以手按腹。兩手護之。眉皺作楚。按其
跌陽。大而有力。乃知腹有燥屎也。欲與大承氣
湯。病家惶懼不敢進。余曰。吾郡能辨是證者。惟
施笠澤耳。延至診之。與余言。若合符節。遂下之。
得燥屎六七枚。口能言。體能動矣。故按手不及
足者。何以救此垂絕之證耶。

休寧吳文哉。傷寒煩躁。面赤昏亂。悶絕。時索冷水。其弟日休。乞余決死期。手揚足擲。難以候脉。五六人制之。方得就診。洪大無倫。按之如絲。余曰。浮大沉小。陰證似陽也。與附子理中湯。當有生理。日休駭曰。醫者十輩至。不日柴胡承氣。則口竹葉石膏。今反用熱劑。烏乎敢。余曰。溫劑猶生。涼劑立斃矣。日休卜之吉。遂用理中湯。加人參四錢。附子二錢。煎成入井。水冷與飲。甫及一時。狂躁定矣。再劑而神爽。服參至五劑而安。文哉遺以書曰。弟爲俗子所誤。旣登鬼錄矣。而兄翁拯之。大奇亦大幸也。方弟躁熱之時。醫以三黃湯。入牛黃服之。轉加悶絕。舉室哀號。惟是

治終具候目瞑而已。不意兄翁毅然以爲可活。參附一投。陰霜見現。荆妻稚子。含淚歡呼。一日卽甦。經年乃復。嗚呼。父母生之。兄翁再生之。昊天罔極。莫可云喻。敢誌巔末。乞附案帙。俾天下萬世。知藥不可以浪投。命不可以輕弃。何莫非大仁人回春之澤哉。

同社王月懷。傷寒至五日。下利不止。懊懣目脹。諸藥不效。有以山藥茯苓與之。慮其瀉脫也。余診之。六脉沉數。按其臍則痛。此協熱自利。中有結糞。小承氣倍大黃服之。果得結糞數枚。利遂止。懊懣遂安。

婁水張爾和。傷寒第二日。頭痛發熱。正在太陽。余曰。方。今。正。月。天。今。猶。寒。必。服。麻。黃。兩。日。愈。矣。若服冲和湯。不惟不得汗。卽使得汗。必致傳經。遂以麻黃湯。蒸飲之。更以滾水入浴桶。置床下。薰之。得汗如雨。密覆半日。易被。神已爽矣。至晚索粥。家人不與。全曰。邪已解矣。必不傳裏。食粥何妨。至明日果愈。不以麻黃汗之。傳變深重。非

半月不安也

光祿卿吳玄水。楊歸頭痛腹脹。身重不能轉側。口內不和。語言謔妄。有云表裏俱有邪。宜以大柴胡下之。余曰。此三陽合病也。誤下之。決不可救。乃以白虎湯。連進兩服。諸證漸減。更加天花粉麥門冬。二劑而安。

縣學師楊龍友如夫人。發熱頭疼。六日後忽見紅痧。衆皆以爲發斑。用升麻犀角等湯。凡五日不效。余視之曰。此痧也。非斑也。班爲陽明火毒。

痧爲太陰風熱。一表一裏。如天與淵。乃用防風二錢。黃芩一錢。甘草五分。薄荷桔梗蟬殼各一錢。四劑霍然矣。

○
○
儒者吳君明。傷寒六日。謔語狂笑。頭痛有汗。大便不通。小便自利。衆議承氣湯下之。余診其脉浮而大。因思仲景云。傷寒不大便六七日。頭疼有熱。小便清。知不在裏。仍在表也。方今仲冬。宜與桂枝湯。衆皆咋舌。掩口謗之甚力。以謔狂爲陽盛。桂枝入口。必斃矣。余曰。汗多神昏。故發謔。

妄雖不大便。腹無所苦。和其營衛。必自愈耳。遂
違眾用之。及夜而笑語皆止。明日大便自通。故
夫病變多端。不可膠執。向使狐疑而用下藥。其
可活乎。

內戚顧淡之。勞神之後。煩躁大熱。頭痛時作時
止。醫者禁其飲食。與之解表。見四日熱不退。欲
與攻裏。余診之曰。脉不浮緊。安得表耶。又不沉
實。安得裏耶。惟心部大而濇。此勞心而虛煩。乃
類傷寒。非真傷寒也。若禁飲食。卽餓絕矣。便以
粥與之。兼進歸脾湯。五日而安。

傷寒諸劑

麻黃湯 治太陽經脉浮緊。頭痛身疼。發熱惡
寒。無汗而喘。

麻黃

二錢 去根節

桂枝 一錢

甘草

五分

杏仁

八枚 去皮尖炒

水盞半。加生薑三片。棗一枚。煎入分。熱服。

桂枝湯 治太陽中風。發熱汗出。鼻鳴乾嘔。

桂枝

赤芍藥

各二錢

甘草

一錢

水盞半。生薑五片。大棗三枚。煎八分。溫服。

大青龍湯 治傷寒中風。頭痛發熱。無汗煩躁。

麻黃 三錢 去節 桂枝 一錢 杏仁 五枚 去皮尖炒

甘草 四錢 石膏 三錢

水鍾半。生薑一錢。棗一枚。煎八分。溫服。

小青龍湯 治表不解。有水氣。發熱嘔欬。或渴

或利。或小便不利。小腹滿而喘。

麻黃 桂枝 芍藥 各一錢

甘草 五分 乾薑 細辛 各五分

五味子 半 夏 一錢 熟

水二鍾。煎八分服。

桂枝麻黃各半湯 治太陽脈浮緩。無汗身疼。

桂枝 五錢 芍藥 甘草

麻黃 各三錢 杏仁 二十個 去皮尖

水四鍾。生薑三錢。大棗四枚。煎二鍾。分三服。

麻黃升麻湯 治大下後。脈沉遲。尺脈不至。咽喉不利。厥逆。泄利不止。

麻黃 八錢 升麻 當歸 各四錢

知母 去毛 黃芩 炒 萎蕤 各二錢

石膏 白朮炒黃 芍藥

天門冬去心 桂枝 茯苓去皮

甘草 乾薑各一錢

水四鍾。煎二鍾。分三服。

麻黃連翹赤小豆湯 治勞熱在裏。身目發黃。中濕身痛。

麻黃去根 連翹 甘草各四錢

桑白皮蜜炙 赤豆各一兩二錢 杏仁三十個

水四鍾。生薑七錢。大棗八枚。煎二鍾。分三服。

桂枝甘草湯 治發汗過多。又手足心。心下悸。欲得按。

桂枝三錢 甘草一錢

水一鍾。煎八分服。

桂枝芍藥湯 治脉浮。腹痛。

桂枝湯。加芍藥一倍。

桂枝附子湯 治風濕身疼。脉浮虛澹。

桂枝湯。加附子一錢。

葛根湯 治太陽無汗惡風。太陽陽明合病。

葛根一錢五分 麻黃一錢 桂枝

芍藥 甘草各六分

水二鍾。生薑五片。大棗二枚。煎一鍾服。

葛根葱白湯 治已汗未汗頭痛。

葛根 芍藥 知母 去毛

川芎 各一錢 生薑 三錢 葱白 五個

水二鍾。煎一鍾熱服。

葛根半夏湯

葛根湯。加半夏。水煎服。

小柴胡湯 治傷寒四五日。往來寒熱。胸滿心煩。喜嘔。少陽經發熱。及風濕濕熱。

柴胡 二錢 黃芩 炒 人參 去蘆

半夏 各一錢 甘草 五分

水二鍾。薑三片。棗一枚。煎一鍾熱服。

柴胡桂枝湯 治風濕。汗後身熱。心下煩。熱妨悶。動氣。

柴胡 二錢 桂枝 一錢 甘草 七分

人參 一錢 半夏 熟 芍藥 各七分

黃芩 一錢 生薑 五片

水二鍾。棗二枚。煎一杯。溫服。

柴胡桂枝乾薑湯 治往來寒熱。胸脇滿。小便不利。嘔而不渴。

柴胡 一錢 黃芩 桂枝

乾薑 各八分 甘草 五分 牡蠣 七分

括蕒根 一錢

水二鍾煎一鍾混服。

柴苓湯 治小便難微熱腹滿。

小柴胡湯加茯苓 水煎服。

柴胡加桂湯 治身熱欲近衣 身熱不渴。

柴胡 黃芩 半夏 各一錢

甘草 肉桂 各五分

水二鍾生薑三片大棗一枚煎一鍾服。

五苓散 治小便不利而渴中暑煩躁霍亂。

猪苓 澤瀉 白朮 炒

茯苓 各一錢 肉桂 五分

右為細末每服二錢白湯調下。

辰砂五苓散 治表裏未解頭痛發熱心膈鬱悶唇口乾焦狂言見鬼小便閉

五苓散加辰砂 研細水飛 白湯調服。

小建中湯 傷寒三四日心忪而煩少陰惡寒手足踈而濕

桂枝 一錢 芍藥 二錢 甘草 六分

錫糖 三匙 生薑 五片 大棗 一棗

水鍾半煎八分納錫令化溫服。

黃耆建中湯 傷寒身痛汗後身痛脈弱宜服。

黃耆 一錢五分 芍藥 二錢 肉桂 一錢

甘草 六分 生薑 五片 棗 二枚

水二鍾煎一鍾去渣入錫一大匙煎一沸服。

若微瀉利或嘔者不用錫。

大柴胡湯 治身熱不惡寒反惡熱大便秘。

柴胡 一錢二分 黃芩 各一錢

半夏 八分 枳實 四分

水二鍾生薑三片棗一枚煎一鍾熱服。

大承氣湯 治五六日不大便腹痛煩渴少陰口燥咽乾日晡發熱脈實三焦俱有邪。

大黃 五錢 芒硝 四錢 厚朴 二錢

枳實 一錢

水二鍾先煎枳實至鍾半投大黃煎至一鍾。

去渣納芒硝一沸熱服。

小承氣湯 六七日不大便腹脹滿潮熱狂言而喘專瀉上焦之痞熱。

大黃 四錢 厚朴 二錢 枳實 一錢

水二鍾煎一鍾熱服。

調胃承氣湯 太陽陽明。不惡寒。反惡熱。大便秘。謔語。嘔逆。宜服。

大黃 六錢 酒洗 芒硝 四錢 甘草 一錢

水鍾半煎八分。去渣入硝一沸服。

桃仁承氣湯 小腹急。大便黑。小便不利。中焦積血也。

桃仁 十箇 肉桂 去皮 甘草 各一錢

大黃 二錢 五分 芒硝 一錢 五分

水二鍾煎一鍾去渣入硝煎一沸熱服。

梔子豉湯 治吐下後。心中懊懣。大下後。身熱不去。心中痛。

肥梔子 四枚 香豉 五錢

水二鍾煎梔子至一鍾入豉煎至七分服。

梔子厚朴湯 太陽下後腹痛起臥不安。

梔子 五枚 厚朴 三錢 枳實 一錢

水二鍾煎一鍾溫服。

猪苓湯 治嘔而渴。心煩不得眠。熱在下焦。小便不利。

猪苓 澤瀉 滑石

茯苓 阿膠 各一錢 五分

水二鍾煎一鍾入阿膠煎鎔溫服。

黃芩湯 太陽少陽合病。協熱下利。

黃芩 三錢

芍藥

甘草 各二錢

水鍾半。棗二枚煎一鍾。熱服。

黃芩芍藥湯 衄後脉微。

黃芩湯 去大棗。

黃芩半夏生薑湯 治乾嘔而利。

黃芩湯 加半夏生薑

黃連湯 治腹滿痛。大便秘。胸中有熱。腹痛欲嘔。

黃連

甘草

乾薑

芍藥 各一錢

人參

半夏 各五分

大棗 一枚

桂 五分

水二鍾煎一鍾服。

黃連阿膠湯

一名黃連雞子湯。治溫毒下利膿血。少陰煩躁不得卧。

黃連 二錢

阿膠 一錢五分

黃芩

芍藥 各一錢

雞子黃 一枚

水二鍾煎三物至一鍾。去渣入膠煎一沸。入

雞子黃勻服。

黃連犀角湯

治狐惑。

犀角 三錢

黃連 二錢

烏梅 四箇

木香 三分

水鍾半煎八分入犀角木香汁勻服。

黃連解毒湯 治大熱乾嘔。譫語呻吟不眠。

黃連 一錢 黃芩 黃柏

梔子 各一錢

水二鍾煎一鍾熱服。

黃連瀉心湯

黃連 生地 知母 各一錢

甘草 五分

水鍾半煎八分服。

升麻湯 治無汗而喘小便不利而煩渴。

升麻 蒼朮 麥門冬

麻黃 各一錢 黃芩 大青 各七分

石膏 一錢 淡竹葉 十片

水二鍾煎一鍾熱服。

升麻葛根湯 治無汗惡寒發斑小兒瘡疹疫癘通用。

升麻 葛根 芍藥

甘草 等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服。

升麻六物湯 治赤斑口瘡赤爛。

升麻 各一錢
梔子 五分
大青

杏仁 各一錢
黃芩 各一錢

水鍾半葱白二三莖煎八分溫服。

陽毒升麻湯 治陽毒赤斑狂言吐膿血。

升麻 一錢五分
犀角 磨
射干

黃芩 各八分
人參 各八分
甘草 各八分

水鍾半煎八分入犀角汁服。

玄參升麻湯 治咽痛發斑。

玄參 各一錢
升麻 五分
甘草 八分

水鍾半煎八分溫服。

白虎湯 治汗後脉洪大而渴虛煩中暈。

知母 三錢
石膏 五錢
甘草 一錢

粳米 一撮

水二鍾煎一鍾溫服。

白虎人參湯 一名化斑湯治赤斑口燥煩渴中暈。

白虎湯 加人參。

竹葉石膏湯 治陽明汗多而渴。身而渴。欲飲水。水入即吐。瘥後渴。

竹葉 十四片 麥門冬 人參 各一錢

甘草 四分 石膏 三錢 半夏 八分

粳米 一撮

水二鍾。煎一鍾。去渣。入生薑汁一匙服。

茵陳湯 治頭汗出欲發黃。

茵陳蒿 三錢 大黃 二錢 梔子 三枚

水二鍾。煎一鍾服。

茵陳五苓散 治頭汗出。發黃。秋疫癘。及黃疸。

茵陳 三錢 五苓散 二錢

每服二錢。米湯調服。

茵陳四逆湯 治陰黃。四肢厥冷。

茵陳 一錢 甘草 炙一錢 附子 一錢

乾薑 炮一錢 五分

水煎溫服。

大陷胸湯 治大結胸。手不可按。此藥極峻。不可輕用。

大黃 四錢 芒硝 三錢 甘遂末 二分

水二鍾。煎一鍾。入硝煎一沸。入甘遂末服。

小陷胸湯 治小結胸。

黃連 一錢五分 半夏 三錢 栝蘆實 二錢

水二鍾煎一鍾服。

抵當湯 治血結胸。謔語小腹滿。漱水不欲嚥。

水蛭 各十枚 蟅蟲 各十枚 桃仁 十枚

大黃 八錢

水二鍾煎一鍾熱服。

小半夏湯 治水結胸。

半夏 四錢 白茯苓 二錢五分

水二鍾煎一鍾入薑汁熱服。

半夏瀉心湯

半夏 一錢 黃連 五分 人參

甘草 黃芩 乾薑 各一錢

水鍾半薑五片棗五枚煎八分溫服。

半夏生薑湯 治欬逆水穀不下而嘔吐。

半夏 五錢 生薑 一兩 水煎服。

半夏桂枝湯 治非時暴寒。伏于少陰。脈微弱。次必下利。一名腎寒。

半夏 桂枝 甘草 各三錢

水鍾半。生薑五片。煎八分服。

厚朴半夏甘草人參湯

厚朴 半夏各一錢 甘草

人參各五分

水鍾半。薑五片。煎八分服。

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯 加甘草

生薑瀉心湯 治下痢。心下痞。腹中雷鳴。

甘草瀉心湯 減甘草一半。加生薑一倍。

赤茯苓湯 治厥陰消渴。氣上沖。吐下後。身振搖。肉湯。

赤茯苓 陳皮 人參各一錢

白朮 川芎 半夏各六分

水鍾半。煎八分。溫服。

茯苓甘草湯

茯苓三錢 桂枝各二錢 甘草一錢

水鍾半。生薑五片。煎八分服。

茯苓桂枝白朮湯

茯苓三錢 桂枝一錢五分 甘草

白朮 各一錢

水二鍾煎一鍾溫服。

四逆湯 治太陰自利不渴。陰證脈沉身痛。

附子 三錢

甘草

乾薑 各一錢五分

水鍾半煎八分服。

當歸四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各一錢

甘草

通草 各七分

水鍾半大棗三枚煎七分服。

通脈四逆湯

厥逆下利脈不至。

四逆湯

加甘草一倍

真武湯

治陰證脈沉身痛。少陰腹痛。小便不利。

附子 三錢

生薑 五錢

白朮 一錢

茯苓

芍藥 各二錢

水三鍾煎鍾半分二服。

附子湯

治陰證脈沉身痛。少陰背惡寒。口中和。

附子 生用二錢

人參

白朮

茯苓

芍藥 各二錢

水二鍾。煎一鍾。分二服。

甘草附子湯 風濕小便不利。大便反快。

甘草 炙

附子 各一錢

白朮

桂枝 各一錢五分

水二鍾。煎一鍾。溫服。

甘草乾薑湯 少陰小便色白。吐逆而渴。動氣。下之反劇。身雖有熱。反欲踰臥。

甘草 二錢

乾薑 一錢

水煎服。

理中湯 治太陰自利不渴。痰多而嘔。腹痛霍亂。

人參

白朮

乾薑 各一錢

甘草 八分

水二鍾。煎一鍾。服。腹痛甚。加附子。寒而吐者。

加生薑。小便不利。加茯苓。腎氣動者。去朮。

附子防風湯

附子

防風

柴胡 各八分

白朮 一錢五分

桂心

茯苓

乾薑 各五分

五味子

甘草 四分

生薑 五片

水鍾半。煎八分服。

芍藥甘草附子湯 汗下後惡寒。

芍藥 甘草 附子 各二錢

水二鍾煎八分服

霹靂散 陰盛隔陽身冷脉浮煩躁欲水。

附子 一隻 用冷灰埋之取出細研入真臘

茶一錢同研分二服每服水一鍾煎六分入

蜜一匙冷服

白通湯 少陰下利。

葱白 二莖 附子 三錢 乾薑 一錢

水鍾半煎七分服

正陽散 陰毒面青四肢厥冷。

乾薑 五分 附子 一錢 甘草 五分

麝 一分 皂莢 一分

為細末水一鍾煎五分服

枳實理中丸 治寒實結胸。

枳實 十六枚 乾薑 白朮

甘草 人參 茯苓 各一兩

為末蜜丸彈子大熱湯化下連進二三服。

乾薑附子湯 下後復發汗。晝夜不得眠。無表證。脉微。

乾薑 二錢 附子 三錢 水煎服

乾薑黃芩黃連人參湯 寒氣內格。食入即吐。

乾薑 黃芩 黃連 人參 等分

水鍾半煎八分服。

脾約丸 少。大便秘。

大黃 枳實 厚朴

白芍 各五錢 麻子仁 二兩 杏仁 三錢

為末。蜜丸。桐子大。每服二十九。溫水下。

金匱風引湯

大黃 乾薑 龍骨 各二兩

桂枝 甘草 牡蠣 各一兩

凝水石 滑石 赤石脂

白石脂 石膏 紫石英 各三兩

為粗末。以囊盛之。取三指一撮。井水二鍾煎。

一鍾去渣服。

百合地黄湯 治百合病。

百合 七枚 生地黄汁 一鍾

先以水洗百合。漬一宿。洗去白沫。別以水二

鍾。煎取一鍾。入地黄汁一沸。分二服。

犀角地黄湯 切後脈微。發狂發黃。失汗成瘀血。大便黑。漱水不欲嚥。

犀角 一錢 生地黄 四錢 牡丹皮

芍藥 各一錢

水鍾半。煎八分。入犀角服。

大青四物湯 一名阿膠湯 治赤班。

大青 阿膠 甘草 各一錢

鼓 三錢

水鍾半。煎八分。入阿膠。候鎔。溫服。

黑膏 治溫毒。發班。嘔逆。使毒從皮中出。

生地黄 二兩 好鼓 一兩 六錢 六錢

猪膏十兩。合露之。煎令三分減一。絞去渣。入

雄黃麝香如豆。大攪和。分三服。忌蕪荑。

紫雪 腳氣。及暑中三陽。所患必熱。煩躁發班。

升麻 六錢 黃金 十兩 寒水石

石膏 各四兩 犀角 羚羊角 各一兩

玄參 一兩 六錢 沉香 木香

丁香 各五錢 甘草 八錢

水五鍾。煮金至三鍾。去金。入諸藥。再煎至一碗。去渣。投朴硝三兩二錢。微火煎。柳條勿停。手攪候欲凝。入盆中。更下硃砂麝香各三錢。急攪令勻。候冷凝成雪。每服一錢。細細嚥之。
吳茱萸湯 嘔胸滿吐利。手足厥冷。煩躁欲死。
吳茱萸 錢各三 生薑 錢各三 人參 一錢
水鍾半。棗一枚。煎一鍾服。

甘桔湯 少陰咽痛。

桔梗 三錢 甘草 二錢

水鍾半。煎八分服。

枳桔湯 痞證。胸滿不痛。

桔梗 錢各三 枳殼 錢各三 水煎熱服

防風白朮牡蠣散

防風 白朮 牡蠣 等分

為末。每服二錢。米飲調服。汗出服小建中湯。

五積散 治感冒脚氣。食積。心腹滿痛。嘔吐。背項拘急。

川芎

蒼朮

桔梗

橘皮

枳殼各七分

白芷

官桂

人參各五分

厚朴

芍藥

茯苓

當歸

乾薑

麻黃

半夏各八分

甘草炙五分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分服。

卜棗湯 痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒。

芫花

甘遂

大戟各等分

水鍾半先煎大棗十枚取八分入藥末七分。

平日溫服若病不除再服五分。

桃花湯 少陰下利膿血并溫青下利。

赤石脂

五兩三錢一半煎糯米三合用一半為末用。

乾薑三錢

水二鍾煮米令熟去渣溫服一鍾入赤石脂

末方寸七日三服愈止服。

冲和湯 即九味羌活湯治傷寒兩感春分後代桂枝麻黃湯用。

羌活

防風

蒼朮各一錢

甘草

白芷

川芎

生地黄

黄芩

細辛

各一錢五分

七分

水二鍾。薑三片。棗一枚。煎一鍾。熱服。取汗。有汗者。去蒼朮。加白朮。渴加葛根。石膏。柿蒂湯。

柿蒂

丁香

各一錢五分

水鍾半。薑五片。煎八分服。

烏梅丸 治虵厥

烏梅 七斤 五箇

細辛

附子

人參

栝皮

桂枝

各一兩 五錢

乾薑

二兩 五錢

黃連

四兩

蜀椒

當歸

各一兩

十味各搗末。以苦酒漬烏梅一宿。去核。薰之。五升米飯在下。飯熟。搗梅成泥。和勻諸藥。蜜丸。桐子大。米飲下十九。漸加至二十九。忌生冷滑物。

牛旁根湯

汗不流。是汗出時。蓋覆不密。故腰背手足搖擗。

牛旁根

麻黃

牛膝

天南星 各六錢

為末。好酒一升同研。以新布濾取汁。用炭火半秤燒。一地坑通赤。去火令淨。投藥汁在坑內。燒令黑色。取出細研。每酒調服五分。日三服。

地榆散

傷寒。熱毒不解。晚即壯熱。腹痛便膿血。

地榆

犀角

黃連

茜根

黃芩

梔子仁 各八分

水二鍾。韭白五莖。煎一鍾服。

酸棗仁湯

汗下後。晝夜不得眠。

酸棗仁

炒

甘草

知母

麥門冬

各一錢

茯苓

川芎

各六分

乾薑

三分

水煎服

茅花湯

臭血不止。

茅花

一握。無花用根。

水三鍾。煎鍾半。分二服。

栝皮湯

熱毒入深。吐血。

栝皮

三錢

黃連

黃芩

各一錢五分

水三鍾。煎一鍾。去渣入阿膠。候溶服。

麥門冬湯

麥門冬

甘草

各二錢五分

粳米湯鍾半。棗二枚。竹葉十五片。煎八分服。

小續命湯

方見中風

黑錫丹

方見眩暈

大秦芫湯

方見中風

補中益氣湯

方見類中風

藿香止氣散

方見類中風

萎蕤湯 治風溫冬溫。春月傷寒。

萎蕤

石膏

各一錢

麻黃

白薇

羌活

杏仁

甘草

川芎

各六分

青木香

五分

乾葛

一錢

水煎服。

牡蠣澤瀉湯 瘧後從腋以下有水氣。

牡蠣

澤瀉

蜀漆

商陸

葶藶

海藻

瓜蒌根

各等分

為末米飲調服。

猪膚湯 少陰下利咽痛。胸滿而煩。

猪膚 五兩

水四鍾。煎二鍾。加白蜜十匙。白粉二合。熬香

和令得所。分二服。

猪膽鷄子湯 傷寒五六日出班。

猪膽 三箇 鷄子 一枚 苦酒 十匙

和勻。煎三沸服。

鱉甲散 傷寒八九日不澆。諸藥不效。名壞傷寒。

鱉甲 升麻 前胡

烏梅 黃芩 犀角

枳實 各七分 生地黄 一錢 甘草 五分

水鍾半。煎八分服。

白頭翁湯 協熱而利。渴而下利。

白頭翁 黃栢 秦皮

黃連 各一錢五分

水鍾半。煎八分服。

赤石脂禹餘糧湯 痞而下利不止。當治下焦。

赤石脂 禹餘糧 各三錢 水煎服

葶藶苦酒湯 發狂煩躁。面赤咽痛。大下傷血。發熱脉瀼。

六五 傷寒

葶藶 五錢 苦酒 一碗半 艾汁 半碗

煎取七分。作三服。

治蠶桃仁湯 傷寒失汗。變成狐惑。唇口生瘡。聲啞不出。

桃仁 槐子 艾 各三錢

水二鍾。棗十箇。煎一鍾。分二服。

雄黃銳散 狐惑。唇瘡聲啞。

雄黃 桃仁 苦參

青箱子 黃連 等分

為末。艾汁為丸。如小指尖大。綿裹內下部中。

猴鼠糞湯 男女陰陽易。

韭根 一大 猴鼠糞 十四枚。附頭尖者是。

水鍾半。煎七分。去渣。再煎一二沸。溫服。

安神丸 方見驚悸

瓜蒂散 寸脉大。胸滿多痰。有涎病。頭痛。

瓜蒂 赤小豆 各等分

二味別搗篩為末。合和。以水二鍾。煮香豉一合。作稀粥。去渣。取三分之一。和散。一錢頓服之。如未生。少少又加。

大羌活湯

治兩感元氣實感之

羌活

獨活

黃芩

黃連

白朮

甘草

知母

川芎

細辛

各三錢

各一兩

每服五錢。水一鍾。煎一鍾。熱飲之。未愈連服

三四劑。若有他證。遵仲景法。

辟邪丸

服此。雖與病人同床。亦不能傳染也。

雄黃

丹參

鬼箭羽

赤小豆

各二兩

右為末。蜜丸。桐子大。空心溫水下五丸。



