

仁齋直指小兒方論

一之二






虹橋涉川足以為福田乎溱洧濟人不足  
 為惠然成者有時而壞也紅粟振飢足以  
 為陰德乎翳桑待哺不能家給然利者有  
 待而病也人主天地間溥万物為一體參

以本有以新以方論方七  
 題首了行常補  
 者無力召鑿力到者無

墨能療雜藥徧嘗付性命於一擲未嘗不  
 為之扼腕焉於是竊暇燈窗研精脉法上  
 稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於  
 漢地仙鳴於唐與晉宋而下諸賢之



虹橋涉川足以為福田乎溱洧濟人不足  
 為惠然成者有時而壞也紅粟振飢足以  
 為陰德乎醫桑待哺不能家給然利者有  
 時而病也人生天地間溥万物為一體參  
 大造為全仁盍思所以廣其濟余每見人  
 以疾痛為憂財匱者無力召鑿力到者無  
 鑿能療雜藥徧嘗付性命於一擲未嘗不  
 為之扼腕焉於是竊暇燈函研精脉法上  
 稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於  
 漢地仙鳴於唐與晉宋而下諸賢之

所難次者搜覽迨盡將以推廣不忍人之  
仁就是而得三昧竊謂大科傷寒法度為  
甚嚴小科驚風方論為難盡傷寒治法表  
裏陰陽出入傳變若網在綱固不容紊若  
夫嬰兒驚風急轉而慢實俄而虛形似實  
非尤難臆度自非審脉驗證達變知幾鮮  
有不以嬰兒為戲此驚風証治指要之所由  
作也證以言驚風之狀治以言驚風之方  
指者直訣以曉人要者精義以致用王氏  
非無家傳然方粹而證不詳錢氏非無訣

法然義深而方難用是編所作本之前聖  
大賢之方論參之聞人高士之見聞得之  
先疇已試之効虛實補瀉之辨其証參苓  
桂朮之隨其方覽者歷歷可曉惠之方來  
傳之同志使據病可以識證因證可以得  
方為天下挾提回生立命起僊扶衰倘執  
此以登盧扁之門或可為消埃萬分之助  
周流人間衛生救物獨不得如封君達之  
用心乎徑刺諸梓嘉與四方共之庶幾廣  
濟於無窮也或曰子朝不私諸已為家傳

計命應之曰喜捨方便釋氏書第一義也  
政使學者復之熟之推是以及人之幼自  
善南陽一書余嘗紬繹其說目曰活人  
括嗣此以求其傳堂上呼盧喝六作五小  
子則不敢知景定庚申開翔三山郡北后  
曹楊士瀛登父自序



新刊仁齋直指小兒方論目錄

環溪書院刊行

○卷之一



初生

○初生噤風撮口臍風方論

風噤方

辰砂膏

撮風散

牛沫方

傳臍方

朱銀圓

○初生不乳證治

控痰散

僵蚕方

蜈蚣方

立聖散

臍風鏢口方

天麻圓

伏苓圓

噤風撮口臍風證

益脾散

甘草湯

蜘蛛方

安臍散

千金龍膽湯

定命丹

治胎寒腹痛方

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

### ○變又蒸

○變蒸方論

柴胡湯  
當歸散

變蒸證治  
紫陽黑散  
調氣散

紫圓子

### ○敬馬

○急風慢風慢脾風總論

驚風方論

羌活膏

本事人參散

雌黃散

安驚圓

驚風證治

來復丹 方見暑門

至寶圓

消驚圓

參砂膏

虎口三關紋訣法

全蝎散

星香散

驅癇散 又方

壓驚圓

定心圓

### ○驚熱

○驚熱方論

銀棗湯

膽星圓

驚熱證治

清心圓

羚羊角湯

犀角湯

伏神圓

### ○胎驚

○胎驚方論

參蝎散

朱麝散

千金龍膽湯

胎驚證治

猪乳膏

獨活湯

太一散

全蝎散

朱銀圓

### ○定驚

○通關定驚方論

○通關定驚證治

○產後定驚方論

陽癇散

擒風湯

定搐散

開關散

開關聖散

一字散

擒風散

擒

眼見瘡疔

瘡乃

○瘡之記又瘡瘡內有目之方仍見

○瘡之記又瘡瘡內有目之方仍見

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

### ○變蒸

○變蒸方論

柴胡湯  
當歸散

變蒸證治  
紫陽黑散  
調氣散

紫圓子

### ○驚馬

○急風慢風慢脾風總論

驚風方論

羌活膏

本事人參散

雌黃散

安驚圓

驚風證治

來復丹 方見暑門

至寶圓

消驚圓

參砂膏

虎口三關紋訣法

全蝎散

星香散

驅癇散 又方

壓驚圓

定心圓

### ○驚熱

○驚熱方論

銀棗湯

膽星圓

驚熱證治

清心圓

羚羊角湯

犀角湯

伏神圓

### ○胎驚

○胎驚方論

參蝎散

朱麝散

千金龍膽湯

胎驚證治

猪乳膏

獨活湯

太一散

全蝎散

朱銀圓

### ○定驚

○通關定驚方論

開牙散

○截風定搐治法

陽癇散

通關定驚證治

嚏驚散

人參羌活散 覲瞻

擒風湯

開關散

開關聖散

一字散

定搐散

發症乃本書癩症之誤胡湯方見發症門

瀉青圓  
阿膠散  
方風湯

木通散  
定命丹  
宣風散

清寧散  
利驚圓  
枳殼散

○治驚稍重下法

揭風湯

朱砂膏

踈風散

小柴胡湯

天麻圓

○治驚重下法

青金圓  
牛黃涼膈圓

青金丹

蘆薈散

生氣散

天麻蘇合香圓

○和胃助氣治法

異功散

銀白散

伏苓二陳湯

蘇合香圓方見氣門慢  
醒脾散方見驚門

天麻蘇合香圓  
參苓白朮散

案血氣門有目至方實見咳嗽門下因

和甘昔  
溫膽湯

定志圓  
百枝膏

○卷之二

慢驚

○方傳慢驚證治

太一保生丹

聚寶丹

案血氣類有目至方實見暑門

王氏惺惺散

神保既濟丹

來復丹方見氣門  
大醒脾散

溫白圓

星香全蝎散

定命飲

○已傳慢驚證治

烏蝎四君子湯

南星散

烏沉湯

沉香散

蘇合香圓方見氣門

○慢驚下痰證治

天南星圓

蘇合香圓方見氣門  
礞石散

案痰飲乃痰涎之化又痰涎內有目至方實見身微門

靈脂圓

神保既濟丹方見  
七珍圓

○慢脾風生胃回陽治法

金液丹方見血

黑附湯

烏散

生附四君子湯

案金液丹血氣門有目至方實見脾胃門



瀉青圓  
阿膠散  
防風湯

木通散  
定命丹  
宣風散

清寧散  
利驚圓  
枳殼散

小柴胡湯 方見發瘥門

○治驚稍重下法

揭風湯

朱砂膏

踈風散

小柴胡湯

天麻圓

○治驚重下法

青金圓  
牛黃涼膈圓

青金丹

蒼蒼散

牛黃涼膈圓

天麻圓

○和胃助氣治法

生氣散

銀白散

伏苓二陳湯

異功散

天麻蘇合香圓

天麻防風圓

蘇合香圓 方見血

參苓白朮散

和中散

醒脾散 方見慢

定志圓

溫膽湯

定心圓

百枝膏

○卷之二

慢驚

○方傳慢驚證治

太一保生丹

聚寶丹

蟬蝎散

神保既濟丹

來復丹 方見血

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

溫白圓

星香全蝎散

定命飲

○已傳慢驚證治

烏蝎四君子湯

南星散

烏沉湯

沉香散

蘇合香圓 方見血

○慢驚下痰證治

天南星圓

蘇合香圓 方見血

白圓子 方見痰

神保既濟丹 方見

礞石散

靈脂圓

七珍圓

○慢脾風生胃回陽治法

黑附湯

川烏散

金匱丹 方見血

生附四君子湯

渴附散

陰瘡散

靈砂

藥與氣有目去方：見泄瀉門方類

急慢脾風

○慢脾風下痰證治神保既濟丹見慢驚門白僵蚕圓

辰砂膏

七寶妙砂丹

○急慢脾風證治

星蘇散

木通湯

神聖圓

虎蝎圓

南星醒神散

鎮心圓

木香湯

乳麝圓

太一萬金丹

香餅子

至聖保命丹

蟾蝎散

快脾湯

助胃膏

沉附湯

鎮痰圓

利痰圓

客忤

○客忤方論

客忤證治

雄麝散

蘇合香圓

麝香飲

犀角散

風嘍實初生門

驚風雜治

○驚積方論

驚積證治

安神圓

伏龍肝方

千金龍膽湯

馬尾方

青龍圓

朱銀圓

辰砂膏方見風嘍門

○天癆方論

天癆證治

釣藤飲

保命丹

○驚風內癆方論附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓

木香圓

白豆蔻散

蘿蔔子散

化虫圓

安息香圓

茴香散

芎歸散

養臟湯



中風

開附散

震靈丹 方見血類

陰痛散

靈砂

急慢脾風

○慢脾風下痰證治神保既濟丹 見慢門 白僵蚕圓

辰砂膏

七寶妙砂丹

○急慢脾風證治

星蘇散

木通湯

神聖圓

虎蝎圓

南星醒神散

鎮心圓

木香湯

乳麝圓

太一萬金丹

香餅子

至聖保命丹

蟾蜍散

快脾湯

助胃膏

沉附湯

鎮痰圓

利痰圓

客忤

○客忤方論

客忤證治

雄麝散

蘇合香圓

麝香飲

犀角散

風嘔實初生門

安神圓  
馬尾方

伏龍肝方

千金龍膽湯

驚風雜治

○驚積方論

驚積證治

辰砂膏 方見風嘔

青龍圓

朱銀圓

○天癆方論

天癆證治

釣藤飲

保命丹

○驚風內癆方論 附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓

木香圓

白豆蔻散

蘿蔔子散

化虫圓

安息香圓

茴香散

芎歸散

養臟湯



中風

中風方論  
 排風湯  
 攝生飲  
 阿膠散  
 星蘇散 方見前  
 五臟俞穴  
 小續命湯  
 星香飲  
 追風毒剉散  
 木通湯  
 中風證治  
 交濟湯  
 附子散  
 肥兒圓  
 通關散 方見前

**痙**

痙方論  
 防風溫膽湯  
 大承氣湯  
 理中湯  
 痙證治  
 敗毒散  
 麻黃葛根湯  
 三生飲  
 小續命湯 方見中  
 小柴胡湯  
 桂枝葛根湯

**發癇**

發癇方論  
 散風丹  
 細辛大黃湯  
 諸癇不治證候  
 保安圓  
 牛黃圓  
 風癇證治  
 獨活湯

睛

葉天麻圓字在定驚以驚重下小

急驚門

驚癇證治  
 虎脂圓  
 密陀僧飲  
 比金膏  
 七寶鎮心圓  
 紫霜圓  
 鎮驚圓  
 清神湯  
 妙聖丹

錢氏五癇圓

錢氏五癇圓

南星散 方見肥傳

猪心湯

本事雌黃圓

蛇黃圓

斷癇圓

當歸大黃湯

蝎虎散

代赭石散

日應丹

地龍散

定癇圓

全蝎五癇圓

金朱丹

千金龍膽湯 觀胎

星朱散

猪膽南星散

肥兒圓 防覘中

驚啼方

論髮際穴

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

論蜈蚣有毒

中風方論

排風湯

攝生飲

阿膠散

星蘇散

方見前

五臟俞穴

小續命湯

星香飲

追風毒剉散

木通湯

中風證治

交濟湯

附子散

肥兒圓

通關散 方見前

痙症

痙症方論

防風溫膽湯

大承氣湯

理中湯

痙症證治

敗毒散

麻黃葛根湯

三生飲

小續命湯 方見前

小柴胡湯

桂枝葛根湯

發癇

○發癇方論

散風丹

細辛大黃湯

諸癇不治證候

保安圓

牛黃圓

風癇證治

獨活湯

○驚癇證治

虎脂圓

密陀僧飲

天麻圓 方見前

定癇治法

猪心湯

斷癇圓

代赭石散

定癇圓

千金龍膽湯 方見前

肥兒圓 方見前

論髮際穴

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

比金膏

七寶鎮心圓

紫霜圓

鎮驚圓

清神湯

妙聖丹

錢氏五癇圓

本事雌黃圓

當歸大黃湯

日應丹

全蝎五癇圓

星朱散

驚啼方

南星散 方見前

蛇黃圓

蝎虎散

地龍散

金朱丹

猪膽南星散

論蜈蚣有毒



# 疳

諸疳方論

疔疳散

脂連圓

至聖圓

天麻圓

走馬疳方

靈脂圓

黃連圓

褐圓子

蚶蚩圓又方

疔瘡方論

諸疳證治

黃連肥兒圓

五疳良方

通神圓

生熟地黃湯

清肺飲

下虫圓

香寇圓

黃耆湯

十全丹

小黃連阿膠圓

集聖圓

大蘆薈圓

胡黃連圓

伏神圓

地黃圓

化匿圓

龍膽圓

木香圓

驚血煎

五珍圓疔瘡方論

龍膽湯

猪肚黃連圓



# 積

積滯方論

和劑異香散

青龍圓疔瘡方論

痞結證治

癖氣證治

挨癖圓

木香圓

和劑流氣飲並脹滿門

挨積圓疔瘡方論

朱銀圓疔瘡方論

聖惠甘遂散

木香圓疔瘡方論

代赭圓

大異香散疔瘡方論

下積圓

辰砂膏疔瘡方論

取癖圓

挨積疔瘡方論



# 熱

諸熱方論

人參芎歸散

清解散

諸熱證治

猪膽圓

加味清涼飲

龍膽草圓



# 疳

諸疳方論

疳疳散

脂連圓

至聖圓

天麻圓

走馬疳方

靈脂圓

黃連圓

褐圓子

蚶蚩圓又方

疳瘡方論

諸疳證治

黃連肥兒圓

五疳良方

通神圓

生熟地黃湯

清肺飲

下虫圓

香寇圓

黃耆湯

十全丹

小黃連阿膠圓

疳瘡證治

集聖圓

大蘆薈圓

胡黃連圓

伏神圓

地黃圓

化匿圓

龍膽圓

木香圓

驚血煎

五珍圓疳類

龍膽湯

猪肚黃連圓



# 積

積滯方論

和劑異香散

五珍圓

青龍圓疳方見驚

痞結證治

疳氣證治

揆疳圓

木香圓

和劑流氣飲並脹滿門

揆積圓疳方見類

朱銀圓疳方見胎

聖惠甘遂散

木香圓疳方見類

代赭圓

大異香散疳方見脹

下積圓

辰砂膏疳方見風

取疳圓



# 熱

諸熱方論

人參芎歸散

清解散

諸熱證治

猪膽圓

加味清涼飲

龍膽草圓

# 傷寒

○傷寒方論

香蘇散

理中湯瀉類

五苓散飲門

人參潤肺湯嗽門 紫霜圓癆門 食

傷寒證治

升麻葛根湯

甘露飲

參蘇飲方門 瘡

桂枝麻黃湯

小柴胡湯暑門

四順飲熱門 精

人參羌活散眼門 視

人參敗毒散

寒瘧

寒瘧證治

常山散

虛寒

虛寒證治

地黃圓方門 見腎

虛汗

虛汗證治

團參湯

撲汗方

中柴胡 實見本當

並見積熱門

五苓散即生料五

苓散實見諸氣

白水飲有目在方

人參潤肺湯湯在內

咳嗽本門均作散

# 痰嗽

○痰涎證治

奪命散

風痰證治

青州謝家白圓子

朱砂圓

○哮喘

○咳嗽喘嗽證治

杏仁膏

紫苑湯

人參實易

和脾胃進飲食下贊證治二字不可通查本乃

和脾胃進飲食證治

驚惕不食證治之訛

治

消乳丹

益胃散

○唯吐證治

半夏散

○吐瀉證治

雞舌香散

交泰散又貳方



# 傷寒

○傷寒方論

香蘇散

傷寒證治

升麻葛根湯

理中湯

甘露飲

五苓散

參蘇飲

人參潤肺湯

紫霜圓

桂枝麻黃湯

小柴胡湯

四順飲

人參羌活散

人參敗毒散

寒瘧

寒瘧證治

常山散

虛寒

虛寒證治

地黃圓

虛汗

虛汗證治

團參湯

撲汗方

小柴胡 實見本方書

並見 積熱門

五苓散 實見生料五

苓散 實見諸氣

白小飲 有目冬方

人參潤肺湯 陽本內

咳嗽 目詳 均作散

# 痰嗽

○痰涎證治

風痰證治

朱砂圓

奪命散

青州謝家白圓子

咳喘

○咳嗽喘嗽證治

杏仁膏

紫苑湯

人參枳實湯

# 脾胃

胃氣虛實證治

和脾胃進飲食證治

吐瀉

○嘔吐證治

消乳丹

益胃散

半夏散

○吐瀉證治

雞舌香散

交泰散

又真方

不換金正氣散 方見寒類

○泄瀉證治

鍾乳震靈丹 方見寒類 木香益黃散

肉寇散

和安散

○瀉痢證治

沒石子圓

赤痢肚熱方

腹痛

腹痛證治

四順清涼飲 方見積 指迷七氣湯 方見

蘇合香圓 方見

桔梗枳殼湯 方見

腫脹

○腫脹證治

葶藶散

分氣飲

○陰腫證治

桃仁圓

傳藥

母蠣散 又方

大小便諸證

○遺尿證治

雞腸散 又方

○尿白證治

伏苓散 又方

○諸淋證治

葵子散

導赤散

尿血方

○大小便不通證

沒藥散

○脫肛證治

龍骨散



# 丹毒

丹毒證治

敗毒散 方見寒類

又方

衄血

吐血衄血證治

蒲黃散

地黃汁方

鼻衄方



# 雜證

○顛陷證治

顛填證治

解顛證治

錢氏地黃圓 又方

口舌證治  
重舌證治  
喉痺證治  
語遲證治  
夜啼證治  
眼病證治  
耳病證治  
龜胃證治  
臍病證治  
鶴節證治  
虎骨圓  
癩疔證治  
川練散  
瘡癬證治

口角瘡爛方  
木舌證治  
喉痺腫痛方  
菖蒲圓  
釣藤散又方  
眼睛白膜方  
龍骨散  
龜背證治  
安臍散  
行連證治  
五加皮散  
五苓散飲門水

滯頤證治  
月蝕耳方又方

臍瘡方  
地黃圓方見腎

當歸散

漏瘡方

鯽魚方又參方

○卷之五

○瘡疹

諸瘡久不瘥方  
癩瘡方  
魚臍瘡方  
前甲散  
蠅蝮瘡方  
癬方

瘡疹方論

壞瘡治法

瘡疹證治

升麻葛根湯方類

消風散方類

紫草木香湯

絲瓜湯

人參羌活散方類

五苓散飲門水

瘡疹備論

論升麻葛根湯

參蘇飲

人參敗毒散方類

加味四聖湯

紫草木通湯

犀角地黄湯

天麻防風圓

小柴胡湯寒類

瘡疹證候

瘡疹惡證

惺惺散

化毒湯

紫草飲子又方

快斑散

大連翹湯

甘露飲方類

四順清涼飲方類

紫升麻葛根湯  
見河內病中止名  
升麻湯  
又人參敗毒散  
實類止名敗毒散

大如聖湯  
 鼠粘子湯  
 麻黃黃芩湯  
 桔梗枳殼湯人施  
 二陳湯方觀  
 甘草散  
 烏梅湯  
 木香理中湯  
 甘草乾薑湯  
 獨聖散  
 宣風散  
 五福化毒丹  
 加味宣風散  
 調解散  
 不換金正氣散  
 黃柏膏  
 豆皮飲  
 蝶蛸散  
 治諸眼昏翳  
 斑翳方  
 扁鵲油劑方又方  
 灌藥服藥法  
 察小兒眼中神法

新刊仁齋直指小兒方論目錄

新刊仁齋直指小兒方論卷之一

三山名醫仁齋楊士瀛  
 建安儒醫翠峯詹宏中  
 登父撰次  
 洪道校定

。初生

小兒病證惟驚疳瀉痢四者難治古語有之急慢脾風與夫諸風種類余於驚風證治指要言之詳矣諸疳方論於此又詳備焉所闕者惟瀉痢兩件而已然小兒病狀亦不止乎瀉痢如直指方論前後編集諸病證治小兒類有之但病各有原治各隨證由博而約不過大人方法推之也雖然小兒多熱用藥不可過溫性小小分劑調而平之毋至以藥勝病則得之矣其他嬰幼證類大人所無者併與各方駢集于後

初生噤風撮口臍風方論

初生噤風撮口臍風是三者一種病也噤風者眼閉口禁啼聲

漸小舌上聚肉如粟米狀吃乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復為風邪擊搏致之自滿月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患○撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥其或肚脹青筋吊腸疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利撮口最為惡候一臍內見之尤急○臍風者斷臍之後為水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身躄重着四肢柔直日夜多啼不能吃乳甚則發為風搐若臍邊青黑撮口不問是為內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胃堂伸引弩氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如前三者受病之源非一朝夕大抵裏氣鬱結壅閉不通並用取下胎毒天麻圓定命丹朱銀圓葦可最與之千金論云小兒始生其氣尚

盛若有微患即須下之若不時下則成大疾疾成則難療矣紫霜圓可量用之紫圓子方見交蒸門

噤風撮口臍風證治

風噤方先用控痰散吐風涎次與益脾散和胃又用辰砂膏利驚即愈或手捉拳噤口不開者不治

控痰散

蝎尾 銅青各半錢 朱砂壹錢  
膩粉壹字 麝少許

右為末每服壹字臘茶清調下先吐風涎然後和胃或後段甘草方吐痰隨輕重用

益脾散

白伏苓 人參 草果  
甘草炒 陳皮 厚朴製 木香濕紙裹熟  
右等分為末每壹錢薑棗煎服 蘇子炒

辰砂膏

辰砂 參錢

鵬砂

馬牙硝 各錢半 玄明粉 貳錢

全蝎

真珠 壹錢

麝 壹字

右為末和畢用好單包起自然成膏每服壹豆粒許治諸驚

僵蚕方 治撮口

直僵蚕貳枚去嘴略炒為末蜜調傳唇口中

甘草湯 治撮口取吐

甘草 生壹錢

右剉煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

撮風散 治撮口

赤脚蜈蚣 半條炙

釣藤 壹分

朱砂

直僵蚕 焙

血蝎梢 各壹麝壹字

右為末每服壹字取竹瀝調下竹瀝解熱

以乃吸

蜈蚣方 治口噤不開不能收乳

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦

右為末入麝少許以猪乳一合和之分叁服猪乳主小兒口

噤不開最良

蜘蛛方 治口噤不開不能吮乳

蜘蛛壹枚去足及口炙令焦細研

右用猪乳一合調和為參服徐徐灌之神妙牙疳亦用蜘蛛

并麝香

牛沫方 取東行牛口沫塗竟口及額上即效

立聖散 治小兒口噤

蝎梢 七箇

乾蜘蛛 一箇

去足及口炙令焦細研以新竹於火上炙取竹油

右同末研極細入膩粉少許每壹字用乳汁調時時滴入口中

安臍散 小兒斷臍後便傳之

赤蜈蚣 畧炒

鈴羊角 畧燒

亂髮 斷不斷各存性

口

麝少許 雀甕三枚

右為末斷臍後便傳之

傳臍方

瓜蒂

南星

白斂

赤小豆等分

右為末每叁錢用芭蕉日然汁調傳臍四邊

臍風鏢口方

金頭蜈蚣一箇 蝎梢五箇

直僵蚕七箇 瞿麥半錢

右為末每壹字吹入臍內啼則可醫仍用薄荷湯調壹字服

千金龍膽湯 方見胎驚門

朱銀圓 方見胎驚門

天麻圓 定命丹 急驚下劑

初生不乳證治

嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭掠其口令惡血淨盡不得下咽則無他病若拭口不前惡穢入腹則腹滿氣知不能飲乳

短

或產婦取冷過度胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳惡穢入腹 宜用伏苓圓

赤伏苓

川黃連 去鬚 枳殼炒

右等分為末煉蜜圓桐子大每壹圓乳汁調灌下

治胎寒腹痛方

木香

陳橘皮

檳榔各一分 辣桂

川白薑生

甘草各半分

右末取壹捻水煎以綿蘸與之

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

木香

乾薑生

伏苓

甘草焙一分

酸木瓜

丁香各半分

右麓末壹捻水煎以綿與之



變文

變蒸方論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形骸成就是五臟之變氣而七情之所由生也三十二日一變其後三大蒸總五百七十有六日變者上氣蒸者躰熱每經一變情態即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相若亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷鼈冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則噎嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨節皆循環一匝各有證應其陰陽水火之變歟治法和平之劑微表熱實者微利之或不治亦自愈

變蒸證治

柴胡湯治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘草

微炙

麥門冬

柴胡各二錢

龍膽草

防風

各壹錢

右判散每服參字煎服

紫陽黑散解利熱氣

麻黃

壹兩

不去節

大黃

半兩

杏仁

壹分

右件同一處搗和並略燒存性再以杏仁少許研膏和之密

器盛每用壹豆許乳汁和咽之

紫圓子疎利積氣實熱

代赭

壹兩

燒醋淬

以裂為度

巴豆

貳拾

用紙花炒過

赤石脂

柒錢

巴豆

貳拾

用紙花炒過

杏仁

伍拾箇

右代赭赤石脂先搗末和杏仁巴豆搗三千杵若硬加蜜少

許更搗圓如粟米大用密器收每服貳圓以乳汁送下如更

有熱不泄明日再與二圓此藥兼治驚積痰癆食癩温壯諸疾

當歸散治變蒸有寒無熱

當歸

貳錢

木香

官桂

辣者



甘草

人參 各壹錢

右劉散每服壹錢薑棗煎食煎服

調氣散治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

厚朴製

人參

橘皮

藿香

甘草 各壹錢

右為末每服參字薑棗煎服



驚馬

急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽癇是爾急者屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其始也皆因臟腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱天官疾醫注云肺氣熱心氣次之驚風痰熱合為四證四證已具八候生焉 搯搯掣手顫反引竄

視日八候

凡搭眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青唇青瀉

青太陽髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風狀也

大抵熱論虛實證別逆順治有後先蓋實熱為急驚虛熱為慢

驚慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢

驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也

男搯左視左女搯右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外

女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此

皆順反之則逆亦有先搯左而後雙搯者但搯順則無聲搯逆

則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難

痊目屬肝肝受風熱則目直視或上竄或兩眦頻搭若無臉赤

五心煩熱之證却不發搯必挾心熱則用風心火二者交爭而

發搯也但竄視直視者與瀉青圓更加發搯者以瀉赤散兼之

大抵肝風心火乃急驚受病之處瀉青圓去肝風瀉赤散降心

火幼幼新書以為要藥故曰證別逆順者此也 陽病陰脈陰病

肝

陽脉亦反熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也綱領如此若折急慢脾風而言之則暴烈者為急驚沉重者為慢驚而慢脾則重而深矣急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動弱者十指開合唇口眉眼引頻併口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣并痰涎壅塞所以百脉凝滯關數不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐痰熱尚作迺下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒涼及銀粉巴硝葷蕩滌太驟水銀輕粉巴豆芒硝鉉霜蟾酥腦麝等劑醫家不得已而用之僅去疾即止或不當用

而用或當用而過焉往往由此成慢驚矣下痰熱不必須用銀粉巴硝但能斟酌大黃可也欲下之法須當審問前人已下未

下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以枳殼昌蒲寬

氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌○截風定搐先與

通關嚏驚葷次則人參羌活散截風圓一字散陽癩散擒風湯

定搐散瀉青圓木通散清寧散阿膠散以意擇用○下劑有三輕下則用定命丹利驚圓防風湯宣風散枳殼散小柴胡湯葷

○稍重下則用揭風湯朱砂膏疎風散柴胡加大黃湯葷○重下則用青金圓天麻圓蘆會散牛黃涼膈圓青金丹王監驚墨

圓葷○下後和胃助氣如生氣散銀白散伏苓二陳湯異功散天麻蘇合香圓參苓白朮散和中散醒脾散之類皆可選用○定志寧神則以定志圓溫膽湯定心圓百枝膏與之他如太乙

神

**保生丹** **聚寶丹** **蟬蝎散** 不冷不熱祛風鎮驚之劑又當繼此以防其再發也下之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作慢驚理之。○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者未可直指以為驚風恐是傷風傷寒傷食成三等證或夾驚而成如**錢氏假搐之說** 傷風夾驚伸困昏悸頭疼氣麓先用**人參羌活散** **惺惺散** **消風散** 葦微取其表次與**天麻防風圓** 傷食夾驚身熱温壯或吐不思食大便酸臭先用**人參羌活散** 加**青皮** **紫蘇** 取表消積次用驅風鎮驚之劑 凡搐搦者不可把握但扶持之否則風癇逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾此治急驚之大要然也**慢驚之候** 或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色淡白淡青眉間唇間或青或黯其脉沉遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者 錢云夏月脾胃伏熱大吐瀉者當解暑熱不可專

傳 變以之

卯

睡

煩心煩也  
 躁身躁也  
 二者難治  
 因火熱而  
 非即火此  
 書煩躁  
 之躁多誤  
 燥須逐  
 一更正下不  
 再及

曰固陽 有臟腑虛洞泄成者 風邪入於腸胃故大便不聚而瀉 有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風 不解誤藥成者有傷寒傳變陰證成者有得之久嗽作癇者有 得之發癇不已者有得之虫積衝心者有得之疝腫疝氣腹痛 者其或日夜汗出脾困多腫煩燥引飲四肢浮腫大小便閉丹 瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疝並傳慢候惟吐瀉積疝成虛致之 則證變甚速 總經吐瀉便是慢驚須用温中扶裏或搐來緊急 乃慢驚初傳尚有陽證不可誤作急驚用藥世言搐慢為慢驚 非也若泥此往往指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之為 重女子以吐得之為重 治法大要須當審問源流不可槩曰慢 證如吐瀉得之則**理中湯** 加**木香** 以温其中 **五苓散** 以導其水 臟寒洞泄得之則先與**木附湯** 下積取轉得之則先與**調氣散** 外感寒邪得之則先與**桂枝湯** **解肌湯** 葦其他可以類推矣然 慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何不可純用温藥及

燥烈太熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如全蝎花蛇僵  
 蚕白附天麻南星輩為良。方傳慢候而尚有陽證者八候尚  
 在不必回陽但與截風調胃可冷可熱均平陰陽而已。太一保  
 生丹聚寶丹蟬蝎散神保既濟丹來復丹王氏惺惺散醒脾散  
 大醒脾散温白圓可選用之。若陽虧陰盛病已傳過純屬慢  
 驚無搐掣反引竄視之證而但昏沉者與星香全蝎散定命飲  
 四聖散烏蝎四君子湯天南星散烏沉湯沉香散之屬。若手  
 足水冷者方可回陽用硫黃附子。慢驚下痰身煖者天南星  
 圓蘇合香白圓子痰盛者神保既濟丹礞石散虛甚而不可下  
 痰者麝脂圓七珍圓如腦麝銀粉巴霜寒涼通關利腸輩一切  
 禁止麝雖温然性屬陰能化陽通腠其有陽已傳陰或者不知  
 但見引搐誤用腦麝銀粉及寒涼輩必為慢脾陰逆若慢驚之  
 候其眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯時也陰氣易  
 盈陽氣易微時刻少延則藥力不及頻併投藥則勢又不可總

進一二劑須審有無傳變稍定則和平為愈勢篤則以剛劑投  
 之此治慢驚之大要然也。慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼  
 合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不  
 收或身冷或身温而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十  
 救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所  
 受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間  
 痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然爾  
 世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或  
 吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢  
 脾風纔見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗  
 其聲沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又  
 當識之治法大要生胃回陽黑附湯川烏散金液丹白圓子各  
 半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則異功散輩温平而調  
 理之如蝎附散陰癩散靈砂震靈等亦可參用。若其眼半開

水

半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽。或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫黃附子。凡服回陽湯劑手足漸煖者仍以醒脾散等繼其後以調之。○慢脾下痰輕者神保既濟丹白僵蚕圓重者辰砂膏甚則七寶妙砂矣。慢驚慢脾逆惡證候諸藥不效者如有大衝脈則取百會穴灸之。此治慢脾風之大要然也。灸百會穴詳具于後。雖然小兒有病問之則幼不能言望之則易驚易喜診之則或惕或動自六歲以下黃帝不載其說者以其難也。又况驚風一科古無全書則尤為難如前所云固足以知三證之詳矣。至於辨析體認通變之際有言而不能盡其蘊者可不深加之意乎。驚風一也。瘧發癇卒中天癩撮口亦風之種類焉。○瘧者手足冰冷瘧者舉身僵仆瘧瘧本一病當以陽剛陰柔別之。剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身反張甚於風癇大抵不治。○癇者目睛涎流神氣鬱勃四體不收。沈默昏潰似死似生其聲惡叫身軟時醒有聲者為癇身強

特  
翻眼掙睛

不醒無聲者為瘧瘧凡治驚遇咬牙啼叫者須與通心行小便。瘧亦多種錢氏有牛羊雞犬猪之說大抵以風驚食三證別而治之。○中風者五臟各有脈證隨五臟俞以施灸法與大科則同時小小分劑耳。○天癩者身體壯熱翻眼掙睛手足搐掣其狀如魚之上釣。又內癩腹痛多啼唇黑陰腫僵僂反張眼有紅筋班血乃寒氣壅結兼驚得之。○撮口者一臟內之篤疾臍風胎風鎖肚吊腸疝俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促口撮如囊而不乳也。○其有初生百日頻頻吐呢呵來噴去睡裏多驚眼翻肚脹手足緩怠煩燥多啼者當作胎驚風理之。○又有變蒸亦發微驚不治自愈。○又瘡豆欲發亦或搐掣如風右臍冷脚冷尻冷耳後有紅脈赤縷者必是瘡豆之證戒不可以腦麝開膝及銀粉巴硝轉下而冰壓之。是辨析之不可不審也。至若眼陷無光白睛灌人瓜甲青黑四體垂禪一臟氣絕不可勉強下藥。面赤如緋面青背冷頭目仰後足冷目青腹脹胃

忽大叫者

吐

口

高手拏胃膈唇舌鼻黑魚口氣麓顛腫顛坑啼哭無淚冷汗不止汗出如珠如油眼青瀉黑血悶涎入心肺噓舌出口咬人五硬五軟五冷五乾皆惡證也。○**急驚**眼睛翻轉口中出血兩足擺跳腹肚搐動或神緩而摸體尋衣或證罷而神昏氣促噴藥不下通關不噎心中痛絕忽大叫者難愈。○**慢驚**四肢厥冷吐瀉加嗽而黯唇慘胃痛鴉聲兩脇動氣口生白瘡胃閉損也直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊。○**慢脾**身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背母口噤頭搖者最難為力。○或者慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸麓大脉來浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復直與峻藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺咎之此則不識覆燈將絕之證雖不下藥亦無生意矣。○又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日間但閉目不開者此為虛候之極虛痰飽養其氣然也凌遽下痰亦未可保姑以**蘇合香****白圓子**輩與之。○他如急驚安靜

之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後淹延必至沉重若急驚證候徒知定搐不去驚熱繞見搐定遂指為安未幾復搐是為過街候。○若慢驚之候藥服已瘥尚虛之數日未省者或妄攻之則前功俱廢是體認之不可不精也。其或傷風傷寒傷暑傷濕傷食停積疳勞煩渴盤腸肚瀉諸瘡疽證皆因之而發風須當體認隨其證療其病正病去則風自去矣。按錢氏方小兒發搐身熱喘急目斜露睛四肢逆冷李醫槩以定驚搐一劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐為肝實身熱喘急為肺虛目斜露睛為肝肺相勝四肢冷為脾虛治法先用益脾補肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安。○一證直視而不能食或謂神崇使然錢知其為肝旺勝脾與之瀉肺而愈。○一證吐瀉或利小便過多以致脾虛不食錢用**益黃散**作效已經數日忽爾不語眾醫類以**失音湯**劑主之竟無寸效錢氏用**地黃圓**數劑補腎於是能言所以然者前乎清利小便太過遂使脾腎俱虛

雖已補脾而腎尚虛故爾。○至論肺虛痰實治法當下故下之必先益脾然後瀉肺。經云欲瀉其子先補其母此錢氏要訣錢

氏方瀉青圓瀉白散導赤散瀉黃散宣風散乃瀉五臟藥益黃

散白朮散阿膠散地黃圓皆補五臟藥○心中驚熱清心而熱

不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便難則不為之疏利蓋利之則胃愈虛而身必冷。○其有傷風寒而吐瀉者欲止吐瀉不特溫脾須以發散之劑先之風寒散而吐瀉自止矣不特此爾小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之劑不愈則易之以攻擊固守之劑太過則時乎而疏利主治在我不可不問源流不可偏徇病家所欲圓機達變消息輕重而應之是通變之不可無法也大槩小兒臟腑柔嫩易實易虛易冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎目視指切意度心惟醫權藥衡斟酌對治用之得中為上矣

### 虎口三關紋訣法

又

虎口者又手處是也三關者第二指之三節是也除拇指為第一

一指近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣

關近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看之驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫者病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋亂者病深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者

驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫

伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主

慢脾風凡手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治

三關直透大抵不治然紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可

用力若紋勢弓反出外駸駸靠於指甲者斷不可回其有三關

紋如流珠流米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚。○

陽為男陰為女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左手屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主耳然男女一身均

具此陰陽左右两手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息又得變而通之之意

驚風方論

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至風也驚邪入心則而紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視驚邪入腎則面黑惡叫啮妳咬牙驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多腫面色淡黃據脈觀之虛則散而濡實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦須究竟其臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是為活法  
睡中驚啼聲浮者易治聲沉不響者難痊

驚風證治

**全蝎散**治小兒驚風不語通竅豁痰大人通用

**全蝎**一枚各用紫蘇葉包涂蜜炙重包又涂蜜炙

右細末每服壹字薑汁入蜜搜和含化

**羌活膏**治小兒驚風痰涎

天麻

赤伏苓各半 羌活

防風各二分半

人參

全蝎

朱砂研

明硫黃

水銀各一分

右**硫黃****水銀**同研如泥次以柴味末夾和煉蜜圓皂子大每壹粒薄荷湯調下

**來復丹**方見暑門治小兒驚風昏塞以貳叁圓薄荷泡湯研灌下得泄即愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇者可與**來復丹**圓數酌量用

**星香散**治小兒急慢風搐搦竄視涎朝

南星圓白者木香 橘紅各半分 全蝎一枚

右剉細入薑錢肆片慢煎熟灌下大便出涎即愈

**本事人參散**治慢脾風神昏痰盛

凡分皆改  
後不後出



陰滿有誤疑浸稍之訛  
榴細亦誤

半兩  
圓白大南星水一兩切片以生薑汁并漿  
壹錢水壹盞薑參片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞

作兩參次灌下

**至寶圓**治小兒驚風痰熱

螺青半兩 京墨四分 巴豆去油一分 北五靈脂二分半  
輕粉 腦各半分 史君子十四箇連殼煨取肉  
麝一字 飛白麵三分

右末并水搜圓桐子大每壹圓水研下

**驅癇散**治諸癇口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背

強直

朱砂研 雄黃研 蛇皮炙黃 石膏煨通紅出火  
蜂房炒 遠志取肉薑 細辛華陰者 麻黃去節  
直僵蚕炒 川大黃生 川芎 獨活各一分半  
右末每壹錢釣藤入少蜜煎湯溫和調灌大兒增用

又方

雄黃

朱砂等分

右末每壹錢猪心血夾蒸水調下

**雌黃散**治顛癇方發瘈瘲嚼舌眼暗聲惡

雌黃 黃丹微炒 麝一分研

右細末用牛乳汁半升撥熬成膏即入上項藥築和杵參伍

伯下圓如麻子大每參肆圓溫熱水下日三服

**消驚圓**治諸驚

人參

天麻

伏苓

朱砂

全蝎焙

直僵蚕炒

羚羊角

犀角各一分

牛膽釀南星 四分

麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓昌蒲煎湯調下

**壓驚圓**治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英

代赭石

蛇黃各醃 鐵粉各二分

人參半兩 圓白大南星二兩 切片以生薑汁并漿水各半陰煎黃帶性曬  
右末每壹錢水壹盞薑參片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞  
作兩參次灌下

**至寶圓** 治小兒驚風痰熱

螺青半兩 京墨四分 巴豆去油一分 北五靈脂二分半  
輕粉 腦各半分 史君子十四箇連殼煨取肉  
麝一字 飛白麵三分

右末并水搜圓桐子大每壹圓水研下

**驅癇散** 治諸癇口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背

強直

朱砂研 雄黃研 蛇皮炙黃 石膏煨通紅出火毒一宿各一分  
蜂房炒 遠志取肉薑製燂 細辛華陰者去苗土 麻黃去節  
直僵蚕炒 川大黃生 川芎 獨活各一分半  
右末每壹錢釣藤入少蜜煎湯溫調灌大兒增用

**又方**

雄黃

朱砂等分

右末每壹錢猪心血夾蒸水調下

**雌黃散** 治顛癇方發瘈瘲嚼舌眼暗聲惡

雌黃

黃丹微炒各一分 麝一分研

右細末用牛乳汁半升撥熬成膏即入上項藥築和杵參伍

伯下圓如麻子大每參肆圓溫熟水下日三服

**消驚圓** 治諸驚

人參

天麻

伏苓

朱砂

全蝎焙

直僵蚕炒

羚羊角

犀角各一分

牛膽醱南星四分

麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓昌蒲煎湯調下

**壓驚圓** 治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英

代赭石

蛇黃各醱 鐵粉各二分 淨者

肉焙上脫  
取後金朱  
且可也

朱砂 龍齒 白附焙 遠志肉薑汁浸炒  
右為末研極細稀麩糊圓桐子大每服壹圓金銀煎湯調下  
凡煨石藥以裂為度不拘遍次研十分細

**安驚圓**治諸驚風癇或大聲異物驚忤打墜不省人事並主之

遠志肉薑汁浸焙 淨鐵粉 朱砂 人參  
伏神 各半兩 全蝎二箇焙 南星中者一箇薑汁浸一宿切細焙  
白附子 各炮二分半 花蛇頭酒浸麝半分  
右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓晉蒲燈心煎湯調下建陽劉泰議方

**參砂膏**通心氣除膈熱去痰壅

朱砂 人參 南星炮 伏神  
遠志肉薑汁浸焙 天麻 白附子 僵蚕炒等分  
鵬砂半倍 麝少許  
右為末煉蜜為膏桐子大金箔衣每壹圓夾門冬湯調下

**定心圓**溫驚用此

伏神 白附子炮 南星炮 人參  
遠志肉薑汁炒 蝎梢各一分 直僵蚕十個炒 乳香三字  
右為末牛膽汁圓桐子大每壹圓金銀煎湯調下

# 驚熱

驚熱方論

驚熱者內蘊實熱鬱勃發驚甚則搐掣變而癇耳治法疏導熱氣利驚定心亦有變蒸微驚以其熱盛得之但與輕藥或不治亦自愈

驚熱證治

**犀角湯**治心驚熱盛

犀角 防風 木通 赤茯苓  
桑白皮炒 甘草炙等分

右判細每叁字水煎服

**銀棗湯**治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮

伏苓 防風

右為末每半錢煎服

**清心圓**治驚熱煩燥

人參 伏神

柴胡各二分 金箔三十片

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓竹瀝調下

**伏神圓**治壯熱發驚痰壅直視

南星 胡黃連

青黛 牙硝

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓石菖蒲 荆芥煎湯調下

**膽星圓**鎮心壓驚利痰解熱

遠志肉 燻製 人參  
甘草 焙 二分 大黃 濕紙煨 一分

防風 朱砂

天麻 伏神 各三分

朱砂 各二分 麝 一字

**牛膽南星** 兩 朱砂

防風 各二分 麝 一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛當風處四十九日  
和下項藥末研細浸牛膽皮湯為圓如桐子大每服壹圓并  
花水調下

**羚羊角湯**治諸驚壯熱

羚羊角

蟬殼 半分

伏神 去心

麥門冬

柴胡

地骨皮 各一

黃苓

甘草 炒 半分

右剉散每壹錢薑棗煎服



# 胎驚

胎驚方論

胎驚風以胎婦調適年常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必  
感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月  
內溫壯翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚喘腮

縮顛開或頰赤或面青眼合胎風眼合不可誤作慢眼妄用溫藥其有着紫撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化涎調氣貼顛甚則以朱銀圓利之

胎驚證治

太一散治胎驚

天漿子微燉南星

白附子各微炮

天麻

防風

伏苓各二分

朱砂各一分

麝少許

右為末每服半錢乳汁化下

參竭散治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬殼等分

麝少許

右為末煉密圓桐子大每服壹圓金銀湯下

猪乳膏治胎驚最妙

琥珀

防風一分

朱砂半分

右為末猪乳調壹字拭入口中

全蝎散治諸驚胎癇

全蝎一箇焙琥珀

朱砂各少許

右為末每服壹字麥門冬煎湯調下

朱麝散治胎風心熱痰壅

人參

朱砂各一分

天竺黃

牙硝

鐵粉各半分

麝少許

右為末每服壹字生薑薄荷湯調下

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活

獨活各一分

天麻

麻黃去節

甘草炙半分

右判散每服半錢水煎服於內加南星末蜜調可貼顙用  
朱銀圓治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治  
驚積但量用之

水銀一錢蒸棗肉研如泥  
白附子一分  
蝎一分  
南星  
朱砂一分  
天漿子  
牛黃  
麝半分  
蘆薈各半分  
鉛霜半分  
硃砂一字  
麝半分  
直羗蚕炒七箇

右為末粟米糊圓芥子大每壹圓薄荷湯下如未通利加至  
貳圓

千金龍膽湯治胎驚月內氣盛發熱凡臍風撮口壯熱皆可用

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

北梗

赤芍藥

茯苓

甘草各半兩

蟋蟀

翅足去

大黃

紙煨濕

右為末每服壹錢北棗煎服或加防風麥門冬以導心熱黃

苓改  
以今

塞者

苓減半用

# 定驚馬

通關定驚方論

諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百節所致痰之所為  
潮寒暑氣實使之治風痰雖不出南星半夏全蝎僵蚕數輩亦  
須先用蘇合香圓入朱砂少許以薑汁侵薄荷湯調和與之蓋  
使氣下則痰下痰下則關竅自通

關關散

赤蜈蚣一條

直僵蚕

南星炮一分

麝香一字

猪牙皂

二錢畧燒存性

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三  
點涎出自開

開牙散

華陰細辛

南星

朴消各七分

麝半分

蝎梢伍條

右為末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中

嚏驚散

半夏生一分

皂角半分

右為末用壹豆許用管子吹入鼻立嚏

開關聖散

赤蜈蚣用一條沖分為兩片各一宿焙乾全蝎一箇亦中分為兩片各記左

右各為末左眼翻左手搯以左藥末搯入左鼻孔右眼翻右手搯以右藥末搯入右鼻孔雙眼翻雙手搯兼用之

截風定搐治法

人參羌活散

方見瘡疹門

散風邪除風熱初作急風每服三字

輕者紫蘇薄荷湯調下搯掣緊急者去節麻黃煎湯調下或惺

惺散加荆芥防風亦可常用免得遽施腦麝

截風圓治驚風痰搯

天麻

直僵蚕炒

南星砲

二錢麝少許

赤蜈蚣大者一條酒浸炙

白附子砲

防風

朱砂

全蝎

焙各一分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯下

一字散截風定搐

全蝎

是色者

赤蜈蚣

一條並新瓦焙

朱砂

半分

腦

麝少許

右為末每服壹字薄荷湯調下先以此少用管子吹入鼻中自然通竅

陽癇散治驚風搯痰熱

朱砂

蘆薈

白附子

生各一分麝少許

輕粉字 胡黃連二分 蝎尾十四個 直僵蚕拾個

赤蜈蚣一條 金箔十片 右為末每服壹字薄荷荆芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中

擒風湯治急風定搐  
白附 僵蚕 全蝎各焙 川薑黃 南星炮

赤蜈蚣一個 去足酒研生葱  
麻黃去節 羌活各一分 牙消半分

定搐散治急風定搐  
右為末每服壹字薄荷湯調下  
赤蜈蚣大者一條 酒浸炙 麻黃去節 南星炮

白附子 直僵蚕炒 羌活 代赭石煅醋淬

蝎梢 川薑黃各二分 麝香半分 朱砂一分  
右為末每服壹字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止加烏蛇肉  
瀉青圓治竄視發搐痰熱

龍膽草焙 梔子仁 大黃濕紙煨 羌活  
防風各一分 川芎一分半

木通散能瀉肝風降心火最利驚熱  
右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓煎首葉泡薄荷湯調下

山梔二分 大黃 瀉紙煨 羌活  
木通 赤茯苓 甘草各一分

清寧散凡驚熱出於心肺須從小便利之  
右為末每服壹字紫蘇煎湯調下

桑白皮炒 葶藶炒 赤茯苓 車前子  
梔子仁等分 甘草炙減半

阿膠散治風熱涎潮喘促搐掣竄視  
右為末每服半錢薑棗煎服

透明阿膠炒二分半 紫蘇一分  
右為末每服壹錢入烏梅肉少許同煎灌下神效熱出於肺



熱則生風阿膠清肺行小便故也肺風用之尤妙

治驚輕下法

定命丹治急驚天吊撮口通利痰熱

全蝎朱箇 天麻 南星炮

朱砂 青黛各一分 輕粉 麝各半分

腦一字 白附各二分半

右為末粟米糊圓菜豆大每服壹圓荊芥薄荷湯調下先研半圓吹入鼻中

利驚圓利驚下痰消熱

龍膽草 防風 青黛

南星炮 鈞藤各二分 牙硝 鐵粉各一分

腦 麝少許

右為末麪糊圓麻子大每服貳圓煎金銀湯下

防風湯治風熱痰壅大便不通

羌活 防風 枳實各半兩 川芎

甘草炒 大黃濕紙煨各二分半

右剉末每服叁字薑棗煎服

宣風散疎導風熱

雞心檳榔个 甘草 橘紅各半兩 牽牛用半兩 炒生

右為末每服半錢蜜湯調下

枳殼散小兒虛中壅實以此導之

小柴胡湯加枳殼防風最能利風熱解血熱免得用銀粉巴硝輩

治驚稍重下法

揭風湯利下痰熱

青黛 蘆薈 全蝎各一分 南星半兩為末水調

全蝎煨冷 朱砂一分半 牙硝 輕粉各三字

右為末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

朱砂膏治驚風痰盛

朱砂半分

馬牙硝二分 川靈脂

蘆薈各一分半

右研細甘草膏為圓菜豆大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

疎風散

治驚風痰熱俱盛

陳皮各二分 牽牛 大黃各三分 濕

右為末每服半錢生蜜調下

小柴胡湯

最利執實方見發症門加大黃少許

青金圓

治風痰壅盛

治驚重下法

巴霜如霜者 油淨盡

青黛

南星碗一分

右為末稀麩糊圓麻子大每服壹圓薄荷湯點茶清送下

天麻圓

利驚下痰九釣腸鎖肚撮口可通用

南星炮二分 白附子炮 牙硝 天麻

川靈脂

全蝎焙 輕粉半分

巴霜一字

右為末稀麩糊圓麻子大每服壹圓薄荷湯送下

蘆薈散

治驚風痰盛發搐

全蝎五个 焙

巴霜一字

輕粉半分 蘆薈

右為末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

牛黃涼膈圓

治熱盛涎潮

馬牙硝 寒水石煨 硬石膏 甘草各半兩

牛膽南星二分半

腦

紫石英一分 牛黃

右為末甘草膏為圓菜豆大每服壹圓橘皮湯調下

青金丹

疎風利痰

牙硝 蘆薈

南鵬妙 輕粉半分 蝎梢 十四个

右為末用香墨水圓麻子大每服壹圓薄荷泡湯下

王監京墨圓 治痰熱驚積

青黛 史君子 焙熟 蘆薈 牛膽南星

川墨各二分 膩粉 麝 半分 腦 一字

右為末飛白麩糊圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下楚州王監賣此藥著名大利痰熱驚積疳積

和胃助氣治法

生氣散 諸風疏利後以此調氣

丁香 三字 白朮 青皮 各二分

甘草 微炙 木香 人參 一分

右為末每服半錢沸湯點服或用 和劑方調氣散亦得

銀白散 助胃祛風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉 白扁豆 製 伏苓 各一分 人參

天麻 白附 炮 全蝎 炒 木香

甘草 炒 藿香 半分 陳米 炒香 三分

右為末每服壹錢薑錢壹片入 冬瓜子仁 柒粒同煎或用陳米飲調下

伏苓二陳湯 和胃助氣加蓮子肉 石菖蒲用薑棗煎

異功散 溫中正氣吐瀉不食用此

人參 伏苓 白朮

甘草 炒 橘紅 木香 各等分

右為末每服叁字薑棗煎服

天麻蘇合香圓 天麻防風圓 蘇合香圓 等分薑棗煎湯調下

參苓白朮散 用酸棗人 石菖蒲煎湯調下

和中散 和胃氣止吐瀉

伏苓 石蓮肉 各一 藿香 人參

天麻 白扁豆 製 木香 白朮

甘草 炒各半分

右判散每服參字煎服

醒脾散二方并王氏惺惺散見初傳慢驚門皆和胃助氣

定志寧神治法

定志圓驚風已退神志未定以此調之

琥珀 伏神 遠志 薑製焙 人參

白附子 炮 天麻 天門冬 酸棗仁

甘草 炙等分

右為末煉蜜圓皂子大朱砂為衣每服壹圓燈心薄荷湯調下

溫膽湯治驚悸煩痰

半夏 枳實 各二分 伏苓 半兩 橘紅

甘草 各半 酸棗仁 薑湯浸去 殼二分半

右判散每服壹錢入竹茹少許用薑棗煎服

定心圓治驚悸煩燥

北參 遠志 薑製焙 伏神 天麻

犀角 各一分 防風 朱砂 一分 麝 一字

右為末煉蜜圓皂子大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

百枝膏安心寧神

人參 防風 天麻

白附子 酸棗仁 琥珀 伏神 各半 石菖蒲 各一

麝 少許

右為末煉蜜圓皂子大麥門冬湯調下壹圓

新刊仁齋小兒直指方論卷之一

新刊仁齋直指小兒方論卷之二



# 慢驚馬

方傳慢驚證治

太一保生丹治慢驚尚有陽證

全蝎肆精者拾

白附子生

直僵蚕

牛膽南星

蟬殼

琥珀各貳錢

麝半錢

防風

朱砂各壹

右為末粟米糊圓如桐子金薄衣每服壹圓薄荷湯調下

聚寶丹方傳慢驚可用

人參

伏神

琥珀

天麻

直僵蚕炒

防風

南星炮

白附生

烏蛇肉酒浸焙

朱砂半錢

麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓易蒲湯調下

蟬蝎散治方傳慢驚

薄以竹

慢

全蝎去毒筒去脚殼壹錢 甘草貳錢半 六天南星壹錢

右為末每服半錢薑棗煎服  
神保濟丹分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃 燄硝 五靈脂 青皮

陳皮 半夏麩炒等分

右硫硝夾研用磁器鎔汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌和粟米糊圓麻子大每服叁圓食前米飲下

來復丹升降陰陽疎風利痰方見血氣類

王氏惺惺散治吐瀉脾困內虛

人參 伏苓 木香焙 天麻

白扁豆製 陳米炒 全蝎焙

右等分為末每服半錢薑棗煎服

醒脾散治吐瀉脾困不食

全蝎焙半錢 白附子炮 天麻焙 甘草炙

人參 白伏苓 石菖蒲細節 木香

石蓮肉 白朮各壹錢

右為末每服叁字薑棗煎服有熱者去木香

大醒脾散

南星 白伏苓 橘紅各壹分 全蝎焙

甘草炒 白附子炮 石蓮子 人參

木香各半分 陳倉米貳伯粒

右為末每服叁字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

溫白圓驅風豁痰

人參 防風 白附子生 直僵蚕

全蝎各錢 南星壹錢 天麻各貳錢

右為末飛白麩糊圓桐子大每服壹圓薑湯調下

已傳慢驚證治

星香全蝎散治慢驚風昏迷痰搐

南星濕紙煨木香 炙甘草半錢

右判細每服壹錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有執加防風

定命飲治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用

圓白半夏生伏苓

木香

老生薑切壹分

右為末每服半錢薑棗煎湯調下

甘草 炙各半分

四聖散治慢驚痰滯虛熱若有窺視搐搦證狀以少許用管吹

入鼻中

全蝎朱箇

直僵蚕拾四

大南星棗錢

真川烏並錢參字

右將南星為末水調作餅裹蚕蝎川烏外用濕紙重包慢火

灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服壹字煎金銀湯點

丹茶清少許調下

烏蝎四君子湯四君子湯加川烏生全蝎焙為末各少許每服

半錢薑棗煎服如再服即去川烏

南星散驅風豁痰

南星

腫八九錢以上者用壹箇就地土作小坑深七寸

右為末入琥珀全蝎末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

烏沉湯慢驚驅風助胃

天麻真錢

人參

真川烏生

全蝎焙

南星炮

木香

沉香各壹錢

甘草炒半錢

右判散每服壹字薑棗片慢火煎取其半與之

沉香散生胃氣止吐瀉

伏苓真錢

沉香

丁香

木香

藿香

川厚朴製

甘草炙壹錢

右為末每服壹字米飲調下

慢驚下痰證治

夫南星圓

治慢驚痰壅惟身執者可服

南星

壹斤每重壹兩上下者用溫湯浸洗去裏外浮皮  
湯令虛軟處令淨用猛火煎壹宿常令藥潤伏時  
湯取出金滿瓶內氣切開壹箇大者嚼少許不麻古為  
熟取即再用銅刀切細候熟

麝香

研銅刀切細候熟  
丁香 各壹兩 龍腦 壹兩半 辰砂 別研水飛貳兩  
右為細末入研藥勻煉蜜并酒圓朱砂為衣每服壹豆許生

薑煎湯調下

蘇合香圓

一倍方見血氣類 白圓子 二倍方見痰飲類 夾和每

服半錢薑湯調下

神保既濟丹

治慢驚痰盛見方傳慢驚門

礞石散

最能利痰急慢脾風通用

青礞石

壹兩揚碎焰消兩同礞石入甘窩內  
通紅候冷

右為末雪糕薄糊圓綠豆大每服貳圓急風薄荷荆芥泡湯

調下慢風慢脾風用南木香煎湯調下礞石焰硝古文錢葶

雖能利痰然其性非胃家所好須以木香佐之

靈脂圓

治慢驚痰盛搖擗

五靈脂

香潤白附子 畧炮木香

直僵蚕 各壹分

全蝎

焙半分 朱砂 壹錢

大南星

濕紙炮半兩

右為末米醋煮生半夏糊為圓麻子大每服叁圓薑湯送下

七珍圓

治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛

川靈脂

直僵蚕 各壹錢半

白附子

壹錢 朱砂 半錢

全蝎 肆箇焙

右為末用大南星生為末煮糊圓麻子大每服伍圓薑湯送下

慢脾風生胃回陽治法

黑附湯

治慢脾風盛四肢厥冷

附子

炮錢皮 木香 壹錢半

白附子 壹錢 甘草 炙半錢

右對散每服叁字薑伍片前散其半以匙送下若手足煖而



蘇省即止後劑

川烏散驅風回陽

真川烏

壹分

全蝎

木香各半分

右為末每服叁字薑肆片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加丁香

金液丹

方見血氣類

白圓子等分祛風回陽二藥為末每服半

錢陳米飲調下

生附四君子湯助胃回陽四君子湯加生附子末四分之一厥逆者判加每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

蝎附散回陽氣豁風痰

全蝎

柒箇

附子

炮貳錢

南星炮

白附子炮

木香

各壹錢

右為末每服半錢薑肆片慢火熟煎旋服

陰癇散

祛風豁痰回陽正胃

白附子

黑附子

南星

半夏

並生各壹分半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末貳錢每服壹字生薑湯調下

靈砂

正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用為細末以少許米飲調下或用糕糊圓如粟米大兒兩叁圓米飲灌下

震靈丹

方見血氣類治慢脾風吐瀉不止每服壹圓研細人參

南木香煎湯乘熱調下。已上諸藥溫熱並乳食前服

# 急慢脾風

慢脾風下痰證治

神保既濟丹

見方傳慢驚門

白僵蚕圓

方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

牛膽釀南星

貳錢

直僵蚕炒

錢子地龍乾

五靈脂

全蝎

焙各壹錢

右為末水煮生半夏糊圓麻子大每服伍圓薑湯下

**辰砂膏**治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子錢重者去皮臍頂上刻壹孔入辰砂末壹錢重者用附子末塞之以炭火三七燒存性為度

南星炮半兩白附子炮川五靈脂蝎梢各壹分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓生薑汁泡湯調下

**七寶妙砂丹**利痰奇效慢驚慢脾通用須以木香佐之開元通

**寶錢**背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中只作壹服南木香煎湯送下人參煎湯亦得

急慢脾風證治

**星蘇散**治諸風口噤不語

天南星略炮判散每服叁字薑肆片紫蘇伍葉煎取其半却入雄猪膽汁少許溫和服凡不語者大小便須要調導治慢風不語只用南星更以人參石菖蒲為佐

**木通湯**治諸風失音

木通 石菖蒲

桑螵蛸 全蝎焙

防風 北梗 直僵蚕 甘草各壹分並

右判散每服叁字紫蘇叁葉薑叁片煎熟與之大便不通更加枳殼杏仁

**神聖圓**治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉米醋浸炙直僵蚕炒防風 天麻

南星牛膽製五靈脂 代赭石煨醋淬

全蝎焙朱砂各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚荆芥湯調下慢驚用生薑湯

**虎蝎圓**治急驚上視搐搦胎風涎潮

虎睛酒對全蝎炒天麻 防風

南星 煨

直僵蚕 炒

烏蛇肉

酒浸焙

麝香

壹錢

南星醒神散

治驚風痰熱

天南星

不去皮切片

生薑

切片

右用竹筴壹條以南星并薑相間揀定次用輕粉此子摻入南星生薑片間風乾為末每服壹字薄荷紫蘇泡湯調下大人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

鎮心圓

急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃

各壹錢

鐵粉

琥珀

人參

伏神

防風

各貳錢

全蝎

茱萸焙

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下如無牛黃以牛膽南星代之

木香湯治慢風慢脾得效

南星 煨紙煨

白附子 焙

天麻

木香

橘皮

白茯苓

石蓮肉 焙

黃耆

白朮

石菖蒲

甘草 炙各半斤

右為麗末每服半錢薑棗煎服

乳麝圓治驚風掣癇反折

赤蜈蚣 全者 壹端 焙

南星 炮參錢 朱砂

花蛇肉 酒浸

直僵蚕 生 各貳錢

麝 壹字

右為末飛白麩糊圓桐子大每壹圓金銀煎湯泡薄荷調下

○ 甫陽趙公施此多所全活

太一萬金丹

治驚風痰熱

代赭石

煨醋

全蝎

焙

朱砂

琥珀

各壹錢

南星

濕紙煨

白附子 生

防風

烏蛇肉

酒浸炙

天麻

各壹錢

麝 壹字

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚薄荷湯調下初傳

香餅子

治慢驚初傳延朝昏搐

全蝎拾四酒浸麻黃鹽炒又凡參乾又花蛇肉

烏蛇肉鹽酒焙直僵蚕壹分白附子焙人參

天麻各壹錢乳香半錢麝壹字

右為末用南星末黃糊圓桐子大捏作餅日乾每服壹餅薄

薑湯調下

至聖保命丹

治驚風搐掣胎驚夜啼

青色全蝎拾肆錢防風天麻

白附子蟬殼直僵蚕炒各貳錢

南星炮參錢麝半錢

右為末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

蟾蜍散

治慢驚身熱痰滯

大乳蟾壹箇酥塗炙黃直僵蚕蟬殼

蛇尾各焙白附子微炮五靈脂蘆薈

琥珀各壹錢朱砂壹錢麝半錢

右為末每服半錢防風煎湯調下

快脾湯

治慢驚脾困不食和胃祛風

大南星壹兩碎水參升同黃令南星透去薑朴只用南星壹兩切兩剉

白伏苓半兩木香人參天麻各貳錢半

全蝎柒箇焙

右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下

助胃膏

治慢風吐瀉不進乳食

人參白朮石蓮肉銘貳丁香

檀香舶上茴香妙白豆蔻木香

甘草炙各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每壹圓陳米飲調下脾困不醒用

冬瓜子仁煎湯

沉附湯治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

白附子焙

丁香

木香

黑附子炮

天麻各等分

右為末每半錢灸甘草生薑煎湯調下身溫則去附子

鎮痰圓治諸風頑痰喉風纏痺

北礬水飛過直僵蚕各壹分

大南星切片濃皂角水浸壹宿焙貳分

右為末稀糊圓麻子大每服伍圓姜湯送下喉風用皂角

水研開灌下

利痰圓治諸風諸癩瘰癧

圓白半夏生

右為末旋入薑汁略拌鬆次以香潤五靈脂研細全蝎焙為

末各壹錢牛黃涼膈圓貳錢夾和研揉得所圓如麻子大每

服肆伍圓薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用

凡姜皆改薑  
後不再出

其

炷

耳



# 客忤

客忤方論

慢驚慢脾危惡證候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有大衝脈即灸百會穴其穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正者非所捏文柱約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾之劑

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛及側癢癢狀似驚癇但眼不上竄且脈來弦急而數視其口中懸癰左右若有小小腫核即以竹針刺漬之或以瓜摘之治法辟邪正氣散驚定心延久則難為力也  
大凡客忤中惡急作醋炭仍以降真香皂角燻之

客忤證治

**雄麝散** 治客忤腹痛危急

雄黃 壹錢 乳香 半錢 麝香 壹字

右為細末每壹字刺雞冠血調灌之

**蘇合香圓** 方見咳嗽門 用薑湯調灌次用**豉**參合水濕擣為圓

如雞子大以摩兒顙上及足心各五六遍次摩臍心及上下良久辟開自有毛即擲之

**麝香散**

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈

**犀角散** 治客忤驚喘壯熱

天麻 犀角 麥門冬 鈞藤

朱砂 各壹錢 鐵粉 雄黃 半錢 麝香 少許

右為末每服半錢以金銀煎湯調下

**安神圓**

母改母

鈞

才 襄 棗

客忤證治

**雄麝散** 治客忤腹痛危急

雄黃 壹錢 乳香 半錢 麝香 壹字

右為細末每壹字刺雞冠血調灌之

**蘇合香圓** 方見咳嗽門 用薑湯調灌次用**豉**參合水濕擣為圓

如雞子大以摩兒顙上及足心各五六遍次摩臍心及上下良久辟開自有毛即擲之

**麝香散**

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈

**犀角散** 治客忤驚喘壯熱

天麻 犀角 麥門冬 鈞藤

朱砂 各壹錢 鐵粉 雄黃 半錢 麝香 少許

右為末每服半錢以金銀煎湯調下

**安神圓**

生犀末 人參 茯苓 菖蒲

朱砂 雄黃 等分

右為末研桃仁膏為圓如麻子大每參圓紫蘇湯下

**伏龍肝方**

竈中黃土和醋得圓棗子大摩兒頭及五心

**千金龍膽湯**

方見胎驚風門 馬尾燒煙熏兒面頻熏以瘥為度

**馬尾方**

驚風雜治

驚積方論

驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚皮有熱睡中覺腹內有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治法量輕重而鍊導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹肚或熱

或脹或硬皆為內實法當疏利

驚積證治

辰砂膏 疎利驚積方見風嗽門

青龍圓 治驚積有熱

青黛

伏神

蘆薈

南星

麝 少許

輕粉

巴霜 壹字

全蝎

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細圓如粟米大朱砂

衣每服壹圓薄荷湯送下

朱銀圓 治驚積方見胎驚風門

天癆方論

天癆壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者  
爪中皆青如崇之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳逆復  
乳兒遂使心肺生執痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法  
解利風熱取愈

甲 如藥

鈞

鈞藤飲

天癆證治

鈞藤

白伏苓

各半

大黃

濕紙裹煨貳錢半

防風

朱砂

蟬殼

羌活

獨活

青皮

甘草 炙各貳錢半

右為麗末每服壹錢薑棗煎服

保命丹

全蝎 焙

蟬殼

直僵蚕 微炒 天麻

犀角

天漿子 有子

白附子

南星 炮

青黛

朱砂

川薑黃

各等 麝 少許

右為末雄猪膽汁為圓棗豆大先將井水調開壹圓入鼻令  
嚏次以鈞藤煎湯調服

驚風內癆方論 附盤腸氣虫痛

驚風內癆腹痛多啼唇黑囊腫偃偻反張眼内有紅筋班血者

蓋寒氣壅結兼驚風而得之又盤腸氣與虫證亦令腹痛多  
啼偃樓相若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸為冷  
氣所搏然爾虫痛則嘔吐清沫痛有去來是疳化為蛔臟腑留  
滯然爾内疔用調氣疎風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之劑  
虫證用殺虫之劑條列于後請詳審之

驚風内疔證治

乳香圓治驚風内疔腹痛驚啼

乳香半錢

沒藥

沉香各壹錢

蝎梢拾肆箇

雞心檳榔壹錢半

右為末煉蜜圓桐子大每服貳圓芎藭鈞藤煎湯調下

木香圓治驚風内疔肚痛驚啼

沒藥

木香

舶上茴香炒鈞藤等分

全蝎

乳香各半

右先將乳香沒藥別研次入諸藥末和畢取大蒜少許研細

和圓桐子大日乾每貳圓鈞藤湯下

白豆蔻散治盤腸氣痛

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

陳皮

甘草炙

香附子

蓬莪朮

各等分

右為末每服壹錢紫蘇煎湯調下

羅蔔子散治盤腸氣痛

羅蔔子炒黃不拘多少

右為末每服半錢辣桂煎湯調下或只入蘇合香圓則用薑

湯調下

化虫圓治虫痛

蕪夷

川鶴虱

雞心檳榔

乾蝦蟇

炙焦各壹分

蘆薈半分

右為末雄猪膽汁為圓麻子大每服伍圓陳米飲下或史君

子煎湯送下凡虫月首則頭向上凌晨可服藥



安息香圓治內癆盤腸氣癆虫痛通用

安息香 桃仁去皮炒 蓬莪朮炮 史君子肉各半兩  
阿魏壹錢 茴香炒 全蝎各壹分

右阿魏并安息香以酒少許就湯瓶口上以盞盛蒸落去沙  
旋入桃仁同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每壹圓生薑湯

調下

茴香散治小兒臍下氣塊癆痛

芸臺子炒 蓬莪朮 茴香炒 青皮  
甘草各壹分 辣桂 木香各半分

右為末每服半錢鹽湯調下

芎歸散治內癆胎寒腹痛嘔啼


官桂 當歸 川芎 香附各壹分  
川白薑 木香 甘草炒各半分

右為末每半錢白水煎乳食前服

養臟湯治內癆嘔啼挾冷作痛內癆一名癆腸

當歸 沉香 木香 桂  
川芎各半兩 丁香貳錢

右為末每壹錢用薑煎食前服



# 中風

中風方論

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠  
理虛開故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂燥  
搐掣氣麤口噤涎潮是也心中風則偃卧不能傾側發熱失音  
其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心  
壞為水或面目亭亭時時悚動者並不治肝中風則踞坐不得  
低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目瞤動上視多怒其目青若遠兩  
目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞或大段青黑其目一黃

一白者不治腎中風則踞坐面淫腰脊痛引小腹其耳黑若兩  
脇左右未有黃色起者可治矣腎俞或脇間如黃土鬢髮直而  
齒黃赤者不治肺中風則偃卧胃滿喘息咳嗽燥悶汗出其鼻  
白若目下至鼻四圍及口間白色者可治矣肺俞或色帶黃乃  
肺壞為血併手尋衣縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉潤動  
四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治矣脾俞或手  
足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆從背上五臟俞入之  
風入於頤頰之筋則口喎而牙噤風塞於咽喉聲音之門則語  
不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如軒轅之嚮是風也  
始入於腠膚浸達於經絡而搏於筋脈筋得寒則拘急攣痛得  
熱則緩弛不隨風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也挾寒  
而拘攣脈必浮緊挾熱而緩弛脈必浮洪寒者與小續命湯熱  
者與追風毒刺散之類大抵脈浮者病在表脈實者病在裏脈  
促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而胃膈澎

湃者湧吐之若虛寒證候則附子川烏又不可闕古人治法雖  
以灼艾為本亦須消息權度而投劑焉此法自大人方論演觸  
而得之若遇大人中風即以此推也雖然風寒暑濕皆能中人  
况又有因氣而中者人之驟病莫若中風一時倉卒若未能精  
審且先與下氣豁痰蓋諸中皆因痰鬱氣滯而作通關以遠急  
以南星南星治卒中下氣豁痰生薑木香煎湯和蘇合香圓灌  
下牙緊者南星細辛末之入麝烏梅肉點擦自開進藥之後痰  
消氣下病勢稍蘇即子細體認五臟外證而調理之至若口開  
手散噓氣麓大喉間軒轅瞪眼合眼瀉血遺尿或面色如緋或  
面色黯慘或汗出如珠如油皆惡候也又一證小兒多因傷風  
咳嗽不能發散遂成肺風其候喘促涎潮面色青黃目能認人  
口不能言如此者當以桑白皮紫蘇麻黃阿膠主之仍灸肺俞  
取愈。大人小兒凡病頭面冷如按瓜或鼻冷不回或汗出髮  
潤其身如洗皆不可救

五臟俞穴

心俞二穴在背上第五椎骨下兩傍各一寸半  
肝俞二穴在背上第九椎骨下兩傍各一寸半  
脾俞二穴在背上第十椎骨下兩傍各一寸半  
肺俞二穴在背上第十一椎骨下兩傍各一寸半  
腎俞二穴在背上第十四椎骨下兩傍各一寸半  
小兒文柱如小麥許但三五壯而止取分寸法大人小兒男取左手女取右手比量中指第一節為壹寸見千金翼方第一節者指根是也

中風證治

排風湯治中風昏潰或狂語或失音

白鮮皮

白朮

芍藥

官桂去麋皮

川芎

當歸

杏仁麩微炒

防風

甘草

麻黃去節

川獨活

白茯苓各半錢半

右細剉每服壹錢薑貳片煎

左  
六  
右  
以  
身  
似  
如

兩

小續命湯治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草炒

杏仁去尖破

防己

官桂去麋皮

防風半錢半

附子炮去皮臍

右除附子杏仁外並搗為麈末次入貳味夾和每壹錢薑參片煎食前服

交濟湯治中風肢體緩弱筋節疼痛排風湯續命湯二藥夾和

入雞心檳榔用生薑煎服次以烏藥順氣散加全蝎繼之

攝生飲治中風

南星炮用貳錢

半夏圓白者次南木香各壹錢

細辛石菖蒲

蒼朮畧炒甘草炒各半錢

右剉散每服壹錢薑參片慢火煎取其半調蘇合香圓壹粒

灌下痰盛者又加全蝎

星香飲治中風

南星錢炮

木香

橘皮各壹錢

全蝎貳箇焙

甘草炒半錢

右判細每服壹錢薑參片慢火煎熟與之虛冷者加熟附子

川烏少許添薑錢

附子散治中風厥冷

生附子壹分

木香半分

右判細每服半錢薑肆片煎服

阿膠散專治小兒肺風喘促涎潮鼠眼斜視

透明阿膠判細炒如珠

右用紫蘇烏梅肉焙乾末之為衣煎人參湯送下或以阿膠

炒為末和人參柴蘇烏梅同煎亦得阿膠育神凡驚風後眼

中腫人不正可以阿膠壹倍人參半倍煎與之

追風毒劉散治中風內外皆熱

大黃壹分

檳榔

桑白皮酪炒老活壹兩

防風半兩

郁李仁壹分炒

右判散每服壹錢黑豆參拾粒同煎乳食後服

肥兒圓治風後瘡不能言

蕪荑

神麩

麥蘗各炒

黃連等分

右為末猪膽汁圓麻子大每服伍圓用陳皮木香史君子炙

甘草煎湯送下蓋黃連能去心竅惡血故爾

星蘇散木通湯治中風不語方見急慢脾風諸方門

通關散方見急驚門



# 痙症

痙症方論痙音景痙音翅字異義同

發痙證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痙濕家發汗稍多亦發痙婦人新產血虛汗出傷風發痙無疑矣項背強直

腹身反張搖頭掣蹇瘖禁口不語發熱腹痛鎮壓不醒其狀可畏  
 病在足太陽經剛瘖無汗柔瘖有汗其面紅眼赤身緊手張痰  
 涎壅盛昏潰煩渴小便赤澀先識語而發者此剛瘖也其大便  
 滑泄不渴不語先手足冷而發者此柔瘖也剛柔二瘖亦如陰  
 隔陽陽隔去之類剛瘖為之發汗柔瘖為之解肌並以小續命  
湯加減剛瘖去附子用麻黃柔瘖去麻黃用生附子大便利而  
 厥逆者則以孰附佐之其間一證身體壯熱識語口乾手足反  
 微寒大便反滑泄此為剛柔不分之瘖可用生附子小續命湯  
 要之得病以來無汗則麻黃按方有汗則麻黃謹勿用也其若  
 痰塞氣盛則南星半夏伏苓以消其痰枳實陳皮紫蘇以順其  
 氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰順氣為上嗣  
 是病勢稍止然後審其熱之輕重而解利之熱輕者與敗毒散  
 熱盛者與小柴胡湯壯熱胃滿口噤咬齒而大便秘結者是為  
 內實大承氣湯下之又法剛瘖麻黃葛根湯柔瘖桂枝加葛根

**湯瘖最難痊十救其一過三日不治請早圖之餘見傷寒類書**  
 活人總括

瘖瘖證治

**小續命湯**

方見中風門

**防風溫膽湯**

消痰順氣疎風

半夏製

枳殼麩炒

伏苓各半兩

橘皮

防風銹錢半

甘草炒壹錢半

右劉散每服壹錢入生薑紫蘇煎服

**敗毒散**

人參

伏苓

甘草炒

芎藭

前胡

羌活

獨活

柴胡

北梗

枳殼

右加防風等分為麤末每服壹錢薄荷少許煎服

**小柴胡湯**治剛瘖有熱

非夏製

柴胡 壹兩

黃芩

甘草 炒壹錢半

枳殼 貳枚

右劉散每服參字入棗煎服

大承氣湯 治剛痊胃滿內實口噤咬齒

大黃

芒硝 各半兩 厚朴 壹兩

右劉散每服參字薑參片煎服

麻黃蒼根湯 治剛痊無汗

麻黃 各半兩 乾葛 半兩

左 人 原 脫 振 以 補

右坐昔年...

汗 服

右 瘧 瘧 厚 脫 振 以 補

日 左 誤 白 振 以 補

壹兩

甘草 炒各陸錢參字 大棗 肆枚

右劉散每服參字煎服

理中湯 治柔痊厥冷自汗

人參

川白薑 炮

甘草 炒

白朮 等分


右劉散每服參字煎服

三生飲 治柔痊自汗肢體厥冷

天南星 壹兩 川烏 生

附子 各半兩 木香 壹分

右劉散每服壹錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之



# 發癰

發癰方論

癰者小兒之惡病也小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所傷為驚怪所觸為乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤延流腹肚膨緊手足搐掣似死似生或聲或哩或項背反張或腰脊強直但體柔軟發而時醒者為癰若一身強硬終日不醒則為瘧瘧矣癰白五癰病關五臟面赤

柴胡 壹兩

黃芩

人參

非夏製

生薑 各半

甘草 炒壹錢半

右判散每服參字入棗煎服

大承氣湯 治剛症胃滿內實口噤咬齒

大黃

芒硝 各半兩 厚朴 壹兩

右判散每服參字薑參片煎服

麻黃芎根湯 治剛症無汗

麻黃 去節

赤芍藥 各兩 乾葛 半兩

葱白 參莖

豉 半合

右判散每服參字煎服

桂枝葛根湯 治柔症有汗

桂枝

芍藥

葛根 壹兩

生薑 壹兩

甘草 炒各陸

右判散每服參字煎服

理中湯 治柔症厥冷自汗

人參

川白薑 炮

甘草 炒

白朮 等分

右判散每服參字煎服

三生飲 治柔症自汗肢體厥冷

天南星 壹兩 川烏 生

附子 各半兩 木香 壹分

右判散每服壹錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之



# 發癇

發癇方論

癇者小兒之惡病也小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所傷為驚怪所觸為乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣拂鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚澎緊手足搐掣似死似生或聲或嘿或項背反張或腰脊強直但體柔軟發而時醒者為癇若一身強硬終日不醒則為瘖瘖矣癇白五癇病關五臟面赤

煩  
而  
臨

魂乃鬼  
之語

陰改陽

目睛吐舌齒心下煩燥氣短息數者曰心癩面青唇青其眼  
 上竄手足拳攣抽掣反折者曰肝癩面黑而晦振目視人其吐  
 清沫不動如尸者曰腎癩面如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐  
 涎沫者曰肺癩面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰  
 脾癩此五臟之證然也調理之法惟以驚風食三種陰陽二證  
 別而治之風癩者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱  
 生痰是也驚癩者震駭懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神  
 魂是也食癩者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭  
 或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身體有熱抽  
 掣啼叫是為陽癩陰病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易  
 愈始者身體無熱手足清冷不抽掣不啼叫是為陰癩陰病脈  
 沉面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰臥屬陽覆臥屬  
 陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒風癩則先為之  
 散風驚癩則先為之利驚食癩則先為之消積續以定癩等劑

面  
羞

主之若臟若腑一陰一陽是固不可無別大槩血滯心竅邪氣  
 在心積驚成癩通行心經調平心血順氣豁痰又其要也繼今  
 小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癩之漸  
 即以紫霜圓導之時間量與紫霜圓減其盛氣則無驚風癩病  
 之患癩證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急為瓜  
 破須令血出啼叫尤得氣通澀濯兒衣不可露天恐為純雌落  
 羽所汚染觸其間未有不為癩也挾邪怪者而色變易不常見  
 人差怕諸癩瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩  
 聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮為末  
 雄猪膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癩圓并南星散以  
 甘遂猪心湯以和蘇合香圓皆治癩之要藥也  
 故表而出之

諸癩不治證候  
 目直無聲 目睛不轉 眼生白障 眼慢唇黑 睛人瞬動



眉間色青黑 面青拍黑 口中涎沫如白膿 口禁肚脹不乳 喉如鋸聲多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不醒 腹滿虛鳴 厥逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止 臥久不寐 痲痺身體反張大人脊下容側手小兒脊下容三指並不治 諸痲僵仆搐掣但扶持之謹勿把捉

風痲證治

散風丹 治風痲先用此

黃牛膽 貳錢 羌活

天麻 人參

細辛 各壹錢

獨活 荆芥穗

防風 川芎

右為末煉蜜圓桐子大每服貳圓薄荷紫蘇泡湯調下

保安圓 治諸風痲久遠亦驗

川烏 生去皮尖貳錢半

五靈指 半兩

右為末猪心血圓如桐子大每壹圓薑汁泡湯調下

獨活湯 治風痲解表通裏

獨活

麻黃 去節

川芎 各壹錢

大黃 焙

甘草 炒各半錢

右剉散每服叁字薑貳片煎服

細辛大黃湯 治風痲內熱

天麻

防風 各半兩

細辛

大黃 焙

川芎 各壹分

甘草 炙壹錢半

右剉散每服叁字入犀角少許煎服

牛黃圓 治風痲迷悶抽掣涎潮

牛膽汁 和南星末 風乾

全蝎 焙

蟬殼 各貳錢半

防風

白附子 生

天麻

直僵蚕 炒壹錢半

麝 半錢

右為末以黃棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末

和圓如菜豆大每服壹圓荆芥生薑湯下

驚癇證治

比金膏驚癇先用此

人參

琥珀

朱砂

天麻

南星

薑汁錢麝壹字

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀煎湯泡薄荷調下

鎖驚圓治一切驚癇

紫石英燒研鐵粉

遠志肉薑製

伏神

人參

琥珀

滑石

南星炮

蛇黃煨醋分龍齒

熊膽半分

輕粉叁字

右為細末煉蜜圓朱砂衣桐子大每壹圓金銀湯調下或用

猪乳調拭入口中

虎睛圓治驚癇邪氣入心

虎睛細研

遠志薑製

犀角

大黃濕紙煨

石菖蒲

麥門冬焙壹 蜣螂去足翅

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓竹葉煎湯調下或金銀

煎湯下

七寶鎮心圓治驚癇心熱

遠志肉薑製

雄黃

鐵粉

琥珀各貳

朱砂壹分

金銀箔貳拾 麝少許

右為末棗肉圓桐子大每服壹圓去心麥門冬煎湯下

清神湯治驚癇

犀角

遠志肉薑製

白鮮皮

石菖蒲

半夏製壹分

伏神半兩

大黃焙

人參 甘草炒各壹分

右為末每服叁字去心麥門冬煎湯調下

蜜陀僧飲治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通用

蜜陀僧為細末

右每服壹字米醋湯調下大人用貳錢熱酒調下

食癩證治

紫霜圓治食癩先用此取積

代赭石煅醋淬赤石脂末各壹兩巴豆叁拾粒去皮出油炒研杏仁伍拾箇去皮別研

右件合研細湯浸蒸飯圓麻子大每服壹圓米飲下

妙聖丹食癩通利

代赭石煅醋淬雄黃 麝各壹字 蝎梢 朱砂各壹分

輕粉 麝各壹字 巴豆叁箇去心出油 杏仁去皮尖微炒貳分

右為末蒸棗肉圓桐子大每服壹圓木香煎湯調下

天麻圓治食癩方見急驚重下門

定癩治法

錢氏五癩圓

朱砂半兩 水銀壹分 鈆叁兩 銀結開沙

雄黃貳兩 真珠壹兩

右為末煉蜜圓麻子大每服貳圓金銀煎湯下

膜 巴豆不去心些是去皮膜三水

銘

失

南星散 方見已傳悞驚門 如大便取下惡物急與和胃之劑

猪心湯 治五癩顛癩及心風血迷神双

甘遂末壹錢

右用帶性猪心壹箇取空管頭血參條和甘遂末如血多只

隨藥末得中和之將猪心批作兩片將所和藥入在內再合

用線縛定外以濕紙包慢火內煨熟不可過度取出去紙取

甘遂細研次入朱砂末半錢和之分作肆圓每服壹圓以所

細心猪心煎湯調下後別用猪心煎湯重者只守本方輕者加

蒜合香圓壹粒准過半日不動又進壹服如大便已下惡物

即止後劑急與醒脾散以助胃氣

本事雌黃圓治頭癩搗掣惡聲嚼舌

雌黃 黃丹微炒 麝半分

右為末拌和用牛乳汁各半兩合熬成膏入藥末杵成百下圓如

麻子大每服壹圓溫熱水下

煎

蛇黃圓治諸癩

蛇黃壹箇煨醋碎 鐵粉細篩研 青礞石

鬱金 朱砂各壹分

雄黃各貳分

右末粳米飯圓桐子大每壹圓人參煎湯調下

斷癩圓治諸癩瘰盛

皂角盈尺者參洗去皮髓碎水參升 南星濕紙兩 蝎梢炒 白附子各半 一且僵蚕炒

白礬煨枯研細 雄黃別研

朱砂 赤蜈蚣壹條去頭足酒浸久 烏蛇酒浸取肉焙

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為圓桐子大每服壹

圓生薑湯調下

當歸大黃湯治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃濕紙 甘草炙 當歸 赤芍藥各叁分 半夏製 川芎各壹分

右為末每服叁字薑棗煎服

蝎虎散治驚癩屢效

褐色生蝎壹箇連血細研

右入朱砂末并麝少許同研薄荷湯調作壹服數年癩亦

作效蓋癩疾皆心血虛滯生蝎可以官守其血繼是即以二

陳湯與之若無生蝎當取帶性雄猪心血代用入于代赭石

散中亦作效

代赭石散陰陽癩通用

代赭石煨醋碎研為末

右每服半錢以金錢煎湯和金銀箔調下連進貳服良久小兒脚脛上自有赤班即邪氣發出其病隨瘥若無赤班則難

治也

日應丹治顛癩連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀研

鐵粉研

各半兩

金銀箔 各參拾片

右水銀鐵粉金銀箔夾和壹處先將黑錫於鉢內鎔開次入硫黃不住手就鉢內研攪候硫黃煙氣欲息次入餘藥就火上同攪少頃時傾出在地壹宿出火毒再研細粳米飯圓麻子大朱砂衣每服壹圓食後人參煎湯下

地龍散治諸癩發歇無時

乾地龍 蚌兩 虎睛壹兩 炙

天竺黃

朱砂

人參壹分

金銀箔各拾片

雄黃壹錢半 輕粉半錢

右為末每服半錢紫蘇湯調下

定癩圓治小兒五癩

赤蜈蚣

酒壹箇去頭足

蝎梢

白附子生

烏蛇肉

酒炙

大南星末

圓白半夏

未用薑汁和壹宿各壹分

熊膽

白礬

新瓦上煨枯各半分

右為末稀麩糊圓桐子大朱砂衣每服壹圓薄荷泡湯調下

全蝎五癩圓

赤蜈蚣

躑躅酒去頭

南星

炮熱半

麝壹字

全蝎

防風

朱砂

研細

遠志肉

薑汁浸炒

白附子生

蘆薈

延胡索

錢壹

金銀箔

各參拾片

右為末入麝糕糊圓桐子大每服壹圓昌蒲紫蘇煎湯調下

金葉丹定一切癩

赤蜈蚣

頭大者壹條去

烏蛇頭

酒浸

延胡索

錢半

白附子

遠志壹宿

鐵粉

炒

透明防風

全蝎

天麻各壹錢

金銀箔

拾片

大南星

錢半末

右為末以圓白半夏為糊入黃牛膽汁并腦麝少許和圓

桐子大朱砂衣每服貳圓金銀器煎湯泡薄荷調下

千金龍膽湯治諸癩壯熱方見胎驚風門

星散定癩利痰

南星

濕紙炮香 乾薑兩

朱砂壹錢

右為末用帶性猪心血為圓桐子大每服壹圓煎防風湯調下  
猪膽南星散 治癩後瘡不能言

大天南星濕紙煨香

右為末每服壹字雄猪膽汁調下

肥兒圓

治小兒心竅有惡血瘡不能言

木香陳皮甘草煎湯吞

肥兒圓

方見中風門

蓋肥兒圓內有黃連能去惡血弱者是

驚喘方油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

論髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以截  
風路也諸風篤證藥力不及昏迷沉絕嘿然無聲於此灼艾每  
有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳前集所載百會一穴  
在頂心端正旋毛間亦濟危困者以是哉

論腦麝銀粉既硝等不可輕用

當世

膏仍應改

四

皇朝日  
可證

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用腦  
麝麻黃以通其閉銀粉巴硝以下其痰熱蓋不得已而用之  
其實為風熱盛實者設也出俗無見不權輕重每見發熱發搐  
輒用腦麝蟾酥鈔霜水銀輕粉巴豆芒硝等劑視之以為常惟  
其不常用而輕用或常用而過用之是以急驚轉為慢驚吐瀉  
胃虛荏苒時月驚風之所為難療者正坐此也萬一發熱驚搐  
本為傷風傷寒傷食瘡豆而作誤藥至此其為害豈淺淺哉以  
理觀之能用細辛羌活青皮乾薑荆芥之類以為發散勝如腦  
麝能用獨活柴胡山梔枳殼大黃之類以為通利勝如銀粉膏  
硝設或常用而不可無之亦須酌量勿過可劑此幼幼書所謂  
瀉青圓導赤散乃醫用之上藥者良以是故論此以為輕用  
藥者勸

論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之然其風氣暴烈非蜈蚣能

截能擒亦不自止但用之貴乎藥病相當弗容固執或半字或壹字或桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉當以蚯蚓桑皮為解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右盼伸手握拳悶鬱弩氣情態不若尋常如此者有驚即散驚有熱即退熱壅實即去壅實熱退則不生痰驚散則不生風壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若夫患在痰熱全未有風癇搐搦顛引之狀則只與退熱化痰如參蘇飲之類也謹勿妄投通關利膈等劑惡或透其熱流入經絡反成風痰此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以為小兒體熱或遇澡浴即與久坐湯水之中風冷外傷水濕內滲頃刻間遽成風搐或惡叫頻吐或昏迷失音或洞泄不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒

新刊仁齋直指小兒方論卷之二

可二字大字接寫  
不排

指惡或之字  
恐心乃恐

