



廣瘟疫論序

雪友林曉鏡

瘟疫一證歷代明哲具有成方少仲景有大青龍陽旦越婢黃芩湯白虎大小柴胡三承氣湯麻黃升麻湯諸條列瘟疫之見證為汗下和等法双解法輕重深淺藏毫倫具特散見于諸經條中而未嘗直指其名為瘟疫非不欵明言也其書卒傷寒立論而互為區別之非耑論瘟疫之且上古文辭簡易詳於立證而不詳於立名欲人從證上細考則不必於名上區別而自無混治之失嗣後何間有宣明五氣論則論瘟疫較詳立法更備少桂苓甘露飲芩連解毒湯二已欵方涼膈散人參石膏湯双解散諸方皆是而亦未正其名焉老東垣大恙

活陽九味卷活鴻立名更脩而以名焉石也吳又可先生與身串古今融以心得著
時行瘟疫一論真可謂獨闢鴻濛揚日月於中天矣顧其石俱在而時疫有未見
者不能用其法或雖見其書而不能信者有口誦其石而噴之稱道至对症施方
仍不用其法口別曰此勿證也而手別仍用傷寒之方拘傷寒之冷比比皆然愚揣
其情尤非知而不用也知其名而未得其办證之法耳累日擊心傷不辭固陋而
取吳子之本原平或註釋或增訂或刪改竟在办瘟疫之体异於傷寒而尤慎办
於見證之始故首增辨氣色脈舌神諸論於開卷使阅者一見了然別吳子之考
人人可用而瘟疫之橫夭者少全者多俾斯世斯民之幸也

上元戴天章麟郊甫識於存書室之渚辛卯歲黃鐘後學拱良林齡祥錄

目次 一辨氣 二办色 三办舌 四办神 五办脈

時疫共凡官異氣

時疫而凡官異受

辦傳經

兼寒

兼凡

兼暑

兼瘧 兼痢

夾疫水

夾食

夾鬱

夾血

夾脾虛

夾腎虛

夾亡血

夾疝

夾心胃痛

夾哮喘

表證

紫熱 惡戶 官熱往來

頭痛

頭眩

頭脹

頭重

目脹

項強酸

背痛痠

腰痛痠

膝痛痠

胫痛痠

足痛

肩背痛痠

腕痛

周身骨節痠痛

拘挾

身重

自汗 盜汗

戰汗

狂汗

頭腫 面腫 頸項腫 耳旁腫 胸脅腫 周身江腫
紫黃 肖斑

紫瘡

裏證 煩躁 呕欬 暴口苦 口甘舌燥 遜燥 鼻孔乾 耳聾

鼻為烟煤 鼻扇張 咽乾 困痛 舌燥 舌強 舌卷短 舌癆

胸滿痛 肋滿痛 腹滿痛 少腹滿痛 自利 便血 便膿血 大便閉

小便不利 小便赤亦黑 小便多 遺尿 肓滿 多言譫語 狂

善忘 沈昏 循衣拊床撮空 多睡 身冷 呥逆 吐欬 四損

汗吐下清和補等法 一不足 二復 办似 遺證

屬病以不表裏陰

嘔吐 呕臘 呕瘡 呕痙 索澤 呕葵 婦人妊娠 小兒錄方

辨氣

凡寒氣從外收斂入內病多臭氣觸人间有作臭氣者尤待數日轉陽明府證之時亦只作腐肉氣不作屍氣瘟疫氣從中蒸達於外病即有臭氣觸人輕則盈於床帳重則染滿一室且為作屍氣不作腐肉氣以人身膀胱氣血津液得生氣則香得敗氣則臭瘟疫敗氣也人受之出膀胱蒸出肌表氣血津液逢涼而收因敗而溢但溢止有盈衰充塞有遠近五行原又有臭氣木臊金腥火焦土香水者竊以臭得其正皆可指而名之若瘟疫乃天地之雜氣非臊非腥非焦非香非腐臭觸人不可名狀非臭觀真者不能辨之試察廁間糞氣與凶地屍氣

自判狀矣。办之既明，治之無惑。知為瘟疫而非傷寒，則允於頭痛兼熱者，表證不得悞用辛溫。兼散者，裏証也。當清當下，亦不得遲徊瞻顧矣。

辨色

凡寒主收，欬歎則急，面色多暗，急而光潔。瘟疫主蒸，散散則緩，面色多鬆，緩而垢晦。人受蒸氣，則津液上溢於頭面目之間，多垢滯，或為油膩，或為烟熏，望之可憎者，皆瘟疫之色也。一見此色，雖頭痛兼熱，不宜用辛散。一見舌苔煩渴，諸裏証即宜攻下，不可拘於下不厭遲之候。

辨舌

凡寒在表者，多年胎即有白脹，亦薄而消，漸轉入裡，方由白而黃，而燥，燥而黑，瘟疫一見頭痛兼熱，舌上即有白苔，且厚，而不消，或色兼淡黃，或粗少。

積粉若倍延入胃則兼二色又有白苔即燥而至黑不燥者大抵疫邪入胃舌苔
頗類凡寧以兼溼之故而不作燥耳惟在表時舌苔白厚而傷寧異能辦於在
表時不用辛溫散入裏時而用清涼清攻下斯得矣

辨神 凡寒之邪傷人令人心知所苦而神自清少頭痛作寒熱之類皆自知之至傳

裏入胃治神昏譟語像凡寒為天地正氣人氣與之乖忤而外浮邪故其氣
不昏人神清也瘟疫初起令人神情異常而不知所苦大概煩躁者居多或少
痴為醉擾亂驚悸及問其何所苦則不自知即間有神清而能自主者亦多
夢寐不安闭目即有所見有所見即譟妄之根緣瘟疫為天地邪氣中人

辨脈

則人病中物別物集故其氣當隨人神情也

瘟疫之脈傳變後凡初起時亦凡寒逼別凡寒從皮毛而入一曰
脉多浮或兼緊兼緩兼洪總皆浮迨傳入裏始不見浮脈其至數亦清、
楚而不模糊瘟疫從中道而變自裏出表二日脉多沈迨自裏出表脈始不
沈乃不浮不沈或兼弦兼大強皆不浮其至數則模糊而不清楚其初起
脉沈遲勿作陰寒對沈者邪在裏也遲者邪在陰分也脈象同於陰寒而氣色
舌苔神情依前諸法亦自不同於陰寒或數而有力亦勿作虛視陽熱、
蒸氣散脈不能鼓指但當解熱不宜補氣受病之因有不同故同脈而異對也

辨時行疫癘

與凡寒異氣

凡主疎泄、主凝泣、一氣雖有不同狀、皆冷而不熱、其中人也。鬱而不宣、方其初

受在表、均宜溫散、麻黃湯、桂枝湯、芎藭蘇十神、神丸等方、皆散寒之劑、非解熱

之劑。時行之氣、屬溼溫、一氣合成熱而不冷、其中人也。立散而腐敗方、其初傳

在表、即宜涼解、大青龍、神通解散、九味羌活湯、萎蕤湯、大羌活湯、人參敗

毒散、皆解熱之劑、非散疔之劑也。以解熱之劑、治凡疔、輒別寒中、陷利重、則厥

逆亡陽、以散疔之劑、治瘟疫、輕則亟湯、深安重則桔葛、安陰此氣之不可不办也。

辨時行疫癘
與風寒異受

彼故汗不厭早、下不厭遲、为和为解、浅深毫不可紊、以其氣皆屬冷、屬收斂入

一層心待下化為熱邪歛入內方以攻下和解否則邪未入裏預用攻利和解虛其
裏氣反引表邪內陷而肺結胸利痞諸陰症也時邪從口鼻而入先中中焦以
傳九變甘之使自裏出表雖出表而裏未全去邪留於過之少表未必全去邪
于故下不厭早汗不厭遲為和為解解淺深必不可拘以其氣皆屬熱勢能作蒸
不允營變而此蒸尤甚彼熱當其未出表時強欲溫表在始則引毒熱肺隙原之
勢為斑駁狂喘諸凶在末則傷真陰為枯槁沈氏歎遂之危也

辨傳淫瘟疫傳淫布凡下不同凡寒從表入裏故從心從太陽而陽明而少陽而入胃若瘟疫
則邪從中道而出表入裏惟視人何淫本氣之強弱為傳變故吳子曰疫邪有先表

以裏者有先裏以表者有但表不裏者有但裏不表者有表勝於裏者有裏勝於表者又有表裏偏勝者有表再表裏而再裏者有表裏分傳者此為九傳

愚按所謂表者當熱惡寒頭痛頭眩項強背痛腰疼腿膝足胫痠痛自汗無汗及頭面腫耳目赤腫項腫當斑疹皆是也所謂裏者渴呕胸滿腹滿痛肺滿肋痛大便不通大便滯小便不通小便黃赤澀痛及煩躁譟妄沈昏舌燥舌卷舌強口咽赤爛皆是也。在凡寒從表入裏之証尤待漸次闡發而詳故見表証不必兼見裏證且入裏之後表多自解故見裡証之不必復見表證若瘟疫從中道而出表故見表症時未有不兼二裏證者且未有不兼見二半表裏之少陽証者仲景所云陽明少陽合病尤

自下利三陽合病脈浮大上潤上但欲眠睡目合則汗三陽令病腹滿身重難以轉側口
不仁而面垢譫語遺尿臂指瘧疫言非指凡寒言也且瘧疫屬厥氣出表入裏原
自不常有入裏下之而餘邪不尽仍可出表者嘗見讖語沈昏之必病愈數日復見頭

痛當熱復從汗解者此所謂表而再表凡寒必是也更有下證全具用承氣湯

裡氣通而表亦達頭痛背熱得汗而解移時復見舌黑胞滿腹痛譫妄仍待下
而必愈者此所謂裏而再裏凡寒必是也若夫表裏不傳之証凡十無一二
疫證十有六七但據傳經之為雜以辦之一經專具一經証者多凡二一經雜具二二

陰証有多疫心日久漸轉屬者多風寒一日驟發一經或二三經多疫証則有病

雖變態而凡寒不混於疫証而疫證不混於凡寒施治自無訛悞矣

至若辨紫色舌神俱已清並而投之而以治疫之药復有不效者則以時疫有獨症有
兼夾他証故是以办時疫異於他証矣已夾他証者則此人時疫與彼人時疫又有不
同尤當細办其兼証凡有五種夾証凡十種詳列於後

兼寒

其一有兼寒者初起二日頭痛身熱身痛寒甚寒諸表証惡寒時疫固而以脈辨則

不同時疫多軟散而不浮兼寒則多浮數浮弦浮大甚至有浮緊者并以办証亦

有不同時疫多汗兼寒則無汗為异亦异於单受寒者单受寒無煩躁口苦口渴

證特疫兼寒尤有煩躁口苦口渴之遇此等更當辦其受寒與時疫孰輕一

兼風

孰重疫重寒輕者煩躁訖多矣汗患寒訖少則當以敗毒散加知母石膏或達原
飲加羌防紫葛或六神通解散尤捷寒重疫輕者粟寒矣汗訖多而且甚煩躁心輕
則只用敗毒散其寒束於外矣汗粟寒既甚疫鬱於內煩躁更甚者冬月大青
湯可借用餘月九味羌活湯最為的當此証若治寒遺疫必有斑黃狂衄之變治疫
渴可借用餘月九味羌活湯最為的當此証若治寒遺疫必有斑黃狂衄之變治疫
遺寒復有厥逆嘔利胸腹痞滿變甚至沈困者不少不可不知然此皆為初起一
二日言也若日久則疫邪勃發表邪不能自存而变为熱火則惟以治疫之法治之而已
其一有兼風者初起一二日表證去時疫悉同惟鼻塞鼻鳴嚏噴咳嗽與時疫畧
異脈亦多浮而喚時之不浮不沈而數者微异治法不大相遠即於時疫諸方中加荆

防咳加前胡杏仁蘇子而已大抵時疫着寒能令病勢增重兼風反令病勢易解以寒主
凝泣則疫邪內鬱一分病勢增痼一分風主游揚則疫邪外疏一分病勢解散一下

兼暑

時疫兼寒兼暑四時皆有至若兼暑一症惟長夏有之初起二日與時疫多异只胸膈
呕利為異而脈則兼弦細芤遲不似時疫不浮不沈而數治法於時疫諸方中微減兼表
之味少用羌即不用獨用紫即不用前蓋時疫多汗暑證更多汗而邪逼出表汗則表尤
虛故兼表之味不可重複也寒潤之品尤宜減清熱之味亦宜減以邪逼表出鬱熱尤輕遇
用清涼恐致寒中而增呕張泄利況表氣太洩裏氣尤虛易犯厥脫之証故清涼寒潤不
可太多也最宜功用利燥脾之品木通為上清石次之猪苓赤茯苓又次之蓋分利則暑濕疫

皆從清道而出邪有去路正不必徒以寒涼逐折取效也間有表見身痛宜用杏薑裡見
腹滿宜用芩不再特疫兼暑則病勢反緩以疫中瘟氣屬亢陽暑為陽中之陰陽得陰
則解雖不能盡解然得一分陰氣則和一分亢陽每見時疫兼暑其誤妄古憲諸記
反緩即此故也

兼瘧

時疫有似瘧有轉瘧有兼瘧之不同用药亦有微异似瘧者寒勢往來或一日二
三次或一次而特無定也時疫初起多有之轉瘧者時疫深妄煩渴大劇之以已經大汗
大下仍有餘邪不解復作寒熱轉瘧象也時疫末路多有之兼瘧之証乃寒暑
時疫合病之証寒熱有常期瘧症全具但熱多寒少且多燥渴擾亂熱勢甚

速神情昏憒從來觸人為异秋令多有之時疫所以似瘧者因時氣盛銷於腹原欲
出表而不能透達狀滯裏而未得宣除故見少表少裏之少陽証之治法宜辛原飲加
紫胡為主時疫所以轉瘧者因汗下以邪氣已衰正氣來復邪正相爭故在先陽氣
獨亢有熱無寒今則陰液漸回而寒熱相爭矣在先邪氣東澗晝夜躁熱無休
止時今則邪氣漸退正氣漸復而寒熱發作有時矣治法以養正為主祛邪佐之以
紫胡湯矣甘草湯紫胡四物湯參胡三白湯量餘邪之盛衰視陰陽之盈虧酌而用之至若
瘧瘧之証最難治吳又可曰瘧疾二三歲或七八歲後忽然晝夜煩熱發渴不寒寒古
上苦利心腹痞滿飲食不進下証漸具此時疫証見而瘧瘧也以疫証方芍治之則生瘧家

方药治之則劇治若火法脈靜身涼每日或間日寒熱復作有常期者時疫解而瘧邪未盡心仍以瘧法治之累抑特疫與瘧病不甚相遠疫乃溼溫二氣合病瘧乃凡暑溼之氣合病其邪氣之雜而不馴相類瘧邪橫連膜原時疫亦當於膜原只受邪之虛相類但時疫之溫氣當別為亢陽故宜下宜清之証多瘧之暑氣停別為鬱肺故宜宣利之証多耳所以特疫初起方用達原飲與瘧之主方用清脾飲藥品尤多相類至其傳變則後氣輕重迥乎不同也善悟者於此處細參思過半矣

時疫卒多自利心表証初起即每日解數次稀其水者是心詳見後自利條下更有春夏之分得特疫即魚下利紅白而裏急後重者名為疫痢初起慎不可從利治益

兼痢

病從裏沁令兼疫邪之發熱汎痛為表裏俱病先用治疫之法解其表邪表解而裡自和其病多有不治自愈者若用治痢之法先清其裏裏氣虛而表邪陷輕者增其慎躁沉困重者遂至呕逆昏憊而危矣所以古人於疫病初起耑主倉廩陽其方乃人手效毒一竟所表但加陳倉米以和中養脾胃俟表沁解後裏熱沁具方可義清陰下不但有連弓承氣之類宜緩即淡滲少利之劑亦宜緩投於表沁未解之後若太陽症不見而微見少陽陽明沁者則紫葛五苓不妨借用利水來表不可清裏不特時疫魚症為然凡一切病証微、魚身熱即宜慎用苦寒淡滲用之若早心增呕逆此歷驗不爽者疫沁魚症為然凡一切病証微、緩亦由病為暑者氣陽中之陰能和亢陽且鬱蒸之熱有所疏泄故也若疫毒太甚驟散即下

沌江汎紫粟血或兼見譥妄舌燥諸粟證者黃連大黃又在急用不可拘此論矣 以
上五條其辦明所以為瘟疫兼症固已不憚遂類詳審然第以前具備氣色舌神脈為
主五者之中尤有一二確據方于疫門求治否則各按各門施治可也若混以時疫治之為
害也矣

夾疫水 飲入於胃陰蒸變而稠濁者為疫未淫蒸變而稀清者為水疫夹水一物也疫能作熱水
能作冷時疫屬熱証故夾疫者更增其熱脈證治法無甚參差但於治疫藥中加桔梗
貝母甚則加牛蒡夾水脈證往往相悖治法則有不同不可不細考也時疫之脈沉數而夾水
在胞膈其脈多緩甚別遲弦此脈夾水之脉也特疫之舌徑傳裏即轉舌轉燥轉黑

若有水在胸膈則煩躁謾妄沈昏諸證悉具而舌色白润間有轉戾黑者亦尤仍有白苔或漏舌於黑半迹夾二條白色或舌尖舌本俱於中夾一段白色此舌夾水之象也時疫胸膈下硬痛手不可按一有水在胸膈心下雖滿痛抑之則軟略加揉按荆漉之有聲此疝夾水之象也時疫見夾水脈証雖有表不宜純用辛涼散恐表不能解而反見沈困有裏証不可遽用苦寒早用苦寒心轉加昏憒此水氣鬱遏於中加辛燥利水之品以祛水氣追水氣去鬱遏然以豫攻豫涼則冬不效者矣燥溼則半夏蒼朮利水則木通木澤利氣則萊菔草果木香甚至有須用大戟芫衣者在時疫雖屬熱邪往往有投三承氣者多不白虎而不效偶用溫樞前收功者遂相訟清熱之非不

和熱邪乃其本氣夾雜乃其間氣也

夾食

時疫夾食者最多而有食填膈上食入腸間之不同入腸胃則為陽明諸熱證治法備於二承氣湯惟食胞膈往來有脉沉手足冷者陰毒三陰投以溫劑亦無毫
熱渴恭現但煩躁倍增長則一二日即死蓋胸中乃陰陽升降之所合謂之別氣兩
氣閉則壅於下而薦所疏泄保溫則壅愈甚於內故外苦者壅證壅甚於下故上
口渴證疫熱以內表為輕入裡為重此證一溫則溫邪入裡入深以致速死而名壅證也
故氣色神志脉辨得為疫證矣而胃脉沉手足冷即為細潤其胸膈若痞塞滿胸
即是天食丹辨其舌脣白厚而微黃益為食填胸膈之証於治療中加桔梗

李氏葉翁趙華甚創吐法以宣之使肺潤而陽氣宣塞然仍推証自見言解表法裡自去候

夾鬱時疫夾氣者初起疫証悉同而多脈沉手足冷呕逆胸滿頤軟失食但失食必有物
由寒抑舌苔厚白而微黃胸滿而痛不可抑而亦不移夾氣由妄物為虛邪舌苔白滑

胸滿滿而動而可抑首先宣通其氣並分解表法裡自去不效若不舒其而少者
表則裡氣不能外達而非抗敵也用清下則上氣不宣多致痞逆惟於解表裏中加
加蘇梗木香大腹皮炙附等類以宣其氣而易解於清裡兼中加以月以舒其鬱
則裡易和以月為舒其要兼但桂力俱緩者用至五錢量兩方能奏效

夾血 時疫傳裡之血畜血量多治後攻裡者不具端惟草有內傷傳乘復感時邪疫於初起

一二日疫之表証悉具而脉或芤或濡明熱陽証陰脈但須細詢其胸腹胁肋四肢有痛
不可按而軟者即為畜血確驗其口孔濡非陽証陰脈乃表証見裡脈之治法必兼消癉紅花桃
仁歸尾赤芍延胡之類量加一二味去邪方易解芤濡之脉方易起若誤認芤濡為陰脈而
投溫劑輕者變劇重者致危

夾脾虛

時疫較之風寒本為難治風寒傳變有次序時疫傳變者常經風寒表邪一發即
散時疫散而復集且往復之再三風寒傳裡一攻即和時疫攻而復合有下至二十
次者此時疫之難治之而脾虛者更为難治蓋時疫在得汗下而後解脾虛者表不
能作汗裡不任攻下或得汗失而氣隨汗脫或得下失而氣隨下離此等証汗勿強

汗若表虛重養正人參敗毒是也下勿輕下攻裡不重固氣生津液黃龍湯是
 之其外証多大分別惟脉不任易按此邪有進退當其邪進方張之時脉亦有
 按有力者不可泥也尤合氣色神情以相參以面色唇黃神情倦怠氣息微促
 及心悸耳鳴皆脾虛中氣不振之象更須細辨含參如意條皆見有餘實象
 而獨見一二虛象反為吃緊角條見虛象而獨見一二虛象又為吃緊總須權
 衡標本凡証之虛表屬上焦虛心肺者皆為標証屬裡屬中焦屬五臟皆為本
 若實証居標虛証居本則虛証為重虛証居標實証居本則實証為重到此虛
 實証而看意參詳庶幾不失

夾
虛

時疫夾脾虛者為難治矣夾腎虛者更難時疫屬寒邪腎氣虛則腰脅酸軟腎虛之中又有陰虛陽虛之分時疫尤待汗下清而少解陽虛者一經汗下則脫絕之証隨見陰虛者一經汗下則枯竭之証隨見元絕時諦察凡在表時見腹痛異常小便頻數腰脅冷軟其人平日非有淋濶陽痿而体寒減精湏弱須調服於通表裏中加入參白芍陽虛並杜仲陰虛重加母以照顧腎氣以免泄未竟外之變若入裡當下必以陶氏黃連湯為主當清心以參白虎湯為主多屢遷屢下其熱更甚舌上燥而舌胎無黑苔念涼而愈長或有燥苔含下而愈躁此皆腎虛之證察其陽以知寒邪可據主溫腎虛治之六味地黃湯易生地加知

孽黃太僕所謂寒之不寒責之與火壯火之主以制陽者此之或仍不應則合生脉散
以滋火之上源或用四物湯滋潤往往微似此熱勢燐原非枯火之體散不作湯液為味尤以
兩許湯液本以斗計乃有過耳見我若早十枚二三酒竭已見十枚散一或更宜脾胃
敗証去而更利五穀散下一百粒散一笑

火血

疫証之血有三其一未病之先素之血而陰虛一受疫則邪熾乘虛煎熬之陰最易
解表清裡用桑元步三照顧榮血加九味羌活湯之用生地人參敗毒散之用人參是也
其二當受病之時忽然吐衄女人崩漏甚至血暈昏厥勢甚危急疫証常有也

病家但知血之可駢往不知受疫醫家亦忽其客邪惟汲之於正血清涼滋補多

至危殆不知血由疫迫惟當治疫疫邪而血自止此症不遽見於疫在表時而
見於發熱數日之後人多易知惟疫邪著於陰迷而暴見此証者難識以其証外
舌頭痛脣熱不可接耳但見微惡寒而大作呕急當視其氣色神脈舌苔若舌
有白苔氣色有二疫象即是疫毒舌疑以童原飲為主略加藿香陳青皮但
治疫毒血証自己若脫血太甚而氣微危者加人參以固中氣此疫証見血最危
害候疫証傳變歸經然後抑經治之其二疫邪太張立後煩熱燥渴之餘而見之
血証此為瘟疫常態詳於血証各條

元夾

時疫夾症其腎囊少腹引痛全屬疝證當照辨氣色神脈舌脉之法辨之有

疫邪不无治法但治疫而邪自消若依常治法用桔梗葛根芍药附子諸燥
品味輕者变为表癰重者变为呃逆嘔厥首次而莫救矣

夾心胃痛

時疫有兼心胃病者於其痛時察其氣色神脈舌苔若有時疫但治時疫
雖平時因寒而甚此則推治其證蓋以疫邪客於膜原傳入太陰而苦心胃痛之
痼疾於達原飲中加木香芩倉朮以開通薦疫使其透發於表而痛自己若保津車
常心胃痛用姜附莫桂尤致危殆

夾喘

喉喘乃肺家病有疫火一受疫邪其溼熱之氣侵其肺而入肺者皆喉喘也此
當察其氣色神脉舌苔有疫但治疫其喉喘自除於治疫藥中加川貝桔梗沒藥

舉皮瘦邪喘而無解法更甚者○以上諸條凡言重者瘦邪並他邪也二邪自外入者也
凡言夾者瘦邪夾內病肉外夾若者又二邪並者以瘦為重犯邪另種故略重治他邪而病
即解二邪夾者如夾水食血氣瘦等症邪則以夫邪為先瘦邪為後蓋清其夾
邪而瘦邪毒皆得遠達方得傳瘦傳瘦方能解利也如夫脾虛亡血諸虛
證則以治邪為主養正為輔且瘦邪最易傷正故不可妄貪正道邪也夫
嘔夾症心胃之痛諸宿病則以但治瘦邪宿病自己蓋宿舊之病乃新
邪所逼而發也

瘦邪見症千變萬化狀不出表裏二者但表症中有裏邪裏症中

有表症則又不可細察也故列証分表裏以尽其常又細辨以尽其變使人

臨证胞有定見少致橫戾於萬一耳

表證發熱

時疫發熱此氣寒邪犯因其發熱時氣色神脈舌苔則同辨得為時疫發熱又當知有淺深表裏之異不辨無以施治發熱表症居多亦有裏症發熱肺不浮不沉而數寸大於閑人熱在皮膚脉之絡手足按反轉必重頭痛項強腰痛腹脹或頭面皮膚角膜有紅腫疼痛諸症不必全見有一於此便是表症發熱九味羌活湯人參敗毒散六神丸解連用月巖寒及惡寒甚者大青龍湯姜葛湯葛根湯

旦可備固全不至寢者白虎湯黃芩湯可加減用裏證者熟附或滑
或沉數或洪滑潤人體於寸熱无至肌肉筋骨初扪熱輕久按熱甚
必屬煩渴胸腹滿大便或不通或有利或便血及膿小便黃赤或澹
妄狂昏諸証雖不必全見必兼二三証方是裏證若熱極子致陽黃
速解毒陽小陷胸湯三承氣湯導赤散濁心陽猪苓湯天小散選用
生辰土裏黃芩熟附多弦胸膈滿或熱或止或口苦咽乾目眩耳聾
目赤或青逼心煩或兼見表裏証達草鶴呂葛解肌湯小柴胡湯
選用時瘦者熟時用藥量取要清楚此處所指不差即傳度多危

救宿亦易不然難於收拾矣凡見表熱即當辨其氣色神脈舌苔為風寒為時疫僅時疫又當辨其在表在裏在半表裏裏時疫見證純表純裏者尤表裏夾雜者多表裏雜夾吳氏達原飲為主表證多加羌活裏證多加大黃半表半裏證多加柴葛後或表裏證均見則諸藥全用即三消飲取效最速誠時疫主劑已至愈數日而復甚熱者乃葛石伏有不透之邪復出於表當察其證之表裏多宜以前法治之大抵愈以復甚則裏熱多而表熱少雖有當用表之証不過半葛後而已更用表法之理若愈以另受

凡寒甚熱甚汗多亡血者不在此例時疫愈後復熱並汗重用葛根至錢帛物以其性涼而解肌兼汗既不得並汗之毒又不得煩熱之裏或有平素羸弱或老人或大病後復染時疫屢往汗下清解其熱轉甚或全無表裏寒征或二脈豁然空或輕初起洪消更甚或用表药而身痛更甚或屢用清熱药而煩躁昏沉更甚或屢用下药而舌燥更甚此皆邪退正虛之咎熟也王太僕所謂古毒有盛候反鴻含寃也此時須畧去征狀而消息陰陽寒者陰寒則熱渴枯渴之證多責在腎宜二味地黃湯兼氣憲令甘脉散酒大作湯液

晝夜頻進效將能梗陽虛則嘔利憤眩之証多青色在脾首二層子陽
通血虛歸脾陽厚胡三石散清燥陽過用羌遇此等証仍用汗下涼
解宣伐斷無生理矣又當熟之為表為裏為半表半裏為復為裏証
狀明顯有據者自易施治若肺証失雜模糊難於分辨者須以舌苔
為據初起舌苔二層白或無苔而潤屬在表面白苔而厚或兼微黃或
中黃邊白中黃尖白或二三色屬在半表半裏黃苔醫色苔黑
苔屬裏舌苔燥則不論何色皆屬裏證屡汗下後舌苔潤而黑
熱者屬陽虛無苔而燥屬陰虛表裏寒依此辨之

遇半表裏虛實有似非證即吾苔亦唯憑據又當往病之末路
探討若屢汗下宣伐而熱愈甚者從^盛治無疑或雖經汗下而
熱漸減药有效則仍屬餘邪未盡不可遽補致邪熱復雜^{天人}
年虛似此虛實闊頭不可不細心體認也 以工辨表裏虛實
諸法雖指發熱時言然類而推之凡證皆可依此為辨惟在學子者
之善悟耳

惡寒

時疫惡寒者風寒溼暑諸証不同諸証惡寒並時而勢不甚時疫惡寒有時而勢甚

惡寒之以尤見其熱熱甚自熱而不覺寒寒時自寒而不覺熱非若諸証惡寒其熱之相

時

並也時疫惡寒之以少在表之時多為寒氣色神脉舌苔些微熱同但有深淺之异邪淺

而在表外惡寒之時之於發熱治未方藥同於發熱而以解表為主邪在裏者寒熱並未

水瘡狀治法方藥亦同發熱邪深入裏失於攻下而熱深厥深反欲擁被向大惡寒而不發熱或熱

亦微甚則四肢反厥此雖惡寒實非寒也乃陽氣為邪所撓折而不通以通鑿冰三達原飲去附陽

三停氣陽運用使寒氣消而撓折陽甚反大熱而頓溫也此証在惡寒最难办其如熱須用九竅察

之勿过大此目赤鼻孔乾脣紅舌苔黃口渴直渴或腹小便黃赤濁痛大便燥結或稀黃極臭

或鮮血或心下至少腹有痛不可按處此皆熱深陽鬱之象大抵周身皆見冷沁三處獨見熱証
反當以熱証為主反此亦然乃亦寒熱真假之機要也予所見時疫不下數十裏証熱寒者百中
三即四肢厥逆爪甲青紫詢其所苦亦不烈寒此可得其概矣至若本係時疫熱証因其
人平素虛損衰老及大病之後用攻伐寒涼太過至汗不止嘔利俱作四肢微厥六脉細濡而惡寒為
陽虛乃攻伐太過而致當以參耆苓术为主寸口脈微者佐以升柴大腹微者佐以桂附酒如雞屎湯
虛部浮熱証未而陰虛桂附亦不可過用當佐以養陰藥物如白芍參冬五味之類此適溫
補若緩及溫補不到必死或過用溫補陽雖回而陰竭亦死此毒不可不斟酌主當又有宣
傷伐正太過而成虛証之要寒宜助涼邪太過而成實証之要寒以瘦邪方伏於膜原未往

信變之時胸膈必多痰滯有見其頹燥而遠用知高月令連者有因其作渴而遠用生地麥冬
 者有病者自恐火症而後吸冷水西瓜梨甘太早者皆能抑鬱陽氣壅利邪熱之過於
 中下二焦冷物嘔瀉肺於上焦每見寒症遇此惟以宣導之瀉常為主瀉肺通則寒寒自
 止不可過溫致下焦瘀熱畜血斑黃呃逆而死不可清涼致胸腹痞悶而死宜用草藥
厚朴
吳茱萸
 木香半夏蒼朮甘草導瀉開常逐水俾瀉常水去則寒止而
 熾証見隨其博變而施涼解攻利之劑乃有效也此法特散药悞非指正病也涼之所寒
 以寒寒為重時疫以寒寒為輕多則和起寒寒一二日不治邪氣傳變而寒寒自止者此
 其悞治毋寧俟之若誤認寒寒為真寒用辛溫之药發散未有不增其病勢者也

寒熱往來寒熱往來寒熱異於熱寒一時薰蒸寒熱往來寒已方執已方寒亦

來

此瘧不因瘧昔有時寒熱長短有定此則寒熱過時長短無定雖不因於瘧而邪俱至少陽半表半裏之間生傳變之初是由輕入重始則寒熱往來退則熱多寒少再但熱不寒至晝夜壯熱譏妄煩渴惡現在傳變之凶是由重出輕晝夜壯熱漸減而為微熱有時而止又減而為微熱往來又減而為戰汗至脈靜身涼而愈夫疫邪

寒

自裏出表者輕自表入裏者重初起寒熱往來是自表入裏犯及少陽裏氣與邪相爭

拒之則邪深入裏表裏併而為熱晝夜壯熱而勢日重既傳後三日而寒熱往來是

邪氣向衰正氣未復自裏出表經溫少陽前之晝夜壯熱邪氣東潤者至以正氣

漸和而寒熱有時矣。前之邪氣猶盛，尤極無陰作純陽者，至此則陰氣未復而寒熱相爭矣。前之邪偏表裏而熱渴日加者，至以則裏氣逐出表邪而作成汗矣。治法於未傷變之先，欲由表入裏時，但透達其邪使易化為主，達原飲是也。於傷變之以欲自裏出表時，以不解為主，小柴胡湯是也。於表汗下之餘脉，或虛微濡弱，舌苔代心或淡，或動或急，參形或羸弱過甚，當養陰益氣助正，却邪。若主大柴胡三百湯，又甘草湯，清燥養營湯，補中益氣湯是也。

頭痛

時疫頭痛與風寒不同。风寒是寒來於上部中下，邪工達頭，雖痛而不昏。時疫是熱蒸於上部中，直邪犯工，頭不甚痛而昏。所謂東熱而痛者是也。驗得氣

色神脈舌苔為時疫頭痛而又有表裏之分初起頭痛腦後顙項目珠累甚舌苔為
紫熱者太陽頭痛也毫舌以苔為主主豉酒芩知母生地為朝額頭脹痛目痛鼻孔乾
舌苔白而微黃煩熱而渴者陽明頭痛也葛根生石膏主沒豉石膏為輔兩額角痛眉棱
骨痛寒熱往來口苦咽乾舌苔中黃邊白或中段黃尖上白少陽頭痛也柴胡荆芥川
芎為三經芩生石膏為輔頭痛而三陽証患者吳氏三消飲為三時疫頭痛專見一往而
者少雜正二三經証者多此方尤為多效頭痛甚者加豆豉芍防清其頭目頭痛舌苔
黃心下滿並乏倦熱者陽明裏証也三黃石膏湯小承氣湯大柴胡湯防風通聖散
選用舌苔黃或土黃或傍邊有一塊白胞滿而嘔噦痛並眩者瘧厥頭痛也前胡為

主少夏菜菔子枳桔山楂麥芽為輔並煩熱者加大黃枳實汗下清解後頭痛心悸而
渴去川芎加丹皮知母黃柏或歸脾湯逍遙散并加生地棗仁凡頭痛見症混雜難分
表裏者淡以舌苔辨之

頭眩

時疫頭眩有三其一乃熱頭眩乃時疫本病寸口脈多浮而長熱荆防芎薄天
麻為主黃芩芍藥煩渴加石膏其二疫水頭眩乃時疫並征脈沉而弦滑並嘔
胸膈滿悸動前胡為主少夏茯苓桔梗胆星葉菔子為輔然必視時疫大熱屬
表屬裏於應用本方計加此數味可也其一虛症頭眩乃時疫更虛多見於汗下
清解後或素有怯症者如上虛寸口脉不及閏尺多汗少氣不足以息心悸參芪為

主中寒間脈不及寸尺多淫溫利太過而未不思食芩水為主下寒尺脈不及寸閑腰膝痠廢二便清滑不味地黃為主三寒皆可加天麻或虛症已見仍寒有疫邪燥熱妨並用清熱之品或補後脈氣稍寒一月有清解亦可大抵時疫頭眩多屬熱少屬寒治須斟酌若傷寒亡陽頭眩又當遵仲師法治之

時疫頭眩者乃胃熱上蒸也下之則愈兼表者防風通聖散大柴胡湯吳氏三消飲通表證者三承氣選用病以虛眩者頭眩本病

時疫頭重者溼熱上壅也於清涼解表藥中加蒼朮或利水之藥病後寒重亦此頭眩本病又有表裏並病之頭中者其目必黃當遵仲師瓜蒂散搐鼻出

頭 脹

頭 重

黃水即愈

目

時疫目珠脹者陽明之病也。並表症葛根葛白湯加石膏、石脂滿舌有黃苔宿食也。量食壅陽明其脈不下行而上逆故目珠脹宜平胃散加山楂麦芽桔梗消導之則愈至屢往清解而目珠脹不愈者當消東其肝膽以養陰滋血和肝之法再不愈者則當追滌附乃一癸同源之治也。

項強

項強

時疫初起項強硬兼發熱乃邪越於太陽經也。羌活、升麻主狂躁正盛而項強者熟壅其經脈也。石膏、黃芩、芍藥主屢往汗下苦熱已退而復項強者血煙而筋皆養也。四物

六味为主外此若傷寒熱之項強主陽漏風之項強則又仲景之法耳

23

背痛
背痠

時疫初起背痛甚者邪淫於太陽也羌活為主背痛而脹並胸脇脹者邪客

瘦

膀胱也草菴原樸桓榔茱萸子大腹皮為主屢經汗下後其熱已退背痛不止

者經脈血亡也六味生脈四物為主又有平素

膀胱內傷而背痛在膏肓二穴者當於東垣
內傷諸論察之

腎痛
腎痠

時疫初起腰痛並脹熱者太陽受病也獨活為主並脹者氣滯也加枳榔並重

者夾溼也加蒼朮牽引之腹及兩脇者氣滯血瘀也加青皮烏藥赤芍元胡並理

氣血疏通肝腎此皆初起寒証治法又有即夾脾虛陰鴻者腰痛獨甚桂周身

氣血疏通肝腎此皆初起寒証治法又有即夾脾虛陰鴻者腰痛獨甚桂周身

並緩痙骨力石尺脈過方後未傳度必危當於初起在表時加人參知母生地預

顧其陰則危殆差減若徒用伐邪之品邪之深入者未必去而陰液大傷則昏沉舌

里直視失溲諸証見陰傷氣脫則厥逆証見至腰乃腎府為先天根本腰痛則
腎虛不可不察要知此時疫初起腰痛尚有虛實之分若汗下以而見腰痛其始腎
意不待言矣宜二味四物養
之不可疏通

膝痛

時疫初起膝痛甚者邪在太陽注也獨活枳榔牛膝为主薦軟者溼甚也

蒼朮为主然此時太陽之一證初起以解表邪大勢為先膝痛滿藥一二味而
已若汗下表邪大勢已解則當察其邪氣之有無正氣之虛實專治下部不
然恐致殘瘻倘餘邪不尽留於下部則仍有熱證如腹並小便黃赤以黃柏黃
柏清溼熱桔梗木通道壅滑筋掣則蒼朮防已仁腫加

則丹皮赤芍懷斷芎歸石甘餘邪見心悸二便頻數尺脈虛小則當以補腎若急六
味加牛膝枸杞知柏湯益陰精

脛腿

時疫初起脛痛酸者太陽經脈之鬱也獨活為主並牽者治在筋加秦艽木

瓜並腫者治在血加木通赤芍梔榔並軟者屬溼溫得名軟脚溫住一二日即

死宜白朮加荳朮陽或荳朮黃柏此膝痛頗同未汗下則解表之大勢加

二味脛痛為表證已解惟留此當寓而治之若屢汗下而見虛症亦以補腎

为主

足

時疫初起有足痛因素有腳氣痼疾者但治時疫於解表药中微加梔榔木

通君已往汗下表裏俱平而足痛不止則消息其腎家寒寒同膝腰痛法治之
肩背時疫初起肩背痛較者手太陽往脈受邪也解表則痛自己往汗下後而肩背
痛者有通隱阻沸血脈空虛之別往隱阻沸者脈多有力証多熱渴以清熱活血為主

黃芩赤芍歸尾紅花之類血脉空虛者証多瘦弱弱弱脉多芤濡養血益氣為主四物

合參芪之類

腕

痛時疫初起腕痛者乃風淫末疾也初起解表汗下以益氣養血共肩背痛同治

週身骨項背膏腫脛足肩背諸痛已列於前則周身之酸痛惱人亦復列周身骨節較

節痠痛

病者以痛在一處邪有寓治痛在周身邪有分布也而汗之邪湏通其凝泣分布之邪

身

須解其搏束故治周身。痙攣痛疏表其大法也。而痙攣痛亦有別。痙攣而淺痛重而深。痙攣與拘挛亦有別。痙攣舉動如常。拘挛²出神不利。痙攣病在營衛。拘挛病在筋脈。合痙攣拘挛又有上下淺深前後之不同。左身半以上者未疾淺而易解。左身半以下者本病深而難祛。合工下痙攣痛拘挛左未汗下者已。汗下者又有別。未汗下屬邪盛。宜宣伐。已汗下屬正虛。宜調補。明乎此則痙攣痛在周身。在一處。按証施治。無不当。天解表諸方人多敗毒散九味羌活湯。二神通解。太羌活陽時疫初起。發熱。身重者。溼勝於熱也。芩水为主。二日至四五日停變之後。汗出更熱而身重者。熱壅其津脈也。白虎湯為主。傳裏表無熱而舌燥便秘。腹痛拒

按而身重者內結而氣不達於表也三承氣陽為主。痿汗下承熱已退身重不可移動脈虛散而無根。古工濕苔二便有通者陰陽兩亡。脈枯竭也。審其陰陽偏勝而而治之偏於亡陰多脾虛證六味合四物為主。偏於亡陽多脾胃证六君令生脉為主。陰陽俱竭生脉合六味為主。

自汗

疫邪由革出桂表初起作寒發時多自汗甚至淋漓不止不可以表裏論。虽頭痛身痛仍以解表為主。羌独紫草之類。兼有渴清陽明之勢者。主白虎之類。有熱有傷破涼為主。陷胸三承氣之類。若痿汗下邪已全退脈虛而舌苔淡二便清利如常向外發熱證方可達意飲汗莫以時疫和。

起得邪有出路而宣歎汗者恆少也

盜汗

時疫初起盜汗者邪在半表半裏也。胸膈痞悶達肩欬者痞悶。胸膈小柴胡湯下以大

戰汗

熱已退有盜汗者餘邪不尽也。小承氣湯少陽胸膈吳氏養榮湯諸方。以其伏匿餘邪盜

汗自止

時疫不論初起傳變未復俱以戰汗為佳則邪正相爭正逐邪必然有透乃不透之分。凡透者汗必淋漓汗出身涼口不渴舌苔淨。二便清胞腹脇無溫溼結痛方為全解。之戰汗否則餘邪未淨而復熱則有再作戰汗而解者。有戰汗須三四次而即解者。有戰汗一次不能再戰待屢下而退者。有不能再作戰汗而即沈困而死者。猿視其本氣之強弱。何如耳。凡戰汗之時不可服藥補則戰止而汗不透留邪為患。汗下則太過而成虛脫危。汗下透微一再觀脈。証施治當戰時或多些熱渴。能助其作汗。戰汗之時脉作戛戛停止勿評。待戰之脉。脈自見也。抵戰汗之脉。以浮為佳。邪出於表也。毫散微濡。应有疫前独尽陽精之防。其脫也。冒者未飲待之然无察其戰汗保邪淨而氣欲脫方可。用凡戰汗成神靜者吉。音躁者危。舌痿不能言者死。目眶陷者死。目轉運者死。戴眼反折者死。形体不仁水腫水不下者死。戰汗雖為佳兆亦有吉凶。得戰汗固由治得其宜邪退正復而致然不可強也。嘗見服大青汁藥毫不得汗而飲冷水得汗者又有用下藥降戰

汗者涼血活血得戰汗者生津益氣得戰汗者種之不一當知戰汗乃陰陽交和表裏通達自然而然非可強致也

狂

時疫臨解有忽手舞足蹈跳床投榻而以作汗者最為駭人狀須驗其是否作汗但作汗之脈浮而緩滑而邪還於表緩則胃氣自和待汗透自愈脈若浮洪數滑滑浮亦散雖有汗亦為發狂非作汗也

頭 痘

時疫頭瘡乃風熱壅於上部太陽之經脉壅於頭頂傍名大頭瘡毫當視表裏輕重加疏凡之品以散其腫荆防薑荷憲退川芎葛根菊花之類如發熱者苦白表裏桂裏之全表之藥用九味羌活湯人參敗毒散也如頭瘡者苦黃者裏重於表也全裏藥

用三消飲涼膈散大柴胡湯調胃承氣湯是也古有用三棱鍼刺出血法亦可用至發

癰膿者不在此例

面腫

時疫面腫風熱溢於上部陽明之經脈被鬱也赤腫者方是治以白芷防風葛根石膏散其風熱視表裏之輕重合頭腫條內諸方加減用之若黃腫乃水氣也當選小腹治之根桔梗牛蒡防風元芩癰膿發願不在此例

頭項腫

時疫頭項腫乃陽明風熱俗名捨頭溫又名蝦蟆溫當按頭腫條內表裏諸方加葛根桔梗牛蒡防風元芩

耳旁腫

時疫耳旁腫乃少陽風熱俗名黃耳傷寒小柴胡加荆防芍藥元芩亦當與頭腫參看

胸腫

時疫胸前一片紅腫粟起似麻疹風熱也俗名赤膈傷寒亦於頭面諸條表裏方中

腫

加荆防連翹赤芍牛蒡土貝

週身時疫周身紅腫以熱滯於皮膚也用羌獨升紫葛芷蕷其皮膚之毛竅石膏黃芩梔子連枳清其肌肉之熱赤芍歸尾紅花生也其毒熱之癥並裏證此頭腫諸條參治

一、坐頭腫諸條列於表證者以初起言也若見於病肉胷有汗下者為餘邪不尽治法則小黑大狗見於初起表邪實盛用表散之藥為主清裏二藥清裏之藥為輔見於病成裏邪留滯用清裏之藥為主表散之藥為輔以此為權衡患過半矣

黃發

時疫發黃有四宿食二畜水三畜血四營熱當疫証初轉在表時胸膈痞悶目珠

黃面自裏正中黃宿食雜於胃腕也於表药中加山楂神曲麥芽茶服子傳裏時小便不利腹滿而嘔吐而目眎俱黃畜水也四營散加茵陳枝子胸腹有更痛處小便不利大便黑而苔黃者畜血也桃仁爭氣陽熱互下其方小便俱不利而苔黃者寒熱也茵陳

葛陽凡黃必以二便為辨二便調屬上焦小便不利屬水小便自利而大便黑潤屬血大小便俱不利屬營熱乃胃熱移於膀胱不必利其小便但當通其大便是以茵陳陽有嵩功也
若黃當辨其色上焦宿食黃只在面目不及周身而水黃黃周於身無微黑而黯淡
瘀血發黃亦無微黑而潤澤極熟發黃黃赤而鮮明此即以黃辨黃之法也

紫

時疫發瘡熱邪侵皮毛出也與汗同機以疏散清熱為主然其他證發疹不同他證或無
裏熱此則未有不理熱者雖以疏散為要而見煩渴苔黃則硝黃仍須兼用他證發疹
痧散而病即愈此則瘡而病不衰也他病發疹不過三日为期此則為期不定治法必視
裏邪解否為用茲之準則不可以瘡之一證為據也

發班

十

29

煩躁

時疫背斑邪熱出於經脈也雖不及戰汗亦有外解之機治以涼血清熱為主白虎化斑湯吳氏舉_斑陽庫角地黃湯選用此亦其他証若斑有異他証帶斑消斑則愈此毫不以斑之消否為輕重而惟以裏寒証為主每斑出而嚴委以故或斑出數日已消而苔沉乃故必待裏熱全清二便清利而身愈故治斑藥味可為輔不可為主若斑發於熱時目互往而不互冒凡遇煩躁而不渴目赤而舌白即是將_背斑疹之候預以清涼解表透毒之药治之俾邪易出易淨_{川工時}證皆闊乎裏不似他証表裏兩不相闊故前列各條皆冠以時疫兩字以明非他病之見証不可以治他病之法治之亦不可以此法治他病後憑氣色神脈舌苔辨之百不失一星者為辨時疫之大綱宜亦辨時疫之細目煩乃心煩情思不定神不安而形如故躁則形更揚手擲足形不明而神復亂煩轉而躁重也生他証有謂煩屬心躁屬腎者煩屬陽躁屬陰者午時疫甚屬肺熱熱淺在上則見煩躁

之形勢深在下則漸近昏沉而不煩躁是時疫初起可即相躁之輕重不煩躁則非時疫設氣色神脈舌苔有時疫確據亦屬但表不裏之輕症凡初起憎寒發熱而煩躁者邪在半表半裏三消飲九味羌活湯六神通解散選用隆冬寒甚汗雖出者大青龍湯歲暮陽可借用舌苔色黃渴而喜飲身熱汗出而煩躁者邪入於胃也但屬黃芩三少氣小陷胸三黃湯心涼膈散選用舌苔已黑頰躁漸近昏沉者邪入心色庫角地黃湯加羚羊黃連解毒湯選用屢狂汗下清涼表裏俱無阻滯而煩躁者陰液傷也生脉散六味地黃湯吳氏養榮湯選用或用汗解清利滋潤諸法不應而煩躁尤甚者當細驗舌苔若黃黑苔中夾一塊白潤是為美水或平素體有疫飲或未病之先曾飲冷物或初煩躁時遇餘冷水忽啖涼物或用清涼太早皆能停飲於胞腸而目胱之間寒飲拂鬱其疫勢外不能達表內不能傳而故煩躁轉甚驗舌之以更細按胞腸滿痛而軟瀉

嘔

瀉有声再細按其脉右寸閑或弦緊或緩皆停水確據當以蒼朮半夏茱萸朴先消水氣然後治其煩躁無不應者不論舌苔有疎黃黑但煩躁而無小便不利者雖無水氣在胸膈而少腹畧有滿痛處即當導赤散潤心陽四苓湯猪苓湯益元散利其小便所謂心邪不達心濁而達小腸濁也

又可曰時疫有始終能食者邪不傳而自也惟勿絕其飲食此不嘔者也愚嘗見時疫初起未發熱時表症未見有先作嘔數日者此疫邪先犯太陰當辨其口氣並具氣而不黏者屬太陰寒症有臭氣黏厚者屬太陰疫症此為先裏而次表不可遽用清涼開遏邪氣致使不能透達傳化雖四肢有時厥逆脈有時沉伏亦不用溫熱致增嘔證甚有舌紫昏沉者惟當宣其胃氣藿香正氣散即取宜若已嘔熱而嘔者吳氏達原飲加半夏禹之陽表症加羌活柴葛各半兩嘔而煩渴身熱而不要寒者邪在陽明之白虎湯黃芩湯並加半夏若嘔而舌黃胸中滿痛處桔皮半夏陽加枳實山楂一錢半每丸緩用至五錢或一兩方能舒懶散若嘔而舌黃心下脹止滿痛桓按者大柴胡湯若嘔而舌黃或黑少腹有滿痛桓按當視其前皮何部不利大便不利調胃承氣散小便不利四苓加木通或益元散利之則愈寒熱已解之便通利胸腹並滯而嘔不止而言之苔多汗心悸瘦倦者中氣傷也大半夏湯或六君子湯加白蔻屢經清下後急異常四肢漸冷者乃清下太過而中寒也理中湯甚至加附子然以為治薦非緩收之法也宜詳察之

欬

欬者疫邪犯肺也。有初起在表夾風邪於肺也。脈魚浮欬多。瘧沫必魚身大鳴自汗。泄
漸惡寒於透表諸方中加前胡桔梗蘿子杏仁淡豉有夾水于肺者不論表裏脈必兼緩欬多。
清痰通舌白心悸胸滿或嘔或呞。痰于表裏病中加桑皮半夏茯苓川貝附子有疫熱傳
裏燥火重。肺者脈必數。欬必多。疫有痰亦難出而咽痛于裏不病中加花粉黃芩川貝姜仁有
病內陰陽肺燥者脈必濡。欬必血力舌必赤而血苔。吳氏清燥養食紫柴湯加麥冬元參貝母知母
屢往汗下辛素陰虛腎氣上逆者。欬必甚。上氣鬱必時亦是。膝必清。痿脈必數。二味加枸杞五
味牛膝。疫邪薰欬者少而有之亦非大有關係之症。宜以病之表裏大勢為主。加治欬病李方治之。
渴乃熱象。時疫為熱症而有不渴者。蓋初起溼熱相迫為蒸氣。欬未勝溼則鬱。鬱心煩而不渴。
熱已太甚在裡而不左。因煩躁心熱而不渴在之下而不左。則躁結而不渴。互血分不在氣分。則
音沉而不渴。疫初呈太陰證者。胸腹滿嘔而不渴。此外遇有不渴者。矣。初起在表兼熱頭痛。舌白
而渴脈必不浮不沉而數。六神通解散加石膏葛根或九味羌活陽加石膏葛根半夏裏口苦咽
乾目脹而渴脈必數。小柴胡加葛根知母或亦加石膏或達原散加石膏葛根祁已入胃作渴身熱
自汗舌現黃苔或膚色或黑燥雪察其胸脇少腹按之無痛處而渴者為有熱無結脈必
洪宣白虎湯按之有痛處為有熱有結心下脈必滑大潤上尤甚小陷胸陽左脰上及當脰潤中
脈必滑大小承氣湯左脰下尺中脈必滑大調胃承氣陽心下至少腹俱痛寸闊尺必皆滑
大承氣陽痛在左脰不可按左闊脈必弦或濡或芤桃仁承氣陽痛在右脰不可按右闊

苦口

脈必弦或滑或遲十寒陽渴而小便不利少腹不可按尺脈必數四冷散猪苓湯三散汗下
以身熱不除而渴不止餘邪未尽也宜將前所用藥再作小劑以利之屢往汗下渴而舌干無苔
胸腹無滿痛心悸而煩脈虛細或浮散或濡亡陰也二味合生脉為主渴此煩躁同机而渴輕于
躁渴有喜飲而又有喜熱飲則為真寒假熱在時疫喜飲多者斑疹不喜飲熱在血分
真寒假熱百不一見也時疫初起以渴為機括渴甚則熱甚渴微則熱甚渴微則熱在末路尤以渴著
餘邪不渴為無餘邪也

熱邪在中工三焦則口苦非特時疫為然即感風寒亦屬少陽熱証如時疫當寒寒甚熱
表證正盛時一見口苦即于普表諸藥中倍加清熱之品輕則黃芩重則知母再重則石
膏肓不但三陽表證如此即三陰裏證手足冷惡寒嘔利胸腹滿不渴証狀似乎純冷無熱而
一進口苦即當溫燥药中加利之品如用半夏蒼朮草果厚朴必加木通芩澤甚至加知母
黃芩本是大民達原飲之口苦為熱証的據每遇証狀模糊寒熱莫辨必借此以決之至舌
苔黃黑乾燥煩躁熱渴閉結又清下之不可或緩者矣

口苦口甘同為熱証苦為燥熱在工中二焦多屬三陽甘為溼熱在中下二焦多屬三陰蓋
脾胃屬土稼穡作甘土邪下涉腎位水土相蒸甘味工溫才口多苦也人每誤認胃寒而
用溫中之劑不知溼熱在于下其土能剋水溫燥太過腎水苦竭雖不見熱渴諸証惟目不見
物漸至昏沈而死口甘一証在諸証初起犹可用溫燥潤道之品而亦不宜過剝在時疫寒清

熱為主消痰為輔或胞中停飲太盛亦不過加蒼朮生薑而已如二陳去甘草加羌活山梔姜汁炒黃連竹茹黃芩等類為口甘要药烏梅更妙後能勝甘草五倍制自然之理也或四苓加山楂亦得然必以時疫之大勢另用藥之權衡斯可矣

食燥者為陽明熱也時疫見此當辨其色深赤為大熱宜清下淺白為亡津液宜滋潤色如常為津液不流通在經脈宜葛根

瘧

時疫齒燥有三輕淡者為陽明經熱前板齒燥身熱目疼鼻乾不得卧此將發斑疹及衄血之先兆葛根為主黃芩知母石膏為輔重者為胃腑燥熱通口皆燥甚則黑乃燥炭三分氣三分石膏遇用至重者為陰火並熱亡血太甚腎水涸竭當峻補其陰知母黃柏生地元參天冬麦冬丹皮每味兩許大作湯液加童便全汁晝夜薰進若久約輕治緩則不及矣

瘧

時疫鼻孔乾有四凡熱則鼻鳴荆防葛根苦参為主陽明經熱則煩躁葛根石膏為主胃

腑熱証別大渴舌淡三黃石膏為主亡津液肺燥麥冬生地五味為主大抵風熱經熱者十之五六

府熱亡液者十之二三非謂熱深鼻孔反不乾也川頤溫大熱証見則不覺之矣

瘧

耳聾之陽邪熱挾痰上壅也時疫耳聾者多是邪之傳變出表入裏必干少陽時疫屬熱聲熱至上升挾痰涎濁氣上壅隧道故耳聾也治法以疫邪大熱為主見于初起傳表時子表病中加荆防川芎見于入裏時子裏中之药加桑白皮知母屢行汗下耳聾不愈不可空治坐食陰調胃為主須待泄食次常二便調自始由漸而愈也

鼻如

烟煤

時疫鼻如烟煤者邪熱燔肺也由鼻孔乾而來當急清下少緩則肺胃枯絕矣三承三氣合白馬或黃石膏加青黛或小陷胸加犀角或犀角大青青陽視其兼証擇而用之

鼻孔

鼻孔扇張有三疫迫于肺氣出入有高喘欬胸滿不渴宜小青葉貝母桑皮桔梗子鴻肺之風通自愈一營熱于肺氣出入多熱有微表末且一營熱古人獨主蟬陽葛根散其外東清其內撫熱也

咽乾

用于時疫中川葛根易麻黃或葛根芩連湯亦可一腎火乘虛而上逆氣出入皆微多死此証必得之屢經汗下或薦多汗心悸耳聾宜大創二味合生脉散加牛膝枸杞或可有救一二

咽痛

咽乾者邪熱浮於膈上也生僵寒另少陽熱証時疫亦然宜苦芩甚則佐以在升知母

時疫咽乾為熱浮于肺當視其咽中有結無結無結者微紅以桔梗花半黃芩半冬葵治之有結者結腫當加牛蒡亦可消其腫紅甚則趁紫花白芨是為乳蛾必以針刺出惡血再服清熱之药方得時疫中常有急喉汎急喉痺三陰証且晝夕死不可不察也急喉風咽痛而喘乃疾邪夾熱上壅于肺古方用肥丸以其痰涎惡血或皂角立膏吐之稍緩則氣閉而死急喉痺即乳蛾速長閉塞喉竇亦宜刺出惡血勿主甚則用刀大向膿血此雖見于時疫中

必其人平素食貪厚味多怒鬱肝火妄動有以致之云也

舌燥

否乃心苗腎火竊通其本脾脈絡其下時疫舌燥由大炎燥中宮堆截腎水不能上濟心火須察

其苔之有無些色之淺深施治白芍而燥疫邪立表疾已桔子腸工吳氏達原散加石膏川貝姜仁大畫此吳氏名白砂苔熱極不變黃色下之而黃不可復也黃苔而燥疫邪傳胃小承氣

少陽膽小柴胡選用柴色苔而燥疫邪入胃深及中下二焦調胃承氣湯裏苔而燥疫邪入胃至深傷及下焦大承氣湯陽燥成堤裂或生芒刺熱更甚也太少氣倍其分兩古黃消兩許方物各燥苔下之漸減不即盡淨為病已中病力未到耳當再下之有下至三五次十餘次而內愈者若屢下而燥苔愈長不可更下當察其腹中若按作响者疫水結于中焦脾胃受之困津液不能上潮改用平胃二陳湯燥之剝即愈又腎陰竭涸愈下愈亡其陰糧苔不回目無神耳聾心悸腰痠再下必死宜二味地黃湯合生脈散主此苔而燥須辨其色正赤或深紫熱歸心色血分熱深石膏知母黃連犀角羚羊牛黃為主鮮紅元陰二冬生地玄參知母阿膠人參為主大棗無苔則四目無物可潤不可攻

舌附舌短

強 瘦 時疫舌本强硬为熱而並疫宜清下通疑須加清涼之藥黃白苔者膈间未逕前人教其疾尚溼佐以生薑大柴胡湯是也黑黃苔者已逕並甚且二疫漸燥佑以川貝桔梗湯是也黑黑苔者熱極瘦亦为火候以牛黃六方效矣黑苔舌色正赤深紫裂燥强者熱毒藪于心色也三黃石膏湯加摩角牛黃三黃其熱於舌強雖與舌燥相類而燥屬胃主熱強屬心主疫又舌痿軟而枯少無苔強硬而不縮有昇乃虛脫已極大補及滋潤或百救一二若屢吐汗下清熱消疫而舌强者當此舌瘦因治時疫之舌一見黃苔便當下失下則由黃而變暗舌色變燥變黑度生芒刺一旦失下則變卷度短為下證至急之際惟大下屢下分和後則不救矣

舌短

胸膈滿痛

時疫胸滿而不痛者為邪未結為虛形之氣稀薄之疫痛而不滿者為病在經絡有寒有實有寒寒相兼滿而痛者為邪已結為實形之氣者按之不痛時疫初起邪

脇滿痛

在腹原多有此证宜達原飲加桔梗木香及大腹皮以同諸之屬稀薄之痰者時疫二三日邪在少表本裏多有此证宜達原飲加半夏茱萸附子或小柴胡湯加茱萸附子病在經絡痛而不滿者初起屬寒于解表药中加元胡烏藥舒其經絡之氣血病久屢汗下多虛于養氣盡之药中僵当歸更有表中夾实者于解表清裏之药中加乳香沒藥最妙酒而痛平可按邪已祛失之疾者牽引寒痛並吐小陷胸去附子方合用甚則大陷胸陽去陷胸尤食指者硬痛成塊不可按多在心下宜平胃散加半夏三錢子前白芍五两有互膈工者乃危证當吐之宜西善而散此二者不可便下須待其轉動方可下之並結在不焦屬氣分下之太息別氣逆呴吐外用按揉之法乃行血者不可按之軟瓶丸酒註宜於解表清裏之药中加桃仁紅花三七川芎甚則挑仁爭氣陽時疫多寒多熱至胞膈滿又屬寒邪非寒證惟是僵症攻下胸痛更甚者乃脾腎兩寒下氣工遂宜溫理脾胃以建中鎮安之甚則導火丸納氣歸腎皆可取不多見須消自愈切不可輕試

脇滿痛

脇滿漏泄脇滿痛同而微有不同者脇滿痛有宿食为病脇滿痛無之乃亦有因宿食而脇滿而不痛及脇者時疫脇滿痛乃疫氣血三者为病其中亦有滿而不痛而不滿之痛並作之分其滿而不痛者膜原之邪未逕傳變宜達原飲加寒熱往來者大柴胡湯痛而不滿者邪分布于少陽逕宣小柴胡湯滿痛並作者有分左右在屬血小柴胡湯去人參加延胡細紅花桃仁甚著加莪朶三棱三七靈脂右屬瘀此氣太柴胡湯去人參加桂枝芍藥甘草甘草大戟

先在氣加青皮茱萸子木香土腹皮瘧與氣痛皆並常所而不聚散。聚散因有所苦氣散則
與所苦若屬經汗下清利而腹痛更甚者寒证也氣走必呕利者氣為主血走必胡熱至高血
為主此亦子中一二腸痛些胸腹痛不同胸腹壁之衝擣塞不能久勝則譬之僻巷宜塞則難開用
薦湏明此意時疫肠痛雖有瘧氣血之殊無不離乎熱且與今是為主药名別有熱证者
若連山枝又所必需他病肠痛有寒有熱不在此例

腹滿痛

時疫腹滿痛屬宿食為邪熱大所結者十之七八屬氣迎疾水者十之二三當以腹為胃此不腸
之正界非胸膈小腹之地可比腹滿而不痛者屬邪在氣分屬水穀散漫而未燥結氣分脛多
沉或弦水穀脾消氣分通腹皆滿水穀滿有分界氣分虛朴太腹皮青皮陳皮枳殼為主水穀
者半自心查麦芽茱萸子於寒神麌為主時疫為熱证腹滿亦當清熱大益以順氣消食可也
唇舌多黃苔雖滿而不痛為邪已傳胃宜少厚氣陽下之痛而不痛者屬邪在血分屬水穀燥
結他病或有屬冷者時疫探屬熱证痛不可按而不硬癟者王清裏方中加赤芍不可按而
有硬癟者調胃承氣湯滿痛兼作為痞滿在氣經寒在血大寒大熱之证大承氣湯諸病腹
滿痛或並自利當青之寒冷時疫自利屬熱大寒方疏下之則止不可疑為寒冷若滿痛而苔燥溫
或惡寒手足冷清利之益甚其或右閨遲繫此非本病或煩渴飲冷太過或因清涼太過太平之所
致又當溫燥為主不可熱矣然此亦治殊弊非治本病也

少腹滿痛

時疫少腹滿痛為邪熱結于下焦下焦乃太陽膀胱及厥陰分界此中焦并亦有滿而不痛之

而不滿之痛並作不拘初起滿而不痛者溼勝氣肺也橘石枳朴為安者药痛而不滿者不可近熱傷屬陰血分也黃芩以清熱赤芍归尾以活血生明以升屬陰之氣著牽引陰陽及兩膀胱道者加秦艽即愈滿痛並作者不論初起未得宣視其而汗在前少水不初去水也四苓猪苓通元至子方選用左以大便不和有燥屎也三承氣擇同小便利渴大便色黑共為血也抵當陽桃仁承氣選用以大便之通寒為辨固矣然亦當細察其以滿痛而有硬塊不可按其屬燥矢滿痛如鼓不可按而却贅塊其屬濁畜脾中滿痛拒按而更其屬畜血此辨之了然夫外有時疫走路痛而不痛者當溫者按其為寒证當細詢串路若屢涉清下太過者消渴溫補以培養陰陽不可執時疫为寒邪熱证而不變通也然此亦十中一見耳

右滿痛諸證乃得疫裏心之大端治屬熱邪內陷車延賓著溼諸

門則寒熱虛實俱有至時疫已往傳疫見於頤潤熱燥既顯之以其為熱证

易辨若見於未行傳疫三先乃疫毒無形而未發多不渴多不營甚甚有手足反厭冷者依風寒法則亦溫行疫邪治則清宜王叔和千里尺掌之厄

也

扶氣神脈者若五者觀察而詳辨之則庶乎

自利

時疫自利皆熱証也。其所利之物其內裏而冷者自利冷利之色淡白，熱利之色正赤甚有深黃。醫色者冷利稀薄熱利稠黏甚冷利散而不自大熱利真而多沫寒利冷利出熱利努圓冷利緩熱利暴注下迫而裏急此辨時疫熱利此冷之大概也。時疫初起有三足厥冷惡寒甚腹痛自利牛有似太陰寒證辨其為疫只生口中穢氣作舌苔白苔相半小便黃神情煩躁即可知其非寒牛太陰是時疫也于太陰也煩躁轉加著舌正氣散煩躁甚即用達原飲一二服以見三陽熱証矣此時若用溫中之藥轉見四肢逆冷手足青紫而死不可不細察也。時疫初起頭痛發熱而自利九味羌活湯博度及太陽少陽合病身熱口苦咽乾目眩而自利此黃芩湯並加半夏厚朴裏舌黃深妄而自利其按直心下至少腹有硬痛處些大承氣湯苦硬痛處小小氣小陷胸大柴胡選用此在下其熱不必以清故雖发硬痛亦主大黃時疫有利而小便不利腹滿而與便塊時作腸明鳴者熱在小腸膀胱而畜水也而谷散猪苓湯益元散選用時疫自利受補者少至屡安輕清下泄表裏表证自利漸至清穀而腹微細止則六君子湯補中益氣湯理中湯又當酌用。

時疫便血熱邪深入也先当辨其血色鮮紅者清熱为主黃芩三黃石斛湯犀角地黃湯血色紫黯或泥下者逐瘀而主桃仁承氣湯按腹脇有痛處同之治確時疫便血散瘀夾膿水涎水者脾胃衰而藏府傷也归脾補中八珍可借用並加烏梅時疫便血之效多亡陰泄神昏

便血

真諱舌頭苔而燥身痛不可轉側之類皆是生肺六味加阿膠峻補其陰泄多不救也

35

便 腫

時疫便膿血此便血有燥溼三分便血屬燥熱涼血為主佐以分利時疫和起頭痛兼熱便膿即古所謂疫利是也不必治膿血但解其表解則便數自減決不可單施清裏攻下之药即分利清凉亦所當慎蓋邪方在表清裏邪必內陷深入於極難治且時疫一見便膿血則

煩渴之熱勢反淺虛熱隨利減也所以舌寒之證不可浪用惟以倉廩陽為主詳見夾癥條下時疫傳變至半表半裏便膿血者此葛解肌湯加芩澤木通黃芩時疫傳變入裏煩渴譏妄惡臭而便膿血者黃芩湯葛根芩連湯選用兼裏急緩重腹中拒按者加枳榔大黃時疫屢經攻下而便膿血

清利者當以養中調氣養血為主清利為佐

大 便

時疫屬燥熱方便潤者少間有潤者乃平素胃陽強盛多燥氣也夫本末陽盛俱受時疫則溼熱皆變為燥熱雖兼表征未得汗可下以時疫其傷寒不同傷寒邪從表入有表征未

得汗必不可攻裏時疫邪從內發雖有表征每一發表而不得汗必待裏氣通而後始得汗以時疫此傷寒不同所以時疫大便一閉即有表征亦當下之不可逡巡也若不越未往未散則當用三消飲用之尚有未証尚可下則煩渴譏妄舌苔黃黑燥裂卷短胞脹硬痛諸証備見更當分別輕重下之無疑又有大便閉而屢下不通者則必有寒邪當審之有寒水者水在腸中則不下而自利水在胃脘以上則脾多殘弱復往之工嘔而不利且舌白而心下按之作响雖用承氣不能下行故下之不過先用半夏旋覆荳朮消其水而以下之亦有可用大陷胸湯者必胸上痛而手

不可近者為病其邪敵有夾氣者氣滯于胸膈之間主上逆而不下降胸腹中痛而脹況當先
以芒硝甘草小服子小香榧榔腹甚氣而以下之有氣壅而壅下不通者屬老人寒人其脈必薰
並力其色必悴其肌肉必緩其神必散若下證全具當川人參加大承氣一服而宿垢頓下或陶氏
黃龍湯或麻仁丸參湯下之酌其量不泄之多寡用之有血虛而壅下不通者屬婦人產後癰疽
潰敗或平素陰虛亡血其脈必虛濡而物六味生脉或吳氏諸養榮陽及麻仁丸選用仍須蜜煎導
豬胆汁道之大凡時疫太便一聞即當下者亦須詢其有無所苦若無所苦下尚可緩有所苦而下不通
又須察有無表邪及裏也當下者十之五可緩者十之三表邪者十之一且時疫如此他病則不然古
語云傷寒下不厭遲時疫下不厭早誠哉是言也

小便不利

時疫初熱在表時頭痛背熱小便不利者熱入膀胱也並元散主之四茶散猪苓湯皆可用東垣云疫
不利而不渴者熱在下焦法當苦寒此可為據時疫傳裏大便閉而小便不利者當先通大便大便通
小便自利此惟時疫為然他病則否時疫屢汗下小便不利者陰竭也為難治知母量相生地黃
冬之類治之或生脉六味皆可然多至少腹如鼓而不散也凡小便不利日久下閉不通必反於上往有
啞吐呃逆涓滴不能下咽至陽藥不進者當用敷膜法大田螺一粒搗爛入麝香三厘敷膜上帛束
之即通一見點滴即受陽藥古法有周蕙尉古及井底泥敷方腹者俱可奏開但不宜於陰竭之寒人且
時疫未傳疫時小便多如常熱邪傳入裏則黃熱甚則赤熱入血分畜血則黑小便可驗裏裏熱
黃赤黑之有過深淺多寡等但不可以作寒證疫邪在表小便黃即於解表中加清涼药邪入裏小便赤亦

小便

雖手足逆冷亦當攻裏逐熱。疫邪已退，表裏俱和，小便自利，未退仍當清利餘邪。惟小便多者，當逐瘀清熱，为主。犀角地黃湯加大黃等類，有屢經汗下，清涼太過，表裏俱無熱邪，而滑潤腹痛，小便黃赤者，當理脾升陽為主，亦治。若非治病也。

小便多

時疫為溼熱，小便多者甚少。傳裏之後，或有小便多者，乃因土變為燥熱也。急下之，屢往復，多者，氣虛也。並三氣，廿陽為主，亦有腎虛而小便多者六味地黃湯加五味子大棗，未下之先，小便多者屬燥熱，小便必微黃，必煩熱渴而喜飲，既下之後，小便多者屬氣虛，則喜飲而少，肺不及，尺濶不及，沉陰虛則喜飲，而尺脈不及，尺濶不及，浮失治日久，則度消渴，時疫小便多者，如此。若大風寒，小便多，則屬陽虛，不在此例。

時疫初起，遺尿者多屬三陽，合病三陽，邪入於陽，則陽害而陰害，故於表裏不为之不宁，又神昏於工，不自知其下部之出入，故遺尿也。合之，腹滿身重，口不仁，面垢，讖語仲景獨主白虎湯此证不可下，以邪全盛，在表，在裡下之，則表邪尚陷，故額工生汗，半逆冷尤不可汗，以邪本屬熱，汗之則愈增其熱，故心憤。譏語惟以白虎湯清其浮越之熱，若別兼燥結，鞭痛者，可於本方加大黃二錢下之。

時疫，表裏皆熱，於厥陰也有結，有熱，則下有熱，無結，則清熱退而表裏自從矣。陰證，表裏俱時疫，頗相類似。陰證，表裏俱熱，心身冷，厥逆，脈沉也。然一寒一熱，自有不同。陰證，表裏俱陰，苦寒，表裏俱熱，則清少，腹牽引作痛而不滿，喜溫，按多自利，神清不煩，時疫，表裏俱熱，小便清少，腹牽引作痛而不滿，喜溫，按多自利，神清不煩。時疫，表裏俱寒，陰證辨之。

遺尿

表裏俱

小便多

小便少

多言譖語

少腹滿而硬痛拒按大便秘煩而神昏。時疫多言者謾語之漸也。疫熱蒸心之所致治同謾語。謾語熱蒸心也。時疫一見謾語即當清熱。並有經熱蒸心而謾語者邪在三陽。主之証多有之脈浮大頭痛畏熱。否。白者是火。火三消飲最当。六神通解散。九味羌活湯。防風通聖散。白虎陽枳子豉皆可選用。有腸熱蒸心而謾語者脈洪身熱汗出不惡寒反惡熱。心中無結者是白虎陽黃芩陽選用有痰涎搏結其熱聚于中上二焦而謾語者脈弦滑胸痛及心下痛拒按者是小陷胸湯。大柴胡湯選用有胃熱。大熱心而謾語者脈滑實大舌黃及黑及燥及芒刺腹滿拒按者是三承氣湯。陽選用輕者只用平胃散加山楂。生半夏。薤白。葛根子即效。有熱入血分而畜血之熱蒸心而謾語者脈沉弦或濁心下至少腹凡有痛處拒按而軟者是摩角地黃湯桃仁承氣湯。抵當湯選用有熱入小腸膀胱畜水之熱。蒸心而謾語者脈浮數少腹滿小便不利者是四苓湯。猪苓湯益元散選用以上皆宜証謾語也。至若屢經汗下清裡二便已清利。胞腹逆阻滯六腑。毫散結代微弱而謾語者陰陽兩虛神無所附也。裏在上焦必心悸神倦。生脈散加枣仁天王補心丹。表在中焦必面色癟黃四肢倦怠。归脾湯。表在下焦必耳聾目直視。玄珠地黃湯加遠志五味龍骨茯神。

時疫發狂者謾語之甚者也亦疫熱蒸心之所致治同謾語

時疫喜忘者畜血之所致也。畜血在上焦其脉芤。胸前及心下痛必拒按而軟。虛火同地黃湯主之。蓄血在中焦其脉或芤或弦或濡而腸及脇上必有痛處拒按而軟。桃仁承氣湯主之。蓄血在下焦

沉昏

其脉多沉結臍下必有痼處拒按而軟抵當陽主之善志雖為畜血主証然必驗之本便
屎雖鞭大使反易其色心黑而小便自利方為畜血之証否則仍当本之多言譏狂諸法治之
時復昏沉熱入至深極瘈証也虽熱初薰及心經則心神不安多夢呓語時自清薰心之經漸
深則心神漸煩多言所言皆日用常行之事並糊塗語薰及心色則精神間有昏處多言
間有糊塗語迨薰及心色漸深則心神昏處居多妄見妄聞甚至疑鬼疑神非人所見
猶省人語也至熱直入心臟則沉昏全不省人事若此熱入淺深之次第見証之輕重為辨也所
以多言譏語熱之浮津其枝苓知膏可解若經熱之深積其硝黃可解至沉昏日熱之主深故
非犀角羚角黃連牛黃六首不能解也此沉雖深熱深更有夾痰氣火胃結夾血結三分
胸滿多口係夾痰氣當加川貝括萎半夏萊菔子水犀連諸藥中古黃及燥黑之腹
滿硬痛并加犀連於三承氣陽中痛而不軟水羸血加桃仁丹皮赤芍於犀連諸藥中治昏沉
之大法備矣以昏嘔失証更有毒證亦可細察若屡汗下清利之後表裏不無熱胸腹無阻
二便自利而神情尚倦而漸昏由昏而漸沉乃太虛之危証大劑生脈散加桂附茱萸芍葛
救其陰陽恐亦不遠矣考於未沉之先求之

循衣摸

時疫循衣摸床撮空手熱盛神昏而四肢冷也當察其舌苔白或無苔有熱無結也犀
牀撮空角黃連石膏為主否有燥苔或甚黑燥烈衣芒刺有熱有結也大黃芩硝为主兼汗下
後脚脇仍有拒痛者邪未尽也仍宜清利並拒痛者陰寒而陽亢也生地黃芩冬至仲冬伏神

安神为主

睡多

時疫初起多睡兼身重者熱邪阻滯其經絡肺也有汗而表陽無汗或加麻黃屢經汗下後表裏熱愈甚二便俱利而身不痛多睡者陰傷也四物六味生脈三分合用大劑養陰方效失治即危脈此數劑身痛已和表裏熱退而仍多睡者於三方中加生麥仁而愈若夫平素喜睡多睡多深嗜卧者一受疫邪必更嗜卧當於時疫藥中參之以理脾消痰之品

身冷

諸病身冷皆屬陰證在時疫多屬熱證須隨色氣神脈舌苔中辨其端倪果得時疫則當分初中末三治之不可紊也時疫初起往往有身冷自利腹痛作嘔全似陰證者舌苔有厚白苔身有穢氣心煩多汗面白色油培小便黃短數有一三証見便是疫邪直入太陰先裏後表非真陰寒之証連輕利塞者正氣因發散無溫利達原飲服一二劑後即昔熱矣時疫傳變營熱之後議要昏沉舌燥腹滿便秘而身冷者先表後裏証有三承氣大柴胡選用與結証者白虎湯時疫未終屢經汗下表裏並邪胞胎無滯二便自和而身冷者當以肺為主肺寒邪不除者用藥太過而成既証也多宜溫補少緩即犯生肺散加苓朴苡芍平補陰陽冷甚者加熟附子時疫一證日服雖下于初起時若寒熱不辨且勿妄投陽劑當少待之多則一二日少則半日多有自行轉變即發熱煩渴者此時則易於用藥若已往營熱傳變之後變為身冷則自有口燥舌乾不得卧諸証在此時之药不可缓時疫呃逆其傷寒不因陽寒呃逆者莫要寒熱俱有時疫呃逆惟熟附子初起時若

呃逆

法汗吐衄

下之下之不止按其脇腹有癰痛拒按處仍當下之有下至十數次方止者總之遂尽桔梗熱腸胃通達其
呃自止慎不可用丁香柿蒂治呃遺瘉致危也

傷寒以衄多寒熱錯雜時疫法衄則有熱無寒此証之當汗當清當下一以傳變之大勢
為主惟加烏梅黃連以安之慎勿因烏梅員中諸辛熱藥致成危篤也

時疫貴解其邪熱而邪熱必有苦自落方善自落至肌表時非汗則邪逸出路故汗法為治
時疫一大法也但凡寒汗不厭早時疫汗不厭遲沉寒微汗必忌三溫三熱以宣陽時疫發
汗必重辛涼至于寒甚以散陰以寒散汗治表不犯裏時疫發汗必忌三溫三熱以宣陽時疫發
汗必發邪傳疫出表時輕者亦可得表药而汗散重者雖大劑麻黃羌葛亦無汗也以伏邪
尚而未尽之故亦有不用表药而自汗淋漓邪終不解者蓋自汗濕裏熱鬱滯遂而出乃邪汗
非正汗也必待伏邪辰晝未盡全撤然後或戰汗或狂汗而解所謂汗不厭遲者此也至辨證
汗則人參敗毒散荆防敗毒散之類是主之寒症汗則大青龍九味羌活大羌活之類是表裏兼
通裏荆吳氏三消散六神通解散防風通聖散之類是更有不求汗而自汗解者如裏熱渴甚
用大承气汤以逼其裏一不已而再一再不已而三直待裏邪遂尽表裏自和又有戰汗而解以不
求汗而自汗解者一又如寒熱燥甚病者患得涼水久而不得忍得煩飲飲盡落枕而汗大出汗止
即解此不求汗而自汗解者二又如半表半里寒甚用汗药不得汗後加入參附諸解表药中
覆杯立汗此不求汗而自汗解者三又如陰虛及奪血枯竭之極用表药全然無汗用大滋陰潤

法下

當在乎升表而在乎通其鬱

燥生津液數劑而汗如水此不求汗而自汗解者四德之疫邪汗法不及奮火而枯竭之極用表药
潤和其陰陽鬱鬱在表辛涼辛寒以通之鬱鬱在裏苦寒攻利以適之陽亢者飲水以濟其
陰之竭者滋潤以回其燥氣滯者開通于西凝者消瘀必察其寒熱寒無一毫之滯滯乃汗法之萬全
此時疫汗法理不同於風寒謹撮諸汗詳列於左發熱惡寒頭項痛背痛腰痛肩背痛

脇脛痛周身肢節痛

時疫下法此屬寒不因傷寒下不厭遲時疫下不厭早屬寒在下其燥結時疫在下其鬱熱
傷寒在裏證言下必待裏寒証全罷時疫不論表邪罷共不罷但其裏寒未盡有邪不可
下必待結在中下二焦方可下時疫工焦有邪亦可下若必待結至中下二焦始下則有下之不通而免
者傷寒一下即已仲景承氣諸方多不過三劑時疫用下藥至少三劑多則有一二十劑者時
疫下法有六結邪在胸上見母下之母本非下药用至兩許即解結邪在胸及心下小陷胸下之
結邪在胸膈連心下太陽胡陽下之結邪在膈上小承氣湯下之結邪在膈下及少腹調胃承
氣湯下之痞滿燥實三焦俱結大承氣湯下之外又有本胃素虛或走人火病或屢汗屢
下後下證雖具不住峻攻者則麻仁丸蜜煎導法猪胆道子法為妙下法之輕重緩急以見証为主
詳列於下急下證舌乾舌卷舌短舌生芒刺舌黑齒燥自疊如烟煤沉昏胸腹悶痛
痛狂發熱汗多身冷呃逆以上俱當急下當下證舌黃譏語善忘多言
協熱利頭脹痛煩躁以工俱屬當下緩下證舌淡黃苔微渴大便閉小便黃赤

清法

潮熱 茄燥 以工俱屬緩下

見緩下諸證不下者則必漸重而為當下證見急下諸證失下者則雖下之多不通而致結熱自下逆上張滿直至心下又逆上透過膈膜有生胸滿如石咽喉鑊响目直視反白或睛盲腫散耳聾耳九竅不通雖有神丹莫之能救矣外更有畜血畜水諸下法前已散見諸條亦可詳列以便繙閱畜水證 小便不利 大便微利 畜血證 小便諸自利 大便黑 他若畜水畜血在胸膈不當下者此不贅

時疫為熱證未有不當清者也其在表宜汗使熱從汗洩下法亦清法也若在表已得汗而熱不退在裏已下而熱不解或本來有熱與結則惟以寒涼直折以清其熱而已故清法可濟汗下之不逮三者之用可合而並可分時疫當清者十之六七則清法不可不細講也凡清熱之要在視熱邪之淺深者熱之淺者在營衛以石膏苗芩為主藥胡葛根為輔熱之深者在胸膈辰粉知母姜半夏子豆豉為主熱在腸胃者當下法不用清法或下而無清亦可熱入心色者黃連犀角羚羊角為主熱直入心臟則難救矣用牛黃猶可十中救一須用至錢許少則無濟非若小兒諸方驚風每用分許即可有效當清諸證詳列于左 热在營衛證身熱汗自出 不惡寒反惡熱 身重 頭面項脰腫 周身紅腫 斑疹 單孔乾讞語 多言 脣前紅腫 舌苔厚白 热在胸膈證 身熱反減 溲少 咽乾舌苔燥 煩躁 遺尿 吐苔白 热在腸胃證 便血 便膿血 餘悉見下證條中

和法

熱在心色及心證 狂沉浮多睡 吞黑

寒熱並用之謂和補濁合劑之謂和平其亢厲之謂和所謂寒熱並用者因時疫之熱夾有他邪之寒故用此法以和之凡方中有黃連與生薑同用黃芩與生薑同用石膏與蒼朮同用知母與草朮同用者皆是所謂補濁合用者因時疫之邪氣宜人之正氣互處故用此法以和之凡方中有參耆歸芍共硝黃枳朴同用者是所謂表裏雙解者因疫邪既有表證復有裏證故用此法以和之凡方中麻葛羌防柴前桂硝黃桔芩荳澤枳朴合用者是所謂平其亢厲者因時疫之大勢已去而餘邪未解故用此法以和之茲用下法而少其劑料復其時日或用清法而變其陽劑易為丸散者皆是凡此和法雖名為和平寓有汗下清補之意疫邪尤有宜和者凡熱不清用清涼藥不效即當察其熱之所附麗呈四無所附麗之熱為寒而無形之氣如感夏炎蒸遇汎雨即解故人身之熱氣清即退有所附麗之熱為寒而有物如烘爐紫炭雖沃以水猶有沸騰之憂必撤去此炭而熱始退凡熱之所約效始能復以和治之精微神變者也宜和之証詳列於下 寒熱往來 盆汗 口苦 咽乾 脘脛舌燥渴 胃脹滿 且難耳 小便黃 嘔吐下利而口下痛 口乾 口燥而惡寒 大小便閉而寒熱痞滿而悸 二便自利而舌苔 癥體瘦損而舌苔 凡此俱重小憲寒熱相兼者不可枚舉引此數端可以類推惟其有和平而實非和証者詳後辨似條

補法

四損

時疫本不當補而有屢經汗下清解不退者必待補而後愈此為病初所傷當消其所傷在陰在陽以施補法疫邪易熱証傷陰者多然亦有用藥太過而傷陽者則補陰補陽又當酌其輕重不可偏廢凡屢經汗清利而項熱加甚者當補陰以劑陽所謂寒之不寒責其無水者是六味四物生脈養胃榮諸方酌用屢經汗下清利熱退而皆僵瘓利不止者當補陽所謂養正以却邪者是四君黑功生脉六君子理中附子等方酌用詳記後

當補陰證 吾里無苔 耳聾耳 目直視 目不明 脈清涼 藥渴不止 服清涼藥煩熱加甚 服攻下藥舌苔愈長 脈攻下藥舌苔生刺翹裂愈甚 脈清涼藥身熱愈甚 身體枯瘦 用利水藥小便愈不通 腸脛癱軟 周身骨節痛不可移動 夢睡

當補陽證 多冷汗 汗出身冷經日不回 小便清而多 大便清利數 暖之清用熟圓道生藥愈甚 自利用清下藥愈甚 痘滿 外此更有損四不足三復証當補詳見後

大勞大慾大二炳久病後有四損氣血兩虛陰陽並竭復受疫邪正毒則邪入食澤邪深則傳化難出汗下傷正而止脫補助營衛邪而邪銅多不可治此補傷兼施洞有愈者有補潤合用之法也先用補劑後施汗下先補後潤之法也先用汗下後施補劑先潤後補之法也當調病之末路斟酌施治尤宜審現在之證若純見寒症亦不可以疑似之見怪人太凡周身但見舌苔大熱三伏而一二處微見生象則吃緊斡旋其寒此治病之權衡也若夫汗之而表寒其裏必周身俱見表象而一二處獨見寒症則吃緊斡旋其寒此治病之權衡也若夫汗之而表寒

四不足

人愈增如頭痛身痛更甚之類也清下而裏証愈增如煩渴痞滿更甚之類則本虛有感候也急宜補之無犯既辨其証尤當細辨其脈凡遇脾之邪寒之浮兆傷盛大者須謹察其沉正虛之微候有無力虛處六部脈皆虛者須察其一部有獨無力虛處果得其一部一候之真無力便可畧其諸部諸候之假有餘從而施治有獨見若神之妙夫既詢得其來路之大概又舉得其輕重之確憑算加之脈理精詳則獨照無遺矣其損証之狀甚多當參後四不足條看

四損由人事四不足由天而生四損在暫時四不足在平素然四不足亦有由四損而來者不可以四損之外便無四不足者氣血陰陽也氣不足者少氣不足以息語言難出也感邪雖重反不成脹滿痞塞凡遇此証縱宣宣伐必以養正氣為主血不足者面色瘦黃舌口刮白也感邪雖重面目反無陽色縱宜攻利必以養血為主陽不足者或四肢厥逆或肌體惡寒恒多泄者須至夜甚甚或口鼻寒冷氣逆邪雖重反無營熱恣刺燥渴凡遇此罕不泄縱欲攻利清熱必先以溫補待其盡回嘯証全見然後以治寒之法治之陰不足者自泄五液枯乾肌膚中錯感知邪雖重應汗無汗應厥不厥遇此等子証惟其攻利必先之以養陰待其氣化津液多不滯自退設有未退酌用清利攻利若早其病甚甚以上四不足合前條四損總不可正治其邪必以養正為要先服養正藥待其安證悉見方可攻邪若服攻邪藥未證復見仍當調補其養正以和邪祛邪以安正互相加減迭為進退直待邪尽去而正不傷方為喜治

三復者勞復食復自復也勞復者大病後因勞碌而復也不必大費氣力即梳洗沐浴亦能致復

辨

復則復熱諸証復起惟脈不沉實為辨者靜養食自愈重者必大補以調其營衛和其腑府待其表裏勻和方愈復用攻下清涼必致不散安神養血陽主之若因飯食過多而復者若苔必復黃軒則損穀自愈重則消遺等始愈若無故自復者乃伏邪未尽也當問從前所見何証服何药而解今仍用前药以滌其餘邪則愈時復復証有復至再三者屢復之後必兼四損四不足証宜奉前條加減進退之法治之

凡病皆以寒實寒熱四字為大綱時復何獨不然但寒實寒熱之真者易辨似者難辨前所列體度表裏諸証皆寒邪熱而實熱中亦有寒實四損四不足皆寒邪寒邪而寒實亦有寒熱合於逐條下已細辨之矣然有寒証似寒之証似寒熱証似寒之証似熱尤不可不細辨故復通論而詳述之所謂寒証似寒者即以表証論之頭痛背熱邪在表也其六腑濁證無汗而反自汗脉無力用當表药而身反疼痛則似寒矣故人惑於多自汗而誤用桂枝湯有之惑於脈無力而引仲景太陽篇背熱惡寒脈微弱為無陽而誤用建中湯者有之惑於身疼痛而引仲景是若不復身體疼痛當溫其裏誤用四逆湯者有之不知此等之証在時疫中皆在表寒似寒之証者也其自汗者腹熱自裏蒸出於表非不寒也其胸熱者熱主散漫散漫則脉軟非比其主收斂其脉硬也身體反疼痛者伏邪自裏而漸出於表非比陽氣不往昔表也此表証之寒証似寒者也又以半表半裏論之寒熱往来胸腹滿和在半表半裏也其脉当弦其口当渴而有脉反沉口不渴者則似寒矣故人惑於脉沉而以胸腹滿為太陰口不渴為內寒而誤用理中者有之不知此証在時疫中皆在表寒裏熱証之似

寒者也其脉沉者邪伏在膜原而未出表故脉不浮非陽寒也其不渴者邪未傳變未入胃府故不能消水非內寒也此半表半裏之似寒者也又以裏証論之曰燥固不得卧邪在裏也其脉當滑其身當熱其便當結按滑當作洪注云消者陰氣有餘也主疫飲宿食此逆諸証洪為氣血燔灼之作主煩主咽乾不復得熟之便濁傷寒陽明經病而脈反沉微弱濡身反四逆厥冷大便自利則全似寒人感於脈之沉微弱濡而用參耆者有之感於厥逆而用桂附者有之意求自利而用參木乾差者有之不知此等証在時疫皆重熱之似寒也之裏宮之似寒也其脉沉微弱濡者乃邪熱結桂附者氣不達於營衛也其身反厥冷者邪熱結於裏結於下氣不達於外通於上也其首利者乃熱結旁流也此裏寒之寒証似寒熱証似寒也總之時疫為熱因寒而寒之寒因太裏故脈証雖有似寒而寒之時而一辨其為時疫則屬邪自外至邪氣盛則寒大都反見寒寒假象明眼人不当为所惑也所謂寒証似寒者即以表證論之頭痛嘔熱身疼痛自汗脈浮大邪在表也而屡用表散清涼藥不惟不減其証轉甚者非藥力之不到乃正氣不能傳药力達表陰液不能隨湯氣作汗也此邪在半表時寒証之似寒者也氣寒者加參芪於表药即汗除寒者加潤劑於表之药即汗若不知其氣血兩寒而宣土不已勢必暴厥而成脫証矣更以半表半裏論三胞脹痛耳聾耳聰如瘡狀脈弦邪在半表半裏也而屡用和解消道子之药不惟不減其証更加者非药力之不到乃中焦脾胃傷而氣不運肝木傷而大燥逆也此疫邪在半表半裏時寒証之似寒也必令四層六層於和解药中合四物於清解药中始能戰汗而解若更消道子清解不已必至胃氣絕而死更以裏証論之舌苔黃黑

遺證

屬病後
不表裏

梨煙芒刺胸腹脇肺硬痛大少便閉六腑數大邪互裏也而屢用攻利或熱不除利或羽後更甚非藥力之峻乃正氣不能轉送腸胃血液不能滋潤腸胃也氣虛者助氣以資傳送血枯者養陰以藉濡滑氣行津化之方得通利此疫邪傳裏時寒征之似實者也若不知其虛竭而恣意攻利必尅沉痼頓而死總之药不中病則傷正氣傷其下則正浮越而上遂傷其中則正解散而外張脈難有似熱似寒之時而一詢其來路若治之太過則萬氣從內奪正氣奪則寒明眼人不當為所惑也夫一证而寒實至異用药稍誤而生死攸分悔何以為辨证之把柄乎曰以閱卷所列神脈氣色舌苔辨其是疫其非疫以曾無誤治辨其時疫之為寒為暑則得其大綱更細玩前所列各证條分缕晰之援詳則得其細目則似是而非之证断不至惑矣全於前各條下每证之細辨其虛寒而此復重言而通論之者正以前散見於諸條恐讀者畧過故復復論以提撕其考証繫處也至若寒证似熱則傷寒諸证有之時疫無故不論及云

(膿瘍)

時疫大勢已平寒熱已解而面目肢體浮腫有食滯中停口水上停心下氣復未歸三種當分別以施治食滯中宮者乃病後脾胃大虛不能消穀病者胃中枯燥偏散多含食停心下臍工則水不能輸於肺腑亦不能通調水道下輸膀胱故溢於肢體而為浮腫其症以下臍工有硬處按之則痛為異小便不利或不利當用平胃散加枳壳山楂麥芽柴胡服子青皮神曲若主硬處消則腫自愈心或加芩澤魚柳水亦可水停心下者乃脾虛不能消水也其食滯而心腹無硬痛小便不利也同芩澤車前木通之類利其小便而愈氣復未歸者此又可所謂病後氣復未復氣無歸

故作腫也。不可治腫，調宜飲食，而其勞復靜養，自愈其異於水停食滯也。水停身重，小便不利，氣腫身輕，小便自利，食滯腹中有結氣，腫腹中自和也。

時疫愈後有背頭者，乃餘熱留於督脈也。治以解毒清熱，活血疏散為主。暑則成膿，不出而牙閼不開，咽喉不利，多不能食，而項下及兩側，亦可見。此可輕故宜早治也。古方以普濟消毒飲為主，而在百後以柴胡川芎為君，在項後或山顛頂加葛根，此尤不可輕補於未潰之先，補早必成膿尤不可。狀用寒涼，於將發之際，恐閉遏而毒不得發，故必薰疎散為要，外治以薑水、時之浴之。

時疫後，後其瘡者極多，餘熱滯於肌肉也。多服清涼養血藥，自愈也。

時疫愈後四肢不能動移者，熱傷筋脉也。吳氏諸養營陽藥，用輕者，粥食調理，自愈也。時疫愈後，身體枯瘦皮膚甲錯者，熱傷其陰也。養陰為主。吳氏諸養陰藥，用重者，亦有粥食，調理時疫愈後有黃骨蒸，如勞瘵者，乃餘熱留於陰分也。不可以其痕癩而遽用表裏，損門治法必察其六府有祛邪，則仍攻其邪為主。次察其經絡，有壅瘀為主，次察其氣道，有痰涎，則仍利其痰涎。主數者俱無，然後以清熱為主，或無邪而陰傷，方可採用。養陰之藥，或分舒邪之輕重，重者之多少，而並用。養陰清熱，药進退加減，以招之更妙。

婦人時疫，患此病者，同惟當待其期，則治法稍異。以其平日，血室也。凡遇風疫，值經期者，治法必重之。陽以之陽，其興發之氣，為素重，厥陰為素重，血室一動，邪必乘之，而化之須分適，來因受病而

發癰瘍瘻，發癰瘍瘻，婦人

妊娠小兒

43

止適來受病而自行適斷而受病三種則裏寒自見凡往水適來而受寒氣遂止者必有瘀血要再察其腸腰少腹有牽引作痛拒按者必以清熱消瘀為主少腹胡加赤芍之胡桃仁归尾丹皮凡往水適來而受病寒氣寒病雖發而往水照常自行者不必治其症但治疫邪而病自愈蓋病本未犯虛症故經自行如常也仲景所謂勿犯胃氣及二焦必自愈者正指此非謂總不用藥也凡經水適斷而受邪者行已盡則血海空虛邪必乘虛陷入血室若見腸腰及少腹滿痛者大柴胡湯加枳朴赤芍逐其血海之邪自愈凡婦人受疫但見晝日明了至夜譫語即當叩其往期以防

熱入血室

婦人感時疫須治之於早則熱不深入而傷胎當汗當清之證多速治不待言當下之證尤不可遲若因妊娠足下傷胎之說固循醫道則胎受熱蒸蒸而反易墮一見重裏元虛下其熱其胎反安然無恙盖西有病則病受之內往所謂有故無殃者於此見之歷驗不誣也妊娠受疫當下失下至於右黑腰痛少腹下墮至心則其胎多死腹中自欬墮至此時下亦墮不下亦墮然下之胎墮母猶可救子中一二不下則母無生理胎亦不能獨存問一墮胎而此苦於彼當明言於病家而後施治下病雖三呼氣皆可用甘草硝蜜煎川芎姜半生僵白附子肉桂大熟大棗不可輕試

少兒受時疫惡寒大風而時見駕馬搖類於駕馬風誤治多死因大人治療清解諸法減小劑料以治之則愈小兒不能言遇當下訛既不知其證言安復難驗其在苦則當驗其否口赤而燥即是下訛此幼科之要訣也

方目 大青龍湯 二神通解散 九味羌活湯 姜蕤湯 大羌活湯 人參

敗毒散

吳氏連魚飲

小柴胡湯

吳甘草湯

參於

三石湯 清脾飲 大平氣 少平氣

調胃承氣 黃龍湯 二味

地黃湯 生脈散

四物湯 趙婢湯

陽旦湯 黃芩湯 桔子豉湯

黃連解毒湯 少陽胸悶

導赤散

猪苓湯 天水散 丹葛

解肌湯 吳氏三消飲

二厚子湯 归脾湯

清燥湯 古以生大湯

三清草養營湯

補中益氣湯

三黃五黑湯 防風通聖散 逍

遙散

白芷湯

葛根茵陳湯

平胃散

辟惡氣養營湯

涼膈散 四苓散 桔梗厚氣湯 茵陳蒿湯 白學班湯 牀
茵地黃湯 三黃導心湯 蒼香正氣散 桃皮甘草湯 心善不善湯
大建中湯 理中湯 十枣湯 二陳湯 白虎湯 善木白虎
白虎學班湯 大陷胸湯 大陷胸丸 振脊湯 小柴湯 葛
根芩連湯 庸心丸 天王補心丹 荊防敗毒散 食鹽湯
四君子湯 异功散 附子湯 蔡安神養血湯 建平湯 羅漢
消毒飲 蔡姜貝母榮陽湯 蔡紫胡卷榮陽湯 蔡紫胡清燥湯
柴人天王榮陽湯 蔡若附子榮陽湯 丹角大青湯 常葛五苓散

卷之三

二神通解散

麻不草不芩术不石茎不

消不

立致十粒

加首尾而大

九味羌活湯 羌活防風甘草細辛葛根白芍

葛根湯

葛根防風細辛甘草細辛葛根白芍白芷

大羌活湯 羌活防風細辛葛根白芍白芷黃芩

人參敗毒散

人參甘草細辛葛根細辛細辛細辛

吳氏連魚飲 桂枝不厚朴不草果五下知母不

少紫胡湯

柴胡少夏人參黃芩甘草姜黃

九味甘草湯 甘草人參姜黃生地麻仁阿膠桂枝姜半夏

柴胡四物湯

小柴胡合柏

參胡三石湯 参附不胡不芍藥微弱之渴

清脾飲

麦皮蘆根柴胡芩夏芩木甘草

大承氣湯 芒硝大黃枳實川朴

小承氣湯

大黃枳實川朴

調胃承氣湯 芒硝大黃甘草

人參白橘湯

姜蕤陽 姜蕤半兩黃白微青木香三錢

三月飲 檀朴草果性葛蕙後

大黃

大黃去苦硝朴不枳實不

黃龍陽

大黃去苦硝朴不枳實不
草不姜參

六味地黃陽

生脈散

人參麥冬味

四物陽

越婢陽

麻黃青草羌活

陽旦陽

桂枝湯加黃芩

桔子致

梗子豆豉

少陽陽

甘夏桔梗川連

黃連解毒陽

芩連桔梗

通口渴 連芩桔梗知母滑石茯苓薄荷
小麥去心多甘草

猪苓陽

生薑澤鷄赤芍滑石河丹

桃仁承氣湯

桃仁 大黃

桂枝 甘草

止渴湯

人參 大黃 茯苓 茵陳 茵陳 茵陳
桔梗 薑半夏 生姜

清煙湯

蒼白木 茴 茴 苍草

澤升柴胡味

大柴胡湯

半夏 生姜
冬 檉 大黃

柴胡

大黃

枳實

陳皮 甘草

補中益氣湯

黃芩

黃連

黃芩

黃芩

防風通聖散

麻黃 桔梗 菊花 滁石 滌石
硝黃 大黃 赤芍 連翹 甘草

附子理中散

附子 中藥

附子理中散

附子 中藥

附子理中散

附子 中藥

平胃散

蘆薈 茵陳 甘草

平胃散

蘆薈 茵陳 甘草

平胃散

蘆薈 茵陳 甘草

膾膈散

大黃 硝冷枝 竹葉 連翹
荷甘草

四苓散

吳氏有傳及無白本亦名四苓

吳氏有傳及無白本亦名四苓

吳氏有傳及無白本亦名四苓

吳氏有傳及無白本亦名四苓

首陳首陽 首陳大黃 梶子

桔皮甘夏湯

吳舉班湯 白芍甘草 草胡 白芷
升甲火

三黃鴻心湯 河液論有黃芩

保命集有甘草

大青首陽

摩角地黃湯

犀角 生地 連翹 日升

石膏青正氣散

藿正 姜夏 李腮皮 木林 桔梗
腹皮 蘇葉 生姜 甘草

竹葉石膏湯

生薑 各生 甘草 檀木 大參 矢身

十枣湯 芫花 甘遂 大戟 大枣

理中湯

白扁湯

二陳湯

白柴班湯 石菖蒲人房甘草

參木白扁湯

大黃芒硝 蒼蘚 去仁 大陷胸湯 大黃芒

甘遂

甘遂 小白蘚二分

烏

水蛭 蟲蟲

桃仁 大黃

吳茱萸 青草烏 呷胡古茶 陳皮 甘草
代安前清大黃 茄子
加姜夷夷

八珍湯

麻仁丸

荆防敗毒散

四君子湯

附子湯

小建中湯

吳茱萸 桂枝湯

知母 芫花 桃仁 肉桂
桔梗當归白芍

天王補心丹

倉廩湯

黑功散

吳安神養血湯

茯神棗仁遠志當歸桔梗白芍
地黃 大棗 加龍眼肉

普濟消毒飲

芩連桑菊紅元參甘草桔梗紫蘇
桔梗連翹牛蒡板藍根馬勃僵蚕升麻

吳茱萸 桂枝湯

知母 芫花 桃仁 陳皮 甘草
桔梗當归白芍

吳人參耆鴨肉片
地骨肉吳人參附耆鴨肉

地骨肉不
附耆鴨肉不

鹿角大青湯

鹿角大青中元茶中甘草下

甘草下

升麻中黃連中黃芩中

升麻中黃連中黃芩中甘草下

甘草下

桔子中

49