蘭室秘藏

中

漢書門

類	號	函	架	冊
	一二九六七	二二	六	七六

内閣文庫

漢書	一二九六七	二二	六	七六
類	號	函	架	冊

内閣文庫

番號	漢 12967	
冊數	75 (41)	
函號	301	59

四十二

国立公文書館
National Archives of Japan

大學東校典籍局之印

蘭室秘藏卷中

東垣老人 李杲 撰
明 新安 吳勉學 校

頭痛門

頭痛論

金匱眞言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於

經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癲疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類爲主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡爲主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷爲主太陰頭痛必有痰體重或腹痛爲痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星爲主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脉沉細麻黃附子細辛爲主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎爲主氣虛頭痛人參黃芪爲

主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其効如神白术半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃暈眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱氣上壅損目及腦痛不止

川芎伍錢　柴胡柒錢　黃連炒　羌活壹兩　炙甘草壹兩伍錢　細挺子黃芩參兩去皮剉一半酒製一半炒

右爲細末每服二錢七於盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧

如苦頭痛每服加細辛貳分

如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏壹兩伍錢

如偏正頭痛服之不愈藁羌活防風川芎一半加柴胡壹倍

如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好吳白芷

徹清膏

蔓荊子　細辛已上各壹分　薄荷葉

川芎已上各叁分　生甘草　熟甘草已上伍分

藁本壹錢

右爲細末每服二錢食後茶清調下

川芎散

治頭目不清利

川芎叁分　柴胡柒分　羌活

防風　藁本　生甘草

升麻已上各壹錢　熟甘草　酒生地黃貳錢

酒黃連炒　酒黃芩已上各肆錢伍分

右爲細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒濕麵

白芷散一名鬱金散

治頭痛

鬱金壹錢　香白芷　石膏已上各貳錢

薄荷葉　芒硝已上各叁錢

右爲極細末口含水鼻內嚙之

碧雲散

治頭痛

細辛　鬱金　芒硝已上各壹錢

蔓荊子　川芎已上各壹錢貳分　石膏壹錢叁分

青黛壹錢伍分　薄荷葉貳錢　紅豆壹箇

右爲極細末口嚙水鼻內嚙之

羌活清空膏

蔓荊子壹錢　黃連叁錢　羌活

防風　甘草已上各肆錢　黃芩壹兩

右爲細末每服一錢茶清調下食後臨卧

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荊芥穗　川芎已上各貳分　蔓荊子

當歸身　蒼朮已上各叁分　酒黃連

生地黃　藁本　甘草已上各伍分

升麻　防風已上各柒分　酒黄蘗
炙甘草　黄芪已上各壹錢　酒黄芩
酒知母已上各錢伍分　羌活叁錢　柴胡伍錢
細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥

柴胡貳分　升麻叁分　黄芪捌分
當歸身貳錢　炙甘草肆錢　紅花少許

右㕮咀作二服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食後

細辛散

治偏正頭痛

細辛　瓦粉已上各貳分　生黄芩
芍藥已上各伍分　酒黄連　川芎已上各柒分
炒黄芩　酒黄芩已上各壹錢　炙甘草壹錢伍分
柴胡貳錢

右爲麤末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清食後服之

羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草柒分　澤瀉叁錢　酒洗瓜蔞根

白茯苓　酒黃蘗伍錢已上各　柴胡柒錢

防風　細黃芩酒洗　酒黃連

羌活壹兩已上各

右爲麤末每服五錢重水二盞煎至一盞取清

食後臨卧通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘温宜苦味

木香　橘皮　柴胡壹分已上各

酒黃芩貳分　人參　黃蘗

白术　川芎叁分已上各　升麻肆分

蒼术　麥蘖麵　當歸身

黃連伍分已上各　甘草　半夏柒分已上各

黃芪壹錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱

服不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

生甘草　炙甘草已上各貳錢　防風貳錢伍分
柴胡　升麻　酒生地黄
酒知母已上各伍錢　酒黄蘗　羌活已上各壹兩
黄芪貳兩

右爲麤末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加
蔓荆子五分川芎三分再煎至一盞去柤臨卧熱
服

半夏白术天麻湯

范天騭之内有脾胃證時顯煩躁胸中不利大便
不通而又爲寒氣怫鬱悶亂大作火不伸故也疑

其有熱服踈風丸大便行其病不減恐其藥少再
服七八十丸大便復見兩行元證不瘳增以吐逆
食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩
悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如
在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得
安卧余料前證是胃氣已損復下兩次則重虛其
胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黄蘗貳分酒洗　乾薑叁分　澤瀉
白茯苓　天麻　黄芪
人參　蒼术已上各伍分　炒神麯

白术 已上各壹錢　麥蘖麵　半夏 湯洗

橘皮 已上各壹錢伍分

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤熱服食前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫瀉火補中益氣二术俱苦甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麯消食蕩胃中滯氣大麥麵寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗太苦寒酒洗以療冬天少火在泉發躁也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上龈隸於坤土乃足陽明胃之脉貫絡也止而不動下龈嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢爲病不同熱甚則齒動龈斷袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而

作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒龈腫起爲痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多爲虫所蝕其齒缺少而色變爲虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

羌活散

治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉龈袒脫疼痛

香白芷　桂枝已上各叁分　蒼朮　升麻已上各伍分　當歸身陸分

草豆蔻仁壹錢　羌活壹錢伍分　羊脛骨灰貳錢

麻黃去根節　防風已上各叁錢　柴胡伍錢

細辛少許

右爲細末先用溫水嗽口淨擦之其痛立止也

草豆蔻散

治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉　防風已上各貳分　羊脛骨灰

熟地黃已上一名伍分　當歸陸分　草豆蔻仁

黄連已上各壹錢叁分　升麻貳錢伍分

右爲細末同前牙痛處擦之

麻黄散

治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風　藁本已上各叁分　羊脛骨灰

當歸身　熟地黄已上各陸分　草豆蔻仁

升麻　黄連已上各壹錢　羌活壹錢伍分

麻黄不去節　草龍膽酒洗　生地黄已上貳錢

細辛少許

右爲細末依前藥法擦之

熱牙散一名麝香散

治大熱牙齒瘴露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛

妨食物餚反忤熱多

熟地黄二分　益智仁二分半　當歸身

生地黄　麻黄根　酒漢防已

人參已上各叁分　升麻一錢　草豆蔻

黄連已上各一錢五分　羊脛骨皮二錢　麝香少許

右爲細末如前藥擦之

治蟲散　名白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲痛胃經濕熱腫痛

桂枝一分　熟地黄二分　藁本
白芷已上各三分　當歸身　益智仁
黄連已上各四分　羌活伍分　吳茱萸八分
草豆蔻　黄芪　升麻已上各一錢
羊脛骨灰二錢　麻黄不去節三錢五分
右爲細末同前擦之
益智木律散
治寒熱牙痛
木律二分　當歸　黄連已上各四分
羊脛骨灰　益智皮　熟地黄已上五分
草豆蔻皮壹錢貳分　升麻壹錢伍分
右爲細末用度如前擦之
如寒牙痛不用木律
蠍稍散
治大寒風犯腦牙痛
白芷　當歸身　柴胡已上各貳分
桂枝　升麻　防風
藁本　黄芪已上各叁分　羌活伍分
草豆蔻皮壹錢　麻黄去節壹錢伍分　羊脛骨灰貳錢伍分
蠍稍少許

右爲細末如前法用之

白牙散

白芷柒分　升麻壹錢　石膏壹錢伍分
羊脛骨灰貳錢　麝香少許

右爲細末先用温水嗽口擦之妙

刷牙藥

麝香壹分　生地黄　酒防已
熟地黄已上各貳分　當歸身　人參已上各叁分
草豆蔻皮伍分　升麻壹錢　羊脛骨灰
黄連已上各貳錢　白豆蔻　草豆蔻已上叁錢
沒石子叁箇　五倍子壹箇

右爲極細末如前法擦之妙

獨聖散

治一切牙痛風痹

北地蒺藜不以多少陰乾

右爲細末每用刷牙以熱漿水漱牙外麤末熬漿水刷牙大有神効不可具述

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛

香白芷　當歸梢　羊脛骨灰

生地黄已上各伍分　麻黄　草豆蔻皮
草龍膽　升麻　黄連已上各壹錢

右爲細末如前法擦之神効

牢牙地黄散

治腦寒痛及牙痛

藁本貳分　生地黄　熟地黄
羌活　防已　人參已上各叁分
當歸身　益智仁已上各肆分　香白芷
黄芪已上各伍分　羊脛骨灰　吳茱萸
黄連　麻黄已上各壹錢　草豆蔻皮壹錢貳分
升麻壹錢伍分

右爲細末如前法擦之

細辛散

治寒邪風邪犯腦牙齒痛

柴胡　防風　升麻
白芷已上各貳分　桂枝貳分半　麻黄去節
藁本　蒼朮已上各叁分　當歸身肆分
草豆蔻伍分　羊脛骨灰　羌活已上各錢伍分
細辛少許

右爲細末先漱後擦之佳

立効散

治牙齒痛不可忍及頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五臟内盛六腑陽道脉微小小便滑數

細辛貳分　炙甘草叁分　升麻柒分　防風壹錢　草龍膽酒洗肆錢

右㕮咀都作一服水一盞煎至七分去柤以匙抄在口中煠痛處待少時則止

如多惡熱飲更加草龍膽壹錢　此法不定隨寒熱多少臨時加減

若更惡風作痛加草豆蔻黃連已上各伍分　勿加草龍膽

牢牙散

治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活壹兩　草龍膽酒洗壹兩伍錢　羊脛骨灰貳兩　升麻肆兩

右爲細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和匀卧時貼在牙齦上

清胃散

治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引

頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身　擇細黃連如連不好更加貳分夏月倍之

生地黃酒製已上叁分　牡丹皮伍分　升麻壹錢

右爲細末都作一服水一盞半煎至一盞去相帶冷服之

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦肉將脫牙齒落血不止

蘭香葉如無藿香代之　當歸身　藿香用葉

木香已上各壹錢　升麻貳錢　生地黃酒洗

生甘草已上各叁錢　黃連去鬚擇淨酒洗秤　縮砂仁已上各伍錢

右同爲細末湯浸餅爲丸如菉豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

桔梗湯

治咽腫微覺痛聲破

當歸身　馬勃已上各壹分　白殭蠶

黄芩巳上各叁分　麻黄伍分不去節　槍梗
甘草巳上各壹錢　桂枝少許
右爲麤末作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱
服之食後
又方
治口瘡久不愈者
黄蘗不計多少真者蜜塗其上炙黄色
右爲細末乾糝瘡上臨卧忌醋醬鹽
神驗法
治口瘡無問久新

夜間將二丸以勒緊左右交手揉三五十次但
遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈
久病諸般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者勒之
二丸揉之數夜可愈
内經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上口爲糜易
老五苓散與導赤散合而飲之
嘔吐門
丁香茱萸湯
治嘔吐噦胃虚寒所致
黄蘗叁分　炙甘草　丁香

柴胡　橘皮已上各伍分　升麻柒分
吳茱萸　蒼朮　人參已上各壹錢
當歸身壹錢伍分　草豆蔻仁　黃芪已上各貳錢

右爲麤末每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱服食前

白朮湯一名茯苓半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒神麯貳錢　陳皮　天麻已上各叁錢炒黃　白朮　白茯苓　麥蘖米麵炒黃各一

半夏已上各伍錢

右㕮咀每服五錢水二盞入生薑五片同煎至一盞去柤稍熱服之

補肝湯一名柴胡半夏湯

治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐遇風但覺皮肉緊手足難舉重物如居暖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復

柴胡　升麻　藁本已上各伍分　白茯苓柒分　炒神麯　蒼朮已上各壹錢　半夏貳錢　生薑拾片

右爲麤末都作一服水一大盞煎至一大盞去柤
稍熱服

吳茱萸丸 一名木香利膈丸
治寒在膈上噎塞咽膈不通

木香　青皮 已上各貳分　白殭蠶
姜黃　澤瀉　柴胡 已上各肆分
當歸身　炙甘草 已上各陸分　益智仁
人參　橘皮　升麻
黃芪 已上各捌分　半夏 壹錢　草豆蔻仁
吳茱萸 已上各錢貳分　麥蘖麵 壹錢伍分

右爲細末湯浸餅爲丸如菉豆大每服二三十丸溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

衄血吐血門

麥門冬飲子
治吐血久不愈以三稜鍼於氣街出血立愈

黃芪 壹錢　麥門冬　當歸身
生地黃　人參 已上各伍分　五味子 拾箇

右爲麤末都作一服水二盞煎至一盞去柤熱服
不拘時

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬貳分去芯　人參去芦　當歸身已上各參分

黃芪　白芍藥　甘草已上各壹錢

五味子伍箇

右爲麤末都作一服用水二盞煎至一盞去祖稍熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居曠室中卧大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附膂有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居曠室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

三黃補血湯

治六脉俱大按之空虛心而赤善驚上熱乃手少陰心脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛微苦峻補其血

牡丹皮　黃芪　升麻已上各壹錢

當歸　柴胡已上各壹錢伍分　熟地黃

川芎 已上各貳錢　生地黄 叁錢　白芍藥 伍錢

右㕮阻如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去柤稍熱服食前

如兩寸脉芤血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黄湯則愈

救脉湯 一名人參救脉散

治吐血

甘草　蘇木　陳皮 已上各伍分

升麻　柴胡　蒼朮 已上各壹錢

當歸梢　熟地黄　白芍藥

黄芪　人參 已上各貳錢

右爲麤末都作一服水二大盞煎至一盞去柤稍温食前服

麻黄桂枝湯

人參 益上焦元氣不足而實其表也　麥門冬 保肺氣口上各叁分

桂枝 以補表虛　當歸身 和血養血各伍分　麻黄 去根節

甘草 補其脾胃之虛　黄芪 實表益衛　白芍藥 已上各壹錢

五味子 伍箇安其脉氣

右以水三盞先煑麻黄一味令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去柤熱服臨卧只一服而愈更

不再作

黄芪芍藥湯

治鼻衄血多面黄眼澀多睡手麻木

葛根　升麻已上各壹兩　羌活已上各伍錢　炙甘草貳兩

白芍藥　黄芪各叁兩

石㕮咀每服伍錢水二盞煎至一盞食後

六脉弦細而濇按之空虛其色必白而天不澤者脫血也此大寒證以辛温補血益血以甘温甘熱骨潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

止衄血法

治鼻血久不止素有熱而暴作者諸藥無驗神法以大紙一張作八摺或十摺於水内濕置頂中以熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小翟露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不愈矣腰痛論中説皆爲足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆

去血絡之凝乃愈其内經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防己　防風已上各參分　炒神麯
獨活已上各伍分　川芎　柴胡
肉桂　當歸梢　炙甘草
蒼朮已上各壹錢　羌活壹錢伍分　桃仁伍箇去皮尖研如泥

右㕮咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去柤稍熱食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沉重如山

炙甘草貳錢　羌活　防風
獨活　大黄煨分　澤瀉
肉桂已上各參錢　當歸稍　連翹已上各伍錢
酒漢防己　酒黄蘗已上各壹兩　桃仁參拾箇

右㕮咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一盞去柤熱服

破血散疼湯

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活　防風　中桂已上各壹錢

蘇木壹錢伍分　連翹　當歸梢

柴胡已上各貳錢　水蛭叁錢炒去煙盡別研　麝香少許別研

右件分作二服每服酒二大盞水一大盞除水蛭麝香另研如泥煎餘藥作一大盞去柤上火令稍熱調二味空心服之兩服立愈

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或脛腨臂股中痛不可忍鼻塞不通

當歸稍壹分　中桂　地龍已上各肆分

麻黃伍分　蘇木陸分　獨活

荊葉　甘草已上各壹錢　羌活貳錢

桃仁陸箇

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤溫服食遠

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛

防風風能勝濕止痛　黃蘗已上各壹錢始得之時寒也久不愈寒化爲熱除濕　柴胡貳錢行經　蒼朮叁錢去濕止痛

右都作一服水二大盞煎至一盞去祖空心服

麻黄復煎散

治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而躁熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱乃濕在經者亦宜發汗況正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白术　人參　生地黄

柴胡　防風 已上各伍分　羌活

黄蘗 已上各壹錢　麻黄 去節微搗不令作末水五大盞煎令沸去沫煎至二盞入下項藥再煎　黄芪 已上各貳錢　甘草 叁錢

杏仁 叁箇去皮

右㕮咀都作一服入麻黄湯煎至一盞臨卧服之勿令食飽取漸次有汗則効

緩筋湯 一名羌活湯

治兩目如火腫痛兩足及伏兎筋骨痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽頸項皆急痛目外眥目絲急食不下

熟地黄 壹分　生甘草　柴胡

紅花　炙甘草　蘇木
獨活 已上各貳分　藁本　升麻
黃芩　草豆蔻仁　酒黃蘗
生地黃　當歸身　麻黃 已上各叁分
羌活 叁錢　蒼术 伍分

右爲麤末都作一服水二大盞煎至一盞去柤食遠服之

拈痛湯

治濕熱爲病肩背沉重肢節疼痛胸膈不利

白术 壹錢伍分　人參 去芦　苦參 酒炒
升麻 去芦　葛根　蒼术 已上各貳錢
防風 去芦　知母 酒洗　澤瀉
黃芩 炒　猪苓　當歸身 已上各叁錢
炙甘草　黃芩 酒洗　茵蔯 酒炒
羌活 已上各伍錢

右㕮咀每服一兩水二大盞煎至一盞去柤食遠服

蒼术復煎散

治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨強肩背胛眼痛膝髖痛無力行步沉重

紅花壹分　黄蘗叁分　柴胡
藁本　澤瀉　白术
升麻巳上各伍分　羌活壹錢　蒼术肆兩水二椀煎二盞
去粗入藥
右㕮咀先煎蒼术湯二大盞復煎前項藥至一大
盞稍熱空心服取微汗爲効忌酒濕麵
羌活蒼术湯
治脚膝無力沉重
炙甘草　黄蘗　草豆蔻
生甘草　葛根巳上各伍分　橘皮壹分

柴胡柒分半　升麻　獨活
縮砂仁　蒼术巳上各壹錢　防風壹錢伍分
黄芪貳錢　知母貳錢伍分　羌活叁錢
右㕮咀分作二服水二大盞煎至一盞去粗空心
服

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不
月其傳爲風消爲息賁者死不治婦人脾胃久虛或
形羸氣血俱衰而致經水斷絶不行或病中消胃熱

善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絶爲熱所爍肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絶宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經適行而有子子不安爲胎病者有矣或心包脉洪數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絶不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣内經所謂小腸移熱於大腸爲癥瘕爲沉脉澀不利則月事沉滯而不利故云爲癥瘕爲沉也或因勞心心火上行月事不來安心和血瀉火經自行矣故内經云月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也

經漏不止有三論

陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒作於中中有赤帶者其脉洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠卧心下

急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病者不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀大甚則胞絡絶也陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳爲脉痿此之謂也

升陽除濕湯一名調經升麻除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足困飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系者包絡命門之脉也主月事因脾胃虛而心包乘

之故漏下月事不調也況脾胃爲血氣陰陽之根
蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火
鬱則發之

當歸 酒洗　獨活 巴上各伍分　蔓荊子 柒分
防風　炙甘草　升麻
藁本 巴上各壹錢　柴胡　羌活
蒼术　黄芪 巴上各壹錢伍分

右剉如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新汲
水三大盞煎至一大盞去柤空心熱服待少時以
早飯壓之可一服而巳如炙足太陰脾經中血海

穴二七壯亦巳

此藥乃從權之法用風勝濕爲胃下陷而氣迫於
下以救其血之暴崩也併血惡之物住後必須黄
芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升
陽湯中加以和血藥便是也若經血惡物下之不
絶尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之
亢乃治其根蔕也若遇夏月白帶下脫漏不止宜
用此湯一服立止

涼血地黄湯

治婦人血崩是腎水陰虚不能鎮守包絡相火故

血走而崩也

黄芩　荆芥穗　蔓荆子已上各壹分

黄蘗　知母　藁本

細辛　川芎已上各貳分　黄連

羌活　柴胡　升麻

防風已上各叁分　生地黄　當歸已上各伍分

甘草壹錢　紅花少許

右㕮咀都作一服水三大盞煎至一盞去柤稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝臏上内廉白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉緩者是也灸三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝内輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股内廉痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黄如蠱女子如妊身可灸二壯

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下疰脚氣腰已下如在氷雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也

面白如枯魚之象肌肉如刀割削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目眩眩無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之極也脉沉厥緊而澀按之空虛若脉洪大而濡按之無力猶爲中寒之證況按之空虛者乎按之不鼓是爲陰寒乃氣血俱虛之極也

茴香伍錢　黑附子炮製去皮臍　良薑已上各柒錢
當歸去豆兩

右四味剉如蘇豆大以上等好酒一升半同煮至酒盡焙乾

炙甘草　苦練生用　丁香已上各伍錢
木香　升麻已上各壹錢　柴胡貳錢
炒黃鹽　全蠍已上各叁錢　延胡索肆錢

右與前四味藥同爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩冷物

酒濕麵

固真丸

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火視物䀮䀮然無所見齒皆惡熱飲痛須得黃連細末擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢致目䀮䀮而無所見齒惡熱飲者是陽明經中伏火也治法當大瀉寒濕以丸藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕炮乾薑大熱辛瀉寒水以黃蘗之大寒為因用又為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡為本經之使以芍藥五分導之恐辛熱之藥大甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脉此用藥之法備矣

黃蘗酒洗　白芍藥已上各伍分　柴胡

白石脂已上各壹錢火燒赤水飛細研日乾　白龍骨酒煮日乾水飛為末

當歸酒洗已上各貳錢　乾薑肆錢炮

右件除龍骨白石脂水飛研外同為細末水煮麵糊為丸如雞頭仁大日乾空心多用白沸湯下無

令胃中停滯待少時以平飯壓之是不令熱藥犯
胃忌生冷硬物酒濕麵

烏藥湯

治婦人血海疼痛

當歸　甘草　木香已上各伍錢
烏藥壹兩　香附子貳兩炒

右㕮咀每服五錢水二大盞去柤溫服食前

助陽湯一名升陽燥濕湯

治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重
如山陰中如氷

生黃芩　橘皮已上各伍分　防風
高良薑　乾薑　郁李仁
甘草已上各壹錢　柴胡壹錢叁分　白葵花柒朶

右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一
盞去柤食前稍熱服

水府丹

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中暴痛
面有黧黯黎黑羸瘠

礪砂紙隔沸湯淋熬取　紅豆已上各伍錢　桂心另爲末
木香　乾薑已上各壹兩　砂仁貳兩

經煆花蘂石 研壹兩 伍錢　班猫 壹百箇、去頭翅

生地黃汁　童子小便 各一升　臘月狗膽 柒枚

芫蜻 叁百箇去頭足糯米一升炒米黃去米不用

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大硃砂爲衣每服一丸温酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脉二尺俱弦緊洪按之無力其證白覺臍下如氷求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脉時微洪也

熟地黃　白芍藥 已上各叁分　川芎

丁香 肆分　阿膠 陸分　生艾葉 壹錢

當歸 二錢二分

右川芎爲細末當歸酒洗剉熟地黃丁香爲細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾

損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人心窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脉沉細而緩間而沉數九竅微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下縮急有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去安心定志鎮墜其經調和脾胃大益元氣補其血脉令養其神以大熱之劑去其冬寒凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不令

四肢痿弱

黃連壹分　生地黃叁分　炒神麯

橘皮　桂枝巳上各伍分　草豆蔻仁陸分

黃芪　人參　麻黃不去節巳上各壹錢

當歸身壹錢伍分　杏仁伍箇另研如泥

右㕮咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯

治婦人經脉漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

柴胡貳分　炙甘草　生地黃已上各叁分
橘皮不去白　熟地黃已上各伍分　黃芪壹錢伍分
蒼术泔浸去皮　當歸身　白芍藥
白术已上各貳錢

右十味㕮咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去柤稍熱空心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

炙甘草　當歸身　葛根已上各叁分
獨活　藁本　升麻已上各伍分
柴胡柴分　羌活　蒼术已上各壹錢
紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去
柤空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止
穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有
形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行
食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人
治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣
無伐天和無勝無虛遺人夭殃無致邪無失正絶人
長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛
陽虛汗之即愈下之即死大抵聖人立法且如升陽

或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬
收藏殞殺寒凉之氣此病是也當用此法治之升降
浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如
治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏
哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人
亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下
矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者
主有形之物也前陰者精氣之戶下竭是病人周身
之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也
陽生陰長春夏是也在人之身令氣升浮者穀氣上

行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絶矣既下元二陰俱脫血氣將竭假令當是熱證今下焦久脫化爲寒矣此病久沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥大升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣次用白术之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也

益胃升陽湯

血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥爲之先務舉世皆以爲補殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之身內胃氣爲寶

柴胡　升麻巳上各伍分　炙甘草

當歸身酒洗　陳皮巳上各壹錢　人參去芦有嗽去之

炒神麯巳上各錢伍分　黃芪貳錢　白术叁錢

生黃芩少許

右㕮咀每服二錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱

服

如腹中痛每服加白芍藥叁分中桂少許

如渴或口乾加葛根貳分不拘時候

升陽舉經湯

治經水不止如右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣切補命門之下脫也

肉桂去皮盛夏勿用秋冬用　白芍藥　紅花巳上各伍分

細辛陸分　人參去芦　熟地黃

川芎巳上各壹錢　獨活根　黑附子炮製去皮臍

炙甘草巳上各錢伍分　羌活　藁本去土

防風巳上各貳錢　白朮　當歸

黃芪巳上各叁錢　柴胡巳上各叁錢　桃仁拾箇湯浸去皮尖細研

右㕮咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三盞煎至一盞空心熱服

半產誤用寒凉之藥論

婦人分免及半產漏下昏目不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君

火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏目
火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也
血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒
之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二
者俱傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺
之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知
上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之
幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有
說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜
汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒涼

藥也分免半產本氣不病是暴去其血亡血補血又
何疑焉補其血則神昌常時血下降亡今當補而升
舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令
大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今
立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足
也

全生活血湯

紅花叁分　蔓荊子　細辛已上各伍分
生地黃夏月多加之　熟地黃已上各壹錢　葉本
川芎已上各壹錢伍分　防風諸陽既陷何以知之血下脫故也

羌活　獨活　炙甘草
柴胡去苗　當歸身酒洗　葛根已上各貳錢
白芍藥　升麻已上各叁錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤食前稍熱服

當歸附子湯

治臍下冷痛赤白帶下

當歸貳分　炒鹽叁分　蜥稍
升麻已上各伍分　甘草陸分　柴胡柒分
黃蘗少許爲引用　附子壹錢　乾薑良薑各一錢

右爲麤末每服五錢水五盞煎至一盞去柤稍熱服或爲細末酒麵糊爲丸亦可

調經補真湯

冬後一月微有地泥氷泮其白帶再來陰戶中寒一服立止

獨活　乾薑炮　藁本
防風　蒼术已上各貳分　麻黃不去節
炙甘草　人參去芦　當歸身
白术　生黃芩　升麻已上各伍分
黃芪柒分　良薑　澤瀉

羌活已上各壹錢　柴胡肆錢　杏仁貳箇
桂枝少許　白葵花柒朶去萼
右㕮咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水三
大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至
一盞零柒分再入生黃芩煎至一盞空心服之候
一時許可食早飯

坐藥龍腦膏

茴香叁分　枯礬伍分　良薑
當歸梢　酒防已　木通已上各壹錢
丁香　木香　川烏炮已上各壹錢伍分
龍骨　炒鹽　紅豆
肉桂已上各貳錢　厚朴叁錢　延胡索伍錢
全蝎伍箇
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大綿裹留系在外內
丸藥陰戶內日易之

勝陰丹

爲水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡　羌活　枯白礬
甘松　升麻已上各貳分　川烏頭
大椒　三柰子已上各伍分　蒜柒分

破故紙捌分與蒜同煑焙乾秤　全蠍叁箇
麝香少許、

右爲細末依前法用

迴陽丹

羌活　全蠍　升麻根
甘松已上各貳分　草烏頭　水蛭炒已上各叁分
大椒　三柰子　蓽撥
枯礬已上各伍分　柴胡　川烏已上各柒分
炒黃鹽爲必用之藥夫之則不効　破故紙
蒜已上各壹錢　蝕蟲三箇去翅足炒

右爲極細末依前製用臍下覺暖爲効

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三兩日

生地黃貳分　丁香肆分　當歸身
防風　羌活已上各壹錢　柴胡壹錢伍分
全蠍壹箇

右件都作一服水二盞煎至一盞去柤食前稍熱一服

延胡苦煉湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黄蘗壹分為引用　延胡索　苦練子已上各貳分
附子炮　肉桂已上各叁分　炙甘草伍分
熟地黄壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黄蘗為引用　知母已上各伍分　肉桂壹錢
附子叁錢

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食前服

服

如少食常飽有時似腹脹夯悶加白芍藥伍分
如不思飲食加五味子貳拾箇
如煩惱面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黄芪壹錢伍分

人參柒分　炙甘草升麻已上各伍分
人參補氣湯

治四肢癲倦自汗無力

丁香末貳分　生甘草稍　炙甘草已上各叁分
生地黄　白芍藥已上各伍分　熟地黄陸分
人參　防風　羌活

黄蘗　知母　當歸身
升麻已上各柒分　柴胡壹錢　黄芪壹錢伍分
全蠍壹箇　五味子貳拾箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤空心稍熱服

黄芪白术湯

治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭痛躁熱

細辛叁分　吳茱萸　川芎已上各伍分
柴胡　升麻已上各壹錢　當歸身壹錢伍分
黄蘗酒洗　炙甘草　羌活已上各貳錢
五味子叁錢　白术　人參已上各伍錢
黄芪壹兩

右㕮咀每服五錢水二大盞生薑五片煎至一盞去柤食前熱服

如腹中痛不決加炙甘草壹錢　汗出不止加黄蘗壹錢

白术茯苓湯

治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白术　白茯苓已上各壹兩　半夏已上各

炒麴貳錢　麥蘖麵伍分炒

右㕮咀每服五錢水二大盞入生薑五片煎至一盞去柤不拘時服

增味四物湯

治婦人血積

當歸　川芎　芍藥

熟地黃　京三稜　乾漆炒煙盡

肉桂去皮　廣茂已上各等分

右爲麤末每服五錢水二大盞煎至一盞去柤食前稍熱服

補經固眞湯

白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得心包尺脉微其白帶下流不止叔和云崩中日久爲白帶漏下時多白滑血枯崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥爲引用爲使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以大辛熱之氣味藥補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥爲佐而益元氣

白葵花去蕚研爛肆分　甘草炙　郁以仁麸炒研泥　柴胡巳上各壹錢

乾薑細末　人參巳上各貳錢半　黄芩細研壹錢　陳皮留皮五分

右件除黄芩外以水三盞煎至一盞七分再入黄芩同煎至一盞去柤空心熱服少時以早飯壓之

温衛補血湯

治耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中吟吟不得卧口舌益乾大息頭不可以回顧項筋緊脊強痛頭旋眼黑頭痛欠嚏

生地黄　白术　藿香

黄蘗巳上各壹分　牡丹皮　蒼术

王瓜根　橘皮　吳茱萸巳上各貳分

當歸身貳分半　柴胡　人參

熟甘草　地骨皮巳上各叁分　升麻肆分

生甘草伍分　黄芪壹錢貳分　丁香壹箇

桃仁叁箇　葵花柒朶

右㕮咀作一服用水二大盞煎至一盞去柤食前熱服

立効散

治婦人血崩不止

當歸　蓮花心　白綿子
紅花　茅花已上各壹兩

右剉如豆大白紙裹定泥固炭火燒灰存性爲細末

如乾血氣研血竭爲引好温酒調服加輕粉壹錢

如血崩不止加麝香爲引好温酒調服

四聖散

治婦人赤白帶下

川烏煨製　生白礬已上各壹錢　紅娘子叁箇
班猫拾箇

煉蜜爲丸如皂子大綿裹坐之

温經除濕湯

十月霜冷後四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也酷心者是濁氣不下降欲爲滿也合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不麻者目開助陽道故陰寒之氣少退也頭痛者風氣下陷於血分不得伸越而作也近火則有之

黄連壹分　柴胡　草豆蔻
神麯炒　木香已上各貳分　麻黄不去節

獨活　當歸身　黄蘗已上各壹分
升麻伍分　羌活柒分　炙甘草
人參　白朮　猪苓
澤瀉已上各壹錢　黄芪　橘皮
蒼朮已上各貳錢　白芍藥叁錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治支節沉重疼痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絶止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼爲最苦觀其色脉形病相應而不逆内經曰陽盛瞋目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木爲風三尺之童亦爲然細校之則有區

且祖木為風三火之黃[illegible]火為熱脉於之[illegible]
[illegible]而不行咬畫於之人令咬其與表而劍邪也
[illegible]六開目[illegible]與[illegible]開目而
目[illegible]經絡[illegible]開目而[illegible]去
[illegible]麻木也
[illegible]其色祖[illegible]
[illegible]為在外在上
[illegible]大小[illegible]其[illegible]木
[illegible]緩者濕氣伏
[illegible]助氣益血微瀉陰火
[illegible]公文不[illegible]別其[illegible]陽則已矣非五臟六腑之
本有邪也此藥主之

生甘草去腎熱　酒黃蘗瀉火除濕　白茯苓除濕導火