

半一錢 右每服八錢 生姜三片 棗一枚 食後溫服
減柴胡 茯苓 五味 貝母 桔梗 枳實 加地骨皮
知母 烏梅 嬰粟殼 即上人參清肺湯已上
乃御米殼 烏梅 例收後藥也

卅溪謂黃昏嗽者火浮于肺以酸味斂而降之用
訶子 五味 五倍子 白礬等是也

雜方

血竭散 治勞嗽見血諸治不効

蛤蚧一對 訶子錢三 血竭錢一 三味共為末以姜

汁與蜜等分熬膏入前末調三五分服効
治咳嗽感冒方 及痰嗽熱嗽

雪梨一箇開一竅入明礬一錢用紙封固灰火
中煨令礬化梨熟為度食之立愈甚者不過枚
又方 治痰嗽

細芽茶三四兩濃煎瀝去渣好蜜六兩水內填
滾抹去沫入濃茶內同煮二三沸露一宿空心
溫服一碗二三次全愈

阿膠散 一切咳嗽虛人老人皆可服

阿膠 馬兜鈴各一兩 五靈脂 桑皮各一錢 炙甘草
草半錢 右為末每服一錢水一鍾煎六分食
後夜卧通口服

當歸散 治男婦因打撲負重辛苦勞力傷損肺
臟既損遇風寒則為咳嗽或咯紫血宜此藥去
心肺之瘀血 仍灸肺俞穴 蘇木 生地黃
當歸 大黃 芍藥 等分為末每服四錢或
水酒煎服亦可

活血飲 自裁得効方治怒氣積血在脅脇咳嗽

年久不愈每咳則隱隱而痛 滑石一錢五分 菝葜仁

錢一 紅花五分 桔梗五分 粉草四分 瓜蒌二錢 丹皮八分 茜根

八分 貝母八分 柴胡五分 香附五分 麩五分 水煎服

躰厚者加大黃川山甲或作末以韭菜汁拌

為丸服

本事 治十六般哮喘

阿膠炒一兩 馬兜鈴 炙甘草 半夏姜汁浸三日

人參五錢 杏仁去皮尖 右為末每服一大錢水

一盞煎至七分臨卧食後服

隨病看湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎 肝嗽眼淚出加
烏梅一枚大米十四粒煎脾嗽不思飲食或惡
心一兩時入姜二片煎胃嗽吐逆酸水入蛤粉
煎膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 膈
咳嗽出痰如員塊生姜汁調藥嚥下 勞嗽入
葶苈末煎 血嗽連頓不住當歸末枣子同煎
暴嗽涕唾稠粘入烏梅生姜同煎 產嗽背
脾痛甘草三寸黃蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹

滿入青皮去白同煎 熱嗽夜甚蜜一匙葱白
同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎 腎
嗽入黃耆白飴糖同煎 上件十六般嗽依法
煎服無不効驗此方京都一家專治此疾因中
官厚賂始得其方屢試有効
本事劫痰方 治癆嗽及哮喘痰湧

青黛

錢三辰砂

雄黃

明瓦

信石

生用各
一錢

右俱為極細末淡豈豉一百粒湯浸去殼研
如膏入藥丸如梧子大臨卧冷茶吞一九

瓊珠散 治咳嗽不問遠近其効如神

桑白皮兩四 五味子兩二 甘草二兩 陳皮兩二 粟殼斤一

去蒂膜用醋浸三宿 晒干再入醋浸晒干 右為末用冷蜜湯調服

忌煎燻油膩酒醎酸等物

潤肺湯 治上盛下虛脾肺濕熱遠年近日氣喘

咳嗽痰盛心胃氣悶不思飲食或寒熱往來或

感冒風寒喘嗽氣急五癆七傷吐血等症並皆

治之 知母錢二 紫苑錢五 山梔仁分五 甘草錢一

半炒 麻黃五分 滾湯泡洗淨 荆芥五分 馬兜鈴五分 去白沫晒干 梗去

前胡錢二 赤芍錢一 桑白皮錢二 半夏錢三

湯泡七次晒 赤茯苓錢二 杏仁錢五 黃芩錢二

半去 如婦人加當歸川芎生地黃牡丹皮各一

錢 此藥製度每服一兩四錢半用水二大鍾生

姜五片初感風寒加葱白三根久患咳嗽加東

二枚不用葱白煎至一鍾半去滓臨睡候將身

右卧用絹帛頂住右軟肚次用竹筒緩吸藥

熱服不言語呼喚切忌房勞

姓 娠 咳 嗽

馬兜鈴散 治胎氣壅塞咳嗽喘息

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢

橘紅 紫蘇 大腹皮 桑皮 各一兩 五味 五錢

每服六錢姜四片水煎服

麻黃散 姪娘外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 節去 橘紅 前胡 各一兩 半夏 人參 白朮

枳殼 貝母 甘草 各五錢 每服六錢姜四片

葱白五根束二枚水煎服

竹茹紫苑湯 咳嗽不止胎不安

紫苑 天冬 各一兩 桔梗 五錢 甘草 杏仁 桑皮

各二錢半 每服五錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半

匙再煎二沸溫服

天門冬湯 氣逆咳嗽

天冬 去心一兩 貝母 人參 甘草 桑皮 桔梗

紫蘇 各五錢 赤茯苓 二兩 麻黃 去節七錢半

每服六錢姜四片水煎服

喘門

岐伯曰不得卧而息有音者是陽道之逆也足三

陽者下行今逆上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安論又曰夫不得卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主卧與喘也

東垣曰肺脹而喘咳胃膈滿壅盛而上奔者於隨証用藥方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許如甚則交兩手而督者

真氣大虛也若氣短加黃耆五味子人參氣盛去五味子人參加黃芩荆芥穗冬月去荆芥穗加草薏蔻仁

卅溪曰哮喘未發以扶正為要已發以攻邪為主陰虛自少腹下火起衝於上而喘者宜降心火補陰有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火上氣喘而躁者為肺脹欲作風水症宜發汗則愈諸喘不止者用川椒目研極細一二錢生姜湯調下劫之氣虛不用又

法用蘿蔔子蒸為君皂角燒灰等分為末姜汁
加煉蜜為丸小莖大每噲化五七十九粒止之
後因痰治痰因火治火氣虛者用人參蜜炙黃
栢麥冬地骨皮之類 氣實人因服參著過多
而喘者用三拗湯 喘甚者須用阿膠若久病
氣虛而發喘者宜阿膠人參五味補之 新病
氣實而喘者宜桑白皮苦葶瀉之

凡喘正發時無痰將愈時却吐痰者乃痰于正發
之時閉塞不通故喘甚當于其時開其痰路則
喘易安也宜桔梗湯及枳殼瓜蒌實杏仁蘇葉
前胡等引出其痰候痰出喘退却調其虛實虛
者補以參著歸木實者瀉以沉香滾痰丸之類
是也

肺虛則少氣而喘經曰秋脉者肺也秋脉不及則
喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音治則人
參五味門冬之屬是也

肺痺肺積則久喘而不已經云淫氣喘息痺聚在
肺又云肺痺者煩滿喘而嘔是肺痺而喘治法

或表之或吐之使氣宣通而愈也

難經云肺之積名息賁在右脇下如杯久不已令人喘咳發肺癰治法則息賁丸是也

胃喘則身熱而煩經云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六腑入六腑則身熱不得卧上為喘呼又云陽明厥則喘而哕哕則惡人或喘而死者或喘而生者何也厥逆連臟則死連經則生是也啟玄子註曰哕謂熱內鬱而煩凡此胃喘治法加減白虎湯之類是也

腎喘則嘔咳經云少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故咳上氣喘也東垣治以瀉白散是也

凡喘不得卧其脉浮按之虛而瀉者為陰虛去死不遠慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝青黛門冬五味枳殼蘇葉服之

東垣曰病機云諸痿喘嘔皆屬於上辨云傷寒家論喘嘔以為火熱者是明有餘之邪中于外寒變而為熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏梁

之人奉養太過及過愛小兒亦能積熱于上而為喘咳宜以甘寒之劑治之脉經又云肺盛有餘則咳嗽上氣喘渴煩心胃滿短氣皆衝脉之火行于胃中而作係在下焦非屬上也蓋雜病不足之邪起于有餘病機之邪自是標本病傳飲食勞役喜怒不節水穀之寒熱感則害人六府皆由中氣不足其膈脹腹滿咳喘嘔食皆以大其辛熱之劑治之立已今立熱喘寒喘二方熱用人參平肺散 寒用參蘇溫肺湯

三因論曰 寸口陰脉實者肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如嘔狀自汗皆肺實之証右寸陰脉虛者肺虛也必咽乾無津少氣不足以息喘有寒有熱有水病寒喘遇寒則發熱喘發于夏而不發于冬水病者小便澀胃膈滿悶脚微腫是也熱喘宜蛤蚧丸寒喘宜煮肺散水病宜當中分冷熱虛而冷者紫金丹實而熱者防已丸戴元禮曰有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者一喘便有痰声氣急喘者呼吸急促

而無痰声有胃氣虛喘者擡肩擷項喘而不休
火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大
槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠
痰喘則止稍久食已入胃反助其火痰再升上
喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者
以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不
愈後以導水丸利五六次而安

又心法附錄曰凡此証脉滑而手足温者生脉瀋
而四肢寒者死 傷寒必上氣急不得卧喉中

有声或声不出以三拗湯華蓋散九室湯神秘
湯皆可選用 氣不調而痰鬱喘逆四磨湯或
蘇子降氣湯 若虛喘脉微色青黑四肢厥小
便多以活人書五味子湯或四磨湯

腹滿脉沉實者為裏實

羅太無治一婦年踰五十身軀肥盛因飲酒及潼
乳過腹脹喘滿声聞舍外不得安卧大小便澁
滯氣口脉大兩倍于人迎関脉沉緩而有力時
值八月霖雨不止予思霖雨之湿飲食之熱湿

熱大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者下之故製平氣散以下之 白牽牛

二兩一半生一半 炒只取頭末一兩 青皮去白 檳榔各三錢 橘紅五錢

大黃七錢

內經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿以為君陳皮青皮苦辛溫平散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使

右為末每服三錢煎生姜湯一大盞調下無

時一服減半再服喘愈只有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再與加減瀉白散

桑白皮一兩 地骨皮兩 知母 橘紅 青皮去白

桔梗去芦各五錢 黃芩 炙甘草各三錢 每服五錢

水二大盞煎至一盞去渣溫服食後數服良愈華佗云盛則為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡看文字雖要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也言肺中之火盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也言肺中之火有

餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中
之火實補肺也不可不知

陰虛者補之

丹溪治一人家豐好內厚味每年到四月九月
內必發氣喘擗有吐痰脉沉澁而細數諸醫用
平肺之藥數年不愈用人參生地黃膏和當歸
牛膝肉苁蓉枸杞五味子知母黃栢天門冬
玄參末為丸如梧子大每服百丸空心服以救
肺虛又用阿魏黃連山查沉香牛黃辰砂膽星

陳皮神麩糊為丸梧子大臨卧姜湯下三四十
丸以治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而
東垣調中益氣湯加減法

如秋冬月胃脉四道為衝脉所逆并脇下少陽
脉二道而反上行病名曰厥逆其証氣上衝咽
不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸五分或
一錢觀厥氣多少而用之 如夏月有此証為
大熱也蓋此証隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃
連黃栢知母各等分為細末熱湯丸如桐子大

每服二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不得胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損症也當用溫平甘多辛少之藥是治其本也如時見寒熱四時証也又將理不如法或酒食過多或食辛熱寒冷之物作病或居大寒大熱之處益其病當暫用大寒大熱之藥而取効此從權也不可以得効之故而久用之必致夭橫矣

平居則氣和行動則氣促而喘者亦衝脈之火予族兄六旬有餘素有喘症或嘔吐血痰平居時則不喘稍行動則氣促喘急以黃栢知母滋腎丸空心服七八十丸其症大減此黃栢知母能泄衝脈之火者如此効也

簡易方 治肺氣喘嗽馬兜鈴二兩去殼取子秋石半兩入碗內和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每一錢水一盞煎六分溫呷之以藥末含嚥津亦得

肺氣虛者宜補之

本事方治咳喘氣急以參一味為末鷄子清投新水調下一錢昔有二人同走一舍人參一不含俱走三五里許其不含者大喘含者氣息自如乃人參之力也

仲景治火逆上氣咽喉不利以麥門冬湯主之止

其逆而下其氣也 麥冬七升 半夏一升 人參四兩

甘草二兩 粳米三合 大棗十二枚 右六味以水一斗

二升煮取六升溫服一升日三夜一

許學士治一婦年五十餘素有痰嗽忽一日大喘

痰出如泉身汗如油脉浮而洪似命絕之狀予

適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味子一

錢五分煎服一帖喘定汗止三帖後痰亦漸少

再與前方內加瓜蒌仁一錢五分白朮當歸芍

藥黃芩各一錢服二十餘帖而安此實麥冬五

味人參之功也如自汗兼腹滿脉沉實而喘者

裏實宜下之

活人五味子湯

治喘促脉伏而數者

五味子錢二 人參 麥冬 杏仁 橘紅各二錢半

姜三片 紅棗三枚 水煎服

喘凡遇冬而發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼三錢 麻黃 防風 黃芩 桔梗二錢 陳皮

木通錢半 通利九竅 紫蘇五葉

右分四帖水煎服之

又方 治寒包熱而喘必用發散 半夏 枳殼

炒 桔梗 黃芩炒 紫蘇 麻黃 杏仁 甘草

如天寒加桂枝

東垣麻黃定喘湯 小兒寒鬱喘喉中鳴腹內响

堅滿鼻流清涕脉沉急而數 麻黃 草薺

益智仁各兩分半 甘草 歸身 紅花 黃芩生

柴胡各一分 升麻 神麩各五分 吳茱萸三分 蘇木半分

全蝎 右分二服水煎微汗愈

麻黃蒼朮湯 治秋暮冬月每夜連声嗽不絕口

喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛卧而多驚

筋挛肢節痛痰吐涎沫日晚呵欠不能飲食

柴胡 羌活 蒼朮各五分 麻黃一分 防風 甘草

稍生 歸尾

黃芩

各四分

炙甘草

三分

五味子

九分

草豆蔻

六分

黃耆

一錢半

右分二帖水煎稍熟

服 此二方發中外之寒

七情氣鬱宜四磨湯以解之庶下其氣而止其喘

急也 人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服

加木香枳殼為六磨湯 有苦寒者加丁香

亦可 衍義云烏藥檳榔氣稍走泄但不甚

剛猛與沉香同磨作湯治胃中氣膈甚當

丹溪治一婦人發熱氣喘與解表藥汗出而定因

夜半食粥早喘再作心痞口乾 半夏 枳實

炒各三錢

黃連

白朮

各二錢

木通

陳皮

各一錢半

麻黃

紫蘇

各一錢

炙甘草

加姜水煎服

分氣紫蘇飲 治脾胃不和洒淅惡寒氣逆喘促

五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果

大腹皮 陳皮

桔梗

各等分

紫蘇

減半

姜三片水煎服

東垣人參平肺散 治心火刑肺傳為肺痿咳嗽

喘嘔痰涎壅盛胃膈痞悶咽嗑不利 桑皮錢一

知母分七 炙甘草 地骨皮 人參分各五 茯苓

天冬分各四 青皮 陳皮分各三 五味子三十粒

如熱甚加黃芩紫蘇葉半夏各五分

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘煩心胃滿

短氣不能宣暢 人參 肉桂 甘草 木香

五味子 陳皮 半夏 白朮 桑皮 紫蘇

莖葉各二兩 茯苓一兩 每五七錢姜三片水煎服

如冬寒月每服加不去節麻黃半分

加味華蓋散 肺受風寒胃滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑皮 麻黃 杏仁

各二錢 甘草一錢 姜三片束二枚水煎服

九寶湯 欬而身熱喘急惡寒 麻黃 薄荷

陳皮 肉桂 紫蘇 杏仁 甘草 桑皮

大腹皮各等分 加姜葱水煎服

發時有痰吐出者宜化痰

婦人大全千緡湯 半夏七枚破四片製之 皂角去皮絃

炙甘草寸各一 生姜六如指 右用水一碗煮去半

頓服一方不用甘草但用半夏末一兩皂角
去皮絃半兩生姜七片同入紗袋中水三升
煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服
連進之効

咳逆上氣時：濁唾但坐而不得卧者皂莢丸主
之方在咳
嗽門

水氣凌肺者宜徹之
東垣神秘湯 治病人不得眠：則喘急水氣
逆行上乘于肺：得水而浮使氣不流通其脉

沉大 蘇葉 陳皮 生姜 桑皮 人參各五

錢 茯苓 木香各二錢 右分二帖水煎服

防已葶藶丸 治肺氣喘嗽面目浮腫小便赤澀

喘促不得卧 漢防已 木通 貝母各一兩 苦

葶藶炒 杏仁 右為末枣肉膏為丸梧子大桑

白皮湯下

喘咳倚息不得卧仲景小青龍湯加石膏主之

方在痰
飲門

汚血凝滯胃膈者宜活之

丹溪治卒上氣喘鳴息急欲死者 韭汁飲一
升 痰蓋韭汁能去胃中惡血滯氣

又方 治上氣咳嗽胃膈妨悶氣喘 杏仁二兩

去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

東垣加味瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嘔

喘促 桑皮一兩 青皮二兩 茯苓三錢 甘草

地骨皮七錢 陳皮 五味 人參各五錢

每五七錢入粳米百粒水煎服

清金湯 治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急

喉中涎声冒滿氣逆坐卧不安飲食不下方在咳

丹溪清金丹見門 治食積痰喘嗽因厚味而發

者

調氣化痰丸 快脾順氣化痰消食治久喘或作

或止者 半夏 南星 白礬 皂角 生

姜 右各一觔水煮南星無白點為度揀去皂

角不用將生姜切作片同半夏南星晒乾再加

青皮去白 橘紅 蘇子炒 蘿蔔子炒另研 乾葛

杏仁去皮尖另研 神麴炒 麥蘖炒 山查 香附子

右各半觔淨與前藥合和一處為細末生姜汁浸餗餅打糊為丸桐子大每服五七十九食後茶湯送下

飲水多者宜滲利之

仲景云病人飲水多必暴喘滿以五苓散主之
白朮散 治夏月飲冷酒生痰膈滿而喘

白朮

茯苓

黃芩

半夏

各等分

每服六七錢

姜三片水煎調陳皮神麴末各一錢食後服

開提之劑

簡易方

治喘急

桔梗一兩半為末童便半

升煎取四合去渣溫服

開闔之劑

安肺散

治痰嗽不問新舊喘急氣逆

麻黃

去節 二兩

炙甘草

二兩

御米殼

去蒂炒 黃四兩

右為末每

五錢水一盞入烏梅一枚煎七分溫服

人參理肺散

治喘嗽不止

麻黃

去節 炒黃

川歸

木香

各一兩

御米殼

炒三兩

人參

杏仁

麩炒各二兩

每服六錢水煎服

雜方

保命集半夏丸 傷風痰作喘逆兀兀欲吐惡心

欬倒 半夏一兩 栝榔 雄黃各三錢 右為末姜汁

浸飪餅糊為丸梧子大每服五十丸姜湯下

羅太無人參半夏丸 化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風疼或壅頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胃膈

不利 人參 茯苓 南星 薄荷各五錢 半夏

乾姜 白礬 寒水石各一兩 蛤粉二兩 藿香二錢半

右為末水糊為丸梧子大每服三五丸姜

湯下日三服 此方治久喘極効於未發時

服之若已發時用沉香滾痰丸微下之累効

孫兆視雷道矩病吐痰頃間已及一升喘咳不已

面色鬱黯精神不快兆乃與仲景葶藶大棗瀉

肺湯一服訖已覺胸中快利畧無痰唾矣

加味白虎湯 治熱痰喘嗽火迫肺金

白虎湯加瓜蒌仁枳殼黃芩神効

雙玉散 治火痰喘嗽痰湧如泉

寒水石 石膏 等分為末人參湯下三錢

羅太無真應散 遠年喘急不能卧百藥不効者

白石英 四兩通明者以絹袋盛以雄猪肚一箇如

前法煮三次取出藥用官局款冬花散二錢入

細末入后前末二錢再加桑白皮二寸生姜三片枣子

一枚水一盞半煎七分通口服其猪肚亦可

食只不得用醬椒醋鹽姜等調和

官局款冬散 款冬花一錢 貝母 知母 桑葉

杏仁 半夏 阿膠 甘草 各二錢 麻黃 去節四錢

為末

陳皮湯 治痰喘 橘紅 半斤 明礬 二兩 共炒香

炙甘草 二兩 半夏 二兩 浸九水 右為末每服二錢 湯

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫 杏仁 半錢 蘇葉 二錢

五味子 大腹皮 烏梅肉 紫苑 炙甘草

各一錢 橘紅 麻黃 去節 桑皮 阿膠 桔梗 各七分

姜三片水煎服

玉華散 咳嗽上喘清肺利膈 甜葶藶 桑皮

半夏 貝母 天冬 馬兜鈴 杏仁 紫苑

百合 人參 百部 甘草 各七分 水煎服

定喘膏 詩括 一兩麻油二兩蜜半兩生姜自然汁紫

苑麻黃及杏仁桔梗細辛斟酌入更加半夏與人參慢火熬來成黑漆臨睡之時三兩匙覺來

定喘無蹤跡

定喘 治上氣喘滿倚息不能卧 杏仁 菴仁

俱麩炒 桑皮 各一兩 人參 五錢 姜朮水煎服

二竒方 治水氣發喘 方在水腫門

杏仁煎 治喘嗽 杏仁 去皮尖 胡菴肉 去皮 等分研

為膏入煉蜜少許丸如彈子大每嚼一二丸 姜湯下

又方 治氣虛喘嗽極效 人參 三錢 胡桃肉 五枚

姜五片水煎服

又方 用胡菴肉三枚生姜三片臨卧嚼下畢飲

湯三兩呷再嚼菴姜如前即就枕勿行動 甚効

又方 肺熱胸滿痰嗽 瓜蒌仁 研 半夏二味和

勻生姜自然汁打麵糊為丸如梧子大每服 五十九姜湯下

又方 治諸喘 麻黃分七 杏仁錢一 甘草分四 細茶炒八

分 石膏煨一 水煎服

定喘奇方 治稠痰壅盛躰肥實而喘者

廣橘紅兩二 明礬錢五 同炒香去礬不用 半夏

一兩 杏仁麩炒 瓜蒌仁去油 皂角去皮絃子燒

炙甘草七錢 黃芩酒拌晒 右為末餵餅用淡姜湯

打糊為丸葉豈大每食後白湯下一錢日二

次服三五日大便下稠痰而愈虛弱人每

治熱嗽喘咳不已 苦葶藶二兩炒 知母蜜炒 貝母

各一兩 杏仁尖研為泥 右為末煉蜜丸梧子大食

後臨卧桑白皮湯下五七十九

治喘哮 貝母一兩香附二兩半生 為末食後茶

調下二錢忌鹽油煎燂不拘水哮鹹哮並効

劫喘方 牛黃散治熱痰蒸 白牽牛炒二 大黃煨二

兩 蜜水下二錢

又方 蘿蔔子蒸 皂角燒存 姜汁和蜜丸梧子大

每服五十丸白湯下

治喘 用古文錢七箇鹽梅七箇水一盞同浸二

宿每服一呷空心良久吐出惡痰而効
子和稀涎散 治痰喘氣逆下氣化痰甚速

氣短氣促少氣

短氣而息促似喘非喘也少氣者氣少不足以言也

素問云三陽絕三陰微是為少氣

方盛衰論

怯然少氣

者是水道不行形氣消索也

示從容禱

言而微終日

乃復言者此奪氣也

綱目云治此少氣蓋生

脉散獨參湯之屬為愈也

一陽發病少氣善咳善泄

運氣言少氣有二

一曰火熱經云火鬱之發民

病少氣又云少陰之復少氣骨痿又云少陽之

復少氣脉痿治以諸寒是也 二曰風濕經云

太陽司天之政四之氣風濕交爭風化為雨民

病大熱少氣是也

喘與短氣辨

成無已曰短氣者氣而不能相續者是也似喘而非喘若有喘上衝而實非氣上衝也夫喘者張

口擡肩捶身滾肚謂之喘也氣上衝者腹裏時
時氣上衝也所謂短氣者呼吸雖數而不能相
續似喘而不搖肩似呻吟而無痛者此短氣也經
所言短氣者衆實為難辨愚師莫識悞者多矣
要識短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是
脉經曰寸口脉沉胷中短氣
生生子曰短氣少氣治法亦有異也短氣仍有虛
有實治法有補有瀉少氣則純不足也治惟有
補而已

仲景曰陽脉微而緊、則為寒微則為虛微緊相
搏則為短氣 又曰胸痺氣中氣寒短氣茯苓
杏仁甘草湯主之 橘枳姜湯亦主之 方見胷
痺痛門
痺喘息咳唾胷背痛短氣括萋薤白半夏湯主
之 方見胷
痺痛門 夫短氣有微飲當從小便去之苓桂
朮甘湯腎氣丸亦主之 腎氣丸方
見脚氣中 欬花補肺湯
治咳嗽短氣 又曰短氣皆屬飲苓桂朮甘湯
是其一法也金櫃云咳逆倚息短氣不得卧其
形如腫謂之支飲又云支飲亦喘而不得卧加

短氣其脉平也又云膈上有留飲其人氣短而渴四肢歷節痛脉沉者有留飲又云肺飲不弦但苦喘短氣其治法危急者小青龍湯脹滿者厚朴大黃湯冒眩者苓桂朮甘湯及澤瀉湯不得息葶藶大棗湯吐下不愈者木防已湯是類也東垣曰胃滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃耆以補之如腹中氣不轉者加甘草一半肺氣短促或不足者加人參

白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽之邪不敢犯之如衣薄而短氣則添衣于無風處居止氣仍尚短則以熱湯一碗薰其口鼻則不短也如衣厚于不通風處居止而氣短則宜減衣摩揩汗孔令合于漫風處居止如久居高屋天寒陰濕所遏令氣短者亦如前法薰之如居周密小屋或大熱而處寒涼氣短則就風日亢氣短皆宜食滋味湯飲令胃氣調和仲景曰平人無寒熱短氣不足以息者實也

丹溪治許

白雲先生脾疼跨痛短氣用大吐大法是也

孫尚正元散 治氣不接續兼治滑泄及小便數

王丞相服之有效 莪朮一兩金鈴子去核二

錢半右件為末入礪砂一錢煉過研末和勻每

服二錢鹽湯或溫酒空心調服

苓桂朮甘湯 治痰飲短氣

方在痰飲門

產後喘

產後喘乃急症極危多死郭氏謂此名孤陽絕陰為難治因所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚

肺中故令喘促喉中氣急也治此症用獨參湯

為妙 陳無擇云宜大料芎歸湯 若惡露不

快散血停凝上薰于肺亦令喘急但服奪命丹

血去喘自定

血沒散 產後敗血冲心胃滿上喘命在須臾

真血竭 沒藥 等分為末每服二錢用童便

好酒煎一大沸溫調下 方產時進一服上

床良久再服其惡血自循經下行更不上冲

免生百病

參蘇飲 產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參為一兩蘇木兩二 右以水二碗將蘇木煎至

一碗去渣調人參末隨時加減服神效

若因憂怒性氣抑鬱而發喘者以小調經散用桑

皮杏仁煎湯調服

旋覆花湯 產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧

不寧 旋覆花 赤芍藥 荆芥穗 半夏麩

五味子 麻黃 茯苓 杏仁 甘草 前胡

各等分 姜五片 棗一枚 水煎服

一婦孕時足腫七月初旬產後二日洗浴即氣喘

但坐不得卧者五個月惡風得煖稍寬兩關脉

動尺寸皆虛百藥不效牡丹皮 薤仁 桂枝 茯苓

乾姜 枳實 厚朴 桑皮 紫蘇 五味 瓜蒌 仁煎湯服

之即寬二三服得卧其痰如失盖作汚血感寒

治之也

若傷醜冷飲食而喘者宜見睨丸 姜黃 三稜

華澄茄 陳皮 良姜 人參 莪木 右等

分為末蘿蔔水煮爛研細將汁煮麵糊為丸

梧子大蘿蔔子湯下

小調經散 產後四肢浮腫者敷血循經流入四肢淫留日久腐爛如水故令四肢腫面色黃宜服此血行腫消則愈 沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸 各一錢 細辛 射香 各五分 右為末每服五分姜汁酒調服之

哮

丹溪曰哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可

哮喘遇冷則發者有二

其一屬中外皆寒者治法乃東垣參蘇溫肺湯調中益氣加吳茱萸湯及紫金丹劫寒痰者是也 紫金丹即砒霜猪肉煨為末蒸餅丸者 其二屬寒包熱治法乃仲景越未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包哮自不發是也

食積痰壅哮喘咳嗽清金丹遇厚味發者用之

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾為末一兩

猪牙皂角

燒存性三錢

用生姜

汁浸蒸餅丸如小葶藶大每服三五丸噉

下 劫喘以姜汁煉蜜如梧子大每服七八
十九噙下止之

遠年近日哮喘痰嗽 蟬退去足 輕粉另研 馬兜

鈴各一兩 五靈脂生 雄黃生 杏仁去皮 砒各

五錢 淡豈鼓四十九粒 右為末用生姜葶蘆自然汁

合輕粉諸藥為丸小彈子大每服一九細嚼

臨睡生姜湯下

治釣嗽 蘇子二錢 麻黃去節三錢 欵花 桑葉蜜炙

半夏各三錢 杏仁去皮尖 甘草 白朮二十一粒

色 水三鍾不用姜煎二鍾徐頻服

一方治全 用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入

口內服之口中橫咬竹管一個片時間則涎自

口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水咻 芫花末為 大水上浮淳過 大米粉

右三味搜為糶清水煮熟恣意食之

又方 青皮一枚 半開者入芑豈一粒鉄線縛定燒

存性為末姜汁并酒各一呷同調服過口便定

定喘湯 白朮二十一粒 去殼 麻黃 欵冬花

桑皮炙

法製半夏

如無以甘草湯泡七次去皮用各三錢

甘草

蘇子錢二杏仁半錢

黃芩炒半錢右用水三鍾煎

二鍾分二服不用姜不拘時徐服

詩曰諸病原有藥方惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏尋蘇子白菓冬花更又良甘草

黃芩同半夏水煎百沸不須姜病人遇此

仙丹藥服後方知定喘湯金陵有一浦舍

用此方專治齁疾無不取効此其真方也

壓掌散治男婦哮喘痰嗽麻黃去節二錢半炙甘

草二錢

白菓

五箇打碎水煎臨卧服

二黃丸濟生方

治傳痰在胃喘息不通呼吸欬

絕

好雌黃

錢一雄黃

兩一研極細末熔黃蠟為丸

彈子大每服一九於半夜時煮糯米粥乘熱

以藥投入粥內攪轉和粥吃

善悲

內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則

悲是也

肺虛補母仲景云婦人臟躁喜悲傷欬哭象如神

靈旸附數欠伸甘麥大棗湯主之

甘草三兩

小麥

一升

大棗

十枚

水六升煮三升分三服亦

補脾氣

許學士治一婦人數次無故悲泣不止或謂之有崇祈禳請禱備至終不應予忽憶金櫃有一証云婦人臆躁悲傷欲哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥尽劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

運氣云悲証皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明

伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

姪娘善悲

綱目述管先生治一姪娘四五箇月臆躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大棗湯一投而愈

肺痿

金匱要畧千金方
脉經論同

論曰寸口脉數其人病咳口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從瘡渴小便利數或從便難被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不澁三焦踟躕入而不出陰脉不澁身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欬欬不得咳咳出乾沫久久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫

而不咳者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欬飲者自愈自張口者短氣也

王海藏曰此証初得可治久則難愈何者上枯水之源下竭水之本也

又曰寸口脉虛小者為肺痿熱之所過初結為膿始萌可救微發渴者欬愈

又曰凡傷風傷寒後咳嗽唾血者此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿當以小柴胡去人參大棗

生姜加乾姜五味子

又曰肺痿肺癰其皮如赭糠○有胃脘成癰其皮
緊如甲錯有腸癰裹大膿血于腸胃之間

又經云陽明司天唾出白血者其狀淺紅如肺色
故曰白血

又曰無汗惡寒脉浮緊得自傷寒法從麻黃○有
汗惡熱脉沉實得自傷酒法從葛根

生生子曰痿乾癘也即早發還先痿之痿

甘草乾姜湯 温臟治肺痿多涎唾小便數肺中

冷必眩不渴不咳上虛下不能制溲服此湯已渴者屬消

渴 甘草灸四兩 乾姜二兩 水三升煮取一升半

分温日二服 集驗肘後有大棗十二枚

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中温温液液方
千金翼名温液湯 甘草二兩水三升煮取一升半分三服

生姜甘草湯 治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生姜五兩 甘草四兩 人參三兩 大棗十二枚

右水七升煮取三升分三服

桂枝皂莢湯 治肺痿吐涎沫不止 桂枝

生姜 各三兩 甘草 二兩 皂莢 一兩 大棗 十五枚

水七升煮取三升分三服

千金方麻黃湯 仲景名小青龍加石膏湯 治肺脹咳而上氣

咽燥而喘脉浮心下有水 麻黃 芍藥

生姜 仲景用乾姜 細辛 桂心 各三兩 半夏 五味子

各半升 石膏 四兩 水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升強壯服一升羸者減之日三服

小青龍湯無石膏

知母茯苓湯 肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓 炙甘草 各一兩 知母 五味子 人參

薄荷 半夏 柴胡 白朮 欵花 桔梗

麥冬 黃芩 各五錢 川芎 阿膠 炒各三錢

右每服一兩姜三片水煎服

久癆咳嗽肺痿見血 知母 貝母 天冬 麥

冬 欵花 各三分 川歸 地黃 苡仁 杏仁

天花粉 各五分 桔梗 甘草 馬兜鈴 紫苑

阿膠 白蟾 各一分半 姜三片東一枚水煎連進

三服立愈

人參平肺散 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔

痰涎壅盛胃膈痞滿咽嗑不利 橘紅 甘草

炙地骨皮 茯苓 青皮 蘇葉 半夏 各五錢

桑白皮 一兩 知母 七錢 人參 天門冬 各四錢 有

熱加黃芩 四錢 五味子 三百粒 每服五錢姜三片

水煎服或為末姜汁丸如彈子大噙化亦可

人參欬花膏 脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳

嗽痰涎嘔逆惡心腹脇滿脹腰背傷痛或虛勞

冷嗽及遠年近日一切咳嗽諸藥不効欬成癆肺

欬花 人參 五味子 紫苑 桑白皮 各一兩

右為末煉蜜丸芡實大每食後細嚼一丸淡

姜湯下噙化亦可

肺癰 仲景王叔和論同

孫真人曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虛者

屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒

非肺痿若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛脉反滑

而數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知

為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何

類何以引之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過于營吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數跌陽脉緊寒熱相搏故振寒而咳跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈

也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也

生生子曰按金櫃要畧脉經元戎論肺痿肺癰皆無分別治亦相須以其俱為肺病也愚歷見今之病此者亦稍有分別不能不為之辯也肺痿近于虛怯故王海巖援內經勞風論証入之謂上枯水之源下竭水之本也何言乎內經五痿論皆以肺熱葉焦為本故今之病肺痿者多乾

咳聲啞无力緣肺主聲肺為火燥憊劇枯痿乾
癆故聲不充發也虛怯者多有之肺癆雖亦為
肺熱所致多有因于外感因于酒熱故間有吐
及膿血而愈者有瀉肺而愈者茲分肺痿肺癰
為二門祖千金也

王海藏曰寸口脉實大為肺癰血為凝滯化為五
色脉數為弱膿成難已不渴者難治

黃昏湯 治欬有微熱煩滿胃心甲錯是為肺癰
者方 黃昏手掌大一片是合昏皮也咬咀以

水三升煮取一升分二服

又方 薏苡仁 瓜瓣半升 薤仁五十枚 葦莖切二升水

二斗煮取五升去滓 右四味內葦汁中煮取二升服一升

當有所見吐膿血

王海藏加味葶藶大棗瀉肺湯 治脉緊數則膿

已成喘而不得卧 葶藶二兩炒 右件杵

成丸以水三升煮大棗二十個取二升去渣
內麻黃五味子各半兩取清飲頓服令三日
服一劑瘥

又一法 治一切欬唾膿血久欬及出不止好酥
三十觔三遍煉停取凝成膏醞服二合日三
服瘥

如聖丸 治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶
及肺癰噴嗽膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁
沫氣息腥臭久久咯膿狀如米粥 龍腦另研

牛黃另研 桔梗 甘草生用各一錢 右為細末煉

蜜丸每兩作二十九丸每服一九嚙化

嗽藥青龍散 石膏生用各一錢 朴硝 甘草生用各一錢

青黛兩半 右為細末每服二三錢煎薄荷湯點熱

漱冷吐

衍義蛤蚧散 治肺虛欬久成瘡吐膿血 犀角

羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕腐盡 黃耆 白芍

藥 香白芷各等分 右為末乾上患處上用膏

藥敷貼一日一換

海藏云此方雖云上瘡吐膿血久不盡者亦宜用
此藥作湯散煎調服之又宜糊為丸桐子大白

湯下三五十九或乾糝細末咽津大妙

錢氏如聖散 桔梗 甘草 阿膠炒白

煎甘桔取清內膠化服

黃耆鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有

盜汗胸脇不利飲食多渴欬唾稠粘時有膿血

知母焙 桑白皮去皮 黃耆去 甘草炙 赤芍藥 紫

苑去蘆已上七味各五錢淨 秦艽洗去蘆 白茯苓去皮焙

焙別 生地黃 柴胡去蘆 地骨皮去骨已上五味各六錢

分 肉桂去皮不 人參 苦桔梗已上三味各

鱉甲去頭用酥炙更佳 天門冬湯洗去心焙一本忌火

半夏分五 右為粗末每服二大錢水一盞煎至七

分去渣溫服食後 海葢云此方內闕黃耆

疑黃芩是黃耆也然內有黃芩有小柴胡今

治虛熱妙為有盜汗亦無妨也兼加知母地

骨皮赤芍藥即錢氏地骨皮散也○治盜汗

亦妙內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也

○天門冬人參地黃即三才也○秦艽柴胡

甘草螿甲芍藥即黃龍湯也○紫苑桔梗甘草即紫苑散也○桂芍黃耆甘草即黃耆建中湯也又云此方治本無傷寒風而得○孫真人治唾膿血用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒而得也內多五味子皆祖仲景法無論傷寒傷風皆可加五味子又云桔梗一味有辛有苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

硃砂膏 鎮心神解熱除煩唾血等證

硃砂另研珍珠末 生犀角 人參 玳瑁末

甘草各一兩金箔泥分輕粉二錢蘇合油一分牛黃

另研麝香另研龍腦另研南鵬砂 琥珀 遠志 羚羊

羊角 赤茯苓已上各半兩安息香酒熬去石約半兩

右為細末入研藥極細煉蜜丸蘇合油和諸藥為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服一皂角子大噙化人參湯下亦得並阿膠丸相雜服尤勝至寶丹

定肺散 知母半兩 貝母二錢 人參二錢 枯礬半兩

烏梅肉兩半 御米殼兩 白朮二錢半 為細末水

煎生姜湯點亦得蜜丸彈子大噲化亦得

定肺丸 欬冬花 紫苑 知母 貝母 人參

甘草炙 桑白皮 御米殼 麥門冬 百部

馬兜鈴 五味子 烏梅肉已上各等分

右為細末煉蜜丸彈子太噲化一九

古方紫苑散 紫苑兩半 欬冬花兩半 百部二錢半

右為細末烏梅湯點服生姜亦得 如欬加

五味子喘加杏仁 渴加烏梅 氣逆加陳

皮 頭痛加細辛三錢甘草二錢 氣脫者

加御米殼蜜炒粗末水煎

增損防風通聖散 治鼻塞不通肺氣不利

桔梗 桑白皮 紫苑 鼠粘子各半 荆芥穗

三兩甘草一兩已上 右為粗末防風通聖散各一

半和勻每服四錢水一盞半生姜五片煎至

七分去渣溫服食後

葶藶大棗瀉肺湯 肺癰胃滿脹一身面目浮腫

鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫

塞先服小青龍湯一帖

葶藶

三炒研

大棗

十二枚

先以水二升煮棗取二升去棗入葶藶煮取一升服

外臺桔梗白散 咳而胃滿振寒脉數咽乾不渴

時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗

貝母

各三兩

巴豆

七分

右三味為散壯人服

五分弱者減之病在膈上吐膿血膈下者瀉出 若下多不止者飲冷水一杯

欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久

久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之

亦治血痺

桔梗

一兩

甘草

二兩

右二味

以水三升煮取

一升分溫再服則吐出膿血而愈也

欬逆上氣時時濁唾但坐不得卧皂莢丸主之

皂莢

刮去皮酥炙

為細末蜜丸梧子大以棗膏和湯

服三丸日三夜一

孫真人治肺癰吐膿血用甘桔湯二十餘條加減

生甘草一兩桔梗二兩水煎服 咳逆氣昏加

陳皮咳嗽者加知母貝母 欬而渴者加五味

吐膿血者加紫苑 肺痿者加阿膠 面目腫者加茯苓 嘔者加生姜半夏 少氣者加人參麥冬 膚疼者加黃耆 目赤者加梔子黃連 咽痛者加鼠粘子竹茹 声不出者加半夏桂枝 疫毒頭腫者鼠粘子大黃茫硝 胸痛膈不利者加枳殼 心胃痞者加枳實 不得眠者加梔子 發狂者加防風荆芥 酒毒者加葛根陳皮

桔梗湯 治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶

咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌仁 只殼 苡仁

桑皮 防已 各一分 甘草節 杏仁 百合 各六分

黃耆 一分錢 分二服姜三片水煎溫服大便秘

加大黃 小便秘加木通

升麻湯 肺癰吐膿血作臭氣 升麻 苦梗

苡仁 地榆 黃芩 牡丹皮 芍藥 各一分錢

甘草 三錢 分二服水煎食後溫服

紫苑湯 治咳嗽唾中有膿血虛勞癯痿

人參 紫苑 知母 桔梗 甘草 五味子

茯苓 阿膠 貝母各一錢 姜三片水煎服

排膿散 肺癰吐膿以此排膿補肺

黃耆一兩 水二鍾煎一鍾食後溫服

束膏丸 肺積在右脇下如杯發為癧 陳皮

苦梗 葶藶 各等分束肉搗為丸梧子大每

服五十九丸米飲下

消濃飲 肺有癧膿腥氣上衝嘔而咳嗽

天南星 半夏 知母 貝母 生地 阿膠

川芎 甘草 桑皮 防風 射干 桔梗

天冬 薄荷 杏仁 白芷 紫蘇 白芨

烏梅 各等分每服七錢姜三片水煎服


赤水玄珠第八卷目錄

瘡門

泄痢辨

泄瀉門

痢門



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第八卷

瘧門

內經黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴飲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也

新安生生子孫一奎著輯

巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故飲冷也此皆得之夏傷暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗空踈腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯

曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍晏也其出於風府日下一節二十五日下至髀骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之