

新藥白品考

前篇

上


特279-205



1200501132096

279

05



始



特 279
205

癸 亥 丙 寅 初 夏 新 刻

坪井信良先生譯述

新藥百品考

前篇

原本獨逸歌仙貌廉涅兒氏著

紀元十八百五十七年發行

初白樓藏梓



序言

輒近西洋醫學日闡而歲明凡天地間自風水煙露水
雪之屬以至金石草木禽獸虫魚皆可取以充治療之
用也故藥劑方法之衆多其麗不億雖更僕不能算然
而其用之不得法則不啻無益于病適足以遺患害是
知其製法之與用法不可不精密焉譬如生薑芥子番
椒胡椒之類少用則調味健胃過用則破血釀熱百物
皆然矣聞嘗譯新藥選蓋獨乙醫官過仙貌廉涅兒氏
為藥舖某撰定新藥四百九十品而荷蘭藥舖屠陸篤
加增訂欲使買者資以審用法而莫所誑誤也每品舉

主治功能、兼詳製法與用法、固瑣、一小冊、雖不足盡
 方法、萬分之一、而亦足以觀西人用心之密、賣藥買藥
 一匙、不苟也、余有所深感、因披其中、方今日用之藥、六
 百品、以公于世、亦省謄寫之勞耳、刀圭之士、或取為理
 療之南針、則庶幾於臨病投劑之際、無繆其方向歟、書
 以告四方、且自警云爾、
 慶應二丙寅歲初夏、
 侍醫法眼、坪井浪信、長誌、

新藥百品考初編目次

醋精	一	結晶枸酸	一
乳酸	二	木醋	三
亞箇尼去謨	四	流動電典埤諾沒尼亞	五
請太刺箇加里	六	塩酸銀	七
生銀	八	銀礪砂	八
酸化銀	九	砒瀕沃實涅液	十
艾根越幾斯	十二	亞篤魯比涅	十一
純金	十三	塩酸金	十四
樺油	十五	蒲魯密烏謨	十六

加印加酸	十七	葛蒲油	十八
加爾基糖	十九	金盞花	十九
印度大麻	二十	罕答里實澀	二十二
獸炭	二十三	硫黃亞爾箇兒	二十三
呀囉方水	二十五	依蘭苔苦味質	二十六
醋酸規尼	二十七	砒酸規尼	二十七
吉那酸規尼	二十七	枸酸規尼	二十八
枸酸鐵規尼	二十八	鐵青酸規尼	二十八
青酸規尼	二十九	沃實澀水素酸規尼	二十九
乳酸規尼	二十九	塩酸規尼	二十九

硝酸規尼	三十	磷酸規尼	三十
硫酸規尼	三十	單寧酸規尼	三十二
酒石酸規尼	三十三	纈草酸規尼	三十三
規尼乙儒謨	三十三	聖叔尼	三十四
醋酸聖叔尼	三十五	吉那酸聖叔尼	三十五
塩酸聖叔尼	三十五	硫酸聖叔尼	三十五
古設尼爾列	以下下卷	古埕乙澀	二
結列阿曹篤	二	巴豆油	五
實芙蓉里澀	七	越默扶澀	八
鐵沃實澀	八	肝油	十

健質亞尼涅 十

人參 十一

越刺斯質加越謨 十二

藥刺比涅 十二

沃實涅硫黃 十三

青酸鐵剝篤亞斯 十四

石灰油 十五

麻屈涅失亞乳 十六

醋酸莫爾比涅 十七

塩酸莫爾比涅 十八

硫酸莫爾比涅 十八

煙草水 十九

番木鱉越幾斯 十九

糖丸 二十

塩酸白金 二十一

鱈魚肝油 二十一

大黃素 二十二

攝綿越幾斯 二十二

珊篤尼 二十二

麥奴越幾斯 二十三

麥奴油 二十四

斯必蘭的私 二十四

塩酸錫 二十五

醋酸斯篤里規尼 二十六

沃實涅酸斯篤里規尼 二十七

塩酸斯篤里規尼 二十七

硝酸斯篤里規尼 二十七

硫酸斯篤里規尼 二十八

麝香根 二十八

肝油舍利別 三十一

單寧酸 三十一

蒲桃蔓越幾斯 三十三

蒲桃花 三十三

醋酸亞鉛 三十三

青酸鐵亞鉛 三十五

塩酸亞鉛 三十六

新藥百品考初編卷之上

侍醫法眼 坪井良信良譯述

醋精 第一品

醋酸諸塩、或ハ木醋ヲ蒸餾スレハ、醋精、及ヒ炭酸臭油等ヲ得、但シ勉テ臭油ヲ脱スルヲ要ス、無色ノ液ナリ、竄透芳香、亞的兒性ノ香氣アリ、味初メ灼クカ如ク、後ニ清凉ナリ、速ニ焰ヲ發ス、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶ケ易ク、水ニ溶ケ難シ、功能 過設印亞的兒、及ヒ結列阿曹篤ニ同シ、衝動、殊ニ肺ノ粘液膜、及ヒ全身ノ毛様細管ニ

功アリ、祛痰、又組織ノ失常ヲ除キ、能ク之ヲ回復ス、或ハ腹痛ヲ發ス、

主治 咽喉勞、肺勞、又鎮痙ノ功アリ、咯痰ヲ容易ニシ、咳嗽ヲ緩メ、汗ヲ止メ、不佳ノ臭氣ヲ除キ、精神ヲ挑發爽活ニス、但シ極テ鋭敏ナル人、勞瘵患者ニハ宜シカラス、又急性慢性痛風、痺麻質ニ賞用ス、又驅蟲ノ効アリ、

用法 每服十五滴、至三十滴、一日二三四、

結晶枸橼酸 第五品

枸橼汁ト、炭酸加爾基ト飽合シテ、枸橼加爾基

トナリ、硫酸ニ由テ分拆シテ結晶ス、

無色透明、整正ナル長斜方晶ナリ、味極テ酸ナ

レト不佳ナラス、水ニ溶ケ易シ、

功能用法 枸橼汁ニ同シ、但シ散トナシ用フヘク、又里蒙奈埵沸騰散ヲ製スルニ便ナルヲ以テ優レリトス、其一刃ハ、枸橼汁八錢ニ充ツ、每服五氏至十氏、

乳酸 第八品

酸性物乙ヨリ製ス、蓋シ酸ト曹達ト飽合シテ乳酸曹達トナリ、之ニ硫酸ヲ注ケハ、分拆シ游

離セル乳酸ト、加爾基ト集合シテ、加爾基塩ハ、
 修酸ニ由テ分拆スルニ成ル、
 精製乳酸液ハ、舍利別ノ稠ナリ、無色無臭、純酸
 ニノ極テ侵蝕スル味アリ、其異重ハ、一、一二五
 ナリ、水、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶化ス、比例皆同シ、
 功能、總テ諸酸類ニ同シ、濃厚ノ者ハ、衝動ナ
 リ、稀薄ノ者ハ、清涼ナリ、胃カラ健運ス、骨ノ土
 質磷酸加ヲ溶解ス、
 主治、胃弱、磷ノ集合ヨリ生スル結石、白色膀胱結石
 失効兜陪苦、又齒石ヲ溶解ス、

用法 每服五滴、至十五滴、三十滴、一日四回至
 六回、單ニ水ヲ和用ス、含嗽劑或ハ錠トナス、
 乳酸ニ糖ハ、達刺侃篤越謨漿適宜、右調和
 シ、一箇毎ニ半莖ノ錠ト為ス、毎用一錠、一日三
 四回、或ハ里蒙奈埵ヲ製ス、
 乳酸五分至水半彬ニ溶レ、糖、舍利別ハヲ
 和ス、又磨齒丁幾、磨齒散ノ配合品トス、
 木醋第十二品
 木材ヲ乾餾シテ得ル所ノ液ナリ、精製木醋ハ
 褐色ニノ燒性酸臭味アリ、醋酸ニ同シ

功能 神經脈管ヲ衝動ス、防腐、蒸氣ヲ發シ、尿
ヲ利ス、大量一、二ハ衝動諸症ヲ發シ、遂ニ神經
力ヲ疲衰ス、

主治 内用、夫苟兒陪苦、肺勞、胃軟解、腐敗熱水
腫、下利、外用寒壞疽、痔瘡、猩紅熱ノ咽喉、喉衝、陰
囊水腫、少女ノ陰部寒壞疽、性潰爛、浸淫性、惡液
性、腺毒性腫瘍、又腐骨疽ノ侵蝕スルヲ防キ、頭
瘡ヲ治ス、

齒痛、微毒性息肉、頑毒流涎、耳聾、

用法 每服十滴、二十滴至三十滴、餉水、吉那浸

葛蒲浸ヲ和シ用フ、外用ニハ木醋四、五ヲ液ト

ハニ和シ、含嗽劑トス、以上精製品 粗製品ハ、外

用ニ供スルノミ、一分ニ液六分若クハ十分ヲ

和シ稀シ、蒸劑、洗劑、注入劑トス、或ハ耳内ニ滴

シ入ルニハ、粗製木醋酸、忽布滿鎮痛液、帝列並

底那油、各等分、

炭酸諸母尼亞ト木醋トノ和劑ハ、微毒性息肉

ヲ收縮ス、

亞爾尼去謨 第十六品

此ノ亞爾加里塩ハ、雙朮菊ノ最要成分ナリ、根

或ハ草ヨリ製ス、製法數様アリ、藥舗販ク所不
 淨質造無効ノ品アリ、其清淨品ハ白色粒狀ニ
 ノ無臭、味始メ苦ク、後刺戟ヲ覺ユ、外氣ニ觸テ
 變セス、揮發ナラス、温湯五十分、冷水百五十分
 ニ溶ク、亞爾箇兒、亞的兒、諸酸類ニハ、容易ニ溶
 ク、
 功能 神經脈管ヲ衝動ス、眼膏ニハ一氏ヲ脂
 二莖ニ和ス、之ヲ點スルニ大ニ刺戟シ、熱ヲ覺
 ヲ、腫子散大或ハ縮小ス、
 主治 内用 危険ナリ、痛風性眼病、外用神經痛、顔

面痛、痛風、痺麻質、膝痛、黒内障、虹彩、嫩衝、角膜暗
 翳、内翳、耳聾、耳痛、

用法 内用十六分氏ノ一、一日二回至四回、丸
 トナス、曾テ一貴婦五十分氏ノ一ヲ外用半氏
服スルニ、殆ント死セントス、
 至三氏ヲ亞爾箇兒一莖ニ和ス、或ハ一氏至四
 氏ヲ脂一二莖ニ和ス、又十六氏ヲ亞爾箇兒十
 六滴ニ溶シ、脂一莖ニ和ス、

顔面痛ニハ、亞箇尼去謨 二氏、亞爾箇兒 適宜
 脂 二莖、右調和シ、發作スル毎ニ、豆大ヲ取リ痛
 所ニ塗ル、之ヲ塗レハ、刺痛ヲ發スレバ、發作漸

ク遠ク、病勢漸ク減ス、連用レテ疼痛全ク止ムニ至ル、

耳内ニ滴スルニハ亞箇尼去謨九人ヲ亞爾箇

兒一ニ和シ用フ、

流動電典埴諸母尼亞第三十品

是レ極テ舊法ナレト、近世應用スル所大ニ廣

シ、故ニ默ス可カラス、此液二十滴ヲ水三十二

錢ニ和シ、醱酏セル人ニ少許宛頻ニ之ヲ與フ、

急性肺焮衝ノ一症、又偏頭痛ニ用フ、顔面痛ニ

ハ此液ヲ筆頭ニ浸シ、上顎齒際粘液膜ニ塗ル、

患者涙ヲ流スニ至レハ、疼痛立ニ去ル、

後頭神經痛ニハ、其功確實ナラス、每發作之ヲ

塗ルノ前ノ如シ、又呼吸器ノ疾患アル喘息神

經性短息、肺藏風氣等ニ用フ、則チ先ツ筆頭ヲ

水ニ浸シ、後諸母尼亞液ニ浸シ、其臭氣ニテ藥

力適宜ノ度ヲ計リ、速カニ筆頭ヲ上顎ノ軟部

ニ貼スルナリ、又發泡法、誘導法、引赤法トナス、

諸答刺箇加里第三十九品

黑色脆軟剥ケ易ク、石腦油臭、亞爾加里性强味

アリ、多ク水ニ溶ク、

功能 緩刺戟、發汗、膽汁分泌ヲ催進ス、粘汗ヲ出スハ、病毒分利ノ微ナリ、
 主治 諸家説ヲ異ニシ、一定セス、或ハ曰ク頭瘡ヲ治スルノ妙効アリト、或ハ曰ク補給機ノ疾患、例之微毒、腺毒性肺勞、惡液等ニ用フト、然レ此之ヲ非毀スル者亦少ナカラス、或ハ曰ク内用微効ナシ、但シ膏トナシ外用スレハ、慢性皮膚病ニ良効アリト、或ハ曰ク惡性瘰癧ニ用ヒテ偉効アリト、但シ必ス連服二月ナルヘシ、吾サレハ良効ヲ得難シ、

用法 毎用二匁至八匁、一日三四回、散或ハ丸トナス、軟膏ニハ四匁ヲ脂八匁至二十四匁ニ和ス、

塩酸銀 第五十三品

硝酸銀ヲ塩酸ニテ沉降セシムルニ成ル、白色光ニ觸ナリ暗無味ナリ、水ニ溶ケス、夫レ硝酸銀ハ、胃中ノ塩酸、又食物中ノ食塩ト合スレハ、直チニ塩酸銀ニ變スルカ故ニ、其功相同シ、但シ塩酸銀ハ、其力峻ニノ分拆スルヲ容易ナラス、又全ク無味ナリ、但シ之ヲ服用スル間ハ

鹹味品ヲ食スルヲ勿レ、何トナレハ、塩酸銀ト
 曹達トノ強カニテ、複塩ヲ生スレハナリ、
 主治 驅蟲、利尿ノ効アリ、又水腫、鬱癆病ニ用
 フ、近世微毒ニ用フ、又鎮痙ノ効アリトシ癩癩
 ニ用フ、又慢性赤痢、又腦病、眼疾ニ用フ、
 用法 毎用五分ルノ一至二ル、大量ニ用フル
 モ害ナシ、癩癩ニハ毎用三ル、一日四五回、丸或
 ハ散トナス、或ハ舍利別ニ和用ス、舌上ニ塗ル
 ニハ、一二ルヲ四回ノ料トス、軟膏ニハ十ル至
 二十ルヲ脂四錢ニ和ス、一日三四回、膏ニハ

生銀 第五十六品

銀鏡ハ、常ニ銅若クハ金ヲ含ム、之ヲ清潔トス
 ルノ法、數般アリ、或ハ酸化銀ヲ紅熾レ、或ハ硫
 酸鐵ニテ硝酸銀ヲ分拆スル等ナリ、
 功能 甚タ疑フヘシ、之ヲ用ヒテ腹痛ヲ發ス
 ル者アリ、恐ラクハ混スル所ノ銅ニ由ル、
 主治 微毒
 用法 五分ルノ一至一ル、丸或ハ錠トナス、舌
 上塗劑ニハ毎用四分ルノ一、軟膏ハ十ル至十
 八ル、脂四錢ニ和ス、

銀硝砂 第五十七品

塩酸銀ト硝砂精トノ結晶ナリ、
 帶青白色、其味灼クカ如ク、殆ント侵蝕ス、
 功能 峻カ確實ナル銀劑ナリ、其功塩酸銀ノ
 如クニ更ニ峻ナリ、
 主治 微毒癩癩、
 用法 始ノ十四分ハノ一漸ク増テ六分ハノ
 一二至ル、一日二回至四回、丸トナス、
 銀硝砂精 塩酸銀ヲ流動諸母尼亞ニ溶化シ、
 更ニ海塩精ヲ加フルナリ、慢性神經病、古列刺、

又癩癩ニ偉効アリ、

此液一莖中、大畧塩酸銀半ハノ含ム、毎用三滴
 至十二滴、一日三四回、漸ク増テ水一食匙ニ和シ用
 ス服用間酸性ノ飲食ヲ禁ス、

酸化銀 第五十八品

硝酸銀ヲ剝篤亞斯瀾、又石灰水ニテ分拆シ製
 ス、帶褐綠、阿列布綠、精製者粗製品ハ灰白色ナリ、
 水ニ溶和ス、外氣及ヒ日光ニ觸テ分拆シ易シ、
 功能 收斂、強壯、鎮痙、殊ニ意識神經ノ暴動ヲ
 鎮靜シ、病性分泌ヲ減少シ、子宮出血ヲ閉止ス、

之ヲ用フル後、或ハ吐涎シ、尿色黒ニ變スルアリ、

主治 補給機失常、微毒曾テ咽喉微毒腫ニ用

逐ニ功 胃粘液膜慢性燦衝ニ由ル消化力缺乏、

胃部壓重、膨滿、噯氣、酸敗、嘈雜、慢性腸胃病、神經

痛、疝痛、風氣曾テ患者五百人ニ治ス、胃痛、腹痛、

神經機能暴動、顛癩、子宮出血、下利、間歇性下利、

神經熱後ノ頑固下利、脱汗、尿崩、惡液漏泄、咳血、

吐血、下血、子宮病性分泌過多妙効品ト益シ局

部刺衝性ノ者ニ、器械性原因アルニ非ス、所

謂子宮症ノ類ニテ、覺機亢進、不整疼痛、月經

病ヲ云ナリ、軟膏或ハ末トナレ外用ス、眼燦衝、

角膜腫瘍、出血、又腺病、微毒合併病、疼痛極テ甚

シキ腫瘍、淋疾此膏ヲ捻子ニ塗リ、尿道内ニ挿入ス、乳頭腫、

用法 每服三分ルノ一至二ル、一日二回至四

回、散或ハ丸トナス、軟膏ハ五ル至十ル、脂一錢

ニ和ス、

砒沃實澀液 第六十五品

砒沃實澀ト沃實澀瀝トヲ、蒸餾水ニテ溶和ス

ル者ナリ、一錢中砒酸八分ル、一酸化瀝四分

氏ノ一、沃實涅五分、瓜ノ四ヲ含ミ、水素沃實涅
酸トナル、トワレル氏、硫酸劑ヨリハ、沃
實涅ノ少ナキハ四分一ナリ、

ドノハン氏、次方ヲ最佳トス、

方、細研砒石 六、零、八、項 一、五、三、八、沃實涅 五、零、

瓜ヲ少許ノ亞爾菌兒ニテ研和シ、淡赤色ノ乾
末トナルニ至ル、而ノ更ニ蒸餾水六十四錢ヲ

注キ、少時間之ヲ研和シ、硝子罎ニ入レ貯メ、水

素沃實涅酸半錢ヲ加ヘ、沃實涅一
ルノ含ム、之ヲ煮ル

少時ニノ放冷ス、全量六十四錢ヲ得ヘ、之ヲ

製スル時、研和スルヲ務テ久シカレヘ、且、

亞爾菌兒少許宛ヲ注テ、乾涸スルヲ勿ラシム、

此ノ如クスレハ、砒石飛散スルヲ極テ微ナシ、

功能、此劑ハ、極力品ヲ集合ニ成ル所ナシ、ハ、

其峻烈ナルヲ自ラ知ルヘシ、之ヲ服スルノ始、

多クハ堪難シ、或ハ流涎ス、且ツ多クハ俄ニ瘦

削ス、之ヲ稀メテ外敷スレハ、其功殆ント腐蝕

劑ノ如シ、

主治、經久頑固ノ皮膚病、殊ニ癩病、頑癬、頑固ノ

夏日斑、微毒性、腺毒性眼病、經久合併微毒種、

用法、水ヲ和シ稀メタル者、毎服二十滴至三

十滴、一日二回、漸ク増テ、每服一錢ニ至ル、水六
 十四錢ニ、八十滴ヲ和スル者、一日二十四錢ニ
 至ル、之ヲ試ルニ輕量每服五滴至十ナルモ、尚
 強カナリ、粘滑液ニ和シ用フ、外用ニハ、水等分
 ヲ和シ、頑癬、疥癬等ノ蒸劑、洗劑トナス、内用ニ
 堪難キ者アリ、之ヲ用ヒテ吐逆スル者ニハ、健
 胃劑、桂水等ヲ與フ、
 ドノハン氏常用方、沃實、涅、硫、瀉、水二錢、蒸餾
 水二十錢、姜、合、利、別四錢、右調和シ、四劑ノ飲料ト
 ナン用フ、

艾根越幾斯 第六十七品

艾根乾末ヲ亞爾箇兒ニ浸出シ、水氣ヲ蒸散シ、
 越幾斯トナスナリ、是レ近十年來、癩癩ノ妙藥
 ト稱スル艾根ヨリハ大ニ効アリ、又小兒ノ骨
 節脫臼、焮衝ナキ腹痛、疝痛、小兒及ヒ大人ノ暴
 瀉、流行下利、赤利、腸胃熱、神經性ニ傾ク者、嘔下
 困難、胃癰、慢性嘔吐、胃ノ硬結、慢性頭痛、及ヒ顏
 面痛、萎黃病、經閉、痔血閉、又癩癩、
 用法 一日半錢至一錢、小兒ハ每服一瓜至三
 瓜、丸又乳劑トナス、

亞篤魯比涅 第七十五品

是レ莨菪ニ於テ發明スル所ノ亞爾加里質ナリ、葉及ヒ根ヨリ製ス、

結晶無色針狀ナリ、無臭、其味不佳、苦ニメ稍刺戟ス、冷水五百分、沸湯三十二分、温・逢テ冷亞爾菫兒八分、冷亞的兒六十三分、分拆温亞的兒二十

二分、又脂油亞的兒油ニ溶ク、

功能 莨菪ニ同シ、亞篤魯比涅一分ノ功ハ、莨菪越幾斯二百分、莨菪葉六百分ニ同シ、瞳子散大ノ外、他ノ刺戟性ナシ、千分ハノ一、既ニ瞳孔

ヲ潤大スルニ足ル、久シク貯テ變性セズ、故ニ他ノ莨菪諸製劑ニ勝レリトス、

主治 水浸劑内外施用ス、虹彩嫩衝ノ初期、瞳子ヲ散大セシムルニ用テ、一ハヲ水ニカニ溶シ、一ニ滴ヲ眼ニ點ス、

又軟膏トナシ、顔面痛患者冷テ覺ユル者ニ用ヒテ大ニ効アリ、

用法 内用ハ決シテ四十分ハノ一ニ過ルヲ勿レ、二ハ至四ハ、亞爾菫兒每服四滴至八滴、一ハ蒸餾水七葉溶化

日二三回、軟膏ハ二ハ至五ハ、脂三葉ニ和ス、亞篤魯比涅舍利別 是レ最佳ノ方ニメ、百日

咳ニ用フ、製法比例舍利別八莖中、亞篤魯比涅
二百分ハノ一ヲ含ム、莖若越幾斯一ハ
功カニ同シ、

純金 第七十七品

甲 販ク所ノ硝酸金ヲ溶シ、撒兜末兜拭斯ヲ
以テ沉降ス、降
金桂黄色ナリ、

乙 金貨ヲ細割スルナリ、金
屑

功能 金製諸劑中ノ緩ナル者ナリ、然レモ偉
効アルト他劑ニ過ク、局部ヲ刺戟セス、故ニ脆
弱鋭敏ノ人、婦人、小兒、又消食器ノ感覺鋭敏ノ
者ニ用フヘシ、

主治 微毒腺毒骨ヲ侵ス者、子宮出血、或ハ軟
膏ヲ製シ、腺病ノ擦劑トナス、凡ソ金製諸劑就
中純金ハ、消食同化滋養ノ機ヲ増進スル者ナ
リ、消化失宜、補給缺乏ハ、此劑ノ主症ナリ、又
依剝昆埵兜、鬱憂病ニ用フ、
用法 内用毎服半ハ至一ハ、一日ニ三四、吐劑、
叔箇刺度ニ和シ、又錠ニ造ル、又舌上ニ塗入ス
ルヲアリ、一日二ハ
至四ハ軟膏ニハ十ハ至半莖、蠟膏
八莖ニ和ス、腫瘍ニ擦スルニハ、金粉一刃尋常
舍利別八莖、

硝塩酸金 第七十九品

金ヲ硝塩酸ニ溶シ水氣ヲ蒸散ス橙黄色ノ長
 針ナリ外氣ニ觸テ融解ス其味不佳ニノ收斂
 ナリ
 水亞爾箇兒亞的兒ニ溶ケ易シ鑛屬鑛塩又諸
 般ノ機生體ニ遇テ還元ス
 金製諸劑中ノ峻ナル者ナリ兼テ腐蝕ノ功ア
 リ然レモ分拆シ易キ者ナレハ其功確實ナラ
 ス王能ハ稍降汞ニ同レ水脈諸腺ノ機能ヲ挑
 起シ皮膚腎唾腺ノ分泌ヲ增多シ陰部機能ヲ

感ニス連用スレハ發熱脱汗吐涎ス

主治 微毒腺病腺毒性腫瘍眼疾辜丸腺腫水
 腫、痲質性痲痺舌硬腫ニ内用シ又朝夕四分

氏ノ一ヲ舌上ニ塗入ス又腐藥トシ癌性腫ニ

塩酸金液 六分 王水 八錢 和シ塗ル又癌腫ニ

内用ス

用法 二十分氏ノ一十六分氏ノ一漸ク增多

ス溶ケ易キヲ以テ一氏ヲ餾水四十八錢ニ和

スルヲ佳トス毎用一食匙茶一盞ニ和用ス舌

上ニ塗入スルニハ十分氏ノ一至四分氏ノ一

外用ハ一匁至二匁ヲ脂一匁或ハ餉水二十四

匁ニ和ス、

樺油 第九十品

樺油ハ北方ノ地、殊ニ魯西亞ニテ白樺ノ根及
ヒ皮ヨリ滴シ取ル、尋常帝兒ヲ取ル法ノ如
シ一分ハ可燃性物、一分ハ植物固有ノ不可分
拆質ナリ、帶赤褐色、稠厚流動、一種竅透ノ臭油
ナリ、亞爾箇兒、亞的兒、脂油、亞的兒油ニ混スレ
ル、水ニハ溶ケス、

往時間歇熱ニ用テ、魯西亞ニテハ、水腫ノ家貯

藥トス、又淋疾、諸蟲、分泌失宜ニ用テ外用一ハ

樓麻質、痛風、皮疹、殊ニ疹癬、侵蝕性疹、頑癬等ニ

單用レ、或ハ脂若干ハ他品ニ和用ス、起熱ノ飲

料過用後ニ發スル假死、酒精ニ酩酊セル人ヲ

醒覺スルニ、陰部殊ニ陰囊會陰ニ塗入ス、凍死

他法功ナキ者ヲ蘇生ス、用法前ノ如シ、

用法 每服三匁至六匁、一日三四回、葛蒲根末、亞

刺比亞越謨ニ和シ丸トナス、外用ニハ單用、或

ハ脂、尋常帝兒等ニ和シ塗ル、

蒲魯密烏謨 第九十四品

箇魯兒ニ似タル一原質ニテ、海水、海藻、又海塩
 ノ母滴、諸種ノ礦水中ニ存ス、暗褐赤色、揮發ナ
 ル液ナリ、水ニ溶ク、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶ケ易
 シ、但シ溶劑ハ分拆レ易シ、
 功能 沃實涅、又箇魯兒ニ同シ、衝動殊ニ粘液
 膜ヲ刺戟シ、大便ヲ通利シ、滑便ヲ利、呼吸器ヲ
 刺戟ス、或ハ神經機能ヲ障害シ、之ヲ抑壓ス、溶
 劑ニハ水ハ十滴至三十滴ヲ用フレハ、微々
 刺戟シテ、其効沃實涅ヨリハ勝レリ、又沃實涅
 ノ如ク、婦人ノ乳房ヲ害スルコトナシ、又斯篤里

規尼、蒲留夫涅等ノ消毒品ナリ、
 主治 腺病、腺毒性辜丸腫、經久遺精ヲ兼ル者、
 頸腺腫、腺腫瘍、痛風性、癩麻質性諸患、皮膚疹、汗疹、
 慢性ノ者、外用溶劑刺戟、解凝關節ノ疼痛ヲ緩メ、
 虛性腺毒性鼻痔ヲ除ク、壞疽性疹、汗疹、壞疽、
 脚部經久腫瘍、又薰劑トナシ、惡臭惡氣ヲ除ク、
 但シ呼吸器ヲ刺戟スルハ、蒲魯密烏謨ノ名譽
 ヲ妨クル所ナリ、
 用法 十分ハノ一至五分ハノ一、一日二回、水
 ニ溶化ス、蒲魯密烏謨六滴水、或ハ亞爾箇兒四
 滴ニ溶化ス、此溶液始メ五滴、漸ク進

テ十五滴以上ニ至ルハ、蒸劑ニハ溶液十二滴、

水或ハ亞爾箇兒三十二錢ニ和ス、軟膏ニハ十

氏至十五氏、脂一錢ニ和ス、

加印加酸 第九十八品

無色針狀ノ結晶ナリ、無臭、始無味ノ如クナレ

氏、後芳香苦味收斂ス、基塩ト合スレハ、極テ苦

味ナル一種ノ塩トナル、亞的兒ニハ溶ケ難ク、

亞爾箇兒ニハ溶ケ易シ、

製法 加印加根煎汁ニ、塩酸ヲ滴レ稍酸味ナ

ラシメ、放静スル一二三日ナレハ、其酸結晶ス、

然レ氏最佳法ハ、根ヲ亞爾箇兒ニ浸出シ、之ヲ

蒸餾シテ其殘物ヲ水ニ溶和スレハ、苦味ノ液

トナル、是レ游離スル酸ニ由ルナリ、加爾基少

許宛ヲ加ハ、苦味消スルニ至ル、後加爾基ト集

合セル酸ハ、溶ケ難キ基塩ナレハ、沉澱スルナ

リ、此ノ沉澱物ハ、亞爾箇兒中ニ稀酸温溶液ヲ

和レ、以テ分拆スヘシ、此時酸ハ針狀ノ結晶ト

ナリ、亞爾箇兒ハ蒸散ス、

功能 強壯ニノ衝動セズ、瀉下緩利尿ノ峻力

アリ、腎及ヒ膀胱

主治 利尿

用法 六歲至十五歲漸々增加ス、九トナス、
亞的兒性菖蒲油 第百品

泥菖根ヲ水ニ浸シ、蒸餾シ、亞的兒性油ヲ分テ、
取ルナリ、新製品ハ灰白黃色、時月ヲ經レハ、帶
赤稠厚トナル、芳香ノ氣アリ、味灼クカ如ク香
竅ナリ、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶解ス、

是レ世久シク知ル所ノ亞的兒性油ナリ、劇レ
キ虛性胃痛、疝痛譫妄、其原胃ニ在ル者、惡性慢性粘液
病、虛性出血、漏泄甚シキ白帶下、水腫、蔓延皮膚疹

經久神經熱、慢性痛風ニ内外苑用ス、

用法 四滴至十二滴、邊設印亞的兒四錢ニ混

シ、每一時或二時、十五滴至三十滴、酒ニ和シ用

フ、又錠ヲ造ル、薄荷油錠ノ如シ、外用ニハ亞

爾箇兒ニ溶シ塗擦ス、

加爾基糖 第百六品

新煖加爾基ヲ焚熱シ、糖舍利別ヲ合スレハ、無

色華爾斯質ノ塩トナル、之ヲ水ニ溶シ、亞爾箇

兒ニテ沉澱セシム、

加爾基舍利別、最モ藥用ニ適ス、則チ生石灰一

分ヲ水百分ニ溶キ、糖溶液十分ヲ和シ、武火ニ
テ煮ルコト十分時、濾シテ四倍量ノ舍利別ニ和
スルナリ、

小兒酸敗慢性下利ニ用フ、胃中酸液アル者ニ
ハ、斷乳セシム、此劑ヲ牛乳ニ合シ用フ、總テ加
爾基水ニ代用スヘレ、

用法 一日一乃至半匁、

金盞花草及根 第百七品

功能 從來無能ノ品トナセルニ、近世之ヲ試
驗スルニ、一種固有ノ性アリテ、病性刺戟ヲ減

除シ、解凝、止血、愈創ノ功アリ、

主治 内外施用ス、腺硬結、瘰癧、腹部閉塞、慢性

嘔吐、胃瘕、硬結、皮膚癌、侵蝕性、微毒、頑癬性、癌性腫

用法 草或ハ花浸劑、又煎劑、一日四匁至八匁、

新搾液 一日八匁至十六匁、内用又外用ス、

酒製水製越幾斯 新草葉ト共ニ亞爾箇兒、及

ヒ水ニ浸出シ製ス、

用法 每服五匁至十匁、一日三四至六回、溶劑

又丸トナス、軟膏ニハ越幾斯一匁至二匁ヲ脂

八匁ニ和ス、

金盞花擦劑 葉及ヒ花ノ新搾汁、或ハ越幾斯

ニテ製ス、硬結皮膚癩、又愈創劑トス、

金盞花水 新花ヲ水ニ浸シ、日光ニ曝シ製ス、

愈創、止血、創口ニ注入シ、或ハ洗劑トナス、

印度大麻 第百七品

印度産ノ大麻ハ、本草家ノ説ニテハ、我地方ノ

産ト異ナルヲナシトスレド、其性功ハ大ニ同

シカラス、是レ所含ノ華爾斯質異ナルニ由ル、

用フル所品類多シ、花アル大麻ヲ乾カス者ア

リ、大葉實子莖ヲ去ル者アリ、自出ノ華爾斯ア

リ、亞利比亞、巴爾西亞産ハ、印度産ニ同シ、之ヨ

リ製スル所ノ華爾斯性越幾斯、亞爾箇兜性越

幾斯及ヒ諸製劑皆醫用ニ供ス、ハシ、

功能 麻醉、阿芙蓉ニ同シ、稍緩ナルノハ、精神

ヲ爽活ニシ、安眠セシム、大量ナレハ、譫妄、秦漢

屈、搐溺、精神錯亂ヲ發スルニ至ル、輕量ナレハ

鎮痛、爽神、食機ヲ奮起シ、精神妄動ヲ鎮定ス、

主治 急性慢性癩麻質、神經痛、痙攣、不眠、破傷

風、恐水病、大ニ苦楚、古列刺、下利ヲ閉止ニ、流行

疫、

酒製越幾斯 印度麻ノ穗ヲ亞爾筒兒ニ浸出シ取ルナリ、水ニ溶ケス、亞爾筒兒ニ溶ク、

用法 每服四分ハノ一半ハ至五ハ、或ハ曰ク亞的兒油加耶普ニ溶ケテ最佳トス、則チ越幾斯四分ハノ一ヲ、亞的兒油二滴ニ和シ、更ニ糖

或ハ乳劑ニ和用ス、又溶液ヲ脂ニ和シ擦劑トナス、

水製越幾斯 亦用フヘシ、

丁幾劑 越幾斯三ハヲ亞爾筒兒ニ浸ニ和ス、曾テ尿閉不治三年ノ者ヲ治ス、

用法 每服五滴十滴至十五滴ハ衝動劑ナリ、半匁至二匁ハ鎮痙劑ナリ、之ヲ單用シ、或ハ少

許ノ水ニ和用ス、但シ速ニ嚥下スヘシ、否サレ

ハ、華爾斯質沉降スルナリ、

罕答里實涅 第百十品

芫菁等ノ發泡ノ功分ナリ、芫菁ヲ水ニテ煮テ

越幾斯分ヲ取リ、之ヲ亞爾筒兒ニ溶シ、又亞爾

筒兒製越幾斯ヲ亞的兒ニテ溶解シ製スルナ

リ、

結晶白色光彩アル薄片ナリ、分析スルニ非サ

レ此融解ス、單純ナル者ハ水ニ溶ケス、温亞爾
箇兒、亞的兒、脂類ニハ溶ケ易シ、

功能 極テ峻ナリ、五氏ヲ獸類ニ試用スルニ、
麻醉諸症ヲ發シ、汚物ヲ吐下シ、速カニ斃ル、其
功能ハ芫菁ニ同シ、

主治 乙膜、喉衝、腹膜、心囊、尿道、喉衝等ニ試
ムルニ、其効實ニ賞スルニ勝ケリ、

外用、引赤、發泡、半氏或ハ更ニ微量ヲ油ニ和シ
貼スルニ既ニ發泡ス、油或ハ亞的兒ニ和シ硬
膏上ニ塗リ貼ス、又痛風、硬膏ヲ製ス、

精製獸炭 第一百十二品

犢牛ヲ屠リ、未ダ全ク冷サルニ乘シテ、肉ノ脂
肪ナキ部ヲ、骨ト共ニ燒キ製ス、多量ノ窒素、炭
素、肉及ヒ骨中ニ存セル固性分、塩類、硫黃質、鐵
分、及ヒ可燃質ノ集合ナリ、

功能 解疑、疎通、收斂、防腐ノ功アリ、往時ハ象
牙、鹿角ヲ

燒キ、炭トナシ、強壯、防腐ノ功アリトス、木炭ヨリハ峻カナリ、植物

性色分、臭分ヲ奪去ス、但シ臭分ト集合スルナ
リ、之ヲ内服スルヲ久レケレハ、全身殊ニ面部
ニ銅色疹ヲ生ス、大量ナレハ胃力ヲ傷リ、下利

ヲ起ス、

主治 乳房、子宮ノ硬結、癌腫ヲ消散シ、膿汁分
泌ヲ改正シ、子宮症ノ出血復發スルヲ減ス、腺
ノ單性硬結、甲状腺硬結、頸腫、子宮硬結、贅肉、又
氣管勞、其原腺病ニ起ル者ニ偉効アリ、又外用
レテ腺腫ヲ疎解ス、又植物毒、礦物毒ヲ消解ス、
則チ四莖ノ獸炭ハ、一ハノ斯篤里規尼毒ヲ消
スルニ足ル、

硫黃亞爾筒兒 第一百十四品

炭素ト硫黃トノ集合ナリ、硫黃瓦斯ヲ炭或ハ

炭素ヲ含メル物質トニ觸レシメテ之ヲ製ス、
透亮水ノ如ク、揮發竅透ノ香氣アリ、能ク燃ユ、
水ニ溶クス、亞爾筒兒、亞的兒、脂及ヒ亞的兒油
ニハ能ク溶ク、能ク硫黃、磷、龍腦等ヲ溶解ス、其
多量能ク新牛乳ト精密ニ混和ス、

功能 刺戟、衝動、興奮、發汗、通經、收斂、解凝、又補
給同化ノ機ヲ盛ニシ、其功能ク全身ニ普達ス、
一分ハ亞的兒劑ノ如ク、一分ハ諸母尼亞劑ノ
如シ、局部粘液膜ニハ、刺戟、衝動、灼クカ如キ疼痛
ヲ發シ、焮衝ヲ生ス、但シ血中ニ入レハ、神經、脈

管ノ機能ヲ亢起シ心動ヲ疾ニシ、温度ヲ増シ、汗ヲ發ス、又諸分泌、殊ニ皮膚腎ノ分泌ヲ增多シ、經ヲ通シ、血液ノ調和ヲ復正シ、凝結ヲ疎解ス、之ヲ外敷スレハ、速カニ飛散シテ以テ冷ヲ起スカ故ニ、消焮ノ効アリ、

主治 假死、卒仆、石炭氣ニ中テ假死スル者、麻痺、網膜麻痺、殊ニ寒冷ニ由テ起ル者、痛風、但シ焮衝去ルノ後、皮膚ノ内陷、頑固慢性ノ者、外用擦入シテ陣痛ヲ増起ス、痛風、腰質性、挫傷後ノ強直拘急、脱臼ノ部ニ滴スレハ、壓定中ヲ貼スルニ便易ナリ、湯火傷輕度ノ者、

手足凍返、又氣浴トノシ、沃實、慢性眼病、神經病、耳聾ニ施ス、

用法 一滴三滴六滴乳汁ニ和用ス、或ハ糖水、燕麦煎、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶和ス、外用軟膏或ハ亞爾箇兒浸劑トナス、則チ二錢ヲ油或ハ亞爾箇兒四錢至八錢ニ調和ス、

嚼囉呔水 第一百十五品

新煨刺篤亞斯ヲ、亞爾箇兒ニ溶シ、箇魯兒ヲ和シ、又ハ亞爾箇兒、或ハ木醋ニテ、塩酸加爾基ヲ餽スルナリ、

無色油質、亞的兒ノ如キ甘味アリ、芳香ナル重
キ液ナリ、

水ニ溶ケス、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶ケ易シ、
此劑ハボトグル氏ノ法ニテ製スルヲ佳トス、
則チ結晶醋酸曹達、塩酸加爾基、同量ヲ取り、精
密ニ研和シ、列篤爾篤ニ入レ、適好ノ受器ヲ接
シ、武火ニテ蒸餾シ、復タ一滴ヲモ得サルニ至
ル、此餾液中ニハ、呵囉吩極テ微量ニシテ、醋酸多
シ、但シ醋酸ハ水ト合シテ液ノ上面ニ集合シ、
呵囉吩ハ器底ニ沉降ス、其酸液ヲ分チ取り、之

ヲ列篤爾篤ニ入レ、再ヒ適宜ノ塩酸加爾基ヲ
合スレハ、濃稠糜狀ノ液トナル、之ノ烈火ニ上
セ餾スレハ、分拆スル醋酸ト、多量ノ呵囉吩ヲ
得ルナリ、水ニ和シ震蕩スレハ、兩液相離ル、此
ノ如ク餾スルヲ再三再四ナレハ、遂ニ復タ少
許ノ呵囉吩ヲ見サルニ至ル、此法ニテ製スレ
ハ、結晶醋酸曹達一斤ヨリ、呵囉吩三十二錢ヲ
得ヘシ、之ヲ清淨ニスルニハ、更ニ醫典埜加爾
基末ニテ餾スルナリ、

功能 防腐、鎮痛、催睡、爽神、又惡性腫瘍ノ臭氣

ヲ去リ、汚穢ノ分泌ヲ止ム、

主治 硬結腫、癰腫、疔、乳癰、疼痛ヲ緩解シ、分泌液ノ汚臭ヲ去

ル、惡臭アル腫瘍、寒壞疽、利尿失宜、子宮疾患、神

經痛、乾嘔神經性嘔吐ニ内外施用ス、近世哥囉吩水

ヲ硫黃亞的兒ノ代用トナシ、麻醉嗅法トナス、

シムプリソン氏則チ二莖ヲ取り、布片ニ浸シ、之

ヲ鼻下口上ニ保スルナリ、

用法 内用ハ、一滴至四滴水適宜ニ和用ス、一

日三四回、外用一乃至四回、水半彬薦ニ調和ス、

依蘭苔苦味質 第一百二十五品

白色ノ粉末ニ入、麻瘋涅矢亞ニ似タリ、無臭ニ

ノ純苦味アリ、水ニハ殆ント溶ケス、温亞爾箇

兒ニハ容易ニ溶ケ、亞的兒ニハ溶ケス、

功能 苦味強壯、

主治 間歇熱、氣管粘液勞、肺勞、

用法 毎用二乃至五乃至十回連用二三月、或ハ

散トナシ、又極テ稀キ酸類ニ溶シ用フ、

醋酸規尼 第一百三十三品

功能 枸酸規尼ニ同シ、硫酸規尼ニ比シレハ

稍緩ナリ、胃門脈系ヲ刺襍スルニ少ナク、熱ヲ

起サス、

分量 半匁至六匁 間歇熱ニハ
一匁丸トス、

硫酸規尼 第三百三十四品

頑固間歇熱ニ實用ス、分量大畧十六分匁ノ一、

吉那酸規尼 第三百三十五品

吉那酸水性溶劑ト、純精規尼トノ飽合ニ成ル、

間歇熱回復期其人刺戟性ニノ神經症アリ、胃

ノ覺機亢起スル者ニ用フ、又經久間歇熱、或ハ

硫酸規尼ヲ用ヒテ、間歇熱愈後ニ發スル神經

諸症ニ用フ、

用法 每服半匁至六匁 間歇熱ニ
ハ、

枸酸規尼 第三百三十六品

硫酸規尼ヲ枸酸曹達ニテ分拆シ結晶セシム

ルナリ、強壯驅熱ノ功アリ、而シテ耳鳴、頭痛ヲ起

リス、驅熱ノ力、硫酸規尼ヨリハ優レリ、且ツ刺

衝甚シキ者、殊ニ痲衝性ノ者ニ用フルモ、絶テ

害ナレ、刺衝性多血性血液沸騰ノ者ニハ、先ツ

全身若クハ局部瀉血後ニ之ヲ用フ、

用法 半匁至六匁 間歇熱ニ
ハ、 或ハ酸性枸酸塩

トナシ、或ハ舍利別トナス、舍利別一斤中、規尼
三十六匁ヲ含ム、一

日一匙、又防腐清血ノ効アリ、
至二匙

枸酸鐵規尼 第百三十七品

枸酸鐵四分ト、枸酸規尼一分トノ集合ナリ、

緩性鐵劑ノ功ト、規尼ノ功トヲ併セ有ス、

間歇熱、神經熱ノ回復期、又惡液病、萎黃病、胃弱

ノ者ニ用フ、食前食後一匁至六匁、或ハ麻痺刺

酒ニ溶シ、或ハ丸トナス、是レ其苦味甚シキカ

故ナリ、

鐵青酸規尼 第百三十八品

硫酸規尼ヨリハ峻カアリ、間歇熱、痲衝合併症

ニ用フ、每服二匁至四匁、丸ヲ最佳トス、

青酸規尼 第百三十九品

驅熱消痲ノ功ヲ併セ有ス、腹部諸藏ノ痲衝性

或ハ刺衝性ヲ兼ル間歇性諸症、肝藏慢性痲衝、

又惡液家ノ間歇熱、每發作危險ノ者ニ用フ、

用法 一日二匁三匁四匁至八匁、接骨木子結

列乙、莖菜昆設爾弗ヲ和シ丸トナス、

沃實涅水素酸規尼 第百四十品

沃實涅ノ苦味品ト配用スヘキ諸症、又腺病等

ニ用フ、每服一匁至八匁、外用二匁
至十八匁、

乳酸規尼 第四百一十一品

其服之易キト水ニ全ク溶ルトヲ以テ賞用ス、
半匁至二匁、開歇熱ニハ一匁、

塩酸規尼 第四百一十二品

揮發強壯兼テ利尿ノ功アリ、多量ノ規尼ヲ要
スル症ニ用フ、是レ硫酸規尼ノ如ク消化器ヲ
損スルコト勿レハナリ、

主治 硫酸規ニ同シ、但シ其量稍微ナルモ、
其功ハ他ノ規ニ諸劑ニ勝レリ、或ハ曰ク驅熱
ノ力、硫酸規ニ勝レリ、殊ニ熱後ノ水腫ニ効

アリ、蓋シ利尿ノ能アルニ由ル、急性間歇熱、粘
液ヲ兼ル者、慢性虛熱、痲質劇痛、間歇性ノ者、
神經性痲質、神經衰弱、慢性痛風、衰弱、瘦削セ
ル人ノ水腫、白腫、惡液病、口中腐爛、痲痺性、慢性
腺病、尙痲病、神經痛、

用法 每服半匁一匁至三匁、毎二時之ヲ用フ、
溶劑ハ規ニ一匁ヲ、餉水四匁、或ハ胡椒水、桂水
ニ和用ス、毎二時二十滴至六十滴、又賢垣兒麻
質トナス、

硝酸規尼 第四百一十三品

分必諸器ノ衰弱諸病ニ用フ、半匁至四匁、
磷酸規尼 第百四十四品

性緩ニノ胃肺ヲ害セス、尿管ヲ刺衝スルハ他
品ニ比スレハ最モ少ナシ、熱性諸症復發シ易
キ者、慢性熱、瘦削、粘液熱、虛性痛風、溶崩、脱汗ヲ
兼ル者、虛性ノ白帶下、敗血、白腫等ニ功アリ、

用法 每服四分匁ノ一、散或ハ丸トナス、

硫酸規尼 第百四十五品

黃吉那粗屑、硫酸ヲ和シテ稍酸味アル水ニ浸
出スルハ二三回、其液ヲ集メ火ニ上セ、水氣ヲ

蒸散シ、吉那ノ原量ニ至リ、放鬆スルハ二三回、

瀝過シ、之ニ灰塩ヲ和シ、沉降セシメ、此沉降物

ニ九十度ノ亞爾菌兒ヲ注キ、温所ニ置キ、稀硫

酸ヲ加ヘ、更ニ水ノ全量四分一ノ亞爾菌兒ヲ

和シ、之ヲ蒸餾シ、少シモ亞爾菌兒氣殘ヲサル

ニ至リ、之ヲ冷所ニ置キ、結晶セシメ、其塩分ヲ

瀝シ取り、更ニ曹達ヲ和シ、分拆スルハ、前ノ法

ノ如クス、

雪白色、粗脆微細ナル針狀、片狀ノ結晶ニテ、臭

ナシ、味極テ苦シ、冷水ニハ溶ケ難シ、七、百、四、温

湯ニハ溶ケ易シ、分三十亞爾箇兒ニハ最モ溶ケ
 易ク、亞的兒ニハ纔カニ溶ルルニミ、試驗最モ多
 ク、世ノ普子ク知ル所ナリ、凡ソ新近製藥書中
 之ヲ載セサルハナレ、其功力全ク備ハリ、諸種
 規尼劑中ノ魁ナリ、其有名ナル所以ハ、之ヲ他
 ノ規尼諸劑ノ固有力ニ比校セハ自ラ明ラカ
 ナルナリ、近世施用漸ク廣ク、殊ニ驅熱ク功ヲ
 稱スルト二十年來最モ盛ナリ、神經衰弱、神經
 痛、流行性古列刺、肺勞、慢性癩麻質、神經熱ニハ
 多量ヲ與フ、又賢埜兒麻質ニ施ス、世ノ知ル

所ナリ、則チ間歇熱、神經痛ニ於テハ、硫黃亞的
 兒ニ溶キ、規尼一、亞的兒一、溶和ス之ヲ筆或ハ海綿ニ
 浸シ、舌上、咽喉、頰ノ内部、咽喉ノ後部ニ塗擦ス、
 其苦味極テ甚シキヲ以テ、非常ノ刺戟ヲ起シ、
 脊髓上ニ功ヲ奏スルコト、極テ強ク、且ツ速クニ
 ノ、半衰ヲ内服スル者ヨリハ盛ナリ、又硫酸規
 尼ノ脾藏ニ効ヲ奏スルコト速クニ、之ヲ多量
 ニ用フレハ、瞬息間ニ脾腫ヲ減縮スルハ、疑フ
 容サル所ナリ、
 用法 其溶化シ難キカ故ニ、未服セシムルヲ

佳トス又丸或ハ溶劑トナス規尼一ハ水和ス

一滴ヲ其苦味ヲ防クハ為ニ服後直チニ叔箇

刺度ヲ用フ但シ哥菲ヲ單用シ或ハ乳汁ヲ和

用スルヲ更ニ佳トス

單寧酸規尼 第百四十六品

強壯ノ外更ニ收斂ヲ要スル者ニ用フ但シ溶

化シ難キカ故ニ必ス健胃品ヲ配用スヘシ

大ニ驅熱ノ功アリ全身衰弱血液閉塞シ易キ

者水腫ノ素因アル者尿道粘液漏泄神經熱再

發シ易キ者間歇熱硫酸規尼ヲ用フレハ効ナ

ク或ハ其効顯著ナラレ者ニ効アリ

用法 每服半ハ二ハ至四ハ丸トナス

酒石酸規尼 第百四十七品

總テ枸酸規ニニ同シ

用法 每服半ハ至一ハ間歇熱ニ

纈草酸規尼 第百四十八品

神經力ノ暴動ヲ鎮靜シ間歇熱ヲ治シ惡性神

經熱慢性神經痛劇甚間歇性顔面痛痺麻質痛

偏頭痛癩癩ニ用フ又油ニ和スルヲ極テ易シ

故ニ賢堊兒麻質ニ施スニ便ナリ

用法 一氏至六氏、間歇熱ニハ每服十氏至三十五氏、單用シ、又護膜漿ニ和シ、或ハ丸トナス、規尼乙儒護 第百四十九品

硫酸規尼ヲ製スルハ、多分ニ遺留スル褐色ノ母滴ヲ、諸母尼亞幾ニテ沉降スルナリ、又貧家規尼ト稱スル者アリ、其舍密成分全ク同シ、暗褐色稜角透明暗光アリテ脆軟ナリ、温所ニ置ケハ、軟塊トナル、味極テ苦シ、水ニハ溶ケヌ、亞的兒ニハ少シク溶ク、亞爾箇兒、稀酸水ニハ容易ニ溶和ス、

功能 多量ニ用フレハ、規尼ニ同シ、頑固惡性間歇熱、又其愈後神經機能振ハサレ者、全身虛憊、腹部膨脹、脾肝閉塞、間歇性諸病間歇熱ノ續症ナレ者ニ用フ、

用法 規尼ノ倍量ナリ、每服二氏十氏至二十氏、散丸、亞爾箇兒、亞的兒、溶劑トス、

丁幾劑 規尼乙儒護 一氏 亞爾箇兒 八氏

每服十滴三十滴至六十滴、後方最ニ佳ナリ、
丁幾劑 八氏 華爾列兒、收斂亞的兒 一氏 薄荷水

二十氏 每一時若クハ三時ニ一茶匙、或ハ每朝夕四氏

一茶匙連用シテ再發セサルニ至ル

又方 規尼乙儒謨 一錢 硫酸規尼 十匁 亞爾箇

兒 十六錢 每服十五滴 一日四回 偉力ノ驅熱劑

ナリ、規尼乙儒謨ノ價ハ規尼六分ノ一ナリ、

聖叔尼 第百五十一品

功能 規ニ同シ、但シ稍多量ナルヘシ、少女

ニ於テ見ル所ノ腸胃不和、酸敗、怠惰、鬱憂スル

者ニ最モ効アリ、規ニヨリハ價稍廉ニシ、且ツ

苦味少ナキヲ以テ用ヒ易シ、

用方 每服二匁至十匁、散、丸、又酸類、亞爾箇兒

酒 和用ス

醋酸聖叔尼 第百五十二品

功能 醋酸規尼ニ同シ、每服半匁至四匁

吉那酸聖叔尼 第百五十三品

功能 吉那酸規尼ニ同シ、每服半匁至四匁

塩酸聖叔尼 第百五十四品

功能 塩酸規尼ニ同シ、每服半匁至二匁

硫酸聖叔尼 第百五十五品

功能 硫酸規尼ニ同シ、開歇熱ノ腸胃衰弱ス

ル者ニハ其功勝リ、又患者虛弱、感覺鋭敏ナ

ル者便秘、下利後ノ直腸衰弱、慢性痿麻質、

用法 每服八分、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

又水、亞爾箇兒ニ溶シ用フ、

山田 亞爾箇兒 散

散

散

散

散

散

新藥百品考初編卷之十一終

終