

57

27.1

著纂吉憲旭 本博  
珍 由  
典醫病器殖生尿泌病膚皮  
全

京 東  
發 南 山 南

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70<sup>7/10</sup> 1 2 3 4

始





醫學博士 旭憲吉纂著  
 由 珍  
 皮膚病泌尿生殖器疾病醫學  
 全

大正  
 15. 4. 29  
 内交

東京  
 南山堂書店發兌



57-276

謹で此微著を

恩師土肥慶藏先生に捧ぐ



改題ノ辭

本書題シテ皮膚病泌尿生殖器病醫典ト稱スルモ曩ニ公ニセル皮膚病花柳病醫典ヲ改題セルモノニ他ナラズ、是レ輓近泌尿生殖器科ノ進歩ニ鑑ミ其分科ニ屬スル治療法ヲ増補シ現今ノ趨勢ニ適應セシモ緒言ニ述ベタル理由ヨリシテ改竄スベキ箇處頗ル多ク公私多シモ緒言ノ機ヲ失シタリシモ讀者ノ督促ト畏友南山堂主鈴木氏ノ熱心ナル勸誘ニヨリ本書遂ニ漸ク成ル。然レドモ版成リテ之ヲ省ミルニ不備不滿ノ點亦尠カラズ、遠カラズ増補改訂ノ機會アルベク亦讀者諸賢ノ隔意ナキ批判ト教示トヲ得バ幸ナリ。

終リニ臨ンデ本書編纂ニ方リ助手醫學士中牟田厚君ノ熱心ナル御助力ニ對シ感謝ノ意ヲ表ス。

大正十五年一月

於福岡

著者誌ス



凡 例

- 一我皮膚科泌尿器科ニ關スル著書ハ甚ダ少ナカラズ然レドモ袖珍的簡明ニシテ專門家ハ元トヨリ實地醫家諸士ニ向ツテ臨床上搜索ニ便ナルモノナシ是レ此著アル所以ナリ
- 一書中記載セル疾患ニ就テハ可及的簡明ヲ旨トシ紙數ヲ減ズル目的ヨリ挿圖ノ如キハ之ヲ省略シ症狀等ノ詳細ハ是ヲ教科書ニ讓レリ
- 一皮膚病篇ニ於テハ各病名ヲ歐文名ニヨルABC順ニ排列シ、性病篇、泌尿器病篇ハ之ヲ系統的ニ記述セリ
- 一處方并ニ器械操作方法ハ本書ノ主眼ニシテ實地醫家諸士ニ向ツテ必要ナルヲ以テ比較的詳細ニ記述シ置ケリ

緒 言

本書ヲ公ニスルニ蒞ミ編纂ニ與リテ功アル畏友醫學士莊原復君ヲ追慕セザルベカラズ矣。

故莊原君ハ東京ノ人幼ニシテ孤獨備サニ辛酸ヲ嘗メ不撓不屈能ク萬難ヲ排シ遂ニ我九州大學ノ前身福岡醫科大學ヲ卒業セリ、爾來我教室ニ入りテ專心斯科ノ研鑽ヲ積ミ不日伯父ノ郷里ニ歸リ共ニ門戸ヲ張ラントスルノ時俄ニ不幸ニ豎ノ犯ス所トナリ溘焉トシテ卒ス悲亦タ慘ナラズヤ惟フニ死ヤ之ヲ人爲的ニ如何トモ爲ス能ハザルモ君ノ如キ多年ノ奮闘能ク效ヲ奏シ今ヤ將ニ社會ニ活動セントスルノ秋ニ當テ不歸ノ客トナル嗚呼實ニ人世ノ悲哀何ゾ之ニ如カンヤ。

願ミテ我專門科ノ跡ヲ窺ルニ恩師土肥博士斯學ヲ中興セシヨリ既ニ十數年荆ヲ拓キ棘ヲ刈リ基既ニ定リ礎茲ニ成リ漸ク大成ノ域ニ達セリト雖モ未ダ研鑽ノ餘地少ナシトセズ此時ニ當ツテ俊秀篤學君ノ如キ人ヲ失フハ斯學ノ爲メ痛惜ノ極ナリトス。











皮膚囊腫	八〇	バザン氏硬結性紅斑	一〇四
ダリエー氏病	八〇	結節性紅斑	一〇五
汗疱	八一	中毒性紅斑	一〇五
壞疽性深膿疱	八一	血清疹、牛痘疹	一〇六
濕疹	八二	汎發性痘疹、ツベルクリン疹	一〇六
急性濕疹、皮膚炎	八三	四肢紅痛症	一〇六
亞急性及慢性濕疹	八四	エリトロメリー	一〇七
頑癬	八七	紅色陰癬	一〇七
皮脂漏性濕疹	九六	黃癬	一〇八
象皮病	九六	纖維腫	一〇八
夏日斑又雀卵斑	一〇〇	毛囊疹又潰瘍性毛囊炎	一〇九
先天性表皮水疱症	一〇一	癬腫及多發癬症	一一〇
丹毒	一〇二	壞疽(脫疽)及尋瘡	一一一
類似丹毒	一〇三	相對性壞疽及レキノウ氏病	一一二
多型滲出性紅斑	一〇三	滑皮症	一一三

口唇匍行疹、顔面匍行疹、陰部匍行疹	二四	毛孔性角化症、毛孔性苔癬	二四
帶狀匍行疹	二四	落屑性毛囊角化症	二三
夏季水疱又種痘様水疱症	二五	縮毛	二三
多汗症	二六	雀斑	二四
毛髮增生症	二六	癩病	二五
魚鱗癬	二七	尋常性白斑	二六
手掌足蹠魚鱗癬	二七	紅色苔癬	二七
傳染性膿疱疹	二八	腺病性苔癬又帶紫色苔癬	二七
尋常性膿疱疹又連鎖狀球菌性膿疱疹	二八	ウキダール氏慢性單純性苔癬	二八
單純性膿疱疹又葡萄狀球菌性膿疱疹	二九	小兒尋麻疹様苔癬	二八
昆蟲刺傷(蚤、蚊、蚊、南京蟲、蜂蟻、毒蛾)	二九	紅斑性狼瘡又脂漏性狼瘡	二九
蟹足腫及癩痕息肉腫	三〇	顔面播種狀粟粒性狼瘡	三〇
進行性對側性紅斑性皮膚角化症	三〇	尋常性狼瘡	三一
傳染性毛囊角化症	三一	淋巴管腫	三一
先天性手掌足蹠角化症	三一	脂肪腫	三一



粟粒腫	一三三	ベラグラ	一四〇
傳染性軟屬腫又疣贅軟屬腫	一三三	陰莖結核	一四〇
麻疹	一三四	尋常性天疱瘡	一四一
菌狀息肉腫	一三五	砂毛、ビエドラ	一四一
項部息肉腫	一三五(四九)	頭部糠枇疹	一四二
色素性母斑及血管性母斑、血管腫	一三六	連圈狀糠枇疹又正圓形糠枇疹	一四二
慢性神經性皮膚炎	一三六(二九)	薔薇色糠枇疹	一四三
神經纖維腫又レックリングハウゼン氏病	一三七	癩風	一四三
急性限局性皮膚浮腫	一三六(四八)	紫斑	一四四
爪病	一三七	痒疹	一四五
臭汗症又腋臭(異汗症)	一三八	乾癬	一四六
ペーヂャット氏病	一三八(七〇)	皮膚瘙痒症	一四七
乳嘴腫	一三八	クインケ氏浮腫	一四八
丘疹膿疱性結核疹	一三九(一九)	ラヂウム皮膚炎	一四九
頭虱、陰毛虱、衣服虱	一三九	レントゲン皮膚炎	一五一

風疹	一五一	氏禿瘡	一六二
皮膚肉腫	一五一	小水疱性白癬	一六三
疥癬	一五二	顔面白癬	一六三
猩紅熱	一五四	爪甲白癬	一六四
皮膚腺病、腺病性護膜腫	一五五	結節裂毛症	一六五
脂漏	一五五	皮膚結核及結核疹	一六五
充血性脂漏症	一五六(三〇)	皮膚粟粒結核 潰瘍性粟粒結核皮膚及粘	一六六
癩皮症及癩皮指	一五六	膜眞性結核	一六六
口腔粘膜炎	一五六	皮膚疣狀結核	一六七
ストロフルス又小兒苔癬	一五七	疥癬腫	一六七
汗疹及粟粒疹	一五八	遠心性固定紅斑	一六七(一三〇)
白癬性毛瘡或寄生性毛瘡	一五九	蕁麻疹	一六七
尋常性毛瘡又非寄生性毛瘡	一五九	寄生蟲性蕁麻疹	一六九
白癬	一六〇	汎發性痘疹	一六九(一五)
頭部白癬・頭部寄生性匍行疹・チエルズニス	一六〇	水痘	一六九



# 性病學

痘瘡(真痘)及假痘  
疣贅  
眼瞼黃色腫  
色素性乾皮症  
處方例

一七〇  
一七一  
一七二  
一七三  
一七四

撒布劑 一七三 軟膏劑 一七三  
參兒劑 一七六 硫黃劑 一七七  
腐蝕劑 一七七 殺菌劑 一七八  
內服劑 一七九 皮下注射劑 一八〇  
雜劑 一八〇

## 汎論

(藥物的豫防法)

一八一  
一八二

## 各論

黴毒  
黴毒ノ症狀及經過  
初期硬結或硬性下疳  
黴毒疹

一八三  
一八四  
一八五  
一八六

黴毒性蕨藟疹又紅斑性黴毒疹 一八八  
丘疹性皮膚黴毒疹 一九〇  
扁平コンデローム、粘膜圓斑 一九〇  
手掌足蹠黴毒性乾癬 一九二  
膿疱性黴毒疹、黴毒性瘰癧 一九二  
黴毒性膿疱疹、黴毒性天疱瘡 一九三  
黴毒性白斑 一九三  
黴毒性禿髮症 一九三

黴毒性爪溝炎及爪床炎

一九一

黴毒性肝腫

一九二

護膜腫性(結節狀)皮膚黴毒疹

一九三

潰瘍性黴毒

一九四

遺傳(先天性)黴毒

一九五

遲發性遺傳黴毒

一九六

惡性黴毒

一九七

黴毒ノ血清診斷

一九八

ワッセルマン氏反應、出現期、陽性率

一九九

ザツクス・ゲオルギー氏反應

二〇〇

村田氏法及小林氏法

二〇一

マイニッケ氏溷濁反應

二〇二

驅黴療法

二〇三

一、水銀沃度療法

二〇四

汞劑療法(塗擦、注射)

二〇五

同 (内服、吸入、温浴)

二〇九

沃度劑療法

二一〇

二、砒素療法(サルプルサン療法)

二一一

三、併用療法(水銀沃度及砒素療法)

二一二

蒼鉛療法

二一三

黴毒疾患ノ局所療法

二一四

軟性下疳

二一五

鼠蹊部横痃

二一六

淋疾

二一七

男子淋疾

二一八

急性淋疾

二一九

慢性淋菌性尿道炎

二二〇

男子淋疾ニ於ケル合併症

二二一

包皮炎

二二二

包莖及包皮狹頓

二二三



汎論

泌尿生殖器科學

解剖的要項  
尿ノ検査

二六〇  
二六〇  
二六五

副尿道

二四〇(三二)

瀝胞及海綿體部ノ浸潤及膿瘍

二四二

コウペル氏腺炎

二四二

攝護腺炎

二四三

精囊炎

二四三

淋菌性副睾丸炎

二四七

女子淋疾

二四八

淋菌性尿道炎

二四九

淋菌性陰唇炎・腫炎・子宮頸部炎

二五〇

女子淋疾ノ合併症

二五二

淋疾性バルトリニー氏腺炎

二五三

10

兩性ニ來ル淋疾合併症

二五三

淋菌性尿道膀胱炎及膀胱炎

二五三

腎孟炎並ニ腎臟炎

二五四

淋菌性僂麻質斯

二五四

淋菌性關節炎

二五四

淋菌性心臟内膜炎

二五五

淋菌性發疹

二五六

淋菌性結膜炎及虹彩炎

二五六

直腸淋疾

二五七

淋疾内用藥

二五八

淋疾注射療法

二五九

二六〇

各論

腎臟及輸尿管疾患

二六五

腎及輸尿管ノ先天性畸形及變位

二六五

腎ノ損傷及打撲症

二六五

腎臟炎及萎縮腎

二六六

妊娠腎臟炎

二六七

青年蛋白尿

二六八

游走腎

二六八

腎臟結石

二六九

腎孟炎及腎盂腎臟炎、化膿性腎臟炎、

二六九

腎膿瘍

二七一

腎臟水腫

二九二

腎臟膿腫

二九三

腎臟結核

二九三

一一



汎論

泌尿生殖器科學

解剖的要項  
尿ノ検査

二六〇  
二六〇  
二六五

- 一、尿量 二六五
  - 二、反應 二六五
  - 三、色 二六六
  - 四、清濁 二六六
  - 五、比重 二七〇
  - 六、病的成分 二七〇
  - 七、淋絲 二七〇
  - 八、分尿検査法 二七一
  - 九、尿ノ細菌學的検査 二七一
- 腎臟機 二七三  
泌尿器科常用機械及其使用法 二七三  
尿道注入器又洗滌器 二七六  
ウルツマン氏尿道注射器 二七七  
ギュイヨン氏尿道點滴器 二七八  
ブージー 二七九  
カテーテル 二八二  
粘滑劑 二八二  
カテーテル挿入法及其副作用 二八三

- 腎臟及輸尿管疾患 二六五
- 腎及輸尿管ノ先天性畸形及變位 二六五
- 腎ノ損傷及打撲症 二六五
- 腎臟炎及萎縮腎 二六六
- 妊娠腎臟炎 二六七
- 青年蛋白尿 二六八
- 游走腎 二六八
- 腎臟結石 二六九
- 腎孟炎及腎盂腎臟炎、化膿性腎臟炎、 二六九
- 腎膿瘍 二七一
- 腎臟水腫 二九二
- 腎臟膿腫 二九三
- 腎臟結核 二九三



腎臟外圍炎、表皮炎及周圍炎 二九四  
 腎臟ノ神經痛及特發性腎出血 二九五  
 血色素尿 發作性血色素尿 二九六  
 乳糜尿及出血性乳糜尿 二九六  
 腎臟腫瘍 二九七  
 輸尿管疾患 二九八  
 膀胱疾患 二九八  
 膀胱ノ畸形 二九九  
 膀胱創傷 二九九  
 膀胱結石 三〇〇  
 膀胱內異物 三〇一  
 膀胱炎 三〇二  
 膀胱結核 三〇三  
 膀胱神經症 三〇五  
 遺尿症 三〇七

尿閉附膀胱穿刺術 三〇八  
 膀胱腫瘍 三〇九  
 攝護腺及精囊疾患 三一〇  
 攝護腺及精囊ノ先天性畸形及創傷 三一〇  
 攝護腺炎及精囊炎 三一〇  
 攝護腺肥大症 三一〇  
 攝護腺惡性腫瘍 三一〇  
 攝護腺凝石及結石 三一〇  
 精囊結石 三一〇  
 攝護腺及精囊ノ結核 三一〇  
 精系、副辜丸、辜丸及〱陰囊疾患 三一〇  
 陰囊及辜丸ノ先天性畸形 三一〇  
 辜丸停留及先天性陰囊水腫 三一〇  
 莖膜炎 三一〇  
 陰囊水腫、陰囊血腫、精系水腫、精系 三一〇

靜脈瘤 三二六  
 精系、副辜丸、辜丸ノ炎衝性疾患 三二八  
 急性副辜丸炎、辜丸炎、結核、黴毒 三二八  
 副辜丸、辜丸及陰囊腫瘍 三三〇  
 男子尿道及陰莖疾患 三三一  
 先天性畸形(尿道下裂、上裂、副尿道) 三三一  
 尿道結石及尿道異物 三三二  
 尿道炎(非淋疾性尿道炎) 三三三  
 尿道狹窄 三三四  
 尿浸潤、膿瘍及尿道瘻 三三六  
 龜頭包皮炎 三三七

陰莖結核 三三七(四〇)  
 包皮及包莖狹頓 三三七  
 尿道腫瘍 三三九  
 陰莖腫瘍 三三九  
 婦人尿道疾患 三三〇  
 男子生殖器ノ官能障礙 三三六  
 攝護腺液及精液ノ異常排泄 三三一  
 交接不能症(陰萎) 三三二  
 生殖不能症(不妊症) 三三六



皮膚病泌尿生殖器病醫典

醫學博士 旭

憲

吉纂著

皮膚科學

Dermatologie.

沉論

抑モ吾人ノ外層ヲ覆フ皮膚ハ其構造上一方ニ外來ノ刺戟ヲ蒙ルコト甚シク他方ニハ一種ノ呼吸器ナルガ故ニ體內ニ於ケル異常ハ直ニ皮膚ノ理學的性質ニ變化ヲ來タス是レ皮膚疾患ノ由來スル處ナリトス。然レドモ常ニ我専門科ニアリテハ他醫學分科ニ觀ザル特點アリテ疾患ヲ直接ニ眼ニテ之ヲ睹、指ニテ之ヲ觸ル、ヲ得、若シ學者自ラコレニ熟達セバ觀察能ク微細ノ點ニ透達シ其本體ヲ究ムル敢テ難シトセス、素トヨリ解剖並ニ生理



ヲ熟知スルニアラザレバ然ル能ハザルモ之ハ教科書ニ譲リ茲ニハ治療法ノ大體ニノミ就テ述ベシ。

蓋シ皮膚病患者ヲ加療シテ治療ノ効ヲ收メンニハ先ヅ其疾病ヲ識ラザル可カラズ、古語ニ云ハズヤ診斷正シカラザレバ從テ治療ノ正鵠ヲ期シ難シト、然リ而シテ疾病ヲ識ルトハ唯確診ヲ下シ病別ヲ誤ラザルヲノミ謂フニ非ズシテ更ニ能ク蔓延ノ狀、輕重ノ度、經過ノ遲速、目前ノ病機及ビ内臟並ニ神經系統ノ異常ヲ熟察シ進ンデ起因ヲ究メ全身ノ健康狀態ヲモ識ル事ヲ云フナリ、斯クシテ疾病ヲ識リ醫治ニ從ハンニハ又豫メ千態萬狀ノ病症ニ應ズ可キ個々ノ策ヲ熟知セザル可カラズ。

一般ニ治療ノ目的ハ患部ニ健全ナル組織ヲ新生セシムルカ、止ムナクバ患部ヲ破壊シ排除シ去ルニ在リ、若シ除去シ能ハザレバ其病症ニ伴フ諸障害ノミニテモ輕減スルニ力メツ、尙常ニ自然治療ノ進捗ヲ拒ムナキヤヲ顧慮セザルベカラズ、之レヲ極論スレバ治療ハ醫術ノ功ニ非ラズシテ寧ロ生體自ラノ抵抗力能ク外襲ノ危害ヲ防ギ有毒ノ侵入ヲ緩和シ缺損ヲ填補シ擾動ヲ治定セルニ因ルト云フヲ得ベシ、然レドモ生體ヲシテ此活躍ニ合否、適不適ノ途ヲ知ラシメ人爲的ニ自然治療ヲ促進セシムルハ即チ醫ノ力ニ待タザル

可カラザル所ナリ。

皮膚疾患治療ニ特異ナルハ既述セル如ク病勢ノ消長、症狀ノ變化ヲ親シク視得ルノミナラズ患部ニ貼用塗布セル藥劑ノ效果ヲモ目前ニ識リ得ルニ在リ、斯ク試メル治療ノ效果成績ヲ能ク白日ノ下ニ比較講究スル便アル事徒ニ暗中摸索ヲ事トスル内科醫ノ類ニ非ズ、故ニ治療ニ惑フ事自ラ少ク治療法モ治療藥ノ作用モ他ノ醫學ニ比スレバ大ニ明白ノ者アリ而カモ幾多ノ藥劑ノ微妙ナル作用ハ未ダ謎ニ屬セリ。

皮膚病治療法ノ個々一様ナラザル事概ネ次ノ如シ、旺盛ナル炎衝ヲ消散スルニハ緩和清涼ヲ旨トシ慢性症ニハ刺戟シ充血ヲ促ガシテ再ビ急性症狀ニ變化セシメ以テ陳在ノ浸潤ヲ去ル、又分泌液ノ過多ナルハ之レヲ吸收乾燥セシメントシ結痂皮ノ硬化セルハ之レヲ軟和剝離セントス、又此處ニ淺キ腐蝕作用ヲ望ミ彼處ニ其深キヲ求ムル事アリ或ハ此處ニ組織ノ離落ヲ惜ミテ彼處ニ殘遺ナキ破壊ヲ試ムル事アリ或ハ一ニ乾膚ニ塗脂シ他ニ過脂ヲ防止スルアリ。其療法斯ク一律ニアラザレドモ要スルニ原因療法ヲ主トナス、サレド又對症療法ノミヲ以テ効ヲ收ムル事アリ。

凡テ是等個々ノ療法ハ諸種ノ理學的技術ト化學的治療藥トヲ待チテ遂ゲラルルモノナ



## 皮膚病一般病理 Allgemeine Pathologie.

皮膚病ノ症狀トハ皮膚ニ於テ主トシテ理化學的變化ニヨリ現ハル之ヲ發疹ト云フ、而シテ其本態ヨリ原發疹ト續發疹トニ區別ス即チ原發疹トハ病機其者ノ發現ヲ意味シ續發疹トハ原發疹ノ變化ニ由テ發生スルモノヲ云フ。

## 原發疹 Primäre Effloreszenzen.

I. 斑 Macula, Fleck 周圍ノ皮膚ト同高ナル限局セル着色異同ヲ云フ其發生由來ニヨリ三様ニ區別シ得。

(1) 毛細管ノ病的變化ニヨリ左ノ四様ヲ呈ス。

a. 實性充血 Aktive Hyperaemie 鮮紅色ニシテ爪大ノモノヲ薔薇疹 Roseola ト云ヒ之ヨリ以上大ナルモノヲ紅斑 Erythema ト云フ發疹ノ周圍ニ邊暈ヲナスモノハ

赤暈 Halo, Hof ト名ヅク、是等ノ斑ハ皆指壓ニテ消褪スルモノナリ。

b. 虚性充血或ハ鬱血 Passive Hyperaemie od, Staunung 青赤色「チアノーゼ」ヲ呈ス。

c. 出血ハ一般ニ約言シテ紫斑 Purpura ト云フ又大小ニ依テ點狀出血 Petechin 線狀出血 Vibices 及ヒ皮下溢血 Ecchymosen ト云フ、是等ノ斑ハ指壓ニテ消失セズ。

d. 血管擴張症 Telangiectasien 血管ノ新生又ハ擴張ニ因リ來ル單ナル充血ト異リ指壓ニヨリ消退セズ。

(2) 真皮ノ限局性病的變化或ハ病的產生物ノ蓄積ニ由テ斑ヲ生ズ黄色腫、鞏皮症等ノ如キ即チ是レナリ。

(3) 皮膚ノ色素増加セルモノハ母斑、肝斑、雀斑等トナリ減退セルトキハ白斑、白皮症トナル。

II 蕁麻疹(發斑) Urtica, Quaddel 限局シ多クハ忽チ消散スル所ノ皮膚浮腫ナリ。浮腫ハ深キ真皮ニ來タリ乳頭血管ヲ壓迫スルニ由リ爲ニ蠟様色ヲ呈スルナリ。

III 丘疹 Papula, Knötchen 即チ小結節ニシテ實質性ニ長ク存在スル隆起ナリ、其



大サ、形、表面及ビ硬度ハ種々ナリ。原因ハ概ネ次ノ四種ナリ。

- (1) 炎衝又ハ蕁麻疹ト異リ細胞性滲潤ニ由ル丘疹性微毒ノ如キハ其好例ナリ。
- (2) 上皮ノ毛嚢口ニ集簇スルモノ 毛嚢性角化症、毛孔性苔癬ノ如シ。
- (3) 皮脂腺ニ分泌物ノ滞留スルモノ例ヘバ粟粒腫ノ如シ。
- (4) 新生物。

**IV 結節** Tuberculum, Knoten. 硬靱ナル豌豆大乃至胡桃大ノ隆起ニシテ丘疹以上ノ大サヲ有シ往々深ク真皮中ニアリ從テ其境界不明ナリ、又其以上ノモノヲ瘤 Phyma, Knollen ト云フ。

**V 小水疱及ビ水疱** Vesicula, Bläschen; Bulla, Blasen. 小水疱ハ扁豆大以下ノ透明若シクハ半透明ノ内容アル上皮ノ擡頭セシモノヲ云ヒ其以上ヲ水疱ト云フ。

上皮、水疱ノ被蓋物タルモノハ上皮組織全部ニシテ其底部ハ即チ乳頭ナリ天疱瘡、多型滲出性紅斑等ノ如シ丹毒或ハ蜂窠織炎ノ如キ深在性炎症ノ際ニモ乳頭炎症ノ爲ニ水疱ヲ生ズ。

水疱ノ内容ハ初メハ純粹ノ血清ナルモ後乳白トナリ遂ニ膿様黄色ヲ呈ス、水疱ノ被蓋

破ルレバ其内容乾燥シテ膿様ノ結痂ヲナシ新ナル上皮及ビ角質ヲ形成シ後剝脱ス。

上皮間水疱ハ殊ニ外界ノ刺戟ニヨリテ起リ角質下又ハ種子層間ニ小水疱多數發生シ恰モ多房性水疱ノ觀ヲ呈ス濕疹、尋常性膿疱疹、凍傷、環狀白癬、人工性皮膚炎等ニ見ル。

水疱強靱ニシテ臍ヲ有スルコトアリ内容ハ血清、血液及ビ汗等ヲ有スルモノアリテ痘瘡、膿疱疹、匍行疹等ニ見ル。

**VI 膿疱** Pustula, Eiterblase 上皮及上皮間ニ生ズ原發膿疱ハ炎症性小結節ヨリ直接ニ或ハ既ニ毛嚢口ニ潜在セル化膿菌アルトキ甫メテ生ズ。

續發膿疱ハ初メ漿液性水疱ニ細菌侵入シ又ハ細菌作用ナク凡白血球ノミノ侵入ニヨリテ起ル。

### 續發疹 Sekundäre Efflorescenzen.

**I 表皮剝離** Excoriation, Hautabschürfung. 上皮ノ缺損ナリ角質ヲ剝離セバ唯白色ニシテ乾燥シ若シ種子層マデ達スレバ濕潤セルヲ見ルベシ、乳頭マデ達スレバ乳頭血管ヲ破壊シ搔爬セバ爪痕ニ相當シテ血點ヲ生ジ血痂ヲ生ズ、新生上皮及ビ角質生ズレバ血



痂剝離シテ完全ニ治癒スルモノナリ、角質新生後ニ血痂剝落スルモ充血ハ遺殘シ周圍ニ色素沈着ヲ貽ス若シ乳頭破壞セラレタル時ハ癩痕様ノ斑ヲ貽スベシ、表皮剝離部ニ化膿菌傳染セバ血性結痂ハ膿性トナル。

**II 輝裂** Rhagades, Schrunde 病的ニ變化セル皮膚ニ輝裂ヲ生ジタルヲ云ヒ殊ニ強キ伸展、牽引等ニ遭遇セシ時ニ生ジ易シ、上皮ノミノモノハ濕性ニシテ真皮ニ達スレバ出血性トナル殊ニ口角、鼻翼、肛圍及乳嘴等ニ生ズ。

**III 痂皮** Crusta, Kruste. 血清、血液、膿等ノ乾涸セル病的產物ヲ云フ、血清ヨリ生ゼバ黃色蜂蜜様ニ透明ナリ膿ヲ生ズレバ乳黃色ニ不透明ニシテ血液ナレバ帶赤褐色ナリ屋根狀ニ層重シテ中央厚ク周圍薄キ結痂ヲ蠣殼瘡ト云フ。

**IV 落屑** Squama, Schuppen. 角質ノ剝落スルモノヲ云ヒ普通上皮ノ連續落屑ナリ鱗、屑トハ一方ニハ速カナル新生ヲ意味スルモノニシテ魚鱗癬ニ於ケルガ如シ、炎症ナク病的ニ角質増加スルヲ角質増殖 Hyperkeratose ト云フ、乳頭ノ炎症ノ結果不完全ニ角質増殖スルヲ不全角化 Para-keratose ト云フ、真皮ノ炎症ノタメ表皮肥厚 Akantose ナ

ルモノアリ。

**V 潰瘍** Ulcus, Geschwür 病的組織ノ破壊ニヨリテ生ゼシ真皮ノ缺損ナリ治癒スル時ハ必ず癩痕ヲ遺ス。

**VI 癩痕** Cicatrix, Narbe 真皮ノ缺損ヲ補フ結締織新生ニシテ初メ赤色ナレドモ漸次白色滑澤トナル、癩痕隆起スル時ハ蟹足腫 Keloid ト云フ。

潰瘍ナクシテ癩痕様ニ變化スルトキハ之ヲ萎縮 Atrophie ト云ヒ紅斑性狼瘡、鞏皮症、護謨腫等ニ於テ之ヲ見ル。

## 一 治療法ノ定型

**1. 撒布劑** Puder 是ハ灼熱、癢痒ノミニシテ未ダ濕潤ナキ病症ニ用フ、他覺的ニハ下温ニ自覺的ニハ冷感ヲ與フ、撒布劑ニハ動物性(精製貝殼、烏賊骨)ト植物性(澱粉、米粉)ト礦物性(亞鉛華、滑石、次硝酸蒼鉛)トアレドモ後兩種主トシテ用ヒラレ殊ニ混和シテ用フルヲ普通トス。



「デルマトール」、水揚酸、撒布劑ニ混和シテ用ヒラル  
沃度「フォルム」、「デルマトール」、「キセロフォルム」、「ヨドール」、「アイロール」、規尼  
涅等ハ單味ニテ撒布劑トス。近時我教室ニ於テハ高木氏創製ノ「チオノール、カルシウム」  
ヲ用ユ。

④ 「チオノールカルシウム」……………五・〇……………亞鉛華澱粉……………一五・〇

撒布ハ最モ簡便ニシテ緩和ナル法ナリ、サレド作用ハ弱シ。特ニ注意スベキハ濕潤甚  
シキ時ハ用ユベカラズ是レ漿液ト混ジ痂皮様トナリ増悪スルガ故ナリ。

撒粉ニハ布ヲ用フベカラズ脱脂綿カ又ハ筵中ヨリ振撒ス患部ニ觸レタル綿ハ再ビ使用  
スベカラズ。

2. 液膏劑振盪劑丁幾劑及ビ假漆劑<sup>フキルニツセ</sup> 是等ハ藥劑ヲ稀釋又ハ混和セル半流動體

或ハ液體ニシテ皮膚ニ塗布スレバ其儘乾燥スル者ナリ。

a. 液膏劑 Liniment ビック氏ノ創ムル處ニシテ處方次ノ如シ。

ビック氏液膏劑

⑤ 「ドラガカント」護膜末……………五・〇……………「グリセリン」……………二・〇……………水……………一〇〇・〇

土肥氏ハ左ノ如ク改良セリ

石炭酸亞鉛華「リニメント」(土肥氏方)

⑥ 「トラガカント」護膜末……………五・〇……………「グリセリン」……………二・〇……………亞鉛華……………一〇〇・〇

石炭酸……………二・〇……………水……………一〇〇・〇

其他諸種ノ處方アルモ製劑上多大ノ注意ト時間トヲ要スルヲ以テ余ハ次ノ如ク改良セ  
リ製法簡單ナリ。

⑦ 「トラガカント」護膜末五・〇……………酒精……………一〇・〇……………「グリセリン」……………一〇・〇

水……………七五・〇……………(旭氏新「リニメント」)

之レニア鉛華、硫黃、「チオノール」、「イヒチオール」、參兒、「グリテール」等ヲ混和  
シテ用フ。

石炭酸亞鉛華「リニメント」(旭氏方)

⑧ 「トラガカント」護膜末……………五・〇……………亞鉛華……………一〇・〇……………「アルコール」……………一〇・〇

「グリセリン」……………一〇・〇……………石炭酸……………二・〇……………水……………七五・〇

硫黃「リニメント」



- ㊦ 精製硫黄……………一〇〇〇……………酸化亞鉛……………一〇〇〇……………旭氏「ネオリニメント」……………一〇〇〇〇
- ㊦ 參兒……………二〇〇〇……………硫黄華……………二〇〇〇……………亞鉛華……………一〇〇〇
- 旭氏「ネオリニメント」……………一〇〇〇〇
- 白雲膏
- ㊦ 焦性没食子酸……………五〇〇……………「イヒチオール」……………三〇〇〇……………旭氏「ネオリニメント」……………一〇〇〇〇
- ウイルソン「リニメント」
- ㊦ 「トラガカ末」……………五〇〇……………「アルコホル」……………一〇〇〇……………「グリセリン」……………一〇〇〇
- 「ントゴム」……………七五〇……………亞鉛華……………一五〇……………水楊酸又ハ……………一〇〇
- 水……………安息香酸……………一〇〇
- 土肥氏ラノリン泥膏、ウイルソン氏軟膏(一七頁)ノ代用品トシテ余ノ調製シタルモノニシテ乾燥シ縹帶ヲ要セザル便アリ。
- 「リニメント」製法
- 乳鉢ニ「トラガカ末」末ヲ取り之レニ「アルコホル」及ビ「グリセリン」ヲ入レ乳鉢

ニテ研和攪拌シツ、水ヲ少量宛入ルベシ、「テール」、亞鉛華等ノ主藥ハ後ニテ混ズ、但シ亞鉛華、硫黄等ノ粉末劑ハ最初ニ「トラガカ末」末ト研和シテ置クヲ可トス、石炭酸、安息香酸等ハ所要ノ量ヲ水ニ溶解シ置クベシ。

ベック氏「グリセリン」液膏劑アリ適當ノ藥劑ヲ加ヘテ用フ。

㊦ 滑石……………澱粉……………各四〇〇……………「アラビアゴム」……………一・五

「グリセリン」……………二〇〇……………水……………二〇〇〇

山田弘倫氏ハ液膏劑ニ代用スベク氏ノ考案ニヨル米糊劑ヲ推賞ス、處方左ノ如シ陸軍ニテ使用サル。

㊦ 米ノ粉 四〇〇—四五〇……………水……………五〇〇〇……………之レヲ煮沸シテ糊トナシ

水楊酸……………二・五……………右山田氏米糊劑

b. 振盪劑 Schüttelmixtur. 粉末ト液體トヲ等量ニ混和セルモノナリ。

㊦ 亞鉛華……………澱粉……………酒精……………

「グリセリン」……………各等量混和

之ニ「チオノールカルチウム」、「キセロフォルム」等ノ粉末ヲ加味セントスル時ハ之レ



ニ相當スルダケ酒精、「グリセリン」ノ量ヲ増セバ可ナリ。

是等ハ撒布ト同一作用アリテ而カモ層厚ク皮膚ニ密着スル故ニ急性皮膚炎及ビ間擦性濕疹ニ廣ク用ヒラル、殊ニ繃帶ヲ要セズ尙水ニテ洗ヒ去リ得ル便アリ。

c. 丁幾劑 Tinctur

「レゾルチン」、焦性没食子酸、「ナフトール」、「エビカリン」、  
爹兒、「グリテール」、「サリチール」酸等ハ酒精或ハ依的兒ニ溶解シテ塗布料トス。丁幾劑  
ニハ一〇%ノ割合ニ「グリスリン」ヲ混和スルヲ可トス。

木「テール」、「レゾルチン」又ハ「サリチール」酸精

酒 木「テール」(「レゾルチン」又ハ「サリチール」酸)……………五・〇 「グリセリン」……………一〇・〇

酒精……………八五・〇

爹兒丁幾

酒 梓木「テール」……………酒精……………依的兒……………各等量

爹兒浴ノ際使用ス(二三頁參照)

d. 假漆劑 Firnisse 藥劑ヲ「コロヂウム」又ハ「トラウマチチン」ニ溶解セル者ナ

リ。

「コロヂウム」ハ「コロヂウム」綿ヲ「エーテル」ニ溶解セルモノナリ(局方)  
「トラウマチチン」ハ左方ニヨル(局方)

酒 「グッタベルカ」……………九・〇 「クロロフォルム」……………九一・〇

之レヲ皮膚ニ塗布スレバ「コロヂウム」ノ依的兒、「トラウマチチン」ノ嘔囉仿謨ハ蒸散シ主藥ノミ乾燥シテ殘ル、安息香酸丁幾モ亦此目的ニ用ヒラルル事アリ。

ウンナ氏亞鉛華膠モ是レニ屬ス

酒 酸化亞鉛……………四〇・〇 白膠……………「グリセリン」……………各二五・〇

蒸餾水……………一〇・〇 加温シテ貼用ス

余ハ好ンデ左法ヲ用ユ乾燥ノ度遲キモ「エーテル」、「クロロフォルム」等揮發性ノモノヲ含マザルガ故ニ永時貯藏ニ堪ユ。

酒 「トラガカン」……………五・〇 「アルコホル」……………一〇・〇 「グリスリン」……………一〇・〇

水……………二五・〇 亞鉛華……………一〇・〇 右旭氏新リニメント(第二)

患部ヲ石鹼又ハ偏陳ニテ良ク拂拭シ置キ粗毫ノ刷毛ヲ以テ塗布シ其上ニ綿層ヲ置キ繃帶ヲ施ス。



是等液膏劑、振盪劑、丁幾劑、假漆劑ハ脂肪ノ作用ヲ避クル時期即チ急性症狀ニ用ヒラル、丁幾劑ハ酒精、依的兒ノ蒸散ニヨリテ主藥ノ作用ヲナシ、水ヲ通サバル假漆劑ハ同時ニ患部ヲ嚴密ニ封鎖ス、殊ニ「コロヂウム」ハ凝結スル際收縮シ患部ニ對シテ加壓作用ヲナス、亞鉛華膠繃帶ハ空氣及ビ水蒸氣ヲ透滲シ且ツ加壓作用モアレバ下腿濕疹及ビ靜脈瘤ヲ伴ヘル下腿潰瘍ニ用ヒテ確實ナル效果アリト云ハルルモ本邦ニハ幸ニ本症ナキヲ以テ著者ニハ實驗ナシ、亞鉛華膠ニハ「イヒチオール」、參兒等ヲ加味ス其作用ハ發汗ヲ保持シツ、患部ヲ嚴密ニ封被シ分泌液ヲ吸收乾燥セシメ且ツ適壓ヲ加フルニアリ。

**3. 泥膏及軟膏** *Pasta et Unguentum* 泥膏ハラッサール氏ノ創メシモノニシテ粉劑

ト油脂トヲ等量ニ熔和シタルモノニシテ分泌物ヲ吸收シテ乾燥セシム、軟膏ハ油脂ニ粉劑ヲ適宜研和セルモノニシテ瘡痂、肉芽、濕潤面ニ用ヒ痂皮ヲ去リ表皮形成ヲ促ス。

- ラッサール氏華攝林膏
- 亞鉛華……………各二五〇
- 澱粉……………各二五〇
- 華攝林……………五〇〇
- 土肥氏刺納林泥膏

- 刺納林……………五〇〇
- 亞鉛華……………
- 澱粉……………各二四〇

土肥氏泥膏ハラッサール氏泥膏ノ華攝林ニ代フルニ刺納林ヲ以テセルナリ、之レ日本ノ華攝林ハ粗惡ニシテ却テ皮膚ヲ刺戟スル懼レアレバナリ。

- 單軟膏(局方)
- 黃蠟……………一〇
- 胡麻油……………二〇
- ウイルソン氏軟膏(局方)
- 安息香酸……………一〇
- 亞鉛華……………六〇
- 豚脂……………三〇〇
- ヘブラ氏軟膏
- 單鉛硬膏……………
- 阿列布油……………等分
- (又ハ落花生油局方)
- 亞鉛華軟膏(局方)
- 酸化亞酸……………一分
- 安息香酸豚脂……………九分

余ハ基礎劑トシテ刺納林泥膏、單軟膏、ウイルソン氏軟膏ヲ賞用ス。種々ノ軟膏ハ單軟膏ヲ原料トナス。



是等膏劑ヲ皮膚ニ塗擦セル時ハ其上ニ粉劑ヲ撒布スルノ後繃帶ヲ施ス、繃帶材料トシテ外科用ノ吸收良キ者ハ却テ塗脂ノ目的ニ反スルヲ以テ不適當ナリ適當ナルハ薄キ常綿更ニ良キハ「リント」ト「フランネル」日本ニテハ紀州「ネル」ニ攤敷シテ貼用ス。

軟膏ヲ貼用シテ侵蝕ヲ速カナラシメンニハ繃帶層間ニ亞麻仁油紙等ヲ挿置シ反對ニ乾燥ヲ急グ時ハ薄キ繃帶材料ヲ用フ下肢ニ施シタル繃帶ハ運動ニヨリテ弛緩シ易キ故更ニ外部ヨリ壓迫繃帶ヲ施スカ又ハ周邊ヲ絆創膏ニテ支持ス、又繃帶ニテ壓迫ヲ加ヘンニハ彈力性繃帶ヲ用フ、手指ノ繃帶ハ個々ニ施ス。

身體各部ヲ貼用スルニ要スル軟膏ノ量ハ凡ソ次ノ如シ。

全身……………二〇〇〇 軀幹及四肢……………五〇〇—一〇〇〇 頭部……………三〇〇〇

顔面……………二〇〇〇 眼、鼻、口、陰莖等……………一〇〇〇

繃帶交換ノ時舊キ軟膏ハ先ヅ「ベンチン」、揮發油又ハ「オレーフ」油ヲ浸セル綿ヲ以テ拭ヒ後チ粉劑ニテ脂肪ヲ除ク、病症ニヨリテハ沐浴シ石鹼ニテ洗滌セシメ復タ繃帶ヲ施ス、分泌過多刺戟甚ナル時ハ患部ヲ包被シ炎症減退セバ繃帶ヲ去ルヲ妨グズト雖モ取捨ハ患者ノ職業ニヨル。

4. 油劑

Oleum 鱗屑及ヒ痂皮ヲ除去スルニ用ユ又ハ皮膚ノ乾燥ヲ防ギ表皮形成ヲ促スニ用ユ植物性(椿油、阿列布油、胡麻油、亞麻仁油、大楓子油)ト動物性(肝油、豚脂、刺納林)ト礦物性(華攝林、巴刺賓)ノ三種アリ諸種軟膏、硬膏ノ原料又ハ皮下注射料ノ賦形藥トス。

㊦ 安息香酸……………二〇〇 豚脂……………一〇〇〇 右安息香脂

㊧ 大楓子油…………… 肝油……………等分ノモノ 右癩病注射料

本邦ニ於テハ椿油ハ最モ純良ナルモノヲ得ラル、肝油ノ如キモノハ注射料トシテ疼痛等少ナシ。

5. 硬膏劑

Pfaster

蠟狀稠度ノ製劑ニシテ體温ニテ溶軟シ皮膚面ニ粘着スルモノ

ナリ患者ニハ通常一定ノ布片ニ攤敷セルモノヲ與フ。

水銀硬膏

㊦ 水銀……………三〇〇 無水刺納林……………一五〇……………ヲ取り親密ニ研和セル後

黃蠟……………一五〇 單鉛硬膏……………九〇……………ノ半バ冷却セル溶和物ニ

密和ス



「サリチール」酸石鹼硬膏(ビック氏硬膏)(局方)

- 水楊酸……………一〇〇〇……………單鉛硬膏……………七〇〇……………白蠟……………一〇〇〇
- 藥用石鹼末……………五〇……………樟腦……………阿列布油……………各一〇〇

市販ノモノ用フルニ足ル。

局方ニハ「サリチール」酸ハ一〇%トナルモビック氏ハ一%ヨリ一〇%マデノモノヲ製シ症狀ニヨリ廣ク應用セリ

「スビール」硬膏、山田博士ノ考案セル五〇%「サリチール」酸硬膏ニシテ疣贅、鶏眼、胼胝腫ニ用ヒラレ市場ニ發賣セララル。

### 6. 石鹼劑

Sapo. 表皮ヲ弛緩、軟和、剝離シ又ハ斯クシテ藥劑ヲ容易ニ浸透セシムルタメニ洗滌、塗擦料トシテ用ヒラル、那篤倫石鹼ハ硬ク加里石鹼(又ハ綠石鹼)ハ軟シ、綠石鹼ハ固體ノ儘、剝離療法ニ(癩風、瘡瘡、疥癬等)用フ、一般ニ溶液ハ作用緩和ナリ、藥用石鹼ニハ爹兒石鹼、水銀石鹼、「サリチール」酸石鹼、硫黃石鹼等アリ、「ザバルコール」ハ酒精ヲ混和セル軟粥狀ノ石鹼劑ナリ、是ハ塗擦ノミニテ通常ノ洗滌ニ代フ

ルヲ得ベク且ツ酒精溶解性ノ藥劑(爹兒、「レゾルチン」、「焦性没食子酸」、「イヒチオール」、「ツメノール」、石炭酸等)ヲ混和シタル製劑モアレバ夫等藥劑ノ使用ニハ極メテ簡便ナリ。ヘブラ氏ノ加里石鹼精ハ缺ク可カラザルモノナリ。

方 加里石鹼……………一〇〇〇〇 酒精……………五〇〇 「ラヘンデル」油……………〇・五  
流動石鹼トシテハ本邦ニ於テ下山氏ノ創製セラレタル諸種ノ藥用石鹼アリ使用上便利ナリ。

### 7. 罨法

Unschlag 病症ニ應ジ夫々冷水、微温湯、熱湯ヲ用フ、例ヘバ強度ノ熱灼アル殊ニ濕潤セル炎症ニハ冷罨法ヲ、爹兒ニ特異質アル患者ニ癢痒制止法トシテ熱罨法ヲ施スガ如シ、罨法ノ温度ハ患者ノ感受性ニ應ジテ加減ス、罨法料ニハ常水或ハ收斂劑ノ溶液ヲ用フ。

皮膚科ニ於テ最モ多ク使用セララルルハ二%硼酸水ナリ其他一萬倍—一千倍「カメレオン水(過滿鞣酸加里液)等用ヒラル。

一一五%醋酸礬土水(明礬水)

一一五%鉛糖水



右ニ〇・五—一%石炭酸ヲ加フルモ宜シ

一—三%「アルゾール」水 一—二%「レゾルチン」水 〇・二五—〇・五%皓礬水

ブーロウ氏液

④ 鉛糖(醋酸鉛)……………五・〇 明礬(醋酸アルミニウム)……………一・〇 水……………一〇〇・〇

右使用時強ク振盪シ一〇%—二〇%ニ稀釋シテ使用ス表皮形成藥トシテ効アリ

8.浴法 Badekur 局所浴ト全身浴トノ二法アリ、通常温浴ハ皮膚角層ヲ軟和シテ

滲透性トナシ藥劑ノ吸收ヲ容易ナラシムル作用アリ、藥劑ハ所謂藥湯トシテ用フルカ或ハ浴後ノ皮膚ニ撒布、塗布ス、本邦ノ如キ温泉多キ土地又ハ本邦人ノ如キ潔癖アル者ニハ多クハ前法ニ據ルヲ宜シトス。

硫黄浴ハ硫肝即硫化加里(一浴二十五瓦—百瓦或ハ湯ノ花一浴ニ五十匁—百匁)ヲ便トス、硬結性瘡瘡、疥癬、痒疹ニ効アリ。

濃厚ニ失スル時ハ刺戟スルコトアルヲ以テ良ク溶解セシメ薄キ乳白色ヲ呈スルヲ度トスベシ黄色又ハ綠色ヲ呈スルハ濃厚ナルノ證ナリ過分硫黄ノ刺戟作用ヲ輕減スルタメニ

米糠ヲ混ズルコトアリ。

糠浴三—四封度ノ糠ノ煎汁ヲ加ヘタルモノナリ、普通糠一升ヲ袋ニ容レ五升ノ水ニテ半時間煮沸シ之ヲ糠袋ト共ニ投ズ、痒疹ニ宜シク又單ニ皮膚洗滌ニ用フ、(米ノ磨汁ヲ代用スルモ妨ナシ)。

澱粉浴(一浴ニ凡ソ一・二封度)効用ハ同上

海水浴或ハ人工鹽浴(一浴ニ鹽一貫目)ハ痒疹ヲ増スコトアリ注意スベシ。

曹達浴(一浴ニ約二百匁)同ジク痒疹ニ向ツテ適ス。

其他明礬浴(一浴ニ五百瓦)過滿器酸加里浴(一浴ニ五瓦—十瓦)單寧浴(一浴ニ百瓦)「カミツレ」浴(一浴ニ二百匁)、松葉浴(一浴ニ百匁)、乾葉浴(一浴ニ二百匁)并ニ昇汞浴(小兒ニハ一浴ニ一—五瓦大人ニハ十瓦)ヲ木槽浴トシテ用ユ等アリ。

爹兒浴ハ軟膏、丁幾劑ノ簡便ナルニ若カザレドモ手、足又ハ四肢ノ局所性疾患ニ用キラル殊ニ余ハ手掌足趾ノ白癬ニ賞用ス。

爹兒丁幾(一四頁)ヲ最モ便トス又ハ

④ 榉木爹兒油…………… 杜松子油……………各五〇・〇 酒精……………



先ヅ此液ヲ患部ニ塗布シテ其稍乾燥スルヲ待ツテ局所浴ヲ行ヒツ、常ニ熱湯ヲ加ヘ成ル可ク熱クスベシ三十分乃至一時間トス。

「リゾール」浴「リゾール」ヲ適下シツ、充分ニ攪拌シ浴湯淡キ乳白色ヲ呈スルマデ「リゾール」ヲ加フ大體ハ一浴ニ五瓦―十瓦即チ約二千倍液トス瘡痒制止ノ効有リ。

局所浴ニハ參見石鹼浴、醋酸礬土浴、「フォルマリン」陰莖浴等アリ

以上述べタル浴法ハ入浴時間ハ長キモ一時間ヲ越ユルコトナシ、之ニ反シヘブラ氏持續浴トテ四六時中入浴セシムル法アリテ全身ノ皮膚疾患又ハ高度ノ火傷等ニ應用セラレ皮膚ヲ洗滌スル事ハ急性炎症ニハ不可ナリ殊ニ強度ノ炎症ニハ之レヲ嚴禁シ、油劑、乳脂ヲ塗布ス、急性炎症ヲ水ニテ洗滌スル時ハ石鹼ヲ用フベカラズ洗滌後再ビ塗脂ス、間擦性濕疹ハ炎症激シクモ洗滌シ汗脂ノ分解腐敗物ヲ去ル、以上ノ場合ニハ必ず洗滌後乾燥セル「タオル」ニテ拂拭スルヲ要ス。

## 二 治療ニ使途廣キ藥劑ノ性狀

### 1. 乾燥劑 Exsiccantia.

次硝酸蒼鉛、「デルマトール」(次没食子酸蒼鉛) 單味ニテ又ハ滑石ト混和シ又ハ軟膏トシテ乾燥ヲ望ム患部ニ用フ(濕疹、間擦性濕疹、龜頭炎等)。

「チオノールカルチウム」濕潤ヲ乾燥セシムル事速カナリ汗疹、間擦性濕疹等ニ廣ク用ヒラル、亞鉛華澱粉ニ混ジテ用ユ(一〇頁參照)。

「キセロフォルム」、次硝酸蒼鉛ニ同ジ。

澱粉、米粉、濕潤面ニハ決シテ用フ可カラズ分解シ易ケレバナリ。

酸化亞鉛(亞鉛華) 單味ニテ或ハ滑石、澱粉等ト和シテ撒布劑トシ赭石、辰砂等ヲ混和シテ皮膚顏料トシ軟膏、泥膏、液膏ト爲ス、用途廣シ。

石松子 小兒ノ間擦性濕疹ニ撒布ス。

### 2. 殺菌藥及ビ消毒藥 Antiparasitaria et Desinficientia.

硼酸 撒布劑、軟膏トス二%水溶液ハ罨法料及ビ洗滌料トナス、軟膏ハ三乃至五%ト



ス。

石炭酸 濃厚ナルハ腐蝕薬トシ稀釋水溶液(〇・五—三・〇%)ハ洗滌料及ビ罨法料トス、殺菌ノ効アルノミナラズ知覺ヲ鈍麻セシムル性アレバー—三%「リニメント」又ハ軟膏トシ瘙痒制止ニ用フ

「リゾール」(「クレゾール」石鹼精)其成分「クレゾール」ニ富ム故ニ消毒力強キガ如シサレド惡臭アリ、浴料トシテ應用ス。(二四頁)

「ヒノゾール」水ニ溶解シ易キ黄色ノ粉末ニシテ消毒力強シ、一千倍—五百倍溶液ヲ罨法料、洗滌料トス。

又タ二〇—三〇%ノ溶液ハ痤瘡等ニ用ヒテ效アリ。

昇汞 濃厚液ニハ腐蝕作用、一千倍溶液ニハ消毒作用、軟膏ニハ瘙痒制止作用アリ、罨法ニハ一萬倍ヲ浴劑ニハ一千倍溶液ヲ用フ。

青酸々化汞(「オキシチアン」汞) 殺菌力強ク腐蝕力ハ弱シ五百倍—一千倍水溶液ハ金屬性器具ヲ消毒スルニ良シ。

白降汞 五—一〇%白降汞軟膏トシテ用ユ。

白降汞軟膏

白降汞〇・五—二・五—五・〇 刺納林…………… 華攝林……………各二五・〇

黄色酸化汞(黄降汞) 軟膏トナシ顔面、鼻腔、粘膜及眼瞼縁等ニ塗布ス。

黄降汞軟膏

黄色酸化汞〇・一—〇・五 華攝林……………一〇・〇

赤色沃度汞(沃度水銀) 強キ腐蝕藥ナリ。

甘汞 最モ緩和ナル汞劑ナリ、皮膚及ビ創傷ノ上ニテ徐々ニ昇汞ニ變ジ汞劑ノ作用ヲ顯ハス陰部並ニ肛圍ニ來ル黴毒疹又ハ扁平「コンヂュローム」ニ撒布劑トス。

又タ往々頭蝨除去ニ用ヤラル。

一般ニ汞劑ヲ使用スル時ハ患者ノ特異質ニ注意シ紅斑、丘疹或ハ口内炎ヲ起セル時ハ直ニ服藥ヲ止ムベシ。

沃度「フォルム」 是ハ下腿潰瘍、軟性下疳、護謨腫或ハ結核性潰瘍ノ如キ汚穢潰瘍面ヲ清潔ニスルニ最モ佳ナリ。

撒布劑、軟膏又ハ「ガーゼ」トシテ用フ、特異質アリ注意スベシ、余ハ本劑ヲ使用スル



ニ先手體ノ一部ニ少量ノ粉末ヲ撒布シ絆創膏ニテ之ヲ掩ヒ廿四時間ノ後刺戟症狀ナキトキハ特異質ナキ者ト見做シ使用ス。

沃度「フォルモーゲン」 殆ド無臭無刺戟ナリ。

「ヨドール」 効果ハ沃度「フォルム」ニ譲ラズシテ無臭ナレバ沃度「フォルム」代用藥ナリ。

「エリナコール」 動物性「テール」ヨリ製セルモノニシテ軟性下疳ニ用ヒラル。

「ナフトール」・「エピカリン」 寄生性皮膚病ニ特效アリ角質剝離ノ作用モ兼ヌ、稀釋溶液一―五%ハ搔痒制止ニ二―一〇%軟膏及ビ丁幾劑ハ濕疹、疥癬ニ用フ。

### 3. 腐蝕藥 Caustica

硝酸銀 損傷アル皮膚ニノミ作用シ淋巴液ヲ凝固セシメ淋巴腔ヲ閉塞シテ深部ニモ其作用ヲ及ボス、硝酸銀棒トシテ廣ク用ヒラル病症ヲ遷移スル懼アレバ近來ハ一―一〇%水溶液ノ塗布ヲ以テ之レニ代フ、腐蝕作用ヲ緩和ナラシメンニハ塗布後直ニ食鹽水ニテ洗滌中和ス。

肉芽發生ヲ促ガシ又ハ肉芽贅殖ヲ破壊スルニハ軟膏ヲ應用ス。

④ 硝酸銀……………〇・一……………華羅林……………一〇・〇……………「ベルウバルサム」一・〇

④ 硝酸銀……………二・〇……………巴刺賓軟膏……………九八・〇

④ 硝酸銀……………〇・一……………「ベルウバルサム」……………一―三・〇……………單軟膏……………五〇・〇

皸裂性濕疹ニ一―二%溶液ハ效果アリ軟性下疳ノ腐蝕ニ濫用シテ初期硬結様ノ硬結ヲ起サシムル事アレバ注意スベシ。

石炭酸 硝酸銀トハ反對ニ損傷ナキ表皮ニモ働ク、創傷ヲ腐蝕スレバ其深達力ハ硝酸銀ヨリモ更ニ強キガ故ニ軟性下疳ノ特效藥ナリ結晶ノ儘用フルヲ良シトス又麻痺作用アル故ニ腐蝕ニ際シ疼痛モ極メテ輕微ナリ(二六頁參照)。

鹽化亞鉛 一〇%溶液ヲ狼瘡腐蝕ニ用フ。

發烟硝酸 疣贅、雞眼等ノ腐蝕破壊ニ用フ、疼痛劇シク癢痕ヲ殘ス。

「クローム」酸 表皮ニ及ボス作用長ク且ツ強キ腐蝕藥ナリ其二〇―五〇・〇%溶液ハ病的表皮贅殖ヲ吸收軟化ス、粘膜ハ外皮ヨリモ感受性弱シ是レ粘膜ノ反抗的粘液分泌ガ藥液ヲ中和シテ組織外ニ排泄スルヲ以テナリ故ニ口腔内ノ微毒性潰瘍又ハ汞毒性口内炎



ニハ尖圭「コンヂュローム」ニ用フル五〇・〇％溶液ヨリモ更ニ濃厚ノ者ヲ用フ、口腔及ビ咽腔粘膜ニ顯レタル微毒性潰瘍分明ナラザル時診斷ノ助トシテ五―一〇・〇％溶液ヲ塗布スレバ壞疽ニ陷レル上皮及ビ纖維素ハ顯然トシテ黄染ス。

三鹽化醋酸 分解シ易キ白色結晶ナリ、疣贅、尖圭「コンヂュローム」ノ腐蝕藥トシテ用フ。又タ其二〇―五〇・〇％水溶液ハ剝離ノ目的ニ用ユ。

乳酸 其二〇―四〇・〇％「コロヂウム」溶液ハ胼胝、雞眼及疣贅ニ用ヒ五〇・〇％又ハ純ナルモノハ結核性ノ糜爛ニ用フ。

クリサロビン 癬風、白癬、寄生性毛瘡、頑癬等ノ寄生性皮膚病皮ハ乾癬、紅色苔癬、慢性濕疹ニ用フ常ニ獨特ノ皮膚炎（「クリサロビン」性皮膚炎）ヲ惹起スルハ避ケ難シ、唯眼瞼炎ヲ起スヲ以テ頭部顔面部ニハ絕對ニ用フベカラズ、廣汎ノ部位ニ使用スル時ハ蛋白尿ヲ注意スベシ、襪衣ニ附着セバ脱色セズ。

一―二％軟膏或ハ泥膏、然レドモ五―一〇％「トラウマチチン」又ハ「クロロフォルム」溶液トシテ用フル方ヲ便トス。

㊦ 「クリサロビン」……………五・〇 「トラウマチチン」……………四五・〇

ロシヤード氏軟膏

焦性没食子酸又ハ「クリサロビン」……………〇・五―二・〇 華攝林……………五〇・〇

ドレウ氏軟膏

㊧ 「クリサロビン」……………水揚酸……………參見……………各五・〇 綠石鹼……………

華攝林……………各五・〇

焦性没食子酸 水溶液トシ酒精溶液トシ又ハ軟膏トス一〇％泥膏、四〇％硬膏ハ狼瘡ニ用ヒ其角層ヲ炭化セシム、狼瘡性結節ハ完膚ヨリモ易ク破壊セラレ、故ニ周圍ノ皮膚ニ累ヲ及ボサズシテ病竈ノミヲ腐蝕スル事ヲ得、サレド貼用永キニ亘レバ完膚モ漸次深部マデ侵サル、故ニ使用ノ際ハ常ニ診査ヲ怠ル可カラズ、乾癬ニハ五―一〇％軟膏、頭部濕疹ニハ〇・二五―一・〇％軟膏ヲ用フ毛髮ヲ變色セシムル憂アリ。

「レニガロール」 焦性没食子酸ニ代用スベシ其一〇―二〇・〇％軟膏ハ完膚ニハ作用微弱ナレドモ皸裂、水疱等角層剝離セル部位ニハ銀作用ト同一ノ効果アリ。

「レゾルチン」 粉末ノ儘尖圭「コンヂュローム」ニ撒布シテ其脱落ヲ促ガシ酒精溶液ヲ



シテ瘡等ニ塗布シテ表皮剝離ヲ催進セシム。稀薄液(5%)ハ濕疹又ハ皮脂漏ニ效アルモ濃厚液(1.5%—2.0%)ハ腐蝕ス。

苛性加里溶液 角質ヲ軟化スル作用アリ、1—4%液トシテ執拗ナル水疱性濕疹及ビ皸裂性濕疹ニ用ヒテ其角層ヲ破壊ス、又孤立セル狼瘡結節ヲ腐蝕スルニ好シ。

過「クロール」鐵液(一半鹽化鐵液) 完膚ニハ少シモ働ナク患部ニノミ強キ腐蝕止血作用ヲナス故ニ小膿瘍(瘡瘡、膿疱ノ如キ)内ニ注滴スレバ燒灼ト同ジ効果アリ。

過酸化水素液 強キ腐蝕藥ニシテ損傷ナキ皮膚ニモ及ブ創傷ヲ清淨ニシ結痂ヲ去ル又含嗽料トス、褪色作用アルヲ以テ夏日斑、面皰ニ使用ス、局方ハ3%ト規定ス。

昇汞 1.0%水溶液又ハ「コロヂウム」溶液ハ疣贅腐蝕ニ効アリ。「サリチール」酸酒精ニ0.1%ノ割ニ混ズルコトアリ。

4. 麻痺藥及ビ搔痒制止藥 Anesthetica et Antipruriginosa.

石炭酸 1%—3%溶液、「リニメント」及ビ軟膏ハ最モ佳良ナリ。  
薄荷 5%—10%軟膏又ハ酒精溶液

知母爾 五百倍—一千倍酒精溶液

「プロモコール」 2.0%軟膏ハ尋常麻疹並ニ搔痒症ニ効アリ。

「アネステジン」 1.0%軟膏ハ奏効確實ナリ。  
鹽酸「コカイン」 粘膜炎ノミ作用ス、1—5%液トシテ使用ス。

シユライヒ氏局所麻酔液。

	第一號	第二號	第三號
鹽酸「コカイン」	0.2	0.1	0.01
鹽酸「モルフィン」	0.02	0.02	0.005
食鹽	0.1	0.1	0.1
蒸餾水	100.0	100.0	100.0

右注射料、殺菌ヲ要ス。

「オイカイン」、「アリピン」 1%—3%溶液ハ麻酔藥トシテ專ラ泌尿器病ニ用ヒラル。「ストバイン」、「コカイン」ノ代用品ニシテ殺菌シ得ル藥ナリ0.5—1%溶液ヲ用フ後遺作用無シ。



「ノボカイン」ハ「アドレナリン」ト合シテ局處麻醉ニ用キラル。  
「ネオカイン」 「ノボカイン」ト同一製劑ナリ  
「バンカイン」 局所麻醉藥トシテ使用ス「アドレナリン」ト併用ス

5. 還元藥 Reduktionsmittel.

茲ニ還元藥ト稱スルハ、硫黃及ビ「クリサロビン」ノ如ク慢性炎症性浸潤特ニ濕疹ニ効果アル者ヲ云フ其作用ハ未ダ之レヲ斷言スル事能ハザレドモ、二ノ者ハ酸化ノ傾向アリテ組織ヨリ酸素ヲ奪フモノナル可ク即チ還元作用ヲナス者ナリ、ビール氏ハ藥劑ニ因リテ起レル充血作用ヲ以テ之レヲ説明シタレドモ硫黃又ハ、如キハ、毫モ充血ヲ起サズシテ尙此作用アリ氏ノ説明ハ未ダ信ズ可カラズ、只消毒、殺菌、殺蟲作用アルモノナリト認識セラル、ニ過ギズ、然シ是等藥劑ノ作用ハ決シテ一様ニ非ラズ。

「木參兒」 皮膚科醫ニハ缺ク可カラザル者ナリ、種類多シ樺參兒、松柏參兒、山毛櫸參兒、杜松參兒及ビ石炭參兒等アリ、純ナルヲ又ハ五—一〇%酒精溶液ヲ塗布料トス、又五—一〇%軟膏トス急性炎衝ニハ適セズ炎症消退ノ後初メテ用フ、水疱性濕疹及ビ膿痂疹狀

濕疹ニハ禁忌トス、特異質アル者稀ナラズ。

ウキルキンソン氏軟膏

木參兒……………一〇〇……………硫黃華……………一〇〇……………滑石……………五〇〇

加里石鹼……………二〇〇……………豚脂……………二〇〇

土肥氏參硫膏(第一)

木參兒…………………………硫黃華…………………………亞鉛華……………各一〇〇

豚脂……………三〇〇

日本藥局方ニハ左ノ如ク規定ス。

「タールパスタ」參硫膏

木「タール」……………一〇〇……………酸化亞鉛……………一〇〇……………昇華硫黃……………一〇〇

豚脂……………一〇〇……………牛脂……………二〇〇……………以上研和

土肥氏參硫膏ハ小兒濕疹ノ急性、亞急性ハ元トヨリ慢性ノモノニ効アリ若シ本劑ニテ刺戟スルトキハ參兒ノ分量ヲ少クシ又タ刺戟ヲ要スル時ハ參兒ノ分量ヲ多クス、斯クノ如ク臨機分量ヲ加減スレバ余ハ斯クノ如ク應用廣キ藥劑ヲ他ニ見ズ。即チ次方ノ如シ



夢硫膏第二(九大皮膚科方)

- 木參兒.....五・〇.....昇華硫黃.....一〇・〇.....酸化亞鉛.....一〇・〇
- 豚脂.....二五・〇

「グリテール」當教室高木博士ノ創製ニシテ豆粕ヨリ得タルモノナリ黒褐色濃厚ノ液體ニシテウイルソン氏軟膏、單軟膏、硼酸軟膏ニ五%ノ割ニ和シテ使用ス五%酒精溶液ハ用法簡便ナリ無刺戟ニシテ小兒濕疹、急性皮膚炎、皮脂漏性濕疹等ニ卓効アリ。

「ビチロール」松浦氏ノ創製ニシテ米糠ヲ乾餾シテ得タルモノナリ參兒、イヒチオール、「ツメノール」等ニ代用シテ効アリ。

硫黃 硫黃及ビ其誘導體ハ硫黃華、沈降硫黃及ビ硫化加留謨(硫肝)トシテ應用セラル硫肝ハ人工硫黃泉ノ材料トス、一般ニ慢性症ニハ一〇%—二〇%軟膏トナシ疥癬及ビ白癬ニハ四〇%ヲ用フ、「ワゾーゲン」ニ溶解シタル者ハ便利ナレド強臭アリ。流動性製劑ニ「ミチガール」(バイエル)アリ使用ニ便ナリ。

人工硫黃泉ハ應用廣シ(二二頁參照)  
硫黃軟膏

- 昇華硫黃.....一・〇.....單軟膏.....九・〇
- 沈降硫黃.....一・〇.....「ナフトール」.....一〇・〇.....加里石鹼.....二五・〇

華攝林.....二五・〇.....(ラッサール氏剝離膏)

旭氏瘰癧水 Acnewasser

- 沈降硫黃.....四〇・〇.....酒精.....二〇・〇.....薔薇水.....三〇・〇
- 「アラビア」護謨.....一・〇.....樟腦.....一・〇

製法クンメルフェルド氏液ニ準ズ(次頁參照)

「イヒチオール」、「チオール」、「チゲノール」、「ツメノール」、「チオノール」等ハ夫々酒精及ビ水溶液(五—一〇%)トナシ又ハ軟膏トシテ慢性表在性皮膚炎衝ニ用フ、參兒、硫黃ニ比スレバ作用緩和ナリ。

- 「チオノール」軟膏
- 單軟膏.....一〇〇・〇.....「チオノール」.....一〇・〇.....次硝酸蒼鉛.....五・〇  
(水疱性濕疹)
- 「ツメノール」.....八〇・〇.....次硝酸蒼鉛.....三〇・〇.....亞鉛華澱粉.....四〇〇・〇
- 「ラノリン」.....四〇〇・〇.....(癢痒制止)



樟腦 クンメルフェルド氏洗滌水トシテ酒渣鼻ノ豫防ニ有効ナリ。  
クンメルフェルド氏洗滌水 Kummerfeld'sches Waschwasser

固 樟腦……………一〇〇……アラビア護膜……………二〇〇……精製硫黃……………一二・〇

薔薇水……………一四〇・〇……石灰水……………一四五・〇

製法 樟腦ヲ依的兒ニテ溶解シ是レニ護膜末ヲ加ヘ薔薇水ヲ以テ乳劑トナシ之ニ精製硫黃ヲ和シ終リニ石灰水ヲ和ス可シ。

用法、此液ヲ放置セバ沈澱ヲ生ズ晝間ハ上澄液ヲ夜間ハ沈澱物ヲ塗布ス。

「クリサロビン」 五—一〇%濃厚液ハ激シキ皮膚炎ヲ起ス。

一—四%ハ乾癬、寄生性匍行疹、頑癬及ビ苔癬ニ効アリ〇・二五—〇・五%ハ肛圍及ビ陰囊濕疹ニ用フ「クリサロビン」ハ「トラウマチチン」ニ溶解スルヲ便トス。(一五頁参照)

「レゾルチン」及ビ焦性没食子酸ノ稀釋液ハ爹兒、硫黃、或ハ「クリサロビン」ノ如ク働キテ少シモ腐蝕作用ナシ、慢性炎症性皮膚疾患ニ有効ナリ。

6. 收斂藥 Adstringentia.

「アルカリ」性ノ者ヲ除キタル腐蝕藥ノ過半ハ其稀釋溶液ニ收斂作用アリ例ヘバ二千倍

ノ硝酸銀水ノ如シ其他ノ收斂藥ハ次ノ如シ。

醋酸鑿土水 一—五%液又ハブローウ氏液トシテ急性炎症ニ冷罨法料又ハ蒸罨法料トス(二二頁、二二頁参照)又白帶下、口内炎、口峽炎ニ用フ。

枯礬 乾燥粉劑トシテ尖圭、コンヂュローマニ撒布ス。

鉛醋(次醋酸鉛液) 一—四・〇%溶液 ハ前者ト同作用アリ。

「アルゾール」 一—五%溶液 ハ罨法料トシ又ハ含嗽料トス。

「レニツェット」 手掌、足趾ノ多汗症ニハ純品ヲ用ヒ濕疹ニハ滑石ヲ加ヘ二〇—五〇%トシテ散布藥トス、潰瘍ニハ一〇—二〇%軟膏トシテ使用ス。

單寧酸(單寧、鞣酸) 溶液ハ多汗症ニ用ヒ、軟膏ニハ硫黃ヲ加味シテ毛瘡ニ用フ。

「フォルマリン」 一—五%溶液又ハ軟膏トシテ多汗症ニ用フ又蒸餾水二百瓦ニ一、二滴ヲ注加シ浸蝕性潰瘍ノ局所浴或ハ罨法料トス。

7. 内服藥及注射藥 Medica interna et injectio.

皮膚疾患ニ直接ニ有効ナル内服藥ハ其數多カラズ。



亞砒酸 一回極量〇・〇〇五、一日極量〇・〇一五。(一)亞細亞丸トシ(二)法列兒水トシ  
(三)亞砒酸溶液トシテ用フ。

亞細亞丸(亞砒酸含量〇・〇〇一)

亞砒酸丸トシテ局方ニ規定アリ含量ハ同量ナリ

亞砒酸……………〇・〇五……………黑胡椒末……………二・〇……………「アラビアゴム」……………適宜

甘草越幾斯及末……………適宜 右爲五十九日三回一丸宛食後服用

一週毎ニ一日量一粒宛ヲ増加シ一日九粒ニ至ル、一日九粒ヲ一週間持續シ漸次減量ス

法列兒水(一回極量〇・五一日極量一・五 一%ノ亞砒酸ヲ含有ス)

亞砒酸加里…………… 枸橼酸水……………等量

右一日三滴乃至二十滴 食後三滴ヨリ漸次增量二十滴ニ至リ再ビ減量ス

一%亞砒酸曹達溶液

右一日一回一筒宛皮下注射用

中毒症狀(口腔及咽頭乾燥、胃痛、食思不進、下痢、四肢疼痛等)起ラバ直ニ服藥ヲ休止ス  
近來皮下注射藥トシテ「ソラルソン」、「エラルソン」、「アルソゾン」、「アトキシル」ヲ應用ス、

一般ニ亞砒酸ノ作用ハ不同微弱ナリ、乾癬、紅色苔癬、天疱瘡、濕疹、微毒等ニ用ヒ甲ニ  
著驗アリテ乙ニ全く無効ニ終ル事アリ。

「メントール」 腸消毒藥トシテ慢性蕁麻疹ニ用ユ

薄荷腦……………〇・一 阿列布油……………〇・五

右貯囊一個トナシ一日三回一―二個宛

甘汞 前者ト同様腸消毒藥トシテ用ユ然レドモ主トシテ遺傳微毒ニ効アリ

大人ニハ〇・一―〇・三、小兒ニハ〇・〇二―〇・〇三ヲ用ユ

鹽酸「ピロカルピン」(一回極量〇・〇二、一日極量〇・〇四)發汗ノ目的ニ用ユ殊ニ痒  
疹ニ効アリ。

一%水溶液一日一回一筒宛注射

鹽酸規尼涅 一―二瓦ヲ一日量トシテ紅斑性狼瘡ニ内服セシムルコトアリ少量ハ「エ  
ルゴチン」ト和シテ多形滲出性紅斑ニ與フ。

鹽酸 滴劑又ハ合劑トシテ蕁麻疹及ビ皮膚瘙癢ニ用フ。

稀硫酸 瘙癢症ニ其溶一%液ヲ十五瓦宛與フ。



硫黄 皮脂漏又ハ瘡瘡酒渣鼻等ニ用ユ

石炭酸 瘡痒ヲ伴フ皮膚諸症ニ用ユ

安知必林 小兒苔癬及ビ天疱瘡ニ一日數回〇・一〇・五宛與フ。

「イヒチオール」 瘡瘡及ビ癬ニ五〇％水溶液ヲ滴劑トス効果不確實ナリ。

「アトロピン」 發汗作用ヲ防止スルガ故ニ多汗症又ハ蕁麻疹ニ用ユ丸藥トシテ與フ

但シ視力障碍ヲ訴フルトキハ直ニ中止スベシ。

「アスピリン」 結節性紅斑、帶狀匐行疹、熱性皮膚病等ニ用ユ。

「ノバスピリン」 「アスピリン」ノ如キ副作用ナキ其代用藥ナリ。

「チレオイヂン」 悪性水腫、乾癬ニ錠劑トシテ與フ。

「オチフォリン」 月經閉止ニ來ル濕疹及酒渣鼻ニ錠劑トシ一日三回〇・五宛與フ。

「オオホルミン」注射及錠劑ノ二種アリ月經初潮又ハ閉止ニ來ル皮膚疾患ニ用フ。我教室ニテハ青年男女ノ一種ノ瘡瘡ニ對シ卓効アルヲ認メタリ  
「チオチナミン」浸潤ヲ軟化シ癬痕ヲ溶解スル作用アリ一〇％溶液トシテ隔日一筒皮下ニ注射ス。

「チオチナミン」……一〇・〇……蒸餾水……七〇・〇……「グリセリン」……二〇・〇

「チオチナミン」……二・〇……酒精……「グリセリン」……各九〇

余ハ好ンデ一％―五％―一〇％ノ溶液ヲ各種皮膚疾患ニ用ユ詳シクハ各論ニ述ブベシ  
(一二二頁蟹足腫參照)

「フィプロリヂン」 「チラヂナミン」ト水揚酸「ナトリウム」トノ複鹽基ナリ一〇％水溶液ヲ皮下注射料トス。代用品トシテ「ナルベルヂン」アリ。

沃度加里 微毒特效藥ナリ其他乾癬ニ三〇・〇ヲ一日量トシテ與フル事アリ。(驅黴療法水銀沃度療法ノ項參照)

「サヨヂン」 沃度加里ノ最良ナル代用品ナリ。  
「エタイノキシール」錫ト其酸化物ヨリナル葡萄狀球菌病ノ内服藥トシテ癬、癰、瘡瘡等



ニ用ヒラルニ〇―分三

釀母製劑モ瘡瘡、癬及ヒ蕁麻疹ニ推賞セラル。

麥酒釀母 一日三回一茶匙宛。

「ブレス」釀母 同上

「ツエロリン」 人工的釀母製劑ニシテ一丸〇・一ヲ含ム、一日三回一粒又ハ二粒宛。

### 8. 理學的器械的療法 *Physikalische Therapie*

皮膚疾病ハ藥劑ノ外ニ外科的及ヒ理學器械的療法ニモ待タザル可カラズ小膿瘍ノ切開、小腫瘍ノ截除、包皮離開、下疳剪除ノ如キ即チ是ナリ、稍大ナル手術ニハ豫メシユライヒ氏液ヲ注射シ局部ヲ麻痺セシム、瘰癧、膿瘡、癬、橫痃等ヲ切開シ或ハ軟性下疳ノタメ穿孔セル陰莖繫帶ヲ離斷スルニハ刀及ニ代フルニ燒灼法ヲ以テス、亂切法ハ寄生性毛瘡ニハ尙應用セラル酒渣鼻ニ應用セラルルコト多シウンナ氏毛細管燒灼器モ此目的ニ用キラル器具ハバクレン氏烙白金ノ尖端漸次細小トナリ針ノ如キモノナリ、不良肉芽或ハ尖圭「コンヂュローマ」ヲ除去スルニハ銳匙ニ依ル、創面ノ知覺ヲ麻痺セシムルニハ

シユライヒ氏液注射ニ代フルニ一〇%「コカイン」溶液ヲ浸セル綿片ヲ以テ創面ヲ二三分間被フテ置ク可シ。

器械的療法トシテ按摩有リ、肥大セル癩痕ニハ一日二、三回宛月餘之レヲ試ミテ効果アリ、鞏皮症ニハ水楊酸華攝林ヲ塗擦シツツ之レヲ施ス、美顏術ニ應用シテ佳良ノ成績ヲ收ムル事多ケレドモ時ニ傳染媒介物ヲ擦込スル懼アリ。

亂切法トハウオルフ氏亂切刀ヲ用ユ本器ハ菲薄ナル刀尖數個ヲ併列セルモノニシテ之ニ鞘アリテ刀尖ノ長サヲ隨意ニ固定シ皮膚ヲ縱横ニ淺ク截切スルナリ。

**熱氣療法** 罨法及ビ浴法ノ形ニヨル、瘡瘡ニハ特別裝置ニテ蒸氣ヲ應用シ、副嚔丸炎ニハ熱氣療法ヲ施ス。

橫痃ニ「テルモホール」ヲ試ミテ効果アリ。

近時熱氣療法トシテ「フエーン」ヲ瘡瘡又ハ濕疹ニ用ユ。

**雪狀炭酸療法** ブッセー氏ノ創意ニシテ炭酸「ボンベ」中ノ炭酸ヲ鹿皮中ニ氷結セシメテ種々ノ形トナシ十秒乃至三十秒疾患部ニ壓抵ス母斑、疣贅、紅斑性狼瘡ニ効アリ熟練ヲ要ス。



電氣療法

平流電氣ハ帶狀匍行疹ニ鎮痛法トシテ用ヒラレ電氣燒灼及ビ電氣分解ハ腐蝕法トシテ用ヒラル燒灼ハ組織ヲ痲化シ分解ハ溶化ス、分解ハ患者ヲシテ濕潤セル積極端ヲ把持セシメ消極端ヲ患部ニ刺穿シテ電氣ヲ通ズルナリ消極端ハ白金又ハ「イリヂウム」又ハ鍍銀セル縫針ヨリナル母斑、疣贅、黃色腫等ノ除去、拔鬚及ビ假尿道ノ破壊ニハ半乃至「ミリアンペア」ノ強度適合ス。

光線療法

赤色光線ハ天然痘及ビ汗疱ニ青色光線ハ瘡痒症ニ効アリ、水銀石英洋燈ハ老人性瘡痒症ニ應用シテ好成績ヲ得タリ、其他フインゼン氏光線療法アリ、日光浴ハ乾癬ニ効アリ。

レントゲン療法

三ツノ異レル目的ニ應用ス。

- 一、新生組織破壊ノタメ(癌腫、肉腫、疣贅、蟹足腫)
  - 二、炎衝ヲ惹キ起スタメ(毛瘡、瘰癧、黃癬、白癬、多汗症)
  - 三、表在セル加答兒ヲ炎衝症狀ナシニ消退セシムルタメ(乾癬、紅色苔癬、單純性苔癬)
- レントゲン光線ノ強弱ハ次ノ者ニ關係ス。
- 一、管ノ硬度 軟管ハ強度ナレド只表面ニノミ働ク硬管ハ深部ニ到達ス。

- 二、電流ノ強度 強流ハ「アンペーア」ニテ弱流ハ「ミリアンペーア」ニテ測ル。
- 三、患部ト管トノ距離 光線ノ作用ハ距離ニ反比例ス。
- 四、時間ノ長短

ラヂウム療法

母斑、疣贅、上皮癌等ノ除去及ビ狼瘡ノ後療法トシテ之レヲ應用ス。「ラヂウム」療法ニ就テ土肥博士ノ研究報告ヲ摘要スレバ左ノ如シ。

- (イ) 刺戟ナク表在作用ヲ營マシムル目的ニハ
    - 一、濕疹及ビ神經性皮膚疾患ニ向ツテハ濾過装置ヲ要セズ。
    - 照射時間ハ毎日一―三分間。
  - 二、苔癬等ニハ四―八百分ノ一「ミリメートル」厚サノ「アルミニウム」板ト五枚ノ紙ト薄キ護膜ニテ濾過シ照射時間ハ毎日三―五分間。
    - ト薄キ護膜ニテ濾過ス
  - 三、表皮癌、蟹足腫ノ如キニハ十分ノ一「ミリメートル」鉛板ト十枚ノ紙ト薄キ護膜ニテ濾過ス照射時間毎日二時間。
- (ロ) 破壊作用ヲ營マシムル目的ニハ
- 色素性母斑等ニハ濾過装置ヲ要セズ或ハ一―五分ノ一「ミリメートル」ノ「アルミニウム」



ウム」板ヲ應用ス三時間持續セシメ或ハ毎日一時間宛四時間照射ス。

(八) 表面ノ刺戟ナク深作用ノミヲ營マシムル目的ニハ

癌腫ノ如キモノニハ五—一〇「ミリメートル」厚サノ鉛板ニテ濾過シ毎日一時間宛三

日間照射シ八日後更ニ反復ス或ハ一「ミリメートル」厚サノ鉛板ニテ濾過シ六日間毎

日三時間乃至十二時間連續スルカ若シクハ二「ミリメートル」ノ鉛(乳房癌)ニテ約七

十時間ヲ十一—十二時間毎二日ニ行フ、又タ三「ミリメートル」ノ鉛ニテ百五十時間ヲ

十時間宛毎二日ニ照射ス。

(ニ) 表皮ノ刺戟ヲ伴ヒ深作用ヲ營マシムル目的ニハ

深部ニ侵蝕セル皮膚癌等ニハ一「ミリメートル」厚サノ鉛板ニテ濾過シ七十二時間連

續ス

其他フオンゼン氏光線療法クロマイエル氏水銀石英燈療法アレドモイヅレモ皆特別ノ

裝置ト熟練ヲ要スルニヨリ詳細ハ之ヲ略ス。

### 各論

#### 黒色表皮腫 *Acanthosis nigricans.*

稀有ナル疾患ニシテ常ニ悪性腫瘍ニテ悪液質ヲ呈セル者ニ來ル。腋窩、下腹部、又ハ背部ノ皮膚黒色ヲ呈シ粗糙トナリ次デ其部ニ疣贅様又ハ角質様増殖ヲ來ス。慢性ノ経過ヲナシ自覺的搔痒ヲ伴フ。

療法 原因ナル悪性腫瘍ノ存在ヲ確メ之ヲ除去スルノ他途ナシ。臨床的ニハ搔痒ニ

向テ殊ニ角質増殖ニ向テ施ス。

石炭酸……………四・〇……………昇汞……………〇・五—一・〇……………「ワセラン」……………一〇〇・〇

#### 惡液質性痤瘡及痤瘡炎 *Acne cachecticorum s. Acnitis*

#### 毛囊炎(一〇九頁)参照。

#### 痤瘡性息肉腫

項部息肉腫。頭部乳頭狀皮膚炎。項部瘰癧皮様毛囊炎。

*Acne cheiloidique Bazin. Nackenkneid. Dermatitis papillaris capillitii*

*Kaposi. Folliculitis nuclae sclerotisans.*



慢性項部毛囊炎ニ跟随シテ起ル多發性纖維樣隆起ナリ、癢痒激シク出血シ易シ。腫瘍ノ表面ハ毛髮稀疎トナリ唯數箇所ニ於テ毛髮ガ往々三四本宛束トナリ一毛孔ヨリ發生スルヲ認ム。

**療法** ビック氏硬膏又ハ水銀硬膏ヲ用ユ。〇・五—一%「レゾルタン」精ノ塗布、又ハ拔毛シテ剝離膏或ハ「チオヂナミン」軟膏ヲ貼布ス。余ハ初期ニアリテハ五—一〇%ノ「サリチル酸コロヂウム」ヲ賞用ス。

「ラヂウム」療法、X光線療法卓效アリ、其度ハ脫毛セバ可ナリ。

#### 角性痤瘡 Acne Corner

傳染性毛囊角化症ノ項參照(一一三頁)

#### 毛囊蟲性痤瘡 Acne demodeci Ando.

主トシテ中年者ニ來リ顔面殊ニ尋常性痤瘡ノ來ラザル眉間ヲ尖角トシ頤部ヲ基底トスル三角部位ヲ占ム。毛囊蟲ノ寄生ニヨルモノニシテ毛囊ニ一致シテ紅色ノ小結節ヲ生ジ中央ニ微ニ小ナル膿點ヲ含蓄ス。癢痒・熱灼感等ヲ訴フルコトアリ、面皰ヲ缺如ス。

#### 療法

ウイルキンソン氏軟膏又ハ剝離膏ヲ塗布シテ表皮剝離ト共ニ驅蟲ヲ行フ

亂切又效アリ。(四五頁參照)。

#### 痘瘡樣痤瘡或ハ壞疽性痤瘡 Acne necrotica, Acne varioliformis.

刺針頭大乃至豌豆大ノ膿疱ニシテ壞疽ニ陥リ或ハ痘瘡樣癩痕ヲ後遺ス。主ニ前額、髮際及ビ有毛頭部ヲ冒ス、稀ニ顔面・全身ニ來ル、男子ニ多シ。

**療法** 〇%硫黃軟膏或ハ五—一〇%「レゾルチン」軟膏ヲ用フルカ或ハ單ニ硼酸軟膏ヲ用フ。再發シ易シ。刷毛及ビ櫛類ハ嚴密ニ消毒スベシ。

#### 酒皰鼻 Acne rosacea

慢性斑樣顔面紅斑ニシテ第一度、第二度、第三度(鼻瘤)ヲ區別ス。結節膿疱及ビ毛細血管ノ擴張ヲ誘起ス。主トシテ鼻部、頤部、前額及ビ頰部ヲ冒ス。

月經障害、胃腸及ビ慢性鼻疾患ニ關聯ス。

#### 療法

刺戟性ノ食餌・咖啡、酒精飲料等ヲ避ケ、便通ヲ正調ニス、輕度ニハ毎夕改正クンメルフェルド氏洗滌水ヲ塗布シ翌朝熱湯ニテ拂拭シ去ル。二〇—五〇%「イヒチオ



ール精又ハ剝離膏モ可ナリ。  
改正クンメルフェルド氏液

- 樟腦……………一・五……………「アラビアゴム」末……………一・五……………硫黃華……………七・五
  - 石灰水……………四〇・〇……………用時振盪スベシ
  - 昇汞……………〇・一……………「グリセリン」……………一〇・〇……………薔薇水……………八〇・〇
- 重症ニハ亂切ヲ行フ、施術ニ便ナリ、時ニ毛細管燒灼又ハ電氣分解ヲ行ヒ又ハ石炭酸ニテ腐蝕スルコトアリ。瘰癧ニ於ケルガ如ク水銀石英燈療法可ナリ。

尋常性瘰癧及面皰 Acne vulgaris, Comedo.

面皰ハ皮脂分泌ノ堰塞ニ起因ス、頤部・鼻翼・前額及ビ胸、背ヲ好發部位トス。瘰癧ハ常ニ面皰ヲ伴ヒ、ソノ發炎症セル者モ之ニ加ハリテ屢々膿疱ヲサヘ作ルノミナラズ時トシテ深部ニ硬固ナル浸潤ヲ遺コス。

療法 脂肪ニ富メル食餌・酒精飲料・咖啡・綠茶等ヲ禁ジ、便通ヲ整フベシ。頭部皮脂漏俱發セバ是ヲモ處置スベシ。

局所療法 先ヅ面皰壓出器又ハ指壓ニテ面皰脂ヲ壓出シ、後チ偏陳又ハ酒精ニテ拂拭

スベシ。膿疱ハ尖刀ニテ開口シ創腔廣ケレバ過クロール鐵液ニテ腐蝕ス。浸潤限局性ニシテ未ダ化膿セザル者ハ先ヅ水楊酸石鹼硬膏ヲ貼用シテ吸收ヲ促ガスカ又ハ沃度丁幾ヲ塗布ス。又ハ

- ④ 沈降硫黃……………一〇・〇……………炭酸加里……………四〇・〇……………「グリセリン」……………二〇・〇
- 「アルコホル」……………四〇・〇……………一日一回塗布
- 「ナフトール」硫黃膏
- ④ 「ナフトール」……………二・〇……………沈降硫黃……………二・〇……………綠石鹼……………八・〇
- 華攝林……………九・〇
- 「レゾルチン」硫黃膏
- ④ 「レゾルチン」……………一・〇……………沈降硫黃……………二・〇……………綠石鹼……………八・〇
- 華攝林……………八・〇

是等ヲ貼用シテ熱灼感ヲ起スニ至リ拭ヒ去リテ撒粉ス。

以上ノ剝離膏ノ代リニ水銀石英燈ニテナス其ノ方法ハ顔面ヲ二〇センチメートルノ距離ニテ三―五分間照射セシムレバ二、三日ニシテ剝離ス。



膿疱深在セル時ハレントゲン療法ニヨリテ吸收セシム。色素ハ稍々晩クマデ後貽ス。  
塗布料トシテ應用セラルルハ

① 沈降硫黄……………五・〇……………酒精……………五・〇……………「グリセリン」……………五・〇  
炭酸「カリウム」……………一・〇  
毎夕時塗擦翌朝温湯ニテ拭ヒ去ル、一、三日繼續シ、二日休止ス。

② 昇汞……………一・二五……………薔薇水……………二〇〇・〇

③ 稀醋酸……………二・〇……………「グリセリン」……………三・〇……………白陶土……………四・〇

④ 刺納林膏……………二〇・〇……………「チオノール」……………二・〇……………朝夕薄ク塗布

毎夕時塗布スレバ面皰脂ハ自ラ去ル。

我皮膚科教室ニテハ好ンデクンメルフェルド氏洗滌水、旭氏「アクネ」水(三八頁参照)ヲ用フ。又ハ朝夕二回加里石鹼ヲ塗擦シ温湯ニテ洗滌後左方ヲ塗布セシム。殊ニ婦人ニ適ス。

⑤ 「イヒチオール」……………五・〇……………硫黄華……………五・〇……………硼砂……………〇・二  
「グリセリン」……………五・〇……………酒精……………二五・〇……………餾水……………二五・〇

軀幹ノ瘰癧ニハ硫黄泉、「ナフトール」硫黄軟膏、硫灰水等有効ナリ。春機發動期ノ婦人ニシテ月經不順ヲ伴ヒ小膿疱密生セル時ハ「オホホルミン」等ノ卵巢製劑ノ皮下注射有効ナリ。

頭部皮脂漏ノ療法ハ其條下ヲ見ルベシ。(九八頁)

### アチソン氏病 Addison'sche Krankheit.

副腎ノ疾患ニヨリ皮膚及ビ粘膜ニ色素沈着ヲ來タス。他ノ原因ヨリスル皮膚色素異常症ニハ粘膜ニ來ルコトナシ、且ツ本症ニハ身體衰弱、胃腸障礙、神經症狀及ビ他ノ臟器ノ結核ト合併ス。

療法 一般榮養療法ニ兼テ胃腸ニ注意ス。局所的療法ナシ。

### 皮脂腺腫 Adenoma sebaceum

顔面殊ニ其中央部ニ密生スル黄色乃至黃赤色ノ帽針頭大乃至「レンズ」大ノ腫瘍ニシテ自覺的苦痛ナシ。

療法 X光線又ハ「ラヂウム」照射ヲ最モ可ナリトス。良性ナレドモ治療困難ナリ。



アイヌーム (足指薯様厚張) Ainhum.

亞弗利加土人ノ一種屬ニ來ル足指ニ環狀搾輪ヲ生ジ遂ニ末梢部ノ脫離ヲ促スヲ以テ特徴トスル局所性疾患ニシテ大人ニ多シ、疼痛ナク疾患部ヨリ先端ハ腫瘍狀ニ膨大シ遂ニ骨部ニ及ビ切斷スルニ至ル。

療法 可及的早ク切除スベシ。

放射狀菌病 Akinomycose

顔面・頸部ニ好發ス、皮膚ニ原發スルハ稀ニシテ多クハ骨等ニアリテ續發的ニ來ル、常ニ硬固ナル不動性浸潤トシテ現ハレ皮膚紫赤色ヲ呈スルヲ特徴トス、諸所ニ瘻孔ヲ生ジ其濃汁中ニ固有ノ放線狀菌ヲ證明ス。

療法 内服トシテ多量ノ沃度加里ヲ與フ、又「ヨデイビン」卓効アリ、局所療法ハ全部抽出スルカ又ハ銳匙ニテ搔爬シ、沃度「フォルムガーゼ」ヲ以テ處置ス。

脫毛 Alopecia, Haarausfall

圓形禿髮症・頭部乾癬・頭部濕疹・皮脂漏・頭部糠枇症・微毒性禿髮症・神經性禿髮症・萎

縮性禿髮症・症候性瀰漫性禿髮症・癩病ノ各條ヲ參照スベシ。

圓形禿髮症 Alopecia areata.

白銅貨大乃至五十錢銀貨大、稀ニハ手掌大ニ達スル有髮部及ビ鬚髯部ノ圓形脫毛ナリ。原因ハ寄生物ト認ムベキ場合アレドモ余ハ榮養神經障礙說ヲ信ズ、屢々自然治癒ヲナス。

療法 身神ノ過勞ヲ避ケ專ラ安靜ヲ圖ルベシ、榮養及ビ生活狀態ニ留意セシム、内服藥トシテ余ノ創製セル人毛製劑タル「立華」ヲ與フ。尙患部ニハ發毛劑ヲ一日二回塗擦セシムベシ、又ハ左ノ酒精劑モ可ナリ。

發毛膏 (ハールザルベ)

水楊酸……………〇・八……………石炭酸……………〇・四……………「ベルガモット油」……………一滴

華攝林……………二〇・〇

右外用一日一回塗擦

催毛劑

茺青丁幾……………一〇・〇……………石炭酸……………五・〇……………「ラーヘンデル」精……………一〇・〇



飽和硼酸酒精……八〇〇

右發毛膏使用前患部ニ塗布ス

水銀石英燈照射ハ頗ル奏効ス。

**萎縮性禿髮症又脫毛性痊癒假性禿髮**

*Alopecia atrophysans, Acne*

*decalvans, Pseudpelado.*

毛囊ニ慢性炎症長ク存在シ毛根破壊セラレ無毛トナル圓形ヲ呈セズ境界明劃ナラズ同時ニ著明ナラザル發赤毛囊炎ヲ認メ滑澤ナラズ、稀ナリ原因不明ナレ共寄生説アリ。

**療法** 湯ヲ用ヒ石鹼ニテ洗ヒ硫黃軟膏塗布、「サリチール」酸・「レゾルチン」精塗布、水銀石英燈・レントゲン線放射但シ効果確實ノモノナシ。

**症候性瀰漫性禿髮症**

*Alopecia diffusa symptomatica*

腸「チフス」・肺炎、「インフルエンザ」、「グリッペ」等ノ重篤熱性病ノ後ニ來ル榮養恢復ト共ニ全快スルヲ常トス 玄華亦用フベシ。

**神經性禿髮症** *Alopecia neurotica.*

神經性疾患ニヨリテ頭髮ノ脱落スルヲ云フ。

**療法** トシテ原因療法ノ他、内服ニハ亞砒酸・鐵劑ヲ與ヘ、局所療法トシテハ前ノ如ク處置スベシ。

**糠枇性禿髮症** *Alopecia pityrodes.*

頭部糠枇症（一四二頁參照）ニ始マリ數年ノ後ニ至リ顛頂部ノミ限局シテ脫髮スルヲ云フ。

**療法** ハ頭部糠枇症ニ同ジ（一四二頁參照）。

**被角血管腫** *Angiokeratoma Mibelli.*

本症ハ稀有ニシテ紫黑色ノ疣贅様粗糙ナル表面ヲ呈セル硬固ノ結節ニシテ手背及ビ足背、又タ往々陰囊皮ニ來ル凍瘡ニ次デ起ル貧血性ノ者ニ多シ、自覺的症狀ナク且ツ數年其形ヲ變ゼズ。

**療法** 結核性ニ關係アルヲ以テ全身榮養療法ノ他局部ハ毛細管燒灼法、電氣分解法



ニテナスカ又ハ三〇%撒酸石鹼硬膏又ハ

- ㊦ 「トラガントゴム」末五・〇……「アルコホル」……一〇・〇……「グリスリン」……一〇・〇
- 水……………二五・〇……撒酸……………一五・〇
- (「リニメント」製法ノ條ヲ参照)

**血管腫** Angioma.

母斑ノ條下ヲ参照セヨ。(一三六頁)

**無汗症** Anhidrosis.

神經性原因ヨリシテ來ル又全身病(糖尿病)等ニ來ル結果トシテ皮膚粗糙トナリ皸裂ヲ起シ易シ。

**療法** 原因療法ノ他、塗脂・(ベルツ水・ワゼリン)・豚脂)又ハ「ピロカルピン」ノ注射ヲ施スモ一時的ナリ、余ハ好シテ蒸氣浴ヲ取ラシム。

**皮膚炭化症** Anthracosis cutis.

稀有ナリ、文身術ニテ故意ニ又ハ職業的即チ煙筒掃除人ニ來ル。皮膚ニ炭粉ノ停滯スルヲ云フ。

**療法** ハ手術的ニ除去スルカ又ハ職業ヲ變スルヨリ外方法ナシ。

**脾脫疽・惡性膿疽** Anthrax, Milzbrand.

脾脫疽菌ニヨル癰腫ニシテ高熱竝ニ激シキ全身症狀ヲ呈ス、家畜等ヨリ傳染ス、七八日ノ潜伏期ヲ經テ丘疹ヨリ血性水泡トナリ遂ニ壞疽ニ陥ル。

**療法** 手術スベシ、燒灼ヲ行フ、或ハ血清療法又ハ「サルグルサン」療法ヲ試ムルモヨシ。

**安知比林疹** Antipyrinexanthem.

安知比林内服ニ因リ來ル、通常蕁麻疹性ノモノト水泡性ノモノトノ二種アリ、自覺的癢痒又ハ熱灼感アリ、口唇、陰部等ニ來ル、兩者何レモ消褪後色素沈着ヲ遺ス。

**療法** 本劑ノ服用ヲ中止スルノ他ナシ。(六三三頁参照)











蓖麻子油ヲ與フ。外用ヨリ起レルモノハ急性濕疹及ビ皮膚炎ノ條下ヲ參照スベシ。

**皮脂缺乏症** Asteatosis. Xerosis

皮脂ノ分泌減退ニヨリ起ル魚鱗癬患者又ハ健康者ニテモ洗濯又ハ雑布拭ヲナスモノニ來ル、皮膚常ニ乾燥シ粗糙ナリ。

**療法** 塗脂又ハベルツ水(左方)ヲ塗布セシム。

苛性加里……………〇・五……………「グリセリン」……………110・0……………「アルコール」……………30・0  
水……………50・0

**粉瘤** Atherom.

皮脂腺排泄管ノ閉塞セルモノニ分泌過多ナルトキ起ル。

**療法** 切開シ囊ヲ悉ク除去セザレバ再發ノ憂アリ。

**皮膚萎縮症** Athrophia cutis

慢性炎衝性疾患ニシテ原因不明ナルモ神經性ノモノナリ、眞性ノ初期ヨリ萎縮トナリテ來ルコトアリ、又續發的ニ或ル皮膚疾患ノ一定ノ經過ノ後ニ來ルコトアリ。

**療法**

患者ノ訴ニヨリ臨床的ニナスベシ、全身症狀冒サルレバ強壯藥ヲ與フルカ又皮膚乾燥ノ感アレバ無刺戟性軟膏、「クリーム」ヲ以テ塗脂ヲ爲シ常ニ按摩ヲ行フベシ。

**柑色皮症** Aurantiasis cutis Baelz.

柑橘類及ビ南瓜ノ過食ニ因リ主トシテ手掌・足趾ニ又タ顔面ニ帶紅黃色ノ斑ヲ生ズルモノヲ云フ。

**療法** 柑橘類ノ過食ヲ禁ズレバ消退ス。

**龜頭炎** Balanitis

龜頭及包皮内葉間ニ多クハ不潔ニ因リ起ル炎衝ヲ云フ。

**療法**

包莖ヲ成セル者ハ一萬倍「カメレオン水」、三%醋酸礬土水、二%鉛糖水、一千倍昇汞水ニテ包皮囊ヲ一日數回宛洗滌スベシ。洗滌ハ尿道「スポイト」ヲ用キテ爲ス。包莖ナキ者ハ如上ノ液ノ罨法。表皮剝離ニハ一二百倍乃至百倍硝酸銀水ヲ塗布シ「キセロフォルム」、「デルマトール」等ヲ撒布ス、或ハ薄キ綿ヲ兩包皮葉間ニ挿置ス。撒布又ハ軟膏療法ヲ行フ。



龜頭炎ニハ常ニ尿中ノ糖分ヲ檢定スベシ。小兒ニハ内臟蟲ノ有無ヲ鏡檢スベシ。

- 因 「デルマトール」……………五〇〇……………澱粉又ハ滑石……………五〇〇〇
- 因 樟木參兒油……………三〇〇……………依的兒精……………三〇〇〇

ビスクラボイレー Biskrabeule.

小亞細亞、東印度地方ニ流行性ニ來ル傳染性皮膚疾患ニシテ二歳乃至七歳位ノ小兒ノ手足・顔面等ニ蕁麻疹様疹ヲ發シ數週ヲ經テ癰腫狀結節トナリ後チ潰瘍トナル。

療法 初期ニハ二―五%撒酸「コロヂウム」ヲ塗布スベシ、潰瘍トナレバ搔爬スルカ切除スルヲ宜シトス。沃度丁幾効アリト云フ。

釀母菌病 Blastomycosis cutis

釀母菌ニ因リテ皮膚ニ潰瘍ヲ發生スル稀有ナル疾患ナリ。

療法 ハ外科的ニ切除、搔爬及ビ殺菌的處置ヲ行フベシ殊ニ全身症狀ニ注意スベシ内服トシテ沃度ノ大量ヲ與フ。

臭汗症 Bromhidrosis (一三七頁參照)

胼胝腫 Callus (一六六頁參照)

### 白髮 Canities

後天性ニ來ル毛髮ノ灰白色トナルヲ云フ、殊ニ若年者ニ來ルヲ云フ、之レ老年者ハ生理的ナレバナリ。

療法 先ヅ毛髮ヲ石鹼ニテ洗ヒ脫脂セル後チ

- 因 硝酸銀……………一〇……………炭酸安母尼亞……………一・五……………清涼膏……………三〇〇〇
- ヲ塗布シ後チ食鹽水ニテ洗滌スベシ、坊間ニ販賣スルモノハ皆「バラフェニールヂアミ」ノ製劑ナルガ故ニ皮膚刺戟シ易ク之ニ堪エズシテ皮膚炎・腎臟炎ヲ起スモノアリ。斯カル人ニハ此種洗髮劑ノ使用ヲ禁ズベシ、療法ハ皮膚炎ノ條ヲ參照スベシ。

癰腫 Carbunculus.

癰腫ヨリモ深く且ツ廣ク浸潤スルモノニシテ表面運實ノ如シ、豫後不良ノモノナリ。

療法 先ヅ消炎法ヲ行ヒ可及的早く外科的切開スベシ。(癰腫一一〇頁參照)。

癌腫 Carcinoma cutis Krebs.

皮膚ニ原發スル癌ヲ分チテ三トス。



一、潰瘍癌又扁平癌 *Ulcus rodens et Cancroid.*

滑澤ナル眞珠様白色ノ皮膚ヨリ稍、隆起セル徐々ニ周圍ニ擴延スル疼痛ナキ結節ナリ、結節ノ中央ハ稍々陥凹シ周圍ハ堤狀ニ境セラレ。

二、結節癌 *C. tuberosum, Papillarkrebs.*

結節或ハ乳嘴狀ノ腫瘍ニシテ花椰菜狀ヲ呈スルコトアリ。潰瘍ヲ續發スレバ速カニ深部ヲ浸蝕シ惡性腫瘍ノ轉歸ヲ取ル。

三、扁平浸潤癌 *Carcinoma infiltrativa.*

所謂ペーヂェット氏病 *Paget'sche Krankheit* 之ニ屬ス、乳房ニ發生ス、自覺・他覺症狀共ニ濕疹様ニシテ濕潤シ結痂シ皮膚ハ爲メニ硬結ス、此ノ硬結節即チ癌腫ナリ、後チ淺キ潰瘍ヲ作ル、片側殊ニ右側ニ來ル、乳房濕疹ト誤診スベカラズ。

口脣・鼻翼・眼瞼・耳・乳房・陰莖及ビ臀部ヲ好發部位トス、發育比較的緩徐ニシテ一時性ノ癩痕形成或ハ硬化性萎縮ヲ來スコトアリ、母斑・乳嘴腫・下腿潰瘍・狼瘡癩痕・粉瘤ヨリ癌腫發生スルコトアリ。

療法

最良ナルハ外科手術ナリ、「ラヂウム」療法亦推賞ニ値ス、白金燒灼、レントゲン線放射、五〇%「クローム」酸腐蝕ヲ試ミルモノアリ。

肝斑 *Chloasma Leberflecke.*

顔面ニ於ケル瀾蔓性色素増殖シテ前額・頰部及ビ上口脣ニ來ル、婦人ニ多シ但シ生殖器疾患ト關連スルガ故ナリ。

療法

一%昇汞水卷法ヲ一、三時間持續スルトキハ表皮水泡狀トナリ後チ剝離ス然ルトキハ無刺戟性軟膏ヲ塗布スベシ(夏日斑條下参照)。或ハ

- 因 「カカオ」酪……………一〇〇 蓖麻子油……………一〇〇 亞鉛華……………〇・二
- 因 白降汞……………〇・二 薔薇油……………三滴 右朝夕二回塗布
- 因 沈黃硫黃……………二〇〇 醋酸……………一五〇 刺納林……………二〇
- 因 炭酸加理……………二〇〇 安息香丁幾……………一〇〇 薔薇水……………二〇〇〇

右一食匙ヲ金盥ニ入レ洗面スベシ

月經不順其他婦人科的疾患アラバ之レガ療法ヲ行フハ論ヲ俟タズ。

鶏眼 *Clavus, Hühnerauge.*



主トシテ足趾ニ來ル限局肥厚セル角質層ノ楔狀ヲナシテ皮膚ノ深部ニ箱入スルヲ云フ。壓迫スレバ激痛アリ。

療法 五〇%撒酸石鹼硬膏・「スピール」硬膏・五―一〇%撒酸「コロヂウム」・發烟硝酸ヲ塗布ス。

撒酸……………一〇……………乳酸……………一〇……………「コロヂウム」……………一〇〇

撒酸……………一〇……………印度大麻越幾斯……………〇・五……………「アルコホル」……………一〇

「エーテル」……………二・五……………「コロヂウム」……………五〇

銳七ニテ搔爬ス又ハ出血ナキ程ニ圓錐形ニ皮膚肥厚ヲ切除シ其内ニ水揚酸ヲ壓入シ絆創膏ニテ被蓋シ放置スルコト三四日ニシテ奏効シ再發セズ。

### 火傷 Combustionis.

太陽・火焰・熱湯・化學用藥品・電撃等ニ因リテ起ル。三度ニ區別ス。第一度發赤及腫脹、第二度水疱形成、第三度壞疽形成。

療法 第一度又ハ紅斑性火傷、二%醋酸礬土水・鉛糖水、又ハ阿麻仁油・石灰水ノ罨法。或ハ粉劑ノ撒布。

「オルトフォルム」……………〇・四……………亞鉛華……………一〇〇……………澱粉……………一〇〇

石灰水……………阿麻仁油……………各等量(火傷リニメント)

第二度又水疱性火傷 注意シテ水疱内容液ヲ去リ亞鉛油ヲ塗布ス。撒劑ハ用ヒザルヲ可トス。

亞鉛油……………亞鉛華……………一五〇……………阿列布油……………三五〇

亞鉛華……………阿列布油……………各等量

疼痛ヲ輕減スルニハ一―二%「ノボカイン」又ハ「オイカイン」溶液ヲ塗布ス。

第三度又燒痲性火傷 剪刀又ハ刺針ヲ以テ痲塊ヲ去リ三%過酸化水素水ノ罨法、硼酸軟膏ノ貼布、又ハ沃度「フォルムガーゼ」ノ繃帶ヲ施ス。患部廣ケレバ持續入浴ヲ取ラシム。虛脫ノ惧アル者ハ興奮劑ヲ與ヘ食鹽水ノ皮下注入ヲ行フ。

火傷第一度比較的廣キ部位ノ冒サレタル場合ニ於テモ生命ニ危險ナシト雖モ第二度、第三度ノ全身三分ノ一以上ノ者ニハ死ノ轉歸ヲ取ルコト多シ。全身症狀劇シク冒サルル時ハ對症療法ヲ行フ。



尖圭コンヂ「ローム Condyloma acuminatum.

陰部稀ニ肛門部ニ來ル乳嘴様腫瘍ニシテ容易ニ出血シ且ツ惡臭アル分泌物ヲ出ス、女子ニアリテハ殊ニ球菜形ヲナス。豫防法トシテハ不潔トナラザル様屢々洗滌スベシ。

療法 小ナルモノハ剪伐シ過「クロール」鐵液ヲ塗布スベシ又ハ

④ 「レゾルチン」……一〇・〇……亞鉛華……四五・〇……澱粉……四五・〇  
ヲ撒布スベシ。

又ハ四〇%ノ「レゾルチン」酒精ヲ日々塗布スルカ又ハ左ノ藥品ヲ塗擦スベシ。

④ 「サビナ」根……服性明礬……各同量

大ナルモノハ元ヨリ切除シ縫合スベシ。

凍傷及凍瘡 Congeratio et Periones, Erfrierung und Frostbeule.

氷點以下ノ低温度ノ作用ニヨリテ起ル。火傷ニ於ケルガ如ク三度ニ區別ス即チ紅斑、水疱形成及ビ壞疽是レナリ。

第一度又紅斑性凍傷即凍瘡

貧血性ノ者ニ多ク身體末梢部寒冷ニ會ヒ暗赤色乃至紫色ニ腫脹シ次デ潰瘍ヲ起ス。  
療法 全身ノ榮養ヲ高ムルタメ鐵劑・肝油等ヲ與フ。豫防法トシテ手指・足蹠ノ拂拭ヲ嚴ニシ就褥前塗脂メ、既ニ冒サルレバ一〇%沃度丁幾・樟腦丁幾・ルゴール氏液等ヲ塗布ス。

ルゴール氏液

④ 沃度……一・〇……沃度加里……二・〇……蒸餾水……三〇〇・〇

④ 「イヒチオール」……五・〇……樟腦油……五・〇……「ラノリン」……二〇〇・〇

塗擦後綿ニテ被フベシ

④ 「イヒチオール」……一・五・〇……「レゾルチン」……一・三・〇……無水「ラノリン」……二五・〇

阿列布油……一〇・〇……蒸餾水……五〇・〇

石炭酸亞鉛華「リニメント」ハ使用便ニシテ効アリ。(一一頁)

第二度又水疱性凍傷

火傷ニ準ス、水疱破壊後ノ潰瘍ニハ硼酸軟膏ヲ貼布ス。

第三度又壞疽性凍傷



罨法ヲ施ス、續發傳染ノ爲メ化膿スルコトナキ様注意スベシ。

凍死ノ際ニハ冷處ニ置キテ雪塊又ハ冷水ニテ克ク摩擦シ漸次身體ヲ温ムベシ、或ハ冷水中ニテナスモヨシ、後チ酒精・咖啡・「カンフル」又ハ「エーテル」ヲ内用又ハ注射スベシ。

**皮角** Cornu cutaneum, Hawthorn.

牛・羊等ノ如ク角ヲ皮膚ニ發生スルヲ云フ、角質化セル上皮細胞ノ重疊セルモノナリ。

**療法** 外科的ニ除去スルカ、余ハX光線ノ卓効ヲ認メタリ。

**蛆墜症** Creeping disease.

蠅・蛆等ノ仔蟲ノ皮下ヲ匍行スルニヨリ赤色狹小ナル線狀隆起ヲ來スヲ云フ。

**療法** 幼蟲ヲ發見シテ之レヲ除去スルヲ得バ治癒スルモ其發見ハ甚ダ困難ナリ。依リテ沃度丁幾ヲ塗布スルニ止マル。

**護膜樣皮膚** Cutis laxa.

皮膚ノ外觀變化ナクシテ伸縮自在ナルヲ云フ。

**療法** 無シ。

**顛頂圖樣皮膚** Cutis verrucis gyrata

頭皮ニ過剩ヲ生ズ腦廻轉ニ似タル皺襞ヲ作ル。

**療法** 過剩ノ頭皮ヲ切除スルヨリ法ナシ。

**囊狀腺腫** Cystadenoma

帽針頭大乃至豌豆大ノ圓キ硬キ褐赤色乃至黃色ノ皮膚隆起物ナリ、顔面及ビ胸部ニ生ズ。檢鏡セザレバ確診シ難シ。

**療法** 五—一〇%撒酸「コロチウム」ヲ塗布スルカ「ラヂウム」照射ヲナス。

**囊蟲** Cysticercus cellulosa.

條蟲ノ幼蟲皮膚ニ寄生シ無痛性ニシテ可動性ノ扁豆大乃至梅實大ノ圓形腫瘍ヲ多數發生スルナリ。

**療法** 表在性ノモノハ摘出シ、又ハ沃度丁幾、酒精ヲ囊中ニ注射ス。

**褥瘡** Decubitus.

重症患者ノ永時仰臥スルニヨリ組織ノ榮養不良ノ爲メニ起ル部位ハ薦骨部・大轉子・足



腫稀ニ肩胛部ナリ、急速ニ進行ス(壞疽及脱疽一一頁参照)。

**療法** 豫防法ニ注意スベシ、一局部ヲ長ク壓迫スルコトナカラシム、克ク酒精等ニヨリ拂拭シ澱粉ヲ撒布スベシ。褥瘡生ゼバ「デルマトール」・沃度仿謨ヲ撒布スベシ、濕潤セル時ハ硼酸軟膏・「デルマトール」軟膏ヲ貼用シ、疼痛甚シキ時ハ一〇%「アネステジン」軟膏ヲ用フ。

**初生兒剝脫性皮膚炎** *Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter*

リッテル氏病ト云フ、生後直チニ顔面殊ニ口邊ニ發赤セル斑ヲ生ジ其部ニ初メハ水疱様、後チニハ乾燥セル落屑ヲ來ス、重症ニ陥ル。

**療法** 榮養ニ注意シ、皮膚ハ注意シテ塗脂スベシ。

**全身剝脫性皮膚炎** *Dermatitis exfoliativa universalis*

皮膚ノ一局部ヨリ發赤ヲ起シ數日乃至數ヶ月ニシテ全身ニ蔓延シ其部分ハ葉狀落屑ヲ以テ被ハルルノ外他ノ發疹ナキヲ云フ。

**療法** 持續浴ヲナサシムルカ、塗脂スルノ外、對症的處置ヲナス。

**匍行性皮膚炎** *Dermatitis herpetiformis Duhring.*

症狀多岐ニシテ激甚ナル瘙痒及ビ灼熱ヲ伴ヒ匍行狀配列ヲ有スル水疱群生シテ全身症狀ノ犯サレザルヲ云フ。

**療法** 持續浴又ハ無刺戟性軟膏貼用。余ハ「サルプルサン」ノ靜脈内注射ヲ推奨ス

**癢痒性苔癬樣皮膚炎** *Dermatitis lichenoïdes pruriens.*

ウイダール氏慢性單純性苔癬(一一九頁)参照

**藥物性皮膚炎** *Dermatitis medicamentosa.*

急性濕疹(八三頁参照)。

**頭部乳頭狀皮膚炎** *Dermatitis papillaris capillitii*

項部息肉腫(四九頁)参照

**絲狀菌病** *Dermatomycosis*

皮膚疾患中濕疹ニ次テ多數ヲ占ムルモノナリ、黃癬、白癬、癢風、薔薇色枇糠疹、紅色陰癬、「スポロトリヒョジス」、屋瓦狀癬、連圈狀枇糠疹之ニ屬ス、各項ニ就キ見ルベシ。



絲狀菌ノ顯微鏡的検査 鱗屑、毛髮等ヲ載物硝子ノ上ニ置キ一〇—二〇・〇%苛性加里溶液ヲ滴加シ約二十分後「デッキグラス」ニテ覆ヒ鏡檢スベシ、爪ハ小刀ニテ患部ヲ削リ同様ニ處置ス、分枝セル絲狀菌及圓形又ハ橢圓形ノ孢子ヲ見ルヲ得ベシ。

#### 皮膚筋腫 Dermatomyoma.

常ニ多發性ニ皮膚中ニ發生ス形小ニシテ帶紅色又ハ黃褐色ヲ呈シ柔軟ニシテ皮膚ト共ニ移動ス。必ず疼痛ヲ伴フ。

療法 亞砒酸内服、腫瘍ノ摘出。

#### 皮様囊腫 Dermoid.

半球形ヲナス柔軟動搖スル皮膚ト同色ノ腫瘍ニシテ時トシテ骨膜ニ癒着スルコトアリ。

療法 切除縫合スベシ。

#### ダリエー氏病又増殖性毛囊性「プロロスベルモージス病」 Dermatose de Darier.

*Psorospermosis follicularis vegetans.*

全身症狀モ自覺的症狀モナク全身ニ小ナル初メハ透明ナル後ニハ黑色ノ硬キ丘疹ヲ發生ス、炎衝症狀ナシ。

療法 X光線又ハ「ラヂウム」照射ニヨル他途ナシ、藥品ニテ除去スルモ直ニ再發ス。

#### 汗 疱 Dysidrosis, Pompholix.

手掌・足趾ニ來リ搔痒アリ、初期ニ皮下ニハ水泡ヲ生ジ時ニ内容濁濁スルモ膿瘍トナリテ外部ニ哆開スルコトナシ。容易ニ治スルモ再發シ易シ。手掌・足趾白癬ト誤リ易シ。

療法 5%撒酸又ハ「レゾルチン」「アルコホル」、5%「フォルマリン」水又ハ「フォルマリン」精ヲ塗布ス。爹硫膏有効ナリ。X光線、水銀石英燈卓効アリ。

#### 壞疽性深膿疱 Ecthyma gangraenosa.

初生兒又ハ小兒ニ殊ニ或ル疾病ニヨリ衰弱セル時弛緩セル膿疱發生シ直ニ破潰シテ圓形ニシテ邊縁明劃ナル皮膚ノ深層ニ達スル潰瘍ヲ生ズ。底面ハ黑色壞疽性組織ヲ有スルガ故ニ此名アリ。部位ハ軀幹ニ多ク殊ニ尿、尿ニテ不潔トナル部ニ來ル、而シテ後チニ癩痕形成ヲ營ミ治ス。然レドモ往々死ノ轉歸ヲ取ル。



**療法** 原因療法ノ外、局部ハ清潔ニ保チ膿疱内容ノ他ノ部ニ附着セザル様注意スベシ。一日一回沐浴ヲナサシメ局部ヲ洗滌スルカ又ハ五千倍ノ昇汞又ハ二%ノ硼酸水ニテ洗フベシ。

可成速ニ膿疱ノ内容ヲ出シ其部ニ沃度「フォルム」、「デルマトール」、「キセロフォルム」等ヲ撒布シ、繃帶ヲ施スベシ。或ハ乾燥療法ニ代フルニブロー氏液ヲ以テ巻法スルモ可ナリ。

餘リ疼痛ナキ時ハ潰瘍ヲ昇汞、石炭酸ニテ洗滌スルカ又ハ沃度丁幾ヲ塗布スルカ五%硝酸銀水ヲ用ユ

**濕疹 Ekzema, Nässende Flechte.**

濕疹ハ皮膚表面ノ加答兒ナリ。先ヅ外見上七種ニ分ツ事ヲ得。

- 一、紅斑性濕疹 Ekz. erythematosum.
- 二、丘疹性濕疹 Ekz. papulatum.
- 三、小水疱性濕疹 Ekz. vesiculosum.
- 四、膿疱性或ハ膿疱疹狀濕疹 Ekz. pustulosum s. impetiginosum.

五、糜爛性濕疹又赤色濕疹 Ekz. madidum s. rubrum.

六、結痂性濕疹 Ekz. crustosum.

七、落屑性濕疹 Ekz. squamosum.

換言スレバ濕疹ハ六期ニ大別シ得ベシ即チ紅斑期ニ始マリ丘疹期ヲ經テ小水疱期又ハ膿疱期ニ至リ破レテ糜爛期トナリ病勢ノ最高潮ニ達シ次デ慢性ニ移行シ若シクハ落屑期トナリ治癒ニ向フ、但シ必ズシモ常ニ各期ヲ經過スルニハ非ズ唯紅斑期及ビ落屑期ハ多ク之レヲ缺カズ。

濕疹診斷上注意スベキハ左ノ七點ナリ。

- 一、濕潤シ、二、癢痒ヲ訴ヘ 三、限界明劃ナラズシテ 四、全然周圍ニ向ツテ増大セズ 五、發疹ノ形狀多型ニシテ同時ニ諸期名稱ノ諸症現在スルコト 六、一定ノ配列ヲ呈セズ 七、潰瘍ヲ形成セズ從テ癬痕ヲ遺サザルコト等ナリ。
- 濕疹ハ皮膚發疹中ノ大部分ヲ占メ其病症千態萬狀ニシテ臨床上最モ緊要ナルモノナレバ之ヲ急性濕疹及ビ皮膚炎ト亞急性性及慢性濕疹ノ二項ニ大別シ更ニ詳細ニ記述スベシ。

**急性濕疹・皮膚炎 Ekzema acutum, Dermatitis.**



起因ヲ究メザルベカラズ。塗擦ノ刺戟、硬膏、軟膏（灰白軟膏、「オルトフォルム」、沃度フォルム）、有毒植物（漆、櫨）、染髮藥、職業關係（「テレピン油、酸類、鹽基類ノ常用）、粗製石鹼、有害顏料等皆原因トナル。

**療法** 先ヅ外襲刺戟ヲ除クベシ、強度ノ炎症ニハ常水、三%鉛糖水、一—五%醋酸礬土水、二%硼酸水ノ冷罨法、水疱多發セバ剪刀又ハ燒灼消毒セル刺針ニテ之ヲ開哆ス、滲出微量ナラバ五%グリテールウルソン氏軟膏、清涼膏ノ塗擦。脂肪適應セザル者ニハ「リニメント」（二〇頁參照）ヲ用フ。然ラザル者ハ左方ヲ處ス。

亞鉛華……………

刺納林……………

華攝林……………

醋酸礬土水……………各等量

紅斑期ニハ粉劑トシテ澱粉、米粉及ビ滑石ヲ單味ニテ又ハ交互ニ混和シ塗脂セル上ニ又ハ患部ニ直接ニ撒布ス。振盪劑、「リニメント」ヲ塗布ス。

強度ノ炎症去ラバ軟膏療法ニ移ル、軟膏ハ其混和スベキ藥劑（「イヒチオール」、「チオノール」、「グリテール」等）ヲ症狀ニ應ジテ加減鹽梅セザルベカラズ。

亞急性及ビ慢性濕疹 Ekzema subacutum et chronicum

病症ノ強度、部位、經過、患者ノ年齡、特異質竝ニ病因ノ異ナルニ從テ療法自ラ異ル、就中誘因ハ精探シテ之ヲ除去スベシ、慢性濕疹ノ大部分ハ外襲作用ニヨリテ起ル、搔抓、粗製石鹼、思慮ナキ洗滌、刺戟性膏劑ノ貼用、發汗、血行障害等ハ疾病ヲ増惡セシムル所以ナリ。

（イ）乾燥性落屑性濕疹 最初ヨリ爹兒、「レゾルチン」、焦性沒食子酸等ノ殺菌藥ニテ處置スベシ、無效ナラバ硫黃膏又ハ「ナフタラン」ヲ試ムベシ。

理學的療法トシテハ水銀石英燈最モ可ナリ。

（ロ）丘疹性濕疹、及ビ丘疹性水疱性濕疹、亞鉛華膏ヲ塗布シ其上ニ撒粉ス、有毛部ニハ一—二%「ナフトール」精、一千倍昇汞精等ノ洗滌ヲ便利トス。

（ハ）皸裂形成ニハ局所ノ刺戟ヲ避ケ一—三%硝酸銀水、爹兒丁幾、二〇%「イヒチオール」溶液、三〇%「チオノール」溶液ヲ塗布シ其上ニ濕布、單軟膏、亞鉛華膏、「ピック」氏硬膏ヲ貼シテ嚴密ニ繙帶ス。

（ニ）結痂性濕疹 結痂ヲ除去スルニハ硼酸軟膏、ブロー氏液ノ蒸罨法、阿列布油ニテ



拂拭ス、三%過酸化水素水殊ニ効果急速ナリ。(八八頁参照)

(ホ)濕潤性濕疹 是ニハ處スルコト多シ。分泌物ノ吸收、搔痒制止、搔爬ニ因ル膿疱疹、膿瘍、瘻形成等ニ備ヘザルベカラズ。分泌旺盛ナラバ先ヅ一―三%硝酸銀水ノ塗布、一萬倍「カメレオン」水、二%硼酸水ノ濕布、收斂劑ニテ時餘濕布罨法ヲナシ後ニ軟膏又ハ泥膏ヲ貼布シ繙帶ヲ施ス。或ハ亞鉛華膏ヲ用フ。

亞鉛華泥膏

- ④ 醋酸礬土水……………五・〇 刺納林……………二〇・〇 亞鉛華……………二〇・〇
- 華攝林……………二五・〇

凡テ濕疹執拗ニシテ釜硫膏、ウイルキンソン氏軟膏其他ノ膏劑、丁幾劑ニ依ルモ治癒進拂セザル時ハ直ニレントゲン療法ヲ試ムベシ。殊ニ職業上ノ關係ヨリ化學的療法ヲ施ス能ハザル時ハ最初ヨリレントゲン療法ヲ施スベシ。

濕疹ハ部位ニヨリテ夫々特有ノ形狀ヲ以テ發生スル故ニ療法モ亦一樣ナラズ。

(一)頭部濕疹

a. 乾燥性落屑性濕疹 本症ハウナ氏ノ所謂頭部落屑性皮脂漏性濕疹ニシテ余ハ專ラ

- ④ 「レゾルチン」……………五・〇……………蓖麻子油……………五・〇……………「アルコホル」……………九〇・〇

ヲ用フ。尙執拗ナルモノニハ

- ④ 沈降硫黃……………一・五―三・〇……………(水楊酸……………一・〇―三・〇)……………安息香酸豚脂……………三〇・〇
- ④ 華攝林…………………………單鉛硬膏…………………………各等量

- ④ 焦性沒食子酸〇・五―一・〇……………華攝林……………三〇・〇

b. 水疱狀濕疹 有毛頭部ニ散點性ニ孤立シテ發生ス、搔痒アリ終ニ黃色ノ痂皮ヲ結ビテ乾燥スル小水疱ナリ。

- ④ 昇汞……………〇・五……………酒精……………二〇〇・〇……………洗滌料或ハ罨法料

或ハ硼酸水、一萬倍過滿鞣酸加里液等ノ液又ハ釜兒石鹼ニテ洗滌スベシ。

c. 濕潤性結痂性即チ膿疱疹狀濕疹 毛髮ヲ短剪シ軟膏ヲ貼布ス。繙帶交換ニ際シ一―五%硝酸銀水ヲ塗布スルモ可ナリ。五%硼酸軟膏或ハヘブラ氏軟膏、硫黃軟膏等ヲ使用ス硫黃膏ト鉛膏ト併用スベカラズ皮膚ヲ黑變スルヲ以テナリ。



結痂ヲ去ルニハ油浸綿帽子ヲ被ラシム。吾人ハ好ンデ油類ヲ痂皮ニ滴下シツ、浸漬セシメテ油紙ヲ以テ被覆ス。毎朝微温湯又ハ緩和ナル石鹼ニテ洗淨シ繻帶ヲ交換ス、濕潤去ラバ如上乾燥性濕疹ニ對スル療法ヲ執ル、殊ニ弱度ノ焦性没食子酸膏ヲ推奨ス。

項部、耳後、頸部、淋巴腺腫大甚シケレバ冷褻法ヲ施スベシ。

d. 風性頭部濕疹 少女ノ頭部及ビ肩胛部濕疹ニハ第一ニ頭虱ノ有無ヲ精査セザルヘカラズ即(一二六頁參照)先ヅ頭虱ノ驅除ヲ先ニシ次デ濕疹ノ療法ヲ行フベシ。

(二) 顔面濕疹

a. 乾燥性ノモノニハ硫黃亞鉛華膏或ハ「レゾルチン」製劑可ナリ。輕度ノモノニハ5%「サリチール」酸酒精ニテ効アリ。

硫黃亞鉛華軟膏

㊦ 沈降硫黃……………一〇—三〇……………亞鉛華……………五〇……………華攝林……………三〇〇

㊦ 一〇%白降汞軟膏

㊦ 參兒……………三〇……………華攝林……………三〇〇

炎症激甚ナル時ハ

㊦ 亞鉛華軟膏……………單鉛硬膏……………各一五〇

㊦ 次硝酸蒼鉛……………四〇……………清涼膏……………一六〇

頑固執拗ナル者ハ

㊦ 「レゾルチン」〇・五—一〇……………「グリセリン」軟膏……………三〇〇

硫黃亞鉛華「リニメント」ハ使用ニ便ナリ。

毎夕時緩和ナル石鹼又ハ硼酸水ニテ顔面ヲ洗淨セル後是等ノ軟膏ヲ塗擦ス、翌朝ハ油劑ニテ拭ヒ去リ只冷水ノミニテ洗フ。日中ハ撒粉シ置クベシ。又五—一〇—一五%參兒「アルコホル」ヲ塗布スルモ宜シ。

b. 濕潤セル時 先ヅ濕布ヲ試ミ漿液出デザルニ至リ亞鉛華膏又ハヘブラ氏軟膏ヲ貼用繻帶ヲ施ス。小兒ニハ假面ヲ被ラシム。繻帶交換ニ際シ〇・五—二%硝酸銀水ヲ塗布シ「ツメノール」亞鉛華泥膏ヲ塗布ス。

㊦ 「ツメノール」……………三〇……………亞鉛華泥膏……………三〇〇

㊦ 參兒……………三〇……………亞鉛華……………七〇……………華攝林……………二〇〇

參兒劑ヲ用フル時ハ其大量ニ堪フルヤ否ヤヲ常ニ注意スベシ、又參兒ノ一茶匙乃至一



食匙ヲ洗滌水ニ混ズルモ好シ洗淨後ハ膏劑塗布繙帶ヲ施ス。

九〇

(三) 眼瞼濕疹

白降汞軟膏或ハ黃降汞軟膏ノ塗布(二七頁参照)又ハ一千倍乃至四百倍皓礬水又ハ一萬倍昇汞食鹽水ノ温罨法(一日三回三十分宛)、同時ニ結膜炎アラバ四百倍皓礬水點眼。

(四) 口唇濕疹

原因屢、流涎、齲齒等ニ在リ、ヘブラ氏軟膏又ハ蠟軟膏貼用。頑固症ニハ先ヅ一—四%苛性加里液ニテ腐蝕シ常水又ハ醋酸礬土水ニテ中和シ次デ刺納林膏貼布又ハ一—五%醋酸礬土水ノ罨法ヲ施ス。藥効ナキ時ハ「ラヂウム」療法ヲ行フ。

(五) 鼻腔濕疹

常ニ伴發セル鼻加答兒ヲ先ヅ處置ス、次デ二—五%硝酸銀水ヲ塗布ス。夜間ハ一—五%醋酸礬土水ノ栓塞ヲナス。

(六) 軀幹ノ濕疹

a. 濕潤性 收斂劑ノ罨法、繙帶或ハ亞鉛華膏貼布、末期ニハ糠汁浴又ハ硫黃浴ヲ可ト

ス。

b. 慢性乾燥落屑性 最良ナルハ初メ硫黃膏ヲ用ヒ後ニ亞鉛華膏又ハ參兒亞鉛華膏ヲ塗布スルニ在リ、硫黃浴ヲ行ハシム若シ刺戟甚シクレバ糠糝ヲ混合ス。(二二頁参照)

(七) 四肢ノ濕疹

療法軀幹ニ同ジ。手掌、腕ノ水疱狀濕疹ハ醋酸礬土水等ノ濕布ヲ施ス、又ハヘブラ氏軟膏ヲ塗布シ後チ亞鉛華膏又ハ參兒亞鉛華膏ニ改ム。

浸潤久シキ圓斑狀濕疹ハ先ヅピック氏硬膏ヲ貼布シ次デ參兒石鹼局所浴ヲ取ラシメ終リニヘブラ氏軟膏、參兒亞鉛華泥膏又ハ參兒丁幾ヲ塗布ス、後ニハ繙帶ヲ去リ唯塗脂ス。頑固ナル水疱狀濕疹ハ苛性加里溶液(二二頁)ニテ腐蝕シ初メハ醋酸礬土水(二二頁)ニテ罨法、後ハ亞鉛華膏ノ貼布ヲナス。

手掌ノ胼胝性皸裂性濕疹ニハ參兒、「クリサロビン」ヲ二—五%軟膏、硬膏、又ハ塗布劑トシテ用フ。「サリチール」酸石鹼硬膏ハ便ナリ。レントゲン療法モ試ムベシ。

本症トセラレタル者ハ往々白癬菌ニテ起ルモノ多シ、注意ヲ要ス(一六三頁参照)

(八) 下腿ノ濕疹

九一



乾燥性ニハ爹兒、硫黃、「イヒチオール」等ノ軟膏ヲ用フ。濕潤性ニハ硝酸銀水ニテ輕ク腐蝕シ二%「イヒチオール」、五%「ツメノール」、「チゲノール」、三%醋酸鑿土水等ニテ濕布褻法ヲ施ス。

(九) 足部ノ濕疹

爹兒石鹼、「アルゾール」、醋酸鑿土水又ハ稀釋過滿褻酸加里水ノ局所浴ヲ行ヒ、ヘブラ氏軟膏、「レニガロール」亞鉛華膏ヲ貼用ス。

「レニガロール」……一〇〇〇……亞鉛華……一〇〇〇……刺納林……一〇〇〇  
華攝林……二〇〇〇

(十) 肛門濕疹

便通ヲ整ヘ攝護腺炎、痔核等アラバ先ヅ之ヲ處ス、便通ノ前後ニ肛圍ニ塗脂ス、摩擦ヲ輕減スルタメニ綿栓ヲ填ズ、爹兒石鹼坐浴モ可ナリ。炎症激シケレバ醋酸鑿土浴、「リゾール」浴ヲナサシメ醋酸鑿土水、五%石炭酸水、石炭酸鉛糖水、又ハ一%「レゾルチン」水ニテ壓迫繃帶ヲナス。末期ニハ爹兒膏、爹硫「リニメント」、亞鉛華膏、爹兒亞鉛華膏、「レゾルチン」亞鉛華膏等ヲ貼用ス。皸裂性ニハ二—五%硝酸銀水ヲ塗布シテ塗脂ス。

發汗多ケレバ「タン」ノフォルム、「サリチール」酸滑石撒布又ハ「フォルマリン」水ヲ塗布セル上ニ撒粉ス。瘙痒ニハ一—三%石炭酸洗滌又ハ二%「クリサロビン」塗布。  
レントゲン療法可ナリ。

(十一) 陰囊濕疹

爹硫膏塗布、頑固症ニハ純「グリテール」、「ピチロール」又ハ「テール」ヲ塗布ス。陰囊皮膚象皮症狀ニ肥厚セバ「ワイルキンソン」氏軟膏、「クリサロビン」、「トラウマチチン」、「ピロガロール」、「トラマチチン」ヲ時々用フベシ。

本症中病竈ノ比較的境界明劃ナル例アリ然ルトキハ於保氏ノいんきん菌ノ證明ヲ怠ルベカラズ從テ殺菌藥ノ必要アリ。

(十二) 鼠蹊部濕疹(間擦性)

肛門濕疹ニ同ジ。普通小兒ニ多シ、看護ヲ嚴ニシ汚染、濕潤スル事ナカラシム初期ニハ溫浴後拂拭乾燥セシメテ充分ニ撒粉スベシ(二四頁參照)。

(十三) 大陰唇濕疹



原因タル白帶下等ヲ處置シ急性症狀去ラバ〇・五%「クリサロビン」又ハ爹兒丁幾ヲ塗布ス。レントゲン療法モ可ナリ。

(十四) 爪ノ濕疹

爹兒浴ヲナサシメ「サリチール」酸石鹼硬膏ヲ貼布ス、又〇・五—五%「クリサロビン」酒精ヲ塗布ス。

レントゲン療法モ可ナリ。

本症ニ似タルモノ白癬菌ヨリ來ルヲ以テ菌ノ檢索ヲ怠ルベカラズ。

以上ニテ濕疹ノ療法ハ之ヲ盡シタレドモ尙日常吾人ノ試ムル局所療法ヲ各期ニ分チテ略述スレバ左ノ如シ。

紅斑期 刺戟ナキ緩和粉劑ヲ一日數回撒布ス。

或ハ

〔方〕 澱粉又ハ滑石……………亞鉛華 各等量 (撒布料)

〔方〕 澱粉……………亞鉛華……………滑石……………各三三〇……………單寧酸……………一〇

小水疱期 撒布劑ハ粉末ト滲出液ト捏合シ却テ分泌液ヲ鬱滯セシムル缺點アル故ニ亞

鉛油ヲ塗布ス(七二三頁參照)。

丘疹期 亞鉛華泥膏、ウイルソシ氏軟膏ヲ用フ。

膿疱期 結痂性濕疹、糜爛性濕疹、膿痂性濕疹ヲ含ム此期ニ應用スベキ軟膏トス、

一般ニ用ヒラルルハ硼酸軟膏トヘブラ氏軟膏トナリ。

是等ノ軟膏ヲ連用スル時ハ却テ癢痒ヲ増進セシムル故ニ數日ノ後泥膏ニ改ムルモ可ナリ。又初メヨリ「イヒチオール」類ノ軟膏ヲ應用スルモ可ナリ。之レ「イヒチオール」ハ癢

痒ヲ制止シ充血ヲ消散スル效アリ。

「ツメノール」軟膏

〔方〕 「ツメノール」……………次硝酸蒼鉛……………亞鉛華……………各一〇〇

單軟膏……………一〇〇〇

「チオノール」軟膏

〔方〕 「チオノール」……………一〇〇……………次硝酸蒼鉛……………五〇……………單軟膏……………一〇〇〇

落屑期 爹兒劑ニ若シクハ莫シ、丁幾又ハ泥膏トシテ應用トス。爹兒精(一四頁)、爹

硫膏(二五頁)等ヲ使用ス。



慢性濕疹 Ekzema chronicum

慢性濕疹ハ落屑期ノ不治ニ遺レルモノニシテ浸潤アリ、癢痒ヲ訴ヘ摩擦、搔爬、濕潤等ノ誘因ヨリシテ屢々急性症狀ヲ惹起シ長年月ニ互リテ患者ヲ苦シマシメ醫治ニ抵抗ス、浸潤ノ程度、皮膚ノ抵抗ヲ顧慮シテ還元劑ヲ應用シ、之ガ根治ヲ圖ルハ皮膚科醫ノ義務ナリ。

結痂浸潤等ノ急性症狀ヲ伴ヘル時ハ先ヅ前章ニ述ベタル方法ニヨリ之ガ治療ヲ施スベシ、汎ク用ヒラルルハ釜硫膏ナリ、之ニテ浸潤去ラバ釜兒精、釜兒「リニメント」ノ如キ使用簡便ナルモノニ移ル、指ニテツマミ全ク健康皮膚ト區別ナキニ到ルマデ醫療ヲ廢止スベカラズ、浸潤殊ニ甚シキ頑症ニアリテハ左記ノ弱剝離膏、強剝離膏、ウィルキンソン氏軟膏、ドレウ氏軟膏等還元力弱キモノヨリ強キモノニ漸次移行シテ適當ノモノヲ選ブベシ、數日貼用シテ上層剝離ノ傾向アレバウィルソン氏軟膏ヲ塗布シテ充分ニ剝離セシメ再ビ元ノ藥劑ヲ用フ、斯シテ尙奏効確實ナラザレバ昇汞(〇・五—二%)、苛性加里液(一—四%)ノ濕布ヲ毎日二時間宛行フ、又ハ「レゾルチン」精等ヲ漸次濃厚トナシテ塗布ス、炎症、疼痛ヲ惹起スレバ無刺戟性軟膏又ハ濕布ヲナスベシ。

強剝離膏 (第一)

- ㊦ 「ナフトール」……………一〇〇……………綠石鹼……………一五〇……………昇華硫黃……………五〇〇
- 「ワゼリン」……………二五〇

同 (第二)

- ㊦ 「サリチール」酸……………四〇……………「レゾルチン」……………四〇……………昇華硫黃……………四〇
- 酸化亞鉛……………四〇……………澱粉……………四〇……………「ワゼリン」……………二〇〇

同 (第三)

- ㊦ 「レゾルチン」……………四〇……………「イヒチオール」……………一〇〇……………「ワゼリン」……………一〇〇
- 酸化亞鉛……………四〇……………豚脂……………三〇〇
- 弱剝離膏
- ㊦ 酸化亞鉛……………六〇……………「レゾルチン」……………二〇〇……………「ワゼリン」……………二〇〇
- 豚脂……………五四〇

頑癬 Ekzema marginatum ; Dermatomyosis marginatum

陰股部ヲ主トシテ大腿内側ニ來リ稀レニ他ノ部分ニ發生ス、境界明劃、皮膚面ヨリ隆



起スル褐色ノ堤狀縁ヨリ圍繞セラルル斑面トナリテ來ル、甚シキ瘙痒ヲ訴フ「デルマト  
フキートン、イングイナール」ナル白癬樣菌ヨリ起ル、陰囊ヲ犯スコトナシ、陰囊ハ濕疹  
ノ好發部位ナリ(九三頁參照)

**療法** 一〇%「クリサロビン、トラウマチン」又ハ一〇%焦性沒食子酸軟膏ヲ塗布  
ス。沃度丁幾又用フルコトアリ、ウイルキンソン氏軟膏其他ノ皮膚剝離藥ヲ用フルコト  
アリ。豫防トシテ陰股部ヲ清潔ニシ乾燥セシメ置クベシ。

**皮脂漏性濕疹** Ekzema seborrhoicum.

經過及ビ治療法ハ濕疹ニ準ズ、ウンナ氏ノ本症ヲ分チシハ皮脂腺ノ多キ部位ニ發生ス  
ルガ故ナリ、只ダ現象ハ彼レニ比シテ少ナク病竈互ニ圓盤狀ニ融合スル傾向アリ比較的  
周圍ト確然タル區劃ヲ有ス。色ハ概ネ黃赤ニシテ頭部、前額、胸及ビ背部、腋窩部、陰  
部ニ多シ。

**療法** 硫黃劑ヲ特效藥トス、濕疹ト同ジク濕潤セルトキハブロー氏液卷法ヲ行フカ  
無刺戟性軟膏ヲ貼用ス、又痂皮形成甚シキ時モ同様ナリ、或ハ硫黃軟膏ヲ塗擦セル後卷  
法スルヲ可トス。

落屑期ニハ亞鉛華膏或ハ硫黃泥膏次デ爹兒泥膏ヲ用フ。

硫黃泥膏 硫黃乳……………一〇〇……………ウイルキンソン氏軟膏…三〇〇

爹兒泥膏 爹兒……………硫黃乳……………肝油……………各二〇

亞鉛華……………滑石……………各一〇〇……………「ワゼリン」……………二〇〇

其他「アルコホル」ニテ時々清拭スルコトヲ忘ルベカラズ。

**象皮病** Elephantiasis.

慢性ノ靜脈鬱血又ハ怒張、心臟疾患又ハ丹毒、狼瘡竈ヨリノ傳染等ヨリ來ル再發性炎症  
病機ニヨリ惹起セラルル皮膚ノ増殖ニシテ屢々數層ノ厚サニ達ス表面ハ或ハ平滑ニシテ  
硬直或ハ乳嘴樣ヲ爲ス。狼瘡ト合併スル事稀ナラズ。

**療法** 極メテ頑固ナリ然レドモ豫後佳良ナリ。

先ヅ注意スベキハ傳染ノ原因タル皸裂、濕疹、狼瘡ノ如キヲ除去スルカ、或ハ少ク  
モ其レ以上増悪セシメザル様務ムベシ、第一ニハ血液循環ニ注意スベシ、即チ鬱血ヲ



減ズル爲メニハ患者ヲシテ常ニ脚部ヲ舉上セシムベシ、晝間ニ於テモ出來得ル限り長ク脚部ヲ高ク保タシムベシ、強度ノ組織浸潤及ビ其レニ基ク榮養過度ニ對シテハ局所按摩ヲ行フベシ、又ハ壓抵繃帶ヲ周圍ニ用フル事ハ佳良ナル效果アリ、入浴モ按摩ト共ニ用フベシ。然レドモ強度ノ場合ニハ上法ハ已ニ效ナシ、依リテ速カニ外科的手術ヲ要ス、即チ皮膚ノ全層ヲ楔狀ニ切除スベシ、尙極メテ強度ナルカ又尙狼瘡ト合併セルガ如キ場合ニハ離斷術ヲ行フヨリ途ナシ。

**夏日斑** Ephelides, Sommersprossen.

日光ニ照サルル皮膚ニ生ズル粟粒大乃至扁豆大ノ黃褐色或ハ咖啡色ノ斑點ナリ。夏日著明ニシテ冬時自ラ消退ス。

**療法** 四百倍乃至二百倍昇汞水ニシテ毎日三、四時宛卷法。又ハ白降汞軟膏ノ塗擦。(七一頁肝斑參照)

- ㊦ 白降汞……………次硝酸蒼鉛……………各五・〇……………刺納林……………八〇・〇
- 豌豆大塊ヲ塗擦ス
- ㊦ 白降汞……………次硝酸蒼鉛……………各二・五……………阿列布油……………一・〇

「グリセリン」軟膏……………四・〇

重症ハ石炭酸水又ハ二十倍乃至三十倍昇汞精ニテ洗淨シ清涼膏ヲ塗擦ス。蔓延セルモノハ瘡瘡ニ使用セシ剝離膏ヲ貼布ス。(五三頁參照)

豫防法トシテ黃褐色又ハ青色ノ布片ニテ日光ヲ遮リ化粧膏ヲ塗布ス。

清涼膏

- ㊦ 醋酸礬土水……………二・五……………蒸餾水……………刺納林……………
- 華攝林……………各五〇・〇

化粧膏

- ㊦ 赤陶土……………〇・二—一・〇……………滑石……………華攝林……………各二〇・〇
- 日光ヲ遮ル目的ニテ一〇%「キニーネ」溶液又ハ「クリーム」ヲ用フ。

**先天性表皮水疱症** Epidermolysis bullosa hereditaria.

遺傳性且ツ家族のニ來タル稀有ナル皮膚疾患ニシテ僅微ノ外傷ニ逢ヒテ容易ニ水疱ヲ生ズ、時トシテ化膿スルコトアリ。主トシテ手及ビ足ニ來ル

**療法** 水疱、膿疱、痂皮形成ニ對シテハ硼酸軟膏、ウィルソン氏軟膏塗布、又ハ硼酸水、



醋酸礬土水ノ濕布ヲ行フベシ。

本病罹患者ハ水疱形成ノ因ヲ有スルヲ以テ之ヲ除去スルコト能ハズ故ニ患者ヲシテ可及的皮膚ヲ保護セシムルヨリ途ナシ、從テ困難ナル手藝等ヲ避ケシムルヲ要ス、若シ止ムヲ得ザル時ハ常ニ水疱形成ニ注意セシメ夫ヨリ來ル傳染ヲ豫防セシムベシ、表皮ノ抵抗ヲ強クスル爲メニ局部浴ヲ取ラシムルカ、收斂劑ニテ洗滌スルカ或ハ塗布ヲナサシムベシ、溫浴ニハ爹兒浴ニ單寧(1:10)、又ハ明礬(1:100)等ヲ加フ。左ノ藥品ヲ塗布セシムルモ可ナリ。

- ㊦ 單寧……………1.0……………酒精……………200.0
- ㊦ 「フォルマリン」……………1.0……………「グリセリン」……………15.0……………酒精……………85.0

丹毒 Erysipelas

惡寒、戰慄、高熱及ビ嘔吐ヲ以テ起ル遊走性皮膚發赤腫脹ナリ、周圍ノ完膚トハ明劃ニ境ス。創傷ヨリ感染ス。

療法 局部及其周圍ニ10%沃度丁幾ノ塗布又ハ純「イヒチオール」、純「チオノー」ル、一二五%硝酸銀水、醋酸礬土水、一千倍昇汞水ノ罨法ヲ施ス、皮膚刺戟ヲ輕減スル爲

メニ無水酒精ノ蒸罨法ヲ施シテ好果アリ。

「テレピン」油、石炭酸ヲ塗布シタル上ニハ鉛糖水ノ罨法ヲナシ更ニ氷囊ヲ置ク。

- ㊦ 「イヒチオール」……………各等量
  - ㊦ 「テレピン」油……………10.0 石炭酸……………1.0
- 内服ニハ下熱劑ヲ與ヘ「ワクチン」注射、「クロールカルチウム」靜脈内注射ヲ行フ。余ハ異種蛋白療法ヲ推奨ス、馬血清、「ヂフテリー」血清等卓效アリ。

類似丹毒 Erysipeloid.

丹毒ニ酷似セルモ無熱ニ經過スル遊走性皮膚發赤ナリ、創傷ヨリ起ル、手指ニ多シ、疼痛ハ輕微ナリ、腐肉ヲ處理スル者、料理人、屠者ニ屢々來ル。

療法 沃度丁幾、「イヒチオール」等ノ塗布又ハ酒精罨法。其他前條參照。

多型渗出性紅斑 Erythema exudativum multiforme.

兩前膊、手甲、下肢及ビ項部稀レニ顔面ニ相對的ニ突發スル紅斑ナリ。強度ノ癢痒及灼熱アリ、初メ粟粒大、豌豆大乃至白銅貨大ナルガ終ニ五十錢銀貨大ニ達シ中心暗紫色、周圍ハ鮮紅色ニ變ズ、出血、水疱形成ニ變化シ易シ。



三週間ノ經過ヲ取ル、原因一ナラズ、寒冒、胃腸疾患ノ自家中毒、酒精過飲等モ之ニ數フ可シ。

流行性ニ來ル事モアリ。個人ノ素因ニヨリ紫斑、多發性關節炎ニ變症スルコトモアリ。  
**療法** 刺戟ナキ撒粉又ハ亞鉛華膏ノ貼布、頑固症ニハ常ニ全身モ冒サルル故ニ水楊酸曹達三・〇(分三)、「ザロール」〇・五(分三)、「アスピリン」、規尼涅、「エルゴチン」、沃度加里(一日一・〇—二・〇)ヲ内服セシム、局所ニハ石炭酸亞鉛華「リニメント」、振盪劑塗布、瘙痒アラバ一%薄荷精ヲ塗布ス。

**バザン氏硬結性紅斑** Erythema induratum Bazin.

稀有ナル疾患ニシテ下腿ノ皮膚ノ内部又ハ直下ニ柔軟ニシテ初メハ無色後チ暗紫色ヲ呈スル結節ヲ生ジ時トシテ吸收スルコトアリ、或ハ長ク持續スレバ波動ヲ呈シ、遂ニ外部ニ破潰シテ潰瘍トナリ治シ難シ。激痛ナク多クハ貧血性又ハ腺病質ノ者ニ之ヲ見ル。

**療法** 頑固ニシテ屢々數年消失セザル事アリ主トシテ榮養狀態佳良ナル時ニ然リ、亞砒酸ヲ與ヘ強壯療法、氣候療法ヲ行フ、沃度塗布或ハ左法ヲ處ス。

沃度……………〇・二……………沃度加里……………二・〇……………清涼膏……………三〇・〇

潰瘍形成ニハ腐蝕、搔爬、「ヨードフォルム」撒布等ヲナス。

**結節性紅斑** Erythema nodosum

春秋ノ候ニ多ク前膊、下腿ヲ冒ス二十錢銀貨大乃至手掌大ノ加壓ニヨリ疼痛アル皮下組織内ノ硬結節ナリ。數週ニシテ消退スルヲ常トス。高熱及ビ關節痛ヲ伴フ。

**療法** 臥床安靜、患部ヲ高舉シ「チオノール、グリセリン」(各等分)塗布、亞鉛華「イヒチオール」軟膏、二—五%イヒチオールコロヂウムヲ塗布ス。内服ニハ水楊酸曹達、「アスピリン」又ハ規尼涅。又「サルヴルサン」注射及ビ水銀療法ノ卓效アルコトアリ、必ず試ムベシ。注意スベキハ徽毒第二期ニ本症ヲ發スルコトアリ。

**中毒性紅斑** Erythema toxicum

本症ハ體ノ内外ニ於ケル毒物ノ爲ニ對症的ニ發生スル多型滲出性紅斑ニ類スル皮疹ノ總稱ナリ藥疹(六一頁)モ此中ニ入ル全身病ニ於ケル中毒疹、腸窒扶斯其他ノ急性傳染病ニ蕃薇疹トシテ來リ慢性腎臟炎ニ斑狀又ハ丘疹狀紅斑、小水疱等ヲ見ルコトアリ、急性關節痲質斯及ビ淋疾性痲質斯ニモ紅斑、水疱、丘疹又ハ紫斑ヲ生ズルコトアリ。



**血清疹**

Serumexanthem

實扶的里、破傷風、腸窒扶斯血清、「ワクチン」等ノ注射後、

熱候ト共ニ早キハ六時間遅キハ十日ニ現出ス、發疹ハ紅斑ナルコトアリ、注射部ノミノコトアリ、汎發スルコトアリ、蕁麻疹ハ主トシテ注射部ニ發シ猩紅熱様疹ハ初メ赤色ノ點狀斑ニシテ速ニ廣キ紅斑ニ變ズ麻疹様ノモノアリ又粟粒疹様紫斑或ハ滲出性紅斑様ノモノアリ多少全身症狀ヲ伴フヲ普通トス。

**牛痘疹**

Postvaccinale Exantheme.

種痘後ニ來ル局所的疾患ト全身の疾患トニ分

ツ發疹ノ種類ヲ分チテ薔薇疹、蕁麻疹、多型滲出性紅斑、匍行疹、膿疱疹トスベシ殊ニ膿疱疹ノ痘瘡ノ如キ外觀ヲ呈スルモノヲ**汎發性痘疹** Vaccinatio generalisata ト稱ス。

**ツベルクリン疹**

Tuberkuline xanthem

ハ常ニ結核患者ニノミ見ル所ナリ、紅斑、丘疹、

猩紅熱様、蕁麻疹様發疹等アリ對側のニ蔓延ス。

**療法**

原因ヲ去ルベシ、皮疹ニハ適宜對症療法ヲ行フ、濕疹、多型滲出性紅斑其他ノ項ヲ参照スベシ。

**四肢紅痛症**

Erythromelalgie.

四肢ノ末梢部ニ激シキ發作性又ハ突擊的疼痛ヲ感ジ同時ニ其部ノ發赤、腫脹及ビ體温上昇ヲ來スヲ云フ。特徴ハ壓迫、垂下、運動ニ際シ殊ニ加温ニ因リ疼痛ヲ起シ堪ヘ難シ、故ニ四肢ヲ水平ニ保ツカ又ハ冷却スルトキハ疼痛減退ス、而シテ夏季ニ發作ス。

**療法**

安靜ヲ命ジ四肢ヲ舉上セシムベシ内用トシテ沃剝、「アンチピリン」及ビ「ビラミドン」效アリ。

**エリトロメリー**

Erythromelie.

本症ハ皮膚萎縮症ノ一種ナルモ皮膚萎縮ヲ起スニ先チ炎衝症狀前驅スルガ故ニ別トス、極メテ慢性ニ經過スル疾患ニシテ或ハ激痛ヲ以テ或ハ自覺的症狀ナクシテ四肢末梢部ノ伸展側ニ初メハ一時性ノ後チニハ持續性ノ發赤、腫脹ヲ來シ漸次身體ノ中央部ニ向ツテ進行シ遂ニ其部ハ菲薄トナリ萎縮シ表皮下ニ靜脈分布ノ狀態ヲ透明シ得ルニ至ル。

**療法**

血液循環ノ障害及ビ之ニ因スル營養障害ヲ顧慮スベシ、一般ニ冷罨法ヲ可トス、其他ハ對症的ナリ、而シテ萎縮來レバ按摩法又ハ電氣療法ヲ行フ。

**紅色陰癬**

Erythrasma.



細微ノ鱗屑ニテ被ハレ癢痒少ナキ黄色又ハ帶褐紅色ノ斑紋ナリ、完膚トハ明境アリ、鼠蹊部、大腿、稀レニ腋窩及ビ肛圍ヲ冒ス。

落屑ニ「ミクロスポロン、ミヌチツシムーム」菌ヲ認ム。(八〇頁参照)

**療法** 一千倍乃至五百倍石炭酸水或ハ昇汞精ニテ皮膚ノ剝離スルマデ洗滌ス、頑固症ニハウイルキンソン氏軟膏、剝離膏又ハ一〇%「クリサロビン、トラウマチチン」ヲ貼布ス。

### 黄癬 Favus.

刺針頭大乃至扁豆大ノ硫黄色圓盤ナリ、圓盤ヲ貫キテ常ニ毛髮アリ、鼠糞臭ヲ放ツ、經過頗ル遅々タリ、毛髮ノ脱落及ビ頭皮ノ癢痕萎縮ヲ來ス。稀ニ無毛部モ冒サル。京阪、越後、富山地方ニ多シ。九州ニテハ一例ヲモ見ズ。

**療法** 緩和ニ處スレバ二百倍昇汞精ノ洗淨、撒酸昇汞精塗布、硫黄膏、焦性没食子酸膏ノ貼用。

㊦ 沈降硫黄一〇〇—二〇〇……水楊酸…五〇—一〇〇……華攝林……………五〇〇

㊦ 焦性没食子酸一〇—三〇……華攝林……………三〇〇

強行的療法ニハ次ノ沃度劑ヲ用フ。

㊦ 沃度末……………〇・五……「クロロフォルム」一〇〇〇

㊦ 沃度丁幾……………石炭酸水……………各等量

レントゲン療法ハ奏效確實ナリ。

### 纖維腫 Fibroma.

皮膚ノ結締織ヨリ發生スル腫瘍ニシテ硬軟ノ二種アリ、前者ハ中實セル硬キ周圍ト明割ニ界シ皮膚上ニ廣ク坐スルカ又ハ細長ノ莖ヲ有ス、後者ハ柔軟ニシテ皮膚ト同色ニシテ廣短ナル莖ヲ有ス、而シテ前者ハ稀ニシテ後者ハ常ニ遭遇スル症ナリ、多クハ無數ニ全身ニ播種狀ニ發生スルヲ常トス。

**療法** 外科的處置ヨリ外途ナシ。

**毛囊疹** 悪液質性瘡癤。瘡癤炎。潰瘍性毛囊炎。丘疹膿疱性結核疹。

Foliklis, Acne cachecticorum, Acnitis, Folliculitis  
exulcerans, Papulopustulose Tuberculid.



一種ノ結核疹ニシテ臨牀上ニハ皮脂腺トハ一致セザル粟粒大乃至豌豆大ノ蒼白紅色又ハ紅色ノ硬結節ナリ、顔面、手指、足趾ヲ好發部位トス、結節ハ真皮中ニ時トシテハ真皮下ニ存シ自ラ軟化膿疱ニ變ジ終ニ癩痕ヲ後遺ス、肺結核患者ニ來ル。

**療法** 局所療法ハ效ナシ、時ニ燒灼法、電氣分解法ヲ試ム、全身療法ハ狼瘡ノ條下ヲ見ルベシ。

#### 癰腫及多發癰症 Furunkel et Furunkulosis.

癰ハ化膿菌ノ皮脂腺及ビ汗腺ニ侵入シテ起ル結締織炎ナリ、臨牀上ニハ中心部ニ壞疽栓ヲ見ル、陰囊、腋窩及ビ初生兒ニハ壞疽栓ヲ見ズ却テ皮下膿瘍トナル。

**療法** 未ダ壞疽ニ陥ラザル者ハ頓挫療法ヲ施シテ效アリ、有毛部ナラバ先ヅ拔毛シ能ク石炭酸水ニテ洗淨シテピック氏硬膏ヲ貼用ス、水銀硬膏ニテモ良シ。斯クシテ二十四時間ヲ經テ尙炎症去ラザレバ燒灼針又ハ石炭酸ニテ刺蝕ス、時ニヨリテハ連日ビール氏鬱血療法ヲ施シ其上ニビック氏硬膏ヲ貼布ス、浸潤増進セル時ハ硬膏ノ上ヨリ更ニ温卷法ヲ施シテ同時疼痛ヲモ寬解セシム。余ハ酒精卷法ノ卓效ヲ認ムルモノナリ。

而カモ尙炎症進メバ十字切開ヲナシ沃度「フォルム」塞栓ヲ施ス、周圍ニハ亞鉛華膏ヲ塗布シテ繃帶ス。全身ニ發生スル癰症ハ個々ノ病竈ヲ注意シテ燒灼器ニテ刺蝕シ硬膏ヲ貼布ス、末期ニハ硫黃軟膏ヲ塗布ス、硫黃ニ起因スル皮膚黒變ハ偏陳ニテ拭淨シ得。主眼ハ膿菌ノ増殖ヲ止メ癰ノ新生ヲ防グニアレバ吸收能キ固定繃帶、過少ナラザル硬膏、硬膏ノ下ニハ分泌物ヲ充分ニ吸收スベキ「ガーゼ」ヲ用フベシ、繃帶交換ハ毎日之ヲ行フ、同時ニ褌衣敷布等ヲモ交換シ得レバ幸ナリ。尿中ニ糖質ヲ認ムル事屢々アリ、糖尿病及ビ食餌療法モ忘ル可カラズ。「エタイノキシール」ヲ内服セシムル事アリ。回復期ニハ豫防トシテ八日毎ニ硫黃泉ニ浴セシム。

#### 壞疽(脫疽)及腐瘡 Gangræna cutis et Decubitus.

皮膚ニ限局セル壞死ニシテ濕性及ビ乾性ノ二種アリ、前者ハ水疱ヲ以テ始マリ軟泥狀ニシテ後者ハ硬クシテ革狀ナリ、何レモ分界線ヲ作り膿潰シテ離脫ス、濕性ノモノハ全身傳染、蜂窩織炎ヲ誘發スルコトアリ、數種アリ、壓迫性壞疽、老人性壞疽、特發性壞疽、糖尿病性壞疽及ビ多發性神經性壞疽トス其他寒、熱、腐蝕藥、「ラヂウム」等ノ外因ニヨリ來ルコトアリ、四肢ニ於ケル左右血行障礙ノ差異ヲ判別スルニハ患者ヲ脊臥セシメ



左右ノ上肢又ハ下肢ヲ高舉シ「ゴム」管ニテ緊縛シ直チニ下ロシテ同時ニ「ゴム」管ヲ外スベシ。左右兩肢末梢部ニ於ケル血管ノ血液ニヨリ充滿サルル時間ノ差異ニヨリ程度ヲ知ル。(モスツコーウツツ氏試驗)

**療法** 原因ヲ探究シテ之ヲ除クベシ、黴毒ノ有無及ビ尿ノ検査ヲ怠ルベカラズ。局所ニハ濕性ニアリテハ硼酸軟膏、「デルマトール」軟膏ヲ貼用シ疼痛著シキ時ハ一〇%、アネステジン「軟膏」アリ、乾性ニハ防腐性粉末劑「アイロール」、「デルマトール」等ヲ撒布シ防腐繃帶ヲ嚴ニスベシ。外科的ニ切斷術ヲ行フ時ハ餘リニ短カキニ過グベカラズ、近時特發性壞疽ニ對シテ動脈周圍交感神經切除術唱ヘラル。

褥瘡ハ重症患者ノ永時仰臥スルニヨリ生ズ(七八頁參照)。

**相對性壞疽又レイノウ氏病**

*Gangraena symmetrica, Raynaudsche Krankheit.*

輕症ハ指趾、鼻端等ニ局處失神ヲ起シ、皮膚ハ蒼白色トナリ厥冷ス暫時ニシテ症狀減退スルカ或ハ漸次局處假死ノ狀ヲ呈シ後チ蒼白ハ黑變シ周圍ニ輕度ノ水腫ヲ起シテ遂ニ壞疽ニ陥ル、相對性ニ來ル、血管壁ノ變化又ハ血管運動神經ノ變化ニ因ルト唱ヘラル。

**療法** 一般強壯療法ヲ行フベシ局所假死ニハ乾燥温ニテ温ムルヲ可トス、壞疽ニ陥リシモノニ就テハ前條ヲ參照スベシ、黴毒ノ有無ヲ檢スベシ。

**滑皮症 Glossy Skin.**

疾患又ハ外傷ヲ蒙リタル神經徑路ノ皮膚ニ炎衝及ビ萎縮ヲ伴フヲ云フ從テ指趾ニ多シ手指ニテハ乾燥シ滑澤緊張シ癩痕ノ如シ、指尖狭小トナリ皺襞ヲ作り赤色ヲ呈ス恰カモ凍瘡ニ似タリ、特有ナルハ持續性ノ熱感ナリ、足趾ニテハ却テ濕潤ス之レ發汗スル故ナリ。其他水疱發生又ハ壞疽來ル。

**療法** 神經炎ノ結果ニヨリ來ルガ故ニ對症療法ヲナスニ過ギズ。

**腺病性護膜腫 Gommies scrofulotuberculoses (一五四頁參照)**

**口唇匍行疹 顏面匍行疹 陰部匍行疹**

*Herpes labialis, H. facialis, H. progenerialis.*

發赤セル皮膚又ハ粘膜ノ上ニ發生スル小水疱疹ノ集簇ナリ水疱ハ直ニ乾燥シテ治癒ス



ルカ又ハ深キ潰瘍ヲ形成ス、陰部匍行疹ト下疳トノ鑑別ハ重要ナリ。

**療法** 「キセロフォルム」又ハ「デルマトール」ノ撒布、硼酸軟膏又ハウイルソン氏軟膏塗布、炎症アラバ〇・五—一・〇%硝酸銀水ヲ塗布シ醋酸礬土水ノ罨法ヲ施ス、陰部匍行疹ハ清淨ニシ坐浴、局所浴ヲ行ハシム、本症ハ殊ニ再發シ易キヲ以テ患者ハ爹兒精ヲ漸次増量シツ、塗布セシム、鼻、齒牙ノ疾患、慢性淋疾、尿道狹窄、便秘等ノ原因ヲ探リテ治療ヲ施スベシ。

**小水疱性寄生性匍行疹** Herpes tonsurans vesiculosus

**斑性寄生性匍行疹** H. t. maculosus

**頭部寄生性匍行疹** H. t. capilli

**帶狀匍行疹** Herpes zoster

白癬(一六〇頁參照)

一皮膚神經ノ領域ニ限ラレ且ツ體ノ半側ヲ超エザル急性ノ水疱集簇ニシテ其發疹ノ周圍ハ紅變セルヲ常トス、癢痒熱灼甚ダシク屢々神經痛ヲ伴フ多クハ自然ニ治癒シ稀ニハ壞疽ニ陥ル。

**療法**

疼痛ニハ鎮痛劑(「アスピリン」、安知必林、「フェナツエチン」)ヲ與フ、局所ニハ撒布藥ヲ處シ或ハ硼酸軟膏、亞鉛華軟膏、亞鉛華油ノ塗布又ハ硼酸水ノ罨法ヲ施スベシ、水疱群ハ破綻セザルヲ可トス、癢痒熱灼ニハ二〇・〇%薄荷油、〇・五—二・〇%「コカイン」軟膏、五—一〇・〇%格魯刺兒軟膏ニテ處置ス。

**鶏眼** Hühnerauge (七一頁參照)

**夏季水疱疹又種痘様水疱症** Hydroa aestivale s. H. vacciniiformis

Bazin.

稀有ニシテ素因アル人ニ生ジ春季ニ發シ夏季ニ劇シ顔面殊ニ鼻、頬、耳等ノ日光ニ曝露スル部ニ來リ發赤、丘疹及ビ水疱形成ヲ來シ痂皮ヲ生ジ痘瘡様癩痕ヲ殘ス。

**療法**

日光ノ直射ヲ避クベク一〇・〇%鹽酸「キニーネ」液ヲ塗布セシム

**多汗症**

Hyperhidrosis.

生理的ノ發汗過多ハ肥滿セル人或ハ劇動後等ニ來タルモ病的ノモノハ神經衰弱、虛脫、喘息、肺結核、バセドウ氏病等ニ來ル、汗疹、濕疹、皸裂ヲ生ジ又ハ癩風、白癬又ハ頑



癬等ヲ發生シ易シ、全身性ト局所性ニ區別ス、全身性多汗症ハ夜間ニ多シ、局所性多汗症中殊ニ多キハ a 足多汗症 b 腋窩多汗症 c 陰部多汗症 d 手掌多汗症ナリ屢々神經質ノモノニ之ヲ見ル。

**療法** 虛弱、貧血、神經衰弱等ニ注意シ原因療法ヲ行ヒ強壯劑ヲ與フベシ。

内服止汗劑トシテハ「アトロピン」丸(四二頁參照)一日一―二粒宛、「ズルフォナル」

○五朝夕服用 樟腦酸一・〇―二・〇「アガリチン」〇・〇〇五―〇・〇一就床前頓服

外用トシテ○五%單寧酸酒精、一%水楊酸酒精ヲ塗布ス又二―一〇・〇%「タンノフォルム」亞澱散、水楊酸滑石(等分又ハ一對二)ヲ撒布ス、重キハ五%「クローム」酸又ハ二

〇%「フォルマリン」水塗布、足多汗症ニテ糜爛表皮剝脫アル際ハ初メ軟膏療法ヲ行フ。

**毛髮增生症** Hypertrichosis, Polytichie.

普通ノ毛髮ガ毳毛ノ發生スベキ部位ニ發生スルモノヲ云フ、先天性、後天性ノ二ツニ分ツ、全身性ト局處性ニ區別スルコトアリ。

**療法** 脫毛藥ハ姑息手段ナリ。

■ 硫化バリウム……一〇・〇 亞鉛華……一五・〇……澱粉……一五・〇

右水ニ溶カシ一、二分間貼用

フレンク氏脫毛藥

■ 苛性加里……八・〇……雌黃……一〇……澱粉……一〇・〇

右數分間貼用

レントゲン線療法ハ不確實ナリ、根治法ハ電氣分解ニ在リ、積極ヲ患者ニ把持セシメ消極ニ挿入セル白金針ヲ毛髮ト平行ニ毛囊球ニマデ挿入ス、電流ノ強サハ $\frac{1}{2}$ 乃至 $1$ 「ミリアンペーア」時間ハ四十五秒乃至一分間ニシテ後拔毛ス。

**魚鱗癬** Ichthyosis.

先天性全身皮膚畸形ナリ、角層一樣ニ肥硬乾燥シ落屑トナリテ分明ナル皮野ヲ劃顯ス。

**療法** 屢々沐浴セシメ二・〇%水楊酸華攝林、「グリセリン」膏又ハベルツ水ヲ以テ充

分ニ塗脂ス、重キハ剝離膏ヲ處ス(九七頁參照)「ピロカルピン」注射ヲ行フコトアリ。

**手掌足蹠魚鱗癬** Ichthyosis palmaris et plantaris.

先天性手掌足蹠角化症(一二三頁參照)



傳染性膿疱疹 *Impetigo contagiosa.*

夏季ニ於テ好シク小兒ヲ侵ス疾患ニシテ所謂「こびひ」是ナリ白色葡萄狀球菌ニヨル健康皮膚ニ突然針頭大ヨリ豆大、雀卵大ノ水疱ニテ始マルモ漸次増大シテ手掌大ニ達スル事アリ、内容濁濁シ遂ニ潰破スレバ藁黃色ノ薄キ痂皮ヲ作ル顔面ニ多ケレドモ前膊、下腿其他全身ニ傳染蔓延スベシ、患兒ヨリ大人ニ傳染スル事アリ哺乳兒ニハ大水疱形成ヲ以テ來ルコトアリ初生兒急性性天疱瘡 *Pemphigus acutus neonatorum* ハ畢竟本症ニ外ナラズ。

療法 水疱ヲ破開シテ 内容液ヲ殺菌綿ニテ吸收セシメ 硼酸軟膏ヲ塗布シ繃帶ヲ施ス「デルマトール」軟膏、亞鉛華油可ナリ。

尋常性膿疱疹又連鎖狀球菌性膿疱疹

*Impetigo vulgaris, Impetigo streptogenes Dohi.*

顔面、手足ノ如キ露出部ニ急ニ發生シ粟粒大乃至麻實大ノ紅疹ヲ生ジ水疱次デ膿疱トナリ一兩日ヲ出デズシテ結痂シ厚キ蠟黃色痂皮ヲ形成シ尙結痂續生シ爲メニ蠟殼様大結痂トナル四季常ニ存シ大人亦侵サルルコトアリ。

療法 傳染性膿疱疹ニ同ジ。

單純性膿疱疹又葡萄狀球菌性膿疱疹 ボックハルト氏膿疱疹

*Impetigo simplex, I. staphylogenes Unna, I. Bockhart*

甚シキ發汗、藥劑ノ塗擦後諸種ノ罨法施行後ノ如キ表皮ヲ軟弱、濕潤セシムル際ニ葡萄狀球菌ガ毛囊孔、汗口、皮脂腺口ニ侵入シテ生ズ又疥癬、濕疹、痒疹、癢痒症等ニ於テ搔爬ノタメニ生ズ、粟粒大ニシテ往々毳毛ヨリ貫通セララルル尖圭ノ炎症發赤アル丘疹ニシテ速カニ其巔頂ニ膿點ヲ生ジ次デ膿疱トナリ結痂ス。

療法 硼酸軟膏塗布、其他亞鉛華阿列布油、亞鉛華泥膏用ヒラル。

昆蟲刺傷 *Insektensich (蚤、蚊、蝨、南京蟲、蜂、蟻、毒蛾)*

蚤 *Pulex irritans, Floh* 蚤蝨ノ痕跡ハ罨粟大ノ暗紅色ニシテ指壓ニヨリ消褪セザル

點狀出血ナリ(蚤蝨性紫斑)數日間殘存ス個人ノ感受性ニヨリ蕁麻疹ヲ發スルモノアリ。

療法 除蟲菊粉ヲ撒布シテ豫防ス、蕁麻疹ヲ發セバ「カンフル」丁酸又ハ之ニ曹達或ハ重碳酸曹達ヲ五—一〇%ニ加ヘタルモノヲ塗布ス石炭酸亞鉛華「リニメント」其他制痒



劑ヲ用フ。

**蚊蚋** Mosquitos 蚊及ビ蚋子又蠓子(ぶこ又ぶよ)ハ唾腺中ヨリ分泌スル腐蝕性ノ液汁ヲ螫口ニ注入ス感受性過敏ナルモノハ蕁麻疹ヲ發シ殊ニ蚋子ニ過敏ナルモノハ往々持久性蕁麻疹ヲ生ズルコトアリ。

**療法** 二―五%石炭酸精、五%薄荷精、二%石炭酸亞鉛華「リニメント」、曹達又ハ重炭酸曹達ヲ局處ニ塗擦スレバ頗ル有効ナリ。

**南京蟲(床蟲、壁蚋)** Cimex lectularis, Bettwanzen. 刺咬ニヨリ恰モ滲出性紅斑或ハ赤色蕁麻疹ノ如ク浮腫狀ニ腫脹シ丘疹ヲ生ジ其隆起セル中央ニ蟲ノ螫口ニ相當シテ大小水疱ヲ認ムルコトアリ痒痒劇甚ニシテ多クハ頸部、手足ニ之ヲ認ムルモ本邦ニテハ往々衣類ヲ纏ヘル軀幹ノ侵サルコトアリ屢々床蟲刺咬ヲ受ケタルモノハ遂ニ免疫性トナリ更ニ皮疹及ビ痒痒ヲ發セザルモノアリ。

**療法** 單ニ發赤腫脹セルモノニハ「イヒチオール」酒精又ハ痒痒制止劑ヲ用フ、表皮剝離、潰瘍ニハ濕布、軟膏劑塗布等法ニヨリ之ヲ行フ。

### 蜂、蟻

Hymenoptera.

蜂螫ノ痕ハ腫起シテ中心ニ出血アリ顔面ノ如キハ浮腫甚シク往々水疱ヲ生ズ又屢々蕁麻疹ヲ發ス疼痛劇烈ニシテ熱發ス蟻螫ハ亦蕁麻疹ヲ來スノミ。

**療法** 螫傷ニハ直チニ「アンモニア」水ヲ塗布シ毒刺ヲ拔去スベシ其他曹達ヲ塗布ス浮腫、水疱等ニ對シテハ通常ノ罨法又ハ緩和ナル軟膏療法ヲ行フベシ。

### 毒蛾

Lepidoptera.

「ドクテフ」ト稱スル毒蛾ノ鱗片ノ附着ニヨリ一種ノ皮膚炎ヲ

惹起ス數分ニシテ局所ニ痒痒ヲ覺エ潮紅シ無數ノ丘疹毛囊ニ一致シテ發生シ浮腫ヲ來シ蕁麻疹様發疹トナリ十乃至一ヶ月ニシテ自然ニ消退ス。

### 療法

急性皮膚炎ニ準ズベシ。

**蟹足腫及癩痕腫** Keloid u. Narbenkeloid.

皮膚面ヨリ隆起セル扁平或ハ結節狀ノ硬固ノ腫瘍ニシテ周圍ニ蟹足狀突起ヲ出ス故此名アリ蠶豆大乃至手掌大ナリ本症ニ眞性ト假性トアリ前者ハ健康ノ皮膚ニ特發スルモノニシテ胸骨部ニ相並行配列ヲナスヲ特徴トス假性トハ癩痕ニ附隨シテ起ルヲ以テ癩痕蟹足腫ト云フ患者ノ素因ニ基ク。



**療法** 一〇〇%「チオチナミン」又ハ「フィプロリジン」液ヲ注射、亂切ヲ施シ次ニ水銀硬膏ヲ貼布ス、レントゲン線及「ラヂウム」療法ヲ行フ。

**進行性對側性紅斑性皮膚角化症** Keratoderma symmetrica

*erythematosa progressiva Asahi-Ijri.*

對側のニ手掌、足趾及肘頭、膝蓋ニ卒然トシテ紅斑ヲ生ジ次デ角質肥厚ヲ來ス、紅斑ハ漸次消失シ灰白色ノ鱗屑ヲ生ジ更ニ皸裂ヲ起スコトアリ、自覺症狀殆ンドナシ。

**療法** 一乃至一〇〇%「チオチナミン」注射卓効アリ、皸裂ニハ塗脂スベシ。

**傳染性毛囊角化症又角性痊瘡**

*Keratosis follicularis contagiosa, Acne cornea.*

對側性ニ來リ四肢ノ伸側ニ最モ多ク肘及ビ膝蓋ニ密集シ毛囊孔ニ一致セル角質異常ニシテ棘狀ヲ呈スルヲ特徴トス、往々中心ニ面皰様ノ黒點アリ疹ノ大サ針頭大乃至麻實大ナリ。

**療法** ビック氏硬膏ヲ貼用シ又ハ加里石鹼塗擦及温浴ヲ行ハシム、水銀石英燈、レン

トゲン線効アリ亞砒酸ヲ内服セシム。

**落屑性毛囊角化症** Keratosis follicularis squamosum Dohi.

本症ハ臀部及ビ大腿外側稀ニハ他部ニ發生ス先ヅ毛囊孔ニ一致シテ黒點ヲ生ジ次デ銀白色ノ落屑ヲ生ズ、瘙痒ヲ缺如ス。

**療法** 頑固ナリ釜硫膏又ハ剝離膏ヲ塗布ス。

**先天性手掌足趾角化症又手掌足趾魚鱗癬**

*Keratoma palmare et plantare hereditarium*

*Ichthyosis palmaris et plantalis.*

出生後直チニ或ハ遅クモ一ケ年以内ニ手掌、足趾ニ限局セル魚鱗癬狀ノ肥厚ヲ來ス、増悪シ上肢、下肢ニ及ブコトアリ。

**療法** 魚鱗癬、胼胝腫、鶏眼ニ於ケルト異ルコトナシ。

**毛孔性角化症又毛孔性苔癬** Keratosis pilaris, Lichen pilaris.

思春期以後ニ來リ殊ニ婦人ニ多シ上肢、下肢ノ伸展側ニ來リ毛囊ニ一致シ多數簇生セ



ル粟粒大ノ尖圭ナル丘疹ニシテ皮膚ノ色變化ナキ時ハ白色毛孔性苔癬ト云フ上膊、頂部、大腿等ニ來リ漸次周圍ニ移行スル薄紫色ヲ呈スルトキハ紅色毛孔性苔癬ト云フ。

療法 肝油、亞硫酸劑ヲ與フ、魚鱗癬ト同ジク洗滌塗脂セシム。

チルジューズ氏禿瘡 Kerion Celsi. 白癬(一六一頁參照)

縮毛 Kräuselhaare.

他人種ニテハ生理的ナレ共邦人ニテハ病的ト見做サルヲ得ズ先天的ニ頭髮悉ク縮セルコトアリ妙齡後ニ一部ニ縮毛ヲ見ルコトアリ。

療法 局處縮毛ニハ水銀石英燈ノ照射ヲ行ヒ發毛膏ヲ塗布ス。

雀斑 Lentiginos. Linsenflecke.

小帽針頭大ヨリ扁豆大ニ達スル黃、褐乃至黑色ヲ呈スル皮膚ノ色素集團ナリ、先天的又ハ春機發動期ニ急ニ増加ス。

療法 石炭酸、三〇%三鹽化醋酸ニテ腐蝕ス反應著明ノ時ハ無刺戟性軟膏ヲ塗布ス(母斑及夏日斑ノ項一〇〇頁及一二三六頁參照)。

### 癩病 Lepra, Aussatz.

ハンセン氏癩桿菌ニヨリテ起リ慢性難治ノ疾患ナリ、遺傳ハ其感受性ヲ傳フルモノナルベク傳染ハ長年月間ノ接觸ニヨリ行ハルベシ、癩菌ハ結核菌ト同様ノ染色法ニヨリ檢出シ得ベシ、其症狀ニヨリ斑紋癩、神經癩、結節癩及之等ノ混合型ニ大別シ得ベシ尙顔面ノ結節融合甚シキヲ獅子顔、手ノ筋肉萎縮甚シキヲ猿掌、指、趾、手、足ノ關節ヨリ脱落セルヲ切斷癩ト稱シ、頭髮、體毛ノ稀疎トナレルヲ癩性脫毛ト云フ。

必ず存スル知覺鈍麻又ハ麻痺(知覺針ニヨリ之ヲ檢ス)耳後神經、尺骨神經、腓腸神經ノ肥厚、帶黃銅色(新發疹ハ赤色ヲ帶アルコトアリ)及ビ油ヲ塗リシ如キ特有ノ光澤ニヨリ診斷スルコトヲ得。

療法 大楓子油及其製劑ヲ内用又ハ注射トス。

因 大楓子油……………三・〇 入膠囊一日三回食後分服

「レプロール」一—三・〇散劑又ハ錠劑トシテ内服、別ニ注射藥アリ。

デキーン氏誘導體 大楓子油總脂肪酸ノ「エチールエステル」ヨリ製ス、邦製品ニ「ヒドノール」、「ギノカリン」等アリ一週二回筋肉内注射又内服藥アリ。



昇汞注射行ハル左方ヲ隔日一回一筒腎筋内ニ注射ス。

昇汞……………一〇〇……………食鹽……………五〇……………水……………一〇〇〇〇

**尋常性白斑又白癜風** Leucoderma vulgaris s. Vitiligo vulgaris.

境界明劃ナル白斑ニシテ其周圍ハ常ニ色素増加ス其部ノ毛髮亦白色トナルモ皮膚ニハ何等異常ヲ認メズ俗稱「しろなます」是レナリ。

**療法** 奏効確實ナルモノナシ皮膚ノ色ノ對稱ヲ少クスルノミ。

「イヒチオール」……………三〇〇……………焦性沒食子酸……………一・五—二〇……………酒精……………三〇〇〇

右一日一—二回塗布

丙 〇・三%昇汞酒精

「イヒチオール」……………三〇〇……………酒精……………三〇〇〇 過クロール鐵液……………一—三滴

「グリセリン」……………三〇〇

右一日一回塗布個人ノ色素ノ厚薄ニ從ヒ過「クロール」鐵液ノ量ヲ變化ス

**毛孔性苔癬** Lichen pilaris. 毛孔性角化症(一二四頁參照)

**紅色苔癬** Lichen ruber.

**苔癬** トハ原發ノ形狀ノ儘始終シ水泡又ハ膿疱ニ變化スルコトナキ小結節ヲ云フ

此義ニ適合スルハ本症ノミトス。

紅色苔癬ハ癢痒甚シク慢性ニ經過スル疾患ニシテ扁平ト尖圭ノ二種ニ分ツモ移行型アリ又同一患者ニシテ同時ニ兩症ヲ併發スルコトアルヲ以テ明確ニ區別ス可ラザルコトアリ。

**扁平紅色苔癬** L. r. planus. 多角形ニシテ粟粒大乃至豌豆大ニ達シ蠟様ノ光澤ヲ

呈シ中央ニ臍窩ヲ有スル褐赤色ノ小結節ニシテ周圍ニハ赤キ邊暈ヲ有シ集簇シテ發生ス播種性ノモノ全身ノ大部分ニ發生セバ結節ハ融合シ皮膚肥厚シテ褐赤色トナリ獸革ニ觸ルルノ感アリ、四肢ノ屈側及龜頭ヲ犯シ軀幹ニ及ブ。

**尖圭紅色苔癬** L. r. acuminatus. 毛囊ニ一致シ播種性ニ發生スル圓錐狀ノ肥厚セ

ル小結節ニシテ紅色乃至褐赤色ニシテ頂點ニ白キ硬キ鱗屑ヲ戴ク故ニ皮膚ヲ輕擦スレバ鱗ノ如キ觸感アリ發疹ハ増生融合シテ全身ニ及ブ手掌、足趾、四肢、軀幹ニ來ル。

**療法** 亞細亞丸又ハ法列兒水ヲ與フ、亞砒酸劑ノ皮下注射ヲ行フベシ「サルバルサ



ン」注射、「チオチナミン」注射効アリ外用ニハ瘙痒制止ノ爲メ左方ヲ處ス。

因 參兒

「グリセリン」……………二〇〇……………水……………二〇〇〇

昇汞石炭酸軟膏(ウンナ氏)

因 昇汞

患部廣ケレバ亞鉛華膠ヲ貼用繃帶ヲ施ス、狭少ナラバレントゲン線放射ヲ勝レリトス。

腺病性苔癬

Lichen scrophulosorum. Scrophuloderma papulosum,

Lichen lividus.

黄色又ハ蔷薇色ヲ帶ベル刺針頭大乃至粟粒大ノ丘疹ニシテ胸部、四肢等ニ密生シ一錢銅貨大乃至手掌大ノ集簇ヲ成ス、丘疹頂ニハ常ニ糠枇様落屑アリ、瘙痒ハ輕度若シクハ缺如ス、癬痕形成ナク色素ヲ後遺シテ治癒ス、腺病性小兒最モ冒サレ易シ。

療法

榮養ヲ佳良ナラシムル事第一義也、肝油、沃度鐵舍利別ヲ與フ、外用ニハ綠石鹼又ハ二%水楊酸硫黃華攝林ノ塗擦、最モ好キハ肝油塗布ナリ。

ウイタール氏慢性單純性苔癬

癢痒性苔癬様皮膚炎  
慢性神經性皮膚炎

Lichen simplex chronicus Vidal, Dermatitis lichenoides

pruriens Neisser, Neurodermitis chronica Brocq.

痒疹ト濕疹トノ中間疾患ト認メラル、項部、陰部、肘窩、膝膕等ニ對側性ニ來ル、瘙痒劇甚ニシテ粟粒大乃至扁豆大ノ表在性丘疹様皮膚隆起即チ苔癬様變化ヲ呈シ外觀「さめ」肌狀ナリ。慢性ナレドモ濕潤スルコトナシ。

本症ハ即チ苔癬様變化ノ好模範型ニシテ慢性皮膚疾患ノ際現ハル、ガ故ニ注意ヲ要ス。

療法

五—一〇%焦性没食子酸「トラウマチチン」、「クリサロビン軟膏塗布(三〇頁参照)水銀石英燈照射、レントゲン線放射、「ラヂウム」療法亦効アリ。

小兒蕁麻疹様苔癬

参照)

Lichen urticatus infantum. ストロフルス(一五六頁

紅斑性狼瘡

充血性脂漏症、脂漏性  
狼瘡、遠心性固定紅斑



Lupus erythematosus, Seborrhoea congestiva, Lupus  
seborrhoeicus, Ulerthema centrifugum.

限局セル紅斑及ビ血管擴張ト共ニ多クハ皮脂腺ノ分泌ヲ伴ヒ終ニ癬痕樣萎縮ヲ遺スモ  
ノニシテ臨床上圓盤狀ト播種狀ノ二種ニ分ツ後者ハ結核性ナリトセララルモ前者ハ確實  
ナラズ。

圓盤狀紅斑性狼瘡 *L. e. discoides* 扁豆大乃至鷄卵大ニシテ中央ニハ密着セル脂漏性  
落屑ヲ殘シ次デ癬痕樣萎縮ヲ以テ治癒シツ、周縁ニ進行スル紅斑性發疹ナリ鼻頰部之ガ  
好發部位ニシテ鼻ヲ中心トセル蝶形ヲナス稀ニ有髮部、軀幹ニ來ル經過頗ル緩慢ナリ自  
覺症狀多クハ缺如スルモ鋭敏ナル患者ハ搔痒又ハ灼熱ヲ訴フ。

播種狀又聚合性紅斑性狼瘡 *L. e. disseminatus s. aggregatus* 稀レニ見ルモノニテ急性或  
ハ亞急性ニ來ル、紅斑全身ニ發生シ紅斑ハ播種狀又ハ集簇性ニ多數存在シ大小ノ差ナク  
通常爪甲大ヲ超エズ病竈ハ周圍ニ増大スルコトナシ發病ノ際高熱、關節痛、頭痛ヲ伴フ  
コトアリ顔面ニ持久性瀰漫性發赤ヲ來タシ丹毒樣ノコトアリ水疱ヲ來スモノハ重症ナリ  
豫後不良ナリ。發作再發シ全身症狀ヲ起シテ死亡ス。

### 療法

レントゲン線、水銀石英燈、「ラヂウム」療法ハ藥物療法ニ比シ遙カニ有効ナル  
コト多シ、五—一〇%焦性沒食子酸軟膏ヲ塗布シ後、硼酸軟膏ヲ用ユ炎症強ケレバ罌法  
ヲ行フ、播種狀狼瘡ニハ亞砒酸劑、鐵劑、「クレオソート」劑等ヲ内服セシメ又ハ亞砒酸  
劑ヲ持續注射ス。榮養ヲ高ム。

### 顔面播種狀粟粒性狼瘡 *Lupus miliaris disseminatus faciei.*

顔面ノ中央部ニ卒然發生シ其後極メテ緩慢ニ數年ニ互リテ存スル尋常性狼瘡ニ似タル  
粟粒大發疹ナリ、自覺症狀ナク一部ハ癬痕ニテ治スルコトアリ、稀有ナリ、近時結核菌  
ヲ證セラレタリ。

療法 「ラヂウム」療法、レントゲン線放射。

### 尋常性狼瘡 *Lupus vulgaris*

臨牀上ノ形狀ハ種々ナレバ主トシテ初發疹即チ狼瘡結節ニ因リテ診斷ス、狼瘡結節ハ  
帽針頭大マデノ小結節ニシテ殆ト皮膚表面ト同高ニアリ、透明検査法ニテ汚穢黃色ノ斑  
點トナリテ殘ル、病竈廣ケレバ其邊緣ニ常ニ此結節ヲ見ル。本症ハ皮膚結核ナリ



**療法** 部位ト形状トニヨリテハ外科的手術ヲ可トス。

病竈ヲ苛性加里液ニテ腐蝕シ次デ焦性没食子酸ニテ處置スルカ又ハ單ニ一〇%焦性没食子酸華攝林又ハ一〇%焦性没食子酸軟膏ニテ腐蝕ス、焦性没食子酸ハ無異ノ表皮ニ作用未ダ及ボサザル間ニ狼瘡結節ヲ疾ク炭化スルカアリ、貼用ニ、三日ニ亘リテ疼痛及ビ過多ノ分泌物アラバ一、二日ハ醋酸礬土水巻法ヲ施ス。

「ラヂウム」療法ハ有効ナリ、レントゲン線ハ瀰蔓セル病竈ニ豫行處置トシテ試ム可シ。

美容ヲ損ゼザルハフインゼン療法、水銀石英燈療法ナレド徒ニ時日ヲ要スルト價廉ナラザルトヲ憾ミトス。

蔓延セル場合ハ舊「ツベルクリン」十分ノ一「ミリグラム」ヨリ小兒ニハ二十分ノ一「ミリグラム」ヨリ注射ヲ始メ漸次増量シテ局所ニ反應ヲ認メナバ其量ヲ持續注射ス。

**淋巴管腫** Lymphangioma cutis.

限割性ノモノハ乳嚙狀ノ小腫瘍ニシテ細小ナル囊狀ノ水泡集合シテ成レルモノナリ故

ニ之ヲ穿刺セバ乳糜様液體ヲ漏ラス、皮膚ノミナラズ粘膜ニ發生スルコトアリ。

**療法** 外科的ニ切除ス、「ラヂウム」及レントゲン線療法。

**脂肪腫** Lipoma.

無痛性ニシテ軟ナル腫瘍ナリ發育緩徐ニシテ一定ノ大サニ達セバ發育停止ス大ナルモノヲ觸診セバ必ず數個ノ瓣ヨリ構成セラルルヲ知ルベシ又有莖懸垂スルモノアリ頸部、項部ニ多ク背部、臀部之レニ亞グ他ノ部ニモ稀ニ生ズ。

**療法** 外科的ニ切除ス。

**粟粒疹** Milia. 汗疹(一五七頁)参照

**粟粒腫** Milium.

多發性細微白色ノ皮膚腫瘍ナリ。額骨部ヲ好發部位トスレドモ又眼瞼ニモ蔓延ス。何等障害ナシ。

**療法** 尖刀又ハ臙刀ニテ開口シ面鉋匙ニテ内容物ヲ壓出ス。

**傳染性軟屬腫** 軟性表皮腫 疣贅性軟屬腫



*Molluscum contagiosum, Epithelioma molluscum.*  
*Molluscum verrucosum.*

豌豆大ニ達スル蠟色又ハ黄色ノ頂端凹メル半球形ノ腫瘍ナリ、側壓ニヨリテ容易ニ其内容物即チ軟屬腫小體ヲ擠出スベシ、主ニ顔面、陰部ニ發生ス、小兒ニハ全身ニ生ズ。

**療法** 手指又ハ面皷匙ニテ内容物ヲ壓出ス、壓出シ難キモノハ一〇%水楊酸「コロヂウム」ヲ塗布ス。

**麻疹** *Morbilis Masern.*

小兒ニ來リ一回罹病セバ再發スルコト稀ナリ多ク流行性ニ來リ約十日ノ潜伏期ノ後ニ高熱ヲ發ス、結膜炎、鼻加答兒、嘶嘎及ビ咳嗽ヲ訴フ、口腔蓋ニ斑狀潮紅ヲ呈スル内疹 *Enanthem* ヲ生ジ同時ニ頬、口脣ノ粘膜ニ白色光澤ヲ呈シ中心小點ヲ有スル紅斑（コプリック氏斑 *Koplik'sche Flecken*）ヲ發生ス同時ニ顔面、頰部、前額、口圍ニ發疹ヲ生ジ全身ニ蔓延ス毛囊ニ一致セル小結節ナレドモ直チニ隆起セル淡紅色ノ暈輪ヲ以テ圍繞セラル一乃至二日ニシテ充分ニ發達蔓延シ二、三日ニシテ枇糠様落屑ヲ生ジ一週乃至十日

ヲ經過ス、發疹時ニ丘疹ヲ生ジ或ハ融合シ水泡形成ヲナスコトアリ、流行時ニ於テ爾餘ノ徵候全ク麻疹ニ一致シ而モ皮疹ヲ缺如スルコトアリ（無疹性麻疹）或ハ固有ノ皮疹ノミ有シテ熱候ヲ伴ハザルコトアリ（無熱性麻疹）全身狀態重篤衰弱ノ徵ヲ呈スルヲ衰弱麻疹又ハ窒扶斯様麻疹ト稱ス。

**療法** 安臥セシメ冷却ヲ防ギ乳汁、肉羹汁ヲ與ヘ眼鼻及ビ口腔ヲ清潔ニシ合併症ニ對シテハ普通對症療法ニ則ルベシ。

**菌狀息肉腫** *Mycosis fungoides.*

部位年齢ヲ問ハズ發生スル稀有症ナリ、痒痒、紅斑アリ落屑濕潤ス（濕疹期）搔爬甚シク浸潤肥厚ヲ來ス此期長シ（濕疹狀期）更ニ濕潤面ニ乳頭狀ノ有莖性又ハ廣底ニテ附着セル密柑大ノ菌狀腫瘍ヲ發生シ表皮剝離シ分泌旺盛ニシテ痂皮ヲ作ル（菌狀期）全身症狀ヲ起シ惡液質ニヨリ死亡ス、例外トシテ初メヨリ菌狀期ヲ以テ發生スルモノアリ（突發性菌狀息肉腫）。

**療法** 亞砒酸丸 一〇%焦性没食子酸軟膏、一〇—二〇%「レゾルチン」軟膏 菌狀腫



ニハ沃度丁幾ヲ塗布ス、レントゲン線及「ラヂウム」照射。

**項部息肉腫** Nackenkeloid. 瘰癧性息肉腫(四九頁)参照

**色素性母斑及血管性母斑及血管腫** Naevus pigmentosus et vasculosus, Angiom.

**母斑** ハ先天性ニ來リ色素異常ニヨルモノト血管擴張ニヨルモノトノ二種アリ、前者ハ皮膚表面内ニアルアリ或ハ稍隆起セルアリ或ハ毛髮ヲ有スルアリ、後者ハ單ナル血管擴張ニヨルモノト海綿狀ニ膨隆セルモノトアリ概ネ生後年ヲ經ルニ從ヒ顯著トナルヲ常トス。

**療法** 「ラヂウム」療法甚ダ効アリ、發煙硝酸、鹽酸、一〇%昇汞「コロヂウム」等ニテ腐蝕ス電氣燒灼電氣分解等モ試ムベシ、小ナルモノハ切除ス、血管腫ニ無水酒精ヲ注射スルコトアリ。

**慢性神經性皮膚炎** Neurodermitis chronicus Brocq.

ウィダール氏慢性單純性苔癬(一二九頁参照)

**神經纖維腫又レックリングハウゼン氏病** Neurofibromatosis

od. Recklinghausensche Krankheit.

纖維腫ニ似タリ只ダ本症ニハ母斑ヲ合併シ發生學上神經鞘ヨリ發生スル者ナリ、常ニ無數發生スルヲ以テ療法無シ。

**急性限局性皮膚浮腫** Oedema cutis circumscriptum.

クインケ氏浮腫(一四八頁参照)

**爪病** Onychosis.

**爪甲絲狀菌症** Onychomycosis 爪甲白癬 O. trichophytina 及爪甲黃癬 O. favosa 之ニ屬ス各其條下ヲ参照スベシ。

**爪圍炎又爪廓炎** Paronychia 膿疱疹、瘰疽ニ際シ化膿菌ノ傳染ニヨル、丘疹性、膿疱性及潰瘍性黴毒疹ニ並發ス又ハ濕疹、乾癬ニ續發スルコトアリ爪母、爪廓ノ炎症ナリ。其他爪牀肥厚症、爪甲鈎彎症、爪甲縱裂症、爪甲橫裂症等アリ。

**療法** 急性濕症ニハ罨法ヲ行フ慢性症ニハ爹硫膏ヲ塗布シ又爹兒丁幾、ピック氏硬



膏、「イヒチオール」溶液等用ヒラル。

絲狀菌病、横裂症、縦裂症等ニハ刀刃又ハ鑷ニテ削リ一〇%水楊酸「コロヂウム」ヲ塗布ス。

爪病ハ頑固治シ難キヲ以テ忍耐シテ治療スベシ、レントゲン線應用セラル。

**臭汗症又腋臭** Osmhidrosis, Bromhidrosis.

異汗症中最モ多キ症狀ニシテ俗稱「わきが」是レナリ。

**療法** 多汗症ニ準ズベシ、レントゲン線放射、「ラヂウム」貼用ヲ試ムルコトアリ、該部皮膚ヲ切除スルハ最モ根本的ナリ。

「クローム」酸及ビ「フォルマリン」用キラル(一一六頁多汗症参照)。

**異汗症** Parhidrosis ニハ尙色汗症、血汗症、尿汗症アリ。

**ペーネット氏病** Pagetsche Krankheit 痛腫(七〇頁)参照。

**乳嘴腫** Papillom.

乳嘴腫ハ纖維腫ノ一種ト見做シテ可ナリ、疣贅ト此腫瘍ヲ區別スルコトハ頗ル困難ナ

レドモ乳嘴腫ハ其形狀ノ花椰菜ノ如キヲ特有トシ且ツ其表面ニモ毛細管アリ。

**療法** 切除、「ラヂウム」照射。

**丘疹膿疱性結核疹** Papulopustulöse Tuberculid 毛囊疹(一〇九頁)参照

**頭虱・陰毛虱・衣服虱** Pediculus capillitii, pubis et vestimenti.

Kopf-Scham-Kleider-laus.

瘡痒激甚ナリ濕疹ヲ來シ殊ニ屢々頑固ナル膿疱疹性濕疹ノ原因ヲナス、其部ニ母蟲ヲ見出ス事難キ時モ毛髮ニ固着セル白色ノ卵ニテ診斷ヲ下シ得ベシ、陰毛虱ハ毛髮根部ニ固着ス、衣服虱モ肩胛部、臀部ノ搔抓痕ニテ診斷シ得ベク衣服ト附着スル身體部分ニ濕疹様發疹アリ。

**療法** 頭虱、陰毛虱共ニ灰白軟膏塗擦又ハ甘汞撒布ヲ以テ最良トス、一%昇汞又ハ

二%醋酸砒法モ可ナリ蟲卵ヲ除去スルニ用ヒラル、又ハ左方ヲ處ス但シ充分ニ火氣ヲ注意スベシ。

因「エーテル」……………「クロロフォルム」……………各等分



百露拔爾撒誤……………酒精……………各等分  
「キシロール」……………「クロロフォルム」……………各等分

衣服虱ハ被服ヲ交換シテ熱湯消毒ヲ施ス。

ペラグラ Pellagra.

伊太利、西班牙地方ノ風土病ナレ共本邦ニ於テモ尙之ヲ見ル、頭痛、眩暈、胃腸障礙等ノ前驅症アリ手足ノ(殊ニ指甲)紅斑(第一期)ヲ來タシ落屑ヲ生ズ、數ヶ月ニテ消退スレ共翌年春季同症狀ヲ發シ色素沈着及ビ萎縮ヲ認メ下痢嘔吐ヲ來ス(第二期)、而シテ逐年諸症増悪シ憂鬱、嗜眠、四肢震顫アリ(第三期)、遂ニ精神障礙ヲ來シ癡愚トナリテ斃ル經過ハ十年乃至十五年トス。

療法 滋養的食品、鐵劑ヲ與フ、近時「ビタミン」劑應用セラレ。

陰莖結核 Penis tuberculose.

稀有ナリ、龜頭及包皮ニ來リ粟粒大ノ結節又ハ小結節ニシテ浸潤著明ナリ、經過緩慢ニシテ硬性下疳、護謨腫ト誤ラレ易シ。

療法 電氣燒灼、「ラヂウム」療法等行ハル。

尋常性天疱瘡 Pemphigus vulgaris.

重キ一般症狀、食機不振、下痢、高熱ヲ以テ起ル豌豆大乃至胡桃大ノ水泡ニシテ發赤セザル皮膚上ニ不規則ニ散在ス稀ニ密集シテ全身ニ發生ス、經過長ケレバ豫後概ネ不良ナリ。天疱瘡中良性ニ屬スル者ニシテ他ニ惡性ノ者アリ。

療法 強壯劑ヲ與ヘテ一般榮養ヲ佳良ナラシム、内服ニハ規尼涅一瓦乃至二瓦ヲ一日量トシ又ハ亞砒酸ヲ亞細亞丸、法列兒水、「アトキシール」トシテ與フ。

局所ハ硼酸軟膏、一〇% 爹兒亞鉛華膏、爹兒浴、過滿俺酸加里浴ヲ施ス重症ハ持續浴ヲ行ハシム。

凍瘡 Pemiones. 凍傷(七四頁參照)

砂毛ビエドラ Piedra.

婦人ノ頭髮ニ多シ、毛髮ニ白ク硬キ砂粒様ノ小結節トナリ固著スル寄生菌病ナリ洗髮ノ際著明トナル蟲眼鏡ニヨリ虱卵ト區別シ得ベシ。



療法 發毛膏塗布 (五七頁參照)

頭部 枇疹 Pityriasis capillitii.

炎衝症狀ナクシテ頭部ハ灰白色糠枇様落屑ヲ以テ蔽ハル是ハ脂漏ト併發シテ數年ニ百  
リ毛髮ノ發生ヲ妨ゲ遂ニ禿髮ヲ來ス。

療法 特效藥ハ硫黃ナルモ患者多クハ女性ナルニヨリ「レゾルチン」劑甚ダ効アリ、

五%「レゾルチン」精塗布又ハ

毛髮水(ハールワッセル)(Haarwasser)

因 「レゾルチン」……………五・〇……………「グリセリン」……………五・〇……………蓖麻子油……………五・〇

酒精……………五〇・〇……………薔薇水……………五〇・〇……………「ベルガモット」油……………三滴

皮脂漏性濕疹(九八頁)參照

連圈狀糠枇疹又正圓形糠枇疹 Pityriasis circinata Toyama.

P. rotunda Matsuura.

境界明確ナル五錢白銅大ヨリ手掌大ニ及ブ圓形ノ發疹ニシテ灰白色乃至褐色ヲ呈シ魚

鱗様光澤ヲ有スル枇糠様落屑面ヲ生ズ、殆ンド癢痒ナシ。

療法 癩風ニ準ズ。

薔薇色糠枇疹 Pityriasis rosae Gibert.

急性良質ノ圓斑狀紅斑也、好ンデ胸部ニ發シ上膊、大腿ニ蔓延ス、圓斑ハ粟粒大乃至  
白銅貨大ニシテ中央部ハ黃色ニ糠枇様落屑ヲ呈シ邊緣ハ淡紅色隆堤ヲ有ス。四週乃至六  
週ニシテ自然ニ治癒ス、原因尙不明ナリ。季節ノ變リ目ニ當リ格納セル衣類ヲ着用セル  
際多ク侵サル。癢痒餘リ甚シカラズ。

療法 「サリチール」酸昇汞精ヲ塗布ス、發赤甚ダシケレバ 亞鉛華膏又ハ釜硫膏ヲ貼  
用ス急性症狀去ラバ五%硫黃亞鉛華膏ヲ應用ス頑症ニハ剝離膏ヲ試ム。

因 「サリチール」酸五—一〇・〇……………昇汞……………〇・五—一・〇……………「グリセリン」……………一〇・〇  
酒精……………一〇〇・〇

癩 風 Pityriasis versicolor.

主トシテ軀幹殊ニ胸圍ニ發生スル癢痒アル褐色乃至黃色ノ大小不同斑紋ニシテ甚ダ頑



固ナリ、剝脱シ易キ軽度ノ鱗屑ヲ有ス。「ミクロスポロン、フルフル」菌ノ寄生ニヨリテ起ル。夏期増悪シ冬期輕快ス。

療法

「サリチール」酸昇汞酒精(前條)、剝離膏、ウキルキンソン氏軟膏等ヲ塗布シテ剝離セシム、沃度丁幾塗布ハ廣汎ノ部ニ應用セラル「クリサロビン」軟膏(五—一〇%)、焦性没食子酸軟膏(五—一〇%)又タ應用セラル。

牛痘疹

Postovaccinale Exanthem. 中毒性紅斑(一〇五頁參照)

紫斑 Purpura.

皮下出血ヲ紫斑ト云フ指壓ニヨリ褪色セザルヲ以テ紅斑ト區別シ得。

一、單純性紫斑

P. simplex. 關節ノ疼痛、熱發等殆ンド認メラズシテ帽針頭

大乃至扁豆大ノ出血ヲ來タス稀ニ手掌大ニ達スルコトアリ、春秋二季ニ多ク紅斑ハ併發スルコトアリ、四、五週ニシテ吸收サル。

二、儂麻質性紫斑

P. rheumatica. 初メハ下肢殊ニ下腿ニ扁豆大、豌豆大ナル皮下出血アリ稍隆起シ同時ニ諸關節ノ疼痛及腫脹ヲ來タス軽度ノ熱發アリ。

三、出血性紫斑又ウエルホッフ氏病 P. haemorrhagica, Morbus Werlhofii

全身症狀高度ニシテ皮膚粘膜ニ不規則ニ多量ノ出血ヲ來タシ口腔、鼻腔、眼瞼結膜ノ出血、咯血、血便、血尿ヲ起ス、無熱ニシテ關節ノ腫脹、疼痛ナシ。

又口腔、咽頭、胃腸等ノ粘膜ニ出血ヲ來タスコトアリ、小兒ニ於テハ殊ニ重症ヲ呈ス之ヲヘノッホ氏電擊性紫斑 P. Huminans Henoch ト云フ經過迅速ニシテ斃ル。

療法

療法安靜ヲ第一トシ消化シ易キ食物ヲ與ヘ、心臟機能ニ注意スベシ、止血藥トシテ麥角ノ浸劑又ハ丸劑ヲ投ジ「ゼラチン」ヲ注射ス、紫斑ノ潰瘍トナル部分ニハ硼酸軟膏ヲ塗布スベシ。

豫後ノ判定ニハ慎重ナルヲ要ス。是レ往々移行型アルガ故ナリ。

痒疹

Prurigo, Juckflechte

主トシテ小兒ニ來リ常ニ四肢ノ伸展側ヲ冒シ下腿ニ始マル劇甚ナル瘙痒ヲ有シ皮膚下ニ帽針頭大ノ小結節ヲ認ム之ヲ痒疹小結節ト稱ス、鼠蹊腺或ハ腋窩腺ノ腫脹(痒疹性横痃)ヲ來スモ化膿スルコトナシ、搔爬ノタメ併發症トシテ濕疹、膿疱疹ヲ起シヤガニ苔



癬化シ皮膚肥厚、色素沈着ヲ起ス季節ニ由テ増減シ夏季及冬期痒疹ニ區別シ更ニ之ヲ重症及輕症ニ分ツコトアリ俗ニ「がんがさ」ト云フ。

**療法** 不消化物其他刺戟性食物ヲ禁ジ便通ヲ整フベシ搔爬ヲ防ギ「リゾール」浴、硫黄浴ヲナサシム一—五%薄荷油酒精、一%水楊酸酒精又ハ石炭酸亞鉛華「リニメント」ヲ塗布ス、膿疱疹等併發セル時ハ硼酸軟膏ヲ塗布シ炎症アラバ硼酸水濕布ヲナス皮膚肥厚ニ向ツテハウイルキンソン氏軟膏、爹硫膏又ハ爹兒浴(爹兒丁幾塗布後入浴)可ナリ從來「ピロカルピン」皮下注射行ハルルモ余ハ却テ蒸氣浴ヲ推賞ス。

**乾癬 Psoriasis.**

常ニ銀白色光澤ノ落屑ヲ有スル慢性皮膚疾患ニシテ時トシテ、或ハ中央ヨリ自然ニ治癒シツツ周圍ニ環狀又ハ蛇行狀ニ擴延スル扁豆大乃至手掌大ノ圓斑狀發疹ヲ呈スルコトアリ。

主トシテ膝蓋、肘等ノ伸展側ヲ冒シ腰部ニモ蔓延ス、痒疹アリ、鱗屑ヲ剝離スレバ點狀出血アリ、青年ヲ冒ス、經過頗ル長ク再發屢々ナリ。

**療法** 先ヅ三十分乃至一時間「リゾール」浴、「リゾフォルム」浴又ハ石鹼浴ヲナサシム沐浴中鱗屑ヲ洗淨ス。浴後五—一〇%「クリサロピントラウマチチン」ドレウ氏軟膏又ハロシャード氏軟膏ヲ塗布ス(三一頁)凡テ是等ノ軟膏ハ刺戟強キヲ以テ注意シテ貼用スベシ、顔面、頭部ニ於ケルモノハ毎日加里石鹼又ハ爹兒石鹼ニテ洗滌シ白降汞軟膏又ハ五%焦性沒食子酸軟膏ヲ塗擦ス。

内服トシテ單ニ亞砒酸劑ヲ用ヒテ効アルコトアリ「サルバルサン」亦試ムベシ又沃度加里ヲ漸次増量シテ大量ヲ用フ、甲狀腺製劑ヲ内服セシムルコトアリ、レントゲン線療法試ミラル。

**皮膚瘙癢症 Pruritus cutaneus.**

皮膚ニ何等ノ變化ナクシテ發作的ニ熱灼、痒疹、刺痛、蟻走感ヲ感ジ衾温ニテ増進スル異常知覺ヲ云フ、全身ニ亘リ又ハ一局部ニ止マル、搔爬症狀ハ常ニ在リ。糖尿病、黄疸、慢性腎臟炎、常習便秘、自家中毒(妊娠、月經前)神經衰弱、動脈硬化、「ヒステリー」、癩癩等之ガ原因トナル。



療法

尿、尿ヲ検査シ原因ヲ去リ攝生ヲ守ル。外用ニハ薄荷酒精、「サリチール」酸酒精、薄荷膏又ハ一%石炭酸華攝林ヲ塗布シ撒粉ス、(二七頁及前項參照)内用ニハ臭剝(五・〇、石炭酸(〇・〇五)等ヲ與フ「リゾール」浴、硫黃浴亦試ムベシ皮膚乾燥セバ塗脂スベシ。

臭剝

臭剝……………八・〇……………臭曹……………臭酸「アンモニア」……………各四・〇

蒸留水……………二〇〇・〇

石炭酸

石炭酸……………六・〇……………「グリセリン」軟膏……………「アルテヤ」末……………各適量

右爲丸子百二十粒石松子ヲ衣トナス一日三回三丸宛

肛門瘡痒症ハ攝護腺ヲ検査スベシ、又便秘、肛門裂傷、痔核ヲ治療スベシ、效果アルハ釜兒石鹼浴ナリ。

陰部瘡痒症ニハ一〇%「クリザロビン」溶液塗布ヲ可トス。  
レントゲン線、水銀石英燈ヲ試ムベシ。

假性禿髮

Pseudopelade 萎縮性禿髮症(五八頁)參照

クインケ氏浮腫又急性限局性皮膚浮腫

Quinckesches Oedem, Oedema cutis circumscriptum acuta.

臺灣、上海等ノ熱帶、亞熱帶ニ多ク一種ノ風土病ナリ全身違和ヲ伴ヒ又ハ卒然梅實大乃至手拳大ノ限局性浮腫ヲ生ス二、三時間ニシテ極度ニ達シ五、六時間ニシテ消失ス同一部位ニ反覆シ又轉位スルコトアリ境界明瞭ニシテ常色ヲ帯ビ指壓スレバ指痕ヲ遺ス。

療法 「キニーネ」、「アンチピリン」等ノ鎮痛下熱劑ヲ與フ局所ニハ清涼膏塗布(尋麻疹參照)

ラチウム皮膚炎 Radiumdermatitis.

第一度 數日乃至數週後潮紅ヲ呈ス。

第二度 淺表ナル水疱ヲ形成シ數日ニシテ黑褐色ノ痂皮ヲ作ル。

第三度 潰瘍ヲ作り膿汁、壞死組織アリ知覺過敏ナリ。

療法 紅斑ニハ「ワゼリン」ヲ塗布シ表皮剝離ニハ「デルマトール」撒布、潰瘍ニハ一〇%「アネステジン」軟膏、硼酸軟膏ヲ用ヒ周圍ノ腫脹ニハ罨法ヲ行フ。

余ハ「バラフィン」療法ヲ推奨ス即チ「バラフィン」ヲ溶解シ潰瘍ニ滴下塗布シ一日一回



乃至二回反覆ス。

レイノー氏病 Raynaudsche Krankheit. 相對性壞疽(一一三頁参照)

レックリグハウゼン氏病 Recklinghausensche Krankheit.

神經纖維腫(一三七頁参照)

レントゲン皮膚炎 Röntgendumatitis.

急性症狀

早期反應 放射一回後、數時間ヲ出デズシテ紅斑ヲ呈シ輕ク灼熱ノ感アリ知覺過敏トナリ潮紅ハ數日間持續スベシ。

第一度 三週ノ潜伏期ヲ經テ紅斑ヲ呈ス輕微ノ落屑ヲ以テ消退ス。

第二度 二週後ニ生ジ第一度ニ加フルニ輕度ノ炎症ヲ呈ス。

第三度 一週ニシテ著明ノ炎症反應ヲ呈シ水疱ヲ作り表皮剝脫、濕潤、脫毛ヲ呈ス跡ニ色素沈着ス。

第四度又「レントゲン」火傷 Röntgenverbrennung 數日ニシテ前記反應ニ加フルニ組織ノ

壞死潰瘍ヲ作ル表面ニ壞死物附着シ周圍ハ紅色ヲ呈ス。

慢性變化 弱度及中等度ノ放射ヲ長時間持續セル際起ル、潮紅、腫脹、角化、血管擴張、肥厚、潰瘍等ヲ呈ス。

療法 輕度ノモノニシテ尙ホ且ツ撒布藥又ハ軟膏ニヨリテ奏効セザルモノモ自然ニ放置セバ漸次消退スベシ、潰瘍ハ難治ナリ「バラフィン」療法、潰瘍清潔ナル時ハチール氏法又ハクラウゼ氏法ニテ表皮移植ヲ行フ。

風疹 Rubella, Rotheln, Windpocken.

二、三週ノ潜伏期後ニ發疹シ前驅症、熱候等殆ド缺如ス、發疹ハ麻疹ニ酷似スレドモ小斑點狀ニシテ其形扁豆大ナリ稀ニ斑點上ニ小水疱ヲ發スルコトアリ、顔面、頭部次デ四肢、軀幹ニ來ルニ日乃至四日ニテ消退ス、麻疹、猩紅熱ト混同シ易キコトアリ。

療法 豫後佳良ナレバ對症療法ニテ可ナリ、水痘(一六九頁参照)

皮膚肉腫 Sarcom.

原發性ノモノト内臓肉腫ノ轉移ニヨルモノトアリ、硬固、彈力性ニシテ其表面ハ平滑



光澤ヲ有スル腫瘍ナリ色素ヲ含有シ暗褐色ヲ呈スルモノアリ(黒色肉腫)迅速ニ發育ス、母斑又ハ乳嘴腫ヨリ發スルコトアリ、確診ハ組織學的検査ニヨルベシ。

療法 切除スベシ、「ラヂウム」及レントゲン線療法

疥癬 Scabies

診断ニ難カラズ、好發部位ニ存スル搔爬痕ニ由テモ推斷シ得ベシ、好發部位ハ指間腕關節屈面、尺骨側、肘關節屈側面、腋窩ノ前側、臍圍、腰圍、陰部、大腿内側及ビ内髀部等トス。

蟲墜道ヲ認メ得ザル事モアリ、又蟲墜道内ニ蟲體ヲ視ザル事アリ。

搔痒最モ甚シク夜間増劇ス其原發疹ハ小結節又ハ小水疱ナルモ搔爬ノタメ濕疹様トナリ、小兒ニ於テハ膿疱性疥癬ヲ起スコトアリ傳染力強キモノナレバ同一家族ニ同様ノ疾患ナキヤヲ調査スベシ。

療法 能フ可クンバ濃厚ナル硫黄泉ニ入レ次デ三日間毎夕時全身殊ニ好發部位ニ左記ノ膏劑ヲ充分ニ塗擦シテ其上ニ撒粉ス塗擦ハ凡ソ四十分間以上トス、濕疹、癬、癩塊

等アラバ豫メ夫々法ニ從テ處置シ、疥癬療法モ緩和膏劑ヨリ漸次強キニ及ブ

- 一 硫黄軟膏又ハ硫黄「リニメント」
- 二 「ナフトール」軟膏(カボジール氏軟膏)
  - ① 「ナフトール」……………一〇〇〇……………綠石鹼……………二五〇……………華攝林……………六〇〇
  - 滑石……………五〇……………毎日塗擦第四日沐浴
- 三 ウイルキンソン氏軟膏
- 四 ① 「ペルーパーサルム」……………蘇合香……………各五〇〇
- 五 ② 「ナフトール」……………二五〇……………「グリセリン」……………一〇〇……………酒精……………一〇〇〇
- 六 ③ 硫黄……………一〇〇……………炭酸加里……………八〇……………水……………一〇〇〇
- 七 ヴレミンクス氏液(硫化「カルチウム」液)
  - ④ 煨製石灰……………一分……………硫黄……………二分……………水……………二十分
  - 煮沸シテ全量ヲ十二分トス

沐浴シ石鹼ニテ洗ヒタル後本液ヲ塗擦シ毛布ヲ被リ二時間許リ臥セシム、衣服、寢具等ハ治療中屢々日光消毒ヲ施シ褌衣、寢衣等ハ一回治療終リ沐浴スル毎ニ交換スベシ、



豫防トシテ全家族ニ硫黄「リニメント」等ヲ使用セシム。

バイエル會社製「ミチガール」ハ液狀硫黄劑ニシテ使用ニ甚ダ簡便ナリ豫防トシテモ用ヒラル治療中尿蛋白ノ注意ヲ忘ルベカラズ。

治療後ノ炎症ナキ瘙痒ニハ就褥前止痒劑ヲ塗布セシム。

薄荷油……………四・〇……………知母爾……………四・〇……………酒精……………二〇〇・〇

**猩紅熱** Scarlatina Scharlach

本症ハ高度ノ觸接傳染病ニシテ主トシテ小兒ニ來ル、四―七日ノ潜伏期ノ後突然高熱、頭痛、嘔吐及ビ嚔下困難ヲ來タス咽頭炎及ビ頸腺腫脹ヲ伴フ次デ頭部、胸部、背部全身ニ猩紅熱發疹ヲ來ス毛囊ニ一致シ密接セル無數ノ細小紅點ヲ生ジ猩紅色ノ瀰漫性紅斑トナル充血ナルヲ以テ指壓ニヨリ消退ス約一週ニシテ恢復期ニ赴キ固有ノ膜狀落屑アリ手足ニ於テ甚シ。

**療法** 安靜ヲ守ラシメ攝生ニ注意シ對症療法ヲ行フ、發疹ノ消退後ハ皮膚脆弱乾燥ヲ防グタメ塗脂スベシ。

**皮膚腺病** 腺病性護謨腫 Scrophuloderma, Gomes scrofulotuberculuses.

頸部、顔面及ビ下腿ニ多ク見ラル虛弱ナル青少年ニ結節トシテ發生シ容易ニ中央ヨリ軟化シ寒性膿瘍ニ變化シ皮膚發赤破壊シ潰瘍ヲ來ス潰瘍ハ皮下掘鑿シ菲薄、弛緩性ノ邊緣ヲ有シ底面、凹凸不平ニシテ黃色ノ肉芽ヲ呈シ容易ニ出血ス、骨、骨膜及淋巴腺等内部ニ存スル結核性疾患ヨリ二次的ニ來ルナリ。

**療法** 亞砒酸、ホーレル水等ヲ與ヘ強壯ナラシム、局處波動ヲ認メザル間ハ一〇%沃度仿謨軟膏、水銀軟膏ヲ使用スベシ、軟化セバ直チニ切開スベシ、肉芽増殖ニハ一%硝酸銀軟膏ヲ用フ、切開後ハ普通外科的療法ニ則ル、レントゲン線放射ハ著効アリ。

**脂漏** Seborrhoe.

單ニ油狀ヲ呈シテ顔面ニ發生スル者ト脂質、痲皮ノ形ヲ成シテ表皮落屑ト共ニ頭部、顔面、軀幹ヲ冒スモノアリ又乾性濕疹ノ隨伴症狀トシテ發生ス。(脂漏性禿髮症、糠枇性濕疹及頭部皮脂漏(參照))

**療法** 加里石鹼精ニテ初メハ毎日、終リハ一週ニ二回宛洗淨ス、斯クシテ左ノ酒精



劑ヲ塗布ス。毛髮水ハ便利ナリ。

〇・二五%—〇・五%「ツメノール」精 一%—三%水楊酸精

二—五% 「レゾルチン」精 二%—四%「ナフトール」精

尙一週ニ二回宛一〇%硫黃軟膏ヲ塗布ス。

**充血性脂漏症** *Seborrhoea congestiva* 紅斑性狼瘡(一三〇頁参照)

**血清疹** *Serumexanthem* 中毒性紅斑(一〇五頁参照)

**鞏皮症及鞏皮指** *Skleroderma et Sklerodaktylie*.

限局性又ハ瀰蔓性浮腫狀腫脹及硬化ヲ以テ始マリ末期ニハ萎縮シ下層ト密着シテ白墨様ノ外觀ヲ呈シ皮膚ヲ撮舉スルヲ得ズ指ハ屈曲シテ鞏皮指トナル。

**療法** 温浴セシメ電氣按摩カ一〇—二〇%水楊酸華攝林ヲ塗布シテ按摩ヲ施ス。トチオチナミン、「ファイブロリジン」注射ト共ニ水楊酸曹達ノ多量ヲ與フルモ可ナリ、注射ハ一日一回一筒宛三十回ヲ以テ一巡圈トナス無効ナラバ三週間休藥セシメ更ニ反覆注射ヲ施ス。我教室ニテハ驅微療法効ヲ奏スルコト屢々ナリ。

**紡錘毛** *Spindelhaare*. 聯珠毛(六二頁)参照。

**口腔粘膜炎** *Stomatitis*.

圓形乃至橢圓形ノ灰白色ヲ呈スル粘膜斑ニシテ狭小ナル赤色暈ヲ有ス、而シテ口腔粘膜ヲ好ンデ冒ス。通常無熱ナルモ時トシテ全身症狀ヲ來シ口臭アリテ咀嚼・嚥下障礙ヲ來ス。

**療法** 酒精及ビ喫煙ヲ禁ジ含嗽劑(温湯ニテモヨシ)ヲ與フ。最モ有效ナルハ二—四—一〇%ノ硝酸銀水ヲ塗布スルニアリ、咀嚼ノ障害アレバ五%「コカイン」水又ハ「オルトフォルム」ヲ用フベシ。

**ストロフルス又小兒苔癬** *Strophulus s. Lichen urticatus infantum*.

乳兒及ビ小兒ニ發生スル蕁麻疹様發疹ニシテ主トシテ四肢殊ニ其外側ニ來リ夜間ニ限リテ激甚ノ瘙痒アル丘疹又ハ水疱疹ニシテ周圍ニハ紅暈アリ足趾ニハ天疱瘡様水疱トシテ顯ハル、乳齒發生時、消化不良、急性疾患後ニ認ムベキ原因ナクシテ起ル、貧血及ビ尙儂病ニ伴ヒ又過肥ノ小兒ヲ冒ス。



**療法** 一—五%薄荷精、一%水楊酸精等ノ止痒藥ヲ試ムベシ石炭酸ハ小兒ニハ使用セザルヲ可トス、續發セル搔爬性濕疹、潰瘍等ニハ各其法ニ據テ處置スベシ炎症激シケレバ冷罨法ヲ施シ又ハ亞鉛華泥膏ヲ貼用ス、食餌療法ヲ嚴ニシ便通ヲ整フ腸制腐ノ目的ニテ甘汞ヲ投ジ「ザロール」ノ少量(一回量〇・〇五—〇・一)ヲ持長セシム、不眠症ニハ「アスピリン」、安知必林、肝油ヲ與フ。

此外就寢前ニハ「リゾール」浴ヲ取ラシム一日二、三回行フモヨシ。

### 汗疹及粟粒疹 *Sudamina et Miliaria.*

俗稱「あせも」ナリ甚シキ發汗後、急劇ニ軀幹ノ屈曲觸接面等ニ發生スル粟粒大マデノ小水疱ナリ滴露ノ如キ時ハ水晶様汗疹(*M. crystallina*)ト稱シ數日ニテ治スベシ普通ノ皮膚ニ卒然發生スルモノナリ密集スルヲ常トス小水疱ノ内容、乳白色ニ濁濁スレバ之ヲ白色粟粒疹ト云ヒ發赤セル皮膚ニ生ゼバ赤色粟粒疹ト云フ此發赤ハ一晝夜ヲ經過スレバ消失シ發汗止ムトキハ輕度ノ鱗屑ヲ以テ消退ス持續的發汗ノタメ角質濕潤軟化シテ間擦性濕疹ヲ生ジ又ハ搔爬シテ濕疹トナル(汗疱性濕疹)或ハ水疱依然トシテ存在シ遂ニ帶黃色

ヲ呈シテ更ニ小膿疱ニ變ズルコトアリ。

**療法** 亞鉛華澱粉撒布 或ハ之ニ二—〇%ノ割ニ「チオノールカルチウム」ヲ混ズレバ効果顯著ナリ、二—一〇%「タンノフォルム」亞澱散、「デルマトール」亞澱散効アリ痒痒ニ向テハ以上ノモノニ薄荷、石炭酸等ヲ混ズベシ(多汗症ノ項參照)。

### 白癬性毛瘡或寄生性毛瘡 *Sycosis trichophytina s. parasitaria.*

初期ハ紅斑落屑性又ハ小水疱性ヲ呈スルモ漸次深部ニ進ミテ急性皮膚炎ノ如キ症狀ヲ呈シ腫脹シテ扁平ニ隆起シ浸潤甚シク膿疱ハ毛ニ貫通セラル、更ニ進行スレバ紫紅色トナリ熱セル苳ノ如キ觀ヲ呈ス尋常性毛瘡ト類似スレドモ之ハ速カニ經過シ浸潤著シ。

**療法** 炎衝症狀著明ナル間ハ硼酸水、醋酸鹽土水、一萬倍「カメレオン」水ノ濕布ヲ施シ次デ白降汞軟膏又ハ釜硫膏ヲ塗布ス。

### 尋常性毛瘡又非寄生性毛瘡 *Sycosis vulgaris s. non parasitaria.*

白色、黃色化膿菌ノ寄生ニヨル極メテ慢性ニシテ中央ヲ毛髮ノ貫ケル膿疱ヲ形成スル毛囊炎ナリ、再發シ易シ。有毛部ノミヲ犯ス。



療法 炎症盛ナラバ二%醋酸礬土水、三%硼酸水、鉛糖水ノ罨法ヲ行フ、剃去スベカラズ、剪除スベシ、炎症去ラバ毎日拔鬚スベシ之レ膿瘍ヲ哆開セシムル最良法ナリ、或ハ拔鬚シタル後二%—三%焦性没食子酸精ヲ滴注スルモ好シ。

尙、白降汞膏、硫黄膏ノ塗擦及ビ〇・二五%昇汞精ノ塗布モ可ナリ又左方ヲ處ス。

因 「ナフトール」……………一・五……………「レゾルチン」……………〇・五……………綠石鹼……………

華振林……………各一〇・〇

因 樺木參兒……………一五・〇 沈降硫黃……………一〇・〇……………大楓子油……………四・〇

華振林……………一〇〇・〇

(佛蘭西膏)

浸潤蔓延セルモノハピック氏硬膏ヲ反覆貼布シ其上ニ蒸罨法ヲ施ス、頑固症ニハレントゲン療法ヲ可トス。

上唇ノ毛瘡ニハ同時ニ鼻腔ノ治療モ行フベシ、結痂ヲ軟化スルニハ阿列布油又ハ一%—三%硝酸銀水ヲ塗布ス。

### 白癬 Trichophytia.

分類 大芽胞菌及小芽胞菌又ハ髮内菌及髮外菌ニ區別ス、症状及部位ヨリシテ左ノ如ク分類ス、索引ノ便宜上舊來ノ病名ニヨリテ各項ニ分類シ記載シタレバ其項ニツキ見ルベシ。

淺在性白癬 Trichophyti superficialis.

1 頭部白癬 T. capillitii. 及頭部寄生性匐行疹 Herpes tonsurans capillitii.

2 顔面白癬 T. facialis. 「はたけ」

3 小水泡性斑狀白癬・斑狀鱗屑性白癬又ハ小水泡性寄生性匐行疹 T. maculo-vesiculosa T. maculo squamosus Herpes tonsurans vesiculosus.

4 頑癬 Ekzema marginatum (九七頁參照)

5 手掌足趾白癬 T. palmaris et plantaris.

6 爪甲白癬 T. unguinum Onychomycosis trichophytina.

深在性白癬

3 チェルブス氏禿瘡 Kerion celsi.

2 白癬性毛瘡及寄生性毛瘡 Sykosis trichophytina s. parasitaria. (一五九頁參照)



**頭部白癬、頭部寄生性匍行疹及チェルズス氏禿瘡**

Trichophytia capillitii, Herpes tonsurans capillitii u. Kerion Celsi.

俗稱白雲ト稱シ學齡兒童ニ多シ灰白色ノ鱗屑アル圓斑ニシテ周圍ニハ灰色塵埃様物ニ包マレ斷折セル毛髮アリ、境界明劃ナリ癢痒餘リ甚シカラズ。

**療法**

毎朝加里石鹼及一萬倍昇汞水又ハ過滿鞣酸加里液ニテ患部ヲ洗滌シタルノチ旭白雲膏ヲ塗布ス(一二頁參照) 釜硫膏亦効アリ。

チェルズス氏禿瘡ハ深部ヲ犯セル頭部白癬ノ膿瘍トナリシモノニシテ腫瘍狀ニ隆起シ次デ膿疱ヲ形成ス其一部ニ深部ヨリ膿ヲ壓出シ得ルノ箇所アリ浸潤シ且ツ結痂アリ、癢痒ヲ訴ヘ毛髮粗鬆トナル、毛根ヲ犯スヲ以テ癩痕性禿髮トナルコトアリ、頭部白癬ノ治療中ニ起ルコトアルヲ以テ特ニ注意ヲ要ス。

**療法**

膿瘍ヲ壓出シ一萬倍過「マンガン」酸加里液ニテ洗滌後之ニテ濕布ヲ行ハシム該液ヲ漸次五百倍マデ濃厚トナスベシ、一萬倍乃至五百倍昇汞濕布モ効アリ、近時行ハル「トリコフィチン」注射ヲ併用スルコトアリ。

**小水疱性白癬 Herpes tonsurans vesiculosus.**

健康ノ皮膚又ハ發赤セル皮膚ノ中心ニ鱗屑ヲ有シ、周圍ニ環狀ニナラフ小水疱アリ此水疱ハ乾燥シテ小ナル鱗屑トナリ、水疱環融合シテ梅花狀ヲ呈ス、俗稱「ぜにだむし」是レナリ、顔面、頸部、手ニ多シ癢痒ヲ訴フ。

**療法**

水楊酸昇汞精、五—一〇%水楊酸精又ハ釜硫「リニメント」、釜硫膏塗布、全身ニ發生セル時ハ 硫黃浴。

**顔面白癬 Trichophytia facialis.**

學齡期兒童殊ニ女兒ニ多シ「はたけ」ト俗稱シ落屑割合ニ輕微ニシテ斑狀白色ヲ呈シ癢痒甚シカラズ顔面ニ來ル。

**療法**

同前

**手掌足蹠白癬 Trichophytia parvialis et plantaris.**

指趾ノ間、手掌、足蹠ニ發生シ多少側面ヲ傳ヒテ手足或ハ指趾ノ背面、足ノ内外踝ノ下



方ニ波及シ形状汗疱ニ酷似シ痒痒ヲ訴ヘ數年ニ涉リテ治セザルコトアリ、輕度ノモノハ小水疱及秕糠狀ノ落屑アリ寒冷ノ候輕快シ春夏ノ候ニ再發ス高度ノモノハ淡紅色ノ丘疹ヲ生ジ膿疱ニ變ジ表皮剝離アリ漸次濕潤シ遂ニ濕疹様トナル。

**療法** 釜兒丁幾ニヨル釜兒浴、(二三頁)ヲ持續スベシ晝間5%「フォルマリン」水ヲ塗布シ夜間釜硫膏ヲ塗布セシム。

**爪甲白癬** *Trichophytia unguinum, Onychomycosis trichophytina.*

爪ノ先端ニテ白癬罹患部ヲ搔爬スルコト等ニテ傳染ス爪ハ其前半ニ於ケル爪牀ヨリ肥厚ノ爲メニ少シク上向シ凸凹不平ニ肥厚シ固有ノ光澤ヲ失ヒ諸處ニ線狀或ハ點狀ニ通常帶黃灰白色ヲ呈ス後ニハ脆弱トナル。

**療法** 銳利ナル小刀ニテ出血セザル程度ニ常ニ其變化セル粗糙部ヲ切剝シ一〇%「サリチール」酸「コロヂウム」又ハ一%昇汞「コロヂウム」ヲ塗布ス、「コロヂウム」塗布前一二〇%苛性加里ニ漬シタル綿ヲ數十分間載置シ軟化セシメ置ケバ更ニヨシ、反復怠ラザレバ遂ニ治癒シ得ベシ。

**結節裂毛症** *Trichorhexis nodosa.*

鬚髯等ノ硬毛ノ處々ニ灰白色ノ結節ヲ生ジ容易ニ折斷ス蟲眼鏡ニテ熟視セバ斷端ハ刷毛狀ナリ。

**療法** 夜間充分ニ塗脂ス、白降汞「ワゼリン」、發毛膏亦用フベシ。

**ツベルクリン疹** *Tuberculine xanthem* 中毒性紅斑(一〇五頁)參照

**皮膚結核及結核疹** *Tuberculosis cutis et Tuberculid.*

結核性皮膚疾患ハ臨牀上甚ダ多型ニシテ之ガ診斷ヲ確實ナラシムルニハ次ノ條件ヲ具備セザルベカラズ、一、結核菌ノ證明、二、動物試驗ノ陽性成績、三、培養試驗、四、「ツベルクリン」反應、五、組織的變化、六、結核性疾患ノ合併是レナリ。皮膚結核ヲ分チテ二者トス、一ハ有菌性皮膚結核或ハ狹義ニ於ケル皮膚結核ニシテ他ハ結核疹又ハ結核毒素疹ナリ、兩者ノ分類ニ關シテハ尙幾多ノ議論アレ共前述セル診斷ノ條件ノ一乃至三ヲ具有スルモノヲ皮膚結核トナシ更ニ分チテ尋常性狼瘡、皮膚疣狀結核、皮膚腺病、皮膚粟粒結核、腺病性苔癬トナシ四乃至六ヲ滿スニ過ギザルモノヲ結核疹トシテ毛囊疹、



硬結性紅斑等之レニ加フ。

**皮膚粟粒結核** 潰瘍性粟粒結核、皮膚及粘膜炎性結核 *Tuberculosis cutis miliaris. Tuberculosis miliaris ulcerosa. T. propria cutis et mucosae.*

皮膚及粘膜炎ニ來リ粟粒大ノ白色結節ニシテ乾酪變性シテ潰瘍ヲ形成シ其周圍ニ粟粒結節アリ、疼痛劇甚ナリ、全身粟粒結核ノ一症候トシテ來リ又ハ肺癆患者ガ自己ノ喀痰ヨリ口腔粘膜炎、口唇等ニ來リ又ハ外部ヨリノ移植ニヨル。

**療法** 硝酸銀棒腐蝕、一〇%焦性沒食子酸軟膏、疼痛ニハ一〇%「アネステジン」軟膏ヲ用ユ。「ラヂウム」療法行ル。

**疣狀皮膚結核** *Tuberculosis cutis verrucosa.*

自覺症狀ナク多年ニ涉リ慢性ニ經過スル疾患ニシテ手足、臀部、肛門附近等ニ發生ス發疹ヲ三層ニ區別シ得、外層ハ紅斑ニシテ漸次中心ニ向テ浸潤シ第二層ハ帶赤紫色ニシテ多數ノ麻實大ノ膿疹ヲ有シ壓迫スレバ惡臭アル膿ヲ出ス中央部ハ皮膚隆起シ乳嘴狀増殖アリ或ハ退行變性ヲナス、結核菌直接傳染ニヨルモノナレドモ患者ハ壯健ナルヲ常トス。

**療法** 「ラヂウム」療法、一〇%焦性沒食子酸軟膏ヲ塗布シテ腐蝕セシメ後硼酸軟膏ニ代ユ。

**胼胝腫** *Tyloma, Tylosis, Callus, Schwiele.*

俗稱「たこ」ナリ角質ノ増加ニヨル皮膚ノ肥厚ニシテ漸次健皮ニ移行シ明劃ノ境界ナシ患部ハ帶黃色、汚穢帶褐色ニシテ堅硬トナリ皮溝消失シ知覺減弱シ容易ニ皸裂ヲ生ス手掌足趾ニ多クレドモ日常ノ作業ニヨリ一定ノ部位ニ本症ヲ來スコトアリ(職業的胼胝腫)

**療法** 原因ヲ除去ス、温浴、一〇%水楊酸軟膏、一〇%水楊酸「コロヂウム」、ピック氏硬膏又ハ「スピール」硬膏用ユベシ。楔狀ニ局處ヲ切開ス。

**遠心性固定斑** *Urythema centrifugum* 紅性狼瘡(一三〇頁參照)。

**蕁麻疹** *Urticaria.*

堪エ難キ搔痒ニ繼テ突如トシテ發生シ又忽チ消散スル不規則ノ發斑ナリ、赤色ノ扁豆大乃至鶏卵大ニシテ全身ニ發ス、發疹素因アルモノハ搔爬等ノ器械的刺戟ニヨリ之ヲ惹



起ス(人工蕁麻疹)先端鈍圓ナル硝子棒ヲ以テ背部ニ一線ヲ劃スレバ之ヲ見ルヲ得(皮膚表記症)原因トシテ昆蟲刺整等ノ外界ノ刺戟ニヨルコトアリ消化器障礙、生殖器疾患、食餌又ハ内服藥等ノ内因ニヨルコトアリ神經性疾患亦原因トナル一時性ノモノアリ反覆發作スル慢性ノモノアリ。

療法 第一ニ原因ヲ去ルベシ、局所ニハ左液ヲ塗布ス

- 一%—三%薄荷精
- 一%—三%石炭酸精
- 一%—二%知母爾精
- 一%—二%石炭酸華攝林

慢性ニハ「リゾール」浴ヲトラシメ二%「アネステジン」膏ヲ塗擦ス。

食餌ハ刺戟ナキ物宜シク菜食セシムレバ再發ヲ防ギ得ベシ。

秘結アラバ下劑ヲ處ス「アルカリ」劑ヲ含メル胃散ヲ與フ「アトファン」ハ尿酸鹽排泄ヲ助クルヲ以テ共ニ用フベシ「アトロピン」ヲ内服トシテ與ヘ又ハ注射ス(〇・〇五%硫酸アトロピン液〇・五蛙皮下注射隔日)「クロールカルチウム」靜脈内注射ヲ試ルコトアリ。

重曹……………三〇……………「ヂアスターゼ」……………〇・八……………「アトファン」……………一〇  
健末……………〇・三……………一日三回食後分服

寄生蟲性蕁麻疹 Urticaria helmentina Asahi.

小兒苦癬ニ酷似スルモ好發部位ハ之ニ異リ臀部ニ初發シ次デ隣接スル上肢ノ外側更ニ肩部ヨリ上腕ノ伸展側ニ散發シ甚シケレバ下腹部ヲ侵シ痒痒激烈ニシテ安眠妨ゲラル、糞便ヲ檢鏡スルニ常ニ内臟寄生蟲蟲卵ヲ檢出スベシ最モ多キハ蛔蟲ニシテ尙蟻蟲、絛蟲亦見ルコトアリ余ノ命名スル處ナリ。

療法 内科的ニ驅蟲法ヲ施スベク對症的ニハ一般蕁麻疹條下ニ同ジ(前頁參照)

汎發性痘疹 Vaccinatio generalisata 中毒性紅斑(一〇五頁參照)

水痘 Varicelle, WasserPocken

小兒疾患ナリ觸接傳染性ニシテ往々流行性ニ蔓延スルコトアリ、輕微ノ先驅症狀ニテ發疹ノ際輕度ノ體温上昇アリ扁豆大ノ水疱ニシテ著明ノ紅暈ヲ以テ圍繞セラレ數日後瀾濁乾固シ一週後ニハ結痂脱落ス、經過不全ナル者ハ水痘性蕁麻疹ヲ生ジ水疱ヲ形成セズシテ消散スルモノアリ、軀幹、顔面頭部ニ來リ時ニ口腔粘膜ニ來ル

療法 經過良好ナレバ臥床セシメ撒布劑ヲ與フ 水疱破潰セバ硼酸軟膏ヲ與フ。



## 痘瘡(眞痘)及假痘 Variola et Variolae. Pocken und Pseudopocken

潜伏二週日ニシテ戰慄、高熱、頭痛及ビ劇シキ腰痛ヲ伴ヒテ來リ一日ニシテ發疹ス、本症ヲ別チテ眞痘及假痘トス。

**眞痘** 顔面及ビ有毛頭部ニ發シ次デ軀幹、上肢、下肢ニ發ス初メハ紅色ノ蚤刺狀點及ビ斑點ナレドモ漸次小結節トナリ水疱トナリ發疹後一週乃至十日ニシテ痘瘡膿疱ヲ形成ス膿疱ハ尖頂ニ痘臍(Pockennabel)ヲ呈シ紅暈ヲ以テ圍繞セラル、粘膜殊ニ口腔、咽頭、喉頭、鼻腔、氣管、食道等ニ發生シ十二日又ハ十三日ニシテ發疹乾固ス黃色ノ痂皮ヲ生ジ癢痒ヲ伴フ、假痘初期ニ於テハ直チニ真假ヲ確定スルコト難ケレド初期病症殊ニ輕易ナル時ハ多クハ假痘ト推想シテ可ナリ

**假痘** 發疹稀疎ニシテ孤立シ化膿期ニ到ルマデノ諸期ヲ經過セスシテ消退スルコトアリ、小結節又ハ小水疱ニ止ル時ハ疣狀假痘或ハ粟粒性假痘 Variolae verrucosa S. miliaris ト稱ス、乾固ハ八一〇日ニシテ初マル。

重症ナル時ハ融合痘瘡・出血性膿疱性痘瘡(黑色痘瘡)ノ狀ヲ呈ス、本症初期ニ於テ急性出血性變質ヲ來シ痘瘡發生前既ニ死ヲ來ス時ハ痘瘡性紫斑ト稱ス。

**療法** 豫防法トシテ種痘ヲ行ヒ患者ハ隔離ス、對症療法ヲ行ヒ續發炎症ヲ防グ、膿疱ノ密生部位ニハ氷巻法ヲ施ス、單軟膏其他油劑ヲ塗布ス。

**疣贅** Verruca, Warze.

限局セル角質増殖ニヨリ來ル硬キ隆起ニシテ之ニ三種アリ。

**尋常性疣贅** V. vulgaris 硬固ニシテ蠶豆大ニ達スル乳嘴ニシテ表面分裂スルコトアリ。青年性疣贅 V. planum juveniles 少壯者ニ來リ多數散發シ扁平ニシテ僅カニ皮膚表面隆起セル黃褐色或ハ赤褐色ノ小乳嘴ナリ部位ハ顔面及ビ手背ヲ特徴トス。

**老人性疣贅** V. seniles 老人ニ來リ脂漏ヲ伴フ事多シ(脂漏性疣贅)角質ハ搔破シ易ク其底面ハ不平ニテ覆盆子ノ如ク出血シ易シ。

**療法** 剃刀、剪刀又ハ白金燒灼器ニテ除去シ過「クロール」鐵液ニテ止血ス發煙硝酸又ハ五〇%「クローム」酸ニテ腐蝕ス或ハ一〇%昇汞「コロヂウム」、「スピール」硬膏・五



一〇%水楊酸「コロヂウム」ヲ塗布ス、前額ノ扁平疣贅ハ二〇%「レゾルチン」精ヲ塗布ス、毎日塗擦スルニ二%「五%重」クローム「酸加里華攝林」ヲ與フ。脂漏性疣贅ニハ剝離膏ヲ應用ス、幼年者ニ來ルモノハレントゲン線及ビ「ラヂウム」最モ可ナリ、老人性ノモノハ電氣分解ヲ可トス、内用ニハ三〇%薏苡仁煎又ハ亞砒酸ヲ與フ。

尋常性白斑 Vitiligo. (一一六頁参照)

水痘 Wasserpocken (一六九頁参照)

風疹 Windpocken (一五一頁参照)

眼瞼黃色腫 Xanthoma palpebrarum.

刺針頭大乃至蠶豆大黃色ノ軟性扁平腫瘍ナリ。内眥ニ初發シ全上下眼瞼ニ及コトアリ。  
療法 切除縫合又ハ電氣分解。

色素性乾皮症 Xeroderma pigmentosum

幼年ニ初發シ慢性ノ經過ヲ取ル、夏日斑又ハ雀斑ノ如キ色素斑ヲ生シ漸次皮膚萎縮乾

燥シ次テ濕疹様又ハ潰瘍狀トナル此間ニ色素ハ漸次増加ス悪性ノモノハ同時ニ黑色素癌或ハ黑色素肉腫ヲ生ズ顔面ニ初發シ次テ頸・肩胛部・手足背ニ及ブ。

療法 唯對症療法ニシテ初期ニハ亞砒酸ノ内服或ハ皮下注射ヲ試ミ後ニハ外科的ニ切除スルカ「ラヂウム」ヲ試ムベシ。

皮脂缺乏症 Xerosis (六六頁参照)

處方例

撒布劑

- ① 米粉……………一五・〇……………苜蓿根末……………一・〇
  - ② 撒酸……………一・五……………麥粉……………五・〇……………滑石……………四三・五
- 右足趾多汗症

軟膏劑

- ③ 「グリセリン」……………九〇・〇……………澱粉……………一〇・〇……………蒸餾水……………一五・〇
- 澱粉ヲ善ク蒸餾水ニ攪和シ之ニ「グリセリン」ヲ和シタル後重湯煎上ニ於テ全質均等ニ



シテ其重量一〇〇・〇トナルニ到ルマデ攪拌シテ製ス (局方) 軟膏ノ基質劑トス  
「グリセリン」軟膏是レナリ

- 次硝酸蒼鉛……………刺納林……………各三・〇……………「ワゼリン」……………三〇・〇
- 甘扁桃油……………薔薇水……………各一〇・〇……………鯨腦……………
- 亞鉛華……………麥粉……………各五・〇……………「ワゼリン」……………一〇・〇
- 右濕疹
- 石炭酸……………一・〇……………「ペーリュバルサム」二・〇……………「グリセリン」軟膏二〇・〇
- 右慢性濕疹
- 硼酸……………一・五……………刺納林……………三・〇……………白堊……………各一・〇
- 右ウンナ氏清涼膏
- 白降汞……………一・〇……………亞鉛華……………一・五……………「ワゼリン」……………一五・〇
- 右傳染性膿疱疹
- 石炭酸……………一・〇……………「ペーリュバルサム」……………白降汞……………各二・〇
- 刺納林……………五・〇……………「ワゼリン」……………三〇・〇……………右口唇濕疹
- 薄荷……………二・〇……………刺納林……………五・〇……………「ワゼリン」……………五〇・〇

- 「クレオソート」……………一・〇……………「ワゼリン」……………五〇・〇
- 右皮膚癢痒症
- 昇汞……………〇・一—〇・二……………石炭酸……………四・〇……………ヘブラ氏軟膏……………一〇〇・〇
- 右苔癬
- 硝酸銀……………〇・三……………「ワゼリン」……………四〇・〇
- 「クリサロビン」……………〇・一—〇・四……………亞鉛華……………
- 澱粉……………各一〇・〇……………「ワゼリン」……………二〇・〇
- 右乾癬
- 「レゾルチン」……………一〇・〇……………刺納林……………二〇・〇
- 右尋常性及び紅斑性痕瘡
- 「ナフトール」……………一・五……………「ワゼリン」……………三〇・〇
- 「ペーリュバルサム」……………刺納林……………各三・〇……………「ワゼリン」……………三〇・〇
- 右疥癬
- 「レゾルチン」……………二・〇……………亞鉛華……………澱粉……………各五・〇
- 「ワゼリン」……………一〇・〇……………