

醫方類聚卷之四十四

傷寒門 十八

傷寒論注解 三

辨陽明脉證并治

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽

明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也陽明胃也

邪正太陽經傳之入府者謂之太陽陽明經曰太陽病若此若下若發汗後微煩小便數

大便因鞭者與小承氣湯正陽陽明者胃家

實是也邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明病脉遲雖汗出不惡寒

傷寒論卷之四十四



其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解可攻裏也手足濇濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之即是

正陽陽明胃家實也 少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經日傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則瀕語

此屬胃即是少陽陽明之為病胃家實

傷寒論陽陽明病也 邪傳入胃熱毒留結則胃多為實華陀

寒也 邪傳入胃熱毒入胃要須下去之不可留於胃

中是知邪在陽問曰何緣得陽明病答曰太

陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名

陽明也 本太陽病不解因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明

古人登廁必更衣不更衣者通為不大便不

更衣則胃中物不得泄故為內實胃無津液

加之畜熱大便則難為陽明裏實也 問曰陽明病外證云何答

曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽明病為邪在表則身熱汗出而惡寒邪既入府則表

證已罷故不惡寒但身熱汗出而惡熱也 問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也

答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而

惡熱也 邪客在陽明當發熱而不惡寒今得

全入府尚帶表邪若表邪全入則問曰惡寒更無惡寒必自汗出而惡熱也

何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入於胃入胃則更不復傳如太陽專之入胃則更不傳陽明病傳之入胃則更不傳少陽少陽病傳之入胃則更不傳三陰本

太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒傳經者則一日太陽二日陽傷

寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食者然者太陽之邪轉屬陽明傷寒三日陽明脉也經曰陽明病法多汗

大傷寒三日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長又邪併於經傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身黃小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便傷寒鞭者即太陰之邪入府傳屬陽明也

轉繫陽明者其人濇然微汗出也傷寒則無多汗此以傷寒邪轉繫陽明中風口苦咽乾陽明故濇然微汗出

腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹
 滿小便難也脉浮在表緊為裏實陽明中風
 裏也發熱惡寒者表仍未解也若下之裏邪
 雖去表邪復入於裏又亡津液故使腹滿而
 難小便陽明病若能食名中風不能食名中寒
 陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之
 海風為陽邪陽殺穀故中風者能食寒為陰
 邪陰邪不殺穀故陽明病若中寒不能食小
 傷寒者不能食陽明病若中寒不能食小
 便不利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便
 初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故
 也陽明中寒不能食者寒不殺穀也小便不
 利者津液不化也陽明病法多汗則周身

汗夫此手足濇然而汗出而身無汗者陽明
 中寒也固瘕者寒氣結積也胃中寒甚欲留
 結而為固瘕則津液不得通行而大便必鞭
 者若干出小便不利者為實也此以小便不
 利水穀不別雖大陽明病欲食小便反不利
 便初鞭後必溏也大便自調其人骨節疼翁翁如有熱狀奄然
 發狂濇然汗出而解者此水不勝穀氣與汗
 共併脉緊則愈消陽病客熱初傳入胃胃熱則
 者則小便當數大便當鞭今小便反不利大
 便自調者熱氣散漫不為實也飲食則胃中
 穀多內經曰食入於陰長氣於陽穀多則陽
 氣勝熱消津液則水少經曰水入於經其血
 乃成冰少則陰血弱金匱要略曰陰氣不通
 即骨疼其人骨節疼者陰氣不足也熱甚於

表者翕翕發熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫不專著於表裏故翕翕如有熱狀奄忽也忽然發狂者陰不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則脉流薄疾并乃與陽明蘊熱為實者須下之愈熱氣散漫不為實者必待汗出而愈故云澱然而汗出解也水穀之等者陰陽氣平也水不勝穀氣是陰不勝陽也汗出則陽氣衰脉緊則陰氣生陰陽氣平兩無偏勝則愈故云與陽明病欲解時從申至戌汗共并脉緊則愈

上四月為陽土王於申酉陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒相搏

故令噦也經曰關脉弱胃氣虛有熱陽明病不可大攻之熱去則寒起此之謂也

脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也陽明病脉遲則邪方入裏熱未為實也

飽飽則微煩而頭眩者穀氣與熱氣相搏也兩熱相合消搏津液必小便難利者不能發黃言熱得泄也小便不利則熱不得泄身必發黃疽黃也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下之則愈脉遲為熱氣未實雖下之腹滿亦不減也經曰脉遲尚未可攻

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也胃為津液之本氣虛津液少

其身如虫行皮中病則反無汗胃候身之肌肉者知胃氣久虛也陽明病反無汗而小便利

二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬
 不嘔手足不厥者頭不痛陽明病法多汗反
 陽明傷寒而寒氣內攻也至二三日嘔而
 支厥者寒邪發於外也必苦頭痛若不欬不
 嘔手足不厥者是寒邪俱攻裏而不外發其
 頭亦不痛也○傷寒論註曰一云冬陽明
 陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必
 咽痛若不欬者咽不痛陽明病身不重痛但
 明中風而風氣內攻也經曰陽明病若能食
 名中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者胃
 之系欬甚則咽傷故必咽痛胃氣不逆則
 不欬其咽亦不傷也○傷寒論註曰一云冬
 陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必

發黃陽明病無汗而小便不利者熱蘊於內
 於外而陽明病被火額上微汗出小便不利
 者必發黃陽明病則為內熱被火則火熱相
 熱得泄越不能發黃今額上小汗出而小便者
 便不利則熱不得越鬱蒸於胃必發黃也陽
 明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者
 必盜汗出浮為在經緊者裏實脉浮而緊者
 脉但浮而不緊者止是表熱也必盜汗出盜
 汗者睡而汗出也陽明病裏熱者自汗表熱
 者盜汗明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必
 衄陽明之脉起於鼻絡於口陽明裏熱則渴
 衄欲飲水此口燥但欲漱水不能嚥者是熱

在經而裏無熱也陽明氣血俱多陽明病本
 經中熱甚迫血妄行必作衄也
 自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了
 者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故
 令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日
 三四行今日再行故知大便不久出今為小
 便數少以津液當還入胃中故知不久必大
 便也先亡津液使大便鞭小便數傷寒嘔多
 雖有陽明證不可攻之嘔者熱在上焦未陽
 明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止

者死利止者愈陽明病腹滿者為邪氣入府
淺未全入府不可便下之心下鞭滿則邪氣尚
去正氣安正氣安則愈若因下利不止者為
正氣脫 陽明病面合赤色不可攻之必發熱
 而死
 色黃小便不利也合通也陽明病面色通赤
者熱在經也不可下之下
之虛其胃氣耗其津液經中之熱乘
虛入胃必發熱色黃小便不利也 陽明病
 不吐不下心煩者可與調胃承氣湯吐後心
內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不
下心煩即是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以
下鬱 陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其必
 重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻

裏也手足澌然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也傷寒論註曰一其熱不潮未可與承氣湯也法與桂枝湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下陽明病脈遲若汗出多微發熱出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足為熱蒸之則周身汗出清液不足為熱蒸之其手足澌然而汗出知大便已鞭也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可使與人承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

傷寒明理論承順也傷寒邪氣入胃者謂之入府府之為言聚也胃為水穀之海榮衛之源水穀會聚於胃變化而為榮衛邪氣入於胃也胃中氣鬱滯糟粕秘結壅而為實是正氣不得舒順也本草曰通可去滯洩可去閉塞而不利閉而不通以湯蕩滌使塞者利而閉者通正氣得以舒順是以承氣名之王冰曰宜下必以苦宜補必以酸言酸收而苦泄也枳實味苦寒潰堅

破結則以苦寒爲之主是以枳實爲君厚
朴味苦溫內經曰燥淫於內治以苦溫洩
滿除燥則以苦溫爲輔是以厚朴爲臣芒
硝味鹹寒內經曰熱淫于內治以鹹寒人
傷於寒則爲病熱熱氣聚於胃則謂之實
鹹寒之物以除消熱實故以芒硝爲佐大
黃味苦寒內經曰燥淫所勝以苦下之熱
氣內勝則津液消而腸胃燥苦寒之物以
蕩滌燥熱故以大黃爲使是以大黃有將

軍之號也承氣湯下藥也用之尤宜審焉
審知大滿大實堅有燥屎乃可投之也如
非大滿則猶生寒證而病不除况無滿實
者而結胃痞氣之屬由是而生矣是以脉
經有曰傷寒有承氣之戒古人亦特謹之

大承氣湯方

大黃

四兩苦溫
寒酒洗厚朴

半斤苦溫
炙去皮

枳實

五枚苦
寒炙

芒消

三合
鹹寒

內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實之
苦以潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫

厚朴之苦下結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒消之鹹以攻蘊熱

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓

內大黃煮取二升去滓內芒消更上火微

一兩沸分温再服得下餘勿服千金翼方同○

聖濟總錄大黃酒洗四兩厚朴去麤皮枳實炒

五右三味咬咀每服五錢匕水一盞半煎

至一盞去滓入芒消一錢匕更煎一二沸

温服

小承氣湯方

大黃四兩厚朴二兩炙枳實三枚大者炙

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者其小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去

芒消又以結不至堅故亦減厚朴枳實也

已上三味以水四升煮取一升二合去滓

分温二服初服譫語即止服湯當更衣不

爾者盡飲之若更衣者勿服之○聖濟總

錄陽明病其人多汗以津液外出胃中燥

大便必鞕鞕則讖語小承氣湯主之若一

服讖語止者勿再服大黃四兩厚朴去麤皮

枳實

者三枚

大右三味咬咀每服五錢匕水

一盞半煎至一盞去滓温服初服湯當更

衣不爾者盡飲之若更衣者勿服醫方大

成治傷寒潮熱譫語如有所見大便六七

日不通是有燥糞結滯此藥主之枳實一枚

製其去穢厚朴去皮姜右咬咀每服

五錢水盞半煎八分温服以利為度醫方集成

南北經驗方

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不

鞭者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲

知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者

此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初

頭鞭後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食

也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便

復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者

慎不可攻也潮熱者實得大便微鞭者便可

有潮熱亦未可攻若不鞭者則熱未成實雖

屎當先與小承氣湯隨之如有燥屎小承氣

湯熱勢緩不能宣泄必轉氣下失若不轉失

後必澹攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中乾燥則欲飲水水入胃中虛寒相搏氣逆而噦其後却發熱者則熱氣乘虛還復聚於胃中胃燥得熱必大便復鞭而少與小承氣湯微利與和之故以重云夫實則譫語不轉失氣不可咬內慎之至

虛則鄭聲鄭聲重語也內經曰邪氣盛則實精氣奪則虛譫語由邪氣盛而神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也譫語者言語不次也鄭聲者鄭音不正也論語云惡擲聲之亂樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不止也今新差氣虛人聲轉者是所謂重語直視譫語喘滿者者也若聲重亦聲轉之

死下利者亦死直視譫語邪勝也喘滿為氣上脫下利為氣下脫是皆主死

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者

死脉自和者不死亡陽胃燥譫語者脉短聿為正氣未衰而尤可生也傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服若吐若下皆傷胃氣不大便五六日內結也陽明王於申酉戌日晡所發潮熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣自餘若劇者是熱氣甚大也熱大甚於內昏胃正氣使

不識人至於循衣摸牀陽而不安微喘直視
 傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱
 劇者為陽勝脈弦為陰有餘澁為陰不足陽
 熱雖劇脈弦知陰未絕而猶可生脈絕則絕
 陰復不可治其邪熱微而未至於劇者但發
 熱下藥中病即止不必盡劑此以陽明病其
 熱未劇故云若一服利則止後服
 人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則
 譏語小承氣湯主之若一服譏語止更莫復
 服亡津液胃燥大便鞭而譏語雖無大熱內
 結亦須與小承氣湯和其胃氣得一服譏
 語下則胃燥以潤更莫復與陽明病譏語發
 承氣湯以本無實熱故也

潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣

湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉失氣

勿更與之明日不大便脈反微澁傷寒論者

裏虛也為難治不可更與承氣湯也陽明病

潮熱若脈沉實者內實者也則可下若脈滑

疾為裏熱未實則未可下先與小承氣湯和

之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小

承氣湯一升以涂之若不轉失氣者是無燥

屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脈得

沉實緊牢之類是裏實也反得微澁者寒氣

大虛也若大便利後脈微澁者正氣內衰為
 邪所勝故陽明病譏語有潮熱反不能食者
 胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭尔

宜大承氣湯下之引語潮熱為胃熱當消谷
 燥屎而胃中實也若能食者胃中虛熱雖鞭
 不得為有燥屎雜病虛為不欲食實為欲食
 傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛熱甚者
 能食與雜病為異也大承氣湯以下燥屎逐
 結陽明病下血讞語者此為熱入血室但汗
 出者刺期門隨其實而瀉之澼然汗出則愈
 陽明病熱入血室迫血下行使下血讞語陽
 明病法多汗以奪血者無汗故但頭汗出也
 刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除
 陽明之邪熱散邪除熱榮衛得通津液得復
 澼然汗傷寒論註出讞語者以有燥屎在
 出而解汗日一作臥
 胃中此為風也須下之過經乃可下下之

若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈

宜大承氣湯胃中有燥屎則讞語以汗出為

表未罷故云風也燥屎在胃則

當下以表未和則未可下須過太陽經無表

證乃可下之若下之早燥屎雖除則表邪乘

虛復陷於裏為表虛裏實胃中邪熱則止○傷寒

論註曰一云傷寒四五日脉沉而喘滿沉為

大柴胡湯

在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛

裏實久則讞語邪氣入內之時得脉沉而喘
 其汗令津液越出胃中乾燥大便三陽合病
 必難久則尿燥胃實必發讞語
 腹滿身重難以轉側口不仁而面垢傷寒論
 註曰又

發身

作枯一讖語遺尿發汗則讖語下之則額上

生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

身重難以反側口不仁讖語者陽明也針經

日少陽病其則面微塵此面垢者少陽也遺

尿者太陽病也參者以陽明證多故出陽明篇

中三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥

熱益甚必愈讖語若下之攻裏表熱乘虛內

陷必額上汗出手足逆冷其自汗出者三陽

經熱甚也內經曰熱則腠理開榮衛二陽併

通汗大泄與白虎湯以解內外之熱

病太陽證罷但發潮熱手足漿漿汗出大便

難而讖語者下之則愈宜大承氣湯

陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮

熱是熱併陽明一身汗出為熱越今手足漿

藥汗出是熱氣於胃也必大便難而讖語經

日手足漿然汗出者必大便已鞭也與大

承氣湯以下陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹

滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發

汗則燥心憤憤反讖語若加燒鍼必怵惕煩

燥不得眠若下之則胃中空虛客氣動隔心

中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

咽燥口苦為熱在經脈緊腹滿而喘汗出不

惡寒反惡熱身重為邪在裏此表裏俱有邪

煩躁不得眠也若下裏熱雖去則胃中空虛
 表中客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於膈使
 心中懊憹而不了了也舌上胎黃者熱氣客
 於胃中舌上胎白知熱氣客於胃中與梔子
 豉湯以吐邪若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加
 人參湯主之若下後邪熱客於上焦者為虛
 煩此下後邪熱不客於上焦而
 客於中焦者是為乾燥煩渴若脉浮發熱渴
 與白虎加人參湯散熱潤燥若脉浮發熱渴
 欲飲水小便不利者猪苓湯主之
 此下後客
 焦者也邪氣自表入裏客於下焦三焦供帶
 熱也脉浮發熱者上焦熱也渴欲飲水者中
 焦熱也小便不利者邪客下焦津液不得下
 通也與猪苓湯利小便以瀉下焦之熱也
 傷寒括要陽明病汗出而多渴者不可以

猪苓湯汗多者胃中燥也汗少者宜與之
 利其小便而愈 少陰病欬而下利譏語
 是為心經積熱小便難者 少陰病下利
 咽痛胸滿心煩者 厥陰病渴欲飲水者
 已上並宜服之
 猪苓湯方

猪苓 去皮 茯苓 甘平 阿膠 甘平
甘平 茯苓 甘平 阿膠 甘平

擣碎炒滑石 碎甘 澤瀉 甘鹹寒

甘甚而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓之
 甘以行小便鹹味湧泄為陰澤瀉之鹹以

泄伏水骨利 葶阿膠
滑石之滑以利水道

右五味以水四升先煮四味取二升去滓
內下阿膠烱消溫服七合日三服 千金翼方同

○聖惠方右件藥搗篩為散每服四錢以
水一中盞煎至五分 括要 去滓不計時候

溫服 神效萬全方同 無求子活人書陽明病脉浮
發熱渴欲飲水小便不利者 少陰病下

利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者並主
之猪苓 夫 茯苓阿膠 過 澤瀉滑石 各一兩 右

剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七

分去滓溫服 南陽活人書日三服 御藥院方治脉浮

煩渴不利小便不分猪苓澤瀉滑石赤茯苓

苓阿膠 各等分 右為麤末每服五錢水一盞

半煎至八分去滓溫服不拘時傷寒指掌

圖嘔渴心煩不得眠熱在下焦小便不利

猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠 各三錢 水一升

三合先煮四味取七合去滓內阿膠分三

服聖濟總錄治傷寒煩渴小便不利猪苓

去黑赤茯苓去黑皮滑石碎葛根剉澤瀉剉

右五味等分麤擣篩每服五錢匕水一盞

半煎至八分去滓不計時候溫服袖珍方

治脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓

茯苓滑石阿膠澤瀉右各等分水二盞煎

至一盞去滓溫服不拘時候

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗

多胃中燥猪苓湯復利其小便故也針經曰

於口輪於腸胃其液別為五大寒衣薄則為

津液外泄胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便也 脉浮而遲表熱裏

寒下利清穀者四逆湯主之浮為表熱遲為

者裏寒甚也與四若胃中虛冷不能食者飲

水則噦噦者咳逆是也千金曰咳逆者噦逆

氣逆脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脉浮

而噦脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄發熱

口乾鼻燥者熱在經也能食者裏和也熱甚

於經迫血為衄胃中虛冷陰勝也水入於經

其血乃成飲水者助陰氣逆為噦發熱口乾

陽勝也食入於陰長氣於陽能食者助陽血

梔子豉湯主之 表未罷而下者應邪熱內陷也熱內陷者則外熱而無手足寒今外有熱而手足溫者熱雖內陷然而

不深故不作結胃也心中懊憹飢不能食者熱客胃中為虛煩也熱自胃中熏蒸於上故

但頭汗出而身無汗與梔子豉湯以吐胃中之虛

煩 陽明病發潮熱大便溏小使自可胃脇

滿不去者小柴胡湯主之 陽明病初未為胃實大便鞭而小便

數今大便溏小便自可則胃熱未實而水穀不別也大便溏者應氣降而胃脇滿去今反

不去者邪氣猶在半表半裏之陽明病脇下間與小柴胡湯以去表裏之邪

鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而

汗出解也 陽明病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可下若脇下鞭滿雖

不大便而嘔舌上白胎者為邪未入府在表裏之間與小柴胡湯以和解之上焦則通則

嘔止津液得下則胃陽明中風脈弦浮大而氣因和汗出而解

短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻

乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有

潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病

過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘

證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治 大深

為陽風在表也弦則為陰風在裏也短氣腹滿脅下及心痛風熱壅於腹中而不通也若

寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛止此
 以風熱內壅故難久按而氣亦不通陽明病
 鼻乾不得臥自汗由者邪在表也此鼻乾不
 得汗而嗜臥者風熱內攻不干表也一身面
 目悉黃小便難有潮熱時時咳者風熱攻於
 胃也陽明之脈出大迎循頰車上手前過各
 主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺
 之經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻
 若外證不解雖過十日脈續浮者邪氣猶在
 半表半裏與小柴胡湯以和解之若其脈且
 浮而不弦大無諸裏證者是邪但在表也可
 與麻黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦者關
 格之疾也故云不治難經曰陽明病自汗出
 關格者不得盡其命而死
 若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬無
 求
 方活人書得效不可攻之當須自欲大便宜

蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆
 可為導津液內竭腸胃乾燥大便因硬此非
 結熱故不可攻宜以藥外治而導引
 之

蜜煎導方 ○傷寒指掌圖自汗大便秘

蜜七合活人書南陽活人書傷寒活人書

得效方袖珍方承類鈔方四兩指

掌圖一味內銅器中微火煎之稍凝似飴

狀攪之勿令焦著欲可凡併手捻作挺令

頭銳大如指長二寸許指掌圖當熱時急
 作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便

時乃去之

千金翼方同傷寒論云疑非仲景意已試甚良

猪膽汁方○傷寒指掌圖陽明自汗反小便

利尿雖硬不可攻宜此

大猪膽一枚瀉汁和醋

得效方少許以灌法醋

穀道中如一食頃當大便出

無求子活人書南陽活人

書傷寒活人書袖珍方永類鈐方同千金翼方傷寒論常大便出宿食惡物甚效

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可

發汗宜桂枝湯

陽明病脉遲汗出多當責邪在裏以微惡寒知表未解與

桂枝湯和表

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈

宜麻黃湯

陽明傷寒表實脉浮無汗而喘也與麻黃湯以頭汗

陽明病

發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出

身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此

為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之

但頭汗出身無

汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者熱甚於胃津液內竭也胃為土而色黃胃氣熱蒸則色奪於外必發黃也與茵陳湯逐熱退黃

傷寒明理論王冰曰小熱之氣涼以和之

大熱之氣寒以取之發黃者熱之極也非

大寒之劑則不能徹其熱茵陳蒿味苦寒

酸苦湧泄為陰酸以湧之苦以泄之泄甚熱者必以苦為主故以茵陳蒿為君心法南方火而主熱梔子味苦寒苦入心而寒勝熱大熱之氣必以苦寒之物勝之曰以梔子為臣大黃味苦寒宜補必以酸宜下必以苦蕩滌邪熱必假將軍攻之故以大黃為使苦寒相近雖甚熱大毒必祛除分泄前後復得利而解矣

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩 苦 梔子 十四枚 大黃 二兩 去

○傷寒論三兩

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以酸大黃之苦寒以下瘀熱

右三味以水一斗 傷寒論千金翼方一斗二升明理論二升 先

煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分

三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一

宿腹減黃從小便去也 ○衛生寶鑑身熱

不大便而發黃者茵陳 六兩 大黃 二兩 山梔子

十四 右剉每服酌量多少以水三升先煮
茵陳至二升內二味煮取一升去粗服

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本

有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色

必黑宜抵當湯下之內經曰血并於下亂而喜妄此下本有久瘀血

所以喜妄也津液少大便鞭以畜血在內房雖鞭大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀

血陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎

者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若

有燥屎者宜大承氣湯下後心中懊懣而煩者虛煩也當與梔子

豉湯若胃中有燥屎者非虛煩也可與大承氣湯下之其腹微滿初鞭後澹是無燥屎此熱不在胃而在上也故不可攻病人不大便五六日繞臍痛

煩燥發作有時者此有燥屎故使不大便也

不大便六七日者則大便必結為燥屎也胃中燥實氣不得下通故繞臍痛煩燥發作有時

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發也

熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜

發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯雖得陽明

證未可便為裏實審看脉候以別內外其脉實者熱已入府為實可與大承氣湯下之其

脉浮虛者是熱未入府猶在大下後六七日表也可與桂枝湯發汗則愈

不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以
 然者本有宿食故也宜大承氣湯大下之後
 能消谷至六七日不大便則宿食以結不消
 故便煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與
 大承氣湯病人小便不利大便乍難乍易時
 以下除之傷寒論註曰不能臥者有燥屎
 有微熱喘冒一作怫鬱也宜大承氣湯小便利則大便鞭此以有燥
 也宜大承氣湯小便利則大便鞭此以有燥
 乍易胃熱者發熱喘冒無時及嗜臥也此燥
 屎在胃故時有微熱喘冒不得臥也與大承
 氣湯以食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主
 下燥屎以食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主
 之得湯反劇者屬上焦也上焦主內胃為之

不受也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反
 劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸一升洗 人參三兩 生薑六兩切 大

棗十二枚

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳
棗十二枚 擘甘溫
藥黃生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以
脾緩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七
 合日三服湯反劇者屬上焦也 ○傷寒指
 掌圖吐利手足厥冷煩躁欲死嘔而胃滿

吳茱萸生薑各半人參分一水二盞棗一枚
煎至八分去滓服

太陽病寸緩關浮千金翼方陽明病寸口緩關上小浮尺弱其

人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以

醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者

此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣

十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法

救之渴者宜五苓散太陽病脈陽浮陰弱為邪在表今寸緩關浮尺

弱邪氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳經之邪入裏裏不和者必嘔此不嘔

但心下痞者醫下之早邪氣留於心下也如

其不下者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬

陽明也若吐若下若發汗後小便數大便鞭

者當與小承氣湯和之此不因吐下發汗後

小便數大便鞭若則無滿實雖不更衣十日

無所苦也候津液還入胃中小便數少大便

必自出也渴欲飲水者少少與之以潤胃氣

但審邪氣所在以法救之如渴不止與五苓

散是脈陽微而汗出少者為自和也汗出多

者為太過脈陽微者邪氣少汗出少者為適
汗出太過當故自和汗出多者反損正氣是
過也陽脈實因發其汗出多者亦為太過
太過為陽絕於裏亡津液大便困鞭也陽脈
表熱甚也因發汗熱乘虛烝津液外泄致汗
出太過汗出多者亡其陽陽絕於裏腸胃乾

燥大便因鞭也脉浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕浮芤相搏陰陽不諧胃津液其跌陽脉浮而澹浮則胃氣強澹則小陽為絕便數浮澹相搏大便則難其脾為約麻人丸主之跌陽者脾胃之脉診浮為陽知胃氣強束之約內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾弱約束津液不得四布但難與脾約丸通腸潤燥

麻人丸方

麻子人二升芍藥半斤枳實半斤大黃

一斤去厚朴一尺炙去杏仁一斤去皮尖

皮苦寒厚朴皮苦寒

溫○千金翼方一升內經曰脾欲緩急食上以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九

日二服漸加以知為度○無求子活人書

跌陽脉浮而澹浮則胃氣強澹則小便數

浮澹相搏大便則鞭其脾為約此主之類

鈴方證具大便秘門夫陽脈浮而高云云
 其彈為約脾約丸用枳殼等分不同為老
 人津少麻人五芍藥四兩○鈴厚朴五寸
 便秘皮薑枳實四兩大黃八兩杏仁二兩半
 汁炙去皮去杏仁去皮尖右
 為散蜜和為圓如桐子大飲下十圓未知
 益之日三服南陽活人書麻仁半芍藥二
 厚朴二寸半去積實二兩杏仁二合半大
 黃四兩服法與無求子活人書同

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也
 調胃氣湯主之蒸蒸者如熱熏蒸言甚熱也
 太陽病二日發汗不解則表

邪已罷蒸蒸發熱胃熱為傷寒吐後腹脹滿
 甚與調胃承氣湯下胃熱者與調胃承氣湯
 者與調胃承氣湯內經曰諸脹腹大皆屬於
 熱熱在上焦則吐吐後不
 解復腹脹滿者邪熱入胃也太陽病若吐若
 與調胃承氣湯下其胃熱
 下若發汗傷寒論此微煩小便數大便因鞭
 下有後字
 者與小承氣湯和之愈吐下發汗皆損津液
 表邪乘虛傳裏大煩
 者邪在表也微煩者邪入裏也小便數大得
 便因鞭者其脾為約也小承氣湯和之愈得
 病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭
 至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和
 之令小安至六日與承氣湯一升若不大便

六七日小便少者雖不能食傷寒論註曰但
 初頭鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須小便
 利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯針經曰脈
 下弱為陰脈當責邪在裏得病二三日脈弱
 是日數雖淺而邪氣已入裏也無太陽證為
 表證已罷無柴胡證為無半表半裏之證煩
 躁心下鞭者邪氣內甚也胃實熱甚則不能
 食胃虛熱甚至四五日則熱甚與大承氣湯一
 氣湯微和之至六七日則熱甚與大承氣湯一
 升若不大便六七日小便多者為津液內竭
 大便必鞭則可下之小便少者則胃中水谷
 不別必初鞭後溏雖不能食為胃實以小便
 少則未定成鞭亦不可攻須小便利尿定鞭
 乃可傷寒六七日目中不了了睛不和無表
 攻之

裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜
 大承氣湯內經曰諸脈者皆屬於目傷寒六
 睛不和者邪熱內甚上熏於目也無表裏證
 大便難者裏實也身大熱者表熱也身微熱
 者裏熱也針經曰熱病目不明熱不已者死
 此目中不了了睛不和則證近危惡也須急
 與大承氣湯下之陽明發熱汗多者急下之宜大承
 氣湯邪熱入府外發熱汗多者熱迫津液將
 註曰一云發汗不解腹滿痛者急下之宜大
 承氣湯發汗不解邪熱傳入府而成腹滿
 承氣湯滿痛者傳之迅也是須急下之
 不減減不足言當下之宜大承氣湯腹滿不
 減邪氣

實也經曰大滿大實白可除下之大承氣湯
下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下
余覆要略曰腹滿時減復如故此陽明少陽
為寒當與溫藥是減不足言也

合病必下利其脈不負者順也負者失也互
相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當

下之宜大承氣湯陽明土少陽水二經合病

脈不勝陽明不負是相尅為順也若少陽

脈勝陽明脈負者是鬼賊相尅為正氣失也

脈經曰脈滑者為病食也又曰滑數則胃氣

實下利者脈當微厥今脈滑數知胃有宿食

與大承氣湯病人無表裏證發熱六七日雖

以下除之脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱

則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜

抵當湯七八日邪入府之時病人無表裏證

下之浮為熱客於氣數為熱客於血下之非

熱去而浮數之脈相當解者下後數脈去而

脈但浮則是榮血間熱併於衛氣間也當為

邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴

之證此下之後浮脈去而數不解則是衛氣

間熱合於榮血間也熱氣合併迫血下行胃

虛脇熱消穀喜飢血至下焦若大便利者下

血乃愈若六七日不大便則血不得行畜積

於下為瘀血與抵若脈數不解而下不止必

脇熱而便膿血也下後脈數不解而不大便

為瘀血也若下後脈數不解而利不傷寒

止者為熱得下泄迫血下行必便膿血

發汗已身目為黃所以然者以寒濕傷寒論註曰一

溫在裏不解故也以為不可下也於寒濕中

求之金匱要略曰黃家所起從濕得之汗出

風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣內著脾色外

奪者身目為黃若瘀血在裏發黃者則可下

所以寒濕在裏故不可傷寒七八日身黃如

下當從寒濕法治之

橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於

外內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出小

便不利小腹痛滿者熱氣甚於外而津液不

得下行也與茵陳湯利小便退黃逐熱傷寒身黃

寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之胃有瘀熱

當須下去之此以發熱為熱

未實與梔子蘘皮湯解散之

梔子蘘皮湯方

梔子一十五甘草一兩黃蘘二兩○千金

聖濟總錄去麤皮炙

右三味以水四升煮取一升半翼方煮去

滓分溫再服○總錄右三味咬咀如麻豆

大每服三錢匕水一盞半煎取一盞去滓

溫服無求子活人書梔子八黃蘘一甘草一

半兩右判如麻豆大每服五錢匕水一盞

半煎至七分去滓溫服南陽活人書同

傷寒痲熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆

湯主之濕熱相交民多病痺黃也傷寒為寒濕在表發黃為痲熱在裏與麻黃

連軹赤小豆湯除熱散濕

麻黃連軹赤小豆湯方

麻黃二兩溫去節赤小豆甘一升連軹二兩連軹二兩連軹二兩

○千金方連軹杏仁○四十箇甘溫去皮尖大棗二十

方甘溫○千生梓白皮方一升苦寒○千金

方一兩辛溫切○千金甘草二兩

斤方生薑方三兩翼方二兩

平

內經曰濕上甚而熱治以甘溫佐以甘平以汗為故止此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

已上八味以潦水千金方一斗先煮麻黃

再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

半日服盡○無求子活人書麻黃一兩去

去黃汁焙乾秤甘草一兩赤小豆半杏仁二十枚

生梓白皮兩切二連軹一兩或作半右剉如

麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服南陽活

人書麻黃一兩去節湯泡甘草一兩連翹

一兩同赤小豆半斤大棗六個杏仁二十個生

根用切半斤生薑兩右剉如麻豆大每服

五錢水一盞半煮至八分去滓温服傷寒

指掌圖傷寒瘀熱在裏身必發黃中濕身

痛身目皆黃麻黃連軹甘草各六錢生梓

白皮赤小豆各一兩六錢杏仁四十大棗二十

枚生薑六錢二潦水三升三合半先煮麻

黃再沸去上沫內諸藥煮取一升去滓分

三服半日盡

辨少陽病脉證并治

少陽之病口苦咽乾目眩也足少陽膽經也

苦者名曰膽痺甲乙經曰膽者中精之府五

藏取決於膽咽為之使少陽之脉起於目鏡

皆少陽受邪故少陽中風兩耳無所聞目赤

口苦咽乾目眩

胃中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚少陽

之脉起於目皆走於耳中其支者下胃中貫

膈風傷氣風則為熱少陽中風氣壅而熱故

則亡血血虛者驚傷寒脉弦細頭病發熱者屬少陽

少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則

愈胃不和則煩悸經曰三部俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少

陽之邪因傳入胃必發譫語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃為少陽木邪干

之故煩本太陽病不解轉入少陽者脇下鞅而悸

滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊

者與小柴胡湯太陽轉入少陽是表邪入於裏脇下鞅滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脉沉

緊者邪陷入府為裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

則亡血血虛者驚傷寒脉弦細頭病發熱者屬少陽

少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則

愈胃不和則煩悸經曰三部俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少

陽之邪因傳入胃必發譫語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃為少陽木邪干

之故煩本太陽病不解轉入少陽者脇下鞅而悸

滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊

者與小柴胡湯太陽轉入少陽是表邪入於裏脇下鞅滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脉沉

緊者邪陷入府為裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

者與小柴胡湯裏實尚未可吐下而脉沉

緊為傳裏雖深未全入府外猶若已吐下發

汗溫鍼譫語柴胡湯證罷此為壞病知犯何

逆以法治之少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中乾

燥木邪于胃必發譫語若柴胡證不罷者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之

救之以治三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡

目合則汗關脉以候少陽之氣大陽之脉浮

合病膽熱則睡少陽病且欲眠睡目合則無汗以陰不得有汗但欲眠睡目合則汗知三

陽合病膽有熱也傷寒六七日無大熱其人燥煩者

此為陽去入陰故也表為陽裏為陰邪在表則外有熱六七日邪氣

入裏之時外無大熱內有燥煩傷寒三日三
 者長邪傳裏也故曰陽去入陰傷寒三日三
 陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此
 為三陰不受邪也傷寒四日表邪傳裏裏不
 和則不能食而嘔今反能
 食而不嘔是邪不傷寒三日少陽脉小者欲
 傳陰但在陽也內經曰大則邪至小則平傷寒三日邪
 已也傳少陽脉當弦緊今脉小者邪氣微而
 欲已少防病欲解時從寅至辰上內經曰陽
 也通於春氣寅卯辰
 少陽木生之時

釋音

廁初吏切瘕音假腹疸音旦憤古對切怵

初吏切 瘕音假腹 疸音旦 憤古對切 怵心亂也

辨太陰脉證并治

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時
 腹自痛若下之必胃下結鞭太陰為病陽邪
 傳裏也太陰之
 脉布胃中邪氣壅而為腹滿上不得降者嘔
 吐而食不下下不得上者自利益甚時腹自
 痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪
 于裏雖痛而亦不常痛但時腹自痛也若
 下之則陰邪留於胃下為結鞭經太陰中風
 曰病發於陰而反下之因作痞
 四肢煩疼陽微陰澁傷寒論而長者為欲愈
 太陰脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者
 風淫未疾也表邪少則微裏向和則澁而長

勅津切 惕音踢敬也 瘧丁賀切

長者湯也陰病見陽脈則生太陰病欲解時

以陰得陽則解故云欲愈

從亥至丑上脾為陰王王於丑亥太陰病脈

浮者可發汗宜桂枝湯經曰浮為在表沉為在裏太陰病脈浮者

邪在經也故自利不渴者屬太陰以其藏有

當汗散之

寒故也當溫之宜服四逆輩自利而渴者屬少陰為寒在下

焦自利不渴者屬太陰為寒在傷寒脈浮而

中焦與四逆等湯以溫其藏

緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若

小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下

利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故

也太陰病至七八日大便鞭者為太陰入府

傳於陽明也今至七八日暴煩下利十餘

行者脾家實腐穢去也下利煩躁者死此以

脾氣知逐邪下泄故雖暴煩下利日十餘行

而利必本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛

者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之表邪未罷

因乘虛傳於太陰裏氣不和故腹滿時痛

傷寒論桂枝三兩芍藥六兩甘草二兩人棗

十二枚生薑三兩右五味以水七升煮取三

升去滓溫分三服本云桂枝湯今加芍藥

千金翼方同

太實痛者桂枝加大黃湯主之大實大滿白

加大黃以下大實以太陰為病脉弱其人續自便利設

當行人黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易

動故也腹滿痛者太陰病也脉弱其人續自

黃芍藥攻滿痛者宜少與之

辨少陰病脉證并治

少陰之為病脉微細但欲寐也少陰為病脉

傳裏深也衛氣行於陽則寤行於陰則寐邪

傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病得吐不吐心煩但欲寐五六日自利

而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色

白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有

寒不能制水故令色白也欲吐不吐心煩者

滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六

日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬

太陰此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛

水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小

便色白也經曰下利欲飲水者熱有熱故也

此下利雖渴然以小便色白明非裏熱不可

察不病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬

少陰法當咽痛而復吐利脉陰陽俱緊為少

汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨

不可內食少陰寒甚
 是當咽痛而復吐利
 者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗
 也效而不利裏寒而亡津液也反以火劫強
 責少陰汗者津液內竭加大氣煩之故譏
 語小便少陰病脈細沉數病為在裏不可發
 難也少陰病始得之反發熱脈沉者為邪在經
 汗可與寐黃附子細辛湯發汗此少陰病脈
 細沉數為病在少陰病脈微不可發汗亡陽
 裏故不可發汗
 故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之脈微
 陽裏虛不可發汗脈弱濇為亡
 為亡陽裏虛復不可下
 少陰病脈緊至七
 八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者

為欲解也雖煩下利必自愈少陰病脈緊者
 日傳經盡欲解之時自下利脈暴微者寒氣
 得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者則手足厥
 而脈緊不去今手足反溫脈緊反去知陽氣
 復寒氣去故為欲解下利煩燥者逆此正勝
 邪微雖煩下少陰病下利若利自止惡寒而
 利必自止
 踰臥手足溫者可治少陰病小利惡寒踰臥
 手足溫者裏和陽少陰病惡寒而踰時自煩
 氣得復故為可治
 欲去衣被者可治惡寒而踰陰寒甚也時時
 復故云少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈少
 可治云少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈陰
 中風陽脈當浮而陽脈微者表邪緩也陰脈
 當沉而陰脈浮者裏氣和也陽中有陰陰中

有陽陰陽調少陰病欲解時從子至寅上陽和故為欲愈少陰病欲解時從子至寅上陽和故為欲愈

於子為一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此各陰得陽則解也少陰病吐

利手足不逆冷反發熱者不死脉不至論註傷寒

曰一者灸少陰七壯經曰少陰病吐利躁煩

作足者灸少陰七壯四逆者死吐利手足不

厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脉不至

至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脉少

陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱

必便血也膀胱太陽也少陰太陽為表裏少

湯太陽為諸陽主氣熱在太陽故一身手足

盡熱太陽經多血少氣為熱所乘則血散下

行必便少陰病但厥無汗而強發之必動其

血也

血未知從何道出或從口鼻或從目出是名

下厥上竭為難治但厥無汗熱行於裏也而

虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出

諸厥者皆屬於下但厥為下厥血亡於上為

上竭傷氣損血邪少陰病惡寒身踈而利手

甚正虛故為難治針經曰多熱者易已多寒者

足逆冷者不治難已此內外寒極純陰無陽

故云少陰病吐利躁煩四逆者死吐利者裏四

逆者寒甚於表躁煩則少陰病下利止而頭

陽氣欲絕是便死矣少陰病下利止而頭

眩時時自冒者死下利止則水谷竭眩少陰

病四逆惡寒而身踈脉不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身踈則寒甚脉不至則真氣絕
 煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為熱
 來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也
 譬猶燈將滅而暴明其能久乎○傷寒論註
 目一作吐利少陰病六七日息高者死腎為
 而躁逆者死少陰病六七日息高者死生氣
 之源呼吸之門少陰病六七日息高者死生氣
 不愈而息高者生氣斷絕也少陰病脉微
 細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自
 利復煩躁不得臥寐者死陰氣方盛至五六
 復則愈反更自利煩躁不得臥寐日傳經盡陽氣得
 則正氣弱陽不能復病勝藏故死少陰病始
 得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之
 少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖
 脉沉以始得則邪氣未深亦當温劑發汗以

散之

麻黃附子細辛湯方

麻黃二兩去節甘熱○無求子活細辛二

辛附子一枚炮去皮

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以
 辛開之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附
 子之辛以温
 小陰之經

右三味以水一斗千金翼方二斗先煮麻黃減二

升翼方去上沫內藥煮取三升去滓温服

一升日三服○活人書右剉如麻豆大每

服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫

服南陽活人書傷寒活人書同傷寒指掌圖少陰發熱

脉沉微汗之麻黃細辛各六錢二字半附子一箇水

三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內

諸藥取一升去滓分三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發

汗以三三日無證故微發汗也二三日邪未深也既無吐

利厥逆諸裏證則可與麻黃附子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩去節○南陽活人書三兩無求子活人書湯炮去黃汁焙乾秤甘

草二兩附子一枚炮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫熱氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升千金翼方

煮取二升半去滓溫服八合日三服○無求子活人書

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半

煮至八分去滓溫服聖濟總錄同相次三兩服

以身微汗為度南陽活人書同

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃

連阿膠湯主之脉經曰風傷陽寒傷陰少陰

上寒極變熱之時熱煩於內心中煩

不得卧也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方
黃連四兩黃芩一兩芍藥二兩雞子黃二枚

苦寒 甘阿膠三兩 甘温〇千

温阿膠金翼方三挺 陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱

陰不足以甘補之雞黃阿膠之甘以補血

酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱 右五味以水五升六升先煮參物取二升

去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得

温服七合日三服〇無求子活人書黃連

一兩阿膠三分雞子黃半筒黃芩一分芍藥半兩右剉

如麻豆大每半劑得效方水二盞煎取一

盞去滓內膠消盡內雞子黃攪令和温服

永類鈔 方同 日二服南人活人書黃連一兩阿膠

二分黃芩二分芍藥二分雞子黃半個右剉如麻豆

大水二中盞煮取八分去滓內膠消盡內

雞子黃攪令勻温服日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當

灸之附子湯主之少陰客熱則口燥舌乾而

無熱也背為陽背惡寒者陽氣弱陰氣勝也

經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰

溫經散寒

附子湯方 附子二枚破八片 茯苓三兩 人參二兩 甘

濟總錄 白朮四兩 芍藥三兩

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓

為病火欲實水當平之不欲偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一

升日三服千金翼方同總錄服法 ○無求

子活人書少陰病得之一二日口中和背

惡寒者當灸之 少陰病身體痛手足寒

骨節痛脈沉者並宜服之茯苓芍藥各一

人參一兩 白朮二兩 附子一枚炮 右剉如麻豆

大每服五錢七得效方 水一盞半煎至七

分去滓溫服日三服傷寒活人書同 傷寒指掌圖

陰證脈沉身痛少陰背惡寒口中和附子

生一枚 茯苓芍藥人參 各一兩 白朮 錢一兩 三字 水

二升六合煮取一升去滓分三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子

湯主之 少陰腎水而主骨節身體疼痛若脈

浮手足熱則可發汗此手足少陰病下利便

寒脈沉故當與附子湯溫經 膿血者桃花湯主之 陽病下利便膿血者叶

血者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂 一斤 一半全用 乾姜 一兩 粳米 一升

半篩末甘温

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七

合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈

餘勿服 千金翼 ○無求子活人書治少陰

病下利便膿血者或病二三日至四五日

腹痛小便不利下利不止便膿血者乾姜

一分 赤石脂 四兩 一半碎一半篩末 ○南

炮 右剉如麻豆大每服四錢入糯米一撮水

煎服之

右剉如麻豆大每服四錢入糯米一撮水

煎服之

煎服之

一盞半煎至一盞去滓再入赤石脂末一

方寸匕服日三服活人書右水二大白盞煮三味米熟去滓內赤

石脂細末一方寸温服六分盞日三服若一服愈勿再服類

同方糯米或作粳米傷寒指掌圖少陰下

利膿血濕毒下利赤石脂五兩三錢一半全用一半為末

糯米三錢乾姜三字水二升三合煮米令熟

去滓温服二合半內赤石脂末方寸匕日

三愈勿更服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下

利不止便膿血者桃花湯主之二三日以至四五日寒邪

入裏深也腹痛裏寒也小便不利者水穀不

別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不

固也與桃花湯少陰病下痢便膿血者可刺

固腸止利也足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之吐利手足厥冷

則陰寒氣甚煩躁欲死者陽氣少陰病下痢

內爭與吳茱萸湯助陽散寒咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之少陰之脈從

入肺中則循喉嚨其支別者從肺出絡心注

胃中邪自陽經傳於少陰陰虛客熱下利咽

痛胃滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚湯方

猪膚一斤

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣

利斷

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜

一升白粉五合熬香和相得温分六服千金

翼方 ○無求子活人書猪膚二兩六錢半 右一

味以水二大盞半煮取一盞許去滓加

白蜜一合半白粉一合永類鈐方此下有相和温服四字

南陽活人書猪膚兩四 右一味水二大盞

半煮取一盞二分去滓加白蜜一合半白

粉一合二勺半傷寒指掌圖猪膚五兩 水三

升三合半煮取一升七合加白蜜三合半

白粉二合熬香和合相得分三服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者

與桔梗湯陽邪傳於少陰邪熱為咽痛服甘

服甘草湯若不差與桔梗湯以和少陰之氣

甘草湯方

甘草 二兩 ○ 承類 鈐方 炙

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服

七合日二服 千金翼方神 ○無求子活人

書右剉如麻豆大每服四錢匕水一盞煎

至六分去滓溫服日二服 南陽活人書同 鈐方右

咬咀四錢水煎六分溫服不差與桔梗湯

桔梗湯方

桔梗 一兩 辛甘微溫 ○ 甘草 二兩 千金翼方 一大枚 甘平

桔梗辛溫以散寒甘草味甘平以除熱甘梗相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再

服 神巧萬全方同 ○無求子活人書右剉如麻豆

大每服抄五錢匕 承類鈐方三錢 水一盞半煎至

八分去滓溫分再服 南陽活人書同 傷寒指掌圖

桔梗 兩半 甘草 兩一分 二服每服水一盞煎至

八分去滓溫服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦

酒湯主之 熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能言語聲不出者與苦酒

湯以解熱愈咽瘡

苦酒湯方

無求子活人書
苦酒米醋是也

半夏

洗破如棗核大十四枚
辛温〇神雞

子

一枚去黃內上苦酒
微寒

辛甘

散之半夏之辛以
以緩咽痛酸以收之
苦酒之酸

以歛

咽瘡

右二味

內半夏著苦酒中以雞子殼置刀
鏤中安火上令三沸去滓少少含嚥之不

差更作三劑

千金翼方南陽活人書
得效方永類鈐方同

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主

少陰客熱

咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽痛
半夏散及湯主少陰客寒咽痛也

半夏散及湯方

半夏

洗辛桂枝去皮甘草炙各等分

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半

夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正

氣

已上三味各別擣篩已合治之白飲和服

方寸匕日三服若不能散服者以水一升

煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸下火令

外冷少少嚥之

千金翼方傷寒論神巧萬
全方半夏有毒不當散服

○無求子活人書右等分各別搗篩已令

和治之每服三錢水一大盞煎至八分令

冷少少嘔之南陽活人書 承類鈐方同

少陰病下利白通湯主之少陰主水少陰各 寒不能制水故自

利也白通湯 温裏散寒

白通湯方

葱白四莖 辛温 乾姜一兩 辛熱 附子一枚 生用 去皮 破八片 辛熱

內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白 之辛以通陽氣姜附之辛以散陰寒

右三味以水三升煮取一升去滓分温再

服千金翼 方同 ○無求子活人書附子一枚 生用 乾

薑一兩 炮 右剉如麻豆大每服抄五錢承類

鈐方三錢 水一盞半入葱白四寸南陽活人書 傷寒活人書

二煮至七分去滓温服

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆

無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯

脉暴出者死微續者生少陰病下利脉微為 寒極陰勝與白通湯

復陽散寒服湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者

寒氣大甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯 和猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而 逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服

湯脉暴出者正氣因發世而脫也故死脉微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

葱白四莖乾姜一兩附子一枚生去皮破八片人尿五合鹹寒

猪膽汁一合苦寒

內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下盛之后冷體既消熱性便發由是病氣隨愈區噦皆除清且不違而致大益此和入尿猪膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格拒之寒也

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽亦可

用千金翼方同

○無求子活人書猪膽生合乾薑

半兩葱白四莖溺二合附子半個生去皮右以水

一盞煎至五分去滓內尿膽汁和相得分

溫再服永頌鈐方同

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯主之少陰病二三日則邪氣猶淺至四五日邪氣已深腎主水腎病不能制水水飲停為水氣腹痛者其濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚小便不利自下利者濕勝而水谷

不別也內經曰濕勝則濡泄
與真武湯益陽氣散寒濕

傷寒明理論真武北方水神也而屬腎用
以治水焉水氣在心下外帶表而屬陽必
應發散故治以真武湯青龍湯主太陽病
真武湯主少陰病少陰腎水也此湯可以
和之真武之名得矣茯苓味甘平白朮味
甘溫脾惡濕腹有水氣則脾不治脾欲緩
急食甘以緩之滲水緩脾必以甘為主故
以茯苓爲君白朮爲臣芍藥味酸微寒生

薑味辛溫內經曰濕淫所勝佐以酸辛除
濕正氣是用芍藥生薑酸辛爲佐也附子
味辛熱內經曰寒淫所勝平以辛熱溫經
散濕是以附子爲使也水氣內漬至於散
則所行不一故有加減之方焉若欬者加
五味子細辛乾薑欬者水寒射肺也肺氣
逆者以酸收之五味子酸而收也肺惡寒
以辛潤之細辛乾薑辛而潤也若小便利
者去茯苓茯苓專滲泄也故若下利者去

芍藥加乾薑酸之性泄去芍藥以酸泄也
辛之性散加乾薑以散寒也嘔者去附子
加生薑氣上逆則嘔附子補氣生薑散氣
兩不相損氣則順矣增損之功非大智孰
能貫之

真武湯方

茯苓三兩芍藥三兩生薑二兩切白朮二兩
附子一枚炮去皮
甘平破八片辛熱
脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾
逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以

酸平附子芍藥生薑
之酸辛以溫經散濕

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七

合千金翼方此下云欬者加五味子半升

苓下利者去芍藥加乾薑二兩嘔者去附子加生薑足前為半斤利不止便膿血者宜桃
花湯日三服後加減法○無求子活人書

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下

悸頭眩身潤動振振欲擗地者此主之

少陰病二三日不已至四五日腹滿小便

不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水

氣其人或欬或小便便利或下利或嘔者此
 主之白朮三分茯苓三分芎藥三分
者去芍藥加乾薑二分附子一枚炮去皮
片嘔者去附子加生姜三兩或云生薑
足前成三兩○活人書足前為一兩
 劉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片水
 一盞半煎至八分去滓溫服日三服若欬
 皆加五味子三分細辛一分乾薑一分經
 驗良方治病人心煩但欲睡至四五日腹
 痛小便不利四肢沉重疼痛或咳或小便

利或下利或嘔者 又治頭痛腰脊強汗
 出不解仍發熱心下悸頭眩身瞶動振振
 欲擗地者白茯苓去皮生姜各三兩白芍藥白
 朮各二兩附子一枚炮去皮尖右為粗末水
 八盞煮三盞去滓每溫服七分盞日三服
 不拘時

若欬者加五味子半升細辛乾姜各一兩逆氣
欬者五味子之酸以收逆氣水寒相若小便
搏則欬細辛乾姜之辛以散水寒
 利者去茯苓水故去茯苓若下利者去芍

藥加乾姜二兩 芍藥之酸泄氣 乾姜之辛散寒 若嘔者去附

子加生姜足前成半斤 氣逆則薑附子補氣 生姜散氣 千金曰嘔

家多服生姜此 為嘔家聖藥 少陰病下利清穀裏寒外熱

手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤

色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者

通脉四逆湯主之 下利清谷手足厥逆脉微 欲絕為裏寒身熱不惡寒

面色赤為外熱此陰甚於內格陽於外 不相通也與通脉四逆湯散陰通陽

通脉四逆湯方

甘草 二兩 炙 附子 大者一枚生用 乾姜 三兩 去皮破八片 強人

可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分

温再服其脉即出者愈 千金翼方同 ○無求子

活人書治少陰病下利清穀裏寒外熱手

足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色

赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出

者下利清穀裏寒外熱汗出而厥者甘草

二兩炙 ○南陽 活人書一兩 乾薑 三兩炮 ○活 人書二兩 附子 大

一枚生用 破 右剉如麻豆大每服抄五錢

匕水一盞半煎至八分去滓溫服未差急更作一劑其脉續出者愈加減法

面色赤者加葱九菀葱味辛以通陽氣腹中痛者去

葱加芍藥二兩芍藥之酸通寒利腹嘔者加

生姜二兩辛以散之嘔痛者去芍藥加桔

梗一兩梗咽中如結加桔利止脉不出者去桔

梗加人參貳兩利止脉不出者亡血也加人

血也四逆加人參湯主之久少陰病四逆其

人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利

下重者四逆散主之四逆者四肢不溫也傷

熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深

故四肢逆而不溫也及至厥陰則手足厥冷

是又甚於逆四逆散傳陰之熱也

四逆散方 甘草炙 枳實破水漬炙乾 芍藥○無求

效方柴胡苦寒 芍藥酸微

丙經日熱淫於內佐以甘苦以酸收之以

醋以收陰氣柴胡之苦以泄裏熱芍藥之

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕活

書得效方二錢南日三服千金翼
陽活人書三錢方同

欬者加五味子乾姜各五分并主下痢肺寒逆
則欬五味子之酸收逆氣乾姜之辛散肺寒
并主下痢者肺與大腸為表裏上欬下痢治
則頗悸者加桂枝五分悸者氣虛而不能通
同桂猶圭也引導小便不利者加茯苓五分
也陽氣若熱以導陽氣若熱以導
淡茯苓味甘而腹中痛者加附子一枚活人書
淡用以滲泄淡用以滲泄
半炮令圻裏虛遇邪則痛泄利下重者先以
水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三
方寸七內湯中煮取一升半活人書得效方
泄利下重先濃

煎薤白湯內藥末三分温再服泄利下重者
錢七耳煮一二沸下焦氣滯也
加薤白以少陰病下利六七日欬而嘔渴心
煩不得眠者猪苓湯主之下利不渴者裏寒
者屬太陰以其藏寒故也此下利嘔渴知非
虛虛寒心煩不得眠知叶熱也與猪苓湯滲
泄小便分別水谷經日復不少陰病得之二
止當利其小便此之謂歟少陰病得之二
三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯湯寒
五六日邪傳少陰則口燥舌乾而渴為邪漸
深也今少陰病得之二三日邪氣未深入之
時便作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水少陰
乾也急與大承氣湯下之以全腎也少陰
病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急

下之宜大承氣湯少陰腎水也青肝色也自

曰從前來者為實邪以腎蘊實邪必心少陰

病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣

湯此少陰入府也六七日少陰之邪入府之

時陽明內熱壅甚腹滿不大便也陽明病

土勝腎水則乾急與大少陰病脉沉者急溫

承氣湯下之以救腎水少陰病脉沉者急溫

之宜四逆湯既吐且利小便復利而大汗出

者不云急溫此少陰有脉沉而云急溫者彼

雖寒甚然而證已形見於外治之則有成法

此初頭脉沉未有形證不知邪氣所少陰病

之將發何病是急與四逆湯溫之

飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始

得之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下也

當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急

溫之宜四逆湯傷寒表邪傳裏至於少陰少

邪既留於胃中而不散者飲食入口則吐心

中溫溫欲吐陽受氣於胃中邪既留於胃中

則陽氣不得宣發於外是以始得之手足寒

脉弦遲此是胃中實不可下而當吐其膈上

有寒飲亦使人心中心溫而手足寒吐則物

出嘔則物不出吐與嘔別焉胃中實則吐而

物出若膈上有寒飲則但乾嘔而不吐少陰

病下利脉微瀝傷寒論嘔而汗出必數更衣

反少者當溫其上灸之脉微為亡陽瀝為亡

陽亡血也津液不足裏有虛寒必數更衣反少者溫其上以助其陽也灸之以消其陰

辨厥陰病脉證并治

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而

不欲食食則吐虵下之利不止邪傳厥陰則熱已深也邪

自太陽傳至太陰則腹滿而盛乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥

陰成消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便少者謂之消渴木生於火肝氣通心厥陰

客熱氣上撞心中疼熱傷寒六七日厥陰受病之時為傳經盡則當入府胃虛客熱飢

不欲食虵在胃中無食則動聞食臭而出得食吐虵此熱在厥陰經也若便下之虛其胃

氣厥陰木邪相厥陰中風脉微浮為欲愈不乘必吐下不止

浮為未愈經曰陰病見陽脉而生浮者陽也厥陰中風脉微浮為邪氣還表向

汗之時故厥陰病欲解時從丑至卯上厥陰云欲愈

王於卯丑寅向厥陰病渴欲飲水者少少與

之愈邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水者少少與之胃氣得潤則愈諸

四逆厥者不可下之虛家亦然四逆者四肢不溫也厥者

手足冷也皆陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然下之是為重虛金匱玉函曰虛者十

補勿一傷寒先厥後發熱而利者必自止見瀉之

厥復利陰氣勝則厥逆而利陽氣復則發熱利必自止見厥則陰氣還勝而復利

也傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利

者當不能食今反能食者恐為除中傷寒論

云消中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈

恐暴熱來出而復去也後三日脉之其熱續

在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六

日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九

日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脉

之而脉數其熱不罷者此為熱氣有餘必發

癰膿也始發熱邪在表也至六日邪傳厥陰

陰氣勝著作厥而利厥反九日陰寒

氣多當不能食正及能食者恐為除中除去

也中胃氣也言邪氣大甚除去胃氣胃欲飲

食自收故暴能食此欲勝也食以索餅試之

若胃氣絕得麩則必發熱若不發熱者胃氣

尚在也恐是寒極變熱因暴熱來而復去使

之能食非除中也金匱要略曰病人索不能

食而反暴思之必發熱後三日脉之其熱續

在者陽氣勝也期之旦日夜半愈若旦日

不愈後三日脉數而熱不罷者為熱氣有傷

餘必發癰膿經日數脉不時則生惡瘡傷

寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲

為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷常不

能食今反能食此名除中必死傷寒脉遲六

已深反與黃芩湯寒藥兩寒相搏腹中當冷

類聚四十四

五十七

自止而反汗山咽中痛者其喉為痺發熱無
 汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者
 其喉不痺傷寒先厥而利陰寒氣勝也寒極
 出咽中痛其喉為痺者熱氣上行也發熱無
 汗而利必自止利不止必使膿血者熱氣下
 行也熱氣下而不傷寒一二日至四五日而
 厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深
 厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口
 傷爛赤前厥後發熱者寒極生熱也前熱後
 微隨陽氣陷之深淺也熱之伏深必須下去
 之反發汗者引熱上行必口傷爛赤內經曰

火氣內發傷寒病厥五日熱亦五日設六日
 上為口糜傷寒病厥五日熱亦五日設六日
 當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五
 日故知自愈陰勝則厥陽勝則熱先厥五日
 日後復厥者陰復勝若不厥為陽全勝故自
 愈經曰發熱四日厥反三日復熱四日厥少
 熱多其是厥者陰陽氣不相順接便為厥厥
 病為愈是厥者陰陽氣不相順接便為厥厥
 者手足逆冷是也手之三陰三陽相接於手
 於足十指陽氣內陷陽不與陰傷寒脈微而
 相順接故手足為之厥冷也傷寒脈微而
 厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為
 藏厥非為蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病

者靜而復時煩此為藏寒虻上入膈故煩須
 與復止得食而嘔又煩者虻聞食臭出其人
 當自吐虻虻厥者烏梅圓主之又主久利方
 藏厥者死 陽氣絕也虻厥雖厥而煩吐虻日
 則靜不若 厥而躁無暫安時也病人藏寒
 胃虛虻動 上膈聞食臭出因
 而吐虻與烏梅食濕藏安蟲
 烏梅圓方

烏梅 三百箇 細辛 六兩 乾薑 十兩 黃連 一斤
 味酸 溫 辛 熱 辛 熱 辛 熱 辛 熱
 苦當歸 四兩 附子 六兩 炮 蜀椒 四兩 去桂
 寒 辛 溫 辛 溫 辛 熱 辛 熱 辛 熱 辛 熱
 枝 六兩 人參 六兩 黃蘗 六兩 苦寒
 辛 熱 辛 溫 甘 溫 苦 寒

肺主氣肺欲收急食酸以收之烏梅之酸
 以收陽氣脾欲緩急食甘以緩之入參之
 甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之以苦堅
 之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所
 勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒虻得甘
 則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安虻
 右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一
 宿去核蒸之五升米下飯熟擣成溼和藥
 令相得內臼中與蜜杵二千下食如梧桐
 子大先食飲服十圓日三服稍加至二十
 圓禁生冷滑物臭食等千金翼方同 ○神巧萬
 全方烏梅 八十個 ○無求子活人書 細辛

一兩黃連四兩當歸兩附子一兩蜀椒一兩

枝一兩人參一兩黃蘗二兩指掌圖一兩

乾姜二兩右十味搗篩合治之以苦酒漬

烏梅一宿去核蒸之五斗活人書指米下

飯熟搗成泥和藥令相得內白中與蜜杵

二千活人書指下丸如梧桐子大先食飲

服十九日三服稍加至二十九忌生冷滑

物等南陽活人書與無求子活人書同

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數

日小便利色白者此熱除也欲得食其病為

愈若厥而嘔胃脇煩滿者其後必便血指頭寒者

是厥微熱少也默默不欲食煩躁者邪熱初

傳裏也數日之後小便色白裏熱去欲得食

為胃氣已和其病為愈厥陰之脈挾胃貫膈

布脇肋厥而嘔胃脅煩滿者傳邪之熱甚於

裏也厥陰肝主血後數日熱不去病者手足

又不得外世迫血下行必致便血厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結

在膀胱關元也手足厥不結胃者無熱也小傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者其後必

便膿也先熱後厥者陽氣邪傳裏也發熱為邪氣在表至四日後厥者傳之陰也

後三日復傳陽經則復熱厥少則邪微熱多為陽勝其病為愈至七日傳經盡熱除則愈

熱不除者為熱氣有餘內搏傷寒厥四日熱厥陰也血其後必大便膿血

反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣

退故為進也傷寒陰勝者先厥至四日邪傳裏重陰必陽却熱三日七日傳

經盡當愈若不愈而復厥者傳作再經至四日則當復熱若不復熱至五日厥不除者陰

勝於陽其傷寒六七日脉微手足厥冷煩燥病進也

灸厥陰厥不還者死傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷脉浮身熱

為欲解若反脉微而厥則陰勝陽也煩燥者陽虛而爭也灸厥陰以復其陽厥不還則陽

氣已絕不能復正而死傷寒發熱下利厥逆躁不得臥

者死傷寒發熱邪在表也下利厥逆陽氣傷虛也躁不得臥者病勝藏也故死

寒發熱下利至甚厥不止傷寒論者死金匱要

府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者利下不禁傷寒發熱為邪氣獨甚下利至甚厥

不止為府藏傷寒六七日不利便發熱而利氣絕故死

其人汗出不止者死有陰無陽故也傷寒至七日為

邪正爭之時正勝則生邪勝則死始不下利而暴忽發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽

氣脫也傷寒五六日不結胃腹濡脉虛復厥

者不可下此為亡血下之死傷寒五六日邪氣當作裏實之

時若不結胃而腹濡者裏無熱也脈虛者亡血也復厥者陽氣少也不可下下之為重虛故死金匱玉函曰虛發熱而厥七日下利者者重瀉真氣乃絕邪傳裏也至七日傳經盡為難治發熱而厥邪當汗出而解反下利則邪氣勝裏氣傷寒脈促傷寒論註手足厥逆虛則為難治傷寒脈促曰一作縱脈逆則者可灸之為陽虛不相接灸之以助陽氣傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之滑為氣內陷是裏熱也與手足厥寒脈細欲絕者白虎湯以散裏熱也手足厥寒者陽氣外虛不內弱脈行不利與當歸四逆湯助陽生陰也

當歸四逆湯方

當歸 三兩 辛溫 〇 桂枝 三兩 辛熱 芍藥 三兩 細

辛 三兩 大棗 二十五箇 甘溫 〇 傷寒 甘草

二兩 炙 通草 二兩 平 〇 傷寒 甘草

內經曰麻者血之府也諸血者皆屬心通脈者必先補心益血苦先入於心當歸之苦以助心血必苦緩急食甘以緩也大棗甘草通草之甘以緩陰血

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一

升日三服得效方云內有久寒 〇 無求子

活人書當歸洗桂枝芍藥細辛 各一兩半 〇 南陽活

人書各各一兩炙○活通草甘草人書六錢三字右剉如

麻豆大每服五錢匕水一盞半棗一枚煎

至八分去滓溫服方同類鈔聖濟總錄當歸

切桂皮去麤芍藥細辛去苗葉各一兩木通甘草炙

七右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞

半棗二枚擘破煎至八分去滓溫服玉機

微義治感寒手足厥冷脉細欲絕者當歸

桂枝白芍細辛各三錢大棗三枚甘草炙通草

各二錢右咬咀水煎傷寒指掌圖下之厥逆

當歸芍藥桂枝細辛各一兩甘草通草各六錢

半水二升七合大棗二十五箇或用十箇煮

取一升去滓分三服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸

牛薑湯主之茱萸辛溫以散久寒生薑辛溫以行陽氣

傷寒論當歸三兩芍藥三兩甘草二兩通草二兩

桂枝三兩細辛三兩生姜半斤吳茱萸二升大

棗二十五枚右九味以水六升清酒六升和

煮取五升去滓溫分五服一方水酒各四升

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆
 而惡寒者四逆湯主之大汗出則熱當去熱反不去者亡陽也內拘急下利者寒甚於裏四逆湯復陽散寒 大汗
 惡寒者寒甚於表與四逆湯復陽散寒 大汗
 若大下利而厥冷者四逆湯主之大下利內外雖殊其亡津液損陽氣則一也陽虛陰勝故生厥逆與四逆湯固陽退陰 病人手
 足厥冷脉乍緊者邪結在胃中心中滿而煩
 飢不能食者病在胃中當須吐之宜瓜蒂散
手足厥冷者邪氣內陷也脉緊者為實邪氣入府則脉沉今脉乍緊知邪結在胃中為實故心中滿而煩胃中無邪則喜飢以病在胃中雖飢而不能食與瓜蒂散以吐胃中之

邪傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓

甘草湯却治其厥不令水漬入胃必作利也

金匱要略曰水停心下甚者則悸厥雖寒勝然以心下悸為水飲內甚先與茯苓甘草湯治其水而後治其厥若先治厥則水飲浸漬入胃必作下利 傷寒六七日

大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至

咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃

升麻湯主之傷寒六七日邪傳厥陰之時大

脉遲而手足厥逆下部脉不至厥陰之脉貫肝上注肺循喉嚨在厥陰經射肺因亡津液遂成肺痿之病從何得之被快藥下利重亡

類聚 四十四 六十五

津液故得之若泄利不亡者為裏氣大虛故云難治與麻黃升麻湯以調肝肺之氣

麻黃升麻湯方 麻黃 二兩半 去節 升麻 一兩一分 當歸 一兩一分

知母 苦寒 黃芩 苦寒 萎蕤 甘平 各寸八 傷寒論註曰一作菖蒲

石膏 碎綿裹 白朮 甘溫 乾薑 辛熱 芍藥 酸平 天門

冬 去心 桂枝 辛熱 茯苓 甘平 甘草 炙甘平 各六銖

玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛

者以辛潤之當歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心片熱津

液少者以甘潤之茯苓白朮之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥之

酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺除熱

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去

上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相

去如炊三斗米頃令盡汗出愈千金翼方得效方同

○千金方麻黃知母萎蕤一作菖蒲黃芩各三

升麻芍藥當歸乾薑石膏茯苓白朮桂心

甘草麥門冬各二兩右十四味咬咀以水一

斗先煮麻黃減二升去上沫次內諸藥煮

取三升分服一升微取汗愈無求子活人

書麻黃

二兩半去節湯泡

升麻當歸

各一

分知母黃芩

各三萎蕤

芍藥

傷寒活人書赤芍藥麥

門冬

去桂枝皮茯苓

南陽活人書三分甘草

姜

炮石膏裏碎解白朮

各一右剉如麻豆大

每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓

溫服相次一炊久進一服汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此

欲自利也

傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛轉氣下趣少腹者裏虛遇寒寒

氣下行欲傷寒本自寒下醫復吐下之寒格

作自利也

更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人

參湯主之

傷寒邪自專長為本自寒下醫反此下損傷正氣寒氣內為格拒經

日格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛而死是更逆吐下與乾薑黃連黃

芩人參湯以通寒格

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑

辛熱黃連 苦寒黃芩 苦寒人參 甘溫各

辛以散之甘以緩之乾姜人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再

服傷寒論千 ○無求子活人書乾薑炮

兩陽

活人書 黃芩黃連人參各三分 右剉如麻豆

大每服抄五錢水一盞半煎至八分活人書

煮取八分去滓溫服

下利有微熱而渴脉弱者今自愈下利陰寒之疾又大

熱者逆自微熱而渴裏氣方溫也經曰諸下

利脉數有微熱汗出今自愈設復緊為未解

下利陰病也脉數陽脉也陰病見陽脉者生

微熱汗出陽氣得通也利必自愈諸緊為寒

設復脉緊陰氣下利手足厥冷無脉者灸之

猶勝故云未解

不溫若脉不還反微喘者死下利手足厥逆

勝陽氣大虛也灸之陽氣復手足溫而脉還

為欲愈若手足不溫脉不還者陽已絕也反

微喘者陽少陰負跌陽者為順也少陰腎水

下為腎邪干脾水不勝下利寸脉反浮數

尺中自濇者必清膿血下利者脉當沉而遲

濇為無血尺中自濇者腸胃血散也隨利下

下必便膿血清與胃通脉經曰清者屬胃下

利清穀不可攻表汗出必脹滿下利者胃

熱不死沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主

者邪氣微而陽氣復為欲自止下利脉沉而

雖發熱止由陽勝非大逆也

遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱

冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴

陽下虛故也下利清穀脉沉而遲裏有寒也

人微厥針經曰下虛則厥表邪欲解臨汗下

之時以裏先虛必鬱冒然後汗出而解也

利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以

有熱故也經曰脉數不解而下不利後脉

絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還

者死下利後脉絕手足厥冷者無陽也晬時

若手足不溫脉不還者傷寒下利日十餘行

為陽氣絕則見死也

脉反實者死下利者裏虛也脉當微弱反實

應病病不應下利清穀裏寒外熱汗出而厥

者通脉四逆湯主之下利清穀為裏寒身熱

通行於外則未當厥其汗出而厥者陽熱利

氣大虛也與通脉四逆湯以固陽氣

下重者白頭翁湯主之利則津液少熱則傷

也與白頭翁湯散熱厚腸

白頭翁 二兩 苦寒 黃連 苦寒 黃柏 苦寒 秦皮 苦寒 各三兩

內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一

升不愈更服一升 千金翼方 ○無求子活

人書熱利下重者或下利欲飲水者以有

熱也並主之黃蘗秦皮黃連 各一兩半 白頭翁

一兩半或作一兩 ○右剉如麻豆大分五

服水二大盞煎至八分去滓溫服不差再

服 永類鈴方同

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其

表溫裏四逆湯攻表桂枝湯 下利腹滿者裏

逆湯溫裏身疼痛為表未解 下利欲飲水者

以有熱故也白頭翁湯主之 自利不渴為藏

溫藏下利飲水為有熱 下利讞語者有燥屎

也宜小承氣湯 經曰實則讞語有燥屎為胃

以下下利後更煩按之心下濡者為虛煩也

宜梔子豉湯 下利後不煩為欲解若更煩而

心濡者是邪熱乘虛客於胃中為嘔家有癰

膿者不可治嘔膿盡自愈胃脘有癰則嘔而吐膿不可治嘔得
 膿盡嘔嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥嘔而脉弱為邪氣傳裏
 亦自愈者難治四逆湯主之嘔則氣上逆而小便當
 不利小便復利者裏虛也身有微熱見厥乾嘔吐涎
 者陰勝陽也為難治與四逆湯溫裏助陽乾沫者裏寒
 嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之乾嘔吐涎
 也頭痛者寒氣上攻也嘔而發熱者小柴胡與吳茱萸湯溫裏散寒
 湯主之經曰嘔而發熱者柴胡證具傷寒大吐大下之極
 虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水
 以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

大吐大下胃氣極虛復極發汗又亡陽氣外
 邪怫鬱於表則身熱醫與之水以發其汗胃
 虛得水虛寒相搏成噦也傷寒噦而腹滿視其前後知何
 部不利利之則愈噦而腹滿氣上而不下也
 利之以降其氣前部小視其前后部有不利者即
 便也後部者大便也
 釋音

蹠音拳不伸也憤扶粉切惡濕上烏路切撞宅切擊也

辨霍亂病脉證并治

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍

亂三焦者水谷之道路邪在上焦則吐而不
吐且利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則
陽乘隔遂成霍亂輕者止日吐利重者揮霍
日霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者
此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復
更發熱也
因邪入裏傷於脾胃上吐下利令
為霍亂利止裏和復更發熱傷寒其脉微
者還是傷寒必汗出而解
者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上
轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大
便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞭十

三日愈所以然者經盡故也

瀦為亡陽瀦為

瀦則本是霍亂吐利亡陽亡血吐利上陽瀦
之邪未已還是傷寒却四五日邪傳陰經
時裏虛遇邪必作自利本嘔者邪其於上又
利者邪甚於下先霍亂裏氣大虛又復寒之
邪再傳為吐利是重虛也故為不治若欲似
大便而反失氣仍不利者利為虛不利為實
欲大便而反失氣裏氣熱也此屬陽明便必
鞭也十三日愈者傷寒六日傳遍三陰三陽
後六日再傳經盡則陰陽之
氣和大邪之氣去而愈也
下利後當便鞭

鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能
 食復過一經能食過之一日當愈不愈者不

屬陽明也

下利後亡津液當便鞭能食為胃
和必自愈不能食者為未和到后

經中為復過一經言七日後再經也類能食者胃氣方和過一日當愈不愈者暴熱使之能食非陽也惡寒脉微傷寒論注而復利利止明氣和也

亡血也四逆加人參易主之惡寒脉微而利者陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血金匱玉旨曰水竭則無血與四逆湯温經助陽加人參生津液益血

傷寒論甘草二兩 附子一枚生去乾姜一兩

半人參兩一右四味以水三升煮取一升二

合去滓分温再服千金翼方同

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓

散主之寒多不用水者理中丸主之頭痛發熱則邪

自風寒而來中焦為寒熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多欲飲水者與五苓散以散之邪稍下者居陰分則為寒寒多不用水者與理中丸温之

傷寒明理論心肺在膈上為陽腎肝在膈

下為陰此上下藏也脾胃應上處在中州

在五藏曰孤藏居三焦曰中焦自三焦獨

治在中一有不調此圓專治故名曰理中

圓人參味甘温內經曰脾欲緩急食甘以

緩之緩中益脾必以甘為主是以人參為

君白朮味甘溫內經曰脾惡濕甘勝濕溫
中勝濕必以甘爲助是以白朮爲臣甘草
味甘平內經曰五味所入甘先入脾脾不
足者以甘補之補中助脾必先甘劑是以
甘草爲佐乾薑味辛熱喜溫而惡寒者胃
也胃寒則中焦不治內經曰寒溼所勝平
以辛熱散寒溫胃必先辛劑是以乾薑爲
使脾胃居中病則邪氣上下左右無病不
知故又有諸加減焉若臍下築者腎氣動

也去白朮加桂氣壅而不泄則築然動白
朮味甘補氣去白朮則氣易散桂辛熱腎
氣動者欲作奔豚也必服辛味以散之故
加桂以散腎氣經曰以辛入腎能泄奔豚
氣故也吐多者去朮加生薑氣上逆者則
吐多朮甘而壅非氣逆者之所宜也千金
方曰嘔家多服生薑此爲嘔家聖藥生薑
辛散是於吐多者加之下多者還用朮氣
泄而不收則下多朮甘壅補使正氣收而

不泄也或曰濕勝則濡泄木專除濕是於下多者加之悸者加茯苓飲聚則悸茯苓味甘滲泄伏水是所宜也渴欲得水者加木津液不足則渴木甘以補津液腹中痛者加人參虛則痛本草曰補可去弱即人參羊肉之屬是也寒多者加乾薑辛能散也腹滿者去白朮加附子內經曰甘者令人中滿木甘壅補於腹滿家則去之附子味辛熱氣壅鬱腹為之滿以熱勝寒以辛

散滿故加附子內經曰熱者寒之寒者熱之此之謂也

理中丸方

人參甘溫甘草甘平白朮甘溫乾薑辛熱已上

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之人參白朮甘草之甘以緩脾氣調中寒淫所勝平以辛熱乾姜之辛以溫胃散寒

右四味擣篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法

以四物依兩數切用水八升煮取三升去

滓温服一升日三服加減法千金翼方同

若臍上築者腎氣動也去木加桂四兩脾虛

動者臍上築動內經曰日者令人中吐多者

滿木甘壅補桂泄奔豚是相易也吐多者

去木加生姜三兩嘔家不喜甘故去木嘔下

多者還用木悸者加茯苓二兩下多者用木

茯苓以濁欲得水者加木足前成四兩半津

不足則渴木腹中痛者加人參足前成四兩

甘以緩之腹中痛者加人參足前成四兩

半裏虛則痛加寒者加乾姜足前成四兩半

人參以補之

寒淫所勝腹滿者去木加附子一枚服湯後

平以辛熱如食頃飲熱粥一升許微自温勿發揭衣被

胃虛則氣壅腹滿甘令人中滿是吐利止而

去木也附子之辛以補陽散壅

身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小

和之吐利止裏和也身痛不休表未解也與

則吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷

者四逆湯主之上吐下利裏虛汗出發熱惡

厥冷陽虛陰勝也與四逆湯助陽退陰既吐且利小便復利而

大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者四

類纂四十四
世地

逆湯主之吐利亡津液則小便當少小更復也
也脉微為亡陽若無外熱但內寒下利清谷為純陰此以外熱為陽未絕猶可與四逆湯之救吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽汁湯主之吐已下内竭則不當汗出汗出者不當厥今汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者湯氣入虛陰氣獨勝也若純與陽藥恐陰為格拒或嘔或躁不得復入也與通脉四逆湯加猪膽汁膽苦入心而通脉膽寒補用而和陰引置湯藥不被格拒内經曰微者逆之甚者從之此之謂也

傷寒論甘草二兩 乾薑三兩 附子大

一枚生去猪膽汁半右四味以水三升煮皮破八片取一升二合去滓内猪膽汁分温再服其豚即來無猪膽以羊膽代之千金翼方同

吐利發汗脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也内經曰食入於陰長氣於陽新虛不勝谷氣是生小煩

辨陰陽易差後勞復病證并治

傷寒陰陽易千金翼方無求子活人書南陽活人書三因方壽域神方陰易

之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝

類纂四十四
世地

脛拘急者燒禪散主之大病新差血氣未復餘熱未盡強合陰陽
 得病者名曰易男子病新差未平復而婦人
 與之交得病名曰陽易婦人新病差未平復
 男子與之交得病名曰陰易以陰陽相感動
 其餘毒相染著如換易也其人病身體重少
 氣者振動真氣也少腹裏急引陰中拘攣膝
 脛拘急陰氣極也熱衝上胃頭重不欲舉眼
 中生花者感動之毒所易之氣熏
 蒸於上也與燒禪散以道陰氣

燒禪散方

右取婦人中禪近隱處剪燒灰以水和服
 方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈
 千金翼方南婦人病取男子視當燒灰三因
 陽活人書同

方傷寒活人書指掌圖同 ○肘後方卒陰易病男女溫

病差後雖數十日血脉未和尙有熱毒與
 之交接者即得病曰陰易殺人甚於時行
 宜急治之令人身體重小腹急熱上衝胃
 頭重不能舉眼中生眵膝脛拘急欲死方
 取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕
 日三小便即利而陰微腫者此當愈得童
 女禪益良若女病亦可用男禪壽域神方
 服者取女手足爪甲二十枚又取女人惡
 中衣帶一尺俱燒灰以酒或米飲調服醫

類聚 四十四 七十一

方大成治婦人傷寒病後與男子交接病
名陰易右川婦人禪襠燒灰細研冷水調
服以小便利為愈 醫方集成本北經
驗方袖珍方同

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿
食者加大黃如博碁子大五六枚 病有勞復
有食復傷
寒新差血氣未平余熱未盡早作勞動病者
名曰勞復病熱少愈而強食之熱有所藏因
其谷氣留博兩陽相合而病者名曰食復勞
復則熱氣浮越與枳實梔子鼓湯以解之食
復則胃有宿積
加大黃以下之
枳實梔子鼓湯方

枳實 三枚炙 梔子 十四枚 鼓 一升綿

枳實梔子鼓湯則應吐劑此云覆令微似
汗出者以其熱聚於上苦則吐之熱散於
表者苦則發之內經曰火淫
所勝以苦發之此之謂也

右三味以清千金方作酢 漿水七升空煮

取四升煎減三升內枳實梔子煮取二升

下鼓更煮五六沸去滓溫分再服覆令微

似汗○袖珍方右咬咀每服一兩用清漿

水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候如

有宿食加大黃如碁子大五六片無求子

類聚 四十四 七十一

活人書治大病差後勞復者一本有陰陽

易差後勞復病脉證字枳實一枚去穰炒梔子

三枚半鼓一兩半綿裹○南陽右以清漿

肥者水二盞半活人書一兩二分半空煮退八分經驗良方

內枳實梔子煎取九分活人書煮下鼓再

煎五六沸去滓温服覆令汗出若有宿食

內大黃如博棊子五六枚良方一錢重同煎良方

待藥熟煎三四沸服

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮

者以汗解之脉沉實傷寒論註者以下解之

差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和

解之脉浮者熱在表也故以汗解脉沉者熱

在裏也故大病差後從腰已下有水氣者牡

蠣澤瀉散主之大病差後脾胃氣虛不能制

腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便

便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也無求子活人書治大病差後云云有水氣

者陰陽易差後勞傷病脉證南陽活人書同

牡蠣澤瀉散方
牡蠣鹹平澤瀉鹹寒栝樓根苦寒蜀漆辛平洗

等 亭蔭 熬苦寒 商陸根 熬辛酸 海藻 鹹寒洗去 鹹已上各

鹹味湧世牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣 內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦 泄之蜀漆亭歷栝樓商陸 之酸辛與苦以導腫濕

石七味異擣下篩為散更入臼中治之白 飲和服方寸匕小便利止後服日三 翼方

傷寒活人書 指掌圖同

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以 丸藥温之宜埋土丸 汗後陽氣不足胃中虛 寒不內津液故喜唾不

了了與理中 傷寒解後虛羸少氣逆欲吐者 丸以温其胃

竹葉石膏湯主之 傷寒解後津液不足而虛 羸餘熱未盡熱則傷氣故

少氣氣逆欲吐與竹 葉石膏湯調胃散熱

竹葉石膏湯方

竹葉 二把 石膏 一斤 半夏 半升 洗 麥門冬 一升 甘人參 三兩 甘温 甘草 二兩 甘 平去心 金翼方 二兩

粳米 半升 甘 微寒

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛 以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參 粳米之甘以補不足辛者散也氣 逆者欲其散半夏之辛以散逆氣

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米
 煮米熟湯成去米溫服一升日三服○無
 求子活人書治傷寒解後虛羸少氣氣逆
 欲吐者陰陽易差後勞復病脈證半夏一
 湯泡洗御藥院方二分石膏四兩碎淡竹
 牛永類鈔方六錢乙字甘草半兩炙麥門
 葉半把人參兩冬二兩去心或作二兩二分右劉如麻
 院方一兩半鈔方乙兩乙分
 豆大每服抄五錢匕鈔方三錢水一盞半鈔方加生
 片薑四入粳米百餘粒煎取八分米熟湯成

去滓溫服嘔者加生薑一兩半

南陽活人書同

病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與
 穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則
 愈陽明王於申酉戌宿食在胃故日暮微煩當下之以損宿穀
 辨不可發汗病脈證并治

夫以為疾病至急倉卒尋按要者難得故重
 集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此
 易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可
 與不可中也諸不可汗不可下病證藥方前
三陰三陽篇中經注已具者更

不復出其餘無者於此已後經注備見

傷寒論少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗 脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知然以榮氣不足血少故也 少陰病脉微不可發汗亡陽故也

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽

微發汗躁不得眠

寸關為陽脈當浮盛弱反在關則裏氣不及濡反在

巔則表氣不逮衛行脈外浮為在上以候衛微反在上是陽氣不足榮行脈中沉為在下以候榮澁反在下是無血也陽微不能因外
汗則劔而渴心苦煩飲即吐水 動氣者榮氣也然氣動也在
動氣在右不可發汗發

汗則劔而渴心苦煩飲即吐水

動氣者榮氣也然氣動也在

右者在臍之右也難經曰肺內證臍右動氣按之牢若痛肺氣不治正氣內虛氣動於臍之右也發汗則動肺氣肺主氣關竅於鼻氣虛則不能衛血溢妄行隨氣出於鼻為衄亡津液胃燥則煩渴而心苦煩動氣在左肺惡寒飲食則傷肺故飲即吐水動氣在左

不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤難經曰肝內證發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤難經曰肝內證

曰肝內證發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤難經曰肝內證

不治正氣內虛氣動於膻之左也肝為陰之

主發汗汗不止則亡陽外虛故頭動氣在上

眩筋惕肉瞤針經曰上虛則眩動氣在上

不可發汗發汗則氣上衝正在心端難經曰

膻上有動氣按之牢若痛心氣不治正氣內

虛氣動於膻之上也心為陽發汗亡陽則愈

損心氣腎乘心虛欲上凌動氣在下不可發

心故氣一衝正在心端動氣在下不可發

汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡

寒食則反吐穀不得前難經曰腎內正膻下

腎氣不治正氣內虛動氣發於膻之下也腎

者主水發汗則無汗者水不足也心中大煩

者腎虛不能制心火也骨節告疼者腎主骨

也目運者腎病則目眊眊如無所見惡寒者

腎主寒也食則反吐穀不得前者腎水乾

也玉冰曰病嘔而吐食久反出是無水也咽

中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足

厥冷欲得倦臥不能自溫咽門者胃之系胃

利發汗攻陽血隨發散而上必吐血也胃經

不和而反攻表則陽虛於外故氣欲絕手足

冷欲蹠而諸脉得數動微弱者不可發汗發

不能自溫諸脉得數動微弱者不可發汗發

汗則大便難腹中乾傷寒論註曰一云胃燥

而煩其形相象恨本異源動數之脉為熱在

在裏發汗亡津液則熱氣愈甚胃中乾燥故

大便難腹中乾胃燥而煩根本雖有表裏之

異治之後熱傳之則脉濡而弱弱反在關
 一是以病形相象也 濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽運微
 為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可
 發汗發汗則寒慄不能自還氣在上則風傷
 之運動微在下則寒傷血血傷者裏為之陰
 寒外氣沸鬱為上實裏有陰寒為下虛表熱
 裏寒意欲得溫若反發汗亡欬者則劇數吐
 陽陰獨故寒慄不能自還 涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩晬時而
 發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗
 蹇而苦滿腹中復堅肺寒氣逆欬者則劇吐
 涎沫亡津液咽中必乾

小便不利膈中陽氣虛心中飢而煩一日一
 夜氣大會於肺邪上相擊晬時而發形如寒
 瘧但寒無熱虛而寒慄發汗攻陽則陽氣厥
 愈虛陰寒愈甚故蹇而苦滿腹中復堅 厥
 脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不
 得前厥而脉緊則少陰傷寒也法當溫裏而
 中循喉嚨挾舌本腎為之本肺為之標本
 虛則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不得前 諸
 逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死傷
 論註曰一云譎言 命將難全不可發汗而強
 目眩睛亂者死 汗而重而難差重者脫其陽陰之氣言亂目
 眩者死難經曰脫陽者見鬼是此言亂也脫
 陰者目盲是此目眩也眩
 非玄而見玄是近於盲也

傷寒論太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便續自可一日二三度發脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗也 太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者無陽也不可發汗 咽喉乾燥者不可發汗 亡血不可發汗發汗則寒慄而振 衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能眴不得眠 汗家不可發汗發汗必恍惚心亂小便已陰疼

宜禹餘糧丸 淋家不可發汗發汗必便

血 瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡下利不可發汗汗出必脹滿

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則

四肢厥逆冷肺經虛冷上虛不能治下者欬而小便利或失小便上虛發汗

則陽氣外亡四肢者諸陽之本陽虛則不與陰相接故四肢厥逆冷

傷寒論傷寒一二日至四五日厥者必發

熱前厥者後必熱厥深者熱亦深厥微者

熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛

赤 傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出自

嘔者下之益煩心中懊憹如飢發汗則致瘥

身強難以屈伸熏之則發黃不得小便久則

發欬唾傷寒當無汗惡寒今頭痛發熱微汗

於裏若反下之邪熱乘虛流於胃中為虛煩

心懊憹如飢若發汗則虛表熱歸經絡熱甚

生風故身強直而成瘥若熏之則火熱相合

消燥津液故小便不利而發黃肺惡久久則

火熱傷肺必發欬嗽而唾膿

傷寒論太陽與少陽併病頭項強痛或眩

冒時如結胃心下痞鞭者不可發汗 太

陽病發汗因致瘥 少陰病欬而下利讖

語者此被火氣劫故也小便必難以強責

少陰汗也 少陰病但厥無汗而強發之

必動其血未知從何道出或從口鼻或從

目出者是名下厥上竭為難治

辨可發汗脉證并治

大法春夏宜發汗春夏陽氣在外邪氣凡發

汗欲令手足俱周時出以熱熱然一時間許亦佳不可令如水流滴若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗也汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也凡服湯也陽虛為無津液故不可重發汗凡服湯發汗中病便止不必盡劑汗多則亡陽凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良驗聖濟經曰湯液主治合本乎腠理壅鬱除邪氣者於湯為宜金匱玉函曰水能淨萬物故用湯也傷寒論太陽病外證未解脉浮弱者當以

汗解宜桂枝湯方

方見前

脉浮而數者可發

汗屬桂枝湯證

一法用麻黃湯

陽明病脉遲汗出

多微惡寒者表未解也可發汗屬桂枝湯

證

夫病脉浮大問病者言但便鞭爾設利者為大逆鞭為實汗出而解何以故脉浮當以汗

解經曰脉浮大應發汗醫反下之為大逆便

是為大逆結胃雖急脉浮大猶不可下下之

即死况此便難乎經曰本發汗而復下之此為逆若不為逆汗治不為逆

傷寒論傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴
 被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出
 愈 病人煩熱汗出即解又如瘧狀日晡
 所發熱者屬陽明也脉浮虛者當發汗屬
 桂枝湯證 病常自汗出者此為榮氣和
 榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和
 故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮
 衛和則愈屬桂枝湯證 病人藏無他病
 時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也

先其時發汗則愈屬桂枝湯證 脉浮而
 緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷
 榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃
 湯方方見前 太陽病不解熱結膀胱其人如
 狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻
 當先解其外屬桂枝湯證 太陽病下之
 微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏子湯
 方方見後 傷寒脉浮緊不發汗因致衄者屬
 麻黃湯證 陽明病脉浮無汗而喘者發

汗則愈屬麻黃湯證 太陰脉浮者可發汗屬桂枝湯證 太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在當復發汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證 脉浮者病在表可發汗屬麻黃湯證 一法用桂枝湯傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者一云大便青知不在裏續在表也當須發汗若頭痛者必衄屬桂

枝湯證 下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯方並見前

下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗外一云裏和表病汗之則愈

傷寒論太陽病頭痛發熱汗出惡風寒者屬桂枝湯證 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者屬桂枝湯

證 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強
 故使汗出欲救邪風屬桂枝湯證 太陽
 病下之後其氣上衝者屬桂枝湯證 太
 陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池
 風府却與桂枝湯則愈 燒針令其汗針
 處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹
 上撞心者灸其核上各一壯與桂枝加桂
 湯方方見後本云桂枝湯今加桂滿五兩所
 以加桂者以能洩奔豚氣也 太陽病項

背強几几反汗出惡風者宜桂枝加葛根
 湯方方見後太陽病項背強几几無汗惡風
 云云不下利但嘔者宜葛根加半夏湯方
方見前太陽病桂枝證醫反下之云云喘而
 汗出者宜葛根黃芩黃連湯方方見前太陽
 病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無
 汗而喘者屬麻黃湯證 太陽與陽明合
 病喘而胃滿者不可下屬麻黃湯證 太
 陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出

而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大青龍湯方方見前陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃湯不溺腹滿加噦者不治小柴胡湯方方見前太陽病十

日以去脉浮而細嗜臥者外已解也 設胃滿脅痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯 傷寒脉浮緩云云或小便不利少腹滿或喘者宜小青龍湯方方見前若渴去半夏加栝樓根三兩若微利去麻黃加薤花如一雞子熬令赤色若噎去麻黃加附子一枚炮若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖且薤花不治利麻黃主喘今此語反之

疑非仲景意 傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也屬小青龍湯證 中風往來寒熱傷寒五六日以後胃脅苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者屬小柴胡湯證 傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者屬小柴胡湯證 傷寒六七日發熱

微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之方柴胡四兩黃芩一兩人參一兩桂枝一兩半生薑一兩半半夏二合芍藥一兩大棗六枚甘草一兩右九半洗芍藥半味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩如柴胡法今著人參作半劑 少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也 脉浮小

類聚
四十四

九十三

汗 便不利微熱消渴者與五苓散利小便發

醫方類聚卷之四十四