

河間六書曰

宣明論方

卷七至卷十五全

黃帝素問宣明論方卷之七

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕瘕堅

硬腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也積者

不散聚者不化留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕為積霍亂吐下為留停瘕瘕者徵也瘕假也斯疾迺五臟六腑陰陽變化興衰之制也

亢則害承迺制極則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃爲積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃爲痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此者亢則害承乃制也瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也經曰血不流而滯故血內凝而乃瘕也

小腸移熱於大腸乃爲虛瘕大腸移熱於小腸謂瘕熱相搏則血溢而爲伏瘕血溢不利月事沉

不行故行爲虛癥爲虛與伏同癥與疝同爲傳寫
誤也世傳冷病然癥病亦有熱或陽氣鬱結弗熟
壅滯而堅硬不消者世傳爲寒癥癥也或堅痞腹
滿急痛寒上筋縮故急上痛寒極血凝泣而反兼土化制之
故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可
忍者皆可爲寒誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳
之五臟六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在
於臍北大如臂上至於心橫於心下如屋梁故曰
伏梁肝之積名曰贲音奔氣在左脇下覆如杯有頭

足久不愈令人瘰癧脾之積名曰痞氣在胃腕覆
 大如杯久不愈令人四肢不收發黃疸食不為膚
 肌肺之積名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不
 愈令人灑淅寒熱喘咳發為肺癰腎之積名曰賁
 奔音狫在於小腹上至心下如狫賁走往來無定久
 不愈令人喘逆發為骨痿少氣乏力此為五藏之
 積也常究斯義未可悉也

得其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病
 傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五
 藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積

其脉沉細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口

吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂

羌花 大戟 荆三稜 蓬莪朮 川練子

葫蘆芭 芭戟 已上各一兩 芭豆 去皮不出油二分

陳米 三合將芭豆一處同炒黑 縮砂仁 一兩

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥

以醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麩

糊和丸如菉豆大每服五七丸食後加減看虛

實隨湯水下

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分

氣逐風功不可述

枳殼去穰 炒 木通剉炒 青皮去皮 陳皮去白

桑白皮炒 蘿蔔子炒 白牽牛炒 黑牽牛炒

莪茂煨 茴香炒 荆三稜煨各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二

十九煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛一兩 芒硝三兩 川大黃二兩 甘遂半兩

石為細末食後溫蜜水調下一錢 錢具加減疎

動止

密補固真丹

治解腎真

元損虛泄痢痰嗽瘡痞水

穀酸臭飲食

脚腰冷痛肢體麻痺下虛痰厥

虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面黧身

悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣一切

脾胃虛證常服補養宣通氣血

天南星

半兩

半夏

製

神麴

麥蘖

茴香

炒

荆三稜

炮各一兩

白附子

乾生薑

川烏頭

生各一兩

芭豆

七

牽牛

三兩

代赭石

兩

官桂

分

右爲末水和丸小豆大每服十九加至五十九

溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸

治和脾胃寬胃膈消痰逆止嘔吐進益美

飲食

官桂

乾薑

各半兩

木香

一分

大黃

蓬莪茂

芫花

醋拌濕炒乾

枳殼

去穰

陳皮

各半兩

半夏

二兩

牽牛

半斤取末四兩

茴香

炒一兩

芭豆

四箇

右爲末滴水爲丸如小豆大每服二三十丸溫

水下

赤金丸

治心胸腰腹急痛或淋悶升產後經病血

刺痛

當歸

半兩

乾

去

酒

洗

一

錢

土

別

硃砂

粉

一

錢

五

錢

五

錢

右同研勻麩肉爲膏塗之立見大刺火下一丸

病甚者加得利後減

泥金丸

治心腹急痛取久新

黃蘗推陳致新

黃蘗

大黃

芭豆

五靈脂

各半兩

猪牙皂角

一分

輕粉

各

一分

各

一分

乾漆

二分

右研勻煉蜜拌得所杵干下瓦蒸豆大新水下

一丸未利更加服

狀元丸 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

芭豆

五十各
取霜

神麴

半兩

半夏

一兩

雄黃

白麴

炒一兩

大黃

芭豆

神麴

半夏

雄黃

右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後
溫水下童子二丸三四歲一丸歲半半丸止嗽
溫瀝汁下止嘔吐生薑湯下

玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索

青皮

去白

陳皮

去白

當歸

木香

雄黃

別研

荆三稜

生薑

各一兩

右爲末酒麪糊爲丸如小豆大每服五七丸生薑湯下

又一方

無陳皮

生薑

有廣茂

兩一

檳榔

分兩同

大延胡索散

治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥

瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索

當歸

芍藥

京三稜

川苦練

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎

各一分

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草

檳榔

二錢

右爲麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱

服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染
槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加
本方得利丸良後常服

三稜湯 治癥瘕痞積聚不散堅滿痞膈食不下
腹脹

荆三稜二兩白朮一兩蓬莪茂半兩當歸半兩枳榔

木香三錢

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚痞瘕氣塊及大小結胸痛不

能仰止

天南星 半夏 芫花 自然銅 等分 生用

右為末醋煑麩糊為丸如桐子大每服五七丸
食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉眩

急津液凝澁便溺不利赤癰疥疽癰發背疥癬走
注脚氣無首尾瘡癩功效不可盡述

檳榔 甘遂 葳靈仙 赤芍藥 澤瀉

亭歷 已上各二兩 乳香 沒藥 一兩 研 黑牽牛 半兩

大戟 二兩 炒 陳皮 四兩 去白

右為末麩糊為丸如桐子大每服五十九至七

八十九丸温水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麪食温粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止捨心疼

痛及遶臍腹痛不可忍者

川大黃

三兩新水浸一宿蒸熟切片于焙

乾薑

一兩炮

大附子

半兩去皮臍

鱉甲

一兩半好伏時炙令

右為末取三年米醋一大升先煎四五合後

和藥丸如桐子大每服十九至二十九丸醋

或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥

當下

開經妙功丸 治佛熱山內盛疹癰堅積

聚疼痛脹悶作發有時以三焦壅滯二

煩心不得眠咳喘噎逆不能食或風濕

腫脹黃瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴

鬱偏正頭疼筋脉拘攣肢體麻痺走注

昏眩中風偏枯邪氣上逆上實下虛脚膝

不通氣血

荆三稜炮 茴香各一兩 川烏頭四兩 神麴炒 來

大黃各一兩 醋半升熬成稠膏 不破堅積不須熬膏水丸

巴豆二箇 破堅 積用四箇 半夏半兩 桂二錢 牽

右爲末膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸
水冷水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却減丸
數以加至快利三五行以意消息病去爲度

木香分氣丸 治積滯癍塊不消心腹痞結疼痛

刺如覆杯狀

陳皮

去白

檳榔

各一兩

破故紙

二兩

木香

一兩

黑牽牛

十二兩炒香熟取末五兩半餘不用

右爲末滴水爲丸如桐子大每服二三十九生

薑湯下食後臨臥服

開胃生薑丸

治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫

氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹歲逆惡心
嘔吐痰水宿食不消
別痛竟中開胃
飲食

桂心

一斤

去心

用鹽

青皮

去白

陳皮

一斤

去白

砂仁

廣茂

當歸

各半兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食前
嚼沸湯化下

道滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利

消食止逆定疼痛

大椒

木香

各一錢

蝎梢

三錢

芭豆

入筒出油為度

右為末後入芭豆霜研勻醋麩糊和丸如菜豆

大朱砂為衣每服五丸至十丸淡醋湯下

積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無

力癥瘕積聚口吐酸水

檳榔

二箇

芫花

一兩

礞砂

二錢

芭豆

二錢半生

青皮

去白

陳皮

各三錢

蓬莪茂

雞爪黃連

京三稜

章柳根

牛膝

各一兩

肉豆蔻

三箇

大戟

川大黃

甘遂

白牽牛

乾薑

青礞石

乾漆

各半兩

木香

二錢半

石菖蒲 三錢

右為末 ... 桐子大每服一九臨臥

燒寒湯 ... 內作聲病退為度

金露紫苑丸 ... 積兩肋虛脹臍疼痛

草烏 去... 黃連 半兩 官桂 桔梗

乾地黃 乾薑 川椒 蕪荑 紫苑 去皮

柴胡 防風 厚朴 甘草 人參

川芎 鱉甲 酒浸 貝母 枳殼 去穰 甘遂 各一兩

芭豆 三兩醋煮 半日出油 入硃砂 三錢

右為末 水養麩糊為丸如桐子大每服五丸空

心臨臥米飲湯下或微踈動詳虛實加減

信香十方青金膏

灌頂法王子所傳十二上願云

藥師瑠璃光如來應當供養正徧知明行足善遊

世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯

變生百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿

塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痰癖堅積中滿膈

氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈痺消中善食而瘦或

消渴多飲而數

色角切
頻也

小便或腸風下血痔瘻痒

痛或胃癰赤或偏身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏

腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡瘰肉或下痢腹痛
或一切風氣肢體疼痛及中風偏枯或痰逆生風
痰涎嗽兼產後腹痛及小兒疳疾諸風潮搐但平
人常服補養宣行榮衛調飲食

信砒
乳香
輕粉
粉霜
芭豆
已上各
二兩同研

龍腦
半字
麝香
半字
青黛
二錢同研
黃蠟
三錢

右研細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸棗豆至
小豆大先服小丸病在上食後在下食前在中
不計時候面東頂禮一丸淨器盛水送下如合
藥即淨處面東每一丸密念呪三遍或病人不

能呪請人呪

或師氏呪過

呪曰

信香十方青金膏

藥師圓成蜜遍拋

普濟有緣除百病

仰吞一粒體堅牢

密呪曰

但言八金剛

莫說十方佛

五蘊六根俱不道

十二上願自然成

金黃丸

治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荆三稜

香附子

澤瀉

芭豆

四十九粒出油

黍米粉

牽牛

二錢半

右爲末用梔子煎湯和丸如菜豆大每服三丸
至五丸如心痛艾醋湯下七丸

逆氣丸 治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬

膈進美飲食

薑黃四兩 香附子四兩 縮砂 甘草 廣茂各二兩

丁皮 甘松 不香 荆三稜各一兩

白檀半兩 藿香葉半兩

右爲末入菜豆粉二兩用湯浸蒸餅爲丸如桐
子大每服三二十九細嚼白湯下食後日進三

服

丁香散 治痲痺氣脇下痞滿息而不消積而不散

元氣在胃不妨食者

好丁香

二十五箇

白丁香

七十箇

密陀僧

舶上硫黃

黃鶯調

各五分

右為細末每服一字皂子煎湯調下不計時候

治肚内生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食

後

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃

三兩

黑牽牛頭末

一兩

礪砂

二錢

山梔子

半兩

輕粉

二錢

右爲末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食
後每服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之
虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯

氣結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃內有癥
癖氣并常有疳蟲蛇蠱攻心腹俱痛忽中傷寒頭
痛不忍狀若山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥
宜通三五行立瘥或中風口喎語多蹇澁睡後口
中涎出不限時節不問男子女人但五日一服不
過三服永瘥人患腰膝疼痛脚氣腫滿運動艱難

飲食無味并小兒疳痢脫肛者量大小與服利三
五行自瘥大人久泄氣痢狀若休息痢止有時俱
一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷熱
老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常
時蓋緣搜出藏府中積滯蟲膿故也無孕婦人久
患血虛氣弱痿黃無力者亦可依方服宜通氣候
殊不困倦無妨此藥凡有百病並皆治之其功不
可具載有孕婦人或遇陰晦時即不可服天道晴
明可進若雖復疾而未愈者再可服

黃耆

木通

桑白皮

陳皮

各一兩

胡椒

白木香

各半兩

白牽牛

四兩沙別取頭末

右七味為細末每服二錢牽牛末三錢生薑二

錢切作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用

生薑湯或溫湯送下平明可行三五次快利無

妨如病瘥後以白粥補之痊矣

五積丹者治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一鈹

一尺二寸火燒留性淨金合之四面土壅合物令出

大芭豆

十二箇白麩一兩五錢同炒令黃色為度

右為末醋麩糊為丸棗豆大每服十九鹽湯下

食後加減

飲食過味類

五石為末調麥門冬為末菜豆大長服十日

一莖豆

蘇氏今黃也

見效藥無四時必效

老身莖一瓊

一以二廿以製附封瓶金命

正蘇氏緣故以即容藏雖出不出姬蘇聚皆

故收酸寒外以白藥而之盛矣

亦服宜通氣

主薑為海山為安不平即下行三正穴并除

送財并子煎主薑為一大蓋臨藥厚良又用

古十和為味末長服二送率中末二送主薑二

白朮

木香

兩各半

白牽牛

兩兩末

四兩

黃帝素問宣明論方卷之八

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

水濕門

夫諸濕者濕爲土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱怫鬱水液不能宣通卽停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以爲兼證云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能爲濕雖

有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸 治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水濕腫

滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦

氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注

疼痛風痰涎嗽頭目旋運瘡疾不已癥瘕積聚堅

滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不

快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹

滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只爲轉動

之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積

熱乳癖滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒
各半兩

牽牛

二兩

大黃

一兩為細末

輕粉

一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後却常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服保養宜通氣血消進酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃柏兩一牽牛兩四大黃兩二輕粉錢二甘遂 大戟

芫花 各一分
依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣常得効 賈同知

稱之不已乃神仙奇絕之藥也

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀

大便滑洩

葶藶 茯苓去皮猪苓去皮白朮各一分木香半錢

澤瀉 木通 甘草各半兩 辣桂一分 滑石三兩

右為末每服三錢白湯調下食前○此藥下水

濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而
反轉泄者此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是
能反為注泄此正氣已衰而多難救也慎不可
攻之而無益耳

白朮木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能臥

不敢食小便悶者

白朮

木猪苓

去皮

赤茯苓

甘草

澤瀉

各半兩

木香

檳榔

三錢

陳皮

二兩

官桂

二錢

滑石 三兩

右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六

分食後去滓溫服

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利

大便滑洩

橘皮去一兩木香一分滑石六兩檳榔三錢茯苓去一兩

木猪苓去皮澤瀉 白木 官桂各半兩甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分

去滓溫服大小便秘先服十劑湯二三日後再服此藥

葶藶膏 治水腫腹脹

牛黃 麝香 龍腦各一分 昆布 海藻上同三分先

牽牛 桂心各一分 椒目三分 葶藶六分

右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十

九日再服稍利小便為度詳虛實加減

茯苓散 治諸般氣腫等疾

芫花醋拌炒 澤瀉 郁李仁 甜葶藶 漢防已

各二錢半 陳皮去白 白檳榔 瞿麥各半兩 藁本二錢半

滑石三分 大戟炒三分

右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取下碧淥水如爛羊脂即瘥如未盡隔日又服腫消如故不用服忌鹽百日

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香各等分

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同

煎溫服食前

二氣散 治水氣蠱脹滿

白牽牛 黑牽牛 各二錢

右為末用大麥麩四兩同一處為燒餅臨臥用

茶湯一盞下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃 一兩用糯米和 澤瀉 二兩 椒目 半兩

大戟 炒半熟米不用 芭戟 去心 茯苓 去黑皮 芫花 醋五升浸一日炒

甘遂 已上各 桑白皮 一兩

右為末從發時加減一分空心用井花水調下
每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒
物油膩血物

從脚腫根在心加葶藶 從肚腫根在腹加椒目

從陰腫根在胸加澤瀉 從膝腫根在肝加芫花

從面腫根在肺加桑白 從心腫根在肋加雄黃

從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小腸加芑戟

從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在胃加茯苓

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶

海藻

海蛤

芫花

醋浸炒

甘遂

大戟

甜葶藶

樟柳根

續隨子

芭戟

各等分
去心

右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨臥間日

再服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石

各等分

右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱

相搏微者宜服

大梔子十五箇

黃蘗半兩

甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次
作一日服溫喫不計時候

大戟丸 治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞

悶背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大

便澹泄不能坐臥

大戟

芫花

醋炒

甘遂

海帶

海藻

郝李仁

續隨子

各半兩

樟柳根

一兩已上八味

為末每料抄藥末十 硃砂

輕粉

各一錢

粉霜

各一錢

水銀砂子

一皂子大

龍腦

半錢

芒豆

二十一箇
主用去皮

右八味已下同研勻用棗肉爲丸如菉豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實

加減

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不

進飲食

粉霜

硃砂

海蛤

寒水石

燒粉

玄精石

白丁香

頭白麩

各一錢

輕粉

三錢

海金沙

一錢

右研勻着紙裹數重上使麩裹又紙裹冷酒蘸

了桑柴火燒麩熟爲度宿飪餅和丸如桐子大
每服三丸生薑湯下一日三服二日加一九至
六日不加即止以補之妙

苦葶蘆丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參

一兩

苦葶蘆

四兩於鍋內紙上炒黃色爲度

右二味同爲細末用棗肉和丸如桐子大每服
十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前○

此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸

治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻

檳榔

輕粉

各一分

黑牽牛

一兩半取頭末

右為末麩糊為丸如菘豆大每服十九至二十
丸煎連翹湯下食後日三服

此藥之性不言其效

十五式煎桑白皮馬可日煎三服空心食前○

粉霜式二和同為臨末用棗肉味式咬酥干大每服

入參一兩苦葶藶上炒黃色為度
四兩於離內炒

苦葶藶式相 台一吐水點屎最良甄蘇不石當答

六日不吐明立以齋之效
輕粉

兵之式生薑散下一日三服二日吐一式生

了桑柴火製麥熟為麥節瑣粉味式咬酥干大

經明論方卷之九

河間

劉守真

撰集

新安

吳勉學

校

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內

傷肺風寒隨玄府而入腠理

而入遂成咳嗽迺肺熱也寒

經云喉中介介如梗狀甚則

傷脾胃外感風邪皮毛

開張內外相合先傳肺

化熱熱則生痰喘滿也

嗽血也胸滿氣喘痰盛

稠粘皆肺氣熱也

太人參半夏丸 治化痰墜

盡迷嘔吐痰逆痰厥頭痛

目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不

肢體麻痺疼痛中風偏枯

保養宣通氣血調和臟腑

人參 茯苓 去皮 天南

半夏 乾生薑 白礬

蛤粉 一分 藿香葉 一分

右為末麩糊為丸如小

涎止嗽定喘諸痰不可

風氣偏正頭疼風壅頭

刺心腹痞滿筋脉拘倦

咳唾稠粘肺痿勞虛人

進飲食

薄荷葉 各半兩

寒水石 各一兩

大生薑湯下三三

丸食後溫水亦得一法加真連半兩黃蘗二三兩

水丸取効愈妙治酒病調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸 治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏生薑製 瓜蒌 杏仁去尖 麻黃 白礬枯礬

欵冬花各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如梧子大每服三

十丸煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮 甘草炙 葛根各一兩 厚朴半兩

右件為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎

至六分去滓食前服顯仁丸仙朮芎散大人參

半夏丸

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤

燥解肌熱止咳嗽

橘皮

半兩 去皮

半夏

二錢半湯 洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片

同煎至七分去滓溫服

知母

治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

甘草

各一兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

款冬花

桔梗 麥門冬 黃芩半兩 川芎三錢 阿膠炒

右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至

七分去滓稍熱服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒

頭疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮

甘草各一兩炙 白薑半兩

右為末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二

寸煎至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者

往來寒暑

杏仁

去皮

桔梗

陳皮

去白

茯苓

去皮

漢防已

白礬

桑白皮

各三錢

薄荷葉

一錢

甘草

二寸

猪牙皂角

一錢

右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去

滓食後温服

防已丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化

痰涎

防已

二錢

杏仁

三錢

木香

二錢

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九煎桑

白皮湯下如大便悶加葶藶一兩食後服

葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦葶藶

蛤粉

各三錢

桑白皮

山梔子

人參

荆芥穗

薄荷葉

赤茯苓

去皮

陳皮

桔梗

杏仁

甘草

各半兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至

六分去滓溫服食後

保安半夏丸

治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴

咽乾煩渴大小便澀滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛

中滿膈氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宜

行榮衛

半夏

天南星

各半兩

牽牛

一兩

大黃

半兩

黃蘗

半兩

蛤粉

一兩

芭豆

四箇

右為末水為丸如小豆大每服十九十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有

乾薑一錢半

人參保肺湯

治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨

蒸潮熱

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃耆

紫苑

荆芥

地骨皮

各一分

茯苓

皮黃芩

連翹

大黃

薄荷

各半兩山
梔子同

甘草

桔梗

各一兩

石膏

滑石

寒水石

半兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹

治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼

婦人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉

甘草

四錢

芭豆

燈燒
存性

盆硝

各二錢

輕粉

二錢

豆豉

一兩慢火炒

五靈脂

二錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一九溫瀝汁

下續後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微
煖効心腹急痛温酒下二丸未効再服得利尤
良帶下以温酒下二丸或大便流利再服

人參散

治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發

戰膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫
痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏

甘草

各一兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右爲末每服二錢温水調下早晚食後兼服梔

子金花丸 一名旣濟解毒丸

寧神散

治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗

御米囊 一斤生

烏梅 四兩

右為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

貝同知方

御米殼

炒一兩

烏梅肉

半兩

依前法服之

康少尹傳

煎烏梅湯尤妙

桂苓白朮丸

治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅

結痛悶推進飲食調和藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉

痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈

解酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服

之利止為度隨證調之

揀桂

乾生薑

各一分

茯苓

去皮

半夏

一兩 白朮

紅皮

去白澤瀉

各半兩

右為末麩糊為丸如小豆大生薑湯下二三

丸日三服病在膈上食後在下食前在中不計

時候或一法更加黃連

半兩

黃蘗

二兩

水丸取

効愈妙

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜萋實

一枚去子用穰

右為末以寒食麩和為餅子炙黃為末每服一

錢溫水化乳糖下日三服効乃止

又方 治寒嗽

麻黃 四兩 官桂 一兩 礬石 二錢

右為末以礬石同煎每服一二錢溫服

寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼 四兩 木瓜 三兩 御米殼一處用蜜

五味子 一兩 人參 一兩 皂角 二兩

右為末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

鱉甲丸 治吐血咳嗽神効

鱉甲 一箇九肋 柴胡 一兩 酒浸一宿

杏仁 一兩 甘遂 一兩 人參 半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十九至十五

九煎生薑湯下

又方 用厚朴

一兩生薑製

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏

一兩

甘草

半兩炙

右為末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下

人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬

天南星

半夏

各半兩

甘草

二錢半炙

人參

錢

赤小豆

四十九粒

杏仁

四十九粒

猪牙皂角

一挺

右為末

三

錢

散

如桐子大

每服十五丸炒藥子湯臨卧下

仙人肢丸 治遠年勞心不問寒熱痰涎喘滿先服

松花膏下過多服此藥無不効

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參

白朮 牡礪 知母 甘草 各二兩 蛤蚧 一對

全用河水淨洗文
武火酥炙黃色

右為末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

松花膏 治三二十年勞嗽預九月間宣利一切痰

涎肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子

甘草 蒼朮 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子
大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服
藥一粒

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞

滿公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏 半兩 洗 葶藶 水研 杏仁 各半兩 炒 朱砂

五靈脂 各一兩 微炒

右爲末更研勻生薑汁煮麩糊爲丸如桐子
每服十五丸生薑湯下

天百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧一對 蜜炙 元州鱉甲一箇 去 附子一兩 人參

柴胡 川乾薑 白茯苓去 白朮 茴香

青皮去 杏仁去皮 知母 貝母 陳皮去

宮桂 甘草炙 半夏生薑 蒼朮湯浸各一兩 蘇

右爲末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚

烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十

粒不用鐵煎

小百勞散 治勞喘嗽不已自汗者

御米殼 不拘多 少炒

右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽

痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子 九兩 良薑 半兩 紅皮 去白 茴香 炒各兩 乾薑 兩半

甘草 七兩 鹽 炒一斤

右為細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者

日進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米殼

蜜炒一兩

人參

陳皮

去白

甘草

炙一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

勞門

白朮黃耆散

治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少

肌瘦昏昧

白朮

黃耆

當歸

黃芩

去皮

芍藥

各半兩

石膏

甘草

各二兩

茯苓

寒水石

各一兩

官桂

一分

人參

川芎

各三分

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服

食前一日三服

人參白朮湯方 在消渴門第一方是也

此乃為同不復錄耳

黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭

目

黃連

好者不拘多少

右為末酒麩糊為丸如小豆大每服二十九溫水下不計時候日三服

必効散 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不

已

川烏頭

一兩生

天南星

半兩生

右爲末每服二錢蘿菔八塊如母指大以水煮
熟去滓食後服嚼

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候
不調月水過多喘嗽者

當歸 芍藥 川芎 白朮 染槐子

黃藥子 各半兩 生地黃 甘草 茯苓 去皮

黃芩 白龍骨 各一兩

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服
食前

紫苑散 治勞體熱心寒脉滑短咳嗽婦人多有此

疾口乾眼澁骨痠短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能
開發玄府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通澁
滯和榮衛順三焦兼服人參白朮湯

紫苑

桑白皮

桔梗

續斷

甘草

五味子

各一兩

赤小豆

一合

右爲末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同
煎至七分溫服去滓

枳實飲子

治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁

經候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣

枳壳

一兩

吳半夏

兩湯洗七次以生薑汁

浸

三日火炒黃色用半夏

夏

紅芍藥

柴胡

各一兩

黃芩

半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通

桃仁

二兩湯浸火炒

川大黃

川朴硝

各二兩

蝨蟲

一兩去翅頭足

右為末用醋五升入金銀鍍內以慢火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣

未再服候鮮紅即住服

盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急

款冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂

甘草 白礬 佛耳草 各等分

右為末每服一錢竹筒子吸喫日三服立効

焚香透膈散 治一切勞咳壅滯胸膈痞滿

雄黃 佛耳草 鵝管石 款冬花 各等分

右為末每服用藥一錢安在香爐子上焚着以

開口吸烟在痰中立効

鴛粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者

御米殼

一兩用蜜炒

烏梅肉

揀人參

呵子肉

葶藶

桑白皮

各半兩

右為細末每服二三錢百沸湯潑臨卧調下

新添三黃丸

治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚

者

太黃

黃芩

黃連

各等分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二三十丸加

至五十丸生薑湯下不計時候日三服妙

當歸木香湯

治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩

語聲沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不思飲食白

日間睡夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃
頻發喘咳遍身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾
拘急發寒熱五心煩燥唇乾多渴胸膈不利喉咽
噎塞疔羸瘦弱經曰脉大為勞宜服此藥

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮

地骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕蔭皮 巴上諸藥全燒

為灰末用十大錢秤 當歸 一兩 木香 紅芍藥 半兩

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一
文同煎至七分溫服如婦人血臟臍下冷痛似
刀攪遍身腫滿室女經脉不通用斑猫一兩大

黃一兩炒剉二味爲末用黃狗膽汁以溫酒調
下一錢如臍下痛止心間痰未止不服二味

燥門

消渴論

新安吳勉學

燥乾者今肺之本燥金受熱也火成燥也兼火致
致金衰耗液而損血鬱而成燥皆由風志燥液耗
耗液故經云風熱火同易也其燥藥可食也

新安吳勉學方卷之九

頻發喘咳通身疼痛節氣走注四肢沉重

拘急發寒熱五心煩燥唇乾多渴胸膈不舒痰

噎塞疔癰瘦弱經口脈大為勞宜服此藥

青皮、五加皮、海桐皮、桑白皮、陳皮

地骨皮、丁香皮、牡丹皮、棕蘆皮

木香、紅芍藥

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢

不文強咬齶不礙土少間燕末土不那二末

黃子兩少性二和燕末用黃餅翻衣以匙酥隨

黃帝素問宣明論方卷之十

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

燥門

消渴論

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於

風熱火也又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經

云諸澁枯渴又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液玄

腑閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲經云肺主聲肢痛

綆戾者風熱濕相致而遂以偏枯語音澁手足不隨

也然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相

鬱榮衛不能開發貫注多成偏枯經曰諸澁枯涸乾

勁皴揭屬於燥也○又如胃膈痺熱煩滿饑不欲食

或痺成消中善食而瘦或燥熱鬱甚而成消渴多飲

而數小便或因熱病或恣酒欲誤服熱藥以致脾胃真陰陽損虛肝心衰弱也狂陽心

火燥其二焦腸胃燥澁怫鬱而水液不能宣行也則

周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多
飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而使
注爲小便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣○
又如周身熱燥鬱故變爲雀目或內障癰疽瘡瘍上
爲咳嗽喘下爲痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化
者變爲水腫濕脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便
有脂液者爲消腎也此爲三消病也消渴消中消腎
經意但皆熱之所致也

人參白朮湯

治胃膈瘴熱煩滿饑不欲食瘴成爲

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小

便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中
偏枯酒過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿
痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荆芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

各半兩

茯苓

去皮

連翹

瓜蒌根

乾葛

各一兩

甘草

二兩

藿香葉

青木香

官桂

各一分

石膏

四兩

寒水石

二兩

滑石

半斤

右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩
生薑三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加

至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減

兼服

消痞丸散以散賜胃結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩

黃丹

漢防已

栝萋實

各等分

右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進

三二服即止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參

三錢

白朮

澤瀉

瓜萋

桔梗

梔子

連翹

各半兩

葛根

黃芩

大黃

薄荷

白茯苓

各一兩

甘草

一兩半

石膏

二兩

滑石

寒水石

各三兩

右為末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服

消痞丸

大黃甘草飲子 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升

先煮三沸出淘苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

大籠者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水少許豆乾成於中故冷令病人食豆

渴食之無時不愈不止再煮

前藥不三

論

論

夫痢者五臟窘急而不散或感冷物或冒寒暑失
饑不能開發又傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱化
成利自古人三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也
今人瘡節初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後
寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃
者乃熱青利是寒太素曰五泄有溇泄鶩泄飧泄濡

泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色
 青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣
 色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色
 蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極
 頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除
 濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利
 積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白瘰閉淋

痛利小便偏主石淋 乃服金石熱藥多待為砂石從小便淋出者也 腸胃

中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結

消畜水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五

藏大養脾腎之氣

此腎水之藏非為主之府也

理內傷陰痿安

魂定魄補五勞七傷一切虛損主癩瘡驚悸

其子切驚

動健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼

痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血

氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役饑渴

宜熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽

及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮悲怒驚

恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能

令遍身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產

後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此
神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石 六兩 甘草 一兩

右爲末每服三錢 許 溫水調下 無蜜亦得 日三服

欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎 葱白豆豉

湯調下四錢 每服水一盞葱白五寸豆豉五十粒煮取汁一盞調下 併三

服効爲度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解

多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易

得之賤物而不明素問造化之理故不取本草

神驗之言而多不用焉若以隨證驗之此凡人

之仙藥也不可闕之

傷寒當汗而不可下當下而不可汗者且如誤服此

藥則汗出自愈裏熱便得宣通而愈或半在裏半在表可和解而不可發汗吐下者若服上藥

多愈亦獲小効是解散 涼膈散 和解為佳或人

加蒼木末 二分同葱豉煎湯調服 滑石麻黃桂

枝 要發汗 甘草 一兩 蒼木 二兩同為末每服四 葱

白豆豉 五十枚同煎至六分去滓 逼毒散 非

婦可 太白散 加麻黃 神白散 或溫

加麻黃蒼木 各等分 濟眾云青龍散 或青龍散

滑石與蒼木 倍 最為發汗之妙藥也 欲更加入

服之則轉加 大通毒散 或解利兩感 涼膈散 調

熱也名為

益元散

四錢或下乳用猪肉麩羹或酒之類調下四錢不計時候日三服宜食肉麩羹

催產

用温油漿調下三錢併二三服三承

氣湯

一服調下五錢須臾更頻用温油漿調服

產下皆由風熱燥溢緊斂結滯不能舒緩是故

產矣慎不可温補而反生燥熱也俗未知產後

虛邪熱大甚而為諸證由不明素問造化故不

識證候陰陽反以妄為產後諸虛百損俾為虛

冷而無熱也誤以熱藥温補或見渴甚者不令

飲水本為善心為害多矣豈知治病之道俱以

藥同將為妄行反招侮慢今以黃丹紅玉散

青黛

令輕粉碧色名

碧玉散

若薄荷葉

若桃仁色

紅玉散

若加

主療並同但以回避
愚俗之妄侮慢耳

玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸藥不

能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液

宣行者宜以逐之兼宜利積熱酒食積黃瘦中滿

水腫腹脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉

者勿服

黃連 黃蘗 大黃 甘遂 芫花 醋拌炒

大戟 各半兩 牽牛 四兩取末二兩 已上同細末 輕粉 二錢

青黛 一兩

右為末勻水丸小豆大初服十丸每服加十丸

空腹日午臨卧三服以快利爲度後常服十五
二十九數日後得食久病未痊除者再加取利
利後却常服以意消息病去爲度後隨證止之
小兒丸如黍米或麻子大退驚疰熱積不下者
須常服十丸

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸

證

金井阿膠

淨草灰炒透明白別
研不細者再炒研細

烏梅肉

去核炒

黃蘗

剉炒

黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

半兩各
等分

右爲末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十
丸食前暮夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂
肥諸物也

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤

白諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚瘡
積熱疰癬堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消

食

輕粉

粉霜

硃砂

以上
別研

雄黃

研

朱砂

信砒

芭豆

去皮各一錢

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱砂信

砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛爲油與前藥
研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑
旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或
止吐瀉痢疾調甘露散是桂苓甘露飲或益元散亦得
芍藥皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無間膿
血並宜服之

芍藥

黃蘗

各一兩

當歸

黃連

各半兩

右爲末水丸如小豆大溫水下三四十九無時
兼夜五六服忌油膩脂肥發熱等物

二勝丸 治泄痢虛損不問久新者

鹽豉

紫蒜 去皮各等分

右同杵為膏丸如桐子大每服三丸至五丸
飲湯下如未愈及赤白痢腹滿脇痛更與杏仁
丸

杏仁丸 治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重者

杏仁

四十九箇 去皮

芭豆

四十九箇 去皮

右以藥同燒存性研細如泥用蠟鎔和旋丸如
桐子大每服一二丸煎大黃湯間日一服

白朮聖散子 治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

亦治

御米殼

二兩
蜜炒

當歸

肉豆蔻

縮砂仁

石榴皮

訶子

乾薑

炮

陳皮

去白

白朮

甘草

芍藥

各等分

右為細末每服二錢水一大盞入乳香同煎和

滓服

勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脘浮熱者及多日

不已者微小者立止

芭豆皮

楮實葉

同燒存性

右為末鎔蠟丸如棗豆大每服五丸煎甘草湯

下

大聖金真散 治一切寒熱赤白瀉泄等痢疾

御米殼 半斤 炒

甘草 一兩 炙

乾薑 半兩 兩當歸

醋石榴皮 一兩 炒

陳皮 去白

白茯苓 去皮

右為末每服二錢水一盞小兒半盞乳香同煎至七分食前忌油膩生冷毒物等

車前子散 一名 斷痢散 治一切痢不止

車前子 不以多 少炒香

右為末每服二錢米飲調下食前空心

象骨散 治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消噫氣吞

酸食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重臍腹疼痛

裏急夜起頻併不思飲食皆可治之

象骨

四兩炒

訶子

取肉二兩

肉豆蔻

一兩

枳殼

一兩

甘草

二兩

乾薑

半兩

右為末每服三錢水一盞半煎至八分和滓熱

服食前日三服

海蛤玉粉散

治血痢解藏中積毒熱

海蛤

不以多少

右為末每服二錢入蜜少許冷水調下不計時

候

黃帝素問宣明論方卷之十

黃帝素問宣明論方卷之十一

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

婦人門

總論

素問曰 目得血而能視 耳得血而能聽 指得血而能
攝 掌得血而能握 足得血而能步 藏得血而能液 腑
得血而能氣 然血所通流 則氣亦然也 氣血宣行 其
中神自清利 而應機能用矣 故

素問氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血藏
爲基本也夫婦人之病手太陽足少陰小腸心之經
絡爲裏表起自任衝之脉於經脉之下以上毛際循
腹裏關元上至咽喉頤循面目過帶脉貫臍而止以
婦人月水一月一來如期謂之月信其不來則風熱
傷於經血故血在內不通或內受邪熱脾胃虛損不
能飲食食既不克榮衛凝澁肌膚黃燥面不光澤或
大腸虛變爲下痢流入關元致絕子嗣爲子藏冷虛
勞損而痰帶下起於胞內○夫帶下之造化但分經
絡標本殊異爲病之本氣也其病所發正在過帶脉

之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也
法曰頭目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小
便秘澁滯脉實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多
有之爲病寒豈能然素問亢則害承廼制謂亢過極
而反兼已勝之化制其甚也則如火煉金熱極則反
化爲水及六月熱極則物反出液而濕潤材木流津
故肝熱則出泣心熱則出汗脾熱則出涎肺熱則出
涕腎熱甚則唾○大凡俗論已煎熱湯煮極則沸溢
及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脉濕熱甚
者津液涌而溢已爲帶下見俗醫白帶下者但依方

論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣
通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散 治徧身燥濕相搏玄府緻密遂令公

悸發渴飲食減少不為肌膚

人參 三錢 白朮 七錢 薄荷 半兩 縮砂仁 三錢 生地黃

茯苓 去皮 甘草 各半兩 黃芩 一錢 滑石 三兩 藿香 三錢

膏 一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

食前日進二三服

白朮湯 治妊娠血液虛衰痿弱難以運動氣滯痺

命榮衛不能通宣常服養液潤燥開胃結帶

昌盛

白朮 三朮水石 當歸 黃芩 芍藥

人參 石膏 乾薑 防風

藿香 甘草 茯苓 木香

崔宣武方 用白朮一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎

分去滓溫服食前日三服

二氣湯 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦

美食有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃

四兩別為末醋一升慢火熬成膏子

當歸

二兩

白芍

右為末以膏子和丸如桐子大每服二十五丸

醋湯下食前日進三服

如月水不通加入

乾漆

二三錢

沒藥

半兩

硃砂

三錢

官桂

二錢

斑猫

三錢

去毛足炒熱

本草云此用熬不
可生用則吐瀉

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多及帶下淋瀝

無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡

露胎痛動不安及大小兒痢瀉並宜服之

當歸

芍藥

黃連

染槐子

艾葉

炒各半兩

龍骨

黃蘗

各一兩

茯苓

半兩

木香

一分

右末滴水為丸如小豆大溫米飲下三四十九

食前服三四服

當歸人參散 治產後虛損瘦弱難以運動疼痛胸

滿不思飲食

當歸 白朮 黃芩 芍藥 大黃

茯苓 去皮 陳皮 各半兩 人參 黃耆 剉 川芎

厚朴 去皮 官桂 各三錢 甘草 一兩 枳殼 四錢去

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分
去滓不計時候溫服如大便闕以此散下和中

丸

增損四物湯 治月經不調心腹疼痛補血臟溫經

注類

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

白朮

牡丹皮

各半兩

地骨皮

一兩

右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服

食前

當歸川芎散

治風壅頭目昏眩痛悶筋脈拘攣肢

體麻痺保護胎氣調和榮衛

當歸

川芎

各半兩

甘草

二兩

黃芩

四兩

薄荷

一兩

縮砂仁

一分

右為末温酒調下。一或漸加至二錢食後日進

三服

辰砂大紅丸 治產後寒熱暈悶血氣塊硬疼痛不

止

朱砂藥一兩一半入附子炮沒藥半兩海馬半錢

乳香 茯苓 肉桂 玄胡 薑黃

礞砂各半兩斑猫一分生地黃一兩

右為末酒煮麩糊為丸如酸棗大每服一九煎
當歸酒下放温經水不行煎紅花酒下

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨炒燒綿灰 血餘灰汗脂者各等分

右為細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢

沒藥丹 治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急

痛或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱

煩渴喘急悶亂肢體疲倦大小人心腹暴痛孕婦

自利惡物過多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可

強行宜調氣養血細詳證用

沒藥 一錢 當歸 一錢 大黃 兩 牽牛 兩 輕粉 一錢

官桂 一分已上同研末 硃砂 一錢同研

右研勻醋麩糊為丸如小豆六每服五丸至十

丸溫水下以快利取積病下為度雖利後病未
痊者後再加取利止心腹急痛煎乳香下未止
取大便利

番藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體
困倦不美飲食

黃藥子

當歸

芍藥

生地黃

黃芩

人參

白朮

知母

石膏

川芎

桔梗

各一分

甘草

兩

紫苑

槐花子

柴胡

各一分

右為麤末抄三錢水一盞煎至七分濾汁溫服

食前但一服

大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘

悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川練子

蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎各二分

桔梗 黃芩 大黃各半兩 甘草 一兩 檳榔 一錢

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服

食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥

子染槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急

痛如本方煎服得利丸好

枳實 神丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有

似妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實

檳榔

黃連

黃藥

黃芩

當歸

阿膠

灰炒
細研

木香

各半
兩

右為末水和丸如小豆大温米飲下三十丸不

計時候日進三服

軟金花丸

治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經

病刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗

者兼治血積食積

當歸

半兩
焙

乾漆

二錢
生

輕粉

生全用

斑猫

為末

礪砂

粉霜

各一錢

芭豆

二錢
去油

右爲末同研細棗肉爲膏旋丸如棗豆大每服
一丸新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃

紅花 各二兩

亡蠱蟲

十箇去翅足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每
服五七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮

黃芩

各等分

右爲末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一

盞稍溫服

海蛤丸 治婦人小便濁眩暈赤白帶下五淋臍腹疼

痛寒熱口乾舌澀不思飲食

海蛤

半夏

芫花

醋炒

紅娘子

去翅足

訶子

炒

玄胡索

川練子

麩裹煨 去皮

茴香

炒各一兩

乳香

三錢

礞砂

半兩

硃砂

半入藥 半為衣

沒藥

各一兩 研

當歸

一兩 半

右為末醋煮麩糊為丸如小豆大每服五丸至

十丸醋湯下量人病虛實加減

烏金散

治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸

蠱蟲

血餘灰 水蛭 鯉魚灰 木香 青皮

皂角 大者炙 各半兩 芍藥 半兩 芫花 三兩醋浸

芭豆 一錢 出油 朱砂 少許 棕皮灰 紅花 一兩 川烏頭 半兩

右為末每服半錢加至一錢煎生薑湯調下空

心食前忌油膩物

伏龍肝散 治婦人血崩不止或結作片者

芎藭 一兩 生地黃 一分 阿膠 八錢 當歸 一兩 續斷 一分

地榆 刺薊根 一兩 伏龍肝 七錢 青竹茹 八錢

右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日

五服不計時候後服補藥

阿膠丸

阿膠

鱉甲

六分續斷

五分

龍骨

半兩

芎藭

六分

地膽

四分

鹿茸

五分

烏魚骨

八錢

丹參

六錢

龜甲

一錢

右為末醋麩糊為丸如桐子大每服三十丸艾

湯下日進三四服

麝香杏仁散

治婦人陰瘡

麝香

少許

杏仁

不以多少燒存性

右為細末如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿

繫口臨上藥炙熱安在陰內立愈

硃砂斑猫丸

治婦人產後喫硬食變作血氣食塊

無問久新

皂角末

錢二

芭豆

四箇去油

朱砂

一錢

硃砂

一皂子大塊

乾蝸

一箇全

班貓

十箇

紅娘子

五箇

水蛭

三箇

右為細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三丸溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治之或大便或小便不多出也

黃帝素問宣明論方卷之十二

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

補養門

補養寒論

素問云諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰也至者爲極也少陰者冬脉所旺居北而屬水爲寒爲歸藏爲周密寒中收引拘縮寒之用也其病上下所生水澄徹冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化

吐利清冷爲病則如天氣寒而水自清也

素問云太陽受寒血凝爲痲太陰受寒氣聚爲疝但
脉急而寒之象也急主於痛故緊急也又內經云數
則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒脉當遲緩寒
毒內鬱洪數爲熱所養心之脉也寒氣生清水清就
於濕故以下利清白此乃腸胃寒化物失常熱則壅
澁不通寒勝則火衰火衰金旺吐利腥穢腥者金肺
之屬也熱則喜酸寒則水腥只如四肢逆冷堅痞腹
滿屈伸不便禁固戰慄謂陰水主之舒倦不便診其
脉沉伏而遲病之證也若身涼不渴而寒蹇足而卧

惡聞人聲不欲言皆陰證也陰陽停則和偏則病如
陽氣暴絕陰氣獨勝則爲寒證陰氣暴絕陽氣獨勝
則爲熱證

經曰陽盛陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽
實外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽
當涼膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆
湯主之

論曰

大凡治病必求標本受先者爲本次者爲標此爲兼
證故知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當不知

標本者是謂妄行也本病相傳先以治其急六氣爲本三陰三陽爲標故病氣爲本受病經絡藏府謂之標也

補養類

防風當歸飲子

治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚

陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱

而身熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表

半在裏進退出入不已而爲寒熱往來或表多則

惡寒裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相

助并甚於裏畜熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽

極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜良畏熱者或熱極悶寒不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗑不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澁小便溺淋闕或是皮膚瘙癢手足麻痺又或筋脉拘急肢體倦怠

或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱怫鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食又服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥

滑石

各一兩
六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同

煎至七分去渣温服

補校

此方未為至當恐當時傳寫之誤

雙芝丸

治補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑

久服注顏不老

熟乾地黃

后取末

石斛

去根酒炙

五味子

焙

黃耆

剉

肉苁蓉

酒浸

牛膝

酒浸

杜仲

蜜水浸炮

兔絲子

酒浸三日炒

麋鹿角霜

半斤

沉香

三錢

麝香

二錢研

人參

白茯苓

去皮

覆盆子

乾山藥

木瓜

天麻

酒浸

秦艽

已上各一兩

薏苡仁

二兩炒

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九至三

四十九溫酒下鹽湯米飲亦可

凡年五十歲已上加入黑

附子

以青鹽湯蘸泡

鹿角

一大對去頂二三指

硫黃

半斤

以上用

此油釜中以水同煮令微沸勿太急甚水耗只

旋添溫水須用水以備添也煉令角膠汁出盡

其角如霜以手捻如膩粉乃盛之取用勿令穢

汚也

內固丹

治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋

骨勁健渾如壯士

肉菘蓉

酒浸

茴香

炒一兩

破故紙

胡蘆芭

炒

芭戟去心 黑附子炮 川練子 胡桃仁各四兩 煆妙

右為末研桃仁為膏餘藥末和勻酒麪糊為丸

如桐子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食

前虛者加至五七十丸此藥明目補腎烏髮進

美食空心

大補丸 治男子脾腎不足不問久新者

陳莖子 陳蘿蔔子已上炒 麩仁去皮各半兩

川山甲七片用酒炙 麝香少許

右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒

送下食前空心

蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧

一對 酒炙

乳香

木香

白茯苓

丁香

茴香

各一錢

川山甲

二錢

右為細末每服一錢好温酒調下空心食前

金鎖丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨

水飛

兔絲子

一兩

破故紙

韭子

澤瀉

牡蠣

各半兩

麝香

少許

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服三十丸温

酒下空心食前日三服

調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮

紅皮各一兩

大黃

一兩牽牛三兩

右為細末滴水和丸如桐子大每服三二十九

溫水下空心食前

水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石

研

木香

乳香

研

青鹽

各一分

茴香

炒

骨碎補

炒

杜仲

各半兩去皮生薑炙絲盡

白朮

一兩緊者槌碎絹袋盛大豆蒸熟取出焙乾研

黃戍腎

對酒一升煮

熟切作片子焙

入白茯苓

一兩與腎為末

右為細末酒麩糊和丸如皂子大每服二九溫

酒下空心忌房室

和氣地黃湯

治沉積氣結不散調養榮衛補順陰

陽常服以代湯茶酒果

木香

一字

揀桂

去皮

茯苓

去皮

白芥子

各一錢炒

白朮

乾山藥

川芎

當歸

各一倍

桂花

縮砂仁

各半錢

甘草

半兩

右為細末入麝香少許研勻用數重油紙或甕

器內密封起每用蜜二斤餵飽一斤溫好甜水

五升化勻開抄前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨

炒香焦槌碎濕地黃根許切長寸約取汁半盞

溫服

白朮調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹

痛 上不所出水液澄徹清冷殺不化小便清白不
澁身涼不渴本末不經有見陽熱證其脉遲者

定也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也
或冷熱相擊而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作

以成熱證者不可亦言為冷當以脉證別之夫濕
熱上瀉常見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉

也當以標本之不可治或熱證誤服此白朮調
中湯溫藥亦能開發陽氣一通而愈別無加害無

問寒熱久新並宜服之 或有口瘡目疾孕婦等吐
瀉者以畏乾薑官桂不服

白朮 茯苓 紅皮 澤瀉
去皮 去皮 去白 各半

乾薑 官桂 縮砂仁 藿香
炮 去皮 各一

甘草 一兩

右為末白湯化密少許調下二錢每日三服煉

密和就每兩作十丸名白朮調中丸小兒一服

分三服

人參白朮散 此方證同調中湯治法

人參 白朮 茯苓 甘草 橘皮

葛根 澤瀉 滑石 藿香 各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分溫服妊婦

加蒼朮三五片熱服

白朮散 治傷寒下後餘熱以藥下之大過胃中虛

熱飲水無力也當生胃中津液多服此藥

人參 白朮 木香 白茯苓

甘草

劉炙

藿香葉

乾葛

劉各一兩

右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時也

丁香附子散

治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子

一兩

母丁香

四十九箇

生薑

半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢米湯一盞調下日進三服

何首烏丸 治男子元藏虛損髮白再黑填精

何首烏斤半肉苁蓉六兩牛膝四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏甑肉蒸棗軟用切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十丸即止却減至數効如神妙

煨腎丸 治男子腰膝疼夜多小便者

川練子 馬練花 破故紙 胡蘆芭

茴香炒各等分

右除茴香外四味酒浸同為末煑麩糊為丸如

桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前

神仙楮實丸

治積冷氣衝心胸及背有蛇蟲疼痛

痔瘻疔癰氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化上
逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上
上氣咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐
則思睡起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑
陰汗盜汗夜多小便洩利腸道衰弱婦人月水不
通小便冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明
日益力輕身補髓益精

楮實子

一升淘去泥微炒

官桂

四兩去皮

牛膝

半斤酒浸三日

乾薑 三兩 泡

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服二十九溫

酒空心食前鹽湯亦得

補中丸 治一切氣疾心腹疴痛嘔吐氣逆不思美

食

厚朴 生薑 炮製 香 乾薑 炮 陳皮 去白 白茯苓 去皮

甘草 多人此各等分

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白

湯化下細嚼亦得

蓮燈茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疴痛吐逆

下痢美飲食

葦澄茄

半兩

良薑

二兩

神麴

炒

青皮

去白

官桂

去皮各一兩

阿魏

半兩醋麴累煨熟

右為末醋麴糊為丸如桐子大每服二十九生

薑湯下不計時候

總論

夫痛者經脈流行不止環周不休寒氣入經而痛

血泣凝而不行客於脈外血少客脈中氣不通故

然而痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛

黃帝素問宣明論方卷之十二終

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服二十丸溫

酒空心食前鹽湯亦得

補中丸 治一切氣疾心腹疼痛嘔吐氣逆不思美

食

薑葛不不指部新

陳皮 去白 白茯苓

白朮末韻致騰於此吹餅子大每服二十丸生

官卦 煉蜜為丸同懸 每服一丸空心白

真參 兩 貝薑 二兩 斬 青史 去白

不麻美着食 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疼痛

黃帝素問宣明論方卷之十三

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

諸痛門

總論

夫痛者經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲
血泣凝而不行客於脈外血少客脈中氣不通故卒
然而痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛甚而
可按或按之而痛止或按之而無益或喘痛動應手

或與心背相引而痛或脇助與少腹相引而痛或腹
痛或引陰股宿昔而成積或卒然而痛死不知人而
少間復生或痛而閉不通者諸痛各不同形經曰寒
氣客於脉外則脉寒脉寒則蹇縮蹇縮則脉絀音督脉
絀急則外引小腹衛氣不得通流故卒然而痛得炅
則痛止寒氣客於經脉之中相薄則脉滿滿則血氣
亂故痛而不可按寒氣客於腸胃之間膜原之下血
不得散小腹急引故痛按之血氣散痛乃止也脇助
痛者寒氣客於厥陰之絡脉也背與心相引痛者寒
氣客於背俞之脉注於心相引痛寒氣客於陰股血

泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒氣客於五臟厥
逆上壅陰氣竭陽氣未入故卒然痛死氣復反則生
矣視其五色黃赤爲熱白青則爲寒青黑爲痛經曰
感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱
則骨弛肉消但痛痒瘡瘍癰痛腫血聚者皆屬心火
熱也不可一例傷寒凡治痛者先察本次明經絡皮
部虛實用藥無悞矣

神砂一粒丹 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止
者

附子一兩 鬱金

橘紅

等附子停用

右為末醋麪糊為丸如酸棗大以朱砂為衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

神聖代鍼散

乳香 沒藥 當歸 香白芷

川芎 各半兩 元青 一兩去足

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搖得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎永不難產但一切痛疾服之大

有神効只是要詳疾證用藥

茴香丸

治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者

茴香炒

良薑

官桂

各半兩

蒼朮

一兩汁浸

右為末酒煮麩糊和充如桐子大每服十丸生

薑湯止痛溫酒下空心食後

趁痛丸

治一切走注疼痛婦人經脈住滯水腫腹

脹

其遂

大戟

芫花

黑牽牛

各等分

右為末以蕎麥同末和作餅子打切為棋子煮

熟服之得利為度每服一錢加減相虛實

六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金
鑰匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走疰疼
痛

大黃

一兩紙裹煨

白牽牛

半兩生

黑牽牛

微炒

甘遂

各半兩

檳榔

三錢生

輕粉

一錢

右爲細末每服一錢密水調下服量虛實加減

定痛丸

治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者

先整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢然

後服藥大効

乳香

一分

川椒

當歸

沒藥

赤芍藥 川芎

自然銅

細骨

右為末，鎔蠟為丸，如彈子大，細嚼酒下一丸，骨

碎者先用竹夾夾定，三五日依舊，小可與服。

香殼散 治小腸氣，臍腹攪痛，急陰股中疼，悶不省

人事

舶上茴香

用鹽炒

枳殼

各一兩

沒藥

半兩

右為末，每服一錢，溫熱酒下，不計時候，併二三

服

金鍼丸

亦名陸神丸

治陽絕痞氣，心腹不忍者。

丁香

木香

乳香

阿魏

輕粉

骨碎補

去毛

檳榔

官桂

桂心

芭豆

去皮

杏仁

去皮

不灰木

肉豆蔻

陽起石

硃砂

各等分

右為細末水麩糊為丸如小豆大每服一九針

穿作孔子小油內袞過燈焰內燎遍於油中蘸

死嚼生薑下不計時候日三服虛實加減

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎噬

草烏頭

五靈脂

各一斤

木鱉子

四兩

白膠香

半斤

地龍

四兩去土炒

細墨

一兩

乳香

一兩

當歸

二兩焙

沒藥

二兩

麝香

錢

右爲末再研一千下糯米麩糊和丸如桐子
每服一丸至二丸温酒下喫藥罷遍身微汗

驗

沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥

乳香
別研

乳香

各三錢

川山甲

五錢炙

木鱉子

四錢

右爲細末每服半錢一錢酒大半盞同煎温服

不計時候

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸爲表裏主爲傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑踈風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澁而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔

素問云因而飽食筋脉橫解房室勞傷腸癖爲痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者而變成癭也五臟切宜保養勿令受

邪

香殼丸 治濕熱內甚因而飽食腸癖成痔久而成

瘦速服悉愈之

木香 各二錢 黃蘗 各二錢 枳殼 去穰炒 厚朴 各半兩

黃連 一兩 蝟皮 一箇燒 當歸 四錢 荆芥穗 三錢

右為末麩糊為丸如桐子大每服二三十丸溫

水食前日三服

榼藤子丸 治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而

不治乃變成瘦

黃耆 枳實 槐花 荆芥穗

鳳眼草 已上各二兩

楸藤子 一對灸

皂子 三百箇灸

右爲細末麩糊爲丸如桐子大每服二三十丸
空心酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血物等

烏荆丸 治腸風痔疾大腸悶澀

川烏頭 二兩炮

荆芥穗 四兩

右爲末醋麩糊爲丸每服二三十丸如桐子

溫水下日三服

黃耆葛花丸 治腸中久積熱痔瘻下血疼痛

黃耆

葛花

黃赤小豆花

各一兩

芡芍藥

真琴

當歸各二錢

皮

檀栢

白蒺梨

毛角子仁

炒各半兩

生地黃

焙一兩

右為末煉密和丸如桐子大每服二十九至三十丸煎桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得

黃連散

治腸風下血疼痛不止

雞冠花

黃連

貫衆

川大黃

烏梅

各一兩

甘草

三分炙

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不計

時候

乳香沒藥散

治五種腸風痔瘻無問久新

宣黃連

白礬

各一兩

穀精草

半兩

石榴

一箇用刀子割下莖

子裏面取子三停一停次將黃連白礬碎內入石榴內用元蓋子合用

右以濕紙一張裹了後用膠渥拍作餅子裹石

榴以炭火燒通赤為度取出去渥紙次將穀精

草於銚子內炒焦黃為度與石榴研細後入麝

香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一

錢熱酒小半盞調下日三服

木香厚朴湯 治痔瘻脫肛腸胃間冷腹膈虛脹不

思飲食

木香

桂心

桃仁

陳皮

厚朴

各一兩

肉豆蔻

赤石脂

各半兩

皂角子

三兩去皮
子醋炙黃

大附

三分
炮

右爲末每服二錢溫粥飲調下食前

瘧門

瘧疾總論

素問云瘧瘧皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頷此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣盡行陽夜行陰氣得陽外出得陰內薄外內相

薄是以日作也。其有間日者氣深內薄於陰陽
氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日作
也其作晏與早者邪氣客於風府循膂而下衛氣
一日一夜大會於風府其日下一節先客於脊背
每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入則病
作晏也

大寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰
先寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先
熱而後寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽
氣獨勝少氣煩冤手足熱欲吐名曰瘧有餘則

瀉不足補熱為有餘寒為不足已得火不能溫熱
已水水不涼氣陰勝併於陽陽勝併於陰陰勝則
寒陽勝則熱故瘧者陰陽風寒虛實邪氣不常之
所作也

辟邪丹 治嵐瘴鬼瘧食瘧併月頻日者

菜豆

雄黑豆

各四十粒

信砒

半錢別研

黃丹

一錢為衣

硃砂

二粒

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作二十粒每
服一粒已用東南桃心取七枝研汁將井花水
早辰日欲出不出向日吞之醋湯亦得已發日

服

斬邪丹 治諸般瘧疾無時不止者

菘豆

小豆

三十粒口退皮再入

硃砂

信砒

各一錢

右為末同研細滴水和丸勻分作十九丸每服

丸已早晨服夜間於北斗下香水獻至早晨用

新倒流水送下

斷魔如聖丹

信砒

一錢

蜘蛛

人者三箇

雄黑豆

四十粒

右為末滴水和丸如豌豆大如來日發於今晚

夜北斗下獻於早晨已紙裹於耳內扎一丸立見愈神聖一粒可醫三人

長砂丸 治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砒

甘草

各一錢

硃砂

二錢

大豆

四十粒

右爲末滴水和丸勻分作四十九服發日早晨日欲出煎桃心湯下忌熱物

瘧神丹 治諸般瘧疾

信砒

一兩

雄黃

一錢

右以於五月重五日用饅子尖拌勻研三千下日未出不令雞犬婦人見丸如桐子大未發前

宣明論方 卷之十三
十一
一日面東冷水下一丸

趨鬼丹 治一切瘡疾神効

信砒 一錢 大豆 七錢 雄黃 輕粉

荷葉 各半 甘草 一寸

右爲末滴水爲丸如小豆大重午日未出不見
雞犬婦人脩合每服一丸無根水下平日夜視
北斗來日服忌熱物

黃帝素問宣明論方卷之十三

黃帝素問宣明論方卷之十四

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

眼目門

眼科總論

素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之經絡所主肝臟受虛而即補腎實而即瀉心。夫人之眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能別辯賢愚天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣

貫五輪外應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊
衝火炎上行故攻目昏滲澁疼痛赤絲皆發榮衛實
則能視榮衛虛則昏暗凡人多食熱物或嗜五辛坐
濕當風凌寒冒暑將息失度皆喪目之源也

黃連膏 治一切眼目癢肉攀睛風痒淚落不止

朴硝

一斗以水半斗淘
淨去土陰乾用

黃連

半斤

白丁香

五升以水一斗淘
淨去土攪細用

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水
面浮牙者取出挖乾以紙袋子盛風中懸至風
化將黃連細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加

蜜妙點之效矣

滌昏膏 治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣

好崖蜜斤一兩黃連一兩沒藥半兩黃丹一兩炒紫色

右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎

熬稠更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗甚妙後

更用通天散啗鼻

通天散 治偏正頭疼并來腦風通一切壅滯明目

赤芍藥 川芎 黃連 黃芩

玄胡索 草烏頭 當歸 乳香別研各等分

右為細末每服少許紙撚子蘸藥任之鼻啗神

効

神芩散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并

牙齒悶痛

川芎

鬱金

各二錢

荆芥穗

一分

薄荷葉

一分

盆硝

二錢

紅豆

一錢已上為細末後入盆硝

右研勻鼻內噴三兩刺耳力慢加藥病甚者兼

夜喘之凡熱多風少隨證選用諸藥

金絲膏 治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼或痛

宣黃連

半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸滓經半日許取汁與前汁放別

用水

半盞

蜜一兩

白礬

一字

升鹽

一分如無以青鹽代之

山梔子

二錢好者梔子與黃蓮滓同煎五十

十沸取盡力子濾去滓與前黃連汁一處入篩藥

右用銀甕器內同熬十餘沸用生綸上細紙敷

重再濾過用時常點

白藥子散

治一切痔眼赤爛目生翳膜肉外瘡疾

并小兒疳痢

白藥子

兩甘草

右為末用豬肝一葉批開糝藥五錢水一大盞

煮熟食後服

胡黃連散 治一切久新赤目疼痛不能坐臥并大

小人口瘡

胡黃連

檳榔各半兩麝香少許別研

右為細末研細點之如口瘡每服半錢麝香一

字勺口瘡大小貼之忌食魚猪油膩物

碧霞丹 點一切惡眼風赤者

龍腦

麝香

礪砂各二錢

血竭

沒藥

乳香

銅青

各一錢鵬砂三錢

右為末滴水和丸如桐子大每服一丸新水化

開點之立効

菩薩散 治遠年近日一切眼疾

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石

太陽石 雨餘石 河洛石 礬礦石

雲母石 盧甘石 井泉石 白滑石

紫英石 寒水石 陽起石 猪牙石

代赭石 碧霞石 烏魚骨 青鹽各一

礪砂半兩 蜜陀僧一兩 銅青一兩 黃丹四兩

麝香 腦子一錢 輕粉一錢 鴨砂三錢

乳香二錢 雄膽一斤 白砂蜜二斤

右為細末以井花水九大碗熬就作四碗點水

內落下錢許大不散可如散者再熬瀝瀆過露

旋點

石膏 羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近印內

外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活 治腦熱頭風 蜜蒙花 治羞明

木賊 退翳障 香白芷 清利頭目 細辛

乾菜子 二味起 蘇子 起拳 川芎 治頭

蒼朮 明目暖 甘菊花 荆芥穗 治目中

黃芩 洗心 石膏 二味 藁本 治偏正

甘草 解諸藥毒 各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一

盞調下或茶清或淘米第二遍泔亦得日進三
服至十日漸明服至二十日大驗此方醫數十
餘人矣

重明散 治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干

仙苓脾 防風 甘草 井泉石

蒼朮 各半 丹參 白朮 石決明

草決明 各三分

右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日

進三服食後

雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼

暗淚出羞明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉生

風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引

兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能漑濟於

肝水此藥久服大補腎藏添目力

肉蓯蓉 一兩 牛膝 一兩 芭豆 一兩 浸一宿 去皮心

菊花 二兩 黑附子 青鹽二錢 以河水三升 同煮為度 去皮臍 兩

枸杞子 二兩 川椒 三兩 去目

右為末元浸藥酒煮麩糊為丸如桐子大每服

十丸空心酒下世人服藥不知多少根源往往

不効耳

丁香復光丸 治一切遠近目疾

丁香 二錢 芭豆 一錢去皮油

半夏 二兩

烏梅 半兩 南鵬砂 三錢 腦子 二百

盆硝 半兩

縮砂仁 二錢半

甘草 半兩 荆芥穗 二錢

右為末醋煮麩糊為丸如菉豆大每服十九至十五丸米泔下食後日三服

已上諸方係先生親驗可錄

小兒門

小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證爲少陰君火
暴強直支綆戾裏急筋縮也皆屬風證爲厥陰風
木大小兒六歲之上爲小兒十八歲已上爲少年
其六歲已下者諸經不載是以乳下嬰兒有病難
治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之
雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以
乳食調和臟腑迺得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以
綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘於心心受邪熱
乃發爲驚驚不止返爲潮搐則爲病也大槩小兒
病者純陽執多爲少故引○素問少陰厥陰證以

小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚
而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱
此證皆謂熱甚而風生○素問驚駭驚愕少陰君
火也

小兒脾疳痢瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青爲熱證
明矣痢色黃者何爲火甚則水衰而脾土旺故痢
色黃也痢色紅赤者爲心火熱甚深也痢色黑者
爲火熱過極則反兼水化制之故色黑也

五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不
澁爲寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷

白不澁身涼不渴脉遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而澁者為之

熱證世傳大人小兒吐痢霍亂食乳未及消化而

痢尚白便言論為寒證誤矣向不脉候別之仲景邪熱不

化穀豈為寒也大人亦同

小兒方類

龍腦地黃膏 治小兒急慢驚風涎痰上潮心胸天

吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效

如病不已與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗甘草橫文者別搗

麝香別研錢

雄黃

水窟者一
分別研

生腦子

一錢
別研

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉蜜為

膏油單裹如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子

大化下如小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀

湯下一丸常服新汲水下大解暑毒如孕婦人

常服新生男女永無疾病如有大人陽毒傷寒

加輕粉

二極
子

龍腦

少許

水化下一丸杏核大小

兒看年紀大小加減服立効

分肢散 治小兒卒風大人眼喎斜風涎暴心驚

癩天弔走馬喉閉急驚一切風熱等疾

芭豆

半兩不出油

川大黃兩朴硝

半兩

右大黃爲末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒胃喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下時上吐下瀉以吐利得快爲効大人半錢小兒一字看虛實加減只是一兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立

止

珍珠丸

治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜

膩粉

二錢

滑石

一錢

天南星

一錢半

蝟稍二十四箇續隨子二十四箇去皮

粉霜一錢半

右爲末研令極細以糯米粥爲丸如黃米大小
兒二歲已下每服三九至一九十五歲每服五
九至十九點茶湯下荆芥湯亦得虛實加減

牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾

肉桂

鬱金

各一兩

馬牙硝

四兩

甘草

半兩並生

右爲末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一
錢新汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服
半錢五歲已下服一字末無驚疳癩風患服之

立効

宣明論大 卷之十四
硃砂丸 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽候不利

取驚積

硃砂

天南星

芭豆霜

各一錢

右為末麩糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二丸或天弔戴上眼每服四五丸薄荷水下

立愈

鬱金散

治小兒急慢驚風等疾

鬱金

一枚大者

芭豆

七箇去皮不出油

右研為細末每服一字煎竹葉湯放溫下把藥抄盞唇上放以湯亮下喉咽為妙

澤瀉散 治小兒齁齕膈上壅熱涎潮

澤瀉 一分 蟬殼 全者二 黃明膠 手掌大一

右為細末每服一大錢溫米湯調下日進二服

未愈再服

鎮庭散 治小兒一切驚喘肚脹咳嗽

鬱金 大黃 各半 甘草 三錢 輕粉 一錢

右為末每服半錢用薄荷汁硃砂細研冷水以

木匙瀝下

定命散 治小兒天弔驚風不能哭泣

梨蘆 川芎 蔚金 各等分

右研爲細末鼻中啗之如哭可醫

金肺散 治小兒諸般喘嗽急驚風神効

錫灰 一錢
漢防已 二錢
鬱金 一錢半

砒黃 二錢
半夏 一錢半
湯洗七次

右爲細末每服半錢加一錢小兒加減煎猪肉湯下日進二服食後

厚朴散 治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴 兩
呵子皮 半兩
史君子 一箇
揀丁香 十箇
茯苓

吳白木 各二錢
青皮 二錢
甘草 一寸
炒

右爲末每服一字一歲加減用清米湯下

人參散 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及疎

轉後服之

人參

半兩

茯苓

二兩

牛犀

二錢

甘草

半兩

乾葛

半兩

桔梗

二錢

右為末每服二錢水一大盞入燈心五莖同煎

至六分放溫不計時候煩渴著以新竹湯下量

年紀加減

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬

半兩

銅青

一分

粉霜

輕粉

各一錢

右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如

吐多不定煎葱白湯投之立止効

桃符丸 治小兒風熱

大黃 郁李仁 黃栢 宣連

蔚金

各一分

芭豆

二七箇去皮
出油為霜

輕粉

二錢

右為細末滴水為丸如菉豆大以硃砂為衣每服二丸用桃符煎湯下看大人小兒加減

黃帝素問宣明論方卷之十四 終

黃帝素問宣明論方卷之十一

河一問

劉守真

撰集

新

安

吳勉學

校

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽疔疹瘤氣結核怫鬱甚者皆
熱五藏不和九竅不通六府不和留結爲癰近於
火氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火
之用也

人之瘡腫因內熱外虛所生也爲風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則爲膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則爲實痒則爲虛非謂虛爲寒也正謂熱之微甚也痒者美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣

得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其
痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越
怫熱內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者
猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐
爛者水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為
癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癩疹也瘤氣赤
瘤丹燦熱勝氣火之色也

如意散 治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸

牛蒡子

荆芥

各一分 牡蠣 半兩

輕粉 半錢

信砒 二錢

右爲細末研勻每臨卧抄一錢油調徧身搓摩
上一半如後有痒不止更少許塗之股髀之間
聞香悉愈

信効散 治風熱上客陽明之經牙齒痒蝕斷宣腐
臭血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發有時兼解
中金石一切毒藥

信砒 一錢

黃丹 二錢

千古石灰

如無但以陳久者炒細研四錢

右研細末入青鹽一分麝香少許如無此二味
亦得每上抄三兩大豆許先洗漱淨以手指蘸
藥捺上下牙齒斷瀝涎勿嚥之須臾漱淨拭

蝕處再上少許日三四次常用如意一上以類
爲妙或服金石藥致病便一日三四上更不上
牙齒如神或已上牙齒者傳之即愈或平人常
用頗能清利頭目寬膈美食使髭鬚遲白久用
亦能固牙齒便遲老人氣於面而手足陽明經
絡貫注憂思則氣結而血液不行燥怫鬱而血
衰不能榮養藏府故早蒼黃而斑白也此藥能
使陽明氣血宣通故效能然也○又方便龍骨
不用石灰

神聖餅子 治一切打撲傷損金石刀刃血出不止

者立効此藥上無膿退痂便愈

烏魚骨

一兩五月五日
前先准備下

萵苣菜

一握

萵菜

一握

青薊草

一握約一虎口人
手取團圓是也

石灰

四兩

右以五月五日未出本人不語將取三味同
杵爛次後下餘藥味杵得所搏作餅子曬乾用
時旋刮敷之

芙蓉膏

治徧滿頭面大小諸靨子或身體者

料炭灰

桑柴灰

蕎麥蘖灰

各半升

右灰用熱湯淋取

升熬至五分又用

獨角仙 一箇不用角

紅娘子 半錢不去翅足

糯米 四十粒 石灰 一兩風化者

右為末將前項灰汁調如麩糊相似在麁合子

內於土底埋五七日取出使用取瘰癧管內刺

破用細竹簽子點之放藥用濕紙措藥再點至

三上見瘰癧痕時冷水淋洗忌薑醋魚馬肉

鉛白霜散 治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者

鉛白霜 二錢 銅錄 二錢 白礬 一塊大許

右為末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之

麝香散 治大小人口齒腐蝕出血斷根宣爛者

上好鹹土

不以多少

麝香

真好者少許

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮

下再與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神效

乳香散 治一切癩癧瘡新久遠近不已者

乳香

一錢

砒霜

一錢

礪砂

一錢

紅娘子

一十四箇去翅足

黃丹

半錢

右為末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢

裏捲大破瘡上白麪糊如不破者灸柴炷大者

不過一月其癩癧核自下

後歛瘡生肌藥

黃蘗

不以多少

為細末麩糊塗患處甚妙

五香丸 治一切惡瘡癩癧結核無首尾及諸瘡腫

沉香 木香 雞舌香 各一兩

薰陸香 麝香 各三錢 連翹 一兩半

右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘

時

紫參丸 治熱毒癩瀝腫痛已內消瘡已破出膿水

服此藥

紫參 各一錢 苦參 各一錢 連翹 二兩 丹參 一兩

膩粉 三錢 麝香 三錢 滑石 二兩

右爲末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日
採取汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗爲末用
玄參酒熬皂子末成膏和前藥如桐子大每服
一丸以黃耆湯下一日加一丸至患人歲數即
止如四十則二十每日却減一丸瘡自乾有結
內消

麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

麝香

雄黃

乳香

礪砂

各二錢

土蜂窩

露蜂窩

燒灰

右研爲細末以醋調少許塗咬着處或不辯認

得多凝是惡瘡三二日不療即毒入心難瘥忌

雞魚油膩物

礪砂散 治一切疔瘡

礪砂

雄黃

天南星

砒霜

各等分

麝香 少許

右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已

聖力散 治諸疔瘡腫

草烏頭 白及

白斂

木鱉子

去皮地龍

金毛狗脊

各二錢半

麝香

三錢

黃丹

少許

右研為細末用針針到生肉痛者用藥黃水出

宣明論方
卷之二十五
六十一
為度

川山甲散 治一切通氣破瘡腫行膿血如神妙

川山甲 木鱉子 烏龍角 各等分都燒存性

右為末每服一錢半空心熱酒調下至中午瘡

破膿血便行

守瘻丸 治瘻瘤結硬

通草 二兩 杏仁 一大合去皮尖研

牛蒡子 一合出油

吳射干 昆布 去鹹 呵梨勒 海藻 各四兩去鹹

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進

三服

鬼代丹 治打着不痛

無名異 研 沒藥 研 乳香 研

自然銅 醋淬研

地龍 去土 木鱉子 去殼各等分

右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不

痛

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛

黃丹 一兩 蜜陀僧 半兩 輕粉 一錢 麝香 半兩

龍腦 一字

右為細末摻藥在瘡上用青白子塗之內留一

眼子

香藥丸 治瘰癧瘡

礪砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉

赤石脂 各等分

右為末糯米粉為丸如桐子大每服十九丸加至
二十九皂角子臨卧

紅玉挺子 治一切牙疳

砒霜 一塊皂角子大 黃丹 煨過 魯土

右為細末餅和作劑子任牙

桃花散 治一切瘡生肌藥

白及 黃柏 黃連

乳香 別研 麝香 別研 黃丹 各等分

右為細末摻於瘡上三二日生肌肉滿

追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂

螺兒青 棟茸草 各一兩 白礬 二錢半

右為細末每服一錢新汲水調下立止

膽礬丸 治男子年少而鬢髮班白

土馬駝 燒存性 石馬駝 燒存性

半夏 各一兩 生薑 二兩 胡桃 十箇 真膽礬 半兩

川五倍子 一兩

右為末和作一塊絹袋子盛如彈子大熱酒水

各少許浸下藥汁淋洗頭髮一月神効

伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶

伏神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩

白蘚皮 酸棗仁 沙參 甘草 炙半兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後

服

鐵脚丸 治大小便不通

皂角 炙去皮不以多少去却子

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服二十九酒

服

全聖散 治小腸膀胱氣痛不忍者

地膽 半兩去足 超微炒

滑石 一兩 硃砂 半錢

右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服

琥珀散 治五淋

滑石 二兩 木通 當歸 木香 尉金

扁竹 各一兩 琥珀 二兩

右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三

服

葵子散 治小便不通

葵子 茯苓 去黑皮 各等分

右為末每服四錢水一盞煎三沸食前

倒換散 治無問久新癰悶不通小腹急痛肛門腫

疼

太黃

小便不通減半

荆芥穗

大便不通減半各等分

右件藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨

時加減服

敗毒散 治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運

大黃

黃藥子

紫何車

赤芍藥

甘草

各五分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生

薑朮萋湯同調下此藥偏治婦人

補真丹 治男子元藏虛冷與陽固腎不虛

黑附子 一兩煨 陽起石 火燒酒淬三錢

海馬 二錢 乳香 雄黃 為衣 血竭 各三錢

石蓮子 去殼皮心 黑錫 炒去砂子半兩

石鷲子 燒以醋淬 麝香 一分

右為細末麪糊為丸每服二十九丸用五香湯空

心下

五香湯

沉香 箋香 乳香 麝香

宣明論方

檀香各等分

右為細末每服半錢煎湯下

新添 一醉烏法治頭髮白再黑方

訶藜勒十箇不
去核

醋石榴二三箇大
者取汁

碌礬五
分

生地黄汁一升

礪砂研

硫黃研各
一錢

右藥同入甕瓶內用二味汁浸密封勿令透氣
至四十九日後取出其訶子狀若黑梅至夜臨
卧含一枚嚥津到曉爛嚼以酒一盞下之三二

日後再服忌葱大蒜蘿蔔

黃帝素問宣明論方卷之十五終