

## Übungsaufgaben

### Aufgabe 27.1.\*

Bestimme die Eigenvektoren der Funktion  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \pi x$ .

**Aufgabe 27.2.** Überprüfe, ob der Vektor  $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  ein Eigenvektor zur Matrix

$$\begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 4 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

ist und bestimme, falls ein Eigenvektor vorliegt, den zugehörigen Eigenwert.

**Aufgabe 27.3.** Bestimme die Eigenvektoren und die Eigenwerte zu einer linearen Abbildung

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

die durch eine Matrix der Form  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$  gegeben ist.

**Aufgabe 27.4.** Zeige, dass der erste Standardvektor ein Eigenvektor zu einer jeden oberen Dreiecksmatrix ist. Was ist der Eigenwert?

### Aufgabe 27.5.\*

Es sei

$$M = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & d_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & d_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix}$$

eine obere Dreiecksmatrix. Zeige, dass ein Eigenwert zu  $M$  ein Diagonaleintrag von  $M$  sein muss.

### Aufgabe 27.6.\*

Bestimme die Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume zu einer ebenen Drehung  $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$  zu einem Drehwinkel  $\alpha, 0 \leq \alpha < 2\pi$ , über  $\mathbb{R}$ .

**Aufgabe 27.7.** Zeige, dass jede Matrix  $M \in \text{Mat}_2(\mathbb{C})$  mindestens einen Eigenwert besitzt.

**Aufgabe 27.8.** Es seien

$$\varphi, \psi: V \longrightarrow V$$

Endomorphismen auf einem  $K$ -Vektorraum  $V$  und es sei  $v \in V$  ein Eigenvektor von  $\varphi$  und von  $\psi$ . Zeige, dass  $v$  auch ein Eigenvektor von  $\varphi \circ \psi$  ist. Was ist der Eigenwert?

**Aufgabe 27.9.** Es sei  $\varphi: V \rightarrow V$  ein Isomorphismus auf einem  $K$ -Vektorraum  $V$  mit der Umkehrabbildung  $\varphi^{-1}$ . Zeige, dass  $a \in K$  genau dann ein Eigenwert von  $\varphi$  ist, wenn  $a^{-1}$  ein Eigenwert von  $\varphi^{-1}$  ist.

**Aufgabe 27.10.** Man gebe ein Beispiel für eine lineare Abbildung

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

derart, dass  $\varphi$  keine Eigenwerte besitzt, dass aber eine gewisse Potenz  $\varphi^n$ ,  $n \geq 2$ , Eigenwerte besitzt.

**Aufgabe 27.11.** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung mit

$$\varphi^n = \text{Id}_V$$

für ein gewisses  $n \in \mathbb{N}$ .<sup>1</sup> Zeige, dass jeder Eigenwert  $\lambda$  von  $\varphi$  die Eigenschaft  $\lambda^n = 1$  besitzt.

**Aufgabe 27.12.** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung. Es sei  $\lambda \in K$  ein Eigenwert von  $\varphi$  und  $P \in K[X]$  ein Polynom. Zeige, dass  $P(\lambda)$  ein Eigenwert von  $P(\varphi)$  ist.

---

<sup>1</sup>Der Wert  $n = 0$  ist hier erlaubt, aber aussageelos.

<sup>2</sup>Der Ausdruck  $P(\varphi)$  bedeutet, dass man die lineare Abbildung  $\varphi$  in das Polynom  $P$  einsetzt. Dabei muss man  $X^n$  als  $\varphi^n$ , also als die  $n$ -fache Hintereinanderschaltung von  $\varphi$  mit sich selbst, interpretieren, die Addition wird zur Addition von linearen Abbildungen, u.s.w.

**Aufgabe 27.13.** Es sei  $M$  eine quadratische Matrix, die man als Blockmatrix

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

mit quadratischen Matrizen  $A$  und  $B$  schreiben kann. Zeige, dass eine Zahl  $\lambda \in K$  genau dann ein Eigenwert von  $M$  ist, wenn  $\lambda$  ein Eigenwert von  $A$  oder von  $B$  ist.

**Aufgabe 27.14.\***

Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung und  $\lambda \in K$ . Zeige folgende Aussagen.

- (1) Der Eigenraum

$$\text{Eig}_\lambda(\varphi)$$

ist ein Untervektorraum von  $V$ .

- (2)  $\lambda$  ist genau dann ein Eigenwert zu  $\varphi$ , wenn der Eigenraum  $\text{Eig}_\lambda(\varphi)$  nicht der Nullraum ist.  
 (3) Ein Vektor  $v \in V$ ,  $v \neq 0$ , ist genau dann ein Eigenvektor zu  $\lambda$ , wenn  $v \in \text{Eig}_\lambda(\varphi)$  ist.

**Aufgabe 27.15.** Es bezeichne  $V = \mathbb{R}[X]_{\leq d}$  die Menge aller reellen Polynome vom Grad  $\leq d$ . Bestimme die Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume zum Ableitungsoperator

$$V \longrightarrow V, P \longmapsto P'.$$

Der Begriff des Eigenvektors ist auch für unendlichdimensionale Vektorräume definiert und wichtig, wie die folgende Aufgabe zeigt.

**Aufgabe 27.16.** Es sei  $V$  der reelle Vektorraum, der aus allen unendlich oft differenzierbaren Funktionen von  $\mathbb{R}$  nach  $\mathbb{R}$  besteht.

- a) Zeige, dass die Ableitung  $f \mapsto f'$  eine lineare Abbildung von  $V$  nach  $V$  ist.  
 b) Bestimme die Eigenwerte der Ableitung und zu jedem Eigenwert mindestens einen Eigenvektor.<sup>3</sup>  
 c) Bestimme zu jeder reellen Zahl die Eigenräume und deren Dimension.

<sup>3</sup>In diesem Zusammenhang spricht man auch von *Eigenfunktionen*.

**Aufgabe 27.17.** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung. Zeige, dass

$$\text{kern } \varphi = \text{Eig}_0(\varphi)$$

gilt.

**Aufgabe 27.18.** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung. Es sei  $\lambda \in K$  und sei

$$U = \text{Eig}_\lambda(\varphi)$$

der zugehörige Eigenraum. Zeige, dass sich  $\varphi$  zu einer linearen Abbildung

$$\varphi|_U: U \longrightarrow U, v \longmapsto \varphi(v),$$

einschränken lässt, und dass diese Abbildung die Streckung um den Streckungsfaktor  $\lambda$  ist.

**Aufgabe 27.19.\***

Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung und seien  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  Elemente in  $K$ . Zeige, dass

$$\text{Eig}_{\lambda_1}(\varphi) \cap \text{Eig}_{\lambda_2}(\varphi) = 0$$

ist.

**Aufgabe 27.20.\***

Es sei  $K$  ein Körper und es sei  $V$  ein endlichdimensionaler  $K$ -Vektorraum. Es sei

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung. Zeige, dass es maximal  $\dim(V)$  viele Eigenwerte zu  $\varphi$  gibt.

### Aufgaben zum Abgeben

**Aufgabe 27.21.** (1 Punkt)

Überprüfe, ob der Vektor  $\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \\ 8 \end{pmatrix}$  ein Eigenvektor zur Matrix

$$\begin{pmatrix} -8 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & -5 \\ -3 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

ist und bestimme, falls ein Eigenvektor vorliegt, den zugehörigen Eigenwert.

**Aufgabe 27.22.** (1 Punkt)

Überprüfe, ob der Vektor  $\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  ein Eigenvektor zur Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & -9 \\ -2 & 7 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ist und bestimme, falls ein Eigenvektor vorliegt, den zugehörigen Eigenwert.

**Aufgabe 27.23.** (4 (1+3) Punkte)

Das Nachtleben im Dorf Kleineisenstein besteht aus folgenden Möglichkeiten: dem Bett (bzw. zuhause), der Kneipe „Nachteule“ und dem Tanzclub „Pirouette“. In der Nacht kann man innerhalb einer Stunde folgende Bewegungen beobachten:

- a) Von den Leuten im Bett gehen  $1/10$  in dieachteule,  $1/12$  gehen in die Pirouette und der Rest bleibt im Bett.
- b) Von den Leuten in derachteule gehen  $1/3$  in die Pirouette,  $1/5$  gehen ins Bett und der Rest bleibt in derachteule.
- c) Von den Leuten in der Pirouette bleiben  $3/5$  in die Pirouette, 8 Prozent gehen in dieachteule, der Rest geht ins Bett.

- (1) Erstelle eine Matrix, die die Bewegungen innerhalb einer Stunde beschreibt.
- (2) Kleineisenstein hat 500 Einwohner. Bei welcher Verteilung der Einwohner auf die drei Möglichkeiten ändert sich die Verteilung innerhalb einer Stunde nicht?

**Aufgabe 27.24.** (3 Punkte)

Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und

$$\varphi: V \longrightarrow V$$

eine lineare Abbildung. Zeige, dass  $\varphi$  genau dann eine Streckung ist, wenn jeder Vektor  $v \in V$ ,  $v \neq 0$ , ein Eigenvektor von  $\varphi$  ist.

**Aufgabe 27.25.** (4 Punkte)

Betrachte die Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zeige, dass  $M$  als reelle Matrix keine Eigenwerte besitzt. Bestimme die Eigenwerte und die Eigenräume von  $M$  als komplexer Matrix.

**Aufgabe 27.26.** (6 Punkte)

Betrachte die reellen Matrizen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Man charakterisiere in Abhängigkeit von  $a, b, c, d$ , wann eine solche Matrix

- (1) zwei verschiedene Eigenwerte,
- (2) einen Eigenwert mit einem zweidimensionalen Eigenraum,
- (3) einen Eigenwert mit einem eindimensionalen Eigenraum,
- (4) keinen Eigenwert,

besitzt.