



幼幼新書卷第二十一

寒痛逆羸

凡十六門

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安治順甫校

胎寒第一

巢氏兒在胎母取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃兒生後冷氣猶在腸胃間不能消乳哺或腹脹或時穀利百色青肥時啼為胎寒痛

異兒胎寒當腹痛痛者軀啼時時吐現或腹中更者按之如水聲便沒沒已復出無所苦早

服當歸丸門 軀啼 黃耆散關

予先生兒生一日口舌冷腹虛鳴面臉青喫乳有妨
在胎六個月日母有疾被伏熱往來胎中飲熱血
所得先以朱砂膏門驚積 妳上吮後磨鎮心丸一切如
都不進妳及肚膨手握拳目微視面黑死此以熱論
胎寒歌

人中臍下有青色乳見難消痢色同衣薄中寒
如是此風邪夾冷上來攻

聖惠當歸散治胎寒聚唾弄舌軀啼反張怒驚

當歸炒

細辛

黃耆

黃芩

龍骨

桂心

赤芍藥各半

羅散乳汁調一字日三意加減

嬰孺當歸丸大便青不能食是胎寒

當歸

人參

芍藥

芎各三

甘草分四

末乳汁和先食服麻子大一丸日三未知加

治兒胎寒大人虛冷內或有實不可吐下虛冷服礬

石丸

馬齒礬石燒汁盡為末棗膏丸大人服梧子大二
丸兒減心腹中溫煖為度有實實去無實下自斷
黃耆湯治胎寒腹中疝痛

黃耆

黃芩

芍藥各六分

當歸二分

甘草

芍各四分

薑八分

吹咀水五升煮升半百日兒半合今三服

虛寒第二

錢乙論腎虛若兒本虛怯由胎氣不成則神不足目
睛多白顙解面晄白色此皆難養縱長不過八八若

恣色慾多不及四旬或因病而致腎虛者不論又腎
氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜于下而縮身也腎水
陰也腎虛則畏明宜補腎地黃丸

張漢兒脾胃虛弱不能飲食或經大病漸損榮衛致
肌體羸瘦時時下痢面色青白變成虛羸宜丁香黃
耆散

錢乙地黃丸

熟地黃錢八

山茱萸

乾山藥錢各四分

澤瀉

牡丹皮

白茯苓各三分

末蜜丸如桐子三歲二三丸空心湯化下

張渙丁香黃耆散

綿黃耆 丁香 人參 當歸

白朮炮 鼈甲醋炙各一兩 胡黃連 甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

惠眼治吐瀉及傷寒脾虛腹熱或手足冷虛汗不已

喉內虛喘附子散一名回陽散

附子炮 北前胡 甘草 人參

桔梗各半兩 麻黃去節一兩

末淡薑湯調半錢至一錢量加此能補虛

寶童治腹內虛鳴烏藥丸

天台烏藥 蒼朮炒各二兩 木香 甘草各一分

肉豆蔻二枚

末醋糊丸如黍服七至十九炒薑葱酒下

吉氏兒面青黃手足逆冷不思食飲和氣散

厚朴薑製半兩 人參 茯苓 甘草炮各一分

茴香二錢

末加減水煎

胃中有寒第三

巢氏三焦不調則寒氣獨留膈上令兒乳哺不消下
嗝酸臭胃膈痞滿甚則喘急

聖惠治膈寒或嗽逆不食訶梨勒散

訶梨勒煨皮一兩

白朮

五味子

麥門冬焙

人參

白茯苓

陳皮去白焙

甘草炙各半兩

細辛一分

粗羅一錢水一盞煎五分不時量溫服

人參散治胃中有寒多吐清水不乳

人參

厚朴薑汁炙

陳皮去白焙

白朮各半兩

當歸炒

丁香各一分

羅散一錢水二盞薑少許煎五分不時意增減服

肉豆蔻散胃中有寒乳哺不消腹中痞滿氣逆不能

乳食

肉豆蔻

人參

藿香

白茯苓

白朮

甘草炙

木香各一分

厚朴薑炙

訶梨勒皮

煨乾薑炮各半兩

粗散一錢水小盞煎五分溫量服日三

早豆蔻散治胃中寒氣積滯氣逆不下乳食

草豆蔻仁三枚 人参

前胡

檳榔各一分

訶黎勒皮煨半兩

甘草炙半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

前胡散治胃中寒結時欲嘔吐

前胡

人参

白朮

陳皮去白煨

高良薑

厚朴炙薑

藿香各一分

甘草炙半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

胃脇滿痛第四

巢氏兒失節度為寒熱所傷寒氣入腹乘虛停積又乳哺冷熱不調觸于宿寒與氣相擊不散結胃脇間故滿痛

真珠囊木香散治兒氣痛因生冷傷而成只在臍上下左右痛宜順氣寬中此治胃膈痞塞心腹刺痛脅脹滿飲食少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾

木香

青橘皮各三兩

薑黃

麥蘖炒各五兩

蓬莪茂四兩

甘草炒

鹽炒各十兩

末一錢不時沸湯點服

外臺灸勞宮二壯一名五里在掌中動脈主熱病發
熱滿而欲嘔噦三日以徃不得汗怵惕脅痛不可
反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止
噎中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心
善悲累嘔欬善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積
聚兒口中腥臭脅肢滿黃疸黃目

心痛第五

聖惠心痛本非起于心即邪氣客于心主之脈夫少
陰心經五藏六府之主精神所舍其藏堅固邪不能

千千之傷心心傷即神去神去即死故諸邪在心者
皆在心色絡色絡心之別脈也故少陰不病夫心痛
者厥氣上逆痞而不散或傷寒氣邪冷搏于經絡故
心痛

茅先生心頭痛者金鈴散夾勻氣散和胃氣不如面黑

眼視瀉黑血鼻口冷手足冷不進食死

寶鑑兒悒心啼有時歇者名心痛是邪攻胃管

肘後治卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息

好鹽如雞子大漿水三升煮三沸內攪消取半分

為三服

聖惠兒數將手摩心腹即啼是心痛不可忍芍藥散

赤芍藥

人參

白朮

黃芩

川大黃炒

當歸各一

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

木香散治心痛手足不和

木香

白朮

桔梗

茯苓赤各

高良薑半

粗散一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

桂心散

桂心

當歸

梔子仁各半

細羅不時橘皮湯調半錢更量加

茅先生金鈴散

金鈴子

炮去皮核

蓬莪茂

炮各一兩

茴香

木香

炮

京三稜炮各半兩

末一錢半錢熱酒調下

張氏治脾疼久腫心氣痛患

木香阜子大兩塊

丁香三七粒

乳香半阜子大

胡椒四十九粒

巴豆

斑猫

淨各二粒

五靈胎

中指大一塊

細末醋糊丸如芥子服三丸菖蒲湯下婦人艾醋湯兒兩三丸如衮顫氣攻痛難忍者一服效

王氏普救散

延胡索

兩二

香附子

兩一

細末一錢白湯點服

腹痛第六

巢氏兒腹痛多由冷熱氣與藏氣相擊故痛熱痛者面赤或壯熱四肢煩手足心熱冷痛者面或青或白

甚者黑唇口爪皆青

茅先生兒中熱痛詩

非時面赤色壯熱四肢煩手足心多熱心中熱

痛難

冷痛詩

面青面白猶自可黑色同青爪一同此是腹心生冷痛須將溫藥裏頭攻

寶鑑腹堅歌

姪娘先須忌數般莫令風冷致胎寒兒生啞

翻嫌乳肚痛頻生腹亦堅

肘後治未百日腹痛徐王神效方

豚子卵一枚

當歸一分

水三升煮七合飲

聖惠當歸散治冷熱不調腹內多痛

當歸

枳殼炒

赤芍藥

川大黃炒

等分粗羅一錢水小盞煎五分溫量服

人參散治卒吐下腹痛不止

人參

當歸炒各半兩

甘草炙

乾薑炮裂

黃耆

細辛各一分

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

又方

木香

高良薑

白朮

人參各一分

厚朴薑炙半兩

細羅不時粥飲調半錢量加

嬰孺治腹痛天糾不能哺乳茯苓丸

茯苓

黃連各一兩

末蜜丸如大豆飲下量與

錢乙和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食和中散

人參焙去頂

白茯苓

白朮

甘草炒

乾葛

黃耆

白扁豆

藿香

等分細末三錢水一盞棗二個薑五片煎八分食

前溫服

張渙寬中湯治心腹痛不可忍

高良薑

木香各半兩

丁香

青橘皮炒

桔梗

甘草炙各一分

細末半錢溫酒調服

溫胃丹治腹痛啼哭不止

人參

白朮炮各兩

五味子

當歸焙

高良薑各半兩

木香一兩

細末白麵糊丸如黍米飲下十九

橘香散

青橘皮

吳茱萸

木香

當歸焙各一兩

乾薑炮

丁香各半兩

羅末一錢水八分薑二片前五分食煎溫熱服

惠眼治氣疾腹痛及消積滯槐角丸

槐角一錢

蜜炙抄

胡椒九粒

四十

巴豆二粒

二

丁香廿粒

廿

細末爛飯丸如黍空心薑湯下五丸

莊氏兒未能語啼哭不能辨者以手候腹如有實硬處即是腹痛

生薑汁煖調麩糊塗貼臍心

吉氏治脾疼脅脹和氣止渴及腹內刺痛不思飲食

香朴散

厚朴一兩

麥蘖

神麩

青皮並炒

木香各一分



末一錢湯調服

腹脹第七附腹滿

巢氏兒府藏嫩弱風冷邪氣客搏于藏令腹脹若脾虛冷移入于胃食則不消若腸虛冷氣乘之則利

錢乙腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下

主紫霜丸積聚白餅子搗搗不喘者虛也誤下則脾

虛氣附肺行脾肺子女皆虛肺主目胞顯之類脾主

四肢母氣虛甚即目胞顯腫色黃者屬脾治用塌氣

丸漸消之胃氣不和未愈加服勿以丁香木香橘皮豆

刀刃斤書

卷二十一

三

雲

寇大溫散藥治何以故脾虛氣不出腹脹而不喘宜散藥使上下分消其氣若虛氣已出附肺即脾胃內弱每生虛氣入四肢面目矣兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱須識之胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣行于四肢若水狀腎氣浸浮于肺即大喘服塌氣丸病愈後面未紅者虛衰不復故也治腹脹者譬若戰寇于林寇未出林攻以兵必獲若出林勿急攻攻必有失意漸收之即順治虛腹脹塌氣丸不愈腹有食積結糞

小便黃時微喘脉伏而實時飲水不能食者可下蓋脾初虛而後結有積治先補脾後下下後又補脾愈補肺恐生虛喘

肘後兒腹暴病滿欲死

半夏篩酒和服黍米五九日三

千金米粉鹽等分炒變色腹上摩

外臺療肚脹漸瘦不食四肢熱不調

甘草

鼈甲

柴胡

茯苓

子芩

訶梨勒皮

芍藥

橘皮各三分 薑 當歸各四分 知母五分

大黃八分

切水升半煎七合數服得瀉差

秘錄治腹脹

胡粉鹽熬色變摩腹上兼治腹皮青若不理須臾

死

喫雜生果多腹脹氣急

肉桂末飯丸如茱萸湯下五丸大人十丸

聖惠治脾胃虛冷腹脅脹滿四肢不和乳食全少丁

香散

丁香 桂心 白朮 人參各一分

厚朴薑炙 陳橘皮去白焙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日

三四

木香散治腹虛脹

木香 川大黃 麝各一分 桑白皮

陳橘皮白焙去 益智仁 艸豆蔻仁各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量服

赤茯苓散治腹雍脹滿虛熱不食大小腸氣滯

赤茯苓 木通 人參 甘草炙

枳實炒 當歸炒 川大黃炒

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

治氣不和心腹脹滿不食檳榔散

檳榔 厚朴薑炙 丁香

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

張渙木沉散

木香 益智仁 沉香 蓬莪朮

草豆蔻 白豆蔻

羅末一錢水八分薑三片煎五分溫服

衛生賺氣丸療腹脹氣急

蘿蔔子 木香

細末蒸餅心丸如菜豆橘皮湯下五丸

張氏紫霜丸治食傷或病妳至冷腹脹

薑 巴豆

好醋一碗煮乾用巴豆

雄黃 朱砂

細末蒸餅糊丸如粟兒食傷三粒腹脹喘急分減食湯下無時

吉氏塌氣散治疳虛腹脹

甘草

茴香

白牽牛

炒並

木香

錢各一

末半錢紫蘇湯服

丁時發溫脾散治脾胃不和腹脅虛脹不欲乳食精

神困倦或壯熱增寒

人參

訶梨勒

白朮

木香

黃耆

茯苓

藿香

陳皮

桔梗

各半兩

甘草

炙一錢

沒石子

一個

末一錢水一盞薑一片棗一個煎五分服

木香丹治諸般傷冷冷物作熱及腹脹黃瘦

木香

錢二

川烏頭

炮裂三個

阜角

去皮七個

縮砂

巴豆霜

各二枚

細末烏梅二七個蒸爛入藥丸如菜豆服三五粒

蘿蔔子薑湯下

鄭愈治腹脹并水鼓氣病

雞子白

一個

白麩

匙一

輕粉

錢一

和作餅小錢大服一餅慢火內燒熟紙筋上去火
毒細嚼臨卧服

外臺灸懸鐘足三陽大絡在外踝上三寸動脈中按
之陽明脉絕乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不食
兒腹滿不食飲

冷熱不調第八

聖惠兒乳食乖度寒溫失節或陰陽相勝氣血不調
令冷歸下焦熱充上膈若風冷入腸胃則瀉利不定
或腹中氣滿或嘔逆不食為冷熱不調

張渙兒不能自調攝全在乳母若乳哺乖宜則冷熱
不調熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不消遂
傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄利挾積則下痢脾胃
最宜調適若疾證甚不已令虫動生風便致危困可
不慎哉

聖惠木香散治冷熱不調胃氣壅滯少思飲食

木香 大腹皮 人參 赤茯苓

青橘皮去白 訶梨勒皮 桂心 前胡

半夏洗七次 丁香 甘草炙各一分

嗽出於
祛穀片
保乎
下虛寒

粗散一錢水一盞薑半棗大煎五分量溫服

白朮散治冷熱不調腹內疼發歇不定病在大陰故不兼涼劑

白朮 當歸炒 芎藭各半 乾薑

青橘去白 甘草炙各

粗羅一錢水小盞煎五分不時量服

香連散治冷熱不調腹痛下利

木香 當歸炒 乾薑炮各 黃連

阿膠炒各

細羅粥飲調一錢量頻服

治冷熱不調大便或壅或通不知乳食訶梨勒散

訶梨勒皮 大黃炒各 人參 檳榔

木香 桂心 芎藭各一

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

當歸丸治冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲乳食

當歸炒 人參 白芍藥 芎藭各三分

甘草炙 白朮各半

羅末麵糊丸如麻子粥飲下五丸日三三歲上加

治冷熱不調腹痛不可忍或寒熱下痢膿血木香散

木香分一

芎藭

當歸炒

桔梗

黃芩各半

末蜜丸如桐子不時溫薑湯破二丸服量加

治冷熱不調或下痢腹痛不食犀角散

犀角

桂心

甘草炙

當歸炒

黃連

人參

陳皮焙去白

益粗羅一錢水小盞煎五分量溫服日三

張渙調中散治冷熱不調致脾胃不和

青橘皮焙去白 人參

木香各一兩

白茯苓

丁香

白朮

大腹皮

甘草炙各半兩

細末一錢水小盞薑三片煎五分鐘

益胃丹調冷熱和脾胃

當歸焙

木香

白朮炮

沉香炮各一兩

白芍藥

蓬莪茂

縮砂仁

人參各半兩

細末麩糊丸如黍服十粒至十五粒點麩湯下更

量加

三稜丹調冷熱消宿食

京三稜炮乘熱破 神麩

木香

半夏薑搗膏炒

黃各

一兩

乾薑炮

陳橘皮去白

丁香

桂心

各半

細末蜜丸如雞頭服一粒薑湯化

趙氏治冷熱不調瀉痢不止腹中疼痛三聖丸

黃連

乾薑炮

甘草炙

等分末麵糊丸萊豆大服七丸赤痢甘草湯白痢

乾薑湯赤白痢二宜湯下

人參丸調氣治冷熱不調飲食不化

人參

木香

白朮

蓬莪茂

當歸

半兩

白芍藥

一分

未湯浸蒸餅丸如黍服十丸空心麝湯下米飲亦

得

胃氣不和第九脾胃附

張漢兒飲乳不知飢飽全在乳母存節若見啼哭即

乳是氣未調使急飲氣逆乳不得下反致嘔逆甚則

吐利成胃虛病

錢乙胃氣不和面眇白無精光口氣冷不思食吐水

當補脾又腹痛不思食又氣不和口頻撮當調氣並

主益黃散若下利調中丸

聖惠人參粥治冷傷脾胃嘔逆及利驚癇

人參兩半

白茯苓三分

粟米合半

麥門冬兩一

細剉半兩水一大盞煎七分下米作粥食

博濟木香散調中順氣補虛

草豆蔻個五

人參

茯苓

防風

藿香各半兩

陳橘皮去白

末一字或半錢薑鹽米飲調

茅先生勻氣散

桔梗兩五

甘草兩二

白薑分一

縮砂仁

陳橘皮

茴香洗各

末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇鹽湯亦得

寶童多厚朴蒼朮良薑桂烏梅名養脾湯

調理衆病醒脾散

木香

白朮並濕紙

人參

茯苓

草菓子

甘草炙

陳橘皮

厚朴細砂

紫蘇子

等分末一錢水六分薑一片菓半個煎四分通口

服
治諸疾調中飲

肉豆蔻

白朮炮

人參

陳橘皮

去白

呵子炮

茴香

縮砂仁

甘草

炙各兩

藿香

桂心

檳榔

各三錢

末半錢一錢薑棗湯隨兒通口服

錢乙調中丸

白朮

人參去頂

甘草

炙各兩

乾薑

炮四錢

細末蜜丸如棗豆服半丸至二三十丸食前湯服

塌氣丸

胡椒

一兩

蝎尾

去毒半兩

細末麩糊丸粟大服五七至二十九陳米飲下無

時一有木香一錢

劉氏亦治腹脹

益黃散

陳橘皮

一兩

青橘皮

呵子肉

甘草

炒各兩

丁香

二錢

細末二錢水一盞煎六分食前溫服

白朮散

人參 白朮 木香 白茯苓

甘草炒 藿香各一兩 乾葛二兩

粗末一二錢水一盞煎五分溫服飲水者多與之

患眼參苓散常服養氣安神益胃

白朮兩半 人參 茯苓 紫蘇子

甘草炙各一分 木香半

細末一錢濃煎棗湯調宜常服

寶童壯脾去積進食

京三稜 蓬莪朮醋紙裹煨 益智去皮各四兩 甘草炙四兩半

食已便瀉

陳皮 青皮各二兩

末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

劉氏人參散調胃進食

人參 白朮 川芎 神麴

木香 陳皮 肉桂去粗皮 甘草炙等分

小麥蘗加一倍

末半錢鹽少許百沸湯點服

治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂溫

養脾胃消進妳食勻氣清神調和藏府神術散

刀斤書

卷二十一

三

雲

白朮

人參

茯苓

石蓮肉去心

鷺粟米

白扁豆

藿香

甘草炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服

漢東觀音散少白朮

粟米多神麩白芷木香黃耆

張氏治脾胃不和泄瀉下痢傷冷面色痿黃心痛膈府不安癥癖氣塊脾胃皆治丁香煮散

丁香一兩

神麩濕紙燻

呵子棗大者

乾薑生熟各半

半夏火炮

厚朴薑製

甘草生熟各半各三兩

陳橘皮四兩半

羅末如麩薑三片藥二錢水一盞煎五分食前熱服甚者兩服日二忌生冷動氣物

莊氏治胃虛去風醒脾

冬瓜子廿粒

天南星一錢

末蒸餅丸菜豆大五七至十九溫漿水下

補虛和氣散

人參

乾葛

甘草炮各五兩

木香三兩

麝錢

茯苓二兩

末半錢水五分薑少許煎三分溫服

丁香丸和胃氣進飲食

丁香 木香 肉豆蔻 人參

茯苓 各一 藿香 各半

羅末朱砂二錢香纏一錢棗三個同研麵糊丸如

粟米飲下隨孩服

末 乳食不下第十

聖惠論脾藏也胃府也脾胃二氣合為表裏胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消令腹脹或泄利不食脾胃不和

千金地黄丸治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黄 大黃 各兩 茯苓 十八 杏仁

柴胡 當歸 各半

未蜜丸如麻子服五丸日三

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胃壅悶前胡散

前胡 蘆根 各三 桂心 一 人參

白朮 赤茯苓 枳椇葉 去毛 甘草 炙

厚朴 薑炙各

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

高良薑散治冷傷脾胃氣不和心腹痛不食

高良薑 草豆蔻 當歸炒 陳橘皮焙

桂心各一 人參兩半

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺治三七歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或

手脚熱有時冷每日一劑便能食

鼈甲一兩 當歸 甘草炙 升麻各一

枳五粒 汗十

切水一升煮八合為三服相去入行六七里再服

覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深

張渙集香煎治脾胃虛不欲食羸瘦

藿香 厚朴薑製 丁香 沉香

木香各一 白茯苓 白豆蔻 白朮炮各半兩

細末入麝一錢水一升蜜半斤大棗卅枚薑廿片

銀石器中慢火熬膏去薑棗通風處陰乾每早子

大乳前米飲下

高良薑 隔氣第十一

水鑑 桃花散治隔氣

桃花錢

半夏錢六

厚朴

桂各一

乾薑

牙硝各二

當門子

江豆各一

搗散空心湯調一錢服至逡巡轉自食乳母忌酒肉熱麪等

寶重治膈氣噎悶兩脇刺痛吐逆酸水氣塊往來疼痛煩躁

檳榔

木通

甘草炙

栝葉炙

半夏

等分末二大錢水一盞煎六分膩粉少許在乾盞

肉研勻通口服如結腸翻胃用虛寒門烏藥丸後用此兒半之

氣逆第十二附哽氣

寶鑑兒氣逆者為乳母煩惱憂悶乳氣凝滯胃中灌擊其乳飲之成疾面黃白乳哺減少夜啼及覘但無精彩勿取轉轉之則劇聚寶透關丸治哽氣行心經

續隨子兩半

大黃錢三

長檳榔一枚

木通兩半

甘遂

大戟各一錢

膩粉七錢

除膩粉諸藥同搗羅去續隨子皮童男女小便拌
謂陰勻陽酒八粉如硬糊日曬稍乾木蜜丸菜豆大燈
 心竹葉湯下廿丸小便色異為效五歲下七丸更
 加減湯使

王氏理一切氣木香分氣丸

青橘皮

兩一

牽牛

兩炒二

木香

分一

細末糊丸菜豆大薑湯下五七丸

言氏真珠散治硬氣

真珠

生犀

各半兩

龍腦

字一

香附

錢四

細末半錢人參湯下

鄭愈取轉後宜調氣桂枝散

赤芍藥

桂心

藿香

白朮

各二錢

末半錢飯飲調下

千金灸心俞二七壯兒減治不能食胃中滿膈上逆
 氣悶熱

肌膚羸瘦第十二

巢氏兒羸瘦不生肌膚皆脾胃不和不能飲食故氣
 血衰弱不榮肌膚兒在胎遇寒冷或生挾伏熱皆不

能飲食故羸瘦挾熱者溫壯身熱肌肉微黃挾冷者
即時時下利唇口青肥

外臺小品療兒因食及在胎宿熱并乳母飲食粗惡
苦辛乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿痿黃瘦脊
四肢痿躄繚戾服之充悅

為藥

分多十

黃耆

鼈甲

分多

人參

分各四

柴胡

分八

茯苓

分六

甘草

分多

乾薑

分各二如

熱枳實代

擣篩蜜丸如大豆服五丸日二千金有大黃無黃

著一歲上乳服三丸更量

聖惠治羸瘦脾胃氣弱挾宿食不乳四肢不和呵梨
勒散

訶梨勒皮

陳橘皮

去白焙各半兩

黃耆

人參

白朮

藿香

桂心

白茯苓

分各一

甘草

分多半

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日

三四更量

黃耆丸治羸瘦體熱面黃不乳

黃耆

赤芍藥

人參

甘草炙

胡黃連

各半

麥門冬焙

鼈甲

醋炙

各柴胡三

羅末蜜丸如麻子不時粥飲下五丸量兒

秦芫丸治羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃

秦芫

桑根皮

枳殼炒

地骨皮

黃耆

人參

赤茯苓

甘草炙

犀角各半

龍膽一

柴胡三

末蜜丸菴豆大不時粥飲下五丸更增減

麥門冬丸治食不着肌膚骨熱小便黃赤

麥門冬

焙

人參

黃耆

青蒿子

桑白皮

枳殼炒

地骨皮

黃連各半

柴胡

三

末蜜丸如菴荳不時湯研五丸更加減

五香煎治脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦

丁香

沉香

木香

藿香

白朮

各

麝錢

白茯苓

陳皮去白

黃耆

各一

訶梨勒皮

甘草

各半

篩散水五升慢火煎一升布絞復入鍋煎麝及蜜

三合薑汁半合棗肉廿枚慢熬粥飲調半茶匙更
加減

嬰孺治羸瘦食少不生肌肉下集冷雞骨丸

宿黃雌雞胸脅骨一具酒浸一宿炙黃甘草各炙三分

蟻蛭炙五個桔梗 白朮 茯苓

芍藥各四分人參 黃芩各五分檳榔六分

末蜜丸小豆大二歲兒服十五丸日二

張氏豬肚丸解肌熱或泄瀉及積滯不思飲食肌肉

消瘦

鼈甲一兩重便醋共一度白朮 薯蕷各一兩

胡黃連 人參 青橘皮 紫苑

桃仁 木香 甘草炙各半兩柴胡一分兩

羅末入淨豬肚內繫定煮爛與藥杵黏丸如梧子
服二三十丸不時湯飲下

張氏香甲丸治男婦童子氣血虛踈肌膚消瘦百節

疼潮作溫五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿氣滯

婦人經血凝澀健脾胃暢神氣充肌膚澤顏色

柴胡 生地黄 京三稜各三分鼈甲炙醋

神麩炒

杏仁

熟地黄

麥蘖炒

各一兩

牛膝

木香

薑黃

當歸

各半兩

白朮

芎各一

細末麩糊丸如桐子服十九空心清茶下米飲亦

得

聖惠灸胃俞穴各一壯在第十二椎下兩傍各寸半

陷者中炷如麥治羸瘦食少不生肌膚

寶鑑三壯

病後虛羸第十四

巢氏兒大病後或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐

利發汗差後血氣尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以

榮身體故氣力虛羸

錢乙病後虛羸有冷者時時下利唇口青白有熱者

溫壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏

月勿服熱者胡黃連丸冬月勿服有是證服之宜少

論用藥識證云齊即中收好藥施人子忽歲熱自取

青金膏三服併一服餌之至三更瀉五行子睡齊言

子睡亦多驚又與一服瀉二行加口乾身熱齊言尚

有微熱又服妻曰用藥十餘行未安莫生病否呂錢

視云已成虛羸先多煎白朮散時時服胃氣不和後用

香瓜丸盜汗十三日愈

外臺五味子湯療傷寒久病不除差後劇羸瘦骨立

五味子銖十

大黃銖六

麥門冬分六

芒硝分五

石膏兩一

甘草炙

當歸

黃苓

黃連

前胡各一分

切水三升煮升半服二合利下即止更量

錢乙木香丸

木香

青黛

檳榔

豆蔻各一分

麝錢半

續隨子

去皮蝦蟇燒三個

末蜜丸菜豆大服三五丸至二十九食前薄苛湯

下

胡黃連丸

胡黃連

黃連各半兩

朱砂一分

細末填猪膽內淡漿水煮線釣勿着鍋一炊久取出研入蘆薈麝各一分飯丸如麻子服五七丸至

三十丸食後米飲下

病後聲不出第十五

錢乙病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能噉藥
此非失音為腎怯不能上接陽故也當補腎地黃丸
虛寒門失音乃卒病耳

吉氏

酸棗仁錢一 白茯苓錢半 朱砂錢二

末蜜丸如梧子服一丸入參湯下

病後不能語第十六

聖惠治病後六七歲不能語雞頭丸

雄雞頭燒一枚 鳴蟬炒三枚 甘草炙

遠志

木通各半兩

麥門冬焙

人參各一兩

當歸

黃耆

芩各三分

川大黃微炒兩半

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五丸量加減不時錢乙
云久服效

幼幼新書卷第二十一 萬卷樓刊

刀刀斤書

卷二十一

十一

么么亲言

卷三十一

十四

三



