

醫方類聚卷之八十五

血病門二

衛生十全方

治血妄行或衄或吐或咯

茜草根

白茅根

艾葉

各一兩

烏梅肉

焙乾

半兩

右為末煉蜜為圓如梧子大每服二三十

圓烏梅湯下

治叶血咯血



青嫩扁柏葉

擇二斤

楮葉

擇一斤

右各以新汲水淨洗於木石杵臼中搗取汁或太乾卽以新水略洒取自然汁銀石器內重湯煮欲成膏以白蜜貳叁匙生薑叁塊取汁再同煮爲膏

黃耆 人參

當歸

糯米

炒熟

各一兩爲末每二錢以膏兩匙水一盞荆芥三穗同煎服立效如病甚卽入蘇灰半錢無不較者

潤肺安血止咳

天門冬

一兩去心

甘草

杏仁

去皮尖炒

貝母

白

茯苓

去皮

阿膠

炒

白茅根

各半兩

右爲末每服三錢水一大盞入生薑七片

同煎去滓溫服不拘時候

調血治血妄行或衄或咯最宜衄後

當歸

川芎

甘草

桂

各一兩

黃芪

熟

乾地黄

各二兩

白芍藥

三兩

右爲麤末每服五錢薑五片棗二箇水

半煎七分服勞嗽加人參一兩
是齋醫方

吐血 咯血 衄血 血濺 小便血

治吐血史丞相方松煙墨汁服之即愈○衛
生易簡方用好墨爲末二錢以白湯化阿

膠清調頓服熱多者尤宜

吳丞相冲卿忽吐血孫兆用冰澄蚌粉研細
入辰砂少許米飲調下二錢日三服遂安
兆祕此方吳以術得之韓子功方朱砂壹

錢真蚌粉半錢

凡吐血咯血其得之多因積熱之甚或飲食
過度馳騁傷胃絡也不然驚恐悻怒使氣逆
上而不下行血隨氣行宛積胃間久則吐血
咯血宜服白朮散行榮衛順氣止血進食退
熱惟忌食熱麵煎炙海味猪雞一切發風之
物酒不宜飲食不宜飽常令飢飽得所自然
胃肅空利氣血流順也紹興癸酉秋蘇少連
病此極可畏百藥不効偶姜昌言通判傳此

方服之遂愈後濟人累驗韜光傳○得効方

治積熱吐血咳血永類鈔方略血若因飲食過度負

重傷胃而吐血者最宜服之忌食熱麵煎燻

壹切發風之物醫方大成集成南北經驗方抽珍方同

白木二兩○經方人參諸方去蘆白茯苓去黑黃

著各一兩山藥去蘆百合三分去心甘草炙各兩前胡

去蘆柴胡去蘆各一分○抽右為散每服壹錢半諸方吹咀水壹盞薑

三片棗一个同煎至六分温服補珍方一

錢大一盞半煎至一盞去滓温服日三服簡易方同

治妄行吐血張裁衣傳其子病服此即止屢

作屢効

熟地黃洗去土焙乾

右為細末用好真京墨新汲水磨半盞來

許分作二服調熟地黃末服之墨須用松

烟者

又方生地黃 熟地黃 五味子各二兩

右三味並為細末煉蜜為元如梧桐子大

每服三十元一日三度空心用好酒送下
治吐血便血固榮散王醫師方

白芷牛真蒲黃炒一甘草炒三地榆去蘆一兩

右為細末每服三錢溫湯調氣急又加石

膏半兩簡易方同○醫方大成白芷半兩真蒲黃

炒一兩○醫方甘草炙三地榆去蘆一兩右咬

咀每服二錢溫酒調服如氣壯人加石膏

半兩南北經驗方袖珍方永類鈐方同

治吐血衄血茆花不以多少煎湯服良方○

朱氏集驗方治鼻衄不止欲絕者茅花一

大握剉水二椀煎濃汁一椀分二服飲立

止

治暴吐血發寒熱欲作勞氣而未成者滁州

趙史君云其族姊為尼住新金一寺忽苦

此疾醫者不肯治偶一士大夫說此藥不

數服而愈其藥以童子小便和酒調下花

藥石散此後亦多有人服得効

治勞心吐血蓮心散孫仲盈說臨安張上

舍曾以此治一人得効

蓮子心

七個○得効方五十粒○得

效方五十粒

右為細末酒調服

簡易方朱氏集驗方同澹寮方湯點服袖珍方

二錢食後

治吐血葛察判名採閣中苦此疾百藥皆試

得此方服之取効後虽發屢服有驗生地

黃壹斤洗淨細擣取汁其滓再入好酒少

許又取汁令盡附子一兩半炮去皮臍切

作片子入在地黃汁內用銀石器熬成膏

其附子取出焙乾更用乾山藥三兩同為

細末却以地黃膏子和成劑木白內杵壹

二十下元如梧桐子大每服三十元漸漸

加至五拾元空心米飲吞下神効

治吐血不止

紫參 人參

阿膠 蛤粉炒成珠

右參味等分為細末烏梅湯調下

治吐血掌中金真蒲黃黃藥子等分用生麻

油於手心內調以舌舐之

經驗良方同

又方兼治衄血蛤粉白膠香等分以好松煙

墨汁調服

治肺破咯血王醫師方蔡邦度傳香附子大

毛為細末以米飲調下○直指方法製香

附方治諸下血大香附杵去毛皮以童子

小便浸壹日夜日乾截碎又用米醋蘸過

焙乾右為末每二錢米湯調下治冷帶用

炒艾葉煎湯調下又方淨香附酒醋各半

煮透焙右為末黃秫米糊圓桐子大每四

五十圓米湯下

治咯血趙君猷云屢試得効薏苡仁不拘多

少為細末以熟煮猪胰切作片蘸藥食後

微空時取意食之蓋薏苡仁能補肺以猪

胰導入經絡耳陳敏捷用單方治肺癰吐

膿血薏苡仁三合擣碎以小二大盞煮至

一盞去滓分作二服便愈

永類鈐方經
驗良方同

治血濺錢季毅槐花半生半炒為細末傅之

治血自皮膚間濺出以煮酒瓶上簡易方永類鈔方埋

上帝碎搥如楊花用手捏在出血處立止

治小便下血不止研酸草自然汁服之

又方檳榔至大者半枚用麥門冬熟水磨至

一盞重湯盪熱服之

又方當歸 香白芷

右等分爲細末每服二錢溫米飲調下○

澹寮方虛人小便血當歸白芷右等分爲

細末溫米飲調下空心服

又方尿後有血乾柿三枚燒灰陳米飲調下

澹寮方同 柿子性寒故也

瑣碎錄

吐血方用童子小便調花藥石散服之

又方松煙墨汁服之即愈或云只服理中湯

小便出血方宜進薄荷蜜湯

又方取竹籬下根斷入土多年者不拘多少

水洗淨煎湯併服數椀立止

治精竭出血麥麩炒香煎猪肥肉蘸而食之

尿血不止蒲黃鬱金各二兩搗羅為末食前

粥飲調下二錢

簡易方

安榮

選奇方黃耆散治咯血成勞眼睛疼四肢倦
脚無力○醫方大成治咳血成勞肌體消瘦
常服能解肌熱

黃耆蜜炙麥門冬去心熟地黃 桔梗炒白芍

藥各半甘草炙一分○玉機微義四錢

右為粗末大成每服四錢水盪半大成經

一薑三片煎七分溫服醫方集成南北經

成同袖珍方一方每服一兩水二盞此藥

生薑三片煎至一盞去滓食後溫服此藥

稍涼有熱者可服永類鈔方同微義右

未病方扁豆散治久嗽咯血成肺萎吐白涎

膈滿不食

白朮 半夏湯洗七次枇杷葉去毛人參各一

永類鈔方 白扁豆炒 牛姜各半 白茅根各分

方無

右細剉小三升煎取一升去滓下檳榔末壹錢拌和分四服不拘時候

一捻金散治虛損勞嗽咯血吐血心胃不利上氣喘急寒熱往來盜汗羸瘦肢節疼痛肌肉枯槁咳嗽不已涎痰壅盛夜卧不安截勞氣定喘滿化痰涎 療暗風癩方倒卧不省

人事口吐痰沫

楊氏家藏方

杏仁

皂角子

各六兩

黃明膠

剉三兩半夏

巴豆

天南星

剉阿膠二兩

白礬

半兩

右以藥入藏瓶內外留一穴子出煙塩泥

固濟候乾用炭半秤煨令煙盡為度却用

泥塞合出煙眼子放冷一宿研為細末每

服半錢生姜自然汁調成稀膏入壘汁半

盞和服臨臥服

葉氏方側柏散治內損吐血下血 因酒太

過勞傷於內 血氣妄行其出如湧泉口鼻

皆流須臾不救

得效方須臾不救則死

此藥二服即止

柏葉

一兩半蒸乾者得效方二兩半

○人參

去蘆壹兩 荆芥穗

燒灰一兩

右細末每服三錢入飛羅麵二錢拌和新

汲水調如稀糊服立效曲珍方經驗良方同得效方云

又方用百草霜川白芷研為末每服三錢濃米飲併服

和劑方必勝散治男子婦人血妄流溢吐血

衄血嘔血咯血並宜服之方見和劑局方

又方蔚金末井花水調一錢甚者再服

又方茶籠箬葉燒灰研細溫水調一錢服

和劑方八正散導赤散諸淋門

家藏方歸血散治男子婦人老幼小便溺血

荆芥剉碎大麥壹合黑豆壹合甘草二錢

右拌和水盞半煎一盞去滓作兩次食後

臨卧溫服 又治血淋用石膏木通桃膠

妙作末為細末每服二錢水一盞煎至七

分通口食後服名桃膠散

和劑方龍腦鷄蘇圓除煩解勞消穀下氣散

胃中鬱熱主肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下

血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸涼上

膈解酒毒 治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口

甜膽疽口苦常服聰耳明目開心益智

生乾地黃末六兩後入膏麥門冬四兩湯浸黃

耆六兩雞蘇即龍腦薄荷淨葉二斤真

蒲黃微炒阿膠微炒人參去蘆木通到各二兩

同柴甘草炙真銀州柴胡二兩將上

湯半升浸一兩日絞乾取汁後大膏○得

效方二兩到同木通以沸湯大半升浸一

二宿絞取汁後取膏

右除別研後入外搗為細末將西路蜜二

斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不佐

手攪時時入絞下木通柴胡汁慢慢熬成

膏勿令焦然後將其餘藥末同和為圓如

豌豆大每服三十圓嚼破熟水下不嚼亦

得得效方和為圓如蚕頭大每服二十圓

以去心麥門冬煎湯食後臨臥服血崩

下血諸淋疾並虛勞煩熱消渴驚悸煎人

空心食前服 參湯下 咳嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬

浸去心煎湯下並食後臨臥服 惟血崩

下血諸淋疾皆空心服治淋用車前子湯

下齒血以苦竹葉濃煎嗽口 舌上有
 穴出血名血衄炒槐花末傅之即愈 葉
 氏錄方鬼擊之狀卒著如刀刺胃膈脇腹
 內絞急切痛不可按摩或吐血下血衄血
 用熟艾如拳大水五盞煎至三盞頓服
 又好酒一盞灌鼻中 又搵一分水二盞
 和攪令服并以冷水噴之吐即差 又蓬
 莪朮以酒研一盞服 又車脂一錢酒調
 溫服 水調伏龍肝服

必用方大阿膠圓治肺有熱或因勞叫怒肺
 胃致傷嗽中有血 昔盛文肅太尉因赴召
 甚急後病嘔血鑿官獨孤及為處此方服之
 立效

葶塵二兩 人參去蘆 遠志去心 防風 白茯苓

皮防已 貝母炒 阿膠炒 五味子 熟地

黃洗 杏仁湯去皮尖 山藥各一兩 丹參 麥門冬

杜仲去皮剉 栝子仁 山草 百部各半兩

右末蜜圓彈子大瓷器收勿泄氣每服十

圓水一盞研化煎六分食後臨臥溫服日
 二三服 張尚書方無丹參遠志防風防
 已葶藶五味加桂別川芎當歸細辛
 通前十七味為末蜜圓彈子大云此方傳
 者不一或用寒藥多不應治法予斟酌益
 損使可通行

本事方天門冬圓潤肺安血止咳治吐血咯
 血

天門冬一兩甘草炙杏仁湯去尖白茯苓去貝

母炒阿膠各半

右細末蜜圓彈子大醫方大成集成南北
 子桐含化一圓日夜可十圓得効方永不拘
類鈐方同

時

家藏方四味圓治吐血

荷葉 艾葉 栢葉 生地黃經驗良方

右件各等分擣爛圓成雞子大並取生者

每服壹圓水三盞煎至一盞去滓溫服良方

加生藕節不拘時 定齋療血妄行川栢

葉一握生薑一塊蜜少許同研細并花水
調用生帛絞裂取濃汁服

直指方 血氣

附吐衄九
竅出血

血疾證治

血氣虛損腰腹疼痛當歸建中湯加南木香
若自汗則去木香加人參白朮

嗽血咯血局方大阿膠圓加木香末少許略
煎食後服

肺熱嗽血金沸草散

方見咳
嗽門 加桑白皮天門

冬去心同煎乘熱調大阿膠圓服

霍亂吐瀉瀉血不止正料治中湯

方見諸
氣門

大便下血芎歸湯加炒槐花

口舌出血槐花日乾爲末傅之

血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣
虛挾寒陰陽不相爲守榮氣虛散血亦錯
行所謂陽虛陰必走是爾外證必有虛冷
之狀法當溫中使血自歸於經絡可用理
中湯加南木香或局方七氣湯

方見諸
氣門 加

川芎或甘草乾姜湯其效甚著又有飲食傷胃或胃虛不能傳化其氣逆上亦令吐
芎木香理中湯甘草乾姜湯通用

五丹圓治虛極而逆氣不歸元衄血喘嗽痰
作來復丹黑錫丹震靈丹金液丹各一貼
養正丹二貼右件別研細秫米糊圓桐子
大芎服三十圓空心生料理中湯加木香
送下或沸湯調蘇合香圓下方見諸氣門
出血諸證每以胃藥收功用木香理中湯或

參苓白朮散二分枳殼散一分方見諸氣門 夾

和米湯乘熱調下或真方四君子湯夾枳

小烏沉湯米湯調下已上並用薑棗略煎

亦得右藥不惟養胃蓋以調氣輩與之並

行若夫桔梗枳殼湯方見諸氣門 夾和二陳湯

方見諸氣門 姜棗同煎入蘇合香圓少許佐之

又調氣之上藥也

蘇沉沉麝圓治諸血諸氣痛不可忍

血竭 沒藥 沉香 辰砂各一分 木香

麝香 各半分

右生為末磁器熬生甘草膏圓如皂子大每壹圓薑塩湯嚼下產後血痛氣痛並主之亦治脾痛

小柴胡湯男女諸熱出血血熱蘊隆

柴胡 二兩 黃芩 人參 甘草 炙各七半夏

製六錢一字

右剉散每服三錢薑五片棗二箇烏梅一箇煎服

桃仁承氣湯治男女下焦蓄血小腹急痛內外有熱大便秘結

大黃 半兩 桂枝 甘草 炙各二錢半 桃仁 浸去芒

硝 別下各一錢半

右剉散分作三服每煎至臨熟入芒硝半錢再煎沸溫服以通利為度

甘草乾薑湯男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血

甘草 炙 川白薑 炮等分

右劉散每服三錢食前煎服

加減四物湯治血氣不足肢體乏力或瘀血腹痛或下血過多

當歸 川芎 白芍藥 乾薑炒各半兩 南木

香 甘草炒各二錢半

右劉散每服三錢食前煎服若腹不痛則無瘀血更加人參又能益血

黑散子諸竅出血並主之

隔年蓮蓬 敗棕藎 頭髮並燒存性等分

右為末每服二錢煎南木香湯調下或只用棕藎燒灰米湯調下亦可

茅蘇湯治吐血衄血

茅花三錢 紫蘇葉二錢

右散新汲水一椀煎七分乘熱調生蒲黃二錢旋服仍以大蒜兩顆煨熟搥扁貼傅兩脚心小頃自覺胃中有蒜氣其血立止若下部出血可以煨蒜傅兩掌心

豆蘇湯治上焦有熱咯血瘀血煩悶燥渴

黑豆三合紫蘇莖葉二條烏梅兩箇

右水大椀同煎臨熟入薑汁三大匙食後旋服

阿膠散治肺破嗽血唾血

人參 伏苓 生乾地黃 天門冬水浸去心

北五味子各一分阿膠炒白及各二分

右白及別為末餘藥剉散每服三錢水大
蒸入蜜二大匙秫米百粒薑五片同煎臨
熟入白及少許食後服

地黃煎治肺損吐血嗽血

生地黄四兩鹿角膠一兩碎炒黃

右為末拌和每服三錢童子小便一盞煖

熱入薑汁少許調下無鹿膠則以透明阿

膠炒酥代用

薏苡湯治肺癰唾吐膿血

薏苡二合黑豆百粒烏梅一箇

右水二盞煎一盞入透明阿膠生蒲黃各
一錢再煎沸食後服

艾蒿湯治大便下膿血

艾葉握一黑豆百粒

右新水一大盞煎六分入生薑汁三大匙

稍熱服

又方黃連二錢南木香一錢

剉細慢火煎食前服

人參湯治吐血咯血新羅人參慢火煎服

又方人參 川芎 伏芎 半夏製各三分 甘草

炒一分

右剉每服三錢薑五片煎服

蘿蔔飲治諸熱吐血衄血生蘿蔔取汁半盞

入白塩少許服之立效如無生蘿蔔只用

蘿蔔子一分微炒紫蘇莖葉半分剉散用

煎亦效

血餘散治吐血衄血

頭髮燒存性

右研細每服二錢米湯調下衄者更以少

許吹入鼻得效方同

小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難其痛者謂之淋不痛者謂之尿血車前子但曬乾為末每二錢以車前子葉煎湯調下
 又方海金砂為細末新汲水調下五淋散夾
 五苓散竹園尿門冬草燈心葱頭煎湯調下

法製香附方治諸下血 方見是齋醫方

又方治血下帶下

香附 杵去皮二分童尿浸一日夜 艾葉 三分米醋煮透曬焙

右為末秫米糊圓桐子大每五六十圓艾醋湯或醋湯下

咯血方

天門冬 去心 青黛 曬乾各四錢 生蒲黃 川姜黃

油髮灰 各一錢

右末煉蜜圓桐子大每五十九入松陽柿中濕紙包煨香候冷桑白皮煎湯臨附嚼下柿能戀肺咯血屬肺嘔血屬脾
 九竅出血方荆芥酒煎通口服

又方暴驚風九竅血其脉虛者靈砂百粒分
三次人參煎湯下此證不可錯認血得熱
則宣流妄用涼藥誤矣

又方治傷寒嘔血繼而齒縫皆流血不止
開口川椒四十九粒

右用法醋大蒸同煎臨熟入白礬少許漱
口含在口中少頃吐出再吸漱而含

理中湯治胃腸逆冷心腹疴痛

方見泄瀉門

和劑來復丹配類陰陽扶虛補損治心腹冷

痛小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐

搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎

米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人

產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白

帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散

腎陰濕止腹脇冷疼應諸疾不辨陰陽證

並宜服之

方見諸暑門

震靈丹

方見諸濕門

和劑黑錫丹升降陰陽暖脾補腎氣衝胃腹

膨脹刺痛

方見癰冷門

和劑金液丹固其氣治衄血

方見脾胃門

小烏沉湯調中快氣治心腹刺痛

烏藥

一兩

香附子

沙盆內

浙去皮

甘草

一分

右為細末每服一錢搥少許或不著搥沸

湯點不拘時

參苓白朮散

方見諸虛門

朱氏集驗方

失血

單方治吐血咯血不止白芨研為末粥飲調

服台州獄吏憫一大囚將死頗照顧之因

感語之吾七次犯死罪盡力杭諱苦遭訊

拷坐是肺皆攆損至於嘔血適得一藥每

用其效如神荷君庇拊之恩特此以報只

白及一味米飲調餌其後凌遲創者剖其

育見肺間竅穴數十處皆白及補填之色

猶不變也洪貫之間其說為郢州長壽宰

規之赴洋川任一卒勿苦咯血勢絕危貫

類聚

三

類聚

三

之用此救之一日而止癸志

又方用新汲冷水調真蒲黃服見效胡制參方本草

用温湯下

又方治咯血烏梅不以多少煎湯調百草霜一服愈

又方治吐血辰砂妙香散又用絲茅根煎湯調平胃散

又用好京墨研末白湯化阿膠稀調服有人吐血連并不止服此而愈

三豆湯治飲酒太過衄血吐血起則無事睡則尤甚服諸藥不效服此而愈

烏豆 赤小豆 菘豆

右各等分渾水服

槐花散得效方名治咯血失聲

槐花炒

為末用糯米飲調服二服袖珍方仰卧得效

方每服二錢食后熱酒調服

止衄散治氣虛發衄

黃芪六錢 赤茯苓 白芍藥 當歸 生地

黃 阿膠各三錢

右為末每服二錢煎黃芪湯下

麋皮湯治血常失道暴出色鮮煩躁引飲

大栢皮 梔子各一兩半 甘草兩半

右咬咀每服五錢用水二盞煎至一盞去

滓溫服

地黃煎治心經火熱尿洪數或吐或衄

生地黃汁半斤 大黃末兩一

右將地黃汁熬乾一半入大黃末熬可圓
如梧桐子大以熟水五圓食後未止加白
十圓

又方治咳嗽吐紅不止

烏雞子清以 化成水須磨千百人參研
化成水然後用人參為

細末

右每服人參二錢重謂勻約五更服服藥
時不得語仰啜下 然覺心肺俱涼滿口
津液如無烏雞子亦得終不及烏雞子如

此喫月十日未有不効者

單方治嗽血咳血用小兒胎髮燒灰麝香酒調下每箇小兒胎髮作一服婦人病用男子胎髮男十病用女胎髮

又方治吐血失血後應男子失血勞疾後用婦人初生男子胎衣以長流水育是不佳洗去惡血待清汁出方妙以酒煮直待爛爲度却不用鐵器煮止用瓶鉢之類俟其爛取去杵爛如泥次入茯神末三五兩又

杵覺乾又入酒些小又杵元如梧桐子大每服百十九米飲或酒下或用人參湯於中更加茯苓當歸尤妙云服時有些逆人愚見加少麝香於中尤妙並朱佐方

參香丸治咳嗽吐紅

辰砂 人參 乳香

右三味等分用烏梅肉爲元麥門冬湯下

京口朱醫方

藁本湯治男子咳嗽吐紅不止梁時發方極有功效

藁本二兩 晉礬 青皮 陳皮 罌粟殼各

右五味不犯鐵器杵爛用瓦瓶煮久煮為妙食後服

二神湯治吐血絕妙治男子婦人吐紅之疾蓋是久病或作急勞損其榮衛壅滯氣上血之妄行所致若投以藕汁生地黃等涼劑治之必求其死矣每遇患者用藥甚簡

甘草炙 乾薑炮等分

右為末每服二錢小一中盞煎至五七沸帶熱呷空心日午進之和其氣血榮衛自然安痊不可不知

薏苡丸治痰吐臭穢及咯血

薏苡仁一斤切 生薑半斤切

右件將手帕裹飯上蒸以米熟為度生薑不用却以麥門冬天門冬二件去心生地黃各三兩為一處搗取自然汁入生蜜人參末各一兩打和入薏苡仁蒸乾每服三

四十九生薑湯下

六一散治咯血發寒熱

黃芪六兩甘草一兩

右細末如常服點不拘早晚乾喫亦得

治氣而嘔血方五膈寬中散下理中丸蓋白

薑能止血也

固榮散治吐血三山曾

蒲黃地榆各二兩滑石兩

右細末每服五大錢溫水調下次用後藥

震靈丹二九黑錫丹二九養正丹十九來復

丹三十

右件作一處作一服用湯使隨意下出梁方

氏方

藕汁飲治吐血衄血不止

生藕汁生地黃汁大薊汁各三生蜜

半匙○衛生易簡方一匙

右件藥汁調和令勻每服一小盞細細冷

呷之不拘時嚴氏濟土方醫方大成集或北南經驗方袖珍方永類鈔

方

嚴氏濟生方

失血

茜根散治鼻衄終日不止心神煩悶

茜根 黃芩 阿膠蛤粉炒 側柏葉 生地

黃各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半醫方大成集

方袖珍方永薑二片袖珍方煎至八分去

滓溫服不拘時候澹寮方得效方同

香墨汁治鼻衄不止

香墨 葱汁

右件藥以葱汁磨墨滴少許於鼻中即止

天門冬湯治思慮傷心吐衄不止

遠志去心甘草煮 白芍藥 天門冬去心 麥門冬

去黃芪去蘆 藕節 阿膠蛤粉炒 沒藥 當歸

去生地黄各一兩 人參 甘草炙各半兩

大有咬咀每服四錢水一盞半醫方大成集

方袖珍方永薑五片煎至八分去滓溫服

不拘時候得効方同

大薊散治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一
合或半升許名曰肺疽

大薊根洗犀角鎊升麻桑白皮炙蒲黃

炒杏仁去皮桔梗去蘆炒甘草炙半

右咬咀每服四錢水一盞半醫方大成集

方袖珍方永薑五片煎至八分去滓溫服

不拘時候得効方同

加味理中湯治飲酒傷胃遂成嘔吐物與氣

上衝與血吐出或心腹疼痛自汗名曰傷胃

嘔血○得効方治飲食過度傷胃不化致嘔

吐其色鮮紅或心腹絞痛自汗名曰傷胃嘔

血

人參 乾薑炮 白朮各一兩 乾葛 甘草炙

兩半

右為細末請方每服三錢水一大盞煎至

七分去滓溫服不拘時候醫方大成集

珍方同得効方又云去乾葛加川芎治鼻

云簡易云只煮乾姜
甘草湯飲之亦妙

雞蘇散治勞傷肺經唾內有血咽喉不利

雞蘇葉 黃芪去蘆 生地黃洗 阿膠蛤粉炒 白

芥根各一兩 桔梗人蘆 麥門冬去心 蒲黃炒 貝母

方玉機微義一兩 甘草炙各半兩 桑白皮半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片得效

三片東一枚 醫方大成集成經驗方 煎至

七分去滓溫服不拘時候微義右咬咀每

嚴氏濟生續方

吐血嘔血唾血

大薊飲治吐血嘔血

大薊汁 生地黃汁各一合

右件和勻入薑汁少許生蜜少許攪均冷

服不拘時候

伏龍肝膏治吐血不止

伏龍肝末 生地黃汁 麥門冬汁 刺

薊汁各三合 白蜜半匙

右件藥相和以慢火熬如稀飴不拘時候

含半匙燕之

錦節膏治唾血嘔血

真錦灰 藕節灰 各半的乳香別研

右為細末煉蜜為圓如龍眼大每服一圓

食後及臨臥噲化 方同

團參散治唾血欬嗽服涼藥不得者

人參 壹兩 黃耆 壹兩 蜜 百合 半 飛羅麩 一兩

右為細末每服二錢食後用白茅根煎湯

調服茅花煎湯亦可

便血

烏梅圓治大便下血不止 衛生易簡方

烏梅 三兩燒存性用

右為細末好醋打米糊為圓如梧桐子大

每服七十圓空心食前用米飲送下 醫方大成

集成南北經驗方袖珍方玉義微義同

聚金圓治大腸畜熱或因酒毒下血不已○

醫方大成治腸胃積熱或因酒毒大便下血

腹中熱痛作渴脉來弦數

黃連去蘆四兩一兩水浸曬乾防風去蘆壹兩炒一兩炮一兩生用 芩各一兩

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服七十圓用米飲送下不拘時候○大成右為末煮麩糊圓如梧桐子每服五十圓米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黃一兩

醫方集成南北經驗方袖珍方同

東垣試效方

衄吐嘔唾血

三黃補血湯治六脉俱大按之空虛必補室秘藏

作面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣

盛多而亡血以甘寒鎮治秘藏衛生之劑人實鑑作陸

瀉其氣以墜氣淨以甘辛溫微苦峻補其血

熟地黃二錢生地黃三錢當歸一錢柴胡二錢

實鑑升麻一錢白芍藥半兩牡丹皮一錢川芎二錢

黃耆一錢

右吹咀如麻豆大每服半兩水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前補之太過以防

血溢上竭 兩寸脉芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血在上焦或衄或嘔血以犀角地黄湯則愈

黃耆芍藥湯治衄血多歲面黃眼溢多眇手

麻木

黃耆三兩炙甘草二兩升麻壹兩葛根半兩棧壹兩義壹兩

兩羌活兩半芍藥壹兩白芍藥秘藏

右件咬咀每服三錢秘藏小二盞煎至一

煮去粗溫服之秘藏後溫服十五服而愈六

脉細弦而澹按之空虛其色必白而天不

澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血

以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡

血亦傷精氣

人參飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少

衄血吐血

人參去蘆黃耆錢一五味子五白芍藥錢一

草錢一當歸身三麥門冬分二

右作為麤散分作二服每服水一盞八分

蘭室秘藏都作煎至一盞去滓稍熱服
 一服用水二盞
 一貧者有前證以前藥投之愈繼而時在
 冬天居大室中臥大熱坑而吐血數次再
 來求治料此病久虛弱附臍有形而有火
 熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽
 氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居大室
 衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏
 熱火邪不得舒伸故血出於口仲景傷寒
 論中一證太陽傷寒常以麻黃湯發汗而

不愈遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同

遂用麻黃桂枝湯

玉機微義治感寒
發衄脈微弱者

麻黃

一錢去其外寒
蘭室秘藏去根節

黃耆

壹錢實
表益南

桂枝

半錢補

白芍藥

壹錢
益脾

甘草

壹錢補其
脾胃之虛

人參

二分益上焦氣而

麥門冬

三分保
肺氣

五味子

實表○秘藏三分

當歸身

半錢活血養血
秘藏和血養血○

右件都作一服水二盞

秘藏先煮麻黃令
三盞

沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去粗

稍熱臨睡一服而愈更不再作

人參救肺散治咳血吐血蘭室秘藏拔粹方

升麻錢柴胡錢當歸尾錢熟地黃錢白芍

藥方一錢○秘藏拔粹蘇木半錢○拔粹方

黃耆錢二人參二錢○拔粹方甘草半錢蒼朮

壹錢陳皮錢

右件秘藏都作一服水二盞煎至一盞去

粗濫服食前○袖珍方右咬咀每服八錢

水二盞煎至八分去滓溫服

麥門冬飲子治吐血久不愈袖珍方名

五味子介麥門冬去心半錢○玉當歸身

人參各半錢○袖珍方黃耆錢生地黃五分

右件為麤末都作一服水二盞煎至一盞

去粗稍熱服不拘時袖珍方溫以三稜鍼

於氣衝山血立愈蘭室秘藏同

得効方

失血

風證桂枝栝樓根湯方見三因方

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水

穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或

下瘀血日夜無度方見泄瀉門

寒證麻黃升麻湯方見鼻門

犀角地黃湯方見千金方

小柴胡湯方見傷寒門

暑證五苓散方見三因方 枇杷葉散方見諸果門

濕證除濕湯方見三因方

七情木香勻氣散治氣逆嘔血衄血川側柝

葉白茅花煎湯下方見諸氣門

蘇合香圓治因氣作衄或吐嘔血濃煎白茅

花湯化方見諸氣門

止衄散治氣鬱發衄無比神方

黃耆六錢 赤茯苓 白芍藥各三錢 當歸 生

乾地黃 阿膠各三錢

右為末煎黃耆湯調下為判散煎亦可

歸脾湯治思慮傷脾心多健忘為脾不能統

攝血心以致妄行或吐血下血醫方大成集

方袖珍方云方見健妄門

白朮 茯神 黃耆 酸棗仁炒去殼 龍眼

肉各一人 參 木香各半 甘草二錢半

玉機微

右剉散每服鈞方每服四錢 水一盞薑五

片棗一枚煎不拘時候溫服

天門冬湯方見嚴氏

虛證加味理中湯方見嚴氏

桂附湯治吐血自汗大效方見瘡冷門

加味四物湯治咯血用毛頭白紙燒灰入麝

香煎調二錢服之如神方見婦人門調經

蒲黃藕節灰少許

熱證大薊散方見嚴氏 犀角地黄湯方見千

茜根散方見嚴氏

萬金散方見朱氏

龍腦雞蘇圓方見簡

三黃圓治肚門腫痛或下鮮血

黃連去須 黃芩 大黃各十兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服四十圓熟

水吞下

白朮散 方見是齋醫方

勞傷雞蘇散 方見嚴氏濟生方 蓮心散 方見是齋醫方

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫

或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血並宜服

之

麥門冬 大心半兩 乾山藥 熟乾地黃 五味

子 各一兩 遠志 去心一分 貝母

炒防風 去蘆各半兩 阿膠 炒一分 茯神 去木 柏子仁

百部根 杜仲 炒各半兩 茯苓 一兩

成去人參一分 皮 大成去蘆

右為末煉蜜圓如彈子大 大成每元水一盞

煎六分 和滓服 醫方集成袖珍方永類鈐方與大成同

傷損奪命散 方見金 花藥石散 方見鼻門

雞鳴散 加味芎藭湯 方並見三因方

茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面

色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡

阻嘔吐亦宜服之

白茯苓

去人參

去前胡

去蘆

半夏

玉機散

兩川芎

各三

陳皮

微義

枳殼

去穰

紫蘇

各半

桔梗

去蘆

甘草

方炙

乾葛

各半

當歸

三錢

白芍藥

兩二

乾地黄

酒炒

壹

右判散

每服

四錢

微義

半兩

鈔

生薑

五片

棗一枚

煎食

前服

通治立效

散治

吐血

急救仙方

側栢葉

焙乾

吐血略血

如倉卒難乾

新瓦焙

為末

每服

三錢

米飲

調食後服

急救仙方

調下

三錢

三

易簡方

同

一方栢葉加赤土

拌勻

煉蜜為餅

下服

單方治鼻衄不止

或吐血

蘿蔔搗汁

入鼻中

血

一盃

立效

或蘿蔔汁藕汁滴入鼻中

麝香散

方見

鼻門

黑神散

治大

經驗良方

吐血及傷酒

傷

方珍

傷

珍

寒食飽低頭掬損吐血

至多并血妄行

口

鼻中俱出但聲未失

無有不効

百草霜

村

燒草鍋底

不拘多少

羅細為末

每服一錢

良方調下

糯米飲調下

鼻衄搗一字皮破

一二錢

糯米飲調下

鼻衄搗

一字皮破

血出灸瘡出血搽上止良方袖珍方百般用藥不止搽半錢

或一字立止并治舌忽然腫破乾搽

川芎三黃散治實熱衄血

大黃濕紙裏蒸川芎黃連淨黃芩等分

右為末每服二錢食後井水調服袖珍方同

敗毒散方見傷寒門加桑白皮麥門冬煎吞雞蘇

圓方見前治肺熱胸中鬱熱衄血兼治血淋

吐血口臭

蘇子降氣湯治虛壅鼻血方見諸氣門

衄血方成片人中白燒去穢為末入麝香少

許入鼻或加油髮灰

天門冬圓方見簡易方

龍骨散方見鼻門

白及散方見鼻門

黃耆建中湯治汗出汚衣甚如坯染皆由大

喜傷心喜則氣散血隨氣行兼服妙香散

金銀器麥子麥門冬煎湯下病名紅汗方見

諸氣門及驚悸門

葎草汁方見三因方側柏散方見簡易方

特效方治鼻衄不止石以蒲黃血竭為末吹

入鼻中

小便出血酒蒸黃連圓白茆根濃煎湯放溫

吞下方見諸痢門

五苓散加辰砂一字燈心一握煎湯調下方見

諸暑門

茯苓調血湯治酒麪過度房勞後小便出血

半赤茯苓一兩赤芍藥 川芎 半夏各半

兩前胡 柴胡 青皮 枳殼 北梗

桑白皮 白茅根 燈心 甘草各二錢半

右剉散每服三錢半姜五片蜜二匙新水

前服

薑蜜湯治小便出血不止

生薑片上蜜半白茅根握一

右用水同煎服神效

鹿角膠圓治房室勞傷小便尿血

鹿角膠兩沒藥別油頭髮灰各三錢

右爲末用白茅根汁打糊丸如梧桐子大
每服五十九塩湯送下

髮灰散

方見三因方

鏡面散治小便出血鏡面草取清汁入蜜少

許同水調服效

單方療小遺出血條淡豆豉一撮煎湯服效

又方治小便出血竹茹一大塊水煎服妙

又方川牛膝一兩去蘆水一椀煎至半椀頓

服

澹軒方

酒後吐血

酒後吐血似狂瀾酒毒薰蒸腸胃間有藥能

安煎一服理中湯下養正丹

吐血

二分槐花一分塩水調能治吐血鮮不然栗

殼燒存性米粥爲湯服亦痊

吐血偏宜桂有功半湯半水打調濃不然只

取松煙墨激并濃磨亦有功

吐血

咯血薏苡細研篩熟煮猪胰片切之飮後稍
空頻醮食自然補肺不能痿

心氣咯血

愁煩心氣血妄行小烏沉湯偏効靈或末或
元隨意服時時不輟自安寧

肌衄

腿間出血是何名肌衄須知有藥靈將取小
兒胎裏髮燒灰乾傅即時停

尿血

最大檳榔川半枚麥門熟水細研之沸湯盪
服乘熱服一盞當時尿血稀或泚文盡三

瀉血

血下無端欲止難葱絲瓦上焙令乾細研為
末米湯點一服三錢即可安

血草蝎血

風傷膚見
血皆可傳

重午多收百草芽葉由中擣汁絞除滓石灰
和餅陰乾付止血之功莫以加

止血

止血無如栗肉宜口中生嚼付包之日乾床

子研為末手摻津調亦自奇

肘後方

治卒吐血唾血大小便血方

葛氏方末黃連蝎各一兩先鎔蝎內黃連攪

調分為五丸溫酒送下丸服之盡三

又方乾薑二兩艾葉二升膠如手掌大水三

升煮取一升去滓又內馬矢汁一升合煮

取一升頓服即止小品同

又方向東者荷根一把搗絞取汁三升服之

小品云不服餘藥亦療蠱毒及痔血婦人

患腰痛

姚氏方療衄止一月者刺羊血熱飲之即差

又方生地黄搗絞取汁著坩堝中膠如兩指

大合蒸之於三升米飯下熟適寒溫一服

効秘方同云不再過

頭聚八十五

如十五

舌上忽出血如簪孔者小豆一升搗碎水三升和攪取汁飲之姚云立止

又方乾地黄五兩膠三兩炙令焦末服之方寸匕立愈

又方巴豆一枚燒作屑亂髮如雞子燒末以酒頓服之姚同

又方黃連半兩黃蘗三兩梔子二十枚酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服

又方濃煮香菘汁服一升日三服

姚治下血不禁如刺猪者用藥葛氏第一豉

汁方不差重作大効方見聖惠方

又方下血不絕大古錢四百以酒三升煮取二升分三服亦可服半劑

下血如小豆汁者黃連末犀角屑各三兩以水五升煮取三升去滓內豉一升更煮三沸去滓分二服近効方

接小便血赤有服石發此病者宜檢右論又姚有大効

葛氏人有九竅四支指歧間皆血方以并華

水溼其血令卒然至勿使病者先知即佳

矣

姚氏云此暴驚所為急刺羊血飲熱血二升

又方治吐血衄血以百葉衛生易簡方千葉衛生易簡方石榴花

作末吹鼻中効

經驗方治嘔血黃蘗好者以蜜塗之衛生易簡方蜜

浸乾杵為末用麥門冬熟水調下二錢匕

立差

又方治咯血黃蘗漢防已各一兩為末每服

一錢匕水一盞小麥二十粒同煎衛生易簡方煎

七分食後溫服

簡要濟眾治吐血榭若葉不拘多少搗末每

服二錢水一盞煎取五七分和滓服之衛生易簡方

易簡方同

又治吐血熱極方黃蘗二兩塗蜜於慢火上

炙焦搗末每服二錢溫糯米飲下

又方治吐血不定茜草一兩生搗羅為散每

服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服

之良衛生易簡方
食後溫服

經驗後方主吐血咯血以荷葉澹寮方云陳
藏器本草云

用先夫惡血生好血焙乾為末米湯下二錢匕衛生
易簡

同方

梅師方治吐血及下血并婦人漏下雞蘇莖

葉煎取汁飲之衛生易
簡方同

初虞世治肺痿咯血衛生易簡
方咳血多痰防風易
簡

方用葶藶等分為末糯米飲調下一錢防已

又方治咯血衄血白芍藥一兩犀角末一分

為末新水服一錢匕血止為限

千金方治無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒服

方寸匕

產書治大小便利血髮灰研如粉飲下方寸匕

食療治下鮮血梔子仁燒灰水和一錢匕服

之量其大小多少服之

孫真人方治糞前有血令人面色黃石榴皮

杵末茄子枝湯下

又方治糞後有血濃煎艾葉生薑汁三合服

經驗方治藏毒下血以苦楝子炒令黃為末

蜜丸壽域神方衛生易方米飲下神方十九

至二十九甚妙

又方治下血槐花荆芥穗等分為末酒調下

一錢衛生易簡方二錢

王氏博濟治藏毒下血不止用豉大蒜等分

壹處杵勻丸如梧子大每服鹽湯下三十

丸血痢亦治

必効方治卒下血赤小豆壹升搗碎水三升

絞汁飲之衛生易簡方同

外臺秘要治尿血棘刺三升水五升煮取二

升分三服

又方膠三兩炙以水二升煮取壹升四合分

再服

經驗方治尿血不定鬱金壹兩搗為末葱白

壹握相和以水壹盞煎至三合衛生易簡方水一升

煎二合去滓溫服日須三服

治九竅出血以刺薊壹握絞取汁以酒半蒸
衛生易簡方水半蒸調和頓服之如無青汁只搗乾
者為末冷水調三錢匕

衛生寶鑑

思袍散治咯血吐血唾血及治煩躁

生蒲黃

乾荷葉

等分

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯放溫調
下食後

地血散治一切吐血咯血能解一切毒及諸

熱煩躁

茜根

四兩大豆

二兩黃藥子

甘草

各二兩

右為末每服二錢新汲水調下加人參二
兩治痰嗽有血

澹寮方

失血

五苓散以茅花煎濃煎湯調服治暑氣流入
經絡壅溢發衄或胃氣虛血滲入胃停留
不散吐血一二升許方見傷暑門孫氏易簡方

治大人小兒臟毒便血五苓散加茅根香
附子枳殼並炒過細末和勻每服二錢米
飲調下

饒州市民李七常爲血衄垂困醫者則以蘿
蔔自然汁和無灰酒飲之則止醫云血隨
氣運轉氣有滯逆所以妄行也蘿蔔最下
氣而酒導之是以一服効經五日復如前
僅存喘息而張思順以明州刊王氏單方
刮人中白置於瓦上火逼乾以溫湯調服

卽時血止至十年不作張監潤之江口鎮
適延陵鎮官曾棠入府府委至務同視海
舶著白毯毛襟子盛服濟潔正對談之次
衄血忽出不止將所服爲紅色凡前後有
此疾特不過點滴獨此酷烈可畏覺頭空
空然殆有性命之慮張曰君勿憂我當漸
治一藥移時而就持與之血而止不復作
人中白者漩盆內積漬垢是也蓋秋石之
類特不多用火力治藥時勿使其人知恐

其以穢濁不肯服此方可謂神矣經驗良方同

孫兆治吐血方蚌粉研細入辰砂少許米飲

調下二錢韓子功方朱砂一錢真蚌粉半

錢

吐血

銅青 白膠

右為末入乾柿內濕紙火熅嚼喫

又方側柏一斤人參一斤

右二味共二錢入飛羅麵二錢調如稀糊

啜服如湧泉者不過二服如倉卒或用荆

芥一握燒令著以蓋地上出火毒細研

如粉陳米飲調下二錢如倉卒亦無此只

用釜煤研三錢濃米飲調下連三服如上

數方皆可旋備也○壽域神方若酒色大

過勞損於內或心肺脉破致血妄行其血

榮如湧泉口鼻俱出須臾不救者用側柏

葉一兩蒸乾人參一兩為末每服三錢入

飛羅麵三錢新汲水調如稠糊啜服血如

漿水不過三度妙小腸便腫淋瀝血

吐血右四物湯加側柏煎百木選方治婦人

經脉淋瀝亦用此藥經火不效亦用此藥

治吐血治吐血

牛地黄研取汁壹升二合白膠香二八

右以薤器盛入甕蒸令膠消服神効衛生

方保測木

秘傳良方云木石草灰皆能止血紫蘇末効

亦不減惟降真節脂尤妙然不可多得但

以降真燒至脂透不待成灰取而為末服之止血功用殊勝彭氏方

失音咯血

槐花新丸

右末三更時仰卧隨意食之

大便下血或清或濁或點滴或濺注或在便

前或在便後或與洩物並下此由內外有

所感傷凝停在腸胃隨氣下通即妄行之

類也方書以鮮血乃腸風瘀血乃熱毒濺

注乃腸痔然愚謂受病之初或因大腸有
熱毒血潮於下或因下虛而腸臟無脂膜
血得以滲入及其久則成失血痼疾矣亦
時有所感觸而發之如遇熱則發為瘀黑
遇風則發為清鮮遇濕則發為豆汁血色
亦因時而轉不可一向拘以前說也

三神烏金散

卷栢 側栢 櫻閣 各化存性灰

右用白酒調三錢空心服一法用研鉢為

圓梧子大每服一百粒飯飲吞下亦妙

瀉血方 衛生易簡方

百藥煎 壹兩半兩煨成炭半兩生研細

右合和乾飯圓如梧子大每服三十圓米

小飯送下 玉機微義每三四十九空心米飲

老如桐子大每服三四十九老空心米飲下

治下血如豬肝石煎四順飲子下駐車圓空

心服

腎虛下血

鹿茸兩烏梅去仁各一兩破故紙炒桂仲各半

右炒為末粟米粥為圓每三十粒空心搥

湯吞下

心氣下血右用棗湯下妙香散

小便出血多因心腎氣結所致或因憂勞房

室過度此乃得之虛寒故養生方云不可

專以血得熱淖溢二者皆致尿血與淋不

同以其不痛故屬尿血痛則屬淋也

雙聖圓治男子婦人老幼下血

百草霜等分白芷等分

右為細末取烏梅肉水浸於甕上蒸爛搗

如膏搜和為元梧子大每服三四拾圓空

心飲飲吞下

獨聖散治諸證下血

烏梅一味燒存性灰

右末米飲調下一大錢空心時增品易簡方

王氏集驗方

治吐血衄血

吐血衄血黃連丸

王生乾地黃 胡黃連

右為末猪膽汁為丸如梧桐子大每服五十丸食後睡時茆花煎湯送下

又方金櫻酒金櫻子去刺并子酒煎服

又方人參散

人參黃芪示血餘燒灰京墨

右等分為末食後溫酒調下水調亦可

衄血小薊湯小薊一味去梗煎湯服

又方梔仁散神珍方名山梔子去殼燒存性

灰為末吹鼻中止

又方青黛散青黛枯白礬等分為末吹鼻中

止 吐血衄血多是熱証用藥亦相類然

亦當審冷熱虛實治之如三黃丸鷄蘇丸

洗心散四順清涼飲皆可選用之

吐血不止白膠香散白膠香不以多少細研

為散每二錢新汲水調下食後

醫方大成

吐血 附咳血衄血

和劑方龍腦鷄蘇圓治膈熱咳嗽或吐血衄

血醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方玉機微義同方見積熱門

和劑方枇杷葉散治暑毒攻心嘔吐鮮血醫方

集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見諸暑門

和劑方三黃元治積熱吐血咽膈不利醫方集成

南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見積熱門

三因方茯苓補心湯治心虛為邪氣所傷吐

血咳血或五心煩熱醫方集成南北經驗方袖珍方同方見心腹痛

門

大全良方四生圓凡吐血衄血陽乘於陰血

熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生柏葉 生地黄各等分

右爛研圓如雞子大每服一圓水三盞煎

一盞濾過溫服醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同玉機微

義每一丸水煎服或用鹽湯化下

和劑方鵬砂散治大人小兒喉閉生瘡風痰

熱毒鼻衄出血

山藥六斤 腦子七兩 甘草二十兩 牙硝四兩

○南北經驗方 柳別研 鵬砂二十兩 麝香四兩

右為末每服半錢如茶點服醫方集成永類鈔方同

活人書黃芩芍藥湯治鼻衄

黃芩 芍藥 甘草各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎六分溫服醫方集成

集成南北經驗方 柳別研 鵬砂二十兩 麝香四兩

濟生方赤芍藥湯治瘀血蓄胃心下脹滿食

入即嘔名曰血嘔

赤芍藥二兩 夏半 陳皮一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分

溫服不拘時醫方集成南北經驗方

下血

和劑方敗毒散治風熱流入大腸經下血不

止若因酒食毒加巴豆炒黃連去巴不用

醫方集成南北經驗方 柳別研 鵬砂二十兩 麝香四兩

和劑方胃風湯治風濕乘虛入于腸胃或下

痰血或下痢如豆汁醫方集成南北經驗方

微義同方 見諸痢門

和劑方黃連香薷散治伏暑純下鮮血兼下

赤痢醫方集成南北經驗方袖珍方永

和劑方香連圓治冷熱不調下血如痢醫方

南北經驗方袖珍方同方見諸痢門

和劑方三黃圓治三焦蘊熱下瘀血者醫方

南北經驗方袖珍方同方見積熱門

本事方槐角散治腸胃不調脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸 枳殼

槐角二兩 甘草二兩 烏梅各半

右改咀每服五錢水一盞南北經驗方煎服

醫方集成袖珍方玉機微義同

南北經驗方

吐血

拔粹方門冬飲下治脾胃虛弱氣促氣弱精

神短少衄血吐血

人參五分 黃耆乙錢 五味子五分 芍藥 甘草乙錢

紫苑乙袋 當歸身 麥門冬各五分

右咬咀分作二服小煎食後方同

拔粹方黃芩芍藥湯治虛家不能飲食衄血

吐血

黃芩 白芍藥 甘草 一法加生姜黃

者 右二藥治傷寒衄血吐血嘔血方同

拔粹方雲歧子犀角地黃湯寸芤血在上焦

生地黃兩二 黃芩乙兩 黃連乙兩 大黃兩半

右咬咀水二盞秤一兩煎至一盞去滓食

後服方同

拔粹方生地黃湯治鼻衄昏迷不省

生地黃斤三五 如不暇取汁袖珍方如使患

者生喫吸汁又以其冲塞鼻須臾血止取

服汁尤佳

下血

拔粹方當歸和血散治腸澼下血溫毒下血

槐花 青皮各六分 當歸身 升麻各二錢 荆

芥穗六分 川芎四分 熟地黃 白朮各六分

右為細末每服二三錢清米飲調下食前
玉機微義無食前二字

拔粹方升陽去熱和血湯治腸澼下血作瀉
其血啣出有力而遠射四散如篩春二月中
下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作
也當去濕毒和血而愈

生地黄 牡丹皮 生甘草 各半 熟甘草

黃耆 各乙 當歸身 熟乾地黄 蒼朮

秦艽 肉桂 各三分 橘皮 二分 升麻 七分 白芍藥

乙錢半

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去滓

稍熱服空心 袖珍方玉機微義同

拔粹方阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連 兩 炒 二 梔子仁 兩 阿膠 兩 炙 黃蘗 兩 炙

各乙兩

右為粗末每服四錢水壹盞煎服無時 袖珍

方同

袖珍方

諸血

雞蘇丸治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉兩 黃耆 桔梗各五錢 甘草 川芎

各一分 荆芥兩 菊花一分 腦錢半 生地黃錢五

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力弱行步不得促嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澁加車前子一分每服一丸

桑枝湯嚼下日可六七服桑枝剉炒香煎用

團參丸治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參 黃耆 飛羅麩各一分 百合錢五

右為末滴水丸如桐子大每服三五十九

用茅根湯下

雙荷散治卒暴吐血

藕節七 荷葉頂七

右同蜜搗細水二盞煎或研末調下

犀角地黄湯主脉浮客脉芤相合血積胸中熱之甚也血在上焦治之○玉機微義治熱鬱血結上焦寸脉芤

生地黄兩二黃芩壹兩半○微黃連壹兩大黃

錢五

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓

通口食後服

辰膠散治大人小兒吐血

阿膠炒蛤粉各壹兩辰砂許少

右爲末藕汁和蜜調下食後服

經驗良方爲細末和

粉紅色藕節搗汁和蜜調下

芍藥湯下血調氣決而使膿血知氣行而血

止行血則使自愈調氣則後重除

芍藥壹兩當歸壹兩黃連各五錢肉桂二錢

半檳榔大黃壹兩甘草各二錢木香半兩

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓

溫服如痢不減漸加木香如汗後藏毒加

黃栢半兩

涼血地黃湯如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則臍脹滿閉塞下為殮泄久為腸澼者水穀與血今則壹派即出者令時值長夏濕熱大盛正當客氣而主氣碍也故腸澼之病

熟地黃

錢半

知母

錢一

青皮

錢半

槐花

當歸

各半

右小便澀臍下悶大便後重加木香檳榔末等服

黃連阿膠丸治肺熱或咯血

黃連

二兩

赤茯苓

二兩

阿膠

炒一兩

右為末水調阿膠和衆手丸如桐子大每服三十九食後米飲下黃連赤茯苓能抑心火則肺得其清

芎藭湯治一切失血過多眩暈不甦

芎藭

當歸

酒浸各等分

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓溫服食後甚者加附子

經効阿膠丸治勞嗽并嗽血唾血

阿膠炒蛤生地黄 卷栢 山藥 大薊根

五味子 雞蘇各一兩 栢子仁炒 人參 茯

苓 百部去心 遠志去心 甘防風 麥門冬

去心 五錢

右為末蜜丸彈子大每服壹丸細嚼煎小

麥湯燕下

當歸地黄湯治嗽血衄血大小使血或婦人

經候不調月水過多喘嗽

當歸 芍藥 川芎 白朮 黃藥子

染槐子各五錢 茯苓 黃芩 白龍骨 生

地黄 甘草各一兩

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓

通口服食後

生地黄湯治上熱衄血

生地黄二兩 阿膠炒一兩 川芎 桔梗 蒲黃

甘草生各五錢

右咬咀每服八錢水壹盞半入生姜汁二

匙煎至八分去滓溫服食後

麥門冬散治鼻衄

生地黃 麥門冬去心各三錢 生姜壹錢 白藥

蒲黃各二錢

右咬咀用蜜壹合水壹盞半煎至八分溫服

固勞散治吐血便血

白芷五錢 蒲黃 地榆各壹兩 甘草三錢

右爲末溫水調下二錢急氣加石膏

治男子婦人九竅出血大効

側柏葉一兩半 荆芥 人參各一兩

右爲末每服三錢井花水調入飛羅面少服

治吐血

馬屁包

右爲末砂糖丸如梧桐子大每服半丸冷水下

茜根散治大人小兒吐血右茜根不以多少

爲末新水調下經驗良方大人二錢良方一日三服
小兒大小各量分兩良方小兒每服乙錢或極小每服半錢或
一字一日亦三服

涼血地黃湯治勞中有熱及肺壅鼻衄生瘡
一切丹毒

生地黃 赤芍藥 當歸 川芎各等分

右咬咀水二盞煎至壹盞去滓溫服食後
鼻血加蒲黃生瘡加茯苓防風

地黃散治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮各分

右爲末服二錢蜜湯調下

麥門冬飲子治衄血不止又衄血先朱砂蛤
粉次木香黃連

麥門冬去心生地黃各等分

右以水煎大便結下之大黃芒硝甘草生

地黃唐軟梔子黃芩黃連可選而用之

生地黃散治諸見血無寒衄血下血吐血湯

血

生地黃 熟地黃 地骨皮 天門冬去心

黃耆 白芍藥 甘草炙 黃芩各等分

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去渣

通口服食前脈微身涼惡風每壹兩加官

桂半錢

治吐血便血咯嘔等証

乾葛 青蘘 梔子 槐花 甘草 烏

梅炒各等分

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去渣

食後溫服

四聖散治咳嗽有血

青蘘經驗良方音蘘 槐花良方槐花子 乾葛 山梔子

良方山梔子仁

右為末每服二錢加烏梅甘草少許煎服

良方水一盞煎七分食後服

黃連散治大人小兒熱氣盛熱乘於血血隨

氣散溢於鼻者謂之鼻衄得寒則凝滯結聚

得熱則流散妄行

黃連 茯苓 栢葉 甘草各等分 豆豉十二粒

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣
通口服食後

永類鈐方

雜病失血

中寒氣虛理中湯 傷胃只煮乾姜甘草湯
久嗽咯血

白扁豆 生姜兩 枇杷葉去毛 製半夏 人

參各一分 白朮根三分

煎下檳榔末服不拘時

勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用剪草壹
斤淨洗為末入生蜜壹斤和為膏丸蒸曝
不犯鐵器以瓦罐盛五更起東而坐不得
語抄服四匙良久用冷粟飲壓之咳血妄
行只一匙效本事詳述
吐血咳血衄血

清心蓮子飲治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁欲淋上盛之証

黃芩 麥門冬 甘草 地骨皮 車前

子 兩 黃芪 蜜 蓮肉 心 白茯苓 人參 各三分

右咬咀每三錢水一盞麥門冬十介煎發

熱加柴胡薄荷

經驗祕方

治吐血雞冠花子為末熱酒調下一錢 簡奇方同

黑豆地中生者治下血

又燈心燈上燒灰為末溫水調下壹錢食後

服亦治咯血

治吐血咯血蓮葉焙為末二錢米飲下 簡奇方同

又方服自已小便 急救仙方 簡奇方同

又方鍋底墨煨過為末井花水下 急救仙方 簡奇方同

衛生易簡方 研細三四錢井水調下

吐血因內損或因酒色損心肺血氣妄行口

鼻俱出荆芥壹握燒灰置地上出火毒細

研每服三錢陳米飲下 急救仙方 衛生易簡方同

一方百草霜每服三錢濃米飲下三服急救仙方

同衛生易簡方
或井花水調下

經驗良方

吐血

治吐血秀州進士陸迎忽患吐血不止舉家
哀訴所祀觀音夢授此方服之隨手愈

益智生一兩朱砂二錢青皮兩半

右為細末燈心煎湯加麝香少許調服

治嘔血咯血肺損或食飽負重而得者服之

愈石白及壹味為末米飲調服 又治鼻

衄雪水調或新汲水調服屢效

治吐血石藕節研汁調飛羅麪帶稀服立愈

治肺破咯血右香附子去毛為細末米飲調

下

治久嗽咯血勞瘵骨立羸弱欲死者

春頭根新掘者剉五加皮新乾

右用無灰酒煮去滓飲酒神效

柳花散治吐血右用柳絮不拘多少焙乾碾

為細末溫米飲下

治嗽唾中有血牽胸脇痛

地黃 桑白皮各五錢 桔梗 紫苑 甘草

五味子 續斷各二錢 竹茹三錢 赤小豆二兩

右各為末每服五錢水二盞煎至七分日

進三服

炙肝散治咳嗽血不止

瓜萇不去皮用穰 烏梅大者五介去核同前藥焙 杏仁

貳拾青粒去皮尖熬炒別研

右為末每一捻猪肝一片切開入藥在肝

內火上炙熟放冷嚼津液吞下食後及臨

夜服

治勞吐血聲失音

白羯羊肺一枚去心喉爛煮為膏 杏仁一兩湯泡猪

牙皂角一兩水椰去滓以水熬為膏

右三味為膏每服一匙蜜湯調下食後日

中及夜卧服

止紅散治心肺客熱咳嗽吐血

北柴胡去蘆 胡黃連 宣連各半

右為末入生朱砂少許研勻每服三錢水

乙蒸煎半蒸服

治肺痿勞吐血

竹茹 赤小豆 麥門冬各三兩 大棗拾壹

桔梗 北柴胡 川續斷各二兩 桑白皮二兩

甘草一兩二錢 麻黃節去 北五味各乙兩

右為末二錢水壹盞煎七分無時服

治吐紅

馬鞭草三錢 罌粟殼大者四介 甘草二錢 大烏

梅介

右為齏末每服三錢水壹盞半煎八分去

滓日午空心臨卧服

治七孔出血右牛脂芳又名牛蒡芳一味切

為麤末每服一勻水用瓦器煎不用鐵器

去滓連服以紗帛盒頭項上仍將穉心扎

小指根男左女右

治口中血腥吐紅咳嗽右用熟地黄乾嚼酒

下又爲末酒調下

阿膠散治肺損嘔血開胃

阿膠三介好者炒木香金糯米一合

右爲細末每壹服壹錢百沸湯點不拘時

治吐血蠶退紙不以多少燒灰二錢井水調下

又方乾蓮葉卽經霜敗荷葉最佳用蓮葉燒灰爲末二錢飯飲或井花水調下食後及臨卧服

治吐血用白雞冠花黃醋浸煮七次爲末二錢熱酒調下

又方熟艾一拳大水三盞煮一盞服

又方用鬱金甘草等分爲末新汲水調下錢甚者三服卽愈

又方用荆芥連根洗淨擣汁半盞飲之無生者穗爲末熟水調溫服

又方用黃丹不以多少細研發時用新汲水調下二錢

又方用龍骨爲末以竹管吹半錢入鼻中九竅出血皆可用

又方隨鼻左右以新水洗足

又方以左右手捩紙索子繫手第四指呪曰血神住連念立止

治耳鼻口中出血不止右用赤馬糞燒灰細末溫酒調下壹錢

治血妄行右熟地黃洗去土焙乾爲末用松烟墨新汲水磨半盞許分作二服調地黃

末服之即止

治勞心吐血孫仲盈云臨安張上舍服效

蓮子心二十粒糯米二十粒生用

右爲細末酒調服

治吐血

雞冠花 馬藍菜根 柳枝 楓枝

白茅根 生姜 甘草各等分

右小酒壹升半童子小便壹盞瓦器固濟煮至壹升去滓溫服

小便出血如鼻衄不省人事用髮燒灰吹入
鼻中又治舌出血亂髮燒灰細研溫酒調
半錢服之差

施圓端效方

秋連散治吐衄咯血嘔血大名汲十
四郎方

蒲黃 敗荷葉熬乾各
一兩

右爲細末每服二三錢桑白皮湯調下

三奇散治衄血不止

亂髮灰一錢人中白半錢麝香一字

右爲細末鼻內噴少許立止

黃花散治臟毒大便血腹痛至危甚者仙巖
張家

方右用新淨槐花二兩微炒黃爲細末每

服二三錢溫酒調下二服

吳氏集驗方

芥飲子治吐血刺芥連根洗淨搗汁半盞飲
之

滲紅圓療便血以肥大生地黃取自然汁入
銀器內重湯頓成膏子入白茯苓末不以

多少搜和成劑為圓桐子大空心米飲下

七八十圓

事林廣記

嘔血服理中湯

又方蒲黃水調下

熱吐用臘茶末壹錢生腦子少許研勻沸湯

點服

山居四要

臟毒便血生藕節切片清早蘸平胃散嚼生衛

易簡方同

新效方

工茸丸治吐血嗽血

鹿茸麋紫苑茸一紅花杏仁去皮大黃

煨桑白皮木通去毛枇杷葉去毛

右八味末之煉蜜丸如彈子大每服壹丸

噙化

急救仙方

危証中鬼氣忽倒地四肢冷手握拳鼻口出

血雄黃爲末壹錢許煎桃葉湯調下

一方故汗衫衣或觸衣久染汚者男用女衣

女用男衣燒灰每服二錢匕沸湯調服觸衣

即內觀衣也

治便紅烏梅燒存性不拘多少醋煮米糊爲

圓湯酒任下衛生易簡方丸如桐子大每服二三十丸空心湯酒任下

一方黃連柏葉焙二味爲末空心酒調衛生易簡

方每服三錢空心酒調下

一方荆芥穗砂仁爲末每服三錢糯米飲調

下口進三服衛生易簡方同

又方五倍子爲末塩梅搗膏丸梧子大每五

十九酒湯任衛生易簡方空心任下

又治瀉血百藥煎不拘多少半燒灰半生用

研末軟飯丸每三十元米飲下

玉機微義

血證

治風之劑

敗毒散治風熱流入大腸經下血不止若因

酒毒加黃連方見欬門

按此出少陽例表裏藥也

本事方槐花散方見簡易方 拔粹方結氣丹方見

痔漏門

按此二方手太陰陽明藥也

濟生加減四物湯方見痔漏門

按此手足厥陰太陰藥也大抵此藥主補血涼血而以風為虛象者蓋非風客於腸間也

東垣黃芪芍藥湯方見本方

按此手足太陰陽明藥也然血虛久則陽亦虛矣故血不足則麻木陰虛火動變證百出亦實非風也此諸出升陽滋陰例

治寒之劑

東垣麻黃桂枝湯方見本方

按此太陽例藥也傷寒論有例茲不詳錄濟生斷紅丸治腑臟虛寒下血不止面色萎黃羸瘦

側栢葉炒 川續斷酒浸 鹿茸醋煮 附子炮 黃芪

阿膠炒 當歸兩各 白礬兩枯 不兩

右為末醋煮米糊丸如梧子大每七十九

空心米飲送下

按此厥陰例藥也

寶鑑平胃地榆湯治結陰便血

白朮 陳皮 茯苓 厚朴 葛根各半

地榆七分 乾姜五分 炙甘草 當歸 炒麴

白芍 人參 益智各三分 蒼朮 升麻

附子炮各一錢

右咬咀作壹服水煎加姜棗

按此少陰例藥也

治暑之劑

局方黃連香薷飲方見醫方大成

按此手少陰足太陰藥心主血脾裏血也

枇杷葉散治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷二錢 厚朴壹錢半 甘草炙 麥門冬 乾木

瓜 白茅根各一錢 枇杷葉 陳皮 丁香

各半

右細末每二錢入姜煎

按此手足太陰經藥中熱者慎之

治濕之劑

胃風湯

方見醫方大成

拔萃升陽和血湯

當歸和血散

方並見南此經驗方

治熱之劑

局方龍腦雞蘇丸

方見醫方大成

甘露飲治男女血妄流溢或吐或咯衄血齒

齟鼻出血並治之

左見續熱門

簡易選奇黃芪散

方見簡易方

按此手太陰足少陰藥也

濟生犀角地黄湯

方見千金方

按此足太陰藥也

良方四生丸

方見醫方大成

河間生地黃散治鬱熱衄血咯血吐血

枸杞

芫胡

黃連

地骨皮

天門冬

白芍

甘草

黃芩

黃芪

生地黃

熟地黄分等

右咬咀水煎服下血者加地榆

按此二方手足少陰太陰藥也

局方槐角丸治五種腸風下血痔瘻脫肛下

血並宜服之

槐角兩炒二地榆 黃芩 當歸 防風

枳殼半斤 剉炒各

右為末酒糊丸如梧子大每三四十九空

心米飲下

按此雖有治風例而惟味辛苦寒故從熱劑少陽藥也

秘方枳殼湯治便血下血

枳殼一兩 剉炒黃連一兩 以槐花四兩同炒去花不用

右二味水煎取濃食前溫服

按此又氣例藥也

治火之劑

黃連解毒湯 大金花丸方並見火門

理氣之劑

三因茯苓補心湯 方見得 本事槐角散 方見

醫方大成

按已上又氣血藥也然三因方雖云補劑而雜以發表之藥姑存之收入此理氣例

補劑

濟生雞蘇散 方見 歸脾湯 方見得

東垣麥門冬飲子 方見 金匱赤豆當歸

散 方見 三因伏龍肝湯 髮灰散

玉屑膏 方並見

按已上諸方平補藥也然病體亦有寒熱氣積等因不同用者自直求責

止澁之劑

三因龍骨散 方見

御藥院方麝香散 方見得 濟生烏梅丸 方見

嚴氏濟生續方

經驗方治瀉血 方見澹

通利之劑

援萃犀角地黄湯 方見袖

桃仁承氣湯治血結胃中心下手不可近為
中焦畜血無寒熱胃滿嗽水不欲嚙喜妄昏
迷其人如狂

桃仁半兩 大黃壹兩 甘草二錢半 桂 芒硝各三錢

右咬咀每兩入姜煎服

抵當湯治下部畜血即臍下手不可近或其
人發狂少腹滿使小便自利大便反黑如狂
者在中發狂者在下也

大黃 水蛭炒各兩 蜚蠊二錢 桃仁三錢

右製每五錢水煎服如作丸煉蜜和
常歸導滯易治跌搏墮擊損傷血滯於中

大黃 當歸等分

右咬咀每壹兩或半兩水煎服

按已上血諦證諸方也蓋畜血有上中下
之分故藥亦隨而輕重之也至血熱血積
陰虛等證例見各門茲不詳錄

解鬱之劑

丹溪越鞠丸治血鬱

桃仁 香附子 紅花 撫芎 青黛分等

右為末糊丸每四五十九食前服

臞仙活人心

補養飲食

栢湯栢味苦微溫主吐血衄血痢血崩血久

服輕身益氣耐寒暑去濕止飢採取嫩葉

線繫垂挂一大甕中紙糊其口經月視之

如未乾更閉之至乾取為末如不用甕只

密室中亦可但不及甕中者青翠若見風

則黃矣此湯可以代茶夜話飲之尤醒睡
飲茶多則傷人耗精氣害脾胃栢湯甚有
益尤助幽尚如太苦則加少山芋尤妙

醫方類聚卷之八十五