



丹溪心法附錄卷之九

休寧東山庵方

類集

痰

痰

二十七

附痰熱

丹溪心法

○脉浮當吐。得脉濡卒難開也必費調理。大凡治

痰用利藥過多。脾氣虛則痰易生而多。濕痰用蒼朮

白朮。熱痰用香薷黃連等。食積痰用山楂

風痰用南星

老痰用海石半夏瓜蒌各附五倍子作

丸服 痰在膈上必用吐法瀉亦不能去

風痰多見奇

証 濕痰多見倦息軟弱 氣實痰熱結在上者吐難得

出 痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐 熱

痰痰風外証為多 熱者清之 食積者必用攻之 兼氣虛

者用補氣藥送 痰因火盛逆上者以治火為先白朮黃

芩軟石膏之類 山傷痰痰必用參芪白朮之屬多用姜

汁傳送或加半夏 芩加竹瀝 中氣不足加參朮 痰

之為物隨氣升降無處不到 脾虛者宜補中氣以運痰

降下二陳湯加白朮之類兼用升麻提起 中焦有痰則

食積胃氣亦賴所養 卒不便虛若攻之重則虛矣 痰成

塊或吐咯不出兼 痰鬱者難治 氣實痰熱者難治 痰

在腸胃間者可下 四愈在經絡中非吐不可吐法中就

發散之義焉假如瀉病因驚而得驚則汗出舍舍空則痰

生也血氣入在舍 四拒其神不能歸焉 血傷必用姜汁

傳送 薑今治熱 然假其下火也 竹瀝滑痰非姜汁不

能行經絡 五倍子能治老痰佐他藥大治頑痰 二陳

湯一身之痰都治 官如要下行加引下藥在上加引上藥

凡用吐藥宜吐 提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗

芽茶生姜薑汁之類或用瓜蒂散 凡風痰病必用風痰

痰次 痰

藥如白附子天麻雄黃生黃斤冬姜桑豬牙皂之類
諸吐法另具于後

○凡人身上中一有塊者多是痰問其平日好食何物吐
下後方用藥以醫學上用蒼朮治痰成窠無寒邊行極妙痰
探瘀血遂成窠寒 眩運嘔雜乃火動其痰用二陳湯加
山梔子黃連黃芩之類 噫氣吞酸此食磁射有熱火氣上
動以黃芩為君 南星半夏為臣橘紅為使 痰多加青黛
痰在脇下非白芥子不能達 痰在皮裏暗脈外非姜汁竹
瀝不能導達 痰在四肢非竹瀝不開 痰結核在咽喉
中燥不能出 用化痰藥加醃藥軟堅之味 瓜蒌仁杏仁

海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁蜜和丸嚙服之 海粉
即海石熟痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸
子末子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝墻壁 小胃丹治
膈上痰熱風痰濕痰脣腭諸痛能損胃氣食積痰實者用
之不宜多

○痰中有物咯不出燕不下此是老痰重者吐之輕者用
瓜蒌葦氣實必用荆瀝 天花粉大能降膈上熱痰 痰
在膈間使人顛狂或健忘或風痰者用竹瀝亦能養血與
荆瀝同功治稍重能食者用此二味效速穩當二瀝治痰
結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁 蕪荊治血滯

不行中焦有飲自然汁冷與兩三銀盞必胸中煩燥不寧
而後愈 參芩丸能消痰 凡吞酸類

入方

青礞石丸 鮮食積去濕痰重在風化硝

南星 二兩切作片用白丸末五錢水浸

片黃芩 一兩 姜汁炒 半夏 一兩包切作片以大

茯苓 枳實 炒各一兩

法製硝 用蘿蔔水煮化去蘿蔔渣令細入臘月牛胆

礞石 二兩 鐵線 定蓋泥固濟晒乾入小瓶候冷取出

右為末神曲胡九梧子大每服三五丸白湯下

一方加蒼朮半兩滑石二兩看病冷熱虛實作湯使

一本礞石南星各二兩無枳實

又方

半夏 二兩 白朮 一兩 茯苓 七錢 黃芩

礞石 一兩 風化硝 二錢

右為末同煎

潤下丸 降痰甚妙

南星 一兩 半夏 二兩 各依橘紅製 黃芩

黃連 各一兩 橘紅 半斤以水化蓋五錢 甘草 炙一兩

右為末蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下

一方用陳皮半斤益半兩木梓者陳皮候乾焙燥為末入甘草末一兩炊餅丸同上亦好治胸膈有痰兼嗽上熱加青金有濕加蒼朮或加參更看虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止心痛

半夏一兩不拘多
少香油炒

右為末粥丸梧子大每服三五十九姜湯下

又方

黃芩 中

香附 上

半夏 製

日每 中

已上治濕痰加瓜蒌仁青黛碎九子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者

南星

半夏各一兩

粉二兩

右為末神曲糊丸如梧子大每服五十丸姜湯下

濕痰加蒼朮 食積痰加神曲麥芽山查 熱

痰加青黛

中和丸 治濕痰氣熱

蒼朮

黃芩

半夏

香附 等分

右為末粥丸如梧子大每服五七十九姜湯下

又方 治痰嗽

黃芩

酒洗一兩

貝母

南星 略一

滑石

白芥子

各半兩

風化硝

輕浮

半取其

右為末湯泡蒸餅丸如梧子之八每服五十丸白湯下

專痰湯

南星炮一兩 橘紅去白一兩 赤茯苓去皮一兩 枳殼去穢炒一兩

甘草炙半兩又云一兩 半夏四兩又云四錢

右吹咀每服五錢生姜五片水一鍾煎七分服

千縉湯 治喘

半夏七箇泡製每箇作四片 皂角去皮炙一 甘草換一

右咀作一服生姜如指大煎服

小胃丹

芫花好醋浸勻過一脂者不任手攪炒令黑不要焦

甘遂濕面裹長流水浸半日再水洗晒乾又云水浸冬七春秋五日或水煮亦可

大戟長流水煮一時再水洗晒乾各半兩

大黃濕紙裹煨勿焦切焙乾再酒潤炒熟焙乾一兩半 黃柏三兩焙炒

右為末粥丸麻子大每服二三十九臨臥津液吞下或

白湯一口送下取其鬲上之濕痰熱積以意消息之欲

利則空心服

又方甘遂大戟減三分之一硃砂為衣名辰砂化瘰

一方加木香枳榔各半兩蒸餅丸每服七八九至十丸止

治酒痰

青黛 瓜萋

右為末姜蜜丸噙化救肺

治鬱痰

白殭蚕下

杏仁去皮

瓜蒌仁中

訶子去核

貝母中

五倍子上

右為末糊丸梧子大每服五十九白湯下

導痰丸

吳茱萸二錢

茯苓二兩

黃連半兩

滑石七錢

蒼朮一兩

右為末糊丸梧子大每服八九十九姜湯下

茯苓丸

出千金方百一選方同

半夏四兩

茯苓二兩

枳殼一兩

風化硝半兩

右為末蒸餅或神麴姜汁糊丸梧子大每服三十九姜

湯下

此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有效

又方 治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十丸白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎七錢

黃連

瓜蒌仁

白朮

神麴

麥芽各一兩

青黛半兩

人中白三錢

右為末姜汁蒸餅丸如梧子大每服五十九白湯下

久吐痰喘

杏仁去皮尖來復丹炒

右等分爲末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸 即黃連清化丸

半夏一兩 黃連一兩 吳茱萸湯洗一錢

桃仁二十四箇研 陳皮一兩

右爲末麩糊丸菉豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸

巴豆三十箇去油 南星 半夏 滑石

輕粉各三錢

右爲末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜萎丸 治食積痰痞滯喘急

瓜萎仁 半夏 山楂 神麩炒各

右爲末瓜萎水丸姜湯竹瀝送下二三十九

又方

瓜萎仁 半夏一兩 蒼朮二兩 香附二兩

黃芩兩半 黃連兩半

又方

瓜萎仁兩半 黃連兩半 半夏一兩

右爲末糊丸梧子大每服五十九丸白湯下

卷之二 二百廿五

抑痰丸

瓜蒌仁一兩 半夏錢二 貝母錢三

右為末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下

清膈化痰丸

黃連兩一 黃芩兩一 黃柏兩一 山梔兩半

香附兩一 蒼朮兩二

右為末蒸丸白湯下

搜風化痰丸

人參 槐角子 僵蚕 白礬

陳皮去白 天麻 荆芥各一兩 半夏四兩

辰砂半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸辰砂為衣服四十丸姜湯下

噎痰丸 治痰飲

黑丑兩一 枳實兩一 白礬錢三 枳殼兩一 猪牙皂角酒炒 朴硝風化

右為末用蘿蔔汁九每服五十九丸雞鳴時服初則有糞

次則有痰

下方治濕痰

蒼朮三錢 白朮六錢 香附兩四 白芍酒浸炒

右為末蒸餅丸如梧子大每服五十九丸白水下

痰丸

痰丸

痰丸

痰丸

痰丸

治肥人濕痰

苦參

半夏各一錢半

白朮三錢

陳皮一錢

右咀作一服姜三片竹瀝半盞米煎食遠吞三補丸十

五丸

祛風痰行濁氣

明礬一兩

防風二兩

川芎

猪牙皂角

鬱金各一兩

蜈蚣三條用赤脚黃脚各一條

右為末蒸餅丸梧子大每三十九丸食前茶湯下春以芭

蕉湯探吐

上焦風痰

瓜蒌仁中

黃連十

半夏姜製

牙皂炮下

姜汁浸炊餅丸梧子大每五七十九丸白水下

痰氣方

茯苓炒五錢

半夏半兩

白朮一兩

白芍一兩

茯苓三錢

陳皮三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸如梧子大白水下五十丸

利膈化痰丸

南星

蛤粉研細一兩

半夏

瓜蒌仁

貝母去心洗淨

膈痰氣妙

香附各半兩童便浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去

皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和
再入姜汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛為末每服五十九
姜湯下

清膈丸

黃芩

半斤酒浸炒

南星

四兩生用

半夏

湯泡七次

右為末姜汁打糊丸如梧子大每服三五十九白水下

清痰丸

專清中脘熱痰積

烏梅

枯礬

黃芩

蒼朮

陳皮

滑石炒

青皮

枳實各半兩

南星

半夏

神曲

山楂

乾生薑

香附略一

右為

末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五七十九白水下

○廣

按丹溪治病以痰為重諸病多因痰而生故前諸

方間有別出者亦其平日常用故不另開於附方觀

者詳焉

附諸賢論

劉宗厚白痰之為病仲景論四飲六証無擇叙內外三因

俱為切當蓋四飲則叙因痰而顯諸証者三因則論其

因有所傷而生痰者也唯王隱君論人之諸疾悉出於

痰此發前人所未論可謂深識痰之情狀而得其與者

矣製痰丸一方總治斯疾固為簡便較之仲景三因
有表裏內外而分汗下溫利之法則踈濶矣况又有虛
實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦
有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得
者有因氣而得者有因酒飲而得者有因食積而得者
有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若
熱痰則多煩熱風痰多成癱瘓寄証冷痰多成骨痺濕
痰多成怠軟弱驚痰多成心痛顛疾飲痰多成脇痛臂
痛食積痰多成癰塊痞滿其為病狀種種難名王隱君
論中頗為詳盡學者但察其病形脉証則知所挾之邪

隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂飲無補法必
當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論執藥治痰
之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之証不可不論夫久痰
凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格之
患况有風寒外束痰氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱
行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四
肢百骸發為諸病理宜導去痰滯必當補接兼行又難
於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因
食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食
雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾

氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣
則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之王道者正
此類也

附脉理

脉訣舉要曰偏弦為飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節
脉理提綱曰痰脉弦滑

附諸方

全沸草散

和濟方

治外感風寒痰氣肉襟鬱咳唾稠粘

參蘇飲和劑方亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促

言語不能相續者

並見傷風類

小青龍湯和劑方治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿

不得安臥者

見咳嗽類

法製半夏

御藥院方

消飲化痰健脾胃氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去臍再泡洗如此七遍焙

乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬

一兩半研細溫水化浸半夏止留水兩指許頓放浸冬

月於暖處頓放浸五日夜取出焙乾再用鉛白霜一錢

溫水化入浸一日夜通前七日晝取出再用醃水放慢

火內煮勿令滾候醃水極熱取出焙乾於銀石器或磁

器內收貯每服一二粒食後細嚼生姜湯下 又一法

依前製成半夏每一兩用龍腦半錢研極細勻飛過硃
硃於半夏上再為衣却鋪上燈草一層約厚一指單排
半夏於上再用燈草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取
出於器內收貯每服一二粒細嚼食後溫水下或冷水
送下

橘皮半夏湯宣明 痰嗽久不已者

橘皮去白半兩

半夏洗七次二錢半湯

右為末分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎六

分溫服

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓去皮三兩

半夏湯泡七次五兩

右以咀每服四錢水一盞薑七片煎六分空心服

大半夏湯御藥院方 治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右以咀水二盞生姜二錢半煎至八分去渣食後溫服

二陳湯和劑方 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或

因食生冷飲酒過度脾胃不知並宜服之

半夏湯洗七次去滑衣

橘紅陳皮去白者是各五兩

白茯苓去皮三兩

甘草一兩半

右以咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇同煎至

六分熱服

○廣按此方半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣
參濕甘草補脾和中蓋補脾則不生濕燥濕參濕則
不生痰利氣降氣則痰消解可謂體用兼該標本兩
盡之藥也今人但見半夏性燥便以他藥代之殊失
立方之旨若果血虛燥症用姜汁製用何妨抑嘗論
之二陳湯治痰之主藥也如寒痰加附子姜桂濕痰
加蒼白二朮食積痰加麩蘖山查熱痰加芩連梔子
風痰加南星皂角品痰加瓜麥青黛鬱痰加枳殼香
附老痰加海石朴心芎乃合其宜

丁香半夏丸 和劑方治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫氣心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參

陳皮

去白各藥香葉餅

半夏

湯泡七次
姜製三兩

右為末以生薑汁煮麵糊丸如小豆大每服二三十丸

姜湯下

○已上數方治寒痰之劑

平胃散 治有濕痰倦怠軟弱嗜臥沉困無力 方見中集

五苓散 治臍下有悸停飲顛眩吐涎沫 方見溫病

化痰丸 本事方治停痰宿食

半夏湯泡

人參 去芦

桔梗 細切姜汁製

白朮

枳實

香附子

白茯苓 各一兩

前胡 去芦

甘草 各半兩

右為末用半夏姜汁糞糊丸如梧桐子大每服四五

丸姜湯下

積柳散

治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時

或嘔逆

杏仁 去皮

旋覆花 去枝

半夏

湯洗七次

檳榔 各一兩

甘草 五錢

桔梗 去芦

白朮

各一兩

人參 五錢

乾姜 炮

橘紅 各一兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分溫服

半夏湯 喘竹堂方 順陰陽消痞病消酒化痰

半夏 姜制各一兩

橘紅 去白

桔梗 去芦

枳實 去穢炒半兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎至七分半飢半

飽熱服

海藏五飲湯 按粹方 一留飲心下 二癖飲脇下 三痰飲胃

中 四溢飲膈上 五流飲腸間 凡此五飲酒後傷寒飲冷

過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

挂心

芍藥

甘草各等分

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清
溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒多飲加葛
根葛花砂仁

蠲飲枳實丸按粹方逐飲消痰導滯疴膈

枳實法穢

半夏湯洗七次

陳皮去白各一兩

黑牽牛半斤取頭二三兩

右為末水煮麵糊為丸如梧桐子八每服五十丸生姜
湯下食後

葛花解醒湯

按粹方

治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸

膈痞塞手足戰慄飲食減少小便不利

見傷食類

一方 治痰飲流注痠痛

用大半夏二兩湯浸為末風化朴硝二兩生姜自然汁
糊丸如梧桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨臥服隔
在下空心服

○已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸

占庵方

清頭目涼膈化痰利氣

半夏湯洗七次

陳皮白六

茯苓去皮各一兩半

薄荷葉

荊芥穗各五

黃芩酒浸炒

連翹

梔子仁炒

桔梗法芦 甘草炙各

右為末姜汁煎水打糊為丸如梧子大每服五十九食後臨臥各一服如腸胃燥實加酒炒大黃芒硝各一兩○廣按此方即二陳湯與涼膈散相合是也蓋痰因火動故作胃膈痞滿頭目昏眩今因二陳以豁痰利氣涼膈以降火散風熱何病之不瘳哉

條痰丸御藥院方 治三焦氣滯痰飲不利胃膈痞滿咳嗽

稠粘回自熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣清

木香 檳榔 青皮去白 陳皮去白

京三稜煨 枳殼法炒 半夏洗七次 大黃煨

黑牽牛微炒

右為末水糊丸梧桐子大每服四五十九姜湯食後下

利膈丸按粹方 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛炒四兩 半夏洗 皂角去皮各二兩

青皮去白 槐角子炒 木香各一兩 檳榔

大黃各半兩

右為末生姜糊圓如梧桐子大每服七十九食後生姜

湯下

開結枳實丸御藥院方 宣導滯氣消化痰飲升降陰陽通

行二焦湯滌脾胃流暢大小腸開導膀胱專主胃中痞
逆惡心嘔噦飲酒不消宿食停積兩脇膨悶咽噎不利
上氣喘嗽黃疸等症

枳實炒

白朮

半夏製

南星炮

白礬枯

苦葶藶炒

大黃

青皮

去白各五錢

木香三錢

黑牽牛頭末

大皂角

酥炙去

旋覆花各一兩

右為末生姜汁糊為丸梧子大每服五十九丸姜湯下無
特婦人乾血氣膈實腫滿或大便不通小便不利生姜
葱白湯下

王隱君滾痰丸

括曰既裏翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八求
斤正硝煨青礞借若沉十七兩山中零半兩水丸桐子意
常斟干般恠証如神效水瀉雙合身却不在

大黃酒蒸

黃芩酒洗

各八兩

沉香半兩

礞石

一兩 鐵線 練定 蓋洗 固瘠 晒乾 火煨 候冷 取出

一方加硃砂二兩

右為細末水丸梧子大每服四五十九丸量虛實加減服

茶清溫水任下臨臥食後服

按此以大黃黃芩為君大瀉陽明濕熱之藥礞石以墜

痰沉香則引諸氣上而至天下而至泉為使也
大利膈長粹方主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢

檳榔七錢

厚朴一兩

人參去

藿香葉

當歸

甘草炙

枳實炒各

大黃酒浸焙

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九丸溫水下
食後或臨臥服

○已上數方治熱痰之劑

辰砂化痰丸和劑方治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬枯過

辰砂飛研各

半夏洗七次姜汁

南星一兩炮

右以白礬半夏禹天南星為末和勻生姜汁煮餅丸

如梧桐子大別用辰砂為衣每服三十丸食後姜湯下

半夏利膈丸御藥院方治風痰壅滯頭眩目眩咽膈不利

涕唾稠粘并治過酒停飲嘔逆惡心胃膈引痛腹內有

聲

半夏湯洗

白朮

白茯苓去皮

人參去芦

滑石

貝母酪

白附子生用

天南星生用

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十九丸食後姜湯下

葉氏分涎方 簡易方 治風痰留滯 膈間喘滿 惡心涎唾不利

陳皮 去白 揀參 枳實 苦梗

半夏 洗七次 令軟 每箇切

天南星 去皮 蒸餅包 灰火煨

右咬咀 每服二錢水一盞 姜十片 同煎 食後服

靈砂白丸子 濟寮方 治元氣虛弱 痰氣上攻 風痰壅塞 嘔

吐不已

靈砂 青州白丸子 末 各一兩

右爲末 和勻 以生姜自然汁 打黍米糊丸 如梧桐子大

每服二十九 空心人參湯 或棗湯下

大人參 半夏丸 宣明方 化痰墜涎 止嗽定喘 治諸痰不可

盡述

茯苓 去皮 人參 去芦 天南星 薄荷葉 各半

乾生姜 半夏 白礬 生 寒水石

蛤粉 各二 藿香葉 二兩

右爲末 糊丸 如小豆大 生姜湯下 二三十丸 食後溫水

亦得一方 加黃連 半兩 黃蘗 二兩 水丸 取効 愈速 治酒

病調和 臟腑 尤宜服之

治風痰不下 聖惠方

荊芥兩四

白礬生一兩

槐角生二兩

陳皮

半夏各二兩半

右爲末水糊爲丸如梧桐子大每服四十九粒生姜湯下

辰砂祛痰丸 聖惠方治酒食過多酸醎作成痰飲聚於胃

中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則

左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効

硃砂一兩水飛一半入藥一半爲衣

半夏四兩

槐角炒

陳皮

白礬生

荊芥各一兩

生姜四兩與半夏製作餅陰乾

右爲末姜汁打糊丸如梧桐子大每服五十九粒生姜湯白

角子湯任下忌動風動氣物食後溫服

化痰丸 瑞竹堂方快脾順氣化痰消食

半夏淨洗

皂角切碎

天南星去皮

生薑

白礬

右件各四兩用砂鍋內同水煮天南星無白點爲度揀

去皂角不用將半夏天南星生姜切細晒乾如無日色

慢火焙乾加後藥

青皮去穢

陳皮

乾葛

紫蘇子

神麩

麥蘖炒

蘿蔔子炒別 山查

香附子去毛

杏仁炒另研

一方加枳實茯苓

右十末各一兩合前藥碾末姜汁蒸餅浸糊丸如梧桐子大每服五七十九丸食後臨臥茶酒任下

利膈化痰丸

白朮兩四

卑角去皮兩三生半夏

生白礬

右將卑角揉水半碗浸半夏白礬春五夏三秋七冬十日不用卑角晒乾為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服三十九丸姜湯下

○已上數方治風痰之劇

四七湯和濟方治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅

核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏兩五

茯苓兩四

紫蘇兩三

厚朴兩三

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至六分熱服婦人有孕惡阻亦宜服之但半夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白丸子有效三仙丸百一選方治中脘氣滯胃膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星生去皮

半夏湯洗七次二味各五兩為末用生

黍為度攤在篩中用楮葉蓋之令發黃色晒乾收之須是五六月內做曲如醬黃法

香附子

畧炒於磚石上磨去毛五兩

右為末麵糊丸如梧子大每服四十九食後姜湯下機要去香附加橘紅名玉粉丸治氣痰

沉香和中丸

秘方治証同前

陳皮白去

青皮

枳殼

檳榔

木香

黃芩

青礞石

煇硝煨各半兩

大黃一兩一分

沉香二錢

滑石二兩

黑牽牛頭末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧子大每服五十九臨臥茶清下

節齋化痰丸

論曰痰者病名也人之身氣血清順則津液流通何

痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變為

痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用

二陳湯為治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以

之而治濕痰寒痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上

肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間

吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被

鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成

歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病

在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰痰

飲痰涎之比也故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼

南星等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而
消化凝結之痰緩以治之庶可取效今製一方于後

天門冬去心兩黃芩酒炒海粉另研瓜蒌仁另研

橘紅去白兩桔梗去蘆香附子浸炒淡薑水

連翹五錢青黛另研芒硝另研

右為極細末煉蜜入生姜汁少許和藥末杵極勻丸如

小龍眼大噲化一九或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸

如黍米大淡湯送下五六十九

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺

與胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩

泄肺火也海粉芒硝酥以軟堅也瓜蒌仁潤肺降痰

香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛解鬱火故皆

不用辛燥之藥

○已上數方治鬱痰老痰之劑

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰

涎壅盛

川當歸去甘草炙前胡去肉桂去

厚朴去皮各二兩半夏麩各五崇蘇子各五

陳皮去白兩半

右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

俞山人降氣湯和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿
咽乾不利并治脚氣七攻煩渴引飲

前胡去 五加皮製 黃芪 肉桂

當歸去 半夏麩 紫蘇子 陳皮去

厚朴去皮姜製 桔梗 羌活去

甘草兩 乾姜炮 附子炮去 人參去

右咬咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚

煎服

黑錫丹和劑方治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯
竭及婦人血海久冷無子或赤白帶下並皆服之

肉桂去皮 沉香 附子炮去 胡荽酒浸

破故紙 茴香船 肉豆蔻炒 陽起石研細

金鈴子蒸去 木香各一 硫黃 黑錫去渣各

右用燈盞或新鉄鉢內如常法結黑錫硫黃砂子地上
出毒研令極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至

暮必研令黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大陰乾入
布袋內擦令光瑩每服四十粒空心以薑湯下女人艾

棗湯下

靈砂丹和劑方治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升
降陰陽安和五臟扶助元氣

靈砂丹和劑方治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升
降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀兩

硫黃兩

右用新鐵銚炒成砂有煙即以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線劍縛晒乾益泥固濟用炭二十斤煨如鼎裂等蘇赤石脂類扶火盡爲度經宿取出研爲末糯米糊爲丸如麻子大每服二十粒空心麥湯米飲人參湯任下

○廣按已上四方並係類取不溫熱之藥而出認醫云治上盛下虛氣不升降蓋謂盛者即心火之炎虛者即腎水之弱火炎水弱則有升無降故津液湧而爲痰稠粘膠固凝滯於胃膈之間非金石丹藥溫熱香燥

之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂劫劑也用此劫劑之後又當用兼補兼消之藥繼之如六味地黃丸之類是也

金匱腎氣丸

即六味地黃丸

治腎氣有飲故用此藥補腎

逐水

見補損

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而爲痰涎用此劑補腎逐水乃標本之藥也前黑錫丹等劑溫脾劫痰乃治標之藥也

六君子湯

治脾虛不進飲食嘔吐痰水

方見調補脾胃

白朮湯

按粹方治胃中虛損及痰吐者

卷八

醫方類聚卷之九

二十七

古信

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯膏膈或留聚腸胃或流注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到其為病也為喘為欬為惡心嘔吐為痞隔壅塞關格異病為泄為眩暈為槽雜怔忡驚悸為癲狂為寒熱為痛腫或膏間輻輳有聲或背心一點常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結欬之難出漸成惡味酸辣者腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於脾胃且實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之又氣升屬人順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐之在中者下之心中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯

橘紅中

半夏湯泡

白茯苓上

甘草下

生姜中

石方揔治一身之痰如要下行加引下藥上行加引上藥

濕痰多軟如身體倦怠之類加蒼朮白朮

寒痰痞塞胸中倍加半夏其甚者加麻黃細辛烏頭之

類痰厥頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白芷子天麻姜蚕猪牙皂角之類

氣虛者更加竹瀝枳實加荆瀝俱用姜汁

熱痰加黃芩黃連痰因火盛逆上降火為先加白朮

黃芩軟石膏黃連之類眩暈嘈雜者火動其痰也

亦加山梔黃連黃芩

血虛有痰者加大門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝姜

汁滯血者更加黃芩白芍藥桑白皮血滯不

行中焦有飲者取竹瀝加生姜韭菜自然汁吃三

五銀盞必胸中燥煩不寧後愈

氣虛有痰者加人參白朮脾虛者宜補中虛以運

痰降下加白朮白芍藥神曲麥芽兼用升麻提起

內傷挾痰加人參黃耆白朮之類姜汁傳送或加

竹瀝尤少

食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者

必用攻之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中焦

有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之

盡則虛矣

老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米連翹之類五倍子
佐他藥大治頑痰宜早藥 喉中有物咯不出無
不下此痰結也 用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜
蒌仁杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝姜汁煉
蜜和丸噲化服之 脉滿者卒難開必費調理氣實
痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣帶者難

治

痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐
脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發
散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如防風川芎

桔梗芽余生薑韭汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊
勒肚於不通風處行之

痰在腸胃間可下而愈枳實其逐巴豆大黃芒硝之
類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

痰在膈下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝
不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生薑韭汁膈間
有痰或癩狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同
功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐

下後方用藥

此人頭面頸頰身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

痰先攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰急驚風痰盛者最為要藥常宜合備但須量人虛實而用之

○痰熱新增

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之原有因執而生痰者有因痰而生熱者廣按因熱而生痰者熱則薰蒸津液而成痰因痰而生熱者痰則阻礙氣道而生熱夫熱生痰而痰生熱始

終新久之謂也

附諸方

四神丸 經驗方 治痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急手足

頑麻

天麻大者

南星熱湯

防風去芦

薄荷葉兩

右為末酒糊為丸如菜豆大每服一十丸食後煎芥生姜湯下

龍星丹 治諸風熱壅痰盛

解毒雄黃丸 治上膈壅熱痰涎不利 並見中風

鵬砂散 和劑方 治大人小兒風痰熱毒喉閉生瘡鼻衄

血

山藥生六斤 腦子七兩 牙硝十四兩 甘草二十兩

射香四兩 鵬石少二十兩

右為末每服半錢好茶點服

上清丸 治膈間痰熱口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽喘悶煩

燥不寧 見風熱

哮喘

二十八

丹溪心法

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用

涼藥消當帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者一法

用二陳湯加蒼朮黃芩作湯下小胃丹者虛實用

又方 治寒包熱而喘

半夏姜製 枳殼炒 桔梗上 片苓炒

紫蘇中 麻黃中 杏仁去皮 甘草下

右水煎服 天寒加桂枝

治哮喘積方

用雞子一箇畧敲殼損膜不損浸尿缸內三四日夜取

出煮熟喫之効蓋雞子能去風痰

紫金丹 治哮喘三年後可用

用精猪肉二十兩一作三兩切作骰子塊用信一兩明者研極細末拌在肉上令勻分作六分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭火於無人處煨青烟出盡為度取放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅丸如菜豆大食前茶湯下大人二十九小兒七八九量大小虛實與之

喘

二十九

丹溪心法

○喘病 氣虛 陰虛 有痰 凡久喘之証未發宜扶

正氣為主已發用攻邪為主 氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加干縉湯有痰亦短氣而喘 陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰有火炎者宜降心火清肺金 有痰者用降痰下氣為主 上氣喘而躁者為肺脹欲作風水證宜發汗則愈有喘急風痰上逆者日大千方干縉湯佳或導痰湯加干縉湯 有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火諸喘不止者用劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火治火劫藥以椒目研極細末一二錢生姜湯調下止之氣虛不用 又法蘿蔔子蒸熟為君皂角燒灰為臣研末生

姜汁煉蜜丸如小豆大服五七十九噲化止之 氣虛者用人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類 氣實人因服黃耆過多而喘者用三拗湯以瀉氣 若喘者須用阿膠若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子以補之 若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩頓項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也世亦都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水凡利五六次而安

入方

痰喘方

南星中製

半夏中製

杏仁去皮

瓜蒌仁中

香附上

陳皮去白

皂角炭下

蘿蔔子下

右為末神麩糊丸每服六七十丸姜湯下

又方

蘿蔔子蒸半

皂角酥

海粉膏

南星兩

白礬

一錢半
姜汁浸

右用瓜萎仁姜蜜丸噲化

切喘藥

好銅青

研

魏丹

少許炒

右爲末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

王節齋曰喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹

脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於

肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經

曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之

官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之

降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故少

便漸短以致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘爲本而腫

爲標治當清金降氣爲主而行水次之脾土惡濕外主

肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸

漬肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生喘矣此

則腫爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之

苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用

清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知

實脾行水而不知分別肺脾二症予故爲發明之

附脉理

袖珍方論曰凡此證脉滑而手足温者生脉瀉而四肢寒者死

附諸方

三拗湯和劑方治感冒風寒鼻塞聲重語言不出咳嗽喘急

生甘草

麻黃

不去節

杏仁

各半

去皮尖

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散和劑方治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡臥或聲音不出者

小青龍湯

和劑方

治感寒咳嗽喘急不得睡臥

蘇沉九寶湯

簡易方

治老人小兒素有喘急遇寒暄不常

發則連綿不已咳嗽乳哮夜不得睡

並見咳嗽

分氣紫蘇散

和劑方

治脾胃不和氣逆喘促

五味子

去梗

桑白皮

茯苓

去皮

甘草

草果仁

大腹皮

陳皮

去白

桔槩

各二兩

右咬咀每用二兩入紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻

每服四錢水一盞姜三片入鹽少許同煎空心服

紫蘇子湯

濟生方

治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛數而

泄 見氣滯類

杏仁半夏湯 宣明方治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒往來寒熱

杏仁 去皮

桔梗

陳皮 去白

茯苓 去皮

漢防已

桑白皮

白礬 各二錢

猪牙皂角

薄荷 各一錢

甘草 仁

右為末作二服水一盞生姜三片煎至六分食後溫服

葶藶散 濟生方治過食煎煉或飲酒過多致肺壅喘不得

安臥及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶 炒

桔梗 去

瓜蒌 仁

升麻

薏苡仁

桑白皮

葛根 兩

甘草 錢五

右以咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去渣

食後溫服

定肺湯 直指方治上氣喘嗽

紫苑

五味子

橘皮 去

甘草 炙

紫蘇子 炒

杏仁 去皮炒

桑白皮 炒

半夏 製

枳殼 各

右以咀每服一兩生姜五片紫蘇五葉水一盞煎至二

盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

人參潤肺湯 宣明方 治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒

熱自汗 見咳嗽

蘇子降氣湯和劑方 治虛陽上攻喘促咳嗽 見痰類

杏蘇飲 直指方 治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉兩二 五味子 大腹皮 烏梅去核

杏仁去皮尖炒 陳皮土白 桔梗

麻黃去節 桑白皮炒 阿膠炒 紫苑

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分去渣食後溫服

玉華散 直指方 治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神

氣

甜葶藶焙 桑白皮炒 天門冬去心 馬兜鈴

半夏製 紫苑 杏仁去皮 貝母炮

百合 人參各五錢 百部 甘草各二錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜四片棗子三枚煎至一

盞去渣食後溫服一方無生姜

杏參散 秘方 治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡臥不得

見咳嗽

○已上數方半攻半補之劑

神祕湯 三因方 治上氣喘急不得臥者

橘皮去 桔梗 紫蘇 五味子

人參 各等分

右哎咀每服四錢水一盞煎至六分食後服

知母茯苓湯 宣明方 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

見肺痿類

五味子湯 活人方 治喘促脉伏而數者

五味子 半兩 人參 麥門冬 去心 杏仁 去皮

生姜 陳皮 各一錢半 棗子 三枚

右哎咀作二服每服水二盞煎至一盞食後温服

寧肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳

嗽痰唾稠黏 見咳類

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接 見發熱

○已上救方補虛之劑

人參理肺散 長粹方 治喘不止

麻黃 去節 木香 各一兩 罌粟殼 炒 人參 二兩

杏仁 三兩 當歸 一兩

右哎咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後温服

紫參散 長粹方 治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安臥

麻黃 桔梗 五味子 甘草 炙

紫參各一兩 嬰粟殼炒黃色

右吹咀每服一兩水一盞半煎至八分食後溫服

○已上二方止瀉之劑

惡心

三十

丹溪心法

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生薑隨證佐藥

戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

附諸方

大半夏湯

半夏 陳皮 茯苓略半

右吹咀水一盞生姜二錢半煎至八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏五兩 茯苓三兩

右吹咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜自然汁投藥中更煎一二沸熱服無時 或用生姜半兩同煎

煎

加味二陳湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草炙

黃連煨汁

黃芩姜汁炒各錢半

右作一服水二鍾姜五片煎八分温服

加味生姜理中湯

人參

白朮

生姜

甘草炙

半夏

陳皮各等分

右水煎服

嘔吐

三十一

丹溪心法

○凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦 胃中有熱

膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生姜 有久病嘔者

胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類 嘔吐

朱奉議以半夏橘皮生薑為主 劉河間謂嘔者火氣炎

上此特一端耳 有痰膈中焦食不得下者 有氣逆者

有寒氣鬱於胃口者 有食滯心肺之分而新食不得

下而反出者 有胃中有火與痰而嘔者 嘔吐藥忌瓜

蒺杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要吐丸藥帶香藥行散不妨

注船大吐渴飲水者即死重便飲之最妙

附脉理

脉訣舉要曰滑數為嘔代者氣逆亂微滑者生瀉數凶斷
附諸方

香薷飲和劑方治伏暑而嘔元中暑

四君子湯按辨方治久病胃虛而嘔

茯苓

白朮

人參

黃芪

各一兩

右咬咀每服一兩水二盞薑五片煎一盞去渣溫服

錢氏白朮散

治症同前

日元痢類

加味理中湯和劑方治胃虛寒嘔吐不止

人參

白朮

乾姜炮

甘草

各一錢

丁香粒

右咬咀生姜十片水煎服

大蘗香散濟生方治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作

寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉

洗去

半夏

白朮

人參

各一錢

木香

不見

兩茯苓

去皮

桔梗

去芦

枇杷葉

制去毛

橘皮

甘草

各一兩

右為末每服五錢水一盞薑五片棗一枚煎六分溫服

養胃湯徐氏方治脾胃虛冷不思飲食嘔吐翻胃

白豆蔻仁

人參

丁香

宿砂仁

肉豆蔻

附子炮

甘草

沉香

橘紅

麥芽

神效各半

右為細末每服二錢姜盪湯下

旋覆花湯濟生方治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花梗

半夏湯炮

橘紅

乾姜炮各

枳榔

人參去

甘草

白朮

各半

右吹咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

加味二陳湯

半夏

橘紅各五

白朮各三

甘草

各一

砂仁兩

丁香錢

生薑

各二

右水煎服

藿香養胃湯神效院方治嘔吐不已

藿香葉兩

半夏

洗兩湯

陳皮

法白

甘草

兩

厚朴二兩

蒼朮

三兩米

右為粗末每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎

去渣溫服

生姜橘皮湯活人方治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮兩

生姜

右吹咀水七盞煮至三盞去渣逐旋溫服

濟生竹茹湯治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根

半夏

湯泡

兩

甘草

兩

右吹咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡錢

半夏湯錢

黃芩

人參

甘草各半

竹茹塊

橘皮錢

右吹咀水一盞生薑七片煎六分溫服

三一承氣湯 宣明方 治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或

利而不鬆快時覺腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不

下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐隔食煎熟又

硝細細服

○廣按三因云嘔吐証忌用利藥此言其常然大小

腸膀胱熱結而不通上在嘔吐隔食若不用利藥開

通發泄則嘔吐何由而出或只嘔吐而大小便不秘

澁者此利藥又當所忌也三承氣湯見溫熱類

吐重而嘔方

黑鉛炒成灰檳榔末等分米飲調下

欬逆

三十一

丹溪心法

○欬逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之其詳

在格致餘論不足者人參白朮湯下大補丸 有餘并有

痰者吐之人參蘆之類痰得氣而吃逆者用蜜水吐此乃
燥痰不出 痰者陳皮半夏 氣虛人參白朮 陰火黃
連黃柏滑石 欬逆自利者滑石甘草炒黃柏白芍人參
白朮陳皮加竹瀝服

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生姜湯 治欬逆欲死

半夏一兩二錢半 生姜二兩

右以水二盞煎八分去滓分作二服

柿蒂湯濟生方治胃脘痞滿咳逆不止

柿蒂各一兩 丁香各一兩

右呿咀每服三錢水一盞姜五片煎服

羌活附子散濟生方治吐利後胃寒咳逆

羌活 附子炮去 茴香炒各 薑黃炮

木香各一兩

右呿咀每服二錢水一盞鹽少許煎至半盞溫服不拘

時一方去木香用丁香三因方二香並用

橘皮湯濟生方治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮去白 人參 甘草煨各

右呿咀每服四錢水一盞竹茹一小塊生姜五片棗二

枚煎七分温服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃火蒸薰津液成痰凝滯於胃膈之間阻碍氣道所以咳逆也已上三方治吐利後胃寒胃熱咳逆然吐利後胃熱咳逆者常多而胃寒咳逆者千百中而一二也

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾姜

梔子仁

甘草炙各半兩

白朮

防風

半夏炮七次

五味子各四錢

右咬咀每服四錢姜三片水一鍾半煎至七分温服

桂苓白朮散

宣明方消痰止咳逆散治寒開堅結痛悶進

飲食調和臟腑

陳桂

乾生薑各二錢半茯苓皮去

半夏各一兩

白朮

陳皮去

澤瀉各半兩

右為末麵糊丸如小豆生薑湯下二三十九日三服病在上食後病在下食前在中不拘時一方加黃連半兩黃栢二兩水丸取効愈妙

灸法

見温熱

大補丸

見補培

翻胃

二十三

丹溪心法

○翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有痰 蕪病

必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生姜汁 氣虛入四君子湯

右手脉無力 血虛入四物湯如童便左手脉無力 切

不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味 治反胃用黃

連三錢生姜汁浸炒山查肉二錢保和丸二錢同爲末糊

丸如麻子大胭脂爲衣人參湯入竹瀝再煎一沸下六十

丸 有痰二陳湯爲主寸關脉沉或伏而大 有氣結宜

開滯導氣之藥寸關脉沉而瀉 有內虛陰火上炎而反

胃者作陰火治之 年少者四物湯清胃腕血燥不潤便

故澁格致餘論甚詳 年老雖不治亦用參朮補防氣虛

胃虛 氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散或

韭汁牛羊乳或入駝馬尿 又有積血停於內而致當消

息逐之入便澁者難治常令食兔肉則便利 翻胃即膈

噎 膈噎乃翻胃之漸 發揮備言 年高者不治 糞

如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻胃血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無

力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有

熱者脉數而有力有痰者脉滑數一者可治血虛者四
物為主氣虛者四君子為主熱以解毒為主痰以二陳
為主

入方

用馬剥兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢
右和勻温酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

茱萸中

黃連中

貝母上

瓜蒌仁下

牛轉草中

治翻胃

菹菜汁兩

牛乳盞

右用生姜汁半兩和勻温服効

治翻胃積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脚丸小丸子時時服

温清丸 治翻胃

乾姜兩

滑石

甘草兩

右爲末丸如桐子大每服三五丸白湯下

附諸方

撞氣阿魏丸 和劑方治五種疔疾九般心痛痞氣塊瘕
痛腹鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並治之 見諸氣

附諸方

卷之九

四十八

金百

木香通氣飲十 御藥院方 治一切氣壅塞痰飲不下

青皮去穢 木香 蓬莪朮 檳榔

陳皮去白 蘿蔔子炒各五錢 藿香葉兩 甘草炙

人參去芦 枳殼各五錢 香白芷二錢

右為末每服五錢水二盞煎八分溫服

瓜蒌實丸 濟生方 治胃痞痛徹背脇喘急妨悶膈噎翻胃 方見痞類

人參利膈丸 技藝方 治胃中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯

推陳致新治嘔噎氣聖藥

木香 檳榔半錢 人參 當歸

藿香 甘草 枳實各一兩 大黃

厚朴姜制

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十丸溫水送下

棗肉平胃散 開胃進食

厚朴姜制 陳皮去白各二兩 甘草炙

紅棗 生姜各二斤 蒼朮炒一宿

一方加茯苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許煮乾焙燥為末每服

二錢蓋湯空心點服

保和丸 消食開胃 見積類

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

導寧純陽丹 治痰涎聚於中脘不能傳導 並見調補脾胃

○已上數方消導之劑

白朮和胃丸 治脾胃虛弱不能運化

和中散 同前

八珍湯 同前

參苓白朮散 同前 俱見調補脾胃

○已上數方補虛之劑

燒針丸 此藥清頭專主吐逆

黃丹 不以多火

右研細用土皮小棗肉丸如雞頭子大每用一丸針茶

於燈上燒灰為末乳汁下

神仙奪命丹 專治噎食

烏梅 十二箇水浸去核

礞石 錢

雄黃 錢

乳香 錢

百草霜 錢

菴豆

黑豆 各四十粒

右將烏梅柱爛煎藥并豆為末入梅再搗和勻丸如彈

子大以乳香少加硃砂為衣陰乾每服一丸空心噙化

待藥盡烙熟餅一箇擘碎入熱茶泡食之無碍為驗過

三五日依法再服一丸即愈極有神效

治膈氣經驗方

用大鯽魚白死者活者不効剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切片填滿魚腹內仍合魚用濕紙包定次用麻縛之又用熟黃泥厚厚固日微乾炭火慢慢煨熟取出鱗刺骨用平胃散杵丸如梧桐子大日曬乾瓶收勿令泄氣每服空心米飲下二十九

槿花散 治翻胃

以千葉白槿花陰乾爲末陳米湯調下三五口不轉再服

一方 治轉食

用翻翅雞一隻煮熟去骨入人參當歸各五錢爲細

末再煮取與食之勿令人共食

一方 治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤入瓦瓶內浸虎脂一月厚綿紙封口勿令氣泄每用清油一兩入無灰好酒一大鍾調勻不拘時溫服服盡病減其虎脂再添油再浸再可活二人若一時無虎脂只用珠子硫黃細研半兩水銀二錢半入碗黃末研至無水銀星再研如黑煤色每服三錢生姜四兩取自然汁入好濃酒一鍾盪熱調空心服厚衾蓋之當自足趾間汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕浮難調須先滴酒少許以

脂緩緩研之旋添酒調

一方 治噎食

用碓甯上細糠蜜丸如彈子大每服一丸噲化津液嚥下

一方

用白麵二斤半蒸作大饅頭一箇項上開口取空將皂
礬裝滿用新瓦四圍遮護饅頭蓋泥封固却窰土窰安
放以文武火燒一晝夜候紅色取出研為細末棗肉丸
如梧桐子大每服二十九丸空心酒湯任下忌酒色

○已以數方專治之劑

四君子湯

四物湯

俱見補損

二陳湯

見痰類

○廣按膈噎翻胃之證因火而成其來有漸病源不一
有因思慮過度而動脾火者有因忿怒過度而動肝
火者有因久食煎炒而生胃火者有因淫慾忘返而
起腎火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰初則痰火未
結咽膈乾燥飲食不得流利為膈為噎久則痰火已
結胃之上脘不開飲食雖進停滯膈間須臾便出謂
之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良

久方出謂之翻胃丹溪云年高者不治蓋少年氣血未虛用藥劫去痰火病不復生年老氣血已虛用藥劫去痰火雖得暫愈其病復作所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証者切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方尤用香燥之藥宜宜合乎夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香散氣燥耗血而滋味助火而生痰也予嘗用霞天膏加於補虛藥中以治此証者一人則吐瀉以去積痰俱獲病安思食而彼二人俱不能節戒隨啖肥甘終不

能免殊不知此証挾虛雖云病去而脾胃尚弱肥其難化故病復也噫嘻得此証者不可不知所謹哉知所懼哉耶若用霞天膏吐瀉後宜用人參煉膏補之

霞天膏

見劑法

人參膏

見野類

嘈雜

二十四

丹溪心法

○嘈雜是痰因火動治痰為先姜炒黃連入痰藥用炒

梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛 嘈雜此乃食齋有熱炒梔子姜炒黃連不可無 肥人嘈雜二

陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子 嘈雜若濕痰氣鬱
不喜食二補丸加蒼朮倍香附子 醫書按蔣氏子條云心
嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止
又云眩運嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類
戴云此則俗謂之心嘈也

三補丸

見補損

二陳湯

見痰類

關格

三十五

丹溪心法

○關格必用吐提其氣之橫格不必在吐痰也 有痰宜
吐者二陳湯吐之吐中使有汗 有中氣虛不運者補氣
藥中升降 寒在上熱在下脈兩手寸俱盛四倍以上
戴云關格者謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降欲
食不食此為氣之橫格也

瘦氣

三十六

丹溪心法

瘦氣先須斷厚味

入方

瘦氣

丹溪心法

三十五

二言廿言

海藻 一兩

黃連 三錢

右為末以少許置掌中特特鼓之津嚥下如消三分之二止後服

附諸方

海帶丸

治瘦氣久不治者

海帶

貝母

青皮

陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚥化一方

海藻

海帶

昆布

各一兩

廣茂

青柏

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚥化

破結散

齊生方治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻 洗

龍膽草

海蛤

通草

昆布 洗

礬石

松蘿 洗

麥麩 兩

半夏 湯洗

七次

貝母

三錢

右為末每服二錢酒服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菜等物

丹溪心法

○結核或在項在脛在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

瘰癧

瘰癧

五

百

入方

姜蚕炒

酒大黃

青黛

牛膽南星

右為末蜜丸噙化

又方

治項頸下生痰核

二陳湯四錢 大黃七分

連翹七分

桔梗八分

柴胡七分

生薑三片

右以水煎食後服

又方

治臂核作痛

四錢二陳湯加連翹七分

防風五分

川芎五分

皂角刺五分 蒼朮七分

酒黃芩七分

右以水煎服

丹溪心法附錄卷之十

休寧東山古菴方廣約之類集

痰熱門

痧
三十七

丹溪心法

○痧切不可作風治無用風藥 大率與癘病相似此癘
為甚為虛宜帶補 多是氣虛有大魚痰宜用人參竹瀝
之類

附論

○廣按瘧症發作則通身而戰掉皆因氣虛挾痰火所致正猶火炎而旋轉也火能燥物而使氣液之不足世人不諳誤認為風而用風藥風能勝濕是不足之中而又見損也玉匱金鑰曰休治風休治燥治了火時風燥了夫火為風燥之本能治其火則是散風而潤燥何風燥之有哉此瘧症所以宜補氣液而無散痰火也

瘧

二十八

丹溪心法

○驚與痰宜吐 大率行痰為主用黃連南星瓜萎半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者 分痰與熱 有熱者以涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸 大法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍會丸正宜服之 且如瘧因驚而得驚則神不守舍含空而痰聚也

戴云瘧者俗曰猪癩風者是也

附脉理

脉訣舉要曰顛癩之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂

附諸方

通泄散 治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出

含砂糖一塊下咽涎出

墜痰丸 治風癩

天南星 九蒸丸晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十九人參湯

蒼蒲麥門冬湯任下

一方 治遠年近日風癩心痒風狂中風涎潮牙關不開

破傷風搗者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦切碎以酸

漿水一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日揉去滓將

汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳枝攪成膏取出攤厚

紙上陰乾收貯用時取手山芋大一片以溫漿水化在盞

內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服

溫薑湯一二口便止忌雞魚生硬濕麵等物

五癩丸 楊氏方 治癩癩發作不問新久並宜服之

全蝎 去毒炒 皂角 四兩 搗碎 水半升 浸 半夏 湯泡 七

南星 炮 烏蛇 夕 去骨 焙乾 白附子 炮 半

雄黃 錢半 白礬 一兩 蜈蚣 半條 去 朱砂 二錢 半

雄黃 另研 白礬 一兩 蜈蚣 頭尾用 朱砂 另研



原件短缺

P4

麝香三錢

白姜香一兩半

右為末姜汁煮麵糊丸如梧桐子大每三十九姜湯下

控涎丹濟生志治諸癰久不愈者頑涎結聚變生諸症並

宜治之

全蠍二錢

鐵粉二錢

甘遂二錢

半夏

生川烏去皮

姜三味

汁浸一夕各半兩

右為末姜汁打糊丸如棗豆大硃砂為衣每服十五丸

食後姜湯下忌甘草

遂心丹 治風疾癩癰婦人心風血邪

甘遂一錢

不銕者

湯下半午之分各一服止五十九

驚氣丸和劑方治心受風邪涎湖昏塞牙關緊閉醒則精

神若痴及驚憂積氣並皆治之

紫蘇子二兩

附子去皮臍

天麻去苗

橘紅二兩

白姜香

麻黃去根節

南木香一兩

朱砂研一錢

南星浸一夕

浸薄切姜汁

白花蛇酒浸炙熟去

乾蝎去針尾毒

右為末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每

服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒化下亦可

○廣按癰症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方

皆用附子何也蓋癰乃痰痰結於心腎之間每遇大動則發非附子熱性走而不守而能流通結滯開散頑痰可乎此從治之法乃劫劑也不得已而用之亦猶中風之證本風大陽邪而用烏附類也丹溪前條云癰症尋火尋痰分多分少則此三方只宜施之於肥白多痰之人用諸藥而不効者若夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛痰丸 治諸風癰暗風

防風 天麻

僵蚕炒去

白附子煨

全蝎上土炒 木香各半兩 硃砂另為衣

猪牙皂角炒一兩

白礬各半兩

半夏湯泡七次碾馬末秤六兩分作二分一分

南星三兩剉一半化白礬水

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十九食遠臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

○廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之當有

不効者 ○已上數方溫脾化痰之劑

鎮心丹 治諸癰

好辰砂不拘多少

右為細末猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟取出丸如梧
桐子大每服一丸食後臨卧人參湯下
參砂丸 治風癩

人參

蛤粉

硃砂各等分

右三味為細末猪心血為丸如梧桐子大每服二十九
食遠金錢薄荷湯下

歸神丹

治癩癩諸疾驚悸神不守舍

顆塊硃砂

二兩猪心酒蒸

金箔二十片

白茯苓

酸棗仁

羅參

當歸各二兩 銀箔二十片

琥珀

遠志姜製

龍齒各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸麥

門冬湯下炒酸棗仁湯亦可

寧神丹

清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荆芥

僵蚕炒

獨活

遠志去心

犀角

麥門冬去心

酸棗仁炒

辰砂各五錢

半夏

南星

石膏各一兩 甘草炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃各三錢

珍珠三錢

生朮

黃連各五錢

金箔三十片

右為末酒糊丸每服五十九白湯下

牛黃清心丸和劑方治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛

煩少睡常發狂癲言語錯亂見中風

六珍丹三因方治風癇卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊

斗猪呼犬吠腑臟相引氣爭掣繼吐沫流涎久而方醒

通明雄黃 葉子雄黃 未鑽真珠各一兩

丹砂半兩 水銀一兩半 黑鉛一兩熬成層

右為末研令極細蜜和杵二三萬下如梧桐子大每服

五九姜棗湯下

龍腦安神丸拔粹方治男子婦人五種癲癩無間遠年近

日發作無時

茯苓三兩 人參 地骨皮 甘草各四兩

麥門冬去心二兩 龍腦別研 射香各五錢 牛黃五錢

硃砂 牙硝各三錢 桑白皮 明犀末一兩

金箔十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫

水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強目進

三服

朱砂安神丸拔粹方治心煩懊懷心亂怔忡胸中氣亂心

下痞悶食入反吐出

朱砂 四錢 研黃連 五錢 生甘草 二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十九唾津送下

虎睛丸 揚氏藏方 治瀉疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作

譫語

犀角屑一兩 虎睛一對 微炒 大黃一兩 梔子仁半兩

遠志去心

右為末煉蜜丸如菉豆大每服二十九溫酒食後送下

滾痰丸 治膈熱太甚作癩 見痰類

龍會丸 治肝火太甚作癩 見脇痛

○已上數方清心降火之劑

古方三癩丸 治小兒百二十種驚癩

荊芥穗三兩 白礬一兩半 生半枯

右為末麵糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十九如

慢驚用來復丹急驚三癩丸食癩醒脾丸可也

本事人參散 治小兒慢脾風神昏痰盛

人參半兩 員白大南星一兩切片以生薑汁并漿水各半陰滿煮黃性燥

右為末每服一錢水一盞薑三片冬瓜仁搗細少許同

煎取半盞作兩三次灌下

來復丹 見中暑

醒脾丸 見

顛狂 三十九

丹溪心法

○顛屬陰狂屬陽顛多喜而狂多怒脉虛者可治實則死
大率多因痰結於心胃間以溫當鎮心神開痰結亦有中邪
而成此疾者則以治邪法治之原病式所論太精蓋為世
所謂重陰者顛重陽者狂是也大槩是熱 顛者神不守
舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經
蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若顛哭呻吟
為邪所憑非狂也燒蚕矢酒水下方寸匕 卒狂言鬼語

針大拇指甲下即止 風顛引脇痛或則耳鳴用天門冬

去心日乾作末酒服方寸匕 顛疾者治之入身自安宜

助心氣之藥 陽虛陰實則顛陰虛陽實則狂病宜大吐

下則除之

入方 治顛風

麻仁 四升

右以水六升猛火煮人牙澄去滓煎取七合旦空心服
或發或不發或多言語勿恠之但人摩手足須定凡進

三劑愈

又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參不以多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸前薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要白顛癇之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂又

日乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作癲狂狂言如有所見

甘遂去心

紫大戟去皮 白芥子真者各等分

右為末者麵糊丸如梧桐子大晒乾臨卧淡姜湯或熟水下三十九以下利去痰飲為愈

追風祛痰丸 治痰迷心竅顛狂妄語

見癇類

葉氏清心圓簡易方 治心受邪熱精神恍惚狂言呼叫

不寧

人參

錫稍

鬱金

生地黄

天麻

天南星

為末入黃牛胆內令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九人參

湯下

龍星丹

治胃膈停痰蓄熱顛狂詭叫 見中風類

痰痰丸

治痰熱攻心顛狂唱哭 方見痰類

○已上數方下痰寧志之劑

牛黃清心丸 治心氣不定神志不定驚悸怔忡虛煩少

睡常發狂癩言語錯亂 見中風

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂語精神不爽

腦子研 牛黃研 朱砂研 鉛 大黃生

右研為末每服二錢原生姜棗米調下

葉氏雄朱丸 簡湯方 治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過

多氣結不散積成痰涎留在心包痰塞心竅狂言妄語

叫呼奔走

顆塊硃砂半 白附子一錢 雄黃明淨者

右為細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂

為衣每服三粒用人參薑湯煎湯下常服一粒能安魂

定魄補心益氣

朱砂安神丸 治症同前

龍腦安神丸 治症同前 此丸癩類

牛黃膏 聖惠方 治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃半 硃砂 鬱金各三 腦子

甘草各一 牡丹皮三

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸新水化下

寧志膏 大全良方 治婦人因血過多心神不安言語不

常不得睡卧

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯苓

琥珀各半

滴乳香研

右為末和勻每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下

一方無茯苓琥珀蜜丸如神于大薄荷湯化下一丸

茯神散 大全良方 治婦人心虛與鬼交通妻有所見聞言

語雜亂

茯神半兩

茯苓

人參

石菖蒲各二

赤小豆半兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

驚悸怔忡

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸有時以朱砂安神丸痰迷心膈者

痰藥皆可定志九加琥珀鬱金 怔忡者血虛怔忡無時

血少者多 有思慮便動屬虛 時作時止者痰因火動

瘦人多是血少 肥人屬痰 尋常者多是痰 真覺

心跳者是血少四物朱砂安神之類 假如病因驚而得

驚則神出舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附錄曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有快快之狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已

附脉理

脉訣舉要曰心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子 濟生方 治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 去皮 半夏 湯洗 茯神 去木 麥門冬 去心

橘皮 去白各一兩 沉香 不見火 苴草 枳榔 各五錢

右咬咀每服八錢生姜五片煎至八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯訟痰散驚

半夏 二兩 白茯苓 厚朴 各一兩 茯神

紫蘇 各一兩 遠志 炒 甘草 炙半兩

右每服四錢生姜五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

本草綱目卷之二十一 心法附錄卷之二 一百四十一

葉氏育神散 簡易方 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐

便白濁

赤石脂 別研細

白茯苓 甘草

遠志 去心 乾姜炮

當歸酒洗

龍骨 易研如粉

紫苑茸 桂心 去皮

白茯苓 去木 防風

人參 去芦 赤芍藥

白木 各一兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分食後

溫服

龍齒湯 簡易方 理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如墮

地小便或赤或濁

官桂 一兩

半夏 二兩

人參 去芦

白茯苓 去皮

枳殼 去穰炒 甘草 炙

當歸

龍齒 研

桔梗

遠志 去心 茯苓 去木

黃芪 炙

右為末每服二錢水一鐘姜三片棗一枚粳米百粒煎

六分溫服

養心湯 治夏秋思慮傷心驚悸不寧

黃芪 炙

白茯苓

茯苓

半夏麵

當歸

川芎 各半兩

甘草 炙 四錢

遠志 去心 姜汁炒

辣桂

柏子仁

五味子

酸棗仁

人參各二錢半

右每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎服 治停水怔忡加檳榔赤茯苓

加味定志丸 治痰迷心膈驚悸怔忡

遠志二兩 人參一兩 菖蒲二兩 白茯苓三兩

琥珀 鬱金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服二十九米湯下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯 見補損

朱砂安神丸 治血虛心煩懊惱驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂五錢水飛過另研 黃連酒洗六錢 甘草炙二錢

生地黄半錢 當歸一錢

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五十九津下

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少

睡夢寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍 並見補類

真珠丹 治肝經因虛內發風邪則魂散不守時或驚悸怔忡

柏子仁

人參

酸棗仁各一兩

熟地黄

當歸各一兩

犀角

茯神

沉香

龍齒各半

真珠母三錢

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十九金

錢薄荷湯下

益榮湯清生方治思慮過度耗傷心血致心不寧怔忡恍

惚夜多夢寐小便赤白濁

當歸去芦酒浸

黃芪去芦

小草

酸棗仁去殼炒

柏子仁炒

麥門冬去心

茯神去木

白芍藥

紫石英各一兩研

木香不見人參

耳草去殼

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分服

○已上數方補血安神劑

健忘 四十一

丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏和劑方治心神恍惚一時健忘 見補損

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志

菖蒲各二兩

人參一兩

白茯苓三兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十九米湯下

壽星丸和劑方 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚

健忘妄言如有所見

天南星一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅去炭以酒五升須坑內候酒盡下南星在坑內以盆覆坑周回用灰排定勿令走氣次日取出為末

朱砂另研

琥珀另研

右用生姜汁麵糊為丸如梧桐子大每服二十九加至五十丸煎石菖蒲人參湯下

歸脾湯濟生方 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯苓去木

黃耆去芦

龍眼肉

酸棗仁去殼

人參各一兩

木香半兩

甘草後二錢

右咬咀每服四錢漿水一鍾姜五片棗一枚煎七分溫服

朱萑丸百一選方

治心神不定事多健忘

茯苓去皮 一兩 沉香半兩

右為細末煉蜜丸如小豆大每服二十九人參湯下食後服

二丹丸 治健忘養神定志和血肉以安神外華腠理

方見中風

人參遠志丸 聖惠方 治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬去心 白茯苓 菖蒲各七 人參

遠志去心 酸棗仁 黃芪各半 桔梗

丹砂 官桂去皮各二錢半

右為末蜜丸如豆大每服二十九至三十九米湯下

附因痛咽瘡

纏喉風喉痺

四十二

升溪心法

○喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 一方射干

逆流水吐之 又方李實根皮一片嚙口內更用李實根

研水敷項上一週調用新菜園中者 纏喉風屬痰熱戴云謂其

咽喉裏外皆腫者是也用桐油以鷄翎探吐 又法用灯

油脚探吐 又用遠志去心為末水調傅項上一遭立効

亦可吐 咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制

客於咽喉也用人參荆芥蜜炙黃柏 虛火用人參竹瀝

血虛四物加竹瀝 實熱者黃連荆芥薄荷硝蜜姜汁

調噙化 治喉痛用倒滴刺根淨洗入些少好酒同研滴

入喉中痛立止 喉痺風熱痰先以千緡湯後以四物加

黃柏知母養陰則火降 又方猪牙皂角為末和霜梅噙

又方木鱉子用鹽酒水浸以人噙一丸 又方茜草一兩

卷五 三百五十五

作一服降血中之火 又方煇硝米麩枯礬半錢明砂一錢為末杜牛膝搗汁調點喉閉或有中垂一絲結成小血珠垂在咽喉中用杜牛膝根即鼓樓草直而獨條者搗碎用好米醋些小和研取汁三五滴滴在鼻中即破 喉痛必用荊芥陰虛火炎上必用玄參 又喉痺陳久白梅入青鹽令化噙梅於口中

入方

雄黃解毒丸 治纏喉急喉風雙鵝腫痛湯藥不下

雄黃二兩 巴豆去油十箇 鬱金一錢

右為末醋糊丸如菉豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即

避大効如口禁以物幹開灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱夜熱 乾硬塞

桔梗二錢 粉草 錢 紫河車四錢 香附三錢

百藥煎半錢

右為末傳口內

又方 喉痛

鵬砂 膽礬 白殭蚕 陳霜梅

右為末和噙

附諸方

奪命散 秘方治急喉風

白礬枯

姜香直者炒鵬砂

皂角末

右等分為末少許吹入喉中痰出瘥

如聖散三因方

治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊

急不省人事或時氣纏喉風並用

雄黃細研

白礬枯

藜蘆厚者去皮心不可生用按粹方言生用

猪牙皂角

去皮炙黃等分

右為末用一字插入鼻內吐痰為愈

治咽喉下

閉經驗方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上却以此紙作筒燃子點灯吹滅以煙薰入鼻中一

霎時口鼻涎流牙關開公天

治走馬咽喉痺張子和方

右用巴豆去皮以綿子似裹隨左右塞於鼻中透如右左俱有者用二枚塞左右鼻中

○愚按已上二方皆用巴豆蓋巴豆乃斬關奪門之將

熱則流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也

吹喉散

治咽喉腫痛急慢喉閉懸壺乳我噤物不下

訶子一兩醋浸一宿去核曬乾

黃芩酒浸一宿曬乾膽礬一錢

明礬一錢

牛蒡子

甘草生

薄荷各五錢

一方有百藥煎

右為末先用老生姜擦舌上每用藥一錢若管吹入喉
中吐出涎痰便用熟茶喫下再吹第二次便用熟粥三
次再吹用熟茶或熟粥兼熟食之加朴硝末少許如口
舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎為妙

奪命丹 秘方 治咽喉一切腫毒木舌雙乳鵝喉痺等証

紫荷車

蜜陀僧 各半 砂仁

管仲

姜蚕 直者

烏魚骨

茯苓 鎔

射香 少許

右為細末麵糊為丸如彈子大陰乾用
一時頻食一丸作二服神効

奪命節頭散 聖惠方 治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得通

欲死之狀

膽礬 四錢

草烏 四錢

碌礬 六錢

雄黃 一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以大
黃甘草等分俱為末每服三錢水一鍾半煎至一鍾
去滓化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白
礬二錢

治咽喉腫痛 秘方

山豆根

射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺 秘方

喉痺為急病

須臾命不通

急研新艾水

入口便和同

臘肉無新艾

蛇床瓶內燒

其烟纔入口

此病一時消

一方 治喉痺

青黛五分

猪牙皂角

去皮夜五錢

膽礬

熟者一錢半

右為細末醋薄糊為丸如櫻桃大每用一丸以熟絹裹

在筋頭上用好醋潤透將藥點在口內喉唇上咬着筋

其延如水即解後服防風通聖散

口寶散

僵蚕十箇直者

猪牙皂角

一錢去皮

全蝎

十箇直者全者去毒

硼砂

雄黃

明礬

膽礬

右為細末每用一字入喉中即愈

碧雪散 治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰

二錢

硼砂

一錢

右研為細末用鴉翎管吹入喉中立效

噲花三黃丸 秘方治咽喉痛大效

山豆根

一兩

硼砂

二錢

龍腦

少許

射香

少許

右為末用青魚膽為丸如菉豆大每服三五丸噲化津

點下

碧玉丸 御藥院方治心肺精熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿

不下或生瘡癬重者木舌並宜服之

青黛

盆硝

蒲黃

甘草末各

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十九丸每服一九噲化
或用乾藥末糝咽候膈內亦好

龍腦散

御樂院方

治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒

蘊滯胃膈不和故發疼痛急喉痺閉塞腫痛粥飲難嚥

鵬砂

腦子

朱砂各一分滑石細末

石膏二兩

甘草

生取末抄小半錢重一字

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾搽喉津亦得

龍腦破毒散 御樂院方 治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝四錢

白殭蚕

微炒去嘴為末八錢

甘草

生末

青黛八錢

馬勃末三錢

蒲黃半兩

腦子

一錢

麝香一錢

右同研為細末用蘆合子收如有病證每服用藥一錢

用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血

便以愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半

錢或以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五

服亦如前法用並不計時候

其如湯活入方治少陰咽痛

桔梗

甘草各等

候

公法付余卷下

二十四

戊

三百天

口吹咀每服五錢水一鍾半煎至八分通日服

桔梗湯御藥院方 治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗炒三錢 半夏湯浸七遍切二錢半

人參 去苦頭

甘草 錢半

右吹咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後

利膈湯本事方 治脾胃有熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉

荆芥穗

防風

桔梗

人參

牛旁子爛

甘草略

右為末每服三錢沸湯點服如咽痛早瘡甚者加姜蚕

一兩

通氣湯應驗方 治喉痺疼 漏閉塞不通水漿不下痰涎壅

盛

牽牛 頭末一兩 半生半熟

鼠粘子 二錢 防風 一錢 七分

枳殼 分一錢 炒 甘草 半生一分

右為細末每服三錢沸湯點服

甘露內消丸 應驗方 治咽喉腫痛不利咽乾癢上焦壅滯

口舌生瘡

薄荷葉 一兩 川芎 三錢

桔梗 去苦頭 三錢 甘草 一錢

人參

柯子 各半錢

右為細末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣每服一九

噲化下無時

上清連翹散精義治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利
虛熱不寧

連翹

山梔子

甘草

防風各二錢

右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後

玉鑰匙大成治風熱喉閉及纏喉風

煇硝一錢

鵬砂半錢

腦子少許

白僵蚕一厘

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散端效方治咽喉瘡腫閉塞不通

硼砂

白僵蚕

百藥煎各三錢

山豆根

盆硝

薄荷

紫荷車各半錢青黛二錢

川芎三錢

右為細末大人每服半錢小兒一字次摻咽中或水調

服

三黃丸大成治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈燥煩

小便赤澀大便秘結並宜服之見火類

加味三黃丸秘方

大黃

黃芩

黃連各二兩半

硼砂二兩

黃藥子

白藥子各一兩半山豆根

黃柏

苦參各一兩

京墨三錢

麝香少許

片腦一錢

侯單

心法附錄卷之十

共

二百半寸

冬加知母

右為末猪膽調攤甑內蒸二次後入片麝胡為丸豆大
禽化

荆黃湯大成治心臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之證

多是風熱壅然後成之非實熱不可服 見風熱

佛手散 應驗 力治咽喉腫痛生瘡風熱喉痺腫塞

薄荷二兩 盆硝一兩 甘草七錢 桔梗五錢

蒲黃五錢 青黛三錢

右為細末 每用少許乾擦又用竹管吹咽喉內禽化下

時時用

絳雪散 大成治咽喉腫痛藥物悶及口舌生瘡

龍腦半錢 鵬砂三錢 朱砂三錢 馬牙硝半錢

寒水石二兩 煅熟

右研勻每用一字搽於舌上津熱之

入參清肺散 御藥院方治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛

燕物妨悶宜服此藥

連翹三錢 黃芩 川大黃 薄荷各一

人參 甘草 枳子 盆硝各一

白附子七分 黃連半錢

右用水一鍾半煎至一鍾去滓溫服食後

牛蒡子湯大成治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有如肉腐

牛蒡子二錢玄參

升麻

桔梗去苦

犀角

黃芩

木通去皮

甘草略

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓溫服食後

涼膈散

大成

治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利

咽喉煩燥多渴腸胃秘澀小便不利一切風熱並皆治

之

方身溫熱

大青湯端效治咽喉腫口舌爛瘡惡口瘡

大青葉

升麻

大黃略二

生地黄切焙三錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食後微利止

漱口地黄散

御藥治脾肺風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞

不通或生舌脹

黃芩四錢

甘草一分

荆芥穗

薄荷葉半錢

右吹咀用水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐不拘時

一方治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞

下或動大便解或用醱醋同研取汁禽引出涎更妙又

名野苳花

灸累年喉痺舉發秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小壯

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角

葉許三稜針針之 針合谷二穴在虎口針五分

針尺澤二穴在臂中橫紋出血妙

四物湯 見補指

千縉湯 見痰類

○廣按經脈風痰痺之證其人腸胃素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房勞不節而發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房

室不節是腎火動也火動痰上而為痰熱燔灼壅塞於咽嗑之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可謂危且急矣治療之法急則治標緩則治本治標用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛已上方劑其於治標已詳悉矣其於治本尤缺畧也諸方出証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾肺火而未云降肝腎火予雖不敏贅以管見如挾痰加以瓜蒌半夏或千縉湯之類如挾肝火加以柴胡黃連或小柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃黃柏或四物湯加知母黃柏之類未知賢哲以為何如又

常論之胃肝腎三經之火各有所因而生富貴之家
醇酒厚味多生胃火婦人隱憂不發多生肝火男子
一勞勞致虛多生腎火人之五臟六腑皆有火不如此
三經之火常變見而為病之多也

