

〔金〕 鑄洪 編

傷寒心要

中國醫學大成續集

傷寒心要提要

舊題都梁鍾洪編。始末未詳。大旨敷演劉完素之說。所列之方。凡十有八。又有病後四方。與常德傷寒心鏡。皆爲後人哀輯。附入河間六書之末者。茲撮拾殘篇。備供參考。

附河間傷寒心要

都梁 錕 洪 編

新安 吳勉學 校

傷寒心要論

夫傷寒者。前三日在表。法當汗。可用雙解散。連進數服必愈。若不解者。病已傳變。後三日在裡。法當下。殊不知下之太早。則表乘虛入裡。遂成結胸虛痞。與膿斑疹發黃之証。輕者必危。危者必死。但當以平和之藥。宣散其表。和解其裡。病勢或有汗而未愈。或無汗而愈。當用二小柴胡涼膈天水三藥合

而服之。

病若半在表半在裡。法亦當和解。三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者。則當微下。四大柴胡合解毒湯主之。熱勢未退。又以大柴胡合三一承氣下之。兩除表裏之熱。病至七八日。裏證已甚。表熱漸微。脉雖浮數。則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶。或喘或嘔。陽脉緊甚者。七可用瓜蒌散涌之。

汗吐下三法之後。別無異証者。涼膈散調之。

病熱已去。微熱者。以益元散服之。無令再病。此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗。脈浮緩者。雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏。十一白虎湯和解之。

病在裏。脈沉細者。無問風寒暑濕。或表裏証俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痛滿。譫語煩躁。畜熱內盛。但是脈沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。解以白虎湯。直格云。夏至前爲濕。夏至後爲暑。是以至後不

用白虎。宜乎局方云。立秋後不用白虎。子和云。若有白虎証亦不用乎。却用詳審之耳。

白虎解後。以五苓合天水調之。多進數服。無妨。

或腹脹滿。脈沉者。

亦當承氣合解毒微下之。

或發汗之後。熱不解。脈尚浮者。

十六

白虎加蒼朮再

解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此証。以致身冷。脈微。昏惰將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一輩庸醫。妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此証。乃陰耗陽竭。陰氣極弱。謂之耗陽。厥極深。謂之竭。畜熱怫鬱。將欲絕者。當此之証。寒劑熱劑。俱不可投。但進涼膈解毒。十七以養陰退陽。宣散畜熱。脈氣漸生。得大汗而愈。有無

汗氣和而愈者。

未愈却解毒合承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽洗滌臟腑。則其他別証自不生矣。

有大下之後熱不退。再三下之熱愈盛。若下之不愈。脈微氣虛力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。則邪熱極盛。陰氣極衰。脈自斷絕。必不可救。似此之証。是下之亦死。不下亦死。醫者到此活人殺人一彈指間。其不至手足失措者幾希矣。直格云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解之。又按餘論云。傷寒下後。自汗虛熱不已。白虎加蒼朮人參。一服如

神。汗止身涼。此通仙之法也。如此則汗下之後。熱不退。不問有汗無汗。宜白虎加蒼朮解之。又加人參亦妙。仍服涼膈解毒調之。

經云。三下而熱不退者。即死。後人有四五次下。以十數行而生者。此乃誤中耳。活者未一二死。者千百。後學切不可爲法。但當依前用解毒合涼膈調之。使陽熱徐退。陰脈漸生。庶不失人命。

若傷飲不散。成結胸之証。臨時擇用。大小陷胸湯丸累下之。脈浮者不可下。是表証未出。小柴胡合小陷胸湯。二十一。投之。脈雖浮而熱大極者。二十二。承氣徐徐踈利之。

或有留飲過度。濕熱内生。自利不止。其熱未退。二十三

解毒湯治之。

陽毒生斑。二十四涼膈加當歸。

佛鬱熱盛。在表燥而無汗。濕熱在裡。不能發於外。相

搏遂成發黃。二十五茵陳湯調五苓散。甚者二十六茵陳

合承氣下之。

煩心不得臥。二十七梔子湯。

悞下太早。遂成結胸。虛痞。二十八涼膈加枳殼桔梗。剛

柔二症。譫語發狂。踰垣赴井。皆陽熱極盛者。二十九承

氣合解毒下之。

汗下之後。煩渴飲水。則三十涼膈。減桂五苓。甘露益元。選而用之。小便不通。五苓泄之。大便閉結。承氣下之。更有外證。加減通聖散。方內隨證用藥。

婦人證治皆然。惟孕婦三四月并七八月不用硝。其餘月分用之無妨。

小兒減劑服之。

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者。其慎寶之。

第一雙解散

防風通聖散

防風

去蘆

川芎

當歸

焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

半兩

石膏

黃芩

去腐

桔梗

一兩

甘草

二兩

滑石 三兩

荆芥

白朮

梔子

二錢半

右爲散。每服三錢。水一盞。薑三片。煎六分。溫服。大黃芒硝麻黃三味對証。旋入自利。去大黃芒硝。自汗去麻黃。

天水散

益元

六一

滑石

六兩

甘草

一兩

右爲末。每服三錢。溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。

傷寒傷風發汗。葱白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四五錢。并三服。解利爲度。加薄荷尤妙。
通聖合益元

右七兩和勻。每服三錢。水一盞半。葱白五寸。豆豉五十粒。姜三片。煎一盞。溫服。

第二 小柴胡涼膈天水合服。

小柴胡湯

北茈胡三兩 黃芩

人參 半夏

生薑 甘草

大棗 一兩

右爲散。每服五錢。

涼膈散

連翹 二兩 梔子

大黃

薄荷

黃芩 一兩 甘草

芒硝

右為散。每服三錢。水一盞。煎七分。入蜜少許。竹葉五片。

第三 涼膈。合小茈胡。

第四 大柴胡。合黃連解毒湯。

大柴胡湯

柴胡 去苗

大黃 半兩

黃芩

白芍藥 一分

半夏 泡七次 二錢

枳實 生 三錢

右爲散。分三服。水一盞半。生姜二片。大棗一枚煎半。服。溫服。

黃連解毒湯

黃連

黃蘗

黃芩

梔子 等分

右爲散。每服。下兩。水一盞。煎五分。溫服。

第五 大柴胡合三一承氣湯。

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

各半兩

甘草 一兩

右剉。每服二錢半。水一六。煎六分。入硝。

再煎一二沸。

第六承氣合解毒湯。

第七瓜蒂散。

瓜蒂

赤小豆

等分

右爲末。豆豉湯調下一錢。未吐再服。

第八涼膈散。

第九益元散。

風

第十雙解散。

第十一白虎湯。

知母 兩半 甘草 一兩 粳米 一合 石膏 四兩

右剉。每服五錢。水一觔。煎六分。溫服。

第十二 承氣合解毒湯

暑

第十三 白虎湯

第十四 五苓散合天水散。

五苓散

猪苓 伏苓三錢 去皮 官桂 一分 澤瀉 一兩

白朮 一錢 活人書三分 宣明論半錢

右細末。

第十五 承氣合解毒湯。

第十六 白虎湯加蒼朮。

第十七 涼膈合解毒湯。

第十八 解毒合承氣湯。

第十九 解毒涼膈天水合。

結胸

第二十 大小陷胸湯丸。

大陷胸湯

大黃

芒硝 三錢 甘遂 三字七

右剉四錢水一觔煎大黃六分內消再煎一二沸。

內甘遂。溫服。未利再與。

小陷胸湯

半夏

四錢

生姜切

黃連

二錢

栝婁實

半箇

右剉。水三盞。煎栝婁至一盞半。內藥。煎至一盞。分作

兩服。

大陷胸丸

大黃

半兩

葶藶

二錢

芒硝

一錢

杏仁

十二枚

去皮尖
炒變色

右大黃爲末。研葶藶杏仁爲膏。圓如彈子。大甘之

末三字。蜜半匙。水一觔。煎半觔。溫服。一丸。一宿乃

下未利再與。

第二十一 小茈胡合小陷胸湯。

第二十二 承氣湯。

大黃

綿紋者

芒硝

芒硝有芒頭者

厚朴

去粗皮

枳實

各半兩

右剉如麻豆大。分一半用水一碗半。生姜三片。煎至六分。納硝煎一二沸。絞去滓。熱極。

第二十三 解毒湯。

發斑

第二十四 涼膈散加當歸。

發黃

第二十五茵陳湯調五苓散。

茵陳湯

茵陳一兩 大黃半兩 梔子十

右剉水二盞煎一盞溫服利爲度。

第二十六茵陳合承氣。

煩心不睡

第二十七梔子豉湯。

梔子七箇 豆豉二合

右水二盞先煮梔子盞半內豉煮半盞。

第二十八五苓空腸煎涼膈加桔梗枳殼。

剛柔二症

第二十九 承氣合解毒湯。

汗後煩渴

第三十 涼膈減桂 五苓 甘露 益元

甘露飲

茯苓

澤瀉

甘草

石膏

寒水石二兩 白朮

桂枝

猪苓半兩

滑石四兩

右爲末。每服三錢。湯調。或新汲水。姜湯充妙。

右共十八方。如無大承氣。係第五三一承氣代之。

亦妙。通三十九件藥味。調理傷寒。曲盡其妙。百發百中。後之學者。詳辨脈證。審而用之。起沉痾於指掌。策竒功以活人。方知其妙也。

新增病後四方

小半夏湯。治汗下後嘔吐不已。

半夏

五兩

赤茯苓

三兩

右剉。每服半兩。水二盞。煎至一盞。取姜汁更煎。一二沸。

五味子湯。治汗下後氣閉咳嗽。

五味子

半兩

麥門冬

人參

杏仁

陳皮

生姜

一錢

棗子

二枚

右剉每服二錢水二椀煎一椀作二服。

大橘皮湯治汗後胃虛。

陳皮

甘草

一兩

人參

二兩

右剉每五錢水盞半姜二片煎至一盞溫服。

赤茯苓湯治胸膈滿悶頭痛已得汗者。

陳皮

甘草

人參

半夏

川芎

白朮

等分

右剉每服五錢水盞半姜三片煎一盞溫服。

傷寒心要餘論

五臟六腑應五運六氣。凡病微則當其本化。甚則兼其鬼賊之化。亢則害。承乃制。微則是其本經本臟之本化。造化之化也。病甚則如金衰不能制木。木則生火。木火者皆陽也。故風火多兼化。則風熱相搏賊其金也。

臟腑之氣應乎三陰三陽。實則行乎本化之氣。瀉之衰則行其勝已之氣。瀉之是爲殺其鬼賊也。如諸陽畜熱。以涼膈合解毒服之。解散極熱。如瀉火熱。解毒調胃承氣是也。如吐法用二仙散。

如調理傷寒。白虎涼膈合服解之。

傷寒三日以裡。連進雙解。如無汗。必是傳變。待三四日之間。以小芫胡解表裏之熱。仍間服白虎涼膈。蘊熱七八日之間。欲下而表證猶在。以大承氣湯。大芫胡湯。雙行并煎。攻裏發表。最爲穩當。若是溫熱內甚。自利者。止涼膈。却進解毒。間白虎服之。或惡心乾嘔吐者。白虎大作一劑。調解毒末五錢服之。即止。大小便不通。併有腹痛不能忍者。以無灰酒煎朴硝三兩。熱服即愈。亦按從治之法也。熱中伏寒下之矣。或大承氣湯加水香瀉之尤妙。

傷寒失下。始病時。又誤服麻黃熱劑。大甚必致熱極。或有陽厥極深。身冷脈微。陽極似陰之證。庸醫以爲陰證是也。須當急救其陰。以白虎涼膈。日進三服。脈氣漸生。身體漸溫。然後以大承氣下之。夫大承氣救急之妙劑。如咽膈吐逆不利。當令熱服。開其鬱結。利而即愈也。

如傷寒汗下之後。自汗虛熱不止。於白虎湯加人參蒼朮。一服如神。汗止身涼。此法至妙。不容詳盡。如赤白痢。先服黃連阿膠丸。次服解毒湯。

傷寒瘡瘍。破傷風。與傷寒治法一同。但以雙解涼膈。

白虎承氣。臨時斟酌用之。雙解涼膈白虎瀉心。此理傷寒之妙劑。

孕婦臨月。可服益元涼胎。產後仍服。如血不盡。則以涼膈與四物合煎調理。經血甚者。大承氣合四物。乃瀉中有補也。

涼膈同四物。名玉燭散。婦人產後之妙劑。

涼膈四物合大承氣湯。名三和湯。

大承氣合四物。治婦人一切血積血聚等疾。加紅花尤妙。初生小兒。五七日有熱證不得已。只以益元散時時灌之。如小兒夜啼。用涼膈調之。肚饑臨睡服。

傷寒心要

凡瘡癰癧癰。涼膈加芒歸治之。

後記

《傷寒心要》金·鍾洪著。鍾洪，號瑞泉野叟，生卒不詳，都梁（今江蘇盱眙縣）人。

《傷寒心要》約成書於一二三四年，書僅一卷，首列傷寒心要論，次列雙解散、防風通聖散、天水散等三十方，再列新增病后四方，末則爲傷寒心要余論。是書多爲集輯劉河間學術思想而成，理論依據，方藥所用，均是宗河間之學。故其所論傷寒，大體以熱病爲主，所用方藥也多系寒涼之劑，此得河間之偏。然作爲研究傷寒火熱變證，還是有一定參考價值的。

此次校勘圈點，以新安吳勉學校勘本爲底本，參考了中華書局一九八五年出版的《叢書集成初編》中《傷寒心要》，對其錯、訛、

脫、澍，以校勘表附後校正之。

顧武軍