

景岳全書卷之六十一長集

婦人規古方

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

婦人

安胎飲一

治妊娠五七個月用數服可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草

灸

紫蘓

炙黃芩

各一錢

古用薑水煎服○一方有砂仁

安胎散二

治妊娠卒然腰痛下血

熟地

艾葉

白芍

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草

地榆

各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱

或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃

氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐
東臯曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小產此由體
弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎
多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清
和無火煎燥則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行
欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快
脾氣多用亦耗真氣况香燥之性氣血兩傷求以安胎適又
損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化
工之妙百發百效萬無一失事表而出之以爲好生君子

共知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩

各一錢

川芎

白芍藥

熟地

各八分

白朮

二錢

炙甘草

砂仁

各五分

糯米

一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

地黃當歸湯

一名內補丸○治妊娠衝任脈虛補血安胎

熟地

二兩

當歸

一兩

右每服五錢水煎服○為丸法以當歸炒為末熟地蒸搗膏

和丸桐子大每服百餘丸温酒或滾湯下○許學士曰大率
妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟
枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒
若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不
致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方當歸湯五

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參

各一二三錢

阿膠炒

甘草

炒各一錢

連根葱白

一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六

或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上搶

短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

白芍

黃芪

炙甘草

等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七

治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或

去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠 炒一兩

艾葉 數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八

治胎動腹痛

阿膠 炒

白茯苓

白朮 炒

川芎

當歸

陳皮 各一錢

甘草 炒三分

右薑棗水煎服

良方黃芪湯 九

治氣虛胎動腹痛下水

糯米 一合

黃芪 炒

川芎 各一兩

右水煎分三服

良方釣藤湯 十 治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

釣藤鈎

當歸

茯神

桑寄生

人參 各一錢
苦梗 一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方 白木散 十一

治妊娠傷寒內熱等證

白木

黃芩 炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方 三味白木湯 十二

治妊娠內熱心痛

白木 四錢

赤芍藥 三錢
黃芩 炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方 四味白木湯 十三

治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮 炒一錢

人參 五分

甘草 炒

丁香 各二分

右薑水煎服

全生白朮散 十四

治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎

腫

白朮 一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓 各半兩

右為末每服二錢米飲下○如末應佐以人參甘草

探胎飲 十五

婦人經水不來三月疑似用此驗之

川芎 不拘多少為末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血癥也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯 十六 治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈

當歸 白芍藥 炒 白朮 炒 茯苓

澤瀉 各一錢 川芎 二錢

右水煎服

益母地黃湯 十七 治妊娠跌墜腹痛下血

生地 益母草 各二錢 當歸 黃芪 炒各一錢

右薑水煎服

良方獨聖散 十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒勿令焦黑取仁為末

右用熱酒調服四五分或一錢此物有安胎導滯易產之

功實妊婦之要藥也

良方安胎寄生湯 十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生

白朮

茯苓

各五分

甘草

一錢

右水煎服

二黃散 二十

治胎漏下血或內熱脯熱或頭痛頭暈或煩躁

作渴或脇肋脹痛等證

生地
熟地

右為末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散 二一
治漏胎下血

條芩
白朮
砂仁
阿膠 各等分

右為細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按

此方若改為湯砂仁用當減半

良方續斷湯 二二
治妊娠下血尿血

當歸
生地黃 各一兩
續斷
赤芍藥 各半兩

白為末每服一錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯

治胎瀉下血或因事下血亦進食和中并治惡

阻

枳殼

炒

黃芩

炙各半兩

白朮

炒一兩

右為末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用

補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻

柴胡○若因肺熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散

二四

此方能令胎變產易○湖陽公主每產累

日不下南山道人進此方

粉草炒

商州枳殼蘇炒二兩

右為末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之

○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散二五

方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯二六

治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不

利或胎死腹中皆效

當歸

芍藥 各一錢
白木 一錢

茯苓 一錢半

橘紅 五分

鯉魚 一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半入葯加
生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中
脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯 二七

治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方
有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃苓

各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四
物○若因中氣虛弱宜兼用四君

此藥穩飲

治妊娠失調胎氣不安上疴作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘓葉

當歸

各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾

氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜

用四君芎歸

安樂散

二九

治妊娠小便澀少遂成淋瀝各日子淋甚妙

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服二錢麥冬湯

服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏梁厚味宜

用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散 三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤

洗畧炒

香附 炒

陳皮

甘草

烏藥

等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘇三葉水煎食前日

進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯

羚羊散 三一

治妊娠虛風頸項強直筋脈攣急語言蹇澁

痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角 鎊

川獨活

棗仁

五加皮

薏苡仁 炒

防風

當歸

川芎

茯苓

杏仁

去皮尖
各五分

炙甘草

木香

各一分

右加薑五片水煎服○若因用經風熱或怒火所致溲用加

味逍遙散

人參橘皮湯 三一

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲

食少進益胃和中○一名參橘散

人參

陳皮

麥門冬

白朮

各一錢

厚朴

制

白茯苓

各五分

炙甘草

三分

右加淡竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳

枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜

用異功散

竹茹湯

三三

治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹

彈子大
九

陳皮

半夏

茯苓

各錢半

生薑

一錢

水鍾半粳米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食

良方 半夏茯苓湯 三四

治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 泡炒黃

陳皮

砂仁 炒各一錢

白茯苓 二錢

甘草 炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在三九

烏附湯 三五

治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥

香附 制

白朮 土炒

陳皮 各一錢

人參

炙甘草 各八分

水鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸 三六

治妊婦腰背痛善於小產服此可免墮胎

之患○此即良方杜仲丸但彼等分用

杜仲 四兩同糯米炒去絲 川續斷 二兩酒洗

右為末山藥糊丸桐子大每服八九十九丸空心米飲下忌酒

醋惱怒

一母丸 三七 一名知母丸○治妊娠血熱頓仆胎動不安或

欲墮產

知母 炒為末

右搗棗肉為丸彈子大每服一丸人參湯嚼送或丸桐子大

每服三四十九白湯下或嚼嚥之

束胎丸 三八

懷胎七八個月恐胎氣展大難產用此扶母氣

束兒胎易產然必胎氣強盛者乃可服

條黃苓

酒炒勿太熟冬月一兩夏月半兩

白朮 三兩

陳皮 二兩

白茯苓

七錢半

右為末粥糊丸子大每服五十九白湯下

茯苓丸 三九

治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

炮

半夏

泡洗紅

橘紅

各一兩

白朮

炒

甘草

炒

枳殼 麩炒各二兩

右為末蜜丸桐子大每服五十九丸米飲下日三服○右原方
仍有葛根二兩似非所宜也用者當酌之

達生散 四十

妊娠臨月服十餘劑則易產或加砂仁枳殼如

兼別證以意增減○詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首
生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參

白朮

當歸

白芍

陳皮

紫蘇 各一錢

炙甘草 二錢

大腹皮

酒洗晒
乾三錢

水一鍾半煎服○一方無當歸白芍白朮

佛手散

四一

一名芎歸湯亦名當歸湯○治產後去血過多

煩暈不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎 二錢

當歸 三五錢

右四每用半兩水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩少氣加羊肉若不應用八珍湯○若用下胎當為末以酒調

服

錢氏生化湯 四二

此錢氏世傳治婦人者

當歸 五錢

川芎 一錢

甘草 炙五分

焦薑 三分

桃仁 十粒去皮尖雙仁

熟地 三錢

右咬咀水二鍾棗二枚煎八分溫服○一方無熟地 附加

減法○凡胎衣不下或血冷氣閉血枯氣弱等證連服生化

湯二三劑卽下或用此送益母丸一丸卽下蓋益母草行血

養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前產後皆

宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡產婦氣

虛氣脫倦怠無力加人參黃芪○一凡陽虛厥逆加附子肉

桂○一脈虛煩渴加麥冬五味○一氣壅有痰加陳皮竹瀝

○一血虛血燥便結加麻仁杏仁荏蓉○一多汗不眠加茯

神棗仁黃芪上體多汗加麻黃底下體多汗加漢防已○一

煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風反張瘈瘲者加荆芥防
風各三四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必
然脹痛加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲
食加山查陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼朮
白朮○一血積食積胃有燥糞臍腹脹痛加大黃二錢○一
產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或
有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒涼其脈浮脫
者可加附子輩諸陽分藥否則無救矣○佛手散單用當歸

三錢川芎二錢此和其變方也

會稽錢氏世傳曰嘗論產證本屬血虛陰亡陽孤氣亦俱病
如大補則氣血陡生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒
四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導
熱不可用芩連恐致宿穢凝滯寒不宜用桂附及招新血流
崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見
裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳聾脇病乃腎虛
惡露之停休用柴胡謔語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實
厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能回陽瘥因陰血之虧
豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘥以瘥治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛須從峻補去血多而大便燥
菴蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君
倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻服救產後之危
活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯

四三

治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

熟地黃

白芍藥

炒

玄胡索

炒

川芎

桃仁

紅花

香附

青皮

炒

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腹愈痛此是瘀血爲

患宜用此葯或失笑散消之○若救之反不痛此是血虛宜用四物參苓白朮○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯 四四 治分娩交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮 一握燒存性 自死龜殼 一個或占過者亦可煎灸

川芎 當歸 各一兩

右咀每用一兩水煎服良久不問生死胎自下

當歸黃芪湯 四五 方在補陣九八

治妊娠下痢腹痛

芎歸補中湯

四六

治氣血虛半產

川芎

當歸

黃芪

炙

白朮

炒

人參

芍藥

炒

杜仲

炒

艾葉

阿膠

炒

五味子

許炒各一錢

甘草

炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散

四七

臨產服之補其血順其氣或胞胎肥厚根

蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸

川芎

白芍

乳香

枳殼

南木香

血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○若胞衣既破其血已涸
或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡
再制亦有得生

人參黃芪湯 四八

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪 炒

當歸

白朮 炒

白芍 炒

艾葉 各一錢

阿膠 炒二錢

右作一劑水煎服

良方 牛膝散 四九

治胎衣不下腹中脹病急服此藥腐化而下

緩則不久

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃 各三兩

當歸

一兩半

桂心

半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢水煎服

方局

黑神散

五十

一名烏金散

靈苑方名肉桂散○治產後

惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹痛不止及治脾腎陰虛血

不守舍吐衄等證

黑豆

二兩炒

當歸

去蘆酒洗

熟地

蒲黃

白芍

甘草

炙

乾薑

炮

肉桂

各一兩

右為末每服二錢童便酒各半調服○良方黑神散有炮附
子半兩無蒲黃

簡易黑神散 五一

方在和陣二二一

治一切失血

經驗滑石散 五二

治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效

滑石 飛過一兩

白蜜

香油 各半盞

右將油蜜慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油
調於產婦臍腹上下摩之立效

難產方 五三

令產婦以自己髮稍含於口中惡心即下亦治胎衣不下

良方桂心散 五四

治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心

瓜蒌

牛膝

藜麥

各五分
或一錢

當歸

一錢或二錢

右水煎

桂香散

五五

治胎死腹中不下

桂心

三錢

射香

五分

右為末作一服酒調下

下胎小品方

五六

用麥蘖一升搗碎水二升煮一升服之即下神效○按麥蘖能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服即下

廣濟下胎方 五七

并下死胎俱效

天花粉 四兩

肉桂

牛膝

豆豉 各三兩

右咀用水七碗煎二碗半分三服每服後一時許又進一服

扶羸小品方 五八

虛弱人欲下胎宜用此

人參

粉草

川芎

肉桂

乾薑

桃仁

黃芩

蟹爪

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服

下死胎 五九

凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢而嘔腹

中不動祇覺陰冷重墜者是

用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝三

五錢再煎三五沸溫服其死胎即化水而出萬不失一○

又方單用朴硝末三錢以熱酒和熱童便調服立出或用

佛手散以酒調服亦妙

千金去胎方 六一

大麩麩 五升

漬酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其胎如
糜母無所苦千金不傳

良方 硫黃散 六一

治產後陽氣虛寒玉門不閉

硫黃

烏賊骨

五味子

右為末摻患處日三易

硫黃湯 六三

治產後玉門不斂陰戶突出

硫黃 二錢

兔絲子

吳茱萸

各二錢

蛇床子

一錢半

右研勻用水二鍾煎湯頻洗自收

良方 益母丸 六四

一名返魂丹○治婦人赤白帶惡露時下不

止及治婦人胎前產後經中諸般奇痛無所不療本草云此
草胎前無滯產後無虛故名益母

益母草 一味

一名克蔚子 一名野天麻 方梗對節生葉

艾類 大麻四五月間開紫花是白花者非

右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨爲細末煉蜜丸
如彈子大每服一九用熱酒和童便化下或隨證用湯引送
下○一方以此爲末每服二錢或酒或童便或隨證用引服
之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許
服之其效甚大○一益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃

汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色爲度入磁罐收貯每服二三匙酒便調下或於治血湯葯中加一匙服之尤妙

良方 奪命丹 六五

治瘀血入胞脹滿難下急服此葯血卽消衣

方 自下○按此方頗有迴生丹之功用下死胎必效須用當歸

附子

炮半兩

乾漆

碎之炒
煙盡

牡丹皮

各一兩

右爲細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前葯丸桐子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩

迴生丹 六六

治婦人產後諸疾污穢未淨及一切實邪疼痛

死胎瘀血衝送等證

大黃膏法

用蘓木三兩河水五碗煎至三碗去粗聽用

紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去粗聽用

黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾爲末俱聽用

大黃一斤爲末用好醋八碗熬成膏次下紅花酒蘓木湯

黑豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾爲末

同豆皮末俱入之

人參

白朮

青皮

木瓜

各三錢

當歸

川芎

元胡

蒼朮

香附 童便炒 蒲黃

赤茯苓

桃仁泥

熟地 各一兩 牛膝

三稜

山茱萸

五靈脂 地榆

甘草

薑活

陳皮

白芍 各五錢

良薑 四錢

烏藥 二兩半

木香

乳香

沒藥 各一錢

右為末用前大黃膏為丸彈子大金薄為衣不拘時隨證擇

用湯引送下一丸

斷產灸法 六七

一傳方欲絕產者灸臍下二寸三分陰動脈

中三壯 此當自臍中至骨際拆作五寸約之

千金斷產方 又六七

四物湯 一劑

芸臺子 一撮即 紅花
油菜子

水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八

斷產墮胎有驗

故蠶退紙 方一尺

右燒為末空心酒調服終身不受孕

丹溪斷子法 六九

用白麩麩一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作

三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經即不

一無不字

行終身無子矣

仲景羊肉湯 七十

治產婦腹中疴痛寒痛血氣不足虛弱甚者

及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後之寒證也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

精羯羊肉 一斤

當歸 二兩

生薑 五兩

右用水八升煮取三升加葱椒鹽温服七合日三服○若寒多者加生薑成一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方羊肉湯 七一

治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍

脇急痛

精羊肉 四兩
當歸

川芎 各半兩
生薑 一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌鷄湯 七二
治產後虛羸腹痛

當歸
白朮 炒
熟地黃
黃芪 炒

桂心 各半兩
小黃雌雞 一隻去頭足腸翅細切

右先用水七碗煮鷄至三碗每用汁一碗葯四錢煎日三服

母鷄湯 七三
治產後褥勞虛汗不止

人參
黃芪
白朮
白茯苓

麻黃根
牡蠣 煅各三錢

右用母鷄一隻去毛雜淨水六七碗同葯煮至三碗任意服之

豬腰湯 七四

治產後褥勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛

俱效

豬腰 一對

當歸

白芍葯

酒炒各一兩

右以葯二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊同晚米一合香豉一錢如葱椒鹽煮稀粥空心日服一次神效○或加入參更妙

四神散 七五

治產後血虛或瘀血腹痛

當歸 二錢

川芎

芍藥 炒各一錢
炮薑 五分

右水煎服

太巖蜜湯 七六

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地

當歸

芍藥 炒

乾薑

吳茱萸

桂心

獨活

甘草 炒

小草 各一兩

細辛 半兩

右每服半兩水煎服

良方 人參湯 七七

治產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等證

○此卽參歸湯亦名團參散

人參

當歸等分

右爲末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二
鐘煎汁八分再入藥三錢煎服

白茯苓散七八

治產後蓐勞頭目肢體疼痛寒熱如瘧

白茯苓一兩 人參

當歸

黃芪

川芎

白芍藥炒

熟地

桂心各半兩

豬腰一對

右以水三盞入豬腰并薑棗各三事煎二盞去粗入煎藥半

兩煎一盞服

良方 七珍散 七九

治產後不語

人參

石薑蒲

生地

川芎

各一兩

細辛

七錢

防風

朱砂

另研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調服

良方 趁痛散 八十

治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝

酒炒

甘草

炒

薤白

各一兩

當歸

白朮

炒

黃芪

炒

桂心

獨活

加薑各半兩

右每服半兩水煎

補腎飲 八一 治產後傷動，脬破不能小便而淋瀝

生黃絲絹 一尺剪碎

白牡丹皮根

白芨 各一錢俱為末

用水一碗同煮至絹爛如饒空心頓服服時不得作聲作聲

則不效

良方 止汗散 八二

牡蠣 煨粉半兩 小麥麩 八兩炒黃為細末

右每服三五錢用猪肉汁調服

良方 麻黃根湯 八二

治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根

人參

黃芪炒

當歸

牡蠣煨粉

甘草

右每服四五錢水煎服

三味參蘓飲 八四

治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參 一兩

蘓木 二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口

鼻黑氣起宜急用此藥加附子五錢亦有得生者

良方 黃龍湯 八五

治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產

後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘧等證○按此即小柴胡湯之去半夏也

柴胡 二錢

黃芩 炒

人參

甘草 各一錢

右用水煎服

陳氏 二母散 八六

治產後熱血上攻留於肺經欬嗽喘促

知母

貝母

人參

桃仁

杏仁 俱去皮尖

白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

猪蹄湯 八七

治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以豬蹄煮汁二碗煎葯服之○或加天花粉

又方 用豬蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲十四片炒將豬蹄洗切入水六碗同葯煎煮約至三碗加蔥薑鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下夏月不可失蓋時用葱湯洗乳為佳

良方 湧泉散 入八

下乳忌食薑椒辛辣飲食

王不留行

蘆麥

麥門冬

龍骨

各二錢

右用豬蹄汁一椀酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散 八九

治產後乳脈不行身體壯熱頭目昏痛大便澀

滯

人參

白茯苓

當歸

炙甘草

各五分

桔梗

川芎

白芷

各一錢

芍藥

七分

右水煎食後服○如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

良方 漏蘆湯

治婦人肥盛脈氣壅結乳少

漏蘆 二兩

蛇退 一條

土瓜根

右共為末酒調下三錢

括萸散 九一

治吹乳腫痛

括萸 一個

乳香 二錢

右用酒煎服○外用南星為末以溫湯調塗

滑氏補肝散 九二

治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭

暈寒熱發熱或徧身作痛經候不調

熟地

白朮

炒各一兩

棗仁

炒

獨活

各四兩

當歸

川芎

黃芪

炒

山藥

五味子

炒杵

山茱萸肉

木瓜

各半兩

右咬咀每服五錢棗水煎服