

丁香 甘草炙 三稜炮 廣茂炮 木香各一 丁皮

甘松淨 砂仁 益智仁各三 香附五 錢

右浸蒸餅糊為丸每服七十丸

香砂和中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯噫

或胸腹脹疼 藿香 砂仁各一 蒼朮二 厚朴

陳皮 半夏 茯苓 青皮 枳實 麩炒各

甘草三分 大便瀉去實青皮加麥孽山查

水二鍾姜三片煎八分食遠服

加味枳朮丸 白朮米泔浸 枳實去白麩 陳皮

半夏泡 神麩炒 麥芽炒 山查肉各一 如胃寒或

冬月加砂仁一兩 氣滯不行加木香五錢 常有

痰火又兼胸膈痞悶加黃連姜汁 茯苓各一

右末荷葉飯為丸每服五六十丸

化食養脾湯 人參 白茯苓 陳皮 半夏

神麩炒 麥芽炒 山查各一 砂仁八分 甘草三分 白朮

半錢 胸膈痞脹甚者加厚朴枳實各一

胃脘痛加草薹仁一錢 氣滯痰盛者去人參加

香附一錢 夏倍之 水三鍾姜三片煎八分食



遠服

秘方思食調中丸 脾胃久弱，飲食不消，氣滯胸

膈痞悶嘔逆痰水 白朮米泔浸 人參錢七

木香錢五 砂仁 香附 陳皮 半夏麩炒

神麩炒 麦芽炒各一兩 甘草炙四錢 右末陳米糊為

丸 梧子大每服百丸白湯下

治中湯 即理中湯加青皮陳皮

十香丸 傷飲食胸膈腹疼或氣滯積聚皆可服

甘松炒 益智仁炒 香附子各四兩 京三稜二兩

莪木二兩 青皮 陳皮各三兩 砂仁一兩 木香

甘草炒一兩 水浸蒸餅糊為丸 梧子大每服五

十丸姜湯下

枳實半夏湯 枳實炒 半夏泡各五錢 姜五片水

二鍾煎服

治心腹膨脹 多食積所致 南星姜製 半夏製

瓜蒌仁各一兩 香附童便浸 黃連姜汁炒 青蒙石

煨 蘿蔔子炒 連翹 陳皮各五錢 射香少許

右末神麩糊為丸

示人 卷一

治因麪內傷發熱頭痛作吐 白朮半錢 白芍

陳皮 蒼朮各一錢 茯苓 黃連 人參 甘草

各五分 姜三片 口渴加葛根二錢

楊氏家藏荳蔻橘紅散 溫脾胃升降陰陽和

三焦化宿食 丁香 木香各一兩 人參 白芷

仁厚朴製姜 橘紅 神麪炒 乾姜炒

半夏麪 甘草炒 藿香 白朮各五錢

每服五七錢姜三片棗一枚水煎服

紅九子 溫脾胃消寒冷食積併治冷瘧

京三稜 莪朮 陳皮去白 青皮去白 乾姜

炮胡椒各二斤 右末醋煮糊為丸梧子大以礬

紅為衣每服二十九丸食後姜湯下

消食化氣香殼丸 醒脾去積順氣化痰

青皮炒 陳皮炒 蘿蔔子炒 木香 三稜炒

蓬朮 神麪 麥芽各一兩 枳殼炒 半夏二兩

枳實炒 香附子醋炒 檳榔 山查 草菓

各一兩 陳倉米一升同巴豆二十粒

右末醋糊丸梧子大每服四五十丸漸加至

七十丸食後白湯下

青橘皮散

食過飽痞悶消食化氣醒酒

青橘皮

去白炒

葛根一兩砂仁錢五

為細末濃茶

調服

寬中丸

治胸膈痞悶停滯飲食山查肉

蒸熟為末丸服

除濕益氣湯

傷濕麩心腹滿悶肢躄沉重

枳實

炒麩

白朮

黃芩

各一兩

蘿蔔子

炒半兩

神麩

一兩紅花錢三

荷葉飯為丸菘豆大每服六十九

白湯下

二黃丸

傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩

二兩

黃連

酒炒一兩

升麻

柴胡

各三錢

甘草二錢

枳實

炒五錢

餛餅糊為丸每服七十丸姜湯下

白朮和胃丸

病久不能食而臟腑或結或澹

由胃虛弱也常服則和中理氣消痰去濕熱飲

食

厚朴

炒半兩

半夏

各一兩

白朮

一兩

陳皮

錢八

枳實

各二錢

木香

錢一

人參

錢七

甘草

錢三

右末姜汁浸蒸餅糊為丸梧子大每服五十

九白湯送下

吳梅坡冲和健脾丸 益心開胃健脾寬胸順氣
進食和中資扶三焦培植五内凡躰欠強盛者
多服大有益也慎勿以人參見疑膈氣膈食翻
胃噎食中滿者亦効

白朮炒四兩

白豆蔻一兩拌白朮

人參三兩

陳皮三兩

同參飯

白茯苓二兩

山查肉二兩

石斛鹽水洗同茯苓

熟甘草綿紙上炒焦黃

色七錢

右各自為末

麥芽粉打

糊為丸每服五十丸白湯下

家傳三因冲和丸

養心扶脾疎肝開胃暢達三

焦通貫五臟贊坎離有升降之能和表裏無雍

塞之患利用一元斡旋五内家傳四世之秘也

歌曰 醫家綱領在三因 多少鑽研那得真

發出肺肝玄妙處 信乎一决勝千金 人參

石斛 白苳仁 廣陳皮 各為末 山查肉 末二

已上五味合研勻碗盛碟蓋飯上蒸熟取起待

冷方開以乃調胃補心接丹由之氣也

遠志 甘草湯泡去心取末一兩 山梔 炒焦色取末二兩 香附 童便浸

淨醋炒 未二兩 以三味共研勻如_レ上法蒸熟勿令洩氣
乃透暢心胞達_レ膈間之滯氣也

海石_{末二兩} 蒼木_{米泔浸洗去浮皮炒黃取末二兩} 以二味如_レ上
法同蒸乃消痰飲而通_レ內外之用也

川芎_{末二兩} 北柴胡_{末一兩} 青代_{末一兩} 以三味和勻
蒸如_レ上法乃踈_レ肝鬱調_レ達者也

夫心為脾母補_レ心則土有力肝為脾賊平_レ賊則
土乃和故曰安穀則昌用_レ穀孽取粉打糊為丸
梧子大晒乾用益元散五錢水飛過神砂五錢

為衣食後少頃白湯下量人大小輕重丸數服
之常用_{五十九丸}胃開氣順少覺舒泰則減數服
之可與補中益氣湯六君子湯相兼服以丸不
犯炎涼又服無妨平康為度不拘內外諸病服
其該科之藥而兼以丸每日一服則胃和脾壯
行諸藥以健成功以秘妙之囑慎毋忽焉

參苓造化糕 人參_{二兩虛者用四兩} 白茯苓_{四兩} 乾山藥
芡實_{蓮肉心去皮炒} 苡仁_炒 白扁豆_{炒各半斤} 粳米
打白炒白糖霜_{二斤} 右為末磁瓶收貯每用四
五升

五錢白湯隨加白糖霜調服一日三四次以平
調脾胃又服精神倍加

○吐法

瓜蒂散 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者
死 瓜蒂 赤小豆 為末每服一錢七溫漿
水調下取吐為度設兩手脉不絕無者不可
使用以藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸
中窒塞不通以指探去之如不得吐者以物
探吐之得吐則已如是食不得去者方用以

藥吐之

○攻下之劑

備急丸 療心腹諸疾卒百病 大黃 乾姜

巴豆 去皮各

右擇精品者為末蜜和搗千杵

丸如小豆大每服三丸木小量之若中惡客

忤心腹脹滿卒痛如錐力刺痛氣急口噤尸

厥卒死者以酒或湯服之口噤以物攪開灌

之藥一下咽頃更差如未差更與三丸以腹

中鳴轉即吐下便愈若口噤須折齒灌之忌

蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生又名獨行丸乃急劑也

神妙列仙散 飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強

跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔

吐瀉痢及酒食停久或一切積聚黃疸熱鼓並

皆治之 沉香 木香 茴香 炒 檳榔 各一

扁蓄 錢三 大黃 一微炒 麥芽 一兩 瞿麥 錢五

右末每服三五錢五更熱酒調下能飲者多

飲二三杯不妨仰面卧手叉胸前至天明取

下大便如魚腦小便如血効忌生冷硬物葷腥
惟啖米粥

木香和中丸 和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除

膈熱進飲食 木香 黃芩 青蒙石 枳殼

檳榔 青皮 橘紅 各五錢 白滑石 二兩 沉香 二錢

大黃 一兩 黑牽牛 取頭末二兩 右末水丸梧子大

每服五十丸姜湯或茶清下

木香檳榔丸 一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶木

小便結澁不利者 木香 檳榔 青皮 去白

陳皮白去枳殼 莪木煨 黃連 黃柏各一 香附

大黃炒 黑丑取頭末各三兩 右末水丸梧子大每服

亦十九生薑湯下以利為度

枳實導滯丸 傷濕熱之物不得施化痞悶不安

茯苓 黃芩 白朮 黃連各三錢 澤瀉二錢

大黃一兩 枳實炒 神麴各五錢 右蒸餅糊丸菴豆

大每服七十丸

三黃枳朮丸 傷食肉濕麵辛辣厚味之物填塞

悶亂 黃芩二兩 黃連 大黃煨 神麴炒 白朮

陳皮各一兩 枳實炒五錢 餛餅為丸服如上

海藏神應丸 一切冷物冷水及潼乳酪小腹痛

腸鳴穀不化 巴豆 杏仁 乾姜 百草霜

各五錢 木香 丁香各二錢 黃蠟一兩 先將黃蠟用

醋煮去渣將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將

蠟再上火入少油溶化入在杏仁等藥內攪勻

旋下丁香等藥研勻搓作挺子油紙裹了旋丸

每用三五丸食前米飲下

秘方化滯丸 理一切氣化一切積奪造化有通

塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痾磨之自
 消暴積乍留導之立去
 丁香去苞木香 青皮
 去橘紅 黃連各半 錢京三稜煨 莪木煨各五錢
 半夏二錢 俱為末 巴豆去壳滾湯泡過再研
 好酒煮乾用六錢 研細 烏梅肉厚者去核焙乾
 和前藥未再研入後藥 醋調畧清慢火
 熬成膏入前藥 右共和勻以麵糊為丸粟米大
 每服五七丸人盛者十九五更陳皮湯下常
 服磨積不欲瀉者津液嚥下
 停食飽悶枳殼湯下 但有所積物取本物

煎湯冷下 因食吐不止津液嚥下即止
 食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下
 赤痢甘草湯冷下 白痢乾姜湯冷下
 心痛石菖蒲湯下 小腸氣痛茴香酒下
 婦人血氣當歸湯下 若欲攻積熱姜湯下
 仍加丸數未利再服瀉不止飲冷水一口立
 止 小兒量歲數加減服 疳積米飲下
 孕婦勿服以藥得熱則行冷則止
 丹溪小胃丹 芫化好醋拌勻過一宿於瓦器上
不住手炒至黑色勿令焦

甘遂

濕麵包水浸半日洗晒乾一云水浸冬七日春秋五日或用水煮亦可

大戟

水煮一時洗晒乾各半兩 大黃 濕紙裹煨勿焦焙乾再

黃栢

兩炒三 右末以白朮膏丸蘿蔔子大臨

卧津液

吞下或白湯送下取其膈上濕痰熱

積以意消息之欬利空心服

一方加木香

栝櫚各五錢餗餅糊為丸每服七八十九

東垣觸飲枳實丸

逐飲消痰道氣清膈

枳實

炒半夏製橘紅各二兩黑丑取頭末

右末麵糊為丸每五十九食後姜湯下如所

食在膈間元元欬吐及鬱悶亂以物探吐甚者用瓜蒂散

海藏金露丸

肉傷心痞氣不升降水穀不消

大黃

兩枳實錢炒五桔梗兩黑丑二錢

右末荷葉燒飯丸每服白湯下三五十九常

服減半一方姜糊丸

傷狗肉不消心下堅硬或腹脹口乾發熱妄語水

煮蘆根汁飲之

傷魚鱠及生鮓停在胸膈不化必成癥瘕

馬鞭草搗汁飲之 飲生姜汁亦消

橄欖煎湯飲之亦佳

傷豆腐以蘿蔔煮食或用蘿蔔子煎湯飲之消

傷蟹用紫蘇生姜煎湯飲

傷瓜菓以健脾消食之劑內加射香服之立消

不能食

生生子曰不能食者由脾胃餒弱或病後而脾胃之氣未復或痰客中焦以故不思食非心下痞滿而惡食也治當補益以開豁之丹溪導痰運

脾之法皆是也下元虛亦令人不思食東黃山谷刀筆手柬載云有將兔絲子淘淨炒乾日服數匙酒下服之十日飲食如湯沃雪又有服補脾藥不效用二神丸治之愈

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用剋伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳朮丸一服慎勿多服昔人有治久瘧後食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫

之言純用補劑又令粥多于菜氣虛甚者加附子一二分佐之

○錢氏異功散 治脾胃虛弱難任飲食

人參 白朮 茯苓 粉草 橘紅 木香各

分加姜東煎服

○二神丸 脾胃虛弱全不思食服補脾藥不効者

破故布炒四兩 肉果生二兩 右末肥東四十九枚生

姜四兩切片者爛去姜剝去東杵研膏入藥末和丸桐子大每三四十九粒湯下

○積聚門

黃帝針經百病始生得三云積者蓋厥氣生足悅生脘寒脛寒則血脉凝滯凝滯則寒氣上入腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起若不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢于腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而成積矣或外傷于寒內傷于憂

怒則氣上逆，氣上逆則六輸不通，溫氣不行，凝血蘊裏不散，津液凝滯，滲著而不去，而成積矣。難經云：肝之積名曰肥氣，肥氣以季夏戊巳日得之，何以言之？肺病傳于肝，肝當傳脾，脾季夏適主，王者不受邪，肝復欲還肺，肺不肯受，故留結為積。故知肥氣以季夏戊巳日得之。心之積名曰伏梁，云云脾之積名曰痞氣，云云肺之積名曰息賁，云云腎之積名曰奔豚，云云並見本方。

滑伯仁曰：越人之意，蓋以五行之道推其理，勢之所有者，演而成文，爾初不必論其感，亦不必論其還不還，與其必然否也。請以所勝傳不勝及王者不受邪，遂留結為積，觀之則不以詞害意而思過半矣。

○論婦人腸覃石瘕

水脹篇云：石瘕何如？岐伯曰：石瘕生于胞中，寒氣客于子門，子門閉塞，氣不通，惡血當瀉，不瀉，血以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下，皆

生于女子可導而下

寶鑑曰夫膀胱為津液之府氣化則出矣今寒客于子門氣塞不通血壅不流而血以止之結硬如石是名石瘕也以氣先病而血後病故月事不來則可宣導而下出者也故難經云任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚以之謂也非太辛之藥不能已可服見睨丹

腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛相搏氣不得營因有所繫痛而內著惡氣乃起瘕肉乃生

其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下以其候也

夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳道為事乃肺之府府主衛衛為氣氣得熱則泄寒則凝今寒客於大腸故衛氣不營有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘕肉乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也以氣病而

血未病故月不断以時下本非妊娠可以此為辨矣

劉宗厚曰按此謂石瘕為血壅不流故月事不來腸覃為氣聚而濁結成瘕故血未病月水不断而知此二積之異然亦有諸積所致或有病瘕膿而似此二證者不可不察也

舟溪曰痞塊在中為痰飲在右為食積痰積在左為血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮

桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醮白朮湯吞下 瓦壘子能消血塊次消痰石醮一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊當降火消食積食積即痰也 行死血塊塊去須大補 凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不丟當用消積藥使之融化則根除矣 九婦人有塊多是血

生子曰積聚一證難經以某日得積及不受欲遷之說後人皆難尊信以下諸書雖亦各有發

明終未有能擴其蘊而可為萬世法者近汪子
良特揭而辨之乃分表裏邪正臟腑內外曰積
曰聚及著治驗數條多有啟悟與丹溪治案可
相表裏深有功於難經者而後人得以此取則
焉幸亦大矣謹述於左

汪子良曰嘗讀難經積聚之說而疑之雖有及於
病情而其說自相矛盾有膠固而難通予慮後
學之悞于承用也為之辨論附以積聚常變之
法亦有自效於匡救之忠已乎

五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而
伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰
聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成積者
陰氣也其始發有常處聚者陽氣也其始發無
根本上下無所留止其痛無常處又五十六難
曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足
久不愈令人發欬連年不已以季夏戊巳日得
之何言以言之肺病傳脾脾季夏適旺者不受
邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知
肥氣以季夏心之積名曰伏梁起臍上大如臂
戊巳日得之

素問卷之五

上至心下久不愈令人煩心以秋庚辛日得之
何以言之腎病傳心當傳肺秋適旺者不肯受邪心復欲還腎不肯受故留結為積故知伏梁以庚辛日得之
 脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如
 盆久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌
 膚以冬壬癸日得之
何以言之肝病傳脾當傳肺不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之
 肺之積名
 曰息貫在右脇下覆大如杯久不已冷久洒洒
 寒熱喘嗽發肺癰以春甲乙日得之
何以言之心病傳肺當傳肝不肯受故留結為積故知痞氣以春甲乙日得之
心不肯受故留結為積故知息貫以春甲乙

日得腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下或
 上或下無時久不已令人喘逆骨痠少氣以夏
 丙丁日得之
何以言之脾病傳腎當傳心不肯受故留結為積故知奔豚以夏丙丁日得之
 夫謂積者陰氣也
 聚者陽氣也是以血氣分陰陽也殊不知陰血
 陽氣也皆能成積但臟腑所主之不同耳心肝
 多主于血丹溪所謂在左屬血是也脾肺多主
 於氣本文所謂肺積息貫者是也息者氣之息
 也是陽氣亦能成積况又曰氣之所積名曰積

與其積陰之說不相合矣。又謂積者五臟之所
生也。聚者六腑之所成也。殊不知有形質之物
積滯不行則為之積。五臟六腑俱有之。如神景
所謂熱結膀胱搏血畜積下焦其人如狂小腹
滿硬而小便自利抵當湯主之。又東垣所謂食
積腸胃腹滿卒痛者。備急丸下之。是六腑之位
亦有其積。豈謂積于臟乎。至論肝積肥氣。夫肥
氣者言其皮裏膜外有塊。以致皮膚有肥滿之
狀。所謂瘡母是也。此肝之外積。非肝之內積也。

又謂脾積痞氣。夫脾居於右脇。今積在於心膈
之位。乃與本文積在本位之說不相合矣。又謂
腎積賁豚。發於少腹。上至心下。若豚狀。或上或
下。無時。乃與聚証走動相類。與本文積屬陰沉
伏之說不相合矣。且五臟之積。未言所因。治何
所據。又謂肝積於季夏戊巳日得之。之類。其說
之失明者。自當知之。愚謂積伏而有常處。其症
靜也。因於血氣。痰食水火之所成。聚者對散而
言。散而無形。或集為有象。其症動也。因於氣虛。

不能運行之所致作於腹中者屬內作於皮膚四肢者屬外如血積左脇作痛日輕夜甚其脉沉澹者所謂在左屬血治用芎歸紅花蘇木射香肉桂莪朮之類又有火鬱左脇而痛甚者治用當歸龍會丸之類又有裏熱蓄水在於左脇而作痛者如仲景所謂心下痞硬痛引脇下乾嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯主之又有食積右脇而作痛者所謂在右屬食丹溪云右脇一條降起作痛色不紅者以食積也予嘗用補中

益氣湯去陳皮加青皮草果木香之類又有食塊積於右脇而不痛者宜治消導為主如白朮枳實三稜莪朮砂仁吳茱萸之類又有痰飲積於心膈作痛總食熱辣湯則暫止而脉沉滑治用白螺丸之類又有氣積胸中而為脹痛喘急脉沉者治用紫蘇杏仁之類又有水積胸膈作痛手不可近身涼脉沉緊者治用陷胸湯之類又有濕鬱心膈而為痞滿者治用木消痞丸之類所謂五臟之積者如此又有積于六府之位

者余嘗治一人膈下大痛有塊不移嘔吐不食吐兼腹痛此中焦吐也從於積用紫沉丸下之而愈又嘗治一人腹中大痛不移緣得大便其痛稍減兩尺脉沉弦而瀋他醫作房後陰症治之弗應余曰據其尺脉陰沉當作陰症治之據其大便去後而痛減者此食積也用倫急丸下之而已又嘗治一婦產後將及一月小腹之位有塊如雞卵作痛日輕夜重嘔吐寒熱此血積也治用芎歸肉桂莪朮乳沒琥珀射香之類一

服而塊消諸症悉退又寶鑑云寒氣客於子門則氣塞不通血壅不流而衄以止之結硬如石是名石瘕見睨丸主之又云清濁之氣結聚腸外成如懷妊按之則堅推之則移月事以時下名曰腸覃晞露丸又嘗治一婦人經閉三月臍下脹痛不移他醫作血積治弗效予曰此氣虛不能上升而陷於下也丹溪所謂陽病極於下者以也治用人參陳皮而安又嘗治一人臍左有塊不痛或時降起此亦食積也治用白朮三

稜莪朮砂仁吳茱萸木香神麩糊丸服之外於塊上灸之而消又嘗治一人小腹左邊有塊堅痛不移大便燥結或因惱怒辛苦即作隔痛嘔吐不食諸醫罔效已一年餘余作瘥火治用順氣消痞丸遠志肉酒炒黃連姜製厚朴各二兩海藻昆布青皮山查肉神麩蒼朮歸枳實各一兩玄明粉六兩同牛肉一斤切碎煮熟焙乾同前諸藥為末醋煮餅糊為丸每服二錢空心湯下未及一月而塊消痛止又治一人右脇塊痛用三補丸加梔子蒼朮服至半月而愈所謂六府之積者如此其餘萊菔酒肉寒冷等積可類推焉

腑之積甚者倒倉法治之此皆內積之症治者也又有外積者作于皮膚四肢之位也如癰疽瘰癧瘡母之類治各從其所宜天癰疽屬陽者仙方活命飲之類屬陰者內托復煎湯之類瘰癧米消者破結散之類已破者如神散之類瘡母又名肥氣宜降瘥火之劑余嘗治一人瘡後左脇之下皮裏膜外有塊大如掌許用七疔散治之犀薈子煨天蓼花子各二兩為末猪胰七箇針亂刺孔同玄明粉四兩煮熟入前二末搗爛焙乾為末每服二錢酒下為丸服亦可服之而效此皆外積之

水火雜錄

三

症治者也且以聚病言之夫內聚者腹中走痛也由於氣虛不能運行故耳余嘗治一人腹中有塊作痛或上或下或有或無此聚也治用入參黃芪白朮當歸枳殼木香之類而止此內聚之症治者也又有外聚者亦由氣衰滯於四肢百節作痛痛作隨腫痛退腫消經曰先痛而後腫者氣傷形也此也治用補氣散邪之劑如人參黃芪白朮為君佐以羌活五加皮薏苡仁之類此外聚之症治者也由是觀之積者由於氣

血瘀食水火之所成而有臟腑外內之分也聚者由於氣虛不運之所致而表裏邪正之別也則常變虛實之治得矣難經之說云乎哉

湯氏三稜散 治積氣肚痛 砂仁 甘草炒

益智仁炒去殼 三稜 莪木 青皮去穢炒

右末白湯點下

散聚湯 久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞

痛攷刺腰脇小腹填脹大小便不利

半夏 檳榔 當歸各三分 陳皮 杏仁去皮炒

桂各二兩 茯苓 甘草炙 附子炮 川芎 枳殼

厚朴 吳茱萸湯洗各一兩 大黃看勢輕重用

每服四錢水煎 太便利者去大黃

大七氣湯 治同上 京三稜 蓬木 陳皮

益志 香附各一兩半 肉桂 藿香 甘草

青皮 桔梗各三兩 每服五錢水煎

玄胡丸 內消癥瘕氣結中煩心腹脹痛

玄胡索 川歸 青皮 木香 雄黃飛另研

檳榔 廣木炮各四兩 京三稜炮六兩 右末入雄黃

拌勻糊丸梧子大每服三十九丸薑湯下不拘時

木香三稜散 和胃進食消化生冷物心腹刺痛

木香 神麴炒各一兩 京三稜炮 甘草炙各二兩 廣茂六兩

益志 橘紅各四兩 右末每二錢入鹽沸湯點服

五食丸 虛實積氣蠱脹積塊水氣年深癥瘕

大戟皮去 甘遂生各半兩 牙皂去皮生子 芫花醋浸一宿炒黃

胡椒各一兩 巴豆去心膜醋煮二十箇研半兩 右末入巴豆和

勻糊丸菜豆大每服五七丸氣實者十九夜卧

水一鍾用白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎

至半鐘去渣用湯下藥忌油膩粘滑物

聖散子 遠年積塊及婦人乾血氣

礶砂 麥蘖各六兩 大黃八兩 乾漆燒過 扁蓄 茴香

炒 檳榔各一兩 如婦人乾血氣加川山甲二兩

右細末每三錢溫酒調下仰臥此藥只在心

頭至天明大便如魚腸小便赤為驗並無毒

神效小兒用一錢十五以上二錢空心服之

更效

荆蓬煎丸 破痰癰消癥塊及冷熱積聚順氣消

食 木香 檳榔 枳殼 青皮 茴香

三稜 各二兩酒浸冬 廣茂 二兩 浸冬 以去皮

巴豆二十箇同炒黃色去巴豆不用

右末糊丸如菘豆大每服三十丸姜湯下

三稜丸 治五穀等積食

陳倉米 一兩 巴豆 五枚 去殼同 陳皮 三稜 各

兩 砂仁 各二錢 麥芽 木香 一錢 右末醋糊丸

菘豆大每十五丸至二十九丸姜湯食遠服

麴孽丸 治熱酒積噎酸脇痛

神麴 麥芽各一兩 黃連五錢同巴豆五粒炒黃色同用

右末沸湯和丸桐子大每五十九食遠姜湯送下

一方 治冷酒積 平胃散加丁香砂仁麥芽神麴姜枣煎服

水積丸 甘遂錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗

爛和末作一九紙裹火煨令香熟取出臨卧嚼

細酒嚥下取病根 若治酒積用東湯吞下

涎積炒粉丸 積聚涎塊結於心腹乾嘔刺痛

蚌粉一兩 巴豆七枚去壳及膜 右二味同炒赤色去巴豆

以醋丸桐子大夫臍腹痛炒茴香酒下二

十九婦人血氣姜酒下敗血冲心童便和常

歸酒服常服姜湯下

茶積丸 治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米半升巴豆七粒去壳同炒赤色去巴豆 青皮 陳皮各二兩

右末醋丸如菉豆大每二十九食後淡姜湯

下

又方 花椒為末麵糊丸桐子大每二十九茶湯

赤豆末

十一

三

任下

茶癖散 治茶積 黃芩 石膏 升麻 等分

為末每三錢砂糖湯調下

鯨甲桃仁煎丸 治諸積 桃仁泡去皮尖五兩水研漉汁三升

三稜煨木香 檳榔 青皮各一兩 鯨甲醋炙黃三兩

右末將桃仁汁慢火熬二升再加醋一升再

熬如糊和藥丸桐子大每服七十九淡醋湯

下空心食前日二服

晞露丸 感寒氣凝結腸外久為癥瘕疼痛名腸

覃 廣木 三稜各一兩酒浸用巴豆三十粒去壳同木稜炒黃色去巴豆

用乾漆炒川烏炮各五錢茴香炒青皮 雄黃各三錢

川山甲炮二錢礪砂研四錢輕粉一錢射香五分

右姜汁糊丸桐子大每服二三十丸空心姜

湯下

阿魏丸 諸積聚癥瘕痞塊 山查 南星皂角水浸

半夏同麥芽 神麩 黃連姜炒各一兩 連翹炒

阿魏醋瓜萎 貝母各五錢 石礪 風化硝

蘿蔔子 胡黃連名二錢半 右末姜汁浸餅餅糊

為丸桐子大每服五十丸姜湯下

見睨丸 婦人石瘕狀如懷子者 大附子炮

鬼箭羽 紫石英各三錢 肉桂 玄胡索 澤瀉

木香各二錢 血竭 水蛭一錢炒 檳榔二錢 桃仁

三錢 三稜五錢 大黃二錢 司三稜一錢 右末酒糊丸桐

子大每三十丸食前益湯或酒下

脾積膏 治諸積神效 雞子五枚 阿魏五分 黃蠟一兩

鍋內一處煎分作十服溫湯空心服諸物不

忌設腹痛是積化動十日後當有血大便中

出其效也

剪紅丸 專治久積有虫者 雷丸 檳榔

三稜 莪木各醋 木香 蕪荑 黑丑

狗脊 大黃 史君子 鶴虱 牙皂 錫灰

茵陳 黃丹各等分 為末以茵陳煎湯為丸梧子

大外以黃丹為衣木人每服三錢小兒每用一

錢空心以酒下 福建者以冷茶吞

奇驗方 黑羊肝一副入左頤牡蠣三錢黃蠟一

兩水煮肝爛食肝并湯空心食肝盡即効但不

厭其苦須多服効

敷方 蕎麥麵水調圍硬處內用皮硝葱重重鋪
三層以火熨之日三次 外服橘半枳木丸加

栽木

又方 以紅麴為糟將生威靈仙同搗極爛敷之
外覺痞塊消即拭去遲恐壞肌膚

熨痞方

吳茱萸三升研碎酒煮熟以布裹熨癥

上冷更炒更番熨之癥逐移走熨之消乃止

二仙膏

貼痞氣及積塊

明礬

雄黃

為末先將二兩水糊和成膏貼

患處俟大便如膿下即愈未愈再以二兩和

膏貼之即効

七臍散

汪子良論中七臍散有瓦楞子

只用皮硝七錢每一

錢擦臍七臍醃七日鉄器上焙乾燥為末又水

紅花子只用七錢無瓦楞子

羅太無乾柿丸

取虛實積下膈甚妙

硃砂

飛為衣

沒藥

牙皂

去皮孩為末

乾姜

炮

乾漆

炒烟

三稜

炮

輕粉

青礞石

煨各一錢

巴豆

三十粒去皮膜醋煮

沸水銀一錢 結成砂子一錢

右末和勻飯丸菘豆大

煎柿蒂湯冷下三丸或五丸 有孕婦人服勿

神功助化散 男婦腹中痞塊不拘氣血食積所

成 扁蓄 麥芽各五錢 瞿麥穗 甘草各五分

木香半錢 沉香 神麴各二錢半 大黃二兩

右末和勻男以淡竹葉甘草等煎湯及無灰

酒同調服 婦以紅花灯心當歸等煎湯及

無灰酒同調服俱酒多於湯 忌油膩動氣之物

及房事一月其藥夜服大小便見惡物為度

此方神妙不可盡述

紅丸子 大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四

肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳

痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積

骨瘦面黃腹脹氣急不嗜飲食漸成脾虛並宜

服之方見傷食

二賢散 進食消積塊 橘紅一斤 甘草四兩

鹽兩半 用水三四碗從早煮至夜以爛為度水

乾則添日乾為末淡姜湯調下 有塊者加

姜黃半兩 氣滯者加香附二兩俱同煎藥
煮 氣虛者加沉香半兩 噤口痢加蓮肉
二兩去心俱另入

小三稜煎 食癥酒癖血癥氣塊時發刺痛全不
息飲食積不消心腹堅脹痰逆嘔噦酢吞酸

京三稜

蓬朮

各四兩

芫花

梗葉

一兩去

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器以炭
火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微
焦焙乾為末醋糊丸菜豆大每十五丸下

猪腰子方 治腹中有塊

猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪腰片
相間縛定外用濕紙包火煨熟去紙搗盆肉
搗如泥入黃連末和丸每二十九丸烏梅甘草
湯下第二服二十五丸三服三十九丸漸加至
以痛為度大便利其塊自消神効

无戎温白丸 治心腹積聚久壅痞塊大如杯碗
黃疸嘔吐滿悶上氣腹脹心下堅結上搶心傷
及脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆噎膈五種

淋疾九種，心疼積食不消，成瘡連年不瘥，及一切風身軀頑痺，不知痛痒，或半身不遂，眉髮墮，落七十二種風，三十六種遁尸，疰忤癩癩，或婦人諸疾斷續，不生下，淋瀝五邪，朱心憂愁，思慮不樂，飲食無味，月水不調，及一切病，有似懷孕羸瘦困弊，或歌如鬼所使等症。

川烏 去皮臍炮 紫苑 菖蒲 柴胡 厚朴 製
 吳茱萸 二兩半 桔梗 皂莢 去子炒 茯苓 乾姜 炮
 人參 黃連 巴豆 去油炒 桂 蜀椒 去目炒
各五錢

右末入巴豆，令勻，蜜丸，桐子大，每三九姜湯下，食後臨卧服，加至五六丸止。

肝之積，肥氣，溫白丸，加柴胡、川芎治之。心之積，伏梁，溫白丸，加菖蒲、桃仁、黃連治之。脾之積，痞氣，溫白丸，加乾姜、吳茱萸治之。肺之積，息賁，溫白丸，加入參、紫苑治之。腎之積，奔豚，溫白丸，加丁香、茯苓、遠志治之。

肥氣丸 肝之積在左脇下，如覆杯，脉弦而細。
 青皮 當歸 蒼朮 各二兩半 蛇含石 煨醋淬七次

蓬朮 三稜 鐵孕粉各二兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

右末醋煮米糊九菘豆大每四十九當歸酒送下

伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温

酒調下桃奴樹上乾桃子是也正月採經

肺喘久不愈為息貫五靈丸

五靈脂二兩 木香半兩 馬兜苓炒一兩 葶藶

右末枣肉丸桐子大每二十九姜湯下日三

本草云肺之積曰息貫在右脇下大如杯令人酒

酒寒熱喘嗽發肺癰東膏丸

葶藶子 陳皮 桔梗各等分

右下二味末入葶藶研勻煮肥枣肉和丸桐子大每五七丸米飲下子嘗患停飲久漬肺經食已必噎喘覺肺系大急服此良驗

當歸丸 治婦人月經不調血積

當歸 赤芍 川芎 熟地 京三稜 廣茂

各五分 神麴 百草霜各二錢半 右末酒糊丸桐子大

温水下

尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六
 年形已骨立衆皆曰不可為柰其未死何家甚
 貧而大小慙之一日召杜至告杜曰但以濟物
 為懷則可業已請召明公非所言也遂以少物
 帛贈杜杜不受曰但服其藥必獲安無以是為
 疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩礪砂
 木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一
 分海馬一箇班猫去翅足炒十四箇為末酒醋
 各半升熬為膏每白天明用一皂子大酒醋化

下十月病退六十日漸安果如其言

黑神丸

神麴

茴香

木香

川椒

炒香出汗

丁香

各半兩

檳榔

四箇

乾漆

六兩半生半熟用姜湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前

生熟漆和丸彈子大又用茴香十二兩鋪陰

地陰乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香

用治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五膈血崩產後

諸血漏下赤白並下九分四服死胎下九皆

綿灰酒下若難產炒葵子四十粒杵碎酒煎

下諸疾不過三服，痰氣亦服，膈氣癥癖，五服血痕，三九下婦有塊如杯，每發痛不可忍，諸藥莫愈，投以丸，三服杯塊盡消，終身不復作矣。

○沒藥散

治一切血氣臍腹作痛，產後惡露兒枕

痛 血竭

沒藥

研並細

桂心

當歸

蒲黃

紅花

木香

玄胡索

乾漆

炒

赤芍

各等分

右細末，每服二錢，熱酒調下，食前。血塊冲心，痛甚者，以大順散三錢酒調服立止。

○牡丹散

婦人久虛羸瘦，血塊走注，心腹疼痛。

牡丹皮

玄胡索

桂心

當歸

各一兩

牛膝

赤芍藥

莪朮

各三兩

京三稜

半兩

每服三錢，水酒各半，盞煎服。

○芍藥湯

治產後諸積，不可攻，宜養去熱。

芍藥

一斤

黃芩

茯苓

各六兩

右每服半兩，水煎，日三服。

帝曰：病脇下滿，氣逆二三載不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，決不妨於食，不可刺灸，祇為導。

引服藥藥不能獨治也

病論云氣逆息難故名息積也

用息貫法治之亦可

磨積丸

胡椒一百五十粒

木香二錢

全蝎十枚去毒

右末粟米糊丸菜豆大每十五丸陳皮湯下

化氣湯

治息積

木香

砂仁

桂心

甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮

陳皮

乾姜

蓬朮

炮各半兩

沉香

胡椒各一錢

右末每服二錢姜蘇鹽湯調

下婦人醋湯服

肝之積肥氣丸

治積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人欬逆瘠瘡連年不已

厚朴半兩

黃連七錢

柴胡二兩

椒

巴霜

川烏

炮去

皮臍一分

乾姜五分

皂角去皮炙

白茯苓

各一錢

廣茂炮

昆布

人參

甘草

各三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴

霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服二九下日

加下九二日加二九漸加至大便微澹再從

兩丸加服周而復始積減大半勿服右後

積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴一半通前重一两減黃連一錢半若治風癩於一料中加入人參茯苓芎藭各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不減漆醋湯空心服下

加減肥氣丸 治同前仲夏合此

柴胡 厚朴各半 黃連一兩 川椒 甘草各五分

肉桂 川烏各二錢 巴霜六錢 乾姜 人參各半兩

右細末旋入巴霜研勻煉蜜丸桐子大初服

二九下日加一丸二日加二丸漸加至大便秘

微瀉再從二九加服空心漆醋湯下大便秘

秋冬去乾姜半錢加厚朴一倍減黃連一半

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不

愈冷人心煩 黃連一兩 人參 厚朴去皮姜製各半

兩黃芩三錢 肉桂 紅豆 茯苓 丹參各一錢

芎藭 乾姜 巴霜 川烏炮去皮臍各五分

右末研巴霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服

二九日加一丸漸加至大便秘從二九加服

食遠淡黃連湯下周而復始即減半勿服秋
冬加厚朴半兩減黃連半兩黃芩不用

鰲甲湯 治休梁積氣心下如臂痞痛不消小便

不利正 鰲甲去裙醋炙黃色 三稜 大腹皮 芍藥

當歸 紫胡 生地各一兩 官桂 生姜切片焙乾各三

分每服三錢水一大盞入生姜木香半錢同煎

至八分空心溫服

脾之積痞氣丸在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴製半生半炒 黃連錢八 吳茱萸 黃芩 白朮各三

錢白茯苓另為木 澤瀉錢各一 巴豆霜另研四分 乾姜炮

縮砂 茵陳錢各一 川烏炮去皮 川椒炒各四分 桂五分

人參錢一 右末旋入巴霜茯苓和勻煉蜜丸桐

子大初服二九日加下九漸加至木便微瀉再

從二九加服食遠淡甘草湯下周而復始積減

木事勿服平

加減痞氣丸 孟秋合耳

黃芩炒酒 益智 吳茱萸 歸尾 橘紅

附子各分三厚朴錢一黃連酒炒半夏各五紅花分

青皮 廣茂 神麴 茯苓 昆布 熟地

人參 炙甘草 巴霜 葛根各二分澤瀉

右末蒸餅糊丸桐子大初服二九日加一九

加至大便微瀉再從二九加服淡甘草湯下

宣明白朮丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便

呼吸引痛不已不可針灸宜導引服藥爾

白朮 枳實 官桂各一兩半人參二兩桔梗醋炒陳皮

甘草各一錢為末煉蜜丸桐子大每服二十九

溫酒下日三服

加減息賁丸 仲夏合此其積為病寒熱喘欬氣

上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒

熱相參氣分寒血分熱治宜益元氣洩陰火破

氣消其堅也 川烏 乾姜 桔梗 白豆寇

各一錢 人參 桂枝各二錢陳皮八錢黃連一兩三錢紫苑

厚朴 茯苓 川椒炒去汗京三稜 天門冬去心

各一錢半 青皮七分紅花少許巴豆霜四分右末餛餅糊

為丸桐子大初服二九日加一九加至大便

微瀉從二九加服食前姜湯下忌酒麪辛辣生冷物

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或

上下無時久不已令人喘逆骨痠少氣及男子

內結七疝女子瘕聚帶下 苦棟酒煮黃連炒

錢 白茯苓 澤瀉 菖蒲各二錢 川烏炮 丁香各五

分 玄胡索半錢 全蝎 附子 獨活各一錢 巴豆

霜四厚朴姜製肉桂分三 右末旋入巴豆霜茯苓

苓和勻蜜丸桐子大服法如前食遠淡鹽湯

下秋冬加厚朴半兩 如積熱堅大先服前

藥不減於一料中加牡蠣三錢疝帶勿加

如木積木聚消其大半乃止藥過劑則死

如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先

服本臟積藥諸疾自愈是其本也餘積皆然

如服藥人覺熱加黃連 如服藥人氣短加

厚朴 如服藥人悶亂減桂

治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻

之所喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神

麩麥孽治酒積水蛭蚘虫治血積木香枳榔治
氣積甘遂牽牛治水積雄黃膩粉治痰積巴豆
礞石治食積各從其類也若用群隊之藥分其
勢則難取效須要認得分明是何積聚兼見何
證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨
時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不
足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者
熱之結者散之客者逐之留者行之堅者削之
强者奪之賊以栗之苦以瀉之全真氣藥補之

隨其所積而行之物飲食慎起居和其中外可
使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反
傷正氣終難復也可不慎歟

○治魚蟹積 香蘇散多加生姜陳皮橄欖煎服

○菓菜積 平胃散加丁香射香為末鹽湯調服

○索粉積 紫蘇濃煎汁加杏仁泥服即消

○麵積阿魏丸 濃煎羅蔔子湯下

○糞糕傷積 酒麩五錢木香丁香錢為末鹽湯調服

口有酒香是効

治婦人血塊有孕難服峻藥

香附子四兩 桃仁一兩 海石二兩 白木一兩

神麴糊為丸

奇方 治一切癥瘕積聚 鱉甲一兩 三稜五錢

白木五錢 青皮 桃仁 紅花 昆布各二錢 香附

醋煮 右末糊丸梧子大每十錢煎白木湯下

治中脘有塊中常跳動 橘紅四錢 桃仁去皮尖

木通一錢 白木八錢 水煎服

治中脘水飲積塊堅大如盤 白木二兩 枳實七枚

分三服水煎

治小兒疳積 太安丸加胡黃連末五錢神麴糊

丸黍米大米飲下

舟溪治一人肚左邊帶脇下有塊先吃匾食牛乳

者成氣痛又因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石五錢 白木四錢 陳皮 三稜各三錢 蘿蔔子

黃連 連翹各一錢 乾葛二錢 桃仁二十枚 甘草炙

半錢 黃芩一錢 分三帖水煎服

婦脇下有塊大如掌脉滿時作熱此虛中有氣

積先與補虛次與磨積藥

白芍藥 當歸尾各四錢 白朮三錢 青皮 川芎

木通各一錢 甘草五分 水煎服

磨積藥 三稜醋煮一錢 青皮 枳實 桃仁 大黃

各五錢 桂枝半錢 海藻醋煮三錢

神麴糊為丸梧子大每服五十九

人有現在脇內有痰熱汗不得泄兩脉大而散

軟此挾虛症 三稜五錢 黃連 白朮 連翹

木通各三錢 人參二錢半 桂 川芎各一錢 甘草五分

水煎吞下保和丸

婦瘡後在脇下有塊小便少

厚朴 柴胡各二錢 三稜 青皮 木通各五錢

白朮六錢半 甘草五分 姜一片水煎服

人因飽食牛肉豆腐患嘔吐又不節飲食右脇

下生一塊漸長大如掌痛發則見痛止則伏脉

弦數性急塊上不可按按之愈痛痛則必吐黃

酸苦水此足太陰食積濕痰

荔枝核二枚 山梔仁五枚 枳實十五枚 山查九枚

吳茱萸

粒炒九

一方有人參

急流水

一盞煎沸入生姜汁服四

帖止其痛却與消塊藥

消塊藥方

半夏末

六錢皂角六枚水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連

炒五錢

石碱

錢

右末以糖毬膏為丸胡椒大

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢

玄胡索蓬朮各四錢每服五十九加至七十九

以利為度

妙應丸即控涎丹方見痰門

酒積方累効

即烏梅丸方出傷飲門

愆義有久病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食

髮而然令餌雄黃一劑少刻吐一碗如拇指無

自燒之有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

丹溪治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈

雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩半吳茱萸益智仁同炒

山梔

半兩炒

川芎

神麴

桃仁

去皮

三稜

蓬朮

各半兩並醋煮

香附

童便浸

山查

各一兩

蘿卜子

炒一兩

一方有青皮

半兩

白芥

子炒一兩半 右麵糊丸ス

治婦人血塊ラ

牛膝根切焙乾酒煎温服効アリ

腸覃生於腸外月事時下石瘦生於胞中月事不

以時下ラ病皆似蠱脹並見脹門

產後消血塊ラ

滑石錢三 沒藥錢一 血竭錢一

右末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末

麵糊丸白湯下陳皮湯下妙

入方 消血塊ラ

香附童便浸 桃仁去皮 為末醋糊丸ス

陳無擇云導引法随意行之皆可愚謂或按摩滿

處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以

氣通為効アリ

大宮詹少溪吳馭閱校

終



赤水玄珠第十八目錄

癲狂癇門

顫振

癱瘓


瘕症門

不得卧


附多卧

煩躁

健忘



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第十八卷

新安生生子孫一奎著輯

○癩狂癩門

此三證大旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癩癩痺疥不知所苦兩蹠之下

男陽女陰後人以癩癩為一門者迹此也又曰暴擊癩眩足不

任身取天柱後人言風癩者迹此也

○明癩症

書云多喜為癩多怒為狂難經謂重陰者癩重陽者狂



素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不
得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病
之初也歲一發不治月一發不治月四五發名
曰癲病又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之
所生也脉搏大滑久自巳小堅急死不治虛可
治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目
赤甚則極已而煩心啼呼喘悸先反僵因而脊
痛又有骨癲筋癲脉癲嘔多沫沫氣下泄者不

治又曰癲疾者疾發如狂者死不治揚此言疾
死不治可見癲
狂非一病也

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病癲疾者病名
何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母
腹中時其母有所大驚氣止而不下精氣并居
故令子發為癲疾啓玄子註曰癲謂
上巔即頭首也
綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰
而鉤高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消其
痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發

散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭
巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩
癩之癩與厥成癩疾眩冒癩疾之癩一疾也王
註悞分癩為二疾獨孫真人始能一之今特冠
此氣亂頭癩等經文於癩癩篇首使人知疾有
所歸而治有所據也

玉機微義曰按內經言癩而不言癩古方以癩癩
或併言或言風癩或言風癩或言癩狂所指不
一蓋癩病歸于五臟癩病屬之於心故今以風

癩另立一門而癩狂合為一門也

生生子曰按此以風癩另立一門明其不與癩狂
相類則是之矣而云癩狂合為一門今終集考
之並無癩狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧克忽患癩疾半年名醫皆不効
召孫療之孫曰但有醜物儘與食之但待云渴
可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴
孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與
之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝

之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏
得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人
不能用耳

辰砂散 治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮
迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目
寃魄不守醫藥無驗

辰砂

光明有墻壁者一兩

酸枣仁 微炒

乳香 半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但
勿令吐至靜室中以前藥都作一帖溫酒調

下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨
量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半
日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息
勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自
醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳
公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥
經云悲哀動中則傷魂寃傷則狂妄不精不
精則不正此悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂
之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類即