

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Formamint フォルマミント ペンタメタノール, ラクトザ ートフォルムアルデヒドと乳 糖化合物及メントールを含む芳 香錠	ウール フイング (謙信) 洋行	(1.0) 50錠 2.00	口腔, 咽頭 殺菌消毒剤 2時間毎に2錠口中 で徐々に溶解せし む
Formidol ホルミドール 蟻酸稀釋液	● 興醫社	1cc. 10管 1.50	ロイマチス治療剤 1回 0.5-1cc. 皮 注
Formityl フォルミチール カンフル, アミノピリン, サ リ曹製剤	東洋新薬	1cc. { 10管 2.00 50管 9.00	ロイマチス 神経痛治療剤 1cc. 皮注又筋注
Formolactin フォルモラクチン錠 フォルムアルデヒドとラクト ーゼの縮合体	三 共	(0.8) 20錠 0.50	口中消毒剤 1回 1錠 1日12錠 を限度とす
Forton ホルトン 合成男性ホルモン複合剤	★ 塩野義	0.5cc. = 15鶏冠單位 { 5管 6.00 10管 11.00 50管 50.00 1錠 = 5鶏冠單位 { 20錠 3.50 50錠 8.50 100錠 15.00	男性ホルモン 1回 0.5-1.0cc. (15-30鶏冠單位) を筋注 1日 3-6錠内服
Fostemin フォステミン エーテル, コデイン, キニー ネ杏仁油カフェインの混合剤	● マルコ 製薬	1cc. 10管 3.20 2cc. 5管 2.80 3cc. 5管 3.00	百日咳治療剤 1-3cc. 皮注又は 筋注
F. Papa Atoropin エフバパアトロピン エフェドリン, パパベリン, アトロピン葡萄糖液	● 全	1cc. { 10管 3.20 50管 15.00 100管 28.00	喘息, 百日咳 治療剤 1回 1cc. 皮注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Fraurin フラウリン 卵巣抽出體, 腦下垂體前葉抽 出體, ビタミンB製劑	★ 中村 研究所	1cc. { 5管 1.50 10管 2.90 0.1 { 50錠 2.00 100錠 3.90	女性ホルモン 皮下注射 (説明書参照)
Frictol フリクトール サリチル酸メチル製劑	圓城商店	軟膏 { 15瓦 0.60 25瓦 0.90	ロイマチス神経痛 1日 1-3回塗擦
Frobin フロービン { ベリベロール(Vitamin-B) アクトコール(強心劑) イノシット磷酸鹽(榮養劑)より成る 【買証】-【買帳】	ラヂウム 製薬	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.20 500瓦 12.50 0.25 { 30錠 0.50 50錠 0.75 100錠 1.30 500錠 5.00	疲労恢復劑 1日 3回 (1回) 0.25 -0.5瓦) 1-2錠 宛食間分服
フロービン (獣醫用)	全	末 { 250瓦 3.50 500瓦 6.50 1.0 { 50錠 1.00 100錠 1.70 500錠 7.00	活力増進疲労防止 並恢復心臓強壯劑 馬匹 1日30瓦 畜犬 1日 5瓦
Fuadin ファジン ブレンツカテヒン, デスルフ オン酸ナトリウム, アンチモン	●★ バイエル	5cc. 10管 6.84	第四性病 住血吸蟲症 筋注 5cc. 宛 (説明書参照)
Fuji-Leber フジレバー 肝臓成分にクレオソートを配 合 【買証】-1日 1.5-3.0	藤 澤	1000錠 5.00	貧血治療剤 1日 3回 1回25- 40錠
Fujiponin フジポニン Rhizoma Panacis repentis よ り得たる結晶性サポニン 【買証】-1日 0.6-0.9	★ 藤 澤	末 { 25瓦 0.85 100瓦 3.00 500瓦 10.50	祛痰劑 1日量 0.6-0.9瓦
Fuji-Richinale 「富士」リチネール	Richinal 358頁 参照		

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
Fujirol フジロール 植物タール製剤	フジロー ル製薬 (藤田 商店)	パスタ 5% { 200瓦 1.50 400瓦 2.50 100瓦 1.30 6% { 200瓦 2.20 400瓦 4.00 軟膏 { 6瓦 0.20 10瓦 0.30 持軟膏 10瓦 0.30 持坐薬 5個 0.30	皮膚及痔疾薬 外用
福モナール		Monal参照259頁	
Funabashi-Eki 船橋新染色液 (改良) 邦製ギムザー液	船橋 (塩野義)	30cc. 0.85	血液染色液 試薬
Furfurmin フルフルミン ビタミンB製剤	日本 薬品洋行	1cc. { 6管 0.57 50管 4.00 100管 7.80 2cc. { 6管 0.67 50管 5.70 100管 10.80 3cc. { 5管 0.84 50管 7.20 100管 14.20 5cc. { 5管 1.12 50管 9.80 液 { 100瓦 0.62 500瓦 2.60 末 { 50瓦 0.60 100瓦 1.13 250瓦 2.35 500瓦 4.32	Vitamin-B 剤 1回 1—5cc. 皮注 又は筋注 液 1日 10—20瓦 末 1日 1—3瓦
Fusirop フシロツプ グアヤコールスルホン酸カリ 10%含有の消化促進性シロツプ (Sirolin 参照)	内外新薬	液 { 100瓦 0.80 600瓦 3.60	解熱, 強壯鎮咳剤 1日量 15—20瓦
Fuskosin フスコシン 磷酸デヒドロコデイン ④ 1日 0.03 2倍用 10倍用は ④に非ず (Antitussin 参照)	日本 合成薬品 (船井)	時價 純末 { 1瓦 5瓦 25瓦 100瓦 二倍用 { 25瓦 100瓦 十倍用 { 25瓦 100瓦	鎮痛, 鎮咳剤 1日量 0.03—0.6

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
Futaba-Kishaku-Eki フタバ, 稀薄液 0.4% クロールナトリウム溶 液	フタバ (林)	60cc. 2管 0.60 20cc. 5管 0.60	注射液調製用
Futormin フトルミン 人腸乳酸菌 (4種) の純粹培養 液	長壽會 細菌所	液 { 50瓦 0.35 100瓦 0.50 250瓦 1.00	整腸剤 結核性消化障碍 1日量 50—100cc.

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Gamelan ガメラン 特種の蠟，脂肪及リポイド混合物	ハウスマン (三共)	塗擦用 10錠 5.00 注射用 5cc. 10管 10.00	結核治療劑 注射 1回 5cc. 1週 2回 塗擦，軟錠 1個 1 週 3回
Gannol ガンノール 結晶性セスキテルペンアルコール	東京薬化学 (塩野義)	末 { 25瓦 3.75 100瓦 14.00	治淋劑 1日 3回 0.5—1.0 瓦
Garcon ガルコン { タンニン酸ゼラチン 70% ペンツナフトール 30% [賣許—醫販] (1日 1.0—3.0)	武田	末 { 25瓦 0.65 100瓦 2.30 500瓦 8.50	止瀉劑 1回 0.3—1.0 瓦 1日 10瓦以下
Gardan ガルダン ピラミドンとノバルギン結合體	バイエル	(0.125) 20錠 1.00	鎮痛，ロイマチス 治療劑 1日 3回 1—2 錠 宛
Gataphorin ガタフォリン 水溶性カンフル	日新醫學	0.5% 1.1cc. { 10管 0.45 50管 2.00 2.2cc. { 10管 0.70 50管 3.00 5% 1.1cc. { 10管 0.70 50管 3.30 10% 1.1cc. { 10管 0.80 50管 3.80	強心劑 0.5% 1回 1—5cc. 5% 1回 1cc. 10% 1回 1cc.
Geburtin ゲブルチン ネオゲブルチンと改稱	Neo-Geburtin 275頁参照		
Gedarmin ゲダルミン リンゴの純粉末	大日本製薬	末 { 100瓦 1.10 200瓦 1.80 500瓦 4.00	止瀉劑 1日 3回 1回 50— 60瓦

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Gedokugen ゲドクゲン (解毒元) チスチンナトリウム，チオズ ルフアート	トシミ製薬	1瓦 5管 } 10% 葡萄糖溶液 } 4.50 5管添付 }	解毒劑 (黄疸治療劑) 1日 2—3 回 1回 1瓦—2瓦を症状 消退に至る迄連用
Gelbamin ゲルバミン 酵母蛋白とタンニン酸結合體	塩野義	末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.40 500瓦 10.00 0.25 { 50錠 0.65 100錠 1.20 500錠 5.00	止瀉劑 1日 數回 0.5—1.0 瓦宛
ゼラチン液			
Gelatina Stelisata ㊦ pro injection 滅菌ゼラチン液 10%ゼラチン液	三共	10cc. 0.55 20cc. 0.80 40cc. 1.30	止血劑 1回 10—40cc. 靜注
滅菌カルチウムゼラチン液 5%の割合に純クロールカル チウムを含有せしめたる10%ゼ ラチン液	三共	10cc. 1管 0.65	止血劑 筋注 1回 5—7cc.
Gelatin "Suzumura" ㊦ 鈴木氏滅菌ゼラチン液 微アルカリ性10%ゼラチン溶 液 (Anaptol Gelatin 14頁参照)	武田	10cc. { 1管 0.50 5管 2.25 20cc. { 1管 0.75 5管 3.40 40cc. { 1管 1.20 5管 5.30	止血劑 1回 10—40cc. 皮注 或靜注
「マルコ」滅菌ゼラチン液 ㊦ 微アルカリ性10%ゼラチン溶 液	マルコ製薬	10cc. { 1管 0.50 5管 2.20 20cc. { 1管 0.75 5管 3.20 40cc. 1管 1.20	止血劑 1回 10—40cc. 靜注
「大京」滅菌ゼラチン液 ㊦	大京製薬	10cc. 5管 2.00 20cc. 5管 2.50 40cc. 5管 4.00	同上
「日新」滅菌ゼラチン液 ㊦	日新醫學	10cc. { 5管 2.00 20管 7.00 20cc. { 5管 2.50 20管 9.00	同上

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Gelbe Salbe ゲルベ軟膏 黄降承軟膏	三輪傳二	1% 30瓦 0.60 2% 30瓦 0.68 3% 30瓦 0.71 5% 30瓦 0.77	眼科用 塗擦
Geneglandol ゲネグラドール 卵巣製剤	三 共	1cc. { 5管 2.75 10管 5.00	無月経, 子宮發育不全治療劑 1回 1cc. 皮注
Genermon M ★ ゲネルモン, エム 哺乳動物の雄性生殖器より抽出せる男性ホルモン	三 共	1cc. { 5管 3.00 10管 5.50 強 1cc. { 3管 6.50 20錠 3.00 50錠 6.80 100錠 12.50	男性ホルモン 毎日又は隔日 1cc. 筋注 内服 1日 3-4 錠
Genesol ゲネゾール 膽汁酸製剤にして主成分はグリコヒヨール酸ナトリウム	塩野義	0.025 { 30錠 0.80 100錠 2.00 1% 5cc. { 5管 1.00 50管 8.00 10cc. { 5管 1.60 50管 12.50	妊娠中毒治療劑 毎日又は隔日 2cc. 筋注 1日 2回 2錠宛
Genestypol ゲネステプトール 卵巣製剤	三 共	1% { 5管 2.00 10管 3.50	月経過多 月経困難 1回 1cc. 皮注
Genka 玄華 人毛の膠様質製剤	日明製薬所	末 { 28瓦 3.00 60瓦 6.00 120瓦 11.00 0.3 100錠 3.70	毛生薬 1日量 4瓦毎食後分服
Gennopon ゲンノポン ゲンノショウコ有効成分	鳥居	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 15.00 錠 { 50錠 0.55 120錠 1.20 600錠 4.80	腸管内殺菌收斂劑 1日 2回 0.5 瓦宛
Gentropin ● ゲントロピン ゲンノショウコの有效成分の2%溶液に硫酸アトロピン 0.05%を配す	日新醫學	1.1cc. { 10管 0.90 50管 4.00	止瀉劑 1回 1cc. 皮注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Geramin (獨逸名 Erugon) ゲラミン 男性ホルモン製剤 (陽器性) 1cc. = 2鶏冠單位 1錠 = 0.25 鶏冠單位 (Androstin, Genermon, Vivasmon 参照)	バイエル	1cc. { 2管 6.80 10管 28.70 30錠 7.80	男性生殖器機能障害治療劑 毎日又は 1週 2-3回 1cc. 筋注
Germanin ★ ゲルマニン メタ, アミノベンツオイル, メタ・アミノ・パラ, メチルベンツオイル 1 ナフチルアミン, 4, 6, 8 トリスルホゾイレのカルバミッド	バイエル	1cc. 5管 13.70	トリパノゾーマ 化學的療法劑 (天疱瘡, 血栓生成の豫防) 1回 1cc. 筋注又は筋注
Gerison ★ ゲリゾン パラフェノール, ズルフォンアミド (Prontosil-album, Therapol, Erytrin 参照)	山之内	末 { 25瓦 6.50 100瓦 24.00 500瓦 100.00 (0.3) 20錠 2.50 5cc. { 5管 1.50 10管 2.80 50管 13.00	連鎖状, 葡萄状球菌性疾患 (丹毒, 敗血症, 尿路感染) 末 - 1日 2回 0.3-0.6瓦宛 錠 - 1日 2回 - 1-2錠宛 注 - 1日 2-3回 1筒宛筋注
Geschwurin ゲシユウリン ヒスチヂン製剤 (Tarostidin, Is-ulcus, Sonostidin 参照)	日本薬品洋行	5cc. { 5管 1.75 50管 15.80 錠 { 12錠 2.20 60錠 10.00 壁外用 { 10瓦 軟膏 { 100瓦	胃, 十二指腸潰瘍治療劑 注射 1日 1回 5cc. 筋注又は皮注 内服 1日 2回 1-2錠宛食間 塗布 1日 1-2回 潰瘍面塗布
Giflon ギフロン 水酸化蒼鉛及酒石酸カリウム 蒼鉛乳劑 (1cc. 中蒼鉛 0.1) (Casbis 参照)	第一製薬	2cc. { 5管 0.70 10管 1.20 50管 5.20 25cc. 無入 1.20 (25cc. 5個入) 5.20	驅微劑 2-5日毎に 1cc. 宛腎筋注
Ginsenin ジンゼニン 朝鮮人蔘より抽出せる配糖體	塩野義	0.3 { 10錠 0.80 50錠 3.20	強壯劑 1日 2-3錠分服 又は 2錠頓用

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Gitosan ギトーザン キノフェン C ₆ H ₅ C ₉ H ₅ N·CO ₂ H (萬有キノフェン 348頁参照)	⑥ 萬有製藥	末 { 25瓦 3.00 100瓦 10.70 250瓦 24.00 0.5 { 2錠 1.00 50錠 2.00 150錠 5.00	ロイマチス神経痛治療劑 1日 3回 0.5—1.0瓦毎食後
Gitosan Solution ギトーザン注射液 ギトーザンとサリチル酸曹達混合溶液 (Atophanyl 参照)	全	5% { 5管 1.80 30管 7.50 10cc. { 5管 2.50 30管 10.00 10% { 5管 2.50 30管 10.00 2% { 1cc. 20管 1.40 10cc. 10管 2.00 20cc. 5管 2.00	ロイマチス神経痛、痛風、尿酸結石 1日 1回 5—10cc. 静注又は筋注
Glabin グラビン Papilionaceae 植物の有効成分 [買取]—[買給] (1日 0.2—0.3)	鳥居	末 { 10瓦 1.35 25瓦 3.20 100瓦 11.50 225瓦 24.50 450瓦 48.00 液 { 100瓦 1.75 450瓦 6.80 錠 { 30錠 0.60 100錠 1.25	祛痰鎮咳劑 末—1日 0.2—0.3瓦 液—1日 2—3瓦 何れも 2—3回分服
Glaukosan グラウコサン 1) 左旋グラウコサン 左旋性オルトデオキシ, フェニルエタノール, メチラミン 2) 右旋グラウコサン 右旋性オルトデオキシ, フェニルメチル, アミンとメチルアミノアセトブレンツカテヒン 3) アミノグラウコサン β イミドアツオリルエチラミン	ウエルム (三共)	3管 1函 品切	緑内障 (点眼用) 15分毎に 1回宛 3—5回点眼
	全	5管 1函 品切	緑内障 (結膜下注射) 2連アンプルを混和し用ふ
	全	2% { 1函 品切 7% } 10% }	緑内障 (点眼用) 2—10%液点眼

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Glosal グロサール トリアセチル・ヂフェノール イサチン	第一製藥	末 (10倍散) { 25瓦 1.60 100瓦 5.00 500瓦 20.00 0.005 { 25錠 0.35 50錠 0.60 100錠 1.00	緩下劑 末 1回 (10倍散) 0.05—0.2瓦錠 1—2—4錠就床前又は空腹時頓用
Gluco-Calcium グルコカルチウム 葡萄糖水酸化カルチウム製劑	リリー社 (鳥居) (塩野義)	30cc. 10.00 5cc. 6管 10.00	肺結核治療劑 静注
Glubrom ★ グルブローム グルタミン酸とブロムカルシウム化合物。白色、無臭、可溶性結晶性粉末	寶製藥	末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.50 500瓦 10.00	有機ブロム劑 1日 3—5瓦 (特に就床前 1回 3瓦)
Gluco harn (検尿試薬) (グルコハルン錠) (A) 検糖 (定性定量) (ネオニール錠) (B) 簡易検糖法用 (アイハルン錠) (C) 検蛋白法用 マツノ式 { 携帯検尿器(A) 大型 携帯検尿器(B) 小型 常備検尿器(C) 常備用	鳥居	ABC各 { 20錠 0.65 100錠 2.50 10瓦 0.65 3種取揃 (20錠) 1箱 1.80 (10瓦) 1箱 1.80 A 検尿器1具 6.50 B 検尿器1具 4.00 C 検尿器1具 14.50	検尿用
Glucos solution ★ [萬有] グルコン注射液 グルコン酸カルチウム 8.5% 液	(萬有)	2cc. { 10管 0.60 50管 2.40 5cc. { 10管 1.00 50管 4.00 10cc. { 10管 1.50 50管 6.00 20cc. { 5管 1.20 50管 10.00	カルシウム劑 毎日又は隔日 10—20cc. 臂筋注射

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Glucosin グルコシン 葡萄糖液	植村	5%	
		10cc. { 5管 0.60 50管 5.00	
		20cc. { 5管 0.75 50管 6.00	
		50cc. 3管 0.85	
		100cc. 2管 0.95	
		300cc. 1管 1.00	
		500cc. 1管 1.10	
		10%	
		5cc. 5管 0.60	
		10cc. 5管 0.70	
		20cc. { 5管 0.80 50管 6.50	
		30cc. 3管 0.80	
		50cc. 3管 1.00	
		100cc. 2管 1.10	
		20%	
		5cc. 5管 0.70	
		10cc. 5管 0.80	
		20cc. 5管 1.10	
		25%	
		20cc. { 5管 1.20 50管 10.00	
		40%	
		50cc. 3管 1.30	
		50%	
		20cc. { 5管 1.40 50管 12.00	
		50cc. 3管 1.50	
Glucosin-Calcium グルコシン, カルシウム { 葡萄糖 10%液 CaCl ₂ 2%液	全	10cc. { 5管 0.85 50管 7.30	
		20cc. { 5管 1.00 10管 1.80 30管 5.50 50管 8.50	
Glucosin-Ringer グルコシン, リンゲル { 食鹽 8.5 葡萄糖 5.0 蒸溜水にて1000とす		300cc. 1管 1.40	100—500cc. 静注
		500cc. 1管 1.60	又は皮注

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
葡萄糖製劑			
Glucosum (Dextrose) "Sankyo" ㊄ 〔三共〕 葡萄糖 C ₆ H ₁₂ O ₆ =180.1	三共	末 { 25瓦 0.80 100瓦 0.80 250瓦 1.70 500瓦 3.00	各種中毒, 尿毒症 栄養減退, 心臟衰 弱, 浮腫, 肺炎肋 膜炎, 痙攣, 痲痺 症, 敗血症, 腦出血
Solutio Glucosi (Dextrose Solution) "Sankyo" 〔三共〕 葡萄糖注射液 等張液—5% 高張液—10%以上 40%液は腦溢血用	全	5% 20cc. 30管 3.50 50cc. 8管 1.05 100cc. 3管 1.65 300cc. 1管 1.05 500cc. 1管 1.65 10% 20cc. 5管 0.80 30管 3.75 50cc. 8管 1.10 100cc. 8管 1.75 300cc. 1管 1.15 20% 20cc. 5管 0.85 30管 4.35 50cc. 8管 1.10 25% 50cc. 3管 1.25 40% 50cc. 3管 1.40	△諸種中毒症狀に は等張液 100— 500cc. △組織脱水を求む る際は高張液を 用ふ △等張液は皮注又 は静注 △高張液は必ず静 注
〔萬有〕 純葡萄糖 ㊄	萬有製藥	末 { 100瓦 時價 500瓦 時價	同上 1日 1回 5—20cc. 静注又は皮注
		5% 20cc. 5管 0.80 50管 6.50 100cc. 2管 1.20 300cc. 1管 1.40 500cc. 1管 1.50 10% 10cc. 10管 1.50 20cc. 5管 0.90 50管 7.50 50cc. 8管 1.30 20% 20cc. 5管 1.10 50管 10.00 25% 20cc. 5管 1.30 50管 12.00 50cc. 8管 1.70 50% 20cc. 5管 2.00 50管 17.00	

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
「タケダ」純葡萄糖末 (注射液は Lodinon 234頁参照)	武田	末 { 25瓦 時 100瓦 價 500瓦	葡萄糖療法用 注射用, 内服用
①純葡萄糖 (注射液は Glyon 163頁参照)	大日本製藥	末 { 25瓦 時 100瓦 價 500瓦 5貯	
「第一」純葡萄糖	第一製藥	末 { 25瓦 0.30 100瓦 0.65 500瓦 時價	
第一糖液	全	5% 20cc. 5管 0.80 50cc. 3管 0.90 100cc. 3管 1.50 300cc. 1管 1.10 500cc. 1管 1.30 10% 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 0.90 25管 4.00 50cc. 3管 1.10 100cc. 3管 1.75 20% 10cc. 5管 0.85 20cc. 5管 1.10 25管 4.80 50cc. 3管 1.20 100cc. 3管 2.00 25% 20cc. 5管 1.20 50cc. 3管 1.40 100cc. 3管 2.20 50% 20cc. 5管 1.50 30cc. 5管 2.00 50cc. 3管 2.00	
“Daiichi” Glucose Calcium Solution 第一カルシウム糖液 第一糖液に鹽化カルシウム 2%添加	全	10% 10cc. 5管 0.80 20cc. { 5管 0.90 25管 4.00 20% 10cc. 5管 0.85 20cc. { 5管 1.10 25管 4.80	止血, 榮養, 強心 解毒, 利尿劑 1回10—20cc. 靜注

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
「タナベ」葡萄糖注射液	田邊五	5% 20cc. 5管 0.90 50cc. 3管 0.90 100cc. 3管 1.60 200cc. 1管 1.10 300cc. 1管 1.30 500cc. 1管 1.50 10% 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 0.90 50cc. 3管 1.10 100cc. 3管 1.70 20% 10cc. 5管 0.85 20cc. 5管 1.00 20cc. 30管 5.00 25% 20cc. 5管 1.40 50cc. 3管 1.50	
「コメット」葡萄糖	コメット(黒田)	末 { 100瓦 時價 500瓦 5% 20cc. 5管 300cc. 1管 500cc. 1管 10% 5cc. 5管 10cc. 5管 20cc. 5管 20cc. 30管 20% 10cc. 5管 20cc. 5管 20cc. 30管 50cc. 3管 25% 20cc. 5管 20cc. 30管 50cc. 3管 50% 50cc. 3管	
「三研」葡萄糖注射液	三菱藥品	5% 100cc. 2管 1.00 300cc. 1管 1.00 500cc. 1管 1.50 5—10—20% 20cc. 5管 0.80 5—10—20—25% 50cc. 3管 1.00 40% 50cc. 3管 1.25	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量		
L三星 ¹ 葡萄糖注射液	三星藥品 (鳥居)	5%			
		20cc. 5管 0.70			
		20cc. 30管 3.50			
		10%			
		20cc. 5管 0.80			
		20cc. 30管 4.00			
		20%			
		10cc. 5管 0.80	40%		
		20cc. 5管 0.85	20cc. 5管 1.10		
		20cc. 30管 4.30	20cc. 30管 5.80		
L三星 ¹ 葡萄糖カルシウム液 葡萄糖10%鹽化カルシウム 2%	全	50%			
		10cc. 5管 0.80			
		20cc. 5管 0.85			
		20cc. 30管 4.80			
		Lカケミ ¹ 純葡萄糖液	掛見商店	5%	
				20cc. { 5管 0.85	
				10管 1.60	
				50cc. { 5管 0.90	
				10管 1.50	
				100cc. { 1管 1.00	
200cc. { 1管 1.20					
300cc. { 1管 1.20					
500cc. { 1管 1.35					
10%					
5cc. 5管 0.65					
10cc. 5管 0.75	25%				
20cc. 5管 1.00	20cc. { 5管 1.45				
50cc. 5管 1.10	30管 7.40				
20%					
10cc. 5管 0.80	50cc. 5管 1.50				
20cc. 5管 1.25	50%				
50cc. 5管 1.30	20cc. 5管 1.60				
50cc. 5管 1.70	50cc. 5管 1.70				
L櫻木 ¹ 葡萄糖注射液	櫻木合資				
Lナニワ ¹ 同	浪速製藥				
L日新 ¹ 同	日新醫學				
L東洋 ¹ 同	東洋新藥				
L昭和 ¹ 同	昭和製藥				
Lトシミ ¹ 同(デキストローゼ)	都志見				
Lアサヒナ ¹ 同	朝比奈				
L大京 ¹ 同	大京製藥				
L小林 ¹ 同 (コバコーゼ)	小林藥學				

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
葡萄糖カルシウム液 Lカケミ ¹ { 葡萄糖 10% クロールカルシウム 2%	掛見商店	10cc. 5管 0.85	止血, 強心, 榮養劑 10-20cc. 靜注
		5管 1.10	
		20cc. { 10管 2.00 30管 5.50	
葡萄糖カルシウム液 2% のクロールカルシウムを 配したる等張葡萄糖液	アルゼー ルトミイ	20cc. { 5管 1.50	榮養強心劑 1日 1回20cc. 靜注
		10管 2.80	
L三共 ¹ 葡萄糖カルシウム液 (略稱. サンカル糖液) { グルコン酸カルシウム 4.5% 葡萄糖 10%	三 共	10cc. { 5管 0.85	榮養利尿強心 1日 1回10-20cc. 靜注
		30管 4.15	
		20cc. { 5管 1.20 30管 6.00	
L大京 ¹ グルコン酸カルチウム 液 グルコン酸カルチウム 8.5%	大京製藥	2cc. { 10管 0.60	カルチウム劑 2-20cc. 靜注又は 皮注
		50管 2.50	
		5cc. { 10管 0.90	
Glycal グリカール グルコン酸カルチウム 賣許一醫藥	大 木	10cc. { 5管 0.70	カルチウム劑 注射 1-20cc. 皮下 又は筋肉 内服 1日 1.5-2.0 分3
		10管 1.20	
		20cc. { 5管 1.00	
Glycanose グリカノーゼ { 葡萄糖 10% ブロム石灰 3% (弱はブロム石灰 2%含有)	龜井藥品	5管 1.80	榮養, 利尿, 鎮靜劑 1回20cc. 靜注
		10管 2.00	
		20cc. { 10管 2.50 50管 11.00	
		弱=同價格	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Glycerophosphas Calcii ㉔ グリセロ磷酸カルチウム $C_2H_5(OH)_2PO_4Ca + H_2O$	三 共	末 { 25瓦 0.50 100瓦 1.65 500瓦 6.35	栄養強壯劑 1回 0.3 1日10瓦 に至る
Glycocol Natrium グリココール酸ナトリウム $C_{24}H_{39}O_4NHCH_2CO_2Na$	三 共	10瓦 3.00	角膜葡萄腫治療劑 3%水溶液 0.3— 0.5cc. を硝子体内 注射
Glycogen グリコーゲン 動物性澱粉	三 共	末 { 10瓦 1.35 100瓦 11.30	滋 養 劑 1回 1瓦
Glycolactin グリコラクチン 乳酸菌糖化菌製劑 (有効期限明示)	日本新薬	末 { 25瓦 0.60 100瓦 1.70 500瓦 6.00 1キロ 10.50 0.3 { 50錠 0.60 100錠 1.10	整腸消化劑 1日 2回 0.5—1.0 瓦 (2—3錠) 食後 直ちに
Glyconal Tablet グリコナル錠 グリコーゲン50%と脂肪、鹽 類、適量を含有す	三 共	(0.25) 100錠 1.70	滋 養 劑 普通用量 1回 4錠
Glysmear グリスメール 白米を破碎整粒して加工せる 離乳期基本食餌	和光堂	500瓦 1.00	榮 養 料 12瓦を100瓦の粥 とす

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Glyon グリオン 葡萄糖注射液	大日本製薬	5% 20cc. 5管 1.00 50cc. 3管 1.10 100cc. 3管 1.70 300cc. 1管 1.50 500cc. 1管 1.60 10% 5cc. 5管 0.60 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.20 20cc. 50管 9.50 50cc. 5管 1.40 100cc. 3管 2.20 20% 10cc. 5管 0.90 20cc. 5管 1.70 50cc. 5管 1.80 100cc. 3管 2.50 25% 20cc. 5管 1.70 50cc. 3管 1.70 100cc. 3管 3.00	栄養強心, 利尿劑 皮, 静, 注射及注 腸
Glyphos グリホス (A) 有機性酸化鐵を含有するグリ セロ磷酸化合物の芳甘エレキシ ール	鶴丸商店	(A) { 250瓦 2.00 500瓦 3.50	(A) 補血強壯劑 1日 2回毎食後 5 —7 瓦宛温湯に和 して用ふ
スペチ, グリホス (B) グアヤコールスルホン酸カリ 含有のグリホス	全	(B) { 250瓦 2.30 500瓦 3.80	(B) 結核治療劑 同上
Glyteer グリテール 大豆粕の乾餾テール	藤永 (三共)	原液 { 25瓦 0.65 100瓦 2.25 500瓦 8.80	皮 膚 藥 5—10%泥膏又は 軟膏
Glyteer-Paste グリテールパスタ 5% グリテールの特殊基礎劑 軟膏	全	パスタ { 25瓦 0.30 100瓦 0.85 500瓦 2.90 チューブ 5管 1.50	皮 膚 藥 外用塗布

品名組成

製造元
發售元

包裝價格

醫効用量

Goldamin

ゴールドミン

チスチンと金の結合體

吉岡
研究所
(田邊五)#1 { 5管 7.00
10管 13.00
#2 { 5管 8.00
10管 15.00
#3 { 5管 11.00
10管 20.00
#4 { 5管 16.00
250錠
500錠結核治療劑
#1 乳兒 #2 小
兒 #3-#4 成人用
1週 2回皮注
内服 1日20錠分3

Gonacrin

ゴナクリン

鹽酸テアミノメチル、アクリ
ジン

(Trypaflavin 参照)

マルホ

0.5%
5cc. { 5管 0.75
50管 6.00
10cc. { 5管 1.10
50管 8.00
2%
5cc. { 5管 1.50
50管 12.00
末 10瓦 8.00
0.025 { 10錠 0.50
100錠 3.00
10瓦 0.30
軟膏 { 20瓦 0.50
500瓦 5.50防腐殺菌劑
四千倍の溶液を注
入用として千倍液
を創傷用として用
ふ

Gonadotropin

ゴナドトロピン

所謂腦下垂體前葉ホルモン
(妊娠尿性々器作用ホルモン)
0.001mg=1 R.U.=1ラット單位

武田

200R.U.(溶劑付) { 5管 3.00
10管 5.50
500R.U.(溶劑付) { 5管 5.75
10管 10.50
2000R.U. 5管 18.50生殖腺刺戟
ホルモン
毎日 1回 200R.U.
或は 500R.U.溶劑
に溶し、皮注又は
筋注

Gonitol

ゴニトール

1cc.中 鹽酸キニーネ 0.068
カフェイン及ウレタン適量を含
有す

金剛製藥

2cc. 10管 1.30
5cc. 5管 1.20
1cc. 5管 0.85
(小兒用)肺炎、マラリヤ
治療劑
1日 1-3回 2-
5cc.筋注

Gono-Brocannon

ゴノブロカノン

(Brocannon 53頁参照)

品名組成

製造元
發售元

包裝價格

醫効用量

Gonoca flavin

ゴノカフラビン

淋菌ワクチン、葡萄状球菌ワ
クチン、葡萄糖、アクリジン色
素製劑

日新醫學

5cc. { 10管 2.00
50管 8.00
10cc. { 5管 3.00
50管 13.50
20cc. { 10管 5.00
50管 22.00治淋劑
隔日 5-20cc. 靜注

Gonocaltin

ゴノカルチン

3% クロールカルチウム加
淋菌ワクチン

大阪血清

10cc. { 5管 2.50
10管 3.70
20cc. { 5管 5.00
10管 7.50
50管 22.00治淋兼診斷劑
1日 10-20cc. 靜注

Gonocystol

ゴノチストール

サンタロール乳酸エステル及
カワカワエキス丸(ケラチン被
覆)

第一製藥

0.3 { 36粒 2.00
60粒 3.00
120粒 5.00
500粒 13.00
1000粒 21.00治淋劑
1日 3回 2粒宛毎
食後

Gono-Kokutigen

淋菌コクチゲン

(Kokutigen 222頁
参照)

Gonosalvin

ゴノサルビン

セスキテルペンアルコール

三友製藥

原液 { 25瓦 0.70
250瓦 4.50
500瓦 8.50
0.3 { 50球 1.20
100球 2.00治淋劑
1日 1-4瓦

Gonosan

ゴノサン

{ 純サンタール油 80%
カワカワ樹脂 20%リーデル
(塩野義)0.3 { 32球 4.80
50球 6.75
100球 12.50
500球 54.00治淋劑
1日 3-5回 1回
1-2球

Gonosol

ゴノサール

アルブチン、クロールカルチ
ウム、メチレン青、ウロトロピン

東洋新藥

20cc. { 10管 2.00
50管 9.00治淋劑
毎日又は隔日 20cc.
靜注

Gonosarin

ゴノザリン

ウロトロピン、クロールカル
チウム、アルブチン重複鹽

日新醫學

20cc. { 10管 2.00
50管 9.00泌尿器殺菌劑
毎日 1回 20cc. 靜注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Gonosarin 内服ゴノザリン メチレンブラウ、ウロトロピン、グルコン酸カルチウム、バルサム、クベバを含む	日新醫學	0.3 { 50球 1.40 200球 4.50 1000球 17.00	利尿, 消炎 殺菌 治淋劑 1日 6粒 2-3 回 分服
Gonosolgin ゴノゾールギン チオヒドロガルブスルホン酸銀とコロイド銀製劑	植 村	液 { 25cc. 1.40 100cc. 5.00	治 淋 劑 0.5-1 %より始 め 2-3-5%溶液 を使用 (洗滌)
Gonostagen "Comet" ゴノスターゲン「コメット」 淋球菌と化膿菌を抗原として産出する抗體 (アンチゲン) をクロールカルシウム液に溶す	コメット (黒 田)	20cc. { 5管 2.50 10管 4.80 50管 18.50	治 淋 劑 1回20cc. 静注
Neo Gonosta ●★ ネオ, ゴノスタ 淋菌, 白色葡萄状球菌及金色葡萄状球菌より抽出せるアンチゲンをサリチル酸カルシウム液に溶す	コメット (黒 田)	10cc. { 5管 1.80 10管 3.40 50管 14.00 100管 27.00	治 淋 劑 隔日10cc. 静注
Gono-Urosamin ゴノ, ウロサミン		Urosamin 参照	
Gonourotin ●★ ゴノウロチン 淋菌ワクチン, 葡萄状球菌ワクチン, 葡萄糖, ウロトロピン製劑	日新醫學	10cc. { 10管 2.50 50管 11.00 20cc. { 10管 4.00 50管 18.00	治 淋 劑 隔日10-20cc. 静注
Gono-Yatoren ゴノヤトレン		Yatoren 参照	
Goto's-Pepsin 後藤ペプシン		Pepsin 参照	
Graverin グラベリン 米胚芽ビタミンB製劑	フタバ (林)	液 { 100瓦 0.65 500瓦 1.90 1肝 3.60	Vitamin-B 劑 1日10-15瓦

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Granugenol グラヌゲノール 鏡物性油劑	クノール (三 共)	液 { 50瓦 2.10 200瓦 6.75	創傷肉芽促進劑 創傷間隙充填
Gravitol ● グラヴィトール メトオキシアリルフェノールのヂエチルアミノエチルエステル (麥角代用劑)	バイエル (1.5%)	1cc. 10管 2.88 (0.025) 20錠 3.70	子宮止血劑 1cc. 皮注又は筋注 1日 3-4 錠
Green-Fesol ★ グリーン, フェゾール 綠色コロイド鐵ゾル (黑色液)	石本活生 化学 研究所	1瓦 { 10個 1.00 瓶入 { 100個 8.00	補血強壯劑 1回 0.25-1.0 冷 水に和して内服
Grelan 薬局 ● グレラン ヂエチルバルピツール酸とヂメチルアミノアンチピリンの分子結合體 用法-1回 0.3 (1日 2回迄)	柳澤藥品	2cc. { 6管 1.30 12管 2.50 50管 8.80 末 { 25瓦 2.50 100瓦 9.00 500瓦 34.00 0.3 { 10錠 0.75 20錠 1.35 100錠 3.80	非アルカロイド性 鎮痛, 鎮靜劑 1日量 0.6-1.2 瓦分3 注 1回 2cc. 1日數 回
Brom-Grelan ● ブロムグレラン グレラン 0.15 ブロムカルシウム 0.5 20cc. 中 { ブロムナトリウム 0.2 グルコン石灰 0.5 葡萄糖 2.0	全	20cc. 10管 3.20	嘔吐, 惡阻, 蕁麻疹 1日 1-2 回20cc. 静注
Salso-Grelan ● サルソグレラン グレラン 0.15 サリチル酸ソーダ 0.2 サリチル酸石灰 0.2 20cc. 中 { サリチル酸 ストロンチウム 0.1 ブロムナトリウム 0.5 葡萄糖 2.0	全	20cc. { 5管 1.90 10管 3.60 50管 16.00	肺結核, 肋膜炎, 腹 膜炎, ロイマチス 1回20cc. 静注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Grenol グレノール クリサロピンに特殊方法により重曹を和し、刺戟と副作用とを除ける製品	武田	末 5瓦 5瓶 1.10	乾癬頑癬治療劑 水を加へ糊泥状となし小水泡を發するに至つて塗布す 1日 1回
G. S. Pepton ヂー, エス, ペプトン		Pepton 327頁参照	
Guajacol-Budocarin グアヤコール, ブドカリン		Budocarin 59頁参照	
Guajacol-Blutose グアヤコールブルトローゼ		Blutose 48頁参照	
Guajacol Exihos グアヤコールエキホス		Exihos 135頁参照	
Guajacol Polytamin グアヤコールポリタミン		Polytamin 339頁参照	
Guajacose グアヤコーゼ グアヤコールスルホン酸カルチウム含有の液状ソマトーゼ	バイエル	液 150瓦 4.35	肺結核治療兼 滋養劑 1日 3-4 回約 4 瓦宛
Guajacol Paphos グアヤコールパプホス		Paphos 321頁参照	
Guaja Pappu グアヤパツプ		Maruishi-Pappu 246頁参照	
Gulzon グルゾン 硼酸, 食鹽, 鹽剝, 過満剝等の混合劑	マルコ製薬	(10錠) 10管 2.50 100錠 1.20 300錠 3.00 500錠 4.50 100瓦 0.35 液 500瓦 1.00	吸入含嗽劑 毎日 1-2 錠を吸入50cc.として含嗽 100-200cc.として

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Gurgol ★ グルゴール アウロチオフェノール, メタカルボン酸ソーダ (Triphal 参照)	武田	0.3% { 5管 3.00 1cc. { 10管 5.50 50管 24.00 1% { 5管 4.50 1cc. { 10管 8.30 50管 38.00 3% { 5管 6.00 1cc. { 10管 11.00 50管 50.00	結核治療 有機金製劑 3-7日の間隔を 置きて1回 0.5- 1.5cc. 静注
Gurimitol ㊦㊧ グリミトール アルゼノベンゾールナトリウム	浪速製薬	1-6號 時價	驅微劑 0.4%の食鹽水に 溶解し静注
Gynandol ギナンドール 結晶性卵胞ホルモン (尿性) C ₁₈ H ₂₄ O ₂ の組成を有するオキシ ケトン型ホルモンの食鹽水溶液 (結晶 1mg=10.000 國際單位) (Progynon, Unden, Oestroglandol, Theelin, Hogival, Perlatan, Mismon 参照)	友田	(1cc. 100單位) { 5管 1.00 10管 1.80 50管 7.50 (1cc. 500單位) { 5管 2.00 10管 3.60 50管 15.00 (油液) (1cc. 10.000單位) { 5管 2.50 10管 4.70 50管 22.00 (1cc. 50.000單位) { 3管 5.00 10管 16.00 (1cc. 250.000單位) 1管 7.00 (1瓦 1000單位) 25瓦 3.60 100瓦 12.80 (1錠 500單位) 50錠 3.75 200錠 13.60	卵胞ホルモン劑 子宮發育不全 月經異常 經閉期障害 性欲缺乏 性落症 乳汁分泌不全 不感症 1日 1回 1-2cc. 皮注 1日 3回 2錠宛食 前
Gynergen "Sandoz" ㊦ ギネルゲン「サンド」 麥角のエルゴタミン C ₃₃ H ₃₅ N ₂ O ₅ の酒石酸鹽 (Secartin, Ryegostin 参照)	サンド	0.5cc. { 6管 2.10 50管 13.95 1cc. { 3管 1.35 6管 2.60 50管 17.10	子宮弛緩, 産後出血, 子宮收縮不全 皮, 筋注- 1日 0.5cc. 静注- 1日 0.3cc. 内服用 15cc. 1瓶 3.10 1瓶 { 15錠 2.50 100錠 12.10 末 { 0.01瓦 時價 0.1瓦

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
------	------------	------	------

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
------	------------	------	------

Haemisin ヘミシン 10%の次硝酸蒼鉛合劑	三共	2cc. 5管 1.20 鼻科用 10管 1.10	痔核, 肥厚性鼻炎 治療劑 1回 0.3-0.5cc. 局所注射
Haemocalcin ヘモカルチン ヌクレイン, 磷酸カルシウム 鹽	大阪血清	(0.1) 250錠 2.50 25瓦 2.50 末 { 250瓦 17.00 500瓦 32.00	特殊結核治療劑 1日 3回 0.5-1.0 瓦 (5-10錠)
Haemojinal ヘモチナール トリクロール, アセトアルデ ヒド誘導體	シオミ (丸善) (太田安)	1cc. { 5管 2.00 10管 3.50 50管 10.00 10瓦 0.60 25瓦 1.30 50瓦 2.40 100瓦 4.20 300瓦 7.50 500瓦 13.00 軟膏 { 6個 0.60 12個 1.00 30個 2.30 100個 7.00 250個 11.00 500個 20.00	痔疾治療劑 1回 0.3-1.0cc. 局所注 軟膏は患部塗布 坐薬は 1-2 回挿 入
Haemorin ヘモリン 淡黄色澄明液	中村信治 藥局	15cc. 1.80	痔疾治療劑 1日 0.5-1.0cc. 宛痔核中心へ注射
Haemorrosal ヘモロザール 特殊軟膏	★ 東京新製 劑研究所	軟膏 { 100瓦 7.00 150瓦 10.00	痔核, 脱肛治療劑 局所塗布
Haemostatine ヘモスタチン 哺乳動物の肺, 脾臓, 肝臓の ホルモン製劑	★ 渡口 研究所 (アルゼ ールト) ミイ	皮注用 { 5管 1.00 1cc. { 10管 1.80 静注用 { 5管 1.50 3cc. { 10管 2.50 末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 200瓦 6.00 錠 { 50錠 1.00 200錠 3.00	止血劑 毎日又は隔日 1cc. 皮注或は 3cc. 静注 内服 1日 3回 1 瓦宛

乳酸菌整腸劑



グリコラクチン

GLYCOLACTIN

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Haemotester ヘモテスター 乾燥血精, 血液型検定剤	★ 大 木	乾燥血清 5人分 2.50 液状 2瓦 30人分 3.50 検定器付 4.00 5瓦 75人分 9.00 検定器付 9.50 検定器 0.50	血液型検定剤 説明書参照
Haemoglobin ヘモグロビン 血液ヘモグロビン製剤	大正製薬	末 { 25瓦 0.70 500瓦 9.00 0.25 { 100錠 0.70 200錠 1.20 300錠 1.65 250瓦 2.30 液 { 500瓦 3.50	補血剤 1日 2-4
Arsen Haemoglobin アルゼンヘモグロビン 砒素, ノイロヂン含有	全	250瓦 2.50 500瓦 4.00	體質改造剤 1回 8瓦 1日 3回
Calcium Haemoglobin カルシウムヘモグロビン グリセロ燐酸カルシウム, ヨ ード含有	全	100瓦 1.00 250瓦 2.30	小兒造血栄養剤 1回 4-6 瓦 1日 3回服用
Guajacol Haemoglobin グアヤコールヘモグロビン チオコール含有	全	250瓦 2.50 500瓦 4.00	呼吸器病 補血強壯剤 1回 8瓦 1日 3回
Jod Haemoglobin ヨードヘモグロビン ヨード, ノイロヂン含有	全	250瓦 2.50 500瓦 4.00	血管硬化 及造血強壯剤 同
Quina Haemoglobin キナヘモグロビン キニーネ, ノイロヂン含有	全	250瓦 2.50 500瓦 4.00	造血強壯剤 1回 8瓦 1日 3回
Haemo-type ヘモタイプ 乾燥式 血型計 (乾燥せる A型 B型の人血清)	三 共	3人分 1.80 25人分 12.00	血型判定剤 被検血液 1滴

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Haisung ハイスン 植物性酵素製剤	保田化学 (里村)	1cc. { 6管 5.00 12管 9.00 粒 { 50粒 4.00 100粒 7.50	癌腫治療剤 1日又は隔日 1回 皮下又は筋注
Hakucil-pasta ハクチール, パスター 有機硫黄剤 (ミチガール) 含 有のパスタ	★ 久 光 合名会社	500瓦 3.50	皮膚薬 患部塗擦
Hakugoko-nanko 白降汞軟膏 (モチダ式) 1-5%白降汞軟膏	中村 澁	1% 50瓦 0.95 2% 50瓦 1.00 3% 50瓦 1.05 4% 50瓦 1.10 5% 50瓦 1.15 1% 100瓦 1.80 1% 500瓦 6.50	眼科用皮膚科 耳鼻科用 外用
Hakulan ハクラン Argentum proteinicum Extractum Scopoliae Glucosum Hexamethylentetraminum Natrium acetici 含有の白色 桿子 (Spuman 参照)	★ 白 蘭 荘	1.0 { 10桿 0.75 30桿 1.80 300桿 16.50	白帯下治療剤 1日 1回 1桿頸管 竝に腔挿入
Haliva ハリバ ハリバツト魚族の肝臓より採 取せる肝油每粒3600国際 Vita- min A単位と500国際 D単位を 含む 注射液はハリバ肝油を中性無 菌液とせるもの 1cc. 6萬国際 A 単位含有	田邊元 (糖衣)	{ 100粒 2.50 球 { 500粒 10.50 (1cc.) 6管 2.50	栄養剤 内服 1日 3-4 粒 分服 注射 - 1週 1-2 回上膊又は腎筋注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Halomin ㊦ ハロミン パラトルオールナトリウム, スルホクロールアミン (局方ク ロラミン)	第一製薬	末 { 25瓦 0.85 100瓦 3.00 500瓦 12.00 0.475 { 15錠 0.30 50錠 0.90	殺菌剤 0.5-1% 水溶液 外用
Hamameris Water ㊦ ハマメリス, ウォーター (別名ウイッチヘーゼル)	三 共	{ 250cc. 1.70 500cc. 3.00	消炎剤 外用塗布
"Hama" Sescol 「ハマ」セスコール セスキテルペンアルコール	岩 城	液 { 25瓦 0.65 500瓦 9.00 0.3 { 5球 1.50 150球 4.00	治淋剤 1回量 0.5-1.0瓦 (2-3球) 1日3回
"Hama" Sulpho-salicyl- saure 「ハマ」スルホサリチル酸	全	{ 25瓦 0.35 500瓦 4.50	検尿蛋白試薬
Haonin ハオニン 麻黄, 車前草の抽出物	橋 本 (福井七) (太田安)	液 { 100瓦 0.80 500瓦 3.60 末 { 100瓦 1.50 500瓦 6.00	鎮咳祛痰剤 1日 3-6cc. (2- 3瓦)
Haribromin ハリブロミン グルコン酸カルシウム (8.5%)液	高田製薬	2cc. { 10管 0.75 50管 2.80 5管 0.80 10管 1.80 10cc. { 5管 1.10 10管 1.80 20cc. { 5管 2.00 10管 3.50	カルシウム剤 5-20cc. 皮注, 筋 注, 静注
Harmin 末のみ ㊦ ハルミン 其他 ㊦ 小亞細亞地方に産する植物 Peganum Harmala より抽出せ るアルカロイドの鹽酸鹽	メルク (シユ) (ミツト)	末 { 1瓦 9.00 5瓦 42.25 0.02 { 20球 4.45 50球 10.25 1% { 1cc. 5管 3.00 2cc. 5管 3.75	流行性脳炎後 障碍治療剤 1日 2回 1-2cc. 宛皮注 1日 2-3回 1- 2球宛内服
Harminum-hydro chloricum 鹽酸ハルミン	武 田	1% 2cc. 5管 1.50	同 上

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Harnstoff 尿素 $\text{NH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$	日本新薬	末 { 100瓦 0.50 500瓦 1.70	利尿剤 1日 15-40瓦
Harnstoff 尿素	三 共	末 { 100瓦 0.85 500瓦 3.30	利尿剤 1日量 15-40瓦
Hartoin ハルトニン ★ 海人草有效成分抽出體	日 本 薬品洋行	液 { 25瓦 0.60 100瓦 1.80 500瓦 7.50	蛔蟲驅除剤 1回 5-8 瓦頓用
Hasethrol ハセスロール ペンタエリトリット, テトラ ニトラート $(\text{O}_2\text{NOCH}_2)_2-\text{C}-(\text{CH}_2\text{ONO}_2)_2$ 白色無味無臭粉末, 注射液は無 痛油溶液	塩野義	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.00 500瓦 12.00 0.1 { 50錠 1.23 100錠 2.00 500錠 8.50 1cc. { 5管 1.00 50管 8.00	高血圧治療剤 1日 3回 0.1-0.2 瓦宛 0.1-0.3 瓦 頓用 1回 1-2cc. 皮注 又は筋注(腎筋内)
Hashiergot ハシエルゴツト 麥角の止血有效成分 (1cc. = 生麥角 4瓦に相当す)	橋本製薬	1cc. 10管 3.80	止血剤 1日 1-2cc. 皮注 又は筋注
Hashitaurin ハシタウリン アミノエチルスルホン酸ソー ダ水溶液	橋本製薬	1cc. 10管 3.80 5cc. 5管 8.50	結核治療剤 1日 1回 1.0-5.0 cc. 皮注
Hashizzen ハシツェン ジアセチル, ビスオキシフェ ニルイサチン ㊦ ㊦ 1日 0.02 (Isacen, Mileval 参照)	日新商行	0.005 { 12錠 0.18 25錠 0.25 55錠 0.50 115錠 1.00 1000錠 末 { 25瓦 7.00 100瓦 26.00 500瓦 120.00 50倍散 500瓦 3.80	緩下剤 末 1回 0.005 50倍散 1回 0.25 錠 1回 1-3錠

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Hatsumon "Comet" ハツモン「コメット」 酵母菌及2種の非病原菌の活性酵素製剤	コメット (黒田)	0.5cc. { 10管 3.20 30管 9.00 1cc. { 10管 3.90 30管 11.00 100管 33.00 2cc. { 10管 5.00 30管 13.50	結核治療剤 1回1cc.より漸次 増量2cc.に至る 皮注又は筋注
		静注用 10cc. { 10管 7.20 30管 20.00 50管 30.00	最初5cc.より漸次 増量10cc.に至る 30回を1クールとす
Hayasol ハヤゾール 硫黄コロイド溶液。微アルカリ性殆んど無色澄明液 (S=1.5%, アルコール=7%)	三共	液 { 10cc. 0.60 25cc. 1.20 100cc. 3.60	皮膚薬 患部塗布
Hectalin ヘクタリン 乳酸エトオキシ, デアミノアクリジン (Rivanol, Rjmaon, Oprival, Rivasepon 参照)	第一製薬	末 { 10瓦 4.50 25瓦 10.00 100瓦 33.50 5cc. { 5管 1.25 10管 2.30 50管 10.00 大人用 { 50錠 1.50 100錠 2.50 500錠 11.00 0.025 { 50錠 1.50 100錠 2.50 500錠 11.00 小人用 { 50錠 1.00 100錠 1.80 500錠 8.00	色素性殺菌消毒剤 外用—5百—1萬 倍液 注射—毎日5cc.静 注 内服—1日2—3 回1—2錠 宛 含嗽—5千—1萬 倍液 注腸—2千—5千 倍液
Heilmin ハイルミン 哺乳動物の新鮮肺臓有効成分	渡口研究 (中村瀧) (塩野義)	末 { 25瓦 1.50 50瓦 2.80 100瓦 5.25 200瓦 10.00 500瓦 22.00 0.3 { 50錠 1.20 200錠 4.50 5管 1.50 1cc. { 5管 1.50 10管 2.60 50管 11.00 3cc. { 5管 2.00 10管 3.50	肺結核治療剤 1日2回1回1瓦 (2—3錠) 皮注1回1cc. 静注1回3cc. 1週1回より漸次 増加

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Hektorol ヘクトロール 禾本科植物サポニンに麻黄エキスを配合 製剤—1日2瓦	ライオン 製薬 (ライオン薬局)	末 { 250瓦 500瓦 (0.32) 500錠	鎮咳祛痰剤 1日2—3瓦 (6—9錠)
Helminal ヘルミナル 海人草の乾燥エキス製剤	メルク (シュミット)	20錠 2.40	蛔蟲驅除剤 1日2回2—3錠
Helmitin ヘルミチン 卵黄油及卵黄より得たる特殊 タール質含有の淡褐色軟膏	藤澤	軟膏 { 10瓦 0.45 30瓦 0.90 100瓦 2.00 300瓦 5.00 坐薬 { 5個 0.45 10個 0.75 30個 2.10 100個 5.00	一般創傷並に痔疾 軟膏—一般創傷塗 布 坐薬—肛門挿入
Helmitol ヘルミトール アンヒドロメチレンクエン酸 ヘキサメチレンテトラミン, 白色結晶末 製剤—(製剤) 1日1—2瓦	バイエル	末 { 25瓦 2.60 250瓦 20.60 1キロ 68.60	尿道防腐殺菌剤 (淋疾, 膀胱炎, 腎盂炎) 1日3—4回0.5—1.0瓦宛
Helpin ヘルピン 1種のリポイド乳劑 (非特異性刺激剤)	● グリユー ノ (三共)	1.5cc. 10管 7.20	悪性貧血治療剤 大人1回1.5cc. 小人1回0.5—1.0 cc.
Helposin ヘルポジン パバグエリン, ヒドロコタル ニン, 及び Hyoscinhydrobro- mid の配伍剤	● 植村	1cc. { 10管 1.60 50管 7.50	鎮痛鎮静麻醉剤 1回1cc.皮注, 筋 注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Heminal ★ ヘミナール イノシット燐酸鐵, イノシツト燐酸銅, イノシツト燐酸マンガンに, オスゲン及 Vitamin B 劑ココア, 白糖を配せる美味製劑	三共	末 { 25瓦 0.75 100瓦 2.50 500瓦 10.80 0.25 { 100錠 0.85 500錠 3.40	増血劑 1日 2-4 瓦分三
Hemoglobine ヘモグロビン 牛血液のヘモグロビン製劑	マルコ製薬	0.25 { 100錠 0.85 500錠 3.50 1000錠 6.50 末 { 25瓦 0.80 450瓦 11.00	補血滋養劑 1日 3回 末 1回 1.0-1.5瓦 (4-6錠)
Hemostill ヘモスチル 特殊の動物性分泌物 (Nidus. vespaee. sp.) の有效成分	帝國製薬	末 { 25瓦 1.80 100瓦 6.50 0.2 { 50錠 1.20 100錠 2.00	止血内服劑 1日 3回 0.5 瓦宛 (2-3錠)
Hemypnon "Ciba" ● ヘミプノン「チバ」 デアリル, バルビツール酸, ヘロイン, アネゾール製劑	バーゼル (チバ)	6錠 品切	無痛分娩劑 (鎮痛半眠劑) 1回出産に 2-5 錠
Hemeralomin ヘメラロミン 大鱈の肝油注射劑, 1cc. 中 ビタミン A-600 國際單位 D-1500 國際單位 (Moriyan 参照)	福井七	乳劑 1號 1cc. { 5管 1.20 25管 5.70 50管 10.80 2號 1cc. { 5管 1.70 25管 7.65 50管 15.30 油劑 1號 1cc. { 6管 1.00 25管 3.95 50管 7.50 2號 1cc. { 6管 1.30 25管 5.25 50管 9.90	Vitamin-A.D. 劑 乳劑と之に添付せる 葡萄糖液等量を 混じり 1回 1-2cc. 皮注
Hepamin ヘパミン 牛の肝臓, 脾臓, 膽汁に Vitamin A, B 造血ホルモンを配す	日新醫學	末 { 100瓦 3.00 200瓦 5.50 500瓦 12.50 0.25 { 80錠 1.00 300錠 3.00 500錠 4.50	造血養劑 1回 0.7-1.5 瓦 毎食後服用

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Hepan ヘパン 牛肝臓有效成分の低温浸粉末 淡褐色臭味を缺く (末 8瓦は生肝 100瓦に對應) 鐵ヘパンは還元鐵含有	大日本製薬	末 { 25瓦 8.50 50瓦 6.50 100瓦 12.00 0.25 { 20錠 1.00 50錠 2.00 100錠 3.60 500錠 17.00 鐵ヘパン 0.25 { 50錠 1.20 100錠 2.20 500錠 9.00	増血養劑 末 1日 1-3 瓦 錠 1日 4-12個 (悪性貧血, ネフローゼ, 子癇, 栄養不良)
Hepatex Comp. "Evans" ★ ヘパテクス「複方劑」 肝臓中の造血成分に養劑を配す	エバンス (柳洋行)	1cc. { 12管 11.50 100管 73.00	造血養劑 1日 1-2 回 1cc. 筋注
Hepatine ヘパチン 豚の肝臓實質 (末 1瓦は生肝 4瓦に對應)	ピラ (丸善)	2cc. { 6管 5.00 12管 8.00 末 25瓦 5.00 (0.1) 60錠 3.50 包装照會中	肝臓疾患, 強壯劑 2日毎に 2cc. 皮下注 末 1日 0.5-1.0 瓦 (4-8錠)
Hepatocarnine エパトカルニン 犢肝臓より抽出せる抗貧血ホルモンを肉汁に吸着せしめたる製劑 (Carnine 76頁参照)	東洋カルニイン商會	10cc. 10管 6.50	抗貧血劑 毎日又隔日 2-3 管を水又牛乳にて稀釋して食前内服
Hepatoze ヘパトゼ 生肝臓を低温處理して得たる粉末に各種ビタミン消化酵素鐵, 蛋白, レチチン配合體	田邊元	0.25 { 120錠 2.60 500錠 9.50 末 { 25瓦 2.00 100瓦 7.00 450瓦 28.00	養血増血劑 1日 3回毎食後 1 瓦 (4錠)
Hepatoze ヘパトゼ肝汁 生肝臓と麥酒酵母の兩者より自家融解法により有效成分を抽出せる製劑 (4瓦は1ポンドの生肝臓に相當す)	全液	85瓦 2.80	補血強壯劑 1-2 茶匙を温湯に溶して 1日 2-3 回内服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Hepatoxin ヘパトキシシン 河豚の肝臓毒素溶液	田邊五	1cc. { 10管 2.50 50管 10.00	鎮痙鎮痛劑 (神經痛) ロイマチス 1回 0.7—2cc. 漸増 4cc.迄皮注
Hepracton ヘプラクトン 肝臓製劑	メルク (シユミツ)	末 50瓦 13.40 1cc. { 10管 6.35 25管 14.40 100管 50.45 2cc. { 5管 5.05 25管 22.20 100管 80.80 錠(1.0)12入2管1組 6.65	肝臓療法劑 末 1日 5瓦 錠 1日 3錠 注 毎日 2cc.筋注
Herunal ヘルナール { サリチル酸石灰 3.00% 鹽規 0.02% 沃度石灰 0.01%	橋本製藥	20cc. { 10管 2.60 50管 12.50	消炎, 解熱利尿劑 20cc.より漸次増量 30—40%に至る静注
Herurol ヘルウロール サリチル酸カルシウムカフェイン, テオフィリン鹽溶液	日新醫學	10cc. { 10管 1.80 50管 8.00	利尿強心劑 1日 1回 1管静注 小兒筋注
Hesaciramin ヘサチラミン ヘキサメチレンテトラミン (約30%)にマグネシア複鹽を配伍す	ラヂウム製藥	5cc. { 6管 1.50 12管 2.80 60管 12.00 100管 16.50 10cc. { 6管 2.00 60管 14.50	膀胱尿道炎 1回 5—10cc.静注
Neo-Hesaciramin ネオ, ヘサチラミン { ヘサチラミン 5cc. 20cc. { 20%葡萄糖液 15cc. プロム鹽適宜	全	20cc. { 5管 1.65 10管 3.00 50管 12.50	腎盂炎, 膀胱炎 敗血症, チフス 流感, 肺炎 1日 1—2回 20cc. 宛静注
Heterogen ヘテロゲン 白痢菌製劑 (非病原性異菌抗原)	同仁製藥	(4錠) 1人分 0.80	腸チブス パラチフス豫防劑 毎朝食 1時間前 2錠宛内服 2日間連用, 十歳以下は 1/2量

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
ヘテロゲン 「二號」	同仁製藥	1人分 6錠 1瓶入り 2.30	赤痢, 疫痢 内服豫防劑
Hexanon ヘキサノン 40%ウロトロピン, 0.5%硫酸マグネシア, 5%葡萄糖液	三菱製藥	5cc. { 5管 1.50 10管 2.50	尿閉症, 尿消毒劑 5—10cc.を毎日一隔日静注
Hexa E. P. B. ★ ヘキサ パラオキシ安息香酸のエステル { E=エチルエステル P=プロピルエステル B=ブチルエステル	第一製藥	ヘキサE 時價 { 25瓦 100瓦 500瓦 ヘキサP { 25瓦 100瓦 500瓦 ヘキサB { 25瓦 100瓦 500瓦	防腐保貯劑 (浸煎劑, 果實蜜) 0.1—0.5%を用ふ
Hexsatin "Futaba" ヘキサチン 「フタバ」 40%ヘキサメチレンテトラミン, 0.5%硫酸マグネシア溶液	フタバ (林)	5cc. 6管 1.50	尿路消毒劑 1回 5—10cc.静注
Hexatropin ヘキサトロピン 40%ウロトロピン 0.5%硫酸マグネシア液	日新醫學	5cc. { 10管 1.20 50管 5.50	尿路殺菌 1日 1回 5cc.静注
Hexa-Urtin ヘキサウルチン 1錠中 { ウフウルチン 0.25 ウロトロピン 0.25 (Uvaurtin 参照)	萬有製藥	0.5 { 100錠 1.20 500錠 5.50 1000錠 10.00	治淋劑 1日 3回 1回 2—3錠
Hexorcine "Eanyu" ★ ヘキゾルチン 「萬有」 ヘキジル, レゾルシノール千倍液	萬有	液 { 100cc. 0.80 500cc. 2.50	殺菌劑 外科, 耳鼻科用殺菌劑として外用

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Hidrofugal ヒドロフガール 鹽化アルミニウム, 硫酸アルミニウム, 醋酸アルミニウム, レゾルチン, クロールチモール溶液	ドクトル ホーテ (ホルス タイン)	液 20瓦 1.50	多汗症 ワキガ治療剤 1日数回塗布
Himaol ヒマオール 芳香ヒマシ油	三 共	{ 30瓦 0.15 500瓦 1.30	緩下剤 1回20-30瓦
Himasen ㊦㊧ ヒマーセン「コメット」 ネオアルゼノベンゾール	黒 田	1-6號 時價	驅微劑 靜注
Hinterin ㊦ ヒンテリン 腦下垂體後葉ホルモン製劑 (0.5%クロレトン含有) 1cc.=Voegtlin 標準後葉 0.5 瓶に相當	三 共	0.5cc. { 8管 1.20 10管 3.50 30管 9.00 1cc. { 8管 2.10 10管 6.50 30管 18.00	陣痛催進 子宮出血防止 夜尿症, 喘息 1回 0.3-1cc. 皮注又は筋注
Hiotinin ヒオチニン	三 共	甲乙各液10cc.入 1箱 1.50 甲液10cc. 0.80 乙液10cc. 0.80	清酒の火落豫知劑 被檢酒に本劑を加へ白濁の程度により火落の危険を豫知す
Hiposarcine Roy ヒポサルシン, ロイ 筋肉プラスマより抽出せる舍利別狀の生肉エキス	小 田 井 商 店	液 { 試用瓶 1.50 300瓦 4.80 600瓦 7.00	滋養強壯劑 1日3回 2-6 食匙宛
Hipotobery ㊦ ヒポトベリー 亞硝酸鹽製劑	日新醫學	1.1cc. { 10管 2.00 50管 9.00 末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.00 500瓦 8.50	高血壓治療劑 毎日1回 1cc. 皮注 1日 2-3 瓦毎食後分服
Neo-Hipotobery ★㊦ ネオ, ヒポトベリー 琥珀酸エチレンジアミン, 亞硝酸及テオプロミン製劑	日新醫學	10cc. { 10管 2.70 50管 12.00	血壓下降, 利尿劑 1日1回10cc. 靜注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Hirao-Vitamin-B 平尾ビタミンB (略名ヒラB) ビタミンB劑	新良貴 (中 央) (新 藥)	1cc. { 5管 1.00 30管 5.70 液 { 100瓦 1.20 450瓦 4.50 50錠 1.25	Vitamin-B 劑 1日1回 1cc. 皮注 内服 1日10cc. (10錠)
Hisagosulin ヒサゴスリン セスキテルペンアルコール 漢液-1日 8瓦	マ ル コ 製 藥	液 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 16.00 1キロ 30.00 5キロ 120.00 10キロ 230.00 0.8 { 20球 1.00 50球 2.00 100球 3.50 500球 17.00 1000球 30.00	治 淋 劑 1日3回 1-2 瓦 (2-3球) 宛 毎食後直ちに内服
Hishi-Carbon ヒシカーボン 吸着力強き無晶形純炭素末 (薬用及び木内氏尿診断用)	日本新藥	100瓦 2.00	内服及尿診断用 1日3回 0.5-3.0 瓦
Hisorin ㊦㊧ ヒソリン アルゼノベンゾール	浪速製藥	時價 1號 0.1 2號 0.2 3號 0.3 4號 0.4 5號 0.5 6號 0.6	驅 微 劑
Hisovalsan ★ ヒソヴァルサン メタアセチル, アミノパラオキシフェニルアルジン酸 (Spirocid 参照)	小 林 薬 化学	末 { 10瓦 6.00 50瓦 29.00 0.1 { 20錠 2.50 100錠 12.00	微毒(殊に乳兒) アミーバ赤痢 治 療 劑 1日 0.6-0.7瓦(6-7錠) 分服 (説明書参照)
Histament A. ★ ヒスタメント「エー」 ヒスタミン, サリチル酸メチル, メントール配合の軟膏	寶 製 藥	チューブ { 10瓦 0.65 25瓦 1.10 50瓦 2.30 100瓦 4.50 250瓦 8.00 500瓦 14.00	皮膚, 消炎劑 1日 1-2 回患部塗擦

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Histament B. ★ ヒスタメント「ビー」 0.2% ヒスタミン含有ラノリン軟膏	賣製薬	10瓦 0.65 20瓦 1.10 100瓦 4.50 250瓦 8.00 500瓦 14.00	皮膚薬 患部塗擦
Histidin "Panyu" ★ ヒスチジン注射液「萬有」 4% 鹽酸ヒスチジン溶液 (Larostidin, Isuleus, Sanostidm, G. schwin 参照)	萬有	5cc. { 5管 1.75 10管 3.40 50管 16.00	胃潰瘍, 十二指腸潰瘍注射剤 毎日 5cc. 筋注
Histidine "Evans" ★ ヒスチジン ヒスチジン溶液	エバンス (柳韓洋行)	5cc. { 6管 8.40 25管 34.20	胃, 十二指腸潰瘍治療剤 1日 1回 5cc. 宛筋注又は皮注, 約 3 週間連用
Hodin ホーデン 米胚芽を原料とせるビタミン B	中央製薬 (浅川)	1cc. { 5管 0.70 10管 1.25 2cc. { 5管 1.00 10管 1.80 3cc. { 5管 1.45 50管 11.00 5cc. { 5管 2.00 10管 3.50 液 { 100瓦 0.80 500瓦 3.00 末 { 25瓦 0.60 100瓦 1.80 500瓦 7.00 0.3 { 50錠 0.70 100錠 1.20	Vitamin B 剤 注射 1日 1回 1-5cc. 皮下 内服 1日 液 6-12cc. 末 2-3 瓦 錠 6-9 錠
Hodojin ホドジン パラヂクロールベンゾール	保土谷 曹達	{ 20錠 0.30 40錠 0.50	衣類防虫剤 ナフタリンに做ふ
Hokatsu Kobo 胞活酵母 薬用酵母にプロテアーゼジアスターゼ等の消化剤を配す	三才商會	500瓦 2.60	酵母消化剤
Hoko-Cresol 芳香クレゾール液	Maruishi Aromatic Sapo Cresol 245頁参照		

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Homacoin ● ホマコイン 2 パラアニシル, 1 パラフェネチルグアニダンの鹽酸鹽 (Acolin 参照)	櫻木	1瓦 1.20	局所麻酔剤 浸潤麻酔は 0.1% 液 角膜麻酔は 1% 液
Home-ment ホームメント グルコーゼ, サリチル酸エステル含有のクリーム剤	マルコ製薬	{ 5瓦 0.15 10瓦 0.25 25瓦 0.55 50瓦 1.00 250瓦 4.50 500瓦 8.00 3.5瓦入 { 10個 1.60 120個 18.00	皮膚薬 1日数回 0.5-2.0 瓦塗擦
Home-Plaster ホームプaster	ヒシイチ絆創膏 472頁参照		
Homoflavin "Banyu" ホモフラヴィン「萬有」 3.6 ギアマミノ 10. アクリヂニウム, クロリッドを中性となしたるもの (注射用) (Trypaflavin 参照)	萬有製薬	末 10瓦 時價 0.5% { 10管 1.00 5cc. { 50管 4.00 10cc. { 10管 1.50 50管 5.50	深達性殺菌消毒薬 注射 1日 5-10cc. 静注 内服 1日 0.1 分3 外用 0.1-1.0% 液 又は 1-2% 軟膏
Hopalet ホパレット 濾膜透析法によるホップ及び縲草根有效成分抽出體	チーマ (田邊元)	{ 100錠 2.40 500錠 10.00	鎮静催眠剤 鎮静に 1日 3回 3錠宛 催眠に夕 6時 4-5錠, 就床時 4-5錠
Hopieki ホビエキ (保鼻液)	櫻木 (綿棒付)	25cc. 1.00 (綿棒スプレー付) 25cc. 2.00 100cc. 2.50 500cc. 10.00	鼻カタル 臭鼻症, 鼻閉 鼻腔塗布又は噴霧
Hornephrin ★ ホルネフリン 哺乳動物腎臓より抽出せるホルモン様物質	中村瀧 (塩野)	2cc. { 5管 1.50 10管 2.80 50管 12.50 末 { 25瓦 2.50 100瓦 9.00	利尿剤 1回 2cc. 皮注 1日 3回 0.3-0.5 瓦宛内服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Hosal ホザール 造鹽素イオンを有せず極少量のナトリウム陰イオンを含有する多アミノ酸カルチウムナトリウム複鹽 (Riken-Yukten 参照)	パード (ホース) タイン	末 { 15瓦 1.80 60瓦 5.00 250瓦 12.00 (品切)	非食鹽性 食餌療法劑 1日 2-3 瓦 食鹽代用として調味服用せしむ
Humagsolan フマグソラン 毛髮蛋白主成分チスチン製劑	フアツ チンガー (三共)	180錠 品切	内用毛髮榮養劑 1日 3回 2-3 錠 宛
Husgen フスゲン Papavercaee Campanulaceae Malvaceae 植物有效成分	三星 (鳥居)	液 { 250瓦 1.50 500瓦 2.40 1キロ 4.30 末 { 100瓦 1.70 250瓦 3.40 500瓦 6.20 0.2 { 30錠 0.30 60錠 0.50 150錠 1.10 600錠 4.00 シロップ { 80瓦 0.30 60瓦 0.50 150瓦 1.10	鎮咳劑 液 - 1日 5-10瓦 末 - 1日 2-4 瓦 錠 - 1日 10-20錠 舎 - 1日 10-20瓦
Hustagin フスタギン 車前草有效成分 (非サポニン配糖體)	藤永 (三共)	末 { 25瓦 0.90 100瓦 3.20 500瓦 12.00 1キロ 16.50 5キロ 67.00 液 { 100cc. 1.60 250cc. 3.50 500cc. 6.00 1000cc. 10.80 (0.25) 100錠 1.00	鎮咳祛痰劑 1日 1.5-3.0 瓦 6-12錠 3-4cc.
Hustol "Cemet" フストール (コメット) Campanulaceae 及び Genta- ceae 植物サポニン製劑	コメット (黒田)	液 { 100瓦 0.90 250瓦 2.00 500瓦 3.60 粒末 { 100瓦 1.30 250瓦 3.00 500瓦 5.60 錠 100錠 1.20 シロップ { 40瓦 0.60 100瓦 1.20 250瓦 2.50 500瓦 4.50	鎮咳祛痰劑 液 1日 3-5 瓦 末 1日 1-2 瓦 錠 1日 6-9 錠

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Neo-Hustol ネオ, フストール ヨード鹽を附加せるフストール	コメット (黒田)	液 { 100瓦 1.20 250瓦 2.50 500瓦 4.60	鎮咳祛痰劑 1日 3-5 瓦食間 分服
Hustomatin フストマチン 特殊リポイドに有機性沃度を 配伍したる油狀溶液	日新醫學	1.1cc. { 10管 1.50 50管 7.00	百日咳治療劑 毎日又は隔日皮注
Hybratin "Limit" ヒーブラチン (リミット) スルフォサリチル酸水銀製劑	浪速製藥	筋肉用 { 10管 1.50 1cc. { 50管 7.00 静脈用 { 10管 3.80 5cc. { 50管 14.50	驅微劑 筋注 0.2-0.5cc. 静注 2-5cc.
Hygiama ヒギアマ 萌芽せる穀物を主とし牛乳を 佐とし之にコ、ア其他の榮養分 を加へたるもの	タイン ハルト (三共)	末 { 125瓦 2.85 300瓦 5.40 500瓦 8.00	美味滋養劑 1日 1茶匙乃至 3 茶匙
Hygytol ヒギトール サリチル酸水銀より誘導した る可溶性チアンカリ複鹽 (Hg...0.6%含有)	ラヂウム 製藥	筋注用 { 12管 1.20 1.1cc. { 50管 4.30 静注用 10cc. 6管 1.50	驅微利尿劑 驅微には隔日 1cc. 皮注, 筋注, 静注 利尿には 1回 2- 3cc. 筋注
Hydein ヒデイン 車前子中のグリコシード (非サポニン性)	ラヂウム 製藥	末 { 25瓦 0.90 100瓦 3.20 500瓦 12.00	鎮咳祛痰劑 1日 1-3 瓦 2回 分服
Hydonocarin ヒドノカリン 大楓子油總脂肪酸のエチルエ ステル。油狀液 $C_6H_7(CH_2)_{10}COOC_2H_5$	日本新藥	注射用 { 1cc. 6管 2.50 2cc. 6管 4.80 5cc. 3管 5.50 25cc. 1管 8.00 内服用 100cc. 瓶 25.00 (0.3) 100球 4.50	治癒劑 注射 1回 1管筋注 漸次増量 内服 1日 2回 0.3 -5.0 漸次増量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Hydonol ヒドノール 大楓子油のヒドノカルブス酸 エチルエステルの沃度化合物	大日本製薬	{ 1cc. 6管 6.00 2cc. 6管 11.00 3cc. 6管 15.50 5cc. 5管 20.00	治癒劑 筋注 1日 1cc.より 漸次増量
Hydonocarpus oil capsules 大風子油球	石川(丸善)	0.3 { 50球 0.80 100球 1.50 500球 6.00	治癒劑 1日 3-5 球
Hydralgine "Banyu" ● ヒドラルギン「萬有」 1メチル 2オキシ 4ニトロ 3.5 ジアセトオキシ水銀ペンゾール	萬有製薬	500倍液 50cc. 1.00	尿道洗滌劑 5千-1萬倍液尿道 注入又は患部洗滌 (淋疾)
Hydronal ★ ヒドロナール コロイド状水酸化アルミニウム	バイエル	末 { 25瓦 1.95 100瓦 7.00 (0.5) 30錠 1.95 (多角形小錠)	制酸劑 (胃酸過多) (胃潰瘍) 1日 5瓦 (10錠) 毎食前分服
Hynax 圃 ハイナックス 特殊芳香油	日本香料(日本新薬)	400瓦 0.60	防臭劑 撒布
Hypal ヒパール チオノールカルシウムと薬用炭含有の軟膏	大日本製薬	{ 10瓦 0.25 25瓦 0.45 軟膏 { 100瓦 1.00 500瓦 3.80 1000瓦 6.50	火傷藥 患部貼付
Hypnal ● ヒブナール フェニル, エチル, ヒダントイン, 白色無味無臭結晶粉末	日本薬品洋行	末 { 25瓦 3.40 100瓦 12.20 0.1 { 20錠 0.90 50錠 1.60 100錠 3.00	鎮静催眠劑 1日 0.3-0.6 瓦 分3 頓服 0.1-0.3 瓦
Hypo-Apo ● ヒポアポ 珪酸, 亜硝酸, ヨード, プロム, テオプロミンカルチウム, 及水酸化マグネシウムより成る均質合劑 白色粉末, 水に難溶	鳥居	末 { 25瓦 2.10 100瓦 8.00 ● 500瓦 36.00 錠 { 60錠 1.70 120錠 3.20 ● 600錠 14.00	動脈硬化治療劑 末 1日 2-3 瓦分 3 錠 1日 9-12錠分 3

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neo-Hypo-Apo ● ネオ, ヒポアポ 燐, 亜硝酸, ヨード, チエチルアミンの合成溶液, アルカリ性, 酸を滴下すればヨードを遊離す	鳥居	1.1cc. { 10管 3.40 50管 15.00	動脈硬化, 腦溢血, 血圧亢進, 狭心症, 1日 1回 1cc. 筋注 又は皮注, 漸次減量
Hypocain ●● ヒポカイン アミノ安息香酸エチル (NH ₂ C ₆ H ₄ -COOC ₂ H ₅) ●● 一内用1日 1.0 外用醫範	塩野義	末 { 25瓦 2.00 100瓦 6.50	局所麻酔劑 内用 1回 0.2-0.5 瓦 外用 0.3-10% 撒布劑又は軟膏と して
Hypoform ヒポフォルム メタアミド, パラオキシ, 安息香酸メチルエステル, 白色結晶性粉末, 水に難溶 C ₆ H ₃ (NH ₂)(OH)COOCH ₃ (Orthoform 参照)	塩野義	25瓦 4.80	局所麻酔劑 内服 0.2-0.5 瓦 (胃痛, 胃潰瘍) 外用 1-10%軟膏 又は撒布劑
Hypohorin ヒポホリン 腦下垂體前葉ホルモン { 注 1cc. = 新鮮牛腦下垂體前葉 末 1瓦 = 〃 0.1瓦 錠 1個 = 〃 6.0瓦 0.6瓦	武田	1cc. { 5管 2.80 10管 5.50 30管 12.70 末 { 10瓦 7.00 25瓦 15.60 50錠 3.90 100錠 7.00 300錠 19.50	生殖器發育不全 (性上ホルモン) 1日 1回 1-2cc. 皮注又は筋注 末 1日 0.3-0.6 瓦 (3-6錠) 分3 食後
Hypophyse ヒポフイーゼ 牛又は羊の腦下垂體前葉ホルモン	ビラ(丸善)	1cc. { 6管 4.50 12管 8.00 末 25瓦 品切 (0.15) 60錠	發育不全 隔日 1cc. 皮注又筋 注末 1日 0.5-1.0 瓦
Hypophysin "Stark" ヒポフイジン「強」 羊の腦下垂體後葉ホルモン 1cc. = フェグトリン 10單位	バイエル	0.5cc. { 3管 2.88 10管 7.90 1cc. 5管 4.45	陣痛催進劑 筋注又は皮注 0.3 -0.5cc.

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Hypophysine ヒポフィジン 羊の脳下垂体全腺ホルモン 末 1瓦は新鮮全葉 5瓦に相当す	ビラ (太田安)	2cc. { 6管 3.80 12管 6.00 末 { 10瓦 3.85 25瓦 9.00 60錠 3.50	脳下垂体機能不全 (神経病, 巨大症) 隔日 1管筋注 (0.5 -1.0 瓦内服)
Hypo-Renin ヒポレニン 大脳下垂体後葉製剤 1cc.=フェグトリン10単位	ゲデオ (田邊元)	0.5cc. 6管 1.80 1cc. { 3管 1.50 6管 2.70	陣痛催進剤 娩出期 1-2 筒皮注
Hypotan ★◎ イポタン錠 ブロムαメチル, アセチルヒ ヨリン, プロモニコリンプロミ ド, クロラルヒドラーの錠	ルマツト ボアノ (東洋 カルニ イ)	44錠 4.85	血圧降下剤 1日 4-6 錠食前 分服
Hypotonin ヒポトニン錠 $2(NO_2)_2C-(CONH)_2Na-C_2H_5$ の組成を有する無晶形物質	白井松	末 { 25瓦 2.80 50瓦 5.50 100瓦 10.00 250瓦 23.50 500瓦 45.00	動脈硬化治療剤 末-1日量 0.5- 1.0 毎食後分 服
Neo-Hypotonin ネオヒポトニン 注射用 1%水溶液		0.18 { 60錠 1.65 120錠 3.00 360錠 7.50 600錠 10.50 1.1cc. { 10管 3.80 50管 17.50	錠-1日量 6錠 注-毎日 0.8-1.0 cc.皮注 血圧下降せざる 場合は朝夕 2回 注射
Hypotin ◎ ヒポチン Rhocadinae 及 Solanaceae 植 物アルカロイド溶液 (モヒ代用-非毒薬)	田邊五	1cc. { 6管 1.40 12管 2.60 60管 9.60	鎮痛鎮痙剤 (胃痙, 膽石, テネズムス 子痙, 狭心症) 1回 1cc.皮注 1日 5回迄
Hypotonal ヒポトナール 琥珀酸エチレンジアミン, 白 色粉末	武田	末 { 25瓦 3.20 100瓦 12.20 (0.2) 50錠 1.80	高血圧前駆症 1日 1-2 瓦 (6-3 回分服)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ibrorin イブロリン リンゲル液のクロール鹽に代 るにブロム鹽を以てせるブロム リンゲル液	塩野義	100cc. 1.00 500cc. 1.20	鎮静リンゲル液 リンゲル液に同じ
Ibs ㊦ イブス カシヤ, オキシデンタリス成 分	堂島	液 { 30cc. 0.35 50cc. 0.50 225cc. 1.50	蟲毒治療剤 數滴塗布
Ichitalbin イヒタルビン イヒチオールと蛋白質との抱 合物	クノール (三共)	25瓦 4.05	急(慢)性腸加答兒 治療剤 1回 1.0 瓦 1日 3 回
Ich-Puph イヒパフ イヒチオール含有の巴布劑	田邊元	{ 100瓦 0.45 250瓦 0.90 500瓦 1.50 2000瓦 4.50	消炎巴布劑 リントに展じて患 部へ貼付
Ichthylos ◎ イヒチロス 特殊ハルツのコロイド, 酸化 亜鉛, ベタナフトール, 可溶性 カンフル軟膏	日新醫學	軟膏 { 50瓦 1.30 250瓦 4.20 500瓦 7.50	丹毒治療剤 3-6 時間毎に塗 布
Icoral イコラール m オキシ, n エチル・デエチ ルアミノ, エチルアミノベンツ オール及びオキシ, フェニル ロペノールアミンの各鹽酸鹽を 4:1 の割合に含有す	バイエル	0.5% { 2管 1.45 1cc. { 25管 9.95	循環系呼吸中枢 興奮劑 筋注 1回 1cc. 皮注 1回 1-2cc. 静注 1回 1/2-1cc.
Ictermin イクテルミン デキストローゼ, 沃度カルシ ウム, ウロトロピン製剤	フタバ (林)	20cc. 5管 2.50	ワキル氏病治療剤 毎日或は隔日 20cc. 静注

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Ictemin イクテミン 茵陳蒿(かはらよもぎ)有効成分抽出物	三共	末 { 25瓦 0.85 100瓦 2.65	黄疸治療劑 1日 1.5—2.0 瓦
Idechigen イデチゲン 微毒の血液着色診断劑	★ いわしや(大磯商店)	試薬 { 10管 2.00 20管 3.50 用具一揃 3.50 海外行 試薬 25管 5.00 用具一揃 5.00	微毒診断藥 1管は20人迄試験し得
Idracafin イドラカフィン 1錠中 { アスピリン 0.5 カフエイン 0.05	リーデル(ホース)タイン	(0.5) 20錠 1.00	解熱鎮痛劑 1日 3回 1—2 錠宛
Igrosin イグロシン サリチルアリルアミド醋酸ナトリウムの水銀化合物 10%と 1.3 dimeチルキサンチンの 3% 溶液 (Salyrgan 参照)	● 武田	1cc. { 10管 2.00 50管 8.50	驅微, 利尿劑 2日置きに 0.5—1.0 cc. 筋注又は静注
Ikeda-Taurin 池田タウリン アミノエチルスルホン酸製劑	日本製藥(太田安)	5% 1cc. { 10管 1.20 6管 3.00 30管 12.00 10% 5cc. { 6管 6.00 30管 24.00 純結晶 { 5瓦 7.50 25瓦 35.00 錠 { 6錠 1.50 270錠 5.00	結核治療劑 1回 1—10cc. 皮注又は静注
Ikutager イクタゲル 二酸化珪素, 酸化アルミニウム, 酸化カルシウム, 酸化マグネシウム製劑	イチヂク製藥	末 { 500瓦 0.60 1000瓦 1.20 10000瓦 10.00	消炎, 鎮痛, 消毒劑 軟膏又はパスタとして外用

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Iliren イリレン 副腎皮質ホルモン製劑 (1丸は新鮮皮質 3瓦に 相当) (Interenin, Enex 参照)	★ バイエル	30粒 11.40	鹽類, 含水炭素, 代謝並に循環機能促進劑 毎日 2—3 回 1—2 丸宛
Iloglandol イログランドール インシュリン製劑 (1 cc. は新10單位) (195頁参照)	ロシユ(日本)ロシユ	1.1cc. 6管 2.85	糖尿病治療劑 1—6cc. 皮注 血糖及尿糖の量によりて定む
I. M. アイ. エム (舊名. イスモリザン)	振東化學	20cc. 5管 5.00	モヒ中毒治療劑 1日 3回以上 20—50cc. 静注
Imamicol イマミコール スルホサリチル酸水銀ナトリウム鹽 10% 水溶液 (水銀 2.75%)	● 三共	1cc. 15管 1.20 5cc. 3管 1.20 30cc. 1管 1.80	驅微劑 筋注 0.5—1.0cc. 静注 0.5—5.0cc.
Neo-Imamicol ネオイマミコール 上マグネシウム鹽溶液 (水銀 0.8%)	● 三共	ネオ 1cc. 15管 1.20	同上, 作用緩和
Iminol イミノール アガリチン, パパベリン, テオフィリン, カフェイン製劑	● ボーリンゲル(三共)	0.25 { 10錠 1.85 100錠 15.00	喘息豫防劑 發作前 1錠内服
Immunisin "Takeda" インムニジン「タケダ」 牛黄の有効成分と同一集成を有する物質, 淡褐色粉末	● 武田	末 { 10瓦 2.00 25瓦 4.50 50瓦 8.00 0.2 { 12錠 0.80 50錠 2.80	細菌性腸疾患 (チフス) (赤痢, 腸炎) 1日量 1.0—1.5 分 3 毎食前 錠は 2錠宛 毎食前
Incisin インチジン 螺旋附装置容器に封入せるクロールエチル	● 第一製藥	噴射管入 { 50cc. 1.80 100cc. 2.30	局所麻酔劑 局所噴射又は覆面へ点滴
Indigomin AA インヂゴミン 1cc. 中. インヂゴカルミン 0.08 食鹽 0.1 含有の溶液	● フタバ	注 10管 1.60	腎臓膀胱機能検査 1管を 20cc. の水に溶解して筋注

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Indramin インドラミン 鹽酸キニーネ尿素 (注射液 2%)	ラヂウム 製薬	末 { 10瓦 2.50 23瓦 6.00 100瓦 19.00 0.1 { 10錠 0.50 20錠 0.90 100錠 3.00 1.1cc { 1管 1.20 12管 2.00 50管 6.50 3cc { 1管 1.50 12管 2.70 5管 8.00 5cc { 1管 1.80 12管 3.20 50管 10.00	肺炎, 扁桃腺炎 マラリヤ 百日咳 アングーナ 1日末 0.3-0.5 瓦錠 3-5 個 注 1-2 筒筋注又 は静注
インドラミン獣醫用 ★	全	2% 50cc. 1管 4.50	デイステンパー 肺炎, 腺疫 馬匹には50cc.小動 物(犬) 3-5cc. 筋 注又は静注
Infantina インファンチナ 溶解性含水炭素, 消化澱粉	タイン ハルト (三共)	末 { 125瓦 1.10 300瓦 2.80 500瓦 3.50	乳兒栄養品 牛乳に補加して
Inhepton インヘプトン ● ヘプラクトンに砒素, ストリ キニーネ, 磷を配合せしめたる もの (Hepracton 180頁参照)	メルク	1cc. { 5管 3.65 10管 6.35 50管 27.10 100管 47.15	増血強壯劑 1回 1cc.筋注
Inkretan インクレタン ★ 甲状腺エキス, 腦下垂體エキ ス, 各種ビタミン, カルチウ ム, 鐵含有の製劑	プロ モンタ (ホルス タイン)	錠 { 25個 8.80 50個 16.00	甲状腺適應症 1日 3回 1錠宛毎 食後服用
Inselin ● インゼリン 膵臓ランゲルハンス氏島有效 成分 (195頁参照)	友田	1cc. 10單位 5cc. { 1管 1.00 4管 3.80 10管 9.00 1cc. 20單位 5cc. { 1管 1.65 4管 6.40 10管 15.20	糖尿病治療劑 1日 1筒皮注

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Insulin "Trent" ● インシュリン「トロント」 膵臓ホルモン (Minglin Hogland 参照)	トロント (三共)	5.0cc. 1瓶 1.70 (1cc. 10單位) 10.0cc. 1瓶 3.50 (1cc. 20單位)	糖尿病, 敗血症 治療劑 血糖及尿糖の量に 依り定む
Insulin "Leo" ● インシュリン「レオ」 膵臓ホルモン	ダニツ シユ (小田井)	1cc. 20單位 5cc. { 1瓶 1.50 10瓶 14.00 1cc. 40單位 5cc. { 1瓶 2.90 10瓶 27.00	
Insulin "Lily" インズリン「リリー」	リリー (塩野義)	50單位 5cc. 1.80 100單位 10cc. 3.45 100單位 5cc. 3.15 200單位 10cc. 6.10 400單位 10cc. 11.00	
Insulin "Novo" ● インシュリン「ノボ」 内服用インシュリン Inve lin 196頁 参照 Langerin 227頁 参照	岩城	5cc. = 50單位 { 1本 1.00 10本 8.00 5cc. = 100單位 { 1本 1.90 10本 15.00 5cc. = 200單位 1本 3.80 5cc. = 400單位 1本 7.50	
Insulin "Schering" インズリン「シエーリング」 ● 膵臓のランゲルハンス氏島の 全有效成分	シエー リング (田邊五)	100單位 5cc. 瓶入 2.90	糖尿病治療劑 特殊用量, 皮注
Dry Insulin ● ドライインズリン 特殊包装にして, 使用直前迄 乾燥状態を保有せしめ, 高温地 帯に於ても長期保存に耐えしむ	全	100單位 5cc. 瓶入 3.95	同上 溶解して皮注
Intelligen A. B. ● インテリゲン ① { 乾燥甲状腺及胸腺 0.025 腦下垂體全腺 0.036 乾燥松果腺 0.02 ② { 胸腺 0.025 腦下垂體全腺 0.045	三共	① 100錠 6.00 ② 100錠 12.00	生長障害治療劑 1日 3回 1-2 錠 宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Interenin インテレニン 副腎皮質成分 {液 1cc. は新鮮副腎皮質 0.1 瓦 末 1瓦は 6瓦に對應す (Enex 参照)	武 田	1cc. { 5管 1.85 10管 2.50 末 { 10瓦 4.00 25瓦 9.20 0.1 { 50錠 2.20 100錠 4.10 300錠 11.80	糖尿病, アヂソン氏病治療劑 1回 1cc. 宛 1日 1—2 回皮注 1日 0.3—0.6 瓦 (3—6錠) 分3 食後又は食間
Intestinol インテスチノール 膀胱, 炭末製劑	ヘンシング (三共)	{ 60錠 1.75 120錠 4.25	健胃消化劑 1日 3回 1—2 錠宛
Introcid イントロチッド 特殊のヨードとセリウムとの化合物	武 田	10瓦 1瓶 4.20	悪性腫瘍治療劑 1—2—4cc. 静注
Inverin インベリン 膀胱の糖新陳代謝調節作用ある特殊有効成分	武 田	末 { 25瓦 5.00 100瓦 18.00 0.1 { 100錠 2.60 300錠 7.20	糖尿病内服藥 1日 2—3 瓦分3 錠 1回 6—10錠食前30分
Invert Zucker インベル糖注射液 [萬有] 蔗糖加水分解による轉化糖液等張 (5%) 高張 (10—50%)	萬有製藥	10% { 10cc. 10管 1.35 20cc. 5管 0.80 50cc. 3管 1.05 20% { 20cc. 5管 0.85 50cc. 3管 1.10 50% { 20cc. 5管 1.70 5% { 100cc. 2管 1.00 300cc. 1管 1.05 500cc. 1管 1.45	栄養, 強心, 解毒劑 葡萄糖注射液に同じ
無水インベル糖	全	末 { 100瓦 0.80 500瓦 2.50	栄養, 強心, 解毒劑 葡萄糖に倣ふ
Iproban イプロバン イソピロピル, β ブロム, アルバルピツール酸	丸善 (鳥居)	末 { 10瓦 3.80 25瓦 8.50 100瓦 30.00 0.1 { 8錠 0.30 10錠 0.75 50錠 3.30 100錠 6.00	催眠鎮靜劑 催眠—1回 0.1 頓用 鎮靜—1日 0.15—0.4 分3

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ipsiron イプシロン 酵母蛋白分解物とフォルムアルデヒド結合物及乾燥肝臓實質配合體	高師濱化学 (伊藤由)	末 { 50瓦 2.75 115瓦 5.50 250瓦 11.00 500瓦 20.00 0.84 { 100錠 2.50 230錠 5.00 500錠 10.00	結核治療劑 1日 3回 2錠宛 末 1日 2—3 瓦分3
Iracmin イラクミン ウロトロピン30%液にマグネシウム鹽を配す	橋本製藥	5cc. 10管 2.00 10cc. 10管 2.50	尿路防腐劑 5—10cc. 静注
Irmerin "Takeda" イルメリン [タケダ] 鹽酸パラオキシベンチルグアニヂンの 5%水溶液 (末及錠は硫酸鹽)	武 田	5% 1cc. { 10管 1.60 50管 6.75 5% 5cc. { 5管 1.85 10管 3.55 20cc. 5管 6.50 内服用 { 25瓦 2.00 末 { 100瓦 7.00 0.1 { 20錠 1.50 45錠 3.00 100錠 6.00	止血劑 皮注 1回 1cc. 静注 1回 0.5cc. 内服 1日 1.5—2.0 瓦分3
Irradol イラドール ビタミンD含有油狀液 (肝油の 250倍ビタミン含有) (Vigantol. Ovoral 参照)	パークデビス (三共)	10cc. 1瓶 4.00	佝僂病治療劑 1日 3回毎食後 3—6 滴
Irregulin イレグリン エチル炭酸キニヂン	★ 塩野義	末 { 10瓦 5.00 25瓦 10.00	恒久性不整脈治療劑 1日量 0.2 瓦より漸次増量 1.5—2.0 瓦に至る
Isabistin イサビスチン [シオミ] ジアセチルビスオキシ, フェニルイサチン	★ 丸善	末 { 5瓦 2.00 25瓦 9.00 500瓦 140.00 1肝 220.00 十倍錠 { 25瓦 1.20 100瓦 4.40 500瓦 18.40 0.005 { 20錠 0.20 50錠 0.40 100錠 0.64 500錠 2.40	緩下劑 1回 0.005—0.015 頓用 1日 0.015—0.025 分服

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Isacen イサツエン ジアセチル, ビスオキシフェニル, イサチン C ₂₄ H ₁₉ O ₅ N [薬許]—1日 0.025 頓 0.015 (Isalaxitin, Isatilax, Welpas, Mileval, Katharisatin 参照)	ロシユ (日本) ロシユ	40倍散 25瓦 3.20 250瓦 22.50 0.005 { 20錠 0.75 40錠 1.30 500錠 11.30	緩下劑 1回 0.2—0.8 1回 1—4錠
Isalaxitin イサラキチン ジアセチル, ビスオキシフェニル, イサチン [薬許]—1日 0.025 頓 0.015 (Isacen 参照)	日本 合成薬品 (船井)	純末 { 1瓦 0.60 5瓦 2.70 25瓦 10.00 100瓦 36.00 結晶 { 25瓦 10.50 100瓦 38.00 500瓦 181.00 10倍散 { 25瓦 1.50 100瓦 5.40 0.005 { 15錠 0.23 25錠 0.30 50錠 0.50 200錠 1.50 500錠 3.40	緩下劑 1回 0.005—0.015 頓服 1日 0.015—0.025 分服
Isatilax イサチラツク ジアセチルビスオキシフェニルイサチン (Isacen 参照)	萬有	粉末10倍散 { 25瓦 1.50 100瓦 5.00 500瓦 23.00 0.005 { 20錠 0.25 50錠 0.45 500錠 3.40	緩下劑 粉末(10倍散) 0.05—0.15 瓦 錠 1—3錠, 就寝前服用
Isathol イザトール ジアセチル, ビスオキシフェニルイサチン	昭和製薬 合資	10倍散 末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.30 0.005 { 50錠 0.45 100錠 0.80 500錠 3.50	緩下劑 同上
Isfolin イスフォリン 特異の香氣を有する水様澄明の防錆兼消毒液 イシカワ肝油 (球)	白井松	100瓦 1.20 200瓦 2.00 500瓦 4.50	鐵器錆止め 適當なる器に取り 金屬類を入れ蓋閉す
		90頁参照	

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Isomin イソミン ブロムヂエチルアセチル尿素 [薬許]—[醫効] (Adalin 参照)	大日本 製薬	末 { 10瓦 1.50 25瓦 3.00 100瓦 9.50 500瓦 45.00 0.1 { 10錠 0.43 25錠 0.65 50錠 1.50 100錠 2.50	催眠鎮靜劑 末 1回 0.25—1.0 瓦 錠 3—10個
Isravlin イスラビン 3.6 ジアミノ10メチルアクリ ヂニウムクロリッド [薬許]—外用 [醫効] (Ty-ravlin 参照)	武田 (0.5%)	5cc { 5管 0.65 10管 1.20 50管 5.00 10cc { 5管 0.95 10管 1.80 50管 7.00 20cc { 5管 1.30 末 10瓦 5.00 糖衣錠 (0.02) { 10錠 0.43 30錠 1.00 50錠 1.50 100錠 2.60 22錠 5.00 500錠 10.50	深達性消毒劑 (淋疾) (膀胱カタル) 静注 1回 5—10cc 内服 1日 3回 1—2錠宛 毎食直後外用, 軟膏, 溶液 撒布劑として (100—400倍)
Isravlin-Lodionon イスラビンロヂノン 10%のロヂノン含有のイスラ ビン (0.5%) 溶液	全	5cc { 10管 1.50 30管 6.50 10cc { 10管 1.90 30管 8.50 20cc { 5管 1.50	治淋劑 毎日又は隔日 5—10cc 静注
Istizin イステチン 1.8 デオキシアントラヒノン	バイエル	末 25瓦 4.24 (0.15) 50錠 1.44	緩下劑 夕食後 0.3—0.45 瓦 (2—3錠)
Is-ulcus イス・ウルクス β-Iminoazol-α-aminopropion- säure hydrochlorid. (ヒスチジン鹽酸鹽の4%液) (A錠: 純正—製品—吸收迅速) (B錠: 中性—中性鹽—吸收緩慢)	大日本 製薬	純正, 中性共 5cc { 5管 1.80 10管 3.50 50管 16.00 末 { 5瓦 7.50 25瓦 35.00	胃, 十二指腸, 食道 潰瘍治療劑 毎日 1回 5cc 宛筋 注又は皮注 3—4 週間に及ぶ 末は 1回 0.06 1日 3回食間

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Isulin アイシユリン インシュリン	★ 模範薬品	5cc. { 1瓶 0.90 50單位 { 10瓶 7.00 5cc. 100單位 { 1瓶 1.50 { 10瓶 13.50	糖尿病治療劑
Iveton イベトン (トモダ轉化糖注射液) 化學的純粹なる葡萄糖と果糖の 同量より成る	友 田	① 10% { 5管 1.00 20cc. { 30管 5.30 100管 14.50 ② 25% { 5管 1.20 30管 6.20 20cc. { 100管 18.50 ③ 25% { 3管 1.45 50cc. { 30管 13.20 ④ 30% { 5管 1.70 20cc. { 30管 8.80 ⑤ 09% { 3管 1.95 50cc. { 30管 18.00 ⑥ 5% 250cc. 1管 1.50 ⑦ 5% 500cc. 1管 1.80 ⑧ 5% { 3管 0.90 50cc. { 30管 8.00 ⑨ 5% 100cc. 2管 1.30	栄養強心劑 10—25—50cc.を靜 脈内に注入す 5% 液は普通食鹽水注 入法に做ふ
Brom-Iveton ブロームイベトン 10%イベトン液に 2% ブロムカルシウム液を配す	全	20cc. { 5管 1.20 30管 5.90	栄養鎮靜劑 1回20cc.靜注
Iwol イオール 0.5%の精製硫黄の特殊植物 油溶液に2%のアセトクロ、 ホルムを配す	★ 塩野義	5cc. 10管 2.00	非經口的 硫黄療法劑 (麻痺性癡呆) (ロイマチス) 1回 5cc.筋注
"Iwashiya" Sal-Bro 「いwashya」ザルブロ { 葡萄糖 10% { ブロムカルシウム 2% { サリチル酸ソーダ { A 2.5% B 5%	いwashya (松本)	A { 20cc. 10管 2.50 20cc. 50管 10.00 B { 20cc. 10管 2.60 20cc. 50管 10.50	消炎、鎮痛、解熱劑 毎日又は隔日 1筒 靜注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Iyoren イヨレン ベンゾール誘導體に屬する二 種の化合物の水溶液—淡黄色透 明液 (A = イヨレン 2.5cc. 入) (B = 鹽酸プロカイン液 1.5cc. 入)	★ 中村瀧	5回用 { A 10管 } 5.00 { B 5管 } 10回用 { A 20管 } 9.50 { B 10管 } 30回用 { A 60管 } 27.00 { B 30管 }	腋臭治療劑 A管に對し B 管を混和し 3.2cc. となす 2日—5日毎に腋 窩皮注
Izal アイゼル液 45%アイゼル油乳劑	ニウトン チエーン バース (井上)	100瓦 0.45 200瓦 0.75 450瓦 1.15 450瓦 1.15	消毒劑 50—1000倍液外用

品名組成	製造元 製造元	包裝價格	醫効用量
------	------------	------	------

品名組成	製造元 製造元	包裝價格	醫効用量
------	------------	------	------

Jambulseed ジヤムブルシード Jambul. Eugenia jambolana. Lam. の種子の粉末	三 共	末 { 30瓦 0.75 250瓦 8.60 (0.15)100錠 0.60	糖尿病治療劑 1回 0.65—1.3 瓦 5—8 錠
Japolamin ヤポラミン 昆布を材料として製せる子宮 頸管擴張桿(ラミナリヤ桿代用)	三 共	1號 (徑5—6耗 長さ 9耗) 2號 (徑7—8耗 長さ 9耗) 3號 (徑9—10耗 長さ 9耗) 各 { 5本入 3.00 10本入 5.00	子宮頸管擴張桿 子宮頸挿入 (午後 1時より翌朝迄)
Japonin ジャポニン Peta-ites Japonica 有效成分 (非サポニン體)	萬有製藥	末 { 100瓦 1.00 500瓦 4.00 1000瓦 7.50 液 500cc. 2.00	祛痰鎮咳劑 1日量末 3瓦 液 9cc.
Javol ヤボール	團 堂島フア ーマシ	大瓶 1.50	毛髮榮養料 毛髮散布
Jecomalt ゼコマルト 粉末肝油 (ココア調味)	ワ ン 社 ダ ー シ ー (ベル ヘ) グ ナ ー	225瓦 3.00	滋 養 劑 1日 3回 1—2 食 匙
Jecoramin ゼコラミン 肝油のビタミンAを殆んど 純粹の状態に抽出せしもの (油溶液) 1cc. = 原肝油 25cc. に相當	◇ 日本新藥	1cc. { 5管 2.00 10管 3.50 27球 1.20 0.3 { 50球 2.00 250球 8.25 原液 { 10瓦 2.80 25瓦 6.50	Vitamin-A 注射1日 1筒 筋注 内服 1日 3回 0.3 —0.5(1—2球)宛
Jecora ゼコラ (眼科用ビタミン-A) ビタミンA (ゼコラミン) 5 %ピオクタンニン 0.1%含有の特 殊基劑軟膏	同	チューブ { 5瓦 0.80 25瓦 1.20	眼科疾患 (角膜乾燥症) 0.1—0.5 瓦 1日 1—2 回眼瞼塗擦



品名組成	製造元 発元	包装価格	醫効用量
Jiyoto (Nutrogen) 「大印」 滋養糖 麦芽糖, 糊精と可溶性磷酸石灰, 食鹽「ビタミン B」を配せる白色易溶性粉末	和光堂	250瓦 1.00 500瓦 1.90	栄養添加糖 牛乳及粉乳溶液に 3-5-12% を用ふ
Jocal ヨーカール ヨードカルシウム液	厚生社 (塩野義)	1% { 3cc. 10管 0.50 5cc. 10管 0.60 2% { 5cc. 10管 0.65 10cc. 10管 0.90 3% { 1cc. 10管 0.40 2cc. 10管 0.60 5cc. 10管 0.75 20cc. 10管 1.50 4% 5cc. 10管 0.80 5% { 5cc. 10管 0.90 10cc. 10管 1.20 6% 5cc. 10管 1.00 甲號 3% 10cc. 10管 1.00 乙號 2% 20cc. 10管 1.30	消炎劑 (肺結核, 悪液質 喘息, ロイマチス) 3-10cc. 隔日静注
Jocal-Syrup ヨーカール舎利別	同	舎 { 240瓦 0.90 480瓦 1.60	變質強壯劑 1日量 2-7cc.
Jocalpus ヨールプス { ヨードカルシウム 2% { 鹽化カルシウム 3% 含有のシロップ	丸石	500瓦 1.80	變質劑 1回 2-3cc. 1日 3回食後
Jodarin ヨードリン 製 ヨード蛋白 (15%ヨード) 劑	日進化學 研究所 (太田安)	末 { 28瓦 0.80 250瓦 5.50 500瓦 10.00 (0.1) 100錠 1.00 1000錠 8.00	變質驅微劑 1日 3回 0.4-0.6 (3-4錠) 宛食後
Jod-Blutose 沃度ブルトーズ		Blutose (49頁)参照	

品名組成	製造元 発元	包装価格	醫効用量
ヨードカルシウム注射液 Jod-Calcium 「三共」 ヨードカルシウム 注射液	三共	3% { 1cc. 10管 0.60 5cc. 5管 0.72	肺結核, 悪液質 氣管枝喘息 ロイマチス 急慢性の炎症性 疾患 1-5-20cc. 静注
「タナベ」 ヨードカルチウム 注射液	田邊五	1% 3cc. 10管 0.70 2% { 3cc. 10管 0.90 10cc. 5管 0.90 20cc. 5管 1.00 3% { 1cc. 10管 0.50 3cc. 10管 1.00 5cc. 5管 0.75 5cc. 10管 1.30 10cc. 5管 1.00 10cc. 10管 1.75 20cc. 5管 1.25 5% { 3cc. 10管 1.30 5cc. 10管 1.50 20cc. 5管 1.70	
「ラヂウム」 ヨードカルチウム 注射液	ラヂウム 製薬	1% 3cc. 12管 0.80 2% 3cc. 12管 0.80 3% 3cc. 12管 1.00 5% 3cc. 12管 1.00 2% 20cc. 5管 0.80 3% 20cc. 5管 1.00	
「萬有」 ヨードカルチウム 注射液	萬有製薬	1% 5cc. 10管 0.80 2% { 5cc. 10管 0.80 20cc. 5管 0.80 3% { 5cc. 10管 0.80 10cc. 10管 0.95 20cc. 5管 0.80	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
「フタバ」ヨードカルチウム注射液	フタバ (林)	1% { 3cc. 10管 0.70 50cc. 1管 0.90 200cc. 1管 3.20 2% 3cc. 10管 0.90 3% { 1cc. 10管 0.50 3cc. 10管 1.00 5cc. 10管 1.30 10cc. 10管 1.80 20cc. 10管 2.00 50cc. 1管 1.00 5% { 3cc. 10管 1.30 10cc. 10管 1.90	結核, 悪液質 喘息, ロイマチス 急, 慢性の炎症 性疾患 1-5-20cc. 静注
「コメット」沃度カルチウム	黒田薬品	1% 3cc. 10管 0.70 3% 1cc. 10管 1.20 3% 1cc. 10管 0.70 2% 3cc. 10管 1.00	
「三研」ヨードカルチウム注射液 ヨードカルチウムの生理的食 鹽水溶液	三菱薬品	1% 3cc. 10管 0.55 2% 3cc. 10管 0.60 3% 3cc. 10管 0.65 5% 3cc. 10管 0.70 1-5% 5cc. 5管 0.55 1-5% 10cc. 5管 0.60 1-2-3% 20cc. 5管 0.80	
「國光」ヨードカルチウム溶液	國光製薬	1% 3cc. 10管 0.80 3% 1cc. 10管 0.60 3% 3cc. 10管 1.00	
「櫻木」ヨードカルチウム注射液	櫻木	1.2.3.5% 各 1cc. 10管 0.70 2cc. 10管 0.75 5cc. 6管 0.75 20cc. 5管 1.20 5cc. 50管 5.00 20cc. 50管 9.00	
「三星」複方ヨードカルチウム液	三星薬品	3% 20cc. 6管 1.00 5% 20cc. 6管 1.20	獸 醫 用 20cc. 静注
Jod-Calcium Diuretin ヨードヂウレチンカルチウム ヨードヂウカルチン		Diuretin Calcium 参照 (111頁) Diucalcin 参照 (110頁)	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Jodeol "Viel" ヨデオール「ヴィエル」 電氣コロイド沃度	ロバン (丸善)	1cc. 8管 3.50 内用 6球 2.50 塗布用 15瓦 2.50 腹膜用 30cc. 3.50 改良 1cc. 8管 4.00 注入用 2cc. 6管 3.50	肺炎治療劑 1日皮注 1-2管 塗布 2-3瓦
Jod-Ferratin ヨードフェラチン		Ferratin 参照 (139頁)	
Jod-Ferratose ヨードフェラトローゼ		Ferrato-se 参照 (139頁)	
Jod-Ferrose ヨードフェローゼ		Ferro-se 参照 (140頁)	
Jodicanon ヨヂカノン { ヨードカルチウム 2% 葡萄糖 10%液	三菱薬品	10cc. 5管 2.00 20cc. 5管 3.00	結核, 肺炎 肋膜炎, 喘息 毎日又は隔日10- 20cc. 静注
Jodilloid ヨヂロイド ヨードの0.2%コロイド溶液 (ヨードチンキ, ルゴール液代 用劑) 〔注射〕-外用〔醫効〕	ラヂウム 製 藥	液 { 20瓦 0.30 100瓦 0.50 100瓦 1.35 3cc. { 6管 1.00 12管 1.75 60管 7.80	動脈硬化 慢性淋毒性疾患 内服 1回 1-2瓦 1日 3回 注 1回 2cc. 静筋注 外用-患部塗擦
Jodipin ヨヂピン ヨードを化學的に脂肪酸に附 加せしめたる油劑	メルク (シユ ミツト)	溶液 10% 100瓦 11.95 20% { 50瓦 10.90 100瓦 19.65 40% { 25瓦 9.00 100瓦 33.85 注射20% { 1cc. 10管 6.65 2cc. 10管 9.00 40% { 1cc. 10管 8.45 2cc. 10管 12.40 アツセンデンス 10管 7.90 内用 50錠 4.30	喘息, 動脈硬化 治療劑 1-2cc. 皮注 1日 2-3回 2-4錠 宛 溶液はレントゲン 診断用

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Jod-Iron-Malz Extract 沃度鐵マルツエキス マルツ汁エキスに有機性沃度鐵を包含せしめたるもの	和光堂	エキス { 120瓦 0.75 500瓦 2.00	滋養強壯劑 1日3回 1回1食匙
Jod-Klesal ヨード、クレザール プレンツカテヒン、サリチル酸、沃度化合物	マルコ製薬	30% { 25瓦 0.85 50瓦 1.50 100瓦 2.50 450瓦 10.00	結核、肺炎塗布劑 等分酒精液胸部塗布
Jod Lynosol Syrup ヨードリノゾール舍利別 リノゾールにヨードを結合せしめし舍利別 (Lynosol 参照)	ラヂウム製薬	液 { 250瓦 1.80 500瓦 2.70	變質劑 1日20—25瓦 3回 食間分服 (1回1茶匙)
Jodostarin ヨードスタリン タリリン酸ヂョヂード (C ₁₈ H ₃₂ J ₂ O ₂) 白色、無味、無臭の結晶、水に不溶	ロシユ (日本) ロシユ	5瓦 2.60 (0.25) 20錠 2.35	血管疾患 呼吸器障害 淋巴腺腫 微毒、肥満症 1日3回 1—4錠 0.25—1.0瓦
Jod-Otosclerol 沃度オトスクレロール	Otosclerol 参照 (812頁)		
Jodovo ヨドボ コスメツク状沃度棒	園田邊元	1個 0.25 1打 3.00	殺菌消毒劑 外用—塗擦

白檀油の有効成分90%以上
 治淋新薬 **ミブノール**


白帯下・膣炎に
 飛蚊症球 **エリタ**



彼等會々お集りんじ候じ候み

東 廣

眞宗の大本山東本願寺



最良!



ヒシイチ豆鉛筆削り器



日本三大祭の統一
京の祇園會



錦より朝あけのや 雲若

富江

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Jod Polytamin ヨードポリタミン		Polytamin 参照 (388頁)	
Jod Tetragnost ● ヨード, テトラグノスト テトラヨードフェノルフタレ インナトリウム (Brom-Tetragnost 参照)	メルク (シユ ミット)	末 4瓦 5.50 カプセル (0.5) 25球 15.25 注射用 { 2管 14.64 3.0 { 10管 44.35	膽囊, レントゲン 造影劑 能書参照
Jogonol ヨゴノール 山歸來, 大黃の主要成分にヨ ード劑を抱合せしめたるもの	日新商行	{ 45錠 0.50 100錠 1.00 210錠 2.00 550錠 5.00	ヨード劑 1日 3回 1回 5錠 食後
Jorgon ヨルゴン 3.5 ユーロチロゲン (58% ユーロチン含有)	小西新	末 { 5瓦 2.90 10瓦 5.00 25瓦 11.00 0.02 { 50錠 1.10 100錠 2.00	有機性ヨード劑 (甲状腺機能異常) 1日 0.1—0.3 瓦 食間分3
Josesil ヨセジール 無水硅酸曹達及沃度ナトリウ ム溶液 (1%)	フタバ (林)	2cc. 5管 0.85	動脈硬化症 肺結核 1週 2回 1—2cc. 静注
Jothion ヨチオン ユーロチンヒドロキシ, プロ パン (80% 沃度含有) 濃度—5%以下外用	バイエル	原油 10瓦 4.10 ヨチオン油(10%) 25瓦 2.46 ヨチオン溶液 (10%) { 10cc. 1.80 30cc. 3.65	外用 有機性沃度劑 10%軟膏又は10% オレフ油液外用 (關節炎, 粘膜炎 症, ロイマチス, 淋巴腺炎)
Juglin ユグリン 胡桃より得たる液體	三 共	1cc. 12管 1.45 5cc. 6管 3.10	汗疱, 凍傷, 治療劑 局所塗布
Jugol ユゴール Juglandaceae 中 Pterocaryae 屬植物より得たる油狀の物質 濃度—(醫藥)	三 共	1cc. 10管 1.35 0.3 { 50球 1.30 100球 2.50	妊娠悪阻治療劑 皮注 1回 1.0cc. 内服 2—4 球宛 1日2—3回

品名組成	製造元 電話番号	包装価格	醫効用量
Jukuromin ユクロミン {クロールカルチウム 5% ブロムナトリウム 5-10%	塩野義	5% { 5cc. 6管 1.00 10cc. 6管 1.00 10% { 5cc. 6管 1.00 10cc. 6管 1.00 20cc. 6管 1.30 葡萄糖加 6管 1.65	止痒劑 5% 5cc.より漸次 増量静注
Jukurotol ユクロトール ブロムナトリウム, クロール カルチウム, 葡萄糖液	日新醫學	10cc. { 10管 1.50 50管 7.00 20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	痒痒症, 神經病 毎日 1回 5-20cc. 静注
Junghorn ★ ユングホルン 尿より製せる水溶コロイド性 男性ホルモン 0.7cc. = 15鶏冠單位	大野 研究所 (玉置 合名)	0.7cc. { 5管 5.50 10管 10.00 20管 28.00 50管 45.00 錠 { 20錠 3.40 50錠 8.20 100錠 15.50	男性ホルモン 1日 1-2 管皮注
Juniliese ユニリーゼ 耐熱性リパーゼの食鹽水溶液	恵潤製薬	1cc. 6管 5.6	結核治療劑 2日毎に 1cc.皮注
Junpyon Pasta ★ ジュンピオン, パスタ 緑膿菌株より製せる免疫劑	ピオン 研究所 (谷村留)	{ 10瓦 0.45 20瓦 0.70 30瓦 1.00 50瓦 1.00 100瓦 4.50	非特異性 局所免疫劑 1日 1-數回患部 塗布
Junpyon Inhalation ★ ジュンピオン吸入劑	全	アンプル 50瓦 { 5管 10管 瓶入 { 250瓦 0.60 500瓦 1.20	局所免疫 消炎, 鎮痛劑 1日 1-3 回50cc. 宛吸入
Juris'amin ● ユリスタミン ジエチルマロニル尿素ナトリ ウム溶液(1cc.中 0.14 瓦含有)	奈瀬化學 (日本 新藥)	2cc. { 5管 1.20 10管 2.00 50管 9.00	モヒ中毒治療劑 1日 1-3 回 2cc. 宛皮注又は筋注

品名組成	製造元 電話番号	包装価格	醫効用量
Jusonin ★ ヂューソニン 重曹 2%水溶液	萬有製薬	20cc. { 5管 1.00 50管 8.00 (50cc.) 3管 1.30	葡萄糖注射液の 酸性中和色素劑 の殺菌力増強劑 連日又は隔日静注
Juvela ★ ユベラ 小麦胚芽油より抽出せる Vitamin-E 製劑 1粒は新鮮胚芽油8瓦中に存する Vitamin-E に相當す	田邊元	内柔外硬糖衣 150球 3.50	Vitamin-E 劑 (不妊症, 流産癖) 朝夕 2回 3-5 粒 宛
Juvenin ● ユベニン メチルアルゲン酸ヨヒンピン 及メチルアルゲン酸ストリヒニ ン製劑	バイエル	1cc. 10管 5.75 (0.1) 50錠 5.40	性慾機能障害 10管を20日, 50錠 を20日, 合せて40 日に與ふ (説明書参照)

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
------	------------	------	------

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
------	------------	------	------

Kabeshima's Serodiagnostic Set 壁島式微毒診断セット	三 共	1具(15人分) 1.00 補充品 0.75	微毒血清診断具 使用書参照
Kada カーダ 乳酸, キニーネ, グルコース, 硼酸, 乳糖含有腔挿入劑	フタバ (林)	{ 20錠 1.20 100錠 3.30 500錠 13.50	白帶下, 腔癰爛 治療劑 毎日癰爛面に1錠 を挿入貼布す
Kaflose カフロゼ クレゾール硫酸石灰と器粟 穀エキスを主成分とするシロツ ブ劑 (Kresival 参照)	塩野義	{ 100瓦 0.50 500瓦 1.80 液 1瓶 3.30 2.5瓶 10.50 25瓶 70.00	鎮咳祛痰劑 1日3回10-15瓦 宛
Kalibron ● カリブロン — { ブロムカルシウム 1.0 〇 { ブロムカリ 1.0 cc { ヨードカルシウム 0.3 中 { ストリキニーネ 0.002	三 共	5cc. { 5管 0.85 10管 1.45	鎮靜劑 (神經衰弱, 精神興奮状態 初期結核) 3-5cc. 隔日静注
Kallikrein (原名 Padutin) カリクレイン フレイ, クラフト氏循環系有 效ホルモン (尿より抽出せる腎臓第二ホルモン)	バイエル	(1cc-4單位) 1cc. 5管 5.18 (1cc-7單位) 液 10cc. 7.86 20錠 7.40	狭心症, 高血圧 更年期障害 筋注 1日2回1- 1筒 内服 1日3回25- 50滴
Kalyform カリフォルム ホルムアルデヒドの脂肪酸エ ステル	龜井 (中村瀧)	{ 100瓦 0.40 500瓦 1.50 2000瓦 4.00 5000瓦 8.00	消毒劑 0.5-3.0% 液外 用
Kalzana ★ カルツアナ カルシウムとナトリウムの乳 酸複鹽	ウール フィング (謙信 洋行)	(0.15) 75錠 3.80	カルチウム劑 1日2-3回2- 3錠宛

色素性止血剤



コアグロート

迅速持続性

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
Kamacol カマコール 天然カンフルを特殊化學的操作により滅菌水溶液とせるもの(吸入用はユーカリ油 其他を含有す) %はカンフルの含量	田邊五	皮下筋注用 10% { 10管 1.10 1cc. { 50管 4.80 100cc. 0.30 吸入用 { 500cc. 1.00 18貯 20.00	強心鎮咳劑 1回 1cc. 皮注又は 筋注吸入は 5-10 倍液 含嗽は 10-20 倍液 使用
Kamaton Campher カマトンカンファー カンフル水溶液	陽光堂 製薬	1.1cc. { 10管 0.95 50管 3.85 100管 6.50 2.2cc. { 10管 1.05 50管 4.45 100管 7.10	強心劑 1回 2-4cc. 皮注 又は静注
Kamboin カンボイン 感冒ワクチン	大阪細菌	7cc. 1.00	感冒治療劑 1回 0.5-1cc.
Kamillen Umschlagmittel カミツレ濕布液 ★ カミツレ花有效成分にカンフル, チモール, サリチル酸メチル, メンタ等を配せる乳液	櫻木	液 { 100cc. 0.30 500cc. 1.20	氣管枝カタル 肋膜炎, 肺炎 扁桃腺炎 20倍に稀釋し濕布
Kamopon カモポン 阿片總アルカロイド可溶性鹽	日本新薬	末 1瓦 1.30 1cc. 10管 1.20 (品切)	鎮痛麻醉劑 注-皮注 1cc. 末-0.01-0.02 瓦 1日 1-2 回
Kanelon カネロン 特殊脂肪體及ビタミン A, D 及 E 配合體	斗南 研究所	1cc. { 6管 6.00 12管 11.00 60管 50.00 0.5cc. { 6管 4.00 12管 7.40 60管 33.50	結核治療劑 症状により 1回 0.5-1cc. を肩胛 間部深く注射
Kanso Shokasen 乾燥松果腺錠 幼牛の松果腺 (0.0065)	パーク デビス (三共)	100錠 10.55	精神機能障害 (モンゴル様状態) 1日 3回 1錠宛

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
Kantiros カンチロス (別名デルマチカ) 樟腦様香氣ある白色泥狀流動 體	三共	泥狀 { 50瓦 1.60 250瓦 5.00 500瓦 9.00 10% { 15瓦 0.45 軟膏 { 100瓦 1.00 500瓦 3.00	丹毒 軟膏(皮膚病)治療劑 患部塗布
Kantol カントール 特種エーテル注射劑	ラヂウム 製薬	1cc. 6管 1.20 2cc. 6管 1.20 3cc. 6管 1.20	百日咳治療劑 満2歳以下は 0.5 -2cc. 3年以上は 1-2cc. 臂筋注
Karbunken カルブケン 有機性炭素 (軟膏は25%) 賣許-外用(賣絶)	三共	末 { 50瓦 1.20 250瓦 4.35 500瓦 7.80 軟膏 { 錫管30瓦 0.75 罐 { 100瓦 1.40 500瓦 5.00	疔癰治療劑 25%以上を含む泥 膏として
Karonasin カロナジン 0.5% カンフル食鹽水	三田薬品 (塩野義)	1cc. { 10管 0.80 50管 3.20 2cc. { 10管 1.00 50管 4.00 5cc. 5管 1.00 10cc. 5管 1.30	強心劑 1回 2-10cc. 皮注
Kashiwagi Diastase 柏木ヂアスターゼ 消化酵素	日本 薬品洋行	末 { 12瓦 0.60 25瓦 1.10 225瓦 7.00 450瓦 13.50 0.1g { 30錠 0.35 100錠 0.85 病院用 450瓦 8.50	澱粉, 蛋白, 脂肪 消化劑 1日 0.3-0.5 分
Katharisatin カタリザチン ヂアセチル, ビスオキシフェ ニル, イサチン 賣許-賣絶 (散) 1日 0.25 頓服 0.15 (Isacen, Mileval 参照)	友田	0.005 { 20錠 0.25 40錠 0.40 200錠 1.50 500錠 3.50 10倍散 { 25瓦 1.60 100瓦 5.50	下劑 散(乳糖9純末1) 1回量 0.1-0.2 1日量 0.15-0.3 錠(純末3.005含有) 1回量 1-4 錠 1日量 3-6 錠

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Kavasantal カワサントール 1個中 { 白檀油 4滴 カワカワ脂 1滴	パーク デビス (三共)	{ 32球 2.55 50球 3.80 500球 35.00 1000球 66.90	治淋劑 1回 2球 1日 3回
Kavidol カヴイドール ヨード, 蒼鉛, クロールカル チウム, ペルーバルサム, カワ カワ樹脂含有の軟膏 [販許]—[外用]—[醫効]	中外醫藥 (塩野義)	{ 6個 0.60 12個 1.00 30個 2.30 100個 7.00 10瓦 0.60 25瓦 1.30 100瓦 4.20 300瓦 10.00	痔疾治療劑 坐藥 1日 3回 1個 宛 軟膏 1日 2—5 瓦
Kawacrin カワクリン 特殊無脂肪性白色軟膏	三友製藥 (光榮) 商會	{ 25瓦 0.30 50瓦 0.55 500瓦 5.00	汗疹治療劑 患部塗布
Kayanol カヤノール 梔子油	フタバ (林)	500瓦 2.50	十二指腸蟲驅除劑 10—20cc. 頓服又は 15—30cc. 3回分服
Kayanomi 榧ノ實 (榧子) 榧の實	フタバ (生薬) (林)	500瓦 0.50	十二指腸蟲驅除劑 1日 3回 2—5 個 宛内服
Kehsin ケージン 脾臓の止血有効成分	塩野義	末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.50	止血劑 1日 3回 1—2 瓦 空腹時
Kei-mag ★ 珪マグ 珪酸マグネシアとマグネシア を含有する白色無味無臭の細末	大日本 製藥	末 { 100瓦 0.50 500瓦 2.00	制酸, 吸着劑 1日 3回 0.5—1.0 宛食間又は食後内 服 外用—其儘患部撒 布
Keisonol ケーソナール { 無水珪酸ナトリウム 1% ヨードナトリウム 1%溶液	中央化學	2cc. { 5管 0.85 10管 1.60	動脈硬化治療劑 1週 2回 2cc. 靜注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Kelene ● ケレーン クロール, エチル (噴射用アンプル入) (Lucisin 参照)	ローヌ (丸善) (太田安)	{ 30瓦 1.75 50瓦 2.00 100瓦 2.75 局所用 15瓦 1.20 直管 { 60瓦 2.00 100瓦 2.75	全身及局所麻醉劑 吸入—全身麻醉 寒冷—局所
Kenny-Shiyaku 検尿試薬 グルコハルン 検糖定性 ネオニールン 簡易検糖 アイハルン 蛋白質	鳥居	各 { 20錠 0.65 100錠 2.50 三種20錠 1.80 各 10瓦 0.65 三種各 10瓦 1.80 検尿器大型 6.50 ク 小型 4.50 ク 常備用 14.50	検尿用 説明書参照
Kerios ケリオス 海棲動物の腦脊髄より抽出せ るリポイドと哺乳動物の膽汁物 質結合體	河西 生化學	0.5cc. { 6管 4.50 12管 8.60 60管 38.00 1cc. { 6管 8.40 12管 15.60 60管 72.00 (膠球) { 50球 8.50 100球 15.00	結核治療劑 1回 0.5cc. より漸 次増量 1cc. に至る 皮注又は筋注
Kesinol ケシノール 麻黄, 罌粟殼, 杏仁の有効成 分, 褐色非引濕性粉末 [販許]—[醫効] 末 1日 2瓦 液 1日 10瓦	日新商行	液 { 150瓦 1.00 500瓦 2.50 2000瓦 9.20 末 { 100瓦 1.50 500瓦 6.00 5000瓦 原料用 0.3 { 40錠 0.50 80錠 1.00 500錠 8.00	鎮咳祛痰劑 1日量液 5—10cc. 末 2—3 瓦 錠 5—10個
Keuchicin ● コイヒチン 百日咳ワクチン	大阪細菌	1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1管 1.00	百日咳治療劑
Keuhusten ● コイフステン 麻醉用エーテル及杏仁油の50 %容量混合液 コイフステン (注腸用) 10%麻醉用エーテル含有の無 刺激性溶液	大日本 製藥	0.5cc. 6管 0.60 1cc. 6管 0.75 2cc. 6管 0.90 3cc. 6管 1.00	百日咳治療劑 1歳迄 0.5—1cc. 4歳以上 2—3cc. (筋注, 皮注)
	同	15cc. 5管 1.20 20cc. 5管 1.30 30cc. 5管 1.50	百日咳注腸劑 1歳迄 1回 15cc. 3歳迄 1回 20cc. 8歳迄 1回 30cc. 1日 1回注腸

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Keuch-Husten-Chorin コイフステン, コリン 脳髓, 副腎, 甲状腺ホルモン 及リポイド製劑	當一麻 研究所 (中村瀧)	幼兒用 { 5回用 1.20 1cc. { 10回用 2.10 小兒用 { 5回用 1.60 1.5cc. { 10回用 2.80	百日咳治療劑 幼兒用 1回 0.5— 1.0cc. 皮注 小兒用 1回 1.5cc. 皮注
Kidonin キドニン 胡蘆科及び冬瓜科植物混合浸 出劑 賣許(醫施)	マルコ 製藥	100瓦 2.50 250瓦 6.00 500瓦 10.00	利尿劑 1日 2回 2—3 瓦 宛空腹時内服
Kieselsaure Inj タケダ, 珪酸注射液 珪酸曹達の 1%滅菌液	武 田	2cc. { 5管 0.80 10管 1.45	血 壓 下 降 劑 1週 3回 1—2cc. 宛靜注
Kikujuji-Rubber Plaster 菊十字ゴム絆創膏	山田製藥 (日 本) (新 藥)	472頁 参照	
Kimu-Jodocol キムヨドコール コロイド沃度製劑	齋藤藥局	内用 { 60球 2.50 180球 7.00 360球 13.00 皮膚外用 25cc. 1.50 粘膜外用 25cc. 1.50 タンポン { 2球 1.50 6球 2.50	變 質 劑 1回 2—3 球内服 ロイマチス(塗布) 炎 症(塗布) 白 帶 下(挿入)
Kinomeal 食 キノミール 新鮮牛乳に麦芽糖糊精等を加 へ母乳成分に比適せしむ	和 光 堂	250瓦 1.00 500瓦 1.90	母乳代用調製粉乳 温湯に溶解し與ふ ミルクフードに做 ふ
Kiocitol キヨチトール 3.8% クエン酸ソーダ溶液	塩 野 義	1cc. 5管 0.60	赤血球沈降反應用 1回 1筒(説明書参照)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Kiosin キオシン ピリヂン, ベタカルボン酸ヂ エチルアミドの25%無菌溶液 (Coramin, Cornutin 参照)	田 邊 五	1cc. { 5管 1.20 10管 2.10 50管 9.50 5cc. { 5管 3.00 10管 5.20 100cc. 1.20 100cc. 8.50 500cc. 36.00	強心呼吸強盛 興 奮 劑 1回 1—2cc. 皮注 又は靜注 内服—1日 2—3 回 1—2cc. 宛
Kisasage キササゲ 紫葳科植物「梓」の實 賣許(醫施)	フ タ バ (林)	500瓦 時價	利 尿 劑 1日 8—12瓦煎劑 として用ふ
Kitagata's Collysium Neonatrín 北方産兒點眼液 7.3% 葡萄糖溶液中に 0.5% の トリパフラビン含有	三 共	0.5cc. { 5管 0.36 10管 0.60	點 眼 藥 初生兒に 1—2 滴
木内博士診斷基體 Kiuchi's-Shindan Kitai			
普通基體之部			
ネオニンゼリン Neoinserin	日本新藥	5回分 1.00	妊娠の有無診斷 (人)
ネオセキシン Neosexin		同 1.50	男女別診斷(人)
ネオパラセキシン Neo-parase- xin		同 1.50	同 補 助(人)
ニンゼリン Ninserin		同 0.55	妊娠診斷(獸)
セキシン Sexin		同 0.70	性 別(同)
パラセキシン Para-sexin		同 0.70	同 補 助(同)
プルゼリン Pluserin		同 0.70	肺病診斷試藥
ヲツセリン Osserin		同 0.65	骨 疾

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
ドルヂン Dolsin	日本新薬	5回分 0.55	脊髄診断試薬
カンセリン Cancerin		同 0.80	癌腫
ザルコミン Salcomin		同 0.70	肉腫
ヘパゼリン Hepaserin		同 0.50	肝臓
パンクレシン Pancrestin		同 0.50	膵臓
ミオゼリン Mioserin		同 0.55	筋腫診断剤
ガストミン Gastomin		同 0.60	胃病
チホイヂン Thyvoidin		同 0.85	チブス
A パラチホイヂン A-para-thyvoidin		同 0.85	A パラ同
B パラチホイヂン B		同 0.85	B パラ同
ルエゼリン Lueserin		同 1.50	梅毒
テベサミン Tebesamin		同 0.95	結核
ウリゴノン Urigonon		同 0.90	淋疾
ネフリヂン Nephrisin		同 0.70	腎臓
ビタゼリン Vitaserin		同 0.75	胎児生死別
着色基體之部			
着色ネオニンゼリン		10回分 2.00	妊娠診断剤
同 ネオセキシン		同 2.50	性別

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量	
同 ニンゼリン	日本新薬	10回分 2.00	妊娠(獣)診断剤	
同 セキシン		同 2.00	性別(同)	
同 ネオパラセキシン		同 2.50	同補助	
同 カンセリン		同 2.50	癌腫	
同 チホイヂン		同 2.00	チブス	
同 ルエゼリン		同 2.50	梅毒	
診断用具類				
Diagnose-Apparatus 尿診断器具	日本新薬	1具 9.20	尿診断用	
酵素濾過器		1函 1.20	尿診断用	
治療用大濾過器		1函 1.50	尿診断用	
絶対炭(純炭素末)		100瓦 2.00	尿診断用	
パンプロール Pampurool トリケトヒドリンデンヒド ラート		末 { 0.05瓦 1.30 0.1瓦 2.20	最鋭敏なる 蛋白試薬 尿診断及一般蛋白 試験用	
Klargin クラールギン フェニル水銀アセタート $C_6H_5-Hg-O.CO.CH_3$ 無色, 無臭, 針状結晶, 250倍の 水に溶解し, 中性反応を呈す		嘉寶物産 薬品部	5瓦 5.35	殺菌消毒剤
			10瓦 9.40	皮膚—5千—1萬 倍液
			25瓦 20.00	尿道—2萬—5萬倍 液
		5倍用 { 5瓦 1.65 10瓦 2.80 25瓦 6.00	注射—1日1回5 —10cc. 静注 (細菌性疾患に)	
		10cc. { 5管 0.75 10管 1.30		

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Klimakton クリマクトーン 純卵巣越幾斯, 純甲状腺越幾斯, ブロムラール, デウレチンカルチウム含有の糖衣球	クノール (三共)	糖衣 { 20球 2.55 50球 5.00 250球 22.20	月經閉止期異常 治療劑 1回 2球宛 1日 3回
Koboi コボイ 藥用酵母に芸香科植物及龍膽科植物の苦味質を配す	三才商會	末 { 100瓦 0.75 500瓦 2.80	健胃消化劑 1日 3—5 瓦分3
Kocal コウカール グルコン酸カルチウムの 8.5% 溶液	厚生社	1號 2cc. 10管 0.50 2號 5cc. 10管 0.90 3號 10cc. 10管 1.30	カルチウム劑 1回 5—10cc. 靜注 皮注又は筋注
コツホ氏結核菌乳劑 所謂最新ツベルクリン		Tuberkrin 参照 (427頁) (461頁)	
Kokutigen コクチゲン (煮沸免疫元)	福井七		各種傳染性細菌疾患の治療及豫防 皮注又は靜注 (説明書参照) 有効期限 1ケ年 (但肺炎菌コクチゲンのみ 6ヶ月)
結核菌コクチゲン ① 下疳菌コクチゲン ②		①②のみ 10cc. 1管 3.00 20cc. 1管 5.00 1cc. 10管 3.00 2cc. 10管 5.00 病院用 50cc. 11.00	
淋菌コクチゲン 百日咳コクチゲン 連菌混合コクチゲン 連鎖状球菌コクチゲン 葡萄状球菌コクチゲン 腸チフス菌コクチゲン パラチフス AB 菌混合コクチゲン 肺炎菌コクチゲン インフルエンザ菌コクチゲン インフル, 肺炎混合コクチゲン 大腸菌コクチゲン		病院用 [其他] 10cc. 1管 2.00 20cc. 1管 3.50 1cc. 10管 2.00 2cc. 10管 3.50 病院用 50cc. 8.00	淋菌コクチゲン 以下同價格
③ 腸チフス菌コクチゲン 赤痢志賀菌コクチゲン ④ 虎列拉菌コクチゲン ⑤		③④⑤のみ 2cc. 1管 1.50 50cc. 1管 3.00	皮注 0.5cc. より漸次増量

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Kokusan-nipa コクサンニパ M. A. P. M=パラオキシ安息香酸メチルエステル A=ク エチルエステル P=ク プロピルエステル NB=ク ノルマルブチルエステル (Nipagin 参照)	株式会社 エボツク	M { 25瓦 1.50 100瓦 5.00 500瓦 22.00 1肝 40.00 A { 25瓦 2.00 100瓦 6.00 500瓦 27.50 1肝 50.00 P { 25瓦 2.50 100瓦 7.00 500瓦 33.00 1肝 60.00 N.B { 25瓦 1.25 100瓦 4.00 500瓦 16.50 1肝 30.00 (大量は特價提供)	防腐保貯劑 藥品, 酒類, 注射液等に對して M—0.1 % A—0.05—0.1 % P—0.05 % N.B—0.05—0.1 %
Kolibacterien Vaccine コロチン 大腸菌ワクチン (1cc中五千萬含菌)	大阪細菌	1cc. 5管 1.00 7cc. 1管 1.00	腎盂炎治療劑 皮注
Konoyu 香腦油 芳香揮發油劑	三星堂	液 { 100瓦 0.60 300瓦 1.20	防臭殺蟲劑 撒布用
Kreneusin クレノイジン クレオソートを主成分とし之に動物臟器及局所麻醉藥を配せる液	三共	1.0cc. { 5管 1.50 50管 10.20	神經痛 ロイマチス 痲痛, 肩凝 毎日又は隔日に 1回 0.5—2cc. 皮注
Krerol クレロール 帯褐色油狀液	中村信治 藥局	液 { 50cc. 1.50 100cc. 2.90 250cc. 6.80	呼吸器疾患塗布劑 1日 3—4 回胸部 又は腹部塗布
Kresatol "Limit" クレザトール「リミット」 20% 蔗糖液にクレオソート 0.8% を配せる所謂サツカローゼ療法劑	浪速製藥	20cc. 5管 1.50	結核治療劑 毎日又は隔日 1回 2cc. 靜注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Kresival クレジヴァール クレゾール硫酸カルチウム 含有シロップ (Kaflose 参照)	バイエル	液 { 125瓦 2.80 500瓦 6.90 5日 時價	祛痰鎮咳劑 1日 3—4 回約 8 瓦宛
Kriobin クリオビン 精製テレピン油10%, オイク ピン 1%, ノボロフォルム 2.5 %, オレフ油 86.5 %	武 田	1cc. { 10管 2.15 50管 9.50	婦人科傳染性炎性 疾患及淋毒性疾患 1回 1cc. 宛 1週 2 —3 回腎筋又は皮 注
Krysolgan クリゾールガン 4 アミノ 3アウロ, メルカプ ト, ベンゾールカルボン酸ナト リウム, 注射液	シエー リング (田邊五)	1—8號(品切)	結核治療劑 1號より 8號まで を以て 1クールト となす
Kuensan-Do-Nanko 「モチダ式」クエン酸銅軟膏 1—5 %軟膏	中村瀧	1% 50瓦 0.95 2% 50瓦 1.00 3% 50瓦 1.05 4% 50瓦 1.10 5% 50瓦 1.15 1% { 100瓦 1.80 500瓦 6.50 (2—5%も同様大包装あり)	眼 科 用 塗 擦
クエン酸ソーダ注射液 クエン酸ソーダ10%液	マルコ (製 藥)	2cc. 10管 0.50 5cc. 5管 0.90 10cc. 5管 1.10 20cc. 5管 1.30 50cc. 2管 1.20 結晶 { 25瓦 0.50 100瓦 1.50 500瓦 3.50	止血用, 輸血用 靜 注
Kyuin キユウイン 木通(あけび), 忍冬の有効成 分に赤小豆の脂肪, サポニンを 配せる黑色粉末	志村商店	末 { 25瓦 0.85 100瓦 3.00 250瓦 7.00 500瓦 12.50 0.2 { 18錠 0.30 36錠 0.50	疔癰, 脚氣, 浮腫 内服・排膿劑 1日 1.5—2.0 (6 —9錠) 3回分

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Labon ラーボン クロールキシレノールサボク レゾール ⓈⓈⓈ—ⓈⓈⓈ 外用	武 田	液 { 100瓦 0.60 500瓦 2.00 1000瓦 3.50	殺菌消毒劑 1—5 %液, 外用 リゾールに倣ふ
Lacarnol ラカルノール 骨格筋エキスのヌクレオシ ド (骨格筋アウトホルモン) 心臓冠狀動脈を擴張す (Myocanon 参照)	バイエル	1cc. { 5管 2.50 25管 11.20 20cc. 滴瓶 2.88	狭心症・神經痛 1日 1—3 回 1cc. 宛皮注 内服 1回10—25滴
Lacfomil ラクフオミール Coix. Lacryma 及び Gossyp- ium 有效成分とエンチーム配合 體	内外新藥	末 { 30瓦 1.30 100瓦 4.00 450瓦 17.00	催乳栄養劑 1日 3回 1回 1— 2瓦宛毎食後
Lacnosan ★ ラクノサン カゼインカルシウム, 蛋白乳 (Laroson 参照)	酪 聯 (鳥 居) (武 田)	末 { 50瓦 250瓦	乳兒栄養劑 湯に溶して用ふ
Lactagol ラクタゴール 綿質中のエデスチン蛋白	ペアル ソン (田邊元)	末 { 75瓦 3.30 150瓦 5.90	催 乳 劑 4瓦宛 1日 3回
Lactester ラクテスター 荒川氏脚氣母乳試薬 ラクテスター反應標準色	ラヂウム 製 藥	1組 箱入 7.50 第1液 1本 1.50 第2液 1本 1.50 第3液 1本 1.50 特製試験管 6本 1.00 標準色 1組 木函入 3.00 紙函入 1.80	脚氣母乳検査試薬 詳細は説明書参照
Lactfermin ラクトフェルミン 乳酸菌製劑	高田製藥	末 { 25瓦 0.60 100瓦 1.60 250瓦 3.20 500瓦 5.50 0.25 { 50錠 0.55 100錠 0.95 500錠 3.80	整 腸 劑 1日 3回 0.3—1.0 宛 (1—4錠)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Lactiferin ラクチフェリン 胎盤リポイド製劑	三 共	筋肉用 { 5管 1.85 3.5cc. { 10管 3.25 皮下用 { 1cc. 10管 1.60 膠球 { 30球 1.80 0.5cc. { 50球 2.75	催乳劑 1日1回臀筋3.5cc. 皮注1.0cc. 内用1-2球宛1日3回
Lactobaryt ラクトバリット 硫酸バリウム乳劑 (Mika-Barium 参照)	獨逸サツ カリン社 (ケミア)	内用 { 200瓦 1.95 2疔 14.50 5疔 注腸用 { 200瓦 2疔 5疔	レントゲン造影用 1回200瓦内用又は注腸
Lactogen ラクトーゲン 人乳に近似し脂肪分は原乳の 脂肪本性を完有せる粉末牛乳	ネツスル (乾卵)	小 225瓦 1.35 中 450瓦 2.50 大 1350瓦 6.95 時價	乳兒哺乳料 保健營養料 7倍半に稀釋せる ものは原乳濃度に 一致す
Lactophenin ラクトフェニン ラクチルパラフェネチデン	ポーリ ンゲル (三 共)	末 25瓦 3.30 (0.5) 10錠 1.35	解熱劑 1回0.5瓦1日3-4回 (極量1回0.7 1日2.0瓦)
Lactostase ラクトスターゼ ブルガリアン乳酸菌製劑	三 共	末 { 30瓦 0.80 100瓦 2.40 250瓦 4.50 500瓦 8.00 1キロ 12.00 0.13 { 50錠 0.50 100錠 0.95 200錠 1.70 ブイヨン 6cc. 0.18	整腸劑 1日3回毎食後 0.3-0.4瓦(2-3錠)ブイヨンは 凝乳調製原料
Lactvitan ラクトビタン Vitamin C 含有錠劑 1錠=40國際單位	★ 嘉寶物産 藥品部	0.3 { 100錠 1.60 300錠 4.00	乳兒用 Vitamin-C 劑 毎授乳毎に1錠を 温水に溶し與ふ
Landsteiner M' N' ランドスタイナー, エム, エン	★ 石津作	Anti M. 0.5cc. } 時價 Anti N. 0.5cc. }	血液型検査劑 1回 M' N' 各1 滴(説明書参照)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Langerin ランゲリン 經口用膽汁加インシュリン	田邊元	1丸=4單位 丸 { 30丸 5.20 100丸 14.50 軟膏 25瓦入 2.00	糖尿病内服藥 1日3回2-3丸 宛8日間連用
Larosan "Roche" ラロサン _L ロシユ _T カルチウムカゼイン製劑 (Galactosan, Lacosan 語)	ロシユ (日本) (ロシユ)	(20瓦5個包) 100瓦 4.00	榮養劑 (乳兒, 下痢, 綠便の際) 1回20瓦
Larostidin "Roche" ラロスチヂン _L ロシユ _T ヒスチヂン鹽酸鹽 (Is-nleus, Sanostidin, Geschwurin, Histidin 参照)	ロシユ (日本) (ロシユ)	(1管中0.2含有) 5cc. { 6管 6.75 25管 25.30 (0.1) 25錠 6.75	胃, 十二指腸 潰瘍治療劑 毎日5cc.筋注(又 は皮注)約3週間 持續
Lartigol ラルチゴール 抱水クロラル, サリチル酸, サリチル酸ソーダ, メントール, カンフル等を主成分とする芳香 パスタ	鳥居	チユーブ 10瓦 0.45 20瓦 0.80 40瓦 1.50	神經痛 ロイマチス 患部に少量宛2- 3分間塗擦
Laryphtin ★ ラリフチン フェニルプロピオール酸ナト リウムの10%水溶液	三 共	250cc. 3.50	喉頭結核吸入劑 本劑10cc.に水を加 へて朝夕2回50cc. 宛吸入
Laudanon "Ingelheim" ● ラウダノン _L インゲルハイム _T { 塩酸モルヒネ 50% 塩酸ナルコチン 30% 塩酸ババペリン 10% 塩酸コデイン 5% 塩酸テバイン 2.5% 鹽酸ナルチエイン 2.5%	友田	2% { 3管 1.1cc. { 6管 (品切) 4% { 3管 1.1cc. { 6管	鎮痛麻醉劑 注射1回1筒皮注
Laumin ● ラウミン 注射液はフェノバルビタール にミグレン 末は更にブロムカリを ラウミンスコボラミンはブロム 水素酸スコボラミンを配す	武田	50瓦 2.80 末 { 250瓦 12.50 500瓦 22.00 注強 2cc. 10管 2.50 注弱 2cc. 10管 2.30 スコボラミン 注 2cc. 10管 2.50	鎮痙, 鎮靜, 鎮痛劑 末は1日量0.8- 2.5瓦を毎食後 注射は1日1回皮 注

品名組成	製造元 / 發售元	包裝價格	醫効用量
Lauterin ラウテリン糖衣錠 セスキテルペンアルコールに フタル酸を結合せしめ更にエ ステル酸ナトリウム鹽とせるも の	三 共	0.125 100錠 1.20 500錠 4.00 1000錠 7.00	治 淋 劑 1回 4錠 1日 3回
Lavocat ラボカ ヌクレイン酸製劑	佛 國 新 ラボカ社 (小 菅) (商 會)	末 { 50瓦 1.00 120瓦 2.00 360瓦 5.00 1000瓦 12.00 1.0 { 50錠 1.20 300錠 5.00 時價	滋 養 每食後 4瓦
Laxaphen ラキサフェン フェノルフタレイン及サリチ ル酸をチョコレート基劑にて調 和せる製劑	パ ー ク デ ビ ス (三 共)	60瓦 1.75	緩 下 劑 1回 4—12cc. 用時 振盪して内服
Laxatin ラキサチン フェノルフタレイン製劑	掛 見	0.2 { 10錠 0.30 30錠 0.70 50錠 1.30 100錠 2.20 末 { 25瓦 1.45 100瓦 5.50	緩 下 劑 1回 2—3 錠
Laxatol ラキサトール イソワレリル, アセチル, フ エノルフタレイン [賣許]—[醫純] 1回 0.5 以内 (Aperitol, Eval, 参照)	塩 野 義	末 { 10瓦 0.85 25瓦 2.00 100瓦 7.30 500瓦 32.00 1キロ 60.00 0.2 { 10錠 0.40 50錠 1.50 100錠 2.50 500錠 10.00 1000錠 18.00	緩 下 劑 1回 0.2—0.6 (1 —3錠) 1回 0.8 迄 增量
Laxiphenin ラキシフェニン アントラキノン製劑	★ 日新醫學	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.20 500瓦 13.00 0.25 { 50錠 0.80 100錠 1.40 500錠 5.50	植物性緩下劑 1回 0.5—0.7 (2 —3錠) 空腹時頓用

品名組成	製造元 / 發售元	包裝價格	醫効用量
Lea-laxin レア, ラキシ (舊名. ラキシ) ワレリル, アセチル, フェノ ルフタレイン	高田製藥	0.2 { 10錠 0.40 50錠 1.50 末 { 25瓦 2.00 100瓦 1.00 500瓦 29.00	緩 下 劑 1回 0.2—0.6 瓦 (1—3錠)
Leberagen "Banyu" レベラーゲン [萬有] 牛肝臓の乾燥粉末	萬有製藥	末 { 25瓦 2.00 100瓦 7.00 (0.25) 100錠 2.00	造 血 劑 大人 1日 2瓦 (8 錠) 小兒 1瓦 (4錠) を 毎食後分服
Leber "Riken" レバー [理研] 肝臓の造血有効成分 [賣許]—[醫純]	理 研 (玉 置) 商 店	末 { 30瓦 2.80 100瓦 7.50 0.18 { 120錠 2.50 600錠 10.00	造 血 劑 大人 1日 2.0 瓦 (10—12錠) 小兒 1瓦 (5—6 錠) 分3.
Leber-Chorin レバーコリン 脳髓, 肝臓複合ホルモン製劑 A 液=1cc. B 液=0.5cc.	常 麻 研 究 所	A 液 5管 } 1函 1.60 B 液 5管 } A 液 10管 } 1函 2.80 B 液 10管 }	惡阻, 嘔吐治療劑 A 液(ホルモン液) B 液(類脂體液)を 混和し毎日或は隔 日 1回 1筒皮注
Leberhorn レバホルン 肝臓ホルモン製劑 (1瓦は生肝10瓦に相當)	吉萬商店	1cc. { 5管 1.50 10管 2.70	増 血 劑 毎日或は隔日 1回 1筒
Lebermin レバーミン 牛肝臓製劑	高田製藥	末 { 25瓦 0.80 50瓦 2.50 100瓦 2.50 250瓦 10.00 500瓦 10.00 0.5 { 50錠 0.90 100錠 1.60 300錠 500錠	造 血 劑 1回 1—2 瓦 (2 —4錠) 1日 3回
Leber-pulver 肝臓末	メ ル ク (シ ユ) (ミ ッ ト)	末 { 250瓦 18.70 500瓦 35.10 時價	貧 血 治 療 劑 大人 1日 最低50瓦 小兒 10—20瓦 (食 餌療法)

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Lecithin レチチン Lipoid (類脂體) の 1種 Phosphatide (磷脂質) にして αレチチン, βレチチンの混合體	武田化學 石津作 小島義忠	卵黃製(メルク) 25瓦 5.50 500瓦 45.00 大豆製 25瓦 0.50 500瓦 4.00 牛乳精製(ウイルソン) 5瓦 11.00	榮 養 劑 榮養劑として内用 皮膚藥として外用
Leprol レプロール 大風子油の硫酸曹達	三 共	25瓦 1.00 末 { 250瓦 8.75 500瓦 15.00 (0.25) 100錠 1.10	*治 癩 劑 内服 1回 0.5—1.0 腎注 1—2cc. (5—10%グリセリン混液 として注射)
Leprosin レプロシン 6 ヨードチモールにリポイド 蛋白を加へたる油劑	三 共	1cc. { 5管 1.80 10管 2.20 2cc. { 5管 2.20 10管 3.60	治 癩 劑 皮注(説明書参照)
Letran レトラン マルツエキス, ココア加肝油	中外新藥	乳劑 { 50瓦 0.35 250瓦 1.40	榮 養 劑 1回10瓦 1日3回
Leuargin ㊟ ロイアルギン 薔薇科植物種子中に含まる、 Alcain を主成分とし、之に撒 曹, 石炭酸を配す	模範藥品	1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 2cc. { 10管 2.80 50管 12.00	神 經 痛 ロイマチス治療劑 1日 0.6—1.0cc. 患 部筋注
Leucoprast ロイコプラスト	バイエルス ドルフ	絆創膏参照	
Liba リバ 可溶性魚肉蛋白	三 共	100瓦 0.85	滋 養 劑 大人 1回15瓦 小人 1回 5瓦
Lichtenin リヒテニン S エトオキシ, ヒノリン 5ス ルフオンナトリウムに鹽化アド リナリンを配す	吉 萬	液 { 10cc. 1.50 100cc. 10.00	保護眼鏡代用劑 光線照射 5分前に 1滴點眼

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Lienalin リエナリン 脾臓の止血ホルモン製劑 (Fibrogen, Thrombogen 参照)	三 共	2cc. { 5管 2.00 10管 3.60 末 { 25瓦 2.25 100瓦 7.40 0.25 { 100錠 2.40 250錠 5.30	止 血 劑 1日 1—2 回 2cc. 皮注 1日 3回 0.5—1.0 瓦 (2—4錠) 内服
Ligcarbon ㊟ リグカーボン 吸着力強き植物炭の微細末 賣許(醫効)	ラヂウム 製 藥	末 200瓦 1.50 0.25 { 100錠 0.60 500錠 2.00	整 腸 劑 1日數回 0.5—1.0 瓦(2—4錠)宛
Lignol リグノール リグノールの硫酸ナトリウ ム 賣許(醫効)	友 田	液 { 25瓦 0.50 250瓦 3.70 500瓦 7.15	皮 膚 藥 單味又は10—20% 軟膏或はチンキと して用ふ
Lignol-Leim リグノールライム 無脂肪性リグノール糊膏	同	ライム { 50瓦 0.60 250瓦 2.00 500瓦 3.60	皮 膚 藥 外用 1日 1回塗布
Ligulloid リグロイド 純植物炭及ベンツオナフトー ル配合劑	堂 島 フ ア ー マ シ ー	末 { 25瓦 0.60 100瓦 2.00 500瓦 8.00 0.2 { 25錠 0.35 50錠 0.60 100錠 1.00 500錠 4.50	整 腸 劑 1日 3回 0.4—0.8 瓦 (2—4錠)
Lipatren リパトレン 牛脂リポイド加ヤトレン (Yatren 参照)	バイエル	1cc. 6管 4.60	肺 結 核 治 療 劑 0.5—2.5cc. 筋注
Lipiodol "Lafay", リビオドール ラツフェー 純沃度を植物油に溶解せるも の (沃度含量40%) (Moljodol 参照)	第一製藥	一般用 (品切) { 5cc. 4管 11.50 1cc. 12管 10.00 アルミ罐 20cc. 8.80 (腎臓注入用) 上行性 { 5cc. 4.00 下行性 { 5cc. 4.00 20cc. 8.80	X 線 造 影 劑 沃 度 治 療 劑 治療用には筋注 造影は注入

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Lipojodin "Ciba" リポヨジン「チバ」 デヨードブラツシジン酸エステル 〔賣許〕〔醫經〕1日量0.15—0.9	チバ (バーゼル)	0.3 { 20錠 2.95 100錠 11.35 末 01瓦 3.35	ヨード適應症 (微毒強自氣管支炎) 1日 1/2—3錠 連用の場合は1日2錠及1錠を隔日に與ふ
Lipolysin ㊟ リポリヂン 生殖腺越幾斯, 男子用は睾丸, 女子用は卵巣を主とす	ヘン ニング (三共)	男子用・女子用各 100錠 14.55 1cc. 12管 9.95	肥満病治療劑 1日 3回食後 1— 3錠毎日或は隔日 に 1cc.皮注
Lipo-nutrogen リポヌトロージェン		Nutrogen 参照 299頁	
Liyoravin リヨラヴィン 3.6 デアミノ10メチールアク リヂニウムクロリッド (0.5 % 液)	厚生社	1號 5cc. 10管 0.90 2號 10cc. 10管 1.50 3號 20cc. 10管 2.00	深達性殺菌消毒劑 1回 5—10cc. 靜注
L. M. ㊟㊟ エル, エム フェノバルビタール	マルコ (製藥)	末 { 10瓦 2.70 25瓦 7.00 (0.1) 10錠 0.45	催眠劑 1回 0.1—0.3 瓦
Lobelin "Ingelheim" ㊟ ロベリン「インゲルハイム」 アルファア鹽酸ロベリンの水溶 液	友田	(小人用) 0.3% { 6管 2.60 1cc. { 30管 12.40 (大人用) 1% 1cc. { 6管 6.10 30管 29.90	呼吸麻痺治療劑 皮注, 筋注又は靜 注 1回 1—2cc. (肺炎, 腦膜炎, 瓦斯中毒) (Atmuratol 参照)
Loberin "Sandoz" ㊟ ロベリン「サンド」 同上	サンド (塩野)	大人用 { 6管 4.90 20管 14.75 小人用 { 6管 2.30 20管 6.90	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
ロツク氏液 Lockei "Futaba" ㊟ (Liquor Lockei) 「フタバ」ロツク氏液 葡萄糖加リンゲル氏液 (加温溶器入)	フタバ (林)	300cc. 1管 時價 500cc. 1管	強心解毒劑 皮注又は靜注
「マルイシ」滅菌ロツク氏液	丸石	100cc. 3管 1.00 300cc. 1管 0.75 500cc. 1管 0.90	急救補血劑 (強心劑) 1回 200—500cc. 靜注
「萬有」ロツク氏液	萬有製藥	300cc. 1管 時價 500cc. 1管	
「シオノ」ロツク液	塩野義	300cc. 1管 1.00 500cc. 1管 1.20	
「タナベ」ロツク液	田邊五	100cc. 3管 1.00 300cc. 1管 0.75 500cc. 1管 0.95	
㊟ ロツク液	大日本 製藥	300cc. 1管 時價 500cc. 1管	
「三研」ロツク液	三菱藥品	300cc. 1管 0.80 500cc. 1管 1.00	
「櫻木」ロツク液	櫻木	100cc. 1管 0.40 300cc. 1管 1.00 500cc. 1管 1.20	
Localein ㊟ ロカレイン 2% 鹽酸プロカインとアドレ ナリン, クロレトーン溶液	平田	1cc. 50管 1.50 2cc. 50管 1.80 100cc. 瓶入 1.60	局所麻酔劑 1—2cc. 局所皮注
Lodibromin ロヂブロミン { ブロムカルチウム 2% { 葡萄糖 10%	三菱藥品	10cc. 10管 1.70 20cc. 10管 2.50	神經性諸疾患 痙攣, 子痲 毎日又は隔日10— 20cc. 靜注

品名組成	製造元 製造元	包装価格	医効用量
Lodion ロヂノン タケダ葡萄糖注射液 (158頁参照)	武 田	1號(10%5cc.) 5管 0.70	栄養, 解毒, 強心 利尿 劑 通常 5—50%液を 静注 5%液 1回10—50 —100—500—1000 cc. 皮注 5%液200—500— 1000cc. 注腸
		2號(10%10cc.) 5管 0.80	
		3號(10%20cc.) 5管 1.20	
		4號(10%30cc.) 30管 6.15	
		5號(10%50cc.) 3管 1.16	
		6號(20%10cc.) 3管 1.30	
		7號(20%20cc.) 5管 0.85	
		8號(20%30cc.) 5管 1.38	
		9號(25%50cc.) 30管 7.70	
		10號(50%20cc.) 3管 1.50	
		11號(50%50cc.) 3管 1.80	
		12號(25%20cc.) 5管 1.80	
		A號(5%100cc.) 2管 1.60	
		B號(5%200cc.) 5管 1.60	
		C號(5%300cc.) 2管 1.16	
		D號(5%500cc.) 1管 1.12	
		E號(5%20cc.) 1管 1.35	
F號(5%50cc.) 1管 1.50			
Lodion Calcium ロヂノン, カルチウム 10%ロヂノンにクロールカル チウム 2%を配す	武 田	10cc. 5管 0.95	止血・栄養, 強心 利尿, 解毒劑 毎日又は隔日 1回 10—20cc. 静注
		20cc. { 5管 1.30	
		30管 6.50	
Lodion Kampfer カムフル, ロヂノン {ロヂノン 5%液に {カンフル 0.1%を配す	武 田	50cc. 3管 時	強心 栄養劑 1回300—500cc. 静 注
		100cc. 2管 時	
		300cc. 1管 時	
		500cc. 1管 時	
Lodion Ringer ロヂノンリンゲル 5%の葡萄糖を配せるリンゲ ル液	武 田	{ 300cc. 時	リンゲル液に同じ
		{ 500cc. 時	
Bros-Lodion ブロスロヂノン {ブロムストロンチウム 10% {純葡萄糖 20%液	武 田	5cc. 5管 時	止痒, 消炎劑 1回 5—10—15cc. 静注
		10cc. 5管 時	
		20cc. 5管 時	

品名組成	製造元 製造元	包装価格	医効用量
Isravlin-Lodion イスラビンロヂノン	武 田	Isravlin 199頁参照	急性循環系不全 (疫痢, 肺炎, 中毒 の重篤なる場合) 説明書参照
		1函 9.00	
Lodion-Salz ロヂノンザルツ {第1液(リンゲル) 50cc. 12管 {第2液(20%ロヂノン) 30cc. 8管 {第3液(第1液 150cc. と 5% ロヂノン 150cc. との混合液 300cc. 1管	武 田	1函 9.00	急性循環系不全 (疫痢, 肺炎, 中毒 の重篤なる場合) 説明書参照
		15錠 0.30	
		30錠 0.50	
Loisedon ロイセドン ブロムキニーネ製劑	大阪薬品 實驗所	15錠 0.30	鎮 頭 痛 劑 1回 2—4 錠
		30錠 0.50	
		500錠 6.00	
Lopion ロピオン 金製劑 Natrium-Salz. der Auroalyl-thioharnstoff-benzoe- saure (Gargol 参照)	● バイエル	0.01瓦 1.35	結核, 敗血症 治 療 劑 用時 5—20cc. の水 に溶解し静注
		0.025瓦 1.73	
		0.05瓦 2.16	
		0.1瓦 3.00	
		0.25瓦 5.15	
		0.5瓦 9.00	
		0.75瓦 12.60	
Lotion ローション 殺菌洗口含嗽劑	Ⓢ ローシヨ ン會社 (安原)	50瓦 0.20	含 嗽 劑 10—50倍液使用
		200瓦 0.60	
		600瓦 1.60	
		整瓶 0.50	
Lounon ラウノン 葡萄糖注射液	金剛製薬	5% { 20cc. 5管 0.85	強心, 利尿, 栄養劑 (157頁参照)
		{ 100cc. 2管 0.90	
		{ 5cc. 5管 0.75	
		10% { 10cc. 5管 0.80	
		{ 20cc. 5管 0.95	
		20% { 10cc. 5管 0.85	
		{ 20cc. 5管 1.20	
		25% { 20cc. 5管 1.30	
		{ 50cc. 2管 1.20	
		50% { 20cc. 5管 1.70	
{ 50cc. 2管 1.70			

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Luehinon ルエヒノン 水銀アセタート, パラオキシグリセリル, オルトエーテル, ベンツオールオキシ醋酸ナトリウム及バルビタール複鹽の水溶液 (Novastrol 参照)	日本 藥品洋行	1.1cc. { 6管 0.80 12管 1.45 50管 5.50 100管 10.00	驅微兼利尿劑 1回 1.0cc. 注射間 隔 2—3 日皮注, 筋注, 靜注
Luemicol ルエミコール スルフォサリチル酸醋化メルクリカリウム及ヅクチンイミド水銀の複鹽	日新醫學	皮下, 筋注用 1.1cc. { 10管 0.70 50管 3.20 靜注用 2cc. { 10管 1.20 50管 5.50	驅微劑 皮, 筋注 1cc. 宛 靜注 3cc. 宛毎日或 は隔日
Luestin "Comet" ルエスチン _L コメット _T オキシチアン汞 Hg(CN) ₂ HgO に特殊操作を 施して, 無痛無菌注射溶液と なす	黒田	筋注用 30cc. 2.00 1cc. { 6管 0.80 12管 1.50 50管 4.00 靜注用 3cc. { 10管 2.00 50管 8.50 5cc. { 6管 2.00 50管 14.00	驅微劑 筋注 0.5—1.0cc. 靜注 1.0—5.0cc.
Lulu ルル クロールメチルメンチルエス テルを含ませたる綿花	三共	1錠 0.18	鼻感冒治療豫防劑 鼻孔挿入
Lumenon ルメノン Vitamin (A+D) 植物油製劑 1cc. 中 { A—30,000白鼠單位 D— 2,000白鼠單位 (Vidalon 参照)	ラヂウム 製藥	液 { 10cc. 1.50 50cc. 5.80 1000cc. 80.00 球 0.3 { 50球 2.00 100球 3.50	結核, 尙癩病 強壯劑 1日 0.4—1.5cc. (12—25滴) (2— 3球)
Lumihorn ルミホルン 肺臓, 脾臓, 聯合ホルモン製 劑	日東新藥 (岩城)	1cc. { 5管 2.80 15管 7.50 30管 14.10 60管 25.80	結核治療劑 隔日 1回皮注又は 筋注(説明書参照)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Luminal ルミナール フェニルエチルマロニル尿素 (フェノバルビタール)(L.M.参照)	バイエル メルク (シュミット)	末 { 10瓦 4.43 25瓦 11.09 0.1 { 10錠 0.86 100錠 7.18	強催眠劑 1回 0.1—0.3 瓦 鎮痙劑としては 1回0.5
Luminal natrium ルミナールナトリウム フェニルエチルマロニル尿素 ナトリウム (溶性フェノバルビ タール)	同	末 { 10瓦 4.43 25瓦 11.09 0.1 { 10錠 0.86 100錠 7.18 (乾燥アンブル) (0.22) 5管 2.68	ルミナールに同じ ルミナールに同じ 注射は20%液とし て筋注 1回1—2筒
Luminaletten ルミナレット ルミナール0.015瓦含有の錠劑	同	0.015 30錠 0.86	癩病劑 1日數回 1—3 錠 宛
Lumitropin ルミトロピン フェノバルビタール, 硫酸ア トロピン, 安那加, アクトコー ルより成る	ラヂウム 製藥	1.1cc. { 5管 0.80 10管 1.50 50管 6.50 2cc. { 5管 1.00 10管 1.80 50管 7.50	鎮痙, 鎮咳, 強心劑 1回 2—3cc. 皮注 又は筋注 疫劑, 百日咳, テ タニー
Luna ルナー 鹽酸デヒドロオキシコデイノ ンと鹽酸ヒドロコタルニン溶液 (Pavinal参照)	橋本製藥	1cc. { 10管 1.80 50管 8.50	鎮痛麻醉劑 1回 0.5—1.0cc. 皮注
Lungeridin ルンゲリヂン 特殊刺戟體療法劑	東洋 臓器藥院	#1 { 6管 4.80 12管 9.00 36管 24.50 60管 36.00 #2 { 6管 9.60 12管 18.30 36管 49.00 60管 72.00 #3 { 6管 14.40 12管 27.30 36管 73.40 60管 108.00 ネオ { 6管 21.00 12管 37.50 36管 100.00 内服用 { #1 50球 2.75 #2 50球 4.80 #3 50球 7.25 小兒用 { 100球 5.50 0.1cc. { 200球 10.00	結核治療劑 1日 3cc. 靜注 内服 1日 3—6 球

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Lusten S. C. G. J. 芥子, ルステン (ルステン S) カンフル, ルステン (ルステン C) グアヤコール, ルステン (ルステン G) ヨード, ルステン(ルステン J)	日本 藥品洋行	S. C. J. 各 { 100瓦 0.60 500瓦 2.30 1肝 4.30 G. { 100瓦 0.65 500瓦 2.80 1肝 5.30	消炎, 鎮痛巴布劑 貼付 S.....感冒, 肺炎 C.....神經痛 G.....呼吸器疾患 J.....腹膜炎
Luteinol ルテインオール 牛卵巢黃體製劑	塩野義	3cc. 5管 1.50	卵巢機能催進劑 1回 1管皮注
Luteoglandol ルテオグランドール 卵巢黃體製劑	ロシユ (日本) (ロシユ)	(0.5) 25錠 2.85 1.1cc. 6管 2.85	月經障害治療劑 1日 1—3cc. 皮注 3—5錠, 内服
Luteo-Renin ルテオレニン 牛の卵巢黃體エキス	ゲデオ (田邊元)	1cc. 12管 3.50 末 10瓦 3.50 (0.1) 50錠 3.10	月經障害治療劑 1回末 0.25—0.5 瓦 (1—2錠) 注 1 cc. 静注
Lutren ルトレン 標準黃體ホルモン 1cc.=2 家兔單位	バイエル	1cc. 1管 16.55	標準黃體ホルモン 月經過強, 月經困 難等に數日連続し て 1cc. 筋注
Lynosol リノゾール グアヤコールスルホン酸の鹽 基性カルチウム鹽 (舍利別は沃度含有 Jod-Lynosol Syrup参照)	ラヂウム 製藥	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.60 500瓦 14.50 0.15 { 100錠 1.00 500錠 4.00 舍 { 250瓦 1.80 500瓦 2.70	肺結核, 肋膜炎 治療劑 1日 0.5—3.0 瓦 3—20錠 舍利別 20—25瓦 (208頁参照)
Lypase リパーゼ 脂肪消化酵素	★ 大阪細菌	末 { 25瓦 0.60 100瓦 2.00 500瓦 8.00	消化劑 1日 0.5—1.0 每食後分服
Lysoform 「吉萬」 リゾフォルム ホルムアルデヒドの純椰子油 加里石鹼製劑 ⑤⑥—外用④⑦	吉萬商店	瓶入 { 50瓦 0.35 100瓦 0.50 500瓦 1.85 罐 { 2000瓦 4.75 5000瓦 10.00	消毒劑 0.5—2% 液外用

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Lysol リゾール 芳香クレゾール石鹼液 Labou-Lysoform. Ohkisol, ⑤クレゾール石鹼液参照)	リゾール 會社 (田邊五)	瓶入 { 100瓦 0.75 500瓦 2.40 1000瓦 4.10 罐 5瓦入 18.00	消毒劑 20—200倍液外用



品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Macnin マクニン 海人草中の有効成分を完全に分離抽出したるもの 錠剤—(錠) 1回 0.7—1.5	藤 澤	液 { 25瓦 1.05 100瓦 3.85 500瓦 17.50 末 { 25瓦 1.40 100瓦 5.25 500瓦 24.50 0.335 { 10錠 0.30 27錠 0.75 50錠 1.35 300錠 7.50 1000錠 22.00 児童團體用 { 100人分 7.00 6錠 0.10 1000錠 11.50	蛔蟲驅除劑 液—1回 1.0—2.0 末—1回 0.7—1.5 錠—1回 3—6錠 児童團體用 1日 1回 1錠 (空腹時) 糖衣錠 1日 1回 6錠
Macrobin マクロビン スベルマチン注射液中にアルソゾン、硝酸ストリキニーネ、鹽酸ヨヒンピンを配す	武 田	1cc. { 5管 3.30 30管 18.00	生殖機能障碍治療劑(男性用) 1cc.宛隔日皮注 12回を1療期として7日休止後反復す
Madarmon マダルモン 酵母「マツコラム」氏鹽及消化劑結合體	塩野義	末 { 50瓦 0.50 100瓦 0.80 250瓦 1.60 500瓦 3.00 錠 { 60錠 0.40 300錠 1.50 1000錠 4.50	食慾増進營養劑 1回量 0.5—1.0 毎食前30分
Magaton マガアトン 純硫酸マグネシウムの5.0%水溶液20cc.に硫酸アトロピン0.0003 瓦包含	鳥 居	20cc. 5管 2.40 10cc. 10管 3.00	胃痙攣、膽囊炎、胃潰瘍等の疼痛 1回10—20cc.静注
Magbron マグブロン ブロムマグネシウム尿素とブロムマグネシア配合體	武 田	5cc. { 5管 0.90 10管 1.65 10cc. { 5管 1.30 10管 2.40 20cc. 5管 1.90 液 { 100cc. 0.90 500cc. 3.30	鎮痙、鎮痛、鎮靜劑 毎日或隔日静注 1回10—20cc. 内服 1日 4—6cc. 分3食間

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Magmin マグミン 硫酸マグネシウム、葡萄糖及ブロム鹽溶液	東洋新藥	1cc. { 10管 1.00 50管 4.50 20cc. { 10管 2.50 50管 12.00	鎮痙劑 1日數回静注又筋注
Magminin マグミニン 硫酸マグネシウム、葡萄糖、ブロム鹽溶液	日新醫學	大人用10% { 10管 2.00 20cc. { 50管 9.00 小兒用25% { 10管 0.80 1.1cc. { 50管 3.50	鎮痙浮腫治療劑 1日 1回20cc.静注 小兒痙攣に 1cc.皮注
マ グ ネ シ ア 乳			
Magnesia Milk 「フタバ」 マグネシアミルク 膠狀水酸化マグネシア乳劑	フタバ (林)	360cc. 1.10	制酸緩下劑 5—20cc.を 5—12倍の水に稀釋して食後 2時間頓用 外用—同量のオレーフ油に混じ塗布
「櫻木」 マグネシアミルク	櫻 木	100瓦 0.30 250瓦 0.60 500瓦 1.00	制酸、緩下劑 制酸劑として 1回 5瓦毎食後
「シオノ」 マグネシアミルク	塩野義	250瓦 0.80 500瓦 1.20	便秘に 1回10—30瓦 1日30—40瓦
「齋藤」 ミルク・オブ・マグネシア	齋 藤	6オンス 0.50 12オンス 1.00	
「理研」 マグ コロイドマグネシア乳劑 (Crimag 98頁参照)	理 研 (玉置商店)	400瓦 1.20	
Magnesin マグネシン 特殊金屬マグネシウムを容れたるA管とグリセリンを容れたるB管とよりなる(用時混合) 同 注射器(針共) 同 注射針 マグネシン耳鼻用注射針 同 肛門吸引ポンプ 同 吸角ゴム管	日本新藥	A. B6對入 3.00 1組 1.20 1本 0.12 1本 0.22 1個 3.00 1組 0.70	痔核、鼻炎、血管腫注射劑 B管中へA粉末を混和し0.1—0.2cc.局所注射

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Magnesium Perhydrol "Merck" マグネシウム, ペルヒドロール 過酸化マグネシウム	メルク (シユ ミット)	15% { 25瓦 1.70 50瓦 3.00 100瓦 5.10 250瓦 10.60 25% { 25瓦 2.20 50瓦 3.65 100瓦 6.55 0.5 { 20錠 1.25 50錠 3.05	胃酸過多制酸劑 1日數回食後直に 1/2—1 茶匙又は 1 —2 錠
過酸化マグネシウム 純過酸化マグネシウム 25% 酸化マグネシウム 75%	三 共	末 { 50瓦 1.60 500瓦 13.20	制酸防腐劑 1回 0.25—0.5 瓦 宛
Magnesol マグネゾール 硫酸マグネシア葡萄糖溶液	鳥 居	20cc. { 3管 1.80 6管 3.30 10cc. 6管 1.80 5cc. 10管 1.90 2cc. 10管 1.60	痙攣子癇治療劑 1回 1筒靜注又は 筋注
Magnesol Hypertonische 高張マグネゾール A { 40%葡萄糖液 3cc. 40%硫酸液 1cc. B { 40%葡萄糖液 4cc. 40%硫酸液 2cc. C { 40%葡萄糖液 7cc. 40%硫酸液 3cc.	全	A 4cc. 3管 0.80 B 6cc. 3管 1.00 C 10cc. 3管 1.50	腦壓亢進治療劑 1回 4—10cc. 徐々 に靜注
Magrapin "Limit" マグラピン「リミット」 { 硫酸マグネシア 3% 葡萄糖 10%	浪速製藥	10cc. 5管 1.00 20cc. 5管 1.80	鎮痙, 浮腫治療劑 1日數回靜注又は 皮注, 筋注
Magserin マグセリン 25%の硫酸マグネシアに10% ブロムナトリウムを配す	日本新藥	1cc. 10管 1.50	鎮 痙 劑 (疫痢の痙攣) 1回 1cc. 皮注 1日 3—4 回迄
Mahon マホン チミチフギン含有の藥物を原 料とせる製劑	★ 友 田	{ 90錠 1.20 270錠 3.00 800錠 7.50	耳鳴症治療劑 1日 3錠毎食後分 服

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Maigre メーグル 複合ホルモン脱脂劑	堂 島	60錠 3.00 150錠 7.00	肥満症治療劑 1日 6錠分3
Maki-Jodin マキヨチン 沃度製劑 第二マキヨチン 第三マキヨチン	牧野沃度 製藥所 (福井七)	1000瓦 2.50 第二 450瓦 2.50 第三 { 30瓦 6本 3.00 45瓦 6本 4.80 300瓦 1本 3.00 500瓦 1本 4.50 1000瓦 1本 5.00	變 質 劑 (結核, 腺病質) 内 用 第二—醫家用, 内 服用 第三—靜注用
第四マキヨチン		500瓦 4.00	第四—醫家用, 内 服用
Makigonol マキゴノール 沃度製劑	全	{ 250粒 12.00 500粒 23.00 1000粒 41.00	治 淋 劑 内 用
Makinatin マキナチン 沃度製劑	全	{ 1瓦 10管 2.50 2瓦 10管 3.50 5瓦 10管 4.50 5瓦 2管 1.20 10瓦 2管 2.00 225瓦 瓶入 22.00 450瓦 瓶入 40.00	變 質 劑 内 用
Makinosamt マキサムト 同	全	{ 120球 5.00 250球 9.00 500球 16.50 1000球 29.00 10號 { 120球 6.50 250球 13.00 500球 25.00 1000球 48.00 10號 { 250瓦 11.00 瓶入 500瓦 20.00	變 質 劑 能書参照

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
外用マキサムト	牧野沃度 製薬所 (福井七)	瓶入 { 25瓦 1.20 50瓦 2.00 100瓦 3.50 225瓦 7.00 450瓦 13.00	殺菌消毒剤 外用
Makino's Colodium マキノコロヂウム 沃度コロヂウム	全	50瓦 1.50	防腐的覆蓋剤 止血, 殺菌に塗布
Maltsellol マルトゼロール ココア, マルツ肝油乳劑	ゲーハ (中外 新薬)	250瓦 2.85	滋養剤 1日3回 5-10瓦 (本劑5瓦=肝油3瓦)
Malzsoup-Extract マルツ汁越幾斯 麦芽糖, 炭酸カリウイタミン B, C, を含有せる濃稠エキス	和光堂	{ 120瓦 0.70 500瓦 1.90	栄養緩下剤 1回10-30瓦 1日2-3回
沃度鐵マルツエキス 有機沃度鐵含有のマルツ汁エ キス	全	{ 120瓦 0.75 500瓦 2.00	栄養剤 1回10-30瓦 1日2-3回
マルト肝油 10%の肝油を含有するマルツエ キス	全	300瓦 1.50	小兒栄養剤 1日15-20瓦
Malzsupper-Extract "Comet" マルツ汁エキス「コメット」 純良マルツエキスに易溶性カ ルチウムを配伍す	コメット (黒田)	{ 100瓦 0.70 500瓦 1.80	小兒栄養緩下剤 1回2-3茶匙毎 食後
Mamagen 〔星〕 ママーゲン 穀類澱粉をコロイド化し, ヴ イタミン及酵母を配せる粉末 (無糖)	明治製菓	〔星〕 { 225瓦 0.55 450瓦 1.00	栄養剤 (重湯素) 牛乳, 粉乳に添加 し用ふ
Mamain マメイン Gossypium 屬種子より抽出 せる蛋白製剤, 無味無臭淡黄色 粉末, 乳腺を刺戟して催乳す	藤永 (三共)	末 { 30瓦 1.75 100瓦 5.50 450瓦 22.50	乳汁分泌催進剤 2瓦宛 1日3回 温湯又は牛乳に混 じて用ふ

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Mammals ★ マムマルス 睾丸より抽出せる男性ホルモ ン (Androstin, Geramin参照)	應用化学	1cc.=20鶏冠單位 6管 6.00 1cc. 30管	男性ホルモン 隔日1回1cc. 皮注
Mammary Substance 乾燥乳腺實質 幼牛及成牛の乳腺組織を乾燥 せるもの, 卵巣機能を抑制す	パーク デビス (三共)	28瓦 4.55	月經困難 月經過多 1日3回 0.325- 0.65瓦宛
Manetol ★ マネトール 脊髄の止血有效成分 乾燥アンプル入 1管=10生物學 的單位含有	バイエル	{ (0.1瓦) 5管 } 10.60 (溜水)20cc.	止血剤 溶解して1回1筒 筋注, 24時間内に 1-6管迄使用し 得
Maos マオキス 麻黄總有效成分エキス	山ノ内	液 { 250瓦 1.40 500瓦 2.50 1瓶 4.60	祛痰鎮咳剤 1日量2-4cc.
Margiton マルギトン(舊名マルキノール) 胡蝶花科植物の有効成分に亞 鉛華とベンゾール誘導體を配せ る黄色軟膏	瀧田 (三共)	チューブ 3瓦 0.55 〔星〕 { 25瓦 2.50 100瓦 8.75	頑癬治療剤 4日目毎に1分間 患部塗擦
Maru-chinal マルキナル キナ皮總アルカロイド抽出體 (0.5%のアルカロイド含有)	丸石	液 { 100瓦 0.50 500瓦 1.80	健胃強壯薬 1日10.0-15.0 cc.分3
Maruishi Aromatic Sapocresol 「マルイシ」芳香クレゾール 芳香佳快なるクレゾール石鹼 液 (Lysol参照)	丸石	液 { 100瓦 0.25 500瓦 1.00 1000瓦 1.80 5000瓦 6.50	消毒剤 外用

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Maruishi-Pappu マルイシパツプ 日本準藥局方白陶土巴布	丸 石	泥膏 { 100瓦 0.45 250瓦 0.90 500瓦 1.65 2000瓦 4.95 5000瓦 8.50	巴 布 劑 貼 布
Guaja-Pappu グアヤパツプ グアヤコール加マルイシパツ ブ	丸 石	泥膏 { 100瓦 0.70 250瓦 1.35 500瓦 2.35	透達性巴布劑 一晝夜 1—2回巴 布す
Maru-Oxin 園 マルオキシ 3% (10.0 容量%) の H ₂ O ₂ を含有する水溶液 (家庭用)	丸 石	液 { 100瓦 0.30 500瓦 0.70 1000瓦 1.20	殺菌消毒劑 用途に應じ適宜稀 釋して用ふ
Maru Oxil ㊦ マルオキシール 同上 (醫療用)	丸 石	醫用 { 125瓦 時 500瓦 價 1000瓦	殺菌消毒劑 同上
ネオマルオキシ 6%の H ₂ O ₂ 含有	全	ネオ { 100瓦 0.40 500瓦 0.95 1000瓦 1.50	
「マルイシ」 アスピリン		Aspirin (29頁) 参照	
「同」 エフェドリン		Ephedrin (125頁) 参照	
「同」 キノフェン		Quinophen (348 頁) 参照	
マルキ・イースト (イーストと 改稱)		Yeast (451頁)參 照	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Marukofon マルコホン 車前草有效成分 桔梗根有效成分結合體 賣 一内用 1日 3瓦迄	マルコ 製 藥	液 { 25瓦 0.50 100瓦 1.20 200瓦 2.00 500瓦 4.00 末 { 50瓦 1.50 100瓦 2.50 500瓦 8.50 1瓦 15.00 5瓦 65.00 錠 { 20錠 0.30 50錠 0.55 100錠 1.00 500錠 4.50	鎮咳祛痰劑 液 1日 3—5 末 1日 1.5—3.0 錠 1日 6—9錠
Marukoroid マルコロイド タラ皮主成分の蛋白結合體	全	末 { 50瓦 2.30 100瓦 4.30 250瓦 10.00 500瓦 18.00 液 { 100瓦 2.00 250瓦 6.50 500瓦 10.00 0.3 { 100錠 1.60 500錠 7.00 1000錠 12.00	糖尿病, 肥胖病 治 療 劑 末 1回 0.5—1 瓦 液 1回 1—2cc. 錠 3—5錠 食前30分
Marukonalin 園 マルコナリン	全	0.3 { 18球 1.20 50球 3.00 100球 5.00 200球 8.00 500球 18.00 1000球 24.00	治 淋 劑 每食後 2—3 球宛
Marukonin ● マルコニン 高級ケトン化合物	全	末 { 5瓦 3.00 25瓦 12.00 50瓦 22.00 0.05 { 12錠 0.50 100錠 3.00 1000錠 25.00	蛔蟲驅除劑 1回 0.15—0.3 瓦 頓用
Marukopan マルコパン 膵臓及膽囊臓器製消化酵素劑	全	末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.00 225瓦 11.50 450瓦 20.00 0.2 { 50錠 1.00 100錠 1.50 200錠 2.80 500錠 7.00 1000錠 12.00	消 化 劑 1日 0.7—1.0 1回 3—5錠

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Marukophen マルコフェン ● フェノルアミン誘導體, プロ ムテオプロミン	マルコ製薬	末 { 25瓦 1.20 100瓦 4.50 450瓦 20.00 0.15 { 20錠 0.50 50錠 1.20	神経痛治療劑 1回 0.2—0.4 (2—3錠)
Marukopirin ● マルコピリン モノブロム, アセトアニリド	全	末 { 25瓦 1.10 100瓦 4.00 450瓦 15.00 0.15 { 12錠 0.40 50錠 0.65 100錠 1.10	鎮靜解熱劑 1回 0.2—0.4 (2—3錠)
Maruko Shipp マルコシツブ (シツブ, ヨメオイル) 無水グリセリン, 硼酸メント ール, 珪酸アルミニウム, 泥狀 體	全	泥膏 { 100瓦 0.35 250瓦 0.70 500瓦 1.00 2000瓦 3.20 5000瓦 6.80 3000瓦 30.00	巴布劑 加温して巴布
Maruko Cod Liver oil ㊦ マルコ純肝油及球	全	液 { 200瓦 0.75 450瓦 1.20 純肝油 { 100球 0.55 0.5 { 300球 1.45 500球 2.20 0.3 { 100球 0.50 500球 2.00	滋養強壯劑 1日 10—20瓦 滋養強壯劑 1日 3回毎食後 5球
㊦ { キ ナ 肝油球 グ ア ヤ ヨード アルセン		㊦ 0.3 { 100球 1.00 200球 1.80 500球 4.00	
マルコ肝油キヤラメル ㊦ 肝油をキヤラメル化したるヴ イタミンA劑	全	1.0 { 50個 1.20 100個 2.00 500個 8.50 1000個 14.00	滋養劑 1日 3回毎回 2—3個
Maruko, tase 純マルコターゼ 植物性純アマラーゼ	全	末 { 25瓦 1.00 250瓦 9.00 500瓦 15.00 0.2 100錠 1.00	消化劑 1回 0.2—0.3 毎食後
Marusurin マルシユリン イースト菌より抽出せるイン シユリン類似物質	㊦ 號 株式會社 イースト 研究所	1cc. { 5管 1.80 10管 3.50 5cc. 1管 1.80 錠 192錠 15.00	糖尿病治療劑 1日 1—2 回 1cc. 宛皮注 1日 9錠毎 食後分服

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Marutamin マルタミン ビタミンB製劑	丸石	1cc. { 5管 0.88 50管 5.95 2cc. { 6管 1.20 12管 2.10 50管 7.30 3cc. { 5管 1.50 10管 2.75 50管 11.00 5cc. { 5管 1.80 10管 3.40 50管 13.90 10cc. { 5管 3.30 50管 29.50 液 { 100瓦 0.90 500瓦 2.90 2500瓦 13.90 末 { 25瓦 0.58 100瓦 1.60 500瓦 6.10 錠 { 50錠 0.90 100錠 1.45	Vitamin-B 劑 注— 1日 1回 1—5cc. 皮注又は 筋注 液— 1日 3回 4—6瓦宛 末— 1日 3回 2—3瓦宛 錠— 毎食後 5錠宛
Masedal ㊦ ㊦ マセダール ブロム, ジエチル, アセチル 尿素 (Adalin, Dormin, Alabon参照)	丸石	末 { 10瓦 時價 25瓦 時價 100瓦 時價 0.1 { 10錠 0.65 30錠 1.35 100錠 3.55	催眠鎮靜劑 催眠— 1回 0.5—1.0 鎮靜— 1日 3回 0.2—0.5 宛
Maskurin マスキリン 舉丸, 攝護腺, 腦下垂體前葉 抽出體製劑	中村 研究所	1.0cc. { 5管 1.50 10管 2.90 0.1 { 50錠 2.00 100錠 3.90	男性ホルモン劑 1回 1cc. 皮注 1日 6錠早朝及就寝前 分服
Mecanyl ㊦ ★ メカニール アロイン, エヴオニミン, 吐 根, 胆汁エキス, パンクレアチ ン, ベラドンナエキスを主劑と せる小丸子	フユ ムウズ 東洋 (カルニ イ)	50瓦 3.30	下劑 夕食前 1—3 丸内 服
Medinal ㊦ ㊦ メヂナール 溶性バルビタール	シエー リング (田邊元)	(0.5) 25瓦 時價 10錠	強催眠劑 1回 0.2—0.5 瓦 就床前内服

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Medulan メヅラン 骨髓に含有するトロンボキナーゼ製剤	第一製薬	末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.00 5管 1.60 5cc. { 10管 3.00 50管 12.50 0.25 { 30錠 1.20 100錠 3.80	止血剤 内服 0.5瓦 (2錠) 宛 1日 2-3回 静注又は皮注 1回 5cc.宛
Meiji-Patlar 明治パトラー 無鉛撒布剤	明治製薬	紙器入 { 小 0.20 大 0.50	皮膚撒布剤 外用撒布
Melan メラン 鹽酸パバペリン, チミアンエキス, プロムラール, アンチピリンを配せる蜂蜜砥剤	三共	250瓦 1.80	百日咳砥剤 1日 3回 1-2茶匙
Melysin メリジン 1cc. 中鹽酸ヒドロリコリン 0.05瓦含有 (エメチン代用)	武田	1cc. 5管 1.20	アメーバ赤痢, 肺 ダストマ治療剤 毎日又は隔日 1cc. 宛皮注
Menispin メニスピン Vittelli 油15%, 醋酒石酸アルミニウム 5%, グルコズム 2%含有の膿球	藤澤	{ 5球 0.65 10球 1.10 50球 5.00 100球 9.00 300球 24.00	帯下, 膿癰爛 治療剤 1日 1回 1球挿入
Mentholatum メンソレタム メントール, カンフル軟膏	近江セールス	{ 小罐 0.25 軟膏 { 12.5瓦 0.45 25瓦 0.90 90瓦 1.80	皮膚薬 外用
Mentpin メントピン チモール, メントール, テルビヒン製剤	オエストライヘル (三共)	2cc. 10管 9.00	グループ性肺炎 治療剤 1回 2.0cc. 筋注
Merc-Sol メルクゾル 1瓦中 { コロイド水銀 0.2瓦 コロイド蒼鉛 0.04瓦 含有の特殊軟膏	国立化学研究所 (日本新薬)	{ 25瓦 0.55 100瓦 2.00 500瓦 7.50	驅微剤 水銀軟膏の如く塗擦, 但普通水銀軟膏の $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ 量にて足る (1回 3.0-4.0)

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Mercural メルクラール 25%の水銀を含有する水溶性水銀軟膏 (使用後水洗可能)	丸石	{ 50瓦 0.50 500瓦 2.50	水銀軟膏改良剤 局方水銀軟膏と同じ
マーキエロクローム製剤			
Banchrom 38頁参照 Ermil 129頁参照			
Mercurochrome マーキエロクローム [第一] デプロム, オキシメルクリ, フルオレスセインナトリウム	第一製薬	{ 10瓦 1.70 25瓦 3.80 100瓦 13.50	殺菌消毒剤 創傷消毒に 1-3% 洗滌に 0.5-2% 創痕なき皮膚面の消毒には 2%アルコール液
Mercuro-chrome "Ohki" マーキエロクローム [オーキ]	大木	末 { 10瓦 2.80 25瓦 6.50 100瓦 25.00 500瓦 105.00	粉末は 2%以下の溶液又は軟膏 チンキは 2%以下 含嗽用不許
Mercurochrome "Yen" マーキエロクローム [エン]	圓城	末 { 10瓦 2.50 25瓦 6.00 2%液 { 100cc. 0.80 500cc. 3.50	Ph. 4.8以上の酸性液 タンニン酸, 硼酸, カルシウム鹽, 重金屬鹽にて沈澱す
Mercuiley マーキレイ (マーキエロクローム T.F. 改名)	鳥居 (一般用)	末 { 10瓦 1.70 25瓦 4.00 100瓦 15.20 500瓦 72.20	
	(注射用)	末 { 10瓦 4.50 0.2 { 3管 0.60 10管 1.60	
Marchioret マーチオレート (マーキエロクローム「ムラ」改稱)	村上化学	末 { 10瓦 2.50 25瓦 5.50 100瓦 21.00	
Macuron マキロン マーキエロクローム「山之内」	山之内	末 { 10瓦 2.00 25瓦 4.80 100瓦 18.20 2%液 { 50瓦 0.50 100瓦 0.80	

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Mercurocrom 「櫻木」マーキユロ (赤丁) マーキユロクローム水溶液	櫻木	液 { 10瓦 0.20 500瓦 3.00	沃度チンキ代用 創傷, 頑癬等に對 して1日數回塗布
Mercurchrom ★ Adhesive Plaster マーキユロクローム絆創膏 1%のマーキユロクローム含 有の亞鉛華絆創膏	三田村商店	17種×91種紙箱入 1本 0.70 30種×455種 徳用絆 1本 4.50 注射用 1種平方 500枚 0.70 1.2種平方 350枚 0.70 (各1打入あり)	殺菌絆創膏
Mercurosal ● メルクロザール 醋サリチル酸水銀ナトリウム	パークデピス (三共)	(筋注用) 12管 11.00 (副注用) 12管 13.00 (品切)	驅微劑 筋注は2cc. 靜注は 5cc.の無菌水に溶 して用ふ
Mergal ● メルガール 膽汁酸, 酸化水銀, タンナル ピン結合體	リーデル (ホルス ティン)	(0.15) 40球 5.50	驅微劑 1日3回1球宛毎 食後内服
Mesurol メズロール デオキシ安息香酸モノメチル エーテルの鹽基性蒼鉛鹽 (Bi 20%含有の乳劑)	バイエル	瓶入) 100cc. 12.67	蒼鉛驅微劑 0.5—1.0cc.宛3— 4日毎に筋注 蒼鉛の總量 0.9— 1.2瓦に至る
Metabolin ★ メタボリン Vitamin B ₁ 鹽酸鹽注射液 1瓶=400鳩單位 C ₁₂ H ₁₇ ON ₄ SCl·HCl の生理的食 鹽水溶液	武田	A號 0.05 瓶 20鳩單位 1cc. { 5管 0.80 10管 1.45 50管 6.00 B號 0.25 瓶 100鳩單位 1cc. { 5管 2.00 10管 3.80 50管 16.50	Vitamin B ₁ 劑 1—2cc. 皮注, 筋 注又は靜注

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Metaborin Strong 強力, メタボリン B ₁ taxin, Bener vit. Eulios B ₁ Orizantin B ₁ Abery B ₁ Neo-Parantrin.	武田	1號 0.5 瓶 200鳩單位 1cc. { 5管 3.20 10管 5.80 50管 26.50 2號 1.0 瓶 400鳩單位 1cc. { 5管 5.00 10管 8.80 50管 59.00 3號 3.0 瓶 1,200鳩單位 2cc. { 5管 8.50 10管 24.00 4號 5.0 瓶 2,000鳩單位 2cc. { 5管 13.50 10管 48.00	Vitamin-B ₁ 劑 脚氣, 食欲障害, 肋膜炎, 結核性疾 患, 視神經炎, 多 發性神經炎
Metallosal Mangan "Leo" メタルローザルマンガン「レオ」 マンガン製劑 MnCl ₂ 無機性 溶液	レオイン スリン (小田井)	10cc. 10管 8.50	早發性癡呆 結核治療劑 筋肉注射 1回 0.5 5cc.
Metallsalz-mangan "Odai" メタルザルツマンガン「オダイ」 同上	小田井 商店	10cc. 10管 5.00 2cc. 20管 5.00	早發性癡呆 肺結核治療劑 (同上) 説明書参照
Methylenblau Medicinale 藥用メチレンブラウ テトラメチルチオニクロリ ツド [買評]—内用 1日 0.02 坐藥 2%以下, 點眼 0.001%	バイエル	25瓦 1.40	神經痛, 赤痢 腎臟炎, 淋疾 内服 1回 0.1—0.3 瓦外用 4%液 1回 0.05—0.1 皮 注
Methylen Kreosote [準局] 「ツル印」メチレンクレオソ ート [買評]—[買絶]	田邊五	水 { 25瓦 0.70 100瓦 6.50 500瓦 12.00	結核治療兼 腸内殺菌劑 1日 1—2 瓦分三
Methyl extract of Tubercular Antigen ●★ "Pasteur" 結核アンチゲン, メチルエキス 特殊結核菌ワクチン	パス ツール (柳 洋 行)	1cc. 10管 8.65	結核治療劑 0.25—0.5—0.75— 1.0cc. と漸時増量 皮注又は筋注

品名組成	製造元 登録元	包装価格	医効用量
Methysot メチソート メチレン, クレオソート	橋本 (福井七)	末 { 25瓦 0.70 225瓦 5.50 450瓦 10.00	結核治療劑 1日 3回 0.3—0.6 瓦
Metilon ●★ メチローン フェニル, デメチルピラツオ ロン, メチルアミノメタンスル ホン酸ソーダ (Novalgin, Novapon, Pyretin, Bonpyrin, Neoelaon 参照)	第一製薬	末 { 10瓦 0.80 25瓦 1.60 100瓦 5.50 500瓦 26.00	解熱, 鎮痛劑 1回 0.5—1.0 瓦 宛 1日 3回
Mettogen メツトーゲン 特殊植物より抽出せる糖分解 作用物質に各種ビタミン酵素 アミノ酸, 脂肪, 鹽類を添加せ る芳香粉末	築地新薬	末 { 250瓦 6.00 500瓦 10.00 0.2 { 550錠 3.80 1200錠 7.00	糖尿病, 治療劑 1日量 2—3 瓦 (10—15錠) 3回 毎食後分服
Meziobental メチオベンタール ベンゾイール, モノスルホン 酸ナトリウム10%液	マルコ 製薬	液 { 15瓦 0.30 25瓦 0.45 100瓦 1.30 500瓦 5.70	皮膚薬 外用塗布 1日 2— 3回
Mibu-Cream ㊦ ミブクリーム サリチル酸メントールエステ ル含有の白色芳香軟膏	日本新薬	10瓦 (化粧罐) 0.25 50瓦 (アルミ大罐) 0.90	家庭皮膚薬 外用塗布
Mibunol ミブノール 白檀油の有効成分セスキテル ペンアルコール90%を含有する 油液, 胃障害少し, 白檀油代用 〔賣許—賣給〕 1日 1.0—3.0	日本新薬	液 { 25瓦 0.75 100瓦 2.50 500瓦 10.00 原料用 { 5瓦 70.00 17瓦 180.75 膠球 { 30粒 0.75 (0.3) { 100粒 2.00 500粒 8.00 1000粒 15.00	白檀油代用 治淋劑 1日 3回 0.5—1.0 (2—3球) 宛食後

品名組成	製造元 登録元	包装価格	医効用量
Mibuso (Coc-Sant) ★ ミブソ (別名コクサント) サントニンを含有する菊科の 新植物「みぶよもぎ」より抽出 せるサントニン製劑	日本新薬	末 { 25瓦 100瓦 500瓦 0.4 { 20錠 100錠 500錠	蛔蟲驅除劑
Mical マイカル (舊名. ゲルカルク) コロイド化せられたるカルシ ウムの正燐酸鹽及炭酸鹽, 白色 無味無臭の粉末にして, 腸膜間 より吸収せらる	石本 (福井七)	末 { 10瓦 1.00 50瓦 4.00 100瓦 7.00 250瓦 15.00 500瓦 28.00 0.25 { 36錠 1.00 80錠 2.00 250錠 5.00 1000錠 17.00 3000錠 50.00	カルチウム劑 (結核, 腎臓炎, 胃酸過多, 骨疾 患, 乳汁不足 更年期障害) 1日 3回 1回 0.5 —1.0 (2—4錠) 宛
Blue-Mical ブルーマイカル コロイド鐵 Fe ^{II} 配合のマイ カル	全	マイカルに同じ	結核及内 分泌疾患治療劑 1日 3回 1回 0.5 —1.0 (2—4錠) 宛
Green-Mical グリーンマイカル コロイド鐵 (green-fesol 167 頁参照) 肝油末含有のマイカル	石本 (福井七)	マイカルに同じ	強壯劑 (結核, 痔瘻) 1日 3回 1回 0.5 —1.0 (2—4錠) 宛
Mika-Barium ミカバリウム 純硫酸バリウム (80%) に粘 稠料及調味料を配す	ミカサ 商會 (新良貴)	末 { 130瓦 0.60 500瓦 2.00 2瓦 7.00 6瓦 21.00	レントゲン造影劑 内服用
Milaneuen ミラノイエン 鹽基性トリクロールブチルマ ロン酸着鉛エムルジオン (Casbin, Giflou, Bistran 参照)	吉萬	2cc. { 5管 0.90 10管 1.65 50管 6.60 瓶入 100cc. 4.20	驅微劑 隔日 2cc. 筋注

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Mileval ミレパール ジアセチル, ビスオキシフェニル, イサチン 【買証】—【買証】 1日 0.025 頓 0.015 (Isacen, Katharisatin, Isalaxitin, Hashizzen, Welpas 参照)	大日本製薬	末 { 1瓦 0.60 5瓦 2.80 25瓦 12.00 10倍用 { 25瓦 1.60 100瓦 5.50 20錠 0.25 50錠 0.50 0.005 { 100錠 0.80 500錠 3.50 1000錠 6.50	下 劑 末 1回 0.005— 0.015 瓦 錠 1回 1—3 錠 10倍用 1回 0.05— 0.15 瓦
Milk of Bismuth 蒼鉛乳 水酸化蒼鉛の乳劑	パークデビス (三共)	16オンス 4.50	腸 收 斂 劑 1回 2—16cc.
Milzsin ミルツシン (結核治療, 脾臓ホルモン) 新鮮なる牛脾臓より抽出せる水溶性ホルモンにして網状織内皮細胞を刺戟して免疫體産出作用を有す 液は無蛋白, 微にフェノール臭を有し末は淡褐色, 香味, 引濕性 【買証】—【買証】 1日量 1.0—2.0	日本新薬	1cc. { 5管 1.50 10管 2.70 50管 11.50 末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.00 500瓦 20.00 0.2 { 100錠 1.60 300錠 4.00 液1cc=生脾臓2瓦 末1瓦=同 5瓦	結核治療並に豫防劑 注射 1cc. 皮注内服 1日 1—2 瓦 (6—9錠) 3回分服 暗血瘰癧には半量を用ふ
Minapon ミナポン チンナモイル, パラオキシフェニル尿素 (Elbon 参照)	太田安	末 { 25瓦 2.30 100瓦 8.20 250瓦 18.00 500瓦 35.00 1瓶 65.00 1.0 { 20錠 2.30 100錠 10.00	結核解熱劑 1日 4—6 瓦 3—4回分服, 連用の場合は 1日 2瓦
Miniglin ミニグリン 脾臓ランゲルハンス氏島のホルモン水溶液 (Insurin 参照)	帝國社 (武田)	1cc.=10單位 5cc. 1.00 1cc.=20單位 5cc. 1.65 1cc.=100單位 0.5cc. 5管 4.00	糖尿病治療劑 インシュリンに倣ふ 1回 2—10單位 皮注又は静注

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Microdin ★ マイクロジン 有機性硫黄化合物。フェニルチオウレタン (内服用は大風子油及肝油溶液)	大木合名	4cc. 10管 4.80 200cc. 瓶入 16.50 内用 { 50球 3.80 200球 11.00 外用 100瓦 3.80	治 癩 劑 注射, 内服, 又は外用 (説明書参照)
Mioka ミオカール グルコン酸石灰液	橋本製薬	2cc. { 10管 0.90 50管 4.00 5cc. { 10管 1.40 50管 6.50 10cc. { 10管 2.00 50管 9.50	カルチウム劑 1日 1回 5—10cc. 皮注又は筋注
Mirth Antimon ★ ミルスアンチモン アンチモンヒドロゾルに非特異性蛋白を配せる液	丸石	2cc. { 5管 1.10 10管 2.10 50管 9.50	第四性病軟性下疳治療劑 毎日又は隔日 1—2cc. 皮注
Missmon ★ ミスモン 卵巣より抽出せる水溶性卵胞ホルモン (Proginon, Uden, Perlatan, Gynandol 参照)	田邊五	1.000 M.U. 1cc. { 5管 1.80 10管 3.30 50管 14.50 5.000 M.U. 1cc. { 5管 2.20 50管 17.50 10.000 M.U. 5管 2.50 50管 20.00 50.000 M.U. 3管 4.00 300.000 M.U. 1管 6.00	女性ホルモン 1cc. 皮注
Mitigal ミチガール ジメチル, ギフェニレン, ギスルフイッド 【買証】—【買証】 (Scabol, Suser.1 参照)	バイエル	液 { 30瓦 0.67 150瓦 2.75 500瓦 8.10 1000瓦 13.66	疥癬, 濕疹, 化膿疹, 頑癬 1日 1—2 回塗擦 原液又は 10—20% 軟膏として
ミチガール石鹼 ★ 10%ミチガール含有石鹼	全	1個 (50瓦) 0.57	皮 膚 藥

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Mitsuboshi V.B. ★ 三星薬品
三星 VB (末), (液)
 末はコルンエキス粉末 (Vitamin-B) にカルチン (有機磷酸カルシウム) を配し, 液はコルンエキス改良剤, 無酒精性 (96頁Corn-Ex 参照)

末	100瓦	1.60	Vitamin-B 剤 兼栄養, 利尿剤 末= 1日 3.0—4.5 瓦 3回分服 液= 1日 10—20瓦 分服
	250瓦	3.20	
	500瓦	5.50	
液	500瓦	2.40	
	1肝	4.00	
	2.5肝		
	5肝		
	5肝		

Mizuhonin 大日本製薬
ミヅホニン
 プチルカルビノール處置法に依るビタミンB製剤

1cc.	5管	0.80	Vitamin-B 剤 注射 1回 1—2cc. 皮筋, 静注 末 1日 3瓦 液 1日 10瓦
	10管	1.30	
	50管	5.50	
2cc.	5管	1.00	
	10管	1.80	
3cc.	5管	1.30	
	10管	2.50	
5cc.	5管	1.80	
	50管	15.00	
末	50瓦	0.85	
	100瓦	1.50	
	500瓦	6.50	
液	100瓦	0.60	
	500瓦	2.00	
	2.5肝	9.00	

"Mochida's" Onanko 中村瀧
黄降汞軟膏 「モチダ式」
 局方品に比し粉末の微細無刺戟性なり

1%	50瓦	0.95	諸種の眼疾患 眼臉塗擦
2%	50瓦	1.00	
3%	50瓦	1.05	
4%	50瓦	1.10	
5%	50瓦	1.15	
10%	50瓦	1.40	
1%	100瓦	1.80	
2%	100瓦	1.90	
3%	100瓦	2.00	
4%	100瓦	2.10	
5%	100瓦	2.20	
10%	100瓦	2.70	
1%	500瓦	6.50	
2%	500瓦	7.00	
3%	500瓦	7.50	
4%	500瓦	8.00	
5%	500瓦	8.50	
10%	500瓦	11.00	

Modanpur 日本薬品洋行
モダンプール
 乳白色の無脂肪性リメント製剤

液	25瓦	0.35	汗疹, 痒疹, 痒疹 1日数回塗布
	50瓦	0.65	
	100瓦	1.10	
	250瓦	2.30	
	500瓦	4.50	

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Moljodol 第一製薬
モルヨドール
 特殊の方法を以て結合せるヨード植物油 (20—40%) (Liplodol 参照)

(40% 沃度)	1cc.	10管	3.30	沃度治療剤 X線造影剤 (肺膿瘍, 肋膜炎, 油腫, 三期梅毒) 治療用は筋注 造影用は注入
	5cc.	5管	6.00	
	20cc.	1管	3.60	
	30cc.	1管	4.00	
(20% 沃度)	1cc.	10管	1.80	上行性 5cc. 1.70 下行性 5cc. 1.70 油胸用 100瓦 瓶入 5.00 脊髄注入用
	5cc.	5管	3.20	
	10cc.	3管	3.00	
	20cc.	1管	1.80	
	30cc.	1管	2.50	
	20cc.	2管	3.60	

Monaat 日新醫學
モナアト
 阿片總アルカロイド鹽に硫酸アトロピン含有

0.6cc.	10管	1.00	鎮痛麻醉剤 1回 0.5—1cc. 皮注
	50管	4.50	
1.1cc.	10管	1.30	
	50管	6.50	

Monal 順天堂 醫化學 (田邊五)
モナール (福モナール)
 Solanaceae 植物より抽出せる2種のアルカロイドにプリン誘導體とカルチウム複鹽を配せるもの

皮注用	5管	1.80	モヒ中毒治療剤 1日 1—3 回皮注 2cc. 静注 5cc.
	10管	3.30	
	20管	5.80	
静注用	50管	13.00	
	5管	2.20	
	10管	4.00	
	20管	7.00	
	50管	16.00	

Monapon 日新醫學
モナポン
 阿片總アルカロイド鹽酸鹽

0.6cc.	10管	0.90	鎮痛麻醉剤 1回 0.5—1cc. 皮注
	50管	4.00	
1.1cc.	10管	1.20	
	50管	5.50	

Monasco 日新醫學
モナスコ
 阿片アルカロイドとブロム水素酸スコボラミン配合體

0.6cc.	10管	1.30	鎮痙麻醉剤 1回 0.5—1cc. 皮注
	50管	6.50	
1.1cc.	10管	1.80	
	50管	8.00	

Monponin 大木合名 (カンフル10%)
モンポニン
 有機性溶剤を用ひたるカンフル食鹽水溶液

1cc.	10管	0.65	血行器急性障害 1回 1cc. 皮筋注
	50管	2.80	
	100管	5.00	

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
モヒ注射液			
Morphinum Hydrochloricum ● 国 「フタバ」 鹽酸モルヒネ液	フタバ (林)	1% 1cc. 5管 0.40	麻酔劑 1回 1cc. 皮注
「三共」 鹽酸モルヒネ注射液 ● 国	三共	1% 1cc. { 6管 0.42 50管 2.90	鹽酸モルヒネ極量 1回 0.03 1日 0.10
① 鹽酸モルヒネ注射液 ● 国	大日本製薬	1% 1cc. { 5管 0.28 10管 0.55 50管 2.30	
「タナベ」 鹽酸モルヒネ注射液 ● 国	田邊五	1cc. { 5管 0.35 10管 0.65 50管 2.60	
「三研」 鹽酸モルヒネ注射液 ● 国	三菱薬品	1% { 5管 0.35 1.1cc. { 12管 0.70	
Mophi Atropin ● 国 モヒ, アトロピン注射液 { 鹽酸モルヒネ 0.01瓦 硫酸アトロピン 0.0004瓦	フタバ (林)	1cc. { 6管 0.70 100管 8.50	鎮痛劑 1回 1筒皮注
「三研」 モヒアト注射液 ● 国 弱—(1cc.中) { Morph. 0.003 Atrop. 0.0005 強—(1cc.中) { Morph. 0.01 Atrop. 0.004	三菱薬品	弱 1cc. { 6管 0.55 12管 1.00 強 1cc. { 6管 0.70 12管 1.30	鎮痛, 鎮痙劑 弱 1回 1—2cc. 強 1回 0.5—1cc. 皮注
「タナベ」 モヒ, アトロピン注射液 ● 国	田邊五	1.1cc. { 5管 0.60 10管 1.05 50管 5.00	
モルヒネ, アトロピン注射液 ● 国	浪速製薬	1.1cc. { 10管 0.90 10管入 5個 4.00	

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
Mophyzalin ● モヒザリン Datura Tatula より抽出せる アルカロイド, 安那加化合物	田邊五	1cc. { 10管 1.90 20管 3.60 50管 8.20	慢性モルヒネ中毒 1cc. 1日 1回皮注
Mordyne "Hata" ● モルダイン「ハタ」 鹽酸プロカイン, 鹽酸コタル ニン及びヂヒドロ, チオキシ, フェナントレンオキシード, メ チラミンの鹽酸鹽結合體	植村製薬	1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 100管 13.50	鎮痛, 鎮咳劑 1回 1cc. 1日數回 皮注
Neo-Mordayne ●★ ネオ, モルダイン 鹽酸プロカイン, ヒドロコタ ルニン, アミノ安息香酸エチル 配合劑	鳥居	1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 100管 13.50	鎮痛, 鎮咳, 鎮靜劑 1回 1cc. 皮注 (1日 3—5cc. 迄)
Moris Ampoul モーリス, アンプール入薬品	櫻医療 (鳥居)	リンゲル液 100cc. 2管 1.00 300cc. 1管 0.70 500cc. 1管 0.80 ロツク液 100cc. 2管 1.10 300cc. 1管 0.80 500cc. 1管 0.90	生理的食鹽水 100cc. 2管 1.00 300cc. 1管 0.70 500cc. 1管 0.80 葡萄糖加リンゲル 100cc. 2管 1.60 300cc. 1管 1.20 500cc. 1管 1.50
Moriyan モリヤン ビタミンD製劑に代用さる べきエリゴステリンカルシウム 製劑 モリヤン皮下用 (Hemeralomin参照)	福井七	1號5cc. { 5管 1.65 10管 3.05 2號5cc. { 5管 2.25 10管 4.25 3號5cc. { 5管 2.95 10管 5.60 1號 { 5管 1.60 0.3cc. { 10管 3.00 2號 { 5管 1.80 0.5cc. { 10cc. 3.40 3號1cc. { 5管 2.20 10管 4.18	結核治療劑 靜脈注射 (説明書 参照) 皮下用
Motilon 国 モチロン 特殊セルロイド容器入注入劑 A-急性用, B-亜急用, C-慢性用	堂島	A B { 6個 1.00 12個 1.80 C { 6個 1.30 12個 2.40	淋疾注入劑 1日 1—2回注入

品名組成	製造元 製造元	包装価格	医効用量
Moxol モクソール (注射薬) ヒストキシンのリンゲル溶液 (非特異性刺激療法剤)	三共	5cc. { 5管 0.90 20管 3.20 50管 7.00 20cc. { 5管 1.95 20管 7.00 50管 16.00 50cc. 5管 4.35 3cc. 50管 5.50 眼科用 3cc. 10管 1.50 牛馬用 { 200cc. 5管 12.50 300cc. 5管 16.50	ロイマチス性疾患 丹毒, 扁桃腺炎 喘息, 耳鳴 動脈硬化, 白内障 毎日或は隔日1管 静注, 皮注, 筋注
M. T. R. マイニツケ氏微毒濁濁反応液 馬心臓浸出液	武田	用具 1組 7.00 液 { 5cc. 3.15 50cc. 27.70	微毒診断 1回用量 0.1cc.
M. T. R. マイニツケ氏微毒清登反応第二液 同	全	液 { 10cc. 1瓶 6.70 50cc. 1瓶 31.50	1回量 0.05cc.
Mucolysin ★ ムコリヂン ロダンアルカリ製剤 粘液溶解, 膿汁液化, 痂皮軟化作用を有す	三共	チンキ 25cc. 0.60 液 25cc. 0.72 吸入液 25cc. 0.85	粘液溶解兼防腐劑 (口峡炎, ゼフテリ ア, 慢性中耳炎, 蝸嚢)
Mukudemin ムクデミン 乳酸桿菌, 糖化菌製剤	内外新薬	末 { 25瓦 0.35 100瓦 1.05 225瓦 1.90 450瓦 3.50 1肝 7.00	整腸劑 1回 0.3—1 瓦毎 食後
無菌蒸溜水			
Mukin-sui "Futaba" 「フタバ」無菌水 滅菌蒸溜水	フタバ (林)	20cc. { 5管 0.60 50管 5.40 30cc. { 5管 0.70 50管 6.30 5cc. 30管 1.20	注射薬調製用
「三研」無菌水 特殊型アンプル入	三菱薬品	20cc. 5管 0.60 30cc. 5管 0.65	

品名組成	製造元 製造元	包装価格	医効用量
「マルコ」無菌蒸溜水	マルコ 製薬	20cc. { 5管 0.65 60管 5.70 30cc. { 5管 0.65 60管 5.70 100cc. 2管 0.85 300cc. 1管 500cc. 1管	注射薬調製用
「シオノ」滅菌蒸溜水	塩野義	20cc. 5管 0.60 30cc. 5管 0.70	
「萬有」特製滅菌蒸溜水	萬有	20cc. { 5管 時 50管 價 30cc. { 5管 50管	注射薬溶解用
「マルイシ」滅菌蒸溜水	丸石	20cc. { 6管 50管 30cc. { 5管 40管	
「カケミ」無菌蒸溜水	掛見商店	20cc. { 10管 0.85 30管 2.20 30cc. { 10管 0.90 30管 2.35	
Mulcin ムルチン 蛋白質及リポイド含有の非特異性免疫體 (Omuadin, Omnin, Erstin, Stimin, EuadinOgardin, 参照)	塩野義	1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 2cc. { 5管 1.50 10管 2.90 50管 14.00	全免疫元 1回 1—2cc. 皮注 又は筋注
Muphiran "stark" ムファイラン「強」 子宮作用のみを有する脳下垂體後葉分離體	バイエル	1cc—10單位 1cc. 3管 4.60	陣痛促進劑 1回 3—10單位筋注 (時に皮注又は静注)
Musculosine ミユスキユロゲン 生牛筋肉汁	ピラ (丸善)	瓶入 { 小150cc. 3.20 大250cc. 5.00	強壯劑 1日數回10—15瓦宛
Muthanol ムタノール 水酸化蒼鹽乳劑	(ムタノール) 塩野義	2cc. 10管 10.00	驅微劑 隔日 1—2 筒筋注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Mutogol ムトゴール 易溶性タンニン酸蛋白銀	櫻木 合資会社	末 { 10瓦 1.20 25瓦 2.50 100瓦 8.00 液 { 50瓦 0.50 20% { 100瓦 0.90 500瓦 4.00	深達性銀劑 洗滌に 0.1—0.5% 注入に 0.5—1.0%
Mutsucan ムツーカン 油酸, ステアリン酸, パルミチン酸等のアルキールエステルを溶劑とせるカムフル液	高田製薬	10% { 5管 0.80 1cc. { 10管 0.50 20% { 5管 0.82 1cc. { 10管 0.55	強心劑 1回 1—2 筒皮注 筋注 (無痛カンフル注 射液91頁参照)
Myalgin ミアルギン 有機性色素に キノリン誘導體及鹽酸プロカインを配す	藤永	2.5cc. { 5管 1.20 10管 2.00 50管 9.00	肩凝, 筋肉ロイ マチス, 腰痛 1回 2.5cc. 筋注又 は皮注
Mygsalin ●★ ミグサリン サリチル酸, カフェイン, アンチピリン結合體 (i グレニン代用劑, 非引濕性)	日本合成	{ 25瓦 0.80 100瓦 2.50 500瓦 11.60 1肝 時價 5肝 時價 12.5肝	解熱, 鎮痛劑 1日量 0.5—1.0 分3 頓服 1回 0.2—0.4
Myo-Arsemin ● ミオアーセミン ジアミノ, アルゼノベンゾール, チメタンスルホン酸ナトリウム (砒素含量 24.2%)	第一製薬	小兒用A 0.02瓦 0.35 小兒用B 0.05瓦 0.40 大人用 { #1 0.1瓦 0.50 #2 0.2瓦 0.90 #3 0.3瓦 1.20 #4 0.4瓦 1.50 (溶解液付)	驅微劑 10%溶液として皮 注又筋注
Myocanon "Banyu" ミオカノン「萬有」 骨格筋中のアウトホルモン (Lacarnol, Myoston 参照)	萬有製薬	1.1cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 11.00 内用 { 25cc. 瓶入 2.70	筋肉痛, 肩凝 神経痛, 狭心症 心悸亢進 1日數回 1—2cc. 皮注, 筋注又は靜 注内服20—25滴
Myo-Ehramisol ●★ ミオ, エーラミゾール 皮下, 筋肉注射用スルフォエーラミゾール	萬有	1號 (0.02瓦) 0.35 2號 (0.04瓦) 0.40 3號 (0.06瓦) 0.45	小兒用驅微劑 添付の溶解液に溶 し臀部皮下又は臀 筋注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Myokombin ●★ ミオコムビン 1cc. 中 { ストロファンチン 0.0005瓦 ノボカイン 0.07瓦	ボーリ ンゲル (ケミア)	1cc. { 5管 10管 100管	強心劑 1日 1回 1cc. 皮注
Myosaltin ●★ ミオサルチン アンチピリン, キニーネ鹽, 安那加溶液にツトカインを配せ る製劑	岩城	1.1cc. { 5管 1.20 10管 2.20	神経痛 ロイマチス藥 1回 0.4—1.0cc. 皮下又は筋肉深く 注射
Myosalvarsan ● ミオサルワルサン デオキシジアミノ, アルゼノ ベンゾール, チメタンスルホン 酸ナトリウム (Myo-Arsemin, Myo-Ehramisol 参照)	バイエル	小兒用 { 0.02瓦 0.74 0.05瓦 0.85 0.075瓦 0.95 大人用 { 0.15瓦 1.17 0.3瓦 1.56 0.45瓦 2.04 0.6瓦 2.44	筋肉注射用驅微劑 10—20%溶液筋注 全量 5—6 瓦を 1 クールとす
Myoston ミオストン 骨格筋より抽出せるアウトホ ルモン製劑 (Lacarnol, Myocanon 参照)	ヘン ニング (三共)	1cc. { 3管 2.25 12管 6.45 20cc. 4.35	狭心症治療劑 注— 1日 1—2 回 1cc. 宛皮注又 は筋注 内服— 1回20滴 1 日 2—3 回
Myotonin ミオトニン 薏苡仁の有効成分 消炎鎮痛作用と, 病組織軟化作 用を有す	塩野義	1cc. { 5管 0.50 50管 4.00 3cc. { 5管 1.00 50管 8.00 5cc. { 5管 1.50 50管 12.00	消炎鎮痛劑 1—5cc. 皮注又は 筋注
Myron ミロン「ミロンシツプ」 粉末芥子にメントール, テレ ピン油, ユーカリ油を配す	生馬薬品 研究所	300瓦 (10個) 1.60 600瓦 (20個) 3.00	芥子濕布劑 5瓦を400—500cc. の温湯に溶し濕布 或は少量の水にて 練り芥子泥として

品名組成	製造元 発售元	包装価格	時 價	醫効用量
Naehr-ex ネエール, エキス 肉エキス	コメット (黒田)	{ 100瓦 500瓦 1000瓦	時 價	細菌培養基 リービーヒ肉エキ スに準ず
Naehrol ネーロール 50%の肝油と次亜磷酸カルチ ウムを含む, 肝油クリーム	三 共	約 300瓦	1.75	栄養強壯剤 1回 5—10瓦毎食 後
Naga Hoko-kobo ナガ芳香酵母 酵母剤	栄養と 育児の會	{ 25瓦 100瓦 250瓦 500瓦	0.30 0.80 1.80 3.50	食欲増進剤 内用 1回 1.0—2.5 瓦外用10%撒布剤 又は軟膏
ナガ芳香酵母エキス	全	{ 100瓦 250瓦 500瓦	0.80 1.80 3.50	賦形薬, 結合薬 水グリセリン等分 液にて用ふ
Nagana ナガナ アルミニウムの醋酸及酒石酸 の複化合物	日新商行	チヌーブ { 大形 中形 小形 瓶入	0.50 0.30 0.20 500瓦 3.00	汗疹, 痒疹, 火傷薬 患部塗擦
Nagravon (獨逸名 Compolon) ナグラボン ヂンスレン教授創製肝臓注射 剤 1cc.=250 瓦の生肝臓に相当 す (Narbin. Leberhorn 参照)	バイエル	2cc. { 5管 25管	5.25 21.50	悪性貧血治療剤 1日1回2cc. 筋注 6 —8—12週連用す
Nahrbron ネーヤブロン イソワレリアン酸のカルシウ ム鹽, スルフォサリチル酸カル シウム, 鐵, ブロムカルシウム 配合剤	田邊五	5cc. 6管 10cc. 6管 20cc. 6管	1.50 2.00 2.50	不眠症, 脳神經 の機能障害 ヒステリー 毎日又は隔日 5— 20cc. 静注數週間持 長し得

品名組成	製造元 発售元	包装価格	時 價	醫効用量
Nahrol ナーロール 血液製剤 (チョコレート衣)	三 共	{ 50球 100球	1.65 3.00	補血滋養剤 1日 3回 2球宛
Nahr-Zucker "Sankyo" 三共栄養糖 ビタミン及鹽類含有の葡萄 糖, 果糖製剤 (Jiyoto 参照)	三 共	末 { 250瓦 500瓦	1.30 2.20	栄養剤 1回 5—15瓦
Nal ナル アミノピリン, パルピタール 分子結合體	マルコ 製薬	末 { 25瓦 100瓦 500瓦 0.2 { 10錠 50錠 100錠 内服液 25% 15cc. 注射用 25% 2cc. 10管	2.50 7.50 29.50 0.50 1.30 2.20 2.00 3.80	鎮痛鎮痙剤 1回 0.3—0.4 瓦 1日 3回 頓服 0.6 瓦 液 1回 30—50滴 1回 2cc. 皮注
Nalgemon ナルゲモン アンチピリン, ブロム吉草酸, パラフェネチデン尿素製剤	田邊元	末 { 25瓦 100瓦 500瓦 カプセット入 { 6個 12個	1.50 5.50 25.00 0.50 0.90	鎮頭痛剤 0.4—0.8 瓦頓用 (1—2カプセット)
Narberysin ナルベリジン { チオシナミン 2分子 サリチル酸ソーダ 2分子 より成る複鹽の15%溶液	三 共	2.3cc. 10管	1.70	瘢痕軟解剤 (火傷, 外傷の瘻口, 食道, 腸門狭窄等) 1回 0.5—2.3cc. 隔日又は 3日毎に 皮注又は筋注
Narbin ナルビン 肝臓の造血總有效成分 液 2cc.=生肝臓200瓦, 末 1瓦= 生肝臓20瓦に對應す (Nagravon 参照)	★ 帝國機器 (武田)	2cc. { 5管 10管 50管 末 { 25瓦 100瓦 500瓦 0.2 { 100錠 300錠	2.40 4.50 20.00 2.00 7.00 30.00 2.30 6.00	悪性貧血治療剤 注射—1日 1—2 cc. 皮注又は筋注 内服—1日 3回 1 瓦 (5錠) 宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Narcain ナルカイン 鹽酸パラブチル, アミノベンゾール, デメチル, アミノエタノール (Pantocain 参照)	塩野義	末 { 1瓦 1.00 5瓦 4.00 25瓦 18.00	局所麻酔劑 鹽酸プロカインの 1量 表面麻酔 1-2 % 液 浸潤麻酔 0.1 %液
Narcopon ナルコポン 阿片總アルカロイドの鹽酸鹽 (Pantopon, Panopin参照)	ラザウム製薬	末 { 1瓦 時 5瓦 時 10瓦 時 25瓦 時 30錠 (0.01) 0.6cc. { 6管 60管 1.1cc. { 6管 12管 60管 價	鎮痛, 鎮靜, 麻酔劑 末 1回 0.01-0.03 錠 1回 1-3 錠 皮注 1回 0.5-1.0 cc.
Tinctura Narcopon ナルコポン丁幾 2% ナルコポン及約30%のアルコールを含有す	全	液 { 25瓦 時 500瓦 價	同上 阿片丁幾に做ふ 極量 1回 1.5 1日 5.0
Narcopon-San ナルコポン散 50倍ナルコポン乳糖散 (強度10倍阿片散に等しく阿片法手續不用)	全	末 { 25瓦 時 500瓦 價	阿片に同じ 用量は阿片の10倍 極量 1回 1.5 1日 5.0
Narcopon Atropin ナルコポンアトロピン { ナルコポン 2.0分 硫酸アトロピン 0.04分 鹽酸パパベリン 0.04分	全	末 { 1瓦 時 5瓦 時 10瓦 時 30錠 (0.01)	鎮痙麻酔劑 1回 0.01-0.02 (1-3錠)
ナルコポンアトロピン注射液 1cc.中 ナルコポンアトロピン 0.0208 瓦含有す	全	0.6cc. { 6管 時 60管 時 1.1cc. { 6管 價 12管 價 60管 價	鎮痙麻酔劑 1回 0.5-1.0 皮注
ナルコポンアトロピン散 { ナルコポンアトロピン 2分 乳糖 98分	全	50倍散 { 25瓦 0.60 100瓦 1.90 500瓦 8.80	鎮痛, 鎮痙, 鎮咳劑 鎮靜には 1日 2回 0.2 1日 0.6 鎮痙には 1回 0.5- 1.0 1日 1.5-3.0迄

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Narcopon-Scopolamin ナルコポン, スコポラミン 1cc.に { ナルコポン 0.04瓦 ブロム水素酸スコポ ラミン 0.0006瓦	ラザウム製薬	0.6cc. { 6管 時價 60管 時價 1.1cc. { 6管 時價 12管 時價 60管 時價	鎮痛麻酔劑 各科麻酔補助とし て 0.5-1cc. 皮注
Narcopon-Papaverin ナルコポンパパベリン 末 { ナルコポン 1.0分 鹽酸パパベリン 2.0分 硫酸アトロピン 0.02分 錠1個 { 0.01 注1cc. { 0.02 0.0002	全	末 { 1瓦 時價 5瓦 時價 10瓦 時價 30錠 (0.0302) 1.1cc. { 6管 時價 12管 時價 60管 時價	鎮痙鎮靜劑 末-1回 0.03- 0.06 1日 0.06 -0.12 錠-1回 1-2 個 1日 2-4 個 注-1回 1-2 筒 1日 2-4 筒 皮注
Nasal balm ネーザルバーム 特殊軟膏	堂島	1/8オンス 1.20	鼻疾患 鼻腔挿入
Nasal Tablet ネーザル錠 重曹, 硼砂, 食鹽, 安息香酸 ナトリウム等の合劑	パークデビス(三共)	50錠 0.72	鼻腔洗滌劑 1個を微温湯60- 120cc.に溶解して 用ふ
Nasedol ナセドール バルビタールとブロムアンチ ピリン結合體	塩野義	末 { 25瓦 1.20 100瓦 4.20 500瓦 18.00 0.2 { 10錠 0.30 50錠 1.00 100錠 1.50	鎮痛催眠解熱劑 1回 0.4-0.6 瓦 (2-3錠) 1日 3 回以内
Natagon ナタゴン フェニル, プロピオール酸ナ トリウムの濃厚水溶液 C ₆ H ₅ -C≡C-COONa 20% 特異の殺菌作用と患部局所の貧 血を除去することにより症状を 輕快せしむ	日本新薬	液 { 25cc. 2.40 100cc. 8.50 500cc. 28.00	喉頭結核吸入劑 2.5cc.に水を加へ 100cc.となし 1回 の吸入に用ふ (1日 2回) 或は50cc.宛 1日 4 回行ふも可 或は原液少量を局 所へ噴霧

品名組成	製造元 発露元	包装價格	醫効用量
Natrium Citrate "Sankyo" 「三共」クエン酸ソーダ (224頁参照)	三 共	結晶 25瓦 0.60 10% 30cc. 5管 1.50 20% { 5管 1.00 10cc. { 10管 1.80 3.8% 1cc. 10管 0.75	輸血, 止血用 輸血—血液の10— 20% 止血—10%液10cc. 静注 3.8%液はウエス テルグレン氏法赤 血球沈降速度試験 用
Natro-Aktivarsan ㊦㊧★ ナトロ, アクチバルサン アルゼノベンゾール, ナトリ ウム	日本曹達 (大木 合名)	1—6號 時價	驅 微 劑 1週 2回静注 無菌水を以て20— 50倍溶液として
Neclijin ネクリヂン	Mical	255頁参照	
Nelkegan ㊦ ネルケガン オキシメルクリ, 2メトオキ シ, 4アリル, フェノオキシ醋 酸ソーダとヂエチルマロニル尿 素との複鹽 (Novasurol 参照)	吉 萬	1.1cc. 10管 1.80	利尿驅微劑 0.5—1cc. 皮注又 は筋注 (心臟瓣膜障害, 心筋炎の浮腫, 多 發性漿液膜炎)
Nemakil ★ ネマキル	パ ー ク デ ビ ス (三 共)	1號 0.2 { 10球 0.55 50球 1.85 2號 0.5 { 10球 0.66 50球 2.35 3號 1.0 { 10球 0.90 50球 3.20 4號 5.0 { 10球 1.75 50球 7.15	家禽の蛔蟲及 糞蟲驅除劑
Nematol ㊦㊧ ネマトール ヘノボヂ油	三 共	30瓦 2.00 球 (0.3) 50球 1.75	十二指腸蟲驅除劑 1回20滴(0.67瓦) —30滴(1.0瓦)
Nembutal "AbbStt" ㊦★ ネムブタール 「アボット」 エチル (1—メチルブチル) バルビツール酸ソーダ	アボット (柳 韓 洋 行)	0.1 { 25球 7.30 50球 14.30 100球 27.40 末 { 5瓦 14.65 25瓦 63.70	麻醉, 鎮痛, 催眠劑 1回 1—2 球

品名組成	製造元 発露元	包装價格	醫効用量
Nemotan ネモタン (舊名 Decencin) パラヨードエトキシ安息香酸 ベンチルエステル19分とブソイ ドズルフィミツド安息香酸アチ ド 1分より成る	バイエル	末 25瓦 9.15 (0.25) 20錠 2.45	高血圧治療及 脳溢血豫防劑 1日 3回 0.25 瓦 (1錠) 宛
Neo-Aktivarsan ㊦㊧★ ネオ, アクチバルサン ネオ, アルゼノベンゾール	日本曹達 (大木 合名)	1—6號 時價	驅 微 劑
Neo-Alomerdin ネオ, アロメルヂン サリチル酸エステルを主劑と せる揮發性製劑	森 武夫 商 店	液 { 100瓦 2.00 500瓦 6.00	神 經 痛 塗布 1日數回
Neo-Antigonosin ネオ, アンチゴノシン エリカ屬植物有效成分	アルゼー ルトミイ	20cc. { 5管 2.80 10管 5.00 50管 14.00	治 淋 劑 毎日20—40cc. 静注
Neo-Arsaminol ㊦㊧ ネオ, アルサミノール ネオアルゼノベンゾール	三 共	1—6號 時價	驅 微 劑
Neo-Arzenol ㊦㊧★ ネオ, アルゼノール ネオ, アルゼノベンゾール	王子製藥	1—6號 時價	驅 微 劑
Neo-Barol	Barol (39頁) 参 照		

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neo-Eeristin ネオ, ベリスチン 米胚のビタミンB製劑	岸 田	末 { 25瓦 0.45 100瓦 1.60 225瓦 3.50 450瓦 6.00 液 { 100瓦 1.00 500瓦 3.50 1cc. 6管 1.20 3cc. 6管 2.00 0.3 { 100錠 1.00 500錠 4.50	Vitamin B 劑 1日 1-3 瓦分3 1-3cc. 皮注
Neo-Eitanin ネオビタミン		Bitanin (47頁) 参照	
Neo-Bistran ネオビストラン		Bistran (47頁) 参照	
Neo-Bonterdin ネオ, ボンターヂン オルトグアヤコールスルホン 酸のヨード化合物に, 葡萄糖, カルシウム及バルピタルを配 す	東洋醫藥	20cc. 10管 10.00	麻藥慢性中毒 治療劑 1日 1-2 回20cc. 靜注
Neo-Eornyval ネオ, ボルニパール ボルネオール, イソワレリル, グリコール酸エステル	リーデル (ホルス タイン)	(0.25) 25球 3.80	神經障害鎮靜劑 1日 2-4 回 1- 3球宛
Neo-Blutose ネオ, ブルトーゼ		Blutose (49頁) 参照	
Neocain ㊦㊧ ネオカイン 鹽酸プロカイン	塩野義	末 { 1瓦 0.28 5瓦 1.30 10瓦 2.50 25瓦 5.50	局所麻酔劑 鹽酸プロカインに 同じ
Neo-Calgonogen ● ネオ, カルゴノーゲン クロールカルチウム含有淋菌 ワクチン	田邊五	20cc. { 5管 3.50 10管 6.00 30管 18.00 50管 25.00	治 淋 劑 隔日1回20cc.靜注

一
つ
の
雨
せ
ー
林
泉
と
の
く
ら
い
も
ま
ま

足利義政の建立 銀閣寺の砂壇

主
座

制汗性解熱劑
ピレバリン
内服で治せる頑固な頭痛に
セファドール


品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Neo-Campeton ネオ, カンペトン 0.5% カンフル沃度食鹽液	山之内	5cc. 6管 2.50	肺炎治療劑 1筒靜注
Neo-Campher "moris" ネオ, カンファー「モーリス」 カムフルを生理的酸化せしめ たるオキシカンフアーの生理的 食鹽水溶液	櫻醫療 (鳥居)	1.1cc. { 10管 0.50 50管 3.00 2.2cc. { 10管 0.80 50管 3.80	強心劑 1回 1-2cc. 皮注 又は靜注
Neo-Chinahipan ネオ, キナヒパン 1.5% キニーネ溶液	植村	10cc. { 5管 1.80 10管 2.40	消炎解熱劑 (マラリヤ) 1回 10-20cc. 靜注
Neo-Cormon "Toma" ネオ, コルモン 羣心臓及牛の骨格筋より抽出 せる綜合ホルモン	當麻 研究所 (中村瀧)	皮下用 1.5cc. { 5回用 1.60 10回用 2.80 30回用 6.50 50回用 10.00 靜注用 { 5管 2.50 5cc. { 10管 4.60	循環器疾患治療劑 皮注— 1回 1.5cc. (A.B.混和) 靜注— 1回 5cc. (狭心症, 瓣膜症, 心筋炎, 内臓炎)
Neo-Cystol ネオ, チストール		Cystol (100頁) 参照	
Neo-Detoxol ネオ, デトキソール		Detoxol (104頁) & 参照	
Neoditol ネオデトール 有效成分 Askaridol 75%含有 するヘノボヂ油	三菱藥品	油液 25瓦 1.80 (0.3) 50球 1.50	十二指腸蟲 蛔蟲, ネカトール 驅除劑 16滴宛を早朝 30 分を隔て、2回投 與



京に田舎あり
閑寂な洛北八瀬の里

賤ヶ原を明布り雪にまぎれけ
36



品名組成	製造元 設器元	包装價格	醫効用量
Neodorm ネオドルム アルファ, イソプロピル, アルファ, ブロム, ブチルアミド	クノール (三共)	0.3 { 10球 2.20 100球 17.00	催眠鎮静劑 催眠 1回 1-2 球 鎮静 1球
Neo-Ehramisol ㊟㊟ ネオ, エーラミゾール ネオアルゼノベンゾール	萬有製藥	1-6號 時價	驅 微 劑 静 注
Neo-Eki ネオ液 0.4% 滅菌食鹽水	厚生社 (塩野義)	60cc. 2管 0.40 30cc. { 3管 0.40 12管 1.30 20cc. 5管 0.50	消炎鎮痛劑 静 注
Neo-Elaon ㊟ ネオ, エラオン フェニル, ギメチル, ピラツオロン, メチルアミノメタン, スルフォン酸ナトリウム (Novalgin, Novapon, Pyretin, 参照)	太田安	末 { 10瓦 1.20 25瓦 2.60 100瓦 9.50 500瓦 病説用	解熱鎮痛劑 1日量 1.5-3.0 分3
Neo-Emoin ★ ネオエモイン錠 ベンツオールヂカルボンゾイレアンヒドリードヂフェノール40%, アンヒドロ, オルトスルファミン, ベンツオエザウレスナトリウム 0.2%	小林 藥化學	{ 5錠 0.15 10錠 0.29 25錠 0.58 50錠 1.08 100錠 2.00	緩 下 劑 空腹時 1-3 錠頓用
Neo-Ephedonon ★ ネオエフェドノン { 鹽酸エフェドリン 4% 鹽酸バパペリン 2%	小林 藥化學	1.1cc. { 5管 1.10 10管 2.00 50管 9.00	鎮 咳 劑 同 上
Neo-Evanin ネオ, エバニン (舊名エバニン) 桔梗根サポニンに葫苧科植物のサポニン配合體 賣一末 1日 2.0	武 田	末 { 50瓦 0.45 250瓦 2.00 500瓦 3.70 錠 50錠 0.45 液 { 100cc. 0.85 500cc. 3.70	祛痰鎮咳劑 末 1日 2-3 瓦 錠 1日 6-9 錠 液 1日 2-3cc. 食後分3

品名組成	製造元 設器元	包装價格	醫効用量
Neo-Fatosin ネオ, ファトシン 「やつで」のサポニンに紫蘇油主成分ペリラルデヒド配合體	東京 生物化學 (谷村留)	末 { 25瓦 0.80 100瓦 3.00 250瓦 6.50 500瓦 12.00 液 { 50瓦 0.80 100瓦 1.50 250瓦 3.50 500瓦 6.50	氣道殺菌祛痰劑 粉末 1日量 0.5-1.0 液 1日量 1.5-3.0cc. 分3
Neo-Fibrogen ネオファイブロ元		Fibrogen (141頁) 参照	
Neo-Geburtin ㊟ ネオ, ゲブルチン (舊名ゲブルチン) 腺下垂體後葉ホルモン製劑	塩野義	0.5cc. (5國際單位) 5管 1.80 1.0cc. (10國際單位) 5管 3.00	陣痛催進劑 分娩第二期に 0.2-0.5cc. 皮注又は筋注
Neo-Gonosta ネオゴノスタ		Gonostagen (166頁) 参照	
Neo-Haemotol ネオ, ヘモトール 卵黃特種テール物質, ヨードカルシウム, 鹽化カルシウム, ペルーバルサム, アネステジン, 次硝酸蒼鹽, 亞鉛華, ロートエキス	日本藥物	軟膏 { 10瓦 0.60 25瓦 1.30 50瓦 2.40 250瓦 9.80 坐藥 { 6個 0.60 12個 1.00 30個 2.30 100個 7.00 液 { 30瓦 3.00 500瓦 30.00	痔疾治療劑 軟膏 1日 2-5 瓦 坐藥 1日 3回 1個宛 液 1日 2-3 回塗布
①號 ネオ, ヘモトール ㊟	全	末 { 20瓦 5.00 30瓦 7.00 ① 50瓦 10.00	痔疾腐蝕治療劑 1日 1-2 回 1回 0.1-0.2 瓦
②號 ネオ, ヘモトール ㊟	全	末 { 30瓦 10.00 50瓦 15.00 ② 100瓦 27.00	
③號 ネオ, ヘモトール ㊟	全	棒狀 { 20本 5.00 30本 7.00 ③ 50本 10.00	痔瘻腐蝕治療劑 痔瘻孔に 1日 1-2回挿入

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Neo-Hepatex "Evans" ★ ネオ、ヘパテキス 肝臓有効成分にして 1cc. は生 肝 250瓦に相当す	エバンス (柳 韓 洋 行)	1cc. { 6管 9.25 50管 69.65 4cc. 3管 12.10 2cc. 6管 16.70	造 血 劑 1回 1—2cc. 筋注 重症の場合は静注
Neo-Hesaciramin ネオ、ヘサチラミン		Hesaciramin (180頁) 参照	
Neo-Hexal ネオ、ヘキサール 第2ズルフオサリチル酸ウロ トロピン	リーデル (ホルス タイン)	末 25瓦 3.15 (0.5) 20錠 1.58	治 淋 劑 1日 3回 1瓦 2錠 宛
Neo-Hipotobery ネオ、ヒポトベリー		Hipotobery (182頁) 参照	
Neo-Hisolin ㊦㊧ ネオ、ヒソリン ネオアルゼノベンゾール	浪速製薬	1—6號 時價	驅 微 劑
Neo-Hustol ネオ、フストール		Hustol (187頁) 参照	
Neo-Hormonal ネオ、ホルモナル 脾臓の細胞液より製せる生理 的下劑	シエー リング (田邊五)	筋肉用 20cc. 7.50 静注用 20cc. 7.50	臓 器 下 劑 20—40cc. 筋注又は 静注
Neo-Hyperemesin ネオ、ヒペレメージン フェニルヒドロキシドとウイ タミン B. D 結合製劑	第一薬房	1.1cc. { 6管 2.00 20管 5.00	妊娠中毒治療劑 1回 1—2cc. 皮注
Neo-Hypotonin ネオ、ヒポトニン		Hypotonin (190頁) 参照	

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Neo-Hypo-Apo ネオ、ヒポアポ		Hypo-Apo (189頁) 参照	
Neo-Imamicol ネオ、イマミコール		Imamicol (193 頁) 参照	
Neo-Joshisalin ネオ、ヨシザリン 純ヨード酸カルチウム複鹽溶 液 (沃度含量 0.5702%)	アルゼー ルトミー	30cc. { 5管 1.50 10管 2.80 1000瓦 3.80	變 質 劑 1日 30—50cc. 静注
Neo-Jodicamphor ネオ、ヨヂカンボル 沃度カルシウム液 (原液は 4倍沃度)	白井松	1號 100cc. 0.60 2號 500cc. 2.00 3號 500cc. 2.00 原液 { 5cc. 6管 1.00 100cc. 1.50 500cc. 7.00	家 畜 消 炎 劑 1回 1號 (小動物) 5—20cc. 2號 (中動物) 30 —60cc. 3號 (大動物) 250 —500cc. 静, 皮注 (3號静脈専用)
Neo-Kansei ネオ、肝精 鱈、鱈の新鮮肝臓を冷凍法に より含有する油分 (25%) と各 成分を完全に保有せしめ、低温 乾燥末とし、之に牛胆汁酸を配 す	藤 澤	末 { 60瓦 1.80 250瓦 6.00 500瓦 11.00 錠 { 270錠 2.00 1000錠 6.00 2500錠 13.00	榮 養 劑 1日 3回 0.5—0.7 (3—4錠) 宛
Neokick ネオキック (A.D. Salbe) ビタミンA 及び D含有の軟 膏	マル天 製薬 (太田安)	膏 { 10瓦 0.25 25瓦 0.50 100瓦 1.00 500瓦 3.50 1キロ 5.50	皮 膚 薬 1日 1回患部塗布
Neo-Kleiex ネオクライエキス Vitamin-B 劑	木澤脚氣 研究所	液 { 150瓦 1.30 500瓦 3.00 1肝 末 { 100瓦 1.30 200瓦 2.30 500瓦 錠 300錠 1.50	Vitamin-B 劑 液 1日 10—30瓦 末 1日 10—30瓦 錠 1日 20—30個 3回分服

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neo-Kogen ネオコーゲン ビタミンB製劑	東洋新藥	1cc. { 10管 1.20 50管 5.50 2cc. { 10管 1.80 50管 8.00 3cc. { 10管 2.50 50管 11.00 5cc. { 10管 4.00 50管 10.70 末 { 100瓦 1.80 250瓦 4.00 500瓦 7.50 液 { 100瓦 1.00 250瓦 2.20 500瓦 4.00	Vitamin-B 劑 1日量注 1-3cc. (1-數回) 皮注 末 2-5 瓦 液 10-15瓦
Neo-Neo-Kogen ㊦ ネオ, ネオコーゲン注射液 硝酸ストリキニーネ (0.002) 含有のネオコーゲン		1cc. { 10管 1.50 50管 6.00 2cc. { 10管 2.00 50管 9.00 3cc. { 10管 2.80 50管 12.50	同上 1回 1筒皮注
Neo-Kutin ネオ, クチン コンヅランゴ皮及レモン皮の 有效成分を加へし苦味丁幾	コメツト (黒田)	{ 250瓦 時價 500瓦	健胃劑 苦味丁幾に同じ
Neo-Liyoravin ネオ, リヨラビン 3.6 ギアミノ, 10メチルアク リヂニウムクロリツド含有の高 張葡萄糖液	厚生社 (塩野義)	1號 5cc. 10管 1.20 2號 10cc. 10管 1.70 3號 20cc. 10管 2.30	殺菌 利尿 解毒 榮 養 劑 1回 5-10-20cc. 靜注
Neo-Milchin ネオ, ミルヒン ゴスピウム植物有效成分	塩野義	100瓦 3.00	催乳劑 1日10-12瓦毎食 後1時間に分服
Neo-Minoalin ★ ネオ, ミノアリン 緑茶の糖代謝作用物質, 綠色 粉末	富士製藥 (松下 商店)	末 25瓦 2.00 50錠 1.30 0.25 { 100錠 2.30 300錠 5.80 500錠 9.30	糖尿病, 惡酔, 船暈 1日 1回 1-2 瓦 (4-8錠) 宛
Neo-Mordyne ネオ, モルダイン		Mordyne(261頁) 参照	

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neonal "Abbot" ㊦★ ネオナール Nブチル, エチル, バルビツ ール酸	アボット (柳韓 洋行)	0.1 { 100錠 11.20 1000錠 104.00	鎮痛, 催眠劑 鎮痛—1日 2-4 錠 催眠—1日 1-2 錠
Neo-Neo-Arsemin ㊦㊦ ネオ, ネオ, アーセミン アルゼノベンゾール, ナトリ ウム	第一製藥	1-6號各 1本入 時價 1-6號各 10本入	驅微劑
Neo-Neo-Chirmin ㊦㊦★ ネオ, ネオ, チルミン アルゼノベンゾールナトリウ ム	東方藥物 研究所	1-6號 時價	驅微劑
Neo-Neo-Corn ネオ, ネオ, コルン		Corn-Ex (96頁) 参照	
Neo-Neo-Hisovarsan ㊦㊦ ネオ, ネオ, ヒソヴァルサン アルゼノベンゾールナトリウ ム	小林藥學 實驗所	1-6號 時價	驅微劑
Neo-Neo-Lap ㊦ ネオ, ネオ, ラツプ オキシヒノリン, ズルホン酸 カリ製劑	ラツプ 製藥 (堂島)	12錠 1.20	花柳病豫防劑 1錠腔内挿入
Neo-Neo-Luesarsin ㊦㊦★ ネオ, ネオ, ルエサルジン アルゼノベンゾールナトリウ ム	植村	1-6號 時價	驅微砒素劑

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
Neo-Nieremin "Toma" ネオ, ニイレミン 腎臓ホルモン及リポイド結合體	當麻研究所 (中村瀧)	皮下用 1.5cc. 5回用 1.60 10回用 2.80 30回用 6.50 50回用 10.00 靜注用 { 5管 2.50 5.5cc. 10管 4.60 内服用 { 25瓦 1.20 末 { 100瓦 4.50 200瓦 8.40 0.3 { 50錠 1.10 200錠 3.80	腎臓薬 皮注 1回 1.5cc. 靜注 1回 5.5cc. 内服 1日 2-3瓦 (腎臓炎, 尿管症 腎盂炎, 萎縮腎)
Neo-Olesal ネオ, オレザール 30%の蒼鉛を含有するヂメチル エンドメチレンヘキサヒドロ 安息香酸蒼鉛の10%澄明油溶液 (Perbismol 参照)	バイエル	2cc. 10管 5.00 20cc. 1管 4.45	驅微劑 1週 2-3回 2cc. 筋注
Neo-Paranutrin ネオ, パラヌトリン	Paranutrin (322 頁) 参照		
Neo-Parman ネオ, パルマン ベタナフトール, ギズルフオ ザウレスアルミニウム	バイエル	末 { 25瓦 2.10 100瓦 7.40 500瓦 27.60	深達性收斂消毒劑 0.25-10%液外用
Neo-Pecton ネオ, ペクトン 器粟穀及麻黄有效成分抽出體 濃縮一1日液10瓦, 末 3瓦	小林薬學 實験所	錠 { 30錠 0.22 60錠 0.40 120錠 0.72 500錠 2.86 1000錠 5.43 末 { 100瓦 1.29 500瓦 5.72 液 { 100瓦 0.86 500瓦 2.86	鎮咳劑 1日 3回 1回錠 6 錠, 末 1瓦, 液 3 瓦宛
Neo-Pedinal ネオ, ペヂナール	Pedinal (325頁) 参照		

品名組成	製造元 発売元	包装價格	醫効用量
Neo-Phthisol ネオ, フチゾール グワヤコールスルホン酸カル チウム, ナトリウム (Ca10%含 有)	日本 薬品洋行	末 { 25瓦 1.20 100瓦 4.50 225瓦 9.50 450瓦 18.00 含利別 5% { 100瓦 0.45 450瓦 1.50 3cc. 6管 0.60 0.1 { 15錠 0.20 45錠 0.50 100錠 1.00 600錠 5.00	結核, 肋膜炎 1日量末 0.6-2.0 (9-18錠) 含利別 10-20cc. 注射毎日又は隔日 3cc.皮注
Neopirin ネオピリン アセチルサリチル酸カルシウ ム (可溶性アスピリン)	日本 薬品洋行	末 { 25瓦 0.65 100瓦 2.20 225瓦 4.50	解熱鎮痛劑 1回 0.5-1.0瓦 1日 3回
Neo-Pityrol ネオ, ピチロール 水溶性脱臭ピチロール (Pityrol 参照)	日本新薬	濃エキス稠 { 25瓦 0.40 100瓦 1.05 500瓦 4.20	皮膚薬 外用塗布 原液又は10%軟膏
Neoprogin ネオプロギン 可溶性プロテイン銀	★ 田邊五	末 { 25瓦 0.77 500瓦 12.50	殺菌消毒劑 プロテイン銀に做 ふ, 100-400倍液外用
Neo-Psychorin ネオ, プシコリン ホルモン及リポイド結合體 1號 神経系疾患汎用 2號 腦溢血用 3號 神経衰弱(男性)用 4號 神経衰弱(女性)用 5號 喘息用	當麻化學 (中村瀧)	皮注各錠 1.5 { 5回用 1.60 10回用 2.80 30回用 6.50 50回用 10.00 靜注各錠 { 5管 2.50 5.5cc. 10管 4.60 内服用 (1-4號) 末 { 25瓦 1.20 100瓦 4.50 200瓦 8.40 0.3 { 50錠 1.10 200錠 3.80	皮注- 1回 1.5cc. 靜注- 1回 5.5cc. 内服- 1日 2.3瓦
Neorabin ネオラビン 百日咳エキソトキシン製劑 1cc.中 0.4 ミリ瓦に相當する菌 體毒素(内外)含有	東京 生物化學 (谷村留)	1cc. { 5管 0.85 10管 1.50 10cc. (瓶入) 1.20	百日咳エキソト キシン治療劑 治療- 隔日又は 3 日毎に 1筒 皮注 豫防- 2日又は 4 日毎に 1筒 皮注 (2回完結)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Neorenalin "Saaken" ㊄★ 「三研」ネオレナリン 天然副腎有効成分, 千倍液 瑞西藥局方	三菱	1.1cc. 12管 1.00	止血劑 1回 1cc. 皮注
Neosal ㊄㊄★ ネオザール アルゼノベンゾールナトリウ ム	陽光堂 製藥 合資會社	1—6號 時價	驅微劑
Neo-Salicalcin ネオ, サリカルシン	厚生社 (塩野義)	Salicalcin (367 頁) 参照	
Neo-Salvarsan ㊄㊄ ネオ, サルワルサン ネオ, アルゼノベンゾール	バイエル	(1管入) 1號 (0.15) 0.68 2號 (0.3) 1.29 3號 (0.45) 1.77 4號 (0.60) 2.25 5號 (0.75) 2.72 6號 (0.9) 3.06 (10管入) 1號 (0.15) 6.00 2號 (0.3) 11.75 3號 (0.45) 16.20 4號 (0.6) 20.30 5號 (0.75) 24.65	驅微劑 靜注又は筋注
Neo-Salvarsan in Isodoppel-Ampullen ㊄ 「蒸留水附」ネオサルワルサン	全	1號 (0.15) 1.57 2號 (0.3) 1.91 3號 (0.45) 2.31 4號 (0.6) 2.72	驅微劑 簡易に注射液を作 り得
Neo-Saviol ㊄㊄ ネオ, サビオール ネオアルゼノベンゾール	京大化學 研究所 (日本新藥) (日新醫學社)	1—6號 時價	驅微劑 靜注
Neo-Scomordin		Nonmorphin (294頁) 参照	

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Neo-Sesugin ネオ, セスキン 1球中 { セスキン 0.297 メチレン青 0.003	小林 化學	{ 30球 0.50 60球 0.98 120球 1.75 500球 6.45 1000球 12.20	治淋劑 1日 4回 1—2球 宛
Neo-Sexanol ネオ, セキサノール		Sexanol (381頁) 参照	
Neo-Silver-Salvarsan ㊄ ネオ, 銀サルワルサン ネオサルワルサンと銀サルワ ルサンの化合物	バイエル	1號 (0.1) 1.15 2號 (0.2) 1.57 3號 (0.3) 2.04 4號 (0.4) 2.45 5號 (0.45) 2.79	銀, 砒素驅微劑 靜注
Neo-Silversol ★ ネオ, シルバーゾル 電氣的コロイド銀含有のラノ リン軟膏	京大化學 研究所 (日新醫學)	軟膏 { 50瓦 1.10 100瓦 2.00 500瓦 9.00	皮膚藥 患部塗布
Neo-Silvol ネオ, シルヴォール 可溶性蛋白基と膠質的ヨード 銀(20%)の化合物	パークデビス (三共)	28瓦 8.00	殺菌收斂劑 1—50%水溶液と して應用
Neo-Sofortin ネオ, ゴーフオルチン サリチル酸鹽, カフェイン, ウロトロピン製劑	志村商店	25cc. 6管 2.50	神經痛治療劑 1回20—25cc. 靜注
Neostaagen ★ ネオスターゲン 淋毒性雙球菌及化膿性葡萄狀 球菌を抗原とせるもの	丸石	20cc. { 5管 2.50 10管 4.80 50管 18.50	治淋特異性免疫劑 隔日 1回20cc. 靜注
Neo-Stibarsan ㊄ ネオ, スチバルサン 銀, アンチモン, サルワルサ ン	萬有製藥	{ 0.1瓦 0.2瓦 時 0.3瓦 0.4瓦 價 0.5瓦 0.6瓦	驅微劑 靜注 0.1—0.6

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neo-Suctor ネオ, サクトール 乾燥硫麻, 無水グリセリン, コリウム軟化劑の軟膏	中村瀧	チューブ { 30瓦 0.65 50瓦 1.00 10瓦 5本入 1.50	癩疔, 癩治療劑 患部貼付
Neo-Syphiarsin ㊦㊧★ ネオ, ジヒアルジン アルゼノベンゾールナトリウ ム	玉置商店	1號 (0.15) 0.35 2號 (0.30) 0.65 3號 (0.45) 0.95 4號 (0.60) 1.20 5號 (0.75) 1.45 6號 (0.90) 1.60	驅 微 劑
Neo-Takamol ネオ, タカモール		Takamol(403頁) 参照	
Neo-Tamabal ネオ, タマバル 精製バルサムと尿路消毒劑配 合體	岸 田 (日本藥 品洋行)	0.3 { 50球 0.60 100球 1.20 300球 3.30 500球 5.10	治 淋 劑 1日 3回 3—5 球 宛
Neo-Tanvarsan ㊦㊧ ネオ, タンプルサン ネオ, アルゼノゾンベール (砒素含量20%)	第一製藥	ネオ { 1-6號各 1本 時價 1-6號各 10本	驅 微 劑 1—4 號は10—20 cc. 5—6 號は25cc. の蒸溜水に溶し 1 —2 週の間隔を置 きて連続靜注
Normal Neo-Tanvarsan 純ネオタンブルサン ㊦㊧ 強ネオアルゼノベンゾール, ナトリウム (砒素含量25.2%)		純ネオ { 1號(0.12) 0.38 2號(0.24) 0.75 3號(0.36) 1.00 4號(0.48) 1.26 5號(0.60) 1.50 6號(0.72) 1.75 各號10本入 時價	
Neo-Tase ネオ, ターゼ 非引濕性ガスターゼ	コメツト (黒 田)	末 { 25瓦 時價 500瓦	消 化 劑 1日 3回 1.0—1.5 瓦
Neo-Taurin ネオ, タウリン アミノエチルスルホン酸製劑	ネオタ ウリン 研究 所 (太田安)	5cc. 6管 3.80 6管 6.00 10cc. { 30管 26.00 50管 41.50	結核治療劑 1日 1回靜注又は 皮注

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neothersin ㊦㊧ ネオテシン アミノ安息香酸エチル	三 共	末 { 10瓦 1.00 25瓦 2.10	局所麻酔劑 内用 1回 0.3—0.5
Neothersin-S ㊦ ネオテシン, エス 可溶性アミノ安息香酸エチル 複鹽 (アミノ安息香酸エチル70.614%)	全	末 { 10瓦 1.20 25瓦 2.60	局所麻酔劑 内用 1回 0.3—0.5 外用 0.5—1.0 % 注射 0.3 %液 5— 50cc.
Neo-Thrombrin ネオ, トロンブリン		Thrombrin (415頁) 参照	
Neoton ㊦ ネオトン デリス根のロテノーン製劑	理 研 (日本農藥)	水溶性 { 25瓦 時 100瓦 225瓦 460瓦 状液 { 45cc. 價 140cc. 450cc.	害 蟲 驅 除 劑 石鹼水に和して使 用 水溶性は200—300 倍に稀釋撒布。
Neo-Tonicin ネオ, トニシン 高張葡萄糖溶液にブロムカル チウムの一定量を配せるもの	厚生社 (塩野義)	1號10cc. 5管 0.70 2號20cc. 5管 0.90 3號20cc. 5管 1.00	鎮靜, 消炎, 止痒 榮 養 劑 1回 10—20cc. 靜注
Neo-Trepol ネオ, トレポール		Trepol (422頁) 参照	
Neo-Tricoba ネオ, トリコバー サンタロールを固化し, メタ ボロチンを結合す	小林藥學 實 驗 所	{ 24錠 0.72 60錠 1.80 120錠 3.60	治 淋 劑 1日 3回 4錠宛
Neo-Trigon ★ ネオ, トリゴン カワカワ, クベバ, セスキ ンに白檀油及メチレン青を配す	全	原液 { 25瓦 2.50 100瓦 8.50 0.3 { 27球 1.20 65球 2.40 135球 4.80 500球 16.70	治 淋 劑 1日 3回毎食後 1.0 (3球) 宛

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
Neotropin ネオトロピン ブチル, デアミノ, アツオピ リヂン (Pyridium, Pyripau, Taltarin 参照)	日本シエ ーリング	0.1 { 30錠 3.40 250錠 25.50 末 { 3瓦 2.95 15瓦 13.30	尿路消毒劑 (淋疾, 腎盂炎 膀胱カタル) 1日 4—5 回食後 0.1瓦 1錠宛
Neo-Trydin ネオ, トリヂン アクリヂン誘導體	植 村	20cc. { 5管 1.80 10管 3.00	治 淋 劑 毎日又は隔日 20cc. 静注
Neo-Tubetalin ネオ, ツベタリン アミノエチルスルホン酸, ヨ ード鹽溶液	厚生社 (塩野義)	10cc. 5管 5.00	結核性疾患治療劑 1回 6—10cc. 静注
Neo-Urihin ネオ, ウリヒン 遠山氏ビタミンB 製劑	いわしや (松 本)	1cc. { 10管 1.10 50管 5.00 100管 9.00 3cc. { 10管 2.00 50管 9.00 100管 17.00 5cc. { 5管 1.20 50管 11.00 末 { 30瓦 0.70 100瓦 1.60 250瓦 3.50 500瓦 6.00 1キロ 10.00 液 { 100cc. 1.00 500cc. 3.50 (0.3) 50錠 1.00	Vitamin-B 劑 1—3cc. 皮注 末 1日 1—1.5 瓦 液 1日 20瓦 錠 1日 3—6 個
Neo-Vicarmin ネオ, ビカーミン 各種ビタミン及鐵, 沃度の 結合體	伊 藤 由	末 { 120瓦 1.50 250瓦 2.50 500瓦 4.50 錠 { 100錠 1.00 220錠 2.00 500錠 4.00	栄養劑(妊婦) 1日量 3—5 瓦 (12錠) 分3
Neo-Vitaminol ネオ, ヴィタミノール	Vitaminol (445 頁) 参照		

品名組成	製造元 発售元	包装價格	醫効用量
Nephra-Renin ㊦ ネフラレニン 鹽酸エビレナミン (天然製品)	ゲデオン (田邊元)	1cc. 12管 2.00 液 { 25cc. 1.40 80cc. 3.50	止 血 劑 鹽酸エビレナミン に做ふ
Nerva Tab. ネルヴァ錠 草蔓科植物有效成分	友 田	{ 12錠 0.30 60錠 1.00	疲 勞 恢 復 劑 1日 3回 3錠宛
Nesbosan ㊦★ ネスボサン パラアミノフェニル, スチビ ン酸ジエチルアミン (水溶性黄褐色粉末)	萬 有	1號 0.05 1管 0.70 2號 0.1 1管 0.90 3號 0.2 1管 1.25 4號 0.3 1管 1.75 5號 1.0 1管 4.50 6號 2.0 1管 6.75 7號 3.0 1管 10.00	第 四 性 病 ヂストマ治療劑 5—20% 溶液とし て隔日 1回筋注又 は静注 8回を 1クールと す
Nestle's Milk food ネツスルミルクフード 粉乳麥芽製劑	ネツスル (乾 卵)	450瓦 時價	小 兒 榮 養 劑 牛乳代用 (森永ミルクフード, 明治 バトローグン, キノミ ル, マエゼンミルクフ ード, 参照)
ネツスルマルテツドミルク 粉乳, 粉末麥芽糖製劑	全	450瓦 時價	
Neuberol ★ ノイベロール Vitamin-B 劑に酵母を配した るものにして B ₁ B ₂ B ₃ V.E. V.D. アミノ酸, 蛋白を含有す る黄色粉末	ラヂウム	末 { 100瓦 1.00 500瓦 3.80 2.5瓦 16.00	綜合 Vitamin-B 榮 養 劑 1日 3瓦分3, 每 食前
Neu-Cesol ノイツェゾール メチルヘキサヒドロピリヂン ベタカルボン酸メチルエステル のプロムメチラート	メルク (シ ユ ミット)	0.05 { (時 價) 20錠 3.05 200錠 23.95 1cc. { 5管 3.20 10管 5.90	止 渴 劑 注 1—1管 皮注又 は筋注 錠 1日 3回 2—3 錠
Neu-Flavin ノイフラビン 3.6 デメチル, アクリヂニウ ムクロリツド液	三菱藥品	0.5% { 5cc. 10管 1.00 10cc. 5管 0.85 2% { 5cc. 5管 0.90 5cc. 10管 1.60	淋 疾, 膀 胱 炎 腎 盂 炎 5—10cc. 静注

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neumariconin ノイマルコニン 海人草製劑	ルコ製藥	末 { 25瓦 1.40 100瓦 5.20 500瓦 23.00 液 { 25瓦 1.00 100瓦 2.80 500瓦 17.00 錠 { 10錠 0.30 50錠 1.35 100錠 2.20 1000錠 23.00	蛔蟲驅除劑 末 1回 0.7—2.0 液 1回 3瓦 錠 1回 2錠
Neunarcin ノイナルシン アミノ安息香酸エチル	東洋製藥	末 { 25瓦 1.05 100瓦 3.90 500瓦 17.00	局所麻酔劑 外用 5—20% 内用 1日 0.6—1.0瓦
Neu Niburomin ノイニブロミン ニブロミン (291頁参照) とアミノピリン結合體 販賣—醫効	マルコ製藥	末 { 25瓦 1.95 100瓦 7.00 500瓦 30.00 ● 10錠 0.50 0.1 { 30錠 1.30 ● 100錠 3.00 液 { 5cc. 1.50 ● 2cc. 10管 3.50	鎮痛鎮靜劑 1日 3回 0.3—0.4瓦宛 液 30—60滴宛
Neuphtin ノイフチン Rutaceae 屬植物の有効成分	白井松	1.1cc. { 6管 1.60 25瓦 0.70 外用 { 100瓦 1.85 500瓦 6.50	神経痛治療劑 1回 1cc. 局所筋注 外用—患部上皮塗布
Neuragen ノイラーゲン ヨード鹽及サリチル酸ソーダ溶液に Liliaceae 植物有効成分を配す	櫻木	1cc. { 10管 2.40 50管 8.50	神経痛ロイマチス 壓痛點 1cc. 宛注射
Neuragy ノイラギー液 皮膚刺戟劑	森武夫商店	液 { 30cc. 0.50 100cc. 1.20 500cc. 4.00	神経痛治療劑 外用塗布
注射用ノイラギー液 ピラツオロン誘導體とマロニール尿素誘導體の合成複鹽溶液	全	2cc. { 5管 0.80 10管 1.40 50管 6.00	神経痛ロイマチス劑 1回 1—2 筒患部筋肉下へ深く注射

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Neuralgin ノイラルギン オキシカンフル, サリチル酸ソーダ, ウレタン製劑	名古屋衛生	1.1cc. { 5管 0.55 10管 1.00 50管 4.50	神経痛, 肩凝 1日 1—2 回皮注
Neura-recitin ノイラレチチン レチチン製劑	文明新藥社 (塩野義)	0.2 { 50錠 2.50 100錠 4.50	陰萎治療劑 1日 3回 6—10錠
Neurarsin ノイラルジン グリセロ磷酸ナトリウム, 硝酸ストリキニーネ製劑	塩野義	10cc. { 5管 1.80 50管 14.50	變質強壯劑 毎日又は隔日 1回 10cc. 静注
Neuren ノイレン 無色半透明液	中村信治藥局	30cc. 1.20	神経痛治療劑 1cc. 筋注
Neurodin ネウロジン { ブロムマグネシウム 25% 葡萄糖 10%	金剛製藥	10cc. 5管 1.25 20cc. 5管 1.80	神経痛ロイマチス治療劑 毎日又は隔日 10—20cc. 静注
Neurol ノイロール フェニルメチルピラツオロンサリチル酸ソーダ溶液	東洋新藥	1cc. { 10管 2.00 50管 9.00	神経痛治療劑 1回 1—2cc. 局所筋注
Neuropin ノイロピン ストリキニーネ, 砒素, ペロナール配合劑	日新醫學	10cc. { 10管 1.50 50管 7.00	神経衰弱治療劑 1日 1回 10cc. 静注
Neuro-Yatren ノイロヤトレン	Yatren (450頁) 参照		

品名組成	製造元 発露元	包装価格	医効用量
Neusal ノイザール 磷化合物及ハロゲン鹽類製劑	アルゼー ルトミイ	20cc. { 5管 2.00 10管 3.80	動脈硬化治療劑 1日 1回20—60cc. 静注
Neutin ノイチン ゲルマチン(ケラチン) (胃液不溶膠液可溶)	大正製藥	末 { 25瓦 時 100瓦 價 500瓦	胃液不溶劑 ノイチン衣原料
白檀油膠球 ^レ ノイチン衣 ^レ ノイチン衣サンタール	全	0.5 { 18球 時 30球 價 50球	胃液不溶, 淋疾藥 每食後 1—2 球宛
肝油膠球 ^レ ノイチン衣 ^レ	全	0.5 { 50球 時 100球 價	胃液不溶強壯劑 5—10粒宛 1日數 回
コパイパバルサム膠球 ^レ ノイチン衣 ^レ	全	0.5 { 18球 時 30球 價 50球 100球 1000球	胃液不溶治淋劑 每食後 2球宛
Neutol "moris" ノイトール ^レ モーリス ^レ アミノピリン, 鹽酸プロカイ ン製劑	櫻 醫 療	1.1cc. { 10管 2.20 50管 9.50	神經痛治療劑 1回 1—2 筒筋注 又は壓痛點の皮下 深く

家庭皮膚藥



ミブクリーム
MIBLCREAM

品名組成	製造元 発露元	包装価格	医効用量
Neu-Vita ノ井ビタ (別名ノ井ビタベリン) ビタミンB製劑 <u>賣</u> <u>注</u> <u>醫</u> <u>範</u>	マルコ 製 藥	液 { 100cc. 1.00 500cc. 3.20 2500cc. 15.00 末 { 50瓦 1.00 100瓦 1.80 500瓦 7.20 1000瓦 14.00 錠 { 50錠 1.10 100錠 2.00 500錠 9.00 1000錠 16.50 1cc. { 10管 1.40 50管 5.80 100管 11.00 2cc. { 10管 1.75 50管 7.50 100管 14.00 3cc. { 10管 2.50 50管 11.00 100管 20.00 5cc. { 10管 3.50 50管 14.00 100管 26.00 10cc. { 5管 3.50 10管 6.00 20cc. { 5管 4.80 10管 8.00	Vitamin-B 劑 液 1日10—20cc. 末 3—6 瓦 錠 6—9 錠 注 1—3cc. 皮注 3—10cc. 静注 1日1 —3 回 皮下用 静脈用
Nevrostan ネヴロスタン 磷, 砒素ストリキニーネ製劑	田 邊 元	1.1cc. { 12管 1.50 50管 5.00 液 250瓦 2.00	結核, 神經疲勞 消 耗 症 毎日又は隔日 1cc. 皮注 内服 4—5 瓦宛 1 日 4回
Niburomin ニブロミン ブロムワレリル尿素 <u>賣</u> <u>注</u> <u>醫</u> <u>範</u>	マルコ 製 藥	末 { 25瓦 0.90 100瓦 2.50 500瓦 9.50 1000瓦 5000瓦 10000瓦 0.1 { 20錠 0.40 50錠 0.80 100錠 1.30 500錠 6.00	催眠鎮靜劑 催眠劑として— 1 回 0.3—0.6—1.0 鎮靜劑として— 1 日 0.3—1.0 分3

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Nican Gouties ★ ニカン滴劑 コデイン, 安息香酸ソーダ, アコニツトチンキ, ベラドンナ チンキ, ラウロチエラス水, プ ロモホルム, ドロセラチンキ, グリンドリヤチンキを主劑とす	カンタン 東洋 (カルニ イ)	液 { 10cc. 2.80 30cc. 4.50	鎮咳劑 大人 1日10滴 4回 に分ち微温湯に和 して内服
Nichiborin ニチボリン 三硼酸ヘキサメチレンテトラ ミン (Borovertin, Blenorin 参照)	日本 薬品洋行	末 { 25瓦 0.60 100瓦 2.00 500瓦 9.00	尿路防腐劑 1日 2-3 瓦分3
Nicotiramin ニコチラミン ビリヂン, ベタ, ガルボン酸 ヂエチルアミド15% パラオキシ, フェニル, エチル アミン鹽酸鹽 2%混和溶液 (Coramin 参照)	藤澤	1cc. { 5管 1.00 10管 1.90 50管 8.50 2cc. { 5管 1.80 10管 3.40 50管 15.50	解毒, 強心 呼吸興奮劑 重症 1時間毎に 1 cc. 静注 軽症 3-5 時間毎 に 1cc. 皮注 (發病・腸性中・ブトマ イン中毒・敗血症・丹毒 イレウス等に)
Nicormin ニコルミン ビリヂン, ベタカルボン酸ヂ エチルアミドの25%水溶液 (Coramin 参照)	吉萬	1cc. { 5管 1.20 10管 2.10 内用液 10cc. 1.20	強心, 呼吸強盛劑 1回量 1-2cc. 1 日數回皮注, 筋注 静注 内用 1回 1-2cc.
Nidstrin ★ ニドストリン 珪酸と類脂體とを吸着せしめ コロイド狀に水中に分散せしめ たるもの	大野研究 (三共)	1cc. { 5管 1.20 10管 2.15 50管 8.65 100管 16.00	刺戟療法に基く 血壓下降劑 0.5cc. より漸次増 量 1cc. に至る隔日 又は三日目毎に皮 注
Nieresol ニレゾール キササゲ及び唐黍の有效成分	日新醫學	液 { 100瓦 0.70 250瓦 1.50 500瓦 2.70 末 { 100瓦 1.40 250瓦 3.00 500瓦 5.50	利尿劑 液 1日 8-10瓦 末 1日 2-5 瓦

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Ninhydrin ニンヒドリン トリケトヒドリンデンヒドラ ート (Pampurool 参照)	バイエル	(末0.1) 1管 2.25 時價	蛋白質試薬
Nipagin ニパギン (A) パラオキシ安息香酸メチルエ ステル ニパゾール (B) 同 プロピルエステル	ユーリス ベンナー (ホ ルス ティン)	(A) { 25瓦 3.00 500瓦 38.00 1キロ 70.00 (B) { 25瓦 5.00 500瓦 65.00	防腐劑 (製劑, 果實蜜) A) 0.05-0.2 % B) 0.05-0.1 % (Kokusai nipa Et. gin, Hexa 参照)
Nippor ニツポール 0.5% のカンフルを含有する 生理的食鹽水	橋本製薬	1cc. { 20管 0.90 50管 2.00 2cc. { 10管 0.70 50管 3.20	強心劑 1回 1-2cc. 静注 又は皮注
Nipron ニプロン ★ パラアミノベンゾール, スル ホンアミド	コメツト (黒田)	末 { 25瓦 5.50 50瓦 10.00 100瓦 18.00 0.3 { 20錠 1.45 100錠 6.40	丹毒, 敗血症, 産褥熱 1日3回 0.3-0.6錠
Nitran (原名 Nitroscleran) ★ ニトラン デスオキシニトラート製劑	トツセー (小田井)	1.1cc. { 6管 1.50 30錠 2.00	血壓下降劑 1週 2-3 回皮注 1日 3回 1錠宛内 服
Nitroglycerin C. C. T. ● ニトログリセリン錠 1錠 中ニトログリセリン 0.0006 を含有のチョコレート錠 子	パーク デビス (三共)	100錠 0.65	狭心症治療劑 1回 1錠
Nitrosol ニトロゾール 2% 亞硝酸曹達溶液	フタバ (林)	1cc. 5管 0.85	血管擴張劑 1回 0.5cc.-1cc. 毎日又は隔日皮注
Noctenal ● ノクテナール (獨逸名 ノクタール) イソプロピルブROMプロペニ ル, パルピツール酸	リーデル (ホルス ティン)	末 { 3瓦 2.25 10瓦 6.00 25瓦 13.00 100瓦 46.00 0.1 { 3錠 0.40 10錠 1.15 50錠 4.55 200錠 15.20	催眠鎮靜劑 1回 0.1-0.2 (1 -2錠)

品名組成	製造元 登録元	包装価格	醫効用量
Nojodin ノヨジン 胆汁有效成分, フクシン, 沃度, 結合體溶液	帝國製藥	2cc. { 5管 1.50 10管 2.70 50管 12.00	結核治療劑 毎日又は隔日 1筒
Nonmorphin ノンモルピン フェノバルビタール, ヨードカルシウム, プロムソーダ製劑 (Neo Scomordin 参照)	小寺洋行 (福井七) (大羽商店)	皮下用 { 5管 3.00 2cc. { 10管 6.50 静脈用 { 5管 4.00 20cc. { 10管 7.50	慢性モヒ中毒治療劑 静注, 皮注併用, 説明書参照
Neo Scomordin ネオ, スコムルジン ノンモルピンに 鹽酸モルヒネ 0.002% 鹽酸スコポラミン 0.0002% 含有液		20cc. 6管 6.00	慢性モヒ中毒治療劑 毎日 1-2回 20cc. 静注
Normacol ノルマコール バツソリン屬植物粘液素 (チョコレート衣顆粒)	シエーリング (塩野義)	{ 100瓦 2.20 250瓦 4.90	生理的下劑 朝夕 2回 5-10瓦
Normolactol ノルモラクトール 乳酸, 乳酸曹達のプツフェル合劑	インゲルハイム (友田)	液 { 200瓦 3.60 1000瓦 16.00	白帶下治療劑 腔内塗布
Normaton ノルマトン 注 { トラミン 5% グリセロ磷酸ソーダ 5% グリセリン 5% 末 { チカミン 80% トラミン 20%	三共	2cc. { 5管 0.75 10管 1.30 50管 5.00 末 { 25瓦 0.75 100瓦 2.10 500瓦 9.00 0.5 { 30錠 0.50 100錠 1.45	血壓降下劑 1回 2cc. 皮注 1日 3-6瓦 (6-12錠) 分3
Normosan ノルモザン 硅酸アルミニウム製劑 [製法] [醫効]	武田	末 { 100瓦 1.00 250瓦 2.20 500瓦 3.50 1000瓦 6.30	制酸劑 毎食30分前 2-3瓦 100瓦の温湯に和して内服

品名組成	製造元 登録元	包装価格	醫効用量
Roto-Normosan ロートノルモザン 0.6%のロートエキスを含有するノルモザン [製法] 1回量 2.0-3.0	武田	末 { 250瓦 2.80 500瓦 3.70	胃液分泌過多 胃粘膜過敏, 胃, 十二指腸潰瘍 ノルモザンに同じ
Normosan-Tabletten ノルモザン錠 ノルモザンにロートエキス薄荷糖を配す	全	1.0 { 2錠 0.10 6錠 0.20 18錠 0.50 45錠 1.00 96錠 2.00 180錠 3.50 360錠 5.00	胃酸過多, 宿酔 1回 2錠食前30分
Nosagie ノザギー コンゴロート溶液 (1%)	浪速製藥	10cc. { 5管 2.00 10管 3.50 50管 16.00	色素性止血劑 1回 10cc. 静注 1日 2-3回に及ぶも可
Nosupurin ノズプリン ノボカイン, スプラレニン耐久性溶液	バイエル	2% { 1cc. 50管 5.75 2cc. 50管 6.90	齒科用局所麻醉劑 1-2cc. 齒齦注
Neo-Nosuprin ネオ, ノズプリン 血液と等アルカリ性のノボカイン, スプラレニン注射液	全	2% { 1cc. 25管 3.20 2cc. 10管 1.65	齒科用傳達麻醉劑 1回 1-2cc. 局所注射
Novabrom-dext ノバブーロムデキスト フェニルヂメチルピラツオロン, メチルアミノメタンズルホン酸ナトリウム, プロム鹽, 葡萄糖, カルチウム鹽溶液	マルコ製藥	10cc. { 10管 2.50 60管 14.00 20cc. { 5管 3.00 60管 23.00	鎮痛解熱劑 毎日又は隔日 10-20cc. 静注
Noval "Comet" ノヴァール [コメット] アルファモノプロム, イソペンチル, プロベニル, バルビツール酸	コメット (黒田)	末 { 25瓦 1.80 100瓦 6.50 450瓦 26.00 0.2 { 10錠 0.30 50錠 0.85 100錠 1.50	催眠鎮靜劑 1日 1.0-1.5瓦 分3

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Novalgin ノバルギン フェニルヂメチルピラツオロ ンメチルアミドメタン, スルホ ン酸ソーダ 〔賣許〕—〔醫絶〕 1日 0.5—1.0 (Novapon, Pyretin, Bonpyrin, Metilon, Neo-Elaon 参照)	バイエル	10瓦 2.40 25瓦 5.70 末 100瓦 15.50 500瓦 73.00 1キロ 130.00 〔賣〕(0.15) 30錠 1.45 〔賣〕 1cc. 10管 2.95	解熱鎮痛劑 (結核、肋膜炎、頭痛、 ロイマチス、腰痛) 1日 3回 0.5—1 瓦宛 注射50%液 1—2 cc. 皮注、筋注又 は静注
Novalgin-Chinin ノバルギン, キニーネ ノバルギンと鹽酸キニーネ結 合体 (Bonpyrin-Chinin 参照)	全	〔賣〕 末 25瓦 10.10 〔賣〕(0.25) 10錠 2.05	解熱鎮痛劑 (流感、關節炎、月経痛) 1日 1—3回 0.2 —0.5 宛食後
Novapon ノバポン フェニル, ゼメチル, ピラツ オロン, メチルアミノ, メタン スルホン酸ソーダ 〔賣許〕—〔醫絶〕 1日 0.5—1.0 (Novalgin 参照)	田邊五	25瓦 2.20 100瓦 7.30 末 500瓦 33.50 1000瓦 65.00 0.15 { 10錠 0.40 30錠 1.00 〔賣〕 100錠 3.00	解熱鎮痛劑 鎮痛 0.5—1 瓦 1 日 3回 解熱 0.25瓦 1日 3回
Novarseno Billon ノブアルゼノビロン ネオ, アルゼノベンゾール	クラン (マルホ)	1-6號各 1本入 時價 1-6號各 10本入	驅微劑 サルバルサンに倣 ふ
Novasuroil ノブアズロール オルトクロールフェノキシ ル 醋酸ナトリウムとヂエチルマ ニル尿素の複鹽 (Nelkegan, Luehinon, 参照)	バイエル	1.2cc. 10管 3.74	利尿, 兼驅微劑 (慢性腎臓性動脈 硬化、慢性肺気腫に) 驅微—0.5—1cc. 腎 筋注 利尿—0.5 cc. より 漸時増量 筋注又は腹 腔注
Novoadorin ノボアドリン 「三研」 ノボオカイン, アドレナリン クロレトーン, 安息酸溶液	三菱薬品	0.5% { 10cc. 10管 2.00 20cc. 5管 2.00 1% { 1cc. 10管 1.20 10cc. 10管 2.20 1% 20cc. 5管 2.20 2% 1cc. 10管 1.20 3% 1cc. 10管 1.20 5% 1cc. 6管 1.20	局所麻酔劑 皮注 小児科 1% 1—5cc 手術 5% 1—3cc 傳導 1% 1—2cc 浸潤 0.5% 5—125cc

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Novocain ノボカイン 鹽酸プロカイン 〔賣許〕—外用 5%以下, 點眼, 坐藥 (Spicain, Neocain, Bancaïn, Omuicaïn Paranesin, Localein 参照)	バイエル	5瓦 2.30 10瓦 4.30 末 25瓦 10.00 100瓦 32.50 ノボカインズプラ レニン液 2% { 1cc. 10管 1.58 2cc. 10管 1.80	局所麻酔劑 0.5—2%液を皮 注 内服 0.5 瓦迄
Novocol ノボコール メチレン, クレオソート	〔専局〕 志村商店	25瓦 0.90 末 100瓦 3.00 225瓦 6.00 450瓦 11.00	結核治療劑 1回 0.2—0.6 瓦 1日 3回
Novohorgen ノボホルゲン 鹽酸プロカイン液	高田製薬	1% 1cc. { 6管 0.45 12管 0.80 50管 0.50 2% 1cc. { 6管 0.50 12管 0.90 50管	局所麻酔劑 1回 1—2 筒皮注
Novolamin ノボラミン 鹽酸プロカイン 鹽酸エピレナミン混合溶液	植村	1% { 1cc. 10管 0.60 1cc. 50管 2.30 2% { 1cc. 10管 0.70 1cc. 50管 2.70 2cc. 10管 0.90 2cc. 50管 3.50 30cc. 瓶入 0.90 100cc. 瓶入 2.70 5% 1cc. 5管 0.90	局所麻酔劑 1回 1cc.—2cc.
Novoloform ノボロフォルム アミノ安息香酸エチル 〔賣許〕—1日 内服 1.0 外用〔醫絶〕	〔専局〕 武田	10瓦 0.80 末 25瓦 1.70 100瓦 6.30 500瓦 10.00 〔坐藥〕(主薬0.2) 10個 1.20	鎮痛制吐制痒劑 内用 1日 0.6—1 瓦分3 外用 0.3—1.0 瓦 外用 6—20%油液 軟膏
Novonol ノボノール (舊名ヤボノール) 樟油セスキテルベンアルコ ール 〔賣許〕—〔醫絶〕 複方ノボノール球 メチレン青, ザロール含有の ノボノール球	藤澤 全	25瓦 0.75 液 { 500瓦 10.00 1肝 18.00 0.3 { 500球 8.50 1000球 16.00 30球 1.00 50球 1.50 0.3 { 100球 2.70 200球 5.00 1000球 20.00	治淋劑 1日 3回 0.5—1.0 瓦 (2—3球) 治淋劑 1日 6—9 球 毎食後30分分服

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Novoteer ノヴォテール 木蓼兒を改良せる無刺激性品	三共	液 { 30瓦 0.62 100瓦 1.45 225瓦 2.60	皮膚防腐劑 外用
Nuclein Solution ヌクレイン酸溶液 5% ヌクレイン酸ソーダ溶液	パーク デビス (三共)	1.0cc. 12管 7.60	神經衰弱, 結核 麻痺性痴呆 0.5cc.より漸次増 量 2cc.に至る, 毎 日又は隔日上膊皮 注
Nuclein Solution 〔三研〕 ヌクレイン注射液 麥酒酵母より得たるヌクレイ ン酸ソーダの 5%溶液	三菱薬品	(1cc.) 10管 3.00	同上
Numal "Roche" ● ヌマル 〔ロシユ〕 アルリル, イソプロピル, バ ルピツール酸	ロシユ (日本) (ロシユ)	末 5瓦 5.50 (0.06) 15錠 2.45	催眠劑 1回 0.06—0.18 1—3 錠
Nupercain (原名 Percain) ● ヌペルカイン 〔チバ〕 α ブチルオキシチンヒヨニン 酸ヂエチルエチレンヂアミドの 鹽酸鹽 〔試〕一頓用 0.005 外用 0.1% △印エビネフリン含有	チバ (バ ゼ ル)	末 { 1瓦 1.35 5瓦 5.60 100瓦 82.00 (0.05) 20錠 1.90 (0.1) 10錠 1.90 (0.05) 10錠 △1.70 0.1% 5.5cc. 10管 △2.95 10.5cc. 10管 △3.40 腫痛用 10管 2.50 齒科用 0.3% 10管 △2.45 0.2% 10管 △2.86 液 2% 30cc. 1.60	局所麻酔劑 浸潤麻酔千—二千 倍液 傳達麻酔千—二千 倍液 腰椎麻酔 2百倍液
Nupercainal "Ciba" ヌペルカイナル 〔チバ〕 1% ヌペルカイン軟膏	チバ (バ ゼ ル)	錫管 { 10瓦 0.75 30瓦 1.45 (病院用) 〔試〕 250瓦 8.40	鎮痛鎮痒劑 局所塗布

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Nutrimin ヌトリミン 胚芽ビタミンB劑	日新 醫學社	1.1cc. { 10管 0.80 50管 3.50 2.2cc. { 10管 1.20 50管 5.50 3cc. { 10管 1.50 50管 7.00 5cc. { 10管 2.00 50管 9.00 液 { 100瓦 0.70 250瓦 1.40 500瓦 2.30 末 { 100瓦 1.00 250瓦 2.20 500瓦 4.00	Vitamin-B 劑 液 1日 20cc. 末 1日 5瓦 注 1日 1回 1筒
Neo-Nutrimin ● ネオ, ヌトリミン ヌトリミン 1管中硝酸ストリ キニーネ 0.002 含有	全	3cc. { 10管 2.00 50管 9.00	1日 1回 3cc.皮, 筋注
Nutrogen "Banyu" ● ヌトロージェン 〔萬有〕 燐 0.01 %含有肝油, 卵黄レ チチン, カルチウム製劑	萬有製薬	{ 100瓦 1.00 500瓦 3.50	強壯劑 1日 10—30瓦 毎食前分服
Lipo-Nutrogen ★ リポヌトロージェン ヌトロージェンの燐の代りに燐 酸鹽を配せる美味製劑	全	末 { 100瓦 1.00 500瓦 4.00	栄養, 強壯劑 1日 15—30瓦毎食 前分服
Nideton ★ ニデトン ビタミンc及クロ、フィル を安定化する植物粉末に、アデ ノシン化合物を配せる緑褐色粉 末	日本新薬	末 { 25瓦 100瓦 500瓦 0.5 { 30錠 100錠	血圧下降劑 1日 3回 1—2瓦(2 —4錠)宛. 毎食間 内服

品名組成 製造元 包装価格 医効用量

Obutal オブタール 松柏科植物揮発油とカワカワ樹脂製剤	塩野義	0.3 { 50球 1.50 100球 2.50	治淋劑 毎食後 2-3 球
Obutandcut オブタンデント 歯科用	齋藤薬局	1.1cc. { 10管 0.90 50管 3.20 25cc. 1.00 250cc. 8.00	局所麻酔劑 1回 1筒
Ocenta ★ オセンタ 胎盤エキス, 脳下垂體前葉エキス, ヴイタミン, 磷, 鐵, カルチウム含有製剤	プロモンタ (ホルスタイン)	末 { 100瓦 4.50 250瓦 10.00	催乳劑 1日 3-4 回 3-4瓦宛
Ochimon オチモン Magen-Darm-hormon に胃及十二指腸の生理的有效成分を含有せしむ	武田	末 { 25瓦 2.20 100瓦 8.00 0.1 { 100錠 1.30 300錠 3.30 1cc. { 5管 1.00 10管 1.90	食慾催進劑 内服—1日 0.5—1.0瓦分 3 毎食前 注射—1日 1—2 回 1cc.皮注又は筋注
Octinum ● オクチヌム メチル, オクテニルアミンの酸性酒石酸鹽(注及液は鹽酸鹽)	クノール (三共)	(0.1) 1cc. 5管 3.55 (10%) 10瓦 2.65 (0.15) 10錠 2.15	胃瘻, 胃潰瘍 月經痛 鎮瘻鎮痛劑 注射 1日 2-3 回 1cc.皮注又は静注 内服 15-20滴 (1-2錠) 宛 1日 2-3 回
Oestroglandol "Roche" オストログランドール _L ロシユ ₇ 卵胞ホルモン (Progynon-B, Uden Perlatan, Gynadol, Mismon 参照) オストロ, グランドール, ザルベ オストログランドール含有白色軟膏	ロシユ (日本) (ロシユ)	(1錠 1cc.) 1000I.E. 錠 { 20錠 4.35 100錠 18.50 1.1cc. { 6管 3.25 50管 25.35	女性ホルモン (卵胞) 内服—1日 3-6 錠 注射—1週 2-3 回 1-2 管宛
	全	チユーア 20瓦 4.35	外陰部癢痒症 濕疹, 疱疹 患部に可及的強く塗擦

品名組成 製造元 包装価格 医効用量

Offnal 園 オフナール 特殊ホルモンとビタミン B 配合體 (Frobin 参照)	大日本製薬	{ 10錠 0.80 20錠 0.50 50錠 0.90 100錠 1.60 500錠 6.50	疲労回復劑 1日 2回食間 3錠宛
Ogardin ★ オガルヂン 鯉科動物の血清中より分離せる成分に, 非病原菌體中の有效成分を配す (Omnadin, Omnin, Multin Erstin 参照)	藤澤	1cc. { 10管 1.40 50管 6.00 2cc. { 10管 2.10 50管 9.00	非特異性免疫元 流感, 肺炎, 丹毒 1日 1回 1-2cc. 皮注又は筋注
Ogawa's Cupper sulfat ● 小川純硫酸銅桿 純硫酸銅桿	友田	1本 0.75	眼科用 その患部へ塗擦
Ogimol オギモール 5% サリチル酸カルチウム溶液	日新醫學	20cc. { 10管 1.80 50管 8.00	肋膜炎, 肺炎 治療劑 1日 1回 20cc. 静注
Ohkisol 園 オーキゾール クレゾール原液に數種の特種劑を加へたる乳白の消毒劑	大木合名	液状ビール _(瓶入) 0.35 18立入石油 _(罐) 3.50	強力殺蛆消毒劑 稀釋して撒布
Ohma オーマ 25%の純過酸化マグネシア含有の粉末	藤澤	末 { 50瓦 0.95 250瓦 4.00 500瓦 7.50 0.5 { 20錠 0.35 100錠 1.50	制酸解毒整腸劑 毎食後 0.5-1.0 瓦 (1-2錠)
Ohnes ★ オーネス 特異結核免疫元 (非抗酸性結核菌製劑)	東方藥物 (奉天) (鶴原)	Ohnes-T (治療用) 1cc. { 5管 10管 Ohnes-P (豫防用) 1cc. { 5管 10管 Ohnes-D (診断用) 1cc. { 5管 10管	結核, 治療, 豫防 診断劑 説明書参照

品名組成

製造元 包装價格 醫効用量

Okihormon オキホルモン α-Alylhormon に胎盤より抽出せる女性ホルモンを配す	★	龜井藥品	500 M.E.	5管 1.50	女性ホルモン (腸器性、水溶性) 1日1回 1cc.皮注
			1cc.	10管 2.75 50管 12.50	
			1,000 M.E.	5管 2.00	
			1cc.	10管 3.40 50管 14.00	
			5,000 M.E.	5管 2.50	
			1cc.	10管 4.50 50管 19.00	
			10,000 M.E.	5管 2.75	
			1cc.	10管 5.00 50管 19.00	
Oleoraxine オレオラキシン _{Lレミー} 純流動パラフィンに Orthospermalae 種子の揮發油を配す		レミー (丸善)	100瓦	1.20	緩下劑
			250瓦	2.20	空腹時40瓦頓用
Oleum Chenopodii ヘノボヂ油 ヘノボヂ油 (Nematol 参照)	⊙⊙	フタバ (林)	原液 { 25瓦 1.55 450瓦 時價 (0.3) 50球 1.45		十二指腸蟲驅除劑 早朝 0.5—1 瓦 (2球—3球) を頓服し 2時間後緩下劑を用ふ
Olink "Pasta" 外用オリンク 高壓分解を行ひたる蛋白質にリポイドを配し Pasta となし、皮膚通過を容易ならしめたるもの		田邊五	軟膏 { 50瓦 0.90 100瓦 1.50 500瓦 6.00		傳染性膿痂疹、丹毒 (異種蛋白經皮免疫劑) 毎日1回塗布
Olobintin オロビンチン 精製テルペン油の10%油溶液		リーデル (ホルスタイン)	1.1cc. 10管	4.65	非特異性刺戟劑 1週 2—3回 1cc. 皮注又は筋注 癬瘡、濕疹、潰瘍
Omnadin オムナデン リポイド、蛋白、脂肪を主體とするムツフ氏全免疫元にして既往性免疫を増強せしめ生體の自然防護力を上昇せしむ (Omnin, muitin Erstin, Stimin, Enadin 参照)		バイエル	2cc. { 3管 2.40 12管 8.85 50管 34.30		肺炎、流感、丹毒 産褥熱、敗血症 腎盂炎、猩紅熱 其他原因不明の高熱 毎日又は隔日 1回 2cc.筋注

品名組成

製造元 包装價格 醫効用量

Omnicaïn オムニカイン 鹽酸プロカイン	⊙⊙★	第一製藥	末 { 5瓦 時價 25瓦		局所麻酔劑
Omnigen "Hata" オムニーゲン _{Lハタ} リポイド、蛋白脂肪を主とする全免疫元 (Omnadin 参照)	★	植村製藥	1cc. { 10管 1.40 50管 6.00		非特異性全免疫元 毎日又は隔日 2cc. 皮注又は筋注 小兒は 1cc.
Omnin "Comet" オムニン _{Lコメット} リポイド、蛋白、非特異性免疫元 (Omnadin 参照)		コメット (黒田)	2cc. { 5管 1.65 10管 3.20 50管 15.00 100管 27.00		解熱劑 (肺炎、丹毒) 毎日又は隔日 1回 2cc.筋注又は皮注
		小兒用	1cc. 10管 2.50		
Omoyu Matsu "Sankyo" 三共 _{L重湯末} 穀類膨脹機にて製せる玄米末に酵素、乳酸石灰、米胚芽、食鹽を配す (Biocemeal, Mamagen 参照)		三共	{ 100瓦 0.75 250瓦 1.55 1斤 4.80		乳兒人工榮養料 6%の割合に溶し用ふ
Omsol オムソール 非特異性全免疫元	★	日新醫學	1.1cc. { 10管 1.20 50管 5.50		肺炎、丹毒、敗血症 毎日又は隔日 2cc. 皮注又は筋注
			2.2cc. { 10管 1.50 50管 7.00		
Onanko 菱一印 _{L黄軟膏} 特殊基礎劑を使用せる微粒黄降汞軟膏 (Jecora 参照)	◇	日本新藥	特殊黑色遮光容器入 { 1% 25瓦 0.60 2% 25瓦 0.60 3% 25瓦 0.65 5% 25瓦 0.70 10% 25瓦 0.80		眼科用 結膜炎、眼瞼炎 塗擦
黄降汞軟膏 (1%, 2%)		マルホ	チューブ { 12.5瓦 0.75		眼科用 (結膜炎、眼瞼炎)
白降汞軟膏 (3%)		全	チューブ { 12.5瓦 0.75		(收斂腐蝕)
クエン酸銅軟膏 (5%)		全	チューブ { 12.5瓦 0.75		(トラホーム)

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Onimsin オニムシン Saxifragaceae 植物有効成分	東西治療 醫學 研究所 (岩城)	皮注用 ● { 10管 2.00	消炎劑 (神經痛) (ロイマチス)
		5cc. { 50管 7.50	
ネオオニムシン (同上改良品)	(安原)	皮注用 ● { 10管 2.50	毎日又は隔日 1管 皮注又は静注
		5cc. { 50管 10.00	
Onsens オンセンス 椒松葉の成分に鹽類を配せる 浴劑	乾 卵	静注用 ● { 10管 2.50	芳香浴劑 1人風呂 1回10瓦 (神經痛、ロイマチス、 濕疹、汗疹)
		10cc. { 50管 12.00	
Oophorin オーホリン 卵巢ホルモン製劑	伯林臟器 (守隨)	2cc. { 5管 5.00	女子機能障害 治療劑 1日 1回 2cc.皮注 1日 3回 1錠宛
		{ 20錠 4.50	
Oophormin オオホルミン 卵巢實質の總ホルモン製劑	武 田	1.1cc. { 5管 3.00	子宮發育不全 無月經, 缺落症狀 閉經期障害 注射—毎日又は隔 日 1回 1— 2cc.皮注 内服—1日 1—1.5 瓦 (10—15 錠) 分3
		30管 13.50	
Oophormin-Luteum オオホルミナルテウム 卵巢黃體ホルモン製劑 (K.E.=クラウベルク單位)	武 田	0.5cc.=1 K.E. { 1管 2.30	原發性無月經 不妊症, 月經不順 破瓜期出血 注射—1回 1管筋 注 内服—1日 1.0— 1.5 瓦分3
		0.5cc.=5 K.E. { 1管 9.80	
Opalon オパロン サンタロール製劑	大阪藥品 實驗所	末 1瓦=2 K.E. { 10瓦 4.50	治 淋 劑 1日 3回毎食後 0.6—0.7 瓦 (1— 2球) 宛
		{ 25瓦 10.30	
		{ 100瓦 38.00	
		液 { 10瓦 1.80	
		{ 25瓦 3.80	
		{ 100瓦 12.00	
		0.35 { 30球 2.00	
		{ 50球 3.00	
		{ 90球 5.00	
		{ 200球 10.00	

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Ophtin for Physician ★ 「オフチン」 100瓦中硼酸 75瓦, 硼砂 25瓦, 薔薇水, メチレン青含有	三 共	① 末 { 250瓦 1.45	洗 眼 劑 (A) 2瓦を約 100cc. の冷水に溶し用 ふ
		{ 500瓦 2.30	
オフチン ② 園	全	② 末 { 50瓦 0.50	② 2%溶液として 洗眼
特殊可溶性硼酸		{ 100瓦 0.80	
Opiel オピール Papaveraceae 及 Polygalaceae 植物より抽出せるサポニン體 末は淡褐色微苦味, 液は褐色濃 稠液	富 松	末 { 30瓦 0.80	鎮 咳 劑 末, 液共 1日量 3 —4 瓦 (9錠) 3回 分服
		{ 50瓦 1.25	
		{ 100瓦 2.20	
		{ 500瓦 10.00	
		液 { 100瓦 2.20	
		{ 500瓦 10.00	
		錠 { 9錠 0.20	
		{ 15錠 0.30	
		{ 30錠 0.50	
		{ 65錠 1.00	
		{ 140錠 2.00	
		{ 230錠 3.00	
		{ 400錠 5.00	
Opisan オピサン 局方阿片の特種乾燥乳糖を以 て 5—10倍とす (阿片法の適用を受けず)	市 山 (田邊五)	十倍用 { 25瓦 0.65	一般阿片剤と同じ 阿片の 5倍乃至10 倍
		{ 100瓦 2.56	
		{ 250瓦 5.50	
		{ 500瓦 10.40	
		五倍用 { 25瓦 1.15	
		{ 100瓦 4.20	
		{ 250瓦 10.50	
		{ 500瓦 20.00	
		時價	
Opopon オポポン 阿片アルカロイド鹽酸鹽	東洋新藥	0.6cc. { 10管 1.00	鎮痛麻醉劑 1/2—1 筒皮注
		1cc. { 10管 1.20	
		{ 50管 5.50	
オポポン, アトロピン ● 園	全	1cc. { 10管 1.20	同 上 1/2—1 筒皮注
		{ 50管 5.50	
1cc. 中 { オポポン 0.02			
{ 硫酸アトロピン 0.0003			
オポポン, スコポラミン ● 園	全	0.6cc. { 10管 1.00	鎮痛麻醉劑 1/2—1cc. 皮注
		{ 10管 1.20	
		{ 50管 5.50	

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Oporenin オポレニン 鹽酸エビレナミン液 (天然製品)	武 田	千倍液 { 10cc. 0.60 25cc. 1.10 100cc. 4.20 五百倍液 { 10cc. 1.20 25cc. 2.20 100cc. 8.40 千倍液 { 5管 0.60 0.5cc. { 10管 1.00 5管 0.70 1cc. { 10管 1.80	副腎髓質製劑
			千倍液は皮注又は 靜注 五百倍液は鼻腔内 点滴又は噴霧専用
Opostatin オポスタチン 脾臓止血ホルモン製劑 {注射液 2cc=新鮮脾臓10瓦 内服末 1瓦=同 6瓦 錠(0.2)1筒=同 1.2瓦に對應す 賣許—1日 3.0	武 田	2cc. { 5管 1.50 10管 2.80 25瓦 1.50 末 { 100瓦 5.50 500瓦 25.00 0.2 { 50錠 1.00 100錠 1.80 300錠 5.00	止血劑
			1回 2cc.皮注又は 筋注 末 1回 0.5—1.0 錠 1日 3回食前服 用
Oprival オプリバル 乳酸エトオキシ, デアミノア クリヂン (Rivanol, Rivanon Hectalin 参照)	大日本 製 藥	末 { 5瓦 2.50 10瓦 4.50 25瓦 10.00 50瓦 18.50 100瓦 34.00	色素性殺菌消毒劑
			外用—500—2000 倍水溶又は 1%軟 膏, 撒布劑, 洗腸 には10—100倍液
Opsolen オプソレン 蜂蜜蛾の蠟分解酵素製劑	東京藥品 研究所 (鳥 居)	1.1cc. { 5管 1.50 10管 2.80 50管 13.50	結核治療劑
			1回 0.25—1.0cc. 錠皮注
Optarson オプタルソン ストリヒニン含有ソラルソン (Solarson 参照)	バイエル	1.2cc. { 12管 6.00 50管 20.70	萎黃病, 貧血 初期結核
			ソラルソンに準ず 隔日 1cc.皮注
Optohin オプトヒン エチル, ヒドロクブレイン (Remijin 参照)	チムメル (三 共)	{ 5瓦 品切 10瓦	マラリア, 肺炎 治療劑
			1日 0.1—0.5 瓦
Oralcid オラルチード 4・オキシ 3・アセチルアミノ フェニルアルジン酸(砒素27%) (Spirocid, Osaminol Osvarsan 参照)	第一製藥	末 { 10瓦 4.00 25瓦 9.00 (0.1) 50錠 2.20	内服驅微劑 (小兒先天微毒)
			1日 0.6 瓦より漸 次増量 (説明書參 照)

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Oral-Tetragnost オラール, テトラグノスト ヨードテトラグノストの製劑	メルク (シ ユ ミツト)	1.1cc. 同量 6.50	膽囊造影劑
			コップ一杯の常水 に溶して内服
Orchic substance オルヒス 機能旺盛なる男性動物の辜丸 ホルモン製劑	マルホ	末 28瓦 7.20 (0.1cc) 100錠 4.20 1cc. { 5管 5.00 10管 9.00	強精劑
			1日 3回 0.1—0.8 (1—2錠) 宛 注射—隔日 1cc.皮 注
Orchic substance desicated 乾燥辜丸實質 0.065 瓦=新鮮辜丸實質約 0.455 に相當	全	20錠 2.00	官能的生殖器障害
			1日 3回 1錠宛
Orchic substance desicated 乾燥辜丸實質 0.065 瓦=新鮮辜丸實質約 0.455 に相當	パーク デピス (三 共)	28瓦 6.70	神經衰弱陰萎 治療劑
			1回 0.2—0.65 瓦
Orchine Capsule "Abbett" オルキン強陽劑「アボット」 乾燥辜丸, ヨヒムピン, ホミ カエキス, ブロード氏炭酸鐵, グリセロ磷酸石灰製劑	アボット (柳 韓 洋 行)	100球 25.00	同 上
			1日 3回 1球宛
Orchitine オルヒチン 牡牛辜丸ホルモン製劑	ビラ (丸 善)	2cc. { 6管 4.50 12管 8.00 末 { 10瓦 3.50 25瓦 7.50 錠 60錠 3.50	男性ホルモン劑
			注—隔日 1筒皮注 内服 1日 1.5—2.0 (4—8錠)
Orexin オレキシシ「カレー」 タンニン酸フェナゾリン 賣許—賣經	バイエル	末 { 10瓦 3.00 25瓦 6.60 100瓦 23.70 500瓦 115.50 (0.1) 25錠 1.85 (0.25) 10錠 1.55	食慾催進劑
			1日 3回 0.2—0.3 瓦宛 3—5cc. を直腸に 注入し綿栓す
Orfon オルフォン 假性オルトカルボン酸の 3個 の水酸基のアルキール基置換エ ステルの20%植物油溶液	船 井	20% { 5管 1.70 1.1cc. { 10管 3.00 50管 14.00 吸入液 0.70 パイプ 0.50 注腸液 { 25cc. 1.70 50cc. 3.00	百日咳, 喘息 治療劑
			1回 1筒筋注 注腸 1回 10cc. 吸入 1—2 滴パイ プにて

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Organesium ★ オルガネシウム ヌクレイン, グリセロ磷酸マ グネシウム, 腦及生殖ホルモン を含有する白糖粒状製劑	ドエツ トウ (東洋カ ルニイ ン商會)	90瓦 4.85	強壯劑 毎食前大匙 1杯
Orgar オルガール 寒天を媒體とせる流動パラフ イン體の乳劑	パーク デビス (三共)	450瓦 4.20	緩下劑 1回 1食匙朝夕 2 回
Original Ringold 創製リングルド液 (ギムザー液改良品) 血液像又は標本製作用	リン ゴルド (石津作)	第1液50cc. } 1組 第2液50cc. } 15.00 容器 0.80	血液染色用 1回 1筒
Ormedin ● オルメジン 無水純沃度グリセリンに鎮痛 消炎劑を配せる褐色透明液	第一製藥 (スポイト付) (徳用瓶)	10瓦 0.80 50瓦 3.00	中耳炎點耳劑 外聽道に沿ふて耳 内に注入鼓膜に接 觸せしむ
Orsol Gold ★ オルゾル, ゴールド 金屬金を大風子油に, コロイ ド状に分布せしめたるもの ①—結核用 ②—癩用	京大化學 研究所 (日新醫學)	① { 0.5cc. 10管 3.00 1.0cc. 10管 4.00 ② { 2.0cc. 10管 5.00 3.0cc. 10管 6.00 4.0cc. 10管 7.00 5.0cc. 10管 8.00 6.0cc. 10管 9.00	①結核治療劑 ②癩治療劑 ① 4日毎に 0.5— 1.0cc. 筋注 ② 毎日 2—6 cc. 筋 注
Orthoberin オルトベリン 胚芽及内皮膜製ビタミンB 製劑	水野藥局	1cc. { 6管 0.90 60管 7.00 2cc. { 6管 1.50 50管 10.50 液 { 100瓦 0.65 300瓦 1.65 500瓦 2.50 末 { 50瓦 0.60 250瓦 2.50 500瓦 4.50 100錠 1.00	Vitamin-B 劑 液 1日30瓦 末 1日 5—10瓦 注射 1日 1—5cc. 錠 1回10錠

品名組成 製造元 包装価格 醫効用量

Orthoform オルトフォルム メタアミノパラオキシ安息香 酸メチルエステル $C_6H_5(NH_2)(OH)COOCH_3$ Ⓢ—外用(Ⓢ), 内用不許 (Hypoform 参照)	バイエル	25瓦 9.00	不溶性局所麻醉劑 そのまゝ又は 5— 20%軟膏, 撒布劑 内用 0.5—1.0 瓦 錠 1日 3回迄
Ortizon オルチゾン 固形過酸化水素製劑	バイエル	75粒 1.98	含嗽料 1—2 粒をコップ 約半量の水に投ず れば過酸化水素を 得
Oryzae オリゼ 絲狀菌 Aspergillus-Oryzae に 紫外線を照射し磷酸カルシウム を配せる製品 Vitamin-B-D. 消化酵素含有	乾 卵	末 { 30瓦 0.90 100瓦 2.40 250瓦 5.50 500瓦 10.00 0.2 { 60錠 0.60 240錠 2.00 700錠 5.50 2000錠 15.00	尙俥病骨軟化症 治療劑 末 1日量 1.2—2.0 瓦分3 錠 1日 6—10錠分 3食後 食欲亢進の目的に は食前
Oryzanin オリザニン Vitamin-B 劑	三 共	液 { 100cc. 1.60 500cc. 6.50 1000cc. 10.30 2500cc. 18.50 末 { 30瓦 1.30 150瓦 5.40 500瓦 12.50 1000瓦 20.50 2500瓦 34.00 0.5 { 50錠 1.20 100錠 2.15 300錠 5.80 500錠 8.70 エキス { 50瓦 1.60 100瓦 11.50 強力オリザニン 1瓦 8.50	Vitamin-B 劑 液 = 1日20瓦 末 = 1日 6瓦 錠 = 1日12錠 エキス = 1日 9瓦 注射 = 1日 1—2 cc. 皮注
Oryza-Viton ★ オリザビトン 2cc. 中 { オリザニン結晶 0.5瓦 ビトン 0.1瓦	同	2cc. { 5管 3.80 10管 7.00 50管 30.00 100管 55.00	Vitamin B. C. 複合劑 (瘧疾腸氣, 浮腫, 食欲不振) 1回 2—4 cc. 皮注, 筋注, 又は靜注

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量																																																				
Oryzanin cryst. Sol. オリザニン結晶液 ★ Vitamin B ₁ (普通品 1cc.=0.05 瓩 50單位 3倍品 1cc.=0.15 瓩 150單位 5倍品 1cc.=0.25 瓩 250單位 10倍品 1cc.=0.5 瓩 500單位 20倍品 1cc.=1.0 瓩 1,000單位 40倍品 2cc.=2.0 瓩 2,000單位)	三共	<table border="1"> <tr><td>普通品</td><td>5管</td><td>0.80</td></tr> <tr><td rowspan="3">1cc.</td><td>10管</td><td>1.45</td></tr> <tr><td>50管</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>100管</td><td>10.50</td></tr> <tr><td rowspan="3">3倍品</td><td>5管</td><td>1.90</td></tr> <tr><td>10管</td><td>3.40</td></tr> <tr><td>50管</td><td>14.50</td></tr> <tr><td rowspan="3">3cc.</td><td>100管</td><td>26.00</td></tr> <tr><td rowspan="3">5倍品</td><td>5管</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>10管</td><td>3.85</td></tr> <tr><td>50管</td><td>16.50</td></tr> <tr><td rowspan="3">1cc.</td><td>100管</td><td>29.00</td></tr> <tr><td rowspan="3">10倍品</td><td>5管</td><td>3.20</td></tr> <tr><td>10管</td><td>5.80</td></tr> <tr><td>50管</td><td>26.50</td></tr> <tr><td rowspan="3">1cc.</td><td>100管</td><td>48.00</td></tr> <tr><td rowspan="3">20倍品</td><td>5管</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>10管</td><td>8.80</td></tr> <tr><td>50管</td><td>48.00</td></tr> <tr><td rowspan="3">40倍品</td><td>5管</td><td>8.50</td></tr> <tr><td>10管</td><td>15.50</td></tr> </table>	普通品	5管	0.80	1cc.	10管	1.45	50管	6.00	100管	10.50	3倍品	5管	1.90	10管	3.40	50管	14.50	3cc.	100管	26.00	5倍品	5管	2.00	10管	3.85	50管	16.50	1cc.	100管	29.00	10倍品	5管	3.20	10管	5.80	50管	26.50	1cc.	100管	48.00	20倍品	5管	5.00	10管	8.80	50管	48.00	40倍品	5管	8.50	10管	15.50	Vitamin-B ₁ 劑 皮下又は靜注 脚氣, 神經炎, 消 化不良, 疫痢, 結 核性疾患, 惡性貧 血, 自家中毒
普通品	5管	0.80																																																					
1cc.	10管	1.45																																																					
	50管	6.00																																																					
	100管	10.50																																																					
3倍品	5管	1.90																																																					
	10管	3.40																																																					
	50管	14.50																																																					
3cc.	100管	26.00																																																					
	5倍品	5管	2.00																																																				
		10管	3.85																																																				
50管		16.50																																																					
1cc.	100管	29.00																																																					
	10倍品	5管	3.20																																																				
		10管	5.80																																																				
50管		26.50																																																					
1cc.	100管	48.00																																																					
	20倍品	5管	5.00																																																				
		10管	8.80																																																				
50管		48.00																																																					
40倍品	5管	8.50																																																					
	10管	15.50																																																					
	Osaminol ● オサミノール パラオキシ, メタアセチル, アミノ, フェニルアルジン酸 (砒素27%含有) (Oralcid, Osvarsan, Spirocid. 参照)	三共	<table border="1"> <tr><td>末</td><td>10瓦</td><td>4.15</td></tr> <tr><td rowspan="2">0.25</td><td>25瓦</td><td>9.50</td></tr> <tr><td>30錠</td><td>3.60</td></tr> <tr><td></td><td>100錠</td><td>10.20</td></tr> </table>	末	10瓦	4.15	0.25	25瓦	9.50	30錠	3.60		100錠	10.20	内用驅微劑 第1日 0.5 第2日 0.75 第3日 0.75 翌3日間休止以後 之を反復す																																								
末	10瓦	4.15																																																					
0.25	25瓦	9.50																																																					
	30錠	3.60																																																					
	100錠	10.20																																																					
Osantigen ★ オサンチゲン 鶏白痢菌製劑	全	<table border="1"> <tr><td>6錠1管1人分</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>100人分</td><td>12.00</td></tr> </table>	6錠1管1人分	0.15	100人分	12.00	チフス, 赤痢の治 療及豫防 内服劑 連續3日間毎早朝 2錠宛内服																																																
6錠1管1人分	0.15																																																						
100人分	12.00																																																						
Osavin オサビン錠 3.6 ギアミノ, 10メチル, ア クリヂニウムクロリッド含有の 佳味錠劑	全	(0.003) 20錠 0.40	口腔, 咽喉消毒劑 1錠を口中に含み 溶解せしむ																																																				
Osgen オスゲン (千秋氏骨粉) 生骨を骨髓と共に乾燥挫碎し たる粉末, 灰白色, 無味 〔賣証〕〔醫証〕	全	<table border="1"> <tr><td>末</td><td>25瓦</td><td>0.48</td></tr> <tr><td rowspan="2">(0.25)</td><td>100瓦</td><td>1.25</td></tr> <tr><td>500瓦</td><td>4.25</td></tr> <tr><td></td><td>200錠</td><td>1.00</td></tr> </table>	末	25瓦	0.48	(0.25)	100瓦	1.25	500瓦	4.25		200錠	1.00	結核, 腺病質 1回 0.5 瓦 1日 3 回																																									
末	25瓦	0.48																																																					
(0.25)	100瓦	1.25																																																					
	500瓦	4.25																																																					
	200錠	1.00																																																					

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量															
Osodin ★ オソジン 胆汁成分, NaBr, CaBr ₂ 葡萄 糖 Vitamin-B 製劑	模範藥品 研究所	<table border="1"> <tr><td rowspan="3">5cc.</td><td>5管</td><td>0.95</td></tr> <tr><td>10管</td><td>1.80</td></tr> <tr><td>50管</td><td>8.00</td></tr> <tr><td rowspan="2">10cc.</td><td>10管</td><td>8.00</td></tr> <tr><td>50管</td><td>14.00</td></tr> </table>	5cc.	5管	0.95	10管	1.80	50管	8.00	10cc.	10管	8.00	50管	14.00	惡阻治療劑 1回 5-10cc. 靜注			
5cc.	5管	0.95																
	10管	1.80																
	50管	8.00																
10cc.	10管	8.00																
	50管	14.00																
Ossofit オツソフィット グリコール酸と, 第二磷酸ソ ーダとの複鹽の 4%溶液	ポーリングル (三共)	10cc. 10管 8.55	假骨形成促進劑 最初 1回 4cc. より 漸次増量, 骨折の 近接部位に注射															
Ostaminal ● オストアミナール バルビタール, アミノピリン 結合體	● 平局 東洋製藥	<table border="1"> <tr><td rowspan="4">末</td><td>25瓦</td><td>2.20</td></tr> <tr><td>100瓦</td><td>7.60</td></tr> <tr><td>500瓦</td><td>32.40</td></tr> <tr><td>1瓦</td><td>63.50</td></tr> </table>	末	25瓦	2.20	100瓦	7.60	500瓦	32.40	1瓦	63.50	鎮痛, 鎮痙劑 1回 0.2-0.8 頓 服 1日 0.6-1.2 3回分服						
末	25瓦	2.20																
	100瓦	7.60																
	500瓦	32.40																
	1瓦	63.50																
Oswaccin オスワクチン	内服ワクチン (461頁)参照																	
Osvanyl ● オスパニール ブロムワレリル尿素 60分 アミノピリンと バルビタールとの化合物 25分 バルビタール 15分	武田	<table border="1"> <tr><td rowspan="3">末</td><td>25瓦</td><td>1.65</td></tr> <tr><td>100瓦</td><td>5.80</td></tr> <tr><td>500瓦</td><td>25.00</td></tr> <tr><td rowspan="2">0.25</td><td>10錠</td><td>0.60</td></tr> <tr><td>20錠</td><td>1.00</td></tr> </table>	末	25瓦	1.65	100瓦	5.80	500瓦	25.00	0.25	10錠	0.60	20錠	1.00	鎮靜催眠劑 鎮靜劑として= 1 日 0.75-1.0-1.5 瓦 催眠劑として= 1 回量 0.5-0.7-1.0 瓦を頓用			
末	25瓦	1.65																
	100瓦	5.80																
	500瓦	25.00																
0.25	10錠	0.60																
	20錠	1.00																
Osvarsan ● オスブルサン パラオキシ, メタアセチルア ミノ, フェニルアルジン酸 (Spirocid, Osaminol, Oralcid 参照)	萬有製藥	<table border="1"> <tr><td rowspan="2">末</td><td>10瓦</td><td>4.50</td></tr> <tr><td>25瓦</td><td>10.00</td></tr> <tr><td rowspan="2">0.25</td><td>30錠</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>100錠</td><td>12.00</td></tr> <tr><td rowspan="2">0.01</td><td>50錠</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>100錠</td><td>1.80</td></tr> </table>	末	10瓦	4.50	25瓦	10.00	0.25	30錠	4.00	100錠	12.00	0.01	50錠	1.00	100錠	1.80	内服驅微劑 (小兒先天梅毒) 内服 1日 3回 1回 0.25 瓦 (1錠)
末	10瓦	4.50																
	25瓦	10.00																
0.25	30錠	4.00																
	100錠	12.00																
0.01	50錠	1.00																
	100錠	1.80																
Oswax オスワックス 滅菌止血蠟	ラヂウム	<table border="1"> <tr><td rowspan="2">瓶入</td><td>25瓦</td><td>1.80</td></tr> <tr><td>100瓦</td><td>6.50</td></tr> </table>	瓶入	25瓦	1.80	100瓦	6.50	止血劑 スパーテルにて壓 展す										
瓶入	25瓦	1.80																
	100瓦	6.50																
Otagol オタゴール サリチル酸を主薬とせる泥狀 軟膏	歌橋製藥	<table border="1"> <tr><td rowspan="2">軟膏</td><td>50瓦</td><td>0.80</td></tr> <tr><td>100瓦</td><td>1.45</td></tr> </table>	軟膏	50瓦	0.80	100瓦	1.45	外聽道痛治療劑 綿栓タンポンの周 圍に着け外聽道挿 入										
軟膏	50瓦	0.80																
	100瓦	1.45																

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Otitol オチトール 0.15%の阿片エキス 5%ア ンチピリンのグリセリン溶液 (Ormedin, Otolysin. 参照)	三共	液 { 10cc. 1.00 30cc. 2.00	中耳炎 點耳劑 點耳
Otogenin オトギニン オトギリ草有効成分 (グリコ シード)	日新 醫學社	1.1cc. { 5管 1.00 50管 8.00	神 經 痛 ロイマチス治療劑 1回 1-2cc. 皮注
Otolysin オトリジン ナルコボン (0.2%) アンチピ リンの無水グリセリン溶液	ラヂウム	液 { 10瓦 1.00 50瓦 4.00 250瓦 16.00	中耳炎 點耳劑 1日 2-3回 點耳
Otonin オトニン フェニルチメチルピラツオロ ン及鎮靜劑の無水グリセリン溶 液	日新醫學	液 { 10cc. 1.00 50cc. 4.50 200cc. 16.00	急性中耳炎治療劑 外聽道に點注す
Otoscrerol オトスクレロール チミチフギン及プロム 燐酸鹽 含有錠劑	友田	50錠 4.00	耳鳴症治療劑 1日 3回 1-5錠
沃度一オトスクレロール 22.7%の沃度ナトリウム含 有のオトスクレロール	同	50錠 4.90	同 上
Otreon オトレオン 鹽酸パパペリン, 炭麻, 次炭 酸若鉛及び泡沫形成物質より成 り1錠は 定規鹽酸 2cc.に對應す (Ataxin 参照)	ルイト ボルド ウエルク (武田)	(0.25) 40錠 2.10	制酸鎮痛劑 1回 1-2錠其儘 嚥下す (胃カタル 胃酸過剰)

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
Ovahormon オバホルモン 妊娠尿より抽出せる卵胞ホル モン (C ₁₈ H ₂₂ O ₂) (水溶性) I.U.=國際單位 (Uden, Proginon 参照)	武田	100 I.U. { 5管 1.00 1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 500 I.U. { 5管 2.00 1cc. { 10管 3.60 50管 15.80 1瓦=1000 I.U. { 10瓦 1.60 25瓦 3.60 100瓦 12.80 500瓦 54.00 錠 100 I.U. { 50錠 1.50 100錠 2.70 錠 500 I.U. { 20錠 1.65 50錠 3.75 100錠 7.50 300錠 20.00	① 卵巣機能不全 子宮發育不全, 無月經 月經不順, 不妊 症 ② 卵巣機能缺落症 狀 原發性無月經, 缺落症狀 ③ 更年期症狀 脂肪過多, 血壓 亢進, 四肢冷感 ④ 乳汁分泌不足 ⑤ 婦人の神經諸症 狀 注射—毎日又は隔 日各單位 1 管皮注又は 筋注 内服—1日 1-2 瓦 (3-6錠) 3回分服 坐藥—1日 1個膣 内挿入
Ovahormon-Benzoat オバホルモン, ベンツアート デヒドロオバホルモンのベン ツオイルエステル (油溶性)	全	0.5cc=1千 I.U. { 5管 2.20 0.5cc. { 10管 4.10 50管 17.50 1cc=1萬 I.U. { 5管 2.70 1cc. { 10管 4.70 50管 21.00 1cc=5萬 I.U. { 3管 5.30 1cc. { 10管 15.00 1cc=25萬 I.U. { 1管 7.50	同 上 筋注又は皮注
Ovahormon for Vag. App.★ オバホルモン球 1個中 オバホルモンベンツア ート 1千國際單位を含有する膣 球 (オストログランドール, ザルベ参照)	全	{ 2球 0.60 5球 1.20 10球 2.10 50球 9.50	同上 (外用劑) 内服, 又は注射と 併用す 1日 1個挿 入
Ovaltine オバルチン 消化性, 牛乳, 卵, 粉末マル ツエキス製劑	シーベル ヘグナー 新藥部	{ 250瓦 時價 500瓦	榮 養 劑 1日 3回 5-20瓦 宛, 熱湯に溶して 用ふ

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Ovaraden Triferrin オヴァラーデントリフェリン錠 オヴァラーデン 0.3 トリフェリン 0.1 白糖 0.032 澱粉 0.008	クノール (三共)	(0.5) 20錠 2.90	脱落症状 發育不全治療劑 1日 2-3錠 咀嚼して嚥下
Ovarial オヴァリアル 卵巣乾燥末	メルク (シユ ミット)	時價 末 { 10瓦 6.70 25瓦 15.50 50瓦 27.55 0.5 { 20錠 1.85 50錠 4.00 100錠 7.25	機能缺如症治療劑 1日 3回 0.42- 1.05瓦
Ovarian オバリアン 卵巣ホルモン製劑	マルホ	28瓦 12.00 (0.13) 100錠 5.80	月經障害不妊症 1日 3回 0.1-0.3 (1-2錠) 宛
Ovarian Residue 無黃體乾燥卵巣實質 成熟黃體を除去せる卵巣成分 (0.065瓦=新卵巣腺0.39瓦に相當)	パーク デビス (三共)	28瓦 7.85	無月經治療劑 1回 0.3-1.3瓦 1日 3回
Ovarian Substance 乾燥卵巣實質 全卵巣の乾燥粉末 (0.065瓦=新卵巣腺0.39瓦に相當)	全	28瓦 18.85	月經障害治療劑 1日量 0.13-0.26 瓦
Ovarin オバリン 卵巣ホルモン製劑	ベルリン 臓器 (守隨)	2cc. 5管 5.00 1.5 グレイン 50錠 3.50	發育不全 更年期障害 隔日 1回 2cc.皮注 1日 3回 1-2錠宛
Ovarine "Byla" オヴァリン「ビラ」 卵巣ホルモン (末1瓦=新卵巣腺5瓦に相當)	ビラ (丸善)	2cc. { 6管 4.50 12管 8.00 末 { 10瓦 4.00 25瓦 9.00 錠 60錠 3.50	卵巣機能障害 更年期障害 隔日 1管皮注 1日 0.4-0.8瓦 (4-8錠)
Ovoglandol オヴオグランドール 卵巣製劑	ロシユ (日本 ロシユ)	(糖衣) 25錠 3.65 1.1cc. 6管 2.85 フェルオボグ ドール 50錠 3.65	卵巣分泌 月經障害治療劑 1日 1-3筒 3- 5錠

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Ovorol オボラール ビタミンDの植物油溶液	藤澤	油液 { 10cc. 2.50 50cc. 11.50 錠 { 100錠 2.00 500錠 9.00	佝僂病治療劑 乳, 幼兒, 毎日油 液 2-3滴 錠 2-3個
Oxan オクサン アスピリン薄荷油溶液	圃 バイエル	硝子筒 5瓦 0.66 品切	鼻感冒治療劑 1日數回吸入
Ox Gall Desiccated 牛膽末 牛膽乾燥末	マルホ	25瓦 2.00	胆汁分泌 消化促進劑 1回 0.3-0.5瓦 宛毎食後 2時間に 内服
Oxozin オクソチン 錫, 亞酸化錫, 及酸化錫の混 合物	三共	末 { 10瓦 0.48 25瓦 0.95 500瓦 11.00 (0.2) 50錠 0.70	痛, 癰, 骨髓炎 葡萄狀球菌病 1日 1-2瓦 (5 -10錠)
Oxper オクスペル 3% 過酸化水素水	浪速製藥	{ 100瓦 0.20 500瓦 0.70	消毒劑 外用
Oxpertin オクスペルチン ウンベルリフェラー屬植物有 効成分	全	1cc. { 6管 1.80 12管 3.20 50管 12.00	惡阻鎮吐劑 毎日又は隔日 1回 1cc.皮注
Oxyfull オキシフル A 3% 過酸化水素 (10容量%) B 2.5% 家庭用オキシフル	三共	{ 100瓦 時價 120瓦 500瓦 1000瓦 B { 100瓦 0.40 250瓦 0.60 (0.1) 50錠 0.60 蒲葎酒 { 5盞 2.70 白用 { 18盞 8.10	殺菌消毒劑 原液又は 3倍に稀 釋し用ふ錠 6個を 10瓦に溶解せば 3 %となる
Oxypyrrin オキシピリン 2アセトオキシ, 4メチルベン ツオールカルボン酸 微酸臭味の白色針狀結晶	三共	末 { 25瓦 1.45 100瓦 5.15 (0.5) 20錠 0.75	解熱鎮痛劑 (結核, 産褥熱, 齒痛) 1日 3回 0.5 宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Oxyurin オキシウリン	三共	末 { 10瓦 0.60 50瓦 1.80 100錠 0.75 500錠 2.15	蟻蟲驅除劑 大人早朝空腹時10錠頓用 3-4日間繼續
1瓦 { ヤラツバ根末 0.03 1錠中 { カタラツクス 0.01			
Ozaenol オツエノール	櫻木合資	液 { 30瓦 1.50 100瓦 4.00 250瓦 8.50 500瓦 15.00	臭鼻症治療劑 1日1回綿棒に浸して鼻粘膜塗布
鹽酸エチルモルヒネ, クロレトーン, コロイド銀, 粘液等の配合體			
Ozenin (Otitis Media Vaccine) オツエニン	大阪細菌	7cc. 1.50	中耳炎治療劑
中耳炎ワクチンより分離したる多價混合ワクチン			

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Palatol パラトール	パークデピス (三共)	液 { 250cc. 2.10 500cc. 3.80	強壯劑 1回 8-16cc. 1日3回
ガゾオール, ヘマチツク次亜磷酸鹽舍利別, マルツエキス製劑			
複方パラトール	全	液 { 250瓦 2.15 500瓦 4.10	強壯劑 1回 4-16cc.
クレオソート, グアヤコール含有のパラトール			
Pamprol パンプロール	日本新藥	末 { 0.05瓦 1.80 0.1瓦 2.20	最強蛋白試薬 尿診断及桑葉の營養價值鑑定及一般の蛋白質試験に0.5-1.0%液使用
トリケトヒドリンデン, ヒドラート, 淡黄色結晶性粉末 蛋白質及其分解成績體に遇へば紫色を呈す			
Panadin パナジン	アルゼールトミイ	瓶入 { 30cc. 0.80 60cc. 0.50 250cc. 1.30 500cc. 2.00 1000cc. 3.20	白癬, 疥癬, 痒疹 原液又は稀釋液塗布
コロイド硫黄沃度の易游離性カルシウム鹽の濃厚液 (硫化水素臭を有する, 金黄色澄明液)			
Pancreatin パンクレアチン	三共	末 { 25瓦 0.65 250瓦 4.60 500瓦 8.40	蛋白消化劑 1回 0.1-0.3 瓦
膵臓酵素 (Comet-Pank 94頁参照)			
パンクレアチン重曹錠	全	30錠 0.65	蛋白消化劑 1回 3錠
{ パンクレアチン 0.16 重曹 0.4			
エイワンパンク (A. one Panc) 改良パンクレアチン	岩城	末 { 25瓦 0.80 250瓦 2.35 500瓦 4.20	同上 1回 0.5
Pancrea Tablet パンクレア錠	ウィルソン (マルホ)	100錠 7.20	膵臓疾患 グレース氏病 毎日3回 1-3錠宛, 食間
膵臓總ホルモン製劑			

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Fangital パンギタール デギタリスの總有效成分 液 1cc=末 1瓦=デギタリス末 0.1 瓦 (フォック單位 5-6) に相當す	● 三 共	液 { 15cc. 0.95 50cc. 2.25 100cc. 3.25 225cc. 6.60 500cc. 12.00 末 { 15瓦 0.95 50瓦 2.55 100瓦 4.60 250瓦 9.60 500瓦 14.00 1cc. { 5管 0.75 10管 1.30 50管 4.35 100管 8.00	デギタリス適應症 注 0.5-1.0cc. 皮注 末 1日 1.5-3.0 液 1日 1.5-3.0cc.
10倍強力 パンギタール末 (1名 デギトール)	全	末 10瓦 1.95	末 1日 0.15-0.3
Panktase パンクターゼ 膵臓エンチーム	内外新薬	末 { 25瓦 1.40 225瓦 10.50 450瓦 19.50	蛋白, 澱粉, 消化劑 1回 0.1-0.2 瓦
Panliver パンリバー 牛肝臓中の造血有效成分30% を含有す	天 兒 研 究 所 (塩 野) (鳥 居)	末 { 25瓦 2.30 100瓦 7.50 250瓦 16.00 500瓦 30.00 1肝 50.00 2肝 80.00 0.25 { 50錠 1.40 100錠 2.50 300錠 7.00 500錠 11.00	造血榮養劑 (悪性貧血 結核性疾患 小兒發育不良) 1日 5回 1.0-1.5 瓦宛 (3-6錠)
Panna パンナー 阿片總アルカロイド鹽酸鹽	● 固 橋本製薬	0.6cc. { 10管 1.50 50管 7.00 1cc. { 10管 1.20 50管 6.00	鎮痙, 麻醉劑 1日 1-2 回 0.5 -1.0cc. 皮注
Pan-Opin パンオピン 阿片アルカロイド鹽酸鹽 末は 45-50%の純モルヒネ含 有 錠はパンピオン末 0.01瓦 注は 2%液	● 固 ⑤ 三 共 塩 野	末 { 1瓦 1.05 5瓦 5.00 10瓦 9.70 (0.01) 20錠 0.47 5管 0.43 10管 0.78 50管 3.45 100管 5.25 1.1cc. { 5管 0.58 10管 1.05 50管 4.65 100管 8.85	鎮痛麻醉劑 末 1回 0.01-0.03 瓦 錠 1回 1-3 錠 注 1回 0.5-1cc. 皮注

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Pan-Opin-Atropin ● 固★ パンオピン, アトロピン 1cc. 中 { パンオピン 0.02 硫酸アトロピン 0.0004 鹽酸パパベリン 0.0004	三 共 塩 野 ⑤	0.6cc. { 5管 0.42 10管 0.70 50管 3.40 100管 6.50 1.1cc. { 5管 0.56 10管 1.06 50管 4.50 100管 8.55	鎮痙麻醉劑 1回 0.5-1.0cc. 皮注
Pan-Opin-Scopolamin ● 固 パンオピン, スコポラミン 1cc. 中 { パンオピン末 0.04 ブロム水素酸スコポ ラミン 0.0006	全	0.6cc. { 5管 0.68 10管 1.25 50管 5.50 100管 10.50 1.1cc. { 5管 0.88 10管 1.50 50管 6.65 100管 12.65	麻醉補助劑 手術前 1時間 0.5 -0.8cc. 皮注
Panos パノス カスカラサグラダ越幾斯にゲ リヂウム屬植物の成分を併合し たるもの (レグリン製劑)	大 日 本 製 薬	0.1 { 100錠 0.50 500錠 2.20 1000錠 4.00 粗末 { 50瓦 1.30 100瓦 2.50 250瓦 6.00	糞量に留意せる 緩下劑 錠 1回 10-20錠 頓 服, 1日 15-30錠 分 3 末 1回 1.5-3 瓦 頓服, 1日 2-5瓦分 3
Pansecal パンセカール { パンセプチン 0.25% グルコン酸カルシウム 3.8% 葡萄糖 5%	塩 野 義	10cc. { 5管 0.95 10管 1.80 50管 7.00 20cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 10.00	治 淋 劑 毎日又は隔日 1回 10-20cc. 静注
Panseptin パンセプチン 3.6 ジアミノ 10メチルアクリ ヂニウムクロリッド ⓧ 外用 ⓧ 内用不許	全	0.5% { 5管 0.65 50管 5.00 100管 9.00 10cc. { 5管 0.95 50管 7.00 100管 12.50 20cc. { 5管 1.30 50管 10.00 末 10瓦 5.00 0.025 { 50錠 1.00 100錠 1.70 500錠 7.50	深達性色素殺菌 消毒劑 注射 0.5% 5-20 cc. 静注 外用 0.1% 液 内服 2-3 錠 毎食 後
Pansid パンシード アントラグリコセンニン C ₃₀ H ₃₆ NO ₅	大 阪 薬 品 實 験 所	末 450瓦 7.50 0.2 { 20錠 0.30 50錠 0.50 120錠 1.00	緩下劑 1日量 2-3 瓦 (6-12錠)

品名組成	製造元 發售元	包裝價格	醫効用量
Pantcain ● パントカイン ブチル、アミノ安息香酸デメ チルアミノエタノールエステル 液状 1点眼 0.1% (Nalcain 参照)	バイエル	末 { 1瓦 1.85 5瓦 5.40 50瓦 40.40	表面(粘膜)麻醉劑 1-2%液外用
Pantopon ●●● パントポーン 阿片總アルカロイドの可溶性 鹽酸鹽(アルカロイド含量50%) (Narcopon Panopin 参照)	ロシユ (日本) ロシユ	末 { 1瓦 2.50 5瓦 10.85 10瓦 21.70 (0.01) 20錠 1.85 2%液 10cc. 1.45 6管 1.80 1.1cc. { 12管 3.50 50管 12.70	鎮痛麻醉劑 末 1回 0.01-0.03 1日 0.06 迄 錠 1回 1-3 錠 1日 6錠迄 注 1回 1-2cc. 1日 3cc. 迄
Pantopon-Scoporamin ●● パントポーンスコポラミン 1cc.に { パントポーン 0.04 ブロム水素酸スコポ ラミン 0.0006	全	1.1cc. 6管 2.15 0.6cc. { 6管 1.65 100管 19.10	鎮痛麻醉劑 1回 0.5-1.0cc. 手術前45-60分 可及的分割して皮 注
Papa (Vitamin Jelly) パパー (ビタミンゼリー) 下田式純肝油に酵母、燐、キ ナ、カルシウム、果糖、葡萄糖 を加へたる固形ゼリー	大木合名 學校團體用	{ 505個 6.00 1010個 10.00	榮 養 劑 大人 1回 2個 15歳以下 1回 1個
Fapain パpain パパイヤ樹植物酵素、無晶形 粉末、酸性及アルカリ性液中に 於て蛋白消化作用を發揮す 液状 1-10錠 (1日 0.1-0.3)	嵯峨山 茂雄商店	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 14.00 時價	ヂフテリア義膜 溶解及消化劑 5%液外用、内用 1日 0.2-0.3
Papanin ★ パパニン液 クレゾールスルホン酸石灰に 麻黄、桔梗、遠志等の成分を配 せる濃厚液	模範藥品 研究所	液 { 100瓦 6個 2.40 250瓦 6個 5.04 500瓦 6個 9.00	鎮咳、祛痰劑 1日量 3-5 瓦 單味水劑として分 服

ビタミンA 眼科用
軟膏
ゼコラ



花見が花見で有名な高き院の三寶院

全誌子



豊太開が花見で有名な高き院の三寶院

品名組成 製造元 包装價格 醫効用量

Paparin バパリン 罌粟殼エキス製劑	大 林	末 { 50瓦 1.20 450瓦 9.50 0.3 { 12錠 0.50 50錠 2.00	鎮 咳 劑 1回 0.5 1日 3回 1—2 錠宛
Papatral パパトラール 注 1cc, 末 0.5 瓦, 錠 2錠, 中 (鹽酸パパベリン 0.025 硫酸アトロピン 0.0005 バルビタール 0.05 アミノピリン 0.06	● 萬 有	末 { 25瓦 2.20 100瓦 8.00 500瓦 36.00 1cc { 5管 1.00 10管 1.80 50管 8.50 錠 { 20錠 0.60 100錠 2.70 500錠 12.00	鎮 痙 鎮 痛 劑 (胃痙、抽痛、膽石痛、 月經痛、手術後の疼痛 腸テネズムス) 注 1日 1回 0.5— 1.0cc. 皮注 末 1回量 0.5—1.0 錠 1回 2—4 錠
Papavel パパベール 4% 鹽酸パパベリン液	● 大 日 本 製 藥	1cc { 5管 0.80 10管 1.50	胃痙、痙攣性便秘 腸 テネズムス 1回 1cc. 1日 2— 3回迄
Papaverin "Ingeheim" パパベリン (インゲルハイム) (注射液 1cc. 中 硫酸パパベリン 0.04 錠 1個中 鹽酸パパベリン 0.04	● インゲル ハイム (友 田)	1cc. 6管 1.40 (0.04) 20錠 1.40	胃腸痙攣、膽石 痙痛、月經痛 皮注 1cc. 内服 1— 2錠 1日數回
Papayostase パパヨスターゼ パパヤ (木瓜) の消化酵素に 膵臓消化酵素を配したるもの (非引濕性) 賣許—(醫施) (1日 0.1—0.3)	マルホ	末 { 25瓦 0.90 100瓦 3.20 250瓦 7.00 500瓦 12.50 0.1 { 30錠 0.35 100錠 0.85	蛋白、澱粉、消化劑 1日 3回毎食後 0.1—0.2 瓦宛
Paphos パフホス カオリン、サリチル酸メチル 泥劑	日新醫學	膏 { 100瓦 0.80 250瓦 0.60 500瓦 1.00 2000瓦 3.00 5000瓦 6.00 30000瓦 33.80	消 炎 巴 布 劑 巴 布
グアヤコール・パフホス パフホスにグアヤコールを配 す	全	膏 { 100瓦 0.60 250瓦 1.20 500瓦 2.25 2000瓦 6.50	巴 布 劑 布に延べて 1日 1 —2 回貼付



耳に由緒深き耳塚
豊太閤が三韓征伐の際に持ち歸つた
數千の敵兵の耳を埋めたといふ

石段にまじりて
眺むるや
春の
風

中耳炎に
チスクレン
オツェアに
サフラビン
鼻炎・痔核に
マグネシン



品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Para formaldehyde 固形フォルマリン パラフォルムアルデヒド	● 圓城商店	末 500瓦 10.00 1.0 { 50錠 1.20 100錠 2.20 500錠 9.00	殺菌防腐劑 和洋衣服, 書畫, 書籍, 標本等の保 存
Paragin パラギン セネガ根の有効成分	第一製藥	末 { 100瓦 1.80 450瓦 7.00 液 { 100瓦 0.70 450瓦 2.30 0.5 { 50錠 0.85 100錠 1.50	祛痰鎮咳劑 粉末 1日 3-4 瓦 液 1日 9-12瓦 錠 1日 6-9 錠
Paramidyl "Willow" パラミヂール パラアミノベンゼン, ズルフ オンアミド (Prontosil album 参照)	★ ウイロウ (柳 韓) 洋行	0.3 { 20錠 2.95 50錠 6.20 100錠 12.00 500錠 58.00 1000錠 113.20	連鎖状及葡萄状 球菌性疾患治療劑 1日 3回 2-3 錠 宛毎食後分服
Paramin パラミン 虎耳草有効成分サキシフラギ ン製劑	★ 龜井藥品	2cc. { 5管 1.10 10管 1.70 50管 6.50 末 { 30瓦 1.20 100瓦 3.00 500瓦 12.50	利尿劑 1回 2cc.皮注 1日 3瓦分3
Paranutrin パラヌトリン 米糠ビタミンB製劑 [讀註]—[醫効] 1日 1.0-6.0 (末)	塩野義	1cc. { 5管 0.90 10管 1.50 50管 6.00 2cc. { 5管 1.20 50管 9.00 3cc. { 5管 1.50 50管 11.00 5cc. { 5管 2.00 50管 16.00 10cc. { 5管 3.50 50管 27.00 液 { 100cc. 1.00 500cc. 3.60 2500cc. 16.50 末 { 50瓦 1.20 100瓦 2.30 250瓦 5.20 500瓦 10.00 1000瓦 18.00 0.5 { 50錠 1.00 100錠 1.80 500錠 7.50 1000錠 14.00	Vitamin-B 劑 皮注 1日 1-2cc. 液 1日 10-20cc. 末 1日 3-6 瓦 錠 1日 6-12錠

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Neo-Paranutrin ネオ, パラヌトリン 組晶ビタミン B ₁ 0.25 瓩=100 鳩單位 0.5 瓩=200 〃 1.0 瓩=400 〃 2.0 瓩=800 〃	★ 塩野義	① 1cc. 5管 1.20 0.25瓩 { 10管 2.20 50管 10.00 ② 1cc. 5管 1.90 0.5瓩 { 10管 3.50 50管 16.00 ③ 1cc. 5管 3.00 1.0瓩 { 10管 5.20 ④ 2cc. 5管 6.50 2.0瓩 {	Vitamin B ₁ 劑 1-2cc. 皮注又は 静注
Paraoxy Benzoic acid B. ester パラオキシ安息香酸ブチル パラオキシ安息香酸ブチルエ ステル	三 共	25瓦 1.10	防腐劑 注射薬, エキス, 其他に對し 0.1 % -0.5 %
Pararivan パラリバン エトオキシ, チアミノアクリ ゲン, ラクタート 0.5 %, 葡萄 糖10%液	掛見商店	10cc. { 5管 1.20 10管 2.20 30管 6.20	膿瘍, 化膿性疾患 治療劑 5-10cc. 静注
Para-Sinomenin パラシノメニン		Sinomenin (384 頁) 参照	
Parathyroid 乾燥上皮小體錠 上皮小體實質 (0.0065)	パーク デビス (三 共)	100錠 10.15	上皮小體障礙 1回 1錠 (テクニー舞踏病)
Paratyphoid- Diagnosticum A. B. パラチフス診斷液	天 兒 研 究 所	A型B型各 20cc. 1.00	チフス診斷劑
Partagon パルタゴン桿	★ サ ン ド	20本 3.80	
Paspat パスパート アンチアレルギー接種劑 多價アンチゲンと腦下垂體後葉 ホルモンより成る	ル イ ト ポ ル ト (武 田)	0.2cc. 5管 12.40	氣管支喘息 治療劑 皮膚を刺絡して接 種す 1-2 週毎に 1回 0.2cc. 宛10回

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Passiflorine "Beaubrg" ★ パツシフロリン「レオーブル」 Passiflora incarnata (とけい そう)の流動エキス製剤	佛レオー ブール 東洋 (カルニ イ)ン	100cc. 4.50	神経鎮静剤 (憂鬱症、神経過敏) 正午及夕食前 1— 2茶匙又は臨臥時 2—3 茶匙
Pastrisin パストリジン サリチル酸カルチウム, ヨー ドカルチウム, キニーネ鹽基及 フクシン溶液	日新醫學	20cc. { 10管 2.60 50管 11.50	消炎鎮痛剤 1日 1回20cc. 静注
Patentex パテンテキス	ホールス タイン	子ユープ 40回分 5.70	花柳病豫防剤 事前塗布
Patrogen パトローゲン ビタミンB 含有のデキスト リン, 粉乳製剤	明治製菓	{ 225瓦 1.20 450瓦 2.20 3ポンド 5.50	母乳代用 1回20—50瓦 ミルクフードに同 じ
Pavinal ●● パビナール { 鹽酸デヒドロオキシコデイ ノン 80% 鹽酸ヒドロコタルニン 20%	武 田	0.5cc. { 10管 1.40 50管 6.20 1cc. { 10管 1.85 20管 3.50 50管 8.20 末 { 1瓦 6.00 5瓦 28.00 (0.005) 20錠 0.80 (0.01) 20錠 1.40	鎮痛鎮痙剤 皮注— 1回 0.5— 1.0cc. 内服— 1回 0.0025 —0.01 瓦
Favinal-Atropin ●● パビナール, アトロピン 1cc. 1錠 1瓦中 { パビナール 0.01瓦 硫酸アトロピン 0.0005瓦	全	1cc. { 5管 1.00 10管 1.85 30管 5.20 (0.01) 20錠 1.40 百倍 { 25瓦 1.60 100瓦 6.00 末 { 250瓦 14.50 500瓦 28.00	鎮痛, 鎮痙, 鎮咳剤 皮注— 1回 0.3— 1.0cc. 内服— 1/2—1錠 末は鎮咳剤として 1回 0.2—0.3 瓦 鎮痛剤として 1回 0.5—1.0 瓦
Pavinal Papaverin ●● パビナール, パパヴェリン 1cc. 中 { パビナール 0.01瓦 鹽酸パパベリン 0.02瓦 硫酸アトロピン 0.0003瓦	全	1cc. { 5管 1.10 10管 1.95	鎮痛鎮咳剤 1回 0.3—0.5—1cc. 皮注

品名組成	製造元 發售元	包装価格	醫効用量
Pavinal Scoporamin ●● パビナール, スコポラミン 強 1cc. 中 (弱は其半量) { パビナール 0.02 ブロム水素酸 スコポラミン 0.0005	武 田	強 1cc. { 5管 1.20 10管 2.20 30管 6.10 弱 1cc. { 5管 1.00 10管 1.85 30管 5.20	鎮痛麻酔剤 (強液) 1cc. を皮注 衰弱者, 老幼者に は(弱液)
Pawlonin パウロニン Pawlonia tomentosa (桐)よ り抽出せる配糖體製剤	ラヂウム	液 { 100瓦 0.75 500瓦 2.00 1肝 3.20	鎮咳祛痰剤 1日 5—10瓦
Pectamol "Ha'a" ペクタモール「ハタ」 ヨードキニーネサリチル酸カ ルシウム溶液	植 村	20cc. { 5管 1.10 10管 1.80 50管 7.00 100管 13.00	肺結核治療剤 毎日又は隔日に 1 管静注
Pectol ペクトール ヨード, キニーネ, サリチル 酸カルチウム溶液	東京化學 (塩野義)	30cc. 6管 2.10 40cc. 6管 2.50 20cc. { 6管 1.60 10管 2.00 50管 8.00	肺結核治療剤 毎日20—40cc. 静注
Pedinal ● ペヂナール 2.ブチルオキシ 4.ヒノリンカ ルボン酸ゲエチルアミノ, エチ ルアミド鹽酸鹽, 鹽酸コタルニ ン, 鹽酸デヒドロモルヒノン製 剤	金剛製藥	1.1cc. { 10管 1.50 50管 7.00 液 { 15cc. 1.50 30cc. 2.90	鎮痛, 鎮痙剤 1回 1cc. 皮注 1回 1—2cc. 内服
Neo-pedinal ● ネオ, ペヂナール 同上 改良, 強力剤	全	1.1cc. { 10管 1.50 50管 7.00 液 { 15cc. 1.50 30cc. 2.90 50cc. 4.40	同上
ネオ, ペヂナール末 ●●	全	末 { 1瓦 6.50 5瓦 32.00 10瓦 62.00	同上
ネオ, ペヂナール錠 ● バルビタール, アミノピリン 鹽酸デヒドロモルヒノン製剤	全	錠 { 10錠 0.50 30錠 1.00 100錠 3.00 200錠 5.80	鎮 咳 剤 1回 1—2 錠

品名組成	製造元 電話番号	包装價格	醫効用量
Pelanin ペラニン 卵胞ホルモン (尿性) (C ₁₈ H ₂₂ O ₂)	東京臓器 (塩野義)	水溶性(皮注用) 100單位 1cc. { 5管 1.00 10管 1.50 50管 2.00 250單位 1cc. { 5管 1.50 10管 2.70 50管 11.00 500單位 1cc. { 5管 2.00 10管 3.60 50管 15.00 油溶性(筋注用) 五百單位 0.5cc. 5管 1.30 千單位 0.5cc. 5管 2.20 ベンツアート 1千單位 1cc. 5管 2.20 1萬單位 1cc. 5管 2.50 5萬單位 1cc. 3管 5.00 25萬單位 1cc. 1管 7.00	女性ホルモン 注射—1日 100— 500單位 皮注(水溶性)又は筋注(油性)及ベンツアート) 内服—1日 2—3 回 100—500 單位宛 末 1瓦 500單位 { 10瓦 1.00 25瓦 2.20 100瓦 7.80 錠A) 100單位 B) 250單位 { 12錠 0.50 50錠 1.50 100錠 2.70 { 12錠 1.00 50錠 3.00 100錠 5.40
Pelargon ★ ペラルゴン 0.5%の乳酸を、乾燥前に附加せしめた全粉乳	ネツスル (乾卵)	225瓦 2.60	栄養品 14瓦に湯86瓦を和す
Pellidol ペリドール ジアセチルアミドアゾトルオール、赤褐色粉末、表皮を汚染せず Ⓢ—Ⓢ 外用 (Saxyl 参照)	バイエル	25瓦 5.11 2%軟膏 此管入 30瓦 1.44	表皮形成促進劑 (潰瘍、火傷、濕疹) 2%軟膏、油液又は撒布劑として外用
Peltugen ★ ペルツェゲン Lニットー 芳香性アミノ化合物	日東新薬 (岩城)	1cc. { 10管 2.40 50管 11.00	百日咳治療劑 1回 1cc.皮注

品名組成	製造元 電話番号	包装價格	醫効用量
Penargan ペナルガン Na ₄ Ag ₂ S ₆ O ₉ なる組成を有する結晶性銀化合物	三共	末 { 1瓦 0.55 5瓦 1.70	深達性治淋劑 0.05—0.1—1.0% 液注入又は洗滌
Peniocol ★ ペニオコール 有機銅化合物 Peniocuprum 80% Pinaceae 科植物樹脂20% 含有の黒褐色軟膏	有明製薬 (塩野義)	軟膏 { 5瓦 0.70 10瓦 1.20 100瓦 9.60 500瓦 42.00	軟性下疳治療劑 布に塗って壓抵
Pepsin Pure 純ペプシン 膵臓消化酵素	メルク (シユミット)	鱗片状 25瓦 時價 顆粒状 25瓦	消化劑 1日 0.1—0.5
純ペプシン 3000倍品	パークデビス (三共)	顆粒状 25瓦 1.55	
ペプシン	ウイルソン (マルホ)	500瓦 時價	
「後藤」純ペプシン	後藤 風雲堂	{ 25瓦 1.80 500瓦 32.00	
Pepton ペプトン 「圓城」 消化蛋白	圓城商店	末 { 25瓦 0.55 500瓦 9.00	細菌培養基用
「照内氏」ペプトン	後藤 風雲堂	末 { 25瓦 0.50 500瓦 9.00	
「イワキ」ペプトン	岩城	末 { 25瓦 0.45 500瓦 7.00	
「タナベ」ペプトン	田邊五	末 { 25瓦 0.40 500瓦 6.50	
「櫻木」ペプトン	櫻木	末 { 25瓦 0.45 500瓦 7.00	
G. S. 乾燥ペプトン 血液フィブリン消化に依るペプトン	塩野義	末 { 25瓦 0.75 500瓦 12.50	滋養劑 1回 5—10瓦

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
満満鐵ペプトン液 0.6%の鐵, 0.1%のマンガン を含む, ペプトン溶液	パークデビス (三共)	液 { 225瓦 1.85 450瓦 3.30	強壯劑 1日3回 4-16cc. 宛
Pepton Inj. ペプトン注射液 [タケダ] 純ペプトンの1%滅菌液にし て異種蛋白刺戟療法劑	武田	1cc. 10管 1.60	氣管枝喘息 偏頭痛 0.3cc. 皮注漸次増 量
Per-Abrodil ペルアブロードイル 有機性沃度 51.8% を含有せ る 3.5 チョードピリドンN醋酸 ヂエタノールアミンの35%溶液 (Sugiuron, Uroselectan-B 参照)	バイエル	20cc. { 1管 13.00 5管 53.65 強力液20cc. 1管 14.90	腎盂撮影劑 體温程度に加温し て靜注
Perandren ★ ペランドレオン [チバ] テストステロン, プロピオン 酸エステル (合成高單位睾丸ホルモン) (Testviron, Uroselectan-B 参照)	チバ (バーゼル)	1cc-5種-250國際單位 1.1cc. 4管 14.00	男性ホルモン 1週 1-2回 1cc. 宛筋注又は皮注
Perbismol ペルビスモール 有機蒼鉛鹽の植物油澄明溶液 (2cc. 中金屬蒼鉛 0.07 含有) (Neo-Olesal 参照)	日本藥品 洋行	2cc. { 10管 1.75 50管 7.50	蒼鉛驅微劑 隔日 2cc. 筋注12- 15回を 1クールと す
Perbon ★ ペルボン 過硼酸ソーダ (NaBO ₂ H ₂ O ₂ 3 H ₂ O) 21% の H ₂ O ₂ 含有の白色粉末	江戸川 工業 (鳥居)	普通青罐 { 200瓦 0.50 500瓦 1.00 藥用赤罐 { 200瓦 0.60 500瓦 1.20 バスペルボン { 150瓦 0.70 300瓦 1.30	殺菌消毒劑 水 1升到對し10瓦 を溶し用ふ バス用は浴湯 300 立に對して30瓦を 投入す
Perborax 過酸化硼砂 8.5% 重量の過酸化水素を含 有す	三共	50瓦 0.65	消毒殺菌劑 水溶液 5%軟膏 5- 10%

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Peremesin ★ ペレメジン コロイド溶性蔘酸セリウム複 合劑	ハイデン 醫化學 ウイン (クレル) 商會	10錠 (袋入) 1.70 25錠 (管入) 3.25	鎮吐劑 (惡阻, 船暈) 1回 1-3錠口中 に溶解吸收せしむ
Perhydrit ペルヒドリット 固形過酸化水素 1分子とカル バミツド 1分子との化合物	メルク (シュミット)	末 { 25瓦 2.85 50瓦 4.90 1.0 { 10錠 1.55 25錠 3.10 50錠 4.75 時價	殺菌劑 外用
Perhydrol ペルヒドロール 30%過酸化水素水	全	{ 50瓦 2.80 200瓦 7.40	消毒劑 外用
Peristaltin "Ciba" ペリスタルチン [チバ] カスカラサグラダのグリコシ ード	チバ (バーゼル)	1.5cc. { 5管 3.60 20管 12.10 0.1 { 15錠 1.65 100錠 7.70	緩下劑 1回 1-2管皮注 筋注又は靜注 内服 1日 1-3錠
Peritonitis-Serum ● 抗腹膜炎血清 大腸菌及ウエルチ, フレンケ ル氏瓦斯浮腫菌抗毒血清	バイエル	20cc. 1管 8.50	汎發性腹膜炎, 腸 穿孔の治療及豫防 20cc.を靜脈に, 同 時に40cc.を筋肉内 に注射
Perlitan ペルラタン 結晶卵胞ホルモン(尿製) (0.1 mg=1000 M.E. マウス單 位) (Proginon, Uden 参照)	三共	1cc.=500單位 1cc. 5管 2.90 1cc.=1000單位 強 1cc. 5管 5.00 1錠=500單位 10錠 4.35 1滴=8單位 10cc. 3.80	卵胞ホルモン (月經過少, 發育不 全, 破瓜期障害) 注 0.5-1.0cc.筋注 錠 1日 1-2錠 液 1回30滴 1日 3 回内服
Perma ペルマ パラヂクロールペンツオール	塩野義	{ 30錠 0.50 200錠 3.00 1000錠 13.00	殺蟲劑 ナフタリン代用

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Pernin ペルニン Euforbiaceae の種子より得たる精油分	日新商行	液 { 12cc. 0.30 500cc. 5.0 軟膏 { 7瓦 0.2 15瓦 0.4 25瓦 0.5 500瓦 5.0	凍傷治療劑 患部塗布
Pernocton ㊟ ペルノクトン 第2ブチルBプロムアルリル バルピツール酸ナトリウムの10%溶液	リーデル (三共)	2.2cc. { 5管 4.35 10管 8.10 (0.2) 10錠 2.50	注射用催眠麻醉劑 無痛分娩に3-8 cc. 靜注 精神病患者には2- 6cc. 皮注又は筋 注 内服就床前1錠
Peromal ペロマール サリチル酸ベンチルエステル	中央新藥 (新良貴)	1cc. { 6管 1.20 12管 2.20 60管 10.00	神経痛ロイマチス 治療劑 1回1cc.筋注
Peronin ㊟ ペロニン 鹽酸モルヒネ, ベンチルエス テル	メルク	{ 1瓦 時價 25瓦	鎮咳鎮痛劑 1回0.002瓦
Perovetten ペロヴェツテン 固形過酸化水素1分子とカル バミッド1分子との結合體	メルク	0.5 { 50錠 2.35 100錠 3.65 500錠 12.80 時價	口腔及齒牙用 含嗽劑 1-2錠をコップ 半量の水に溶解
Pertussin ペルツシン チームス屬植物の有効成分を 含む舎利別	テシユ ネル (田邊五)	液 { 50瓦 0.60 100瓦 1.20 240瓦 2.50 500瓦 4.50	百日咳治療劑 1回1茶匙(5瓦) 1日數回
Peryth ペリス 止血, 殺菌性便滑劑	田邊元	軟膏 { 30瓦 0.60 100瓦 1.50 坐藥 { 5個 0.40 15個 1.00 50個 2.50 便滑錠 120錠 1.20	痔疾劑 軟膏 1日2-3回 患部へ貼付 坐藥 1日2-3回 肛門挿入 錠 1回3-4粒内 服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Perzon ㊟ ペルゾン 3% 中性過酸化水素液	第一製藥	{ 100瓦 時價 500瓦	殺菌消毒劑 外用
Petin ペチン 25%の過酸化マグネシウム含 有の内服過酸化水素製劑 (Ohma 参照)	田邊元	末 { 50瓦 1.00 250瓦 4.20 0.5 { 20錠 0.40 100錠 1.60	制酸, 解毒劑 毎食後 0.5-1.0 瓦水と共に(1-4 錠)
Petula ペツラ 流動ベツロレータム, アガ ール乳劑	全	液 { 100瓦 0.50 250瓦 1.00 500瓦 1.80	痔疾, 妊婦, 臥 床患者の便滑劑 1回15-25瓦内服
Phanodorm ㊟ ファノドルム チクロヘキセニル, エチルバ ルピツール酸 (強度はペロナールとルミナールの中間熟眠劑)	バイエル メルク (シュミット)	(0.2) 10錠 1.30	催眠鎮靜劑 1回0.15-0.2瓦 1-2錠 頑症には1回2錠
Phanodorm Calcium ㊟ ファノドルム, カルチウム チクロヘキセニルバルピツ ール酸カルチウム	全	末 { 10瓦 4.57 25瓦 10.84	催眠鎮靜劑 同
Phenolphthalein Agar フェノールフタレン寒天 3% フェノールフタレンを含 有する寒天製劑	三共	100瓦 品切	緩下劑 1回1瓦1日3回
Phenolsuphoptalein フェノール, スルフォフタレ イン溶液	全	(1cc中0.006) 1.3cc. 10管 1.25	腎臓機能診断用 1回1筒皮注, 靜 注
Phonowerin ホノウエリン 卵胞ホルモン (1cc. 及 1錠=1 R.E.)	中村 研究所 (岩城)	1cc. { 5管 1.00 10管 1.90 50管 9.00 0.1 { 50錠 2.90 100錠 5.70 500錠 27.00	女性ホルモン 能書参照

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Phoscalpin ホスカルピン 有機構成のカルシウム剤及其 磷酸、硅酸鹽及少量の可溶性ア ルカリ鹽より成る白色粉末	日興 薬品部 (岩城)	{ 500瓦 1.00 1肝 1.80 5肝 8.00	制酸, 強壯劑 1日 3瓦毎食後分 服
Phytin "Ciba" フィチン (チバ) イノシットヘキサ磷酸の酸性 マグネシウムカルシウム鹽 (C ₂ H ₆ O ₉ P ₂) ₂ CaMg 白色微酸味 粉末 鐵フィチン (Ferrophytin 参照)	チバ (バーゼル)	末 { 25瓦 3.80 50瓦 6.40 100瓦 10.50 0.25 { 20錠 1.25 40錠 2.35 100錠 5.15 粒状 100瓦 2.65	神經營養劑 (神經衰弱, 貧血 記憶力減退) 1日量 0.75-1.0 瓦 (3-4錠粒状10 粒) 毎食前分服
Picalsin ピカルシン カマフエトンとカルボル蟻酸 配合體	鳥居	1.2cc. { 6管 1.00 12管 1.80 60管 8.00	神經痛治療劑 1回 1cc. 局所筋注
Pilmin ピルミン Di-β-thio-α-aminopropionsa- cure とアミノ酸及毛髮を構成す る無機成分を含む	塩野義	{ 100錠 1.00 250錠 2.00 500錠 3.50	發毛劑 1日 3回 4-5 錠 宛毎食前
Pilocarpin Hydrochlor 三研 ¹ 鹽ピロ注射液 弱=0.2% 中=1% 強 2%	三菱薬品	弱 1.1cc. 5管 0.85 中 1.1cc. 5管 1.00 強 1.1cc. 5管 1.00	腎臟性浮腫 滲出性肋膜炎 癢痒疾患, 虹彩炎 弱 1cc. 中強 0.1 -1cc. 皮注
鹽酸ピロカルピン注射液	田邊五	2% 1cc. 5管 0.45	同上
Pineal Gland Dessicated 乾燥松果腺錠 幼牛の松果腺製劑	パーク デビス (三共)	0.0065 100錠 10.55	精神發育障礙 1日 3回 1回 1錠
Pineal Tablet パインール錠 松果腺製劑	ウイル ソン (マルホ)	100錠 15.00	小兒發育不全 低脳 1日 3回 1-4 錠 宛數ヶ月連用

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Pine Tar and Honey パインスターハネイ	(スター) ン社 堂 島	液 3オンス 1.20	鎮咳祛痰劑 1日 3回 1匙宛
Pino-inhalor ピノ吸入器 松葉エキス製劑	團 田邊元	1具 1.20 エツセンス 0.35	氣道消毒藥 吸入
Pinus Syrup ピナス, シロツブ (複方ピナス舎利潤) サポニン, グリコシード, テ ルペン含有のシロツブ製劑 販許一國給	マルホ	液 { 500瓦 2.00 1000瓦 3.60 2000瓦 6.00 3000瓦 8.50	肺 炎 氣管支カタル 鎮咳劑 1日 10瓦分3
Pirosulf "Banyu" ピロズルフ (萬有) ¹ 硫黃のオレーフ油溶液 (發熱療法劑)	萬有	1cc. 10管 0.80 2cc. 10管 1.10 5cc. 10管 1.70	脊 髓 癆 麻痺性癱呆症 腦神經微毒 1回 1-1.5cc. 筋 注, 漸時增量
Pisol "Comet" ピゾール (コメット) ¹ ビタミンB 製劑	コメット (黒田)	静注用 { 6管 2.00 3cc. { 50管 14.00 5cc. { 6管 2.50 50管 15.00 皮注用 { 6管 0.90 1cc. { 50管 6.00 3cc. { 6管 1.80 50管 11.00 5cc. { 6管 2.20 50管 14.00 内服用 { 50瓦 0.80 末 { 250瓦 2.50 500瓦 4.50 100瓦 0.80 液 { 500瓦 2.50 2500瓦 11.50	Vitamin-B 劑 静注 1回 3-6cc. 皮注 1-5cc. 液 1日 10-15瓦 末 1日 3-6 瓦
Pistin ピスチン 玉蜀黍雌蕊の有効成分を含む 暗褐色服用し易き液	三 共	液 { 250cc. 2.10 500cc. 3.80 1000cc. 7.00	急, 慢性腎臟疾患 利尿劑 1日 10-20cc.

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Pitosin ピトシン 脳下垂體後葉催分娩成分製劑	パーク デビス (三共)	1cc. 6管 9.55	分娩催進劑 分娩時子宮無力の場合 1回 0.3—1cc.筋注
Pitretusin ピトレツシン 脳下垂體後葉血圧上昇成分製劑	全	1cc. 6管 15.20	血圧上昇劑 尿崩症、又は手術後の血圧上昇の目的に 1回 0.3—1cc.筋注
Pituglasin ピツグラシン 脳下垂體後葉製劑 1号=1cc.中10國際單位(子宮收縮ホルモン) 2号=1cc.中10國際單位 外科用ピツグラシン=1cc.中20國際單位	藤澤	1号 { 2管 3.00 0.5cc. { 10管 9.50 30管 25.50 2号 { 2管 1.00 0.5cc. { 10管 3.30 30管 9.00 2号1cc. { 2管 2.00 10管 6.00 30管 16.00 外科用 { 2管 4.00 1cc. { 10管 12.00	陣痛催進劑 0.3—0.5cc.を皮注 3—5時間を隔て、更に0.3—0.5cc.皮注 外科用 0.5—1cc.皮注又は筋注 (手術に續發する尿閉、腸管麻痺等に)
Pituglandol ピツグランドール 脳下垂體後葉製劑	ロシユ (日本) (ロシユ)	1.1cc. 6管 4.80	陣痛促進劑 1回 0.25—2.0cc.筋注
Pituitary-body whole grand 乾燥脳下垂體全腺 脳下垂體全腺の乾燥粉末 (0.065瓦=新鮮腺實質約0.325瓦)	パーク デビス (三共)	28瓦 26.45	脂肪過多性生殖器萎縮治療劑 1回 0.065—0.26瓦
Pituitary Solution ピツイタリー液 脳下垂體後葉製劑 (1ccは脳下垂體後葉の0.2瓦に相當す)	ウイル ソン (マルホ)	1cc. 2管 2.50 0.5cc. 3管 1.50	陣痛催進劑 0.5—1.0cc.皮注
Pituitary Tablet 乾燥脳下垂體前葉錠 脳下垂體前葉を乾燥末となしたるもの	パーク デビス (三共)	0.1625 { 50錠 14.25 { 100錠 26.60	月經過多閉經期障害心身發育不全 1回 2錠より 1日 20錠まで増量

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Pituitrin 産科用ピツイトリン 脳下垂體後葉製劑	パーク デビス (三共)	0.5cc. 3管 3.50 1cc. 3管 4.80	陣痛催進劑 0.3—1cc.皮注
Pituitrin 外科用ピツイトリン 産科用に比較し 2倍強度	全	1.0cc. 3管 8.40	手術後に續發する尿閉並びに腸管麻痺治療劑 0.5—1.0cc.皮注
ピチロール製劑			
Pityrol ピチロール 松浦博士の特許恒温乾溜装置によりて米糠を乾溜して得たる黒褐色、特異の臭氣を有するタール。肉芽催生、消炎、止痒作用を有す	日本新藥	原液 { 25瓦 0.35 250瓦 1.70 500瓦 3.10 原料用 { 5貯 時價 10貯	皮膚藥 (特に濕疹、膿胞疹、頑癬、結核性潰瘍、其他難治の皮膚疾患) 原液又は 5—10%パスタ或はチンキとして塗布
Pityrol-Paste 特製ピチロールパスタ (略稱—ピチパス) コロイド亜鉛華、微粒澱粉、特製ワセリン、ラノリン基劑にピチロール10%を配す	全	化粧罐 15瓦 0.20 チューブ { 250瓦 0.40 100瓦 0.60 500瓦 2.00 2500瓦 7.50	皮膚藥 (殊に濕疹) 1日 1—2回塗布
Neo-Pityrol ネオピチロール ピチロールを硫酸化し無臭、水溶性となしたるもの	全	ネオ { 25瓦 0.40 100瓦 1.05 500瓦 4.20	ピチロールと同じ 原液又は10%軟膏
Fityrol Mannoko ピチロール萬能膏 10%のピチロールを含有する古方練膏藥、水中にて剥離せず	全	硬膏 { 25瓦 0.35 500瓦 2.50	ヒビ、アカギレ 1日 1—2回紙に展べて貼付
Pityrol Ointment ピチロール軟膏 單軟膏を基劑とせる10%ピチロール軟膏	全	罐 500瓦 2.00	腫瘍治療劑 1日 1—2回塗布

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Plasma プラズマ 天然コロイド性白土より得たる膠様體を基調とせる巴布劑	櫻木 (後藤 風雲堂)	100瓦 0.50 250瓦 1.00 500瓦 1.80 2000瓦 5.50 5000瓦 11.50	巴布劑 (感冒, 肺炎 ロイマチス 神經痛) 1日 1-2 回展布
Plasmochin プラスモヒン ヂエチルアミノヒノリン化合物 體 (キニーネに非ざる化學的合成品. 殺原蟲作用はキニーネの60倍)	バイエル	1cc. 10管 4.00 (0.02) 25錠 4.00 (0.01) 500錠 60.00 複方錠 (0.01) 30錠 3.19	マラリヤ特效劑 體重10瓦に對し 1 日 0.01 瓦
Platykodin プラチコジン 桔梗根流動エキス	藤澤	液 { 100瓦 0.70 500瓦 2.80	鎮咳祛痰劑 1日 2瓦
Pleunin プロイニン サリチル酸カルチウムカフェイン, ヨードキニーネ製劑	日新醫學	20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	肋, 腹膜炎, 肺炎 治療劑 毎日 1回20cc. 靜注
P-Marukotin ● ペーマルコチン (略稱ペーマル) ヂヒドロオキシコデイノン鹽酸鹽及ウレタン製劑	マルコ 製藥	末 { 1瓦 5.80 5瓦 28.00 10瓦 54.00 (0.01) 20錠 1.30 (0.005) 20錠 0.80 1cc. { 10管 1.70 50管 7.50 100管 14.00	鎮痛鎮咳劑 1回 0.0025-0.01 瓦内服 1回 1cc. 皮注
ペーマルコチン, スコポラミン (略稱ペースコ) ● 強 { ペーマルコチン 0.02 スコポラミン 0.0005 弱 { ペーマルコチン 0.02 スコポラミン 0.00025	全	強 1cc. { 10管 2.00 50管 9.00 弱 1cc. { 10管 1.70 50管 8.00	鎮痛麻醉劑 1回強 1cc. 皮注 弱は虛弱, 酒客, 老 幼者に用ふ
ペーマルコチン, アトロピン (略稱ペーアト) ● { ペーマルコチン 0.01瓦 硫酸アトロピン 0.0003瓦	全	20錠 1.40 1cc. { 10管 1.70 50管 7.50	鎮痛鎮痙劑 1回 0.5-1cc. 皮 注 (1/2-1錠)

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Pneumin ● プノイミン メチレンクレオソート	スバイ エル (三共)	末 { 25瓦 1.25 50瓦 2.35 100瓦 4.25 500瓦 17.00 (0.25) 100錠 1.40	結核治療劑 1回 0.25-0.5 瓦
Pneumin Calcium プノイミンカルチウム メチレンクレオソートカルチウム	全	末 { 25瓦 1.70 50瓦 3.10 100瓦 5.80 225瓦 11.80 450瓦 23.80	肺結核 治療内用劑 1日 0.5-1.5 瓦
Pneumococcen-Vaccin ● プノ井モチン 肺炎球菌ワクチン	大阪細菌	7cc. 1.00	肺炎治療劑
Pneunon ● プノイノン 鹽酸キニーネ及びアンチピリンを含有する濃厚粘稠性液 (1.0cc中鹽酸キニーネ 0.25 瓦含有)	三共	2cc. { 5管 1.25 10管 2.35 50管 9.50	クループ性 肺炎治療劑 1回 2cc. 筋注
Poical ● ポイカール 砒素, ストリキニーネ, レチチン製劑	鳥居	末 { 25瓦 2.40 100瓦 8.50 100錠 2.50 500錠 11.00	變質強壯劑 1日 3瓦 (15錠) 毎食後分服
Poil ● ポアール 醋酒石酸アルミニウム撒布劑	塩野義	末 { 50瓦 0.30 100瓦 0.50 250瓦 1.00 500瓦 1.80	濕疹撒布劑 撒布用
Polinal ポリナール キニーネ, サリチル酸結合體	ボーリ ンゲル (三共)	0.25 { 10錠 1.60 25錠 3.60	解熱劑 1日 3-5 回 1- 2錠宛
Polyhefe ポリヘーフエ 麥酒酵母より調製せる活性酵母	日新醫學	末 { 25瓦 0.50 100瓦 1.50 250瓦 3.00 500瓦 5.00	食慾増進營養劑 1日 1-3 瓦食前 又は食後分服