



情迹疑  
難臨時  
審察

勒殺類自縊溺死類投水奴婢捶撻  
在主家自盡俱詳前毆假作自縊  
及溺水辨生前死後各條  
刑律鬪毆例云一原毆並非致命之  
處又非極重之傷越五日因風身死  
者免抵擬以杖流若死在五日以內  
仍絞候如當致命之處傷輕或傷重  
非致命之處因風死在十日以外方  
準改流其致命傷重及雖非致命傷  
至骨損骨斷即因風死在十日以外  
仍擬絞抵若正限外餘限內因風身  
死照毆至廢疾律杖徒至餘限外因

洗冤錄詳義卷三

海甯許榘編校

疑難雜說

凡檢屍差之毫釐失之千里切勿輕  
視常有勒殺類乎自縊溺死類乎投  
水鬪毆有在限內致命而實因患病  
身死。奴婢因被捶撻。在主家自害自  
縊之類。情迹不同。並為疑難。務須臨  
時審察。

刃傷

風身死止科傷罪其因患病身死與本傷無涉者仍依律從本毆傷法

殺傷篇云被快物傷死者看原著衣衫有無破損處隱對痕血點可驗

集韻攛取亂切音爨擲也

酒醉及失脚自傷

凡檢驗疑難屍首如刃物所傷透過者須看內外瘡口大處為行刃處小處為透過處如屍首已爛須看其原衣服比傷著去處屍或覆卧其右手有短刃物及竹頭之類自喉至臍下者或是酒醉攛倒自壓自傷如貼近有登高處或泥中須看身上有無他故錢物有無損動處恐因取物失脚自傷之類

腐爛無迹可憑驗顛門骨

正骨心法云顛頂骨一名天靈蓋位居至高內函腦髓以統全體是天靈蓋即頂心骨非顛門也  
安徽省奏手指掐傷咽喉死者生前氣喉處所被掐指痕尚未實靠喉骨皮肉消化之後其骨色作何檢驗刑部議覆氣喉被掐正與疑難說案絕呼吸氣血上湧之條相符只檢顛門一骨便明等因乾隆三十五年成案

命門骨手擊立斃

將人致死或經久屍肉腐爛無跡可憑者但檢驗顛門一骨諺稱天靈蓋必浮出腦殼骨縫之外少許其骨色淡紅或微青皆因音絕呼吸氣血上湧所致只撥驗此骨便明

凡命門骨最屬虛怯以手擊之即可立斃因命門骨左右兩穴有紅筋若細絲通於兩內腎拍斷即死外無痕跡若有告稱拍著命門處身死只檢

命門骨即骨格內所載腰眼骨之第一節也自尾蛆骨倒數第八髓此作第七髓誤詳見骨格內腰眼骨條上層

屍無痕損宜詳

洗冤錄表云此是不知有無爭鬪而屍無痕損者是一疑難

元槩本洗冤集錄及平冤錄捫並作搗案搗俗擣字  
捫捫殺面色必紅若檢骨其面上眉稜等骨及兩腳後跟骨俱紅氣不得出塞於胸間故肉硬

驗命門骨紫赤者即是其命門骨自尾蛆骨倒數上第七髓兩旁各有一小穴者是  
凡屍身無痕損惟面色有青黯或一邊似腫多是被人以物搭口鼻及罨捫殺或是用手巾布袋之類絞殺故不見痕須看項上肉硬此最為切要處手足有無繫縛痕舌上或有嚼破痕大小便二處或有踏腫痕若無此

鬪毆分散失跌落水淹死

方書云纏喉風喉腫而大喉內有紅絲纏緊或兩頤及項赤色纏遶口多涎沫手指甲青頃刻即死  
患各本譌有據元槩本改  
此專指鬪毆之後言之須看明分散二字若當場因打而失跌落水難以並論矣

淹各本譌渰據舊鈔本改說文渰雲雨貌與淹之訓沒義異

類方看口內有無涎唾喉間腫與不腫如有涎及腫恐患纏喉風死或是酒醉卒死宜詳  
有鬪毆之後各自分散或近江河池塘洗頭面血或取水喫但因相打力乏或因醉相打後頭暈音運失跌落水淹死初落水時尙活其屍腹肚膨脹十指甲內有沙泥兩手向前此是落水淹死相驗分明雖有毆擊痕損去

辜限數語可與律例參用

生前奔跑忿激氣血湧逆身死者面色黃瘦口鼻有血見成案

相打分散乘高失腳身死

爭鬪致死屍無

此明知爭鬪而屍無痕損極宜詳細推鞠方無枉縱

處一一填入驗狀定作毆後落水致命緣打傷雖在要害處尙有辜限及限外以他故死者各依本毆傷法此既落水身死則雖有傷痕其實以他故死○更有相打分散後乘高撲下而死者但須驗失腳處高下撲損痕癍致命要害處仍根究眼見相打分散之證佐人恐為相打者所擠故須詳究凡因爭鬪致死而屍上並無痕損此

痕損

成案質疑駱好學姪女被曹氏迷拐將曹氏捉獲先以拳掌打其腮脰繼以樹枝打其左腿均係輕傷曹氏忽稱腹痛倒地旋即殞命驗得上下牙齒各指甲俱青色屍子供伊母夙患陰寒病證不時舉發其為臨毆適值病發自斃無疑擬杖完結宋本或字下有一個或兩個五字今脫去非是洗冤辨正云一個縮上亦可致死如何可去此五字

年老虛弱爭鬪氣絕

此與上條均以腎子縮上為憑洗冤彙編云凡年老人以手擣之而氣亦絕是無痕也

或是被傷人舊有宿患氣疾或是未毆以前先會飲酒至醉及爭鬪時有所觸礙以致氣絕而死也如此者腎子或縮上不見須用溫醋湯蘸音贊衣服或懸絮之類罨一飯時令作作以手按小腹下其腎子自下即其驗也然後子細看要害致命處

有年老虛弱之人與人爭鬪登時氣絕沿身無傷更驗腎囊兩子多是一

各本腹下諱作肚腹據舊鈔本改觀前條亦有此語可以互証

驗無傷損又無病狀

檢婦人無傷損處須看陰門恐自此入刃於腹內離皮淺則臍上下微有血沁深則無如男子須看頂心糞門恐有平頭釘硬物刺入  
火燒釘子插入骨內其血不出亦不見形迹

被殘害死

要錄凡被人用秤桿通入糞門死者兩眼胞瞋起兩手腳拳縮大腸拖出四五寸

被打後服毒自

被打服毒誣以自服毒藥須參看後服毒篇死後用繩吊起死後推在水

身死

中須參看被毆勒假作自縊及溺水辨生前死後篇

洗冤集編載甲乙同行乙有隨身衣服而甲欲謀之行至谿河甲執乙就水而死驗得乙屍瘦怯胸前赤色肚腹脹口唇青十指甲黑黯色指甲縫鼻孔各有泥沙此乃乙劣而甲利其衣服執於水而致死也一鞫即伏  
洗冤集說云有兇徒謀死小童推入水中發覺距行兇日已遠官司打撈得之皮肉潰盡僅存骸骨不可辨驗  
囚雖招服未免疑其假合後因閱卷見血屬所供其弟原是龜胸復檢果然方敢定刑

箇縮上須用手按小腹下則腎子自下。

驗屍諸處並無傷損又無病狀難為定驗者恐是被人將刃物釘入顙門或腦中致命先須令屍親干證人等立狀訖然後剃除死人髮髻驗之

如被殘害死者須檢齒舌耳鼻內或手足指甲中有簽刺之類

凡檢驗屍首指定作被打後服毒身

死及被打後自縊身死被打後投水身死之類須要見得親切若是打死人後以藥灌入口中誣以自服毒藥或死後用繩吊起假作生前自縊或死後推在水中假作自投水者一有差誤關係不小必須子細點檢死人在身痕傷如果不是要害致命去處其自縊投水及自服毒皆有確據實跡方可明白開報

見證無人屍無下落  
密訪是極難事或平日喜恃此策則訟師地棍必遣人妄布流言變亂黑白不可不慎說詳卷一檢驗總論內廣為訪察條上層

疑難檢  
驗毋使  
件作舞  
弊  
近時案關人命重情如遇財勢之家一經地保帶同屍親稟報不必俟官吏臨場而刑件人等早被勾通打點此事全在司牧者胸有把握不至被其欺朦方能無枉無縱否則不論案之大小難易未有不墮其術中者余作吏二十餘年目中所見因此被黜者不知若干人矣

若昏夜被殺見證無人及屍無下落者只宜案候密訪不可妄意猜疑鍛鍊成獄  
凡疑難檢驗及兩爭之家稍有勢力須選慣熟件作人謹慎守分者隨帶同行毋使暫離左右飲食水火令人監之少休以待其來不如是則恐其作私舞弊變動事情枉屈人命不可不慎

驗病死  
人先問  
因由

屍傷雜說

凡驗病死之人須先問本人來自何處幾時到來有無熟人識認原患是何疾病年歲若干病幾日身死若是奴婢則先討契書看問有無親戚會請是何醫人喫甚藥問明因由然後對眾證定如別無他故只取驗狀聲明遍身黃色骨瘦委是生前因患是何疾致死仍取醫人驗狀一紙如果

洗冤集錄云死屍肥壯無痕損不黃瘦不得作患病死  
凡屍有青色者雖係病死應將銀釵探試是否服毒注明屍格以杜日後刁告

病死形狀

凡勞病死者形體瘦弱遍身皮肉黃白色氣膨食膨死者肚腹不堅硬按之則凹放手即高血膨死者當氣絕時即有黃水流流出腿脚胖脹

眾證因病身死分明既不是非理致死不須請復驗

求乞病死

宋本蓋作著洗冤錄辨正上既云口合則不當復言唇不蓋齒言不著者

凡因病死者形體羸瘦肉色痿黃口眼多合腹肚低陷兩眼通黃兩拳微握髮髻解脫身上或有新舊針灸癍痕餘無他故是因病死  
凡患病求乞在路死者形體瘦弱肉色痿黃口眼合兩手微握口齒焦黃唇不蓋齒

病死發變

不過浮而相離之意

卷一驗屍篇有驗發變屍二條須參看

或疾病死值春夏秋初經隔兩三日肚上臍下兩脅肋骨縫有微青色此是病人死後經日變動腹內穢污發作攻注皮膚致有此色不是生前有他故

邪魔中風卒死

此與下邪祟卒死相同但分別內因外因邪魔者內因也心神昏亂似顛非顛或目閉口呆不省人事由於氣血衰耗元神不守所致非真有鬼邪附著也邪祟者外因也若十疰五尸中惡客忤之類由於感觸邪惡逆忤臟氣所致是實有鬼邪為患也二者非不可救但恐內外誤治耳

邪魔中風卒死屍多肥肉色微黃口眼合頭髻緊口內有涎沫遍身無他故  
卒死肌肉不陷口鼻內有涎沫面色

涎壅卒死

先寇錄詳後

卷三

屍傷雜說

七



卒中死

卒死者猝然僵仆死也其症有中陰中陽之別中於陰者面色青黑痰喘昏亂中於陽者面色紫赤上視強直此即真中風也  
肝風乘胃則口齒閉牙關緊急以皂莢乳香黃芪防風煎湯熏之然須大作湯液如蒸如霧乃得力風中經絡則口眼喎斜手足拳曲以桂枝三兩酒煎濃汁用舊布蘸搭數次患左搭右患右搭左尚可救十中一二  
此屬內虛暗風與外來風邪迥別肥人患此者多方書云中五藏之絡者口眼俱閉人肥必氣急而肺盛肺金尅肝木故痰盛涎流  
此當與前邪魔卒死條參看

中暗風

死邪崇卒

暗風如發驚搐

虛風內煽必發驚搐中血脈則口眼喎斜中腑則手足枯細如此死者鼻

死

梁十指甲俱青

傷寒死

張仲景傷寒論云陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必赤

冒時氣

傷寒症血氣壅逆死後身色紫赤元槩本眼閉作眼開舊鈔本同應據改時行病因天之風雨不時地之溼熱蒸鬱齒豁之氣蔓延人觸之而病則為溼溫傳染即為疫癘

斑疹死

斑疹死者兩眼合十指甲青黑色兩曲脉有青筋紫紅瘰

中暑死

中暑與傷暑異傷暑者或坐卧陰涼為寒所襲肢體拘急嘔吐霍亂此由

紫赤蓋其人未死時涎壅於上氣不宣通故如此

卒中死眼開睛白口齒閉牙關緊閒有口眼喎斜並口兩角鼻內涎沫流出手脚拳曲

中暗風屍必肥肉多混白色口眼皆閉涎唾流溢卒死於邪崇其屍不在

於肥瘦兩手皆握手足爪甲多青或暗風如發驚搐死者口眼多喎斜手

足必拳縮臂腿手足細小涎沫亦流出

傷寒死遍身紫赤色口眼開有紫汗

流出唇亦微綻手不握拳

冒時氣死者眼閉口開遍身黃色畧

有薄皮起手足俱伸

斑疹死皮肉上只有星點紅斑痕而

不甚浮腫

中暑死多在五六月眼合舌與糞

靜而得者也中暑者或遠行勞役大熱而渴陽氣內伏卒然昏暈此由動而得者也二者不可不辨

凍死

山東省萊陽縣民王四毆推賈發才落水受凍身死查王文進推跌賈發才擦傷頭顱額角雖係致命之處原驗僅去浮皮傷甚輕淺不至於死賈發才爬起尚能叫罵後被王四推落水灣爬起蹲立寒顫經王四扶回用火烤救旋即氣微殞命原驗屍身面帶芙蓉色口有涎沫兩手緊抱胸前其為落水受凍身死無疑將王四擬抵乾隆四十三年成案案禁即噤字緊禁者即緊閉也

門俱不出。面黃白色。亦有鼻孔及糞門有血出者。

凍死者。面色痿黃。口內有涎沫。牙齒

硬身直。兩手緊抱胸前。一說項縮脚拳檢時

用酒醋洗。少得熱氣。則兩腮紅。面如

芙蓉色。口有涎沫出。其涎不黏。

餓死者。渾身黑瘦硬直。眼閉口開。牙

關緊禁。臍肚低塌。手足俱伸。

驚死者。目瞪口開。兩手舒展。猶若怕

驚死

餓死

酒食醉飽死

醉飽悶脹未死尚可救治當問其所傷何物即用其物為灰好酒灌下急覓消導之藥以導之如麪食積則以麪食燒灰多加炒焦麥芽飯食積則以飯食燒灰多加炒神麪肉食積則以肉食燒灰多加炒山查如係米麪肉食積而更雜以油膩則以米麪肉食共為灰加以炒麥芽神麪山查好酒調灌外以生大黃末雜芒硝酒調敷其前後心及臍上再用艾灸三四壯得汗即愈元槩本如或作如因影宋本飲酒作服毒此段注語本係服毒篇正文列在服砒霜野葛之後意謂毒因吐瀉而輕其狀似與服毒相反故申明其說不知何以移作此注殊誤

怖之狀。

凡驗酒食醉飽致死者。先令作作用

醋湯洗。檢在身如無痕損。以手拍死

人。肚皮膨脹而響者。即是因食飽腹

脹。酒醉心肺致死。仍取屍親供狀。死

人生前常喫酒多少致醉。及現今喫

酒多少數目。以驗致死因由。如或吐瀉瘦弱

皮膚微黑。不破裂。口內無血。面唇指

甲不青。糞門不腫。突乃是飲酒相反

燒酒醉死

燒酒醉死用鍋蓋上氣水灌下半碗即活或以井底泥塗其胸浸髮冷水

燒酒醉死者牙齒動搖欲落屍軟弱不硬口鼻間有血水流出○燒酒不

飲之則能殺人其人之面多青黯

昔有人燒酒醉後復引烟而死者又有人醉燒酒身頗畏寒以綿被厚蓋之而死又有人醉燒酒索飲冷水數碗而死或曰冷水徐飲可以漸引火毒外達若連飲過多熱毒為冷所遏無由透達故閉厥不救

凡酒食醉飽後被築踏內損死者其

醉飽後築踏內

貴州省饒連科先被張林才等毆傷小腹等處後被胡萬林嚇踢適傷饒

損死

連科臍肚下坐跌在地胡萬林順勢推倒仆壓身上稱欲捆縛詎饒連科醉飽被踢坐跌震動臟腑內損吐血用藥醫治各傷將次平復惟臍肚下之傷色仍紫赤且吐血不止延至三十七日身死其為內損致死無疑嘉慶二十一年成案

鍼灸死

此條語氣未了宋本致死因由下有雖無意致殺亦須說顯是鍼灸殺亦可科醫不應為罪二十一字刪去非是

因其死之靜與躁以決其用鍼之誤此非質之醫家難為誤用之證故上節云須另句醫人靈樞素問載鍼灸刺中心一日死其

狀甚難明若屍別無他故惟口鼻糞門有飲食并糞帶血流出驗此等屍須子細體究曾與人交爭因而築踏見證分明方可定狀一說其屍偏身兼有血出兩手握肚腹脹

鍼灸死者須另句醫人驗鍼灸處是否穴道有無錯誤致死因由

五臟之氣已絕於內而用鍼者反實其外是謂重竭重竭必死其死也靜

動為噫刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日死其動為語刺中脾十日死其動為吞刺中腎六日死其動為噓刺中膽一日半死其動為嘔刺中膈刺中大脈血出不止死刺頭中腦戶入腦立死刺腎中太陰脈出血多立死

男子作過太多脫死

相傳婦人脫死面作笑容玉門不閉有粉紅精外溢柳子厚河閒婦人傳所云髓竭而死是也

臟氣已絕於內陰虛也反實其外誤益陽也益陽則愈損其陰是重竭也陰竭必死死則靜也

五臟之氣已絕於外。而用鍼者反實其內。是謂逆厥。逆厥必死。其死也躁。

臟氣已絕於外陽虛也反實其內誤補陰也助陰則陽氣愈竭故至四逆而厥逆厥必死死必躁也

凡男子作過太多精氣耗盡脫死於婦人身上者真偽不可不察真則陽不衰偽者則痿

昔有人暈一婢而脫者斂時啟所蓋被異香四發此因服房藥多麝臍通透之品故也夢中脫死者男則陽不衰女則陰必洩屍俱有笑容

陰陽症死

陰症死

受杖死

陰陽症即張仲景傷寒論所稱陰陽易易者即交易之義男病而女與交接相染名陽易女病而男與交接相染名陰易男相染則陰腫入腹絞痛女相染則裏急腰膝連腹內痛此因淫情不禁陰邪得以投其隙移禍於不病之人頓令一身之精氣形神皆受慾火之害犯此症死者兩手足指甲青黯或青紫甚則頭面及遍身皆紫黯緣其血敗精脫故也

凡受杖而死者須驗所受杖處瘡痕

男女因陰陽症死者脣及指甲多青黯甚或遍身皆紫乃氣絕血凝之故

陰症死者屍青黑黯似毒死形而色

微淡口眼合兩手握陽縮小餘精流出

凡受杖而死者須驗所受杖處瘡痕

杖後因他故死

古以荆杖決打小杖曰笞大杖曰杖  
 笞罪自一十至五十為五等杖罪自  
 六十至一百為五等今以竹板代之  
 每一十折責四板除零核算小竹板  
 大頭闊一寸五分小頭闊一寸大竹  
 板大頭闊二寸小頭闊一寸五分  
 竹板新者質重而棱角尚存責臀上  
 有如石壓舊者質輕而鋒芒都去責  
 雖重而迎臀即起卑役受賄舞弊或  
 打用縮頭則傷聚一處血瘀成瘡或  
 專打腿灣筋傷骨痿或將腎子挺起  
 打下則氣閉頭悶  
 受杖之人忌卧草席及竹席並熱炕  
 不獨潰爛難痊且恐引毒入心或至

闊狹看外腎并陰囊婦人并兩脅肋  
 腰小腹等處有無血瘡痕  
 小杖痕左邊橫長三寸闊二寸五分  
 右邊橫長三寸五分闊三寸各深三  
 分  
 大杖痕左右各方圓三寸至三寸五  
 分各深三分各有膿水兼瘡周圍亦  
 有膿水淹浸皮肉潰爛去處  
 杖後有因他故死者若兩腿面及小

受杖因風身死

不救

各項刑傷俱有生風變症不可不慎

腹有微紅色勿以曾經受杖便作血  
 瘡傷痕蓋受杖時按捺在地或被硬  
 物硃傷死後自然發現臨時務須分  
 別  
 兩臀上各有破傷斜長幾寸闊幾分  
 深至骨上有血痂委是受杖決因風  
 透患致命身死

臨高跌死

驗明失腳蹤跡及致跌因由并查抵  
 癮物件此乃受傷確證仍將抵癮之  
 物比對傷痕可攜取者帶回貯庫不  
 能攜取者同眾封記

凡從樹及屋臨高跌死者看枝柯挂  
 絆所在并屋高低失腳處蹤跡或土

自跌推  
跌有別

自跌止傷半邊推跌先傷頭面洵屬  
不謬若云自跌多在腿足臂膊而竟  
不及頭面推跌多在頭面手腕而竟  
不及腿足未必盡然惟輕重有不同  
耳全在臨時詳察  
在上在下不可執定蓋被推而跌者  
未必不自護其首失足者亦未必不  
因他物磕撞猝不及護致傷頭面且  
從高而下或先上身倒落則頭面安  
得不傷

痕高下。及要害處。須有抵癢。或物磕  
擦痕癢。若內損致命者。口眼耳鼻內。  
定有血出。若傷重分明。更當細驗之。  
仍量撲落處高低丈尺。

跌者。從高而下。或失足。或自絆。其力  
在下。則所傷多在腿足及臂膊。然其  
或左或右。又皆止傷半邊。如係人推  
而跌者。則其力在上。所傷多在頭面  
及兩手腕。蓋推之力大。而人之一身

塌壓死

江西省義甯州民段邦發從高自行  
失跌身死。驗得該屍致命頂心偏左  
額角均有磕傷。有血癢。委係失足跌  
傷身死。嘉慶八年成案。據此則錄中  
所載從高失跌所傷多在腿足及臂  
膊數語。未便拘泥也。

塌壓致死必有塌壓物件更須詳查  
塌壓因由以防仇人謀害

各本瘀誤作淤據舊鈔本改說文瘀  
積血也淤澱滓濁泥也此稱血瘀互  
作瘀為是

其最重莫如首推而下之。勢必自顧。  
或兩手先至地。或出於不知。則頭面  
必先倒垂而下。雖亦未必全傷。而所  
傷與自跌者不同。

凡被塌壓死者。兩眼突出。舌亦出。兩  
手微握。遍身死血瘀。紫黯色。或鼻有  
血。或清水出。傷處有血癢。赤腫。皮破  
處四畔赤腫。或骨并筋皮斷折。壓著  
要害致命。如不壓著要害不致死。或

舍屋及  
墻倒石  
落壓死

樹木壓  
死

共擡一  
物力小  
壓傷

長闊分寸必與所壓之物比對相符  
方無遺患

死後壓。即無此狀。

凡舍屋及墻倒。或石頭脫落。壓死者。

其屍沿身虛怯要害處。若有痕損。須

聲明長闊分寸。作堅硬物壓痕。仍看

骨損與不損。若樹木壓死。要看所倒

樹木。斜傷著痕損分寸。死後壓者。亦

無此狀。

兩人共擡一物。一人力大。驟為擡起。

一人力小。被壓。則所壓之肩窩及相

若因傷致死。腰間必有瘀血痕。蓋擡  
物全用腰力受傷。必致血瘀

他物壓  
塞口鼻  
死

衣服溼  
紙搭口

各本他誤作外據舊鈔本改

口鼻流血及便溺污。可以洗滌掩飾。  
惟眼開睛突。滿面血瘡。糞門突出。諸  
形狀斷難掩飾。樊混

凡用衣服悶壓死者。猶有血瘡痕跡。  
可驗。如用溼紙搭口鼻死者。面上並

對之手足。必俱有傷。如誤觸而壓傷  
者。當辨其前後左右。如被壓於後。則  
前有跌磕微傷。被壓於前。則後有跌  
磕微傷。左右亦然。

凡他物壓塞口鼻。出氣不得。以致身

死者。眼開睛突。口鼻內流出清血水。

滿面血瘡。赤黑色。糞門突出。及便溺

污衣服等件。

凡被人衣服或溼紙搭口鼻死。則腹

鼻死

他物壓塞死

無痕跡最為難辨須看手足心胸有無捉拏束縛傷痕細心查驗並詳訊犯證要在落膝初供庶可得情稍一疎忽便成疑獄  
凡以石灰袋悶死者頂骨必裂碎以溼紙或他物悶死者頂骨必紅色此節補上二條所未及須合參

腦後腳踝腳跟必有挺撞傷痕

檀褥捲束倒立死

乾脹。被他物壓塞而死者其兩手外膊不拘上下兩足後骨並心胸之前俱各有微傷方是蓋悶至睛突壓之必重身雖不能展動未有并手足壓定不能稍動者如或并縛其手足則亦當驗手足有無束縛傷痕。或有將人飲醉厚其檀褥挾令橫卧俟其睡熟然後將檀褥捲而束之倒

倒入石桶灰水死

若止酒氣熏蒸安知非實係醉死故又引讀律佩鱗以申明之則與醉飽死而脹在肚皮者不同矣

立片時即死者並無口眼血出諸跡。即或微有淨洗即無而酒氣倍為熏蒸。一說大腹小腹皆平弱而無脹形。又案讀律佩鱗云凡脹在兩肋及心胸之前按之堅實擊之無聲者即是若檢骨則傷在頂心及兩足心骨

有以高桶二隻疊而合之約如人身之高下以下桶貯水令滿入石灰數升攪渾將人倒入水中再以所合之桶蓋上片時即死名曰游湖其人死



既將人倒入水桶則死者手足應有掙扎傷痕可驗否則有束縛痕

此等致死必有同謀多人但須供證確鑿起繳灰桶方可請檢否則一無可疑之端豈得冒昧檢骨乎

硬物癩  
店死

店平冤錄作菴云或作塾廣韻菴徒念切支也據此店為菴字之譌無疑

後用水洗淨毫無傷跡面色微黃而白一如病死雖云有血倒出然見灰氣即回而血之應凝滯於面者得灰盡解此若非檢骨則不得其實檢骨之法必在腦殼之內蓋灰滓從口鼻而入口鼻雖可淨洗而從鼻灌者直入於腦灰最沈滯腦內必多灰滓以此為驗自無所遁  
凡被硬物癩店音閃死者助後有癩店

馬踏死

字書店音苦瘧疾也與義未合

筋當從平冤錄作助為是案上文既云助後則此處係承上文而言應是助字無疑且助骨方是虛怯要害致命處設泛言筋骨便難直指矣

著紫赤腫方圓三寸四寸許皮不破用手揣捏著筋骨傷損此為虛怯要害致命處

驢足牛  
角傷

凡被馬踏死者屍色微黃兩手散頭髮不慢口鼻中多有血出痕黑色被踏要害處便死骨折腸臟出若只觸倒或踏不著要害處即有皮破癩赤黑痕不致死○驢足痕小牛角觸著處多在心頭胸前或在小腹脅肋若

人馬驢  
驢牛踏傷

青細漫筆云有人被馬踹踏受傷甚重或傳一方用鼠糞五十枚故馬鞘一尺燒存性同研細末豬脂調敷數次愈

毛世洪便易經驗集馬齧傷潰爛以馬齒莧一握煎湯日服以愈為度傷口以籠頭繩索燒灰糝之即愈洗冤錄備攷馬踹踏傷心腹兩肋小腹間長寬三四寸不等月牙樣半邊青紫半邊紅色一蹶可踏肋三條中一條損折有芒刺

驢騾不甚跳動故凝聚成形

皮不破。傷亦赤腫。牛角傷痕小而深者方是  
人馬驢騾踏傷者。有緩急叢亂之分。總以傷之多寡輕重為辨。馬馳力大。所傷處少。傷必骨折。或腸臟出。擁擠仆地而踏傷必多。但不似馳騾者之力重而折甚。人踏傷成片而長。一頭重。一頭輕。叢踏不起者。則輕重長短不一。驢騾踏傷。不獨較小於馬。其傷之暈。凝聚成形。牛觸係不知而驟撻

車輪搗死

集韻搗子末切。逼也。各本从木作搗。誤據舊本正。

幾希錄方驢馬踏傷骨碎用生半夏二錢生黃柏二錢研末敷之再用鮮蟹殼新瓦上燒存性研末黃酒調服一醉其骨自合或用活蟹小者二三隻大者一隻搗爛熱酒沖服亦驗

者。傷多在前兩肋之半。小腹及心胸。若牛伏而奔。方避之而不及。則受傷多在脊背及肋之左右。凡被車輪搗死者。其屍肉色微黃。口眼開。兩手微握。頭髻緊。速死者屍狀如此經數日死者異是。凡車輪頭搗著處。多在心頭胸前。并兩脅肋要害處便死。不是要害不致死。

車有橫輦直輦分別

橫輦及面迎二者半由自取追給埋葬銀兩可也從背輦者辨其係曠野及避空車可稍止以讓人重則人自應避之即酌輕重以定追埋杖懲之衡

車有橫輦直輦之分。橫輦者十字路口人從橫過。車行急驟不及挽回。其人跌仆被輦而死。則或項或首或心胸背脊肋腹或手膊腿足各有經過傷。如係對面迎輦者其傷或手足或脅肋。卻皆或左或右。俱在半邊。直而經過其傷必長。卻多在仰面。若人前行。車從後至。傷亦如之。但屬在背居多。

雷震死

江西省零都縣監生賴鼎被雷擊傷身死。驗得左額角擊傷一處。皮破緊硬。焦黑色。兩眼胞微開口。開手散肚腹。火燒篆文一道。焦黃色。髮散如燄。火燒焦腎囊。微脹。穀道出血。周身黃黑色。乾隆四十一年成案。

凡被雷震死者。其屍肉色焦黃。渾身軟黑。兩手拳散。口開。眼皺。音脫皮剝也耳後髮際焦黃。頭髮披散。燒著處皮肉緊硬而攣縮。身上衣服燒爛或不燒。傷損痕跡多在腦上及腦後。腦縫多開。鬢髮如燄火燒焦。從上至下。時有手掌大片浮皮紫赤。肉不損。胸項背膊上。或有似篆文痕跡。○雷有震擊二項。震者被驚而死。無傷。擊則有傷。

雷有震擊分別

雷擊死者其形一如前條所載。惟震死者面色深黃。帶黑黯而已。

虎齧死

毛世洪經驗便易方虎齧爪傷以蠶豆葉搗敷如無葉時以枯蠶豆水浸軟連皮搗爛敷之亦應

集韻拏柱買切讀與鴛近聲譜拏攬物也

虎齧傷不死用水調沙糖塗傷處或麻油塗或生薑汁拌白礬末敷均效

痕。

衡陽人某被雷擊死身首俱無燒痕惟左足大指上如針刺一孔甚深自腳心起至膝上焦黃如灸亦無篆字文

凡被虎齧死者屍肉色黃口眼多開

兩手拳握髮髻散亂糞出傷處多不

齊整有舌舐齒齧痕跡。

虎齧人多齧頭項上身上有爪痕拏

聲派上損痕傷處成窟或見骨心頭胸

前臀腿上有傷處地上有虎跡勒畫

仍飲薑汁解毒

顛狗傷死

顛狗齧人其傷處雖未破但見青紅即已中毒宜亟治之被齧後用冷水洗淨齒垢蓋以杏仁泥服韭菜汁一碗以後隔七日一服服至七碗止此症最怕七日一發發時即無風但畏風大須人蒙護過三七日無此情狀方吉百日內忌鹽醋一年內忌豬肉魚腥終身弗食犬肉蠶蛹讀律佩鱗云黃風蛇倒束人身上以尾入鼻竅不救無齒痕青色帶腫方書蛇傷人用蜈蚣燒存性研敷又焙研二條酒服

蛇蟲傷死

匠畫出虎跡并令村甲及傷人處地鄰為證。虎齧人月初齧頭項月中齧腹背月終齧兩足貓齧鼠亦然。凡被顛狗傷死者傷處必有痕跡腹脹硬陰莖挺出其毒發之時如感冒風寒之狀畏風特甚時作狗聲每欲齧人及衣物小腹墜脹小便難。凡被蛇蟲傷致死者其被傷處微有齧損黑痕四畔青腫有黃水流毒氣

死後被蟲鼠傷

道路死屍

元槩本洗冤集錄他物齧作狗齧

驗道路倒卧無主屍須看身上有無  
灸癍疤瘰肉瘤等項肢體有無舊損  
皆要一一記明以防日後覆驗  
驗報受傷路死及無傷而被禽犬殘  
毀者要先看屍旁有無腳蹤血跡即  
跟尋蹤跡由來並傷痕內齧痕禽啄  
痕之類如有形跡即敘於作作喝報  
之前或有屍親認領須訊明年貌衣  
服並遺物是否相同設稍有未符不  
得遽準給領以防垂涎遺物致被冒

灌注四肢。身體光腫。面黑。  
死後被蟲鼠傷者。皮破無血。破處周  
圍有齧痕蹤跡。有皮肉不齊處。若他  
物齧。則痕跡粗大。

道路死屍。地方申報。即行相驗明白。  
開造有無傷痕。約畧年紀。填註面貌  
衣服。如有攜帶行李財帛。眼同鄰甲  
公驗貯庫。以俟親人認領。買棺殮封。  
培土暫埋。標立記號。若係兇死之屍。

附吞金身死

認軍流遣犯病故向係將屍浮埋飭傳  
屍屬領骸歸葬乾隆四十五年刑部  
以浮埋之棺日久無人赴領轉致屍  
骸暴露行令就近深埋此等道路死  
屍其親屬赴領更遙遙無期應一體  
深埋以免日久暴露  
雲督劉參革總兵田允中吞金斃命  
一案驗得屍身並無別項形狀用銀  
鍼探驗亦無青黑形色查田允中於  
初五日吞金戒指三個後精神恍惚  
不進飲食時索水飲于初八日口吐  
黃水不止即于是夜殞命  
檢驗叢說吞金死者其骨色黃

尤必斟酌申報

參附毒

烏沙脹

各項傷痕真偽易辨惟中毒一項有似毒而非毒者如傷寒陰症暗中風中毒之類各有青紫腫突形狀然猶有病情醫法可以查據至若誤中真毒如此論內所云參附瘴癘食物蛇蟲等類全在相驗時詳察其平素之服食起居同伴之親友奴僕務得誤中毒氣確情庶免冤累若但以屍狀係是毒死鍛鍊成獄則為害匪淺觀後服毒辨生前死後篇末節有中毒輒驗稱服毒宜子細辨之二語益當十分詳慎矣

沙脹死者面青色或身亦青色心坎兩肋有紫紅沙斑兩曲脉有青筋生前鍼刺無血出若十指甲青黯面青黑恐是中毒非盡沙脹也

論中毒

凡可以致人於死者。非獨砒鴆為然。而參附為尤甚。日夕服之不置。以致口鼻流血。膚為寸裂而死。岐黃書中更有青筋脹一症。即俗所謂烏沙脹。倘誤認為陰症。而投之以藥。則斷乎不救。凡此等症候。及陰症之不救者。兩手足指甲皆青黯。或盡青紫。甚則頭面及遍身皆紫黯。緣其血敗。積而

閩粵瘡

有宦游閩廣者云嘗見人感受瘡癘之氣百般療治迄無一效惟以吾鄉之長安卧龍丹及塘西痧藥丸其應如響因思此一丹一丸海內著名但近年市肆所售往往減輕貴藥而以賤藥足之以此功效稍遜於前余家遺有二方特錄於此凡有心濟世者誠能選料配合不特瘡癘可治而內外諸症百試百效此居家出外必備之藥也卧龍丹方麝香二錢梅花冰片四錢蟾酥二錢犀黃肉桂水安息檀香沈香各五分丁香薄荷開楊花鷺不食艸各壹錢牙皂二錢火硝五分燈艸炭六錢各研細末每藥秤準再合研極細養餅收貯不論何症臨時取少許嗅鼻得嚏即愈痧藥丸方茅山蒼朮六錢丁香大黃各壹兩二錢蟾酥二錢麝香壹錢雄黃天麻朱

成色故也。又閩粵多瘡癘。凡為瘡癘所中之人。急令人以磁鋒代刺。或於額上。或於眉叢。或於兩臂膊。立出血升餘則瘥。病淺者血紅而多。病深者血紫而少。若紫黑而極少。則病甚深。乃倖而僅救者耳。土人每以得血稱賀。如或不得血。或得之艱澀。則咸知不治。及其死也。其屍頭面。或多青黯。或盡紫黑。其手足指甲亦然。又肺癰

肺癰腸風中臟諸症

砂麻黃各八錢甘艸五錢各研細末以糯米粥漿和勻杵數千下丸如荀子大朱砂為衣晒乾養餅收貯內傷外感輕者七丸重者十四丸白湯送下外症照服并研末黃酒調敷中臟據舊鈔本作臟毒為是甘草與鮎魚黃瓜與花生南瓜與羊肉均不宜同食犯之立死物類如此者甚多洗冤錄表云物性相反誤食而死須參看意外諸毒改變條

食物相反

滇粵瘡癘身死形狀

洗冤錄表云前言瘡癘死者頭面青黯此言亦有面色紅赤等語蓋補前條所未備也

腸風及中臟諸症未死之前吐出惡物。或瀉下黑血。穀道腫突。或大腸突出等項。豈可盡視為中毒之驗耶。且如日用飲食中。其物性相反。誤食而死者。更復不少。即如生蔥不可見蜜。河鮑不可見弔灰之類。苟因其死之暴。而狐疑以推之。則大謬矣。滇粵等省受瘡癘身死者。頗多。其屍不盡青紫黑黯。亦有面色紅赤。脣口

蟲蛇毒  
物狂犬  
等傷

既有齧痕較前二節之中毒易辨

中毒檢  
骨

中毒檢骨有頭顱與下身仍然黃白者有牙根骨白色者蓋中毒有淺深久暫人有老少強弱未可一概論也惟胸骨十指尖骨或青黯或黑黯無

紫黑胸腹咽喉脹滿手足指甲俱青黯口眼耳鼻并糞門小便處所亦閒有血出若死後檢骨骨多青暈色毒有自外入而非飲食致者如蟲蛇等毒物傷則皮上有齧損痕若狂犬傷瘡乾後死亦有齒痕但分大小耳各所傷處但青黑腫凡中毒屍骸潰爛檢骨則骨上下黯黑色胸膛心坎牙根十指尖骨俱青

不如此余歷次會檢俱經目睹即成案亦不少非憑空臆說也

色。



服毒死後形狀

凡服毒酒死者周身皮肉俱黑腹背俱發小炮七竅流血眼睛突出舌有芒刺唇吻破裂十指甲青黑色肛門有血如將毒藥攪和食物服而死者周身皮肉青黑或紫黑腹背無炮七竅不盡出血舌無芒刺  
驗服毒死者當究明毒自何來若自藥肆買致應問是否知情須查明有無餘剩毒藥並取驗盛藥器皿以定虛實  
耳鼻口內元槩本洗冤集錄作口鼻眼內平冤錄同

未死前形狀

此節據元槩本洗冤集錄合上文為一節平冤錄未死前句上有仍詢究

服毒死

凡服毒死者口眼多開面紫黯或青色唇紫黑手足指甲俱青黯口眼耳鼻間有血出甚者遍身黑腫面作青黑色唇捲發炮舌縮或裂拆爛腫微出唇亦爛腫或裂拆指甲尖黑喉腹脹作黑色生炮身或青斑眼突耳鼻口內出紫黑血鬚髮浮亂  
未死前須吐出惡物或瀉下黑血穀

服毒發作

三字

銀釵探法

驗水銀毒以金鍼試探取出白色者是  
諸毒俱可用銀釵試探惟服瀉及澀  
衣灰水雖有銀釵試探不出  
口內照宋本作喉內為是  
洗冤錄備攷載廣濟縣有用蛇毒命  
一案先將手足細縛逼令開口入蛇  
頭用火燒蛇尾使蛇衝過咽喉盤攪

道腫突。或大腸突出。服毒多而速死者形狀始有此  
凡服毒死。或即時發作。或當日早晚。  
若其藥慢。或一日二日方發。或翻吐。  
或吐不絕。仍須於衣服上尋餘藥。及  
死者坐處尋藥物器皿之類。

驗服毒用銀釵。皂角水揩洗過。探入  
死人口內。以紙密封。良久取出。作青  
黑色。再用皂角水揩洗。其色不去。如  
無。其色鮮白。人既死雖非服毒未免有穢故銀釵亦作黑色

糯米飯放屍口驗法

五內初相驗時。毫無傷痕。即銀釵探  
試亦無青黑色。惟檢骨可得其情。此  
骨從頂至足。周身四旁。凡一尺一寸  
之骨。俱紅赤色。鮮潤明亮。將骨細刮  
愈刮愈紅。是由蛇入腹攪亂。周身血  
髓悉行透溢。各處骨道。故耳案洗冤  
錄表云。查用蛇毒命。既須先縛手足。  
則手足定有細縛痕。且逼令開口。定  
有他物。搗傷牙齦。去處及有按住兩  
頤。提勒髮辮。種種痕跡。可驗。

但洗之即去也。惟真中毒雖  
洗數次。其色青黑。不能鮮白。  
案毒藥身死者。事多曖昧。全憑  
銀釵定驗。虛實銀釵。假偽一觸  
穢氣。其色即變。難以辨明。若臨  
事取辦。於民則情弊多端。必須  
令工匠用足色銀成造。以官對  
牌試驗。鑿記封收。專為驗屍需  
用。亦絕冤濫  
之一端也。

袋當依元槩本洗冤集錄及平冤錄  
作袱。為是庶下袱字方有根  
蒸元槩本洗冤集錄作饋。平冤錄同  
注云。饋甫文切音分。半蒸也。案劉熙  
釋名。饋分也。眾粒各自分也。  
元槩本細破作打破。

又一法。用大米。或黏米。三升炊飯。用  
淨糯米一升淘洗訖。用布袋盛。就所  
炊飯上炊蒸。取雞子一個。鴨子亦可細破  
取白。拌糯米飯令勻。依前袱起。著在

用絲絮至三五條未免過多以三五條之絮而欲以三五升之醋煮覆則醞醋又嫌過少二者必有一誤須臨時斟酌

前大米黏米飯上以手三指緊握糯米飯如雞子大毋令冷急開屍口齒外放著及用小紙三五張搭遮屍口耳鼻臀陰門之處仍用新絲絮三五條念音醋三五升用猛火煎數沸將絲絮放醋鍋內煮半時取出仍用糟盤罨屍卻將絲絮蓋覆若是死人生前被毒其屍即腫脹口內黑臭惡汁自然噴來絲絮上不可近後除去絲

飯入屍口取與雞喫驗法

空腹食飽虛弱老病服毒形狀不同

廣東省開平縣民婦許氏毒死親夫李宜滿一案據覆檢仵作供稱李宜滿食存胸膈毒不復行是以項頸胸膛骨色青黯而頭顱與下身各骨仍然黃白九卿會駁此屬臆揣之詞並無確證嗣據禮部尚書王安國奏李宜滿項頸並胸膈骨青黯不得謂非中毒所致照罪疑惟輕將許氏斬決

絮糯米飯被臭惡之汁亦黑色而臭。此是受毒藥之狀如無則非也。又一法將白飯一塊入死人口中喉內用紙蓋一兩時辰取出飯與雞喫雞亦死即是。

有空腹服毒惟腹肚青脹而脣指甲不青者有食飽後服毒惟脣指甲青而腹肚不青者又有腹臟虛弱老病之人畧服毒而便死腹肚口脣指甲

乾隆十二年成案

糟醋罨法

並不青者。卻須參以他症。驗虛弱老病。人先以銀釵探喉中。如果色變。還作服毒論。其後方以他症參之。須詳審此人未死。前有何病。症虛損等情。

有服毒已久。蘊積在內。試驗不出者。須先以銀釵探入死人喉訖。卻用熱糟醋。自上而下。罨洗。漸漸向上。須令氣透。其毒氣熏蒸。黑色始見。如便將熱糟醋。自上而下。則其熱氣逼毒氣向下。不復可見。或就糞門上試探。則用糟

契物壓毒入腸臟驗法

醋。當反是。

服毒中毒。若生前。契物壓下。入腸臟內。試驗無證。即自穀道內試其色。即見。

生前中毒驗法

平冤錄云。本屍唇破舌爛。口內紫黑。手指甲青。以銀釵探入喉中。少時取出。其釵黑色。是生前中毒身死。無冤錄云。凡服毒死。屍口眼多開。面紫黯。或青色。唇紫黑。手足指甲俱青。黯口眼。耳鼻間有血出。中毒亦然。宋本其骨黯黑色。作黧色。說文黧。淺青黑也。七感切。

服毒辨生前死後

生前中毒。遍身作青黑。多日而皮肉尚有。亦作黑色。若經久。皮肉腐爛。見骨。其骨黯黑色。胸膛心坎。牙根。十指尖。俱青色。

死後假作中毒驗法

中毒稱服毒宜細辨

死後將毒藥置口內假作中毒皮肉

與骨只作黃白色。

有本是中。毒輒驗稱服毒者宜子細

辨之。

蠱毒

凡頭面有光他人手近之如火熾者此中蠱也。用蒜汁半兩和酒服之。當吐出如蛇狀即愈。中蠱毒即取蠱相制之。蠱蟲曝乾燒灰服少許立愈。如知是蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱用蛇蠱蟲之類。粵中名藥鬼又名挑生。凡室中無塵網者必有藥鬼。又名挑生。凡置造藏刑律造畜蠱毒殺人條云。凡置造藏畜蠱毒。堪以殺人。及教令人造畜者。斬不問已未殺人。財產入官。妻子及同居家口。雖不知情。並流二千里。安置教令者。之財產妻子等不在此限。若以蠱毒毒同居人。其被毒之人。父母妻妾子孫。不知造蠱情者。不在流

諸毒

中蠱毒者。徧身上下。頭面胸心。並深

青黑色。肚脹。或口內吐血。或糞門瀉

血。

造蠱者取百蟲置皿中。經年開視。有一蟲盡食諸蟲。而獨存者。為蠱。故字從蟲。從皿也。能隱形。似鬼神。其毒不一。皆變亂元氣。多因飲食行之。南方有蠱毒之鄉。於他家飲食。即以犀角攪之。白沫竦起。即為有毒。無沫者。即無毒。令病人吐於水內。沈者是蠱。浮者即非。或

遠之限若係知情雖被毒仍緣坐

### 金蠶毒

馮氏醫說蠶類不一有魚蠶雞蠶鵝蠶羊蠶牛蠶犬蠶蜈蚣蠶蜘蛛蠶小腸蠶蛭蠶科斗蠶馬蝗蠶艸蠶小兒蠶等惟以金蠶蠶為最烈被其毒者嚼白礬反甜生黃豆不腥以升麻鬱金各二錢煎服不吐即瀉立愈

嶺南雜記雷州有挑生蠶凡喫雞魚瓜果皆可挑初中毒覺心腹作痛滿十日則內物能動治法毒在上焦用熱茶投膽礬五分候礬化呷服良久以雞翎探喉中即吐出如在中焦以米飲下鬱金末二錢即瀉出

述異記石門沈心厓任開化時偶坐晚堂見一物其光如慧詢之胥役云此蛇蠶也亦名飛蠶每於夜閒飛出下食人腦故開化居民時屆黃昏不

令含黑豆豆脹皮脫者是蠶豆不脹皮不脫者即非

中金蠶毒死屍瘦劣徧身黃白色

眼睛塌口齒露出上下脣縮腹肚塌

將銀釵驗作黃浪色用阜角水洗不去此金

又有身體脹皮肉似湯火

炮起漸次為膿舌頭脣鼻皆破裂乃

是中金蠶毒之狀

此言瘦人

金蠶一名食錦蟲蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉滇蜀

### 鼠莽草毒

敢露坐巢氏病源中蛇蠶毒心腹熱悶胸脅支滿舌本脹強不喜言語面赤昏焦又心腹間如有蟲行經年不治肝膈爛而死崔行功纂要以馬兜鈴一兩煎服即吐出

閩小記閩有蝦蟇蠶每至庚辛申酉日則蠶神下糞如白鳥矢取以毒人或入飲食中或彈衣領內中其毒者必先一嚏則蠶入百節五臟矣治法用車轄脂半斤漸漸服之即出

五岳游艸一種稻田蠶胃中生土一塊內生稻芒刺心而死

安徽省婺源縣民李歡與俞氏通姦口角俞氏潛往山塢采服鼠莽草越三日殞命驗止脣吻青色起炮並無脣裂齒齦青黑出血諸狀駁覆勘歷經究審實係中毒等語查鼠莽草有二種一係木本一係藤本其質既

湖廣閩粵皆有奸人畜之取其糞置飲食中毒人人即死蠶得所欲則日置他財使人暴富然遣之極難水火兵刃都不能害必倍其所致金銀錦物置蠶於中投之路旁人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶不然入人腹殘齧腸胃完而後出也

粵西有藥思蠶狀似竈雞蟲如蠶豆大能變幻作小孩形遣嫁之法仿佛金蠶

中鼠莽草毒江南有之亦類中蠶毒

加之脣裂齒齦青黑色此毒經一宿

一日方見九竅有血出

諸毒

沈氏金言

卷三

三

有不同其性未必無異况春夏盛長之時其毒必深重若遇秋冬凋落僅存枯梗其毒必然輕減見成案急救方解鼠莽毒用黑豆汁或枯蓮房帶蒂梗煎水灌之

巴豆毒

中巴豆毒用芭蕉根葉搗汁服之痢止而安或飲以新汲水亦效

莽草本作网人以毒鼠故名鼠莽食之令人迷罔南中川蜀以及上谷皆有之木若石楠葉稀無花一說藤生繞石間是名网草

中巴豆毒口乾兩臉赤五心煩熱痢不止

砒霜毒

山東省荷澤縣民婦張謝氏與王有通姦砒毒親夫張僧致死原驗官開棺驗屍口眼俱閉牙白無血肚腹指尖骨微青疑為屍身發變據供以病死詳報覆檢牙根骨心坎骨十指尖骨俱青黑色其餘骨殖俱黯黑色委係受毒身死乾隆四十五年成案

中砒霜毒得一伏時徧身發小炮作青黑色眼睛聳出舌上生小刺炮綻出口唇破裂兩目脹大腹肚膨脹糞門脹綻十指甲青黑

湖北省漢陽縣民婦姚徐氏與劉長通姦用砒毒死親夫姚大訊明將砒霜放入茶內喫後只叫心燒腹痛尚能飲食越至十日始發狂身死因係砒霜底子不甚酷烈且原喫不多是以發毒甚遲驗得脣紫胸青骨黑黯色實係受毒身死見成案

中砒霜毒吐逆腸腹絞痛不可忍發狂七竅迸血口脣亦青黑色若飽時服上一半青饑時服下一半青外腎脹大

直隸省安平縣民陸二梅與李從泰之妻紀氏通姦起意商謀致死本夫將信毒入麪做成火燒李從泰取食一枚旋即毒發越八日殞命乾隆五年成案

砒石出信州玉山有砒井故亦名信又隱信字為人言此井官封禁取甚嚴然他處出銅錫之山往往有之生者名砒黃赤色毒緩以火煉之令烟上著器凝結作白霜者名砒霜毒尤熱烈

浙江省松陽縣民詹廷華因葉長森姦佔其妻王氏遂服紅砒二錢延至八日殞命查紅砒卽砒石未煉成霜其毒稍輕見成案

若遇酒及燒酒尤腐爛腸胃頃刻殺人

鈎吻毒

折獄龜鑑王臻知福州時聞人欲報仇先食野葛而後鬪卽死其家遂誣

中鈎吻毒百竅流血狀與砒霜畧同

告之臻訊得其實懲誣告者賈昌齡為饒州浮梁尉其俗輕死與人有怨往往食野葛以誣怨者昌齡能辨究之

中鉤吻毒口不開者急以大竹筍通節以頭拄兩脇及臍灌冷水入筍中數次口便開多服人糞汁或斷鴛鴨頭瀝血入口灌之

冰片毒

急救方中冰片毒飲以新汲冷水可解

水銀毒

未信編昔文信國服冰片自戕而無害以未飲酒故也冰片切忌入酒毛氏經驗方中水銀毒飲地漿水立愈其法掘地成坑以水傾注攪成泥水謂之地漿

果實金石藥毒

鉤吻即野葛因入口鉤人喉吻故曰鉤吻廣人謂之胡蔓草又曰斷腸草滇人謂之火把花岳州謂之黃藤其草近人則葉動蔓生葉圓而光春夏苗嫩毒甚秋冬草枯稍緩五六月開花似樺柳花數十朵作穗嶺南花黃滇南花紅

中冰片毒熱酒服冰片錢許則正氣散亂血脈沸騰七竅流血而死

中水銀毒身死者以黃金驗之色白者是

食果實金石藥毒者其屍上下或有

赤腫平冤錄作青腫

酒毒

酒性最烈不宜近火如須熱飲必以重湯炖之而燒酒為尤甚犯此者陰受其害而不覺也

藥毒菌蕈毒

蘇臺記略宋時天平山白雲寺有五僧偕行山間見一蕈甚大采而食之至夜嘔吐不止三人急采鴛鴦草生啖遂愈二人不肯甚啖吐至死鴛鴦草即俗稱金銀花也

銀鋤毒

鋤方書作銷案鋤銷二字字書俱無當即銷字集韻物有光也中銀鋤毒顛門偏左偏右脊背肋骨俱紅色或起霉斑兩肩兩臂兩腿骨

一二處赤腫有類拳手傷痕或成大片青黑色爪甲黑身體肉縫微有血或腹脹或瀉血

中酒毒腹脹或吐瀉血

中藥毒菌音蕈音淨毒手脚指甲及身上青黑色口鼻內多出血皮肉多裂

舌與糞門皆露出

服銀鋤死檢驗傷痕法各書中俱無載



絡或為毒氣攻成蜂窩樣  
中銀鋤毒服黃泥水一盃即愈又方  
每日用飴糖四兩熬成小丸不時以  
真芝麻油送下亦效  
張氏驗方解銀鋤毒將帶皮綠柿連  
喫十數枚自愈冬月喫柿餅

服鹽鹵死

服鹵死者面色黃周身皮發亮黃色  
口鼻內涎沫流出嘗之必鹹肚腹低  
陷十指甲黃或青黯色滿身經絡俱  
收縮如服鹵太多皮肉俱青與毒相  
似或面色微紫赤唇吻皮皺牙齦微  
紅色舌縮微有小炮

案銀鋤性主腐爛皮肉今人每  
用以去痣此物投入腸胃非比  
砒藥諸毒性烈服之即口眼鼻  
竅流血唇齒豁裂指甲青黑現  
有外傷可以檢驗係黏入腸胃  
漸漸腐爛令人如患病狀或半  
月一月而死卻無外現傷形又  
金銀圓光無鋒芒者入腹可下  
若剪碎尖稜鉤住腸胃能令人  
斷腸而死亦無外傷可以檢驗  
此種人命既無檢驗之法  
姑闕疑以俟畱心體察

服鹽鹵死者髮亂手指甲秃胸前有  
爪傷痕因痛極不可忍徧地滾跌自  
抓掐音却所致

服灰汁死

余官平度驗服鹵身死者一年壯婦  
人面色黃亮周身及十指甲俱黃色  
喉下抓破浮皮數點一年老人面色  
微黃口流涎沫十指甲青黯色  
毛氏經驗方凡服鹽鹵急先灌米泔  
水數碗再以活雞鴨一兩隻斷去頭  
塞於口中以熱血灌下即解

服鹵死者身不發炮口不破裂腹不  
膨脹指甲不青釵探不黑頗有黯色  
洗之即白徧身黃兩眼合口中或有  
涎沫但其屍雖發變心肺不爛取汁  
煎之猶能成鹽

服澣衣所用灰汁死者有乘人病時  
以灰汁煎藥毒之致死者髮亂指甲  
秃身拳曲口鼻有血

葇若毒

本艸葇若一名天仙子一名行唐其  
子服之令人狂浪放蕩故名金匱要

中葇音郎若音蕩毒悶亂如卒中風或似

苦杏仁

略葭蓉葉圓而光有毒誤食令人狂亂甘州汁解之生食亦能死人故市買杏仁須用清水浸泡泡出之水令犬食之立斃服杏仁死者周身皮及指甲俱黃色見山西省成案中杏仁毒急取杏樹皮煎湯服之雖迷亂將死者亦可救

草烏頭

本艸艸烏頭亦名烏喙野生狀類川烏有大毒熬膏名射罔傅箭射獸見血立死

熱盛狂病。一名水葭蓉葉圓而光。誤食令人狂亂或吐血。中苦杏仁毒。西北諸省有苦杏仁。生熟服之。都不為害。畧用火炒。仍令半生。服數十粒。即能死人。其屍眼閉。舌脣耳竅。手足十指。俱青色。肚腹有青色塊。每有食以詐人者。人不易防。最難禁化。惟急取吐。吐出可解。中草烏頭毒。江左山南有草烏頭。其汁煎之名射罔。俱大有熱毒。而射罔更烈。塗破傷損處。立能殺人。

鳩鳥毒

此條自南海以下至末各本列為小注。今以上文中苦杏仁毒及中艸烏頭毒兩條例之一。則西北諸省云云。一則江左山南云云。則此處南海云云。明是正文無疑。否則僅此中鳩鳥毒四字。語氣未了。且於上文亦不類。因此改正。

附蟾酥

鷓鴣各本譌鴉據廣志改。說文鳩毒鳥也。玉篇鳩羽畫酒飲之即死。中鳩毒氣欲絕者。用乾葛末井水調服三盞。即愈。口噤者灌之。浙江省仁和縣民祝永林。服蟾酥一錢五分。嘔吐發顛。滿面大汗。輾倒在。地身死。驗得面色微青。兩眼開。鼻竅。血水流。出上下脣。吻翻。牙齦黑。口開。舌起。炮爛。咽喉連食氣。喉微腫。肚腹。平陷。十指甲青。黯色。穀道糞出。乾隆

中鳩鳥毒。南海有鳩鳥。似鷹而大。狀如鷓。紫黑色。赤喙黑目。頸長七八寸。雄名運日。雌名陰諧。食蛇及橡實。蛇入口即爛。其屎溺著石。石皆黃爛。飲水處百蟲吸之皆死。巢於大木之顛。其下數十步艸不生。人誤食其肉立死。惟得犀角。其毒即解。

服官粉毒

四十九年成案查本州載蟾酥即癩  
 墓眉閉白汁辛溫大毒能爛人肌肉  
 惟疔瘡合他藥服一二釐取其以毒  
 攻毒  
 河南省中牟縣民婦劉張氏被李進  
 強姦致令羞忿服官粉中毒身死驗  
 得張氏上下唇吻青上下牙齒青十  
 指甲青委係中毒所致據伴作周大  
 聲稱洗冤錄雖無服官粉中毒一條  
 但官粉俗稱鉛粉是黑鉛燒成自然  
 有毒今驗唇吻牙齒指甲俱青色實  
 係中毒無疑乾隆十八年成案  
 江西省石城縣溫張氏與溫子勝通  
 姦用輕粉謀毒本夫溫名勝身死查  
 輕粉乃水銀加以鹽礬用火煅鍊而  
 成輕揚燥烈毒氣善竄經絡筋骨服  
 多者毒重唇吻牙齒指甲俱青服少  
 者毒輕僅現於龜子骨見成案

服輕粉毒

服鳴箭  
艸毒

江西省石城縣捕役黃和詐逼張吉  
 瑞服鳴箭艸中毒身死檢得兩眼眶  
 骨兩十指尖骨俱青色十趾甲骨俱  
 黑色委係服毒身死乾隆四十三年  
 成案

食 菟驚并

物類相感志驚同菟菜食生血驚  
物理小識以赤菟和驚刺成小塊厚  
以茅包經旬即化為驚舉投池中數  
月可食吳人謂之種驚

食 驢肉荆芥并食

舊本驢肉作黃魚據注以黃魚為是  
但驢肉與荆芥相反宜兩存之  
谿澗中石斑小魚亦與荆芥反

意外諸毒

菟驚并食毒

昔有人將驚與菟并食之遂病  
死屍未殮忽小驚無數自九竅  
湧出散走馬廐中惟遇馬溺者  
輒化為水又有人誤食驚菟飲  
馬溺得瘥或云  
白馬溺尤良

食驢肉喫荆芥茶殺人

本艸昔有人啖黃魚羹罷採荆  
芥和茶而飲少頃足底奇癢上  
徹心肺跣行沙中馳走如狂足  
皮皆破欲裂急求解毒藥餌之  
兩日乃止○荆芥一名假蘇本  
艸謂性溫不然實微涼數見食

意外諸毒

漏滴肉

方書茅屋漏下沾著肉上名漏脯中其毒者燒犬糞酒調服

蜜鮮并食

養生襍記鮮與青小豆同食殺人食物本艸諸鮮不可合生胡荽葵菜麥醬蜂蜜食令人霍亂多死

藥後食河魴

河魴毒在肝血脂子并眼尤忌塵煤落入

食物禁

輟耕錄云中河魴毒用槐花微炒與乾燕脂各等分同擣水調灌妙風藥如荆芥之類河魴與荆芥相反并食必死  
洗冤筆食物變改禁忌凡錄中所未詳者攷諸載籍分類摘錄以備參

黃頰魚偶犯荆芥者必立死甚於鉤吻毒

茅舍漏滴肉上食之殺人

蜜鮮并食毒

韶州月華寺側民家設僧供新蜜方熟羣僧飽之有某院長老兩人還至半道遇村墟賣鮮買食盡半斤至夕皆死

河魴風藥并食毒

昔有人招友晨餐者烹河魴為饌友以故不食遺歸餉妻妻方平明服藥不以為慮啜之甚美即時口鼻流血而絕

食物變改及食禁○按禽獸蟲魚之

稽如雞四距六趾黑身白頭鴨目白黑身白頭或五色元鳥白首鳥足不伸卵有八字此羽族變改也羊六角心有孔白羊黑頭黑羊白頭豕白蹠青爪心肝有孔黑牛白頭白馬黑頭六畜自死口不閉首北向肉多黑星此獸族變改也魚無腮目能開合腦中連珠鮎魚赤目赤鬚鰻魚腹有黑斑鰓無鬚煮熟不變鰓目白目陷獨目赤足無裙頭足不縮腹下有蛇文有三字天字卜字小字領下有輓骨如龜形蟹獨目目赤兩目相向腹斑腹中有骨背有星點此水族變改也其餘禁忌備列於後  
各本腎色作腎氣據舊鈔本改

余家於數年前剖一鯽無腸膽并無血惟有一物似帶蟠屈其中引之長

屬或有感沴氣所生形質變異者如獸有歧尾蟹有獨螯羊一角雞四足是也○物有形色變異者如白鳥烏首烏雞白首白馬青蹠白馬黑蹠是也○有形色無異其肉變怪者如落地不沾灰塵經宿肉體尚暖曝炙不燥入水自動之類是也○有皮肉無異腸臟變改者如肝色青黯腎色紫黑魚無腸膽牛肝葉孤之類是也○

丈許因棄不食  
洗冤贅筆凡食物禁忌如雞肉忌橘  
皮合糯米食生小蟲合兔肉食發虛  
黃雞卵合蟹與莧菜食生血驚鴨肉  
忌薄荷野雞忌蕎麥木耳合鮪魚食  
令人癩鷺肉合榧子食生歷節風  
此羽族禁忌也羊肉忌半夏合南瓜  
食殺人羊肝合笋食令目盲猪肉合  
蕎麥羊肉食脫鬚眉豬心肺合吳茱  
萸食發痔疾牛肝忌鮎魚馬肉忌蒼  
耳犬肉忌商陸合菱食令人生癩免  
肉合芥菜食成惡疾此獸族禁忌也  
鮪魚合天門冬食生水腫合麥醬食  
生喉瘡鰻魚合銀杏食生輭風黃魚  
忌蕎麥鰕蟬忌犬肉蛤忌米醋此水  
族禁忌也其他桃杏雙仁瓜有二蒂  
王瓜花生同食斷腸之類難以悉數  
養生家不可不察也

有一物常食性善與他物相反過口  
而害人者如鮪魚同鹿肉食之殺人  
羊肉同鱸酪食之害人羊肝得生椒  
破人臟猪肉得胡荽雖音爛人臍是也  
○有一物常食性平與他物相感入  
腹成動物者如鱸生同酥乳食之變  
諸蟲蟹肉與莧菜食之還生蟹牛肉  
同猪肉食之成寸白蟲豬羊肉以桑  
楮柴煮炙食之亦成寸白蟲也

蛇遺水

張氏驗方誤服蛇遺水用甘艸煎湯  
灌下吐十餘次自愈

飲蛇遺水毒

湖州陳某因步春渴掬澗水咽  
之數日覺心腹微痛日久疼甚  
醫診之云心脾受毒今心脈損  
甚陳語其故醫曰蛇遺不淨在  
澗子誤飲其水蛇已成形在腹  
食心而痛也遂以水調雄黃服  
之果下赤蛇  
數條皆能行

隔宿茶水恐亦有毒蟲所遺不淨皆  
當慎之

餅花水

洗冤彙編云餅中花水凡有色可愛  
香可嗅者除萱花外俱毒不可飲其  
味辛故中毒死者口微開不閉

飲餅花水毒

宋汪待舉字懷中守處州郡部  
民有飲客者客醉臥於空室中  
夜醒酒渴索漿不得乃取花餅  
水飲之次早啟戶客死矣其家  
訟於官待舉究舍宇所有物惟  
餅浸旱蓮而已細鞫之訟乃白

三足蟹

洗冤錄附考蜀人買得蟹十數枚痛飲大嚼且食红柿至夜忽大吐繼之以血昏不知人病垂殆同邸有知其故者憂之忽一道人云惟木香可解但深夜無此偶有木香餅子試用之病人口已噤遂調灌即漸甦吐定而愈

食三足蟹毒

○一云餅浸蠟梅

太倉州民道見漁者持一蟹而三足買歸令婦食之既熟呼婦共食婦不欲食出坐門外久不聞其夫聲入視已失所在地上止存髮一縷衣服冠履事事皆在如蛻形者驚怖號喚里甲以婦為謀殺夫而詐諉也官為鞠之得其情乃原婦罪

艸藥

不獨艸藥為然即園圃菜蔬亦當揀淨而食不致有誤自來醫家開方於柴胡上必加一淨字詢之醫士茫然不知偶遇一貨藥者云斷腸艸往往與柴胡並生采取時必得揀淨方可入藥正藥且然何

艸藥夾雜毒

英州僧某往州南三十里掃塔有客船自番禺至舟中士人攜一僕僕病腳弱不能行舟師憫之曰吾有一藥治此病如神既

況艸藥

秋鐙餘話載王阮亭尚書過濟南有友邀飲正荆花盛開即布席庭中阮亭距荆花丈許一客纔二尺餘厨人以鯉魚進阮亭素不嗜魚置不食客與主人甚啖未幾俱作嘔遂致殞命次日方知魚與荆花相反也

食魚投荆花

食物過荆林毒

賽廟畢飲昨頗醉乃入山求藥漬酒授病者其藥入口腸胃即痛如刀割遲明而死士人咎舟師舟師恚即取所餘藥自漬酒服之不踰時亦死蓋山多斷腸艸人食之輒死而舟師所取藥為根蔓所纏結醉不暇擇徑投酒中是以及於禍則知艸藥不可妄服也

單縣有田作者其婦餉之食畢死翁姑曰婦意也陳於官不勝筮楚遂誣服是時天久不雨許某時官山東曰獄其有冤乎乃親歷其地出獄囚徧審之至餉婦乃曰夫婦相守人之至願鳩

老雞

張氏驗方解老雞毒犀角并水磨汁服屢試極驗

雞毒

毒殺人計之至密者也焉有自餉於田而鳩之者哉遂詢其所饋飲食所經道路婦曰魚湯米飯度自荆林無他異也許乃買魚作飯投荆花於中試之狗彘無不死者婦冤遂白即日大雨注如

昔有蘇人出商於外其妻畜雞以待其歸數年方反殺雞食之夫即死鄰人疑有外姦首之太守鞫之無他故後細察其由獄遂白蓋雞食蜈蚣百蟲久則畜毒食之殺人故養生家雞老不食又夏不食雞

黃蠟炒雞

既脹悶氣塞斷不死如平人矣故注內補出屍狀并檢驗之法洗冤彙編云黃蠟入雞炒其味最美食之氣塞腹脹死明劉誠意飲於胡惟庸家歸而腹中如有拳石築塞而死其即此之類也

黃蠟炒雞人食之脹悶氣塞三日而死他毒可驗此毒死如平人絕無可驗亦無可救法

考辟穀諸方每有用黃蠟者云食之不飢必須解下然後可喫他物解之之法用青菜湯或冬葵子湯飲一二碗藥即解下依然未化也若未解時止可飲清水凡有質有味者俱不可食食之必甚脹滿然則黃蠟炒雞之毒或亦前物可解乎或麻油大麻子汁葵菜湯波稜菜湯亦可解乎又黃蠟能斂氣不散故凡丸藥之珍貴者以蠟裹之可久貯不壞今中此毒者口鼻等竅



鱻

此條出智囊原本令異之下有召此婦而烹焉出死囚與食便稱腹痛俄仆地死十九字洗冤錄辨正云此謂其人性嗜鱻因妻烹鱻啖後腹痛而死縣令疑中鱻毒乃以鱻數百斤置水中見有昂頭出水者已覺其異必仍令其婦烹食死囚而驗方得實據然後定獄若僅以鱻昂頭為異而無烹食一層即無實據矣此十九字如何可刪

鱻毒

自當無血水流但既脹悶而死必有眼凸臍凸糞門凸腹膨脹等狀可驗或屍已腐當視其腸胃必有蠟雞未化似宜取出洗去他穢以水煎之蠟浮水面候冷自凝成片仍作黃色此亦似屬可驗者乎  
鉛山縣有賣薪者性嗜鱻一日自市歸飢甚妻烹鱻以進恣啖之腹痛而死鄰保謂妻毒夫執送官拷訊無據械繫踰年縣令閱其牘疑中鱻毒召漁者捕鱻得數百斤悉置水甕中有昂頭出水二三寸者數之得七令異之知為他物所變其毒必甚細

守宮

說文云在壁曰蝮蛭在艸曰蜥蜴本艸綱目蝮蛭即守宮也一名碎宮一名壁虎一名蝎虎以善捕蝎蝮故得名博物志守宮以器養之食以朱砂體盡赤擣以點女人臂終身不滅淫則點滅故謂之守宮吾鄉又謂之潛龍

守宮毒

為鞠究婦冤始白  
驚蟄後至九月凡茶水在几上經宿者雖渴甚不可飲因守宮之性見水則淫每於水內相交餘瀝遺入為性最毒如誤飲時急覓地漿水解毒之或吐或瀉尚可拯救一二

暑衣

中暑類傷寒故善醫者必問病原驗屍者亦當推鞠因由

衣有暑毒

沈氏尊生書云夏月曝書曝衣暑氣未散隨即收藏至秋冬近之其氣亦從口鼻而入而即發此暑毒伏于物而觸于人者也其病或霍亂吐瀉或洩痢腹痛或瘧發寒熱皆當細詢其因以為治甚或有身熱足冷者其

夏日汗透衣切不可於烈日中曬若將乾忽暴雨將至急為收納則烈日之毒即錮於內如遇酷暑汗出時偶一衣之則暑以引暑其毒立中證候全類傷寒若誤作寒治必至發狂譫語再

勢則甚危矣

冬月且中暑毒可見夏日曬衣尤不宜驟為收藏

空屋邪氣

巴蜀志異明彭將軍征寇入蜀偶過一禪院規模宏敞詢之土人云已百年無僧彭慮有伏寇率兵而入前殿中有黑鵝奪門飛去中殿無異又進之軍士咸覺頭痛彭親入亦然須臾有蝎自梁蠢蠢而下大如琵琶一軍驚走彭遂火其寺

空屋邪氣毒

誤投參芪桂附陽以益陽未有不至口鼻流血不已者有婦因間從兄自遠至更衣見之時方冬月凡所更衣皆夏日所暴而藏者婦方有娠胎為暑毒所中激而生煩腹痛脈伏熱極似寒諸醫誤認中寒參附併投病益煩悶而死

房屋園林久閉其中毒氣最盛切莫急入蓋久閉宅舍陰暄潮溼毒閉結不散甚或狐淫邪魅借以潛蹤蛇虺惡獸從而盤踞若夫園林深秘恐更有異物潛身必大其聲勢或先之以火驚而散之使其預匿以免卒遇相傷也

蛇虺涎

養生雜記夏月有食物過夜被蛇涎沾上人誤食之腹內隱隱作痛時刻患飢食之即吐用赤頭蜈蚣一條炙為末分二服酒下集驗方中蛇涎毒覺胸中有物如蟲行頃刻昏亂酒調貝母末盡量飲自愈

蛇虺涎毒

凡年久臺榭池館藤蘿花樹翦翳之下不可恣為烹飪恐為毒中前明閩中一田姓鄉紳得一園亭掃除初就即宴邑令於園中其時盛夏蓮花正茂飲將午夜席未及半邑令忽憤憤不語疑為沈醉急扶舁回入署未幾而殂且縣素有蠱因閩傳邑侯為本紳所毒事聞於上奏請逮繫獄遂成然卒無可指之實各存疑案以待再推延至十餘載欽遣恤刑往閱及半毅然曰醜毒之施所以復讐怨即果讐而毒之焉有大設筵宴廣集多人以肆其術之理因訊本紳以宴客之園置自何年曰係購得之

非自置也。訊以在內亭舍會鼎，新否曰：仍其舊，惟加圻墁而已。再訊以花樹亦蔭翳可觀，否曰：古樹逾圍，竹木亦頗叢森，更訊以被罪後會以售他人，否曰：得此園即膺禍，人咸咎之，畏不敢售。故雖家業盡零，而此園獨存。恤刑隨呼縣令語以夙聞斯園，甲茲邑當即往遊，仍為廣諭士民，各攜肴酒以示同樂，更命密具畚鍤待用，眾咸莫解。所以至期，恤刑攜縣令先往呼士民隨之。至則啟其園，除辟草萊，令士民中有識宴邑令之所者，指其處巍然大厦，蘿積重簷，蘇陳古砌。恤刑曰：斯紳之冤，吾得之矣。命諸士民各以酒肴雜坐，盡飲至醉，以其餘各飲好事者，盡令

煤炭

洗冤彙編云：其屍輒而無傷，此脫無字，非是。應據增。

煤炭死者，口開舌出，兩手微握，胸前有細黑斑點，肚腹脹周身並無傷痕。見成案餘詳卷二。火焚辨生前死後篇上層。

升高并力拆毀於墻垣內，得毒虺盈數石，若其不經見物，則不計也。恤刑曰：砌古則陰沴積陰，沴積則苔蘚生，藤蘿附，即為蛇虺窟穴之地矣。而毒物又多乘陰氣以遊行，若其捕生自養，更以氣取，宴設至夜，蠅蚋之類必為叢積，諸物遊行梁上，吸其所欲，而不得，涎墜肴中，誤而饜之，焉不立斃？若非斯園，猶存冤何白以。

中煤炭毒。土炕漏火氣而臭穢者，人受熏蒸，不覺自斃。其屍輒而傷，與夜臥夢魘不能復覺者相似。

養生雜記中煤炭毒心口作嘔或即  
暈倒急擣生蘿蔔汁灌之或清水亦  
可

房中置水一盆并使窗戶有透  
氣處則煤炭雖臭不能為害

洗冤錄表云救得一人不死便全得  
兩人性命此急救方所由錄也

洗冤錄詳義卷四

海甯許樾編校

急救方

救縊死

救縊死

不絕其繩而從容放解則氣不驟泄  
踏肩提髮而撚整喉嚨使氣得舒貫  
磨擦其胸腹臂足使氣得運行尤須  
綿軟裹緊大小便則氣無他溢自從  
口內出又用官桂湯粥飲并筆吹耳  
以通順其氣自能救活當與下數節  
參合行之  
不可使頭垂下一語影宋本元藁本  
均無

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至  
早稍難若心下溫一日以上猶可救  
不得截繩但緩緩抱解放臥令一人  
踏其兩肩以手提其髮常令緊不可  
使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手

浙江省富陽縣民何盛榮妻蔣氏於五月二十九日自縊氣尚未絕因解救不能如法致氣管仍難通順又不擦胸按腹屈伸臂足血脈仍是不行延至六月初二日身死乾隆四十八年成案  
甦醒後三字宋本作勿苦勞動

擦胸上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸漸強屈之又按其腹如此一飯久即氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥飲與之令潤咽喉更令二人以筆管吹其耳內若依此救無不活者

官桂湯

廣陳皮 八分 厚樸 一錢 肉桂 五分  
製半夏 一錢 乾薑 五分 甘草 三分

用手罨口

洗冤錄表云一法取活鷺鷥入口內鷺鳴應聲即活

阜角細辛吹鼻

又法緊用手罨其口勿令通氣兩時許氣急即活

又法用阜角細辛等分為末如大豆許吹兩鼻孔

真山羊血酒灌

佩觿二三分作二三釐并云不可過多未知孰是切忌將茶水灌

又法用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

僵定可救

又法凡男女縊死身雖僵定尚可救活不可割斷繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先將手

手佩觸作首是洗冤錄辨正云拉直頭然後喉項方能通順若拉直手與喉項何涉且上文已云先將手足慢慢曲彎如何又要拉直應據改  
 洗冤錄表云雞冠血滴入喉鼻之內凡跌打縊溺心頭熱者均可用  
 一法灸湧泉穴男左女右各三壯亦能救活

足慢慢曲彎然後將大小便用懸輦之物裹緊不令泄氣用一人坐於頭前兩腳踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒或葦筒入耳內不住口吹氣不住手撫摸其胸前用活雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用公雞女用母雞刻下即能甦活如氣絕時久照前救法務要多吹多摸勿謂已冷忽

畧不救

救溺死

救溺水諸法總以出水為主緣氣被水閉水漸出則氣漸通矣  
元稹本或屈死人兩足以下提行另作一條或字作又

壁泥覆

元稹本云洪丞相在番陽有溺水者用此法救即甦

救溺死

水溺一宿者尙可救。擣阜角以懸裹納下部內。須臾出水即活。或屈死人兩足著人肩上。以死人背貼生人背擔走。吐出水即活。

又法。先打壁泥一堵置地上。卻以死者仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喻入泥閒。其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

炒沙覆面  
元槩本熟作熱舊鈔本同此誤作熟應據改

醋灌

石灰納下部

倒懸灌

酒倒懸吹

灸臍

四時分別救法

又法炒熟沙覆死人面上下著沙只留出口鼻沙冷溼又換數易即甦又醋半盞灌鼻中

又懸裹石灰納下部中水出即活

又倒懸以好酒灌鼻中及下部

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以

筆管吹其耳

又急解死人衣服於臍上灸百壯

又撈起時急急將口撬音開橫銜箸

一隻使可出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚皮橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從口中並大小便流出再用生薑湯化蘇合丸灌之或生薑汁灌之若無牛以活人覆臥躬腰令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上令活人微微動搖水亦可



救凍死條下云冬月溺水之人雖纖毫人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

出若一時無牛兼活人不肯拯救或鍋一口將溺人覆於鍋上亦可如係冬月急將溼衣解去為之更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內不著草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆臥於上臍下墊以縣枕一個仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暍於眼內其撬口銜箸灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道

臍燒罈覆

換脫衣更

等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲溫酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之少頃即活此明驗也

又以酒罈一個紙片一把燒放罈內急以罈口覆臍上冷即再燒紙片放罈內覆臍去水即活

又初救起之時倘有微氣或胸前尚煖速令生人脫貼身裏衣為之更換

燎紙熏鼻

近時遇中風中暈等人昏迷不省以臥龍丹通關散諸嗅藥吹入鼻孔頃刻即嚏較阜角末尤驗

抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。即有生機。一面用粗紙燎灼。取煙熏其鼻竅。稍熏片時。即用阜角研細。吹入鼻竅。但得微有一嚏噴。即可得生。

傷未透膜

刃傷透膜則難救

元槩本半溫作通口通口者一口呷盡也半溫者不大熱也當以半溫為是宋本止上有血字

此段論本書體例應作小注元槩本此為前半段尚有後半段云曾以語樂平知縣鮑旂及再會鮑曰葱白甚妙樂平人好鬪多傷每有殺傷公事未暇詰問先將葱白傳傷損處活人甚多大辟為之減少出張聲道經驗方等語據此似不可刪

治刃傷

凡殺傷不透膜者。乳香沒藥各一阜角子大。研爛。以小便半盞。好酒半盞。同煎。半溫服。然後用花蕊石散。或烏賊魚骨。或龍骨為末。敷瘡口上。即止。昔推官宋瑑。定驗兩處殺傷。氣偶未絕。亟令保甲取葱白。熱鍋炒熱。徧敷傷處。繼而呻吟。再易葱白。傷者無痛矣。

洗冤錄續輯馬前子壹斤枳殼壹斤於屋下雨水不及常有人溺之溺缸將前二物放入浸至四十九日取起長流水淘淨將馬前子用磁鋒刮去面上薄皮枳殼破開挖去瓢各晒乾切片用黃土拌炒微焦黑去黃土研極細末磁餅收貯無論跌打手足木石金刃各傷以及湯火傷並火藥毒箭傷均治凡傷痕已破損見血或已潰爛者將藥乾敷如腫而未破者用黃酒調敷若湯火傷泡起未破者用麻油調敷泡已破乾敷傷重者急以一錢五分熱黃酒一碗沖服不能飲者作二三次服此百試百效之方也

花蕊石散

乳香 沒藥 羌活

紫蘇 蛇含石 童便煨三次

草烏 厚樸 白芷

細辛 降香 當歸

南星 輕粉 蘇木

檀香 龍骨 各二錢 麝香 三分

花蕊石 五錢童便煨七次

右共研極細。罐收聽用。蔥湯洗淨。

刀傷血出不止

血流不止用千年石灰或生半夏研細末敷上或用乾麪和白糖糝傷處均立效  
紫藤香忌銅鐵器故用舊刮石碾

刀傷痛不可止

用此糝之。輒縣紙蓋扎。一日一換。神效。

又被刀傷血出不止。用紫藤香。即降香佳

者。養瓦鏟刮下。石碾碾細敷之。血即止。又無癥痕。

又刀刃傷痛不可止。用好雞骨炭。擲

地上。鏗然有聲者。與松香明透者等

分。捶成一塊。再多用老韭菜擣汁。拌

入陰乾。如此拌捶三四遍。後為細末

出 金瘡腸

近時治金瘡並跌打損傷骨斷筋折血流不止者以七釐散為最驗用飛淨朱砂壹錢二分當門麝香梅花冰片各壹分二釐乳香沒藥紅花各壹錢五分血竭壹兩兒茶二錢四分各研細末稱準淨數再合研極細磁餅收貯臨用先以藥七釐燒酒沖服復用藥以燒酒調敷傷處如見血急以此藥乾糝立時見效并治一切無名腫毒亦照前法調服

收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常  
金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升懸濾淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁啜其背則腸漸入啜時勿令病人知之及多人在旁言語如未入擡席四角輕搖則自入既入者須用麻油潤線縫緊仍以潤帛紮束慎勿驚動使瘡口復迸

箭鏃傷

治箭鏃木竹器傷者用艾絨攤成餅子將火硝細末鋪上再用大蜣螂擣成末鋪火硝上包傷處一日夜即拔出  
治誤吞鍼方以大蝦蟆挖取眼睛酒沖服下其鍼即穿入睛內從大便而出

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共研極細拌入所剉醃肉內再為勻剉令其合一厚敷箭鏃周圍一飯頃其鏃即自為迸脫

治蚌漿掃

凡遇湯火傷一時驟難覓藥先飲童便一盞再將生大黃細末用麻油調敷爛至肌肉者用百州霜三錢輕粉一錢五分研末用麻油敷之

又方用大麥以淨沙鍋炒之以漆黑為度取出隔紙攤土上出火氣研細末爛者乾糝未破者用麻油調敷又方用蛇皮煨存性將真菜油調敷一宿即愈又絲瓜煨灰敷之亦愈

讀律佩臚載此條於層層掃入上有隨乾隨加四字可見不是但掃一次即能見效若去此四字便誤事矣應據增

救湯火傷

湯潑受傷急覓水中大蚌置養盤中將其口向上置無人處俟其口自開時預將冰片二三分真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口即合而蚌內之肉即化為漿然後再入冰麝少許用雞翎黏掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最

冰片摩治

佩臚於火氣已退下有由白轉紅由紅漸淡塗上不即乾即防其潰處腐害二十字此謂慢慢細察轉色又恐不乾腐潰再將蚌殼灰圍掃若但云火氣已退其如何是退便不明白此二十字不可無

禁用冷物

又從邊圍掃下佩臚有俟蚌漿未乾時用絹篩將蚌殼灰勻篩傷處或竟將蚌漿調勻雞翎敷上外以舊絹護之更加揉熟粗紙數層紮束令緊沁去傷中水如覺稍痛仍用蚌漿四面滲入內服甯心散毒之劑以除煩無不立愈等云如此方為詳細又如無蚌處下有如其地有藏冰急取冰一小塊從四圍摩起今錄中將冰塊易作冰片設誤以此為藥品貽害匪淺不可不亟正也應據改

杭粉調塗

驗之第一方也及其火氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面摩起漸及於中亦可漸瘥凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其熱氣遇冷則入之愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣

陳醬寬塗

一法用好杭粉為細末同婦女所用好頭油調塗之如無或栢子油亦可又法用多年陳醬寬寬塗之但愈後有黑癍

劉寄奴糯米漿掃糝

鹽末急糝

大黃醋敷

又用劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃傷著處後糝藥末並不痛亦並無痕大約湯火著急以鹽末糝之護內不壞然後用藥敷之至妙

又用生大黃以米醋調敷二日即愈

地漿灌救

說文暍傷暑也玉篇中熱也漢書武帝紀元封四年夏大旱民多暍死

禁喫冷水

冷水激之暑毒攻內死之必速方書云凡暑病有傷暑有中暑傷暑者或貪受陰涼為寒所襲頭疼發熱霍亂吐瀉宜香薷飲以溫通之中暑者即中暍或遠行勞役大熱而渴陽氣內伏卒然昏暈少與冷水即死亦禁臥冷地溼地急移其人於陰處再以熱土放臍上撥開作窩令人尿其中以生薑或蒜搗汁和童便或熱湯灌之立甦切忌香薷等溫散之品此傷中暑所當分別而治之者也

熱湯淋臍

救中暍

暍死於行路上旋以刀器掘開一穴入水擣之取爛漿以灌死者即活中暍不省人事者與冷水喫即死但且急取竈間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手中熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆

氣海在臍下一寸五分

臍熱土壅

湯溺臍代

蒜水研灌

前言與冷水喫即死此言以冷水送下未免自相矛盾據方書宜改用熱湯下條新汲水亦恐未宜

臍下及氣海間續以湯淋布帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉卒無湯處即掬道上熱土於臍端以多為佳冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處即掬熱土於臍上仍撥開作窩子令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立

生蔥解渴

胡麻研末調服

新汲水乃初出井水不可驟飲惟調胡麻末喫下或可無妨

醒路中倉卒無水渴甚急嚼生蔥二寸許和津同嚥可抵飲水二升中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷為末新汲水調下

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋盛熨心上冷即換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭

炒灰熨心

凡凍僵之人非但火不可近即極熱之茶極熱之湯不可驟與之飲雖其



躡薦捲

害不至如近火之甚但不知而驟飲則滿口之齒盡落冷氣凝結二人相對以足推滾使血活氣舒自然甦醒

溺水凍極毋令近火

杆各本作杆形近而譌據宋本改說文杆摩展衣古案切

寒氣遇火逼入內臟則笑而無救中寒之不可驟近火猶中暑之不可驟飲冷水其理一也

必死。

又用躡或橐薦捲之以索繫定放在平穩處令二人相對躡令滾轉往來如杆躡法候四肢溫即活

冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

此條見奇效良方生薑陳皮下有各一兩三字應據補

齧足呼名唾面徐灌薑湯

說文魘夢驚也方書肝藏魂者也游魂為變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐若肝有邪魂不得歸是以臥則飛揚常多驚魘治法以獨活湯送真珠母丸以安魂定驚湯用人參獨活羌活前胡各一錢茯苓半夏沙參炒棗仁各二錢細辛三分炙甘草五分烏梅半個五味子十四粒生薑一片水煎丸用珠母二錢五分當歸熟地各五錢人參炒棗仁柏子仁茯苓各三錢犀角沈香龍齒各一錢五分為末蜜丸朱砂為衣

救魘

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮搗碎用水三碗煎一碗溫服

魘死不得用燈火照並不得近前急喚但痛齧其足跟及足大拇指頻頻呼其名及唾其面再灌以薑湯必活魘不醒者移動些小臥處徐徐喚之即醒夜間魘者原有燈即存燈無燈者不可用燈照

吹耳刺

鹽湯灌

救非汁灌

元槩本無得嚏二字

灸足大指

鼻阜角吹

蘇合丸調灌

又用筆管吹兩耳。及取病人頭髮二七莖。撚繩刺入鼻中。○又鹽湯灌之。又研韭菜汁半盞灌鼻中。冬用根亦可得嚏。

又灸兩足大姆指聚毛中三七壯。聚乃脚指向上生毛處。

又方。阜角末如豆許。吹兩鼻內。得嚏則氣通。三四日者尙可救。魘死者。若身未冷。急以酒調蘇合丸。

元槩本豆上有大字此脫應據補

鼻非黃刺

阜角半夏吹鼻

沈氏尊生書中惡者口鼻吸著鬼氣也。凡人偶入荒墳古廟人迹罕到之處。忽見鬼物卒然昏倒四肢厥冷。口鼻出清血白沫。慎勿輕動。速令眾人圍繞打鼓熏香。俟甦方可移歸調治。客忤者感觸邪惡之氣也。多於道路得之。即時昏暈。心腹絞痛。脹滿氣沖。心胸不速。治亦能殺人。急取鹽如雞子大炒熱。納酒中灌之。令吐出惡物。然後服藥。

凡人卒死皆一時氣血凝滯。脈絡閉塞。故也。宜用阜角末吹入鼻孔。得嚏則氣通。血活可徐按各症。更以湯藥救之。

灌之即活。

救中惡

凡中惡客忤卒死者。或先病及睡臥閒。忽然而絕。皆是中惡也。用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七寸。令目開血出即活。

視上脣內沿。有如粟米粒。以鍼挑破。又用阜角。或生半夏末。如大豆許。吹入兩鼻。

羊屎熏  
鼻醋汁入

元槩本醋作酒前救溺死篇亦有醋半盞灌鼻中一條又有酒灌鼻中一條當是醋酒均可用也

灸臍吹  
鼻灌耳

灸則艾氣攻達吹則阜角通竅灌則非汁散邪自有奇驗

菖蒲研  
汁灌救

又用生菖蒲研取汁一盞灌之

溫酒灌  
救

驚怖死者以溫酒一兩杯灌之即活

救撲打卒死

控髮吹  
鼻

凡救五絕之法急於人中穴及兩足大指甲外側離一韭葉許各灸三五壯即活  
撲打暈倒在地者用血管鵝毛煨存性一錢乳香沒藥百艸霜各一錢共為末老酒調服即醒  
凡跌打損傷者用人中白煉紅投好醋七次研末已死者勿移動將藥末二錢好酒送下吐出惡血即可救矣  
但移動者不治  
救五絕之法全在通關開竅使氣得展舒此方止用生半夏一味以其能開通關竅作噴嚏也

蘇合丸  
調灌

急以酒調蘇合香丸灌入口若下喉

傷重昏  
暈救法

跌壓與撲打無異。撲打跌壓雖分有心無心而其氣血受傷則一。夫氣運乎血。血本隨氣以周流。氣滯則血凝。而經絡藏府并與俱傷。其患遂不可勝言。大法以導氣行血為主。打撲跌傷內損經絡吐血不止。童便調白芨末服。

此條載見佩臚云。先拳其兩足。束其兩手。又少頃二字。作俟有微氣。又不令洩氣。下有扶坐少頃。然後緩緩呼之十字。此等皆緊要情節。未便抹去。致有遺誤。

去可活。

救跌壓傷

凡跌壓傷重之人。口耳出血。一時昏暈。但視面色尚有生氣。身體尚為鬆軟。則皆可救。但不可多人環繞。嘈雜驚慌。致令驚魂不復。急令親人呼而扶之。坐於地上。先拳其兩手兩足。緊為抱定。少頃再輕移於相呼之人懷中。以膝抵其穀道。不令洩氣。若稍有

童便馬  
溺熱灌

肢體全仗血氣。傷損必加補養。初治消瘀和血為急。若去血過多。脈微欲死者。獨參湯加童便服。接住元氣。

加味四  
物湯灌  
救

知覺。即移於素所寢處。將室內窗櫺遮閉。令暗。仍拳手足緊抱。不可令臥。急取童便。乘熱灌之。馬溺更妙。如一時不可得。即人溺亦可。要去其頭尾。但須未食蔥蒜而清利者。強灌一二杯。下得喉去便好。一面用四物湯。照原方加三四倍。再入桃仁去皮尖。及好紅花各一兩。全當歸及南山楂。搗碎各二兩。生大黃二兩。童便一大鍾。

用急流水取其性速而趨下也在芎  
煎藥欲使藥氣漸漸透達患處也藥  
承鼻下先令藥氣入內然後投藥汁  
緩以受之反有速效也藥先運氣非  
至緊時仍只氣動豈可驟解以洩之  
及動而有聲往來數徧則氣得藥力  
而攻惡血矣故所下盡屬瘀毒切勿  
急急以致有損無益

如係夏月加黃連四五分多用急流  
水即在芎用急火煎半熱傾入碗內  
承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則  
不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓  
服如其不受則姑緩少刻又進只要  
陸續灌盡不可使臥服藥之後其穀  
道尤須用力抵緊不可令其洩氣如  
藥已行動非至緊不可即解恐其氣  
從下洩以致不救也必俟腹中動而

有聲上下往來數徧急不能待方可  
翼之以解所下盡屬瘀紫毒已解半  
方可令睡至所下盡為糞即停止前  
藥否則再用一二劑亦不礙然後次  
第調理不可輕用補藥

四物湯

當歸 一錢  
川芎 七分  
熟地黃 三錢

炒白芍 一錢

治蛇蟲傷

利刀割 遲則毒氣流走上攻及心即死

藍汁雄黃調點

治蛇毒莫妙於斑蘭根先令患者口嚼即以嚼細之滓敷患處此物出自閩廣花有斑點葉有花紋根與蘭花根相似而較細蛇遇此蘭即化為膿并非希罕之物閩廣販藥材者常有帶來第勿以藥肆中之板蘭認作此物致有誤事

米醋燒酒吮傷拔毒

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所嚙之死肉可以漸解  
蛇傷蟲咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末二錢調勻點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛花青黛代之  
虺蝮傷人其毒內攻即死立將傷處用繩絹紮定勿使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸拔其毒隨

白芷麥冬湯調服

五靈脂雄黃酒灌救

蛇咬致潰爛不愈用香白芷為末入膽礬麝香各少許水洗患處令淨以藥末敷之  
此條本夷堅志急下有則字較為明晰

吮隨吐隨換酒醋再吮俟紅淡腫消為度吮者不可誤嚙中毒又急飲麻油一二盞護心解毒以薑末敷之  
被蝮咬死用香白芷一味以麥冬湯調服急以水代之飲之即活  
又方用五靈脂一兩雄黃五錢以酒調灌每服二錢再以滓塗咬處

治顛狗傷

乘毒未發用斑蝥七個去頭足翅淨

斑蝥雞蛋蒸食

顛狗毒最厲人受其咬毒氣入腹頓孕小兒攻脹而死初咬猶可救藥毒

已發則狗形已成不治雖蔽而未破  
但現青紫即已中毒宜急治之  
斑蝥奔走下竅而至精溺之處能下  
敗物用此以毒攻毒但初愈後忌聞  
鐘鼓之聲復發則不可治又畏巴豆  
丹參惡甘艸豆蔻不可不慎  
用防風獨莖者一兩天南星一兩水  
泡七次曬乾為末每服二錢白湯下  
半日再進一服出汗即愈  
又法以細辛五分白芷一錢雄黃一  
錢好酒研入麝香少許一服立效

擠血盡  
多飲薑  
汁

用雞蛋二枚同蒸去斑蝥淡食雞蛋  
於小便內取下血塊痛脹不解則血  
塊未淨仍再食塊盡乃止  
又法用斑蝥同米炒俟米老黃去斑  
蝥將米研末蒸雞蛋食如前法血塊  
下盡為度  
又法受蔽後立至溪河將傷處洗擠  
血淨盡多飲生薑汁則毒可解仍封  
紫瘡口勿使受風

服下未  
久雞蛋  
調礬末  
灌救  
服久磨  
鉛水灌  
救

雞蛋鎮心安藏明礬防毒內攻故服  
砒未久者急用此方若已經入腹則  
用鉛水鉛性重能墜下且解毒安神  
多磨多灌或者濟然終不如後方  
用糞青之為第一也  
凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青  
肢冷用防風二兩煎湯服之即解  
又方柏樹葉搗爛沖生白酒飲之即  
解  
又方楊梅樹皮煎水二三碗飲之即  
愈  
又方用紫蝴蝶花根搗汁頻頻灌之  
立愈  
又方甘艸末一錢明礬五分綠豆粉

救服毒中毒方

解砒毒

砒霜服下未久者取雞蛋一二十個  
打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之  
吐則再灌吐盡便愈但服久砒已入  
腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一  
塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋  
灌盡則愈即先吐出之後亦宜再用  
鉛水服之以盡餘毒方無後患

鴨血糞 一錢新汲井水一碗調灌下如手指紅則活黑者不治

又方用冬青樹葉或用嫩葉更佳帶水搗汁灌下以吐為度或得瀉下亦愈

豆豉湯

解砒毒方不勝枚舉莫靈于用防風

甘艸藍 一兩冷水調服余在京師知此方活人不少後閱紀文達如是我聞載歎

豆腐漿 灌救 人蔣紫垣以醫為業有解砒毒方用之十全即此方也

大豆煮 冷薄粥一碗喫下即止如大豆汁等汁冷飲亦須冷飲若熱飲痢愈不止

大黃等藥冷服

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又

糞青灌之亦解

又方以豆豉濃煎湯飲之可解

又用甘艸汁同藍汁飲之即愈

又用熟豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒痢不止以大豆一升煮汁

飲之

又巴豆畏大黃黃連蘆筍菰筍黎蘆

蕉葉搗汁冷服

各煎冷服皆能止泄  
又用芭蕉葉搗自然汁服之即止

解鼠莽毒

黑豆汁可解○又方用枯蓮房殼帶

蒂梗陰乾咬咀煎水二三碗灌之如

無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯一

碗溫冷灌之毒即散

解莨菪毒

用甘艸汁或藍青汁飲之即愈若服

黑豆汁 解 鼠莽毒以黑豆汁澆其根即爛可知其能解毒矣

咬咀各本譌作咬咀據舊藏鈔本改方書藥之粗齊為咬咀本艸綱目注李杲曰咬咀古制也古無刀以齧細令如麻豆曰咬咀

甘艸藍 汁灌救



杏樹皮  
湯灌救

本艸凡杏仁如誤食雙仁者殺人

藥卽劇。

解苦杏仁毒

用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將死者亦可救。

解斑蝥芫青毒

芫音官

用豬膏、大豆汁、戎鹽、藍汁服之。或用鹽湯煮豬膏、巴豆飲之。又或用大小黑豆汁服之。並瘥。用肥皂水灌下。再以鵝翎攪喉數次。令吐卽活。

豬膏等  
解

各方中以大小黑豆汁解斑蝥芫青毒。須濃煎多服。試之極效。

雞鴨卵  
灌救

生雞鴨卵灌吐。此治危險之症。曾在山左有僕患淋閉。服斑蝥過多。幾至殞命。灌之得吐而活。

又方。用生雞鴨卵開孔。灌入口中。連灌五六枚。得吐卽活。倘閉。以箸抉開灌入。

治菌毒

掘地攪  
水救治

凡菌草如夜中放光者。欲爛無蟲者。煮不熟者。煮汁照人。無影者。上有毛。下無紋者。仰卷赤色者。俱極毒。殺人。飲以地漿及糞青。俱可解。中笑菌毒。飲冬瓜蔓汁。立解。或用苦菜白礬。調新汲井水服之。凡中菌毒。芫花生。研新汲水服一錢。或濃煎防風飲。

四明溫台閒山谷。多產菌。然種類不一。食之。閒有中毒。往往至殺人。蓋蛇虺毒氣所熏蒸也。有僧教掘地。以冷水攪之。令濁。少頃取飲。皆得全活。其方自見本艸。楓樹菌。食之。笑不止。俗

胡蔓艸卽鉤吻亦卽斷腸艸

解胡蔓艸毒

中斷腸艸毒先將服毒人扶正撬開  
牙關剝取生鴨蛋囫圖灌下三箇待  
蛋入胃裏住毒艸次用豬膏鎔化溫  
和灌下一碗又用黃豆一大碗雜雞  
一隻連毛帶腸同豆擣爛用清水一  
碗泡入布袋濾渣取汁灌下其毒卽  
吐如不吐卽用鵝翎探喉毒卽吐出  
但在胃者可治入腸者難治

中胡蔓艸毒將糞汁灌之可解或飲  
浸艸毒水百竅潰血急取抱卵不出  
之雞蛋研細和麻油開口灌之吐出  
可救。

解草毒

金銀花  
生嚼

與菌毒治法一例須參看前治菌毒  
條

誤食毒草至吐卽採生金銀花嚼之  
可解。

飴糖黑  
豆冷水  
救治

解艸烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解之。

甘艸等  
汁救治

射罔卽艸烏頭之汁煎成詳前諸毒  
條內

解射罔毒

用甘艸汁或小豆葉浮萍薺芫汁冷  
水解之。薺芫又名甜桔梗河南人呼  
爲杏葉沙參能解百藥毒

解輕粉冰片毒

鉛壺煮  
酒任飲

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五  
斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重

湯煮一日夜埋土中出火毒每日早

新汲水

解  
桌布洗  
水灌救

鷓鴣肉  
等救治

凡服瀉用生黃豆入水搗爛絞汁或用生大黃二兩搗碎以生豆腐漿一碗同搗數十下灌服俱效

吞金者用上好湖絲剪斷約二寸長置碗內以滾水泡軟如細麩連滾水吞下則絲自裹金從大便出其法神效

晚任飲數杯。溺時以瓦盆接之。當有

粉出。服至筋骨不痛乃已。

冰片毒。飲以新汲冷水可解。

救服瀉

服鹽瀉。將常用擦桌布。洗水灌之。使

吐即解。

治吞金

中黃金毒者。食鷓鴣肉。中白銀毒者。

以黃連甘艸解之。又洗金以鹽。駱駝

輕粉調服

石蟬磨水熱服

金銀光潤者能柔而下。若翦碎而有尖角者。鈎住腸胃。易致斷腸。恐未必能出。有吞金者。金重墜。不能出。醫者惟以升麻等。升提藥。與服。蓋漸提其氣。金必漸動。漸動則漸隨大便而出。若鎮重不移。何由令其轉運乎。凡吞銅錢者。多食核桃及生葶薺。自然消化。吞鍼鐵者。煮蠶豆。同韭菜食。或用黃蠟。鎔化入磁石細末。合勻。擦如鍼大。冷水送下。蠟裹鍼。從大便出。

驢馬脂。餘甘子。皆能柔金。羊脂。獲子。

皆能柔銀。吞金銀入腹中。當服食前

品。柔則易出。

又服金者。用真輕粉為末。水調下。能

令金從大便出。

解藥蠱金石毒

治一切藥毒。蠱毒。金石毒。用石蟬。以

熱水磨服。

解水銀入耳

黃金枕

本州載荷葉松葉松脂穀精州萱州  
巨松夏枯州煎湯服下皆能制汞

以黃金枕耳邊自出。若水銀入肉。令  
人筋攣。以金物熨之。水銀乃出。蝕金  
其病即瘥。

解煤熏毒

飲冷水可解。或蘿蔔擣汁。灌口鼻。移  
向風吹。便能醒。

解飲饌毒

凡中飲饌毒。不知何物。即煎甘艸薺  
芎湯飲之。便治。

冷水葡萄  
汁灌救

甘艸薺  
芎湯解

凡中一切毒。從酒得者。難治。從食得  
者。易治。蓋酒性行諸血脈。流徧體也。  
食入於胃。胃能容雜毒。又逐大便。瀉  
出毒氣。毒氣未流於血脈。故易愈也。

白礬嘗  
試味甘  
黑豆不  
腥  
榴皮湯  
解

蠱多暗藏。飲食內行之中。其毒者。心  
腹絞痛。如有物嚼嚙。或吐下。皆如爛  
肉。或好卧暗室。或乍噴乍喜。或吐逆  
不定。或面目青黃。甚者十指俱黑。其  
毒有緩有急。倉卒或數日即死。  
緩者。延引歲月。游走腸胃。蝕五藏。盡  
則死。

白礬芽  
茶擣飲

此條載見宋蔡條鐵圍山叢談。惟石  
榴皮湯。作石榴根皮。未知孰是。各本  
作皮根。誤叢談下字。上有不字。言不  
大便也。不大便。即上吐如誤。作飲下  
解。便非。

保靈丹  
治一切  
毒

此方當照開藥味。預行修合。以備急  
需。可治諸毒。非僅專治蠱也。

治蠱毒及金蠶蠱

泉州一僧。能治金蠶蠱毒。如中毒者。  
先以白礬末。令嘗不澀。覺味甘。次食  
黑豆不腥。乃中毒也。即濃煎石榴皮  
湯飲之。下。即吐出蟲。皆活。無不愈者。  
李晦之云。凡中毒。以白礬芽茶擣為  
末。冷水飲之。即愈。

保靈丹

治蠱毒諸毒  
一切藥毒

大山豆根

半兩  
雄黃

硃砂

淨細研  
一兩

雄黃黃藥子黃丹麝香均不注若干錢數非是查醫學祕要載此方雄黃等四味各二錢五分應據補

祕要云如遇急用但擇吉日精潔修合以石灰襯紙收乾又於不得嚼破下云病人自覺心頭如拽斷皮條聲須與毒物下或自口出或大便出嫩出血老則成鼈或蟻蝮諸動物隨藥丸並下其病如失瘥後忌酒食發物一月服淡尤妙較此詳明應據改

黃藥子 黃丹 麝香

斑蝥 二錢半 去頭足 續隨子 生杵末 二錢半

糯米 半生 半炒 大赤蜈蚣 二條 生一炙

川巴豆 肥者取肉不 去油二錢半

右藥入乳鉢研和於端午重陽臘日修合宜避婦人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾糞合收每一丸好茶清吞下不得嚼破須與毒物下藥丸凝血並下以水淨

鰻鱺魚 末救治

卷三金蠶蠱毒條上層備載各蠱名目及治法當參看

常山馬兜鈴力能發吐而本艸載馬兜鈴尤為吐蠱要藥

收可救三人

治諸蠱毒用鰻鱺魚乾末空心服之魚或燒炙令香食之其魚有五色文者佳

志云嶺南俚人解蠱毒畏人知其方乃詭言三百頭牛藥或云三百兩銀藥久與親狎始得其實所云三百頭牛藥者土常山也三百兩銀藥者馬兜鈴也俱用水煎服即愈福清縣有訟遭金蠶毒者縣令治之不得蹤或獻謀取兩刺蝟入捕必獲蝟獸類遍身有刺如栗房蓋即山中之刺鼠也金蠶

畏蝟蝟入其家金蠶不敢動雖匿榻下墻缺盡為兩刺蝟擒出之

辟穢方

三神湯能辟屍氣。

蒼朮二兩米泔浸 白朮半兩

甘艸半兩

右為細末。每服二錢。入鹽少許。點

白湯服。

辟穢丹能辟穢氣。

麝香少許 細辛半兩 甘松一兩

川芎二兩

三神湯

各本脫能辟屍氣四字據宋本及舊鈔本增宋本屍作死洗冤錄辨正云言能辟死氣則與後能辟穢氣之辟穢丹稍別毛氏經驗方載有辟瘟丹云時疫大行恐其傳染急服此藥雖與病者同居亦無害藥用丹參壹兩赤小豆壹兩鬼箭羽壹兩雄黃五錢共為末煉蜜丸如桐子大每日空心酒下七丸甚驗

辟穢丹

蘇合丸

此方載見宋時太平和劑局方及蘇沈良方兩書藥共十五味並無天麻台烏白豆蔻肉等三味蘇沈云丸如雞頭實大每服一丸溫酒嚼下大能安氣血卻外邪凡疾自內作不曉其名者服此往往得效惟治氣瘴氣厥氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有神功嘗見嘔血奄奄即絕傷寒日久而死心窩尚煖腹瀉諸藥不效病瘵日漸羸削並霍亂邪氣瘟疫瘧疾疔瘡疔腫等疾服之均驗惟古方雖云用酒化下多不相宜只白湯為佳

右為細末。蜜圓如彈子大。久嘗為妙。每用一圓燒之。

蘇合丸。每一丸含化。尤能辟惡。

犀角尖 丁香 香附

安息香 明天麻 沈香

白朮 檀香 木香

畢撥 硃砂 訶子肉

麝香 蘇合油 白豆蔻肉

台烏 各二兩 大片腦 乳香 各二兩 或一兩

藥味只三十六兩。斷無用蜜至六斤之理。即黃蠟更不能。用三十斤之多。以每藥一錢。作丸計之。不過三百六十丸。嘗以粵東所售之各種蠟丸。權蠟殼之輕重。每殼重一錢二分。合計只須二斤十一兩二錢。是三十斤必係三斤之誤。蜜六斤當是六兩之誤。要在修合時。以意消息為是。

黃蠟 三十斤 或六斤 蜜 五斤 或一斤 金箔 一百片

右藥一十八味。各取淨末。煉蜜搗

和為丸。金箔為衣。用蠟作丸裹之。

或不用蜜丸。別以糯米糊搗和印成香佩亦妙。







