

聖濟總錄纂要

八

國立中央圖書館台灣分館



3 1111 008723684

414.6
18250
26
v.8

1850
26
1.8

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂

要

八



上海大東書局印行

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十七

面體門

面黥黠

論曰。黥黠之狀。點如烏麻。班如雀卵。稀則碁布。密則不可容鍼。皆由風邪客於皮膚。痰飲浸漬。其形外著。或飽食安坐。無所作為。養生方所謂積聚不消之病。使人面目黧奸是也。散之固有常劑。若乃塗澤蠲除。朝夕從事者。又安可已耶。

治面黥黠方

雞

子一枚
去黃

硃砂末一兩

效。二味。先研硃砂為末。入雞子中封固。口與雞卵同。令雞哺。候雞雛出即取塗面。

治面黥黥方

沉香三分

牛黃三分

薰陸香三分

雌黃各半兩

丁香一分

玉屑三分

鷹屎半兩

水銀一分

共八味。先將三味香搗羅為末。次將玉屑雌黃入乳鉢中研令細。方入水銀及諸藥同研令極細。入白蜜調和令稀稠得所。入瓷盒中盛。每至臨臥時塗面黥處。

杏仁膏

治面黥黥。塗之令白潤澤。

杏仁去皮尖雙

黃一兩

瓜子一兩

白芷一兩

零陵香半兩

白蠟三兩

右六味。除白蠟外。並入乳鉢中。研令細。入油半斤。并藥內鍋中。以文火煎之。候稠凝。即入白蠟。又煎攪勻。內瓷盒中。每日先塗藥。後傅粉。大去黥黥。

羊髓膏方

治面黥黥。塗之令光白潤澤。

殺羊脛骨髓二兩

丹 砂半兩

雞子白

三味。先將髓并丹砂入乳鉢中。研令極細。以雞子白調和令勻。入盒中盛。每用時先以漿水洗面後塗之。

益母草塗方 治面黧黯令光白潤澤。

益母草灰一升

一味。以醋和爲團。以炭火煨七度。後入乳鉢中研細。用蜜和勻。入盒中。每至臨臥時先漿水洗面。後塗之大妙。

面肝炮

論曰。面肝炮者。面生皴皸。細起如粟殼狀。由風熱相搏而生。蓋諸陽在於頭面。風熱乘之。結而不散。故成肝炮。養生方說醉不可露臥。及飲酒熱未解。冷水洗面。令人面發瘡。輕爲炮。正謂此也。

白芷膏方 治面肝炮塗面光白。

白 芷

白 斂各三

白 朮三兩

白 芩

細 辛 三兩

白茯苓 半兩

白附子 半兩

右七味。搗羅為末。用雞子白和勻。丸如彈子大。瓷盒中盛。每臥臨時先洗面。後取一丸。以漿水研化塗面上。明旦并華水洗之。不過七日大效。

礬石散方 治面疔炮令白塗面。

礬石 燒令汁盡

白石脂 各一分

白 斂 三分

杏 仁 去皮尖 研半兩

四味並為散。以雞子白調令勻。入瓷盒中盛。臨臥時先用漿水洗面。後塗藥。明旦以并華水洗之。

浮水膏方 治面疔炮令光白。

水 萍 曝乾 五兩

一味。搗羅為末。以白蜜調和。稀稠得所。入瓷盒中盛。每臨臥時塗面。

面鼓炮

論曰。諸陽皆會於面。風邪熱氣客於膚腠。不能流通。因發為鼓炮。形似米粟。色有赤白。亦有緣醉酒露臥。及飲酒未解。以冷水洗濯而得之。有率由風熱在皮膚間。

外感冷氣。擊搏而應。

杏仁膏方 治面皴皯。

杏仁 浸去皮

硫黃 研一

蜜陀僧 研半

礪砂 研一

白鵝脂 鍊成

右五味除鵝脂外。再同研如粉。入鵝脂油。更研令勻。傾入瓷盒子。坐塘灰火中。養之。攪令稀稠得所成膏。每臥臨時以紙拭皯。令乾塗之。

防風散 治肺臟風毒。及過飲成鼓皯。

防風 一兩

石膏 細研

小荆子 一兩

梔子仁 一兩

薺 芎 一兩

枸杞子 一兩

白蒺藜 一兩

甘草 炙半

共八味。擣羅為末。每服二錢。溫水調下。食後服。

面皴

論曰。面皴者。是粉刺也。面上有皴如米粒。此由膚腠受於風邪。搏於津脈之氣。因虛而作。亦去傅胡粉散。入虛肌使之然也。

白斂膏塗方 治面粉皴。

白斂

白石脂

杏

仁

去皮尖雙仁
研各半兩

三味搗羅為末。更研極細。以鷄子白調和。稀稠時所。瓷盒盛。每臨臥塗面上。明早以井華水洗之。

菟絲汁塗方 治面粉皴。

菟絲苗 一握

一味搗絞取自然汁。塗面上。不三五次效。

石粟膏塗方 治面粉瘡癩如麻子。

石 灰二兩

粟 米二合

二味將石灰研細。同粟米內瓶中。以水浸三宿。取出研如膏。暴乾重研如粉。以面脂調勻。入瓷盒中盛。每洗面訖。拭面塗之。

面體疣目

論曰。風邪入於經絡。氣血凝滯。肌肉弗澤。發為疣目。或在頭面。或在手足。或布於

四體。其狀如豆如結筋。綴連數十。與鼠乳相類。故謂之疣目。
去疣目方

石 灰二兩

又方 一味。以苦酒漬七日。滴汁點疣上即落。

牛口中涎

用以塗疣上自落。

又方

艾

一味。作注於疣目上灸之。三壯即除。

狐臭

論曰。陰陽之在人。血與氣爾。二者調適。則行流散徙。莫或底滯。達於形色。暢於膚理。無不得其和。苟失其宜。血氣從而凝積。此所以有狐臭之病。其候不一。有曰狐

殍。有曰體殍。有曰漏腋。狐殍者。指其腋間。體殍者。舉其大概。漏腋則又言其溼而生瘡者。不可不辨也。

治丈夫婦人腋氣不可近者方

右方以開通錢四十九文。用銅筋穿入炭火內燒赤。醋浸四十九次。碾羅為細末。入麝香一分。研和勻。先用熱酒洗腋下。後以藥末揩腋下數次。永除殍氣。

治腋氣人不可近者方

石 灰二兩

桑柴灰一兩

炭 灰一兩

雌 黃一兩

四味同研末。水調塗於腋下。可一食久。即以柳木篦子刮藥。其腋下毛並落。然後用四灰散。

治腋氣四灰散方

粉 霜

艾葉灰

礬石灰

鉛

灰無即用胡粉
蜜陀僧代之

四味唯艾葉灰稍多。餘並等分。研令極細。先以醋漿水洗拭。乾即傅之。不過三五上。永除殍氣。如要試。但傅藥蒜上。良久自無殍。兼治脚汗。

治腋下溼汗不止。及足心手掌陰下股裏。常如汗溼殍方。

乾薔薇根

乾枸杞根

甘草炙各半兩

商陸

胡粉

滑石炙各一兩

右六味。先將四味搗羅極細。即入研者二味拌勻。以苦酒許和塗。當微汗出。夜復更塗之。不過三傅愈。

丁沉丸方 治七竅殞氣。

沉 香一兩

丁香 香半兩

甘草炙半兩

白瓜子仁一兩

藁 本三分

當歸

芎藭

麝香

共八味。研七味為細末。後入麝香拌勻。鍊蜜丸如小豆大。每服溫酒下二十九。日三。含化令徧體俱香。

滅癩痕

論曰。風熱諸毒。留於腑臟。發於肌肉。而為瘡癬。病後瘡愈。餘毒未殄。故瘡痂雖落。而癩痕不滅。治法既有塗澤膏潤之劑。亦須賴榮衛平均。肌溫氣應外。宜慎風冷也。

辛夷膏方 治面上癩痕塗之。

辛夷 一兩

鷹屎白

杜若

細

辛 各半

白附子 三分

共五味。除鷹屎外。並剉碎。以酒兩盞浸一宿。別入羊髓五兩。銀石鍋中以文火煎得所。去渣。將鷹屎研如粉。內膏中攪勻。再以微火煖入盒中。每日三塗。瘡癩上避風。

當歸膏方 治面上癩痕塗之。

當歸

白芷

烏雞糞以豬脂三斤飼雞三日後取乾雞糞各一兩

鷹屎白

半兩與雞糞同研

右四味。先將當歸、白芷剉碎。酒浸一宿。別鎔豬脂一斤。消後入浸藥并酒。文火煎之。候白芷黃色去滓。將雞屎、鷹屎內膏中攪勻。傾入瓷盒中。每日三塗。瘡癩上避風。

臘脂膏方 治面上癩痕塗之。

臘月豬脂 四兩

大鼠 一枚

二味入鐺中。以文火煎之。待鼠銷盡。以新綿濾去渣。入瓷盒盛。每用先以布拭。令癩痕色赤。次以膏塗之。三五度差。慎風。

雞子膏方 治瘡癩痕無問新舊塗之。

雞子 五枚

一味熟煮。取黃於鐺中。炒如黑脂膏。以物先揩癩痕。然後塗膏。日三次。卽自滅。麥麩散 治面癩痕凸塗之。

右方秋冬以小麥。春夏以大麥。細搗爲散。酥和傅封癩痕上。

真玉磨方 治面上癩痕。

真玉

取平處一面磨癩痕。久則無痕。

髭髮門

眉髻髭髮統論

論曰。足太陽血氣盛則眉美。足少陽血氣盛則髻美。足少陰血氣盛則髮美。手陽

明血盛則髭美。夫經絡所至不同。血氣各有所屬。眉鬣髮髭。率本於經絡之血氣。或黑或紺。或黃或白。可以知盛衰。蓋血氣在人。猶水之津也。髭髮猶津之有髭也。津之槁澤。而髭隨之。則髭髮本氣血可知矣。

烏髭髮

論曰。髮本於足少陰。髭本於手陽明。二經血氣盛則悅澤。血氣衰則枯槁。容貌之間。資是以貴飾。則還枯槁為悅澤法焉。可廢乎。

地黃丸方 烏髭髮

生乾地黃 一斤

生薑汁 五合

巨勝子

旋復花

熟乾地黃

乾椹子 各二兩

共六味。除二味汁外。搗羅為末。先將前二味汁用銀器煎熟。看稀稠。將藥末和丸。如彈子大。每服夜飲酒半酣。後含化一丸。

揩牙烏髭方

皂 荑 懷州者 十條

以地黃自然汁。生薑自然汁各半盞和勻。旋刷皂莢於火上炙。以二藥汁盡爲度。研細爲末。入青鹽拌勻。逐日擦齒。藥用經旬效。

鬚髮黃白

論曰。足少陰血氣盛。則髮潤澤而黑。足太陽血氣盛。則鬚潤澤而黑。二經血氣虛。則鬚髮變爲黃白。然則還其潤澤。復其紺黑。雖有傳染之法。曾不如益血補氣爲常服劑。蓋血調適。則滋澤外彰。其視用傳染之功遠矣。

乾漆丸方 治鬚髮白。可以變黑。

乾漆炒令盡

柏子仁炒

生乾地黃

熟乾地黃各一

共四味。搗羅爲末。研糯米飯和。搗三五百杵。塗酥丸如梧桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

治鬚髮黃白。變令黑色。倒行油方。

右方取銀子三兩。作小盒子盛。汞一兩。以乾水蛭七枚爲末。同入盒內。用蚯蚓泥固濟。約半指厚。深埋在馬糞中。十九日取出。已化爲黑油矣。用魚胞裹指頭。

點藥擦之。

白禿

論曰。蟻之為害。因血氣虛。乘風而上。則能生瘡。疽癬。癩。疥。無不為也。瘡痂不去而

痒。鬣髮禿落。無復生榮。是為白禿。

五味子膏方

治白禿髮落。

肉菘蓉

松脂

蛇牀子

遠志各三兩

雄黃研

雞糞白

雌黃研

白蜜

兔絲子五兩以酒浸一宿各一兩

豬脂二

共十一味。先將草藥搗羅為末。次將石藥及雞糞白再研令如粉。下豬脂、松脂入鍋中同熬化。復下諸藥。文火煎稀稠得所。以綿濾去滓。瓷盒盛。每用先以桑柴灰汁洗頭令淨後。塗藥不過三次。髮落生。

赤禿

論曰。諸陽脈皆在於頭。風熱乘之。則陽邪熾盛。發於頭皮腦絡之間。細瘡徧密。赤色有汁。痒痛侵淫。乃至髮落。故名赤禿。

旱蓮汁方 治赤禿髮落塗之。

旱蓮草 三兩

鐵粉 一分

二味。先將旱蓮草搗絞取汁。次入鐵粉。研令極細。入盒中。每用先以泔漿洗頭。次塗之。

牛羊角灰方 治赤禿髮落塗之。

牛羊角 等分
燒灰

一味。研如粉。以豬脂調傅之。

馬蹄灰方 治赤禿髮落塗之。

馬蹄 燒灰

一味。研如粉。用臘月豬脂調塗之。

椹汁方 治赤禿髮落塗之。

黑椹 一斗

一味。內瓶中密封。於北簷下埋之。百日即變爲水。每用淨洗頭。次塗髮即生。

眼目門

眼目統論

論曰。內經曰。肝主目。又曰。在臟爲肝。在竅爲目。難經曰。肝氣通於目。目和則知五色矣。內經又曰。心者五臟專精。目者其竅也。夫目旣爲肝之竅矣。又爲心之竅何也。曰。目者五臟之精華。固不專於肝也。所謂骨之精爲瞳人。筋之精爲黑。血之精爲絡脈。氣之精爲白睛。肉之精爲約束是也。析而言之。則通乎五臟。合而言之。則主於肝。夫惟通乎五臟。故曰精明。五色者氣之華於此乎。觀五臟有餘不足。六腑強弱。形之盛衰。以此參伍。決生死之分。夫惟主於肝。故肝虛寒。則目眵。視物生花。肝實熱。則目痛如刺。肝中寒。則目昏而瞳子痛。肝熱衝睛。則目眇赤痛。生瘰肉。不特如此。神志俱悲而泣下。則以水火相感故也。一水不勝五火。而目盲。則以陰陽各併故也。夫五臟陰陽。其變動俱感於目。又况攝養失宜。動過生疾者耶。或多熱食。或嗜五辛。或喜怒不時。或房室不節。以至凌寒冒暑。處溼當風。哭泣不寐。凡

過用目力。皆至疾病。其候不一。養生者不可不知也。

肝虛眼

論曰。肝虛眼其證不一。巢氏析之。有忽然發腫者。有淚出不止者。有精生翳膜暈者。有視物漠漠不能遠視者。有精彩昏濁。黑白不明而暈者。蓋肝開竅於目。腑臟精華之所聚也。氣血既衰。不足以榮養。故證狀之異如此。龍木論有肝臟虛熱外障。謂其證忽發昏澁。淚出。痒痛摩隱。瞳人黑。睛腫。漸生翳障。視物不明者。宜審治之。

柏子仁丸方 治肝虛視物漠漠。不能遠見。睛輪昏暗澁痛。翳暈時聚。補肝丸。

柏子仁

薏苡仁

烏麻仁

車前子

枸杞子

菴藺子

兔絲子

酒浸別搗末各一兩杜荊子

青葙子

五味子

蛇牀子

桂心

菊花

山藥

熟乾地黄

肉蓯蓉

白茯苓各一兩

各半

酒浸切焙

右十七味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

石決明丸方 治肝虛血弱。目久昏暗。

石決明

免絲子酒浸一宿別研

五味子各一兩

熟乾地黄

細辛

知母

山藥各一兩

七味為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九。空心米飲下。

地黄丸方 治肝虛淚出不止。翳暈侵睛。視物不遠。或睛昏濁。黑白不明。

熟乾地黄

五味子

免絲子酒浸一宿別搗

蕤仁去皮

車前子各一兩

白茯苓

柏子仁研

細辛

甘草

防風各半兩

共十味為末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

肝實眼

論曰。肝氣通於目。其氣平則諸疾不生。過實則生患。乃有肝實眼之證。令人目痛如刺。久不已。則目赤而生淫。膚息肉。治宜瀉之。又當視其老壯。凡人五十以前可

服瀉肝湯。過五十則不可。或有是疾。當不得已而用之。
菊花散方。治一切眼疾。肝熱上攻。羞明畏日淚出。

菊花一兩

蜜蒙花

甘草生

梔子仁

芎藭

大黃各半兩

蒺藜子炒去角

防風

當歸焙切各一兩

九味為散。每服二錢。食後臨臥麥門冬熱水調下。

生地黃湯方。治肝實熱。眼熱痛不止。

生地黃汁

蜜

車前子汁三味和勻各二兩

玄參

升麻

梔子仁各一兩

芍藥半兩

細辛半兩

共八味。羅五味為末。每服五錢。水煎入前三汁。再煎溫服。

點眼煎方。治肝實熱。目皆熱痛。

梔子仁

麩仁

決明子微炒各一兩

石膏二兩

車前葉三合

竹葉二握

秦皮三分

白蜜後入

共八味。剉碎七味。以井華水五斤。煎取汁一升。再入蜜調勻。瓷器中重湯煮如稀餳。每點如大豆許。

羚羊角散方 治肝臟實熱。眼目昏暗。時多熱淚。

羚羊角

羌活

玄參

車前子

黃芩

括蕪仁

山梔子

胡黃連

菊 花各三分

細辛一分

為散。每服二錢。食後竹葉熱水調下。

目胎赤

論曰。目胎赤者。緣在胎時。母嗜五辛。及餌熱藥。傳移胞藏。內稟邪熱。及至生長。兩目赤爛。至大不差。故名胎赤。又人初生。洗目不淨。穢汁潰壞者。亦有之。內外之治小異也。

羚羊角湯方 治胎赤眼久不差。昏暗漠漠。瞳人脹痛。

羚羊角屑三兩

防風

芍藥

蕤仁

麥冬

地骨皮

決明子

甘

草炙各

茯神去木

每服五錢。水煎。食後臨臥服。

治胎赤眼點眼梨汁煎方

梨汁絞汁

古字銅錢文二十七

胡黃連末二錢

青鹽半兩

龍腦一錢

共五味。先將古錢二七枚。重重着青鹽隔。每一重錢。着一重鹽。疊之填滿錢孔。中入火燒令通赤。去灰塵。投入前梨汁中。浸一復時。去錢。將汁煎三五沸。以新綿濾入瓷器瓶內。入胡黃連末。浸七日。去黃連。龍腦末。令勻。要用以銅筋點少許在目眦頭。

治胎赤眼點眼龍腦膏方

龍腦研一

麩仁去皮一分

杏仁七枚湯浸去皮尖雙仁研

三味。研如膏。用人乳汁調和令勻。瓷盒中盛。每用以銅筋點少許在目眦頭。日兩度。

目赤痛

論曰。內經謂心主血。又曰。肝受血而能視。蓋肝開竅於目。若肝氣壅盛。心經熱實。熱氣既熾。血乃滂溢而上衝於目。故令目赤痛也。難經所謂痛者為實。宜散壅滯。決邪實。則病可已。

羚羊角湯方 治肝心氣熱。目赤痛。

羚羊角 鎊

蔓荊實 皮去白

菊花

防風

芍藥 各一兩

黃芩 一兩

玄參 半兩

每服三錢。煎。再入馬牙硝半錢。食後溫服。臨臥再服。

旋復花湯方 治目赤痛。

旋復花

升麻

秦艽

防風

羚羊角

萎蕤 各一兩

黃連

柴胡 去苗

黃柏 去粗皮

甘草 各半兩

每服五錢。水煎。食後溫服。臨臥再服。

乳汁煎點眼方 治肝熱目赤痛。

人乳汁半兩

古字錢十文

二味以乳汁於銅器中磨錢令變色。稀稠成煎即止。內瓷瓶盛。每以銅筋點少許於目眦頭。日三五次。

犀角湯方 治赤目腫痛。

犀角末

秦 芫二兩

黃 連

馬牙硝

滑 石

杏 仁去皮尖雙仁半兩出油

右六味為末和勻。以沙糖一處入藥熬成膏。每用皂子大。沸湯化洗之。

通頂散方 治赤眼腫痛。

苦葫蘆子四十粒

穀精子研一錢

瓜 蒂燒灰十四枚

乳 香研半錢

薄荷葉一錢

五味為末。入龍腦少許。鼻內搗一字立效。

石膏散方 治上焦壅熱。目赤口乾。

石 膏

甘菊花

羌 活

白附子

白殭蠶

玄參

黃連

共七味。等分爲散。每服二錢。生薑茶酒調下。

目熱疼痛赤腫

論曰。五臟六腑之精華。皆上注於目。若風熱搏於腑臟。毒氣乘肝衝發於目。則熱氣外泄。淚下眇多。日夜暴燥。故熱疼痛赤腫也。

地骨皮湯方 治風毒衝眼赤痛。朝乾礮。

地骨皮

甘菊花擇

升麻

黃連

防風

決明子微炒

細辛各一兩

竹葉

共八味。除竹葉外。搗篩。每服五錢。入竹葉七片。同煎服。食後臨臥再服。

龍烟湯方 治眼礮澁如針刺。赤痛昏暗。

生麥門冬一兩

木通一兩

熟乾地黄三兩

旋復花

大青

茯苓

黃連各一兩

每服三錢。水煎入芒硝半錢。攪勻。食前溫服。

地骨皮散方 治風毒氣上攻兩眼。礪澁疼痛。及暴赤眼。

地骨皮

羌活

防風

土蒺藜去刺微炒

甘草炙一兩

為散。每服二錢。荆芥茶清調下。如患暴赤眼。濃煎甘草湯調下。食後臨臥服。

洗眼蕤仁湯方 治目熱赤痛礪澁。

蕤仁去皮

秦皮

防風各一兩

甘菊花半分

竹葉二握

山梔子仁

萎蕤各半兩

共七味。剉如麻豆。以水五盞。煎取二盞半。熱淋冷頓。煖淋洗。痛止則止。即住煎。

藥不得犯鐵器。

點眼黃連煎方 治眼目暴赤。礪澁疼痛。

甘草十二兩

黃連研半兩

二味。於銅器中。以慢火養。令汁涸去半。以綿濾淨。每日兩度點。

目赤爛



論曰。目赤爛者。眵眵俱赤且爛。見風益甚。又謂之風赤眼。此由衝冒風日。風熱之氣傷於眵眵。與津液相搏。故令赤爛也。迎風則癢淚出。遇熱則傷爛眵多。治宜鎮平肝氣。滌洗眵眵。則清淨之竅自然明矣。

菊花湯方

治風毒氣攻眼生瘡爛。

菊花

升麻

黃連去鬚

木通

防風去叉

白茯苓

地骨皮

萎蕤各一兩

右八味。搗篩。每服五錢。入竹葉十片。同煎去滓。空心、日午、臨臥溫服。

茈胡洗眼湯方 治眼赤痛微腫。眵赤爛多時。

茈胡去苗

蕤仁去皮

黃連去鬚

升麻各一兩

右四味。搗篩。以水三升。煮取一升半。濾去滓。微熱淋洗。如冷再煖。洗三徧。

黃連散方 治赤白眵爛生瘡。衝風淚出。

黃連去鬚

雄黃各一兩

細辛去苗

黃柏去粗皮

乾薑一分

右五味。搗羅為散。研令極細。以密器盛。每用二黍米許。點兩目眵。日三度。

目血灌瞳人

論曰。目屬肝。肝受血而能視。則目瞻視必資血。苟因物損傷。致血脈散亂。則敗血侵睛。灌注瞳人。害於瞻視。不早治。或致喪明。故謂之血灌瞳人。

人參

赤茯苓

細辛

桔梗

車前子

各一兩

防風

去叉

五味子

各半兩

共七味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。食後臨臥再服。

決明湯方 治血灌瞳人。

石決明

人參

川芎

細辛

五味子

各一兩

赤茯苓

二兩

右六味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。食後臨臥服。

沒藥散方 治血灌瞳人。

沒藥

半兩

麒麟竭

大黃

炒

芒硝

各一兩

右四味。搗研為細末。每服三錢。熟水調下。空心食後。日三。

赤脈衝貫黑睛

論曰。眼者五臟之精華。若風邪熱毒。內干於臟腑。則隨其經絡上衝於目。故令赤脈衝貫黑暗也。上下左右。各有部分。不可不察。其從大眥侵睛而癢者。肺胃熱也。其從小眥起者。手少陽脈動虛熱也。其自上而下者。足太陽脈動邪熱也。其自下衝上者。足陽明脈動邪熱也。其源不同。當察其部分。依經以治之。

通明湯方 治三焦熱。小眥偏赤。赤脈射黑睛。

- 木通
- 萹 蕪
- 甘草 炙各一兩半
- 枳
- 殼 去瓢 炒

黃 芩 去黑心

右五味。搗篩。每服五錢。水煎。入芒硝地黃汁各少許。再煎沸溫服。

黃耆湯方 治眼上下赤脈貫黑睛。

- 犀 角 屑各半
- 苦竹葉 五十片
- 知 母
- 升 麻

右六味。搗篩。每服五錢。水煎。入芒硝少許。再煎溫服。
摩頂明目膏方。治風熱衝目。赤脈胥肉。

生麻油二升

真酥五兩

車前葉

淡竹葉

洗各半兩

吳藍

大青

黃連去鬚

山梔子仁

麥門冬

槐白皮

甘草炙

柳白皮

黃芩

馬牙莧實

生犀角鑊

馬牙硝

別研

朴

硝別研各一兩

鹽花研半兩

右十八味。除硝鹽油酥外。細通油瓷瓶中。綿罩口。重湯煎三復時。捩去滓。更新綿濾過。置生鐵器中。每日飯後及臥時。開髮滴頂心。以生鐵熨斗子摩頂一二千下。兼去目中熱毒。昏障痛澁。

墜生睛

論曰。墜睛者。眼因賊風所吹。血脈受寒。貫衝瞳人。風寒氣隨眼帶牽拽。眼瞳向下。名曰墜睛也。日久不治。瞳人損陷。遂致失明。

犀角散方 治墜睛眼。時發疼痛。視物散亂。

犀角

羚羊角各半兩

青牛膽一枚

五味子

槐實

茺蔚子

青蘗子

惡實

胡黃連

盧會研

地骨皮各一錢

兔肝炙乾具乾

右十二味。除膽外。搗研為末。以膽汁拌勻。每服二錢。煎槐子湯調下。臥再服。忌發熱毒物。

槐實丸方 治墜睛失明。眼睛牽陷。

槐實

羚羊角

獨活

地膚子

天麻

沙參

人參各一兩

防風去叉

甘菊花

枳殼炒各一兩

決明子二兩

右十一味。搗羅為末。鍊蜜和搗百杵。丸如梧桐子大。每服三十九。空心。臨臥漿水下。

蟹目

論曰。臟腑壅滯。肝經積熱。上衝於目。令人目痛睛疼者。毒氣結聚。甚則黑睛上生。黑珠子。如蟹目狀。故以名之。或有如豆者。名曰損翳。或曰離睛。又曰蟹睛。病極難治。不可鉤割。及傳諸毒藥。唯宜服宣泄之劑。使邪熱退。病差矣。

瀉肝補膽防風湯方

治蟹目疼痛。

防風半兩

遠志

黃芩

人參

桔梗炒

細辛

芍藥各一兩

右七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

萎蕤犀角散方 治眼生蟹目。黑睛疼痛。

萎蕤

犀角

蕤仁湯浸去赤皮

黃連去鬚

黃芩

梔子仁

甘草

升麻各等

共八味。搗羅為散。每服三錢。水煎。食後。臨臥溫服。

瀉肝黃芩羚羊角湯方 治蟹睛疼痛。

黃芩

羚羊角

赤芍藥

細辛

桔梗炒

人參

遠志

甘草炙各半兩

防風去叉一兩半

右九味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。日再。

目珠子突出

論曰。人因風熱痰飲。攻瀆腑臟。陰陽不和。肝氣蘊積。熱毒之氣上衝於目。使目睛痛疼。甚者突出。治宜先服寒藥。以瀉肝氣。然後調治。勿求速效。惟漸治之。仍須微鍼引出惡汁也。

麥門冬芫蔚飲方 治風熱攻目赤痛。目睛欲凸出者。

麥門冬

芫蔚子各二兩

桔梗炒

防風

玄參

知母各一兩

黃芩去黑心

天門冬去心各一兩半

右八味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

黃連湯方 治風毒衝眼赤腫。睛欲突出。洗眼。

黃連去鬚

秦皮

黃柏去粗皮各一兩

乾棗十枚

麩仁三分

右五味。呔咀如麻豆大。拌勻。每用一兩半。以水四盞。煎至二盞。稍熱去滓。抄洗眼。冷卽重煖。日三度。

治睛眼忽然突出一二寸者。冷水灌。

右方急取冷水灌眼中。數次換水。須臾睛當自收。

目見黑花飛蠅

論曰。腎水也。肝木也。木得水而盛。其理明矣。腎水既虛。肝無以滋養。故見於目者。始則眈眈不能矚遠。久則昏暗見黑花飛蠅。其證如此。腎虛可知也。治宜以益腎水。去肝風之劑。則標本兩得矣。

治肝腎風虛。眼生黑花。宜服此方。

磁

石二兩燒醋淬七遍細研水飛

神

麴四兩炒

珠

砂一兩細研水飛

右三味。搗羅爲末。鍊蜜和搗一二百杵。丸如梧桐子大。食後酒下二十九丸。治肝腎虛風上攻。眼生黑花。頭目不利。能通神延年。

川椒一斤

一味。揀淨。去目并閉口者。於鉢內炒令透。於地上鋪淨紙二重。新盆合定。周迴用黃土培之。半日去毒。出汗。然後取之。乾為度。只取椒於瓷盒子內收。每日空心新汲水下十粒。

五倍子丸方 治眼見黑花。去翳明目。

巴戟天一兩

枸杞子揀二合

甘菊花三兩

旋復花四兩

蜀椒去目并閉口者五兩

右五味。將椒入銀器內。入青鹽四兩。醋三升。慢火煮乾。如器物小。旋添醋煮。候醋盡。又將椒與前四味焙乾。杵為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九至四十丸。空心。午夜。臨臥溫酒。或鹽湯下。

枸杞丸方 治肝腎風氣上攻。眼生黑花。

枸杞子久暴二兩

巴戟天穿心紫色者去心

椒去目并閉口者炒出汗各一兩

旋復花擇淨

右四味。擣為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九丸。臘茶下。不拘時。兔肝丸方 治肝腎毒風攻衝。眼生黑花。昏暗視物不明。

兔肝去筋膜切焙

羌活

黃連

菊花各三分

地骨皮

龍齒

防風

蒟胡

車前子

青葙子

白附子

萎蕤各半兩

右十二味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後竹葉湯下。

息肉淫膚

論曰。脾肺有熱。蘊積不散。傳播肝經。流注血脈。上衝於目。發於瞼眥。息肉脹起。攀系白睛。隱澁妨悶。故謂之息肉淫膚。

桔梗湯方。治目生雞冠蜆肉。

桔梗

大黃炒

細辛

黃芩

玄參

芒硝鍊過者各一兩

防風

車前子各半兩

右八味。搗篩。每服三錢。水煎。食後溫服。

點眼蝸牛漿方。治息肉淫膚。赤白膜。曾見人說。治小兒痘後生翳。以蝸牛汁。丹

砂滴目中效。

生蝸牛一枚

一味去其掩。內丹砂末於口中。火上炙沸。以綿注取汁。傅於眦中立效。

點眼雀糞膏方 治息肉淫膚赤白膜。

雄雀糞

一味取細直者。以乳汁和研。細點傅眦上。

又方

杏仁雙仁用七枚

一味嚼細吐於手掌內。以綿纏筋頭。點於胬肉上。不過三五度差。

點眼食鹽膏方 治眼中息肉。

食鹽研一分 驢脂一兩

二味先熬驢脂。後下食鹽。調成膏。以銅筋點如黍米許。於目眦頭。日三夜一。

通神膏方 治眼生翳膜赤脈息肉。澁疹痒痛有淚。

白沙蜜四兩 青鹽研 麝香研各 礪砂飛過

白礬飛過 當歸為末 黃連去鬚為

右八味。同研令勻。入青竹筒內。慢火煑半日。候冷綿濾去滓。瓷瓶收貯。每點眼了。瞑目少時。以溫湯洗。翳與息肉等俱平。

目生贅肉

論曰。目生贅肉者。由脾肺不利。風熱乘之。其候或痒或痛。赤瘀而爛。壅熱既久。息肉增長。近則侵睛輪。大則覆瞳人。治不可緩。鈎割熨烙。各自有法。至於祛風滌熱之劑。豈可偏廢哉。

玄參散方 治目赤痛。贅肉滿疼。

玄參

甘菊花

決明子

大黃炒

苦參

車前子

枳殼麸炒

山梔子仁

防風

黃連去鬚

升麻各二兩

右十一味。搗羅爲細散。每服三錢。食後以米飲調服。臨臥再服。

決明散方 治眼生贅肉侵睛。及贅肉生瘡。暈眼赤。

決明子

車前子

青箱子各半兩

黃連去鬚

萎 蕤

甘草炙

羚羊角

枳 殼 麸炒

芎 藭 各一兩

右九味。搗羅為細散。每服三錢。食後溫漿水下。臨臥再服。

升麻丸方 治目熱痛。胬肉生瘡。

升 麻

車前子

黃 芩

羌蔚子

玄 參

決明子炒

龍 膽

山梔子仁

防 風

甘 草 炙

生地黃

地膚子 各一兩

右十二味。搗羅為細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九丸。食後溫漿水下。臨臥再服。加至三十九丸。

點眼艾熏散方 治目生胬肉。

蕤 仁 研細一兩

膩 粉 一錢

牛 酥 一兩

熟 艾 如鷄子大許

右四味。搗三味。入乳鉢中。研令極細。攤開。次取艾火燒。將乳鉢覆。令煙熏之。候燒盡艾煙。以槐木椎碎研。令煙氣勻。然後少少點眼。皆頭。日三五度。

鯽魚貼方 治目生胬肉。澁痛。

鯽魚鮮者

一味。去皮骨淨。取肉一片。中央開一竅。正貼眼上。日三五度易。

目內生瘡

論曰。目內生瘡者。以脾臟毒熱。熏蒸於上。鬱而不散。遂令瞼內生瘡。其初患時。或痒或痛。發歇無常。或多眵淚。皆門如丹砂色。於是漸有翳膜。龍木論謂不宜點藥。鍼灸惟宜服瀉脾清膈之劑。滌蕩本源。當如是也。

決明子丸方 治肝肺熱毒氣攻。兩眼生瘡赤痛。

決明子炒

菊花

秦皮

黃連去鬚各一兩

車前子

地骨皮各一兩半

黃芩

羚羊角

生乾地黄焙

山梔子

萎蕤

秦艽各一兩

青蘗子

白茯苓各一兩半

升麻一兩

右十五味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九。食後溫水下。再服。

梔子湯方 治肝心熱毒。目生瘡及矜痛。

梔子仁 半兩

犀角屑 一兩

木通

黃芩 各半兩

大黃 炒

瞿麥穗 各一兩

黃連 去鬚

車前子 一兩

右八味。搗篩。每服五錢。入竹葉七片。同煎入芒硝末半錢。放溫服。日二。

清涼包子方 治眼赤熱生瘡退翳。

黃連 爲粉

一味。用水一碗。面東撲取。倒流水些小。將黃連末勻摻在碗內。用熟艾一塊。如雞子大。安在古錢七文上。四面更用青銅錢四十文。足作四塊。塚子覆黃連碗在上。點火燒艾。候煙盡。更掃下黃連末。用夾絹袋子盛了。取孩兒乳汁浸。時時點在眼中。覺口中苦透爲度。如暴赤眼。用之立效。

目膿漏

論曰。目膿漏者。緣血脈壅熱。傳入於足太陽膀胱之經。膀胱之脈起於目內眦。則令人臉皆腫痒。久即成瘡。濃汁時下。綿綿不絕。如器津漏。故謂之膿漏。不治則膿毒淹漬。穿壞白睛。黑點相連。即難治療。

防風湯方 治眼漏睛膿出。

防風 二兩

地骨皮

遠志

白茯苓

人參

黃耆 各一兩

大黃 炒

知母 各二兩

右八味。搗篩。每服一錢。水煎。食後。臨臥溫服。

龍腦散點方 治睛漏瘡。目大皆出膿。汁有竅。

龍腦 研

馬牙硝 各半兩

菴豆粉 一錢

三味。同研極細。用燈心黏藥。點之。再點。

目生珠管

論曰。目生珠管者。風熱痰飲漬於肝。血氣蘊積。津液結聚所由生也。肝藏血。故肝受血而能視。氣調血和。則精華見於目。今邪乘於肝。肝氣受病。為風熱熏蒸。痰飲漸漬。使血氣壅闕。上衝於目。津液結聚。狀如珠管。故以名焉。

銅青丸方 治眼生膚翳垂珠管。

銅青 一兩

細墨 半兩

二味。合研爲末。醋和丸。如白豆大。每用一丸。以乳汁、新汲水各少許浸化。以銅筋點之。

鉛丹膏方 治眼卒生珠管。

鉛 丹 半兩
鯉魚膽汁 量鉛丹多少用

二味。合調如膏。點目眇中。日三五次。

治卒生珠管方

白 蜜

一味。以少許點目中。仰臥令淚出。半日許洗之。

雀目

論曰。晝而明視。暮不覩物。名曰雀目。言其烏鵲不能見於夜也。夫衛氣晝行於陽。夜行於陰。陰血受邪。肝氣不能上榮於目。肝受血而能視。今邪在於肝。陰血澀滯。至暮則甚。故遇夜目睛昏不能覩物。世謂之雀目。

防風煑肝散方 治雀目

防風去義

黃連去鬚

穀精草

黃芩

甘草炙

天南星各一兩

蛤粉半分

右七味。搗羅為細散。每服一錢。用羊子肝一片。銅竹刀批開。摻藥在內。以麻繩纏定。研粟米飯一大盞。銀石鍋內煮熟。放溫。臨臥嚼服。切不得犯鐵器。病甚者不過再服必效。

鬱金散方 治雀目。

鬱金三兩

新牛膽一枚

豬膽二枚

蛤粉三兩

大黃炙半兩

黃連去鬚半兩

雄黃一分

共七味。將五味為細散。并豬膽拌和。入牛膽中填滿。陰乾為細散。每服大人一錢。小兒半錢。食後新汲水調下。赤眼、氣眼、疳眼亦能治之。

煮肝散方 治雀目咫尺不見物。

紫芥菜子員香炒令黑色。碾為細散。用羊肝一具。分作八服。每用散二錢。捻在肝上。以筭籜葉裹煮令熟。放冷服。以煮肝湯下。不過一具肝。永除根本。臨臥時服。

還睛丸方 治雀目。

人參

細辛

白茯苓

木香

知母

芎藭各一

石決明

羌蔚子各二

共八味。搗羅為細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心茶下二十九。

目瞼垂緩

論曰。眼瞼垂緩者。以血氣不足。膚腠開疎。風邪客於瞼膚。其皮垂緩。下覆睛輪。故俗乎為睢目。又曰侵風。久之則垂覆愈下。眼閉難開。

羌蔚散方 治風毒攻眼瞼垂下。

羌蔚子

防風

羌活

蔓荊實

玄參

細辛

甘菊花

黃芩

車前子

甘草各一

大黃炒半

右十一味。搗羅為散。每服四錢。水煎溫服。食後臨臥各一。

竹葉湯方 治眼熱毒。瞼垂腫遮睛。

苦竹葉

黃連去鬚

黃柏

梔子仁各一兩

麩仁湯浸去皮半兩

右五味。細剉。以水五大盞。煎至二盞半。去滓溫服。澄清洗眼。日五七次。

黃耆丸方。治氣血不足。膚瞼下覆。睛輪垂緩難開。又名睚目。

黃耆

蒺藜子炒去

生乾地黄焙

苧胡

甘草炙

梔子仁

苦參

白朮

白花蛇酒浸去皮骨各一兩防

風去義

菊花

茯苓

山藥

秦芫各三分

天門冬

枳殼炒

白檳榔各一兩半

右十八味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

升麻散方。治風邪客於瞼。膚其皮垂下。緩覆睛輪。眼閉難開。

升麻

山茱萸各三分

甘菊花

細辛各半兩

蔓荊實

山藥

防風各一兩

右九味。搗羅為散。每服三錢。溫酒調下。

目瞼腫靨

論曰。目瞼腫靨者。內因肺肝積熱。上衝於目。外為風邪所搏。風熱留結在於瞼眥。血氣不得宣通。故令腫靨。久不差者。多成風粟細瘡。眵汁淹漬。浸壞眼目。先宜鎌洗出毒。然後以藥攻治。則病可差。

黃耆湯方 治目瞼腫赤腫痛。

黃耆

芎藭子

麥門冬各一兩半

地骨皮

玄參

黃芩

知母各一兩

右七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。日三。

大黃桔梗散方 治目瞼腫靨刺痛。

大黃兩半

桔梗炒

黃芩

玄參

羚羊角

白茯苓

人參各一兩

七味。搗羅為散。每服一錢至二錢。食後。臨臥米飲調下。日三。

洗眼防風湯方 治風熱客搏。目瞼腫靨。

防風

秦艽

甘菊花各二兩

蕤仁湯浸去皮

竹葉一握

梔子仁

萹荑各半兩

右七味。細剉令勻。每服一兩。以水三盞。煎取一盞半。綿濾去滓。每煖洗之。

倒睫拳攣

論曰。臟腑久積風熱。內熏肝經。衝發於目。始則腫赤。隱痛多淚。日久津液澁少。瞼皆皮急。致睫拳倒刺隱瞳人。治法當起去毛睫。又刺太陽經令出血。及鉸鎌除其惡血。仍服除風退熱之劑。

防風湯方 治風熱衝肝目多倒睫。

防風

甘菊花

旋復花

決明子炒

萹荑

麥門冬

梔子仁

黃連

甘草炙

升麻

秦皮各等分

右十一味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

車前子散方 治倒睫赤眼。疼痛不開。

車前子 二兩

馬蹄決明 微炒

蕤仁 各半

地膚子

龍膽

甘草 炙

菊花 各半

青箱子

山梔子仁 各一 前胡 三分

右十味。搗羅爲散。每服二錢至三錢。空心粟米飲調下。食後、臨臥再服。

洗眼湯方 治風熱攻目。礮澁疼痛。漸致倒睫。

蕤仁

秦皮

防風 各一

山梔子仁

菊花

萎蕤 各半

竹葉

右七味。細剉。以水三升。煎取一升半。乘熱淋洗。冷卽再煖。作三度使。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十八

眼目門

目生膚翳

論曰。目生膚翳者。以腑臟氣血虛實不調。加以風邪痰飲。鬱於膈上。熏蒸既久。衝發於目。乃生膚翳。其睛上及瞳人有物如蠅翅狀。是為膚翳也。
決明子丸方 治久患膚翳。遮覆瞳子。

決明子炒

麩 仁去皮

地膚子

白茯苓

防 風

麥門冬

澤 瀉

羌 蔚子

枸杞子

五味子

青葙子各一兩

細辛

車前子

兔絲子

酒浸別搗末三分

生乾地黄二兩

桂

心去粗皮半兩

黃芩

杏仁

右十八味搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後以米飲下。臨臥再

服。九月服此藥。加兔肝一兩。至二月停甚妙。

盧會丸方

治眼熱赤痛及生膚翳。

盧會研半兩

鯉魚膽取一枚

牛

膽乾者半兩溼者用汁一合

熊膽研一分

石決明剖削一兩

麝

香半分

車前子一兩

右七味除膽外。搗研為細末。後入汁同和勻。鍊蜜丸如梧桐子大。食後米飲下

二十九。加至三十九。

貝齒散方

治目風熱赤生膚翳點眼。

貝齒七枚燒為末

珍珠一分為末

龍

腦研半錢

三味合研如粉。每點眼時。用黍米大。於翳膜上。日三度。

菊花散方

治眼目膚翳。侵及瞳人。如蠅翅狀。

菊花

防風

木通

木賊

僊靈脾剉

荊芥去梗

甘草炙各一兩

右七味。搗羅爲散。每服二錢。食後茶半錢。同點溫服。

目生花翳方

論曰。目生花翳者。點點色白。狀如棗花魚鱗之類是也。此由肝肺實熱衝發眼目。其始則目痛淚出。變生白翳。宜急治之。不爾則致障翳也。

桑白皮湯方。治目生花翳白點。狀如棗花。

桑根白皮

木通各半兩

羚羊角

澤瀉

黃芩

旋復花

川大黃炒

玄參

茯苓神一兩以上各

甘草一分

甘菊花半兩

右十一味。搗羅爲細散。每服二錢。水煎溫服。

羚羊角湯方。治眼生白翳如棗花。

羚羊角

大黃炒

桑根白皮

黃連

決明子

黃芩去心 黑

甘菊花各一兩

甘草炙各

右八味。搗篩。每服三錢。水煎煮。食後溫服。

退翳僂朮散方 治眼生花翳。

蒼朮二兩 米泔一宿 焙 木賊

甘草炙各

穀精草

蟬蛻各一分 蛇蛻洗焙

黃芩半兩

共七味。為散。每服一錢。空心臨臥。冷水調下。

目青盲

論曰。龍木論稱內障有變青盲者。初患之時。昏暗。不癢。不痛。亦無翳膜。至於失明。與不患者相似。是知青盲之狀。外無異證。瞳子分明而不見物。由肝腎氣虛。精血衰弱。不能上榮。故目盲而無所見者。經曰。肝氣通於目。目和則知白黑。養生方乃以塞故井水瀆。令人目盲。豈其本哉。

羊肝丸 治內外障。青盲雀目。眼生黑花。白翳。十年以上者可治。

羯羊肝一具 切片 炙 仁一兩 錦文斑鳩一隻 去頭足腸 取肉 炙為末

細辛

防風

黃連去鬚

瞿麥子

蒺藜子

桂

甘菊花

牡蠣燒為末
各五兩

羌活三兩

白茯苓四兩

蔓菁子五升
七遍蒸

決明子炒二兩

右十五味搗羅十二味為末。入羊肝、斑鳩、牡蠣末、乳鉢內同研勻。鍊蜜和丸。如

梧桐子大。每服二十九。食後臨臥茶清下。

澤瀉湯方 治肝臟熱衝目赤。瞻視漠漠。積年青盲不見物。

澤瀉

杏仁湯浸去
皮尖研

決明子炒

大黃炒

黃芩

甘草炙

枳實熬炒

芍藥各一兩

梔子仁

人參

赤茯苓

黃柏

細辛

白朮各半兩

柴胡四兩

青葙子一兩

桑根白皮炙三兩

升麻一兩

右十八味搗羅。每服五錢。水煎。入生薑半分同煮。再入芒硝半錢。放溫。食後臨

臥服。日再。

真珠散方 治眼青盲。

真珠末 三分

胡黃連 三分

石決明 三兩搗碎
細研水飛 琥

珀 三分

地膚子 一兩

天靈蓋 三分
燒灰

母猪肝 半兩切
炙乾

右七味搗羅爲散。每服二錢。食後溫水調下。臨臥再服。日三。

治青盲烏雞丸方

右方用黃荊嫩頭春初取之。九蒸九晒。取半斤。用烏鷄一隻純黑者。以米飼五日。安淨版上。飼以大麻子。又二三日。旋收糞暴乾。取入淨瓷罇子內。熬糞令香黃。然後和荊頭搗成末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。陳米飲下。加至二十九丸。日二服。

將變內障眼

論曰。眼疾始於浮淺。久而弗圖。變爲內障者。非一端也。龍木論內障皆有其漸。蓋從一眼先患。後乃相牽共損。是肝腎氣虛。風邪熱毒。上攻眼目。氣血衰微。久則爲害。但不痛不疼。亦無眵淚。目視如輕烟。或如薄霧。或見垂絲。或見蠅翅。或見飛蚊。其初若無足慮。至其成內障。則慢慢不知矣。今以將變內障者。敘之。蓋圖難於易。

之意也。

瀉肝飲方 治雷頭風。恐成內障。先服瀉肝飲。後服磁石丸。

防風二兩

五味子炒

細辛

車前子

黃芩

茺蔚子

桔梗炒

大黃炒

芒硝研各一兩

右九味。搗篩為粗末。每次服三錢。水煎去滓。放溫。食後。臨臥服。

磁石丸方

磁石二兩燒赤醋淬七遍 五味子炒

牡丹皮

附子去皮

玄參各一兩

右五味。搗羅為細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九。空心鹽湯下。

黃耆丸方 治肝虛勞。兼膀胱久積虛冷。目眩見花不明。漸成內障。

黃耆

白茯苓

石斛去根各二兩

鹿茸去毛酥炙一兩半

五味子炒二兩

防風去叉

生乾地黄

覆盆子

酸棗仁

牡丹皮各三兩

右十味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。空心溫酒下。加至三十丸。

蕤仁丸方 治內外障眼。

生乾地黄焙一兩半

菊 花焙一分一兩

蕤仁三兩

黃連去鬚

車前子各二兩

人參

麥門冬各三兩

防風

黃芩

青葙子湯浸

秦艽

羚羊角各一兩半

甘草炙

丹參炒

決明子炒

天門冬

地膚子

升麻炒

苦參炒

地骨皮

羌活

玄參炒各一分

右二十二味。搗羅拌勻。鍊蜜和丸。如梧桐子大。食後煮百合湯下二十九。加至三十丸。但有瞳人。不拘內外障翳。並治。

目眇曠

廣音眇目汁凝目傷皆曠目赤也眇音眇曠音滅

論曰。目者五臟之精華。肝之外候。津液之道也。若腑臟挾熱。內熏於肝。衝發於目。

使液道熱澀。結滯於眥。則成眇。眇。

羚羊角散方。治風熱衝肝。上熏於目。結成眇。眇。

羚羊角二兩。犀角一兩。

桑根白皮

生乾地黃焙

防風

五味子

白蒺藜炒

牛膝

羌活

芍藥各三分

為散。每服二錢。水煎溫服。

淋洗秦皮湯方。治目生眇。眇。

秦皮

柴胡

黃連去鬚

黃柏

蛇銜各二兩

苦竹葉二握

細辛一兩

每一服用藥二兩。河水細煎濃去滓。須熱淋洗眼。冷即再煖洗。

黃柏膏點方。治風熱衝目。多生眇。眇。

黃柏去粗皮一兩

麩仁半兩

大棗青州者三枚劈

三味以水三升。同內瓷器中。慢火煮至一升。去滓取清。再以淨瓷瓶子收。每用

銅筋點眼。日五度。

眯目

論曰。眯目者。簸糠飛塵等物。入於目中。治宜亟出之。久不出。着於臉眚。因而傷動。則爲澀痛淚出。古方初眯時。令綿裹筋。擦去之。或以墨汁。或以雞血。浮出者皆良。

治雜物眯目不出方

桑根白皮

一味。取新者。一片如筋大。削一頭薄。椎令軟滑。漸漸入目中撥之。須臾自出。

又方

猪脂一分

一味。取塞鼻。隨左右用之。

又方

生粟米七顆

一味。爛嚼。并唾洗之。卽出。

治雲母等入眼方

好墨

研爲細末。用新筆蘸點眼大小皆頭。卽時隨墨出

又方

鷄肝中血少許

取滴目中卽出。

又方

衣中白魚

暴乾研爲末。點皆頭卽出。

又方

酥

以少許內鼻中。隨眯目左右垂頭。臥少時。令流入目中。淚與眯物同出。

鍼眼卽偷

論曰。鍼眼者。以邪熱搏於血脈。上攻眼目。發瞼皆結。焮腫痛。赤根白頭。包裹膿汁。痛如鍼刺。治法當詳其外證。隨宜砭刺。決泄邪毒。後以消毒敗熱之劑。斷其根本。半夏湯方。治目熱客目眦。結成腫泡。俗呼偷鍼者。

半夏湯方

半夏

夏湯浸七

細辛各一

前胡

枳

殼數炒各

烏梅肉半兩

每服五錢。水煎。入生薑三片同煎。食後。臨臥溫服。

芍藥湯方。治熱毒攻目眦。目腫起。有膿汁者。

赤芍藥半兩

羚羊角

玄參

防風

黃芩各一

蔓荊實

甘菊花各三錢

每一次服五錢。用白水煎濃。入馬牙硝一錢。俟食後。臨臥時溫服。

點眼蕤仁膏方。治熱毒攻注目眦。腫結赤痛。

蕤仁研去

黃柏去粗

青竹茹洗切

秦皮各一

梔子仁半兩

剉碎拌勻。以水三升。入銅器中煎取一升。以綿濾取清汁點眼。日三五度。

耳病門

耳病統論

論曰。腎氣通於耳。心寄竅於耳。氣竅相通。若牕牖然。音聲之求。雖遠必聞。若心腎氣虛。精神失守。氣不相宣。內外窒塞。斯有聾曠之疾。經所謂五臟不和。則九竅不通是也。

耳聾

論曰。耳聾之證有二。有腎虛精脫而聾者。腎氣通於耳也。有經脈氣厥而聾者。經脈終於耳也。腎虛而聾者。其候面色黑。氣厥搏於耳而聾者。其候耳中輝輝焮焮。或耳中氣滿是也。輝輝焮焮。過在手少陽。耳中氣滿。過在手太陽。以至五絡皆會於耳中。各有證候。審而治之。

肉菴蓉丸方 治腎虛耳聾。

肉菴蓉 酒浸切焙

兔絲子 酒浸搗餅

白茯苓 去黑皮

山藥

人參

熟乾地黄

桂皮去粗

防風去義

芍藥

黃耆半兩

附子去皮

羌活去蘆

澤瀉各一

羊腎一對批去筋膜炙乾

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九。空心溫酒下。

山藥丸方 治耳聾。

山藥

熟乾地黄

磁石煨碎

菊花炒

黃耆

茯苓去木

木通各一

升麻

獨活各三

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。米飲下。加至三十九。

磁石酒方 治耳聾及耳鳴。常如風水聲。

磁石搗研碎綿裹半兩

木通

菖蒲米泔浸一二日切焙各半斤

共咬咀。以絹囊盛。以好酒一斗浸。寒七日。暑三日。每飲三合。日再。

鐵酒方 治耳聾。

鐵五兩

酒一升

燒鐵令赤投酒中去鐵飲之仍以磁石塞耳中。
菖蒲丸方 治耳聾塞耳。

菖蒲

木通

磁石煨研

乳香

杏仁炒去尖

松脂蠟各一分

共研極細入鵝膏同搗一二百杵。撚如棗核大。以鐵穿中心作一孔子。先挑耳令淨。然後內藥耳中入。再初著時癢及作聲勿怪。
治久耳聾方

烏驢乳一合

皂莢半兩 爲末

蠟一兩

相和於銚子內。鎔成膏。卽丸如棗核大。用針穿透。安耳中一宿。至來日看之。有物下來在耳門中。卽便取却再用一兩度卽差。
又方 治耳聾塞耳。

雄黃一分

硫黃一分

共研爲末。綿包裹一字於耳中卽差。

治耳聾灌耳方

鵝毛翎根筒七莖燈心七莖木通地龍三條

共相和燒灰研。每用半錢。以生油調。傾入耳中。便用綿紙塞耳。且側臥良久。如此三度。

鯽魚膽膏方 治耳聾滴耳。

鯽魚膽一枚 烏驢脂少許 生油半兩

和勻。內入葱管中七日。滴放耳內。

鵝膏方 治耳聾滴耳。

鵝膏一合

以少許滴耳中。

蟹汁方 治耳聾滴耳。

生蟹二枚

搗絞取汁。以少許滴入耳中。

龜尿方 治耳聾滴耳。

龜

一味。荷葉上養之。專看葉上有尿。收取滴耳中。

鼠膽方 治耳聾灌耳。

鼠膽雄者

取汁滴入耳內令透。初益聾。半日後便能聽。雖久亦差。

蠟紙角方 治耳聾。

蠟紙一張

一物裁爲四片。每一片於肌上緊捲。抽却筋。以蠟紙捲子安耳中燃之。待火欲至耳急除去。當有惡物出在殘紙上。日一角之角了。以蠟塞定。

又方 治耳聾。

以綿裹鐵內耳中。隨耳左右。口含磁石一塊卽通。

風聾

論曰。風聾者。本於足少陰經。虛風乘之。令氣脈不通。風邪內鼓。則耳中引痛。牽及頭腦。甚者聾閉不通。故謂之風聾。

黃耆湯方 治風聾。颼颼如風雨鐘磬聲。或時出清水。或有膿汁。

黃耆半兩

附子去皮

菖蒲米泔浸一宿各一兩

木通二兩

五味子

防風各一兩半

磁石醋淬七次三兩

杜仲妙去粗皮

玄參

白茯苓

熟乾地黄

人參各一兩半

每服三錢。生薑三片。大棗一枚。同煎。空心溫服。日二。

魚腦膏方 治風聾年久。

生鯉魚腦二兩

當歸切焙

細辛

白芷

附子去皮

菖蒲各半兩

共為末。以魚腦置銀器中。入藥在內。微火煑候香去滓。入瓷盒中。候凝如棗核大。綿裹塞耳中。

勞方龍聾

論曰。勞聾者。腎氣虛勞所致也。足少陰腎經宗脈所聚。其氣通於耳。腎氣虛弱。宗脈耗損。則氣安得聰。徹而不曠。舊說謂因勞則甚。要當節嗜欲。慎起居。無損腎藏。

爲要。

內補丸 治腎虛勞聾。

熟乾地黄

附子 去皮

桂心 去粗

肉蓯蓉 酒浸一宿

鹿茸 去毛酒浸酥炙

人參 各一兩

山藥 半兩

柴胡 三分

遠志 半兩

胡黃連 一分

白茯苓 一分

細辛

鍾乳 鶉管者二兩以甘草水煮三日研

共爲末。再研勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下二十九。

肉蓯蓉丸方 治勞聾積久耳鳴。

肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

附子 去皮

山茱萸 炒

乾薑

桂心 去粗皮

巴戟天 去心

熟乾地黄

石斛 去根

澤瀉

兔絲子 酒浸一宿別研

人參

白茯苓

蛇牀子 炒

牡丹皮

當歸 酒浸令潤

細辛

甘草 炙

菖蒲 米泔浸一宿

黃耆

遠志

芍藥 各一兩

羊腎 一對批去筋膜炙

防風 三兩

除兔絲子外。為末。入兔絲子重羅。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後溫酒下。漸加至三十九。日三。

五聾

論曰。五聾不同。曰風聾。曰乾聾。曰勞聾。曰虛聾。曰聒聾。是也。腎通氣於耳。足少陰其經也。經虛受風邪。及勞傷血氣。停滯津液。皆能致聾。惟所受不同。故其證各異。葛氏所謂風聾者。痛掣。乾聾者。生眵。勞聾者。出黃汁。虛聾者。肅肅作聲。聒聾者。膿汁出。可不辨哉。

黃耆湯 治五聾。

黃耆一兩

附子皮一兩去

葛蒲米泔浸一兩

木通一分兩

磁石醋碎七次二兩

白茯苓

五味子

防風

熟乾地黄

玄參

人參各一分兩

杜仲粗皮一兩去

每服五錢。生薑半分。大棗二枚。同煮溫服。續喫羊腎粥助之。日四五服。

耳聾有膿

論曰。耳聾有膿者。蓋腎藏虛。勞傷血氣。與津液相搏。熱氣乘之。則結聚於耳中。腐化膿汁。氣不開竅。則致耳聾。

禹餘糧散方 治耳聾有膿。

禹餘糧 服醋碎一分

烏賊魚骨 去甲

伏龍肝

龍骨 各半兩

附子 去皮臍一兩

共為散。每以一錢。綿裹塞耳中。日一易。取差為度。如有蟲。加麝香一黑豆大。一方加錫墨半兩。

治耳聾有膿水不絕臭穢方

肉苳蓉 一兩

龍膽 一兩

白茅根

共燒為灰。以少蜜和令勻。後入鯉魚膽汁三枚。攪令稀。即以絹搥取汁。瀝入耳中。其振乾滓。捻作挺子。以薄綿裹塞耳。不過三日上愈。

治腎熱耳聾有膿血溜日夜不止方

鯉魚腦 一枚

鯉魚腸 一具

烏麻子 一升

先搗烏麻令碎。入二味相和。微火熬。以煖布裹薄耳。兩食頃開之。當有白蟲出。

復更作藥。若兩耳並膿。分藥於兩耳中用。若只一耳即於一面薄之。不過三度差。

二聖散方 治耳內出膿水。

白附子

羌

活各一

為散。用猪羊腎各一隻。切開。每隻入藥末半錢。不得着鹽。溼裏煨熟。五更初溫

酒嚼下。續喫粥壓。

速效散方 治耳聾膿出久不差。

地

龍一條入白蔥管

入麝香少許。研為細散。摻入耳內。

魚醋膏方 治耳聾出膿或有蟲。

鯉魚腸一具

醋三合

搗如膏。取少許。綿裹塞耳中。二食頃當痛。或白蟲出。即易之。蟲盡乃止。

耳虛鳴

論曰。耳者心之寄竅。腎氣所通也。腑臟和平。則其竅通而無礙。腎氣既虛。風邪干之。復以思慮勞心。氣脈內結。不得疏通。則耳內輝焯。與氣相擊而鳴。或為鐘磬雷鼓。或如蟬噪。皆腎虛所致也。

磁石散方。治腎氣虛弱。氣奔兩耳作聲。甚則成聾。

磁石煨醋碎

熟乾地黄

菖蒲米泔浸一宿

牡丹皮

白朮各一兩

白茯苓

人參

芎藭

附子

牡荊子炒

桂心去粗皮

大黃炒

桑螵蛸切破

當歸各半兩

羊腎一對切去筋膜炙乾

共為散。每服一錢。溫酒調下。日三。加至二錢。不拘時。

桑螵蛸散方。治腎氣虛弱。氣奔兩耳鳴。甚則成聾。

桑螵蛸炙

附子

人參

白茯苓

當歸

桂心各半兩

牡丹皮

白朮炒

熟乾地黄各一兩

羊腎切去筋膜炙乾

每服一錢。空心食前溫酒調下。日三。加至二錢。

鹿茸丸方 治腎勞虛後耳常聞鐘磬風雨之聲補腎。

鹿茸去毛酒浸磁石煅醋碎枳實炒各二兩附子去皮

山藥肉蓯蓉切焙牡蠣煅各半五味子

巴戟天各一兩楮實炒別搗末三兩

共為末入楮實末同羅鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心牛膝酒下。

塞耳方 治耳內晝夜虛鳴。

菖蒲烏頭去皮臍生用一兩

為末綿裹半錢塞耳中再易之。

牛膝煮丸方 治腎虛弱風邪干之上攻於耳常作蟬鳴以至重聽。

牛膝海桐皮二味各半斤搗末用好酒於銀石器內熬成膏藋香子炒

當歸五加皮赤箭赤芍藥

桂心去粗皮麻黃去根節地龍炒木香

獨活乳香研防風骨碎補

麒麟竭

乾

蠍土炒去

沉香

天南星生用各一兩

附子去皮

烏頭去皮

棟實

川芎生用各一兩

虎腦骨酥炙

沒藥一兩

麝香研半兩



共研。再入前膏內。和搗三千杵。丸如桐子大。每服十九至十五丸。空心溫酒或鹽湯下。

耳聾

論曰。耳者腎之候。心之寄竅。風熱搏於經絡。則耳中津液結聚如麩片之狀。久則丸結不削。或似蠶蛹。致氣竅不通。聾為聾。

豬脂膏方 治聾塞耳聾。強堅不可挑。塞耳。

生豬脂一合 釜下墨半兩

調和成膏。捏如棗核大。綿裹塞耳中。

地龍汁方 治聾塞耳聾。強堅不可挑。灌耳。

地龍溼者五條

取汁數滴。入耳中挑卽自出。

聾耳

論曰。腎氣通耳。耳者腎之候。若其經爲風邪所乘。毒氣蘊結於耳中。以至膿汁俱出。妨悶疼痛。謂之聾耳。

白欵散方 治聾耳出膿血塞耳。

白 欵

黃 連

龍 骨

赤石脂

烏賊魚骨去甲各一兩

爲散。先以綿拭乾。用藥一錢。綿裹塞耳中。

鯉魚腸方 治聾耳出膿。久不差者。

鯉魚腸一具細切

醋三合

合搗。布裹棗核大。塞耳。半食頃。痛卽有蟲出。著布。卽拔之。更易新者。蟲盡爲度。

附子散方 治聾耳耳中痛。

附 子去皮一分

黃 連半兩

爲散以少許摻耳中。

又方 治聾耳塞耳。

母鼠肝 一具

旋取產鼠乘肝熱時。以棗核大塞耳中。

治聾耳方

石首魚腦中枕子

爲末。摻耳中卽差。

百蟲入耳

論曰。百蟲入耳。其類不一。古方或灌以藥。或導以物。皆以意出之也。獨驢乳、牛酪二物。最爲良法。諸蟲之入耳。灌之卽化爲水。其入腹者。則連服數劑。取差。灌耳牛乳方 治蚰蜒入耳。

牛乳 一盞

少少灌入耳內卽差。若入腹者。飲一二升。當化爲黃水出。未出再服。

塗耳百部方 治蚰蜒入耳。

百部切焙

爲末。以一字生油調塗於耳門上。其蟲自出。

胡麻枕耳令出方 治蚰蜒入耳。

胡麻令香半升炒

碎研。以葛袋盛。側臥枕耳。

豬肉掩耳方 治蜈蚣入耳。

豬肉片一兩

炙令香。掩耳上立出。

鯪鯉甲方 治蟻入耳。

鯪鯉甲爲灰半兩燒

以水調濾過。滴入耳中即出。

豬脂枕耳方 治蟻入耳。

豬脂一片

豬肉一片

將豬脂煮。炙豬肉令香。安耳孔邊。枕睡即出。

蜀椒醋灌耳方。治百蟲入耳。

蜀椒半兩末。醋半盞

以椒末入醋中。少灌入耳內。行一二十步即出。

葱油枕睡方。治百蟲入耳。

油麻一升炒研

葱白一莖切

將葱與油麻拌勻。以餅子盛。當耳門安。側睡令餅口向耳。無令傾。蟲從耳中出。至餅子內即去之。

又方

以火照之。即向明出。

擊刀法。治百蟲入耳。

以刀口於耳上相擊作聲。蟲即出也。

治百蟲入耳方

雄雞冠血不拘少

滴耳內立出。

治蜈蚣入耳閉氣令出方

閉氣氣滿卽吐復閉卽令出。或死耳中。徐徐以物鉤出之。若積久不出者。取新熱猪肉安耳竅上卽出。

治飛蛾入耳法

先大吸氣仍閉口。掩鼻呼出氣。蟲卽隨氣出。

又方

以雞肉塞耳中立出。

鼻病門

鼻病統論

論曰。肺爲五臟華蓋。開竅於鼻。肺氣和則鼻亦和。肺氣感風冷則爲清涕。爲鼈。爲息肉。爲不聞香臭。肺實熱則爲瘡。爲痛。膽移熱於腦。則濁涕不已。謂之鼻淵。惟證候不同。故治藥亦異。

鼻塞氣息不通

論曰。鼻塞氣息不通者。以肺感風寒。其氣搏結。不得宣快。窒塞既甚。而息不能出入也。巢氏謂息肉生長。致氣塞不通。蓋有未嘗生息肉而氣息不通者。宜析而治之。

人參湯方 治肺風上攻。鼻塞不通。

人參

白茯苓

陳橘皮 去白

蜀

椒 去目并合
椒口者妙

麻黃 去根節

黃芩

羌活 各半
活 兩

每服三錢。水煎。食後溫服。

杏仁煎方 治肺傷寒氣。欬唾痰。聲重鼻塞。補肺。

杏仁 去皮尖雙
仁 二兩 研棗 肉 核 去皮 一升

白蜜

生薑汁

酥 各半
升 半

錫 一升

同合和於銀器中。微火煎。候熟。服一匙頭。溫酒調下。食後。

人參丸方 治肺風上攻。鼻塞不通。

人參

防風

細辛

黃耆

沙參

甘菊花炒

木通各半

共為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十九。溫水下。日再。

木通膏方 治鼻塞不通利。

木香

細辛

當歸

川芎

木通

麩仁研

白芷各半

共細剉。內銀石器中。入羊髓微火煎。候白芷色黃。膏成去滓。澄清凝。每用小豆大。內鼻中。日再。以差為度。

鼻塞不聞香臭

論曰。鼻有息肉。不知香臭者。亦有無息肉而不知香臭。生息肉不知香臭。已例方濟。此姑論鼻塞不聞香臭。蓋鼻之窒塞。或冷風乘。或肺壅熱。冷熱故異。其塞則一。皆肺臟不和。氣不宣通也。治塞者。當審其冷熱。天門冬丸方 治鼻塞不聞香臭。

天門冬

白茯苓各五兩

人參

枳實炒

甘草炙各三兩

檳榔二兩

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。食後漿水下。日再。暑月以牛乳下。通氣膏方。治鼻中不利。窒塞不通。不聞香臭。

木通

當歸

川芎

蕤仁

桂心各半兩

細辛

白芷

共細剉。與羊髓三兩。同於銀石器中微火煎至白芷黃色。去滓澄凝。每取小豆大。塞鼻中。日再。

芎藭散方。治鼻塞不聞香臭。

芎藭

辛夷各一兩

細辛三分

木通半兩

每用少許。綿裹塞鼻中。濕即易。

瓜蒂散方。治鼻塞不聞香臭。

瓜蒂

藜蘆各一分

每用一錢。綿裹塞鼻中。日三易。

鼽鼻

論曰。鼻和則知香臭。夫鼻為肺之竅。非能自和也。必肺氣流通。然後鼻為用。而香臭可知。若心經移熱於肺。致肺臟不和。則其竅亦無以宣達。故為鼽鼻。此乃內經所謂心肺有病。則鼻為之不利也。

黃耆散方 治鼽鼻。順肺氣。四時服食。

黃耆

人參

防風

防己

生乾地黄

桔梗炒

芍藥

黃芩

澤瀉

石南葉

白朮米泔浸一宿炒

桂心去粗皮

甘草炙

牛膝酒浸一宿

赤茯苓

紫苑各三兩

共為散。每服一錢。溫酒調下。如要丸。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫酒下。

雄黃丸方 治鼽鼻。

雄黃一錢

甘草炙

附子去皮

細辛各一分

為末。用羊膽汁和丸。如棗核大。以綿裹內鼻中。移時出惡物即差。

細辛散方 治鼈鼻不聞香臭。宜塞鼻。

細辛

甘草炙

附子去皮

木通各一

為散。以羊膽汁和如棗核大。塞鼻中。

治鼈鼻法

伏面臨牀。以新汲水淋玉枕上。即差。

治鼈鼻吹鼻

皂莢一挺炙去皮子

為散。以一字吹入鼻中。即差。

鼻中生息肉

論曰。鼻者肺之竅。鼻和而知香臭。風寒客於肺經。則鼻氣不利。使津液壅遏。血氣搏結。附著鼻間。生若贅疣。有害於息。故名息肉。

羊肺散方 治鼻中息肉。

羊肺一具切去筋膜炙乾木通半兩

白朮米泔浸一宿炒黃四兩

乾薑半兩

肉蓯蓉酒浸一宿半兩

川芎半兩

為散。每服一錢。食後米飲調下。日二。

礬石丸 治鼻生息肉。

礬石

熬令汁枯四兩

木通

細辛各半兩

丹砂研一

共為末。麵糊和丸。如小豆大。每用一丸。綿裹內鼻中。一日一易。取下息肉止。

胡粉膏方 治鼻中息肉不通。傅鼻。

胡粉炒

白

礬燒令汁盡各等分

為末。用青羊脂和成膏。以少許塗傅息肉上。

鼻淵

論曰。內經謂膽移熱於腦。則辛頰鼻淵。鼻淵者。濁涕下不止也。夫腦為髓海。皆藏至陰。故藏而不瀉。今膽移邪熱。上入於腦。則陰氣不固。而藏者瀉矣。故腦液下至滲於鼻。其證濁涕出不已。若水之有淵源也。治或失時。傳衄蟻瞑目之患。防風散方 治腦熱鼻淵。下濁涕不止。

防風一兩

黃芩

人參

甘草炙

川芎

天門冬各一兩

為散。每服二錢。食後沸湯調下。日三。

雞蘇丸方 治腦熱肺壅。鼻淵多涕。

雞蘇葉乾者

麥門冬

桑根白皮

川芎

黃耆炙

甘草炙各一兩

生乾地黄二兩

為末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。食後臨臥人參湯下。

辛夷膏方 治肺熱鼻塞多涕。

辛夷一分

白芷三錢

薑本

甘草

當歸

細剉以清酒二盞。羊髓十兩。銀器內微火煎五七沸。傾入盒中澄凝。每取一豆許內鼻中。日夜各一服。

鼻流清涕

論曰。五臟化液。遇熱則乾燥。遇寒則流行。鼻流清涕。至於不止。以肺藏感寒。寒氣上達。故其液不能收制如此。且涕泗洩皆鼻液也。以繼位則曰涕。以生於肺則曰泗涕。甚曰洩。此獨言涕。與宣明論五藏化液肺為涕同意。

細辛丸內鼻方 治腦冷鼻塞時出清涕。

細辛

桂心

甘遂炒

芎藭

附子各一分

辛夷半兩

木通二兩

為末。鍊蜜丸如棗大。以綿裹內鼻中。勿令氣泄。覺小痛搗生薑汁和擦即愈。一方用狗膽和丸。

芎藭膏方 治鼻塞多清涕。

芎藭

吳茱萸炒湯浸

蜀椒去目炒

細辛

乾薑

皂莢去皮子各三分

細剉。以醋浸一宿。內猪脂於銀石器中。煎五七沸。去滓。傾入盒中澄凝。以綿裹少許內鼻中。

黃連汁方 治鼻塞多年。清水出不止。灌鼻。

黃連去鬚 二兩

蒺藜苗二握

細剉。水二升。煎至一升。取一合。灌鼻中。不過再灌。大嚏即差。

蒺藜汁方 治鼻塞清水不止。灌鼻。

蒺藜苗一握

細剉。以水三盞。煮至一盞。去滓。仰面先滿口含飯。取汁一合。灌鼻中。不過再灌。嚏出息肉差。

鼻中生瘡

論曰。心肺有病。鼻為之不利。蓋心肺在膈上。肺開竅於鼻。心肺壅熱。氣熏於鼻間。蘊積不散。其證乾燥而痛。甚則成瘡也。惟能平調心火。以利肺經。則瘡可已。

升麻湯方 治鼻乾癢生瘡。乾嘔不下。飲食。

升麻

桔梗

黃芩

犀角

貝母去心

龍膽各半

甘草一

每服三錢。水煎。食後溫服。不拘時。

硫黃膏 治面瘡鼻頭赤爛。

硫黃 研細一錢

以葱白三寸入童便二合。浸一宿。研絞取涎。和末如膏。塗上。不見風。日二。

梔子煎方 治肺氣風熱。鼻内生瘡。

山梔子 去皮

苦參

木通 各三兩

細剉。以四兩酥同煎令香。去滓傾入盒中。每以少許滴入鼻中。

礬石煎方 治鼻中熱氣生瘡。有膿瘻。兼有蟲。

礬石 一兩

苦參

生地黄 洗令淨絞取汁三合

二味為末。以地黃汁并水二盞。煎至三合。綿裹去滓。少吹滴鼻中。三五度差。

黃柏飲方 治鼻中熱氣生瘡。有膿瘻。兼有蟲。

黃柏 二兩

以冷水浸二宿。絞取汁一盞服之。

疔蟲蝕鼻生瘡

論曰。五臟皆有蟲。蟲得風則化。肺開竅於鼻。肺經既虛。風熱乘之。鼻氣壅塞。不得宣通。則疳蟲因得侵蝕。瘡生鼻間。

治鼻中疳瘡方

牛鼻津

取塗瘡上。

椿根湯方 治疳蟲蝕人口鼻。

椿根切一升 鹽半合

葱 白切半

豉半升

椒去目

合和以醋及清泔各三升。同煎數十沸。去滓約及一升。分作三服。有惡物出。小

兒量加減。

如聖散方 治疳蟲蝕鼻生瘡。及鼻下赤爛。

胡粉半兩

麝香研一字

甜瓜蒂七枚為末

合研勻。用蟾酥少許。水浸一宿。次日取蟾水先和粉。次同和丸如菉豆大。每用二丸。水化傅瘡上。鼻下赤爛者。亦塗之。小兒每用一丸。

青金散方 治疳蟲蝕鼻生瘡。及鼻涕淹漬。

銅 青

白

礬生研各等分

同爲散。每用少許傅瘡上。小兒亦可用。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十九

口齒門

口齒統論

論曰。足太陰脾之經。其氣通於口。足陽明胃之經。手陽明大腸之經。其脈並夾於口。故其腑臟風邪濕熱發於經。則於是有口吻之疾。牙齒者。骨之所終。髓之所養也。又手陽明之支脈。入於齒。故骨髓之氣不足。與夫陽明之脈虛。不能有所滋養。於是有牙齒之疾。牙齒之疾。其候甚多。治療之法。固不得略也。養生方云。鷄鳴時叩齒三十六下。食畢令啄齒。皆宜長行之。令齒不蠹去蟲。又早朝未起。漱口中玉

泉。令滿口嚥之。啄齒二七遍。去蟲牢齒。千金又曰。每旦以鹽一捻內口中。以煖水揩漱。及叩齒百遍。爲之不絕。不過五日。卽牢密。若此之類。皆簡易可行。行之有效。不可忽也。

口瘡

論曰。口瘡者。由心脾有熱。氣衝上焦。熏發口舌。故作瘡也。又有胃氣弱。穀氣少。虛陽上發而爲口瘡者。不可執一而論。當求所受之本也。

當歸膏方 治口爛生瘡。水漿不下。

當歸一兩

射干

升麻

附子

各半兩

白蜜四合

猪脂五兩

除蜜外。并剉。先煎脂化去滓。入諸藥。慢火煎。候附子色黃。又去滓入蜜。更煎如膏。以瓷器盛。每服如杏核大含之。日三五度。嚥津不妨。

黃連膏方 治口瘡并咽喉塞。

黃連三兩

猪脂一斤

白蜜四兩

羊髓研二兩

以慢火煎猪脂。取油去渣。入黃連。又煎令黑色。下羊髓。髓化以綿濾去滓。入蜜更煎成膏。瓷盒盛。每含一棗大。日三五度。嚥滓不妨。

燒肝散方 治口瘡久不差。

茵陳蒿 犀角屑

石斛 白朮

苧胡各半 芍藥

吳茱萸湯浸三遍 紫參

桔梗 防風

桂心 人參

白蕪荑各一分

每服五錢。以白羊肝五兩。切去筋膜。入葱白一莖。細擘相和。濕紙三五重裹。慢

火煨熟。空腹頓服。米湯下。

巴戟散方 治元藏虛冷。上攻口瘡。

巴戟天一兩 白芷半兩

高良薑爲末一錢

爲細散。用猪腰子二隻。去筋膜。每一隻入藥散一錢。用紙溼裹煨熟。乘熱去紙。

以口吸熱氣。有涎卽吐。候冷細嚼服之。

生薑煎方 治口瘡疼痛。

生薑取汁一盞 白沙蜜二三兩

用煎十沸。用瓷器盛。時時以熱水調一匙。含嚥之。

柳花散方 治口瘡。

黃柏一兩 殿花半兩

為散。臨臥乾摻。誤嚥亦不妨。

升麻含汁方 治口瘡。

升麻不拘多少

一味。含一里嚥津。

升麻飲方 治口內生瘡。齒斷肉爛。

升麻 黃連

麥門冬 黃芩

防風 羌活

甘草炙 知母各二分

每服三錢。水煎。食後溫服。

羚羊角

葛根

大黃各半兩

玄參

甘菊花

人參三分

玄參湯方 治心肺壅熱。口內生瘡。胸膈痰逆。

玄參

茅根

羌活

竹茹

木通

羚羊角

升麻

黃連

苦竹葉

人參

半夏

甘草

每服三錢。入生薑三片。同煎溫服。食後再服。

玄參丸方 治口瘡。

玄參

天門冬

麥門冬

為末。鍊蜜和丸。如彈子大。每用一錢丸。綿裹含化嚥津。

口糜

論曰。膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上為口糜。夫小腸之脈。絡心。循咽。下膈。抵胃。陰陽和平。水穀入胃。小腸受之。通調水道。下輸膀胱。今熱氣厥逆。膀胱移熱於小腸。胃之水穀。不得傳輸於下。則令腸隔塞而不便。上則令口生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱。則必熏蒸於上。不可概以傳藥。當求其本以治之。

大青丸方 治口糜生瘡久不差。及心脾中熱。乍發乍退。

大青去根

甘草炙

枳殼麩炒

苦參各三

生乾地黄焙

升麻各一

黃連一兩

共為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九丸。食後熟水下。日二服。

升麻丸方 治口糜生瘡。

升麻

黃連

黃柏

杏仁各一兩
去皮尖

將上三味為末。次研杏仁如膏。鍊蜜三兩。以藥末并杏仁和為丸。如彈子大。每服一丸。含化嚥津。

口吻瘡

論曰。口吻瘡者。其瘡發於唇吻之間。疼痛微腫。濕爛有汁。世名燕口。又名肥瘡。此由脾胃有熱。隨氣熏發。上攻於口唇。與津液相搏所致。

芎藭丸方 治口吻瘡。

芎藭二兩

白芷

陳橘皮去白

黃連各半

爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。甘草湯下。不拘時候。
麝香散方 治口吻生瘡久不差。

人中白研

麝香研各一錢

再研勻塗瘡上。

葵根散方 治口吻瘡。

取秋葵根一握。燒作灰。研爲散傅之。

口舌生瘡

論曰。口舌生瘡者。心脾經蘊熱所致也。蓋口屬脾。舌屬心。心者火。脾者土。心火積熱。傳之脾土。二臟俱蓄熱。毒不得發散。攻衝上焦。故令口舌之間。生瘡腫痛。烏犀湯方 治口舌生瘡。

犀角屑三分

羚羊角屑三分

丹砂三分

黃耆半兩

大黃一分

升麻半兩

生乾地黄一兩

射干一分

天門冬生者去心一兩

玄參三分

甘草炙一兩

每服三錢。水煎食後溫服。

防風散方 治口舌生瘡。

防風 一兩

龍膽 一兩

生地黄 二兩

沉香 半兩

升麻 半兩

每用二錢。入鹽少許。沸湯調勻。揩齒含嚙便睡。

茯神丸方 治積年口舌瘡。諸方不瘥。

茯神 一兩

白朮 一兩

旋復花 半兩

縮沙蜜 三分

大黃 煨半兩

芍藥 半兩

桂心 三分

郁李仁 一兩

大麻仁 別研 二兩

人參 半兩

枳殼 炒三分

訶黎勒 一兩

厚朴 薑汁炙 一兩

白檳榔 三分

白鮮皮 半兩

陳橘皮 去白 一兩

地骨白皮 半兩

為末。鍊蜜和丸如梧桐子大。每服二十九丸。空心粥飲下。加至三十丸。

口瘰

論曰。口殞者。脾之候。心脾或熱。蘊積於胃。變為腐臊之氣。停聚不散。隨氣上出。熏發於口。故令殞也。

升麻散方 治口殞生肌長斷。

升麻 二兩

防風 一兩

當歸

白芷

各半

川芎

藁本 各三分

麝香 一分

甘草

炙半兩

木香

細辛 各一分

每用一錢。傅齒根下。甚者綿裹含化。嚥津。

七香丸方 治口及身殞。

白豆蔻仁

丁香

藿香

零陵香

青木香

白芷

桂心 各一分

香附子 二兩

甘松香

當歸 各半

檳榔 二枚

沉香 一兩

為末。鍊蜜和丸。常含一丸。大豆大咽汁。日三夜一。亦可常含咽汁。五日口香。十日體香。二七日夜被香。三七日下風人聞香。四七日洗手水落地香。五七日把他人手亦香。慎五辛下氣去殞。

芎藭散方 治心虛寒口瘖。蟲蝕齒痛。

芎藭

白芷各一兩

甘草炙三

桂心去麩

杜蘅各半兩

當歸切三

為散。食前煖酒調下一錢。日二服。三十日體皆香。即差。

草豆蔻丸方 治心脾蘊熱。隨氣上熏。發為瘖。

草豆蔻仁

丁香各一

麝香一分

藿香葉

零陵香

桂心

莎草根去毛

木香

白芷

當歸

檳榔各半兩

為末。鍊蜜和丸。如鷄頭大。每含化一丸。嚥津液。日三丸。

唇瘡

論曰。唇瘡者。以脾胃有熱。熱氣循經而外發於唇。故生瘡也。蓋足陽明之脈。下循鼻外。入上齒縫中。還出挾口環唇。內經謂脾之合肉也。其榮唇也。是故脾胃之經與唇相應。熱氣乘經而衝發。所以唇為之生瘡。

硫黃膏方 治脣瘡及緊瘡久不差。

硫黃 研

白礬 枯研

丹砂 研

水銀

麝香 研

黃柏 各一分 為末

同研。候水銀星盡。用臘月猪脂和如泥。先拭令淨。後以膏塗之。日三五上。即差。

五倍子散方 治口脣生瘡。

五倍子 去心 中蟲

槐花 擇

等分為細散。每用蜜傅脣上。如瘡口乾。以葱汁調上。

治瀋脣瘡方

鯉魚血

一味。取血磨墨。相和塗之。差。

脣生核

論曰。脣生核之候。大概與脣瘡緊脣相類。然其腫至於生核者。蓋足陽明與太陰為表裏。臟腑俱有風熱。風熱之氣衝發二經。與血氣相搏而為脣腫。外復為風冷。

所乘。血氣凝結。聚而不散。故生核也。

防風湯方 治脾胃蘊積熱氣。復為風冷所搏。脣邊生核。結輒疼痛。

防風法義半兩

菊花一兩

升麻半兩

獨活半兩

黃芩半兩

知母半兩

玄參半兩

生乾地黃半兩

藁本半兩

大黃炒半

梔子半兩

前胡半兩

桔梗炒

甘草炙

麥門冬各半

每服用三錢。水煎食後溫服。日三。

黃連散方 治脾胃積熱。風冷乘之。脣結核。

黃連去鬚

升麻

龍膽各一

為散。綿裹如彈子大。臨臥新汲水浸過。含化嚥津。

治脣生核腫痛如彈方

牛膝燒灰存性研

先以鍼刺出惡血。次用藥少許。以新汲水調塗核上。

治脣黑腫生核痛痒不可忍方

古銅錢青者四文

放石上以臘月猪脂磨取汁塗之。

重舌

論曰。重舌者。以心脾二經蘊伏熱氣。循緣經絡。上衝舌本。遂令舌下血脈脹起。如小舌狀。故謂之重舌。蓋心開竅於舌。足太陰之脈屬脾。絡胃上膈。俠咽。連舌本。散舌下故也。紫雪服之甚效。

牛黃散方 治重舌。

牛黃研

人參

各半

白茯苓三分

大黃炒半

當歸一分

甘草

各半

丹砂研半

爲散。每服半錢。水溫調下。甚者加至一錢。食後服。

舌腫強

論曰。心氣通於舌。脾脈挾咽連舌本。散舌下。心脾二經受風邪。則舌本強。不能卷。

舒。久或熱氣加之則腫。腫則脈筋脹急。勢連咽喉。礙於呼吸。法宜刺之。洩去惡血。及餌以藥。

白茯苓湯方 治舌腫強。

白茯苓

牛黃三分

犀角屑一

甘草炙

人參

羚羊角屑

熟乾地黄

白朮

桂各半兩

每服三錢。水煎溫服。日三。

百草霜方 治舌忽緊。輒。逡巡能塞。煞人者。

百草霜

好鹽各半兩

同研勻。表裏塗之。立效。

麈蟲散方 治舌腫滿口。言語不得。

麈蟲五十枚

鹽半兩

細研為散。每服以水煎熱含。冷吐。以差為度。

螻蛄散方 治木舌腫強。

桑螵蛸十二月者炙黃

每服半錢。萊菔汁調下。

蚯蚓塗方 治舌腫滿塞喉欲死。

蚯蚓一條

以少許鹽花化爲水。以塗咽喉舌上。良久漸消。

牙齒歷蠹

論曰。牙齒歷蠹者。腎虛弱也。骨髓不固。氣血衰耗。不能榮潤於牙齒。故令人牙齒

黯黑。謂之歷蠹。

麝香散方 治齒歷蠹。

麝香一匙

定粉一錢

黃蠟半兩

細研前二味。鎔蠟調之。攤在紙上。每臨臥時剪作片子。貼所患齒上。

升麻散方 治牙齒歷蠹。齒根黯黑。

升麻

槐枝灰各半兩

白附子

蜜陀僧服

露蜂房各一分

為散。入地黃汁一合。和勻陰乾。每用揩齒。

牙齒疼痛

論曰。牙齒疼痛有二。手陽明脈虛。風冷乘之而痛者。謂之風痛。蠱居齒根。蝕侵不已。傳受餘齒而痛者。謂之蟲痛。二者不同。古方有塗傅漱濯之藥。治去風蟲。用之各有法也。

細辛散方 治牙齒疼痛。頭面浮腫。喫冷熱物不得。

細辛

芎藭

藁本

獨活

各一分

地骨皮半兩

藜蘞子三分

為散。綿裹如江豆大。含化嚥津。每日三五度。易之。去膈間風熱。若患頭風鼻塞。先以油塗頂心。以手摩一二百遍。次用散一錢。又摩頂心。依前法。

地骨皮湯方 治牙齒疼痛。吃物不得。

地骨皮一兩

細辛半兩

生乾地黃一兩

戎鹽

一分

每用五錢。以水煎三五沸。熱漱冷吐。以差爲度。

地黃湯方 治牙齒痛。

生乾地黃三兩 獨活一兩

咬咀。每用五錢。以酒一盞。浸一宿。煎十餘沸。熱漱冷吐。以差爲度。

柳枝湯方 治齒痛連牙額疼。

柳枝

槐枝

黑豆各一

蜀椒半兩

青鹽

細辛

羌活各一

除椒鹽外。剉。先以水六盞。煎取二盞。入椒鹽。再煎一盞。通口漱之。不拘時候。以差爲度。

齒齲

論曰。齒齲如疳。齲蟲之證。齒根先露壞爛。膿血俱出。口內氣息。蓋緣臟腑壅滯。熏發上焦。攻衝齒牙。又有嗜肥甘過多。或宿食在齒根。不能漱去。致腐殞之氣。淹漬而成者。

雄黃膏方 治齒齲蟲蝕牙齒。

雄黃別研半兩

牛酥五兩

黃蠟

白蜜各一兩

藁本三分

丹砂別研一分

藜蘆一分

升麻

川芎

白芷

杏仁去皮尖雙仁各半兩

除別研藥并蜜蠟外。餘細剉。先於鐺中以酥煎所剉藥。候杏仁赤黑色。去渣。下蜜復煎二十沸。候膏成。續下別研藥。攪勿住手。候凝成膏。於瓷器盛。每以少許塗齒病處。或蟲孔中。點之大驗。

薔薇根膏方 治齒齲。

薔薇根二兩

地骨皮一兩

葱根一兩

胡粉一兩

白蠟一分

前三味俱剉。以水二大盞。煎至半盞。以重抄紙半張。浸之暴乾。更濕浸。汁盡為度。乾了以粉蠟塗之於上。剪作條子。夜臥貼之神效。

細辛散方 治齒齲齒根腐爛。

細辛二兩

川升麻二兩

地骨皮二兩

角蒿二兩

牛膝二兩 生地黃五兩

都燒為灰。細研。每夜臨臥傅齒根。或以蠟紙上貼之。至旦即去。

黃礬散方 治疳齲齒根宣露。

黃礬燒灰一分

麝香研一錢

乾蛤殼燒灰一分

防風去叉

獨活各一分

除別研外為散。以煖漿水漱口。後用藥貼齒根上。有涎即吐。出日再貼。即差。

藜蘆散方 治齒疳風齲疼痛不止。

藜蘆

蜀椒去目

附子各一分

麝香研一錢

先以三味為散。次下麝香和勻。每用一錢。綿裹置所患處。有涎吐之。

虫蝕牙齒

論曰。字書謂凡動皆風。虫以風化。蓋手陽明脈入於齒。其經虛損。骨髓不榮。風邪乘之。攻入於齒。毒氣與濕相搏而生虫。故云虫蝕牙齒也。其狀齒根有竅。或作疼痛。甚則搖動宣露。浮腫作殍。世俗亦呼為虫牙。

烏頭去皮

芎藭

甘草

地骨皮

細辛

高良薑

白芷等分

共七味。搗羅爲散。以指點藥措於藥處出涎。以溫水漱三五度。即差。

腎虛齒風痛

論曰。腎主骨髓。齒者骨之餘。而髓之所養也。足少陰經虛。氣血不能榮養骨髓。故因呼吸風冷。浮漱寒水。冷則令齒痛而不已。

地黄丸方。治腎臟虛。食冷熱齒皆痛。

生地黄 一兩

白茯苓

防風

獨活

枸杞子

山藥各半

右六味。搗羅爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每空心煎棗湯下十九丸至十五丸。

鷄腸草散方。治腎虛齒痛措牙。烏髭鬢駐顏。

鷄腸草

白礬

訶梨勒皮

藿香子

旱蓮子

晚蠶沙

青鹽

茜根

皂

莢各一兩

麻

粃半兩

共十味。除礬并青鹽、藿香、蠶沙外。各剉半寸。用磁瓶一枚。開口入諸藥在內。紙筋鹽泥固濟。以炭火半秤煨。盡火放冷。取出研如粉。早晨食後。夜臥搯三兩上。頃之漱口。

齒風腫痛

論曰。齒風腫痛者。齒根虛浮。牙齒疼痛。或過呼吸風冷。其痛愈甚。則斷臚腫赤。乃至動搖。此蓋手陽明經虛。風客其脈。流注齒間。故為齒風腫痛之患也。
芎藭湯方 治風齒疼腫及口瘡。

芎藭

當歸

獨活

細辛

白芷

各一兩

共五味。搗為末。每用五錢。水煎。熱含冷吐。如此三五次。易取差為度。
草撥散方 治諸陽氣虛。風攻牙齒疼痛。不任寒熱。嚼物隱痛。

草撥

苦參

防風

升麻

各三兩

藁 本一分

共五味。搗羅為散。每三錢水煎。熱漱冷吐。

皂莢湯方 治諸風齒疼痛。

皂 莢一挺去皮子 炙令黃色

露蜂房一枚 劈碎

鹽一分

三味劈剉。分為三貼。每貼以漿水煎。熱漱冷吐。

齒斷腫

骨膈 風附

論曰。足陽明之脈。起於鼻交頰中。旁約太陽之脈。下循鼻外。入上齒中。手陽明之脈。其支者。從缺盆直入上頸。貫頰下。入齒縫中。若其經虛。風熱所襲。傳流齒牙。攻注斷肉。則致腫痒。甚者與斷間津液相搏。化為膿汁。或血宣而不已。

黃芩湯方 治齒斷腫痛及蟲蝕。

黃 芩

甘 草

當 歸

細 辛各一兩

蛇床子

桂 心各一兩

右六味。共搗篩。為粗末。每用五錢。酸漿水一盞。煎十沸。熱含冷吐。

地骨皮散方 治骨膇風。牙齒宣露。腫痒浮動。疼痛作時。或斷爛生瘡。兼治大人

小兒口瘡。

地骨皮

麥 葉各一

豬牙皂莢半兩

青 鹽一分

右四味同搗碎。入鍋炒。搗羅為散。每用先以鹽漿水嗽口。搽擦。

風疳

論曰。風疳之病。其候膇斷虛腫。牙齒動搖。侵蝕齒根。腐殞脫落。下攻斷頰。損爛。膿血俱出者是也。蓋緣手足陽明之經氣虛。風邪熱毒。在胃蘊積。日久上熏胸間。攻發口齒。故成斯疾。

升麻細辛散方 治風疳痒痛。侵蟲斷爛。

升 麻

細 辛

藁 本

防 風

芎 藭

凝水石研各一兩

甘 草炙半兩

右七味。搗研為散。取少許貼齒痒處。又取一錢。綿裹含化。嚙津。當令藥味相接為佳。

治風疔出血。及牙齒浮動。牢牙散方。

皂

五挺燒存性
英小者用十挺

附子生一枚

乳香研半

麝

香研少

四味搗研為末。如常揩齒。良久漱之。頻用為妙。

齒間出血

論曰。邪僭熱在上。流傳於手陽明之脈。注於齒間。則令齒斷虛腫。甚者齒間出血。蓋血性得溫則宣流故也。

龍腦散方。治牙齒疼痛。斷間血出。去口氣。辟風冷。

龍

腦研一

蔓荊實

細辛

升麻各一

共四味。搗羅三味為散。入龍腦拌勻。每用半錢。揩齒良久。以溫湯漱口。

胡粉散方。治牙宣血出不止。

胡粉半兩

麝香研半

二味同研為散。臨臥淨揩牙漱口。兼能牢牙。

齒齲

論曰。齒齲之病。由風熱邪氣客於手足陽明二經。其狀斷腫。或腫膿出而殞。久則侵蝕齒斷宣露。一名風齲。

蜀椒湯方 治牙齒風齲疼痛。

蜀椒去目并

芎藭

細辛

升麻

莽草

防風

黃芩各一分

右九味搗篩。每用五錢水煎。熱漱冷吐。

白礬散方 治齲齒斷腫出膿汁。

白礬燒灰

蟾酥半分

乾蝦蟆

麝香半分

雄黃半分

熊膽一分

右六味搗羅為散。每用半錢傅牙根。

牛膝散方 治牙齒風齲疼痛解骨。膾風毒氣。

牛膝為灰

爲末以少許著齒間含之。

又方 取郁李根一握切水一盞煎至六分熱含之吐出蟲長六分黑頭蟲。

牙齒動搖

論曰手陽明支脈入於齒足太陽之脈又徧於齒爲骨之所終髓之所養若經脈虛風邪乘之血氣損少不能榮潤故令動搖也。

治齒風動搖捍齒牢牙方

丹

砂別研一兩

青

礬別研半兩

白

礬別研半兩

馬牙硝

別研半兩

防

風半兩

細

辛半兩

黃

蠟一兩

麻

油三兩

松

節二兩

當

歸半兩

松

脂二兩

黃

耆一兩

臘

月豬脂半斤

右十三味除脂蠟油外並細剉先於鐺中煎脂濾去滓次下油煎三兩沸續下剉藥煎十餘沸以綿濾去滓再下蠟並別研藥慢火養成膏於瓷器盒盛每用少許塗傅患處卽差。

防風湯方 治齒根出露。動搖疼痛。

防風 一兩

蔓荊子 一兩

細辛 半兩

川升麻 半兩

地骨皮 半兩

赤茯苓 半兩

芎藭 一兩

共七味。都剉碎和勻。每用半兩。以酒水同煎。熱含就於患處良久。冷即吐。含盡為度。日二。此一劑永差矣。

地黄丸方 治齒動搖。

生地黄 五斤粗

山藥 四兩

枸杞根 三兩

人參 一兩

白茯苓 四兩

右五味。先煎生地黄汁。搗諸藥末。用好酒一斗。別煎至三升。入煎下地黄汁。同再煎。入白蜜一斤。酥少許煎。候可丸。即成。丸如小豆大。每服酒下二十九丸。日三服。加至五服。

咽喉門

咽喉統論

論曰。咽門者。胃氣之道路。喉嚨者。肺氣之往來。一身之中。氣之升降。出入莫急乎是。詳攷經絡流注。卽咽喉所繫。非特肺胃爲然。故孫思邈曰。應五臟六腑往還。神氣陰陽通塞之道也。又人之氣血。與天地相爲流通。咽喉尤爲出納之要。故內經曰。喉主天氣。咽主地氣。若藏熱則咽門閉而氣塞。甚則咽門破而聲嘶。以至腫痛。喉痺生瘡。懸癰之屬。與夫哽塞。如有物妨悶。痛痒多涎唾。其證不一。不可概以實熱爲治。大率熱則通之。寒則補之。不熱不寒。依經調之。湯劑蕩滌之外。復有鍼刺等法。要皆急治。時不可緩。非若臟腑積久之病。磨化調養之可比也。一切咽喉病紫雪爲要藥

升麻湯方 治喉中痛閉塞不通。

升麻

木通各一

射干

絡石

芍藥

羚羊角三

淡竹葉

杏仁去皮尖雙仁炒各半兩

共八味。除竹葉外。搗篩。每服三錢。水煎入竹葉七片。煎至六分。溫服。日三。

喉痺

論曰。喉痺謂喉裏腫塞痺痛。水漿不得入也。治稍緩殺人。由脾肺不利。蘊積熱毒。

外犯寒邪。二經壅熱。結於喉間。痺而不通。其狀身熱惡寒。治法有先鍼而後藥者。可謂之急先務矣。

射干丸方 治喉痺腫塞。

射干一兩

香豉一合

杏仁雙仁炒

芎藭

犀角各二兩

升麻一兩

甘草炙半兩

右七味搗羅為末。鍊蜜丸如小彈丸大。每服一丸。含化嚥津。日可三五服。

治咽喉閉塞不通方

大黃末一分

蝸牛二七

白礬末

馬勃一分

四味於五月五日午時用白梅肉。蝸牛同研和丸。如棟實大。如患者開口不得。

即以水磨。用竹管子吹下喉中立差。如輕者以綿裹含化一丸。

透關散方 治男子婦人喉痺。口噤牙關緊。

雄黃研

猪牙皂炙去皮

藜蘆各一分

三味研為散。每用一匙。分彈入兩鼻中。關透處即差。

逡巡不救方 治急喉痺

皂莢生半兩
一味。搗為末。每服少許。筋頭點腫處。更以醋調藥末。厚塗項下。須臾便破。血出即愈。

馬喉痺

論曰。馬喉痺之狀。勢如奔馬。喉間痺痛。腫連頰骨。壯熱煩悶。數數吐氣者是也。此蓋脾肺不利。熱毒攻衝。發於咽喉所致。
生犀丸方。治熱衝喉間連頰腫。數出氣煩滿。

犀角

枳實

射干

海藻洗去鹹

升麻各一兩

杏仁去皮尖

白附子

百合一兩

胡黃連

蒺藜子各三分

右十味。搗羅為末。鍊蜜丸。如彈子大。每服一丸。綿裹嚥津。不計時。

天門冬丸方。治馬喉痺。咽喉腫痛。唇焦舌乾。頤頰連腫。

天門冬

玄參

惡實炒各一兩

百藥煎半兩

人參一分

紫蘇葉半兩

甘草兩半

蓬砂研一分

龍腦一分

右九味搗研為細末。鍊蜜和丸。如皂子大。每服一九。食後臨臥熟水下。

治馬喉腫連頰吐氣方

馬嚼鐵一具

以水三升煎至一升。細細含嚥。

龍腦散方 治馬喉瘰頰咽痛。

白龍腦細研

牛黃細研

犀角屑

羚羊角屑

玄參

馬牙硝細研

沉香

甘草炙剉

砂以上各一分

蓬砂研一分

升麻半兩

右十一味除龍腦牙硝搗篩為散。每服三錢。水一盞。竹葉七片。同煎去滓。溫入龍腦馬牙硝一錢攪令勻。細細含嚥。

咽喉生癰

論曰。肺氣上通於喉嚨。胃經外連於咽嗑。其氣和平。則呼吸嚥納。無所妨礙。若脾肺壅熱。熏發上焦。攻於咽喉。結聚腫痛。不得消散。熱氣熾盛。致結成癰。妨害吐納。古方論一寸爲癰。二寸至五寸爲癰。其候使人寒戰。效吐稠濁。善用鍼者。辨其可刺。宜速破之。仍施以點餌之劑。

天門冬煎方 治喉癰咽嗑不利。

生天門冬汁二升人參一兩

生麥門冬汁一升生薑汁一升

桂一兩

半

夏湯浸七遍暴乾一兩赤茯苓二兩

生地黄汁一升

牛黃研半兩

甘草三分

右十味。除四味汁外。餘六味爲末。先以天門冬、麥門冬汁煎減半。次入生薑汁。又煎減半。次又入地黄汁。并餘六味末。同煎汁欲盡。卽入白蜜一斤。酥四兩。同煎成煎。以瓷盒盛。不拘時。以溫水調下一匙。以差爲度。

射干湯方 治喉癰咽嗑腫塞及心肺熱極吐納不利。

射干半兩

升麻

大黃生用

惡實生用各一兩

木通

馬藟子炒半兩

右六味。搗篩。每服三錢。竹葉七片。水煎去滓。下馬牙硝半錢。攪令勻。不拘時候。細細溫服。

尸咽喉

論曰。道家服藥。務先去三蟲者。以其為人害也。尸咽之病。亦本如此。巢氏謂腹中尸蟲。上蝕咽喉。能令生瘡。或痒或痛。如蠶候者是也。善攝生者。儻未能除去。亦當服藥治之。勿使妄動則善矣。

黃柏湯方 治尸咽喉閉塞出瘡。及乾嘔頭痛。食不下。

黃柏炙半

升麻

木通各一兩

竹茹三分

麥門冬半兩

玄參一兩

前胡

大青各三分

共八味。搗篩。每服三錢。水煎去滓。入芒硝末一錢。攪勻溫服。如鼻中有瘡。以生地黃汁少許滴入鼻中。日三五服。不計時候。若通利。加芒硝。不欲利去之。一捻金方 治尸咽及走馬喉痺。或腦内生癰。

雄黃研

藜蘆

猪牙皂角去皮子各一分

三味搗研爲散。先含水一口。用藥一米許。搐鼻內。卽吐去水。少時立效。

咽喉中如有物妨悶

論曰。喉者胃之系。故咽主嚥物。天氣通於肺。故主通氣。咽喉如有物妨悶者。乃肺胃壅滯。風熱客搏。結於咽喉使然。故聖惠謂憂愁思慮。氣逆痰結。皆生是疾也。射干湯方。治咽喉中如有物。噎塞不下。

射干

升麻

紫苑

百

合各半

木通一兩

赤茯苓

桔梗各三

右七味。每服三錢。水煎。食後溫服。如要通利。每服加朴硝末一錢。同煎服。

半夏湯洗七遍

木通

乾薑各半

芍藥

桑根白皮

共五味。每服三錢。入鹽少許。煎溫服。又一方。搗羅爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。食後生薑湯下。加至二十丸。

四物湯方 治咽喉中如有物。嘔吐不利。

半 夏薑汁洗辰 厚 朴薑汁炙 陳橘皮浸去白各一兩 赤茯苓二兩

共四味。每服三錢。入生薑三片。同煎。食後溫服。

厚朴湯方 治咽喉中如有物。

厚 朴薑汁炙 赤茯苓各一兩 半 夏洗七遍切 紫蘇葉一兩

共四味。每服三錢。入生薑三片。同煎。食後溫服。

石蓮湯方 治咽喉如有物噎塞。飲食不下。

石 蓮 人 參 杵頭糠各一分

共三味。每服三錢。水煎溫服。日二。

杵糠丸方 治咽喉中如有炙鬱。食即噎塞。

碓杵頭細糠二合

一味為末。鍊蜜和丸。如彈子丸。每空腹含化一丸。微微嚙津下。

杏仁煎方 治肺胃壅滯。咽喉中如有物妨悶。

杏 仁湯浸去皮尖雙仁炒 桑根白皮 貝 母各半 生薑汁二合

地黃汁二合

酥半兩

大棗六十枚

紫苑二分

甘草炙

桔梗炒

五味子

赤茯苓去黑皮

地骨皮各一兩

人參三分

共十四味。研杏仁。以水五升。濾取汁。將草藥細剉。同煎至二升。以綿濾去滓。續下酥及地黃汁。慢火煎成膏。每食後含一匙。細細嚥津。

骨鯁

論曰。用藥之法。有不取於氣味。特以意為用者。若魚網虎骨之治骨鯁是也。然網能制魚。乃魚之所畏。虎能伏獸。乃獸之所畏。其所制伏既不同。則用之不異矣。治咽喉諸鯁。輒骨散方。

赤茯苓

陳橘皮各半兩

甘草炙

縮砂仁各一分

共四味。為散。每用二錢。先搽口中。次用新水一盞嚥下。

馬渤散方。治骨鯁在喉中不出。

馬渤

白礬灰

惡實

陳橘皮各半兩

共四味。研為末。漿水和丸。如櫻桃大。含化嚥津。

橘皮丸方 治骨鯁在喉中不出。

陳橘皮去白半兩

烏賊魚骨去甲

沙糖各一分

右三味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如皂子大。綿裹含嚥。

粟皮丸方 治諸骨鯁在喉中不出。

粟子肉上皮半兩 香

鮎魚各一分

三味同研為丸。如梧桐子大。看骨遠近。綿裹一丸。水潤外留綿線。吞之即釣出。

飴糖丸方 治諸魚骨鯁在喉中。

飴糖不拘多少

一味為丸。如鷄子大。吞之。又漸作大丸子。再吞即效。

魚網散方 治諸魚骨鯁在喉中。

捕魚網 一片

一味。燒灰研細。每服一錢。新水調下。又以魚網覆鯁人頭上即下。

鷓鴣散方 治諸魚骨鯁在喉中。

鷓鴣毛翅十片

一味燒灰細研。每服一錢。濃汁橘皮湯調下。或以綿裹含嚥卽下。

薤白

一味。嚼令揉。取麤線繫之。持線一端。吞薤到鯁處。引之卽出。

揉筋引方

治諸魚骨鯁在喉中。

鹿

筋不拘多少

一味。漬之令軟。索如彈丸。持一端吞之。至軟處徐徐引出。

虎骨散方

治諸獸骨鯁。

虎骨

一味。研細。每服一錢。水調下。狸骨亦得。

血餘散方

治食中髮鯁。不下遠喉。

亂

髮一團燒灰

一味。研爲細散。每服一錢。粥飲調下。

豬膏吞方 治諸鯁。

豬膏

一味。吞如杏核大。未差再吞。

螻蛄散方 治諸鯁并刺不出。

螻蛄頭 一枚

一味。爲散。以綿裹嚙津。勿令鯁人知。若刺不出者。塗刺瘡上卽出。

治諸鯁方

右方用木炭皮爲末。研令極細。如無炭皮。但堅炭亦可。粥飲調下二錢。四五服。以鯁下爲度。

誤吞諸物

論曰。誤吞諸物。若金銀錢鈎之類。雖非病之自內。然無術以出之。久則害人。若舊梳治髮。磁石出針。皆意爲之治。不特取其性味。治藥之工。可謂用心精微者矣。治誤吞針及箭鏃等方

肥豬脂肉不拘多少

一味。煮令熟。輒恣意飽食。卽下。

治誤吞針方

磁石大一彈

一味。口含之。卽出。

癭瘤門

五癭

論曰。石癭。泥癭。勞癭。憂癭。氣癭。是爲五癭。石與泥。則因山水飲食而得之。憂勞氣。則本於七情之所感。氣則隨之。或上而不下。或結而不散。是也。

治癭瘤海藻散方

海藻一兩

昆布半兩

海蛤

木通

白茯苓三兩

桂心

羊脂十枚去

右七味。搗研爲散。非時溫酒下三錢。夜再服。

茯苓丸方 治氣結喉中蓄聚不散成癭。

白茯苓 三兩

半夏 湯洗

生薑 二兩

昆布

海藻 各五兩

桂心

陳橘皮 各一兩

右七味為末煉蜜丸如杏仁大常含化一粒細細嚥津令藥氣不絕。

諸瘤

論曰。瘤之為義。留滯而不去也。氣血流行不失其常。則形體和平。無或餘贅及鬱結。壅塞則乘虛投隙。瘤所以生。初為小核。寢以長大。若杯盃。不痒不痛。亦不結強。方劑所治。以治癭法同。但癭有可鍼割。而瘤慎不破爾。

消腫散方 治骨瘤。石瘤。肉瘤。膿瘤。血瘤。大如盃。孟升斗者。二三十年不差。致有膿潰。令人骨消肉盡。或堅。或軟。或潰。令人驚惕。寤寐不安。體中掣縮。

烏賊魚骨 去甲

硫黃 各一分

白石英

紫石英

鍾乳 各半兩

乾薑

大黃 炒

附子 去皮

胡燕屎

琥珀 各一分

丹參 三分

共十一味。爲散。貯以韋囊。勿令氣洩。若瘡濕卽傅之。若瘡乾無汁者。以猪膏和傅。日三四易之。以乾爲度。若汁不盡者。至五劑十劑止。著藥令人不疼痛。若不消。加芒硝二兩。

神效散方 治項氣瘤結附贅。日漸增長。

猪羊靨各三十枚旋入猪膽內蕪過令乾

陳橘皮去白一兩

三味爲散。每服二錢。空心米飲調下。初結不過數服。覺消。不用久服。

瘰癧門

瘰癧結核

論曰。瘰癧結核者。由風熱毒氣蘊積肝經。攻注筋脈。毒氣鬱而不散。故項腋之間。瘰癧結聚成核。或如梅棗核狀。累累相連。其證令人乍寒乍熱。頭項強痛。心神煩躁。蓋毒氣與氣相搏。則榮衛不知使之然也。

沉香湯方 治瘰癧毒腫。

沉香

丁香

木香

麝香

研各一分

連翹

黃芩各半

犀角半兩

升麻一兩

每服五錢。水煎溫服。空心、日午、夜臥各一服。

凝冰散方 治風熱毒氣。項下結核。及欲作癰疽。瘡癬。發背等疾。

菘豆粉

乳香研各一兩

二味合研為散。實人分作四服。虛人分作八服。食後米飲調下。就有核處一邊臥。盡劑必差。大消腫痛。

內消方 治瘰癧腫結。

蝸牛殼不拘多少

一味搗為細散。每服二錢。空心米飲調下。日再。至四十九日自消。

消毒塗方 治風熱結鞭。腫赤疼痛。及腮頰下忽結成核。

大黃二兩 景天即慎火草

二味同研爛。塗於患處。日再傳。

平肌散方

黃狗骨頭燒灰 鮫鯉甲燒灰各一錢 亂髮一團紙

三味。研勻。如瘡口已乾。用自津唾調溼傅之。日三四次。瘡即平愈。
治癰癤在項上。結成顆塊及觸處。但有結凝似作癭癰。急灸法。

獨蒜頭一斤

一味。截兩頭去心。作艾炷。火與蒜稱貼癰子灸之。勿令破肉。但取氣而已。覺熱勿畏。每七壯易蒜。可至七易取消。

治五種癰癤牡蠣散方

牡蠣煨研

連翹瓦上炒各一兩

二味。為細散。每服一錢。臨臥無灰酒調下。差後更服一兩。永不發。

癰癤寒熱

論曰。甲乙經論癰癤寒熱。皆鼠瘻寒熱之毒氣。留於脈而不去。上攻於項腋之間。風熱毒氣。與血相搏。則榮衛不和。故癰癤而發寒熱也。
連翹丸方。治癰癤寒熱。結核在項腋之下。堅痛。

連翹

玄參

木香

升

麻各一兩半

大黃蒸半兩 大麻子別研微炒 昆布各二兩 枳殼熬半兩

共八味搗羅為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前米飲下。加至二十九。

木香消毒湯方 治瘰癧連連。大小寒熱煩悶。

木香 大黃生用各半兩 竹葉乾者一分 連翹一兩

獨活半兩 梔子仁一分

共六味。每服三錢。水酒童子小便共一盞。同煎溫服。

瘰癧久不差

論曰。風熱毒氣。蘊積腑臟。攻於筋膜。則結為瘰癧。其毒氣所感深者。則衝發肌肉。令久不差。此疾尤忌憂思。恚怒。氣血勞傷。飲食寒冷。

漏蘆湯方 治瘰癧久不差。將欲破者。

漏蘆半兩 海藻半兩 連翹一兩 沉香半兩

山梔子仁一分 玄參 丹砂各三分

右七味搗篩。每服三錢。水煎溫服。

烏雞丸方 治瘰癧久不差。

烏雞卵一枚

錦貝子

二味將錦貝子入在雞卵內。用濕紙裹頭七重。再用泥固濟。火煨過後。入地坑內。出火毒一宿。取出。研細。入大黃末半兩。麝香一錢。同研細。煉蜜丸。如菉豆大。空心蜜水下五十丸。不過五服效。

連翹湯方 治瘰癧不差。敗肉生膿。

連翹

犀角各一兩

玄參

木通

黃耆

漏蘆

杏仁

去皮尖雙仁炒
黃各一兩半

共七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後溫服。日二。

烏雞丸方 治療癰久不差。

烏雞卵 一枚

錦貝子

二味將錦貝子入在雞卵內。用濕紙裹頭七重。再用泥固濟。火煨過後。入地坑內。出火毒。一宿取出。研細。入大黃末半兩。麝香一錢。同研細。煉蜜丸。如菘豆大。空心蜜水下五十丸。不過五服效。

連翹湯方 治療癰不差。敗肉生膿。

連翹

犀角 各一兩

玄參

木通

黃耆

漏蘆

杏

仁 去皮尖雙仁炒
黃各一兩半

共七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後溫服。日二。

國立中央圖書館台灣分館



3 1111 008723684

聖濟總錄纂要
卷十九
瘰癧門
瘰癧久不差

四八

民國二十五年 五月 拾日

