

病機沙篆

卷下

增補病機沙篆卷下

古吳尤乘生洲校訂重鑄

頭痛

頭者天之象也、陽之分也、六府清陽之氣、五藏精華之血、皆朝會於高顙、天氣所發、亦淫之邪、人氣所變、五賊之逆、皆矯犯上而為酷害、或蒙蔽其清明、或壅遏其經隧、與正氣相薄、鬱而成壅、脉滿而病、是皆為實也、若寒溫所侵、雖正氣衰微、不與相搏、而成虛然、邪襲於外、則血凝涩而脉攣縮、收引小絰而病、得溫則病減、是為虛也、因風而病、抽

刹寒風或自汗出、川芎、細辛、羌活、防風、升麻、紫欒、荆芥穗、乾薑、薄荷、甘菊、藁本、天麻、蔓荆子、白芷、因暑而病、或有汗無汗、選桂香薷扁豆、藿梗、葛連、厚朴、甘菊、因疫飲而病、昏重憤、欲吐、眼黑、頭旋、天麻、半夏、白朮、陳皮、甘草、芩連、因濕甚頭病、頭必重、遇天陰尤甚、令人煩心、川芎、細辛、蒼朮、芩連、羌活、甘草、冬月厥防逆而痛、大寒犯腦、深入骨髓、故頭痛齒亦痛、麻炭、羌防、升麻、蒼朮、黃芪、附子、殭蚕、氣虛痛耳、鳴九竅不利、遇勞則甚、考葛、吊木、升柴、芎芍、細辛、蔓荆子、陳皮、甘草、血虛痛、自魚尾眉尖、及近髮際上、川芎生地炭、

薄荷當歸用沸湯泡乘熱吸之候溫服氣血俱虛多汗
木芍藥升柴蔓荆細辛凡治頭痛皆取風藥矣乃東坡所
云高巔之上惟風可到味之薄者陰中之陽自地升天者
也然有三陰三陽之別○太陽惡風寒脈浮緊頭項痛用
麻黃川芎獨活藁本杏仁甘草少陽頭角痛脈弦寒熱奈
胡黃芩半夏甘草陽明頭額痛自汗發熱不惡寒脉長
緩實升葛芷甘石羔○太陽_陰頭痛體重有痠脉沉緩蒼朮
半夏南星茯苓陳皮甘草少陰頭痛足冷脉沉氣逆為厥
麻黃附子細辛湯厥陰頭項痛吐涎沫冷厥脉浮緩人參

吳茱萸大棗生姜、

陰經取痛可用溫藥、桂附姜萸風濕生熱取痛上壅損目、及偏正取風年深不愈並宜空清膏、芩連羌防芎索甘荆如陽火發熱惡熱而渴白虎湯加白芷、以旋眼黑者必用安神散羌防升榮知柏芩連生地甘草或川芎散芎羌索細荆落薊草首陳互附槐子石膏拔厥以痛時省嚴冬猶喜風寒略見溫暖其痛便甚清上湯火湯荆防羌本細蔓矣歸芪术紅生甘苓知柏芩連升等共十九味次服補氣湯考芪辛歸甘丁麻升並服風甚頭痛石羔散麻黃石羔

乾葛首烏頭痛及胸痛食少夜冷噃噬不休
麻黃吳萸湯、麻吳蒼羌、升藁陳芩、連柏葛細半夏紅甘附
陳、新沐中風為首鳥風、汎面多汗惡風、當先一日、則病甚至
其風日、則少愈、大川芎湯、川芎天麻一味為末蜜丸、茶送
下、風氣循風府而上、則為腦風、項背惡寒、腰散極冷、神金
散、麻黃細辛、乾葛霍香等分為末酒下、因發汗太過、宜酸
收而斂之、乳香落蓋散、甘桔陳榮、乳香粟壳末服
腎厥頭痛、玉真丸、硫黃二兩、石羔半夏硝石各一兩、為末
姜汁丸、姜湯送、再灸兩元一百壯、寒在黑甚者、去石羔、用鍾

乳或黑錫丹、疫厥頭痛、眼黑、頭旋、惡心煩悶、半木天麻湯
狗蒙招尤、目眩耳聾、肝風虛動也、鈎藤殼、鈎藤陳皮、半夏
麥冬、人參、茯苓、甘草、甘菊、石羔防風、傷食、頭痛、胸滿惡食、
卷酸、愛癟、砂枳木、查、麵來木、或紅丸子、三棱莪术、青陳
姜椒、醋糊丸、碧紅為衣、傷酒後痛、葛母解醒湯、葛根知母、
赤岑砂蔻、青陳魚鱠、猪苓生姜煎服、怒氣傷肝、頭痛、宜以
沉氣降氣散、沉木清陳、柴蘿細片、臭毒、頭痛、香附砂煎服、
偏頭風、總屬於疫、又左屬風、荆芥蕎粉、右屬血虛、芎歸地
黃、雷公風之痛、而成核塊者是也、或以雷鳴清震湯、荷葉

丹麻蒼木、腫核宜刺出血、亦有屬瘦墮者、瘦者以丹、以
半夏一兩、皂角姜汁煮大黃二兩、酒浸紙包煨三次、殼卷
連翹橘紅桂梗、天麻各五錢、黃芩七錢、薄荷三錢、白芷粉
芽、礞石硝煅各一錢、共為末、蒸餅丸、臨卧茶吞二錢、
真經痛、天門真痛上引泥丸、久發旦死、旦發夕死、腦為髓
海、真氣所聚、本不受邪、一受不治、古方用考附湯、可救十
中之一、然天柱折、及手足青至節者、尤難為方矣、又法考
附湯、送黑錫丹、灸百會穴、或有得生者、黑錫丹沈立附子、
奴蘆巴茴香肉桂各五錢、補骨脂肉豆蔻木香各一兩、硫

黑錠、杏二兩、熔砂子二兩、酒煮麪糊丸、桔子大陰乾布袋擦令光瑩、每服十九丸、空心姜鹹湯下。

傷寒於膀胱、多屬天行疫病、東垣云、身半已上、天氣主之、身半已下、地氣主之。比雖邪熱客於心肺、若以承氣下之、是誅伐無過矣。宜消毒普濟飲、芩連清心肺之火、橘紅苦杏生甘草、鴻火石兼補氣、牛蒡連翹、葛根葛根、姜卷馬屁勑解毒、升麻引經、桔梗為舟楫、白湯調末、時人服少許、海藏論大抵痛者、感四時不正之氣、大抵足陽以邪熱、實資少陽相火而益熾、視其症在何部、隨其經而治之、溫熱

為眩風水為痛以先見者為主治之宜早不延遲其
病所也頭痛更甚邪見於至高之分當先緩而後急先緩者
不用重劑也更須緩急服若急服則不能去病凡藥性味
形體皆宜緩施及寒藥須酒浸炒之其意皆是也及急者
謂之經高分之邪侵入於中焦染於有形質之地若不
速去反損陰也此謂客邪客急去之是治客以急也甘桔
湯加石生白芷牛蒡連翹大黃延胡姜黃荆芥肩棱骨痛
眉骨疼目系所過上抵於腦訛陽經挾外邪鬱成風熱毒
上攻腦下注目睛遂溢目系過眉骨相并而痛若心肝壅

熱上攻目睛而痛、目系、興眉骨牽引而痛、風痰上攻者、
亦然。若脾家溫氣內鬱、寒迫下焦、痛留於項、互引眉骨、有
疫毒、有抽掣、有牽者、有向左、各審以而治之、選奇湯、最
妙、羌活防風各二錢、淫芩一錢、甘草三錢、水煎分三服、少
因風熱者、祛風清上散、淫芩二錢、白芷一錢五分、柴葛防
風、桑枝各一錢、川烏一錢、二分荆芥八分、甘草半錢、水煎服、
固疫安、二陳湯加芩芷、因風寒者、羌、烏散、羌細各一錢、川
烏草、烏俱用童便浸一宿、各一錢、淫芩炙草各五分、共為
末服。○戴後卷云：為二症皆屬於肝、一作肝氣傷、發劄記

引眉骨俱痛、眼不能開、晝靜夜劇、導痰湯加川烏細辛、又作肝虛痛、若一見光則卽發、生絃地黃丸主之。

偏正頭痛、搐鼻所蒂散、藜蘆川芎、蕤耳落粉、焰硝雄黃各一錢、天竺黃一錢五分、右為末、含水口、中搐鼻一上立效、治卒瘲病方、皂莢末、搐鼻取嚏、又鵝兒不食茶、陰乾為末、取嚏止妙。秘方貼兩太陽穴、治火熱痛、大黃為末、加焰硝等分、以井泥和捏作餅貼之。

沉風塞鼻方、草撥細辛為末、以猪胆汁拌紙條、蘸於鼻內塞之、又方以椒為末吹之、又法、卑麻肉五錢、大棗十五枚、

共打和塗紙上、用竹筋捲上去筋、將此入鼻孔、良久取
清涕卽止、又法生菜菔汁、仰卧注鼻中、左注右、右注左、
針灸經云、凡病、凡風、凡運、皆有風、有火、有痰、亦多屬虛、為
本事方曰、腎虛則犯、下虛也、肝虛則犯、運上虛也、均宜
補之、卷灸百會、頭會、而丹田、氣海、必不可缺、而病腦頂陷
至泥丸者、此真犯病、且發夕死、夕發旦死、

此病筋痙驚不嗜卧、謂之腎厥犯病、宜灸關元百壯服用
玉真丸。偏正犯病、刺緣竹空二穴、風池二穴、合谷二穴
內撻針吸氣三口、又內撻針吸氣五口、患人自覺針下有

病一道以線上至頭為度長呼氣一口出針立愈

筆立愈

東垣云高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地
升天者也所以引病皆用風藥治之總其大體而言也然
患病多血必不足而風藥最能燥血故有愈治而愈甚矣
此其要宜養血不可不審也一人往返燕京感受風寒遂
得頭疼數月不休凡頭風之藥血所不服其痛更甚肢肉
瘦削扶篋踵門求予療治予思此症夙係外邪如何解散
不効語有之曰治風先流血血行風流滅本因血虛而風
空入之今又疎泄不已烏能愈乎又聞之病則不通通則

散

醉

不痛故以常沸生血活血、木通利脉道、而行常沸之力、向
遠者、竹沥平曰砂、而且可多、近者醫戒不敢飲、因食用斗
酒、入二味於中、浸三日夜、至湯盡、乘趁飲之、至醉醉、
去枕而卧、卧覺疼若失、所以取酒矣、欲引二藥之性上升
於心、至醉乃卧者、醉則挾肌膚、淪骨脉、藥力方到、臥則血
有所歸、其神安也、有志活人者、推此用之、恩過半矣、然又
有火鬱於上而痛在經云、淫所勝、民病於痛、治以冷劑、宜
瀉芩石羔之類治之、不可泥於此傍也、又有二方、用夢帰
敷地、連翫丸二錢、以薑去渣、以熟悶、薄荷葉二錢、放碗底、

歸藥乘陽沖下、臭吸其氣俟溫卽服卽安卧其効甚速。
然亦為血虛者所設耳。

腦多髓之海髓不足則腦為之痛宜草珠丹之類治之、少
用風藥久之必死。

目病另有專科方藥今附針灸法於后

眼暴赤紅腫痛合谷攢竹睛明臨泣迎風流淚上星風池
肝俞大小骨空攢竹臨泣合谷針灸二兩灸

目生翳障上星合谷風池睛明瞳子竈

目昏肝俞灸七壯一法灸足三里引火下降目自明也

雀目神庭上星百會前頂頸會五穴宜出血以鹽塗之
小兒肝積眼炎百合谷五壯第一

偷針眼枕其背上有紅點為瘡以鋒針刺破即瘥

眩暉

眩在眼黑而花暉。暉如轉運之運。俗名頭眩。頭旋內經論暉屬肝木。為上虛。仲景主疫丹溪主火與虛。風則脉浮有汗。川芎散以芎白芷防風。甘菊人參茯神。山茱萸陳皮寄劄脉少。手少陽。抽掣半而病。不換金正氣散。蒼朮厚朴。甘草陳皮。乾姜丁香。東姜。○肝木上虛而病眩。四物湯加天麻。甘菊枸杞。腎虛上劄。○眩六味丸加牛膝。生地。肉桂。納大外丸之法也。伏疫嘔逆。旋覆荳湯。參苓木草。桔梗。乾姜。旋覆。因火矣。茶調散或注炒大黃末。茶調服。七情所傷。半

夏茯苓、陈皮、枣仁、远志、柏子、木香、肉桂、青风。有虚在氣分、或汗多亡陽而眩者、宜補中益氣、加熟地、天麻、或腦虛而眩、用鹿茸為末、全六味湯服。

針法用上星、風池、合谷、神庭、肝俞、足三里、解谿、腎俞等穴。酌選用。

防眩湯、人參三錢、白朮一錢、半夏三錢、川芎一錢、山萸五錢、白芍一兩、半夏三錢、大麻錢、陳皮五錢、小茴、服、蓋眩暈似乎小症、卒然眼赤倒仆、而不可救者、治之不愈不早、故曰防眩、復服受益、不可二劑、不見功而止也。

心痛

心為君主之官、丙丁之元、神靈之舍、邪氣不得而犯之。其受傷者、乃包絡也。包絡引邪、直犯心臟、謂之心病必死不治。怵惕思慮則傷神、神傷則虛、而邪干之、故終包受邪而病也。心主諸陽、又主陰血、故因邪而陽氣鬱抑、生病。陽虛而邪氣勝、生病。因邪而陰虛、凝注、生病。陰虛而邪勝、生病。方論分邪為九種、曰飲風、冷熱、食慾、蟲疰、俱未述內經之旨。內經論六淫為邪、乘心而病、各有病形、故靈樞曰、與背相控、善懊、為從後觸其心、偃僂失、腎心病也。

苗。以盧巴肉桂地黃附子川練沈魚葵半腹脹胸滿心
尤病甚。胃心痛也。又附茯苓枳朴薑陳。病久錐針脾心痛
也。白朮菖蒲乾姜歸芍枳朴蜜砂甘陳色蒼。終日不得
太息。肝心病也。青沈木冬桂桂連甘吳萸紓俯不能仰動
作痛益甚。肺心病也。白蔻紫苑天冬桔梗口羌乾姜。病
引小腹上下考定。溲便難。劄病心痛。取足厥陰藥用苗。并
木矣
練青朮。肉桂歸地心痛腹脹大便閉。枳朴蜜葛大黃。
心痛引腰脊欲嘔。取足少陰。心痛引背不得息。刺足
少陰之。取手少陽。心痛腹脹。奮然大便不利。取足

太陰○心痛引背不得息刺乎太陰○火逆運山梁上
勝後相乘於心而病、必有缺痛狀。苟未妙悉、何以施治哉。五藏失調皆為心痛。刺治分經理甚明悉至以含針用藥尤宜詳察其義。腎心病者、多由陰邪上冲、故善瘧。從後觸其心。胃心病者、多由停滯中焦、故胸腹脹滿。脾心痛者、多由寒犯中焦、故其病尤甚。肝心病者、多由木火之鬱、病在血分、故色蒼蒼如死狀。肺心病者、多由上焦不清、病在氣分、故動作劇痛益甚。知其在氣則順之、在血則行之。鬱則開少、滯則逐之。火多实、則或散或清、虛

虛、刻或溫或補、若犯真心痛、乃不可治、其餘舒得其情、應手而愈、易以探囊也、

腕

胃腕痛、今呼心痛也、其在蔽骨之下、所謂胃心者心而病胃名溫土、位列中焦、受氣多血、是水穀之海、五藏六府皆於此受氣、而天人所感之邪、壯多氣行自愈、怯多着而成病、冲和之氣變為偏寒偏熱、因而水穀不消、停留與中氣相蒸為病、惟肝木之相乘、多為甚、木性暴疾、兼之正克也、其痛必上支兩脇、飲食不下、咽膈不通、則為食脾、謂食入胃、而上支也、督氣之厥心火、厥氣上逆、川壅而胃

而痛也或滿或脹或不能食或嘔吐或吞酸或大便難或泄惡及面色浮黃四肢倦怠皆未病在胃也其天人相襲之邪大抵與厥心痛多相倣但與胃病兼久也

雜經曰陰維為病苦心痛陰維行於陰而主營營為血屬心故苦心痛也潔古云其治在足太陽三陰交仲景太陰症、別理中湯少陰症、別之逆湯厥陰症、別當歸之逆吳茱萸湯又云按之心下滿痛多為實大柴胡湯下之脉堅實不大緩腹滿不可按承氣湯下之丹溪云外受寒者、當散內受寒者、當溫利病久屬鬱、則拈用山楂為溫藥

之向導。則邪氣易伏。寒客於胃。則卒然而痛。外吸涼風。內食冷物。亡陳湯加半果豆扣吳萸乾姜之類。

卒心痛。脉洪數。葱連一味。煎頓服。大抵作痛。清中陽。葱連山枝半夏陈。反。茯苓甘草。豆扣生姜。有按之。痛減矣。是

屬虛。宜酸歛而養之。不宜辛散。○死血作痛。脈濶壯盛。女

抵者在。虛弱人。の物湯加桃仁桂枝。蓬术山甲降生。又有

疫積作病。南星安中湯。疫甚者。白螺蛳壳。或海蛤壳。煅

梅性一錢調服。○心膈大痛。發厥嘔逆。藥不納。女。趁勢以

鵝毛探吐。疫次而病止。○食積作病。山楂半果。麴芽。青陳。

注積作痛、白扣砂仁乾姜○疫火痛、白凡朱砂等分為末、
硝和丸、姜湯下○寒氣痛、菖蒲良姜草扣砂仁厚朴等分
煎服○腎氣逆上、心而痛、韭汁和五苓散為末作丸、苟
魚湯下○蟲痛、剗面有白斑、唇紅能食、或口吐沫、先以肉
汁及糖引蟲向上、然後用妙功散、空心服、方見痛止○因
謂作病、又有作止、令人蛔吐、或渴與飲、轉入轉吐、蛔動故
也、川椒烏梅、兵郎萸連煎服○氣刺痛、沈水降氣散、沈
水附砂仁甘草、姜汁和丸、湯下、或之磨湯、木香烏藥、
沉水鬱金等分各水磨酒服、

肺法 淫大結宜降氣、沉濇宜和血、沈細遲易治、

堅大實長滑數多難治、

針灸法

心脾疼痛

灸上中脘脾俞胃俞腎俞足三里

刺內閣三里陰交內庭公孫

心痛欲絕一時妄藥 急灸大拇指指甲男左女右二壯

立効

腹痛

經脉者、天真流行之道路也。水穀之精散為營衛、行於脉
之內外、調和五藏、洒陳六府、法之時升降浮沈之氣、以成
生長化收藏、皆天真之妙用也。故曰、氣血乃人之神、不
謹不養、之則邪不能傷、失之則營氣解散、故邪乘虛
客入矣、於是氣停積聚、為積為癰、血瘀血畜、滯邪正相搏、故
作痛也。

脾胃內舍心腹、心肺內舍胸膺、兩脇胠內舍肝膽、小腹腰
內舍小腸與腎、大小腸衝任皆在小腹、此藏府所舍之部

位也、

靈樞曰、風雨傷於上、清溫傷於下、傷於上者、病逆外入內、從上而下也。次傳經傳輸、六經不通之肢、則肢節病、腰脊強、或着孫肺、或着絡肺、或着經肺、或着輸肺、或着伏衝之肺、或着於腸胃之募原、皆能成積而病。傳於下者、病起於足、故積之始生、得寒乃生、厥乃成積、厥氣生足之下、胫、掌之則血脉凝注、寒氣上入腸胃而瞋脹、腸外汁沫之道聚不得散、日以成積。○又曰、傷於藏者、病起於陰、復飲則腸滿、起居不節、用力過度、則絡肺傷、陽絡傷則外溢而衄。

血陰絡傷、創血內溢而尿血、腸胃之絡傷、創血溢於腸外、有寒汁沫、與血相搏、創積成矣、卒然外中於寒、內傷憂愁、則氣逆、上下凝結不通、而積成矣、未至於結塊、乃汁沫聚也、至於七情氣逆、營衛不行、創液聚血凝、及飲食用力過度、亦然、不必陰與冷始作病也、又素向有亡、胃实血虛、其脉软散、當病食脾、

素向云、歲土太過、澁淫可勝而痛、有言衝脈之病、氣溢於大腸、繞脅而痛、有脾傷傳腎、少腹冤然而痛、有肝熱腹痛、有腎虛腹痛、太陰厥心痛引背、創諸邪竟入作病、何必有

與空氣相關則矣、

雜經曰、臍上病心症也、臍下病腎症也、臍左病肺症也、臍右病肝症也、若厥心痛、與五邪相乘而痛、更有五藏之病、不干罪尤、止在腹作病多種、察之、庶為醫之務事、則病多遁情矣。○臍下忽大痛、人中里多死。

素尚舉痛論、叙腹痛十條、屬於中僅一條、緩審正氣之虛實、別邪之盛衰、最為切要、

中脘痛、太陰脾也、实者、砂枳术、连朴蒼蓬附枳、虛者、姜

姜桂茴附少陽痛者厥陰肝也
少陽桂辛甘通姜枣脾

安正陽散附姜皂角甘射或仲景芍藥甘草湯甲己化土

真神方也久绵绵而痛喜垫喜按砂理中湯空痛得溫

藥不効用神保丸木香枳椒各二錢五分巴豆十粒去皮

心研去油蠟七個蒸餅丸椒目大硃砂三錢另衣每服七

丸空腹津唾下時痛時止肺洪數用參連梔子、羌朴陳

甘蒼以冒暑宜急蘇飲加參芩木草如感溫作痛小便

塘

癃

大便難脉細胃苓散如虫病烏梅丸感應丸治之小腹痛

因畜血在仁承氣湯加山甲桂固宮病木香茴桂吳萸青

死血痛、脉沉濶、降桂樞孫、山甲大黃以索、因病痛矣、尚桂川棟青、木魚青木魚、若甲錯腹皮急、或遠臍痛、及生瘡、乃小腸癰也、脉數為膿、用大苦葵根下之、更以太乙膏丸、服脉細小遲者生、堅大疾數淫長者死、大痛而喘、人中黑者死、針法凡刺腹痛須針足三里下為氣良

脾虛腹滿腸鳴切病內關中脘三里三陰交

遠臍痛大腸病也、天樞三里、胃脘痛內關脾俞胃俞

脣下冷痛灸氣海、脾虛腹脹公孫三里內庭

腰痛

劑

經曰腰為腎之府、轉搖不能、腎將惫矣。又云巨陽虛則頭項腰脊痛、此二條言正氣之虛也。又云膀胱之脉、挾脊抵腰、故挾脊痛、腰似折、此一條言邪之实也。膏梁之人、久服熱藥、醉心入房、損其真氣、久則腎極、腰脊病、久則髓減、骨枯、發若骨痿、夫足之三陽、從頭走足、足之三陰、從足走腹經、筋脈過、皆筋為病、治之多緣審係何經、方得應手取効、若專主腎虛、或有寒濕風為病者、毋乃固乎、然虛為本、而風常溫於為標、上有麻血、滯氣、痰飲為病者、○風病者、脉浮。

或左或右病未定處牽引而走宜防風蒼木白芷桂枝陳

蝎

皮棗仁芍藥朴光甚妙加全蠅○溫病久坐水滯或着

雨露

必帶緩天陰尤甚體氣沈重宜用腎着湯於柴白

木乾姜甘草或滲溫湯二术二錢丁香甘姜甘草為挾風

乾

加狗脊寄生挾芩加桂枝并用摩腰膏附子烏沉尖南

星各三錢五分丁香樟腦朱砂雄黃各一錢五分乾姜一

錢射干五分蜜丸為圓眼大姜汁化為鰐粥塗掌上烘擦

厚

摩腰中卽以熱綿衣裹之挾溫熱透羌活勝溫湯感寒亦

火

要

白芷桂附芎帰朴蒼陳姜并用摩腰膏傷寒病多脉必洪
數渴便秘甘芷湯甘草二錢馬料黑豆二合加天麻續
斷因內躉傷痛乳魚散虎胫骨敗龜板各兩二血竭赤芍
乳沒外傷白附蒼耳自然銅骨碎補肉桂乾姜各三兩牛
膝天麻各五加皮羌活各二兩為末酒下一錢甚妙加
桃仁全蝎或用黑荳神散黑豆半升炒去皮芎帰芍地姜
桂甘草蒲黃各末童便和酒下二錢勿不効瘀血甚也宜
五積散加桃仁紅花大黃葱白益服瘦注病安用二陳湯
加南星烏藥各附只壳氣滯病安脉沉宜沉年砂仁香附

烏藥、羌桂、怒氣傷肝、及腎病。芎歸牛矢、杜仲木瓜、細辛半夏葛蒲甘草、枣仁益服。思憂傷脾、及腎病。芎歸脾湯、加互附烏藥、沉香、砂仁、抑鬱失志。七氣湯。人參半夏肉桂、芍藥乳、甘草、姜棗益服。腰痛。引足膝女、杜仲續斷牛膝骨碎補、骨脂、巴索、靈化桃仁等分。為末。酒糊丸加桃仁打勻丸。泛下五錢。

凡諸腰痛俱係腎虛而挾邪。去其邪。妄邪則從。補可也。而桂為向導之藥。鹿茸羊腎亦可。腎藏志。盛怒傷志而致腎敗。則腰脊強不動轉。而死。

針法

腰痛脊强宜人中委中

腰疼及颈项强回顧不便委中承浆腰俞腎俞

腰痛不可俯仰如坐水牛穴取之

腰脊內引痛不得屈伸近上合谷近下昆

昆嶺

挫傷腰並脇痛尺澤曲池陽陵泉委中人中昆

嶺

腰背俱僵合谷昆嶺風池

腰及足疼痛委中出血督虛腰痛久不已非督俞

素問腰痛論曰腰痛不可舉勢申脉僕參主之此太陽之

穴陽蹻之本也又曰會陰之脉令人腰痛上潔然汗

出汗乾令人欲飲已欲走刺直陽之脉上三痏在蹻上
部下五寸橫居祝其上多出血何謂直陽足太陽之脉循
腰下會於後陰故曰會陰直陽之脉卽陽蹻所生之申脉
穴也蹻上部下承筋穴也卽腨中央如外蹻中也太陽
脉氣所發禁刺佗祝其而腨中央血絰乃刺之出血

又曰昌陽之脉令人腰痛引膺目眩然甚刺反折反
卷不効言刺內筋為三痏在內踝上大筋前太陰後上踝
二寸所此內筋卽陰蹻之部交伏穴也

顛狂顛屬府疫在包絡故時發止

顛之為病、反固抑鬱不遂、侘傺音茶梨妄聊、精神恍惚、語言錯亂、或歌或笑、或悲或泣、以醉為癡、語言有以妄尾、穢汚不知、經年不愈、俗呼心風、有狂之意、不至狂之甚也、暴病曰狂、久病曰顛、故越人云、重陽音茶梨多狂、重陰音茶梨也多顛也、失意之狀、內經云、顛疾始生、先不樂、以重痛、目赤、牙挾、上安下虛、已而煩心、○骨顛疾者、顚齒諸俞分肉皆滿、而骨居汗出、煩惱嘔多沫、氣下泄死不治、○筋顛疾者、身蹠掌急、嘔多沫、氣不泄不治、○脉顛疾者、暴仆四肢之脈皆脹而縱、

嘔多沫沫氣下泄不治。顛發為狂死不治。下泄不治。
顛發為狂不治矣。由心之陽不勝其陰氣之逆。神明散亂。
陽氣暴絕故發為狂。猶燈將滅而復明也。下泄不治矣。
因其邪入於陰。陰氣滿鬲室於下。剝逆而上。令今氣下泄。
腎氣虛脫故也。○難經云。脉有陰陽。又有相乘相伏也。脉
居陰部。反見陽脉。為陽乘陰。雖沉濶而短。為陰中伏陽。脉
居陽部。反見陰脉。為陰乘陽。雖浮滑而長。為陽中伏陰也。
○王叔和脉經云。陰附陽則狂。陽附陰則顛。易附金火要。

以下安也。蓋陰氣虛不能治於內、則附陽而上升；陽氣虛不能衛於外、則附陰而
不下降、故上熱而下寒。陽氣虛不能衛於外、則附陰而
不歸、故下熱而上寒。○脉法、堅實者生、沉細者死。
治法、先宜以吐劑、湧吐其痰涎、用控涎丹、甘遂大戟白芥
子等分、糊丸、淡姜湯下。七丸、壯其部之、吐其痰涎、然後用
安神之劑、人參茯神、琥珀菖蒲、遠志棗仁、乳香、硃砂等、
因驚而得勢、宜抱丸丸水銀二兩、乳香一兩、黑銀一兩、五
錢、將銀入銚內、下水銀練成珠子、次下硃砂乳香、乘丸研
勻、火焚安大、每用一丸、空心井花水下。

因思慮而得勞傷脾陽主之兼用天地膏滋服之。有因心經蓄熱煩躁眼鼻火放火宜芩连花粉竹茱丹參麥冬茯神遠志菖蒲牛蒡之類或因七情所致鬱痰為熱熱宜鬱金七兩川芎三兩細末薄荷湯泛為丸每服二錢菖蒲姜湯下或因氣滯痰迷用之七湯半夏一錢五分芩芍一錢桔梗六分厚朴九分姜枣益服

火攻宜吐其痰苦芥蒂為末一錢井水調一盞服得大吐後安睡切勿呼醒吐時或令人目翻須以手掩之吐不

琥珀星半夏才知前則

附孫光治一僧患顛半年不愈他嘗以鹹物食之待其發

渴

可來取藥今夜得睡明日便愈治之僧睡兩晝

夜而愈倘一驚覺不可復治用酒調靈苑辰砂散辰砂

一兩枣仁乳各五錢加人參為末調酒恣飲取醉令

臥淨室病淺半日或一日病深日禁三兩日醒惜人不

能用此人但知安神而不知昏其神則神始安得睡禁

酒力也醉則神昏而反安矣

一婦人發顛用心藥不効投養正丹二服乳全湯送下

更以三生飲佐之。川烏生南星生附子加大黃治愈
一人病顛脈喘且搏以承氣湯數下之而安

針法 神門內關人中足三里陰蹻陽蹻鳩尾心俞胞俞

勞宮向使選用

灸法

小兒驚癇以狂 金門僕考灸三壯炷以麥大用

針入一寸又灸崑崙三壯炷同用針入三分

狂症

狂之為症、皆因陽邪過極、故猖狂剛暴、若有邪附、殺人不
避水火、罵詈不辨孰疎、登高而歌、棄衣而走、踰牆上屋、非
力所制、或言未嘗欠之事、少卧而不飢、自高賢也、自辨智
也、自負倨也、故越人云、產陽多狂也、素向帝曰、有怒狂女
此病安生、岐伯曰、生於陽也、陽氣妄、暴折而難決、故善怒、
名曰陽厥、陽則怒常動、巨陽少陽不動、而動大疾、此其候
也、奪其食即已、夫食入於陰、長氣於陽、故奪其食即已、使
以服生鉄落為飲、以其下氣疾也、○陽氣抑鬱、而不舒疎

越、少陽胞木挾三焦相火、與太陽陰火而上故使人發怒如狂、奪其食也、不使火助邪也、飲以生鐵落丸、金以制木也、木平則火降、故曰下氣疾也、

帝曰、陽明甚病、棄衣而走、登高而歌、或至不食數日、踰牆上屋、非其性也、病反紓勢何也、岐伯曰、四肢交病陽之本也、陽盛則四肢实、實則能登高也、蓋甚於身、故棄衣而走也、上焦实矣、從高抑下、生鐵落飲、生鐵之十觔、入火燒赤、砧上捶之、有花墜地、是名鐵落、用水二斗、煮取一斗、

各一兩、入鉄汁中煮去五升加竹酒二合、創之自愈。
在上者、越之附子散、丸前。陽則实、則脉伏大承氣下之。
虛者補之、寧志膏人參、麥仁、辰砂乳、白蜜丸、薄荷湯下。
或一醉散、朱砂五錢、蔓陀羅花二錢、五分末服二錢、徑送
下、若醉便卧勿驚之。

經云、悲哀動中則傷魂、傷則狂妄不精、不精則不止、若
以喜勝之、以溫藥補魂之陽、驚氣丸主之、附子木年、殭蚕
花蛇、天麻、黃柏紅乾葛、五錢、蘆薈一兩、南星五錢、朱砂
為丸、入水射少許、蜜丸圓眼大一丸、金箔落粉湯下、又

防己地黃湯、防己一錢、桂枝防風各三錢、甘草二錢、淫
浸一宿、绞取汁、生地二斤、逐浸之、取汁、和勻服、以補魄之
二陽。喜樂妄極、則傷魄、傷魄則狂、嘗以恐勝之、以涼藥
補魄之陰、辰砂丸、主辰砂白丸、辰砂金為末、蜜丸或以苦參
一味為末、蜜丸、落荷湯下十九、補魄之二陰。

婦人熱血室、發狂不認人、芍、牛黃丸、牛黃二錢五分、硃砂
丹、丹、金各三錢、水引甘草各一錢、為末、蜜丸、新汲
水化服、又方、一味大黃為末、童便調服、

咏屋漏魚戲皆崇脉也秦承祖先以施舍厚備湯酒之
稍避用木瓦烏藥白柏檀砂仁霍多荳木原朴陳及甘
草生姜益服。又取東向槐柳枝各七寸益湯灌之可避
虛人避役以拂脾湯調理之。

凡中鬼祟卒然仆地切勿移動其尸宜令人圍繞打鼓楚
燒燭品名五氣不斷候避方可移動。

顛狂哭笑悲歌妄言登高棄衣多稱鬼神邪言灸百會三

壯針人中三分心俞向使神門

灸戶厥秘法用繩圍患人男左女右臂腕截斷將繩從大

椎上度下脊上繩以次處士一壯立甦

扁鵲取三陽五會更熨兩腋下號太子卽甦

尸厥暴死不省人事一石會人中啞而全活

王生夜半夢見人曰汝姪直令全人固難其姪夢
入其家知其早歸歸里之

茅生妻重病。又知東向脉搏急者在處約數之百步

脉搏用木丸急塞口鼻鼓氣如火外寒氣紫赤林枯火甘

癇癎

癇病發時昏不知人、卒然倒仆、甚而瘈瘲抽掣、目上视、或口眼喎斜、或作六畜聲、將醒時、口吐涎沫、有連日發作、有日三五次發作、中風中寒、中暑中熱、倒仆時、妄聲、惺時、妄誕、不復發也。

痙病上屢發熱、身體強直、角弓反張、不知痛之、手軟、或為人畜之鳴也、痙舊作痙、傳寫之誤也、此症面赤目赤、爪搖四噤、背反弓張、或頸項強急矣、世多認作驚癇治之、夫枉如此、耳痙上有二症、極為窄抑、妄汗之痙也、溫蒸為熱、

有汗之症也、以參別之。

癥瘕之發厥、由腎中耗火之上升、而肝宗雷火相從而助之、惟有肝風故作搐搦、搐搦則逼身之脂液逼迫而上、隨逆氣而吐出於口也、陰氣虛不能寧謐於內、則附陽而上升、故上寒而下熱、陽氣虛不能固衛於外、則附陰而下溫、故下熱而上寒、脉經曰、寸口脉前部左右彈兮陽蹻也、動若腰背病又為顛痛僵付羊鳴、惡風偏枯麻痺、身體強又曰、微濱為風痛、並取陽蹻在外踝上三寸、值絕骨是穴卽

寒於皮膚浮腫又為少腹病裏急腰及骭竊下相連陰中
病男子陰疝女子漏下不止、髀髀骨也、竊腰下穴也、
張潔古曰二脉起於足使人蹻捷也陽蹻之絡為病陽矣
剗狂走目不寐表病裏和陽病剗空可針耳地尻府尻府
在項後入髮際一寸大筋內宛宛中○陰蹻為病陰急剗
陰脈徑直五絡不由表和裏病陰痛剗捲可灸照海穴及
陽陵泉在膝下一寸骭外廉陷中○又曰鯁痛晝發灸陽
蹻夜發灸陰蹻

王叔和脉經曰寸口脉從少陰斜至太陽是陽維脉也動

苦肌肉痺痒皮膚痛下部不欲汗出而嘔又苦顛仆羊鳴
手足相引甚勞失音不能言宜取客主人在耳前起
上

廉角有空乃手足少陽陽明之會。又曰寸口脉從少
陽斜至厥陰是陰維脉也。勁苦顛瘓僵仆羊鳴又苦僵什
失音肌肉痺痒應時自汗發出惡風身洗然也取陽白

金門僕矣

又曰尺寸俱浮直上直下此為督脈腰背強痛不得俛仰
大人顛病小兒風癇又脉未中央浮直上直下勁勞督脈
之力全要可蒸透大便小兒高直至一尺二寸即當戶

張仲景金匱云、脊強者五癥之總名。其癥卒口噤背反。禁背反張
訥藥不已可灸身_桂大椎陶道穴。又云、癥宗脉築_築而
弦直上下行。難經曰、督脈為病、脊強而厥。王海藏云、此
病宜用羌活、鴟活、防風、荆芥、細辛。葉本、黃連、大黃、附子、烏
沉、卷耳之類。

巢氏不達內經叔和之旨、妄立五癥之說。一曰陽癥、二曰陰
癥、三曰夙癥、四曰馬癥、五曰惺癥。不知癥癥之發、由腎肝
轉雷上冲、如從標而得勢、止在經脉不通、從本而得勢、邪
入腎間、動氣夫兩腎間動氣、是生氣之本、藏府之根呼。

吸之門也。所謂生氣者、陽從陰極而生、卽蒼天之氣、所自
起之分也。故經曰、蒼天之清淨、則志意治、順之、則陽氣固。
雖有賊邪、不於害也。或經脉引入外感、內傷於本、卽傷其
生化之原、而命門相火、自下逆上、塞其音聲、迫出遍身之
鳴、與脾之涎沫、湧出於口、潮入於心、故卒倒妄知、而故令
論治、皆不審內經之旨深可慨也。

劉河間以為熱甚而風燥、其兼化也、專清涼為主、三因分
六氣為外因、七情為內因、飲食為不內不外因、

吐然後用安神平肝之劑調之外地芍藥桂枝甘草半夏牛膝
金箔之類、

張子和法汗吐下並行虛而不勝三法妙宜星豆芩芩
蒲白冬全蝎竹沥或丸腦安神丸犀角芩神人參麥冬各
二兩水射牛黃各三錢馬牙硝二錢甘草骨皮桑白各一
兩金箔三十五片蜜丸彈子太姜湯下日三服○因火熱
去黃連麥冬茶神竹葉半夏南星柏子仁菖蒲元氣散妙
滾痰丸大黃二兩黃芩二兩沉香一兩紫石硝石同煅一
兩水澄竹懸姜汁神曲糊丸或考硃丸虛實可用最妙以

人參蛤粉、朱砂等分為末、羚心血為丸、金銀湯送下。
晝發治陽躉宜升陽鼎、麻黃連節八錢、蒼朮一兩、五錢炒
防風八錢、炙甘草五錢、空心益服。

夜發治陰躉宜少物湯、加柴胡、桔梗、半夏、南星、菖蒲、遠志。
柏
李仁知母、黃芩、心煎服。

晨朝發熱、病在足厥陰肝。○平旦發熱、病在足少陽胆。○
日午發熱、病在足太陽膀胱。○黃昏發熱、病在足大陰脾。
不定時發熱、病在足陽明胃。○半夜發熱、病在足少陰腎。

千金方云。先悞痘驚啼而後發。脈浮大者為陽癟。在府易治。○先身冷不驚掣。不啼吠。而病後脈沉細者。名曰陰癟。在藏難治。○劉宗厚云。陰陽癟即急慢驚也。

陽癟。○疫熱客於心胃。眞驚而作。若疫熱甚矣。雖不驚觸。亦作也。宜用涼劑。○陰癟。○之卒於疫熱。而用寒涼太過。損傷脾胃。變而成陰。法宜溫補以燥退之品治之。病久而疫成窠囊。須與厚朴丸。厚朴川芎。川烏各一兩半。紫苑吳萸。桑白皮。葛蒲。桔梗。芍藥。官桂。皂角。乾姜。人參。各二兩。萸。桔梗。芍藥。葛蒲。桑白皮。各一兩半。巴霜。五錢。蜜丸。桐子大。每服五七十九粒。姜

胡

湯下、春夏加黃連二兩、秋冬加厚朴二兩外、加人參葛蒲、
茯苓各一兩五錢、窠囊日久必至生蟲、宜妙功丸服之、木
豆丁、桑白各五錢、乳頭射頭、鱗胞各二錢五分、百丁豆
三百粒、輕粉一錢五分、雄黃青皮芩連翻連各五錢、里刃
三稜、蓬木雷丸、鶴虱甘草、陳皮各一兩、大黃一兩半、赤豆
三百粒、巴豆七粒、喬麥兩半、作丸糊、每丸重一錢、朱砂為
衣、陰乾溫水化開服、經去即愈、至夜吃三服、用治瘧癘俱
效、然須防其再發、宜十全大補湯、加枣仁、遠志、麦冬、硃砂、

少火脉沉小急實虛而弦急皆不治
灸法 狂言不避水火 間使三七壯 百會九壯
顛癇瘧癰不知所苦 二蹻主之男陽蹻女陰蹻
畫發 取陽蹻申脈 夜發 取陰蹻照海
失志癡呆 取神門鬼眼百會
凡灸兩蹻各二七壯必先用藥下之乃灸否則疫氣壅塞
必殺人

小兒急慢驚癇切不可執持其發搐又不可混灸遇謂風
痛可灸驚搐不可灸風癇之疫若灸着穴疫去心清可治

安矣每欠人妄術輒投艾火不惟失之次兒反增憒且小兒
經絡脉道未全戒之

小兒驚癇先怖恐啼叫乃發也用炷火变大灸頂上旋毛
中三壯及耳後青絡脉指

風癇先出手指數物狀乃發也灸髮際宛宛中三壯
狹癇病以戶厥口吐清沫灸巨闕三壯

羊癇目瞪吐舌羊鳴灸第九椎下間三五壯
馬癇張口搖頭牙反折馬鳴灸僕參左右各三壯

怔忡嘯慄

人之所主也。心也。心之所主者血也。心血消亡。神氣失守。
則宅舍空虛。疫因以客。此怔忡之所由作也。心中惕々然
躁築。並動。怔々忡々。不能自安。即所謂慄也。一房虛。一
房飲。虛由陽氣內虛。心神不足。內動為慄。宜人考白术。萸
茱甘草。茯苓。以養心氣。虛由陰氣內虛。火即妄動而慄。宜
考麦生地。肺身。杜眼。以養心血。飲由水停心下。侮其所勝。
心君畏水。不能自安。故惕々而慄。宜茯苓白术。半夏。桔紅。
淡神。以清其痰飲。或有汗吐下後。正氣內虛。以致怔忡。左。

宜考究本末、脉訣之類、以補其耗散之氣血、又有邪氣攻擊而慘矣、宜審其為何邪、而攻去之、又有厥來結代、是營衛不足、非補氣血生津液矣、不能除也、

心為君火、包絡為相火、火為陽母

鼎陰

之相火下水氣承之、以是則勁得其正、而清淨光明為生
之氣也。若之所承、則煩擾而為怔忡、考補其不足、以安其
神氣、未瘥、則求其屬、以衰之、壯水之主、以制陽光也。
居
各藏有疾、皆能與包絡之火合、勁而為怔忡、隨其所犯、而
補焉、更貞逆向、各而周之。

胞絡火動在治上如之

有所憂慮便怔忡矣、属虛、肺脾陽主之。○有時作時止矣、瘦因火動也、溫胆湯加黃連、或二陳加枳實、玉竹、○瘦人多血虛、肥人多氣虛、及疫飲、

陰火上衝、怔忡不已矣、甚則眼運眼花、齒髮脱落、或久異物鬼神之類、或腹中作响、皆宜涼陰降火、宜六味加知柏、茯神枣仁養心之品、日服降火藥不愈矣、是妄根失守之火、宜八味丸、

亦有所求不遂、或過縱自悔、嗟嘆夜語、若有所失矣、宜以

溫胞湯加人參柏子仁為丸辰砂為衣日三服
胸中痞塞不能飲食心中如有所怯恚喜居暗室或倚牆
後見人卽畏避至地此名單慄之病專由於不足也宜人
參養營湯加藿香穀芽

驚悸恐各有不同○驚者卒然驚觸不自知也○悸者本非
所驚心自動而不寧卽怔忡也○恐者自疑若人將捕不能
獨坐臥也治之一法慄則祛其疫驚則安其神恐則定其
志心為離火內陰而外陽腎為坎水內陽而外陰心以神
為主腎為志為生焉之拿之六奇瓶解中云曰五味之全

精上奉以安其神、陽氣下藏以定其志、驚氣入肝。黃帝問曰：足陽以之勝病，惡人與火，聞木音則惕然而驚。岐伯對曰：陽火在胃脈也，胃在土也，聞木音而驚者，土惡木也。因大驚而成女，脈必勁如豆粒而妄心至。以菟連安神丸鎮之，硃砂黃連生地、歸心、甘草為末，蜜丸。腎虛而恐，人多黃芪、白朮、元參、黃柏、益水、川芎、歸心、熟地等。胞虛而恐，人多枸杞、枣仁、柏子仁、熟地、五味、桂半夏、茯苓、陳皮、肝脾俱虛，百藥不效，鹿角膠、淫化空腹下五錢，極炒。古人所謂肝妄虛，不可不補，補腎卽所以補肝也。肝藏血，血

不足則恐、物傷加山萸、麥仁、丹參圓肉、胃虛則恐必宜
之。君子湯主之。怵惕思慮則傷神、神傷則恐懼自失。煩脾
濡主之經云精氣并於腎、則恐地黃天冬、枸杞遠志、蕤英、
健忘女勝胃寶而心虛、心虛則營衛留於下、久之不以時
上、故善忘。煩脾湯加升柴大枣、腎盛怒而不止、則傷志。志
傷則喜忘其前言。地黃知芍丹皮遠志、杞天冬思慮過
度、瘦迷心竅竅而善忘女煩脾湯加柏半枳木、蕤神珠砂。
心腎不交、宜朱雀丸、沈氏五錢、蕤神二兩、蜜丸、姜湯送下。

針法 心中虛惕神思不安 膽俞心俞內闕通里

怔忡健忘不寐手少陰心虛

內闕金針五分灸三壯

神門 鈎三分灸二七壯

少海 鈎一分

健忘

經云上氣不足下氣有餘、腸胃實而心氣虛、虛則營衛留於下、久之不以時上、故善忘也。又曰、腎盛怒而不止、則傷志、志傷則喜忘、其前言血并於下、氣並於上、亂而喜忘、宜代抵滯丸去其瘀血、大黃四兩、生地、赤尾、梔仁、山甲、元明粉各一兩、桂三錢、為末蜜丸。

思慮傷脾歸脾湯、挾疫加姜竹瀝精神短少人手養營
湯參芩木草熟地師苓桂心遠志五味陳皮姜棗

疫迷心竅導疫湯二陳加胆星枳實戎二陳送壽星丸、琥
珀胆星硃砂猪心血姜汁丸參湯送下上盛下虛以丹參
麦冬、淡神遠志人參黃芪甘草叶柴水火不交宜朱雀丸
見前。稟賦不足以致健忘孔聖枕中丹遠志肉石菖蒲
乾骨龜甲等分為末酒服三錢。又方石菖蒲遠志肉等
分為末戊子日服一錢令人不忘丁酉日蜜自往市買遠

不能寐

經曰衛氣留於陽、則陽氣滿、不得入於陰、則陰氣虛、故目不瞑也。衛氣留於陰、則陰氣盛、不得入於陽、則陽氣虛、故目閉也。雜經云、老人寤而不寐、少壯寐而不寤、少壯其血氣盛、肌肉滑、氣道通、營衛之行、不失其常、故日清而夜不寐、老人血氣衰、肌肉不滑、營衛之道滯、故晝反不能清、夜不寐也。○經曰、涉水病寒、不得卧、卧則驚、驚則咳甚。陰虛目不瞑、內經飲以半夏湯一劑、陰陽已通、其臥即安、以流水千里以外、舟入井外揚之、美遍、取五斗炊以葦薪、沸

下

剉秫米一斗半、夏五金、徐炊令竭去一斗半、去渣飲汁一
小杯日三服、以知為度、病訥發女、覆杯則臥、汗出則已矣、
久在三陰而已矣。○又云、胃者六府之海、其氣直行陽川
遂、不得從其道故、不得卧也、故曰、胃不和、則臥不安、此之
謂也、白朮陳皮茯苓砂仁、生姜、仲景治虛煩不眠酸枣湯
主之、棗仁甘草、知母茯苓、川芎生姜、振慄不得眠、眼半夏裂、
茯苓陳皮甘草芡實竹茹、虛勞煩熱不得眠、棗仁二兩研
水、盞絞汁同半夏二合、丸糜入地黃汁一合、再丸時時

炒末、茶湯調服。胞實多睡也。枣仁生末、姜茶湯調下。
卧而多驚邪，在肝胞，羌活勝濕湯、菟葵甘苓、羌獨芎膏、防
蔓辛薄荷等治之。大凡怔忡失志，驚悸健忘，心亂不寐，皆
係胞誕沃心，或因心氣不足，反以涼心太過，心火益微，疫
延愈盛，惟以理疫順氣為第一義。導疫一陳加枳殼、南星
菖蒲喘不得卧，蕤子梢紅、桔梗甘草、竹茹、厥陰不得卧，宜
牛膝丹、芍仁沈丸、官桂木通之類。總之補肝和胃二法
克之矣。

針法灸法 见前怔忡門

不能食

泄

胃氣盛、小便食而不傷、過時而不饑、脾胃俱虛、不能食而瘦、脾胃俱旺、小便食而不肥、凡不能食必作虛論、一作火衰、脉緩怠惰、肢重濶浮、濕也、二木茯苓、陳皮甘草、厚朴姜枣、脉弦氣弱、自汗肢冷泄瀉、毛枯髮脫、虛而冷也、虛火不補、考芪术性、苓桂山藥、陳皮之品、脉虛氣弱、君子加半夏炮姜、虛而有瘦、君子加姜汁、瘦積痞膈、而不能食、皂角燒存性、研末澄下、脾虛不運、而不能食、切不可消克、宜以異攻散調之、或嗜食太過、脾胃痞滿、不食、枳术丸、亦不可

多服或服補藥未效、加上附、老年食滯、宜用木香、乾姜丸。
白朮二兩、枳實一兩、乾姜七錢、木香五錢、為藥煎湯、調打
神曲糊為丸、或以補骨脂、肉豆蔻各二兩、木香一兩、神曲糊
丸九服、又方、免絲子、淘淨浸、晒乾為末、分服三錢、十日
外飲啜如湯沃雪或、用八味丸、補命門之火、以壯脾土、為進
食妙劑、中佳是治、自年前症矣、上有心腎不交、以致脾失
健運、宜鹿茸杓及前丸、杓及十兩、去白為末、又用五斤
不去白、搗碎搗者汁、去渣、以餌鹽用、鹿茸鬼參、吳萸乾姜、
厚朴各一錢半、大黃一錢半、白朮一錢半、甘草一錢半、

炙草一兩、巴豆上各以法梨共為末、入前飴并皮末搗和丸、
桐子大空心鹹湯下三十九、

惡聞食臭、大劑考术、須各用姜汁拌炒、煎服、尤宜資生丸、
人參白术、苡米仁各三兩、桔紅山楂、神曲各二兩、白茯苓
芡實各一兩、五錢、山藥麥芽、白扁豆、蓮肉各二兩、黃連肉
蔻各三錢半、桔梗霍丘、甘草各五錢、蜜丸重一錢、每一丸、
空心細嚼姜湯下、

針法 内闕 中脘 尺三里 内庭 公孫

又法 灸同使三十壯、若の肢厥冷脉沉不至、乾嘔不食

粥藥皆吐炎之使通此起死回生之法也

盜

則

內經云。陽氣有餘。身熱妄汗。陰氣有餘。多汗。身寒。陰陽有
餘。則妄汗而寒。此平人也。又云。飲食飽甚。汗出於胃。驚而
奪精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。
搖體勞苦。汗出於脾。卧而出汗。醒則倏收。名曰盜汗。不
因勞表。不因動作。自然汗出。名曰自汗。

夫心之所藏。在內者為血。歲於外者為汗。自汗之症。未有
不因心腎俱虛而致。若陰陽虛。劄腠理發。劫自汗。此陰陽
偏勝而致。又有傷風中暑。驚恐房勞。厯節風濕。陽瘧疫飲。

產蓐勞倦、不能自汗、

仲景云、尚極、則津脫、腠開、汗大出、巢氏曰、勞倦、陽虛、津泄多汗、又云、心熱、則腠理開、而汗出、

蓋心之陽、不能衛外而為固、則自汗出、腎之陰、不能退藏不為密、則盜汗出、肺主氣、又主皮毛、司腠理、肺虛、則表不能衛、而自汗出、邪在於內、則玄府不通、則汗從腎府出、邪在於表、則腠理不密、而汗從經絡出、

藏府之陰、拒格衛氣、浮散於外、妄所依從、則汗出、胃虛水

陰虛陽必腠故發於自汗者歸六黃湯主之陽虛陰必乘
故妄厥自汗黃建中湯主之身冷自汗陰躁欲坐卧於泥
水中脉浮而數按之如矣經曰脉至而從按之不鼓弦陽
皆然此陰盛格陽也真武湯水令與服

尺膚滯而尺脈滑營血自涸也多汗又津脫在汗大泄宜
調衛湯疫多汗自出疫消汗自止理中降疫湯火氣上蒸
胃溫作汗涼膈散氣不順利則汗小建中湯加木通芍藥
官桂炙草姜枣

飲酒中風則為漏風而多汗白朮散牡蠣白朮防風黃芪

俱

病後氣血俱虛、或產後氣血虛自汗者、十全大補湯別處
妄汗、惟心孔一乃有汗、此必思慮傷心也、犢犢心一具、
破壞帶血、入人考肺身各一兩、用線縫熟、去藥食心仍
以艾湯調茯苓末服之、是三服取效、倘諸藥止汗不效、但
理心血液汗乃止、十全大補湯加枣仁、遠志肉、五味子、砂
鎮、棗心、神為主、若汗出如珠如膠、而淋漓揩拭不逮、皆
不可治、

初汗出者、亟而還血、瘀也、額上偏多者、首為太陽之會、蒸
故而汗出、生頭暈耳、生頭痛耳、生頭熱耳、生頭冷耳、

三焦之火涸其腎水其外溝渠之水迫而上行於心故額
偏多而心血不足也丹參當歸生地茯神棗仁白芍黃芪
枸杞圓肉手足汗多氣短也白芍黃連牡蠣仁有氣弱者
汗多冷十全大補湯或挾風疫者加白附子川烏
盜汗陽衰則衛虛所虛之衛行於陰當目瞑之時妄氣以
固其表則腠理疏而汗醒則行陰之氣而復於表汗自止
故名盜汗

傷寒陽微病脉沉實有力潮熱自汗脉畧浮者必盜汗又
三陽合病目合則汗傷寒盜汗非雜症之責其陰虛也邪

在半表半裏、小柴枝火氣上蒸、胃溫自汗、非陽虛宜以
涼膈散自汗陰蒸於陽、玉屏風散盜汗陽蒸於陰、當歸六
黃湯虛人加黃芪減芩連身熱加骨皮秦艽肝虛加棗仁、
肝實加胆草煩心加連辰砂、麥冬竹葉脾虛加木芍山藥、
去芩連○灸法透汗灸膏肓大椎複溜針列缺雲門
傷寒自汗及嘑汗不汗補合谷

傷寒多汗及自汗荳蔻湯復溜內庭補合谷
傷寒多汗及自汗荳蔻湯復溜內庭補合谷

闕格

閑其陰盛之極、故閑閉而溲不得出也。格者陽盛之極、故格拒而食不得入也。經曰、上下不通、暴憂之病也。又曰、傳化不行、上下不并、良醫弗為。身半以上、陽氣常在、劄劫為主病、身半以下、陰氣常在、劄空為病主、忽然生逆、二便不通、甚則煩亂、手冷、妄脉、此氣閉也。與大承氣湯、劄便通吐止脉和矣。脉虛人倦、人參茯苓、半夏陳皮、甘草生姜、水煎入水射少許服、脉沈細肢冷、參附加水射為末、糊丸、每服十九、脉數有甚、五苓散加枝子大黃、厚朴、只羌、兵郎木通。

陳反生姜水煎入水射少許服、

又法皂角燒存性為末米湯送或猪脂二兩丸食

呃逆刺鼻取嚏卽止遇大驚亦止

傳摩汗吐下後與利日久或大病後氣呃中氣虛也虛而熱者人參竹茹陳反甘草生姜大枣虛而寒者人參白朮甘草乾姜附子丁香柿蒂大便閉脉沉數者調胃承氣呃而心下悸者半夏陳反茯苓甘草南星木瓜竹懸姜汁丁香柿蒂前服久病虛人見之為危火呃水煎乾柿湯加

肺脉散大死

霍亂

霍亂者、心腹脹痛、嘔吐泄瀉、曾空壯熱、頭疼眩暈、先心痛、
則剝陵吐、先腹痛、剝陵瀉、心腹俱痛、吐瀉并作、或手足冷、或
自汗、甚則轉筋入腹、剝死、又因中氣不足、或內傷七情、外
感六氣、或傷於飲食、往々發於夏秋、陽熱迫於外、陰冷伏
於內、使人陰陽反戾、清濁相干、陽氣暴升、陰氣頓墜、陰陽
否隔、上下奔迫、治之之法、滲脾胃之溫、散諸邪之氣、然脾胃
胃有虛有實、感邪有陰有陽、宜消息施治、

內經云太陰所致為霍亂又曰土鬱之發民病霍亂又歲
土不及風乃大行民病霍亂又足太陰之經厥氣上逆則
霍亂且巢氏病源源乃曰霍亂由清濁相干亂於脾胃因
飲食而發也心腹絞痛因風寒而發也身體疼痛因於心
也但心腹痛而已如是而內經之旨不復向矣

劉河間專主火熱張子和則以風溫暍二氣合為病邪蓋
土溫為風木所克又為炎暑鬱蒸致嘔吐也暑熱之變也
泄瀉者土溫之變也轉筋者風木之變也合衆論而參治

清名曰地漿服之則氣和而吐瀉自止若多食冷水必果
所致宜藿蕷木豆厚朴陳茱萸茱生姜若の肢重着骨節
煩痺因於溫也二术朴陳茯澤車前若七情鬱結宜烏藥
主附木豆厚朴陳茱萸子若手足厥逆氣少神清舌
寧也逆湯加食鹽為轉筋丸用木克脾土也平胃散加
木瓜以身熱煩渴氣粗口燥面垢者是也主苦黃連厚朴
陳茱萸甘草生姜煎好冷服如食滯在腹痛不可近承砂
二术只實荷扣在上吞吐之食益湯在下者加大黃下之

通用霍車、主砂石、在厚朴半夏茯苓甘草陳反生姜復菴
用蕤合承丸以通其否塞、次進霍車正氣散加木香前吞
未復丹若渴甚剗而用來復丹若渴而不吐胸膈濃蓋湯
探吐如已吐未吐、并勿用正氣散或用佳蕤散利九、如吐
而不渴心腹大痛、欲登圓苦於不適宜木香只克桔梗
煎服若膈而不下未復丹引導下行吐瀉不止元氣耗散
病勢為篤或米粒不入或口渴喜冷或惡寒戰掉手足逆
冷或發熱煩躁搗去衣被此內虛陰虛不可以其喜冷去

而餘吐餘瀉未止、腹有餘病、宜一味扁豆葉煎服。如胞癟甚、因吐不透、柏紅益各一兩、煎服。大吐瀉後、虛煩而渴、津液枯竭、人方麦冬、花粉乾葛、甘草茯苓煎服。乾霍亂、飛益の五錢、調童便服。此良法也。遲則難救。所謂乾霍亂者、心腹脹痛、煩躁憤亂、不吐不瀉是也。俗名攪腸沙、此土鬱不發泄、火熱內熾、陰陽不交、皆為迫火極之故。或云、方論皆言宿食與、陰氣相結、何以猶指火乎。曰、向乱烦病、故經云、諸躁狂越皆房於火者乎、又卒暴之病、亦房於火者乎、但攻之太過、則反悍格湏反佐以治、然以火可散耳。古法有

用益益童便非第用其降火亦可取其行血故妙

壯厚霍亂先吐或腹痛吐活是因於熱也於腹體痛發熱是挾風若風犯皮膚則氣不由而風熱上冲必為瘧疾若

風入脾胃則活利嘔吐甚則手足逆冷壯歸患此多致損

胎障立而不云以內傷飲食外感風寒霍亂正氣散若只因

食滞平胃散若陽氣虛寒于足逆冷溫補者急理中湯

產後霍亂府藏虛損飲食不消感胃風冷所致若熱而欲

飲水者互苓散若寒而不欲飲水在理中湯虛冷在理中

凡霍乱初起及新愈不可便与穀氣每致殺人少吐已
多、尤氣因極、審年邪在湏米飲補養、脉洪大者吉、少脈見
微細、而舌卷囊縮者不治、

霍亂之發、喘氣已絕、或遺尿、或乏氣不語、或汗出如珠、或
躁欲入水、或四肢不收、皆為死症、

霍亂欲死、矢法肘尖七壯取令病人端坐又手平胸肘后
突出尖骨罅中是大用指甲按切酥麻為直背承迎灼艾
針灸將委中出血又法以水將手擦兩腿摩立止

故其後人皆以爲生靈之嘯歎也
安生者非無多矣但中華以通籍者惟有此文
聖哲萬世我朝仰承光大始更念舊人舊事以毛平西
樂毅之次又曰漢不外者此多君

南歸後老矣乃知勤政之難不樂矣子也其然乎
義在古卷中

吾人所因跡尋多不足宋太祖養誠如大名哲之禪學

肩背痛

背

經曰、西風生於秋、病在肺、喻在肩背、其分野所屬故也、又云、肺氣有餘、則肩背痛、風寒汗出、虛則肩背痛、而浮少氣不足以息、又云、少陰司天、按搖所勝、病在肩背、缺盆、又云、邪在腎、則肩背痛、是腎氣上逆也、

歲火太過、肩背熱痛、卽少陰司天、金為火賊故也、宜之冬知地、甘草於歸谷以風寒、汗出、肩背痛、小便數、宜防風湯、此柴羌荳參葛青陳白枳芍柏、虛左去柏加桂枝、肩背痛不可回顧、此小腸氣鬱也、宜用風華散之、有因

看書對奕所致。宜十全大補湯加枳壳於梗理其氣滯。
風熱乘肺而病。宜荆防牛蒡。桔芩於壳。以短氣小便自遺
左虛也。補中益氣湯。陞墮項強連背左。宜非痛勝。肺陽
羌防升葛。二木歸甘。參桂知芩。降茵苦陳。膏肓背冷痛。
一月疫飲淤積也。宜消之。導疫湯加木通。烏附於枳。用散
倍以白芍。腎氣逆上。病引肩背。況失肉桂。青鹽牛夕。
川芎小茴。芩腰胱夾脊脈道。六味湯加肉桂。苡仁芡实。

臂痛

前廉係器口經州麻軀紫而泄後廉太陽經羌道
廉係少陽經榮胡內廉係厥陰榮青內廉前係太陰州麻葛
白白芷內後廉係少陰獨活細辛

病有風淫所搏摩邪所襲者宜白芷荆芥芎歸甘桔只朴
芍藥乾姜蒼朮桂枝 痘有掣牽傷筋宜八珍湯加官桂
丹皮胡索寄奴木所引姜黃 痘有瘦飲流注患處冷而
不熱輕者導瘦湯加木瓜乃姜黃重者控涎丹

針法 肩膊背及兩胛紅腫瘦瘍俯仰不便牽引作楚用

肩外俞 肩井 肩髃 脾絳 曲池

灸法凡臂病多作勞所致技藝辛苦之人与士子攻苦及
閨閣外指女工亦有之尤有色勞者如晉之景公是也
風濕流注於太陽未必非勞苦時所感也大凡背及肩
臂痠痠瘡灸 膏肓 肩井 肩髃 善不效驗

背脊心紅脰痛 肩井 肺俞 颸內 五樞

宜與病癥門參看

脇痛

肝合於胠腋、故脇屬肝、然筋經所過、則挾亦而病、亦有爻
端不杓也、且左右為陰陽之道路、故肝主陰血、而屬左
脇肺主陽氣、而隸於右脇、左脇多怒傷、或瘀血作病、右脇
多疫氣、或鬱結作病、其向七情六淫之犯、飲食勞動之傷、
皆足以致疫凝氣結血留、不可以疫氣專主於左、左脇專
主於血、要知疫氣與血相搏、而為病也、
肝氣宜順而不宜逆、逆則病、病不止而死矣、故治脇病必
順平肝、平肝必須補腎、腎水足而後肝木有養、其氣自平、

而腹痛止矣。宜肝腎兼資湯。熟地一兩、白芍二兩、當歸一
錢、白芍子三錢、枝子少一錢、山萸肉五錢、甘草三錢、水煎
服。此方補腎為主、滋肝佐之、兼理瘦火、一劑而腹痛止。
傷寒也陽脇痛。柴胡湯、不大便、加只克、不因傷寒、脇痛。
手體受熱、只克桔梗、細辛川芎、防風乾葛甘草、蓋只克為
腸病的劑、可以該方皆用之。 脘痛而氣喘、令氣紫荳飲。
紫荳白皮五味桔梗、腹皮半果、芥炭陳皮甘草、姜煎服。
怒氣傷肝、柴枝疏肝散、以芍柴切煎、附桔梗、只克陳皮甘
草煎服。其效甚大。

參末姜棗湯送下
病血痛者日輕夜重年微寒亦可治
而短赤仁承氣湯加蟹甲青白芍子
瘦飲脈沉滑導度湯加白芍子甚在控涎丹下之
食積脇痛必有一條扛起魚砂只术加查朴麴芽末丸服
痃癖脇痛熟黃丸巴豆炮去皮心五錢畧去油雄黃一兩
全研如泥入白朮二兩小丸麻子大每用十二丸湯送入
冷漿湯沈冷一晝夜盡十二丸冷利為度不必盡劑附
治驗一人受暑脇痛皮黃後泡清肝理氣俱不効用大
所萎搗爛為粉草紅丸少許入口而病即止又讀王宇泰

筆塵所載秦文山掌教平湖与家兄同官因勞而兩脇痛
清晨并飢時尤甚以書呈家兄求余方余意其肝虛當補
其子母用芪术芎歸萸熟枣藥柏仁之類仍以細辛防風
各少許姜枣遂服叮囑此方勿示他醫恐令其笑不合口
也幸而秦君貽書來謝云服不數劑而病止余宗長安
時聞魏崑溟吏部之變上因投謁忍飢煩而脇痛他年所
苦而粗工以青皮只壳之類雜投遂至不起吁可不鑒哉
司命在貴識圓通也執成說之害大矣

肝積氣塊脇痛及藏府虛冷
取勝刺病取
支溝 章

陽陵泉 臨泣

胸脇痛不可忍取章門

期門

行間

坵墟

兩脇下病奄奄欲絕此為奔豚急以熱湯浸兩手足頻頓
鳴之次灸 氣海 閩元斷期門各百壯

脚氣

脚氣之病前古未聞起於後世其麻痺脹痛在經所謂之
痺厥也其衝心在經所謂厥逆也其痿軟不收在經所謂
之痿厥也東垣云脚氣实由水滯然上有二焉一劄南方
卑溫經曰清濁襲虛劄病起於下此自外而感在也北方
常食牛乳或飲酒過度脾胃有傷不能運化水滯下流此
自內而致在也楊大受云脚氣為壅疾治宜宣通不使壅
也壅既成在去惡血然後服藥南方脚氣外感在濕北
方脚氣內傷溫熱此前人所未幾在

千金方云脚氣之病初起甚微人多不竟而飲食如故猶
卒然腳氣弱或腫痛並述方附葉南文脚氣小便不利
腳氣之病初發頗似傷寒有壯熱及癆惡食嘔吐或腹不
快或二便祕或腹痛下利或昏憤錯亂或轉筋牽急或頭
麻緩縱或上腫或下反不腫或少腹不舒皆其候也並作
腳氣治東坡先生脚氣論由小便不利之本末一脉南文

腫者為澀腳氣不腫者為乾腳氣總以除澀滯為主半夏
蒼朮厚朴霍車蓴米陳皮白术甘草木通兵郎姜枣煎服

後廉太陽經羌活附風外廉少陽經柴胡附經柴胡附

青以吳萸川芎內前廉太陰經葛术白芍內後廉少陰經細辛白芍

風勝去自汗走注脉浮弦越婢加木湯麻黃湯合芍藥

甘草姜枣如惡風加附子脉微弱風引喘者葛术附姜桂

同麻黃石桂甘草川芎吳萸猶活秦艽細辛杏仁防已防

風空勝去寒汗掣急掣痛脉沉濇小續命湯麻黃防

已防風桂附參芎芍薑杏加姜枣或牛夕丸牛夕二兩川

椒五錢附子一錢虎胫骨五錢末丸酒服

着

重著脉濡細除溼湯丸前暑勝去煩渴者朴脉洪數用

清暑益氣湯加參麦各三分五味五粒 脚氣雖宜宣通
太過反能下注損脾以發一寸寒病便溺阻隔先用導
氣姜桂湯羌活已實煩黃加茯苓斗柴後用者煩拈痛湯
羌防升葛二木茵陳甘苦知桂澤煩加參為飲食不消心
下痞兩端導飲丸木半芩陳曲青實乾姜末丸服
脚氣衝心火氣逆上也丹溪用の物加炒柏又用附子末
津潤數湧泉虛熱去全匱腎氣丸 実症兵部為末
童便調服或兵部木通牛久沉魚為末姜湯送下

針法

一切寒濕風氣

三里

陽陵泉

筋

三陰交

丘墟

絕骨

崑崙

兩膝紅腫

膝關

膝眼

三里

委中

陰陵泉

腳背紅腫

崑崙

丘墟

臨泣

太衝

行間

脚氣風冷搏於經絡者也。風寒之中人因汗出腠理疏
邪得乘之而入成先中手足十指或先中足心足跌成
中膝胫夜竟即宜急灸所竟處二三十壯或三里絕骨
為要穴也。

灸法

脚氣灸風布五百壯不復發一日灸之

竟有

重

自足心行至腰間卽暈絕久方甦醒此真脚氣也

附

兩足轉筋灸陽陵泉承山三陰交一法灸脚踝上一壯
內筋急灸內踝の十壯外筋急灸外踝の十壯

又法用照海

右文中年四十許夜半中風發目眩不能入眠腰痛
甚不可動口瘡瘍多尿急入圊而色黑黑如漆
銀青丸頭 寶蓋 過雲 藥姑 大補 行酒
水銀丸頭 銀青丸頭 寶蓋 過雲 藥姑 大補 行酒
三金丸頭 銀青丸頭 寶蓋 過雲 藥姑 大補 行酒

遺精

內經曰腎主水受五藏六府之精而藏之又曰腎乃閉
蟄封藏之本精之處也又曰厥氣客於陰氣則夢接內蓋
陰器主宗筋之所係也而脾胃肝腎之筋皆結聚於陰器
然厥陰主筋故諸筋統屬於肝也○腎為陰主藏精肝為
陽主疏泄故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固若
遇陰邪安於其竅與所強之陽相感則精脫失而成夢泄
矣病之不起上有不在腎肝而在心肺及在心肺脾胃之
不足在然必待於腎肝而後精遺也陽虛主補其氣陰虛

益其精陽強而泄其火隨其因而俾其偏。夢失之因於真陽不固故精脫之後其氣未能卒復不比人之接內而氣易乃復也

思慮傷神則流淫不止又思想委窮所欲不得而為白淫治法有五神氣浮游用辰砂乾骨磁石之類以鎮墜之○思久氣結成瘦心竅閉宜桔苓丸半夏一兩破如豆大桂苓二兩同拌炒勻焦為末糊丸桐子大空心鹹湯下思相傷陰大鳳髓丹黃柏二兩砂仁一兩甘草五錢桔芩
想

宜鹿茸從容瓊脂兒絲二類。陰陽俱虛令人氣虛神迷。
志棗仁蓮子芡實葛蒲湯歸生地麥冬鬼絲知母柏黃。
又思欲不遂宜妙手散萸芪遠志山藥茯神各二兩人參
甘草桔梗各五錢木豆二錢五分辰砂三錢麝一錢為末
熔黃蠟的加茯苓末的水作塊同煎服。色欲過度腎
虛不禁の君子湯加山藥萸芪五味遠志枸杞巴戟鹿茸
龜甲或六味丸加五味牡蠣杜骨人參從容兒絲。又有
壯年盛滿寡欲而溢泄在黃柏知母生地茯苓黃連蓮子
菖蒲遠志澤泻大凡不甚而脉洪或滑皆因於熱知柏桂

澤二冬茯神生地蓮子竹葉木通之類凡屬積滯瘀血等
疾貴在疏泄不知其理但用固濇反增其病矣惟滾痰丸
下之最宜更與滋腎丸及木通
一枝光丸之類每不立愈或用
扶光丸止。脾胃虛弱之人及飲酒厚味太過瘦火為
患多致遺泄宜蒼白二陳加知柏牛膝俾清升濁降脾胃
健而遺泄止矣。又有鬼魅相感之症由正氣本虛欲以
妄動邪因乘之其狀不欲見人必有暗對或笑歌哭脉
息乍大乍小乍有乍無或兩手以出以入或尺寸各為一

矣。茯神遠志養其正生地黃歸棗仁安其神殊砂雄黃沉
玉安息玉麝玉魄箭羽虎胫骨辟其邪移寢室於向陽用
多入作伴焚香不絕乃其治也。仲景治手足煩熱咽
乾口燥或為慄歛此陽上升而不降陰拘居而在內則為
夢失小建中湯和之此世俗所昧也凡脫精不止固澀者
功當清心火清理不愈則用升舉升柴二味甘以緩之甘
草大枣酸以收之茱萸五味枣仁烏梅之類蓬萊金櫻子
桑螵海螵牡蠣固濟之品知柏二冬芩連竹茱山枝
清降之屬虛而不禁氣衰火微益智茱萸人黃蘆莖枸杞

參黃

骨脂從容坎樞韭子鹿茸桂附之屬擇而用之可也

夢失父而玉閨不憇精竭而命亡矣俗惟以瀆為事以瀆而不止奈何始於未甚之時大用補氣補精之藥不至於久而不禁此方保精用芡實山藥各一兩蓮肉五錢茯神二錢東仁炒三錢人參一錢水煎服先將湯飲之後加白砂糖五錢拌入查內同食日日連服不半月而止矣品味平和淡而不厭收功獨神也

針灸法遺精白濁心俞腎俞膏肓三里闕元中極氣海

赤白濁 潤

內經矣赤白二濁之名也云思想委窮亦願不得意淫於外入房太甚發為白淫又曰脾遺熱於腎則赤白從溲而下此濁之源流也靈樞云中氣不足溲便为之變考內經之論雖屬腎家精氣下流因於脾病久之復不少夫腎主閉藏以濫用事志意內治則精藏而固若勞逸於外思竭於內及脾耗後殃氣滯下陷則精氣離宮淫泆不守鍼隨溲溺而下為渭病也渭之為症莖中熱病津火灼刀刺而溲溺仍清惟竅端時流穢濁如農林瀝不斷由敗精瘀

腐者十之七八由湿热流注与脾虛下陷者十之二三不知其故以五苓八正散投

雜

因而增劇者而卒不改殊可歎也

赤左房小腸火本於心虛有熱由思慮而得之生地

麥冬地骨皮竹葉苦甘山藥五味夫精血所化有濁去太

多精化不及赤未更日故成赤濁此虛之甚也曾見天癸

未至強力好淫而所泄之精則繼之以血有之若溺不赤

妄他熱症不以赤濁為熱也考芪术草歸地杞味萸芡鬼

鬚遠神山來成有心經伏暑而成濁者之苓散加桑薰麥

嗜慾過度而得濇而病在疎之茯苓芪术山甘芍蓮牛久
不痛左濇之鬼火萸肉五味覆盆金櫻芡鬚骨脂甘草有
滌瘦流注左蒼朮二陳湯加升柴胃虛氣陷左補中益氣
有小便少常少痰即泛濁左或渴以米泔草薢分清飲益
智草薜菖蒲卷英山藥鬼紅烏藥加益煎服有稠粘之膠
莖中痛甚此非熱淋乃敗精瘀室加味清心飲芩車澤牛
麥矢菖蒲益智遠志遂心人舌骨皮黃芩曾見白潤人服
清利之藥不効以八味丸溫之而愈或發口渴腎水枯也
六味湯合生脈散治之○便濁泛濁以泔水此三症消也

宜玄兔丹乃遺精白濁之聖藥上治之消鬼丝十兩浸
搗焙為末元參の兩五味七兩浸未另為末白茯蓮心肉
各二兩山茱六兩共卷將前件浸酒打粉拌為丸米飲下
の錢。渴消有三總係腎本虛以致濁也不必分上中下
而合治之。萸三兩茱萸二兩麥冬二兩玄參一兩車前
子五錢水煎日一服之三消自愈。尺脉滑數宜清利浮
虛急疾也難治遲去補之

小便黃赤有空氣虛寒之別素同曰治病水液渾濁皆屬

小便赤宜服附子之逆湯此實症也素向曰胃足陽明之脉盛則身已前皆熱其有餘於胃則消穀善飢渴色黃宜降胃火又云肝熱在小便先薑宜降肝火此實症也又曰手太陰之肺脉氣盛則肩背寒痛少氣不足以息渴色變宜補中益氣湯之類以補肺氣又曰冬脉在腎脉也冬脉不及則令人嘔清脊痛小便變宜地黃丸之類以助腎脈此虛症也

小便遺失責在肺而不在腎蓋肺為腎之上源又其母也上源治則下流約矣甲乙金曰肺脉不及則上氣不足以

息卒遺失多度故東垣謂宜安卧養氣禁勞役以冀民人
考之類補之不愈嘗責有執加萸柏生地

遺精淋洩法

倒元

膏肓

腎俞

精宮

三里

三陰交

丹田

氣海

大茴、九治白濁出髓條大茴人參白芍益智白朮骨脂
棗仁各炒左顧牡蠣煅等分為細末用青鹽澄糊丸梧子
大每服二十丸食前米飲下治虛憊便滲滴地成霜丸遠
志肉蓬頭乾藕節軟骨各一白凡兩珠砂各錢末為糯
糰丸為次同子大每服十五丸空心白湯下

赤白帶

明堂曰女人少腹痛裏急癰癰月事不調赤白帶下越人
曰帶脉為病腹滿腰溶如坐水中按帶脉起於季脇圍
身一周左束帶然楊氏曰帶脉總束諸脈使人不妄行以
人束帶而前垂此脉若固卽妄帶下漏經之症矣

女人帶下與男子精滑大同小異有胃中濕熱瘦滲入膀
胱宜健脾土燥濕化瘦二陳二木升柴之類如久而氣虛
加參芪肥人多瘦前方加炒黃柏瘦人多火夜取脉數口
物加炒黃柏青鹽滑石蛤粉鴟皮黃芪氣帶赤加葵花赤

蘇

用赤花白用白花滑脱不禁加牡蠣較骨赤石脂有字自
壳加桂附炮姜○若帶下小腹作痛是癆結瘦氣下注
也須兼辛收苗魚炮姜之類○赤芍の物加椿根皮赤葵
花炮姜升柴為丸又椒目湯送下若用燈心湯送下○白芍
用二术白葵花白芍為丸空心二陳湯下

凡帶下反延於氣鬱辛能開之鬱久必熱故佐以黃柏清
之皆有微意輕重正治升舉之重者或通之劫之不不執
一甚妄宜吐以提其氣有下注頸之腰腹以下必在冰雪
中厚覆火共薦令汎以骨立而火去魚小瓦与帶下不分

眼目瞞。步履欹側食少瘦。拘是上中下三焦俱病。宜大
補之。又云女人帶下其色有五。皆因凡邪入於胞門而
傳傷藏府所致也。若傳於足厥陰肝經帶色為青泥。傳手
少陰心經帶色為紅津。傳手太陰肺經帶色為白涕。傳足
太陰脾經帶色黃。以瘤所傳足少陰腎陰經帶色黑。以衄
血人有帶脉圍於腰間。為束帶之狀。此病由此經而來。故
名帶下。白者屬氣。赤者屬血。各經塊症有五色相雜。左
以陽氣下陷。補中益氣湯。溫經下注。風痰丸。蒼朮半夏黃
柏湯。桔梗涼藥。白芍椿皮丸。白芍五錢。椿皮根。兩五錢。加

根

黃柏二兩炒焦乾姜三錢炮黑共為末粥丸每服三五
十九空心米飲下。○又方荳木鹹水炒乾姜煨滑石炒只
壳地榆炒神曲炒各等分為末丸服米湯下。○或因
七情所傷肺來急數在加黃連丸附木香。

海瀉宜溫燥用半果去壳入麝少許以鈎包火炮焦存性
同鈎為末每用二錢陳皮湯調下重者三錢。○又方椒目
白芷為末米飲下。○又伏紗肝梁上塵各炒令烟光生火
毒棕榈燒存性研勻入冰射各少許每服三錢溫酒或淡
昔易下達十年後半月可愈

疝病

內經曰任脈為病男子內結七病女子帶下癰瘕又曰三陽為病陵空其傳為頸病○足陽以經為病為癰病○面黃脈大有虛有積名厥病○脾傳邪之腎名病瘕○上衝病心不得前後為衝病○邪客厥陰二絡為卒疝○厥陰之陰盛脈脹不適為癰瘤病○肝所生病為狐疝○心脉搏急為心疝○肺脉沉博為肺疝○肝脉滑甚為癰疝○脾脉微大為病氣○腎脉滑甚為癃疝○又云少陽脈滑病肺凡疝○太陰脈滑病脾凡疝○太陽脈滑病腎

風疝。少陽脉滑病肝風疝。歷觀內經總是任脈為病而肝列佐任脉之生化者也。任之陰氣為病肝之陽氣為風是以風疝並稱也。凡內邪外邪之感皆能使陰陽不和陰盛勝則陰氣衝激陽勝則熱氣內盛悉知任脈為病其邪不逆任脈起而歧經所受之邪上必犯任脈也功於藏府列為腹中之疝會於陰器列為墨丸之疝

張仲景治癰疝腹中痛及腸病裏急者當煑生姜羊肉湯主之本草衍義稱其妄不應驗豈非補肝之力與余每治病腎氣上衝心危急者以山茱萸丸治之

驗也又大便不通者利大便為許叔微羅謙甫皆用元花
是已小便不通者利小便如許叔微治宋荀甫以五苓
散是已令大篆要之不于腎經列五苓不常用又言病不
當下利元花不可用其所列者惟數味破氣之藥苦辛雜
收牽摶妄別既不能補肝腎之真陰又不能通行二竅使
邪有所洩而徒耗其氣於冥土之中且日趨於危而不覺
也豈不悖哉深可痛也

扶

朱丹溪幾門醫理頗多而臨症處方又多以移植元氣為
主故意人遭厄運其手書皆不傳而傳於世者皆為育夫

俗子裁剪增續疵繆實多纂要一書其行尤甚凡丹溪長處皆為刪去大可恨也即為疝癥一門首載云專主肝經與腎經絕多相干而不知世所患多皆由腎虛而致肝乃腎之子而前陰列腎之竅也欲補其肝絳多顧其母乎又世俗執肝主補汰之說逢一疝癥過用攻伐死多矣今纂要中全不載一補汰時師既妄自悟之則又奪他書足考焉得而不誤也按丹溪云疝有挾虛左脉不沈以而證大者以參术为主疏導佐之非補汰平

巢氏序七病互顧逆心痛飲食不下曰厥病腹中滿病氣責火等同巖山等次飲食易復上口口復上口易

乍減而病曰氣疝。病在脇旁曰盤疝。脇下有積曰附疝。小腹引陰而病大便難曰疝。疝皆由陰氣積於內為寒氣所加營衛不和故成疝也。○又小兒啼哭不止動於陰氣結聚不散則陰核腫大而病癰疝。○又有飲食不節喜怒不時津液內結而為癰疝。

經

張子和云巢氏所立之疝與結旨不合及其立論似辨陰器與小腸膀胱腎了不相干專屬肝經受病之分七疝之名一曰寒疝陰囊冰冷結硬以至陰莖不舉控睾而痛得於坐卧摩溫之處或冬月涉水或遇凡雨畏冷貪涼使內

過勞年子爻欲宜溫劑下之二曰水疝腎囊腫病陰汗以
流囊以水晶或山黃芩或小腹之內接之如水得之碎而
使內汗出若風淫邪注於囊中宜逐水之劑下之三曰筋
病陰莖腫脹或癢或痛裏急筋掣或莖中作痛或痒或挺
縱不收或精隨洩不得於房勞太過及邪術所使宜清心
之藥下之四曰血疝小腹兩旁狀如土瓜得於春夏之月
燠溼之氣并勞於使內氣血流溢入胞囊中積成瘡膿宜
和血之劑下之五曰氣疝上連腎虛區下及陰囊得取於忿
怒喘哭則氣鬱而脹怒號卽聚氣之隨消宜散氣之劑下

之小兒止有此疾得於父衰陽痿強力入房因而有子胎
稟病也添年治之亦不効六日狐疝卧劄入於小腹行立
劄出腹入囊與狐之日出夜入相類故名狐疝宜逐氣流
經之藥下之七日類疝陰囊腫大如斗不痛不痒得於地
氣卑濕宜祛濕之藥下之凡祛疝下後或調或補更有陰
盛腹脹內有血膿小便不通癥瘕疝也

按子和之意忘內經任脈為病之本此其失一也靈樞
云小腸病多少腹痛腰脊控睾丸而痛然劄果有膀胱之
症又安得不逆此二而成乎其失二也因抗病在下左引
經

而竭之必主下元不向虛人上必与之攻下禍不旋踵此其失三也

丹溪云罩丸连小腹急痛或有形委形或有聲委聲皆以為經絡得寒收引而痛不知其始於溫熱壅遏又外感溫熱被鬱故作痛也宜只寒極仁山梔吳萸山查生姜溫勝成顏疝加荔枝痛甚加益粉大茴病處可按車加桂枝此二前人所未備耳也○大凡疝受熱則挺縱不收受寒則牽引作痛受溫則腫脹下墜三者之間審其熱之多少而治之止一法也

腎有二睪丸亦有二又名少陰左屬水而生肝木而生心
火三左皆司血分而統納左之氣在肺之職也右屬火而
生脾土而生肺金三左皆司氣分而統主右之氣在肺之
職也故旣收引則血液迎泣下注於左丸旣憤發氣則
溫肺下注於右丸此睪丸脈絡之經非左厥陰一經而
太陰陽明之筋上入絡也往往見偏患左丸則病多脹少
偏患右丸則病多脹多此二氣血之訛驗也○病多脹多
者歸白芍木通茴豆青皮肉桂木通之類治之病多脹少
者半夏茯苓木通烏藥川羌活芍荔枝木通之類治之

幾川云男子疝氣女人瘕帶皆任脈所生也肝腎受病治
法相同宜丁壬棟突丸川棟子附子苟糸歸尾各一兩桂
二錢同萸乾再焙為末每末一兩入丁年木糸各二錢為
末延擗索五錢全蝎十三枚去足翅灸又為末入前項末
拌勻酒打粉丸每服一錢酒送下凡疝氣帶下皆屬於
風全蝎乃治风之藥川棟突能入小腸膀胱延擗活血
止痛疝氣帶下皆寒邪積聚入於大腸故用附子佐之丁
壬木糸為向導也若膝下撮急及周身皆病小便數而清
誦脉急而虛猶腎脉不急而緩力名曰腎病丁壬疝氣丸

烏藥丁苗延切防桂歸羌麻同鷄草酒粒送春回
病因虛得不宜驟補先去其邪然後補之天台烏藥散烏
藥及良姜青枳尙木至川棟同已炒衣起効以嚮川棟散
川棟三十箇巴豆半圓炒葛蒲青木至一兩共相搗荔枝
核廿枚草薢五錢好加麝少許和益湯二錢調此治因感
序故借已益妙此惟衣起左二方所宜不不施於虛人
病因暑熱而便濶脉數妄山梔二錢吳萸炒榧仁三七
查实少生姜三片小因煎內麝之熟多散了
小腸氣小腹引繫尤必連腰脊而痛小腸虛則凡令乘拘

而入邪氣入劄厥而上衝肝肺控引睾丸上而不下齒反
川棟吳萸陳皮馬蘭花炒錯各一兩羌活錯炒五錢共末
錯粉丸每服一錢加至二錢酒送又方益智蓬朮各五錢
大茴山萸牛久續鬱川芎葛蘆巴防風牽牛粉甘草各二
錢伍分為末每服三錢水煎空心連滓服湯調不益人得
膀胱氣小腹腫痛不得小便是也五芩散一兩分三服葱
白一莖小茴一錢益八分水一鍾盞七分服三服後喘下
小便為黑汁續用硇砂丸末至沈沈巴豆肉各一承青反
一承同慢火炒紫色去巴豆為末入硇砂一錢銅青三錢

同研勾蒸餅丸梧子大每服七丸至十九益湯空心下

敷

丹溪後以醫理頗多臨症處治又多以扶植元氣為主每
意人遭厄運其手亦皆不傳而傳於世者皆為育夫裁剪
增續此謬实多纂要一亦其行尤甚凡丹溪長處皆為刪
去甚可恨也卽以疝症一門首載云傳主肝經與腎經絕
乎相干而不知世所患者皆由腎虛而致肝乃醫之子而
前陰腎之竅也欲補其肝絳妄顧其母平而世執肝半補
濟之說逢一疝症輒謂肝實過用克伐死亦多矣今纂要
中全不載一補法時師旣妄自悟之以又妄他亦不考焉

中全不載一補法時師旣妄自悟之以又妄他亦不考焉

得而不误也按丹溪云病有挾虛而發在其脉不甚沈緊
而大豁無力是也當以考究為君疎導之品佐之何嘗不
補添哉

張仲景治空心腹中痛及脇痛裏急者嘗係生姜羊肉湯
主之李草行義稱其屢試屢驗豈非補肝之力乎余每治
疝氣甚上衝危急者以八味丸投之立應又補腎之一驗
也又大便不通嘗利大便以許叔微_羅謙甫皆用羌活
已小便不通利小便者許叔微治宋菖蒲以五苓散
是已今為纂要不於腎經列五苓不若用又言古不

下則羌玄不常用而所列者惟數種破氣之藥苦辛雜收
壅撋妄別既不能補肝腎之真陰又不能逼行二竅使邪
有所洩而徒耗其氣於冥冥之中且日趨於危而不覺者
豈不悖哉

大凡各方多用燥滻之劑丹溪以為滻也蓋大勞則火起
於筋碎飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於
肝火盛之久滯氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥經肝
性急速為寒所束宜其病甚此亦補前人之未備要知病
處喜按而減去為虛用桂枝山梔與川烏附等分為末姜

汁糲丸以川烏治外來之寒椎子瀉內麝之熱然不可守
為揆度也

針灸治大敦通主七病兼以三陰交及灸水道九妙三穴
○女人瘕聚卽男子疝氣同源胃俞氣海行間の穴

腹中氣脹引脊作痛食飲反多手體消瘦灸脾俞章門各
七壯○女人淋帶腎俞中封各五十壯或三陰爻及中極
氣海腎俞已上女人赤白帶下得治

癰瘕積聚痞塊痃疝

精

或問癰瘕與痞塊痃疝積聚有何分別其病相似請得其詳并論其治曰癰在癰也又精也以其有所徵驗及久而成癰萃也王叔和云脉經云左手脉橫癰在左右手脉橫癰在右昔人患癰癖死遺言令剖腹視之得腹中病塊又石文理具五色後將削成刀柄因以刀刈三棱柄消為水乃知三棱可療癰也一方蓬莪术荆三棱酒煨煎服效又人疾體瘦喜飲鮮血謂之風癰等藥不療須千年木梳燒灰服或飲黃酒水乃瘡瘕在假也又假也以其假借之氣

血而成形又歷年遐遠之謂也癰瘕腹中積塊堅者曰癰
有物形曰瘕史倉公傳燒瘕為病得之經日內飲以芫花
一撮出燒乃數升病已正義曰犬狗魚鳥不孰食之成瘕
病方亦云腹中雖硬忽聚忽散每有常準謂之瘕言病瘕
而未及癰也經曰小腸移於大腸為伏瘕瘻妄否也以
天地不文之否內柔外剛美物不魚之義也物不可以化
否故否久而成脹滿而莫能療焉積久跡也挾瘦血而成
形跡久疊積久之謂耳聚久絃也依元氣以為端終久
聚散不常之意也瘻瘻者懸絕隱辟又亥妙莫則之名六

書故云癥積弦急也李莘陳藏器曰昔人有患痃癖去取
大蒜合皮截去兩段吞之名曰內灸果獲效病去洗也氣
洗自然上入而病也素問黃帝曰診得心脉而急為何岐
伯曰病名心疝少腹當有形也又脈急者曰疝瘕少腹痛
史倉公傳臣意診之曰湧疝也令人不得前後溲中止故
溺赤又牡疝在鬲下上连肺病得之內切其脉得番陽番
陽入虛裏處久日死一審一絡者牡而也方亦曰三陽急
為瘕三陰急為疝難經曰任脉之為病其內若結男子為
七疝七疝左湧水筋血氣猶癩七女是也凡治七疝先灸

大敦穴一名天顺在足大拇指離爪甲如韭葉大乃足厥陰井也灸三壯愈大抵痞与痘癰乃胸鬲之候積与聚为肚腹内之疾固屬上中二焦之病故反灸於男子其癰与瘕左拘急於脇下是為下焦之病故常得於婦人凡腹中積聚之塊俱為惡候切勿祝為尋常不而求灸治若待脹滿已成朐腹鼓擊擊雖食扁復生六莫能救遘斯疾女可不懼乎蚤治之法不可損傷胃氣者用和解軟堅積消痞開白朮五兩芍药三兩神曲二兩地栗粉八兩人參五錢甘草一兩白芍三兩半夏一兩白朮子一兩卜子五錢厚

朴五錢肉桂三錢附子一錢當歸二兩鱉甲一觔另為細
末已上俱共為細末煉蜜丸每服五錢臘卧益湯下即以
美食壓之使下一料未有不療古

一方只去穰入巴豆一粒以麻皮扎之灸燄去巴豆焙
為末治一切瘧良

針灸湊食積血瘕病胃俞氣海行間三穴

小兒瘧氣久不愈灸中脘章門各七壯臍後脊中七壯

瘧塊同病大陵中脘三陰交六穴

脾積氣塊病脾俞天樞中脘氣海三里五穴

腹中有積作病大便閉灸神闕用巴豆肉為餅填入脐

中灸三壯五壯一穴

三灸交六穴

十灸之不赫血脈而胃俞廉節神滿三穴
灸半部一時熱身

一卷之末去蘇人之遠之殊知兩丈止少微去四更半
羹食羹羹之十二枚亦未亦不發亦用

末之土取其火候末熟者勿服服之勿過勿過半咽勿
吞之勿內卦三穴隔半一尺半以一水燭甲子

淋閉癃

淋之忌病腎虛而膀胱熱也腎氣虛則便數膀胱熱則溺竅窒淋瀝不快小腹弦急痛引於腰有石淋勞淋血淋氣淋膏淋冷淋之別沙石淋以湯瓶結碱尿難卒出宜清熱用以聖散馬蘭花麥冬茅根冬葵子夢寐只宜連喬成石葦瞿麥滑石之類勞淋之遇勞卽發痛引氣衝純宜補之考芪歸芍葛根遠志鹿茸牛久條芩生地車前之類血淋之心遺於小腸甚則血與溺俱下候其鼻色黃赤

小便難赤牛久側柏藕節生地赤芍小蘗歸尾車前之類

氣淋在胞內氣脹小腹堅滿渴有餘廼石韋去毛赤芍藥
茅根冬葵木通木通瞿麥滑石川芎芒硝之類膏淋在液
火脂膏精漏俱出兒丝桑螵蛸茱萸澤瀆鹿霜角之類○

冷淋在冷客下佳先空戰而後便數成淋蕤蓉地黃山藥

石斛牛久極郎官桂附子細辛黃芪黃連甘草至於小便

銀雞不痛而痒虛也八味九鹿加茸人參小腹膀胱按之

內痛若沃以湯澣於小便上為清涕此名胞痺赤芍細辛

防風桂附葛芍紫苑當生地玄参甘草山藥山茱牛膝

半夏狗脊共為末蜜丸或腎美湯久服腰痛門腎瀝陽腎門

胞婢灸法 三陰交 三壯宜脉大而实忌虛小而濇
虛人宜補氣血勿利小便恐竭其水也

小便不禁係肺氣虛不能統攝而致下陷則遺失也宜用
雞膝腎丸骨遠志鬼臼人參牡蠣五味海螵蛸腫而遺尿
為下元冷桑螵蛸韭菜子菟丝麻茸人參之房

小便閉癃 暴為尿則滴點不適久為癃則淋漓頻數點
滴不適為病最急內經曰肝之脈逼陰氣所生病者閉癃
督脈又云督脈主宗筋女人入繫廷孔男子循莖至篡所生病
不得前後又言三焦下輸入絡膀胱約則癃虛則遺漏又

云膀胱不利為癃不約者遺溺此之經而主出者肝与腎督脈及三焦耳然膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣其形有下口而無上口夫主氣化者太陰肺也若使肺燥不能生水則氣化不及州都法當清空潤肺紫苑麥冬桑皮茯苓車前之類如脾湿不運而精不上升故肺不能下輸法當健胃燥脾二木茯苓半夏之類以附水涸熱膀胱不利法當滌腎除熱知柏元參地黃茯苓之類夫滌腎活膀胱名為正治清金潤肺名為隅之之治健胃燥脾名為隅之之治又或補益只參大腸小府因而因渴直

以淡滌之品分利之茯苓猪苓通澤之類或有氣滞不能
通調水道下輸膀胱宜順氣為主桔梗枳壳木通之類有
大寶桔梗與純陰之品則陽氣以化上桔梗子苦芩中
楂萸迷芍藥下楂萸橘核母有大虛者非与溫補之劑則
水不能引以至腹丸八味丸及補中益氣湯是也

東垣治一人小便不通目突腹脹皮膚欲裂用淡滌藥不效
東垣曰疾急矣膀胱之府必氣化乃出服淡滌藥而病甚是
氣不化也無陽則陰安以生無陰則陽安以化淡滌氣滞
皆陽藥也孤陽無陰欲化得乎以涼腎之品投之立愈

丹溪曰吾以吐法也小便嬖以滴水之器上竅閉則下竅無以自通必上竅而下竅之水出焉氣虛在補中益氣陽先服以吐血虛在考歸陽先服以吐疫氣在上陽陽先服以吐氣閉在下附木矢探吐或有瘀血而小便閉在牛膝桃仁為要藥別錄云小便不利審是氣虛獨參湯少神由是觀之則受病之源自非一途若不從望聞問切察之以審之常而浪投藥刺幾何不以人命為戲耶

附氣閉不更方陳皮去白末服三錢酒調下外用鹽入隔孔薑白頭十餘根紫切指厚艾大灸之

前陰諸疾

督脈肝脉任脈皆前陰所過之脈又太陰陽明之所合俱聚於陰器男子為玉莖女子為玉門所謂甚大也卒則筋縮收入腹內此危候也桂附紫苑歸芩之屬劫剝挺縱不收小柴枳湯乾胞潤肝濡甚者小承氣湯下之陰痿在腎虛肝傷八味丸主之或保真丸丸地杜仲姜蜜炒山藥炭共乳拌晒七次各二兩鹿膠八兩切豆大同鹿角霜炒成珠鬼絲酒煮晒山萸肉各一兩半牛丸酒蒸五味炒益智小茴鹽水炒以練鍼灸遠志甘草湯泡去心巴戟淫浸去

心各一兩補骨脂一枚巴栢子仁山甲酒炙沉香各三錢
全蝎去足尾錢五分嫩蓮蓉の水酒洗去甲及膜淨二兩
酒炙成膏練蜜和前藥末鳥鴞丸傳桐子大每服三錢酒
送下○前陰冰冷有汗宜傳肝湯姜炭苓草羌防紫葛升

知柏澤倉梯柏麵獨陳煎服陰汗不上青蛾丸杜仲の兩
補骨脂の兩七榧肉三十枚研膏入練蜜和前末丸桐子
大每服五錢砂仁湯送下外用蛇床子末同蜜陀僧末撲
之良前陰濕痒椒粉散麻黃蛇床狗脊殊米川椒紅花炭
肺肉桂栓粉共為末乾者之內服方大禁畏去皮研入工

西淡豆豉和丸硃砂末為衣燈心燭下錢許

陰囊溫痒先用吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸

朱

煎湯洗之後用吳茱萸五錢黃柏

末硫黃末各二錢安息石三錢蛇床澤漆各五錢兵部枯

凡白芷三錢輕粉一錢為末撲之良

陰脰痛風熱也沈氏兵郎丹參白蒺藜只羌活柴胡芍藥
赤芍藥而令脰有氣攻衝上下木通赤茯丹皮澤漆防風丘郎

郁李仁末

女人陰脰痛只實功臣炒熟絹包熨冷卽易熨數次效
陰吹女婦人胃氣下泄陰吹甚喧弦油八兩亂髮髮為拳

大入油煎化为度余二服病退小便出

陰瘻 吴茱萸

丁主丸末為瘻之

硫黃煎洗

陰腫痛 肉蒼蓉

牛膝

左酒服

蛇床煎洗

女人疝瘕病

白芷藁本草菱白蘚皮羌活陽起石不服

硫黃煎洗

陰脫

草蓆子研膏貼项心及脐半夏為末搐鼻劄止

產門不合 石灰炒熱淬水洗

後陰諸疾

脫肛有瘻漏而脫者有痔漏而脫者屬虛也宜補而瀉之
五倍子末敷之托入如此五七次不腹脫煎湯洗之上有
大鷹_腸受_陽者皆能脫肛者立倍朴硝湯洗之至
附荆芥湯洗木賊燒灰存性射少許大便後同培末敷之
氣虛下陷用補中益氣湯大腸者之物湯加荆防芎連
湯久脫肛用補中益氣湯加五味子蓮肉煎服
腫痛屬熱者生地芩連梔柏升柴挾空心草附砂仁肉桂
荆芥防風日久不愈诃子軀骨各二錢五分沒石子二個

粟壳赤石脂各二錢為末米飲下一錢分用灰敷

蟹殼

痔漏作病蜈蚣焙研八分腦敷之成豆油前過入五倍末
調塗又田螺入片腦取水搽又孩兒茶同麝少許唾調敷
痔腫灯火淬之腫消枳壳水煎重洗旱蓮汁塗之良

反花痔木瓜末鱉涎調敷桃葉杵坐蜜陀僧同銅青塗
漏孔矣有異名火煅醋淬研塞水銀同枣研塞

腸鳴有虛有水飲有虫積脾虛四君子湯加姜連

脾移寒於腎為傳水水者按之腹不堅水氣客於大腸疾
行則鳴以囊裹水之聲革厯澤浮柂目瘡皮杏仁猪苓各

五錢為主葱白湯送五分以利度

胃寧作添腸鳴升陽除滯陽加益智半夏相火激動真水
二陳湯加配三黃梔子瘦飲腹內雷鳴大戟主之

心腹邪氣上下雷鳴幽火走水海藻昆布女萎主之

交腸病

大小便滯位而出或因猝飽或因大怒藏府垂張不循常
道嘔吐以提其氣伎閼門清利得泌別之職司服五苓散
加木通、羌鈞愈

左風右
北蓮莊左
左芳血鵠
左樹
以紅玉生
鱠菜