

遠西草水譜

十五

洋学文庫
文庫 8
F 6
15



遠西草木譜 十五

新訂

第一種

斯姪乙和撒兒箇斯



種三第

斯^ス姪^テ乙^乙和^ヲ撒^ビ兒^兒箇^箇斯^ス



種二第

斯^ス留^留玉^玉質^質抹^抹

斯^ス姪^テ乙^乙和^ヲ撒^ビ兒^兒箇^箇斯^ス



第二十章 斯箇兒撒和乙姪斯

名義 斯箇兒撒烏斯 羅甸

地和思谷里迭斯ハ唯其一種ヲ説ケリ然レ今來ハ其種類アルヲ知ル故ニ此章ニ三種ヲ舉ク

第一種ハ谷里迭斯ノ書ニ「斯箇兒撒和乙姪斯」ト稱シ即チ眞ノ者トス故ニ予ハコレヲ以テ第一種ト

ス何則彼説ニ此草一種ノ小草ニメ葉少ナク子スレヒツ尾ニ似タリト云ヘリ布立糝斯ハ厄勒齊亞語ニテ

斯箇兒撒翁乙姪斯ト稱ス羅甸ニ「斯箇兒撒烏斯」倭

兒拔ト云即チ彼書第二卷十五章ニ「斯箇兒撒烏斯

倭兒拔ハスレヒツ蠶尾草ノ義ニメ其子蠶尾ニ似且蠶咬傷

ヲ治スルヲ以テ名ツクトイヘリ○又別ニ同名ノ

モノアリ是ササ耆和字樂思スレヒツ紐斯ノ「涅把」ナリ彼條ニ於

テ辨スベシ

第二種ハ抹質玉留斯ノ斯箇兒撒和乙姪斯ナリ是

谷里迭斯ノ第一種ト同シカラズ何則此草葉少ナ

カラス甚繁密ナリ或人コレヲ「的歷比烏莫」ニ充ツ

諸本草家モコレニ從フ

第三種ハ是モ亦同名ナリ此草其莖末ノ枝梢鈎曲シテ大倏立和禿祿撒烏莫ノ枝ニ似タルカ故ナリ
○此草諸本草家説説繆繆線窩耳種種類ニ充レ
凡非ナリ其葉對生セサルノミナラズ根モ亦大ナ
一指許ニ至ラス故ニ充リ難シ

附考 羅別兒ノ亞烏カ久辣繆カスニ斯箇兒撒和
乙姪斯ノ名ヲ附接スル者ハ郭留莫那及葛思把
兒拔烏吸耨斯等ノ考ニハ謁矢烏莫未尼繆莫ニ
近シ皮屈六斯ノ一種ナリ○郭留莫那ノ記ス所

ノ小封茲東竭ハ彼ト同種ニノ其他ハ斯箇兒撒
和乙姪斯ノ種屬ナルモノナリ○耆和孚樂思絀
斯ノ斯箇兒撒烏斯一名斯箇兒撒和ハ獨度涅烏
斯ハコレヲ別條ニ説ケリ第二十六卷二十一章
ニ説ケリ又諸本草家各異説アリテ或ハ斯得建姪葛
立トシ獨度涅烏斯ノ第一種ノ葛立トシ或ハ部
列莫ノ一種トス此物二種アリテ亦鬚尾ニ似タ
リ故ニ碩學ノ郭留識烏斯ハ斯箇兒撒和乙姪斯
ノ品類トス詳ニ部列莫ノ條ニ於テ説レヲ説ベ

シ

總說第一種ハ拂郎察ノ邊蘭虵匱古ノ山地高燥、
 處膽八樹下ニアリ又圃中ニモ種時ス弱莖小ニメ
 低ク高サ五寸或ハ一尺許一方ニ傾キ或ハ地ニ妥
 生ス直立スルハ稀ナリ葉狹長ニメ差潤ク數多カ
 ラス細莖ヲ抽テ夏ノ始ヨリ末ニ至テ花アリ金黃
 色隨テ實熟ス狀豌豆山鰲豆大巢菜ノ花ニ似テ稍
 小莢ハ相對ス粗糙ニメ毛茸アリ節アリ勾曲シテ
 蟹尾ノ如シ中子アリ根ハ細シ

附考獨度涅烏斯ノ所謂第一種ナル者ハ諸本草
 家コレヲ斯箇兒撒和乙姪斯覆立和皮布歷烏カ
 ト稱ス羅別兒ハ獨乙都ニ於テ發線窩耳ノ名ヲ
 接ス故ニコレヲ羅甸ニ斯箇兒撒和乙姪斯列扁
 斯覆立和皮布歷烏カト稱ス其節間ヨリ出テ形
 潤葉皮布歷烏劣莫南柴ノ葉ニ似テ軟韌ニシテ
 勁カラズ故ニ此名アリ而メ羅別兒ノ說ト獨度
 涅烏斯ノ說ト相合セリ即チ羅別兒曰此草斯箇
 兒撒翁箇祿乙鐸ト名ルハ莢中ニ子ヲ結ヒ毛茸

アリテコレヲ覆ヒ卷縮メ稍鬚尾ニ似タリ其莖
長サ一掌半或ハ高サ一尺許ニノ地ニ安生ス
ヨリ葉ヲ出ス一猶前説ノコトシ蒙禿卑爾力意
爾斯ノ近山枯燥ノ地及ヒ膽八樹下ニ多生ス然
凡他處ニテハ但園中ニアルノミ乃チ合備烏斯
谷留莫那ノ考ハ斯箇兒撒和乙姪皮布歷烏力覆
立和ノ種類ハ谷里迭斯ノ真ノ郭利覓嫩ニ充ベ
キ也是必耆和孚樂思紉斯ノ郭利覓嫩ハ布立糲
斯ノ郭利覓嫩ヨリモ多シ

○第二種ハ抹質玉留斯ノ説ニ拂郎察ノ地葡萄圃
ノ邊ニ生ス其莖叢生シ葉多ノ莖ヲ拵テ生ス其葉
枝ノ本ニ著キ大抵三葉攢著ス中心ノ葉ハ左右ヨ
リ大ナリ且長大畧馬齒莧葉ニ似タリ夏ノ初ヨリ
莖梢小黃花ヲ開キ季夏ニ至テ細莢ヲ結フ其莢亦
節アリ先尖テ鬚尾ノ如ク鈎曲ス中子ヲ含ム哈歷
哈ニ似タリ根ハ小ニシテ細シ

附考 斯箇兒撒和乙姪斯未訥兒花六列深救刺
ハ羅別兒ノ稱スル所ニノ獨度旦烏斯ノ第二種

ト狀相似テ唯黃色ノ一花ヲ開キ一莢ヲ結フノ
ミナリ獨爾孛屈ニ於テ見タリト其草甚小十

○第三種ハ曠野穀田草莽ノ地或ハ葡萄ノ生スル
處及ヒ流水中ニ生ス濕地ニ生スルハ愈長大ナリ
燥地ニ生スルハ愈軟弱ニモ毛多シ此草當時ノ人
能知ル所ノモノナリ莖微稜アリテ其葉稀疎綠色
狹長ニメ半指徑許莖葉共ニ糙漚ニモ毛茸アリ四
月ヨリ季夏ニ至テ莖梢枝末共ニ盤旋ノ花ヲ著ス
狀蟹尾ノ如シ花五瓣青色ヲ帶テ中邊微黃ニシテ

野生葛覓姪犁斯ニ似テ稍小ク其色亦淡シ花漸々
ニ代謝ス根ハ小ニメ鬚多シ

〔附考〕獨度涅烏斯カ此章ニ説トコロノ第三種斯
箇兒撒和乙姪斯ハ流水ノ近傍ニ生ス其葉通常
ノ楊ニ甚似タリ而ノ繆乙線窩耳ノ種類ニ近シ
故ニ羅別兒ハ妥生繆乙線窩耳ト稱セリ獨度涅
烏斯ハ何ニ據テカ繆乙線窩耳ノ種類トセズメ
斯箇兒撒和乙姪斯ノ條ニ收ムルヤ
○斯箇兒撒和乙姪斯ノ別種

羅別兒ノ繆乙線窩耳ノ下ニ半女半直ノ別種ト
 スルモノハ是獨度涅烏斯第第種斯斯箇兒スレヒヤレコロイト
 和乙姪斯ナリ其花天藍色ニメ愛スベク花實ノ
 莖梢旋轉シテ蠶尾ニ似タリ故ニ蠶尾草ト稱ス
 根鬚多シテ繁延ス莖長サ一尺許多ク小枝ヲ分
 寸半ハ地ニ安生シ半ハ直立ス柔毛茸アリテ巨
 些而倏乙而葉ノ如シ此草水傍及曠野ニ生ス藥
 局ニテハ繆乙線窩耳ノ名ヲ通稱ス其鼠耳ノ細
 毛アルニ似タルヲ以鼠鼠耳稱稱スル充レリト

雖氏其花鈎曲シテ蠶尾ニ似タルヲ以テ蠶尾草
 ト名ルモ亦可ナラスヤ獨度涅烏斯ノ本條ノ種
 類ニ收ルト是衆人ノ視ル所指サス所ナリ
 ○斯箇兒撒和乙姪斯歷救未訥沙莢ヲ結ノ義ナリ
 羅別爾ノ名ル所ナリ此草蘭虵コノト匱古ノ穀田中ヨ
 リ見出セリ稀ナルモノナリ根ハ鬚多シテ二三
 莖ヲ生ス細ノ直立ス高サ一尺許或ハ一掌半莖
 頭莢ヲ結フ末彎曲シテ翕尼屈吏古胡蘆ノ莢ニ
 リモ圓メ狹シ稍蠶尾ノ彎曲セルニ似タリ花ハ

黃色ニメ小ナリ他ノ品類ト同シ葉ハ復掘爾附
土又質カ彌留斯蒺藜葉ニ似テ稍小ナリ莖下ヨ
リ地上ヲ離テ直立シ各對生シテ肋骨狀ヲナス
○斯的而洛歷救未訥沙

谷兒絀率斯ノ亞兒絀祿ト名ツクル者ナリ葉ハ
前種ノ如シト羅別爾ハ記セリ花ハ洛莫布沙那
ニ相近シ少シク曲タル莢中ニ小黑子アリ一小
莖ノ上ニ星狀ニ附着セリ味ハ穀類ノ如シ意爾
蘭太ニ於テハ甚尊テ斯的而洛星トト名ツク而
房中飲劑ニ用ユル也我輩ハ知ラサルヲナリ

○亞烏カ久辣繆カスニ羅別爾斯箇兒撒和乙姪
斯ト接名スルモノハ郭留莫那及ヒ葛思把兒拔
烏吸耨斯等ノ考ニハ謁失烏莫未尼繆莫ニ近ニ
イヘリ皮屈六斯ノ一種ナリ

○小封茲東竭ノ種類ヲ以テ郭留莫那ハ斯箇兒
撒和乙姪斯ノ種類中ナリトシテ記セリ

○得和不樂思絀斯ノ斯箇兒撒和乙姪斯ハ獨度
涅烏斯ハコレヲ別條ニ説ケリ

本草綱目卷之三

第二十章斯箇兒撒和乙姪斯

第二十六卷二十一章斯得呢建姪

部列莫ノ條
ニ說ケリ

又諸本草家異說アリテ或ハ斯得建

姪葛立トシ或ハ獨度涅烏斯ノ第一種ノ葛立ト

シ或ハ部列莫金雀ノ一種トス何則部列莫ノ類

二種アリ是亦蠶尾ニ似タリ故ニ碩學ノ郭留識

烏斯モ斯箇兒撒和乙姪斯ノ品類トス詳ニ部列

莫ノ條ニ載ス

性効主療第一種ハ地和思谷里迭斯ノ說ニ蠶ノ螫

傷ニ貼メ甚功アリ或ハ關節損傷ニ貼ス

附考此草ヲ以テ蠶ニ礙スレハ失氣昏倒ス其半

死ノ者ヲ白花草名謁而歷薄劣斯白花アリ一草名銀蘭根ヲ


以テ之ニ觸レハ即活ス其蠶毒ヲ解スルコト知

ベシ○第一種皮布歷烏劣莫葉ノ者ヲ金瘡藥劑

ニ充ツ

種 一 第

禿 | 兒 | 得 | 斯 | 禿 | 兒 | 卑




遠西草方譜卷三

百六十五下


小兒得斯秃兒卑トイ子

者花無




種二第

小兒得斯秃兒卑トイ子




種別

葛點斯得兒禿



增補

設的物
質釋印
斯乙曼
斯悉
悉乙
未尔
斯法
質久
莫。





增補

物印曼謁坎乙斯繼莫。布樂天設。
形及斯悉未斯。
設質斯

增補

物印曼謁坎乙斯繼莫。
布樂天設。部列罪和度。
斯設質斯。敷地繼莫。



第二十一章

飛彪力斯 一名卑兒禿斯得兒禿

名義

飛彪力斯 厄勒卑兒禿斯得兒禿 業謁垓謁坎乙

設繼莫羅謁坎乙那立斯同撒立古斯謁坎乙那同葛

烏香謁坎乙那藥悉葛掙的武熱爾瑪祿悉斯王子同

丕兒斜王子同坎物姪設法爾拂即箇香姪繆洛伊斯

亞樂薄姪繆洛同谷沓地葛法爾陸里亞福兒設達乙

歷諸厄布列斯立葛別謁

布立祿斯ノ書ニ謁坎乙設質斯ト称ス其形馬尾ニ

似タルヲ以テナリ以上諸名同義ナリ湿草ニシテ

大小二種アリ一種次章ニ出ス

○第一種 ゴートパール 大卑兒禿斯得兒禿

和名キドクサ 木賊一種

或人羅甸ニア亞斯布列ル洛ラト称スコウコウ糙澀草ノ義ナリ

此草糙澀ナルカ故ニ木工櫛匠茎ヲ用テ物ヲ搓擦

シテ平滑ナラシム 独乙都國婦人ハ錫造酒壘ヲ磨

磋カシノ光淨ナラシム故ニ酒壘草ト称ス又謁エ丕ヘ度ド

論コト名クルハ湿地ニ生スルカ故ナリ

總說 第一種ハ涅溝原野下湿ノ地四五月頃ニ生ス

茎直立中空虛圓シテ藁得ノ如ク高一尺半餘粗糙

ニノ節多シ關節ノ如ク包括シ筒様器物ノ如ク相

合ス毎節燈草ニ似テ細葉圍繞束縛セル頭上飾ノ

如シコレヲ撚スルニ糙澀ニメ硬シ或ハ稍赤色ヲ

帶フモアリ又一種葉ナク茎粗糙ニメ線條アリ但

節ノミアリテ茎頂楫状ノ花ヲ結フイ覓イ乙ア于カン達タ實

ニ似タリ根多節地中ニ傍引ス

附考 ゴートパール 大馬尾草無葉者ハ五月ニ生ス花ハ四月癸

又短茎中ニ包括メ燈草ニ似タリ

△正恭曰第一種ハ和名キドクサニメ木賊一種也其狀木賊ヨリ長大ニメ每節枝ヲ生スル者ナリ又本條ニ一種葉ナクシテ茎粗糙線條多ク但節ノミアリ茎頂楫狀ノ花ヲ結フトアルハ是物

○第二種 小卑兒禿斯得兒禿

和名イヌトクサ 問荊

羅甸ニ未釋斯。謁歎乙設。緇莫。厄勒齊亞ニハ謁歎乙

設質容ト称スケイマヤルトステール小馬尾草義ナリ又別ニ葛點斯得兒

禿ト貓尾ノ義ト名ルモノアリ是地ガ和思谷里リ送斯及布立

禿斯ノ所説ニメ短小柔軟萌生スル者ナリ

附考此國ニ於テハ靴兒磨斯トモ称ス衆説ニ其

功用損傷ヲ痊ス故ニ斯名ツクルト言ヘリ根細

軟ニメ黒色四月花アリ後節間周圍纏繞圓結メ

燈心草ノ如シ大者ト同ケレ氏糙澀ナラス且細

軟磋商ノ用ニ便ナラス

△正恭曰第二種ハ物印曼ノ謁歎乙斯ス緇莫ム布パ樂ラ

甚

天^セ設^キ。弄^シ及^ス斯^シ悉^ス未^ス斯^セ。設^チ質^ス斯^ト接^ス名^スル者^ニノ本
 書第二圖ト同シ和名イヌドクサ一名スギドク
 サ スキナドクサ ハマドクサ ミヅドクサ
 ト称ス茎深綠色長四五尺ニ至ル其質薄キ故ニ
 中空虚ニ濶シ乾セハ輕虚淡綠色物ヲ磋スルニ
 密緻ニノ木賊ニ勝レリ夏月中心茎頂花筆頭菜
 ノ如シ其根深ク土中ニ入ル今來藥舖ニ眞ノ麻
 黄ト称メ貨賣ス舶來麻黄中ニ亦雜來テアリ本
 草原始言麻黄茎類ニ節々草ト此物ナルベシ

○本編第二種ノ下ニ一種猫尾草ト附考第二種
 靴^ル而^モ磨^ス斯^ル。此^ノ物^ハ印^ノ曼^ノ悉^ヒ尔^ル法^ハ質^キ久^ム莫^テ的^シ釋^ス乙^イ
 斯^ス悉^ス未^ス。設^チ質^ス斯^ト接^ス名^スセル者^ニメ和名スギナ
 軟弱^ト 斯^ス悉^ス未^ス。設^チ質^ス斯^ト接^ス名^スセル者^ニメ和名スギナ
 一ツナ 筑^ツギ一ツ 佐^ツギタサ 仙^ノ節々相續スル
 ヲ以テ名ツク春葉ニ先夕チテ花ヲ生ス筆頭状
 ニ似タリ和歌ニフデツグサ又フデツバナト詠
 ス和俗ツクシ ツクツクシナト 称シ土筆ト書
 ス嫩時茹フベシ慶陽府志ノ筆頭菜ナリ問荊ノ
 一種ト為ベシ

性効 哈列釋斯說性聚ニノ味微苦燥劇ケレ氏浸蝕スルナシ

主療 地和思谷里送斯ハ此草ノ品類ハ能金瘡ヲ療ス細ニ搗テ貼ス哈列釋斯ハ神經ノ損傷已ニ斷絶スルヲ接スト云○或說ニ膀胱及大小腸損傷ヲ治ス奇効アリ○衄血諸出血ヲ止ム又婦人帶下赤痢泄瀉水及酒ヲ以テ服ノ速ニ治ス○自然汁ヲ取り又酒水ヲ以テ用ユルモ亦勝レリ

附考 下血出血ニ自然汁ヲ服ス吐血尿血ニハ日

阿合台經味不過ハ種一苦二淡三辛
四鹹五淡六甜七酸八不了味
服平木寒

○赤痢腸痛經服ス○小水ヲ

通利スルニハ葉細末又ハ全草ヲ酒煮シテ服ス○又腎膀胱腸中潰瘍ヲ治ス○下部赤腫焮痛及陰部諸疾ニ蒸露トナシ木綿布ニ浸シ寒溫適宜シテ慰ス又諸惡瘡ヲ治ス腹部ヲ慰メ赤痢ヲ治ス地和思谷里送斯哈列釋斯ハ此草根ヲ以テ咳嗽呼吸短促内部損傷ニ煎服セシム○衄血ニ自然汁ヲ取り鼻中ニ滴メ之ヲ止ム蒸露ト為モ亦

性効 哈列釋斯說性聚ニノ味微苦燥劇ケレ氏浸蝕スルナシ

主療 地和思谷里送斯ハ此草ノ品類ハ能金瘡ヲ療ス細ニ搗テ貼ス哈列釋斯ハ神經ノ損傷已ニ斷絶スルヲ接スト云○或說ニ膀胱及大小腸損傷ヲ治ス奇効アリ○衄血諸出血ヲ止ム又婦人帶下赤痢泄瀉水及酒ヲ以テ服メ速ニ治ス○自然汁ヲ取り又酒水ヲ以テ用ユルモ亦勝レリ

附考 下血出血ニ自然汁ヲ服ス吐血尿血ニハ日

本草綱目卷之四

二三ヒヲ服ス三四日ニメ功アリ○赤痢腸痛經久咳嗽喘急肺氣損傷ニ酒ヲ以テ服ス○小水ヲ通利スルニハ葉細末又ハ全草ヲ酒煮シテ服ス○又腎膀胱腸中潰瘍ヲ治ス○下部赤腫焮痛及陰部諸疾ニ蒸露トナシ木綿布ニ浸シ寒溫適宜シテ慰ス又諸惡瘡ヲ治ス腹部ヲ慰メ赤痢ヲ治ス地和思谷里送斯哈列釋斯ハ此草根ヲ以テ咳嗽呼吸短促内部損傷ニ煎服セシム○衄血ニ自然汁ヲ取り鼻中ニ滴メ之ヲ止ム蒸露ト為モ亦

佳ナリ又挿藥ニ造リ子宮中ニ入テ崩漏ヲ止ム
○金瘡傷損發熱スル者ニ此草搗爛貼傳スレハ
之ヲ拒ム○金瘡ノ用ニ供スルハ此草乾シ細末
シ貯ヘ急ニ臨テ之ヲ貼ス能瘡口ヲ斂ム或ハ根
茎ヲ連子醋ニ調和シ貼スルモ亦佳ナリ

他用

ゴローテパルトステルト大馬尾草茎硬ノ粗糲ナル者櫛工銀匠材金諸

器ヲ磋擦ノ光淨平滑ナラシム独乙都国ノ婦人ハ
專ラコレヲ用ユ

附考

ゴローテパルトステルト大馬尾草嫩苗意太里亞人ハ齋日ニ柔軟ナ

ル者ヲ採リ食品トス水煮シ小麥粉ニ糝シ鍋中
ニ油ヲ投煎シ魚肉ニ代テ食フ飽滿スレハ噯氣
ヲ發ス是膽液閉塞漂溢ノ身體ヲ閉塞セシメ大
ニ腹痛ヲ發ス

○

ゴローテパルトステルト大馬尾草

第一種トスルハ地中ヨリ出所ノ一

種ノ巨芽ヲ發スルヲ以テ充タルナリコレハ軟
弱也意太里亞ニ捌パルト而秃ト留リ合イ立ト名ツク此種類
ハ彼處ニ發生スルト黒色一束狀ニ懸垂スルト
馬尾ノ如シ茎頂黒色花ヲ著ス根白色節アリ茎

ト同シ羅甸ニ謁欽乙設立斯ト称シ厄勒齊亞ニ
撒而賓及應ト言真ノ亞那拔悉斯ト又伊斯把尼
亞ニハ矢煙釋地而六斯ト云

○斯下見姪卑兒禿斯得兒箇祿乙鐸

葛思把兒拔烏飛釋斯ノ可說一種異草ヲ載ス謁
欽乙設繼莫和立丢莫臭馬尾ト名ツク蕪亦齊亞

ノ属留說淪意太里亞ノ属亞拔那等ノ硫氣アル
溫泉地傍ニ生ス此物泥土硫黄氣アリテ全白色
長枝ヲ生ス多節葉ニ換テ燈草様瑣碎叢攢セル

小莖節ノ周圍ニ車輪状ニ纏繞ス乾燥スル者指
ヲ以テ燃スレハ盡ク粉碎ス

△正恭曰是物印曼ノ謁欽乙斯繼莫布樂天設部
列霏和皮斯設箕斯敷地繼莫ナリ彼圖ヲ斯ニ標
出シテ参考ニ備フ

○謝卑兒禿斯得兒箇祿乙鐸

吾邦近傍各處コレアリ飛彪カス沙吉斯亞ト名

ツク珊瑚ノ如ク石質ヲナス是海草中ニ属ス

△正恭曰按スルニ此物ハ本邦ニ称スル海拂子

ト名ツケ海中巖石上ニ生シ状僧侶ノ持ル拂子
ノ如シ是レ活物ト植物ト相半バスル物ニ今
ノ西洋人ハ布蘭土地逸兒ト云最凡品類多シ本
草所謂越王餘筭及沙箸ノ類ナリ此種類ニ収ム
ヘキモノニアラス

○活得兒卑兒禿斯得兒禿箇祿乙鐸

羅甸ニ謁欽乙設絀莫把劣斯的列ト名ツク独度

涅烏斯ハト利兀釋莫翁未那ト名ツケ羅別爾ハ

此物毎時花アリテ子ヲ結バガルヲ以テト利兀

釋莫翁未那ト云義ナル欽ト名ツ

ケ夕リ然凡一説ニハ織長ナル蒲桃状ノ結節ヲ

懸垂スルト馬尾ノ如シトアレハ謁欽乙設絀莫

把劣斯的列ト名ツクベシトアリ

△正恭曰又按スルニト利兀釋莫翁未那モ亦一

種ノ物ニアラス第四卷二十九章ニ出ル水藻ナ

リ彼條ニ於テ辨ズベシ

茅二十二章

謁エ丕ハ沓ド樂ラ

一名亞ア那ナ拔バ悉シ斯ス

名義爰ニ一種草ヲ曰リ古人之謂丕沓樂一名亞那

那拔悉斯一名ツク其草卑兒亮斯得兒亮二稍相似似

夕リ之布立孫斯書茅二十七卷七章二此草謁丕沓

樂一名謁丕沓亦高鳥公ト名ツク其他亞那拔悉斯ト名ツク

生シ樹上之攀緣シ枝ハ懸垂ス葉ナクメ但多ノ乱

髮ノ如キヲ得夕リ是細致枝ヲ束子タル蘭ノ如キ

者ヲ縈紆纏結ス根臙黃色ナリ布立孫斯前書十七

章ニ示シタルハ唯飛彪カ斯ノミ也コレヲ厄勒齊

茅二十二章 謁ニハドヲ丕ニ沓樂 一名亞那拔悉斯

名義 爰ニ一種草アリ古人コレヲ謁ニ丕ニ沓樂一名亞那拔悉斯ト名ツク其草卑兒忒斯得兒忒ニ稍相似

タリ ○布立祿斯書茅二十七卷七章ニ此草謁丕沓

樂一名謁ニ丕ニ沓亦鳥ト名ツク其他亞那拔悉斯ト名ツクル者ハ

生ニ樹上ニ攀緣シ枝ハ懸壘ス葉ナクメ但多ノ乱

髮ノ如キヲ得タリ是細致枝ヲ束子タル蘭ノ如キ

者ヲ繫紆纏結ス根臨黃色ナリ布立祿斯前書十七

章ニ示シタルハ唯飛彪カ斯ノ也コレヲ厄勒齊

茅二十二章

謁丕沓樂

一名亞那拔悉斯

名義 爰三種草謂古人謂丕沓樂一名亞

那拔悉斯一名ソク其草卑兒亮斯得兒亮稍相似

夕リ〇布立祿斯書茅二十七卷七章此草謁丕沓

一丕沓樂又其他亞那拔悉斯風烈シキ處ニ

生シ樹上ニ攀緣シ枝ハ懸垂ス葉ナクメ但多ノ乱

髮ノ如キヲ得夕リ是細軟枝ヲ束子タル蘭ノ如キ

者ヲ縈紆纏結ス根鱗黃色ナリ布立祿斯前書十七

章ニ示シタルハ唯飛彪カ斯ノミ也コレヲ厄勒齊

此草謁丕沓樂

亞人ノ種々考索分別セシハ彼説ニ謁丕沓弄ト云
 或ハ亞那拔悉斯アアバシス正名ツケテ共ニ併合シ樹ニ倚テ
 攀縁シ攀蔭ノ如キ黒枝ヲ懸垂スル攀騾馬尾ノ如シ
 膝狀結節シテ僅小細葉アリ子圓クシテ胡蔓ニ似
 タリ木ノ如キ根毎ニ多小樹寄生ス古人ハ共ニ
 混シテ飛彪カスト名ツク故ニ地和思谷里迭斯ハ
 二種ニ別テ大馬尾草ト謁丕沓樂トヲ錯乱セシト見
 ス飛彪カスハ下湿及ヒ湟中ニ生ス即大馬尾草也
 謁丕沓樂ハ硬土喬木高處樹枝ニ攀縁ス是亞那拔

悉斯ナリ尚布布糝斯ノ説ノ如シ

總説 此草形状馬尾草ヨリ長大ニノ一枝上ニ寄生

シ巨サ一臂ノ如シ傍ヨリ多枝ヲ分テ柔軟纖長ナ
 ル數枝ヲ結節ヨリ發出シ馬尾草ハノ乱髮狀ヲ為シ
 夕如シ五月結節之莖狀小莖ヲナシ花細小鱗黃色花
 二似タリ其後八月ニ實ヲ納ム酸液ヲ保有ス小覆盆子
 ノ如シ中子ヲ著ス根ハ堅ノ木ノ如シ其生スル下
 或ハ甚高又低小ニ止モアレト稀ニ見人ノ定タル
 ノミ何者凡一二ノ樹木ニ背面ニ生シ其高カモ亦

其生スル物ニ隨フベシ

別爾陸蘇斯ハ此草和藜莫彪斯山ノ谷中ヨリ見出

ス刺忽尼亞ノ屈樂執察ノ近傍ニ五月花咲ク八月又熟ク

夕リト又同人異考紀事ニ布刺達釋斯ヨリ生シタ

ル其最高ナル物ヲ見タリト夫ヨリノ小樹灌木ニ

育スルハ恣ニ長大ニハ至サル也此自生スルモノ

葡萄ノ如ク蔓延旋回シ常春藤ノ如ク盤廻固著シ

鼓子花大蓼等如ク移絡遷蔓スルノ類ニアラス其

物ノ大サニ隨ヒ高低ヲ止ル者ナリ

附考

別爾陸蘇斯諸説ニ此物別ノ國産ク甚ク按録

沙蒙シモンノ似ニ如ク色色藍赤シト言フ郭留識クワリウシキ鳥斯ウス異草譜

第一卷十四章ニ見ヘタリ既既ニ先哲及布立

蘇斯地和思谷里迭斯等ス此草ニ元テ名名ヲ付

斜度シヤド旋奇センキ同形ドウゲイナルヲ以

テ此物ノ次章ニ記シ独度ドクド涅鳥斯ネウスニ

註譯セリ

性効

主療性寒ニノ燥其効力ハ馬尾草ト一般ナル

ト明ケシ其形狀モ亦相遠カラサルニ似タレハ主

療運用モ相近シト知ベシ

正恭曰 謁ト丕ト沓ト樂トハ先哲及布立ト穰ト斯ト地ト和思ト谷里
車ト姪ト斯ノ諸說溪山喬木上ニ寄生スル者古人モ
稀ニ見ル者ニシテ其體狀ヲ親シク目撃スルモノ
ナク故ニ此書ニモ圖ヲ載セス且其花実ヲモ審
ニ説ガレ任其形狀ヲ察スルニ全ク松蘿ニ彷彿
タリ而シテ本編ニ説トコロハ實覆盆子ノ如シト
アレハ甚異ナルニ似タリコレハ別爾陸穰斯始
テ和ト犁ト莫ト彪ト斯ト山ノ谷中ヨリ見出シ其子按度碌沙蒙
ニ似テ色ト赤トシトイヘルニ拠テ此編ニ実ク狀

ヲ載タルナルベシ和犁莫彪斯山ハ斯刺忽尼亞
ノ屬樂ト救察ノ近傍ナリ自國ニ非レバ唯遠望シ
タルノミナルベシ按スルニ謁ト丕ト沓ト樂トハ和名サ
ルヲガセ漢名女蘿一名松蘿深山幽谷風氣烈シ
キ處喬木雜木ノ樹皮ニ富著ト絲ト糾トセトルト乱髮及
細絲ノ如ク下垂シ山人マウバノオガセト稱
ニ長サ三四尺ヨリ五六尺ニ至リ小結節ヲ為ス
ト胡婁子ノ如キ物アリ之ヲ瓜ニテ抓刺ストハ
皮取レテ珠ト數トノ狀ノ如シ俗ニ弘法ノ數珠ノ變

化ト云雨降時ハ重ク垂テ自ラ墮落ス花実ハ見
ヘズ又一種本草李時珍曰劉松石保壽堂方云白
龍鬚生近水旁有石處寄生搜風樹節乃樹之餘精
也細如椶絲直起無枝莖最難得真者和名ホマ一
名シラゴケ深山枯木ノ枝ニ附著ス長サ二三寸
細絲ノ如ク松蘿ニ似テ色白ミアリコレヲ按ム
ニ柔軟ナリ此等モ亦苔類ニノ謂ハ不レ當レ樂レノ種類
ナリ飛懸加耶一名馬尾草ノ種類ニアラズ然レ正
別爾陸稜斯ノ説ニ其子按度碌洲蒙ニ似テ色赤

シト云ハ和名ヤシヤビシヤク漢名葛爾雅ニ葉
似當盧子如覆盆赤黑味甜美トアリ一小木ニノ
樹上ニ寄生シ高カ五六寸小葉婆娑トノ形木ニ
ヨドリ上戸又常春藤ニ似テ兩々相對シ二三月此
二花双出大サ三分許五瓣先尖リ崔古ノ如ク淡
黄色五葉圍繞セリ花後実ヲ結フ熟スレハ赤色
ナリ而メ是ヲ考ルニ毛詩ニ葛與女蘿旋干松上
トアルカ如ク樹ニ二物ノ寄生シタルヲ別バル
稜スノ見誤ラ記載セシナルベシ是レ本草根

柳蘓恭說出原列斗門方言即今楓樹上寄生トア
ハ者ナリ氣味功用ハ細目ニ於テ考ベシ

○布刺達釋樹根ノ一樹ニ

本草綱目卷之...

第二十三章 学發末力那

名義 学發末力那 羅斜度旅奇 都独乙

此草今世ノ本草象ハ学發末力那ト称ス拂郎察人

ハ頼深姪兒ト云フ独乙都ニテハ斜度旅奇ト云


其矣覆盆子ニ似テ核アリ又葡萄ノ如ク数顆積簇

又故ニ名ツク厄勒齊亞ニ達樂兀斯一名達樂哈嫩

又達樂哈訥斯ト云地^{和思谷里送斯}ハ其枝末尖ヲ

鬚尾ニ似タルヲ以テ斯箇兒^{概容}ト云名ツク達樂

哈訥斯ト云ハ野羊ノ如ク臭氣アルカ故テラス其



矣食フベク最モ人ノ養ヒ為ルベキモノナルヲ以
テ名ツクル也厄勤齊臣語ニ食ノ義ヲ禿祿兀ト云
又食後ニ盤上ニ可供モノニ達樂梅末達アリ是以
知ルベシ

附考 此草郭留識鳥斯及羅別爾ノ説ニ最モ詳ナ
リ郭留識鳥斯ハ伊斯把尼亞ニ於テ二種ヲ見出
セリ彼異草譜第一卷四章 前草ニハ十四ニ其大
カニ由テ差別ヲナス 第一種ナル者ハ伊斯
把尼亞人別而穀ト稱ス繆兒失亞國ノ地ニ生

セシヲ見ルノニ第一種ハ伊斯把尼亞ノ中土ニ
アリ遠海ノ地最モ多シ然レ佛郎察蘭虬置古等
ニ於テハ近海ノ處ニ生ス故ニ 樂深斯姪
末兒ト云是即斜度旅奇ト名ツクルノ義ナリ海
辺ニ多生スルカ故ナリ○羅別爾ハ 蒙禿
百爾利兒斯ノ斜度旅奇ト云地和思谷里迭斯ノ
真ノ達樂哈訥斯ニ充ツ○蒙禿百爾利兒斯ノ學
士及テ漁人ハ其実ヲ賴溪斯姪兒ト云フ是亦
斜度旅奇 海葡萄ノ義ナリ 地和思谷里迭斯ハ

ハラ落哈斯ト云フ其子大サ小麥ノ如キ者三四
顆簇リテ覆盆子ノ状ヲナス中ニ小硬核アリテ
聚斂ノ力強シ三稜ニシテ兩頭尖リ稍堅ク小麥
顆ノ如ク又壹和絞樂斯紐斯ノ設撒繆莫ノ如シ
テ外面黒ク内白ク髓多シノ味滴取ノ頗愛スベシ
但其實ハ赭赤色ノ液汁充テ味甚甘美ナリ能小
水ヲ通ス羅別爾ハ二三年ノ間此事ヲ試ムク
リト言ヘリ伊斯把尼亞ニ生スルハ蘭蠟置古ニ
生スルヨリモ大ナリ且茎直立シテ子モ亦是ク

大ナリ

酸潘箱

○此物地和思谷里迭斯ノ達樂兀斯一名達樂俾
又達樂哈訥斯ニ充ルヲ確的トス而ノ又抹質玉
留斯ノ謁歎乙設繆莫成兒紐莫ニ充ツ又尼干娘
兒及ニ按突爾刺樂ノ郭祿東ニモ充タリ○抹質
玉留斯ハ謁ヲ葛力ノ一種トスル所ノ達樂俾ニ
充ツ是ハ壹和絞樂思紐斯ノ所留度離撒斯ニメ
後章ニコレヲ説ベシ○或人ハ此物ヲ独乙都語
斜令設ニ充テ羅甸ニ蓬質久樂未カ那設樂撒和

正期ト稱ス亦後章ニ詳ニスベシ

和名未詳

漢名麻黃

總說

此草拂郎察ノ屬蒙尅百尔利思斯ノ近傍其他

海邊ニ産ス好テ海邊ノ堤砂土ノ地ニ生ス熱爾瑪

尼亞業謁垣爾蘭杜ノ園中ニニ種蒔スレハ能生ス

其形状大ニ亞那拔悉斯ニ似タリト雖比小ニノ低

シ茎弱ク細クメ圓シ燈草ニ似タリ枝多ク末尖リ

堅メ銳利刺ノ如シ葉ハナシ花ハ擲簇ノ小ク綠色

微白ヲ帶フ茎ノ節間ヨリ細茎ヲナシテ附著ス實

ハ甚小ニメ多聚リ覆盆子ノ未熟ニ似タリ熟スレ

ハ猩紅色味甘美ニメ愛スベシ核ハ堅メ三稜兩頭

尖リ味酸瀋ナリ根ハ多節ニメ長ク横ニ傍引ス其

茎直立スルヲ稀ナリ多ハ地ニ安メ茎枝ヲ多分生

シ恣ニ繁衍ス自生ノ地ニテハ秋ニ至リ実ヲ結フ

且冬ニ至テモ尚綠色ニメ能寒氣ニ堪ユ自生ニフ

ラガレハ実ヲ結ナシ

△正恭曰 稟發末カアハ本草ニ就テ考ルニ麻黃

ナリ掌禹錫言西陽雜俎云麻黃莖頭開花花小而

黃叢生子如覆盆子可食又蘇頌言今近汴京多有
之以棗陽中牟者為勝春生苗至五月則長及一尺
以來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子
味甜微有麻黃
黃時珍叙名注或云其味麻其色黃今
按麻即同本謂諸果實未熟之味也
黃字疑氣外皮紅裏仁子黑根紫黑色云云是二氏
衍支ノ説ト甚相合ス且舶來麻黃稀ニ花実ヲ著セル
モノアリ花ハ細ニノ節ニ多攢簇ス実ハ外皮程
紅色子核ハ稍蕎麥顆ノ如シ子發末カ亞ハ麻黃
ナルト確然タリ蘇頌説ニ有雌雄二種雌者於三

四月内開花六月結子雄者無花不結子ト雖此
書ニハ自生ノ地ニテハ実ヲ結ニ自生ニ非レハ
不結實トアレハ雄者無花不結子ト云ハ非ナリ
凡草木ノ雌雄ハ花ニ因テ其性質ヲ辨ス一花中
ニ各雌花雄花ヲ具有シ雄花精ヲ輸テ雌花受テ
実ヲ結ス是通例ナリ又一木中ニ雌雄ヲ別ツ者
ハ松柏樅栗ノ如キ雄花精ヲ輸發ノ子腫コレヲ
受納ノ実ヲ結ス又一草中ニ雌花雄花ヲ別ツ者
ハ桔樓王瓜胡瓜絲瓜ノ如ハ雄花亦精ヲ輸發ノ

雌花コレヲ受納ノ実ヲ結ス又雌雄兩體ナル者

アリ桑漆蜀椒大麻葎草等是ナリ雄木精ヲ發輪

シテ雌木コレヲ受納ノ実ヲ結ス是其大畧ナリ

餘ハ倒生荅微ニ於テ宜辨別葎草譜ニ蕪花トアリ和俗ムダバナ伝

〇葎發木カ五形状飛彪カ斯ニ相近似スルヲ以

謁ハト不ハト皆ハト樂ハトノ次ニ列ス絶テ是等ノ種類ニアラス

迥然トメ別種ナリ

性効

此草ノ實及核ハ前説ノ如ク收斂ニメ且燥ノ

身二度ヲ隔ツ

雌花コレヲ受納ノ実ヲ結ス 羣芳譜ニ蕪花ト称ス和俗ムダハ十伝
又雌雄兩體ナル者アリ桑漆蜀椒大麻葎草等是
ナリ雄木精ヲ發輸メ雌木コレヲ受納ノ實ヲ結
ス是大畧ナリ餘ハ倒生啓微ニ於テ宜辨別
性効 此草實及核ハ收斂ニメ且燥ノ茅二度ヲ隔ツ
主療 地和思谷里送斯ハ實ヲ用テ泄瀉ヲ療ス又婦
人經水過多ヲ止ム

附考 達樂兀斯ノ實ハ即斜度旅奇ナリ最モ收斂
ノ功アリ此物十個ヲ酒ニテ服スレハ泄瀉婦人

赤帶下ヲ止ム ○或ハ実ヲ搗キ塊トナシ貯テ缺
乏ニ備フ ○又木味ナル酒ヲ以テ服スレハ咳嗽
喘急短息ヲ鎮メ腹中雷鳴ヲ治ス此物能小水ヲ
通利ス

△正恭曰 孛發末カ亞ハ麻黄ニメ其形状飛彪カ
斯ニ近似セルヲ以テ其次條ニ列スレモ花実ヲ
檢査スルニ種類ニハアラス亦謁丕沓樂トモ異
ナリ本綱ニモ麻黄次條ニ列シ木賊ノ附録ニ問
荊ヲ屬スレモ是亦形状相似タル故ナリ唐山ヨ

リモ麻黄櫃中ニ問荊ヲ雜来ス然レ其花実ヲ以
テ辨スレハ迥然トノ異物也然レ其形状ニ就テ
考レハ相近似スルノミナラス稍其功用ヲ同ス
本邦古来ヨリ加豆^{カヅ}称久佐^{カサ}和名一名阿萬^{アマン}奈同^{ナトウ}加
久^{カク}麻^マ久^ク佐^サ延喜^{エンキ}式一名加津^{カヅ}波^ハ久^ク佐^サ同ノ称ヲ麻黄ニ
克ツ藥舖ニテモコレヲ真麻黄トメ貸買ス真ニ
アラスト雖レ亦能蒸發解肌ノ功アリ故ニ此草
生スル地ハ冬雪早ク消スルヨシ崗ケリ僧繼洪
言中^{ナカ}年^{ネン}有^{アル}麻黄^{マウ}之^ノ地^チ冬^{フユ}不^レ積^ル雪^{ユキ}爲^シ池^チ内^ノ陽^{ヨウ}也^{ナリ}ト同日

ノ談也麻黄ハ唐山ニテハ傷寒解肌第一藥ニノ
世人專称用ス本草ニ中風傷寒頭痛温瘧瘧毒出
汗去邪熱氣止欬逆上逆除寒熱大明言通九竅調
血脉開毛孔皮膚張元素言去營中寒邪波衛中風
熱ト共ニ通腠理肌ノ功ヲ説ケリ李時珍言麻黄
微苦而辛性熱而輕揚觀此則性熱可知矣ト繆仲
淳言麻黄禀天地清陽剛烈之氣又其味大辛氣大
熱性輕揚善散亦陽草也ト按スルニ麻黄ハ中等
熱ニメ微燥其功脉理ヲ開達シ寒氣皮膚壅遏或

乙切草



ハ稠厚酷厲液汗孔ニ粘著スルヲ蒸發蕩滌稀釋
 融解驅出消散ノ功アルヲ以テ前條ノ諸症ヲ治
 ス繆氏說ニ稟天地清陽性輕揚善散ト言ハ可也
 又剛烈之氣大辛大熱ト言ハ不可也凡大熱剛烈
 者ハ皮膚ヲ毀傷シ大ニ癰疽結痂ス豈輕揚解肌
 ノ功アラシヤ麻黃ハ味不辛本草叙名云其味麻
 ト麻トハ即木ナリコレヲ以テ可徵此書唯字發
 末カ^レ亞^レノ^レ實核ノ功ヲ舉タル而已莖葉ノ功ヲ載
 セス故ニ爰ニ贅ス

增補

夏百草木譜




廿七草

雌乙印草



廿一

夏百草木譜





廿七草

雌乙印草



廿八



第二十四章

毗百力公 一名深土央斯箇呂度

名義 毗百力公 厄勒亞 深土央斯箇呂度 爾蘭杜

藥局の百兒覆樂達ト称ス其葉細孔鍼眼アルヲ以

テ名ツク又欵哈脊木稱莫ト称ス是驅逐邪惡氣ノ

功ヲ名ツク又按度祿沙蒙トモ名ツク是男血ノ義

ニメ花葉ヲ榨レハ赭血色液ヲ出スカ故也次章ニ

モ同名多シ然レ按度祿沙蒙ノ名ハ第二十七章ニ

出ルヲ以テ正名トスベシ大小二種アリ大ナル者

真毗百力公小ナル者小毗百力公ト称スベシ

附考

拂郎察ニ未^ル而^レ歷^レ百^パ兒^ル爾^スト稱^シ羅^ン甸^ニ未^ル

而^ル歷^レ覆^ホ樂^ラト稱^ス伊^ス斯^バ尼^亞ニ葛^カ樂^ラ容^シ悉^シ而^レ歷^レト

云^ク共^ニ其^ノ葉^ニ太^ク陽^ニ向^テ見^レハ鍼^ノ眼^ニ細^ク点^スアルカ

故^ニ名^ツク

第一種 毗^ハ百^パ力^リ公^シ

和名ヲトギリサウ

第二種 小^ヒ毗^ハ百^パ力^リ公^シ

和名ヒメヲトギリサウ

總說 第一種ハ樹籬園圃或ハ曠野草莽下濕ノ地ニ

生ス地ニ依テ方茎圓莖及赤葉等ノ異アリ地上ニ

直立叢生シ高一尺餘小枝ヲ分テ葉長潤太陽ニ映

スレハ鍼眼アリ六七八月小莖頂五瓣黃花ヲ開キ

中心黃葉アリ花後長莢ヲ結フ形体共ニ大麥粒ノ

如シ中細子アリコレヲ研ハ松脂ノ氣アリ根堅メ

鬚アリ枝ノ如ク繁衍ス葉莖花共ニ研レハ黯血色

ノ液ヲ出ス

第二種ハ曠野穀田中ニ生ス形状全ク第一種ト同

ク小ニノ地ニ著シ弱茎稍直立ノ高サ一掌徑ニ至

小葉ヲ附着ス全夏花アリ花莢共ニ第一種ニ同ク
秋ニ至レハ葉黃赤色ニ變ス

△正恭曰毗百カ公ハ品類頗多シ其形狀大小肥
瘠各產地ニ因テ異ナリ物印曼ハ十五種ヲ擧ケ
林奈斯ハ三十四種ヲ擧ク二類ニ分最生十四種
草生二十種トス彼書云百爾覆樂^ハ莫^ハ毗百カ
久莫^ハニメ通常^ハ溪土^ハ央^ハ斯^ハ箇^ハ呂^ハ度^ハナリ花ニ雌葉ヲ
ラナシ莖枝兩対シ葉鍼眼點アリ花黄色ニシテ
黒点ヲナシ粉葉約束ノ黒腺條ヲ為モアリ政羅

巴諸州田圃原野林木及道傍ニ自生シ又園庭中
凡多アリテ形狀ハ人ノ能知トコロニメ金瘡
勝タル薬剤也ト是和名乙切草ナリ本邦人モ
此葉ヲ以テ金木傷損及犬鷹諸畜ノ病ヲ治ス古
花山院ノ時鷹飼暗頼ナル者其業ニ精シ鷹傷ヲ
被レハ一草ヲ以テ能愈ス人コレヲ求レハ秘メ
傳ヘズ家業密ニコレヲ洩ス暗頼怒ニ堪ヘズ其
芽ヲ又傷ス此ヨリ世人鷹ノ良藥タルヲ知ル
因テ芽切草ト名ル由今通メ乙切草ト書ス其功

用ニ因テ劉寄奴草ニ充非ナリ又小連翹ニ充ニ亦

未穂 ○茅二種ハ物印曼ニ毗百カ久莫。未穂莫。

^率撒釋莫ト称スルモノ同物參考スベシ和名姫乙

切草高カ二三寸許莖末ニ三四花ヲ著ス此一種

最ニ僅小長カ一二寸ニ過ズ枝梢ニ唯一花ヲ著

又是物印曼ノ毗百カ公未^左釋莫ニ的當ス附考

最小^乙毗百カ公トハ別物也

○世俗ニ通ノ小毗百カ公ト名ツクル者アリ是ハ

一種ノ小草ニノ地和思谷里迭斯ノ骨カ斯ナリ

百カ公ニ相似タルカ故ニ称スレハ谷里迭斯ノ説

ニ葉倏乙姪ニ似テ赤ク唯小カクノ厚シ高一掌半

ニ過キズトイヘハ倏乙姪ノ種類ニ近キ者ナリ

附考 最小^乙毗百カ公^部刺旁上弗^按凸^歛ノ^碗碗

粗惡地ニ生ス枝莖高一掌及二指指横徑毗百カ

公ニ似テ葉小低^繆斯ヨリ稍大ナリ花^醜黄色子

肥大尋常ノ者ニ比スレハ稍小用エル者亦稀也

^云羅甸ニ毗百カ久莫未^左繆^率撒釋莫^設布^的莫

質カ玉那カ烏莫ト称ス^初羅別而ハ谷里迭斯ノ骨

カリスニ克ツク或ハ安生毗ア百カ公ノ一種トス

△正恭曰物印曼ノ毗ビ百カ久莫未諾カ弊斯ヘ西復シ種トス

斯ハ其葉似シ繹斯ニ似テ稍大ナリ此説ニ甚近シ

今彼圖ヲ舉テ參考ニ備フ安生毗ア百カ公ノ一種トスル非也

○亞歷吉葉ア姪カ印斯ノ毗ビ百カ公ハ葉他ノ毗ビ百

カ公ヨリ小ナルテ四分一枝頂ニ穂ヲ為シ擷ヘ獲

ノ花ヲ著ス黃色尋常者ト同シ

△正恭曰此物形状物印曼ノ毗ビ百カ公ニ悉シ直ニ嬌斯カ分ル配ス

密耳麻百身絲謁ト列レ郭ト實ト斯ニ近シ彼圖ヲ舉テ參考ニ備フ

骨カリスニ克ル諸草ヲ辨ス

○地ナ和ス思ス谷リ送ス斯ノ骨カリスハ本條ニ載ス其功

用ハ後條ニ識ス

○一種黃花毗ビ百カ公ニ同シク唯小ナル者アリ

忽諾カ由斯別而留斯ノ説ニ是カ如ク骨カリスハ

甘的亞ニ生ス灌木様條ハ乙シ姪ニ同ク高二尺許ニ

至ルモアリ彼地ニテハ和ラ兒ル撒ビ陸ル穀ト兒ト禿ト十名ク

○羅別而真マノ骨カリス

蒙思百而立亞葛ニ産ス木本叢生真立ス周圍ニ
小枝ヲ出シ高サ一咫或ハ一尺五寸許ニ至ル葉
密著ノ大候^{ゴク}シ姪^イ葉ノ如ク子花苞中ニ藏ム圓ノ
達末カ^リ斯子ノ如シ黯白色又茶褐色薄膜ヲ覆フ
眼睛状ノ如シ骨カ^リ斯ノ名ハ是ニ由ル欵全草赤
色ヲ帶^ル味辛微苦香氣アリ根ハ按^カ救^ク沙^ク根ノ如
ク赤色液汁ヲ充實ス

○骨カ^リ斯^ハ而^ル陸^ル劣^ル莫^ル又^ハ伊^ス斯^ハ把^ル諾^ル劣^ル莫^ル

郭留識烏斯ノ説ニ伊^ス斯^ハ把^ル屋^ル亞^ル入^ルハ賓^ル説^ル而^ルト稱

ス拂郎察國ニ生スルハ肥大ニメ液汁充實ス花
萼一處ニ攢簇シ穂ヲナス末各五尖ニ分レ五黒
点ヲ為シ花ヲ發シ香氣惡シカラス香蓮色外面
紫碧色甚愛スヘシ色久ク保ツ二裂瓣上下ニア
リテ四瓣ノ如シ上瓣ハ最大子莢小刺アリ彼國
ニテハ亞^ア黎^リ彪^ウ莫^ム玉^ヨ按^カ屋^ル斯^ハ布^ル洛^ル果^クト云是抹^シ質^ク玉^ヨ
留^ル斯^ハノ勸^ル負^ル質^ク莫^ム百^ハ土^ト賴^ル由^ル莫^ムナルベシ
○抹^シ質^ク玉^ヨ留^ル斯^ハノ骨^カ力^ク斯^ハ
此ハ前^レ説^ル真^ルノ骨^カ力^ク斯^ハトハ別^レ種^{ナリ}木本叢生高

一咫許ノ小茎ヲ發シ葉割立類蘆蓬又斯ス兒ル史リ葉
ノ如ク星樣花苔ヲ發シ又野野亞ア由ユ印印ノ星狀ヲ
為スカ如シ肌膚色ニメ黄点アリ海邊ノ曠野ニ
生ス又別而陸陸左左鳥鳥斯スカ骨骨カ斯スニ克タルハ亞ア斯ス
拭キ逸イ弄ニニメ根赤色ニメ臭氣アリ又骨骨カ斯ス部部蔓蔓
建建煙煙別別兒兒件件悉悉斯スハ毗毗百百カ公公トハ大ニ異ナリ以
上ニ記ス所ハ各異ノ者ナリ

性効 哈列釋斯說ニ氛氣精微ニメ性溫燥ナリ

附考 今世諸家說ハ性溫燥芽三度トス

主療 經水ヲ催シ小水ヲ利ス專ラ全實ヲ用ユ子ノ
ミハ用ヒズ○金瘡ニハ生菜ヲ搗テ貼ス又火傷ヲ
治ス○濕爛腐蝕諸瘡ニ全草乾シ細末シ糝ス○地地
和思和谷里谷迭斯迭曰三日熱四日熱ニ草酒服ス○又曰
痛風及腰部ニアル者子ヲ湯トメ飲服スレハ十四
日ニノ愈

附考 或說ニ此物邪氣ヲ避ク故ニ此草火薰スレ
ハ惡氣ヲ消除ス○金瘡損傷ニ花葉自然汁ヲ取
用ベシ又馬ノ糞ヲ殺スニ先ニ龍芽草アガリモニ少許ヲ食

セシメ後ニコレヲ用ユレハ功速ナリ○毒虫咬
傷ニ草搗キ貼ス甚効アリ○葉及子ヲ糊劑トナ
シ又膏ニ割メ火傷ヲ療ス又附骨疽ヲ治ス○經
水ヲ催シ小水ヲ利スルニハ右ノ如ク外貼スベ
シ又全草花葉共ニ煎服スルモ亦佳ナリ能泄瀉
ヲ止ム○布立^リ株^ス斯日此子滋潤ノ功アリテ三日
熱ヲ療シ腎臟ノ結石ヲ驅リ諸中毒ヲ解シ諸毒
蟲咬傷ヲ治スルニ白酒ヲ以テ飲服ス又吐血嘔
血ヲ治ス膽汁諸液ヲ蕩滌シ能大便ヲ通スルニ

子二錢ヲ溫肉羹汁ヲ以テ服ス又痛風腰痛ニ子
ヲ服スルテ十四日ニノ愈エト本條ニイヘルガ
如シ

△正恭曰林奈斯言此草殊ナル金瘡劑ナリ花又
ハ自然汁ヲ油ニ交ヘ拔^ル尔^ル撒^ル莫^ルニ代用ス古人ハ
関連小便通利シ又唯諸熱ヲ驅除スル功アルノ
ミト思ヘリ今此花精氣ヲ引出シ茶ノ如ク飲服
スレハ内臟損傷赤痢其他惡液流動ノ諸症ヲ療
スルテ最^ニ良^ク稀^クスベシ婆^兒華^歌ハ咽喉中ノ腫起

ノ啞嘶スル者ニ用タリ此物味苦銳烈ナル故ニ
能諸毒ヲ殺ス葉水煎シテ用ユ甚効アリ此子ハ
性聚斂ノ者ナリト彼説ヲ擧テ補之

○剥簾國ニ於テハ此草花ヲ酪及鹽ト共ニ麥酒
ニ浸シ渣ヲ去リ體中内部傷損或ハ尿管破裂ノ
危篤ニ至ル者ヲ療ス

○此草蒸露水ハ癩症昏睡病四肢癱瘓ニ飲服ノ
最良効アリ

○此草ノ鹽ヲ取テ脇痛ヲ治ス

○毗百カ公油ハ羅別而的列思葛蘭ト名ツク
毗百カ公茎梢瞻八樹油各百九十二文沒藥元莫
覓謁歷莫左各十六錢的兒綿的印落葉冬十二錢
蘆薈八錢微邏古乳香各四錢ヲ取り調和シ重湯
ニテ煎シ收貯フ黃疸石淋ニ奇効アリ

○又法毗百カ公茎梢芽香ナル蒲萄酒ニ浸ス
三日重湯ニ煎煮シ搾壓シ渣ヲ去リ復再毗百カ
公ヲ浸テ前法ノ如クス又重湯ニテ煎スル亦
前法ノ如シ勿釋茶產的兒綿的印二十四錢終年

油四十八錢ハナ大藍オホ三分ノ一合シ重湯オモシニ煎シ酒
氣ヲ蒸發盡シ渣ヲ去別ニ硝子器ニ貯又適宜ニ
温ノ惡性潰瘍又冒寒ヨリ發セル關節肉瘦神經
反張腫痛及痛風牙齒疼痛ニ貼ノ良効アリ

○毗ヒ百力公ヒノ拔爾撒護ヒ 金瘡損傷ヲ通治ス毗

百力公ヒ花茎梢ヲ連子ヒ ヒ櫻實ヒ薔薇ヒ苔ヒ共ニ

調和シ硝子器ニ入レ大陽ニ曝シ稍萎凋シテ淡
赤色ニ透明スルヲ窺テ木綿布ニテ榨壓シ收置
ラベシ

○骨力斯ヒ ヒ開達温ヒ昉ヒ稀釋消除ノ功アリ ヒ地初ヒ忍

谷里送斯ヒ日子ハ小便又經水ヲ通利シ蜘蛛咬傷

ノ毒ヲ解シ腰痛及骨節疼痛ニ酒ニテ飲服ス又

掣顛動搖ヒ胡椒ヲ雜ヘテ用ユ甚良ナリ又項頸

ノ局曲強木スルニ油ニ調和シ塗ル亦佳ナリ一

説ニ此根ハ頭暈ヲ救フ酒煎シテコレヲ飲服ス

衣ヲ被覆スレハ身體ヨリ大ニ發汗シ功驗ヲ得

ルナリ

○蒙土百爾卑兒斯ヒノ骨力斯根ノ自然汁ハ木綿

第一種
 比田百加公三狀野呂所廉



哆羅呢
 赤色之深
 用之

ハヒエ切草



第二十五章

毗百力公狀野呂的
 妄生溪土央斯箇呂度

名義第一

留達悉力奇斯禿力斯
 元勅未而姪呂的搖沓按的反溪土央斯箇呂度
 甸羅百哈嫩亞屈力容
 杜蘭 齊亞 堽尔

地初恩谷里迭斯ハ毗百力公狀ノ野呂的トスレ
 毗百力公ノ種類ニ属スベキモノ也何則谷里迭斯
 ノ初版ニ其葉呂的ニ似タルヲ以テ呂的ノ次章ニ
 收ノ又末版ニ於テハ假品ナリトノ毗百力公亞訥

左斯ト稱シ刺歴木^ニ居史莫^ノ條ニ入夕リ詔ト
 言ベシ其葉毗百カ公及^レ召的ニ似テ叢生シ程瀟
 小枝ヲ出シ稍赤色ヲ帯^テ花蜜蠟色小圓莢ヲ結^テ
 大麥ニ似タリ中ニ小黑子松脂氣アリ葉指ヲ燃ス
 レハ血色赤汁ヲ出ス故ニ亦按鐸祿^ノ意蒙一名曼斯
 部^ガ婁度^ノ男子血ノ名アリコレニ拠レハ莖葉程瀟ト
 ノ毗百カ公ノ毛茸ナキニ似スト雖^モ此種類ニ収ム
 ベキモノ也

○第一 毗百カ久莫率必釋莫^旬



郭留識鳥斯^ハコレヲ業^ノ熟姓^ル蘭杜ニ^コ安生^ノ溪^ト土^ニ
 斯苗呂度ト稱ス

總説 第一種ハ甚稀品ナリ偶陰湿ノ地ニ於テ見^レ
 アリ莖葉全ク毗百カ公ニ似テ暗綠色軟ニ柔毛
 茸アリ花黄色真ノ毗百カ公ト時ヲ同ウス莢モ亦
 似テ黒細点アリ中細子アリ根モ同シ

第二種ハ郭留識鳥斯ノ説ニ斯把^ガ及^レ左印^ノ谷中低
 處ニ生ス殊ニ撒刺滿加ノ近傍又發^シ蒸^シ線^ノ海岸ニ
 多シト言ヘリ凡テ此類ノ諸草ハ荷蘭地方下湿灰

土様ノ地原野共ニ多シ茎細毛茸アリテ地ニ安生
ス葉真ノ毗百力公ニ似テ柔毛アリテ蘭細色ナリ
花差早ク三月黄色茎ニ連著ス莢細クメ根硬シ

附考

郭留識鳥斯ノ説ニ安生毗百力公ハ枝多ク

毛茸アリテ地ニ安生ス葉ハ茎ニ附テ对生ス尋
常ノ者ニ似タレ凡全ク蘭細色細毛アリ然レ此
圖ハ細毛ヲ画テラ缺ク花黄色枝ニ連著ス尋常
ノ者ヨリ光澤ナク稍小ナリ花後小穂ヲ結フ亦
尋常ト同シ根ハ堅シ茎安生ノ地ニ附ク處ニ亦

細根ヲ生ス六月ニ花アリ濶リテ蘊茎ノ縁ノ如

シ發簾線ノ地ニテハ三月ニ花アリ土人毗百力

公ニ似タルヲ以テ種類トス然レ真ノ者ニ比ス

レハ力弱ク香氣薄シ撒刺滿加人ハ谷樂公拭而

陸ト云溪土央斯箇呂度ト謂カ如シ或ハ谷里送

斯ノ野生呂的ニ充ツ

○又一種羅別而ハ蒙土百爾犁兒斯ノ地ヨリ高

一掌徑ニ過スシテ白毛茸ヲ覆フモノヲ觀出シ

タリ

○北洲ノ安生毗百力公ハ前種ト異ナリ。多枝ナ
ラスノ軟弱ナリ葉モ稀疏ニノ爾紺色ナラスコ
レヲ按ノハ葉端血色液ヲ出ス唯葉端ノミ黒点
アリ郭留識鳥斯ハ穀田ノ列タル處ニ於テ見タ
リト言ヘリ


△正恭曰此編二種毛茸アル者 本邦ニ於テ未
見之ヲ和俗ハイヲトギリ草ト呼フ者ハ本編ノ圖
ノ如シテ毛茸ノナキ者ナリ

性効 此物功用ハ野呂的ニ甚近シト然レ谷里迄斯

ハ其性熱ニメ燥氣氣精微ナルカ故ニ真ノ毗百力
公ト同功ナリトメ此章ニ收メタリ

主療 經水ヲ通シ小便ヲ利ス○四日熱ニ酒ニテ用
エ○大傷ニ葉子共ニ搗テ貼ス○腰痛ニ此葉ヲ服
スルヲ四十日ニメ治ス

論曰 婿 斯 亞



第二十六章 亞斯婿論 一名倏兒子賄

名義 亞斯婿留莫 羅亞斯婿論 倏兒子賄 爾業錫瑤 爾蘭杜

和名突抜乙切草

羅甸 = 又按鐸祿息蒙ト称ス是男子血ノ義ニシテ

血色液汁出ルカ故ナリ 哈列釋斯曰 毗百力公ノ一

種ニノ或ハ 亞斯婿祿乙姪斯 正名ツク 熱爾瑪左亞

人ハ 發兒子發或又活兒之蒲乙帶ト称ス 藥局ニハ

コレヲ知ナシ

總說 此草森林翁鬱ノ地ニ生ス 莖直立ノ 毗百力公

ヨリモ高シ葉赤大ニノ白色ヲ帶フ鍼眼ナシ花モ
毗百カ公ト同シ莢モ相似テ細点アリ花臭共ニ毗
百カ公ト同時ナリ根ハ稍堅シ花葉ヲ搗キ或ハ指
ニ按トキハ血色赤汁ヲ出ス

附考

此物野ニ自生セズ唯園圃中ニ栽ルノニ莖
長ノ枝ナク側ヨリ芽ヲ發ス葉毗百カ公ヨリ長
ノ褐綠色葉背傍ニ柔毛茸アリコレヲ撫ルニ軟
ニ針眼ナシ花瓣長ノ光澤ナシ子莢共ニ相似
テ又松脂氣アリ

物百八十九
物百九十

△正恭曰此物ハ突抜乙切草ナルベシ莖高カ一
尺五寸直立莖梢傍枝ヲ生シ葉兩々相對ノ長
ク兩葉附著ノ莖ニ貫タルカ如シ故ニ世俗突抜
乙切草ト称ス莖末小黄花ヲ著ス乙切草ノ如シ
即チ乙切草ノ一種也是レ物印曼ノ毗百カ久莫
謁歴蔽質斯思繆莫嫩樂木率莫覆立和洛禿ナリ
本條ニ舉タルハ同書ノ毗百カ公葛鳥歷別度郎
評陸屈刺部碌ナリ二種共ニ穿心乙切草ト称ス
ベシ蓋本草ノ獨用將軍ナラン蘇恭說ニ生林野

中節々穿葉心、生苗其葉似楠不時采根葉用氣味
辛無毒主治毒腫乳癰解毒破惡血ト又附錄留軍
待生斂列山谷葉似楠而細長采無時味辛溫無毒
主肢節風痛折傷瘀血五緩擊痛トアリ此說ニ就
テ考レハ形狀相近ノミナラス功用ニ於テモ亦
相均シ恐ラクハ此物ナルベシ今物印曼ノ二圖
ヲ舉テ參考ニ備フ

性 剋 性 溫 二 燥 十 九

附考 葉ハ燥ニメ能淨除ス子ハ蕩滌ノ功アリ

主療 功用全ク毗百力公ニ同シ○谷里達斯ノ說ニ
此子ヲ各半ノ蜜水ニ加テ一杯ヲ飲服スレハ過多
膽汁ヲ大便ヨリ驅逐ス又腰痛ニ功アリ病快復ニ
至マテ勉テ服用スベシ○哈列轉斯ノ說ニ子ハ下
利劑ニメ能大便ヲ疏通ス

附考 腰部痛風ニ全草酒煎メ服ス又腰痛ニ蜜水
ニテ久服スベシ○火傷ニハ此草搗キ爛シ貼ス
ベシ○金瘡ニハ葉ヲ酒煎シテ滓ヲ去リ屢洗フ
ヘシ○子ハ膏ト為メ湯火傷ヲ療ス最功アリ

○荷蘭國ノ安生倭児子賄

羅旬ニコレヲ亞斯塔留莫率必釋莫謁陸姪斯

祢ス近世碩學完才醫師批的兒巴吾ナル者始テ

親出タルモノニノ郭留識烏斯モ彼ニ據テ記セ

リ此草下湿地ニ生ス全ク柔軟毛茸アリ圓莖安

生シ兩葉對生ノ尋常倭児子賄ヨリハ圓シ花ハ

五瓣黄色コレヲ按テモ赤汁ナシ別而陸屋烏斯

ニ充ツ甘的亞ニ亞兀烏度烏祿ト云根臭氣アリ

赤色ナラズ

