





紅杏秘録 上

武
22
/





門中印
號 522
卷 1



古之毛者目魚之夷藏之深抱生
男者紀癘投款仗新氏備壽減是
此登忽布在方冊以存予人傳諸
美世學之不厭分洞象育育警乾



二豎終未離也而世之爲医者藥
老素味漫厭欲好者費耳賤目只
遷延古今方彙以爲是法做于茲
名高浪用藥者實倒投施宅熱錯
膠漆与病相索者十無二三誤治

之弊者雖死竟爲痲痲者蓋亦
不鮮名余每目擊其術之誤治惟
然由有涉梳石家方步鉛學夕思
揣摩多年窺得醫法一經乃知方
彙之選於未爲做巧以然者反覆

全篇病心藥方相徑庭者有焉大
病者症不做聖方有焉傷寒疫邪
滋雜疥癬膏治飲病水拿回嫩肺
腐肺癰毒補症毒桂葛承寧癰脫滋
骨酥換如此窮漏不可枚舉之遊

併腐者不少正路恐余子弟亦習
時弊依樣葫蘆故索搜石家方書
彙集以爲上下二卷名云紅杏秘錄
以便時檢之用云尔

去以五黃之初反上脫日

惠圃老物粘章識



目錄

| | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|-----------------------|-----------------------|----|
| 傷寒 | 感冒 | 中風 | 中疔 | 瘟疫 | 時毒 <small>附斑疹</small> | 中暑 |
| 燥 | 諸火 | 內傷 | 食傷 | 諸鬱 | 痰飲 | 咳嗽 |
| 瘡 | 霍亂 | 反胃 | 嘔吐 | 泄瀉 | 痢 | 黃疸 |
| 疝氣 | 頭痛 <small>附眩暈</small> | 諸氣 | 痞滿 | 呃逆 <small>附噎氣</small> | 鼓脹 | 水腫 |
| 虛勞 | 諸血 | 汗症 | 麻木 | 癲狂 | 癩 | 健忘 |
| 不寐 | 濁 | 淋疾 | 便閉 | 痔瘡 | 脫肛 | 面 |
| | | | | | | 眼目 |
| | | | | | | 補益 |
| | | | | | | 積聚 |

小青龍湯

麻黃 芍藥 細辛 乾姜 桂枝 五味 半夏 甘草

太陽証心下水氣或喘或悸或噎或咳或小便不利者此方主之

大青龍湯

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 石膏

太陽証惡寒發熱身疼痛不汗出而煩躁者此方主之

桂麻各半湯

太陽如瘧狀熱多寒少者此方主之

五苓散

澤瀉 豬苓 白朮 茯苓 桂

太陽病脈浮微熱消渴而小便不利又渴欲飲水水入則吐名云水逆此方主之

桂枝加附子湯

即於桂枝湯方內加附子一枚

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者此方主之

麻黃杏仁石膏甘草湯

麻黃 杏仁 石膏 甘草

汗下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者此方主之

桂枝加厚朴杏子湯

即於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十箇

太陽病下之微喘者表未解故也此方主之

桂枝人參湯

即理中湯加桂枝四兩

太陽病外証未解而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者此方主之

葛根黃芩黃連湯

葛根_{半斤} 黃芩_{三兩} 黃連_{三兩} 甘草

太陽桂枝証醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者此方主之
十棗湯

芫花熬

甘遂

大戟

大棗十枚

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人漿汗出發作有時頭痛心下痞
鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也此方主之

瓜蒂散

瓜蒂一分

熬黃 赤小豆一分

病如桂枝証頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者
此胸有寒也當吐之宜此方

桂枝去芍藥湯

即桂枝湯去芍藥

太陽病下之脈促胸滿者此方主之若微惡寒者加附子
大陷胸湯

大黃六兩

芒硝二升

甘遂

一錢 另碾

右三味以六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末
溫服一升得快利止後服

太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也
醫及下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中
懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胸此方主之 又太陽病誤下不大便
五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞅滿而不可近者又
結胸無大熱此為水結在胸膈也但頭汗出者並此方主之

大陷胸丸

大黃半斤 葶藶半斤 芒硝半升 杏仁半升
熬 去皮尖

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗
甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下

結胸者項亦強如柔症狀下之則和此方主之
小陷胸湯

黃連一兩 半夏半升 栝蒌一枚

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥煮取二升溫服
小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者此方主之

枳實理中湯

即理中湯加枳實一枚

熱實結胸及寒實結胸但用陷胸湯不瘥者此方主之

大黃黃連瀉心湯

大黃二兩 黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

傷寒表已解心下痞按之濡其脈關上浮者此方主之

附子瀉心湯

大黃二兩

黃連二兩

黃芩二兩

附子

一枚炮去皮另煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁溫服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

甘草瀉心湯

甘草四兩

黃芩二兩

黃連二兩

乾姜三兩

半夏半升

大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫及下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心中痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故使鞭也此方主之

生姜瀉心湯

甘草^{三兩} 人參^{三兩} 乾姜^{一兩} 半夏^{半升} 黃芩^{三兩} 黃連^{一兩}
生姜^{四兩} 大棗^{十二枚}

右八味以水一升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噎食鼻腹下有水氣腹中雷鳴下利者此方主之

半夏瀉心湯

半夏^{半升} 黃芩^{三兩} 乾姜^{三兩} 人參^{三兩} 黃連^{一兩} 甘草^{三兩}

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱似柴胡症心下滿而不痛者此方主之

赤石脂禹餘糧湯

傷寒服湯藥下利不止下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦此方主之
旋覆代赭石湯

旋覆 三兩 人參 二兩 生姜 五兩 代赭 一兩 半夏 半升 甘草 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服
傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者此方主之

桂枝新加湯

桂枝 二兩 芍藥 四兩 甘草 二兩 人參 三兩 生姜 四兩 大棗 十二枚

右六味以水一斗二升微火煮取三升去滓溫服

發汗後身痛脈沈遲者此方主之

小建中湯

桂枝 三兩 芍藥 六兩 甘草 二兩 生姜 三兩 膠飴 一斤 大棗 十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫

服一升日三服吐家不可用建中湯以甜故也

傷寒二三日心中悸而煩者此方主之

炙甘草湯

甘草四兩

生姜三兩

桂枝三兩

麥冬半升

麻仁半斤

大棗十二枚

人參三兩

阿膠二兩

生地一斤

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內阿膠烱消

盡溫服一升日三服

傷寒脈結代心悸動者此方主之

桂枝甘草湯

桂枝四兩

甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此方主之

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半斤

桂枝四兩

甘草二兩

大棗十五枚

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服水宜甘瀾 發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此方

主之

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 二兩 甘草 二兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者此方主之

梔子豉湯

梔子 十四枚 香豉 四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後

發汗若下之而煩熱胸中窒者又下利後更煩按之心下濡者為虛煩也並此方主之 少氣者加甘草 嘔者加生姜

桃仁承氣湯

桃仁五十箇 去皮尖 桂枝三兩 大黃四兩 芒硝二兩 甘草二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之此方主之

抵當湯

水蛭三十個 熬 蟅蟲三十個 熬 去頭足 大黃三兩 棗 桃仁三十個 去皮尖

右四味以水五升煮取三升去滓溫服不下者更服

太陽病六七日表證仍在脈微而沈及不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿而小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也又太陽病身黃脈沈結少腹鞭滿小便不利者為魚血也小便自利其人如狂者血證諦並此方主之

抵當丸

水蛭二十個 熬 蟅蟲二十個 熬 去翅足 桃核二十五個 去皮尖 大黃三兩

右四味搗篩為四丸以水一升煮一九取七合服之晬時當下血
傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也此方主之

白虎湯

知母^{六兩} 石膏^{一斤} 甘草^{二兩} 粳米^{六合}

右四味以水一斗煮^米熟湯成去滓溫服一升日三服

傷寒脈浮滑身有大熱汗出煩渴者此方主之

小承氣湯

大黃^{四兩} 厚朴^{二兩} 枳實

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服當硬衣不
爾者盡飲之若硬衣者勿服之

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者又陽明病腹滿大便
難少喘者又陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者皆主之

麻仁丸

麻仁^{二升} 芍藥^{半斤} 枳實^{半斤} 大黃^{一斤} 厚朴^{一斤}

杏仁 一升去皮尖
另熬作脂

右六味蜜合丸如梧子大飲服十九日三服漸加以和為度

跌陽脉浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮濡相搏大便則鞫其脾為約此方主之

調胃承氣湯

大黃 四兩去皮
酒浸 芒硝 半斤 甘草 二兩

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火兩沸少少溫服之

傷寒吐後腹脹滿者又陽明病不吐不下心煩者並主之

大承氣湯

大黃 四兩
酒洗 厚朴 半斤 枳實 五枚 芒硝 三合

右四味以水一斗先煮三味取五升去滓內大黃更煮取二升去滓

內芒硝更上火一兩沸分溫再服得下餘勿服

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外
欲解可攻裏也手足濇然汗出者又傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十

餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床
惕而不安微喘直視脉弦者生瀉者死但譫語發熱者又陽明病發熱汗
多者急下之又傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微
熱急下之並此方主之又病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不
能卧者有燥屎也又下後六七日不大便煩不解腹滿痛者本有宿食故
此方主之

蜜煎導猪胆汁土瓜根導法及更衣丸等方不錄于此

猪苓湯

猪苓去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石各二兩

右五味以水四升先四味取二升去滓內阿膠烱消溫服七合日三服
陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利者此方主之中陰病下利六七日咳而心煩不得眠者

麻黃連軹赤小豆湯

麻黃二兩 去節

赤豆一升

杏仁四十枚 去皮尖

生姜二兩

大枣十枚

甘草二兩 炙

梓白皮一斤 生

連軹二兩

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分
溫三服半日則盡

傷寒瘧熱在裏身必發黃此方主之

茵陳蒿湯

茵陳 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分三服小
便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便出也

傷寒七八日身黃加梔子色小便不利腹微滿者又陽明病頭汗出身無汗劑
頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘧熱在裏身必發黃並此方主之

梔子柏皮湯

梔子 十五枚 甘草 二兩 黃柏 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒身黃發熱此方主之

小柴胡湯

柴胡 半斤 黄芩 三兩 人參 三兩 半夏 半升 甘草 三兩 生姜 三兩

大枣

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

傷寒中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者又傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者又陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者並此方主之

柴胡桂枝湯

柴胡 四兩 桂枝 一兩半 人參 一兩半 半夏 二合半 甘草 二兩 黃芩 二兩 芍藥 一兩半 大枣 六枚 生姜 一兩半

右九味以水七升煮取三升去滓温服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡 半斤 桂枝 三兩 乾姜 二兩 枳實 四兩 黃芩 三兩 牡蠣 二兩

甘草 二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日已發汗而復下之胸脹滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為不解也此方主之

大柴胡湯

柴胡 半斤

黃芩 三兩

半夏 半升

芍藥 三兩

枳實 四枚

大黃 二兩

生姜 五兩

大棗 十二枚

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

傷寒發熱汗出不解心下痞鞅嘔吐而下利者又太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡證仍在先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為不解也並此方主之

黃連湯

黃連 三兩

甘草 三兩

乾姜 三兩

人參 三兩

桂枝 三兩

半夏 半升

大枣

右七味以水一斗煮取六升去滓温服晝三夜二

傷寒胸中有熱胃中邪氣腹中痛欬吐者此方主之

理中湯

人参

白朮

甘草炙

乾姜

右四味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

腹滿吐食不下自利益甚時腹自痛不渴者屬太陰以其臟有寒故也當温

之此方主之

乾姜黃連黃芩人参湯

乾姜

黃連

黃芩

人参各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温服

傷寒水寒^自下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐者此方主之

厚朴生姜半夏甘草人参湯

厚朴半斤

生姜半斤

半夏半斤

甘草二兩

人参二兩

右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服

發汗後腹脹滿者此方主之

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也此方主之大實病者加大

黃六兩

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓温服

一升日三服

少陰病始得之反發熱脈沈者此方主之

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩

附子一枚

甘草二兩

右三味以水七升先煮麻黃二兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升

少陰病得之二三日用此方微發汗以三日無裏證故微發汗也

附子湯

附子二枚去皮 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二日口中和其背惡寒者當灸之此方主之又少陰病身體痛手足寒骨節痛沈脈者亦主之

四逆湯

甘草二兩 乾姜二兩半 附子一枚生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾姜三兩少陰病脈沈者急溫之宜此方又少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦有寒不能制水故令色白也若膈上有寒飲乾吐者當溫之宜此方

白通湯

葱白四莖 乾姜二兩 附子一枚生用

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利者此方主之

白通加猪胆汁湯

葱心四茎

乾姜二兩

附子一枚生用

人尿五合

猪胆汁五合

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者此方主之服湯脉暴出者死微續者生

真武湯

茯苓三兩

芍藥三兩

生姜三兩

白朮二兩

附子一枚炮

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為水氣其人或咳或小便不利或下利或嘔者又太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者並主之

吳茱萸湯

吳茱萸一升

人參三兩

生姜二兩

大棗十二枚

右四味以水七升煮取三升温服七合日三服

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者又厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者人食穀欲嘔屬陽明並此方主之

四逆散

甘草^炙 枳實^炙 柴胡 芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

少陰四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者此方主之

黃連阿膠湯

黃連^{四兩} 黃芩^{二兩} 芍藥^{二兩} 雞黃^{二枚} 阿膠^{三兩}

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得温服七合日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者此方主之

甘草湯

甘草^{二兩}

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七合日二服

桔梗湯

桔梗 二兩 甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病二三日咽痛者此二方主之

半夏散

半夏 桂枝 甘草 炙各等分

右三味各別搗篩已合治之以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煮三沸下

火令少冷少嘔之

苦酒湯

半夏 洗破如棗核大十四枚 雞子 一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓

少嘔之不差作三劑

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者此方主之

桃花湯

赤脂 一斤 一半生用 一半節用 乾姜 一兩 糯米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合內赤石脂末方寸匕日三服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者此方主之

烏梅丸

烏梅 三百枚 細辛 六兩 乾姜 十兩 黃連 十兩 當歸 四兩 附子 六兩
桂枝 六兩 人參 六兩 黃柏 六兩

中寒

五積散 和劑

當歸 川芎 芍藥 蒼朮 厚朴 陳皮 茯苓
半夏 白芷 枳殼 桔梗 乾姜 肉桂 麻黃
甘草 生姜

寒中厥陰頭痛惡寒發熱身痛拘急腹痛吐膈腹疼痛者主之

附子理中湯 活人

附子

白朮

人參

甘草

乾姜

寒中太陰腹痛吐泄四肢厥冷者此方主之

四逆加人參湯

寒中少陰厥冷冷汗出脈微欲絕者此方主之

人參吳茱萸湯

寒中三陰吐利厥逆煩躁脈微欲死者

附子粳米湯

病如附子理中證吐利腹痛與附子理中及益吐者其人素有肥氣也此方則立効

參附湯

中寒元陽虛脫危在頃刻者此方主之

中風

三生飲 和劑

卒中昏倒不知人事口眼喎斜半身不遂痰氣上壅脈浮盛或伏者主之

南星 三錢

川烏

附子 各錢

木香 五分

生姜 水煎

通頂散

初中風不知人事口噤不能開用此藥一字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治

藜蘆

甘艸 生

川芎

細辛

人參 各錢

石膏 五錢

共為末

如倉卒不備用生半夏末吹入鼻中亦得吹法男左女右

稀涎散

初中風暴仆痰涎湧盛此藥與之頻吐涎沫塞壅少疏續進他藥

猪皂四條去 白礬兩 共為末每進三字水下

攝生飲

一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此

南星製 木香 蒼朮 細辛 生甘 菖蒲各錢 半夏

右水煎加生姜七片乘熱調蘓合香丸半丸灌下痰盛加全蝎二枚 寒阻關竅可

用蘓合香丸 熱阻關竅可牛黃清心丸初中風喉中痰涎壅塞水飲難通

非香竅不能開竅此二藥主之

小續命湯錄驗

初中不省人事神氣潰亂半身不遂筋急拘攣口眼喎斜言語蹇澀

六經中風此藥主之 正傳云金匱載古今錄驗本方有石羔當歸無附子防已防風
北山先生云羔歸固不可無千金方之附其離亦不可缺也

麻黃 人參 黃芩 芍藥 川芎 甘草 杏仁 防已

桂枝 防風各錢 附子券 生姜 水煎

烏藥順氣散和劑 風氣攻注四肢骨節疼痛肢體麻木手足癱瘓言語蹇澀筋脈拘攣者

主之

乾姜 陳皮各錢 強蚕五分 麻黃 川芎 白芷 桔梗各錢 甘草三分

枳殼一錢 姜東水煎

八味順氣散

濟生

中風正氣虛痰涎壅盛者主之

即錢氏異功散加烏藥白芷青皮

順風勻氣散

中風半身不遂口眼喎邪者主之

白朮

烏藥

人參

天麻

白芷

紫蘇

木瓜

青皮

沈香

甘草

生姜

牽正散

中風口眼喎邪無熱症者主之

白附

姜蚕

全蝎

候氏黑散

金匱

大風四肢煩重心中惡寒不足者主之

菊花四分

細辛三分

茯苓三分

牡蠣三分

桔梗八分

防風十分

人參三分

礬石三分

黃芩三分

當歸三分

芎藭三分

桂枝三分

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服初服二十日用溫酒調服禁一切膏肉大蒜
常宜冷食六日止即藥積在腹中不下也熟食藥即下冷食自能助藥力

風引湯

除熱癰癩蓋風者外司厥陰內屬風木中見少陽相火風火並發必害
中土四肢不用聚液成痰癰換者主之

大黃 乾姜 龍骨各四兩 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二兩 滑石

石膏 寒水石 赤石脂 白石脂 紫石英

右十二味杵為散以韋囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸溫服一升

神仙解語湯薛氏 風中心脾舌強不語半身不遂或角弓反張者主之

天麻 杏仁 附子 防風 肉桂 羚羊銜 羌活 甘草各五分

水煎入竹瀝調服

導痰湯濟生 中風痰飲語澆頭目眩暈或胸膈流飲痞塞不通者主之

半夏四兩 南星 陳皮 茯苓各兩 枳實同上 甘草半兩 生姜
水煎

竹茹溫膽湯三兩 中風言語不出其人面赤如粧狂躁煩擾不安者主之

陳皮 枳實 茯苓各兩 竹茹二兩 半夏半兩 甘草五分 生姜

黃耆防風湯許氏 中風不能言脈沈而口噤者主之

黃耆 防風 造煎湯數十解置于床下蒸之

星附散 中風能言口不歪而手足躄曳者此風虛寒痰阻過脾中陽氣不得周行

也此方主之

南星 半夏各製 茯苓 強蚕 川烏去皮 人參 附子 白附子

水二盞前以八分食遠熱服得汗瘥

千金三黃湯

中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經不欲飲食者主之

麻黃五分 獨活二分 細辛二分 黃耆二分 黃芩二分

右五味以水六升煮取三升分溫三服一服小汗二服大汗氣逆加人參三分悸加牡蠣三分湯加括萎根三分先有寒加附子一枚

二丹丸

風邪健忘者心神一虛百骸無主風邪擾亂故用此方安神益虛養血清熱息風得安睡

丹參 熟地 天冬 辰砂 人參 菖蒲 遠志 茯神

麥冬 甘草各二兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服五十九至百丸空心食前服

祛風定志湯

心虛驚悸不能言者主之

防風 杏仁 人參 當歸 遠志 陳皮 菖蒲 羌活

南星 甘草 生姜

水二鍾煎八分

三化湯

中風九竅俱閉唇緩舌強者主之

即小承氣湯加羌活

北山先生云宜去羌活加秦艽防風

參歸三聖散

中風左半身癱瘓口目左喎此風中血脈也此方主之

當歸 肉桂 人參

右水二鍾煎一鍾

瀉青丸 賈鑑

中風發熱不能安卧者主之

龍胆 川芎 梔子 當歸 大黃 羌活 防風

右為細末煉蜜丸

活絡丹 和劑

中風手足不用日久不痊者經絡中有濕痰死血此方主之

胆南星 川烏 草烏 二味炮去皮 地龍 乳香 去油 沒藥 各二兩三錢

右細末和勻酒糊丸如梧子大每服二十丸空心日干冷酒或煎茶下

改容膏

中風口眼喎邪在左以此膏傳其右喎僻在右以此膏傳其左

蓖麻_{二兩} 水斤_{三分} 共搗為膏寒月加桂枝

四君子湯 中風因氣虛得之半身不遂者主之

本方加竹瀝姜汁

回物湯 中風因瘀血得之半身不遂者主之

本方加桃仁紅花竹瀝姜汁

地黃飲子 中風舌瘖不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰風痺

熟地 巴戟 史肉 茯苓 附子 肉桂 石斛 茯苓 五味

菖蒲 遠志 麦冬_{一分} 生姜 枣子 薄荷 水煎

防風通聖散 風熱壅盛表裏三焦皆實者主之

防風 川芎 當歸 芍藥 麻黃 大黃 芒硝 連翹
薄荷_{各畧} 梔子 桔梗 石膏 黃芩_煨 白朮 滑石_{四分} 甘草_{一錢}
生姜水煎

補中益氣湯 中風氣虛遺溺及甦后清氣下陷者主之

厥證

六君子湯

暴死口噤吐沫身體溫暖脈來虛大者中風暴死也此方主之

本方倍加天麻

附子理中湯

腹痛額頭黎黑手足攣引脈來沈下無氣以息者中寒暴死也此方主之

生麻散

人本陰虛復遇暑暈飢困暴仆昏絕者此方主之

本方加香薷

四君子湯

暴死有痰聲者名曰痰厥此方主之

獨參湯

行立之間暴眩仆絕喉無痰聲身無邪熱者陰虛陽暴絕非此不能救

五磨飲子

暴怒暴死者名曰氣厥此方主之

木香

沉香

檳榔

枳殼

烏藥

右枳殼湯磨服

二十四味流氣飲和蘇合香丸

尸厥破陰絕陽取靜如死此方主之

蒲黃湯

內經曰大怒則氣絕而血菀于上使人薄厥此方主之

蒲黃

兩炒 清酒 十盞 湯法 褐色 之溫服

大補丸

陰氣衰於下足下熱循陰股而上者名曰熱厥宜此方

黃柏

炒褐色

右為末水丸用四物湯送下

八味順氣散

七情拂鬱令人手足厥冷者此方主之兼有眩運脈不流利者加半夏

天麻

火醋薰鼻法

凡感冒穢瘴毒暴絕者名曰中惡不治即先用此方甦後用藿香正氣散

中寒

五積散 和劑

寒中厥陰頭痛惡寒發熱身痛拘急腹痛嘔吐臍腹疼痛者主之

當歸

川芎

芍藥

蒼朮

厚朴

陳皮

茯苓

白芷

半夏

枳殼

桔梗

乾姜

肉桂

麻黃

甘草

生姜

大棗

水煎

附子理中湯 治寒中太陰腹痛吐瀉四肢厥冷脈沈微者主之

乾姜

人參

白朮

附子

甘草

右水煎

四逆加人參湯

寒中少陰厥冷汗出脈微欲絕者主之

人參吳茱萸湯

寒中三陰吐利厥逆煩躁脈微欲死者主之

附子粳米湯

病如附子理中證吐利腹痛與理中反益甚嘔而不納藥者以其素有

肥氣故與此方則得安

人參附子湯

中寒元陽虛脫危在須臾此方主之

瘟疫

人參敗毒散

瘟疫惡寒發熱頭痛身疼有汗脈浮數者主之

羌活

獨活

前胡

枳殼

茯苓

柴胡

川芎

桔梗

人參

薄荷

甘草

生姜

水煎

九味羌活湯

瘟疫惡寒發熱頭痛身疼無汗脈實數者主之

羌活

黃芩

生地

川芎

防風

細辛

白芷

蒼朮

甘草

生姜

大棗

水煎

防風通聖散宣

瘟疫表裏俱實者主之

頭痛發熱身疼者表熱也煩悶燥渴小便黃赤大便難者裏熱也

加味益氣湯回

瘟疫惡寒發熱頭痛腰肢煩疼懶語嗜卧唇口乾燥脈浮大而虛者主之

即補中益氣湯加羌活防風黃柏

柴胡桂枝湯

瘟疫惡寒發熱頭痛汗出唇乾肢腹拘急惡食脈弦數者主之

當歸補血湯

瘟疫發熱煩渴引脈洪大而重按全無者主之

黃芩八物湯

瘟疫七八日不解發熱自汗盜汗身體疼重言語聲重初雖語漸謔語朝輕午後轉煩熱唇口乾燥舌上生白胎耳鳴耳聾小便赤濁或澀滯如淋大便

秘而不通或微澀而不多精神虛耗不欲飲食脈浮大而弱或虛數者主之

即八物湯加黃芩陳皮麥冬五味

人參養榮湯

前症汗出太甚面黃肌瘦筋惕肉瞤不能睡卧腹中雷鳴者後必下

血色如豚肝臭不可聞此為危候汗出不止加附子已見血者加阿膠

獨參湯

前症下血元氣大脫者急用此救稍緩則不可救也

桂枝加龍骨牡蠣湯加麥冬五味

前症服滋補潤劑反痞滿嘔逆者主之

陶氏理中湯 六書

瘟疫發熱口渴腹痛大便下利不能飲食者主之

即錢氏異功散加肉桂芍藥陳壁土黑姜

胃關煎 張景岳

瘟疫發熱汗多津液枯涸腹痛大便下利者主之

竹葉石膏湯 傷

瘟疫熱盛心煩燥渴吐逆欬吐脈滑實者先與之徹其熱必不用

溫經益元湯 六書

瘟疫汗多已陽筋惕肉瞤躁而不煩不能言語者主之

附子

人參

白朮

當歸

黃耆

甘草

芍藥

生地

茯苓

陳皮

肉桂

生姜

大棗

水煎

附子湯 傷

瘟疫發熱而煩口渴欲飲水蒸氣大熱汗出頓解復二日而發熱大煩汗出頓

解如前此非病解乃厥熱勝復也此方主之

真武湯 傷

前症小便不利大便下利者主之

歸芍六君子湯 汪

瘟疫症減大半仍未能食者主之

即六君子湯加當歸芍藥

蕙圃每治此症加麥冬五味黑姜砂其功更奇

歸芍溫膽湯 汪

瘟疫已差復發熱虛煩不得安睡得食欬嘔者主之

即溫膽湯加當歸芍藥

蕙圃每治此症加麥冬杏仁遠志粳米

犀角地黄湯千金 過食肉麪熱酒膏粱熱鬱迫死血於上面赤身熱譫語者主之

時毒疫癘

升麻鱉甲湯金匱 陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治此方主之

升麻二兩 當歸二兩 蜀椒二兩炒出汗 甘草二兩 鱉甲手學字大一斤炙 雄黃半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之老少再服取汗

前方太雄椒方全 陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治此方主之

即升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒

葶藶湯千金 風溫憎寒壯熱頭疼身痛渴面腫脉陰陽俱浮者主之

姜蕤二錢半 麻黃 白微 青木香 羌活 杏仁 川芎 甘草各五分
石膏 菊花各二錢五分 水煎

漏蘆湯

痲癩積熱時生疣瘡結毒面腫咽塞者主之 倍稱流注

漏蘆 升麻 大黃 藍葉 黃芩 玄參 連翹 大力

桔梗各等分 甘草減半 水煎大便結者加芫硝

五香麻黃湯全 四時傷寒忽發腫或著四肢或在胸背虛腫浮如吹狀亦著頭面

唇口頸項劇者偏着脚脛外如軸大而痛不赤著四肢者乃致不

逐悉至之

麻黃 防風 獨活 秦艽 姜蕤 甘草各三兩 白微 枳實略

麝香半兩 薰陸 丁香各一兩 沈香 木香各三兩

右十三味以水九升煮取三升分三服覆取汗外摩防已膏

防已膏

防已二升 茵芋五兩

右二味以酒九升漬一宿猪膏四升煎三三下膏成太手摩千遍差

麻黃湯後方

發腫三日外與五香麻黃湯不差脈勢仍數者即氣猶在經絡未入臟腑

桂枝

黃芩

甘草

各兩

升麻

葛根

生姜

各兩

芍藥

石膏

梔子

三枚

右九味以水九升煮取三升七分三服相去十里久若前兩服即得汗者停后服不得

汗者更進一服得汗者即止不得汗者明日去梔子加麻黃三兩足水二升再依方服

葛根橘皮湯

葛根溫毒肌肉斑疹如錦文而咳心悶但嘔有清汁者主之

葛根

橘皮

杏仁

知母

麻黃

黃芩

甘草

水煎

調中湯

先傷暑次食冷物併卧涼處內外皆寒火浮遊於表而發斑者主之

芍藥

桔梗

半夏

白芷

枳殼

羌活

各兩

川芎

麻黃

桂枝

各三分

水煎

夾暑者加香薷扁豆

玄參升麻湯

玄參發斑咽痛

玄參

升麻

甘草

水煎

陽毒升麻湯

陽毒發斑頭項背痛狂躁罵詈咽腫吐血者主之

升麻

甘草

犀角

射干

黃芩

人參

水煎

消斑青黛飲

傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽毒發斑者主之

青黛

黃連

犀角

石膏

知母

玄參

梔子

生地

柴胡

人參

甘草

生姜

水煎

化斑湯

胃熱發斑脈浮滑或脈伏者主之

即白虎加參湯

十四味建中湯蘊要陰症發斑胸背手足但稀少而淡紅絕脈微者此方主之

即十全大補湯加茯苓麥冬半夏附子

升麻葛根湯流陽症發斑欲出未出者以此湯升發之已出不可用也

犀角消毒飲和劑

斑疹魚裏症者主之

中暑

香茹飲 和劑

伏暑煩渴口燥咽乾或吐瀉熱盛者主之

香茹

厚朴

扁豆

茯苓

生脉散 醫錄

補心肺滋腎陰

麦冬

人参

五味

清暑三氣湯 脾胃 長夏濕熱蒸人四肢倦怠精神短少口渴而煩大便或溏小便短赤者主之

人参

白朮

陳皮 各五分

黃柏 三分

神麩 五分

澤瀉 五分

當歸 三分

青皮 分

麦冬 三分

葛根 二分

五味 九粒

黃耆

蒼朮

升麻 各錢

甘草 三分

水煎

清熱滲濕湯

夏月濕熱痿困煩渴泄瀉溺赤者主之

黃柏

蒼朮

茯苓

澤瀉

甘草

竹葉

黃連

水煎

六和湯 醫察

暑傷心脾霍亂轉筋吐瀉寒熱痞嗽痰喘頭目昏痛煩渴小便赤黃者主之

半夏

砂仁

杏仁

人参

扁豆

茯苓

木瓜

香薷

藿香

厚朴

生姜

大枣

益元散 宣明

中暑煩渴引飲小便赤澀者主之

滑石 甘草

二香湯和劑 夏月感冒頭痛瀉利肚腹不快者主之

香茹 扁豆 厚朴 黃連 腹皮 半夏 陳皮 桔梗

茯苓 蒼朮 白芷 甘草 生姜 水煎

白虎加參湯 夏月中暍煩渴引飲自汗大熱者主之

桂苓甘露飲儒門 夏月引飲過多小便不利濕熱為患者

肉桂 人參 藿香各半 茯苓 白朮 甘草 葛根 澤瀉

石膏各 滑石二兩 寒水石 木香一分

右為細末每三錢白湯點下新水或生姜湯宜隨症用

大順散和劑 夏月引飲過多脾胃受濕清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐者主之

甘草炙 乾姜炮 杏仁 肉桂各等分

右水一中盞煎七分溫服

中湿

除湿汤 準繩

中湿身重宜熱腰脚酸痛大便泄瀉或逼迫而不通小便或淡或利其人如昏
或周身浮腫肌肉如泥脉沈細或沈緩者主之

即不換金正氣散加白朮茯苓

不換金正氣散 直格

受山嵐瘴氣及出遠方不服水土寒熱吐瀉腹痛者主之

蒼朮

厚朴

陳皮

半夏

藿香

甘草

生姜

大棗

水煎

腎着湯 金匱

腎虛傷湿身重腰冷如坐水中形如水形及不渴小便自利飲食如故病屬下
焦身勞汗出衣裏湿冷久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

乾薑

茯苓 各四錢

甘草 各二錢

右以水五升煮三升分溫三服腰中即温

羌活勝湿湯 脾胃

脾胃受湿身重倦怠好卧腰脊痛項強腰似折頭似拔并頭痛者主之

羌活

獨活 各二錢

藁朮

甘草

防風

川芎 各五分

蔓荊 三分

水二盞煎一盞空心食前温服

藿香正氣散和劑中濕頭痛身重寒熱腹滿者主之

陳皮 白朮 半夏 藿香 白芷 桔梗 厚朴 腹皮

茯苓 紫蘇 甘草 生姜 大棗 水煎

麻黃加朮湯金匱風濕相搏一身盡痛關節不利脈浮無汗者主之

即麻黃湯加朮

防己黃耆湯金匱風濕脈浮身重汗出惡風或一身疼痛者主之

防己二兩 甘草半兩 白朮七錢半 黃耆兩分 生姜四片 大棗一枚

右水盞半煎八分溫服良久再服

按煎法恐非張醫聖之意

甘草附子湯金匱

風濕相搏骨節疼痛煩燥痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風

不欲去衣或身微腫者主之

甘草二兩 附子一枚 白朮二兩 桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙

麻黃杏仁薏苡甘草湯金匱

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也此方主之

麻黃^{去節} 甘草^炙 芫花^{半兩} 杏仁^{十枚}

右每服四錢水盪半煮八分溫服有微汗避風

燥症

滋燥養榮湯

皮膚皴揭筋燥爪燥者主之

當歸^{二錢}

生地

熟地

芍藥

秦艽

黃芩^{各錢} 防風^{一錢}

右水煎

大補地黃丸

精血枯涸燥熱者主之

黃柏

熟地^{各四}

當歸

山藥

枸杞^{各三兩}

知母

黃肉

芍藥^{各兩}

生地^{三兩五錢}

茯苓

玄參^{各兩半}

右為細末煉蜜丸如桐子大每服分九空心淡鹽湯送下

東垣潤腸丸

脾胃中伏火大便秘瀆或乾燥閉塞不通全不思食乃風結秘皆令閉塞也此方主之

麻仁另研 桃仁另研 羌活 歸尾 大黃煨各半兩 皂仁 秦艽各五錢

右陳別研外為細末五上火煉蜜丸如桐子大每三五十九食前白湯下

潤燥丸

主治全前

前方加郁李防風

清燥救肺湯法律 諸氣膈鬱 諸痿喘嘔並主之

桑葉經霜不凋者三錢 石膏煨二錢五分 甘草一錢 人參七分 阿膠八分 胡麻炒研 麥冬一錢二分

杏仁炒黃七分 枇杷一斤去毛

右水一碗煎六分頻二三滾熱湯服痰多加貝母瓜蒌血枯加生地熟甚加犀角羚羊

生血潤膚飲正傳

體瘦血弱之入值燥金太過皮膚折裂手足枯燥撥之屑起血出痛楚十指甲厚及而莫能撥痒者主之

當歸 生地 熟地 黃耆 各錢 天冬二錢半 麥冬二錢 五味九粒

黃芩^{酒五分} 瓜蒌^{五分} 升麻^{二分} 紅花^{一分} 水煎溫服如大便結燥加麻仁柳李各錢
三和飲^{友松} 血弱之人傷燥身枯燥搔之則生小紅點如癩嘔有苦汗喜太息心腹痛不能及

側啞乾面塵身無膏澤等證加減主之

芍藥^{二兩} 黃耆 熟地 當歸 川芎各錢 甘草炙 肉桂各錢

柴胡^{酒二分} 黃芩^{酒二分} 花粉 人參^{隨宜} 煎如東垣法初加防風澤蘭以行表後併

去柴芩以和中

諸火

導赤散^{錢氏} 心經溫熱小便黃赤口糜者主之

生地 木通 甘草等分 竹葉 水煎

三黃瀉心湯^{金櫃} 心膈實熱狂燥面赤者主之

黃芩 黃連 大黃^{酒潤等分} 水煎

左金丸^{丹溪} 肝藏火實左勝作痛者主之

黃連^高 吳萸^{一兩鹽水浸} 神麴 三味為丸

當歸龍薈丸錢氏 風熱蓄積時發驚悸筋惕搐搦頭目昏眩肌肉癢胸膈不利腸熱燥澀
躁擾狂越罵詈驚駭諸火熱證主之

當歸 龍胆 梔子 黃連 黃柏 黃芩各兩 木香一錢 麝香五分

大黃 青黛 蘆薈各錢 煉蜜丸如小豆大每服三十粒生薑湯下

瀉脾散錢氏 脾家伏火唇口乾燥者主之

藿香二錢 梔子二兩 石膏五錢 甘草三兩 防風高

右全蜜酒微炒香為末每服二錢水一盞煎五分溫服

黃芩湯四春

肺火咳嗽吐血咽喉腫痛乾燥或鼻乾生瘡鼻腫痛者主之

黃芩 山梔 桔梗 芍藥 桑皮 菴芥 薄荷 麥冬

連翹 水煎

滋腎丸蘭室

膏梁積熱損傷致膀胱久而乾涸小便不化大便逆上而為嘔噦者主之

黃柏 知母各兩 肉桂錢 熟水為丸如芡實大每服二百丸熟水下

黃連解毒湯漢

三焦實火內外皆熱煩渴小便赤大便結舌生瘡者主之

黃芩 連翹 黃連 山梔 黃柏 水煎

涼膈散 宣明

火鬱上焦大熱面赤者主之

黃芩 酒炒

山梔

薄荷 各兩

連翹 兩

大黃 酒浸

芒硝

甘草 各三兩

右每服一兩水鍾竹葉三十斤同煎七分入生蜜少許食後溫服加黃五錢名清心湯

珍珠散 和劑

男婦小兒五臟積熱心胸悶亂口乾舌燥精神恍惚顛狂等症主之

琥珀

珍珠

鉄粉

花粉

硃砂

寒石

牙硝

大黃 酒浸

生甘 各等分 各別為末用竹葉湯調下一錢

抽薪飲 景岳

諸凡火熾盛而不宜補者主之

黃芩

石斛

木通

山梔

黃柏 各二錢

枳殼 錢半

澤瀉 全上

甘草 三分

服藥煎 景岳

此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大奇

生地

麥冬

芍藥

菖蒲

石解

丹皮

茯神 各三錢

陳皮 一錢

木通

知母 錢半

水煎食遠服

升陽散火湯 脾胃

肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燎捫之烙手者主之

柴胡 防風 葛根 升麻 羌活 人參 芍藥 甘草

生甘 生姜 大枣 水煎

綠豆飲 景岳 凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者主之

綠豆 不拘多少 寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可也待水冷或厚或稀或湯任意用

雪梨漿 全 解煩熱退陰火生津止渴之妙劑也

甘梨 削去皮薄切 用清冷甘泉一碗浸少頃水必甘美但頻飲其水勿食其粗

內傷

補中益氣湯 脾胃 取神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈洪大而虛或虛微無力頭痛惡寒而渴自汗氣高而喘者主之

人參 黃耆 當歸 脾胃用 白朮 陳皮 升麻 柴胡 甘草

生姜 水煎

調中益氣湯 全 脾胃不調腸鳴飧泄腹中急迫或彭脹氣弱汗出不思飲食嗜卧者主之

黃耆 人參 蒼朮 陳皮 升麻 柴胡 黃柏 甘草

生姜 水煎

參朮益胃湯 內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃者主之

即前方倍蒼朮加半夏黃芩益智

節濟補氣湯 勞倦辛苦用心太過生內傷發熱之病者主之

人參 白朮 陳皮 麥冬 五味 黃耆 生姜 大棗

飲食傷

行氣香薷散言 內傷生冷飲食厚味堅硬物肚腹脹滿疼痛惡寒發熱者主之

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎 羌活 枳殼 甘草

麻黃 生姜 水煎

香砂平胃散和劑 過飧膏粱滋味脾土生濕肚腹不快者主之

香附 砂仁 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 生姜 水煎

香砂養胃湯醫 脾胃虛弱易傷飲食或不能食痞滿不伸者主之

香附 蒼朮 厚朴 茯苓 陳皮 白朮 白朮 甘草
砂仁 人參 木香 生姜 水煎

葛花解醒湯 脾胃 飲酒太過嘔吐頭昏目暈小便不利者主之

即四苓散加葛花陳皮木香青皮白朮砂仁神麴乾姜

保和丸 食積停飲腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯惡食者主之

山楂 神麴 茯苓 半夏 陳皮 萊菔 連翹 為丸

治中湯 飲食生冷身受寒氣腹痛吐瀉者主之

乾姜 白朮 陳皮 人參 青皮 甘草 生姜 水煎

附子理中湯 飲食傷太陰腹痛已吐且瀉手足厥冷自汗脈微欲絕者主之

人參四逆湯 前證吐利甚而不止自汗厥逆脈脫者主之得湯益嘔不能納者宜附子粳米湯

三因吐法 欲吐不得吐欲瀉不瀉腹中大痛者主之

燒鹽 十四 熱飲 十五 三飲而三吐

大黃備急丸 金匱 心腹卒痛如錐刺氣急口噤停展卒死者主之

大黃 巴豆 去皮膜 乾姜 各等分

右藥各須精新光搗大黃乾姜為末研巴豆內中合搗為散蜜丸亦佳密卷中貯之勿令見風暖水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌下咽須臾啞差若不差更與三丸腹中鳴即吐下便差若口噤須折齒灌之

枳實大黃湯四春 食積腹滿疼痛屬大實者主之

即小承氣湯加枳柳木香甘草

厚朴七物湯全樞 宿食冷熱不調腹滿或痛者主之

諸鬱

六鬱湯丹溪

總治六鬱

香附 蒼朮 山梔 川芎 甘草 神麴 茯苓 砂仁

半夏 水煎

氣鬱胸脘痛脈滿 加烏藥木香枳柳紫蘘乾姜

濕鬱周身走痛或關節痛遇陰雨則發脈沈細 加白朮

痰鬱動則喘寸口脈沈滑 加南星枳壳皂角

血鬱四肢無力能食便紅脉沈瀟 加桃仁紅花丹皮

食鬱噎酸腹飽不能食氣口麻緊盛 加山查麦芽神麩

熱鬱目蒙口渴舌燥小便淋濁脉沈數 加黃連梔子連翹

歸脾湯 薛氏

鬱病已久脾虛心弱者多服久服必有奇功

溫膽湯

鬱結在脾半年不食午後發熱煩悶口渴亦喜暗處困卧如癡婦人經水極少男

子小便小便點滴昏憂思氣結此方加減王之

北山先生曰時維承平王法森嚴人守己個習業君子則遠慮小人亦不敢放肆所

以鬱症多於他病雖患酒食陰虛亦從鬱症而成疹矣當今之貴人貴婦以及高賈

死於鬱症者極多臨症須體察可以為世之大醫也

痰飲

小半夏加茯苓湯金匱病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者悸微者短氣是為飲家先渴後
嘔者主之又卒吐心下痞膈間有水眩悸者者主之

半夏二升 生姜半斤 茯苓三兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

小半夏湯金匱

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也此方主之

即前方去茯苓餘依前法

五苓散金匱

假令病人臍下有悸吐涎沫而顛眩此水也此方主之

桂苓味甘湯金匱

短氣有微飲當從小便去之呼之氣短者主之吸之氣短者腎氣圓主之

甘遂半夏湯金匱

病者脈伏其人欲自利此為留飲欲去故也雖利心下續堅滿者主之

甘遂大者三枚 半夏十二枚以水半升煮取半升去滓 芍藥五枚 甘草如指大一枚

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎八合頓服之

六君子湯

痰飲其人素盛今瘦水走腸間漚漚有聲者主之

本方加澤瀉黃連乾姜 心下極冷者桂苓味甘湯主之

桂苓木甘湯

心下有痞飲胸脹支滿目眩者主之

已椒藶黃圓金櫃

痰飲滿口舌乾燥此腸間有水氣此方主之

防己

蜀椒目

葶藶煮

大黃各二兩

右四味末之蜜凡如梧子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半兩

十棗湯全

懸飲飲後水流在臍下咳吐引痛脈沈而弦者主之

小青龍湯

溢飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重有熱者主之

按溢飲有寒者小青龍湯有熱者大青龍湯

葶藶芩連湯全

支飲咳逆倚息氣短不得卧其形如腫支飲不得息者主之

木防己湯全

胸間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沈緊得之數十日醫吐下之不差者

主之

防己三兩

石膏十二枚

桂枝二兩

人參二兩

右四味以水六升煮取二升分溫服虛者即差實者三日復發復與此方不差者去石膏加

茯苓四兩芒硝三合主之

澤瀉湯全

心下有支飲其人苦冒眩者主之

澤瀉去心 白朮二兩

右二味以二升煮取一升分溫再服

十棗湯

支飲家咳煩胸中痛者不卒死至一百日或一歲又咳家其脉弦為有水並主之

旋覆花散法律

心胸疼熱頭目旋痛飲食不下者主之

旋覆花

甘草各半兩

枳殼

石膏各兩

赤茯苓

麥冬

柴胡

人參各兩

犀角

防風

黃芩

生姜

水煎

金匱云夫心下有留飲其人背寒冷如掌大留飲者腹下痛引缺盆咳嗽則轉甚胸

控涎丹三兩

中有留飲其人短氣而喘有四肢歷節痛此明辨留飲證而無治方三因控涎丹似近其治

痰涎留在胸膈上下變為諸病或頸項胸背腰肢手足膝臂隱痛不可及筋骨牽引鈞

痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又頭痛不可舉

或睡中流涎或咳唾喘急或痰迷心竅並宜此藥散服痰涎自失諸尋愈心

甘遂去心

大戟去皮

白芥各等分

右三味為末薑汁打麪糊為丸梧子大每服七丸或三丸以津液咽下若欲取刺服五丸

金匱云膈上病痰滿喘咳吐痰則寒熱背疼腰痛目泣自出其人振身潤劇必有伏

欽此明辨伏飲在膈上而無治方李士材立倍木丸主之愚以為恐不至當名醫錄久喘良

方似近其治

久喘良方名

久喘肺分有積痰結氣者主之

青皮一枚

巴豆一箇

右使青皮展開去穰入巴豆將麻線繫定火上燒盡烟留性為末生姜汁和酒大呷服之

茯苓飲分量

脾弱胃寒生飲病者主之

即錢氏異功散加枳實乾姜木香

二陳湯和劑

痰飲脾濕為病變生諸症脈滑不勻者此方主之

陳皮

半夏各五兩

茯苓三兩

甘草二兩

生姜七片

烏梅一箇

水煎

瓜蒌枳實湯四春

痰結吐咯不出胸膈為痛不能轉側寒熱氣急者主之

當歸

砂仁

木香

山梔

黃芩

陳皮

瓜蒌

桔梗

枳殼

茯苓

貝母

生姜

竹瀝

水煎

痰迷心竅不能言語或

手足不隨其症彷彿中風但其初病不卒倒為異本方加菖蒲遠志去木香主之

清濕化痰湯四春

濕痰為病遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不

仁或背心點加水冷者主之

南星

半夏

陳皮

茯苓

蒼朮

羌活

黃芩

白芷

白芥

木香

甘草

竹瀝

薑汁

水煎

清氣化痰湯

熱痰者主之

陳皮

枳實

半夏

南星

杏仁

瓜蒌

黃芩

茯苓

生薑

水煎

補中益氣湯

勞後脾胃氣虛下陷者主之

六君子湯

脾虛胃弱之人不能消滯而生痰者主之

六味地黃丸

腎水虛損即水泛而生痰者主之

八味地黃丸

腎氣虛寒痰上壅者主之

咳嗽

清肺湯

上焦痰盛咳嗽久嗽聲啞或喉生瘡者主之

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 貝母 當歸 杏仁 黃芩 山梔
麥冬 五味 天冬 甘草 水煎

清肺飲

痰濕氣逆而咳嗽者主之

桔梗 茯苓 杏仁 貝母 甘草 五味 陳皮 生姜 水煎

消食化痰湯

飲食生痰胸膈悶五更嗽甚者主之

半夏 南星 神麴 麦芽 陳皮 青皮 杏仁 山楂

蘿蔔 葛根 香附 蘊子 生姜 水煎

金沸草散 和劑

因風咳嗽生痰者主之

前胡 旋覆 各兩 赤芍 甘草 各錢 半夏 五錢 紫菀 兩半 赤茯苓 六錢 生姜
大棗 一枚 水煎冬月加麻黃

杏蘇散

上氣喘嗽面目浮腫者主之

紫蘇 五味 腹皮 烏梅 杏仁 陳皮 桔梗 麻黃

桑皮 阿膠 紫苑 甘草 生姜 水煎

欬冬花散

寒塵相交肺氣不利咳嗽喘滿胸煩鼻塞涕咽壅腫者主之

欬冬 桑皮 知母 貝母 杏仁 半夏 阿膠 麻黃

甘草 生姜 水煎

金水君煎 景岳

肺腎虛寒水之為疾或年過陰虛血氣不足外受風寒咳嗽吐痰多痰喘嗽等證主之

熟地 三錢 當歸 二錢 陳皮 一錢半 半夏 三錢 茯苓 三錢 甘草 一錢 生姜 三片 水煎食遠服

六安煎 全

風寒欬嗽及非風初感痰滯氣逆者主之

即三陳湯加杏仁白芥子

東垣瀉白散

陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐者主之

桑皮 骨皮 茯苓 人參 青皮 陳皮 五味 粳米

甘草 水煎

參朮調中湯

夏月暑傷肺金喘嗽者主之虛甚者生脉散主之

補肺湯 良方

肺虛勞嗽者主之

人參 黃耆 蜜炙 五味 紫苑 各兩 桑皮 蜜炙 熟地 各二兩

右六味每服三錢水二盞煎八分入蜜少許溫服

補肺阿膠散 肺虛有火嗽無津液而氣哽者主之

阿膠 燒鈴 甘草 大力 杏仁 粳米 水煎

百合固金湯 肺傷咽痛咳喘痰血者主之

生地 熟地 麥冬 百合 芍藥 當歸 貝母 玄參

桔梗 生甘 水煎

人參蛤蚧散 海藏 二三年肺氣上喘咳嗽膿血滿面生瘡者主之

人參 三兩 蛤蚧 一對全者河水浸五日後換水洗淨 杏仁 甘草 各五兩 茯苓 知母 炒 桑皮 蜜炙 貝母 三兩

右八味為細末磁器內盛每日熟茶清點服

潤肺湯 魏晉 前傷風寒被藥壞風寒雖去其咳仍在而聲嘶者主之

訶子 五味 五倍 黃芩 生甘 各等分 水煎獨立禪師云加大黃減半其

効異常又無後患

斂肺劫嗽丸 丹溪 咳嗽日久失氣此藥亦宜用

訶子 百藥煎 煎各等分三味為末姜汁入蜜丸如芡實大時時噲化

瓊玉膏並生脈散 咳而失聲誠危症既顯肺絕之兆則急於此方隨宜選用

小柴胡湯 咳而胸膈痛不能轉側而眩暈者 加五味青皮杏仁

黃芩湯 咳而嘔苦水者主之 加生姜半夏

桔梗湯 咳而喉中如梗狀甚則咽喉腫閉者主之

芍藥湯 咳而大便失氣者主之

即芍藥甘草湯

喘急

麻黃湯 三之春初天氣最寒之令喘病屢發者此肺部受寒邪也宜此方

定喘湯 肺虛寒感風寒氣逆膈熱而作哮喘者主之

白朮手投 黃芩炒 杏仁各錢 桑皮二錢 蘇子二錢 甘草一錢 麻黃去節 半夏法製急不備以日草湯泡去滑用

欬冬各三錢 每服三錢煎成徐服無時

蘇沈九寶湯 人素有喘急遇寒暄不常發則不止哮喘不睡者主之

紫蘊 陳皮 薄荷 麻黃 杏仁 桑皮 腹皮 肉桂

甘草 烏梅 生姜 水煎

越婢加半夏湯金匱 漱而喘目張鼻扇脈浮而大者主之

麻黃二兩 石膏半斤 生姜三兩 大棗十枚 甘草二兩 半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

小青龍加石膏湯金匱 前症心下有水者主之

麻黃杏仁石膏甘草湯 咳嗽喘急吐痰胸前高起者主之

附子理中湯 卒然喘急悶絕不知人事手足俱冷脈沈下者主之

蘇子降氣湯和劑 虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽者主之

蘇子五錢 陳皮 厚朴 前胡 肉桂各二錢 當歸三錢 半夏五錢 甘草一錢 大棗二枚

生姜三片 水煎

俞氏降氣湯 虛陽上攻氣不升上盛下虛胸壅痰實喘滿咽膈不利煩渴引飲頭目昏眩腰脚無

力四肢倦怠咳嗽等症主之

即前方加黃芩五加桔梗羌活乾姜附子人參紫蘇

三子養親湯濟世 老人痰嗽氣喘氣逆者主之

白芥研八分 蘇子研 南星各八分 蘿蔔研七分 半夏九分 黃芩 茯苓各八分 陳皮

枳實各五分 甘草二分 生姜 水煎

玉竹飲子晉通 痰火涎壅盛致逆喘滿者主之

薑蘇各三錢 茯苓三錢 甘草 桔梗 陳皮 紫苑各錢 貝母三錢 生姜

白蜜二匕 八味長流水煎入蜜分三服

麥煎散方考 濕熱內淫肺病喘急以致皮毛之氣不充令人盜汗四肢煩疼肌肉消瘦者主之

知母 石膏 人參 茯苓 芍藥 滑石 葶藶 杏仁

骨皮 麻黃根 甘草 共為末浮小麦煎湯調下二錢

五味子湯漢 肺虛作喘脈大或伏者主之

五味二錢 人參 麥冬 杏仁 陳皮各錢半 生姜三片 大棗三枚 水煎

小柴胡湯 壯年男婦及小兒素有喘或因天之寒暄或因七情惱怒起伏不定者主之

本方加陳皮半夏茯苓蘇子桑皮青皮桔梗杏仁

喘四君子湯醫 呼吸短促而無痰聲者名曰短氣此方主之

人參 甘草各錢 茯苓 陳皮 厚朴 砂仁 蘇子 桑皮各六分

當歸八分 白朮錢三分 沉香 木香別研各 生姜三片 大枣三枚 水煎

補中益氣湯

因勞役內傷元氣氣不接續而短氣者主之

人參胡桃湯

肺腎不足虛喘自汗者主之

胡桃去壳不去皮 人參錢 水煎

瘧疾

麻黃羌活湯金鑑

瘧疾先寒後熱寒多熱少無汗者主之

羌活 麻黃 防風 甘草 水煎吧者加半度

桂枝羌活湯全

先寒後熱熱多寒少有汗者主之

桂枝 羌活 芍藥 防風 甘草 水煎吧者加半度

桂麻各半湯傷

瘧疾初起寒相均者主之

白虎湯金鑑

先熱後寒渴甚者主之 汗多者合桂枝湯

柴胡白朮湯 金鑑

陽氣獨盛但熱而不寒者主之

柴胡桂枝湯 全

陰氣獨盛但寒而不熱者主之

草薢柴朮湯

食瘧痞悶噎氣惡食者主之

人參養胃湯 和劑

瘧因飲食肌飽傷胃而發者主之

人參

茯苓

陳皮

半夏

厚朴

蒼朮

藿香

草薢 各八分

烏梅 不

甘草

生姜

大棗

水煎

大柴胡湯

瘧疾有表裏不清便澀腹滿者主之

加厚朴草薢檳榔芒硝

清脾飲 濟生

瘧發時熱多寒少口渴咽乾大便赤澀者主之

青皮

厚朴

白朮

半夏

柴胡

黃芩

茯苓

草薢

甘草 各等分

生姜

水煎

四獸飲 易簡

久患瘧疾散氣俱虛脾胃虛弱不思食者主之

即六君子湯加草薢烏梅

補中益氣湯

瘧疾已久散氣俱虛元氣下陷不思飲食

十全大補湯

瘧疾久病勞損氣血虛者主之 加鱉甲

八物湯

瘧疾氣血俱虛熱盛者主之 加柴胡黃芩陳皮麥冬

小柴胡湯

發過三五次表裏無症當先截瘧藥若不足人宜此方 加常山檳榔烏梅桃仁

右煎成露一宿次日發前三時小濕服惡心糖拌梅肉壓之

獨參湯

老人虛人患瘧者用此截之 若無人參自泉以伐之

不二飲

截有餘之瘧

常山

檳榔

知母

貝母

生姜

煎成入酒少許露一宿臨發日五更溫服午

間查再服

桂麻柴物湯

金鑑

瘧在夜發名曰三陰瘧初熱宜此方

桂枝湯麻黃湯小柴胡湯四物湯四方串合去杏仁加桃仁

七味白朮散

錢氏

瘧久不愈發後食不下渴飲湯倦甚者主之

不換金氣散

濕瘧瘴瘧神治之方也

控涎丹

久瘧腹中成塊癖名曰瘧母取實者非此方則不差也

霍乱

藿香正氣散

霍乱心腹卒痛者主之 暑則吐合香茹飲湿則瀉加蒼朮

鹽湯吐方 三四

乾霍乱不吐不瀉心腹疝痛悶乱欲死者主之

玉泉散 景岳

霍乱因暑而厥但渴而引飲者主之

石膏 六兩

甘草 二兩

為極細末每服二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下

桂苓甘露飲

儒門

霍乱暑熱太甚大渴者主之

烏附理中湯

金鑑

霍乱腹痛吐瀉寒極四肢厥逆自汗脉伏者主之

即理中湯加烏頭附子轉筋加木瓜

錢氏白朮散

霍乱已症吐瀉已定陽氣將復煩渴引飲者主之

本方加烏梅砂仁枳殼乾姜

漿水散 潔古

霍乱吐利通身冷汗不止脉伏或脫者急用救之庶可十全三

附子

乾姜

甘草

肉桂 各五錢

半夏 醋製

良姜 各三錢

右用漿水煎去滓冷服

壹膈胃反

大黃甘草湯金匱 食已即吐者主之

大黃四兩 甘草二兩 以水三升煮取一升分溫再服

附子散衛生 久冷胃反者主之

用姜汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸

茯苓澤瀉湯金匱 胃反吐而渴欲飲水者主之

茯苓半斤 澤瀉四兩 甘草二兩 桂枝三兩 白朮三兩 生姜四兩

右六味以水一斗煮三升內澤瀉再煎取二升半溫服八合日三服

橘皮湯金匱 乾嘔噦若手足厥者主之 此症雖手足厥非陽虛陰盛者此乃氣閉不達於四肢也

橘皮四兩 生姜半斤 以水七升煮取三升溫服一升下咽則愈

調胃承氣湯全 噦而腹滿大便不利者主之

猪苓湯全 噦而腹滿小便不利者主之

瓜姜實湯 噦膈因痰者主之

瓜姜 枳殼 半夏 桔梗 黃連 吳萸 姜汁 水煎

千金七氣湯 深師 因七氣或因飲食為膈氣者主之

乾姜 黃芩 厚朴 花粉 生地 芍藥 各兩 蜀椒 三兩 枳實 五枚

人參 兩 吳萸 各 以水一斗煮取三升分三服日三

人參利膈丸 噎膈便秘壅遏者主之

枳殼 厚朴 大黃 人參 甘草 木香 當歸 桃仁

麻仁 檳榔 藿香 煉蜜為丸

承硫丸 噎膈吐逆不止者主之

承 硫黃 二錢研如墨 老酒姜汁服

金水六君煎 噎膈吐逆不止者主之 此症血枯痰湧不能受納以補陰化痰潤枯降氣則當痊也

本方加青皮白芥枇杷沈香

沈香降氣湯 肝氣上逆膈膜不和食道窄狹食則吐者主之

本方加青皮枳殼木香山查 若咽喉不利有物阻碍者合茯苓杏仁甘草湯

雞沈六君子湯 金鑑 噎膈脾胃虛寒者主之

即六君子湯加丁香沈香

竹茹溫膽湯

胆氣不升痰阻礙中焦飲食屈曲難下者主之

干西味流氣飲

噎膈屬氣滯者主之

八味腎氣圓

噎膈胃及命門火衰津液枯竭者多服則必立效

十全大補湯

氣血虛損陰陽衰弱以致血液枯竭遂成噎膈胃及者主之

按當今之世患噎膈者初因用心太過屬氣血衰耗者十中居七八也醫者視其吐食祇用辛燥之藥強要姑息察其氣血衰耗用滋補峻劑者百中無三也竟至心胸雖痛吐沫不已之死症病者暗蒙其害極多嗟冤矣哉

補中益氣湯

勞役及飲酒過之人清陽不升濁陰不降中氣閉塞遂成噎膈者主之

五汁飲

嘔吐

小半夏湯 全

嘔家不渴者心下有支飲此方主之

大半夏湯 全

胃反嘔吐者主之

半夏

人參

白蜜

猪苓散 全

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者是病不除而有水飲也此方主之

猪苓

茯苓

白朮 各等分

三味杵為散飲服方七日三服

小柴胡湯

嘔而發熱者主之

四逆湯 全

嘔而脈弱小便後利身有微熱見厥者難治此方救之

人參黃連湯 全

嘔而胸滿者主之 乾嘔吐涎沫頭痛者亦主之

半夏瀉心湯 全

嘔而腸鳴心下痞者主之

黃芩加半夏湯 全

乾嘔而利者主之

生姜半夏湯 全

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤然無奈何者主之

半夏 半升

生姜汁 一升

以水三升煮取二升內生姜汁者取一升半小冷四服日三夜一服止

停後服

半夏乾姜散 全覆 乾嘔吐逆吐涎沫者主之

半夏 乾姜 等分 二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之

文蛤湯 全 吐後欲得水而貪飲者兼微風脈緊頭痛此方主之

文蛤 五兩 麻黃 甘草 生姜 各三兩 石膏 五兩 杏仁 五十個 大枣 十二枚

右六味以水六升煮取三升溫服一升汗出即愈

小半夏湯 全 諸嘔吐穀不得下者主之

黃連湯 傷 上熱下寒腹中痛故嘔吐者主之

黃連竹茹湯 四卷 胃熱頭痛嘔吐者主之

陳皮 半夏 茯苓 竹茹 黃連 梔子 麥冬 粳米

烏梅 白朮 芍藥 甘草 生姜 水煎

丁香六均湯 全鑑 脾胃虛寒嘔吐者主之

即六君子湯加丁香吳萸

附子粳米湯 全鑑 腹中寒氣雷鳴切痛胸腹逆滿嘔吐者主之

附子 一枚 半夏 半升 甘草 兩 粳米 半升 大枣 十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

大建中湯金匱

心胸中大寒痛嘔不能食飲腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近者主之

蜀椒三合

去汗

乾姜四兩

人參三兩

三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫

再服如嬰頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

澤瀉湯千金

上焦飲食下胃胃氣不定嘔吐面背身皆熱名云漏氣此方主之

澤瀉

半夏

柴胡

生姜各三錢

肉桂

甘草各三錢

茯苓

骨皮五錢

石膏八錢

竹葉一把

蓴心五錢

水煎溫服日三

麥門冬理中湯全

漏氣上焦熱腹滿不欲飲食則先嘔後瀉身熱痞悶此方主之

麥冬

白朮各五錢

甘草

茯苓各三錢

人參

橘皮

蓴心

薑蕪各三錢

蘆根一握

竹茹雞子大

生姜四錢

陳米一合

水煎溫分日三服

人參湯全

下焦熱氣逆不續嘔逆不禁二便不通名云走哺此方主之

人參

黃芩

知母

姜蕪各三錢

白朮

梔子擘

陳皮

蘆根各三錢

石膏八錢

茯苓三錢

水煎溫服準經多竹茹

此和飲壽世

胃虛嘔吐聞食即嘔聞藥亦嘔者主之

人參 白朮 茯苓 神麴各錢 藿香五分 陳皮五分 砂仁五分 甘草三分

陳米一撮 伏龍 水煎 一方加生姜大棗

順氣和中湯全 嘔吐翻胃噎膈吞酸痞悶噯氣心腹刺痛惡心吐痰水者主之

即香砂六君子湯 加梔子 姜連 神麴 枳實

人參安胃散 脾胃虛熱口舌糜爛煩渴吐者者主之

黃耆 人參 白朮 茯苓 芍藥 陳皮 黃連 甘草生

甘草炙 水煎

輪迴酒入門 舟暈嘔吐不止者甚危非此方不可救也

自己小便 不拘多少呷之吐止勿服

泄瀉

胃苓湯回春

脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分者主之

即平胃散五苓散合方

陶氏理中湯

腹中虛寒腹痛泄瀉外有微熱者主之

即錢氏異功散加肉桂芍藥黑姜陳壁土

調中益氣湯

脾胃不調腸鳴飧泄氣弱自汗者主之

參朮白朮散

脾胃虛弱飲食不進多困力中滿痞塞心忪氣喘吐泄瀉者主之

人參

白朮

茯苓

山藥

甘草各兩

扁豆二兩

蓮肉

桔梗

薑朮

砂仁各兩

為細末每服二錢大棗湯調下

通脈四逆湯

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之此症誤汗汗出必脹滿

小承氣湯

下利謔語者有燥屎也此方主之此症亦有虛者但脈滑數其利穢粘知有宿食積熱也

然必脈症如此始可知有燥屎也

胃關煎

脾胃虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等症主之

熟地三五錢

山藥二錢

扁豆二錢

甘草二錢

黑姜二三錢

吳萸五七錢

白朮二三錢

木煎食遠服

伏蘭煎景岳

生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒濕安脾胃此胃關煎之佐者也

厚朴一錢 陳皮一錢 山藥二錢 扁豆二錢 甘草七分 稻卷二錢 澤瀉二錢 焦姜三錢

水煎

二木煎全

肝強脾弱氣泄濕泄等症主之

白木二錢或 蒼木二錢 芍藥一錢 陳皮一錢 甘草一錢 茯苓二錢 厚朴一錢 木香七分

焦姜二錢 澤瀉一錢 水煎食遠服

八柱散

腸胃虛寒滑泄不禁者主之

即附子理中湯加肉蓯訶子粟殼

魏氏豆蔻丸心鑑

腸胃虛滑濕補固瀉之藥無効驗者用此立止

錢氏白朮散直訣

脾胃虛弱吐瀉發熱咽乾口渴者主之

人參 白朮 茯苓各一分 葛根一錢 藿香 木香 甘草各一分 水煎

除濕防風湯脾胃

泄瀉頭痛者主之

蒼朮一錢 防風二錢 白朮 茯苓 芍藥各二錢 水煎

雲林白朮散回春

虛瀉飲食不化脈微弱者主之

人參 白朮 茯苓 砂仁 山藥 藿香 陳皮 乾姜 蓮肉

訶子 肉蓯 甘草 各等分 生姜 燈心 水煎

升陽益胃湯 蘭室 元氣虛弱飲食難進飧泄不止便短少洒淅惡寒體重節痛者主之

黃耆 陳皮 獨活 防風 半夏 甘草 黃連 白朮 澤瀉

茯苓 柴胡 羌活 生薑 大棗 水煎

加味陳湯 壽世 疾瀉者或多或少或瀉或不瀉脈沈滑也此方主之

即二陳湯加蒼朮白朮砂仁山藥車前木通厚朴烏梅燈草各等分

神木湯 風木之邪內于脾土泄利下血者主之

蒼朮 藜蘆 川芎 羌活 白芷 細辛 甘草 生薑

水煎

半夏瀉心湯 腹中有水搏火腸鳴泄瀉者主之

人參安胃散 脾胃虛熱吐瀉口糜泄瀉者主之

桂苓理中湯 脾胃虛弱泄瀉口糜服涼藥轉甚者主之

即理中湯加肉桂茯苓

止水瀉方

老人及陽氣不足久腸鳴泄瀉宜此方主之

白朮

茯苓

杜仲

補骨

澤瀉

甘草

水煎

痛瀉要方

肝木乘脾痛瀉不止者主之

白朮

芍藥

陳皮

防風

水煎久瀉加升麻

當歸厚朴湯

肝虛忿怒所傷面色青慘厥而下利者主之

當歸

厚朴

良姜

肉桂

甘草

水煎

四神丸

腎虛火衰食不能入大便泄瀉者主之

枳實導滯丸

傷濕熱之物不得施化痞悶不安腹內硬痛積滯泄瀉者

大黃

枳實

黃芩

黃連

神麴

白朮

茯苓

澤瀉

痢病

倉粟散

初痢頭痛發熱下痢赤白及疫痢噤口痢者皆主之

即人參敗毒散加黃連陳米生姜大棗

芍藥湯 機要

下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度者主之

芍藥

當歸

黃芩

黃連 各錢

肉桂

木香

檳榔

甘草 各錢

大黃 錢五分 水煎

白朮和中湯 壽世

下痢多日不拘新久用攻擊下後不愈者主之

當歸 大

白朮 大

芍藥 大

茯苓 中

陳皮 中

黃芩 中

黃連 小

甘草 小

木香 許

水煎食前服

參歸芍藥湯 回春

痢久二三十日痢去多不止用此調氣血自愈

即異功散加山藥砂仁烏梅蓮肉燈州

不換金正氣散

初痢自傷食得者

加神麴山查黃連乾姜木香砂仁

參連湯 丹溪

下痢噤口不食者主之

人參 五錢

黃連 二兩

水煎終日時呷之如吐再強飲但得一口呷下咽喉即好

除濕防風湯

濕痢暑痢清陽下陷者主之

六和湯

暑痢發熱煩渴者主之

胃風湯

濕痢如豆汁或五色雜揉者主之

即八物湯去地黃加肉桂粟米

加味四物湯

下痢鮮血不止者主之 加黃連槐花粟殼阿膠艾葉

桃核承氣湯

血痢小腹急結裏急異常窘迫甚者主之

大承氣湯

下痢三部脈皆平按之心下堅者急下之

下利脈遲而滑者實也利未欲止急下之

下利脈反滑者當有所去下乃愈

下利已差至其年月日時復發者以病不盡故也下乃差

白頭翁湯 金匱

熱利下重下利膿血裏急濕熱已深者主之

白頭

黃連

黃蘗

秦皮

四味以水七升煮取三升去滓溫服二升

訶黎勒散 全

氣利者主之

訶子十枚一味為散粥飲和頓服

藿香正氣湯入門 氣痢如蟹痔者主之 加木香檳榔枳殼山楂

桃花湯 下利便膿血日久滑脫者主之

真人養臟湯

大小兒冷熱不調下痢赤白或膿血如魚腦髓裏急後重臍腹疼痛或脫肛下墜酒毒便血者主之

肉桂八錢 人參 當歸各六錢 木香五錢 訶子二錢 粟殼三錢 甘草一兩六錢

芍藥二兩六錢 白朮六錢 肉蓯蓉半兩 水煎

千金飲子

先吐後瀉又變痢臍腹疔痛眩助脹痛虛鳴膿血五色相雜或如豆汁或如瘀血

夜無度食少肌瘦者主之

黃耆 甘草 陳皮 粟殼 木香 芍藥 地榆 黑豆

當歸 枳殼 烏梅 大棗 白朮 訶子 黃連 水煎

葛根湯法律 專治酒痢

葛根 枳殼 半夏 生地 杏仁 茯苓各錢四分 黃芩二錢 甘草減半

黑豆百粒 梅肉一個 生姜五片 水煎食前溫服

黃疸

桂枝加黃耆湯金匱諸黃家病但利其小便假令脈浮者當以汗解之宜此方

即桂枝湯加黃耆

大黃硝石湯全

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之

大黃

黃蘗

消石各四兩

梔子十五枚

三味以水六升煮取三升去滓內消石更煮取

一升頓服

茵陳五苓散全

黃疸病小便不利者主之

茵陳十分

五苓散末五分

先食飲服方寸匕日三服

小半夏湯全

黃疸病小便色不變故自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者此方主之

茵陳蒿湯全

穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心忪不安久發黃為穀疸此方主之

茵陳蒿

梔子十四枚

大黃二兩

三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫

三服小便當利尿如皂角汁狀色赤一宿腹減黃從小便去也

硝石礬石散全

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下

熱因而作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非水也腹滿者難治此方主之

消石 礬石 燒等分 二味為散以水麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大便去便正黃天

便正黃是候也

小建中湯 男子黃小便自利當與此方

梔子大黃湯 酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也中懊懣或熱痛者主之

梔子 十四枚 大黃 二兩 枳實 五枚 豉 一升 四味以水六升煮取三升分溫二服

小柴胡湯 諸黃腹滿而嘔者主之

茵陳梔子蘗皮湯

黃疸無表裏症者主之

胃疸湯 方考 穀疸其症已食如飢食難用飽飽則心煩頭眩已見黃色穀疸已成矣

即四苓散加蒼朮茵陳黃連梔子防己葛根秦艽陳皮

茵陳解酲湯 飲酒過度發疸虛者主之

即葛花解酲湯加茵陳

腎疸湯 蘭室 女勞疸額黑小腹急小便自利者主之

升麻 蒼朮 各錢 防風 獨活 柴胡 羌活 葛根 各五 人參

甘草 各三分 黃柏 二分 神麴 六分 白朮 五分 茯苓 二分 藁本 五分 澤瀉 三分 猪苓 四分 水煎

茵陳四逆湯 元戎 發黃脈沈細而遲肢體逆冷腰以上有汗者主之

即四逆湯加茵陳

秦艽飲 入附 五疸目赤耳鳴脚弱寒熱小便白濁者主之

秦艽 當歸 木香 桂枝 茯苓 熟地 陳皮 小蓀

川芎 甘草 半夏 大棗 水煎

加味君子湯 真精 色疸及久疸不痊者主之

即四君子湯加黃耆扁豆芍藥

人參養榮湯 三因 五疸脚弱心忪口冷耳聾微寒發熱氣急者主之

瓜蒂散 黃疸腹滿欲吐鼻乾脈浮者主之

又卒然發黃心滿氣喘者命在須臾名云急黃證宜瓜蒂散

積聚

肥氣丸 俞

肝積在左脇下大如覆杯嘔逆或兩脇痛引小腹足冷轉筋久不瘥令人發咳逆瘕瘕連歲不已者主之

當歸

蒼朮

青皮

三稜

莪朮

鉄粉

蛇含石

平肝湯 自訂

肝積攻衝兩脇痛注肩背足冷轉筋者主之

香附 大

柴胡 大

沈香 中

梔子 中

青皮 中

木瓜 中

砂仁

枳殼 中

甘草 喜多 隨宜 水煎

解肝煎 景岳

暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯者主之

陳皮

半夏

厚朴

茯苓 各錢

蘓葉

芍藥 各錢

砂仁 二分

生姜 隨

八味水煎

息責湯 俞

肺積在右脇下大如覆杯氣背痛久則洒淅惡寒喘咳發肺壅者主之

半夏

吳萸

肉桂

人參

桑皮

葶藶

甘草

水煎

大氣湯

前症咳唾如膿汁者主之 加半夏杏仁桑皮

伏梁丸 俞

心積起臍上大如臂上至心下久則煩心者主之

枳殼 茯苓 厚朴 人參 白朮 半夏 三稜

半夏瀉心湯 前症腹中雷鳴者主之 加枳實桔梗薑蒲

痞氣丸 脾積在胃脘大如覆杯四肢不收發黃疸久則飲食不為肌膚者主之

山椒 黃連 厚朴 川烏 乾姜 人參 茯苓 吳萸

黃芩 砂仁 澤瀉 茵陳 巴霜

奔豚湯 腎積發于小腹上至心若豚狀上下無時久則喘咳骨疼少氣者主之

葛根 川芎 當歸 半夏 黃芩 芍藥 李根 甘草

桂枝加桂湯 金匱 奔豚氣上衝咽喉發作欬死者主之

即桂枝湯加桂三兩

清堅湯 醫 五積六聚諸般癥瘕瘵癖血塊等症加減主之

當歸 白朮 半夏 陳皮 枳實 山楂 香附 厚朴

砂仁 木香 各等分 生姜 水煎

三因散聚湯 九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疝痛攻刺腰脇小腹臏脹大小

便不利者主之

檳榔 半夏 當歸各四分 杏仁 桂心 茯苓各錢 附子 川芎

甘草各五分 陳皮一錢 枳殼 厚朴 吳黃各錢 生姜 水煎大便不利加大黃

柴平湯 胃春 積塊屬熱者主之

即柴胡平胃合方加青皮枳殼神麩山查三稜莪朮

乾漆湯 血積血痕者主之

乾姜 桃仁 牡丹 當歸 芍藥 紅花 穿甲 乾漆

水煎

太平丸 景岳

胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積氣疝血疝疝實秘滯痛劇等症主之

陳皮 厚朴 木香 烏藥 白芥 草薈 三稜

莪朮 乾姜 牙皂炒斷明 澤瀉各三錢 巴豆霜七分 為末蒸餅為丸每用三五分

右隨症用引湯送下 傷食停滯以本物湯下 婦人血氣痛當歸湯下 氣痛陳皮

湯 疝氣茴香湯下 欲瀉用熱姜湯送下一錢

大七氣湯 濟生 五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小

便不利者主之

三稜 藜 青皮 陳皮 桔梗 藿香 香附 肉桂 益智 各兩
甘草 三分 水煎

疝氣

烏頭桂枝湯 金匱 寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身痛灸刺諸藥不能治者主之

烏頭 一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升初服三合不知即服三

合又不知復加五合其知者如醉狀得吐者為中病

烏頭煎 全 寒疝遠臍痛若發則自汗出手足厥冷其脈弦而緊者主之

烏頭 大者五枚 煮 去皮不吐 以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合

弱人服五合不差明日更服不可一日再服

當歸溫經湯 金匱 中寒疝氣主之

當歸 芍藥 附子 肉桂 玄胡 茴香 棟子 茯苓

澤瀉 吳萸 水煎

烏頭 烏頭 烏頭 湯升後 癩疽陰囊腫大頑硬小腹不痛者主之

烏頭 枳子 水煎

吳茱萸湯 方考 寒疝腰痛牽引羣丸屈而不伸尺內脈來沈遲者主之

本方加附子

升陽除濕湯 全 水疝者腎囊腫大陰汗不絕此方主之

柴胡 羌活 蒼朮 黃耆 防風 升麻 藁本 甘草 各錢

蔓荊 七分 當歸 獨活 各五分 水煎熟服以早飯壓之

甘草黑豆湯 全 筋疝莖筋掣痛挺脹不堪者主之

生甘 兩 黑豆 半斤 水五倍煎去半空心服

腎氣丸 友松 氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因忿怒號哭則氣鬱結而脹急或則氣散者主之

補中益氣湯 方考 疝疝書則氣出而腎囊腫大令不堪夜則氣入而腫脹皆消也無疾苦此方主之

本方加知母黃柏

十味蒼柏散 入門

醇酒厚味生濕熱房勞不謹動火內熱為外寒所束發痧為痛者主之

蒼朮

黃柏

香附 君

青皮

益智

茴香

山查

桃仁 臣

玄胡

附子 佐

水煎

一方有甘草無山查

茴棟五苓散 全鑑

水疝小腹引陰丸小便不通者

即五苓散加茴香棟子葱白燒鹽

大黃皂刺湯 全

血疝其狀類便毒者主之

大黃

皂刺

酒煎

秦余湯 全

衝疝少腹痛引陰丸氣上衝心者主之

吳萸

肉桂

澤瀉

水煎

當歸四逆湯 寶鑑

厥疝少腹痛引陰丸及肝之逆氣衝胃作吐者主之

當歸

附子

茴香

柴胡

芍藥

玄胡

棟子

肉桂

茯苓

澤瀉

立効散

疝因食積作痛者主之

山查

青皮

茴香

枳實

蒼朮

香附

吳萸

山梔

棟子 生姜

為苓通氣湯 疝氣無問遠年近日風寒濕熱氣並皆王之

烏藥

當歸

芍藥

香附

山楂

陳皮

茯苓

白朮

枳殼

玄胡

澤瀉

甘草

生姜

行氣香蕪散

疝因氣滯氣胸傷食得之者加減

加減柴苓湯

疝因肝經濕熱發作腰腹疼痛腿膝拘急足下為痛者王之

五積散

疝因寒濕小腹疼痛或惡寒發者王之

加吳黃

桃仁當歸湯

準繩

疝因瘀血作痛者王之

即四物湯加桃仁玄胡吳黃青皮丹皮

頭痛

川芎茶調散

諸風上攻頭目昏沈偏正頭痛鼻塞者主之

薄荷

香附

藜蘆

川芎

羌活

白芷

甘草

防風

茶清調下

芎芷香蘇散

前症兼氣腦者主之

香附

紫蘇

川芎

白芷

甘草

生姜

水煎

六君子湯

氣虛濕痰頭痛者主之

加川芎薄荷細辛白芷

活血化痰湯

血虛痰火作頭痛者主之

即四物湯二陳湯合方

黃連竹茹湯

胃熱頭痛嘔吐者主之

半夏白朮天麻湯

痰厥頭暈眩暈頭旋眼黑惡心煩悶者主之

半夏

陳皮

麥芽

茯苓

黃耆

人參

神麩

白朮

澤瀉

蒼朮

天麻

黃柏

乾姜

生姜

水煎

消風散

諸風上攻頭目昏痛耳鳴眼赤好睡皮膚頑麻者主之

清震湯 四卷名
升麻湯

雷頭風痛頭面生疙瘩耳聞雷聲者主之

薄荷

蒼朮

升麻 各等分

水煎

人參芎附湯

虛寒真頭痛者主之

即參附湯加川芎

三五七散 和劑

大寒中於風府頭痛項筋急緊者主之

細辛 二兩半

防風 四兩

乾姜 三兩

附子 三枚

黃肉

薯蕷 各三兩

共為細末每服

二錢溫酒食前調下

芎犀丸 必讀

偏正頭風鼻流清涕服化藥不效者主之

川芎

辰砂

石膏

犀腦

人參

茯苓

甘草

細辛

山梔

犀角

阿膠

麥冬

補中益氣湯

陽氣下陷頭痛眩暈者主之加川芎細辛蔓荊

蕪子摩氣湯

虛陽上攻上盛下虛頭痛者主之

黑錫丹

前症陽虛甚者主之

既濟解毒湯 必讀

上熱下寒頭目赤腫而痛煩悶不得安卧下體寒足胫最甚者主之

大黃 黃連 黃芩 甘草 桔梗 柴胡 升麻 連翹

當歸 水煎

人參吳茱萸湯 頭痛眩暈欲吐者主之

防風通聖散 風火濕熱表裏俱實頭痛者主之

柴胡清肝散 肝火濕熱頭痛者主之

王氏天麻湯 疼厥頭暈卧則稍輕但舉足頭旋眼黑者主之

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 當歸 白附 天麻 姜蚕

黃芩 甘草 生姜 水煎

六君子湯 脾胃虛弱生痰頭目眩暈者主之 加天麻山梔黑姜

順氣和中湯 食積化痰頭目眩暈者主之

十全大補湯 氣血兩虛頭目眩暈者主之

參附湯 真陽不足上氣喘急短氣眩暈者主之

諸氣

分心氣飲 和劑

憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞不通大便虛秘者主之

肉桂

半夏

茯苓

木通 各錢

桑皮

陳皮

青皮

羌活

腹皮 各錢

紫蘊 高

芍藥 三錢

甘草 二錢

生薑

大棗

水煎

加味四君子湯 四春

氣虛為病倦怠不食者主之

即異功散加當歸厚朴砂仁

木香流氣飲

諸氣凝滯胸膈不快或痞悶或走痛或脹滿浮腫者主之

陳皮

青皮

厚朴

紫蘊

香附

腹皮

木香

檳榔

丁香

草菓

莪朮

肉桂

藿香

人參

麥冬

白朮

茯苓

枳殼

菖蒲

木瓜

白芷

半夏

木通

甘草

生薑

大棗

水煎去菖蒲藿香加沈香枳殼大黃名曰四味流氣飲

三因四七湯 本出千金

七氣相干膈氣不平憎寒發熱心腹脹滿傍兩腋上塞咽喉有灸瘻吐不出噤不

下者主之

半夏

茯苓

厚朴

紫蘊

生薑

水煎

沈香降氣湯

陰陽壅滯氣升降胸膈痞悶吞酸者王之

香附大

沈香中

砂仁中

甘草小

鹽少許

水煎

三和散和劑

七情氣結五臟脾胃不和心腹脹急大小便秘寢食俱廢者王之

沈香

紫蘓

腹皮

羌活各分

木香

白朮

枳殼

陳皮

甘草各分

川芎錢二分

木瓜二分

生姜

水煎

退熱清氣湯

氣逆身熱中脘痞滿者王之

柴胡

陳皮

茯苓各錢

半夏

枳殼各分

香附七分

川芎各分

砂仁七粒

木香

甘草各三分

生姜

水煎

秘傳降氣湯

氣不升降上盛頭目昏眩痰實吐逆胸緊舌瘡咽痛耳聾下虛腰脚無力

小便數大便秘者王之

訶子

草薢

骨碎

五加

桔梗

半夏各分

甘草

柴胡

骨皮

枳殼

陳皮各分

桑皮八分

紫蘓一分

姜煎溫服

肺虛滿加參茯

苓

熱盛加黃芩

虛甚加附子

婦人血虛加當歸

痞滿

消痞湯 濟世

痞滿腹脹小便利者主之

即六君子湯加枳實厚朴黃連砂仁澤瀉

厚朴溫中湯 脾胃

脾胃虛弱心腹痞脹或痛者主之

厚朴

陳皮

茯苓

草薢

木香

乾姜

甘草

水煎

桂枝人參湯

心下痞鞅下利不止者主之

枳實理中湯

心下痞鞅不能食者主之

木香化滯湯 脾胃

憂氣鬱結腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食食不消常嘔痞氣者主之

木香

陳皮 各錢

柴胡 錢

當歸

枳實 各錢

半夏 兩

紅花 五分

草寇

甘草 各五分

生姜

水煎

呃逆

橘皮竹茹湯

胃虛膈熱呃逆者主之

陳皮

人參

甘草

竹茹

柿蒂

丁香

生姜

大棗

水煎

清熱竹茹湯

胃中疼熱發呃者主之

砂仁

沈香

木香

茴香

蘇子

甘草

黃連

竹茹

梔子

陳皮

半夏

麥冬

烏梅

水煎

附子理中湯

中氣虛寒手足冷脉沈細發呃者主之

加陳皮良姜沈香

真武湯

下焦在寒發呃者主之

補中益氣湯

大病后中下二焦并降失常呃逆者主之

加麥冬黃柏五味附子生薑大棗

木香調氣散

中焦呃逆因寒者主之

木香

檀香

白菴

丁香各錢

砂仁四

甘草

藿香各半兩

共為末每服二錢鹽湯下

旋覆代赭石湯

中焦虛而火浮上呃逆者主之

都氣湯金鑑

真陰不足元氣虛極發呃者主之

六味丸生脉散合方

小陷胸湯

陽邪陷胸發呃者主之

白虎湯

傷寒傳經熱及暑熱俱發呃者主之

沈香降氣湯

肝氣上逆發呃者主之

噫氣

香砂平胃散

宿食不化噯氣吞酸者主之

左金丸

肝木上騰吐吞酸者主之

加味陳湯

痰火吞酸嘈雜者主之

即本方加黃連山梔神麴砂仁沉香

六君子湯

脾胃虛寒噯氣嘈雜者主之

加益智乾姜木香

八物湯

氣血俱虛嘈雜者主之

茯苓補心湯

血虛嘔五更發者主之

旋代赭石湯

噫氣心下痞鞅者主之

旋覆

赭石

人參

甘草

半夏

生姜

大棗

鼓脹

厚朴參湯金鑑

腹滿時減復如故大便不難此為寒此方主之

厚朴半斤

生姜半斤

半夏半斤

人參

甘草

五味以水斗煮取三升去滓

溫服一升日三服

大承氣湯全

腹滿不減減不足言者主之

厚朴三物湯

腹滿痛而閉者主之

即小承氣湯

厚朴七物湯全

病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故者此方主之

即桂枝湯小承氣湯之複方也

大柴胡湯全

按之心下滿痛潮熱此為實也

雞矢醴散全

血盡良方

大黃

桃仁

雞屎白

各等分

三味為末每服三錢姜湯下

分消湯

脾虛中滿成彭脹主之

蒼朮

白朮

厚朴

枳實

茯苓

砂仁

木香

香附

猪苓 澤瀉 腹皮 生姜 燈心 水煎

廣茂瀉堅湯 脾胃 中滿腹脹有積聚如石堅硬令人坐卧不安或硬或滯上氣喘急通身虛者主之

厚朴 黃連 黃芩 益智 草寇 當歸 半夏 菝葜

升麻 吳萸 生甘 柴胡 紅花 澤瀉 神麩 青皮

陳皮

寒脹分消湯 中滿腹脹而散氣虛少寒者主之

人參 黃耆 當歸 茯苓 厚朴 半夏 吳萸 黃連

乾姜 升麻 柴胡 麻黃 青皮 黃柏 澤瀉 烏頭

草寇 木香 華澄 益智 水煎

熱脹分消湯 中滿腹脹而散氣虛少熱者主之

砂仁 人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏 澤瀉

知母 猪苓 枳殼 黃芩 厚朴 黃連 乾姜 姜黃

水煎

木香流氣散 通身皆脹及單腹脹四肢不脹者主之 加姜黃川芎

木香順氣湯

陽陰壅滯氣不宣通胸膈痞悶腹脹滿大便不利者主之

木香

草蔻

益智

蒼朮

厚朴

青皮

陳皮

半夏

吳萸

乾姜

茯苓

澤瀉

升麻

柴胡

當歸

水煎

散血消脹湯

血脹小便多大便黑亮者主之

當歸

五靈

肉桂

烏藥

甘草

木香

川芎

半夏

砂仁

莪朮

紫蘇

水煎

下瘀血湯

血實石瘕者主之

大黃

桃仁

蟅虫

甘遂

水煎

疎肝消脹湯

黑瘦人單腹脹者主之

當歸

赤芍

川芎

生地

黃連

吳萸

柴胡

澤瀉

楮卷

枳殼

木香

山梔

茯苓

生姜

燈心

水煎

補氣消脹湯

肥白人單腹脹者主之

白朮

茯苓

陳皮

人參

柴胡

升麻

木香

澤瀉

楮卷

枳殼

檳榔

甘草

生姜

水煎

北原湯

下焦虛寒中滿腫脹小便不利上氣喘急陰囊兩腿皆腫或面有浮氣者主之

即錢氏異功散加附子肉桂補骨乾姜砂仁

金匱腎氣丸

脾胃俱虛遂作蠱脹者主之

水腫

枳實白木湯金匱

心下堅大如盤邊如旋盤水飲所致此方主之

枳實七枚

白木二兩

二味以水五升煮三升分溫三服腹中臈即當散

越脾湯金匱

風水其脈自浮外症骨節疼痛惡風身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者主之

麻黃二兩

石膏半斤

生姜二兩

甘草二兩

大棗十枚

五味以水六升先煮麻黃去上

沫內諸藥者取三分溫服惡風加附子

麻黃附子甘草湯金匱

風水脈沈者主之

麻黃 三兩

甘草 二兩

附子 一枚

以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升半溫服八

合日三服

沈明宗曰麻黃附子湯今人置之不講余特舉而明之麻黃附子湯通陽開竅治水妙劑今人惟用腎氣湯丸壅補其內致陽氣不宣轉補轉壅邪無出路水腫日增咳血而死者不知凡幾矣

杏子湯 全

前症脈浮者主之

麻黃 四兩

杏仁 半個

甘草 二兩

以水七升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服二升得

汗止服

防已黃耆湯 全

風水脈浮身重汗出惡風者主之 腹痛加芍藥

方中量

防已茯苓湯 全

皮水其脈浮外症胸腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗皮水為病四肢腫水

氣在皮膚中四肢聶動者主之

防已 三兩

黃耆 三兩

桂枝 三兩

茯苓 六兩

甘草 三兩

五味以水六升者取三升分溫

三服

麻杏石甘湯 全

正水其脈沈遲外症自喘者主之

麻黃附子甘草湯 全

石水其脈自沈外症腹滿不喘者主之

謹按仲景醫聖論五藏水唯有法無方而歷代醫哲註金匱者不啻數十家也然依文下註靡補無方雖似慎謹之至使後世之庸流竟以為卷格諸無用之地錄羊徒存告朔不行余不能

默止選方合症有識君子無罪潛竊幸甚

水在肝腹下支滿噎而痛 又曰肝水其腹大不能轉側腹下脹痛時時津液微生小便續通

按此二條與懸飲同故以十棗湯為主

水在心下堅築短氣惡水不欲飲 按此條水在上部故以小青龍湯為主

又曰心水者其身重而少氣不得卧煩而躁 按此條水在中焦上侵乎心故以豬苓湯為主

水在脾少氣身重 按此條土虛不能堤防故以人參湯為主

又曰脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣則小便難 按此條土苦濕盛故以防己黃耆湯為主

水在肺吐涎沫欬飲水 按此條與正水同故以麻黃杏仁石膏甘草湯為主

又曰肺水者其身腫小便難時時鴨溲 按此條肺病傳乎大腸故以越婢湯為主

水在腎臍下悸 按此條臍下悸欬為奔豚故以茯苓桂枝甘草大棗湯為主

又曰腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面及瘦 按此條與石水同故以麻

黃附子甘草湯主之

香薷散 從上腫者外傷風邪咳嗽呼吸短促者主之

即香薷散五苓散合方

沈香琥珀丸 金鑑

從下腫者內生濕和宜下氣利水此方主之

葶藶

郁李

防己

沈香

陳皮

琥珀

杏仁

蘓子

茯苓

澤瀉

麝香

疏鑿飲子

通身腫滿發熱渴大便秘小便澀氣厥喘者主之

澤瀉

赤豆

商陸

羌活

腹皮

椒目

木通

秦艽

檳榔

水煎

導水茯苓湯

水腫外散內利兩解和劑

茯苓

麥冬

澤瀉

白朮

桑皮

紫蘓

檳榔

木瓜

腹皮

陳皮

砂仁

木香

燈心

蘓子葶藶丸

腫滿水盛上攻喘急不得卧者非此方病不除

蘓子

葶藶

皂角為丸

實脾散

陰水發腫大便不實者主之

厚朴

白朮

木瓜

木香

草菓

腹皮

附子

茯苓

乾姜 生姜 大枣 水煎

腎氣丸 金匱

脾胃兩虛腰痛脚腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫者主之又痢後腫滿者主之

即八味丸加車前牛膝

參附理陰煎 景岳

脾胃虛寒腹脹浮腫服腎氣丸無効者主之

即理陰煎加參附子白朮

五皮飲 千金

脾肺不運行氣滿皮膚水停不利者主之

腹皮 茯苓 姜皮 陳皮 桑皮 水煎

理中湯 老人浮腫及病後發腫者主之

分氣紫蘓飲 金匱

脾胃不和胸膈壅塞腹脹疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止者主之

紫蘓 腹皮 桑皮 甘草 桔梗 草薢 茯苓 五味 生姜 水煎

赤豆湯 金匱

年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或渴小便不利者主之

赤豆 當歸 高陸 澤瀉 連朮 芍藥 防己 豬苓 桑皮 干膝 生姜 水煎 熱盛者加犀角

大連翹飲

前症散氣實病熱盛者主之

八物湯

產後腫滿上氣喘急小便不利者主之

加麥冬車前木通澤瀉燈心

三子養親湯

痰嗽氣喘浮腫者主之

小分清飲

小水不利濕滯腫脹不能受補者主之

茯苓

澤瀉

黃芩

猪苓

枳殼

厚朴

水煎食前服

郭清飲

三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小便不利年力未衰遍身腫脹或肚腹單脹非水等証主之

枳殼

厚朴

腹皮

白芥

蘿蔔

茯苓

澤瀉

陳皮

水煎食遠服

補益

四君子湯 和劑

脾胃虛弱飲食少思面色萎黃言語輕微脈微弱或大便泄瀉者主之

人參

白朮

茯苓 各錢

甘草 一錢

生姜

大棗

水煎

六君子湯 薛氏

脾胃虛弱飲食少思或久患癰痢凡土虛生痰者主之

即前方加陳皮半夏 去半夏名錢氏異功散

四物湯 和劑

肝脾腎血虛寒熱往來頭目不清日晡發熱或煩躁不寐胸腹脹痛者主之

芍藥 二錢

川芎 一錢半

當歸

地黃 各三錢

水煎

如梔柴胡丹皮名加味四物湯 薛氏

八物湯

肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁作渴或寒熱昏噴或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛等症主之

即四君子湯方也

十全大補湯 和劑

氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又久病虛損口乾作渴食少咳而不利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾瀆或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖癢痛等症主之

即八物湯加黃耆肉桂

十補湯

前症陽氣將脫者主之

即十全大補湯加附子

十四味建中湯

氣血不足虛損勞瘠短氣嗜卧或成勞瘵及陰症發理甚甚脈微者主之

即十補湯加半夏冬花茯苓

人參養榮湯

和劑

脾肺俱虛發熱惡寒四肢倦怠肌肉消瘦面黃短氣食少作瀉者主之

即十全大補湯去川芎加陳皮五味遠志

固真飲子

脾肺腎俱虛五心煩熱自汗盜汗日晡潮熱精氣滑脫行步無力腰膝疼痛泄瀉脈沈弱或虛

救者主之

人參

山藥

當歸

黃耆

黃柏各錢

熟地二錢

白朮

澤瀉

芎藭

骨補各五分

五味十粒

陳皮

茯苓各分

杜仲

甘草各七分

水煎

雙和湯

和劑

虛勞氣血兩虛者主之

芍藥七兩半

熟地

黃耆

當歸

川芎各兩

甘草

肉桂各兩

水煎

歸脾湯

濟世

心脾損傷少寢發熱盜汗或思慮傷脾健忘怔忡驚悸不寢或心脾傷痛嗜卧少食或思慮傷脾不能攝血以致妄行或婦人經行不準晡熱內熱或瘰癧流注不能消散瀉飲

者王之

黃耆

人參

白朮

茯苓

酸棗

龍眼各二錢

當歸

遠志各一錢

甘草

木香各一錢 生姜

大棗

水煎

加紫胡 梔子 名加味歸脾湯

左歸飲景岳

命門之陰衰陽勝者王之

熟地三錢或加至三四

山藥一錢

枸杞一錢

甘草一錢

茯苓一錢

萸肉三錢畏酸者少煎之

水煎

右歸飲全

命門之陽衰陰勝者王之

熟地三錢或至三四

山藥二錢

萸肉一錢

枸杞二錢

甘草二錢

杜仲二錢

肉桂三錢

附子三錢

水煎食遠服

獨參湯

元氣虛弱惡寒發熱或作渴燥煩疼喘氣促或氣虛卒中不語嘔或痰涎上湧手

足逆冷者王之

人參

炮姜

七寶美髯丹

氣血不足羸瘦周痺腎虛無子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡痔腫等症王之

紅肉

茯苓

牛膝

當歸

枸杞

兔絲

補骨

黑地黃丸

脾腎不足房室虛損敗瘦無力面色青黃及久痔不差者王之

蒼朮

熟地

五味

黑豆

棗肉

虛勞

小建中湯 金匱

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥者主之

黃耆建中湯全

虛勞裏急諸不足自汗體痛者主之

千金黃耆湯

氣極虛寒皮毛焦津液不通短氣枯淡氣力損之脈來遲緩者主之

黃耆 四兩

人參

白朮

桂心 各二兩

附子 三十銖

生姜 八兩

大棗 十枚

水煎

二母散 良方

肺勞有執咳嗽痰壅清道但右手寸關脈沈數者主之

知母

貝母 等分

每服五錢生姜三斤水二盞煎八分溫服無時

天王補心丹

過勞其心忽喜忘大便難或時溇利口内生瘡者主之

人參

茯苓

玄參

丹參

遠志

桔梗各錢

生地四

五味

當歸

麥冬

天冬

柏實

酸棗

犀角地黄湯

勞心動火吐血衄血者主之

千金葶藶湯

脾旁四肢不用五臟皆乖脹滿肩息舌根苦直不熱唾者主之

半夏

宿姜各兩

茯苓

白朮

杏仁各三兩

大棗十枚

竹葉一升

陳皮

芍藥各三兩以水斗煮三升分四服

三陰加枸杞煎

肝勞面目青口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明者主之

當歸

三錢

地黃

三錢

甘草

一錢

芍藥

二錢

酸棗

二錢

人參

隨量

枸杞

三五錢

水煎

加味四物湯

肝勞寒熱往來咳嗽盜汗筋骨疼痛前陰生瘡等症主之

知柏地黄丸

方考

腎勞背難俯仰小便有餘瀝裏濕生瘡小腹裏急便赤黃者主之

即六味丸加知母黃柏

涼腎湯

必讀

腎勞實熱腹脹耳聾者主之

生地

茯苓

玄參

遠志

知母

黃柏

水煎

腎氣丸

腎勞虛寒發熱作渴淋閉頭眩眼花者主之

寧肺湯 楊氏

榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急嗽痰乾咳或痰帶血者主之

即八物湯加陳皮麥冬五味棗皮阿膠

滋陰降火湯 四春

陰虛火動潮熱盜汗咳嗽吐血者主之

當歸一錢分 芍藥一錢三分 熟地 天冬 麥冬 白朮 各錢 生地 八分 陳皮 七分

黃柏 知母 各五分 甘草 各 生姜 大棗 水煎臨服竹瀝量便

地骨皮散

風勞發熱自汗盜汗咳嗽者主之

骨皮 柴胡 知母 半夏 茯苓 人參 甘草 各等分 水煎

人參散 本草

邪客經絡痲嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞邪未深入臟腑者主之

即古方逍遙散去薄荷加人參半夏黃芩葛根

麥煎散

少女室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗婦人血風攻注四股者並主之

赤茯苓 當歸 乾膝 鱉甲 醋炙 常山 大黃 煨 柴胡 白朮

生地 石膏 各兩 甘草 各兩 每服三錢小麦五十粒水煎前食後臨卧服若有虛汗加麻黃根加入

參助胃氣度可多服取効也

逍遙散

肝脾血虛煩熱肢體疼痛口乾盜汗者即月事不調寒熱如瘧疼嗽骨蒸者主之

當歸

白朮

芍藥

柴胡

薄荷

甘草

生姜

水煎

滋陰至寶湯

除骨蒸止喘嗽凡痰涎收盜汗散寒熱

即逍遙散加陳皮香附貝母地骨麥

茯苓補心湯

潮熱咳嗽吐血痰喘無汗骨蒸者主之

即參蘓飲四物湯複方也

驚甲地黃湯

熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾血身體羸瘦不為肌肉者主之

柴胡

當歸

麥冬

驚甲

石斛

白朮

熟地

人參

茯苓

秦艽

肉桂

甘草

水煎

人參刑芥散

非純

婦人血風發熱身體疼痛頭目昏眩心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不

爽或月水不調膈脹疔痛痲痺塊硬疼痛發歇或時吐逆飲食不進或產後淹延瘦瘁

乍起乍卧等症主之

人參

荆芥

生地

柴胡

驚甲

酸棗

枳殼

白朮

羚羊

桂心

甘草

防風

川芎

當歸

水煎

清骨散

骨蒸勞熱者主之

銀柴

胡連

秦艽

鱉甲

骨皮

青蒿

知母

甘草

水煎

酸枣仁湯

心腎不交怔忡恍惚夜卧不寧精血虛耗脾胃泄瀉者主之

枣仁

遠志

黃耆

蓮肉

人參

當歸

茯苓

茯神

陳皮

甘草

生姜

大枣

水煎

石膏散

女骨蒸外寒內熱四肢微瘦足浮腫者主之

石膏

用新汲水和方寸匕服身無熱為度

百花膏

勞嗽吐血及小兒久咳宜此藥

款冬

甘草汁浸

百合

各等分

為末煉蜜丸

分心氣飲

氣滯鬱結之病盜汗咳嗽胸膈痞悶彷彿虛勞但脈不虛數多見沈瀆者主之

諸血

犀角地黄湯

胃火熾盛血熱妄行或吐血或衄血或便血主之

犀角

生地

丹皮

赤芍

水煎

清咽太平丸

膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉不清者主之

薄荷

川芎

防風

犀角

柿霜

甘草

桔梗

蜜丸

十灰散十藥

一功吐血先服之無不取效

大劑

小劑

荷葉

側柏

茅根

茜根

山梔

大黃

清肺湯

肺火胸痛咳嗽吐血者主之

牡丹

梭櫚

茯苓

陳皮

當歸

生地

芍藥

天冬

麥冬

黃芩

山梔

阿膠

桑皮

紫苑

甘草

烏梅

大棗

水煎

桃核承氣湯

吐衄覺胸中氣塞上出紫黑血者主之

柴胡疎肝散

怒火傷肝腹痛血苑於上作吐血者主之

柴胡

陳皮

川芎

芍藥

枳殼

甘草

香附

山梔

生姜

重便

水煎

左金丸

前症火盛者主之

鎮陰煎

陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢以致大吐大衄六脈細脫手足厥冷危在頃刻而不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也

熟地^{三錢}

午藤^{二錢}

甘草^{一錢}

澤瀉^{一錢半}

肉桂^{三錢}

附子

^{五分或二三錢}

水二鍾速煎服

藕參湯

元氣暴虛脈細脫不省人事咬牙戰振頻吐鮮血者主之

人參

藕汁

人尿

歸脾湯

思慮過制吐血便血者主之

理中湯

飲食過度傷胃吐衄腹絞痛冷汗自流者主之

八物湯

氣血俱虛驚悸怔忡吐血衄血者主之

加側柏山梔阿膠

參原髮灰煎

衄血日久不止身體憔悴者主之

即獨參湯加髮灰人尿

柏葉湯^{全匱}

吐血不止者必是熱伏陰分用此宣發

柏葉

乾姜^{各三兩}

艾^{三把}

三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服

瀉心湯 金匱

心氣有餘熱盛而傷陽絡迫血妄行者王之

大黃 三兩

黃連

黃芩 各兩

三味以水三升煮取一升頓服之

千金肺熱湯

肺熱喘息鼻衄血者王之

羚羊

玄參

射干

薄荷

芍藥

升麻

柏皮 各錢

生地汁

山梔 四錢

竹茹 一錢

十味以水九升煮取三升分三服須利者加芒硝三錢更煮三沸

黃土湯 金匱

下血先便後血是血有胃即古之所謂結陰也此方王之

甘草

生地

白朮

附子

阿膠

黃芩 各三兩

伏龍肝 半斤

右七味以水八升煮取三升分溫二服

赤豆當歸散 金匱

下血先血後便是血在腸即古之所謂腸痔也

赤豆 三升浸令芽出乾

當歸

二味杵為散漿水服方寸匕

撰營前 景岳

脾虛不能攝血凡憂鬱怒積勞誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虛陷神魂不寧大便脫

血不止或婦人無火崩淋症凡兼吐惡最為危候速宜用此單救脾氣則統其固而血自歸源也

白朮 三錢

當歸 二錢

山藥 三錢

甘草 一錢

酸棗 錢半

遠志

乾姜 地三錢

蓮肉 炒三粒

人參 隨宜三錢 水煎

槐花散

腸風臟毒下血者主之

槐花

側柏

荆芥

枳殼

為散

瀉青丸

肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭者主之 方見中風

除濕和血湯

腸風下血如澣者主之

生地

熟地

當歸

甘草

芍藥

黃耆

升麻

蒼朮

肉桂

秦艽

陳皮

牡丹

水煎

四君子湯

下血面色痿黃心忪耳鳴脚弱口冷不味者主之

加黃耆扁豆芍藥

補中益氣湯

便血糞前糞後食少倦怠面色痿黃者主之

加吳萸黃連

辰砂妙香散

心脾不足恍惚不睡盜汗遺精溺血者主之

清腸湯

心移熱於小腸尿血者主之

當歸

生地

山梔

芍藥

黃柏

瞿麥

茯苓

木通

知母

扁竹

麥冬

甘草

燈心

烏梅

水煎

小蓴飲子

下焦結熱而成血淋者主之

小蓴

蒲黃

藕節

滑石

木通

生地

山梔

竹葉

甘草

當歸

水煎

止齒血方

汪氏

脾胃為濕熱所用莖維出血者主之

即竹茹温胆湯去茯苓加蒼朮猪苓滑石藕汁

黃耆六湯

舌衄者主之 合生脈散

柴胡清肝散

耳衄西關脈弦數者主之

六味丸

陰虛耳衄尺脈弱或脈者主之 加五味子

枝子鼓湯

積熱傷肝或誤藥擾動陰血致眼出血名曰眼衄此方主之 加犀角秦皮牡丹赤芍

汗症

當歸六黃湯

心火傷陰盜汗者主之

當歸

黃耆

黃柏

黃芩

黃連

生地

熟地

水煎

酸棗仁湯

心虛不固盜汗者主之

酸棗

當歸

芍藥

生地

知母

黃柏

茯苓

五味

黃耆

人參

水煎

調衛湯

濕勝自汗一身盡痛脈濡者衛氣虛弱表虛不任外寒者主之

除濕湯

脾濕四肢怠墮舌上黑胎自汗盜汗者王之

黃耆六一湯

表虛惡寒自汗者王之

黃耆

甘草

水煎甚者加參附子

玉屏風散

症治全前

黃耆

白朮

防風

水煎

黃耆建中湯

表虛及血氣不足自汗盜汗者王之

柏實湯

陰虛盜汗者王之

柏實

人參

白朮

半夏

五味

牡蠣

麥蘖

麻黃根

大棗

水煎

大補黃芪湯

魏氏

氣血俱虛自汗者王之

即十全大補湯去芍藥加肉蓯蓉黃肉五味防風

艾煎茯苓散

要訣

別處無汗獨心孔一汗有汗者王之

茯苓未錢

艾煎湯調服

調衛湯

脾胃

麻黄根

黄耆 各钱

麦冬

生地 各三分

生甘

当归 稍

黄芩

半夏 各五分

羌活 七分

猪苓

茯苓

红花 各分

五味 七粒

水煎

