# 三術撮要

史載之方

楊氏算法

寶祐四年會天歷

江蘇古籍出版社

# 史載之方

江蘇古籍出版社



宛委別藏

（清）阮元 輯

江蘇古籍出版社出版
江蘇廣陵古籍刻印社整理
江蘇省新華書店發行
上海市印刷七廠印刷
開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開
印張：一八九七·七五 插頁：四八〇
一九八八年二月第一版
一九八八年二月第一次印刷
ISBN 7-80519-073-9/Z·13
定價：（全120册） 2650 圓

史載之方二卷提要

宋史載之方二卷提要

宋刊本依樣過錄上卷之末詳是編傳本甚希此從北史新編作史載之方乃形近之譌施彦執北窗炙輠錄稱其治蔡元長疾以此得名案所作為醫總論闡發甚明各治推其因證主治之法精核無遺較諸空談醫理者固有別焉

四時正脉

春

春脉弦其氣來柔軟弱虛而滑端直以長名之曰弦反此者病其氣來實而強名爲太過病在外其氣來不實而微此爲不及病在中太過則令人善忘忽胃脘痛引背下兩脇滿

夏

夏脉鉤其氣來盛去衰反此者病其氣來盛去亦盛此爲太過病在外其氣來不盛去反

盛此急爲不及病在中太過則令人身熱而膚
痛爲浸淫不及則令人煩心上見欬嗽下爲
氣泄

秋

秋脉浮其氣來輕虛以浮其氣來急去散
故曰浮反此者病帝曰何如反其氣來毛而
中央堅而兩旁虛此謂太過病在外其氣來
毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣
而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而
欬上氣見血下聞病聲音

冬

冬脉營其氣來沉而博故曰營及此者病其氣來如彈石者此謂不及病在中太過則令人解㑊脊脉者謂其去如數者謂其常

中

飢耎少氣不欲言其不及則令人腹滿小便變心懸如病

脾無善脉止見惡脉盖脾脉以和緩爲主故四時之脉雖不同春弦夏脉鉤秋脉毛冬脉營皆要有脾脉若脾脉不見便是五藏真脉見者死所以脾無善脉者謂其常脉太過則

令人四肢不舉其來如水之流者太過也濕勝則然耳不及則令人九竅不通名曰重強其來如鳥之啄者不及也土不用事而九竅不利因受木所制則脾受水乃傷腎土不用事而九竅故多生浮腫脹滿之疾久而成水

## 真脉

真肝脉至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃色青白不澤毛折乃死真心脉至堅而搏如循薏苡累累然色赤黑不澤毛折乃死真肺脉至大而虛如似毛羽中人膚色白赤

不澤毛折乃死

真腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然色黑

黃不澤毛折乃死

真脾脈至弱而乍數乍疎色黃青不澤毛折

乃死

厥陰所勝生病

運氣所勝

殘泄食減躰重煩寃腸鳴腹支滿甚則忽忽

善怒眩胃巔疾脇痛而吐甚衝陽絕者忽忽

不治

體重肌肉萎食減口爽目轉耳鳴胃脘當心

司天所勝

而痛飲食不下舌本强食則嘔腹滿
泄瘕水閉

洒淅寒熱如瘧善伸數欠心痛支滿兩脇裏急
飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得候
與氣則快然如衰身體皆重

瘧少氣欬喘血溢泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱

喘嘔寒热啘鼽鼻窒甚則瘡瘍脇痛善太

息賁中煩熱嗌乾右肢滿皮膚痛寒熱欬喘

唾血鼽衄胸溺色變瘡瘍附腫肩背臂膊及缺盆痛

地勝

腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大

太陰所勝生病

運勝

腹痛清厥意不樂體重煩冤肌肉萎足萎不收行善痿脚下痛飲食減四支不舉

腹滿溏泄腹鳴反下甚而大谿絶者不治

胷中不利陰萎氣大衰而不起不用當其時
反腰睢痛動轉不便心下否滿少腹痛時害
抬食腑腫骨痛陰痺者按之不得臂脊
頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食咳
唾則有血心如懸

地勝

飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺陰病血
見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項
似拔臂似折髀不可以回腘如結腨如別
陽明所勝生病

兩脅下少腹痛目眥痛眉稜骨痛耳無所聞体重
煩冤胸滿且痛引少腹痛引背兩脇甚則喘
逆氣咳肩背痛尻陰股膝髀踹脛足皆病

運勝

天勝

脇痛目赤掉振鼓慄筋痿不能久立口便變
寒熱如瘧甚則心痛清干中感而瘧欬甚則
腹中鳴注泄鶩溏心脇暴痛不可反側嗌乾
面塵腰痛丈夫癲疝婦人少腹痛目眛眥瘍
瘡痤癰

地勝

昏病喜嘔嘔嘔有苦太息心脇痛不能反側甚則噫乾

十

運勝

身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚

天勝

則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風

心熱煩噫乾善飢啘喜悲數欠熱氣妄行善忘甚則心痛嘔血泄鼻衄善悲數口口時

眩仆腹滿手熱肘攣掖腫心澹澹大動脅

胃脘不安面赤目黄善噫噫乾甚則色灺渴

而飲

少腹控睾引腰脊上衝心痛血見噦痛頷腫

口口　地勝　口少陽所勝生病

口口　天勝

欬唾鼽衄鼻窒瘍寒熱腑腫心痛胃脘痛厥逆

鬲不通熱上皮膚痛色變黃赤傳而爲水身

面腑腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍嘔血煩心

胄中熱甚則鼽衄

地勝

注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

少腹堅滿裏急暴痛心痛汗發嘔吐飲食不入而作復

六氣復而生病

厥陰之復

吐

少陰之復

燥熱內作煩躁嘔逆少腹絞痛火見燔灼皮膚痛燥分汪時止氣動於左上行於右窃心痛欝冒不知人迺洒淅惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿腸腸不便暴瘖心痛欝冒不知人迺洒淅惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿腸腸不便外爲浮腫噦噫瘡瘍癰瘇甚則入肺欬而鼻淵

體重中滿食飲不化陰氣上厥胃中
發於中滿食飲不化陰氣上厥胃中
密默唾吐清液甚則入腎竅泄無度
太陰之復
驚瘛欬衄心熱煩躁便數惛風厥氣
少陽之復
如浮埃目瞤瘛瘛少氣內發上爲口瘡
血溢血泄發而爲瘡惡寒鼓慄寒極反熱嗌
絡焦槁渴引水漿色變黃赤少氣脉
陽明之復
爲水傳爲浮腫甚則入肺欬而血泄

病生眩仆腹脹而則入肝若左善太息甚則心痛至蒲脇氣歸於泄嘔苦欬煩心病在萬中頭痛甚驚駭筋攣手

太陽之復

心胃生寒膏中不利心痛痞蒲頭痛善恐時眩仆食減腰睢反痛屈伸不便少腹控睾引腰脊上衝心嗌出清水及爲噦噫善忘甚則入心善悲

五行之爲病一也而所生之病

論六氣所生之

所至爲風化而病而所生之氣不同如木之肝火之所

至爲化熱而病之生不獨止於心此司天司地
統歲化而病之紀運之不同又有故爲病亦從而各異
乘年之虛過月之空失時之和或勝而所勝
受刑或復而制於所勝且以經言之天火下
臨則肺氣上從白起金用而草乃青燥氣
下臨則肝氣上從則蒼起木用而土乃青以
常所勝而論之則火至而肺病金至而肝病
今也天火下臨則木從天之氣而白迺用
故病反生於肝天金下臨則木從天之氣而
蒼迺用故病反生於肺類舉而推則厥陰司
天脾氣上從而水斯眚太陽司天心氣上從

而金斯者少陰司天肺氣上從而肝斯者
陰司天則腎氣上從而火斯皆可知矣此
天度之尊獨異於他經言天能制色以其能
制勝已而使不爲害至於司地則氣化之正
各隨其證耳若夫天紀運統歲之不同則又視
其司天之氣化如六甲之歲陽土當運有陰
凝流衍之布宜與六甲之歲同六庚多肝病而庚寅庚
已亥之歲不同也然已已
申之歲金不能制肝六戊多肺病而戊辰戊
戌之歲火不能害肺氣化所至譬如權衡可
即其氣以求其病惟勝復之候不同難以前

期亦隨其氣之多寡以求其證勝之為病輕
復之氣報怨仇焉此又不可不知也今以木
於肝金之所制則不過如肺氣有餘凌犯
於肝木生眼昏背癢耳無所聞胃痛躰
必相救邪及傷肝氣妄行大傷於脾則金
者謂金之復也雖然人之氣猶口天地之氣
五藏之氣即五運之氣三陰之氣即六氣之
變顧一身之氣多寡之如何亦不必因天地

之氣化所生已亥之
者子午之歲人多肝病而
之身自有天地之氣
氣所至之法同至於
受之本所以至病之
餘而成或以本藏不
處同而成經之所載
不同而其實則一太陽
五藏水土共胞寒
所生之病亦類目會
殊狀各有其應今詳
五藏而病生奇怪清
各有其機表裏

肝熱刑脾而泄即經言飧泄餘證當
支滿口膠渴小府赤
其脉六脉輕弦胃上得
脉雖弦亦不必有胃力以泄則氣虛不實故
也宜用荆芥穗風
勻藥訶子皮

大府泄

荆芥穗 壹分 防風 羌活 甘草 各壹分 白蒺藜 半兩 厚朴 去皮 十銖

右爲細末非時以水壹盞棗壹个同煎
三錢七和滓服

木香 三銖

脾濕而泄經言腹滿腸鳴泄餘證腹痛體重食減甚則足痿行善契脚下痛宜用削术豆蔻散

草豆蔻　削术　訶子皮　各壹兩　大芍　藿香　各一分　甘草　各半兩　橘皮　各半　棗本　錢各八　獨活

右爲細末空心水壹盞薑五片棗兩个同煎三錢取八分和滓服

腎水之寒亦生瀉泄以寒濕同化陰氣入腎又言寒迫下焦傳爲濡泄其證躰重食減腹痛四支不舉甚則注下赤白腰膝

酸痛服膝不便若脾氣之濕則六脉
革濡微散而大如按泥漿加之腎寒則又沉伏
遲弱動而無力宜併治其水暖其脾腎暖脾
藥宜以前术豆蔻散暖腎藏方蒲蘆解勝金丸
蒲黃 訶子 各壹兩
芍藥 附子 石斛
當歸 獨活 各壹分 蓬莪茂 山茱萸 細辛
茯苓 巴戟 去心 續斷
官桂
右爲末煉蜜丸如梧桐大空心米湯下五
十九
七
又方宜服舶上硫黃丸 方見痢門

肺金之勝亦生腹鳴溏泄肺主清肅之氣入于大腸中變成寒中腹鶩溏又肺王少腹病餘證少腹痛中清胠脇痛其脉六脉毛而微不浮毛為肺脉微則泄而氣弱初一指偏一二日則變而微但不浮耳尺澤沉而小擊宜温其肺四味芍藥散

肺脉

右等分為末非時水壹盞生薑三片同煎桔梗　香白芷

吳白朮　芍藥

三錢七入棗二个取八分服

大府秘傳大府結澁口苦舌麤甚肝心氣實風血相

則口乾膠小府赤頭痛眼昏六脉洪大而實宜用柴胡湯

柴胡　前胡　防風　杏仁去皮尖　芍藥各一分　甘草　伏苓　黄芩八銖　半夏二銖

右爲㕮咀麤散食後并非時水一盞煮白一根一分去滓服

同煎三四錢匕取八分去滓服

肺氣上實其氣上蒸不能傳送大府祕熱其脉浮而疾尺澤脉短寸口脉大宜用柴胡湯加紫苑麻黄各一分良

寒濕之證勝大府反祕經言陰氣不用便堅以

土不用事脾胃不動無傳送耳其陰具水土之證脉亦如之宜用大腹皮散

陳橘皮 大腹皮 青橘皮 各半兩 甘草 各一分 大芎 五味子

右爲細末每服三錢水一盞煎八分非時水一盞煎六

和滓服

右爲細末每服三錢水一盞煎八分非時水一盞煎六

元氣虛弱胃水空虛胃無津液大府澁遲六脉微而虛宜用蔍蓉粥

肉蔍蓉一兩捵先洗蔍蓉一分米一合令淨切極細同米用水二兩椀已上煮作稀粥

右爲細末食後以水一壹盞葱白一十一支同煎三錢七和滓服

又方宜服此五苓散

悽宜用蔓荆湯方

蔓荆子　羌活　獨活　麻黄　甘草　木通　芥穗　芍藥　水煎食後服

右等分前法煎食後服

濕氣寒氣之勝同犯於心心氣上行不得小便小府不快宜服削水草豆蔻散又服此大芍湯

右大芎 壹兩 蓬莪茂 水香
錢七和滓服 伏苓 半兩 甘草 革薤 各一分
元氣虛弱腎氣不足膀胱氣虛衝任脉虛丈
夫癲疝婦人癃閉宜服此方其脉六脉皆動
細數而輕弦腎脉小擊而沉膀胱滥而短

右青塩 各一分 五味子 壹兩 大芎 壹兩 蓬莪茂 水香
爲細末餘七味爲細末蒸 芎 各半兩 革薤 各一分
乾熟地黄 壹兩 牛膝 蓬莪茂

餅九如梧桐子大空心清湯下五七十元

寒邪所傷身能發熱

鼻塞氣麤聞氣出入如火此當發其寒六脉

浮而輕疾散滿指下

麻黃去根節各半 蓽茇 削术各兩 甘草已上各壹分

獨活 芍藥

細辛四銖

右爲麤散空心并非時水一盞生薑一片

前煎三錢去滓服

獨盛少陰少陽之勝身熱小府赤大府

祕頭痛口乾舌黧骨疼六脉洪大而實有骨
力又數宜用此方

伏苓　麥門冬去心　芍藥　麻黃
前胡　柴胡　甘草　羌活
桔梗各一分　牡丹皮四銖

右、、、

亦同
紇然心火之勝
勝耳宜用此方
荊芥穗
羌活　獨活　芍藥
防風
麻黃去節　連翹子　秦艽
蔓荊子　乾葛　甘草　等分
右㕮咀爲㕮散食後水一盞煎三錢取八分去
滓和滓任意又看其人氣實肝藏熱多
至於生涎則加天南星半夏白礬蚕乾
蠍各少許天南星白礬蚕可
減不必多涎結而大府祕

則以牽牛和上件藥服以踈爲度

經言陰盛生寒陽盛生熱元氣虛之腎水極寒發爲寒戰冷汗自出六脉微細而沉寒邪犯心則煩悸腎脉必擊而沉不安甚則仆倒宜先暖其腎後保其心暖腎藏方

牛膝 酒浸一宿 石斛 巴戟去心 苁蓉 各半兩 續斷 伏苓 附子炮 五味子 兔絲子 各一分 酒浸兩宿 蛇床 鹽水炙

右爲末煉蜜爲元如梧子大空心米湯下七

温氣之勝汗出憎風肌體多冷畏風食減倦怠無力六脉渾濁而緩弱大而散面目無光宜服前畧腎元井服此方

白朮 陳橘皮 各半兩 藁本 獨活 各一分 草蔻 人參 半兩 甘草 炙 蘿香 細辛 各半兩 乾薑 四銖

右為末煉蜜和元如梧子大空心米湯下十元

## 頭痛

頭痛之狀最為難辨大風入骨而痛大熱入骨中而痛元氣虛微而痛心

火之勝頭痛六脉之應皆應于心即用涼心藥風氣之勝而頭痛六脉之應皆屬于肝即用涼肝藥氣熱而生痰亦能令人頭痛即用前取涎藥腎水之勝陵犯於心經言心氣上行痛留眉頂間甚則腦戶間痛及匈頭痛腦戶者腎氣初作未至宜暖其腎獨寒濕之氣風池熱府令人頭目不利腦後兩大筋逆急風池者風邪襲於陰上貫腦入五藏六脉皆初傷寒之屬浮散而數宜用前發汗藥

腹痛

人有病腹痛者其狀多端經之所言亦多變濕邪之滯腹痛食減體重四肢不舉腹鳴腸泄宜用此方

草豆蔻　陳橘皮　厚朴去麤皮　丁香　木香　白朮各半兩　大芍藥十錄

右爲細末每服參錢空心水壹盞棗兩个同煎八分和滓服

寒冷食物所傷厥入胃腹中撮痛即與前寒濕勝痛之脉不同若寒濕之氣勝而腹痛六脉皆微細而沉時小擊經訣所謂陽絃頭

痛陰微腹痛是也至於爲冷寒之物所傷則
六脉又緊而微緊應腹有形而爲濕氣所傷者脉止於微而已
脉必有形此爲物
宜用神和散加大腹皮半兩主之覺冷物未
化即加青橘皮少許每服入半夏少許主之清厥入胃橘皮兩脇下痛及小腹痛此肺
之氣所成六脉當急而微紇肺脉獨大而實
左尺微小急蓋清肅之氣流入于中寒聚
而小腹有形經言連小腹而作寒甚則爲婦
人瘕瘕寢丈夫癩疝之類肺以毛爲主若口口
爲熱沉大爲冷至於寒之所聚則大者斂而

爲小急又甚則緊緊爲痛應腹有形亦各從其類也宜暖行肺氣以散之

陳橘皮　蓬莪茂　紫苑　茗

京延胡索　官桂

桔梗　甘草　當歸

芍藥各四錢　白朮半兩　木香各一分　大腹皮

右爲細末服時水壹盞生薑二片同煎三錢七調取八分和滓服

至於肺氣之勝已傷於肝則又能體重煩冤胃痛引背而痛宜服前方又服此暖行肝氣方人參散

人參半兩　當歸　桑寄生　白蒺藜
蓬莪朮　芎
獨活　京三稜
右爲細末每服三錢服時水一盞棗二个同
煎八分服
甘草各一分炙　藿香四錢　五味子半兩　木香四錢
人有六病胃脘當心而痛食已而痛又甚
中而急六脉紘緊而長宜用肝藥人有病兩
脇下鼓動非時氣痛不安如生積聚一腹中
搖悶不安甚則生氣堀上衝咽喉頭目俱進
口舌膠粘小便赤黃衝心而痛夜卧不安此
爲肝涎與血相聚致生此疾其脉當洪大沉

實而有骨力以肝脉之熱生風而痛則脉絃
而長今反洪大沉實者此爲涎伏之也宜用
荆芥散

荆芥穗　連翹　羌活　牡丹皮
黄芩　杏仁　當歸　芍藥
山梔子　大黄　醋煮　薑荆子各一分

右㕮咀每服三錢食後水一盞生薑二片半夏
少許同煎取三盞去滓温服大府不甚
祕量加減進服其祕甚自作大黄末每服
時以酒調末

素問舉痛論云寒氣客於經脉之中與卫氣相薄然而痛得卫則痛止其脉正與寒濕之氣脉同宜神朮和散

寒則縮踡縮踡則脉細急則外行小絡故卒脉散滿指下充大而至數不多却不甚有骨力宜去其寒而行其血氣

則脉滿指下充大而血氣亂故痛甚不可按其脉充大而血氣俱實

舉痛論云寒氣客於脉外則脉寒

當歸　大芎　蓬莪茂　伏苓

大防風　陳橘皮　青橘皮　延胡索

官桂各一分　木香四錢　芍藥十錢

右爲細末每服三錢水一盞煎八分服
舉痛論云寒氣客於腸胃之間膜原之
不得散小絡急引故痛以手按之則血氣散
脉亦羌緩而沉宜用前藥青橘皮非時水一盞煎八分服
舉痛論云寒氣客於腸胃之間膜原之下血
故按之無及夫脊乃贅之脉則按之不能及者
澤沉而墾宜行其腎經以去其寒痛其
烏藥 分芎 當歸 京三稜 蓬莪茂 延胡索 各 木香 檳榔 各三錢
甘草炙三錢
右爲細末空心水一盞煎三錢服

舉痛論云寒氣客於衝脉衝脉起於
腹直上客寒所犯則脉不通脉因之動應手其脉當實大有形不勻輕滑
通故喘動應手其脉當實大有形不勻輕滑
而又緊來疾去遲如有物制之宜通其脉行
其氣

桔梗 半兩　大腹皮　芍藥
當歸　陳橘皮　枇杷葉 去毛　木香
半夏 自爲末每服入兩豆許　芫花 好醋於土鍋內炒令煙出焦黑已上各壹分

右爲細末每服三錢生薑一片同煎八分
以大腑通疏爲度宜服神和散之餘如
此多喘宜調暖其肺

舉痛論云寒氣客於背俞之脈則脈滛
則血虛血虛則痛背俞主於心故相引而痛
按之則熱至熱氣至則痛遂止脈滛以血虛
而不行其脈六脈細數而肝心左微心脈如
帶乳重按即缺往往身有汗宜足其血以保
其心

人參一兩　當歸半兩　木香　延胡索

烏藥　官桂　甘草　茯苓

防風各一分　沉香三錢　陳橘皮十四錢

闕右語

舉痛論云寒氣客於厥陰之脉者絡陰器繫於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故引胷與小腹痛矣其脉皆輕搖帶弦肝脉連腎而弦宜用此方

白芷 疾藜 半兩炒去尖 蔓荊子 一分 芍藥 獨活 蓬莪茂 各一分 麻黄 十銖去節

右爲細末每服三錢空心水一戈盞棗兩箇同煎八分服

舉痛論云寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行故卒然成積其脉沉大而實膀胱脉動而有聲宜

通其小腸

右爲末 大芎 蓬莪 各半兩 木香 當歸 各三錢

七十丸 茯苓 各半兩 青皮 三錢

右爲細末蜜丸如梧子大空心淸湯下五







舉痛論云寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣謂陽氣未入故卒然不知人事氣復反則生矣其脉伏而大極無骨力三部皆乳身有冷汗宜久氣逆上出故痛而嘔其脉細而滑宜用神和散（用暖藥）舉痛論云寒氣客於腸胃厥

加茯苓人參各半兩

人有病腹脹滿口噫兩脇滿咽乾不通此肝勝也其脉弦而長宜涼其肝人有病腹大小腹痛惡寒發熱如瘧小腑赤其脉洪大此腹中痛也宜涼其心人有病小腹痛睡不得小便頭痛目似脫頂似拔腰似折此太陽濕之勝宜暖其脾其脉當濇而動人有病右脇滿大滿膨脹而喘咳此氣爲肺脾相持宜解其金大之熱

小如心脉此爲心脉其脉兩手寸口洪大肺上亦洪骨力

火所勝其脉兩手寸口洪大肺上亦洪骨力

肺腫滿心痛肺脹腹

以平其心肺

右爲麤散非時水一盞盖一片棗一箇同

煎三錢去滓服

人有病身肿腫腹滿仰息泄注赤白欬血此

少陽之勝與火勝同候其脉亦然以前方主之

## 喘

世人論凡喘喘者皆以爲肺然有服肺藥而不

愈者遂以肺不受藥爲難治何以言之繆也

杏仁十四个去皮尖

麻黄去節

甘草炙

防風各一分

羌活

紫苑

又或以肺熱而喘誤投涼藥此又近似之言
止可以知肺喘而未足以明五臟之喘且以
經言之喘嘔皆屬於上未嘗以喘屬於肺至於言五臟之多寡六氣之勝復則
喘之所生可指其狀而明藥之所投亦可以
隨其證而效
今人有病胷中煩熱嗌乾右胠滿欬喘唾血
肺膜腹大脹脹而喘者此火之刑金肺傷而
喘也宜用此方

麥門冬 去心 兩半　杜若 一兩半　桔梗 一兩半　紫苑
杏仁 去皮尖　柴胡　前胡
甘草 炙

散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服
人有病左脇痛寒清晨所成宜用此藥
清氣所成宜用此藥
小比之火之盛刑金則異矣蓋火盛刑金而喘
則六脉純得火脉疾大而有力若寸口偏大而
關脉帶乳即須唾血
人有病腹大脛腫喘欬寢汗出憎風實中滿
食不消化食減體重而濁渾渾革至如物制之此爲腎寒大過宜暖其腎
至如物制之此爲腎寒大過宜暖其腎

續斷　牛膝　細辛　五味子

人有亡病肝臟風壅積涎所聚伏隔間口乾而
膠食即惡心全惡肉味心躁不安夜卧不得
開咽如物抵築多端診其脉六脉皆
喉隔塞
大而沉伏重手取之隱隱然骨間乃得再再
尋來疾去遲宜用治涎藥

荆芥穗　防風　羌活　獨活
白芷　蔓荆　南星　川芎
麻黄　桂枝　細辛　甘草

右㕮咀每服五錢水一盞生薑三片棗一枚煎
七分去滓温服不拘時候

巴戟　附子　當歸　鬼絲子
補骨脂各一兩　大芎　革薢
木香一錢二

右煉蜜丸如梧子大空心鹽米湯五七十九以

敖乾荷葉　乾蝦蟆　天麻　炮　半夏

右㕮等分修治爲細末每服三錢入生薑三片煎七分和滓飯後服

兩耳豆許水一盞生薑三片煎七分和滓飯後服

有人得此涎候却緣久病而虛又誤服熱藥

或元氣本虛六脉大而無骨力却浮洪而數

重手按之則浮指而虛有表無裏却不宜用

前方此病難治當用此方

人參　半兩　天南星　炮　防風

麻黃　天麻　炮　半夏

羌活　已上各一分　白蒺藜　去刺　琵琶葉　去毛　半夏

右除半夏一味自爲末餘爲細末非時水各十錢

一表盡盡三片煎至七分又宜時時以補藥助其

元氣而徐以此壞證延藥挽之

人有病久患欬嗽虛羸氣乏胷中氣微不能

報息六脉虛微而數此之一候並帶勞疾證

即爲難治若脉止虛微不浮而數寸尺調勻

即藥到便安若浮數而虛亦勞也若浮大疾

數而虛輕手取之全無骨力重手按之全不

應指此不治之證肺若當用此方

人參半兩　五味子　茯苓各半兩　麩魚甲炙酥

甘草　杜仲各十錢　麥門冬去心生各一分

紫苑　半夏　阿膠炙透各四錢

右為㕮咀麤散生薑三片棗二枚水二鍾煎一鍾去滓許飯次前服或非時服以歸其元氣每服三錢水一盞煎至七分

## 脚痛

脚氣之勝故經於太陰之病蓋由有寒濕之勝言至引飲腫甚則肌肉萎足痿不收行善痿脚下痛飲發中滿四支不舉此寒濕之病固有似是而非若脚氣本異而標同用藥過差至於寒濕之勝而至於肺熱而病生於

足胃熱而風生於足與脚氣相似而寒熱殊狀試別而明之熱經言歲金太過則胃熱而足痛者以肺經之熱而明之熱而足病者抑以宗筋不行而股髀踹踦傳爲痿也故經言歲金太過則胃熱而足病焉人病足痛得水土寒濕之狀六脉沉伏而澁宜暖其下用此方

牛膝 半兩　黃耆 半兩　獨活　當歸

五加皮 各一分　細辛

木香 各三錢　天麻 炮　大芎　附子

石斛　革薢 各十錢　續斷

官桂 四錢　芍藥 一分

胃熱而宗筋不潤則脚弱無力兩足酸軟或
帶微腫診其脉胃脉又微帶疾
六脉差大宜用此方
大腹皮半兩 茵芋八銖 杏仁去皮尖 伏苓
芍藥 當歸 陳橘皮 甘草炙各一分 青橘皮銖四 芎十銖
薏苡仁各一兩
右㕮咀爲麤散非時薑棗煎仍以前暖腎藥壯元
氣煎藥相兼而進若服此藥大府微利即住
此卻進補藥兩三日待定帖仍進此藥

脉要精微論解

經曰春日浮如魚之游在波夏日在膚泛泛

乎萬物有餘秋日下膚蟄虫將去冬日在骨蟄虫周密君子居室故曰知內者按而紀之知外者終而始之此六者持脉之大法以經以內外之辨且以春夏秋冬之分表裏之淺深而決之意考之以四時之脉分表裏之淺深而決之以內外之辨且以春夏秋冬之分表裏之淺深而決之陽氣之萌脉雖見而未出于膚夏日浮如魚之游在波則泛乎萬物有餘則脉已在膚矣秋日下膚蟄虫將去冬日在骨蟄虫周密則脉已沉矣以是知內者按而紀之知外者終而始之以

明脉之在表也如春日之浮夏日之
然知内者必曰按而紀之者蓋脉之
深按之無以得其實紀之無以知外必曰終而始之則
初按而病已見矣故因其病以推原其本啓
元子乃以知内爲知脉知外爲知色脉色其殊非黄
帝所謂持脉之大法也
堅而長當病舌卷不能言凡脉之搏以有所
細舉而明之心脉搏
犯而鬼賊勝則搏心脉之搏以腎邪犯之也病
舌卷而舌本蓋少陰經
舌卷不能言舌雖應心而舌本
之所散也治之之法不獨涼其心且暖行其
腎其大而散當消環自
已若心脉之弦雖

而軟縱失血亦當温加之以胃藥

紫蘇子　黄耆

獨活　伏苓

天麻　炮干姜　杏仁四錢去皮尖　芍藥

大腹皮　官桂

甘草炙各一分

右爲麤末每服三錢煎七分時候用水一盞煎

寸口脉沉而弱曰寒熱及疝瘕及少腹痛病同而脉異啓元子曰脉急者疝瘕少腹痛病同而脉異啓元子遂以爲經傳之誤亦不知變矣寒疝之爲病有寒清連于小腹而爲疝故止言寸口脉沉而弱不分左右之脉皆沉故也右沉則肺冷而寒清之氣流入于中左沉則心氣不足血

爲寒邪所犯而少腹痛
則亦言六脉之皆急也
急爲疝正謂此矣寸脉
急而疝者宜緩其中
脉沉而疝者宜用此方

當歸　牛膝　各半兩　烏藥

京三稜　蓬莪茂　延胡索　苗香　木香

各一分　芍藥

各半錢　大芍

各十錢　益智子

三錢　細辛　桔梗

五錢　血竭　沉香

四錢　右爲細末蜜丸如梧子大空心清湯六七

十九

脉急而疝宜用此方

薑三片水一盞煎至七分不計時候服

獨活十銖　甘草炙　木香　茯苓各一分　蓬莪茂　芎藭半兩　荆子　麻黄　芍藥

右爲細末每服三錢生

明意脉

春戊夏丑秋辰冬未四時之喜神取五行之

養氣爲用皆歷三辰而數如春以戊爲喜神

即正月在戌二月在亥三月在子四時放此

而推若於脉中得之犯他脉喜有慶之事

四時脉皆於胃中見以五行皆資土以致用

而周身之脉亦因胃脉然後見於氣口如春脉以弦爲主須六部脉皆循循不急不絶不緊不數而胃脉微弦而緩緩爲本六脉無犯主一月內喜應若正月於戌日見二戌日見三月於子日見則旬內應如胃脉帶弦而毛則主災夏脉洪爲主六脉皆隱隱而大不散不浮不滑不數胃脉微洪而緩緩爲本脉無犯一月內喜應旬內得脉皆不出旬秋脉主毛胃脉上輕帶毛而緩又須有根蒂此一脉難辨如四時之脉氣則反爲災不爲喜脉

惟不浮不輕緩緩而徐浮手按之不依如秋脉然後爲喜脉日辰之應與春夏同注久脉最重手取之則去来如一毬之不散舉之不輕爲易辨但胃脉沉而不擊即是

## 傷寒論

病有懸性命於豪髮之端決死生之間係醫者之工拙醫者之工則病下死生之間係醫者之工拙醫者之工則病之痊愈速如轉圜殿醫者之拙則所投之藥過於白刃此傷寒之病非獨傷人之急殿醫者之難事也古人有言一日二日在於皮膚四日五日傳之藏府故皮膚之間可汗傳藏府之

間可下世之學者未嘗不宗之以爲定論然不知人之有虛實貫則病之有輕重病之有遲速忽有經兩日三日而傳藏府者當審察其脉病之所在而尚在皮膚其始在於皮膚其次傳之藏府當皮膚之間可汗而汗可下而下苟不辨陰陽寒熱之病治傷寒之病失一失之愚蓋傷寒之病內外當汗而下當下而汗誤投藥餌以傾人性命此一失之愚也二失之不精蓋傷寒之病傳之藏府則證候多端千變萬化若不能盡

究其毒氣之在肝者不可疎脾在心
疎肺五藏之治餘皆同此醫者治之決以為
病之所傳在於何藏方之所投當以何藥病
知病之源流不識病之傳受誤投藥餌以希
之所忒藏當以何時藥之一投遂可平復苟不
苟合不幸而少有差悞人之傾危可立而待
此貳失不精也三失之怯蓋傷寒熱毒傳在
五藏攻損正氣其毒氣之盛如煙如霧薰灼
三焦致令病危困不思飲食醫者反以為胃
氣虛不肯通疎遂見傾損性命但今患傷
寒熱毒之人飲食不進大府不通小便黃赤

病者危困即先定其病之所傳在於何藏急
以疎轉之藥取其毒氣其病勢輕減則飲食
增加而平復如故矣此三失之忌也四失之
暴蓋治傷寒之法既失之愚又失之忌則不
精不詳者不可容易言也愚因言治傷寒之
忘後之學者心術未明見識未到但務
忌切忘四失之暴也然後之學者苟能明此四失
以不生忌爲志妄投轉藥以傷人性命此余所
以言四失之大略至於陽毒所注其傳在五
亦足以識治傷寒藏則藏證各殊毋貫於六府
毒所注其傳在五藏則藏證各異其傷
則府證各異其傷人之急者惟二感尤爲極

重余今輯以病證脉候陳其一二庶幾世人
緣此而一日已之傳也

額交顛上入絡腦下項循髆內夾脊抵腰中
在手爲小腸在足爲膀胱故頭項腰脊強其
脉當疾數而浮以散如新沐浴如風而左尺
脉微緊而數

二日陽明受之陽明主肉其脉夾鼻絡於目
故身熱目疼而鼻乾不得卧其脉又經於腹
背上頭項在手爲大腸在足爲胃診其脉當
疾數而浮漸漸按之如通於衰以陽明爲宗

筋而胃脉受之又漸入於秉六脉雖俱
胃脉一指微洪而數 三日少陽受之
循脇絡於耳故胷脇痛而耳聾又起於目銳
皆上抵頭角下耳後其脉當疾數而利得六
七至以上而肝脉又羞其脉當疾數此三陽受病皆屬於
表故其脉疾數而浮以其未入於藏府故經
言汗而已
四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌入胃
上隔夾咽連舌本而散於舌下其脉當疾數
而洪大有骨力胃脉差大
五日少陰受之其脉直行者從腎上肝萬入

肺中循喉嗌脏夾舌本故口燥舌乾而渴其脉
最爲洪大六七至以上心脉隱隱應指來去
如一
六日厥陰受之厥陰之脉自足上循陰器抵
少腹又上貫膈故煩滿而囊縮其脉疾數如
長三陰三陽五藏六府榮衛不行五藏不通
則死大抵三日以前爲三陽受病其脉在表
宜汗三日已後三陰受病其脉在裏宜泄若
初經三日其脉疾數大表裏如一即不可汗
亦不可下只以解利藥溫通其中而已
一二日脉氣疾數以温立發散藥汗之而愈

藥中亦須有通表解藥不可純用熱藥既汗之後疾不數如老人脉當安和亦數軽手按之絲絲不絶重手按之隠隠不自然安寧若既汗之後疾數不解即難治加之以結則困重或至於死蓋結脉疾數而懸絶纍纍如珠而又不流利與滑不同但逐部位通流於指如滴水起頭是也然初得病一日二日内有増寒壯熱脉軽而浮乃謂之傷寒若才得病並無増寒頭疼欲碎身熱如火大頭目赫赤眼睛逆痛雖初得亦不汗蓋治洪大有骨力此名熱病脉六

傷寒之法惟初一二日
四日已後與熱病同醫之
不疾不數不浮不散唯沉軟而細則汗之之
藥宜極以温辛如脾胃濡沉則是感冷之一
候多變成陰證陽毒傷寒面赤頭痛身熱如
火心神煩躁頭目昏眩項背強直脉候當洪
大而有骨力
傷寒寒氣煩燥飲水不休若脉實而洪不是
是爲心脾受毒
忽走在腿面上疼此爲遺氣在肝脉氣洪而
傷寒寒氣後寒熱已退腹中餘一塊疼痛不
在肝脉氣洪大而不實是爲心脾受毒若洪大而不實是爲心脾受毒
忽走在腿面上疼此爲遺氣在肝脉氣洪而
傷寒寒氣後寒熱已退腹中餘一塊疼痛不
可忍
傷寒寒氣煩燥飲水不休若脉實而洪不是
大而有骨力
傷寒寒氣煩燥飲水不休若脉實而洪不是
火心神煩躁頭目昏眩項背強直脉候當洪
候多變成陰證陽毒傷寒面赤頭痛身熱如
藥宜極以温辛如脾胃濡沉則是感冷之一
不疾不數不浮不散唯沉軟而細則汗之之
四日已後與熱病同醫之法惟初一二日脉氣微小
藥宜極以温辛如脾胃濡沉則是感冷之一
候多變成陰證陽毒傷寒面赤頭痛身熱如
火心神煩躁頭目昏眩項背強直脉候當洪
大而有骨力
傷寒寒氣煩燥飲水不休若脉實而洪不是
是爲心脾受毒
忽走在腿面上疼此爲遺氣在肝脉氣洪而
傷寒寒氣後寒熱已退腹中餘一塊疼痛不
可忍

長肝脉縱縱循循而過左足宜清其血

四五日热毒上衝心胸噎塞滿悶渾身壯熱

頭痛不止大府不通亦宜清其血

脉實而尺澤輕如絶

熱毒在肝善怒筋脉碎痛神昏不欲見人兩

脇脹滿手足躁不安卧右手關脉當偏大緊

急而長

熱毒在心頭疼煩躁而赤舌強口語

不快忽心痛善嘔狂言妄語忽思狂走入水

精神不守左手脉一指偏大若舌強硬急以

妙手針刺其舌兩傍出惡血不可刺其舌心

熱毒在脾渾身肌肉疼碎疼聞食即惡思吐通

身發熱兩唇乾焦邊脉
則腰痛腹滿兩頰痛右手關上脾脉
大如衆肺上衝咽喉心胃壅實閉塞不通渾
熱毒在肺面色或赤而又帶白喘欬不得大息
身大熱無口一指偏大而加之以浮
右手寸口一指偏大而加之以沉
熱毒在腎腰背疼痛若渴
數飲甚則項痛而強脇行寒以酸足下不欲言
其脉當左手尺澤微而輕浮又輕緊
傷寒熱毒攻於肝心兩藏毒氣煩盛上衝於
肺血隨氣逆鼻中衄血口中吐血甚則耳中

眼中皆有血診其脉當洪大而疾上如流水之長如仄開仄合仄斂仄散此爲失血之候

熱毒內傷肝心兩藏肝心失守不能主血毒氣順盛上蒸於肺血隨氣行流入於肌膚發爲赤斑通身大熱頭重疼痛睡時如已身傍一身精神昏亂不守其脉雖大而鬱結不解重手取隱隱而有骨力如重夾綾絹

畏之爲發斑之候

傷寒熱病發嗽坐卧喘急不安其脉洪大而加之浮數傷寒熱毒熾盛薰關脉當洪大而疾右手寸

灸三焦攻擊皮膚通身發如橘色其脉如發

班候而差沉與黃疸同法

熱病結胸心前閉塞不通堅硬不散結胸通身發熱頭疼不安面色黯赤喉中涎溢大府祕熱昏悶不省人事病與脈伏暑相似其肺脈當洪大而有力而肺脈實而不浮伏暑即結而沉

傷寒熱病五六日愈加困重因嘆時疎藥下糞如紫黑色病勢不減神思昏昏小腹膨脹狂言妄語不省人事甚則腹中有塊堅硬不散其脉結伏此毒氣攻血腹內有淤積惡物十普九死

陰毒傷寒渾身手足厥冷面青唇皮無色四肢無力心中寒慄重則閉目不知人事氣當細微而沉重手取之又軟而無骨力若腎脈細微而搏沉者爲重

診失血

脉訣謂乳爲失血乳脉狀如按環子內面兩頭有中間曲而缺非謂絶也若心脉肝脉帶肺脉浮以數又謂乳而肺脉微弦而緊則骨蒸咯血

乳而肺脉軟沉尺脉沉伏微微帶緊腸風下血

心脉芤

心肺乳而尺脉緊膀胱滑小腸溺血

肝脉乳而肺脉大浮而促兩手尺澤皆微喘而咯血

肝心肺脉俱盛洪大而不甚有骨力斧開斧

合如流水之狀此金火相傳當吐血而緊促而朝上魚際急按即來遲去速此為腸風下血少多心戰悸事無心力肝脉長而動下貫尺澤心脉大而實三焦血有餘亦當下血

心脉與肝脉不盡連接如滴水起頭鼻衄出血

肝脉細微而澁尺澤微胃脉濡大府失血

肺脉浮大而散心脉大鼻暴衄
訣云緊尔細方爲痔不尔即虫也
六脉浮大無骨力來疾去遲輕手帶洪重手
取之如濡此久害瘡癰血少六脉浮大有骨
力肝脉大而實沉與胃相際胃
脉輕弦而長肺脉大而濡此三焦血泛胃虚下血
六脉如常心脉動腎脉搏而沉又細而數血便血
泄或溺血婦人胎孕在手關寸脉滑數而肺脉虚而
毛尺澤陷而與關脉不際者孕也若肝脉長

而溢寸胎漏失血胎下血有二有肝氣虛微
腎脉縣軟胎脉陷下胎動而失血者當補之
若肝脉有餘而失血是胎溢當凉也
婦人肝脉洪大而反結溢訣云溢脉生婦人
敗血若脉洪大而又伏則積塊而血不行久
則陰門腫以厥陰脉絡門而過

診失精

腎脉虛緜軟而沉又微以濡凡尺脉得入裏
脉又搏擊皆失精心脉動多盜交六脉濡緩
而輕浮又溢多溺精
六脉濡緩腎脉沉而細膀胱脉動而緩以大心

脉動而浮主小便白濁肝心脉弦而腎脉緊
而細重手按之却來疾小府當赤而濁
腎脉細沉而微緊肺脉重而洪大小便即少
腹先痛此寒伏於胞絡中
赤脉伏陰胞滿小便不出小
腹迸弦而結陽中有伏陰胞滿
六脉如常人獨脾脉一指疾大而數唯腎脉
差微主頭疼口乾溺出精此為土邪入腎當清
其脾
婦人尺澤帶弱遲八瘕之脉膀胱脫脉動多下
白帶若腎脉搏而沉陰中濕瘕生瘡丈夫陰

濕此皆精氣之失

六脉皆濇又遲緩丈夫失精婦人失血

心脉肺脉膀胱動而濡丈夫溺血

多口乾即多口乾為熱

可以口燥若婦人産乳多口乾即多捕其腎不

診癲疝

癲疝之病尺脉緊而動按之即虛

肺脉輕弦而虛胃脉沉濡而軟尺脉緊而動

肝脉弦而疾腎脉緊而疾腎脉緊而軟而虛亦為

厥入胃肺主少腹少腹當如有形腎虛即成

癲疝疾

陰器絡陰而過乃爲癇疝
六脉急沉爲疝爲瘕爲少腹痛蓋
搏於中而急則爲痛腎肝脉大急沉爲肝之疝
當暖其腎肝脉大急沉爲腎之疝
小急而沉又急而沉爲肺脉同診皆爲疝若
心脉搏而沉不鼓皆爲瘕

## 診汗脉

脉訣曰陰微盜汗勞兼有此特其一端耳大
抵汗爲心之餘若陰微則血不足則當主少
汗此言陰微盜汗當緜軟而濇右手寸膀胱急而
沉心脉搏而動方主盜汗小府濇急忽失精

六脉皆滑主汗以其陰氣有餘故多汗

心脉大滑而腎脉搏沉以汗爲心之液今心脉大滑則水犯之而動故汗

心脉獨大而洪六脉亦獨大而疾而動主瞤中忽然出心氣獨主故耳

六脉濡濕而重濁脾脉大而濕主汗出惛風

論腸嘻

六脉微而澁腎脉綿軟而沉来遲去疾如代

脉相似心脉沉主元陽正氣虛弱陽事不起

小便後餘瀝輕冒風雨忽哭些子冷物即嘗中

嘻寒如有一塊物在喉中飲食無味

肝心脈溫而遲來遲去速肝脈無胃力主慮心
喜怒忽憂淫思憶其狀心胷滿悶不可忍
飲食難下兩脇脹滿忽時氣痛衝之緩而無
面色青黃肝心脈滿而沉重手取之緩而無
少行步無力大府虛冷非時閒心前如有一
力如新沐舉重來遲去疾胷中噎塞飲食減
條冷線上徹咽喉此為冷噎六脈滿而浮汗
肝心脈浮大而無力胃脈大而散重手取之
雖無骨力隱隱而來唯兩手尺澤差短其胷
前膈塞飲食減少大府祕熱忽時不調噯酸
即心躁噯暖即咳乾痰實頭目昏重兩足無

力載身不起舌上生瘡唇皮焦裂或非時口
涎中流不住胸膈衝肺散為乾嗽忽時急飢見食即吐食
六脈微有骨力而來遲却差小而微急主寒
熱氣隔其狀大府熱忽時却下黃糞汁胃中
萬塞不快滯氣積聚
六脈浮大輕有骨力來遲去速肺脉偏大而
浮加之如促聚於寸口主熱噎胃前噎塞
不通飲食不下所噦湯水只到喉仍便吐出
睡涎溢大府祕熱當用通藥利其大府熱咽

如上所說用引大府藥既通其大府
輕以解肺順氣益胃化涎藥餌之
六脉皆得噎脉肝脉橫格主
洪大如宮實但去疾與氣尋常洪大之脉即脉氣
不同即
六脉皆得大便不通
因怒而得噎脉肝心微小而弦微有滑力而來
遲因悲憂而得所喫物聞巡歷胷間隱隱而
下蓋風不化血不盛當益其肝心順其氣
六脉濡伏重手取之如動而無胃力主冷噎
飲食不進身上厥冷胷中如有冷物填塞
六脉濡伏胃脉偏重濁而重主胃寒履濕而

得噎證四支厥冷胸前噎塞飲食不下

診室女婦諸脈

諸婦人之脈陰陽與男子相反當要尺澤隱隱去如一和緩不澁不弦寸口平方能孕隱來入尺澤弦急肝脈動心脈疾六脈澁而不育若尺澤弦急肝脈動心脈疾六脈洪大流利替而滑與肝脈與勻無子

血盛氣衰爲孕謂心脈洪大流利替而滑

肺脈毛而微却不浮爲孕仍須尺澤隱隱

微間而肝脈微橫即是孕

肝脈澁而不絕尺脈微陷心脈滑是孕

肝脈澁心脈滑肺脈衰一如孕脈然尺脈急

而長爲敗血爲積血非孕

肺脉永急而弦長右脉浮而短小腹堅硬如孕

肺脉急而沉腎脉濡沉小腹有形如孕

肝脉急而沉腎脉小急緊陰痒陰中痛腫

室女六脉皆弦而長又洪尺脉微緊經候通

行兩足痛腫行不得肌肉消瘦大府乾澁頭

痛眼昏室女十六七肝脉弦而長胃脉輕弦

表裏如一骨槽蒸熱風行周身上焦壅肌肉

消瘦忽通身黃黑面色帶黑小便黃赤五心

煩躁漸欲成勞

婦人肺脉盛肝脉軟而虛忽微而動心脉乱

肺氣有餘相刑尅上
候多少遲速不定多
之又無節以致無子
關尺微細而沉腎氣
少遲速不定不能生
肝心脉弦浮而大尺
澤鬱鬱不通大府祕
消瘦漸次如馬藍節
六脉弦緊而長心脉
通長洪大而實尺脉
小便赤大府如常忽

肝脉虛弦而長按之無骨力心脉動而疾肝
邪傳心日夜煩躁忽如顛狂不得眠睡六脉
大而沉肝脉横肺脉浮主婦人血熱經候行少
次忽半年不行或止此小黒血
背上非時有一片發熱口無津液忽兩三月一
六脉大而沉重手取之隱隱乃得輕手如無
重取却有骨力非如尋常沉伏之脉此因胎
藏本熱忽因産後未經百日恣噢涼物寒熱
相伏經及二三月候不通全如懷孕惡血所
聚如有身露下有塊但堅硬不動往却氣
痛只以辛温藥散自然行下不必疎通

婦人脉六脉俱絶與孕無殊但尺脉亦絶如孕尺脉亦
而不勻滑胃脉輕帶伏此因經候行次或産後
起早井悞喫生冷傷損氣血俱病因生積聚
久無所療變成惡物其狀腹中成塊如虵鼠
通行或經候行時只如按之衝手跳起但此病
到年深其惡物帶命喫人血盡忽絶無經候
六脉疾大虛急疾大爲風浮血溢急爲尺澤
有寒忽因經候行時或産後喫生冷不相
當之物忽産後早起傷風血氣俱病臨經行
時忽先氣疼忽小腹急疼

心脈乳肝脈虛尺
多忽成斤流下不
而虛尺澤細細如
寒伏在子宮血海
如米泔少陰腎脈
冷口中即吐清水
六脈疾大而浮腎
六脈弦大肝心脈
頭痛口乾吐痰
六脈沉而搏緣
使性多瘀怒傷損
氣逆涎隨氣上其

快遂有一塊之物上觸到咽喉即手足俱冷
口噤不開不省人事
六脉沈弦大而疾尺脉亦弦而動泛不絶經
候過多七八月不止皆下鮮血此非虚不可
補止可凉風血緣風盛盛血散然久而不止即
肝氣乘脱血
姓娠之脉若肺雖微然浮而聚於寸口當上
氣喘促
姓娠六脉雖要滑而流利然肝脉滑而洪大胃
脉亦有骨力則上喘而口膠見食多
姓娠之脉尺脉不絶與肝脉相連而口軟無

力又沉以細當主少腹疼痛蓋胎氣熱則拄上冷則墜下

姙娠又軟之脉尺脉急沉而搏胃脉濡而重六脉姙娠脉如長而散主胎漏失血也當安其胎氣墜下陰門腫

血不可補之此血溢又澤沉伏肺脉實沉而動腰痛不可舉兩手沉重行步無力睡臥腸痛

姙娠心脉洪大而浮肺脉浮而散胃脉浮而大通身瘙癢漸次面目渾身俱腫心躁不安

姙娠六脉皆結而伏胃脉沉而動主忽然如

中風心前昏悶即如有一塊物填塞此緣臟
腑本虛熱而忽感寒忽感暑忽喫生冷寒熱相伏而不
散以辛温散之
姙娠六脉洪大過關溢寸主上萬有熱唇口
乾焦口舌生瘡非時頭痛不安小便黃赤
姙娠血有餘六脉大而疾又緊而流利表裏
俱有骨力主渾身碎痛并腹内疼不可忍者
宜凉其血
婦人姙娠有發熱如瘧雖夏常畏風此肝盛
血熱風行于表熱極即生寒若肝盛胃虛即
更右一壁寒以姙則血盛而氣衰故也診其

脉當左長而緊微帶浮右關沉而濡如按涩
漿
婦人之脉六脉俱沉細而急左手尺澤微而
緊指如縷而轉連及肝脉按之即結而散此
胞精不足當久患敗血赤白帶若動而數加
之以短即不久傾危
婦人之脉皆沉洪大重手取之其深至骨力來疾去遲至數與常人
隱隱然應指有骨大上隔有伏涎此爲血虛
無異但胃脉亦洪大上隔有伏涎當經候不快忽不行腰痺口乾而渴背
生積塊當經候不快忽不行腰痺口乾而渴背
逆眼睛迸兩臂重手缺盆迸大府祕心憎夜

不得眠

## 診黃疸

黃疸有二有肝熱刑脾而疸有濕熱極而疸若肝脉洪大胃脉濡弱而濁肝脉加擊即發黃疸若胃脉重濁而弦長按之無骨力腎脉搏而沉心脉有動象即濕極而發疸然疸之病多先以肝熱而疸胃熱亦目黃而不乾小府赤而澁胃濕亦目黃而不澁又有下部冒寒寢汗濕氣衝心發爲目黃不必是疸素問言太

陽之時勝有面赤目黃者是也只可緩行其小
府濕熱相鬱而疸即口脉洪而大不弦却帶
軟而長宜利其小府

半產正產論

夫半產正產婦人之常事也然其間多有產
後染成大病忽絶無水月行忽宫藏虧損不禁
忽積成癥瘕而歲久月深傾損性命此無他
輕之候以爲半產而不甚將養之所致也不知
半產當過如正產十倍正產止
血藏空虛半產即肌骨腐爛常切警之正產
有如果中之栗夫栗之爲物俟其自熟陰陽

氣足則其殼自開而栗子自墮方是之時子與殼兩無所損如婦人懷孕十月已滿陰氣足則其子宮自開而兒子生下若月未滿陽氣足因誤服藥餌忽寒邪熱毒所傷忽扶輕舉重忽倒地打傷其胎藏傷損胞系腐爛然後胎墮下即有如世人採折新栗帶殼中斷其根蒂然後取得栗子此其半產之人將養調治得不過如正產之後補其虛生其好血化惡血保其藏氣去其風邪人人無有不安

也半產之後補其虛生其肌肉益氣養血窮其所
因解其病去其風邪養其藏氣加之將養過
如正產十倍損傷之胎無不平復也吁世之
人多輕之至於傾危不可勝數得不惜哉
正產半產出血過多不可禁止忽作氣悶不識
人其脉洪大而浮以泛如新沐如破肚之脉
若微細而澁絶其候凶
胎死腹中其脉洪大而沉尺澤當澁透下部
不澁不絶即無畏謂胎不下當氣滿實所以
洪大而沉又溢寸過若澁而短即死
婦人欲產漿破血下渾身疼診其脉當洪大

骨力肺脉洪而浮主血逆頭疼面赤如醉身體如在
產後六脉俱虛空大腑祕溢語聲微細
脉浮而洪大如血量脉得洪大如黍而紋肺
產後如骨蒸脉六脉弦而微緊有骨力主血
行少未經數日身下乾淨腹中餘血惡心嘔逆
下非時氣痛攻心刺肋
產後六脉輕浮微有骨力而來遲肝脉細而
虛紋多因小遺登後早忽亂噦食物早宜藏
傷風飲食減可近以十日遠經半月粥食不
進才噦一口湯水即聞湯水巡歷胸中方下

入胃既入胃仍下出面色井肉色黃形體困
重此候留風邪在中血熱而感寒成寒熱隔
氣風不用事食不化此病須是嘔得酒一兩
盞故予特製此方可調理每日宜服酒一兩盞如治風咽

芎　當歸各半兩　官桂　細辛　藿香各一分　木香一錢　桑寄生一分

羌活　甘草四錢炙

右爲細末每服三錢水一盞吳茱萸少許薑七片棗二枚同煎至八分去滓空心煎防風湯調下

嘔了渾身手足暖勿頭疼即連嘔一兩盞

倘通身發熱忽行下惡物即便安樂也若

人得此病須是依上件題目方可服此方

產後六脉皆沉伏而沉遲主渾身厥冷非時噤不識人

產後六脉動而疾胃脉滑而溢於尺澤腎脉軟而虛弦此緣產遲忽衣遲既產後早起傷風吐泄不定之脉宜温其胃

產後六脉沉細而伏此寒氣在下要腹痛起動不得不得

產後六脉沉細腎脉小而大產後乳汁多故流出其乳汁冷而口乾此腎冷肺虛寒不可以口乾為上熱悞服涼藥此腎

少陰之脉從肺出絡心注胸中其直行者從
腎上貫肝膈入肺中循喉嚨夾舌本故如此
產後六脉洪大而結肝脉溢肺脉浮
疼堅硬成塊將欲成癰腫
產後未經百日腹疼氣疼轉瀉不止
細而虛此餘寒在中
產後心脉一指偏小右脉重而動又乳陷若脉
而洪大却無骨力則主乳多肺脉如常惟心
脉如此加之腎脉微細則小便虛憊
產後惡血行少腹中堤刺痛須六脉大而緊
肺脉緊系而虛弦爲寒肺主少腹中有堤產後

血熱肝藏風搏生涎發爲疼痛即急心痛六
脉當得二陽一陰一陽實大一陰虛軟而代
産後尺澤虛軟而代至數不及白淋不止血
崩下帶
濕而散
而虛腎
代中風
虛冷
産後六
身躰疼
産後六脉浮而數來去遲中風四肢躁
精神昏悶大府秘澁産後發亂喫物早

傷損脾氣非時腹脇脹滿飲食不快診其脉
産後胃脉遲而肝脉弱
産後亂噢物早傷損血氣身體虛弱肺脉肺脉横格而肝脉乱
少眼如猫兒眼診其脉動而無力此血氣俱病
傷微弱腎脉泛泛欲動其血益其氣暖其胃使進食
當調其胃腎脉微而沉胃脉濡濕而沉多緣寒氣
産後忽因坐草多時地之寒氣所衝腹中成塊忽因坐草多時地之寒氣所衝心背
腰腹疼痛嘔逆惡心不思飲食
産後血氣微弱六脉沉細重手取之細細乃

得脉氣別無陽脉唯肺脉差浮而弱主頭冷
重項頸麪非時間頭面上肌肉麻痺冷頻出後又多虛往或時泄瀉兩足
精神行步無力面黃瘦或未經百日經候通沉重少
行忽悞觸風疾候忽自懷孕時間通大腸虛
身寒冷至産後却有此疾但極以補腎補肝
藥補益其血氣而祛風邪藥助之
産後心中風心中嘐涼藥有此疾
補大府虛中風邪所中腎脉細而肝心脉偏細而沉又産戰慄驚動不安如人將
後只緣腎氣之虛寒風邪所中腎脉非時驚
以沉腎既受病傳其所勝心感腎邪

悸如人將捕物以益心氣去風邪藥治之次
當補其腎又次當益其肝足其血緣心受腎
邪而又肝氣微弱不能生其心氣故以三方
藥治之
産後肝腎虛冷受邪六脉虛微腎脉搏沉心
脉輕帶滑主産後肝虛中風産後血暈之疾
有二風搏血熱而暈即六脉洪大有力又
有一般大府虛冷却因使性激怒傷肝心
其氣上逆因而血暈其狀頭覺重痛昏昏如
醉語聲低小但多思睡診其候六脉輕浮而不毛心脉促而朝

上此最爲用藥之難故作此一方

麻黃去根一分　延胡索　芍

官桂去皮半兩　甘草炙　細辛各一錢

木香各一銖

右爲細末每服一錢半水一盞煎取九分

非時去滓服不要多服病止即住藥若氣

體虛微嗽煎藥未效却加壯熱頭痛面赤

如醉宜服此方

牡丹皮　荊芥穗　羌活　防風各一分　甘草二銖炙

麻黃去根

右爲細末每服二錢水八分一盞煎一兩

沸急瀉出食後徐徐去滓熱服病已即止

産後熱頭痛面赤如醉人眼濇痰急咨問不醒身餘惡血未下因感風邪與熱血相搏壯盛空見食即吐食不住腹脉氣結而不勻逐位間絶然各有骨力而微此用藥亦難宜此方

大黄　荆芥穗　山梔子　芍藥　羌活　黄芩　麻黄去節三錢根　麥門冬

右爲細末不要燉只當歸各一分二兩半　甘草一兩炙三錢漉煎薄荷湯調下若脉氣極有骨力應指而動

又當有伏涎當大府祕熱出後不通煎
二錢半取汁用調下韋牛末一錢半夏末
一字和滓服大府不熱不用韋牛

史載之方卷上終

大也方立蓋矣載之治病用藥初不求其審證精本法以銖計黑炱者服四丸可病按泥為敢而孝

診胃脉

訣云阿緩若春楊柳此是脾家各四季此和緩而貴不疾不遲重而取之阿阿大柢胃脉雖和之而未詳也大抵胃脉雖和五藏脉全若弦而急又而至不洪不濡即爲五藏脉全若弦而急又洪大而緊即有胃力即受肝熱邪能生嘔逆若弦因脾執此非脾熱而侵脾故作此和神之方須使去風邪藥以和胃藥此非方神效但於使療處方覺其驗

右爲末每服三錢水一盞煎取捌分去滓和滓任意服餌才服後巡却覺刑脾而吐唇焦口膠面赤渴引飲小便赤背脊痛如欲洒洒如癢聞暖藥臭只要凉水喫即加

訶子皮 壹兩 削末好者
陳橘皮 貳兩
芍藥 行肝氣乃木香中揀圓小氣烈味苦者 細辛
防風 甘草 炙各一分
羌活 獨活 此止風各半兩
藿香 葉本
根子 此用七錢

已上同爲末每服三錢更入半夏二片水一盞
荆芥穗 貳錢
乾薄荷 壹分
羌活 半兩
連翹 壹分
秦膠 銖三

禾香白芷 壹分 肉豆蔻 草豆蔻 各半兩

如法修製大抵用脾藥相並其他加減乃臨時看風氣多少即萬不失壹脚膝下邊生瘡乃肺氣不下降使然宜服降肺氣湯藥

有病吐半月不已乃心胸間有涎宜用天南星去涎藥去之

水邪攻心氣素問云攻所熱者死用桂與薑

壯心氣勝之其病狂言身熱骨節疼痛面赤眼如拔而腦如脫

小便白濁而口乾是土氣餘而克腎水以枳殼

散清其脾則安痔病用荊芥薰以釣腸丸服之方出靈苑者是

## 爲醫捴論

道之既判變化无窮莫知其端推其變化之間渾淪莫知其源凝而爲質五行而爲氣五運統之鍾而爲人五藏應之自此而後物之可名數之可推理之可窮而道之迹乃大而天地小而一身理或皆然統而論之要其所養一歸之無失而已故雲霧不精則上應白露不下白露不下則菜不榮乃至賊風數至暴雨數起天地

四時不能相保與此天氣不襲道之人之起居乖宜將養失度一藏有餘一藏不足寒温之不能相交榮衛之不能相通風之氣乘隙而入疾如飛矢奇病奇疾應如反掌此天地之與人其理未嘗不一矣古之聖人和於陰陽調於四時春夏養陽秋冬養陰與萬物浮沉於生長之門故生身無奇病而壽蚤門故生身無奇病而壽竭者也賢人則上配天以養頭下象地以養足中傍人事以養五藏而無失亦可益壽而有極時至於庶人不能法天之紀用地之理失於

所養天之邪氣感而害五藏水穀之寒熱感而害六府地之濕氣感而害皮肉筋脉百病無端從斯而至病之一生千變萬化莫能窮究故世之善醫者不患治病之難患識病之難患識病有淺深使藥有重輕度其淺深分毫之間不可差明其輕重錙銖之不可偏淺深輕重之間醫者之精粗病者之性命差之毫釐失之千里得失之間死生之所係醫術之道不得不爲之難也故善爲醫術者一病之生必先考其根源定其傳受審其寒熱寒温辨其上下内外有

真有邪之有虛有實忽隔絶痞塞不通忽空虛
微弱失守可針可灸可下可汗闕於不精勇
於必驗制之有先後取之有輕重條理具存
各有其常而不可差之分毫也夫病之所起
其來有根源其次有傳受其傳有刑尅此非常
之證勞傷之候也夫勞之爲病始於丹元髓
海之虛則真病之所生莫不先在於腎水能
勝火故傳之於心火能勝金故傳之於肺金能
勝木故傳之與肝木能勝土故傳之與脾五
藏相傳五氣相滅五神耗散榮泣衛除而精
神榮衛治之之法其根在腎而末傳於心

者投之以腎邪之藥而其氣自損也當於腎之未治而傳之與心先治於腎攻其腎而傳之與心先治於心逐其邪而保全其心氣也當於心之未治而傳之與肺涕垂膠粘喘嗽不安先治於肺解其邪而保安其金氣也後治於心攻其鬼而斷其相傳之勢火邪撲滅肺藥未投而喘嗽之消滅十亦去八九矣次治於肺解其邪而保安其金氣也後治於腎清其藏而還其真氣也當此未治而至於肺傳之肝胗骨痠痺隱伏於床褥之間受而審治之亦徒勞功如此所為考其根源定其傳變而將養乖宜病其刑剋也夫五藏温病安從來將養乖宜病

生於竅變是則百病之起雖千變萬化之幾而
要其治之以温名曰不及涼而治之以熱名曰太
過不及者病之不能滅而太過者反有所傷
於真氣也冷者熱之寒者温之輕重得宜疾
徐有制動無毫釐之失而所療之病舉獲萬
全此治所為分其冷熱寒温者矣傳曰行
枯枝大風入林者先折猛雨破湮隙者先壞則入
以感傷於人莫非乘隙而入此人之所病不能
無内外上下之辨也肺氣喘嗽膠痰堅實伏
在胸中潮涎併起傾損性命如此之類病在

上也脚膝痿軟行步無力腰膀沉重如此之類病在下也生於皮毛染於筋骨忽寒所中飲食不消忽熱毒所攻大府祕澁百端隨人冷熱如此之類病在上者吐之而安然不可吐者當制之以緩在下者補之而愈可汗暗隨其所宜而在內者可攻可補可下可急在外者可針可灸其冷熱而已其治之有法亦何患乎所投之藥無必勝之驗者哉此辨其上下內外者也夫五味爽人之口五色盲人之目嗜慾無窮貪着不已憂患迭生精神弛

壞而去真殘根伐是人之不能無虛實者爲有餘而去之而補之温之以氣精不足者補之内外之辨故形不足者温之以氣精不足者補之以味五藏六府之内實者瀉之有餘者瀉之虛者補之有餘者補之以針石　此其補瀉之有所不同也乃所爲分肢八節之外實者通之以藥餌四時五人年未滿五十而動作有衰非天之私於古之人年滿百而動作不衰蓋其全而邪不能惑其心血氣安和精神内守故年滿百而動作不衰蓋其全而邪

氣不能勝也今之人不知養道之術務快其心逆於生樂血氣枯衰精神耗散乃有胎胎相傳病病相孕受氣虛微肌躰羸弱呼吸喘息之間而百病臻湊於五藏六府者矣此無他精虛神之而外邪得以干其陰陽之正氣也善爲醫者保其真去其邪無使過劑之藥反有以賊其真邪者矣夫病勢至有隔絶痞塞不通空虛微弱失守雖心識者矣夫病勢之急而藥餌攻之病之在外針石取之其有病之在內而難制聖人不能灸之

法類而舉之若今陰毒傷寒其四肢
不過一炊而人事急於氣海灸之一炊
月任意取涼頻飲涼水忽飲冷酒後恣貪色
慾精氣至虛陰邪壯盛陰陽相奪陰氣偏勝
獨守下元陽氣虛微上攻頭項其病脚冷如
雪四肢八節俱寒脉氣深伏但有其熱如火
其痛難忍方此之際針石何濟急於灸之一炊不過數十壯而日前之所
灸四肢八節俱暖而陰陽之氣仍相交際者又十壯皆轉下須臾有冷熱之
氣相交際冷酒皆轉下須臾四肢八節俱暖而陰陽之鮮赤而

疼痛忽堅硬而不痛急以濕帋帖其上尋其
帋之先乾處便灸一灸至百壯餘而帋上不得
以冷腫而帋先乾處即於腫處當
頭着灸亦以百壯止但量肌躰厚薄方可
安灸瘦薄者少灸肥厚者多灸忽是冷腫灸
而不痛則以聞痛而止因喫硫黃後有此病
更在虛處不請安灸大病之可汗可下可針
可灸其緩急之序重輕之別操之不失其宜
施之各有其度又何患乎人之不安病之不
愈者哉嗚呼天地無全功聖人無全能雖黃
帝岐伯之論尚有不治之病則今有非常之

候不得其詳未明其實闕而勿治醫者不爲
之辱也苟其病之熾盛人之危苦萬醫者既
明其理又識其詳當此之時不可有分毫之怯
急以毒藥驗針灼其生於萬死之地舉必萬全
然非至神無能與此愚者行之無異於操刀
殺人也何爲闕於不精勇於必驗者矣
此皆持之有術治之有統不可相踰於規矩權
衡者也至於病之有非五行之所傳化若寒
壅之相交陰陽之相伏忽似熱而反寒忽似
寒而反熱忽兩寒兩熱之相攻忽有餘不足
之相礙千變萬化而生人之口病若今若肺

藏本有實熱又因臨大風昌大雨極感於寒
邪之氣寒邪之氣客於肺經寒熱相合成嗽發
醫者治之投以涼藥順其肺氣則助其寒邪之勢而嗽愈增投以暖藥則激其本藏
之熱而加喘急寒温之藥俱難以進則脩方使藥之輕重當見於此或有以羌活

黄橘皮　麻黄去根　紫菀　杏仁二去雙仁炙

細辛　獨活　防風　桔梗

右為末每服二錢沸湯點空心服不過數服而嗽止

此輕口口解其寒邪空心賺其寒邪之氣流出於胃也此所謂治其寒熱相交者矣忽有

人之藏府根本實熱却因復天暑當
入凉處頻飲凉水寒氣勝畏其熱氣
伏陰氣固而不散陽氣伏而不動其
一塊狀似傷寒而脉不甚也其病結爲
寒心中煩躁狀似傷寒而脉不甚也其候忽
之妄投轉藥雖六府名爲伏暑者治
前之結塊愈增堅固此無他所下之
寒邪之勢陰氣轉堅而不散也治之之法

芎　細辛　霍香　黄耆　陳皮　木香　各一分

右爲末每服二錢水一盞煎至七分
爲湯空心服之先解其寒邪之氣不移時而

心前之結堀頓然消散其暑毒之輕重必投藥以解之則亦何患乎藥之不驗者哉如此所謂治其陰陽之相伏者矣夫病有似熱而反寒者若今有產後之病五六日藏積冷陰氣偏勝乳汁倍多無故流出口舌常乾非時發渴頭旋目暈飲食減少腸胃虛空身躰羸瘦每思登後忽又不通淺學治之不過曰口舌常乾非時發渴上焦之有熱也頭旋目暈血熱而生風也每思登後又忽不通者大腸之祕澁也是不知乳汁倍多流出則口乾而乾發熱從可知矣躰氣虛

弱頭旋目暈腸胃空虛而傳送之氣不足則
每思飲食減少才喫醎味即便惡心醫者治
而投之冷藥豈不傾人性命於頃刻哉可知矣一旦悞以為熱
似寒而反熱者若令壯歲之男子志在遥邪病有
恣貪補藥以昏求色慾熱藥所攻榮衛結澁
上氣不相交際脚肌躰
膝痠痿弱行步無力兩足多冷或時增寒
黑瘦飲食減少才喫醎味即便惡心醫者治
之不過曰此五藏六府之虛弱也投以暖藥
譬猶抱薪救火與甚亡攻之氣榮衛之藥
解利肺經散其毒熱上通則

其陰陽之氣仍相交際手足自暖脚脉損輕而平復如故矣此所謂似寒而反熱也夫歲陽太過天地不無旱乾之災歲陰太過天地不無水潦之患以虛生寒以實生熱則人之藏府不能無兩寒兩熱之相攻也若今偏陽毒之類皆兩寒兩熱之相攻者矣哀哉色慾無厭喪身之本世人多以迷心恣其所欲反飡毒熱之藥以希苟活其丹元髓海雖已空虛而藏府骨槽虛熱轉盛此病之所生不能無有餘不足之相凝也若今人之患大腸秘澁忽忽五六日忽忽十日出後不通小腸虛僉日

夜五六次每次小便仍有一盞半盞已來
其清如水忽時黃色臨小便時其痛難忍甚
則心神煩躁此肝心脾肺四藏之毒熱有餘
而腎與小腸主氣不足也脾肺心積熱則腸
乾澁腎肝心積熱則水道滑口瞑黯黑熱毒之氣如煙如
霧鎮在中焦因其小腸虛僬水道氣如煙如
於小腸此所以小便雖清其痛難忍其病有
似於淋而非淋疾天下物理有似是而非者
正謂此也醫者治之投竣藥以固小腸而則
滋其肝心熱毒之氣而痛愈加下涼藥通大

府則藥隨水道只行於小腸而病愈盛冷熱之藥俱難以進此有餘不足之相凝也治之法當以通氣藥爲湯洗其穀道先引其五藏之氣歸入於胃使其湯水稍隨氣而下入於胃第二度使水漸取得一兩箇下氣相次如藥取得些小乾糞氣歸大腸所餘湯水亦隨氣行歸入大腸則未喫小腸氣藥而小便自止也漸次使藥通其肝心熱毒之氣使出後徐徐取其熱毒所取下物如半腐爛者淡血之類如此然後得其病根之消減也治所下之藥具在方中此謂治其不足有

餘之相礙也吁醫術如
已醫道如海余之所得
雖無窮道如海余之所得
而已略舉數條論之於
者今略舉數條論之於前以明醫道之大略

## 涎論

論曰舟非水不行然波濤沸溢則覆舟之患生人非氣不活然痰涎併積則傾人之患至
波濤非自生也其所以積之也痰涎非自積也其所以積之也
也痰涎之作氣留之也故善行舟者不懼波濤而懼舟之不完

善攝生者不懼疾涎而懼氣之不順故世人之疾病甚而世之醫者乃有見其所以殘傷性命之急者無甚於疾涎而不能識忽有識之而不能治此不幸之人其殘傷矣橫者不可勝數何則舉天下之人獨知風氣之有涎不知藏府冷亦生涎熱亦生涎一生千變萬化而病之所起非特一端愚今略舉數端明之亦庶幾其疾病之徒無手橫者矣夫涎之爲名一也而具數種一曰風涎二曰熱涎三曰冷涎四曰毒涎其一曰虛涎五曰風涎蓋

因人之風氣之盛上運於涎不能下入於胃
風氣一止蒸痰涎併起而上填塞胷中即使人
悶倒無知其風氣久不順性命之傾危速
如反掌若其風氣未復自順
其涎亦平復如故此蓋人之肌
肉厚淖重裹深風不得泄於外風熱內攻大府
祕熱毒氣上攻遂生斯疾此名之曰風涎
風涎之為名一也而人藏府虛實之不同則
涎之為病也變化不同言一愚得以命其
之若今人之病大府實熱痰涎蒲口吐如清膠
胃中端息如常但湯水飲食俱不可進凡所飲

食只到喉中即不能下用力嚥下即喉中隔絶喘急悶倒良久方甦惟進得些小膠粥此亦風涎之候也然風涎之候變不同則當如何而治之曰善除荆棘者先斷其根善治風疾者先順其氣人身無倒上之涎天下無逆流之水今風疾一上而填塞胷中傾人性命者風氣運而上也今使天南星半夏之類是不知病之源流去荆棘而不斷根也苟能以藥先順其風氣兼發其湊理使其風氣得以發泄於外順行於内則其胷中之疾涎自隨氣而下未嘗涎藥而疾涎自

順矣然病勢之有輕重則取之有緩急若風氣痰盛膠涎併起其氣卒難以順之者當制之以急非吐之不可風氣未極痰涎未深者當制之以緩先順其氣而後治其痰涎未併爲害未深者當制之以緩先順其氣而後治其痰此亦治涎之大約也然風涎之候又有冷熱之不同或有寒風所中冷涎所聚其人必先覺於半年或數月前喫食減少身躰沉重筋脉痿弱才見肉味便覺惡心非時口中一兩點冷涎出身不自覺冷涎所併忽悶倒不知人事良久復蘇即生麻痺或生癮疹或失音不語冷涎所積少有上併多聚中焦盈溢胷

中包裹心絡能使人
狂言妄語神識不定非
特不覺手臂勿自舉
治之法先以溫煖之藥散其冷毒
熱藥發其腠理然後
鉏且暫安而寒風所
萬物其人雖病難死
養人也寒風所中於
含殺氣以肅殺萬物
古人所謂風所以能
今有取性之丈夫多
古人所謂風所以能害人也其二曰熱涎若

爲心恣食貪補藥忽因酒醉酒房室勞傷其精毋
元髓海虛隔在中焦因甘藏府骨膲虛熱轉盛其
涎所積雖以空虛而若其腎藏之虛寒邪氣與
熱涎相交發爲疼痛重則不移時而傾人性
命醫者治之不過曰此肝腎之氣是不知熱
涎乃病之根本然京三稜蓬莪茂非能治氣
而世人用而不驗者不識其病之源流也善
爲醫者臨事制宜隨機應變審當輕重涎多
者吐之涎少者下之所用之藥偏取肝家之
風毒又何患乎人之不安哉三曰冷涎者若
今人之肝氣不足忽因使性長懷

淤怒傷損肝心正氣此冷涎之所以積也脾
氣不足復因肝氣所乘伏而不動停水滯穀
久而不化肝心長懷淤怒則其氣滯溢而不
行此冷涎之所以積也然肝生風性之不定
忽時而作肝主怒怒則氣逆此冷涎所以隨
氣而上而生人之大病也證其候必先聞心前潰亂不快相次悶倒不知人事手足
隨氣而上觸至咽喉即悶倒不知人事手足
肌肉漸次寒冷遂巡復平愈治之法當以
吐藥取之得其所取之涎其清如水其冷如
雪取涎之後復審其所藏氣隨其所病而調和

之亦無患乎藥之不驗也四曰病涎其人必好食長堅硬之物傷損脾氣忽因寒邪熱毒之傷忽因大病之後餘毒客在藏府其氣似涎因而聚積涎與滯氣相交結壅昏滯不能宣暢是以涎滯肝正氣忽因寒邪熱毒之傷忽因大病之後餘毒客在藏府其氣似涎因而聚積涎與滯氣相交結壅昏滯不能宣暢是以涎滯

疼痛此名之爲病涎往往發爲痛輕則連年累月痛無暫停重則傾人性命者也明其病證在心前痛無暫停重則傾人性命者也明其病證在心前

速如反掌重輕之殊涎之多少也治之之法當在量其病勢輕重以利藥取之輕則其涎如油重則其凝如白膠取涎之後然後使藥

清其藏氣益其正氣使之平復如故也五曰

虛涎其人必因受氣之虛忽因大病之後生
之氣不順之氣隔在中焦是以虛涎併上蒸上氣
冷所傷忽因疾病之間虛熱上蒸上氣不相交
際不足陰陽之氣因而積聚致令藏府
鎮長有餘下氣但常不足陰陽之氣不相交
風熱一攻即其涎併上蒸上氣
蒲口漸聞心前有一物上觸咽喉中急
促悶倒不覺兩手相亂把拽風氣極上即頭
上瘡忽皮膚間痛遂巡風氣順下乃遂平復
治之法當以臨發時使五分利吐也若利吐不出
其胃氣不足不可十分

非時以壞風涎藥攪之候分數少減即於氣
海上安之一灸引其涎下入於胃然後使藥
調其藏氣酌量其藏府之虛實有餘者瀉不
足者補令上下之氣相等可庶幾其全安也
若脉氣微細大府虛冷減其肝氣益其胃氣
斯可矣若小兒得病之者全是胃氣之虛氣海
上安灸補暖脾胃以今愈斯疾仍不輒取喫取風
涎藥也六曰毒涎若今人之患陽毒傷寒肝
心脾肺受其疫毒之氣因其毒毒涎相積聚在
中候其證即使人大府祕熱小便黃澁而色
黯赤渾身發熱昏昏如醉狂言妄語不知人

事如此之候悉皆是涎診其脉氣又却
手取之骨間乃得此乃痰毒之骨間乃得此乃痰毒之
其脉氣非脉氣之與病相交者也此所謂毒涎
者矣治之之法急以疎轉之藥取其毒毒氣蕩下
肝藏爲主偏下肝脾肺四藏俱治然當以
病千變萬化其狀不一是今之所舉數端止其
大略而已後之學者類而推之加以識見之明
而診療無差亦無患乎涎爲人之大患者矣

治涎諸方凡一件只有此內一件
一句病證皆可與此藥

治涎諸方凡一件只有此內一件
一句病證皆可與此藥

治一切丈夫婦人風涎所積非時急飢見食

即飽心中嘔逆一切飲食都不聞味口中涎
溢唾如濃膠急即吐逆食不住腹面色青黑
肌肉乾燥唇皮焦赤忽時黑色兩腸忽時
忽衝助下跳戰轉入背脾痛遍身肌肉忽時
跳戰兩臂沉重忽如有物壓着夜間都睡不
着忽如有物上觸咽喉即昏悶不醒須臾仍
却無事忽時如有物纏繫腰背忽時如有物横
在背上腰背疼痛忽如蒲口生瘡忽時下赤黃
忽時泄瀉不定頂上躁熱小便赤色通身發
熱眼色已勁急忽時心躁熱上攻胃額發汗如
水忽時項上皮肉間疼痛不可忍忽時心前

肋下小腹兩脚都腫若是婦人連陰門腫急疼痛不安忽忽起兩眼物忽聞重處非時麻痺致也凡人不安有此候月水不行通得小便大發熱昏絶不醒人事須吐氣千百聲良久方蘇如此是藏府有積毒風涎之所

藥但以論輕重加減服餌肌肉毛髮俱軋軋然有聲即藥之驗也此病有喫此藥後四肢八節喫後大府反熱即取病之證也此病根若根受之太深此藥不輸徑進服徐徐減其風氣若是大府結病勢濃者急攻肝俞減其風氣若是大府結澁更添下面藥數味喫大安校若是太歲過六壬丁卯已亥之年常有此候已已已已已亥年其病尤甚若遇已上年辰雖無病之人亦可喫此藥免得生病

治風氣取涎方

荆芥穗　麻黄去根　薄荷　羌活

以上細搗爲末每服貳錢食後煎生薑薄荷湯調下和滓服若是大府祕不出後即用大黃壹分半夏藥不快只請去滓嘬候即和滓嘬也若是大府祕不出後即用大黃壹分半夏三錢半生薑半大棗三枚水煎服

連翹　防風
木香　乾蠍
半夏三錢　山梔二分
獨活　芍藥
僵蠶去絲各三分　牽牛半兩

每服用上面藥末三錢共計六錢滴熟水丸如梧子大爲一服巳午時慈湯下大府尚不通忽穀道中通糞不下即用

皂角
道中
下也

痢論

夫痢之爲病世人所
未嘗有必驗之方古
之論服餌之間世人
人名方爲大奇後之
也若今有人得一名
效不測然有一人服
之驗也此愚以方冊
所載者未嘗有必驗之

皂莢半生二味搗羅爲細末筆管盛
吹之鼻去指甲用指頭轂道中撥取乾糞

方也以赤爲熱以白爲冷醫者之辭萬口一說此愚以爲古人所談未嘗有卓然之論也何則以赤爲熱以白爲冷赤白爲冷熱不和獨知大綱而痢之有變化重輕之別得其粗而不得其詳知其一不知其二者矣夫痢之爲痢一名而具八種一曰痢二曰赤痢三曰赤白痢四曰水穀痢五曰血痢六曰疫毒痢七曰休口口痢八曰小兒疳痢此皆受之不同治之不口口不異索其詳而論之則其痢之爲病雖口口口重輕之不同然一歸之脾氣之虛而已萬物非土不生五藏非

脾不養脾者中州之土能化腐水穀設滋味於肌膚者胃行糟粕於大腸膀胱藏温和而有冷熱不調即自生他病不爲之痢也是故赤痢雖熱本因脾腎之虚赤白相雜雖爲冷熱不和而又有重輕之別若今人之下赤痢先轉數行而後有赤痢之變若以赤痢爲熱何乃有先轉之説歟以赤白爲冷熱不和而有赤少白多赤多白少能無重輕之別乎復有赤少能無重輕之別乎此病有變化之不同予得以命其祖而言之也一曰白痢者五藏傷冷脾胃極虚之所成也其得之重出後如鷄卵清如魚腦狀者腎

有所傷也急以補脾黃丸主之無問多少空心即服以止爲度蓋治之不可後時也二曰赤痢者三焦之熱血有餘而脾腎感寒之所成也夫肝心脾腎藥以暖之加以鎮熱血之重人多食生冷愛喫涼水口之所納於脾腎寒温之氣所傷而肝心氣變血都聚中此肝心之血乘脾之虚滲入大腸而赤痢者也先服解寒氣藥次喫暖脾藥其治之如反掌尔三曰赤白痢者心肝血損而脾胃藏腑皆虚之所成也脾氣之虚則停水滯穀凝而爲滌肝氣相乘胃氣之虚則

脾氣則肝心之熱血兼脾之虛滲入於大腸
與胃中之涕相雜而下此所以爲赤白也忽
有赤少而白多忽有赤多而白少忽有赤白
相等此受病有淺深之差毫也當在臨時
度宜隨機應變不可差毫忉以謂赤多而白少者清利肝氣而輕暖脾胃也白
多而白少者清利肝心之氣而甚暖脾胃也赤少者微清肝心平益脾胃氣而自愈
但發寒熱爲寇重方見痢方中四日水穀痢
其人多飲涼水忽餐生冷之所成也所下之
痢皆黃色忽時下白沫治之之法補暖脾

胃而其疾自愈五日血痢其人多淤怒因更
相毆擊忽因焦熱極驟食生冷脾胃損虛之
成也所下之痢多黯赤色無寒熱者清其肝
心之氣而疾自去矣六曰疫毒痢者感毒氣所
傳一坊一境家家戶更相染易無有不病
凡下痢之時忽先發寒熱忽先轉數行忽生
冷所傷因而下痢所下之痢渾是赤色濃如
膿涕忽時半盛下濃血腹中刺痛忽心中
煩躁三焦否隔全不思食此名爲疫毒痢也
然則疫主毒所主五藏從何而得經言春若傷
陽夏必人多瀉痢此疫毒之根先受之於肝

也夫春氣本和而反傷於熱此陽氣
家受熱而其氣有餘者也經言五行受病必
先傳其所勝則肝之得病必先傳之與脾而
世人於夏月之間多食生冷傷損脾氣脾氣
虛肝邪得以乘之而脾受肝邪伏而不動莫
能消水穀之化穀此疫毒之痢必先轉數行而後
有赤痢之變也先轉數行者脾受邪而脾已
生病也後有赤痢之變者肝之血熱乘脾之
虛滲入大腸而爲赤痢也中間忽有赤白相
等者此肝胃中之寒滌也若發寒
熱方見赤痢方中有白少而赤多或有白多而

赤少肝之邪毒有輕重之不等也七日休息痢者蓋患痢之人其治痢之時不能解肝邪而肝家餘毒之所成也脾藏久受肝邪則不能強健消化水穀是毒之所下纏綿久遠而不較此所以爲休息也八日小兒痢肝受熱而相刑於脾之所成也肝之刑脾則所下之痢全是赤肝受疳氣則骨肉消瘦所下之痢多黄漐白沫少有赤色相雜也如此數端亦治痢之大略而已至於醫道之淵微愚不能知其妙

治痢諸方

治脾胃虛冷停水滯氣凝而成滌所下之痢渾是白滌宜喫此方初得痢時並無壯熱頭痛方可喫此藥

舶上硫黃一兩細研如塵

右以白麵一分鍋內炒令熟放冷於乳鉢內與舶上硫黃末同研令勻滴熟湯丸如梧桐子大每服五十丸以止爲度空心温米湯下若初得痢時即不可喫此藥

治脾胃氣冷相刑於腎土水相攻寒濕交爭所下之痢全是清涎有如雞卵清之類宜喫此方將舶上丸相間服

右以上細搗羅爲末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心温米湯下五十丸空心服有壯熱不請喫焦雘熱其血流散乘脾之虛滲入大腸而所下之痢盡皆赤色別無白痢相雜並不壯熱亦無心腹疼痛診其脉上都洪大脾脉外鼓而沉大宜服此方以變成白忽赤痢消減後却聞得小腹迸

石斛 去根　白朮
草豆蔻 麦麪炒　芍
防風 各一分　訶梨勒 逐箇麪裹火炮核只使皮 秤半兩
牡礪 一分火通赤　吳茱萸 續斷 從容分
乾薑

脹即便脩合後方喫取平安

各一分 蒲黃 四銖 麻黃 去根 防風 麥門冬 去心 獨活 木香 牡丹皮 去心 前胡 去毛 荊芥穗

右爲細末每服二錢食後熟湯調下去滓服候赤丸稍減忽變成白忽聞小腹脹即修合後方喫也

治赤痢喫前方了忽變成白忽已校可忽聞小腹膨脹宜喫此方

防風 甘草 炙各一分 芍藥 半兩 木香 錄三

訶梨勒 麵裹火炮熟 去核只使皮半兩

右爲細末每服一錢米水一盞煎取九分空心温服
心和治水瀉痢無赤色只下黄水淳喫
下白沫飲食減少肌躰無赤色只下黄瘦宜服此方

訶子 麵裹火炮熟去核只使皮一兩　各半兩
芍藥 四錢　黄芩 一兩細研　甘草 四錢　黄橘皮 去白　肉豆蔻 一箇　白朮 一兩

右搗羅爲細末用舶上硫黄相和令勻用薏苡粉煮粥丸如梧桐子大急火焙乾每服五十丸空心温米湯下須是焙乾莫令損藥氣
治赤痢所下之痢渾是鮮血忽有黯色據候

多因使性瘀怒傷損肝心正氣忽因事爭打
傷損經絡致有斯疾

桑寄生一兩　獨活　木香　甘草炙
牡丹皮去心各一分

右爲細末水一盞煎取八分非時喫每服二錢
治疫毒痢并論痢此一集方無不精妙但要對證用之取效如神大抵痢
不病緣疫毒之痢非獨一般證候多端根
凡疫毒痢一方一境家家戶戶更相染易無
源奇異雖神農岐伯尚以爲大奇之病後
之學子醫曹未識其粗迹豈知其津涯但
言白痢爲冷赤痢爲熱赤白爲冷熱不

和不知有何經證以白爲冷偏下駿藥幸亦無差以赤爲熱不知以赤爲熱從何藏愚者妄言不過曰熱從肝心因何無涼肝心必驗之一方定治赤白痢以行於世以知指痢稱何藏愚者妄言不過曰冷熱不和又不知因何無和氣藥一方定可用治赤白痢以存之方冊醫家自不知病在五藏從何而生只務撿方行藥幸而偶有所中人且獲安不幸而差之毫釐所投之藥乃暗中與戰但病者不見痕迹所傷無能知覺觀之得不寒心吁神農之後世世學子醫者

未明天地之氣候不識五藏之應變者不能
知常病之源流豈足與語奇病之變化是以
痢之一病方冊所載古人所談未嘗有一言
一句略明其粗予嘗探尋五運之氣參稽諸
天地之變化推步六氣之行度參考脉氣之
纒注以天驗人以人應天痢之一病億萬分中
少知其一二但以其變化之間獨可神悟難
以言宣其窮筆舌之間不能曲伸其旨使後學
者洞識精微而無悟人之性命深以爲恨
今但子細陳其粗迹以爲後之醫者筌蹄在
詳審而用之適足以知我之用心誠以爲愛人

之切尔經言春若傷陽夏必久多瀉痢此之
一節無問太歲但一春之間早有炎暑暄熱
之化至於夏月忽生瀉痢之病通其肝氣其
病即愈但兩三盞無驗更不請喫若少有效
驗喫之以較爲期蓋瀉痢之一病證候多端藥
中其源即便安投故無在於多喫也一切慮世
醫悞認證候妄投藥餌以傷性命但患痢
人所喫之藥兩三盞不見効驗更不請進服
今自有方具其變之狀在詳擇而用之求無差悞緣痎瘧痢疫痢之狀變證多端予請以太歲推之

司天之歲雖殊相鬱而生病則一也方見下
卯酉之年陽明司天金行其令氣化凄清人
少脾病六月七月水火相犯八月九月金木相
攻水之與土司地少陰在泉火能制金一旦於
是歲君火司地少陰在泉火能制金一旦於
歲中火遙所勝焰明郊野則化來救寒更作
人病赤白下注從此而生
地與此同少陽在泉相火司
則傷人遲治同法方並見下
辰戌之年少陽司天水化流行寒邪犯心血
氣內變傷損於中因而下注赤白此病世之

罕有差盖傷犯人之急也但
辰戌年之痢發熱如火當痛所下
草水如膠涎如茶脚不急治之其人亡也如反
掌方並見下
已亥之年厥陰司天木化流行土木相交風
濕相爭脾土受邪此肝之熱血乘脾之困滲
入大腸而生赤白瀉痢之病方見下
甲子甲午濕化已上天地氣候推之未詳請以五運
之政推之
甲子甲午濕化有餘丙子丙午寒運太過庚
子庚午上受天刑必有水救已上年辰天地

相過剛柔始交月氣是水與天相犯
以爲一年病始更遇寒濕之運與水相助忽
受刑之淫一年病始更遇寒濕之運與水相助忽
有清肅之化至於夏月氣候反熱交爭
乃生赤白之痢爲此寒濕犯火德之與常例
不同自有方在下子年少減若
病痢疾乃加
戊子年天符戊午年天符歲會氣以之
詳人以多患暴死有此證候治之亦與丙
下赤白之寧一旦寒濕之氣少犯於心忽注

申年
火今
上有
後使
之化
危中
而死
壬子
乃受
瀉痢
地之

共居若於歲中又有寒濕之多所生之痢治亦與甲
寅庚申同法方並見下
乙丑乙未丁丑丁未己丑己未辛丑辛未癸
丑癸未已上年辰每一年之運各管三氣化
乙丑乙未金運本涼以其氣之不足反與少
徵同化然火土交睽太陰所寓熱化並行濕
熱相持心氣內鬱血損於中注下赤白忽火
之不常其德侵傷其不足之金則水必相救
寒邪犯心因而生痢此乙丑乙未年之病忽

有以土之鬱火而生忽有水之犯心而成其受病其治大同而小異也土水共胞寒濕同化則其其治大同而小異也土水共胞寒濕同化則其熱寒蓋以此矣向下並見下經言其運涼丁丑丁未木運正風與天土相犯然以氣之不足反與少商同化若於歲內金之不常其德多有清肅之化則火必相救炎暑將至與土相持而濕熱相交血氣內損乃注下赤白然丑未之年天能制化大來土木相戰則肝而其怒無時忽若風色土將犯水木雖不足發傷脾此丁丑丁未之痢忽起於肝忽生

於脾者矣方見下經言丁丑未之年其運風
涼熱濕蓋以此也
巳丑巳未年天符歲會氣以之安然太陰之
人以味先苦後甘物以之寧
土性生金火性剋金氣化相交
內變之痢疾所生人多暴死此蓋邪
傷於貴人也方見下遇此年辰常以
氣藥以安貴人是服食之宜也
辛丑辛未水運不足錐上受天刑然下加太陽
反歸平氣是歲天主地水寒濕偏多火氣見
鬱若有痢之疾生其起在心其鬼在於脾腎

方並見下

癸丑癸未火當其運其氣不足反與少羽同化是歲太陽在泉寒氣不減寒濕更作火氣見傷痢之所生其病在心其鬼在脾賊在腎胃方並見下

寅申之年大約與子午年同但相火之政暴遇其獨勝則其害立至若與水土相犯其候變證多端方具于下

乙卯乙酉年金運不足本與少徵同然乙在卯上爲天符反歸平氣在酉上爲三合名曰貴人邪不可犯然是歲金位在上火位在下

名爲逆化金燥交合切忌火氣之勝若火有所勝水必來救此年多忽有痢疾之熱病起於心氣候清寒病起於腎方具于下丁卯之年木運不足下加於卯雖上受天刑其政不減是爲歲中之勝痢疾之生其鬼在肝乙酉之年木受天刑然是歲火司於地泉與木相得忽於歲中反有風熱之作方見下

已卯已酉年土運不足然水受天刑必難相犯忽於歲中風濕交爭痢之所作卯年宜有此候酉年差減若有此疾治之亦同

辛卯辛酉年水運不足反與土同化而歲水
不及火化妄行與土相持勝熱客於胃多下
赤痢忽作便血土勝則溼火而注下赤白是
歲若有痢疾之生一起於心一起於脾有方
治之具見于下
甲辰甲戌丙辰丙戌之年寒濕過多火氣見
溼庚運之年清化亦甚是歲運氣與天水相
生與地土相得已上諸年辰痢疾之生切爲大
害不可妄投涼藥戊辰戊戌之年土木相
壬辰壬戌之年土木相攻所生之痢其證自
各不同方具于下

乙巳
與少
之甚
已巳
亥之
偏弱
符火
見下
子午
辰戌
月木

乙亥之年金運不足無能與天
徵同化丁巳丁亥之年上爲天符木化
已巳之年木能制土脾將受邪辛已辛
亥之年水運不足與土化同土木相
攻脾氣與地相
之火與天相得
疾所生起在肝
以運言之猶且未足乎請以六氣推之
年丑未年寅申年四月五月火土相交
年四月五月水火相犯已亥年四
月五月金火相持水

若相救耶邪乃犯心子午年六月七月土火相
鬱卯酉年六月七月火相犯辰戌年六月七月土相持
七月土木相攻巳亥年六月七月火土相持
巳上年六月忽生痢疾皆隨其月氣相攻而成
也善爲醫者先治其患思其病自愈議者謂
六氣推遷於十二月中各紀一步今獨舉四
月五月六月七月兩年六月七月土水二化長遊行於其
夏秋相交火金相繼土水二化長遊行於其
間土寄治於巳所以生金火位於申所以制金土
生於申所以傳金水位於申所以救金然後
夏秋有相承之理五行六氣元妙從此而著

人之病疾從此五行元妙中生是故聖人名之曰大奇之病予故陳逐年四月五月六月七月之氣候以言之其餘他氣生病皆倣此而推切以六氣之政化見之未詳請以脉候時氣之下病服涼藥暖藥藥皆不驗診其脉指外鼓而沉此名腸澼非藥力可治久當自較但世人有患不驗纏綿經久却因亂喫一般物便得安校此乃正腸澼之候也今有患病診其脉肝脉一指小而緩此病輕治即愈今有人患病診其脉腎脉一指小

而沉
常治
人患
絶所
脉微
痢其
熱通
未足
謂如
未嘗
年中

未嘗有一年無水土相攻未嘗無土水火相犯但五運之政譬如權衡一自然不作忽若一氣大過一藏有餘疾則其年間五行氣數更相承制得其平等則其疾生應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟庶幾診療之間無差悟之過者矣但毒痢時先傷人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其勢不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入口水狂走渾身肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫痢方須是子細首

尾讀此方論令分明識病根源然後喫藥但毒痢初得病先發寒熱頭痛即是寒邪犯心寒氣相雜忽止下白痢後變成赤痢忽先下白痢後變成赤痢忽壯熱忽轉數行便下時先發寒熱頭痛即是寒邪犯心寒氣與熱水火相犯血亦變於中所以多下赤痢如紫草水無色澤者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢止白色者寒邪犯心之未重也先下赤痢而後有赤痢之變者寒邪犯其勢漸加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸減也赤白相雜等者

水火相犯其氣相等寒濕之氣相搏而成也
忽有赤少而白少此寒邪之勢有多少毒痢
之病有輕重以白多爲輕以赤多爲重治之
則丙子丙午甲子甲午庚子庚午庚申庚寅
年甲寅甲申甲午庚申年庚寅庚申井辰戌
丙申及之年運過之年運所臨其害尤甚及丑未之年宜
有此候又更無問太歲蓋天地變化其候多
端難可窮盡今立此方但世人亦不必椿定太
歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽
光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多

寒濕之化寒邪犯心所受之病先發寒熱忽頭痛忽先轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下白痢並宜喫此通神散喫後兩三盞後壯熱不退更不喫取壯熱減退若兩三日後壯熱不退更不喫此方自別有論方在下

麻黃去根節 官桂去麤皮 各三分
大芎 白朮 各一兩
獨活 桔梗 各半兩
芍藥 白芷
甘草炙 各一分
細辛八銖
防風
牡丹皮去心

壽牛四銖炒

右爲細末每服貳錢非時熱湯調下和滓熱

喫若
方論
減便
熱已
喫一日
決修合
度數減
甲之年
痢疾此
化偏多
豆蔻二
喫三兩盞後寒熱不退更勿喫
在下若喫此藥後寒熱已退赤痢已消
修合第二第三方藥喫之取安
校若寒
更服三兩盞然不可多
白痢漸
減更勿
修合第三方喫取平安也但六
甲之年六庚之歲春夏之內時氣多寒人得
痢疾此藥通神若是
之歲濕
多人得痢疾先發寒熱即於方
內添草
問太歲但一年間春夏

之内多寒人有痢疾先發寒熱並宜噢此方治毒痢赤痢初得時先發寒熱噢前方藥赤痢已消減宜進此方還真散若熱已退寒未退赤痢未消減更勿進此方藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡子細以故尔

訶子 五箇用麪裹火炮熟不要生不要焦得所去麪不便就熱咬訶子破去核不用只使皮焙乾

右細搗羅爲末每服貳錢以米湯調下食前噢一盞半同藥煉蜜取一丸盞噢若吐出一兩口涎住如此數盞大府漸安出後減少便住如此噢經數盞大府漸安出後減少便住如此修合第三方藥噢以牢固大腸若噢前方藥壯熱未退

血痢未減不請進此藥病勢已減所下之痢
治疫毒痢噤前兩方藥湯如濁
止餘此小忽青糞忽如鴨糞忽如茶色宜噤此方以牢固
油忽浮只餘此小淺深紅色
大腸還復真氣舶上硫黄丸

舶上硫黄一兩去沙石細研如飛塵

右以蓄意苡仁二兩炒熟搗爲末與舶上硫黄相
和勻滴水相和丸如梧子大空心以米湯下
五十丸

治毒痢初得時先發寒熱服前面毒之痢方通
神散一夜寒熱不退下痢

不減分數通身發熱所下之痢多是濃滯如
桃花色如紅米膠每一次忽下一盞半盞已
來喫此藥貳盞叁盞經一日忽一夜寒熱不
退下痢不減分數更不進此藥若依此法進藥
兩盞壯熱便退下痢少減分數即請漸漸進
此藥每日只兩盞候赤痢稍減忽變成白痢
却修合上面還真散喫取平安且痢之有寒
投之其說何也荅曰水邪犯心身能發熱土
濕鬱火身亦發熱肝熱刑脾身亦發熱惟至
精者識其秋毫之變切恐世人未能通其

妙二日子因設此兩方以救其失然大毒痢之傷人惟水邪犯心最為極重但患痢之人有增寒壯熱先嗽上面通神散兩三服寒熱不退下痢不止然後進此藥以太歲而六戊之年必有差變蓋火盛之年宜有此候壬六戊寅申巳亥之年宜分之惟六年痢有差變蓋火盛之年必有寒濕相犯故然以六氣推遷不定又不可扃定年辰但一年之間春夏之內熱氣偏多濕化不舉人有病疾肝脉弦心脉洪然後嗽此藥若嗽兩盞後不見效驗更勿進服蓋痢之所起切忌水之犯心不可妄投凉藥故此方兩盞後

無驗更不可服

荊芥穗　牡丹皮 志　木香　白頭翁

芍藥　桔梗　防風　獨活

地榆 各一分　黃連 蜜浸一宿火上炙乾使三分　壽牛 妙分

右爲細末每服貳錢水壹盞煎一二沸急瀉出食後温和喫之此藥少見効驗更可進服以安爲期然不可多喫一日只兩盞亦痢才住便得止

治毒痢初得時發寒熱微有小寒相推却自痛出後時糞後有少膠涎與赤痢相雜忽止腹悞喫凉藥漸漸下痢極多從早至暮但只思

睡早朝即顔色枯瘁身躰稍凉近晚至夜即
面色赤顔色光潤下痢極多皆是清涎與赤
痢相雜通身發熱不思飲食渾身肌肉着床
則痛據此候宜當喫此藥但身躰大熱如火
與人相近則熱氣逼人其脉輕微輕手取之
散滿指下不分部位全無骨力指下如風如
氣重手取之指下全無急用訶子五箇炮制
如下五味吐出涎脉氣方生可進下而方

白朮半兩　芍藥

甘草四錢炙　大苦各

訶子五箇面裹煨熟去
咬碎去核用肉焙乾

右細辛桔梗茯苓桂枝甘草白朮人參川芎當歸白芍藥防風羌活附子川烏天雄半夏生薑大棗烏梅烏頭天南星白蘞赤小豆黃芩黃連黃柏大黃黃芪厚朴枳實山梔子石膏知母貝母瓜蔞根葛根升麻柴胡秦艽羚羊角犀角麻黃杏仁蜀椒吳茱萸細辛桔梗茯苓桂枝甘草白朮人參川芎當歸白芍藥防風羌活附子川烏天雄半夏生薑大棗烏梅烏頭天南星白蘞赤小豆黃芩黃連黃柏大黃黃芪厚朴枳實山梔子石膏知母貝母瓜蔞根葛根升麻柴胡秦艽羚羊角犀角麻黃杏仁蜀椒吳茱萸

瓶口大小火煆通赤後煙絶取出就熱研如飛塵每服二錢熱鹽米湯調下和滓服應是赤白痢無問赤多白少但身躰無增寒壯熱者皆可喫此方

治赤痢或赤白相雜初得時並無增寒壯熱經及數日身躰不熱只聞小腹内躁熱下血不止血便暖藥不見驗効宜服此方寅申巳亥年六壬之年宜有此候但喫兩盞後不見效更不請喫此藥但脣皮赤忽腫黯色小便黄白身躰涼夜間則發熱如此即肝熱刑脾之證也

右搗羅爲細末每服貳錢水壹盞煎兩沸食後和滓温服須是一年之間春夏之内風熱大甚分明識其病疾定是伏熱方可進此藥

治下赤痢身躰並無增寒壯熱此名肝心竅久澼

黄連 一兩蜜浸炙令香熟 壹 水香 三銖

右爲細末濃煎陳米湯調下貳錢食後和滓服

治赤痢不止其脉反微小沉而又濇其身熱

荆芥穗 壯丹皮 去心 白頭翁 地楡

芍藥 防風 桔梗 各一分 黄連 一分

壽牛 炒熟 三銖 木香 三銖

者死熱七日死此候極危困但喫上面一
兩劑真散船上黃丸喫取安校若喫通神散
熱不退難治之也
治患痢赤痢白忽因先寒瘧後變成痢但疾痢時無問土
有增寒壯熱並宜喫上面通神散喫了
已退便修合還真散船上黃丸喫取
緣此證候乃水邪犯心治之不可輕也

桑寄生 書兩　地楡 芍　防
人參　黃芪　橘皮 各一兩　甘

右爲末每服壹錢半空心倉米湯調下量兒大小服之

治小兒肝受疳氣相刑於脾所下之痢多是

面黃腹大忽非時泄瀉不成肌肉宜喫此方

服經數日外仍修合暖益脾藥喫

治小兒疳痢所下之痢多黃沫白滑但髮稀

右爲末每服壹錢水壹盞煎取八分和滓

木香 各三銖 白蒺藜 半兩 炒去尖

使君子 半兩煨 訶子 一兩麵裹炮 去核使肉

芜荑 芍藥 檳榔

肉豆蔻 木香 各一分

鮮血勿是膿血勿忽赤白相雜宜此方

右爲細末每服壹錢半非時或食後任意煎

黑沈嗽益真丸

治疾梨去刻各一分

防風　地榆　芍　白蒺藜炒　木香　甘草各三錢

史君子半兩蒸四五回焙　黃連四錢二十四銖爲一兩

人參　黃耆　吳白朮各半兩　木香一分

熟乾地黃六錢　鱉甲四錢　當歸去苗

白芍藥　白伏苓　阿膠炒成珠子　桑寄生二錢

枳實一錢炒

右爲細末每服三錢水一盞煎七分
治精血皆虛鹿茸丸
白茯苓炒去刺 人參 各半兩 枳實 各一分炒 木香錢
白朮 七錢以性涼續添
甘草 炙 梔角
血茸 半兩酥微炙用 五味子
山藥 各一兩以上三件爲末 青
右煉蜜和作一塊妝盒中臨時丸每服三十九
食前溫酒下
治肝腎氣虛外應目不榮宜服此足精丸
好熟乾地黃 須是蒸九遍用酒製造者 當歸
山藥 各半兩
白芍藥 人參
茄茸 酥炙去皮七錢 五味子 六錢
川椒 去目一錢半

右爲細末煉蜜丸如梧子大空心濃煎糯米湯
入鹽少許下五十丸

又服洗肝散

芎　青木香
白芍藥　各半兩　獨活　甘菊　各三錢
甘草　炙　杜仲　去皮酥炙
人參　各三錢　兎絲　黃耆　各半兩
沉香　煎時磨少許　木香　一錢半

天麻　半兩酒浸一宿濕紙裹煨
白殭蠶　去口絲　天南星　炮各一分

蒺藜　去刺四錢　甘菊
薏苡仁

肉蓯蓉　各四錢

白蒺藜　去皮酥炙　大芎

右爲細末水一盞薄荷二葉磨沉香少許同煎藥之時取七分去滓服日進二三服每服二錢

補心氣人參散

人參七錢　伏神　黃耆　甘草一錢炙　官桂去皮半　天南星炮二錢　防風一錢半　白芍藥　山藥各半兩　黃各一分

右爲細末每服一錢水一盞生薑棗少許煎七分

司業六脉俱浮而氣不實寸口倍於人迎天時通而氣血濁而氣浮宜清血抑肺氣如此即隔

歸於下不可服燥烈之藥第一方

人參七錢好者　陳橘皮去白一錢半　白茯苓

右爲細末每服三錢非時或食後少時水一盞

磨沉香少許生薑一片同煎八分初服

覺膈快便不須服却只常服丸子候三四服

間覺似壅即進一服此散子不常服

又方

天麻 炮 麪裹 肉蓯蓉 酒浸一宿

兎絲子 酒浸一宿 山藥 柏子仁 各半兩 熟乾地黃 好者

革薢 茯苓 白芍藥 各半兩

麥門冬 去心 三錢 桔梗 紫苑

黃耆 前胡 白芍藥 各一分 木香 一錢半

白蒺藜 去刺 桑白皮 各半兩 甘草 二錢炙 大腹皮 半箇 防風

右爲細末搗薏苡仁爲粉煮作稀糊丸如梧子大陰乾每日空心溫浪煎糯米湯入鹽下五十丸

治小兒腹中有氣不散而藏府微溢夜有盜汗

史君子三錢　京三稜　蓬莪蒁各一分　黃耆一錢　白茯苓　甘草二錢　木香一錢半　肉豆蔻二箇

右爲細末非時水半盞煎二錢煉取三分去滓

牛膝去頭四錢　木香一錢半　人參七錢　枳實炒一分　麵

服覺氣散則已之不可多服

治小兒瀉本因傷水

訶子　白朮

茯苓　獨活

厚朴　去皮各二錢

黃連　炒黑錢半

甘草　炙

白芍藥　各一分

右爲㕮咀麤末煎一錢許去滓服水七分煎至半盞

黃連　一錢炒焦半

白芍藥　去刺半兩

訶子　炮取肉

獨活

荊芥穗

薑炙荊子　各一分

白芍藥　三錢

甘草　二錢炙

木香　一錢半

枳實　炒焦

槐花　炒焦

右爲細末食後水壹盞煎三錢七分和
滓服或煉蜜丸如梧子大清湯下三四十丸無
時日一服或二服
治小兒急慢驚風

人參 半兩好者　天麻 炮　天南星 炮　黃耆 蜜炙　茯苓 各二錢　蒼朮 泔浸炒　川芎 各一錢半　獨活　伏神 去皮　蔓荊子 各一分　酸棗仁 炒黑　木香 各一錢半　甘草 炙一錢

右爲細末如飛塵入朱砂麝香少許每服二錢前三四沸與三服蜈蚣四箇全者用糯米同炒米熟爲度起頭如更發數即添麻

朱砂 令研細 麝香 同朱砂研

黃一味并煎服不入
木末一二豆粒許同煎小兒藥宜服
其氣液之全唯是止瀉痢乃作丸耳
治血滯精虛肛門痒痛成痔
白斂　黃耆炙各半兩　槐花
白芍藥　甘草炙各一錢半　當歸去苗各壹分
枳實麩炒黃一錢半　白蒺藜三錢　茯苓
右爲細末取
右爲粗末非時水壹盞煎三四錢七取八分去滓
服每日空心先服鹿茸青鹽丸方在前
却日進三四服以去痔根初服只二服侯清
丸及旬日自然可載此藥後續進兩三服二藥

相兼而進久可以去其根本下血日多即令人
心忪無情緒意思不悅宜戒酒慎護之病雖已
服藥若痔根已安藏血未止即更服後方
止宜服此二藥
新活鯽魚壹箇重四五兩以上去腸不去鱗 白礬三兩微敲研
右袞合同納於臭腹中紉縫繫之入
槐花半兩
蒲黃
一坩合中外以益泥固濟乾十斤炭
盡取出細研如塵蒸餅丸如梧子大非時米湯下
二三十九一日一兩服
少陽相火之後與水爭戰耳痛方

右爲末每服三錢水壹盞生薑一兩斤煎至七分去滓服日三如不痛更不消服只進補腎藥

小兒芫藏寒泄瀉不止豆蔻丸

草豆蔻 壹枚剝開皮入乳香一塊在內復用和白麵裹煨火燒令熟去麵及豆蔻皮不用

右爲末細末以粟米飯下無時

治婦人骨蒸方

桑白皮 黃耆 菩薩仁 各半兩

官桂 三去皮錢

防風

麥門冬 去心各一分

黃耆 半兩

甘草 炙

羌活

山茱萸 半兩

白芍藥

白茯苓 桔梗

麻黃 去節

右為細末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十丸

小兒泄瀉腹丸

右為末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十丸

右

右爲細末棗肉爲丸非時服三十丸白湯藥方

白朮半兩　白芍藥半兩　桔梗一分　白茯苓去皮一錢薑炙　木香半錢　白豆蔻半兩　人參一兩　黃耆　薏苡仁　茯苓　糯米末

治久瀉

詞子皮削朮各三錢一厚朴去皮一錢薑炙　木香半錢　赤石脂各一分

右爲細末以猪肝四兩片切如食法入少鹽和之不用藥先和一半於鈍內先煉過次用朮炭火上炙熟乾再傳末作兩三次食之止泄最妙

又方新製

右爲細末不羅非時以水壹盞生薑一片棗
子一箇破之同煎三錢取七分服去滓服至十
來服或七八服覺血淡或微有些小腹痛每
服加白朮少許及烏梅肉半箇煎但血旋止和
胃藥未可全去只以白朮桔梗枳實二味以白蒺
藜代之

痢稍止未全咸藏府忽下血猶未止却
服此方

黄耆 輕炙 白蒺藜 去刺各半兩 槐花 微炒 獨活 各一分 木香 分一

訶子皮 四錢 伏苓 黄連 焙焦 二錢

右爲末煉蜜丸如梧子大空非時清湯下二十九至三十九米湯亦得

又方

詞子炮令大熟　山藥　人參　白朮各半兩

熟乾地黃一兩半地黃最能補而去肝風但過腸於利藥中使非詞子不能爲功

木香一分　桑寄生一分

右爲末煉蜜丸如梧子大空心米湯下三十九常服以去痔疾又能足血

進飲食香末丸

白朮一兩炒　丁香半錢　半夏　木香炮

蓬莪茂各一分　防風　麥蘗子炒　神麯炒各半兩

右爲末
食後服
茯苓　甘草各一分
水麵糊丸如梧子大每朝米湯下三十丸

史載之方卷下終