

諸淋洗敷貼等藥治之庶得消散若不散可服
內消丸消之或隔蒜灸之

馬刀瘡亦生於項腋之間下脇延及陰脅形如瘰
癧而長於瘡不可認作流注治之皆肝胆怒鬱
之所致也俱當清肝膽之火調氣開鬱以鹹軟
之劑附之繼以養氣血運動經絡之劑收功不
可徒務班猶毒劑攻逐致成瘍怯慎之

柴胡連翹湯 治男婦瘰癧馬刀瘡

柴胡 連翹

知母

酒

黃芩

酒炒各五錢

黃柏

酒

生地

炙甘草各二錢

中桂三分

大力子一錢

瞿麥穗

六錢

川帰尾

一分一錢

右剉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎

至一盞去渣食後熱服

薄苛丹 解瘰癧風熱之毒自小便出毒後常須
服此

薄苛

皂角

不蛀者去絃皮

連翹

蔓荆子

荆芥

京三稜

煨

何首烏

米泔浸

右為末好豉二兩半以米醋煎沸灑豉淹令軟

研如糊和丸桐子大每服三十丸食後热水下
每日一服病雖愈仍常服以消餘毒

神秘散 治瘰疬

班猫

去頭足翅
祕散二十八枚

荆芥穗

直姜蚕炒去
絲嘴

黑丑

微炒各一錢取末

右為細末每服一錢五更好酒調下日中當取
下惡物如不下次日五更再進一服或更不下
第三日五更先食米粥一碗次服此藥其毒
決下如小便痛澁以葱茶解之或木通燈草煎

湯瘡之

楊氏家藏方頭晚先將活石末一錢用
米飲調服半夜時又一服至五更服神

祕散看虛實或二

三錢第三日仍以灯心湯調

琥珀末一錢如小便痛用青黛一錢甘草湯調

下即止

蝙蝠散

治瘰疬多年不瘥

蝙蝠

一箇

狗頭

一箇

右同燒作灰撒上黑薑其
骨灰化為細末濕即乾摻乾則油調敷之內服

五香連翹湯効

白卷蛇散

治九漏瘰疬發於項腋之間或痛或

不痛

白巵蛇

酒浸去皮
骨焙二兩

生犀角

二錢

牽牛

半生半炒一兩

青皮

五錢

右為末每服一錢入膩粉五分五更

糯米飲調服已時下惡物乃瘰癧之根也更候

十日再服一服忌發風熱毒物已成瘡者一日

便見効

四聖散

瘰癧服白巵蛇散轉利後此藥調之永

去其根

海藻

洗

石決明 蝦 羌活

瞿麥穗

各等分

右為細末每服二錢米湯調下

清水盡為度

散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至
缺盆中或至肩上或於脇下皆手足少陽經中
及瘰癧遍於頰或至頰車堅而不潰在足陽明
經中所出或二瘡已破乃流膿水並皆治之卧
時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以意消息
治之

昆布

桔梗

各半兩

廣茂

微炒

京三稜

炒

酒洗

連翹

各三錢

升麻

六分

黃連

白芍

葛根

錢

帰尾

柴胡

甘草

各五分

龍胆草

酒洗炒四錢

黃芩

酒洗一半半生炒

右每服六錢先水浸半

日煎熱服于卧處伸足在高處頭微低每噙一口作十次噙至服畢依常安卧取藥在胸中停留也另配半料為細末煉蜜為丸葦荳大每服一百丸或一百五十丸就以此藥送下

瞿麥飲子

治癰瘡馬刀此方須久服乃効

瞿麥穗

斤半

連翹

每服一兩水煎食後服

海藻丸

治癰瘡生於頭項上交接名鰐蟹瘡宜

當早治之

海藻菜

蕎麥炒

白羌瘑

微炒去殼

右等分煮細末海藻菜旋炒研篩湯泡白朮取

肉減半用所泡湯為丸如梧子大每服六七十丸食後臨卧米飯送下其毒自大便泄出若与

淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦治此病

忌豆腐鷄羊酒麵日五六服

蜂房膏

治熱毒氣毒結成癰瘡

露蜂房

炙

蛇蛻

玄參

蛇床子

黃芪各三錢

杏仁

二兩半

亂髮

鷄子大

飛丹

黃芩各二兩

先將前五味剉細綿裏用酒少許浸一宿勿令

酒多用油半斤內杏仁亂髮煎髮消盡瀝去渣再煎然後下丹蟾再熬成膏傾倒於磁盆中取

貼瘡上一日一換

枳郎散 治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食

枳郎

前胡

赤茯苓

牛蒡子

炒各一兩

人參

只壳

去白炒

沉香

防風錢各五錢

炙甘草

錢二錢

每服五錢生姜一片水煎服

射干連翹湯 治瘰癧寒熱

射干

連翹

玄參

赤芍

木香

升麻

前胡

山梔仁

川帰

炙甘草

各一兩

大黃

炒兩

每服五錢水煎服氣盛加芒硝少許服之

括萎子散

治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

括萎子

連翹

何首烏

大力子

炒微

大黃

炒微

皂角子仁

白螺壳

梔子仁

牽牛

炒微

甘草

生各

一兩

為細末食後溫酒下二錢

內消丸

瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服令

內消大効

青皮

陳皮

牽牛

取頭末各二兩

薄荷葉八兩

皂角

八兩不蛀者碎水煮軟搗汁熬膏去粗皮槌

右為末以皂角

膏和為丸荒豆大每服三十丸食後荆芥湯下

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角

不蛀者三十條內
每條用十兩水煮軟搗汁用

何首烏

玄參

薄荷葉各四兩

右為末與前膏子同煉

蜜為丸碗豆大每服三四十丸食後白湯下

紫胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰

馬刀

紫胡 級尾 生甘草 連翹 黃芩

牛旁子 京三稜

枯梗 各一錢半

黃連 一錢

紅菴

少許

水二中煎服此方亦治瘰癧乃是攻

裡內消之劑

消腫瘡 治馬刀瘡 黃蓍 括萎根

各一錢半

連翹

三錢

級尾 級菴

少許

甘草 各一錢

右分作二帖水煎服

十香膏 治五發惡瘡結核瘰癧痈疽痔瘻

沉香

射香

各一錢

木香

丁香

乳香

甘松

霍香

零陵香

安息香

白芷

各五錢
為細末

川歸

川芎

黃蓍

木通

芍藥

細辛

升麻

白歛

獨活

川椒

藁本

菖蒲

木別子

厚朴

商陸根

官桂

柏子仁

桑枝

菟仁

松子仁

杏仁

錢各五

槐枝

硃砂

柳枝

松枝

浸藥

輕粉

雄黃

枯礬

另研未

雲母石

犀角

血餘灰

猪脂

飛丹

一斤

麻油

真酥油

羊腎脂

右

如常法煎成膏藥以紺帛攤貼

如腸胃瘻疽可作丸子如梧子大每服七丸空心溫酒吞

救苦勝靈丹

治馬刀挾癰從耳下或耳後下頭

至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其瘰癧在於頰下或至頰車乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也今將二証合治之

黃蓍

一錢護皮毛實腠理活血氣

元氣乃瘡家之聖藥

升麻

錢一

三分

人參

及不調而喘者加之

甘草

五分能調中和

葛根

五分此三味俱

葛根

是陽明本經藥

益胃

連翹

一錢此一味乃十二經瘡中之藥不可無者散血結氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮

三分去腸胃

生地熟地各三味

諸經分此

中和血生血

涼血之藥也

白芍藥

三分如夏月倍用之補益氣治腹痛如冬月

能散結聚如陰症瘡癆用之此寒

寒症

勿用

用辛熱

去之煩躁者勿用

內桂

能散結聚如陰症瘡癆用之此寒因熱用之意又為陰寒覆蓋其瘡

黍粘子

三分腫不用

紫胡

功同連翹如瘡不可以用少陽經勿用

羌活

錢一

京三稜

炮分

廣茂

三分此二味酸苦堅硬甚者

昆布

三分此二味酸苦堅硬甚者用之不硬者勿用

獨活

防風

各一錢此二味勻羌活以開手足太陽症脊痛頑強不可回頭防風

辛溫

如瘡在臍上雖無手足太陽症亦當用之為能散結去上焦風邪助黃芪立功也

羌活

三分此二味酸苦堅硬甚者

羌活

錢一

炒三分

神曲

炒化一分食不消化者用之

麥芽

一錢消食健脾

益智仁

二分如唾多者胃不和也或吐沫

黃柏

三分如有熱或腰膝無力加之如煩躁欲去

姜炒一錢

二分食胃中寒者加之無則勿用

厚朴

三分如腹脹加之如煩躁欲去

如腹脹

加之如腹脹者此腎中伏大也更宜加用

右

為細末湯浸蒸餅裡作餅子晒乾搗如米粒大每服三錢白湯下如氣不

順加橘紅

甚者加木香少許量病人虛實消息

之

令藥多妨其飲食此治之大法也如止在

陽明分者

去紫胡黍粘子餘皆用之如在少陽

分

馬刀挾癰獨活漏芦升麻葛根加瞿麥三分

順加橘紅

甚者加木香少許量病人虛實消息

之

令藥多妨其飲食此治之大法也如止在

陽明分者

去紫胡黍粘子餘皆用之如在少陽

分

馬刀挾癰獨活漏芦升麻葛根加瞿麥三分

分如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促不可因其平素宜作氣盛治之乃從病變治之權也加黃芩黃連黃柏知毋防已視邪氣上中下擇而用之假令在上焦止用黃芩半酒洗半生用

在中焦加黃連如在下焦加酒製黃柏防已之類如大便不通滋其邪盛者加酒製大黃利之如大便燥者加杏仁泥大黃如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之如風澁而大便不行者加煨皂角仁大黃秦艽利之如肺澁

覺身亦氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥如陰寒症為寒結秘而大便不通以局方半硫丸或加炮附子乾姜煎水冷服之大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯弱者當去苦寒之劑多加人參黃蓍甘草之類以馮火而補元氣餘皆倣此

玉燭散和血通經能使瘻瘍自消及治室女經不行頸多結核

川帰芍藥大黃甘草熟地茫硝

黃芩 川芎 各等分每服五錢姜三片水煎
服日進一服七八日効

治療癰未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉陰乾為末五分半 白花蛇蛻存性二分半 蜜蜂七枚焙為末

右將杏樹葉末用清水調再入四味末藥和勻敷患處却將皮帛一張以針刺孔貼藥上如乾用清水就帛上刷之每一昼夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數帖自退

敗毒瘍癰方神効

白膠香

海螵蛸

降真香

用中火無土乾者

右等

分為末搽患處外以濕帛揜之一夕而退

已破者

蜜蜂

一枝

蛇退

七分半

蜈蚣

二條端午次者

右用麻油四兩將前藥入油內以文武火熬成入光粉二兩用棗枝七條如筋大者急撓候冷

出火氣七日方可用帛搘貼

已上二方乃鄭家門累驗者不須服藥貼此五

七日便消

海藏方 治項後側少陽經中疙瘩不辨肉色不
問大小及月日久遠或有赤硬腫痛

生山藥去皮一塊 草麻子一枚右研勻攤貼之如神

眉溪云山藥生者能消腫硬極佳
清涼餅子 生山慈姑 良姜 等分搗為餅卷
之能散去寒熱 或以生慈姑磨調酒服大妙
此藥大能散癧如神

本事方 治瘰疬鼠癧

駒鵝皮毛上炒研為末加輕粉乾敷

治頸上核塊動者 夏枯草

末六錢

甘草

末一錢

右和勻每服一錢至二錢茶清調下

肘後方

治頸下瘰疬如梅李大宜速消之

海藻

一斤

酒一升浸數日稍、飲之

文武膏 治瘰疬

葉椹黑熟者二斗以布袋絞取汁瓦器中熬成

膏白湯化下一匙一日三服紅者晒乾為末白

湯調服

結核 獨形而小核者

劉守真云結核者火氣熱甚則鬱結堅硬如棗中
核也不湏潰發但熱氣散則自消

丹溪云結核或在頸項在臂在身如腫毒者乃痰
注於皮裡膜外之間結聚而不散也問其平日
好食何物吐下後用藥散之

結核在頸項方

直羌瘣炒

大黃酒浸

青黛

膽星

分各等

右為末蜜丸噙

結核在下頰二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼
朮皂角刺羌瘣射香行太陰厥陰之積痰使結

核自消甚捷

濟世方

治頰下結核不消經驗方

大蜘蛛不拘幾枚以好酒浸之研爛同浸酌酒
去渣臨卧溫熱服之

海藏 生山藥草麻子方佳方在瘡門

癰氣

氣結於項久畱不去而項為脹大

丹溪曰癰氣先湏斷厚味

海藻洗一兩

黃連

二兩

右為末以少許置掌上時舌舐之津咽下如

消三之二湏止後服

又方

黃柏

二兩

海藻

一兩

不用黃連亦佳

治癰氣結核磊々腫硬

昆布

一兩

洗去鹹為末

每用一錢綿裹於好醋中浸過食之咽津藥味

盡再噙之

肘後方

治頸下卒結囊欲成癰

海藻一斤洗過

酒浸飲之

破結散

治五癰極佳

麥麵

四分

松蘿

半夏

貝母

海藻洗

龍胆草

海蛤

通草

昆布

枯礬各三分

右為末酒服一錢日三忌

鯽魚猪肉五辛生菜毒物二十日愈

玉壺散

治三種癰

海藻洗

海帶洗

昆布

雷丸

各二兩

青鹽

廣茂錢各五錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

人參化癰丹

海帶洗

海藻洗

海蛤

昆布

四味皆焙

澤瀉炒

連翹

各二兩

豬臘

羊臘各

一分

右為末蜜丸芡實大臨睡噙化一二丸忌油膩

寶金散

治癰氣無不瘥

猪羊臘

膜十對後晒乾

水洗去脂為細末

海藻洗

海帶各二兩

丁香

木香

琥珀

射香

研各分

珍珠

研五錢

右先將各味為細末配和勻再重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜睡時湏垂頭而睡若童男女十服効大人一日見効有孕者忌之

海帶丸

青皮

各

等

治癰久不消

海藻

貝母

陳皮

一丸大効

治癰氣神効方

海藻

海帶

昆布

蒲黃

各三錢

豬膾子

培乾

右為末每服二錢半臨睡以酒

調服且不用枕頭三日

無擇曰癰多着於肩項瘤則隨氣凝結此皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癰皮色不变者名曰肉癰筋脉露結者名曰筋癰亦脈交結者名曰血癰隨憂愁消長者名曰氣癰五癰皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致枉

瘤

瘤有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤粉瘤膿瘤即膠瘤也惟粉瘤與膿瘤可決餘皆不可決潰肉瘤

尤不可治治則殺人

黑瘤癰方神驗

素炭灰

東木灰

黃荆灰

桐殼灰

各二升半

蒼麥灰

炒

右以沸湯淋汁五

碗許澄清入班猫四十箇川山甲五片乳香冰
片不拘多少後入煎作二碗以磁器盛之臨用
時入新石灰調成膏敷瘤上乾則以清水潤之
其効若神

丹溪治丹瘤

草麻子去殼研入麵一匙水調搽

之甚妙

消瘤方 用向陽槐枝於菜油燈蓋火上以槐枝
薰熱浸油熨瘤上如法熨數次其瘤自消

腸瘻門

附胃脘瘻

夫腸瘻者乃陰陽偏勝喜怒無時伏於臟腑之中
結在腸胃之內血凝氣滯回旋失度不能通行
聚結成瘻致生腫痛孫真人云卒得腸瘻而不
曉其病候錯則殺人其病初起覺腹中微痛小
腹腫而強抑之則痛小便澀似淋時汗出復
惡寒其身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀按之濡

或發熱無汗灑淅惡寒皆其候也其脉洪數者為有膿也可下脉遲緊者未有膿不可下也甚者腹脹轉側有水聲或達脐生瘡汁從脐出或大便下膿血或一足不能舉凡此皆為惡候胃脘瘡者經曰胃脉沉細沉細者氣逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為瘡也治法亦與腸瘡頗同初以疎利之藥導其滯次以排膿消毒托裡之藥調之此其大法也

脉經問曰羽林婦何以知腸有膿師曰脉滑而數

滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛、數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澀或自汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊則為瘀血血下即安

薏苡附子敗醬散 治身甲錯腹皮急如腹脹本

無積聚身熱脉數者

附子炮二分

敗醬五分

薏苡錢

右為末每服一錢水煎頓服小便

當下而愈

三因方

苡仁

附子同前

敗醬一兩二分

錢五分

每用四錢水一盞半煎七分去渣空心服

千金大黃牡丹湯 治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色白堅大如掌熱小便自調時自汗出脉遲堅者未成膿可下之當有血脉數則膿已成不復可下 大黃四兩 牡丹皮三兩 洋硝一錢 冬瓜仁一升 杞仁五十粒 右水五升煮一升頓服當下膿血

無擇薏苡湯 腸癰腹中痛煩燥不安或脹滿不食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但

疑是者便可與或有差亦無妨

冬瓜子

四兩

薏苡五兩

牡丹皮

茺蔚仁

各三兩

如無冬瓜仁

以瓜萎仁代之每服五錢水煎服

姚氏去茺蔚

仁用杏仁 雀氏加芒硝二兩

醫案曰女子腹痛百方不治脉滑數時作熱腹微急孫尚診曰腹痛脉當沉細今脉滑數此腸癰也以雲母膏一兩作丸如梧桐子大用牛皮膠溶化溫酒調膠水吞丸子下餉時服尽下膿血

一盆而安

昔一婦人腸中痛不可忍大便從小便中出楊吉老之婿李生診之曰夫芤脉見於寸部者乃積血在胸令芤見於關乃腸生瘡也乃出雲母膏作百十九煎黃蓍湯吞下利膿血數升而安

右腸瘻五方丹溪所集也前三方置於篇首者蓋亦腫瘻瀉利例也後二方用膠黃蓍煎湯吞藥者乃潰瘍補例也

四聖散

一名神効
括萎散

治腸瘻

疽五發乳瘻便毒
研末一錢

服之神應

大生瓜

萎去皮一枚

粉草

研末四錢

乳香

研末一錢

沒藥

研末三錢

右用好酒二大盃漫

火煎至一盃分作二次兩日服盡大便順導惡物妙若乾瓜萎則用兩枚若疾甚者再服以退為度此方極佳盃音碗

牡丹皮散

腸瘻冷症腹濡而痛時利膿

丹皮

人參

天麻

白茯

黃蓍

木香

川帰

蕤仁

去皮尖

川芎

官桂

各二分

白芷

苡仁

甘草

右用水煎溫服

梅仁湯

腸瘻裡急隱痛大便閉澀

梅核仁

四十
去皮
十九枚
兩

大黃

三

兩

牡丹皮

一

兩

七

冬瓜仁

四
兩

芒硝

二
半
兩

犀角

一
兩
錢

半

每服七

錢水煎服下利膿血三兩行為度

神仙鷄礪丸 治腸瘻神妙此藥不拘老幼皆可服之無不取効最止疼痛不動臟腑乃內托之藥也 方見瘻疽門

丹溪曰腸瘻大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦艽近肛門破入風者難治用防風類河間射干湯 治胃脘瘻人迎脉逆而盛數膿血

營衛不流熱聚胃口成瘻

梔子仁

赤茯苓

射干

去毛

升麻

各一
兩

赤芍

一
半
兩

白朮

五
錢

每服五錢水煎將熟入生地黃汁一合蜜半合再煎溫服不拘時

復元通氣散 治諸氣滯耳聾腹瀉便瘻瘍疽無頭止痛消腫

青皮

陳皮

各二
兩

甘草

三寸半
生半
炙

川山甲

炒

瓜萎根

各二
兩

金銀花

一
兩

連翹

一
兩

右為末熱酒調下

痔漏門

痔者肛門內外有癟脹疼者是也東垣謂溫熱風燥四氣相合而致也痔有五種謂壯痔牝痔脉痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔翻花痔鼠痔蠆痔等痔之名不一究其所因亦不過父嗜辛热炙燄新酒及房勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門之外若蘊毒深者其狀大蘊毒淺者其狀小大者如蓮花鷄冠核疮之狀小者如牛痔鷄心櫻

瘡之類久而不愈有妨行坐或出鮮血或流膿水則成漏矣治法在外者宜點之洗之在內者宜祛其風而除其湿消其熱而解其毒斯得治之法矣

東垣秦光芩木湯 治痔疾若破謂之痔漏大便秘澁必作大病此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也變病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是溫熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也

作大病者風也若大便燥結者主病兼受火邪
也熱結不通去燥屎者其西方肺主諸氣其体
收下亦助疾病為邪湏當破氣藥兼之治法全
矣服之其疾立愈不可作丸以剉湯與之効如
神秦艽一錢去芦澤瀉三分蒼朮七分製防風根
五分酒洗大黃少許另研當帰根三分酒洗第二服藥用身黃柏去皮
五分燒存性去皮一錢亦可多用大便祕
仁搗細未調下服右除樞卽茺蔚角角
三味候煎成藥研勻調入外餘咬咀作一服水

三盞煎至一盞二分去渣入前三味再上火煎
至一盞空心熱服待少時以羹餳壓之不犯胃
氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜
之類犯之則藥無効如有白膿加五朵白葵花
湏除萼去心細剪入青皮五分不去白入上藥
同煎又用木香三分為細末同樞卽等三味再
上藥同煎依上法服餌古人以此疾多以歲月
除之此藥一服立愈若病久者再服必愈

秦艽白术丸

秦艽去芦

酒浸洗

龜仁

另研各一兩

地榆

錢酒浸去皮尖

澤鴻

皂角仁燒存性去皮各半兩

枳實

麸炒

白朮

各半兩

右為細末和菟仁泥研勻煎熱沸湯麪糊丸鷄豆大焙乾白湯下空心宿食消盡服之少時以羨膳壓忌生冷硬物冷水菜并溫麴酒及五辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗十服必愈

菟木澤鴻丸

菟木

四兩去皮

澤鴻

枳實

秦艽

各二兩

地榆

皂角子

燒存性各一兩

右為細末燒餅為丸如桐子

大每服三十丸米飲湯或酒下

一婦人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便疼與黑神散又多食肉太飽此溫熱在大腸

郁李仁

去皮

麻仁

槐角

各二錢

枳實

皂角仁

五錢炒去皮末

菟木

帰尾

生地

各三錢

大黃

錢一

右分六帖內三仁另研煎服

又方

治療用鷄冠花不拘多少濃煎湯每服一

蓋空心服

本草云鷄冠花性涼治鴻血

丹溪治番花痔頭向上是大腸熱甚收縮為主用

四物解毒加枳殼白朮槐角秦艽

治番花痔 荆芥 防風 朴硝 右煎藥湯洗

之次用木鱉子爵金研末龍腦壯少水調塗上
痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛病並
用銀潤籠蘸藥塗傳日一次重者五七次立愈
先用藥水洗拭乾却傳此膏用真桑灰不拘多
少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片
各二錢再漫火熬至半碗入甘草一錢數沸下
淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用綢一

重花紙二重如絞漆狀瀘過再熬成膏候冷用
真胆礬五分研極細末放入膏中用瓦器盛貯
封之臨用入龍腦末和勻傳之

治腸痔鱉甲丸 鱉甲

蝦皮

炙焦

川山甲

炙焦

白礬

桔

附子

猪牙皂角

各半兩

炙焦

存性二分

右細末研勻蒸餅丸如桐子大米飲下二十九

食前日三服

又方 槐花

炒

白礬

桔各一兩

附子

五錢

右細末

研勻蒸餅丸如桐子大每服二十丸米飲下食

前日三服

丹溪治二十三年不愈者三服止用蓮花蕪散
蓮花蕪 黑牽牛頭末各一兩半 當歸半兩 磬紅少許
右為末先忌食肉五七日空心令食肉一頓就
取溫酒下三錢約兩時辰取下膿血或蟲是効
海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊胆取瘻神効諸
方不及此

七聖丸 治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生
於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍鴻三焦湿

莫漫多方立紀綱

羌活一兩

枳郎

木香

川芎

桂枝

去皮各半兩

大黃八錢

煨

郁李仁

去皮另研一兩

右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗
虛實臨時斟酌丸數白湯下取大便微利一服
而愈切禁不得多利大便若大便大行其病滋甚
治鼠痔結核作渴疼痛方

皂角

炙

川山甲

黃耆

荆芥

槐子

木香

蝟皮

鱉甲

醋炒

桔梗

露蜂房

炒焦

芍藥各一

大黃錢

三

右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下食
前日三服未止加至四五十丸

治療瘧疾下血疼痛不止以玩月沙不拘多少慢火
熬令黃色為末每二錢入乳香五分空心溫酒
調下日三四服瘥

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂瘻瘍不任其痒
升麻根 紫胡 甘草 炙 麻黃根 各五分 黃蓍
錢一 盒 分 七分 三分 炒

紅花少
羌活根三分錢
水煎服

治療有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煎
汁安盆中坐薰之塞其穀道湯冷更煖之良久
欲大便當虫出不過三度即愈如用末綿裹納

下部

淋渫藥 治下部痔腫大腸頭痒痛

歲靈仙

浙 **下** **音** **膚** **腫** **大**
枳殼 **麸炒** **各**
一兩

丹溪治腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根
冷即再煖臨卧避風洗三次挹乾貼蒲黃散

瞿麥

半斤

猪牙皂角

一寸

右為末入豬腰子一隻內用米泔煮空心食之
少頃肚痛上攻重皆墮出作地坑埋之薄粥補之
當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下
垂多血苦痛不能忍 鳥角仁另研細末調服 郁李仁
秦艽

各一錢

麻子仁

一錢半

當歸梢

分七

大黃

三錢煨

生地黃

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻豆大水三大
盞煎一盞去渣入皂角末調在內空心食前候

宿食消盡服之忌風寒處大小便如欲涼大腸
寬大腸則用枳殼去穰入巴豆鐵線繆煮透去
巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用
治腸瘻 每大便下血槐樹上木耳取末之飲服
方寸匕日三服良

治腸瘻多年不瘥下血不止木賊枳壳各二兩乾
姜一兩大黃一分四味並剉一處入铫子內炒
黑色存性三分搗羅溫粟米湯調食前服二錢
七甚妙

治痔漏方

鷄子

一個煮熟去黃取白切炒

明礬

如皂角子大匙

上枯過用三分

右為末用溫湯洗淨拭乾用紙燃點

藥送入瘡孔內立効日三易

又方

川山甲

一兩燒紅

肉豆蔻仁

三同為末

米飲調二錢服治氣痔膿血甚者

刺蝟皮一兩

燒服中病即已不必盡劑

治痔神應散 治五種腸風下血上廁糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛糰道四面有努肉名妳痔頭上有孔漏出名腸風

並治之 黃牛角鰐

一枝酌中

蛇蛻皮

一條

豬牙皂角

七莖

川山甲

七片

刺蝟皮

一兩

右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用小火燒令烟出後用大火煅令通赤為度取出搘開候冷搗羅為末服時先令患者臨卧時細嚼胡桃仁一個如糊用無灰好酒一盞送下不可言語便睡至五更時以溫酒調下藥末三錢至辰時更進一服雖年久不過三服立効

丹溪治腸風痔漏如神大樹木上寄生葉取乾為

末酒水米飲任下或丸桐子大服三十丸亦可
千金方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾

為末水服方寸七或丸桐子大服之立効

洗痔疼

用荆芥朴硝桑寄生定痛解毒去風涼
大腸熱安胎如腫者加倍子木鼈子研極細調

服而愈

又方 五倍子朴硝桑寄生蓮房水煎洗一方
加百藥煎洗

洗痔方 輕者用朝東馬齒莧刲寄奴濃煎湯薰

待溫却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一
半同煎

丹溪治痔瘻用灰莧帶根煎濃湯先薰後洗

又方 取河水頻洗用蠅牛塗之

一方治痔 用雄鷄胆片腦和勻貼之

一方 熊胆塗之神効

蒲黃散 治下部痔漏 蒲黃 血竭兩半

右為細末每用少許貼於患處

薰痔法

蝟皮

切方三
指大

雄黃東大

熟艾

鷄子
大

右為末用瓦器以灰實一半如燒香法安長桶
內坐其上薰之烟氣從口出為佳凡三度薰永
瘥勿犯風冷忌鷄肉毒物

丹溪治痔瘡 大蒜十片頭垢搊成餅子先安頭
垢餅於痔頭上外安蒜片以艾灸之

本事方 治一判官乘驛入駱谷有痔疾因此大
作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如塘灰火至驛僵
仆主驛吏云此病予曾患來湏灸即瘥用柳枝
濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽

覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出
至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去
無擇云腸癖如痔如大澤中有小山突出為痔人
於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門
邊生有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出
五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣牡痔者肛邊生
瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛邊發
露肉珠狀如鼠跡時々滴瀆膿血脉痔者腸口
顆々發癟且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結

候有血寒熱往來墜瀉脫肛氣痔者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又方有酒痔每遇飲酒發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清血隋下而不止宜解熱調血順氣為主若久不愈必至穿穴為漏矣

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物及乾姜之類犯之無効此東垣格言也

秦艽防風湯 治痔漏每大便時疼痛

秦艽

防風

帰身

白术

錢半

甘草

炙

澤瀉

六分

黃柏

五分

大黃

煨

陳皮

各三

紫胡

升麻

各三分

桃仁

卅分

紅花

少許

右水煎空心熱服

烏金散

治療漏

川山甲

蟬皮

燒存性

黃牛角腮

剉碎炒

牙皂角

槐子

皂莢刺

枳壳

貫衆

阿膠

各等分

川山甲

黑炒右為細末每服錢半用胡桃肉爛研

併調酒食前服大腸熱荆芥湯下漏血不

湯止

謂皮丸 治諸痔出血裡急後重

川帰

川芎

白芍

枳壳

各五錢

槐花

炒三錢

艾葉

炒

地榆

黃蓍

白礬

枯

貫衆

各半兩

謂皮

炙焦一兩

大皂角

醋炙一條

豬後蹄

垂甲十箇炙焦

蜂房

炒焦二錢五分

川山甲

炒焦三分錢五分

皂角刺

畧燒錢五分

一方有

蟬退洗净畧燒二錢

右為末

醋糊丸

如桐子大每服七十丸

逐瘀湯

治熱痔通利大小便取下黑物

川芎

赤芍

生地

白芷

五靈脂

枳殼

阿膠

蓬木炮

茯苓

茯神

木通

生甘草

各一分

大黃

生

杏仁

去皮各半

每服三錢

姜三片蜜三匙煎服以利為度

汚血

作疼通用

釣腸丸

治久新諸痔肛邊腫疼或痒挾虛寒而

作者

括萎

二箇燒存性

謂皮

剉碎確內燒存性二箇

白礬

綠礬

枯

胡桃仁

十五箇燒存性

枳殼

附子

去皮生

半夏

南星

鷄冠花

五兩燒存性

枳殼

附子

去皮

詞子

夫核各二兩

右為末

醋麪糊丸

梧子大每服

二十丸空心臨卧溫酒下

槐角丸 治諸痔出血及痔頭上有孔名瘻

槐角炒一兩 地榆八兩 川帰八兩 黃芩八兩

防風八兩 枳殼八兩 右為末酒糊丸如梧子大

每服五十丸米飲下

乾葛湯 治酒痔

白乾葛 枳殼 半夏 茯苓 生地 各半

黃芩 甘草各一錢 杏仁五錢 每服三錢黑豆

百粒姜五片白梅一個水煎服

橘皮湯 治氣痔

陳皮 枳殼 川芎 槐花炒各半兩

枳壳 麝香 紫蘇葉 香附 甘草

炙各半錢半

每服三錢姜東煎服

黑玉丹 治腸風及痔漏頭疼不可忍用此去虫

拔根三五服見效 蜈皮剉八兩

猪懸蹄百隻

牛角腮八兩 槐角二兩 雷丸 脂麻各二兩

亂髮皂角煎湯洗倍 敗棕剉各二兩

苦練根剉二半

右用磁礮內燒存性研細末入乳香一兩射香

四錢研合和勻酒糊丸如桐子大每服五十丸
先細嚼胡桃一枚以溫酒吞下日二服甚者日
三服空心及食前服

多方 治同上

人參 黃蓍參 生地 川歸 川芎 条芩
升麻 枳殼 槐角各等分 右為細末麵糊丸
如桐子大每服三十九空心米湯下
敷藥蠅牛膏 蠅牛一枝 腦子 射香各少許摻
之用磁合盛次早取汁附之

一方 熊胆一錢 射香一分 片腦五厘 共為細末
點田中大螺數枚碗盛候汁出取以點之

一方 寒水石 朴硝 共為末以津調手指點
藥附痔上

一方 蜈皮燒灰生酒油和附 治腸痔下部者
如垂蝕炙末用

一方 治諸痔用川山甲自尾根盡處數除三鱗
不用取第四五大鱗橫三行燒存性為末入射
香少許臘茶一匙同調空心服以澄下濃者附

瘡上其冷如冰冷永不痛大効

卷三

五一

肘後方 治漏 蜂房一枚灸黃赤色為末每用

一錢臘豬脂調附瘡上

一方 用兔糸子炒黃黑色為末用少許和鷄子黃調附亦治谷道中赤腫

一用木鱉子槌去油煎湯洗一用槐柳枝煎湯洗
又方 飲酒多之人生痔三黃丸以生地黃汁為
丸空心淡酒吞下三五十丸立効

二八通玄丹 梅東先生方

宣連

入兩炒去茱萸用茱萸四

川歸

兩

烏梅肉

槐角

枳殼

各二兩

右為末以雄豬肚一箇洗

淨入藥在內外以韭菜四五斤包其肚用水醋
共數碗煮肚熟為度去韭菜并肚以藥爛搗丸
如桐子大每服空心白湯下五七十丸

蟲痔 用鰻魚乾燒烟薰之虫尽死而愈

治穀道邊生瘡久不愈者 用鷄內金燒灰存性
研細末乾貼患處如神

皂角煎丸 治內痔漏腸頭裏面生核寒熱徃來

滿尺皂角

二挺去弦
挾醋炙

白礬

煅

刺蝟皮

炙

薏苡仁

各半
兩

白芷

各一
分

甜葶苈

炒
炒

川芎

桔梗各半
兩

猪後蹄

垂甲十枚
存性

燒

右為細末

煉蜜丸如桐子大

每服五十丸空心

用桑白皮煎湯送下

拔毒散 敷痔腫毒處

大黃

黃蘗

白芨

石羔

黃芩

黃連

白歟

梔子

朴硝各等分

右為末用井花水調塗

湯火門

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物搣之及井底泥傳之使熱氣不出爛入肌肉

火燒以好酒洗之再以鹽傅其上如皮搣者以酒熬牛皮膠傅之

熱酒傷用糯米粉炒黑末酒調傅之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中取膜貼上日次

治湯火瘡麸皮炒黑灰為末傳上神妙此方有補性始終皆可用

治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生姜調於帛上貼之痛止

一方用溶銀鍋子細末油調傳上佳

保生救苦散 治大燒熱油損或至皮肉脫及一切狗齒損傷并刀斧傷用生寒水石不拘多少為極細末調塗之或乾上然不如油調塗其痛立止並不作膿無分毫厘苦楚日近完復永無

破傷風症

冰霜散

治火燒皮爛大痛

寒水石

生牡礪燒

朴硝

青黛

輕粉等分

右為細末新水或小油調塗立止

治火燒

桐油

水銀各等分

右二件以柳條不

佳手撓成膏再入大黃石羔二末和以牛皮膠入少水溶開外用猫兒肚底毛細剪摻上貼之以青黛傳之妙

治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水

少待爛成水傳上神妙

熱油燒外痛以蜜傳之立安

梅師方

治湯火瘡至妙 用劉寄奴為末先以粳米漿鷄
翎掃傷處後以桑末搽上不痛且無痕大瓦湯
傷先用鹽末摻之護肉不壞然後傳藥

又方以榆白皮末豬脂油塗瘡愈

顛撲損傷門

按發明經云夫從高墜下惡血留於內不分十二
經絡聖人但作風中肝經留於脇下以中風療

之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經
之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有
自汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬於肝未況
敗血凝滯從其所屬入於肝也從高墜下逆其
所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之
內經云肝脉搏堅而長色不青當病墮若搏因血
在脇下令人嘔逆金匱云寸口脉浮微而滯然
當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧
所傷亡血故也

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

砍瘡出血一二石者脉大二十日死

砍刺出血不止者其脉止脉來大者七日死滑

細者生

從高顛什內有血腹脹滿脉弦者生小弱者死
劉宗厚云按破傷有瘀血在內脉堅強實則生虛
小弱者死若亡血過多脉虛細小者生浮大數
實者死皆為脉病不相應也

子和云諸落馬墜井打撲傷損胸腹損折杖瘡腫

發焮痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜
以通經散薰水丸等藥或加湯劑瀉之後服和
血消腫散毒之藥

劉宗厚曰按子和於墮車落馬杖瘡胸腹者俱用
峻下其有心恙牙關緊急者云是驚癎堵塞於
上俱用三聖散先吐後下其法雖峻然果有經
涎瘀血停留於內焮痛腫脹發於外者亦奏捷
功但於出血過多老弱之人脉虛大者亦當求責
又曰謹按打金刃損傷是不因動氣而病生於外

外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六
淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一
症專從血論但湏分其有瘀血停積而亡血過
多之症蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀
血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可
同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補
而行之又察其傷有上下輕重淺深之異經絡
氣血多少之殊惟宜先逐瘀血通經絡和血止
痛然後調氣養血補益胃氣無不効也湏見圍

城中軍士被傷不問頭面手足胸背輕重治者
例以大黃等藥利之後大黃缺少甚者遂以巴
豆代之以為不於初時瀉去毒氣後則多致危
殆至於略人手指亦悉以藥利之殊不知大黃
之藥惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣
胃氣虛弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止
能破堅逐積用於此疾尤非切當所以有服下
藥過後其脉愈見堅大治者不察又以為瘀血
未尽而復下之因而夭折人命可不慎歟

凡損傷切不可食冷水血見寒則凝但一系血人
心即死攻下瘀血之劑治之

金櫃治馬墜及一切筋骨損方

大黃酒浸一兩 緋帛燒如手大存性 亂髮燒如鷄子大存性
炒單布燒灰一尺 敗蒲一把四十粒 桃仁四十九粒去皮尖
甘草炙如中指節 七味以童便煎成入酒一丈盡

次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎
湯浴衣被覆斯湏通利痛楚立瘥
復元活血湯 從高墜下惡血留於脇下疼痛實

不可忍 柴胡錢五 當帰錢六 甘草 川山甲
大黃酒浸一兩 杞仁五十枚去皮尖 紅花
瓜萎根錢二 右件桃仁研爛剉如豆大每服
一兩水二中半酒半中煎至七分食前服以利
為度得利後痛或不尽服乳香神應散

靈樞云墜墮惡血留於脇下則傷肝膽之經行
於脇下屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以
當歸活血脉又急者痛也以甘草緩其急亦能
生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萎根桃

仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗
血為之使

當歸道滯散 治損傷瘀血大便不通紅腫暗青
疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩 當歸三錢 射香少許 右二味為細末
入射香和勻每服三錢熱酒調下其瘀血自下
若骨節傷折疼痛以定痛接骨紫金丹治之
定痛乳香神應散 東垣方 治從高墜下疼痛
不可忍及腹中疼痛 乳香 没藥 雄黑豆

桑白皮 獨科栗子各二兩 破故帛炒二兩
當歸一兩 水蛭半兩 右為末每服五錢醋一盞
沙石器內煎至六分入射香少許溫服
定痛接骨紫金丹

麝香 没藥 紅娘子各一錢半 烏藥二錢
地龍去土半錢 川烏 草烏炮各一兩 五靈脂半兩
木鱉子去壳半兩 苗香二錢半 黑丑生用五分 骨碎補
威靈仙 金毛狗脊 防風 自然銅紅醋淬七次各二錢
禹餘糧四錢 陳皮 青皮各二錢五分

各五錢

右為細末醋糊丸桐子大每服十九至二十九
溫酒送下

三因鷄鳴散 從高墜下及木石所壓凡足是損傷
瘀血凝滯疼痛欲死兼以此藥推陳致新神妙
此方治血滯於肺部氣分也 大黃酒浸一兩

杏仁三十粒去皮尖 右研細酒一碗煎至六分去滓
鷄鳴時服至晚取下瘀血即愈若便覺氣絕取
藥不及急劈開口以熱小便灌之

王海藏云若登高墜下撞打及傷心腹胸中積血

不散以上中下三焦部分分之以易老壓角地
黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以
小便同煎治之者更有內加生地黃歸煎服者
亦有加大黃者惟智者擇之

潔古巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜
卧不能飲食此謂血閉臟腑不通 巴戟去心
大黃各半兩 當帰 地黃 芍藥 川芎各一兩
右水煎以利為度

嚴氏奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓

損瘀血凝滯心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌慢火炒令黃色半兩

黑丑二兩

右為末每服

二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑丑

末二錢催之湏下惡血成塊以盡為度

破血止痛行經之劑

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血留於脇下

其痛苦楚不能轉側

羌活 防風 桂各一錢

一錢

紫胡

連翹各二錢

帰稍三錢水蛭炒研二錢

射香少許

另研

右分作二服每服二大錢酒水一盞除水蛭射
香外另研如泥煎餘藥一大盞調二味食前服
地龍散 治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血
留於太陽經中令人腰脊或腫脹臂腰中痛不
可忍 中桂 地龍各四分 羌活二錢 黃柏

甘草各一錢 蘇木六分 麻黃五分 桃仁六枚

帰稍一分 每服五錢水煎服

三因加味芎窮湯 治打傷敗血入胃嘔吐黑血

川芎 當歸 白芍 百合浸半日 荆芥穗各芽

右水酒各半煎服

元戎加味四物湯 治虛人損傷不禁下者

四物湯加川山甲水煎服

花蕊石散 治一切金刃箭鎛傷及打撲傷損
大咬傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化為
黃水再摻藥便活不疼痛如內損血入臟腑煎
童子小便入酒少許調一大盞服之立効若牛
舐腸出不損者急納腸入用細系或棄白皮為
線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無棄白皮

用生麻繆亦可並不可封裏瘡口恐作膿血如
瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不
盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至
死者但心後覺緩急以童子小便調一大盞取下
惡物如肝片終身不患血風血氣症若膈上有
血化為黃水即時吐出或隨大便出

石硫黃四兩 花蕊石二兩 右二味相拌合匀先
用帛筋和鹽坭固濟瓦罐子一箇內可容藥候
坭乾入藥在內再用坭封口候乾安在四方磚

上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己
午時從下着火漸々上徹直至經宿火冷炭尽
又經宿出礮細研以絹羅子篩極細磁盒盛之
依法使用

雜方

本事方 治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙
散未展荷葉陰乾一味為末食前以熱童便一
盞調下三錢以利下惡物為度

經驗方 治打撲損筋傷骨折

黃柏

兩

半夏

五

右為細末用生姜自然汁

調如稀糊敷以帛花貼如乾再敷如骨折先以
絹帛封縛次用杉樹皮來定良久痛止即痒癢
热乃是血活筋骨復舊輕者三五日重者不過
旬日矣

本事方 治跌仆傷筋損骨痛不可忍

此方乃神龜相授

生地

未

藏瓜

姜糟

各一

生地

四

兩

切

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處令則易之

神効

治打撲內損筋骨疼痛

打撲內損筋骨疼痛

乳香

沒藥

芍藥

川芎

川椒

去子及
閉口者

當歸

各半兩

自然銅

三錢

右為細末用黃蠟

四兩溶開入藥末不住手撓勻溫丸如彈子大

每服一丸用好酒煎開消尽乘熱一服吃尽看

何處痛向痛處臥霎時服三五丸立効

衍義云

沒藥通滯血打傷撲損疼痛皆以酒化

服夫血滯真而行之則痛腫消焉

肘後方

治被打瘀血在骨節下出者

生鐵

一斤

酒升五升煎取一升飲之

丹溪治一人因上山惡血瘀入內損傷食少脉絶
治宜活血和氣

川芎

三錢

青皮

二錢

芍藥

活石

各一錢

丹皮

五分

炙甘草

一錢

桃仁

七枚研

水煎服之

綴耳鼻法 治擦落耳鼻用髮入罐子塗泥固濟

蝦為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟帛

縛定立効

肩穿法 凡負重擔肩破者剪猪兒頭上毛不語

唾粘之

遠行脚打泡 以生麪水調為糊貼過夜即乾不可擦破

又方用飯粘搗貼以布覆之過夜次日平復効

抵金用 跌撲傷損閃扭出骨竅等症

蚕沙

炒黃

荒豆粉

炒黃各四兩

枯礬

二兩錢

右為末

醋調敷患處厚帛貼之絹帛綁扎換

敷三四次即愈忌產婦

秘傳神効散 治跌撲損傷骨折筋斷疼痛

不可忍者此藥極能理傷續斷累驗若神

用路上或墻脚下過往人便溺處經久碎瓦片
取來洗淨火煅醋淬五七次瓦黃色為度以刃
刮細末每服三錢好酒調服不可以藥微賤而
輕忽其功也

一字散 治跌撲傷損功效同前

半兩錢

五枚火煅醋淬四十九次

甜瓜子仁

五錢

珍珠

二錢

右為末每服一字好酒調下

治跌撲傷損 用蟹二隻連殼搗爛好酒二碗濃
煎去渣飲之留渣敷患處

治損傷神効 治跌傷骨折急取雄鷄一隻量患
人酒量多少成一碗半碗將鷄刺血於酒中溫
之令患人熱飲其痛立止驗甚

癟風

內經云脉風成癟此疾非止肺腎二臟有之以其
病發於鼻俗呼為肺風也鼻準赤而脹大乃血
隨氣化也氣不施則血聚血聚則肉瀆而生虫
此屬厥陰當以藥疎之可用局方升麻湯下錢
氏鴻青丸是也餘病各隨經而治之癟風成癩
樟皮散主之從少至多服五七月後灸承漿七
壯瘡愈勿止藥再灸同止 承漿一名懸漿在
唇下宛宛中足陽明任脈之會療偏風口喎面