

53  
235



始





53

235

STRENGTHEN YOUR  
MIND AND BODY

10



醫學博士 岩井勝三郎 著

新撰內科治療法集成

全

大正  
15.6.24  
內交

東京・京都

江南書堂發行



自序

内科ノ治療法ニ關スル知識ハ、内科醫ノミニ限ラズ他ノ専門醫ニトツテモ不可缺ノモノデアル故、内科的疾患ニ就テ、其ノ治療法ノミヲ集載セル書籍ハ幾許アツテモ良イ様ニ思ハレル。然ルニ各疾患ニ就テ比較的克明ニ治療法ノミヲ集纂セル書籍ハ存外ニ少イ様ニ思ハル、コトヲ、著者ハ實地醫家及ビ學生諸氏ノ爲メニ少シク物足りナク思フテ居タノデ、昨夏閑ヲ得タルニ際シ試ミニ筆ヲ起シテ、現在東大醫學部ニ於テ行ヒツ、アル治療法ヲ根基トシ、尙諸成書及ビ新刊書ノ所載ヲ取捨シテ、書イテ見タノガ本書デアアル。内容ハ一見分明ノ通りデアルカラ冗言ノ要ハナイ、唯本書編纂ノ目的ハ元々繁忙ナル實地醫家及ビ學生諸氏ノ座右ノ控ヘトナスニアツタコト故、徹頭徹尾便宜ト實用トヲ旨トスルニ努メタコト丈ヲ記シテ置ク。從ツテ一面理論的記述ノ少イ點



ニ於テ甚ダ遺憾ノ點モアルガ、(イ)兎モ角モ内科的各疾患ニ就テハ新療法ニ就テモ比較的忠實ニ集載セルコト、(ロ)記述ノ方式ヲ項書キトシテ内容ノ了解ヲ容易ナラシメシコト、(ハ)徒ニ處方例ヲ煩多ナラシメズシテ探擇ヲ容易ナラシメシコト、(ニ)前編ニ藥物ノ用量及用法ヲ集録シ、(ホ)末尾ニ食品表ヲ添加セルコト等ハ幾分ニテモ本書ノ能率ヲ高メタコトカト思フ。勿論書キ足ラヌ點ハ隨處ニアルガ、頁數ニモ制限アルコトデアルシ、又初版ノ事デモアルカラ、其ノ點ハ暫ク寛恕ヲ乞フテ、爾後江湖ノ忠言ヲ俟ツテ次第ニ改竄致シタイ積リデ居ル。幸ニシテ小冊子乍ラ同學ノ一伴侶タルヲ得バ、本書ノ幸福之ニ過ギヌ。

大正十五年二月

著者誌ス

目次

前編 (藥物篇)

内服劑及注射劑ノ用量及用法	一頁	利尿劑	四〇頁
藥量表使用注意	二	興奮劑	四一
鎮痛鎮痙劑	三	吐瀉劑	四二
催眠劑	九	止瀉劑	四三
鎮靜劑	四	止瀉劑	四四
局處麻醉劑	八	瀉下劑	四五
一、内科的ニ用フルモノ	八	止瀉劑	四六
二、内科的以外ニ用フルモノ	九	吐瀉劑	四七
解熱劑	三		
心臟血管劑	三〇		
一、強心劑	三〇		
二、血管緊張劑	三一		
三、血管擴張劑	三一		
興奮劑	四一		
利尿劑	四〇		
		尿消毒劑	四八
		止血劑	四九
		一、一般出血止血劑	四九
		(A)内服劑	五〇
		(B)注射劑	五〇
		(C)局處貼付劑	五一
		二、子宮出血止血劑	五一
		健胃劑	五二
		一、苦味芳香性健胃劑	五二
		二、酸及アルカリ劑	五三
		三、酸酵制止劑	五三
		四、消化酵素劑	五四
		瀉下劑	四五
		止瀉劑	四六
		吐瀉劑	四七



目次

驅蟲劑	三
呼吸器劑	三
一、呼吸鎮靜劑	三
二、祛痰劑	三
三、分泌抑制消毒劑	三
制汗劑	七
一、内服及注射劑	七
二、外用劑	七
發汗劑	七
強壯乃至變質劑	六
一、鐵劑	六
二、キニーネ劑	六
三、砒素劑	六
四、磷劑	六
一、黃磷	六
二、沃度劑	六
三、尿酸症(痛風)治療劑	六
四、白血病治療劑	六
五、癩癬軟解劑	六
六、マクレーン酸劑	九
七、脚氣治療劑	九
特種殺菌治療劑	九
一、エメチン劑	九
二、クレオソート劑	九
三、治癩劑	九
四、驅黴劑	九
五、膠樣銀劑	九
催淫劑	九
臟器製劑	九
一、甲状腺及其レニ關係セル製劑	九
二、腦下垂體製劑	九
三、卵巢製劑	九
四、睾丸製劑	九
五、其他ノ製劑	九
劇毒藥極量表	一〇〇
配合禁忌表	一〇〇
甲、水劑ノ配合禁忌	一〇〇
乙、散劑ノ配合禁忌	一〇〇
諸液劑一瓦ノ滴數表	一〇〇

後編 (治療篇)

急性傳染病治療法	一一
腸チフス及パラチフス	一一
細菌性赤痢	一九
「附」疫痢	二六
チフテリヤ	二七
猩紅熱	三三
痘瘡	三三
水痘	三六
流行性腦脊髄膜炎	三九
流行性腦炎	四二
マラリア	四三
流行性感冒	四六
麻疹	四九
百日咳	五〇
虎列刺	五〇
黄疸出血性スピロヘータ病(ワイル氏病)	五七
發疹チフス	一五九
破傷風	一五九
ペスト	一六二
流行性耳下腺炎	一六五
再歸熱	一六六
鼠咬病	一六六
狂犬病	一六七
急性關節ロイマチス	一六八
慢性關節ロイマチス	一七〇
筋肉ロイマチス	一七〇
敗血症	一七九
驅黴療法	一八五
寄生蟲病治療法	一九七
寄生蟲病(驅蟲療法)	一九九
一、蟻	一九九
二、十二指腸蟲	二〇三

目次



目次

三、蛔蟲	二〇四
四、蟯蟲	二〇六
五、鞭蟲	二〇八
六、東洋纖毛蟲	二〇八
七、肥大吸蟲	二〇八
八、鉅形二口蟲	二〇八
九、日本住血吸蟲	二一〇
一〇、肺臟二口蟲	二一〇
二、住血系狀蟲(乳糜尿)	二一一
三、アメーバ赤痢	二一二
消化器系疾患治療法	二二五
吃逆	二二五
嘔吐	二二七
鼓腸	二三三
下痢	二三七
便秘症	二三四
食道狹窄症	二四三
一、食道癌腫	二四三
二、食道瘻管症	二四六
三、癱瘓性食道狹窄	二四八
食道麻痺症	二四九
特發性紡錘狀食道擴張症及噴門瘻管症	二四九
胃酸過多症	二五一
胃神經痛(胃痙攣)	二五二
神經性消化不良	二五七
急性胃加答兒	二六〇
慢性胃加答兒	二六一
胃アトニー	二六六
胃擴張	二六九
胃下垂症	二七五
胃潰瘍	二七七
十二指腸潰瘍	二七八
胃癌	二八八
急性腸加答兒	二九二
慢性腸加答兒	二九五
蟲樣突起炎	二九八
膜樣大腸炎(粘液疝痛)	三〇一
潰瘍性大腸炎	三〇二

四

急性腸閉塞症	三〇五
腸狹窄症	三〇九
痔核	三一
痔瘻	三五
肛門裂傷	三六
加答兒性黃疸	三七
膽石病及膽囊炎	三二
肝臟硬變(レンネック氏型)	三六
肥大性肝臟硬變(ヘノリ氏型)	三九
急性黃色肝臟萎縮症	三九
肝臟癌毒	三九
肝臟癌腫	三九
肝臟膿腫	三九
肝臟腫	三九
鬱血肝	三九
急性汎發性腹膜炎	三九
結核性腹膜炎	三九
呼吸器系疾患治療法	三九
氣管支喘息	三九
氣管支加答兒及加答兒性肺炎	三九
一、急性氣管及氣管支加答兒	三〇六
二、慢性氣管支加答兒	三〇〇
三、加答兒性肺炎	三〇三
纖維素性氣管支炎	三〇四
氣管支擴張症	三〇六
氣管支狹窄	三〇七
格魯布性肺炎	三〇七
肺臟水腫	三一
肺臟壞疽及腐敗性氣管支炎	三一
肺臟膿瘍	三一
肺氣腫	三一
肺氣腫	三一
肺臟栓塞	三一
肺臟膨脹不全	三一
就下性肺炎	三一
慢性間質性肺炎	三一
肺膿瘍	三一
肺結核	三一
急性全身粟粒結核	三一
肋膜炎	三一

五



一、乾性肋膜炎……………三九七

二、渗出性肋膜炎……………三九七

氣胸……………四〇〇

胸水……………四〇〇

「附」縱隔實腫瘍……………四〇五

循環器系疾患治療法

心臟瓣膜病——(強心劑使用法)……………四〇七

急性心内膜炎……………四一八

心筋炎……………四一九

狹心症及心臟性喘息……………四一九

不整脈……………四二三

一、期外收縮……………四二三

二、恒久性不整脈……………四二四

三、刺戟傳導障礙……………四二五

神經性心臟症……………四二六

心悸亢進症……………四二七

一、普通ノ心悸亢進……………四二七

二、發作性心悸亢進症……………四二八

心臟救急療法……………四二九

心囊炎……………四三二

心囊氣腫……………四三五

心囊水腫……………四三五

動脈瘤……………四三五

本態的血壓亢進症及動脈硬化症……………四三八

靜脈血栓形成(及白股腫)……………四四二

泌尿生殖器系疾患治療法

浮腫(水腫)(利尿劑使用法)……………四四五

尿毒症……………四五三

「附」子癇……………四五七

無尿症……………四五八

ネフローゼ……………四六〇

急性絲絨體腎炎……………四六四

慢性絲絨體腎炎及萎縮腎……………四六九

腎血腎……………四七一

限局性腎炎……………四七一

起立性蛋白尿……………四七一

腎孟炎……………四七二

腎石病……………四七六

腎臟結核……………四八〇

腎臟膿腫……………四八一

腎臟水腫……………四八一

腎臟病腫……………四八一

遺毒腎……………四八一

膀胱炎……………四八二

「附」膀胱結核……………四八八

夜尿症……………四九〇

男性生殖器淋疾……………四九二

神經系統疾患治療法

腦貧血……………五〇一

腦充血……………五〇三

腦溢血……………五〇四

腦水腫……………五〇六

麻痺狂……………五〇八

震顫麻痺……………五二〇

小舞踏病……………五二二

其他ノ主要ナル腦疾患……………五二四

一、腦腫瘍……………五二四

二、腦徵毒……………五二四

三、腦膿瘍……………五二五

四、腦性小兒麻痺……………五二五

五、腦軟化症……………五二五

進行性延髓麻痺……………五二五

其ノ他ノ主要ナル延髓疾患……………五二六

一、急性延髓麻痺……………五二六

二、進行性眼筋麻痺……………五二六

三、筋無力症……………五二七

結核性腦膜炎……………五二七

化膿性腦膜炎……………五二八

脊髄炎……………五二八

脊髄癆……………五二九

急性脊髄前角炎(ハイネ・メヂン氏病)……………五三六

其ノ他ノ主要ナル脊髄疾患……………五三七

一、脊髄空洞形成症……………五三七

二、フリドドライヒ氏病……………五三七

三、筋萎縮性側索硬化症……………五三八

四、痙攣性脊髄麻痺……………五三八



五、進行性筋萎縮症……………五三八  
 六、脊髓及脊髓膜出血……………五三八  
 七、壓迫性脊髓炎……………五三八  
 坐骨神経痛……………五三九  
 三又神經痛及肋間神經痛……………五三九  
 顔面神経麻痺……………五三八  
 顔面神経痙攣……………五三九  
 テタニー……………五三九  
 レイノー氏病……………五四〇  
 皮膚紅痛症……………五四〇  
 神經衰弱症……………五四〇  
 ヒステリー……………五四〇  
 癩……………五四〇  
 偏頭痛……………五四〇  
 發作性四肢麻痺症……………五四〇  
 血液疾患治療法……………五四〇  
 貧血症……………五七一  
 一、萎黃病……………五七六  
 二、ピールメル氏惡性貧血症……………五七八

三、溶血性黃疸……………五八六  
 四、再生不能性貧血……………五八六  
 五、バンチ氏病……………五八六  
 六、發作性血色素尿症……………五八六  
 白血病……………五八六  
 一、慢性白血病(骨髓性及淋巴性)……………五八六  
 二、急性白血病(骨髓性及淋巴性)……………五八六  
 假性白血病……………五八六  
 紫斑病……………五八六  
 新陳代謝障礙及内分泌障礙疾患治療法……………五八六  
 糖尿症……………五八六  
 尿崩症……………五八六  
 痛風……………五八六  
 肥胖症……………五八六  
 骨軟化症……………五八六  
 佝僂病……………五八六  
 バゼドウ氏病……………五八六  
 粘液水腫……………五八六  
 硬皮病……………五八六

アクロメガリー(尖端肥大症)……………六二〇  
 アヂソン氏病……………六二〇  
 脚氣……………六二〇  
 壞血病……………六二〇  
 諸種中毒症治療法……………六二〇  
 モルヒネ(阿片)中毒……………六二〇  
 コカイン中毒……………六二〇  
 アトロピン(スコポラミン、ペラドンナ)中毒……………六二〇  
 ストリキニーネ中毒……………六二〇  
 麥角中毒……………六二〇  
 抱水クロラール中毒……………六二〇  
 ズルフォナール及トリオナール中毒……………六二〇  
 ヴエロナール及ルミナール中毒……………六二〇  
 クロロフォルム中毒……………六二〇  
 燐中毒……………六二〇  
 鉛中毒……………六二〇  
 水銀中毒……………六二〇  
 砒素中毒……………六二〇  
 デギタリス中毒……………六二〇

ヨード中毒……………六二〇  
 ヨードフォルム中毒……………六二〇  
 ブローム中毒……………六二〇  
 サリチル酸中毒……………六二〇  
 キニーネ中毒……………六二〇  
 アンチピリン中毒(ミグレニン、ピラミドン)……………六二〇  
 アンチフェブリン中毒……………六二〇  
 ニコチン中毒……………六二〇  
 サントニン中毒……………六二〇  
 ヘノボチ油中毒……………六二〇  
 綿馬中毒……………六二〇  
 エメチン中毒……………六二〇  
 鹽素酸加里中毒……………六二〇  
 硝酸銀中毒……………六二〇  
 石炭酸中毒(リゾール、クレオリン)……………六二〇  
 強酸(鹽酸、硝酸及硫酸)中毒……………六二〇  
 砒酸中毒……………六二〇  
 アルカリ性腐蝕劑ノ中毒……………六二〇  
 鹽素中毒……………六二〇



目次

銅中毒……………六四八  
 青酸中毒(青酸加里、苦扁桃水)……………六四九  
 クロム酸中毒……………六五〇  
 酸化炭素中毒(燈用瓦斯)……………六五〇  
 硫化水素中毒……………六五一  
 魚及獸肉中毒……………六五一

毒蛇ノ咬傷

毒蛇ノ咬傷……………六五一  
 附録 食品表……………六五三  
 (甲)動物性食品……………六五三  
 (乙)植物性食品……………六五〇  
 索引……………六七一

目次終

新撰 内科治療法集成

醫學博士 岩井勝三郎纂著



前編 (藥物篇)

内服劑及注射劑ノ用量及用法

藥量表 使用注意

一、極量ハ第四改正日本藥局方ノ記載ニ依ル。  
 二、同量及日量ト記セルハ、普通使用セラルル大人(二〇—六〇歳)一回及一日ノ適用量ニシテ、時ニ該記  
 量ノ範圍ヲ越セテ用キタル、コトアリ。小兒及老人ニ對シテハ大人量ニ比シテノ割合ニテ用フレバ可ナリ。

小兒藥量表

(イ)ガウピウス Gowhins 氏式。

一年未満  $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{10}$  一—二歳  $\frac{1}{8}$  二—三歳  $\frac{1}{6}$   
 藥量表使用注意



内服劑及注射劑ノ用量及用法

三十四歳 1/4 四十七歳 1/3 七十一四歳 1/2

(一) 一四—二〇歳 2/3—3/4 (六〇歳以上 2/3—3/4)

(ロ) ヤング Young 氏式 大人量 × 年齢 + 12 = 小兒用量

三、投與ノ形トシテ下部ニ記入セルハ、該藥劑ヲ使用スル時用フル主ナル藥形ニシテ、水ハ水劑、散ハ散劑、丸ハ丸劑、錠、嗅、吸、洗、乳、膠、煎、浸、振、搗、坐等ハ夫々錠劑、吸入劑、洗腸劑、乳劑、膠劑、煎劑、浸劑、振盪合劑、搗劑、坐劑等ヲ意味セシメ、内、外、トアルハ内服、外用ノ義、油トアルハ肝油等ノ油ニ溶シテ用フルノ義、煙トアルハ喫煙スルノ義、又注ハ皮下注射、注〔筋〕ハ夫々筋肉内及靜脈内注射ヲ意味ス、又散〔水〕トアルハ、多クハ散劑トシテ用フルモ時ニ水劑トシテ用フル義、又用量中例ヘバ〔六〇〕トアルハ時ニ六〇位迄用フルコトアルノ義ナリ。

四、前編中ニ掲ゲザル藥劑ニシテ後編中ノミニ掲ゲタル製劑ハ、ソノ箇處ニ於テ用量用法等ヲ説明セリ。

五、主ナル藥劑ノ副作用ニ關シテハ、後編諸中毒症ノ條及諸疾患治療法中隨處ニ掲出セリ。

鎮痛鎮痙劑 Analgetica. Antispastica.

鹽酸モルヒネ Morphinum hydrochloricum

△注射液一%

{ 0.001—0.01 回量 } 散、水、注、丸  
{ 0.01—0.05 一日量 } 散、水、注、丸

鹽酸モルヒネ錠 Pastilli Morphini hydrochlorici

△一錠 0.005

硫酸モルヒネ Morphinum sulfuricum

{ 0.001—0.01 回量 } 散、水、注、丸

複方クロロフォルムモルヒネ丁液 Tinctura Chloroformi et Morphini composita

五—二〇滴

一—六滴

水

△含有鹽酸「モルヒネ」量約一%、印度大麻越幾斯八%、「クロロフォルム」一%、稀醋酸五%。

鹽酸ロヂオン Codeinum phosphoricum

{ 0.01—0.05 } 散、水、(注)、丸

△「モルヒネ」ノ代用藥トシテ副作用及習慣性甚少シ。

鹽酸ピロロヂオン(アンチツシン) Codinum hydrophosphoricum (Antitussin)

0.01—0.01 散、水、丸

ヂオニン Dionin (鹽酸エチールモルヒネ)

{ 0.01—0.01 } 散、水、注、丸

△強度「モルヒネ」ト「ロヂオン」ノ中間ニ位シ、習慣性モ少シ。

△好シテ呼吸器疾患ニ用フ。

ペロニン Peroin (鹽酸ベンチールモルヒネ)

0.01—0.01 散、水、丸

鹽酸ヘロイン Heroinum hydrochloricum

{ 0.001—0.001 } 散、水、丸

(鹽酸チアセチールモルヒネ)

{ 0.001—0.01 } 散、水、丸

△「モルヒネ」ニ比シ毒性尙大ニシテ且習慣シ易シ。

△呼吸困難、咳嗽ニ賞用、鎮痛作用ハ「モルヒネ」ニ劣ル。

鎮痛鎮痙劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

四

モルフォサン Morphosan (プローム・メチール・モルヒネ) 一回量 0.05—0.1 一日量 0.3—0.5 散、水、注射

△「モルヒネ」ニ比シ無害ナリ。

パラコチン Paracodin (ニ水化「コデイン」ノ重石硫酸鹽) 0.01—0.05 0.05—0.2 散、水

△「コデイン」ニ比シ鎮咳作用迅速且強大。

オイコチン Eucodin (メチール・プローム・コデイン) 0.05—0.1 0.1—0.4 水、散、錠

鹽酸パペリン Papaverinum hydrochloricum 0.01—0.05 0.05—0.1 水、散、錠、注

△阿片中ノ「アルカロイド」ニシテ毒性「モルヒネ」ヨリ弱シ。

△血管及内臓ノ平滑筋ニ直接ニ作用シ、ソノ痙攣ヲ靜止セシム、故ニ好テ膽石痙痛、胃痙攣、

喘息、狭心症、血脈亢進等ニ用キラル。

△錠及「アムブレン」0.03。

スパスマルギン Spasmalgin 0.5—1.0g 2.0—4.0g 注

△「S」中「ソルビン」0.02、「ソルトボリン」0.01、「アトリナール」0.001。

アンチスパズミン Antispasmin (ナルセイン「ト」撒曹ノ化合物) 0.05—0.1 0.5—0.3 水

ナルセイン Narceinum (阿片「アルカロイド」ノ「ツ」) 0.01—0.05 0.05—0.1 散、丸

△鎮咳鎮靜ニ用フ。

阿片 Opium

△腸管鎮靜ノ目的ニ最も多ク用キラル。

{ 0.01—0.05 } { 0.05—0.5 } 散、丸、坐

阿片越幾斯 Extractum Opii

{ 0.01—0.05 } { 0.05—0.5 } 散、丸、坐

△効力阿片末ニ優ル。

阿片丁幾 Tinctura Opi (阿片一分、水、酒精各五分) { 0.1—0.5 } { 0.5—2.0 } 水

△一瓦ノ滴數蒸餾水ヲ二〇滴トセバ本劑ハ三〇滴。

△効力阿片末ニ比シ迅速ナリ。

阿片安息香丁幾 Tinctura Opii benzolica 10—20滴 一日數回 水

△阿片含量二百分一。 △鎮咳制瀉ニ用フ。

芳香阿片酒 Vinum Opii aromaticum { 0.1—0.5 } { 0.5—2.0 } 水

△阿片含量一〇%。

阿片坐劑 Suppositoria Opi (一個中阿片量〇.〇六)

△痔痛、直腸加答兒ニ用フ。

ドーブル散 Pulvis Doveri (阿片、吐根各一分) { 0.1—0.5 } { 0.3—1.5 } 散

△阿片含量一〇%。 △主ニ呼吸器症ニ用フ。

鎮痛鎮痙劑

五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

六

阿片吐根錠 Pastilli Opii et Ipecacuanhae (一錠中、阿片吐根各〇・〇二五)

△一錠ハドーフル散〇・二五ニ當ル。

パントボン Pantopon (阿片ノ全「アルカロイド」ヲ析出セルモノ)

0.005—0.01

0.01—0.03 水、錠、散、注

△「モルヒネ」含量五〇%。△「アムブレ」二%。

ナロコボン (ラヂウム) Narcoxon (邦製パントボン) 用量同前。

0.01—0.02

(一六錠)

パントボン・スコポラミン Pantopon-Scopolamin

△一錠中「パントボン」0.05、「スコポラミン」0.002%。

0.3—0.5—0.8g

注

△狂躁状態及痙攣ニ賞用、外科ニテハ麻醉補助薬トシテ用フ。

△老人、小兒、酒客ニハ禁ズ。

ナルコボン・スコポラミン (ラヂウム) Narcoxon-Scopolamin 0.3—0.5—0.8g

注

△前者ノ邦製品、効用用量同前。

パンモルフォン (星) Panmorphon

0.01—0.01

0.03—0.03% 散、水、注、坐

パンロイド Panoid

0.5—1.0g

1.0—3.0g 注〔皮、靜〕

印度大麻越幾斯 Extractum Cannabis indicae

{ 0.01—0.1

{ 0.1—0.2

丸

△「モルヒネ」ニ代用スルモ効力確實ナラズ。

印度大麻丁幾 Tinctura Cannabis indicae

一—四滴

一日數回

△印度大麻越幾斯ノ五%丁幾。

ゲルセミウム丁幾 Tinctura Gelsemii

10滴

10—30滴

散、水、丸、注

鹽酸ペロキン Pellonum hydrochloricum

{ 0.03—0.05

{ 0.03—0.1

散、水、丸、注

△作用「モルヒネ」ニ類スルモ弱ク、主ニ催眠ノ目的ニ用フ。

硫酸アトロピン Atropinum sulfuricum

{ 0.0005—0.001

{ 0.001—0.005

注、丸

△副交感神經興奮從フテ平滑筋痙攣ニ好シテ用フ。

△錠 0.0005

オイミズリン Eumydrin (メチール硫酸アトロピン)

0.001—0.001

丸、注

プローム・メチール・アトロピン Atropinum methylbromatum

0.001—0.001

丸、注

△右二者何レモ硫酸「アトロピン」ニ比シ副作用少ク特異質アルモノニ適ヌ。

鎮痛鎮痙劑

七



内服劑及注射劑ノ用量及用法

八

プロロム水素酸スコポラミン Scopolaminum  
(Hyoscinum) hydrobromicum

一回量 0.0001—0.0005  
[極] 0.0005  
一日量 0.0005—0.0015  
[極] 0.0015  
丸、投與ノ形注

△精神病、狂躁状態、振頭麻痺等ニ實用ス。

硫酸ソボイン Duloisinum sulfuricum

0.0001—0.0005 0.0005—0.001 丸、注

賞岩葉 Folia Scopoliae, (Belladonnae)

{0.05—0.15 [極] 0.15} 0.1—0.5 煙

ヒヨメ葉 Folia Hyoscyami

{0.05—0.3 [極] 0.3} 0.2—1.0 煙

曼陀羅葉 Folia Stramonii

{0.03—0.2 [極] 0.2} 0.1—0.6 煙

△右三種ノ葉ハ「ニコチン」「アトロピン」「ヒヨスチアミン」等ヲ含ミ喘息ニ喫煙用トナス。

ヒヨス越澁斯 Extractum Hyoscyami

{0.01—0.05 [極] 0.1} 0.05—0.15 丸、(坐)

△氣管支炎等ニ用フ。

賞岩根 Radix Scopoliae, (Belladonnae)

{0.03—0.06 [極] 0.1} 0.1—0.2 浸、丸、散

△「アトロピン」ト同一目的特ニ消化器疾患ニ用フ。

賞岩丁散 Tinctura Scopoliae, (Belladonnae)

{0.2—0.5 [極] 1.0} 0.5—1.5 水

△賞岩根一分、稀酒精五分ヨリナル。

賞岩越澁斯 Extractum Scopoliae, (Belladonnae)

{0.015—0.03 [極] 0.05} 0.05—0.06 水、散、坐

△甚屢使用セラレ、「アトロピン」ノ内服劑ノ感アリ。

△「プロロム」加里ト伍用スレバ「プロロム」ノ作用頓ニ増強ス。

テトロドトキシン Tetrodotoxin (河豚ノ卵巢製劑) 0.5—1.0ㄑ 一日一回注

△疼痛、痙攣、痙攣、淫萎、夜尿等ニ用フ。 △用法—坐骨神經痛ノ條、

ヘパトトキシン Hepatotoxin (河豚ノ肝臟製劑) 0.5—1.0ㄑ ↓ 3.0ㄑ 二日一回注

△用法—隔日一回漸増シテ最高一回 3.0ㄑ ニ至ル。

△適應症前者ト同一。 △右二者共ニ1%液トシテ販賣セラル。

抱水クロラル Chloralum hydratum {0.5—3.0 [極] 2.0} {1.0—7.0 [極] 6.0} 錠

△催眠劑ノ條參照。

催眠劑 Hypnotica

抱水クロラル Chloralum hydratum 一回量 {0.5—1.0 [極] 2.0} 一日量 {1.0—3.0 [極] 6.0} 水、錠

但破傷風、子癇、狂犬病等ノ痙攣ニハ大量ヲ用フ……………1.5—3.0 水

催眠劑 九



内服劑及注射劑ノ用量及用法

- △奏効半時間後。持續數時間。
- △特異質ノ人ニハ、ニ〇位ニテ危險ヲ來スコトアリ、四〇ニテ死セルモノアリ。
- △胃刺戟劇シキ故、必ズ大量ノ水、又ハ粘滑劑ト共ニ與フ。
- △禁忌—胃腸症、心臓血管病、肺患、貧血者。

クロラール・フォルムアミード Chloralun formamidatum

一回量 一日量 投與ノ形

散

△前者ニ比シ害少キモ、効力弱ク、約一倍半量ヲ要ス。

△胃刺戟少キ故散劑トシテ與フルコトヲ得。

△奏効内服後半乃至二時間。

イゾプロパール Isopral (三鹽化プロピール・アルコホル) 〇.三—一.〇

膠

錠

△神經性不眠症ニ適ス。△毒性少キモ胃刺戟強シ。

ドルミオール Dormicl (アミレン・クロラール) 〇.四—〇.六—二.〇

膠

水

△胃症、血行器症アルモノニハ禁忌。

△副作用少ク、二—三〇分ニシテ奏効。△牛乳ニ加ヘ内服スルモ可。

ブロムラール Bromural (プローム・鹽草酸尿素) 〇.四—〇.六

散

錠

△副作用ナク、小兒ニモ用キ得。但重症ニハ効力充分ナラズ。

△五—三〇分ニシテ奏効、持續三四時間。

カルモチン (武田) Caluotin

(邦製「プロムラール」)

〇.四—〇.六

〇.六—一.〇 散

錠

ヒプロチン Hypotin

用法同前。

〇.四—〇.六

〇.六—一.〇 散

錠

プロヴァリン (日本新藥) Provarin

用法同前。

〇.五—〇.七—一.〇

一.〇—一.五—二.〇 散

丸

ノイロナール Neuronal (ヂ・エチール・プローム・アセトアミード)

興奮状態ニハ

一.〇—一.五

用法同前。

丸

△作用迅速、持續七時間位、副作用少シ。

アダリン Adalin (プローム・ヂ・エチール・アセチール尿素) 〇.三—〇.五—一.〇

〇.八—二.〇 散

散

△無副作用ノ良劑。

ドルミン (鹽野) Domin (邦製アダリン) 〇.三—一.〇

〇.八—二.〇 散

散

アロイドリン Aludrin (ヂ・クロール・イソプロピール・アル) 〇.五—一.〇

一.〇—二.〇 散

散

ブローマン (日進化學) 〇.四(三錠)

一.三(九錠) 散

錠

パラアルデヒド Paraldelydum 二.〇—三.〇—五.〇

一.〇—二.〇 水

錠

△作用迅速、確實、害少シ。但發揚性精神病者ニハ効少シ。

△惡臭アリ、且胃刺戟強シ、必ズ大量ノ水ト共ニ用フ。

催眠劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△處方例 「バラアルデヒド」三〇、「アルテア」舍利別一〇〇、水五〇〇。  
右臥床前頓服。

△極量 前藥局方一回五〇一日一〇〇、新方ニハ極量規定ナシ。

抱水アミレン Amylenum hydratum

一回量 一日量 投與ノ形  
二〇—三〇 一七〇 水・錠

△前者ノ如ク局處(胃)刺戟強カラズ、殆無害ニシテ奏効モ確實。但翌日少シク惡心等アルコトアリ。  
ヒプノシ Hypnon (アセトフェノン) 〇・五—一・五 膠、乳

△油狀液體。

ウレタン Urehan

一〇—二〇—四〇〇

水

△呼吸器、血行器疾患アルモノ、及ビ小兒ニ適ス、作用弱シ。  
ヘドナル Hedonal (メチール・プロピール) 一〇—二〇 散、水

△「ウレタン」ヨリハ強力ナルモ高度ノ不眠症ニハ適セズ。

△比較的無害ナルモ、翌朝尙睡氣アルコトアリ。

△「オブラート」ニ包ミ與フ。

ヴェロナル Veronal (Urea diaethylmalonica)

{ 〇・二—〇・五  
〔極〕〇・五

{ 〇・五—一・〇  
〔極〕一・〇

散

△心臓、呼吸、胃腸ニ害ナク、効果確實。  
△一週間以上ノ連用ハ不可ナリ。

マロナール Malonal (「ヴェロナル」ト同一物)。

ヴェロナル ナトリウム (メチナル) Veronalnatrium (Medinal) 〇・三—〇・五 散、注、錠、坐

コデオナル Codeonal (「メチナル」ト「コバイン」ノ抱合體) 二錠(〇・三) 錠

プロボナル Proponal (Urea dipropylmalonica) 〇・二五—〇・三 散

△「ヴェロナル」ニ似テ更ニ有効。

ルミナル Luminal (「ヴェロナル」ノ「フェノール」化合物) 〇・二—〇・四 散

△強力ナル新劑、癲癇ニ賞用ス。

ルミナル ナトリウム Luminalnatrium 〇・二—〇・四 散、注、錠

△注射ハ二%液、但吸收遅ク、且深ク注射セザレバ癲癇ヲ起ス。

△前者同様、癲癇ニ賞用。

チアール Dial △錠 〇・一 { 〇・一—〇・二五  
〔重症〕〇・二—〇・五

〇・五—〇・三 散、錠

△甚長好ナル藥劑ナリ、奏効迅速且確實。

チチアール Didial

一錠 一二錠 錠

△強度ノ不眠症ニ用フ。

催眠劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

二四

ヌマール Nunnal "Roche" △其劑ナリ、

一回錠量

一日量 錠 投與ノ形

ズルフォナル Sulfonalum

{0.4-1.0 (極) 1.0

{極} 3.0 散

△其劑ナルモ、吸收、排泄緩慢ナル故、奏効遅ク、持續長キニ過ク。  
△熟眠不能ニ用フ。 △虚弱者ニハ禁ズ。

トリオナル Trionalum (メチール・ズルフォナル)

{0.4-1.0 (極) 1.0

{極} 3.0 散

△連用一週間以上タル勿レ。 △使用時ニハ多量ノ温湯ヲ伍用セヨ。  
△前者ニ比シ作用迅速、危険少シ。

テトロナル Tetonal

0.2-1.0

散

鎮靜劑 Sedativa

臭素カリウム Kalium bromatum

一回量 0.5-2.0

一日量 水 投與ノ形 (散) 2.0-3.0

臭素ナトリウム Natrium bromatum

0.5-2.0

2.0-3.0 水 (散)

△臭素劑ヲ用フル時、有効度ヲ増サントセバ食鹽ヲ制限ス、此レ「クロール・イオン」ハ、臭素「イオン」ヨリモ加リ、曹達等トノ親和力大ナル故、臭素ヲ分離、次イデ排泄セシムルヲ以テナリ。  
△加里ハ心悸亢進ヲ起スコトアル故、ソノ時ハ曹達ヲ用フ。

△臭素ハ胃ヲ害スル故、多量ノ水ト共ニ用キヨ、胃障礙ハ「ナトリウム」ノ方少シ。

0.5-1.5

2.0-3.0 水 (散)

△特ニ癲癩ニ用フ。

臭素アムモニウム Ammonium bromatum

0.3-1.0

1.0-4.0 水

臭素カルチウム Calcium bromatum

0.3-1.0

1.0 水

△胃障礙ソノ他ノ副作用少シ。

プロモコル Bromocoll (ヂ・プローム・タンニン・ゲラチン)

0.5-1.0 (漸増) 3.0-6.0

1.5-3.0-5.0 (漸増) 6.0-30.0 散

△外用 (イ) 10-20%軟膏(癬痒)。

(ロ)「プロモコル」5.0-10.0、亞鉛華 10.0、澱粉 3.0、「グリセリン」、水各 100.0、右振盪外用。

溶解性プロモコル Bromocollum soluble (三分ノ一量 硼砂ヲ含ム)

△5-10%液(癬痒ニ外用)。

{0.1-0.3 (極) 0.3

{0.3-0.8 (極) 1.0 丸

プローム樟腦 Camphora monobromata

{0.1-0.3 (極) 0.3

{0.3-0.8 (極) 1.0 丸

△生殖器鎮靜ニ賞用ス。 △注射ハ脂肪油ニ溶シテ行フ(皮下)。

サブロミン Sabromin (Calcium dibrombenenicum)

0.5-1.0

1.5-3.0-8.0 散、錠

△腸ニ至リテ分解吸收セラル、故、奏効緩和、永續、且副作用少シ。

鎮靜劑

一五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△「カルチウム」含有ノタメ癲癇ニモ用フ (三〇—八〇)。△錠 〇・五。

ブ・ロ・ム・ラ・ール	Bromural	カルモチン、プロヴァリン	一 同 量	一 日 量	散 投與ノ形
ブ・ロ・マ・リン	Bromalin	(「ウロトロピン」、臭素) 「エチール」ヨリ成ル。	〇・五—一・五	二〇—五〇—八〇	散 水
ブ・ロ・ミ・ピ・ン	Bromipin	(「プローム」胡麻油)	{ 10%液 四〇—一三〇cc 3%液 二〇—四〇cc	{ 三〇—四〇cc 四〇—二〇〇cc	乳 膠
含糖固形プロミピン	Bromipinum solidum saccharatum		一—三錠	三—八錠	錠
ア・ダ・モ・ン	Adamon	(三%臭素ト「ボルネオール」含有)	〇・五—一・〇	一・五—三・〇	散 水
ウ・レ・ア・ブ・ロ・ミ・ン	Ureabromin	(臭素カルシウム尿素)	一・〇	三・〇	散 水
イ・ク・イ・ブ・ロ・ミ・ン	(三共) Equibromin	(邦製「サブロミン」)	一・〇—三・〇	三・〇—九・〇	散 水
セ・ド・ブ・ロ・ール	Sedobrol	(臭素及植物性越幾斯含有)	{ 一錠 } { 三〇—一〇〇 } { 一—五錠 }	{ 一—五錠 }	錠 水

△一錠ニ〇。 △温湯ニ溶解シテ用フレバ味良シ。

ブ・ロ・ー・ム・ア・ル・バ・ン・ギ・ツ	Bromalbacid	(蛋白、臭素ノ化合物)	〇・五—一・〇	一・五—四・〇	散 水
ブ・ロ・ー・ム・ア・イ・ロ・ン	Bromegon	(蛋白、臭素ノ化合物)	〇・五—一・〇	一・五—四・〇	散 水
縹草根	R. dix Valerianae		一・〇—二・〇	五〇—六〇	浸 水
縹草丁癸	Ti cura Valerianae		一〇—二〇滴	一日數回	水
エーテル性縹草丁癸	Tinctura Valerianae aetherea		一〇—二〇滴	一日數回	滴
縹草酸亜鉛	Zincum valerianicum		〇・〇一—〇・〇五	〇・〇五—〇・三	丸 散
縹草越幾斯	Extractum Valerianae		〇・五—一・〇	一・〇—二・〇	丸 水
縹草酸アモモニウム	Ammonium valerianicum		〇・〇五—〇・一	〇・二五—〇・五	水、丸
ヴァリダール	Valdol	(縹草酸メントール)	一〇—一五滴	一五—六〇滴	膠
ヴァロール	Valol	(「ヴァリダール」ト同一化合物)	一〇—一五滴	一五—六〇滴	膠
ヴァリール	Valyl	(縹草酸チ・エチール・アミッド)	一—三膠囊	三—九膠囊	膠
ボルニヴァール	Borhyval	(縹草酸ボルネオール)	〇・七五—一・五	一—二	膠

△一膠囊 〇・一五。

鎮靜劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△一膠囊 0.1g

一回量

一日量

投與ノ形

樟腦ワックス Validolum camphoratum

10—15滴

15—50滴

膠

阿魏 Asa foetida

{0.2—1.0  
3.0—5.0

{0.5—1.0  
5.0

錠丸

散

△「ヒメナリ」患者ニ用フ、特異ノ臭氣アリ。

阿魏丁液 Tinctura Asae foetidae

{内 0.5—1.0  
2.0—6.0

{1.5—3.0

洗水

鹽化亜鉛 Zincum oxydatum

0.05—0.1g

0.1—0.5g

散

△「プローム」ノ奏効セザル癩癧又ハ小兒ノ「テタニー」等ニ試ム。

△初メ一回 0.05 漸増シテ一回 0.1g ニ至リ數ヶ月間持長ス。

局所麻酔劑 Localanaesthetica

一、内科的ニ用フルモノ

鹽酸コカイン Cocainum hydrochloricum

一回量 {0.01—0.01  
[糖] 0.04

一日量 {0.05—0.05  
[糖] 0.1g

投與ノ形 水、散、坐、注、外

鹽酸コカイン錠 Pastilli Cocaini hydrochlorici △1個 0.005g

アキメチミン (コカインノール) Anisich sin (Kocainol)

0.2—0.5g

1.0—2.0g

散、坐、外

チクロフェノール Cycloform 0.2—0.5g

1.0—2.0g

オルトフォルム及新オルトフォルム Orthoform u Orthoform nat 0.5—1.0g 始劑 1.5—3.0g 散、坐、外

プロパシン Propasin (アセトン・クロロフォルム) 0.2—0.5g 散、坐、外

クロレトシ Chlorotol (アセトン・クロロフォルム) 0.2—0.5g 散、坐、外

ノボフォルム (武田) Novoforum 0.2—0.5g 散、坐、外

△右何レモ嘔吐、船暈等ニ内服ス。

二、内科的以外ニ用フルモノ

鹽酸コカイン Cocainum hydrochloricum

△煮沸ニ堪エズ、溶液ハ變化シ易シ。

△中毒性大ナリ (1%液 1.0cc ノ注射ニテ中毒スルコトアリト。1%液 5.0g 以下ヲ用フベシ)。

△「アドレナリン」ヲ伍用スレバ、ソノ効力ヲ増大シ、且吸收中毒ノ憂ヲ少ナカラシム。

△點眼 2%、鼻咽喉塗布 10—20%、尿道注入 2—5%。

鹽酸シユライヒ氏浸潤麻酔液。

第一液—鹽酸「コカイン」 0.3、鹽酸「モルヒネ」 0.01、食鹽 0.3、水 100.0。

第二液—鹽酸「コカイン」 0.1、鹽酸「モルヒネ」 0.01、食鹽 0.3、水 100.0。

局所麻酔劑 種類、用量、用法



内服劑及注射劑ノ用量及用法

第三液——鹽酸「コカイン」0.01、鹽酸「モルヒネ」0.005、食鹽0.2、水100.0。  
△通常第二液ヲ使用ス。

鹽酸トロバコカイン Troscocainum hydrochloricum  
△「コカイン」ニ比シ組織透入性劣リ、血管收縮作用ナク、又「アドレナリン」ヲ加フルモ其影響ナシ。

△然レ共毒性前者ノ三分ノ一(0.3ヲ用フルモ危険ナシト)、且煮沸及溶液貯蔵ニ堪ユルノ利アリ。

△點眼 三—五%、腰髄麻酔 0.3—0.5% (本劑ノ主能)、部分麻酔 0.5—1%。

ベタ・オイカイン Beta-Eucain  
△「コカイン」ニ劣ル點ハ「トロバコカイン」ト同一。然シ煮沸ニ堪エ、毒性「コカイン」ノ約四分一。

△點眼 2%、尿道 1%、浸潤麻酔 0.2%、部分麻酔 2—4%、口腔ニハ乳酸「オイカイン」10—15%。

鹽酸ストヴァイン Slovianum hydrochloricum  
△主トシテ腰髄麻酔ニ用フル—0.04—0.08。

△毒性「コカイン」ノ二分ノ一、煮沸消毒可能ナルモ、前者ト同一ノ缺點アリ。

ノボカイン Novocain (プロカイン・ノボカイン)  
△毒性「コカイン」ノ六—八分ノ一(2%液 60.0ニ適用フルコトヲ得)。短時間ノ煮沸ニ堪ユ。

△作用一過性ナルモ、「アドレナリン」ニヨリ強大持久セシメ得ル故基ヨク用キラル。

△浸潤麻酔 0.1—0.3%ノ濃度ニテ全量0.2迄。皮下 3%。

△粘膜 10%、部分麻酔 0.5—2%、腰髄麻酔 0.1—0.5%。食鹽モ亦モイテ。

バンカイン Bencain 邦製「ノボカイン」ナリ。用法同前。

アリピン Aripin  
△短時間ノ消毒ニ堪エ、毒性二分ノ一、「アドレナリン」ニテ効力増ス、但局所血管收縮作用ナシ。

△點眼 1—5%、粘膜 10%、腰髄麻酔 0.2%、浸潤麻酔 0.1—0.5%。

葡酸アリピン Alypinum nitricum △皮下注射 2—5%。

アコイン Acoin  
△毒性弱ク、作用持久、煮沸ニ堪ユ。

△點眼 1%以下。浸潤麻酔 0.2%。

鹽酸ホロカイン Holocainum hydrochloricum  
△毒性大ニシテ眼ノ手術ニ用フル—1%。

アロカイン Alocain S.  
△種々ノ優點アルモ、組織液ノ如キ弱「アルカリ」ニヨリテモ沈澱スルノ不利アリ。

△浸潤、皮下 1—2%、原液ハ 3%液ナリ。

ニルヴァニン Nirvanin △浸潤麻酔 0.5—2%、部分麻酔 2%。

ネオカイン (鹽野) Neocain △粘膜 10%、浸潤及部分麻酔 0.5—2%、脊髄麻酔 5—10%。

局處麻酔劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

クロールエチール Chloroethyl 小手術ノ時ニ皮膚上ニ噴霧シテ冷却麻醉ス。

解熱劑 Antipyretica

アンチピリン Antipyrinum 一回量 0.3-1.0 散、水、注 一日量 {1.0-3.0 (極) 3.0

アンチピリン錠 Pasilli Antipyrini 量 0.15g。

ザリピリン Salipyrin (サリチール酸アンチピリン) {0.3-1.0 (極) 1.0 散、振

ミグレニン Migrenin (アンチピリン五分、コフェイン五分、梅糖酸五分) {0.3-0.5-1.0 (極) 1.0 散、錠

ピラミドン Pyramidon (チメチール・アミド・アンチピリン) {0.1-0.3 (極) 0.3 散、水

マルブリン Melubrin (アンチピリン・アミド・メタンスルフォ酸ナトリウム) 0.5-1.0 1.0-3.0-8.0 散、錠 (注) 散、(静)

マレチン Marcain (カルベシジン酸トリール・ヒドラシッド) 0.04-0.1 0.2-0.4 散

△急性「ロイマチス」ニ適ス。△注射用ニ實用セラル。

△結核熱ニヨク用フルモ、發汗、虚脱ヲ來スコトアリ、又重症貧血ヲ來スコトアリ。

ツツソール Tussol (扁桃酸アンチピリン)。

△百日咳ニ實用ス。△小兒ノ月數ノ二倍適、又ハ年數ノ二倍盼ヲ一日量トシ、水劑トス。

ヨードピリン Iodopyrin (ヨード・アンチピリン) 0.3-1.0 1.0-3.0 散、外

△「インフルエンザ」、梅毒性頭痛等ニ用フ。

△外用——10%、軟膏(痒痒)。

アセトピリン Acetopyrin (アセチール・サリチール酸アンチピリン) 0.3-1.0 1.0-2.0-4.0 散

△腸ニ至リテ分解スル故、胃ヲ害スルコト少シ。

ザリチール酸ピラミドン Pyranidonum salicylicum 0.1-0.2 0.3-0.6 散、水

トリゲミン Trigemim (「ピラミドン」ト抱水「ブチール・クロラール」ノ化合物) 0.1-0.2 0.3-0.6 散

△疼痛特ニ直接腦神經ヨリ來ルモノニ適ス。

△嘔吐、胃灼感等來ルコトアル故空腹時ニ與フベカラズ。

カムフォルミドン Camphomidonum (「ピラミドン」ト樟腦ノ化合物) 0.2-0.3 0.5-1.0 散

△成分ヲナス二者ノ作用ヲ兼備ス、即解熱、制汗ノ効アリ。

ネオピリン(田邊) Neopyrin 0.5-1.0 1.5-3.0 散



内服劑及注射劑ノ用量及用法

二四

藥名	同量	一日量	投與ノ形
ア。ン。チ。フ。エ。ン。リ。ン Antifebrin (アセトアニリド)	{0.5-0.3 [極]0.3	{0.3-0.6 [極]1.0	散、丸
△「アンチピリン」ニ比シ作用強ク毒性大ナリ。			
△0.1-0.2ニテ虚脱ヲ來スコトアリ、少量分服法ヲ可トス。			
エ。キ。サ。ル。ギ。ン Exalen (メチール・アンチフェブリン)	0.1-0.3	0.2-0.7	散
△解熱作用弱ケレドモ鎮痛作用大ナリ。			
△中毒ヲ起シ易シ。			
ベ。ン。ツ。ア。ニ。リ。ド Benzalidum	0.5-1.0	1.5-6.0	散
△解熱作用緩和ニ過グ故ニ小兒ニ用フルニ適ス	{1-2年 0.05-0.2 成長兒 0.1-0.5		
フ。エ。ナ。セ。チ。ン Phenacetinum	{0.3-0.8 [極]1.0	{1.0-2.5 [極]3.0	散
△解熱作用ノ外、鎮痛鎮靜作用著シ。			
ラ。ク。ト。フ。エ。ニ。ン Lactophenin (ラクチール・フェネチデン)	{0.3-0.6 [極]0.7	{1.0-2.0 [極]3.0	散、錠
△解熱作用ノ外、鎮痛鎮靜ノ効大ナリ。			
チ。ト。ロ。フ。エ。ン Citrophen (枸橼酸フェネチデン)	0.5	1.5	散
△毒性「フェナセチン」ニ倍ス。			

ア。ポ。リ。チ。ン Apolysin (枸橼酸ト「フェネチデン」ノ化合物)	0.5-1.0	1.0-3.0	散
△解熱、鎮痛ノ効弱シ。			
テ。ル。モ。ヂ。ン Thermodin (フェナセチン・ウレタン)	0.3-0.6	1.0-1.5	散
△解熱作用「フェナセチン」ニ比シ緩和ニシテ永續ス。			
ノ。イ。ロ。ジ。ン Neurosin (アセチール・オキシ フェニール・ウレタン)	0.3-0.5	0.6-1.5	散
△神経痛ニハ有効ナルモ發汗強クシテ用キ難シ。			
サ。リ。チ。ール。酸 Acidum salicylicum	0.3-1.0	1.5-8.0	振、散
サ。リ。チ。ール。酸。ナ。トリ。ウム Natrium salicylicum	0.5-2.0	1.5-5.0-10.0	水、散
△普通ハ3.0位用フルモ急性「ロイマチス」ニハ10.0位迄用フ。△急性「ロイマチス」ノ特効藥ナリ。△胃腸障害シキ故、必ず重曹ヲ伍用シ、水劑トスルヲ可トス。△錠0.5。			
ア。ス。ピ。リ。ン Aspirin (アセチール・サリチール酸)	0.4-0.6	1.0-3.0-6.0	散、錠
△腸ニテ分解吸收セラル、故、胃腸障害少シ。△但作用モ前者ニ劣ル。			
可溶性アスピリン Aspirinum subtile (アセチール・サリチ ール酸カルチウム)	0.5	1.0-3.0-6.0	錠、(水)
△90%「アスピリン」ヲ含ム。△「アスピリン」ニ堪エザル人モヨク本劑ヲ服用ス。			
△水劑ハ分解シ易キ故、錠劑ヲ可トス。			

解熱劑ノ用法及投與法

二五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

- ノヴァスピリン Novaspirin (「メチレン」桐蘇酸ノ「サ」リチール「酸」エステル) 一回量 一日量 投與ノ形  
0.5-1.0 1.0-6.0 散、錠
- △作用「アスピリン」ヨリモ尙緩和ナリ、故ニ慢性症ニ用フ。
- オポピリン (三共) Opopyrin (アセチール・サリチール酸) 0.4-0.6 1.0-3.0-6.0 散
- ボンピリン (武田) Bonpyrin (アセチール・サリチール酸カルチウム) 0.4-0.6 1.0-3.0-6.0 散、錠、(水)
- ザロール Salolm (サリチール酸フェニール) 0.5-1.5 1.5-3.0-8.0 散
- △腸ニ至リテ分解スル故、胃ヲ害セズ。 △急性「ロイマチス」ニハ効少キガ、慢性症ニハ持長シ得ル利アリ。 △腸ノ防腐劑トシテモ用フ。
- ヂプロザール Diplosal (「サリチール」酸ノ「サ」リチール・エステル) 0.5-1.0 1.0-4.0-6.0 散、錠
- △腸ニテ分解吸收セラル、故、胃ヲ害セズ、又、作用時間長シ。 △錠 0.5。
- ザロフェン Salophen (アセチール・パラアミノ・ザロール) 0.5-1.5 1.5-3.0-8.0 散
- △腸ニテ分解シテ「サリチール」酸ヲ生ズ。
- △作用「ザロール」ヨリモ尙緩和、亞急性乃至慢性症ニ適ス。
- ヴェジピリン Vesipyrin (アセチール・サリチール酸フェニール) 0.5-1.0 1.0-3.0 散、錠
- △腸ニテ分解ス。 △緩和ナル「ザロール」ノ代用品。
- ロイマチン Rheumatin (中性サリチール酸サロヒン) 0.5-1.0 1.0-3.0 散

- サラセトール Salacetol (サリチール酸アセトール) 0.5-1.5 1.5-5.0 散
- △「ザロール」ノ無害ナル代用品。
- アガチン Agathin (サリチール・メチール) 0.1-0.4 1.0-3.0-1.0 散 (直、散)
- ビレノール (ピラン) Tyrenol (Pyran) (「サリチール」酸、安息香酸「チモール」ノ混合物) 0.5 1.5-3.0 散、水
- エルボン Elyon (桂皮酸「フェノール」、尿素ヲ含ム) 0.5-1.0 2.0-4.0 散、錠
- △結核熱ニ賞用ス。 △錠 1.0。
- 鹽酸キニーネ Chininum hydrochloricum 0.3-0.5-1.0 0.5-1.5 丸、散、錠、水、注
- △一回 1.0ヲ用フルハ「マラリア」ノ場合ナリ。 △強壯劑トシテハ 0.5以下ヲ用フ。
- 硫酸キニーネ Chininum sulfuricum 0.3-0.5-1.0 0.5-1.5 丸、散、錠
- △前者ノ如ク多クハ用キラレズ。
- 硫酸キニーネ丸 Pilulae Chinini sulfurici 0.1-1.0 0.5-1.0 丸、水
- △一個中硫酸「キニーネ」量 0.1。
- ブローム水素酸キニーネ Chininum hydrobromicum 0.1-0.5 0.5-1.0 丸、散、水、注



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△熱性病患者ノ興奮セルモノ、神經性嘔吐等ニ用フ。

重硫酸キニーネ *Chininum bisulfuricum* 一回量 一日量 投與ノ形  
 重硫酸キニーネ *Chininum tannicum* 〇・三—一・〇 〇・五—一・五 散、水、丸  
 重硫酸キニーネ *Chininum tannicum* 〇・五—一・〇 一・五—三・〇 散、丸

△苦味ナキ點鹽酸「キニーネ」ニ優ルモ、効力半ニモ及バズ。△小兒ニ用キラル。  
 重鹽酸キニーネ *Chininum bilydrochloricum* 〇・三—一・〇 〇・五—一・五 注

△ヨク水ニ溶クル故注射用ニセラル。  
 オイビニン *Echinin* (エチール炭酸キニーネ) 〇・五—一・〇 一・〇—二・五 散、錠

△「キニーネ」ト全ク同効ニシテ、苦味少キノ利アリ。  
 △副作用モ少シ、故ニ小兒、「キニーネ」特異質ノ人ニ適ス。

△「マラリア」、百日咳ニ用フ。  
 アリストビン *Aristochin* (「キニーネ」ノ炭酸「エステル」) 〇・五—一・〇 一・〇—二・五 散

△「オイビニン」ト同様ニ用キラル。  
 バダニン *Bagnon* (鹽酸「キニーネ」ト「カフェイン」ヲ含ム) 二・〇—五・〇 二・〇—十・〇 注 [皮、筋]

△「マラリア」、「インフルエンザ」ニナルベク早期ニ一日二回五〇.〇宛一日一二回注射シ、  
 後ハ一日一回二〇.〇宛注射ス。

ザロビニン *Salobinin* (「キニーネ」ノ「サリチル酸」エステル) 〇・五—一・〇 一・〇—三・〇 散

△吸收悪キ故、「マラリア」ニハ適セズ。△効力「キニーネ」ノ半。  
 アセチールザリチル酸キニーネ *Chininum acetosalicylicum* 〇・二—一・〇 〇・五—一・五 散

亞砒酸キニーネ *Chininum arsenicosum* 悪性「マラリア」ニ對シ…………… 〇・〇—一・〇 一・〇—二・五 散

キネオナル *Chinonal* (「キニーネ」二分、「ヴ」ノナル) 一分 〇・三—一・〇 一・〇—二・五 散

△百日咳ニ用フ。  
 キナフエニン *Chinaphenin* (「キニーネ」ト「フェ」ナセチン「ノ化合物」) 〇・五—一・〇 一・〇—三・〇 散

オイツツシン(三共) *Eutassin* (「キニーネ」ノ誘導體) 〇・五 一・五 散

△特ニ百日咳ニ用フ。  
 鹽酸オプトビン *Optochinum hydrochloricum* 一〇—一〇 一〇—一〇 散

レミジン *Remijn* (鹽基性オプトビン) 〇・二 〇・八—一・五 散

△二者共ニ急性肺炎ニ用フ。  
 △〇・八—一・ニヲ六回ニ分服、且服藥前牛乳又ハ粥ヲ攝ラシメヨ、空腹時與フレバ副作用強シ。  
 △三—四日以上連用スベカラズ、視力障碍等ヲ起スコトアリ。  
 △樟腦ノ伍用ハ右二劑ノ効力ヲ減殺ス。  
 サリチル酸オプトビン *Optochinum salicylicum* 〇・二 一・五—二・〇 散



内服劑及注射劑ノ用量及用法

三〇

鹽酸ヒドロキノ Hydrochinum hydrochloricum

一回量 一日量  
0.5 1.0 散、投與ノ形、水

△「オプビトピン」ノ如キ作用ヲ有ス。

心臓血管劑 Cardioangiotonica et Angiodilatatoria

1. 強心劑 Cardiotonica

チギタリス葉 Folia digitalis

一回量 一日量  
0.1-0.25 散、投與ノ形、水  
〔極〕0.1 〔極〕1.0

△用法——詳細ハ後論心臓瓣膜病ノ條參照。

チギタリス丁幾 Truncura digitalis

〔極〕0.5 〔極〕1.5-3.0  
水

チガレイン(クローエッタ氏可溶性チギトキシニン) Digalen

1.0 2.0-3.0 注、水、錠、錠

△1.0gハ「チギタリス」葉0.25ニ相當ス。

△効果速ニ現ハル、モ葉ノ如ク永續セズ。

チギタール・コラーツ=チギタリス・チアリザート

〔内〕1.0-1.5 滴 〔外〕0.5-1.0 注〔靜〕

Digital-Golaz Digitalis-dialysat

(新鮮ナル葉ノ浸劑ヲ透析セルモノ)

△1.0gハ新鮮葉1.0、乾燥葉0.2ニ當ル。

チギタミン(鹽野) Digitamin

0.5-1.0 1.5-3.0 注、水

チギフオリン Digifolin

△皮下注射始無痛、効力又卓越ス。△錠0.2及液1.0gハ葉0.1ニ當ル。  
〔液〕1.0 〔末〕0.2 散、水、錠、錠

パンギタール(三共) Pangital

0.5-1.0 1.5-3.0 注、水、散

△末1.0、液1.0gハ葉0.2ニ當ル。

△葉中ノ全有効成分ヲ自然ト均シキ比例ニ含ムモノ。効力卓越ス。

チキプラツム Digipuratum

0.1(1錠) 0.1-0.4(1-4錠) 散、錠

△0.1gハ葉0.1ニ當ル。△「パンギタール」ト効力伯仲ス。

液體チキプラツム Digipuratum fluidum

0.5-1.0 1.0-2.5 水、注〔筋、靜〕

△皮下注射ハ少シク疼痛アリ。

チギタリザート・ビュルゲル Digitalisatum-Birger (コラーツ氏ノモノト殆同一物)。

チギタロン Digitalon

0.5-1.0 1.0-2.0 水、注、錠

△1.0gハ葉0.1ニ當ル。

結晶チギトキシニン Digitoxinum crystallisatum

0.0005 0.0005-0.001 錠

△局處刺戟強クシテ内服、注射不可能。△澆腸スルモ多少ノ下痢ヲ來ス。中毒シ易シ。

心臓血管劑

三一



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△全量 0.005g 至ラバ休藥スベシ。 △0.001g 薬 1.0g 當ル。

△溶液ヲ作ルニハ微温湯 100.0g 酒精 15 滴ヲ加ヘシモノニ溶ヌ。

真正デギタリン Digitalinum verum Kiliani

△局處刺戟強クシテ宜シカラズ。 △錠 0.0005g。

△一週間ノ全量 0.03g ヲ超ユベカラズ。

デギタリン Digisalin

ストロファンツス丁幾 Tinctura Strophanthi

結晶ストロファンチン Strophantinum crystallatum (K.G) 0.0001g

ストロファンチン・ベリンゲル (K「ストロファンチン」ノ 1% 液) 0.3-0.5g

Strophantin-Bohringer

△「ストロファンチン」劑ハ局處刺戟強キ故靜脈内ニ注射ス。

△實ニ強力ナル強心劑ナル故危急ノ場合ニ用フルコト多シ。

△四十八時間内(少クトモ三六時間内)ニハ二回用フベカラズ。

△前ニ「デギタリス」ヲ用キ居リシ時ハ使用ヲ差控ヘヨ。

一回量 一日量 投與ノ形 錠

0.0005g 0.001-0.005g 水、注

0.5-1.5g 1.0-5.0g 水、注

0.3-0.5g 0.5-1.0g 水、注

0.5-1.0g 1.0-5.0g 水、注

チマリン Cymarin

△一錠 0.0003g 「アムブレ」ニ混中 0.001g △「ストロファンチン」ヨリモ強力ナリ。

硫酸スバルテイン Spartanium sulfuricum

△奏効一般ニ不確實ニシテ大ニ効アルコトト無効ノコトトアリ。

酸化スバルテイン Oxysparte in

鹽酸カルバイン Carpainum hydrochloricum

△前者ト同効アリ。

カフェイン Caffeinum

△心筋及内臟神經配下ノ血管ノ收縮力ヲ増シ、腦、腎、及

安息香酸ナトリウム・カフェイン Caffeinum natriobenzoicum

ザリチール酸ナトリウム・カフェイン Caffeinum natriosalicylicum

△注射ニハニ0%液ヲ一日數筒用フ。

心臟血管劑

0.0001-0.001 0.0005-0.001 注(筋、靜)、錠

0.01-0.1 0.1-0.3 散、水、丸

0.001-0.005 0.01-0.03 注丸、散、水

0.05-0.2 0.2-0.5 散、丸

0.15-0.4 0.5-1.2 散、水、注

0.5-1.0 0.5-1.2 散、水、注



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△此等「カフェイン」劑ハヨク「ヂギタリス」末ト伍用シテ後者ノ缺點ヲ補フ。

一回量 一日量 投與ノ形

枸橼酸カフェイン Caffeinum citricum 0.1—0.5 0.5—1.0 水、丸、注

ヨードカフェイン Jodocafein (カフェイン沃度ナトリウム) 0.25—0.5 0.5—1.0 散、水

精製樟腦 Camphora depurata 0.05—0.5 0.2—1.0 散、丸、乳、浣

△浣腸用乳劑——樟腦 0.5、卵黄一箇、水 200.0、阿片丁幾 0.5。

樟腦油 Oleum camphoratum (10—10%樟腦オレイン油) 0.5—1.5 1.0—2.0 注、(浣)

△危急ノ場合ニハ一日ニ三筒ニ及ブモ何ノ害ナシ。

ヘキセトン Hexeton (樟腦ノ同分體ニシテ水溶性ナルモノ) 1.0—2.0 注(筋)

1.0—2.0 注(静)

鹽酸キニーネ Chininum hydrochloricum 0.2—0.5 0.2—1.0 散、水、丸

△不整脈、バセドウ氏病ノ心悸亢進等ニ用フ。

キニーネ Chinidin 0.2—0.5 0.5—1.0 散

△不整脈ニ用フ、弱キ強心劑ナリ。

鹽化バリウム Baryum chloratum 0.01—0.05 0.05—0.05 水

△作用恰モ「ヂギタリス」ニ類ス、稀ニ用フ。

リンゲル氏液 Ringer'sche Lösung 100.0—1000.0 100.0—1500.0 注(皮、静)、浣

△成分——食鹽 7.5、重曹 0.1、鹽化加里 0.3、鹽化石灰 0.2、水 1000.0。

ロック氏液 Lock'sche Lösung 100.0—1000.0 100.0—1500.0 注(皮、静)、浣

△成分——食鹽 6.0、重曹 0.1、鹽化加里 0.2、鹽化石灰 0.2、葡萄糖 1.0、水 1000.0

生理的食鹽水 Physiologische Kochsalzlösung (0.5%) 100.0—1000.0 100.0—1500.0 注(皮、静)、浣

アルコール Alkohol (「ブランデー」、「コンニャク」、「ウイスキー」) 5.0—10.0 反覆投與 水

アドニム草 Herba Adonidis 0.5—0.5 1.5—3.0 浸

△作用——「ヂギタリス」ニ相似ス、蓄積作用ナシ。

カルチオトニン Cardiotannin (君影草成分ト安那加ヲ含ム) 1.0—2.0 1.0—6.0 注

II. 血管緊張劑 Angiotonica

一回量 一日量 投與ノ形

鹽化アドレナリン Adrenalin chloride (1%液) 0.3—0.5—1.0 1—數回 注(筋)

注(又ハ食鹽水)

注(又ハ浣腸)

心臟血管劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

一回量 一日量 投與ノ形

ス・ブ・ラ・レ・ニ・ン Suprarenin  
 エ・ビ・ネ・フ・リ・ン Epinephrin  
 パ・ラ・ネ・フ・リ・ン Paraneprin } 前者ト同一物ナリ。

△心臓興奮ノ外、末梢血管、特ニ腹部内臓血管ノ收縮ヲ起シ、血壓ヲ高ム、但シ作用急劇ナル故、過敏ナル患者ハ腦貧血ヲ起スコトアリ、故ニ注射ハ徐々ニナスベシ。  
 △最危急ノ場合ニハ、靜脈内、時ニハ心臓内注射ニヨリ同生ノ奇効ヲ奏スルコトアリ。  
 △「アドレナリン」ノ作用ハ、急劇ニシテ一過性ナル故、急性心臓衰弱ニ最モ適應ス。

硝・酸・ス・ト・リ・キ・ニ・ー・ネ Strychninum nitricum  
 {0.001—0.001# {0.001—0.005# 丸、注  
 {〔極〕 0.00# {〔極〕 0.01#

△血管運動中樞ヲ刺戟シ、末梢血管ノ收縮、血壓上昇ヲ來ス。  
 △故ニ血管麻痺、中毒性中樞麻痺ニ用フルニ適ス。

III. 血管擴張劑 Angiodilatoria

亞・硝・酸・ア・ミ・ー・ル Amylium nitrosum 發作時……1→5滴 1—數回 嗅

△狭心症、喘息、偏頭痛、鉛毒痲痛等ニ用フ。  
 △初メハ1—2滴ヲ用キ、後ニハ5滴位マデニナス。

處方 — 亞硝酸アミール 3.0、酒精 3.0。右 10—20滴布ニ滴下吸入。(發作時)

亞・硝・酸・ナ・ト・リ・ウ・ム Natrium nitrosum (漸増) 0.05→0.1 0.1→0.2 散、水

△内服 3—4分ニシテ效果現ハレ、10—30分ニシテ極度ニ達シ約一時間持續スルコト前劑ト同ジ。

ニ・ト・ロ・グ・リ・セ・リ・ン Nitroglycerinum 0.005→0.01 0.001→0.005# 液

△作用前者ニ比シテ強ク且長ク持續ス。  
 △酒精、「オレーフ」油、「グリセリン」等ニ溶シ與フ。丸劑等トナスハ危險(爆發)ナリ。

ニ・ト・ロ・グ・リ・セ・リ・ン液 Liquor Nitroglycerini (1%酒精液) (漸増) 1→5→10滴 3回 水

四・硝・酸・エ・リ・ト・ロ・ール Erythrolum tetranitricum 0.5→1→2錠 1→5錠 錠

△一錠 0.01#

亞・硝・酸・エ・ー・テ・ル・精(甘硝石精) Spiritus Aetheris nitrosi 0.3→1.0 1.0→3.0 水、嗅  
 △甘硝石精、亞硝酸「アミール」各 5.0。右 5滴布ニ滴下吸入。(喘息發作)。

鹽・酸・パ・パ・バ・ス・リ・ン Papaverinum hydrochloricum {0.03—0.05# {0.05—0.1# 注〔皮〕、散、水  
 {0.01—0.01# {0.01—0.05# 注〔靜〕

ワ・ゾ・ト・ニ・ン Vasololin (「モルビン」及「ウレタン」ヨリナル) 1.0g 隔日一回 注

△注射回数 10—20回トス。

心臓血管劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

三八

テラツターテン Teraten (血管内皮製劑)

一回量 一日量 投與ノ形  
1.0g 三日一回注〔靜〕

△注射回数セー5回。△注射直後腦貧血等ヲ起スコトアリ。

ヒポトニン Hypotonin

0.5 一五散

アニマーザ Animasa

一錠 三錠錠

△右五種ハ何レモ血壓凡進症ニ用キラル。

プリン誘導體 (「コフェイン」、「テオプロミン」、「テオフィリン」等)。

△腎、腦、心冠狀動脈ヲ擴張ス、(用法——利尿劑ノ條)。

アンチピリン屬 (「アンチピリン」、「ピラミドン」等)。

△腦血管ヲ擴張ス、(用法——解熱劑ノ條)。

興奮劑 Excitantia

葡萄酒 Vinum

一回量 一日量 投與ノ形

5.0—15.0g 15.0—100.0g 水

コニヤック Cognak

5.0—10.0g 10.0—50.0g 水

ウイスキー Whisky

5.0—10.0 10.0—50.0 水

醋酸エーテル Aether aceticus

5—10滴 | 嗅 (内)

△失神時吸入又ハ内服セシム。

ホフマン氏液 (エーテル精)

10—20滴 | 内

Liquor Hoffmanni (Spiritus aethereus)

△「エーテル」一分、酒精三分ヨリ成ル。

アムモニア水 Aqua Ammoniac

數滴 嗅

△失神、酩酊時等ニ吸入セシム。

麝香 Moschus

0.1—0.5 0.1—1.0 散、乳、錠

小兒肺炎ニハ 0.5—0.1 0.1—0.5

△虚脱時ニ毎二—三時0.1—0.5宛ヲ屢樟腦ト伍シテ與フ。

硝酸ストロキニーネ Strychninum nitricum

{0.005—0.015 1—2回注  
〔極〕 0.005 〔極〕 0.015}

△虚脱時ニ大量ヲ用フ。

ブルチン Batcin

0.005—0.05 散

△「ストロキニーネ」ニ類スルモ毒力二三十分ノ一ニ當ル。

興奮劑

三九



内服劑及注射劑ノ用量及用法

四〇

コリアミルチン Coriamyrtinum

一回量 一日量 投與ノ形  
0.005—0.01 水、丸、注

利尿劑 Diuretica

醋酸加里液 Liquor Kalii acetici (3%液)  
醋酸ナトリウム Natrium aceticum

一回量 一日量 投與ノ形  
5.0—10.0—10.0—10.0—20.0 水  
1.0—2.0 3.0—11.0 水

△効力前者ニ劣ル。

硝酸カリウム(硝石) Kalium nitricum  
硝酸ナトリウム Natrium nitricum

0.5—1.0 1.0—3.0 水  
0.5—1.0 1.5—6.0 水

△効力前者ニ劣ル。

重酒石酸加里(精製酒石) Kalium bitartaricum (Cremor Tartari) 0.5—1.0  
△多量ニ用フニ下痢ス。

2.0—5.0 水、散

酒石酸加里 Kalium tartaricum

1.0—2.0 3.0—6.0 水、散

酒石酸カリウム・ナトリウム(ゼニトナリ鹽)  
Natrio-Kalium tartaricum. (Sal Seignetti)

0.5—1.0 1.5—5.0 水、散

△右二品何レモ大量ニ用フニ下痢ス。

安息香酸ナトリウム・コフェイン Caffeinum natrio-benzoicum

{0.1—0.3 {0.5—1.0 {0.5—1.0 散、水

ザリチール酸ナトリウム・コフェイン Caffeinum natriosalicylicum

{0.1—0.3 {0.5—1.0 {0.5—1.0 散、水

枸橼酸コフェイン Caffeinum citricum

0.1—0.3 0.5—1.0 散、(丸)水

シムフォロール Symphorol (カフェイン・スルフォ酸鹽)

1.0—1.5 3.0—5.0 散、水

ヂウレチン Diuretin (サリチール酸ナトリウム・テオプロミン)

{0.5—1.0 {1.5—3.0 (6.0) {0.5—1.0 水

アグリリン Agrin (醋酸ナトリウム・テオプロミン)

0.5—1.0 1.5—3.0 (6.0) 水、散

オイステニン Eustenin (ナトリウム沃度テオプロミン)

0.5 1.5—3.0 (6.0) 水、散

テオフォリン Theophorin (蟻酸ナトリウム・テオプロミン)

0.5—1.0 1.5—3.0 (6.0) 水、散

テオラクチン Theolactin (乳酸ナトリウム・テオプロミン)

0.5—1.0 1.5—3.0 (6.0) 水

ウロシトラール Urostral (枸橼酸ナトリウム・テオプロミン)

0.5—1.0 1.5—3.0 (6.0) 水

ウロフェリン Urophenin (安息香酸又ハ「サリチール」酸)

0.5—1.0 1.5—3.0 (6.0) 水、散

△以上六種ハ効力「ヂウレチン」ト伯仲シ用量モ亦同ジ。

ヂスプノン Dyspnon (「ヂウレチン」、「アグリリン」及「ケブラチン」越幾斯ノ合劑)

0.5 1.5—3.0 水、散

バルチン Barutin (サリチール酸ナトリウム・テオプロミン)

0.1—0.5 0.3—0.7 水、散

利尿劑

四一



内服劑及注射劑ノ用量及用法

四二

テオファイリン Theophyllin (「テオプロシント」同分體)  
 テオチン Theocin (「テオファイリン」同質)

一回量	一日量	投與ノ形
0.2—0.4	0.4—1.0	散、
{0.1—0.3 〔極〕0.5	{0.3—0.5—0.9 〔極〕1.5	

△最強力ナル利尿劑ナルモ副作用特ニ胃障礙甚シ。

△一日一六ニテ死セル例アリ。△錠 0.15。

醋酸ナトリウム・テオチン Theocinum natrio-ceticum

0.2—0.5 0.6—1.0—1.5

ザリチール酸ナトリウム・テオチン Theocinum natriosalicylicum 0.2—0.5 0.6—1.0—1.5

△右二者何レモ大量ノ水ニ伍用セバ胃障礙少シ。△右二者共ニ一日一五ヲ超ユベカラ

尿素 Urea

2.0—10.0 10.0—30.0—50.0 水

チレオイチン Thyroidin

0.1 0.3 散、錠

△「ネフロゼ」ニ試用ス。

商陸越幾斯 Extractum Phytolaccae

0.2—0.3 0.5—1.0 水

△試用セラル、コトアルモ確効ナシ。

ノヴズロール Novasuiol (水銀劑ナリ) 10%液

0.5—1.0 3 0.5—2.0 3 注(筋、靜)

甘汞 Calomelas

0.1—0.1 0.4—0.8 散

△下痢ヲ抑制スルタメ、阿片 0.03ヲ伍用ス。

尿消毒劑 Harantiseptica

ウヴウルシ葉 Folia Uvae ursi

一回量	一日量	投與ノ形
1.0—2.0	5.0—10.0	煎

△「アルブチン」、「エリコリン」ナル糖原質、樟腦様ノ「ウルソン」

及鞣酸含有。此ノ中「アルブミン」ガ腎臟ニテ分解シテ「ヒドロ

キノン」ヲ發生シ防腐性ニ作用ス。又利尿作用モアリ。

アルブチン Arbutinum

0.5—1.0 1.5—3.0 散

△前者ヨリ採レル有効成分ナルモ効力生薬ニ及バズ。

ウロトロピン Urotropin (ヘキサメチレン・テトラミン)

0.5—0.7 1.0—2.0 水

△酸性尿ノ時ノミニ分解シテ「フォルムアルデヒド」ヲ生ジ尿路ヲ消毒ス。

△ヨク「ウヴウルシ」葉煎ニ伍用ス、(以下ノモノモ然リ)。

△胃ヲ害スル故大量ノ水ニ溶シテ用フベシ。

ヘルミトール Helmitol (「チタリン」ト「ウロ

0.7—1.0 2.0—4.0 水

トロピン」ノ化合物)

尿消毒劑

四三



内服劑及注射劑ノ用量及用法

四四

ボロヴェルチン Boroverin (「ウロトロピン」ト硼酸ノ化合物) 0.7-1.0 二〇-四〇 水 一回量 一日量 投與ノ形

△此等ノモノハ「ウロトロピン」ト異リ尿ノ反應ヲ顧慮セズニ用フルコトヲ得。

ヘトラリン Hetrain (「ウロトロピン」ト「レ」  
「ソルチン」ノ化合物) 0.5 一五-二〇 水、錠

チストプリン Cystopurin (「ウロトロピン」ト  
「醋酸曹達ヨリ成ル」) 1.0-1.5 三〇-六〇 水、(散)

ヘキサール Hexal (「ウロトロピン」ト「スルフォ」  
「サリチール」酸ノ化合物) 1.0-1.5 三〇-六〇 水

△腸ニ至リテ分解シテ吸收セラル。

アマフトロピン Amphotropin (樟腦ウロトロピン) 0.5-1.0 一五-三〇 水

チストール (武田) Cystol (スルフォサリチール  
「酸ウロトロピン」) 0.5-1.0 一五-四〇 水

ザロール Salolm (サリチール酸フェニール) 0.5-1.0 一五-四〇 散

△腸ニテ分解シ石炭酸ト「サリチール」酸トナリ吸收セラル。

メチラニン (鹽野) Methylanin 1.0 三〇 水、散

サリフォルミン Salformin (サリチール酸ウロトロピン) 0.5-1.0 一五-三〇 水

フェジカール Vesical (「ヘキサール」ニ同ジ) 1.0 三〇-六〇 水

コバイバ、バルサム Balsamum Copalvae 0.5-1.0 一五-三〇 膠、丸、乳

コバイバ、膠囊 Capsulae Copalvae △各膠囊含量 0.5。

△急性期過ギテ悪急性又ハ慢性ニナリシ淋ニ好シデ用フ。

白檀油 Oleum Santali 10-15滴 三〇-五〇滴 膠

△急性症ニ用キ甚有効ナリ。

△用法例——10滴宛膠囊ニ入レ一回一個宛一日數回。

サンタロール (モノロール) Santalol (Gonorol) 0.3 〇.9-1.2 膠

△白檀油中ノ有効部分ニシテ前者ヨリモ有効ナリ。

ゴノサン Gonosan 「カワ」樹脂越幾斯含有白檀油) 二膠囊 六-八膠囊 膠

△最ヨク用キラル、治淋劑ナリ。 △一膠囊 0.3。

△「カワ」成分ヲ含ム故、尿路知覺ヲ麻痺シ、勃起、遺精ヲ防遏スルノ効ヲ兼有ス。

サンチール Santyl (「サンタロール」ノ「サリ」  
「チール」酸「エステル」) 二〇滴 六〇滴 膠

△良劑ニシテ胃腸ヲ害スルコト少シ。 △急性及悪急性症ニ用フ。

チレゾール Thyrsol (「サンタロール」ノ「メチール・エステル」) 0.2-0.5 0.6-2.0 膠

アロヴィン Arivoin △一膠囊 0.35 三-四膠囊 膠

尿消毒劑

四五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

四六

オプタール (鹽野)	一回量	一日量	投與ノ形
サントルゴール (友田) (固形白檀油)	0.5—1.0	1.5—3.0	膠
ツヨール (ツヨール)	0.5—1.0	1.5—3.0	内
ゴノサルピン (三友)	三膠囊	九—二膠囊	膠
	0.5	1.5—2.0	
葦澄茄 (該植物ノ未熟果實ヲ乾燥セルモノ)	1.0—3.0	2.0—9.0	散、丸、紙
葦澄茄越幾斯 Extractum Cubebarum	0.3—1.0	1.0—3.0	膠、丸

止血劑 Haemostyptica

一、一般出血止血劑

(A) 内服劑

鹽化カルチウム Calcium chloratum	一回量	一日量	投與ノ形
	0.5—1.5	2.0—5.0	水
△Caハ「プロトロムピン」ヲ能動性ノ「トロムピン」ニ變化ス。			
△又血管壁ニ作用シ、ソノ滲出性ヲ減ジテ止血性ニ作用ス。			

乳糖カルチウム Calcium lacticum	0.5—1.5	3.0—6.0	水、散
鹽化ナトリウム (食鹽) Natrium chloratum	3.0—10.0	10.0—30.0	水

白阿膠 Gelatina alba	3.0—6.0	10.0—30.0	水、澆
-------------------	---------	-----------	-----

△「フィブリノゲン」ヲ増加セシムル作用アリ。  
 △約0.6%ノ「カルチウム」ヲ含有スルコトモ止血ニ役立つ。  
 △處方例——白阿膠 3.0 枸橼油 二滴 單舎 20.0 水 200.0 右一日量。  
 コアグレン Coagulen (血小板越幾斯) 10%液 1.5—3.0 水 5.0—10.0 澆  
 クラウチン Clauden (肺臟組織ヨリ得タル製劑) 10.0 水 10—30.0 澆  
 醋酸鉛 Plumbum aceticum { 0.03宛 毎二時間  
 [極] 0.1 [極] 0.3

(B) 注射劑

白阿膠 Gelatina alba	%	一回量	一日回數	注射部位
鹽化カルチウム Calcium chloratum	10%	20.0—40.0 3	一回	皮下
鹽化ナトリウム Natrium chloratum	(5)—10%	10.0 3	一回	靜脈内
止血劑	(5)—10%	10.0 3	一回	靜脈内

四七



内服劑及注射劑ノ用量及用法

カリチーネ Kalizine	(五%鹽化石灰) 10%白阿膠	%	一回量	一日回數	注射部位
コアグレン Coagulen	五—10% 三% 五0.0g		30.0—50.0g	一回皮	下
ペプトンウイッテ Pepton „Witte“	五%		10.0—20.0g	一回皮	下
血清(健馬又ハ「チフテリア」血清) Blutserum			20.0—50.0g	一回皮下	筋肉内
牛乳 Kuhmilch			5.0g	二回皮	下
クラウデン Clauden			2.5—5.0g	一回皮	下
コアグレン Coagulen			5—10%液ヲ「ガーゼ」ニ浸シテ出血部ニ貼ス。		
クラウデン Clauden			△溶液又ハ粉末撒布。		
過クロール鉄液 Liquor Ferri sesquichlorati			△棉花ニ浸シ、強ク絞リテ出血部ニ貼ス。		

(C) 局所貼付劑

オキシクロール鉄液 Liquor Ferri oxychlorati.....△作用前者ヨリモ緩和ナリ。  
 フェリピリン Ferripyrim (過クロール鉄アンチピリン).....△純品又ハ10—20%液ヲ貼ス。  
 コタルギット Cotargit (鹽化鐵ト「スタブチチン」ノ化合物).....△有効ナルモ組織ヲ腐蝕スル故ナルベクハ用ヒズ。  
 フェロスチブチン Ferrostybin (過クロール鉄ウロトロピン)△腐蝕作用ナシ、純品又ハ10—3%液ヲ用フ。  
 醋酸 Acidum aceticum.....△稀醋酸、食醋何レモ効アリ。  
 鹽化アドレナリン Adrenalin chloride.....△一物液ヲ鹽酸「コカイン」液ト粘膜出血ニ伍用ス。  
 其他種々ノ腐蝕劑(硝酸銀、三鹽化醋酸、鹽化亞鉛等)。

II. 子宮出血止血劑

麥角 Secale cornutum  
 △主トシテ子宮ノ收縮ニヨリテ止血ス。  
 △採取後一年ノモノハ効力既ニセー八分ノ一トナル。  
 麥角越幾斯 Extracum Secalis cornuti {0.05—0.1 (極) 0.3 {0.2—0.6 (極) 1.0 丸、水、注(筋)  
 止血劑 四九



内服劑及注射劑ノ用量及用法

五〇

一回量 一日量 投與ノ形

△處方——麥角越幾斯一〇、水、グリセリン各二〇、右半一筒腎筋内注射。

麥角流動越幾斯 Extractum Secalis cornuti fluidum 〇.三—1.0 1.0—3.0 水  
△此等ハ概シテ効力不同ナル故、左ノ製劑ヲ用フルコト多シ。  
セカコルニン Secacornin „Roche” {内 0.二五—0.五 0.七五—1.五 水、錠  
注 0.五—1.0 注(筋、皮) 錠

△錠 〇.二五。  
エルゴチン・ホルムロン Ergotinum (fluidum), Romvelon {内 0.五—1.0 0.3 數同 注水  
注 0.三—0.75 0.5 注水

△最多ク用キラル、良劑。  
△使用時水ニテ倍量ニ稀釋シテ注射ス。

エルゴチン・フロムメ Ergotin-Frome 0.1—0.2g 0.3—1.0g 水、注  
枸橼酸ロルヌチン Cornulinum citricum {内 0.001—0.005 0.001—0.01 水、注

エルゴチノール Ergotinol 0.1—0.2g 0.3—1.0g 水、注  
セカルチン (鹽野) Scaltin {注 0.3—0.5 1.0—2.0 水、注

コラーツ麥角透折液(セカラン) Dielysatum Secalis cornuti Colaz (Seclan) {内 10滴 6滴 水、注(筋)

ヒドラスチス根 Radix Hydrasis 0.5—1.0 1.5—4.0 浸

△作用麥角ト同シ。  
ヒドラスチス流動越幾斯 Extractum Hydrasis fluidum 10—30滴 60—120滴 水

鹽酸ヒドラスチニン Hydrastininum hydrochloricum 0.005—0.01 0.01—0.02 水、注

△卓効アリ。一回〇.一ニ至ルモ害ナシト云フ。  
鹽酸ヒドラスチン Hydrastinum hydrochloricum 0.015—0.04 0.05—0.1 丸、膠、注

△本劑ハ効力弱シ。  
スチプチン Stypticin (鹽酸コタルニン) 0.015—0.05 0.1—0.2 水、散、錠、注、外

△注射液ハ五—1%液トス。△輕キ鎮靜作用ト止血及消炎作用トアリ。  
スチプトル Strykol (フタル酸コタルニン) 0.05—0.1 0.15—0.25 散、水、錠、外

△外用——子宮出血ニ「ガーゼ」又ハ撒布劑トス。  
ピツイトリン Pituitrin (腦下垂體漏斗部製劑) 1.0g 1.0—0.5g 注

△子宮ノ收縮ニヨリ止血ス。  
止血劑 五—



内服劑及注射劑ノ用量及用法

ピツグランドール	Piuglandol	一回量	一日量	投與ノ形
ヒポフィジン	Hypophysin	1.0g	1.0-3.0-5.0g	注射
ゲブルチン	(鹽野) Geburtin			

健胃劑 Stomachica

一、苦味、芳香性健胃劑

ゲンチャナ(根)末	Pulvis (radicis) Gentianae	一回量	一日量	投與ノ形
龍膽(根)末	Pulvis (radicis) Gentianae scabrae	0.1-0.3	0.3-1.0	散、(浸)
ゲンチャナ越幾斯	Extractum Gentianae	0.1-0.2	0.3-0.6	水、丸
龍膽越幾斯	Extractum Gentianae scabrae	0.1-0.2	0.3-0.6	水、丸
複方ゲンチャナ丁幾	Tinctura Gentianae composita	0.3-1.0	1.0-3.0	水
龍膽丁幾	Tinctura Gentianae scabrae	0.3-0.5	1.0-1.5	水
苦味丁幾	Tinctura amara (龍膽、橙皮、莖遂ノ丁幾)	1.5-3.0	5.0-10.0	煎
コンヂュランゴ皮	Cortex Condurango	1.0-2.0	3.0-6.0	水
コンヂュランゴ流動越幾斯	Extractum Condurango fluidum			

コンヂュランゴ酒	Vinum Condurango	5.0-10.0	15.0-30.0	水
コロムボ根	Radix Colombo	0.2-1.5	0.5-5.0	煎、浸、(散)

△特ニ嘔吐、下痢ヲ伴フモノニ實用ス。

コロムボ越幾斯	Extractum Colombo	0.5-0.8	1.0-2.5	丸、散
コロムボ丁幾	Tinctura Colombo	0.7-1.0	2.0-3.0	水
キナ皮	Cortex Chinae	1.0-1.5	3.0-5.0	煎
キナ丁幾	Tinctura Chinae	1.0-2.0	3.0-6.0-8.0	水
複方キナ丁幾	Tinctura Chinae composita (「キナ」皮、「ゲンチャナ」根、橙皮及桂皮ノ丁幾)	1.0-2.0	3.0-6.0-8.0	水
キナ越幾斯	Extractum Chinae	0.3-1.0	1.0-3.0	丸、散、本
キナ流動越幾斯	Extractum Chinae fluidum	0.3-1.0	1.0-3.0	水
キナ酒	Vinum Chinae	3.0-10.0	10.0-20.0	水
大黃(末)	Radix Rhei (Pulvis Rhei)	0.05-0.1	0.1-0.5	散
大黃越幾斯	Extractum Rhei	0.1-0.3	0.3-1.0	丸
大黃丁幾	Tinctura Rhei	1.0-3.0	2.0-8.0	水
水製大黃丁幾	Tinctura Rhei aquosa			

健胃劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

五四

	一回量	一日量	投與ノ形
蘆薈丁幾 Tinctura Aloës	二〇—三〇	三〇—八〇	水
複方蘆薈丁幾 Tinctura Aloës composita	{0.01—0.01 〔極〕0.05}	{0.05—0.05 〔極〕0.1}	散、丸、(水)
番木鱉越幾斯 Extractum Strychni (Vomicae)	{0.1—0.3 〔極〕1.0}	{0.5—1.0 〔極〕2.0}	水
番木鱉丁幾 Tinctura Strychni (Vomicae)	0.5—1.0	2.0—3.0	冷浸、煎
クヱツシニア木 Tiganum Quassiae	0.2—0.5	0.5—1.5	丸、散
クヱツシニア越幾斯 Extractum Quassiae	1.0	2.0—3.0	水
クヱツシニア丁幾 Tinctura Quassiae	0.2—0.5	0.6—1.5	煎、丸、散
黄蓮 Radix Coptidis	0.05—0.1	0.15—0.3	丸、散
黄蓮越幾斯 Extractum Coptidis	0.2—1.5	1.0—5.0	煎
睡菜葉 Folia Trifolii fibrini	0.2—1.5	2.0—5.0	水
橙皮丁幾 Tinctura Corticis Aurantii	0.2—1.5	2.0—5.0	水
橙皮舍利別 Sirupus Corticis Aurantii	0.1—1.0	0.5—3.0	丸、水
カスカリラ越幾斯 Extractum Cascariillae	1.0—1.5	3.0—5.0	水
カスカリラ丁幾 Tinctura Cascariillae	0.5—1.5	1.5—5.0	散、浸
桂皮 Cortex Cinnamomi			

桂皮丁幾 Tinctura Cinnamomi	0.5—1.5	1.5—5.0	水
生薑 Radix Zingiberis	0.1—1.0	0.5—3.0	丸、散
生薑丁幾 Tinctura Zingiberis	0.5—1.0	1.5—3.0	水
生薑舍利別 Sirupus Zingiberis	0.0—1.0	2.0—3.0	水
芳香酸 Pulvis aromatics	0.2—0.5	0.5—1.5	散
芳香丁幾 Tinctura aromatica	0.3—1.5	1.0—5.0	水
稠厚牛膽 Feri Tauri inspissatum	0.1—0.3	0.3—1.0	丸

△健胃劑トシテハ少量、黃疸ノ時ハ一回一〇位迄用フ。

單寧酸オレキシン Oxerinum tannicum	0.3—0.5	0.3—1.0	散
△食慾凡進劑トシテ賞用セラル、食前一時間服用。			
△嘔吐、船暈ニモ好シテ用フ。			
蓚酸セリウム Cerium oxalicum	{0.1—0.15 〔極〕0.3}	{0.3—0.4 〔極〕1.0}	散
△健胃劑ニハ非ザルモ、嘔吐ニ賞用ス。			

二、酸及アルカリ劑

健胃劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

五六

一回量 一日量 投與ノ形

稀鹽酸 *Acidum hydrochloricum dilutum*

0.3

1.0 水

△健胃煎劑ト伍シ、又ハ「リモナーデ」トシテ又ハ「ペプシン」トシテ用フ。

アチドール *Actol (鹽酸メタイン)*

0.2—0.5

0.5—1.0 錠、散

△錠 0.5 及 1.0 △1.0 ハ鹽酸ハ滴ニ當ル。

アチドール・ペプシン *Acidolpepsin*

第一種 (強) 「アチドール」0.4、「ペプシン」0.1

第二種 (弱) 「錠中」アチドール」0.5、「ペプシン」0.1

重炭酸ナトリウム *Natrium bicarbonicum*

0.5—3.0

2.0—10.0 散、水

△酸中和、分泌抑制、粘液溶解。

服性マグネシア *Magnesia usta*

0.2—1.0

0.5—5.0 散、撮

△制酸ノ効前者ヨリ大ナリ。△大量ハ下劑トシテ用フ。

過酸化マグネシウム *Magnesium peroxydatum*

0.5—0.5

0.5—1.5 散

三、酸酵制止劑

クレオソール *Kreosolum*

{0.05—0.1  
〔極〕0.5}

{0.2—0.3  
〔極〕1.5} 丸、膠、滴

薄荷腦 *Mentholium*

0.01—0.1

0.5—0.3 散、水、錠

△水劑ニハ酒精ヲ加ヘザレバ溶解セズ。△一日量六〇迄用キ得。

薄荷油 *Oleum Menthae piperitae*

0.2—0.3

1—3 滴 散、丸

レゾルチン *Resorcinum (メタニ酸化ヘンツォール)*

0.2—0.3

0.5—1.0 散、水 膠

ベタ・ナフトール *β-Naphtholum*

0.2—0.3

0.5—1.0 散、水 膠

四、消化酵素劑

含糖ペプシン *Pepsinum saccharatum*

0.2—0.5

0.6—1.5 水、散、錠

△牛豚胃粘膜ヨリ製出セル蛋白消化酵素。

ペプシン酒 *Vinum Pepsini*

4.0—8.0

10.0—25.0 水

ラクトペプシン *Lactopepsin (「ペプシン」ト乳酸ヨリ成ル)*

0.3—0.5

1.0—1.5 散

△乳酸ノ「ペプシン」能作力ハ鹽酸ト伯仲ス。

パパイン (パパヨチン) *Papain (Papajotin)*

0.2—0.3

0.5—1.0 散、水、丸

△「パパヤ」樹ノ果實及葉ヨリ製ス。

△凡テノ反應ニ於テ蛋白、澱粉ヲ消化シ、乳汁ヲ凝固セシム。

健胃劑

五七



内服劑及注射劑ノ用量及用法

ペグニン Pegin (犢胃ヨリ製セル凝乳素) 一回量 二〇—四〇

△四十度ノ牛乳一合ニ付キ本劑二〇ヲ投ジテ凝固セシメ、然ル後同乳ヲ振盪シ、凝塊ヲ細片ニ碎キテ服用。

パンクレアチン Pancreatinum (温血動物膵臓製劑) 〇・二—〇・五 〇・六—一・五 散

△蛋白、澱粉、脂肪ヲ消化ス。

液體パンクレアチン Pancreatinum liquidum 二〇—五〇 六〇—一五〇 水

パンクレオン Pankreon (「パンクレアチン」ト單寧酸抱合體) 〇・二—〇・五 〇・六—一・五 散

プロタミラーゼ (武田) Protamylase (豚膵製劑) 〇・一—〇・二五 〇・三—〇・八 散

パンクターゼ (後藤) Panktase 〇・一—〇・二五 〇・三—〇・八 散

アニモスターゼ (平田) Aminostase 〇・一—〇・二五 〇・三—〇・八 散

△右三品ハ澱粉、脂肪、蛋白ノ消化劑。

プロテアーゼ (星) Protease 〇・二—〇・三 〇・六—一・〇 散

タカチアスターゼ (三共) Taka-Diastase 〇・一—〇・三 〇・三—一・〇 散

コメツトチアスターゼ Diastase "Comet" 〇・一—〇・三 〇・三—一・二 散

柏木チアスターゼ Kashiwagi-Diastase 〇・二—〇・五 〇・六—一・五 散

局方チアスターゼ Diastase 〇・二—〇・五 〇・六—一・五 散

△「チアスターゼ」ハ主ニ麥芽及麹ヨリ製セル澱粉消化劑。

ヂゲスチン (圓城) Digestin (「アスヘルギールス」屬) 〇・一—〇・三 〇・三—一・〇 錠、散

△澱粉消化ノ外、少シク蛋白及脂肪ヲ消化ス。

ビオフィエルミン (武田) Biofermin (糖化菌含有乳菌酸製劑) 〇・三—一・〇 一〇—三〇 散、錠

瀉下劑 Cathartica

硫酸マグネシウム (瀉利鹽) Magnesium sulfuricum 一回量 一日量 投與ノ形

硫酸ナトリウム (芒硝) Natrium sulfuricum 二〇—三〇 六〇—三〇 水

△是等鹽類下劑ハ一般ニ大量ノ水ト共ニ服用スベシ。

硫酸カリウム Kalium sulfuricum 一〇—二〇 三〇—八〇 水、散

人工カルルス泉鹽 Sal Carolinum factitium 三〇—五〇 一〇〇—一五〇 水

△成分——乾燥硫酸曹達 四分、硫酸加里 二分、食鹽 一分、重碳酸ナトリウム 五分。

酒石酸加里 Kalium tartaricum 一〇—一〇 三〇—五〇 水

△本劑六〇ヲ一立ノ水ニ溶解セバ、天然ノ「カルルス」泉鹽ニ似タル液ヲ得ベシ。

△單用スルコトハ稀ニシテ通常「センナ」葉、大黃等ト伍用ス。

瀉下劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

六〇

重酒石酸加里 *Kalium bitarlicum (Cremor Tartari)* 一回量 一日量 投與ノ形  
 二〇—八〇 六〇—二〇〇 振、散  
 酒石酸カリウム・ナトリウム (セリヒト鹽) *Natrio-Kalium tartaricum (Sal Seignetti)* 三〇—一五〇 八〇—三〇〇 水

緩下沸騰散 *Pulvis aerophorus laxans*  
 △此等酒石酸鹽ハ利尿ノ効モアリ。  
 (イ) 酒石酸加里曹達七五、重曹二五。(ロ) 酒石酸末二〇。

先ツ用ニ臨ンデ(イ)ヲ水ニ溶シ、次ニ(ロ)ヲ投ジ沸騰ニ乗ジテ服用。

炭酸マグネシウム *Magnesium carbonicum* 一〇—三〇 三〇—九〇 散、振

重質炭酸マグネシウム *Magnesium carbonicum ponderosum* 一〇—三〇 三〇—九〇 散、振

煅性マグネシア *Magnesia usta* 一〇—二〇 一五—五〇 散、振

重質煅性マグネシア *Magnesia usta ponderosa* 一〇—二〇 一五—五〇 散、振

沸騰檸檬酸マグネシウム *Magnesium citricum effervesens* 五〇—一〇〇 一五〇—五〇〇 水

△主成分ハ炭酸「マグネシウム」(10%)。△緩和ナル故虚弱者ニ適ス。  
 △用法——糖水ニ和シ沸騰ニ乗ジテ服用。

磷酸ナトリウム *Natrium phosphoricum* 六〇—三〇〇 二〇〇—四〇〇 水

△緩和ナル故主トシテ小兒ニ用フルニ適ス……………一〇—五〇 一〇—一〇〇 水

甘 汞 *Calomelas (Hydrargyrum chloratum)* 一〇—一〇・五 散 散  
 小兒ニハ……………0.01—0.02

△乾燥シテ貯フヘシ、濕潤セバ昇汞ニ變ズ。

△甘汞服用後糞便綠色ヲ帶フルハ膽汁ガソノマ、出テ來レバナリ。

精製硫黃 *Sulfur depuratum* 一〇—五〇 二〇—五〇 散

沈降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 〇・五—二〇 一〇—二五 散

△共ニ緩下劑ナリ。△糞便放屁硫黃臭ヲ帶フ。

蓖麻子油 *Oleum Ricini* 一五〇—三〇〇 内、乳

△主トシテ中毒、消化不良、一時的便秘等ノ時根本的ニ腸内容ヲ排泄セシムルニ最屢用フ。

△空腹時「コーヒー」、葡萄酒、單舎等ト共ニ與フ。

△二—三時間ニシテ確効アリ。

カスターロール (芳香性蓖麻子油) 一五〇—三〇〇 内

リチノール *Riciniol* (粉末蓖麻子油) 五〇—一〇〇—二〇〇 散

リシコール (友田) *Ricicool* (粉末蓖麻子油) 一五〇 一五〇—三〇〇 散

六一



内服劑及注射劑ノ用量及用法

六一

- 巴豆油 Oleum Crotonis {一回量 一日量 投與ノ形  
[極] 0.05 散
- 藤黄 Gutti {一回量 一日量 投與ノ形  
[極] 0.05 散
- 右二劑何レモ峻下劑ニシテ刺激強ク殆用キラレズ。
- ヤラツバ根 Radix Jalapae {緩 0.2—0.3 散  
峻 0.5—1.0 丸
- △「ヤラツバ」劑ハ量ニヨリ作用峻或ハ緩ニシテ、ヨク用キラル。
- △膽汁ノ分解ヲウケテ初メテ有効トナル故、黃疸時ニハ効果ナシ。
- ヤラツバ脂 Resina Jalapae {0.5—0.5 [極] 0.5 散  
[極] 0.5 丸
- ヤラツバ石鹼 Sapo Jalapae (「ヤラツバ」脂、藥用石鹼等分) 0.1—1.0 散
- ヤラツバ丸 Pilulae Jalapae (「ヤラツバ」根一分、  
「ヤラツバ」石鹼三分) 2—10粒
- △一丸 0.1。
- 蘆 蓄 Aloë } 緩 0.1—0.3 丸  
峻 0.4—1.0 散
- 蘆蓄越幾斯 Extractum Aloës } 緩 0.1—0.3 丸  
峻 0.4—1.0 散
- △蘆蓄劑モ量ニヨリ峻或ハ緩下ヲ起シ、ヨク用キラル。
- △大腸ニ作用シ、骨盤ノ充血ヲ起スコト特有ナリ。
- 蘆蓄丸 Pilulae Aloës (蘆蓄末、藥用石鹼等分) 緩峻 1—6—10粒 丸

- △一丸 0.1
- 蘆蓄ヤラツバ丸 Pilulae Aloës et Jalapae (蘆蓄末、「ヤラツバ」  
石鹼、甘草末等分) 2—6粒 丸
- △一丸 0.1。
- 蘆蓄鐵丸 Pilulae Aloës et Ferri (蘆蓄、硫  
酸鐵等分) 緩 1—5粒 丸
- △一丸 0.1。 △「クロロゼ」等ニ毎夕1—5丸ヲ與フ。
- アロイン Aloin (蘆蓄中ノ有効成分) 0.1—0.3 散、(水、注)
- △注射—「五—八分」グリセリンニ溶シテ皮下注射。
- コロシント越幾斯 Extractum Colo ynthidis {0.05—0.05 [極] 0.05 丸
- △峻下劑ニシテ餘リ用キラレズ。
- コロシント丁幾 Tinctura Colocythidis {5—10—(30)滴 [極] 1.0 水
- コロシント・ドモス丸 Pilulae Colocythidis et Hyoscyani 1—3丸 丸
- ポドフィラム脂 Resina Podophylli {緩 0.01—0.03 丸  
[極] 0.1 散
- △大量ハ峻下ス。
- センナ葉 Folia Sennae 1.0—5.0 浸、散、丸
- △大黃ニ比シ少シク作用強ク、甚屢用キラル。
- △數時間ニシテ軟便乃至水樣便ヲ排出ス。

六三



内服劑及注射劑ノ用量及用法

六四

複方センナ浸	Infusum Sennae compositum	一回量	一日量	投與ノ形
		一五・〇—三〇・〇	數回	水
△成分	「センナ」浸ニセニエト鹽、炭酸曹達、及「マンナ」ヲ加ヘシモノ。			
△下記ノ量ヲ毎二時奏効迄用フ。				
センナ舍利別	Sirupus Sennae	〔大人〕 四・〇—一〇・〇		水
センナ・マンナ舍利別	Sirupus Sennae cum Manna	小兒五・〇		水
複方甘草散	Pulvis Liquiritiae compositus	四・〇—五・〇		散
カリフイッゲ	Calfig	四・〇—七・〇—一五・〇		水
△「カリフォルニヤ」ノ無花果ノ舍利別ニ「センナ」流動越幾斯ヲ加ヘシモノ。				
緩下茶劑	Species laxans	五・〇—一〇・〇		茶
大黃(末)	Radix Rhei	一・〇—二・〇		散
△極々緩和ノ下劑ニシテ衰弱者ニ適メ。				丸
大黃越幾斯	Extractum Rhei	〇・五—一・〇		丸
水製大黃丁幾	Tinctura Rhei aquosa			水
大黃丁幾	Tinctura Rhei	三・〇—一〇・〇		水
複方大黃浸	Infusum Rhei compositum	〔大黃含量一〇%〕 三・〇—一〇・〇		水
大黃舍利別	Sirupus Rhei			水

複方大黃散 Pulvis Rhei compositus

二・〇—三・〇

二・〇—五・〇 散

△成分—大黃末二分、煨性「マグネシア」六分、生薑末一分。

複方大黃丸 Pilulae Rhei compositae

一—三—一〇粒

五—一〇粒 丸

△成分—蘆薈越幾斯二分、大黃越幾斯六分、「ヤラッパ」脂一分、藥用石鹼四分。

△一丸〇・一。

小兒散 (苦土大黃散) Pulvis infantum

小兒……〇・五—二・〇—四・〇

散

△成分—炭酸「マグネシウム」一〇分、大黃末三分、茴香油糖七分。

フラングラ皮	Cortex Frangulae	五・〇	八・〇—一五・〇	煎
フラングラ流動越幾斯	Extractum Frangulae fluidum			
カスカラサグラダ流動越幾斯	Extractum Cascarae sagradae fluidum	一・〇—二・〇	三・〇—六・〇	水
カスカラサグラダ乾燥越幾斯	Extractum Cascarae sagradae siccum	〇・五—一・〇	〇・一—一・〇	丸
カスカラサグラダ糖衣錠	Pastilli Cascarae sagradae	二錠	三—六錠	錠
レグリン	Regulin (スヲ含ム寒天製劑)	四・〇—一五・〇	四・〇—一〇・〇	散
△常習便秘ニ粥ニ和シテ用ユ。				
パラレグリン	Pararegulin (「カスカラ」越幾斯二〇分 流動「バラフィン」九〇分)	二—三膠囊		膠

瀉下劑

六五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

六六

薬名	一回量	一日量	投與ノ形
△一膠囊 3.0			
カスカリン Casarine	0.1-0.3錠	0.3-0.7錠	散、丸
ペリスタルチン Peristalin	注錠 1.0-1.5錠	2-5錠	注錠
△錠 0.1			
タマリンド Pupa Tamarindorum	1.5-0.3錠		煎、煎
精製タマリンド Pupa Tamarindorum depurata	小兒 1.5-0.1錠		水、水
△酒石酸、枸橼酸、林檎酸及ソノ加里鹽ヲ含ム。			
△緩下劑ニシテ小兒ニ適ス。△「センナ」等ト伍用スルコト多シ、例ヘバ			
△處方例——精製「タマリンド」3.0、「センナ」各利別 3.0。右一日二回一茶匙宛。			
マンナ Manna	小兒 10.0-5.0		水
△8%「マンニット」ヲ含有ス、小兒ニ用フ。			
マンナ各利別 Sirupus Mannae	小兒 毎時 5.0		水
△「センナ」各利別ノ等分ヲ加ヘ用フ。			
プルガチン (プルガトール) Purgatin (Purgatol)	0.5-1.0		散
イスチチン Isizin	0.3-0.4		錠、散

△一錠 0.15			
エキソヂン Exodin	0.5-1.0-1.5		散、錠、丸
フェノールフタレイン (プルゲン) Phenolphthalein (Purgan)	小兒 0.1-0.5 哺乳兒 0.05-0.1	0.1-1.0	散、錠、丸
△「フェノールフタレイン」劑ハ凡テ其緩下劑ナリ。			
ラキサトール (鹽野) Laxatol (「フェノールフタレイン」劑) 0.2-0.6 (0.8)			散、錠
△一錠 0.1			
ラキソイン (田邊) Laxoin	二錠		錠
アペリトール Aperitol (「フェノールフタレイン」劑)	一-四錠		錠
△一錠 0.1			

左ノ三品ハ下劑トシテハ用キザルモ腸管麻痺ニヨル鼓腸ニ賞用ス。

サリチール酸 Physostigminum salicylicum	0.0003-0.001 (極)	0.0003-0.001 (極)	注、丸、散
硫酸フェイゾスチグミン Physostigminum sulfuricum	0.0003-0.001 (極)	0.0003-0.001 (極)	注、丸、散
カラバル豆越幾斯 Extractum Physostigmatis	0.0015-0.003	0.005-0.01	丸



止瀉劑 Antidiarrhoica

	一回量	一日量	投與ノ形
タニナルビン (Albuminum tannicum)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.5-0.5 散、振
△腸ニ至リ分解シテ單寧酸ヲ生ズル故、胃障碍少シ、以下數藥モ概ネ然リ。			
タニニゲン Tannigen (アセチール・タンニン)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
タニニスムート Tannismut (重タンニン酸着鉛)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
タノコール Tanocol (タンニン酸ト膠質トノ抱合物)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散、錠
タノピン (タンニン) (「タンニン」酸ト「ウロト」)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
Tannopin (Tannon) (「ロビン」トヨリ成ルモノ)	0.5	1.5	0.4-0.4 散、外
タノフォルム Tanniform (「タンニン」酸ト「フォルム」アルデヒド「ノ」結合物)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
アルバルタン Albartan	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
タニン酸カゼイン (タンノカゼイン) Caseinum tannicum (Tannocasum)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
ツリチン Turicin (「タンニン」酸ト植物性蛋白質トノ化合物)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散
次硝酸着鉛 Bismutum subnitricum	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散、振
次サリチール酸着鉛 Bismutum subsalicicum	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散、振

デルマトール (次没食子酸着鉛) Dermatol (Bismutum subgalicum)

次炭酸着鉛 Bismutum subcarbonicum	0.3-1.0	1.0-4.0	0.4-0.4 散、振、外
枸橼酸着鉛 Bismutum citricum	0.3-1.0	1.0-3.0	0.4-0.4 散、振
キセロフォルム Xeroforn (「トリプローム」炭酸着鉛)	0.5	1.5	0.4-0.4 散、外、振
ビスムトーゼ Bismutose (着鉛ト蛋白質ノ抱合物)	0.5-1.0	1.5-3.0	0.4-0.4 散、振
ビスマール Bismalum (「メチレン」重没食子酸着鉛)	0.1-0.5	0.3-1.5	0.4-0.4 散、振
ビスモン Bismon (膠質性酸化着鉛)	0.5	1.5-5.0	0.4-0.4 水、振
オルフォール Orpholum (「メタ・ナフトール」着鉛)	1.0-2.0	3.0-8.0	0.4-0.4 散、振
硼酸カルチウム Calcium boricum			
△小兒ノ下痢ニ年齢ト同數「デシグラム」ヲ用フ。			
沈降炭酸カルチウム Calcium carbonicum precipitatum	0.5-2.0	2.0-10.0	0.4-0.4 散、振
△「カルチウム」ハ收斂作用ヲ有ス。			
沈降磷酸カルチウム Calcium phosphoricum precipitatum	0.5-2.0	2.0-10.0	0.4-0.4 散、振
石灰水 Aqua Calcariae	50.0-100.0	100.0-300.0	0.4-0.4 水

△原液ハ「アルカリ」性強ク刺戟スル故、牛乳又ハ水ニテ稀釋シテ與フ。

止瀉劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

一回量 一日量 投與ノ形

△牛乳ニテ下痢スル人ニハ牛乳一合ニ就キ本劑三〇〇位ヲ混ジテ與フ。

五倍子丁幾	Tinctura Gallarum	0.5—2.0	1.5—6.0	水
ラタニア根	Radix Ratanhiae	0.5—1.0	1.5—3.0	散、丸、煎
ラタニア丁幾	Tinctura Ratanhiae	0.5—1.5	1.5—5.0	水
ラタニア越幾斯	Extractum Ratanhiae	0.5—1.0	1.5—3.0	丸、散、錠
阿仙藥	Catechu	0.3—1.0	1.0—3.0	浸、散、丸
阿仙藥丁幾	Tinctura Catechu	0.5—1.5	1.5—5.0	水
阿仙藥丁幾	Tinctura Catechu		7.0—10.0	煎、(散)
コロシネ根	Radix Colombo	2.0—3.0	7.0—10.0	煎

△右六品何レモ「タンニン」ヲ含有シ、慢性下痢ニ用キラル。

△慢性下痢(結核等)ニ用フ。

サレツプ根	Tabera Salep	△約1%ノ煎劑トシテ用フ。	0.7—2.0	煎
サレツプ漿	Mucilago Salep (1%「サレツプ」根浸出製劑)		5.0—15.0	水
アラビアゴム(末)	Gummi arabicum		0.7—2.0	水、散、丸
アラビアゴム漿	Mucilago Gummi arabici (前者ノ30%液)		2.0—6.0	水
アラビアゴム漿	Mucilago Gummi arabici (前者ノ30%液)		8.0—10.0	水
ゴム舍利別	Sirupus gummosus (「アラビヤム」一分)		2.0—5.0	水
ゴム舍利別	Sirupus gummosus (「アラビヤム」三分)		2.0—5.0	水

△右六劑何レモ粘滑劑トシテ止瀉ノ効アリ。

オイトルミン(三共) (ゲンノショウコ草製劑)

0.5—1.0g 1.5—3.0g 注、水

歌炭(血炭)	Carbo animalis (Carbo sanguinis)	4.0—15.0	1.0—7.0	散、振
骨炭末	Carbo ossium pulveratus	4.0—15.0	2.0—7.0	散、振
木炭末	Carbo Ligni pulveratus	1.0—3.0	5.0—10.0	散、振
白陶土	Bolus alba	10.0—100.0	30.0—50.0	振

△此等ノ細末ハ腸内ノ瓦斯、細菌、毒素等ヲ吸着シテ止瀉ニ効アリ。

ピオフェルミン	(武田) Biofermin (糖化菌含有乳酸菌製劑)	0.5	1.0—3.0	散
ラクトスターゼ	(三共) Lactostase (乳酸菌製劑)	0.3—0.5	1.0—1.5	散
ブルガリン	(日本藥品) Bulgaria (同前)	0.5	1.0—3.0	散

△是等ノ製劑ハ腸内ニ乳酸菌ヲ繁殖セシメ、有害菌ノ繁殖ヲ抑制セントスル原理ニ基ク。

硝酸銀 Argentum nitricum

{0.005—0.01 [極] 0.01 丸、水、洗

止瀉劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△内服トシテハ胃潰瘍、稀ニ神經疾患ニ用フ。

一回量 一日量 投與ノ形

阿片劑 (阿片末、同越幾斯、同丁幾)

△腸蠕動鎮靜ニヨル有力ナル止痢劑、用量前編鎮痛鎮痙劑ノ條參照。

### 吐劑 Emetica

鹽酸アポモルヒネ Aponorphinum hydrochloricum

{0.005-0.01-0.015  
[極] 0.01 [極] 0.05

注 一回量 一日量 投與ノ形

△奏効數分後、確實。△狂人、自殺者等ノ嘔吐ヲ欲セザルモノニ用フルコト多シ。

吐根 Radix Ipecacuanhae

0.5-2.0

浸、散

△右量ヲ二十分位ノ間ニ二回ニ分與。△奏効數十分後。

吐酒石 Sibirio-Kalium tartaricum

{0.5-0.1  
[極] 0.1 [極] 0.3

水

△右量ヲ二十分間位ニ二回ニ分與。△奏効十分乃至數時間後ニシテ不定。

吐酒石 Vinum sibiricum

大人 0.5-1.0  
小兒 0.1-0.5

水

硫酸銅 Cuprum sulfuricum

{0.1-1.0  
[極] 1.0

水

△奏効約十分後。

硫酸亞鉛 Zinn sulfuricum

{0.1-1.0  
[極] 1.0

水

△燐(猫イラズ)中毒ノ時ニ好シク用フ、之レ燐ヲ酸化シテ無害ノモノニスル性質アレバナリ。

△稀ニ用フルノミ。

### 驅蟲劑 Anthelminthica

後編寄生蟲病ノ條ニ掲出セリ。

### 呼吸器劑

#### 呼吸鎮靜劑 Antidyspnoica

オキシカムフル Oxycamphor

一回量 一日量 投與ノ形  
0.5-1.0 1.0-3.0 散

△肺及心臓性呼吸困難ニ用フルガ、分解シ易キ故。

通常ハ「オキサフォール」トシテ用フ。

△作用——呼吸中樞ヲ麻痺セシム。

オキサフォール Oxaphor

(20%オキシカムフル酒精液)

20-30滴

數回 水

△處方——「オキサフォール」、甘草越幾斯各10.0、酒精20.0、水適宜。

右全量150.0トナシ、一日三回一食匙宛。

### 驅蟲劑呼吸器劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

七四

ケブラチヨ皮 Cortex Quebracho

一回量 一日量 投與ノ形  
一・五—三・〇 五・〇—一〇・〇 丁 澱

△本劑モ呼吸中樞ヲ麻痺セシメテ呼吸困難ヲ緩解スルニ効アリ。

△處方——「ケブラチヨ」皮 三〇・〇ニ酒精 三〇〇・〇ヲ加ヘ浸出液ヲ蒸發セシメテ得タル越幾斯ヲ水 六〇・〇ニ溶シ、一日三回、五・〇—一〇・〇宛内服。

鹽酸ケブラチヨハミン Quebrachaminum hydrochloricum

〇・五—一・〇 〇・一—〇・二 注、散、水

△呼吸困難ニ用フ。

杏仁水 Aqua Pruni amariaceae

{ 〇・五—一・五 } { 二・〇—四・〇 }  
{ (極) 二・〇 } { (極) 六・〇 }  
水

苦扁桃水 Aqua Amygdalarum amararum

バクチ水 Aqua Pruni macrophyllae

△右三品共 〇・一%「チアソ」水素含有、呼吸中樞鎮靜ノ効アリ。

△右何レモ呼吸困難及咳嗽ニ用フ。

ロベリア草 Herba Lobeliae

{ 〇・五—一・〇 } { 〇・一—〇・三 }  
{ (極) 〇・一 } { (極) 〇・三 }  
浸、散、丸、煙

ロベリア丁澱 Tinctura Lobeliae

硝石紙 Charta nitrata

煙

△右三品ハ氣管支痙攣ヲ鎮靜スルニヨリ △喘息ニ用フ。

ピリヂン Pyridinum

六—一〇滴

二—三回吸

其他「モルヒネ」「コデイン」以下鎮痙鎮痛劑ノ條ニ掲ゲシ諸劑。

二 祛痰劑 Expectorantia

セネガ根 Radix Senegae

一回量 一日量 投與ノ形  
一・〇—一・五 三・〇—五・〇 浸、煎

△「セネガ」根ハ咳嗽ヲ催サシメテ咯出ヲ促ス。

△故ニ咯痰ノ多量ナルモノニ適ス。

セネガ舍利別 Sirupus Senegae

三・〇—五・〇—一〇・〇 一〇・〇—三〇・〇 水

遠志根 △漢法藥ニシテ「セネガ」ト同作用アリ。

一・〇—一・五 三・〇—五・〇 浸、煎

セネガロイン Senegalon (「セネガ」浸濃縮末)

一・〇—一・五 三・〇—五・〇 散、浸

吐根 Radix Ipecacuanhae

〇・一—〇・二五 〇・三—〇・四 浸

△吐劑ハ凡テ祛痰ノ効アリ、但シ少量ニ用フ。

△咯痰粘稠ニシテ咯出シ難キ時ニ適ス。

吐根丁澱 Tinctura Ipecacuanhae

〇・五—一・五 一・五—五・〇 水

吐根舍利別 Sirupus Ipecacuanhae

三・〇—一五・〇 一五・〇—四〇・〇 水

吐根酒 Vinum Ipecacuanhae

〇・五—一・五 一・五—五・〇 水

呼吸器劑

七五



一回量 一日量 投與ノ形

- 吐根錠 Pastilli Ipecacuanhae △錠中吐根量 0.01
- アルテア根 Radix Altheae 1.0—1.5 3.0—5.0 浸、煎
- △粘稠劑ノ性質トシテ氣道ノ加答兒ヲ輕快セシム。
- キラヤ皮 Cortex Quillajae 1.0—1.5 2.0—5.0 煎
- アムモニア茴香精 Spiritus Ammoniae foeniculatus 0.3—1.0 1.0—3.0 水
- △「アムモニア」劑ハ「アルカリ」劑ノ性質トシテ喀痰ヲ溶解シテ咯出シ易カラシム、故ニ
- △濃痰ニ病ムモノニ適ス。
- △「セネガ」浸等ト伍用スルコト屢アリ。
- 芳香アムモニア精 Spiritus Ammoniae aromaticus 0.3—1.0 1.0—3.0 水
- 鹽化アムモニウム(硼砂) Ammonium boratum (Borax) 0.3—1.0 1.0—3.0 水、錠
- 醋酸アムモニウム液(ミンチル精) 3.0—5.0 5.0—10.0 水
- Liquor Ammonii acetici (Spiritus Mindereii) 0.3—1.5 1.0—5.0 水
- 酒石酸アムモニウム Ammonium tartaricum 0.3—1.5 0.3—1.5 散、丸
- 安息香酸 Acidum benzoicum 0.1—0.3 0.3—1.5 散、丸
- △分泌過多ノ氣管支炎ニ用フ。△咳嗽ヲ催サシメテ咯出ヲ容易ナラシム。
- 安息香酸アムモニウム Ammonium benzoicum 0.1—0.5 0.5—2.0 水

△安息香酸ノ作用ト「アムモニウム」ノ作用トヲ兼備ス。

- 安息香 Benzoe 0.2—1.0 0.5—3.0 丸
- プロチン (三共) Rocin (櫻樹皮製劑) △錠 0.5 液末 1.0—2.0 3.0—6.0 10.0—20.0 水散、水
- エバニン (武田) Eranin (桔梗製劑ニ安息香酸) 液末 1.0—1.5 3.0—5.0 水散
- △右二者共ニ祛痰鎮咳ノ効アリ、ヨク用キラル。
- 沃度カリウム及ナトリウム Kalium et Natrium iodatum 0.3—0.5 1.0 水
- △濃痰ノ場合ニ用フレバ喀痰ヲ液化スルコト「アムモニア」劑ト似タリ、慢性氣管支症ニ賞用ス。

### 三 分泌抑制消毒劑

- テレピン油 Oleum Terebinthinae 0.3—0.5 1.0—1.5 膠、丸、乳、吸
- △肺壞疽、腐敗性氣管支炎等ニ用フ。△分泌ヲ減ジ、喀痰ノ分解ヲ防グ。
- 精製テレピン油 Oleum Terebinthinae rectificatum 0.3 1.0 膠、乳、吸
- 抱水テルピン Terpinum hydratum (「テレピン」油ト水ノ化合物末) 0.1—0.5 0.3—1.5 散、丸、膠、水
- △處方——抱水「テレピン」2.0、酒精、水、薄荷舎利別各5.0。
- 右一日三—六回一食匙宛内用。
- テルピノール Terpinol (抱水「テルピン」ト硫酸トヨリ製ス) 0.1—0.2 0.5—1.0 膠、丸

呼吸器劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

七八

クレオソール	Kreosolum	一回量	一日量	投與ノ形
ミルトル	Myrtol	0.2—0.3	0.5—1.0	膠、丸
オイカリツメ油	Oleum Eucalypti	0.2—0.3	1.0	膠、乳、吸
コバイン・バルサム	Balsamum Copaivae	0.5—0.7	1.5—2.0	膠

制汗劑 Antihydrotica

一、内服及注射劑

硫酸アトロピン	Atropinum sulfuricum	一回(就寢前)量 0.0005—0.001 〔極〕0.001	一日量 〔極〕0.003	注、投與ノ形 丸
オイミドリ	Eumydrinum	0.001—0.003	〔極〕0.005—0.008	水、散
實岩越巒斯	Extractum Scopoliae (Belladonnae)	〔極〕0.005	〔極〕0.015	水、散
實岩丁幾	Tinctura Scopoliae	〔極〕0.005—0.01	〔極〕1.0—1.5	水、散
アガリチン	Agaricin	〔極〕0.005—0.01	〔極〕0.1	散、丸

△作用確實ナルモ効果持續短シ。

△實岩劑ハ晝間モ盜汗アルモノニ持長スルニ便ナリ。

△効果持續永シ(十時間)、故ニ △拂曉ニ盜汗アルモノニ適ス。  
△下痢ヲ起スコトアル故、好シデドーフル散又ハ阿片ヲ伍用ス。  
△處方——「アガリチン」0.01、ドーフル散0.2。右就寢前頓服

樟腦酸	Acidum camphoricum	0.5—1.0	1.0—3.0	散
グアカムフォル	Guacamphol (樟腦酸「グアヤコール」)	0.2—0.5	0.5—1.0	散
アチフネリン	(鹽野) Adiphorin (樟腦硫基酸ノ石灰化合物)	0.5—1.0	1.0—1.5	散、注
鹽化ナトリウム	(食鹽) Natrium chloratum	0.0—0.5		水
ヴェロナール	Veronatum	0.3—0.5		散
ベルンハイム氏液	Bernheimsche Lösung	1.0—4.0	毎夜一回	注

△「サリチール」酸「エーテ」ル「エーテ」ル「エーテ」ルニ溶シ、脱脂綿ニテ濾過シ、發散セル  
「エーテル」ノ量丈ケ濾液ニ追注シ、後、甘扁桃油ヲ滴下シツ、絶エズ攪拌シテ  
滴下量10.5ニ及ベバ全液澄明トナル、此レ同氏液ナリ、數日間試用ス。

制汗劑

二、外用劑

七九



内服劑及注射劑ノ用量及用法

八〇

フォルマリン Formalinum.....一—四%酒精溶液トシテ。 塗 布  
 サリチール酸 Acidum salicylicum.....三%酒精液、又ハ三%「サリチール」酸「タルクム」トシテ 塗布、 撒布  
 タンノフォルム Tannoforn.....三%「タンノフォルム・タルクム」トシテ 撒 布

發汗劑 Diaphoretica

鹽酸ピロカルピン Pilocarpinum hydrochloricum  
 一回量 一日量  
 {0.005—0.01 [極]} {0.05 [極]}  
 注、(水、散、丸)

強壯乃至變質劑 Roborans et Alterantia

一、鐵劑

鐵粉 Ferrum pulveratum

△胃中ニテ鹽酸鹽ニ變ジテ溶解ス。

還元鐵 Ferrum reductum

△最屢用キラル、無機鐵劑ナリ。

次炭酸鐵 Ferrum subcarbonicum

硫酸鐵 Ferrum sulfuricum

一回量 一日量 投與ノ形

0.05—0.3 0.2—0.5 1.0—1.5 丸、散

乳酸鐵 Ferrum lacticum  
 枸橼酸鐵 Ferrum citricum

△右二品何レモ水ニ溶解シ、吸收セラレ易キ鐵劑ナリ。

枸橼酸鐵アムモニウム Ammonium ferro-citricum

酒石酸鐵カリウム Kalium ferrotartricum

△本品ハ胃ヲ害スルコト少シ。

ブローネ丸 Phalae Blandi

△一丸中硫酸鐵量 0.1 (其他炭酸加里 0.05、白糖 0.1、

瘦麻、「アルテア」根末各 0.05、及「グリセリン」ヲ含ム)。

規鐵丸 Phalae Ferri et Chinini

△一丸中還元鐵、鹽酸「キニーネ」各 0.05 ヲ含ム。

糖皮規鐵丸 (三共) △同前

枸橼酸鐵液 Liquor Ferri citrici oxydati

含糖炭酸鐵 Ferrum carbonicum saccharatum

含糖沃度鐵 Ferrum jodatum saccharatum

沃度鐵舍利別 Sirupus Ferri jodati

強壯乃至變質劑

八一

0.1—0.6 0.3—1.0 2.0 丸、散、(水)

0.2—0.5 0.6—1.0 2.0 水、散、丸

0.3—1.0 0.6—2.0 3.0 水

二—三粒 六—九粒 丸

二—三粒 六—九粒 丸

二—三粒 六—九粒 丸

0.5—1.5 1.5—6.0 水

0.2—1.5 0.6—5.0 散、丸

1.5—6.0 5.0—25.0 水



内服劑及注射劑ノ用量及用法

△分解豫防ノ爲鐵線ヲ投ジテ貯フベシ。△主ニ腺病性貧血ニ用フ。

鐵酒 Vinum Ferri

△枸橼酸鐵「アムモニウム」ノ二%白葡萄酒液。

林檎鐵越幾斯 Extractum Ferri pomati

林檎鐵丁幾 Tinctura Ferri pomati

蛋白鐵液 Ligor Ferri aluminati

△胃ヲ害スルコトナシ。

エーテル性鐵丁幾 Tinctura Ferri aetherea

アネミン Anemia (含糖鐵「プトン」液)

△甘味ノ溶液。

ブルタン Blutan (鐵インガン「プトン」液)

△沃度「ブルタン」(0.1%沃度含有)ナルモノアリ。

△「プローム・ブルタン」(0.1%「プローム」含有)ナルモノモアリ。

フェラチン Ferratin (鐵アルブミン酸)

△胃ヲ刺戟セズ、極メテ吸收容易ノ良鐵劑。

一回量 一日量 投與ノ形

5.0—15.0

15.0—50.0 水

0.2—0.5

0.6—2.0 丸

水

0.2—2.0

2.0—6.0 水

2.0—5.0

5.0—15.0 水

0.5—2.0

1.0—6.0 水

10.0—15.0

30.0—50.0 水

4.0—15.0

10.0—50.0 水

0.5—1.0

1.0—3.0 散

錠

△沃度「フェラチン」、概素「フェラチン」アリ。各一錠 0.5、一日 3—6錠。

フェラトール Ferratose (5%フェラチン液)

△沃度「フェラトール」、「アルゼン・フェラトール」アリ、用量同前。

ブルトール Blutose (邦製「フェラトール」)

△沃度「ブルトール」、「アルゼン・ブルトール」アリ、用量同上。

フェローゼ Ferrose (有機鐵溶液)

△沃度「フェローゼ」、「アルゼン・フェローゼ」アリ、用量同上。

ヘモグロビン Haemoglobinum

ヘモグロビン錠 (三共) Haemoglobinablenen

ヘマトゲン Haematogen

△「ヘモグロビン」50%、「グリセリン」20%ヲ含ム。

ヘムアルブミン Haemalbuminum

ヘマトパン Haematopan

△血液製劑ニシテ「レチチン」ヲ含ム。

△沃度「ヘマトパン」、「アルゼン・ヘマトパン」、「グアヤコール・ヘマトパン」アリ。

ビオフェリン Bioferin (「ヘモグロビン」含量 6%)

強壯乃至變質劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

八四

カルニフェリン Carniferin (肉越幾斯ヨリ製セル鐵劑)

一回量 一日量 投與ノ形  
0.2-0.5 0.6-1.5 散、錠

二、「キニーネ」劑

鹽酸キニーネ Chininum hydrochloricum

0.1-0.25 0.3-0.5 丸、散

硫酸キニーネ Chininum sulfuricum

0.1-0.25 0.3-0.5 丸、散

△此二品ハヨク、鐵、砒素等ニ伍シテ強壯劑トセラル。

枸橼酸鐵キニーネ Chininum ferro-citricum

0.2-0.5 0.6-1.5 丸、散、(水)

△恢復期ノ貧血等ニ適ス。

キノイリン (グリセリン燐酸キニーネ)  
Kineurin (Chininum glycero-phosphoricum)

0.1-0.2 0.3-0.6 散、丸

△「グリセリン」燐酸ヲ含ム故、神經症ニ適ス。

キナ皮、キナ丁、複方キナ丁、  
キナ越幾斯、キナ流動越幾斯、キナ酒

健胃劑ノ條參照。

三、砒素劑

亞砒酸 Acidum arsenicosum

{0.001-0.001 [極] 0.005} {0.001-0.01 [極] 0.015} 丸、注

△一日量ニ三匙ヨリ初メ、二日毎ニ〇.五匙宛増量シ、一日量ハ一〇.〇匙ニ至リテ二週位持續シ、後再ビ漸次減量ス。

△又〇.〇〇三位ヲ永ク持續シテ用フルコトモアリ。

△胃ヲ害スル故、食後ニ與フ。

△結膜炎、耳鳴、眩暈、胃障礙等ヲ察サバ注意スベシ。

フオール水 (亞砒酸加里液) 濃度一% 一→六滴 三→二〇滴水

△一日三滴ヨリ初メ、二日毎ニ一滴宛増量シ、一日量一六→二〇滴ニ至リ、二週間位持續セル後、再漸次減量ス。

亞細亞丸 *Pyralae asiaticae* △一丸中亞砒酸量 0.001 一→三粒 二→二〇粒 丸

砒鐵丸 *Arsenisenpillen* 一→三粒 二→二〇粒 丸

△一丸中亞砒酸 0.001、還元鐵 0.05 含有。 0.01→0.03 0.01→0.2 丸、水、注

カコチール酸曹達 *Natrium cacodylicum* 0.01→0.03 0.01→0.2 丸、水、注

△砒素ノ有機化合物ナル故毒性少シ。

△皮下注射——日々 0.01-0.04ヲ數日間注射ノ後 0.2ニ増量シ、ヤ一〇日間持續後、減量シテ二→三日間注射シ、後一週間休止シテ再ビ前法ヲ反復ス。

△内用——一日最大用量 0.2 (注射時ノ倍量)。  
カコチール酸鐵 *Ferrum cacodylicum* {内 0.02-0.1 [注] 0.03-0.1} 0.5-1.0 丸、(皮、靜)水

強壯乃至變質劑 八五



内服劑及注射劑ノ用量及用法

エラルソン Elarson

一回量 一日量 投與ノ形  
(漸増)  
一↓四錠 三↓二錠 錠

△亞砒酸「ストロンチウム」ヲ含ム鹽類。

ソラルソン Solarson (1g中0.05g亞砒酸含有)

オプタルソン Optarson (1g中0.05g亞砒酸、0.05g

ストリキニーネ含有)

△右二品隔日一回1.0g宛注射シ十乃至十二回ノ後、

十日間休業シテ、再ビ前法ヲ反覆ス。

四、燐 劑

有機燐 (オルガノ燐) Eukrin (Organarin)

0.3—0.5 1.0—2.0 散、錠

△糖ヨリ製出セル有機性燐化合物。 △錠 0.3g

フイチン Phytin 0.3—0.5 1.0—1.5 散

△種子ヨリ採取セル有機性燐化合物。

キニーネ・フイチン Quinine-Phytin △錠 0.1g 二四錠 六一三錠 錠

鐵フイチン Eisenphytin 三一〇錠 九—三〇錠 錠

次亞燐酸カルチウム Calcium hypophosphorosum 〇.15—〇.5 〇.5—1.5 散、水、(注)

次亞燐酸舍利別 Sirupus hypophosphorosum 1.0—5.0 3.0—15.0 水

グリセリン燐酸カルチウム Calcium glycerophosphoricum 〇.5—1.0 〇.5—1.2 散、水、錠

△本劑ハ神經症ニ賞用セラル。

オボ・レチチン Ovolecithin } 「レチチン」製劑 〇.15—〇.5 〇.3—1.2 液

レチトール Lecithol

△「レチチン」劑ハ營養障礙、貧血等ノ外、特ニ神經症ニ賞用ス。

(神經中樞ニハ「レチチン」含量極メテ大)。

肝油 Oleum Jecoris 5.0—10.0 15.0—20.0 油、乳

△燐ノ含量ハ「レチチン」ト異リ極メテ少キ故、ソノ主作用ハ「ビタミン」A

及消化ヨキ脂肪ニ原因スベシ。

△處方——肝油 20.0、「アラビアゴム」末 3.0、單舍利別 15.0、水 100.0。右一日量。

一、黄 燐

燐 (黄燐) Phosphorus { [極] 0.001 { [極] 0.0005—0.001 乳、油

△胃障礙甚シ。

△處方——黄燐 0.03、肝油 100.0。

△處方——黄燐 0.03、甘扁桃油 10.0、水 80.0、「アラビアゴム」末 5.0、單舍利別 5.0。

強壯乃至變質劑



右何レモ一日一―回五・〇宛食後。骨軟化症。

### 二、沃度劑

沃度カリウム Kalium jodatun	一回量 〇・二―一・〇	一日量 〇・五―三・〇	投與ノ形 水
沃度ナトリウム Natrium jodatun	〇・二―一・〇	〇・五―三・〇	水

△胃ヲ害スルコト多キ故、重曹ヲ伍用シ水劑トナス。

△沃度「ナトリウム」ハ沃度「カリウム」ニ比シ胃障碍少シ。

△沃度服用時粘膜ニ水銀劑(甘汞)ヲ用フルコトヲ避ケヨ、沃度水銀ヲ局

處ニ生ジテ腐蝕スベシ、但灰白軟膏ノ皮膚塗擦ハ害ヲ見ザルヲ常トス。

△心悸亢進アルモノニハ沃度「ナトリウム」ヲ良シトス。

沃度アムモニウム  
Ammonium jodatun

〇・一―〇・五 〇・三―一・五 水

△作用、副作用共ニ前二者ヨリモ強シ。

ヨチピン Jodipin (沃度胡麻油) 10%液

{内 五・〇―一五・〇 一五・〇―五〇・〇 二日一回 注乳〔皮、筋〕

△腸ニテ分解シ副作用少シ。

サヨジン Sajodin (「カルチウム」含有有機沃度劑)

〇・三―二・〇 一・〇―六・〇 散、錠

△錠 〇・五。

△本劑及以下ノ製劑ハ腸ニテ分解セラレテ徐々ニ吸收セラレ、

副作用少ク、沃劑ニ堪エザルモノニ用フルニ適ス。

イクイヨチン (三共) Equijodin (邦製「サヨジン」)	〇・三―一・〇	一・〇―三・〇	散、錠
鐵サヨチン錠 Eisensajodintablette	一錠	二―三錠	錠
ヨードメニン Jodomucin (沃度、着鉛、蛋白ノ化合物)	一―二錠	三―六錠	錠
ヨードスターリン Jodostarin (Iarinsäurejodid)	〇・三―二・〇	一・五―六・〇	散、錠
リポヨチン Lipojodin	〇・三	一・〇	散、錠

### 三、尿酸症(痛風)治療劑

アトファン Atophan (フェニール・キノリン・カルボン酸)	〇・五―一・〇	二・〇―四・〇	散、錠
△錠 〇・五。			
パラトファン Paratophan (メチール・アトファン)	一―二錠	四―六錠	錠
△錠 〇・五。			
ノヴァトファン Novatophan (前者ノ「エチール・エステル」)	〇・五―一・〇	二・〇―三・〇	散

△「アトファン」劑使用後ハ尿中尿酸及尿酸鹽ノ排出多クシテ尿潤濁シ、尿結石生成ノ虞アリ、故ニ「アトファン」ハ尿結石症ニハ禁忌トス。又「アトファン」使用時ニハ必ず多量ノ「アルカリ」水ヲ與ヘテ結石ノ發生ヲ防グベシ。

強壯乃至變質劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

九〇

ビペラチン Piperazin 一回量 一日量 投與ノ形  
 リセトール Lycoctol 〇・二—〇・五 〇・五—一・五 水  
 リシチン Lysidin 〇・三—〇・七 一・〇—二・〇 水  
 〇・三—一・〇 一・〇—二・〇 水

△右三劑ハ尿酸溶解劑トセララル、モ、ソレハ試験管内ノ  
 コトニシテ、体内ニテハ効力疑ハシ。

シドナル Sidonal (キナ酸ビペラチン) 一・五—二・〇 三・〇—四・〇 水、散  
 キノトロピン Chinotopin (キナ酸ウロトロピン) 〇・五—一・〇 二・〇—三・〇 水

△「キナ」酸ハ尿酸形成抑制及ビ鎮痛、「ウロトロピン」ハ

尿酸溶解劑ナルモ体内効果疑シ。

コルヒクルム子 Semen Colchici 〇・〇五—〇・二 〇・一—〇・八 丸、散  
 コルヒクルム丁 〇・三—一・〇 (極) 一・〇—四・〇 (極) 水  
 コルヒクルム酒 Vinum Colchici 〇・三—一・〇 (極) 一・〇—四・〇 (極) 水  
 コルヒチン Colchicum 〇・〇〇五—〇・〇〇一 〇・〇〇一—〇・〇〇三 丸、散、水

△是等「コルヒクルム」劑ハ急性發作ニ用フルモ、効果ハ單ナル麻痺作用ノミ。

△下痢ヲ發スルニ至リ服藥ヲ廢ス。

枸橼酸リチウム Lithium citricum 〇・二—〇・五 〇・六—二・〇 水、散  
 炭酸リチウム Lithium carbonicum 〇・五—〇・三 〇・三—一・二 水、散、錠  
 サリチール酸リチウム Lithium salicylicum 〇・五—〇・八 一・五—二・五 水  
 ウリセチン Uricedin (枸橼酸曹達、同「リチウ」ム「硫酸曹達、食鹽ノ合劑」) 一・〇 三・〇—五・〇 水  
 ウロジン Urosin (キナ酸リチウム) 二—三錠 六—十錠 錠

△右「リチウム」劑モ尿酸溶解劑ノ意味ニテ用フ。

四、白血病治療劑

ベンツオール Benzol (化學的純粹ナルモノ) 一・〇—一・〇—三・〇—五・〇 (漸増) 膠

△用法——後編白血病ノ條參照。

五、癥痕軟解劑

チオジナミン Thiosaminin (芥子油ト「アンモ」ニ「ア」ノ化合物) 一・〇錠 隔日一回 注  
 フィブロysin Fibrolysin (前者ト撒曹トノ複鹽) 一・〇—一・五錠 隔日一回 注  
 チオヂン Thiodin (「チオジナミン」ト「ヨ」ド「エチール」ノ化合物) 〇・〇五—〇・一 每又ハ隔日一回 注  
 注内 三〇%—一〇〇% 每又ハ隔日一回 注

六、「ヌクレイン」酸劑

強壯乃至變質劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

ヌクレイン酸ナトリウム Natrium nucleicicum (Bohringer)	2%液	神経衰弱 麻痺 狂	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	一回量	毎又、隔日一回	投與ノ形
ヌクレオール Nucleol (純粹ナル「ヌクレイン」)	注内	注内	0.5 0.5	一回量	毎日一回	注

七、脚氣治療劑

オリザニン (三共) Oryzalin (「ビタミンB」劑)	液	越幾斯	5.0-10.0 3.0-7.0 2.0-5.0	一回量	毎日一回	水
スペルゾン (武田) Spelzon	錠液		5.0-10.0 5.0-10.0	一回量	毎日一回	水
エケイニン (旭) Eguinin	注末		0.1-1.0 1.0-3.0	一回量	毎日一回	注散
ウリヒン (松本) Urichin	注末	ネオウリヒン	0.5-1.0 1.0-3.0	一回量	毎日一回	注散
アンチペリペリン (南信) Antiperiperin	注末		1.0-2.0 1.0-2.0	一回量	毎日一回	注散
パラヌトリン (鹽野) Paranutrin	注内		3.0-10.0	一回量	毎日一回	水

特種殺菌治療劑 Disinfectientia specifica

一、「エメチン」劑

鹽酸エメチン Emetinum hydrochloricum	一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	投與ノ形
沃度蒼鉛エメチン Emetine bismuthidid	一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	注(皮、静)

△「アメーバ」赤痢、「チストマ」病等ニ用フ。

二、「クレオソート」劑

クレオソート Kreosolum	△丸一個中含量	0.05	一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	丸、膠、乳、外
炭酸クレオソート (クレオソータル)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	膠、乳
グアヤコール Guajacolum (「クレオソート」ノ主成分)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	膠、乳
炭酸グアヤコール (ツオタール)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	散
安息香酸グアヤコール Guajacolum benzoicum			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	散
チオコール Thiool (グアヤコール・スルファ酸カリウム)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	散
シロリン Sirolin (「チオコール」ノ橙皮舍利別溶液)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	水
シロール Sirool (殆「シロリン」ト同一物)			一回量	0.05-0.1 0.05-0.1 0.05-0.1	一日量	0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0	水

特種殺菌治療劑



内服劑及注射劑ノ用量及用法

九四

	一回量	一日量	投與ノ形
グアヤコーゼ (Guajacose) 「チオコール」含有液状「ソマトーゼ」	五・〇	一五・〇—二〇・〇	水
フアゴール (友田) (Fagol) (メチレン・クレオソ)	〇・二—〇・五	〇・五—一・五	散
ブノイミン (三共) (Pneumia) (メチレン・クレオソート)	〇・二—〇・七	〇・五—二・〇	散
スチラコール (Syracal) (桂皮酸グアヤコール)	〇・三—一・〇	一・〇—三・〇	散
△本劑ハ結核性下痢ニ實用セラル。			
リノソール (グアヤコール・スルフォン酸カルチウム)	〇・二—一・〇	〇・五—三・〇	散、水
カコヂール酸グアヤコール (Guajacolum caeodylicum) 五%	一・〇g	二・〇—三・〇g	注

三、治癩劑

大楓子油 Oleum Gynocardiacum	〔内〕 四—二〇滴 〔注〕 〇・五—五・〇	一〇—六〇滴 一週—二回 注〔筋〕	丸、乳
△内服——一日二滴ヨリ初メ、漸次増量シ患者ノ堪ヘ得ル量マテ増量シテ、數年間持長服用セシム。			
△注射——「オレノフ」油ヲ等分ニ加ヘ、殺菌シ、ソノ一〇—五〇—一〇〇cc宛ヲ、一週二回腎筋内ニ注射ス。			
大楓子油酸ナトリウム (大楓子油ノ硫酸基) (Natrium gynocardicum)	〔内〕 〇・三—一・〇 〔注〕 〇・五—一・〇	〇・六—二・〇 一・五—三・〇	膠、散、注〔筋〕
レプロール (三共) (Leprol) (大楓子油ノ硫酸基) (Sulfuracidbase)	〔内〕 〇・三—一・〇 〔注〕 〇・五—一・〇	〇・六—二・〇 一・五—三・〇	膠、散、注〔筋〕

△注射——「グリセリン」水等分液ニテ五—一〇%液ヲ作り、ソノ一〇—二〇ccヲ注射ス。

四、驅微劑

アトキシール (Atoxy) (Natrium arsenicum)	〇・〇三—〇・一	一週—三回 注〔皮、筋〕
アルサセチン (Arsacetin) (マセチール・アトキシール)	〇・〇四	〇・二 丸
サルプルサン 其ノ他ノ驅微劑——後編驅微療法ノ條參照。	〔注〕 〇・〇三—〇・一—〇・五	一週二回 注

五、膠様銀劑

△適應症——敗血症、丹毒、「ロイマチス」、「インフルエンザ」等。		
エレクトラルゴール (Electralgol)	五・〇—一〇・〇g	一日一回 注〔筋、皮、靜〕
コラルゴール (Collargol)	〇・五—二%液ヲ五〇—一〇〇cc	一日一回 注〔筋、皮、靜〕
銀エレクトロイド (國光) (Ektroidsilber)	三・〇—一〇・〇g	一日一回 注〔筋、皮〕
アルゴエレクトロゾール (後藤) (Argoelectrosol)	五・〇—一〇・〇g	一日一回 注〔筋、皮〕

△本品ニ添加セル滅菌水一個宛ニテ「アムブレ」ヲ稀釋シテ注射ス。

△邦製品(後二者)ハ危険特ニ多キ故、靜脈内ニハ用キザルヲ宜シトス。

九五

特種殺菌治療劑



催淫劑 Aphrodisiaca

鹽酸ヨロビニン Yohimbium hydrochloricum	△錠 0.005 「アムブレ」0.01	一回量 0.005—0.01 0.005—0.01	一日量 0.01—0.03 一週二回注	投與ノ形 丸 錠
ムイラ流動越幾斯 Extractum Muirae fluidum	△錠 0.005 「ムイラ」越幾斯「レ」 「チチン」トヨリ成ル。	一回量 一五—二〇滴 二粒	一日量 三〇—八〇滴	投與ノ形 丸 錠
ムイラチチン Muiracitin	△右三品ヲ含ム催淫劑多數アリ、例ヘバ左ノ如シ。 ユベニン、ローマ、ポテントール、ダミアシン、ピリサノール、テストガン、テリガン等。	一回量 一五—二〇滴 二粒	一日量 三〇—八〇滴	投與ノ形 丸 錠

臟器製劑 Organpreparate

一、甲狀腺及其レニ關係セル製劑

新鮮甲狀腺 Glandola thyroidea	一回量 0.1—0.5	一日量 0.5—1.5	投與ノ形 生又ハ煮
乾燥チレオイチン Thyreoidinum siccum (Merck)	一回量 0.1—0.2	一日量 0.1—0.4—0.5	散
チラーヂン Thyraden (Knoll)	一回量 一二錠	一日量 三—六錠	散

チレオイド (パーク・デヴィス) Thyroid (Park D. Vis)	一回量 0.1	一日量 0.1—0.3	散
ヨードチリン (チレオヨチン) Jodothyrim (Thyreoidin)	一回量 0.3—0.5	一日量 0.5—1.5	散
△甲狀腺中ヨリ製出セル「ヨード」含有物質ナリ。 △ソノ一分ハ新鮮腺一分ニ相當ス。△錠 0.3。	一回量 一二錠	一日量 三—六錠	散
甲狀腺末及錠 (鹽野) △錠 0.3。	一回量 0.01—0.04	一日量 0.04—0.15	散
アヨヂン Ajodin	一回量 0.01—0.04	一日量 0.04—0.15	散

△ソノ一部ハ新鮮腺一〇分ニ當ル。  
△以上製劑ノ適應症——粘液水腫、硬皮病、脂肪過多症、  
早發性癡呆、喘息、「ネフローゼ」。

ロダゲン Rodagen (甲狀腺抽出山羊乳汁製品)	一回量 一五—五〇	一日量 五〇—一五〇 (漸増)	散
アンチチレオイチン Antithyreoidin (甲狀腺抽出羊血清)	一回量 0.5—1	一日量 一五—五〇	液
チレオイチクチン Thyreoidectin (甲狀腺抽出動物血液製劑)	一回量 一二膠囊	一日量 三—六膠囊	膠
△一膠囊 0.3。			
△以上三劑ハヘセドウ氏病ニ用キラル、モ効果ハナシ。			



内服劑及注射劑ノ用量及用法

一、腦下垂體製劑

製劑名	一回量	一日量	投與ノ形
ピットリチン Pituitin	0.5—1.0 c.c.		注
ピツグランドール Pituglandol	0.5—1.0 c.c.	効果アル マデ數回	注
ゲブルチン (鹽野) Geburтин	0.5—1.0 c.c.	反覆	注
ヒポフィジン Hypophysin	0.5—1.0 c.c.		注
乾燥腦下垂體前葉錠	二錠	四—六錠	錠

△此等製劑ノ適應症——陣痛微弱、子宮出血ヲ主トス。  
又尿崩症、四肢肥大症、腦下垂體性脂肪過多症ニモ試用ス。

三、卵巢製劑

オオホルミン (武田) Oophormin	二—三錠	毎日又隔日一回 重症ハ一日二回	内注
オオホルミン (武田) Oophormin	0.5—1.0 錠		内注
オオフォリン Oophorin	三—四錠		錠
ゲネグランドール (三共) Geneglandol	1.0 錠		一日一回注

△子宮發育不良及萎縮(無月經)、月經閉止期ノ  
障碍(肥胖、神經症)、月經過多ニ用フ。

オヴォグラインドール Ovoglandol	一錠		三錠 錠
オヴァラヂン Ovarden	△錠 0.25		二—三錠 錠
ルテイノール Lutinol	三—五錠		一日一回注
ゲネステプトル (三共) Genestypol	1.0 錠		一日一回注
テトロドトキシン (鎮痛劑ノ條参照)			

四、睾丸製劑

ボエール氏スヘルミン・エッセンス Essentia Spermii, Poehl	二—三滴	六—九滴	水
ボエール氏注射用スヘルミン Spermium Poehl pro injectione	1.0 錠	一日一回	注(皮、筋)
スヘルマチン (武田) Spermatin	内注 二—三錠	一日一回	九錠 錠

△右諸劑ノ適應症——男性生殖器官神經衰弱症。

五、其他ノ製劑

副腎製劑(鹽化アドレナリン、ズブラレニン、アドレナール、バラネフリン、副腎越勢斯等——心臓血管  
臟器製劑)



劇毒藥極量表

劑ノ條參照。  
 副甲狀腺錠 (「テタニー」ニ用フ)。 脾臟製劑 (ホルモナル) — 腸蠕動ヲ亢進セシムル目的ニテ筋肉内  
 又ハ靜脈内ニ注射ス。一回一五・〇—三〇・〇cc、作用ハ數日後發現ス。  
 肝臟製劑 (ヘパトトキシシン) — 鎮痛劑ノ條參照) 等アリ。

劇毒藥極量表 (第四改正日本藥局方)

藥名	一回極量	一日極量	藥名	一回極量	一日極量
印度大麻越幾斯	〇・一	〇・三	麥角越幾斯	* 〇・三	一・〇
ロベリア丁幾	一・〇	三・〇	番木鱧	〇・一	〇・二
ロベリア草	〇・一	〇・三	番木鱧越幾斯	〇・五	〇・一
△實若葉	〇・一五	〇・五	番木鱧丁幾	一・〇	二・〇
實若根	〇・一	〇・三	バクチ水	二・〇	六・〇
實若越幾斯	〇・〇五	〇・一五	巴豆油	〇・〇五	〇・二五
實若丁幾	一・〇	三・〇	抱水クロラール	二・〇	六・〇
麥角	一・〇	五・〇	芳香阿片酒	一・五	五・〇
			ボドフィルム脂	一・〇	三・〇

ホミカ丁幾 (番木鱧丁幾ニ同ジ)

藥名	一回極量	一日極量	藥名	一回極量	一日極量
トリオナール	* 一・〇	三・〇	カフェイン	〇・五	一・五
△ドーフル散	一・〇	三・〇	カンタリス	* 〇・〇五	〇・一
吐酒石	* 〇・一	〇・三	カンタリス丁幾	* 〇・二	〇・五
△チオニン	〇・〇三	〇・一	ヨード	〇・〇一	〇・〇五
チギタリス葉	〇・二	一・〇	ヨード丁幾	〇・二	〇・五
チギタリス丁幾	一・五	五・〇	ヨードフォルム	〇・二	〇・五
△チウレチン	一・〇	三・〇	△ラクトフェニン	〇・七	二・〇
【リ】			△ヴェロナール	〇・五	一・〇
硫酸アトロピン	〇・〇〇一	〇・〇〇二	【オ】		
硫酸フィゾスチグミン	〇・〇〇一	〇・〇〇二	黄色沃度汞	〇・〇二	〇・〇五
硫酸銅	一・〇		【ク】		
硫酸亞鉛	一・〇		クレオソート	〇・五	一・五
硫酸モルヒネ	〇・〇三	〇・一	グアヤコール	〇・三	一・〇
磷酸コデイン	〇・一	〇・三	【ヤ】		
【カ】			ヤラツパ脂	* 〇・五	一・五

劇毒藥極量表



劇毒藥極量表

△曼陀羅葉	0.2	0.6		
【フ】				
ブローム水素酸スコポラミン	* 0.0005	0.0015		
ブローム水素酸ホムアトロピン	0.001	0.003		
ブローム樟腦	0.1	1.0		
フェナチン	1.0	3.0		
フォーレル水	0.5	1.5		
【コ】				
コロシント越幾斯	0.05	0.15		
コロシント丁幾	1.0	3.0		
コルヒクウム酒	2.0	6.0		
コルヒクウム丁幾	2.0	6.0		
【エ】				
鹽酸モルヒネ	0.04	0.1		
鹽酸アポモルヒネ	0.01			
鹽酸ヘロイン	* 0.005	0.015		
鹽酸コカイン	0.05	0.15		
△鹽酸トロパコカイン	0.1	0.3		
△鹽酸エメチン	0.05	0.15		
續酸ピロカルピン		* 0.01	0.03	
【テ】				
△テオフィリン	0.5	1.5		
【ア】				
阿片	0.15	0.5		
阿片越幾斯	* 0.1	0.3		
阿片丁幾	1.5	5.0		
△アンチピリン	1.0	3.0		
アセトアニリド	0.3	1.0		
安息香酸ナトリウム・カフェイン	1.0	3.0		
亞砒酸加里液	フォーレル水ニ同ジ			
亞砒酸	0.005	0.015		
△アコニット丁幾	0.5	1.5		
アガリチン	0.1			
【サ】				
サリピリン	1.0	3.0		
サリチール酸ナトリウム・カフェイン	1.0	3.0		
サリチール酸フィゾスチグミン	0.001	0.003		
サリチール酸汞	0.01	0.03		

サントニン	0.1	0.3		
醋酸亞鉛	0.1	0.3		
【キ】				
杏仁水	2.0	6.0		
稀青酸	0.1	0.3		
【メ】				
△綿馬越幾斯		10.0		
【ミ】				
△ミグレニン	1.0	3.0		
【シ】				
硝酸ストリキニーネ	0.005	0.015		
硝酸銀	0.01	0.1		
萘酸セリウム	0.3	1.0		
昇汞	0.01	0.03		
【ヒ】				
ヒヨス葉	0.3	1.0		
ヒヨス越幾斯	0.1	0.3		
ピラミドン	* 0.3	1.0		
【セ】				
石炭酸	0.1	0.3		
赤色沃度汞	0.01	0.03		
【ス】				
スルフォナール	* 1.0	3.0		
ストロファンツス丁幾	0.5	1.5		

註 本表中、△ハ第四改正藥局方ニ於テ新ニ極量ヲ制定セラレシモノ、\*ハ極量ノ變更セラレシモノニシテ、琴角越幾斯ガ増量セラレシ以外ハ凡テ減量セラレタリ、新藥局方ニ於テ極量表ヨリ刪除セラレシモノハ此處ニ掲ゲズ。

配合禁忌表

配合禁忌トシテ擧ゲラル、モノ無數ニアレドモ、大部分ハ理論上ノ禁忌ニシテ、實地上ニハ殆問題トナラザル





配合禁忌表

104

モノ多数アリ、ソフ一々掲グルハ徒ラニ煩雜ニシテ却テ記憶ニ不便ナル故、此處ニハソノ中重要ニシテ記憶スベキモノノミヲ掲ゲ、(イ)日常殆配合スルコトナキモノ、例ヘバ硝酸銀ト硫酸、酒石酸、沃度、臭素等ノ如キ禁忌ノ如キ、又ハ(ロ)禁忌トハナリ居ルモ實地上必ズシモ特筆スルニ及バザルモノ、例ヘバ「テオプロミン」劑ニ舍利別ヲ加ヘテ黄色ヲ呈スルガ如キ、又「アスピリン」ト重曹トノ禁忌ノ如キハ、此處ニ掲ゲザルコトトシ、且總括的ニ表示セリ。

甲、水劑ノ配合禁忌

表ノ説明——第一表ハ「アルカロイド」ハ「タンニン」酸、「ヨード」、「アルカリ」及重金屬トハ配合禁忌ニシテ、ソノ際「アルカロイド」ガ沈澱スルコトヲ意味ス。同ジク第二表中「ヂウレチン」ノ條ハ本劑ガ「アルカリ」ニ會シテ沈澱スルコトヲ意味ス。



△但沈澱シテモ振盪シテ用フレバ差支ナキ場合多キコトヲ注意スベシ。




配合禁忌表

105



配合禁忌表

106




乙、散劑ノ配合禁忌

- 一、有毒物質析出配合
  - 「アンチピリン」類(「ピラミドン」等)……次第ニ黒變シテ甘汞ヨリ昇汞ト水銀ヲ化生ス、特ニ
- 二、潮解的配合
  - 左ノ諸表ノ上下ニアル二品ヲ配合セバ潮解性軟塊トナル。


107



配合禁忌表



三、爆発的配合 左記上下ノ二劑ヲ混ジテ強打スレバ爆發ノ虞アリ。



諸液劑一瓦ノ滴數表

△攝氏十五度ノ蒸餾水一瓦ヲ二〇滴トナシテノ割合、(滴下面圓形直徑三耗)

水	三〇滴	燐	三〇滴	エーテル	三〇滴
鹽酸	三〇滴	稀鹽酸	三〇滴	杏仁水	三〇滴
硝酸	三〇滴	稀硫酸	三〇滴	揮發油含有水(例ヘバ)	三〇滴
硫酸	三〇滴	稀靑酸	三〇滴	薄荷水、桂皮水)	三〇滴
醋酸	三〇滴	醋酸エーテル	三〇滴	鉛醃	三〇滴

諸液劑一瓦ノ滴數表



フオーレル水	二〇〃	枸橼油	三〃	一般脂肪油	三〃
舍利別類	五〃	扁桃油	三〃	酒精製丁幾類	三〃
過クロール鐵液	一五〃	揮發苦扁桃油	二五滴	酒精劑	三〃
クレオソート	三滴	茴香油	三〃	酒精精	五〃
クロロフォルム	三〃	橙花油	三〃	稀酒精	三〃
コバイバ・バルサム	三〃	丁香油、桂皮油	二五〃	藥用酒精	三〃
ペルーバルサム	二〇〃	ベルガモット油	三〃	吐酒石酒	二五〃
テレピン油	三〃	オレーフ油	三〃	エーテル性鐵丁幾	三〃
葛麻子油	三〃	迷迭香油	三〃	ホフマン氏精	三〃
巴豆油	三〃	薔薇油	三〃	甘硝石精	三〃
薄荷油	三〃	石油	三〃		三〃

後編 (治療篇)

急性傳染病治療法



腸チフス及バラチフス Typhus abdominalis

et Paratyphus. (A, B)

△經過順調ナル間ハ、安靜ト食餌療法トヲ專ニシ、藥劑ハ「リモナーデ」位ノミヲ與ヘオケベ可ナリ。

④ 赤酒 100-150 稀鹽酸 0.5-1.0 單舍利別 10.0 淨水 100.0

右赤酒鹽酸「リモナーデ」日量三回分服。

攝生法

- (イ) 有熱期 ニハ絶對安靜、頭部ヘ氷嚢貼付ヲ要ス。
- (ロ) 床上起座 ハ大體粥菜ヲ與フル頃ヨリ許ス、但シ座リテ脈搏甚シク増加スルモノハ暫ク起座ヲ見合ス。
- (ハ) 起立及歩行 ハ常食ヲ與フルニ至リテ許ス、入浴モ亦然リ、(下熱後二週半)。
- (ニ) 退院 充分ニ恢復シ、且ツ三日毎ニ一回宛都合三回ノ検査ニ於テ、尿糞中常ニ細菌成續陰性ノ場合。
- (ホ) 職業従事 ハ少クトモ下熱後二ヶ月後。

食餌療法 (左記ノ食餌法ハ略東京市駒込傳染病院ニ於テ行ヒツ、アル處ニ準據ス)。

有熱期 ニハ食餌ハ凡テ流動食トナス、即チ

腸チフス及バラチフス



急性傳染病治療法

主食 重湯 200.0、牛乳 300.0—400.0、卵黃二個(晝及夜)、梅「ビシヨ」少量。右一日量三分與。

其他 時ニ應ジテハ水飴、果汁、「ソップ」、餅湯、「クリーム」、葛湯、牛乳入レ「バタ」、等若干ヲ許シ得。

飲料 充分ニ與フベシ(番茶、果汁等)。昏睡有ニハ求メザルモ時々與ヘヨ。

下熱後 下熱後一週ヨリ次ノ順序ニヨリ、日々次第ニ食物ヲ常食ニ近ツク。

下熱第八日目、オ交リ一回(晝)……即前記主食ノ中晝一回丈ヲ、重湯ノ代リニオ交リ(重湯ト粥ノ中間ノ

モノ)一椀半位ヲ與フ。

同 第九日、オ交リ二回(晝、夕)。同第十日、オ交リ三回(朝、晝、夕)。

同 第十一日、粥一回(晝)……即晝一回丈ヲ粥一椀半、朝夕ハオ交リ一椀半。

同 第十二日、粥二回(晝、夕)。同第十三日、粥三回(朝、晝、夕)。

同 第十四日、粥一回(晝)……即晝一回丈粥ノ外ニ消化良キ菜ヲ加ヘ、朝夕ハ前日ト同ジ、菜トシテハ

刺身、金鮎等ヨリ初ム。

同 第十五日、粥菜二回(晝、夕)。同 第十六、七、八日粥菜三回。

同 第十九日、常食一回……即晝一回丈常飯ト菜ヲ與フ。

同 第二十及廿一日、常食二回(晝、夕)。同 第二十二日、常食三回……即全然普通ノ食餌トナス。

但シ(イ)右ハ一般的ノ型ヲ示セルモノニシテ病症ニヨリ加減スベキコト勿論ニシテ、即チ、

(ロ)經過中發熱、再發等ヲ來セル時ハ、再ビ流動食トナスベシ。但シ

(ハ)再發(屢下熱後一週頃ニ來ル)ノ場合ニハ、下熱後ノ食餌進行ノ速度ハ、初發ノ場合ヨリモ幾分早目ニナシテ宜シ。又

(ニ)初發症ニテモ、ゴク輕症ノ場合ニハ、下熱後ノ食餌進行速度ハ少シク速ニシテ可ナリ。

○牛乳ニテ下痢スル人ニハ、牛乳一合ニ付キ石灰水一—二食匙(5.0—10.0cc)、又ハ炭酸石灰若クハ燐酸石灰

一—二〇ヲ加ヘ與フ。

○牛乳ヲ嫌惡スル者ニハ、「コホア」、「レモン」、「紅茶」、「コーヒ」等ヲ加ヘ與フ。

○食慾不振ノモノニハ、「ソップ」類、肉汁、果汁等ヲ與フ、但シ梨ハ下痢ヲ來スコトアリ。

○「ヴァイタミン」 病症永ビク時ハ「ヴァイタミン」缺乏症ヲ起シ易ク、出血素質等ヲ將來ス、ソノ虞アラバ果汁、

特ニ「レモン」、蜜柑汁、野菜「ソップ」、麥重湯等ヲ與ヘヨ。

○「クリーム」製法……牛乳一合、卵黃一個、澱粉 15.0、單食 110.0(110「カロリー」)。但シ「クリーム」ハ鼓腸

ヲ起シ易シ、鼓腸起レル時ニハ冷水灌腸ヲ行フ。

對症療法

一、熱

(イ)高熱時 非常ニ高熱ニシテ危險アル時ニノミ、少量ノ解熱劑ヲ試ム、「チフス」ノ熱ハ非常ニ解熱劑ニ銳敏ニシテ、急下虛脱ヲ起スコトアル故注意ヲ要ス。

(ロ)下熱期 末期ニ至リ三十七度二三分ノ低熱永クツゞキテ却々去ラヌ場合ニハ、少量ノ鹽酸「キニーネ」、「ピラミドン」等ヲ數日間用フルコトニヨリ奏効スルコト屢ナリ。

腸チフス及バラチフス



二、便秘

- (イ)「グリセリン」、水各三〇・〇、又ハソノ倍量ニテ三回浣腸。本劑効果ナカラバ
- (ロ)「グリセリン」、「リチネ」各三〇・〇ヲ以テ浣腸ヲ試ム。尙不成功ニ終ラバ
- (ハ)「一—三%藥用石鹼三〇・〇—五〇・〇cc」ヲ浣腸ス(尙便秘ノ條參照)。
- (ニ)回復期ニハ硫酸「マグネシウム」、精製酒石等緩和ナル下劑ハ用フルモ可ナリ。

△便秘ハ糞便熱ヲ起スコトアル故注意スベシ。

三、鼓腸症

- (イ)冷巻法、冷水浣腸、又ハ温巻法。(ロ)「メンタ」濕布、「テレピン」油塗布。
- (ハ)硫酸又ハ「サリチール」酸「フィズスチグミン」一日量〇・〇〇一ヲ丸劑トシテ試ムルモ可也。

四、腸出血

- (早キハ第二週、普通ハ廿日頃ニ、時ニハ下熱後ニモ襲來ス)。
- 前徴 トシテ鼓腸及下痢アルコトアリ、コノ時ニハ「メンタ」濕布ヲ施シ、阿片丁幾ヲ與フ。
- 出血 既ニ起ラバ、直チニ

(イ)廻首部ニ氷囊貼布。

(ロ)食餌 一日間ハ絶食セシメ、次ノ二日間位ハ重湯ヲ二—三分ノ一量丈與ヘ、次デ普通ノ重湯食餌ニ進ム。卵黃、牛乳ハ四五日間廢スベシ。

(ハ)阿片丁幾ニヨリ蠕動ヲ抑止ス 即先一五滴位與ヘ、爾後三—四時間毎ニ五滴位宛與ヘ、「グルレン」減ジ經過良好ナラバ減量シツ、數日間投與スベシ。

(ニ)止血劑ノ注射 例ヘバ(イ)「10%「ゲラチン」液 50.0—100.0cc」ノ皮下注射。

(ロ)「10%鹽化「カルチウム」又ハ鹽化「ナトリウム」液 10.0cc」宛一日二回位靜脈内注射。

(ハ)其他 前編止血劑ノ條參照。

(ホ)脈搏不良ノ時ニハ、食鹽注射 50.0cc位、及「カムフル・オレーフ油」ノ皮下注射ヲ行フ。

(ヂ)「ヂギタリス」劑ハ血壓ヲ亢ムル故、出血時ニハ用キザルヲ普通トス。

(ヘ)出血素質ノ發現ニヨル出血ノ時ニハ「ヴァイタミン」C、特ニ蜜柑及「レモン」汁著効アリ。

(ト)絶對安靜ヲ必要トスルコトハ勿論トス。

五、脚氣及脚氣様血管心臓障礙 屢々襲來ス。

(イ)脈搏數 男二三、女二〇位トナラバ、必ズ「ヂギタリス」(末一日量〇・三、〇・四)ヲ用フ。

「ヂギタリス」奏効シテ脈搏減少スルモノハ豫後長、一時効果アルモ直チニ脈搏ノ増加スルモノハ不良ナルコト多キガ如シ。

ⓧ「ヂギタリス」末〇・三、安息香酸「ナトリウム・コフェイン」〇・六、乳糖一〇。右一日量分三包、三回食後分服。

(ロ)ⓧ「オリザニン」液 40.0、阿片丁幾六滴。右一日量。

(ハ)麥重湯、野菜「ソッパ」、果汁ノ攝取(ヴァイタミン)。

(ニ)脈搏細小ニシテ危險アラバ、每一—數時二—三%「カムフル」液一〇cc宛皮下注射。



急性傳染病治療法

(ホ) 胸内苦悶及呼吸困難甚シク苦痛ニ堪エザルモノニハ鹽酸「モルヒネ」一日0.01—0.02位ノ内服及「カムフル」注射ヲ行フ外、瀉血(一回200—300cc位)ヲ行フ。(術式 尿毒症ノ條參照)

(ヘ) 四肢麻痺ヲ殘スモノニハ、電氣及「マッサージ」療法ノ外、硝酸「ストリキニーネ」ノ内服(一日量0.001—0.004位丸劑)ヲ試ム。

六、氣管支加答兒↓肺炎。

(イ) 胸部濕濕布、白湯ニテ濕布「カブレ」ノスル人ニハ2%硼酸水濕布ヲ可トス。又「カブレ」甚シキ時ニハ亞鉛華「タルクム」(等分)ヲ撒布シ、一—三日間濕布ヲ廢スルモ可ナリ。

(ロ) 吸入 2%重炭酸曹達水。

(ハ) 祛痰劑(「セネガ」等)モ用フルモ、一般ニ「チフス」ノ氣管支炎ニハ喀痰少キコト多シ。

七、耳下腺炎。

(イ) 水蛭 3—5條ヲ耳下腺部ニ貼付シテ吸血セシメタル後。

(ロ) 灰白軟膏、又ハ5—10%「イヒチオール・グリセリン」又ハ同「ワゼリン」ヲ塗布シ。

(ハ) 且ツ氷囊ヲ貼付ス。

(ニ) 既ニ化膿シテ波動ヲ呈スルニ至ラバ切開排膿シテ、「ヨードフォルム・ガーゼ」ヲ挿入ヲ行フ。

△切開ノ場處—耳下、又ハ下顎骨下縁ノ後部。但シ、顔面神經及外上顎動脈ニ注意スベシ。

○水蛭貼付法 局部ノ皮膚ニ豫メ砂糖水ヲ塗布セル後、3—5條ノ水蛭ヲ太キ試驗管又ハ小杯ニ入レ、ソレヲ倒マニシテ皮膚ニ密着セシムレバ、水蛭ハ容易ニ吸着スベシ。カクテ吸血約三十分間ニ及ビ、脱落スルヲ待チテ沃度丁幾「コロヂウム」ヲ吸血創ニ塗布ス。若シ水蛭脱落ノ模様ナキ時ニハ、水蛭ノ頭部ニ食鹽ヲ撒布スレバ脱落スベシ。

八、腦膜炎癩症狀 (「メニンギスムス」)

(イ) 腰椎穿刺—効果アリ。 (ロ) 食鹽注射—毒素排泄ノ目的ニテ試ム。

九、譫妄及狂躁

(イ) 食鹽注射(毒素排泄ノ目的)。 (ロ) 「ヴェロナール」ノ内服。

(ハ) 抱水「クロラール」100、阿片丁幾30、橙皮舍利別150、水1500。右毎二時一—二茶匙宛内服。

(ニ) 「バントボン・スコボラミン」ノ皮下注射、一回0.3—0.5cc(劇症ノ場合)。

一〇、褥瘡

豫防法—(イ) 時々體位ヲ變換シ、壓迫ヲ受クル部分ニハ空氣入「ゴム」輪ヲ挿置ス。

(ロ) 皮膚紅潮セバ酒精ニテ清拭シ、沃度丁幾「コロヂウム」ヲ塗布ス。

既成セバ—「オキシフル」ニテ拭ヒシ後、左記種々ノ藥劑ヲ塗布又ハ貼布ス。

(イ) 10%「ヂルマトール」硼酸軟膏又ハ亞鉛華軟膏ヲ厚ク貼布。

腸チフス及バラチフス



(ロ) 三%「ペルーバルサム」軟膏貼布。  
(ハ) 一〇%「ビチロール・ラノリン・バスタ」貼布。

四 亞鉛華澱粉 五〇、〇、「ラノリン」五〇、〇、「サリチール」酸二〇、〇、「ビチロール」二〇、〇。  
(ニ)「デルマトール」、又ハ「アイロール」粉末撒布。

一一、出血素質ノ發現

(イ) 野菜「スープ」、果汁特ニ蜜柑、「レモン」類、麥重湯等ノ攝取、(尙壞血病ノ條參照)  
(ロ) 止血劑ノ注射及內服、(前編止血劑ノ條ヲ見ヨ)。

一二、穿孔性腹膜炎

(イ) 腹部水冷罌法。

(ロ) 絶食。

(ハ) 阿片丁幾又ハ阿片末ノ內服。

(ニ) 強心劑ノ應用。

(ホ) 手術——有熱期ノ穿孔ニハ成績不良ナルモ、恢復期ノモノニハ佳良ナリ。

一三、結膜炎

(イ) 鹽化「アドレナリン」加〇・三% 硫酸亞鉛水ノ點眼。

(ロ) 三% 硼酸水ノ眼部濕布。

一四、瘡口瘡 五—一〇% 重炭酸曹達水ノ塗布又ハ含嗽。

△「チフス」患者ハ平生ヨリ 三% 硼酸水ニテ含嗽ヲ忘ラザラシムベシ。

一五、水 瘡

(イ) バクレン氏燒灼器ニテ燒灼、又ハ

(ロ) 硝酸銀(純品) 挺子又ハ 五〇% 溶液)、又ハ「クロール」亞鉛(純品)ヲ以テ腐蝕シ、

(ハ) ソノ後ハ、過酸化水素水塗布後、沃度丁幾ヲ塗布シラク。

一六、細菌尿

「ウロトロピン」一日量一・五—二・〇ノ內服有効ナルガ、休藥スレバ再ビ元ニカハルコト多シ。

一七、其 他

(一) 血清療法 初期第一週中ニ用フレバ有効ノコトアリ。成ルベク高免疫價ノ血清二〇〇ccヲ皮下ニ注射

シ、翌日又ハ翌々日再ビ二〇・〇ccヲ注射ス。

(二) 胸腹ノ温濕包纏法 時々効果アリト云フ。

(三) 時ニ試用セラル、モノ「エレクトラルゴール」又ハ「カゼオザン」ノ注射。

豫防法 「ワクチン」注射、有効期間一ヶ年。

細菌性赤痢 Bacillendysenterie

Epidemische Dysenterie

△「アメーバ」赤痢ニ就テハ寄生蟲病ノ條ヲ見ヨ。

細菌性赤痢



急性傳染病治療法

食餌療法

一、初期ニハ腸チフスノ場合ト同様ノ流動食ヲ與フ(腸チフスノ條參照)。  
 下熱シテ糞便中粘液ヲ見ザルニ至ラバ、三食中一回ヲオ交リトナシ、以後漸次食餌ヲ進ムルコト「チフス」ノ場合ニ於ケルト同様ナルガ、但シ「チフス」ノ場合ノ如クニ嚴重ナルヲ要セズ、進行速度ヲ比較的速ニシテ可ナリ。但老婦人等ハ治療緩漫ニシテ、遂ニ「マラスムス」ニ陥ルコトアリ、故ニ餘リニ病症永ビク時ハ、便ノ性状ニ關セズ、オ交リ其他適宜ノ不刺戟性消化物ヲ與フベシ。

二、食餌ハ凡テ暖メテ與フルコト緊要ナリ。

三、飲料ハ充分ニ與フ。飲料ノ種類ハ粘性飲料、番茶、麥湯、「リモナーデ」、「セルテル」水等。

四、重炭酸「ナトリウム」二・五、酒石酸二・〇、單舍利別二〇・〇、枸橼油一滴、水一〇〇・〇。

但酒石酸ヲ最後ニ入ル、ト共ニ密栓スベシ。右「セルテル」水一日量三回分服。

△赤酒鹽酸「リモナーデ」ノ處方ハ腸チフスノ條ニ掲出。

腹部保温 緊要事ナリ。特ニ

(イ)S 狀部ニ灰爐、巴布、苧蓆、濕濕布等ヲ貼ス。

(ロ)肛門部ニモ巴布、濕布等ヲ施セバ、裏急後重ヲ緩解スベシ。

藥劑療法

一、下劑 (イ)蓖麻子油 三〇〇—三〇〇ヲ大人一回量トナシ、隔日位ニ一回宛投與スルコト三—四回。  
 △飲ミ難キ人ニハ赤酒、牛乳、咖啡等ト共ニ與へ、又ハ單舎ヲ充分ニ混和シテ與フルヲ可トス。

(ロ)硫酸「マグネシウム」又ハ「ナトリウム」。

一日量二〇—五〇、三回分服一週間位連用。

人工カルルス泉鹽二〇—三〇、用法同上。何レモ食間多量ノ水ト共ニ與フ。

(ハ)甘汞 用法—

(I) 初メ甘汞、後蓖麻子油ヲ用フル法。(嘔氣アル時ニ可)

一〇—五分毎ニ甘汞 〇・〇二五—〇・〇六ヲ與へ、全量 〇・〇六—〇・一ニ至リシ後、二—三時間ニシテ蓖麻子油 三〇・〇—五〇・〇ヲ投與ス。

(II) 急性症ニ〇・五宛一日數回、數日間連用スル法。

慢性症ニ 更ニ少量ヲ連用スル法モアリ。其ノ他

(III) 小兒赤痢ニテ熱永ビク時、好ンデ少量ヲ持長ス。

二、吸着劑 毒素吸着排出ノ目的ニテ好ンデ用キラル。

(イ)血炭末 一日六〇・〇—三〇〇・〇ヲ「オブラート」ニテ分服、又ハ硫酸「マグネシウム」液中ニ振盪合劑トシテ分服セシム。

(ロ)白陶土。

白陶土 一〇〇・〇—二〇〇・〇、水 三〇〇・〇—五〇〇・〇。

右空腹時ニ一度ニ全量ヲ頓服又ハ浣腸料トナス。

細菌性赤痢



急性傳染病治療法

白陶土 1.5g 宛 一日三回内服。

△普通ハ以上ノ療法ヲ行フ間ニ、赤痢便ハ先ヅ血液次ニ粘液ヲ失ヒテ黄色ノ液状態トナリ、且ツ回数モ次第ニ減ジテ間モナク治癒スベシ。

三、洗腸療法

術式—(イ)患者ヲ左側臥トナシ、骨盤部ヲ稍高クシ下肢ヲ屈曲セシメタル後、口ヲ開キテ安靜ニ呼吸セシメ、「オレーフ」油、又ハ「グリセリン」ヲ塗布セル嘴管又ハ「カテーテル」ヲ肛門内ニ「80—100」挿入シ、他端ニY字管ヲ繋ギ、該管ノ兩枝ニ流入管及流出管ヲ連結シ、「イルリガトール」ヲ三尺位ノ高サニ置キテ、徐々ニ洗滌液ヲ注入セシメテ反覆洗滌シ、排出液ノ透明ナルニ至リテ止ム。一回洗滌液量 500—1000cc 位、洗滌液温度 35度、回数 一日一回。

(ロ)又ハY字管ヲ用キズニ、普通ノ浣腸法ニテ「0.5—1.0」ノ洗滌液ヲ注入シタル後嘴管ヲ抜キ去リ、約十分間位堪エシメシ後排出セシム、普通ハ此ノ法ヲ用フルコト多シ。

洗滌液

- (イ)生理的食鹽水 糞便腐臭アリ、中毒症狀強キ時ニ用フ。
- (ロ)「タンニン」酸 0.3—0.5% 液。前記一、二ノ療法ヲ十日間モ續ケ行フモ、尙治癒ノ傾向ナキ時ニ最ヨク用キラル、洗腸劑ナリ。
- (ハ)硝酸銀液 千倍液。膿便永ク續ク時ニ用フ。先ヅ温湯ニテ洗腸後硝酸銀液ニテ洗腸シ、後直チニ食鹽水ニテ後洗ス。

(ニ)「プロタルゴール」0.2—0.5% 溶液。硝酸銀ト同ジ意味ニテ用キラル。

(ホ)重曹水 1.0—2.0% 液。粘液溶解ノ効アリ。

(ヘ)微温湯 疫病等ニテ中毒症狀強キ時好ンデ用キラル。

(ト)「ヨーグルト」10% トシテ用フルコトアリ。

(チ)「ヤトレン」注腸療法 試ムベシ。方法—潰瘍性大腸炎ノ條参照。

(リ)「アドレナリン」洗腸療法 血便アル時ニ試ミテ可ナリ。

五十萬乃至百萬倍鹽化「アドレナリン」液 800—1000.0cc ヲ攝氏 30度ニ温メテ高位浣腸ヲ施ス。輕症ハ一日一回、重症ハ一日二回。注腸前千倍鹽化「アドレナリン」1.0cc ヲ内服セシムレバ腸ノ蠕動ヲ減ジテ鎮痛ノ効アリト。本注腸施行後六—三時間効力ノ持續ヲ見ルト。粘液ノ排泄止ミ、黄色液状態ヲ排出スルコト數日ニ至ラバ、下劑ヲ廢シテ收斂劑ヲ與フ。

「タンナルビン」1.0、「デルマトール」3.0、右一日量、三回分服。

對症的療法

一、裏急後重 (一)内服 磷酸「コデイン」。

(二)坐藥 鹽酸「コカイン」0.05、「カカオ」脂 2.0。右坐藥一個。

鹽酸「コカイン」0.01、阿片末 0.03、莢若越幾斯 0.02、「カカオ」脂 2.0。右坐藥一個。

細菌性赤痢



- (三) 注腸 稀薄葛湯 150.0—200.0、阿片丁幾 10滴。
- (四) 温濕布、巴布、ヲ肛門部へ貼スルコト。
- 二、腸出血、下劑ヲ中止シ、阿片丁幾ヲ與ヘ、S 狀部へ氷囊ヲ貼シ、一—三日間絶食セシムル等、腸「チフス」ノ腸出血ノ場合ト同ジ。

三、痙痛 (イ) 燒酸「コデイン」ノ内服。

(ロ) 硫酸「アトロピン」0.005—0.01宛、一日二—三回皮下注射。

(ハ) 阿片 ハ疼痛餘リニ甚シキ時用フルコトナキニ非ザルモ注意ヲ要ス。

(ニ) 鹽化「アドレナリン」ノ内服ヲ試ムル人アリ、一回量一物液 10—20滴。

四、嘔吐 (イ) 沃度丁幾 20滴ヲ茶又ハ赤酒ト共ニ與フ。

(ロ) 鹽酸「コカイン」、蓆酸「セリウム」等ノ内服。其他嘔吐ノ條参照。

五、肛門炎 「ワゼリン」ノ塗布。

脱肛 「コカイン」軟膏ノ塗布。

六、其他ノ對症療法ハ略ス。解熱劑ハ必要ナシ。

血清療法

余リ用キザルガ、用フレバ多價血清ヲ初期ニ皮下ニ注射ス。

一回量 10.0—10.03(一日量 10.03迄)。翌日尙一回注射ヲ反覆スルモ可ナリ。

◎治療法要略

□普通症 ハ流動食ヲ與ヘ、蓖麻子油ヲ一—二日ヲキニ二—四回投與シ、ソノ間硫苦ヲ連用シ、S 狀部ヲ保温シ、時ニハ白陶土内服ノ兼行等ニヨリ、普通ハ發病後週餘ニシテ便中血液粘液モ見ザルニ至リ、糞便ハ黄色液狀ヲ呈スルニ至ル、カ、ルコト數日ノ後、硫苦ヲ廢スレバ便自ラ固マル。餘リニ固マリ難キ時ニハ、「タンナルピン」ヲ與フ。食餌ハ粘液消失後オ交リヲ與ヘ、後次第ニ常食ニ近ツク。

□永ビノモノ 右ノ療法ヲ行フコト二—三日以上ニ至ルモ、便ノ改善思ハシカラザルモノニハ、尙硫苦ヲ續ケツ、日々又ハ隔日一回「タンニン」酸水ノ洗腸ヲ行ヒ、尙快癒ノ傾向ナキモノニハ硝酸銀水ノ洗腸ヲ試ム。永ビク場合ニハ屢「マラスムス」ヲ來ス、食餌ヲ餘リ嚴重ニナシ過ギザルコトヲ要ス。

處方例

一、硫酸マグネシウム	15.0	淨水	100.0
稀鹽酸	1.0	右爲一日分食間三分服。	
芳香丁幾	1.5	一、硫酸ナトリウム	15.0
淨水	10.0	血炭末	50.0
右爲一日量食間三分服。		稀鹽酸	1.0
一、人工カルルス泉鹽	15.0	淨水	100.0
薄荷水	7.0	右振盪合劑一日量三分服。	
單舍利別	8.0	一、次硝酸蒼鉛	3.0

細菌性赤痢



急性傳染病治療法

アラビアゴム漿 八・〇 淨 水 100・0  
單舍利別 一八・〇 右一日量三分服。

「附」疫 痢 Elkiri

急ヲ要スル故、前記ノ諸法ヲ早急ニ且充分ニ行フ。

- 一、先ツ鹽化「アドレナリン」ヲ注射シ置キ(本劑ノ大量ハ本症ニ非常ニ有効ナリトスル人アリ)。
- 二、蓖麻子油(又ハ初メ甘汞ヲ與ヘ、一二時間後蓖麻子油)ヲ投與ス。  
量ハ二歳ハ一回五・〇—七・〇、四—五歳ハ 10・0—15・0、六—七歳ハ 15・0—20・0。  
(右二—三回與フルヲ可トス)。
- 三、同時ニ充分ニ腸洗滌ヲ行フ。一日二—三回宛數日間、病勢良好ニ向フ迄。  
洗滌液—微温湯、又ハ微温生理的食鹽水、最良キハ二—三%ニ獸炭末ヲ浮游セル二—三%重曹水。
- 四、心力ノ保持、毒素ノ稀釋及排泄ノ目的ニテ、生理的食鹽水ノ皮下注射、  
其他強心劑—「コフェイン」、「アドレナリン」、「カムフル」、「チギフォリン」等ノ注射ヲ行フ。
- 五、「アルカリ」療法。「アチドージス」アル故之ヲ行フ、即四%重曹水ノ皮下注入、注腸及ビ内服ヲ試ム。
- 六、痙攣ニハ抱水「クロラール」ノ注腸効果アリ。
- 七、腹部ノ保温 緊要ナリ。
- 八、食餌 ハ中毒症狀去ルマデハ絶食、ソノ後ハ赤痢ノ場合ト同ジ。

チフテリム Diphtheria, Diphtherie

攝生法

血清療法

- (イ) 空内ヲ濕潤ナラシムルコト ハ輕症ニモ緊要ナリ。
  - (ロ) 静臥 熱及局處症狀ノ消散後ト雖ドモ、心臟衰弱ノ徴ヲ有シ、又ハ疲勞甚シキ間ハ床中安靜ヲ持續スルコト。
  - (ハ) 食餌 初メハ流動食ヲ與フ。
  - (イ) ナルベク早期ニ充分量ヲ筋肉内(時ニハ靜脈内)ニ注射スベシ。
  - (ロ) 普通五千單位ヲ早期ニ用フレバ充分ナルモ、重症ニハ先ツ五千乃至一萬單位ヲ用キ、後必要アラバ翌日更ニ數千單位ヲ追加ス。
  - (ハ) 第一回注射卓効ナクシテ一週間モ經過セルモノニハ、過敏症ノ發起ヲ悞レ、先ツ血清〇・五ccヲ皮下ニ注射シ、後五時間ニシテ、成丈大量ヲ筋肉内ニ注射スベシ。
  - (ニ) 血清ノ最大及最小有効量 (及病症ニヨル適當量)。
- (I) シック Schick氏ニ依レバ……體重一kgニ付キテノ最小有効量ハ 100單位、最大有効量ハ 500單位ナリト。
  - (II) 長尾氏ノ血清注射標準表 (シック氏ノ成績ニ基ク)

1歳未満(5-10kg)	2-10歳(10-15kg)	10-15歳(15-20kg)
0.5-1.0千	1.0-2.0	2.0-5.0
2.5-5.0	5.0-10.0	10.0-25.0

チフテリア



急性傳染病治療法

咽頭チフテリア(輕症) 〇.八—一.五  
 一.五—三.〇  
 三.〇—六.〇  
 鼻喉頭チフテリア(重症) 二.〇—五.〇  
 五.〇—一〇.〇  
 一〇.〇—二五.〇  
 (單位ハ千免疫單位)

(III) ホイブネル Heubner 氏。發病二日以内ノモノニハ一五〇〇、稍重症三〇〇〇、最重症ニハ六〇〇〇—一〇〇〇〇單位。

(IV) ヲイヘル Mayer 氏。咽頭ニ局限スルモノニハ三〇〇〇位、變化相當ニ著シキモノニハ五〇〇〇、咽頭壞疽ニ陥レルモノニハ一〇〇〇〇宛靜脈内ニ注射シテ總量三〇〇〇單位ニ及ブ。

局處療法

一、吸入 二%重曹水、一—三%過酸化水素水、三〇—五〇%石灰水。  
 △充分ニ行フコトヲ要ス。

二、「スプレ」(咽頭) 一%過酸化水素水ヲ用フ、(含嗽不可能ナル初生兒ニ行フ)。

三、含嗽 二%鹽剝水、一—三%過酸化水素水、〇.二%過「マンガ」酸加里液。  
 △扁桃剝離後ニモ尙細菌存在スル故、含嗽ヲ廢スベカラズ。

四、頸部ニ環狀水囊、後ニハ温濕布ヲ施ス。又芥子泥卷法モ用フ(方法—流行性感官ノ條參照)。

五、扁桃腺塗布 行ハズモ可ナリ。

「トルオール」三.〇、「メントール」一〇.〇、無水酒精六〇.〇、過「クロール」酸四.〇。  
 右レフレル氏液一日二回塗布。

六、喉頭「チフテリア」ニテ「チアノーゼ」來ラバ手術ヲ要ス。

(イ)氣管切開術 Tracheotomy

術式——上及下氣管切開術(甲状腺峽ノ上又ハ下方ニ於ケル切開)アリ、前者ハ大人ニ適シ、後者ハ小兒ニ適ス。

(一)下氣管切開術 環狀軟骨ヨリ下方三—四種ノ間ヲ正中線ニ於テ切開シ、左右ノ胸骨甲状筋ノ間ニアル白線ヲ正中線ニ於テ縱ニ切ル、(側方ニ偏シテ切レバ手術ハ困難トナルベシ)。次ニ筋肉ヲ左右ニ引分クレバ結締織ト靜脈トヲ見ル、靜脈ヲ避ケ、結締織ヲ側方ニヤリ、助手ヲシテ甲状腺峽ヲ鈍鈎ヲ以テ上方ニ引カシメバ氣管輪ヲ見ルベシ。次ニ一ツノ氣管輪ノ下縁、左右兩側ニ各一ツノ銳鈎ヲ穿テ、之ヲ前方ニ引キテ氣管ヲ固定セシム。爰ニ於テ下方ヨリ上方ニ向ヒ二—三ノ氣管輪ヲ切ルト共ニ、前述ノ銳鈎ヲ氣管切開創縁ニ移シテ之ヲ固定シ、深呼吸時ニ於ケル創口ノ沈下ヲ防グ。次デ「カニューレ」ヲ氣管内ニ挿入シ、紐ヲ以テ頸ノ周圍ニ固定ス。「カニューレ」ノ直径ハ一—二歳ニテハ五耗、三—四歳ニテハ六耗、五—六歳七耗、七八歳八耗、九—一三歳九耗、大人二—三耗トナス。

(二)上氣管切開術 前者ト略同ジ。甲状軟骨ノ中央ヨリ、三—四種下方ニ切開シ、深部頸筋膜ニ達セル時ハ、甲状腺峽ノ上縁ニ接シテ之ヲ横切シ、峽ヲ氣管ヨリ剝離シテ壓下スル時ハ氣管現ハル。以下前法ト同ジ。

後療法 (イ)「カニューレ」ノ周圍ニハ消毒布片ヲ置キ、特ニ「カニューレ」ト皮膚ノ間ニモ布片ヲ入レテチフテリア



急性傳染病治療法

摩擦ヲ防グ。

(ロ) 挿管後ハ日々「カニユール」ヲ通ジテ氣管内ヘ羽毛ヲ挿入シ、之ヲ刺戟シテ粘液、義膜等ヲ略出セシム。

(ハ) 切開後一―二日ヲ經テ、鼻咽腔ト氣管トノ間、既ニ充分ニ通貫セルヲ見バ、「カニユール」ノ内管ヲ抜キ、間モナク外管モ抜ク、無用ニ永ク放置スルコトヲ禁ズ。

(ニ) 「カニユール」拔去後ハ、創口ヲ清潔ニナシ綿帶ヲ施シ置ケバ、自然ニ癒痕ニヨリテ治療ス。

(ロ) 喉頭挿管術 Intubation

術式 患兒ヲ半臥座位ニ於テ頭部ヲ固定セシメ、オドワイヤー氏開口器ヲ上下白齒間ニ挿入シ終ラバ、術者ノ左示指ヲ口腔内ニ入レ、會厭軟骨ニ達セバ之ヲ上方ニ壓定シ、カルステンズ氏挿入器ニヨリ金屬製

管ヲ喉頭内ニ挿入ス、次ニ左示指ニテ管ヲ固定セル後、右手ニ持テル挿入器ヲ除去ス。「チャノーゼ」

忽チ消散セバ成功セルナルモ、呼吸困難、「チャノーゼ」増スガ如キハ、管ノ食道又ハ粘膜炎等ニ入レルヲ示スモノナル故、改メテ行フベシ。

管ノ挿入ハ二十四時間トス、三十六時間以上放置セバ聲帶ノ褥瘡ヲ生ズ。

挿管ニハ豫メ糸ヲ附シテ挿入後ハ口腔外ニ固定シ置キ、抽出時ニハオドワイヤー氏抽出器ヲ用フ。

七、鼻「ヂフテリア」ノ處置

(イ) 3% 過酸化水素水(「オキシフル」)ノ塗布。

(ロ) 5% 「イヒチオール」液ノ滴入。

(ハ) 白降汞軟膏 綿花ニツケテ挿入ス。

(ニ) レフレル氏液(前掲)ノ塗布。

八、軟口蓋麻痺及他ハ「ヂフテリア」後麻痺

(イ) 生理的食鹽水 1.0cc 宛一日一回軟口蓋根ニ注射。

(ロ) 電氣療法

(イ) 平流電氣最可ナリ、麻痺部例ヘバ口蓋ニ陰極ヲ貼ス、一日一回。

(ロ) 感傳電氣モ用フ。

(ハ) 血清注射 一度細胞ニ毒素ノ結合セル以上ハ、如何トモ致方ナキ筈ナルモ、頑固ナル多發性四肢麻痺ニ再ビ大量ノ血清ヲ注射スルニ、時トシテ(毒素ノ遊離シテ)効ヲ見ルコトアリト云フ。

(ニ) 「ストリキニーネ」、「ホミカ」越幾斯ノ内服、時ニハ注射モ試ムベシ。硝酸「ストリキニーネ」0.001—

0.002 宛一日一―二回内服(丸)、或ハ0.002 宛一週二―三回皮下注射。

△概シテ後麻痺ノ驟後ハ宜シク、二―三週ニシテ治癒スルコト多シ。

合併症ノ處置

一、氣管支加答兒及肺炎 胸部療法乃至全身温濕纏絡法。其他氣管支加答兒及肺炎ノ條參照。

二、心臓衰弱 最モ恐ルベキモノニシテ、第二―三週ノ終頃ノ間ニ突然來リテ死ニ致スコト屢ナリ。故ニ「ヂ

ヂフテリア







急性傳染病治療法

六、「サルブルサン」注射。特ニ「アングリーナ」強キモノニ有効ナリトスル人アリ。

七、初期ニ甘承又ハ蓖麻子油ヲ與ヘテ腸ヲ清掃スルハ可ナリ。

症狀別治療法

一、「アングリーナ」

(イ)含嗽、鹽剝水(2%)、硼酸水(3%)、過「マンガ」酸加里液(0.1%)、「オキシフル」(10%)、生理的食鹽水。

(ロ)冷濕布、頸部ニ施ス。環狀水囊貼付ニテモ可ナリ。

(ハ)壞疽性ノ時ニハ

(イ)灌注法、腹位ニテ頸部ヲ側方ニ向ケシメ、500.0—1000.0ccノ生理的食鹽水ヲ口腔内ニ灌注ス、粘液多キ時ニハ食鹽水ノ代リニブラウン氏處方ヲ用フ。

重曹2.0、硼砂2.0、水200.0。右ブラウン氏處方。

(ロ)六—八倍「アルコホル」ニテ含嗽。

(ハ)二千倍過「マンガ」酸加里液ニテ含嗽、後食鹽水ノ灌注。

(ニ)時ニ潰瘍面ニ塗布ヲ行フ。

(I) 二—三%「プロタルゴール」。

(II) 五%石炭酸、「グリセリン」各1.0、飽和硼酸水50.0。

(III) 沃度丁幾、又ハルゴール氏液。

(IV) 過酸化水素ヲ「スプレー」ニテ灌ギ、又ハ塗布後含嗽又ハ灌注。

(V) 「ゾツオヨドール・ナトリウム」。

二、頸淋巴腺腫脹

(イ)ブロー氏液又ハ二—三%鉛糖水ノ冷罨法、又ハ水囊貼付。

(ロ)塗布、五%沃度「ワゾゲイン」、二〇%「イヒチオール」軟膏等ノ塗布。

(ハ)化膿、波動ヲ呈セバ切開ス。

三、中耳炎、日々検査ヲ怠ル勿レ、鼓膜ニ赤發ヲ見バブロー氏液ノ罨法ヲ行ヒ、遂ニハ穿孔術ヲ行フ、(通常ハ自然ニ破ル)。穿孔後日々「オキシフル」ニテ外聽道ヲ清洗ス。

乳嘴突起痛ム時(乳嘴突起炎)ハ切開ス。

四、「ロイマトイド」(イ)局處ヘ二—三%鉛糖水ノ罨法。

(ロ)「サリチール」酸劑ノ内服。

五、腦症、(イ)乳嘴突起部ヘ水蛭十餘條貼付。(ロ)麻醉劑ノ應用。

六、腎臟炎、普通第十九乃至二十病日頃ニ起ル。

(イ)常ニ檢尿シツ、充分ノ飲料水及「ウロトロピン」ヲ與ヘ、且ツ食餌ニ注意シテ之ヲ豫防スルニ努ムベシ。

(ロ)既ニ起ラバ、急性絲絨體腎炎ノ治療法ヲ施ス、(同條參照)。

七、心臟衰弱、強心劑(「コフェイン」、「チギタリス」、「カムフル」、「アドレナリン」等)ヲ投與ス。

猩紅熱



急性傳染病治療法

八、敗血症

- (イ)「エレクトラルゴール」5.0-10.0cc 宛一日一回筋肉内、皮下又ハ靜脈内ニ注射又ハ注腸ヲ試ム。
  - (ロ)連鎖球菌免疫血清ノ注射モ試ムベシ(用量用法前掲)。
  - (ハ)其他敗血症ノ條參照。
- 九、「チフテリア」ノ合併 スルコトアリ。直チニ抗毒素血清ノ注射ヲ行フ、「チフテリア」ノ條參照)。

瘡 Variola, Pocken

期待療法ヲ行フノミ。

- 一、發熱及頭痛 頭部へ氷嚢貼付、時ニ下熱劑ヲ用フ。
- 二、腰痛 浸リニ皮膚ヲ刺戟スベカラズ、刺戟部ニ多數發疹ノ傾向アレバナリ。
- 三、發疹 (一)起炎菌毒ノ入ルヲ防ギ、且疼痛、癢痒ヲ減ゼシムルタメ種々ノ藥劑ノ塗布ヲ行フ。

(イ) 5-10% イヒチオール軟膏。

(ロ) 2-5% 硝酸銀液。

(ハ) シュウイムメル Schwinmer 氏糊膏。

(ニ) フィラトウ Filatow 氏軟膏。

石炭酸 5.0-10.0% 「オレーフ」油 20.0% 精製石灰 2.0%  
灰白軟膏 20.0% 黄臘 10.0% 「テール」2.0%

(ホ) ドライヤー Dreyer 氏 過「マンガ」酸加里ノ飽和水溶液ノ塗布——初メ二日間ハ一日三回、其後ハ日々一回宛行フ。

(ニ) 膿疱ヲ掻カザル様ニ、兩手ヲ縛リ、顔面ニ「マスク」ヲ掛クルコトアリ。

(三) 口内疹 2% 鹽素酸加里液ノ含嗽又ハ同液ニ依ル口内洗滌。

四、口臭 醋酸鑿土(3%) 液ノ含嗽。

五、眼病 3% 硼酸水水ヲ以テ洗滌及ビ濕布ス。

六、退院 完全落屑後ニ許可ス、中等症ニテモ發病六週間以上ノ後。

預防法 種痘 動物性牛痘漿ヲ用フ。

切種法 (刺種法ハ近時用キズ)。

術式 三角筋附着部ノ下方ヲ「アルコール」ニテ充分消毒セル後、互ニ二種以上ヲ隔テ、四—六ヶ處ニ痘

苗ヲ塗リ、ソノ上ヨリ切種刀ヲ以テ十文字ニ表皮ヲ切り、苗ヲ擦入ス、此ノ時切創ノ深サハ、出血セ

シメズシテ僅ニ紅痕ヲ呈セシムル位ヲ適度トナス。

乾燥後之ヲ覆ヒ、二週間入浴ヲ禁ズ。

経過 第三—四日蓄疹、第五日小水泡、第八日膿疱(發熱)、第十二日痂皮、第二十一日脱落。

△但シ種々ノ異常型アリ。

檢診 接種後六—八日ノ間ニ行フ。

痘 瘡



急性傳染病治療法

善感——第一期種痘ニ於テハ定型痘疱二顆以上發セルモノ、第二期以後ノ種痘ニ於テハ膿痘形成セズ接種日ヨリ第三日以後ニ於テ一個以上ノ小結節又ハ水疱ヲ生ジタルモノモ善感トス。(接種後二日以内ニ現ハル、局處過敏症(痒痒、潮紅、結節)ト混同スベカラズ、コレハ二日以後ニハ消散スル故區別明ナリ)。  
種痘ニ依ル障礙

- (イ) 早發丹毒 三—四日目ニ接種創ヨリ起ル、原因接種器ノ不潔ニ依ル。
  - (ロ) 晚發丹毒 七—九日目ニ初發ス、患者ノ創ヲ不潔ニナセルニヨル。
  - (ハ) 膿痂疹、淋巴管炎、等化膿性炎症、原因(ロ)ト同ジ。
  - (ニ) 「ワクチノーゼ」一切種部ヲイヂリシ指ニテ、眼、顔面等ヲ擦ル時、ソコニモ痘疱ヲ生ズルヲ云フ。
  - (ホ) 全身性種痘 *Vaccina generalisata* 第十一—十二日目頃ニ全身ニ膿疱ヲ生ズルコト極メテ稀ニアラフ云フ。
  - (ヘ) 種痘發疹 八—十二日目ニ顔面、軀幹、四肢ノ伸側ニ稀ニ麻疹様發疹ヲ來スヲ云フ。
- 種痘ノ禁忌症 (イ) 他ノ傳染病ノ患者及ツノ家人。(ロ) 結核者。(ハ) 衰弱者。(ニ) 廣汎性濕疹患者。  
種痘ノ時期

- 一、第一期種痘 出生ヨリ翌年六月ニ至ル間、但生後三—十二ヶ月ノ間ヲ最モ適當トス。母乳兒ハ生後一週ニテモ善ナシ。若シ不善感ノ場合ニハ翌年六月迄ノ間ニ更ニ行フベシ、切種數四切。
- 二、第二期種痘 數ヘ年十歳ノ者、切種數六切。若シ不善感ノ時ニハ翌年十二月迄ニ尙一回行フベシ。

三、定期外種痘 流行時ニハ善感者モ行フヲ可トス。

水痘 *Varicellen, Windpocken, Wasserpocken*

對症的療法ヲ講ズルノミニテ治療スベシ。

- 一、疱ノ乾燥ヲ促スタメ粉末撒布 例ハ、  
四 「サリチール」酸〇・五、澱粉二五・〇、滑石粉一五・〇、亞鉛華一五・〇、右撒布料。
- 二、痒痒甚シキ時ニハ 左ノ如キモノヲ塗布ス。  
二—五%「メントール」酒精、二%「プロモコル」軟膏、七%「イヒチオール」軟膏等。
- 三、尿検査(腎臟炎) 特ニ第二週ニハ再々検査スベシ。

流行性腦脊髄膜炎 *Meningitis cerebrospinalis, Epidemische Genickstarre.*

看護法

- (イ) 室内ヲ暗クシ、高音等ノ刺戟ヲ少クスルコト。
  - (ロ) 頭部ヲ高クシ、水囊ヲ頭部及脊椎ニ沿ヒテ貼ス。
  - (ハ) 乳嘴突起部ニ水蛭二〇—三〇條貼付(術式 腸「チフス」ノ條参照)。
  - (ニ) 頭部、項部及脊柱部ニ水銀軟膏ノ塗抹。
- 水痘 流行性腦脊髄膜炎



急性傳染病治療法

(水)含嗽 侵入門へ口腔ナルコト多キ故、過酸化水素水其他ニテ含嗽セシム。  
腰椎穿刺及血清療法

一、腰椎穿刺ニヨリ腦脊髄液壓ヲ下グルコト。

排出量ハ小兒ニテハ約100—150cc、大人ニテハ約200—400ccトス。但液壓ニヨリテ加減シ、生理的壓又ハ少シク以下ニ迄液壓ヲ降下セシム。急性期ニシテ瀾瀾強キ間ハ日々反覆シテ行フベシ。

二、多價免疫血清ノ脊椎腔内注射

腦脊髄液穿刺後、其穿刺針ヲ抜カズニ置キ、夫レヘニ五入注射器筒ヲ附シ、新鮮(三ヶ月以内ノモノ)血清大人300—400cc(小兒一年以下200、一年乃至十四年300)ヲ極メテ徐々ニ注入ス。

△注射後過敏症發來ノ虞アラバ、豫メ「アドレナリン」、鹽化「カルチウム」ヲ注射ヲ試ムベシ。

三、腦脊髄液ヲ洗ヒ出スコト (腦脊髄液膿性ナル場合)。

腰椎穿刺ニヨリ腦脊髄液200ccヲ採取シ、ソノ代リニ滅菌生理的食鹽水200ccヲ注入シ、然ル後再ビ200cc採取シテ代リニ再ビ食鹽水ヲ注入スル方法ヲ何回モ繰返シ、初メ膿性ナリシ腦脊髄液ガ、澄明ニナリシ後、洗滌ヲ中止シ、最後ニ免疫血清200ccヲ注入シテ終ル。

毎日又ハ隔日一回施行。

四、免疫血清ノ靜脈内注射 本病菌ニヨル敗血症ヲ伴フ場合ニ行フ。

△關節炎ヲ起セル時ニハ關節腔内ニ血清ヲ注入スルコトアリ。

其他對症的ニ

一、不眠、譫妄、不安、狂躁、頭痛、等ニ對シテハ度ニ應ジテ

臭素劑、「ヴェロナール」、「モルヒネ」、抱水「コロラール」、「バントボン・スコポラミン」等ノ内服又ハ注射ヲ行フ。

二、甚シキ高熱 ニハ下熱劑ヲ與フ。

三、尿閉 ニハネラトソ氏「カテーテル」ヲ使用シテ一日二回、排尿ヲ行フ。

四、便秘 ニハ甘汞等ノ投與、又ハ排便瀉腸ヲ行フ。

五、尿消毒ノ目的 ニテ「ウロトロピン」ヲ内服セシム。

六、心臟衰弱其他 ハ應急適宜ニ處置ス。

腰椎穿刺法術式

患者ハ「ベット」ノ端近ク側臥位(又ハ座位)ヲ取ラシメ、兩脚ヲ曲ゲテ之ヲ抱カシメ、以テ脊椎ヲ出來ル丈彎曲シテ椎間裂孔ヲ廣カラシム。穿刺部位ハ第三—五腰椎棘狀突起ノ下ニシテ、最宜シキハ第三及四腰椎間ノ裂孔トス、第四腰椎ノ棘狀突起ハ兩側腸骨櫛ノ頂點ノ連結線上ニアル故、該線ノ僅カ上方ノ裂孔ヲ穿刺スレバ宜シ。即此部ヲ消毒ノ後、クインケ又ハクレーニツヒ氏腰椎穿刺針ヲ正中線ニ於テ鉛直ニ刺入シタル上、心持テ上方ニ向ケテ裂孔ヲ通過シ、椎間韌帶ヨリ脊髄硬膜ヲ貫通セバ針先ノ抵抗減ズベシ、此ノ時「マンドリン」ヲ抜ケバ、脊髄液ハ自然ニ針ヲ通ジテ滴出スベシ。普通大人ニテハ脊椎腔ニ達スルニ約二寸程刺入スルヲ要ス、ソレ

流行性腦脊髄膜炎



以前ニ大ナル抵抗ニ衝突セルハ刺入ノ途ヲ誤リシナリ。  
 液壓ヲ知ルニハ、穿刺針ヨリ液ノ滴下シ始ムルキ否ヤ、一端ニ細キ硝子管ヲ連結セル短キ「ゴム」管ヲ針ノ外端ニ結合シ、硝子管ヲ鉛直ニ立タシム、此ノ時管中ヲ上レル液ノ頂點ト穿刺孔トノ鉛直距離ガ二五〇耗アラバ、脊髄液壓ハ二五〇耗水柱ニ相當ス。

流行性腦炎 Encephalitis epidemica

看護法 一、安靜ニシ、光、音響其他ノ刺激ヲナルベク與ヘザルコト。  
 二、頭部ニ氷嚢ヲ貼ス。

藥劑療法 效果アルモノナキモ、試ミニ、

(イ)鹽酸「キニーネ」、其他解熱劑ノ内服。

(ロ)「エレクトラルゴール」ノ注射等ヲ試ミンカ、

少クトモ一時的ニ腦膜炎症狀ヲ緩解スル故、試ムベシ。

對症的療法 ヲ主トス。

一、不安、狂躁アルモノニハ、(イ)「プローム」劑、(ロ)鹽酸「モルヒネ」、(ハ)「バントボン・スコポラミン」等ノ内服又ハ注射ヲ行フ。

二、後胎症 トシテ筋強剛、舞踏病様運動、震顫、其他ノ所謂錐體外性症狀群ニ對シテハ、

(イ)「プローム」水素酸「スコポラミン」一日量 0.005 位ヲ主トシテ丸劑(又ハ注射)トシテ投與ス、但シ

感受性人ニヨリテ大差アリ、又容易ニ蓄積作用ヲ呈スルコトアル故注意ヲ要シ、初メハ 0.001—0.003 位用フルヲ良シトス、慣習セバ一日 0.003 位迄ハ用キ得ルコトアリ。

(ロ)硫酸「アトロピン」 効力遙ニ前者ニ劣ル。

(ハ)臭素「カリウム」等モ試ムベシ。

處方例

一、プローム水素酸スコポラミン

0.015

甘草末及甘草羔

適宜

右爲百丸 一日三回一丸宛。

マラリア Malaria, Wechselfieber

急性「マラリア」

發作時ノ看護法

(イ)惡寒期……温包シ湯婆ヲ貼置ス。

(ロ)有熱期……衣衾ヲ輕クシ、頭部へ氷嚢ヲ貼付ス。

(ハ)發汗期……醋又ハ酒精ニテ皮膚ヲ拭ヒ、又稀ニ阿片ヲ投與ス。

藥劑療法

一、特效藥「キニーネ」ノ用法

マラリア



急性傳染病治療法

(イ)ノホト、Nocht氏法、鹽酸「キニーネ」一日量一〇ヲ五回ニ分服。即發作前十二時間ヨリ初メ毎二時間一包宛、最後ノ一包ヲ發作前三―四時間前ニ終ル様ニス。カ、ル法ヲ一週間持續セル後三日間休息ミ、次ニ三日間持續セル後四日間休息ミ、再ビ三日間持續ケテ五日間休息ミ、又三日間服藥後一週間休息ミ、最後ニ三日間持續ケテ終リトナス。

(ロ)コツホ Koch氏法、毎日一回發作前四―五時間ニ鹽酸「キニーネ」一〇頓服。之ヲ七日間連用シタル後三日間休息シ、更ニ二日間投藥シテ四日間休息、又二日間投藥シテ五日間休息ト云フヤウニ二日間ノ投藥ニ次グ休藥日數ヲ一日宛増加シツ、持長ニケ月間ニ及ブ。

(ハ)臺灣法、鹽酸「キニーネ」〇・八、右一日量、發作前二時間毎ニ四回ニ分服。八日間連用後三日間休息、以後ハ連用日數ヲ二日間トシ、休藥日數ヲ漸次永クシテ、一ケ月間連用。

(ニ)發作前五時間ニ一〇頓服三―四日間連續、以後ハ〇・五宛頓服二―三週間ニ及ブ法モアリ。

(ロ)大量頓服法ハ副作用多キニ反シ(イ)(ハ)ハ之レ少シ。

(ホ)ギムザ、Giensa氏注射法、昏厥又ハ嘔吐アリテ内服シ得ザル者ニ用フ。鹽酸「キニーネ」10.0、「アミール・ウレタン」5.0、溜水一八〇。右減菌シテ一.5cc宛毎日二回腎筋内注射七日間。

(ハ)補還、鹽酸「キニーネ」ハ劇甚ナル苦味ヲ有スル故、散劑トシテ與フル時ニハ「オブラート」ニ包ミテ與フ。

△小兒ニハ通常年齢一歳ニツキ〇・二ノ割合ヲ一日量トナス。

△「キニーネ」ハ水劑トシテ内服スルモ可。

△「キニーネ」ハ坐藥トシテモ用キ得。

△「キニーネ」ハ瀉腸シテモ効果アリ。

△「キニーネ」中毒症狀、頭痛、眩暈、耳鳴、重聽、精神朦朧、發疹、腎炎、黒水熱、甚シキハ譫語、痙攣、延髓麻痺。

二、「サルバルサン」「キニーネ」効ナキ時ニ用フ、三日熱ハ大抵一回ノ注射ニテ治シ、四日熱及悪性「マラリア」ニモ「キニーネ」ト併用セバ、「キニーネ」ノミ用フルヨリハ宜シ。

三、其他試用スベキモノ。

(イ)「メチレン」青 〇・三入り膠嚢ヲ一日五回一個宛内服。

(ロ)「フェナセチン」「アンチピリン」等 著効ナシ。

慢性「マラリア」及「マラリア」惡液質

一、「キニーネ」ノ外、鐵劑、亞砒酸劑 等強壯劑(用法貧血ノ條参照)ノ内服及滋養物ノ攝取。

二、温浴、水治療法。



- 三、大ナル脾臟部ニ通電、貼膏、注射(沃度)——餘リ行ハレズ。
- 四、脾臟摘出ヲ稱用スルモノアリ。
- 豫防法「キニーネ」ノ間歇的内服法ヲ行フ。  
 毎十日間ノ中第一、第二ノ二日間丈、鹽酸「キニーネ」0.5、又ハ「オイヒニン」1.0宛ヲ一日一回頓服、  
 (又ハ二回ニ分服)。

### 流行性感胃 Influenza, Grippe.

特效藥ナシ、主トシテ對症療法ヲ行フ。

#### 一、解熱(又發汗)劑

- (イ)鹽酸「キニーネ」 一時特ニ實用セラレシモ特效ハナキガ如シ、一日量0.5—1.0。
  - (ロ)「フェナセチン」 一日量1.0—1.5。
  - (ハ)「アスピリン」 一日量1.5—2.0。
  - (ニ)「アンチピリン」 一日量1.5—2.0。其他。
- 此等ハ一品ヲ用フルヨリモ減量シテ二品以上伍用スル方効力大ナリ。  
 (ホ)「バグノン」(鹽酸「キニーネ」ト「カフェイン」ヨリナル注射藥)  
 成ルベク早期ニ一日二日間5.0宛一日一二回皮下又ハ筋肉内ニ注射シ、ソノ後ハ2.0宛一日一二回同様注射ス。

(イ)「オプトヒン」、「レミジン」 効果アルコトアリ、一日五回0.3宛、三—四日間内服。

### 二、呼吸器型

#### 一、氣管支炎

- (イ)胸部温濕布ヲ施ス、三時間毎ニ交換。
- (ロ)吸入療法 2%重曹水又ハ2%硼酸水。
- (ハ)祛痰劑 「セネガ」劑、「アンモニア」劑、「プロチン」、吐根劑等。
- (ニ)鎮咳劑 「コデイン」、「デオニン」、ドーフル散等。
- (ホ)扁桃腺炎、咽頭炎アラバ、含嗽、藥液塗布、頸部冷罨法、等ヲ行フ。

#### 二、肺炎

- (イ)氣管支炎ノ場合ニ掲ゲシ事項ノ外。
- (ロ)芥子泥罨法 攝氏四十度ノ湯100.0ニ芥子50.0ヲ入レ、泥狀ニ攪キマゼ、約十五分間香ヲ立タセシ後、布ヲ浸シ、絞リテ胸部ニ纏シ、10—30分後皮膚發赤スルヤ之ヲ除去シ、微温湯ニテ清拭シタル後、普通ノ温濕布ニ代ユ。
- (ハ)強心劑 少シク早目ニ與ヘ心臓衰弱ヲ防グ。  
 豫防ニハ「チギタリス」ヲ良シトシ、既ニ衰弱起ラバ「カフェイン」、「カムフル」、「アドレナリン」等ヲ良シトス。
- (ニ)酸素吸入 「チアノーゼ」來レル時ニ行ヒ、又「チアノーゼ」ヲ目標トシテソノ用量ヲ定ム。(方法—格)

流行性感胃



急性傳染病治療法

魯布性肺炎ノ條參照。

(ホ) 咯血、肺結核ノ咯血ト同一ノ治療法ヲ施ス、(同條參照)。

(ヘ) 高張葡萄糖液ノ靜脈内注射、ヲナスコトアリ、10%液 100.0cc 宛一日二回。

(ト) 「エレクトラルゴール」注射、隔日位ニ 50.0—100.0 (時ニハ 30.0) cc 宛、筋肉内又ハ皮下ニ注射ス、靜脈内ニ用フル時ニハ、毎日 50.0cc 宛極メテ徐々ニ注射スベシ、危險ヲ伴フ事アリ。(尙敗血症ノ條參照)。

(チ) 蛋白療法、一時盛ニ喧傳セラレタリ。

(イ) 血清 (健馬血清、「ヂフテリア」血清、等) 30.0cc 宛一日一—二回、隔日位ニ二—三日間、筋肉内ニ注射ス。注射期間餘リ永クナレバ血清病ヲ起ス虞アリ。

(ロ) 「カゼオザン」 0.5—1.0 位ヨリ初メ、増量シツ、一—四日ニ一回注射ス、但シ靜脈内ニテハ一回 1.0 迄、筋肉内ニテハ一回 2.0—3.0 位迄増量スルコトヲ得。

(リ) 氣管支膿漏ヲ殘ス時ハ下熱後暫ク待チテ石炭酸ノ吸入、「テレピン」油、「ミルトール」ノ内服等ヲ行フ。(肺壞疽ノ條參照)。

三、神經型

一、腦症狀アラバ (イ) 頭部へ氷嚢、項部へ芥子紙又ハ吸角等ノ貼付、(ロ) 「プロム」劑。

二、神經痛、神經炎、殘ラバ——夫々ソノ治療ヲ講ズ。

四、消化器型

(イ) 腹部ノ温罨法。

(ロ) 食餌ノ注意——流動食。

(ハ) 嘔吐、下痢、疝痛等ニ對シ夫々對症療法ヲ行フ。

處方例

一、鹽酸キニーネ	0.5	一、セネガ根浸(四・〇)	100.0
フェナセチン	0.8	杏仁 水	3.0
乳 糖	1.0	磷酸コデイン	0.5
右爲一日量三回分服。		アムモニア茴香精	2.0
一、アスピリン	1.0	苦味丁 幾	1.0
フェナセチン	0.5	橙皮舍利別	1.0
右一日量三回分服。		(氣管支炎)	8.0

麻疹 Morbilli, Masern

看護法

一、空氣 常ニ呼吸器症ヲ併發スル故、室内ヲ温暖濕潤ナラシムルコト緊要ナリ。

二、安靜 二—三週間安靜臥床、解熱後一週間ニシテ離床、更ニ一週間ニシテ外出ヲ許ス。

三、食餌 初メ流動食、解熱後粥ヲ與フ。

四、入浴 落屑初ラバ入浴セシメテ之ヲ促進ス。

對症的療法

一、熱、特別治療セズ。

麻疹



- 二、結膜炎、三%硼酸水又ハ〇.五%鉛糖水ノ用法。
- 三、鼻炎、「ラノリン」又ハ一%白降汞軟膏塗布。
- 四、口腔衛生、最モ緊要ナリ。
- (イ)年長兒、二%硼酸水ノ含嗽。
- (ロ)幼兒、二%硼酸水ノ吸入、又ハ二%過酸化水素水ノ噴霧。
- 五、氣管枝炎、(イ)胸部ノ温湿法及吸入療法。
- (ロ)咳嗽強劇ナラバ、燐酸「コデイン」ノ内服。
- 六、心臓衰弱、速ニ「デギタリス」劑、「カフェイン」等ヲ投與ス。
- 七、其他夫々對症の療法ヲ講ズ。特ニ「ヂフテリア」ニ罹リ易キガ、既ニ發症セル場合ニハ直チニ三—四千單位以上ノ抗毒素血清ヲ注射シ、必要ニ應ジテハ二十四時間後ニ更ニ反覆注射ス。「ヂフテリア」ノ條參照。

風疹 Rubella, Röteln

隔離及藥劑療法ノ必要ナシ。

百日咳

Tussis convulsiva, Pertussis, Keuchhusten

食餌衛生法

- 一、食餌 滋養ニ富メル固形食ヲ與フ、但刺戟性ノモノヲ避ケ。
- 二、空氣 乾燥ヲ避ケ、湿度ノ劇變ヲ防グ。
- 三、運動 第二期ニ於テハ合併症ナキモノハ野外ニテ運動セシムル方可ナリ。

藥劑療法

一、「ワケチン」療法(「コイヒチン」) 早期ニ用フル程有効ナリ。

年齢	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
一年未満	0.1瓦	0.1瓦	0.2	0.3	0.4
一—二年	0.15	0.1	0.3	0.4	0.5
二—三年	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
三—五年	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
五—七年	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
七年以上	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0

注射ノ間隔ハ三—五日トシ、尙症狀ニヨリ注射ヲ繼續スル要アル時ハ第五回ノ用量ヲ反覆ス。

禁忌——心臓疾患、腎臓炎、胸腺淋巴質。

反應——注射後多少ノ發熱、頭痛等ヲ來スコトアリ。

二、「キニーネ」劑 賞用セラル。

(イ)「オイヒニン」「キニーネ」ハ苦味ナル故、主ニ「オイヒニン」ヲ代用シテ賞用ス。

風疹、百日咳



一日量——一歳未満0.1—0.25、二歳0.3、三—四歳0.5、五歳0.6、八歳0.8。  
(大人一日量1—2.5)

(ロ)「アリストピン」(「エチール」炭酸「キニーネ」) 用量——「オイヒニン」ニ同ジ。

(ハ)「キナフェニン」(「キニーネ」ト「フェネチジン」ノ化合物) 同量略同前。

(ニ)「單寧酸」「キニーネ」 同量略同前。

(ホ)「キノオナール」(「キニーネ」二分、「ヴェロナール」一分ヨリ成ル)。

一日量哺乳兒0.1—0.25、二—五歳0.3、六—十二歳0.6。

三、「アンチピリン」劑 有効ナルコト少ナカラズ。

(イ)「アンチピリン」 一日量——哺乳兒0.1—0.2、二—五歳0.2—0.6、六—十二歳0.6—1.2

(ロ)「オイラチン」(「アミド・プロウム」安息香酸「アンチピリン」)

一日量——哺乳兒0.3—0.7、成長兒(六歳以上)1—1.5—2.0。

(ハ)「ツツソール」(「扁桃酸」アンチピリン) 鎮咳ノ効モアリ。

一日量——小兒ノ月數ノ二倍適、又ハ年數ノ二倍幼ヲ水劑トシテ與フ。

「フェナセチン」モ用フルコトアリ。

四、痙攣性咳嗽ニ對シ 鎮靜劑ヲ用フ。

(イ)「實岩越幾斯」 特ニ實用セラル。

哺乳兒 一日量 0.001—0.005。 成長兒 一日量 0.01—0.05。

(ロ)「プロモフェルム」 乳兒ニ實用ス。

一年以下ハ一滴宛一日三回、一年以上ハ年數ニ應ジ一回一滴宛ヲ加フ。

(ハ)「臭素」カリウム及臭素「ナトリウム」。

一日量——哺乳兒0.3—0.4、二—五歳0.4—0.8、八歳1.0。

(ニ)「ベルツシン」(加糖「チミアン」越幾斯) 効果ハ確實ナラズ。

二—五歳 一日數回半—一茶匙宛、六—十二歳各一回—小兒匙宛。(水劑)

(ホ)「アンチスパスミン」(阿片「アルカロイド」ノ一ナル「ナルセイン」ノ誘導體)。

5%液ヲ製シ、哺乳兒ニハ一回三—八滴、二—五歳兒ニハ一回一〇—一五滴、

六—十二歳兒ニハ一回二五—三〇滴宛、一日三回與フ。

(ヘ)其他硫酸「アトロピン」、抱水「クロラール」、頑固ノ時ニハ「コデイン」、又ハ「ヂオニン」ヲ用フ。

五、「エーテル」注射療法、近時實用スル人アリ。但シ時ニ壞疽ヲ起スコトアリト。

隔日ニ一回1.0g、2.0g、2.0g、ト三回合計5.0gヲ筋肉内ニ注射ス。

六、其他ノ治療劑。

(イ)「マロセリン」錠 (ロ)「メソノール」(一日三回0.2宛)

(ハ)「テコイファン」Tekuchun (1.0g中ニ「キニーネ」0.01g、「コデイン」0.01g、及ビ「カフェイン」0.01gヲ含ム無色ノ液ナリ)。



急性傳染病治療法

一五四

三ヶ月兒 0.4、六ヶ月兒 0.6、一歳兒 0.8、三歳兒 1.0、五歳兒 1.2cc。  
右一回量、筋肉内又ハ皮下注射。

七、吸入療法、モ行フ。

(イ) 0.5% 石炭酸水、

(ロ) 0.2% 硝酸銀水、

(ハ) 1% 重曹食鹽水ニ一回一二滴ノ千倍鹽化「アドレナリン」ヲ滴加セルモノ。

(ニ) 1% 臭素「ナトリウム」食鹽水。

(ホ) ①「クロロフォルム」30.0、「エーテル」60.0、精製「テレピン」油 10.0°

右重症者ニ一二茶匙、布ニソ、ギテ嗅入セシム。

八、加答兒期、ニハ祛痰劑及「アルカリ」性鹽泉(粘液溶解ノ目的)ヲ與フ。

虎列刺 Cholera asiatica, Cholera indica

看護

一、食餌、流動食ヲ與ヘ、湯ニハ氷片又ハ鹽糖「リモナーデ」ヲ與フ。

二、腹部ノ保温、(灰爐、蒭蕪等)。

三、皮膚冷厥ニハ(イ)湯婆。

(ロ) 温浴特ニ芥子浴、〔方法〕— 芥子粉 20.0ヲ布袋ニ入レ、之ヲ温浴槽中ニ吊シテ揉ミ出シ、入浴、皮膚紅潮スルニ至ラベ、浴ヲ出デ布片ニテ乾拭、後温包ス。

四、膀胱筋痙攣アラバ、(イ)脚湯、(ロ)「マッサージ」ヲ試ミ、(ハ)「モルヒネ」ノ注射ヲ行フ。

藥劑療法

一、血清注射、初期ノモノニ、40.0cc以上ヲ皮下ニ注射ス、必要アラバ尙反覆シテ注射ス。

△但効果ハ疑ハシ。

二、下痢ニハ

(イ) 阿片、普通初ヨリ用フ。(最初ニ先ツ甘朮ヲ用フル人アリ)。

(ロ) カンタニー Cantani 氏灌腸法。

① 「タンニン」酸 5.0—10.0、「アラビアゴム」末 50.0

阿片丁 幾ニテモ。

水 100.0。

右攝氏 37—40 度ニ暖メ、1—200.0ヲ一回量トナシ、一日數回徐々ニ灌腸ス。

三、嘔吐ニハ (イ) 芥子泥ヲ心窩部ニ貼付。

(ロ) 「ブランデー」、熱キ赤酒、濃茶等ノ内服。

(ハ) 鹽酸「モルヒネ」、「パントポン」ノ注射。其他嘔吐ノ條參照。

△嘔吐頑固ナル場合ニハ氷片以外何物ヲモ攝取セシメズ。

四、體液缺乏ニハ

(イ) 食鹽注射。皮下、特ニ靜脈内ニ 500.0—700.0cc 宛反覆注入。

(ロ) 生理的食鹽水中ニ 3%ノ割合ニ葡萄糖ヲ混ズレバ更ニ可ナリ。

五、心臟衰弱、強心劑ヲ盛ニ投與ス。

虎列刺

一五五



- 六、コレラ(腎(ネフロゼ)) 療法「ネフロゼ」ノ條參照。
- 七、後胎症、及合併症 夫々對症のニ治療法ヲ講ズ。

處方例

一、阿片丁幾	二〇・〇	淨 水	五〇・〇
エーテル性纈草丁幾	一〇・〇	右一日量數回分服。	
芳香丁幾	一〇・〇	一、重炭酸ナトリウム	五・〇
薄荷油	一・〇	阿片丁幾	一・五
右每半時一五〇滴宛(ハウク氏)		番木鱈丁幾	一・五
一、阿片越幾斯	〇・五	薄荷水	一八〇・〇
次硝酸蒼鉛	三・〇	白糖	一〇・〇
タンナルビン	二・〇	右每半時一食匙宛(振盪)	
薄荷油	一滴	△嘔吐ニ	
右一日量三回分服。		鹽酸モルヒネ	〇・五
一、△心臓衰弱アル時		芳香阿片丁幾	二〇滴
樟 腦	〇・七	杏仁水	一〇・〇
阿片丁幾	一・五	淨 水	一〇〇・〇
醋酸エーテル	八・〇	右一日量數回分服。	

黄疸出血性スピロヘータ病 (ワイル氏病)

*Spirochaetosis icterohämorrhagica, Morbus Weilii*

看 護

一、安靜、臥床。

二、食餌、脂肪性食物、刺戟性食物ヲ禁ジ、蛋白質ヲ制限シ、腎炎起ラバ食鹽、「エキス」質等ヲ禁ズ。

食物ハ半流動食トナス。

三、飲料、ハ充分ニ與フ。

藥 劑 療 法

一、免疫血清療法、發病後五日間迄ハヨク奏効ス。

一回 50.0cc 靜脈内注射、但シ初メ 1.0cc 皮下ニ注射シテ反應ヲ見タル後、數時間後殘余ヲ靜脈内ニ注射スルヲ安全トス。

△豫防——5.0cc 皮下ニ注射シ置ケバ二週間豫防ノ効アリ。

二、心臓衰弱(第二週ニ來ル)ヲ防グコト最モ緊要ナリ。

第二週ニ至ラバ最初ヨリ「ヂギタリス」ヲ與ヘ置クカ、又ハ少シク心臓衰弱ノ兆ヲ現ハスヤ否ヤ、直チニ之ヲ與フベシ。心臓衰弱既ニ起リシ後ノ強心劑トシテハ(イ)「コフエイン」劑ヲ最良シトス、三時間毎ニ又ハ一日三回安息香酸「ナトリウム・コフエイン」0.2宛、

黄疸出血性スピロヘータ病



即チ一〇%液一〇cc宛ヲ皮下ニ注射ス。(但シ膿瘍ヲ生ジ易キ故注意スベシ)。

(ロ)「チギタリス」劑 内服又ハ注射ノ形ニテ投與ス。

(ハ)生理的食鹽水又ハリソゲル氏液 ノ皮下注射又ハ點滴注腸(一分間一〇—二〇滴)モ好ンデ行フ。尿量ヲ増シ、毒素ヲ排泄シ、黃疸ヲ減ズルニ効アリ。

三、腎炎及蛋白尿 腎炎ノ療法ヲ施ス(同條參照)。

無尿 ニハリソゲル氏液ノ靜脈内注射ヲ試ム。其他無尿症ノ條參照。

四、胸内苦悶 「コフェイン」又ハ「カムフル」ノ注射ト共ニ「パントボン」ノ皮下注射ヲ行フ。

五、不安 ニハ「パントボン」又ハ催眠劑(「ヴェロナール」、「アダリン」、「プロムラール」等)ヲ投與ス。

狂躁 ニハ「パントボン」スコポラミン」〇.5cc皮下注射。

七、「ウロデキシソ」(長 氏製劑)「ウロトロピン」グリコロゼ」沃度「カルチウム」ト云フ新劑アリ。

二〇cc宛日々又ハ隔日靜脈内ニ注射ス。第二期(第二病週)ニハ、同量ヲ〇.6%食鹽水一〇〇ccニ溶解シテ、靜脈内ニ注射スルヲ良シト稱ス。

八、筋痛 (イ)温濕布、芥子泥貼布。

(ロ)塗布「カムフル」丁幾、5%「クロロフォルム・オリーブ」油、實岩軟膏等。

九、瘰癧 加答兒性黃疸ノ條參照。

### 發疹チフス Typhus

exanthematicus, Flecktyphus

期待の療法 ヲ行フノミ。

一、食餌 流動食、充分ノ飲料(飲メル文)ヲ與フ。

二、發熱 (イ)頭部ニ氷嚢貼付。 (ロ)口渴ニハ水片ヲ與ヘ、又含嗽セシム。

(ハ)解熱劑「キニーネ」、「アンチピリン」等ハ老人、酒客、心臟病等ニテ高熱ニ堪エザル者ノミニ用フ。

三、興奮状態 ニハ催眠劑(「ヴェロナール」等)、「モルヒネ」、「パントボン」等ヲ注意シテ用フ。

四、心臟衰弱、血管麻痺 ニハ強心劑、血管劑(「ストリキニーネ」)ヲ投與ス。

五、氣管支肺炎 時々臥位ヲ變ジテ之ヲ豫防スベシ、既ニ起ラバソノ治療ヲ講ズ。

其他試ムベキ療法。

一、自家血清療法 熱ノ極期ニ採血シ、ソレヲ數日間續ケテ5.0—10.0cc宛、靜脈内ニ注射ス(「Ristler」)。

二、生理的食鹽水靜脈内注射療法 日々50.0cc宛二—八日間連續之ヲ行フ。

### 丹毒 Erysipelas, Rothlauf, Rose

局處療法

發疹チフス 丹毒



急性傳染病治療法

甲、皮膚丹毒

- 一、塗布 (イ)「イヒチオール」、又ハ五〇%「イヒチオール・アルコホル」、  
二〇—五〇%「イヒチオール・ワゼリン」、五〇%「イヒチオール・ワゾゲン」等。  
(ロ)一〇%「チオノール・コロヂウム」。  
(ハ)五%石炭酸「ワゼリン」。  
(ニ)「アンチフロギスチン」(〇.二%沃度加里「ラノリン」)(黑色ナラザルヲ可トス)ノ貼布。  
二、冷濕布 (イ)二千倍昇汞水。 (ロ)飽和硫酸「マグネシウム」液。  
(ハ)「ブーロー」氏液。 (ニ)六%醋酸鞣土水。  
△冷濕布ノ上ニハ氷嚢ヲ貼スルヲ可トス。  
三、肝創膏ヲ局處ノ周圍ニ貼布スルコトニヨリ、病症ノ進行ヲ止メ得ルコトアリ。  
四、石炭酸注射療法 局處ノ中心部ニハ稀釋「イヒチオール」及濃厚沃度丁幾數滴ヲ塗布シテ冷濕布ヲ施シ、  
周邊部ニハ五〇%「イヒチオール・コロヂウム」ヲ塗布シ、局處ノ外周部ニハ一—二%石炭酸ヲ皮下ニ注射  
シテ進行ヲ阻止ス。  
五、熱氣療法。  
六、體血療法 (ピール Bier 氏)。  
七、瘡、痒ニハ軟膏塗布及氷嚢ノ貼付効アリ。

乙、粘膜丹毒

- 一、塗布 四%「イヒチオール」、沃度丁幾、二%「ヨチオン・グリセリン」。  
二、含嗽 三%「オキシフル」、二%「クロール」酸加里液。  
全身的療法  
一、連鎖球菌血清(多價) 四〇.〇cc宛ヲ皮下注射 二—三回、全量一六〇.〇ccニ及ブモ効果ナキ時ハ、  
二、「ワクチン」療法、ヲ試ム、丹毒治療液(丹毒患者ヨリ得タル多數ノ連鎖球菌株ノ混合「ワクチン」  
一〇—一五cc宛ヲ毎日又ハ隔日ナルベク患部ノ近クノ皮下ニ注射ス。  
三、鹽化「カルチウム」液ノ靜脈内注射 三—五%液ヲ日々二〇—三〇.〇cc宛。  
四、「エレクトラルゴール」 毎日又ハ隔日一回五〇—一〇〇.〇cc宛皮下、筋肉内又ハ極メテ注意シテ靜脈内注  
射、(靜脈内注射最モ効果アルモ危険ナキニ非ザレバ、一〇.〇ccノ注射ニ一分間位ヲ要スル程度ニ徐々ニ、  
反應ヲ觀察シツ、注射シ、且一回量ヲ五〇.〇ccニ止ムルヲ良シトス。皮下及筋肉内ハ危険ナケレバ必ずシモ  
一〇.〇ccト限ラズ、必要アラバモ少シ多量ニ用フルコトヲ得)。  
「コラルゴール」一—二%液、五〇—一〇〇.〇cc、皮下、筋肉内又ハ靜脈内注射。  
邪製膠樣銀(銀「エレクトロイド」)、「アルゴ・エレクトロゾール」ハ靜脈内ニハ用キザルヲ良シトス。  
五、「カゼオザン」療法 行フコトアリ、用法敗血症ノ條參照。  
六、腎、炎ニ注意シ、起リ次第ソノ治療ヲ講ズ(急性絲絨體腎炎)。



- 七、心臓衰弱、發熱、頭痛等ハ對症的ニ治療ス。
- 八、靜臥、流動食餌、充分量ノ飲料供給、等ニ注意スベシ。

### 破傷風 Tetanus, Starrkrampf

看護法

- (イ) 靜ナル暗キ室ニ靜臥セシメ、光、音響等凡テノ刺激ヲ少クスルコト。
- (ロ) 食餌 流動食ヲ少量宛分與ス、但嚥下肺炎ヲ起サズル様注意スベシ、食物ヲ攝取シ得ザル時ニハ、滋養瀉腸又ハ「オレーフ」油ノ皮下注射ヲ行フ、瀉腸ニヨリ痙攣ヲ起ス時ハ豫メ「モルヒネ」ノ注射ヲ行フ。

(ハ) 尿ハ一日二回、ネラトソン氏「カテーテル」ニテ排尿スベシ、(消毒ニ注意スルコト)。

(ニ) 糞便ハ、二三日ニ一回、瀉腸ニ依リ排出セシム。(便秘ノ條參照)。

血清(抗毒素)療法 成ルベク早期ニ大量ノ抗毒素ヲ注射ス。

(イ) 注射部位ハ、筋肉内、皮下(傷口ノ近ク)、靜脈内、又ハ脊椎腔内トナスガ、就中脊椎腔内ヲ最モ宜シトス、然ラザレバ普通皮下ニ注射ス。

(ロ) 腰椎腔内注射量、ハ一回約100單位(約10.0cc)トシ、初メハ一日一回施行ス、但一回量大人ニ50.0cc以上ニ亘ラザル様ニスベク、又注射前約同量又ハソレヨリ少シク多量ノ脊髄液ヲ洩スベシ。

(ハ) 皮下注射量、ハ先ヅ一回ニ50單位宛ニ三時間ヲ隔テ、數回注射シ、400(8單位ニ及ブ、ソノ後尙症狀

去ラスバ一日二回位ノ割合ニテ反覆注射ス、少キニ失センヨリハ多キニ失スルヲ可トシ、又本法ハ腰椎腔内注射ト並べ行フモ可ナリ。

注射ニ際シテハ過敏反應ヲ避クルタメ、毎回先ヅ一〇ccヲ皮下ニ注射シ、後一時間ニシテ殘部ヲ注射スルヲ安全トス、特ニ前回注射トノ間ニ間隔大ナル時ニ於テ然リトス。

△初生兒破傷風、ニテハ一回量5.0ccヲ越ユベカラズ。

(ニ) 乾燥血清、ヲ用フル時ニハ、是レヲ生理的食鹽水、又ハソレニ〇.5%ノ割ニ石炭酸ヲ加ヘタル液ニ溶シ用フ、但シ完全溶解ニハ十數時間ヲ要ス。

△傳研發實血清、一號100單位、二號50單位、乾燥血清100單位。

(ホ) 豫防、ニハ二〇—五單位宛ヲ四日ノ間隔ヲ以テ二回注射。

局處療法 創口ヲ切開シ、異物ヲ除去シ、酸化劑即三%過酸化水素水(即「オキシフル」)又ハ五百倍過「マンガ」ン「酸加里液」ニテ洗滌シ、血清ノ滲法又ハ乾燥血清ノ撒布ヲ行フ。

痙攣ニ對スル對症的處置

一、硫酸「マグネシウム」ノ注射、甚有効ナリ。

(イ) 腰椎腔内注射、50%液、5.0—10.0cc。

△但本注射ハ背筋強直ノタメ、屢甚困難ナルコトアリ、且ツ皮下注射ニテモ目的ヲ達シ得ル故、普通皮下注射ヲ行フ。

破傷風



(ロ)皮下注射 10.0ㄐ宛一日二〜四回。

△硫苦ノ作用ハ運動神經末梢ノ麻痺ニアルコト「クローレル」ノ如シ、皮下ニ注射スル時ハ危険少キモ、筋肉内又ハ靜脈内ニ注射スル時ニハ、呼吸筋ノ麻痺(ソノ他血壓降下、知覺麻痺)ヲモ起ス危険アリ、腰椎腔内注射ノ時モ皮下注射ニ比シ危険大ナリ。

△但シ硫苦注射後呼吸困難ヲ來サバ、直チニ拮抗劑鹽化「カルチウム」ヲ注射スレバ即時ニ危険ヲ免ル、急グ時ハ二%液ヲ筋肉内ニ注射スベシ、濃厚液ハ必ズ靜脈内ニ用フベク、皮下ニ用フレバ瘰癧ヲ起スベシ。

△硫苦ノ極量ハ體重一ㄐニツキ一回0.2ㄐセラレ。

二、「グリセリン」燐酸「マグネシウム」モ有効アリ。

三五%液 10.0ㄐ宛一日六〜八回迄、靜脈内注射、腰椎腔内注射ニハ二五%液 5.0ㄐヲ用フ。

三、抱水「コロラール」ノ注腸 モ行フベシ。

四、抱水「コロラール」3.0、「アラビアゴム」漿、水 各 5.0。

右一回注腸料、一日二〜四回。

四、「バントボン・スコボラミン」0.5〜0.8ㄐ皮下注射。

鹽酸「モルヒネ」一回0.01、皮下注射。但コノ二者ノ中前者ノ方有効ナリ。

△此等ハ抱水「コロラール」ニテ發作止マザル時ニ用フ。

五、「テトロドトキシシン」一回量1.0ㄐ、是レモ奏効スルコトアリ。

六、臭素加里、「ヴェロナール」、「ルミナール」、等ノ内服、注腸モ試ムベシ。

七、「サリチール」酸(毎時0.5宛内服)、「アスピリン」(一日數回1.0宛)等モ試ミラル。

### ペスト Pestis, Pest

特效療法ナシ。

一、心臓力ヲ保ツコト最緊要ナリ。最初ヨリ強心劑「ヂギタリス」、「ストロファンチン」等ヲ充分ニ使用ス。

二、免疫血清 極初期ニハ効果アルモ、但シ多量ノ注射ヲ要ス。

一回 50.0〜100.0ㄐ宛數回、全量 100.0〜300.0ㄐヲ要ス。

三、外科的手術 膿疱、癰、腺腫等ヲ周圍組織ト共ニ充分ニ除去ス。

四、甘汞 初期ニ用フルコトアリ、用量0.3〜0.5。(カントリイ Canthi 氏)。

五、其他對症的。

(イ)發熱 ニハ「キニーネ」、「アンチピリン」等。

(ロ)肺炎 ニハ祛痰劑、胸部電法等。

(ハ)不安狂躁 (イ)「バントボン・スコボラミン」0.5ㄐ皮下注射。

(ロ)抱水「コロラール」2.0注腸。

六、豫防 (イ)「ワクチン」注射 少クトモ腺「ベスト」ヲ豫防シ得。

ペスト



(ロ) 免疫血清注射(100—200cc) 有効期間二週間、此レハ既ニ潜伏期ニアル疑アヘ時ニ行ヒ、血清注射後續イテ「ワクチン」注射ヲ行フ。

流行性耳下腺炎 Parotitis epidemica, Mumps

殆ド治療ヲ要セズ。

- 一、局處ニ「オレーフ」油、「ラノリン」等ヲ塗布シテ緊張ヲ減ズ。
- 二、炎症強キ時 (イ) 水糞法。 (ロ) 水蛭貼付(貼付法—腸「チフス」ノ條參照)
- 三、瘰癧丸炎 (イ) 瘰癧丸ノ高擧。 (ロ) 炎症強キ時ハ水糞貼付。

再 歸 熱 Febris recurrens, Rückfallsieber

「サルヰルサン」注射 著効アリ、0.2—0.5ニテ既ニ全治スト云フ。

鼠 咬 病 Rattenbisskrankheit

- (イ) 「サルヰルサン」注射 最モ有効ナリ。
- (ロ) 水銀軟膏ノ塗布 沃度劑ノ内服等モ試ミテ可ナリ。

狂 犬 病 Lyssa, Wuthkrankheit

豫 防 法

一、咬傷部ノ處置

- (イ) 直チニ千倍昇水ニテ咬傷部ヲ洗滌シ。
- (ロ) 10%苛性加里、發煙硝酸、鹽化亞鉛等ニテ腐蝕シ。
- (ハ) 又ハ咬傷部ヲバクレン氏燒灼器ニテ燒灼シ、或ハ廣ク截除ス。

二、パスツール Pasteur 氏豫防注射法。

狂犬病豫防劑ノ製法 狂犬病固定毒ヲ兔ノ腦膜下ニ注射シテ發病セルモノノ脊髓ヲ採リ、一日乃至三日間乾燥シテ(乾燥スル程毒力減退ス)三種ノ苗トナシ、各0.5ml宛ニ截切シ、「グリセリン」中ニ貯藏セルモノナリ、但シ一ヶ月以上古キモノハ無効トス。

用法及用量 苗一個ヨリ約2.0ccノ乳劑ヲソノ都度調製シ、ソノ全量ヲ一回ノ皮下注射量トナス、但シ十歳以下ノ小兒ニハ半量ヲ用フ。

乳劑製法 滅菌「ビンセット」ヲ以テ乾燥苗一個ヲ「グリセリン」中ヨリ取出シ、乳鉢ニ入れ、乳棒ニテ潰磨シ、徐々ニ生理的食鹽水ヲ滴加シツ、無菌的ニ全量ヲ2.0ccトナス。

注射方式 他ノ疾病ニテ高熱等ナキ限り毎日左ノ方式ニテ十八日間注射ヲ行フ。  
流行性耳下腺炎 再歸熱 鼠咬病 狂犬病



注射日	第一日	第二日	第三日	第四日	第五日	第六日	第七日	第八日	第九日	第十日	第十一日	第十二日	第十三日	第十四日	第十五日	第十六日	第十七日	第十八日	第十九日	第二十日
乾燥苗	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

△備考——(イ)注射ノ効力ハ注射完了後約一週ニシテ完全ス。  
(ロ)狂犬病ノ潜伏期ハ十四日乃至半年ナリ。

發病後ノ療法

對症的療法アルハ、

- (イ)「クロロフォルム」麻醉、最も鎮靜ニ効アリ。
- (ロ)「モルヒネ」、抱水「クロラル」ノ注射、注腸。
- (ハ)「クラール」(0.001—0.005皮下注射)。

急性關節ロイマチス Acuter Gelenkrheumatismus  
Polyarthritidis rheumatica acuta,

看・護

- 一、絶對安靜。
- 二、食餌ハ流動食ニシテ滋養ニ富メルモノヲ與フ。
- 三、發汗甚シキ時ハ、亞鉛華「タルタム」(等分)ヲ撒布シ、又「タオル」製下着ヲ着セシム。

四、局處關節部ノ處置。

- (イ)離被架ヲ置キテ布圍ノ荷重ヲ防グコト。
- (ロ)電法(氷又ハ温)電法液ハ一%鉛糖水、三%醋酸礬土液等ニ可ナリ。
- (ハ)「オレーフ」油ヲ塗布シ、ソノ上ニ「グッタベルカ」、更ニソノ上ヲ「フランネル」ニテ包ム。
- (ニ)又ハ「ワゼリン」或ハ軟膏ヲ塗布シ、ソノ上ヲ綿ニテ包ム、等。

藥劑療法

一、内服劑

- (イ)「サリチール酸」「ナトリウム」ハ特效藥ナリ、第一ニ試用ス、大量ヲ用フ、胃ヲ害スル故必ズ重曹ト伍シ、水劑トナス。(病症改善後、次第ニ減量ス)  
一日量五〇—九〇 一日數回ニ又ハ一時間毎ニ分服。
- (ロ)「アスピリン」「サリチール酸」重曹達副作用強クシテ用キ得ザル時ニ代用スル第一ノ内服劑。  
一日量三〇—六〇 數回ニ分服、(初メハ六〇、後漸減ス)。
- (ハ)「アンチピリン」(イ)(ロ)何レモ副作用ノタメ用キ得ザル時、又ハ病症永ビク時ニ交替的ニ使用ス。  
一日量一〇—二〇。
- (ニ)「サリチール酸」〇.五宛膠囊ニ入レ、每一時一膠囊、一日二—五膠囊。又振盪合劑トシテ與フルモ可ナリ。
- (ホ)「ザロール」腸ニ至リテ分解シ、副作用少シ、撒曹ニテ稍輕快セルモノニ代用ス。

急性關節ロイマチス



一日量 四〇—八〇。

(ハ)「ザロフェーン」 腸ニテ分解、「ザロール」ヨリモ一層緩和ナリ、亞急性ニナリシモノニ用フ。一日量 三〇—五〇。

(ト)「デプロザール」 腸ニテ分解、胃障碍少ク、解熱時間モ長シ。一日量 二〇—四〇—五〇。

(チ)「アンチフェブリン」 副作用多ク、血管障碍即チ「チアノーゼ」等來ルコトアリ。

(リ)「フェナセチン」 副作用少シ、一日量 一・五—三〇。

(ヌ)「アトファン」 重曹ト共ニ用フ、一日量 三〇—五〇。

(ル)「メルブリン」 「アンチピリン」劑ナリ。一日量 四〇—七〇。

二、注射劑 内服劑胃障碍強クシテ用キ得ザル時ニ用フ。

(イ)「サリチール」酸「ナトリウム」、「メルブリン」各五〇。安息香酸「ナトリウム・カフェイン」五〇、溜水 一〇〇。

右新製殺菌シ、日々一〇—二〇宛靜脈内注射。

(ロ)「サリチール」酸曹達ハ〇、「サリチール」酸「ナトリウム・コフェイン」二〇、溜水 五〇。

右一回一〇—二〇宛半乃至二日ニ一回靜脈内注射。

△婦人ニテ靜脈ヲ見出シ得ザル時ニハ皮下ニ注射ス。

(ハ)「五〇%」メルブリン」一回一〇—二五宛用フルコトヲ得。(皮下、筋肉内、又ハ靜脈内注射)。

(ニ)「ロイマリン」 〇・五cc「アムブレ」入り、一日一—二回皮下注射。

(ホ)「アナルゴール」。

(ヘ)「ラルギン」 筋肉内又ハ痛ム局處ヘ一〇cc宛注射。

(ト)「ノブルギン」 一〇cc「アムブレ」入。

(チ)「エレクトラルゴール」 「サリチール」劑ヲ用フルモ治効充分ナラザル時ニ試ム。

用法用量— 敗血症ノ條參照。

(リ)「カゼオザン」療法 用法用量— 敗血症ノ條參照。

(ヌ)蟻酸 〇・二—一〇%溶液、一〇cc宛三日ニ一回皮下ニ注射ス、但シ局處ノ疼痛アル故「アコイン」又ハ硝酸「アリピン」ヲ 〇・五%ノ割ニ加フルヲ可トス。

三、灌腸劑。

「サリチール」酸「ナトリウム」五〇、阿片丁幾五滴、「アラビアゴム」漿 三〇、水 五〇。

右一回注腸料 (胃障碍強キ時)。

四、局處塗布劑 (關節部貼用)

(イ)「一〇%」サリチール」酸軟膏。

(ロ)「サロメチール」

(ハ)「〇・二%」沃度加里「ラノリン」ヲ塗布シ、油紙ヲカケ、ソノ上ヨリ濕布。

急性關節ロイマチス



合併症ノ療法

- (ニ)「ザレイン」酒精等分液 無刺戟ナルモ効果少シ。
  - (ホ)「メソタン」「エリチン」(「サリチール」酸「メトキシ・メチール・エステル」) 甚ヨク用キラル。
  - 一日「二回」一茶匙ヲ同量又ハ倍量ノ「オレーフ」油ニ和シ、患部ニ輕ク塗布ス(塗擦ニ非ズ)、迅速ニ吸收セラレ、内服量ヲ大ニ輕減スルコトヲ得。
  - (ヘ)「スピロザール」(「サリチール」酸ノ「モノ・グリコール・エステル」)。
  - 副作用ナキ點「メソタン」ニモ優ル、一日一回五〇ヲ同量ノ酒精ニテ稀釋シ、塗布又ハ塗擦ス。
  - (ト)「サロクレオール」(「サリチール」酸ノ「クレオソート・エステル」)。一日五〇—一〇〇純品塗布、真劑ナリ、「ロイマチス」ノ外ニ腺病性淋巴腺炎等ニモ用フ。
  - (チ)「サリット」(「ボルネオール・サリチール」酸「エステル」) モ有効ナリ。
  - 一日二・五—五・〇、同量ノ「オレーフ」油ヲ以テ稀釋シテ塗布ス。
  - (リ)「ロイマサン」(一〇%「サリチール」酸「石鹼」クリーム)。
  - 一日二—三回、五・〇—一〇・〇ヲ局處ニ塗擦シ棉花ニテ纏包ス。
  - (ヌ)其他「ノイラギー」、「ラルチゴール」等無數ノ製劑アリ。
  - (ル)「イヒチオール」
- ④「イヒチオール」、「クロロフォルム」各一五・〇、「カムフル」丁幾七〇・〇。右塗布料。

一、心内膜炎 (イ)安靜、心臓部ニ氷囊貼付(但シ暖メテ却ツテ心臓部ノ自覺症狀ヲ減ズルコトアリ)。

(ロ)脈搏頻數細小ノ場合ニハ、「カムフル」注射ヲ行フ。

(ハ)「サリチール」酸劑ハ、心臓狀態甚シク惡化セル時ニハ暫ク控フルヲ可トス。

二、心筋炎、心臓衰弱 強心劑ヲ應用ス。

三、漿膜炎 「サリチール」酸劑ノ投與、其他當該症(肋膜炎、心囊炎等)ノ條參照。

四、扁桃腺炎 (イ)二%鹽素酸「カリウム」溶液ノ含嗽。

(ロ)塗布 ルゴール氏液、五%「プロタルゴール」液、五%硝酸銀液、鹽化「アドレナリン」加

鹽酸「コカイン」溶液等ヲ用フ。

(ハ)頸部ノ氷褌法、又ハ冷濕布。

五、多發性滲出性紅斑

(イ)「サリチール」酸劑ノ内服。

(ロ)吸入及ビ含嗽。

(ハ)局處療法 (I)亞鉛華「オレーフ」油又ハ亞鉛華硼酸軟膏ノ塗布。(II)三%硼酸水ノ褌法。

六、結節性紅斑

(イ)「サリチール」酸「ナトリウム」ノ内服。

(ロ)局處療法 「イヒチオール・チオノール」ノ塗布。

七、小舞踏病、紫斑病 (各當該症治療法ノ條參照)。

急性關節ロイマチス



急性傳染病治療法

處方例

一、サリチール酸ナトリウム	六・〇	右一日量六回分服
コルヒクルム丁酸	二・〇	一、メソタン
重炭酸ナトリウム	四・〇	イヒチオール
薄荷水	八・〇	オレーフ油
淨水	100・0	右輕ク塗布一日二回
右一日量六回(食後)分服		一、スピロザール
一、アスピリン	四・〇	クロロフォルム
實岩越幾斯	〇・〇三	カムフル丁酸
ゲンチャナ木	〇・三	右塗布料

慢性關節ロイマチス Polyrthritis rheumatica  
chronica, Chronischer Gelenkrheumatismus

養生法 寒冷、濕潤ヲ避クベシ。

藥劑療法 急性症ノ場合ノ如クニ有効ナラズ。

- 一、内服劑 (イ)「サリチール酸」ナトリウム、「ザロール」等。
- (ロ)「沃度」カリウム 一日量 一・〇—一・五—二・〇内服。

(ハ)黃燐 容易ニ胃障礙ヲ起ス不利アルモ試ムベシ。

(I) 〇・〇〇五ヨリ始メ次第ニ増量シテ、〇・〇〇一ニ至リシ後一ヶ月間位持長シテ、數週間休ミシ後再び服用ス。

(II) 或ハ〇・〇〇一位ヲ増減セズシテ持續服用ス。

燐 〇・〇一、肝油 100・0。

燐 〇・〇一、甘扁桃油 10・0、「アラビヤゴム」末 五・〇、單舍利劑 五・〇、淨水 八〇・〇。  
右何レモ一日二回一茶匙(四—五〇)宛食後内服。

(ニ)亞砒酸、「キニーネ」、鐵劑等ノ強壯劑。

二、注射劑

(イ) 五〇%「メルブリン」 日々一〇〇cc宛皮下又ハ筋肉内注射、其他急性「ロイマチス」ノ條參照。

(ロ)鹽酸「シノメニン」、「テトロドトキシシン」、「ノイロマチン」等。

(ハ)「カゼオザン」療法。用法—敗血症ノ條參照。

三、局部塗布劑

(イ) 六%「ヨード・ワゾゲイン」。

(ロ)「メソタン」、「スピロザール」、「サロメチール」、其他急性「ロイマチス」ノ條參照。

理學的療法

(イ)温泉療法 硫黃泉、鹽類泉ヲ可トス。

慢性關節ロイマチス



急性傳染病治療法

(ロ) Bier 氏 體血療法 初メハ一日一時間位、慣ル、ニ從ヒ一日八時間位迄之ヲ行フ。  
(ハ) 熱氣療法 Heisslufttherapie

術式——木製又ハ「ブリキ」製半圓筒狀保温匣ヲ布片ニテ被ヒ、匣内ニ裝置セル電燈ヲ熱源トシ、ソノ點燈數ニヨリ溫度ヲ加減ス。通常患者ハ仰臥位ヲトリ、患部ヲ匣内ニ入レテ點燈シ、溫度ハ初メハ六〇度位、後ニハ漸次昇セテ、八〇度位マデモ達セシム、初メハ一五—二〇分後ニハ三—三分ニ至ル。終ラバ消燈シテ匣内ノ溫度下降シテ略體温ニ近ケル時匣ヲ除キ、汗ヲ拭ヒテ尙暫シ安臥セシム。

(ニ)「デアテルミー」不快ノ熱感ナキヲ度トシテ行ヒ、時間ハ一五—三分間。

(ホ)「ラヂウム」療法 「ラヂウム・エマナチオン」、「ラヂオゲンシユラム」、「ラヂオゲン」壓抵布等ヲ用フ。

(ハ) 温 電 法、罹患關節部ニ之ヲ施ス。

器械的療法 罹患關節ノ強直ヲ豫防シ又之ヲ治療スルタメニ、該關節部ノ他動的運動及ビ「マツサージ」ヲ怠ルベカラズ、特ニ浴湯中ニ於テ行フヲ可トス。

處方例

一、沃度カリウム	一・五	薄荷水	100.0
サリチール酸ナトリウム	三・〇	淨水	100.0
重碳酸曹達ナトリウム	三・〇		右爲一日量三回食後分服

ザロール	三・〇	一、ザレイン又ハスピロザール	三〇・〇
ゲンチヤナ末	〇・三	酒 精	三〇・〇
重炭酸ナトリウム	二・〇	クロロフォルム	二五・〇
		右塗布料	

筋肉ロイマチス Rheumatismus musculorum, Muskelrheumatismus

藥劑療法

一、内服劑

急性時ニハ先ツ下劑ヲ試用シ、而シテ「ロイマチス」劑ヲ投ズ、(慢性症ニハ餘リ有効ナラズ)  
(イ)「アスピリン」一日六〇迄。 (ロ)「フェナセチン」一日一・五。  
(ロ)「フェナセチン」〇・五、「ピラミドン」〇・五、鹽酸「キニーネ」〇・三、安那加 〇・五。  
右一日量 三回分服。其他適宜。

二、注射劑

急性關節「ロイマチス」ノ條参照、其他ニ  
局處的ニ(イ) 〇・五%食鹽水五〇—一〇〇ccヲ少シク暖メテ局處筋肉内へ、隔日一回注射。  
(ロ) 石炭酸 〇・二、鹽酸「ロカイン」 〇・一、溜水 10.0。  
右 一〇—二〇cc、皮下又ハ筋肉内へ注射。  
(ハ)「シュライヒ」Schleich 氏第二液(前編鹽酸「ロカイン」ノ條参照)

筋肉ロイマチス



右1.0cc宛隔日一回、注射數回ニ及ブ。

(ニ)蟻酸0.2—0.3%液0.5ccヨリ始メ四日毎ニ一回、毎回増量、一回量ニ0.5ccニ及ブ。

三、局處塗布劑

(イ)クロロフォルム・オレーフ(等分)。(ロ)芥子精。(ハ)「カムフル」丁液。

(ニ)其他「スピロザール」、「サロクレオール」、「サロメチール」等急性「ロイマチス」ノ條參照。

理學的療法

一、温濕布。

二、熱氣浴(30—35度三十分間宛一日一回)

三、砂浴。

四、「デアテルミー」(前章參照)。

五、「マッサージ」。

六、電氣療法。

(イ)平流電氣——陽極貼付。

(ロ)感傳電氣モ用フ、——感傳電氣刷子ヲ用フルヲ便トス、但シ患者ノ皮膚過敏ナル時ハ、醫師ノ手ヲ介シテ電氣ヲ患部ニ傳フルヲ可トス。

其他ノ療法

一、瀉血、痛ム局處ニ水蛭數十條ヲ貼付スルコト著効アルコトアリ。(貼付法—腸チフスノ條參照)。

二、カテラン Cathelin 氏硬膜外注射、肛門ノ周邊痛ム時ニ用フルコトアリ。(術式—坐骨神經痛ノ條參照)。

三、腰椎穿刺、腰部痛ニ有効ノコトアリ。

四、「ロイマチス」性硬結ニ依ル頭痛、項部ニ硬結ヲ生ジ、上方頭部ニ放散スル疼痛ヲ起スコトアリ、女性ニ

多シ。ソノ場合ノ療法ハ

(イ)急性症 ニハ「サリチール」劑ノ投與、局處ノ保温ヲナス。

(ロ)慢性症 ニハ「マッサージ」ヲ最モ良シトス、一—二時間前ヨリ巴布等ニテ暖メ硬結ヲ軟ゲ置キテ、日々一回二—三分間強ク摩擦ス、輕快スルニツレ隔日一回トナシ、二ヶ月間以上連續治療ス。

五、疼痛ヲ他處ヘ誘導スル目的ニテ 芥子泥、「カンタリデン」等ヲ他局處ヘ貼布スルコトアリ。

敗血症 Sepsis, Septicopyaemie

看・護

(イ)安靜臥床、頭部及ビ心臓部ニ氷嚢貼付。  
(ロ)食餌ハ粥狀トナシ、且ツ多量ノ飲料ヲ與フ、(毒素ノ稀釋及排泄ノ目的)。

特・殊・療・法

一、「ワクチン」療法、大腸菌、淋菌、葡萄狀球菌等ノ敗血症ニ用キラル、特ニ前二者ニ有効ナリ。自家「ワクチン」(製法、用量、本項末尾ニアリ)最モ有効ナルガ、是レヲ得ザル時ニハ、販賣セラル、多價「ワクチン」ヲ使用ス。皮下注射。

二、免疫血清療法

連鎖球菌及ビ腦脊髄膜炎菌敗血症等ニ試用ス。

(イ)連鎖球菌血清、一回10.0cc宛ニ一回、全量150.0cc迄、皮下又ハ筋肉内或ハ靜脈内ニ注射ス。(心内

敗血症