

蕭

萍編

傷寒自療

上海大眾書局印行

傷寒自療序

吾國醫士重視傷寒證。其意蓋謂凡百病證不離六經。傷寒論言六經證狀甚詳。能治傷寒。卽無病不能治也。日本維新以前。民間盛行漢醫。其醫士之重視傷寒論。亦猶其理學家信仰朱陸。文學家推尊轉柳。詩學家崇拜李杜。近雖酷信西醫。漢醫仍未絕迹。不第日本。卽美之某州。英之加拿大。亦時有漢醫露頭角。雖有警察干涉。而居民要求官廳准其行道。聯名至數萬人。西醫在吾國者。動謂中醫不足信。而中醫之在彼土者。乃爲人歡迎至此。抑又何也。西醫之腸風扶斯證。日人譯爲傷寒。觀其所論證狀。中西初不甚遠。所異者。西醫於看護預防之法。不憚再三之瀆。方劑祇寥寥所味。中醫無所謂看護。

更無所謂預防。方劑則條分縷晰。不厭求詳。試以中醫治療傷寒之方劑。問諸稍知中藥之西醫。吾知僅能譬爲藥無特效。不能指出有何流弊。又試以西醫之看護預防。問諸中醫。亦祇能謂傷寒非僅看護預防所能治。不能指出有何流弊。夫習慣已久之事。斷非旦夕所能盡改。而天地間真理。亦不容吾輩一隅之見。始終劫持。今之欲以西醫盡改中醫者。心不可謂不熱。見不可謂不明。力則斷有所不及。而欲以中醫拒西醫者。是直以一葦障狂瀾。片石填大海也。然則欲圖吾人之健康。又不背斯世之信仰。計惟有師西醫之看護預防。用中醫之方劑藥味。兼收而並蓄之。其庶可乎。秋間傭書新隄稅關筆墨多暇。輒本此意。演成傷寒問答六章。意取通俗。不尚高深。末章專論古法。某病證用某方劑。言簡意賅。不作支離疑似之語。世之保存。

國粹。及研究新法者。或皆有取於斯歟。

民國五年十月二十七日蕭屏序於新隄權署

傷寒自療序

三

上海大眾書局印行

傷寒自療目錄

第一章 釋名 詮釋傷寒病得名之由來

第二章 痘原 研究傷寒病從何而起

第三章 病狀 指示患傷寒者之情狀

第四章 療法 詳敘治傷寒之穩妥西藥及其看護法

第五章 古義 將張長沙之傷寒論剝膚存液包括無遺

第六章 古方 選錄傷寒論中所用之靈驗藥方

第七章 實體 蕭家顥患極危險之傷寒治愈記

最新癆病問答

此書采擇東西最精最確之學說而成。其優點有四。

一 文字淺顯人人能懂。

二 提要鉤玄專門肺病學者之各種議論。均包括於此小冊子之中。

三 所用方藥簡之又簡最穩妥最靈驗。

四 靜坐法。都布口淋注射法。門外睡眠法。俱彼中極新之發明。有志衛生者不可不讀。有志醫學者尤不可不讀。

傷寒自療

崇義蕭屏

第一章 釋名

問傷寒是何種病證。

答傷寒是有定期日之急性傳染病。

問何謂傳染。

答由一人而傳及多人。由一處而傳遍他處。如色之染物。然故謂之傳染。

問傷寒二字。古人如何解釋。

答素問謂熱病者皆傷寒之類也。難經謂傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕溫。有熱病。有溫病。仲景謂其宗族素多未及十稔。死亡者三分。

之二。傷寒十居其七。可見古人視傷寒二字兼有發熱與傳染兩義。問傷寒證西醫命以何名。

答西醫名曰腸窒扶斯。

問何謂腸窒扶斯。

答其意蓋謂小腸發熱而潰爛也。吾國亦有譯爲小腸壞熱證者。問吾國言傷寒者。羣推張仲景。究竟張仲景之說可盡信否。

答自傷寒論出。然後傷寒始有專書。仲景篤路藍縷之功。自不可沒。惟其書自西晉以後。屢經妄人刪改。實非長沙原本。其中議論精確者固多。而可疑者亦復不少。吾國名醫如喻嘉言。尤在涇。張隱庵。陳修園輩。竟謂其書一字一法。則信古而過猶是。經生之陋習矣。問小腸發熱而潰爛。其說果可信否。

答此由西醫解剖而知。自不可不信。第一週（即發病後第一日至第七日）小腸腫脹形如腦髓。謂之髓樣浸潤期。第二週（即發病後第八日至十四日）小腸內層因血液不足又有病菌之作用成黃色之腐癰。謂之腐癰形成期。第三週（即發病後十五日至二十日）腐癰剝落成爲潰瘍。謂之潰瘍形成期。第四週（即發病後二十一日至二十七日）潰瘍漸愈。貽留瘢痕。謂之瘢痕形成期。

問中西命名不同。其實際亦有相同之點否。

答吾國傷寒論所謂太陽證者。即係指小腸有病。所謂手太陽小腸是也。其少陽陽明各證。尙在傷寒病範圍以內。至於太陰少陰厥陰諸證。則係合併他證。非傷寒病所固有矣。

第二章 病原

問傷寒病從何而來。

答由於一種微生植物名傷寒病菌者（西名腸窒扶斯菌）而來。此菌入人腹中先至小腸發生毒液誘起種種病證。

問傷寒病菌是何形狀。

答爲末端鈍圓之小桿上有脚毛八枚或十二枚可以運動自如惟其形至小非大力顯微鏡不能見也。

問傷寒病菌如何能入人腹。

答大約由於飲食不潔之物而來故飲食最宜注意。

問飲食之內如何有此種病菌。

答此種病菌多在患傷寒病者之大小便中或老農老圃以尿糞灌澆菜蔬或在井側浣洗患者之衣服致病菌與污水相混流入井中。

或茅廁與水井相近。廁中病菌。由地下滲入水井。或以患者之大小便傾棄河中。或於河中浣洗患者汚物。皆可由水中混於飲食之內。間接以入人腹中。

問此事有何證據。

答前清光緒初年江寧縣之黑廊地方。一時有七八人同患傷寒。後聞病者均飲同井之水。而前數日有一傭婦患傷寒病。勉強在井側洗濯自己之污物。可見七八人之病原均由井水中來也。又某年安徽和悅洲地方。洲頭左邊有一患傷寒病者之家。其後左邊沿河一帶。患傷寒病甚多。而右邊則否。此非由於河水之故乎。

問井水河水既皆傳染傷寒病菌。然則飲自來水可免此患否。

答現在自來水雖經濾過不必慮及。中含傷寒病菌。惟有時鐵管破

損。仍有混入傷寒病菌之患。

問。有人謂各種病菌皆不能在冰雪中生存。然則飲冰餐雪無害否。
答。不然。傷寒病菌有極強之抵抗力。德名醫某君試驗得傷寒病菌。
能在冰雪中生存三個月。故冰雪傳染傷寒與河水井水同。

問。傷寒病菌除飲食外。尙有傳染之路否。

答。從飲食傳染者。是爲間接傳染。尙有直接傳染。如父母兄弟常伴。
病人誤以手指接觸患者之糞便或衣服上之污穢。未經消毒。自觸其口。遂致傳染此病。

問。傷寒病菌一入人腹。即能爲患者否。

答。亦有病菌入腹而不爲患者。其人身體必係營衛調和而有天然
之免疫質。

問·免疫質是何物。

答·免疫質是人身體中蛋白質一種作用。有先天後天之分。先天免疫質即衆人同染此病而渠則獨免。所謂天然者是也。後天免疫質則因曾患此病一次。體中生有抗毒物質。即可終身或數年不染此病。

問·此病發生有一定之時期否。

答·此病隨時發生。無關於氣候之寒暖。爲傳染病之最多者。

問·患傷寒者多爲青年壯年之人。小兒及老人則患此病者絕少。此係何故。

答·傷寒病菌專侵小腸內之脾兒氏叢線。令其潰爛。小兒尙無此種叢線。老人則此種叢線已經消失。故二十歲至四十歲之人多患傷

寒而小兒與老人則否。

問照後天免疫質之說。則患傷寒病一次即可不再傳染否。

答患傷寒一次雖可防止第二次之傳染。然亦有患至三次四次之例。外惟每患一次。則病勢較輕。一次亦猶曾種牛痘一次。將來再發天花。便不至十分危險也。

第三章 病狀

問傷寒病之情狀如何。

答初發病二三日身體不適。食物無味。漸起頭痛惡寒。發熱四五日後。熱度上升。至攝氏表三十九度以上。苟有如此證狀。即係傷寒病之見端。

問患傷寒病者之容貌如何。

答。面現倦怠之色。口微開。目時啟閉。振動不已。使伸其舌。則震顫而久不縮入。

問。患傷寒者之體溫如何。

答。無病之人。體溫約三十七度。如患傷寒。則第一日之下午。體溫昇至三十八度。第二日之上午。體溫又復下降。下午則又上升。第一週內逐日如是。如階級之上升。名曰階段熱。至第一週之後半或終期。體溫最高。通例在三十九度以上。或逾四十度。第二週病機成熟。體溫最高。而昇降不及一度。名曰稽留熱。第三週之體溫。朝時則甚下降。朝夕所差。過於一度。名曰弛張熱。第四週則熱度復常。且有時降於常溫之下。

問。體溫如何測定。

答以攝氏體溫計插入患者腋下或口中。經十分鐘或十五分鐘。其水銀漸漸上昇。至管之某處不能再生。於是從腋下取出。將測得之體溫記於簿中。每日朝夕測驗二次。爲通常之例。亦有因病證危急。每隔三時或四時而測驗一次者。

問患傷寒者之脈搏與呼吸如何。

答凡病之發熱者。均能令脈搏加速。呼吸促迫。傷寒病既發熱。故脈搏必較平時爲速。呼吸亦較平時爲促。

問患傷寒病者。脈搏速至如何程度。呼吸促至如何程度。

答脈搏大約每分鐘八十至一百零。至呼吸每分鐘二十四回至六十七回。若脈搏每分鐘一百五六十。至呼吸每分鐘一百回以上。則其病危矣。

問患傷寒者之小便如何

答小便含有多餘之音第坎質。

問何法以試之。

答取病者之小便五立方仙迷。（立方仙迷量杯之度也。）加入相等之濃厚鹽酸。再加硝酸一滴。煮沸之。則成暗黑色。此卽音第坎質多餘之證。若於冷後。再加依的兒而搖動之。則泡沫之色變爲青藍。而依的兒之色變爲薔薇紅或紫紅。

問患傷寒者之大便何如。

答初病多秘結不通。至第一期之末。則變爲下利。每日二三次或五六次。色黃而綠。有鹹性。（以紅色紙試之。紙變藍色。）久之則成爲

豌豆羹汁之狀。

問。患傷寒者之舌苔如何。

答。其初大抵粘着而濕潤。舌背尖端有灰色或灰黃灰褐煤灰等色之苔。其邊似有齒痕。至第一週之末。舌面乾燥而赤。迨舌苔剝落。則自尖端以迄前面全部顯出一種鮮紅色之三角形。未幾遂遍舌背之全部。

問。患傷寒者之皮膚如何。

答。皮面恆發類圓形之紅斑。平均如豌豆大。以指壓之。色即消退。名曰薔薇疹。初僅發於脣部。繼則腹部。胸部。胸部。背部。頸部。四肢亦俱發現。惟顏面上則無之。乃發傷寒病之確證。此疹約三日至七日漸漸消失。皮膚傷稍稍落屑。熱候或亦全退。又有於恢復期內重發新疹者。問。患傷寒者往往腹脹如鼓。以手按之。則洩氣如連珠何也。

答·因腸管中發生多量氣體。且有液狀之內容物充滿其中。若復以外物迫壓。則內不能容而氣洩於外矣。

問·患傷寒者之內臟如何。

答·脾臟腫大。在第一週之後半期可觸而知之。此乃診斷上特別重要之事。病勢漸愈。腫亦漸消。若至恢復期而腫大如故。則此病恐有再發之虞矣。

問·此病幾日可愈。

答·若無併發症。則六週後（四十二日）即可操作如常。

問·常見患傷寒者已愈而旋即復發。是何原故。

答·大約因離床過早。飲食無節。或受大喜劇悲之刺激。以致病菌餘毒乘間竊發。

問已愈復發。中國名詞謂之復感。據云危險者居多。其說如何。
答傷寒一證固有因再發喪生者。然以常例言之。則病勢大都輕微。
脾腫及薔薇疹之發現。亦較初病爲速。

問傷寒病狀亦有不盡如上文所云者否。

答有一日頓挫性傷寒。此證僅腸管微腫。熱退甚速。不過一二週後即愈。二曰輕證傷寒。此證發熱甚輕。經時亦短。無危險之併發證。唯脾腫及薔薇疹則頗顯著。三曰無熱性傷寒。此證全不發熱。頭部疼痛。不思飲食。一身倦怠。有積極的偉大耳氏之血清反應。故能定其爲傷寒病也。

問傷寒病之併發證有幾種。

答有三種。一爲重篤全身傳染之併發證。二爲腸粘膜炎性及潰瘍。

變化之併發證。三爲炎性之併發證。

問何爲重篤全身傳染之併發證。

答其證神經瞀亂。口出譖語。甚至惡聲謾罵。暴力撞擊。又或狂走室外。恆舞酣歌。亦有神識雖昏。而狀態安靜。或喃喃自語。不求飲食。不知溲溺。或臥而不適。亦不輾轉。或手指抽搐。或手臂頻頻跳動。或以手指撮引被褥。如撮絨毛之狀。而無他種粗暴舉動。以上種種證狀。久而不愈。必致心臟痺麻而死。

問何爲腸粘膜炎性及潰瘍性變化之併發證。

答其證下利清穀。二十四小時內排洩稀薄之糞便約十次至十五次。故有衰弱而死之危險。若大便不通。亦係併發證之一種。燥糞擦傷腸管。以致大便帶血。又有腸中積氣甚多。腹大如鼓。致將心肺等臟。

逼至上部。呼吸不通而死。

問傷寒便血。無大妨礙否。

答傷寒便血。有一次即止者。有兩三次方止者。又有暫時休止。過兩三日後復發。或反覆數回。病勢日劇者。總之傷寒而兼腸出血爲非。當之險證。若進而侵入深部。則易成腸穿孔。或穿孔性腹膜炎。而其人危矣。

問何爲炎性之併發證。

答一爲喉頭粘膜潰瘍。此證能誘起聲門水腫。或喉頭軟骨炎。膜勢最重篤。二爲氣管枝加答兒。大抵因治療失當而致。三爲肋膜炎。四爲耳下腺炎（俗名痄腮）。五爲耳炎。六爲褥瘡。此證由於看護不良。或病重久臥床褥所致。甚有變爲壞疽者。

問。傷寒病愈後之情狀如何。

答。傷寒新愈。有精神倦怠。記憶力衰減。不如病前之精神活潑者。有皮膚浮腫或出血。脾臟腫大。久而不愈者。有成爲下利或便秘之習慣。及毛髮脫落者。

第四章 治療

問。傷寒病應以何法治之。

答。傷寒病最確實之治法。現在尙未發明。其較有把握者。未病用預防法。已病用待期療法。或對證療法。

問。何謂預防法。

答。未病而先防之。此即內經所謂聖人治未病。不治已病也。一切傳染病之不二法門。而對於傷寒病。更有奇效。

問預防之法如何。

答前於第二章謂傷寒病菌由飲食而入人腹。可見能於飲食上留心便是預防善法。

問飲食上如何留心。

答未沸之水斷不可飲。雖沸而曾經過夜者亦不可飲。未熟之物斷不可食。雖熟而曾經過夜者亦不可食。

問水過夜而不飲此易做到。物過夜而不食棄之不甚可惜乎。

答過夜不食非棄之也。再煮再沸又可食矣。

問所食之物所飲之水皆須煮沸何也。

答傷寒病菌煮至沸度則全行死滅。雖入人腹不能爲害矣。

問飲水食物雖經煮沸後又沾染病菌不知而飲之食之如之奈何。

答此亦不可不防。如患者之衣服器用必須消毒，看護者之手指宜常以消毒之藥洗滌，皆係除惡務盡，以免病菌混入飲食之意。

問患者之衣服器用如何消毒。

答最妙以沸水煮過數分鐘或以水九十五分石炭酸五分相和洗之，亦可。惟飲食所用食器皿，則此法殊不相宜，因石炭酸性烈而有毒也。

問何謂待期療法。

答保護病體靜待轉機是也。

問如此豈非聽其自然乎。

答起居飲食處處均須留意，何能聽其自然。

問患者之起居宜如何留意。

答病室宜肅靜無譁。夏日應開窗以通空氣。冬日應開鄰室之窗以促空氣之流通。病室之門宜經鄰室不可直接受風。又不可有劇烈之日光。室中宜備兩床。晝用其一。夜用其一。被褥宜滑澤而無褶襞。問患者之飲食。宜如何留意。

答固形之物萬不宜食。冲藕粉。冲豆粉。冲百合粉。豆漿最融之稀飯。牛乳去油之鷄鳴湯。肉湯。水酒均宜食之。惟不可多食。

問何以不宜食固形之物。

答傷寒病係小腸發熱而潰爛。前已言之。小腸與大腸相近。其潰爛之處往往蔓延至大腸。若食固形之物難保不磨穿潰爛之處而出血。此證至於腸裂而出血。則其人危矣。

問患病者宜戒葷腥。何以能食雞鳴肉湯及牛乳等物。

答患病不食葷腥此係中國舊習慣屬於迷信之一種原無滿足之理由且此證既係小腸潰爛不宜食固形之物必須有物入腹滋養營衛始可抵抗病勢鷄鴨魚肉牛乳等物最能滋養營衛所以爲患傷寒者最宜之食物若拘泥中國舊習不敢食葷則祇食藕粉豆粉稀飯之類亦可。

問患者久臥床褥蓬首垢面可以如常梳沐否。

答傳染病以清潔爲第一要義洗面漱口浴身並宜加勤其法以手巾入攝氏三十五度之微溫水內過數分鐘提出擰乾遍擦病人全身擦後以烘熱之手巾揩乾每日兩次可令身心活潑皮膚清潔至於漱口宜以較濃之鹽水每日漱兩次可免病菌侵入唾液排洩管內至患喉證。

問患者神識昏沉。宜如何救護。

答每半時須給以合宜之飲料。以清其神識。

問何種飲料最爲合宜。

答冷開水二分。葡萄酒一分。和勻時時飲之。最妙無葡萄酒中國之
糯米甜酒亦可。若其人素不飲酒。則冷開水宜多用。酒宜少用。

問病勢沈重。二便失禁。則如之何。

答以草紙布片之類。墊於身下。一沾污穢。即行掉換。並將污穢之物
以火焚之。免致其傳染他人。

問患者既宜靜養。而飲食梳洗。均須勞動。且有至親好友。前來省視。
亦不得不恭小作周旋。此等小勞動。無礙於患者之靜養否。

答傷寒證最重。靜養飲食梳洗等事宜。看護者代爲勞動。至親友省

視原爲關切。起見不作周旋。未必招怪。即親友亦不宜時來省視。及饋送食物。至擾患者之安靜。總之患傷寒病者。不宜多起坐。不宜多說話。不宜食固形之食物。此待期療法之最要關鍵也。

問何爲對證療法。

答發熱用解熱藥。便閉用利便藥。便血用止血藥。各種併發證用各種併發證之特效藥。

問解熱以何藥爲最佳。

答安知必林最佳。每日服中權一分五釐。作三分服。每次服五釐。可令熱勢輕減。

問利便以何藥爲最佳。

答甘汞最佳。因其能令燥糞外出。且性亦和緩。每日服中權一分五

釐作三次服。每次服五釐。能令病期縮短。證候減輕。
問大便帶血宜用何藥。

答傷寒而大便帶血重證也。第一宜安靜不可令人驚擾。患者亦不可令患者忽起忽坐。第二宜以冰囊置於患者小腹上。第三每日宜服阿片丁幾三次。每次服十滴至十五滴。若無阿片丁。則服白阿膠以代之。

問大熱不退。神識昏沉。如第三章所謂重篤全身染之併發證。則如何。

答以冷而且濕之布纏繞全身。每五分鐘換一次。並令時飲沸過之。冷水即能減輕病勢。至於勿藥。

問傷寒至於大熱不退。神識昏沉。寒閉甚矣。尙可用冷布纏身。以寒

益寒乎

答病名傷寒。實係一種病菌發生熱毒所致。冷水能助血中養氣祛退熱毒。昔年患傷寒而不能愈者爲百分之十九。自用此法。患傷寒而不能愈者僅居百分之四方。經西醫實驗不必疑也。且此法中國方書早已有之。如葛稚川肘後備急方治傷寒時氣溫病條內有一方云。冷水漬青布以掩之。又類證活人書亦有冷水治傷寒之法。可見吾國古人早已發明此法。不過後世醫者識見卑陋。畏不敢用耳。問此法既如此靈妙。則遇患傷寒者無論何時皆可以此施之矣。答亦須看病勢如何。如重篤之全身染可用冷水漬布纏繞全身之法。病勢尙未至神識昏沉。祇須以布片漬冷水貼於肚臍下。若脈搏微弱及發病之第三週（十四日至二十一日）均不宜用此法。

問傷寒之對證療法。固宜視其病證。施以方藥。然使無特別情狀。亦有普遍治療之次第。可依據以爲準繩者否。

答初病時若胃有宿食則宜用吐法。腸有積糞則宜用下法。病久便秘。是時小腸已爛。不可再下。略遲數日俟爛處稍愈。再用微利。樂倘尿內毒質混入血液。必現神識昏沉。及撮空牽衣等證。宜先服利小便藥。不效再服發汗藥。使血中毒質從汗中洩出。古人有汗吐下三法。即此意也。

第五章 古義

問治傷寒病之西法既已聞命矣。請問吾國舊法用之亦可收效否。答長沙集古人成法著傷寒論研究之者代不乏人。如果毫無效驗。此書早應廢棄。其所以歷祀千百年風行十餘國。一前此日本朝鮮。

安南緬甸暹羅琉球等國均信用漢醫者必有其不可磨滅之故。所惜後世研究傷寒論者不從實地試驗專就理想推求以致越說越歧令人無從捉摸古賢著述真意遂漸湮沒不彰矣。

問舊法既有效驗其所以與新法不同者何在。

答新法治傷寒重預防舊法治傷寒重治療新法治傷寒有一定之範圍舊法治傷寒往往涉及各種合併證此其不同之點也。

問重預防與重治療二者孰優。

答內經云聖人治未病不治已病病而後求治是猶鬪而後鑄兵渴而後掘井不已晚乎由此觀之似乎預防較優於治療。

問預防既優於治療不識既有預防可廢治療否。

答預防有效必不致病既已有病自不能不以治療繼之長沙舊法。

均是歷試有效之對證治療與後世治雜病之方藥以幻想構造者不同。

問長沙治療傷寒之法如何。

答以淺見窺之大抵以吐汗下爲經以六經爲緯。

問吐汗下固甚易知請問六經果何所指。

答六經謂太陽陽明少陽太陰少陰厥陰而每一經又有手足之分如足太陽膀胱手太陽小腸足陽明胃手陽明大腸足少陽膽手少陽三焦足太陰脾手太陰肺足少陰腎手少陰心足厥陰肝手厥陰心包絡質言之即膀胱之經絡小腸之經絡胃之經絡大腸之經絡膽之經絡三焦之經絡脾之經絡肺之經絡腎之經絡心之經絡肝之經絡心包絡之經絡而已。

問。傷寒病是否由於六經所發。◆

答。傷寒病由於小腸潰爛。前已言之。小腸既爛。難免不波及其餘藏腑。六經受病亦固其所。至於古人所謂。一日太陽。二日陽明。三日少陽。四日太陰。五日少陰。六日厥陰。以次相傳。週而復始。則與以五行生克。斷身世之窮通。六律循環。推天行之遲速。同一假定。不可信。以爲真也。

問。吾國以假而泰。西以眞。此中醫遜於西醫之由來乎。

答。知其然而未知其所以然。往往假定一說。以便着想。中西講學家均有此一種途徑。小之如代數學中之天地等字。物理學中之忽打等名（忽打電量之單位也）。大之如吾儒所謂太極無極。西人所謂上帝真宰。比物此志也。以吾之目光觀之中國醫術。乃惟心的泰。

西醫術乃惟物的西醫固日進高明中斷亦斷難偏廢聞者疑吾言乎試觀西醫盛行之日本高揭漢醫之幟者尚不乏人中醫挾其如意油午時茶之小技懸壺北美竟能致富至數十萬磅此其故可深長思矣

問傷寒論中所謂太陽經證其情狀及治療之法若何

答其證頭痛項強發熱若脈緩有汗惡風是爲虛邪宜服桂枝湯脈緊無汗惡寒是爲實邪宜服麻黃湯虛邪八九日不解面熱身癢形狀如瘡者宜服桂枝麻黃各半湯實邪無汗煩躁者宜服大青龍湯乾嘔而咳宜服小青龍湯近人畏桂枝麻黃二湯之峻不敢用冬日以加味香蘇飲代之春夏秋三季以九味羌活湯代之雖有訾其不合古法者然以吾人之科學眼光觀之轉覺其與最近德國名醫發

明之傷寒治療法不謀而合。此其所以風行一時歟。

問太陽腑證之情狀。及其治療之法。

答其證於頭痛項強發熱惡寒之外。尚有口渴煩躁。臥不安枕。脈浮小便不利。茶水入口即吐。之情狀。是爲膀胱蓄水證。宜服五苓散。其證於頭痛項強發熱惡寒之外。尚有狀如顛狂。小腹硬滿。小便自利。脈沈之情狀。是爲膀胱蓄血證。宜服桃仁承氣湯。此太陽腑證之情狀。及其治療之大要也。

問太陽變證之情狀。及其治療之法。

答不應下而下之。於是下利清穀。全身疼痛。宜服四逆湯以救裏。桂枝湯以救表。發熱頭痛脈沈身痛或大汗大下。四肢厥冷。均宜服四逆湯。發汗太過。其人惡風。小便不利。四肢難於屈伸。宜服桂枝加附

子湯發汗太過。其人仍發熱。頭眩身戰。宜服真武湯。以上各證。因汗下太過。致傷元氣。故所服之藥。如附子。乾姜。白朮。桂枝之類。大抵皆有興奮作用。俾氣血得助。以與病勢相抗。若熱結於裏。又誤服助火之藥。以致大煩大渴。舌燥欲飲水者。宜服白虎加人參湯。若內則大便六七日不解。外則頭痛有熱。宜服小承氣湯。患者煩熱汗出。則解。其狀如瘧日晡發熱。脈實者。宜服大承氣湯。脈虛者。宜服桂枝湯。以上各證。因熱熾傷津。腹有燥糞。故所服之藥。如大黃。芒硝。甘草之類。皆有生津利便。瀉火之功。此太陽變證之情狀。及其治療之大要也。

問陽明經證之情狀。及其治療之法。

答其證。身熱。目痛。鼻乾。睡眠不穩。若兼有頭痛。惡寒之太陽證。脈緩有汗者。宜服桂枝湯。脈緩有汗而又項背強直者。宜服桂枝加葛根。

湯脈浮無汗者。宜服麻黃湯。脈浮無汗。而又項背強直者。宜服葛根湯。若無頭痛惡寒之太陽證。僅有壯熱口渴之陽明經本證。宜服白虎湯。此陽明證經之情狀。及其治療之大要也。

問陽明腑證之情狀。及其治療之法。

答其證潮熱譫語。手足腋下濺然汗出。腹滿而大便硬結。若本係太陽證。因治療失法。亡其津液。致轉陽明者。則必現小便數。大便硬之證狀。傷寒論謂之脾約。又曰太陽陽明。宜服麻仁丸。若本係少陽證。因治療失法。亡其津液。致轉陽明者。則祇現大便結燥。傷寒論謂之大便難。又曰少陽陽明。宜以密煎猪膽汁導法導之。若病人陽氣素盛。或有宿食外邪傳入胃腑。傷寒論謂之胃家實。又曰正陽陽明。宜服三承氣湯。此陽明腑證之情形。及其治療之大要也。

問陽明經證。未離太陽則汗之。既離太陽則清之。腑證則審其輕重而下之。旣聞命矣。若病在經腑之間。旣不可汗。又不可清。復不可下。則如之何。

答。宜用吐法。除胃實證外。如有虛熱。咽乾。口苦。舌生厚胎。腹滿煩躁。小便不利之情狀。則是邪在經腑之間。宜服梔子豆豉湯以吐之。

問少陽經證之情狀。及其治療之法。

答。其證口苦。咽乾。目眩。寒熱往來。若胸脅苦滿。默默不欲食。是爲虛火。宜服小柴胡湯。若心中痞滿。鬱鬱微煩。嘔吐不止。是爲實火。宜服大柴胡湯。此少陽經證之情狀。及其治療之大要也。

問少陽腑證之情狀。及其治療之法。

答。其證雖無寒熱往來於外。而有寒熱相搏於中。腹中有痞。嘔而不

痛者宜服半夏瀉心湯。腹痛欲嘔。胸中有熱者宜服黃連湯。邪已入裏。膽火攻脾而自利者宜服黃連湯。膽火攻胃而嘔吐者宜服黃芩加半夏生姜湯。此少陽腑證之情狀。及其治療之大要也。

問傷寒論有所謂太陰之邪從陰化者其情狀如何。治療如何。

答其證腹滿。吐食自利。不渴。手足溫暖。腹時自痛。宜服理中丸。不愈再服四逆湯。

問傷寒論有所謂太陰之邪從陽化者其情狀如何。治療如何。

答發汗後病不愈。腹痛宜服大承氣湯以急下之。腹滿時痛宜服桂枝加芍藥湯。大便堅實而痛者宜服桂枝加大黃湯。

問傷寒論有所謂少陰之邪從水化而爲寒者其情狀如何。治療如何。

答其證脈沉細而微。但欲寐。口中和。腹痛。下利清穀。小便白。有回陽及交陰陽發微汗三法。

問證狀如何。始可用回陽法。

答手足厥冷。吐利小便數下。清利穀。內寒外熱。脈微欲絕者。宜服四逆湯。內寒外熱。面赤或腹痛或咽痛或乾嘔或利止。脈不出出而厥者。宜服通脈四逆湯。汗下後不解而煩躁者。宜服茯苓四逆湯。少陰病二三日不已。至四五日。腹痛小便不利。四肢沉重疼痛下利者。宜服真武湯。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈者。宜服附子湯。吐利手足厥冷。煩躁欲死者。宜服吳茱萸湯。此應用回陽法之少陰諸證也。

問證狀如何。始可用交陰陽法。

答少陰病。寒邪始傷。是當發熱而反不熱。乃太陽之標陽外呈脈沈。

乃少陰之生氣不升。宜服麻黃附子細辛湯。使太陽之標陽內合於少陰。少陰之生氣上合於太陽。此爲交陰陽法。

問證狀如何。始可用發微汗法。

答少陰病。自始得以至於二三日。俱無裏證。可知太陽之表熱非汗不解。惟過汗則不免傷津。宜服麻黃附子甘草湯。以微發其汗。

問傷寒論有所謂少陰之邪從火化而爲熱者。其情狀如何。治療如何。

答其證脈沈細而數。但欲寐。臥不安枕。口中熱。下利清穀。小便短赤。有救陰及去熱兩法。

問證狀如何。始可用救陰法。

答少陰病二三日咽痛者。宜服甘草湯。或半夏散。或半夏湯。不愈。宜

服甘草桔梗湯。咽中生瘡。言語不能出聲者。宜服苦酒湯。下利咽痛。胸滿心煩者。宜服豬膚湯。心中煩不得臥者。宜服黃連阿膠湯。下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得臥者。宜服猪苓湯。腹痛小便不利。下利便膿血者。宜服桃花湯。此救陰之法也。

問證狀如何。始可用去熱法。

答少陰病二三日。口燥舌乾者。六七日。腹脹不大便者。自利清穀。色純青。心下痛。口乾燥者。均宜服大承氣湯。以去其熱。

問傷寒論有所謂厥陰證者。其情狀如何。治療如何。

答其證消渴。氣上衝心。心中痛熱。不欲食。食則吐。下之利不止。烏梅丸爲厥陰證之總方。久利與吐衄者。服之尤宜。若手足厥冷。脈微欲絕者。宜服當歸四逆湯。脈代結心動悸者。宜服炙甘草湯。脈滑而

厥內熱鬱閉者。宜服四逆湯。渴欲飲水者。宜服白虎湯。熱利下重者。宜服白頭翁湯。腹中急痛者。先服小建中湯。不愈再服茯苓甘草湯。此厥陰證之情狀。及其治療之大要也。

問仲景治傷寒之法。僅止於此乎。

答傷寒論一書。篇幅本長。字句又極古拙。吾人閱之。往往不能盡解。明末喻嘉言氏。以爲此書乃晉人王叔和所改竄。非仲景原書。於是自出手眼。移動其前後次序。著尙論篇。自稱有功。仲景後之醫者。又斥喻嘉言氏爲無知妄作。往復辯論。著書滿家。實則仲景議證處方。大綱已盡於上所云。云後世諸醫。推波助瀾。不過爲字句間之爭執。於病情治療。毫無裨益。允宜將此類書籍付之一炬。以免耗去吾輩寶貴之光陰也。

第六章 古方

(一) 太陽經證之方。

(甲) 桂枝湯

桂枝

白芍各三錢

甘草二錢炙

生薑三錢切片

大

棗四枚

水二杯。煎八分溫服。服後少頃。飲粥一杯。以助藥力。覆被取微汗。一服病止。不必再服。病重者。一日夜作三服。

(乙) 麻黃湯

麻黃

三錢去根節

桂枝二錢

杏仁去皮尖二十三枚

甘草一錢

水三杯。先煎麻黃至二杯。吹去上沫。納諸藥煎八分溫服。不須飲粥。餘將息如前法。

(丙)桂枝麻黃各半湯

即桂枝湯分兩減半。麻黃湯分兩減半合煎而服之。

(丁)大青龍湯

麻黃六錢去根節

桂枝二錢

甘草二錢炙

杏仁去皮尖十二枚

生薑三錢切片

大棗四枚

石膏

打碎以綿裹之四錢五分

水四杯。先煮麻黃至一杯半去上沫。納諸藥再煎八分溫服。覆被取微汗。汗出多者以溫粉撲之。汗多亡陽者以真武湯救之。

以白朮。蝦。牡蠣。龍骨研細末。謂之溫粉。

(戊)小青龍湯

麻黃去根節

白芍

乾薑

甘草

桂枝各二錢

半夏三錢

五味子一錢

細辛八分

水三杯半。煮至二杯半去沫納諸藥煎八分溫服。渴者去半夏加括萎根二錢。噎者去麻黃加附子六錢五分。小便不利。小腹痛滿者去麻黃加茯苓四錢。喘者去麻黃加杏仁二十一枚。微利者去麻黃加茯苓四錢。

(己)加味香蘇飲

紫蘇葉二錢

香附炒

陳皮各一錢五分

秦艽 荆芥

蔓荊子

川芎

甘草各一錢

薑三片

葱一段

水煎服取微汗。

(庚)九味羌活湯

羌活

防風

蒼朮

各一錢五分

白芷

川芎

黃芩

生地

甘草各二錢

細辛九分

生薑三片

葱白一段

水煎服。

(二)太陽腑證之方

(甲)五苓散

澤瀉一兩六錢

猪苓

茯苓

白朮十八銖

桂枝半兩

共爲末。以米飲和服二錢五分。日三服。多飲暖水以出汗。

(乙)桃仁承氣湯

桃仁十六粒去皮尖

大黃四錢

甘草

桂枝各二錢

芒硝二錢後入

水二杯。煎八分去渣。入芒硝。煎微沸溫服。

(三)太陽變證之方

(甲)四逆湯

見下少陰門

(乙) 桂枝湯見上經證之方(甲)

(丙) 桂枝加附子湯見下少陰門

(丁) 真武湯見下少陰門

(戊) 白虎加人參湯

卽白虎湯加人參一錢

(己) 小承氣湯見下陽明門

(庚) 大承氣湯

(四) 陽明經證之方

(甲) 桂枝湯太陽經證之方(甲)

(乙) 桂枝加葛根湯

即桂枝湯加葛根四錢。

水三杯半。先煮葛根至二杯半。吹去沫入諸藥煎至八分溫服。不須歎粥。

(五) 陽明腑證之方

(甲) 麻仁丸

麻仁另研

芍藥 枳實炒

厚朴各五兩炒

杏仁五兩半研作脂

大黃一片蒸焙

右爲末。煉蜜丸如梧子。大米飲送下十九丸。漸加以便通爲度。

(乙) 蜜煎導方

蜜一杯。於銅器內煮如飴狀。取紙捲作挺子。以線紮之。以蜜厚包之。如指許。長二寸。微熱納入穀道。以手急抱。欲大便乃去之。

(丙) 猪膽汁導方

猪膽一枚。和醋少許。以竹管灌入穀道中。過一食頃。當大便。

(丁) 調胃承氣湯

大黃四錢酒潤

炙草一錢

芒硝三錢

水二杯半。先煮大黃甘草至一杯。去渣入芒硝。微微煮令沸。少少溫服之。

(戊) 小承氣湯

大黃四錢

厚朴

枳實各三錢

水二杯。煎八分服。初服當便衣。不爾者再煮服。若更衣止服。按更衣卽是大便。因古人入廁必更衣。故以更衣爲大便之代名詞。

(己) 大承氣湯

大黃

二錢酒潤

厚朴

四錢

枳實

芒硝

各二錢

水三杯。先煮枳實厚朴至一杯半去渣納大黃煮一杯去渣納芒硝微火煮一二沸服得下勿再服。

(六) 陽明經腑界證之方

(甲) 梔子豉陽

梔子

七枚生用

香豉

三錢

水三杯先煮梔子至一杯半入香豉煮七分服一服即吐。

(七) 少陽經證之方

(甲) 小柴胡湯

柴胡

四錢

人參

黃芩

炙草

半夏

生薑

各二錢五分

大棗

二枚

水三鍾煎一鍾半去渣再煎八分溫服。日夜作三服。胸

中煩而不嘔者。去半夏人參加括蔞二錢。渴者去半夏加人參七分括蔞根二錢。腹中痛者去黃芩加芍藥一錢半。脅下痞硬。去大棗加牡蠣二錢。心下悸小便不利者。去黃芩加茯苓二錢。不渴外有微熱者。去人參加桂枝一錢五分。覆被取微汗。欬者去人參。大棗。生薑加五味子一錢乾薑一錢半。

(乙) 大柴胡湯

柴胡二錢

半夏

黃芩

芍藥

枳實各錢半

大棗二枚

生薑二錢五分

一本有大黃五分

水三鍾煎八分溫服。一日夜作三服。
吾

(八) 少陽腑證之方

(甲) 半夏瀉心湯

半夏三錢 黃芩 乾薑 炙草 人參各一錢五分 黃連五分
大棗二枚

水三杯煎一杯服。去渣再煎八分溫服。

(乙) 黃連湯

黃連 炙草 乾薑 桂枝各一錢五分 人參一錢 半夏二錢

大棗一枚

水二杯煎七分溫服。

(丙) 黃芩湯

黃芩三錢 炙草 芍藥各二錢 大棗二枚

水煎服。日二夜一。

(丁) 黃芩加半夏生薑湯

●卽前方加半夏二錢。生薑三錢。

(九) 太陰寒證方

(甲) 理中丸

人參 白朮 甘草 乾薑各三兩

共研末。蜜丸如雞子黃。研碎以沸湯服一丸。日三四服。服後啜熱粥。以腹熱爲度。或用各三錢水。二鍾煎八分溫服。服後啜熱粥。

若臍上築者。去朮加桂。吐多者。去朮加生薑二錢。下多者。還用朮。悸者。加茯苓。渴欲飲水者。加朮。腹痛。加人參。寒者。加乾薑。腹滿者。去朮加附子。服湯後。如食頃。

飲熱粥白溫。勿揭衣被。

(乙) 四逆湯

甘草四錢炙 乾薑三錢 附子二錢生用

水三杯煎八分溫服。再加乾薑三錢。名通脈四逆。加茯苓六錢。人參一錢。名茯苓四逆湯。

(十) 太陰熱證方

(甲) 大承氣湯

(乙) 桂枝加芍藥湯

桂枝一錢 生薑各三錢

大棗四枚

芍藥六錢

甘草二錢

水三杯煎一杯服。

(丙) 桂枝加大黃湯

桂枝 生薑各三錢

芍藥六錢

炙草二錢

大黃七分

大棗四枚

水三杯煎八分服。

(十一) 少陰寒證之方

(甲) 四逆湯見(九)之(乙)

(乙) 通脈四逆湯同上

(丙) 茯苓四逆湯同上

(丁) 真武湯

茯苓 芍藥 生薑各三錢

白朮二錢

附子一錢炮

水三杯煎八分溫服。

(戊) 吳茱萸湯

吳茱萸三錢湯泡

人參一錢半

大棗四枚

生薑六錢

水煎服。

(己) 麻黃附子細辛湯

麻黃去節 細辛各一錢 附子一錢五分

水三杯。先煮麻黃至一杯去沫入諸藥煎七分溫服。

(庚) 麻黃附子甘草湯

麻黃去節 甘草各二錢 附子一錢五分

水三杯。先煮麻黃湯一杯去沫入諸藥煎七分溫服。

(十一) 少陰熱證之方

(甲) 甘草湯

甘草二錢

水三杯煎一杯分兩次服。

(乙) 半夏散及湯

半夏 桂枝 炙草

各等分爲末。白飲和服一錢。日三服。不能服散者。用水一杯。
煮七沸入散三錢。更煮三沸。俟冷。少少咽之。

(丙) 桔梗湯

甘草六錢 桔梗三錢

水三杯煎一杯半分二服。

(丁) 苦酒湯

半夏一枚生的破十四片

雞子一枚去黃

納半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令三沸。去渣。

少少咽之不愈。再作三服。

(戊) 猪膚湯

猪膚四兩

水六杯煎三杯加白蜜半盞米粉三錢熬香分三服。

(己) 黃連阿膠雞子黃湯

黃連四錢

黃芩一錢

芍藥三錢

阿膠三錢

雞子黃一枚

水三杯煎一杯去渣入膠烊盡少冷入鷄黃攪令相得溫服。
一日三服。

(庚) 猪苓湯

猪苓

茯苓

瀉澤

滑石

阿膠

各三錢

水一杯先煮四味至一杯去渣入膠煎烊服。

(辛) 桃花湯

赤石脂八錢留一錢研末

乾薑五分

粳米四錢

水三杯煎八分。入石脂末一錢。調服。日作三服。

(壬) 大承氣湯見(五)之(己)

(十三) 厥陰證之方

(甲) 烏梅丸

烏梅九十三枚

細辛六錢

乾薑一兩

當歸四錢

黃連一分六錢

附子六錢炮

蜀椒四錢炒

桂枝

人參

黃柏

各六錢

各另研末合篩之。以苦酒浸烏梅一宿去核。飯上蒸之。搗成泥。入煉蜜共搗千下。丸如梧子大。先飲食。白飲服十丸。日三服。漸加至二十九丸。

(乙) 當歸四逆湯

當歸三錢 桂枝 白芍各二錢 甘草炙 木通各一錢五分
細辛一錢 紅棗五箇擘

水三杯煎八分溫服。寒氣盛者加吳茱萸生薑各二錢。老黃酒半杯同煎服。

(丙) 炙甘草湯

炙甘草二錢 桂枝 生薑各一錢五分 人參一錢 火麻仁
麥門冬 阿膠各三錢 生地八錢 大棗四枚

水酒各半煎。

(丁) 白頭翁湯

(戊) 白頭翁湯

白頭翁一錢 黃連 黃柏 秦皮各一錢五分

水二杯煎八分溫服

(己) 小建中湯

芍藥六錢 桂枝 生薑各三錢 炙草二錢 大棗四枚

水三杯煎一杯去滓入飴糖四錢烊溫服。

(庚) 茯苓甘草湯

茯苓 桂枝各二錢 炙草一錢 生薑三錢

水一杯煎一杯服。

次子家顥患極危險之傷寒證治愈記

民國十一年余就食於金陵刻經處眷屬從焉。次子家顥年十九歲。
夏歷六月二十八日渠忽覺身體不適頭痛目脹飲食減少終日臥
床摸其頭有微熱每日早晨似乎與常人之體溫無異下午則體溫
漸高大便每日一次小便短赤至七月初四後每日又加洩瀉一二
次余以其熱度時有時無且有時作冷疑係瘧疾之初期每日令其
服金雞納霜二三英釐至初六夜間忽便血一次初七日間便血三
四次是夜血又大下體溫驟減手足厥冷昏暈兩次一息僅存時已
夜半無處延醫余爲救急計乃以熱水瓶置其手足上每十分鐘與
以白蘭地酒一小匙匙中九分爲水一分爲酒每二十分與以極淡
之牛乳一小杯延至初八日清晨血雖漸止人則煩躁異常忽歌忽

罵。大有風狂之狀。乃延一日本醫生診視。告以已過之病狀。疑是傷寒證。渠謂非傷寒證。因傷寒證無第二週之初。卽便血者。余問此係何證。渠謂謂係單純之腸出血證。余謂無論如何。總須先將便血止住方好。渠以爲然。於是注射一次。並予藥水一瓶。藥粉一包。余試嘗之。均帶滷味。其爲止血藥無疑。照服其藥。血竟漸止。而體溫又覺漸高。至十七日體溫又高至百度。表三十九度餘。十八日血又大下。余知此日本醫生於病證全未看清。僅能以滷藥強止其血。其技斷不足恃。乃改延一中國人之習西醫者。詳告以種種證狀。渠亦謂係傷寒證。與余意見相合。詰以第二週之初。卽見腸出血似與醫書所載之證候不合。渠謂醫書所載。不過一種標準。不必人人均如是也。渠又用注射一次。所給之藥水藥粉。大約與日本醫生相仿。不過渠尙

知係傷寒證。日本醫生則並不知係傷寒證也。如此者又一週飲病證固未加劇。亦未輕減。余因此輩醫生均不可恃於是一概謝絕。自作主張。以布浸冷水繩其周身。稍熱即換。日夜不斷。此冷水繩身治傷寒之法。中西醫書均載之。前此問之中日兩醫。均以爲不可用者也。每日服阿片丁幾三次。每次七滴。另以次硝酸蒼鉍一克。分作三次服之。至於飲食一層。因余於其初便血時。即疑其爲傷寒證。故每日均給以極淡之牛乳。或極稀之藕粉三五次。每小時並給以極淡之白蘭地酒少許。從未許其食固體之物。如此者又歷一週。先則下血止矣。次則體溫復常矣。至八月初四五。居然可以起床。余仍禁其有急劇之動作。至九月中旬。忽又大便不通。體溫驟增。且少腹及右脅發生疼痛。余乃以灌腸器。每日灌腸一次。大便改通。體溫又減少。

傷寒自療

六二 上海大衆書局印行

腹右脅痛亦漸止。至十月上旬霍然愈矣。惟身體尙弱。每日仍予以滋養食品。至十一月中旬起居操作始復原狀。

傷寒自療終

