

醫方類聚卷之一百二十六

消渴門三

聖濟總錄二

消渴煩躁

消渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲且躁也內經謂諸躁狂越皆屬於火蓋以心腎氣衰水火不相濟故也

治消渴熱盛煩躁恍惚麥門冬飲方

生麥門冬三

去心

甘竹瀝三

合

小麥二

合知母兩



半蘆根二生地黄三

右六味剉如麻豆每用半兩水三盞煎至

二盞去滓入竹瀝少許分二服食後

治消渴心脾中熱煩躁不止下焦虛冷小便

多羸瘦蘆根湯方小蘆根剉內熱飲之

蘆根壹斤黃耆剉栝樓根牡蠣煨各知母

三生麥門冬夫心

右六味咬咀每服三錢匕水一盞煎取七

分去滓食後乘渴細服六

治煩渴不止咽乾躁熱昏悶翠碧丸方

青黛研麥門冬去心葛根剉各半夏湯洗

七偏切人參焙知母焙各半栝樓根三分天南

星牛膽攪寒水石火煨

右九味搗研為末麵糊和丸如梧桐子大

金薄為衣每服十五丸人參竹葉湯下食

後臨卧服

治消渴心脾實躁熱多渴化為小便知母飲

方取麻豆

知母焙切生蘆根各三兩土瓜根二兩黃芩去黑心

甘草炙各兩半龍齒三兩大黃二兩

右七味咬阻每五錢匕水三盞煎取二錢

去滓下生麥門冬汁二合食後分溫三服

治消渴及心藏躁熱飲水無度桑白皮湯方

桑根白皮剉人參切知母切麥門冬去心

枇杷葉刷去毛黃連去須炒葛根剉地骨皮

去微炙淡竹根洗去土暴乾

右九味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓食前服日再

治消渴心中煩躁黃耆湯方

黃耆剉白茅根剉麥門冬去心白茯苓去

皮各三兩石膏八兩車前子去土五兩甘草二兩半

右七味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至

一盞去滓空腹溫服

治消渴發熱心神煩躁引飲麥門冬湯方

麥門冬去心黃耆剉黃連去須桑根白皮剉

石膏二兩知母焙生天門冬去心白蜜鍊

合

右二味先以水五盞煎天門冬至三盞新  
汲水淘四五過漉出別以熟水壹盞下蜜  
攪勻瓷餅貯湯天門冬五日密封每食後  
食壹兩

治丹石發關節毒氣不宣心肺躁熱渴不止  
飲水旋作小便久即為癰疽發背茅根飲方

白茅根剉一兩 桑根白皮剉二兩 麥門冬去心  
白茯苓去黑皮 露蜂房炙黑色

右五味擣篩如黍米粒大每服四錢匕水  
一盞半入竹葉十餘片細剉棗二枚擘同  
煎至八分去滓食後服

治消渴胃膈煩悶躁渴飲水無度人參飲方

人參去黑皮 白茯苓去黑皮 甘草炙各半兩 麥門冬去心

右四味咬咀如麻豆大以水五盞煎取二  
盞去滓溫頓服之

治消渴口乾煩躁飲水無度鉛白霜丸方

鈎白霜

兩半

青黛

兩

栝樓根末

壹

竜腦

錢

右四味細研勻鍊蜜和凡梧桐子大每服

二十九煎竹葉湯嚼下食後日三

治消渴煩熱白礬丸方

白礬

燒令汁盡

鈎白霜

各壹分

右二味細研令勻鍊蜜和丸如雞頭大縣

裹含化嚙津

治消渴煩熱心中狂亂葛根汁方

生葛根

去皮五斤細切水杵臼中爛搗研如泥淨布摺取汁一瓷碗

白

蜜

右二味同攪勻不限早晚渴即飲一盞量

力飲之類服亦不損人

治消渴心胃煩燥黃連丸方

黃連

去須栝樓根

甘草

炙

梔子

人壹兩半

和香豉

炒黃二兩半

心右五味搗羅爲末鍊蜜和劑更於鐵白內

煎塗酥杵勻熟丸如梧桐子大午食後溫漿

水下三十九

消渴口舌乾燥

脾主口心主舌消渴口舌乾燥者邪熱積於  
心脾津液枯耗不能上湊故也其證飲食無  
味善渴而口苦治法當滌去心脾積熱使藏  
真濡於脾則愈  
治消渴口乾脣焦心脾藏熱唯欲飲水茯苓

湯方

白茯苓去黑皮 麥門冬去心焙 石膏五兩 茅根  
升麻升 黃連升 龍膽升 黃芩升 犀角升 前胡升 知母升 鹿角升 龜甲升 龍骨升 牡蠣升 蜃炭升 石蜜升 白蜜升 白蜜升 白蜜升

右四味升 麤搗篩每服四錢匕水壹盞半入  
冬瓜一片同煎至七分去滓溫服不拘時  
治消渴口舌乾燥四肢痠疼日晡頰赤煩悶  
升麻丸方

升麻升 黃連升 龍膽升 黃芩升 犀角升 前胡升 知母升 鹿角升 龜甲升 龍骨升 牡蠣升 蜃炭升 石蜜升 白蜜升 白蜜升 白蜜升

右十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服二十九不拘時溫漿水下

治消渴唇乾舌燥枸杞湯方

枸杞根剉二兩石膏碎一兩小麥壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時候

治消渴口舌乾燥麥門冬丸方

麥門冬去心焙生乾地黄焙升麻去心黃芩去心

心黃連去心黃蘗去皮人參去心栝樓實去心苦

參各二兩

右九味搗羅為末以牛乳和衆手左如梧

桐子大每服二十丸至三十丸米飲下

治消渴口乾舌燥地黄煎方

生地黄三斤細切生薑半斤細切麥門冬去心

右三味壹處於石臼內搗爛生布絞取自

然汁用銀石器盛慢火熬稀稠得所以瓷

合貯每服壹匙用溫湯化下不拘時

治消渴口乾喜飲水小便數心煩悶健忘怔

松麥門冬丸方蘇干

麥門冬去心土瓜根剉山茱萸去心鹿茸酒

炙去牛膝去苗狗脊碎切去毛茯神去木人參各

黃連須去菟絲子酒浸壹宿暴乾別龍骨燒

牡蠣煨各

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十丸不拘時煮小麥飲下加至

三十九丸

治消渴口乾日夜飲水無度渾身壯熱冬瓜

飲方

冬瓜壹枚重三斤去皮麥門冬法心黃連

去須壹兩半右三味以二味麤搗篩作十二服每服水

三盞入冬瓜壹片擘碎同煎至壹盞去滓

瀉服日三夜二

治消渴飲水不止小便中如脂舌乾躁渴喜

飲栝樓丸方

栝樓根五兩黃連去須壹兩浮萍草

右三味搗羅為末用生地黃汁半盞於石

臼內木杵搗令勻再入麵糊丸如梧桐子

日內木杵搗令勻再入麵糊丸如梧桐子



大每服三十食後臨卧牛乳湯中下日三煎菖蒲湯下亦得

治消渴膈熱咽乾止煩渴生津液烏梅湯方

烏梅肉炒二兩茜根剉壹兩黃芩去黑心壹分葛根

剉人參壹兩白茯苓去黑皮壹兩甘草炙各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

八分去滓不拘時溫服

治消渴口舌乾燥煎丸方

生地黄取汁二升半生栝樓根取汁二升半羊脂碎切

半白蜜壹斤黃連去須壹斤別搗為末

右五味先取地黃汁等四味入銀石器內

慢火煎令脂消熟傾出將黃連末同搗令

得所衆手丸如梧桐子大每服二十九粟

米飲下日三五服

治消渴日夜飲水不止小便利地骨皮飲方

地骨皮剉土瓜根剉栝樓根剉蘆根剉各壹兩

麥門冬去心焙二兩棗七枚去核

右六味剉如麻豆每服四錢匕水一盞煎

取八分去滓温服不拘時

治消渴口舌焦乾精神恍惚栝樓根湯方

栝樓根切黃連去須石膏碎各三兩枸杞葉切半斤

甘草炙二兩

右五味麤擣篩每服四錢匕水一盞煎下

七分去滓不拘時温服

治消渴口乾小便數茅根湯方

茅根剉蘆根剉菝葜細剉各二兩石膏碎半兩烏

梅去核炒淡竹根剉

右六味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半煎

取壹盞去滓温服不拘時

治消渴腎藏虛損腰脚無力口舌乾燥磁石

湯湯

磁石壹兩半擣如麻粒大先以水淘去赤

煎黃耆剉地骨皮剉生乾地黄焙五味子

桂皮去麤枳殼去麤檳榔剉各半兩

右八味七味麤擣篩分爲五貼每貼先用

水三盞與磁石壹貼同煎至壹盞半去滓

分二服

治消渴舌乾引飲麥門冬湯方

生麥門冬

去心壹兩半

栝樓根

三兩

竹茹

各五兩

小麥

三合

烏梅

去核七枚

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至一盞去滓溫服不拘時

治消渴舌乾體瘦方

枸杞根白皮

小麥

生麥門冬

去心各壹升

右三味以水壹斗煮取五升去滓渴即飲

之

治口中乾燥無津液而渴豬膽煎方

雄豬膽

一枚定粉兩壹

右二味以酒煮膽候皮爛即入粉研細同

煎成煎丸如雞頭大每服二丸含化嚙津

煎消渴腹脹

脾土制水通調水道下輸於膀胱消渴飲水

過度內潰脾土土不制水故胃脹則為腹滿

之疾也內經謂水為陰腹者不陰之所居是

以水飲之證先見於腹滿

治久患消渴小便數服止小便藥多渴猶不止小便復澀兩肋連膀胱脹悶急妨心胃煩熱赤茯苓丸方

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉

防已

令

麥門冬

去心焙各

木香

郁李人

湯浸去皮焙各一兩研

右六味先搗前五味細羅為末與郁李人

研冷勻鍊蜜和為劑更於鐵臼內酥杵令

勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎木通棗

湯下三十九至晚再服漸加至五十九

治消渴腹脅虛脹心下滿悶旋復花湯方

旋復花

淨擇去莖葉微炒

桑根白皮

剉各一兩

紫蘇

并內莖

犀角

銹各半兩

赤茯苓

去黑皮 陳橘皮

湯浸去白微炒

右六味麤搗篩每七錢匕水三盞入棗二

枚擘生薑半分拍破搯鼓半匙同煎至壹

盞半去滓分溫三服每食後壹服如人行

十五里已來更壹服

治消渴飲水過多心腹脹滿或脅助間痛腰  
腿沉重人參湯方

人參 芍藥 各壹兩 大腹子 兩枚慢灰 葛根

剉 赤茯苓 去黑皮 黃芩 去黑心 桑根白皮 剉知

母 焙各一兩 萎蕤 一分 枳殼 去瓢 炒三分

右十味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

薑如棗大拍破煎至七分去滓空心溫服

食後夜卧再服

治消渴飲水過多心腹脹滿木香湯方

木香 枳殼 去瓢 炒 半夏 湯洗七遍 芍

藥 檳榔 灰火 煨過 人參 桑根白皮

剉 黃耆 剉 草豆蔻 去皮 各 桂 去 龜皮 枇杷

葉 去毛塗蜜 慢 火炙青兩

入右一十一味麤搗篩每服四錢匕水壹盞

半入生薑如棗大拍破同煎至八分去滓

食前服日三

治消渴喉乾不可忍飲水不止腹滿急脹麥

門冬湯方

麥門冬

去心 烏梅 去核取肉 炒各二兩

右二味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓食後溫服日三

半消渴後虛乏火解蘇同煎至八分

久病消渴之人榮衛不足筋骨羸劣肌膚瘦瘁故病雖差而氣血未復乃為虛乏又有緣少服乳石而消渴者病後津液虛竭經絡不澀亦令虛乏須防癰疽之變救治之法所不可忽

治消渴後四肢羸弱氣虛乏地黄生薑煎丸

方

生薑汁升一 生地黄汁升五 蜜二斤綿 生麥門

冬升三 牛脛骨內髓 茯苓神木 甘草炙 石

斛去根 黃連去須各 枯樓根兩五 五味子微炒 知

母焙 人參當歸 切丹參各二 肉蓯蓉酒浸

切焙三兩 除前五 外味茯苓 地骨皮升二 胡

麻人升二 萎蕤兩五 生竹根升三

右二十味先以水壹斗五升煮地骨皮等

四味至水四升絞去滓下麥門冬地黃汁  
再煎五六沸却下蜜體薑汁再煎至七升  
為膏稀稠得所入前件藥末和為丸如梧  
桐子大不拘時候竹葉湯下三十九

治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風取  
冷患脚氣發動兼消渴後虛乏腎脉細弱阿  
膠湯方

阿膠二乾薑二麻子一遠志四附子壹

右五味除阿膠搗篩麤散以水七升煮取

二升半去滓內膠令烊分三服說云小便  
利多白日夜數十行頻服良

治消渴後氣乏體羸腿脛細瘦菴蓉丸方

肉菴蓉酒浸切焙黃耆剉牛膝去苗酒浸切焙車前子

革薺白茯苓去黑皮地骨皮黃連須去檳

榔煨各壹山芋菟絲子酒浸別搗蒺藜子炒

角人參白芍藥各壹兩澤瀉桑螵蛸

炒各枳殼去瓢生乾地黃焙二

右一十八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服空心粟米飲下三十九

治消渴後虛乏鍾乳丸方

鍊成鍊乳粉續斷熟乾地黄焙石韋

去毛各杜仲去麤皮剉炒天雄炮裂去皮

山茱萸白蛇牀子遠志去心肉蓯蓉酒

切焙各壹防風去山芋根石斛去根赤石脂

各壹兩甘草炙牛膝酒浸切焙石韋火

右壹十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服三十九溫酒平下三十九

治消渴後虛乏填骨煎方

白茯苓去皮菟絲子酒浸焙山茱萸當

歸切焙各肉蓯蓉三兩酒大豆炒去皮石

韋去毛牛膝酒浸切焙巴戟天去心麥門冬去

各二天門冬去心五味子白人參遠

志去心杜仲去麤皮附子炮裂去石斛

去根各盡入煎煎煎煎煎

右一十七味搗羅為末用生地黃生括樓

根各三斤搗絞取汁以銀石器慢火煎減



半然後內藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜食如雞子黃大米飲下日三蒸末不必盡入惟看稀稠得所佳

治消渴羸瘦小便不禁鈆丹散方

鈆丹研一兩 栝樓根三兩 黃連去須 白石脂各一兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕食後以漿

水調下

治消渴肌膚羸瘦或轉筋小便利甚栝樓根散方

栝樓根 黃連去須 防已 鈆丹研各壹兩半

右四味搗羅前三味入研鈆丹和勻每食後良久煎醋壹合水二合調三錢匕日二

服

消渴小便白濁

消渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流胞中與水液渾濁隨其小便利下膏凝故謂之消渴小便白濁也

治消渴小便白濁如脂腎澀湯方

白羊腎壹具去脂膜切黃耆剉杜仲剉五味子

生薑切各壹兩生乾地黄焙一兩人參半兩棗五枚

去磁石碎綿裹磁石三兩其小者碎不碎者別剉

右九味除羊腎磁石外剉碎分為二劑先

以水四升煎腎與磁石及二升去腎然後

下諸藥再煎取八分去滓分二服食前

治消渴府藏枯燥口乾引飲小便如脂鐵粉

丸方研水飛過乾雞腕胫陰乾五枚炙熟黃連去須

鐵粉研水飛過乾雞腕胫陰乾五枚炙熟黃連去須

三牡蠣炒研如末右四味洗搗二兩末此羅為末再與鐵粉牡

蠣研白鍊蜜和劑以酥塗杵熟搗丸如梧

桐子大每服三丸食前煎粟米飲下漸

加至四十九

治消渴小便濃濁如麩汁此為腎冷金牙石

湯方

金牙石搗碎厚朴去蘆皮塗生薑汁炙熟石苜蒲各

兩貝母煨去心烏梅去核炒葶藶子剉別搗

半兩

頭

三桂皮去麤高良薑菟絲子酒浸兩宿暴

各半兩右九味先尋人味為麤末次入金牙石再

研勻每服三錢匕水一盞以棗仁救苦核

煎七分去滓早晚食前溫服升大器然從

治消渴飲水不知休小便中如脂香乾口渴

黃連九方括樓根各五右二味搗羅為末生地黃汁和劑石臼內

用木杵塗酥搗勻熟丸如梧桐子大每服

三十九食後牛乳下日二白治消渴下冷小便濃白如泔嘔逆不食葶

藶力方慢火炒別搗枳殼去桂去麤

葶藶干如膏膏兩半白茯苓去黑花胡去鼈甲去羊角鎊防風去菟絲子酒浸兩宿焙牛膝去安息

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

香各三陳橘皮湯浸去白右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵

類聚

十一

搗勻熟丸如梧桐子大每服三十九丸空腹

酒下

治消渴飲水極多肢體羸弱小便如米泔腰

膝冷痛諸方不能治者山茱萸丸方

山茱萸 栝樓根剉 土瓜根剉 苦參 龍

骨細研各一兩半 黃連去須三兩半

右六味先搗羅五味次入龍骨再研勻用

生栝樓汁和劑酥塗杵搗勻熟丸如梧桐

子大每服三十九丸食後煎白茅根飲下日

三消渴中者熱五胃而消渴為食小便黃赤

治消渴尿脂小便如泔肉菘蓉丸方

肉菘蓉去皺皮酒浸切焙 澤瀉兩 五味子益 巴戟

天去心 當歸切焙 地骨皮各壹兩 磁石煨醋淬

人參 赤石脂各壹兩半 韭子炒 白龍骨 甘

草炙 牡丹皮各壹兩 熟乾地黄煨壹兩 禹餘糧

人煨 桑螵蛸炙四枚 土熟地斷不煨 冬食

右一十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十九以牛乳下日三

類聚

十一

拔粹方

消渴

人參石膏湯治膈消上焦燥渴不欲多食

人參半兩石膏一兩知母七錢○壽域甘草

四錢○神方無

右為麤末水煎食後東垣加黃芩杏仁○

袖珍方右咬咀每服一兩小二盞粳米一

撮煎至一盞神方七分去渣通口服無時

順氣散消中者熱在胃而能飲食小便黃赤

以此下之不可多利微微利至不欲食而愈

厚朴製壹兩○袖珍方四錢○袖珍積實

二錢神方右判水煎食遠服○袖珍方右咬咀水二

盞煎至一盞去渣通口服無時

茴香湯治腎消病在下焦初證小便如膏油

之狀

茴香炒葛練炒各甘草兩○袖珍

右為細末每服三錢溫酒一盞調服食前

外右為細末每服三錢溫酒一盞調服食前

化水丹治手足少陰渴飲不止或心痛者

川烏頭大者四個炙甘草二兩牡蠣生用蛤

粉六兩用厚者炮

茜右為細末醋浸餗餅少糊為丸桐子大每

服十九十五九新水下心痛者醋湯下其

疾立愈煎食或煎○歸身○廿粒○水二

消渴之疾三焦受病也有上消有消中有消

腎上消者肺也多飲水而少食大便如常

小便清利知其燥在上焦也治宜流濕以

潤其燥

消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消

穀知其熱在中焦也宜下之

消腎者初發為膏淋謂淋下如膏油之狀至

病成而面色鰲黑形瘦而耳焦小便濁而

尿有脂液治法宜養血以肅清分其清濁而

自愈也

黃連膏狀如漆大黃二兩生地黄二兩白蓮花藕汁

黃連末壹斤生地黄自然汁白蓮花藕汁

類聚重刊

牛乳汁各一斤石將油熬成膏子刺黃連末為丸桐子大每服二十九少呷溫水送下日進十服渴病立止

八味丸治消腎方見諸虛門以煎諸食其帶鹹而

醫方大成面赤發熱汗數面黃熱不渴渴而

消渴發熱汗數面黃熱不渴渴而

和劑方五苓散治伏暑發渴引飲無度醫方集成

南北經驗方補珍方承類和劑方清心蓮子飲治心經蘊熱作渴飲水

小便赤澀醫方集成南北經驗方補珍方同方見諸淋門承類鈐方方見血病

和劑方玄兔丹治腎水枯渴心火上升消渴引飲醫方集成南北經驗方補珍方同方見諸虛門

和劑方八味圓治心腎不交消渴引飲一方除附

子加五味子名腎氣圓醫方集成南北經驗方補珍方同方見咳嗽門承類鈐方方見諸

虛門南北經驗方同方見諸秘方烏梅五味子湯專治消渴生津液

五味子巴戟酒浸去心百藥煎 烏梅 甘

真經重刊

草各等分

右咬咀每服四錢水壹盞空心煎服醫方集成

南北經驗方補珍方永類鈔方同

秘方茯苓圓治三消渴疾累有有效

五倍子快穰蓮肉附龜骨煨附左顧牡蠣

右用茯苓二兩為末煮糊圓如梧桐子每

服五十圓空心塩湯下仍兼服靈砂黑錫

補珍方靈砂黑錫

三消渴治一兩水二盞煎一蒸去渣

補腎地黄丸降心火益腎水治消渴降骨蒸

壯筋骨明眼目黃柏同地黃

生地黄半斤酒浸二日蒸爛黃柏官斤割

乾麥門冬去心枳殼二兩揀參二兩鼠苓三兩

當歸酒洗熟地黄酒浸天門冬二兩甘菊二兩

生者一兩白茯苓四兩

右為末滴水丸如桐子大每服七十丸空

心塩酒下和劑若白杵千下



止渴散治霍亂煩渴

甘草 麥門冬 茯苓 桔梗

天花粉 葛根 澤瀉

右為末每服二錢蜜湯下不拘時候

人參散經驗止渴及瀉後除煩渴常服調和

和氣 茯苓 人參 乾葛 藿香 木香

甘草 各宜 錢半 小 大 益 神 水 命 滋 潤 世 蒸

右改咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣

通口服加滑石亦可

五豆湯能解酒毒止消渴能發小兒痘疹不

出并解發渴之証

黑豆 黃豆 菜豆 青豆 赤小豆

升乾葛 一斤 甘草 一斤 貫衆 一斤

右前藥俱不到川水五斗騰入日用大鍋

熬至熟濾出豆汁冷以磁甕盛之箬葉紙

重封春夏月開用酒後渴隨意飲大人渴

示後生成瘡瘍小兒豆瘡不出皆可飲妙

類聚聖方

三五

永類鈴方

雜病瘡渴

下虛上熱而渴菝葜根每服一兩水二盞半  
 煎減半日一二服渴減只二服又線絲湯  
 放冷服一二椀良 稗灰汁亦佳食時勿  
 令病人知之 五月蠶沙煎湯放冷一服  
 尤效  
 脾約小便數而渴脉浮濇而大便難屬麻仁  
 元

竹葉石膏湯治大病後表裏俱虛內無津液

煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡

寒身不疼痛不可汗下並宜服亦見傷寒門

木事火府丹治心驚熱小便澁及治五淋許

學士治一卒日飲斗水病渴不食三月心下

煩悶已卜月以心經伏熱用此方數服而愈

生地黃二兩木通下黃芩各乙

右細末蜜元梧子大每三十元木通煎湯

下

醫說治消渴每日食北黎以安為度

經驗良方同

食菓實與酒過度雖能食而多飲水渴而數

溺以麝香當門子以酒濡之作十許元取

枳椇子煎湯下麝香敗酒壞菓實枳椇亦

敗酒

經驗秘方

治消渴用羊美兒壹个苦豆壹升水斟酌用

同煮爛為度湯肉俱要患人喫了便可

經驗良方

消渴

治消渴日飲水一石小便不禁

雞內金

即雞近內黃

菠薐根

右等分為末米飲調下二錢

又方稟賦弱小便數亦不禁

五味子

四兩熟地黄

六兩肉苁蓉

八兩兔絲子

二兩

酒浸

右為末酒煮山藥末為糊丸如梧桐子大

每服二三十丸米飲下

大治消渴方白虎湯方見傷寒門去桂五苓散益

元散方並見諸暑門

醫林方

治焦渴出子蘿蔔根曬乾為末每服一二兩

用水熬渴時飲之三服即愈

又治焦渴石黃連為細末不以多少用冬菘

汁浸黃連末浸曝九通用黑豆湯調下三

錢宣明論中降雪散亦可服之

神效名方

治消渴

揀黃連二兩八節者

右剉如咬咀以水一椀煎至半椀去滓頓

服之立止衛生易簡方同

百日還丹

佛茄子已上各等分獐柳根

臨右為末枸杞汁和為丸如雞頭大每服

鼠丸新水送下

玉機微義消渴

王治熱之劑

局方清心連子飲

調胃承氣湯治消中熱在胃而能飲食小便

赤黃方並見傷寒門

三因真珠丸方見本方

按此心胃經藥也以上三方有輕重之殊

宜選使

治燥之劑

東垣當歸潤燥湯 清涼飲子方並見本方

按已上脾心肝腎藥也

清氣之劑

局方人參白虎湯治高消上焦燥渴不欲多

食方見諸熱門

東垣蘭香飲子方見本方

按已上三方主上中二消之劑肺胃經藥

也

滋陰之劑

丹溪補陰丸方見諸虛門

局方加減八味丸治腎虛消渴引飲

金匱腎氣丸減附子加五味

右服如本方法要略治男子消渴小便反

多仍用本坊

簡易地黃飲子方見本方

按此心腎脾肺藥也已上三方主下消之

劑

朱砂黃連丸方見得効方

按此心脾藥也上消之例

清氣滋陰之劑

局方黃芪六一湯方見澹寮方

按此肺腎脾三焦命門之劑也

東垣生津甘露飲子方見本方

按此肺胃心腎藥也東垣曰此制之緩也

不惟不成中滿亦不傳下消之三消皆可

用

宣明麥門冬飲子方見衛生寶鑑

按此肺腎脾胃藥也

禱方

丹溪方

黃連末 天花粉末 生地黄汁 生藕

汁

右二物汁為膏入上藥搜和入牛乳佐以

姜汁和蜜湯為膏徐徐留於舌上以白湯

少許送下

機要方無天花粉有牛乳汁

二汁熬膏和末為丸桐子大每二十九少

呷溫水下日進十服

急救仙方

治消渴神効散

白芍藥 甘草

又右等分為粗散每服三錢仲水壹盞半煎

八分去滓服不拘時日三服疾止則已

衛生易簡方

衛生易簡方

治消渴用霜降後葵根皮一握水一斗煮取

三升服之但酒渴傷寒渴皆治

又方用栝樓根大尺圍者生取汁服之或煮水服

又方用白藥爲末每服方寸匕冷水調下亦可蜜丸如桐子大每服二十九日二服

又方用黃丹砂胡粉炒赤石脂白石脂石膏澤瀉各五分另研甘草炙栝樓根各十分爲末共再研勻水調方寸匕日三服少壯服七半渴甚者夜間二服

又方用生牛乳頓飲渴時再飲自便不渴大患不過十次

治渴若遠行無水用水花卽水沫和苦栝樓爲丸早朝預服三十丸永無渴  
治消渴小便多用栝樓五兩水五升煮取四升隨意飲之良

治心熱或酒多消渴用朱砂壹兩別研黃連三兩生地黄二兩爲末煉蜜丸如桐子大每服五十九燈心棗子煎湯送下



治一切消渴不能止者用米以冷水濃淘汁

注澄清飲之俟至酸飲尤佳

余匱鈎玄

消渴

養肺降火生血為主對分上中下治

治法黃連末天花粉末人乳生地

黃汁生藕汁以二汁為膏入土藥搜

和再入薑汁并蜜調成膏頻頻放舌上以

少許白湯送下能食者內加軟石膏即寒

水石

瓜萇根治消渴之神藥瀉者先用白朮白芍

藥炒為末調服後却服前膏

消渴食治

千金方

消渴

治大渴秘方以青粱米煮取汁飲之以瘥止

食醫心鑑備預百要 ○壽親養老書治老

人消渴壯熱燥不安兼無力青粱米飲方

青粱米升淨洗淘右以水三升和煮之

渴即漸飲服之極治熱燥並除

治尿數而多者方羊肺一具作羹內少羊肉

和鹽豉如食法任性食不過三具

食醫心鑑

論消渴飲水過多小便無度食治諸方

凡消渴有三一日消渴二日消中三日消腎

渴而飲水小便多者聖惠方若飲水多者小便又少名曰消

渴與食多不甚渴小便數漸消瘦者名曰消

中渴而飲水不絕腿膝瘦弱小便濁有脂液

者名曰消腎此蓋由積久者食鹹酸聖惠方鹹物炙

肉飲酒過度無有不成消渴然本草云人寒

凝海唯酒則不冰明其酒性酷熱物無以喻

此之二味聖惠方喻酒徒耽者不離其口酣

醉之後制不由已飲噉無度加以鮓醬不擇

鹹酸積長夜聖惠方積酣飲不懈遂使三焦

猛熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不

渴治之愈不愈屬在病者若能如方節慎旬

月聖惠方而瘳不自愛惜死不旋踵方雖有

效其如不慎者何其所慎者有三一酒二房

室三鹹酸麪食能慎此者雖不服聖惠方雖

自可無他不防此者縱金丹不救良可悲夫

宜深思之聖惠方此下云今以飲

治消渴口苦舌乾骨節煩熱方聖惠方

枸杞根升桑白皮切一生麥門冬壹升小

麥壹升石以水壹斗煮取五升去滓渴即飲之備

預

百要方同

治消渴傷中聖惠方小便無度方聖惠方名

黃雌雞一隻治如法

右煮令極爛漉去雞停冷取汁飲之○聖

惠方右以爛煮取肉隨意食之其汁和豉

汁粥食之亦妙

治傷中消渴口乾小便數方聖惠方

野雞青隻治如法

右煮令極熟漉雞出渴即飲其汁○聖惠

方右以水五大盞煮取三大盞渴即取汁飲之肉亦任性食之別後方同

治消渴日夜飲數斗水小便數瘦弱方

猪肚壹枚淨洗

右以水煮令極熟著少豉汁和煮渴即飲

汁飢即食肚此方治消渴

治消渴飲水不知足方

兔骨一具肘後方

右以水煮取汁飲之

治消渴口乾方

鹿頭一枚治如

右蒸令極熟醬醋食之

治補虛羸止渴牛乳方取牛乳不揀冷煖任

性飲之備預百要方同○聖惠方治痲渴口乾小

便數右取牛乳微溫飲之生飲令人利熟

飲令人渴故宜微溫與馬乳功同直指方

治渴疾生牛乳細呷壽親養老書治老人

消渴煩悶常熱身體枯燥黃瘦牛乳方牛

乳一升真者微熬右空心分爲二服極補益五藏令人強健光悅

治消渴發動無時飲水無限方蘿蔔罽紋取

汁一升頓服之立定肘後方同○聖惠方生蘿

蔔五枚右搗揆取汁壹大蒸攪粥作飲頻喫

甚效神巧萬金力同

治消渴口乾方

苽蔣草根半斤葱白一握切冬瓜一斤切

右於豉汁中煮作羹食之

又單方煮豉停冷渴卽飲之

又方大小麥米煮粥飲食之備預百要方同

又方青小豆煮和粥飲食之

治虛冷小便數方

雞腸一具治如食

右切作臠和酒飲之

聖惠方

食治三瘡諸方

治瘡渴飲水不止方

黃丹三分 菰蘆根末 葱白握 白麩兩 薤

白壹握

右件黃丹等末以水和麩浚作餈餈樣即先煮葱薤白令爛熟即內餈餈煮之令熟即并汁食之神巧萬全方同

治三疳心熱氣逆不下食宜喫杏酪粥方

煎成濃杏酪青黃牛乳壹大麥人三合折

右件藥依常法煮粥食之入白錫沙糖和之神巧萬全方同更大美也

治疳渴菰蘆粉方治疳小疳

菰蘆根多取削去皮二月三月

右於新瓦中磨訖以水淘生絹袋同如造

米粉法曝乾熱渴時冷水調下一錢服之

大效神效

治三疳小便數宜喫羊肺羹方

羊肺一具治精羊肉五兩粳米半葱白五

切生薑少蒜醋等

右相和依常法作羹飽食之神巧萬全方同

治瘡渴口乾心神煩躁宜喫菰蘆羹方

菰蘆根 半斤 冬瓜 半斤

右切作小片子以豉汁中煮作羹食之

又方右單煎豉汁停冷渴即飲之亦佳

治瘡渴神效煮兔方

兔 壹枚 新桑根白皮 半斤

右剝兔去皮及腸胃與桑根白皮同煮爛

熟為度盡力食肉并飲其汁即效

治瘡渴飲水日夜不止口乾小便數方

田中螺 五升

右以水一斗浸經宿每取壹大盞入米一

合煮作粥食之如渴即飲其水甚效 肘後方水

壹升衛生易簡方 壹斗 浸經宿飲之每日易

肘後方

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴

雉一隻細切和塩豉作羹食

聖惠方治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二

兩搗碎以水三大盞煎取二盞去滓下糯

米二合煮粥溫溫食之効

必用全書

食治老人煩渴熱諸方

枸杞飲方治老人煩渴口乾骨節煩熱

枸杞根白皮壹升小麥壹升淨淘粳米三合

右以水一斗煮二味取七升汁下米作飲

渴即漸服之極愈必用之書壽親養老書同

大麥湯方老人煩渴不止飲水不定轉渴舌

捲乾焦

寒食殘大麥二升赤飴二合

右以水七升煎取五升去滓下飴調之渴

即服愈必用之書壽親養老書同

黃雌雞羹方治老人煩渴小便黃色無力

黃雌雞壹隻如常法粳米二合葱白壹握

右切雞和煮作羹下五味少著搗碎心食

之漸進常効必用之書壽親養老書同

猪肚方治老人消渴熱中飲水不止小便無

度煩熱



猪肚一具肥者豉五合葱白壹握

右煮令爛熟下五味調和空心切漸食之

渴即飲汁亦治勞熱必用之書壽親養老書同

兔頭飲方治老人煩渴飲水不足日漸羸瘦

困弱最効常服

兔頭一枚淨洗常服

右以加鼓心五合水七升煮取五升汁渴

即漸飲必用之書同

青豆方治老人消渴熱中飲水無度常若不足

青豆二斤○壽親養老書二升淨淘

右煮令爛熟空心食之渴即飲汁或作粥

食任性益佳必用之書同

冬瓜羹方治老人消渴煩熱心神狂亂躁悶

不安人熱

冬瓜半斤豉心二合葱白半握

右以和煮作羹下五味調和空心食之常

作粥尤佳必用之書壽親養老書同

鹿頭方治老人消渴諸藥不差黃瘦力弱

鹿頭壹枚炮去毛○必用之  
書壽親養老書淨洗之

右煮令爛熟切空心日以五味食之并服

汁極妙

壽親養老書

治老人煩渴藏府乾枯渴不止野雞臠方

野雞壹隻如常法葱白壹握粳米二合細研

右切作相和羹作臠下五味椒醬空心食

之常作服佳妙

治老人消渴消中飲水不足五藏乾枯蘆根

飲子

蘆根切壹斤水壹斗煎取七升半青粱米五合

右以煎煮飲空心食之漸進為度益効忌

鹹食炙肉熟麵等日以土不可煎食則益

消渴禁忌西氣事食而酸熱食難辨

巢氏病源

消渴候白豆合煎噉食之

養生法云人睡卧勿張口久成消渴及失血

色赤松子云臥閉目不息十二通治飲食

不消

大全本草人銀... 孫真人云赤白豆合魚鮮食之成消渴  
得效方

凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎炙糟穢  
物及一切熱物白日以上不可鍼灸則瘡

中牛膿水或成癰疽膿水不止則死

備預百要方

此病飲酒及喫鹹酸過度所致克慎酒味房

室鹹酸麵食不慎此者不可理也

又消渴鍼灸

千金方

消渴烟喉乾灸胃管下輪三穴各百壯穴在

背背第... 椎下橫三寸開寸灸之

前堂五... 壯又灸足太陽陽五十壯

消渴口乾不可忍者灸小腸輸百壯橫三間

前寸灸之

...

消渴口乾煩悶灸足厥陰百壯又灸陽池五

壯壯者不可忍若灸小淵神百壯對三間

消渴欬逆灸手厥陰隨年壯七壯消渴

消渴小便數灸兩手小指頭及足兩小趾頭

並灸頭椎佳胃管下舖三穴各百壯穴亦

又灸當脊梁中央解間一處與腰目上兩處

下並三處

又灸背止脾輸下四寸當俠脊梁灸兩處凡

諸灸皆當隨年壯此又灸腎輸二處

又灸腰目在腎輸下三寸亦俠脊骨兩傍各

壹寸半左右以指按取關元一處又兩

傍各二寸二處

又陰市二處或三二列灸相去一寸名曰腎

系者黃帝經云伏兔下一寸曲泉陰谷陰

陵泉復留此諸穴斷小行最佳不損陽氣

亦云止遺溺也太谿中封然谷太白大都

跌陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各壹

百壯腹背兩脚凡四十七處其腎輸腰目

關元水道此可灸三十壯五日壹報各得壹百五十壯佳涌泉一處可灸十壯大敦隱白行間此處可灸三壯餘者悉七壯皆五日壹報滿三灸可止也若發灸諸陰不愈宜灸諸陽諸陽在脚表并灸肺輸募按流注孔穴壯數如灸陰家法一十七壯小便數而少且難用力輒失精者令其人舒兩手合掌併兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉際肉際方

後自然有角令炷當角中小侵入爪上此兩指共用一炷也亦灸脚大趾與手同法各三炷而已經三日又灸之

袖珍方

消渴

近世醫者不審病証何從而得不明虛實每以補藥投之遂致不救可惜也乃積熱也痺者熱也復以熱藥與之是乃實之服補藥卽寸口脉芤其人下熱卽不可治也甚

者吐血而死有一灸法甚妙令病人豎其  
兩手剪去中指甲於兩手中指頭上各灸  
一炷如大豆令兩人發火仍令兩人吹去  
各指尖上艾焙其火必爆再用艾焙兩個  
兩脚而二處太衝脉上亦依前法兩人發  
火吹之亦爆高五六寸四个艾焙有四个  
小孔處此其驗也其人立飲食黃色遽退  
更先灸百會穴一焙如前法吹之萬不失  
一矣

消渴導引

巢氏病源

消渴候

法云解衣惓卧伸腰瞋少腹五息止引腎去  
消渴利陰陽解衣者使無罣礙惓卧者無  
外想使氣易行伸腰使腎無逼蹙瞋者大  
努使氣滿小腹者卽臍腹牽氣使上息卽  
爲之引腎者引水來咽喉潤上部去消渴  
枯槁病利陰陽者饒氣力此中數虛要與

時節而為避初食後大飢時此二時不得  
導引傷人亦避惡日時節不和時亦避導  
已先行一百二十步多者千步然後食之  
法不使大冷大熱五味調和陳穢宿食蟲  
蝎餘殘不得食少眇著口中數嚼少滯咽  
食已亦勿眠此名穀藥并與氣和即真良  
藥

水腫門一

目錄

論

水腫門二

金匱方

水氣病脉證并治

防已黃耆湯

越婢加朮湯

湯干杏子湯

桂枝加黃耆湯

越婢湯

甘草麻黃湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝去芍藥加麻黃細

防已茯苓湯

麻黃附子

湯

細

辛附子湯 枳朮湯 防已黃耆湯

千金方

水腫

中軍候黑圓 大豆散 麥門冬飲

徐王煮散 漢防已散 茯苓圓 澤漆

湯 猪苓散 苦瓠圓 麻黃煎 大豆

散 麻子湯 摩膏 麝香散

千金月令

聖惠方

治十水腫諸方

神効葶藶散 木通散 芫花散 陳橘

皮散 檳榔丸 牽牛子丸 大戟丸

續隨子丸 木川朴消丸 川大黃丸

治水氣徧身浮腫諸方

牽牛散 甘遂散 猪苓散 大麻子散

商陸丸 海蛤丸

治風水腫諸方

防風散 海藻丸 麻黃散 大腹皮散



椒目丸

治石水腫諸方

白朮散 海蛤丸

治皮水腫諸方

漢防已散 桑根皮散

治氣水腫諸方

大腹皮散 牽牛散 猪苓散 葶藶丸

木香丸

治大腹水腫諸方

赤茯苓散

治身面卒浮腫諸方

鱧魚湯 赤茯苓散 飲子 葶藶丸

甘遂丸 木香藤丸

淋瀝治水氣心腹鼓脹諸方

大戟散 木香榔丸 木香丸

淋瀝治水腫欬逆上氣諸方

漢防已散 杏人散 烏扇丸 海藻丸

瀉下治水癥諸方

類聚

四十九

鼈甲散 木香丸 海藻丸 白礬丸

黃川治水蠱諸方

楮枝湯

大治水氣脚膝浮腫諸方

檳榔散 郁李人散 大戟散

甘瀉治水氣小便澀諸方

漢防已散 蘧麥散 大戟散 海蛤丸

商陸丸 水銀丸

表大全本草

脫氣丸 香茅煎 水蠱丸 御腹丸

三因方

水腫證治

復元丹 當歸散 正陽丹 消腫丸

消腫散 康仁散 禹餘糧丸 退水丸

退水餅 大腹子散 桃紅散 大丸

千金散 葶蘆丸

料簡

大豆湯 五皮飲 澤漆湯

料簡

附子棗豆湯 無礙丸 三稜煎 茯苓

分氣飲 茯苓蘇子丸

步水料簡

氣分證治

桂附湯

神巧萬全方

水病

黑牽牛丸 椒目丸 葶藶丸 鴨頭丸

中軍候黑丸 磁石丸 薰洗法

是齋醫方

水氣

蠱脹

水腫門三

直指方

水飲證治

芎夏湯 大半夏湯 小半夏茯苓湯

五苓散 桂朮湯 桂苓湯 平肺湯

青龍湯 十棗湯 安腎圓 青木香圓  
五皮散 三和散 消飲圓 倍木圓

虛腫證治

青龍湯 安腎圓 溫白圓 集香湯  
蘿蔔子飲 三和散 神助散 行水圓  
薑蔻散 桑皮飲 防風散 消蠱湯  
加味枳朮湯 調榮飲 續斷飲 土狗

方

朱氏集驗方

虛腫 附膨脹

製菜豆 沉香大腹皮湯 沉附湯  
減五苓散 過氣丸 穀神嘉禾散 沉  
香降氣湯 平胃散 胃苓丸 野雞饅  
餛法 獨勝散 加料五加皮散 紅丸  
子 縮砂飲 橘蒜丸  
嚴氏濟生方

水腫

實脾散 踈鑿飲子 鴨頭圓 赤小豆

湯 三仁圓 塗臍膏 加味腎氣圓

宣明論

水濕

三花神祐丸 神祐丸 葶藶木香散

白朮木香散 大橋皮湯 葶藶膏

茯苓散 調胃散 貳氣散 雄黃神金

散 禹勝散 牽牛丸 梔子藥皮湯

大戟丸 粉霜丸 苦葶藶丸 肉豆蔻

丸

御藥院方

地榆散 葶藶木香散

得效方

腫滿

復元丹 禹餘糧圓 實脾散 加味腎

氣圓 神助散 加味控涎圓 疎鑿飲

子通苓散 赤小豆湯 三仁圓 分

心氣飲 三和散 塗臍膏 五皮散

麻黃甘草湯 芫花圓 牽牛湯 菴菴

散 烏鯉魚湯 郁李仁散 川活散

紅豆散 紫金圓 防風散 茯苓散

小續命湯 治卒身面腫滿方

澹軒方 治卒大腹水病方

水蠱 肘後方

肘後方

治卒身面腫滿方

治卒大腹水病方

水銀丸

澹察方

腫疾

知母湯 無礙圓

衛生寶鑑

諸濕腫滿

沉香海金砂丸 海金砂散 續隨子丸

聖靈丹 赤茯苓丸 海藻散 白丸子

除濕丹 拾棗湯 葶藶木香丸 木香

通氣丸 神秘湯 消痞丸 香蘇散

牡蠣澤瀉散

胃氣為本

導滯通經湯

聖濟總錄

水腫

防已飲

補氣丸

五靈湯

牽牛湯

妙香湯

炮腎散

奪命丸

礬石丸

檳榔散

大戟丸

二氣湯

大黃湯

芫花湯

鼈甲湯

郁李人丸

麝香丸

商陸丸

防已丸

藁本丸

桑白皮丸

檳榔丸

商陸豆

逐氣散

十水

十水丸

十水丸

檳榔丸

葶藶丸

三消丸

大海藻湯

檳榔湯

防已檳

椰丸

葶藶湯

大黃丸

木香湯

妙湯

防已丸

四石丸

木香湯

寶丸

再蘇丸

鼈甲飲

海蛤丸

椰飲

桑白皮飲

涌水

旅復花丸 大黃附子丸 葶藶丸 椒

目丸 豬苓丸 乾棗湯 檳榔丸 海

蛤湯 商陸丸 蓖麻單方 木豬苓飲 轉

通草飲 葶藶丸 葶藶散 葶藶丸 葶藶丸

十木風小 十木丸 葶藶丸 葶藶丸 葶藶丸

麻黃石膏湯 蒼朮飲 麻黃湯 大豆

湯 防已飲 防已湯 桑白皮湯

石水 桑白皮丸 桑白皮丸 桑白皮丸

桑白皮湯 楮皮湯 海蛤丸 桑根白

皮湯 鼈甲丸 杏人丸 葶藶丸

大腹水腫

防已丸 牛黃丸 麝香丸 水銀丸

甘草丸 蘇合香丸 葶藶散 蓖麻飲

丹參酒

水腫欬逆上氣

白前湯 防已湯 鯉魚湯 澤漆湯

郁李人湯 白雌雞湯 大棗散 海蛤



九 大白前湯 白前湯 大黃耆湯 大

葶藶丸 杏仁半夏丸 葶藶丸 牽牛

子丸 澤漆根湯

水腫門 四

聖濟總錄 仁 芥 芥 芥 芥 芥

水氣徧身腫滿 散 芥 芥 芥 芥

欵氣丸 甘遂丸 小消化丸 大豆散

一字湯 大戟散 葶藶丸 鯉魚湯

桑白皮湯 赤小豆湯 麻黃湯 桑苳藥

湯 木香丸 水銀丸 白丸子 甘漱

齒貫衆湯 海蛤丸 五橫榔丸 枳實湯

萬靈丸 水銀丸 白木湯 平補鹿茸

先 輕粉丸 備 藥 撥湯

水腫 腎滿氣急

防已丸 澤瀉丸 十聖丸 甘遂湯

黃耆丸 桑根白皮湯 苦葶藶丸 馬郁

李人湯 葶藶散 茯苓湯 蔓麥湯

木蟲 中 亂 水 甘 芥 芥 芥 芥

無比丸 中膈丸 甘遂散 葶藶湯

葶藶丸 分氣散 大黃湯 雙麥湯

海蛤丸 結水湯 椒目丸 大戟湯

鼠尾草丸 惡實丸 瓠瓢煎 楮枝煎

膜外氣

徒都子論病本

防己湯 順氣丸 五靈湯 牽牛五靈

煮散 紫蘇煮散 五蠱丸 牛李子丸

澤漆丸 香十水丸 白牽牛散 甘遂餅

必用全書

水腫證 木香公孫圓 杏積丸

神應散 七寶丹 龍腦餅 水菴煎 鳳凰

拔粹方 五寶丹 雙神丸 珠珀丸

水腫證 水散 補腎丸 木香湯

白茯苓湯 白朮丸 楮實子丸 大戟

散 神效散 葶藶丸 赤茯苓散 七聖散

十神腫脹證 聖代 大黃湯 葶藶煎

王氏集驗方

治水腫

十種丸 三聖丹 大戟散 檳榔散

烏梅丸 葶藶丸

醫方大成

水腫

五苓散 五皮散 煨腎散 葶藶圓

當歸散 十棗圓 消腫圓 葶藶圓

分氣補心湯 木香分氣圓 杏蘇飲

郁李仁圓

袖珍方

水腫

加味腎氣丸 葶牛即丸 十水丸 茯苓

琥珀丸 塌脹丸 海蛤湯 茯苓湯

商陸散 貝分小散 檳榔丸 木香塌腫

散 導氣通經湯 香棗丸 白朮木香

散 退腫塌氣散 赤茯苓散 七聖君

子散 牽牛湯 順氣丸 雞屎醴散

永類鈴方

雜病水腫

萬全元

經驗秘方

蠱氣

高經驗良方

論水腫

諸證

玄胡圓

十種水病并根源證狀方法

...

...

...

...

...

...

甘甜圓 萬全丸

補藥 香苓散 牛黃通膈圓 吳茱萸

圓 羌活散 茯苓散 歸表湯

醫林方

水氣

防已湯 紫蘇散 順氣丸 燒青丸

八寶散 管仲黃連散 石中黃散

烟霞聖効方

水腫

防已湯

壽親養老書

磨積丸

施圓端効方

八寶蠱脹水腫黃腫疔 疔中黃疔

大沉香尊重丸 散腫丸 火場氣丸

中經丸 康木香枳黃丸 丁香散 神效

九 補虛千金散

吳氏集驗方 芥茶疔 補夫疔

蘇藥水腫 芥疔 半黃並圓圓 吳茶黃

祛浮飲 聖靈圓和截水圓

神效名方 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

水腫黃疸 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

黃連散 木通散 實子丸 芥茶疔

急救仙方 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

推車負 無名元 金疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

玉機微義 水疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

水氣 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔

越脾湯 防已茯苓湯 越脾加朮湯 疔

甘草麻黃湯 麻黃附子湯 黃藥芍莖  
桂枝苦酒湯 十棗湯 三花神祐丸  
神助散 導水丸 濬川散 大戟散  
葶藶丸 雄黃神金散 續隨子丸 消  
腫丸 五苓散 葶藶木香散 大橘皮  
湯 五皮散 楮實子丸 茯苓湯  
平胃散 胃苓湯 實脾散 復元丹  
枳朮湯 消腫丸 中滿分消丸 溫白  
丸 當歸散 加味腎元丸

臞仙活人心

腫脹

壽域神方

水腫

衛生易簡方

水腫

金匱鈞玄

水腫

二陳湯

御醫撮要

牽牛湯 黑豆煎 黑豆煎

備預百要方

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌

鍼灸

導引

水腫門

金匱方

水氣病脈證并治

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃

汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水

其脈亦浮外證胸腫按之沒指不惡風其腹

如鼓千金方有不滿二字不渴當發其汗正水其脈沉

遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘

黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久

不愈必致癰膿 脉浮而洪浮則爲風洪則  
爲氣風氣相搏風強則爲隱疹身體爲痒痒  
爲泄風久爲痲癩氣強則爲水難以俛仰風  
氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此爲  
風水不惡風者小便通利土焦有寒其口多  
涎此爲黃汗 寸口脉沉滑者中有水氣面  
目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁  
如蠶新臥起狀其頸脉動時時欬按其手足  
上陷而不起者風水 太陽病脉浮而緊法

常骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人  
不渴汗出卽愈此爲風水惡寒者此爲極虛發  
汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷  
狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得  
眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲  
脾脹其狀如腫發汗卽愈然諸病此者渴而  
下利小便數者皆不可發汗 裏水者一身  
面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如  
小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯



主之 跌陽脉當伏今反緊本自有寒痼瘕  
腹中痛醫反下之下之卽胸滿短氣 跌陽  
脉當伏今反數本自有熱消穀小便數今反  
不利此欲作水 寸口脉浮而遲浮脉則熱  
遲脉則潛熱潛相搏名曰沉跌陽脉浮而數  
浮脉卽熱數脉卽止熱止相搏名曰伏沉伏  
相搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難  
相搏水走皮膚卽爲水矣寸口脉弦而緊弦  
則衛氣不行卽惡寒水不沾流走於腸間

少陰脉緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便卽  
難脉得諸沉當責有水身體腫重水病脉出  
者死 夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脉  
伏其人消渴病水腹大小便不利其脉沉絕  
者有水可下之 其脈沉而數者利小便  
問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫  
者何也答曰此法當病水若小便自利及汗  
出者自當愈 心水者其身重而少氣不得  
卧煩而躁其人陰腫 肝水者其腹大不能

自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通  
肺水者其身腫小便難時時鳴澇脾水者  
其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便  
難腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下  
濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦師曰諸  
有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發  
汗乃愈師曰寸口脉沉而遲沉則爲水遲  
則爲寒寒水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣  
衰則鶩澇胃氣衰則身腫少陽脉卑少陰脉

細男子則小便不利婦人則經水不通經爲  
血血不利則爲水名曰血分

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不  
利脉之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如  
炙肉當微欬喘審如師言其脉何類師曰寸  
口脉沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在  
關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相  
干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎  
脇下急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去

其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水  
小便不利小穀不化面目手足浮腫又與葶  
藶丸下水當時如小差飲食過度腫復如前  
胸脇苦痛象若奔狎其水揚溢則浮咳喘逆  
當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差  
先治新病病當在後

巢氏病源 水腫病諸候

水腫候

腎者主水脾胃俱主土土性剋水脾與胃合

相為表裏胃為水穀之海今胃虛不能傳化  
水氣使水氣滲液經絡浸漬府藏脾得水濕  
之氣加之則病脾病則不能制水故水氣獨  
歸於腎三焦不寫經脉閉塞故水氣溢於皮  
膚而令腫也其狀目裹上聖惠方作微腫如  
新臥起如臥蚕之狀頸脉動時欬股間冷  
以手按腫處隨手而起如物聖惠方裹水之  
狀口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得臥  
臥則驚驚則欬甚小便黃澁是也水有五

不可治第一脣黑傷肝第二缺盆平傷心第  
 三臍出聖惠方傷脾第四足下平滿傷腎第  
 五背平傷肺凡此五傷必不可治脉沉者水  
 也脉洪大者可治微細者死脈洪大者水腫  
 水腫從脚起候候腎者陰氣主於水而又主腰脚腎虛則腰脚  
 血氣不足水之流溢先從虛而入故腰脚先  
 腫也

水分候

水分候

水分者言腎氣虛弱不能制水冷冰氣分散  
 流布四支故云水分但四支皮膚虛腫聶聶  
 而動者名水分也

水分候

夫水之病皆由腎虛所為腎虛則水流散經  
 絡始溢皮毛今此毛水者乃肺家停積之水  
 流溢於外肺主皮毛故餘經未傷皮毛先腫

因名毛水也

毛水候

水病無不由脾腎虛所為脾腎虛則水妄行  
盈溢皮膚而令身體腫滿此疸水者言脾胃  
有熱熱氣流於膀胱使小便澀而身面盡黃  
腹滿如水狀因名疸水也  
夫木燥水候山澤澁澁氣留水而澁澁  
燥水謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉  
上則隱隱成文字者名曰燥水也

濕水者謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫

肉上隨畫隨散不成文字者名曰濕水故也

犯土腫候

犯土之病由居住之處穿鑿地土犯之土氣  
而致病也令人身之肌肉頭面徧體盡腫滿  
氣急故謂之犯土也

不伏水土候

不伏水土者言人越在他境乍離封色氣候  
既殊水土亦別因而生病故云不伏水土病  
之狀身體虛腫或下利而不能食煩滿氣上

是也

二十四水候

夫水之病皆生於府藏方家所出立名不同亦有二十四水或十八水或十二水或五水不的顯名證尋其病根皆由榮衛不調經脈否澁脾胃虛弱使水氣流溢盈散皮膚故令遍體腫滿喘息上氣目果浮腫頸脈急動不得眠卧股間冷小便不通是其候也

水瘦候

水瘦者由經絡否澁水氣停聚在於心下腎經又虛不能宣利溲便致令水氣結聚而成形段在於心腹之間抑按作水聲但欲飲而不用食遍身虛腫是也  
水癖候  
水癖由飲水漿不消水氣結聚而成癖在於兩脇之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是也癖者謂癖側在於脇間故受名也  
千金方

水腫

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯曰水之始起也目果上微腫靈太素作如新卧起之狀頸脉動時欬陰股間微癰寒足脛腫腹仍大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹何以候之膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然而堅太素外臺腹大身盡腫皮厚按其腹陷太素作不堅作而不起腹色不變此其候也鼓脹如何鼓

脹者腹脹身腫大大與膚脹等其色蒼黃腹脉起此其候也腸覃如何腸覃者寒氣客於腸外與胃太素作衛氣相滿正氣不得榮因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉乃生始也如雞卵稍以益大及其成也若懷子之狀久者離歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石瘕如何石瘕者生於胞中寒氣客於子宮閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆

生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可刺耶  
曰先瀉其腹之血絡後調其經刺去其血脉  
凡水病之初先兩自上腫起如老蠶色俠頸  
脉動股裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側有  
聲此其候也不卽治之須臾身體稍腫腹中  
盡脹按之隨手起水爲已成猶可治也此病  
皆從虛損所致大病或下利後婦人產後飲  
水不卽消三臆決漏小便不利仍相結漸漸  
生聚遂流諸經絡故也

和劑指南  
論氣虛腫滿  
氣虛腫滿者因脾氣停滯脾經受濕氣不流  
行致頭面虛浮四肢腫滿腹肚膨脹如鼓上  
喘氣急者可與茯苓散五苓散三和散分氣  
紫蘇飲木香分氣圓俞山人降氣湯小降氣  
湯蘇子降氣湯曹脾散嘉禾散喘甚者可  
與潤金散欬肺散 大便秘者與三和散  
小便不通五苓散



三因方

水腫敘論

夫腎主元氣天一之水生焉肺主沖化地四之金屬焉元氣乃水中之火所以太陽合少陰主精髓以養血沖化乃土中之金所以太陽合陽明主肌肉以養氣合腎虛則火虧致陽水凝滯肺滿則土溢使陽金沉潛則氣閉滯則血淖經絡不通上為喘急下為腫滿故經曰腎為少飲肺為太陰其本在腎其末

在肺皆毛陰以積水也所以能聚水而生病者蓋由腎為胃關關鍵不利樞機不轉水乃不行滲透經絡皮膚浮腫諸證不同廣如經說治法曰平治權衡者察脉之浮沉也法苑陳莖者疎滌腸胃也開鬼門潔淨府者發汗利小便也原其所因則冒風寒暑濕屬外喜怒憂思屬內飲食勞逸背於常經屬不內外皆致此疾治之當究其所因及諸禁忌而為治也

水腫證治脉例

古方十種證候以短氣不得臥爲心水兩脇疼痛爲肝水大便鴨溏爲肺水四肢苦重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲膽水乍虛乍實爲大腸水腹急腹瘦爲膀胱水小便秘澁爲胃水小腹急滿爲小腸水各隨其經絡分其內外審其脉證而甄別之然此十水謂之正水外有風水皮水石水黃汗以義攷之風合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾石合歸腎

雖名理不踰柰證候少異古方備列不可不辨但風水脉浮必惡風皮水亦浮按不沒指石水脉浮不惡風皮水亦浮按不沒指石水脉沉腹滿不喘黃汗脉沉遲發熱多涎久而不愈必致癰膿正水寸口脉浮而遲浮則熱遲則潛熱潛相搏名曰沉跌陽脉浮而數浮則熱數則止止熱相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚卽爲正水此金匱節文所以用寸口

跌陽二脉者蓋水氣不在一經也大抵浮脉帶數卽是虛寒潛止於其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實爲水必矣要知水脉必沉論曰脉出者死與病不相應也諸唇黑則傷肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足平則傷腎背平則傷肺此此五傷必不可療也治法曰腰以上腫宜發汗腰以下腫宜利小便學者當知之

水病方論

素問水熱論云腎者至陰也至陰者盛水也又曰腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類王水云關者所以司出入也腎主下焦膀胱爲府主其分注關竅一陰故腎氣化則二陰通二陰閉則胃填滿故腎者胃之關也關閉則水積水積則氣停氣停則水生水積則氣溢氣與水同類故關閉不利聚水而生病靈樞亦曰下焦溢而爲水又巢氏云腎主

水脾胃主土胃爲水穀之海今胃虛不能傳  
化水氣使水滲液經絡浸漬腑藏脾得水濕  
之氣加之則病脾病則不能制水故氣獨歸  
於腎腎水妄行散入令腫其有說肝水心  
水之類者亦不可必之大抵諸腫俱屬治  
法去水補脾腎爲得脈浮大易治脈虛小難  
治大都水病難治差後特須慎於口味又病  
水人多嗜食不廉所以此病難愈然醫者隨  
時情不本性命病人欲食肉於貴勝之處勸

令食羊頭蹄肉如此未見有一愈者又此病  
百脉之氣中外俱實治之皆欲令寫之使虛  
羊頭蹄極補那得瘳愈所治水藥多用葶藶  
等諸藥本草云葶藶多服令人大虛故水病  
非久虛不得絕其根又有蠱但腹滿不腫水  
脹但腹不腫而四肢面目但腫大有醫者不  
善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹  
滿皆以藥如此者仲景所云愚醫煞人今錄  
慎忌如左音樂房室誼戲并一切魚肉生冷

搥醋蒜豆油膩並須戒忌三年慎之永不復  
重發不介者差而更發重發不可更治也世  
人多疑水病不可取則水無所出故古人言  
水病非久虛之不絕其根然取之之術不可  
執一途也雖大槩利其大小便然須汗之針  
之也經云廓其元府故形乃復此之謂也病  
其者初隔一日一取候減及二三分則隔兩  
日一取候減及六七分即隔三日一取更減  
八九分亦須隔四五日一取其不是取日即

須汗之或針之其補藥如磁石木香丸之類  
日不下三四服亦相兼服行水不動藏腑之  
藥如葶藶丸木香丸之類是也云云此下詳見千金  
方又取水之法初服甚快利後漸見無力須  
漸增其丸數如初服十九得利五六行第二  
三次服便見行數少如初時即加三五丸既  
加一二度又還帶慢即又加三五丸每取常  
令得五六行為佳散藥亦如此以意漸增之  
斷病提綱

浮腫詩

心腎火生脾肺土樞機運動內安平火虧真  
 土無滋養相制纔偏水妄行三焦不寫還盈  
 溢氣脈不通中閉塞滲透洋於經絡間皮膚  
 溢滿上喘急心腹堅脹偃臥難目下腫起水  
 端的小便不利夢多驚滲之泄之安可必法  
 當禁慾絕鹹醃如斯半年方有益  
 直指方三  
 胃脇痛引背頭面兩手浮腫

腎虛不能納氣歸元氣逆而上奔故胃膈滿  
 痛以手摩塗痛走背上又從背摩塗則其氣  
 循脇泄於後分而痛不作矣此氣之為病固  
 也奈何腎虛又不能行水故水隨氣奔上乘  
 於肺頭面兩手浮腫氣短而喘由是血化為  
 水與之俱滯况其人舊來有風白風曰水曰  
 血曰氣四者合而為病其痛非常如沉香木  
 香烏藥檳榔之類不能施其巧治法將何如  
 曰先以二十四味流氣飲加獨活枳殼五靈

脂炒牽牛入薑蜜烏梅同煎嚙下養正丹二  
十粒雄黃圓十粒升降水火引導大便次用  
桑皮紫蘇木通阿膠當歸桃仁青皮桔梗炒  
芫花生大黃作劑依前煎以薑蜜烏梅取盡  
大便黑物卽收全功原誠論山鼓血水  
山李水飲方論水之與飲同出而異名也人惟脾土有虧故  
平日所飲水漿不能傳化或停於心下或聚  
於脇間或注於經絡或溢於膀胱往往因此

而致病矣孰謂血氣痰涎能生諸疾而水飲  
之不能爲恙乎惟水與飲漉漉有聲爲喘爲  
咳爲嘔爲泄爲痞隔爲脹滿爲眩運爲怔忡  
爲寒熱爲堅痛爲浮腫爲多唾爲短氣爲體  
重氣爲飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痺則曰氣分  
滯脈不行血化爲水四肢紅腫則曰血分凡  
此等類皆水氣之所由作也據病驗證可不  
究其所受之原乎然則療治之法將何先日  
能以表裏虛實訂之斯得矣表有水者其身

熱嗽喘怔忡乾嘔微利青龍湯汗之而愈裏  
有水者其身涼嘔嗽痞滿引脇痛硬十棗湯  
下之而安虛者脈虛心腹滿而濡當以安腎  
圓爲主加青木香圓少許以行之實者脈實  
心腹滿而硬當以青木香圓爲主用五皮散  
加枳殼以導之尋常水氣心下怔忡大半夏  
湯小半夏伏苓湯五苓散輩通用可也然而  
瘧家多積黃水或於心下停瀦或於脇間結  
癖惟癖爲能生寒熱所以瘧劑多用常山蓋

水在上焦則吐之水不在於上焦則常山亦  
能破其癖而下其水也若夫水腫證候亦此  
種類詳見于後請旁參而互攷焉

### 虛腫方論

賈洛陽以病腫不治必爲痼疾雖有扁鵲亦  
莫能爲則知腫之危惡非他病比也夫人所  
以得全其性命者水與穀而已水則腎主之  
土穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不  
能制水胃與脾合氣胃爲水穀之海又因虛



而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞小滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目胞上下微起肢體重著咳喘怔忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窩舉手卽滿是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又當權其重輕不可過用芟花大戟甘遂猛烈之劑一發不收吾恐峻決者

易固閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之爲腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉風腫者皮蠲麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脇脹膨其或煩燥漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脈壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此祖順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告殂矣大凡虛腫先起於腹而

後散於四肢者可活先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫唇焦傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺皆為不治之診當明辨之凡男從腳下腫而止女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治嚴氏濟生方

水腫論一平曰風曰虛曰血合而皆四

水腫為病皆由真陽怯少勞傷脾胃脾胃既

寒積寒化水蓋脾者土也腎者水也腎能攝水脾能舍水腎水不流脾舍壅塞是以上為喘呼欬嗽下為足膝胛腫面浮腹脹小便不利外腎或腫甚則肌肉崩潰足脛流水多致不救歧伯所謂水有膚脹鼓脹腸覃石瘕種類不一皆聚水所致夫水之始起也目裹微腫如蠶起之狀頸脈動喘時欬陰股間寒足脛腫腹仍大為小已成以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也又有蠱脹腹滿

不腫水脹而目四肢俱腫治蠱以水藥治水  
 以蠱藥非其治也治療之法先實脾土脾實  
 則能舍水土得其政面色純黃江河通流腎  
 水行矣腫滿自消次溫腎水骨髓堅固氣血  
 乃從極陰不能化小成冰中焦溫和陰水泮  
 流然後腫自消而形自盛骨肉相保巨氣乃  
 平然此病證不可治者有五五證見巢氏病源然水  
 病最難治特須慎於口味戒房勞謹戲若不  
 能戒此愈而復病者多矣經云治水之法腰

以上腫宜發汗腰以下腫宜利小便此至當  
 之論然腫滿最慎於下當辨其陰陽陰水為  
 病脉來沉遲色多青白不煩不渴小便澀少  
 而澹察方清大腑多洩此陰水也則宜用以  
 溫暖之劑如實脾散復元丹是也陽水為病  
 脉來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澀大  
 腑多閉此陽水也則宜用清平之藥如疎鑿  
 飲子鴨頭圓是也又有年少血熱生瘡變為  
 腫滿頰渴小便少此為熱腫素問所謂結陽

者腫四肢是也

治病百法

夫一切沉積水氣

目眩者可用茶調散

服七宣丸則愈矣

不可用芭豆銀粉等藥

十形三療

風水

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴

人斷為風水水得風而暴腫故遍身皆腫先

令浴之乘腠理開發就煖室中用酸苦之劑

加全鴨壹枚吐之節次用藥末至三錢許出

痰約數升汗隨湧出腫去八九分隔一日臨

卧向一更來又下神祐丸七十餘粒三次嘔

之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六十

丸以麝香湯下又利三四行後二三日再以

舟車丸通經散及白朮散以調之愈

後重右

曹典史妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小便如常其脉浮而大此風水腫也先以蠶水擦其痰以火助之發汗次以舟車丸瀋川散瀉數行後四五日方用苦劑涌訖用舟車丸通經散過十余行又六日舟車瀋川復下之末後用水煮桃紅丸四十余丸一月如故前後涌者二瀉凡四通約百余行當時議者以爲倒布袋洗耳病再來則必死世

俗只見塵中貨藥者用銀粉巴豆塌腫者暫去復來必死以爲驚俗豈知此法乃內經治鬱之玄兼此藥皆小毒無毒之藥豈有反害者哉但愈後忌慎房室等事况風水不同徒水無復來之理

人夏水腫

南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉戴人令上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯布囊高支兩足而臥其藥之行

自腰已上水覺下行自足以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如線牽四肢森然涼寒會於臍下而出不旬日間病大減余邪未盡戴人更欲用藥竟不能從其言

資水涌冰來之

李七老病涌水證面黃而喘兩足皆腫按之陷而復起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡卧戴人命此涌去痰而汗之次以舟車丸瀉川散下之以益腎散復下之以分陰陽利水

道之齊復下之所苦皆差

停飲腫滿

涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成腫滿或用三花神祐丸憚其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數月終無一效蓋粗工之技止於此耳後手足與腎皆腫大小便皆秘託常仲明求治于戴人戴人令仲明付藥此及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必

以神禹決水之法斯愈矣  
今小腹痛滿面腫又牙口  
蕭令腹滿面足皆腫痿黃而喘急食減三年  
之間醫者皆盡而不驗戴人以芡帶散涌之  
由寒痰三五月以舟車丸濬劑散下之青黃  
涎沫幾半缶以桂苓白朮散五苓散調之半  
月復舊矣  
水腫畢九  
霍秀才之子年十二歲畢九一旁腫臍戴人

見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲  
嘔血下則腎傷而爲水腫以琥珀丸通經散  
一瀉而消散

### 腹脹水氣

蹙踰張承應年幾五十腹如孕婦面黃食減  
欲作水氣或令服黃耆建中湯及溫補之齊  
小溲涸閉從戴人療焉戴人曰建中湯攻表  
之藥也古方用之攻裏已誤也今更以此取  
積兩重誤也先以涌齊吐之置火於其旁大

汗之次與猪腎散四錢以舟車丸引之下大  
缶殊不困續下兩次約三十余行腹平軟健  
啖如昔常仲明云向聞人言瀉五六缶人豈  
能任及聞張承應渠云誠然乃知養生與攻  
病本自不同今人以補齊療病宜乎不效  
醫方大成

### 水腫

歧伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃右癢者是  
也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土

五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能  
防其汎濫水腫之疾究其所因皆由脾土有  
虧不能防制以致腎水浸漬脾土凝而不流  
遂成此疾其爲證也發見之初裏裏微腫有  
若臥蠶纒起之狀微而至大以手按之則隨  
手而起如裏水其內上則喘急欬嗽下則足  
膝胛腫面目虛浮外腎或腫小便不利治療  
之法當辨其陰陽脉證若陰水爲病者脉來  
沉遲色多青白不煩不渴小便澁少而清大



類聚百病  
五臟  
腑多泄腸水爲病者脉來沉數色多黃赤或  
煩或渴小便赤澁大腑多秘腰已上腫者宜  
發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土  
土盛自能攝養腎水其腫自消虛弱者又當  
溫補下元尤宜節飲食絕生冷戒房事否則  
愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰足脛流水  
又若唇黑缺盆平臍凸背平足平五者皆是  
五臟有損非可療之病又有內挾七情之氣  
停滯涎飲腹滿脇脹名爲氣分及少血熱生

瘡變爲腫痛名爲熱腫又當隨證施年治不  
可一塗而取要知此證脉浮大者生沉細者  
死臨證施治宜詳審焉

永類鈴方

雜病水腫

五不治証唇黑傷肝臍出傷脾缺盆平傷心  
足下平傷腎背平傷肺脉沉小腫爲病皆由  
真陽怯少勞傷脾胃脾胃既寒積寒成水非  
脾土不能防腎水之泛濫然脾土受漬而不

流亦為患矣初治不可用宜藥脾敗不救四肢悉腫者為水但腹脹四肢不其腫者為蠱

脈 病證 治

古方十 皮水証四肢頭目百一選葶藶元

水用寸 腫腹不滿不渴 仁齋杏蘇飲

脈陽 按之沒指無汗 脈浮肺腎虛也

二脈以 清水濁水証酒色 生嘉禾散和五皮

過度服熱藥多 散小便少加燈心

候沉伏 腎虛脾弱脈沉 車前子五加皮散

蓋寸口 小不治 下復元丹濟生腎

脈浮而 氣元腎腫腹脹局 方茴香元下釣腸

遲遲則 元後下安腎入味 元

潛浮則 元

執熱潛 水分証腎虛不能 五皮散 生嘉禾

相搏名 制水分歸四肢 散 三因當歸散 禹餘糧元

日沉跌

陽脉浮

而數浮

則熱數

則止止

水腫咳嗽腎虛水生嘉禾散黑錫丹

乘於肺故腫滿楊氏消腫元百一

咳嗽吐氣下出選葶藶元主濟生

三仁元 仁齋杏

蘇飲 郁李仁元

局方二十四味

流氣飲

毛水証肺經停積 郁李仁末和麩煮

腎水寒故皮毛 作餅食大便氣通

熱相搏

名曰伏

沉伏相

搏名曰

水沉絡

脉虛伏

人先腫 頭面腫嚼之搽面

即消

疸水証脾胃熱炁 茵陳五苓散 瓜

流入膀胱使身 帶散

面黃小便赤腹

滿如水曰疸水

燥水証水炁溢於 五苓散加燈心滑

皮膚以指畫肉 石瞿麥五皮散神

上隱隱成文字 助散濟生三仁元

則小便

者名曰燥水宜

嚼郁李仁作粥食

難虛難

利水

商六枳殼等分酒

相搏水

濕水証指盡肉上

商六香附子為末

走皮膚

隨畫散不成文字

炒時出火毒酒浸

即為十

者名濕水

日乾為末米飲下

水大抵

居住穿鑿犯土氣

宜襪謝

令人身體悉腫

加減十味正氣散

浮脈帶

同不服水土

阿紅圓濟生實脾

數即是

水厥証大小便不

三和散脾積元

虛寒潛

利內有結塊兩

三稜煎神保元

脇膨脹

經驗茯苓散簡易

止於其

四炒元 仁齋蘿

間久必

藟子飲腹脹大蒜

沈伏沉

水瘦証脾腎悉不

三和散 二十四

癰疽疔毒

疔毒

伏則陽

不能宜泄久則水味流氣飲一金露

虛陰實

結成形段在心元

為水必

腹間按作水聲

矣要知

但欲飲而不欲

食

水脈必

水蠱証水毒蒸結

沉論曰

腹大動搖有聲

脈出者

常欲飲水聞廣

間有金蠶蠱毒

雄黃元 金露元

死與應

腹滿不腫皮膚

粗黑

不相應

陰水証脈沉遲色 濟生實脾散復元

青白不渴不煩 丹腎炁元即八味

小便澁而清大 元神助散參附正

便多泄 氣散和五皮散有

脈浮大

久腫炁塞服濟陰

者生沉

陽水証脈沉數色

濟生疎鑿飲鴨頭

頁

細者死

細若有

加可救

黃赤或黃或赤圓三因十棗圓消

見於小便或煩腫圓楊氏消腫圓

渴大便秘二十四味流氣飲

和五苓散去桂腰

以上腫宜發汗白

朮麻黃防已白朮

苓甘草腰以下腫

宜利小便五苓散

加滑石瞿麥燈心

熱腫証年少血熱濟生赤小豆湯生

生瘡變成腫疾五苓加派瀉羌活

煩渴小便少

婦人感濕或妊娠滲濕湯產後加

減五積散調經散

妊娠有微腫者不

必治產後自愈腫

甚鯉魚湯

女子血聚經不行紅花當歸散琥珀

類聚百病

九

赤	青	黃	白
先從心腫根於心 短炁不得臥	先面目後偏身其 根在肝或兩脅	先腹腫四肢若腫 重其根在脾	先脚及胛腫或大
散通經圓	大戟等分與病証	甘遂蜜圓小豆大	
葶藶 主之 以上十味皆	同者倍之日		

黑	懸	風
便溏利其根在 肺	先腰痛足冷脚肘 腫根在腎	先四肢腫後腹 大小便秘澁
蒿本 每一圓米飲 下日三下病	連翹根服三元虛	澤瀉 人病有冷熱
	芫花者三元富貴	

石	根在胃	當理脾益腎
氣	先四肢腫小腹 獨大腫外腎 如石引脇	桑白女人當理血 皮去濕常人有
暴	乍盛乍虛乍來 乍去其根在 大腸	赤小虛實當消積 豆利水灸法
	先腹滿其根在 小腸痛脹不	巴豆俞三里水分穴

之效開胃喘上至胃腕去油可效

醫林方脈小兒又觀到各症若依此法亦三合盡者  
水氣論

凡治水氣者有三皆脾胃虛肺受寒傳之於  
腎腎氣虛而脾土衰不能制水小便不利溢  
於肌膜之間氣攻於膜外謂之膜外氣其病  
令人腹脹四肢腫滿按之而沒指隨手而起  
人以腎氣為本不可以虛虛而五臟皆衰是



以胃氣閉而脾不磨氣結而小便澀輕重之  
後在小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內  
衝出膜外悉化為水使人手足頭面浮腫若  
小便微澀則微腫極澀極腫大小便三日  
不通遍身洪腫至重則陰腫大陰腫者有二  
有腫而小便自出者有腫而小便不出者又  
有莖頭連小腹及臍腫者治法有三有蠱者  
腹脹四肢不腫者遍身腫者婦人有血蠱治  
之以開鬼門潔淨府去菟陳莖五瀉七補是

為大法  
施圓端效方

蠱脹水腫

經曰諸濕腫病皆屬於脾諸脹腹大皆屬於  
熱濕熱乘虛蘊結不去憂患苦形表裏相攻  
下虛中滿復下復成損敗脾土腎水到行補  
下則滿甚於中散滿則下虛滋甚治宜補胃  
泄膀胱經云五藏不足當補其脾脾為中藏  
以養四藏耳

吳氏集驗方

原十種水腫不以爲難其難者中寒  
夫人患水皆酒色食物傷肺變積不散下傳  
於腎腎是肺家子肺氣關鬲不利聚留於腎  
腎既受水初發時當月微腫脚虛此腎陰也  
元是冷睡於地當風取涼肺受寒邪傳留入  
腎腎受寒邪卽生潮熱小便赤黃膀胱氣滯  
小腹膨脹肺受寒熱邪嗽氣不絕毛孔閉塞  
肺內受積傳入脾胃氣漸虛冷水穀不消心

腹脹急氣喘氣撮關閉不利故聚爲水而從  
其類也上下溢滿於皮膚發爲附腫如初病  
生飲食則逆脾胃不受留傳入於肌則腹大  
受陰太多臍上脉大心是腎家子心心內受  
邪腎敗其水也心脹氣短婦人產血流行敗  
血入腹則攻入經絡脾胃不和化爲黃水遍  
身積腫水有五敗不可治面上瘡黑色者是  
肝敗掌中腫無紋心敗屬小腸背平如板肺敗  
連腹腫陰腫不退兼腰腫腎敗臍突者脾敗

水有五傷又五不治不醫唇黑傷肝壘盤者  
傷心臍突者傷脾背壘者傷肺腰不平者傷  
腎肺腫水不逆雙水四當而十熱熱回香  
水有五候一因服藥泄痢不止者死候二服  
藥不瀉死候三體壯筋脉赤如藤大者死候  
四脉沉細者死候五面小消瘦死候內受  
十般水氣皆有發處五臟五般水一名清水  
先從面上起其根在肝肝受積盛州太戲爲  
君二名赤水先從胃鬲起其根在心加水銀

葶藶爲君三名黃水先從腹肚起其根在脾  
甘遂爲君四名白水上氣喘息腹滿其根在  
肺加藁本葶藶子爲君五名黑水先從脚上  
虛腫其根在腎加連翹澤瀉爲君六名玄水  
先從頂面上其根在膽加芫花爲君七名風  
水先從四肢腫怕風其根在胃加澤瀉爲君  
八名石水先從腹上腫其根在膀胱加桑白  
皮爲君九名裏水先從小腸并瘦水連臍起  
其根在腸加江子爲君十名水氣瘦氣乍上

乍下攻兩脇止充胃堂加大腹子皮爲君  
玉機微義云水氣六益水則水與水相和  
入下諸經教水氣爲病所因亦謂水氣自  
內經曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太  
陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺  
皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病歧伯  
曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其  
類也上下溢於皮膚故爲臃腫臃腫者聚水  
而生病也故水病下爲臃腫大腹上爲喘呼

不得臥者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫  
肺爲逆不得臥下焦溢爲水王註曰下焦  
爲分注之所氣壅不瀉則溢而爲水肺移寒  
於腎名曰涌水云云証見後諸有水氣者微  
腫先見於目下也

針經曰水始起也目窠上微腫如新臥起之  
狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大  
其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水  
之狀此其候也肢脛者人之管以趨翔也

莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故  
 飲食不節喜怒不時津液內溢乃下留於畢  
 血道不通日大不休俛仰不便趨翔不能此  
 病榮然有水不止不下也  
 謹按內經論諸水氣皆諸藏本病也針經  
 所引則又主飲食及七情等因皆能致之  
 可見病機之微矣但有濕腫氣腫初皆頗  
 相似然以手按之成凹不即起者濕也濕  
 與水有微甚之意况有氣腫及諸水形證

不同要在臨證詳審也

脈經敘諸水脈證

病有風水有皮水有正水有石水 云云 腰以

出腫當發汗乃愈 詳見金匱方

按已上論五臟所主見證與諸經論根本  
 不同詳見後神金散下宜並詳審

論生死脈法

水病脈洪大者可治微細者不可治水病脹  
 閉其脈浮大軟者生沉細虛小者死水病腹

大如鼓脉實者生虛者死  
水論論水氣主於濕熱  
原病式曰或云水腫者由脾虛而不能制其  
腎水則水氣妄行而脾主四肢故水氣遊走  
四肢身面俱腫者似是而實非也夫治水腫  
腹脹以辛苦寒藥為君而人利其大小便也  
經曰水滿者治之于內然則豈為脾土之虛  
也此說正與素問相反經曰諸濕腫滿皆屬  
脾土又曰太陰所主腑腫又曰濕勝則濡泄

甚則水閉腑腫皆所謂太陰脾土濕氣之實  
甚也又經曰諸腹脹大皆屬於熱又云諸腑  
腫疼酸皆屬於火又曰熱勝則腑腫皆所謂  
心火實熱而安得言脾虛不能制腎水之實  
甚乎故諸水腫者濕熱之相兼也如六月濕  
熱太甚而庶物隆盛水腫之象明可見矣故  
古人制以辛苦寒藥治之蓋以辛散結而苦  
燥濕以寒除熱而隨其利濕去結散熱退氣  
和而已所以妄謂脾虛不能制其腎水者但

謂數下致之又多水液故也豈知巴豆熱毒耗損腎水陰氣則心火及脾土自甚濕熱相搏則怫鬱痞隔小便不利而水腫也更宜下之者以其辛苦寒藥能除濕熱怫鬱痞隔故也若夫世傳銀粉之藥以治水腫而愈者以其善開怫鬱痞隔故也慎不可過度而加害也况銀粉亦能傷牙齒者謂毒氣感於腸胃而精神氣血水穀能勝其毒故毒氣循經上行而至齒齦嫩薄之分則爲害也上下齒縫

者手足陽明之經也凡用此藥先當周濟亦或云陰水徧身而又惡寒止是寒者非也

丹溪曰諸氣臏鬱皆屬於肺者諸濕腫滿皆屬於脾諸腹脹大皆屬於熱蓋濕者土之氣土者火之子故濕病每生於熱熱氣亦能自濕者子氣感母濕之變也凡病腫皆以治腫爲主所挾不同治法亦異盧砥鏡治水脹辨以隸於腎肝胃三經而不及脾下文繼以肺金盛生水水液妄行之說豈理也哉夫脾土

受病肺爲之子焉有自盛而生水者哉若爲  
腫之水果生於肺金之清氣則滋長腎陰奉  
行降令爲生化之源何病腫之有今滲透經  
絡注流溪谷皆濁腐之氣窒碍津液久久灌  
入隧道血亦化水而欲藉脾土以制之導腎  
氣以利之不得脾病則肝木來侮子氣亦衰  
木寡於畏脾欲不病不可得矣治法宜清心  
經之火補養脾土全運化之職肺氣下降滲  
道開通敗濁之氣其稍清者腹回而爲氣爲

血爲津液其敗濁之甚者在上爲沫在下爲  
溺以漸而分清矣盧不明言而更曰制水燥  
水得非白圭以鄰國爲壑乎

謹按河間論水氣主於脾土濕甚爲病蓋  
言有餘證也但脾虛受濕或濕熱自甚不  
足所致者爲甚多故以丹溪之論併及之  
觀者當自審察然脉經論熱甚金衰金棄  
土母而歸水水藏火神土亡其子其氣衰  
微水爲洋溢浸漬爲池走擊皮膚面目浮



腫歸於四肢愚醫見此直往下之虛脾空  
 胃水逐居之云云規此實諸臟之本病也  
 夫水為物元土為物母然物元物母為病  
 則真氣危矣故不得妄下之也由是觀之  
 則水氣之病始非氣鬱飲食濕熱諸證所  
 致者禁不得妄下蓋恐真臟為病也是以  
 水丹溪宣明肺腎脾之意深備此理  
 論諸證似水氣不則宜  
 發明曰夫脚氣之疾實水濕之所為也云云見諸

濕河間曰結陽病生四肢脛腫四肢熱勝則  
 腫云云  
 論濕證似水氣論見諸  
 謹按濕者水氣之漸也故治有輕重所殊  
 論水氣繆刺法  
 內經曰經脈滿則絡脈溢絡脈溢則繆刺之  
 以調其絡脈使形容如舊而不腫故曰繆刺  
 其處以復其形也

其謹按繆刺謂不分隧穴而刺之也故此水  
 以熱穴論無刺水穴分去法水溢於表或腹  
 內脹或四肢雖腫而氣稍實脉浮洪者宜有  
 此至病氣孤危脉微弱而四肢水氣盛實  
 者今人往往繆刺之禍不旋踵蓋不審經  
 言脉滿絡溢宜繆刺之理也

論水氣證治大法

內經曰不從毫毛病生於內者陰氣內盛陽  
 氣竭絕不得入於腹中故言五臟陽以竭也

津液者水也充郭皮中陰畜於內水氣脹滿  
 上攻於肺肺氣孤危魄者肺神腎為水害子  
 不救則致云其魄獨居也夫陰精損削於內  
 陽氣耗減於外則三焦閉溢水道不通水滿  
 皮膚身軀否腫故云形不可與衣相保也凡  
 此之類皆四肢脉數急而內鼓動於肺中也  
 肺動者謂氣急而欬也如是者皆水氣格拒  
 於腹膜之內浮腫施張於身形之外欲窮標  
 本其可得乎平治權衡謂察脉浮沉也脉浮

爲在表脈沉爲在裏在裏者泄之在表者汗  
之故云開鬼門潔淨府也去宛陳莖謂去積  
久之水物猶如草蔭之不可久留於身中也  
此謹按經論水氣證治至爲機密故云開鬼  
門潔淨府然鬼門者猶幽玄之謂有毛竅  
則而不見其開闔邪氣感入邪與正相搏毛  
竅閉塞而寒熱作爲病客於表故宜發汗  
遣邪氣以開鬼門也此亦發汗之別稱泄  
諸病在表之通例也淨府者謂膀胱內無

入孔而外有出竅爲清淨津液之府焉腎  
氣藏氣化水穀之精而滲入腠中氣約成  
溺出也夫腎主下焦司開闔關竅二陰肺  
脾之氣通調水道下輸膀胱氣化水行而  
自清淨否則便澁或濁或淋爲水氣溢於  
腠理爲膚腫諸病若宛屈陳莖壅滯於身  
中當泄去是物而淨潔宜此二法在表者  
汗之在裏者泄之權衡於治也雖然經云  
水病本之於肺腎二經而古今方論並不

以治水獨瀉腎氣爲說者何蓋腎陰奉行降令爲生化之源而常不足至陰精損削於內生氣不能運化至爲臍腫其氣索矣况肺弱而母氣孤危者乎故東垣曰若治以甘淡滲泄陽藥獨陽無陰其欲化得乎此深擷已上治例之妙也如積飲留飲傷脾若土之於雨中則爲泥矣或因七情所致手足太陰俱病身面浮腫似水氣者用燥脾導氣之劑卽愈一則若泥土之得和

風暖日水濕去而陽化自然萬物生長一則肺氣開泄滲道通利水氣不濡於脾矣此正諸濕腫滿皆屬脾土諸氣臏鬱皆屬於肺而與陰陽爲病水氣機之不同故亦不待開鬼門潔淨府而已也

醫方類聚卷之一百二十六