

中西醫學群書

歲庚申薄遊西冷賣藥葛仙嶺下青山寂歷丹竈空明
稚川有知應亦笑人千古也我友壽喬幼耽繡虎壯梅
雕蟲宏景之閣三層鴈湖之水一曲常日攤書有時倚
權寄身於材不材間寓巧於元之元外惜盈盈三十里
賞析爲難玉屑珠霏空付停雲落月中耳歲籥初更嚶
鳴綦切爰借二三舊雨訪壽喬於一隅草堂積雨新霽
空翠滿庭延佇旣久皓魄漸升迺斟桂醕載啟瑤編循
環雜誦沁入心脾半生疑竇一旦冰釋嘻幸已憶予與
壽喬交迄今垂二十餘年矣屈指故人如雪泉石帆梨
谷諸君子悉皆化爲異物而計然七策沈約一圍猶得
鴻爪雪泥一話當年陳跡雖青青鬢漸復成絲亦可

見吾兩人之長鑱白木劔尤尋苓未始非人間世大自在法也二月初吉壽喬將官廣文閒雲出岫本自無心而故山猿鶴有待招尋爰於諸公祖帳之時聊將賤子題襟之意他日者春風桃李收拾藥籠當結束青鞋與壽喬重問勾漏消息未識三生一笑果有舊因緣否也嘉慶九年陞月二十有六日吳江同研第沈翹拜手跋

雜症述畧

秀水計楠壽喬氏輯

爛喉發癍疹近時甚多在穉年不治者十有八九何也
其根由於種痘近時嬰孩稟質既薄痘師防其發點繁
多下苗甚輕多者數十顆少者不過數顆而先天臟腑
之毒未經盡透一遇時感傳染乘機而發治之以寒涼
之劑則必至下陷治之以透表之劑則又邪未達而本
先撥蘊伏咽喉隨卽潰爛而亡其危可勝言哉讀金匱
書有陽毒之爲病面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血五
日可治七日不可治升麻鼈甲湯主之之文蓋以升麻
透厲毒鼈甲泄熱守神富歸和血調營甘草瀉火解毒

卽內經所云熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘之旨釋其
意實與此症相類而方內有蜀椒雄黃似當加於陰毒
方中或因傳寫之訛醫者當息心揣度用古而不泥於
古轉機則在於臨症活變也

李雲浦云爛喉痧一症風熱者宜清透濕熱者宜清滲
痰火凝結者宜消降蓋邪達則痧透痧透則爛自止若
過用寒涼勢必內陷其害不淺但其症有可治有不可
治口中作臭者謂之回陽其色或淡黃或深黃此係痰
火所致皆可治也如爛至小舌鼻塞合眼矇矓是毒氣
深伏元氣日虛色白如粉皮樣者皆不可治也

爛喉發痧症半由於元虛不正時邪易於感染重者用

紫背浮萍生石膏等藥透毒解熱稍輕者只宜用大
子桑葉杏仁連喬桔梗荆芥葶藶花粉輕清之品清邪
化熱不得早用大生地麥冬等以膩之亦斷不可用黃
連黃芩太苦大寒等品以遏之此等時症其勢危速須
細心詳慎審脈察色庶幾不致誤治也

南人多溫熱病而少真正傷寒不可概從六經論治蓋
傷寒六日傳遍多有變症溫熱惟留戀一經或傳入營
分從風從濕必潛心細究於舌色尤爲先務葉天士前
輩溫熱論治數條發前人所未發最爲切要學者宜宗
法焉

邪之所湊其氣必虛故曰不能治其虛焉問其餘然亦

不可執也強壯之人思慮應酬之間爲淫邪賊風所乘
或自恃脾強過啖甘肥炙燂釀成膠痰實火亦宜發表
攻裏如河間推陳致新之法有何不可若因循顧忌治
不中肯久則反傷正氣所謂五虛死五實亦死又云母
實實母虛虛是也若不論虛實動手便用補益執扶正
化邪之說與膠柱而鼓者何異耶

瘧病無汗要有汗固矣至於有汗要無汗亦不可不斟酌也雖有虛實之不同其根未有不因暑邪內藏陰邪外束所致暑爲陽邪陽邪多汗故瘧往往有汗豈可因其汗多早加固表之藥以致病情反覆故古人但言久瘧扶正爲主未嘗言固表也愚謂汗少不妨更發汗汗

多不必再發汗但以輕清和解治之可也

衛屬陽其氣慄悍故行速營屬陰其氣靜翕故行遲瘧邪之間一日及連二日發者邪之着於營也如周天之數日行過之月行不及亦是陰陽遲速之分耳

治疫之法解毒爲先務吳又可專用大黃驅逐毒穢但近時之人體氣多薄攻蕩難施莫若張路玉用人中黃配蔥豉等解毒藥爲起首方葉天士用銀花金汁涼解之品最爲穩當喻氏云上焦如霧升而逐之佐以解毒中焦如漚疏而逐之佐以解毒下焦如瀆決而逐之佐以解毒觀其旨病有上中下之分而獨於解毒一言叮嚀再四豈非急於解毒之法哉

疫者穢惡之氣互相傳染吳氏謂從口鼻而入卽踞膜原但口鼻吸受肺爲出入之門戶無有不先犯肺者疫皆熱毒肺金所畏每見此症身熱先有憎寒肺先病也繼而充斥三焦或有徑走心包絡者所謂厲氣無非鬱熱也至於疫邪漸解而肺蓄餘熱每多咳噎肌熱自汗等證亦所謂肺先病而未愈之明徵也今人每遇房勞遺洩之後偶感風寒發熱卽謂之陰症病者怕虛醫者怕表不問現症如何竟用參地附桂溫熱峻補之劑是則先補實其風寒於腎中矣邪何由出耶夫所謂陰症者寒邪中於三陰經也卽使中於腎經亦須先散少陰之風寒如傷寒論中少陰發熱仍用麻黃細辛發表之

法是也若果直中三陰身不壯熱有惡寒倦卧厥冷喜熱等症亦且先宜溫散漸進滋補之法此理不可不細辨也

大概治膏粱者多滋養治藜藿者多消散然膏粱之體易生痰積由其多食厚味也亦宜消散藜藿之人易於清減由其自奉淡薄也亦宜滋養所謂人情物理不可執一以施

病有在下者其見證反在上如蓄血發狂是矣在上者反在下如肺氣壅大便頻肺氣虛小便數是矣在表者反在裏如三陽合病下利是矣在裏者反在表如熱深厥亦深及面反戴陽是矣治宜細察

衛爲陽風爲陽邪中風者陽虛不能衛外以類相從也故多顯陽熱之症治宜求受病之本毋徒事於風藥以重虛其表

傷寒論云能食者爲中風不能食者爲中寒則傷寒內中風之症未嘗禁其食也又云欲飲水者稍稍與之蓋實火煩渴得水則解未嘗禁冷水也乃醫者凡遇此症恐其傷胃禁止勿與是亦背先賢之大旨矣

陰虛則陽無所附氣有升無降法當以滋陰藥爲君斂降之藥爲佐苟徒降其氣則濁未必降而清且隨虛矣陽虛則氣中斷氣有降無升法當以補中藥爲君升舉之藥爲佐苟徒升其氣則清未必升而濁且隨干矣此

治陰陽之偏虛也外此或七情逆滯或氣血飲食痰阻礙於中焦妨其升降出入之路其人元氣未虧不妨升之降之也此後天有形之氣血調治之理至若先天元陰元陽則陰虛陽必薄陽虛陰必乘但當峻補陰陽無暇爲升降治標計也

陽虛而見陽熱之症是真火無根而脫出也陰虛而見陽熱之症是陰虛陽無所附而然也陽盛而見陰寒之症是陽盛拒陰也陰盛而見陽熱之症是陰盛格陽也四者用藥不當生死反掌

腎者胃之關從陽則開從陰則闔陽太勝則開而爲消陰太勝則闔而爲水明矣仲景治水腫主之以腎氣丸

而治消渴亦然甯不與陽盛有乖乎然而此之消是腎
中陽虛不能收攝也此之渴是腎中陰虛引水自救也
喻氏謂腎水下趨故消腎氣不上騰故渴均用此丸蒸
動腎氣恐未必然

咳嗽之症大半由於火來克金謂之賊邪最難速愈因
風寒外襲而內生實火急宜瀉之若失於提解久之傳
變生痰誤服陰藥反成癆瘵如果係虛火惟有壯水一
法但養陰之藥又皆阻氣滯痰是在治之者靈也如生
脈六君湯金水六君煎之類最爲妥當

腎虛水泛爲痰有腎中陽虛腎中陰虛陽虛津液洋洋
泛溢味淡起沫治宜補氣以生陰則上泛可降陰虛咳

可雜也

臑膈爲難治之病然臑猶可治膈斷不可治臑多實症
或痰或血或氣或食或水凝結於中能先下其滯繼以
補養腸胃漸能運化矣內經雞矢醴之方卽治法也至
臂細臍凸青筋繞腹手心及背平滿此藏氣已絕死不
治若膈症始由肝火犯胃木來侮土謂之賊邪所以肝
陰素虧津液不足之體嘔逆不止久成噎膈以至胃汁
枯槁痰涎壅塞食不下達仍復吐出此病在賁門固與
反胃之症朝食暮吐暮食朝吐病在幽門者判然兩途
經云穀入於胃以傳於肺五臟六腑皆以受氣今旣食

客居醫言 卷一
五
不能入則臟腑之氣皆竭矣故見此病少可納穀不出
一年而死全不納穀不出半年而死春得病死於秋秋
得病死於春金木相克之時也

心腎不足小便渾濁中氣不足溲便爲之變色要知金
衰則水涸水涸則小便短數而渾濁氣不足則易鬱鬱
則生熱熱生則溺色變爲黃赤矣當求其本而治之若
徒執水液渾濁皆屬於火概施利水清熱之品必致反
增其病

脚氣之病多由濕熱因濁邪下先受之也膏梁者濕熱
內生藜藿者濕熱外侵治宜分利滲濕固也若有陰虛
之極不能吸氣歸元陽虛之極不能攝血歸經陰陽偏

勝升降失司於是陽獨浮於上陰獨沈於下足至暮則
腫痛矣治又宜補陰益氣不可概施分利滲濕以重傷
其陰陽是在觀形察脈以細求之

有思慮傷脾脾虛不能統血而失出者有思慮傷脾脾
衰不能消穀而泄瀉者失血斷不宜用涼血泄瀉不宜
用消導以致脾氣愈傷皆當扶養脾土爲本勿徒治其
標

平脈云少陰脈不至腎氣微少精血奔氣迫促上入胸
膈夫少陰脈不至是先天元陽元陰受傷腎者先天也
脾胃者後天也先天既已受傷則不能生乎後天故脾
胃之陰陽亦傷不能運化水穀而生濕熱濕熱下流則

膀胱之氣化不行濁氣因而上入濁氣上入肺氣便壅
脾氣愈滯於是爲痰爲飲而食滯腹脹之症形焉其少
陽生發之氣鬱而不得升爲周身刺痛爲嘔逆吞酸心
主之陽爲濁陰所乘則爲心悸怔忡是腎之一臟腑而
五臟六腑皆爲之不甯故養身莫妙於節慾也若不知
此而但以利氣行痰消食爲治則燥以傷其陰利以傷
其陽不坐困乎此專主腎虛而言也

諸痛無補言氣逆滯也然壯者氣行則愈怯者着而成
病真氣虛乏之人諸邪易於留着着則逆逆則痛疏刷
之中不可無補養之品徒事攻擊則正愈虛邪愈着而
痛無休止也所以脾胃亡液焦燥如割宜用地黃養陰

等以潤之脈陽澀陰弦腹中急痛當用小建中湯肝血不足兩脇脹滿筋急不得太息四肢厥冷心腹引痛目不明了爪甲枯面青宜補肝湯腎虛羸怯之人房勞過度胸膈間多隱隱痛此腎虛不能約氣氣虛不能生血之故往往凝滯而作痛宜用破故紙萸肉枸杞等溫腎歸芍等養血至於頭痛有氣虛有血虛有腎虛皆不可無補也

風溫溫瘧之病其根得之於冬令中於風寒遇溫而發其氣自內而達於外故多汗不比風邪外束閉其營衛當發汗解肌也治故以發表爲逆亦不可因汗而斂之致變別病務以清解得宜

吐血一症繆氏云治有三訣宜行血不宜止血血不循經絡者氣逆上壅也行血則使循經絡不止自止若用硬止之劑血必凝血凝則發熱惡食病日痼矣宜補肝不宜伐肝肝主藏血吐者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸若使伐肝則肝愈虛血愈不止矣宜降氣不宜降火氣有餘便是火氣降則火降火降則氣不上升血隨氣行無溢出上竅之患矣若使先降火必用寒涼之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血愈不歸經矣吐血入水浮者肺血沈者肝血半沈半浮者心血色赤如太陽之紅者腎血肺血宜保肺不宜瀉肺肝血宜養肝不宜伐肝心血宜補心不宜瀉心腎血宜滋腎不宜

脾和則能裹血也若暴吐不止急用大劑參朮以急固元陽血脫益氣陽生陰長之理也如一味以生地苓連知柏黑梔寒涼陰膩之屬清其火則脾傷作瀉發熱效嗽勢必至於不救矣

幼科驚症自喻氏以食痰風驚四字立名大剖從前之訛原爲確論然亦有未盡者近多冬令氣暖失藏入春寒溫間雜小兒吸受其邪先傷肺經起自寒熱氣麤久延漸入包絡雖有微汗而痰多鼻煽煩躁神昏病家惶懼輒云變爲驚風動用香開妄投金石重鎮以致陰液消亡熱勢愈張正不敵邪肝風陡動漸見肢牽目竄瘡

閉發厥必多傾敗若能於病未猖獗之時先以辛涼開肺繼以甘寒化熱佐以潤燥降痰兩候自能平復此蓋溫邪陷入陰液內耗而動肝風實非驚恐致病也若誤以驚藥治之鮮有不危殆者矣

內經云臨病問所便蓋病人之愛惡苦藥卽病情虛實寒熱之徵醫者之切脈望氣不若問病人使自言以推求其理爲確如身大熱而反欲飲熱則假熱而真寒身寒戰而反欲飲冷則假寒而真熱如此之類是也所以病人之喜好不妨從病人之便卽可以治其病

病者之性情不同醫者之意見各異人有能受溫熱不能受寒涼者有受補有不受補者必須順其性察其情

現症有與平素相反者有與平素不相遠者不可執已見誤治其標本也

近時醫家每用囫圇古方硬引經語以自矜淵博殊不知古賢立方與人以規矩不能使人巧蓋規矩做方做圓之呆法而作噐長短大小時時變通所以病情古今無印板式樣卽方無一定呆藥必須加減寓變通於成法之中斯神乎技矣

婦科述略

秀水計楠壽喬輯

治婦人病必先明衝任之脈衝脈起於氣街

在毛際兩旁

並

少陰之經挾臍上行至胸中而散任脈起於中極之下

臍旁四寸

以上毛際循腹裏上關元又云衝任脈皆起於胞

中上循背裏爲經脈之海皆血之所從生而胎之所有
繫明於衝任之故本原洞悉不槩治以男子泛用之藥
自能所治輒效矣

肝氣之病近時甚多婦女爲尤甚卽十餘歲之童女往
往左脇下痞積脹滿嘔逆此先天之肝血不足也治以
疏伐則劇治以滋養則平比比而然况乎天癸久轉生

育頻多之婦人其血愈虧肝愈旺上犯胃腕下侵於足
甚至納食卽吐兩足攣痛致發痙厥此肝氣久痛必入
於絡因血少不能流通其氣必滯非養血和絡補水滋
木焉能療治世人槩以謂東方常實有瀉無補遂皆以
肝無補法論治殊不知肝氣之痛大半屬於水虧木熾
所以逍遙散爲治肝之始方並無瀉伐之品其中歸芍
補肝白朮甘草補中加以柴胡煨姜爲疏通之用氣平
卽繼以八珍湯調養之則自然所發漸輕若隨俗附和
任意用枳殼香附青皮鬱金等破氣之藥元氣日益消
耗陽衰則陰竭禍不旋踵矣景岳質疑難云肝無補法
者以肝氣之不可補非謂肝血之不可補補肝血莫如

滋腎水腎者木之母也母旺則子強是以上當滋木也
千古之良法也夫將軍之官其性剛勁木火同居風乘
火勢火助風威母贊其勝此言其氣實有餘也若求其
本則乙癸同源滋陰養血尤爲急矣

婦人血結胞門則上焦之陽不得入於陰在下則小腹
裏急五液時下在上則孤陽獨浮爲嗔怒發熱口燥發
厥治法先宜開痺破陰結不得一味滋膩致成蠱滿當
看其虛實用景岳新陣柴胡飲六方柴陳煎歸柴飲解
肝化肝煎等方因病加減治之較古方尤爲靈動

妊娠傷寒及溫熱症最難措手須辨舌胎張誕先舌鑑
六條實爲名論治宜宗之其一云孕婦初傷於寒見面

赤舌上白滑卽當微汗之以解其表如面舌俱白發熱多飲冷水陽極變陰所致當用溫中之藥若見厥冷煩躁誤與涼劑則厥逆吐利而死 其二云面赤舌黃五

六日裏症見當微利之庶免熱邪傷胎之患若面舌俱黃此失於發汗濕熱入裏所致當用清利水藥 其三

云面舌俱黑水火相刑不必問其月數子母俱死面赤舌微黑者還當保胎如見灰色乃邪入子宮其胎必不能固若面赤者根本未傷當急下以救其母 其四云

妊娠傷寒溫熱見面舌俱赤宜隨症汗下子母無虞面色皎白而舌赤者母氣素虛當略用溫散法若面黑舌赤亦非吉兆若在臨月則子得生而母當殞 其五云

見面赤舌紫其人必嗜飲乃酒毒內傳所致如淡紫戴
青爲陰症夾食難治也卽用枳實理中四逆輩亦難爲
力若面赤舌青母雖無妨子殞腹內急宜用芎歸湯合
平胃散加朴硝下之以救其母 其六云面黑而舌乾
卷短或黃黑刺裂乃裏症至急不下則熱邪傷胎下之
危在頃刻如無循衣撮空直視等證十中可挽回一二
妊娠傷寒傷風首宜固胎順氣雖見脈緊無汗不可用
麻黃青龍及一切解表猛劑以風藥性升皆犯胎氣也
鄭虛谷曰妊娠傷風無論時月及月分多少俱宜嚴氏
紫蘇飲加蔥白爲至穩

古人用芩朮安胎是因子氣過熱不甯故用黃芩苦寒

以安之脾爲一身之津梁主內外諸氣而胎息運化之
機全賴脾土故用白朮以助之然惟形瘦血熱營行過
疾而胎常上逼者宜之至若形盛氣衰胎常下墜者非
人參舉之不安形盛氣實胎常不運者非香砂耗之不
安血虛火旺腹常急痛者非芎歸地芍養之不安體肥
痰盛嘔逆眩暈非芩半豁之不安此皆治母之偏勝也
婦人墜胎與難產病之最險者也治墜胎往往用補瀉
治難產往往用攻下皆非正法蓋半產之故由於虛滑
者半由於內熱者半得胎之後衝任之血爲胎所吸無
餘血下行血苟不足則胎必枯槁而墜其本由於內熱
火盛陽旺而陰劫血益少矣治宜養血爲先清熱次之

若泥於賦補反生壅滯之害至於產育乃天地生生化育之理本無危險皆人之自作也用力不可太早早則胎先墜下舒轉不及胞漿先破胎已枯澀遂有橫生倒產之虞其治亦不外乎養血爲主血生則胎自出若誤用攻下之藥則胎雖已產衝任大傷氣冒血崩危在呼吸矣慎之慎之

胎前論治

孕婦元氣不足倦怠腹鳴胎動或微熱減食煩渴宜服加味安胎飲

人參 八分

製白朮

炒 一錢

白當歸

分 一錢五

砂仁

炒 三分

蘇葉

四分

陳皮

炒 四分

熟地

炒 三錢

淡子

黃芩

八分

炙草二分 麥冬一錢

孕婦或胃脘痛肝脹小腹墜痛腰痛皆名胎痛治宜加

味參橘飲

人參五分 製白朮一錢 當歸一錢五分 製半夏六分

新會橘紅六分 鹽水炒 藿梗五分 炙甘草三分 砂仁三分

白芍一錢 蘇梗六分 生薑二分

孕婦多怒胸腹滿悶宜服加減和氣安胎飲

人參四分 白朮七分 當歸半錢 川芎五分 鹽水炒 炙甘草三分

蘇葉四分 陳皮五分 青皮四分 炒炭 石決明一錢 煨 錢五分

孕婦面目虛浮四肢有水氣多因脾胃氣虛或久瀉所

致宜健脾利水服全生白朮散

人參 四分 茯苓 二錢 生白朮 一錢 淮山藥 二錢 扁豆 二錢

澤瀉 五分 炒 大腹皮 七分 陳皮 七分 蘇葉 四分 炙甘草 三分

胎氣上攻心腹脹滿名曰子懸宜服順氣安胎飲

人參 五分 白朮 八分 當歸 一錢 白芍 一錢 條芩 八分

蘇葉 四分 陳皮 六分 砂仁 三分 茯苓 一錢 製香附 八分

受胎後尙有經來數點乃氣血盛也若不腰痠腹痛不

必服藥如下血不止或按月下血名曰胎漏多因勞傷

氣血或喜食炙煨熱物或因房事宜服補中安胎飲

人參 一錢 淡黃芩 一錢 阿膠 一錢 蛤粉炒珠 白朮 一錢

歸身 一錢 生地 二錢 川斷 一錢 蘇葉 四分

白芍 一錢 炙甘草 三分

孕婦跌仆傷胎下血不止宜服膠艾安胎飲

阿膠一錢 蛤粉炒 艾葉五分 人參 一錢 白朮一錢 川芎 六分

熟地三錢 黃芩一錢 當歸一錢 陳皮五分 蘇葉 四分

孕婦心驚膽怯煩悶不安名曰子煩宜服竹葉安胎飲

竹葉十斤 人參 八分 麥冬一錢 當歸一錢 生地 二錢

棗仁一錢 黃芩八分 遠志肉四分 甘草水炒焦

川芎 四分 炙甘草 二分 陳皮四分

孕婦脾虛氣弱飲食停滯嘔吐腹脹洩瀉宜服加味人

參平胃散

人參 一錢 茅蒼朮七分 厚朴七分 姜汁炒炭

陳皮四分 炙甘草 三分 白朮八分 山查炭 七分

孕婦成胎之後兩足冷腫漸至臍腹行步艱難氣促喘悶面浮不思飲食甚至足指出黃水蓋脾主四肢脾氣虛弱不能制水肺腎少氣血滋養名曰子氣宜服天仙藤散

天仙藤七分香附六分陳皮五分蘇葉四分
微炒製

甘草三分烏藥六分木瓜八分薑皮三分人參五分

白朮一錢當歸一錢五分如元虛脾胃弱間服補中益氣湯

孕婦口噤項強手足攣縮言語蹇澁痰涎壅盛人事不省名曰子癇不可作中風治宜羚羊角散

羚羊角一錢棗仁一錢薏苡仁一錢當歸一錢五分
炒

獨活八分 茯苓一錢五分 生甘草四分 五茄皮五分
酒炒

川芎六分 防風五分 木香二分 苦杏仁十粒
去皮尖 薑汁一滴

竹瀝一匙 如體虛胃弱加人參 白朮

孕婦小便澹少或成淋瀝名曰子淋宜服加味安榮湯

人參一錢 當歸一錢五分 白朮一錢 麥冬一錢五分 茯苓一錢五分

通草五分 生甘草五分 燈草五分 原方有北細辛不可用

孕婦小便帶血宜清膀胱之火治以加味逍遙散

當歸一錢五分 白芍一錢 柴胡四分 白朮八分 茯苓一錢五分

丹皮一錢 黑山梔七分 生甘草三分 或加生地二錢 麥冬半錢

亦安

孕婦小便癰閉少腹脹滿欲死徒利水無益也當用加

味葵子茯苓飲

冬葵子 四錢
茯苓 六錢
歸身 一錢五分
橘皮 四分

人參 一錢五分
麥冬 二錢
大腹皮 七分

孕婦臍腹脹痛或小便淋閉此脾胃氣虛胎壓膀胱宜服升提安胎飲

人參 八分
白朮 一錢二分
熟地 二錢
當歸 一錢五分
川芎 六分

製半夏 四分
炙甘草 三分
陳皮 四分
柴胡 四分
升麻 四分
蜜炙

如小便自利者升柴宜輕人參宜重如無血熱宜加

生黃地

孕婦遍身浮腫胸滿腹脹便閉名曰胎水不利宜服鯉

魚湯合四君子湯

白朮一錢 茯苓四錢 當歸二錢 白芍一錢五分

用活鯉魚一尾約重二斤去鱗腸加橘皮錢三 生薑片錢三

河水煮取魚湯加藥煎服虛者加入參錢一 炙甘草四

孕婦感冒風寒咳嗽宜服甯肺散

麥冬一錢 知母一錢 桔梗五分 蘇葉五分 生甘草五分

杏仁一錢 去皮尖 橘紅四分 桑皮八分 如寒嗽加姜汁一匙

竹瀝一匙 熱嗽加黃芩一錢 虛嗽加紫苑一錢 川貝一錢

若嗽不止胎動不安加入參一錢 天冬一錢 百合五分

歸身一錢 炒焦 白芍八分 炒焦

孕婦咳嗽吐血宜服涼血安胎飲

生地三錢 天冬一錢 紫苑一錢 知母八分 白朮八分 蜜水炒

麥冬一錢 歸身一錢 陳皮四分 甘草四分 黃芩四分

孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛先服六和湯繼服安胎飲

人參一錢 木瓜八分 扁豆三錢 茯苓一錢 製半夏五分

砂仁三分 陳皮六分 藿香五分 甘草三分 杏仁錢半 去皮尖

竹茹六分 生姜一片 大棗二枚 煎服

安胎飲

蜜炙黃耆八分 杜仲二錢 茯苓一錢 黃芩一錢 生白朮八分

阿膠一錢 川斷一錢 炙甘草三分 蘇葉四分 陳皮六分

加糯米百粒

孕婦瘧疾往來寒熱宜服六和安胎飲

人參五分 白朮八分 歸身一錢 川芎四分 條芩八分

製半夏五分藿香六分蘇葉四分茯苓一錢五分砂仁二分

重者加柴胡三分

孕婦壅熱心神煩躁口渴舌乾或舌苔黃黑宜加減參

麥散

人參五分廣皮四分歸身一錢條芩八分
鹽水炒

麥冬一錢五分石斛二錢

孕婦熱病癍疹紫赤小便短赤氣急欲絕腹痛胎欲落之象症雖危險宜服梔子蔥豉湯以救之

黑山梔一錢黃芩一錢升麻四分青黛五分鮮生地二錢

淡豆豉四十九粒杏仁十粒石膏一錢五分蔥白七寸
去皮尖

孕婦嘔吐不食胸中煩躁宜生津葛根湯

人參 五分 麥冬 一錢

梔子 八分 知母 八分 葛根 七分

竹茹 六分 蘆根 二錢 蔥白 二寸

孕婦吐血衄血忽然口噤項強背直皆失血所致非類中風也宜加減安胎飲

人參 一錢 當歸 一錢 白朮 一錢 大生地 二錢 條芩 八分

純鉤藤 二錢 荆芥 四分 陳皮 四分 甘草 三分

麥冬 一錢 五分 去心

孕婦每三月殞胎是肝虛血不能養胎也宜人參阿膠

湯預先服之

人參 一錢 阿膠 一錢 五錢 當歸 一錢 五分 川芎 四分

蛤粉炒珠 水炒

白芍 一錢 二分 桑寄生 一錢 二分

孕婦傷胎胎死腹中口噤昏沈腹中脹痛血上冲心急

宜服佛手散

當歸 六錢 川芎 三錢 水七分酒三分煎服數劑

臨產交骨不開及橫生倒產宜急服加味芎歸湯

當歸 一兩 川芎 四錢 敗龜版 一具 陳酒炙碎

婦人頭髮如鷄子大一團洗淨瓦上炙灰存性如久而虛欲脫者加

人參 熟地 牛膝 酌量用之開支河之法也

二寶湯方

全白當歸 一錢五分 川芎 八分 羌活 三分 厚朴 五分 姜汁炒

荆芥穗 七分 兔絲餅 一錢五分 陳枳殼 五分 麩炒

生黃耆 八分 川貝 一錢 白芍 一錢二分 甘草 四分 酒炒

斲艾

五分
醋炒炭

姜一片

一方

羌活厚朴
蘇葉藿香

此方耑治一切胎症未產能安胎臨產能催生懷孕五
月後腰痛腹痛服之卽愈分娩時交骨不開橫生逆產
或子死腹中服之能下懷妊五月後每月服二三劑臨
盆容易子母俱全故名二寶湯異人傳下不可輕忽視
之

客塵醫話卷三

產後述略

秀水計楠壽喬輯

婦人之病莫重於產後因氣血大虧內而七情外而六氣稍有感觸卽足致病且多疑似之症母徒以逐瘀爲事以致變端百出讀金匱書中有用大黃等峻劑者非古人立法之不善也蓋以古時稟氣之足或西北地土堅厚人亦強壯用之良善至於吾地體質柔弱深閨嬌養豈能受此侵尅此看病之不可泥於古也時人每謂產後不可補恐其瘀阻往往用蘇木紅花等行瘀爲先務設或血行不止立見厥脫急難措手可不懼哉丹溪云產後以大補氣血爲主雖有他症以末治之王肯堂

卷二
云產後用下藥者百無一生誠哉是言也

金匱要略云新產婦人有三病一病瘧二病鬱冒三病大便難新產血虛多汗出善中風故令病瘧亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難心典云血虛汗出筋脈失養風入而益其勁此筋病也亡陰血虛陽氣逆厥而寒復鬱之則頭眩而目瞽此神病也胃藏津液而滲灌諸陽亡津液胃燥則大腸失其潤而大便難此液病也三者不同其爲亡血傷津則一故產後血虛諸症由此而類推之則不致誤治矣

產後諸病總宜以生化湯爲主隨症加味可也竹林寺世傳秘本生化湯論云產後血氣暴虛理當大補但惡

帶補方爲萬全世以回生丹治以下胞胎攻血塊雖見
速效未免虧損元氣非良劑也不得已而用之只可服
一丸以參湯下之庶無虞耳夫生化湯以藥性功用而
立名也夫產後瘀固當消新血宜生若專消則新血不
甯專生則舊血反滯考藥性芎歸桃仁善破惡血驟生
新血佐以炮薑甘草引三品入肺肝生血理氣五味共
方則行中有補化中有生實產後之要藥也加減得宜
是在臨證者之善悟可耳又論產後治法云夫產後憂
驚勞倦血氣暴虛諸症乘虛易起如有氣勿專耗散有
食勿專消導熱不可用苓連寒不可用桂附用寒則血

塊停結用熱則新血崩流至若虛中外感見三陽表症似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏症似可下也在產後而用承氣則重亡其陰耳聾脇痛乃肝腎惡血之停休用柴胡譫語汗出乃元弱似邪之症毋同胃實厥由陽氣血衰無分寒弱非大補不能回陽而起弱痺因陰血之虧不論剛柔非滋榮不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作有期類瘧也若以瘥治則遷延難愈神不守舍言語無倫似邪也若以邪論危亡可待去血多而大便燥結菴蓉可加於生化湯中非潤腸承氣之爲患汗多而小溲短澀六君子倍多參著必生津助液之可利加參生化頻服能救垂絕之危長生活絡能

用可甦絕穀之人類疝脫肛多是氣虛下陷生化可參
用補中益氣口噤拳攣乃因血燥類瘋加參生化宜服
產戶入風而痛甚服宜羌活養榮玉門寒冷而不閉洗
宜床菟黃硫類怔忡驚悸生化加定志之品似邪恍惚
生化加安神之法因氣而虛煩滿悶生化加木香爲佐
因食而酸酸惡食合六君加神麩麥芽爲良不可用蘇
木菴蓬以破血不可用枳實青皮以消脹血崩血暈之
危汗脫氣脫之急連煎加參生化湯爲最要務也王太
僕云治下補下制以緩急緩則道路遠而力微急則氣
味厚而力重丹溪云產後切不可發表故治產固本當
遵丹溪服法宜效太僕

生化湯原方

分兩斟酌在臨用變通也

川芎二錢

白當歸四錢

炙甘草五分

炒黑乾薑四分

單桃仁

十粒去皮尖

水二鍾

陳酒半小盃冲服

產後血暈因勞倦去血過多氣竭神昏而暈不可誤認爲惡血冲心投散血之劑不可誤認爲痰火鬱冒用消降之方宜服加味生化湯

歸身

三錢

川芎

一錢五分

炮薑

四分

桃仁

十粒去皮尖

荆芥炭

五分

如汗多加人參

一錢

產後厥逆因勞傷脾孤藏不能注於四旁故足冷而厥氣上行經云陽氣衰於下則爲寒厥是也宜加參生化

湯滋榮復神湯

加參生化湯

人參 一錢

川芎

一錢五分

歸身

四錢

桃仁

十粒

炙甘草

五分

炮薑

五分

橘紅

四分

鹽水炒

滋榮復神湯

川芎

一錢

白朮

一錢

黃耆

二錢

人參

一錢五分

當歸

三錢

熟地

三錢

麥冬

一錢

炙甘草

三分

五味子

十粒

茯神

二錢

熟附子

四分

陳皮

四分

如大便不通

加菴蓉

一錢五分

產後血崩如紫色有塊是敗血未盡當用原方生化湯

加澤蘭葉

一錢五分

如血鮮紅色大來或因驚傷心怒傷肝

勞腸脾血則不能主不能藏不能統陰絡大傷矣症甚

急當用升舉生化湯

人參一錢五分製白朮一錢五分歸身二錢炙黃耆一錢

熟地炭三錢荆芥炭四分陳皮四分升麻三分

白芷三分川芎六分淡附子二分炙甘草四分

如汗多加淮小麥四錢

產後氣短似喘因血既暴去氣必上竄脾失健運不能上輸於肺所以呼吸短促言語不相接續急服加參生化湯續氣養榮湯若認爲痰火而妄議散氣化痰之方誤事多矣

續氣養榮湯

歸身四錢川芎一錢炙甘草四分炮薑四分人參一錢

炙黃耆一錢製白朮一錢熟地炭三錢陳皮四分如煩渴加

麥冬一錢五分 五味子十粒 如大便閉加淡菝蓉二錢

傷食加神麩八分 查炭一錢 砂仁三分 汗多加浮小麥

四錢 如手足冷加淡附子三分

產後妄言妄見由氣血兩虛魂魄無依也不可誤認爲

邪祟墮以符水驚以法尺多致不救丹溪云虛病似邪

祟是也又云欲泄其邪當補其虛宜服安神定志生化湯

棗仁一錢五分 遠志四分 柏子仁一錢五分

麥冬一錢五分 歸身三錢 川芎一錢 桃仁七粒

炙甘草四分 炮薑炭四分 人參五分 加龍眼肉五斤

產後去血過多防血脫氣短如喘防氣脫汗多妄言妄

見防神脫雖有血陰氣陽之分而精散魂去之促無異

若非厚藥急方濃煎頻服奚能有救宜服大補生化湯

人參一錢五分熟地四錢炙黃耆一錢五分淡附子三分

五味子十粒製冬朮一錢麥冬一錢五分白桃仁八粒

歸身三錢川芎八分炮薑四分炙甘草三分

產後傷食因形體勞倦脾胃俱虛不思食而強與之胃雖勉受脾難轉運食停痞滿噯腐吞酸必須健脾助胃加以輕品消導之藥則食化脹平斷不可用峻劑消之致傷元氣宜服健脾消食生化湯

歸身三錢川芎一錢焦白朮一錢焦神麩一錢焦麥芽一錢

陳皮五分炙甘草四分如傷肉食加焦山查一錢

砂仁四分或以絹包炒熟麩皮加芒硝少許揉慰更穩

產後因忿怒氣逆胸痞不舒宜用木香生化湯

煨木香二分 歸身三錢 川芎一錢 炮薑四分 陳皮四分

產後類瘧寒熱往來應期而發此元虛而外邪易侵不

可作泛常瘧治有汗宜用滋榮扶正化邪生化湯無汗

頭痛加減養胃湯

歸身三錢 川芎一錢 人參一錢 炙甘草四分 麥冬一錢

陳皮四分 炙黃耆八分 藿香三分 荆芥炭四分 生薑四分

河井水煎服

加減養胃湯

當歸三錢 川芎二分 藿香梗四分 炙甘草四分 人參一錢

焦白朮一錢 茯苓五分 製半夏八分 橘紅四分 姜皮二分

客居醫言卷三
酒炒柴胡三分

產後七日內外發頭痛惡寒類太陽症潮熱自汗大便不通類陽明症往來寒熱口苦脇痛類少陽症皆由氣血兩虛陰陽不和類外感傷寒治者慎勿輕產而重傷寒以麻黃柴胡等湯治之也蓋產婦血脫之後而重發汗虛虛之禍不可勝言仲景有云亡血家不可發汗丹溪云產後切不可發表古賢立說皆具至理即使真感傷寒生化湯內芎藭亦能散邪且內經云西北之氣散而寒之東南之氣溫而收之即病同而治亦異至於產後屬虛無分南北當於溫補中少佐辛散可也宜祛邪生化湯

歸身錢川芎五分炙甘草分炮薑分羌活分

桃仁十粒防風分蔥白七如虛者加入參五分

產後頭痛口燥咽乾而渴類少陰症腹滿液乾大便實

類太陰症汗出譫語便閉痙厥類厥陰症多由勞倦傷

脾運化稽遲氣血枯竭腸腑燥涸乃虛証類實承氣諸

湯斷不可施宜養正通幽湯

當歸錢四錢川芎五分炙甘草分陳皮分桃仁十粒去皮尖

肉苳蓉錢麻仁錢如汗多加入參錢黃耆一錢

口渴加入參錢麥冬五分腹滿液乾加入參一錢

大腹皮錢汗出譫語便閉加入參錢熟棗仁二錢

柏子仁錢茯神錢遠志錢肉分麥冬五分

產後血氣暴竭百骸無以涵濡卒爾口噤牙關緊閉手足攣急症類中風不可任用中風劑也蓋衝爲血脈之海血脈空虛關節不能流利治當先服生化湯以生旺新血如危極卽服滋榮活絡湯救之

熟地錢三人參錢一炙黃耆錢一歸身錢四川芎一錢

茯神一錢五分天麻六分麥冬一錢荆芥四分防風四分

羌活三分陳皮四分炙甘草四分如有痰加製半夏一錢

姜汁一匙竹瀝一匙有食加山查炭一錢五分焦神麩一錢

大便閉加柏子仁二錢茯苓一錢五分驚悸加熟棗仁二錢

言語恍惚加遠志肉四分石菖蒲四分棗仁二錢

產後汗出不止亡陽之徵也蓋汗爲心之液又腎十五

液血去而心腎大虧必須急補心腎益榮衛而噓血歸源則汗自止宜補陽益陰生化湯以救之

人參一錢五分熟地三錢炒炙黃耆二錢炙甘草四分

歸身三錢川芎一錢炮薑四分煨牡蠣二錢製白朮一錢

桃仁六粒去皮尖浮小麥一撮如渴加麥冬一錢五分

五味子十粒

產後舌燥口渴兼小便不利由產後失血或汗多所致治當助脾益肺調養氣血則津液生而小便自利矣斷不可用芩連知柏以降之五苓等劑以通之宜服生津止渴益水散

炙黃耆一錢五分人參一錢五分熟地三錢炒五味子十粒

麥冬二錢 歸身三錢 川芎一錢 茯苓一錢 生甘草三分

炙升麻三分

產後小便不禁是氣血虛不能收攝腎氣宜加味生化湯

鹽水炒益智仁四分 煨牡蠣三錢 北五味十粒 歸身二錢

炙黃耆一錢 川芎一錢 桃仁十粒 炮薑四分 熟地三錢

覆盆子八分 兔絲子一錢 炙甘草四分

產後泄瀉非雜症飡泄洞瀉水穀下注之比大率氣血虛易於食積傷濕所致宜消補兼施加味參苓生化湯

白朮一錢 人參一錢 茯苓二錢 川芎一錢 當歸二錢

炮薑四分 炙甘草四分 焦神麩五分 焦麥芽八分 廣皮四分

澤蘭錢一 如有寒加生姜片一 大棗二枚 如熱去炮薑加

金石斛錢三 如痛加煨木香四分 如至五更而甚者加

煨肉菓四分

產後完穀不化因勞倦傷脾而轉輸稽遲也又有飲食

太過脾胃受傷當血塊未散之時患此脾敗胃弱之症

宜先服香砂生化湯繼服加味參苓白朮散乃可無虞

香砂生化湯

砂仁三分 益智仁三分 歸身三錢 川芎一錢
炒研 炒 土炒 焦

炙甘草四分 炮薑炭四分 澤蘭一錢 焦鍋芭五錢
五分

加味參苓白朮散

人參錢一 白朮錢一 茯苓二錢 歸身三錢
土炒 錢五分 土炒

川芎錢一炮姜四分炙甘草四分益智仁三分澤蘭一分錢

白芍藥八分酒炒炭廣皮四分煨木香二分

產後患赤白痢疾後重頻併最為難治須行不損元補不助邪惟生化湯去炮姜加木香茯苓則可以並治而不悖也後立數條斟酌用之

一產痢黃色乃脾土真氣虛宜服加味補中益氣湯加煨木香四分煨肉菓四分

一久痢元氣下陷肛門如脫宜服六君子湯加木香四分煨肉菓四分乾姜四分歸身三錢升麻三分

一久痢四肢浮腫宜四君子加木香四分五茄皮四分歸身

二錢
土炒

一產痢臍下急痛生化湯加木香四分大腹皮六分白朮

一錢
土炒

一產痢嘔吐生化湯加廣藿香五分製半夏五分焦白朮一錢

陳皮四分

一產痢小便短濇生化湯加茯苓二分木香三分人參四分

澤瀉一錢

一產後血痢過多日久不止血分虛也宜四物湯加入

參一錢荆芥炭五分淮山藥三分白朮八分

產後膨脹皆因中虛傷食多氣瘀積所致也中虛宜加

參生化湯內加陳皮五分多氣生化湯內加川鬱金五分砂

仁三分傷食生化湯內加白朮炭六分焦麥芽八分焦神麩

八分瘀積生化湯內加沙糖炒山查一錢五分新絳一錢五分陳皮

四分以上四症如虛必須人參隨機酌用

產後霍亂因血虛陰陽升降不順清濁亂於腸胃冷熱

不調邪正相搏遂上吐下瀉宜生化六和湯

川芎一錢歸身三錢炮姜三分炙甘草三分茯苓一錢五分

砂仁四分陳皮四分藿香五分如手足厥冷無塊痛者加人

參一錢白朮一錢淡附子三分

產後嘔逆不食人之胃腑為水穀之海水穀之精化而

為氣血榮潤臟腑產後空虛寒邪易乘入於腸胃則氣

逆嘔惡而不食也初宜生化湯加砂仁治七日後始用

溫胃丁香散

歸身錢二白朮錢一乾姜分三丁香分二人參錢一陳皮五分

炙甘草四分半夏麩五分藿香四分

產後水腫肢體俱浮皮膚光澤乃脾虛不能制水腎虛不能行水宜實脾飲香砂六君子湯金匱腎氣丸濟生腎氣丸因症擇用斷不可用破滯行水之藥丹溪治產後誤服消導藥以致水腫方

人參錢二白朮錢二歸身錢三木通分六白芍錢一
炒焦

茯苓錢二澤瀉錢一厚朴分五蘇葉分四陳皮錢五
炒

木香分四大腹皮分六萊菔子分六
炒

又加味五皮飲

五茄皮分四地骨皮分六大腹皮分六茯苓皮錢三

生薑皮分三 加人參錢一 歸身錢二 白朮皮錢一 陳皮四分

產後驚悸怔忡因驚憂勞倦去血過多惟宜補養心血

調和脾胃病自漸安後列二方

加減養榮湯

人參五分 歸身錢三 川芎錢一 茯苓錢二 熟棗仁二錢

麥冬五分 遠志四分 炙黃耆錢一 白朮錢一 陳皮四分

炙甘草分四 龍眼肉錢一 如虛煩加竹茹八分 姜汁炒 有痰竹

瀝三匙 姜汁一匙

養心湯

黃耆一錢 茯神五分 歸身錢二 川芎分八 麥冬一錢 去心

遠志分四 棗仁一錢 炒研五分 柏子仁一錢 勿研五分

五味子十粒 人參一錢 炙甘草四分

產後骨蒸乃陰虛生內熱也宜保真湯加減治之

人參一錢 白朮一錢 茯苓二錢 知母一錢 生地二錢

熟地二錢 麥冬一錢 白芍一錢 枸杞子一錢 川芎一錢

五味子十粒 甘草四分

此方繁多須臨病斟酌加減用

產後胃脘痛因血虛肝氣上犯或由風冷乘虛襲入皆

宜生化湯加泡淡吳茱萸三分 陳皮四分 如遍身疼痛宜服

趁痛散

歸身三錢 黃耆一錢 白朮一錢 牛膝炭八分 肉桂二分

獨活四分 薤白四分 炙甘草四分 如痛喜手按屬大虛加

熟地錢三川斷一錢五分酒炒如少腹結痛加川芎一錢

延胡七分酒炒

產後感冒風寒傷冷腰痛不能轉側宜服養榮壯腎湯

當歸錢二獨活分四桂心分四川芎錢一杜仲錢三防風四分

川斷一分桑寄生一分酒炒錢五分生姜分三如虛加熟地錢三

產後血塊已消腹中空痛不止宜服交加地黃湯

人參錢一當歸錢三川芎錢一白芍炭分八煨木香三分

沒藥分四製香附分四熟地炭錢三煨姜分三大棗一枚

產後或敗血或濕痰乘虛流注宜服參歸生化湯

人參錢一馬蹄香錢一當歸錢三川芎錢一生甘草四分

炙黃耆錢一肉桂分四茯苓錢二

以上產後論治數條雖未能全備症情而遍考方書摘
取純正試之輒效刊以質之同人未必無小補耳予凡
看胎產諸症已二十餘年遇大險大危之候竟得十中
挽回七八者皆以用補得宜不隨世俗以治標逐瘀爲
先務也

壽喬識

[General Information]

书名=中西医学群书 12

作者=页数65

页数=65

SS号=12498463

DX号=000007570584

出版日期=

出版社=