

醫燈續焰目錄

卷之十二

脹滿脉證第七十一

枳實理中湯

見第十七

金匱厚朴七物湯

仲景大柴胡湯

寶鑑晞露丸

寶鑑木香通氣散

寶鑑見曉丸

寶鑑和血通經湯

積聚脉證第七十二

濟生大七氣丸

東垣肥氣丸

東垣息賁丸

金匱鼈甲煎丸

東垣伏梁丸

半夏湯

東垣痞氣丸

東垣奔豚丸

三因奔豚湯

萬病紫苑丸

見第三十二

太無神功助化散

寶鑑醋煮三稜丸

寶鑑聖散子

三聖散

控涎丹

見第二十二

雲岐牡丹散

三因化氣丸

見第三十二

保和丸

見第三十七

沉香化氣丸

中惡脈證第七十三

蘇合香丸

見第十八

調氣平胃散

六君子湯

見第十六

香砂四君子湯

見第十  
六

千金返魂湯

見第三十五

玉樞丹

見第六十三

華佗救中惡方

又方

又方

解砒毒

解附子天雄川烏班蝥毒

解河鮀毒

解巴豆毒

解諸藥毒

解刺毛虫毒

解鬱肉漏脯毒

解馬肉毒

解牛肉毒

解犬肉毒

解中箭死鳥獸肉毒

解諸魚毒

解蟹毒

解諸果毒

解諸菌毒

解野芋毒

解閉口椒毒

解水莨菪葉毒

解芹菜毒

解貪食成病

解諸食物毒

卷之十三

癰疽脉證第七十四

遠志酒

獨勝散

人參敗毒散

見第三  
十七

飛龍奪命丹

蟾酥丸

真人活命散

護心散

防風通聖散

見第六十

神効托裏散

正鐵箍散

鐵井欄

補中益氣湯

見第二十九

玉樞丹

見第六十三

十全大補湯

見第十六

當歸補血湯

見第十六

神仙太乙膏

替針丸

六君子湯

見第十六

園藥

金絲萬應膏

八珍湯

見第十六

瘀瘡大楓膏

桃花隔紙膏

千槌膏

烏龍膏

麥飯膏

精要神異膏

內托復煎散

神仙蠟磬丸

癰疽收口藥

比天膏

仙傳萬靈膏

解輕粉毒

花蓋石散

卷之十四

肺癰豚證第七十五

金匱甘艸乾薑湯

金匱葶苈大棗瀉肺湯

金匱桔梗湯

見第三十二

仲景炙甘草湯

見第三十三

千金甘艸湯

千金生薑甘艸湯

千金桂枝去芍藥加皂角湯

外臺桔梗白散

千金葦莖湯

瀉白散

四物湯

肺癰神方

濟生排膿散

又排膿散

肺癰收口方

又肺癰方

治吐膿血方

又治肺癰方

試肺癰法

腸癰脈證第七十六

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

萬氏治腸癰方

薏苡仁湯


四聖散

神仙蠟礬丸

見第七十四

雲母膏

排膿散



醫燈續焰卷十二

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

俞其恒子占

門人張其旋上有校

陳梅售曾詠

脹滿脈證第七十一

脹滿脈弦。土制於木。濕熱數洪。陰寒遲弱。浮爲虛滿。

滿乃脹之漸  
脹乃滿之極

緊則中實浮大可治虛小危極。

陽在內陰之守也

脹謂脹于外滿謂滿於中排藏府而郭胸脇急皮膚而露筋脈躋凸腰圓鼓之如鼓胸腹之疾也間亦有脹及于頭面四肢者與水腫大同小異而此則無水耳大抵飲食不節起居失宜房室過勞憂思無極久久皆足以耗其守陰衰其陽運致氣壅滯畱中而脹滿之疾漸起矣故實者少虛者多熱者少寒者多成於他藏府者少成于脾胃者多蓋

虛則氣空浮。故易鼓而大。寒則氣凝滯。故易壅而堅。脾胃居中。以胸腹爲宮城。屬土而化濕。性緩氣屯。故亦易脹易滿。此但言其常耳。至若五藏六府盛衰之脹。五運六氣勝負之脹。有實者。有熱者。有

成于他藏府者。又不能以此數端盡也。在圓機者。自爲審別。再宜參看張景岳水脹一論。斯得之矣。

靈樞諸脹。則有本神篇所云。腎氣實則脹。

腎主藏  
歲己申

實而更加以實其爲脹也。不言可知。經脈篇所云。胃病則大腹水脹。

胃屬土而主中氣土病不能

又云。胃中寒則脹滿。

制水則水汎濫而腹大矣

又云。胃中寒則脹滿。

寒則氣滯

又云。足太陰虛則鼓脹。

脾足太陰主運而壅塞故又云。足太陰虛則鼓脹。虛則不運不運

則脹虛則空

邪氣藏府病形篇所云。三焦病者。腹

故如鼓也

邪氣藏府病形篇所云。三焦病者。腹

氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急溢則水畱。卽爲脹

候。在足太陽之外大絡。

三焦主氣爲遊行之部病則氣化滯而遊行阻故病

如是在太陽者三焦聯絡膀胱耳

熟病篇所云。男子如蠱。女子如

怛。

蠱者蠱毒也。脹急如蠱蓄怛者阻也。阻滯如懷孕皆形容腹之大

素問諸脹。則

有脉解篇所云。太陰所謂病脹者。太陰子也。十一

月。萬物氣皆藏于中。故曰病脹。亦氣藏而中實故病如是大奇。

論所云。肝滿肺滿腎滿皆實。卽爲腫。肺之壅。喘而

兩胠滿。肝壅。兩胠滿。卧則驚。不得小便。腎壅。胠下

至少腹滿。脢有大小。髀脰大跛。易偏枯。肺主氣而呼吸應兩

胠肝主驚主疏泄而經兩胠腎經脢與髀蹠而少腹乃其部分故肺壅實則氣喘而兩胠滿肝壅實

胠滿卧驚而難小便腎壅實則少腹滿而脢髀蹠大跛偏枯

調經論所云。志有

餘則腹脹

志爲腎所藏有餘則實則

脹與腎氣實則脹之義同

脈要精微

論所云。胃氣實則脹。

胃脉下膈屬胃經脾其支者起于胃口下循膜裏實則經

脈瀧湧

陰陽應象大論所云。中滿者。渾之于內。

中滿

故脹

實則從內瀧之如攻下之類。若虛滿虛脹。瀧之反成其害也。不可不審。

入云。濁氣在

上。則生膩脹。

清陽上升。濁陰下降。濁不降而陰滯于上。膩脹生焉。

生氣通天

論所云。因于氣爲腫。四維相代。陽氣乃竭。

氣者榮衛藏府

之氣也。流行如常。何腫之有。設或不調。不順。則壅滯。而形腫于外。四維乃人之四肢。爲諸陽之本。更代俱病。陽氣不從此衰竭乎。卽本篇所云。失之。則外壅。肌肉衛氣散解之義。

太陰陽明

論所云。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之。則

入五臟。則膩滿閉塞。

飲食起居爲內傷。內傷則陰受之。而入藏。

故內則病膩  
溝閉塞也

平人氣象論所云。盛而緊曰脹。

此言  
脹病

之脈也。盛則氣實。緊則氣強。皆中有餘邪。

故脹異法方宜。論所云。藏寒生

滿病。

此言脹病生于方土也。北土地寒。乳酪爲食外寒歟。而內滯。故溝病生焉。

五常

政大論所云。適寒涼者。脹。

適往也。之往寒涼之處。外閉內鬱。故脹。

刺

熱篇所云。下牙車。爲腹滿。

此言外部之色應腹中而知脹滿也。牙車卽牙床轉動之處。牙車之下正應腹中。腹脹者。牙車

下當見青白色。青白爲寒。寒則凝滯。故脹也。

金匱要畧。論諸脹滿有云。趺陽脉微弦。當腹滿。

不滿者。必便難。兩胠疼痛。此虛寒從下上也。以溫藥

虛滿則有時而減

服之。微弦之脉陽不能運。腹自當滿。設不滿亦當便難。兩胠痛。正不通。故耳。然見于胃足。則能通。能運而愈矣。如枳實理中湯之類。又云。

病者脹滿。按之不痛爲虛。痛者爲實。可下之。舌黃

未下者。下之黃自去。

正虛于內。按以實其虛。故不痛邪。實于內。按以實其實。故

痛。又云。腹滿時減。復如故。此爲寒。當與溫藥。

得緩必減

如理中湯加丁桂之類。又云。病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲

食如故。厚朴七物湯主之。又云。按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。下固可下。要審其宜大柴胡湯。

又云。腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大柴胡湯。  
已上諸脹諸滿。雖種種不同。然而無一不關於脾  
胃者。蓋脾胃者。土也。居中而溉四藏。胸腹乃其城  
府。胸腹脹滿。猶城府崩裂。未有城府崩裂。而土能  
獨全者。有諸中形諸外。此必然之理也。脈若見弦。  
知木來侮土。更爲不吉。若見數洪。必濕熱之鬱。若  
見遲弱。乃陰寒所凝。浮則氣散。外雖滿而中必虛。  
緊則氣欬。外固堅而中更實。浮而大者。元氣之振。

作與病形相宜。故云可治。虛而小者。知元氣之衰。

微。又與病形相反。故云危極。外有腸臙石瘕二種。

女子之病也。寶鑑言之甚詳。以其類乎脹滿。故附

錄於此。腸覃者。寒氣客于腸外。與衛氣相搏。氣不

得榮。因有所繫癖而內着。惡氣乃起。癰肉乃生。其

始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成。如懷子之狀。

久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其

候也。夫腸者大腸也。覃者延也。大腸以傳導爲事。乃肺之府也。肺主衛衛爲氣。得熱則泄。得冷

病無根也。註云氣病血未

病無根也。註云氣病血未

則凝今寒客于大腸故衛氣不榮有所繫止而結  
瘕在內貼着其延久不已是名腸覃也氣散則清  
氣聚則濁結爲瘕聚所以惡氣發起瘻肉乃生小  
漸益大至期而鼓其腹如懷子之狀也此氣病而  
血未病故月事不斷應時而下本非妊娠可以此爲辨矣晞露丸木香通氣散主之石瘕者

生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡  
血當瀉不瀉衃以畱止日以益大狀如懷子月事  
不以時下皆生于女子可導而下夫膀胱爲津液  
之府氣化則能

出焉今寒客于子門則氣塞而不通血壅而不流  
衃以畱止結硬如石是名石瘕也此病先氣病而  
後血病故月事不來則可宣導而下出者也難經  
云任之爲病其內苦結男子爲七疝女子爲瘕聚

此之謂也。非大辛之劑不能已。  
也可服見覲丸和血通經湯。

諸脹滿病。腹脹。身

崩漏

死唇黑傷肝

缺盆平傷心

臍凸傷腎足

心平傷腎背

平傷肺皆不

治

熱。或腹大脹。四末清脫形泄甚。或腹脹便血。其脉  
大時絕。或嘔欬。腹脹且殞洩。其脉絕。或面黑齒長  
而垢。腹脹閉。上下不通。或腹脹不得息。善噫善嘔。  
嘔則逆。逆則面赤。不逆則上下不通。不通則面黑。  
皮毛焦。或手足掌紋不見。或臍凸氣促等證。皆主  
必死。

附方

枳實理中湯 見第十七

金匱厚朴七物湯

厚朴 半斤

甘草

大黃 各三兩

大棗 十枚

枳實

五枚剉

桂枝 三兩

生薑

五兩

水一斗。煮四升。溫服八合。日三服。嘔者加半夏  
五合。下利去大黃。寒多者加生薑至半斤。

仲景大柴胡湯

柴胡

半夏

各半斤

黃芩

三兩

芍藥

三兩

生薑

五兩

枳實

四兩

大棗

十二枚

右七味。以水一斗二升。煮六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方用大黃二兩。

寶鑑晞露丸。治寒傷于內。氣凝不流。結于腸外。

久爲癥瘕。時作疼痛。腰不可伸。

崔曰陰凝堅  
結積聚癥瘕  
腹此如日瞞

京三稜

蓬莪术

二味各一兩。並酒浸入  
巴豆三十粒。切碎同炒

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香各二錢

檳榔二錢半

血竭一錢半另研

水蛭一錢炒

京三稜五錢剉

桃仁三十粒湯浸去皮尖

研  
薺炒

大黃二錢剉用酒同

三稜浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同爲末入另研二味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十丸。食前淡醋湯下溫酒亦得。

寶鑑和血通經湯治婦人室女受寒月事不來。

惡血積結堅硬如石

當歸

京三稜

炮各五錢

廣茂

炮

木香

熟地黃

肉桂

各三錢

紅花

貫衆

蘇木

各二錢

血竭

一錢另研

右十味除血竭外同爲細末和勻每服三錢熟酒一盞調下食前忌生冷及當風大小便。

積聚脉證第七十二

五藏爲積。六府爲聚。實强者生。沉細者死。

積聚雖分陰  
陽要知都由

氣病而成扁  
鵠揭出氣字

令人有下手

處

引證精詳令  
人無辯

難經五十五難曰。積者。陰氣也。聚者。陽氣也。陰沉而伏。陽浮而動。又曰。積者。五藏所生。聚者。六府所成。越人以陰陽分藏府。旣分藏府。自有五六之名。但歷考靈素積聚癥瘕之類。亦不全以藏府分也。如靈樞百病始生篇云。積之初成。必先身形自虛。而後外邪中傷。始於皮膚腠理毛髮。次絡脉。次經脈。次輸。次伏衝。次腸胃。次腸胃之外。募原之間。此

總病在着字  
該經云勇者

氣行則已弱  
者則着而爲

病

言邪氣自淺入深之常道也。然亦有不必傳至極處。邪之所在無論淺深。若有積畱。卽積于彼。故本篇岐伯又曰。或着孫脈。或着絡脈。或着經脈。或着於督筋。或着于腸胃之募原上。連於緩筋。邪氣淫泆。不可勝論。後復詳言畱着成積之病狀。曰。其着孫絡之脉而成積者。其積往來上下。臂手孫絡之居也。浮而緩。不能勦積而止之。故往來移行腸胃之間。水湊滲注灌。灌灌有音。有寒則膩脹滿雷引。

故時切痛。其着于陽明之經。則挾脅而居。飽食則  
益大。饑則益小。其着于緩筋也。似陽明之積。飽食  
則痛。饑則安。其着于腸胃之募原也。痛而外連於  
緩筋。飽食則安。饑則痛。其着于伏衝之脈者。揣之  
應手而動。發手則熱氣下於兩股。如湯沃之狀。其  
着於脅筋在腸後者。饑則積見。飽則積不見。按之  
不得。其着于輸之脉者。閉塞不通。津液不下。孔竅  
乾壅。此邪氣之從外入內。從上下也。又云。積之始

生。得寒乃生。厥乃久積也。又云。厥氣生足。足。生  
脛寒。脛寒。則血脉凝滯。血脉凝滯。則寒氣上入于  
腸胃。入于腸胃。則覃脹。覃脹。則腸外之汗沫。迫聚  
不得散。日以成積。又云。卒然多食飲。則腸滿。起居  
不節。用力過度。則絡脉傷。陽絡傷。則血外溢。血外  
溢。則衄血。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則後血。腸胃  
之絡傷。則血溢于腸外。腸外有寒汁沫。與血相搏。  
則并合凝聚。不得散而積成矣。又云。卒然外中於

寒。若內傷于憂怒。則氣上逆。氣上逆。則六輸不通。

溫氣不行。凝血蘊裏而不散。津液濁滲。着而不去。

而積皆成矣。最後黃帝始曰。其生于陰者。奈何。岐

伯曰。憂思傷心。重寒傷肺。忿怒傷肝。醉以入房。汗

經云五藏爲

中之守藏氣

既傷運凡難  
周則易留結  
爲積也

出當風。傷脾。用力過度。若入房汗出浴。則傷腎。此

五藏之五傷也。雖不詳言成積之狀。謂之五藏所

生可也。謂之卽成肥氣。伏梁。痞氣。息竇。責豚。五積之因亦可也。據本篇全文。及素問脉要精微論云。

推而外之。內而不外。有心腹積也。又五藏生成論  
云。赤脉之至也。喘而堅。診曰有積氣在中。時害于  
食。名曰心痺。赤乃其色。色赤而脈喘堅。則知病爲心痺。下文倣此。白脉之至

也。喘而浮。上虛下實。驚有積氣在胸中。喘而虛。名  
曰肺痺。青脉之至也。長而左右彈。有積氣在心下。  
支胠。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。黃脉之至也。  
大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。黑脉之  
至也。上堅而大。有積氣在小腹。與陰。名曰腎痺。又

平人氣象論云。寸口脈沉而橫。曰。脇下有積。腹中有橫積痛。又云。盛喘數絕者。則病在中。結而橫。有積矣。又大奇論云。腎脈小急。心脈小急。不鼓。皆爲痕。又云。三陽急。爲痕。又靈樞邪氣藏府病形篇云。心脉微緩。爲伏梁。在心下。肝脉微急。爲肥氣。在脇下。若覆杯。腎脈微急。爲沉厥奔竚。又衛氣篇云。積痛可移者易已也。積不痛。難已也。又難經十八難云。診在右脇。有積氣。得肺脈結脉結甚。則積甚。結

腹中堅硬按之應手曰癥。腹中雖硬而忽聚忽散無有常處曰瘕。在腹內近臍左右急痛如臂如指如弦。側有肋之間有時而痛曰癰皆積聚之別號卽如五積之稱隨地命名非積聚之外別有

微則積微。診不得肺脈而右脇有積者何也。然肺脈雖不見右手脈當沉伏。又脈經云脈遲而濶。中寒有癥結。又云弦急痴癥。小腹痛又爲癥病。又云弦小者寒癥。由是觀之。則脈之小也。微也。小急也。弦急也。沉也。沉伏也。遲也。濶也。實也。數絕也。沉橫也。結伏也。長而左右彈也。是皆陰寒飲實之脉。則知積之成也。亦多屬陰寒。陰寒則不能溫散。而易于凝着。始則毫厘之畱。日以增益。如堆積然。久久

此數症也

積聚分陰陽  
全在動靜浮

伏上見此處  
分拆最精

則小者大。軟者堅。虛者實。無形者有形。越人言其始發也。有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。又云。積者。陰氣也。又云。陰沉而伏。皆中的之語。聚則不然。越人謂聚者。陽氣也。六府所成。又云。陽浮而動。病發無根。痛無常處。夫無根無常。則氣不留止。偶與氣血相搏。則邪正相干。氣聚而痛。氣散則解。非若積之留止。不移不散也。如腸腹攻衝。疝瘕瘕熱。胸腹脹滿。切痛雷鳴等證。皆聚

此處以元本  
盛衰分生死  
說得極妙

之類也。古人論積聚分藏府者，亦不過以沉伏留止不移者屬陰，陰則爲藏，浮動聚散不常者屬陽，陽則爲府耳。治之者當于畱止聚散上相機，不當于藏府二字上作工夫也。其脉實强者，陽脉也。一以徵邪正之相搏，一以徵元本之壯實，從府從陽，故曰生。其脉沉細者，陰脉也。一以徵邪氣之深入，一以徵元本之衰微，從藏從陰，故曰死。已上積聚二證，楫引靈素難經金匱諸書，其病因病狀可謂

溫行運機四  
字治積聚要  
法溫行自無  
停着機運氣  
自前通夫何  
積聚之有

詳且悉矣。但言證處不斬然亦不全屬一證。故雖  
有成方不能捕入。今歷觀積聚之由似宜溫行。不  
宜寒歛。似宜運動樞機。不宜專尚攻尅。是選名方  
十九首。以便擇用焉。

附方

濟生大七氣丸 治積聚癰瘕。隨氣上下。心腹疼痛。上氣窒塞。小腹脹滿。大小便不利。

京三稜

達義术

青皮

陳皮各去白

藿香葉

桔梗去蘆

肉桂不見火

益智仁各一兩半

甘艸炙七錢半

香附炒去毛一兩半

佐賢自攻引  
毒藥過用損  
真故減半而  
止

咬咀。每服五錢水二盞。煎一盞。食前溫服。

東垣肥氣丸 治肝之積，在左脇下。如覆杯。有頭足。久不愈。令人咳逆瘡瘍。連年不已。其脉弦而細。

柴胡二兩

黃連七錢

厚朴半兩

牛艸

炙三錢

椒

炒去汗去目及  
閉口者四錢

廣茂

炮

昆布

人參各二錢半

阜角

去皮弦子煨

白蒺苓

去皮共一錢半

川烏

炮去皮臍一錢二分

乾薑

巴豆霜

各五分

右除蒺苓阜角巴豆外爲極細末。再另研蒺苓  
阜角爲細末和勻。方旋旋入巴豆霜和勻。煉蜜  
丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二  
丸漸加至大便微溏。再從兩丸加服起。周而復

始積減大半勿服。

東垣息賁丸 治肺之積在右脇下。覆大如杯。久

不已。令人酒淅寒熱。喘嗽發肺癰。其脈浮而毛。

厚朴

薑製八錢

黃連

炒一兩三錢

人參

去蘆

乾薑

泡

白茯苓

去皮另末

川椒

炒汗

紫苑

去毛各一錢半

桂枝

去皮另末

桔梗

京三稜

炮去一錢半

天門冬

去心皮

陳皮

川烏

炮去皮臍

白豆蔻

各一錢

青皮

五分

巴豆霜

四分

右除疾苓巴豆霜旋入外。餘藥共爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二丸。一日加一丸。二日加二丸。加至大便微溏。再從二丸加服起。煎淡薑湯食遠送下。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴五錢。通前一兩三錢。黃連減七錢。用六錢。

金匱鼈甲煎丸

治瘧母。

鼈甲

炙三兩

烏扇

燒

黃芩

讀左曰：陽甚

多一治久癰

成積一治虛

勞風氣皆正

虛邪着久不

去者非彙集

衆力攻補兼

施自不易愈

鼠婦 煎

大黃

桂枝

石葦 去毛

厚朴

紫歲

阿膠 各七錢半

乾薑

人參

瞿麥

桃仁

柴胡

蟷蟷 煎各一兩五錢

芍藥

牡丹皮

廬蟲 炒各一兩二錢半

蜂窠 炙各一兩

葶藶 炒

半夏 各二錢半

赤消 三兩

右二十三味爲末。取煅竈下灰一斗。清酒一斛。

五升浸灰。候酒盡一半。着鼈甲于中。煮令泛爛。  
如膠漆。絞取汁。內諸藥煎爲丸。如桐子大。空心

服七丸。日三服。

千金方用鼈甲十二片。又以海藻三分。大戟一分。麤蟲五分。無

鼠婦赤消二味。以鼈

甲煎和諸藥和丸

東垣伏梁丸

治心之積。起脅上大如臂。上至心

下久不愈。令人煩心。其脉沉而芤。

黃連

去鬚一  
兩半

人參

去蘆

厚朴

去龜皮薑  
製各半兩

黃芩

三錢

肉桂

去桂皮

茯神

去皮

丹參

炒各一錢

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮各五分

紅豆

菖蒲

巴豆霜

各半兩

不用。

右除巴豆霜外。爲末。另研巴霜。旋入和勻。煉丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡黃連湯下食。遠周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴半兩。通前共一兩。減黃連半兩。只用一兩。黃芩全

半夏湯 治肺積息責咳嗽

半夏

湯炮去  
滑培乾

細辛

去苗  
葉

桑白皮

炙

前胡

去蘆各  
一兩半

桔梗

炒

貝母

去  
心

柴胡

去  
苗

诃梨勒

煨去  
核

炙甘艸

人參

去  
蘆

白术

各一  
兩

右咬咀。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗三枚。擘破。同煎至七分。去滓溫服。食後臨卧各一服。

東垣痞氣丸 治脾之積。在胃脘。腹大如盤。久不

愈。令人四肢不收。發黃疸。飲食不爲肌膚。其脉  
浮大而長。

厚朴

製半兩

黃連

去鬚八錢

吳茱萸

燒三錢

黃芩

白术

各二錢

茵陳

酒製炒

縮砂仁

乾薑

炮各一錢半

白茯苓

另爲末

人參

澤瀉

各一錢

川烏

炮去皮臍

川椒

各五分

巴豆霜

另研

桂

不四分

右除茯苓巴豆霜。另研爲末。旋入外餘藥。同爲

細末。煉蜜丸。桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡甘艸湯下。食遠周而復始。積減大半。勿服。

東垣奔豚丸 治腎之積。發于小腹。上至心下。若豚狀。或上或下。無時。久不已。令人喘逆。骨痿少氣。及治男子內結七疝。女子瘕聚帶下。其脉沉而滑。

厚朴

薑製

黃連

炒五錢

苦練子

酒煮五錢

白茯苓

另末

澤瀉

菖蒲

各二錢

玄胡索

一錢半

附子

去皮臍

全蝎

獨活

各一錢

川烏頭

炮

丁香

各五分

巴豆霜

四分

肉桂

二分

右除巴豆霜茯苓。另爲末。旋入外餘藥爲細末。  
煉蜜丸如梧子大。初服二丸。一日加一丸。二日  
加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡鹽  
湯下。食遠。積減大半。勿服。秋冬加厚朴二兩。通

前一兩二錢。如積勢堅大。先服前藥不減。于一料中加存性牡蠣三錢。疝帶下勿加。如積滿腹或半腹。先治其所起是何積。當先服本藏積藥。諸疾自愈。是治其本也。餘積皆然。如服藥人覺熱。加黃連。氣短加厚朴。悶亂加桂。

### 三因奔豚湯

甘李根皮

焙

乾葛

當歸

白芍藥

黃芩

甘艸

炙各一  
錢半

半夏

湯炮七  
次二錢

右作一服。水二鍾。薑五片。煎至一鍾。食前服。

萬病紫苑丸

見第三十二

太無神功助化散。專治男子婦人腹中痞塊。不

拘氣血食積所成。此方之妙。不可盡述。

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘖

各五  
錢

神曲

二錢半

沉香

木香

各一  
錢半

甘艸

五  
錢

大黃

二  
兩

右爲細末淨。依分兩和勻。男以燈心淡竹葉二  
味等分煎。及無灰酒同調服。湯多于酒。婦人用  
紅花燈心當歸等分煎湯。及無灰酒同調服。酒  
多于湯。忌油膩動氣之物。及房事一月。藥須于  
黃昏服。大小便見惡物爲度。

寶鑑醋煮三稜丸 治一切積聚。不拘遠年近日。

治之神効。

京三稜

四兩醋煮軟竹  
刀切片晒乾

川芎

二兩醋煮  
微軟切片

大黃 半兩 醋浸濕  
紙裹煨過

右爲末。醋糊丸如桐子大。每服三十丸。溫水下。  
無時。病甚者。一月効。小者半月効。

寶鑑聖散子 治遠年積塊。及婦人乾血氣。

硇砂

大黃

各八錢

麥蘖

六兩炒取淨麵

乾漆

炒烟盡

扁蓄

茴香

炒

檳榔

各一兩

婦人乾血氣

加穿山甲二兩炮

右爲細末。

每服五錢。臨卧溫酒調下。仰卧。此藥

只在心頭。至天明大便如爛魚腸。小便赤爲驗。  
藥並無毒。有神効。小兒用一錢。十五以上三錢。  
空心服之。更効。此按古方。後定今綱目。刻本。確  
砂六兩。大黃八兩。豈不誤人。

三聖散 消積塊進飲食。

橘紅

一斤  
淨

甘艸

四  
兩

鹽

半  
兩

用水三四碗。從早煮至夜。以爛爲度。水則添  
水。晒乾爲末。淡薑湯調下。有塊者加薑黃。半  
兩同前藥煮。氣滯加香附。二同前藥煮。氣虛者。

加沉香

半兩

另入

噤口瘡。加蓮肉。

二兩

另入。

去心另入。

控涎丹

見第二十二

雲岐牡丹散

治婦人久虛羸瘦、血塊

心腹

疼痛。

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索

各一兩

莪术

牛膝

赤芍藥

各三兩

京三稜

一兩半

右爲粗末。每服三錢。水酒各半鍾。煎服。

三因化氣丸

見第三十二

保和丸

見第三十七

沉香化氣丸

專攻赤白青黃等色痢疾。諸般腹

痛。飲食傷積。酒積。痰積。血積。跌蹣損傷。五積六

聚。胸膈氣逆痞塞。胃中積熱。中滿腹脹。瘧痞。茶

癖。及中諸毒惡氣。傷寒大便不通。下

積未

盡。感時疫氣。瘴氣。并諸惡腫瘍。瘍瘍。腫毒。及食諸

般牛畜等物中毒。不憚婦人小兒。並皆治之。

大黃

綿紋者

黃芩

條實者各一兩

人參

官捷去蘆

白术

去蘆肥者各三錢

沉香

上好角沉者四錢另爲末

右將前四味剉碎。用雷竹瀝七浸七乾。爲極細末。和沉香末再研勻。用竹瀝入薑汁少許爲丸。如菉豆大。硃砂爲衣。晒乾。不見火。每服一錢。淡薑湯送下。小兒六分。

中惡脉證第七十三

中惡腹脹緊細者生。脈若浮大。邪氣已深。

不善之謂惡。暗襲潛侵。忽然倒仆。昏不知人。或手

足厥寒。或肌膚粟起。或語言錯矣。或唇齒禁關。或

肢體不仁。或面目青黑。卽客忤卒厥。鬼擊飛尸之

類。涉水登山。穿塚入廟。夜行露卧。爭死問喪者。多

得之。然非正氣之大虛邪。亦不能一時中傷如此

陽氣不振則  
陰邪易乘非  
急用蘇合開  
竅轉機便難

也。初宜灌以蘇合丸。候竅開氣轉。再以

平胃

散與服。若服後吐下者。如六君子湯。香砂四君子

大黃。定隨  
辛時奏効

湯。皆中的之藥。視與證相宜者。投之自無不効也。

人之正氣。自內達表。自胸腹而達四肢者。其常也。  
卒中外邪。則正氣不能達外。而反退縮于中。退縮  
于中。則氣機歛實。而緊細之脈象見矣。待不  
脹藥力一助。正氣必張。邪氣必散。緊者仍舒。細者  
仍充。而本來之面目可還也。故知其生。若脈浮大。  
則正先散越。散越于外。則裏更虛。裏更虛。則邪必  
深入。而欲爲之治。不亦難乎。

附方

蘇合香丸

見第十八

調氣平胃散

木香

烏藥

白豆蔻

檀香

砂仁

各一錢

藿香

一錢

奢术

一錢半

厚朴

炒薑汁

陳皮

各二錢

甘艸

五分

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

六君子湯

見第十六

香砂四君子湯

卽四君子加砂仁木香  
見第十六

千金返魂湯

見第三十五

玉樞丹

卽紫金錠見第六十三

華佗救中惡方 治一應忤惡鬼氣。

犀角末

五錢

辰砂

水飛過

麝香

研各二錢五分

每服二錢。井水調下。如一時不能得此藥。用雄黃末一錢。煎桃枝葉湯調灌之。又無雄黃。可用着身上多時遭汗衣。或貼肉襯衣。男用女。女用

男燒存性。服二錢。百沸湯調下。

又方 韭菜搗汁滴鼻中。冬月用韭根。

又方 百會穴。人中穴。足大拇指離甲一韭葉許。  
名鬼眼穴。及丹田。氣海諸穴。灸七壯。愈多愈妙。  
一二處醒。卽止。不必俱灸也。以炭火烹米醋薰  
鼻亦妙。諸急證。宜先以牙皂末搐鼻。牙關  
緊者。以烏梅肉擦之自開。皆通關之法。後可進

藥。

砒毒 早禾稈燒灰。新汲水淋汁。絹濾過。冷服一  
碗。得下利卽安。新汲水調白扁豆末亦好。華佗  
用黑鉛磨濃水灌之。

佑賢曰斑蝥

爲毒最厲

見少年人生

便癥服此則

小便急痛欲

死尿血尿肉

苦不可言曾

以大劑木通

滑石朮豆通

附子天雄川烏斑蝥毒 煮大小黑豆汁飲。  
河豚毒 倉卒無藥用清油多灌之。得吐愈。  
巴豆毒 煮黃連汁飲。

諸藥毒 牛艸黑豆淡竹葉等分水一碗煎服。

刺毛蟲毒 疼痛不已。蚯蚓泥乾搽。又治胡蜂叮。

鬱肉漏脯毒

鬱肉密器蓋隔宿者漏脯茅屋漏下沾着者

燒犬屎酒

服方寸匕。生韭汁亦好。

馬肉毒 香豉二兩。杏仁三兩。蒸一飯時。杵之。酒

煎服。蘆根煮汁飲。亦良。

牛肉毒 甘艸煮汁飲之。卽解。

牛犬斷不宜食。蓋以病死。毒死者多無益而有大害也。

犬肉毒 心下堅。腹脹口乾。發熱妄語。

杏仁一升。不去皮。熟研。以沸湯三升和取汁。分三服。利下肉片良。

中箭死鳥獸肉毒 大豆煮汁及鹽汁服之解。

諸魚毒 橘皮煎濃汁飲之解。蘆根煮汁亦良。

蟹毒 紫蘇煮汁飲之。蘇子亦好。

諸果毒 猪骨燒過爲末。水服方寸七。解。

人當急用白  
食白果多則  
吐涎沫不知  
之能解

諸菌毒 悶亂欲死。人糞汁飲一升。飲土漿一二

升亦良。大豆濃煮汁飲之。或服吐利藥。俱可解。  
亦治楓樹菌毒。令人哭不止。哭一作笑

野芋毒 卽前方

閉口椒毒 戟人咽喉氣欲絕。或吐白沫。身冷。用  
肉桂煎汁飲之。或多飲冷水。或食蒜。或飲地漿。  
俱良。

水萐菪葉毒 人每誤認作菜食。令人狂亂吐血。  
甘草煮汁飲之。卽解。

芹菜毒 手背腹滿痛。名蛟龍病。以芹  
精耳。用硬糖二三升煮服之。當吐如蜥蜴者。  
貪食成病方 食多不消。心腹堅滿痛。用鹽一升。

水三升。煮鹽消化分三服。當吐出食。  
諸食物毒。煮甘艸薺蕷。芼汁飲之。通能解。

醫燈續焰卷十二

終