

故衄瀆者死也

汪琥曰日晡所發潮熱者府實燥甚故當其
經氣王時發潮熱也獨語者卽譫語也病人
自言爲譫獨語如見鬼狀乃陽明府實而妄
見妄聞劇者甚也成註云熱甚昏冒正氣故
不識人循衣摸牀者陽熱偏勝而躁動於手
也惕而不安者胃熱冲膈心神爲之不寧也
又胃熱甚而氣上逆則喘直視則邪干臟矣
故其生死之機須於衄候決之

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不
了了者此大便必鞭故也以忘津液胃中乾燥故
令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四
行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以
津液當還入胃中故知不久必大便也

註

陽明病本應自汗出醫誤以爲風邪更重發
汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞭故
也然無或滿或痛之苦者以重汗亡津胃中
乾燥故大便鞭本無宿食也則當問其小便

日幾行若本一日三四行今日祇再行可知
大便不久則出蓋小便數少則津液當還胃
中故知不久必大便自出不須藥也

集註

方有執曰水穀入胃其精者爲津液粗者成
樞滓水精滲出腸胃之外清者爲津液濁者
外而爲汗下而爲小便故汗與小便過多者
皆能奪乎津液所以樞滓之爲大便者乾燥
結韌而難出也然二便者水穀分行之道路
此通則彼塞此塞則彼通小便出少則津液

還停胃中必大便潤而自出也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大豬胆汁皆可爲導

註

此承上條詳其義以明其治也陽明病自汗出或發汗小便自利者此爲津液內竭雖大便鞭而無滿痛之苦不可攻之當待津液還胃自欲大便燥屎已至直腸難出肛門之時則用蜜煎潤竅滋燥導而利之或土瓜根宣

氣通燥或豬膽汁清熱潤燥皆可爲引導法
擇而用之可也

集註

成無已曰津液內竭腸胃乾燥大便因鞭此
非結熱故不可攻宜以潤藥外治而導引之
張璐曰凡係多汗傷津及屢經汗下不解或
尺中脈遲弱元氣素虛之人當攻而不可攻
者並宜導法

程應旂曰小便自利者津液未還入胃中津
液內竭而鞭故自欲大便但苦不能出耳須

有此光景時方可從外導法漬潤其腸腸潤則水流就濕津液自歸還於胃故不但大便通而小便亦從內轉矣

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍疑似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

內臺方用蜜五合煎凝時加皂角末五錢蘸捻

作挺以豬膽汁或油潤穀道內之

豬膽汁方

大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如
一食頃當大便出宿食惡物甚效

內臺方不用醋以小竹管插入膽口留一頭用
油潤內入穀道中以手將膽捻之其汁自入內
此方用之甚便

土瓜根方

缺

按土瓜卽俗名赤雹也肘後方治大便不通採

根搗汁用筒吹入肛門內此與上豬膽汁方
同義內臺方用土瓜根削如挺內入穀道中
誤矣蓋蜜挺入穀道能烝化而潤大便土瓜
根不能烝化如削挺用之恐失仲景製方之
義

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便
難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

註

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜大
承氣湯者乃因熱勢甚速消灼腎水津液不

能到咽故不必待其有可下之證而急下之
是下其熱以救將絕之水緩則腎水乾竭陽
必無依躁冒自焚而死也目中不了了而睛
和者陰證也睛不和者陽證也今傷寒六七
日目中不了了睛不和者是腎水爲胃陽所
竭水旣不能制火則火上熏於目而眸子朦
朧爲之不了了也此熱結神昏之漸危惡之
候也雖外無陽證惟身微熱內無滿痛祇大
便難亦爲熱實故曰此爲實也急以大承氣

湯下之瀉陽救陰以全未竭之水可也睛不和者謂睛不活動也

集註

方有執曰了了猶瞭瞭也素問曰陽明主肉其脈俠鼻絡於目靈樞曰足陽明之正上循咽出於口還繫目系合於陽明也又曰足陽明之筋其支者上頸上俠口合於頰下結於鼻上合於太陽太陽爲目上綱陽明爲目下綱所以目中不了了睛不和知胃實也急下者任脈循面入目督脈上繫兩目中央諸脈

皆屬於目而人之精神注焉是以宜急下也
喻昌曰少陰有急下三法以救腎水一本經
水竭一木邪涌水一土邪凌水陽明亦有急
下三法以救津液一汗多津越於外一腹滿
津結於內一眼睛不慧津枯於中合兩經下
法以觀病情生理如身在冰壺腹飲上池矣
張錫駒曰陽火亢極陰水欲枯故使目中不
了了而睛不和急下之所以抑亢極之陽火
而救垂絕之陰水也

魏荔彤曰陽明燥屎應下胃實應下俱詳考其脈證矣乃有表裏無他證獨於陽明胃脈所發見端倪處體認其證如傷寒六七日太陽已罷陽明已成其目昏暗朦昧若隔雲霧而不了了明白者此證名爲睛不和也陽明熱盛循經絡而發其昏朦之象以致睛失其光此內熱盛而爲實其機已兆兼以大便秘而難身有微熱者則胃實已真故曰此爲實也急下之宜大承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

註

陽明病之人小便自利大便當鞭小便不利大便不鞭是知鞭不鞭不在熱不熱而在液之竭與不竭也今小便不利而大便乍難乍易者蓋熱將欲作結而液未竭也有時微熱者熱入裏也喘者熱乘肺也冒者熱乘心也不能臥者熱併陽也此皆一派熱結便鞭之徵神昏譫狂之漸雖無滿痛亦必有燥屎宜

大承氣湯下之自愈也

集註

王三陽曰此證不宜妄動必以手按之臍腹有鞭塊喘冒不能臥方可攻之何也乍難乍易故也

林瀾曰既微熱時作喘冒不能臥則有燥屎已的自宜下逐裏實爲急安可復以小便利屎定鞭始可攻之常法拘哉

汪琥曰此條病未經下而有燥屎乃醫人不
易識之證成無已云小便利則大便鞭此有

燥屎乃理之常今病人小便不利大便乍難乍易何以知其有燥屎耶蓋大實大滿之證則前後便皆不通大便爲燥屎壅塞其未堅結者或有時而併出故乍易其極堅結者終著於大腸之中故乍難燥屎結積於下濁氣攻衝於上以故時有微熱微熱者熱伏於內不得發洩也後條辨云濁氣乘於心肺故旣冒且喘也不得臥者胃有燥屎所擾卽胃不和則臥不安也凡此者皆是有燥屎之徵故

云宜大承氣湯

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

註

病人不大便五六日繞臍痛者是腸胃中燥屎結無去路故繞臍痛也煩躁發作有時者是燥屎穢熱上攻則煩躁不攻則不煩躁故發作有時也不須以小承氣湯試之直以大承氣湯下其燥屎大便利自可愈也

集註

方有執曰病人謂凡有病之人而證犯如此

者則皆當如此治之此示人辨凡百胃實之
大旨也

程應旄曰攻法必待有燥屎方不爲誤攻所
以驗燥屎之法不可不備無恃轉失氣之一
端也病人雖不大便五六日屎之燥與不燥
未可知也但繞臍痛則知腸胃乾屎無去路
滯滯在一處而作痛煩躁發作有時者因屎
氣攻動則煩躁發作又有時伏而不動亦不
煩躁而有繞臍痛者斷其不大便當無差矣

何大承氣湯之不可攻耶

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

註

此承上條以明其治也下之未盡仍當下之乃大下之後六七日後不大便煩亦不解腹仍滿痛者此有燥屎下之未盡也所以然者

本有宿食故也宜大承氣湯復下之自愈也

集註

程知曰大下之後宜乎病解矣乃復六七日不大便煩不解而腹滿痛此必有燥屎未盡

而然蓋宿食因熱復爲之結鞭也

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣
饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

註

陽明經病下之身熱未除手足溫不結胸者
是所陷之邪淺也心中懊懣饑不能食但頭
汗出者是陽邪蒸鬱於胸膈間也故宜梔子
豉湯涌其熱也

集註

程知曰其外有熱者經邪未解也手足溫者

熱入未深也

程應旄曰懊懜擾胃故饑不能食熱鬱氣蒸故但頭汗出

魏荔彤曰表邪未全入裏乃卽以爲胃實而遽下之則其外仍有熱究不能隨下藥而蕩滌也於是雖熱而不潮手足雖溫而無澱然之汗出則是在表者仍在表而下之徒傷其裏耳卽不至於全在太陽者悞下成結胸而心下懊懜饑不能食但頭汗出其陽明蒸蒸之熱爲陰寒之藥所繼俱疑塞於胸膈之上

其證已昭然矣但病仍帶表既不可再下且
已入裏又不可復發汗惟有主以梔子豉湯
仍從太陽治也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

註

傷寒三陽多有嘔證以其風寒之表未除胸
中陽氣爲寒所鬱故皆不可攻下也其乾嘔
而惡寒發熱者屬太陽也喜嘔而寒熱往來
者屬少陽也今雖祇有惡熱不惡寒大便鞭
之陽明證而嘔多亦不可攻之其氣逆在上

而未歛爲實也

集註

沈明宗曰惡寒發熱之嘔屬太陽寒熱往來

之嘔屬少陽但惡熱不惡寒之嘔屬陽明然嘔多則氣已上逆邪氣偏侵上脘或帶少陽故雖有陽明證慎不可攻也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

註

陽明謂陽明裏證中風謂太陽表證也口苦咽乾少陽熱證也腹滿陽明熱證也微喘發

熱惡寒太陽傷寒證也脈浮而緊傷寒脈也
此爲風寒兼傷表裏同病之證當審表裏施
治太陽陽明病多則以桂枝加大黃湯兩解
之少陽陽明病多則以大柴胡湯和而下之
若惟從裏治而遽以腹滿一證爲熱入陽明
而下之則表邪乘虛復陷故腹更滿也裏熱
愈竭其液故小便難也

集註

程知曰此言陽明兼有太陽少陽表邪卽不
可攻也陽明中風熱邪也腹滿而喘熱入裏

矣然喘而微則未全入裏也發熱惡寒脈浮而緊皆太陽未陰之證口苦咽乾爲有少陽之半表半裏若誤下之則表邪乘虛內陷而腹益滿矣兼以重亡津液故小便難也

程應旄曰此條與太陽大青龍證同太陽以風寒持其營衛故有煩躁證而無腹滿證此以風寒持住陽明故有腹滿證而無煩躁證然口苦咽乾實與煩躁同其機兆也

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出

不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讖語
若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空
虛客氣動膈心中懊懜舌上胎者梔子豉湯主之
若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若
脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之陽
明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中
燥猪苓湯復利其小便故也

註

此承前條互發其義以明其治也前條表證
居多戒不可誤下此條表裏混淆脈證錯雜

不但不可誤下亦不可誤汗也若以脈浮而
緊誤發其汗則奪液傷陰或加燒鍼必益助
陽邪故譏語煩躁怵惕憤亂不眠也或以證
之腹滿惡熱而誤下之則胃中空虛客氣邪
熱擾動胸膈心中懊懣舌上生胎是皆誤下
之過宜以梔子豉湯一涌而可安也若脈浮
不緊證無懊懣惟發熱渴欲飲水口乾舌燥
者爲太陽表邪已衰陽明燥熱正甚宜白虎
加人參湯滋液以生津若發熱渴欲飲水小

便不利者是陽明飲熱並盛宜豬苓湯利水
以滋乾然陽明病法當多汗因汗出多致小
便少而渴者不可與豬苓湯蓋以汗多胃燥
無水不能下行乃水涸之小便少非水蓄之
小便不利也恐豬苓湯更利其小便則益竭
津液而助燥矣

按

太陽病煩熱無汗而渴小便利者大青龍湯
證也小便不利者小青龍湯去半夏加花粉
茯苓證也太陽病煩熱有汗而渴小便利者

桂枝合白虎湯證也小便不利者五苓散證
陽明病煩熱無汗而渴小便利者宜葛根湯
加石膏主之小便不利者以五苓散加石膏
寒水石滑石主之陽明病煩熱有汗而渴小
便利者宜白虎湯小便不利者以豬苓湯少
陽病寒熱無汗而渴小便利者當以小柴胡
湯去半夏加花粉小便不利者當以小柴胡
湯加茯苓太陰無渴少陰陽邪煩嘔小便赤
而渴者以豬苓湯少陰陰邪下利小便白

渴者以真武湯厥陰陽邪消渴者白虎加人
參湯厥陰陰邪轉屬陽明渴欲飲水者少少
與之則愈證旣不同法亦各異當詳審而明
辨之

集註

喻昌曰發熱以上與前條同而汗出不惡寒

反惡熱身重四者皆陽明之見證所以汗下
燒鍼俱不可用舌上胎則膈熱甚故湧以梔
子豉而徹去其膈熱斯治太陽而無碍陽明
矣若前證更加口乾舌燥則宜用白虎湯以

解熱生津更加小便不利則宜以豬苓湯以
導熱滋乾也其汗多而渴不可與豬苓湯者
以熱邪傳入陽明必先耗其津液加以汗多
復奪之於外又利小便更奪之於下則津液
有立亡之患故示戒也

程應旄曰熱在上焦故用梔子豉湯熱在中
焦故用白虎加人參湯熱在下焦故用豬苓

湯

豬苓湯方

豬苓 去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各一兩碎

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

阿膠烱消溫服七合日三服

集解

趙羽皇曰仲景製豬苓一湯以行陽明少陰

二經水熱然其旨全在益陰不專利水蓋傷

寒表虛最忌亡陽而裏虛又患亡陰亡陰者

亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛之人

不但大便不可輕動卽小水亦忌下通倘陰
虛過於滲利則津液反致耗竭方中阿膠質
膏養陰而滋燥滑石性滑去熱而利水佐以
二苓之滲瀉旣疏濁熱而不留其壅瘀亦潤
真陰而不苦其枯燥是利水而不傷陰之善
劑也故利水之法於太陽用五苓者以太陽
職司寒水故加桂以溫之是煖腎以行水也
於陽明少陰用豬苓者以二經兩關津液特
用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有形

也利水雖同寒溫迥別惟明者知之

衄浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗
屬府者不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈汗
少則便難衄遲尚未可攻

註

屬藏謂屬裏也屬府謂屬表也溲謂小便也

衄浮而大太陽陽明衄也浮屬表大屬裏今

太陽衄浮之表未解而心下反鞭陽明之裏

又急權乎汗下可也設裏有熱實攻之無疑

不須先汗以解外也如無熱實而有衄浮之

表不但令攻之卽小便不利亦不令利小便仍當解外也蓋恐洩數汗多亡其津液致大便鞭則熱愈實也若汗少脈遲卽有便鞭裏尚未實亦未可攻也

集註

王肯堂曰論言脈浮大反發汗反下之爲逆此以心下鞭有熱知傳邪入裏故舍脈而從證也大便則許攻之小便則不許利何也曰攻大便則內熱除利小便則津液傷也林瀾曰心下鞭與腹鞭滿不同腹鞭邪已結

聚成實此但在心下自與非下不可者異
腑與臟對舉而言見一爲入裏一猶屬表之
義也

陽明病衄遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難
此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者衄遲故
也

註

陽明病不更衣已食如饑食輒腹滿衄數者
則爲胃熱可下證也今衄遲遲爲中寒中寒
不能化穀所以雖饑欲食食難用飽飽則煩

悶是健運失度也清者阻於上升故頭眩濁者阻於下降故小便難食鬱濕痰此欲作穀疸之徵非陽明熱濕腹滿發黃者比雖下之腹滿暫減頃復如故所以然者脈遲中寒故也

集註

方有執曰遲爲寒不化穀故食難用飽濕鬱而蒸氣逆而不下行故微煩頭眩小便難也疸黃病也穀疸水穀之濕蒸發而身黃也

張璐曰下之腹滿如故蓋腹滿已是邪陷脈

遲則胃不實徒下其糟粕病既不除而反害
之耳夫陽明證本當下陽明而至腹痛尤當
急下獨此一證下之腹滿必如故者緣脈遲
則胃氣空虛津液不充其滿不過虛熱內壅
非結熱當下之比也可見脈遲胃虛不但下
之無益卽發汗利小便之法亦不可用惟當
用和法如甘草乾薑湯先溫其中然後少與
調胃微和胃氣可也

程應旂曰熱畜成黃之腹滿下之可去此則

穀氣不得宣洩屬胃氣虛寒使然下之益虛
其虛矣故腹滿如故

陽明病若中寒者不能食小便不利手足澼然汗
出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃
中冷水穀不別故也

註

陽明病內熱則不大便能食小便利手足澼
然汗出是可下之證也今中寒不能食小便
不利雖手足澼然汗出不可下也此爲中寒
欲作固瘕何以知之以大便必初鞭而後溏

也所以然者胃中虛冷水穀不分故小便不利而大便必澹也

按

不能食與上條食難用飽同一不能腐熟水穀也小便不利與上條小便難同一不能下輸膀胱也惟手足澀然汗出與上條飽則微煩頭眩不同彼欲作穀疸此欲作固瘕皆胃中寒冷一以微煩頭眩陽在中上故不病瀉而病疸一以手足汗出陽在四肢故不病疸而病瀉也再上條中寒食難用飽無汗小便

難欲作穀疸以其尚能少食微煩猶有陽氣
故也此條中寒不能食手足冷汗小便不利
欲作固瘕則是寒濕不化純陰故也固瘕者
大瘕瀉也俗謂之溏瀉固者久而不止之謂
也

按

人之汗以天地之雨名之陰陽和而後有雨
陽亢則熱而雨少陰盛則寒而雨多人之汗
亦若是也四肢手足屬土土主脾胃若衄大
其汗蒸蒸而熱則爲陽盛可下之證也若衄

遲其汗漿漿而寒則爲陰盛可溫之證也

集註

程應旄曰水穀不別屬濕熱偏滲者多此點

出胃中冷欲人知病本於寒宜從寒治不在小便也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但

以法救之渴者宜五苓散

按但以法救之五字當是若小便不利方與上文小便數下文渴者之義相合此條病勢不急救之之文殊覺無謂必有遺誤王三陽亦云此處五苓散難用不然經文渴者之下當有闕文也

註

太陽病脈浮緩而弱中風脈也發熱汗出惡寒中風證也不嘔則裏氣和緣何而有心中痞證此必以醫下之故也如其不經醫下邪熱自傳於裏病人不惡寒而渴者此邪去太

陽已轉屬陽明也若小便數者大便必鞭然
使不更衣十餘日而無或滿或痛之苦是仍
屬虛燥不實之鞭不可議下俟之可也如或
渴欲飲水必是胃中乾燥當少少與之以滋
其胃可耳其或小便不利而渴者是又爲水
停不化宜五苓散以導其所停之水矣蓋病
在膀胱故仍治太陽而不治陽明也

集註

張兼善曰十日不更衣而不用攻伐何也曰

此非結熱雖不大便而無潮熱讖語可下之

證當須審慎勿以日數久而輒爲攻下也
喻昌曰寸緩關浮尺弱發熱汗出惡寒純是
太陽中風未罷之證設非誤下何得心下痞
結耶如不誤下而太陽證必漸傳經乃至不
惡寒而渴邪入陽明審矣然陽明津液旣偏
滲於小便則太陽失其潤而大便鞭與腸中
熱結自是不同所以旬日不更衣無所苦也
汪琥曰小便數大便鞭仲景論中何以無治
法耶蓋此正是仲景不須用藥處俟其陰陽

自和則小便漸少大便必自出也

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者
死利止者愈

註

此申上條痞鞭不更衣十日無所苦誤攻之
變也陽明病非胃家實而心下鞭滿者不可
攻之若攻之其人利不止者則正脫而死其
人利自止者邪退則猶可愈也

集

註汪琥曰或問結胸證同是心下鞭滿又屬可

下何也蓋結胸證心下鞭滿而痛者爲胃中

實故可下此證不痛當是虛鞭虛滿與半夏瀉心湯之心下痞鞭畧同故云不可攻也

諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇

註

虛者下之是爲重虛陰津消亡自然大渴其求水者陽氣猶存故易愈若惡水者陽氣已絕則難愈矣

集註

程應旄曰諸虛者陽津陰液必有所亡故下之則大渴求水者亡陰惡水者亡陽故有愈

劇之分觀此知仲景慮誤下之助陰甚於慮
誤下之亡陰矣

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治
之得小便利必自愈

註

大下之後復發其汗重亡津液小便當少以
水液內竭故也勿治之言勿利其小便也須
俟津液回而小便利必自愈矣

集註

程知曰言下後復發汗有俟津液自回之法

若強責其小便則膀胱之氣化不行有增鞭

滿喘脹者矣故宜以不治治之
陽明病下血讖語者此爲熱入血室但頭汗出者
刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈

註

婦人病傷寒經血適至則有熱入血室之證
宜刺期門男子病傷寒有下血讖語者亦爲
熱入血室也若熱隨血去必通身汗出而解
矣若血已止其熱不去蓄於陽明不得外越
而上蒸但頭汗出而不解者亦當刺期門隨
其實而瀉之則亦必通身澱然汗出而愈也

集註

方有執曰血室頭汗期門註皆見太陽篇中

陽明之脈其直者從缺盆下乳內廉下俠臍
入氣街中血室之脈起於氣街上行至胸中
而散所以婦人經來熱入血室則似結胸而
譏語從陽明裏也男子下血熱入血室但頭
汗出亦譏語從陽明外也故並宜刺期門

程應旄曰下血則經脈空虛熱得乘虛而入
血室譏語以血室雖衝脈所屬而心經實血
室之主室被熱擾故心神不清也但頭汗出

者血下奪則無汗熱上擾則汗蒸也刺期門者熱入陰分實在陰隨其實而瀉之則榮氣和而心氣下通故濺然汗出而解乘虛而入

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

註

陽明屬胃開竅於口陽明有熱故口燥也但欲漱水不欲嚥者雖燥而不渴知熱在經而不在府在血而不在氣也熱在經血迫血妄行必致衄也

集註

喻昌曰口中乾燥與渴異漱水不欲嚥知不

渴也陽明病口燥但漱水不欲嚥知邪入血
分陽明之脈起於鼻故知血得熱而妄行必
由鼻而出也

沈明宗曰陽明病口燥漱水而不欲嚥乃邪
鬱於經未入於府也

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

註

此承上條詳出脈證以互發其義也陽明病
脈浮發熱口鼻乾燥熱在經也若其人能食
則爲胃和胃和則邪當還表作解也然還表

作解不解於衛則解於營汗出而解者從衛
解也衄血而解者從營解也今既能食衄血
則知欲從營解也

集註

張錫駒曰此論陽明經脈燥熱也夫熱在經
脈故脈浮發熱熱循陽明經脈而上故口乾
鼻燥不傷胃氣故能食能食者則衄言病不
在胃府非因能食而致衄也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久
瘀血故令喜忘屎雖鞭大便秘反易其色必黑者宜

抵當湯下之

註

經曰血併於下亂而喜忘喜忘者好忘前言
往事也今陽明病其人喜忘者本有久瘀之
血與熱上併於心故令喜忘也畜血之屎雖
鞭然大便反易其色必黑蓋以血與糟粕共
併故反易而色黑也不用桃仁承氣湯而用
抵當湯大下之者以其人本有久瘀之血故
也

集註

張志聰曰太陽畜血在膀胱故驗其小便之

利與不利陽明畜血在腸胃故驗其大便之
黑與不黑

張璐曰大便色黑雖曰瘀血而燥結亦黑但
瘀血則黏如漆燥結則晦如煤此爲明辨也
鄭重光曰太陽熱結膀胱證輕者如狂重者
發狂如狂者血自下故用桃仁承氣湯因勢
而利導之發狂者血不下須用抵當湯此條
喜忘差減於狂乃用發狂之重劑何也蓋太
陽經少血陽明經多血所以宜用抵當湯峻

攻太陽云主之乃確然不易之法此云宜用則證有輕重在於臨時酌量耳

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解而下不止必協熱便膿血也

註

此承上條言畜血喜忘熱結而無表裏證者當下之義也病人無表裏證是無太陽表陽明裏證也但發熱而無惡寒七八日雖脈浮

數不可汗也若屎鞭可下之假令已下脈不
浮而數不解是表熱去裏熱未去也至六七
日又不大便若不能消穀善饑是胃實熱也
以大承氣湯下之今既能消穀善饑是胃和
合熱非胃邪合熱故屎雖鞭色必黑乃有瘀
血熱結之不大便也宜用抵當湯下之若脈
數不解不大便鞭而下利不止必有久瘀協
熱腐化而便膿血也則不宜用抵當湯下之
矣

集註

張璐曰病雖七八日尚發熱脈浮數仍屬太

陽表證因誤下引邪內入所以脈數不解內

外合邪而見消穀善饑穀入既多反至六七

日不大便且不煩渴是知其證非熱結在胃

乃熱結在血以其表證誤下尚兼太陽隨經

之熱未盡故以抵當爲至當也若脈數不解

而下利不止又當隨其下血與不下血而異

治之倘血分之熱邪不除必協熱而便膿血

也

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

註

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以表有寒裏有濕未解也夫表寒裏濕鬱而發黃自非熱濕內瘀鬱而成黃者比故不可下惟當於表寒裏濕中求其治法宜發其表寒利其裏濕可也

集註

喻昌曰傷寒發汗已熱邪解矣何由反蒸身目爲黃所以然者寒濕搏聚適在軀殼之裏

故爾發黃也裏者在內之通稱非謂寒濕深
入在裏蓋身曰正屬軀殼與藏府無關也於
寒濕中求之求其寒濕中之治法也

程應旄曰其人素有濕邪在裏表寒雖經發
汗而其爲裏濕所持者終在裏而無從解散
也發汗後之寒與濕鬱蒸爲熱非實熱也故
不可下仍當於寒濕中責其或淺或深而治
之可也

傷寒痲熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主

之

註

傷寒表邪未解適遇其人陽明素有濕邪熱入裏而與濕合濕熱蒸瘀外薄肌表身必發黃也若其人頭有汗小便不利大便鞭則或清或下或利小便自可愈也今乃無汗小便利是裏之瘀熱未深表之鬱遏猶甚故用麻黃連軹赤小豆湯外發其表內逐其濕也

集註

喻昌曰傷寒之邪得濕而不行所以熱瘀身中而發黃設泥裏字豈有邪在裏而反治其

表之理哉

程應旌曰凡傷寒瘀熱在裏者由濕蒸而來故身必發黃此之瘀熱未深祇從表一邊開其鬱滯而散除濕熱麻黃連軹赤小豆湯是其主也

林瀾曰麻黃連軹一證雖曰在裏必因邪氣在表之時有失解散今雖發黃猶宜兼汗解以治之也

汪琥曰夫寒邪自外而來若挾內濕瘀於經

絡之中則鬱而變熱故令其人身目發黃也
此條乃是太陽經傳來者太陽傷寒理宜用
麻黃湯祇因邪傳陽明熱瘀於裏裏非胃府
以陽明經居太陽之裏卽尚論篇所云軀殼
之裏是也惟其裏有熱所以方中用麻黃湯
而去桂枝之辛熱更加赤小豆薑棗之甘辛
以祛散在表之寒濕復加連軹生梓白皮之
苦寒以清解肌裏之瘀熱也

麻黃連軹赤小豆湯方

麻黃 二兩 去節

赤小豆 一升

杏仁 四十枚 去皮尖

生薑 二兩 切

大棗 十二枚 擘

甘草 二兩 炙

生梓白皮 一升 切

連軹 二兩

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日則盡

方解

濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利者利之裏實者下之表實者汗之皆無非為病求去路也用麻黃湯以開其表使黃從外

而散去桂枝者避其熱也佐薑棗者和其營
衛也加連軺梓皮以瀉其熱赤小豆以利其
濕共成治表實發黃之效也連軺卽連翹根
無梓皮以茵陳代之

集解

周揚俊曰此亦兩解表裏法也故用外汗之
藥必兼滲濕之味傷寒發黃者必其人太陰
素有濕熱更兼寒邪未散兩邪相合因而蒸
鬱爲黃也

傷寒七八日身黃如橘子色小便利腹微滿者

茵陳蒿湯主之

註

身黃濕熱之爲病也濕盛於熱則黃色晦熱盛於濕則黃色明如橘子色者謂黃色明也傷寒七八日身黃色明小便不利其腹微滿此裏熱深也故以茵陳蒿治疸病者爲君佐以大黃使以梔子令濕熱從大小二便瀉出則身黃腹滿自可除矣

集註

唐不巖曰熏黃陰黃也橘子黃陽黃也

程知曰此驅濕除熱法也傷寒七八日可下

之時小便不利腹微滿可下之證兼以黃色鮮明則爲三陽入裏之邪無疑故以茵陳除濕梔子清熱用大黃以助其驅除此證之可下者猶必以除濕爲主而不專取乎攻下有如此者

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚
擘

大黃 二兩
去皮

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內

二味煮取三升去滓分三服小便當利尿如
皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便出也
傷寒身黃發熱梔子蘖皮湯主之

註

傷寒身黃發熱者設有無汗之表宜用麻黃
連軹赤小豆汗之可也若有成實之裏宜用
茵陳蒿湯下之亦可也今外無可汗之表證
內無可下之裏證故惟宜以梔子蘖皮湯清
之也

集註

林瀾曰傷寒身黃胃有瘀熱須當下之此以

發熱而熱未實故宜梔子蘖皮湯解之

汪琥曰身黃兼發熱者乃黃證中之發熱而非麻黃桂枝證之發熱也熱旣鬱而發黃雖表而非純乎表證但當清其鬱以退其黃則發熱自愈

魏荔彤曰此三條雖皆外寒挾濕之邪瘀而成熱之證然在表在裏濕勝熱勝尤當加意也豈可槩以爲裏證而混下耶

梔子蘖皮湯方

梔子

十五枚

甘草

炙 一兩

黃蘗

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再

服

按

此方之甘草當是茵陳蒿必傳寫之誤也

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

註

陽明病無汗不以葛根湯發其汗而以火劫

取汗致熱盛津乾引飲水停為熱上蒸故額

上微汗出而周身反不得汗也若小便利則

從燥化必煩渴宜白虎湯小便不利則從濕
化必發黃宜茵陳蒿湯

集註

喻昌曰陽明病濕停熱鬱而煩渴有加勢必

發黃然汗出熱從外越則黃可免小便多熱
從下洩則黃可免若誤攻之其熱邪愈陷清
液愈傷而汗與小便愈不可得矣誤火之則
熱邪愈熾津液上奔額雖微汗而周身之汗
與小便愈不可得矣發黃之變安能免乎

程知曰太陽發黃由寒鬱濕濕不得解陽明

發黃由濕瘀熱熱不得越故宜分經論治

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

註

陽明病無汗以熱無從外越也小便不利濕不能下泄也心中懊憹濕瘀熱鬱於裏也故身必發黃宜麻黃連軹赤小豆湯外發內利可也若經汗吐下後或小便利而心中懊憹者乃熱鬱也非濕瘀也便鞭者宜調胃承氣湯下之便軟者宜梔子豉湯涌之可也

集註

方有執曰無汗小便不利則濕停懊憹濕停

熱鬱所以知必發黃也

張璐曰外不得汗下不得溺而濕熱鬱於胸中不得泄勢必蒸身爲黃也

陽明病面合色赤不可攻之必發熱色黃小便不利也

註

陽明經病面合當色赤是熱邪猶怫鬱在經尚未入裏而成實也故雖不大便不可攻之若攻之則怫鬱在經之邪不解必令發熱色黃若其人裏燥小便利則同燥化當不發黃

而必大便鞭矣

集註

方有執曰合應也赤熱色也胃熱上行面應赤色攻則亡津液故發熱色黃因小便不利也

程知曰言熱在陽明之經不可攻也熱在於經陽氣怫鬱在表也攻之則經中之熱未得表散必發熱色黃因小便不利也

程應旄曰熱阻於肌膚之間故發熱而小便爲之不利鬱而成黃也

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗
出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此爲
瘧熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

註

陽明病發熱汗出者此爲熱越小便若利大
便因鞭不能發黃也但頭汗出身無汗是陽

明之熱不得外越而上蒸也小便不利濕蓄

膀胱也渴飲水漿熱灼胃府也此爲濕熱瘧

蓄在裏外薄肌膚故身必發黃也茵陳蒿湯

主之者通利大小二便使濕熱從下竅而出

也

集註

方有執曰越散也頭汗癢熱發黃註皆見太

陽篇中茵陳逐濕癢之黃梔子除胃家之熱

大黃推壅塞之瘀三物者苦以泄熱泄熱則

黃散矣

程應旄曰頭汗出身無汗躋頸而還足徵陽

熱之氣鬱結於內而不得越故但上蒸於頭

頭爲諸陽之首故也氣不下達故小便不利

府氣過燥故渴飲水漿癢熱在裏指無汗言

無汗而小便利者屬寒無汗而小便不利者屬濕熱兩邪交鬱不能宣泄故蠶而發黃解熱除濕無如茵陳梔子清上大黃滌下通身之熱得泄又何黃之不散耶

傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也

註

此太陰轉屬陽明證也傷寒脈浮緩手足熱者太陽也今手足自溫非太陽證是爲繫在

太陰也然太陰脈當沉緩今脈浮緩乃太陽
脈也證太陰而脈太陽是邪由太陽傳太陰
也故曰繫在太陰也若小便自利者則不從
太陰濕化而發黃至七八日大便鞭者則是
從燥化此爲陽明也

集註

程應旂曰陽明爲病本於胃家實胃家之實
不特三陽受邪能致其轉屬陽明卽三陰受
邪亦能致其轉屬陽明聊舉太陰一經例之
脈浮而緩是爲表脈然無發熱頭痛惡寒等

外證而手足祇溫是邪不在表而在裏但入裏有陰陽之分須以小便別之小便不利濕蒸熱瘀而發黃以其人胃中原無燥氣也小便自利者胃乾便鞭而成實以其胃中本有燥氣也病雖成於七八日而其始證却脈浮而緩手足自溫實是太陰轉屬而來也卽太陰陽明推之少陰三大承氣證厥陰一小承氣證何非轉屬陽明之病哉

魏荔彤曰病在太陽熱爲濕鬱團聚於裏必

有歸著既不能發黃小便自利則邪何歸乎
不得不歸之於萬物所歸之胃至於七八日
小便自多大便自鞭而爲陽明病矣

傷寒轉繫陽明者其人澼然微汗出也

註

凡傷寒無論三陰三陽若轉繫陽明其人必
有澼澼然微汗出之證始爲轉屬陽明也

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲
近衣此爲吐之內煩也

註

太陽病吐之表解者當不惡寒裏解者亦不

惡熱今反不惡寒不欲近衣者是惡熱也此
由吐之後表解裏不解內生煩熱也蓋無汗
煩熱熱在表大青龍證也有汗煩熱熱在裏
白虎湯證也吐下後心中懊懣無汗煩熱大
便雖鞭熱猶在內梔子豉湯證也有汗煩熱
大便已鞭熱悉入府調胃承氣湯證也今因
吐後內生煩熱是爲氣液已傷之虛煩非未
經汗下之實煩也已上之法皆不可施惟宜

用竹葉石膏湯於益氣生津中清熱寧煩可

也

集註

張璐曰此以吐而傷胃中之液故內煩不欲

近衣雖顯虛煩之證較關上脈細數而成虛
熱脾胃兩傷者稍輕雖不致逆亦誤吐之過
也

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關
上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中
饑口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食
朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆

按

欲食冷食之下當有五六日吐之者六字若無此一句則不喜糜粥欲食冷食與朝食暮吐之文不相聯屬且以上文一二日三四日之文細玩之則可知必有五六日吐之一句由淺及深之謂也

註

太陽病不解當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱是表已解也關上脈細數胃不和也細者胃氣虛數者胃氣熱證脈不和詢其故知以醫吐之過也一二日病在太陽正氣未衰

吐之者傷胃未深故腹中知饑口不能食也
三四日病在陽明胃中已熱吐之者復傷津
液故不喜糜粥欲食冷食也五六日病將轉
入陰經正氣已衰吐之者胃中虛冷故朝食
暮吐也此皆醫吐之所致尚在可治故曰此
爲小逆也

集註

程知曰本太陽病醫吐之則表邪乘虛傳入
陽明傷動胃氣而關脈細數矣

程應旄曰陽明之氣下行爲順上行爲逆以

醫吐之所致則非脾胃本來之病此爲小逆
更勿誤治使小逆變成大逆也

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者
屬上焦也

註

食穀欲嘔屬陽明者以胃主受納也今胃中
寒不能納穀故欲嘔也以吳茱萸湯溫中降
逆而止其嘔可也若得湯反劇者此必非中
焦陽明之裏寒乃上焦太陽之表熱也吳茱

萸氣味俱熱藥病不合故反劇也法當從大

陽陽明合病不下利但嘔之例治之宜葛根
加半夏湯

集註

方有執曰食穀欲嘔胃寒也故曰屬陽明言
與惡寒嘔逆不同也上焦以膈言也

病人嘔數數爲熱當消穀引食而反吐者此以發
汗令陽氣微膈氣虛嘔乃數也數爲客熱不能消
穀以胃中虛冷故吐也

註

病人嘔數數爲有熱則當消穀引食今食而
反吐者蓋以身熱嘔數誤爲表熱而發其汗

因使其人陽氣微膈氣虛也不知此衄之數
乃外邪客熱之數非胃中實熱之數也其不
能消穀食而反吐者乃胃中本虛冷故耳

集註

程知曰此言汗後衄數吐食當責胃之陽虛
也陽受氣於胸中發汗過多令陽氣微膈氣
虛客熱外越故衄數也客熱不能消穀而吐
者當責其胃之虛冷若因其數而投以清胃
之藥則左矣

程應旄曰見數衄而反吐者數爲熱衄無力

則爲虛脈膈虛陽客於上不能下溫故令胃
中虛冷熱爲客熱寒爲真寒究其根由祇由
發汗令陽氣微然則陽氣之珍重何如而可
誤汗乎

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷
故也以其人本虛攻其熱必噦

註

陽明病不能食者爲中寒卽有脈數客熱上
條旣戒以不可汗此又言亦不可攻若攻其
熱則寒其胃陽亦必作噦矣所以然者客熱

雖除胃亦虛冷故也以其人本來胃虛故攻其熱必噦噦卽乾嘔也

集註

方有執曰攻熱皆寒藥故知必噦胃中虛以不能食言此亦戒謹之意

林瀾曰陽明譫語潮熱不能食者可攻由燥屎在內也乃亦有胃中虛冷不能食者須詳別之未可便以不能食爲實證也若誤攻之熱去噦作矣然則安得以陽明槩爲宜下哉

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

註

此承上條不攻亦噦之義也若其人胃中虛冷不能食者雖不攻其熱飲水則噦蓋以胃既虛冷復得水寒故噦也宜理中湯加丁香吳茱萸溫而降之可也

集註

喻昌曰表熱裏寒法當先救其裏太陽經中亦用四逆湯其在陽明更可知矣此條比前條虛寒更甚故不但攻其熱必噦卽飲水亦噦也

汪琥曰若胃中虛冷不能食飲水則水寒相

搏氣逆而亦爲噦矣法當大溫

跌陽脈浮浮則爲虛浮虛相搏故令氣餒言胃氣
虛竭也脈滑則爲噦此爲醫咎責虛取實守空迫
血脈浮鼻中燥者必衄血也

註

誤攻飲冷皆可致餒固矣今跌陽胃脈浮而
不大無力而虛則是胃虛與邪相搏卽不誤
下飲冷亦令餒也若跌陽胃脈滑則爲噦者
乃熱氣擁鬱之餒非胃氣虛竭之餒醫何可
取實責虛以自取其咎耶若跌陽胃脈浮而

鼻中燥者此熱據營分營熱迫血妄行必作
衄也世有以噦爲呃逆者不知噦卽乾嘔也
以其有噦噦之聲故又名噦也觀今病呃逆
之人與飲冷水則氣自臍下衝上出口而作
格兒格兒之聲聲長時止者爲實可治聲短
不已者爲虛難治

集註

方有執曰此又出跌陽脈而以噦與衄言皆
逼汗而不得汗之所致也咎過愆也責虛言
求病於虛取實言反以虛爲實而攻取之也

血屬陰而爲內守故曰守空迫血言劫汗也
寸口脈浮大而醫反下之此爲大逆浮則無血大
則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷
水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人必餒

按
令汗大出四字當是衍文

註

寸口脈浮大指六脈皆浮大也六脈皆浮大
則非陽明按之大脈乃太陽不按之大脈也
醫反下之此爲大逆則從前浮脈變而爲無
血之虛大脈變而爲胃冷之遲虛寒相搏則

爲腸鳴醫乃不知而反與飲冷水其人得水
寒之氣冷與虛相搏於胃中故必餉也餉者
氣饒結有聲卽今之呃逆也

集註

程知曰言邪氣在表妄下之變也寸口浮大

而無鞭滿藏熱之證法應發汗若反下之此
爲大逆旣經妄下則所謂浮者至於內空而
無血所謂大者變爲裏虛而有寒虛寒相搏
則爲腸鳴醫見脈大以爲有熱飲以冷水欲
以水寒勝熱而作汗裏先虛寒又得冷水與

之相搏則冷結上焦必至咽噎塞而氣逆矣

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

註

傷寒噦而不腹滿者爲正氣虛吳茱萸湯證

也噦而腹滿者爲邪氣實視其二便何部不

利利之則愈也

集註

成無已曰噦而腹滿氣上而不下也視其前

後有不利者卽利之以降其氣前部小便也

後部大便也

程知曰前部不利後人治以五苓後部不利

後人治以承氣是也

沈明宗曰邪傳於胃胃氣壅遏兩氣相搏氣逆上衝則爲噦矣

張錫駒曰傷寒至噦非胃氣敗卽胃中寒然亦有裏實不通氣不得下洩反上逆而爲噦者當詳辨之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也

註

譫語一證有虛有實實則譫語陽明熱甚上

乘於心亂言無次其聲高朗邪氣實也虛則

鄭聲精神衰乏不能自主語言重複其聲微短正氣虛也

集註

戴元禮曰譖語屬陽鄭聲屬陰經曰實則譖語虛則鄭聲譖語者顛倒錯亂言出無倫常對空獨語如見鬼狀鄭聲者鄭重頻頻語雖謬而諄諄不已老年人遇事則諄語不休以陽氣虛不精明也此譖語鄭聲虛實之所以不同也二者本不難辨但陽盛裏實與陰盛格陽皆能錯語須以他證別之隨證施治可

也

婁全善曰余用參耆歸朮等劑治譫語得愈者甚多豈可不分虛實一槩用黃連解毒大

小承氣等湯以治之乎

按

其所云亦鄭聲也

張錫駒曰實則譫語者陽明燥熱甚而神昏氣亂故不避親疎妄言罵詈也虛則鄭聲者神氣虛而不能自主故聲音不正而語言重複也

傷寒四五日脈沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗

津液越出大便爲難表虛裏實久則譏語

註

傷寒四五日入裏之時也衄沉而喘滿乃爲在裏之喘滿而反發其汗津液越出則表虛也汗出胃乾大便爲難則裏實也久則胃熱熾盛必發譏語也

集註

方有執曰越出謂枉道而出也

張璐曰傷寒四五日正邪熱傳裏之時况見衄沉在裏之喘滿而反汗之必致燥結譏語矣蓋燥結譏語頗似大承氣證此以過汗傷

津而不致大實大滿腹痛祇宜小承氣爲介
當耳

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭
鞭則讞語小承氣湯主之若一服讞語止者更莫
復服

註

此詳上條以明其治也陽明病其人多汗以
津液外出胃中乾燥大便必鞭久則讞語宜
以小承氣湯主之若一服利讞語止慎不可

更服也

集註

張璐曰多汗讖語下證急矣以其人汗出既多津液外耗故不宜大下但當畧與小承氣湯和其胃氣讖語自止若過服反傷津液也

沈明宗曰此汗多胃燥非同實治也

汗出讖語者以有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣湯

註

病自汗出而讖語者以素有燥屎在胃中此

爲太陽風邪之所傳也須當下之然必須太

陽之邪已過陽明之經而入陽明之府乃可
下之若下之早則裏熱未結不但熱去不盡
且虛其中熱乘虛而上干於心語言必亂此
表虛汗出裏實讖語所以必待過經入府而
後下之則愈宜大承氣湯

集註

方有執曰過經謂寧遲遲非謂必待十三日
後也

程知曰此言讖語不當下早也既出汗矣而
讖語則必有燥屎在胃此當屬風風爲陽邪

陽邪入裏故讖語然須六七日乃可下之下
之早則風邪未解於表盡入於裏裏邪燥實
語言更亂也

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎
五六枚也若能食者但鞭爾宜大承氣湯下之

按

宜大承氣湯下之句應在必有燥屎五六枚
之下始合當用大承氣湯下之之義若但便
鞭而用大承氣湯下之殊失仲景顧慮悞下

慎下之旨

註

陽明病譫語有潮熱反不能食者知胃中必有燥屎已結實也宜大承氣湯下之若能食者知胃將和但大便鞭耳當導之不可下也

集註

張璐曰此以能食不能食辨燥結之微甚也

潮熱譫語皆胃中熱甚所致胃熱則能消穀今反不能食此必熱傷胃中津液氣化不能下行燥屎逆攻於胃之故宜大承氣湯急祛亢極之陽以救垂絕之陰若能食者胃中氣化自行熱邪不盛津液不致大傷大便雖鞭

不久自行不必用藥反傷其氣也

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

註

下利裏虛譫語裏實若脈滑大證兼裏急知其中必有宿食也其下利之物又必稠粘臭穢知熱與宿食合而爲之也此可決其有燥屎也宜以小承氣湯下之於此推之可知燥屎不在大便鞭與不鞭而在裏之急與不急便之臭與不臭也

集註

汪琥曰下利者腸胃之疾也若譫語則胃家

實與厥陰無與乃腸中有燥屎不得下也治
宜小承氣湯者此半利半結祇須緩以攻之
也又曰或問旣下利矣則熱氣得以下泄何
由而致譫語有燥屎也答曰此係陽明府實
大熱之證胃中糟粕爲邪所壅留著於內其
未成鞭者或時得下其已成鞭者終不得出
則燥屎爲下利之根燥屎不得出則邪熱上
乘於心所以譫語要之此證須以手按臍腹
當必堅痛方爲有燥屎之徵

直視譫語喘滿者死下利者亦死

註

上條下利譫語爲可治此條下利譫語者死
要知譫語不死於下利而死於直視也直視
者精不注乎目也譫語者神不守乎心也已
屬惡候加之喘滿陽上脫也故曰死下利陰
下脫也故曰亦死也

集註

方有執曰直視精不榮於目也譫語神不主
乎心也喘則陽爭於上利則陰爭於下胃中
土也陰陽爭奪於上下而中氣不守故無法

可治而皆主死也

發汗多若重發汗者亡其陽讖語衄短者死衄自和者不死

註

太陽病發汗過多不解又復重發其汗以致氣液兩亡熱邪乘燥傳入陽明而生讖語讖語者胃熱陽也衄短者氣衰陰也陽病見陰衄爲陰勝於陽故死也若衄不短爲陰陽自和故不死也

集註

喻昌曰方註以此爲太陽經脫簡不知太陽

經無讖語之例必日久而兼陽明少陽方有
讖語故此言太陽經得病時發汗過多及傳
陽明時重發其汗因有亡陽而讖語之一證
也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂不定而
妄見妄聞與熱邪乘心之候不同衄短則陰
陽不附衄和則陰陽未離其生死但從衄定
耳

汪琥曰讖語者衄當大實或洪滑爲自和自
和者言衄與病不相背也病雖甚不死若讖

語岬短爲邪熱盛正氣衰乃陽證見陰岬也
無法可施

發汗多亡陽讖語者不可下與柴胡桂枝湯和其
營衛以通津液後自愈

註

此又承上條以出其治也讖語者屬陽明熱
實可下之證也若發汗過多大亡氣液而發
讖語者乃津枯致燥之讖語非熱甚內實之
讖語不可下也裏有熱宜白虎加人參湯表

不解與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液後

自愈也

按

發汗過多亡陽讖語以無大便鞭滿痛故不可下以無身寒汗出惡寒故不可溫於此可知發太陽汗出過多致讖語者必無發熱汗出惡寒也發陽明汗出過多致讖語者必有潮熱惡熱不大便也此則發少陽汗多致讖語者卽論中少陽不可發汗發汗則讖語是也然舍小柴胡湯別無治法若祇用柴胡又恐升散非亡陽所宜故合桂枝和其營衛通

其津液自可愈也

陽明中風衄弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛
久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃
小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不
解病過十日衄續浮者與小柴胡湯衄但浮無餘
證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

按

續浮之浮字當是弦字始與文義相屬則可
與小柴胡湯若俱是浮字則上之浮旣宜用
小柴胡湯下之浮又如何用麻黃湯耶

註

中風傳陽明病太陽未罷脈當浮緩今脈弦

浮大弦少陽脈也浮太陽脈也太陽明脈也

脈既兼見證亦如之腹滿太陽陽明證也脇

下及心痛久按之氣不通快少陽證也鼻乾

陽明證也不得汗太陽證也嗜臥少陰證也

面目悉黃太陰證也小便難太陽府證也潮

熱陽明裏證也噦逆胃敗證也耳前後腫少

陽證也短氣氣衰證也凡仲景立法無方之

條皆是此等陰陽錯雜表裏混淆之證但教

人俟其病勢所向乘機而施治也故用刺法
待其小差若外病不解已成危候如過十日
脈續弦不浮者則邪機已向少陽可與小柴
胡湯和之使陽明之邪從少陽而解若脈但
浮不大而無餘證者則邪機已向太陽當與
麻黃湯汗之使陽明之邪從太陽而解若已
過十餘日病勢不減又不歸於胃而成實更
加不尿腹滿噦甚等逆卽有一二可下之證
胃氣已敗不可治也

集註

程知曰此條全是表證未解而無汗出燥渴
之證故不可用白虎雖有潮熱而無鞭滿譫
語濺濺汗出之證故不可用承氣不如俟氣
之自回猶可漸引其邪從外出也

程應旄曰此條證以不得汗三字爲主故酌
量於柴胡麻黃二湯間以通其久閉總是要
得汗耳

脈浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其

陽則絕

計 衄浮而芤浮為陽盛芤為陰虛陽盛則發熱

陰虛則汗出二者相搏則胃氣生熱愈盛胃

則中津液立亡其陽則絕者言陽亡津液絕也

集註 方有執曰浮為氣上行故曰陽芤為血內損

故曰陰胃中生熱者陰不足以和陽津液乾

而成枯燥也

張璐曰此言脾約當下不下則浮瀉轉為浮

芤津液竭而難下矣其陽則絕即陽絕於裏

亡津液之互辭也

趙良曰胃中陽熱亢甚脾無陰氣以和之孤陽無偶不至燔灼竭絕不止耳

沈明宗曰此辨陽明津竭之脈也浮爲邪氣強芤爲陰血虛陽邪盛而陰血虛爲浮芤相搏胃氣生熱故曰其陽則絕卽亡津液之互詞也若見此脈當養津液不可便攻也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

註

陽明病法多汗反無汗而小便利是寒氣內

攻也至二三日嘔而欬寒邪上逆也手足厥
者寒氣見於四支也氣上逆則欬而苦頭痛
矣若不欬不嘔不厥則頭不痛此證之頭痛
者標也欬逆手足厥者本也

集註

程知曰無汗小便利嘔欬肢厥頭痛曷不謂
太陽病蓋初起無頭痛諸表證也此頭痛是
二三日後嘔欬而厥所致非因頭痛致嘔欬
而厥也嘔欬二證太陽少陽俱有之其表證
未解則屬太陽病其寒熱往來者則謂之少

陽病也厥則厥陰有之但無嘔與欬也

張璐曰陽明無汗嘔欬手足厥者得之榮衛俱傷而邪入深也然小便利則邪不在內而在外不在下而在上故知必苦頭痛仍宜小青龍主之若不嘔不欬不厥而小便利者邪必順水道而出豈有逆攻巔頂之理哉

林瀾曰須識陽明亦有手足厥證胃主四肢中虛氣寒所致也然頭苦痛而欬自與陰寒但厥者異矣此類數條最爲難解

吳人駒曰嘔欬手足厥頭痛皆由反無汗之故也

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者咽不痛

註

陽明病當惡熱不惡寒若從傷寒傳來則不能食今從中風傳來故能食也傷寒挾寒邪則有頭痛證今中風挾風邪則有頭眩證理固然也寒邪屬陰若兼飲則欬而嘔今不嘔而咽痛則以風屬陽邪風病則兼火故欬而

咽痛以類相從也

集註

方有執曰眩風旋而目運也風故不惡寒能食欬逆氣也咽門胃之系也胃熱而氣逆攻咽則欬而咽傷也

程知曰陰邪下行故無汗而小便利陽邪上

行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能

食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也

程應旄曰陽明以下行為順逆則上行故中

寒則有頭痛證中風則有頭眩證以不惡寒

而能食知其鬱熱在裏也寒上攻能令欬其
欬兼嘔故不能食而手足厥熱上攻亦令欬
其欬不嘔故能食而咽痛以胃氣上通於肺
而咽爲胃府之門也夫咽痛惟少陰有之今
以欬傷致痛若不欬則咽不痛况更有頭眩
不惡寒之證益可辨其爲陽明之鬱熱也

病人有寒復發汗胃中冷必吐衄

註 病人有寒謂胃中寒也復發汗謂汗而復汗

也胃寒復發汗陽氣愈微胃中冷甚衄不能安

故必吐衄也宜理中湯送烏梅丸可也

集註

程應旄曰汗生於穀精胃中陽氣所釀也有

人寒復發汗知胃陽不復存於內矣衄何能安

發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不

止

按

必吐下不止之下字當是衍文

註

此承上條誤而又誤必變而成逆也胃中虛

冷本因誤汗水藥不得入口入口即吐而為

逆也若更發其汗則胃逆益甚不能司納不

特水藥入口方吐且必無時而不吐逆也

集註

成無已曰汗後水藥不得入口爲之吐逆發

汗亡陽胃中虛冷也若更發汗則愈損陽氣
胃氣大虛故吐不止

程應旄曰發汗後見此者由未汗之先其人
已是中虛而寒故一誤不堪再誤也

衄浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

註

陽明病衄浮而遲浮主表熱遲主裏寒今其

證下利清穀則爲裏寒太甚法當溫之宜四

逆湯主之

集註

汪琥曰陽明經病衄當從長今衄但浮此在表之熱凝也腑病衄當從數今衄過遲此在裏之寒甚也故見下利清穀其所利之穀食色不變氣不臭卽完穀不化也此裏寒已極故與四逆湯也

陽明病欲解時從申至戌上

註

凡陽明病無論在經在府必乘其旺時而解申酉戌陽明旺時也經氣旺則邪氣自退故

解也

集註

張志聰曰經云日西而陽氣衰陽明之所主

也從申至戌上乃陽明主氣之時表裏之邪

欲出必隨旺時而解

音切

奄

音厭

跌

音夫

搏

音團

屎

音豕

摸

音莫

揜

音聶

蘸

莊陷切

挺

庭上聲

繞

音擾

憤

古對切

怵

勅律切

疽

音日

痕

匣牙切

漱

音瘦

軺

時饒切

藥

音伯

潦

郎到切

沸

音蒂

尿

同溺

轉

株戀

詢

音壹

沈

音回