

徐仁甫著

實用醫學講義

伍銓萃題



實用醫學講義中冊

第一篇 上部

第一章 頭

頭者陽中之陽。是一身之主腦。凡病多先於頭。如外感之頭痛。腎虛之頭暈。最惡險者中風。(即腦充血症)內治參上冊中風門。外加藥引敷。療治倍然。其餘頭中之外科瘡瘍等。初起多是陽盛血熱。若久患膿流過多。氣血虧損。皮膚而致寒者有之。施治溫熱藥亦應用也。

(甲)偏正頭風症。頭頂及全部痛爲正。或常定痛於左右邊者爲偏。內服祛風藥。與和甘緩藥。加以外敷引散治之。

(一)偏正頭風內服方。此方主治偏正頭風痛。久患不癒。用白芷二兩五錢。川芎一兩。甘草一兩。各味炒黃。熟川烏五錢。生川烏五錢。共爲研末。用薄荷二錢煎水冲散二錢溫服。每早晚服一次。服至癒爲止。

(二)偏正頭風外治方。此方主治偏正頭風。痛如刀劈。用沙棠葉四兩。山

大艾葉四兩。葱頭一兩。共搗爛酒煮熱敷患痛處。縛紮圖式如下。
(說明)頭風痛之起。多產婦及血虛者。或因雨沾濕頭部。寒風所吹。令頭內肌肉毛細血管凝結栓塞。阻血液循環。該部之經絡神經系。失新血之潤澤。偏正頭痛作矣。內服方。用白芷川芎川烏。辛香走經絡。以甘草和肌肉。薄荷消腫痛。外以沙棠葉大艾葱酒。祛風引散。凝結之寒。加以熱藥外敷引之。肌肉經絡。感熱立通。風痛止矣。

第一圖



(用法)頭頂裹紮法。先將綁帶平鋪頭額之中央。延長至腦後。折回原處。如是往返鋪滿。圍頭作結。即第一圖。

(乙)頭太陽部疼痛。其痛在耳上髮際之間。每日以下午爲甚。久之兩耳流膿水是也。

(一) 頭太陽部疼痛症。此方主治太陽部疼痛。經年不癒者。皆肝燥腎虛。下方以黑豆補腎氣。杞葉清肝。是對症療法也。枸杞葉連梗半斤。黑豆二兩。用長流水三斤。煎回半斤。空心溫服。連服至癒為止。外以偏正頭風甲二方參用。

第二圖



- (一) 顙門
- (二) 天庭
- (三) 日角
- (四) 月角
- (五) 風池
- (六) 太陽
- (七) 心火
- (八) 山根
- (九) 年壽
- (十) 太陰
- (十一) 氣池
- (十二) 風門
- (十三) 脾土
- (十四) 左頰肝
- (十五) 右頰肺
- (十六) 地角腎水

頭太陽部。看第二圖六字處是也。

(二) 頭瘡紅腫症。瘡之紅腫而痛。因熱迫而成。方用大涼退熱外敷。引諸

(三) 熱毒由皮毛而去。紅腫自消。不致化血為膿也。

(三) 治頭瘡紅腫方 用馬齒莧。鴨仔菜。大紅花葉各一兩。鹽五分。共搗爛。煑煖敷。一日換二次。

(丙) 爛頭瘡症 此因久患瘡不好。瘡內痕癢。時流膿水。用以酸澀殺蝨菌生肌藥者。多可治癒。

(一) 爛頭瘡經久不癒方 用茶葉二兩。煎水一斤。將瘡洗淨。另用酸味草一斤。煎回水二兩。去渣加蕨粉二兩晒乾研末。外搽瘡中。每日多次。

(丁) 過頭蛇與纏身蛇症 此症初起有一紅血線。患於頭者。名過頭蛇。患於身者。名纏身蛇。生於頸者。名鎖頸蛇。各醫書有名為紅線疔。其紅血線入耳入心胸。多生危險。久而不癒。此紅血線部位。發生膿泡潰爛。流膿水不止成癰瘡者。

(一) 治過頭蛇纏身蛇鎖頸蛇方 初起紅血線之頭尾。以蒜切片貼住。上用艾火灸之。紅血線漸縮。縮小之頭尾再灸。以癒為度。

(二)內服方 治心熱皮燥發生皮膚蛇氣紅腫症。用金銀花五錢。燈心四十子。清水二盅煎回一盅半。溫服。

(三)頭蛇已穿成癰瘡方 用出入山虎各二兩。熟烟屎二厘。共搗爛。用酒開搽患處。或用冷茶開亦得。

(戊)頭癩瘡症 此瘡在皮肉化膿。久而不癒。俗名稔拿瘡。因在十歲以上之小兒。多食魚蝦。燥其嬌陽嫩體而成。

(一)頭癩瘡方 治癩瘡。鷄屎磊。隨好隨發。經年不癒。用松香三錢。乳香一錢。沒藥一錢。石灰三錢。竹筍四兩。猪宗肥肉二兩。共搗成膏。貼患處。一日一換。以癒爲度。

(己)頭稔拿瘡方 卽癩瘡經久。瘡毒灌孔於皮肉。以手指按稔軟如皮裏水狀。名爲稔拿瘡。

(二)用狼狗骨二兩。貓骨二兩。鵝毛管二兩。三味煨存性置地。去火毒。格木虫屎一兩。共研末。用茶油開搽。或用茶開亦可。洗用本部辛二

方。

(二)用徐仁甫紅藥膏。加水楊酸少許貼之。而癒。

(說明)凡物腐久則蟲生。瘡久亦然。瘡之化膿。膿中成以菌蟲。欲治瘡癒。必先清膿菌。本方骨毛煨之。化爲鹼礫之質。而能去污殺蟲。加以格木虫屎之辛散爲引。其效之理如此。

(庚)爛頭疔癰疽症。此症因患疔癰已穿。內有腐肉。膿血水長流。瘡口四邊癢是也。

(一)爛頭疔癰疽方。治爛頭疔癰疽。並通治中下部疽潰。及爛脚等症。用葶麻子五兩。加鹽一錢。醋六兩。三味共搗爛煑暖成膏貼之。一日換二次。腐肉去而生肌。外洗用本部辛二方。

(辛)天泡癰又名飛揚癰。此症生起小泡。內化膿包。穿之膿水沾到處起發。由頭連至週身及四肢。痕痛非常。小兒多患。大人亦有之。

(一)天泡癰方。治頭及週身四肢起未老先白頭瘡癰。又名飛揚癰症。

用枯礬三錢。白芷三錢。滑石三錢。黃芩三錢。硃砂五分。生軍二錢。楓子肉二錢。黃柏二錢。蟬蛻（煨）二錢。共研末。以滾水開搽患處。

(二)天泡癰瘡洗方 用地榆葉二兩。蚊仔花二兩。釧板茶二兩。紫蘇梗二兩。酸味葉蘆二兩。薄荷一兩。木槌仔殼一兩。樹頭猛二兩。清水煎洗患處。

(說明)凡瘡瘍膿血未清。必須勤於外洗。其療治之功倍然。外洗方本方最爲完備。消腫則有薄荷紫蘇。殺蝨菌則有酸味葉木槌仔。去腐毒則有地榆板茶。生肌則有樹頭猛蚊仔花。此是外洗普通要方也。

(壬)頭生小瘡出黃水立即腫大如斗症 此入時行症。可向上册瘟疫參考對治。皆因臟腑感受疫熱。身體發冷發熱。氣喘作渴。危險立至。

(一)頭瘡出黃水腫大症方 此治時行瘟疫。大頭瘟。發冷發熱。大喘大渴症。用生石膏一兩。知母五錢。大黃三錢。川連三錢。黃芩三錢。白

菊花四錢。甘草二錢。清水三盅煎同一盅半溫服。重者一日三服。

(二)外洗方 用牛耳苓一斤。秤星菴一斤。五苓脂二兩。赤小豆二兩。共煎水洗患處。

(癸)頭生蠱生虱。此因不潔。頭髮生虱。用水銀一錢。青菔葉五錢。熟烟五錢。百部五錢。共末和酒擦之。

(說明)頭患瘡瘍等。皆因不勤沐。一經汗出易於沾垢。小兒體魄未堅。每易發汗。所以患瘡瘍者。小兒居多也。

第二章 面

面乃一身氣血精華之所聚。凡內病無不先顯於面。即面色青肝風動。面色紅心火熾是也。其餘外科而生於面者。亦須留意。語云面無善瘡也。

(甲)面道瘡症。此症起於面中。紅腫作痛。久之成爲膿包。一經穿爛。埋口甚難。必須內兼用藥托。取效爲快。

(一)面道瘡內服方 治面道毒瘡症。

用連翹三錢。白芷一錢。川貝三錢。紅花二錢。皂刺一錢。金銀花三錢。生地三錢。枝子一錢。清水煎服。初起服之即消。已成膿服之即穿。每日服二劑。以瘡爲度。

(二)面道瘡外敷方 用森樹皮二兩。天紅草一兩。鹽二分。蜜糖一兩。黃片糖一錢。共搗爛敷患處。一日二換。以瘡爲度。將埋口改用徐仁甫萬應膏更妥。

(說明)面道瘡失治而潰爛。成爲翻花癰狀。至此可參下冊癰疽門。本方森樹皮取生二囊白皮。藥書名苦楝根皮是也。其果名爲川楝子。味苦殺蟲去熱毒。獨用兼治疥癩。

第二章 眉

眉爲風池。(即二圖五)肝風動。風池部位立變他色。即現眉毛垂。眉皮肉跳。眉骨疼痛等病。肝木得養。眉毛潤澤清秀。語云喜氣揚眉是也。

(甲)眉骨疼痛症。此症因血虛不能養肝木。肝虛不能禦外風。風襲於風池。風

池骨之神經。因感無血液滋潤。而生該部骨內疼痛。

(一)眉骨疼痛方 用生薑五錢。仙半夏五錢。清水煎服。一日一服。

(二)眉骨疼痛有一定時候方 此症每日下午三時痛至晚十二時止。用百合一斤。冰花一兩。用清水四盅煎成一盅。去渣加冰花溶化溫服。一日一服。服至癒爲度。

(說明)此方經治男界眉骨痛多年。百藥弗效。此方治之。其病豁然若失。後有患眉骨痛者。依法用之多癒。因冰花(即白糖)味甘入脾心。而增壯心氣。百合清潤。而養肺氣。肺主人身之大氣。大氣與心氣轉運。人身之氣行血自行。諸經絡爲風凝結等立通。各部之痛自除矣。

第四章 目

眼目是人之視官。關於人身最重要。其內病另開一科。本編下冊眼科療治甚詳。除此療治各法外。均可向下冊參考。患目疾之內外病者。每每因內者用外治。外者用內治。互相並用。取效倍然。

(甲)蟹眼腫凸惡症。此症小兒食物煎炒過甚而生。五疳積結而成。是目最惡之症。可向本編下冊眼科參考調治。

(一)蟹眼腫凸惡方 此方食後由大便疴血。連食三日。此眼漸復原。惟此方甚烈。需有醫生主理爲安。用使君子肉末一錢。輕粉末五厘。鷄蛋一隻。先將鷄蛋開一小孔。以上藥插入蛋內。封回蛋孔口。加玉扣紙潤濕包此鷄蛋多層厚。置於炭火中煨熟食。或煎熟。每日食一隻。連食三日。大便疴血及白膠片等無防。另每日食下方一劑。

(二)眼睛凸出蟹眼方 治小兒大人兩眼睛凸出。或一眼睛凸出。內服方。用熟軍八分。木賊一錢。地膚子一錢半。防風一錢。知母一錢。白芷五分。北細辛二分。元參一錢半。菊花五分。使君子肉一錢。清水一盅。煎回半盅。每日一服。連服多日。

(乙)眼起點膜症。此症原因多是積熱所致。清除肝膽積熱。其眼點膜自除。

(一)眼起黃白點膜及紅筋不退方 用草羊膽一隻。桂花末二錢。二味煎熟

飲汁。每日一次。連食五六次。並用木條三四方外搽點。

(一)眼起點膜久而不退方 用雲耳一兩(洗淨)。白蜜糖一兩。二味煎熟食之。連食六七次。

(二)眼起點膜外搽方 用藤黃五分。梅片一分。雙料酒四錢。在飯面蒸之。熱點眼膜中。初點痛片時。不久見涼。每日點搽多次。並內食本條一二兩方。其膜漸退而癒。

(四)眼起點膜外搽方 用蛤蚧膽七隻(即田鷄)。人乳汁一錢。二味開勻。點於眼膜中漸退。

(說明)眼病爲上部最高之位置。無論內服外搽點藥。必經於時日。方能達到病所。醫生診治時。應將其理說及。免病者朝夕改醫。自取其誤也。

(丙)眼起斗生紅筋朦昧症 此症小兒屬肝積熱。照上二條參考治之。大人多屬肝腎兩虛而起。治法如右。斗者即眼頭起厚膜脹高是也。

(一) 眼起斗膜方 此方治大人小兒眼起斗膜多年者。用穀精六錢。淮山六錢。丹皮六錢。木賊六錢。茯神六錢。桑白六錢。蒙花四錢。紅花六錢。正石蟹六錢。金蟬蛻一兩。海螵蛸四錢。蕤仁肉一兩。夜明沙六錢。杭菊八錢。共晒脆爲末。煉白蜜爲小丸。每早晚用六安茶送服二錢。連食多料。


(說明) 余遊鼎湖得高僧授之。經用此方醫過黃某兩眼起斗十年。照方連食四料痊癒。其若患年輕者。一二料痊癒多人。並用本條三方外搽之。

(二) 眼瞶起紅筋將成斗狀方 此因肝虛肺燥者。用鮮冬桑蕊一兩。乾用二錢。豬肝四兩。切碎二味煲熟食。一日一次。連食六七天癒。

(三) 眼起紅筋斗膜外搽方 用金蟬蛻一錢。蛇蛻一錢。正蟾蘇一分。正冰片二分。共爲細末。以小許點於斗膜中。日多次。紅筋斗膜漸退。

(四) 眼起斗膜外敷方 用假生荷蘭豆。假生苦墨菜。生蒲公英。豬屎豆。

第三圖 (三)



即草決明各一兩。用滾過水大暖將上各藥洗淨。用淨瓦盤搗爛敷眼中。一日二次。敷眼外束紮物法。丁方大約二寸餘。以蒲草織成。或用疎布爲之。四角以細棉繩繫之。先將所敷藥於內。外用此蒲草片覆上。將繩束於兩耳。可免藥墜下。即三圖是也。

(五)眼起紅筋西法方 用硼酸五分開蒸溜氣水二錢。希士連一錢。以棉花點擦眼內。

(丁)眼出眼膠流淚而生暗症。此症多在四十歲以上之男婦者。因色慾過度。致其脾胃虛弱。納穀漸減。不能生精血。肝腎相因而虛。眼目失護養。淚流眇膠作矣。治當用滋腎健脾等藥。

(一)眼流淚視物不明方 治脾胃兩虛。眼流淚。日夜不止。用杞子一兩。青箱子(鹽水炒黃色)一兩。蒙花一兩。茯神一兩。共爲末。每次用三

錢。豬肝四兩。切碎和勻蒸熟食之。每日一次癒。

(二)眼淚流不止方。治脾虛不能養肝流淚。用肇朮一兩。瘦豬肉四兩。用清水二斤。煎回半斤服食。連食旬日癒。

(三)眼出膠外搽方。用菊花一錢。紅棗七枚(開)。膽礬二分。穀精一錢。膽草一錢。夜明沙一錢。清水二盅煎洗搽眼內。內服藥參考一二兩方。

(戊)眼觀視一物如二物症。此症多因心包絡積熱。誤用瀉劑。腸熱已去。心熱邪未清。蘊於心胸隔間。令肝目而生錯視也。

(一)眼視一物如二物方。用正川連一兩。清水二盅。煎回半盅。空心溫服。一日一服。連服一二劑癒。

(己)小兒大人。眼閉不開症。此症多患於誕生嬰兒者。因其眼中受風熱所致。內服徐仁甫沆瀣丹一二服。外用右方洗之。

(一)小兒眼閉不開方。用葱頭一錢。淡豆豉三錢。清水二盅。煎回一盅洗。

眼內。早午晚洗一次。連洗多日痊癒。

(庚)小兒發鷄盲症。一名夜摩。此症多患於十歲八歲小兒。因其未定性。食物過雜或過飽。而生積滯。將成疳積也。治用疏潤肝氣法。

(一)小兒發鷄盲方 用鮫魚腸洗淨一兩。莧菜花一錢。二味蒸熟食之。每日一次。連食多次癒。

(二)小兒夜發鷄盲方 用白蟾肝一兩。搗爛加酒二錢蒸熟食之甚效。

(辛)眼生眼旗針瘡。連及左右眼。瘡初起紅粒時。用百足牙刺穿。出膿血。以珍珠末。川連。冰片。防風等分爲末。用乳汁或滾水開搽痊癒。

(壬)泥沙入目。切不可用手搓擦眼目。免沙深入眼肉。法用手將眼蓋皮撐開。以清水浸洗眼。其沙自下水中。如仍不出。用牛七搗爛敷眼角。泥沙即出。

(癸)鐵箭及炮沙入目。用沙糖點入。待見發癢。鐵頭露出。另用密口鉗取之。可向刀傷門參治。

第五章 耳

耳爲腎竅。耳鳴響腎虛。耳乾痛腎受風。耳腫瘡瘍。腎受濕熱。凡耳患外症。多是於內因。治理者必參脈息。內外並治。取效當快。

(甲)小兒耳下腮腫結核。此多因風火痰熱而成。食餅乾及燥熱。如蝦油炸。燒猪炒花生等而發。內服化痰藥。外散熱藥敷之。

(一)小兒耳下腮腫結核症內服方 用海草炭二錢。蒲公英五錢。金銀花二錢。前胡二錢。連翹二錢。水煎溫服。

(二)外敷搽方 用草烏三錢。白芷二錢。南星。血竭。五倍子。白礬。生

軍。半夏。草節。薑黃。青黛。赤小豆各一錢。共爲末。用鷄蛋白開

(乙)耳痛。耳內乾痛如針刺。此腎肺燥而生。用桑白四兩。茅根四兩。紅棗四兩。用清水十餘盅。久煎成一盅溫服。愈。

(丙)耳癰。在耳內孔腫爛。初起耳內痕癢非常。用枯礬。黃丹。礪砂各二分。

(丙) 冰片一分。共末吹入耳內。數次而癒。

(丁) 耳疽。在雲孔下腫不紅而實。有些痕痛。用地鏡仔。紅東風菜。九乾菜。

(五) 共搗外敷之而癒。

(戊) 耳疔。生於耳竅中。微腫悶疼。穿破流膿。久之令人重聽。皆肝腎胃火凝

結而成。方內用枝子清肝湯。外以散摻之。連用多次痊癒。

(一) 枝子清肝湯 用山枝子。川芎。歸身。柴胡。白芍(酒炒)。丹皮。石

膏(煨)。牛蒡子(炒研)各一錢。甘草。黃芩。黃連各五分。水二盅煎

(一) 回半盅。空心溫服。

(二) 外敷方 用川連。雄黃各一錢。山茨菇五錢。赤小豆一兩。冰片二分

(甲) 小兒。共末滾水開敷患處。

(二) 外摻散方 用人指甲(煨)二錢。冰片二分。共為末吹入耳內。用皮節

其音響吹之。即下第六圖。

(己) 小兒耳孔流膿。多患於三四歲小兒。每每連綿數年不癒。一經治癒。必須

戒口。可無復發。

(一)小兒耳孔流膿方 用田鷄骨煨灰二錢。大梅片。巴西烟灰。黃柏各五分。共爲末。先以酒蘸棉花洗淨耳內。用此藥末吹入耳內。多次而癒。

(二)耳孔流膿外洗方 用絢牛棧菴。老虎鬚菴各五錢。以酒二兩浸之。以酒灌入耳內。另用上方摻之。

(三)耳孔流膿滴耳方 用加布力珠一分。甘油十分。調勻。每次滴一二點入耳內。連滴多次癒。

(說明)耳孔流膿腥臭。多因濕熱而起。經已內外治癒後。對於鷄蛋及油炸豆腐等。當要戒之勿食。可無復發也。

第六章 鼻

鼻爲肺竅。肺燥則流鼻血。肺虛則流鼻涕不止。肺有濕熱。鼻內生瘡瘍。外治而兼內服。方可永久不復發之患也。

(甲)鼻孔内生花。或癰腫閉。皆鼻孔粘膜結核而成瘡瘍。穿爛過久。結爲如花

(甲) 如癬。治用去腐膿殺菌藥可癒。

(一) 鼻孔内生花癬。用甘油二分。加布力珠四分。用毛管點入鼻孔內花

癬處。連點多次而癒。

(二) 韭菜子薰法。治鼻孔生花癬。疽結核流膿症。用新瓦一件。以火燒此瓦

。加韭菜子一錢於瓦面。蓋以漏斗。斗尾貫長竹管。該韭菜子烟。由

竹管上。薰於鼻孔內癬花瘡處。此患處之腐疽菌聞烟即斃。連薰多次

而癒。

(四)

薰鼻孔法。用新淨大瓦一張。炭火燒

到瓦將紅。而加韭菜子於瓦面。然後


蓋以漏斗。取烟薰鼻孔患處。烟如過

熱。必須加長漏斗上竹管。薰時以手

探烟熱否。不可遽然置於鼻。免熱傷

鼻孔。如此圖是也。

第四圖



(乙)鼻衄不止。此症多患於未成年十餘歲童子。皆因其陰血未強。肺易生燥。

(甲)以六味加清絡藥爲丸治之。自能斷根。永無復發。

胃蘇(一)止鼻衄丸。治大人小兒長期鼻衄。每數日一次。或一月一次。或睡臥輒醒。不知而流者。黃面體瘦。以一料而止。連服三料痊癒。並可參考上冊

鼻衄治法。用竹茹(切碎醋浸透炒黑)二兩。卷柏一兩。丹皮。熟地。

黃肉。淮山。茯苓。沙參。白茅根花各六錢。澤瀉四錢。共爲末。煉

蜜作小丸。鹽水送服二錢。早晚一次。

(二)猪肉柿皮湯治小兒鼻衄。時發時止。用柿菓皮蒂曬乾二錢。瘦猪肉三

兩。清水共煲食之而愈。

(三)塘虱魚酒湯。治小兒女子鼻衄。用塘虱魚二尾(去內臟)。料酒二兩。

清水三盅。煎回半盅服食多次而癒。

(四)外吹止衄方。用嬰兒胎髮煨灰爲末。吹入鼻中卽止。此藥不便有。改

用韭菜連根搗爛塞鼻孔中亦止。或用荖葉爲末吹之亦止。吹法以皮節

毒散開。唇色變黑。不識調理。多會至命。

(二)馬嘴疔內服方。治馬嘴疔環。腫痛身熱症。用柴胡。荆芥。牛蒡子各二錢。生軍。知母。麻黃。山甲。黃芩。赤茯苓。連翹各三錢。羌活。獨活各一錢五分。甘草。烏梅各一錢。生地四錢。水二盅煎回半盅溫服。

(三)馬嘴疔外敷方一。用壁虎仔數隻。冷飯。荖葉五分。石灰一錢。水馬數隻。馬齒莧一兩。共搗爛敷疔處而癒。此方如覓不齊。少一二味亦可。

(三)馬嘴疔外敷方二。先用鷄冠血點疔處。後用瓦簷茜。烏欖樹二囊皮。竹筍。木虱數粒。猪槽坭。硃砂五分。黃糖。或白糖亦可。馬齒莧。

(六)共搗爛敷之。或加生蜆數個更妙。

(四)馬嘴疔外搽方三。用雄黃二錢半。油麻子五分。冰片二分。麝香一分。三仙丹一分。以猪膽汁開搽患處而癒。

(五)馬咀疔外搽方四 用貓尿以棉花蘸點立癒。取貓尿法。將貓用盤蓋之。以蒜頭擦貓鼻即疔尿也。

(六)灸疔手術 用鐵錐燒熱。以錢孔罨疔頭。加冰片於錢孔填滿。或曲見少許。以錐鐵灸疔頭。然後用上各方敷之。

(說明)馬咀疔。因脾胃積熱起。或過食犬牛肉等。初見癢痛。人多不留意。經一對時唇面俱腫。必須查明疔頭。用手術灸壞疔毒頭。則毒失去主毒。治當快痊癒。

(乙)口斜。因脾風及天打鬼頭風。被惡風吹歪不等。重者聲被撲啞。治法內服養陰祛風。外以藥敷搽之。

(一)風雨撲啞口斜內服方一 用桔梗。甘草。烏梅。防風。台烏各二錢。水煎服。

(二)當風撲啞口斜內服方二 用鷄蛋黃二隻炒煎至黃。米醋三兩沖於煎蛋中溫服。

(三)鬼頭風吹歪口面方。白豆蔻。硃砂。葶藶子各五錢。共爲末。生黃蠶
血和勻。用布開糊貼。如歪左貼右。歪右貼左。稍煖揭開一息時。復
貼。連貼多日而癒。

(說明)暴風撲啞者。其本原是身體氣血所偏。風乃乘虛而入。防避法
遇暴風大雨。以布巾束口鼻阻隔之。

第八章 牙齒

牙爲骨餘。內臟主屬腎。腎發炎熱。牙多腫痛。牙脚流血名爲牙衄。牙牀潰爛
名爲牙疳。牙牀成腐骨名爲牙癩。牙因不潔腐爛作痛。以外治補修。牙黃白無
光彩。脾腎將絕。有因梅毒致牙發生諸病者。亦須參本册花柳門方治可也。
(甲)牙衄。因腎受熱。腎熱衝於牙牀。血管破而流血。若流不止。不知救治。
每因此致命。

(一)牙衄哈口方一。用竹茹四兩。米醋半斤。浸片時含口內立止。
(二)牙衄外敷方二。用酸檸檬敷牙脚處。

(三)牙呎外哈方三 用食烟筒竹一枝。去淨烟屎。煎水溫服。但烟筒竹含有烟尿分量多者。每每服之麻醉作嘔。服此宜少不宜多。求其呎止乃合。

(乙)牙癩。因牙牀橫血管凝結不通。積瘀發腫化膿。膿血感空氣及人身原有石灰質蒸結將成爲骨像。其骨多有連生於牙牀。不識治理。及遽然施刀。誤斷牙牀大血管。流血不止。多會發生危險。治法。內用化膿離骨托起藥。外以解毒藥頻敷。使骨寬動。而施手術取之爲妥。

(一)牙癩內服方一 治兩牙牀紅腫堅實。將化膿毒。以此升散之。用歸尾。連翹各三錢。升麻一錢半。海草炭。蒲公英。紅花。金蟬蛻各二錢。山甲(炒)一錢。清水二盅。煎回半盅溫服。每日一服。連服至散爲止。

(二)牙癩初起內服方二 用鹹仁面四箇。煲白米粥食。多食爲好。

(三)牙癩含口藥水方 用水楊梅四兩。雄黃精二分。五倍子(打)五錢。三

味煎水頻含口內。

(四)牙痍在牙脚穿爛外挿方。用梅片。牛黃。甘草。川貝。川連各二分爲末。鵝不食草四錢搗爛。將上藥末和勻。用棉花托挿入牙肉患處。卽連流出惡毒水。連插多日而癒。

(五)牙痍生穿外面部敷藥方。用了哥麻。無爺藤各五六兩搗爛。每加鹽五分和勻。以火用瓦碗煑煖敷患處。每早晚換一次。連敷多日。膿毒瘡骨自出而癒。

圖 五 第



頸部裹紮法。將綁帶一條。兩端平分爲二。中央相連二寸許。成四尾形。兩根結於頭上。兩根結於頸後。卽如上圖是也。

(六)牙疽腐骨內服方。牙脚腫瘍。經久不癒。膿毒結成腐骨症。用金蟬蛻三錢。穿

山甲四錢。百足(去頭足)二條。清水二盅煎回半盅溫服。

(丙)牙疔疔症。生疔疔牙牀潰爛。白膿腐臭。其牙亦脫爛。久之不理。全牙盡脫。小兒多因疔積。或患白喉痧而成。治用殺蟲消疔積藥。內外治之。並用而癒。

(一)牙疔疔內服方 治走馬牙疔疔症。用苦參。石榴皮。金銀花。金蟬蛻。元參。薄荷。川貝。白芍各二錢。清水煎服。

(二)牙疔疔外搽方 用紅棗十枚。雄磺三錢。將紅棗切開。入雄磺在棗內。火煨研末。先將牙牀白點施手術針刺破。出盡瘀血。先用墨或糖塗之。再用此散搽患處。有痰膠潺吐去之。

(三)牙疔疔含口方 用水蓉梅二箇。春爛炒香沖酒含口內。去清牙疔疔毒。每日多次。以癒爲度。

(四)說明 牙疔疔。皆因牙牀腫久腐爛。化爲膿毒菌。上方內服之石榴皮薄荷。最爲殺菌。外含搽之酸味及煨雄磺紅棗化爲鹼性。亦能殺菌。

此症腐膿菌去盡。便即生肌痊癒。

(丁)牙蛇症。在牙牀紅腫。兩腮有紅根如蛇狀。痛苦非常。久之成膿穿爛。治用祛風清熱而癒。

(一)牙蛇含口方 用蕎頭醋二斤。或原醋亦得。雞項一隻。生鮮桑白根八兩切碎。共煲數滾含之。再煲百餘滾。服湯食肉癒。

(二)牙蛇腫連及周身骨痛內服方 用脆骨仔葉蕊二三兩搗爛。加白糖一兩。滾水沖服。

(戊)牙痛症。有因風熱而致牙痛。有因虛火而致牙痛。有因牙爛至牙筋作痛。風熱痛以祛風清熱治之。虛火痛以滋水降火治之。爛牙痛或鑲補回爛牙。或將牙除去之。

(一)虛火牙痛外含方 用甘草。桔梗各三錢。白醋半斤煲滾溫含口內。其痛自除。

(二)牙痛外含方 治一切牙痛症。用竹蜂二隻。甘草。黃柏各二錢。木鼈

(二) 子。殭蠶各三錢。細辛一錢。綠豆一兩。共煲水四盅含口內。加金鎖匙。狗頭蒲根各一兩。大孝麻根二兩。共煎含更妙。

(三) 風火牙痛外搽方 治牙脚腮腫痛。用紅棗十箇(開)。夷茶末一錢。入於紅棗心。煨存性爲末。搽牙肉患處。不久吐去潺而癒。加向日葵根五錢。共煨更妙。

(四) 牙蟲爛牙痛外搽方 因一時不能脫去。以止痛爲先。用鹹欖二錢。煨存性。硃砂一錢。牙硝一錢。硼砂一錢。雄磺七分。梅片一分。麝香二厘。共爲末點少許於痛牙處。或加樟腦冰五厘。哥羅方水一滴。和勻點之。其痛立止。

(五) 牙蟲爛牙痛含口方 用枯礬。朴硝。石榴皮各一錢。胡椒二分。鹹油。柑子四箇。鹼水五分。白醋一兩。清水四盅煎滾含口內。久之吐去。

(六) 牙痛丹(外點用)。用樟腦片一錢。甘草五錢。細辛五錢。鹽一兩。用碗二箇。將藥在碗內。以熟石膏粉開水封固。不使洩氣。加油火升半

時許。取碗邊之丹搽搽點牙痛處而癒。

(七)脫爛牙方 用正蟾酥。細辛。葶撥各三厘。鯽魚骨一分。用瓦焙乾。玉簪花一分。共爲末點爛牙處取脫。或加曲見二厘。用脫牙鉗拔之。止痛較妥當。

(八)未於用鉗前。先以利針刺之。試其局部經麻醉否。如仍有知覺。加多的藥可也。近日局部注射止痛藥水。用施手術爲妙。經脫去牙後。以鹽二錢。開滾水一斤。頻含口內。血自然止。切不施用壓迫止血藥。免發生後患也。

(說明)牙痛爛牙病。多因不潔。垢積蝕爛牙半心而起。如平時早晚用牙齦。或炒鹽末洗擦牙。可杜牙病於未然也。

第九章 舌

舌爲心竅。舌中出血。舌紅腫爛。主心火熱。舌邊爛及有花點像。主虛火或小腸生積蟲等。

(一) 舌霎時腫大塞滿喉。立即氣絕。此因心火暴熱與外風相撞而生。或食生菓
毒。菓傳染蜂蛇毒所致。外搽方。用鏤底煤(即百草霜)三錢。白醋三兩。開
搽舌上下即消。

(二) 舌下出舌。名出雙舌外敷方。用蕃薯藤一兩。地珠仔十箇。黃片糖五錢共
搗爛敷之。先用麻糖雞屎煑熟點之。另用蒲黃一兩。煎水含口內。數日自
縮。

(三) 舌上無故出血外搽方。用槐花五錢。扁柏一兩。共炒黑爲末。搽之而止。

(四) 乳子舌白胎症含口方。此症久而不治。必發重危症難救。每於月內嬰兒。
不可不注意。用石榴皮一錢。蚊仔花樹二囊皮一錢。山茜一錢。江南臭
草五分。硼酸二分。煎水頻洗口舌自除。另食徐仁甫沆瀣丹數樽。永無復
發。

(五) 舌黑症內服。此肝風大熱症。用生駁節草(即生木賊)半斤搗爛。滾水沖服
之立癒。

(說明)舌腫實名爲木舌。皆陽毒熱症。用徐仁甫沆瀣丹。通治木舌諸腫痛症。或該丹不便。可用犀角地黃湯治之。方見上冊。

第十章 喉

喉爲肺門。肺氣燥。喉自乾涸。如陰虧津液不能上升。肺喉多生紅白痧。雙單鵝喉。瘰肉喉痧等。治法無不養陰清肺爲主。關於內服方法。可參上冊喉痧對治。

(甲)紅白喉痧症。初起喉痛。週身發冷發熱。頸腫多口水泡吐。滿口喉紅白痧點痛腫。飲食困難。久之潰爛成塊。名爲喉痺。或結瘡膿如鵝。一隻爲單鵝。兩聲腺內均有。名爲雙鵝。治用內服外搽收效爲速。

(一)內服方用養陰清肺湯。治一切喉痧症。用生地一兩。元參一兩。麥冬六錢。川貝四錢。薄荷三錢。丹皮三錢。白芍四錢。甘草三錢。加竹蜂三箇。水二盅煎同一盅溫服。日二服以癒爲度。

(二)紅白喉痧外吹方。用冰硝。梧桐淚。人中白(煨)。雄磺精。川連各三

(一) 錢。大梅片二分。江南臭草二錢。地蝦十隻(煨)。共爲末吹入喉痧處。隨吐膠痰。連吹多次。如見有痛及血來。亦無礙也。

(二) 紅白喉痧外含方。用蒲黃二兩。馬鞭草半斤。煎水三盅。頻含口內。久之即吐去。連用多日癒。

(四) 雙單鵝喉外吹方。用硼砂。青黛。薄荷。人中白(煨)各一錢。白礬。雄磺各七分。山豆根二錢。梅片。硃砂。蟾酥各二分。元胡五分。共末。用皮節吹之。加木槌子(煨)五分。黃瓜霜四分。地虎(煨存性)。竹蜂(煨存性)各一錢更妙。雖喉腫急危。立可挽回。

(五) 雙單鵝喉外含方。用生地五錢。元參。麥冬。黃芩。黑枝。連翹。射干。山荳根。牛蒡子。柴胡。殭蠶。桔梗各三錢。煎水頻含口內。吐清膿血而痊癒。內服本條第一方合。

(六) 患鵝喉穿爛久不埋口外吹方。用川連。人中白(煨)。青黛。甘草。山荳根。枯礬各三錢。雄磺。枯硼砂各一錢。牛黃。梅片。血珀。珍珠。

末。硃砂各二分。麝香五厘。鵝喉一條（煨存性）。共爲末。用皮節吹之。頻吹之。去腐生肌而癒。

（七）鵝喉穿爛久不埋口外含方 用桔梗。甘草。陳皮。山荳根。鬱金。防風。薄荷。元參。牛蒡子。烏梅各三錢。鵝不食草一兩。黃糖五錢。共煎水含之。流清瀉毒而癒。

（八）在口吐血不止內服方 用黨參一錢半。丹皮（炒黑）二錢。荆芥二錢半。共爲末。每服一錢半。滾水沖服立止。可參上冊吐血門治之。

（乙）喉生瘰肉。在喉內中凸起。飲食不便。卽施手術。並以外吹塗藥治之。

（一）喉內生瘰肉外塗方 用針刺破。令瘰肉出血。以鹽一錢。豆豉末二錢塗敷之。

（二）喉生瘰肉吹方 此方並治嬰兒鎖喉風。嬰兒三朝七日。不思飲乳者。

喉中作腫。風痰塞喉。名爲鎖風症。用全蝎尾（酒炒）。川烏尖（製）。

甘草各六分。僵蠶（炒）。牛黃各二分。蜈蚣一條（去頭足）酒炒共爲末。

用皮節吹入喉中。瘰肉消而癒。

(三) 喉起紅腫聲沙。或久咳聲沙亦可。內服方用杉木炭一兩。白糖五錢。

滾水沖服。如無杉炭。薑炭代之亦得。

(丙) 喉為骨物硬。骨物硬喉。因老人無牙。或小兒食物過快。未經咀嚼所致。

(一) 骨硬喉內服方 治一切骨硬喉症。用鷄內金(煨)。威靈仙。草菓。象

牙。烏欖乾(去核)各三錢。共為末。每服三錢。黃糖五錢。滾水調

服之。

(二) 猪魚骨硬喉方 用鯉魚骨煨灰五分。白

糖三錢。冷水開服。加貫衆煎水沖服。


盡力一咯而去。

(三) 骨物硬喉含方 用仁檢七箇(切)。酸梅

七箇。煎水頻含喉內。骨物自出。

用皮節吹藥法。先將藥散插入皮節口內

第 六 圖



復置皮節嘴向正患處。以手指掐皮囊。吹藥到患處。經掐時。不可遽鬆手指。否則吸水氣毒入囊中。必須拈出口外而鬆指。如此圖是也。

第十一章 鬚髮

鬚髮是血之餘。少年氣血強壯。鬚髮黑而潤澤。外治必須內服補氣血者。方為有效。

(甲)(一)固髮鬚不落外搽方 用甘松。扁柏。金銀花。苦楝皮各四錢。茶油四兩煎百滾。外搽鬚髮潤黑不脫。

(二)鬚髮黑潤快長方 用何首烏半斤切片。汾酒一斤浸之。每早晚搽髮鬚。黑潤光澤。

(三)鬚髮黃內服方 用鹿茸一錢。雞肉四兩。淮山二錢。水一盅。酒少許。共燉食之。如素來血虛者合。最便服徐仁甫壯元丹。每早晚服一錢。連食多罇特效。

第十二章 頰

腮頰脹痛。因脾胃積熱。及素實火臟者患多。如小兒食煎餅油炸魚蝦肉品過多而發。俗名頰脹痛。疥腮是也。治內服疏風散熱。外以敗毒藥敷之而癒。

(甲) 頰脹疥腮初起洗敷之。如已穿爛托毒生肌爲要。

(一) 頰脹疥腮內服方 此方治疥腮初起疏風散熱消散之。用防風。荆芥。羌活。甘草各二錢。連翹。牛蒡子。金銀花。蒲公英各四錢。水三盅。

(甲) (一) 煎同一盅溫服。

(二) 疥腮脹爛內服托方 治疥腮爛穿。流膿血不埋口。用黃芪。金銀花。

甘草各三錢。穿山甲。金蟬蛻各一錢。水煎服。

(三) 疥腮脹痛外搽方 用赤小豆末一兩。青黛五錢。白醋二兩。開塗患處。

卽消。

(三) 疥腮外洗方 用豬頭骨半斤。鹹酸棗四兩。酸味草四兩。煎水溫洗患

處止痛立消。

心(說明)如腮脹潰爛。或用上方不能見特效。須向上牙痠各法參考治
(丙)難言之。盛開。...

第十三章 頸項

頸項爲頸部大腦血管通流之樞紐。諸陽氣之所宗。不論患陽瘡陰瘰癧。當須注意。卽陽瘡所患對口髮脚瘡。每失調理。因潰腐腦血管。流血不止而致命。又如陰之結瘰癧。求治速癒。亦不易也。

(甲)對口髮脚瘡。患於頸項髮脚。名爲髮脚瘡。在頸背凹中名爲對口瘡。初起一小粒。癢痕而腫。經日許生白膿頭。其人發冷發熱。作渴舌黃。瘡見疼痛。如不識調理。數日項腫非常。化爲膿毒惡症。多因起食燥熱煎炒蝦蟹牛肉狗肉。動其脾胃之火而發。治內服解毒。外敷拔毒藥。勤勤換貼。方可見效。切勿因循自悞也。

(二)髮脚對口瘡內服方 用金銀花二兩。薄荷一錢。海草二錢。水二盅煎

(一)回半盅服。

(一) 髮脚對口瘡外敷方 用金銀花葉四兩。黃片糖一錢。共搗爛敷之。

(二) 髮脚對口瘡外敷方 用生半夏二錢。生南星二錢。梅片二分。白礬五分。沙鷄七隻。石灰五分。共搗爛敷患處。

(四) 手術 先將此疔刺去。或照上馬咀疔熱鐵灸之。以灸壞疔毒頭。免其蔓延。而後敷上各藥可也。

(乙) 頸生癰癤。多因食熱物而起癰癤者。

(甲) (一) 頸癰外洗方 用蛤屎屨二兩。蛤蚧藤二兩。馬蹄匣二兩。煎水洗之。

(二) 頸癰外搽方 用鷹毛(煨存性)爲末。開茶油搽癰處。

(三) 頸癰外敷方 用猪屎豆葉。鬼燈籠。牛萬藤。白麻頭各一二兩。共搗爛煑熟敷之。

(說明) 本冊另有專科治療各法。可向本冊癰癤科參考治之。

(丙) 鎖頸蛇。過頭蛇。因心燥皮膚熱。或臨近樹木被絲蟲蝟螫毒發者。治用清心退熱。殺菌清血藥。敷洗之而癒。

(一) 鎖頸蛇過頭蛇初起外灸法 初起有一紅線。以蒜片。貼在紅線頭尾處。面用艾火燒之。該紅線縮散。

(二) 鎖頸蛇過頭蛇內服方 用燈心二錢。連翹四錢。金銀花四錢。水煎溫服。

(三) 鎖頸蛇過頭蛇外洗方 用過塘蛇二兩。赤小豆(打)一兩。青黛五錢。水煎洗之。

第二篇 中部

第一章 肩

瘡癩毒瘡。生在肩中。因苦力人。擔挑紅腫。血瘀積結化膿而成。不識治理者。連肩前後生之。蔓延日久不癒。

(一) 瘡癩毒瘡外洗方 用川槿皮。海桐皮。五倍子各五錢。蜂巢三錢。滑石一兩。共煎水洗之。


(二) 瘡癩毒瘡外敷方 用老松香二兩。雄磺三錢。黃澤鹹魚煨灰一兩。以猪油

黃熱搽之。或用茶油開搽之亦可。

第二章 手腋

手患瘡毒。有因食狗牛死畜等肉而發。有因手指不潔淨。染着菌蟲毒。及損傷口感受各菌毒附殖者有之。治用殺菌消腫毒藥對治痊癒。

(甲)蛇頭纏指。生於各指頭節。初起積瘀節中。引心刺痛。久之瘀血化膿。若不治理。其指節腐爛斷去。如毒蛇咬一樣。初起時查明其毒頭以針刺去瘀血。加藥外敷之爲妥。



第七圖

紮指法。將敷藥用隔水臘紙貼妥。後用繃帶在藥面紮之。繞紮多次。復紮於手腕。免其鬆脫。如此圖是也。

(一)蛇頭纏指外敷方一 用川連末。硃砂末。雄磺末。黃丹

末。白芨末。白斂末。五倍子末。白丑末各五分。猪膽汁一箇開敷之。

(二)蛇頭纏指外敷方二 用良薑。白芷。甘草。白菓各三錢末。蜈蚣二條。塘虱魚一尾。共搗爛敷之。如已穿爛。先用田螺一箇去靨加梅片於田螺肉內。以火燒之。由田螺尾滴出之水搽於患處。而敷此藥較好。

(三)生於指節箝中紅腫外敷方 俗名生蝦鉗地穀瘡。用地穀草。火秧筋囊。田基王。赤小豆。綠豆各一兩。黃糖五錢。共搗爛敷之。

(四)蛇頭纏指穿爛外洗方 用上肩部第一方合。

(五)生蛇而在內起一紅血線。患在手足均有。痛楚難堪。名爲紅線疔。其紅線直衝至心。其人昏迷難救。治法。先用燈心火燒上部紅線所至處。卽用塘虱魚多尾。川百足四條。雄磺。硫磺各一錢。共搗爛敷之。立卽止痛。紅線自除而癒。


(說明)手指甲藏垢。最易發生蛇頭纏指。及腫毒膿瘍。手指甲除至不

能藏垢。係手指衛生也。

(乙)手掌生鵝掌瘋。此症生於手掌。痕癢入骨。狀如紅癬。每患多年不癒。或於冬隱藏不發。一到春夏紅腫不已。治用砒毒外攻之。方可痊癒。

(一)鵝掌瘋外搽方 並癩蟄面癢症。用信石末一錢。硫磺五錢。猪油一兩。開。以布包之。用火燒熱外熨患處。連熨至癒為止。但此熨過之藥渣。不可拋棄水塘中。免毒死魚蝦。至好深埋土中。用時格外仔細。切勿誤食入口為要。

第八圖



曲池手曲紮法 先將藥貼妥。以繃帶頭紮多次。以實為度。紮完將繃帶尾破開為二分。一分反向覆結束之。如此圖是也。

(丙)手較生瘡。一名曲池瘡。每起紅腫結核疼痛。或因癩痘餘毒而成者。治需

內服外敷之。

(一)曲池生瘡內服方 用地丁。連翹。夏枯草。花粉。生地。紅花。歸尾

各二錢。水三盅。煎同一盅溫服。

(二)曲池瘡外敷方 用過天螭。天吊香。

蒲公英。大天紅。馬齒莧各等分。共搗

爛敷之。外洗用上肩部第一方。

傷手安定紮法 手部患傷痛等。以三角

巾。或闊布帶。將手回放於內。兩帶頭

左右交結紮於肩項處。則手安定。如上

圖是也。

第九圖



(丁)夾腋起核疼痛。此症多因食鯉魚蝦狗肉死畜中毒而發。每發夾腋中生瘡。

一經痛腫成膿穿爛。治之甚難。因此處部位。常於動作。埋口不易。診有

此症當以實報告病者知之。經久時間。方能治癒。

(一)腋瘡內服方 治夾腋起核疼痛。用夏枯草。金銀花。乳香。生花。海草。蒲公英。桔梗。川貝各三錢。水三盅煎回半盅溫服。

(二)外敷方 用上曲池瘡第二方敷之。已穿爛者。用徐仁甫白藥膏貼之。

(三)腋瘡初起作痛外敷方 用牛奶樹葉

四兩。黃糖二錢。生蒲公英五錢。

犁頭草五錢。共搗爛敷之。

腋傷繃紮法 先將藥貼妥。將繃帶

紮於肩上。反引帶於左腋下過背多

次。紮完將帶尾以扣針扣之。如十

圖是也。

第十圖



第三章 乳

乳瘡多因乳子啼哭。口氣吹入乳房。或初生兒。乳房腺未通。乳結不消。紅腫化膿。名爲乳瘡。如寡婦鬱怒氣結成如核子。經多年時間。漸大腫痛而潰爛。

此名爲乳癰。由陰分肝血虧損而發。多患於五十歲左右之婦人。調治甚難。

(甲)乳瘡因少年新產。乳房腺未通。或乳子啼哭吹氣於乳房而生紅腫。治法內外並用之。

(二)乳瘡內服方一 治乳瘡初起紅腫。用生蒲公英二兩搗爛。酒沖服。或用水翁樹葉四兩搗爛。煮酒溫服。

第十圖



乳胸部瘡傷紮法。先將藥敷貼妥。以繃帶紮傷部。引行左肩交於腋下過背。反覆紮妥爲度。完時將帶尾。以扣針扣之。如十一圖是也。

(二)乳瘡內服方二 治乳瘡已潰。將破肌膜。以川白臘一錢。白礬一分。爲丸酒送服。以護膜不穿。並能止痛之奇效。

(三)乳瘡內服方三 治乳瘡已潰。去毒生肌。用金銀花。白芷。生芪。川

貝。甘草。蒲公英各三錢。山甲(炒)一錢半。水二盅煎回半盅服。

(四)乳瘡外敷方 治乳瘡紅腫痛。用蒲公英。血見愁。獨脚烏白。山白菜。狗耳苓。霧水葛。刀鞘豆葉。假荷蘭豆。水蕉各一兩。共搗爛加入天仙子。黃糖。生南星各二錢。梅片。乳香各二分。川烏。沒藥。山茨菇。木鼈子各五分。牛黃二分。此味如不用亦可。共搗爛煮暖敷之。

(五)乳瘡外敷方 因有乳子食乳。其乳汁不通腫痛症。用蕎頭一兩。葱白五分。黃糖五分。蜜糖二錢。草決明葉二錢。如無生葉(用核代亦得)。筋矮瓜二兩共搗爛。先用山甲一錢。鼈甲一錢。爲末開酒搽之。而敷此藥合。

(六)乳瘡外敷方 既穿成癰生瘡。有惡臭腐膿者。先用鷄蛋二枚。馬齒莧三兩。煮熱取氣薰洗之覺癢。另用烏蠅十個。螳螂二個。無花菓(即牛奶樹葉)四兩。酒糟二錢。煮熱敷之。如瘡有疽蟲。加青黛一錢。

筋竹筍五錢。牛鉅菜。矮瓜葉。大王勒葉。含鋪柏菴。陳皮。白芷各二錢共敷之。

(七) 乳瘡已穿生肌方。已穿敷上藥去清毒。外搽搽藥。用甘草末一錢。麝

帽灰五分。白益母草五分。硫磺五分。梅片一分。白芷五分。白蠟一

錢。共末搽之。另用徐仁甫白藥膏搽之。收功痊癒。

(八) 手術乳瘡成膿。檢正瘡頭。以銀針放開。未施針前。先用曲見。大

梅片各二分。開水搽止痛。

第四章 心 胸

心胸痛者。多因胃與心包絡痛。內治用散瘀止痛藥無效。改用清胃養血者立癒。對於內治法。除此方外。可參上冊心痛門。其在心胸部所患之外科症。除外科敷治者。亦須內服藥爲安。

(甲) 心痛者。非心痛也。如真心痛者死。其痛多因氣鬱血結。間有血虛寒痛。若關鬱者散之。虛者補之。痛自除矣。

(一) 心氣痛內服方一 因鬱結而成者。用香附二錢。蘇葉一錢半。炙草一錢。陳皮一錢。元胡三錢。水煎溫服。

(二) 心胸瘀積痛內服方二 因苦力工人用力過度。或關於跌打而致。用田棗。香附各一錢。元胡。鬱金。五苓脂。武夷茶。百草霜各一錢。共爲末。每服二錢。滾水沖服。或加酒一杯和之更妙。

(三) 心痛欲死內服方三 因胸血凝作瘀。其痛甚劇。瀉之立除。用巴豆霜二分。川芎二錢。薑黃。元胡各三錢。共爲末。每服二分。料酒送服。得瀉痛止。

(四) 心吊痛內服方四 治走乳下沖心。其痛連綿不已。因胃積化而成。用柿蒂二錢。紅囊柚皮。黃皮樹寄生。檳榔花。蘇木各三錢。瘦豬肉四兩。共煲食之。或用猪小肚煲。能治小腸氣痛症。

(五) 小兒胃痛內服方五 並治大人諸心痛。用薑黃末一錢。大糯米四兩。猪心一箇切開。共燉食之癒。

(六) 在心大痛名爲吊心蛇內服方六 用黑節關二兩搗。滾水冲服立止。若無此味。改用沙薑炒黃五錢。酒浸片時温服。

(七) 痰濕流注胸膈作痛內服方七 用辣蓼薑二錢。蒜頭。白芥子各一錢。水煎服。

(說明) 有人患胃痛八九年。不能痊愈。用生椰子二箇。取回原水。加鷄項肉一隻。龍涎香二分。連燉食多次而癒。此因血虛胃弱所致。用鷄能補肝血。龍涎香能壯元行氣。椰子能清肺胃。肺主大氣。肺清大氣立轉。其積結遂通。痛自除矣。

第十圖



心胸及乳部繃紮法。三角巾之用。用途甚廣。無論何部所傷。

皆合用。而心胸部用之最便。用法先將藥敷貼妥。將巾蓋於上。以一

角引於肩上。兩角平紮於身部。各巾尾紮於背中心。如心胸傷過闊者。以吊帶闊布平法紮之。如十二圖是也。

(乙)在正心胸生一紅肉墜下。觸之痛如刺心。此名爲井心疽。若在心胸紅腫潰爛出膿水。名爲連皮蛇。若紅腫成箇化膿者。名爲胸瘡。治法分別於下。

(一)井心疽外治方一 用白降丹五厘。大梅片二分。共爲末。加桃膠水。或用漿糊代之亦得。以棉花細線浸之陰乾。以此線紮於井心疽近肉處。外用本冊一篇耳部戊第二方藥外敷之。連敷多日。此墜下之細肉疽自脫。用徐仁甫白藥膏搽之痊癒。

(二)心胸紅腫潰爛出膿水連皮蛇。多年不癒。外搽方二。用本冊第一篇頭部辛第二方藥洗之。另用鯉魚二尾。車碌繩。舊帽氈各一兩。共入瓦盅煨存性。加大梅片五分。共爲末。開茶油搽之。或用徐仁甫白藥膏開藥更妙。

(三)心胸部生結實紅腫瘡外治方三 用本冊第一篇頸項部甲第二藥方。加

赤小豆末二兩。滾水開敷之。

(四) 心胸紅點痕癢非常症外洗方四 用枯礬。膽草。苦參。蛇床子。檳榔。

蘆薈。防風。荆芥。石榴皮。五倍子各五錢。共為末。每次用五錢。

以滾水一斤。沖洗患處。

(五) 心胸肺脹。及內臟腑痛外敷方五 用天仙子四兩。元胡。甘菊各三兩。

側柏葉三兩。共末滾水開敷痛處痛止。

第五章 肋脇

肋脇主內臟應肝。肝鬱肝燥瞋怒。皆足以令其結核成瘡瘍。如寡婦因鬱極而生。

初起如豆。多年而大。久之抽痛腫脹。名為脇瘤陰疽。治法可查下陰疽門。

脇生癰瘡。多因喜食蝦蟹鯉魚牛肉狗肉等。瘡狀上高下深纍垂。如瞽目。其中

帶青。瘡頭上露一似舌。毒孔透裏引痛不已。

(一) 脇癰瘡外敷方 用生在井蛙皮數隻。火煨存性為末。如蜜糖清水各半調敷

之。

(二) 肋脇結核。又名扳棋核。生在腋中。治法可參上腋部各方。用矮瓜（即茄）不論紅白色二箇。搗爛敷之。

(三) 肋脇生黃蜂巢外搽方 此症各部均有生。其腫穿爛如蜂巢一樣。千百孔眼流膿水是也。先用絡麻濕油火燒烟薰患處。另用黃糖二錢。蕃薯葉五錢。鹽一錢。烟葉五錢。共搗爛敷之。連敷多次。加蜂巢二兩（煨存性）爲末。開茶油搽之收功。

（說明）肋脇之綳紮法。可參本冊十圖及十一圖是也。

第六章 背

人身背脊。應陰中之陽。嗜酒家與食燥熱蝦蟹狗牛肉等。多發生背瘡。其瘡生在兩肩下。用自扳到之處而生。名爲背搭瘡。生正背脊者。名爲背癰。癰穿潰爛。經久不癒。四邊反開如花。名爲背花。周身起泡穿爛。名爲過身蛇。療治法如下。

（甲）背搭瘡。生在肩下。自手扳到之指尾處而生。初起紅腫結實如核。觸之甚

痛。其人發冷發熱。敷托不散。化膿成瘡。

(一)背搭瘡初起紅腫內服方 用穿山甲。皂刺。歸尾。草節。赤芍。花粉。白芷各一錢。熟沒藥。熟乳香。防風。金銀花各一錢半。水二盅煎。同半盅溫服。

(二)背搭瘡外敷方 用籐竹筍二兩。葶麻子。霧水葛。磨熨草各一兩。黃糖五錢。無花果葉。生酒糟各三兩。共搗爛煑煖敷之。

(三)背搭背癰背花外洗方 用松樹皮一斤。苦參四兩。共煎水。敷藥前後洗患處。殺菌去毒易癒。如臭惡者。可加熟礬砂五錢。

(乙)背癰背花瘡。起時與背搭瘡同。內服方亦可同用。此瘡一經潰爛。臭惡難聞。滌洗須勤。

(一)背癰背花瘡外敷方 用甘草末五錢。大梅片二分。紅藤菜十兩。名大薯無紅用白代之。共搗爛煑煖敷之。不久痕癢非常。不可速去。約多時去之。以上方頻頻洗之。內服方可用背搭瘡方。

第十三

第三十圖



背部繃紮法。將繃帶過肩左右交繞。兩邊反迴腋脇。連繞多次。帶頭用扣針扣之。即十三圖是也。

所到。即生紅泡點。泡點穿流水潰爛。痕痛不已。內服用上背搭瘡方。

(二) 過身蛇外洗方 用五倍子。枯礬。金銀花。羌活。蒼朮。黃柏。荆芥。槐花。知母。草節。黃芩。吳萸。連翹。獨活各三錢。水煎洗患處。

(二) 過身蛇潰爛外搽方 用水蛇皮(煨)。鳳凰衣(煨)。青皮。大風子。水銀。天龍骨各三錢。雄磺四錢共為末。生豬油以火燒出油開搽患處。

第七章 腹

腹是胃腸之所藏。胃腸之病甚多。如胃腕積痛。胃弱隔食等。腸中之發炎。名

爲絞腸痧。腸內膜腫名爲水蠱脹。腸受染痢菌名爲腸癖。腸中乾枯名陰病津枯腸結。胃腸內之主治。當參考上冊內科。如腹之皮膚結實。經久不散。名爲腹膜瘤。當臍紅腫流黃水名爲臍癰。在腹結痧。能行動者。名爲血龜。環臍左右上下成條實者。名爲黃癆。實而不痛。漸漸增大而爛。名爲陰疽。諸種病之所發。無須因氣血虛弱。飲食不合衛生得來者也。

(甲)腹中蠱脹。因腸內膜蓄水不去者。或有因兩腎腫脹。中部之液失去轉運作用。水停其中發脹。名爲腎水脹腫。蠱脹之對治先用下藥瀉之。繼用補劑助其元氣。切不可長施下藥而傷其陰。關於腎水腫。瀉後用利小利壯元陽方法收功。有因脾受濕脹。兩眼白睛成黃色。名爲脾水腫。治用健脾利小便爲妥。

(一)蠱脹內服散 治腸膜裏水而蠱。服之作瀉多次。用甘遂。木香各二錢。萊菔子。大腹皮各三錢。共爲末。白粥送服之。

(二)蠱脹內服丸 治蠱脹大便結。小便短少。經久不消。用胡椒。牛黃。

巴豆霜各一錢。木通。木香。益智仁。青皮(醋炒)。川椒。連翹。黑牽牛。大黃。枳殼。甘遂(麩炒)。陳皮。桑白各三錢。葶藶。春砂仁。朴硝各二錢。共爲末。用米粉米醋糊作小丸。如綠豆大。每服二分。早晚一次。服之連瀉黑屎合。

(二) 蠱脹內服丸 治胃積痰成蠱。用山楂一兩。茯苓。半夏。神朮各三錢。陳皮。連翹。萊菔子各二錢半。共末爲小丸。每服一錢半。白粥送服。

(四) 蠱脹內服方 治脾濕成蠱脹。法用健脾利水藥。其蠱漸消。用厚朴。木香。白朮。薏米。熟地。川芎。木瓜。牛棗。萊菔子(炒)各二錢。白芍。春砂。茯苓各三錢。水二盅煎回半盅。空心溫服。

(五) 蠱脹內服方 治結恭蠱脹。連食七八天。其脹自除。用紅心蕃薯半斤。黃糖一兩。共煲食之。如周身腫脹。改用米醋煲薯食立消。

(六) 蠱脹外蒸薰方 治諸蠱脹久不消散症。用大田螺七隻。葶藶子(打)五

錢。川麝香二分。共搗爛敷臍中。外用布紮緊。另用老墻泥二斤。生火炭母二斤。共煎水入新塔中。去禪坐而薰之。每日一二次。得大便通流。其脹自消。

(七) 腹蠱內服方 治因誤食生菜水蛭。及食豬牛魚肉。發生蠱蟲水蛭。腹大如孕。用貫衆一斤。檳榔半斤。煎水溫服。其蟲蛭由大便疴之而癒。

(說明) 食豬牛魚能患蠱蟲。因牛食草中蠱蟲。增殖於牛腸。該蟲鑽穿腸而入肌肉。發生許多卵子於肉中。此蠱蟲卵子。在牛體不能發育。一經人食牛肉帶卵子入人腸胃。即行發育。其頭有一吸盤。吸住腸衣。其長一丈八尺不等。每經成熟老時。在蠱蟲尾脫去。每脫一截。藏有卵子甚多。魚食人屎。即如牛一樣。在猪肉之蠱蟲。其頭有二鈎。向腸衣鈎住。名曰鈎蟲。凡食肉菜蔬品。必經煮熟。可防患此蟲也。

(乙) 腹患血龜症。因跌打積瘀。或婦人經產瘀血不清。或寡婦鬱極閉經。及誤

食生菓藏有蟲毒。結生於胃腸中。而成如龜樣。動走於腹中。名爲血龜。

治法多用攻破之劑。

(一)腹中生血龜能行動走內服方 用防風四兩。水母四斤。赤芍。巴戟天各六兩。用水十二斤。煎回一斤半。空心溫服。服之腹中作痛。血龜瀉出。

(二)腹患血龜內服方 初起心痛。早晚加劇。覺有物行走。用土狗二十隻(炒熟)。白鵝血。豬血各四兩。人中白(煨)三錢。酒水各半煮食之。大便疴黑塊合。

(三)腹患血龜內服方 因血龜結久不散。以此方服之龜化水。用白馬尿五錢。空心服之。另每日食馬蹄一二斤。其毒由大便瀉之。

(四)腹患血龜內服吐方 因血龜在胃。不能下之。用茶枯頭(炒香)四兩。煎水溫服。即將血龜吐出。若不吐加白礬二錢服之即吐。

(丙)腹痛症。在胃痛者。多因食積不化作痛。名爲胃腕痛。在臍右邊痛。多因

肝氣不舒作痛。名爲肝氣痛。在臍下橫腸痛。因腸結熱作痛。名爲絞腸痧。小腹吊痛。多因膀胱結熱作痛。或素患疝氣應而作痛。名爲吊氣痛。治法分列於下。

(一)腹中胃腕痛內服方 因胃有積結作痛。用百合。羊草結。建蓮。橙皮。薄荷各五錢。木香一錢。水煎溫服。

(二)腹中臍上作痛內服散 治男女老少諸痛症。用海螵蛸一兩。蛤粉五錢。青黛。朴硝。陳皮各一錢。木香二錢。硃砂五分。共爲末。小兒加白糖一錢。滾水沖服五分。大人加酒一杯沖服二錢。其痛立止。

(三)腹中痛內服丸 治男女老少諸肚痛。用防風。荆芥。天冬。麥冬。赤芍。陳皮。蘇子。半夏。大黃。獨活。蒲黃(炒)。香附。鬱金。薄荷。天麻。茯苓。蒼朮(鹽水炒)。良薑。白芍各二錢。共爲末。煉蜜作小丸。每服一錢。小兒減半。滾水送服。或用酒亦得。

(四)腹小肚吊痛內服方 因肝脾受濕作痛。用白花丹二兩。遠薑一錢。猪

(四) 脾肉四五兩。共袋食之。如無遠薑(即冷飯頭)單用亦可。

(五) 婦人肚痛內服方 治一切肚痛症。用羌活。陳皮。青皮。白芍各一錢。甘草六分。木香。沉香各三分。生薑一錢。水煎溫服。

(六) 小兒蟲積腹痛內服方 因小兒食物過雜。而生蟲積作痛。用苦楝根二。囊白皮一兩。黃糖五錢。共煎水半杯服。先以鷄蛋與其食之。蟲聞香味則舉頭吸食。約小時與上藥服。蟲由大便瀉下。其痛自除。

(七) 腹痛疴嘔抽筋內服方 治霍亂抽筋肚痛。應驗神效。用蒼朮。藿香。柴胡。神朮。澤瀉。木通。羌活各二錢。茶葉三錢。葱頭二箇。共爲末。加白公煙八厘。蒜頭炭六厘。沙紙化灰一錢。清茶沖服即止。

(八) 腹痛絞腸痧內服方 因腸中絞痛。指甲黑色。名爲陰痧症。用芋頭去皮二兩生食覺有甜味。其痛立止。另用烏白葉半斤。煎水沖鹽五錢服。一吐即鬆。如見抽筋劇痛。用烟斗筒油水二厘沖滾水服立止。此烟斗油切不可多服。以免醉之患。用時留意可也。

(九)腹痛絞腸痧內服方 疴嘔唔得出。不知治法立斃。卽用生鹽五錢炒紅。加童便四兩調服。取吐卽鬆。另用樟木子一兩。木瓜一兩半。煎水溫服。可參上冊霍亂門治之。

(十)小腹小腸氣痛內服方 因小腸受風。芋與附子同。能祛一切之風。僕芋有毒。用時先滾過泡頭次水。經六七時之久煎則無毒。不可苟且服食。否則喉痕癢腫大。誤者以生薑汁水飲解。用僕芋去皮切片半斤。瘦猪肉半斤。以水七斤。煎回半斤溫服。久年小腸氣痛。連食多次可癒。

(丁)腹中臍上下左右結實不散。按之堅痛。名爲黃癆。可參上冊癆門。腹皮紅腫化膿。名爲腹瘡。當正臍中腫痛。名爲臍癰。治法列下。

(一)腹中實痛外敷方 此患因喜食魚蝦鹹魚發毒。名爲黃癆。用鬼燈籠。牛萬藤。白麻頭。猪屎豆各四兩。搗爛敷患處。見痕癢漸消。內服參上冊癆症門。此方並能敷散癰核之用。

(說明)此牛萬藤一名大茶葉。又名苦搯藤。毒藥也。用時切勿入口。誤食即斃命。解法用白礬一兩。煎水服之吐清。後以花生油四兩飲之可解。該方散肌肉結核。屢試特效。

(二)臍癰腹瘡外敷方 治在臍中腫流黃水。及腹瘡膿。有膿即流清。無膿亦消。用赤小豆二兩。白芫三錢。天花粉一兩。黃柏三錢。共爲末。生酒糟一兩。煑煖敷之。

第八章 腰

腰內臟應腎。腎受濕腰疼痛。身不能轉側。腰左右結實。紅腫者爲腎熱發癰。如結實不紅痛而腫。久則大如冬瓜。其色藍紫。此是腰疽。癰屬陽疽屬陰。陽者可用清散藥。陰者當以補托藥。診時不可不留意焉。

(甲)腎受濕腰疼痛。其病狀如腰帶重物。臥床身不能轉側。因其人喜食生菓。或麪酒蝦蟹者所發。

(一)腎受濕腰疼痛內服方 用熟薏米二兩。白朮一兩。茯苓五錢。水煎溫

服。

(二)腎氣虛腰痛內服方 用杞子一兩。杜仲二兩。小茴香二錢。瘦豬肉半斤。水四盅煎回半盅。加酒一杯沖溫服。

(說明)腰部疼痛。多因濕着腎而生。疼者酸痺之象主陰。痛者如刀刺之象主陽。兩字貫用原因。腎主內臟屬陰。腰是一身柱幹。其人坐臥定。祇見酸痺。一經行動。支持人身上部之重而發痛。此處用痛字。非作陽症解。亦不可因其移動之痛而施寒涼藥。可參上冊脈理主病爲斷。

(乙)腰左右結實。紅腫刺痛。是生癰瘡症。內服用手部丙第一方。外敷用背部乙第一方。


(丙)腰左右結實。不紅痛而腫。名爲疽。多患於寡婦因鬱結閉經。氣血凝滯所發。內服陽和湯加減。外用散毒藥敷之可癒。疽本虛而生。切忌施刀割。誤割破流血。更爲損傷。則療治埋口極難。祇可施藥敷之。腫毒由毛管化

黃水滲出可癒。

(一)腰患陰疽。腫大如瓜柚。內服陽和湯。用熟地一兩。麻黃五分。鹿角膠三錢。白芥子二錢(炒研)。玉桂一錢冲服。生甘草一錢。炮薑炭五分。水三盅煎同一盅。加鹿膠溶化。玉桂另用滾水冲先。再加上藥湯調和溫服。

(二)腰患陰疽外敷方 治疽腫大如瓜柚。用麝香二分。鷹毛(煨存性)三錢

(十四)



第十四圖

共為末開滾水搽之。另面加金瓜半斤。生半夏。生南星。台烏末各一錢。綠豆末二兩。共搗爛滾水開敷。一日兩換。連敷多日自癒。腰腿罅部繃紮法。將藥敷妥。以繃帶。由右轉繞反覆紮之。帶頭用扣

針扣緊。此十四圖是也。

第三篇 下部

第一章 前陰小便

前陰男膀胱泌尿生殖器相連。女泌尿器與生殖器雖有別。但泌尿器患病。亦能蔓延過生殖器。外治方法。必須相連關係。因小便並列於前陰章。俾易對查也。

(甲)男子陰具。內臟主腎。腎虧則陰萎縮陽。腎熱腎囊發癰腫淋濁。腎受濕。小便點滴痺痛不清。尿水如泔。或成疝痛。腎染梅毒菌。則流白濁及陽具腫大潰爛。名爲鵝嗉鹹疳。毒久不去。入腿罅紅腫名爲枕菓。毒入於周身骨節作痺痛。名爲花柳入骨。此梅毒療治法。另列入花柳門。可參下花柳門各法可也。

(一)縮陽救急手術 因其人丹田真炁虧而發。縮時覺疼痛。急用厘戩殼中心夾陽物。不俾其縮入。如無此物改用箸紮之。連內服用胡椒末二錢酒冲服。以艾茸燒炙尾龍骨百莊。而用下方治之。並可參考上册陰痿

門。

(二)縮陽內服方 用熟附子。乾薑。炙草。防黨。天生朮各四錢。水煎溫服。

(乙)陽痿陽卽物不舉。舉而不堅。或臨事痿縮。此皆腎虧丹田氣弱。大補元陽可也。

(一)陽痿內服方 用蜂巢五(煨存性)爲末。每服一錢。滾水沖服。服之堅而實。

(說明)此不過急則治標法。可參上冊痿症門。並佩徐仁甫製丹田帶。可以根本治法。

(丙)小便閉塞不通。多因膀胱結熱。或嗜酒家。男女同治。一名中尿毒。二對日不通危險。

(一)小便閉塞不通內服方 用地龍十餘條搗爛。燈心一錢。酒煎去渣溫服。如無地龍改用金魚。螳螂。蟋蟀均可。取此數蟲善動作穴之義。引

達下行之功也。

(二)小便閉塞刺痛內服方 因嗜酒者。用冬瓜熬膏二兩。白糖一兩沖服。或用荻胡雷汀八分。奶糖沖服之。外用下敷各方並治。

(三)尿管刺痛難當外敷方 用大板蕉心剖開合陽具卽止。另用吳萸四兩。鳳仙花柏葉四兩。煎水半桶浸洗下陰。

(四)小便閉塞施手術 用放尿管。以甘油。或鷄蛋白滑其管頭。順向尿管孔插入之。尿從管中流。此手術不過因急治法。當要內服藥外敷等並用。令其膀胱口消腫而癒。否則隨放隨閉也。

(五)小便閉塞外敷方 治尿閉小腹脹大作痛多日。用烏白樹葉五錢。葱頭二錢。田螺七箇。梅片二分。麝香二分。鹽五分。淡豆豉二錢。芭蕉汁開。萊菔子三錢。共搗爛敷正肚臍中。數時卽通。如無田螺改用蛤蜊亦得。

(六)小便下地變白泔色內服方 此小兒患者多。因脾受濕而起。用五苓散

加酒米飯湯沖服。猪苓。澤瀉。茯苓各二錢。玉桂五分。白朮四錢。共爲末。每服二錢。以酒一杯。飯湯一盞沖溫服。

(七)小便多夜尿內服方 用蒜頭四兩。鯉魚一尾。共煎熟食之。連食多次。以癒爲度。

(丁)沙淋症。此因膀胱積結熱而成。初見小便刺痛。久之沙漸大。塞閉尿管。放尿散如沙飛。

(一)沙淋內服方 治男女沙淋症。用塘邊藕二兩。瘦猪肉四兩共煲食。連食半月。已成之沙淋。自爲化爛。由便而下。再用下散等方兼治。

(二)沙淋內服散 用蟋蟀乾末五分。沙螺二兩。前子一兩。二味煎水半盞。沖蟋蟀末。空心溫服。另用蘆荻根菴葉二兩。鴨內金一兩。共煎水溫服。此沙由小便去。

(三)沙淋迫痛外浸方 用錢串草一斤。煎水浸洗尿管。

(四)沙淋常作茶飲方 用鳳尾草一兩。煎水作茶飲。

(五)沙淋經久。食上各方。兼施手術。滑沙結。用水銀五錢。以放尿管插入膀胱內。另用皮節吸此水銀於皮節內。皮節咀駁於尿管頭。後搯皮節。此水銀灌入膀胱內。水銀與沙淋混合。由便疔出。

(說明)沙淋之生。多在膀胱口。藏沙之孔深入。以水銀重填沙孔。則沙浮於膀胱中。人身生理有天然拒一切外加之物力。膀胱既入水銀。膀胱就起拒水銀。不知水銀體重。加以膀胱收縮之力。膀胱口開大。並連膀胱浮中之沙一概冲出。灌水銀之理如此也。

(戊)白濁五帶症。此症男界由膀胱腎內積熱而發。女界由子宮受濕熱而生。患此症者。不論男女。最易令到精神彷彿。心起悸忡。體瘦皮黃。育嗣生養自少。此指因體自病所發而言。其餘由花界傳染者。成爲白濁菌所蔓延。療治法另立一花柳門於下。

(一)白濁內服方。治苦力工人。勞熱而成白濁者。用豆腐。猪血各半斤。白菜乾四兩。清水四斤。煎回半斤。空心溫服。連服多次。

(二)白濁內服方 治因大小便俱結。小便刺痛。大便急迫。便後痛甚症。

用大黃(後下)三錢。金銀花。澤瀉。車前子。黃柏各四錢。血珀末沖服。海金沙末沖服各一錢。黑牽牛。白牽牛各二錢。清水三盞煎同一盞。空心溫服。服瀉一二次合。

(三)白濁內服方 治走路過度。熱結膀胱所致。用山黃粟根一兩。朴仔草二兩。瘦猪肉四兩。共水煎食。連食多次癒。每日另用白果連心一兩搗爛。酒沖溫服。

(四)白濁內服方 治流白濁尿管疼痛。用沙鷄仔二十隻。搗爛用酒沖去渣溫服癒。

(五)婦女白濁帶內服方 治婦女經前肚痛。長流白帶濁症。用蘇魚尾八兩。黃芪。丁貴草。紫蘇葉。黨參。杜仲。破故紙各一錢。水煎溫服。

(六)婦女白濁帶內服方 治婦女血虛長流白濁帶症。用路邊菊二兩。甕菜頭一兩。鷄蛋二枚。改用鷄肉亦得。黑米醋二兩。水煎溫服食。

(七) 婦女白濁帶內服丸 治婦女一切白帶。用麩粉二兩。鷄蛋白四箇爲小

丸。硃砂爲衣。每服二錢。以圓眼肉煎湯送服。每日以白豆(打)六錢

酒煎溫服。兩法間用。取效更速。

(八) 男女白濁五帶外洗方 治男女白濁白帶外洗。用石灰一錢。開水先去

頭次水。取二次水約六兩度。加硃砂一分。輕粉一厘。三味調勻。以

皮節吸射入膀胱內。女界用女節吸射入陰裏內。每日洗一二次。

(說明) 此藥宜少不宜加多。用時需仔細的。因輕粉殺菌及會腐蝕內臟

肉也。輕粉西名甘汞。又名加路米是也。女界凡經塞丸入陰引清五帶

後。當用上方勤洗之。

(九) 婦女五帶塞陰丸 治五帶經久不癒。以丸塞入陰內。用枯礬二兩。海

螵蛸(煨)五錢。五椴子一錢。共爲末。白蜜作丸。如檳榔大。每於臥

時塞入陰戶內。以布外紮之。明早取去。用上方洗之。或塞入見有微

痛難當時可去。不拘時間也。

(十)男界夜夢遺精濁內服方 治夜夢遺洩。腎受濕熱所致。用雄鷄鷄內金五兩。蓮子五錢。二味用鹽水浸蒸熟晒乾爲末。每日空心酒調服重一錢。此症可參上冊遺精門對治之。

(己)陰囊腫痛。多因嗜酒家。酒濕下墜而發。有因傳染油蟊發痕。以手抓癢。指甲傳染毒而發腫。名爲囊癰。有因內睪丸受寒毒。漸發大而實。不紅不痛。久之甚大而潰。潰而內有疽。名爲囊疽。有囊中發癢而流血。女界陰戶腫癢。名爲陰囊風。以上各症見癢者。必用去毒殺蟊藥對治可癒。

(一)囊癰紅腫內服方 治囊起癰腫。紅痛不已。人身發冷發熱。用海藻。黃柏。蒲公英。紅花。歸尾。金銀花。槐花各三錢。天花粉。生石膏。知母各四錢。甘草二錢。水三盅煎回半盅溫服。

(二)囊癰女陰戶腫痛外敷方 用李果葉四兩。生紫蘇葉五分。黃糖五錢。共搗爛仰臥敷之。

(三)囊癰女陰戶腫痛外洗方 用紫蘇一兩。柴胡。防風。荖葉。尖檳各二

錢。煎水洗患處。並治婦弄產出血陰腫。

(四) 囊經潰爛流漿水外搽方。用鯽魚一尾(煨存性)。大梅片二分。雄磺五分。共爲末。先用上三方洗淨。搽於患處而乾痂。

(五) 婦人中年陰門紅腫瘀黑潰爛。名爲陰崩沙症。因平生交感時受風毒而發。用歸身半斤。煎服一盅。每日服一次。連服六七次。外洗用上三方。

(說明) 歸身爲補血之劑。而且去瘀生新之妙。獨以一味功用甚大。經已療治癒多人。

(六) 陰囊陰戶發癢外洗方。用檳榔。荊芥。蛇床子。苦參。蒼朮。茵陳。歸尾。靈仙。茶仔各五錢。膽礬一錢。水煎洗之。

(七) 陰囊陰戶生油蟻外沖法。每於洗身時。先用冷水沖陰部。其蟻自除。(說明) 油蟻生於毛管。冷水一沖。毛管立縮。蟻觸冷失其附拔之能。隨冷水而去。去症癒也。

(八)陰囊生疽內服方 治男界生疽腫實症。用熟南星。紫蘇。沉節。蘇木。

佛手。熟附子。陳皮各三錢。清水煎服。

(十)陰囊生疽外敷方 用乳香。熟附子。首烏。山茨菇。金銀花各五錢。

山甲。木香各三錢。共為末。蜜糖開敷之。

陰囊臀部繃紮法。裹陰囊。用方

布一件。上下開二孔。用帶穿過

四孔。布頭一橫帶。過腰紮之。

即乙圖是也。裹臀較側。可參甲

丁圖樣紮之。


(十二)尿管生爛頭疔洗方 用防風三錢

荆芥。黃柏。金銀花。甘草節各四錢。豬膽一隻。水煎洗之。

(十三)尿管生爛頭疔外搽方 用六一散二錢。大梅片二分。硃砂二分。共末

搽之。此疔症。可參下花柳門治之。

第五十圖



(十五)

(十三) 婦人血山崩內服方 治婦人素虛弱。血海受寒濕。關闌失調。崩流不止。用山檢果二兩。新瓦八兩(春爛炒香以水泡滾)。二味煎好。舊棕繩(煨炭)末五錢沖服。如無以棕樹炭代亦可。療治可參下冊婦科。

(十四) 婦人生產子不出外敷方 用紅萆麻子半斤。搗爛酒炒熱敷脚底心即產。取其便者。以鞋套之亦可。一經產即要除此藥。若連子宮脫下。將此藥敷於頭頂心。子宮自縮上。

(十五) 婦人生產胎衣不下方一 用荖葉七張。用手掌心兩手合擦之。令手掌心熱即來。並治產不出合用。

(十六) 婦人產後胎衣不下方二 用瓦塔一箇。黑醋一斤。白礬一兩。入塔內。煑滾令婦坐在塔口。其胎衣立出。若醋礬不便免煑者。改用爛葵扇二把燒着。放在塔中。令婦人坐之更快來。

(十七) 婦人產後胎衣不下內服方 用黑醋六兩。吹乾子末二錢(炒香)。煑熱醋沖服即出。

(六)婦人子宮寒不受孕外敷方 用吳萸一兩。川椒一兩。共爲末。酒和麵粉爲丸。納入前陰多次。子宮溫暖成孕。可參下冊種子原談門。

(庚)小腸氣痛即疝氣痛症。多因腎寒濕而發。療治各法。除此備列外。可參上冊疝氣門對治。

(一)小腸氣痛兩邊睪丸腺痛腫內服方一 用桔葉二錢。小茴香五分。猪花腸仔二兩。白花鬼燈籠菴一兩。共煎加酒一杯溫服。

(二)小腸氣痛內服方二 治睪丸腫大。偏左偏右。多患於小兒等。用春沙殼。荔枝核。石菖蒲。木通各二錢。水煎好冲辰砂二分溫服。

(三)小腸氣痛內服方三 因膀胱結熱作痛。用水瓜菴五錢。狗腳跡一兩。黃皮樹菴一兩。水三盅煎回半盅溫服。

(四)婦人小腸氣痛內服方 治婦人膀胱結痛。苦楚難堪症。用柑菓核。海螵蛸(煨)各一兩。木香二錢。共爲末。每服一錢。酒水各半冲服。立卽痛止。

第二章 肛門大便

肛門卽大腸頭。應內臟肺。肺燥則大便結。腸有積熱。及過食辛熱品。則肛門腸頭多發惡瘡。腸寒凝冷。腸頭脫出。名爲脫肛。其餘腸頭染痔癬等。另向下痔癬方法治之。

(甲)脫肛症。有因食瀉藥劑多而脫。有因經久結恭。用力迫恭而脫。有因小兒患疳積氣虛而脫。有因患痢疾而脫。治法分別於下。

(一)脫肛內服方 治因久患結恭。出恭迫脫者。用豹芽郎菴二兩。九里明二錢。瘦猪肉三兩煲食。

(二)脫肛內服方 治男女久患脫肛。及小兒疳積後脫肛。用黑芝蔴二錢。熟地。北蒼各三錢。大歸頭二兩。豬腸頭半斤。共煲食之。連食多次。

(三)脫肛內服方 治用寒瀉藥劑過多脫肛症。用大頭龜乙隻去淨內臟。鷄項乙隻。二共煲食之。

(四)脫肛內服方 治因久患痢疾脫肛者。用車前草半斤。瘦豬肉四兩。共煲食之。

(五)脫肛外洗方 治一切脫肛症。用阿魏一兩。防風三錢。故紙五錢。蒟葉一錢。枯礬五分。黑醋一斤。共煎好候凍洗腸頭。另鷄蛋一枚。煮熟切開按押腸頭自升縮入。

(六)脫肛外擦方 用大田螺一個去蓋。入梅片五厘。即時取流出之水。以鴨毛蘸水點擦腸頭。

(七)脫肛外擦方 用地龍七條。龜頭乙隻。共煨存性。加梅片二分共爲末。以牛燭油開擦搽之即縮回。

(八)小兒泄瀉脫肛方 用正清花玉桂二分。滾水沖服。連服多次。

(說明)治脫肛之症。內外並治易於收功。兼脫出之時。最忌以手托起。因有手氣及不潔者。必須常備青蒟葉。及蕉葉。菜葉。此葉亦須用滾水泡過。免有菌毒也。其餘用臘紙等亦可。

(乙)肛門生瘡。多因喜食熱毒之蝦蟹犬牛鯉魚等所發。俗名老鼠守穀倉。患者痛苦非常。治用外敷內服法。

(一)肛門生瘡內服方 用本篇第一章(己)第一方服之。

(二)肛門生瘡外洗方 用本篇第一章(己)第三方洗之。

(三)肛門生瘡外敷方 用老鼠擔冬瓜四兩。苦搗藤頭一兩。生酒糟二兩。

共搗爛煎熱敷。已穿者用徐仁甫白藥膏敷埋口。

(說明)苦搗藤乃是毒藥。勿入口食。上經有說明。若無此味亦可。

第三章 腿股

腿罇結核者。因膀胱結熱。或花界染梅毒等。即便毒魚口。橫痃芒果均生在此部位也。其腿股中患紅腫。名爲牛毒瓜瘡。或經久骨痛。名爲骨槽疽。又名骨發炎。初起不識療治。經已穿爛腐骨。療治頗難。可參下腐骨疽門各法。

(甲)生芒果魚口便毒症。古云左爲魚口。必經花界傳染而來。右爲便毒。因食毒物蝦蟹牛肉犬肉等而發。初起紅腫實痛。狀如芒果。名曰芒果。久之化

膿毒穿爛。舉步瘡口開合。狀如魚口。名為魚口。其實一梅毒症結成。除

此療治各法外。可參下花柳門。

(一)魚口芒果便毒內服方 用猪膽二箇。熱酒

二兩沖服。連服多次自消。

(二)生芒果便毒外敷方 用信石末五分。鷄蛋

二枚。入信石於蛋煑熟敷患處。

(說明)信石毒藥也。切勿入口。經敷過之

鷄蛋等藥。切勿棄於塘地。免被魚及畜類

所食。必須深藏土中為要。誤食信石。用


菘豆腐可解。

(三)橫痃外敷方 用大黃。黃柏。甘草。燕子

坭。白芷。石膏。雄磺各一錢。冰片五分

。共末猪膽汁開搽患處。

第十六圖



腿股膝繃紮法。腿罅橫疔瘡。敷藥紮法。卽丙圖。用繃帶繞過腰中。膝頭繃紮。看甲乙圖式。紮完時。將帶尾開作二分。反覆對紮之。或用扣針扣亦可。

(乙)腿股中生牛毒瓜瘡。此部肌肉甚厚。未曾化膿刺痛。卽用藥勤敷散之。若經化膿。以水紙敷患處。其紙先乾者。爲頭腦。加放大鏡檢確實。以止痛藥局部麻醉。用手術針割瘡頭。方用各法治之。較爲快癒矣。

(一)生瓜瘡牛毒內服方 用第二篇第六章第一方服之。

(二)生牛毒瓜瘡外敷方 用九腳跡。桃仔葉。黑面神。蒲公英。天花粉。蛤屎屨。蝦鉗草。狐狸墮各四兩搗爛。生酒糟調和煮熱敷之。以上各藥若少一二味不備亦可。連敷多次。未膿卽散。有膿卽穿。穿後用徐仁甫白藥膏貼之收功。

(三)陰疔惡毒外敷方 此疔毒多生於腿中。陰戶上下。初起一黑點。人發冷發熱。內服上第一方。外用白麻頭四兩。鷄蛋白二枚。白蜜糖一兩。

共搗爛敷之。

第四章 足脛

足疾如嗜酒者。脚患紅腫痛。名爲酒風脚。時歇時發。多患於五十歲以上之氣血少者。若臨南方海濱濕地。兩足腫痛名爲脚氣症。多患於異地之人。嗜食蝦蟹牛肉狗鯉魚發毒而生痰火患於膝頭者。名爲鶴膝風。多生於十餘歲之兒童。其餘生瓜瘡爛脚多由於內毒而發。治理無不加內服藥並用。取效爲易。

(甲)脚氣腫痛症分乾濕兩種。其原因無不關於氣血兩虛。及臨異地卑濕而發。除此列治外。可參上册脚氣門。

(一)脚氣水腫內服方一 治脚腫及周身俱腫。用花生肉。川木瓜各四兩。紅棗二兩。雙料酒二兩。清水二大盅。煎回一盅。加酒一兩連渣食之。勿食木瓜棗核。連食六七次消散。

(二)脚氣腫小便赤結內服方二 用赤小豆。川葶藶各五錢。蒜頭二兩。糯米六合。共煎食之。如以指按足腫凹久不起。專用禾蟲半斤。乾用四

兩。以酒煮食多次。

(三)脚氣腫痛內服方 治脚氣初起腫痛。用首烏。當歸。陳皮。防杞。穀芽(炒)。海桐皮。澤瀉。獨活各二錢。茯苓。金釵斛。木瓜各三錢。生薑五錢。水三盅煎回半盅溫服。如頭腫加蘇葉薄荷梗各二錢。腹與下陰腫加大復皮。橘紅各二錢。

(說明)脚氣受濕過重。四肢無力。足軟不能行動。用山菩提水魚公方多食爲妙。方見上冊醫按。

(四)酒風脚氣痛內服方 治平生嗜酒。年至四五十歲時。氣血漸衰。酒患時發作痛腫。用木棉花根四兩乳香炒黃去乳香。瘦猪肉四兩。水四盅煎回半盅服食多次。

(五)酒風脚氣痛內服方 治老年酒風脚。每年一二發。用桑寄生。桑白。薏米(炒)各四錢。木瓜。葛花。茯苓。加皮各三錢。蒼朮。寬筋藤。松節各二錢。水二盅煎回半盅空心溫服。

(六)兩足無力。手足痺疼內服方。治四肢不能行。手足痺疼。用老茶葉。蘇木各八錢。青色鴨蛋一枚。長流水四盅。煎回半盅。每日食一次。連食十餘次癒。

(七)脚軟不紅不腫。兩足冰凍內服方。用老桑樹十餘斤。陳皮四兩。長流水十斤。瓦缸熬至水三分之一格去渣。再熬成膏。每早晚溫酒沖服二錢。

(說明)脚軟不能行。多因風寒濕結於筋絡。療治各法。可參上冊痺症門。

(八)因病後患脚腫痛內服方。用羌活。獨活。杜仲。木瓜。歸身。狗脊。防黨。黃芪。加皮。旂蛇。走馬胎。寬根藤各三錢。水酒各一盅。煎回半盅溫服。如小便不通加防杞二錢。有痰及腰重。加南星二錢。川斷二錢。

(說明)病後欠補。多患虛腫。其病產後爲多。用鷓鴣乙隻。香信二錢。

紅棗六枚。生薑五分。共煎服食。取效甚速。而鷓鴣功用。能化痰消腫。補五臟。於虛腫之病最宜也。

(九)脚腫連至頭面俱腫。多年不癒。用仁醋薯飯。方見上冊。

(十)兩脚腫。時發時癒。內服方。用過山香四兩。陳皮二箇。猪鬃脚一隻。水酒二盅煎服。渣加水再煎洗患處。一二次痊癒。

(十一)脚痛風癱內服方。用遠薑。大小榕膽菴各一兩。大歸頭二兩。南棗二十枚。猪脚筋一條。共煎服食。

(十二)脚筋抽痛內服方。用松菴。含鋪柏菴各二兩。長流水三盅。煎回半盅。加酒一杯。空心溫服。

(十三)小兒發黃週身浮腫。腹實作痛內服方。用獨脚烏舅菴一兩。了哥麻菴五錢。黃絲草一兩。水二盅煎回半盅溫服。即吐瀉多次。其腫自消。後忌食鹽百日。不復發。

(乙)爛脚多生脛中。因外損傷紅腫化膿毒而爛。或生瘡瘍而爛。亦有因嗜酒酒

濕而發。治法先以殺菌去毒外洗塗敷後。其肉色由黑轉朱紅。加以生肌埋口藥收功。

第十七圖



足部繃紮法。將繃帶人字交繞安完。帶尾分作二開。反覆對繃。即此圖甲乙是也。

(一) 爛脚外敷方 治脚脛面紅腫潰爛瘡毒等症。用崩大碗。獨脚烏舅。犁頭草。田基黃。甜藤蘆。清明草。讀書君各一兩。將生草藥用石灰洗過。另用滾過煖水洗淨。用臼椿爛。以瓦器煮熱敷患處。每早晚換一次。未敷藥

前先用下(二)方煎洗之。

(二) 爛脚外洗方 治一切瘡腫損傷爛脚。用白芷。柴胡。桑白。五檜子。蟲菌之弊。前後用藥做此。

(三) 爛脚外洗方 治一切瘡腫損傷爛脚。用白芷。柴胡。桑白。五檜子。

薄荷。蒼朮。桔槩。赤芍。苦參。海桐皮各三錢。水五盅煎洗患處。每早晚洗一次。

(三) 爛脚外敷方 治足脛脚面紅腫潰爛症。用草決明。杏仁。水僕芋各五錢爲末。用黑醋開敷。或以桐油開搽之。

(四) 遠年爛脚外敷搽方 治經多年爛脚。不乾水埋口。先用檳榔灰五錢。塘虱魚一尾。共搗爛敷一對時。以上二方洗淨。後用牛屎乾燒灰五錢。

鼠子石灰乙隻。大梅片二分。共爲末。以麻油開搽。

(五) 脚黑腫腐爛(名生崩沙)外敷方 用大樣豹牙郎。細樣牛毒。脆骨草。

五指甘各一兩。洗淨搗爛敷之。

(六) 脚脛黑腫入夜流血外敷方 治因嗜酒者。酒濕墜脚黑腫。血脈腐斷。

血流遠射。名爲血線箭症。不識治理。往往流血不止。而發危險也。

用三柰末二兩。開鷄蛋白敷之止血。或用蛤芫一兩。石灰五錢。搗爛

敷之。

(說明)遇血箭症。卽施手術。先用帶緊束來血上部。舉高流血部。而後敷藥。內服提氣止血藥。卽用花旗參一兩先煎。熟地炭。大歸頭各五錢。茯苓一兩。大薊炭四錢。血珀沖服。白蠟沖服各一錢。陳皮。酥半夏各一錢。水煎溫服。

(七)脚面生腐骨外敷方 治因脚患瘡腫。膿頭未出。結成腐骨。時流膿水。症。用沙鷄蟲二十隻。草麻子一兩。瘦猪肉二兩。共搗爛敷之卽凸出。外洗用上二方合。

(八)脚甲生臭田螺外敷方 治手足甲因損傷及生瘡腐爛惡臭症。用田螺去。入梅片一分。火燒滴水於患處。後用猪鬃肉一兩。京柿五錢。蜜糖五錢。冰片一分。酒洗淨。以上各味搗爛敷之。

(丙)瓜瘡多生脛腿中。治法除外敷外。內服仙方活命湯內托易穿。或於皮膚過厚。多用刀針刺割。以去膿毒。未成膿者。用火灸法治之。

(二)生大瓜瘡內服方 用仙方活命湯。治一切瘡毒。未成膿服之內消。已

成膿卽穿。用穿山甲(炒)。陳皮。歸尾各一錢半。貝母。甘草。乳香。沒藥(去油炒)。花粉。白芷各一錢。皂刺五分。金銀花三錢。淡陳酒三盅煎溫服。瘡生上身飯後服。生下身空心服。

(二) 瓜瘡初起火灸法 治瘡起疼痛症。用艾火灸手眼。膝眼。脚眼各三莊。

脚板心七莊卽消。

(三) 大腿生瘡外搽方 瘡久不穿。用木虱血搽瘡頭。以本篇第三章乙二方敷之卽穿。

(四) 手足患瘡爛發外敷方 治手足患瘡爛發。經久不癒。名爲捕門蛇症。用捕門蛇草。過天螭。天吊香。辣椒葉各二兩。石灰二錢。共搗爛。煑熟敷之。

(五) 脚面生瘡腫爛穿底外敷方 治脚面生瘡經化膿穿爛。名爲穿盆症。用水僕芋六兩。假青菜四兩。共搗爛敷之。一日二換。外洗用本章乙二

方。

(六) 脚底湧泉生厚腫成瘡外敷方 用川烏末。草烏末。花粉末各一兩。生酒糟煑熱敷之。

(七) 脚生鷄眼外敷方 治在脚底面起一實核。觸之痛甚。名爲鷄眼。患在手亦有。用法先以刀削去實眼肉。另糯米飯二錢。梔水四錢。浸一宿。貼患處卽癒。或單用苛性鈉點之亦可。

(八) 手足生飯銳外敷搽方 用生紫蘇葉擦之。另以自己頭上坭敷搽之。

(九) 脚底生石硬外敷方 治日晒熱路石。人足觸熱而生實腫於脚底。名爲石硬。亦有因履堅硬傷而發。用生南星。生半夏。生枝子。鹹茨菇二箇。大黃。生川烏。生首烏。生乳香各五錢。馬前二錢。共爲末。以滾水開敷患處。

(說明) 方中馬前生南星。是毒藥。對於製散。及煑器具。當經手整妥。切勿假手於人。免誤食中毒。且此藥渣。不可棄於塘池河中。免毒魚蝦。埋於深土中可也。

(十)石硬初起紅腫痛外敷方 治石硬初起紅腫痛症。用仙人掌一片煨熟貼之。無用火秧筋代之。後以石灰二錢。鹹檸檬二箇。白糖二錢。信石末五分。鷄蛋白清二隻開敷患處。方中信石亦毒藥。應參本條說明慎之。

(十一)脚指罅生水蠃外搽方 治足踏濕處。發生水蠃。用水龍骨(煨)一兩。細茶葉三錢。水松子五錢。共爲末。開生油搽患處。

(十二)足起水泡紅痛外洗方 用水浸松皮四兩。龍膽草五錢。蜂巢三錢。煎水洗患處。

(十三)蛇骨刺入脚底不出外敷方 用水浸松二囊皮。丹竹筍。水芋。沙糖各一兩。黃泥五錢。共搗爛敷患即出。

第四篇 瘡瘍部

第一章 癰腫

癰陽症也。初起紅腫刺痛。在肌肉結瘀化膿。令局部腐爛。全身發熱。脈搏洪

數。作渴口苦頭痛。患於背者。名爲背癰。心胸乳中。名爲乳癰。卽瘡之最大者曰癰。治法可向瘡科參考。其發病原因。多患於葷食嗜酒家。葷食肉品。是爲有窒素。窒素過盛。與血液混結於肌肉間。該局部之肌肉血脈被窒素栓塞。頓生反應而發紅腫。久之血結不散。成膿而爲癰。其餘嗜食煎炒熱物。亦能發癰。初起用外敷內消藥散之。既已化膿。取穿去膿生肌肉埋口藥治之。各方法列左。

(甲)癰毒發於肌肉深部。初見闊部紅腫。久之化膿穿爛。治初起時。內服發散解毒。外用引散藥敷之。

(一)癰腫丹毒紅痛內服方 治一切癰腫丹毒初起。用防風。升麻。荆芥。薄荷。甘草各一錢。枝子。麥冬。木通。乾葛。牛蒡子。元參各二錢。清水二盅。煎回半盅。空心溫服。

(二)癰腫仙方活命湯內服方 治癰腫初起卽散。成膿卽穿。方見足脛部丙

一方。

(三) 癰腫外敷方一 治一切無名腫毒。及四肢起核腫痛症。用無射香葉。鴨仔菜。霧水葛。大葉芙蓉。田基王。獨脚烏白各二兩。紅花。歸尾。甘草。葶豆各末五錢。鹽二錢。將上生草藥搗爛。和勻酒糟煮熱敷之。

(四) 癰腫外搽方二 治癰腫無論生於何處。均可搽之。用生川芎。大黃。生草烏。花粉。木鼈子。黃柏。鬱金各二錢。生半夏。生南星。冰片。麝香各二分。象膽二錢共末。豬膽汁二兩開搽。癰腫自消。

(五) 身體頸等紅腫起核牛毒症外敷方三 用塘邊藕。白燈盞花。狗腳跡。桃菓葉。黑面神。蒲公英各二兩。冷白粥一盅。共搗爛敷之。

(六) 癰腫瘡毒外敷方四 治癰腫患於腿部如瓜瘡症。用松毛葉。風芋。蟻芋。玉芙蓉。假油麻根。白米薯蕷。羊角扭根(生樹不是漚塘的)。金鎖匙(即到鈎蕨)。葶荳各二兩。共搗爛。酒糟二兩煮熱敷之。

(七) 癰腫已成膿外敷取穿方 治癰腫已成膿。瓜瘡惡毒。以此代刀引穿之。

用巴豆肉五錢。紅信石。牛黃。血珀各一分。蟾蘇。雄磺。黃柏各五分。麝香。冰片各二分。共爲末。米糊作小丸。檢正膿頭處。放小丸於此。外用徐仁甫紅藥膏貼之。或用上五方敷藥蓋之亦得。

〔說明〕如癰瘡成膿已放白色。其皮甚薄。可用中部乳門甲八手術取穿之。

(八)癰腫毒乳瘡等外敷方 用連翹。山甲。海草。金銀花。皂刺。牛蒡各三錢。花粉。浙貝。歸尾各四錢。枝子二錢。甘草一錢半。熟乳香末一錢半。先將各藥煎回一盅。沖乳香末成爲涼粉。加赤小豆末四兩和勻敷患處。乳部繃紮法。可參十一圖。

(九)癰毒穿爛外敷方 用上部頭庚一方。

(乙)腸癰多患於大腸橫降部。因葷食嗜酒。熱積而生。初起見該部實痛。以手按之如結屎狀。久之成膿。治理不當。每每生穿腸衣。發生危險也。治療法。除本條外。可參上冊一〇一頁胃癰各方對治。

(一) 腸癰內服方 治腸癰腫痛。未成膿可散。已成膿清毒生肌。用金銀花八兩。地榆。歸身。生薏米各四兩。清水四盅。煎回一盅。空心溫服。連服至癒爲止。

(說明) 藥經過小腸時。各種成分功效已消去不少。每關於大腸部病。藥當重用。執斯業者。不可不知也。外敷方。除本條外。可參用中部腹門丁一方。

(二) 腸癰外敷方 治腸癰結痛及一切瘡症。用紫荊皮二兩。花粉。赤芍。獨活。白芷。赤小豆各一兩。薑黃。苘蒲。大黃。黃柏。葱頭各五錢。共末。加生蕉葉二兩。蜜糖三兩。和酒煮熱敷之。

(丙) 肺癰之初起。先由思想過度。常時失眠。令肺部漸感憔悴苦悶。肺因焦燥引吸多數水分於中。名爲肺積水。水蓄久而化腐膿。名爲肺癰。患此症。不得適當療治法。多生危險也。治法除本條外。內服可用上冊一〇一頁桔梗湯方。

(一) 肺癰內服方 用木蕎頭二兩。鴨蛋二隻。清水煎食五六次。見頻吐腥臭口水合。

(二) 肺癰外敷方 用本章乙二方。如積水未成膿。加滑石末四兩。天仙子四兩。肺中之水引向毛管而出。每日二換。敷至無水流出爲止。

(丁) 瘡毒與癰畧有分別。癰發於深肌肉。瘡發於皮肉。瘡之成膿快易穿。治理亦易。不會發生危險等弊也。

(一) 瘡毒內服方一 治瘡毒紅腫痛症。用香附。歸尾。木瓜。川連。威靈仙。白朮各二錢。熟沒藥。熟乳香各一錢半。羌活。牛蒡。荊芥。甘草。白芷各一錢。清水二盅。煎回半盅溫服之。

(二) 瘡毒內服方二 治瘡初起紅腫。以此方消散之。用大黃三錢。紅花。角刺。花粉。白芷。穿山甲。厚朴。牛蒡。防風。木瓜。陳皮。金銀花。歸身。桂枝各二錢。清水煎服。

(三) 瘡毒外搽方 治大人小兒頸頭核瘡及小泡瘡症。用黃連。大黃各四錢。

黃柏。白礬。石膏(煨)。白芷。獨活各二錢。石灰一兩共末。炒至黃色。加梅片。麝香各二分。以豬膽汁一兩開搽之。

(四)瘡如蛇頭外搽方 治瘡凸起如蛇頭。誤觸其頭。痛苦非常。時流清水膿。及生紅腺蛇。纏身蛇症。用黑牽牛。大黃。桂枝。山甲。陀僧各二錢。雄磺。辰砂。硫黃。白礬。青皮。血珀。象皮各一錢。麝香。冰片各二分。共爲末開醋搽之。或用茶油開亦得。

(五)瘡潰爛浸淫內服外搽方 治瘡潰爛流連周身。名爲棉花瘡。先用黃連五錢煎服。另用舊茶蕊。黃連各三錢。陳皮一錢。共爲末外搽之。

(六)血脈瘡流血外敷方 治久患瘡。瘡毒生爛血脈。血流不止。除本條治理外。可用足脛門乙六方。用辣椒乾末。白芨各三錢。以糯米飯開敷之即止。

(七)身生流連瘡毒外洗方 治身或手足紅腫發瘡。名爲過身蛇瘡。用紅草。麻。金邊菊。蒼耳草。路邊菊。小金櫻。假紫蘇各二兩。雄磺。陀僧。

各二錢。煎水洗患處。如有癢狀。用熟烟油少許搽四邊處。

(八) 癰瘡潰爛外貼紅膏方 治一切癰瘡潰爛。爛脚惡毒症。用松香十兩。水煎製淨。茶油。蜜糖。樟腦。白蠟各四兩。銀硃二兩。以瓦盅載藥。用水燉溶化。桑枝攪成膏。外貼患處。洗用上方。

(九) 瘡爛腐清生肌外搽散方 治一切癰瘡。腐膿等已清。生新肌肉埋口。用礬茶。乳香。沒藥。血竭。田朮。龍骨各三錢。梅片。麝香。珍珠各一分。白芷。赤石脂。烏藥。白芨各一錢。共爲末。先用上七方洗淨。以此散摻之。

(十) 陰毛疔瘡外敷方 治疔瘡生在陰毛上。狀如黃豆。人見發冷發熱。名爲下山虎症。用鷄蛋白一隻。蜆灰。鷄爪芋。臘猪肥肉。龍骨。白糖各三錢。共搗爛敷之。

(十一) 小指疔瘡外敷方 治疔瘡生在指甲。色白頭小泡。經對時。人苦沉重。若不速治。多發生危險。名爲虎尾疔。用龍眼肉乾二錢。胡椒。大

黃。雄。磺。川。連。甘。草。血。竭。海。螵。蛸。各。一。錢。共。爲。末。酒。調。敷。之。
繡。紫。參。第。七。圖。

(十二) 擔肩瘡外搽方 治膊肩瘡。及諸瘡症。用舊神花銅片一兩。百足二條。茶油四兩浸之。用時以油開陀僧末二錢。外搽患處。

第二章 疽

疽陰也。多患於血虛體弱人。喜食蝦蟹葷酒家。與未成年之童子。貪食腥膻熱毒物。及寡婦憂鬱過度。血滯氣凝結而生。初起腫實如核。不紅不痛。久多時日。漸大如斗。局部腐化穿爛流清水。骨裏刺痛。寒氣凝結如骨。名爲腐骨疽。療治法內服和陽化陰。外以溫散敷之。忌用施刀。免再損其血之弊。

(甲) 疽起不覺。慢腫無痛。平坦色白。微覺痠疼。狀如凝核。此當速理。免其穿爛。

(一) 疽內服陽和湯方 治一切血虛(卽貧血)凝結成疽。未穿已穿。腐骨流注等疽。方見本冊六六頁。

(一) 疽已穿爛不能生肌內服方 治疽久不散。或已穿爛不長肌埋口症。用炮附子一兩。黑狗肉半斤。共燉食之。托其長肌。

(乙) 腐肉腐骨疽。因疽起過久。局部之肉腐爛如猪肝。此當用外藥敷去之。若腐肉生熱蒸結膿毒成腐骨者。常見流清水膿血。不能埋口。內有腐骨亦用散引出此腐骨。而能埋口痊癒。

(一) 去腐外敷搽方 治腐肉黑如猪肝爛不去。常流惡水症。用石灰五錢。鹼水一錢。和勻搽腐肉處。外用扁魚鰓一兩。水葶萍二兩。三仙丹一錢。共搗爛敷之。

(二) 腐骨外敷搽方 治久患腐骨不出。用白鶴骨足嘴一副。白花蛇一兩。共煨存性爲末。將散摻入腐骨孔隙中。外用白蕊假江梅。圓眼樹蕊。鹽鋪霜蕊。茶仔樹蕊。地榆葉各一兩。葶麻子。烏梅。荔枝肉各五錢。麝香。梅片各五分。共搗爛敷之即出。後用徐仁甫白藥膏埋口。

(說明) 腐骨。又名骨疽。在肌肉發者。名爲附骨疽。附於骨外。可以

用上方敷之即去。治癒亦易。若原骨腐爛（即骨發炎）名爲骨槽疽。此症治理甚難。每每患至體弱衰頹。變生危險也。

第三章 蛆蟲

蛆蟲者。因患癰疽。痘瘡癩包等潰爛。及由皮膚毛孔傳入肌肉而發。療治用大辛殺菌藥。內服外敷之。便可痊癒也。

(一) 周身有蛆在肉內現見行走內服外敷方 治人身肌肉見有蛆行走癢痕。名爲蟻蛆症。用葱頭。蒜頭各二斤。雄磺四兩。麝香一錢。共搗爛取汁五分滾水沖服。此藥渣外敷患處。

(二) 諸瘡痘胞爛生蛆內服方 治一切瘡爛及痘潰爛生蛆症。用蛇蛻（煨存性）一兩。蟬蛻。青黛各五錢。細辛二錢半。共爲末。酒沖服三錢。早晚服一次。外用下方摻之。

(三) 瘡痘胞爛生蛆外摻方 用寒水石。海參（煨灰）。白礬（煨）水飛過各一兩。共爲末。外摻之。其蛆化水。

〔說明〕民國七年有黃謙求診年三十六。右脇下起一蛆。初如蛋大。經醫時大如斗。牽動身斜側。其人能大飲大食。惟面黃骨瘦。所食之養體料。診定是此蛆作怪。即用本條一方敷服。該蛆內覺有物走動。以癰腫門甲七方取穿。則有蛆無數。長約五分有尾。以本條三方埋口收功。

又有葉婦年五十。以拾田螺爲業。周身如針刺痛。肉色如蚊點。來醫時已患有數年。其夫及子均同染之。細檢肉中毛管有蟲。細如針嘴。長約半分。在肉中鑽出。跌下地能飛去。亦用上一方治。

又有何信童年十四歲。由六歲起在頭枕骨生一蛆瘡。長流清水。用上方外敷之。留一口不敷。在瘡出蛆三條。長約二寸。以水盛之能行走。用上三方收功。

又有呂良在正掌中生一蛆。如蛇頭狀。檢之。有蛆多條。在瘡蠕動。用上一方敷之。藥到其人痛苦難堪。不久出蛆十二條。用上三方

(一) 出收功。

又張義鼻孔腫大流黃水蛆。用上一方內服外敷。由鼻孔出有殼小蟲

(丙) 出收功。如油麻子大無數。後用鼻門二方薰之痊癒。

按人身能發生此等蠕動物。歷代名醫屢有論及。未經親歷醫過。多

以為妄。余當時將各蟲蛆原體樽載起。以為標本也。

第四章 疥癬汗斑出斑痘痲胞胎毒

疥癬因皮膚不潔。或食蝦蟹毒物而起。汗斑亦是。出斑者。其內蘊熱。兼於春

夏天時熱而發。痘痲胞瘡因出痘痲時發托不清。餘毒凝於皮肉而生。胎毒因母

懷孕時。多食蝦蟹毒物。或染有梅毒等而發。

(甲) 疥癬多患於小兒。因小兒沐浴不動。食物不禁。嬌嫩之體。最易發生。初

起如芝麻大。多日全身皆有。癢痕非常。名為疥。若能灌膿水。該膿水染

着即發。名為飛揚癬蛇。治法兩同。

(二) 疥飛揚癬蛇外洗方。治身癢痛。起水泡膿飛揚癬蛇症。用出漿草。金

(一) 鎖匙各八兩。(即倒鈎蕨頭是貫衆)煎水溫洗患處。

(二) 疥飛揚癩蛇外搽方 用白芷。大黃。楓子肉。黃柏。黃芩。黃連各三

錢。雄磺。吳萸。硫磺。蛇牀子。朴硝各二錢。麝香二分。共爲末。

(甲) 用滾水開搽。或用茶油開亦得。

(乙) 汗斑又名癩。在皮毛白色名白癩。紅色名爲紅癩。細檢之實一種微菌蝕皮

夏。肉作用。久不治則蔓延全身。一經天氣熱時。且有微癢狀。

(一) 汗斑外搽方 用青苔(炒)。胡椒。知母。陀僧。白礬各一錢。信石

(煨存性)二分。共爲末。醋開搽之。

(二) 癩外搽方 治紫白癩(癩即汗斑)症。用硫磺末。以茄蒂蘸擦患處。紫

癩用紅茄。白癩用白茄。

(丙) 出斑在春夏天氣熱。而人身內有熱相因而發。治法外徐仁甫銅拔刮出斑痧

。圖具可參上冊三十圖及痧症門。

(一) 出斑內服方 用苦地膽。白茅根。鋪狗尾。山芝蔴頭。鬼羽箭。垂絲

柳。高渣葉。鴨脚樹皮各五錢。甘草二錢。水煎溫服。飲見甜味合。

(二)銅拔刮斑法 用鹽水濕頸骨。手足較。心胸。以銅拔刮之。令該部斑點出盡。其人自然。忌食米氣多日。

(丁)痘痲胞瘡。因出痘痲時解發不清。餘毒凝結而發之。

(一)痘痲胞瘡外敷方 用芙蓉花葉。刀鞘荳。假油麻。絡麻葉。水油麻。

沙牛屎各二兩。共搗爛煮熟敷之即散。有膿亦穿。

(二)痘後餘毒及滅痘皮外搽方 用黃牛屎曬乾。鯢魚牙各二兩。煨存性共為末。開清油塗之。

(戊)小兒胎毒。多因孕婦不戒食蝦蟹煎炒燒鵝。或父母染梅毒等而發。甲益散

(一)小兒爛頭胎毒外搽方 用枯礬。松香。雄磺各三錢。輕粉。川花椒各

一錢。共為末。茶油開搽。先用本册癰腫丁七方洗之。


第五章 癩癩

癩癩係一種蟲生於肌肉中。生於面部如錢狀。名爲紅雲血癩。全頭皆白。名爲


白頭癬。皮厚結者。名爲牛皮癬。在坐臀者。名爲坐板癬。履水而生。名爲水癬。起膿胞成瘡。名爲癬癩瘡。治法須內服藥。外搽殺蟲藥並用。收效爲快。

(甲)癬蟲身毛刺。常覺癢痕者。因其蠕動毛刺肌內發熱所致。患癬多因傳染來。間或喜食鵝鰾鯉魚等。自發者有之。

第十八圖



癬蟲腹部甲部雄雌



癬蟲腹部形狀。甲爲雄蟲。乙爲雌蟲。卽此圖是也。

十八

水豆腐半斤。水四盅。煎回半盅溫服。

(二)面部紅雲白雲癬外搽方。用五靈脂三錢。五倍子。錫粉。尋茶。膽礬。

乾柴(煨存性)各一錢半。共末醋開搽。

(二)白頭癬外搽方。用舊瓦燒過一兩。雄磺。硫磺。樟腦。松香。錫粉。

輕粉。枯礬各一錢。水銀五分。鹼沙五分。共末用醋開搽之。

(三) 頸生厚皮癬外敷方 用蒜頭二兩。冰糖五錢。共搗爛敷見痛甚去之。

(四) 水癬外搽方 治水癬及坐板癬。頭身四肢均有。常有水流是也。用錫

粉三錢。梅片五分。南星。半夏。白芷。生石膏。枯礬。吳萸。樟腦

各一錢。共爲末。茶油開搽。

(五) 癬散外搽方 治一切癬癩症。用江子肉。硫磺。胡椒各五分。五倍子

。楓子肉。錫粉。枯礬。膽礬。皮烟各一錢。鴉膽子。冰片。信石各

三分。水銀五分。用瓦器炒至此藥黃色。共研末。以薑先擦癬部。茶

油薑點散擦之。

(六) 洗癬方 治一切癬及陰戶囊痕癢症。用龍膽草。五倍子。蛇牀子。苦


參。石榴皮。枯礬各一兩。共末。每次用一兩。滾水一斤沖散洗之。

每早晚洗一次。

(七) 癬水外搽方 治頭身四肢紅雲癬。金錢癬。用青礬。白礬。膽礬。鹽

各一斤。信石四兩。共入於瓦埕中。以蒸氣凝液。點搽諸惡癰甚效。若搽見痛。以火酒開淡之。

第九十圖



蒸氣凝液法。置藥於瓦埕中。將埕口用熟石膏粉開水封密。另以一曲空管透於水盛空瓶。較以生水通流。免瓶不熱。以火燒埕化氣。氣過水盛密口空瓶遇冷凝聚為液體。此液即是癰水。即第十九圖是也。

(說明)此癰方除第一條內服方外。俱是外搽洗敷者。各方均雜有毒藥。切勿入口誤食。且未懂事情之小兒者。每每以手搔癢後。誤將藥置回口內。凡關理小兒癰留意。或將有信石水銀味去之不用。免其誤食及可也。製癰水散者。以棉花塞鼻孔。

避免吸及此藥味。製造場亦於僻地為好。

(乙)癩瘡傳染最易。若生癩之衣服用具。坐櫬牀等。均可傳染。初起紅小點。痕癢不止。手足指罅必有。診癩檢此便知。

(一)癩瘡內服方 用辣蓼菴。矮脚幌傘各一兩。猪肉半斤。水煎服食。

(二)癩瘡外搽方 用枯礬。膽礬。硫磺。生川芎。白芷。樟腦各二錢。胡椒。沙薑各一錢。鷄蛋黃一枚。共煎至黑色研末開油搽。

(三)生油蠟外搽方 用雄磺二錢。胡椒。蛇皮各五分。共末茶油開搽。先用本條甲六方洗之。

(說明)治癩與癬同。除此方外。可參上甲各方治之。

第六章 痔

痔形狀甚多。特舉其最著者。卽肛門腸頭起花點。及出恭迫出如蛋如管。恭後必須按回方能起立。或尿迫腸頭痔瘡流血。痠痺疼痛。行動不便。此皆痔在腸頭蔓延腫脹所致。療治法。內服散毒清膿藥。外用殺菌枯痔。如於內痔過深部者。當用藥挿於肛門腸內痔中。取效爲快。

(一) 痔初起痕痛內服方 治痔初起肛門有花點。恭後見緊痛。用歸身。生地。蒼朮。荆芥。防風。枳殼。桔梗。茯苓。側柏。龜板。槐花。地榆各三錢。清水煎服。

(二) 痔瘡流血內服方 治久患痔。出恭流血。用歸身四兩。皂刺。蟬蛻各二錢。槐花米一兩。豬腸頭一截。長約一尺。共煎服食。連食多次。

(三) 痔瘡內服丸方 治痔長流清水。腸頭翻花痕痛。用白礬。黃蠟各二兩。雄磺精五錢。川連酒浸一宿撈起焙乾。烏梅將上餘酒浸之。百草霜各一兩。共爲末。米糊爲小丸。每日服一次。空心酒送服二錢。如不嗜酒者。滾水送食之。

(四) 遠年痔瘡管瘡內服丸 治痔遠年成管癩症。用枳殼(醋炙)。刺猬皮(炒)。槐角米各三兩。牛黃一兩。皂角刺七錢。麝香三分。阿磺(豆腐煲過)二兩。川連一兩五錢。共末米糊爲丸。每服六錢。滾水空心送食。

(五) 痔瘡痛甚內服丸 治痔瘡紅腫作痛。以此三香丸止之。用木香。鴉片煙

○白芷○寒水石各二錢○大黃四錢○乳香一錢半○麝香二分○共末○煉蜜為丸○每服五分○或八分○另食山甲(炒)○槐花米各五錢○入生魚肚內○共煲水服食多次○

(說明)痔在腸頭○食藥非有恒久○不能達其病所○因藥經過小腸時○已分泌藥力甚多○所以理痔者○內服必須外藥並搽○方能收效○

(六)痔瘡外搽方 治痔瘡凸出○如蛋如花○用輕粉○珍珠末○梅片○麝香○信石(煨過)各五分○陀僧三錢○白礬○皂角(煨存性)各一錢○阿魏○川連○甘草○蟾酥○膽礬各五分○共為末○豬膽汁開搽之○或加扁魚膽二錢開○以芫葉托敷○

(七)痔瘡外插方 用皂角(煨存性)○猬皮(煨存性)各一兩○田柒○黃連各三錢○陀僧一錢半○麝香○冰片○膽礬○血竭○乳石○蟾酥各二分○共為末○以糯米粉二兩○醋開搽上藥散○插入腸頭○每日一次○內腸花點痔消散○

(八)痔瘡外洗方 治一切痔瘡癢痛○用枳殼○荆芥○歸尾○甘草○木賊○朴硝

五倍子。黃葵花。九里明。榕樹鬚。硼砂。川連。川棟子。白芷。貫衆。
槐花。枯礬各五錢。共煎水洗痔瘡處。

(九)痔頭突出外氣薰方 用芫葉二斤。豬血四斤。五倍子。防風。烏梅各一兩。
以盆煮滾氣薰肛門腸頸痔處。連用七八次。搽用上各方。

(十)薰痔法 因痔餘毒不清。濕癢流水。用花粉。龍骨。石脂各三錢。甘草。
靈脂。乳香。沒藥各二錢。用棉花或布包藥三錢。火燒之放於缸中。人坐
缸口。使烟薰痔處。

(說明)痔之治法。內服藥外。必須取搽洗各方法並用。令其痔毒易清。方
無復發之虞。

第七章 瘰癧

瘰癧起於頸筋中。左右均有者。名爲夾板瘰。連串環頸者。名爲串珠瘰。內藏
水者。名爲水瘰。其致患瘰原因。一痰火盛凝痰結瘰。一由花界染梅毒凝毒結
瘰。一由喜食鼠野禽獸燥肝血凝結瘰。小兒多因喜食煎炒餅乾蝦蟹鯉魚燥熱凝

痰結癰。癰癰初起內服化痰藥散之。久之結核成膿。多自穿爛。調理手續過長。患癰者貴於早治。

(一)癰內服湯方 治痰火凝結成癰。以此方升散之。用柴胡。桔梗。赤芍。知母各一錢半。黃芩。甘草。歸身。膽草。川連。乾葛。黃柏。莪朮。連翹各一錢。三稜。花粉各四錢。升麻五分。清水二盅。煎回半盅。飯後一時服。早晚一服。

(二)癰癰內服方 治環頸串珠癰。用菊花葉。山枝。茯苓。歸尾各二錢。黃芩。熟地。白朮各二錢半。木瓜。白芍。龍膽草各一錢半。柴胡。生牡蠣。炙草。川芎。川貝各一錢。清水二盅。煎回半盅溫服。另用老鼠筋根。蛇抱筋根各二錢。鹽水炒煎作茶飲。

(三)癰癰益氣養營湯 治寒痰結癰。及乳癰癰潰爛。用石柱參(先煎)。白芍(炒)。川貝(打)。飯朮各三錢。川芎。香附。桔梗各一錢半。茯苓二錢。柴胡(酒炒)。甘草。陳皮各一錢。歸身四錢。北芪。熟地(砂仁伴)各五錢。

○清水二盅○煎回半盅溫服○如口乾加五味子○麥芽各一錢半○寒熱往來
加柴胡一錢半○川古三錢○膿已清加多北芪○石柱參各三錢○膿多加川芎
一錢○歸身三錢○膿不止加石柱參○歸身各三錢○肌肉遲生加白蘞三錢○
玉桂(去皮)三分沖服○

(四)癰癤內消散丸方一 治大人小兒癰癤○用穿山甲(炒)七錢○薄荷一兩二錢
○大黃一兩○三苓○莪朮○夏枯草各五錢○川貝○斑蝥(糯米炒黃色去翼
足)各四錢○共爲末○米糊丸○大人每服五分○將藥散劑每服三分○小兒
每服一分五厘○滾水空心送服○服後小腹必痛○其毒從小便疔出○若小便
痛甚○可服滑石六錢○甘草一錢○硃砂八分○正血珀五分○共末粥水送服
五錢○

(五)癰癤內消除根服食丸二 治癰癤兩邊皆有夾板癰症○用牛黃○海石(煨)各
一錢○川貝○桔梗各一兩○殭蠶三錢○牡蠣(煨)二錢○竹黃四錢○元參六
錢○北杏五錢○澤瀉七錢○珍珠七分○斑蝥三十隻(去頭足翅濕糯米炒黃

去米。夏枯草一錢半。穿山甲四兩（炒）。共爲末。煉蜜作小丸。每服二錢。小兒一錢。細蛇泡根湯送服。食上七天可食本條三方一料。其癩自消。

（六）癩內服丸方三 治耳下結癩核多粒。用元參。昆布。生地。夏枯草。生牡蠣。海草。菊花葉。天葵。郁李仁各五錢。斑蝥二十隻（去頭足翅）。加粳米三兩。和蝥蟲用酒煮滾放過夜炒乾去蝥蟲。取米入上藥爲末。煉蜜爲丸。每服三錢。小兒減半。米湯送服。癩毒由大便下。其癩自消。並食糯米粥。以解蝥蟲毒。

（七）癩內服丸方四 治痰火結癩。及連至肩成串癩癧。用正川貝。生牡蠣。海粉。人中白各一兩。元參二兩。牛黃二錢。草羊角四兩。（以威靈仙加水一斤煎至乾取角切片）。白芥子二錢。木香二錢。共爲末。煉蜜爲丸。每服三錢。小兒減半。夏枯草一兩煎水送服之。如痰多者。以蚰蛸二百隻。米酒三斤。熬三時許。取酒飲之。

若食上丸見燥者。可用細蛇泡根一兩。煲猪肉六兩飲食。

(八)癰內服丸方五 治婦女患癰。久不消散。用夏枯草。歸身。元參。烏藥。牛蒡子。川貝。白芍各五錢。桔梗。甘草。昆布。茯苓。紅花各三錢。北杏仁霜。羌活各二錢。香附(酒炒)一兩。丹皮。連翹。劉寄奴。半夏各一錢。共爲末。蜜爲丸。每服二錢。鹽水送食。每早晚食一次。

(九)癰內服丸方六 治夾板癰。及痰水癰。紅腫作痛。用烏貓一隻。(入尿壺火煨存性)。百合。川貝各五錢。枯礬三錢。甘草。法半夏。南星各一錢半。陳皮。海石(醋製)。海帶。白芥子(炒)。枳殼。橘紅。射干。茯苓。海草。金礞石(煨)醋製七次。全蝎各八錢。大黃(酒浸)。黃芩(酒炒)各一兩。共末。飛雄磺作衣爲丸。每服二錢。夏枯草一兩。煎湯送服之。如已穿爛者加蜂巢五錢。蠶蠶三錢。燈心一錢半。赤茯苓二兩。牛蒡子五錢。另以了哥麻蕈五錢。鷄蛋二枚煲食之。

(說明)此上湯丸各方。可按症對用。除以內服外。下貼敷洗法並用。或核

結難散。以丹藥取出之。但瘰癧至要開取瘰核。不過不得已而施。每每取核後。消毒不清。及誤傷大筋。則長流清水。結痂埋口甚難。本醫生治瘰。無不以內服藥消之。收效俾取核者爲安。

(十)瘰癧內服酒方 治虛弱嗜酒結核瘰。用威靈仙。防風。元參。川貝(去心)。夏枯草各二錢。獨活。川芎。牛蒡。菘朮。歸身。皂角刺。生地。山甲(炒)。金蟬蛻(去頭足)。羌活。金銀花。三稜。茯苓。連翹各一錢半。枳子五錢。雙料酒濕藥蒸熟。後用五斤浸之。每晨早煖飲二兩。

(十一)瘰癧外敷方一 治瘰癧紅腫。及穿爛鼠瘰。敷此消之。用白芷。紅花。川芎。生南星。歸尾。獨活。牡蠣。大棗。菊花葉。桐油子。草麻子。北芥子。水銀。花粉各三錢。海馬二對。共末蜜糖開煖敷。已穿者加生菖蒲。穿破石各五錢。改用生酒糟二兩。煖煖作餅。心加麝香三分。敷之頻流清水合。

(十二)瘰癧外敷方二 治小兒大人頸瘰初起。敷之取散。用生半夏。鴨仔菜。赤蕨。

鈎。水翁樹二囊皮。指甲花葉各一兩。白醋二錢。冷飯二兩。共搗爛。煮熱敷之。先鷹羽（煨存性）爲末。滾水開搽而敷。此藥在面。

（十三）癩外搽方 治癩起成串。左右頸皆有。以此外搽之。用蜂巢（煨存性）。百足（炒）。梅片。牛黃。青黛。川烏。南星。沙牛。蟾酥（炒）。川連。細辛。乳香。殭蠶。山茨菇。木鼈子各五分。共爲末。醋蜜糖各一錢。豬膽汁一兩開搽之。

（十四）癩外洗方 治癩經敷搽藥前後。以此方洗潔淨。用烏白樹二囊皮。艾葉。夏枯草。蜂巢。白芷各一兩。馬蹄匣。蛤屎屨。各一兩半。水二斤煎洗之。

（十五）癩已穿爛外搽口方 治癩穿爛外搽瘡口。每未搽前。以上方洗之。用白芷。白芍。生石膏各一兩。茸末。梅片各二錢。共爲末搽之。

（說明）既穿爛之癩。每早晚洗一次。令毒易清。埋口收功亦易也。

（十六）癩紅腫毒多水蛭吸血法 治癩癧紅腫難消。用水蛭一條。先檢定癩毒頭。

以墨點之。另用臘紙開一小孔。蓋癰凸出墨點處。即用玻璃燈筒載水蛭。吸正癰墨點處。水蛭聞知。立向此小孔墨點處吸此毒血。待其吸飽自脫。一條未清。可加用二三條。此筒放毒妙法。古名醫施中風症。即腦充血。在耳背血管放之。均有特效。放完後以石灰水洗水蛭吸口。殺其蝨菌毒。水蛭勿殺可放於海中。誠感互救好生之德。

(七)癰核外脫方。(毒藥勿入口食)治癰用藥托浮高出筋外皮下。用此引取出癰核。用紅升丹三分。白降丹七分。白芨末一分。水和爲小丸。以燈心火燒癰頭。置此小丸用下二十六方膏藥貼之。

(六)癰癰破爛外插方。(毒藥勿入口食)治癰癰穿爛。以此插入癰去消腐膿。用三仙丹一錢。沙牛二分。推車蟲三隻。麝香一分。共末用灰面水開。作藥條插入癰瘡口。外用膏藥封貼。每早晚用上十四方洗之。

(九)升丹方法。(又名五虎丹毒藥勿入口食)治癰核升托不散。以此丹引開取癰核。用信石。水銀。白礬。青礬。牙硝各三錢。用青萆四兩搗爛。攤開瓦

盆上。上蓋一碗。周圍用沙紙固封。另加生石膏於盆底。焰火三枝香久。候冷取蓋碗內升起之丹用。

金剛丹製法 卽白降丹與升丹等分和合之。其功力能達瘡底。

(二)紅降丹方法 (毒藥) 治癰癤久患。內用藥托起癰核。用此引開出之。用法

半夏。雄磺。硃砂。陳皮各一錢。水銀五錢。信石三錢。礪砂二錢半。白

礬。青礬。火硝各七錢半。降至合爲度。每丹一錢。加砂牛九隻研勻。以

飯爲丸。如綠豆大。製扁久藏爲好。臨症先以艾火炙三莊。以丹敷上。用

水調溶貼之。七日其癰核拔出。外洗以綠豆。甘草各五錢煎水。

(三)七寶丹方法 (毒藥) 治癰用藥攻不散。貼膏藥不消。以此丹引出之。用青

礬。白礬。生鹽。水銀。火硝。田柴各一兩。梅片五錢。將此藥乾放盅內

。上碟蓋之。坭封固。炭火燒三枝香久。越宿開取碟中丹。用冷飯爲丸。

如綠豆大。以下膏藥蓋癰頭。經多日癰核引出。另用紫蘇。薄荷。陳皮。

金銀花各五錢。煎水洗。流清毒以甘草二錢煎水洗。仍用甘草末摻之。

(廿二) 八仙丹方法 (毒藥) 治瘰癧惡瘡穿爛流膿水。用牙硝。水銀。青鹽。白礬。膽礬。青礬。信石。礪砂各三錢。共研細末。用上(十九方)升法。丹一錢。加沙牛十隻。牛黃五分。梅片一分。硃砂。田棗各二分。以飯作藥箭插患癩孔。三日一換。洗用上(二十一條尾方)

(廿三) 瘰核脫清方法 (毒藥) 琥珀散脫出瘰核後所需。用珍珠。牛黃。梅片各二分。琥珀。川百足(炒)各五分。輕粉。乳香。紅升丹各三分。雄磺。丹頭各四分。共末作膏藥心用。如瘰無膿。加生鷄骨(炒黃)末五分。而膿未清方中去琥珀。免早埋口復發之虞。

(廿四) 瘰貼藥膏方 治瘰穿爛惡毒不清。用南杏(去皮)。桃仁(去殼)。蓖麻子(去殼)各二錢。木鼈子五錢。麝香二分(後下)。梅片。硃砂各二分。麻油搗成膏貼瘰處。

(廿五) 瘰外貼膏心方 (毒藥) 用大黃。梅片。百足(炒)。血珀。象皮。枯礬。乳香。珍珠末各二分。丹頭。血竭。龍骨(炒)。雄磺各三分。共爲末。作膏

藥心用。

(說明)癩經穿破作痛久不埋口。想必內丹毒未清。或誤傷筋中。如接他人手醫理。當令其戒食無鱗魚。猪牛蜆蟻鯉鵝芝蕪薑醋橙果。並戒房事五個月。依上各方法。審定治之可癒。

(其)癩科膏藥方法

通治一切癩症。用細辛。猪牙皂。蘇葉。菖蒲。貝母。黃

芩。生地。連翹。金銀花。花粉。羌活。獨活。防風。荆芥。昆布。海草

赤芍。僵蠶。防杞。甘草。桑枝。柳枝。秦艽各一兩。全蝎五錢。用茶

油二斤。浸四十九日。去渣煮老。加生川烏。生南星。生草烏。生半夏。

銅青。枯礬。樟腦。雄磺各二錢。爲末攪勻。另落黃丹以成膏合。如症重

加蟾酥。冰片。麝香各二分作膏藥心。

(其)消癩核膏方法

治癩初起以此膏貼消之。用甘遂。大戟各二兩。生南星。

生半夏。僵蠶。藤黃。朴硝各一兩六錢。白芥子八錢。麻黃四錢。麻油一

斤。浸七天。煎老去渣。加黃丹成膏。用童便浸一月用。

(說明)上各升降等丹。內有毒藥甚多。製煉時於更夜靜僻處。免人吸着丹氣受毒。製者亦須防範。且製成之丹。亦要密藏。免人誤入口食中毒。凡關於製毒藥者。非有明師親為指示法門。不可輕視妄為。一經發生危險。功不能補過。執斯業者。不可不知也。

第五篇 花柳蛇鼠蟲螫六畜咬雜症

第一章 花柳

花界叢中染來之疔疔。枕菓白濁梅毒。統名為花柳。花柳實一種菌。每與患梅毒白濁。橈坐器具衣巾。均能傳染。其菌一經誤入眼中。立起點膜紅腫。療治花柳之方法。以瀉利殺菌藥為主。

(甲)疔疔生尿管。起粒如米碎痕癢痛腫名鵝嗉疔。穿爛名臘燭疔。連於周面部名為大疔疔。治疔疔貴於勤浸洗。

(一)疔疔外浸洗方 治一切疔疔症。用防風。荆芥。金銀花。九里明。青芩。枯礬。五倍子。鹽欖。生白欖。甘草節。大黃。川連。茯苓皮。

龍膽草各三錢。山檢葉。大油金。蕉葉。葶麻頭各二兩。水三斤煎洗。

浸。洗白濁同用。

(二) 疔疔內服方 用土茯苓。皂角。金銀花。皂角刺。川椒。薏米各三錢。

花粉。防風。木通各二錢。肥猪肉二兩共煎服。

(三) 疔疔外搽散方 用彝茶。銀砂。麝香。流金石。珍珠。川連。三仙丹。

田柒。川蠟。血餘。滑石各五分。硃砂。硼砂。梅片各一錢。共爲

末搽患處。

(四) 疔疔內服丸 治疔疔與身面俱有。用穿山甲。大黃。血竭。雄磺。紅

花。川連。連翹。槐花。金銀花。百足各二錢。滑石。歸尾。沒藥。

乳香。木通。前子各三錢。江子肉。麝香。正梅片。斑蝥(去頭足)各

五分。共末。米糊爲丸。辰沙作衣。每服一錢。

(五) 疔疔嗅鼻方 用百草霜二錢。水銀。錫粉。地檢。九里明各一錢。硃

砂六分。冰片二分。麥冬(煨存性)。紅棗(煨存性)。辰砂各一錢半。

(丙) 淋毒

艾茸四錢。沙紙捲埋二條燃烟嗅之。另用甘草。綠豆。山豆根。黃柏。花粉。猪苓。川連。赤茯苓。石膏。桔梗。土茯苓各二錢。煎水含

口。

(六) 瘡疔潰爛名蠟燭疔內服方 用甘草。大黃。川連。黃柏。歸尾。生地

連翹。枝子。山甲。茯苓。紅花。麥冬。桑白。木通。黃芩。胡麻

(四) 前子。九里明。金銀花。花粉。槐花各二錢。雄磺末。珍珠末各二

分冲服。水煎服。六國文前通水入氣管內。

(七) 蠟燭疔外搽方 用甘草。滑石。黃柏。雄磺。川連。乳石。沒藥各

二錢。牛黃。梅片。珍珠末。麝香。血珀各五分。共末搽之。用猪膽

汁開。血。淋。各一錢。金。血。山甲各一錢。

(乙) 白濁初起小便刺痛。濁菌在內增殖。不數日尿管腫大。濁中帶血來。內菌

蝕爛血管之證。內服藥。並外洗之。則毒易清。

(一) 白濁內服方 用赤芍。元胡。前子。鬱金。劉寄奴。枝子。川連。澤

(一) 瀉。歸尾。牛棗各二錢。秋石。瞿麥。海金沙沖服。甘草。生地各一

錢半。燈心甘子。水煎空心溫服。

(二) 白濁內服丸。用大黃。黑牽牛。鍾乳石各三錢。牛黃。珍珠各七分。

麝香五分。血珀。梅片各一錢。金蟬蛻。彝茶。血竭。穿山甲各一錢

。共末爲丸。辰砂作衣。每服五分。

(三) 白濁外洗方。用輕粉。川連。五倍子。雄磺。野菊花各二錢。膽礬五

分。煎水洗。以第六圖皮節節水入尿管內。

(四) 白濁內食方。用白欖蕪。水枝蕪各一兩。白菜乾。猪血。水豆腐各四

兩。水二斤煎回半斤。空心溫服。

(說明) 疝疔白濁之方。可互相用。其藥均是去毒殺菌。並食徐仁甫白

濁丹爲妥。

(丙) 梅毒杌菓魚口。由梅毒凝結腿罅腫大。如杌菓樣。名爲杌菓。既已化膿穿

爛。瘡口因行動作聲開合。名爲魚口。治法未成膿內服外敷可散。既穿爛

用生肌埋口藥。

(一) 杧果外敷方一。治杧菓初起敷散之。用桃仔葉。半邊蓮。獨脚烏白。菊花葉。葶麻子。花粉。共搗爛煑熱敷之。或單用信石五分入雞蛋內煑熟切開敷之。

(二) 杧果外敷方二。治杧果魚口已穿爛敷。生半夏。生南星。白礬。雄磺。各二錢。麝香。冰片各二分。用鷄蛋白開敷。面用艾火灸之。令其煖熱。毒易清。繃紮法如十四圖。

(三) 杧果魚口內服方。用穿山甲。生地。木瓜。大黃。土茯苓。川連。黃芩。黃柏。歸身。甘草各二錢。百足(去頭足)二條。滑石。槐花。防風。荆芥。薄荷。川芎。半夏。木通各一錢。水二盅煎回半盅。猪膽汁一兩空心溫服。如痛加沒藥。乳香各一錢。

(四) 杧菓外洗方。用葶麻子一兩。巴豆炭。木鼈炭。馬前炭。山甲。殭蠶。五倍子各三錢。水煎洗瘡口。此方加猪膽汁開敷。並能拔出疔毒。

根。

(五) 枕蓂內服丸方。用大黃。黑白牽牛各二錢。川連。江子肉各八分。金

蟬蛻。全蝎。殭蠶。山甲。白芷。川貝。花粉。連翹。皂角各一錢。

共爲末作小丸。每服一錢。另用了哥麻菴二錢煎水飲。

(丁) 梅毒枕果魚口埋口後。周身面部起大疔。頸中起瘰癧骨痛。或如紅癬。婦

女陰戶腫爛。皆餘毒未清所致。

(一) 梅毒潰爛多年不癒外搽六脈方。用五倍子。大黃。輕粉。錫粉。乳香。

生枝子。黃柏。黃連。大楓子。青黛。膽礬。雄磺。硫磺各一錢。

(二) 江子肉。梅片。彝茶。銅青。枯礬。珍珠末各五分。麝香二分。白降

丹。信石各五厘。水銀三錢共末。麻油一兩。擦手足脈門腕較。早晚

擦一次。七日見牙痛等。甘草。蜂巢。綠豆各一兩。煎水含口內。毒

從牙脚出去之。

(三) 梅毒發周身疔內服丸。治梅毒週身紅大疔。用葶藶。硃砂。牛黃。珍

珠。蛤粉各一錢。甘草。黃芩。犀角。海石。川古。枝子。木通。紅
花。大黃。川連。茯苓。乳香。沒藥。知母各一錢。百足（去頭足）七
條。共末爲丸。每服二錢。上部多加川芎。升麻各一錢。中部加桂枝
五分。下部加牛蒡七錢。倘穿加皂角刺一錢。

(三) 梅毒大疔潰爛外搽方 用膽礬。枯礬。珍珠。草薺。雄磺。歸身。銅

青。冰片。乳香。沒藥。水銀各一錢。五倍子。硃砂。尋茶。輕粉。

(丸) 象牙（煨）。龍骨（煨）。紅褐子灰。海巴焙各五分。鱉甲灰。狗骨灰各
二分。共爲末茶油開搽。或乾摻之。

(四) 梅毒入骨手足癱瘓骨痛內食方 用生雞仔乙隻。去頭足內臟。大茉莉
薑半斤切片。以火燒紅鏊加酒泡之。另加水清煎食之。並食上甲四

方。

(五) 梅毒深入肌肉腫大耳厚面起風僕紅核內食方 用生雞一隻。以五虎丹
五分俾雞食。此雞二時許量。將雞去毛。以針針密雞屎屨。煲熟去內

腸臟。食此雞肉。此人全身出汗。辛苦非常。約二時度。用生豆腐食之解。另服甲六方加重大黃一兩瀉之。則毒清腫消。

(說明)本條一方與五方。內毒藥甚多。係治最烈之梅毒症。但用毒藥攻病。非有醫生經手泡製。不可輕用。免發生危險。

(六)患梅毒水管流血不止內服方 用松柏葉一兩。山檢果乾五錢。共末滾水沖服。

(戊)婦女患梅毒。常流紅白五帶。陰戶疳疔腫爛等。可用上各方治之。

(一)五淋濁內服方 治男婦淋濁作痛。用瞿麥。枝子。扁朶。滑石。甘草。木香各一錢。木通。前子各三錢。海金沙沖服一錢。秋石五分沖服。水煎好。白粥調服。如淋閉塞欲死。連服多劑痛止。

(二)婦女疳疔內服方 治男婦疳疔日久不癒。用滑石。石膏各九錢。辰沙。甘草各三錢。牛黃二錢。麝香三分。共末。土茯苓半斤。煎水送食。二錢。每早晚一次。

(三) 婦人下陰戶疔瘡痛內服方 用生地。歸身各二錢。白芍。川芎各一錢

半。乳香。甘草。沒藥。黃柏(酒炒)各一錢。清水煎服。

(四) 婦人下陰戶疔瘡外搽方 用血珀。珍珠末。象皮。乳香。沒藥各一

錢。梅片。血竭各二分。共末搽之。

(五) 婦人患過梅毒生子女免胎毒方法 用黑鴨鵝乙隻。將所割出之鴨血。

及鴨毛煎水五六斤。加豬膽汁二兩。將產生之男女洗身。在二朝內照

用。可免患胎毒等症。

(六) 小兒疔胎毒內服外搽方 用犀角。金銀花。生地。川連。連翹。元

參。青黛各一錢。土茯苓四錢。共末。乳汁開服二分。或蕉樹汁開搽

及洗用。


第二章 蛇咬

蛇之毒在牙。以牙咬時。其毒滲入。該受傷局部感毒立腫。霎時蔓延周身。若

不知醫理。人遂昏危。

(一) 防法。毒蛇咬傷手足。即用帶紮實上部。不俾蛇毒速行上冲。紮帶頭用生結。因蛇毒腫大時。易於解除。立刻用刀將蛇咬口處肉挖除去。以防蛇牙脫藏其中。如在血脈管部。亦要向傷口用銀刀器等。在傷口上部刮下。隨

第十二圖



刮隨用滾過冷水沖洗。連沖洗至血流鮮紅。若滾過水一時不便。以淨清水亦可。但沖洗刮下。愈多愈好。則毒自清。惟切不可復用沖過之水再沖。即要連用蛇咬丸酒開。半服半敷傷口上部。

蛇咬紮法。先將繩摺作三度。將兩灣頭紮之。如甲圖。兩繩頭亦作一結。免其誤抽及之患。即乙圖。後覆紮時。將二繩抽緊。一繩邊放開。成一小孔圈。解繩時。將一繩小孔

圈抽之。其結自解。如丙圖是也。

(二) 毒蛇咬內服外敷丸。治毒蛇咬傷黑腫。外敷內服。用細辛。雄磺精。吳萸。川貝。五靈脂各一兩。雞骨香。蛇抱筋根。獨脚烏白各二兩。韓信草。田基王。蟾酥。半邊蓮各三兩。竹黃。黃連。鹿耳苓。千里香。蛇通管。狗腳跡各四兩。入地金牛五兩。共爲末。米糊作丸。每箇重五錢。另加雄磺精爲丸衣。如遇毒蛇用酒開丸噴蛇。蛇即身軟不能行走。或作散。以樽載之亦得。

(三) 毒蛇咬內服方。治毒蛇咬傷。防蛇毒蔓延。雄磺精二錢沖服。威靈仙。吳萸。甘草。金銀花。五靈脂。法半夏。川連。白芷。連翹。川貝。鹿耳苓。花粉。歸身。生軍。芒硝。蒲公英各四錢。清水煎好。加酒一杯沖雄磺服。

(四) 毒蛇咬內服外敷方一。用鋪地錦(卽丁貴草)半斤。搗爛。雙酒沖。以一半服之。另一半加黃糖。酒糟各一兩。敷傷口四圍。每日換二次。

(五) 毒蛇咬內服外敷方二。用雙眼龍樹二囊二兩。搗爛酒沖服小杯。其餘外敷。

傷口。若傷口不開。加了哥麻二兩。鹽二錢。熟烟筒屎五厘。百足草一兩。共搗爛敷之。

(六)毒蛇咬外洗方 用威靈仙。吳萸。白芷。細辛。貝母。羽箭。雄磺。苦參。各一兩。鹽五錢。共煎水洗傷口。

(七)青蛇咬方法 青蛇咬。立將蛇打得。開取蛇膽。將膽一半內服。一半搽咬傷處。無論何種毒蛇。取該蛇膽服搽最效。並用上蛇丸治之。外用酸味葉一斤。煎水洗傷口。狗宗蛇咬依此方法治之合。

(說明)毒蛇咬致命甚快。求藥每於不備。身中可常備吳萸一味。被蛇鼠咬。單以一味服搽先。可免蛇毒速中。且以此味和酒噴蛇。蛇自順服不能走。

第三章 癩狗咬

癩狗之毒在牙。咬時毒從牙灌入。被咬者人漸昏如狗吠聲而亡。被其咬六畜牛等亦癩。咬於樹木亦乾枯。可見其毒之害。凡畜狗者。切不可用硫磺燥熱物飼

之。一經發癩。害人不淺。治療非經多時日。不能將其毒去清。

(一)癩狗咬時。即將癩狗殺之。取狗膽食一半。一半搽傷口。另每日用滾水磨虎牙搽傷口及服。

(二)癩狗咬內服外搽方一。治癩狗咬獨步驗方。用萬年青一斤。搗爛滾水沖服。一盅。渣敷傷處。連食至好爲止。另每日用秤星菴。苦心菴各四兩。煎水作茶飲之。

(三)癩狗咬內服方二。用斑蝥七隻(去頭足糯米炒去米不用)。生附子一錢。二味共爲末。酒送服。服後片時小肚作痛。其毒由小便出。若咬傷日久。有惡物形下。禁忌酒色五月。外敷茨菇芋仔各二兩。杏仁。黃糖各一兩。共搗爛敷之。

(四)癩狗咬內服方三。用黨參。羌活。生薑。獨活。大黃。桃仁。前胡。柴胡。枳殼。桔梗。茯苓。甘草。川芎各三錢。生地榆一兩。紫竹根四兩。地鱉蟲七隻。水煎溫服。連食上七劑。用白豆試生食之。如生氣欲嘔者毒盡。

若見甘味。照上方再多二三劑。加蜜糖。酒各一兩沖服。此人作癩狀。加烏藥一兩。

(五)狗咬外敷方 用指天椒。雄磺。黑牽牛。白牽牛。大黃。木鱉各二錢。鹽一錢。共末敷之。(此方癩狗咬不合用)

(說明)狗咬之傷口。切不可俾其埋口快。一經埋口。毒在肉發作。時可用熟礪砂一兩。滾水一斤沖洗之。

第四章 百足咬

百足又名蜈蚣。其牙與尿甚毒。每被其咬之。腫痛難堪。誤食其尿。而不知救。多會至命。

(一)誤飲百足尿內服方 百足發生於陳舊屋宇。每聞鷄肉香氣。吸食後放尿於其中。食物不經百滾。其毒未散。人誤食之。喉腫腹痛舌脹。眼紅氣喘而斃。用酸五連乾(即洋桃)半斤煎水飲之。

(二)百足咬外搽方一 用蘭花蕚。秧居草。光松毛。百足草。黃皮核各一兩。

烟葉二錢。共搗爛搽之。

(三)百足咬外搽方二 用燈心炭。人指甲炭各等分爲末。茶油搽之。如一時不便。用人口水擦腎囊油搽之止痛。

(四)百足咬外洗方三 用了哥麻。光松毛。酸味葉各二兩。煎水洗之。

(說明)百足生於屋宇中。欲驅除此蟲。用人頭髮燒烟薰屋。百足聞烟遠逃。若在樑中。卽刻跌下而斃。

第五章 虎鼠貓咬 衣虱 癩狂 死人風 戒洋煙 隔食

(甲)虎咬方法 虎咬爪傷甚毒。內食生冬瓜。白糖點食多日。外用下方敷之。用細樣蕃薯藤。狗苓耳各半斤。共搗爛敷之。

(乙)鼠咬方法 鼠乳嚙爲最毒。每被其咬後。徧身起瘰核穿爛。用荔枝乾肉嚼爛敷之。並多食荔枝乾。蘇鼠咬用五涼草。森樹蕊各二兩煎水飲。另以甘蔗汁袋水洗之而癒。

(丙)貓咬方法 貓咬不可俾其埋口。卽用紫蘇葉四兩搗爛敷之。並用此味煎水

洗之。

(丁)衣虱方法 用百部根。大楓子油各一兩。水銀。胡麻油各五錢。共末布包塗之。另用草烏頭。百部。白芷。樟腦各一兩。煎水浸洗衣服。

(說明)衣虱寄生人身之衣服蟲。在皮膚吸引血液。患者癢。爪搔痕暗色。經久不消。多在下流社會。及渡船客旅者傳染。

(戊)(一)癩狂內服方 治痰入心竅。亂呬發狂症。用牛黃。巴豆霜。白礬各三分。辰砂一分(水飛過)。共研末。米糊分作二十丸。辰砂作衣。用蠟封固溫水吞一丸。如經半時不瀉。再服一二丸。令其或吐或瀉。若其不肯食。將丸納於糕糍中食之。忌食肥豬肉一月。孕婦忌服。

(二)癩狂內服方 用絲瓜仁(打)一斤。煎水服之即吐。後用金櫻樹寄生二兩。燻瘦豬肉。或鴨肉食多次。

(三)癩狂內服方 治癩狂經久不癒。用此吐之。蜀漆。川貝。甜瓜蒂各四

錢。北芥子。竹黃。瓜蒌仁。萊服子。星朴。大糯菑各五錢。白礬二錢。沖服。水煎溫服。服後卽吐。

(說明)癲狂者。皆痰之作用。療治之初。當以吐劑入手。若經久時間。及因體素虛致者。可參上冊癲狂門。按脈施治爲安。

(己)生人染着死人風方法。人死出汗之際。其風乘此而出。生人手着之。該手患風痺。名爲死人風症。用牛肉半斤。酒半斤。煮飲食之。如經久者。用水豆腐一斤。酒半斤。煮飲食之。外用豆腐水六斤。杉木刨口一斤。共煎水洗患處。

(庚)戒洋烟方。用酸楊桃四斤。切碎曬乾。黃糖半斤。共煮。每早晚食一兩。烟癮漸斷。


(辛)隔食內服方。用砂仁。桔梗。麥冬。半夏。蒼朮。金礬石。香附。橘紅。枳殼。白豆蔻各二錢。彝茶。沉香。辰砂各一錢。麝香一分。沖服。水煎溫服。此症可參上冊隔食門施治。

第六篇 跌打刀傷湯火炮傷急救法

第一章 跌打

跌打刀傷炮傷。診斷對關於受傷時間。與六脈循環部位中傷。用藥與部位所傷之引藥。亦當參考明瞭。救治亦分還氣醒迷。止血止痛。吊瘀推瘀。局部麻醉。整骨繃紮。防腐生肌諸方法。

子午卯酉辰戌



第十二圖

(二十一)

跌打於每日時晨。及中傷六脈部位圖。

(甲) 跌打診斷法。時晨傷中六脈首行部位。多屬危險無醫。即子頭側腦痛歸終。午鼻眼耳不堪用。卯舌喉項多見重。

酉心乳肺及脇胸。辰腹臍中肝脾胃。戌主兩陰兼尾龍。傷逢部位六脈時。危過七天醫有功。

(說明) 人身血脈循環。與日中時間有關係。卽寅卯陽興喉乾。午面紅唇焦。此是血脈之應時外現。人所知見。其於內現者。非有深悉國醫國技術。多不領畧其所以然。因此統名爲六脈時。該部時脈行有失其衛護之作用。加以外打擊中傷。因此爲危重也。

(乙) 跌打傷部位用藥法。依所傷方法。加入各部藥引。引帶諸藥療治功效。

(一) 腦頭傷 除需用各藥外。加藁本。大黃(酒炒)各三錢。

(二) 眼目傷 加木賊。白菊花。蒺藜(去刺)各三錢。

(三) 肩 傷 加秦艽。骨碎補各四錢。

(四) 手 傷 加桂枝二錢。牡蠣五錢。

(五) 心胸傷 加丹皮三錢。

(六) 脇 傷 加木香。白芥子。枳殼各三錢。細辛一錢半。

(七) 腰 傷 加橘紅。杜仲。萆薢各三錢。

(八) 脚 傷 加大黃。厚朴各三錢。

(九) 腳盤傷 加青皮。檳榔。牛柴各三錢。

(十) 打傷腰間。受風自不知痛苦。呵呵大笑。加杜仲。破故紙各三錢。砂

仁。小茴香。木香。丁香各一錢半。

(十一) 打傷遍身肉痛 用松節。虎骨。秦艽。乳香。沒藥。川續斷。南杏。

靈仙。羌活。骨碎補各五錢。

(十二) 打傷遍身骨節痠痛 用白芷。歸身。郁李仁各三錢。枳殼。生地各五

錢。血竭一錢。

(十三) 打傷肺臟咳嗽氣促 用麥冬。杏仁。元參。桔梗。蘇子。陳皮。枳殼

各三錢。

(十四) 打傷臟腑洩血 用川連。槐花。地榆。厚朴各三錢。木香一錢半。

(十五) 打傷腹脹 用厚朴。枳殼。香附。烏藥各三錢。青皮。檳榔。木香。

山楂各一錢半。

(十六) 打傷嘔吐不止 用砂仁。白豆蔻各三錢。丁香一錢半。

(七)打傷腎胞尿出不止 用萆薢。益志。牡蠣各二錢。

(六)打傷腎水管小便淋漓 用冬葵子。扁蓄。瞿麥各三錢。辰砂一錢冲服。

(五)打傷膀胱小便不通 用車前子。木通。猪苓各三錢。澤瀉。滑石各四錢。

(四)打傷大腸腹部積瘀大便不通 用枳殼。烏藥。紅花。桃仁。青皮。田
柴。赤芍。歸身。大黃。朴硝各三錢。川芎。白芷。細辛各一錢半。
酒水各半煎服。

(三)打傷身體發熱 用花粉一兩。滑石。南星。蒼朮。赤芍。陳皮。川連。
柏葉(酒炒)。黃芩(酒炒)。白芷。甘草各三錢。如痛甚加田柴七錢。
生薑三片。

(二)打傷血水常流痛不能忍 用蒼朮一兩。川烏五錢。天麻。白芷。川芎。
各三錢。全蝎(稍炒)二分。紅黃七分。乳香八分。共爲末每服一錢。

酒冲服。

(三) 打傷受風。及破口傷風。手足掉直發痙不止。用人手指甲(煨)六錢。硃砂。南星製。獨活各一兩。共爲末每服二錢。酒冲服。

(四) 打傷中風角弓反張。用百足一條(炒)。全蝎二隻(炒)。共爲末。先吹鼻。後擦牙內。

(說明) 跌打所傷之部位。各方中應照所傷加引藥。使藥力直到傷處。此是跌打用藥最要之法門也。

(丙) 跌打傷內服方法。司跌打刀傷科者。必須常備丸散。不至臨時束手。如係湯劑。亦將方改爲散。用時以滾水冲服。不使煎藥煩難。如隨軍出發之救傷隊。所需藥品。更要完備。

(一) 跌打傷內方一 治一切跌打所傷。其所傷之部位。照上乙各條加入引藥。用茜根。血竭。靈仙。川連。西紅花。歸尾。木通。桃仁。大黃。生枝子。前子各三錢。田棗。乳香。羌活。生地。白朮。黃柏。牛

柴。沒藥。黃芩。生柏葉各二錢。木耳。木香。鬱金各一錢。水酒各二盅煎服。上部加川芎。手足加桂枝各二錢。

(二) 跌打內服方二 治跌打積瘀作痛。用元胡。桃仁。烏藥。香附。蘇木。川芎。劉寄奴。田棗。防風。獨活。紅花。骨碎補。車前子。乳香。沒藥各三錢。歸身。生地各六錢。酒水各二盅煎回半盅。加童便一杯沖服。如傷各部引藥。查上乙例。下湯方倣此。

(三) 跌打破血過多內服方 用炙芪。炙黨。茯苓各四錢。麥牙。白芍(酒炒)。炙甘草。防風。乳香。沒藥。粟殼(炒)各三錢。山楂二錢。熟地一兩。歸身六錢。清水煎服。

(四) 跌打內服散瘀血止痛方 治一切跌打痛不止。用澤蘭。紅花。續斷。牛棗。南星。歸身。鬱金各三錢。沉香。自然銅(醋製七次)。沒藥。防風。青皮。田棗各二錢。生地五錢。血竭。乳香。赤芍。川貝。甘草。桃仁。木瓜。蘇木各三錢。酒水煎服。

(說明)此湯方亦可改用散。以錫瓶封固。臨時用水滾加酒沖服。照上原方分三次。每早午晚服一次。服時飲藥水。不可服渣。其功效亦同。且便於攜帶也。

(丁)跌打內服丸散劑。與外敷丸散方。應用甚大。每製散必親自檢正藥品。用電機或研盤。研至極末。方可施用。

(一)跌打內服消腫止痛散方一 用大羅葉。薑頭各三兩。苦楝葉五兩。羌活。獨活。麻黃。升麻。蒼朮各四錢。虎骨。半夏。大黃。南星。白芷。川芎。草烏。薑黃。山茨菇。山甲。枝子。花粉。黃連。黃柏各三錢。共爲末。每服三錢。酒沖服。其腫可消。

(二)跌打失氣內服散方二 治因跌打過重失氣。用三稜。莪朮。蘇木各四錢。田棗。厚朴。檳榔各二錢。防風。血竭。自然銅。紅花。半夏各三錢。熊膽。人中白各一錢。共爲末。每服一錢半。酒沖服。若不醒。以此噴面鼻。

(三) 跌打傷外敷方一 用九里明。紅背沙。鳳尾草。鐵線草。白麻葉。黃花母。大蒲葉。牛暑葉。山艾葉。干打葉。韓信兵。小牛棧。東榕葉。大那葉。大板葉。狗屎葉。田基王。石上雲。鷄婆翼各二兩。加皮二兩。乳香。沒藥。血竭。骨碎補。續斷各一兩。以上草藥在五月五日採之曬乾。共研末。用酒加灰麵開煮熱敷之。如折骨斷骨。加用屈頭鷄仔七隻。大小還魂。韭菜頭。鷄骨香。千里香。獨行千里。大小幌傘。入地金牛。落地金錢。杉木炭。扯牛入石各二兩。共敷傷處。一對時見傷部聞响聲合。

(四) 跌打腫黑吊瘀外敷散方二 治跌打積瘀黑腫症。用生大黃。生南星。生半夏。黃柏。黃連。紅花。連翹。花粉。蘇木。川烏。草烏。蒼朮。龍骨。桂枝。枝子。薑黃。沉香。靈仙。沒藥各二錢。共爲末。蜜糖酒煮敷患處。傷眼目加桃仁。生地各三錢。傷骨節四肢。加胡椒。細辛。樟腦。生薑。葱頭各一錢。黑腫折骨。加澤蘭。白蘞。白芨。

蒺藜各五錢。旱榕樹葉一兩。如傷大腿部加葶藶子。北芥子。歸尾各三錢。鷄蛋白四枚。

(五) 跌打諸傷外敷散方 治跌打諸傷症。用血見愁。苦地膽。扁柏葉。大風艾。犁頭草。黃枝葉。斑鳩酸。滿天星。木棉皮。鵝不食草。山桔葉。澤蘭。梧桐皮。大還魂。鬼燈籠。生用各二兩。乾爲末各一兩。加薑黃。甘草。血竭。乳香。沒藥。鐘蕊石。田柒各五錢。共爲末。白糖一兩共酒煮熱敷傷處。

(六) 跌打傷內服外敷丸一 治跌打刀傷及炮火傷症。用千里馬。六月霜。大金櫻。小金櫻。山油麻。路邊燈。走馬胎。山湖跳。千斤拔。白花燈。生枝子。午時合。匿麻金。五指甘。鹹霜菴。檜桐菴。青梅菴。英山紅。台烏。小牛大力。鷹不撲。白蠟菴。散血丹。還魂草。小熊膽。松光節。薑柒。山胡椒。滿山香。韓信兵。鵝不食草。鐵線草。田基王。澤蘭。鹿耳苓。透骨消。丁貴草。犁頭草。酸味草。白鐵線

草。馬邊草。荔枝草。劉寄生。無節五良草。麝香。血見愁各二兩。每年五月五日採此草洗淨曬乾。共爲末。酒糊作小丸。每服三錢。外敷隨加。若失氣者。用芥菜子。蘿蔔子各二錢爲末。熱酒冲童便二錢灌服。若各傷破口將丸爲末開蠟燭油外敷之。

(七) 跌打諸傷內服丸二 治跌打失氣。一切重傷危症。用羌活。荆芥。木通。歸身。澤瀉。牛黃。破故紙。續斷各八錢。劉寄奴。台烏。蘄艾。蒲黃。靈仙。靈芝。薑黃。獨活。白芍。熟地。青皮。桃仁。枳殼。丹皮。丁香。細辛。黑豆皮。莪朮。紅花。鬱金。茄筋。木耳。升麻。加皮。油桂。血竭。香附。三稜。防風。珍珠。骨碎補。大黃。蟹殼(煨存性)各六錢。元胡。自然銅(醋製七次)。無名異。檀香。琥珀。川芎。白芷。乳香。沒藥。澤蘭。蘇木。彙茶。白朮。山甲(炒)各四錢。石柱參。熊膽。麝香。梅片。川椒。降香。木香。土鱉。南星。木槩子。人中白。虎骨。五爪龍。皂角刺。白蠟(醋炒)。地龍。

(煨存性) 半夏 田棗各二錢 馬錢(去毛醋煑製黑色存性)五分 共爲末 煉蜜爲丸 辰沙爲衣 每服二錢 酒童便沖服。

(說明) 此方馬錢毒藥也 製此毒藥 切不可假手於人 可免製法不良之弊。

(八) 跌打內服丸三 治跌打所傷內服外敷症 如炮火傷不合用 用血竭 虎骨 桃仁各一兩半 丹參 澤蘭 赤芍 羌活 黃芪 甘草 薄荷 厚朴 南星 陳皮 續斷 茜根 歸尾 加皮 防風 參鬚 蘇木 大黃各一兩 西紅花 田棗 白芍 白芷 白芨 白朮 黃柏 黃芩 枝子 牛蒡 川連 連翹 花粉 荆芥 川貝 川芎 前子 骨碎補 木通 桔梗 三稜 獨活 靈仙 海馬 莪朮各五錢 桂枝 細辛 沒藥 乳香各三錢 熊膽 野狗膽 生猴爪各一錢 加入生草藥 天吊香 駁骨消 駁節草 出山虎 遠薑 榕樹鬚 田基黃 假芝蘭 入山虎 黃京膽 韓信兵 石叻青 大還魂 過山風 朱

中仔。鐵線草。黑節關。蛇利草。鵝不食草各一兩。共爲末。以生地一斤熬膠爲丸。礞石爲衣。每服三錢。如失氣童便酒沖服。

(戊) 跌打內服外敷酒。麻醉膏藥。必要常備。不至需時束手。但於製煉各法。亦當研究。

(一) 跌打內飲外搽敷酒方。治跌打腫痛外搽內服。用木瓜。續斷。杜仲。

茜根。靈仙。蘇木。虎骨。桃仁。紅棗。木耳。赤芍。韓信兵。絢牛

棧。入山虎。田基黃。遠薑各一兩。牛柴。紅花。三稜。骨碎補。丹

皮。桂枝。羌活。歸身。銀花。生地。乳香。沒藥。榕樹強。防風。

血竭。香附。沉香。元胡。鬱金。黨參。田柴各五錢。檜桐木強二兩

。共粗末。用雙蒸酒三斤。浸數十日。布格渣。如跌打內臟疼痛。

服二三兩。或骨傷整理時。先服此酒止痛。

(二) 跌打外搽敷酒方。(忌服食) 治一切跌打黑腫痛外搽擦之。用生半夏。

生南星各六錢。生地。大黃。薑黃。荆芥各四錢。桂皮。陳皮。樟腦

○鹼沙○紅花○歸尾○細辛各二錢○共粗末○雙蒸酒二斤○浸十餘天

○加酒精四兩○凡腫痛者○以此搽之消腫止痛○

(三)麻藥內服方一 用於整骨施刀割之前○令其麻木不知痛苦○用紫京皮○木鱉子○生川烏○生草烏○木香○歸身○白芷○沒藥○小茴香○萬
佗羅○猪牙皂○川芎○共爲末○每服五錢○酒冲服○若麻醉不醒○以
鹽水五分○飲之而醒○

(四)麻藥內服方二 治無論銅鐵箭碼彈竹木入肉不出○服此施刀不痛○用
開楊花五錢○田柒○洋烟各一錢○麻黃○胡茄○薑黃○川烏○草烏各
三錢○靈仙○白硃砂○白丁香○石膏○人中白○乳香各一錢半○冰片
五分○共爲末○每服二分至五分○另用蜂巢半斤○浸酒一斤○取酒二
錢冲服○解用甘草一兩煎湯服甦○

(五)麻藥外敷方 用於局部麻藥○將該局部用酒開此散敷之○令其麻木施
刀○免其痛苦○用生川烏○生南星○生半夏○胡椒各八錢○蟾酥○麝

撥各四錢。細辛。公麻雀糞各一兩。共研末。用酒開敷患處。約半時許。該局部以針刺試失知覺。而後施刀割可也。

(一) (說明) 傷科之用麻醉藥甚廣。但製麻醉藥。必須親手監製。免其分量不合。且用之分量。亦當注意。一經過量。久醉不醒。非得師長明白指示。不可輕用。即今哥羅仿。嗎啡。經已製成分之麻醉藥。尙審查其身體之強弱。心臟能否抵當否。方可施用。內服三四兩方。亦當如此審慎也。

(六) 跌打外貼藥膏方 治一切打傷作痛症。用生南星。生半夏。大黃。白芷。白礬。青礬各五錢。細辛。五苓脂。樟腦。百草霜各三錢。共爲末。茶油一斤。熬至滴水成珠。加黃丹六兩。桑枝攪至七成結。加上藥末。不歇手攪勻。用水煎過去火毒用。

(七) 跌打外貼軟膏方 治跌打不拘傷何處。及小兒胎毒。刀斧重傷症。用半邊蓮。蒲公英。益母艾。山桔葉。獨脚烏白。茄根。扁柏葉。鵝不


食草。山榆葉。霧水葛。豹狗。鹿耳苓。木棉皮。小榕葉。木鱉子。
白薯蕷。土茯苓。黃枝子葉。田基黃。血見愁。苦地膽。犁頭草。假
黃薑。金銀花。九里明。大黃。文蛤。豬膽。鯉魚膽。澤蘭。薑黃。
甘草。白芨。白蘂。川蓮。苦參。朴硝。草麻子。菊花葉各四兩。用
瓦缸燉至三分一水。去渣熬成如膠樣。加入下藥攪勻。劉寄奴。血餘
煨。蒲黃(煨灰)。血竭。乳香。沒藥。雄磺。石脂。田柒。牛黃。冰
片。花蕊石(童便製二次)。黃蠟。白蠟。黃明膠各四錢。共末入上藥
膠內。將此膏攤貼患處。

(子)子部頭腦兩側。至兩眉處止。療治該部所傷方法如下。惟適遇子時中傷此
部。名爲中脈。其傷必重。可參上乙戊各方施治外。以此主部方用之。

(一)跌打頭骨及肉黑腫痛內服外敷方 治頭部及各部骨傷肉黑腫症。用紅
花。歸尾。生地。骨碎補。五加皮。續斷。京柿。茄筋。乳香。沒藥
。川芎。羌活。田柒各三錢。共末酒沖服水。其渣加入烏不企。榕樹

鬚。周桐木。白辣筋。小牛棧。黃花母。鐵側木葉。樟木葉。楓木葉。
山柒頭。老鴉酸。鳳尾草。大那葉。幌傘筋。生南星。生半夏。千
斤拔。走馬胎各二兩。共末。早糯米飯半斤搗爛。灰麵四兩。酒煮熟
敷。如碎骨加生鷄仔一隻（去頭足）。杉木炭二兩椿爛。先用無名異末
麝香末。雄磺各二錢開酒搽患處。而敷上藥於面。繃紮法如下圖。
（說明）此方用引藥向上乙各條參考外。並將部位需再加引藥。頭傷加
川芎三錢。腰傷加杜仲。破故紙。兔絲子各四錢。肝膽傷加黃芩。茯
苓各三錢。左脇加柴胡。赤芍各三錢。心經傷加丁香。鬱金各三錢。
右脇加升麻。桃仁各四錢。左右手傷加桂枝。升麻各一錢。腹肚傷加
丁香。砂仁各四錢。肺傷加骨碎補。丁香。千層紙各三錢。傷後背骨
加鷄枕絲。黑棗灰各四錢。於上一方共末同沖服之。
頭部繃紮法。照參第一圖紮之。又本圖甲傷額及側腦紮法。傷頭頂紮
法。先貼二頭帶於額中央。即用其兩頭繞顱側。交叉於枕骨。次則引

第 二 十 二 圖



徐仁甫實用醫學講義

中冊 跌打

一五八

其一頭經頂至前項。其他一頭迴行顛側達額。復交叉其兩頭。反覆行之。終成環狀。纏絡兩頭於顛周圍。以安全針固定之。即乙圖。其餘用三角布。闊布紮法。可參看丙丁兩圖是也。

(二) 跌打頭額及全身骨肉黑腫痛內服藥酒方

用川芎。白朮。茯苓。連翹。牛蒡。遠智。續斷。骨碎補。茄筋。全歸身。炙芪。木香。澤瀉。蒼朮。無名異。春砂。鬱金。自然銅。生地。首烏。木瓜。元胡。紅杞。杜仲。川烏。桃仁。丹皮。黨參。田柒。虎骨膠。玉桂。血竭。入山虎。大艾頭。冬薑。黑豆。圓肉各一兩。新鮮屈頭

(一) 鷄仔七隻。共粗末。浸雙蒸酒六斤。每日飲二兩。

(二) 跌打黑腫傷外洗方。用歸尾。桃仁。甘草梢。乳香。沒藥。樟腦。生南星。大黃。生半夏。黃柏葉。川連各二錢。生鹽二兩。杉節。松節。黑骨秧草。石榴皮各一兩。煎水洗傷處。

(三) (說明) 跌打所傷各部等藥。可參上甲至戊各方法用之。下由子至戌除主部治方外。均可參考上各用法也。

(午) 午部由眉至口止。其眼目兩耳鼻在內。該午部傷療治方法如下。若於午時傷及該部。名爲中脈。其症乃重。可參上乙戌各方施治外。又以此主部方治之。

(一) 跌打傷午部內服方。治傷眼目耳鼻頭下紅黑腫症。用降香。花旗參或石柱參。川芎。田柒。白芷。甘草。大黃。川烏。生地。紅花。歸尾。蘇木。桃仁。靈仙。羌活各二錢。水煎服之。如穿破血流不止。加白蠟末一錢沖服。

(二)跌打傷眼目紅腫外敷方 用紅花。生地。生南星。生半夏。歸尾。川連。珍珠各一錢。京柿三錢。冰片二錢。共末以人乳汁開。先用生豬瘦肉切薄片鋪底。將藥在面。紮法可參三圖。及下丁圖可也。若無人乳汁。以滾水開之。內服照上一方加入草決明。蒺藜。紅杞各二錢。

第二十三圖



側面鼻眼編紮法 紮面側即丙

圖參看。紮鼻傷。可參看乙圖

。眼傷參看丁圖。各帶紮完。

以扣針扣之。或將帶破開為二

。反覆紮之。較為利便。

(卯)卯部由口喉舌頸顎至肩膊兩手止。除此方治外。照上甲戊各

方參用。此部若依卯時傷及。名為中脈時。其症乃重。

(一)跌打周身發熱不退內服方 用葛根。尖欖各二錢。牛柴。田柴。紅

花。大黃。沉香。生地。柴胡各四錢。麥冬。白菊花各三錢。水煎服。服後被覆取出汗。照上乙各部傷加引藥合。

(二) 跌打破頭傷口風牙關緊閉四肢強直內服方 先用本條丁八九方食之。用生地。川芎。石柱參。續斷。紅花。桃仁。知母。赤芍。陳皮。骨碎補。大黃。防風。木香。草烏。田棗。川烏。歸尾各二錢。沉香三錢。水煎好。用上冊三十圖銅拔開牙較灌服之。外用手術整內傷口骨等。以上丁四方敷之。紫法參二十二圖。

(三) 跌打喉頸腫痛內服方 治打傷喉腫症。用紅花。生地。京柿。歸尾。加皮。骨碎補各二錢。辰砂。珍珠。麝香。琥珀各五分。共末。先飲白糖二兩煎水服。後白糖水開此散服之。外敷用上丁五方。

(四) 跌打如死有氣吹喉救醒方 治一切跌打失氣如死。速用此散吹之。用蘭花蕊。松仔莢各二錢。河邊石底蟲。上下山虎。大金鱉蟲各十餘隻。共煨存性爲末。以上六圖皮節吹入喉中卽生。

(五) 跌打下顎肩膊墜下錯骨內服方 先服定痛丹。外用戊五方麻此局部。

以手術整回錯骨。用細辛。降香。乳香。半夏各二錢。紅花。川烏。

草烏。防風。南星。蘇木各三錢。水煎服。外敷用丁三方。繃紮法。

頸部參二十三圖甲。肩部參十圖。

(六) 定痛丹內服方 治一切刀傷跌打疼痛不止。及整骨時食之止痛。用牛

銀二斤。製法以長流十斤煎六時之久。去淨其毛。其毛甚毒。必需去

淨。另用水洗多次。以醋六斤。文火煎至乾黑爲度。共爲末。每服四

厘。滾水冲服。至多不可過六厘。其痛即止。用製此毒藥。必需親手

慎之。

(七) 跌打錯手較手腕接合骨外敷方 用黑枝。加皮各一兩。續斷。桃仁。

紅花。歸尾。京柿。生乳香。沒藥。五倍子。葱頭。酒餅。白木耳。


無名異。骨碎補。兔絲子。木棉皮各五錢。金土鱉十隻。共爲末。蛤

仔二十隻。水蛭二十條。用生鷄仔一隻連毛屎杵爛。毛麝香。豬棕草

第 二 十 四 圖

駁骨丹。榕樹鬚。雷公苑。鵝不食草。韓信兵各一兩。共搗爛酒煮敷之。紮法參二十四圖甲。

(說明) 蛤仔。專去鐵鏽。關鐵傷者。必以此味去清鏽毒也。



手較之紮法。即甲圖。手較

必將其搭於肩膊。不俾其手

搖動。帶繞附肩脇下。反覆

紮之。紮完以針扣之。其手

骨指傷紮法即丙丁戊是也。

(八) 跌打手脚折骨續骨外敷方

用骨碎補。續斷。乳香。沒

藥。自然銅。歸身。田菜。

遠智。大黃。加皮。川椒。

琥珀各二錢。共末。用薑四兩。生鷄仔一隻重約十兩。去毛不到水杵

爛酒煮熱。先食定痛丹。將骨用手術整正。以夾竹加藥在內合好敷。一對時去之。去藥不可過早遲。否則骨內長短不等。洗用薑皮。葱頭。秧居草各二兩煎水洗之。紮法二十四圖丁。及二十五圖。

(九) 跌打手足破口流血止血止痛外敷方 用牛銀製。血竭。杉蕊。松蕊。

文仔花。骨碎補。光松。辰沙各五錢。血餘。蒲黃(用醋炒成炭存性)

。松香。牛柒。百草霜

各三錢。冰片五分。大

黃一兩。石灰二錢。共

炒至大黃黑色去石灰。



以上各藥共末。以藥棉

托散敷之。

手編紮安定法。其人傷

圖五十二第

甲(五十二)



碎手骨。用鴨腳輕木。製成乙圖。令傷者臥或坐。以木托合實。令筋

骨不移動。易於生肌接續。卽二十五圖是也。

(十) 跌打破傷埋口散方 治一切破傷及刀傷埋口通用。用乳香。沒藥。石脂。龍骨(煨)。枯礬。彝茶。血竭。丹頭。田棗各一錢。血珀二錢。珍珠末。梅片各三分。共末乾摻患處。

(十一) 跌打斷筋筋攣不舒內服方 用熟地。歸身。木瓜。川芎。炙芪。丹皮。萸肉。牛棗各五錢。牛角尖。檜桐木。田基黃各一兩。豬腳筋一條。水酒各半煎食。

(西) 西部由肩下至心胸。其心肺肝胃上灣在內。該部是跌打最重要部。若傷正酉時。名爲中脈時。其傷更重。可參上乙戊各方施治外。以此主方治之。

(一) 跌打心胸肺部內服方 用柴胡。紅花。枝子。牛棗。靈仙。羌活。香附。澤蘭。枳殼。續斷。獨活。大黃。桔梗。丹皮。歸身。公英。田棗各三錢。桃仁。赤芍。木通。赤茯苓。生地。木瓜。甘草。骨碎補。荊芥。黃芩。生黃芽。桑寄生各四錢。土鱉二十隻。末沖服。酒水各

二盅。煎回一盅。空心溫服。如無大便。加元明粉四錢沖服。若傷過危。加顛茄仔五錢。並參上乙戊各方施用。煎藥不便。即用徐仁甫製跌打丸食之。

(二) 跌打胸心內服散方 治打傷心胸痛重至失氣症。用田柒。川連。沒藥。

桑白。木鱉。蘇木。西紅花。桃仁。乳香。歸尾。黃芩。茯苓。白芫。蒲黃。三稜。莪朮。大黃。桔梗。薺茶。台烏。枳殼。桂枝。香附。五苓脂。木香。白蠟。丁香。沉香。柏香。川破石。甘草。牛柒。血珀。半夏各三錢。公煙。麝香。牛黃。珍珠。熊膽各一錢。共爲末。每服三錢。酒沖服。如見血。用薑汁五分。童便五錢。米湯沖服。傷乳前血腫。以炙芪。花旗參。玉桂。生地各三錢。煎水沖散。

(三) 跌打脇胸心部瘀血腫痛外敷方 用生枝子。鬱金。生乳香。川烏。草烏。三稜。莪朮。紅花。歸尾各五錢。共末。鳳凰殼。水蛭。屈頭鷄七隻。韭菜頭。土田柒。斑鳩酸。鵝不食草。生老薑。蟻芋頭。蕎頭。

各二兩搗爛和散。酒糟煮熱敷之。如傷發膿毒。加春花李。藤酸葉。鋪地錦各二兩。其膿毒在傷口出。紮法參二十四圖乙。

(四) 跌打心胸氣門內服酒 治跌打心胸脈門。時見刺痛。並治風痰鶴膝。用熟地。歸身。加皮。紅杞子。海風藤。虎骨。鹿筋各三兩。首烏。木瓜。東風桔根。假胡椒根。加洋柒根。羌活。杜仲。防風。松節。健年。牛柒。劉寄奴。炙芪。鹿鞭。續斷。玉蕊蓉。白朮。薏米。川芎。石斛各一兩半。蒼耳子。乳香。沒藥。沉香。蒼朮。靈仙。萆薢。天麻。疆蠶。南星。獨活。萆薢各六錢。共爲粗末。酒蒸熟。浸酒二十四斤。每早晚溫飲二兩。

(五) 跌打胸部內積瘀痛內服丸 治新舊心胸積瘀痛症。用竹黃。沒藥。血竭。藤黃各三兩。鮮山羊血一兩。伴藤黃(蒸曬九次)。無山羊用乾羊血代之。熟乳香。大黃各二兩。阿魏。雄磺各一兩。牛黃。麝香。西紅花。木節瓜(去油)。田柒各三錢。冰片。木香。蘇木。古文錢各

二錢。自然銅四錢。共末蜜爲丸。每服一錢。酒送服。

(六) 跌打失音不省人事吹鼻方 用半夏五分。細辛。硃砂各三分。共末。用六圖皮節吹鼻中。卽能出聲音。

(辰) 辰部由心下至小腹丹田止。胃底大腸小腸兩腎肝尾葉在內。如於辰時傷及此部。名爲中脈時。傷反爲重。可參上乙戊各方施治。並以下主治之方治理。

(一) 跌打心下大腸膨脹內服方 治跌打大小腸腫脹症。用桔梗。沉香。牛蒡。山楂。神朮各二錢。田朮。大黃。枳殼各三錢。鬱金。陳皮。尖檳。木通各一錢半。燈心十子。生薑一錢。酒水各一盅。煎回半盅溫服。

(二) 跌打肚腹瘀血積塊內服方 用巴戟。三稜。莪朮。降香。蘇木四錢。杏仁。田朮。紅花各三錢。川烏。草烏各二錢。水二盅煎回半盅溫服。瘀血隨大小便出之。

(三) 跌打肚腹瘀血積推積內服散 治用二方湯劑不應。以此散推之。用山
烏白。三稜。莪朮。元胡。木香。大黃。黑牽牛。白牽牛。白芥子。
白芷。木通。歸尾。百霜草。白麻樹各一兩。共末。每服三錢。蜜糖
二錢。酒沖服。

(四) 跌打腹破流出腸內服方 用玉桂。花旗參或石柱參。防風。鹿茸。沉
香。牛棗。川芎。田棗。附子各二錢。炙芪四錢。先煎參茸送食本部
丁七方丸。另水煎此藥溫服。後施手術托回。


(五) 跌打出腸托回手術方法 先用生地。牽牛各半斤。骨碎補四兩。用水
四斤煎滾布格渣。以此水蘸棉花。便用鉗棉花洗淨腸。醫生手以膠
套套之。外用鷄蛋白糊手套。將腹桶瘀血取清。以臘紙。或經滾水洗
過蕉菱等葉。隔手順托腸回原。傷口用線針縫埋。另以生鷄鷄皮捫住
傷口。另用下六方敷上面。

刀剪針便用鉗圖 如傷口平者。以彎針針之。卽丁圖。凡用刀剪器

具。未用前以滾水洗過。或用酒精。或石灰水浸抹淨。其線亦要消毒清潔。免沾傳染菌毒可也。

圖六十二第


(六十二)



丙鉗

乙剪

甲刀



庚逸管

己探針

戊便用鉗

丁針

(六) 跌打出腸外敷方 治腸出施手術托回外敷。用紅花。京柿。生地。歸

尾。田菜。象皮。骨碎補各三兩。白降丹二分。珍珠。梅片。麝香各

三錢。共末。以豬油和勻。煖熱敷之。並參用上乙戊各方施治。其人

已醒後。用金龍地虎。袋生鷄仔肉內托食之。繃紮法參十四圖。

(七) 跌打破腹出腸嗅吸內服聞方法。治破腹出腸症。用磁石。滑石各三錢。共末。酒沖服之。以米醋煎滾與傷者口吸其醋氣味吞之。其腸自行縮回。先以上五方手術針縫生鷄皮捫好。另用上六方外敷。及參乙戊各方法治之。

(說明) 跌打破腹出腸。其腸查明無穿爛破傷。該症萬無危險。經上方法治理外。不可食飯硬物。祇可用蓮米一兩。燕窩五錢。黃米三合。共爲末。水煲作粥少食之。當醫生之手甲時要除去。不可沾穢。且切不可手觸腸。手氣觸腸發毒。若無膠套者。亦以鷄蛋白糊手。方可拈針縫傷口。司此職者。不可不慎。

(八) 跌打腹傷破埋口外敷散。治一切傷不埋口症。用紅花。薑黃。彝茶。血竭。田柒。白葎。石脂。象皮(煨)。沒藥。龍骨。甘草各二錢。乳香四錢。珍珠二分。共末。猪膏開敷傷口。

(九) 跌打碎腰筋骨外敷方 治一切斷筋碎骨駁骨症。用老薑。薑黃。加皮。酸味草。紅花。歸尾。生地。骨碎補。京柿。無名異。花粉。生枝子。白麻根。沙黃各一兩。續斷。三丫苦。黃芽仔。苦搗藤葉。田基黃。田基薑。韭菜頭。乳香。沒藥。五倍子。木耳各五錢。麝香五分。共末。生鷄仔一隻。約十兩重合。連毛椿爛。加灰麵四兩。酒糟和勻煮熱敷之。

(十) 跌打斷筋骨接筋骨內服散方 治跌打斷筋骨駁骨症。用花粉二錢。歸身。蘇木各三錢。硼砂(煨)一錢半。水蛭(煨)三錢。蝦蟆子(去頭足肚煨存性)。土狗(煨存性)各五錢。共末。每服二錢。酒沖服之。外用上九方敷之。

(十一) 跌打刀傷口通用外洗方 用秧居黑骨草。川槿皮。海桐皮。荊芥。薄荷。羌活。防風。五倍子。蜂巢。甘草。生南星。殭蠶各五錢。煎水洗患處。

(說明) 凡跌打刀炮火傷口洗之要勤。每換藥一次。必要洗一次。使其去毒生肌埋口爲快。一切傷症俱用上十一方洗爲安。

(戊) 戊部由丹田下至兩足。其中膀胱升腸頭。降腸肛門。兩陰畢。子宮在內。若傷於戊時。名爲中脈時。其傷較重。療治方法。可參上乙戊各法外。以此主部方並治之。

(一) 跌打小腹腫痛內服方 治跌打小腹部腫痛症。用朴硝。大黃。澤瀉。紅花。蘇木。血竭。乳香。牛蒡。蒼朮。木瓜。半夏。澤蘭。生地。地榆各三錢。酒水各一盅。煎回半盅溫服。

(二) 跌打傷大小便不通內服方一 用紅花。歸尾。甘草梢。生地。熟地。大黃。桃仁。木通。蘇木。沉香。沒藥。升麻各二錢。水煎服。如因傷上部大小便不通。加川芎。中部加桔梗。下部加牛蒡各三錢。

(三) 跌打傷大小便不通內服丸 用生地。朴硝。豬牙皂各一錢。巴豆霜。黑枝子各八分。珍珠三分。共末爲丸。如綠豆大。硃砂作衣。每服二

十粒。滾水送服。

(四) 跌打傷下陰橫根內食外敷方 用扁魚皮膜包住傷口。另以麝香。冰片

。白降丹各一分。歸尾。生地。京柿。川白蠟。竹青。田基黃。加皮

。骨碎補各三錢爲末。人乳汁一兩。生豬油一兩。共搗勻。敷於扁魚

皮面。一日一換。內服八味丸湯。或以熟地。牛棗。兔絲子。丹皮。

。黃肉。黃芪。杜仲(炒去絲)。茯苓各三錢。豬脚筋二條。水共煎服食

。繃紮法參十五圖。

(五) 跌打傷破陰囊露辜丸重危內服外搽方 治傷下陰危在旦夕症。即用白

毛鴨血二兩。酒一兩。童便二兩。共煎灌服。有還魂之功。另用蜘蛛

數隻(煨存性)。珍珠七分。共末。開茶油搽之。加上四方外敷方。

(六) 婦女跌打破陰穴流血不止內服方 用熟地八錢。歸身。炙芪各四錢。

川芎。白芍(酒炒)。茯苓。白朮。炙黨各三錢。炙草。升麻。薑炭。

川白蠟末沖服各一錢。水二盅。煎回半盅沖蠟空心溫服。

(七) 跌打斷腰脊手足骨內服方 治腰部斷脊骨症。用旋覆花。骨碎補。虎筋。桑白各三錢。黃芪。虎骨。彝茶。血竭。豬牙皂。細辛各二錢。土鱉蟲一錢。水酒各半煎服。外敷用下十二方。

(八) 跌打斷腰手足駁骨內服丸 治一切折骨症。用上樹蛤拐五隻。老蜚蟹二隻。水蛭。蚯蚓。老鼠仔(未有毛合)各二兩。共煨存性。鳳凰胎七隻。共末爲小丸。每服二錢。若一時不便。單用蟹(瓦煨爲末)沖服。亦能駁骨。

(九) 跌打手足下部重傷內服丸 治傷手足下陰止痛症。用乳香。豬牙皂。骨碎補。琥珀。金邊水蛭(煨存性)各一錢。桑白。元參。血竭。雄磺。冰片。珍珠。麝香各三錢。尖欖。大黃。彝茶各五錢。木槌子(煨存性)。白蠟各二錢。熊膽五分。共末。酒沖服二錢。

(十) 跌打碎腰骨手足骨外敷方 用五檜子。金櫻根。龍鬚根。蛇抱根。鵝不食草。山油麻根。地膽頭。斑鳩酸。水蛭。牛柰葉。救主葉。田菜。

○地龍各五錢。○雙眼龍。○鳳凰胎。○早禾灰。○石竹筍。○青蟹公各一兩。○共爲末。○灰麵。○糯米粉各二兩。○生鷄仔一隻。○共椿爛。○生酒糟四兩和勻。○煑敷之。○若見癢痕卽除去此藥。

(十二) 跌打刀傷斷骨外貼膏方 治跌打斷骨刀傷折骨症。用板康青。石膏。

黃柏。冬花。天龍血。熟地。血餘。防風。鉛粉。沉香。朴硝。紅丹。

陀僧。槐枝。毛菇。自然銅。沒藥。白蠶殭。茯苓。龍骨。歸身。

蕪荅。黃芩。風薑。虎骨。血竭。生地各六分。共爲末。羊膏二兩。

芝麻油七錢。煑滾約半小時。後加入玉桂一錢。冰片二分。田菜。麝

香。息香油。牛黃。樟腦。檀香。珍珠。熊膽。沉香各六分。共爲末。

○加入上藥攪勻。磁器封好。開布貼傷骨處。

(十三) 跌打傷斷脛骨外敷方 用歸尾。五倍子。金櫻。枝子。降香。白芫。

續斷。鬱金。劉寄奴。澤蘭。布渣。蕃薯。木賊。牛軋筋。猪檢菓各

五錢。骨碎補。大黃。薑黃。水蛭。灰麵。筋菜。牛菜各一兩。檀香

三錢。鳳凰胎七隻。老薑二錢。共末。酒煮敷之。一日二換。夾定敷。法參二十五圖。外洗消腫。用辣了半斤煎水洗之。

(說明)六度脈傷部分治各法。經已列明。但雖分開治方。仍要時參上乙戊各法用藥爲安。

跌打刀傷通用主要特效方法

- (一) 跌打八寶丸內服方 治跌打損傷皮。跌打斷骨。炮礮彈傷。箭頭射傷。並治蛇蝎咬傷。產婦瘀血發熱。痰迷心竅危急症。用藤黃。黃丹各二兩。竹黃。血竭。大戟。劉寄奴。乳香。彝茶各三兩。朴硝。歸尾各一兩。琥珀。二錢。花粉(炒)。水銀。麝香各三錢。共爲末。黃蠟十四兩。麻油二兩。先將油煮滾。後下蠟和勻爲丸。如豆大。每服五粒。酒送服。磁瓶貯藏。勿洩氣。

(二) 跌打續筋骨外貼膏方 用榕樹鬚。羌活。紅花。無名異。骨碎補。續斷。蒼朮。歸尾。甘草節。加皮。京柿。生地。三稜。玉桂。獨活。白木耳。

澤瀉。川烏。莪朮。乳香。沒藥。川芎。首烏。大黃。川連。桑白。田棗。
水蛭。地龍。象皮。鬱金。木香。香附各一錢。麻油半斤。入上藥浸七
日。煑枯去渣。煉至滴成珠。加黃丹四兩。柳枝攪至四成結。加琥珀。血
竭。白蠟。辰沙各一錢。麝香。珍珠。冰片各五分。共末入膏中。將膏水
燉去火毒備用。

(二) 跌打傷氣門脈門百草藥丸。治跌打刀傷。點脈重傷。續筋駁骨。止痛消腫。
刀傷等症。用七葉一枝花。鹿耳苓。大科愁。韓信兵。滿天星。鐵包金。
連地管通。一枝香。鐵香爐。鷄骨香。金鷄脚。落地金錢。金耳環。過
塘蛇。大葶萍。松寄生。過山風。過江藤。九里明。九里香。打不死。大
還魂。小還魂。崩大碗。小崩碗。紅蘧烏白。獨脚烏白。大幌傘。小幌傘。
霧水草。何首烏蘧。蓉肚草。急星草。水松蘧。蟹鉞草。飛揚草。珍珠
草。水蓉根。駁骨草。鳳尾草。爛耳羊。大芙蓉葉。江瓦藍。欖鼓筋。筋
作蘧。小芙蓉蘧。夜蘭蘧。澤蘭蘧。瓜子菜。水扒草。水抱草。薄荷草。

半邊蓮。水鬻葉。人字草。黑面神。血芙蓉。白公英。大糟蘧。白花旗。
蒲公英。白花菊。紅花菊。七仙香蘧。白頭翁。金花蘧。銀花蘧。珠子
蘧。水甲花。金囊膏。紅福裾。黃福裙。紙甲花。蛇通管。觀音草。鯽魚
草。水荇菜。蒙公蔗。獨脚蓮。抱樹蓮。水葛菜。過牆虎。寬筋藤。紫薇
蘧。金鈕菜。山楂蘧。出山虎。入山虎。前冠草。三丫苦。土荊芥蘧。土
茯苓蘧。鋪地錦。白薯蕷蘧。吹紅管。鷄公花。白花鬼燈籠。紅花燈籠。
菖蒲根。花檢蘧。水桐蘧。大風茅根。犁頭草。白花鐘。紅花猛。牛啻筋
蘧。五美蘧。南籬蘧。大影葉。英不薄葉。蛟龍葉。五指蘧。龍鳳草。水
乾水大。磨挈葉。以上各三兩。五月五日採之曬乾。加入附子。骨碎補。
歸身。五倍子。貝母。膽南星各八錢。生地。台烏。續斷。大黃。枝子。
白芨。乳香。沒藥。薑黃。黃連各一兩。淮山。杜仲。紅花。牛棗。熊膽。
桂枝。山豆根。大戟。雄磺。地膚子。石決明。青黛。血竭。川椒。川
芎。白芷。田柒各五錢。牛黃。血珀。珍珠。半夏各三錢(酒炒)。共爲末

另用白薯莢。地膽頭。獨脚烏白。苦參頭。地榆頭。猪榆頭。地金牛頭。金雞脚頭。一枝香頭。白花鬼燈籠根。蘭古心。竹筆。紅桐子根。夜蘭頭。水甲頭。退磨挈根。水影枝頭。何首烏頭。生草烏頭。本地田柒頭。魚狗筒根。吹筒管根。連地管通沙頭。冷飯苑頭。澤蘭花頭各一斤。以水三十斤。熬膠。加蜜糖一斤。煮乾水氣。加生水龜仔十二隻。同春爛和勻。加上二種藥末爲丸。以辰沙爲衣。每服三錢。

（說明）此方名爲五時跌打救急丸。每年製一次。用駁骨續筋甚有功效。但製丸時。不可俾孕婦觀看。國術技家。該丸無不常備也。

（四）國術練堅拳浸拳方 用海馬四十九對。虎骨。生鐵銹。川蠟。各四十九兩。醋十二斤半。共浸十天外用。練習時。將拳擊物。令手紅熱。將拳浸入藥水中。久之拳堅如鐵。

（五）防打不痛外敷方 用百草霜三錢。赤石脂。龍骨。白芷。丹頭各六錢。共爲末。酒敷之。經敷該部。打不痛也。

(六) 跌打傷口皮縮外糊方。治傷之皮抽縮症。用紅薯莖二斤。搗爛糊塗敷之。

(三) 第二章 刀傷

刀傷之療治方法。與跌打各法同。惟跌打不破口。注重於散瘀推瘀。不俾瘀血發熱攻心作痛。其藥偏於攻散敗血。而刀傷多是破口。其藥多用止血生新血。不俾其血多流。免生貧血虛脫。其餘埋口止痛。及跌打傷破口者。治法同於刀傷。全身分作上中下三部治之。

(一) 刀傷內服方。治一切刀傷症。用荆芥。赤芍。防風。羌活。殭蠶。南星。

靈仙各二錢。細辛。薄荷。甘草。桂枝。青皮。川烏。田柒各一錢半。煎水溫服。如流血不止。加白蠟末二錢沖服之。上部加白芷。中部加桔梗。下部加防杞。尖檳各二錢。此藥渣加五倍子。白礬。生薑。葱頭各二錢。煎水洗刀傷口。繼食下方。用生地。白芍。黃芪。杜仲(鹽水炒)。續斷。白芷。秦朮。靈芝各二錢。甘草一錢半。水煎服。重者連服多劑。助其生

(二) 肌。

(二)刀傷跌打內服外敷丸 治刀傷跌打疼痛。流血不止外敷止血。用山楂。厚

朴(薑汁炙)。靈芝。元胡。枳殼。胭脂(焙)。猪苓。澤瀉。香附。春砂。

遠智。鬱金。沒藥。紅花。黃連。黃芩。黃柏。乳香。沉香。藿香。血竭

。麻黃。續斷。桂枝。柴胡。硃砂。桑白。川烏。洋煙。三稜。莪朮。蛇

通管。猪鬃稔根。布渣根。英不薄根。滿天星。行酸頭。鬼畫符根。鹽布

根。東風桔根。五爪金龍根。鐵包金根。金雞腳根。七星香。白背香。星

樹根各三錢。大黃。朴硝。歸尾。尖檳。川芎。洋七根。勸菜根各五錢。

田基黃。苦參。白蠟。歸身各一兩。生地二兩。丁香。麝香。梅片。珍珠

。花旗參。牛鬃葉各一錢。木槌子(煨)。牛黃。桃仁(去皮)各二錢。田棗

一兩半。共末。煉蜜爲丸。每服三錢。滾水送服。若外敷止痛止血。搗爛

滾水開敷之。

(三)刀傷止血外敷散 用田基黃。韓信兵。黃京膽。遠薑。大容膽。青蒿。黑

骨秧居。三月蒲葉。苦槎藤。柴木樹蕊。假麗參。舊石灰。了哥麻菴葉。

松毛。光松。辰沙。骨碎補。蚊仔花各五錢。共爲末。見血乾摻。或用滾水開敷。

(四)刀傷止血定痛外敷方 用南星。沒藥。茯苓。檸檬。白蘇。白芨。生半夏各二錢。乳香。龍骨。防風。白芷。田柒。赤石脂各三錢。象皮五錢。薑黃一錢半。冰片一錢。血竭。珍珠各五分。人中白(煨)。共爲末。乾慘傷口。或用豬油開敷之。


(五)刀傷外敷膏 治一切刀傷跌打破口傷症。用南星。大黃。桃仁。羌活。獨活。半夏。川烏。草烏。雄磺。歸身各四錢。生薑。葱白。亂頭髮各一兩。上藥入油內煎枯。瀘淨渣。松香一斤漂淨。陀僧末二兩。再煎溶。隨加入硫磺末八兩。慢慢攪勻成膏。以瓦盤載之。燉一枝香久。去清火毒。瓦虛藏之時用。

(上部)由頭至心胸。其耳目口鼻兩手。內臟腑心肺胃上管在焉。可參二十七

圖。

(一)刀傷上部止血定痛外搽方 用乳香。沒藥各一兩。水粉二兩。石灰
(漂淨)三兩。枯礬四錢。共末。開茶油搽之。

第二十七圖



圖下部診斷法。便知部位主病脈然。

(二)刀傷破口金鎗銃傷外敷膏 治一切刀傷破口症。用血竭。麝香。海螵

蛸。甘草梢。歸身。牛黃。田棗。川連。乳香。象皮。赤石脂各二錢

(四)八寶。冰片。白蠟各三錢。硃砂五分。共為末。猪宗肉。麻油。鷄油各四

兩。黃蠟一兩。共煎去渣。入上藥末和勻為膏。

(三)刀傷破口外敷方 用大黃二兩。血竭一兩半。乳香。沒藥。白蠟各五

此圖示明上
中下部。欲
求各部傷應
於脈者。可
參上冊第五

錢。硃砂一錢半。河底蟲。猪膏。烏藥。歸身。樟腦各三錢。赤石脂一錢。石灰（漂淨）十二兩。共搗爛敷之。

（四）刀傷生肌埋口外搽方。用赤石脂。白蠟。血竭。龍骨。乳香。黃柏。沒藥。田柒。琥珀各一錢。雄磺一錢半。川連。白芷。象皮。牛黃。丹頭各四分。硃砂。梅片。珍珠。沉香。麝香各二分。共爲末。猪膽汁一錢。茶油二錢開敷之。

（五）刀斧傷面部外敷散。用海螵蛸（漂淨）。蠶蛾（炒焦黑）各一兩。共爲末敷之。

（六）刀傷手足肩外敷方。用番紫蘇。森木蕊。松樹皮。山檢果。紅棗。歸尾。榕樹蘗各一兩。搗爛敷之。並治瘡疥不埋口。另用葱頭。防風。老薑。荊芥各五錢。黑骨秧居草二兩。煎水洗之。每日換藥洗一次。

（中部）由心胸至臍下丹田。肺胃肝大小腸兩腎在其中。如破腹流出腸等。可參上跌打辰部破腹流出腸手術療法。

(一) 刀傷埋口外敷膏方 治刀傷破口症。用血竭。龍骨。彝茶。白芷。尖檳。沒藥。黃柏。乳香各一錢。琥珀。枯礬。土鱉。五倍子。硃砂各五分。象皮。田柴。川連。蒼朮各二錢。紅花。珍珠。冰片各二分。共末。蜜開敷之。如破腹流出腸。照上跌打辰部方法線針回。用此藥敷之可也。

(二) 刀傷外敷藥膏方 用彝茶。龍骨。歸身。白芨各一錢半。血竭。赤石脂。海螵蛸。蟹黃。寒水石。血珀各三錢。田柴。丹頭(炒)。黃丹(炒)。乳香。沒藥。珍珠各一錢。梅片一分。共末。黃蠟五錢。白蠟二兩。火油半斤。將蠟煮溶化。扛起然後下上各藥末成膏。再加水燉一時。去火毒用。

(三) 刀傷起肉筋外敷方 用風化硝。生芪。花粉。月柿。甘草各二錢。鳳凰胎二隻。蛤拐七隻(金邊爲好)。共末。用冷粥搗爛。煨熱敷之。

(四) 刀傷生肌散外搽方 用黃丹。枯礬各五錢。木香。輕粉各一錢。共爲

末。猪膽汁伴勻曬乾爲末。或加猪皮一兩。(煨存性)。冰片二分。共末搽之。

(五)刀傷跌打破口日久其傷口生爛外洗方 用大板茶一兩。紅花。生地。歸尾。乳香。沒藥。甘草節。大黃。九里明。金銀花。枯礬。黃連。黃柏。蘇子。不遲。葱頭。森樹皮。圓眼樹皮。羊頭樹皮各五錢。煎水洗之。用以上部一方尾方茶食內托之。另用上部四方敷之。

(說明)凡刀傷至化膿者。皆因用具消毒不清。各藥滌洗不淨所致。每於需用器具。注意消毒。消毒法。可參二十六圖下說文。


(下部)由丹田至兩足。而大小腸膀胱睪丸。前後陰子宮兩腎在其中。療治法可參上中部各方。

(一)刀傷止血續筋接骨外敷方 用韓信兵。鳳尾草(生於簷前屋巷者是也)狗木葉。小牛棧。白麻蕊。田基黃。大蒲葉各二兩。白蠟。五倍子。自然銅各一兩。鳳凰胎七隻。共搗爛。酒煮熟。如足脛等。施手術夾


正外敷之。參下圖。

第二十八圖

甲 (八十二)



乙



足脛傷安定圖。夾正足部之器具。多用鴨脚木。及輕身木造之。如排竹用竹造爲妥。夾正後之安定各法。仿該圖式可也。

(二)刀傷碎骨內服外敷方


用薑黃。駁骨草。猪鬃。稔苑。兵狗草。十九浩

葉。蛤拐菜。七星香苑。鋪地錦。吹桐管。正田柒。白糖。耳楮。狗屎。瓜頭。鬼燈籠。白博葉各二兩。雙酒搗爛。取藥汁先飲之。其渣加滾水開白糖敷患處。或流黃水不乾。加老根棟二兩。或碎骨不出。

加茯神。白薯蕷。草麻子各二兩。若日久受濕。加五月艾一兩。或傷口起泡粒仔。用甘草。綠豆(打)各一兩。煎水洗傷處。

(三)刀傷口久不收口外敷洗方法。用藤酸頭。茶狗舌。鬼燈籠各二兩。煎水洗淨。用徐仁甫醫生製拔毒膏貼之。或用中部一方膏搽貼。若傷口有腐骨。先加黃蠟末敷開其口。後用烏鐵貓骨(煨灰)爲末。開油搽之。其腐骨自行引出淨。

第 二 十 九 圖



各部安定用器圖。一至七用木造之。九排用竹造之。其餘各式用鐵爲邊。間以繩亦可。但繩以蠟過。易於消毒也。

(四)刀傷生肌外摻散方 用田柒。骨碎補。赤石脂。白芷。續斷。紅花。歸尾各二錢。百草霜。鯢魚牙(煨)。象皮。白蠟各四錢。珍珠。麝香各八分。川連一錢。共末。罈封固使用。

(五)刀鑿傷手足外敷方 用樟木蕈。韭菜頭。水辣了。辣椒葉。紅花味荳。生薑。白筋蕊各二兩。共搗爛敷之。

(六)竹木刺入肉外敷方 用蒜頭。牛柒。土狗。黃糖。葶麻子。猪肚油各一兩。搗爛敷之。

(七)針刺入肉不出外敷方 用禾雀屎。葶麻仔肉。田螺。紫蘇。羊屎。黃糖各三錢。欖鼓八錢。蚰蛄肚二十隻。蜜糖五錢。共敷之。如鐵彈入肉。加白番瓜。鰻魚鰓肚各二兩。共搗爛敷之自出。

(八)吞針入胃腸內服方 用蝦蟆雙眼。用圓眼肉包住生吞食之。其針在便

疴出。

第三章 炮碼傷

炮碼傷與刀傷同治。爲炮傷有火毒。內服最忌引火歸心肺之藥。如玉桂。桂枝。諸種參者。切不可入口食。其餘外敷方法。均可參考刀傷門。

(一) 炮碼傷內服方 用西紅花。乳香。車前子。沒藥。田柒。木通。歸尾各二錢。生地。大黃。乾葛各四錢。枝子。川連。西根各三錢。水煎服。服後大便不通。加重大黃一兩。後再服青蛇仔。過天螭。魚撒仔。鐵線草各一兩。搗爛滾水沖服。忌服玉桂。桂枝。諸種參。誤者解以生石膏四兩。蘿白半斤煎水服。

(說明) 炮火傷。其經中火藥熱毒。加以辛熱之玉桂。能卽引熱入心。而發生譫語昏迷。若食參者。參是提氣入肺。熱加以提氣入肺。其人氣促目紅。胸肺發熱。結恭氣喘垂危。用藥者不可不慎。

(二) 出炮碼外敷方 用田基黃。天吊香。蒲公英。大天紅。小天紅。魚撒仔。

(二) 水芝甲。犁頭草各二兩。如傷口黑色轉牛毒。加桃仔葉二兩。傷口紅色轉蛇氣。加過天蟾蟒二兩。共搗爛敷三四天。口有白膿來。用珍珠末。礞石末各二分。插入傷口。另用水銀灌滿。碼即易出。每換藥用葶藶四兩。煎水洗之。出碼後有碎骨者。用古銅錢二兩。浙醋半斤。將錢燒紅淬七次飲之。另用無爺藤半斤。搗爛敷之。骨碎自出。以埋口散搽之。每日用飯米水洗傷口。

(說明) 每用生草藥。必需用滾過水大煖洗過之藥。或用石灰水浸片時洗先。而後以滾過水再洗。免染諸種菌毒。其用器具亦然。下仿此。

(三) 炮碼傷口外搽散方 用田柴。甘草。大黃。川連。生枝子各一兩。共末。

(四) 車吼外敷方 用白降丹。信石。硃砂。生石膏。珍珠各二分。共末。油作

煎小丸。如米大。或作長條。於膏藥心貼正應開處。對日此肉即變色。用刀交之。再加丸漸深之。

(五) 炮碼外敷出方二 用田螺七箇。沙鷄。鹽土狗。田柴各三錢。三柰。葶藶

子。水仙子。貧婆魚。推車蟲。益菜各一兩。共末。滾水開敷。若入骨罅者。加生磁石二兩。螻蛄。上樹蛙各七隻。敷之自出。繡紮法參跌打門各圖。

(六) 炮碼外敷方三 用雷公菀。過塘蛇。出鷄尾。筋竹菜。灶頭大頭狗。白番瓜囊各三兩。冷飯一兩。苦搗藤四兩。共搗敷之。若炮碼入腹墜下。加升麻二兩。爲末。升提易出。後石柱參。甘草各五錢。共末摻之。

(七) 炮碼傷紅腫外洗方 用無爺藤。蚊仔花。榕樹鬚。鐵線草。芒菓葉。紫蘇梗。薄荷梗各二兩。煎水洗。若受丹毒不埋口。加黃土二兩。共煎洗之。

(八) 炮碼傷口受腐毒令腐肉化水外摻方 用信石。蟾酥各一錢。爲末。摻腐肉處。

(九) 炮碼傷及刀傷埋口外敷散方 用白芷。白芍。白芨。石柱參。甘草。梅片。川蠟。琥珀。生石膏。熟石膏各五錢。熊膽三錢。共末外摻之。

(十) 炮碼鐵沙彈外敷出方 用八角草。小天紅。黃麋膽。杉蕊。松蕊。推車仔。

京仔葉。冬棗。青皮各五錢。白蕃瓜。編魚鰾肚各二兩。共搗爛敷之。

膏藥製法

(一)紅色膏方 治刀傷跌打瘡疥症。用松香半斤(漂淨)。樟腦二兩。枚片二錢。硃砂五錢。麝香二錢。共燉成膏。時常水浸之便用。

(二)拔毒膏方 治刀傷跌打碎骨症。用大黃。黃芩。黃柏。山豆根。山茨菇。赤芍。金銀花。甘草各六錢。草麻子。木鱉子各二兩。白芨。浙貝。白芷。白蘞各四錢。牛銀。牽牛。連翹各一兩。用麻油六斤半。浸藥三日。煮至成珠去渣。加紅丹二斤半成膏。又落松香一斤十兩。水燉去火毒用。

(三)白藥生肌膏方 白芨一兩。松香。樟腦各四兩。輕粉。乳香。彝茶各二錢。冰片五分。共爲末。猪宗肉六兩。煎油去渣。加藥攪成膏。

(四)紅膏藥方 用松香(漂淨)十兩。樟腦。白蠟。蜜糖。茶油各四兩。銀硃二兩。共燉成膏。治一切刀傷跌打。並治發冷。加斑蝥(煨存性)。甘草各二分爲末。作膏藥心內。貼正肚臍而癒。

(五) 拆口油方 用蛇蛻。血餘各二錢。桐油二兩。煑滾去渣。取油塗之。

(六) 隔底膏方 治拆口脚底硬痛症。用舜茶。康青。松香。白芷。元粉。陀僧。血竭。枯礬各二錢。冰片。銀硃各一錢。共末。酒糟開敷之。

第四章 湯火傷

湯火傷過人身皮膚半數以上。則生危險。其原因係皮膚被傷處。失去呼吸之作。該局部之氣血迴迫心臟。而見發冷發熱譫語等症。

(一) 火藥燒傷內服外搽方 用生地龍一兩。搗爛滾水服少許。渣和青荖二兩。芥菜。芋頭。蜜糖各三兩。共搗爛塗傷處。如起水泡。用銀針挑破之。此藥一時不便。用茶油二兩。開鷄蛋白七隻。飛過蜆灰或石灰五錢塗之。

(二) 火藥燒傷外搽方 治湯火傷症。用石灰四兩。滾水一斤攪勻。去之不用。又以滾水半斤再攪取此水。以麻油四兩和合。搽患處止痛痊癒。無麻油用各種油代亦可。

(三) 火藥燒傷外敷散方 用大黃。石脂。生石膏。猪毛。煨存性。歸身(炭)。

(三) 寒水石各二兩。共爲末。滾水開搽。并治湯傷。

(四) 滾水泡傷及火燒傷外敷方 用石力青。假白麻葉。鷄冠尾(青梗合用)。牛

丁蛇。酸棗葉。地拈葉各二兩。共搗爛冷茶開敷之。倘變白癱。加樹頭搗

(一) (煨灰)一兩。酸辣椒五錢。以麻油開塗之亦可。

本篇生草主治病要藥分列

(甲) 跌打刀傷常用藥

(一) 鳳凰胎 生肌活絡續筋。

(二) 鋪地錦 涼血散毒。

(二) 豬鬃檢葉 止痛。

(四) 正田菜 止痛散瘀。

(五) 鬼燈籠 涼皮止痛。

(六) 駱骨草 生肌止痛去瘀。

(七) 耳 楮 消腫。

(八) 吹筒管 散血去鐵銹。

(九) 兵狗草 乾水消腫。

(十) 狗屎坑瓜頭 涼血去蛇毒。

(十一) 白博葉 止痛。

(十一) 小九浩葉 消腫。

(十三) 蛤拐菜 涼血去毒。

(十四) 七星香苑 散血。

(乙)刀傷主藥

(一)韓信兵 止血生肌。結痂駁骨。(二)田基黃 消腫埋口去硝磺火毒。

(三)王麝膽 止血生肌埋口。(四)過天螭螬 消腫去蛇氣。

(五)大蓉膽 去銹性鏢毒。(六)犁頭草 拔毒涼血。

(七)小蓉膽 止血。(八)鐵線草 去銹性。

(九)遠薑 祛風活血寬筋結痂。(十)馬鞭草 止血生肌。

(十一)路邊青 止血散瘀去毒。(十二)鬼畫符 散瘀。

(十三)圓眼蓬 去傷口黑瘀。(十四)花榆蕊 去黑積瘀。

(丙)跌打傷較骨主藥

(一)出入山虎強 消毒散瘀。(二)大小蓉膽強 寬較活血。

(三)駁節草 去骨筒內之瘀。(四)牛角尖 寬筋較。

(五)白麻頭 消腫散毒。(六)黑節關 寬較筋去骨積之瘀。

(丁)跌打駁骨藥

徐仁甫實用醫學講義

中冊

生草藥治病分列

一九七

(一) 檜桐木 散瘀駁筋骨。

(二) 天吊香 止痛去蛇氣腐宿毒氣。

(三) 田基黃 韓信草 過天螻蛄 白麻頭 出入山虎 上有同用。

(四) 假芝蘭 活血駁骨。

(五) 桑栢木 散熱毒。

(六) 黃蛇退殼 散氣結止痛。

(七) 顯仔葉 消腫毒去瘀血治皮膚傷

(八) 朱宗草 退瘀。

(九) 黃皮葉 去黃溫水疏通毛管。

(十) 花檢葉 退黑瘀腐肉。

(十一) 蛇利草 散蛇氣去瘀毒。

(十二) 韭菜頭 散瘀積。

(十三) 石力青 寬筋活血。

(十四) 大小還魂 駁骨。

(十五) 杉木炭 駁骨去水氣。

(十六) 虎骨 止痛。

(十七) 較剪草 去瘀生新。

(十八) 苦搵藤 毒藥勿入口食。

(十九) 跌打刀傷發毒。出碼。駁筋藥。(敷藥後二時能接合)

(二十) 水蛭(炒) 續筋。

(二十一) 丹竹青 續筋清熱。

(二十二) 京柿 甘潤生肌。

(己)寬筋活血藥

(一)大小蓉膽菴 石力青 韓信兵 遠薑 豬脚筋 共煲食。

(庚)壯筋骨藥

(一)田基黃菴 韓信兵 天吊香 牛角尖 雙料酒 生鷄仔 鮫魚 共煲食。

(說明)以上是傷症主藥簡表。其每味詳細功效用法。可參下生藥學。

第七篇 防範中毒救急法醫按

第一章 防範中毒

毒物能致人於死命甚速者。卽如藥品。化學品。天然毒品。有信石。毒瓦斯。雙綠汞。深林古屋古井之空氣。植物之苦搗藤。鼻嗅迷烟等類。軍旅中對敵用此謀害。不知防範。甚爲危險。

(甲)人日中所最重要爲水。若對敵謀害。施砒汞毒於水中。若飲食之中毒。最爲危險。

(一) 如河溪井之水。試其有毒否。取水一斤。下礮砂末一錢。其變濁及各
種色。水則不潔淨。或有毒等。如清淨之水。清而不變色也。或用酒
精溶解肥皂滴於水試之。如上能變色者有毒。若誤中毒解救。可參下
救急法。

(二) 取食水法 在河溪沙灘挖深。自然經沙泥滲隔過之水爲淨。或用杉木
炭碎。骨灰載於隔水缸。上下蓋以厚沙。經炭骨吸收雜質淨清。此水
可食。

(三) 如水泥濁不清。用白礬浸於水中。水中坭垢自然墜底。其水立清可
食。

(乙) 深山巖洞古井古屋。自然發生一種空氣。人誤吸之立斃。誤中者。可參救
急法。

(一) 入深山巖洞古井古屋。先口含黃糖一錢。以水濕布紮口鼻。點燭火或
油燈火行。若有窒氣之地。其火立熄。其人不可進入。

(二)古洞巖古屋井之窒氣。欲驅去之。以硫磺一二斤。加柴燃燒薰於其中。窒氣自然消散。

(丙)化學之毒瓦斯。敵人之毒烟彈迷烟等。除軍人有防毒面具外。平民亦無防範者。最易受毒。

(一)迷烟人吸之。其人昏迷若醉。口中含黃糖一錢。此種迷烟自失去功效。不能迷醉。

(二)毒瓦斯烟。放毒瓦斯時。其瓦斯氣比空氣爲重。必藉風力而行。及其呈一種黃綠等色烟雲臭味。防範者如下。(子)躲避之法。宜背風行走。脫出毒氣範圍。(丑)因其毒氣重凝聚。切勿處森林山谷田禾低窪之處。宜於空氣流通。其毒氣易分散。並不可呼吸速。及高聲大叫。

(寅)感毒見喉咽癢痕。流眼淚發咳。胸腰疼痛。快要療治之。(卯)以厚棉布巾或棉花蘸人尿。或亞流酸銅。蘇打以水溶化。束於口鼻。或用鹽水亦可。口含酸烏梅一個。其毒不易侵受。

(丁)香甜生菓被蜂螫蛇蟲咬毒。其菓變成黑色。食時將黑色去之。或以鹽水浸片時而食。則去清其毒。

(說明)鹽水最爲解毒。喜食生果者。以滾水鹽浸之。一切蟲螫毒可解。

第二章 急救法

急救者。卽患一切失氣。溺水覆船窒氣。中暑昏厥。電燒跌仆失氣。嬰兒產出失氣。中風痰血。自縊誤服毒藥物假死等。施人工呼吸救法。

(一)自高處墜落。或跌打頭腦震盪。一時不省人事。其脈緩細之假死。卽解除緊迫之衣帶。將頭部稍高。仰臥施人工呼吸如下圖。


人工呼吸法

救護時。先以手按死者心胸暖否。並用輕燈心鷄毛置於鼻中。觀其有氣出否。如心微暖及有些氣動。卽以人工呼吸救之能復生。將病者仰臥。頭部高些。解開胸頸衣服。舉其兩手至頭上。向下輕按。漸復原處。每分鐘行十五次。甦後摩擦四肢。及心胸部。其令溫暖。可參此甲至戊圖。若溺斃

第三十圖

此圖表明
扶病者之
頭使呼吸
易於通達
之法

三十



甲



乙



丙



丁

人工呼吸法
之呼吸式



戊

人工呼吸法
之呼吸式



庚

人工呼吸法之呼吸形



己

人工呼吸法之吸氣形

用俯臥法。令病者俯臥。張開其口。闢其鼻孔。兩手全力按其腰。時壓時鬆。每分鐘約行十二次。氣管及胃中之水。由口鼻流清。其人漸甦。後用薑汁水一錢灌之。

(二) 練兵疲勞過度。暑天熱氣中喝。

卒時昏倒。中風抽搐者。用薑汁點眼角兩頭。男點左。女點右。加以童便一杯灌之。另以童便熱擦心胸。丹田。臍中。仍若不醒覺。則行人工呼吸法。及吹通關散鼻中。方見上冊中風門。並用中風方對治。

(二)誤食信石諸汞毒。惡心腹痛。用生藜豆水研半斤取汁灌之。或以鷄羽毛攪擾其咽頭。令其嘔吐。或用防風末一兩服之。或用蛋白一碗。蚌肉四兩食亦解。

(說明)服毒藥者。莫善於吐。取其吐用鹽三錢。白礬一兩灌之即吐。若不吐施以手術洗胃法。

(四)觸電。電燈洩電。或電線斷落。接觸人體。因以昏厥。不省人事。切勿以手扯其人。免電傳觸。以不傳電之竹木。或御橡皮手膠套。將電線打開。及設法止其電流。將病者移開。行人工呼吸救甦。後飲以提神藥。

(五)救食苦搯藤。將大煖茶蕊茶一斤。以白毛鷄屎藤半斤搗爛沖服。如無白毛鷄屎藤。用各鷄屎藤亦可。或出漿草代之。或用生鯪魚搗爛灌吐。或甜

瓜蒂一兩煎水服。又方以葦葉搗爛開冷水灌之。又方以生油一斤。石灰五錢。去頭次水。取二次水開油服。

(六)標蛇症。由手足起紅腫核。經片時其人昏迷。用蚰蟬二十隻。紅絲線吊芙蓉二兩。共搗爛滾水沖服。外用鹽水拍紅腫處。以銅拔刮之。見上冊三十圖。

(七)自縊。將縊人托起解下。使其坐椅牀。不可放其落地。吸及地氣。並不可用刀割斷繩。以生薑汁二錢灌服。另用小許擦眼角鼻孔。以手掩其口鼻。令其氣急則活。下前後陰。用棉花塞實。將兩手搖於頸上。由順放下。原處。連搖每分鐘十二次。即用人工呼吸法。其人漸甦。加通關散吹鼻即醒。

(八)喉哽塞氣。用力拍背部。使哽物咽下。或用貫衆一兩煎水服。或用肥皂水芥末水飲之。引其吐。哽物可吐出。

(九)癩犬咬傷。用玻璃桿蘸硝酸水。遍擦傷口。令其燒透受毒肉。則不傳達全

(八) 身。並參上癩犬咬門方治之。

(十) 凍死。人遇寒凍死。四肢強直口噤。祇有微煖氣。用釜炒灰布包煖熨心上。冷則易之。另以溫粥水灌之。或用溫酒薑汁灌亦可。至好用氈被包身。輾轉搖動。令其溫煖可活。

(十一) 凶荒之歲。人多餓死。若累日不得食飢困。切不可頓吃飯肉。犯之即死。先以稀粥清嚥下。令咽腸滋潤。過一日。漸與粥食。自然生活。

(十二) 卒死。客忤。中惡。尸厥。一切不省人事。用灸法治之。針刺少商穴。灸氣海。丹田百會。四十九壯。或用紙條蘸油燒烟薰鼻中。令其作噓。

(十三) 溺水。如心頭常煖。將溺人覆於牛背。令牛行之。無牛用鑊搖動水自吐出。或用酒埕載煖水。將溺人覆於埕面亦可。並於人工呼吸法救之。

人不識游水者。當知落水免溺斃法。其法墜於水中時。將口合理不可吸水。又不可將手亂把。心自安定。勿驚勿亂。將手足身伸直。心當無事。自然浮上水面。後看見何處近岸。將手輕輕撥之埋岸。此經驗多人之妙法。

○ 行旅者。不可不知也。

(十四)絞腸痧肚痛急症。用生鹽三錢炒紅。開童便一盅飲之。另用樟木子一兩煎水服。

(十五)中洋烟醉。用白礬一兩開水灌之令其吐。

(十六)牙衄血不止。用酸檸檬敷之。可參上冊衄血門方法。

(十七)產嬰失氣。將嬰兒以煖水浸件人及嬰兒。另用上三十圖己庚式。人工呼吸

法。便可救甦。

(十八)龜蛇野禽獸咬不放。用針錐刺咬蛇獸屎屙。及陰部即放。

第三章 醫案

(一)易某學界。年十七。患風痰鶴膝。兩脚拘攣。日夜疼痛。經二年之久。用老桑頭百斤。長流水二百斤。文武火煎回數斤。服完痊癒。

(二)王某醫界。年四十二。患噎食症。糜粥不下。經半年之久。用花旗參四兩。橘紅胎一兩。煎服數劑而癒。

(三) 黃某商界。年五十二。頭面身四肢俱腫。眼閉不見。臥牀不起。經三年。用蕃薯二十斤。黑糯醋煮作飯。連食半月而癒。

(四) 李某軍界。年四十五。面身起紅疔。着痛不已。狀如瘋疾。經二年之久。此因食辣椒過多所發。用生冬瓜蘸白沙糖作飯食。半月而癒。

(五) 劉氏年三十五。產後兩脚腫。經年餘之久。用鷓鴣二十隻。每日用生薑一兩。紅棗五錢。煲食一隻。食完痊癒。

(六) 黃某政界。年二十四。患風熱週身痛苦。搗牀數日。用防風二兩。生石膏四兩。知母二兩。甘草五錢。煎服即癒。

(七) 馮女士年十三歲。患鼻衄。每月流二三次。每次碗多。經二年之久。用沙參三兩。黃茅根花一兩。煎服數劑而癒。

(八) 易某年六歲。吞圓銅破一箇。日夜咳血。骨瘦如柴。經半年之久。用膽礬四分灌下。銅破吐出而癒。

(九) 王某妻年三十六。孕五月胎死冲心。痛楚日餘。手脚腫黑。不能開聲。用

蝮蝮四十九個。歸身四兩。蜀漆七分。服之死胎卽出而癒。

(十) 易某妻。在臀患流水瘡。二年之久。用白鶴骨灰五錢。瘦猪肉四兩。琢爛敷數貼。流粉數碗。內服陽和湯。數劑而癒。

(十一) 劉某年二十六。炮彈墜腹中。用升麻末二兩。風劍草二兩敷之。見癢極彈從傷口流出。

(十二) 楊某商界。年三十七。咳血年餘。用生石膏六兩半。旋覆花二兩。沉香五分。連服數劑而癒。

(十三) 劉某妻脇痛五年。用殺虫升雪丹四分。服之疴蟲千萬條而癒。

(十四) 馮氏年二十七。患喉痧。喉閉日餘。不能出聲。危在旦夕。用針刺少商穴出血。以元參八錢。生地一兩。麥冬六錢。白芍五錢。貝母五錢。薄荷三錢。丹皮四錢。甘草二錢。竹蜂三隻。煎服自癒。

(十五) 張某醫界。年四十二。患失榮頸腫甚大。用川麝香五錢。生薑汁一兩。開搽卽流黃水立消而癒。

(十六) 吳某工界。年四十五。吐血盈盆。日夜不止。危在時刻。用歸頭四兩。熟地炭二兩。大蘗炭五錢。艾葉(炒黑)一兩。川白蠟末一錢沖服。煎服卽止而癒。

(十七) 本醫生因往鶴山大塘鄉診症。中途見多人救一婦。該婦雙目爛爛。手搖搖不能開聲。此乃風痰鎖喉症。用料酒二兩。鹽二錢。開灌卽吐痰血痰數啖而癒。

(十八) 侯某媳腰患水疽。腫大如斗。連患年餘。用金瓜一斤。穿山甲末四兩。共搗爛敷之。流水數日痊癒。

(十九) 林某工界。年二十八。眼見鬼怪。觀物高低不整。室宇行走。終日狂叫。半月之久。用百部二兩。防杞二錢。煎服而癒。

(二十) 呂某兒年十三。天行痘爛臭。人不敢近。臥牀不起。用黑狗肉六兩。紅棗十枚。煮食數日。自能行走。結痂痊癒。

第八篇 六畜科

第一章 猪

畜猪是農家生利之本。農家多藉此獲厚利。且兼得溺洩。作肥田料。誠農家重要之利源也。惟不識調理。發生疾病。死亡相繼。血本無歸。甚惜。若將病畜屠於市。人購食中病。其害更不堪設想。但其調理。分爲畜欄之建設。空氣充足。浴洗之周到。平時之防範。於未病已病之療治等法。方可免病斃之患也。

(一) 畜欄之建設衛生。普通畜猪以十隻爲一欄。其丁方約一丈二尺以上。地鋪石板。四面通空氣。其欄用竹間之。一猪之胸肺闊大。當與人等。其人呼吸轉氣需五十以上立方尺。每欄總在丈二尺丁方尺。方足呼吸之用。而猪欄隘窄。空氣不足。於衛生有碍。發生疾病。不可不注意。

(二) 猪性喜浴涼。每於二月至八月。每日用清水。洗猪身一次。如冬月嚴寒。每星期用溫水洗猪身一次。洗法用水冲於猪身上。冲完之後。將欄石板用

(三) 竹掃洗潔之。

(三) 每早午晚飼一次。每隔一二日。加生白菜。苕菜。莧菜。蘿蔔菜等。每十隻豬可用七斤俾其食。但此菜必須用石灰水浸半小時。另用滾過暖水洗去灰味。方可與食。否則菜中小蛭雜蟲。誤食中病。並每星期用徐仁甫畜牧丹五樽開飼料與食。可免染豬疫痧癆各病。且極爲開胃索食。發育長大。比不用此丹調理。實有天淵之別。

(四) 豬起病先兆。豬頭毛色糠直豎。每食二三啖。則企定不食。眼有眼屎紅赤。或呃。或咳。或抄欄爪地。豬尾垂。食時尾不搖動。此豬起病。卽要隔離他欄。以徐仁甫畜牧丹早午晚加入飼料服二樽。若五十斤以下之豬。每次用一樽亦可。或加鬼畫符。天葵。柴胡。連翹各一兩。煎水開丹和飼料食之。

(五) 豬病多患痧癆。又名痧癰。又名瘟疫霍亂症。其皮出紅點。腿罅結核。氣喘瀉水。卽用畜牧丹每早午晚三樽灌之。如結屎加大黃。牽牛。枝子各二兩煎水沖丹服。另用刺刀向尾開小口放出毒血。以冷水浸一小時。不可浸

過頭。天寒不宜浸也。其未經傳染者。每早午晚燃徐仁甫製辟瘟丹二枚。免其傳染。

此丹方。出於上冊瘟疫門。可參考之。刺刀參二十六圖甲是也。

(六) 猪咳肺燥者。該飼料加黃糖四兩。畜牧丹一二樽。外用鹽半斤開水一桶。

(七) 冲洗猪身頭等。由皮膚引洩其肺燥。連用多次癒。

(八) 猪食後作嘔吐。胃腸中有蟻蟲等。用苦楝根皮。貫衆各二兩。加畜牧丹二

樽灌之。或加入飼料飼之。其蟻蟲由大便疴出。

(九) 猪齣反胎及不受孕。皆脾腎寒。用早禾穀五斤。鹽四兩開水。將穀開鹽水

炒香飼之。

(十) 猪仔疴白屎。因猪母有病。乳汁不良。用畜牧丹六樽炒香。飼猪母猪仔而

癒。

(說明) 猪仔疴乳白屎。最易死之。可依上八九兩方施治。一次未癒。連用

多次。以癒爲度。此畜牧丹各埠均有代售。若無者。可在郵政滙銀來。或

用郵票代價。十足通用。該丹即在郵政用包裹寄到無悞。

(十)如鄰近有瘟疫痧癆豬發現。購食肉品。及一切臘肉。難保無病豬肉等造。所有洗碗碟米水。不可加入作飼料。並不可放其於郊外遊。免其吸受傳染。

(十一)如豬病瘟疫死。切不可屠於市。恐人食之中毒。將埋於深土中。或培植菓樹地中。作肥料用。其欄用石灰水週圍洗過。或用辟瘟丹十枚。及硫磺二兩薰之。所有一切草物。經火焚化。免疫毒留下。傳染別豬之患。

(十二)猪生癩蟊。用酸味葉。睇牛子蕈各半斤搗爛。洗猪患處。

(十三)養六畜須觀氣候。若見下午黃昏。天落黃白霧沙。此霧沙最害畜牲。即將六畜欄各窻門閉。不俾霧沙侵入。即焚辟瘟丹五枚。祛去此毒霧沙。如禽類露天籠。亦當用布罨密之。或將其籠欄移入屋內。閉門窻門可也。此霧沙不獨六畜感爲害。而人感受。又能發生疾病。亦閉窻焚辟瘟丹多枚防範之。

第二章 牛馬驢騾羊犬貓獸

獸類以牛是農村家耕田之需。馬驢行軍負重之要。此皆有益吾人之動物也。畜者明了防範其病調理衛生。可免其染諸疾病。其欄之建設。每隻牛必在一百五十立方尺（甲）牛之胸肺面積。比人當多三倍。其欄之建設。每隻牛必在一百五十立方尺以上。方够呼吸。乃合衛生。其有病用藥重量。比人亦當加至三四倍。馬驢亦然。而畜欄滌洗乾淨。每星期用徐仁甫畜牧丹五樽。開飼料粥水。或米豆漿與食。不染瘟疫等病。

（一）防範患病法 牛病發生。多出於感天時氣候不正。黃昏落霧沙等。每晚焚辟瘟丹二枚。永不染傳染病。此方出上册瘟疫門。其餘馬驢騾羊發病亦同。

（二）牛生死之診斷法 牛病診斷法。略分爲二。一曰不治症。二曰有醫治症。

（子）牛病不治症。舌頭太硬不治。舌冷把起無動不治。舌又奪手。猶

如堅鐵不治。看牛眼反白不動。而血落隔者不治。牛鼻屬肺竅。其氣全無出入。肺經已絕不治。以聽筒聽其喉頸呼吸不聞。大氣絕不治。鼻見縮牙露齒。脾腎已絕不治。牛肋屬腎。肋通五臟之血脈。耳尾冷至耳肋。大柱骨倒。亦腎絕不治。看牛口腕內以手探之。滿口俱冷無潤氣者即斃。看牛草庵。脫落隔。兩庵相通不治。四脚俱冷到膝。牛皮血出黑色。企立八字樣脚。一跌即死。以上各種症。皆不治之死症。雖用如何法子。醫之亦屬徒費金錢而已矣。其馬驢診斷法同此參考。

(午)牛病有醫治症。如舌底有血氣。未變硬者可治。如其呼吸氣半出半入者可治。耳肋半煖半冷者可治。牛草庵不甚脫落隔可醫治。(說明)牛舌不能伸出來歛鼻孔。及不能食草。皆因舌頭強硬腫大也。若猪瘟流行傳染於牛。則牛胃腸炎腫疔爛屎。名爛肚瘟症。若眼內有紅根。肝熱出眼屎。將為發病。防範以徐仁甫畜牧丹早

午晚服一次。每次用六樽。則能制止其病。

(三)牛起病預知診法。不論黃水牛。及其他國牛。食草不勤。臥不轉芻。時疴爛屎。眼出眼屎。舉頭响天伸氣。尾垂而不動。流鼻水。咳頭毛。兩耳反墜。此要防範治理。

(四)牛瘟病熱病刺舌筋法。牛病放血法。爲治理最要手術。無論其症輕重。一放血後。加用各藥對治。功效特倍。法將牛口開之。撥起其舌。舌底下兩邊有黑筋浪浮起。對正浮起黑筋。用銀針刺之。令其毒血流出。後用鹽水撞洗淨其舌口毒血。然後灌藥。

(說明)凡放牛舌筋。切不可放其舌底中心部。此係黃泉眞血命脈。誤則危險。慎之。祇向其舌底兩邊對牛處下針刺爲合。若其舌底有生鵝。但對鵝頭處下針刺之。此刺針參二十六圖。

(五)開藥方法。牛食藥後。禁犯風雨。不可外出五六日。其藥必要洗淨。不可露霧。食水不可用生水。必須經滾過而開藥。若患瘟疫彪屎出瘰。

用滾水開藥。若患結屎肚脹用蕉水茶油開藥。若患飛揚標蛇用酒開藥。

若患雙鵝單鵝用醬開藥。

(六)牛出痘麻疹痧時行瀉屎之診斷法。其餘馬騾驢診法同。

(子)牛患痘症。穴門有紅黃二色點。牛尾起有紅點。如蚊口大是也。

(丑)牛患血痲症。穴門起有紅點。牛尾下起有紅點。如蚊口樣是也。

(說明)紫紅色爲疹。大粒的爲痘。細粒帶紅爲痘痧症。

(寅)牛患喉痧症。口內兩邊有紅黃二色。此肺臟熱甚。而發於口喉。

一名喉痧症。

(卯)牛患時行瘟症。其初起一二日必咳。咳聲痲喉。雖翻芻食草。亦

須查其尾筋有生暗色。糞門有瘀紅細粒。眼出眼屎。腹部脹。此

時行症。速宜瀉去其毒。

(乙)牛內症診法。欲知其寒熱。用寒暑表器械診斷。該表用法示明。可參上冊

寒暑表診斷門。其餘參本條甲各法。並將內病治方法分列於下。

(一)牛疴血紅屎症內服方 此因大腸發熱受毒而致。用白倍根。點秤根。臨磨孽根。老鴉膽根。檳榔。白頭翁。布渣葉。矮柴。黃皮欒。蘇木。綠豆。黃茅根。紅鬼燈籠。門頭羅。鋪地錦。亞婆酸。仙人掌。假指甲。地膽頭。耳公根。黑豆。白糖各一兩。地榆。厚朴。山楂。黃蓮。葛根。車前。赤茯苓。麥芽。枳殼。金剛頭。霸王虎各五錢。共煎服開糯米五合灌服。

(二)牛肚脹不食草內服方 此肺胃二經結熱症。用石膏。枳殼。黃芩。枳實。甘草。蕉心。山楂。鹽霜柏。前子。山油麻。山桔葉。鋪地錦。亞婆酸。地膽頭。槐花。鷄屎坭(有咳不用)各二兩。水煎灌服。

(三)牛不轉草(卽不反芻)內服方 用銀花。榕膽草。筋菜根。耳風根。竹葉。七星草。狗乾菜。六一散各一兩。共煎水沖鷄蛋二隻灌服。

(四)牛患水瀉內服方 用蒼朮。厚朴。陳皮。豬苓。澤瀉。白朮。茯苓。白芍。炙草各一兩。玉桂。羌活。防風各五錢。共末。炒米湯灌服。

(五)牛結屎內服方 用山蘿蔔根。老鼠擔冬瓜根。地米根。苦瓜。地膽頭。金銀花。筋菜根。蕉心。博仔樹。白餅葉。黃糖各二兩。雞蛋白三隻。共搗爛溫水調服。

(六)牛瀉紅水。亦食草不反芻內服方 用荳豉四兩。茶蕊一兩。共搗爛滾水沖服。

(七)牛標屎帶有鮮血內服方 用冬菜半斤。紅貝娘。小蓉膽。銀鈕子各二兩。白面風。金銀花各一兩。共煎水服之。

(八)牛吐血內服方 用大艾二兩。冬瓜五斤。共搗爛。滾水沖服。

(九)牛發痧內服方 用黃坭。黃茅根。點秤根。龍頭草。神沙藤葉。生鹽各二兩。水沙木。絡麻頭各一兩。共煎水灌服。

(說明)此症要早理。遲則風熱攻心。發狂難救。可用徐仁甫畜牧丹連食至癒。

(十)牛患絞腸痧內服方 先用鹽一斤抹背脊汗出。然後用生槐花葉。生白

芎。黃連。地膽頭。金銀花。雄磺各二兩。厚朴。神麩各一兩。煎水加酒一杯灌服。現狀其腹畧脹。反起反倒。四足搨開。又搨埋是也。

(十二)牛絞脚症內服方 用黃茅根。風茅根。檸檬葉。桃果葉。吹筒管。流

鼻血草。鋪地錦。山油麻。金銀花。牛鬪筋。爛耳羊。草麻葉。熾藤

鹽布根各二兩。水煎服。

(十三)牛頸腫大內服方 用大黃。黃柏。薑黃。麻黃各一兩。木鱉子。牛蒡

子。黃芩各六錢。黃連。硃砂各五錢。雄磺二錢。牛黃三錢。共為末

酒開服。

(十四)牛患時行瘟疫肚脹瀉屎內服方 用地榆。枳殼。檳榔。黃芩。木通。

土茯苓。麥芽。神麩。車前子。荊芥。甘草。苦艾根。早禾米。綠豆

黃柏。連翹。地膽頭各六錢。雄磺。硃砂各三錢。牛黃五分。共為

末。用下藥煎水沖散服。金銀花。爛耳羊。鬼燈籠根。滿山紅。檸檬

葉。亞婆酸。土瓜頭。鋪地錦。勸菜根。紅貝子。水漫頭。涼藤子。

水大黃。吹筒管。芽瓜頭。散血丹。鹽霜柏。博仔葉。假指甲。白芍。歸尾。天門冬。雷公根。山桔葉。地榆各二兩。蜜糖。鷄蛋白。冰糖各五錢。先煎好上草藥。沖上藥末及糖蛋白灌服之。若腰弓加沉香。木香各五錢。酒一斤調勻服之。

(說明)牛瘟一經內臟腑喉爛。治療甚難。必須預早防範。治於未然爲妥。

(十四)牛黃癆肚脹內服方 用狗乾菜。筋菜根。竹葉。銀花。膽草。滿山紅各三兩。雄磺。硃砂。沉香各五錢。鷄蛋白四隻。鷄屎白(炒香)末沖服一兩。水煎好上藥。沖蛋白鷄屎白末服。

(十五)牛生皮疔大毒內服方 治牛毛起鉤。腹略脹。皮毛發毒疔症。用黃連。元參。黃柏。綠豆。土茯苓。槐花。前子。甘草。木通。雄磺。硃砂。天冬。滑石。金銀花。厚朴。膽草。神麩各五錢。地膽頭一兩。水煎服之。

(丙)牛馬孕產科。分爲動胎。不能產出。胎死不下。

(一)牛馬胎動內服方 此藥安胎。治牛馬未足月胎動症。用熟地一兩。川

芎。白朮。阿膠各六錢。歸身。白芍。黃芩(酒炒)。炙草。貝母。厚

朴。枳殼。荆芥。陳皮各八錢。水煎服之。或加黑芝朮末。白糖各一

兩冲服。

(二)牛產子不出內服方 用籬頭綱。倒鈎草。酸醋頭。白頭公葉根。狗芽

花各三兩。糯米三合。鷄蛋白三隻。共搗爛滾水冲服。

(三)牛胎死不下內服方 用葶麻子。灶底坭。柞木根。交剪花根。燕子巢

坭各二兩。共煎水服。加蕉樹搗爛搾汁一盅。開白糖四兩調勻服。其

死胎自下。

(四)牛產胎衣不下內服方 用葶麻子。仙人掌。黃糖。蜜糖。假指甲。車

前草。紅花草。黃茅根各四兩。共搗爛滾水冲服。

(丁)牛馬外科及跌打方。

(一) 治牛馬眼起膜外搽方 用龜板二兩。(煨存性)為末。滾水開搽。其膜自除。

(二) 牛脚甲生疔外搽方 用犁頭生鐵燒紅滲醋一斤洗淨脚甲。以蟾酥二錢(煨存性)。雄磺三錢。共末。搽之埋口。

(三) 牛馬疥癩外搽方 用蕎麥捍燒灰沖滾水洗。以藜蘆末。五倍子末各二兩。水開塗之。

(四) 牛出紅花片外搽方 用紅花葉四兩。搗爛以糯米醬料酒各二兩。煮熱搽塗之消。

(五) 牛馬跌錯大腿骨腕方法 先用跌打門第一章丙二方加三倍水煎好。酒一碗和灌服後約半時度。將半腿用人腳踏之。令其骨腕復原。

(說明) 牛錯骨腕。切勿將牛作不治。若不曉手術者。可向上跌打門錯骨腕方加多三倍。外敷之亦能復原。

按牛病內外療治方法。而馬驢騾羊亦可參考對治。不再另立療治方法。

也。

(戊)羊欄之建設。每羊之面積。在三十立方尺於空氣呼吸方足用。

(一)羊防範病方法。此欄四角。用水竹原筒去內節。留底節不去。內入滿生鹽。其鹽漸滲標於竹筒外。羊得時常舐食。其羊不致發生他病。並能發育長大。

(二)羊牛馬豬病吹鼻方。用豬牙皂。細辛。川烏。草烏各一兩。雄磺。蟾酥各二錢。麝香五分。共爲末吹鼻中。另用鹽一兩。開滾水二斤與服或灌。

(己)犬病多是熱者。常用黃糖五錢開飼之。則少生病。至好以徐仁甫畜牧丹每星期與半罇飼之。可防範一切傳染病。

(一)犬生蚊癩外搽方。用蕃薯藤汁半斤。開水豆腐半斤塗之。並治貓生蚊症。

(庚)貓病以咳嘔爲多。常以豬肝及蜆肉飼之。最能發育長大康強。

(一) 貓病內服方 用川烏藥三錢。煎水開雞蛋白一隻灌之。

(二) 貓生蠃外擦方 用蒸蜆自然汁開雄磺末一錢塗之。

第三章 禽類

(甲) 鷄病多患肝血熱。胃腸寒。瘟疫病。不知防範。最易病死。其防範之法。分列於下。

(一) 鷄之空氣衛生法 鷄之胸部。容納空氣呼吸。需二立方尺以上。方合衛生。其籠之構造。亦當照此。且籠底開以疏罅。鷄尿易於流下。籠脚安車轆。以便移動。每早掃除其尿。另用石灰水灑之。或用辣蓼葉浸水灑。最爲殺菌消毒。

(二) 防範鷄瘟傳染病 每晚焚辟瘟丹。以丹烟薰籠內。各籠用疏布覆之。免蚊螫咬傳染諸病。

(三) 鷄常效方 鷄以炭灰油質。爲發育重要品。炭內鹼碘。鹼碘解血熱。且能助消化。灰質爲壯骨造卵殼之主料。油入腸胃生熱力。三質配合

妥。誠爲禽中特效妙品。每鷄重一斤度。每日合方共重二分。以上。加入飼料飼之。不止能育長大。且防範其疾病也。用杉炭一斤。此杉久入坭土中。洗淨坭土煨之。硯灰二兩。以水一斤攪勻。澄清去水。取灰曬乾。芝麻二兩。三味共研末。每鷄每日用一分至二分。加入飼料飼之。

(四) 鷄連環生蛋法 此法專畜鷄取蛋。依此方法用之。其鷄甚少懶孵。而多蛋生。法將鷄初產第一次所有之蛋。每生一蛋。連殼打開以早禾穀伴炒飼生卵之鷄。犧牲第一次所有之蛋。後此鷄產蛋倍然。且不懶孵。

(五) 鷄有蠟癩外治方 用雄磺。硫磺各四兩。辣蓼葉乾二二斤。共末。坭沙開。放鷄遊戲地。其有蠟癩之鷄。自行在此沙場作沙浴狀。其蠟癩聞沙中藥自斃除。

(六) 鷄病之診斷法

(六) 子 鷄肉冠色彩不鮮明。呈暗黑色。乾倒狀。肝血熱病也。

(丑) 鷄常蟄睡眠。行動無。垂翼縮頸。此發冷病也。

(寅) 鷄鼻孔有涕流出。感冒傷風病。

(卯) 鷄不時仰空長呻吟。咽喉患痧腫病。或鷄瘟病。

(辰) 鷄糞白中帶水泡瀉。胃腸寒病。

(巳) 鷄無病時。羽毛光滑澤。出籠伸翼疾走。雄鷄鷄慄。食時叫雛。

遊場把坭沙。與同群作戲。依時高唱啼。糞色灰白軟潤。此皆健

康也。

(七) 鷄肝血結熱針刺法 治肝血結熱。肌肉起紅黑點。張口氣促症。用針

刺鷄冠頭。令其出血。後以油擦刺口。若患喉痧瘟疫。並刺兩翼較曲

池穴。針刺參二十六圖。後用徐仁甫畜牧丹一樽煎水灌服。若無此丹

。用鹽三分。雄磺一分。開水灌之。

(八) 鷄患發冷內服方 用徐仁甫發冷丸一粒。開酒灌之。

(九) 鷄患感冒傷風外噴方 用酒二兩。醋四兩。調和。用噴壺向鷄頭噴之。連噴多次癒。

(十) 鷄腸胃寒瀉白水內服方 用蛤仔一隻。川胡椒二粒。灌其食之。如蛤仔冬天難覓。以酒開胡椒亦可。

(說明) 鷄病之治理貴於未然。防範之法。最妙用滾過水。每一斤加貫衆末。製淨硯灰末各一錢。和勻與飲。其鷄甚少發生他病。並用第二方焚丹防之。

(十一) 畜養鷄求肥法 用猪膏一兩。冷飯一斤炒飼之。以籠牢固。不俾其出入。半月肥大。骨軟肉甘。

(乙) 鴨水禽。其胃消化力甚強。疾病比陸禽少的。有病亦可參陸禽鷄門方法治之。

(一) 鴨發育長大內服方 並飼於鷄亦可。用蝦殼乾五斤。蟹殼乾五斤。硯灰(製過)半斤。共爲末。每日每隻鴨用二分至五分。開飼料與其食。

格外發育長大。

第九篇 生藥物學

生藥物之採用。以外科跌打刀傷炮傷瘡瘍爲最多。其功效之卓著。每每出乎人意料之外。卽如鮮荷葉大小天紅之解暑。鮮松葉雞心蒲韓信兵之止血止痛。凡施用之。皆應如桴鼓也。謹將是書方中所用者。詳列於左。

一 畫

(一) 一枝香。又名老虎料。土細辛。一炷香。(草本)性質辛散。(功用)治頭風。跌打祛風。殺蟲止癢。(處方)外洗。或酒煎服。

二 畫

(一) 人指甲煨(人之骨餘)。(性質)含有硫鹼性。(功用)殺菌續筋乾水。而人乳潤肌澤臟。

(二) 人字草(草本)。(性質)甘辛。(功用)治跌打腫痛。內服消烟癖積。

(三) 入地金牛。又名兩邊針。出入山虎。上下山虎。(性質)苦辛。(功用)治痰

火癰。喉痧。跌打消腫散瘀。蛇蟲咬。感冒夾色。(處方)治感冒夾色。用

入地金牛五錢。紅花二錢。鬼羽箭三錢。水煎服。

(四)七葉一枝花。又名金線重樓。(草本)(性質)味甘平。(功用)跌打

消腫止血活血。益精氣。內傷咳。解毒。

(五)七星香。又名七星草。七仙香。(草本)(性質)辛香。(功用)跌打刀傷散瘀

血。牛病不轉草。

(六)九乾菜。又名青蛇仔。(草本)(性質)甘寒。(功用)清熱去炮傷火毒。牛不

轉草。

(七)九里香。又名千里光。(草本)(性質)苦澀寒。(功用)跌打消紅腫。小兒胎

(一)毒。蛇傷。外洗脫肛痔瘡。

(八)九里香。(草本)(性質)苦寒。(功用)腸癰痔瘡。

(九)八角草。(草本)(性質)辛香。(功用)引炮碼沙外出。

(十)刀鞘豆葉。(草本)(性質)甘平。(功用)敷乳瘡痘胞。豆核止呃逆。

(十二)了哥麻。(草本)(性質)苦寒。(功用)脚抽筋。百足蛇咬。跌打。蕘枯果癩

(處方)枕菓癩。用瘦猪肉四兩。了哥麻二兩。水二斤。煎回半斤服。

三畫

(一)小天紅。(草本)大天紅功用同。(性質)甘平。(功用)解暑炮火傷。

(二)小幌傘。又名矮脚幌傘。(木本)大幌傘功用同。(性質)辛苦。(功用)跌打

駁骨祛風止痛。癩瘡。

(三)小還魂。(草本)大還魂功用同。(性質)甘酸。(功用)跌打散瘀駁骨。

(四)小蓉膽草。(草本)大蓉膽功用同。(性質)甘淡。(功用)寬較活血。強理風

癰。治牛不轉草。

(五)小芙蓉蘂。(木本)大芙蓉功用同。(性質)苦。(功用)跌打生肌瘡瘍。

(六)小牛棧。又名絢牛棧。(小木本)(性質)甘平。(功用)治跌打刀傷寬筋。

(七)小九浩葉。(木本)(性質)味酸澀。(功用)治刀傷消腫。

(八)小金櫻。(木本)大金櫻功用同。(性質)酸甘。(功用)治蛇傷跌打脚腫。

(九) 小榕葉。(木本)(性質)甘平。(功用)跌打。榕樹鬚感冒夾色。散瘀。

(十) 小崩碗。又名地鏡仔。魚撒仔。(草本)(性質)苦寒。(功用)去炮傷火毒。
內服去熱毒。蛇咬。

(十一) 大紅花葉。(小木本)(性質)甘淡。(功用)治瘡瘍散腫引膿。

(十二) 大浮萍。(水草)(性質)味淡寒。(功用)洗汗癩血熱癢痕。跌打腫痛。

(十三) 大羅葉。又名大那。(木本)(性質)味苦。(功用)跌打消腫。

(十四) 大板葉。(木本)(性質)苦澀。(功用)治刀傷跌打去腐肉。

(十五) 大風艾。又名牛耳艾。大艾。(草本)(性質)苦溫。(功用)治跌打活血。

牛吐血。

(十六) 大孝麻根。(草本)(性質)甘淡。(功用)治瘡腫。

(十七) 大油柑。(木本)(性質)甘澀。(功用)洗疔疳爛腫。

(十八) 大茉莉。(木本)(性質)苦寒。(功用)疔疔入骨疼痛。處方同鷄袋食之。

(十九) 大王籐。又名黃蛇退殼。姪仔屎。(木本)(性質)苦寒。(功用)治乳瘡。

蘆寬筋骨。散氣結止痛。

(二十)大小牛力。(木本)(性質)甘淡。(功用)治跌打碎骨。

(廿一)大蒲蕖。又名鷄心蒲。(木本)(性質)甘寒。(功用)跌打刀傷散瘀。

(廿二)太科愁。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打刀傷消腫。

(廿三)大糟蘧。(草本)(性質)辛散微溫。(功用)治跌打刀傷去毒。

(廿四)大楓茅根。(草本)(性質)甘寒。(功用)治跌打散血。通經絡。

(廿五)大影葉。(草本)(性質)苦大涼。(功用)治跌打祛風。

(廿六)千里香。又名滿山香。(草本)(性質)辛溫。(功用)治消腫止痛洗疥瘡。

蛇咬。

(廿七)千斤拔。又名千里馬。(木本)(性質)辛溫。(功用)祛風痺痛。去濕。跌

打。

(廿八)千打葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)消跌打腫痛。

(廿九)山大艾。又名過山風。(木本)(性質)苦香溫。(功用)治跌打頭風痛。

(三十) 山白菜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治乳瘡無名腫毒。

(卅一) 山茜。(草本)(性質)辛寒。(功用)去鵝喉舌胎。

(卅二) 山黃粟根。(木本)(性質)辛散。(功用)治白濁。葉刀傷敷生肌。

(卅三) 山菩提。(草藤本)(性質)甘淡。(功用)利小水。去脚氣腫痛。

(卅四) 山榆果。(木本)(性質)甘澀。(功用)葉洗疔。去蟻殺菌。葉止諸衄吐

血。

(卅五) 山芝蔴頭。又名山油蔴。(木本)(性質)苦辛。(功用)出斑。熱毒。牛肚

脹。

(卅六) 山桔葉。(木本)(性質)苦澀。有毒勿食。供外用。(功用)洗瘡疥爛肉。

跌打消腫。

(卅七) 山楂蘂。(木本)(性質)酸。(功用)跌打止血。

(卅八) 山胡跳。(木本)(性質)辛苦。(功用)跌打駁骨。

(卅九) 山胡椒。(木本)(性質)辛燥。(功用)治骨傷麻痺。

(四十) 山茱頭。(木本)(性質)苦。(功用)治跌傷。

(四一) 山蘿蔔根。(草本)(性質)甘寒。(功用)治牛結屎。

(四二) 土狗。(蟲)(性質)甘辛。(功用)推瘀積。引炮彈竹木刺入肉。下死胎。

(四三) 土鱉。(蟲)(性質)甘淡。(功用)續筋駁骨。癩狗咬。

(四四) 土瓜頭。(草本)(性質)甘寒。(功用)治牛瘟疫肚脹。

(四五) 土荆芥蘂。(草本)(性質)辛溫。(功用)祛風止痛。洗瘡疥。跌打腫痛。

(四六) 土茯苓蘂。(草本)(性質)甘淡。(功用)去跌打瘀血積痛。

(四七) 三丫苦。(木本)(性質)苦寒。(功用)去熱毒。跌打發熱作痛。

(四八) 三月蒲。(草本)(性質)苦溫。(功用)治跌打紅腫。洗瘡毒。

(四九) 上樹蛙。(蟲)(性質)甘淡。(功用)出炮碼。去鐵銹。

上下山虎。詳於二畫三。

(五十) 川破石。(即穿破石)又名地棉根。(木本)(性質)甘平。(功用)活血寬筋

祛風濕。跌打傷骨。癩外敷。

四畫

- (一) 水楊酸。又名水楊梅。(草本)(性質)酸寒。(功用)治爛腳瘡。
- (二) 水囊樹葉。(木本)(性質)苦澀。(功用)治乳瘡刀傷跌打。
- (三) 水蕉。(草本)(性質)甘澀。(功用)治乳瘡。葉洗疔。
- (四) 水蛇皮煨。(蟲)(性質)辛散。(功用)治外搽過身蛇瘡。
- (五) 水瓜蕚。(草本)(性質)甘寒。(功用)治小腸氣痛。
- (六) 水魚公。(蟲)(性質)甘滋水。(功用)治腳氣。頭煨治痔。
- (七) 水松子蕞。(木本)(性質)苦溫。(功用)松節治身骨痛。葉止血祛風。
- (八) 水龍骨。(水浸石灰)(性質)苦澀。(功用)殺菌消毒。金瘡埋口。
- (九) 水浸松二囊皮。(木本)(性質)苦寒。(功用)去火毒。治皮膚水泡瘡。
- (十) 水油麻。(草本)(性質)辛香。(功用)痘胞瘡。
- (十一) 水芝甲。又名水甲花。假指甲。(草本)(性質)甘寒。(功用)炮火傷跌打

疔血。

(十二) 水沙木。(木木)(性質)甘淡。(功用)治牛發痧。人煎水洗其身退風熱。

(十三) 水漫頭。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛豬瘟疫。

(十四) 水把草。(草本)(性質)苦散。(功用)治跌打腫痛。

(十五) 水苕菜。(草本)(性質)甘寒。(功用)跌打瘀痛。

(十六) 水葛菜。(草本)(性質)甘涼。(功用)跌打散瘀。

(十七) 水桐蕓。(木木)(性質)苦散。(功用)跌打駁骨。

(十八) 水乾水大。(草本)(性質)甘寒。(功用)跌打涼血。

(十九) 水影枝葉頭。又名黃枝。(木木)(性質)苦寒。(功用)去熱毒及白濁。跌

打紅腫。

(二十) 水豆腐。(草本豆)(性質)甘淡。(功用)散毒藥。治犬貓生蠱外搽。

(廿一) 水馬。(水面蟲)(性質)辛散。(功用)治外搽馬嘴疔。此藥有毒。不可內

服。

(廿二) 水瓜藤。(草本)(性質)甘寒。(功用)解暑熱。煨治鼻淵症。

(廿三)水母。(水面蟲)(性質)甘寒。(功用)攻瘀積血龜。
(廿四)水芋。又名樸芋。(草本)(性質)甘辛。(功用)散瘀。外搽蛇骨刺入肉。

蜂螫。

(廿五)水浮萍。(草本)(性質)苦散。(功用)殺菌去腐肉。

(廿六)水蓉根。(草本)(性質)甘酸。(功用)跌打散瘀毒。

(廿七)水蛭。(水蟲)(性質)辛散。(功用)續筋骨。破瘀積。

(廿八)水辣蓼。(草本)(性質)辛溫。(功用)殺菌刀傷消腫。

(廿九)天紅。(草本)(性質)甘淡。(功用)治曲池瘡。清熱毒腸癰。

(三十)天吊香。(草本)(性質)甘香。(功用)止痛去蛇氣腐宿毒氣。瘡瘍。

(卅一)天龍骨。(石灰)(性質)辛澀。(功用)同水龍骨。在瓦頂之陳石灰是也。

止血埋口殺菌。

(卅二)牛耳苓。又名鹿耳苓。(草本)(性質)苦寒。(功用)去蛇氣。解虎犬咬毒。

跌打紅腫。

(卅三)牛奶樹。又名牛慄葉。(木本)(性質)酸寒。(功用)治腋瘡。

(卅四)牛鉅菜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治乳瘡諸腫痛。

(卅五)牛萬藤。又名苦搔藤。(草本)(性質)苦毒藥。勿入口食。(功用)外洗痔

瘡肛門瘡。敷引炮彈。

(卅六)牛屎乾。(動物屎)(性質)煨用苦含鹼質。摻爛脚瘡乾水。治隔食症。

(卅七)牛暑葉。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打積瘀。

(卅八)牛銀即馬錢。(菓實)(性質)辛寒。(功用)毒藥。非經製煉。不可入口。

製法參跌打門卯部六方。

(卅九)牛丁蛇。(木本)(性質)甘寒。(功用)治炮火滾水傷。

(四十)牛角尖。(草本)(性質)甘微酸。(功用)寬筋較。

(四一)牛營筋。又名牛齒筋。(木本)(性質)辛寒。(功用)跌打腫痛。牛患絞脚

痧。

(四二)五指甘。又名五爪甘龍。(草本)(性質)甘淡。(功用)跌打黑爛肉。

(四三) 五涼草。(草本)(性質)苦香。(功用)腹氣痛。外洗敷蘇鼠咬。

(四四) 五美蕒。(草本)(性質)酸散。(功用)跌打刀傷流膿水。

(四五) 木櫨仔。(木本)(性質)酸澀。(功用)去腐。鵝喉。跌打積瘀作痛。

(四六) 木虱。(蟲)(性質)辛散。(功用)其血引穿腿毒瘡。

(四七) 木蕎頭。(草本)(性質)辛香燥。(功用)敷肺癰。散結氣。

(四八) 木棉皮。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打續筋。

(四九) 火秧籐。(木本)(性質)苦澀。(功用)殺菌魚。蝕爛肉。勿入眼。敷生石

硬。

(五十) 火炭母。(草本)(性質)甘淡。(功用)薰洗敷蟲脹。小兒身熱驚抽。

(五一) 瓦檐齒。(草本)(性質)苦寒。(功用)洗斑癩熱癩。

(五二) 瓦。(又名新瓦。)(坭)(性質)辛淡。(功用)搽面癬血崩。

(五三) 仁面。(木實)(性質)酸。(功用)鹹去喉痛。蝕腐肉。

(五四) 六月霜。(又名含鋪柏霜。)(木本)(性質)果鹹木葉酸。(功用)跌打駁骨。

(五五) 午時合。(草本)(性質)酸寒。(功用)跌打寬筋。

(五六) 公麻雀糞。(小禽)(性質)辛散。(功用)外搽肌肉麻木局部。

(五七) 毛麝香。又名假薄荷。(草本)(性質)辛香。(功用)跌打消腫止痛。瘡瘍

惡毒。

(五八) 不遲。(草本)(性質)甘香。(功用)散風消腫。刀傷止血。

(五九) 王麝膽。又名黃字。橫紋木。(木本)(性質)酸散。(功用)刀傷止血。生

肌埋口。

(六十) 丹竹青。(木本)(性質)甘淡。(功用)刀傷續筋清熱。

五畫

(一) 白花丹。(草本)(性質)辛澀。(功用)治脾積痛。外洗瘡疥。

(二) 白蟾肝。(魚)(性質)甘寒。(功用)平肝。

(三) 白博葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打止痛。

(四) 白麻頭。(草本)(性質)甘淡。(功用)跌打瘀血。敷療癰陰疔瘡刀傷。

(五) 白蕃瓜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治炮火傷。發熱作痛。

(六) 白荳。又名黃豆。(草本)(性質)甘淡。(功用)解丹毒。瘡腫癰痛。試癩狗毒清。

(七) 白鶴骨灰。(禽)(性質)苦鹼。(功用)化腐膿。引腐骨。

(八) 白燈盞花。(草本)(性質)甘寒。(功用)跌打消腫。

(九) 白粥。冷飯同用。(草本穀)(性質)甘淡。(功用)外敷馬嘴疔瘡。

(十) 白花鬼燈籠。又名白花燈。路邊燈。紅花者同功。(草本)(性質)苦寒。

(十一) (功用)治小腸氣黃癩。牛疔血。跌打紅腫。

(十二) 白蠟蝨。又名白辣筋。(草本)(性質)苦散。(功用)寬筋骨。

(十三) 白薯蕷。(草本)(性質)酸澀。(功用)跌打腫痛。背癱。紅薯蕷治皮皴

縮。

(十四) 白蕊假江梅。(木本)(性質)酸寒。(功用)去腐肉骨。

(十五) 白欖。(木本)(性質)甘淡。(功用)強治白濁。菓洗疔痰迷心竅。

- (十五) 白菜乾。(菜類)(性質)甘寒。(功用)解熱毒清血熱去白濁。
- (十六) 白糖。(草本蔗)(性質)甘甜。(功用)解熱引毒開口止痛。冰糖治頸癰。
- (十七) 白毛鷄屎藤。(草本)(性質)辛寒。(功用)去骨痛。解苦猛藤毒。
- (十八) 白公英。(草本)(性質)甘淡。(功用)治乳瘡跌打腫毒。
- (十九) 白花旗。(木本)(性質)甘寒。(功用)治跌打紅腫。
- (二十) 白草鍾。(木本)(性質)苦寒。(功用)治跌打瘀痛。
- (廿一) 白背香。(木本)(性質)甘香。(功用)治跌打刀傷痛。
- (廿二) 白榕根。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛疴血。
- (廿三) 白餅葉。(木本)(性質)辛散。(功用)治牛結屎。
- (廿四) 白面風。(木本)(性質)辛溫。(功用)治牛馬獸標屎帶血。
- (廿五) 白頭公根。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛死胎不下。
- (廿六) 白蠟。(蟲屎)(性質)甘淡。(功用)生肌止血。製法滾水浸漂去油爲末。

酒冲服。

(廿七)田基黃。(草本)(性質)酸。(功用)消腫埋口去硝磺火毒。蝦鉗瘡跌打蛇咬。

(廿八)田螺。(殼蟲)(性質)淡寒。(功用)治蛇頭纏指。引炮礮。去尿毒沙淋。

(廿九)生鐵銹。(金)(性質)辛澀。(功用)跌打練堅拳。避孕下瘀血。

(三十)生鮫魚。(魚)(性質)甘。(功用)走筋絡。生引吐苦搗藤毒。

(卅一)生猴爪。(獸)(性質)鹹散。(功用)跌打續筋。癲狂痰迷。

(卅二)生鹽。(液)(性質)鹹。(功用)引熱外出。吐痰。牛發痧。

(卅三)生槐花葉。(木本)(性質)苦散。(功用)去腸癖。牛患絞腸痧。

(卅四)出漿草。又名飛揚草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治瘡瘍。解苦搗藤

卅五 毒

(卅五)出鷄尾。(草本)(性質)甘淡。(功用)治炮火傷。

出入山虎參二畫二。

(卅六)石上雲。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打散瘀。

(卅七)石力青。(草本)(性質)甘潤。(功用)跌打寬筋活絡。滾水火傷。

石灰參四畫二十一。

(卅八)玉贊花。(草本)(性質)甘清。(功用)潤肺止咳血。

(卅九)玉芙蓉蕈。(木本)(性質)苦寒。(功用)治癰腫瘡瘍。

(四十)禾雀屎。(禽)(性質)辛。(功用)治針刺入肉。

(四一)禾蟲。(蟲)(性質)甘溫。(功用)乾用治腳氣。消水腫。

(四二)血見愁。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打散血。乳瘡。

(四三)血芙蓉。(木本)(性質)甘淡。(功用)治跌打瘀痛。

(四四)甘蔗汁。(草本)(性質)甘甜。(功用)治蘇鼠咬。

(四五)仙人掌。(草本)(性質)甘淡。(功用)治石硬。

(四六)仙人掌。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛疔血。死胎不下。

(四七)冬菜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治牛標屎有血。

(四八)冬瓜。(草本)(性質)甘寒。(功用)膏利小便。虎咬。

(四九) 加洋柒根。(木本)(性質)苦燥。(功用)跌打內傷臟腑。

(五十) 打不死。(木本)(性質)甘淡。(功用)跌打骨痛。

(五一) 半邊蓮。又名蛇利草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治柃菓魚口。蛇咬跌打諸瘀痛。

(五二) 古銅。(金)(性質)辛燥。(功用)治跌打碎骨。出腐骨。即與自然銅同功。

(五三) 本地田柒。(草本)(性質)苦散。(功用)治跌打積瘀。

(五四) 布楂葉。又名高楂葉。(木本)(性質)甘淡。(功用)解暑熱。牛疴血症。

跌打腫痛。

冰糖參上十六白糖。

六畫

(一) 地榆葉。(草本)(性質)苦寒。(功用)洗疔瘡去腐肉。滾水火傷。牛瘟。

(二) 地虎。(蟲)(性質)辛散。(功用)煨之吹鵝喉。

(三) 蜘蛛仔。(蟲)(性質)甘淡。(功用)化痰舌腫痛。

(四) 地龍。又名蚯蚓。(蟲)(性質)甘鹹。(功用)炮火傷。

(五) 地膽頭。又名苦地膽。葶麻頭。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打積瘀。

浸洗疔疔。牛疔血。出斑癩。

(六) 地米根。(草本)(性質)苦寒。(功用)牛結尿。

(七) 地穀草。(草本)(性質)酸淡。(功用)治手指生地穀瘡。

地鏡仔參三畫十。

地金牛頭參二畫二。

(八) 老虎鬚蕈。(木本)(性質)苦溫。(功用)跌打腫痛。

(九) 老墻坭。(土)(性質)鹹辛。(功用)散蠱脹。去垢污。

(十) 老鼠擔冬瓜。(草本)(性質)甘寒。(功用)治腸癰痢。肛門瘡。牛結尿。

(十一) 老鴉酸。又名酸丟菜。(草本)(性質)酸寒。(功用)治刀傷流血不止。跌

打腫黑。

(十二)老鼠筋根。(木本)(性質)苦温。(功用)治療癰瘡。

(十三)老棟根。(木本)(性質)甘寒。(功用)刀傷續筋。

(十四)老桑頭。(木本)(性質)甘寒。(功用)去骨節風痰。治老年鶴膝風。

(十五)老鴉膽根。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛疝血。

(十六)竹蜂。(蟲)(性質)辛散。(功用)治鵝喉腫痛。

(十七)竹筍。(木本)(性質)甘淡。(功用)引蛇骨。跌打續筋。炮碼。背搭瘡。

(十八)竹葉治牛不轉草。

(十八)羊屎。(獸屎)(性質)酸鹹。(功用)刀傷瘀痛。

(十九)羊膽。(獸)(性質)苦寒。(功用)去積眼起膜症。角散癰核。

(二十)羊角扭根。(木本)(性質)苦有毒。(功用)外治癱腫。

(廿一)羊頭樹皮。(木本)(性質)苦散。(功用)刀傷止痛止血。

(廿二)耳公根。又名耳風根。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛疝血腸毒。牛不

轉草。

(廿三)耳稽。(木本)(性質)苦寒。(功用)消腫毒。

(廿四)江南臭草。(草本)(性質)苦溫。(功用)治喉腫舌爛。馬嘴疔。蛇咬。

(廿五)江瓦藍。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打腫痛。

(廿六)艾。(草本)(性質)苦溫。(功用)灸諸病。洗風痛。

(廿七)向日葵根。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打刀傷紅腫。

(廿八)朴仔草。(草本)(性質)甘淡。(功用)治白濁症。

(廿九)百草霜。(鑊底垢)(性質)辛散。(功用)解百毒。去油蠟。

(三十)百足草。(草本)(性質)苦。(功用)蛇百足咬。

(卅一)光松。(木本)(性質)苦辛。(功用)治百足咬。外洗跌打腐爛。

(卅二)瓜子菜。又名馬齒莧。(草本)(性質)甘寒。(功用)瘡腫痛。

(卅三)朱中草。又名猪宗仔。即生香附。(草本)(性質)甘溫。(功用)消腫下氣

止痛。

(卅四)早禾穀。(草本)(性質)甘淡。(功用)治猪不受孕。及猪仔疝乳白尿。

(卅五)行酸頭。(草本)(性質)酸寒。(功用)跌打刀傷腫痛。
(卅六)交剪花根。(草本)(性質)苦寒。(功用)牛死胎不下。

七 畫

(一)沙牛。又名金牛。沙鷄。(蟲)(性質)辛散。(功用)去瘰核腐肉。引炮碼。
開口。治白濁。對口瘡。

(二)沙牛屎。(獸屎)(性質)鹹澀。(功用)煨治隔食。爛脚乾水。

(三)沙棠葉。(木本)(性質)酸苦。(功用)去斑痧腐膿。洗身退熱。

(四)沙紙灰。(竹)(性質)鹼。(功用)霍亂。

沙螺參五畫二十八。

(五)赤小豆。(草本)(性質)甘淡。(功用)利小水。消癰腫。

(六)赤蕨鈎。即貫衆。又名金鎖匙。(草本)(性質)苦澀。(功用)解毒殺菌痘。

(七)胞瘡疥。

(七)吹筒管根。又名吹紅管。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打腫痛。

(八) 車繩。(草本製)(性質)煨鹹苦。(功用)治身瘡爛乾水。

(九) 車前草。又名錢貫草子。即車前子。(草本)(性質)甘淡。(功用)利小便

。牛產胎衣不下。跌打傷。

(十) 杉樹。(木本)(性質)辛香燥。(功用)木創口洗染死人風痛。煨炭治聾瘂

喉痛。跌打駁骨。杉蕊炮碼止血止痛埋口。杉寄生及杉節治心氣痛。骨

節疼痛。

(十一) 冷飯頭蕓。又名蕓蕓。(草本)(性質)苦香溫。(功用)治脚氣風癱。跌打

止痛消腫。

冷飯參五畫九。

(十二) 李果葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)治陰戶腫。洗身退風熱。

(十三) 芋頭。(草本)(性質)辛辣。(功用)治癩狗咬。蜂螫。

(十四) 扯牛入石。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打腫痛咳血。

(十五) 走馬胎。(木本)(性質)苦溫燥。(功用)跌打散痛。四肢疼痛。

- (十六) 何首烏蘗。(木本)(性質)苦甘。(功用)跌打腫痛。活血生肌。
- (十七) 灶頭大頭狗。又名蟋蟀。(蟲)(性質)辛散。(功用)引出炮碼。
- (十八) 兵狗草。(草本)(性質)苦散。(功用)乾水消腫。
- (十九) 灶底坭。又名土伏龍肝。(坭)(性質)辛。(功用)治牛死胎不下。
- (二十) 希士連。(液)(性質)酸。(功用)止血止痛。
- (廿一) 枕菓槩。(木本)(性質)酸溫。(功用)洗炮碼傷。
- (廿二) 含舖柏菴。又名鹹霜。(木本)(性質)酸鹹。(功用)治乳瘡。脚抽筋症。
- 跌打紅腫痛。牛肚脹症。

八 畫

- (一) 金瓜。(草本)(性質)甘寒。(功用)薰痔瘡。洗疔疔。敷黃水疽。
- (二) 金邊菊。又名路邊菊。(草本)(性質)苦香。(功用)治纏身蛇瘡。婦人五帶白濁。

- (三) 金花蘗。又名針菜。(草本)(性質)甘淡。(功用)跌打散瘀痛。菴去白

濁。

(四) 金鈕菜。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打腫痛。

(五) 金剛頭。卽川葶藶。(草本)(性質)酸澀。(功用)利水。牛疴血症。

(六) 金鷄腳頭。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打刀傷腫痛。

(七) 金魚。(魚)(性質)甘寒。(功用)治小便不通。引炮礪出。

(八) 金櫻樹寄生。(木本)(性質)苦甘。(功用)治化痰利便。心熱。

(九) 金耳環。(草本)(性質)甘淡。(功用)跌打生肌去腐膿。

金鎖匙參七畫六。

(十) 青芫蕖。(草本)(性質)苦澀。(功用)殺菌油蠟。馬嘴疔。火藥傷。

(十一) 青苔。(草本)(性質)辛散。(功用)治汗斑。

(十二) 青梅蕘。(木本)酸寒。(功用)跌打腫痛。

青蛇仔參二畫六。又名狗乾菜。

(十三) 狗耳苓。(草本)(性質)辛散溫。(功用)治虎咬。乳瘡。

(十四)狗脚跡。(木本)(性質)苦温。(功用)治小腸氣痛。蛇咬。牛毒瓜瘡。

(十五)狗肉。(獸)(性質)甘補脾。(功用)黑狗肉治疽痘爛。骨灰探疔。

(十六)狗屎葉。(木本)(性質)味苦。(功用)跌打刀傷消腫。

(十七)狗屎攬。(木本)(性質)苦澀。(功用)跌打刀傷紅腫。

(十八)狗頭蒲根。(木本)(性質)酸温。(功用)治牙痛煎水含之。

(十九)狗牙花。(草本)(性質)辛香。(功用)治牛難產。

(二十)松。(木本)(性質)苦香。(功用)松節治酒風脚。跌打消腫。松毛葉止血。

(二十一)生肌。炮傷瓜瘡。松仔莢。跌打吹鼻作嚏。松寄生止心痛。

(二十二)油柑子。(木本)(性質)酸澀。(功用)洗疔疔毒。

(二十三)油麻子。又名黑芝麻。(草本)(性質)甘香。(功用)潤肌。外洗退熱。脫

肛。

(二十四)虎牙。(獸)(性質)甘辛。(功用)治癩狗咬。虎骨止痛。

(二十五)屈頭鷄。(禽)(性質)鹹。(功用)跌打駁骨。

(廿五)河邊石底蟲。(水蟲)(性質)辛散。(功用)跌打失氣吹鼻。

(廿六)東風桔根。(木本)(性質)辛香散。(功用)治跌打腫痛內服。

(廿七)抱樹蓮。(草本)(性質)甘香。(功用)刀傷打傷瘀痛。

(廿八)花檢蕘。又名番石榴。鷄屎菓。(木本)苦澀。(功用)殺蟲去瘀。

(廿九)京仔葉。(草本)(性質)苦溫散。(功用)治炮碼傷外洗。

(三十)芥菜。(草本)(性質)辛散。(功用)去火藥傷腫痛。

(卅一)門頭羅。(草本)(性質)苦。(功用)治牛疴血。

(卅二)芙蓉花葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)治小兒痘胞瘡。

(卅三)狐狸墜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治牛毒瓜瘡。

(卅四)夜蘭蕘。(草本)(性質)酸香。(功用)治刀傷跌打止血。

(卅五)柒木樹蕊。(木本)(性質)苦散。(功用)治刀傷跌打止血。

(卅六)垂絲柳。(木本)(性質)甘淡。(功用)清熱毒洗斑癩。

九畫

- (一) 紅花葉。(木本)(性質)甘淡。(功用)治諸瘡癰腫。牛出紅斑症。
- (二) 紅貝娘。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛標屎帶血症。
- (三) 紅桐子根。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打刀傷痛。
- (四) 紅福裙。(草本)(性質)苦散。(功用)治跌打瘀腫。
- (五) 紅花味荳。(草本)(性質)甘平。(功用)利小水。刀傷消腫痛。
- (六) 紅背沙。(草本)(性質)甘淡。(功用)治跌打刀傷腫痛。
- (七) 紅花猛。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打駁骨。
- (八) 紅藤菜。又名大薯。(草本)(性質)甘寒。(功用)敷背癰。
- (九) 紅貝子。(草本)(性質)苦散。(功用)治牛瘟疫肚脹。
- (十) 紅花菊。(草本)(性質)甘寒。(功用)治跌打腫痛。
- (十一) 紅蘆烏白葉。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打瘀痛。絞腸痧。
- (十二) 紅花草。(草本)(性質)甘寒。(功用)治牛產胎衣不下。

(十三)紅絲線吊芙蓉。(草本)(性質)甘淡。(功用)治耳瘡膿。標蛇。

(十四)紅冬風菜。(草本)(性質)甘寒。(功用)跌打散瘀。

(十五)指甲花葉。又名紙甲花。(草本)(性質)甘淡。(功用)治炮火傷。

(十六)指天椒。又名辣椒。(草本)(性質)辛辣溫。(功用)治狗咬傷。手瘡。鷄

生蠶。洗腳氣。

(十七)苦心蕒。(草本)(性質)苦寒。(功用)治癩狗咬。解熱症。

(十八)苦楝葉。又名森木。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打消腫殺蟲。刀傷止

血。蘇鼠咬。

(十九)苦瓜。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛結屎。

(二十)苦艾根。(草本)(性質)苦溫。(功用)治牛時行瘟疫肚脹。

苦搯藤參四畫三十五。

苦地膽參六畫五。

(廿一)風芋。(草本)(性質)苦癢。(功用)治瓜瘡蜂螫。

- (廿二)風劍草。(草本)(性質)辛散。(功用)引炮彈去蛇氣。
- (廿三)風茅根。(草本)(性質)苦香。(功用)牛患絞脚痧。洗頭風痛。
- (廿四)洋七根。(木本)(性質)苦寒。(功用)刀傷跌打紅腫。
- (廿五)洋桃。又名楊桃。五蓮。(木本)(性質)酸甜。(功用)戒煙。
- (廿六)英山紅。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打瘀腫痛。
- (廿七)英不薄葉。又名鷹不撲。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打消腫。
- (廿八)扁魚鰓。又名編。(魚)(性質)甘燥。(功用)去腐肉。膽治痔瘡。針刺。
- (廿九)扁柏葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)散血。
- (三十)星樹根。(木本)(性質)辛散。(功用)跌打止痛。
- (卅一)南籬蘧。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打消腫。
- (卅二)柑菓核。(木本)(性質)甘香溫。(功用)小腸氣痛。
- (卅三)枸杞葉。(木本)(性質)清淡。(功用)治頭風痛。
- (卅四)柿菓皮蒂。(木本)(性質)甘澀。(功用)止鼻衄血。

(卅五) 胎髮炭。(人)(性質)苦。(功用)治止血結痂。

(卅六) 茄。又名矮瓜。(草本)(性質)苦寒。(功用)治汗斑。腋乳瘡。

(卅七) 珍珠草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打瘀痛。

(卅八) 春花李。(木本)(性質)苦散。(功用)治跌打消腫。

(卅九) 芽瓜頭。(木本)(性質)辛散。(功用)治牛瘟疫肚脹。

(四十) 柞木根。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛死胎不下。

(四一) 急星草。(木本)(性質)酸溫。(功用)治跌打腫痛。

前冠草參七畫九。

飛揚草參五畫二十四。

十 畫

(一) 馬鞭草。又名倒鈎草。(草本)(性質)苦淡。(功用)治鵝喉。跌打腫痛。

牛難產。

(二) 馬蹄匣。(草本)(性質)苦寒。(功用)治癰核紅腫。

(三) 馬尿。(獸) 酸散。(功用) 治婦人血龜。

(四) 馬蒂。(草本) (性質) 甘淡。(功用) 治婦人血龜。化食銅錢。

馬齒莧參六畫三十一。

(五) 茶枯頭。(木本) (性質) 苦澀。(功用) 治血龜。感冒夾色。殺蟲菌。去垢穢。

(六) 茶蕊。(木本) (性質) 甘香澀。(功用) 治手足無力。牛瀉紅水。水蠶。

(七) 茶狗舌。(草本) (性質) 苦寒。(功用) 治刀傷止血。

(八) 烏欖樹二囊皮。(木本) (性質) 苦澀。(功用) 治洗疔。果治骨硬眼旗

瘡。

(九) 烏蠅。(蟲) (性質) 辛散。(功用) 敷乳瘡。

(十) 烏鐵貓。(獸) (性質) 辛鹼。(功用) 煨刀傷止癢血。化核。去腐骨。貓尿

擦龜背馬嘴疔。骨灰去腐骨。

烏白葉參九畫十一。

(十一) 鬼畫符。又名黑面神。(木本)(性質)苦散。(功用)跌打散瘀止咳。牛毒瓜瘡。

鬼燈籠參五畫十。

(十二) 烟葉。(草本)(性質)辛溫。(功用)治癩百足蛇咬。烟筒竹止鼻衄。

(十三) 格木蟲屎。(蟲)(性質)辛燥。(功用)治爛瘡過身蛇。

(十四) 桃仔葉。(木本)(性質)苦散。(功用)治頸腫。洗杔菓。火炮傷。牛熱病。

瓜瘡。桃果葉治牛絞脚痧。

(十五) 脆骨仔。(木本)(性質)甘淡。(功用)治頸耳下腫。洗爛脚。

(十六) 狼狗骨。(獸)(性質)苦鹹。(功用)去爛瘡腐肉。

(十七) 蚊仔花。(木本)(性質)苦香。(功用)治舌腫刀炮碼傷。

(十八) 釧板茶。(木本)(性質)苦澀。(功用)去腐肉跌打止痛。

(十九) 桂花。(木本)(性質)甘香。(功用)去眼膜。

(二十) 桑葉。又名桑柏木。(木本)(性質)苦寒。(功用)清熱。桑頭治脚軟無。

力。

(廿一)海參。(蟲)(性質)甘。(功用)煨治痘胞瘡爛。補血生肌。

(廿二)海風藤。(木本)(性質)苦散。(功用)治跌打內瘀痛。祛肢節風痛。

(廿三)酒。(液)(性質)辛香。(功用)祛風行血。牛出紅片花斑。酒糟敷臍癰。

蛇咬諸腫毒。

(廿四)豹芽郎菴。(木本)(性質)苦散。(功用)治脫肛。結恭迫脫。引炮礮。大

樣洗爛脚。

(廿五)豹狗。又名壁虎仔。墻虎。(蟲)(性質)辛散。(功用)治馬嘴疔瘡。

(廿六)捕門蛇草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治手足瓜瘡。

(廿七)荔枝肉。(木本)(性質)酸溫。(功用)去腐肉。治鼠咬。

(廿八)荔枝草。(草本)(性質)苦平。(功用)跌打黑腫。

(廿九)茨菇。(草本)(性質)甘寒。(功用)鹹治癩狗咬。石硬。

(三十)秤星蕒。又名點秤根。(木本)(性質)辛寒。(功用)治癩狗虎咬。牛疔

血。

(卅一) 珠子蘗。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打紅腫症。

(卅二) 盜菜。又名蕤菜。(草本)(性質)甘寒。(功用)解熱毒。救食苦槁藤。藟

治五帶。

(卅三) 神沙藤葉。(草本)(性質)苦溫。(功用)治牛發紅痧。

(卅四) 流鼻血草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛絞脚症。

(卅五) 涼藤子。(草本)(性質)苦燥。(功用)治牛瘟疫肚脹。

(卅六) 秧居草。又名黑骨草。鐵線草。(草本)(性質)苦散。(功用)治百足咬。

刀傷跌打紅腫痛。

倒鈎草參十畫一。

莖葉參八畫十。

穿破石參三畫五十。

十一畫

- (一) 假白麻葉。(草本)(性質)甘寒。(功用)治滾水火傷。
 - (二) 假荷蘭豆。(草本)(性質)甘淡。(功用)治眼起膜乳瘡。
 - (三) 假苦墨菜。(草本)(性質)苦寒。(功用)治咳血清暑熱。
 - (四) 假青菜。(草本)(性質)苦淡。(功用)治脚瘡穿盤。
 - (五) 假芝蘭。(木本)(性質)苦溫。(功用)治刀傷跌打腫痛駁骨。
 - (六) 假紫蘇。(草本)(性質)苦香。(功用)治纏身蛇。
 - (七) 假黃薑。(草本)(性質)苦散。(功用)治跌打散瘀。
 - (八) 假胡椒根。(木本)(性質)辛溫。(功用)跌打內部止痛。
 - (九) 假麗參。(草本)(性質)甘淡。(功用)刀傷止血止痛。
 - (十) 假油麻根。(草本)(性質)苦散。(功用)治癰腫痘胞症。
- 假指甲花參四畫十一。

(十一) 豬屎豆。又名草決明。(草本)(性質)苦涼。(功用)敷癰。癰瘡。明目。

(十二) 猪檢頭。又名猪慄檢根。(木本)(性質)苦淡。(功用)治跌打瘀黑腫痛。

(十三) 猪。(獸)(性質)甘潤。(功用)猪宗肉生肌腐疽。猪脚筋補筋骨。猪膽汁

搽蛇氣蝟螫瘡毒。猪膏畜肥雞。猪肝去肝熱。猪血去血積。猪脾治腹痛

猪小腸花治哮喘。猪槽坭治馬嘴疔。

(十四) 蛇抱筋根。(木本)(性質)苦散。(功用)治瘰癧。蛇咬。感冒夾色。

(十五) 蛇通管。(草本)(性質)甘寒。(功用)治刀傷止痛。蛇咬。

蛇利草參五畫五十。

(十六) 魚狗筒根。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打紅腫。

魚撒仔參三畫十。

(十七) 莧菜花。(草本)(性質)甘淡。(功用)治瘡毒。

(十八) 崩大碗。又名雷公苑。(草本)(性質)甘寒。牛患瘟疫。肚脹。(功用)治

炮火傷。爛脚。跌打紅腫。

(十九) 甜藤蕞。(草本)(性質)甘淡。(功用)敷爛脚。

- (二十) 清明草。(草本)(性質)苦寒。(功用)敷瘡爛脚。
- (廿一) 推車蟲。(蟲)(性質)辛散。(功用)引炮礪散癩癧。
- (廿二) 細樣牛毒草。(草本)(性質)苦溫。(功用)治脚爛黑腫痛。
- (廿三) 梧桐皮。(木本)(性質)甘淡。(功用)治跌打腫痛。
- (廿四) 野狗膽。(獸)(性質)苦涼。(功用)散熱行氣還魂止痛。
- (廿五) 烏不企。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打紅腫痛。
- (廿六) 連地通管。(草本)(性質)苦涼。(功用)去炮沙毒。跌打腫痛。
- (廿七) 貧婆魚。(魚)(性質)甘苦。(功用)引炮礪。去腐肉。
- (廿八) 荳豉。(荳)(性質)甘鹹。(功用)引吐。牛瀉紅水。
- (廿九) 蚌肉。(蟲)(性質)甘淡。(功用)解信石毒。利小便。
- (三十) 匿麻金。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打腫黑。
- (卅一) 蚰蚘。又名夜行蟲。(蟲)(性質)甘鹹。(功用)治小兒急驚風。癩癧。針刺入肉引出。

高楂葉參五畫五十二〇。

十二畫

(一) 黃瓜霜。(草本)(性質)甘淡。(功用)解暑。喉痧熱毒。

(二) 黃糖。(蔗)(性質)甘甜。(功用)治蛇犬鼠咬。蛇骨木竹入肉。疔瘡。犬

病。

(三) 黃蟾血。(蟲)(性質)甘淡。(功用)治小兒大人中風。口眼斜。

(四) 黃澤鹹魚灰。(魚)(性質)苦鹹。(功用)治肩癢痕瘡。

(五) 黃皮樹寄生。(木本)(性質)苦香。(功用)治心痛小腸氣痛。黃皮核治百

足咬。葉牛通毛管。

(六) 黃葵花。(草本)(性質)苦寒。(功用)治痔瘡。

(七) 黃絲草。(草本)(性質)苦散。(功用)治小兒身體。胃感惡斑。

(八) 黃坭。(土)(性質)淡。(功用)解火丹毒。蛇骨入肉。牛發痧。

(九) 黃牛屎。(獸屎)(性質)苦鹼。(功用)治痘胞煨痘皮隔食。

(十)黃蛇退殼。又名大王韌。(木本)(性質)甘淡。(功用)散氣結止痛。

(十一)黃茅根。(草本)(性質)甘涼。(功用)跌打內傷。牛絞腳痧。

(十二)黃花母。又名蒲公英。(草本)(性質)甘寒。(功用)治乳瘡。炮火傷。跌打腫痛。

黃豆參五畫六。

黃枝葉參四畫十九。

黃麋膽參四畫五十九。

(十三)黑豆。(草本)(性質)甘淡。(功用)補血痘瘡眼赤痛。

(十四)黑節鬪。(草本)(性質)苦溫。(功用)跌打瘀腫。心痛。

黑骨秧居參十畫三十五。

黑芝麻參八畫二十一。

黑面神參十畫十一。

(十五)無爺藤。(草本)(性質)甘澀。(功用)引腐骨碎骨。

(十六) 無花菓。(草本)(性質)酸寒。(功用)敷背搭瘡。

(十七) 無麝香。(草本)(性質)辛香。(功用)治癰腫痛。

(十八) 無節五涼草。(草本)(性質)苦香。(功用)跌打紅腫。

(十九) 蛤慄膽。又名田雞。(蟲)(性質)苦涼。(功用)點退眼膜。

(二十) 蛤屎屨。(草本)(性質)苦散。(功用)敷瘡瘰。

(廿一) 蛤薯。(草本)(性質)辛燥。(功用)敷血箭瘡。脚氣症。

(廿二) 蛤拐菜。(草本)(性質)苦寒。(功用)涼血去毒。

(廿三) 蛤仔。(蟲)(性質)甘淡。(功用)跌打刀傷。接骨續筋。

(廿四) 犁頭草。(草本)(性質)苦涼。(功用)跌打炮傷紅腫爛脚瘡毒。

(廿五) 犁頭生鐵燒。(金)(性質)辛散。(功用)治牛生疥癩。

(廿六) 番紫蘇。(草本)(性質)苦香。(功用)刀傷消腫。

(廿七) 雲耳。(草本)(性質)甘淡。(功用)散瘀退眼膜。

(廿八) 象牙。(獸)(性質)甘淡。(功用)治骨硬。退熱。

(廿九) 葶麻子。(木本)(性質)苦寒。(功用)治乳瘡。引炮礪。竹刺入肉。纏身蛇症。

(三十) 蛙皮。(蟲)(性質)甘潤。(功用)敷癩瘡。

(卅一) 棕繩。(木本)(性質)辛澀。(功用)諸衄血。婦人血山崩。

(卅二) 斑鳩酸。(草本)(性質)酸寒。(功用)治跌打腫痛止血。

(卅三) 蛟龍葉。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打腫痛。

(卅四) 博仔樹。(木本)(性質)苦溫。(功用)治牛結屎。

(卅五) 絡麻頭。(草本)(性質)苦澀。(功用)治牛發痧。葉治黃腫蟻瘡。痘胞。

(卅六) 散血丹。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打腫痛。

(卅七) 紫薇蕩。(草本)(性質)辛燥。(功用)跌打紅腫痛。

(卅八) 菖蒲根。(草本)(性質)辛香溫。(功用)跌打止痛消腫。

鹿耳苓參四畫三十一。

森木樹參九畫十八。

十三畫

(一) 過牆虎。(草本)(性質)甘淡。(功用)治跌打紅腫。

(二) 過塘蛇。(草本)(性質)辛苦。(功用)治跌打腫痛。炮礮傷。蛇氣。

(三) 過天螻蛄。又名樹頭搥。(草本)(性質)苦寒。(功用)消腫。去蛇氣。炮礮傷。手瘡。

(四) 過山香。又名滿山香。豆豉薑。(木本)(性質)苦香。(功用)祛風脚氣腫痛。

(五) 過江藤。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打腫痛。

過山風參三畫二十九。

(六) 鳳仙花。又名鳳仙草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治利小便沙淋。

(七) 鳳凰衣。(禽)(性質)苦礮灰。(功用)煨治過身蛇。

(八) 鳳尾草。(草本)(性質)苦溫。(功用)治刀傷跌打紅腫。

(九) 塘邊藕。(草本)(性質)甘利。(功用)治五淋沙淋頸腫。

(十) 塘虱魚。(魚)(性質)甘淡。(功用)治蛇頭纏指爛脚。

(十一) 辣蓼蕒。(草本)(性質)辛辣。(功用)殺菌蟲癩瘡心痛。

辣椒葉參九畫十六。

(十二) 路邊青。(草本)(性質)苦寒。(功用)止血散瘀去瘡毒。

路邊燈參五畫十。

(十三) 矮菜。(木本)(性質)苦辛。(功用)治牛疴血。

(十四) 矮脚幌傘參二畫二。

(十五) 矮瓜葉參九畫二十六。

(十六) 韭菜子。(草本)(性質)辛散。(功用)薰鼻淵。頭跌打刀傷。散積瘀。

(十七) 萬年青。(草本)(性質)甘淡。(功用)癩狗咬。

(十八) 萬佗羅。(木本)(性質)苦散。(功用)跌打紅腫。引碎骨。

(十九) 蜆。(蟲)(性質)甘寒。(功用)治眼起膜。陰毛生疔。

(二十) 蜂巢。(蟲)(性質)辛有毒。(功用)局部麻醉。蜂巢瘡。

(十九)葱頭。(草本)(性質)辛香。(功用)發散通竅消腫。

(二十)楓木葉。(木本)(性質)甘香溫。(功用)跌打痛。

(廿一)落地金錢。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打消腫。

(廿二)較剪草。(草本)(性質)苦涼。(功用)去瘀生新。

(廿三)椰子。(木本)(性質)甘淡。(功用)胃熱心痛。

(廿四)葵扇。(草本)(性質)苦寒。(功用)下胎衣。

(廿五)鼠子石灰。(獸石)(性質)苦鹹。(功用)治爛脚刀傷止血。

(廿六)圓眼樹蕊。又名龍眼。(木本)(性質)苦澀。(功用)刀傷止血。殺菌去

腐。

(廿七)絲瓜仁。(草本)(性質)甘淡。(功用)吐痰。治癲狂。

雷公根參十一畫十八。

新瓦參九畫五十二。

楊桃參九畫二十五。

十四畫

- (一) 駁骨丹。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打接合骨。
- (二) 駁骨草。又名木賊。(草本)(性質)甘散。(功用)去骨筒之瘀。黃癆。
- (三) 酸味葉。又名酸菜葉。(木本)(性質)酸寒。(功用)治青蛇百足咬。水火
- (一) 傷。殺蟲菌。
- (四) 酸檸檬。(木本)(性質)酸苦。(功用)治牙衄止血。治鹹石梗。
- (五) 銀鈕子。(木本)(性質)苦寒。治牛標尿有血。
- (六) 銀花葉。(草本)(性質)甘香。(功用)治暑熱跌打腫痛。
- (七) 銀沙。(金)(性質)辛墜。(功用)殺菌蟄。去惡腐肉。
- (八) 蒜。(草本)(性質)辛溫。(功用)治頸癩癬。蛇咬腳氣灸病。
- (九) 蜜糖。(蟲)(性質)甘甜。(功用)和藥敷惡瘡。潤肺腸。
- (十) 榕樹葉。(木本)(性質)苦散。(功用)散瘀痛。鬚洗炮碼傷。
- (十一) 蒙公蔗。(草本)(性質)甘甜。(功用)跌打散瘀止痛。

(十二) 槐花。(木本)(性質)苦散。(功用)去腸痔瘻。牛肚脹症。

(十三) 絢牛棧。(木本)(性質)甘平。(功用)跌打續筋消毒。

(十四) 節古心。(草本)(性質)甘淡。(功用)去心熱。跌打紅腫症。

(十五) 蓉肚草。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打紅腫。

蓉膽草參三畫四。

蒲公英參十二畫十一。

十五畫

(一) 鋪地錦。又名丁貴草。(草本)(性質)甘寒。(功用)蛇咬。跌打紅腫。

(二) 滿天星。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打散瘀。

(三) 滿山紅。(木本)(性質)苦香。(功用)治牛患瘟疫肚脹。

(四) 滿山香參七畫十一。

(五) 蝦蟆眼。(蟲)(性質)甘淡。(功用)治吞針入腹。

(六) 蝦鉗草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛毒瓜瘡。

(六) 寬筋藤。(草本)(性質)苦溫。(功用)治酒風脚腫。

(七) 鋪狗尾。(木本)(性質)辛香。(功用)治出斑。

(八) 醋。(米造)(性質)酸。(功用)解毒消毒。牛疔外洗。

(九) 墨。(烟)(性質)苦。(功用)止吐血刀傷出血。

(十) 樟樹葉。(木本)(性質)苦香。(功用)跌打瘀痛。止血行氣。

(十一) 綠豆。(草本)(性質)甘淡。(功用)解百毒。牛疔血。

遠薑參七畫十一。

貓尿參十畫十。

壁虎仔參十畫二十五。

十六畫

(一) 蕎頭。(草本)(性質)辛鹹。(功用)引膿外出。跌打消腫。

(二) 蕎麥稈灰。(草本)(性質)苦鹼。(功用)煨治牛馬癩。

(三) 鴨內金。(禽)(性質)甘平。(功用)消積滯。青鴨蛋。治手足無力。烏鴨

洗小兒胎毒症。

- (四) 鴨仔菜。(草本)(性質)苦寒。(功用)外敷癰瘡。
- (五) 鴨腳木皮。(木本)(性質)苦散。(功用)治出斑痧。本造合手足用具。
- (六) 龍鳳草。(草本)(性質)苦散。(功用)治跌打散瘀。
- (七) 龍頭草。(草本)(性質)苦涼。(功用)治牛發痧。
- (八) 獨行千里。(木本)(性質)苦散。(功用)治跌打腫痛。
- (九) 獨腳蓮。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打腫痛。
- (十) 獨脚烏舅。(木本)(性質)苦散。(功用)治杌菓白濁。
- (十一) 蕉樹汁。(草本)(性質)甘淡。(功用)蕉心治牛肚脹。汁牛胎死不下。小便結。腸癰。
- (十二) 蕃薯藤。(草本)(性質)苦甘淡。(功用)蛇虎咬。舌腫。霍亂抽筋。犬貓牛蟻。薯蓣醋治全身腫。
- (十三) 蕨粉。(草本)(性質)甘澀。(功用)治紅白痢症。

(十四) 磨髮草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治背搭癰瘡。

(十五) 磨挈葉。又名退磨挈根。(木本)(性質)苦散。(功用)跌打紅腫。

(十六) 澤蘭蕙。(草本)(性質)苦寒。(功用)治跌打紅腫。

(十七) 燕子坭。(禽巢)(性質)辛散。(功用)治橫痃紅痛。

(十八) 舊神花。(金)(性質)辛。(功用)殺菌蟲。治擔肩瘡。

(十九) 檜桐藟。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打續筋活血。

(二十) 僕芋。(草本)(性質)苦澀。(功用)治小腸氣。爛脚瘡毒。

(廿一) 熾藤。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛絞脚痧症。

(廿二) 熟烟屎參十畫十一。

(廿三) 樹搵頭參十三畫二。

錢串草參七畫九。

十七畫

(一) 霧水葛。又名霧水草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治背搭瘡癰腫。

(二) 筋矮瓜。(草本)(性質)甘淡。(功用)治乳瘡。

(三) 筋菜根。(草本)(性質)甘寒。(功用)治跌打紅腫。

筋竹筍參六畫十七。

(四) 螳螂。(蟲)(性質)辛。(功用)引炮礪。利小便。治乳瘡。

(五) 氈帽灰。(獸毛)(性質)苦鹼。(功用)治乳瘡生肌。

(六) 薄荷草。(草本)(性質)辛香。(功用)治跌打消腫。

(七) 蟋蟀。(蟲)(性質)辛散。(功用)利小便去沙淋症。

(八) 還魂草。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打黑腫症。

(九) 薑柒。(草本)(性質)苦香。(功用)跌打散瘀。

(十) 臨磨孛根。(草本)(性質)苦寒。(功用)治牛疴血。

饕菜頭參十畫三十一。

薯莢參五畫十二。

點秤根參十畫二十九。

十八畫

- (一) 鯢魚腸。(魚)(性質)甘。(功用)去小兒疳積。魚牙去痘皮。
- (二) 鯉魚。(魚)(性質)甘平。(功用)煨治瘡潰爛。膽點眼膜。骨灰治骨哽。
- (三) 鵝。(禽)(性質)甘鹹。(功用)鵝喉治喉症。鵝血去血龜隔食。
- (四) 鵝不食草。又名豬屎蘭。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打紅腫瘡癰。
- (五) 韓信兵。(草本)(性質)苦涼。(功用)刀傷跌打止血止痛。蛇咬。
- (六) 雙眼龍。又名巴豆。(木本)(性質)苦有毒。(功用)樹二囊皮。治蛇咬。
- (七) 藤酸葉。(草本)(性質)甘淡。(功用)跌打刀傷瘀痛。

檸檬參十四畫四。

十九畫

- (一) 蟻芋。(草本)(性質)苦癢。(功用)治癰腫。
- (二) 蟹鉗草。(草本)(性質)苦寒。(功用)治瘡腫毒。
- (三) 蟹殼。(蟲)(性質)甘香。(功用)跌打駁骨。

(四) 顛茄仔。(草本)(性質)苦辛。(功用)治跌打腫痛。

二十畫

(一) 鯽魚骨。(魚)(性質)甘溫。(功用)脫牙。

(二) 鯽魚草。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打止痛。

(三) 糯米。(草本)(性質)甘香。(功用)治血脈瘡。牛難產。

(四) 鹹酸菜。(草本)(性質)甘鹹。(功用)治疔腮。

(五) 蘆荻根。(草本)(性質)甘淡。(功用)清肺熱。

編魚標參十畫二十八。

二十一畫

(一) 鐵香爐。(草本)(性質)苦香。(功用)跌打刀傷止血。

(二) 鐵側木葉。(木本)(性質)辛散。(功用)跌打散瘀。

(三) 鐵包金。(木本)(性質)苦甘。(功用)駁骨止痛。

鐵線草參十畫三十五。

(四) 蘭花菴。(草本)(性質)苦香。(功用)跌打失氣吹鼻。百足咬。

(五) 爛耳羊。(草本)(性質)苦寒。(功用)跌打紅腫瘡痛。牛絞脚。

鹹霜菴參七畫二十一。

(六) 鷄骨香。又名駁骨消。(木本)(性質)苦溫。(功用)跌打紅腫。蛇咬。

(七) 鷄。(禽)(性質)甘燥。(功用)鷄冠血。點惡血瘡。鷄屎白。治舌腫霍亂。

牛肚脹。鷄蛋湯火傷。牛結屎。鷄毛管灰。去骨腐癰。

(八) 鷄爪芋。(草本)(性質)苦癢。(功用)治陰毛疔。

(九) 鷄朮蓀。(草本)(性質)甘散。(功用)跌打腫痛症。

(十) 鷄公花。又名鷄冠尾。(草本)(性質)苦散。(功用)治水火傷。跌打腫痛。

(十一) 鷄婆葉。(草本)(性質)苦酸。(功用)治跌打腫痛。

(十二) 霸山虎。(草本)(性質)苦辛。(功用)治牛疔血。

二十二畫

(一) 讀書君。(草本)(性質)苦寒。(功用)治爛脚紅腫。

一二十三畫

(一) 蘿蔔。(草本)(性質)甘淡。(功用)解諸參毒。清肺。

(二) 鷹毛。(禽)(性質)苦澀。(功用)搽療癩陰疽。

鷹不蝶參九畫二十七。

(三) 顯仔葉。(木本)(性質)苦寒。(功用)跌打刀傷腫痛。

一二十四畫

(一) 鹼水。(灰)(性質)苦澀。(功用)蝕腐。去鷄眼疔。癬。跌打散毒。

一二十五畫

(一) 鹽布根。(木本)(性質)苦寒。(功用)治牛絞脚痧症。

(二) 鹽蛇。(蟲)(性質)鹹。(功用)解小兒中痰。

(三) 鹽。(液)(性質)鹹涼。(功用)止牙痛。去蛇咬。解毒。

鹽霜柏。又名鋪霜參七畫二十一。

- (四) 欖鼓筋。(木本)(性質)苦溫。(功用)治跌打紅腫。針刺。
- (五) 觀音草。(草本)(性質)酸苦。(功用)治跌打散瘀止痛。
- (六) 籬頭綱。(草本)(性質)甘淡。(功用)治頭暈眼痛。牛難產症。

生草藥歌括

寒信兵結痂止血。消紅腫駁骨生肌。黃京膽埋口止血。除瘀毒散腫生肌。

小容膽流血立止。大容膽諸毒皆理。路邊青去瘀散毒。鬼畫符散毒涼皮。

鐵線草去性最奇。遠薑祛風散積痛。寬筋活血此能醫。馬鞭草消腫止血。

檜桐木駁筋骨利。假芝蘭駁骨活血。白麻頭散腫毒氣。出山虎消腫駁骨。

黃皮葉去黃開皮。顯仔葉消腫去瘀。朱宗草黑積立醫。天吊香止血活筋。

兼去宿腫諸蛇氣。蛇利草散毒去蛇。大小還魂駁筋肌。韭菜頭散肉積瘀。

駁節草穿骨治痢。較節有傷效最奇。黑節關去骨節瘀。水芝甲去火毒氣。

牛角尖補筋活較。大小天紅退紅腫。眼赤火毒痛立醫。魚撒仔開口涼血。

白飯葉乾水生肌。較剪草散毒去瘀。白背木葉最長肌。黑心薑去血積瘀。

蒲公英涼血宿氣。絢牛枝活血生肌。過山風祛風極快。癩到蛇專去蛇氣。
半邊旗鐵性刀傷。鳳尾草止血更奇。鵝不食草散毒氣。大油柑與元眼精。
山檢葉腐骨拔去。花檢葉去黑腐瘀。桃仔葉打毒涼皮。八角草與蓉樹鬚。
杣葉鐵沙立起。無爺藤碎骨卽出。甘草茂月柿生肌。冬青草與鷄心鋪。
血止續筋而長肌。元眼蕊與豹芽郎。出腐骨加葶麻子。大糯蕓能去炮性。
水流豆結痂效美。杉松蕊止血快奇。紅豺牙蕓治黃腫。檢果乾蚬崩立起。

著此書者食長素。喜戒殺兼放生爲本旨。此上中下冊方內。用生動物療病。
。不過多因古今驗方法編入。去之雖然功效或緩。而好生之功德甚大。每
每收效倍徒。多出夫人意料之外。若關於急救中行權而用之。病癒後永戒
食此類生物。並多放生以贖前用生物救己之愆爲禱。並錄願雲禪師戒殺詩
宗黃庭堅詩於左。

千百年來盃裏羹。曷深如海恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門夜半聲。
我肉衆生肉。名殊體不殊。原同一種性。只是別形軀。

索引

小兒(一畫)

一圖

六二

二十八圖

一八九

小兒(二畫)

二圖

三

十一圖

一四七

二十圖

二三四

十三圖

五六

二十一圖

一四二

十四圖

六六

二十二圖

一五八

十五圖

七六

二十三圖

一六〇

十六圖

一八二

二十四圖

一六三

十七圖

一八八

二十五圖

一六四

十八圖

一〇八

二十六圖

一七〇

十九圖

一一〇

二十七圖

一八四

十圖

四六

刀傷

一八一

小便白如泔

六九

刀傷上部

一八三

小兒發鷄盲

一六

八圖

四四

小兒身浮腫

八七

八仙丹

一二三

小指生疔瘡

一〇一

七圖

四二

小兒胎毒

一〇七

七寶丹

一二二

口斜

二四

九圖

四五

口唇

二二

人工呼吸

二〇三

口吐血不止

二五

二圖(二畫)

三圖

十四

小腸氣痛疝氣痛

七八

三十圖

二〇二

小腸氣痛

六三

大腿瘡

一九一

小便閉塞

六八

下部

一六七

小腹脹大

六九

子部傷

一五六

白濁 (四畫)

手腋

四二

五苓散

七〇

手足生瘡名捕鬥蛇

九一

五帶塞丸

七三

手掌生鵝掌瘋

四四

五淋

一三二

手較生瘡

四四

升丹方法

一一〇

手較紮法

一六三

井心疽

五二

手縮紮安定法

一六四

不受孕

一七八

水蠱

九三

丹毒

九四

水泡紅腫

九三

天泡癰

一一六

水蛭吸血毒法

二二〇

午部傷

一五九

心胸

四九

六畜科

二二二

心痛

四九

六圖

三六

心胸及乳部紮法

五一

牛科

二二五

牛毒瓜瘡

八三

白濁內服方

二二七

中部

四一

生產不出

七七

止鼻衄丸

二一

生子女免胎毒法

二三三

犬病

一二五

生草藥主治

一九六

水腫(五畫)

生藥物學

二三〇

牙齒

二五

石硬

九二

牙衄牙癢疔牙黃白

二五

出斑

一〇六

牙疽腐骨牙疔

二七

四圖

二〇

牙蛇牙痛

二九

瓜瘡

九〇

牙蟲痛

三〇

皮節

一三六

牙痛丹

三一

仙方活命湯

九〇

白頭癬

一〇九

(六畫)

〇

白濁五帶

七一

耳

一七

耳痛疔
 耳癰疽流膿
 耳孔流膿
 舌
 舌中出血紅腫
 舌霎時腫大塞滿喉
 舌下出舌
 舌白胎舌黑
 血龜
 血山崩
 血線箭
 肋脇
 肋脇結核

一七
 一七
 一八
 三一
 三一
 三一
 三一
 三二
 三二
 三二
 三二
 五九
 七七
 八九
 五三
 五四

衣虱
 艾火灸瘡
 曲池手曲紮法
 肌肉蛆行
 汗斑癩
 百足咬
 死人風
 卵部傷
 羊病
 各部安定用器圖
 (七畫)
 肛門大便
 肛門生瘡

一〇四
 九一
 四四
 一〇三
 一〇六
 一三八
 一四一
 一六〇
 一二五
 一八九
 七九
 八一

足脛傷安定法

一八八

西部傷

一六五

足脛

八四

(八畫)

足部繃紮法

八八

乳

四六

防打不痛

一八〇

乳瘡

四七

防範中毒

一九九

乳胸部瘡傷紮法

四七

尿管刺痛難當

六九

乳癰

四八

尿管爛頸疔

七六

乳瘡已穿

四九

夾腋起核疼痛

四五

狗咬

一三八

沙淋

七〇

泥沙入目

一六

杧果

一二八

枝子清肝湯

一八

杧果魚口便毒

八二

松花水瓜散

一三

戒洋酒

一四一

灸疔手術

二四

辰部傷

一六八

取貓尿法

二四

肩	四一	面紅雲癩	一〇九
放尿管	六九	眉	九
夜尿	七〇	眉骨疼痛	九
兩足無力痺疼	八六	風雨撲啞口斜	二四
油蠶	一一一	風火牙痛	三〇
金剛丹	一二二	風癱	八七
花柳	一二五	骨哽	三六
青蛇咬狗宗蛇咬	一三六	骨槽疽	一〇三
虎咬	一三九	背	五四
(九畫)		背搭瘡	五五
面	八	背癰背花	五五
面道瘡	八	背部紮法	五六
面圖	三	紅白喉痧	三四

紅線疔

四

飛揚癰蛇

一〇五

紅升丹

一二二

胸膈作痛

五一

指節腐爛

四二

索引 (十畫)

一四

胃腕痛

六一

穿喉

三四

前陰小便

六七

穿盆瘡

九一

胎衣不下

七七

酒風脚氣痛

八五

胎毒

一三三

馬嘴疔環

二二

肺癰肺積水

九七

疔腮穿爛

三八

疥癬

一〇五

疽

一〇一

厚皮癬

一〇九

流連過身蛇瘡

九九

炮碼傷

一九一

疔疔生尿管

一二五

急救法

二〇二

唇

二二

飛揚癰

六

唇

二二

(十一畫)

痕癢非常

五二

陰戶爛疔

一三〇

眼起點膜紅筋

一一

婦女白濁帶

一七二

眼起斗膜

一一二

婦女患梅毒五帶

一三三

眼出眼膠流淚

一一四

啞

一一一

眼視一物如二物

一一五

偏正頭風症

一一〇

眼閉不開

一一五

脫爛牙方

一三一

眼生眼旗針瘡

一一六

紮指法

一四二

陰戶腫爛流水

一七四

魚豬骨哽

一三六

陰戶癢油蠟

一七五

蛇頭纏指

一四二

陰囊腎部繃紮法

一七六

蛇骨刺

九三

陰囊蛆

一七六

蛇咬及防法

一三三

陰疔惡毒

一八三

蛇咬紮法

一三四

梅毒 一二八

側面繃法 一六〇

豬 二二一

國術練拳法 一八〇

蛆蟲 一〇三

痔流血 一一一

(十二畫)

跌打 一四二

跌打刀傷通用主要方 一七七

跌打八寶丸 一七七

喉 三三三

喉痺痧腫痛 三三三

喉生疽肉 三五

腋瘡 四六

腋傷繃紮法 四六

過頭蛇 四

過身蛇 五六

脚氣腫痛 八四

脚軟水腫 八六

脚筋抽痛 八七

脚面生腐骨 九〇

脚甲生臭田螺 九〇

脚黑腫腐爛生崩沙 八九

痘胞 一〇三

痘痲胞瘡痘皮 一〇七

黃癩 六三

陽和湯

六六

腰疽

六五

湧泉瘡

九二

腰腿罽紮法

六六

無名腫毒

九五

傷手安定法

四五

棉花瘡

九九

傷六脈

一四二

絞腹痧

六二

韭菜子薰法

一七

湯火傷

一九五

塘虱魚酒湯

一九

(十三畫)

隔食

一四一

禽類

二二六

腮腫

一七

飯銳

九二

腹痛

六〇

鼠咬

一三九

腹

五六

(十四畫)

腰

六四

鼻

一九

腰痛

六五

鼻衄

二一

鼻淵鼻流臭水

二二二

蝦鉗地殼瘡

四三

鼻孔内生花癬

二〇

瘡毒蛇頭

九八

蒸氣凝液法(癬水)

二〇

瘡瘍

九三

對口瘡

三九

養陰清肺湯

三三

腐骨疽腐肉

一〇一

(十六畫)

膏藥製法

一九四

頸生瘰癧

四〇

腿股膝繃紮法

八二

頸項

三九

腿股

八一

頸紅腫

九三

(十五畫)

猪肉柿皮湯

二一

頸核瘡

九八

髮黃

三七

頸癰瘡

四五

髮脚瘡

三九

頸太陽部痛

六三

敷眼外束紮物法

一四

頸瘡紅腫

六四

頭瘡出黃水
 頭生蠍生虱
 頭稔拿瘡
 頭頂裹紮法
 頭面俱腫
 貓咬
 貓病
 頤
 瘰癧
 瘡痍
 遺精濁
 橫痃
 擔肩瘡

七
 八
 五
 二
 八七
 一三九
 二二六
 三八
 一一四
 四一
 七四
 八二
 二〇一

鴨水禽
 (十七畫)
 縮陽救急手術
 聲沙
 癰瘡
 囊癰疽風
 (十八畫)
 薰鼻孔法
 薰痔法
 雙單鵝喉
 鎖喉風
 鎖頸蛇
 臍癰

二二九
 六七
 三六
 五三
 七四
 二〇
 一一四
 三四
 三五
 四〇
 六四

醫按

二〇七

鷄盲症

一六

蟾蛆

一〇三

鷄眼

九二

(十九畫)

蟹眼腫凸

一一

癩貼膏

一二三

頸部裹紮法

二七

纏身蛇

四

(二十畫)

癩蟻面癢

四四

鐵箭沙入眼

一六

癩瘡

一一一

鬚髮

三七

蘇鼠咬

一三九

癬癩蟲

一〇七

爛頭疔癩疽

四

(二十三畫)

爛頭瘡

四

蠱脹

五七

爛脚

八八

癰腫

九三

蠟燭疔

一二七

癩狗咬

一三六

(二十一畫)

癩狂症

二四〇

本書勘誤表

頁	行	字數	誤	正
五七	八	二六	利	便
六八	四	五	陽卽	卽陽
七五	十三	五	蠶 [○]	蠶 _{CO}
八八	八	二	灰洗	灰水洗
九三	十	十一	患卽	患處卽
二八	九	二十一	苓	苓
一三九	十一	八	核	枝
二八六	十一	一	宗	宋
二八六	十二	八	冕	寃

徐仁甫畜牧丹

專醫猪
牛犬禽

六畜等病。經國民
政府特准註冊
畜牧丹字
商標。如有用此商標名稱假冒
及影射者。定依法呈官究辦。

註
冊

商
標



廣州市中華南路一百四十九號

徐仁甫醫廬



徐仁甫畜

牧丹。如

遠方購用

。以中國

郵票代價

。十足通

用。