

遠西醫方名物考

安 卍

卷十八

和書門			
二	八	一	四
號	函	架	冊
類	類	類	類

庫	文	閣	內
九	二	八	和
函	六	一	書
四	四	四	類
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	和 28614
冊數	45 (18)
函號	185 282



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



遠西醫方名物考標目

卷十八

阿芙蓉

下

精製說

精製阿芙蓉

阿芙蓉液

舍電發謨阿芙蓉液

芙蓉薄荷飲

阿魏

盧會驅蟲丸

阿魏丁幾去爾

安息香華

亞鉛

亞鉛華

鎮痙定嗽丸

掃蕪銀華丸

皓黃膏

遠西醫方名物考標目

明治十三年購求

トス。内服外敷ノ其効。前ニ説所ノ如シ。○服量一匁ヨリ二三匁ニ至ル。○然レ生阿芙蓉ヲ用テ嘔氣ナキ人ハ上好淨潔ノ生阿芙蓉ヲ用ベシ峻効アル。精製ノ者ニ勝レリ。或醋。橙汁。綠礬精。鹽類等ノ性功相反スル者ヲ加製ノ其悍烈ナル毒ヲ抑制スル者アリ然レ此皆其峻効ヲ奏スル所ノ主能ヲ減損スルナリ。故ニ眩ヲ恐ル人ハ服量少許用ルヲ良トス

精製阿芙蓉

ゲソイフルデヘウルサフ

阿芙蓉 一匁

沸湯 二匁

右阿芙蓉ヲ湯ニ浸メ溶化シ布片ニテ絞リ瀝シ渣ヲ去リ文火ニ上セ乾シ貯フ

又法 阿芙蓉 適宜

右硝子蠟ニ内レ水三倍量ヲ加テ文火ニ上セ。烱解ノ蜜ノ稠トナルニ至リ。温ニ乘シ絞瀝シ滓ヲ去リ復微温火ニ上セ乾固シ貯フ。○戾云。多ク湯ヲ加テ溶シ瀝過スレバ華爾斯ノ質多ク分テ渣トナリ。布片ニ殘留ルナリ湯少キハ華爾斯多ク分離セズ。是ヲ瀝スト雖モ趨謨ト混和ノ布片ニ透漏スト

又法 ラウダミム。オッピア。タム。羅。○按ニ此法ハ阿芙蓉ノ華爾斯質ヲ

去ラス。唯塵土等ノ汚物ヲ除クナリ

阿芙蓉 ヒ好者。細剉

雨水 或半北ハ蒸餾水ヲ用フ

右格兒弗^{コル}内^イレ固封シ沙火ニテ煮ル^フ一時許。温

ニ衆ノ瀝^コシ液ヲ取り其布片ニ殘ル阿芙蓉 即チ其

質^ナヲ陶器ニ内^イレ文火ニ上セテ乾シ是ヲ硝子壘

ニ内^イレ燒酒ヲ加テ阿芙蓉ノ上。四指横徑ニ至リ。其

口ヲ固封シ是ヲ少温ノ沙火ニ内^イレ置^フ一時許ニ

ノ其壘ヲ取出シ。其液ヲ傾ケ寫セバ粘穢土沙等其

壘底ニ殘ル。是ヲ棄去リ其液ト前ニ取^ルタル液ヲ各

別ニ硝子ノ鉢ニ入レ沙火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ蜜

ノ稠ト爲シ此兩個ノ液ヲ合和シ文火ニ上セ煎熬

ノ乾シ貯^フ 伍 ○或云。右ノ諸法ノ如ク是ヲ精製ス

ト雖モ其嘔吐ヲ起ス所ノ華爾斯質ヲ脱スル^ト能

ハズ。盡ク其華爾斯ヲ脱メ純粹ノ麴^コ質ト爲シ感

動甚キ人ニ用^テ少^シモ妨害ナキ者ト爲^ンコ^トヲ欲セ

バ左ノ如ク製スベシ。其法。前ニ説ク如ク是ヲ沸湯

ニ浸^トノ溶^トシ微温火上ニ置テ泡釀スル^ト一月許。其

間ニ液減スル片ハ時々温湯ヲ加^フベシ。是ニ由^テ

華爾斯質ハ盡ク其底ニ沈^ニ。麴^コ質ノニ其湯ニ烱

遠西名物考 卷十八

風雲堂藏

化ス。即チ其底逆ヲ除キ上清ヲ取テ文火ニ上セ乾固スルナリ又法。阿芙蓉ヲア亞ル爾コ箇ル兒ル燒酒ノ條ニ出脱ノ純精ナニ浸ス一三四日則チ其華爾斯質ハ盡ク溶化シ越護質ハ溶解セズ是ニ於テ瀝テ其溶化セザル者ヲ取り乾ス片ハ即チ純粹ノ越護質トナリ。其性効殆ト罌粟球ノ越エ幾キ斯ス劑ノ如シ是レ罌粟熬固ノ膏ト爲ス者ナリ。白按布福叔伍罌粟ノ條ト參考スベシ。侯依淑過亞

阿芙蓉製劑說 古人オモヘテ以爲阿芙蓉ハ性大寒ニシテ生活ノ温暖氣ヲ撲滅ス。故ニ過服スレハ肢體厥冷ノ死スト。是ヲ以テ其寒性ヲ抑制スルガ爲ニ多ク熱

性香竄ノ藥ヲ加ヘ以テ的テ里リ亞ア加カ及密ミ篤ト利リ太ト多ト實ダ亞ア斯ス格コ爾ル需ダ謨ム共ニ阿芙蓉劑ハ名ノ如キ多味繁雜ニシテ性功相反スル藥品ヲ調和シ是ヲ以テ汗ヲ發シ下利ヲ止ル等ニ用フ晚近ニ至テハ的リ亞ア加カ劑中ノ刺長無用ノ藥品ヲ除テ簡徑適實ノ方ト爲シ是ヲ阿芙蓉コン昆セル設ル爾フ弗ト名ケテ局方ニ載ス因部ニ出ダス因部ニ出ダス因部ニ出ダス

○阿芙蓉液次ニ製スルニ精製阿芙蓉ヲ用フ。是劑中香竄ノ藥品ナキ故ニ生阿芙蓉ヲ用レバ動モスレバ惡心嘔吐ヲ發スレバナリ舎電ハ發ハ謨ハ阿芙蓉液次ニハ劑中香竄ノ藥品アル故ニ生阿芙蓉ヲ

遠西名物考 卷十八 風雲堂藏

用フ。其香竄ノ品アルハ阿芙蓉ノ寒性ヲ抑制スル
為ニ非ズ。其生阿芙蓉ノ嘔氣ヲ起ス。アルヲ静止
スルガ為ナリ

阿芙蓉液

即チ阿芙蓉アヘンヲ幾キ去ク爾ニナリ。ラウダラウダニムリ
グイグイガムガム又マテイテインンキキテテウウララ。オオピピウウムム。ヒヒノノササ
ヲヲ又マフルフルククウウエエインイン。ハハンン。ヘヘウウルルササ。
アア又マフルフルイイババレレ。ヘヘウウルルササ。フフ蘭蘭

製法

阿芙蓉 精製者 二多

葡萄酒 十六多

燒酒 十五多者 四多

右硝子壘ニ内レ浸テ二日。漉過ノ其液ヲ取。硝子壘
ニ内固封シ貯フ。此液十氏ニ阿芙蓉一氏ヲ含リ技

又法

阿芙蓉 精製者 一多

燒酒 尋常者 十多

右長キ硝子壘ニ内レ微温火ニ上セテ溶シ紙ニテ
漉シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ庚

主治

大抵舍電發謨阿芙蓉液出ツ及精製阿芙蓉ノ

如シ○服量十八滴マデ用フ是ニ慣ル者ハ三十滴
許モ用フ○此液ニ硝砂精或羯布羅油ヲ加ヘ胃瘕
前ニ疝痛。頭痛等ノ患部ニ塗テ其痛ヲ止ム○炊腫
眼ニ此液ヲ取テ二三滴宛眼ニ點ス。毎日二次或三
次其症ニ隨テ増減ス。初ハ痛ニ堪ス涙多ク出レ庚

其後痛止ム。焮腫劇キ者ハ此液ニ水ヲ加、稀クシ施
ベシ。○瘰癧毒、焮腫眼。及、經久ノ傷冷毒ノ眼疾ニ亦
良驗アリ。○角膜星翳曇暗症ニ是ヲ點メ殊効アリ

舎電發謨阿芙蓉液

一名香竄阿芙蓉液

デ
カ
タ
又
ハ
ム
又
ヲ
ン
キ
ヲ
ラ
ホ
ビ
ム
コ
ロ
カ
タ
又
ハ
ム
又
ヲ
ン
キ
ヲ
ラ
ホ
ビ
ム
コ
ロ
カ
タ
又
ハ
ム
又
ヲ
ン
キ
ヲ
ラ
ホ
ビ
ム
コ
ロ

製法

阿芙蓉

上好者 二多

雜腹蘭

一多

桂

上好者

丁香

各一錢

葡萄酒

一北

右件硝子壘ニ内レ時々振蕩シ浸ス。四日。漉シ絞

テ液ヲ取り、硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法

エ
ッ
セ
ン
チ
ア
ア
ノ
デ
イ
ナ
羅
ペ
イ
ン
ス
チ
ル
ウ
ル
サ
フ
ハ
ン
セ
イ
デ
ン
ハ
ム
蘭

阿芙蓉

二多

桂露

一北

葡萄酒ヲ以テ蒸餾スル者
和蘭藥鏡出

雜腹蘭

一多

右件硝子壘ニ内レ微温沙火ニ上セ阿芙蓉溶化シ
其色ヨク出ルニ至リ漉テ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ

固封シ貯フ 医

又法

テイニキタルテバイカ 羅ソ阿芙蓉

阿芙蓉

精製者 二弓

桂精

十八弓

右硝子壘ニ内レ浸ス¹四日。漉過ノ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ。○此液十瓦ニ阿芙蓉一瓦許ヲ含ノリ 依

主治 鎮痙。催睡。止痛。發汗。驅風。ノ良藥トス。嘔吐下利ヲ止メ痙攣搐掣子宮衝逆。疝痛等ヲ治スル¹阿芙蓉ノ如クニメ嘔吐等ノ妨害ナシ。劑中香竈ノ品ア

レ凡阿芙蓉ノ効減セズ。又虛冷ノ病ニハ尤^モ驗アリ
○服量四五滴ヨリ二十滴ニ至ル
○阿芙蓉ヲ服メ嘔吐ヲ發スル患ヒアル者ハ左ノ劑ヲ用フベシ

芙蓉薄荷飲

桂露

薄荷舍利別

各二錢

阿芙蓉液

二十滴

右調和ス。○痙攣ク運動ニ因テ嘔吐休マズ藥汁咽ニ下リ難キ者ハ舍^{セイデン}電發^{ハム}謨阿芙蓉液ヲ温メテ毛布ヲ蘸シ心窩ニ貼メ効アリ頭痛ニハ顛顛ニ塗リ咬

牙ニハ顯ニ擦メ良○大便秘閉セル者ハ先ヅ下劑ヲ用ヒヨク通利ノ後此劑ヲ用フベシ。否ラザレバ諸症解散シ難シ依按亞過

阿魏 アサフチダ 羅 ドイフルス デレキ 蘭

是ハ百兒西亞等ノ熱國ニ産スル草根ノ脂液ヲ取曝乾ノ凝固シ大小碎塊ヲ成者ナリ。上品ハ黄色ニノ赤色或赭色ヲ帶ビ。是ニ白色若クハ帶赤色ニノ透亮光澤アル顆粒。間錯シ或淡紫ノ斑アリ。乾ケハ粘潤アリ嚼バ齒ニ粘著ス暫ク手ニ握バ軟ナルヲ

蠟ノ如シ。然レ年ヲ經レバ稍固クノ赭黑色ヲ帶ブ。其氣蒜ノ如ク甚ダ竄透メ嘔噦スベキ烈臭アリ。火ニ投スレバ臭氣殊ニ甚シ。其臭烈キホド逾上品トス。固封シ貯レバ數年ヲ經レハ臭氣及効力減セス。味辛苦。舌ニ鑽透ス此物黯黑色ニ汚物ヲ雜ベ或軟ニソ脂膏ノ如ク或枯燥メ粘潤ナク臭氣微キハ藥用トセス○或白色ノ萃爾斯類ニ蒜ノ絞汁ヲ加搗テ乾シ下品ノ阿魏ニ雜ヘ偽者アリ是ハ疏脆ニ碎易ク光滑多ク燒酒ニ浸カ盡溶化スルヲ以テ知レシ○此草ノ生汁ハ臭氣極テ甚シ生汁一錢ノ

臭氣ハ乾固ノ者百北ヨリ甚シト云○其質ハ麩ゴム華爾斯ナリ大約オヨソ華爾斯二分麩ゴム三分アリ。故ニ燒酒ニ浸セバ溶化スレ。凡渣脚多シ。水ニハ其麩ゴム質盡ク溶化ス。醸醋ニ浸バ盡ク乳白色ノ液トナル。油ニ浸バ少許溶化ス。此皆麩ゴム質多キノ徴ナリ。又精微ノ油及揮發鹽アリ○此脂液ヲ取草ハヘラ。アサフチダ羅ペルシアアンス。ホルストク蘭ト名ク。百兒西亞ア西里亞ア其ニア細ガ其他印度地方ニ産ス。初根ヨリ葉生シ長一尺五寸許。粗糙ニシテ形芍藥ノ如ク。質刺發ラハ斯葉ニ似タリ葉ノ梗大指ノ如ク殆ト圓ク

是ヨリ小梗ヲ分チ小葉生ス。其後莖ヲ抽キ年ヲ經レバ高サ五六尺許。太腕ノ如シ。中實ノ髓充ツ。莖頭ニ大ナル繖花ヲ開キ子ヲ結ブ。此草生ノ四年ヲ經バ根長五尺許太人脚ノ如ク或、極ヲ爲ス。外面栗殼色。裏白色ニシテ蘿蔔ノ如シ。是ニ乳白色ノ汁多ク。蒜臭極テ烈シ。根年ヲ經ニ隨ヒ其汁多ク且粘稠ナリ。氣ニ觸テ自ラ凝固シ黃褐色トナル。此草多年枯レズ。土人初夏ノ頃。莖葉ヲ截去リ。根ニ土ヲ被フ。一月餘。復新芽ヲ生スルヲ候ヒ根ノ頂ヲ截斷スレバ白汁滿溢シ太陽ノ暖氣ニテ自ラ乾固ス。是ヲ取復其

頂ヲ截斷ノ其汁ヲ乾固セシメ取ル。斯ノ如ク逐次ニ
 截取テ終ニ少モ其汁ナキニ至ル。是ヲ取曝乾ノ凝
 固セシム。土人は是ヲ飲膳調理ニ加テ葱蒜ノ如ト云
 主治 竄透ノ壅塞ヲ開達シ刺戟衝動ノ凝結ヲ疏解
 スル効尤峻ナリ。又ヨク表發ノ蒸氣ヲ排泄ス。○子
 宮衝逆及痙攣ノ諸症ヲ治スル一良藥トス。又經閉
 及痔血壅滯ヲ通スルニ峻効アリ。○此藥粘液ヲ疏
 解シ輕ク瀉下シ且臭氣烈キニ由テ殺蟲ノ峻効ア
 リ。其臭味ニ由テ蟲ヲ侵刺シ遂ニ其巢ヲ剿絶ス。此
 物三錢ニ藤黃二月ヲ加三氏ヲ一丸トシ三丸宛日

四次瀉下ノ多少ニ隨テ加減シ用フ。又是ヲ長服ノ
 ヨク條蟲ヲ殺ス。○或一味丸トシ用テ亦ヨク蛇蟲
 ヲ殺ス。是ヲ用レバ蟲其藥氣ニ堪ズノ騷擾シ腹痛
 搐掣神經ノ諸症ヲ發スルコトアリ。然レ虫死スレバ
 其症頓ニ治ス。胃弱キ者ハ苦味ヲ越幾斯劑健質亞
 ノ幾那葛爾儒等或ハ鐵劑ニ加用フ酸敗液ノ症ニ
 ノ越幾斯劑刺姑石麻源淫ニ加用フ腹部諸藏ノ壅塞
 ハ制酸劑失亞迺爾投等ニ加用フ腹部諸藏ノ壅塞
 硬腫ニハ其症ニ隨テ中和鹽霸王鹽孕水銀劑安質
 沒拏等ニ加蟲症ニハ驅蟲劑瀉下劑ニ加用ヒ或
 ハ吉利詞參兒テイルヲ兼子施ス。又鼓脹ノ一良藥ト

ス。毎日二錢許用七時、大黃丸九藥ヲ用、大便ヲ順
利ノ治スル者多シ。此病粘液鬱積シ或ハ蟲アルニ
因テ發スル者亦少カラズ。此症ハ左ノ方殊効アリ

盧會驅蟲丸

阿魏 三錢

格失亞丸 料

錢

右研和シ三丸ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛

用、一日三次瀉下多キ片ハ服量ヲ減ス

○格失亞丸方

盧會

蘇甘沒担謨

格碌董篤

大霸王鹽 丁香油

錢

右細末トシ丁香油ヲ和シ亞刺比亞譚漿ヲ加テ
泥ト爲シ三丸ヲ一丸トシ金箔或ハ甘草末ヲ衣ト
シ三丸宛用ル、一日三次、但大便ノ多少ニ隨テ加減
ス阿魏過服スレバ吐シ或瀉下ス、寒粘液質以人ハ
瞑眩少シ、○腹部諸藏ノ壅塞、頑硬腫、并是、ヨリ起
ル腹脹水腫ニ阿魏峻効アリ、但、癌瘡毒樣ノ硬腫ハ
効ナシ、○疝腹痛ヲ治シ、風氣痞滯ヲ散シ、風疝腹脹
ヲ消ス、胃腸ノ運營衰弱ニハ疝痛ヲ兼此症ニ尤モ良
○胃中ニ粘液、酸敗液鬱滯ス、此諸症及胃脘嘔吐
ヲ兼ヲ治ス、○痛風脚痛ニ用テ驗多シ、○頑固久間

歇熱及是ヨリ起ル水腫ニ阿魏一味丸薬トシ或ハ
 幾那ヲ加ヘ用テ多ク治ス○疫欬及經久ノ痰欬喘
 急等人胸病ニ効多シ○腐骨疽其他惡厲ノ潰瘍ニ
 是ヲ内服シ或ハ外敷ノ良驗アリ○服量ニ刃マデ
 一服トシ用テ害ナシ然レ通例ニ氏ヨリ十氏マデ
 ヲ丸薬トシ用フ或ハ是ヲ適宜ノ舍利別ニ和シ或
 ハ芳香ノ露水ニ加ヘ或ハ雞子黄ニ研和シ用ヒ或
 ハ龍腦。麝。安沒尼亞幾。纈草等ニ加ヘ丸薬トシ用
 ヒテ良。但シ是ヲ用テ四日毎ニ適宜ノ下劑ヲ與フベ
 シ○諸失血其他脫泄ノ患アル人ニ此薬ヲ用レバ

其症ヲ增長ス○痢ノ發作ニ此烟ヲ嗅シメテ醒復
 ス○外敷ノ寒腫ヲ温散シ且凝結ヲ疏解スル峻効
 アル故ニ瘰癧等諸頑硬腫ヲ消散シ痛ヲ止ム一味
 膏薬トシ貼メ良○腐骨疽汚穢潰爛ノ瘡瘍ニ此末
 ヲ摻ケテ腐壞ヲ祛キ膿ヲ排ヒ淨刷ス
 阿魏アウイ 丁テイ 幾キ 去キ 爾ル

製法

阿魏 搗碎者 一匁 燒酒 二十度者 八匁
 右 潤キ 格兒弗ノ半ニ充シメ厚紙ニテ其口ヲ蓋封
 シ 鐵ニテ其紙面ヲ穿テ幾多人細孔ヲ作シ 格兒弗
 ヲ微温火上ニ置テ時々振蕩シ浸スヲ六日ニノ濾

過シ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ 〔後〕

又法 阿魏ニ^三硝砂加燒酒精^{十二}

右硝子壘ニ内レ蓋閉シ浸ス^一六日。漚テ滓ヲ去リ

固封シ貯フ。○服量十滴ヨリ十六滴許。葡萄酒或ハ

呼^イ埤^デ等ニ點服ス。或ハ阿芙蓉液ヲ等分ニ加ヘ十二

滴或ハ十五滴許用ヒテ尤^モ効アリ

〔主治〕 子宮衝逆及ビ痙攣搐掣等葛^カ私^{スト}多^レ儂^{ラム}。主治ノ

諸症ニ奇効アリ 〔依〕 〔疾〕

安息香華

フロレス、ベンソイニユム、
ベンソイン、ブルトメン、
蘭

是ハ安息香ヲ升煨ノ汚物ヲ去リ純粹ノ精華ト爲

ス者ニノ其質精微ナル酸性ノ揮發鹽ナリ。安息香

十北ヨリ華一北出ツ

○按ニ安息香偽品多シ。洋船ノ品ヲ擇ニ用^レベシ。

藥舗ニ古渡ト稱スル者間^マ真品アリ。和蘭說云。安

息香ハ應^シ帝^デ亞^ア地方ニ産スル一種ノ樹ニ生スル

華^ハ爾^ル斯^スナリ。二種アリ。第一種ハ自然ニ其樹ヨリ

流滴シ顆粒ヲ爲シ脆^ニ碎^ク易^ク。外面黃色。

裏ハ白色ニシテ紅白ノ條理アリ。甚^ク芳香ニシテ味淡

ナリ。是ヲ最上品トス。又一種顆粒ヲ爲シ鮮麗淨

潔。硬固ニシテ黄白色雜リ或ハ赤色ヲ帶ビ白點アリ
 リ芳香ニシテ甘味ヲ帶ル者アリ此亦上品トス。然
 レ右二品ニ甚稀ナリ○第二種ハ乾固ノ大塊
 ヲ爲シ淨潔ニシテ汚物ナク硬脆ニシテ破碎シ易ク
 光澤アリ黄白色及赤褐色ノ碎塊間錯ス。多ク鮮明
 ナル顆粒ヲ夾ミ且破碎セル扁桃ノ如キ白點多
 者ヲ上品トス。味油様ニシテ甘ヲ帶ビ佳香アリ。是
 ヲ磨シ或ハ温レバ殊ニ香氣多シ。但シ楮黑色ヲ帶
 テ汚物ヲ雜ヘ鮮麗ノ碎粒。白點ナキ者ハ下品ト
 ス○錫蘭セイロン 印度 島名ノ産ハ楮赤色ノ者多シ暹羅シマ 暹羅 蘇門蘇門

答刺タラヤ瓜ハ哇ハ上同ニ多ク産ス。亞墨利加洲ノ産ハ黑色
 葉。枸櫞葉ニ似テ小。光澤ナク。背白色ヲ帶ビ花四
 瓣黄色。山茱萸花ノ如ク實大。肉豆蔻ノ如ク形ノ
 扁圓ナリ。或云。蘇門答刺スマタラニ於テ亦此樹生メ五六
 年ヲ經テ幹六指横徑ヨリ八指横徑許ニ至
 レバ其皮ヲ縱ニ鑽リ。脂液流淌シ皮ヲ著キ乾
 是ヲ小刀ニテ刮カ取ル。其初ニ出ル脂ハ柔ニシ
 白色。香氣尤モ窟透ス然レ此品他國ニ輸スコトナ
 其後數日此脂ヲ取レニ隨テ漸ク黄色トシテ終ニ楮

色トナル又老木ヨリ出ル脂ハ楮黒色ナリ其黄
 白楮赤等種ノ碎塊間錯スルハ其流滴セル脂
 ノ前後早晚アル者ヲ集取テ大塊ト爲ニ因ル大
 抵一樹ヲ鑽刻スル一十年或ハ十二年ニ其脂
 三比許出ツ○第一種ハ甚ダ稀ナル故ニ多ク第
 二種ヲ藥用トス黒色燥硬ニシテ香氣ナキハ他ノ
 樹脂ヲ雜テ偽ル者ナリ○其質華爾斯ナル故ニ
 水ニ溶化セズ油ト燒酒ニハ溶化ス

製法

二法アリ一ハ溶化法一ハ升煨法ナリ

溶化製法

安息香

上好者極細末
適宜

雨 水

安息香ノ
四分一

六倍

右磁鍋ニ内レ手ヲ住メズ攪セ煮テ四分時ニシテ火
 ヲ下シ靜定ノ上清ノ液ヲ取り其渣ニ氷ヲ加ヘ前
 法ノ如ク煮テ上清ヲ取り其清液ヲ合シ文火ニ上
 セ水氣ヲ蒸散ノ遂ニ安息香ノ一倍ノ量ト爲シ火
 ヲ下シ是ニ綠礬精ヲ滴シ加テ其液黄色ヲ帶ビ乾
 酪ノ如ク凝固スルニ至リ是ニ數沸湯ヲ加テヨク
 溶化セシメ冷處ニ置片ハ柔ニシ薄キ芒ヲ結ブ是
 ヲ取り紙上ニ撒シ乾ノ硝子壘ニ收メ固封シ貯

升煨製法

安息香

上好者粗末
適宜

右陶壺ノ長ク筒ノ如クシテ口窄キ者ニ入レ厚ク
硬キ紙ニテ△形ノ蓋ヲ作り是ヲ以テ固ク壺口ヲ
覆ヒ氣ヲノ透漏セザラシメ其壺ヲ沙火或ハ熱灰
ニ入レ華爾斯ノ烱ル程ノ火候ト爲ス片ハ安息香
融解ノ其精華升騰シ其蓋ニ著テ銀白色ノ芒ヲ爲
ス乃チ一時毎ニ蓋ヲ換テ其華ヲ拂ヒ取り終ニ其
華赭褐色ニノ粘リ油ノ如クナルニ至テ火ヲ下シ
速ニ其華ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

又法

安息香

極細末
五弓

沙

乾淨者

安息香ノ四分一

右攪和シ陶壺ニ内レ蓋ヲ覆ヒ文火ニ上レ華ヲ取ル

前法ノ如クス ○安息香華ハ白色ニメ灰色ヲ帯ビ

光澤アリ味初甘ク後酸ヲ帯ビ頗琥珀鹽ノ如シ

主治 是安息香ノ酸性鹽ナリ安息香ニ比スレバ功

力尤峻ニメ揮發鑽透スルヲ龍腦ニ似タリ ○粘痰

敗液等ノ肺ニ凝滯スルヲ稀豁メ疏散シ喘急肺傷

欬嗽及ビ肺瘍等總テ肺病ニ殊効ヲ奏シ又腦及ビ

神經ヲ強壯ニス但肺焮衝等ノ危險ノ効ハ寛解シ

難シ ○服量五匁ヨリ八匁ニ至ル

叔依 叔依

ク稍蒸氣ノ漏ル許ニシ其焰盡ク熄ヲ候ヒ上坩ヲ
取去レバ輕虛ニシ白絮ノ如キ華其坩及熔タル亞
鉛ニ著ク。悉是ヲ取り其坩ノ渣塊ヲ去リ新ニ亞鉛
ヲ投シ熔ス前法ノ如クニシ華ヲ取數斯ノ如ク
ノ多少適意ノ量トナルニ至リ。是ヲ陶壺ニ内レ冷
ルヲ候ヒ水ヲ加テ溶シ濾過メ其最モ輕虛ナル者
ヲ取意ヲ用テ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ亞鉛
ハ少許宛坩ニ投メ熔スベシ一頓ニ多ク煨クキハ火
氣徹セズ溶化シ難クノ華ヲ得テ少ケレバケリ
主治發汗劑トス或ハ吐劑下劑トシ用テアリ。服量

四匁ヨリ十二匁ニ至ル○又鎮痙ノ良藥トシ痙痙
搐掣ノ諸症ニ奇効ヲ稱ス。近世名哲ノ經驗說甚ダ
多シ。胃腸ノ粘穢汚液ヲ驅除ノ後。二匁ヨリ五六匁
マデ用フ。然レハ煨衝ノ疔ヲ兼ル者。是ヲ用テ勿レ○
腹部諸藏ノ壅塞及神思ノ感動等ヨリ發スル痙攣
搐掣。子宮衝逆其他神經ノ諸症ヲ治ス○小兒蛇蟲
及酸敗液ヨリ起ル搐搦ニ捷効アルト鹿角精ニ勝
レリ○痘ノ初熟ノ搐搦甚キニ用テ速ニ解ス○一
婦人二十四歳。痙ヲ患ルト三年。其症二十四日毎ニ
一發ノ卒倒ス。治痙鎮痙ノ諸藥寸効ナシ。因テ亞鉛

華五尺宛用ル一日兩次漸ク加テ十二尺ニ至レ
 瞑眩セズ唯服後稍惡心ヲ覺ルノニ。是ヲ用ヒテ後
 兩面ノ發作ハ以前ヨリ甚シ。然レ爾後漸ク減シ稍
 筋惕肉瞤ヲ覺ルノニテ卒倒ニ至ラズ。是ヲ用ル
 一半年許ニ全愈シ既ニ一年ヲ經レレ微恙ナシ
 ○亞鉛華ヲ綠礬精ニ溶シ結芒セシメテ皓礬ヲ製
 ス。一ニ是ヲ亞鉛礬ト名ク。鎮痙ノ良効アルヲ亞鉛
 華ト同シ。皓礬二種アリ一ハ自然生ニ山坑ニ出
 條皓礬ノ一ハ亞鉛華ヲ以テ製造ス。其法石膽ノ
 下ニ出。○一少年大ニ驚怖ノ後。心動悸ノ歇マズ
 竟ニ神思鬱憂病ニ罹ル。皓礬製造二日ヲ取テ單方

解毒水四弓ニ溶シ一匙宛用ル一日三次。一月許ニ
 ノ回復ス。解毒水ハ單方複方アリ單方、羅甸名「ア」名
 荷葉一比半、亞爾鮮、德白芷、葉各一丸。○頑固ノ傷冷
 右水適宜ニ加ヘ蒸餾ノ露水ヲ取ル。○頑固ノ傷冷
 毒痛及ビ是ヨリ發スル喘急。小兒疫欬ニ用ヒテ治
 驗多シ。○腹内諸藏ノ壅塞スルヨリ攀急ノ乾欬ヲ
 發シ荏苒トメ治セザル症ハ左ノ丸藥偉効アリ

鎮痙定嗽丸

著艸。越幾斯劑。錢半。○著ハ坊間ノコギリ草
 穂ヲ採リ。越幾斯劑ト爲ス。其
 法。蒲公英。越幾斯劑ト同シ
 律比丸料 一錢

西行抄 卷十八 風雲堂

阿魏 半錢

亞鉛華 十五分

右二氏ヲ一丸トシ刺蝟石ヲ衣トシ五丸宛用ル

日兩次或ハ其症ニ隨テ四次ニ至ル○小兒蛇蟲ノ

諸症ハ左ノ丸藥甚ク驗アリ

掃蟲銀華丸

水銀 二錢

的列並底那 一錢

亞鉛華 二錢

右乘卜的列並ヲ研合ノ星ヲ見ザルニ至リ亞鉛華

及桂末少許ヲ研和シ三氏ヲ一丸トシ初ニ丸ヲ用

日一丸宛増シ患者惡心ヲ發スル片ハ健胃下劑ヲ

與ヘ惡心歇ニ至テ稍丸藥ノ數ヲ減シ用ベシ○頑

固ノ下利大黃一百葛格安那等ヲ用テ効ナキ症ニ

皓礬一味用テ大効ヲ得一アリ○焮腫眼ノ良藥ト

ス亞鉛華一錢ヲ薔薇水五分ニ溶シ眼ニ點ノ酷厲

液ヲ消シ痛ヲ止治ス○鶯口瘡ニ皓礬半分ヲ水ハ

ヲニ溶シ漱藥トシ良驗アリ舌甚乾燥セズ稍焮衝

ヲ兼ル症ニ尤良○乳頭垢裂若クハ潰爛腫痛スル

ニ皓礬ヲ水ニ溶シ稀クシ塗或ハ亞鉛華ノ末ヲ摻

ケテ即効アリ。破爛モ亦是ヲ塗テ良。創傷潰瘍ニ
摻ケテ痛ヲ止メ乾愈ス。此末ヲ布ニ夾ニ貼メ汚液
多キ潰瘍ヲ乾シ治ス。○疥癬ニ左ノ軟膏殊効アリ

皓黃膏

皓礬

硫黃華

老利兒細末 各等分

阿利襪油 適宜

右調和ノ軟膏トシ少許ヲ取テ掌中ニ擦ル。一
兩
次初メ疥癬多ク發出シ爾後速ニ乾治ス
布 敷 依

亞兒尼加羅

アルニカモシタナ羅
ハルコロイド又ウルヘンイ蘭

形狀 此草。春月宿根ヨリ葉ヲ生シ橢圓ニメ末尖リ

三縱理若クハ五縱理アリ。肥土ニ生スル者ハ潤ク

メ大車前ノ葉ノ如シ瘠地ノ者ハ狭ク長シ邊ニ鋸

齒ナク滑澤。淡綠。背ニ毛茸アリ。葉間莖ヲ抽。一

尺。傍枝ヲ分チ。二葉或ハ四葉對生ス。根葉ニ比スレ

ハ狭ク長シ。莖頭ニ黃花生シ。大ナルハ徑一寸餘。旋

覆花ニ似テ瓣ノ末。三鋸齒アリ。每瓣五鬚蕊長クメ

瓣上ニ出ツ。瓣枯テ毛絮殘リ。每絮一細子著ク。根ハ

木ノ如ク乾ク者ハ太サ鶯管ノ如シ鬚多シ。花葉根共ニ味苦クノ辛ヲ帶ビ生鮮ノ者ハ不佳ノ氣アリ。揉テ嗅キ或ハ搗テ末トスレバ嚏ヲ發ス。歐羅巴洲諸國ノ原野ニ生ス。

○按ニ此草和產未詳ナラズ舶來ノ品ヲ用ベシ。主治花ヲ藥用トス。葉モ亦効アリ。根ハ吐ヲ發スル故ニ用ルル稀ナリ。或云根モ亦花ト同シ下利及腐敗諸病ニ殊効アリ。末トシ沙糖ヲ加ヘ或ハ泡劑トシ用フ。○是ヲ嗅キハ嚏ヲ發シ。多ク服スレバ吐スル。煙草類ノ如シ。故ニ鑽透刺戟ノ經久ノ壅塞ヲ

開通シ惡液ヲ分利シ汗ヲ發シ小便ヲ利シ月經ヲ通ス。○脉管纖維及神經ノ弛弱虛衰ノ血液壅滯シ或ハ血中粘液多クノ醇精ノ質ヲ失フ諸病ニ是ヲ用レバ刺戟衝動ノ壅滯ヲ疏解シ惡液ヲ分利ノ排泄ス。故ニ總テ虛弱ニ屬スル熱病。神經熱。腐敗熱。粘液留飲過多ノ熱病ニ偉効アリ。○痰ヲ疏解メ吐セシムルニ殊効アリ。故ニ肺及ビ胸脇焮衝熱ノ劇症退キ。病勢衰ヘ唯專ラ粘痰ノ吐出ヲ要スル症ニ甚驗アリ。又虛弱ニ屬スル咽喉焮腫。久效痰喘等ニ是ヲ泡劑トシ蜜ヲ加用テ良。○扶欵蘭度ヒュヘランド名云惡性ノ

神經熱ニ於テ患者虛脱シ危篤ノ諸症ヲ發スルニ
 至テハ揮發衝動ノ藥劑幾那ノ條ニ註スヲ法ノ如ク用テ
 其垂絶ノ元運力ヲ挽回スルコト一大緊要タリ是ヲ
 用テ脉漸緩ニシカヲ生シ諸器ノ機轉漸次ニ故ニ
 復スルノ時ニ至テハ更ニ亞兒尼加根一錢ヨリ二
 錢許ヲ取、纈草、攝爾扁答利亞四部出ヲ等分ニ加泡劑
 トシ用テ良効アリ。若シ其罷極危劇ノ時ニ當テ亞
 爾尼加ノ刺戟シ幾那ノ收固スル藥劑ヲ用レバ虚
 憊ノ胃腸是ヲ消化スルコト能ハズノ壅滯シ生氣揮
 發セズノ逾、危篤ニ至ルナリ。○凡、熱病ノ患者虚衰

シ生氣ノ運行怠慢ニシ病毒排泄シ難キ症ハ此藥
 ヲ幾那ニ加用レバ其鑽透衝動ノ効力ヲ以テヨク
 壅塞ヲ開達シ病毒ヲ驅逐メ排泄ス。○胃腸ノ虚弱
 ニ因リ或ハ腸間膜壅塞スルヨリ發スル經久ノ下
 利ヲ治ス。○赤痢ノ惡性ニシ腐敗ヲ兼ル症腐敗熱症アリ
 ルヲハ此藥尤効アリ其刺戟衝動ノ功力ニ由テヨ
 ク病毒ヲ排泄ス。否、ザレバ其毒鬱積メ腸ヲ侵蝕シ
 寒壞疽トナリテ救レザル者アリ。此症ハ左ノ方殊
 ニ良驗アリ

亞兒尼加排毒飲

亞兒尼加花 三錢

右沸湯九寸ニ浸ス下八分時漉過ノ滓ヲ去リ次ノ
二品ヲ加フ

醋 三寸

過爾託亞舍利別

右調和シ四分時ニ二匙宛用。每次大麥煎汁ニ綠礬
精ヲ滴シ加テ適意ノ酸味ト爲與フ。○痲痺及各部
痲痺殊ニ半身不遂ノ症ニ効アリ。是ヲ服ノ患部搔
痒或刺痛或筋惕ヲ發スルハ良候トス。或經久ノ傷
冷毒痛。痛風或痲癩ニ亞兒尼加ヲ内服外用ノ効多

シ。○黑障眼ニ多ク治驗ヲ稱ス。數日は用テ眼痛
ヲ發スルハ善徵トス。是ヲ以テ視神經ヲ衝開シ壅
塞セル粘液ヲ驅除スレバナリ。○打撲傷ニテ内部
ノ血脉破裂ノ吐血。衄血。尿血等ヲ發シ或其血内部
ニ凝滯ノ諸症ヲ發シ或皮下ニ泛溢ノ青斑トナル
者ハ皆此藥ヲ内服外用ノヨク其瘀血ヲ驅散シ治
○凝血ヲ疏解スル効アルニ由テ經閉ニ用テ効多
服量花一錢ヨリ二錢マデ沸湯八寸ヲ加テ泡劑ト
シ服ス。或香竈揮發ノ藥ヲ加用ス。甚濃ク泡出スレ
バ吐ヲ發ス。或花一錢ヲ取泡劑若クハ浸劑トシ朝

夕一服宛用ヒ漸加テ二錢ニ至ル感動少キ人ハ四
 錢マデ用。或末トシ二錢若ハ三錢ニ蜜ヲ加煉膏ト
 シ毎日服ス。○或越幾斯劑製法。蒲公英。越幾斯劑ト同シ。トシ毎日
 二錢ヨリ六錢ニ至ル。或花若ハ葉四錢ヲ取リ麥酒。葡
 萄酒等四十多ニ浸用ス。○此花ニ越幾及華爾斯多
 ○胃ノ感動シ易キ人ハ此藥ヲ服ノ嘔吐腹痛等ヲ
 發スルコトアリ此症ハ初少許宛用テ漸慣レバ大抵
 自ラ止。或緩和ノ効アル藥ヲ加用フ。然レハ過服スレ
 バ其症ヲ發スルノミナラズ或胃腸焮衝。煩悶。失血
 眩冒。麻痺等ヲ發スルコトアリ。若此症ヲ發セバ醋。橙

汁ノ如キ酸味ノ液ヲ用レバ速ニ解ス。或此花ニ微
 細ノ毒蟲著トアリ誤テ是ヲ服スレバ右ノ症ヲ發
 ス。ヨク意ヲ用テ是ヲ除ベシ。○此藥ハ熱性ニノ鑽
 透刺戟スル故ニ一切壯實多血ノ症。焮衝病。内因ヨ
 リ發スル諸失血。胃腸ノ感觸シ易キ者ニハ皆害ア
 リ。○外用ニハ濃煎ノ蒸溺劑トシ或燒酒少許ヲ加
 温テ施シ或琶布トシ外敷ス。殊ニ麻痺不遂或膀胱
 ノ麻痺ヨリ起ル小便閉及打撲傷ニ良効ヲ稱ス。或
 花及葉ノ末ヲ嚏藥トシ鼻ニ吸入ノヨク頭中ノ惡
 液ヲ排泄ス。○特伊滿人名ノ經驗說ニ云。間歇熱ハ初

發其症ニ隨テ吐劑或下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨刷シ飲
 食ヲ節慎ノ幾^キ那^ナヲ用レバ大抵治ベシト雖モ極テ
 頑固ノ症ニ至テハ多^ク幾^キ那^ナヲ連服スレバ効ナク或
 腹部ノ諸器壅塞硬結ノ塊腫ヲ生シ諸液腐敗ノ日
 虛羸ニ就ク者アリ。是病性頑固ニシテ神經勞弊シ内
 藏ノ諸管壅塞ノ敗液滯積スレバナリ。此症ハ專^ラ壅
 塞ヲ通シ腐敗ヲ除^キ神經ヲ強壯スルニ非レバ全功
 ヲ收^メ難シ故ニ幾^キ那^ナノ功ナキ症ニ亞^{アル}兒^ル尼^ニ加^カヲ用テ
 殊効ヲ得ル者甚多シ左ニ其治驗ヲ舉^ゲ一婦人。年三
 十五。四月下旬ニ三日熱ヲ患フ。初^メ下劑ヲ與^テ胃腸

ヲ淨掃シ次テ幾^キ那^ナノ濃煎劑ヲ用ヒ或安^ソ質^ナ没^ト拉^ニ劑
 ヲ加^ヘ與^レレバ効ナシ。因テ幾^キ那^ナノ末ヲ取テ其間日ニ
 一^ク宛^ツ用^レレバ治セズ淹滯ノ翌年六月ニ至ル。終^ニ
 亞^{アル}兒^ル尼^ニ加^カ花四錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ服セシム。
 次ノ發作。以前ニ比スレバ遲^キ一^ク時。且^ニ諸症劇盛ニ
 ノ終^ニ大^ニ粘汗ヲ發ス。爾^レ後^ニ此劑ヲ用ルニ次ノ發
 作ノ後。小便多ク逆ヲ生ス。是ニ於テ其花三^クヲ取
 テ泡劑トシ間日ニ盡^ク服セシム。是ヨリ其熱再發セ
 ズ諸症脫然タリ一婦人年四十二。初冬。日發熱ニ罹^ル
 リ下劑及對症ノ藥劑ヲ用テ其熱治ス。然^レル^レ後^ニ飲

食ヲ慎マズ藥劑ヲ怠ニ由テ黄疸ヲ發シ食進マズ
 腹脹右脇鈍痛ス。因テ解凝劑及下劑ヲ用テ腹脹減
 シ食稍進メ凡黄疸及腸痛荏苒トメ治セズ。翌年三
 月下旬ニ至リ又三日熱ヲ兼發ス。因テ亞兒尼加花
 ナ以テ間日ニ用テ前法ノ如クシ黄疸漸減スレ凡
 熱ノ發作更ニ增劇シ患者虛憊甚シ。故ニ幾那煎ヲ
 用テ數日ニノ精力稍復スレ凡其熱減セズ。黄疸亦
 增長シ遷延替留メ七月中旬ニ至ル。是ニ於テ又亞
 兒尼加花六錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ用テ。是ヨリ
 第八日ニ當テ又三ヲ取テ泡劑トシ與テ。其後熱

ノ發作並ニ黄疸大ニ減シ時粘痰ヲ吐シ或發汗シ
 發作ノ終ニ於テ殊甚ク且臭氣アリテ粘著ス。爾後
 此藥ヲ連用スルテ三週ニノ其熱發セス諸症盡治
 ス一婦人年十八。四月下旬三日熱ヲ患ヒ諸藥効ナ
 ク六月下旬ニ至ル。因テ此花ノ泡劑ヲ用テ其發作
 殊甚ク且患者湯液ヲ嫌ヒ惡ニ因テ此花ヲ末トシ
 二錢ヲ取テ蜜一弓半ニ和シ間日ニ服セシム。是ヨ
 リ其熱漸減シ第十發ニ至テ悉平復ス一婦人年七
 十二。三日熱ニ罹リ多幾那ヲ服スレ凡驗ナシ。因テ
 輕下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃シ。此花六錢ヲ泡劑トシ

間日ニ用フ。是ヨリ漸發汗ノ熱減スレ_レ患者甚勞
 倦ノ舉動ニ堪_ス。爾後此藥ヲ連進スル_レ十四日ニ
 ノ總身夥ク斑疹ヲ發ス。是ヨリ勞倦頓ニ治シ其熱
 亦再發セス。是其酷厲ナル熱病毒驅發セラレテ
 斑疹トナリ排泄スル顯微トス。一婦人年六十一。資
 稟薄弱ニノ子宮衝逆ノ患アリ。偶頑固ノ間日熱ヲ
 患_レ發作スレバ痙攣ヲ發ノ言_レ不能ハズ。予是ヲ診
 ノ以爲是其熱病頑固ニノ神經大ニ罷勞シ子宮衝
 逆ヲ兼ルナリ。故ニ其發作ニ隨テ神經ノ諸症_{痙攣}ヲ
 發スル_レ。乃_チ神經劑並ニ幾那ヲ投シ或龍腦ヲ加

與_レ凡寸効ナシ。是ニ於テ亞兒尼加花ノ泡劑ヲ用
 ルニ嘔吐ノ服スル_レ能_ズ。因テ左ノ丸藥ヲ製用フ

幾那亞兒尼加丸

亞兒尼加花 末

幾那 末 各二錢

拔爾撒謨 字露 適宜

右調和シ三瓜ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ發作ナキ
 時。半時ニ五丸宛用フ。其後多_ク發汗シ是ヨリ第四發
 ニ至テ痙攣ノ症減シ。言語ヲ妨_ズ。調治二十餘日ニ
 ノ熱病全治シ爾後暫_ク此藥ヲ服_テ痙攣ノ症悉_ク愈_ユ

○右ノ經驗説ニ因テ考レバ血液中酷厲毒アルヨ
 リ發スル經久ノ諸病或腐敗ヲ兼ル熱病及腐敗熱
 ノ如キハ此藥ヲ用テ其酷厲毒及腐敗液ヲ分利排
 泄ヲ殊効ヲ得ベキヲ類推メ知ベシ或ハ胃腸ニ汚
 物敗液鬱滯スル者ニ是ヲ用レバ嘔吐ヲ發スル
 アリ故ニ預メ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ清刷メ用ベシ但
 胃腸淨潔ナレト吐ヲ發スル者ハ服量ヲ減シ用テ
 漸ク慣シムレバ吐スルヲナシ
 (依) (福) (叔) (淑)

遠西醫方名物考卷十八終



和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 棟齊南先生著 全三冊 宇田川格庵先生著 八五三冊
 內景 棟齊南先生著

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完
 自初篇至七篇

增補和蘭藥鏡 同上 全七冊 醫療正始 十齋伊東先生著 每篇三冊完
 自初篇至七篇

遠西醫方名物考 同上 全八冊 羣雅泰西名醫彙講 蘇川天作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄庵先生著 全三冊

瘍醫新書 大槻玄庵先生著 全四冊 醫方例幾 飯野足堂先生著 每篇三冊完
 初篇二篇

蘭學階梯 同上 全二冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄庵先生著 全二冊

幼幼精義 素齋內丸先生著 全二冊 病學通論 山崎闇斎先生著 初篇三冊完
 初篇二篇

濟生三方 杉田成卿先生著 全四冊 青藜閣 江戸漢草堂町三丁目 須原屋伊八

