

證治準繩


外科

卷之五上

					漢書門
				一 二 五	
				八 二 四	
				〇 一 八	
冊	架	函	號	類	

庫文閣內				
				漢書
				三 五
				〇 八
架	冊	號	類	

內閣文庫		
番號	漢	12548
冊數		80 (30)
函號		301 61



癰醫準繩卷之五

癰疽

金壇王肯堂輯 門人新安閔承詔校

諸腫

無名腫毒者不拘於頭面手足胸腹等處焮赤腫硬
結核疼痛又名腫瘍又名虛瘍也但腫無頭無面者
俱是也腫勢盛者以稜針刺去惡血切不可用火針
烙之 惡寒發熱或頭疼或拘急宜表散之以劑防
敗毒散 腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯 無表
裏證腫勢盛者以兩面龜散 若暴發赤腫切不可
以針破只宜以洗腫方淋洗以八仙膏解毒丸等藥

者腫

塗之 若急切卽用金腦香葉田茶菊插酒燉服以
渣敷患處以汁刷患處 尾秋骨處結毒如桃李之
大紅赤焮痛不能行動此名病喉用芙蓉葉搗酒炒
縛爛者以蟻尾殼火燉存性爲末用麻油調搽卽愈
大効 紫游虎蕩用魚苞子根煎水入酒和服又以
水荔枝葉赤子葉搗刷有熱者以追疔奪命湯加雞
屎子雞距根 手背脚背腫大有赤痕如蝦之狀名
病蝦證也用油炒鹽糟令香以熱湯淬之泡湯乘熱
淋洗之卽消要服疥癬藥 膝內賺近摺紋之處結
核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚以稜針亂刺

去惡血以椶枯雷廷藤山樟子葉搗糟炒縛之又用
山雷廷藤赤牛膝山蘇木椶枯搗鹽糟炒縛又方雷
藤鼈尿藤根皮搗糟炒縛之又方魚苞子椶枯搗糟
炒縛之又方山雷廷根皮椶枯搗糟炒縛及用七聖
膏敷之却以九金六馬散服之 遍身起如風疹疥
丹之狀其色白不痛但搔痒抓之起白疔名曰蛇虱
用油穢田肥株山樟子葉樟樹葉柏葉煎水入些醋
洗之又方只用柏葉一味煎水洗更速也要服若參
九蠟礬丸金銀皂角丸 脚背或脚趾腫痛不可忍
以脚高懸起其疼方止些若以脚垂下其疼不可當

也名曰倒拔腫瘍先用兩面龜一味煎酒服次服兩
面龜散如不應以蛇薯磨酒服大効耳中疼痛不
可當者名曰腦裏虛瘍宜以金腦香根或葉搗爛入
井水少許濾去渣入片腦半分研勻滴入耳中即効
又用根磨薄荷湯入少酒和服又用金雞舌苦參青
木香金鳳尾搗水入片腦少許和勻濾淨滴入耳中
又服兩面龜散及以水坊子根煎水入酒和服紫
遊風用紫茶根皮搗水刷又方加紅心蜈蚣小金錢
豆瓣草馬蹄草金鶯葉尾搗水入此醋煖刷之
附方

兩面龜散 治一切腫瘍焮赤無名腫毒疼痛者

兩面龜

雞屎子

雞距根

詐死子

真珠美

山烏豆

紫金皮

脫殼藤

魚桐根

山淡豉

連又大青

沿地雞距

右水煎入酒和服

發熱加水坊根吉面消骨

裏痛加紫金藤馬蹄金鉄馬鞭 又方加白朮待

根山芙蓉根山苧根川山蜈蚣

雞屎散 治虛瘍

雞屎子

詐死子

冬青根

楊香根 右水煎入酒和服

退熱消毒散 治無名腫毒發熱者

雞屎子 雞胆根 水坊根

臭木待 白根子 山烏豆

苦花子 紫金藤 金腦香

吉面消 連义大青 落鴉爪藤

大葉小青 過山龍梗 大葉金涼傘

右薄荷煎服

天花刮毒散 治一切腫毒焮赤疼痛

天花粉 黃蘗 各叁兩 南星

赤芍藥 薑黃 各壹兩

為末井水調入些醋和煖刷患處夏月冷刷亦可

退腫消核散 治一切無名腫毒及結核赤腫者

艮脚根 肆兩 紫金皮 樟柳根 各壹兩

右為末用毛屎梯葉生地黃苦薄荷金腦香金鳳

尾地薄荷赤薺子尻池葉不拘二三味取葉搗米

泔水入醋少許調勻煖刷 又方單用艮脚一味

為末以生赤樟柳根磨米泔調塗更妙

消腫切毒散 治一切無名腫毒虛瘍等毒

毛屎梯葉 柒分 雞屎子葉 叁分

右末用米泔水調溫刷

又方 生樟柳根為末米泔水調溫刷或以毛屎梯

葉同刷亦妙

丹卒腫起大痛芫青根大者杵之和苦酒如泥煮三

沸帛上包之葛氏 風毒腫三年苦酒濃煎葱白以布

包熨腫上外臺秘要 治一切熱毒腫商陸根和鹽少許

傳之日再易孫真人食忌 治一切毒腫疼痛不可忍者

搗草麻仁傳之立効肘後方 治腫蒺藜子壹升炒黃

杵細以香油和如泥再炒令焦以舊布如腫之大小

攤之貼腫上勿開頭搭上外臺秘要 治惡刺及狐狸刺

毒腫取蒲公英草根白汁傳之多塗立瘥余七月十

五日夜左手中指背揩着庭木痛不可忍十日後瘡

日深漸高大痛欲死用此而安孫方

經患熱腫水研山豆根濃汁塗之再塗

衍臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝貳升投湯中

攪散掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調

半盞掃一切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫

痛應手神効

山腫毒或疼痛處以赤小豆為末水調傳頻換或用

香白芷水調傳尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角

為末水調傳

丹治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於

痛處火炙皮鞋底熨之妙經方

治一切赤腫但癰毒結未成者並可消

右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得

所將絹帕子裹定旋挹所餘汁撲腫所四畔數撲

之

犀角飲 治諸風腫

犀角 壹錢 鎊

柴胡 去苗各半兩

玄參

升麻

連翹

木通 各柴錢半

芒硝 生用

麥門冬 去心各壹兩

沉香

檀香

射干

甘草 炙各貳錢半

右剉碎每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去滓食

後溫服及夜食後各一服利多即減一名犀角湯

無檀香

熨風散 治諸瘡因風致腫

羌活

防風

白芷

吳茱萸

細辛

當歸

芍藥

芫花

官桂 各等分

右為麤末作壹劑赤皮蔥連鬚細切半斤同醞醋

言用 外科五 六
拌勻炒令極熟帛裹於瘡上熨之稍冷卽換藥再
熨之上下痛止

蠶沙熨方 治風腫

晚蠶沙

鹽各不拘
多

右相和炒熟布裹熨之冷卽再炒各入醋少許尤
佳

水澄膏 治熱腫痛大効

大黃

黃蘗

鬱金

天南星

白芨

朴硝

黃蜀葵花各壹
兩

右為細末每用新水壹盞半藥末貳錢攪調勻候
澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急
燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色
者勿用之

右剉碎每服參錢小壹盞調至陸分去滓不拘時
溫服

黃連散 治紅腫結便發熱赤色毒氣攻衝未定

者重

卜耳五

三

身之上下痛止

沙梨方 治風腫

晚鐘沙

鹽烙

右相和炒熟布裹熨之冷即再炒各入醋少許

住

普濟用之 治腫痛大効

欬事聖既之北藥制燕毒赤刺脈故咬又實白也
登元香去骨木以燻芥干曬之則熱與濕之咬益
古為膠末或供藤木青蓋半藥末看益對臨三劑

○石癰石疽

謂癰疽腫鞭如石久不作膿者是也

犀角湯 治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角 鎊

木香 各末錢半 連翹

梔子仁

射干

當歸 切焙

升麻

赤芍藥

玄參

枳殼 麸炒

甘草 生各壹兩

大黃 炒貳兩

右剉碎每服叁錢水壹盞煎至陸分去滓不拘時

温服

黃連散 治石癰結硬發熱紫赤色毒氣攻衝未定

日夜疼痛宜用此消腫化毒止痛

黃連

川大黃生

白欬

馬牙硝

黃礬各壹兩

麒麟竭

青鹽各半兩

赤小豆半合炒熟

杏仁肆拾玖粒湯浸去皮

研尖

右為細末蜜水調塗乾即易之

大黃散 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣暢

川大黃壹兩炒 川芒硝

黑豆皮

枳殼去穰麩炒 牛蒡子微炒

當歸

芎藭各貳錢半 甘草生剉半兩

右剉碎分作三服每服水壹盞煎至伍分去滓不

拘時溫服以利為度

治石癰堅如石未作膿者

右用生商陸根不拘多少熟搗傅之乾即易取軟

為度及治濕漏諸瘡癰羊城人用此方取効者多

沉香湯 治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不

得卧

沉香

防風去義

木香各柒錢半

麥門冬去心

當歸切焙

枳殼麩炒

獨活去蘆

麝羊角屑

升麻

玄參

地骨皮

赤芍藥

甘草

生剉各壹兩

大黃

剉炒貳兩

右剉碎每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓不拘時溫服

癩疽

風疽

癩疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫炮黯熟紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脉入臟殺人南人名為撮着毒厚肉處卽割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯諸單方治專去其熱取瘥其病喜着十指故與代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉上入臟殺人南方人得之皆斬去其指初指頭

先作黯疱後始腫赤黑黯瘰痛入心是也
治瘰疽秘方

射干 甘草 枳實

升麻 乾地黄 黃芩 各貳兩

麝香 貳分 前胡 叁分 犀角 陸分

大黃 拾分

右十味哎咀以水玖升煮取叁升下大黃一沸去
滓內麝分三服瘥止不限劑數此方世所不傳神

良 外臺無黃芩深師加黃芩
麻黃白薇枳實升麻松葉

射干散 治瘰疽皮肉中忽生點子如麻豆大或如

桃李腫痛不可忍

射干 川升麻 枳實 麩炒

川大黃 剉微炒 甘草 生用各壹兩 麝香 細研貳錢半

前胡 去蘆壹兩半 麝羊角屑 柒錢半

右剉碎入麝香令勻每服肆錢水壹中盞煎至陸
分去滓不拘時溫服

丹砂膏 治瘰疽

丹砂 細研 射干 大黃 剉炒

犀角屑 前胡 去蘆 升麻

芩藟 黃芩 去黑心 沉香

木香 各壹兩

生地黄 貳兩

麝香 壹錢貳分半研

豬脂 貳斤

右除丹砂麝香豬脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候地黄赤黑色以綿絞去滓入丹砂麝香末以柳篋攪勻瓷盒盛傳患處日三五上又取棗大以溫酒調空心日午服一方溫水調下半匙

治癰疽諸疽十指頭焮赤痛痒方 千金翼名豬蹄湯

白芷

大黃

芩窮

黃芩

黃連

甘草

細辛

藁本

當歸

藜蘆

莽草 各壹兩

右十一味咬咀以水貳斗先煮豬蹄壹具取壹斗煮藥取伍升浸瘡卽瘥

又方

竈屋塵

竈突墨

釜下土 各壹升

右三味合研令勻以水壹斗煮三沸取汁洗日三四度

治癰疽著手足肩背忽發累累如赤豆剝之汁出者方

鯽魚

長叁寸者壹尾

亂髮

雞子大

豬脂

壹升

右三味煎為膏傅之

又方 藜蕪菁子搗碎布裹展轉傅上良

又方 以麻子熬作末傅上良

又方 以豬膽傅之良

又方 亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方 煮芸薹菜取壹升服之并食乾熟芸薹數頓

少與鹽醬冬月研子水和服之

又方 枸杞根并葵根葉煮汁煎令如糖隨意服之

治疽潰後方

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良

又方 牛耳中垢傅之良

又方 梁上塵和車軋中脂傅之

又方 以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出入須候

治疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿者

方

芸薹熟擣濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之不過

再三度安瘡冬用乾者

又方 皂莢煎湯洗瘡拭乾以槩皮為末傅之勿令

作癩

治疽卒着五指筋急不得屈伸者方

保官中央數十壯或至百壯

此藥膏中央數十壯或至百壯

式

京成以職而小育異艷咬小豆卡今日去即日滿首

又式以主麻由宰餘藥亦飲土蟲出

又式以藥土壘味車陣中韻轉之

又式半耳中訣轉之與煮汁煎令如糖

以鹽湯洗了熱草焚火餅土與

反花瘡

瘡有旁肉凸出者是

薛翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡

口齖肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一

治法當滋肝補氣外塗藜蘆膏齖肉自入須候元氣

漸復膿毒將盡塗之有效不然雖入而復潰若誤用

刀針蝕藥灸火其勢益甚或出血不止必致寒熱嘔

吐等症須大補脾胃為善 判官張承恩內股患癰

將愈翻出一肉如菌余曰此屬肝經風熱血燥當清

肝熱養肝血彼謂不然乃內用降火外用追蝕蝕而

復翻翻而復蝕其肉益大元氣益虛始信余言遂內

用梔子清肝散外用藜蘆膏而痊 一上舍素膏梁
善怒耳下結一核從潰而瘡口翻張如菌嫩連頭痛
或胸脇作脹或內熱寒熱或用清熱消毒之藥年餘
未瘥余用補中益氣湯六味地黄丸而尋愈 一男
子背瘡斂如豆許翻出肉寸餘用消蝕割繫法屢去
屢大此肝經血虛風熱余用加味道遙散三十餘劑
塗藜蘆膏而消又用八珍散倍用參芪歸朮而斂
一婦人素善怒臂患癰瘡口出肉長二寸許此肝脾
鬱怒氣血虛而風內動用加味道遙散塗藜蘆膏而
愈後因怒患處脹悶遍身汗出如雨此肝經風熱風

能散氣故耳仍用前散并八珍湯而愈 一男子項
患腫痰涎涌甚用散堅行氣等劑腫硬愈甚喘氣發
熱自汗盜汗體倦食少余曰此屬足三陰虧損當滋
化源不信反追蝕患處開翻六寸許慘巖色赤日出
鮮血三月餘矣肝脈弦洪緊實余用大補湯加麥門
五味五十餘劑諸症漸愈血止三四復因怒飲食頓
少其血湧出此肝傷不能藏脾傷不能攝也用補中
益氣湯為主加五味麥門其血頓止再以六味丸加
五味子常服瘡口斂至寸許遂不用藥且不守禁而
歿

黎蘆膏 治一切瘡疽疔肉突出不問大小長短用
黎蘆一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日
易之

臘脂散 治反花瘡

臘脂

貝母

胡粉

硼砂

沒藥

右研細先以溫漿水洗拭後傳藥

甘草塗傳方 治反花瘡

甘草半生半炒

礬石灰

人中白

蜜佗僧各半兩

右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篦攪成膏取塗瘡上日五次

惡實根塗傳方 治反花瘡並諸瘡積年不瘥者

惡實根

研末肆兩

豬脂

貳兩

右調和如糊塗瘡上日三四次

諸瘡疔肉如蛇頭出數寸者硫黃末傳之即縮聖惠

瘡有肉凸出烏梅燒灰為末傳之立盡鬼遺 又以白

梅肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙聖惠

梅治反花瘡馬齒莧壹斤燒灰細研豬脂調傳

世瘡凸出寸許根如小豆或大如梅者用花脚蜘蛛

絲纏其根則漸乾而自脫落

辨以辨味人逐其氣而收其味大其氣之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也

蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也
蒸肉出其味也蒸肉未熟之味也

多骨疽

薛多骨疽者由瘡瘍久潰氣血不能營於患處邪氣
陷襲久則爛筋腐骨而脫出屬足三陰虧損之症也
用補中益氣湯以固根本若陰火發熱者佐以六味
丸壯水之主以鎮陽光陽氣虛寒者佐以八味丸益
火之源以消陰翳外以附子餅蔥熨法祛散寒邪補
接榮氣則骨自脫瘡自斂也夫腎主骨若腎氣虧損
其骨漸腫荏苒歲月潰而出骨亦用前法若投以剋
伐之劑復傷真氣鮮有不誤者 舉人于廷器腿患
流注年餘出腐骨少許午前畏寒午後發熱口乾唾

多骨疽 小年五

痰小便頻數余以為足三陰虧損朝用補中益氣湯
夕用六味丸料加黃芪當歸五味子各三十餘劑外
用豆豉餅諸症漸愈又以十全大補湯之類喜其慎疾
而愈 一儒者患附骨疽失於調補瘡口不斂日出
清膿少許已而常出三腐骨其脉但數而無邪此氣
血虛瘡結膿管而不能愈維以烏金膏日服十全大
補湯而愈 上舍王廷璋患前症三年未愈肢體消
瘦飲食難化手足並冷大便不通手足陰冷余謂此
陽氣虛寒用補中益氣湯八味丸仍灸其患處而痊
一男子左腮腫硬年餘方潰內熱作渴肢體消瘦

六脉洪大左手尤甚用補中益氣湯六味丸出腐骨
一塊仍服前藥諸症悉去瘡口亦斂 一男子十六
歲足間腫黯潰而露骨體瘦盜汗發熱口乾用十全
大補湯六味地黄丸各五十餘劑而愈不然多變瘵
症或瀝盡氣血而亡 一男子自十四歲閃是腫痛
服流氣飲外敷寒涼腐潰而至十六瘡口開張足背
漫腫黯黑骨露出形體消瘦盜汗不止發熱口舌乾
燥天真已喪用十全大補湯六味地黃丸各五十餘
劑元氣漸復患處漸赤脫落骨一塊又各五十餘劑
始愈 一婦人年三十餘素弱左手背漸腫二年後

潰出清膿腫黯連臂內熱晡熱自汗盜汗經水兩月
一至此肝脾氣血虧損朝用歸脾湯夕用逍遙散腫
處頻用蔥熨法
諸症漸愈瘡出腐骨仍服前
藥前證黑骨露出
如瘡成如少寒寒熱
或如瘡蓋瘡血而
大瘡透大和血黃
六和共大主手武其
六和共大主手武其
六和共大主手武其

時毒

時毒者為四時邪毒之氣感之於人也其候發於鼻
面耳目焮赤腫痛重則咽喉頸項亦腫或漫腫無頭
或結核有根令人憎寒發熱頭痛或肢體痛恍惚不
寧咽喉閉塞醫人不識謂之傷寒便服解熱之劑一
二日間腫勢益增始知藥誤原夫此疾古無方論初
發狀如傷寒五七日間乃能殺人若能延至十日之
外者不治自愈也五日以前精神昏亂咽喉閉塞語
聲不出頭面益腫食不知味者必死之候治之無功
矣然此疾有陰有陽有可汗有可下粗工不識但云

時毒

小斗五

七

熱毒只用寒涼之藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審也。脈浮數者邪在表也用葛根牛蒡子湯解毒升麻湯升麻牛蒡子散之類以發之。脈沉實而便秘者邪氣在裏也宜梔子仁湯。脈沉瀯者邪氣入深也宜漏蘆湯大黃湯。表實而不解者散之以芩連敗毒散。裏實而不利者下之以五利大黃湯。表裏俱實而不解者解表攻裏以通聖消毒散。腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒以普濟消毒飲次用十神散。頭面耳項赤腫作痛咽乾發熱脈浮數以黃連敗毒散次以劫瘡消毒散七神散。腫痛發熱作渴脈實便秘者以五利大黃湯次以追疔奪命湯又次以水邊嫩柏根水煎入酒和服。腫痛發熱脈浮數以芩連敗毒散次以退熱消毒飲又次以七神散。焮腫脹痛作渴寒熱便秘脈數按之尤實以通聖消毒散次以芩連消毒散又次以七神散。腫勢已盛大熱脈實者先宜砭去惡血次以洗瘡散洗之消腫散刷之却以蛇不見根同白梅搗傅牙斷含去涎。初服追疔奪命湯次服七神散萬病解毒丸。表邪已解腫尚不退脈滑而數乃瘀血欲作膿也以托裏

消毒散潰之若脉浮數或洪數者不可托之只宜消
之以烏苞子根水煎服又方以谷藤根水煎服及用
祛瘡散服之 又宜於鼻內搐通氣散取十餘嚏作
効搐藥不嚏者不可治如嚏出膿者治之必愈左右
之人每日用嚏藥搐之必不傳染其病人亦每日用
嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也 經三
四日不解者不可大下猶宜和解之犀角連翹散之
類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托
裏散黃芪散

發表 一人頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脉

浮數邪在表尚未解用荆防敗毒散二劑勢退大半
更以葛根牛蒡子湯四劑而痊經云身半已上腫天
之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客心肺之間上
攻頭目而為腫此感四時不正之氣也與膏梁積熱
之證不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不審其
因及辨其虛實表裏槩用攻之必致有悞常見饑饉
之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之不
可不察 一人腫痛發寒熱數以荆防敗毒散
二劑少愈再用人參敗毒散一劑減半又二劑而
瘥 一人耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆

瘥 一人耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆

防敗毒散二劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一人冬月病頭面赤腫耳前後尤甚痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安卧醫砭腫上四五針腫赤不減痛益甚予診其脉浮緊按之洪緩知為寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫且夫天令寒凜之時腠理閉汗不出血氣強肉堅濇善用針者不得取四厥必待天溫又云冬月閉藏用藥多少針石也宜以苦溫之劑溫經散寒所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之方名

托裏溫經湯

麻黃

苦溫發之為君去根節貳錢

防風

辛溫散之去蘆貳錢

升麻

苦辛肆錢

葛根

甘平解肌出汗專治陽明經邪故以為臣

白芷

當歸身

溫以和血散滯各貳錢

蒼朮

濕熱則腫蒼朮甘溫體輕浮力雄壯能泄膚腠間濕熱壹錢

人參

去蘆壹錢

甘草

甘溫

白芍藥

酸微寒調中益

氣使托其裏為佐各壹錢半

右剉每服壹兩水貳盞先煎麻黃令沸去沫再下餘藥同煎至壹盞去粗溫服服訖以薄衣覆首厚被覆身卧煖處使經血溫腠理開寒乃散陽氣升

大汗出腫減七八分再服去麻黃防風加連翹鼠
黏子腫痛悉愈經言汗之則瘡已信哉
郭氏升麻牛蒡子散 治時毒瘡疹脉浮洪在表者
瘡發於頭面胸膈之際

升麻

牛蒡子

炒研

甘艸

桔梗

葛根

玄參

麻黃

各壹錢

連翹

貳錢

右咬咀薑叁片水貳盞作一服

又方 治時毒

升麻

赤芍

乾葛

青木香

甘草

防風

白芷

荆芥

牛蒡子

桔梗

金銀花

玄參

麻黃

連翹

藍葉

右薄荷煎服

芩連敗毒散

治時毒腫痛發熱左脉浮數者

防風

荆芥

黃連

黃芩

連翹

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

桔梗

藍葉

玄參

牛蒡子

升麻

赤芍藥

金銀花

白芷

甘草

乾葛

青木香

右生薑薄荷煎服

發熱無汗加麻黃

葛根牛蒡湯

治時毒腫痛而便利調和者

葛根

貫眾

甘草又名國老

豆豉

牛蒡子

半生半炒各貳錢

右水煎服

返魂丹

治時毒瘡氣疔瘡惡瘡

朱砂

雄黃

血竭

黃丹

穿山甲

白礬

銅青

乳香

沒藥

輕粉

蟾酥各壹錢

麝香貳分

右為末酒煮麵糊丸如胡椒大每服貳丸葱白壹

根嚼爛裹丸温酒吞下

攻裏

一人患此腫痛發熱作渴脉實便閉以五秘大

黃湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一人表散藥愈熾發熱便秘診脉沉實此邪在裏

以大黃湯下之裏症悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦

消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈

時毒 攻裏

小斗五

三四

漏蘆湯 治時毒頭面紅腫咽喉閉塞水藥不下若
素有臟腑積熱發為腫毒疔瘡一切腫瘍惡瘡便
實者

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

甘草

藍葉

牛蒡子

玄參

桔梗

連翹

青木香

苦參

右薄荷煎服

五利大黃湯 治時毒焮赤腫痛煩渴便秘脉實數
者大効 加連翹玄參大青甘草名梔子仁湯

大黃

黃芩

升麻

梔子

芒硝

右薄荷煎服

加減解毒丸

治時毒疔瘡瘴氣癰疽發背無名腫

毒解砒霜毒光粉毒鼠莽毒惡蛇毒惡犬毒蜈蚣
毒白蟻毒蜂蠱毒菌菰毒惡瘡毒可以磨服可以

磨塗大効如神

五倍子

叁兩

山茨菇

貳兩

大戟

壹兩半

朱砂

雄黃

各叁錢

麝香

貳錢

續隨子

去殼壹兩

右為末秫米粉者煮糊杵搗為丸印作錠子陰乾每服壹錠井花水磨化服冬月薄荷湯磨化服一切腫毒米泔水磨塗或用芙蓉葉搗汁磨塗更妙凡修合此藥要端午七夕重陽日或選天德月德日德天醫日最佳合時要淨室焚香至誠修製勿令孝婦雞犬見之効驗不可具述

羅時毒疔瘡漏蘆散 治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭面洪腫咽噎堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

各壹兩

藍葉

玄參

各貳兩

右為粗末每服貳錢水煎腫熱甚加芒硝貳錢半消毒丸 治時毒疔瘡惡證

大黃

牡蠣

燒

白僵蠶

炒各壹兩

右為細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔梗黍粘子湯尤妙

發表攻裏

一人炊腫脹痛作渴煩熱便秘脉數按之

尤實用防風通聖散一劑諸證頓退以荆防敗毒散加玄參牛蒡黃芩二劑而差一老冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脉實此表裏俱實也飲防風通聖散

時毒

發表攻裏

小斗

二十六

不應遂破患處出黑血仍投前藥即應又以荆防敗
毒散而瘰蓋前藥不應者毒血疑聚上部經絡藥力
難達故也惡血既去其藥自効或拘用寒遠寒及年
高畏用硝黃而用托裏與夫尋常消毒之劑或不破
泄其毒專假藥力鮮不危矣 海藏云疫毒頭腫者
甘桔湯加鼠粘子大黃芒硝

防風通聖散 治時毒熱毒便秘熱燥若時毒饑饉
之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用
防風 當歸 川芎
芍藥 大黃 芒硝

連翹 薄荷 麻黃

桔梗 石膏 黃芩 各壹兩

白朮 山梔 荆芥 各貳錢

甘艸 貳兩 滑石 壹兩

右水煎服或為末白湯調下仍量人虛實

通聖消毒散 治時毒腫痛表裏俱實者

防風 荆芥 連翹

赤芍藥 當歸鬚 黃芩

麻黃 梔子 青木香

黃連 黃蘗 石膏

時毒 半表半裏 小半 七

滑石

大黃

朴硝

牛蒡子

川芎

桔梗

玄參

藍葉

甘草

右薄荷煎服

大便利去大黃朴硝

半表半裏中和湯

治時毒脉浮在半表半裏者

葛蒲

牛蒡子

川芎

羌活

防風

漏蘆

荆芥

麥門冬

前胡

甘草

各等分

右咬咀每服壹兩水煎

按此出足太陽陽明例藥也

內托

一婦頭面俱赤腫焮痛甚盛其脉浮數此形證

俱在表也以平昔胃氣有損不可用發表之劑宜用

潔古法托裏以防邪毒之內侵作內托復煎散一劑

終日飲之兩日而平

內托復煎散

見前通
用諸方

內消泰和年東垣監納濟原稅時長夏多疫癘初覺

憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利

舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多

不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍

根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸

至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視
具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之
氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以
承氣下之瀉胃中之實熱是誅伐無過殊不知適其
病所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱
以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為
臣連翹鼠黏子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁
勃白僵蠶味苦辛散腫消毒定喘以為佐新升麻柴
胡苦辛行後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於
中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也

此却為客邪當急去之是治客以急也且治主當緩
者謂陽邪在上陰邪在下各為本家病也若急治之
不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩
也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陽
分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之
此治急以客也 假令少陽陽明之為病少陽為邪
者出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃
連甘艸通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用
大黃或酒浸或煨又以鼠黏子新瓦上炒香咬咀煎
去查內芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微

利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第
用之取大便利邪已即止如陽明渴者加石膏少陽
渴者加瓜蒌根湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類
太陽行經加羌活防風荆芥之類選而加之並與上
藥均合不可獨用散也東垣方名普濟消毒
飲子見雜病頭痛門
芩連消毒飲治時毒發熱惡寒頭項腫痛脉洪數

防風

荆芥

連翹

柴胡

黃芩

川芎

羌活

桔梗

藍葉

射干

白芷

牛蒡子

黃連

甘草

青木香

金銀花

右薄荷煎服

和藥衛

一婦表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃
瘀血作膿也以托裏消毒散潰之而愈 一婦腫痛

用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退亦

瘀血欲作膿亦以前藥潰之愈 一人表裏俱解惟

腫不消以托裏消毒散四劑膿成針之而愈 少宰

李蒲汀用發散之藥耗損元氣患處不消體倦惡寒

食少口乾用補中益氣加桔梗及托裏消毒散而愈

秋官陳同野元氣素弱脉微細而伏此形病俱虛

也用參朮芩歸陳皮柴胡升麻炙甘草以升舉陽氣
用牛蒡玄參連翹桔梗以解熱毒二劑腫頓消而脉
亦復矣苟以脉微細為屬陰以腫赤為屬陽而藥之
鮮有不誤者 一婦人潰後腫赤不消食少體倦膿
清色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芩歸後用
益氣湯加桔梗而斂

通鼻

通氣散治時毒炊腫咽喉不利取嚏以泄其毒

玄參

清歲

豬牙皂角

川芎

冬壹錢

北細辛

藜蘆

草烏頭

羊躑躅花

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度一日二次

流注

薛流注之證或因飲食勞倦脾胃傷損或因房勞陰
虛陽氣湊襲或因營氣不從逆於肉理或因腠理不
密外邪客之或暴怒傷肝或鬱結傷脾或濕痰流注
或跌撲血滯或產後惡露皆因氣血凝滯而成也或
生於四肢關節或生於胸腹腰背或結塊或漫腫或
作痛皆元氣虧損所致恣宜葱熨及用益氣養榮湯
固其元氣則未成者自消已成者自潰若久而不斂
佐以豆豉餅琥珀膏祛散寒邪補接陽氣若內有膿
管而不斂者用針頭散腐化之經云形傷痛氣傷腫

又曰真氣奪則虛邪氣盛則實若不補氣血節飲食
慎起居戒七情而專用寒涼尅伐其不死者幸耳
黃不串流者俗曰馬瘕串流者名曰走散流注俗曰
爪藤馬瘕外形微腫骨節內疼甚名曰啣骨馬瘕若
遍身骨節內疼痛不能起坐無堆作熱不退者名曰
啣骨馬瘕若脊骨及髀骨上起堆或一一个或三五
个名曰過脊馬瘕若尾骶骨上起堆作熱者名曰殺
着馬瘕若髀骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖脚馬瘕
若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬瘕此
證因風熱走散四肢治當踈風散熱初起不可用火

針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熟者可火針烙
之流注入股者死 傷寒餘邪未盡者和解之以人
參敗毒散次以小柴胡合二陳湯加羌活川芎枳殼
當歸白朮 暴怒所致胸膈不利者調氣為主宜方
脉流氣飲 抑鬱所致而不痛者宜調經脉補氣血
益氣養榮湯 腫硬作痛者行氣和血宜瘡科流氣
飲 潰而不斂者益氣血宜人參養榮湯十全大補
湯 脾氣虛濕熱凝滯肉理而致者但腫一塊不痛
肉色不變飲食少思宜健脾除濕六君子湯加芎歸
黃芪白芍肉桂 悶膈瘀血凝滯為患者和氣血調

經絡宜方脉流氣飲次以二陳合四物加香附烏藥
桔梗 寒邪所襲筋變骨痛或遍身痛宜溫經絡養
氣血宜大防風湯及五積散合敗毒散加川牛膝杜
仲或獨活寄生湯次以四物湯加黃芪羌活杜仲
病尚有潮熱者裏有寒邪未盡散宜榮衛返魂湯加
乾葛升麻紫蘇川芎獨活薑水煎服 如無潮熱用
榮衛返魂湯加獨活酒水各半煎服 接骨馬瘕用
穿山蜈蚣白田柯石楠藤山良薑九節香紫金皮含
笑葉煎水時時熱淋洗之却服續骨散九金六馬散
起堆核數枚但小些名馬疔又名馬鈴用紫金鍾

紫金皮紫河車天南星磨醋煖塗又用紫金皮紫金
藤紅內消馬蹄香馬蹄藤煎酒服 鎖脚馬瘕用野
芋子根馬藍草梨蘆子紫河車山枇杷根皮山布瓜
根紫金皮搗爛鹽糟炒縛又以煎水熱淋洗之却服
輕脚散九金六馬散 啣骨馬瘕用穿山蜈蚣紫金
皮石楠藤白田柯溪楓根九節香對節金驚煎水淋
洗却服啣骨散九金六馬散四味浸酒方 過脊馬
瘕用山枇杷根皮黎蘆子小樟子根皮天門冬天南
星仙人掌根山布瓜根赤牛膝半夏凌霄根皮佛桑
花馬藍草野芋子根天銅柯普營子根皮赤毛桃根

皮赤芍根皮搗爛半泔半醋調煖刷查封瓜藤馬瘕
並効却服蠲脊散九金六馬散 瓜藤馬瘕用山布
瓜根多赤葛子根皮樟柳根紫金皮紫金鍾落鴉鎗
根七葉楊香天花粉真珠簾根白芙蓉葉凌霄根皮
溪楓根皮赤毛桃根皮搗爛鹽糟炒縛之又方山布
瓜根葛合根紫河車黎蘆子馬鞭穢紫金皮山枇杷
根皮凌霄根皮佛桑花落鴉鎗根白田柯搗爛鹽糟
炒縛之又方山布瓜根紫金皮溪楓根皮搗爛酒炒
縛之此方馬瘕並大効却服九金六馬散四味浸酒
方又用洗腫方熱淋之 殺着馬瘕用紫河車山枇

杷根皮黎蘆子山布瓜根凌霄根皮佛桑花葛合根
石萍搗爛醋調刷查封用洗腫方淋洗却以九金六
馬散蠲脊散服之 諸馬瘕有熱者用去熱散有表
者用荆防敗毒散有裏者用肉踈黃連湯有表復有
裏者用追疔奪命湯却用水金鳳搗爛縛核堆上卽
効 馬瘕有熱未成服藥卽能退之若已成者但要
出膿其熱卽退若生堆核四五個只一二個未成膿
餘者皆已出膿其熱亦不能退要五個盡出膿熱方
退也 若潰爛者卽係潰瘍宜查本門治之

治驗

一人因怒脇下作痛以小柴胡對四物加青皮

桔梗枳殼而愈 一人醫腫一塊微痛脉弦緊以瘡
科流氣飲四劑而消 一人因怒脇下腫痛胸膈不
利脉沉遲以方脉流氣飲數劑少愈以小柴胡對二
陳加青皮桔梗具母數劑頓退更以小柴胡二十餘
劑而痊 一婦因悶胸膈患腫遍身作痛以黑丸子
二服而痛止以方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳
對四物加香附枳殼桔梗而愈 一婦腿患筋攣骨
痛諸藥不應脉遲緊用大防風湯一劑頓退又二劑
而安 又一婦患之亦然先用前湯二劑更服黑丸
子而痊此二患若失治潰作敗症 一婦稟弱性躁

脇臂腫痛胸膈痞滿服流氣敗毒及葭熱少食用四
七湯數劑胸寬氣利以小柴胡對四物加香附陳皮
腫痛亦退 一人腿患潰而不斂用人參養榮湯及
附子餅灸更以補劑煎膏貼之兩月餘愈 一人脾
氣素弱臂腫一塊不痛肉色不變飲食少思辛載不
潰先以六君子加芎歸芍藥二十餘劑飲食漸進更
以豆豉餅日灸數壯于前藥再加黃芪肉桂三十餘
劑膿熟針去以十全大補湯及附子餅灸之月餘而
愈 一人腿腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中益
氣湯加半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之

謂氣無補法乃服方脉流氣飲愈虛始用六君子湯
加芎歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消 夫氣
無補法世俗論也以其為病痞滿壅塞似難為補殊
不知正氣虛不能運行則邪氣滯而為病不用補法
氣何由行乎 一人臂腫筋攣骨痛年餘方潰不斂
診脉更虛以內寒散一料少愈以十全大補湯及附
子餅灸而愈 精要云留積經久極陰生陽寒化為
熱以此潰多成癭宜早服內寒散排之 一人腿腫
一塊經年不消且不作膿飲食少思強食則脹或作
瀉日漸消瘦診脉微細此乃命門火衰不能生土以

致脾虛而然也遂以八味丸飲食漸進腫患亦消
一人背髀患之微腫形勞氣弱以益氣養榮湯間服
黑丸子及木香生地黃作餅覆患處熨之月餘膿成
針之仍服前藥而愈 一人腿患久而不斂飲大補
藥及附子餅以針頭散絀之而愈 一人臂患年餘
尚硬飲食少思朝寒暮熱入珍湯加柴胡地骨皮牡
丹皮月餘寒熱少止再用益氣養榮湯附子餅灸兩
月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而愈 一婦
膿潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內寒散灸附子餅
而瘳 一人臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉

浮大而瀆乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可
全彼謂火尚未盡乃用涼藥內服外敷幾危求治其
形甚悴脈愈虛先以六君子加芎歸月餘飲食漸進
以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃亦更以十全大
補湯外以附子餅僅年而差 一老傷寒表邪未盡
股內患腫發熱以人參敗毒散二劑熱止灸香附餅
又小柴胡加二陳羌活川芎歸木槲殼數劑而消
侍御朱東溪左脇下近腹肝膽經部分結一塊四寸
許漫腫不赤按之則痛余曰此當補脾胃彼謂腫瘍
宜表散乃服流氣飲後胃氣頓虛始信余言遂用四

君子加芎歸酒炒芍藥薑桂胃氣復而惡症退乃去
乾薑加黃芪數劑微赤微痛又三十餘劑焮腫大痛
此膿內潰也遂針之用補中益氣湯加減八味丸而
愈 一男子脇腫一塊日久不潰按之微痛脈微而
瀆此形證俱虛當補不當瀉乃用人參養榮湯及熱
艾熨患處膿成以火針刺之用豆豉餅十全大補湯
百劑而愈 一婦腰間患一小塊肉色如常不潰發
熱予欲治以益氣養榮解鬱之劑彼却別服流氣飲
後針破出水年餘而歿又一婦久不斂忽發寒熱予
訣其氣血俱虛彼反服表散之劑果發大熱亦歿

一人元氣素弱患此胸膈不利飲食少思予欲健脾
解鬱養氣血彼反服辛香流氣之劑致腹脹又服三
稜蓬朮厚朴之類飲食少四肢微腫兼腰腫一塊不
潰而歿 一婦經不調兩月或三月一至四肢腫飲
食少且晡發熱予曰此脾土氣血虛也川養脾滋氣
血藥飲食進則浮腫自消血氣充則經水自調彼以
為緩用峻劑先通經果腹泄不止遍身浮腫飲食
少沒於木旺之月 一人年踰三十小腹腫硬逾年
成瘡頭破時出血水此七情所傷營氣逆于肉理也
名曰流注診之肝脉瀰蓋肝病脉不宜瀰小腹正屬

肝經須瀰屬金脉退乃可予欲以甘溫之藥補其氣
血令自消潰彼不信乃服攻伐之藥氣血愈虛果歿
于金旺之月 一男子腹患此腫硬不潰脉弱時嘔
欲用敗毒等藥余謂腫硬不潰乃陽氣虛弱嘔吐少
食乃胃氣虛寒法當溫補脾胃彼不信仍用攻伐而
嘔愈其復請治脉微弱而發熱余曰熱而脉反靜脫
血脉反實汗後脉反躁者皆為逆也辯不治後果歿
瘡科流氣飲 治陰發流注恚怒氣結堆核腫硬作
痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡或血不和
結成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭或陰發岩

乳等證未成速散已成速潰敗膿自出惡肉自去
非常之驗

桔梗 人參 當歸

肉桂 甘草 黃芪 鹽水炒

厚朴 薑製 紫蘇 白芍藥

烏藥 防風 枳殼

檳榔 南木香 川芎

白芷 右生薑煎服 疼痛加乳香沒藥

來乾加知母貝母 瘡不乾加炒皂角刺 流

注加羌活獨活 氣滯加香附 胃虛加陳皮

此乃行氣散血之劑若服之過度則氣血虛耗何
以為膿學者知之

敷毒流氣飲 治流注初發堆核硬痛不可忍者宜
用此藥疎邪流氣

羌活 獨活 青木香

赤芍藥 當歸 紫蘇

陳皮 香附 白芷

三稜 蓬莪茂 枳殼

川芎 桔梗 柴胡

半夏 薑製 赤茯苓 甘艸

右生薑生地黃煎服 熱加大黃黃芩 虛加人參黃芪

方脉流氣飲 治陰發流注癰瘰及鬱結腫聚結塊 或走注疼痛或心胸痞悶脇腹脹滿嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛或面目四肢浮腫大小便秘者

紫蘇

青皮

白芍藥

當歸

白茯苓

烏藥

桔梗

炒

半夏

薑製

黃芪

炒

川芎

枳實

炒

陳皮

防風

南木香

大腹皮

甘草

檳榔

枳殼

右生薑煎服 流注加羌活獨活白芷稍 小便不通加木通梔子 浮腫加豬苓澤瀉 氣滯加香附 血滯加肉桂 嘔吐加藿香 癰瘰加夏枯草

此行氣耗血之劑不過二三劑止之不可多服 去熱散 治馬瘕發熱者此藥退熱腫瘍亦效

吉面消

山烏豆

雞屎子

雞胆根

水坊子

過山龍

金涼傘

大葉

白根子

紫金藤

九牛天竹

臭木待根

連义大青

落鴉爪藤

右水煎服

九金六馬散

治馬瘕流注馬瘰馬面馬腿馬挪癰

疽腫瘍乳癰脇癰便毒頭風風核等發者

鐵馬鞭

白馬骨

地馬稍

紫金藤

馬蹄藤

金星草

金驚根

金銀花

山紅花根

馬蹄金

紫金皮

金涼傘根

金腦香

山烏豆

雞屎子

毛裏金釵

小滾子根

穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

散血消核湯 治馬瘕

紫金皮

大薊根

山蘇木

溪楓根

山烏豆

雞屎子

赤牛膝

馬蹄金

馬蹄藤

鐵馬鞭

白馬骨

馬蹄香

穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

二馬散 治馬瘕

馬蹄金

鐵馬鞭

撥雪根

右水煎入少酒和服

立効散 治馬瘕

水滾子根

又名溪風根又
名木楊柳多

淡茶櫟根

中

晚祥西根

少

右水煎入酒和服或合六馬散亦効

浸酒方 治馬瘕創人此藥退創

老公鬚

根

毛裏金釵

根

狗骨子

根

大葉毛吹曲

右浸酒煖服不可煎

續骨散 治接骨馬瘕

天燈心

紫背草

赤牛膝

山蘇木

釣鉤藤

馬蹄香

馬蹄金

紫金皮

天花粉

白馬骨

鉄馬鞭

臭木待

根

酒罈子

根

右酒水各半煎服

輕脚散 治鎖脚馬瘕

天燈心

紫背草

赤牛膝

釣藤根

山蘇木

酒壘根

白馬骨

馬蹄金

鉄馬鞭

穿山蜈蚣

右酒水各半煎服

朔骨散 治朔骨馬瘕

馬蹄金

馬蹄藤

白馬骨

紫金皮

釣鈎藤

鐵馬鞭

酒罈根

馬蹄香

天燈心

山蘇木

赤牛膝

地茄根

紫金藤

李子根

臭木待根

烏苞子根

穿山蜈蚣

右水酒各半煎服

蠲脊散 治過脊馬瘕

紫金皮

天燈心

酒壘根

馬蹄香

馬蹄金

紫背草

狗骨根

地茄根

山蘇木

白馬骨

鐵馬鞭

臭木待根

右生地黃酒水各半煎服

蠲骭散 治殺着馬瘕

溪楓根

白田柯

赤牛膝

白馬骨

撥雪根

馬蹄金

金腦香

馬蹄藤

馬蹄香

地馬稍根

穿山蜈蚣

右水酒各半煎服

退創散 治馬瘕滿身創人轉動不便

流注

小引五

四三

地馬稍根

白馬骨

鉄馬鞭

頭形花根

雞屎子

詐死子

馬蹄金

山茄根

狗骨根

對節金驚根

右水煎入酒和服

釣鈎藤散

治馬瘕腫瘍病後筋脉拘急

釣鈎藤

伸筋藤

石楠藤

羊帶歸根

天燈心

狗骨子根

真珠簾根

豨薟艸根

右水煎入酒和服

馬鞭散 治馬瘕

石楠藤

涼藤子

晚祥西

雪裏開

馬蹄金

鉄馬鞭

鬼腰帶根

右水煎入酒和服又用雪裏開搗糟炒縛之又用

樟樹根皮山枇杷根皮搗糟炒縛之

妙草散 治病馬瘕

白根子

赤芍根皮


右搗糟炒縛之又用七層樓煎酒服之

一妙散 治滿身起堆是馬瘕

馬蹄香

香圓橘葉

右搗爛糟炒縛之又用秦椒酒煎



雲集開

黑龍金

趁馬鱗

白蘭蘇

京蘇子

雞鞭西

以辨類 宜用藥

楊梅瘡

或問廣瘡何如曰此肝腎二經濕熱或色慾太過腎經虛損感邪穢之氣而成或因下疳毒纏綿不已而作一名翻花瘡肉反於外狀如蠟色有如綿花故又名綿花瘡此則邪毒盛細小者名廣豆或如赤根膿窠此則邪毒淺凡患此證先宜食毒物以發之後服通聖散之類須用土茯苓對停服毒勢既殺入珍十全大補湯之類以補氣血必守禁忌方獲全愈大忌房勞如犯之服藥不効慮後結毒一忌酸醋酸斂邪毒後結廣癬一忌白腸能發鬱火以致纏綿不已

易海言

小科五

如五

一忌輕粉及冷水致後筋骨疼痛結成風塊或一二年或數年方發其狀堅硬肉色平淡或痛或痒多結於骨節頭面喉鼻之間經絡交會之處已破則膿水淋漓甚可畏也輕則發廣癬亦名千層癬多生手心足底重疊不已又有餘毒亦名氣毒筋骨疼痛來去不定亦名濕毒筋骨痛酸乍作乍止宜隨其淺深治之先服消風敗毒後服補劑瘡勢盛及結毒深者必用熏藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯大補湯之類弱者不宜熏恐不能勝火氣也 薛屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受症在肝腎二經故多在

在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者初起脉浮數邪在脾肺經也先用荆防敗毒散解散之脉弦數邪在肝膽經也先用龍膽瀉肝湯清解之脉沉數邪在臟腑也先用內疎黃連湯通導之後用換肌消毒散為主愈後再無筋骨疼痛之患若瘡凸赤作痛熱毒熾盛也瘡微作痛毒將殺也瘡色白而不結痂陽氣虛也色赤而不結痂陰血虛也搔痒脉虛浮氣不能相榮也搔痒脉浮數血不能相榮也醫背間或頸間作痒膀胱陰虛也陰器間或股內痒肝經血虛也陰囊作痒重墜肝經陰虛濕熱也小便

頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數色白短少脾
肺氣虛也面目搔痒或搔變赤外邪相搏也眉間痒
或毛落肝膽血燥也飲食少思口乾飲湯胃氣虛也
飲食難化大便不實脾氣虛也侵晨或夜間泄瀉脾
腎虛也若治失其法有蝕傷眼目腐爛玉莖拳攣肢
體者但用九味蘆薈丸以清肝火六味丸以生腎水
蠲痺解毒飲以養血祛邪亦有可愈者若誤用輕粉
等劑反為難治 濕勝者宜先導濕 表實者宜先
解表 裏實者宜先疎裏 表裏若俱實解表攻裏
表虛者補氣 裏虛者補血 表裏俱虛者補氣

血 一人遍身皆患左手脉數以荆防紫毒散表症
乃退以仙方活命飲六劑瘡漸愈兼葦薈湯月餘而
痊 一婦焮痛發熱便秘作渴脉沉實以內疎黃連
湯二劑裏症已退以龍膽瀉肝湯數劑瘡毒頓退間
服葦薈湯月餘而痊 一人下部生疔諸藥不應延
及遍身突腫狀如翻花筋攣骨痛至夜尤甚此肝腎
二經濕熱所致先以導水丸進五服次以龍膽瀉肝
湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔
蒜灸拔其毒而愈 若表實者荆防敗毒散 裏實
者防風通聖散 氣虛者四君子 血虛者四物仍

加兼症之藥並愈。若服輕粉等藥及收毒于內以致迭發。槩服防風通聖則氣血愈虛因而不治者多矣。一人患之發寒熱作渴便秘兩手脈實用防風通聖散而退以荆防敗毒散兼龍膽瀉肝湯而痊。一人患之腫痛先以龍膽瀉肝湯導水丸各四劑少愈再以小柴胡加黃蘗蒼朮五十餘劑而平。一人玉莖腫潰小便赤澁肝脈弦數以小柴胡加木通青皮龍膽草四劑又龍膽瀉肝湯數劑而痊。一童玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞蘆薈丸更貼神異膏月餘而痊。一人愈後腿腫一

塊久而潰爛不斂以蒜搗爛傅患處以艾灸其上更貼神異膏及服黑丸子并托裏藥兩月而愈。一婦然輕粉藥於被中熏之致遍身皮塌膿水淋漓不能起居以滑石黃蘗為末菜豆粉等分鋪席上令可卧更以金銀花散月餘而痊。一人皆愈但背腫一塊甚硬肉色不變年餘方潰出水三載不愈氣血俱虛飲食少思以六君子湯加當歸藿香三十餘劑更飲革薺湯兩月餘而痊。一人患之勢熾兼脾胃氣血皆虛亦服前藥而瘥。一婦患之皆愈惟兩腿兩膝各爛一塊如掌兼筋攣骨痛三載不愈諸藥不應且

晡熱甚飲食少思以草薢湯兼逍遙散倍用白朮茯苓
 數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜
 仲木瓜三十餘劑而痊 一人楊梅瘡後兩腿一臂
 各潰二寸許一穴膿水淋漓少食不睡久而不愈以
 八珍湯加茯苓神酸棗仁服每日以蒜搗爛塗患處灸
 良久隨貼膏藥數日稍可却用豆豉灸更服十全大
 補湯而愈 凡有腫硬或作痛亦用蒜灸及敷中和
 膏內服補藥並効 一儒者患前證先玉莖作痒出
 水後陰囊股內小腹脇臂發小癩或乾膿窠誤服祛
 風等藥肢體倦怠惡寒發熱飲食漸減大便不實左

尺洪數左關弦數右關浮緩按之微弦余曰此患屬
 肝膽經也左關脉弦左尺脉浮數者腎水少而虛熱
 傳於肝也右關脉浮緩脾胃之氣弱也按之而弦者
 肝木乘脾土也用六味地黄丸補中益氣湯為主佐
 以換肌消毒散而愈 一儒者患前症色焮赤作痛
 大便秘而不實服祛風敗毒等藥舌痛口乾脉浮而
 數此邪氣去而陰虛所致用六味丸料加山梔當歸
 四劑脉症頓退又用八珍湯加山梔丹皮瘡色漸白
 後用四君加歸芪而愈 一患者服攻毒等藥患處
 凸而色赤作痛肢體倦怠惡寒發熱脉浮而虛此元

氣復傷而邪氣實也用補中益氣湯二劑而痊 一
儒者患之誤服祛風消毒之藥復傷元氣因勞役過
度內熱口乾齒齦作痛右關脉洪數而虛此脾胃受
傷而火動用清胃散之類而愈 進士劉華甫患之
數月用輕粉硃砂等藥頭面臂脛各結一塊二寸許
潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥唇裂小便淋漓痰涎
上湧飲食少思此脾胃傷諸臟弱而虛火動也先用
六君子二十餘劑又用補中益氣加山茱萸山藥麥
門五味服之胃氣復而諸症愈惟小便未清痰涎未
止用加減八味丸而痊 一儒者患之頭面搔痒或

成粒或成片或出水脾肺脉俱洪數此風邪所傷先
用荆防敗毒散加草薢鈞藤鈎數劑漸愈但口乾內
熱用四物加山梔鈞藤金銀花甘草節而愈後遍身
搔痒內熱口乾佐以六味丸而痊 一商人每勞役
飲酒後則遍身生瘡服祛風敗毒之劑面目胸背臂
脇結一塊如桃栗凹凸痒膿水淋漓氣血虛甚寒
熱往來作渴痰壅此濕熱壅盛元氣虛而不能愈也
外敷當歸膏內服補陰八珍加草薢伍錢并換肌消
毒散加乾葛鈞藤鈎各壹錢二十餘劑諸症漸退仍
以前藥為主佐以調理之劑兩月餘血氣復而瘡愈

單解湯

川草解

一名土茯苓 俗呼冷飯團

每服貳兩水參鍾煎壹鍾半去粗徐徐溫服病甚患久者以此一味為主而加以兼證之劑

換肌消毒散

治時瘡不拘初起潰爛

上茯苓 伍錢

當歸 酒洗

白芷

皂角刺

薏苡仁 各壹錢

白鮮皮

木瓜 伍錢

木通

金銀花 各柒分

炙甘草 伍分

右水煎服

蠲痺消毒散

治時瘡肢節拘攣

薑黃

土茯苓

獨活 各壹錢

白朮

當歸 各壹錢

赤芍藥 壹錢

白芷 伍分

右水煎服

蠲毒換肌飲

治楊梅瘡

冷飯團

白色者木槌打碎肆兩

右以長流水肆大碗入砂

鍋內煎至參碗入後藥

黃瓜萋

連仁杵爛或細切壹个

黃芪 鹽水炒叁錢

白芍藥

當歸 各壹錢半

木瓜

白芷

風藤

白鮮皮

貝母

天花粉

穿山甲

本草綱目 卷之五

皂角刺

甘草節 名壹錢

漢防已 柒分

鼈虱胡麻

炒研 貳錢

金銀花

叁錢

豬胰子

切碎 壹兩

右再煎至壹大椀通口頓服胃弱者分為貳服日

三服

又方

木瓜

牛膝 去蘆

生地黄

當歸

金銀花

貝母

已上各 貳錢

粉草節

五加皮

天花粉

地骨皮

已上各 壹錢半

鼈虱胡麻仁

炒研 貳錢半

白芷

大風藤 各壹錢

薏苡仁

炒 叁錢

柴胡

伍分

獨核肥皂子

去硬殼 柒分

皂角子

柒个炒 打碎

冷飯團

肆兩白色者可用木槌打碎

豬胰子

貳兩 切碎

白鮮皮

壹錢 貳分

河水參大椀入砂鍋內煎至壹大椀空心上下午

飢時各壹服忌食茶醋牛肉河豚豬肝腸

洗湯方

五倍子

肆兩

皮硝

壹兩

地骨皮

叁兩 打碎

甘草

壹兩伍錢 作片

艾葉

貳兩

蔥

拾枝

入麻布囊中煎極濃湯壹鍋勿侵生水先以一分滾湯乘熱熏洗旋添熱湯浴至汗出為度浴時先

且易每百

小計五

五十二

服前煎藥一服

點藥方

真輕粉 伍分

杏仁 米粒 去皮

冰片 參釐

三味同搗極爛洗淨點上

楊梅瘡丸藥方

白花蛇 肆寸 酥炙

露蜂房 壹枚 煨

全蠍 肆枚 酒浸 蜜炙 去足螯

蜈蚣 貳條 煨

龜板 壹兩 酥炙

雄黃

飛丹 各壹錢

槐花米

雨前細茶 各伍錢

孩兒茶

辰砂 各伍分 為衣

麝香 參分 同砂為衣

右用黃米飯為丸日進二三服好酒送下七日後

瘡即光矣 當加樺皮灰

發癩瘡毒方

用雄羊肉壹斤水捌碗煮熟入後藥

川芎

大黃

蟬蛻

麻黃

威靈仙 各壹兩 此味 虛人不可多用

共五味入羊肉內煎至壹大碗空心服其羊肉任意食之蓋被取汗天明洗浴 只用一貼立効

圍藥方

丁香

檀香

沉香

乳香 各伍錢

赤石脂 參兩

麝香 壹錢

桑霜 貳兩

鹽水調圍

廣瘡膏

亦治結毒

黃連

黃蠟

木鼈子

蘄艾

韶粉

白蠟

雄黃

蘆甘石

龍骨

冰片

香油煎膏

熏法

治楊梅瘡毒流注四肢或徧身結成大瘡久不能愈者用此法熏之極妙能收輕粉毒

好艾葉

雄黃

黃丹

松香

蒼朮

右四味為末入艾拌勻用黃紙做成藥筒五寸長

以火燒着一頭將烟熏瘡口待筒燒過一半去筒

用水銀膏貼之次日又洗又熏之半月有效如重

二十日有效

洗藥方

石菖蒲

荆芥

防風

羌活

獨活

金銀藤

地骨皮

何首烏

甘草

右日日煎湯洗之

水銀膏

無名異

水銀

銀朱

亦治臙瘡

黃丹

百草霜

各等分

右研極細和勻用桐油調成膏油紙攤作隔紙膏貼之其油紙先用黃連黃蘗煎湯刷數遍然後貼
 又捷法 治楊梅瘡不問新舊並効不過旬日用膽礬白礬末并水銀各參錢半入香油津唾各少許和勻坐無風處取藥少許塗兩脚心以兩手心對脚心擦磨良久再塗藥少許仍前再擦用藥盡即出汗或大便去垢口出穢涎為驗連擦三日煎通聖散澡洗更服內疎黃連湯或敗毒散愈後服單解湯有熱加芩連氣虛參芪血虛四物之類

惡瘡

諸痛痒瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合潰敗肌膚浸淫不休不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癩疹之屬怫鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已者是已若鬱氣血在肌肉之分外連皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則瘡者是已一瘡而有宜汗不宜汗之別法有淺深表裏故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之

汗之浴之外以殺蟲潤燥皆解疑結涎汁
得之
瘡在肌肉則當因其重而減之瀉經絡之熱清涼氣
血外以化膿生肌膏燻之瘡在頭顛則當射而取之
用酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺蟲解熱
藥傳之能明此三者其於治瘡思過半矣
乳香消毒散質鑑 專治惡瘡

大黃

煨

黃芪

牛蒡子

炒

金銀花

各伍

甘草

參兩

牡礪

鹽泥煨
燒伍兩

乳香

沒藥

懸萋

各半兩

右為粗末每服伍錢水煎瘡在上食後在下食前

連翹飲

治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血

風斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹

當歸

瓜蒌根

生乾地黄

荆芥

黃芩

赤芍藥

麥門冬

瞿麥

木通

牛蒡子

炒

山梔子

防風

川芎

粉草

各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半燈心貳拾莖煎至捌
分去滓不拘時服

救苦黃芪散

治惡瘡癰癤

黃芪

當歸

芍藥

瓜蒌根

甘草 各壹兩 伍錢

瓜蒌 壹對

金銀花 貳兩

熟地黃 不拘 多少

皂角刺 為引

右咬咀每服半兩 無灰好酒壹升同引子裝入磁瓶內瓶頭用箒葉封將瓶坐於鍋內上以火盆覆鍋口盆外以黃泥封之勿令出氣煮至外聞藥香為度取出瓶澄定飲清將藥滓再添酒壹升依前煮服若飲少者酒水各半煎服瘡在上食後臨卧服在下空心服此藥治病萬無一失神驗如谷應聲常於五月五日修合

托裏金銀地丁散 治諸惡瘡腫毒疼痛

金銀花

黃連

當歸

紫花地丁

赤芍藥

黃芪

人參

甘艸節

桔梗

大黃 各半兩

乳香

白檀香

沒藥

連翹 各叁錢

子芩

梔子仁

玄參 各貳兩

麥門冬 去心

前胡

甘草 微炙各壹兩

右咬咀每服伍錢水壹盞酒壹盞煎至捌分去滓隨病上下溫服

紫花地丁散 治諸惡毒瘡腫痛如神

紫花地丁 當歸 大黃

赤芍藥 金銀花 黃芪 各半

甘草節 貳錢

右吹咀每服壹兩用水壹盞酒壹盞同煎至壹大盞去滓隨病上下服

增益四物湯 治一切惡瘡

川芎 當歸 芍藥

地黃 防風 荆芥

甘草 各等分 鳳尾草 斟量加入

右剉碎每服參大錢水壹盞半煎至捌分去滓食前溫服

海惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉 半兩 乾臙脂 參錢 定粉 貳錢

右為細末新水調下

碧霞挺子 治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅綠 硃砂 各貳錢 蟾酥 壹錢

右為細末燒飯和作麥蘖挺子每刺不覺痛者須刺出血方維藥在內以膏藥貼之

蝕惡瘡方 非奇異惡瘡不可用

銅綠

貳錢

硃砂

壹字

石膽礬

半錢并細研

右為細末傅之

治惡瘡或有小蟲

膽礬

輕粉

乳香

各壹錢

龍骨

虎骨

露蜂房

白礬

各貳錢半

硃砂

土蜂房

雄黃

各貳錢

麝香

伍分

片腦

壹字

右為細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神效

拔毒散 治諸惡瘡消腫去毒

天粉

無名異

黃礬

黃芩

木鼈子

大黃

牡蠣 各等分

右為細末好醋調敷貼立効

桑螵蛸散 治諸惡瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

黃礬

各半兩

號丹

煨壹兩

乳香

貳錢半

粳米粉

貳錢

麝香

半錢

雄黃

輕粉

各壹錢

右為細末以新汲井水和沙糖調傅

洗瘡藥 洗諸般惡瘡

貫眾

川芎

茵陳

地骨皮

荆芥

獨活

防風

地扁蓄

甘草

當歸

錢參

咬咀水參椀煎三沸去滓通手洗之

又洗藥

白芷

荆芥

萎蕤

何首烏

茯苓

苦參

川芎

白牽牛

防風

蔓荆子

各壹錢

為細末用漿水肆盞煎五七沸臨臥洗淨塗後

塗藥

輕粉

白礬

舶上硫黃

右為細末用酥油調臨睡塗三次

萬寶代針膏

治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用

針刺膿此藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏

藥膿即自潰此秘妙良方

蓬砂

血竭

輕粉

金頭蜈蚣

壹條

蟾酥

半錢

雄黃

壹錢

片腦

少許

麝香

壹字

右為細末用蜜和為膏看瘡有頭處用小針挑破

以藥些小紙花上封貼次早其膿自出如腋下
要核兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破
如前用之忌雞羊魚酒麵等物喫白粥三日為妙
龍葵散 治諸惡瘡多出膿水不乾

龍葵

即天茄子

景天

即慎火草

黃連

去鬚

天靈蓋

各壹兩

龍骨

木鼈子

乳香

黃蜀葵花

各半兩

右為細末入膩粉少許蜜調隨瘡大小紙攤貼之
神効方 治一切惡瘡醫所不識者

水銀

黃礬

黃連

松脂

黃明者

膩粉

土蜂窠

者壁上方

多有之或云蠟蠟窠

甘草

各等分

右將水銀放掌中以唾津殺為泥入磁器中以生
麻油和研生絹濾如稀餈和藥末再研如稠餈先
溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡塗一次即差
有黃水者塗之隨手便乾痒不堪忍者塗之立止
痛甚者塗之立定治疥尤佳抓破敷藥

乳香散 治遠年惡瘡

乳香

膩粉

各半錢

黃礬

去粗皮

龍骨

大黃

剉各叁錢

麝香

壹字

右為細末先以苦竹瀝洗瘡拭乾摻藥

熊膽膏 治一切惡瘡

熊膽

研壹錢

膩粉

壹錢貳分半

雄黃

研

麝香

研各半錢

檳榔

研壹字

右研勻於臘日用豬膽壹枚取汁和藥仍入在
膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑焰熏遍黑掛於
陰處如惡瘡有指面大者用如黍米大貼之如錢
大者用如菉豆大貼之恐藥乾難貼薄以津唾調
如稀糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不
可多用

烏金膏 治一切惡瘡

桑枝

槐枝

榆枝

枸杞枝

桃枝

柳枝

右各長壹尺粗如小指俱壹寸截劈肆破用油肆
兩炒令焦黑瀝去滓入鉛丹半兩蠟壹兩復熬令
黑色傾在瓷合內候冷以新汲水浸出火毒用塗
瘡

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨

虎骨

龍骨

寒水石

半斤

白石脂

赤石脂

白歛

各半兩

黃丹

少許

右入白芨半兩同為細末量瘡大小敷貼

黑面煎五毒者內刺者以油或水或酒出火毒則空

兩狀今煎黑面者入銀丹半兩煎宜兩煎然令

古各身壹入塔映小書其壹下者變與油用油煎

淋外效

淋外效

淋外效

桑外

淋外

淋外

烏金膏 治一切惡瘡

丹毒

內經運氣丹燦皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹

外發及為丹燦是也 聖惠云夫一切丹毒者為人

身體忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒也或發手足

或發腹上如手大皆風熱惡毒所為重者亦有疽之

類也若不急治則痛不可忍久則壞爛出膿血數升

若發於節間便令人四肢毒腫入於腸則殺人小兒

得之最為急也 戴復菴云發丹色狀不一痒痛亦

異大槩皆因血熱肌虛風邪所搏而發然色赤者多

以赤故謂之丹宜消風散入燒楓樹子存性為末酒

丹毒

小斗五

六五

調服有發而色白者謂之冷瘕宜消風散雜黑神散
酒調此病多緣肌肉疎為風邪所襲而成風熱則赤
風冷則白今人但呼赤為丹白為瘕所以用酒調土
硃服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類
古方亦名為癭疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方
論呼為白婆瘕亦為血風赤白二證並可用烏藥順
氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用
消風散病此者俱宜用藿香正氣散煎有人一生不
可食雞肉及鱈魚動風等物纔食則丹隨發以此見
得係是脾風脾主身之肌肉藿香正氣散乃治脾之

藥而土硃亦入脾之藥此方屢試屢驗 丹溪云內
傷癰者胃氣極虛一身之火游行於外所致宜補以
降之 嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹
熨用諸般敷貼丹熨藥及用刀於箇箇丹頭出血丹
皆不退後以半陳生薑加補劑治嘔不效遂純用參
半兩歸朮各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱
漸減約五十餘貼熱始除神氣始復
金花散 治一切丹毒熱痛焮赤

鬱金

黃連

黃芩

各壹兩

糯米

合參

右為末每用蜜水調如泥雞翎掃丹上乾即易之

治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍簡要濟衆

車前草 益母草 地膽草

右等分爛研塗乾再塗之如無新者只以乾者為末冷水調傳

治一切丹毒惡氣五色無常不即瘳之痛不可忍若

皮膚壞則出膿血或發節解則斷人四支此蓋疽

之類也宜速治之方

大蒜或小蒜

右杵如泥厚塗之乾即再塗以差為度

又方 赤小豆壹升 羊角燒灰

右為末雞白和塗如無羊角即單用小豆亦良

治一切丹毒走皮中浸淫疼痛方

蟻螬研

右以雞子白和塗乾再塗先刺破塗之良

治一切丹毒徧身

芸薹子壹兩

右以酒壹大盞和研去滓煎五七沸無時溫服壹

合孫真人云治丹神驗方擣芸薹葉傳之即差未

愈但三日內傳之臣以正觀十七年三月八日內

江縣每以飲多至夜睡中覺四支骨肉疼痛目眩

丹毒
頭疼額角上如彈丸大腫不得手近痛至午時至
右角至夜諸處皆到其眼合並不得開幾至於斃
縣令周公種種藥治不差經七日臣自處此方其
効如神故疏之以傳於世 又戴行之家傳方云
如無青者以乾者為末水調傅凡丹毒遍身或連
腰腹周匝百方不能治惟此輒能治之凡治二十

四般丹毒

仙人水鑑治火丹

蕎麥麵

黃連

各少許

右二味同研細塗立差切不得入油及鹽

孫真人曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之狀
大者如掌甚者遍身有痒有腫無定色或有白丹肉
中腫起痒而復痛微虛腫如吹癰疹狀亦有雞冠丹
赤色而起大者如錢小者麻豆粒狀如雞冠色皮澁
一名茱萸丹或有火丹或有水丹遍身起遇水濕搏
之晃晃然如黃色如有水在皮中喜着眼及陰此雖
小疾令人至死也

治丹毒搗方

升麻

漏蘆

芒硝

各貳兩

梔子

貳拾枚

黃芩

叁兩

胡蘆

伍兩

右伴以水參升浸良久煮取貳升以故布染汁搗
後須服漏蘆湯

漏蘆湯方 非裏實證不可用

漏蘆

白欬

黃芩

麻黃

白薇

枳殼

升麻

芍藥

甘草

大黃 各叁兩

右以水壹斗煮參升分三服快下之無藥之處只
單用大黃下之

五香湯

主熱毒氣卒腫痛結核或似癰疽使人頭

疼寒熱氣急者數日不除殺人方

青木香

藿香

沉香

丁香

薰陸香 各壹兩

右以水伍升煮取貳升分三服不差更服之

劉涓子鬼遺方治丹癰疽始發焮熱浸淫長成搗湯

方

升麻

黃芩 各叁兩

黃連

大黃 各貳兩

當歸

甘草 貳兩

芎藭 貳兩

芒硝 叁兩

麝羊角屑 壹兩

右咬咀以水壹斗參升煮取伍升絞去滓罇中內

丹毒

小斗五

六十二

芒硝上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼帛搨腫
上數過其熱隨手消散王練甘林所秘不傳此方
朱氏家傳治火丹

伏龍肝

豬槽下土

多年者

朱砂

少許

右為末雞子清調鵝毛掃

又方

躑躅花根

曲蟻土

壁上多絲蟻窠

百艸霜

伏龍肝

豬槽下土

右如上法用之

金花散

鬼遺

治一切丹毒

鬱金

黃芩

甘草

山梔子

大黃

黃連

糯米

已上各壹兩

右七味生為末冷水和少生蜜調藥以鵝毛掃之

長沙醫者鄭愈傳治大孕丹諸般毒聖塗散

凌霄花

萬州黃

各壹分

芋根

半兩切焙

右同杵爛以酒和蜜同調服少許仍塗丹上立効

麻黃散

金

治惡毒丹及風疹

麻黃

升麻

葛根

各壹兩

射干

雞舌香

甘草

炙各半兩

石膏

半合

右咬咀以水參升煮取壹升大人作壹服三歲兒分三服日三

本事治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末壹兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起鎮火草即景天搗和苦酒塗之

丹毒藍靛傅熱即易子母秘錄

肘丹者惡毒之瘡五色無常芋根參斤水參斗煮汁每日塗之

治赤丹用黃瓜種中瓢水去子以器貯之用時以水

塗患處

又方用臘雪貯器中久化為水以水塗赤

游妙

並初虞世

丹諸丹毒腫蚯蚓矢水和傅之

聖惠方外臺同

千療丹癭疹方酪和鹽煮以手摩之手下消

治赤游風腫蕎麥麵苦酒調傅

兵部手集

楊治熱赤游丹括萋末二大兩醞醋調塗之

治五色丹毒煮栗皮有刺者洗之佳

拔毒散 治熱毒丹腫游走不定

石膏

寒水石

並生用各肆兩

黃檗

甘草

各壹兩

右為細末以新水調掃之或紙花子小貼尤妙涼水潤之

十二件单方 治丹毒或得一物瘡

水苔 生地黃 生松葉 蒴藿葉

慎火草 浮萍 豆豉和水 大黃和水

梔子和水 黃芩和水 硝石 豆葉

右一十二味但得一味搗以貼之即瘡赤小豆末和雞子塗之無雞子水和用之

療竈丹從兩脚赤如火燒

右用五加葉燒作灰伍兩取煨鐵槽中水和塗之

治丹毒瘤

蜈蚣乾者壹條

白礬如皂子大

雷丸壹个

百部貳錢

右為細末醋調塗之

郭氏金黃散 治熱毒丹流遊走不定疼痛不止

寒水石貳兩 鬱金壹對

藍實

大黃 黃礬 黃連

景天各壹兩

右為細末用雞子清調敷水亦可

風丹 痛者為丹毒痒者為風丹

賈宅小娘風痒黃精丸四十粒與

白朮

柒分

枳實

炒

黃芩

肆錢

右分八貼下之食前

遍身風痒癢疹凌霄花細末酒下壹錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微

腫五六日不退兩寸脈滑大實右浮大左浮弦小以

炒芩炒連歸芎藭地枯草黍粘紫葳各一錢防風黃

芪各半錢凡五六貼而安

世河間神佑丸

治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年發者此丸下之百發百中方見

丹一人患風丹徧身痒因酒得者

浮萍

半兩

防風

黃芪

羌活

叁錢

當歸

貳錢

乾葛

麻黃

壹錢

生甘草

半錢

世治冷丹風

防風

甘草

白僵蠶

蟬退

川芎

白芷

茯苓

荆芥

陳皮

厚朴

蒼耳子

人參

右為末豆淋酒調服貳錢

丹痒者用非葉摻些鹽與香油以手摩熱於丹上指
之立愈 治風丹用穿山甲洗去腥於瓦上炒過存
性每壹兩入甘草參錢為末米飲調服 治血風疙
瘡瘡癩瘡浮萍搗取自然汁豆淋酒下四物浸酒下
亦得

丹用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗患
處木瘡更入硫黃少許磨塗之

赤白遊風

薛赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒
閉腠理內熱怫鬱或陰虛火動外邪所乘或肝火風
熱血熱治法若風熱用小柴胡湯加防風連翹血熱
用四物加柴胡山梔丹皮風熱相搏用荆防敗毒散
內熱外寒用加味羌活散胃氣虛弱用補中益氣湯
加羌活防風及消風散血虛用加味道遙散陰虛道
遙散六味丸若肝腎虛熱用六味丸則火自息風自
定痒自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈
熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣受傷相火翕

合血隨火化反為難治矣 一男子秋間發疔瘡此
元氣虛而外邪所侵也先用九味羌活湯二劑又用
補中益氣加羌防而愈後不慎起居盜汗晡熱口乾
唾痰體倦懶言用補中益氣湯加減八味丸而愈
一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益
甚用加味逍遙散而愈 一婦人患赤白遊風晡熱
痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛
而筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱而歿 一婦
人患前症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹而歿 一
女子赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡湯加生地

黃連翹牡丹皮而愈

如水散

治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成

腫血溢膚癢如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒

攻衝熾赤熱痛

朴硝

伍兩 另研

寒水石

蛤粉

各叁兩

白芷

壹兩

片腦

壹錢 另研

右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以攤

塗掃不令藥乾

治赤遊腫方

川大黃

貳兩

慎火草

伍兩

赤白遊風

卷十五

三

右各搗塗之訖即再塗

治赤遊腫流徧身赤色入腹即死方

右用生豬肉傅上數數換之其肉蟲鳥俱不食臭惡甚也

○紫白癜風

白駮

癰瘍風

海龍蛇散

治風虛頑麻遍身紫白癜風癰痒痛者

白花蛇

去骨焙

黑稍蛇

去骨焙

草薺

天麻

黃芪

金毛狗脊

自然銅

骨碎補

楓香

草烏頭

鹽水浸剉

地龍

各壹兩

乳香

沒藥

各叁錢

麝香

貳錢

右為細末酒糊丸梧子大每服拾伍丸酒下食後為末酒調服亦得

羅何首烏散

治白癜紫癩諸風筋骨疼痛徧身疥

本草綱目

小科五

三

癬手足皸裂睡卧不穩行步艱難兼療癩疾眼斷
白仁鼻梁崩塌並宜服之

何首烏

蔓荆子

石菖蒲

荆芥穗

甘菊花

枸杞子

苦參

去蘆

威靈仙

各半兩

右為細末每服參伍錢食後温酒調下或茶清或
蜜水亦得日進二服

當歸散

治皮風紫白癩風

當歸

去蘆

赤芍藥

苦參

去蘆各半兩

赤土

壹兩

右為細末生豬脂貳兩熬油去粗同蜜壹兩作一
處調藥隔一宿每服壹大匙熱酒調下空心食後
各一服並忌雞鴨無鱗魚豆腐等物

本事烏頭丸

治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮

膚麤澁四肢麻痺

草烏頭

壹斤

入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就

水中瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控
起令乾用麻油肆兩鹽肆兩入銚子內炒令深黃
色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度
取一枚劈破心內如米一點白恰好如白多再炒

趁熱取羅為末用醋糊丸如桐子大每服參拾丸
空心晚食前溫酒下真州資福菴文雅白老有此
疾服數年黑黥頓除腳力強健視聽不衰有一宗
人遍身患紫癩風身如墨服逾年體悅澤予服之
一年諸風疥瘡瘍皆瘥性差熱雖云去毒要之五
七日作烏頭粥啜之為佳粥法用豫章集中者佳
外治 治紫白癩風塗藥

白礬

綠礬

生砒霜

各壹錢

右研極細如粉用生茄子蒂蘸擦患處先浴後擦
一黃膏 治紫白癩風瘡癬疥

雄黃

雌黃

砒霜

各半錢 並另研

白礬

黃丹

蛇床子

為末

藜茹

各壹兩

白膠香

另研

輕粉

各壹錢

右件用清油肆兩入巴豆肆粒煎黃色去巴豆入
諸藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後
用藥擦神効

四神散 治紫白癩風

雄黃

雌黃

硫黃

白礬

各等分

右研為細末每用時先浴令通身汗出次用生薑

紫白癩風 又方
蘸藥擦患處良久熱湯洗當日色淡五日除根

又方

紫癩白癩兩般風附子雄黃最有功薑汁調勻茄蒂蘸擦來兩度更無蹤

世紫白癩風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神効 又方以信石好者為上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傳之愈 又方用金獅草搗碎擦之累効

丹又方杜大黃 飛礬 右以肥皂為丸擦之

紫癩風夫紫癩風者由皮膚生紫點搔之皮起而不

痒痛者是也此皆風濕邪氣客於腠理與氣血相搏

致榮衛否澁風冷在於肌肉之間故令色紫也

白花蛇散 治紫癩風

白花蛇 貳兩

晚蠶蛾 貳錢半

白僵蠶 炒

烏犀角屑

麻黃 去節

何首烏

天南星 薑製

天麻

白附子 炮

桂心

草薢 酒浸

白蘚皮

羌活 去蘆

蔓荊子

防風 去蘆 各半兩

磁石 壹兩醋淬 為末研

右為細末入研令勻每服貳錢食前温酒調下忌

熱麵豬魚蒜等物

酸石榴丸 治紫癩風其効如神

酸石榴 柴枝去皮燒盆內盛隨
以飯上蒸爛絞取汁 羌活 去蘆

防風 去叉 薄荷葉 人參 去蘆
各壹兩

羌蔚子 白附子 炮 苦參 去蘆

烏喙 搗絞 犀角屑 各半 冬消梨 貳拾枚
去皮核

取汁

右件為末取前二味汁煎如膏和丸如梧桐子大
每服貳拾丸温酒送下不拘時候

桑枝煎 治紫癩風

桑枝 拾斤 益母草 叁斤

右件用水伍斗慢火煮至伍升濾去粗入小鍋內
熬為膏每夜臨卧服半合温酒調下

硫黃膏 治紫癩風

硫黃 白礬 並細研
各壹兩 礶砂 細研

白附子 各半 附子 雄黃 細研各
柒錢半

蛇蛻 壹條

右為細末入研令勻用清油肆兩黃蠟貳兩先煎
油三五沸下蠟後入藥末煎成膏每取塗所患處
日三度用之

灰藿膏 治紫癩風

灰藿草 不以多少燒作灰用重 蝦蟇灰

白礬灰 紙觀水淋取汁熬膏 硫黃 各半兩 雄黃 貳錢

硃砂 朱錢半 水飛 膩粉 研 麝香 各壹錢 研

右外藥為細末同研令勻用灰藿膏調塗所患處乾即再塗之

治紫癩風

硫黃 貳兩細研

右先用篋布擦患處令傷用面油調藥末如膏一日三度塗之

白癩風 夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交

并邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散令

皮膚皴起生白斑點故名白癩風也

烏蛇散 治身體頑麻及生白癩風

烏蛇 參兩 酒浸 白殭蠶 炒 獨活 去蘆

天麻 胡麻子 各貳兩 天南星 貳錢半

白附子 炮 川烏頭 炮去皮臍 桂心

防風 去蘆 細辛 去苗 枳殼 去穰 欬炒

蠟蛻 各半兩

右為細末每服貳錢温酒調下不拘時

防風湯 治白癩風

防風 去蘆

地骨皮

山梔子

王不留行

荊芥穗

惡實

人參 去蘆

生乾地黄 各壹兩

甘艸 炙 錢半

右咬咀每服伍錢水貳盞入惡實根少許煎至壹

盞半去粗溫服不拘時候日進二服大有神効

苦參散 治肺藏久積風毒皮膚間生白癩不止

苦參 去蘆 參西

附子 去皮臍

梔子仁

木蘭皮

露蜂房 各壹兩

烏蛇 貳兩 酒浸

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候

摩風膏一治白癩風

附子

川烏頭

防風 各貳兩

凌霄花

躑躅花

露蜂房 各壹兩

右件細剉用豬脂參斤煎煉看藥黃焦去粗候冷收斂合中用摩風癩上以差為度

又方

硫黃

蜜陀僧

膩粉

乳香 四味並 另研

杏仁

白僵蠶 炒

右為細末酥調成膏用漿水洗瘡以生布擦破塗

白癩風
之日夜四五次甚妙

治白癩風

紅灰藿草

蒼耳根莖

各伍斤

茄子根莖

叁斤

右件並晒乾一處燒灰用水壹斗煎湯淋取汁却於鍋內熬成膏以篋合盛用好乳香半兩研又入鉛霜膩粉各貳錢半相和入於膏內用煉成黃牛脂貳兩入於膏內調攪令勻每取摩塗所患處一日塗三上夜塗一上

治白癩風胡桃塗之

胡桃

初生青者伍枚

硫黃

半兩細研

白礬

貳錢半細研

右件和研為膏日三兩次塗之瘡

治白癩風

附子

壹枚生用

硫黃

半兩研

鷄子

叁个用米醋浸經七

日出看殼軟取出用白調藥

為細末用米粉貳錢半更研令勻雞子白調塗之

玉粉膏 治白癩風

白礬

硫黃

各半兩

右件同研如粉用醋調塗即瘡

治白癩風如雪色

硫黃

香墨

各壹兩半

白癩風
右件同研如粉用生布揩癩上微傷用醋和如膏
塗之作瘡未差更塗

三聖膏 治白癩風

硫黃 生研

黃丹 各半兩研

右件用生絹袋盛緊縛定蘸生薑自然汁於白癩
上搽之日夜十次自愈

治白癩風

草烏 半兩

芭豆 貳錢半

右為細末以醋和為劑用絹布裹定浴後擦之其
藥力自下矣

紫桂散 治白點漸長如癬

桂 不以多少去麁皮

右為細末唾津和調傅每日三四次塗傅之甚妙

又方 蘿蔔白汁 生白礬 參錢 先用生布揩令

微破調之不過三上差

又方 楸木白皮 細剉用水伍斗煎取伍升濾去

粗於慢火上再熬如稠膏用不津器收每用膏以
手摩塗所患處日三五次上効

治白癩風淋洗

桑柴灰 參斗

右內大甌內蒸使氣溜下釜中

取湯淋汁熱洗不過五六度差

白駁病源論云風白駁者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駁此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也夫白駁者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不癢痒不能早療即便浸淫也
治面上風白駁

弊帛

蟾頭

蛇蛻皮

故麻鞋底

苕帚

甌帶各壹炷

右件藥以月蝕之夜盛蝕時合燒灰為末每服壹

錢温酒調下日進三服更用此散醋調塗之甚妙

忌雞豬魚肉大蒜等物

治白駁

硫黃研細

草决明

半夏生用

槲樹皮

燒灰各壹兩

蛇蛻皮

壹條燒灰

右為末用清漆和之薄塗白處欲塗藥時先用巴

豆中截摩白處令皮微起却敷藥二三遍即愈

又方

雄黃

硫黃並細研

附子生用各壹兩

右為細末醋調塗之

又方

雌黃

硫黃

各壹錢半

蛇蛻皮

貳條燒灰

右件同研為末用醋調如膏先以巴豆中截指白處令皮起然後敷藥三二遍差

又方

硫黃

研

川烏頭

各壹兩

為細末醋調塗之

又方

桂心

為末

以唾調塗駁上日再塗即愈

又方

取樹孔中水溫熱洗之然後搗桂心牡蠣等

分為末用面油調塗白駁上日三夜一

又方

先用新布擦令赤用醋摩巴豆塗之効

又方

鰻鱧魚脂 右先洗拭駁上擦令微痛用魚

脂塗之一上便愈

治白駁

用蛇蛻燒末醋調敷上神効

癩瘍風

夫風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚

令人頸邊胸前腋下自然斑駁點點相連其色微白

而圓亦有紫色者亦無痛痒謂之癩瘍風也凡此皆

風之與熱伏留肌腠之間氣血不和乃生此疾也

烏蛇散

治癩瘍風斑駁如白癩

烏蛇

叁兩

犀角屑

壹兩

防風

羌活

並去蘆

黃芩

去蘆

苦參

去蘆各貳兩

人參

丹參

玄參

沙參 各去蘆 桂心 秦艽 去蘆土

川芎 梔子仁 白鮮皮

川升麻 通草 白蒺藜

枳殼 麸炒去穢 各壹兩

右為細末每服貳錢温酒調下食後良久服之忌

雞豬魚蒜熱麵等物

炊帚散 治面及項忽生白 狀如白癬名曰癩瘍

故炊帚 甌帶 鞋底

蛇蛻皮 各半 兩

右件四味以月蝕夜伺候月正蝕時都燒之成灰

研令細每服貳錢温酒調下不拘時候必用醋調

藥如膏塗敷駁上即消

又方 烏蛇 壹條 右為細末每服貳錢用熱豆淋酒

調下日進三服

女萎膏 治身體癩瘍斑駁

女萎 附子 雞舌香

木香 白芷 各半 兩 麝香 研壹 錢

右件細剉用臘月豬膏半斤煎藥看黃焦便去滓

入麝香攪令勻放凝用麈布擦斑駁上微疼塗之

即瘥

蜀水花膏 治癰瘍

蜀水花

鷹糞白

白附子

白欵

當歸 各壹兩

麝香 壹錢另研

右件剉碎用豬脂壹斤合煎諸藥焦黃去粗候冷入麝香攪令勻於瓷合中盛先擦微破敷塗之

蒼耳丸 治癰瘍風

蒼耳葉 不計多 少陰乾

萇若子

右為細末每用伍兩取粟米貳合煮作粥即研如膏却用萇若子淘去浮者炒令黃黑色搗為末用壹兩相和令勻丸如菉豆大每服貳拾丸空心温

酒送下晚食前再服

又方

附子

硫黃 各半兩研

蒼耳 壹握陰乾

右為細末用醋調先以生布揩擦微赤破敷塗之乾即更塗一方加鐵精無蒼耳

又方

蒴藿 貳斤

防已 半斤

亞燒灰用水淋取醞汁

又方

羊蹄草根蘸醋於生鐵上磨旋旋刮取塗於患處未瘥更入硫黃少許同磨塗之

又方

青胡桃皮

參枚

硫黃

貳錢半
細研

右件爛搗入醬少許更研令勻先用泔清洗之然後塗於患處

又方 烏賊魚骨用三年陳醋研磨如糊先用生布

擦令肉赤即塗其上

又方 五月收赤脚蜈蚣燒灰醋調塗之

又方 用自歛蜣螂為末先用布指擦患處令熱敷

之一宿即瘥

烏白癩

烏癩 夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛

變黑或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語

無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癰疹赤黑手足

頑麻針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開

口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛痒而時如蟲行

或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之症大

同小異故不別錄也

蛭皮丸 治烏癩

蛭皮

蚌蛇頭

各燒
存性

魁蛤

各壹
枚

蜈蚣 壹條 半

蠱蟲 去頭 足翅

蟻蟪 焙乾

紅娘子 去頭 足翅

水蛭 糯米 炒熟

蟹螯 去頭 足翅

蜘蛛 焙各 叁个

鯪鯉甲 叁片

龍骨 研

川椒 炒

川大黃

黃連

麝香 研

桂心

水銀 各半 兩

石膏 研細

川芒硝 各壹 兩

白礬 枯

滑石 研水飛

甘遂 與胡麻同炒以胡麻 熟為度各貳錢半

附子 貳枚炮 去皮臍

巴豆 去皮膜 心油

雷丸 各拾 伍粒

右為細末入研令勻煉蜜和丸如小豆大每服壹丸溫水送下空心臨卧各一服未覺每服加壹丸

如小便莖中痛即有蟲下皆死也細觀形狀痛多即減一丸痛少則加至貳丸以瘥為度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服仍參薛氏治癩風變

症類症治法用之 見雜病準 繩第五

外治

治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛殺蟲雄黃藥塗之

雄黃 水飛

金星石

銀星石

紫石英

白石英

太陰玄精石

馬牙硝

白礬 各壹 兩

右為細末入瓷合中用白土泥固濟候乾用炭火

烏癩

小

八

伍斤煨通赤即止以土蓋罨藥合候來日取出於
濕地上紙襯盆蓋出火毒三伏時再研如粉取楓
樹膠煮汁和調每日用塗之以差即止
硫黃散 治烏癩瘡久不瘥

硫黃

雄黃

雌黃

金星石

銀星石

握雪石

水浮石

寒水石

蜜佗僧

馬牙硝

不灰木

槐白皮

蟬蛻

亂髮灰

蜂窠灰

蝸牛子

牡蠣

麝香

白礬

伍錢

研細用水銀半兩以津唾殺研如泥另入膩粉貳
錢半用生清油肆兩調勻每於患處遍塗之立効
大黑神膏 治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭

芫薺

川升麻

防已

去皮

黃檗

藜蘆

黃連

白礬

雄黃

雌黃

並細研

胡粉

各半兩研

巴豆

杏仁

各拾肆粒

松脂

亂髮

各如雞子大

右判如大豆粒用豬脂貳升并藥同煎以亂髮消

盡為度綿濾去粗後入雄黃雌黃胡粉白礬攪勻
收入甕器中每用塗於瘡上一日至夜三次塗之
每次以熱鹽湯洗過然後更塗之藥勿令入口眼
治烏癩殺蟲

雌黃不拘多少 右研如粉用醋和雞子黃攪勻塗於
瘡上乾即再塗

酒蜂房釀酒 治烏癩

露蜂房 伍兩 苦參 肆斤

右件細剉用水參斗煮取壹斗貳升去粗浸麴肆
斤半炊糯米叁斗入麴葉搜拌如常醞法酒熟壓

去糟每温一小盞食前服之

白癩 夫白癩病者其語聲嘶啞目視不明四肢頑疼
身體大熱心中懊惱毛脚緩縱背脊拘急內如針刺
或生癰疹而起往往正白在皮肉裏鼻有息肉目生
白珠當於瞳子視無所見名白癩也

白花蛇散 治癩病語聲嘶啞者

白花蛇 酒浸 晚蠶蛾 去頭足翅 天麻

槐子 羌活 防風 各去蘆

蔓荊子 威靈仙 白鮮皮

枳殼 去穰麩炒 甘草 炙半兩

烏白頭白 小斗五

為細末每服貳錢温酒調服不拘時日進二服

鯪鯉甲丸 治白癩

鯪鯉甲 叁片

蝮蛇 半條

魁蛤 壹枚

水蛭 生用

蜘蛛 生用

蟹螯 去頭足翅

蝨蟲 去足翅各貳箇

蟻螻 生用叁箇

蜈蚣 壹條

龍骨 半兩研

石膏 壹兩細研水飛

白礬 桔

滑石

川芒硝

硝石

水銀 與硝石點楮汁研令星盡

川大黃

黃連

桂心 各半兩

附子 炮去皮臍貳枚

雷丸 拾枚

巴豆 拾貳粒去皮心膜油 川椒 貳錢半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳丸空心臨卧温水送下日進二服

天麻煎 治白癩

天麻 壹斤

天蓼木 叁斤

右件剉如大豆粒用水叁斗入銀鍋或石鍋中熬至壹斗貳升濾去粗却於慢火上熬如稀飴每服半匙食前用荆芥薄荷酒調下

又方 治白癩

馬鞭草 不以多少 為細末每服壹錢食前用荆芥薄荷

湯調下

苦參酒 治周身白點如脂如榆莢搔之白屑落或
痒或痛色白漸展世呼白癩

苦參 伍斤

露蜂房 伍兩

蝟皮 壹具

右剉碎用水參斗煮取壹斗去粗浸細麩伍斤炊
黍米參斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前温
飲一小盞

治

治白癩

蟹螯 拾肆枚

大蝮蛇 壹條乾者
首尾全

右件用酒柒升入甕瓶中用糠火煨酒及壹升濾
去相收甕合中每用薄塗於白癩上

癩疹

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發
散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則
為痒也所以有風疹瘙痒皆由於此又有赤疹者忽
然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓疹起瘙之逐手起又
有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱 夫風癩
疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癩疹若
赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則
極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結為
白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則瘥着厚煖

衣亦瘥也其脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則成癩疹致身體為痒也 丹溪云疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也 朱院君三十餘久患癩疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛蒡子為極細末每貳錢水盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因并發於表則赤若風濕搏於氣分則氣液不行因邪并發於表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞瀰者即內經所謂汗出見濕乃生痲痺又曰勞汗當風寒薄為鬱乃痲痺即癩疹屬也故痞瀰類也此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發者方論中則

無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下貳錢日二服

衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皂角貳兩水壹升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大食後溫水服貳拾凡次日便愈

千金方治法白疹宜者礬石汁拭之或者煮蒴藿和少酒以浴之良姚氏以治赤疹或者煮石南汁拭之良或水煮雞屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風尸盛者石南湯主之

石南湯神功方亦名石南根飲子治風癩疹瘙之則作瘡風尸身痒卒風面目腫起

石南葉神巧用根

乾薑炮

黃芩

細辛去苗

人參去蘆各壹兩

桂心

麻黃去節

當歸

芎藭各壹兩半

甘草炙貳兩

乾地黄柒錢半

食茱萸壹兩貳錢半

右為吹咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗
加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發為癩疹增
寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活

前胡

人參

桔梗

甘草

枳殼

川芎

天麻

茯苓

薄荷

蟬蛻

茯苓

右為細末每服叁大錢水壹盞生薑叁片煎至柒

分去粗溫服無時

羚羊角散

治風癩疹遍身痒痛心胃滿悶

羚羊角屑

白鮮皮

白蒺藜

防風

麻黃

甘草

羌活

枳殼

人參

杏仁

黃芩

生乾地黄

右為吹咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入

酒壹合更煎一兩沸溫服

樺皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及風癩疹

枳殼

樺皮

甘草

癩疹

小

五

荆芥穗

杏仁各貳兩 剉 炒去皮尖

右件除杏仁用水壹碗於銀器內熬去水一半已來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻於瓷合內收之每服叁錢食後溫酒調下

犀角散 治風癩疹心悶

犀角屑

川升麻

人參

玄參

沙參

防風四味各 去蘆

白鮮皮

白蒺藜各壹兩 研

甘草炙

馬牙硝各半兩 研

牛黃貳錢半 研細

右為細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉

湯調下不拘時

鬼箭羽散 治風癩疹累醫不効

鬼箭羽

白蒺藜

防風去蘆

白欬

甘草炙

白礬枯各壹兩

右為細末先用粟米粉伍合粉身了每服貳錢溫熟水調下不拘時

漏蘆丸 治風癩疹

漏蘆壹兩

枳殼剉炒 去穰

苦參各叁兩

防風去蘆

川大黃煨

烏蛇

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子六每

服參拾丸用温漿水送下食後服

楓香丸 治風癩疹痒不可忍

楓香

白鮮皮

白蒺藜

蛇床子

羚羊角屑

各壹兩

川烏頭

炮去皮臍

藁本

去蘆

仙靈脾

蔓荆子

莽草

赤箭

各半兩

右製服法同前

加味烏荆丸 治癩疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮

脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭

湯洗浸三五次去皮尖焙乾

荆芥穗

各半兩

當歸

水浸三日洗焙乾秤壹兩

薄荷

伍錢

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸

温酒或茶清送下

治風癩疹痒不可忍

赤土

不拘多少細研

每服壹錢空心温酒調下

治遍體疹風

側子

作末

冷酒調服

治風癩疹痒不止

枳殼

麩炒去穰參兩

為細末每服參錢水壹中蓋煎三五沸

分去滓温服無時

一方水煮枳殼為煎塗之

治風疹入腹身體腫舌强乾燥

蔓菁子參兩為細末每服貳錢温酒調下

又方

白蜜壹合酒貳合二味調和空心温服

又方

白僵蠶不拘多少焙令黃色右為細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏 治風癭疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治

筋脉攣急

烏蛇

當歸去蘆

木鼈子去殼

枳殼去穢

大黃各兩

天麻

附子

烏喙

天南星

桂心

細辛去苗

吳茱萸

羌活去蘆

蒼朮去粗皮

防風

牛膝

川椒

白芷

白僵蠶

乾蝎各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌浸一宿用鹽

月煉成豬脂貳斤於鐺中入藥以慢火煎看白芷

變黃紫色下火濾去粗令淨入於甕合內盛之用

摩塗於所患處立効

蒴藿膏 治風瘙癭疹皮膚中苦痒搔之血出

蒴藿根

薔薇根各貳兩

白蒺藜

附子

獨活 去蘆

白芷

防風 去蘆

苦參 去蘆

川升麻

漏蘆

漢防已

川椒

木香

蛇銜草

羌蔚子

枳殼 一方作枳實

莽草

犀角屑 各壹兩

右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石滾

鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥中

煎令白芷赤色膏成濾去粗盛甕合中每取塗摩

患處累用卽瘥 一方無薔薇根

莽草膏 治身體赤癢疹而痒瘙之隨手腫起

莽草 柴錢半

當歸

芫蕒

大戟

細辛

芍藥

芫花

川椒

躑躅花

附子

蒴藿根 各壹兩

苦參 貳兩

豬膏 成煉者叁斤

右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏

成去粗以敷病上日三用之

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡

青羊脂 肆兩

甘草

芍藥 各叁兩

白芷

白芨

黃芩

防風

去蘆

黃耆

升麻

寒水石

各壹兩

石膏

竹葉

切各壹升

右為吹咀先用水捌升煮石膏竹葉取肆升去粗浸諸藥豬脂貳斤合煎膏成敷病處効

蒴藿煎

治赤白風癩疹

蒴藿根

白蒺藜

兔藿

細辛

虎杖

各叁兩

辛夷

白礬

鹽

各貳兩

右剉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去粗再煎至半升用綿蘸藥塗患處頻塗之即効

治風腫及癩疹

白礬

石灰

各壹兩

右件為末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處日用一上効

治風癩疹宜用楓香湯洗之

楓香

半斤

芸薹

川大黃

黃芩

當歸

川升麻

甘草

射干

各貳兩

苦參

叁兩

蛇床子

壹兩

右件藥並生用吹咀每用伍兩水壹斗煮取伍升

去粗看冷熱洗病上日三五度

治風身體生癩疹宜用蒴藿根湯洗之

蒴藿根

蒺藜苗

當歸

各伍兩

蛇床子

細辛

各貳兩

右件細剉用水壹斗伍升煮取壹斗去粗看冷熱洗患處日用三五度藥水冷再溫用之

地骨皮湯

治風癩疹

地骨皮

半斤

當歸

肆兩

鹽

貳兩

白礬末

壹兩

右件細剉每用藥伍兩水玖升煎取貳升去粗再

煎至壹升收斂器中用綿蘸拭患處五七度瘡

治風癩疹淋洗神効

蒴藿

白蒺藜

白礬

細研後入

茵芋

馬蘭子

茺蔚子

細辛

扁竹

各貳兩

右剉用醋漿水壹斗煮取伍升去粗入白礬洗之

治風癩疹自治不瘥神効

白礬

伍兩

右為末用酒參合小便壹升煎如稀膏

以綿蘸藥於上輕手揩之令熱徹入皮膚其風疹須臾消散一方只用白礬末酒浸帛蘸染患處

治十種癩疹

右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即減 千金方用石灰淋取汁洗之良

又方 葫藿煮湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴治癩疹痒 芫蔚子莖作湯浴之良

治風疹痒不止

雲臺菜參握搗取汁於疹上熟揩時時取少藥指令熱徹又續煎椒湯洗之

又方

蛇蛻皮壹條水壹升煎取半升鷄翎蘸熱藥湯塗

上卽瘥

單方 治面目身體生癩或痒或癩子腫起不即愈甚殺人

右用羚羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙

癩疹入腹亦能殺人用蠶沙煎濃湯洗之

風疹癩疹成瘡 夫風邪客熱在於皮膚遇風寒所傷

則起癩疹熱多則色赤風多則色白甚者痒漏之則成瘡也

卷栢散 治風皮膚癩疹及風熱生毒瘡

卷栢

枳殼去穢炒

羌活去蘆

麻黃去節

五加皮各壹兩

赤箭

天竺黃

藜蘆去蘆

防風去蘆

芎藭

黃芪

桑耳

犀角屑各半兩

烏蛇酒浸

右為細末每服貳錢食前薄荷湯調下忌熱麵鷄

豬魚蒜等物

丹參散 治風瘙皮膚赤癩疹痒痒隨搔生瘡

丹參

人參

苦參並去蘆

雷丸

生條酒浸

防風去蘆

白附子炮

白花蛇酒浸

右為細末每服貳錢食前煎甘草酒放溫調下

升麻膏 治諸熱風毒氣攻衝皮膚搔生癩疹赤起

生瘡兼有黃水結為膿疱痛

川升麻

白欬

漏蘆

枳殼

連翹

藍葉

黃芩

梔子仁

蒴藿根

玄參去蘆

大黃

蛇銜草

川芒硝

犀角屑各壹兩

右件細剉用竹瀝參升拌勻經一宿用成煉豬脂

成府

小斗

一

貳斤同煎候白斂色焦黃絞去粗令凝用摩塗患處日六次瘥

治風瘙癢疹遍身皆痒搔之成瘡

茵陳

生用

苦參

各伍兩

右件細剉用水壹斗煮取貳升溫熱得所蘸綿拭之日五七度瘥

又方

蠶砂

壹升

右用水貳斗煮取壹斗貳升去粗溫熱得所洗之宜避風處

疥癬

疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沉者為癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥癩赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥痞癩含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾茄五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癢疹或圓或斜或如莓苔走散內藏汁而

疥癬

外科

二百四

外有筐其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然
彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔
則痺頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而
且堅五曰狗癬時時作微痒白點相連六曰刀癬則
輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒
之藥敷之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絕其根
又面上風癬初起瘡癩或漸成細瘡時作痛痒發於
春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽
氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風
疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱

之藥敷之則自愈矣 戴院使云此雖皮膚小疾不
足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癩嗜膚尤為煩擾
甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傳
藥須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼
飲犀角飲皆可用

通治疥癬方

升麻和氣飲

治瘡腫癰疥痒痛

升麻

桔梗

蒼朮

乾葛

甘草

大黃

煨各壹錢

陳皮

貳錢

當歸

半夏

內服

茯苓

白芷

乾薑

枳殼

芍藥

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

防風

白蒺藜

荆芥

何首烏

黃芪

甘艸

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服或為末亦可

除濕散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荆子

薄荷

白芷

天麻

川芎

防風

烏蛇

酒浸壹宿焙乾各半兩

右為細末每服參錢茶酒任調下無時日進三服

六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸

治遍身癢痒癬疥瘡瘍

苦參

玄參

黃連

犬黃

剉碎炒香

獨活

去蘆

枳殼

去穢

防風

去叉各貳兩

黃芩

去黑心

梔子

菊花

各壹兩

名禾五

百六

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服
參拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得
四生散 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不

明

白附子

下注生瘡
用黑附子

黃芪

沙苑蒺藜

羌活

各貳兩

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下若於豬腰子
切開夾藥在內合定拴住紙裏煨熟尤妙又有患
赤眼睛痛不可忍臨睡一服目反大痛至二鼓時

乃得睡更三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥
俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風
及眼疾頑癬無不効

治面身瘙痒明目爽神

威靈甘艸石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末貳錢酒
壹椀渾身瘙痒一時無

治

羌活散

治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白鮮皮

硫黃

狼毒

各壹兩

輕粉

貳錢半

白附子

黃丹

芥詳

小斗五

百二

蛇床子

各半兩

右為細末油調成膏傳之

疥藥神効散

治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔

蛇床子

各壹兩

全蠍

半兩

倭硫黃

壹兩伍錢

右化開硫黃入荆芥末參錢滾數沸候冷加輕粉

貳錢冷再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小

油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥

氣神効

香疥藥

治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉

水銀

樟腦

各參錢

大楓子

去殼

川椒

各肆拾玖粒

桐油燭

壹對

杏仁

少許

右為細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡搽上此藥

功效如神

八仙散

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒

生瘡

細辛

荆芥

白芷

黃芩

川芎

防風

地骨皮

甘艸

各等分共為粗末

右每用藥貳兩水貳盞煎十沸去滓熱搗患處

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃 通明手可碎者 熟硫黃

黑狗脊

蛇床子

炒各半兩

寒水石

陸錢

蟹螯

叁個去翅足研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入蟹螯和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去痂油調手中擦熱鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火灸湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔痒不効者

百部 半兩碎切

亂髮

木香

碎切

檳榔 搗碎

苦參

碎切各壹分

川椒

叁銖

鯽魚

壹箇不要見水切成片

右以油伍兩煎藥得所去藥却用麝香壹分膩粉拾錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏 治疥癬

硫黃

白礬

白芷

丹

夕

子

吳茱萸

川椒各等分

右為細末煎油調塗之

楓實膏 治風瘡燥痒疥癬

大楓子肉半兩 輕粉

枯礬各此少

三島為膏擦瘡上

