

中國藥學
大辭典

吳敬恆題



待用無遺

牛惠生題



中國藥學大辭典

是國藥之寶藏
亦國醫之津梁

僑港國醫聯合會主席呂哲以題



藥之淵海

余雲岫題



濟世瓊編

李廷安題



中國藥學大辭典

按圖可索

徐相任題



溫
故
知
新

陸仲安題



以萬物之精華供人
生之養素大哉人力
視此書而益壯之

陳立夫



妙盡方書

褚民誼題

醫學津梁

顏福慶敬題



章太炎先生序

醫師陳存仁以其所著中國藥學大辭典示余頗
識醫經病狀於藥物知其名不識其形疏方治病
能名誤可謂之去醫而不可謂之知本也詎知清言
藥物者本於自如自忙荒者有其法全創之藥而況于人
其如口之猶人食五穀菜蔬食屬適而果腹也止
矣豈嘗過論其功用之於其次於醫用之十全其六
則遂以為行藥漸有本也別錄集之其次大醫和齋數
味一為方經或上病下取或下病上取藥不必與病
相應而敏捷於炮製此不可以其方論藥也其次有化

驗之術有餌餌之術論藥漸精始有機不與毒機同效
庶物如惡或與之殊試之者未盡其道也故余以為問藥
於中西大醫不如問之鈴醫為審能古之增益本州者豈
醫師也過涼而言之莫操以理定之哉其去年志出於鈴醫
也今陳子之為書圖象以審援引中外醫述近百餘家
抑可謂勤於蒐求者矣使求藥者不惑於真偽不暗於
虛實不誤於處方大齊如是也亦有以求之今人而窮室
莫如退而及古及古者非謂守師桐雷以重其言則訪諸
於醫是矣余素不甚辨藥物形色又老耄不暇為陳子
考能宜以是求遠民國廿三年九月季炳麟序

焦易堂先生序

中國首崇醫術而崇藥療良以生理營養有其自
然機能反是疾病斯起故治療方法以如何利導自然
為無上原則藥療多藉化學作用本其自然起予調
整安全奏效絕無手術所含之危險性在輒適應
用日廣取財愈眾向恃神農本草兼收並蓄非
不為博惟因年代煙遠重以產地之不同泡製
之各異而藥之質者未遑精事講求關係學
術益繁治功至非淺鮮上海世界書局有鑒於此

特刊行中國藥學大辭典以藥名首字筆畫多寡
編列次序系以產地形態種植性質效能成分
主治配合應用暨用量各條不惟便利檢查且
皆臻於詳備更附精采圖畫纖屑畢肖眼底
瞭然中國藥物辭書殆以此為首屈一指本
館倡導國粹醫學主用科學整理藥學建設
此非不為偉大貢獻云時在

民國廿三年十一月二十九日

中央國醫館館長 焦易堂序



蕭方駿先生序

中國藥學。創自神農。夫人而知之矣。然自三代以來。所傳之書。僅神農本草三卷。識者以爲戰國時人所輯。非神農時口授之原書也。秦漢以後。發明本草之家。不下數百。但可取者。亦甚寥寥。以余經眼而論。蔡邕陶宏景兩書外。最古之本草。莫如唐卷子鈔本。其書朱墨并行。持論最精。湘潭王壬秋先生會論定之。惜其書僅有說而無圖。其有圖者。以蘇恭本草圖經本爲有據。下此則蘇頌嘉祐圖經。及曹孝忠校正之經史證類本草。陳承補注圖經而已。明代李時珍本草綱目。雖較諸本加多。而圖亦備。第多以意爲之。與藥物本質不合。且無色彩分別。讀者憾焉。清內府有寫本新本草。與綱目相似。最動目者。爲藥物圖考。皆依類傳色。燦然可觀。此書爲廠肆一骨董客所得。江安傅沅叔先生見之。會勸其影印。以供醫林研究。卒未果。此最爲余所心儀者也。余於藥學。雖少心得。亦不無考證。嘗恨中國之藥。能治人之要證。而爲醫家所忽。本草不收者。不知凡幾。姑舉一二品以爲印證。如馬寶一物。最能開痰降逆。第一能治虛呃。而於顛狂癲各病。尤爲要藥。綱目不收。又如水茄秧一種。北方隨處產生。本如豆梗。嫩莖四出。葉厚而長。春夏間開小白花。結子如茄形。大如荳蔻。其梗煮水。能治女人崩證。百發百應。綱目亦不收。如此之類。指不勝屈。余擬作補遺。尙未有成也。因思天壤之間。講藥學如余者。

自大有人在。未幾。接上海世界書局一函。知正編輯中國藥學大辭典。觀其例言。實獲我心。方今之世。科學昌明。自當以科學方法整理。乃能遠傳歐美。爲世界醫家所宗尚。書既成。余瀏覽一過。服其用心之專。採書之富。且多綱目未收之品。尤喜其重實際理論。不尙空談。而於圖畫一門。更爲精當。俾讀者能辨藥物之形質色彩。其有功於醫學。實非淺鮮。竊念古之醫士。藥由自選。深山窮谷。日事搜尋。陽年採陽藥。陰年採陰藥。以備囊中之用。其有道遠不能得者。率皆互易以求其備。臨證則自爲咬咀配合。故萬無一失。李唐以後。醫與藥分。野品絕少。往往以僞品種品相混。醫者立方之後。不知藥之真贗。治病鮮效。職此之由。相沿至今。能識真者尤少。不幸與人口實。而舶來品之洋藥。遂奪我利權而去。當局者不爲提倡。反加摧殘。欲求藥業之振興難矣。抑余尤有說者。醫士之不識藥。自趙宋開設藥局始。其時醫士處於無用武之地。而所恃以爲研究者。僅在圖經。自圖經無善本。縱欲深考。亦無由而得。所以藥之應如何改良。迄今尙無善法也。此書所輯。新舊并採。內容可稱美備。如能家置一編。按圖搜採。依說參考。俾醫士徐復自行採配之舊規。將見研究發明之力。或能駕西人而上。亦未可知。今出版有日。余因書此以歸之。吾知此書一出。必能不翼而飛。不脛而走。不僅爲神農之功臣。而且爲唐宋以來藥學家之誼友。世有知者。當不以余言爲河漢也。是爲序。

中華民國二十三年十二月吉日三臺蕭方駿龍友序於舊京

自序

中國醫學。積數千年經驗而成。如仲景之書。記某證某證爲何種病症。應用何方何藥。神農本經。記某藥主治何症何症。均條列分明。試無不驗者。在科學上皆確爲極有價值之作。自後世攙入陰陽五行家言。以意象空論爲理論根據。於是中醫學術上大受浩劫。而爲近世科學家所詬病。西醫界以地處對立。尤以是爲攻擊之焦點。意欲廢止中醫而後快。然平心論之。中醫理論。確有不倫之處。所恃以見信於社會。見信於民衆。歷無數次政治議廢而屹然不能搖其地位者。蓋在於藥物之效驗卓特。治療之配合出奇耳。中國藥物。善取病之癥結根源。不尙膚淺捷功。以取效於一時。又善治複雜兼夾之症。故中醫能治療多方面之混合症。又鮮有副作用及劇烈毒質。故無反應後患。而合於國人體質。此皆長於西藥之處。治療成績。卓著於世。誠民族健康之瓊寶。豈能以其理論稍有不合科學而妄加非議哉。况中國藥物。十分之九爲純粹國產。故藥方價值廉於西藥甚鉅。不特適合民衆之經濟程度。且國產藥物。關係農村生計國民經濟。統而計之。其數可驚。亦爲國家命脈所寄。今西醫界有識之士。已轉而研究國產藥物文獻。或以中藥製爲新藥。中央研究院且特設中藥研究室。縱觀世界醫界。方以研究中藥爲近

世紀最新發現之無盡寶藏。國產藥材。細載以去。成爲出口大宗。製爲新藥。遍銷於世。歷觀書報。札錄所載。能不令人驚惕。茲將各方面之記述錄後。

德國方面

一、德醫黃勝白氏爲同德醫藥雜誌主筆。著「注意中國藥」一文。內稱「余游德國。見德國藥學家。幾無一不住意中國藥物。其國中各大藥業商家。亦莫不以此爲重。達摩城之怡默克廠 E. Morck Darmstadt。柏林之立德爾大製藥廠 J. D. Riedel-Berlin。以及奇嘉大藥廠 Cehand Co. 等皆有專門陳列中國藥之室。搜集中國生藥之標本。盈廚滿篋。既多且精。如奇喜廠除中國生藥標本外。并印有大小兩種生藥標本圖。着色鮮明。詮註詳細。并及該藥生產地之附近狀況。或採掘時情形。此種生藥圖中所列中國生藥雖不多。然吾所見數種皆東三省方面產物。觀圖中景物真切。類似從實地攝影來者。其搜集之勤。亦至可驚人矣。怡默克廠 E. Morck 之搜羅尤富。彼所蓄中國藥材。其富足精美。悉聚上海大藥業商十家所有者與之較。亦未必能也。怡默克廠且有成件之中國生藥標本出售。每件購齊約有千數百瓶。皆以整塊整個或切片之中國藥材。裝於三四十生的米達長。四五生的對徑寬之精美玻璃筒中。用黑色硬橡皮蓋密蓋之。皆標紙箋。標明藥名。並何地所產。其中如大黃一種有十數瓶之多。分爲西藏產。山西產。蒙古產。上海產。等等。其大小及紋理各各不同。並皆精美。非中國藥肆中所得。……中國醫藥界。皆知德國有一製藥商採買中國當歸。提出精英。製成婦女痛經良藥。炯幼門羅耳 Eumenol。販運於歐美各邦以及中國。因而大獲其利者。即怡默克大藥廠是也。……並聞近年來向運來中國生藥。如川貝母。川黃連。五倍子。等多種。例如當歸獲利之前事。彼殆爲利用吾國生藥。奈何吾中國人皆熟視無睹。而不肯急起力追耶。……昔西人亞爾加羅以特 Alloid。多所發明。而醫學遂大昌明。今吾國藥物豐富。繪以圖。附以說。則吾國藥學發達。爲外人而上之。豈可翹首以待。不然。庸然大都。物產豐富。徒供外人利用耳。自西學入吾國。尙有中西醫之別。各不相能。互起黃語。要知醫術多方。不外用藥。苟於藥學多所發明。則貴一中

西息其爭論。吾知其必甚易也。……吾又曾見立德爾廠出一小書。中文名為大清國藥譜。係三十三年前出版物。封面四周且印以彩色畫。皆採中國畫景。以為東方古物之表示。其自序略謂「中國藥品中確有價值之藥料甚多。其中有極小一部分。已久為歐洲醫藥家所引用。而極大部之部分。則歐洲人有至今日尚無知之者。中國藥物標本之採集。大非易事。編中所載各藥。能沒集如此齊整。考據如此詳確者。全賴常居中國腹地之某德神父及其德領事之動力云云。」於是可見外國傳教之野心及其領事之用場矣。

二、德國醫學兼理學博士德樂根道夫著「各國名時代藥草。」其中廣搜中國各種藥草。詳為論列。足徵德國學者留意中國藥材。非僞心研究多年者斷斷不能下筆。

三、德國柏林大學藥學院長樞密顧問傷姆斯教授 Geheimrat Prof. Dr. H. Thoma 為近代世界有名之藥學化學專家。德國第一等傑出之名教授。執柏林大學化學教授職者垂三十年。各國有名藥學之士出先生門下者。無慮千百人。先生特注意吾中國藥品。其標本室陳列吾國名藥殆數百種。有為柏林立德藥廠所贈者。有為傷姆斯先生自向私人徵求而得者。其間如茶磚。羚羊角。犀角等。皆在陳列之列。昔年先生舊弟子上海科發藥廠廠長薛魯敦君 H. Scholten 歸德省親。過謁先生。先生諄諄以中國舊產藥為問。并許無報酬為中國化驗藥物。因聞薛君言吾中國南嶺張季直先生有發展中國藥之意。會在南嶺狼山購地百畝。種中國藥。以資化驗云云。先生即以該校百年紀念冊一冊。親署款誌。以贈張君。并附書云。願盡化驗及指導之義務。其注意東方藥物。乃贊助吾國藥學之熱心。由來久矣。一九二七年十月傷姆斯教授特來中國一遊。參觀中國藥學狀況。并搜集中藥標本若干種。認為異常滿意。欣然返國。

四、中國早年革命家田桐氏著中華民族醫藥與廢論。內稱「吾邑明代李時珍以四十年之功著本草綱目。非徒空言。乃自經實驗者也。近日德人大為尊重而譯之。倩人吳其榕著植物名實圖考。山西官書局刊行之。日本入赴太原者。每人或購十部。二三十部不等。其注目中國藥用植物可想見矣。」

英國方面

自序

自序

四

一、英人伊博思氏專考植物學。在英時發現中國『藥用植物』種類至多。奏效至遠。如哥倫布發現新大陸。遂決意赴華考察。欣然就道。旋至北平。遇華人劉汝強君。任職北平博物試驗所。廣徵中國藥材。得本草綱目一書。該書為世界珍寶。乃與劉君譯為英文。曰藥學植物。於民國十八年刊行。由朱啓鈞氏作序。

二、申報民國十年二月二十三日即舊歷辛酉正月十六日有『英國醫家之中國醫學論』一電。文曰『二十一日倫敦電。巴姆堂士於皇家醫學會開會時。對衆宣讀其所撰中國醫學進步之文稿。略謂中國醫學在某數點上實居英國之前。中國有一藥書。係一千七百年前所編成者。內載藥品多種。今日為世界所通用。此即其證明也云云。表加里斯特爵士稱中國醫學進步。殊足注目。會衆聽讀完。對於中政府刷新醫學之舉動。表示同情。並允予以種種之助力。以促中國醫學之進步。』

三、一九一三年出版 E. H. Wilson 氏著 A Naturalist in Western China 中。內載一八九〇年英國自然學者布拉忒 (A. B. Peck) 來華搜集中國藥物標本。布氏暨於藥用植物多在四川峨嵋山。特親赴峨嵋山一行。得標本無數。又載一八八七年萊茵教士弗貝爾博士 Dr. Ernst Faber 為搜集中國藥用植物。特赴四川峨嵋山。居山十四日。得新奇植物種不下七十種。

日本方面

一、日本東京神州區中棧樂區町十五番地同仁會出版之同仁醫學雜誌二卷三號六十二頁載稱日本自西醫東漸以來。因制度之關係。漢醫漸次衰微。漢醫之妙理。漢藥之奇效。有偶西醫而上者。於是數年來提倡振興漢醫者。屢出。此番帝國議會開會中。提出關於振興漢醫之請願者有二。其一為請願設立『國立皇漢醫方研究所』之件。請願者為京都府愛宕郡修學院村。高木源次郎。外一千九百三十七名連署。介紹員為政友會之川原茂輔氏。一為請願制定『漢方醫術開業試驗法』之件。請願者為台灣高雄州之陳應春。外一千一百六十六名連署。介紹員為神田正雅氏。以上二件。經在分科委員會審議。二月十九日決定有理採擇。不日將付之本會議討論云。

二、德國藥學博士黃勝白著『與國人談藥』一文內云『本草綱目一書實為吾藥界可貴之著作。大可供參考之用。吾嘗見精印本草圖繪一書。其印刻之精。彩色之鮮艷。令人愛不忍釋。及觀其註解。知為日本人所翻印。今日藥學實為吾國利源之所在。乃國人不知開發。而為鄰國所竊取。代為之謀。其大利之損失。將如何耶。』

三、日本維新以前。盛行漢醫。維新後漢醫雖廢。獨不廢漢藥。精研中國藥學。發明無數特效藥。全世界醫藥界咸為震異。日本新醫藥觀第二卷第六期載『此次日本第八屆醫學大會。武田長兵衛氏代表某大藥廠對中國醫師代表演說。略謂敝公司自創辦以來。已有一百五十餘年。初時專售漢藥。和中國的藥行無異。後因醫術變遷。一轉而販賣洋藥。最近二十年。尤致力於研究漢藥製造。今則試驗部研究所製藥總廠等。均經成立。規模粗具。製品漸繁。仿造二字。略可類脫。今後敝同人當本我所長。以獨特之研究製品。供給於諸先生之前。敢乞倍加援助。又本人對於皇漢醫藥古書。立意竭力搜求。目今在日本國內及中華方面所購得者。雖已不下二千餘部。價值日金七萬元。然以中華面積之大。在本人實難一夕徵集。素諗諸先生友交廣闊。擬懇隨時指示。以便向購。而遂我素志云云。』

美國方面

一、近年歐美不乏研究漢醫之輩。且承認其效果。而尤傾倒於本草綱目。如麻黃用為發汗劑。已證明效能。嘗第三次太平洋學會開會時。據美代表之調查。麻黃亦可強壯心臟。又西芹認喘息用阿爾來那林注射。僅一時暫止。而麻黃治療喘息。二千年前已用之。又知雞肝凡治肺病。龍骨治瘰癧。鉛丹去蝨蟲等。（素著現代國醫之趨勢）

二、江亢虎所著中國文化對於西方的影響。謂『美國政府和學者。近年着實注意中國學問。他們的農部。因為有幾種植物。科學家研究不出他的性質和能力。我們本草（按即中國藥書）上所記載的。卻非常詳明。試驗起來。更是非常靠得住。因而對於中國本草和植物名實圖考一類的書。特別注意。年派專員。從事研究和實行實驗。』

三、西醫不善治糖尿病。華醫陸仲安重用黃耆而治。美國人襲其法。製黃耆精。口外黃耆近年因以大貴。（田桐著

中華民族與廢論第六頁。

著名西醫俞鳳賓君記陸君治胡適之先生糖尿症方藥一文云。胡適之先生患腎臟症。尿中含蛋白質。腹部腫痛。在京中延西醫診治不見效。某西醫告以同樣之症。會服中藥而愈。……乃延中醫（陸君）處方。數月全愈。藥方爲『生耆四兩。雲苓三錢。澤瀉三錢。木瓜三錢。西黨三兩。酒芩三錢。法夏三錢。杭芍四錢。炒於朮六錢。山萸六錢。三七三錢。甘草二錢。生薑二片。』此係民國九年十一月十八日初診之方。治至十年二月二十一日止。藥方。

四、威爾遜氏 E. H. Wilson 於一九〇三年十月十二日赴四川峨嵋山。採取大黃黃連 *Coptis Chinensis* 及當歸等。見 *A naturalist in Western China* 中。E. H. Wilson 著。一九一三年出版。

五、順天時報云。駐美特約通信員云。『從來所用中國藥者。並未經科學的製造。惟就五千年來之研究與經濟。實決不可以輕易視之。其有熱心研究之德國人。已於三四十年前。着手調查華藥。近年來。聞已用華藥爲原料。以科學的方法。所精製之藥品。出現於市上。最近在美國西海岸地方。對於華藥之信用。幾有與日俱增之勢。美人繪費於中醫之藥價。已達意外之巨額。聞目下中國醫。以藥店之形式爲人治病者。在美國桑港最多。』

六、世界新聞社譯舊金山美報云。外國各教會。洛克番勒基金會。國際聯盟會。及其他機關。歷年耗費百萬元。輸送西方藥材至中國。彼等之年報中。咸稱中國如何信任西方之藥。而舍棄中國之舊醫術。然而此間沿太平洋海岸。中國藥材及奇效之醫術。及日益推廣。蓬焉勃焉。其傳播之遠。有如一種新宗教。新式建築之中國醫院到處皆是。美國人紛紛前往就診。所付中國藥材之費。已不下數十萬元。往此等醫院就診者。道趾相接。醫生應接不暇。至須預先掛號。方得診視之機會。此中國醫生者。總病人述病狀。彼輒領首。表示明瞭其病之所由起。彼卽擬一藥方。或與以一種濃煎之茶。病者飲之。疾良已。最近兩月內。舊金山一埠之華醫。已有七人。因診所狹小。不敷營業。不得不改租巨屋。且竟有一人租住三層樓者。其生涯之發達。尙可異也。

國聯方面

一、民國二十年六月三十日新申各報東京電云。去年五月國際聯盟保健委員會。日本委員宮島幹之助博士。爲介紹中國數千年來所傳漢法藥並漢藥劑之科學的價值于全世界爲目的。提議將中國及日本現存之國內漢法藥委員會。移爲國際的。以便與關係各國諸研究機關聯絡。以圖進行研究之一案。經報告於五月聯盟理事會。滿場一致可決。結果今回由聯盟保健委員會內。設置一漢法藥特別委員會。蓋此委員會。將特選在植物學上。有經驗智識之藥學界權威者。由中國及日本各選任二名乃至四名。由印度選定二名。歐美諸國中選出五名爲委員。依此構成之。國際聯盟委員長賴希萬氏對於日本。經由外務省。照會於內務省赤木衛生局長。令選定日本一役之委員事。內務省近將就全國藥學會之權威者。加以適當詮議。然後回答於聯盟。（新申各報均載）

右爲余歷年扎錄所得。考之世界醫學。離健全之境甚遠。特效醫物。寥寥可數。無藥醫治之病不知凡幾。中國藥物。效驗卓特。當然爲世界醫界所認爲新發現之無盡寶藏。是以中藥出口數量年多一年。於是可知中國藥物。乃吾國絕大問題。余爲中國人。而又爲研習中國醫藥者。對此偉大工作。焉能旁觀坐視。日譯本草綱目盛行於世。世人均疑此東方藥學巨典。乃日本著作。寧不可恨。况本草綱目爲明代作品。搜求過濫。水有四十三種。土有六十一種。甚至日用器物。均列爲藥品。每一藥品。其文字質量。十分之五六爲最無意義之附方。對於種植形態辨僞效能用量。均非所尙。且自李氏時珍以來。閱時三百餘年。化學實驗之印證。藥物產地之變化。舊藥有絕種失傳者。新藥有陸續發現者。以是近人同感李氏綱目。已不合於近世應用。余於

七年前。對此整理中藥文獻工作。有深切之注意。日以搜集藥料爲樂事。積之三年。得參考書籍近二百種。藥學上有價值之論文凡一百八十篇。藥物標本凡五百餘種。搜集愈富。愈覺中國藥學問題之偉大。勢已不容不從事。邏輯整理以貢獻於世。然茲事體大。豈淺薄之流所能勝任。余習醫不過十餘年。年少識淺。安能任此偉大工作。不敢率爾操觚。壯念屢生屢消。旋經南海康有爲先生嚴詞督促。梁啓超先生以長函爲示。章太炎先生亦深加贊同。且賜以序。而其間先師姚公鶴先生訓導擘劃之力尤鉅。遂決定集合中國醫藥研究社同人。編纂中國藥學大辭典一書。歷四年而全書告竣。編輯既竟。檢閱數四。三百萬言中未發現之錯誤。當然不在少數。惟嚴守述而不作。寧缺毋濫之意。或亦足爲當世藥學彥碩。得一比較排列整齊之草案。而業醫藥學者亦可得一材料較豐之中藥辭書。尤有望者。希冀世之科學專家。西醫藥家。對中國藥學。引起研究興趣。進而作中藥科學化之真實工作。則中國科學地位之增進。農村經濟之恢復。皆所賴焉。

本書吳善慶先生助編之功績最鉅。尤學周先生修訂數四。李君樸駐杭州圖書館抄錄孤本藥籍。孟君琪生至北平圖書館亦專抄錄孤本藥典。搜集藥物標本最出力者爲孫文毅先生。上海藥材行方面以費庭華先生之指揮。在在予以便利。藥肆慨借飲片者。爲蔡同德堂同春堂等。廣東方面以

產藥豐富。余特赴廣東一行。又得粵醫鄺光漢先生之助。得標本十餘色。四川之行未成。川蜀亦爲產藥之富源。有醫友李大生先生窮搜冥索。亦得原株標本十餘色。繪藥者爲費立凡君。吳明時君。周志遠君。江風君。門人金哲明君。李生春君。袁杏佛君。則助理抄寫稿件。製作標本。編排次序。無役不預。各如余之左右手。附誌於此。以留紀念。尙有醫界前輩俞鳳賓先生。丁福保先生。陸士諤先生。均作精神上之贊助。其他友人有借錄名貴藥籍者。各省同學及醫友神交。有代搜道地藥物標本者。日本醫友有代搜日文漢藥圖書者。各方熱烈贊助之殷。皆以赤誠相見。均已發出謝函。先後凡三百起。名不備錄。

民國廿三年十月一日上海陳存仁謹識

編輯例言

一、本書搜集古今藥學、醫學、植物學、礦物學、動物學、及化學之關於中國藥學材料。完全以科學方法整理刪選。分條纂述。所有舊有藥學上之科學材料。及近世化驗發明之新學說。盡量採入。而以辭典之方式編纂而成。故名中國藥學大辭典。

二、本書注重實際理論。不尙空言。金、元以來之五行玄談。絕對認爲中國藥學上之障礙物。盡量廢棄。

三、中國藥品。別名最多。歷來醫書。主名別名。互相通用。故同一藥品。主名互異。或一藥而有數名。或一名而有數藥。近人主張統一藥名。誠爲切要之圖。本書博考藥品名目。取其流行較廣意義較正者。定爲藥品主名。所有該藥之學說理論。詳列於此主名之下。其餘名目。或爲古籍別名。或爲處方用名。一概另立子目。檢查者如查得別名。皆須另查主名爲準。如丁香爲主名。凡以公丁香、雞舌香作檢查者。則於該條中說明此爲丁香之別名。須查丁香條。此爲統一古來醫書藥名之考核工作。爲本書對中國藥學上貢獻之一。

四、本書對於圖畫部份。頗爲注重。常用藥品及重要藥品。繪爲五彩圖畫。用三色版精印。次要藥品及應以立體圖形表示者。則以攝影寫真。用單色銅版印。比較冷僻而不常用之藥品。則繪以鋼筆畫。製成鋅版。插入文字中。以便隨時對照。間有藥品若干種。爲詳盡起見。則彩圖攝影畫稿三者並見之。

五、本書對於常用之藥品。記述不厭詳盡。每品平均約二三千字。冷僻藥品則三五百字不等。

六、常用藥品。首述命名之意義。次處方用名。次古籍別名。次外國名詞。間有用原名學名等以資考證。次為基本產地。形態。種植。性質。成分。效能。主治。歷代記述考證。辨偽。近人學說。配合應用。用量。參考資料等項目。如不能釋明命名之意義。或外國名詞未經譯出。或產地。成分不詳者。則該項子目缺出。如另有新材料若『種類』『國外學說』『施用宜忌』等則另行加入。

七、處方用名。為醫生處方時所用之名目。如『上湘軍』即大黃。『上廣皮』即橘皮。繁用之藥品。恆有十餘名目。均為社會上所流行。而於古今書籍中所遍查不得者。今特廣為載入。並以其首字筆劃。另立條款。以備查檢。

八、本書對於『古籍別名』一項。詳為考核。並於每一別名之下。註明出處。以詳來源。惟古名繁多。頗多近世所不用者。本可刪除。然本書為檢查者完備起見。不得不博考羣籍。應有者盡備之。

九、『外國名詞』一項。以外國已有其名之藥品。一一列入。首列拉丁。以為標準。次英、德、日等。其僅有學名者。則列學名一項。

十、『基本』一項。乃表示該藥品之取材基本。如植物品之何科何屬。所用為根部、枝部、葉部。

十一、『產地』一項。乃詳述其生產之地。并說明以何省何處為最道地。

十二、『形態』一項。乃述其形狀姿態。如植物品則述其原株生產形態。葉何色何狀。枝莖何狀。根部若何。種種

詳細。殫述靡遺。

十三、『種植』一項。乃述其種植方法。繁生過程。栽收時序。本書對於繁用藥品。如蘇葉、半夏、薄荷、丁香之類。記載特詳。多經實驗。以備研究農村生產者之需要。

十四、『性質』一項。乃述其藥性質地。屬寒屬熱。何氣何味。有毒無毒。

十五、『效能』一項。乃記述近世藥學化學家化驗之結果。及臨牀應用之生理效能。凡經國內外專家試驗已經發表其報告者。盡量採入。

十六、『成分』一項。乃詳述該藥之何種成分。採取最近中外各國所最新研究而得者。

十七、『主治』一項。乃述其主治病症。此條以本經為根據。如為本經所未有之藥品。則以別錄或歷代名醫所經驗之著述為根據。

十八、本書對於張仲景氏引用之藥品。特列『張仲景之發明』一條。以示醫聖實驗之重要。

十九、『歷代記述考證』一項。乃搜集古來所有書籍。凡關於論及此一藥品者。一律採入。依其歷朝先後為序。唐宋元明清分別標明。務使歷代數十專家之理論。無數書籍之記載。盡錄於一二頁之中。以最經濟之編輯方法。予檢查者以絕大貢獻。

二十、『辨偽』一項。詳記市上該藥以偽亂真之情形。辨別真贋異同之點。如秦鏡燃犀。俾檢查本書者。得一正

確之辨別法。惟藥品中大率以貨價昂貴者最多。賤品貨價較低者。必貨多質賤。絕少作偽。故普通藥品。此項恆缺。

廿一、『近人學說』一項。記述近人對於本品研究之結果。間有許多新發明之言論。以改正歷來舊說之誤點。

廿二、『配合應用』一項。記述該藥臨牀應用時之配合組織。大率以經驗藥方爲準繩。

廿三、『用量』一項。記述臨牀應用時之低量及高量。本項以近人應用習慣及經驗所得爲標準。惟病人南北體質不同。容有高下出入。故以閱者足資參考爲度。其餘材料。無可歸類而又未便割愛者。則列入『參考資料』一項中。

廿四、本書引用古今學說。各註明書名。著名之書籍。依通常習慣。恆註以簡名。如本草綱目簡稱綱目。流傳較少之書籍。則盡舉其原名。引用個人之學說。恆註以人名。亦有人名書名須並見者。則並註之。

廿五、古籍別名。有一名而有數藥者。則分別註明出處。一一列舉之。

廿六、藥品俗名。或處方用名。或簡筆便名。亦仿古籍別名。各備條目。以便查檢。惟註明該藥主名。須查主名條。

廿七、同一藥品有葉部、莖部、子部、根部。性質不同功效互異者。則分條記述。如『人參』、『人參葉』、『人參鬚』之類。

廿八、近世醫家常用之藥品。僅數百種。檢查時大抵不出此數範圍。故以常用之藥品。另編索引一通。以便查檢。

廿九、本書排比之法。以首字筆劃爲序。少者在前。多者在後。首字相同者。則以次字筆劃爲序。劃數相同之字。從康熙字典部首爲序。

伊任仲仰交

立禾示石矢日皮白申甲由田生甘瓦瓜

六畫

四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	三	三	三	三	三	三	三	三
七	七	七	七	七	七	七	七	三	三	三	六	六	六	六	五	四	三	三
五	五	五	五	五	五	四	四	二	二	二	一	四	四	四	一	四	八	四

目

地因回向吐后名同吊吉合吃印卉列冰再共全光休伐伏

四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	七	七	七	七
九	九	八	八	八	八	八	八	七	五	五	五	五	一	一	一	九	九	五

次

死次枕柴朴朱有曲早收扞托戎戌年州安守妃如好夷多

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	四
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	九
八	八	八	八	五	四	四	四	四	四	四	二	二	二	二	〇	〇	〇	〇	九

肌耳老羽冲尖巨未宅白羊米竹百犴狽豺豺牟牝灰池江

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
四	四	三	三	三	三	三	三	三	三	二	一	一	一	一	一	一	〇	〇	〇
〇	〇	九	九	九	九	九	九	九	〇	六	九	〇	〇	〇	〇	〇	九	九	八

初冷冶兌佛何低伽伯串 西衣行血艾舌芳至自臣肉

七畫

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	五	五	五	五	五	五	五	五	四
七	七	七	七	六	二	二	一	〇	〇	〇	五	五	五	〇	四	四	四	三	〇

二

妓夾壯坐坎均囧臬呂呀吻吹吸吳舍吟君卵助利刳別

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	七	七	七	七	七	七	七	七	七
五	五	五	五	五	四	四	四	四	四	四	四	四	八	八	八	八	八	八	七

東柿杭服朋昔昏明昌昆於放招拙拖拔拒拋拙押抹抱承

七
○ 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六
九
一 九 九 九 九 九 九 四 三 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇

目

泔泊沿治油沸河壽歧武枝果林枕析扶榜枇板松槐梳杲

七
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇
五 五 五 四 四 四 三 三 三 二 二 二 二 二 二 一 一 九 九 三 三 三 三

次

玫珽狷狙狗狻獬狐狎狀物收牦版炙炒炎炊注泥波泡法

七
二 二 二 二 一
六 六 六 五 九 九 九 七 七 七 七 七 七 七 七 七 六 六 六 六 五 五 五 五

琴菱芋芥菽菜芡芝芙茁舍肺肥羌笏空袖祁祉知直肝的

七
四 四 四 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 二 二 二 二
一 一 一 八 八 八 六 六 五 五 五 五 四 二 二 〇 〇 〇 〇 〇 七 七 七 七

阿門長金采邵返近迎瓠虱虹虎茵葵芹芸芳花菱芮芭莞

七
七 七 七 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 一
三 三 二 四 四 四 四 四 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

四

咬叛厚卽卻南勃前削冠信俠促保便侯 青雨佳附陀

九
臺

八
二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 五 五 五 一 一 〇 〇 〇 〇 九 九 九 九 七 七 七 七 七 七 七 七

革面降重郁郟迓迦軍赴負貞衍窰虻虺菜茈菱菲茅茄范

九
—
九 九 八 八 七 七 七 七 七 七 六 六 六 五 五 五 五 五 四 四 四 二 二

目

員原剛凍凌兼保倭倚倒倍個倉偃俳修 香食飛風韭

**十
畫**

九
四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 三 二 二 二 一
九 七 七 七 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 六 五 三 九

次

挾振拳息徑徐席師峯峭射家宵害宮娑奚夏城埋壘喇唐

九
五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四
六 六 五 五 五 四 四 四 四 四 二 一 一 一 一 一 一 九 九 九 九 九

桃桂筵栽格根核榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭

九
六 五
三 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 六 六 六 六 六

烙烘烏烈涎涓濕浸海浴浮浣浙泰氣般柏桔菜榘桑桐桃

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九
—
一 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 七 七 七 六 六 六
八 八 三 三 三 〇 〇 〇 〇 〇 九 九 五 五 四 四 四 四 四 四 九 九 九 九 九 八

六

秘神祝秘破矜砭砭砭砭砭真盍益皋病玻班珠狼狻特熘烟

〇
—
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 一
九 六 六 六 六 六 五 五 五 五 二 二 五 五 五 五 五 四 一 一 〇 〇 〇 〇 八

脂能耿胭耕耆殺羔缺索素紙紗純納紋粉笋柜稅秧秦

目

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四三
七七七七七七七六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

茼茺茹茸茶茵茵苕茶茯菱茨葦葶莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢

次

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
七七七七七六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

虬蛭蚘蚓蛟蚰蚌蚊蠅虺藥茵荒荏莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

陟陝針釜釘酒郢郎逆追軒起迷貢豺豹豕訓蚩蚩蚩蚩蚩

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

噉參區瓠勒剪兜側做偏假偃乾 十一畫 鬼鬲高骨馬隼隻除

七

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
五五五五五四四四四四四四四四四四四四四四四四四四

常帶巢崖崑屏尉將寇密寄宿婪婢婆董堅聖執國問商啄

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
四四四四四四四四四四四四四三三三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三五五

確短盜盛敝發登痛疏匿異畫番琪琥獬猴猯狨猩獬獬獬獬獬

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

目

絳絲統給絡結粢粟答筐筒筋筆筆童稞硬稍稭程稂稊硫碑

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三四三四三四三四三四三四三四三四三四三四三四三四三四三四
六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四六四

次

菌莽菠菟菝菜菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三六三六三六三五三五三五三五三五三五三五三五三五三五三五三五
六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六

蒨葵萍萌萋萊胝蕘草蒸菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽菽

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三七三七三七三七三七三六三六三六三六三六三六三六三六三六三六
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

賁貽買貴貓貂象訶蛭蛭蛤蚌蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭蛭

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三八三八三八三八三八三七三七三七三七三七三七三七三七三七
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

雲雅雄雁階隊隈陽閑閨開釧鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇鈇

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三九三九三八三八三八三八三八三八三八三八三八三八三八三八
一一一一一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一〇

厥 嬖 嫁 塔 塌 塊 圓 嗎 虞 盪 勤 僂 催 亂

黑 黍 黃 髡 髡 須 順

十三畫

一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二

一一四三六
一一四三五
一一三九五
一一三九五
一一三九五
一一三九五
一一三九四
一一三九四

目

楔 榷 楓 楊 椿 楫 椶 榫 榔 會 暈 新 撤 槌 搜 搖 慎 感 愛 微 彙 廉 盧

次

一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二
一一四四二二

滑 滋 滂 溼 溺 浴 洩 溪 溫 殿 榭 楸 楮 榎 櫟 榆 楠 枋 棟 椈 楛 楚 楸

一一四六〇
一一四六〇
一一四六〇
一一四六〇
一一四六〇
一一四六〇
一一四五九
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七
一一四五七

當 瓶 瑟 瑞 瑒 瑒 獅 猴 搏 猺 犏 煨 焪 照 黏 煉 煨 煤 煙 煎 滌 溜 源

一一四六五
一一四六五
一一四六五
一一四六五
一一四六五
一一四六五
一一四六四
一一四六四
一一四六四
一一四六四
一一四六四
一一四六四
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三
一一四六三

經 絹 粳 梁 筵 筧 娼 窠 窟 稔 稚 稠 稗 禁 碎 礪 磬 碗 碗 矮 睢 睡 痰

一一四七五
一一四七四
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二
一一四七二

一

葡 蒟 蒟 葛 葳 葳 葳 葳 葳 葉 蒟 落 蔞 蒿 蒟 萱 萬 腹 腰 腦 聖 義 綸

一一四八八
一一四八八
一一四八七
一一四八三
一一四八三
一一四八三
一一四八二
一一四八二
一一四八一
一一四八一
一一四七八
一一四七七
一一四七七
一一四七七
一一四七六
一一四七五
一一四七五
一一四七五
一一四七五
一一四七五
一一四七五
一一四七五
一一四七五

潮潭潞漿檝榑榭樟植槎樗樓槿樊糊樂槽榭數敷撻撲撮

一六三〇
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一
一六三一

穀稻稷磳礪暝瞎皴瘡瘦瘡疽癢犖備摩熠熱熱頤澄澀潼

一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六
一六三六

藪膠膚翫翦戮羯練緬編緣線細糊樓篆簞愆節箱簪箭箬

一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三
一六四三

蔣蔞蔗萋薜蔚蕨蔗蔓藪藨藨藨藨藨藨藨藨藨藨藨藨藨

一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六
一六四六

藎蝮蟻蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮蝮

一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一
一六六一

銷醋醉醃醃鄭輪質賈賤賜隸腕調褊銜蝻蝻蝻蝻蝻蝻蝻

一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六
一六六六

目

次

一四

鋪 鮓 鮓 鮓 鮓 魏 駢 馥 錫 題 鞭 雞 萑 雙 鎮 鎖 鎊 替 醫 競 蹕 摸 豐

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

甍 甍

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

譽 齋 瓊 獸 蠱 瀝 瀘 撥 櫟 櫛 欄 櫓 曠 擬 攀 懷 嬾 韃 驗 勳 駟

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
十九畫

薄 藿 藪 藷 藩 藥 藤 藜 藎 藪 蕙 藕 藺 臘 扇 羅 繭 繫 繩 箴 箝 械 磔

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四

鏐 醯 醢 邊 蟻 踴 積 識 蠍 蝟 蠹 蠅 蠶 蟄 蟾 螫 蟻 蟻 蟻 蟹 蟻 蝗 藹 藹

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

鵬 鎔 錯 鏗 鏘 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨 鯨

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
七四七四七四七四七四七四七四七四七四七四七四七四七四
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

目

次

一八

目

儲懸寶 二十畫 慶馨遠迥麗腐麒雛鷗寫鶻鶻鶻鶻鶻鶻鶻鶻

一
八
七
八 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四

麓蘇蘆蘅蕲蘇藿諸騰器糲稽穢礪礦整翮筆爐榑榔檣

次

一
九 八
〇 九 九 九 九 九 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八
〇 六 一 一 一 〇 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八

鯪鯽鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪鯪

一
九
〇
九 七 七 七 七 七 七 七 七 七 五 五 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇

二十一畫

飴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴醴
一
九
七 七 七 七 七 二 二 二 二 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇

龍蓊藥蕘糗續纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈纈

一
九
四 三 三 二 二 九 九 九 九 九 九 八 八 八 八 八 八 七 七 七 七 七 七 七 七 七

一九

鯪鯪鯪

一
九
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 二 二 二 二 五 五 五 五 五 五 四 四 四

饑	藎	孳	二 二十六畫	盪	爾	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	觀	蠻	蕪	蕪	櫻	
一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九		九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
七	七	七		七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
三	二	二		二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二

目

饑	藎	孳	二 二十八畫	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	二 二十七畫	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯
一	一	一		一	一	一	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九		九	九	九	九	九	九		九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
七	七	七		七	七	七	七	七	七		七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
六	六	六		五	五	五	五	五	五		五	五	五	五	五	四	四	四	四	三

次

鶯	鶯	鶯	二 二十九畫	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯	鶯
一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九		九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
八	八	八		八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

二

一 薑


【一寸樓薑】即露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「露蜂房」條。

【二丈紅】即蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【二帆青】即蜘蛛香之別名。典見植物學大辭典。詳「蜘蛛香」條。

【一杯慧】即薺鷲之別名。典見動物學大辭典。詳「薺鷲」條。

【一枝香】產地 江西廣信。形態 鋪地而生。葉如桂葉而柔厚。面光綠。背淡有白毛。根長三四寸。色蒼。



香 枝 一

主治 治小兒食積。

【一枝黃花】產地 以江西山坡為最多。

形態 獨莖直上。高尺許。間有歧出者。葉如柳葉而寬。秋開黃花。如單瓣寒菊而小。花枝俱發。茸密。

一 薑 一

無際。望之如穗。

主治 洗腫毒。

【一枝蒿】產地 出新疆巴里坤之深山間。

形態 一枝蒿為山草類之一種。一莖出土。無枝無葉。氣味如蒿。可供藥用。

採取 四月間採之。煎膏用。

主治 活血解毒。驅風理怯。去一切積滯。沉痾。陰寒諸疾。

【一枝箭】即兔耳一枝箭之簡稱。典見綱目拾遺。詳「兔耳一枝箭」條。

【一洞仙】即抱雞母之別名。詳「抱雞母」條。

【一根草】即木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木香」條。

【一捻金】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。

【一捻紅】即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【一粒金丹】古籍別名 洞裏神仙。野廷胡飛來牡丹。綱目拾遺。

形態 一粒金丹為雜草類之

二 薑 丁

一種。葉似牡丹而小。根長二三寸。春開小紫花。成穗。似柳穿魚。結子於枝間。生青者。黃。落地復生。小枝其根下結有小粒。年深者大如指。小者如豆。其根上所生之子。可供藥用。

採取 以紫花者用。其有一種黃花者。乃蕪屬。根上亦無子粒。採時不可誤用。

主治 治跌打損傷。去風氣。消癰腫。便毒。天蛇毒。鴉翅毒。搗敷火丹。痔腫。風痺。閃挫。腰痠。癰腫。毒初起。搗汁和酒服。

【一連條】產地 生四川建昌。形態 一連條赤莖。長枝獨葉。葉如苧麻而尖長。面青背白。細紋微齒。其幹葉可供藥用。

主治 搗敷腫毒。

【一莽果】即蜜望子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜜望子」條。

【一葉】即蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「蜘蛛香」條。

【乙切草】即弟切草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「弟切草」條。

【乙金】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鬱金」條。

【乙鳥】即燕之古籍別名。詳「燕」條。

二 薑

【丁子】即丁香之古籍別名。和漢藥考。詳「丁香」條。

【丁子香】即丁香之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳「丁香」條。

【丁子草】即水甘草之日本名。詳「水甘草」條。

【丁公寄】即南藤之古籍別名。典見別錄。詳「南藤」條。

【丁公藤】即南藤之古籍別名。典見別錄。詳「南藤」條。

【丁年藤】即木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木通」條。


【丁癸草】產地 東江。四月生。性質 甘溫。

主治 敷大瘡。解熱毒。散癰疽。治疔疾。合諸瘡口。亦治蛇傷。

【丁香】命名 雖舌香人以其似丁子。故呼丁香。曰丁香者。簡稱也。

處方用名 公丁香。母丁香。

一



古籍別名 雞舌香(別錄)丁子香(嘉祐補註本草)丁子如字香(素問香)百里香(瘦香嬌)瘦香娘(和漢藥攷)

學名 *Caryophyllum*.

外國學名 *Cloves*. (英)

Gewürznelken. (德)

基本 屬桃金娘科丁香樹之花蒂。

產地 爪哇山藥物生產辨云。丁香大花者來自荷屬中花者來自印度羣島。俱由架刺吉打運出。檳榔石助而來。以花頭壯色紅為上。七八月新。



香 丁

形態 丁香樹係生熱帶地方之圓錐形常綠樹。幹直立。高二丈餘。葉對生。作長橢圓形。前端尖。邊緣無鋸齒。作不正波濤狀。花略作傘形。有淡紅色花瓣。實為長圓形。肉果作革質。花蒂乾燥。長三寸。

餘。粗一分許。作長圓柱形。下方稍作方形。萼瓣缺裂為四。質柔韌。似革質。有濃褐色脂肪狀光澤。實體之前端。分為二房。中藏多數卵形。氣味俱有一種芳香性。

種植 種丁香之法。先將此等核果。橫平壓入泥土。約半英寸深。每粒相離一英寸。播種後。歷時約一月之久。便發萌芽。當嫩秧發出。小葉兩對或三對之時。宜由播種箱內。將其掘起。移栽於竹盆內。所用泥土。宜含腐壤及鬆沙。務須宣洩水氣。裝載嫩秧之竹盆。宜放於硬地之面上。用蘆蓆遮蓋。以避陽。其蘆蓆須離地五英尺高。以便灌溉。嫩秧將變老時。宜將所遮之陰。逐漸遷去。俾嫩秧漸漸堅硬。預備移栽於園圃。灌溉時。極宜細心。因丁香樹由始至終。生長時期。不能抵受泥土中之過份水氣。若水道疏通不透。嫩秧則落其葉。停止生長。種仁發芽後。若料理妥當。由六個月至八個月時期。可以生長至六英寸高。及發出嫩葉。約有十對。至此時期。可以移栽。嫩芽於園圃矣。種植距離之點。每樹相離

廿英尺。三角形勢。如此則每一英畝。可栽丁香樹一百廿四株。若欲此樹生長迅速。從早繁殖。宜在地上挖掘窩穴。每穴橫直二英尺。深二英尺。穴中所挖之泥。宜將其運出。乃將糞爛牛糞。混雜於糞土。或地面鬆土。填補所掘之窩穴。栽種嫩秧後。宜將青葉等物。豎立附近。以為遮蔭。栽種時期。最適宜者。莫如陽曆十月至十一月。蓋此兩月。雨水調勻。可免亢旱。礙及嫩秧之生長。但無論如何留意。亦難保嫩秧之萬全無失。自後必須繼續補種。當雨水時期。以陽曆四月為最。須將種植地段查察。所有枯萎嫩秧。須要補種。西元一九二三年三月。南洋沙試驗場。開始種植丁香。其地段約四英畝。半在山崗下。端略斜之地。面向東方。該處泥土。乃屬一種石英土質。(Dunak, Isig Typo)。其土壤。乃是黃泥。而兼鐵礬土者。(Laterite)。因泥濘窩穴方法。(Site Preparing System) 尚不敷用。故當一九二九年。至一九三〇年。再造外線堤園。(Coh. Soil Ditch) 以收藏水道。至一

九三〇年十月時。再開地段三英畝。以推廣種植之用。所掘之泥。闊二英尺。深二英尺。但每坑至三十英尺計長。離二英尺。然後再掘別泥。所掘之泥。宜放於坑之下端。方面。欲令堤園堅固。須將糞泥。填實。復將地地華草。(Vetiver Grass) 之割草。栽種上面。每壟相離一英尺。威地華草。最合此等作用。因其勿莖不蔓延。別處。易於料理。且其根粗壯。而深入泥土。能令堤園堅固。而不崩壞也。丁香樹根。強稠。密生於土中。吾人由經驗所得。已有兩度疑問。第一疑問。覆土植物。能侵奪主要植物之生長。若種於丁香樹附近。頗不適宜。第二疑問。耘草時。最易傷害丁香樹之核強。尤不可不慎。檳榔嶼種植丁香樹。多在當陽之地。丁香樹施肥。頗為重要。每年施用磷精 (Ammonia) 以作肥料。挖入泥土。掘成小坑。但須隔遠。不傷其根。則丁香樹定然暢茂。在沙駁地方。每株丁香樹。施用磷精三安士。比於不施肥之樹。異常壯苗。當丁香樹長大之時。施用牛糞。或別項糞。爛有糞土。亦

頗相宜。凡施用有機物質 (Organic Matter) 以作肥料。須將其摻入泥土。離樹之面上正根頗遠方可。

種類 一粒小爲雄。雄爲丁香。而味濃香。又稱爲公。二粒大爲雌。雌爲雞舌。而味淡香。又稱爲母。

採取 二三月間。其花蕾或採摘。或擊落。煙薰日曬。使成褐色。

製法 雄者煎背。中用之。去丁。薏乳子。免發背癢。雌者類大如棗核。力大。不可見火。宜去粗皮用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 含有揮發油。加里奧費魯林 (Caryophyllin) 膠質。樹脂。單萜。萜酸。水楊酸等。

效能 溫胃。煖腎。止嘔逆。除嘔。用作香竄。衝動藥。及健胃驅風藥。或霍亂吐瀉。與寒冷之腹痛。胃空痛。初期霍亂痛。

二畫 丁

受激動而興奮。心臟之跳動亦同時亢進。與霍亂前相遇。能停止其運動。而使之呈麻痺狀態。或竟由麻痺而死。

主治 溫脾胃。止霍亂。攪腹。風毒諸腫。齒疔。癰。能發諸香。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論丁香曰。風濕骨痛。勞臭殺蟲。辟惡去邪。治奶頭花。止五色毒刺。五痔。【唐】韓保昇蜀本草論丁香曰。療嘔逆甚驗。【宋】大明日華諸家本草論丁香曰。治口氣冷。

氣。冷勞反胃。鬼疰。蠱毒。殺酒毒。消疔。疥。療腎氣奔豚。氣。陰痛。腹痛。壯陽。煖腰膝。【金】張元素珍珠囊論丁香曰。去胃寒。理元氣。氣血盛者勿服。【明】李時珍本草綱目論丁香曰。治虛喘。小兒吐瀉。痘瘡。胃虛。灰白不發。【明】經希雍本草經疏論丁香曰。丁香氣純。陽之氣以生。故其味辛。氣溫。性無毒。入足太陽。

足陽明經。其主溫脾胃。止霍亂。攪腹者。蓋脾胃爲倉廩之官。飲食生冷。傷於脾胃。留而不去。則爲壅塞。脹滿。上湧下泄。則爲揮霍。攪亂。辛溫。煖脾胃。而行滯氣。則霍亂止。而

攪腹消矣。齒疔。癰者。亦陽明濕熱上攻也。散陽明之邪。則疔。癰自除。療風毒諸腫者。辛溫散結。而香氣又能走竅。除穢濁也。【清】黃宮繡本草求真論丁香曰。丁香辛溫。純陽。細嚼力直下達。故書載能泄肺。溫胃。煖腎。非若縮砂。仁。功。皆溫肺和中。木香。功。皆溫脾。行滯。沉香。功。皆入腎。補火。而於他臟。則止兼而及之也。是以亡陽諸症。一切嘔噦。嘔逆反胃。并霍亂。嘔噦。心腹冷疼。並痘瘡。灰白。服此。逐步閉關。直入丹田。而使寒去。陽復。胃開。氣縮。不致上達。而爲病矣。此爲煖胃。補命要劑。故逆得溫而逐。而嘔自可以止。若止用此。逐滯。則木香較此更利。但熱症則忌用。【清】黃元御玉楸藥解論丁香曰。丁香味辛。氣溫。溫燥脾胃。驅逐脹滿。治心腹疼痛。除腰腿溼寒。最止嘔噦。善回滑瀉。殺蟲解蠱。化塊磨堅。起丈夫陽弱。愈女子陰冷。又曰。丁香辛烈。溫燥。驅寒泄溼。緩中扶土。降逆升陷。善治反胃。腸滑。寒結。腹痛之證。宜用母丁香。【清】王士雄隨息居飲食譜論丁香曰。丁香辛溫。煖胃。去溼。

散寒。辟惡殺蟲。消痞解穢。已冷利。止冷痛。療虛癆。補虛陽。制酒肉魚蟹。瓜果諸毒。古人喻之。焚香。治口臭也。陰虛內熱。人忌之。【清】楊時泰本草述鈞元論丁香曰。丁香以辛味能發香之臭。即就香氣。轉致辛之用。故於脾胃冷氣。諸證。治有殊功。夫由氣熱之專。雖爲辛味。由味辛之烈。歸於香臭。是入胃實先入肺。肺氣歸於胃。則元氣無壅。關之處。而自下行入腎。其所以治病。風腫毒者。以風爲熱化。風勝即血熱已。病乎營。而風更傷其衛。故營衛不宜蘊積。而成腫也。其他味之散風腫者。未若此味極辛。極香。更以熱而從治之。大能開腠理。宣榮衛耳。

三

國外學說 日本藥局方有云。丁香係採集丁香樹未開花蕾。曬乾者。長十二至十七密米 (公毫) 作褐色。其實體頗長。作鈍四稜性圓柱形。上部具有二小房。頂端有四裂之萼。內側附有近圓形淡褐色之花瓣。包擁多數雄蕊。作球狀。壓榨之。則滲出油質。本品氣味。爲特異。較烈。芳香性。須密封貯藏。本

二畫 丁

品與水同蒸餾時。可得約三十%之揮發油。謂之丁香油。(Oil of Clove) 丁香油之新鮮者為無色或淡黃色之稀薄液體。經日較久則由黃色變為褐色。成爲濃稠液體。比重一·〇四至一·〇六。酒精及伊打善能溶解。氣味俱同。丁香曰丁香油。係丁香和水蒸餾所得之揮發油。稍濃稠。或澄明無色。或稍帶黃色。經空氣則漸次變爲褐色。有特異香氣。稍溶於水。若酒精伊打及冰醋酸等。則最易混和。比重一·〇四四至一·〇七四云。

配合應用 ●治小兒傷生冷腹痛。用丁香、砂仁、厚朴、乾薑、橘皮、草果、蒼朮、木香、麥蘖。
●治小兒虛寒吐瀉。丁香、橘皮等分。煎汁糊丸。菉豆大米湯化下。
(劉氏小兒方)

●治小兒脾胃虛寒。嘔吐不止。丁香、半夏末各一錢。薑汁浸一夜。曬乾爲末。薑汁打麩爲丸。黍米大。用薑湯下。(全幼心鑑方)
●治婦人產難。母丁香、乳香、麝香三件。用十分之三。各爲末。臘月

以兔腦和杵爲丸。如芡實大。每服一丸。酒下。(和劑局方)

●治乳頭破裂。用丁香末傳之。(梅師方) 食蟹致傷。丁香末薑湯服五分。(證治要訣方)

●治痘瘡虛寒之極。又值冬月寒氣薄之發不出者。用丁香加入陳氏異攻散。

●治暴心氣痛。雞舌香末。酒服一錢。(肘後方)

●治乾霍亂。不吐不下。用丁香十四枚研末。以沸湯一升和之。頓服。不遑更作。(千金方)

●治嬰兒吐乳。小兒百日內吐乳。或糞青色。用年少婦人乳汁一盞。入丁香十枚。陳皮去白一錢。石器煎一二十沸。細細與服。(陳文中小兒方)

●治小兒冷疳。面黃腹大。食即吐者。用母丁香七枚爲末。乳汁和蒸三次。薑湯服之。(衛生易簡方)

●治胃冷嘔逆。氣厥不通。母丁香三箇。陳橘皮一塊。去白。水煎熱服。(十便良方)

●治反胃吐食。用母丁香一兩爲末。以鹽梅入搗和丸。交子大。每

噉一丸。(袖珍方)

●治朝食暮吐。用丁香十五箇。研末。甘蔗汁薑汁和丸。蓮子大。噉之。(摘玄方)

●治反胃關格。氣噎不通。用丁香、木香各一兩。每服四錢。水一盞。半煎一盞。先以黃泥做成盤。瀝藥汁於內。食前服此方。(德生堂經驗方)

●治傷寒呃逆。及噎逆不定。用丁香一兩。乾柿蒂焙一兩。爲末。每服一錢。煎入參湯下。(簡要濟衆方)

●治毒腫入腹。雞舌香、青木香、薰陸香。麝香各一兩。水四升。煮二分。二服。(肘後方)

●治婦人崩中。晝夜不止。丁香二兩。酒二升。煎一升分服。(梅師方)

●治婦人產難。母丁香三十六粒。滴乳香三錢。六分爲末。同活鬼膽和杵干下。丸作三十六丸。每服一丸。用好酒化下立驗。名如意丹。(頤真堂經驗方)

●治婦人陰冷。母丁香末。炒囊盛如指大。納入陰中。病即已。(本草衍義方)

四

草衍義方)

●治鼻中息肉。丁香綿裹納之。(聖惠方)

●治風牙宜露。發軟口氣。雞舌香。射干一兩。麝香一分。爲末。日搽。(聖濟總錄方)

●治齒齙黑臭。雞舌香煮汁含之。(外臺秘要方)

●治唇舌生瘡。雞舌香末綿裹含之。(外臺秘要方)

●治乳頭裂破。用丁香末傳之。(梅師方)

●治妬乳乳痛。丁香末。水服方寸七。(梅師方)

●治癰疽惡肉。丁香末傳之外。以膏藥護之。(怪症奇方)

●治桑螵螯人。丁香末蜜調塗。(聖惠方)

●治香衣辟汗。丁香一兩爲末。川椒六十粒和之。絹袋盛佩。絕無汗氣。(多能鄙事方)

●治香衣辟汗。丁香一兩爲末。川椒六十粒和之。絹袋盛佩。絕無汗氣。(多能鄙事方)

●治香衣辟汗。丁香一兩爲末。川椒六十粒和之。絹袋盛佩。絕無汗氣。(多能鄙事方)

人參一錢。生薑五片。以水煎服。

參攷資料 ①雞舌香與丁香同種。花實叢生。其中心最大者為雞舌。擊破有順理而解為兩向如雞舌故名。乃是母丁香也。(陳藏器) ②齊民要術云。雞舌香俗人以其似丁子。故呼為丁子香。(掌禹錫) ③雞舌香樹葉及皮。並似栗花如梅花。子似栗核。此雌樹也。不入香。用其雄樹。雞花不實。採花釀之以成香。出崑崙及交州愛州以南。(蘇恭) ④丁香生交廣南番按廣州園上丁香樹。高丈餘。木類桂。葉似檫葉。花圓細黃色。凌冬不凋。其子出枝蕊上。如釘長三四分。紫色。其中有粗大如山茱萸者。俗呼為母丁香。二月八月採子及根。一云盛冬生花子。至次年春採之。(馬志) ⑤雞舌香。唐本草言其木似栗。南越志言是沉香花。以志名是草。花茂生。實熟。貫之。可以香口。其說不是。今人皆以乳香中揀出木質似栗核者為之。堅頑枯燥。絕無氣味。燒亦無香。用療氣與口臭。則甚乖疎。不知緣何以為雞舌也。京下老醫言。雞舌與丁香同種。其

二畫 丁

中最大者為雞舌。即母丁香。療口臭最良。治氣亦效。葛稚川百一方。治暴氣刺心痛。用雞舌香酒服。又抱朴子書。以雞舌黃連乳汁煎之。注目。治百疹之在目者皆愈。更加精明。古方治疥癬。五香連翹湯。用雞舌香。而孫真人千金方。無雞舌。用丁香。似為一物也。其採花釀成香之說。絕無知者。(蘇頌) ⑥沈存中筆談云。子集靈苑方。據陳藏器拾遺。以雞舌為丁香母。今考之尚不然。雞舌即丁香也。齊民要術言雞舌俗名丁子香。日華子言丁香治口氣。與三省故事載漢時郎官日含雞舌香。欲其奏事芬芳之說相合。及千金方五香湯用丁香無雞舌。最為明驗。開寶本草重出丁香謬矣。今世以乳香中大如山茱萸者為雞舌。略無氣味。治疾殊乖。(唐慎微) ⑦宋朱太醫陳文中治小兒痘瘡不光澤。不起發。或脹或瀉。或渴或氣促。表裏俱虛之證。並用木香散異攻散。倍加丁香。官桂。甚者丁香三十枚。官桂一二錢。亦有服之而愈者。此丹溪朱氏所謂立方之時。必運氣在寒水司天

之際。又值嚴冬。鬱遏陽氣。故用大辛熱之劑發之者也。若不分氣血虛實寒熱經絡。一概驟用。其殺人必矣。葛洪抱朴子云。凡百病在目者。以雞舌香黃連乳汁煎注之。皆愈。此皆得辛散苦降養陰之妙。(李時珍)

【丁香油】 命名 本品係以芳香辛烈之油。故名。
產地 出西番。
性質 辛熱無毒。
主治 透關竅。通經絡。驅寒濕。煖下元。治胃寒病。解蟹毒。同煎湯服。祛口臭。揩牙用。

參攷資料 ①丁香油壯陽煖腎。疝痛陰寒。(藥性考) ②按齊民要術。雞舌香即母丁香。時珍所謂雄為丁香。雌為雞舌香也。丁香中雌者獨大而可取油。雄者細小不可榨取。丁香油亦近時始有其性熱而淫。凡衣飾器物。經染其氣。數日不滅。近日豪華家多珍之。為房帷用。以色紫同玫瑰。滴水中攪之。散而復聚者為真。偽者曰樟木油。色稍淡。紫中帶黃黑色。氣辛烈觸

鼻。作樟腦氣。滴沐器洗衣。或入香佩。可以辟汗。不入藥用。(趙學敏) ③丁香油塗臍散臍痞。受寒胃痛。好酒和服。(趙學敏) ④胃寒呃逆。或嘔吐甚者。用丁香油擦透。中脘痛痺。擦痛處。皆獲奇效。屢試屢驗。(金御乘) ⑤治療癰化核膏用之。取其香烈。直透經絡。辛熱以散結滯耳。(祝穆試驗方)

【丁香花露】 命名 本品係之露。故名。
性質 辛溫。
主治 清利頭目。

【丁香栝】 即君遷子。圓小如指頭者。之古籍別名。與見日本草。詳「君遷子」條。

【丁香實露】 命名 本品以露。故名。
性質 微辛。氣烈。無毒。
主治 寒滯胃病。

【丁香樹皮】 形態 狀似桂皮而厚。
性質 辛溫。無毒。
主治 齒痛。心腹冷氣諸痛。方

五

家用代丁香。

【丁香樹枝】

心泄瀉。水穀不消。

【丁香樹根】

風熱毒腫。

【丁翁】

即木通之古籍別名。與見吳普本草。詳「木通」條。

【丁樂】

即葶藶之古籍別名。與見和漢藥考。詳「葶藶」條。

【丁葷】

即雞楸之古籍別名。與見綱目。詳「雞楸」條。

【丁蘆】

即葶藶之古籍別名。與見別錄。詳「葶藶」條。

【七仙草】

草類之一種。葉尖細長。可供藥用。


【七里香】

即查七里之原名。另詳「查七里」條。即山攀之古籍別名。與見綱目。詳「山攀」條。即瑞香之古籍別名。與見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【七里丹】

產地 在廣西南安廣信山中。

形體 春時抽莖生葉。似蘆而軟。葉有間道直紋。長弱下垂。夏發細琴小葉。葉際開花如粟。紫黑色。細根結褐。可供藥用。



七里丹

主治 骨癱。跌打損傷。

【七里麻】

產地 生於江西山中。

形體 似吉祥草葉。而紋理粗直。橫根緣潤。有節。似竹根而嫩。採得可供藥用。



七里麻

主治 筋骨疼痛。

【七星草】 即胖蠶草之小者。即金星草之古籍別名。與見綱目。

詳「金星草」條。

【七星魚】

即鮠魚之古籍別名。與見綱目。詳「鮠魚」條。

【七星劍】

為多出。六月新。產地 以番禺花地。

性質 辛香。

主治 專治癩狗毒蛇惡物咬傷。理跌打。敷大瘡。

【七香餅】 即香附子之處方用名。詳「香附子」條。

【七絃琴】 即七葉黃荊之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【七葉一枝花】 即蚤休之古籍別名。與見本草蒙筌。詳「蚤休」條。

【七葉草】

古籍別名 活血丹。落得打(綱目拾遺)。

基本 本品為落得打之木本者。

主治 煎洗痰核瘰癧。搗汁酒服。療跌打損傷。疔瘡腫毒。

【七葉黃荊】

古籍別名 豬鬃草。珠于草。烏食草。烏蛇草。七絃琴(綱目拾遺) 搗搗活。放棍行。珊瑚配(俗名) 根名千秋藤。

臥草。地五爪。烏。

【七葛】 產地 出青海伊犁一帶。

產地 凡土層下陰地俱生。

形體 七葉黃荊為澤草類之一種。葉尖長相對。三四行成一瓣。莖上起稜。一凹間紫色。白露後抽心。高三五尺。開細白花。成簇。結子亦細碎。結後紅如珊瑚細珠。根長而白。名千秋藤。木本者名搗搗活。其根可供藥用。子詳見該條。

性質 甘平。

主治 療勞力傷。跌打損傷。魚口便毒。漆瘡。煎湯洗。並行血敗毒。洗一切疥癬。鬼箭風。

配合應用 治便毒。搗汁。將肥皂一個。煨存性。調酒服。渣敷患處。暴之。

治跌撲損傷。因腰挫氣痛。集。此藥方也。用烏蛇草曬乾。為末。砂糖酒調服。最凶者。加童便。須端午。日午時。收者。更效。若急。用不拘時。日。取鮮者。搗爛。服。發汗。愈。

【七葉黃荊子】

曬乾吞之。

【七葉樹】 即婆羅子之古籍別名。與見留音日記。詳「婆羅子」條。

【七葛】

產地 出青海伊犁一帶。

【七葛】 產地 出青海伊犁一帶。

【七葛】 產地 出青海伊犁一帶。

【七葛】 產地 出青海伊犁一帶。

【七葛】 產地 出青海伊犁一帶。

製法 用馬乳裝皮袋內。以繩繙口手提袋。提壓半時許。放於熱處。一夜即成。

性質 熱。
主治 補虛羸。長氣力。
參攷資料 怯弱者宜服。若日日服之。有返老還童之功。(綱目拾遺)

【乃東】即夏枯草之古籍別名。與見本經。詳「夏枯草」條。

【乃瑞草】即四方如意草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「四方如意草」條。

【七金藤】基本 蔓草類之一種。
性質 溫。

主治 中風痰迷。不省人事。半身不遂。左癱右瘓。小兒急慢驚風。
用處 大人一錢。小兒五分。

【九女春】即鹿茸之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【九子萍】即浮萍之古籍別名。與見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【九元菰】即川芎之古籍別名。與見和漢藥考。詳「川芎」條。

【九孔石決明】即石決明之處方

用名。詳「石決明」條。
【九孔螺】即石決明之古籍別名。與見日華諸家本草。詳「石決明」條。

【九日三官】即吳茱萸之古籍別名。與見和漢藥考。詳「吳茱萸」條。

【九牛草】性質 微苦。有小毒。
山岡上。 慶地 生四川筠州

形態 二月生苗。莖高。高一尺。葉似艾。圓而長。背有白毛。面青。
採取 五月採苗用。

主治 解風勞。治身體痛。
配合應用 與甘草同煎服。不入藥用。

【九仙子】古籍別名 仙女蟻。
(綱目拾遺)

慶地 出均州太和山中。
形態 九仙子為蔓草類之一種。一根連綴九枚。大者如雞子。小者如半夏。色白。二月生苗。蔓高六七尺。莖細而光。葉如烏桕。而短扁不圓。每葉極生子枝一二。莖下垂。六七月開青黃色花。隨即結實。碎子。殼如殼。精草子狀。其根可供藥用。

採取 九月間採根用。

性質 苦。涼。無毒。
主治 咽痛喉痺。散血。以新汲水。或醋磨汁。含嗽甚良。

【九死還魂草】即卷柏之俗名。詳「卷柏」條。

【九老】即鬼白之古籍別名。與見本草綱目。詳「鬼白」條。

【九白】即鬼白之古籍別名。與見本經。詳「鬼白」條。

【九尾羊角】即羚羊角之古籍別名。與見和漢藥考。詳「羚羊角」條。

【九里光】即劉寄奴草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「劉寄奴草」條。

【九里明】命名 本品功能明目。故名。
性質 苦。涼。微寒。

主治 明目去翳。消熱毒。生肌去腐。治疔疔瘡。為瘡藥之綱領。

【九里香草】命名 本品香氣濃厚。雖距離極遠。亦可嗅其香氣。故名。
慶地 南海大溼。

形態 九里香草。為溼草類之一種。正二月生新苗。其莖葉可供

藥用。
主治 肚癰。搗碎浸酒服。

【九空子】即楓果之俗名。詳「楓果」條。

【九面芋】即芋子大而美者之古籍別名。與見綱目。詳「芋子」條。

【九英菘】即蕪菁之古籍別名。與見食療本草。詳「蕪菁」條。

【九香蟲】(本草綱目)

慶地 產貴州永甯等處。
形態 九香蟲為卵生蟲類之一種。大如小指。其頭狀如水龜。身青黑。至冬伏於石下。至驚發後即飛出。捕得可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。
主治 平肝止痛。腸腹滯氣。脾胃虧損。壯元陽。

參攷資料 攝生方。烏龍丸。治肝氣痛證。久服益人。四川何卿。兵常服有效。其方用九香蟲一兩。半生焙。車前子微炒。陳橘皮各四錢。白朮焙五錢。杜仲酥炙八錢。為末。蜜煉丸。梧桐子大。每服一錢五分。以鹽湯或酒送服。早晚各一服。此方妙在此蟲。(李時珍)

【九眞膠】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳「何首烏」條。

【九華茶】即茶之產於安徽九華山者。功效最良。

【九腕葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤蘭葉」條。

【九葉草】即狗舌草之日本名。詳「狗舌草」條。

【九葉雲頭艾】即九鼎連環草之別名。典見綱目拾遺。詳「九鼎連環草」條。

【九鼎連環草】別名。九葉雲頭艾。(綱目拾遺)

產地 出自口外。及五台山諸地。

形態 九鼎連環草。爲溼草類之一種。三月生苗。係子出高二三尺。葉似艾菊。香亦近之。霜後枯。八九月間起穗。結莖類野菊。但不開花。結實。其實如野菊花心。先起疙瘩。逐漸長大。內包十餘子。子細長。小葉乾之甚香。入藥須不時焙。否則易霉。微則無用。

性質 溫。
主治 通行氣血。治風痺。同胡

桃宮歸酒浸。隔水煮服。

【九管血】 產地 生南安。

形態 結莖。根高不及尺。大葉如橘葉而寬。對生。開五尖瓣白花。梢短攢簇。可供藥用。



九管血

主治 通竅。和血。去風。

【九製熟地】即熟地黃經九次製成者之處方用名。見「熟地黃」條。

【九層皮】即九層皮果之簡稱。

【九層皮果】即羅晃子之古籍別名。典見綱目拾遺。見「羅晃子」條。

【九層塔】 產地 多在廣東番禺。喃嶺。

採取 四月採新。
主治 跌撲損傷。破瘀生新。

【九熟草】 命名 本品一歲有九熟故名。

古籍別名 烏粟雀粟。(別錄)
形態 九熟草生庭院中。爲溼草類之一種。葉如葉。實亦似之。

性質 甘。溫。無毒。

採取 七月採。
主治 止汗。治洩。療煩悶。

【九節金獅草】即望江青之古籍別名。典見秋泉家秘。詳「望江青」條。

【九節菖蒲】即菖蒲之處方用名。詳「菖蒲」條。

【九節狸】 命名 本品以其文有九節故名。

形態 九節狸爲貓狸之一種。形如虎狸。而毛色有黑白錢文相間。眼金色。尾甚長。文有九節。能捕鼠。其皮可製裘。毛可製筆。療疾功用。與貓狸同。參見「貓」條。

【九節蘭】即草蘭一幹數花者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「草蘭」條。

【九醇】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【九醞】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【九頭獅子草】即馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳「馬齒莧」條。

【九龍草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「九龍草」條。

【九龍草】 古籍別名 九頭獅草。子草。金銀草。(綱目拾遺)

形態 九龍草爲石草類之一種。蔓延丈餘。節處生根。苗頭極長。其葉可供藥用。莖根詳見各條。

性質 溫。

主治 風痺。跌撲損傷。雙單喉蛾風痛。

配合應用 治奶癰。九龍草搗。同醬板。宋寶方。

除臭蟲。取九頭獅子草。放牀四角。每角用二三顆。置草瀝下。任其自乾。去臭蟲神妙。(經驗廣集方)

治紅白蛇。九龍草焙存性。麻油調搽。周氏家寶。治游蛇咬。用九龍草搗汁。半碗。雄黃二錢。酒沖服。痛止。此草生紅子。如楊梅。搗汁亦可治喉痛。(王氏秘方)

【九龍草根】 採取 以單枝上生者良。

主治 喉痛。重舌。牙關緊閉。搗擦牙及探喉間。

【九龍草莖】 主治 折傷筋骨。並解諸毒。搗

骨。並解諸毒。搗

番之蛇螫。及喉痛搗汁塗服。

【九龍蟲】即洋蟲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『洋蟲』條。

【九轉靈砂】即靈砂之古籍別名。典見綱目。詳『靈砂』條。

【九靈黃童】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【二尸籛】即枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【二竹茹】即竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【二氣砂】即靈砂之古籍別名。典見綱目。詳『靈砂』條。

【二麻】即蛇頭抓草之有二根者。詳『金銀花』條。

【二寶花】即金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【二蠶沙】即原蠶沙之處方用名。詳『原蠶沙』條。

【人中白】命名。滯澁為涎。此故有溺白涎之名。

古醫別名。溺白涎（唐本草）人尿白千年冰。萬年霜。秋白霜。尿白。鹼（和漢藥考）

基本。係曾經用過數年之尿。取其中自然沈澱固著之灰白

色薄片。

產地。陳仁山藥物生產辨云。人中白原以香館童便缸底倒餘之浮白尿尾。用清水泡淡曬乾。用之。其次鑿出尿缸之積。泡淡曬乾。用之亦可。但市上之人中白。多由陳村而來。係元寶塘或尿池爛了。將其四便之灰鑿出。放於海邊。浸五七天。取起付廣州市作人中白。治之。即將此銀建造新尿池。或新元寶塘。尚亦有利。此味為小童除痰要藥。非速設法改正不可。但欲改正。必向省中廣州市近十三行街左右之倒尿工商訂。因該尿艇可裝尿過百擔。到沙河交尿時。除卸尿尚餘艇底一層白尿積。有數分厚。命伊將此尿積鏟起。用大缸裝貯在沙河取水泡之。每日換水三次。至淡為度。曬乾交來。每筋發回銀約六毫左右。彼必樂從。此乃多餘之工錢。否則伊亦將此尿積棄於江上。何憚而不為。寬人中白者。莫便於此。

形體。按人中白。為人溺澄下之白涎。固結而成之白片。大小不一。質脆氣穢。

種類。①人中白。乃人溺之白涎所結者。②人中黃。乃甘草納竹筒。塞其兩端。臘月浸入於甕缸中而成者。③秋石。秋月用石膏。浸於童子溺缸中。并入秋露水而製成者。

製法。人中白以風日久乾者。良。入藥並以瓦煨過用。

性質。鹹。平。無毒。

成分。人中白之主要成分。大約為尿酸鈣。

效能。清火邪。治疳熱。用作瀉火清熱藥。

主治。降火。治瘰癧。治咽喉口齒生瘡。疔腫。諸般出血。肌膚汗血。

歷代記述攷證。【唐】蘇恭新修本草論人中白曰。鼻衄。湯火灼傷。燒研主瘰癧。【宋】大明日華諸家本草論人中白曰。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦。渴疾。【元】朱丹溪本草衍義補遺論人中白曰。能瀉肝火。三焦火。並膀胱火。皆從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。

【明】穆希雍本草經疏論人中白曰。溺白涎。即人中白。乃人溺之積氣結成。其味鹹。氣涼。無毒。能瀉肝

腎三焦膀胱有餘之火。本經療鼻衄。及大明治傳屍勞熱。肺痿。心膈熱。吐血。羸瘦。渴疾者。以其能入諸經。瀉去火邪也。涼能除熱。故又治湯火灼瘡。今人以之治口舌生瘡。疔腫等證。多效。是其除熱降火之驗也。【清】黃宮繡本草求真論人中白曰。人中白。即溺白涎之物。故以白名。味鹹。氣平。能瀉肝經膀胱之邪。使之從小便而出。蓋膀胱係溺白之故道。用此正以由其故道耳。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之熱也。故可以治瘰癧。消渴。疔瘡。倒陷。牙疳。口瘡等症。但僅堪用以清熱清火。而不可以資補耳。

【清】黃元御玉楸藥解論人中白曰。人中白。味鹹。性寒。入手少陰心。足太陽膀胱經。清心。泄火。涼血。止衄。又曰。人中白。鹹寒。泄火。治鼻衄。口瘡。牙疳。喉癢之證。即人溺澄清白濁下澁者。庸工以法曬煉而為秋石。妄作各種丹丸。泄火伐陽。以天人命。甚可惡也。【清】楊時泰本草述鈞元論人中白曰。人溺之與白涎。原是一物。但溺則徑達下而不留。白涎性稍留。於肺所生病可

徐而致其功。故用之微有異。經曰。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。是飲之精氣。由胃而脾。由脾而肺。以達其清陽於上。即少陰屬腎。腎上連肺之義。陰中之陽致於上。則陽中之陰達於下。故能化血歸經。經所謂肺之濁氣。下注於經也。血化歸經。是謂營氣。是乃謂之通調水道也。後天之水。皆根氣化。氣固肺所主。而氣化之能。通調水道者。以其清陽之能化。而濁陰之化乃行。則凡濁陰不化。如血證當首及而更於治肺。為切當也。所治上焦諸證。皆就清陽之能化。以化濁陰耳。即痘瘡倒陷。非又清陽之不化。以致病於濁陰者乎。若止以酸能入血而散為言。則亦不究其本矣。

配合應用 ①治大衄久衄。諸竅出血。用人中白一團。雞子大。綿五兩。燒研。每服二錢。溫水服。(聖惠方)

②治鼻衄不止。五七日不住者。立見功效。並治崩出汗血。用人中白新瓦煨乾。入麝香少許。溫酒調

服。(經驗方)

③治正偏頭痛。用人中白。地龍等分。為末。羊膽汁丸。芥子大。每新汲水化一丸。注鼻中。音之名。一滴金。(普濟方)

④治脚氣成漏。跟有一孔。深半寸許。其痛異常。用人中白煨。有水出。滴入瘡口。(戴原禮證治要訣方)

⑤治鼻中息肉。用人中白。瓦焙。每服一錢。溫湯下。(朱氏集驗方)

⑥治痘瘡倒陷。用臘月收人中白。火煨為末。溫水服三錢。陷者自去。(雷門事親方)

⑦治口舌生瘡。用漏桶塗七分。枯礬三分。研勻。傅之。有涎出。拭去。數次即愈。(集簡方)

⑧治小兒口疳。用人中白。煨。黃蘗。炙。焦。等分。為末。入冰片少許。以膏布拭淨。搽之。累效。(陸氏經驗方)

⑨治痘疹煩熱。用人中白。或者黃紅白垢。洗淨。研末。每服二錢。白湯或酒服。(痘疹便覽方)

⑩治走馬牙疳。用小便盆內白屑。與瓷瓶內鹽泥固濟。煨紅。研末。

入麝香少許。貼之。又方用婦人尿桶中白垢。火煨一錢。鋼絲三分。麝香一分。和勻。貼之。尤有神效。(沐梁李提領方)

用蠶 一錢至二錢。施用宜忌 凡陽虛無火。消化不良。及腸胃不實。而多泄瀉者。禁用。

參攷資料 ①人中白。降相火。消痰血。蓋鹹能潤下。走血故也。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之驗也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白散。即時血止。又延陵鎮官營榮。鼻衄如傾。白衣變紅。頭空空然。張潤之用人中白藥治之。即止。並不再作。此皆散血之驗也。(李時珍)

②人中白。以蒙館童子便桶。及山中老僧。溺器中刮取者。尤佳。(吳儀洛) ③人中白。以歲久。溺器有厚寸餘者。取置瓷盤內。露高潔處。越一二載。中外皆白。絕無臭氣。乃可用。研極細。水飛數遍。再研萬匝。如仍有臭。臭。隨泡隨飛。約數百遍。以無臭為度。煨淨者。精粹盡失。轉增火毒。不堪用。(楊時泰)

【人中黃】 命名 本品用黃色之甘草末。浸人糞中而成。故名。

古籍別名 金汁。馬子。鹹。(和漢藥考)

基本 係用甘草末。入竹筒。浸在人糞中而製成者。

形態 按人中黃。色黃體輕。而成圓筒形。剉之。則成碎細粉末。

製法 人中黃之製法。以竹筒入甘草末。外以松香。塞兩頭。冬月浸糞缸中。立春取出。漂去糞汗。懸風處陰乾。破竹取草。曬乾。用。但現在之人。中黃。多用黃芥末。綠豆粉。加少許甘草。搗香膠而成。實偽品也。

性質 甘。寒。無毒。

效能 瀉胃火。解疫毒。用作瀉熱解毒藥。

主治 天行熱狂熱疾。中惡毒。瘧瘧。

歷代記載攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論人中黃曰。熱毒溼毒。大解五臟實熱。飯和作丸。清痰消食。積降陰火。【清】黃宮繡本草求真論人中黃曰。人中黃味甘。

草求真論人中黃曰。人中黃味甘。

性寒。善殺功。入胃解毒。以其味
甘故也。其解五臟實熱。以其味寒
故也。又治痘疫諸毒。狂及發瘡。
痘黑陷不起。以其臭與不正相類。
故能以毒攻毒也。然遇急症難得。
可取坑塢以代。

用薑 八分至錢半。

施用宜忌 凡無實火及熱毒
者禁用。

【人爪甲】 古醫別名 筋退。

性質 甘。鹹。無毒。

主治 懷妊婦人爪甲。取末。點
目。去腎障。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論人爪甲曰。鼻。細。刮
嗜之立愈。菜人甲亦可。【明】李時
珍本草綱目論人爪甲曰。僅生。下
胞衣。利小便。治尿血。及陰陽易病。
破傷中風。去目昏。

參攷資料 爪甲者。筋之餘。膈

之外喉也。蠶。樞。經云。用應爪。爪厚
色黃者。膈厚。爪薄者。膈薄。爪
堅色青者。膈急。爪。頭。色赤者。膈緩。
爪。直。色白者。膈直。爪。惡。綠。厚者。膈
積。【李時珍】

【人牙】

處方用名 燬人牙。燬
牙齒。

性質 甘。鹹。熱。有毒。

效能 發痘。瘰癧。用作瘰癧解
毒藥。

主治 除勞治瘰。解蟲毒氣。入
藥燒用。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論人牙曰。治乳癰未潰。
痘瘡倒靨。【明】穆希雍本草經疏
論人牙曰。牙齒者。腎之標。骨之餘
也。經云。男子三八。腎氣平。而真牙
生。五八。腎氣衰。而齒槁。以腎主骨
故也。其味甘。鹹。氣熱。有小毒。其主
除勞治瘰者。蓋勞乃勞極。精氣乏
絕。腎家虧損所致也。齒牙為腎氣
所生。以類相從。迺遵其本。故主之
也。瘰亦因勞而發。非夏傷暑。秋為
瘰之比。故亦主之。味甘而鹹。所以
能解蟲毒氣也。今世又以之治痘
瘡倒靨。乳癰未潰。亦為必須之藥。
【清】黃宮繡本草求真論人牙曰。
人牙味鹹性溫。功尚治痘倒靨。綠
痘。或出不快。及見黑陷。多因毒氣
深入。故須用此。內發。時珍謂齒者
腎之標。骨之餘也。痘瘡則毒自腎

出。方長之餘。外為風寒穢氣所胃。
騰理閉塞。血澀不行。毒不能出。或
變黑倒靨。宜用此物。以酒磨達之。
置入腎經。發出毒氣。使熱令復行。
而瘡自紅活。蓋初劑也。若伏毒在
心。腎胃不省人事。及氣虛色白。瘡
塌不能作膿。熱癰紫泡之症。止宜
解毒補虛。苟誤用此。則鬱閉聲啞。
反成不救。可不慎哉。燬退火毒用
之。

配合應用 ①治痘瘡倒靨。用
人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服

半錢。又聞人規痘疹論云。人牙散
治痘瘡方。風寒外襲。或變黑。或青
紫。此倒靨也。宜溫肌發散。使熱氣
復行。而痘自出。用人齒脫落者。不
拘多少。瓦礫固濟。煨過。出火毒。研
末。出不快。而黑陷者。積碯血調下
一錢。因服液藥。血澀倒靨者。入麝
香溫酒服之。其效如神。無假散。用
人牙。貓牙。豬牙。犬牙等分。火煨研
末。蜜水調服一分。【錢氏小兒方】
②治乳癰未潰。人牙齒。燒研。酥
調貼之。【肘後方】
③佛牙散治五般耳聾。出膿血
水。人牙燒存性。麝香少許。為末。吹

之。【醫濟方】

④治疔瘡。懸瘡。乾水生肌。用人
牙灰。油髮灰。雄雞內金灰。各等分
為末。入麝香。輕粉少許。油調傅之。
【直指方】

⑤治陰疽不發。頭凹沈黯。不疼
無熱。服內補散。不起。必用人牙煨
過。穿山甲炙。各一分。為末。分作兩
服。用當歸。麻黃煎酒下。外以薑汁
和麵傅之。又方。川烏頭。硫黃。人牙
煨過。為末。酒服亦妙。

施用宜忌 凡痘毒冒心神憤。
及氣虛白陷者。禁用。

參攷資料 痘疹管見云。左仲
恕言。痘疹變黑。歸腎者。宜用人牙
散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之
乎。【高武】

【人字草】 塵地。香。禹。南。石。頭。

性質 甘。辛。平。

主治 跌打撲腫。解毒。消鴉片
積。

【人汗】 性質 鹹。有毒。

參攷資料 ①飲食食
之。令人生疔毒。【李時珍】②汗出

於心。在內則爲血。在外則爲汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。(李時珍)

【人耳垢】 原名 耳塞。古籍別名 腦膏。

(日華本草)泥丸脂(本草綱目)

性質 鹹。苦。溫。有毒。

主治 癩狂。鬼神及嗜酒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論人耳垢曰。蛇蟲蜈蚣螫者。塗之良。

【人肉】 主治 瘵疾。參攷資料 ●張杲醫

說言。唐開元中。明人陳藏器著本草拾遺。載人肉療羸瘵。問。問有病此者。多割股。按陳氏之先。已有割股割肝矣。而歸咎陳氏。所以罪其筆之於書。而不立言以破惑也。本草可輕言哉。嗚呼。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。父母雖病。爲豈肯欲子孫傷殘其支體。而自食其骨肉乎。此愚民之見也。按何孟春余冬錄云。江伯兒母病。割脇肉以進。不愈。禱于神。欲殺子以謝神。母愈。送殺其三歲子。事聞太祖皇帝。怒其絕倫滅理。杖而配之。下禮部議

曰。子之事親。有病則拜託良醫。至乎呼天禱神。此懇切至情。不容已者。若割股臥冰。事屬後世。乃愚昧之徒。一時滋致。務爲詭異。以驚世駭俗。希求旌表。規避徭役。割股不已。至於割肝。割肝不已。至於殺子。遠道傷生。莫此爲甚。自今遇此。不在旌表之例。嗚呼。聖人立教。高出千古。豈哉如此。又陶九成輟耕錄。載古今亂兵食人肉。謂之想肉。或謂之兩脚羊。此乃盜賊之無人性者。不足誅矣。(李時珍) ●割股療親。幸而獲愈。乃病者之精神上受一時之感動。促起其反抗病邪之機能之結果。非真能療疾也。(尤學周)

【人血】 性質 鹹。平。有毒。主治 羸病人皮肉乾枯。身上鉄片起。又狂犬咬。寒熱欲發者。並刺血熱飲之。

參攷資料 ●血猶水也。水穀入於中焦。泌別蒸化。其精微。上注於肺。流溢於中。布散於外。中焦受汁。變化而赤。行於隧道。以奉生身。是之謂血。命曰營氣。血之與氣。異名同類。清者爲營。濁者爲衛。營

行於陰。衛行於陽。氣主煦之。血主濡之。血盈則水。以火爲用。故曰。氣者血之帥也。氣升則升。氣降則降。氣熱則行。氣寒則凝。火活則紅。火死則黑。邪犯陽經。則上逆。邪犯陰經。則下流。蓋人身之血。皆生於脾。攝於心。藏於肝。布於肺。而施化於腎也。仙家鍊之。化爲白汁。陰靈陽純也。衰弘死忠。血化爲碧。人血入土。年久爲燐。皆精靈之極也。(李時珍) ●肉乾鉄起。燥病也。不可卒潤也。飲人血以潤之。人之血可勝刺乎。夫燥燥治狂犬之藥。亦夥矣。奚俟於此耶。始作方者。不仁甚矣。其無後乎。虐其殘賊。亦有以酒飲人血者。此乃天譴之民。必有其報。不必責也。(李時珍) ●刺血而飲。雖有其法。亦少應用。惟大出血後。及虛羸瘦弱者。可以用他人之血補償之。謂之輸血法。其法有二。一取他人之血。注入患者臂靜脈內。據諸家實驗。不惟施行不便。且多危險。其一受血者之機骨動脈。縫合於受血者之肢靜脈。使相連結。血液可以直接輸送。然實行困難。非至迫不得已時。不輕易施用。

(尤學周)

【人尿】 卽童便之原名。詳「童便」條。

【人尿白】 卽人中白之古籍別名。與見和漢藥考。詳「人中白」條。

【人肝藤】 (本草拾遺) 古籍別名 承露仙。

產地 出嶺南山石間。

形態 人肝藤爲蔓草類之一種。葉有三極。花紫色。附石而生。莖根可供藥用。

主治 解諸藥毒。遊風。手足軟痺。並生研服之塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論人肝藤曰。解毒毒。以根三兩。磨汁。或煎濃汁服之。

【人言】 卽砒霜之古籍別名。與見綱目。詳「砒霜」條。

【人身】 卽人參之古籍別名。與見和漢藥考。詳「人參」條。

【人身香】 卽甘松之古籍別名。與見和漢藥考。詳「甘松」條。

【人乳】 命名 乳者。化之信。故字從孚。化。省文。曰乳。

處方用名 乳汁。古籍別名 妳汁。(本草綱目)

仙人酒。(和漢藥考) 生人血。白
珠砂。(方家)

外國名詞 Lac.(拉丁) MILK
(英) Milk (德)

基本 係婦人初產男孩。子母
俱健。為其母之乳液。

形態 為白色不透明稀薄液
汁。味和而甘。

製法 或以曬曝成粉入藥。或
以蒸焙藥品。

採取 凡入藥。或服食。須取首
生男孩。而無疾病婦人之乳。乳色
潔白而稠者佳。

性質 甘。鹹。平。無毒。

成分 人乳之成分。由飲食。起
居。動靜。神思等。而異其量。惟其平
均。最大抵為水八七。七三至八
八。五五。蛋白質一。五三至二
。八一。脂肪二。九七至三。五
六。糖質七。六一至四。八二。鹽
類〇。一六至〇。二一。
效能 補血。潤燥。止渴。明目。用
作強壯劑。亦為滋養緩和藥。
主治 補五臟。令人肥白悅澤。
療目赤痛。多淚。解獨肝牛肉毒。合
濃鼓汁。服之神效。

二 蠶 人

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論乳汁曰。和雀屎。去目中
弩肉。【宋】大明日華諸家本草論
乳汁曰。益氣治瘦悴。悅皮膚。潤毛
髮。點眼止淚。【宋】寇宗奭本草衍
義論乳汁曰。人乳治目之功多。何
也。人心生血。肝藏血。脾受血。則能
視。蓋水入於經。其血乃成。又曰上
則為乳汁。下則為月水。故知乳汁
則血也。用以點眼。豈不相宜。血為
陰。故性冷。鹹。寒。人如乳餅。酥酪之
類。不可多食。雖曰牛羊乳。然亦不
出乎陰陽之造化耳。老人患口瘡。
不能食。但飲人乳。甚良。【明】經
希雍本草經疏論乳汁曰。人乳乃
陰血所化。生於脾胃。攝於衝任。未
受孕。則下為月水。既受孕。則留而
養胎。已產。則赤變為白。上為乳汁。
此造化玄微之妙。人身轉運之神
也。其味甘。氣平。無毒。入心入腎入
脾。潤肺益壽延年之聖藥也。氣血
之液。故能補五臟。五臟得補。則氣
血充實。而體自肥白悅澤也。經曰。
目得血而能視。乳為血化。故能療
目赤痛多淚。甘能解毒。故又主解
獨肝牛肉毒也。【清】黃宮繡本草

求真論乳汁曰。人乳氣味甘潤。按

據諸書有言。此為陰血所化。生於
脾胃。攝於衝任。未受孕。則為月水。
既受孕。則留而養胎。已產。則變赤
為白。上為乳汁。以養小兒。乃造化
之玄微也。服之益氣血。補腦髓。所
謂以人補人也。若大人服之。則能
止渴。澤膚。潤燥。目得血能視。凡赤
澁多淚。可用黃連浸點。實為補虛
潤燥要劑。取無病婦人乳水。頓如
攤粉皮法取用。名為乳丹丸。但鹹
寒。胃弱作泄者。不宜多服。【清】黃
元御玉楸藥解論乳汁曰。乳汁味
甘性涼。入手太陰肺。足太陰脾。足
厥陰肝經。清肺除煩。滋肝潤燥。乳
汁以肝化於肺氣。即朱朱變為白
金。養育嬰兒。滋生氣血。全賴乎此。
內傷虛勞。為小兒熱咳極佳。非尋
常草木所能及也。一離人身。溫氣
稍減。但存冷汁。質寒滑。滋潤。絕無
補益。血得氣化。溫變為精。暖服不
熱。冷飲則涼。潤肺滋肝。是其長耳。
抑陰扶陽。非所能也。至乳酥。乳酪
之類。冷食寒飲。極損中氣。惟塞外
西方之民。脾胃溫燥。乃為相宜。陽
虧土溼。切當遠之。噎膈溼旺之病。

朱丹溪以為燥證。而用乳酪。滋滋

土敗。其死更速。點眼病甚良。解食
牛中毒。【清】王士雄隨息居飲食
譜論乳汁曰。乳汁甘平。補血充液。
填精化氣。生肌安神。益智長筋骨。
利機關。壯胃養脾。聰耳明目。本身
氣血所化。初生藉以長成。強壯小
兒。周歲即宜斷乳。必以穀食。始可
培植。後天造物之功。不容穿鑿。故
大人飲乳。僅能得其滋陰養血。助
液濡枯。補胃充肌而已。設脾弱氣
虛。膏梁溼盛者。飲之。反有滑瀉。酸
痰。滋養痞悶之虞。且乳無定性。乳
母須擇肌膚豐白。性情柔和。別無
暗疾。不食葷濁厚味者。其乳汁必
礦白甘香。否則清稀腥濁。徒增兒
病也。【清】楊時泰本草述鈎元論
乳汁曰。乳汁由血所化。故滋血者。
選以乳。夫婦人之乳。資以衝賦。因
衝與胃經通故也。衝為血海。而胃
為血液化生之府。安得不資其本。
乎。凡男子以氣為主。究氣之所生。
所生者腎也。女子以血為主。則當
究血之所生。所生者心也。血赤火
也。女子之乳白。男子之精亦白。皆
從金也。女子氣盛。合於心包絡。血

即就血所生處而化乳。男子氣盛。合於衝脈之血。即就氣所生處而化精。乳與精俱從血化。而血化俱由於氣。但分上下者。分於血與氣所生之處也。化不離生。生亦不離化。上之血生為氣。下之精生為血。化耳。但男女之化。乳化精者。皆不離於脾胃。以其為升降。鼓舞運化精微之地也。然則乳汁固不徒少陰血主之所化。實由脾胃氣化之所成矣。第血化之乳。化原固在氣。一離乳房。則徒存陰質。而氣化已散。故取以療病者。必審病之所宜。如血虛有熱。燥渴枯涸。乃其的對。即用以培養者。亦必審體之所宜。如貧瘦無痰。臟陽胃強。乃見資益。不則概投。止以取累耳。至力香謂宜於虛火。及中風證。夫虛火類有燥痰。而風證之屬陰虛者。亦不能攝痰歸元。即此宜投之證。猶當為乳汁地以佐使為功可也。

日五更一服。能消痰補虛。生血延壽。此以人補人之妙法也。(攝生衆妙方)

①治一切虛損勞證。太乙神應丸。用人乳一碗。磁器煮乾。焙燥。牛乳一碗。同煎。杜仲三兩。破故紙二兩。白蘇皮。白茯苓。牛膝。當歸。各二兩。黍米金丹一箇。曬乾。即初生兒口中血珠。共為末。蜜丸。桐子大。每服一丸。夜間嚙化。(萬氏家抄方)

②治虛損勞瘵。用無病婦人乳三酒盃。紆磁礪極熱。置乳於中。次入麝香末少許。木香末二分。調勻。服後飲濃茶一酒盃。次日服接命丹。接命丹用乳三酒盃。如前曬。盛入乳井人胞末一具。調服。服畢。面膝俱赤。如醉思睡。只以白粥少少養之。(德生堂方)

③治眼熱赤腫。人乳半合。古文錢十文。銅器中磨。令變色。稀稠成煎。瓶收。日點數次。或以乳浸黃連。蒸熱洗之。(聖惠方)

④治中風不語。舌根強硬。三年陳醬五合。人乳汁五合。相和。研以生布絞汁。隨時少少與服。良久當

語。(聖惠方)

⑤治卒不得語。人乳半合。美酒半升。和服。(范汪方)

⑥治失音不語。人乳竹瀝各二合。溫服。(滴玄方)

⑦治月經不調。日飲人乳三合。(千金方)

⑧治初生不尿。人乳四合。葱白一寸。煎滾。分作四服。即利。(劉涓子丸遺方)

⑨治初生吐乳。人乳二合。饅條。麩少許。鹽二粟大。同煎。入牛黃米許。與服。(劉涓子丸遺方)

⑩治癰腫不出。人乳汁和麩。傅之。比曉膿盡。出不可近手。(千金方)

⑪治癩癧生瘡。人乳桐油等分。和勻。以鵝翎掃塗。神效。(滴玄方)

⑫治喉蛇牛毒。牛喉蛇者。毛髮向後。其肉殺人。但飲人乳汁一升。立愈。(金匱方)

⑬治中牛馬毒。人乳飲之。良。(千金方)

⑭治百蟲入耳。人乳滴之。即出。(聖惠方)

用量 一盃或一盅。

施用宜忌 凡臟氣虛寒。滑泄。多痰。以及消化不良。症。禁用。

著名方劑 參乳丸。大補氣血。用人乳粉。人參末等分。煉蜜糊丸服。

參攷資料 ①漢張蒼。年老無齒。妻妾百數。常服人乳。故年百歲。餘。身肥如瓠。(陶弘景) ②婦人之血。下為月經。上為乳汁。以人補人。功非渺小。世俗服者多瀉。遂歸咎於人乳。不知人乳若能發瀉。則嬰兒。壅滯。泄矣。惟乳與食。混進。便。何怪其瀉。當夜半服之。昨日之食。既消。明日之食未進。且陰分服。陰藥。正相宜也。(李士材) ③人乳無定性。其人和平。飲食沖淡。其乳必平。其人暴燥。飲酒食辛。或有火病。其乳必熱。凡服乳。須熱飲。若曬曝。為粉入藥。尤佳。南史載。宋何倫之。積年勞瘵。飲婦人乳而瘳。又百種。城老人年二百四十歲。惟飲曾孫。婦乳也。按白飛霞醫通云。服人乳。大能益心氣。補腦髓。止消渴。治風火證。養老。宜每用一吸。即以紙塞鼻孔。按唇貼齒而飲。乳與白津。

相和。然後以鼻內使氣由明堂入。腹方可徐徐嚥下。如此五七吸。爲一度。不瀉而吸。何異飲醋。止於膈胃而已。(李時珍) ①傾乳取粉法。以小鍋燒水滾。用金瓢如磁大。錫瓢亦可。傾乳少許入瓢。浮滾水上。頓。再浮冷水上。立乾。刮取粉。再頓。再刮。如搗粉皮法。但須用一婦之乳。爲佳。乳雜則氣亦雜矣。(吳儀洛)

【人柳】即檉柳之古籍別名。典見綱目詳「檉柳」條。

【人面子】命名 本品核形。兩邊略似人面狀。故名。

外國名詞 Spondias dulcis Forsk. (拉丁) ニンメンシ (日本)

產地 粵省南海海濱。人多植之。以增城水東所產爲佳。其核中仁核之即脫出。他產則否。

基本 熱帶植物。係漆科樹漿果類。藥用人面之子。

形態 人面子。爲夷果類之一種。樹狀如桃子。如桃實。大如梅李。核形類人面。兩目口鼻皆與。內有仁三粒。核色灰白。熟則微黑。點茶

如梅花片形。光澤可愛。春間開花。夏月結實。至秋方熟。

種植 本品宜植沙土。以沙土質鬆易去。不數歲後。即可發榮。僅蓋。故山民均喜植之。以爲利。

製法 本品內仁。甘酸。香氣馥郁。宜爲蜜煎。或鹽漬醋浸。味甘美可口。又可同豕肉及鴨共煮。惟須趁爛熬膏。尤能益津。

性質 甘平。無毒。效驗 醒酒。解毒。止渴。生津。靈治 風毒著身。遍身疥癩。成瘡。或疥或痒。食之即愈。

【人尿】性質 苦寒。無毒。主治 時行大熱。狂走。解諸毒。治末沸湯沃服。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論人尿曰。傷寒風毒。水瀉飲之。彌善。新者封丁腫。一日根爛。

【明】李時珍本草綱目論人尿曰。骨蒸勞復。癰腫發背。瘡漏痘瘡。不起。【明】羅希雍本草經疏論人尿曰。人之五穀入胃。津液上升。爲氣。

血。精粕下降。而成糞。其本原以化過。但存極苦大寒之氣味耳。入足陽明經。經曰。陽明實熱。則登高而

歡。棄衣而走。苦寒能除陽明之熱。故療時行大熱狂走也。凡毒必熱。必辛。苦寒能除辛熱。故又主解諸毒也。蘇恭云。新者封疔腫。一日根爛。蓋疔腫乃風火之毒。氣結成。得大寒極苦之氣。則風火散。根自爛也。今世人又以之治瘡。瘡血熱紫黑倒靨者。殊效。

【人胞】命名 人胞。包人如衣。故又有胞衣之稱。方家諱之。遂別立諸名焉。

處方用名 人胞衣。紫河車。古醫別名 胞衣。(綱目拾遺) 混元母。(本草蒙筌) 胎衣。混沌衣。佛袈裟。仙人衣。(綱目)

形態 人胞大似豬肚。狀亦相似。其色有紅綠紫三者。藥用以紫色者佳。其風乾者。形圓或橢圓。質較堅硬。難碎。而色亦變爲赤褐。

製法 紫河車。古方不分男女。近世男用男。女用女。一云。男病用女。女病用男。初生者爲佳。次則健壯無病。婦人者亦可。取得。以清米泔。攪淨。竹器盛。於長流水中洗去筋膜。再以乳香酒洗過。度飽盛之。烘乾。研末。亦有瓦焙研者。酒煮搗

爛者。頗難曬乾者。以薰者爲佳。蓋炳云。今人皆酒煮火焙。及去筋膜。大誤矣。火焙水煮。多失其性。惟搗搗和藥。最良。筋膜乃初結真氣。不可剔去也。

性質 甘。鹹。溫。無毒。效驗 補氣血。治虛損。專作滋養強壯藥。

主治 氣血羸瘦。婦人勞損。面黧皮黑。腹內諸病漸瘦者。治淨以五味和之。如髓餅法。與食之。(陳藏器)

歷代記述攷證 【元】朱震亨丹溪心法論人胞曰。紫河車。治虛勞。當以骨蒸藥佐之。氣虛加補氣藥。血虛加補血藥。以側柏葉烏藥。以酒浸九蒸九曝。同之。爲丸。大能補益。名稱腎丸。【明】羅希雍本

草經疏論人胞曰。夫人有生之初。攬父精母血。以成胚胎。外即有衣一層。裹之。即胞也。至十月降生時。隨兒後出。其味甘鹹。氣溫無毒。血氣羸瘦。婦人勞損。面黧皮黑。腹內諸病。漸瘦者。皆榮血不足。精氣虧損也。此藥得精血之氣。而結。能

從其類以補之。是以主諸證也。今

世以之治男女一切虛損勞極。爲益血補精氣之用。【明】黃元吳折肱浸錄論人胞云。有人謂河車性熱有火。此說最誤。人河車乃是補血補陰之物。何嘗性熱。但以其力重。故似助火耳。配藥緩服之。何能助火。【明】李士材本草圖解論人胞曰。紫河車味鹹性溫。主男女虛損勞極。不能生育。下元衰頹。【清】黃宮繡本草求真論人胞曰。紫河車甘寒性溫。雖曰本人血氣所生。故能以人補人也。凡一切虛勞損極。恍惚失志。癩癩肌肉羸等症。用之極爲得宜。【紫河車稟受精血結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。】如永類鈴方用此。合以山藥參苓以補真陰。【所謂精不足者。補之以味也。】然究皆屬滑陽之品。故合天冬、麥冬、黃柏、生地、龜板等同服。則於胃氣有損。【如吳球創大造丸之類。】况乾食則等肉脯。入藥亦鮮奇效。至於收斂不密。或令猪雀蟻蟻所食。於子尙屬有礙。矧可取用入藥。以殘厥子。且藥之補劑甚多。在人別爲取用。慎毋於此戀戀不置也。用取

初生色紫者良。去筋膜。蒸搗和藥用。【清】汪初庵本草備要論人胞曰。紫河車甘鹹性溫。本人之血氣所生。故能大補氣血。治一切虛勞損極。【虛損一損肺。皮槁毛落。二損心。血脈衰少。三損脾。肌肉消脫。四損肝。筋緩不收。五損腎。骨痿不起。六極。曰氣極。血極。筋極。肌極。骨極。精極。】恍惚失志。癩癩。以初胎及無病婦人者良。有胎毒者害人。【以銀器插入焙煮不黑則無毒。】長流水洗極淨。酒蒸焙乾研末。或黃爛搗碎入藥。【如新瓦炙者。反損其精汁。】亦可調和養食。【清】張石頑張氏醫通論人胞曰。紫河車稟受精血結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。喘嗽虛勞之疾。是補之以味也。【清】熊叔陵中風論人胞曰。中風日久。則衛氣必衰。欲在表之衛氣盛。必須益其腎間動氣。如樹木培其根本。則枝葉暢茂也。然諸藥總不如紫河車之妙。其性得血氣之餘。無非草木可比。且又不寒不熱。而爲衛氣生發之源。蓋人身結胎時。其形如兩甲。即兩腎也。

此衛氣受生之始。河車即從此兩甲而生。以包護於五臟四體之外。即衛氣外行軀殼。衛外爲固之始。以血肉之屬。爲血肉之補。同氣相求。乃無上妙品也。【清】閻立陞本草選旨論人胞曰。人胞味甘鹹。氣溫無毒。本草主治男女一切虛損勞極。癩癩失志恍惚。安心養血。益氣補精。故凡諸虛不足。五勞七傷。情慾斷絕。咳嗽無痰。日晡發熱。或飲食少進。咳嗽有痰。自汗盜汗。或形瘦無力。四肢困倦。骨痿少氣。是皆精血不足之症。用此精血所化之物。以補精血所虧之症。則精血已足。而諸虛之症皆無矣。

● 配合應用 ● 治婦人瘵疾勞嗽。虛損骨蒸等證。河車丸用紫河車初生男子者一具。以長流水中洗淨。熟煮。壁網焙乾。研山藥二兩。人參一兩。白茯苓半兩。爲末。酒糊丸。梧子大。麝香養七日。每服三五丸。溫服鹽湯下。【永類鈴方】

● 吳球云。紫河車即胞衣也。愚每用此得效。用之女人尤妙。蓋本其所自出。各從其類也。若無子及多生。女月水不調。小產難產。人服

之。必主有子。危疾將絕者。一二服可更活一二日。其補陰之功極重。百發百中。久服耳聰目明。鬚髮烏黑。延年益壽。有奪造化之功。故名大造丸。用紫河車一具。男用女胎。女用男胎。初生者。米泔洗淨。新瓦焙乾。研末。或以淡酒蒸熱。搗爛研末。氣力尤全。且無火毒。敗龜版年久者。童便浸過三日。酥炙黃二兩。或以童便浸過。石上磨淨。蒸熟。曬研尤妙。黃藥去皮。鹽酒浸炒。一兩半。杜仲去皮。酥炙。一兩半。牛膝去苗。酒浸曬。一兩二錢。肥生地黃二兩。中入砂仁六錢。白茯苓二兩。絹袋盛入瓦壇。酒煮七次。去茯苓砂仁不用。杵地黃爲膏。聽用。天門冬去心。麥門冬去心。人參去蘆。各一兩二錢。夏月加五味子七錢。各不犯鐵器。爲末。同地黃膏入酒米糊丸。如小豆大。每服八九十九。空心鹽湯下。冬月酒下。女人去龜板。加當歸二兩。以乳養糊爲丸。男子遺精。女子帶下。並加牡蠣粉一兩。世醫用陽藥滋補。非徒無益。爲害不小。蓋邪火只能動欲。不能生物。龜板黃藥。補陰補陰。爲河車之佐。加以

杜仲補腎強腰。牛膝益精壯骨。四味統爲足少陰經藥。古方加陳皮名補腎丸也。生地黃涼血滋陰。得茯苓砂仁同黃蘗。則走少陰。白朮以此四味爲天一生水丸也。天麥門冬能保肺氣不令火炎。使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣。有升有降。故同地黃爲固本丸也。又麥門冬人參五味子三味。名生脈散。皆爲肺經藥。此方配合之意。大抵以金水二臟爲生化之原。如河車以成大造之功故也。一人病弱。陽事大痿。服此二料。體貌頓異。連生四子。一婦年六十已衰。服此壽至九十。尤強健。一人病後不能作聲。服此氣壯聲出。一人病痿。足不任地者。半年服此後能遠行。

⑤治五勞七傷。吐血虛瘦。用初生胞衣。長流水中洗去惡血。待清汁出乃止。以酒煮爛。搗如泥。入白茯苓末。和丸。梧子大。每米飲下百丸。忌鐵器。(朱氏集驗方)

⑥治久癩失志。氣虛血弱者。紫河車治淨。燻麥食之。(劉氏經驗方)

二畫 人

⑦治大小癩疾。初生胎衣一具。長流水洗淨。仍以水浸。春三夏一。秋五冬七日。焙乾爲末。羌活天麻。防風各半。白朮。白附子各一兩。兩星二兩。川烏一箇。全蠍二十箇。爲末。糊丸。梧子大。硃砂爲衣。每服五十丸。好酒下。(乾坤秘韞方)

⑧解諸毒。不拘草蟲。蛇蠱。蜈蚣。蟻。其狀入咽喉痛欲死。取胞衣一具。洗切。曬乾爲末。開水調服。一錢七。(梅師方)

⑨治目赤生翳。初生孩兒胞衣。曝乾。焙研細末。日日俾目背中。愈乃止。(千金方)

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡非虛羸。而有實邪者。禁用。繆希雍云。人胞乃補陰陽兩虛之藥。以其形質會合男女坎離之氣而成。如陰陽兩虛者。服之。有反本還元之功。誠爲要藥也。然而陰虛精滑。水不制火。發爲咳嗽吐血。骨蒸盜汗等證。此屬陽盛陰虛。法當壯示之主。以制陽光。不宜服此。並補之劑。以耗將竭之陰也。胃火齒痛。法亦忌之。

【人胞衣】即人胞之處方用名。詳「人胞」條。

【人退】即血餘炭之古籍別名。與見綱目。詳「血餘炭」條。

主治 骨病。接骨。

【人骨】 參攷資料 古人以掩暴骨爲仁德。每獲陰報。而方伎之流。心乎利欲。乃收人骨爲藥。餌仁術固如此乎。且犬不食犬骨。而人食人骨可乎。父之白骨。惟親生子刺血。濕之。即滲入。又酉陽雜俎云。荊州一人損腰。張七致飲以藥酒。破肉去骨一片。塗膏而愈。二年復痛。張曰。所取骨寒也。尋之。尙在牀下。以湯洗綿裹收之。其痛遂止。氣之相應如此。孰謂枯骨無知乎。仁者當倍矣。(李時珍)

【人參】 命名 參之形態如人之參。少所見矣。

處方用名 吉林參。野山參。古籍別名 人葠。人葠。鬼蓋。人葠。(本經) 神草。人葠。土精。血參。(別錄) 黃精。玉精。(吳普本草) 地精。白物。海腹。皺面。還丹。廣雅。百尺杆。(陶經) 金井玉欄。孩兒參。湯

參。(綱目) 揀參。人身。黃石。(和漢藥考)

外國名詞 Pagan's Tongues. CA. Moy.

別名 甲花名及土名。人參品。厚價昂。參農參商。各創花名。以標新異。或從產地。品質色澤。形狀等。取名如下。①遼東參。②吉林參。③紫團參。④版參。⑤邊江參。(以上均從產地立名) ⑥老山參。(久年山參也) ⑦大山參。(山產大參也) ⑧石柱參。(形如石柱) ⑨野山參。(產於山野者) ⑩移山參。(山山移植家圃者) ⑪樺椎參。(良隱名) ⑫放山參。(鹿隱名) ⑬秧子參。(白色參種) ⑭白抄參。(白色參種) ⑮鹿參。(移植而生者) ⑯養參。(人工培養者) ⑰白參。(未煎製者) ⑱扒山參。(扒出移種者) ⑲水質參。(由水中挖出者) ⑳紅參。(蒸製二次者) ㉑統貨。(參之上等者) ㉒拗色。(參之中等者) ㉓泡丁。(參之下等者) ㉔參商。名參至唐。必逐一細辨。分等次第。以定價值。各自多立名色。取五

六十名。以眩外行。移步換形。難以執論。總在識者辨別。今將通行之名色列下。一拔頂。熟紅潤圓。旋全段是肉。每枝重一錢至四五錢者。及參之最紅熟者。不拘大小。塘西所行。故最高熟。參謂之塘西貨。揚州之行。熟參。次於塘西。二統頂。細紅皮肉圓。滿。六七分至八九分。一錢者。三二頂。細紅皮肉。或色滯稍較頂。熟身瘦。法。六七八分者。四次頂。細紅皮肉稍瘠。或色滯。或瘦長。或武相。五六七分者。五大揀熟。細紅皮肉。圓。滿。短。壯。四五分。六中揀熟。細紅皮肉。或色滯。身長三四五分者。七中熟。細紅皮肉。圓。滿。二三分成枝者。八小熟。細紅皮肉。一分四五釐。至二分以外者。九條小熟。細紅皮肉。身長圓。瘦。有頭尾。一分以外者。一短中。細紅圓。滿。成枝。一分上下者。

基本 人參為山草類植物。入於五加科。人參屬。係多年生植物。宿根。

產地 參之著名產地為中國。高麗。美國。日本。其中國人參之產生詳下。①產於吉林南遼寧東之

長白山。及吉林省之甯安縣。野生者為最佳。河北省永年縣。山西省長子縣。(清屬蔚安府)雲南省姚安縣。(清屬姚州)安徽省舒城縣等。其山海關以東之遼寧吉林兩省所產者。稱關東人參。撫松寬甸。通化。臨江。興京者。次之。其他奉吉界。屬。近山各縣亦多產之。惟功用稍差。吉林南境。濛江。遼東。如南嶺。北山等處。參營遍地。皆由人工栽種。功力薄弱。近時各省所市賣者。皆此類也。②大抵天然產之山參。成於上述各山陰處。見之若在山陽。則易遭動物侵害。得之甚稀也。(竟天廬叢錄)③人參生於極溼潤之處。故稟性屬陰。不若其他植物。多生於陽處。而喜受日光。藉以生發。獨參見日即爛。故多生於深山密林之中。賴溼潤以生長。產參之區域。山勢極多險峻。週圍千餘里。皆崇山大川。環繞其間。森林茅草。遮掩遍山。晨起視之。瘴霧迷漫。終年不見日光。寒風透骨。甚至有終年冰雪不能溶化之處。(藥物游記錄)④人參今之用者。皆河北種。場博易。高麗所出。率虛

軟。味薄不苦。潞州上黨者。味厚。體實。有據土人得一窠。則置於板上。以色絲纏繫。根頗纖長。不與樞場者相類。根下垂有及一尺餘者。或有十枝者。其價與銀等。稍為難得。(本草衍義)⑤人參在明時。心州。高麗。邯鄲。百濟。澤州。冀州。井州。幽州。薊州。易州。平州。均產。參而上黨。山谷出者為最。上黨即今潞州也。太行紫團山所出者為紫團參。紫色稍扁。百濟參白。堅且圓。名曰條參。俗名羊角參。高麗參近紫。體虛。新羅參亞黃。味薄。竹人形者。神類。雞腿者。力大。高麗。百濟。新羅。三國。今屬朝鮮。其參有子。十月下種。如種菜法。春生苗。多於深山背陰處。初生小者三四寸。一極五葉。四五年後生兩極。末有花莖。十年後生三極。年深者四極。葉各五。中心生一莖。俗名百尺杵。三四月有花。細如粟。莖如絲。紫白色。秋後結子。如大豆七八枚。生背熟紅。自落。秋冬採者。堅實。春夏採者。虛軟。清季。獨重遼參。以人參乃神草。時人目為鍾靈之處。生者。味勝而力洪也。鳳凰城貨。雖道地。所出不一。大略早

出。白秀。體鬆而瘦。長者。皆名曰鳳凰城。土人採取。出山甚早。五六月即可採。九十月。買人開價矣。故其質不堅。皆由未經霜雪。行根未久。統貨。精多。熟少。此種低貨。惟行銷於兩廣。江西。一過年。春風。透時。熟則變。鬆。則更變。腐。不堪矣。去鳳凰城三四千里。名曰船廠。其地多巨木屋宇。道路橋梁。皆巨木所建。相傳以開海禁時。曾於是地造洋船出洋。故名船廠。其處二百里內外。所產較鳳凰城稍堅實。且紅潤可觀。但其中空鬆者。確不少。土人非以鉛條等。插入。以圖利。大約六七月。採取出山。冬初上市。鉛條來源。蓋土人採參者。不過藏精於藥。以充食。鉛。蜜。貯酒。以供飲。酒。罄。即。剪。置。作。條。以。插。參。中。其。貨。稍。遜。遼。貨。者。甯。古。遼。所。出。之。貨。也。地。處。極。北。去。船。廠。五。千。餘。里。地。極。厚。天。極。寒。深。秋。之。時。霜。雪。即。已。載。道。總。在。八。九。月。採。其。體。質。皆。由。地。土。既。厚。出。山。又。甚。遲。晚。所。以。堅。實。圓。滿。甚。熟。多。糯。少。即。或。間。有。糙。皮。而。肉。必。紅。結。并。無。藏。鉛。之。弊。夫。鳳。凰。城。三。處。此。蓋。總。羅。大。地。之。名。而。言。其

各有所屬一隅。如老城新城等處。地道甚雜。稱名甚多。難以盡舉。產莫悉別。必須憑貨品題。難以懸擬。大要以色光體圓質熟肉湛四項。象者爲上耳。(唐秉鈞人參考)

形態 花莖形色。東陸遊記云。遼東人參。產甯古塔。卽今吉林甯安縣。三四月發芽。草本方梗。對節生葉。掌上複葉。形如秋海棠。六月七月開小白花。地白如韭。大者似碗。小者如鐘。八月結子。若小豆而連環。色正紅。久之則黃而扁。初生一極。四五年兩極。十年三極。久者四極。每極五葉莖直上。卽冠從東遊日記所謂百尺杵也。高者數尺。低者尺餘。凡山林野生之花草。多叢雜一處。開花數朵。或數十朵不等。參獨不然。花開獨一枝。單生一莖。不與俗草爲伍。他花隨風飄動。而參花風不能搖。而反靜。誠仙草也。故入山採參者。類多識之。摩樵人參栽培法云。人參第三年始開花。卽由一個長花柄之頭部。簇生數多之花梗。開白色之小花。是年亦能結實。然結子形小而少。不能爲種子用。宿根形狀。人參者。植

物類多年生宿根。長至六七寸。肥至四五分許。短者二三寸。分歧略似人形。或缺臂少腿。或如蝦蟆形者。種類甚多。大概近人形者。約十之六七。似他動物形者。十之三四耳。其外皮葱黃色。內部類白色。稍帶柔韌性。味甘微苦。有芳香氣。葉狀複葉。輪生。小葉五片。卵形。葉緣有小鋸齒。



人參

種類 人參一爲野生。一爲人工栽植者。東三省栽植之人參。每斤價目二兩至十二兩。深山自生者。有時每斤價有至銀數千兩者。野生人參。年數愈久。價亦愈昂。辨別年數。視莖外面之目點。卽可知其老嫩。梵天盧叢錄云。人參可分爲三種。卽山參。移參。養參三種。山參係山中自然生成者。品質最美。價值最高。移參就自然生成之參苗。再行移植培養者。俗名移山參。品價次之。養參以參籽播種

而成者。俗名秧子參。市上所賣。率以養參爲多。李春芝曰。人參可分老山。大山。扒山。移山。石柱。秧參。爲六種。老山係產於長白山者。年代在二百以上。至少五六十年者。能補將絕之元氣。爲最佳品。大山。凡生於山中。在數十年者。無論大小。統名之曰大山。療法雖與前同。而功力較薄耳。扒山。爲山野所生。苗將出未出之際。或被獵人或禽獸踐踏。參苗陷入土內。再數十年復萬。或有至四五十年始茁者。爲採參者所得。故名扒山參。治療之力。與山參同。惟形狀略差耳。移山亦野生。在三五十年不等。爲採參者所見。明知年限尙少。又恐被人採去。將其掘起。栽於家園。或植於山野者。故名移山參。治療功力。較大山。扒山。次百分之六十五。其性稍異。石柱參產於寬甸之石柱溝者。惟園種頗多。其效用較大山參減百分之八十。俗名石柱子。秧參卽各縣參園所栽種者。大多出於人工。且有赤白二種。其性味帶燥。惟補氣尙可。山形色鑑別之一則老山。大山等參。其嫩皮如綿而質

堅。紋細而膩。蘆頭與鬚之傍。天然長成珠結。一年一結。蘆長二三寸許。細驗卽知其年限。家園秧參。皮粗紋或上身有紋。亦係製作。而無珠結。總之無論作者如何精巧。其珠結不易偽造。更不能綴接也。卽此一法。亦可知參之真偽矣。龍江鄉土志亦云。野山參。有米珠在鬚。其紋細橫。秧子參。順紋無米珠。米珠卽珠結也。所謂秧參。卽鳳凰城及遼江產之參。生蒸者。形色白秀。體鬆而皮長。皮色多糙紋。皮熟細嫩者少。味甜無餘味。近人所謂白抄參。秧子參。太子參。皆爲白參。卽其類也。船廠產者。其地週二百里。內外所產。較鳳凰城堅實。且紅潤可觀。味苦微甘。其空懸者亦多。俗所謂廠參。邊江參是也。皆非道地之品。由性質鑑別。則人參野生。歷年愈久。性愈溫和。其精力亦足。因其吸天空清靜之氣。足。受地脈英靈之質。故效力巨也。梵天盧叢錄云。產野參之地。其樹色鮮秀。樹枝葉厚。茂蓋其土性特異也。且人參形狀。代有變態。據近時辨之。雖野山參不可得。而秧參辨之。體

實宜堅白。皮宜細緊。有橫縐紋。蘆
 葍宜四圍。蘆上極節宜多。極節多
 卽年份多故也。味宜甜中兼苦。且
 有清香氣。而有回味。方是上品。否
 則皆側路。此曹炳章氏經驗所考
 得也。①因地土及種植關係。有異
 類之參種若干。如甲、燕參、燕窩參、
 上黨參。詳見「燕參」條。乙、高麗
 參、朝鮮參、佛國參、百濟參、新羅參。
 詳見「高麗參」條。丙、西洋參、花
 旗參、美國參。詳見「西洋參」條。
 丁、東洋參、日本參。詳見「東洋參」
 條。戊、太子參。詳見「太子參」條。
 己、珠兒參。詳見「珠兒參」條。②
 又有人參之附屬品。其用途與人
 參不同。如人參鬚、人參蘆、人參葉
 等。各見本條。

陽光。將參移種於溝內。二三年內。
 始行生苗。將苗挖出。倒栽地下。以
 其生殖力向下。故灌溉蘆頭。使其
 肥大。以壯美觀。七八年間卽長成。
 ③整畦。梵天盧叢錄云。種參之圃
 名曰參營。凡三種。一爲苗圃。發參
 苗用者。一爲第一本圃。發苗後移
 種用者。一爲第二本圃。種至三年
 後。再行移植者。地址擇向陽斜面
 地。每圃壘土爲畦。高二尺。寬五尺。
 長三丈。上用山灰。質軟色黑。腐蝕
 土。施以牛馬糞。攪週佈細。每畦距
 約三尺。以資排水。而便人行。每畦
 周圍樹立木架。架上蓋木板。前高
 後低。以便流水。山民稱參營。又稱
 板子營。栽參一畦。稱爲一架棚。每
 年擇春秋。季。揭板向陽。三五次。至
 陰雨連綿時。放雨一二次。皆有程
 期。④播種。其栽種之法。預選最良
 種子。秋季。密地。次年。芒種後。取出
 在苗圃畦上。每間一寸五分。播下
 數粒。上撒土灰。或覆乾草樹葉。不
 過旬日。芽卽發現。培養至秋分後。
 卽移到第一圃內。排列插畦。每株
 相距約四五寸。參之所忌。爲烈日
 水溼。參之所害。爲雜草。蟲鳥。此後

生長發起。防護宜慎。⑤移種。經三
 年後。第一圃不能容受。再移至第
 二圃。每株相距一尺以外。是以第
 一圃之畦。爲數倍常種苗圃。第二
 圃苗數。更當倍之。因參秧移植後。
 發育甚速。佔地甚廣。如是再四五
 年前後。約八年。卽行收穫。泡製出
 售。以上爲種植之大概也。有並述
 栽培之注意點如下。(一)擇地。人
 參爲冷帶植物。性好寒冷。而忌溫
 熱之氣候。土質以礫質壤土最適
 其生長。其餘一切土地。皆不宜也。
 否則品質下劣。收量減少。欲使其
 生長。亦已難矣。(二)整地。宜選定
 適當之土地。而後作二三尺之高
 畦。土塊必須細碎。作畦既畢。乃可
 播種。(三)施肥。肥料以人糞尿。木
 灰。肥堆等爲主。於種子未播以前。
 可混和木灰於堆肥中。每畝地積
 用木灰五六百兩。堆肥三四百斤。
 人糞尿四五百斤。共施與三分之
 一作爲基肥。而播種之後。適其發
 芽成長。可再施以三分之一之混
 和肥料。(木灰。堆肥。人糞尿)是
 謂補肥。分作三四次施與之。以助
 其生長。如此則甚適當也。(四)摘

芽。栽培經三年。漸有花梗抽出。而
 開花。此時宜行摘芽法。以防其根
 部養分之流失。法用銳利之長剪
 於其花梗部剪斷之。止其生長。若
 不剪去其花梗。則其根部之養分。
 必爲所奪吸。以致生根甚少。其品
 亦劣。收量又少。故摘芽一事。甚要
 (五)收穫調製。採收之期。當在第
 四年八九月時。可以用鐵採收之。
 採收之時。不可損傷其根。若損傷
 其根。則形狀不正。品質下劣。價亦
 減低。採收之後。乃去其根毛。以洗
 滌之。再曬於日光中。候其乾燥後
 而調製之。再擇適宜之處。貯藏之
 可也。

採取 ●採參組織。梵天盧叢
 錄云。長白山北。有老林地方。處處
 產參。清初禁止採挖。參客諱參曰
 棒椎。採參爲挖棒椎。亦名放山。採
 參者。人持一根。名索羅木棍。其放
 山分三期。初夏爲放茅草。其時百
 草甫生。參芽發露。覓之尙便。夏季
 秋初爲放黑參。時則叢林濃綠。辨
 別最難。秋季爲放紅頭。則參苗頂
 心結子淺紅。識之甚易。又云。放掃
 筍頭。專舉下山。曰轉棍。●挖參狀

况。當進山時。有把頭者。名曰山頭。領其夥伴。遠望名山。把頭者。驗得參苗。即割樹皮。蓋窩棚。相借出尋。各人距丈許。執索羅木棍。將草拔。攪。詳細注視。參苗高數寸。苗頭平。分數莖。每莖五葉。形如掌狀。暫見參苗。即招集各人。左右前後。再三。搜覓。緣有苗不止一處。偶有孤苗。挺生者。亦百中之一耳。挖參時。量參草之大小。刈其四週之草。而後向內刨挖。一面起土。一面用骨簪。攪拌草莖。恐防參之根。鬚損傷也。挖出之後。裹以青苔。包以樹皮。俗稱捧根。大者每株二三兩。李春芝云。採參者。多於每年六七月間。由初伏日起。至末伏日止。採取之人。多結數十人。為一幫。凡遇人參。首由頭目驗視。確定後。支配數人。持板。摺取。拂以泥土。包之。而回。摺水質。參加以製造。始行出售。③藏參方法(一)以人參。藏茶葉。與中與茶。相間。收之。則經久而不蛀。屢試之。不遠。(二)人參。易於蛀壞。頗見風日。則生蟲。矣。惟以盛過麻油之磁瓶。泡淨。焙乾。與華陰細辛。相同。納於中。密封。經年不壞。(三)用

二畫 人

淋。過。窺。灰。腐。乾。曬。收。亦。可。(四)光熱。參。皆。包。貯。茶。葉。之。中。此。法。最。便。(五)預。防。變。色。最。怕。黃。梅。時。節。桂。花。黃。後。大。暑。不。使。其。傷。熱。淫。雨。不。使。其。受。溼。溼。則。烘。之。熱。則。風。涼。之。不。時。啓。看。勿。使。蟲。蟻。光。熱。參。至。夏。日。逼。身。白。點。謂。之。起。霜。當。以。軟。布。用。新。涼。水。擠。溼。捻。去。無。礙。蓋。經。焙。則。其。色。易。老。再。焙。則。色。皆。黑。紫。矣。製。法。以。其。生。時。背。陽。故。不。喜。見。風。日。凡。生。用。宜。咬。咀。熟。用。宜。隔。紙。焙。之。或。熱。酒。潤。溼。咬。咀。焙。熟。用。並。忌。鐵。器。梵。天。巖。錄。云。人。參。在。白。露。節。後。起。土。先。用。小。毛。刷。洗。去。泥。土。而。後。泡。製。泡。製。俗。名。做。貨。做。時。以。沸。水。煮。到。半。熟。刷。去。浮。皮。用。白。線。小。弓。別。盡。參。紋。中。塵。土。再。以。冰。糖。熬。成。清。汁。將。參。皮。浸。漬。一。二。日。再。排。列。於。蒸。籠。上。鍋。蒸。熟。蒸。籠。須。用。馬。尾。毛。編。成。細。絲。形。蒸。時。候。火。力。大。小。務。宜。合。度。過。蒸。則。爛。不。足。則。有。腐。敗。之。虞。蒸。至。適。當。火。候。取。參。出。籠。排。在。長。方。之。火。盤。內。下。用。文。火。烤。乾。約。一。晝。夜。之。久。至。不。粘。膩。而。不。過。燥。為。度。後。移。於。別。器。置。於。坑。上。俟。其。餘。徐。收。乾。至。八

九分。始。舉。其。事。亦。有。不。煮。水。不。浸。糖。而。生。剝。蒸。者。名。曰。歸。參。即。假。高。麗。參。之。粗。製。法。其。效。則。一。山。參。移。參。養。參。製。法。皆。同。惟。李。春。芝。之。製。法。略。有。不。同。附。錄。於。下。以。備。參。考。李。春。芝。曰。製。作。人。參。分。為。二。步。初。精。製。將。人。參。取。來。用。水。洗。淨。剝。去。老。黑。皮。再。用。紙。製。之。弓。將。參。之。週。身。拉。成。細。紋。用。針。通。刺。出。孔。以。糖。鍋。一。只。先。以。白。冰。糖。同。水。煎。熟。糖。亦。溶。解。移。時。候。冷。將。參。擲。於。鍋。內。以。糖。汁。浸。一。宿。翌。日。取。出。陰。乾。為。免。壞。爛。之。虞。名。曰。白。參。及。蒸。煮。亦。用。前。法。將。參。洗。淨。用。蒸。籠。乾。蒸。之。後。取。出。曬。乾。即。成。名。曰。紅。參。性。質 甘。微。寒。無。毒。成。分 ①人。參。之。有。效。成。分。據。額。里。克。斯。氏 (S. Carlsberg) 就。北。美。產。人。參。研。究。之。發。見。有。名。『巴。那。規。倫』(C. H. B.) 之。成。分。日。本。京。都。大。學。之。籐。谷。功。彥。氏。就。朝。鮮。及。日。本。產。人。參。從。化。學。研。究。其。成。分。亦。名。之。為。『巴。那。規。倫』。據。云。朝。鮮。產。者。含。有。○·二。五。%。靈。州。產。者。含。有。○·○。八。三。%。惟。對。於。額。里。克。斯。氏。之。『巴。那。規。倫』

指。為。尚。非。純。粹。物。質。②人。參。之。有。效。成。分。據。日。本。近。藤。平。三。郎。田。中。儀。一。報。告。愛。壽。辣。克。脫。辣。脫。○。六。八。三。%。中。含。有。人。參。香。氣。之。物。質。為。揮。發。性。油。狀。體。與。不。揮。發。性。黏。稠。物。質。之。混。合。體。構。成。之。美。溫。辣。科。羅。珂。來。脫。辣。脫。二。五。·六。六。三。○。○。中。含。有。薩。且。羅。斯。與。一。種。薩。波。泥。狀。之。琪。珂。邊。華。壽。來。克。脫。辣。脫。四。萬。七。七。·六。六。二。%。中。含。有。黏。液。及。抱。水。炭。素。之。混。合。物。據。卡。里。苦。司。氏。就。北。美。產。人。參。 (即。西。洋。參) 而。研。究。其。成。分。發。見。『巴。那。規。倫』。③日。人。籐。谷。功。彥。氏。就。朝。鮮。產。及。日。本。產。人。參。而。研。究。之。亦。得。同。樣。之。結。果。朝。鮮。產。 (即。別。直。產) 含。有。○。三。五。%。靈。州。產。 (即。東。洋。參) 含。有。○。○。八。三。%。④日。人。朝。比。泰。泰。彥。及。田。文。太。兩。氏。於。人。參。發。中。發。見。『撒。帕。凝』。井。上。剛。治。氏。所。研。究。之。竹。節。人。參。亦。得。一。種。糖。原。汁。為。『撒。帕。凝』。之。屬。⑤卡。里。苦。司。氏。發。見。『巴。那。規。倫』。其。方。程。式。為。炭。二。四。·三。三。二。·三。三。一。八。一。八。乃。黃。色。無。晶。形。之。粉。末。易。溶。於。水。及。酒。精。中。不。溶。於。依。的。兒

中有甘草樣子。甘味及苦味。其水溶液。遇碳酸之溶液。即生沉澱。遇鹼性溶液則變為褐色。與酸類共熱時。則發炭酸氣。⑤籐谷功彥氏。發見之。『巴那規倫』為雪白色。無晶形之粉末。味純苦。亦能溶解於水酒精。水醋酸。及偏蘇爾中。不溶於依的兒。哥羅仿。石油。阿米兒。阿爾考爾。阿米通中。其水溶液呈中性反應。振盪之。則生泡沫。光學上為左旋。其水溶液。對反林葛氏液無還元性。加以稀鹽酸而煮沸時。則發生炭酸氣。而折出結晶性物質。生右旋性之還原性砂糖。其反泥爾屋柴。從於二百零二度。溶解本品。則於一百七十二度左右。溶解。而變為褐色物質。⑥撒帕凝之方程式。尙未確定。恐為炭三十二。氫五十四。氧十八。為白色或微黃色。無晶形之粉末。稍有引溼性。味初緩和。而後呈持續性之苦味。能溶解於水及沸酒精。難溶解於冷酒精。不溶於依的兒。哥羅仿。偏蘇爾中。其水溶液。呈中性反應。強振盪之。則生許多泡沫。光學上為左旋性。惟能破壞赤血球。以

百十度乾燥者。熱之。則於百九十度左右。發生泡沫。變為黃褐色之物質。而溶解。加以稀薄之鹽酸。或硫酸共熱之。則分解為砂糖。及撒帕根銀。(方程式。為炭十四。氫二十三。氧二) 又加以反林葛氏液。則生紫狀之沉澱。亦能使硫酸銅還原。⑦結論。發見『巴那規倫』者之報告。謂此藥之價值。全與甘草相同。由發見『撒帕凝』者報告。謂在藥物學上。毫無趣味云。且其化驗。為北美人參(即西洋參)朝鮮人參(即高麗參)雲州人參(即東洋參)皆非中國之野生。生山人參。故其化驗之結果。無充分之成績。且化驗藥物。凡含有毒質猛烈辛辣味。及芳香物與特性異味等品。則必呈特別反應。與成績。若平常淡味及甘味緩和性之補品。與滲利藥。其治病之有效成分。在化學上。雖未能顯出。然於臨床上之實驗。成績甚優。試驗實例。殆不勝枚舉矣。

病元虛弱脫者。必用。病後欲求恢復元氣者。常服之。入胃後能助胃之消化力。一部分與胃酸化合。而含水素與類似葡萄糖之糖質。至小腸始被吸收。而入血中。能促進血液之進行。助長血球之產生。使精神振興。體力強健。故人參之主。要效能。為強壯藥。凡肺癆。神經衰弱。陰萎。遺精。衰老。貧血。與腎臟病。子宮病。及一切體力消耗所起之病。皆可用。於神經衰弱之頭痛。眩暈。尤有特效。但久用人參。則呈頭痛。頭重等腦充血及便秘胃呆之症狀。

主治 補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服。輕身。延年。又能療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止瀉。通血脈。補虛積。令人不忘。

張仲景之發明 人參一藥。張仲景氏之實驗。認為有主治心下痞。堅。痞。腹。支。結。勞。治。不。食。嘔。吐。喜。睡。心。痛。腹。痛。煩。悸。等。作用。茲。考。徵。如下。●木防己湯證曰。心下痞。堅。(用人參四兩)心下痞。堅。愈。復。發。者。去。石。苪。加。伏。苓。芒。硝。湯。主。之。是

人參芒硝。分治心下痞。堅之實痞。堅也。於是乎可見古人用藥不苟也。蓋其初。心下痞。堅。猶。緩。謂。之。痞。緩。亦。可。故。投。以。人。參。也。復。發。不。愈。而。痞。之。堅。必。矣。故。投。以。芒。硝。也。●半夏瀉心湯。脫。緩。字。也。甘草瀉心湯。此方中。倍。甘。草。生。姜。瀉。心。湯。加。生。姜。之。湯。也。而。共。云。治。心。下。痞。緩。則。此方。脫。緩。字。也。明。矣。●人參湯證曰。心中痞。又曰。喜。睡。久。不。了。了。●桂枝人參湯證曰。心下痞。●半夏瀉心湯證曰。嘔。而。腸。鳴。心。下。痞。●生。姜。瀉。心。湯。證。曰。心。下。痞。●乾。噎。食。臭。●甘。草。瀉。心。湯。證。曰。心。下。痞。●乾。噎。而。滿。乾。嘔。心。煩。又。曰。不。欲。飲。食。惡。聞。食。臭。●小。柴。胡。湯。證。曰。默。不。欲。飲。食。心。煩。喜。嘔。又。云。胸。中。煩。又。云。心。下。悸。又。云。腹。中。痛。●吳。茱。萸。湯。證。曰。食。穀。欲。嘔。又。曰。乾。嘔。吐。涎。沫。●大。半。夏。湯。證。曰。嘔。而。心。下。痞。●白。茯苓。飲。證。曰。氣。滿。不。能。食。●乾。姜。黃。連。黃。芩。人。參。湯。證。曰。食。入。口。即。吐。吳。茱。萸。湯。伏。苓。飲。乾。姜。黃。連。黃。芩。人。參。湯。六。物。黃。芩。湯。生。姜。甘。草。湯。皆。人。參。三。兩。而。云。治。欬。唾。涎。沫。嘔。吐。下。利。不。云。治。心。下

痞。於是綜考仲景治欬唾涎沫。嘔吐下利方中。其無人參者。十居八九。今依人參之本例。用此五湯。施之於心下痞。而欬唾涎沫。嘔吐下利者。其應如響也。由是觀之。五湯之證。皆心下痞。之毒也。明矣。桂枝加芍藥生姜人參新加湯。不具也。其云發汗後身疼痛。是桂枝湯證也。然則芍藥生姜人參之證。明也。說在類聚方。六物黃芩湯證曰。乾嘔。白虎加入人參湯。不具也。白虎加入人參湯四條之下。俱是無人參之證。蓋張仲景之用人參三兩。必有心下痞。之證。此方獨否。因此考覈千金方。外臺祕要。共作白虎主之。故今盡從之。生薑甘草湯證曰。咳唾涎沫不止。上十四方人參皆三兩。柴胡桂枝湯證曰。心下支結。乾姜人參半夏丸證曰。嘔吐不止。乾姜人參半夏丸。依本治之例。試推其功。心下有結實之毒。而嘔吐不止者。實是主之大抵。與大半夏湯之所主治者。大同小異。微有緩急之別。四逆加入人參湯證。附子湯證。按惡寒厥微而復利。

二畫 人

是四逆湯之所主。而不見人參之證也。此方雖加入人參。僅一兩。無見證。則何以加之。是脫心下之病證也。明矣。附子湯之與真武湯。獨差一味。而其於方意也。則大有迥庭。附子湯以朮附為君藥。而主身體疼痛。或小便不利。或心下痞。真武湯以茯苓芍藥為君藥。而主肉瞶筋惕。拘攣嘔逆。四肢沉重疼痛者。以上三方用人參一兩。或一兩。黃連湯證曰。腹中痛。欲嘔吐。旋覆花代赭石湯證曰。心下痞。噎氣不除。旋覆花代赭石湯。共用人參二兩。而有心下痞。之證。此小半夏湯加減之方也。二兩疑當作三兩也。大建中湯證曰。胸中大寒痛。嘔吐不能飲食。以上四方用人參皆二兩。按上述諸方。人參主治心下結實之病也。故能治心下痞。痞支結。而旁治不食。嘔吐。喜唾。心痛。腹痛。煩悸。亦皆結實所致者。人參主之也。

歷代記述攷證 【魏】華佗中藏經論人參曰。人參與側柏葉煎芥穗燒為末。和飛羅麵。治氣血妄行。心脾脈破。口鼻血出。如湧泉者。【唐】甄權藥性本草論人參曰。人參主五勞七傷。虛損痰多。止嘔噦。補五臟六腑。保中守神。消胸中痰。治肺痿及癰疾。冷氣逆上。傷寒不下食。凡虛而多夢粉。【唐】李珣海藥本草論人參曰。人參能止煩渴。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論人參曰。相傳欲試人參。使二人同走一舍。人參一。空口各走三五里許。其不令人參者必大喘。含者氣息自如。【宋】日華子諸家本草論人參曰。人參消食開胃。調中治氣。殺金石藥毒。【宋】陳自明產論集論人參曰。人參與石菖蒲石蓮肉。同治產後不語。【金】張元素珍珠囊論人參曰。人參治脾胃陽氣不足。肺氣虛促。短氣少氣。補中緩中。瀉心脾脾胃中火邪。能止渴生津液。【元】王好古湯液本草論人參曰。人參補五臟之陽。沙參補五臟之陰。雖補五臟。須各用本臟之藥。佐使引之。【元】李東垣用藥法象論人參曰。人參補肺中元氣。肺氣旺則四臟之氣皆旺。精自生而形自盛。肺主諸氣。故也。仲景法病人汗

後身熱亡血。脈沉遲者。下利身涼。脈微血虛者。並加入人參。古人血脫益氣。故補氣用人參。血虛者亦須用之。【明】李時珍本草綱目論人參曰。治男婦一切虛證。發熱自汗。眩暈。頭痛。反胃。吐食。痰癆。滑瀉。久痢。小便頻數。淋瀝。勞倦。內傷。中風。中惡。瘧疾。吐血。嗽血。下血。血淋。血崩。胎前產後諸病。【明】張介賓景岳全書論人參曰。陰虛而火不盛者。自當用人參。為君。陰虛而火稍盛者。但可用參為佐。若陰虛而火大盛者。則誠有暫忌人參。而惟用純甘壯水之劑。庶可收功一證。不可不知也。予非不善用人參者。亦非畏用而不知人參之能補陰者。蓋天下之理。有對待。謂之曰陰虛。必當忌參。固不可謂之曰陰虛。必當用參。亦不可要亦得其中。用其當而已矣。【明】李士材本草圖解論人參曰。人參職專補氣。而肺為主氣之藏。故獨入肺經也。肺家氣旺。則心肝脾腎四臟之氣皆旺。故補益之功。獨魁羣草。凡人元氣虛衰。譬如令際嚴冬。雖然肅殺。必陽春布德。而後萬物發生。人參氣味

溫和合天地春生之德。故能回元氣於無何有之鄉。愚謂肺家本經有火。右手獨見實脈者。不宜驟用。即不得已而用之。必須鹽水焙過。秋石更良。蓋鹽能潤下。且參畏鹵。鹽故也。若夫腎水不足。虛火上炎。乃刑金之火。正當以人參救肺。何忌之有。【明】陳嘉謨本草蒙筌論人參曰。人參補虛。虛寒可補。虛熱亦可補。氣虛宜用。血虛亦宜用。但恐陰虛火動。勞嗽吐血。病久虛甚。者不能抵當其補耳。非謂不可補也。如仲景治亡血脈虛。非不知動火也。用此以補之。謂氣虛血弱。補氣則血自生。陰生於陽。甘能生血。故也。葛可久治癆瘵。大吐血後。亦非不知由火載血上也。用此一味煎服。名曰獨參湯。蓋以血脫須先益其氣耳。丹溪治勞嗽火盛之邪。製瓊玉膏以爲之君。或以此單熬。亦曰人參膏。服後肺火反除。嗽病漸愈者。又非虛火可補之明驗耶。若古方書云。諸痛不宜服參。此亦指暴病氣實者而言。若久病氣虛而痛。何當拘此。東垣治中湯同乾薑用。治腹痛吐逆者。亦謂裏虛

則痛。補不足也。肥白人任多服。若黃人宜少服。丹溪云。肥白氣虛。若黑氣實。然考醫案中。證虛色蒼者。亦每多用此。云其常猶當應其變也。丹溪治外感夾內傷症。但氣虛熱甚者。必與黃芪同用。托住正氣。仍恐住緩。不能速達。少加附子資其健悍之性。以助成功。是知火與元氣勢不兩立。一勝一負。輒用匡扶。經曰。邪所湊。正必虛是也。【明】倪朱蓀本草禁言論人參曰。人參與麥冬、黃芪、白芍、皂角刺、肉桂、穿山甲。同治痘瘡。灰白乾枯不起者。【明】薛立齋薛氏醫書十六種論及人參者有四條。一則曰。人參一品醫者。但泥於作飽。而不敢用。蓋不知少服則滋。多則反宜。通不滯矣。一則曰。人參但入肺經。助肺氣而通經活血。乃氣中之血藥也。補遺所謂入手大陰而能補陰火者。正此意也。一則曰。人參一品古方解散之藥。及行表藥中多用此者。亦取其通經而走表也。一則曰。人參運用之性。頗緩。補益之性。最充。但虛火可掣。而實火難用。以其甘能生血。故有通脈之功也。

【明】經希雅本草經疏論人參曰。人參得土中清陽之氣。稟春升少陽之令而生。故味甘微寒而無毒。氣味均齊。不厚不薄。升多於降。神農微寒。別錄微溫。二義相蒙。世鮮解者。蓋微寒者。春之寒也。微溫者。亦春之溫也。神農直指所稟。故曰微寒。別錄兼言功用。故又曰微溫。既云微寒。寒不甚寒。則近於溫。溫不甚溫。則近於寒。故知寒溫雖別。言微則一也。其主治也。則補五臟。蓋臟雖有五。以言乎生氣之流通。則一也。益真氣。則五臟皆補矣。其曰安精神。定魂魄。止驚悸。開心益智者。以心藏神。肝藏魂。肺藏魄。腎藏精。與志。脾藏意。與智。故也。心腎虛則精神不安矣。肝肺虛則魂魄不定矣。驚悸者。心脾二經之病也。心脾虛則驚悸。心脾之氣強則心竅通利。能思而智益深矣。邪氣之所以久留而不去者。無他。真氣虛則不能敵。故留連而不解也。茲得補而真元充實。則邪自不能容。譬諸君子當陽。則小人自退。清陽之氣下陷。則耳目不聰明。兼之目得血而能視。陽生則陰長。故明目。真

氣內虛。故腸胃中冷氣旺。陽回則不冷矣。心腹鼓痛者。心脾虛故也。二臟得補。其痛自止。所謂按之快然者是也。故經曰。可案者虛也。不可案者實也。不可案者勿用。胸脇逆滿者。氣不歸元也。得補則氣實而歸元也。脾胃俱虛。則物停滯而邪客之。故霍亂吐逆也。補助脾胃之元氣。則二證自除。調中者。脾胃中焦。脾得補則中自調矣。消渴者。津液不足之候也。氣回則津液生津。液生則渴自止矣。通血脈者。血不自行。氣壯則行。故通血脈。破堅積者。真氣不足。則不能健行。而廢物日積月累。遂成堅積。譬夫膠管納物。無力則不轉。不轉則停積矣。脾主消化。真陽之氣回。則脾強而能消。何堅積之不磨哉。令人不忘者。心主記。脾主思。心脾二臟之精氣滿。則能慮而不忘矣。久服輕身延年者。純陽則充舉。氣積則身輕。五臟皆實。延年可知矣。斯皆數本之論也。【清】陳士鏗本草新編論人參曰。夫獨參湯乃一時權宜。非可恃爲常服也。蓋人氣脫於一時。血失於頃刻。精走於須臾。陽絕於

且夕。他藥緩不濟事。必須用人參一二兩。或四五兩。作一劑煎服。以救之。否則陽氣遺散而死矣。此時去管不可雜之他藥。共相挽回。誠恐牽制其手。反致功效之緩。不能返之於無何有之鄉。一至陽回氣轉。急以他藥佐之。總得保其再絕耳。否則陰寒逼人。又恐變生不測。可見人參必須有輔佐之品。相濟成功。未可專恃一味。期於必勝也。又曰。當今之世。非長人參。即亂用人參。畏用之弊。宜用而不用。亂用之弊。不當用而妄用。二者均殺人。余故言人參之功。增長用者。勝於人參之過。詐亂用者。所能入五臟六腑。無經不到。非僅入脾肺心。而不入腎肝也。五臟之中。尤專入脾入肺。其入心者十之五。入腎者十之三耳。世人止知人參為脾肺心經之藥。而不知其能入肝入腎。但肝腎乃至陰之經。人參氣味。陽多於陰。少用則泛上。多用則沈下。故過肝腎之病。必須多用之。於補血補精之中。助山黃熟地純陰之藥。使陰中有陽。反能生血生精之易也。【清】張路玉張氏醫通論人參

二 蠱 人

曰。傷寒有宜用人參入藥者。發汗時元氣大旺。外邪乘勢而出。若元氣虛弱之人。痛雖外行。氣從中餒。輕者半出不出。留連致困。重者隨元氣精入。發熱無休。所以虛弱之人。必用人參入表藥中。使藥得力。一消而出。全非補養之意。又曰。古今諸方。表汗用參。蘇敗毒和解用。小柴胡。解熱用白虎竹葉石膏湯。攻下用黃龍湯。皆領人參深入驅邪。即熱退神清。從仲景至今。明賢方書。無不用人參。何為今日醫家屏絕不用。以阿諛求容。全失人參應用之長。殊不知誤用人參殺人者。皆是與黃芪白朮乾薑當歸肉桂。附子同行溫補之誤。所致。不與羌獨柴蒲芍半根桔等同行之法。所致也。安得視人參為砒鴆刀刃。固執不用耶。又痘疹不宜輕用人參者。青乾黑陷。血熱毒盛也。若氣虛頂陷。色白皮薄。泄瀉漿清。必用也。參鬚價廉。貧乏之家。往往用之。共治胃虛咳嗽失血等證。亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精崩中下血之症。每致增劇。以其味苦降泄也。【清】楊時泰本草述

鈞元論人參曰。先哲云。虛火可補。參芪之屬。實火可瀉。芩連之屬。四語遺賢商酌。必須精晰火與熱之辨。而後可假如形證與脈俱虛。其不足。祇屬陽分之虛。而無干於陰。虛是為虛熱。可補陽也。參芪任用。若由真陰之虛。以致陽不足者。是謂虛火。必補陰而並格陽。若寒固未宜。若竟以參芪補之。恐甘溫祇以益陽。反損其陽生之原也。是則可投參芪者。乃止屬陽分之虛。名為虛熱。不名為虛火也。又如形證與脈俱燥。其有餘。止屬陽分之實。而無干於陰。虛是為實熱。可瀉陽也。芩連任用。若由至陽之盛。以致陰不足者。是謂實火。必抑陽而並滋陰。辛熱固不宜。即概以芩連瀉之。恐苦寒反致劫陰。先絕其陽化之原也。是則可用芩連者。乃止屬陽分之實。名為實熱。不名為實火也。總之虛實兩治。一干於陰。虛便實商酌。有如此者。更專言虛火之治。凡人身中以下屬陰。身中以上屬陽。假如陰分陽虛。不由真陰之虛而致之。則當直補先天之真陽。如桂附之屬。參芪可以

佐之。一由於陰虛而致者。即當以養陰為主。而寓扶陽之義。獨任參芪。非的劑也。又如陽分陰虛。不由至陽之盛而致之。則當滋益後天之元陰。如歸芍之類。參芪亦可以佐之。一由於至陽盛而致者。即當以抑陽為主。而寓生陰之義。參芪正以貽害耳。至陰陽各分之中。又各有陰陽何者。勞倦飲食。損傷氣分。固有陰氣陽氣之分。而思慮色欲。損傷血分。又有陰血陽血之異。蓋血陰氣陽者。分陰分陽之義。而氣血各有陰陽者。陰陽互根之理也。大法陽氣虛者。宜桂附兼參芪。較補。陰氣虛者。宜芩甘草緩而益之。陰分血虛者。生地元參龜板知柏補之。陽分血虛者。茯苓參歸遠志之類補之。此實前人之所未發也。統治諸證。總先明於火與熱之分。先習胃陽虛生寒。寒生溼。溼生熱。陰虛生火。火生燥。燥生風。此火熱之介。然而不移者。火固熱也。第所謂少火者。乃陰中之真陽。不指氣之熱者。以名火也。若指氣之熱者。以為火。是屬壯火而非少火矣。【清】黃宮繡本草求真論人參曰。

二 五

人參性稟中和。不寒不燥。形似人。氣冠羣草。能回肺中元氣於垂絕之鄉。功與天地並行不悖。是猶聖帝御世。撫育萬民。參贊位育。功與天地並立。此參之義所由起。而參之名所由立也。第世畏懼其參者。每以參為助火助氣。凡遇傷寒發熱及勞役發熱等症。畏之不肯煇。以為內既發熱。復以助火助熱之藥入而投之。不更使熱益甚乎。詎知參以補虛。非以填實。其在外感。正氣堅強。參與芪朮附桂同投。誠為助火彌熾。若使元氣素虛。邪匪不出。正宜用參相佐。如古參蘇飲。敗毒散。小柴胡湯。白虎加入參湯。石羔竹葉湯。黃龍湯。皆用人參內入。領邪外出。矧有並非外感。止因勞役發熱。而可置參而不用乎。夫參之所以能益人者。以其力能補虛耳。果其虛而短氣。虛而泄瀉。虛而驚恐。虛而倦怠。虛而自汗。虛而眩暈。虛而飽悶。食滯等症。固當用參填補。即使虛而嗽血。虛而淋閉。虛而血與虛而喘滿。煩燥口渴。便結等症。又何不以虛治。而不用以參乎。况書有云。參與升麻同

用。則可以瀉肺火。同茯苓則可以瀉腎火。同麥冬則可以生脈。同黃耆甘草則可以退熱。是參更為瀉火之劑。則參曷為不用。惟在虛實二字。早於平昔分辨明確。則用自不見誤耳。潔古謂其喘嗽不用。以其痰實氣壅之故。若使腎虛氣短喘促。豈能禁而不用乎。仲景謂其肺寒而嗽勿用。以其寒束熱邪壅滯在肺之故。若使自汗惡寒而嗽。豈能禁而不用乎。東垣謂久病鬱熱在肺勿用。以其火鬱於內。不宜用補之故。若使肺虛火旺氣短汗出。豈能禁而不用乎。丹溪謂其諸痛不宜驟用。以其邪氣方銳。不可用補之故。若使裏虛吐利。及久病胃弱。與虛痛喜按之類。豈可禁而不用乎。節齋謂其陰虛火旺吐血。勿用。以其血虛火亢之故。若使自汗氣短。肢寒脈虛。豈可禁而不用乎。夫虛實二字宜相較。果其氣衰火熄。則參雖同附桂可投。如火旺氣促。即參同知柏亦宜切忌。至於陰氣稍虛。陽氣更弱。而陰不受火。薰蒸者。則可用參為君。陽氣稍衰。陰氣更弱。而火稍見其盛者。則可

用參為佐。蓋陽有生陰之功。陰無益陽之理。參雖號為補陽助氣。而亦可以滋陰血耳。是以古人補血用四物。而必兼參同用者。義實基此。非若黃芪性稟純陽。陰氣絕少。而於火盛血燥不宜。沙參甘淡性寒。功專瀉肺。而補絕少。女參苦鹹寒滑。色黑入腎。治腎經無根之火。攻於咽喉。不能有益於氣。故耆識參益土。生金。明目。開心。益智。添精助神。定驚止悸。解渴除煩。通經生脈。破積消痰。並治發熱自汗。多夢紛紜。嘔噎反胃。虛嗽喘促。久病滑瀝。淋瀝脹滿。中暑中風。一切氣虛血損之症。至謂參畏蠶脂。而亦有與參同用以治經閉。是畏而不畏也。參惡皂莢。而亦有參同用以名交泰丸。是惡而不惡也。參反藜蘆。而亦有參同用以取涌越。是蓋借此之激其怒。難反而不反也。然非深於醫者。不能以知其奧耳。但參本溫。積溫亦能成熱。故陰虛火亢。咳嗽喘逆者。為切忌。清。鄒澍本經疏證論人參曰。凡論藥之用。有求之傷寒。可通。雜證不可通者。惟人參所謂上動下靜者。則無是

也。因火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。麥冬湯主之。胸痹心中痞氣。氣結在胸。胸滿脅下逆搶心。人參湯亦主之。胸中大寒。痛嘔不能飲食。腹中寒上沖皮起出。見有頭足上下痛。不可觸近者。大建中湯主之。非病在上而動者乎。諸下利氣。氣利下利。膿血下利。瀉熱利下重下利。欲飲水證。非病在下而靜者乎。獨九痛丸治九種心疼。其病在上。不可不謂之靜。但所與共者。狼牙巴豆。皆非常用之品。則不得以常情測之。矧其方下注云。治連年積冷流注心胸痛。并冷沖上氣。落馬墜車血疾等。則仍不得不謂之動矣。蓋其用人參乃使賊賊者將兵。而以純厚長者監之之術也。又曰。烏梅丸。侯氏黑散。黎瀆丸。竹葉石膏湯。溫經湯。皆有人參。但其任退在偏裨。以不得與他方並論。然亦有可資者。烏梅丸中居君藥三之一。侯氏黑散十二之一。黎瀆丸四之一。竹葉石膏湯亦三之一。謂之偏裨可也。溫經湯仍居三之二。謂之偏裨可乎。雖然其入氣藥中。則和合而生氣。入血藥中則

陰而化氣。入風藥中則隨所至而布氣。終不得謂之偏裨也。且烏梅丸中用寒藥爲君。竹葉石膏湯中用寒藥甚多。而溫經湯以熱藥爲君。紫菀丸之補瀉錯雜。侯氏黑散之收散並行。非人參則其力不齊。而互相違拘者有之矣。【清】陳修園本草經讀論人參曰。本經止三十七字。其提綱云。主補五藏。以五藏屬陰也。精神不安。魂魄不定。爲悸不止。目不明。心智不足。皆陰虛爲亢陽所擾也。余細味經文。無一字言及溫補回陽。故仲景於汗吐下陰傷之症。用之以救津液。而一切回陽方中。絕不如此陰柔之品。反緩覆附之功。故四逆湯。通脈四逆湯。爲回陽第一方。皆不用人參。而四逆加人參湯。以其利止亡血而加之也。茯苓四逆湯用之者。以其在汗下之後也。今人輒云以人參回陽。此說倡自宋元以後。而大盛於薛立齋。張景岳。李士材輩。而李時珍本草綱目。尤爲雜沓。學者必於此等書焚去。方可與言醫道。又曰。仲景一百一十三方中。用人參者。只有一十七方。新加湯。小

柴胡湯。柴胡桂枝湯。半夏瀉心湯。黃連湯。生薑瀉心湯。旋覆代赭石湯。乾薑黃連黃芩人參湯。厚朴生薑半夏人參湯。桂枝人參湯。四逆加人參湯。茯苓四逆湯。吳茱萸湯。理中湯。白虎加人參湯。竹葉石膏湯。炙甘草湯。皆是因汗吐下之後。亡其陰津。取其救陰。如理中吳茱萸湯。以剛燥劑中。陽藥太過。取人參甘寒之性。養陰配陽。以臻於中和之妙也。又曰。自時珍之綱目盛行。而神農之本草經遂廢。卽如人參。本經明說微寒。時珍說生則寒。熱則溫。附會之甚。蓋藥有一定之性。除是生搗取汁。冷服與蒸曬八九次。色味俱變者。頗有生熱之辨。若入煎劑。則生者亦熱矣。况寒熱本屬冰炭。豈一物蒸熱不蒸熱。間遂如許分別乎。嘗考古聖用參之旨。原爲扶生氣。安五藏起見。而爲五藏之長。百脉之宗。司清濁之運化。爲一身之橐籥者。肺也。人參惟微寒清肺。肺清則氣旺。氣旺則陰長。而五藏安。古人所謂補陽者。卽指其甘寒之用。不助壯火以食氣而言。非謂其性溫補火也。又曰。陶

宏景謂功用同甘草。凡一切寒溫補瀉之劑。皆可共濟成功。然甘草功兼陰陽。故本經云。主五臟六腑。人參功備補陰。故本經云。主五臟。仲景於咳嗽病去之者。亦以形寒飲冷之傷。非此陰寒之品所宜也。【清】徐洄溪本草經百種錄論人參曰。人參得天地精英純粹之氣以生。與人之氣體相似。故於人身無所不補。非若他藥有偏長。而治病各有其能也。凡補氣之藥。皆屬陽。惟人參能補氣。而體質屬陰。故無剛燥之病。而又能入於陰分。最爲可貴。然力大而峻用之。失宜其害亦甚於他藥也。今醫家之用參。救人者少。殺人者多。蓋人之死於虛者十之一二。死於病者十之八九。人參長於補虛。而短於攻疾。醫家不論病之已去未去。於病久或體弱。或富貴之人。皆必用參。一則過爲謹慎。一則借以塞責。而病家亦以用參爲盡孝之道。不知病未去而用參。則非獨元氣不充。而病根遂固。諸藥罔效。終無愈期。故曰殺人者多也。或曰。仲景傷寒方中。病未去而用參者不少。如小柴

胡新加湯之類。何也。曰。此則以補爲瀉之法也。古人曲審病情。至精至密。知病有分有合。合者邪正並居。當專於攻散。分者邪正相離。有虛有實。實處宜瀉。虛處宜補。一方之中。兼用無礙。且能相濟。則用人參以建中生津。拓出邪氣。更爲有力。若邪氣尙盛而未分。必從專治。無用參之法也。况用之亦皆入疎散藥中。從無與熱地黃肉桂等藥同入。感證方中者。明乎此而後能不以生人者殺人矣。又曰。人參亦草根耳。與人殊體。何以能驟益人之精血。蓋人參乃升提元氣之藥。元氣下降。不能與精血流貫。人參能提之使起。如火藥藏於炮內。不能升發。則以火發之。若砲中本無火藥。雖以砲投火中。不能發也。此補之義也。

國外學說 日本藤谷功彥氏之漢學人參藥物學之研究云。用『巴那規倫』之稀薄液。注入蛙之胸淋巴囊內。則起中樞性麻痺。蛙之心臟。漸次減少其搏動。始僅微弱。終而休止。對於器械的刺激。或亞篤魯濱 (Atropine) 皆不感

應。若按先投以亞篤魯。制止心臟神經。然後投以人參。其成績亦屬相同。故知人參顯係使心臟肌肉而使之麻痺者。若者由以上試驗所得而下結論曰。此『巴那親倫』實為一種肌肉毒。使心臟尤為強烈。類似鉀鹽。倘使果如Kommergh之說。鉀鹽雖為心臟毒。但用少許。反能與奮心臟機能。因而增加脈搏。亢進血壓。則用人參少許。或亦能興奮心臟機能。果爾。則人參於藥用上之價值。實際極微。古人用之於衰弱狀態。不能謂為全然不能證明云。又湯本求真云。古來以人參為萬病之寶藥。病者若瀕於危。為不問病之若何。不問證之表裏虛實。必與此藥。視為故常。是則為後世醫者之謬見。蓋人參斯非萬能藥也。此藥以治胃衰痞脹。及新陳代謝機能之減衰。為主要目的。食慾不振。惡心嘔吐。消化不良。下利等證。為次要效用。若反背之。則必有害也。又猪子氏之實驗云。人參為興奮強壯藥。固為漢醫輩所珍重。然微諸病床上之實驗。則不甚讚賞。在

病症危急時。毫無作用。唯數日至數週間。接續食之。始覺營養稍佳。其有效之成分未詳。又富田長壽成氏之報告云。脈微弱而易壓迫者。用之。則血壓漸增。用脈波計。見脈波漸漸高起。然猪子氏於血行器。尚未實驗。其有顯明之變化。又藥學士井上圓治氏之實驗報告之大要。為研究真正人參之階梯。先研究竹節人參。發見一種糖原質。為サホニン之屬。在藥物學上。無甚趣味。依氏最初之意見。謂對於漢醫家所述人參功用之廣大無邊。因父母或夫之病。實身而購人參之孝女。烈婦。明治維新前。往往聞之。如著名小說家浮城瑠之作者。其著作內。反覆言人參之效力。可想見當時世人。皆信參功。非不驚愕。然自今日之學者觀之。似非重要之藥也。此藥宜於病衰而血壓沈降之時。其禁忌在血壓高脈有力之時。即人參之主效。在恢復沈退之血壓。既如ストロファンテン。作用專於心臟。又如黃芩答利斯。作用於心臟之外。更能收縮血管。所以能影響及於

血壓而奏效。蓋無疑也。藥物之化學式與效力之間。有密接之關係。此事為識者所不疑。然則作用於心臟。增高血壓之藥物。當屬於化學上如何之部類耶。其為糖原質歟。此氏之所容易答出者也。糖原質以外。雖有於心臟為副作用之化合物。然主作用於心臟。增高血壓者。於糖原質之外。不知尚有他物否也。若糖原質果為心臟要藥。則漢醫家之說為不謬。而人參之有效成分。必為糖原質矣。即漢醫家代用之竹節人參。為氏之所研究者。殆含有糖原質無疑。以糖原質製造法。為氏之研究方針。可確定也。依其化學的試驗之成績。自竹質人參。得呈深灰赤色之物質。雖已確定為糖原質。然動物試驗之結果。均為消極的。又牛山香月啓益氏藥簡本草曰。本邦近世。醫多持人參功力。以為人命繫於一草根。浸說曰。人參能生死人。世俗往往習而不察。唯此說是信矣。愚昧者謂人參價貴。則其功亦豈不大耶。焉而不論理者。謂人參價值金。我豈輕身惜財耶。是以常自服

之。以為長壽之術。不但自服。而施與貧者。以為傲富之驕壯。是賢於輕身惜財者。然貧其害則抑一也。予每對此等人。喻之曰。非人參能生死人。此自當生者。人參能使之起耳。是非予之私論。人參功力。古人所說。其言確。其旨深。然世醫庸莽而不詳察。其所用當否。又斟酌其分量多寡。待其功者。用如飲食。不特其功者。嫌如蛇蝎。妄投妄賦。徒不見利。而反見其害。嗚呼可嘆哉。夫天地間物。皆稟陰陽五行之氣而生。各異其性。獨稟純陽清和之氣。其補性者。除參無他。故稱參為百草之靈。百藥之長。蓋人參補人之元氣。故不問男女老少。氣血寒熱。病屬虛者。悉皆用之。補虛舍參。奚用矣。如傷寒汗下後。中寒中暑。中風。卒倒。刺後。痘後。產後。脫血。金瘡。失血。吐衄。亡血。癰疽。潰膿。諸大病。氣血枯痺。元氣衰弱。垂死者。服之。則能回真氣。除虛邪。是以古人立方。有獨參。參附。理中。治中。四順。保真。湯等劑。是皆救急之寶筏也。觀古人用人參。皆因其人。因其病。而斟酌多寡。今人不然。不詳人

虛實。不察病輕重。沒用人參。十倍於古矣。又曰。本邦亦治世百有餘歲。文物盛而武事懈。沃土之民。而奉養極厚。氣體共薄。用大料人參。取驗居多。然非隨病之輕重。爲用之多寡。則不但無益。反爲其害。今閱清之醫書。用人參復倍於明。本邦醫亦祖之者。十而八九。是世之風習。或曰。今世反說末。天地氣候不如古。則人物亦從而氣性薄弱也。治其薄弱之人。以薄弱之物。必非大料。則何以取驗乎。此說雖似精細。而惑世誣人之鑿論也。何則。天地生物。一木一草。無不爲人用。故稻粱以爲養。菓菜以爲助。藥物以治病。若言世既及澆。末物性亦薄弱。則豈獨人參而已乎。蓋人飢則食稻粱。以送其生。未聞澆末。薄弱之人。有倍食稻粱而爲養者。且諸藥中。具補性者許多。就中黃芪補力。亞人參。胡不爲大料。而獨拘拘於人參乎。是不思之甚也。蓋如東垣自古稱醫中之王道。視其方用參二三。或六七分。合爲一服。其分量計三錢。至四五錢爲度。治瘵疾也。莫過葛可久者。治吐血暴

病。用獨參湯。其分量用人參十錢。大棗五枚以爲度。况本邦之人。視中華之人。則質弱氣薄。其藥餌亦不任濃。故方藥一服之重。起一錢半而止。三錢。加參亦二三。分。至六七。分。從東垣之例而可也。如獨參湯。從其病勢。自一錢至五錢。自五錢至十錢而止。微葛可久之例。而可也。是予用參之定式也。如今用人參至十錢。而元氣不甦者。其人無魂。猶樹之無根。所謂無魂。不當治也。雖至百錢。亦何益之有。又有數人參。醫適見虛證。用人參五厘。或七厘。反滿悶。而其病增劇。則益而致舍之。殊不知少服則滋壅。而不行。多則反宣通而不滯也。又有侍人參。醫不問方藥之補瀉。妄倍用之。見彼醫方藥一服。僅不過一錢半。而用人參六七分至一錢。是亦不知方藥中有君臣佐使也。若見危篤。則用人參二三十錢。或五六十錢。甚者至半斤。猶恐其未及。徒無益而有害耳。至其無效。則曰用人參如是而不及。是命也。奚不恥賴人參。而我工之拙乎。此二者醫人之愚偏。而不知中且無恒。而

文過者。夫醫云。又有病虛者。加參二三。分。則泥隔而不食。至六七分。則發嘔吐。至一二錢。則滿悶而病增劇者。又有雖服人參數十錢。而無泥滯之患。其病自平服者。此二者病人之性。自有好否也。如其不好者。必不任其氣也。如其好者。能任其氣也。非獨人參。如地黃黃芪之類亦然。言能任其氣。則非惟補藥。如烏附黃硝亦然。如其好者。臭撲鼻。則覺清爽。味下咽。則開膈。鬱而快活。如其不好。近鼻則爲嘔吐。一啣則泥胸膈而滿悶。以此觀之。則知人參亦從其人性。而利害得失自異矣。又如飲食藥餌。平日慣以爲恒。則其味雖甘美。苦澆。其性雖滋補。毒惡。能任其氣。而不見其利害。今見嗜烟草代茶酒者。其始也未嘗有不啣。載目眩者。是不任其酷烈之烟氣也。然強慣服之。則苦而反覺爽口。况於如人參。清純中和者乎。平日慣以爲恒。則其應驗亦無以速見焉。其害亦無以深矣。凡用人參之要。雖危篤虛疾。及暴病氣血脫去。而死在頃刻者。單服十錢。則必元氣甦。而其效可

速也。元氣復後。不可服大料參。察其病勢。而當漸減人參。節其補而可也。又雖好而能任者。單服數十錢。則未嘗不偏於補。故雖無泥滯之患。其病或四五個月而愈。或踰中歲而復。或偏於補而爲廢人。或至短折者。往往有之。所謂久而增氣。則物化之常。氣增久。則天之由也。信哉此言也。諺曰。人參能活人。能殺人者。不亦宜哉。古聖言破桂。辦聖積。先哲解之曰。真氣不足。則不能健行。故成堅積。用之而真陽之氣回。則何堅積之有。蓋人參味甘苦。自有餘味。千草百藥中。未曾有如此備純粹發達之氣勢者。予試譬喻言之。今有一壯夫。元氣充實。藏府強固。一旦過飽。飲食壅滯。胃中無一氣升降。脾氣爲之不運。不能上吐下瀉。脉絕手足厥冷。不省人事。死在頃刻。用參附理中湯等之類。發達一氣。則得吐瀉而元氣甦。庸醫見之。以爲補元氣。故也是病者之元氣非虛脫。惟爲穢物所抑鬱。而不能運也。猶燈火雖有油。有燈心。爲塵垢所抑鬱。則光燭自滅。將滅者。方此時也。以引

火奴發揚之。則孛然焰矣。謂其破
 痲痺堅積者。不亦宜乎。破之一字。
 有深意存焉。又齊藤系平氏。在慶
 應醫學上之報告。人參之試驗。用
 種種之法。惹起動物(兔)之血糖
 過多症。後用人參之注射。與內服
 兩途。以實驗其及於血糖過多症
 之關係。其結論如下。(但人參是
 用人參末。與人參精兩種)(一)
 人參有制止用愛特命林所惹血
 糖過多症之作用。效力猶以人參
 精為著。(二)上記之效力。不論
 人參劑之注射與內服。皆是同樣。
 但中止之。則血糖過多症亦再發。
 (三)對於食餌性血糖過多症。人
 參亦具有制止作用。中止之。則藥
 復來云云。又報告其第二次之研
 究云。(一)人參精之對於中樞性
 血糖過多症之作用。(二)對於宮
 羅立繩性血糖過多症二項。行嚴
 密之實驗。其結論如下。人參之作
 用。不但能抑制愛特命林性及食
 餌性血糖症而已。且對於顯來項
 性。血糖過多症。亦具有抑制作用。
 對於用富羅立繩所惹起實驗血
 糖症。人參則不能奏效云。

辨偽 ●形似於參偽造者。或
 以形似於參之物造作亂之。如防
 風。沙參。薺。薺。桔梗之類是也。江浙
 間出一種土人參。苗葉與桔梗相
 似。根亦如桔梗。而柔氣香味甘美。
 較參稍淡。亦薺。薺。又有野蘿蔔
 根。宛然似人參。以山柵甘草等次
 第。麥味於巾。一時殊難辨別。惟色
 澤不甚光亮。煎之湯無香味。渣不
 肯爛。惟腹腫耳。●真偽攸攸。參價
 日貴。奸惡之徒。巧於網利。恐以全
 假之貨求售。被人眼破。反罹罪戾。
 故或以糖接熟。或以假鑲真。或用
 豎相雜以攪。或用層相間以節
 。做成枝極一色。宛如無縫天衣。
 一時眩惑人目。難以識別。名曰金
 鑲玉嵌。必須細心審察。庶不受欺
 也。●慎防流弊。人參價貴。若人寒
 素者。多潛泊自甘。甯以人參為常
 食之物。然或有時進以奉親。有時
 自需調攝。或出外旅行。攜備不時
 之需。則此物非常用習見。難分玉
 石。向有以短接長者。謂之接貨。以
 小併大者。謂之合貨。必先用 Waterloo
 過。原汁已出。又用粉膠。粘紫蒸烘
 做成。其力薄而易變。固不待言。又

有薄夫以參湯泡自吸。乃曝乾烘
 燥。做色復售。謂之湯參。真參尚無
 大礙。邇年價目昂貴。漸致以偽雜
 售。若不辨識。真贗不分。被欺誣財
 且恐貽害非細。●辨參特點。今所
 用者皆是遼參。其高麗。百濟。新羅
 三國。皆屬於朝鮮。其參猶來中國
 互市。遼參連皮者黃潤色如防風。
 去皮者堅白如粉。偽作者皆採沙
 參。薺。薺。根亂之。但沙參體虛
 無心而味淡。薺。薺。體虛無心而味
 甘。桔梗體堅有心而味苦。人參體
 實有心而味甘。微帶苦。自有餘味。
 此人參之特點也。●藥物辨偽專
 家之研究。(一)曹炳章曰。人參。多
 年生草根也。長者八九寸。短者二
 三寸。略似人形。故名。人參。產吉林
 以野參為貴。故又謂吉林參。或稱
 之為野山參。葉似掌狀複葉。考其
 產處。有人工培植者。有天然野生
 者。如為鳳凰城及船廠產者。種植
 為多。而甯古塔產者。野生為多。總
 之人參野生。歷年愈久。性愈溫和。
 其精力亦足。因其吸天空清靜之
 氣足。受地脈英靈之質厚。故效力
 勝也。吳渭泉云。真野山人參。山中

少出。今市肆所售。皆秧種之類。其
 秧種者。將山地壅成墊土。純用糞
 料培養之。受氣不足。故質不堅。入
 水煎之。參渣即爛。臭之亦無香味。
 陰虧之證忌用。故秧種一出。而參
 價遂賤。而野山真參。更不可得也。
 因野參採取難。且出額少。不使其
 年久滋養長大耳。又且產參之山
 險峻。多虎狼毒蛇。故走山者。常有
 傷生。東陞遊記又云。走山採參者。
 多山東山西等省人。每年三四月
 間。趨之若鶩。至九十月乃盡歸。其
 組織以五人為伍。內推一人為長。
 號曰山頭。陸行乘馬。水行駕威風。
 (以獨木雕成。首尾皆銳)沿松
 花江至諾尼江口。登岸隨山頭至
 嶺。乃分走叢林中。尋參枝及葉。其
 草一莖直上。獨出叢草。光與曉日
 相映。得則跪而創之。日暮歸窠。各
 出所得。交山頭洗別。實以長繩懸
 木。曬乾。或蒸而曬之。曬乾後。有大
 有小。有紅有白。土人貴紅而賤白。
 大抵生者色白。蒸熟則帶紅色。近
 世以白者為貴。名曰京參。其體實
 而有。其味甘微兼苦。自有餘味。
 即野山真參是也。龍江鄉土誌云。

野山參。有米珠在鬚。其紋橫。秧子參多順紋。無米珠。所謂秧種者。卽鳳凰城及船廠產者是也。鳳凰城之貨。形色白秀。體鬆而瘦長。皮色多網紋。皮熟者少。味甜。因用糖汁煮過。無餘味。近人所謂白抄參。移山參。太子參。皆其類也。船廠產者。其地二百里內外。所產較鳳凰城稍堅實。且紅潤可觀。味苦微甘。其空鬆者亦多。俗所謂廠參。今俗名石渠子是也。皆不道地人參形狀。代有變態。據近時辨之。體態宜堅白。皮宜細緊。有橫網紋。蘆蒂宜回陷。極節宜多。節多年分多也。味甘中兼苦。要有清香氣。而有回味。方是上品。否則皆屬側路。不可不知也。(二) 鄧肯巖曰。真人參。以遼東產者爲勝。連皮者。色黃潤。如防風。去皮者。堅白如粉。肖人形。有手足。頭面畢具者。有神。故一名神草。產於地質最厚處。性微溫。味甘兼味苦。生時三極。五葉。背陽向陰。故類見風日。則易蛀。陶貞白云。納新器中密封。可經年不壞。李言聞云。凡生用。宜咬咀。熟用。宜隔紙焙之。或醇酒潤透。咬咀焙熟。並忌鐵器。

切片。月池翁嘗著人參傳二卷。言之甚詳。不能備錄。近代貨缺價昂。假者皆以沙參。薺芩。桔梗。棗根。造作亂之。考沙參。體虛無心。而味淡。薺芩。體虛無心。而味甘。桔梗。體堅有心。而味苦。而人參。體堅有心。而味甘。味苦。自有餘味。煎之。易爛。而渣少。氣味形色。原自可辨。所恨牟利之徒。僞造混售。以亂真品。甚至因人參價貴。有以短折長者。謂之接貨。以小併大者。謂之合貨。必先用水潮過。原汁已出。又用粉膠粘。紫蒸烘。成力薄而易變。又有以湯泡參。自吸。乃曬乾。烘燥。飯色復舊。謂之湯參。江淮所出。土木人參。多薺芩混充。層出不窮。欺人太甚。今欲辨真僞。不如用蘇頌之一法。但使二人同走。一舍人參。一空口。度走三五里許。其不舍人參者。必大喘。舍者。氣息自如。其人參乃真也。然必使年歲體氣相若之人。行之方準。否則反至誤事。夫富貴人平時衛生。喜服人參。誤購假品。雖無裨益。尙未大害。倘購假參。以治大病。則害立見。匪特不能升提中氣。抑且反賊陰。蓋薺芩。桔梗。沙

參。性皆降下。如上損下損。虛寒之體。垂危之症。服之。則去生反速。吾見亦多矣。可不慎歟。
近人學說 鄧肯巖云。神農本經。上品首列人參。漢張仲景。制方。悉遵本經。傷寒論。百十三方。用人參者。得一十七方。皆是因汗吐下之後。亡其陰津。取其救陰。其理中湯。吳茱萸湯。以剛燥陽藥太過。故取人參。甘微寒之性。養陰配陽。以臻於中和之妙也。此專指人參而言。若高麗參。東洋參。黨參。氣味則皆甘溫。惟西洋參。氣味苦寒。微甘。又不得能統言之。而毫無區別也。奈庸淺之輩。不察虛實。但見發熱。則動手便攻。且曰傷寒無補法。是未親仲景之堂奧也。若夫日本明治維新以前。醫藥專重漢學。自醫學堂興。盡棄所學。而學泰西之學。其研究新理。造詣雖深。然就所試驗言之。以人參有原糖質。爲化學試驗之成績。又云。脈微弱而易壓迫者。用之。則血壓漸增。進而不。知血不自生。必先補氣。而後血行。彼所謂脈波漸漸高起也。不觀葛可久十藥神書。用化蕊石散。十灰

散。化痰止血之後。卽繼以獨參湯。正以脫血者。須益氣。其陽生則陰長。其義顯然。若火氣方逆。血熱妄行。則又當忌用已。其曰病危急時。毫無作用者。蓋彼第知人參有原糖質。而未知人參佐桂附等品。則實扶危之至寶。救急之靈丹矣。其曰原糖汁爲心臟之要藥。是又未知人參首補肺臟。肺爲五臟之長。百脈之宗。司清濁之運化。爲一身之稟藉。且肺主氣。益氣卽以益血。陽生陰長。故五臟皆安。又豈僅爲心臟要藥云乎哉。總而言之。以化學爲體驗之的。據而索理解之。精微。是終身由之。而不知其道者矣。
張山雷曰。古稱人參。今有遼參。高麗參。黨參之別。形色性情功效。各有不同。而古今醫藥諸書。則皆以人參兩字統言之。不獨諸家本草。均未辨析也。考遼東高麗。在上古雖未通中國。而秦漢之際。皆已交通。然許叔重說文。則云人參藥草。出上黨。(瀋卽古之參字)似東漢時。始有黨參也。本草經則云生上黨。及遼東。此句雖未必爲古本所固有。然縱出於後人增益。

亦在陶宏景所定名醫別錄之中。千金翼方亦有此句。則又似彼時黨參遼參同為一種也。再考其氣味主治。則本經寒而補五臟安精神云云。皆似指遼參而言。別錄則微溫而療腸胃中冷心腹鼓痛云云。皆似指高麗參而言。若云皆即今之黨參。則實不能具此力也。又證以太平御覽引吳普本草則曰。神農甘小寒。又曰。根有頭足手面目知人。則今之遼參。固有具頭項手足略似人形之一種。范子計然亦云。人參出上黨。狀類人者善。劉敬叔異苑亦云。人參生上黨者佳。人形皆具。此皆非今之黨參所能近。似更詳稽唐宋以後本草及方藥。則皆曰人參。而執為遼參。執為高麗參。孰為黨參。在有識者。或可以心領神悟而分別之。然究竟是一是二。始難確定。或謂古書之人參。皆即今之黨參。則僅說說文而未讀本草經者。但本經之氣味功用。則明是今之遼參。而別錄之氣味功用。又明是今之高麗參。不獨微寒微溫。顯有區別。即所載主治。亦是顯分畛域。止以微寒微溫四

字。各本多并為一句。而本經之與別錄。昔人又每合而讀之。遂致或寒或溫。紛如聚訟。補氣補血。更僕難修。此則古今本草。以遼東高麗所產。混為一種。不為分別之過也。但上黨之所產。豈古時本與遼參無別。而今之所謂黨參者。別自一種乎。抑古今地氣攸殊。古則同於遼參。而今則遂成潞黨乎。李瀕湖綱目引陶弘景之言。已有上黨來者。形長而黃。狀如防風之說。則頗似今之黨參。張路玉本經逢原。別出上黨人參一條。但曰甘平清肺。又不似今之黨參。惟吳遵程本草從新。別出防風黨參一條。則即今所通用之黨參也。蓋遼參高麗參。其力皆厚。惟一則甘而能清。一則甘而兼溫。功力自別。若黨參則為補脾和緩之藥。而力甚較為薄弱。三者之性情功用。迥乎不侔。萬不能一陶同治而無區別也。

配合應用

- 治相火乘脾。身熱而煩。氣高而喘。頭痛而渴。脈洪而大者。用黃蘗佐人參。
- 治夏月熱傷元氣。致汗大泄。欲成瘧疾者。用人參同麥冬。五味

子為生脈散。此補天元之真氣。非補熱火也。

- 人參得升麻。引用補上焦元氣。瀉肺中之火。得茯苓。引用補下焦元氣。瀉腎中之火。得麥冬。則生脈得乾薑。則補氣。
- 人參同黃耆。用補表虛。同白朮。用助脾胃。
- 補脾陰。用人參同棗仁。龍眼肉。白芍。甘草。大棗。
- 止虛煩躁。用人參同白朮。茯苓。炙草木瓜。饗香。
- 治自汗。用人參同白朮。黃芪。芍藥。
- 治汗多亡陽。用人參同黃芪。芍藥。五味。
- 治真氣虛。氣不歸元。因而胸脅逆滿。用人參同沉香。白芍。
- 治恍惚驚悸。魂魄不定。用人參同茯苓。遠志。益智。棗仁。麥冬。
- 治心虛而邪客之作痛。用人參同沉香。茯神。
- 治驚癇。用人參同牛黃。犀角。天竺黃。鈎藤。珠砂。雄黃。真珠。茯神。遠志。
- 治慢驚。慢脾風。用人參同附

子。白朮。芍藥。甘草。茯苓。

- 治中風不語。用人參同黃芪。天冬。五味。牛膝。枸杞。菖蒲。
- 腎氣衰。陽痿。以之為君。加鹿茸。巴戟。菴蓉。五味。菟絲。山萸。地黃。麥冬。枸杞。杜仲。柏子仁。為扶衰之要劑。令人有子。
- 治房勞過度。脫陽欲絕。下部虛冷。用人參同附子。肉桂。麥冬。五味。
- 治陽氣脫。溫腸胃中冷。用人參同附子。五味子。
- 治寒厥。指爪青黯。便溺儂臥。用人參同附子。乾薑。肉桂。
- 治中寒泄瀉。下利清穀。用人參同乾薑。白朮。炙草。甚則加肉桂。附子。
- 治脾瀉久不止。用人參同白朮。吳黃。
- 治腎瀉。用人參。君五味。吳黃。骨脂。肉苁。
- 治血虛心腹鼓痛。用人參同白芍。炙草。
- 治肺虛氣喘。夏月服之。益氣除熱。止消渴。用人參。君五味。麥冬。加白朮。又治中暑傷氣。倦怠。

① 治胃虛嘔吐。用人參君薤香木瓜。橘紅。如妊娠嘔吐。加竹茹。枇杷葉。

② 治惡阻安胎。用人參同橘皮。木瓜。竹茹。紫蘇。白朮。熱多者。去白朮。紫蘇。加麥冬。

③ 治胎漏不安。用人參同鹿膠。杜仲。續斷。當歸。熟地。生地。去生地。加蘇木。治貧重努力。內傷失血。

④ 治血崩。用人參同地黃。阿膠。麥冬。山萸。五味。續斷。加牛膝。大薊。鹿膠。治血淋。

⑤ 治橫生倒養難產神效。用人參同乳香。硃砂。雞子白。薑汁三匙調勻。別用當歸兩許。煎濃同吞。

⑥ 治產後血暈。用人參同蘇木。當歸。童便煎服。

⑦ 治產後不語。用人參同石膏。滑。蓮肉等分水煎。

⑧ 治氣虛久瀉不止。用人參同寔皮各兩許。水煎露一宿。五更溫服。

⑨ 治瘧母。用人參同鼈甲。青皮。乾漆。熬蟲。肉桂。牡蠣。射干。

⑩ 治滯下腹痛赤色。用人參同黃連。紅麴。白芍。滑石。升麻。

二畫 人

① 治滯下久不止。用人參同黃連。烏梅。蓮肉。升麻。滑石。肉豆蔻。

② 明目。用人參同甘菊。枸杞地黃。當歸。柴胡。薄荷。甘草。

③ 治痿。用人參同黃蘗。黃芪。白朮。麥冬。五味。白芍。木瓜。慈米。茯苓。

④ 治痺。用人參同五加皮。白蘇皮。石楠葉。石斛。秦朮。木瓜。薏苡草。蘇。牛膝。沉香。薑。蒲。二朮。

⑤ 治勞傷元氣。人患熱病渴甚。井頭疼。人參加入白虎湯。

⑥ 治氣虛人患四時不正寒氣。人參加入敗毒散。

⑦ 用鹽。三分至三錢。大量自三錢至一兩。則奏效多而無弊。

⑧ 應用宜忌。① 繆氏云。人參本補五臟真陽之氣者也。若夫虛羸。危怯。饑飽勞役。努力失血。以致陽氣短乏。陷入陰分發熱。倦怠四肢無力。或中熱傷暑。無氣以動。或嘔吐泄瀉。霍亂轉筋。胃弱不納。脾虛不磨。或真陽衰少。腎氣乏絕。陽道不舉。完穀不化。下利清水。中風失音。產後氣喘。小兒慢驚。吐瀉不止。痘後氣虛。潰瘍長肉等證。投之。不立效。所不利者。惟是火炎氣上。

如欬嗽吐痰。吐衄。勞瘵。內熱。骨蒸。陰虛火動之候。又有癆疹初發。斑點未形。傷寒始作。邪熱方熾。若誤投之。鮮有不誤者。② 李月池云。凡人面白面黃。面青。憔悴者。皆脾肺腎氣不足。可用也。面赤面黑者。氣壯神強。不可用也。脈之浮而芤澀。虛大遲緩無力。沉而遲澀弱細結。代無力者。皆虛而不足。可用也。若弦長緊實滑數有力者。皆火鬱內實。不可用也。③ 潔古謂喘嗽勿用者。痰實氣壅之喘也。若腎虛氣短喘促者。必用也。仲景肺寒而欬勿用者。寒束熱邪。壅鬱在肺之欬也。若自汗惡寒而欬者。必用也。④ 東垣謂久病鬱熱。在肺勿用者。乃火鬱於內。宜發不宜補也。若肺虛火旺。氣短自汗者。必用也。⑤ 丹溪言諸痛不可驟用者。乃邪氣方銳。宜散不宜補也。若衰虛吐利及久病胃弱虛痛。皆按者。必用也。⑥ 節齋謂陰虛火旺勿用者。乃血虛火亢能食。脈弦而數。涼之則傷胃。溫之則傷肺。不受補者也。若自汗氣短肢寒脈虛者。必用也。如此詳審。則人參之可用不可用。思過半矣。畏

三三

五種。照。慈。皂。莢。黑豆。及。參。蘗。雞。術。參。攷。滋。補。關於人參之專門著述有三。一為光論。人參考。一卷。在醫編閣叢書中。一為清李唐衡銓著。人參考。一卷。敘述頗重。實際。尤於南方參商名目等級。搜考詳盡。一為近世曹炳章著。人參。一篇。論列尤詳。考證極博。勞及日本學說。勝於唐作。日本以人參為唯一補品。所隸高麗。尤以人參為大宗出口品。故銳意研究。各家著述。專論人參者有三種。一為加藤順氏著。和漢人參考。一卷。一為田村玄峯氏著。人參耕作記。一卷。一為月池翁著。人參傳。二卷。據和漢藥考。尚有手抄本四種。曾榮著。人參識。二卷。田村玄峯著。人參譜。五卷。田村玄峯著。人參類集。一卷。栗本昌藏著。人參辨。一卷。田村玄峯著。從製秘錄。二卷。

【人參三七】即昭參之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「昭參」條。

【人參子】命。本品即人參之子實。故名。

形。人參子。式如腰子。生青。

三三

熟紅。大如小黃豆。可供藥用。
主治 痰補元氣。返人魂魄。尤能健脾。發痘行漿。

參攷資料 人參子如腰子式。

生青熟紅。近日販參客從遼東帶來者。皆青綠色。如小黃豆大。參葉上甚多。甯古塔一帶。七八月霜大。難以入山。故不能待其子熟。生取而歸。以售客。每多綠色。發痘行漿。凡痘不能起。發分標行漿者。藥內加參子。後日無癢塌之患。(趙恕軒)

【人參木質】即牡荊實之日本名。詳『牡荊實』條。

【人參酒】製法 用人參末同麴米釀酒。或袋盛浸成飲。

主治 補中益氣。統治諸虛。
【人參條】性質 詳見遼參條。

外國名詞 Folia Ginseng (拉丁)

性質 苦。微甘。無毒。

主治 補中。生胃津。祛暑。降虛火。利四肢。清頭目。浸汁沐頭。令髮光黑不落。醉後食之解醒。

參攷 ● 陳仁山云。參葉產四

川大寧府。一產陝西漢中府。均屬黃連葉。俗呼其名為參葉。相沿如是。究不知其起自何時。以黃連葉而稱參葉也。嘗考究之。黃連葉與參葉。葉質葉色。梗均同。惟紋不同。黃連葉尾尖。參葉尾圓。黃連葉味苦味濃。參葉淡苦略甘。曹炳章曰。以色不黃。粹綠翠如生。手按之有清甜香氣者。真品也。率多參客帶來。餉客。頗不易購。市肆所售參葉。不知何種樹葉。偽充。勿服為是。項元麟云。各種參葉形狀相似。難分真偽。然皆苦寒。損氣敗血之物。未可視為補藥。此乃益中含損。如麻黃發汗。根節反止汗之意。趙恕軒云。大率補者多在根。葉乃枝節之餘氣。不可以言補也。參葉雖稟參之餘氣。究其力止能行。皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。近時婦人以參葉塞於髮內。能令光黑而不落。醉後食之解醒云云。未識驗否。然觀近時市上通行者。決非樹葉偽充。惟何參之葉。則難斷定耳。

參攷資料 ● 人參葉氣味清香。善於生津。又不耗氣。乾之以餉造。可代茶葉。不計入藥用也。其葉

雖稟參之餘氣。究其功力。止能行皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。惟可施於生津潤燥益肺和肝之用。(綱目拾遺) ● 參葉本不入藥。惟吳氏從新收之。乃謂大苦大寒。損氣敗血。其性與參相反。太不近理。而趙恕軒本草綱目拾遺。則謂其清香微甘。清肺生津。止渴力能行於皮毛。性帶表散。養胃陰。祛暑氣。降虛火。若用以代茶。為醉後解醒第一。以理推之。趙氏之說。為是。(藥學講義)

【人參蘆】命名 本品即人參之蘆頭。故名。

性質 苦。溫。無毒。
主治 涌吐。虛勞。痰飲。

近人學說 張山雷曰。蘆是參之蒂。部位在上。力能上行。古人以為虛人涌吐。膈上痰飲之用。張石頑亦謂其性升。而於補中寓瀉。屢有效驗。又謂能治瀉利。膿血崩帶。精滑等證。惟氣虛火炎。喘嘔嗽血者。忌之。則上逆之病。惡其升騰耳。

頤按 凡瀉瀉日久。陽氣下陷。參蘆加入應用藥中。頗有功效。若瀉下賤血。而濕熱未清。則不可升也。

參攷 ● 人參葉氣味清香。善於生津。又不耗氣。乾之以餉造。可代茶葉。不計入藥用也。其葉

參攷資料 ● 人弱者以參蘆可代瓜蒂用。(吳綬) ● 人參能補參蘆能瀉。猶麻黃苗能發汗。根能止汗也。(朱震亨)

外國名詞 Ginseng (拉丁)

【人參鬚】性質 鹹。有毒。

主治 詳見『遼參鬚』條。

【人眼淚】參攷資料 ● 凡母哭泣。墮子目。令子傷睛。生腎。(李時珍) ● 淚者肝之液。五臟六腑津液皆上滲於目。凡悲哀笑。秋時則火激於中心。系急而臟腑皆搖。搖則宗脈感而液道開。津上溢。故涕泣出焉。正如飯上水滴之意也。(李時珍)

【人莧】即莧之小者。詳『莧菜』條。

【人頂骨】即天蠶蓋之古籍別名。典出和漢藥攷。詳『天蠶蓋』條。

【人魚】即鮫魚之古籍別名。典見山海經。詳『鮫魚』條。 ● 即鮭魚之古籍別名。典見本草集註。詳『鮭魚』條。

【人效】即人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。

【人腦骨】即天蠶蓋之古籍別名。

參攷 ● 人參葉氣味清香。善於生津。又不耗氣。乾之以餉造。可代茶葉。不計入藥用也。其葉

參攷 ● 人參葉氣味清香。善於生津。又不耗氣。乾之以餉造。可代茶葉。不計入藥用也。其葉

典見和漢藥攷。詳『天壤蓋』條。

【人熊】即獬豸之古籍別名。典見綱目。詳『獬豸』條。

【人精】

性質 甘溫。主治 和糜屎滅瘵。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人精曰。塗金瘡血出湯火瘡。

參攷資料

營氣之粹化而為精。聚於命門。命門者。精血之府也。男子二八而精滿。一升六合。養而充之。可得三升。損而喪之。不及一升。謂精為峻者。精非血不化也。謂精為寶者。精非氣不養也。故血盛則精長。氣聚則精盈。邪術家。惑愚人。取童女交媾。飲女精液。或以己精和其天癸。吞嚥服食。呼為鉛汞。以為秘方。放恣貪淫。甘食穢滓。促其天年。吁愚之甚矣。又將誰尤。按鮑景翔云。神為氣主。神動則氣隨。氣為水母。氣聚則水生。故人之一身。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。李時珍。自內分泌之功用。發明後。人精治病。亦非無據。大約可以與陽治痿。補益精髓。至於

塗金瘡火傷。尚少應用。亦無人願用之也。近有人功接種法。用人精注入婦人胞宮。法便而效捷。然尚未得人信仰。少聞施行者。尤學周。

【人菱】即人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【人銜】即人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【人蠶】命名。蠶字從虫從虫。疾而昆繁。故名。丸。迅也。蠶。昆也。蠶行迅疾而昆繁。故名。

古籍別名 虱。(綱目) 性質 鹹平。微毒。

主治 人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蠶三五百。搗傳之。又治疔腫。以十枚置瘡上。用荻箔纏作柱。灸蠶上。即根出也。又治脚指間肉刺瘡。以黑蠶傳之。根亦出也。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人蠶曰。眼毛倒睫者。拔去毛。以蠶血點之。數次即愈。

配合宜忌 畏水銀。銀砂。百部。菖蒲。

參攷資料 按酉陽雜俎云。人將死。蠶離身。或云取病人蠶於

床前。可卜病。如蠶行向病者必死也。荊州張典兵。曾得兩頭蠶也。(唐慎微) 人物皆有蟲。但形各不同。始由氣化而後。乃遺卵出。蟻也。草木子言其六足。行必向北。抱朴子云。頭蠶黑。着身而白。身蠶白。着頭變黑。所漸然也。又有蠶。蠶瘡。諸方法。可見蠶之為害非小也。千金方云。有人嚼蠶。在腹中生。長為蠶。能斃人。用敗篋。敗梳。各以一半燒末。一半煮湯調服。即從下部出也。徐鉉精神錄云。浮梁李生。背起如孟。惟痒不可忍。人皆不識。醫士秦德立云。此蠶瘡也。以藥傳之一夕。瘡破。出蠶斗餘。即日體輕。但小瘡不令。時時蠶出無數。竟死。予記唐小說。載滑壺一人。病此。買魏公言。惟千年木梳燒灰。及黃龍浴水。乃能治之也。洪邁夷堅志云。臨川有人。頰生瘡。痒不可忍。惟以火灸。一醫剖之。出蠶無數。最後出二大蠶。一黑一白。頓愈。亦無瘡痕。此蠶瘡也。又今人陰毛中。多生陰蠶。痒不可當。肉中挑出。皆見八足。而扁。或白或紅。古方不載。醫以銀杏擦之。或銀珠燕之。皆愈也。(李時珍)

時珍)

【人髭鬚】命名 在鬚上者曰髭。在兩頰者曰鬚。在頤下者曰鬚。

主治 燒研。傳癰瘡。

參攷資料 唐李勣病。醫云。得鬚灰服之。方止。太宗聞之。遂自翦鬚燒灰。賜服。復令傳癰。立愈。故自樂天詩云。翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂夷簡疾。仁宗曰。古人言鬚可治疾。今朕翦鬚與之。合藥。表朕意也。(唐慎微)

【人齒垢】原名 齒垢。性質 鹹溫。無毒。主治 和黑蠶研塗。出箭頭。友寇刺。破癰腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人齒垢曰。塗蜂蟄。

【人頭垢】古籍別名 梳上者。名百齒垢。(綱目) 性質 鹹苦。溫。有毒。

主治 淋閉不通。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論人頭垢曰。療瘰癧。酸漿煎。存川之立愈。又治勞復疾。【宋】大明諸家本草論人頭垢曰。

參攷資料 按酉陽雜俎云。人將死。蠶離身。或云取病人蠶於

中蠱毒。致毒。米飲或酒化下。並取吐為度。

【人頭茶】即普洱茶製成團塊。如人頭式者。參見「普洱茶」條。

【人頭骨】即天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「天靈蓋」條。

【人龍】即虺蟲之古籍別名。典見綱目。詳「虺蟲」條。

【人獲】即人參之古籍別名。典見本經。詳「人參」條。

【入地金牛】別名 兩邊針。產地 廣東西

江均出之。

主治 治痰火癰核。并急喉痰。閉危。驚治跌撲損傷。蛇蟲螫傷。

【入骨丹】產地 粵東禺山均產之。

採取 三四月採新。

主治 跌撲損傷。

【八升豆】即黎豆之日本名詞。詳「黎豆」條。

【八月札】即預知子之俗名。詳「預知子」條。

【八月春】即秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「秋海棠」條。

【八月珠】即大茴香之古籍別名。

典見和漢藥攷。詳「大茴香」條。

【八月黃】即粟中熟者之古籍別名。典見綱目。詳「粟」條。

【八仙草】即土茵草之別名。典見綱目拾遺。詳「土茵草」條。

【八角兒】即天牛之古籍別名。典見綱目。詳「天牛」條。

【八角茴香】即大茴香之處方用名。詳「大茴香」條。

【八角梧桐】即臭梧桐之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「臭梧桐」條。

【八角油】別名 莽草子油。茴香之油。本品即八角

茴香之油。

產地 廣西之百色。龍州等處。

製法 以八角茴香之皮浸及種子入曲頭甑中蒸爛而成。每百斤約得油七斤。

學名 *Pataia Japonica*

形態 常綠小灌木。生於暖地。高至七八尺。一根叢生。葉大掌狀。分裂。質厚光澤。有長葉柄。互生。冬

月枝梢之葉心出花軸。分極開花。花小。白色。與土當歸之花相類。花

瓣五片。雄蕊與花瓣同數。互生。繖形花序。花後結圓實。熟則呈黑色。近根之皮可入藥。



八角金盤

性質 根皮苦。辛。平。有毒。

主治 麻痺風毒。淋瀝。打撲瘀血停積。

【八角連】古籍別名 馬目奔公。獨葉一枝花。(綱目拾遺)

基本 八角連為雜草類之一種。可供藥用。

主治 消一切毒。療蛇傷。力能軟堅透膜。

【八角盤】即鬼白之古籍別名。典見本草綱目。詳「鬼白」條。

【八角鏡】即鬼白之古籍別名。典見本草綱目。詳「鬼白」條。

【八卦仙桃】即接骨仙桃之古籍別名。典見集韻。詳「接骨仙桃」條。

【八哥】即鸚鵡之俗名。見「鸚鵡」條。

條。

【八指杏】即甜杏仁之古籍別名。典見綱目。詳「甜杏仁」條。

【刀豆】命名 本品淡形似刀。故名。

處方用名 刀豆子。刀豆乾。

古籍別名 挾劍豆。(綱目) 葛豆。刀斂豆。皂莢豆。(和漢藥考)

學名 *Canavalia ensiformis* (L.) DC.

外國名詞 *Ensiform bean*

基本 屬豆科。藥用刀豆之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。刀豆。廣東各屬均有出。實則各處田園皆可種植。按刀豆為一年生蔓草。長至一二丈。葉為卵圓形。覆葉。由三小葉而成。花作紫青色。或白色。蝶形花冠。花後結長大扁



刀豆

平茨。作鈍狀。大者長尺餘。闊至二寸。莢內藏淡紅色或白色種子。稍帶橢圓形。長八九分。如拇指大。成熟者作淡紅色。有光澤。又有一種白豆。形狀相同。

採取 七八月連莢採之。

性質 甘平無毒。

效能 下逆氣。止呃噦。用作祛痰滋養藥。

主治 溫中下氣。利腸胃。止呃逆。益腎補元。

歷代記述攷證 【清】汪詒卷

本草備要論刀豆曰。刀豆甘平。溫中止呃。勝於柿蒂。【清】王士雄

隨息居飲食譜論刀豆曰。刀豆煨英可替以爲葷。蜜以爲果。子老入藥。甘平下氣。溫中止嘔。【清】吳

儀洛本草從新論刀豆曰。刀豆甘溫。溫中下氣。利腸胃。益腎歸元。止呃逆。

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 ①刀豆本草失載。

惟近時小書載其暖而補元陽也。又有人病後呃逆不止。聲聞隣家。

或令取刀豆子燒存性。白湯調服二錢。卽止。此亦取其下氣歸元而

逆自止也。(李時珍) ②以莢形命名也。按段成式酉陽雜俎云。藥

瀝有挾劍豆。莢生橫斜。如人挾劍。卽此豆也。(李時珍) ③刀豆人

多種之。三月下種。莢生引一二丈。葉如豇豆葉而稍長大。五六月

開紫花如蛾形。結莢長者近尺。微似阜莢。扁而劍脊。三稜宛然。嫩時

羹食。饜食。蟹煎皆佳。老則收于子。大如拇指頭。淺紅色。同豬肉雞肉

羹食尤美。(李時珍)

【刀豆根】 主治 頭風及鼻淵。酒服。

【刀豆殼】 主治 腰痛。燒研酒服。久痢。蒸熟洋糖蘸食。

配合應用 ①治鼻淵。老刀豆文火焙乾爲末。酒服三錢。重不過

三服。卽愈。(年希堯集驗方)

②治牙根臭爛。刀豆殼燒灰。加冰片擦。齒出卽安。(洪氏一盤珠方)

③治婦女經閉。腹脹痛欲死。并消血痞。用陳年刀豆殼。焙燥爲末。好酒服一錢。加麝香五釐。亦妙。

(經驗廣集方)

④治喉癰。刀豆殼燒灰。以二三釐吹之。立見效。(張氏必效方)

⑤治楊梅瘡。當歸。川芎。苡仁。木通。木瓜。生地。熟地。金銀花。防己。防

風。荊芥。黃柏。白芷。知母。甘草。皂莢。猪苓。去皮各二兩。人參二錢。山紅

花。刀豆殼各五錢。硬飯團二兩。水煎一鍋。濃汁。不拘時。當茶服。忌魚

腥生冷。四劑全愈。(萬氏濟世方)

【刀油】 卽鐵燕之處方用名。詳見『鐵燕』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀煙】 卽鐵燕之古籍別名。典見綱目。詳『鐵燕』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀娘】 卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

至治 止血。出金瘡出血。

【刁芎】 卽川芎之處方用名。詳見『川芎』條。

【刁鴨】 卽鴨之古籍別名。典見食療本草。詳『鴨』條。

【十二時蟲】 命名 本品變色極易。能於十二時每易一色。故名。

古稱別名 避役。(綱目)

基本 係脊椎動物。爬蟲類。蜥蜴類。守宮科之守宮。卽五色者。

產地 出容州交州等處。或人家籬壁樹木之間。亦有產之。

形態 十二時蟲。爲爬蟲類之一種。大如指節。狀同守宮。而略扁。

頭部扁平。口吻肥大。鼻孔隔離。眼大無睛。背上連背有肉殼如冠。長頭長足。身青色。大者尺許。尾與

身等。在陰處色呈湖綠。日中變易或青或綠。或紅或赤。肢較守宮略長。各具五趾。每趾均有鉤爪。趾有

橫褶裂。故能爬行牆壁樹木等處。性凶。善蝨人。難以療治。捕之可供藥用。

性質 鹹寒。有毒。

主治 療痛風。治蛇蝎螫傷。其

他功用略同守宮。

參攷資料 有云十二時蟲不能變十二色但黃褐青赤四色而已(北戶錄)石龍五色者為蜥蜴陸佃言蜥蜴能十二時變易故得易名若然則此蟲亦蜥蜴矣而生離壁間蓋五色守宮爾陶氏所謂守宮螫人必死及點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮既不堪點臂亦未有螫人至死者也(李時珍)

【十八娘】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『荔枝』條。

【十姊妹】古籍別名 佛見笑。(綱目拾遺)

學名 *Rosa multiflora*, Thunb. Var. *platyphylla*, Rod.

形態 十姊妹為雜草類之一種。其色有黃白紫淡紫四種。莖葉一似薔薇。枝亦有刺。惟花小於薔薇。而干葉碧口一倍。十花或七花。春秋折枝插種。恒多生活。其根葉可供藥用。

採取 采得根葉陰乾用。
主治 傷寒危篤。為末。蜜糖湯

調服。

【十藥】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『魚腥草』條。

三 畫

原名 山漆。

【三七】 命名 本品能合金瘡如漆黏物。故名。又其葉左三右四。送名之三七也。

處方用名 三七末。參三七。古籍別名 金不換。(綱目)

三七草。土三七。水三七。旱三七。見腫消。(植物名彙)

學名 *Gynura pinnatifida*, DC. (拉)

基本 屬菊科。藥用三七之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。三七產廣西田州為正地道。近日雲南多種亦可用。以藍皮藍肉者為佳。黃皮黃肉者略差。暑天收成者佳。冬天收成者次之。園庭間亦有栽植者。

形態 按三七草為多年生草。本莖高一二尺至三四尺。葉大。分裂若羽。似薔薇。無茸毛。柔軟平滑。面綠色。背帶紫。秋間開花於梢頭。

其色黃。狀如筍。排列為頭狀花序。類似薔花。



其色黃。狀如筍。排列為頭狀花序。類似薔花。

種類 中國產之三七根作團塊。日本產之三七根長。名土三七。

採取 暑天或冬天。採根曝乾。性質 甘微苦。溫。無毒。

效能 行瘀。止血。定痛。消腫。用作血病藥。

主治 止血。散血。定痛。金刃箭傷。跌撲杖瘡。血出不止者。嚼爛塗。或為末。摻之。其血即止。亦主吐血。衄血。下血。血痢。崩中。經水不止。產後惡血不下。血暈。血痛。赤目。癰腫。虎咬蛇傷諸病。(李時珍)

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論三七曰。三七甘苦微寒而溫。世人僅知功能止血住痛。殊不知痛因血瘀則痛作。血因數散則血止。三七氣味苦溫。能於血

分化其血瘀。試以諸血之中。入以三七。則血旋化為水矣。此非紅花紫草類也。故凡金刃刀剪所傷。及跌撲杖瘡。血出不止。嚼爛塗之。或為末。摻之。其血即止。且以吐血。衄血。下血。血痢。崩漏。經水不止。產後惡露不下。俱宜自嚼。或為末。米飲送下。即愈。并虎咬蛇傷。血出可治。此為陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。一種庭砌栽植者。以苗搗敷。腫毒即消。亦取散血之意。廣產形如人參者。是有節非。所用良。

國外學說 日本和漢藥攷曰。昔者日本當德川時。有養大關及東錦之金魚者。金魚忽奄奄垂斃。百計同效。聞蕃椒水能令魚復生。試之亦復失望。偶有攜此草來者。置東錦金魚水缸邊。為風吹撲。葉浸水內。人無知之者。無何客去。忘攜草歸。主人心念金魚復趨視之。時夕陽已下。見草葉沒於水。金魚潛身葉下。似頗有活潑態。怪甚。歸視其草。則三七也。主人於中藥。固夙有心得者。姑摘葉數片。按而絞其汁。遍投諸金魚缸。請朝視之。昔之萎弱者。今皆鼓鬣而上下泳。更

以試他魚。悉驗。由是主人遂得飼養金魚之秘法。而以三七草為救命丹。凡魚池旁。輒遍種之。以備急需云。

辨偽 鄭肯巖曰。假田三七

即莪朮假造混充。誤人匪淺。按田漆即山漆。一名三七。以葉左三右七。故有是名。產廣西南丹諸州。番峒深山中。採根曝乾。黃黑色。團結者狀似白芨。長者如老乾地黃。亦有如人形者。有節味微甘而苦。能止血散血定痛。匪特為金瘡聖藥。或云試法。以三七摻猪血中。血化為水者。真用者不可不明辨也。曹炳章曰。按三七原產廣西鎮安府。在明季鎮隸田陽。所產之三七。均真田州。故名田三七。消行甚廣。亦廣西出品之大宗也。有野生種。植之分。其野生形狀類人形者。稱人七。非經百年。不能成人形。為最難得最道地。前廣西百色商會吳寶森君。購得人七一枚。送滬陳列。其他普通野生者。皮黃黑色。肉色黃白。兼紅潤皆佳。種植者。如菘豆色亦佳。黃色次之。產湖廣者。名水三七。黃黑色。皮嫩有節。略次。產廣

東者。名竹節三七。形似良薑。有節而長。色淡紅。別有用處。專能如無節苗者。名蘿苞三七。皆次。頃廣東出有一種。有蘆。肉色白。名新三七。更次。偽者以白芷做。成。實害人匪淺。不可不辨也。

近人學說 張山雷曰。三七

一作山漆。言其止血合瘡。如漆之能黏合也。始見於瀨湖綱目。已言共有二種。一種生於廣西番洞中。用其根。味微甘而苦。頗似人參。則今之所謂人參三七也。又有一種苗高三五尺。葉似菊艾。而厚有歧。尖莖有赤稜。甚易蕃衍。則今人種植之者甚多。根莖葉皆可用。止血甚效。瀨湖稱其氣味甘微苦而澀。止血散血定痛。圭金刃傷。跌撲杖瘡。血出不止。搗爛塗。或乾為末。摻之。止血立效。亦主吐血衄血。下血血痢。崩中。經水不止。產後惡血不下。血暈。血痛。赤目。癰腫。虎咬蛇傷。按三七以止血見稱。而瀨湖又謂其治產後惡血不下。血暈。血痛。則不獨止血。而又能破血。一守一走。正自相反。今皆用之以止血。而破血則未之驗也。張錫純云。三七

善治血證。人多知之。乃今於治血證之外。又得其特殊之功能。由自身試驗而知。蓋曾於夏間。因被風襲。右腮腫疼。服西藥阿斯匹林汗之。而腫疼加劇。又連服清火散。風活血。消腫之藥數劑。心中熱退。而腫疼如故。復覺肌膚甚熱。遂用醋調大黃細末。屢敷其上。初似覺輕。遲半日。仍無效。轉覺其處畏涼。因以熱水絞巾熨之。又見輕。乃屢熨之。繼又無效。因思未受食之先。頭面原覺發熱。連為涼風所襲。則涼熱之氣。凝結不散。因其中涼熱皆有。所以乍涼之與熱相宜。則覺輕。乍熱之與涼相宜。亦覺輕也。然氣凝則血滯。腫疼久不愈。必將化膿。遂用山甲皂刺。乳香。沒藥。花粉。連翹等藥。迎而治之。服兩劑。仍分毫無效。遂至其痛徹骨。夜不能眠。忽憶三七外敷。善止金瘡作疼。以善化瘀血也。若內服之。亦當使瘀血之聚者。速化而止疼。遂急取三七細末二錢。服之。疼即見輕。逾一旬。鐘。又連服兩次。一夜疼退。腫消。繼又服兩日。每日三次。其腫消無芥蒂。於斯深喜三七之功能。幾令人

不可思議。內子王氏亦謂曾傷手出血。敷三七末少許。移時疼止。歷一日。夜傷處全愈。較之曾因傷手敷黃典（沃度仿謨）須三日始愈者。則三七固勝於黃典也。又以畜犬煎門潰爛。流血。用三七細末。錢半。黃典少許。摻粥中。飼之。日兩次。連飼三日。其犬竟愈。內子以為兩藥並用。治人腸中生癰潰爛。當亦必有捷效。愚因曉之曰。黃典內服。一次之極量。為六釐。劇烈之品。慎勿多用。其性原善解梅毒。犬因食含有梅毒之人矢。所以腸中生癰潰爛。連及煎門。外流膿血。治以黃典原甚中的。而與三七之化腐生新者並用。所以見效尤捷。此本為治人之良藥。特因其一為中藥。一為西藥。故從前未有將此藥並用者。今既並用之。試以犬而有效。用於人。亦何患不效乎。既可以用於人。治梅毒之腸癰有效。其無梅毒之腸癰。治之不更易乎。而愚又思之最難治者。莫如肺癰（肺結核之甚者即肺癰）及赤痢。末期。腸中潰爛。所下腥臭腐敗也。乃由腸癰而推及肺癰。且由腸中

生癰潰爛。推及腸中赤痢潰爛。想
用此二藥亦皆能奏效。(此尙待
試驗)並以此說示涪州友人李
品三。品三曰。三七誠爲良藥。余曾
治一孔姓壯年。心下疼痛。經他醫
屢治不愈。俾用丹參。桃仁各三錢。
煎湯。邊服三七細末二錢。一劑而
愈。此蓋因其心下血管。爲血所瘀。
是以作疼。三七長於化瘀血。故奏
效甚捷。余又醫治天津劉驥。如其
右腿環跳穴處。腫起一塊。大如掌。
按之微硬。皮色不變。繼則漸覺其
處骨疼。日益加重。及愚診視時。已
三閱月矣。因思其處正當骨縫。其
骨縫中作疼者。必其骨縫中有
瘀血也。俾日用三七細末三錢。分
作兩次服下。至三日。骨已不疼。又
服數日。其外皮色漸紅而欲腐。又
數日。瘡頂自潰。流出膿血若干。遂
改用生筋莖。天花粉各六錢。當歸
甘草各三錢。乳香沒藥各一錢。連
服十餘劑。其瘡自內生肌。排膿外
出。結痂而愈。按此瘡者不用三七。
托出骨中之毒。其骨疼不已。瘡毒
內陷。或成附骨之疽。爲不治之壞
證。今因用三七不但能托骨中之

毒外出。並能化瘡中之毒。使毒潰
膿。(若早服三七。並可不潰膿而
自消)三七之治瘡。何若斯之神
效哉。因恍悟愚之右腿腫疼時。其
腫疼原運於骨。若不服三七。將毒
托出。必成骨槽風。證無疑也。由此
知凡瘡證之毒在於骨者。皆可用
三七托之外出也。又醫治胡氏婦。
信水六月未通。心中發熱。腹悶。治
以通經之藥數劑。通下少許。自言
少腹仍有發硬一塊。未消。其家適
有人送三七若干。俾爲每日服四
五錢許。分數次服下。約盡三兩。經
水大下。其發硬之塊亦消矣。審斯
則凡人腹中有發硬之血積。或婦
人產後。惡露未盡。結爲癥瘕者。皆
可用三七徐消之也。又治劉問籍。
偶患大便下血甚劇。西醫注以止
血藥針。其血即止。而止血之後。月
餘不能起床。周身痠軟。飲食減少。
其脈甚而無力。重按甚澀。因謂病
家曰。西人所注射者。流動麥角膏
也。其收縮血管之力甚大。故注射
後。其血頓止。然止血後宜急服化瘀
血之藥。則不歸經之血。始不至凝
滯於經絡爲患。今但知止血。而不

知化血。積之日久。必成癆瘵。不僅
瘦軟減食也。然此時尙不難治。下
其瘀血。即愈矣。俾日用三七細末
三錢。分兩次服下。服至三次後。自
大便下瘀血若干。色紫黑。從此每
大便時。必有瘀血隨下。至第五日。
所下漸少。至第七日。即不見瘀血
矣。於斯停藥不服。旬餘身體即復
如初。由斯觀之。是三七一味。可代
金匱之下瘀血湯。而較用下瘀血
湯。尤爲穩妥也。

配合應用 ●治吐血。山
漆一錢。自嚼。米湯送下。或以五分
加入八核湯。(瀨湖集簡方)

●治赤痢血痢。三七三錢。研末。
米泔水調服。即愈。(瀨湖集簡方)

●治大腸下血。三七研末。同淡
白酒調一二錢。服三服可愈。如五
分入四物湯亦可。亦治婦人血崩。
(瀨湖集簡方)

●治產後血多。山漆研末。米湯
服一錢。(瀨湖集簡方)

●治男婦赤眼。十分重者。以山
漆根磨汁塗四圍甚妙。(瀨湖集
簡方)

●治無名癰腫。疼痛不止。山漆

磨汁。米醋調塗。即散。已被者。研末
乾塗。(瀨湖集簡方)

●治虎咬蛇傷。山漆研末。米飲
服三錢。仍嚼塗之。(瀨湖集簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛無瘀者禁
用。

參攷資料 ●此藥近時始出
南人軍中。用爲金瘡要藥。云有奇
功。又云。凡杖撲傷損。瘀血淋漓者。
隨卽嚼爛。搗之。卽止。青腫者。卽消
散。若受杖時。先服一二錢。則血不
衝心。杖後尤宜服之。產後服亦良。
大抵此藥氣溫味甘微苦。乃陽明
厥陰血分之藥。故能治一切血病。
與麒麟竭紫銅相同。(李時珍) ●
生廣西。南丹。諸州。香喇深山中。採
根。暴乾。黃黑色。團結者。狀略似白
芫。長者如老乾地黃。有節。味微甘
而苦。頗似人參之味。或云。試法以
末。摻豬血中。血化爲水者。乃眞。近
傳一種草。春生苗。夏高三四尺。葉
似菊艾。而幼厚。有歧尖。莖有赤稜。
夏秋開黃花。蕊如金絲。盤紐可愛。
而氣不香。花乾則吐絮。如苦苣絮。
根葉味甘。治金瘡折傷。出血及上

下血病甚效。云是三七。而根大如牛蒡。根與南中來者不類。恐是劉寄奴之屬。甚易繁衍。(李時珍) 陰虛火炎失血。非其所長。或與地冬滋陰之藥同用。亦可。(佚名)

【三七末】卽三七之處方用名。詳【三七】條。

【三七草】卽三七之古籍別名。典見植考彙編。詳【三七】條。

【三七葉】主治 折傷跌撲出血卽散。其餘功用同根。

【三乃子】卽山柰之古籍別名。典見和漢藥攷。詳【山柰】條。

【三十根】卽叙子股之古籍別名。典見本草綱目。詳【叙子股】條。

【三尸酒】卽酸石榴之古籍別名。典見道書。詳【酸石榴】條。

【三尸藤】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【枸杞子】條。

【三木棉】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【雷公藤】條。

【三生萊菔】古醫別名 三生蘿蔔(綱目)

拾遺)

製法 取水萊菔根一枚。周圍

鑽七孔。入巴豆七粒。入土種之。待其結子。取子又種。待萊菔根成。仍鑽七孔。入巴豆七粒。再種。如是三次。至第四次將開花時。連根拔起。陰乾收貯用。

主治 腹脹。取一枚搗碎。酒煎服。重者二枚立愈。

【三生蘿蔔】卽三生萊菔之古籍別名。典見綱目拾遺。見【三生萊菔】條。

【三白草】命名 本品葉上有三白點。故名。

外國名詞 (Saururus Lon-
gus, Deno) (拉丁)

基本 係三白草科三白草屬。

藥用 三白草之莖葉。

形態 三白草爲澤草類宿根草本。莖高二尺許。葉長橢圓形。基

脚呈心臟形。葉柄之基部。抱攔於莖外。盛夏之候。莖梢有二三葉。變

爲白色。其葉腋綴以總狀花。淡黃色。無花被。有六雄蕊。與四離雌蕊。

性質 甘。辛。寒。有小毒。

主治 治水腫脚氣。利大小便。消痰破癖。除積聚消丁腫。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論三白草曰。搗絞汁服。令人吐逆除癰。及胸膈熱痰。小兒痞滿。

參攷資料 ●三白草。生池澤畔。高尺許。葉似水荳。亦似蕒。又似

菝葜。葉上有三黑點。非白也。古人祕之。隱黑爲白爾。根如芹根。黃白

色而粗大(蘇恭) ●此草初生無白。入夏葉端半白如粉。農人候之

蒔田。三葉白則草便秀。故謂之三白。若云三黑點。蘇未識矣。其葉如

薔薇。亦不似水荳(陳藏器) ●三白草生田澤畔。八月生苗。高二三

尺。莖如薔。葉如章陸及青箱。四月共顯三葉。面上三次變作白色。餘

葉仍青不變。俗云一葉白。食小麥。二葉白。食梅杏。三葉白。食黍子。五

月開花成穗。如薔花狀。而色白。微香。結細實。根長白。虛軟。有節鬚。狀

如泥。莖蒲根。造化指南云。五月採花及根。可制雄黃。蘇恭言似水荳。有三黑點者。乃馬薔。非三白也。陳

藏器所說雖是。但葉亦不似薔。 (李時珍)

【三白草根】主治 療脚氣 風毒。腫。搗研

酒服甚驗。又煎湯洗癬瘡。

【三石】卽三葉之古籍別名。典見別錄。詳【三葉】條。

【三光鳥】卽練鵲之古籍別名。典見動物學大辭典。詳【練鵲】條。

【三百兩銀葉】卽青木香之古籍別名。典見綱目。詳【青木香】條。

【三角尖】卽三角風之古籍別名。典見綱目。詳【三角風】條。

【三角胡麻】卽胡麻之處方用名。詳【胡麻】條。

【三角風】古醫別名 三角尖。

外國名詞 (Acer trifidum
Houtt) (拉丁) タツカハテ

(日本)

基本 係無患樹科。爲槭樹屬之三角楓。

形態 三角楓爲石草類之一種。綠莖叢生。葉如花楮樹葉。而小

老者五又嫩者三又。可供藥用。採取 以石上者良。

主治 風溼流注疼痛。及癰疽腫毒。

【三角酸】卽醉漿草之古籍別名。典見綱目。詳【醉漿草】條。

【三足龜】即貢龜之古籍別名。典見爾雅。詳「貢龜」條。

【三足鼈】即能鼈之古籍別名。典見綱目。詳「能鼈」條。

【三果】即毗梨勒之古籍別名。典見綱目。詳「毗梨勒」條。

【三枝九葉草】即淫羊藿之古籍別名。典見爾雅。詳「淫羊藿」條。

【三春柳】即檉柳之古籍別名。典見綱目。詳「檉柳」條。

【三奈】即山柰之古籍別名。典見綱目。詳「山柰」條。

【三珠草】即黃麻葉之古籍別名。典見綱目。詳「黃麻葉」條。

【三眠柳】即檉柳之古籍別名。典見本草衍義。詳「檉柳」條。

【三聖子】即馬蘭子之古籍別名。典見綱目。詳「馬蘭子」條。

【三勒漿】即陀得花之古籍別名。典見開寶重定新本草。詳「陀得花」條。

【三廉】即連翹之古籍別名。典見別錄。詳「連翹」條。

【三稜】命名。本品草有三稜。故名。

處方用名 荊三稜。

古籍別名 雞爪三稜。(開寶

本草) 黑三稜。(爾雅本草) 草三稜。石三稜(本草綱目) 半天丹乙。削堅都尉(和漢藥考) 琴。(呂忱字林)

外國名詞 Cyperus rotundus (拉丁)

基本 屬莎草科。藥用三稜之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。三稜產江蘇徐州。八月新。江西河南兩省均有出。凡池沼陵澤及卑溼之地。恒有生育。用醋浸透。切片曬乾用之為合。

形態 按三稜為多年生草本。春日抽莖。莖三稜。高三四尺。葉細長而尖。質堅。為三縱列而互生。夏月梢頭對生多數之苞。其上簇生深褐色之小穗花。約三朵至八朵。相集而為一叢。花後乃結瘦果。根為黃白色。狀似小芋。頭端較尖。三四塊連合為一。具黝黃色之鬚根。質堅實。且沈重。市人多去其外皮售之。

種類 三稜生於荊楚諸地。

故名荊三稜。有作京三稜者。京乃荊字之誤。草三稜。雞爪三稜。係生蜀地者。實係一類而隨形命名。

荊稜色黃體重。狀若鱗魚而小。旁生細根。黑三稜色黑體輕。狀似烏梅而大。不生細根。雞爪三稜即草三稜。根端鉤曲如爪者。石三稜形如釵股。色黃白。葉綠如蒲苗。高及尺。亦有三稜。四月開白花。似麥蒞花。

採取 二月八月間採根日乾。

製法 張元素曰。凡使三稜。須炮熟。李時珍曰。入酒積須用醋浸一日炒。或煮熟焙乾入藥乃良。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉氣。破血。化積聚。消癥瘕。用作鎮痙藥。又為消散藥。

主治 老婦癥瘕。積聚結塊。產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣。(開寶本草)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論三稜曰。治氣脹。破積氣。消撲損瘀血。婦人血脈不調。心腹疼痛。產後腹痛。血暈。【金】張元素珍珠囊論三稜曰。心膈痛。飲食不消。

【元】王好古湯液本草論三稜曰。

通肝經積血。治瘡腫堅硬。【明】李時珍本草綱目論三稜曰。下乳汁。

【明】經希雅本草經疏論三稜曰。三稜稟火土之氣。故本經味苦平。潔古益甘。亦應兼辛。兼甘。故無毒。入足厥陰。亦入足太陰。從血藥則

治血。從氣藥則治氣。老婦癥瘕。積聚結塊。未有不由血凝氣結。食停所致。苦能泄而辛能散。甘能和而

入脾。血屬陰而有形。此所以能治一切凝結停滯有形之堅積也。又

主產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣者。亦散血行氣之功用也。

潔古用以治心膈痛。飲食不消。海葭用以通肝經積血。皆與作者之意合也。【明】李士材本草圖解論

三稜曰。荊三稜苦溫。肝家血分藥也。破堅積。結聚。行瘀血。宿食。治瘕腫。墮胎。通經。下乳。墮胎。昔有患瘕瘕死。遺言必開腹取之。得病塊如石。文理有五色。削為刀柄。後因刈

三稜。柄消成水。故知能療瘕瘕。元素云。能瀉真氣。虛者勿用。醋煮炒

乾。【清】黃宮樞本草求真論三稜曰。三稜味苦氣平。皮黑肉白。大破

肝經血分之氣。故凡一切血瘀氣

結。瘡硬食停。老塊堅積。下。藉此味苦入以血分行其滯氣。俾血自氣而下。但此若以血藥同投。則於血可通。以氣藥同入。則於氣可治。仍須和以補氣健脾之味方良。若使專用尅伐。則胃氣愈虛。氣反不行。而積增大矣。出荆地。色黃體重。若鮑魚而小者良。今世所用。皆草三稜。醋浸炒。或麵裹煨。

配合應用 ①三稜同蓬莪茂、青皮、香附、延胡、肉桂、牡蠣、鼈甲、人參。消一切堅積老癖之積聚。

②三稜同青皮、紅藍花、當歸、川芎、生地、芍藥、桂心、牛膝、延胡、五靈脂。治產後一切惡血。停滯留結。及月水凝滯不通。少腹作痛不可按。

③三稜同橘皮、青皮、縮砂蜜、紅麴、山查、麥芽、人參、肉豆蔻、黃連。消一切食積。并氣壅塞不利。

④三稜煎治癥瘕鼓脹。用三稜根切一石。水五石。煮三石。去滓更煎。取三斗汁。入鍋中重湯煎。如稠糖。密器收之。每日酒服一匕。日二服。(千金方)

三畫 三

兩。肉豆蔻、檳榔各一兩。硝砂二錢。爲末。糊丸。梧子大。每煮湯服三十丸。(奇效方)

⑤治疝瘕不瘥。腸下硬如石。京三稜一兩。泡。川大黃一兩。爲末。醋熬成膏。每日空心生薑橘皮湯下一匙。以利下爲度。(聖惠方)

⑥治小兒氣癖。三稜煮汁。作羹粥與奶母食。日亦以漿許與兒食。小兒新生百日及十歲以下。無問癰熱疝瘕等皆理之。祕妙不可具言。大效。(子母祕錄方)

⑦治痞氣胸滿。口乾肌瘦。食減。或時壯熱。石三稜、京三稜、鷄爪三稜。並泡。蓬莪茂三枚。檳榔一枚。青橘皮五十片。醋浸去白。陳倉米一合。醋浸淘過。巴豆五十箇。去皮。同青皮。倉米炒乾。去豆爲末。糊丸。綠豆大。每米飲下三丸。日一服。(聖濟總錄方)

⑧治反胃惡心。藥食不下。京三稜泡一兩半。丁香三分。爲末。每服一錢。沸湯點服。(聖濟總錄方)

⑨治乳汁不下。京三稜三箇。水二盞。煎汁一盞。洗奶。取汁出爲度。極妙。(外臺祕要方)

⑩治渾身癩泡。如棠梨狀。每箇出水有石一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌膚肉。卽不可治。用荆三稜。蓬莪茂各五兩。爲末。分三服。酒調連進。愈。(危氏得效方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡脾胃虛弱及無實積者禁用。

參攷資料 ①三稜能破氣散結。故能治諸病。其功可近於香附而力峻。故難久服。按戴原禮證治要訣云。有人病癥瘕腹脹。用三稜莪茂。以酒煨煎服之。下一黑物如魚而愈也。(李時珍) ②三稜草有三稜也。生荆楚地。故名荆三稜。以著其地。開寶本草作京者誤矣。又出草三稜條云。卽鷄爪三稜。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名。爾故併見之。(蘇頌) ③三稜種有三四種。京三稜黃色。體重。狀若鯽魚而小。又有黑三稜。狀如烏梅而稍大。體輕。有鬚相連。莖廷作漆色。蜀人織以爲器。一名琴者是也。療體並同。(陳藏器) ④京三稜舊不著所出地土。今荆襄江淮濟南河陝間皆有之。多生淺水旁。及

四三

破澤中。春生苗葉似莎草。極長。高三四尺。又似菱蒲葉。而有三稜。五六月抽莖。高四五尺。大如人指。有三稜如削成。莖端開花。大體皆如莎草而大。黃紫色。苗下卽魁。初生成塊。如附子大。或有扁者。其旁有根。橫貫一根。則連數魁。魁上亦出苗。其魁皆扁長如小鯽魚體者。三稜也。其根末將盡一塊。未發苗。小圓如烏梅者。黑三稜也。又根之端鈎曲如爪者。鷄爪三稜也。皆皮黑肌白而至輕。或云不出苗。只生細根者。謂之鷄爪三稜。又不生細根者。謂之黑三稜。大小不常。其色黑。去皮卽白。三稜者。本一種。但力有剛柔。各適其用。因其形爲名。如烏頭烏喙雲母雲苗之類。本非兩物也。今人乃妄以烏喙。香附子爲之。又河中府有石三稜。根黃白色。形如釵股。葉綠如蒲。苗高及尺。亦有三稜。四月開花。白色如薔薇花。五月采根。亦消積氣。今舉世所用三稜。皆淮南紅蒲根也。秦州尤多。其體至堅重。刻削魚形。葉扁形。圓不復有三稜。不知何緣命名爲三稜也。雖大醫亦不以爲謬。流習既久。

用根者不識其苗。采藥者莫究其用。因緣差失。不復辨別。今三稜皆獨旁引下根。無直下根。其形大體多如鮑魚(參頌)。

三稜多生荒廢池溼地。春時叢生。夏秋拍高莖。莖端復生數葉。開花六七枝。花皆細碎成穗。黃紫色。中有細子。其莖莖花實俱有三稜。並與香附苗莖花實一樣。但長大爾。其莖光滑。三稜如櫻之葉莖。莖中有白稜。刮之穢物。至如膠。呂忱字林云。草生水中。根可緣器。即此草莖。非根也。抱朴子言。莖根化。亦是此草。其根多黃黑。削去殼皮。乃如鮑狀。非本根似鮑也。(李時珍)

【三葉】 原名 鴨兒芹。古醫別名 三石。當田。赴魚。(別錄)

外國名詞 Cryptotaenia japonica, Hasak (拉丁) ミツバ ミツバセリ (日本)

基本 係繖形科。鴨兒芹屬。藥用三葉之莖葉。

形態 三葉為多年生平滑草。本高二三尺。葉互生。有三小葉。邊緣有細鋸齒。下部之葉葉柄甚長。

夏日莖梢着花。作繖繖形花冠。花小白。或帶淡紅。雄蕊五枚。與花瓣同數。而互生。其莖小。根色黑。性質 辛。無毒。

採取 三月採陰乾用。主治 寒熱。蛇蜂螫傷。

【三葉酸】 即酢漿草之古籍別名。與見綱目。詳『酢漿草』條。

【三層草】 即蚤休之古籍別名。與見本草綱目。詳『蚤休』條。即甘遂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【三莖草】 即巴戟天之古籍別名。與見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【三賴】 即山柰之古籍別名。與見綱目。詳『山柰』條。

【三欽子】 即羊桃之古籍別名。與見綱目。拾遺。詳『羊桃』條。

【三寶姜】 命名 本品乃薑之產於臺灣島鳳山縣境者。相傳為明初三寶太監所植。故名。

主治 功與薑同。

【三賴】 即山柰之古籍別名。與見和漢藥考。詳『山柰』條。

【上川連】 即黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【上中廣】 即橋皮之處方用名。詳『橋皮』條。

【上甲】 即鼈甲之古籍別名。與見和漢藥考。詳『鼈甲』條。

【上玉桂】 即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【上池水】 係未至地之雨水。如雨露之存留於竹木者是。即俗稱半天河。與見史記扁鵲倉公傳。功用詳『半天河』條。

【上宜燕】 即燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【上阿膠】 即阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【上草】 即黃連之古籍別名。與見和漢藥考。詳『黃連』條。

【上清童子】 即古文錢之古籍別名。與見綱目。詳『古文錢』條。

【上湘軍】 即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上湘黃】 即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上廣皮】 即橋皮之處方用名。詳『橋皮』條。

【上廣軍】 即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上樹膠】 即楓上寄生之古籍別名。與見綱目。拾遺。詳『楓上寄生』條。

【上蔞參】 即蔞參之處方用名。詳『蔞參』條。

【下甲】 即龜版之古籍別名。與見和漢藥考。詳『龜版』條。

【下馬仙】 即大戟之古籍別名。與見綱目。詳『大戟』條。

【下窟鳥】 即鴉之古籍別名。與見綱目。詳『鴉』條。

【丫雞草】 即龍鬚草之古籍別名。與見綱目。拾遺。詳『龍鬚草』條。

【久冷】 即滑石之古籍別名。與見和漢藥考。詳『滑石』條。

【乞星麻魚】 即鱒魚之古籍別名。與見飲膳正要。詳『鱒魚』條。

【勺藥】 即白芍之古籍別名。與見和漢藥考。詳『白芍』條。

【千人踏】 即蚯蚓之在路上為人所踏死者。入藥最良。與見日華雜家本草中。詳『蚯蚓』條。

【千心子】 即地膚子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【千心妓女】 即地膚子之古籍別名。

名。與見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【千打鵝】

產地 本品以廣東北江爲多。

採取 五六月新時採之。

主治 跌打損傷。

【千年冰】即人中白之古籍別名。與見和漢藥攷。詳『人中白』條。

【千年艾】

外國名詞 Chrysan-
nonum, Mexim. (拉丁) シ

ホキクシホカヤキク(日本)
草本 係菊科蒿蒿屬。藥用千

年艾之葉。
產地 生山野中。

形態 千年艾爲蓬草類之一種。莖細小。高尺許。根似蓬蒿。葉長寸餘。無尖極。面青背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如珠粒。但其葉似艾而無艾香。槎之即碎。亦似艾葉之能成茸。

採取 三伏時採之。

性質 辛。微苦。溫。無毒。

主治 男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。

【千年冷】即金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【千年柏】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳『玉柏』條。

【千年健】

產地 出廣西安南

諸地。

形態 千年健爲蔓草類之一種。形如藤。長數尺。氣極香烈。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 壯筋骨。祛風氣痛。酒浸服。止胃痛。酒磨服。

配合宜忌 忌菜菔。

參攷資料 千年健同類地風。虎骨。牛膝。甘枸杞。二蠶砂。草薢。可理風痛。老人最宜。(綱目拾遺)

【千年蕘】即無漏子之處方用名。詳『無漏子』條。即海欒子之

古籍別名。典見本草綱目。詳『海欒子』條。

【千年莖】即萬年青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『萬年青』條。

【千年潤】即石斛之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『石斛』條。

【千足蟲】即馬陸之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『馬陸』條。

【千里及】即千里光之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【千里水】即流水之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『流水』條。

【千里光】

古籍別名 千里及。

(綱目拾遺) 黃花波。

千里急。(蘇頌)

基本 係山草類。藥用千里光之莖葉。

產地 生山中及原野道旁。巖落間。

形態 按千里光立夏後生苗。一莖直上。高數尺。葉類菊而長。不

對生。背有毛。枝幹圓而青。秋開黃

花。不結實。其莖與葉可供藥用。

性質 苦。平。有小毒。

主治 疫氣結黃。瘴瘧。瘴毒者。煮汁服取吐。搗傅蛇犬咬傷。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論千里光曰。同甘草煮汁

飲。退熱明目。不入衆藥。【明】李時

珍本草綱目論千里光曰。同小青煎服。治赤痢腹痛。

參攷資料 千里及。藤生道

旁。離落間。葉細而厚。宜湖間有之。

(陳藏器) 千里急。生天台山中。春生苗。秋有花。土人採花葉入服藥。又鈔州有千里光。生淺山及路

旁。葉似菊而長。背有毛。枝幹圓而

青春。生苗。秋有黃花。不結實。採莖

葉入眼藥。名黃花波。實卽一物也。

(蘇頌)

【千里急】即千里光之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『千里光』條。

【千里馬】即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【千兩金】即淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『淫羊

藿』條。即續隨子之古籍別名。

典見日華諸家本草。詳『續隨子』條。

【千金子】即續隨子之處方用名。見『續隨子』條。

【千金木脂】即安息香之古籍別

名。典見和漢藥攷。見『安息香』條。

【千金花】即剛草花之古籍別名。典見綱目。詳『剛草花』條。

【千金草】即蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。即牛筋

草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳

『牛筋草』條。

【千金菜】即高苣之古籍別名。典見綱目。詳『高苣』條。

【千金藤】 外國名詞 Stephania, yuho. (拉丁) ハスノハカ

ツラ イヌツツラ ベウツル カタマタ ヤキモチカツラ (日本)

基本 係防己科。千金藤屬。藥用千金藤之根。

形態 千金藤爲攀緣灌木。葉互生而平滑。有長柄。作卵狀三角形。而柄狀下面帶白色。長二寸至四寸。廣一寸至三寸。莖上昇。花淡綠色。繖形花序。花梗白。葉腋生。卵片倒卵形。鈍頭。花瓣三四枚。倒卵形。肉質。雌雄同株。雄花雄蕊合生。藥六個。橫裂。雌花有不完全雄蕊。子房一個。核果平滑。內果皮平扁。作蹄形。側面凹入。成孔。種子如環形。子葉細長。其莖可供藥用。

主治 一切血毒。諸氣霍亂。中惡。天行瘧疾。瘧疾。痰嗽。不利。癰腫。大毒藥石。發癩。癩。悉主之。

參攷資料 千金藤有數種。南北名稱不同。大略主療相似。或是皆近於藤也。生北地者。根大如指。色如漆。生南地者。黃赤如細辛。舒

藤間有一種藤似木莖。又有烏虎藤。遠樹生。冬青亦名千金藤。江西林間有草生。葉頭有瘰子。似鶴膝。葉如柳。亦名千金藤。又一種似荷葉。只大如錢許。亦呼爲千金藤。又名古藤。主痢及小兒大腹。千金者以貴爲名。豈俱一物。亦狀異而名同耶。若取的稱。未知孰是。又云嶺南有陳思及亦名千金藤。(陳藏器)

【千金鏢】 產地 出江南原野。形態 千金鏢爲雜草類之自生草本。高二三尺。可供藥用。

主治 蛇蝎蟲咬毒。及搗傳瘡。上生肌止痛。

【千秋藤】 卽七葉黃荊之藤。功用相同。詳「七葉黃荊」條。

【千筋拔】 產地 出粵省北江。採取 三四月新時採之。主治 跌打損傷。

【千振】 卽苦草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「苦草」條。

【千條鍼】 卽鐵筴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵筴」條。

【千張紙】 產地 出雲南存廣南府境。江蘇亦有之。

形態 千張紙爲雜木類之一種。其葉形如篇豆。其中片片如輝翼。大如手掌。狀似通草。或謂係仙人掌草之晒乾者。中心層層作羅紋捲心。折之如通。或謂卽宜男草。可供藥用。

主治 心氣痛。胃氣痛。燒灰酒服。小兒袋盛。佩之辟惡止驚。

【千雀】 卽雀梅之古籍別名。典見別錄。詳「雀梅」條。

【千歲子】 產地 出交趾。形態 千歲子狀似青黃李子。其莖蔓生。而子在根下。繫綠色。交加如錢。一苞恒二百餘顆。皮殼青黃色。殼中有肉如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。搗之有聲。

性質 味甘。

【千歲菓】 古籍別名。葛藟。(陸機草木疏) 葛藟。(毛詩) 藟藟。(新修本草)

基本 係蔓草類藤屬。藥用千歲菓之藤汁。產地 本經謂生太山山谷中。

蘇頌謂經本草曰。處處有之。形態 千歲菓爲蔓生草本。生於山野。其莖攀緣他樹。折之有白汁。葉如葡萄葉。而小。五月開花。七月結實。色青黑。微赤。其根與藤莖中白汁俱可供藥用。

採取 八月間採汁。性質 甘平無毒。

主治 補五臟。益氣。續筋骨。長肌肉。去諸瘰。久服。輕身不饑。耐老通神明。

參攷資料 藤生如葡萄。葉似鬼桃。蔓延木上。汁白。今俗人方藥都不諳用。仙經數處須之。(陶弘景) ① 莖似葛。葉下白。其子赤。莖瓜連蔓而生。蔓白子赤。可食。醉而不美。南州人謂之推藟。毛詩云。葛藟注云。似葛之草。蘇恭謂爲藟。藟深是妄言。(陳藏器) ② 處處有之。藤生。蔓延木上。葉如葡萄。而小。四月摘其莖。汁白味甘。五月開花。七月結實。八月採子。青黑微赤。冬惟凋葉。春夏間取汁用。陶陳二氏所說得之。(蘇頌) ③ 唐開元末。訪隱民姜世。年幾百歲。召至京。賢院

言殿常春藤。使白髮還黑。長生可致。藤生太湖終南。帝遣使多取。以賜老臣。詔天下使自求之。擢撫銀青光祿大夫。號冲和先生。又言終南山有旱藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取之作湯餅。賜大臣。有驍騎將軍。甘守誠云。常春藤。乃千歲蕓也。旱藕。乃牡蒙也。方家久不用。故撫易名以神。之民以酒漬。藤飲之多暴死。乃止。撫內慚。乃請求藥。牢山遂逃去。今書此以備世疑。(寇宗奭)

【千歲蕓】原無常春之名。惟陳藏器本草。土鼓藤。下言李邕名。為常春藤。浸酒服。羸老變白。則撫所用。乃土鼓藤也。其葉與千歲蕓不同。或名同耳。(李時珍)

【千歲蕓根】 主治 緩筋。令不痛。

【千葉水仙】 基本 本品係水仙之一種。其根可入藥。

主治 一切風證。

配合應用 合通關散。搗鼻中。能吐痰濁。搗爛。外懸腫毒。參攷資料 千葉水仙根之色紅者。不可用。(佚名)

【千葉玉玲瓏】即茶菊。白色。千葉者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「茶菊」條。

【千葉白】即山茶。花瓣多色。白者之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【千葉紅】即山茶。花瓣多色。紅者之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【千層紙】即雲母之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「雲母」條。

【千層塔】即益母草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「益母草」條。

【千頭柏】即側柏之根。上生枝蒙茸。茂密者。功用詳「側柏子仁」條。

【千頭草】即地膚子之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「地膚子」條。

【千針草】即大薊之古籍別名。典見圖經本草。詳「大薊」條。

【又子】即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。

【又雞草】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【口津】 古籍別名 靈液。神水。玉體。金漿。醴泉。(綱目) 性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 疔腫疥癬。皴皸。五更未語者。頻塗。搽之。又明目退腎。消腫解毒。辟邪。粉水銀。

參攷資料 人舌下有四竅。兩竅通心氣。兩竅通腎液。心氣流入舌下。為神水。腎液流入舌下。為靈液。道家謂之金漿玉醴。溢為醴泉。聚為華池。散為精液。降為甘露。所以瀆澀臟腑。潤澤肢體。故修養家。嚙津納氣。謂之清水灌靈根。人能終日不睡。則精氣常留。顏色不槁。若久睡。則損精氣。成肺病。皮膚枯涸。故曰遠睡不如近睡。近睡不如不睡。人有病。則心腎不交。腎水不上。故津液乾。而真氣耗也。秦越人難經云。腎主五液。入肝為淚。入肺為涕。入脾為涎。入心為汗。自入為唾也。(李時珍)


唾津乃人之精氣所化。人能每日漱口。擦齒。以津洗目。及當時以舌舐。拇指甲。指目。久久令人光明不昏。又能退腎。凡人。有靈腎。但每日令人以舌舐數次。久則真氣。薰及自然。毒散。腎退也。范東陽方云。凡人。斃死。不得叫呼。但痛咬脚根。及拇指甲。際多唾其面。徐徐喚之。自甦也。按黃震

日抄云。晉時南陽宗定伯。夜過鬼間之。答曰。我新死鬼也。問其所惡。曰。不喜唾耳。急持之。化為羊。恐其變化。因大唾之。實得千錢。乃知鬼真畏唾也。(李時珍)

【土人參】即粉沙參之原名。見「粉沙參」條。

【土三七】 產地 廣信衛州山中有之。

形態 土三七。葉似千年艾。無歧。有齒。深綠。柔脆。惟有淡白紋。一縷。秋時。梢頭。開尖細小黃花。又一種。生巖西者。莖葉。俱似。景天。而不甚高厚。葉有汁。無紋。周圍。有圓齒。經月不槁。無花。實。摘葉。種之。即生根。長寒。經霜。即腐。



土三七

主治 吐血。

【土子】即無名異之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「無名異」條。

【土山奈】即紫茉莉子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紫茉莉子」條。

條。

【土升麻】

產地 湖北武昌。
形態 綠莖如竹。高四五尺。無葉無枝。僅有小又可供藥用。



土升麻

主治 痘症。

【土木香】

古籍別名 御藥園木香(和漢藥考)

外國名詞 Inula Holonium, L.(拉丁) Elecampano.(英)

基本 屬菊科。藥用大車之根。

形態 土木香為自生之宿根草。莖高五六尺。葉在下部者作長橢圓形。柄長。上部者細小。邊緣俱有粗鋸齒。有毛茸。夏季於莖上分數極。頂上開黃色頭狀花。後結淡褐色子實。根之經二三年者。秋季採掘之。供藥用。生鮮時內部作白色。乾後則作灰褐色。氣味俱芳香而苦。

性質 苦。溫。無毒。

成分含有歐列甯(Eleolin)苦味質、伊努甯(Inulin)樹脂、揮發油等。

效能 用作肺病藥及健胃藥。

主治 治風氣痞滯諸症。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。土木香性溫。芳香而苦。為健胃良藥。或云用於肺胃有效。又發蒸氣。利小便。稀釋黏液。分利污穢惡液。排泄之。治風氣痞滯諸症。疝痛。腰痛。瘰癧病。依刺昆垓兒。通經閉。殺蟲。及治未發咳嗽痰喘等。喉嚨之胸病。又能刷淨肺黏痰。故用於由傷冷毒之痰嗽喘急等為最佳。患者如為虛弱黏液質。治黏痰壅積之肺症。尤為有效。此症加安質沒粗劑(發汗湯液)或加龍腦。或隨其症加亞鉛華(發汗鎮痙)或阿芙蓉用之。俱有殊效。咳嗽而兼胃中黏液鬱滯之症。於此藥加芒硝或礬砂少許用之。多有效。又喘急之症。胸中有膠液壅塞者。以此根之越幾斯劑。溶化於安質沒粗酒用之。亦有大效。

用量 五分至三錢。

【土木甯】即木甯子之古籍別名。

與見和漢藥攷。詳「木甯子」條。

【土牛兒】即蝸牛之古籍別名。與見和漢藥攷。詳「蝸牛」條。

【土瓜】即王瓜之原名。詳「王瓜」條。即草薺之古籍別名。與見和漢藥攷。詳「草薺」條。

【土瓜根】即王瓜之處方用名。詳「王瓜」條。

【土石】即長石之古籍別名。與見別錄。詳「長石」條。

【土朱】即代赭石之古籍別名。與見綱目。詳「代赭石」條。

【土肉】即鹿角菜之細如牛毛。呼牛毛石花者。與見郭璞海賦。詳「鹿角菜」條。

【土伽楠】基本 本品即伽楠島者。草生。

形態 白質而有黑點。狀如油。速。精多而氣厚。剖之香氣甚烈。

製法 其香易散。手汗沾滿。數月即滅。須濯以清泉。背以蘇合油。或以甘蔗心藏之。以白芨葉其之。曬土數月。日中稍曝。而後香氣可復。

主治 同伽楠香。

【土芩】即土芩之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「土芩」條。

【土坑砂】即硃砂之古籍別名。與見綱目。詳「硃砂」條。

【土杏】即杜若之古籍別名。與見植物學大辭典。詳「杜若」條。

古籍別名 黃獨。土豆。

目拾遺

外國名詞 Dioscorea Sp.

Diva, L.(拉丁) ニガカシウ

カシニウイモ カシウイモ

(日本)

基本 係薯蕷科。薯蕷屬。藥用山芋之根。

產地 山野平原俱有出。

形態 山芋為菜類之多年生蔓草。木葉闊大。呈心臟形。互生。夏日葉腋生小花。作穗狀花序。雌雄異株。花色淡黃。其葉腋之零餘子。圓而多疣。其根略呈球形。直徑二三寸。根甚多。肉白皮黃。可供食與藥用。

性質 甘。辛。寒。有小毒。

主治 解諸藥毒。生研水服。當吐出惡物便止。煮熱食之。甘美不

飢。厚人腸胃。去熱嗽。

參攷資料 土芋功能種痘。小兒熱食。大解痘毒。(種學啟)

【土芋藤】 主治 燒灰傳痘爛成瘡。可無癢痕。

【土苧】 卽紫本之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「紫本」條。

【土豆】 卽土芋之古籍別名。典見綱目。詳「土芋」條。卽落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「落花生」條。

【土貝母】 命名 本品爲貝母之產於安徽等處者。以別川浙產者之不同故名。

古籍別名 大貝母。(綱目拾遺)

形態 土貝母爲貝母之一種。其根大如錢。獨瓣不分。可供藥用。採取 以色白而大皮細而燥者入藥用。

性質 苦。平。微寒。無毒。

主治 除風溼。化膿毒。利痰行滯。斂瘡口。專消癰疽惡毒。楊梅結毒。鼠瘡汗斑。痰核癰癧。

配合應用 治乳癰初起。白芷。土貝母。各等分爲細末。每服三

三畫 土

錢。陳清熱服。護暖取汗卽消。重者再服。如壯實者。每服五錢。又方。天花粉。乳香。去油。沒藥。白芷。歸尾。土貝母。赤芍。獨活。川芎。各一錢。甘草。節。陳皮。各八分。穿山甲。三片。皂角。刺。一錢五分。金銀花。二錢五分。防風。一錢二分。好酒煎服。又方。白芷。梢。土貝母。天花粉。各三錢。乳香。去油。一錢五分。共炒研末。白酒漿調搽。再用酒漿調服三錢。(楊春涯驗方)

治乳癰。紫河車。草薺。貝。各三錢。用黃糖拌勻。好酒和服。盡醉。蓋被取汗。超買裁云。浙貝。乃甯波土貝母也。(外科全生集方)

治乳岩。陽和湯。加土貝母五錢煎服。數日可消。(華氏驗方) 又治乳岩已破。用大貝母。核桃。楓。金銀花。連翹。各三錢。酒水煎服。(姚希周濟世經驗方)

治癰疔。不論已破未破。皆治。用土貝母。半觔。牛皮膠。四兩。敲碎。牡蠣。粉。炒成珠。去粉爲細末。水發丸。菴豆。大。每日早晚。用紫背。天葵。根。三錢。或用海藻。昆布。各錢半。煎湯吞丸。三錢。又癰疔膏藥。用牛皮

膠。水。熬化一兩。入土貝母末五錢。攪油紙上貼之。(瑞安生驗方) 又紫背。天葵。一兩。五錢。土貝母。昆布。海藻。各一兩。西牛。黃。三分。海螵。蛸。五錢。陳。星。三錢。桔。梗。一兩。共爲細末。酒。發。爲。丸。如。菴。豆。大。每。日。服。六。七。十。九。好。酒。送。下。(吉。雲。旅。抄。方) 又治男婦小兒生癰疔。內消。用土貝母研末。陳米醋調搽。數日卽消。(千金不易方) 又治痰核癰疔未潰。用此方。生南星。生半夏。土貝母。各等分研末。醋蜜調勻敷。(仙姑玉環散方)

治癰疔初起。土貝母研細。陳米醋和搽。數日暗消。又方。土貝母。大力子。全。蟲。洗。各。五。錢。紫。背。天。葵。根。昆。布。洗。海。藻。洗。各。一。兩。青。皮。燻。退。各。三。錢。甲。片。炒。四。錢。蜈。蚣。酒。炙。七。條。當。歸。二。兩。爲。末。蜜。丸。砂。仁。湯。下。三。錢。虛。加。人。參。又。用。生。南。星。生。半。夏。生。大。黃。各。一。兩。大。貝。母。昆。布。海。藻。海。浮。石。銅。綠。明。礬。各。五。錢。用。商。陸。根。汁。葱。汁。薑。汁。蜜。四。味。調。敷。又。痰。核。癰。疔。膏。中。用。大。貝。母。(種。福。堂。數。核。癰。疔。方)

治痰核方。人參。甘草。各六分。

川芎。桔。梗。陳。皮。木。香。烏。梅。各。八。分。當。歸。白。芷。防。風。茯。苓。各。一。錢。半。夏。五。分。生。薑。三。片。黑。棗。二。個。水。二。鐘。煎。服。如。患。處。有。水。不。乾。加。知。母。一。錢。土。貝。母。一。錢。

消癰瘰。穿山甲和沙炒。皮膠。切碎。麥。殼。炒。各。二。兩。土。貝。母。連。翹。各。一。兩。共。爲。末。大。人。三。錢。小。兒。二。錢。(傳信方)

治汗斑。土貝母一兩。南。礪。砂。一。兩。冰。片。一。分。研。末。搽。之。(集驗方) 搽砂五錢。以暑月出汗時搽。(家寶方)

治貝瘡。大。鯽。魚。一。尾。皂。角。內。獨。子。每。歲。一。個。川。貝。母。二。錢。土。貝。母。二。錢。將。皂。角。子。貝。母。入。魚。肚。內。黃。泥。包。裹。陰。陽。瓦。炭。火。焙。乾。存。性。研。細。末。每。服。三。錢。食。後。黃。酒。調。服。忌。單。百。日。(彙。集。關。紹。聖。方)

治手發背。生。甘。草。炙。甘。草。各。五。錢。角。刺。二。錢。五。分。土。炒。土。貝。五。錢。五。分。半。夏。一。錢。五。分。甲。片。二。錢。五。分。炒。黑。知。母。二。錢。五。分。加。葱。薑。水。酒。煎。二。劑。卽。愈。(慈。惠。編。方)

四九

治刀割斧砍。夾。刺。箭。傷。損。土。貝。母。末。敷。之。止。血。收。口。(集。驗

方)

①治毒蛇咬。急飲麻油一碗。免毒攻心。再用土貝母四五錢。為末。熱酒沖服。再飲盡醉。安臥少時。藥力到處。酒化為水。從傷口噴出。候水盡。將碗內貝母渣敷傷口。垂死者皆活。(祝氏效方)

②治腫毒初起。此方傳自異人。應驗如響。重者不過三服。輕者一二服。初起即散。已成者自潰。且易收口。甲片炙搗六錢。全當歸五錢。花粉八錢。白芷五錢。廣皮三錢。土貝母研二錢。銀花一兩。角刺三錢。赤芍六錢。防風五錢。甘草節六錢。乳香炙另研一錢。沒藥炙另研一錢。蘇木二錢。川牛膝一錢。川斷五錢。酒水各半。煎汁去渣。將沒藥乳香末調服。取汗。趙貢裁云。此方專於攻散。藥力太重。惟可施於壯實之人。虛弱者勿服。(百草鏡方)

參攷資料 按貝母有甜苦之分。有川象之別。百草鏡云。出川者曰川貝。出象山者名象貝。絕大者名土貝。川產者味甘。間有微苦。總不似他產之一味苦而不甘者也。入藥能補氣利痰而不寒。虛人宜

之。象貝一味。苦寒能化堅痰。性利可知。若土貝功專化膿解癰。性燥而不潤。以象貝皆小。土貝獨大。於川產者亦異。綱目不分著功用。或其時尚未有此種耳。又用藥識微云。川貝中一種出巴東者。獨大。番人名紫草貝母。大不道地。出陝西者名西貝。又號大貝。張石頑云。貝母川產味甘最佳。西產味薄。次之。象山產者微苦。又次之。一種大而苦者。僅能解毒。並去心用。今川中亦產一種大如錢者。土人以此搗粉作漿。刷川綢用。不可入藥。然則土貝川中亦產。不特浙江也。億庚子春有友自川中歸。贍予貝母大如錢。皮細白而帶黃斑。味甘。云此種出龍安。乃川貝中第一。不可多得。信是則川中之甜貝母。亦有大者。不特金川子獨甜也。(趙學敏)

【土辛】即細辛之南產大而香者。參見「細辛」條。
【土乳】即土殷孽之古籍別名。典見唐本草。詳「土殷孽」條。
【土狗】即蟻蛉之古籍別名。典見普濟方。詳「蟻蛉」條。

【土狗乾】

主治 消水腫。治骨硬。為接骨聖藥。
【土芝】即芋子之古籍別名。典見別錄。詳「芋子」條。

【土阿魏】

基本 本品係臭梧桐根皮搗出之汁如膠者。
主治 寬筋活血。化癥消癥。

【土附子】

即杜父魚之俗名。見「杜父魚」條。
【土附子】即草烏頭之原名。詳「草烏頭」條。

【土青木香】

即青木香之古籍別名。典出嘉祐圖經本草。詳「青木香」條。
【土砂】丹砂之一種。不僅畫用。即療瘡疥亦好。但不入內服藥用。詳「丹砂」條。

【土紅山】

即土紅花之原名。詳「土紅花」條。

【土紅花】

原名 土紅山。
產地 出福建諸地之山野間。
形態 土紅花為毒草類。紅花之一種。種有二。大者高七八尺。葉似枇杷葉而小。葉背無毛。秋開白

花。如粟米粒而不實。其葉可供藥用。又有作細藤似芙蓉葉。葉面青背白。其根如葛頭者。亦供藥用。詳見該條。
製法 入藥薄切。用米泔浸一宿。更用清水浸一宿。搗服。
性質 甘微寒。無毒。

【土風葢】

產地 安南。
形態 根似薑而有鬚。葉莖似薑而細瘦。略似初生細薑。可供藥用。

【土紅花根】

製法 取根。米泔水再浸一宿。炒黃研末用。
主治 勞瘵甚效。

【土虺蛇】

即虺之古籍別名。典見綱目。詳「虺」條。



土風葢

性質 溫。
主治 風損。
【土疇】杜父魚之俗名。見「杜父魚」條。

魚」條。

【土桔梗】即齊危之古籍別名。典見本草原始。詳「齊危」條。

命名 本品乃土之脂液生於土穴中。狀如殷孽。故名。

古籍別名 土乳(唐本草)

產地 生高山崖地中。南方山崖多有之。

形態 土殷孽。色白如脂。狀似蠶乳。孔公孽之類。故有土蠶乳之稱。

性質 鹹。平。無毒。

主治 婦人陰蝕。大熱乾癆。

【土消】

產地 河北。

形態 色黃白。狀如末。

製法 採得時。中有沙土。須以水。煮化。澄去渣滓。入蘿蔔數枚。同煮熟。去蘿蔔。傾入盆中。經宿則結成白消。方可入藥。

【土茜草】

命名 本品為茜草之產於南方者。故名。

古籍別名 地蘇木。過山龍。風車草。八仙草。根名活血丹。(綱目拾遺)

形態 土茜草為產於南方之舊草。立夏後發苗。葉四五瓣。成一叢。葉莖節而生。方梗柔莖。皮糙澀。棘人指。莖莖直上。至一二尺。乃有分枝。處處如箭鏃。風吹能環轉如車輪。秋時結實。小如梧桐子。實後便枯。其根黃赤色。可供藥用。

性質 平。

主治 治跌撲癰毒。癰瘰癧閉。便血。崩中帶下。痔漏風痺。鬼箭風。跋腿黃疽。蛇傷疔瘡。

配合應用 治疔瘡。用過山龍。仙橋草。玄耳草。豨薟草。紫花地丁。野苧麻根。六味等分。酒煎服。取汗。須多服。轉丸。汗出。鹹者可治。若味淡不可治。又方。地蘇木。陰乾。為末。重者八錢。輕者五錢。好酒煎服。如放黃耆。沖酒服。渣罨疔上。(朱羅峯方)

參攷資料 土茜草入肝脾心三經。性善行血活血。無癆者禁用。(百草鏡)

原名 禹餘糧。

命名 相傳昔禹行山中。乏食。採本品充糧。而棄其餘。故名。形似茯苓。後遂謂之土茯苓。

仙道根。鮮奇良。古籍別名 草禹餘糧。(綱目拾遺) 土草蕪。山猪莖。冷飯團。硬飯。山地栗。(綱目) 刺猪苓。(圖經本草) 奇良。奇糧。岐良。山牛。冷飯。硬飯。山歸來。冷飯塊。地茯苓。導河。蘇。山奇糧。木猪苓。黃牛根。過岡龍。榮莫。木猪腰子。(和漢藥攷) 過山龍。(吳氏集驗方)

外國名詞 Smilax Chinensis (拉丁)(China Root) (英)

基本 屬百合科植物。為草藤類。土茯苓之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。土茯苓產東江惠州者為佳。西江。北江。清遠。下四府。廣西等均有出。和漢藥考曰。產中國之河北。山東。湖北。浙江諸省。日本不產。

也。

形態 土茯苓為多角莖生草。本莖生如草。莖有細點。其葉不對。狀類大竹葉。而質厚滑。如瑞香。葉而長五六寸。其根狀如蕨。莖而離尺許。近或數寸。其肉軟。可生嚼。有赤白二種。入藥用白者良。昔人

不知用此。近時弘治正德。因楊梅瘡盛行。率用輕粉藥。取效。毒留筋骨。潰爛終身。後人用此。遂為要藥。諸醫無從考證。蓋此亦草蕪。莖葉之類也。

探取 春夏間採之。宜採白者入藥良。

性質 甘。淡。平。無毒。

效能 祛風溼。療癰瘡。專作驅除梅毒惡瘡之解毒藥。

主治 食之當穀不飢。調中止洩。健行不睡。(陳藏器)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論土茯苓曰。健脾。胃。強筋骨。去風溼。利關節。止泄瀉。治拘攣骨痛。惡瘡癰腫。解汞粉銀朱毒。

【清】黃宮繡本草求真論土茯苓曰。土茯苓甘淡氣平。功有等於葶藶。治能除溼消水。去清分濁。然此尤解楊梅瘡毒。蓋楊梅瘡多由峯瘴蕩蕩。與淫穢溼熱之邪。交互而成。其症多屬陽明(胃)厥陰(肝)而兼及他經。蓋相火寄於厥陰。肌肉屬於陽明。故也。如兼少陰。太陽。則發於咽喉。兼太陽。少陽。發於兩角。若用輕粉剗劑。毒氣入竅。經絡

筋骨。莫之能出。變為筋骨掣拘。發為結痛。遂成痼疾。須用此一兩。外用金銀花防風木通木瓜白蘚皮各五分。皂莢子四分。人參當歸各七分。日服三劑。忌飲茶酒肉麵鹽。隔井戒房勞百日。渴飲土茯苓湯。半月方愈。取其溼熱斯除。而濁陰得解矣。

國外學說 英美學說謂土茯苓產中國南方等處。其根可為藥品。為改血藥及發汗藥。服之能令人欲嘔。甚者竟嘔吐。又能感動內腎及肌膚。又能增加身體之堅壯。及補身力。如身瘦或虛軟。可令其肥壯。又如身體因病而有惡質在內。亦能治之。又如第二疔毒與疔毒。服之亦有益。其功用又能治楊梅結毒。久風濕。久膿瘡。頑癬。又日本於享保年間傳入。漢種。日產概為幾萬。真土茯苓。大抵皆中國產。但松村理學博士著植物名彙載土茯苓為百合科植物之山歸來 (Heterosmilax Japonica, (L.) Kunt.) 又荷蘭藥鏡曰。皮黯赭色。裏淡赤色。生根含黏液。味帶甘。乾則其質如粉。氣味淡。能緩和筋

屬毒。且能發汗。利小便。加薩爾沙根。朴窟福烏。薩撒弗刺斯。山牛蒡根等煎湯用。有排毒清血之效。又治梅毒。胃寒傷冷毒之肢節痛。歷節遊走痛。脚痛風。頑癬。乾癬類。經久汚穢之潰瘍。瘰癧。有瘡毒之。水腫。小兒帶帶瘡。肢節痛等。又梅毒諸症。水銀劑外。兼用排毒劑煎湯。日服五六碗。發汗。利小便。能排除其毒。其薩芬排毒劑。係薩爾沙根二叁斯。土茯苓一叁斯。朴窟福烏。葛四錢。甘草六錢。到細。浸水八磅。經六時間。煮至三分之一。加薩撒弗刺斯到三錢。攪合。下火。暫蓋待冷。用毛巾布濾服。此藥治梅毒。泛漫血中。尚未潛結。諸骨者有效。欲抑制朴窟福烏。瑞香皮等辛辣。腐質。多加此藥煎湯用。服量以此藥一叁斯。或一叁斯半。加水五六磅。煮至三分之一。服之。惟此藥性緩弱。非多服不見效。或加於他排毒劑服之佳。

近人學說 張山雷曰。土茯苓自瀨湖綱口始入本草。謂昔人不知用此。近弘治正德間。楊梅瘡盛行。率用輕粉藥取效。毒留筋骨。潰爛終身。乃用此。遂為要藥。時醫無從考證。往往指為革薺。然其根苗迥然不同。但功用頗相近。蓋亦革薺之類。壽頤按此則利溼而兼有補土之功。綱目謂氣味淡平。健脾。胃強筋骨。去風溼。利關節。止洩瀉。治拘攣骨痛。惡瘡癰腫。解汞粉銀朱毒。壽頤按此物蔓生。而根又節節連貫。性又利溼去熱。故能入絡。搜剔溼熱之蘊。其解水銀輕粉毒者。彼以升提收毒上行。而此以滲利下導為務。故為專治楊梅瘡。深入百絡。關節疼痛。甚至腐爛。又毒火上行。咽喉痛潰。一切惡症。雖西學亦以為梅毒唯一良劑。瀨湖綱目言之最詳。但淡而無味。極其平和之物。斷非少數所能奏績。李氏所錄數方。未免言之太易。必不足用。今惟專用大劑。採取鮮根。熬膏長服。并以為日常常用之品。能食至數十百斤。以多為貴。則一味自可治最重最危之症。已得實驗數人。此則未經前人道破之語。患者非用此法。必無第二良藥可救。雖西國專科。研究注射藥水。亦不能及。蓋彼法雖能速效。且無劫

毒內攻之害。但日久亦必復作。終不除根。曾否若多服此藥。永無後患。此則十餘年之經驗者也。人皆謂服此者不可飲茶者。然犯之確能脫髮。必令如牛山之濯濯。亦無他患。

配合應用 治楊梅瘡。用冷飯團四兩。皂角子七個。水煎代茶飲。淺者二七。深者四七。見效。又方冷飯團一兩。五加皮。皂角子。苦參各三錢。金銀花一錢。用好酒煎日一服。(鄧筆峯雜興方)

治小兒楊梅瘡。起於口內。延及遍身。以土草藤末乳汁調服。月餘自愈。(外科發揮方)

治骨節癱瀉。服輕粉致傷脾胃。氣血筋骨疼痛。久而潰爛成癰。連年累月。至於終身成廢疾者。土草藤一兩。有熱加茶連。氣虛加四君子湯。血虛加四物湯。水煎代茶。月餘即安。(薛已外科發揮方)

用過山龍四兩。即硬飯。加四物湯一兩。皂角子七個。川椒四十九粒。燈心七根。水煎日飲。(朱氏集驗方)

治瘰癧潰爛。冷飯團切片。或

爲末。水煎服。或入粥內食之。須多食爲妙。江西所出色白者良。忌鐵器發物。(陸氏積德堂方)

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡肝腎陰虛而無微毒者禁用。忌茗茶。

參攷資料 ①草萬餘根。生海畔山谷。根如蓬。連根。半在土上。皮如茯苓。肉赤味澀。人取以當穀食。不飢。(陳藏器) ②越州一種刺猪苓。莖生。春夏采根。削皮焙乾。彼土人用傳瘡毒。殊效。(蘇頌) ③按陶弘景注石部。萬餘根云。南中平澤有一種藤生。葉如菝葜。根作塊。有節。似菝葜而色赤。味如薯蕷。亦名萬餘根。昔禹行山。乏食。采此充糧。而棄其餘。故有此名。觀陶氏此說。卽今土茯苓也。故今尙有仙遺根。冷飯團之名。亦其遺意。陳藏器本草。草萬餘根。蘇頌。附經。猪苓下。刺猪苓。皆此物也。今皆併之。茯苓。猪苓。山地栗。皆象形也。俗又名過岡龍。謬稱也。(李時珍) ④醫家有搜風解毒湯。治楊梅瘡。不犯輕粉。病深者。月餘。淺者。半月。卽愈。服輕粉藥。筋骨痠痛。癢瘻。不能動履者。

三畫 土

服之亦效。其方用土茯苓一兩。惡莖仁。金銀花。防風。木瓜。木通。白蘇皮。各五分。皂莢子四分。氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。用水二大盞煎飲。一日三服。惟忌飲茶。及牛羊鷄鵝魚肉。燒酒。法麵。房勞。蓋祕方也。(李時珍) ⑤土茯苓。楚蜀山箬中甚多。莖生如蓴。莖有細點。其葉不對。狀頗類大竹葉。而質厚滑。如瑞香葉。長五六寸。其根狀如菝葜。而圓。其大若鷄鴨之子。連綴而生。遠者。尋尺許。近或數寸。其肉軟。可生啖。有赤白二種。入藥用白者良。按中山經云。鼓鐘之山。有草焉。名曰榮草。其葉如初。其本如鷄卵。食之。已風。恐卽此也。昔人不知用此。近時。弘治。正德間。因楊梅瘡盛行。率用輕粉藥。取效。毒留筋骨。潰爛終身。至人用此。遂爲要藥。諸醫無從考證。往往指爲草薺。及菝葜。然其根苗迥然不同。宜參考之。但其功用亦頗相近。蓋亦草薺菝葜之類也。(李時珍) ⑥近有好淫之人。多病楊梅毒瘡。藥用輕粉。愈而復發。久則肢體拘攣。變爲癰漏。延綿歲月。竟致廢篤。惟對土草薺。

三兩。或加皂莢。牽牛。各一錢。水六盞。煎三盞。分三服。不數劑。多瘻。蓋此疾。始由毒氣。干於陽明。而發。加以輕粉。燥烈。久而水衰。肝挾相火。來凌脾土。土屬溼。主肌肉。溼熱。鬱著於肌膜。故發爲癰腫。甚則拘攣。內經所謂溼氣害人。皮肉筋骨是也。土草薺。甘淡而平。能去脾溼。溼去。則營衛從。而筋脈柔。肌肉實。而拘攣癰漏。愈矣。初病服之不效者。火盛而溼未鬱也。此藥長於去溼。不能去熱。病久。則熱衰。氣耗。而溼鬱爲多故也。(汪機)

【土茴香】卽茴香之古籍別名。典見圖經本草。詳「茴香」條。

【土荆芥】 古醫別名 鷄脚草。(和漢藥攷)

外國名詞 Mokkan Soosee Root (英)

基本 屬薔科。藥用其莖莖。形態 土荆芥爲一年生草。或自生於田野。或爲人所栽植。莖高二三尺。葉互生。作披針形。惟上部者。多作卵圓形。末端狹。邊緣有細鋸齒。夏月於葉腋。簇生綠色小花。八月採取莖莖。曬乾。氣味芳香。俱

如樟腦。成分 含有揮發油、樹脂、鹽類等。

效能 用作健胃通經藥。及神經強壯藥。

主治 毒蟲刺傷。搽生藥貼之。用法 一分至二分。

【土荊】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「杜衡」條。

【土馬駿】 命名 本品生土垣。上形同垣衣。而長如馬之駿。故名。

外國名詞 Polytrichum Communis, L. (拉丁) スギク (日本)

基本 係土馬駿科。土馬駿屬。藥用其莖莖。

產地 多在山野陰溼諸地。



形態 土馬駿爲苔草類之常綠隱花植物。多年生草本。高至四五寸。莖細長而直立。葉小。披針形。

五三

三畫 土

寄生。與杉葉相類。子囊方形。有長柄。生於莖頂。其包被子囊之笠。略似白色。密生長毛。謂之蘇帽孢子。綠色囊體之橫斷面呈多角形。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 骨熱。煩熱。毒腫。鼻衄。
現代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論土馬錢曰。沐髮令長。黑。通大小便。

【土骨皮】 古籍別名 樹皮。櫟。檫木皮。赤龍皮。皂斗皮。肉桂皮。(和漢藥考)

基本 屬殼斗科。為櫟樹之幹皮。

形態 櫟為落葉喬木。高達二三丈。酷似栗樹。葉作披針形。邊緣有鋸齒。但新葉則作倒卵圓形。有茸毛。花為單性。雌雄同株。果實為堅果。包於碗狀殼斗內。其幹皮為扁平之粗皮。厚約三四分。外面蒼白色。縱橫有深裂痕。內面呈暗褐色。味甘。有收斂性。

性質 苦。溫。無毒。
效能 用作疝氣及痢疾藥。
主治 除蟲及瀉。止赤白痢腸。

風下血。洗惡瘡。

用量 八分至錢半。

【土參】 即粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粉沙參」條。

【土常山】 古籍別名 蜜香草。(植物學大辭典) (圖經本草) 甘茶。

外國名詞 Hydrangea

Thunbergii, Siob. (拉丁) アマチャノキ アマチャ(日本)

基本 係虎耳科。八仙花屬。藥用土常山之葉。

產地 生山野間。

形態 土常山為生於諸國深山崖上之落葉灌木。高二三尺。春季生新葉。盛夏繁茂。葉對生。長三四寸。作卵圓形。末端帶紫色。邊緣有鋸齒。夏月每梢叢生白碧紫紅諸色花。稍作繖形。外側花大。萼亦大。中心花小。大二三分。其嫩葉可供食與藥用。



土常山

性質 甘。無毒。

成分 對於土常山之甘味質。

丹波藥學博士曾研究其成分。名之為歐萬開精(Hydranganin)。

主治 代茶飲。益人。多食寒氣。

參攷資料 ①天台山出一種草。名土常山。苗葉極甘。人用為飲。甘味如蜜。又名蜜香草(蘇頌)。

土常山之嫩葉。揉之。榨其綠汁。曬乾貯藏。每以加湯中。供飲料。謂之甘茶。(植物學大辭典)

【土鼻】 即鴉之古籍別名。典見爾雅。詳「鴉」條。

【土犀角】 即雪裏青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雪裏青」條。

【土細辛】 即杜衡之處方用名。詳「杜衡」條。

【土連】 即南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「南連」條。

【土部】 即杜父魚之俗名。詳「杜父魚」條。

【土肉】 即杜衡之古籍別名。典見爾雅。詳「杜衡」條。

【土硝】 基本 本品係鱗鱗土。及鱗鱗之藥。

主治 小兒丹毒。

五四

【土筋】 即地筋之古籍別名。典見別錄。詳「地筋」條。

【土菌】 命名 地生者為菌。木生者為朮。本品者地而生。故名。

古籍別名 杜蕈。(菌譜)地蕈。(綱目拾遺)蕈子(食物本草)地雞(爾雅)蕈頭。中蘆首(綱目)

形態 土菌為菜類菌屬之一種。感受溼熱鬱蒸之氣以生。其形如種如傘。又如帽狀。可供藥用。採取 須採於生牛糞上。色黑者良。

性質 甘。寒。有毒。

主治 瘡疥。燒灰傳之。

【土草薺】 即土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳「土茯苓」條。

【土蛙】 即蝦蟆之原名。詳「蝦蟆」條。

【土酥】 即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳「萊菔」條。

【土蘆子】 即萊菔子之古籍別名。典見爾雅。詳「萊菔子」條。

【土黃】 命名 本品係以磁石。諸物。合理土坑而成者。故名。

主治 小兒丹毒。

製法 用砒石二兩。木鱉子仁、巴豆仁各半兩。礱砂二錢爲末。用木鱉子油、石麟油和成一塊。用油裹埋在土坑內。七七四十九日。取出。勞作小塊。瓷器收貯用。

性質 辛。酸。熱。有毒。
主治 枯癆。瘵。痔。乳食。癆。瘵。并諸瘡。惡肉。

參攷資料 土黃能制雄黃。(獨孤酒)

【土窟春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【土當歸】 命名 本品爲當歸之一類。故名。

處方用名 杜當歸。土當歸。根。古籍別名 茶考(進賢)水白芷。(植物學大辭典)

外國名詞 *Arilia cardata*, *Thunb.* (拉丁)ウツ(日本)

基本 係五加科。爲木質。藥用土當歸之根。

產地 凡河南密縣及江淮諸山野。咸有出。

形態 土當歸爲山草類之多。年生草本。高至五六尺。葉大二回羽狀複葉。其小葉橢圓形而尖。花

小白色。作繖形花序。花瓣五。雄蕊五。雌蕊亦五。互相結合。有五花柱。果實紫黑色。其嫩莖葉可供食。其根可充藥用。



歸 當 土

性質 辛。溫。無毒。

主治 除風和血。煎酒服之。因拘手足。同荊芥。葱白煎湯淋洗之。

參攷資料 ①近時江淮山中

出一種土當歸。長近尺許。白肉黑皮。氣亦芳香。如白芷。故謂之「水白芷」。人用以充獨活。解散或亦用之。不可不辨也。(綱目) ②土當歸江西湖南山中多有之。惟江湖產者花紫。(植物圖考) ③土當歸其莖對面有線楞。葉似芹菜而硬。邊有細鋸齒刺。又似蒼朮葉而大。每三葉攢生一處。開黃花。根似前胡根。又似胡蘿蔔根。其葉味甜。採葉。燻熱水浸。成黃色。換水淘洗淨。油鹽調食。可以救飢。今人遇當歸

缺時。多以此藥代之。觀此則土當歸與當歸同是一類二種也。其根皮黑。亦有白者。肆中所售白當歸。疑卽此也。(救荒本草)

【土當歸根】卽土當歸之處方用名。詳「土當歸」條。

【土落草】 產地 出嶺南山谷。基本 爲雜草類之

自生草本。其葉細長。可供藥用。性質 甘。溫。無毒。

主治 腹冷氣痛。絞解。酒煎服。亦可搗汁濕服。

【土蛹】 卽乳蟲之古籍別名。典見廣雅。詳「乳蟲」條。卽草石蠶之古籍別名。典見餘冬錄。詳「草石蠶」條。

命名 此蜂穴地作房。故名。

古籍別名 蜚零。蟻蜂。(本經) 馬蜂。(綱目)

外國名詞 *Diacolia vicia*, *Frans. Sch.* (拉丁)

主治 蜘蛛咬傷。燒末。和油傅之。

參攷資料 ①土蜂生武都山谷。(別錄) ②土蜂穴居作房。赤黑

色。最大。螫人至死。亦能釀蜜。其子亦大而白。(陳藏器) ③土蜂能食蜘蛛。取其相伏。故能治其咬傷也。(陳藏器) ④郭璞註爾雅云。今江東呼大蜂在地中作房者爲土蜂。卽馬蜂也。荆巴間呼爲蠶蜂。(蘇頌) ⑤土蜂子江東人亦啖之。又有木蜂似土蜂。人亦食其子。然則蜜蜂。土蜂。木蜂。黃蜂子。俱可食。大抵蜂類同科。其功效不相遠矣。(蘇頌)

性質 甘。平。有毒。

主治 癰腫。(本經)

【土蜂子】 命名 此蜂穴地作房。故名。

團代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論土蜂子曰。功同蜜蜂子。【宋】日華諸家本草論土蜂子曰。利大小便。治婦人帶下。【明】李時珍本草綱目論土蜂子曰。酒浸傅面。令人悅白。

主治 癰腫。不消。爲之。不入服食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論土蜂子曰。療疔腫瘡毒。

【土蜂房】 主治 癰腫。不消。爲之。不入服食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論土蜂房曰。療疔腫瘡毒。

【土蜂窠】 命名 本品穴地爲窠之細腰蜂也故名。

古醫別名 蟻窠(綱目)

性質 甘平無毒。

主治 癩風頭。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論土蜂窠曰。醋調塗腫毒及蜘蛛咬。宋寇宗奭本草衍義論土蜂窠曰。醋調塗蜂毒。

【土鼓腹】 卽常春藤之古籍別名。典見綱目拾遺詳常春藤條。

【土漆】 形態 土漆爲雜木類之一種。其皮如胡桃皮。黏着人手。卽刻發腫。可供藥用。

主治 金瘡出血搗傅卽止。

【土瑪瑙】 卽瑪瑙之產於山東舊沂州府境者。功用與尋常瑪瑙同。參見瑪瑙條。

【土精】 卽人參之古籍別名。典見別錄。詳人參條。卽牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳牛黃條。

【土蜘蛛】 卽蟻蟻之古籍別名。典見綱目。詳蟻蟻條。

【土蜜】 蜂蜜之生於土中色青白味鹹者。參見蜂蜜條。

【土撥鼠】 原名 鼯鼠。

花。飲膳正要。

基本 係鼠屬。藥用土撥鼠之肉。

形態 土撥鼠穴土爲巢。形如類。皮可爲裘。溼不能透。

產地 原生西番山澤間。凡東三省蒙古等處皆有出。

性質 甘平無毒。

主治 野雞瘡。

參攷資料 夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。似近此也。陳藏器按飲膳正要云。雖肥而食之無油。味短。多食難化。微動風。李時珍。

【土撥鼠頭骨】 主治 小兒夜臥不安。懸之枕邊卽安。

【土槿皮】 爲江浙諸省木槿樹根之皮。其功用與川產者同。惟味薄氣劣。效亦甚遜。可參考川槿皮條。

【土漿】 卽地漿之古籍別名。典見綱目。詳地漿條。

【土漿水】 卽地漿之處方用名。詳地漿條。

【土蟻】 卽蟻之小而色灰者。典見綱目拾遺。詳蟻條。

【土蕪荑】 卽蕪荑之古籍別名。典見食療本草。詳蕪荑條。

【土蝸】 卽蝸之古籍別名。典見別錄。詳蝸條。

【土實汁】 卽益母草之古籍別名。典見綱目。詳益母草條。

【土駒】 卽蟻之古籍別名。典見和漢藥考。詳蟻條。

【土齒】 基本 爲雜草類之自生草本。狀如馬牙。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 輕身益氣延年。

【土壘】 基本 係石灰窖中流結之土渣。

形態 色緒而質輕。

主治 腫癢。頭瘡。痰核。疔腫。如指。

【土燕】 卽石燕之古籍別名。典見綱目。詳石燕條。

【土鏡鐵】 鐵之堅黑宜作武器者。

【土鷓】 卽鷓飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳鷓飛條。

【土鴨】 卽鴨之大而有背脊者之古籍別名。典見本草集註。詳鴨條。

【土龍】 卽蚯蚓之古籍別名。典見別錄。詳蚯蚓條。卽鼈之古籍別名。典見綱目。詳鼈條。

【土蠶】 卽乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳乳藤條。

【土橫】 卽蟻之古籍別名。典見綱目。詳蟻條。

【土蠶】 卽蟻之古籍別名。典見綱目。詳蟻條。

【土蠶】 卽蟻之古籍別名。典見綱目。詳蟻條。

【土藜蘆】 古醫別名 千葉水。形態 土藜蘆爲水仙之一種。花有黃白色及紅色。其根可供藥用。

採取 以花黃白者入藥用良。紅者不可服。

主治 吐一切風症。研末。合蓮肉散搗鼻中。搗葱消毒。

【土蠶】 卽蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳蚯蚓條。

【土語】 卽山藥之古籍別名。典見綱目。詳山藥條。

國經本草。詳「山藥」條。

【土藿香】即藿香之處方用名。詳「藿香」條。

【土藤子】即落花生之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「落花生」條。

【土交】即杜父魚之俗名。詳「杜父魚」條。

【土磨】即磨之產於東南省者。功與磨同。而力較遜。參見「磨音」條。

【土蠶】即蠶蟲之古籍別名。與見別錄。詳「蠶蟲」條。

【土蠶蟲】即蠶蟲之處方用名。詳「蠶蟲」條。

【夕旬】即夏枯草之古籍別名。與見本經。詳「夏枯草」條。

【夕利】即刺蒺藜之處方用名。詳「刺蒺藜」條。

【大丁草】即蒲公英之古籍別名。與見庚庚辛玉册。詳「蒲公英」條。

【大力子】即牛蒡子之處方用名。詳「牛蒡子」條。

【大士粉】即觀音粉之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「觀音粉」條。

【大山鹽】即鹽參之古籍別名。與見黨參新研究。詳「黨參」條。

【大川芎】即川芎之處方用名。詳

【川芎】條。

【大元參】即元參之處方用名。詳「元參」條。

【大木皮】產地 產施州。性質 苦澀。溫無毒。

主治 一切熱毒氣。參攷資料 大木皮土人與苦栲皮根栲皮三皮刮洗淨。焙乾等分。搗碎。酒服之。(蘇頌)

【大毛蓼】即蓼草之日本名詞。詳「蓼草」條。

【大札】即益母草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「益母草」條。

【大母藥】產地 出川邊雪山之石塊間。

形態 大母藥為石草類之一種。有雌雄二種。出必雙苗。採得可供藥用。

主治 補元氣。益髓脉。功同人參。

【大生地】原名 乾地黃。

命名 本品生者以水浸驗之。浮者名天黃。半浮半沉者名人黃。沉下者名地黃。此用其陰乾者。故名。

處方用名 頂生地。生地黃。原

生地。炒生地。生地炭。

古籍別名 芎。芎地髓。(本經)

陽精。深深奶。婆婆奶。牛奶子。選元大品。砂活芭地精。(和漢藥考)

學名 Rohmannia Lutes, Maxim

基本 屬玄參科。藥用地黃之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。地黃產河南懷慶府沁陽武陟溫孟四縣。八九月出。以溫孟二縣出產為多。製熟地亦以溫孟二縣出者為最良。

形態 地黃生時。形如廣東之蕃薯。葉藤亦相似。莖高五六寸。葉厚而互生。作長橢圓形。邊緣有鋸齒。面有皺紋。毛茸花作穗狀。花序排列。有黃白色。或帶紫色。而為唇形花冠。其根內部色黃。乾則變黑。但有根莖細長。皮薄肉厚。皮部皺紋較密者。亦有根莖肥大。皮厚。皺紋並不致密。而有疣瘡者。此即和漢藥考之所謂有白夫赤夫耳。

種植 古時種子。今時種根。以根節多者。寸斷而蒔之。園圃田野。恒有栽種。其栽培要點略述如下。

①地黃種類因播種之期節有早晚。別為夏地與冬地二種。夏地又曰火地。火地種之品質。較冬地為劣。且其貯藏又難。故其價亦廉。冬地種之品質。較火地為堅實。而其貯藏亦易。價亦較貴。故欲栽培地黃者。宜取四川之冬地為佳。次之則取浙江之冬地。至於湖南湖北之種子。無論火地冬地。決不可取而栽培之也。②適地及氣候。栽培地黃之土地。以溫帶之砂質壤土為最佳。黏質壤土次之。其餘重黏土。瘠土及壟土等。皆不及也。氣候以溫和而略帶寒氣者為適。若溫暖之氣候。及過寒之氣候。則不適其生長。③整地作畦。先擇定砂質之壤土。至冬季耕其土塊。使之細碎。至翌年春。乃作高畦。畦闊約三尺。至三尺五寸。長短不拘。作畦既畢。乃用點播器於畦上。點穴。株與株距離相隔約四寸或五寸。整地既竣。作畦既畢。乃可擇時播種也。惟栽培地黃。當以先施基肥一次為要。故於作畦既畢之後。或於播種前二三日。施稀薄之人糞尿一次。且不可施於日光猛烈之時。當

以上午日陰時起之為適當也。⑤
 播種期節。播種地黃之時期。不必
 過早。亦不可過遲。有一定之時期
 在。若早播亦不能早為發芽。必至
 一定不易之時期至。始能發芽。若
 遲播則經過其一定發芽之時期。
 遂不能發芽也。地黃播種。分為二
 期。若播火地。則在清明後二三日。
 若播冬地。則在立秋前二三日。皆
 栽培地黃一定不易之時期也。⑥
 播種。播種方法甚難。最當留意。法
 先將地黃洗潔後。用剪刀自根而
 上。每隔二寸五分處剪斷。置之於
 畦上。斜插畦間。不可直放。且當其
 插時。切不可倒插。宜使根部向下。
 即無根之地黃。亦當依有根之插
 法。若倒插則不能發芽也。⑦ 施肥
 未播以前。先施基肥一次。播後六
 七日。再施以補肥一次。又過二十
 餘日。當再施肥一次如舊。而後每
 過除草以後。亦當施以肥料。以助
 其生長之不足。施肥次數。自種迄
 收。至少約可六七次。若再減其次
 數。則不可矣。但施肥過多。徒令莖
 葉繁茂。亦無益於根部也。⑧ 除草
 播種地黃之土地。見有雜草叢生

時即宜除去。不可遺留。若留而不
 除去。則必有妨於地黃之生長也。
 且削除雜草之際。最當留意。不可
 過深。過深。則根部有割斷之慮。若
 遇有深入土中之雜草。當用手拔
 之。不可用器削之。削草次數。大抵
 火地多於冬地。見有草生。即可削
 除。不必拘定。削除時間。宜在晴天
 早上。不可於午間削除。以免旱魃
 之患。且早上除之。至晝間日光猛
 烈時。雜草即乾枯而不復生。⑨ 中
 耕。中耕者。恐其栽種之土地。過於
 堅實。而妨地黃生長。行之而使土
 地鬆鬆。生長可以自由也。中耕之
 時。當留意者。有下述三項。(一)不
 可過深。恐傷其根部。且易遭旱魃
 之患。(二)不可過淺。徒耗多時勞
 力。於地黃之根部。無甚利益。(三)
 中耕於二三寸處為適度。是可以
 增進地黃之生長。且其成熟。亦因
 之而早。火地自清明後播者。六月
 底可收穫。冬地立秋前播者。十二
 月中亦可收穫。法將土地掘鬆後。
 用手連其莖葉拔之。少附以泥。用
 草束之。置者曝日中數小時。已足
 若供種子用者。則曝日中一日而

後藏之可也。

採取 二月八月採根陰乾。若
 供售買者。地黃採取時。少和以泥。
 用草束之。曝日中數小時。已足。若
 供種子以備栽植者。則曝日中一
 日而後藏之。其法擇高燥之泥地。
 下稍積糞。上置地黃一層。不可過
 密。恐其腐爛。再鋪稍糞於地黃上。
 糞上復置地黃如舊。如是三層。不
 可過高。恐受上層壓力。以致下層
 腐爛也。

製法 陳藏器曰。乾地黃本經
 不言生乾及蒸乾。方家所用二物
 各別。蒸乾即溫補。生乾即平宜。當
 依此法用。李時珍曰。本經所謂乾
 地黃者。即生地黃之乾者也。其法
 取地黃一百斤。擇肥者六十斤。洗
 淨。曬令發皺。以揀下者洗淨。木臼
 中搗絞汁。盡投酒。更搗取汁。并前
 地黃。日中曬乾。或火焙乾用。

性實 甘寒無毒。
 效能 補真陰。涼血熱。用作滋
 養強壯藥。
 主治 傷中逐血癰。填骨髓。長
 肌肉。作湯除寒熱積聚。除癰。療折
 跌。鬆筋。久服。輕身不老。(本經)主

男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下
 血。破惡血。消血。利大小腸。去胃中
 宿食。使力漸絕。補五臟。內傷不足。
 通血脈。益氣力。利耳目。(別錄)

張仲景之發明 地黃一味。經
 張仲景之實驗。認為主治血證。及
 水病。茲考徵如下。① 八味丸證曰。
 小腹不仁。又曰小便不利。(用地
 黃八兩) ② 芍藥膠艾湯證曰。漏
 下。又曰下血。(地黃六兩) ③ 三物
 黃芩湯證曰。在草摩自發露。得風。
 四肢苦煩熱。(地黃四兩) 按上述
 三方。皆主治血及水。不及其他三
 方。以地黃為君藥。而二方。皆血證。
 一方。皆小便不利。膠艾湯方中。除
 地黃之外。有阿膠當歸。芍藥。均是
 治血藥也。三物黃芩湯。去地黃。則
 其餘無治血藥品也。由是觀之。古
 人用地黃。並治血證。水病。明矣。且
 施治之法。不別血之與水。亦明矣。
 歷代記載攷證 【唐】甄權藥
 性本草論乾地黃曰。產後腹痛。久
 服。變白延年。【宋】大明諸家本草
 論乾地黃曰。助心膽氣。強筋骨。長
 志。安魂定魄。治驚悸勞劣。心肝損
 吐血鼻衄。婦人崩中血暈。【金】張

元素珍珠論。乾地黃曰。涼血生血。補胃水真陰。除皮膚燥。去諸溼熱。【元】王好古湯液本草論。乾地黃曰。主心病。掌中熱。脾氣痿。嘔。嗜臥。足下熱而痛。【明】李時珍本草綱目論。乾地黃曰。治齒痛。唾血。【明】穆希雍本草經疏論。乾地黃曰。乾地黃。味甘氣寒。而無毒。別錄又云。苦者。以其發入心脾也。此乃補腎家之要藥。益陰血之上品。本經主折跌絕筋。傷中逐血。瘰者。肝藏血而主筋。補肝則榮血。調則傷中自去。瘰者。血分之病。因虛而風寒。溼邪客之。故筋拘攣而痛。養血和肝。寧必瘰矣。作湯除寒。熱積聚。除瘰者。血和則結散。故諸證自除也。其曰填骨髓。長肌肉。主男子五勞七傷者。地黃為至陰之藥。正補腎水真陰。而益血。血王則髓滿。陰足則肌肉自長。五勞七傷。皆陰虛內熱。真陰不足之候。甘寒能除內熱。而益精髓。故勞傷自除也。女子傷中。胞漏下血者。陰虛則火熾。而血熱。火能銷物。造化自然之道也。涼血益血。則胞漏自止矣。下血者。血熱也。涼血則下血自愈。

榮血滯則為惡血。生地黃能行血。故破惡血。瀉血者。腎與小腸熱也。益陰涼血。則瀉血自止。二便自利矣。胃為足陽明胃家。溼熱盛。則食不消。生地黃能瀉脾胃中溼熱。溼熱去而脾胃安。則宿食自去。飽而努力。則腸胃筋脈。有絕傷之患。形屬血。故行血益血。則諸傷自理矣。五臟成屬陰。陰即精血。補精血。則五臟內傷不足自愈矣。通血脈。益氣力。利耳目者。皆臟安之驗也。又主婦人崩中。血不止。及產後血上。薄心悶絕。傷身胎動。下血。胎不落。墮墜。隨折。瘀血留血。以血吐血。生者。搗汁飲之。皆涼血行血之功也。久服輕身不老。則益陰。填髓。補五臟之能事畢矣。又按日華子云。助心膽氣。強筋骨。長志。安魂定魄。除驚悸者。皆為五臟六腑之首。行春升之氣。故十一臟。皆取決於膽。為中正之官。地黃入手足少陰。亦入足厥陰。心與肝為子母之臟。膽為肝之腑。肝主筋。腎主骨。腎藏精。與志。肝藏魂。肺藏魄。心膽二經。虛則病驚悸。生地黃為手少陰之要藥。能涼心助膽。補肝。心涼則熱不薄。

肺。肝肺清寧。則魂魄自定。膽氣壯。則驚自除。肝腎足。則筋骨自強。心腎交濟。則志自長矣。【清】黃宮繡本草求真論。乾地黃曰。乾地黃。味甘。性陰而寒。考諸長洲張璐。謂其心紫入心。中黃入脾。皮黑歸腎。味厚氣薄。內專涼血滋陰。外潤皮府肌澤。病人虛而有熱者。宜戴元禮曰。陰微陽盛。相火熾強。來乘陰位。日漸煎熱。陰虛火旺之症。宜地黃以滋陰退陽。合人參。茯苓。石靈。名玃。玉膏。治虛勞咳嗽吐血。合天麥。二冬。熟地。人參。名固本丸。治老人精血枯槁。於固本丸中加枸杞。煎膏。名集靈膏。治虛勞喘咳。乏力。其瓊玉膏。須用生者搗汁。桑火熬膏。散中寓止。與乾者無異。固本丸。集靈膏。並用乾者。而集靈變丸。作膏。輕之。固本差勝。易簡方曰。男子多陰虛。宜熟地黃。女子多血熱。宜生地黃。虞搏云。生地黃。涼血。而胃氣弱者。恐妨食。熟地黃。補血。而痰飲多者。恐泥膈。或言生地黃。酒炒。則不妨胃。熟地黃。薑製。則不泥膈。然須詳病人元氣。病氣之淺深。而用之。若產後惡食。泄瀉。小便結。

痛。虛勞。脾胃薄弱。大便不實。胸膈多痰。氣道不利。升降窒塞者。咸須遠之。所產者。尚於涼血潤燥。病人元氣本虧。因熱邪閉結。而舌乾。焦黑。大小便秘。不勝攻下者。用此於清熱藥中。通其秘結最佳。以其有潤燥之功。而無滋潤之患也。愚按地黃本經。雖列上品。而實性寒陰。柔。與邪惡不異。譬之小人。內藏險。外示優容。是以舉世名家。靡不稱為滋陰上品。止血神丹。雖或用非其宜。得以稍清旺氣。服之。仍得暫安。非若人參之性。稟陽明象。類君子。有過必知。是以師家。斂手不敢用。病家。緘口不敢嘗。故甯用地黃。門冬。陰柔最甚之屬。以至於死。不覺。張璐所論如此。然非深究病情。通達世故。洞悉藥品。亦安能討論如斯乎。生於江浙者。陽氣力微。生於北方者。純陰力大。生於懷慶。菊花心者。良。酒製。則上行外行。姜製。則不泥膈。【清】張隱菴本草崇原論。乾地黃曰。地黃色黃。味甘性寒。主治傷中者。味甘質潤。補中焦之精汁也。血薄。猶脈痺。逐血。瘰者。橫紋似絡。通周身之經絡也。得少。

陰之水之精。故與骨髓。得太陰中土之精。故長肌肉。地黃性能下行。故字從下。藉湯飲則上行外達。故曰作湯。除寒熱積聚。除積聚上行也。除寒熱外達也。又曰除痺。言不但逐血痺。更除皮肉筋骨之痺也。除皮肉筋骨之痺。則折跌絕筋。亦可療矣。久服則精氣充足。故輕身不老。生者尤良。謂生時多津汁而尤良。惜不能久貯遠市也。後人蒸熱合丸。始有生地熱地之分。熱地黃。功力與生地黃相等。寒性稍減。蒸熱則黑。故補腎相宜。愚按地黃入土最深。性惟下行。作湯則助其上達。日華子有天黃地黃人黃之分。謬矣。〔清〕葉天士本草經解論。乾地黃曰。地黃氣寒。稟天冬寒之水氣。入足少陰腎經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味重濁陰也。陰者中之守也。傷中者守中真陰傷也。地黃甘寒。所以主之。痺者血虛不運。而風寒溼澆之。所以麻木也。地黃味甘益脾。脾血潤則運動不滯。氣寒益腎。腎氣充則開合如式。血和邪解而痺痿矣。腎主骨。氣寒益腎。則水足而骨

髓充。脾主肌肉。味甘潤脾。則土滋而肌肉豐也。作湯除寒熱積聚者。湯者澀也。或寒或熱之積聚。湯能澀之也。蓋味甘可以緩急。性滑可以去着也。其除痺者。血和則結者散。陰潤則閉者通。皆補脾之功也。其療折跌絕筋者。筋雖屬肝。而養筋者脾血也。味甘益脾。脾血充足。則筋得養而自續也。久服氣寒益腎。腎氣充所以身輕。味甘益脾。脾血旺則華面。所以不老。且先後二天交接。元氣與發氣俱納也。又曰除痺者。言不但除血痺。更除皮肉筋骨之痺也。除皮肉筋骨之痺。則折跌絕筋亦可療也。生者尤良。謂其本性俱在也。〔清〕徐洄溪本草經百種錄論乾地黃曰。地黃色與質相類。血故入人身。則借於補血。血補則陰氣得和。而無枯燥拘牽之疾矣。古方只有乾地黃。生地黃。從無用熟地黃者。熟地黃乃唐以後製法。以之加入溫補腎經藥中。頗為得宜。若於湯劑。及養血涼血等方。甚屬不合。蓋地黃取其性涼而滑利流通。熱則膩滯不涼。全失其本性矣。又仲景傷寒一百十三

方。惟復脈用地黃。蓋傷寒之病。邪從外入。最忌滋滯。即使補。必兼疎拓之性者。方可入劑。否則邪氣向裏。必有遺害。今人一見所現之證。稍涉虛象。便以六味湯為常用之品。殺人如麻。可勝長嘆。〔清〕鄒澍本經疏證論地黃曰。地黃本經主治首舉傷中。逐血。填骨髓。長肌肉。續絕筋。夫痺者。閉而不通也。隨其血之不通而為病。如在目則赤。在齒則痛。在肉則癢。腫。在心則昏煩。在肺則欬血。壅遏而為身熱。枯耗而為燥。瀉。瀉。汎溢而為吐衄。崩漏。血癆。頗廣。當各以類推之。逐者。俾其流通者也。性惟潤下。功力到時。得二便通利。以為外候。千金方黑膏。用治熱積所成之斑。肘後方并雞蘇汁。用治寒積所成之疝。咸從血癆所生。耳血中有癆。則骨髓不滿。肌肉不長。筋脈斷絕。均謂傷中。若填滿。若生長。若接續。皆克成血液之流通者也。地黃之用。在本經即首歸其功於血。夫血本天一之真陰。資中五之土氣。以生者。也。夫萬物莫不資生於土。惟此味之取精於土者。最專且酷。故

種植之地。土便焦苦。十年後。方得轉甜。得謂此味不專主中焦之營氣哉。〔乘雅〕云。種地黃一年。其土便苦。次年止。可種牛膝。再二年。可種山藥。足十年。土味方轉甜。始可復種地黃。否則味苦形瘦。不堪入藥矣。夫既資沖氣以化生。獨以涼血歸之者。何。蓋脾統血。其為藏也。體柔用升。升為陽。血屬陰。設其所統之陰不繼。不足以柔其體。而其用之升者。自升。於是陽益盛。陰益虛。則至其脾為約。經曰。至陽盛。則地氣不足。此之謂也。於斯時也。不以得地氣之最精且專者。裕其所統。又何以柔其體。而善其後耶。第所謂傷中者。義又云何。夫中者。陰陽之會也。無陽則陰何由而升。無陰則陽無所從而降。升降之樞。生氣生血之源也。血乃真陰之化。陽能化。則血何自而癸。陰能固。則血無緣而漏。故凡病於陰不濟。陽氣不能化血者。用地黃則為宜。劑。即本經所謂逐血癆。除寒熱積聚是也。凡病於陰不勝陽。陽迫血而陰不固者。用地黃。又為攝劑。即別錄所謂治胞瀉。下血。崩中。血

不止是也。方書治虛勞有云。實熱實極者。均用地黃。既云虛勞矣。又何以云實也。經曰。精氣奪則虛。邪氣盛則實。因精氣之虛。以致邪氣之實。因邪氣之實。益致精氣之虛。故用地黃。消其實。在邪者。即救其虛。在精者。知補勞劣之味。乃在其後。是不可悟。塚骨。長肌肉。痠跌折。絕筋之義矣。

近人學說。閻立陞曰。乾地黃味甘苦。氣寒。薄味厚。沉而降。陰也。無毒。惡貝母。畏蕪荑。忌銅鐵器。葱蒜蘿蔔諸血。稟仲冬之氣。以生。象得地之和氣。黃者土之正色也。為補腎家之要藥。益陰血之神品。然此特總言其要耳。而茲之乾地黃。不惟與熟地有別。而與生地亦別。所云生者。乃本地新掘鮮者。別錄主治婦人崩中血不止。及產後血上。薄心。悶絕傷身。胎動下血。胎不落。墮墜。臨折。瘀血。留血。鼻衄。吐血。皆搗汁飲之。可立取神驗。然江南已不可得。則所云生地黃。即乾地黃也。乾者入手少陰心經。滋陰退陽。亦涼血而生血。本經主折。跌。絕筋。傷中。逐血。痺。調血。養血之

效也。作湯除寒熱積聚。除痺者血和則結散。故諸症自除也。女子傷中。胞漏下血者。陰虛則火熾而血熱也。惡血者。榮血之滯也。溺血及二便不利者。腎與小腸之熱也。乾地黃能涼血。則益血而又能行血。故悉主之。其曰去胃中宿食。飽力絕傷者。胃家之溼熱盛。則食不消。乾地黃能瀉脾胃中溼熱。溼熱去則脾胃自安。宿食自去。飽而努力。則腸胃筋脈有絕傷之患。形屬血益血。則傷自理矣。日華子又云。助心膽氣。強筋骨。長志。安魂定魄。除驚悸者。地黃為手少陰之要藥。能涼心助膽。補肝。心涼則熱不薄。肺肝肺清寧。則魂魄自定。膽自壯。驚自除。肝腎足。則筋骨自強。心腎交濟。則志自長矣。吾嘗深究於此。而凡遇心火血熱。脾土溼熱。諸經血熱。骨蒸勞熱。驚悸怔忡。五心煩熱。及目赤。腹疼。血溢。吐衄。溺血。便血。為陽虛陰微。虛火上炎之症。與夫婦人月經閉絕。月事先期。產後血上攻心。妊娠下血。漏胎。崩中。下血不止。病人虛而多熱。脈洪實者。一切蟲咬心痛。大便結。瘀血。癰疽

等多加用之。並得功效。縱不能立取奇驗。以不得生者。絞汁用耳。本經原云。生者尤良。復何疑乎。○張山雷曰。地黃味甘色黃。最合土德。故能補養中土。為滋養之上品。本經主折。絕筋者。即補血補傷之義也。主傷中者。即其補陰補血之功。氣味和平。凡臟腑之不足。無不可得其滋養。別錄之主男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下血。補五臟內傷不足。皆即此旨。逐血痺者。則血不足而痺者不行。補養充足。自然流動洋溢。而痺者行矣。煩骨。髓。長肌肉。則充其補益之意。而極旨之別錄之所稱通血脈。益氣力。利耳目。又即此義之引申耳。作湯除寒熱積聚。除痺。則言其入煎劑。尤為流動活潑。所以積聚痺着皆除。此以補養為磨積之計。乃正氣旺而病自退。非謂地黃滋補之藥。竟能消積通痺也。蓋氣血不充。津液不布。則似此堅頑固結之病。必無可愈之理。所以積聚癥瘕痞痞結等證。均宜且補且行。斟酌進退。緩以圖之。自可徐收效果。若僅讀張子和書。止知攻破為長。不顧正氣。日

事峻削。甚至愈攻愈堅。糾結不解。以速其危者。其亦有昧於此而少知自反乎。生者尤良。則採取鮮新。其力尤足耳。別錄又謂去胃中宿食。亦養其心而消化力充。可以運行宿滯。必非謂滋潤厚膩之質。竟有消尅之功。此宜看得靈活。不可泥煞字面。其治溺血。利大小腸者。甘寒清熱。又能養陰。固通利二府。熱結之正治也。惟破惡血一層。似乎寒涼黏滯性質。必無破瘀導滯之功。然凡跌仆。敲撲。肌肉血瘀。發腫青紫者。以鮮生地搗爛厚敷。自能去瘀消腫。活血定痛。知地黃去瘀自有天然作用。不可誤認其膩滯物質。而遂疑古人之言。惟唐宋以降。破血逐瘀諸方。已無復採用。及此者。蓋亦嫌其厚膩有餘。終非攻堅陷陣之將。此讀古書者。所以不可執而不化也。別錄又有飽力。斷絕四字。該不可通。疑有訛誤。刪之。別錄又有生地黃一條。云大寒。則以新採得者而言。故結以皆搗飲之四字。謂搗飲其自然汁也。蓋鮮者得土氣至陰之性。尤為純粹。未漓。故其氣大寒。較之乾者已輕

日曝。自有不同。其治鼻衄吐血者。指氣火升騰。挾血上逆。妄行洶湧。而言如大吐大衄之屬於氣火有餘者。是宜以大寒直折其逆上之勢。而下血瀉血之實症火症。亦同此例。若去血已多。火欲已滅。即非所宜。而所失太多。氣營兩虧者。更無恣用大寒之理。又謂主婦人崩中血不止。則血崩一症。多屬衝任無權。下元失其固攝之力。虛症極多。實火絕少。必無純事寒涼。可以止崩之法。蓋諸失血之宜於甘寒清火者。惟陰虛火動。邪熱熾張。而心氣未衰。脈洪神旺之時。可以寒涼瀉。先去其憑依之勢。一至所失不少。縱有餘火未熄。總之形神已餒。脈象已虛。即非一味清涼。所可奏效。若更形消色奪。氣怯神疲。則虛憊之餘。固攝扶元。猶懼不逮。又安可寒涼無忌。更戕其心。況乎大寒止血。更必有血凝積滯之害。雖曰地黃散瘀。是其特長。或尚不至積寒生瘀。然大寒之性。必非通治諸般失血。無往不宜。別錄所言。似嫌呆板。必不可泥。乃更以主治產後血上。薄心悶絕。則氣逆上沖。

法宜降逆逐瘀。亦非甘寒所宜。縱曰此物果能破瘀。而大寒二字。終非新產通用之品。亦當存疑。未敢輕信。又主胎動下血。則症與崩中近是。亦難泛用。又接以胎不落三字。則指胎元已壞。欲墮未墮者。言之以為破血下胎之用。蓋古人固以鮮地為逐瘀破導品也。又主墮胎。斃折。瘀血留血。是亦古人用以破瘀之常。北齊徐氏之才。亦有鮮生地破血之說。頃謂傷瘀發腫。發熱。用以外治。清熱定痛。散瘀之功。固不可沒。若內傷有瘀。則恐非大寒之性。所能破導者也。

辨偽 鄭有巖曰。地黃以懷慶所產為良。一經蒸曬。其色便黑。為熟地黃。以九蒸九曬。透心黑者為佳。中心微黃者次之。間用紅白蘿蔔。以地黃汁浸透曬乾。假充尤宜細辨。曹炳章曰。按地黃六七月出新。淮慶出者。短圓如卵。細皮性糯者。道地直地。乃出新時。壓扁捏長。以枝頭大小。分價目。上下天津出者。體長皮粗性硬。為次。細者名細生地。或曰直皮。熟者以生者洗去泥沙。蒸曬九次者佳。云以紅

羅荀做就偽充者。此屬理想之談。於形色氣味不符。豈可混充。又有鮮生地一種。杭州葛橋出者。長莖根皮光黃。白色。肉白微黃。尾長性糯者佳。河南出者。枝亦長黃。褐色。肉自有硬筋。略次。此物以治血熱。證鮮用易爛。藏者搗一淨土密。下用乾沙泥。襯底。面上貯生地一層。再夾沙一層。如是收藏。則少爛耳。

配合應用 補虛治熱。地黃煎。用生地黃不拘多少。三搗三壓。取汁令盡。以瓦器盛之。密蓋勿洩。氣湯上煮。減半。絞去滓。再煎如湯。丸彈子大。每溫酒服一丸。日二服。(千金方)

利血生精。地黃粥。用地黃切二合。與米同入。籠中煮之。候熟。以酥二合。蜜一合。同炒香。入內。再煮熟食。(陸仙神隱方)

補益。地黃煎。生地黃十斤。洗淨。搗壓取汁。鹿角膠一斤。半。生薑半斤。絞取汁。蜜二升。酒四升。文武火煮地黃汁。數沸。即以酒研紫蘇子四兩。取汁。入煎。一二十沸。下膠。膠化。下薑汁。蜜。再煎。候稠。瓦器盛之。每空心酒化一七服。(千金方)

開心益智。髮白返黑。齒落更生。辟穀延年。更治癩疽。癆瘵。咳嗽。吐血等症。瑤玉膏。用生地黃汁十六斤。取汁。人參末一斤。中。白茯苓末三斤。白沙蜜十斤。漚淨。拌勻。入瓶內。箬封。安砂鍋中。桑柴火煮。三日夜。再換蠟紙重封。浸井底一夜。取起。再煮一伏時。每以白湯或酒點服一匙。丹溪云。好色虛人。咳嗽。唾血者。服之甚捷。

益男子精。用乾地黃。沙苑蒺藜。肉蓯蓉。鹿茸。山茱萸。五味子等分。

多服令人有子。用乾地黃。背蒿子。鹽甲。銀柴胡。沙參。天麥冬。黃蘗。甘草。地骨皮。牡丹皮。白芍藥。牛膝等分。

益氣力。能逐及奔馬。用乾地黃。麥門冬。人參。五味子。牛膝等分。煎酒。

固齒烏髮。一治齒痛。二生津液。三變白鬚。其功極妙。用地黃五斤。柳木飯內。以上蓋上。蒸熟曬乾。如此三次。持為小餅。每嚼嚥一枚。(御藥院方) 又方。烏髮。用乾地黃。何首烏。桑椹。甘菊。歸腸。蜀椒等分。

又方。生齒。用乾地黃、五味子、人參、人乳粉、白茯苓等分。

①治虛勞困乏。用地黃一石取汁。酒三斗攪勻。煎好日服。(必效方)

②治心虛驚悸。怔忡健忘。用乾地黃、人參、遠志、麥門冬、酸棗仁、柏子仁、茯神、甘草等分。

③治盜汗久不止。用乾地黃、黃耆、黃連、黃芩、酸棗仁、五味子、白芍藥、麥門冬、龍眼肉、牡蠣粉等分。

④治男女虛損。或大病後。或積勞後。四體沈滯。骨肉酸痛。呼吸少氣。或小腹拘急。腰背強痛。咽乾唇燥。或飲食無味。多臥少起。久者積年。輕者百日。漸至復削。用生地黃二斤。麩一斤。搗爛炒乾為末。每空心酒服方寸匕。日三服。忌如法。(肝後方)

⑤治骨蒸勞熱。用生地黃一斤。搗三度。絞盡。分再服。若利即減之。以涼為度。(外臺秘要方)又方用乾地黃、青蒿子、鼈甲、銀柴胡、沙參、天麥二冬、黃芩、甘草、地骨皮、牡丹皮、白芍藥、牛膝等分。

⑥明目益精。用乾地黃、甘菊花。

女真實、枸杞子、白茯苓等分。

⑦治目暴赤痛。用黃連、連翹、薄荷、甘草、甘菊花、木通等分。

⑧治一切跌打損傷。瘀血作痛。用乾地黃、當歸、赤芍藥、乳香、沒藥、肉桂炒黃荊子末等分。

⑨治咳嗽吐血。勞復骨蒸。日晚寒熱。用生地黃汁三合。煮白粥。臨熱入地黃汁攪勻。空心食之。(食醫心鏡方)

⑩治肺損吐血。或舌上有孔出血。用生地黃八兩。取汁。童便五合。同煎熱。入鹿角膠炒研一兩。分三服。

⑪治心熱吐衄。脈洪數者。用生地汁半升。熬至一合。入大黃末一兩。待成膏。丸梧子大。每熱水下五丸至十丸。(聖惠方)

⑫治鼻出衄血。用乾地黃、地龍、薄荷等分。為末。冷水調下。(孫兆誌寶方)

⑬治血分溼熱。用乾地黃、金銀花、甘草、荊芥穗、參連翹、黃芩、地榆、白芷、木通等分。凡生膿疔痛甚者。濃煎。悉飲立差。

⑭治吐血不止。用生地黃汁一

升二合。白膠香二兩。以磁器盛。入飯蒸令膠消。服之。(梅師方)

⑮治吐血便血。用地黃汁六合。銅器煎沸。入牛皮膠一兩。待化。入蜜汁半盃。分三服。便止。或微轉一行不妨。(聖惠方)

⑯治初生便血。小兒初生七八日。大小便血出。乃熱傳心肺。不可服涼藥。用生地黃汁五七匙。酒半匙。蜜半匙。和服之。(全幼心鑑方)

⑰治小便尿血。吐血。及耳鼻出血。用生地黃汁半升。生薑汁半合。蜜一合。和服。(聖惠方)

⑱治小便血淋。用生地黃汁。車前葉汁。各三合。和煎服。(聖惠方)

⑲治婦人發熱。形成勞病。肌瘦食減。經候不調。用乾地黃一斤。為末。練蜜丸。梧子大。每酒服五十九丸。(保慶集方)

⑳益母安胎。用乾地黃、當歸、白芍藥、川芎、阿膠、鹿角膠等分。

㉑治經事不調。用乾地黃、芍藥、當歸、川芎、阿膠、斷艾、香附等分。

㉒治月水不止。用生地黃汁。每服一盞。酒一盞。煎服。日二次。(千金方)

⑳治月事先期。用乾地黃、青蒿、地骨皮、安門冬、白芍藥、山茶、黃芩、枳殼等分。

㉑治妊娠胎動。用生地黃搗汁煎沸。入雞子白一枚。攪服。(聖惠方)

㉒治胎動下血。用乾地黃同苧麻根搗汁。碗許。加砂仁末三錢。

㉓治妊娠漏胎。下血不止。用生地黃汁一升。清酒四合。煮三五沸。服之。不止。又服。百一方。又用生地黃為末。酒服方寸匕。日一夜。又用生地黃熟地黃等分。為末。每服半兩。白朮根。浸煎服。空心調下。日二服。(保命集二黃丸方)

㉔治胎動下血。腰痛。用乾地黃砂仁。

㉕治胞衣不出。生地黃汁一升。苦酒三合。相和。緩服。(必效方)

㉖治產後百病。地黃酒。用地黃汁。漬麴二升。淨秬米二斗。令發如常。醱之。至熟。封七日。取清常服。令相接。忌生冷。蒜。雞。豬肉。一切毒物。未產。先一月。釀成。夏月不可造。(千金方)

㉗治產後血虛發熱。用乾地黃。

當歸、川芎、蒲黃、黑豆、炒炮薑、澤蘭、益母草、牛膝、續斷、杜仲、鹿角膠等分。

⑤治產後中風。腦不得轉。交加散。用生地黃五兩研汁。生薑五兩取汁。交互相浸一夜。次日各炒黃。浸汁乾。乃煮為末。每酒服一方寸匕。(濟生方)

⑥治產後煩悶。乃血氣上沖。用生地黃汁。清酒各一升。相和煎沸。分三服。(集驗方)

⑦治產後惡血不止。乾地黃搗末。每食前熱酒服一錢。連進三服。(瑞竹堂方)

⑧治寒疝絞痛來去。用烏雞一隻。治如常法。另用生地黃七斤。剉細。飯中同蒸。下以銅器承取汁。清且服。至日哺令盡。其間當下諸寒。澀訖。作白粥食之。久疝者作三劑。(肘後方)

⑨治小兒陰腫。以葱椒湯燉處洗之。唾調地黃末敷之。外腎熱者。雞子清調。或加牡蠣少許。(危氏方)

⑩治小兒蟲病。用生地汁一升。二分三四服立效。(子母秘錄)

方)

⑪治小兒枕痛。用乾地黃、肉桂、乳香、沒藥、五靈脂。夏月去桂。用薑三錢至八錢。

⑫施用宜忌 凡脾胃虛寒及有溼熱者禁用。

⑬配合宜忌 惡貝母、畏蕪荑、葱、蒜、蘿蔔諸血。忌銅鐵器。得清酒麥冬良。

⑭參攷資料 ①地黃忌銅鐵器。令人腎消并髮白。男損營。女損衛。

②(靈敏) ③病人虛而多熱者。宜加用之。(甄權) ④地黃忌葱蒜蘿蔔。諸血。令人營衛澀。鬚髮白。(甄權)

⑤本經只言乾生二種。不言熟者。如血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱者。若與生乾。當慮太寒。故後世改用蒸曝熟者。生熟之功殊別。不可不詳。(寇宗奭) ⑥地黃葉如甘露子。花如脂麻花。但有細斑點。北人謂之牛爛子。花莖有微細短白毛。(寇宗奭) ⑦今處處有之。以同州者為上。二月生葉布地便出。似車前。葉上有皺紋而不光。高者及尺餘。低者三四寸。其花似油麻。花而紅紫色。亦有黃花者。其實作

房如連翹。中子甚細。而沙褐色。根如人手。指通黃色。粗細長短不常。種之甚易。根入土即生。一說古稱種地黃宜黃土。今不然。最宜肥壤。虛地則根大而多汁。其法以葦席圍編如車輪。徑丈餘。以壤土實葦席中。為壇。壇上又以葦席實土。為一級。比下壇徑減一尺。如此數級。如浮屠。乃以地黃根節多者寸斷之。蒔壇上。層層令滿。逐日水灌。令茂盛。至春秋分時。自上層取之。根皆長大而不斷折。因不致斷傷。故也。得根暴乾。出同州者。光潤甘美。(蘇頌) ⑧生地黃入手少陰。又為手太陽藥。故錢仲陽陽丙火與木通。同用。以導赤也。諸經之血熱。與他藥相隨。亦能治之。謂血便血皆同。(王好古) ⑨本經所謂乾地黃者。乃陰乾日乾。火乾者。故又云生者尤良。別錄復云。生地黃者。乃新掘鮮者。故其性大寒。其熟地黃乃後人復蒸曬者。諸家本草皆指乾地黃為熟地黃。雖主治證同。而涼血補血之功稍異。(李時珍) ⑩地黃姜汁浸則不泥。酒製則不妨胃。鮮用則寒。乾用則涼。(李時

珍) ⑪爾雅云。下地黃。郭璞云。江東呼為下。羅願云。下以下沉者為貴。故字從下。(李時珍) ⑫今人惟以懷慶地黃為上。亦各處隨時興廢不同。附地黃初生。地葉如山。白菜而毛滴。葉面深青色。又似小芥葉而頗厚。不又丫。葉中嫩莖。上有細毛。莖梢開小筒子。花紅黃色。結實如小麥粒。根長三四寸。細如手指。皮赤黃色。如羊蹄根。及葫蘆。荀根。曝乾乃黑。生食作土氣。俗呼其苗為婆娑。古人種子。今惟種根。王昉山居錄云。地黃嫩苗。摘其旁葉作菜。甚益人。本草以二月八月採根。殊未窮物性。八月殘葉猶在。葉中精氣未盡。歸根。二月新苗已生。根中精氣已滋於葉。不如正月九月採者。殊好。又與蒸曝相宜。禮記云。羊豕豕。則自古已食之矣。(李時珍) ⑬理虛元鑑。桑枯貝母之類。清金之品也。歸地丹皮之類。養營之品也。而養營劑中。又以生地為第一。以生地治雜證之痰。則能障痰之。能滯化痰之氣。且反能助痰之成。若加之虛勞劑中。則肺部喜其潤。心部喜其清。腎部

房如連翹。中子甚細。而沙褐色。根如人手。指通黃色。粗細長短不常。種之甚易。根入土即生。一說古稱種地黃宜黃土。今不然。最宜肥壤。虛地則根大而多汁。其法以葦席圍編如車輪。徑丈餘。以壤土實葦席中。為壇。壇上又以葦席實土。為一級。比下壇徑減一尺。如此數級。如浮屠。乃以地黃根節多者寸斷之。蒔壇上。層層令滿。逐日水灌。令茂盛。至春秋分時。自上層取之。根皆長大而不斷折。因不致斷傷。故也。得根暴乾。出同州者。光潤甘美。(蘇頌) ⑧生地黃入手少陰。又為手太陽藥。故錢仲陽陽丙火與木通。同用。以導赤也。諸經之血熱。與他藥相隨。亦能治之。謂血便血皆同。(王好古) ⑨本經所謂乾地黃者。乃陰乾日乾。火乾者。故又云生者尤良。別錄復云。生地黃者。乃新掘鮮者。故其性大寒。其熟地黃乃後人復蒸曬者。諸家本草皆指乾地黃為熟地黃。雖主治證同。而涼血補血之功稍異。(李時珍) ⑩地黃姜汁浸則不泥。酒製則不妨胃。鮮用則寒。乾用則涼。(李時

喜其滋。肝部喜其和。脾部喜其甘。緩而不冷不滑。故凡勞嗽吐血。骨蒸內熱之劑。必無遺生之地。唯惟勞嗽初起。客邪未清。痰嗽方盛。御忌生地泥滯。至於清熱蒸灼。金受火刑。非生地之清潤。以滋養化源。則生機將絕矣。若因畏其滯而始終不用。乃是不明要義也。(張石頑)

【大生地花】

主治 功同地黃

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論地黃花曰。胃虛腹脊痛。為末。酒服之。

【大生地葉】

主治 靈脂似。癩十年者。搗爛。日塗。鹽湯先洗。

【大生地實】

採取 四月採之。陰乾。搗末用。

主治 功與地黃等。

參攷資料 地黃出渭陽者有子。淮南七精丸用之。(陶弘景)

【大有香】 即黃耆之處方用名。詳

【黃耆】條。

【大米】 即蓬草子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓬草子』條。

【大吳風草】 即望江南之別名。典見植物學大辭典。詳『望江南』條。

【大尾羊】

古籍別名 羖羊。(唐書)

產地 哈密及大食諸番地。

形態 羊尾皆短。而大尾羊細毛。薄皮。尾上旁廣重一二十斤。

主治 療毒。

【大角豆】

即豇豆之日本名詞。詳『豇豆』條。

【大豆】

即黑大豆之原名。見『黑大豆』條。

【大豆卷】

原名 大豆黃卷。命名 本品係用黑大豆溼蒸發芽。芽卷色黃。故名。

地方用名 清水豆卷。豆黃卷。古籍別名 豆蘗。(本草綱目)

黃卷皮。(和漢藥考)

基本 係黑豆之種子。

形態 按黑豆於夏至前後下種。莖高三四尺。葉圓有尖。秋開小白花。成莢結莢。長寸餘。經霜乃枯。本品係用其子。萌芽乾之者。皮黑芽白。而鬚卷色黃。

採取 九十月間採子日乾。製法 陶弘景曰。黑大豆為蘗。

牙。生五寸長便乾之。名為黃卷。用之熟過。

性質 甘。平。無毒。效能 除溼痺。消脹滿。為利溼清熱藥。

主治 溼痺筋攣。膝痛。五穀不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑肝。潤肌膚皮毛。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論豆卷曰。破婦人惡血。

【唐】孫思邈千金翼論豆卷曰。宜腎。【明】李時珍本草綱目論豆卷曰。除胃中積熱。消水病脹滿。【清】

黃元御玉楸藥解論豆卷曰。豆黃卷味甘氣平。利水泄溼。通木舒筋。金匱薯蕷丸用之。以其泄溼而疏木也。大豆黃卷專泄水溼。善達木

鬱。通腠理而逐溼痺。行經脈而破血瘀。療水鬱腹脹之病。治筋攣膝痛之疾。黑大豆長於利水而行血

及其芽生而為黃卷。更能破瘀而舒筋。以其發舒通達。秉之天性也。

【清】鄒澍本經疏證論豆卷曰。盧子由曰。大豆作黃卷。比之種於土

而生芽者異矣。始生之日。黃黃而卷。曲直之木性備矣。木之為物。藏

真通於肝。肝藏筋脈之氣也。夫筋聚於膝。膝屬谷之府。故主溼痺筋攣膝痛者。象形從治法也。惟稱與菽。並著於水中。放芽。特稱喜水

養。菽宜乾燥。故稱種者浸水中。俟其有萌而後布種。菽則直種於土。以稍稟金水之氣而成。菽飽火土之氣而熟。性元不同。培發自宜異耳。溼痺者。生氣為溼所閉。不能宣達也。閉於水中。暢發生氣之物。宜乎能治之矣。乃不以稍藥。而以菽藥者何。夫溼痺而筋攣膝痛。則為下部病矣。溼閉於下者。宜升稟金水之氣者。則降。故必以飽火土之氣者。升而散發之。溼不閉。則筋自舒。筋既舒。則膝自不痛。比之稍藥。善使痰溼食滯下行者。正相對照耳。舒筋之物。有木瓜。慈以牛膝。何以茲獨取大豆黃卷。夫木瓜治轉筋。非治筋攣。慈以治筋急拘攣。不治筋攣。牛膝治筋攣。能降而不能升。既治筋攣。又欲其溼升者。會大豆黃卷無別物矣。所以者何。溼流關節。關節之大者。無如膝。而又最近於腹。溼既痹於此。勢不能下。又不能升。與其運而下之。仍無出路。

莫若就近使上於腹。或從小便。或從汗出而解。仲景紫葳丸。治風氣百疾。取此與芫胡。桂枝。防風。白斂。為伍。亦豈不以其能發耶。

近人學說 張山雷曰。豆黃卷。本以黑豆發芽而後乾之。其實已鬆。故善於通達宜利。本經主溼痺。筋攣。膝痛。則萌孽孳生之能通行百脈也。別錄治胃氣結積。益氣止痛。則本質空鬆之能開通壅塞也。孟詵謂破婦人惡血。瀕湖謂除胃中積熱。消水病脹滿。則此藥之性情效用。蓋與豆豉大同小異。本不在發表解肌之例。但今之江浙市廛中。則亦以麻黃湯浸過。發汗又確有證據。是因製法之變遷。而藥物性情。今非昔比矣。爰并錄於輕疏類中。用藥分量。隨其人體質酌量輕重。亦如豆豉之例。

配合應用 治周痺邪在血脉之中。上下周身水痺不痛。大豆籩散。用大豆蘖一斤。炒香為末。每服半錢。溫酒調下。日三服。此藥經五臟留滯胃中。結聚谷氣。出毒。潤皮毛。補腎氣。宜明方。

治頭風溼痺。筋攣膝痛。胃中

積熱。大便結澀。黃卷散。用大豆黃卷炒一升。酥半兩為末。食前溫水服一匙。日二服。普濟方。

治水病腫滿。喘急。大小便澀。大豆黃卷。醋炒。大黃炒。等分為細末。葱橘皮湯服二錢。平明以利為度。聖濟總錄方。

治小兒撮口。初生豆芽。研爛絞汁。和乳灌少許良。普濟方。

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無溼熱者禁用。惡海藻龍胆。得前胡。杏子。牡蠣。烏喙。天雄。鼠屎。共蜜和良。

大豆豉 即淡豆豉之古籍別名。典見別錄。詳淡豆豉條。

大豆黃卷 即大豆卷之原名。見大豆卷條。

大豆卷 條。

大貝母 即土貝母之古籍別名。典見綱目拾遺。詳土貝母條。

大居莖 即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳大薊條。

大武肉 即牛肉之古籍別名。典見禮記內則。詳牛肉條。

大空根皮 產地 襄州山谷中。

形態 樹高六七尺。葉如楮而

圓。又似桐葉而不尖。深綠色。有皺紋。根皮赤色。虛軟。

性質 苦。平。有小毒。

主治 殺三蟲。作末和油塗髮。蟻蝨皆死。

歷代記載攷證 明李時珍本草綱目論大空根皮曰。殺虱極妙。搗葉篩園中。殺蟲。

大灰寶 即灰寶之處方用名。見灰寶條。

大芥 芥之葉大。紋皺。色深綠。味辛辣者。性質功用與芥同。參見芥條。即蕪菁之古籍別名。典見揚雄方言。詳蕪菁條。

大芹 即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳當歸條。

大青 命名 本品莖葉色皆小之別。故名。

處方用名 大青葉。鮮大青。

古籍別名 菘藍。本草綱目外國名詞 Tardis tinctoria。

基本 係十字花科。藥用大青之莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

大青以產廣西北流為最。廣東肇屬廣利亦有出。原係靛草。植物學辭典曰。原產歐羅巴。

形態 大青為一年或越年生之草。本處處有之。莖高二三尺。葉圓長三四寸。上部之葉為箭形。如披針形。無柄。下部之葉為倒卵形。皆有葉柄。面青背淡而對生。八月開小花。花四瓣。或紅或黃。列為總狀花序。雄蕊六枚。四長二短。結青實。大如椒穎。扁平與翅果相類。九月赤熟。可供製藍染料。其莖葉可充藥用。



大青

採取 三四月採之。採得莖葉陰乾用。

性質 苦。大寒。無毒。

效能 療熱毒熱痢。治喉痺喉風。專作解熱解毒藥。

主治 時氣頭痛。大熱口瘡。

歷代記載攷證 南北朝陶弘景本草集註論大青曰。除時行

弘景本草集註論大青曰。除時行

熱毒甚良。〔唐〕甄權藥性本草論大青曰。治溫疫寒熱。〔宋〕蘇頌圖經本草曰。古方治傷寒。黃汗黃疸等有大青湯。又治傷寒頭身強腰脊痛。葛根湯內亦用大青。大抵時疾多用之。〔宋〕大明諸家本草論大青曰。治熱毒風。心煩悶。渴疾口乾。小兒身熱疾風。及金石藥毒。塗嬰腫毒。〔明〕李時珍本草綱目論大青曰。主熱毒狗黃疽。喉痺。丹毒。又曰。大青氣寒味微苦。鹹能解心胃熱毒。不特治傷寒也。朱肱活人書。治傷寒發赤斑。煩痛有犀角大青湯。大青四物湯。故李象先指掌賦云。陽毒則狂斑。煩亂以大青升麻可回困。〔明〕程希雍本草經疏論大青曰。大青稟至陰之氣。故味苦。氣大寒。無毒。甄權云。大青味甘。能去大熱。治溫疫寒熱。蓋大寒兼苦。其能解散邪熱明矣。經曰。大熱之氣寒以取之。此之謂也。時行熱毒。頭痛大熱口瘡。為胃家實熱之證。此藥乃對病之良藥也。〔明〕李士材本草圖解論大青曰。大青小青味苦大寒無毒。主時氣頭痛。大熱口瘡。時行熱毒。溫疫寒

三畫 大

熱。小青不如大青。古方不用。陰寒之物。止宜祛除。天行熱病。而不可施於虛寒脾弱之人。
 近人學說 張山雷曰。大青小青之氣味性質。皆與藍草近似。故功用亦相等。張石頑竟以大青小青併於藍實一條。未為無見。特古書皆不謂大青小青可以為藥。則亦自有區別。別錄謂大青味苦。大寒。主時氣頭痛。大熱口瘡。陶宏景謂除時行熱毒。甄權治溫疫寒熱。日華主熱毒。煩渴風癩。金石藥毒。腫毒。嶺湖謂大青主熱毒。疥。黃疸喉痺。丹毒。小青治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。蘇頌謂小兒搗散。癰腫疔毒。石頑謂宋朱肱治發斑咽痛。有犀角大青湯。大青四物湯。皆以治溫熱毒盛之病。非正傷寒病。大青能瀉肝胆之實火。正以祛心胃之邪熱。所以小兒疳熱丹毒。皆為要藥。小青殺百藥毒。解狼毒。射罔斑。蝨。砒石等毒。
 配合應用 ①治喉風喉痺。用大青葉搗汁灌之。取效止。(衛生易簡方)
 ②治小兒口瘡。大青十八銖。黃

連十二銖。水三升。煮一升。服一日。凡二服。以瘥為度。(千金方)
 ③治熱病下痢。困篤者。大青湯。用大青四兩。甘草赤石脂三兩。膠二兩。鼓八合。水一斗。煮三升。分三服。不過二劑。瘥。(肘後方)
 ④治熱病發斑。赤色煩痛。大青四物湯。用大青一兩。阿膠甘草各二錢。半。鼓二合。分三服。每用水一盞。半。煎一盞。入膠烱化服。又犀角大青湯。用大青七錢。半。犀角二錢。半。梔子十枚。鼓二撮。分二服。每服水一盞。半。煎八分。溫服。(南陽活人書方)
 ⑤治小兒卒然肚皮青黑。乃血氣失養。風寒乘之。危惡之候也。大青為末。納口中。以酒送下。(保幼大全方)
 用量 三錢至八錢。
 施用宜忌 凡無實火熱毒者禁用。
 參攷資料 ①今江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗。葉花紅紫色。似馬薹。亦似芫花。根黃。三月四月採莖葉陰乾用。(蘇頌) ②處處有之。高

二三尺。莖圓。葉長三四寸。面背背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大椒。顯九月份赤。(李時珍) ③大青乃陰寒之物。止用以祛除天行熱病。而不可施之虛寒脾弱之人。(程希雍) ④凡證宜用大青者。如無。即以藍實代之。或真青黛亦可。(楊時泰)
 【大青子】即藍實之古籍別名。與見和漢藥考。詳「藍實」條。
 【大青尊者】即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「朴硝」條。
 【大青葉】 產地 生南安。
 形態 莖高二三尺。灰綠色。有漚毛。中空。白如蘆莖。葉三又中長寸許。大如掌。面淡青。背微白。漚毛粗。有鸞眼如麻。葉子附莖而生。葉下如大麻子。薄殼。青褐色。亦有毛。中有細紅子一窠。可供藥用。
 主治 溫瘧。
 【大青錢】即古文錢之處方用名。詳「古文錢」條。
 【大室】即葶藶之古籍別名。典見本經。詳「葶藶」條。
 【大洞果】即胖大海之古籍別名。

六七

與見綱目拾遺。詳『胖大海』條。

【大胡麻】即胡麻之處方用名見『胡麻』條。

【大苦】即黃蘗子之古籍別名。與見綱目。詳『黃蘗子』條。

【大風子】即大楓子之處方用名。見『大楓子』條。

【大風草】即玉如意之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『玉如意』條。

【大桂】即肉桂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【大海子】產地 以安南新州爲佳。西貢次之。暹羅會安又次之。石叻出者最次。

採取 四月出新時採之。

性質 味甘淡。性涼。

主治 火閉癩。服之立起。並治一切熱症。

【大荔】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【大茴香】原名 藜香。命名 藜臭肉。下少許。即無臭氣。臭入末亦香。故曰回香。又俚俗多懷之衿衽咀嚼。故名懷香也。

處方用名 大茴香。舶茴香。八

角茴香。原油香。谷茴香。

書籍別名 八月珠。(和漢藥考)

外國名詞 Semon foniculi (拉丁) Fennel fruit. (英) Fenchelamen. (德) Анис (日本)

學名 Illicium Verum. Hooker

基本 屬木蘭科。藥用大茴香之果實。

產地 產於吾國西南諸省。陳仁山藥物生產辨云。大茴香產廣西南寧百色。又名八角。味香純甜。有產日本者。味辛香辣不甜。

形態 按茴香原屬地中海岸所產之多年生宿根草。春月苗叢生。高五六尺。葉大。作絲狀細裂。與莖同帶白色。莖圓而疏。夏月於枝梢開黃色五瓣小花。作複繖花序排列。果實爲乾果。香氣甚烈。本品雖由產地及栽培法。而異其形態及大小。惟大抵則爲有梗之分裂。實長二三。分作黃灰色圓柱狀。尖端有錐形柱頭。頗易脫落。於其一分實之橫斷面見有五個銳形

肋狀突起。氣味芳香而稍甘。

採取 八九月採實陰乾。

製法 楊時泰曰。隔紙焙燥。研極細。八角者亦同。此得酒良。上行宜酒炒。黃下行宜鹽水炒用。

性質 辛平。無毒。

效能 祛寒濕。治疝痛。並治神經衰弱之消化不良。功能刺激胃腸之血管。使精神奮興。全身血液流動增加。故可用作健胃及驅蟲藥。

主治 諸瘧。霍亂。及蛇傷。

歷代記述攷證 【唐】馬志開寶新詳定本草論茴香曰。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中止痛。嘔吐。

【宋】大明日華諸家本草論茴香曰。治乾選脚氣。腎勞瘧瘧。陰疾。開胃下氣。【元】李東垣用藥法象論茴香曰。補命門不足。【明】李士材本草圖解論茴香曰。茴香辛溫。暖下焦。逐膀胱胃間冷氣。調中進食。療諸疝。腹痛吐瀉。其形如柏實。裂成八瓣者。爲大茴香。性熱損目。不宜入食料。其形如麥粒者。爲小茴香。性溫。宜入食料。【明】繆希雍本草經疏論茴香曰。茴香味辛平。亦

應兼甘無毒。辛香發散。甘平和胃。入足太陽陽明太陽少陰經。故主

霍亂。香氣先入脾。脾主肌肉。故主諸痿。脾主四肢。故主脚氣。通腎氣。膀胱爲腎之腑。故主膀胱腎間冷氣。及治疝氣。胃和則熱解。熱解則口臭自除。【清】黃宮繡本草求真論大茴香曰。大茴香辛甘性熱。據書所載。功入肝燥腎。凡一切沉寒痼冷。而見霍亂。痼冷。陰腫。腹痛。及乾溼脚氣。并肝經虛火。從左上衝頭面者。用之。服皆有效。蓋茴香與肉桂。藥性。皆屬厥陰燥藥。但黃則走腸胃。桂則能入肝腎。此則體輕能入經絡也。必得鹽引入腎。發出陰邪。故能治疝有效。余按茴香形類不一。據書所載。有旨大如麥粒。輕而有細稜者。名大茴。出雷夏。他處小者。名小茴。自番舶來。實八瓣者。名八角香。今市所用大茴。皆屬八角。而雷夏之茴。未見。余細嚼雷八角茴香味。其香雖有。其味甚甘。其性溫而不烈。較之葵菜。莢。艾。葉等味。更屬不同。若以八角大茴。甘多之味。而謂能除沉寒痼冷。似於理似屬有礙。鹽水炒用。得酒良。

【清】王士雄隨息居飲食譜論苗香曰。苗香辛甘溫。調中開胃。止痛散寒。治霍亂吐傷痲痲即氣。殺蟲辟穢。肴饌所宜。制魚肉腥腥冷滯諸毒。又小便頻數而色清不渴者。用苗香淘淨鹽炒研末。炙稷米餵糧食。

國外學說 英美學說謂大苗香產中國之福建、廣西及日本、日耳曼等處。在古時希臘時早知之。屬香味類。其子可入藥。似卵形。色綠灰。面少有細毛。其香能遠散而有趣。味暖而微甜。能行氣祛風。處方用大苗香一分研末。酒五分。浸二天。裝淋筒淋乾。再加酒漂淋足五分。過淋紙為度。治肚疼。每服二分。六釐二毫半。至五分二釐半。用量為每服五分二釐半。至一錢零五釐。又日本藥局方曰。苗香係採集苗香之果實。作長圓柱形。帶褐綠色。長七至十密米。直徑三至四密米。其十條肋線中。惟互相密接之邊緣肋線。較他肋線更形隆起。其肋線間。各有一巨大油槽。分果之嵌合面。各具有二油槽。本品有特異芳香性。較烈氣味。又云。苗

三畫 大

香油 (Fennel oil) 係苗香中所含約三至七%之揮發油。為無色或淡黃色液體。經久則變暗色。有芳香性。其味及爽快之香氣。比重在攝氏十五度為 0.985。陳年者一.二八。易溶於伊打及哥羅仿姆。酒精亦稍能溶之。反應為中性。逢冷則分離白色結晶狀塊。終而固結。油中之主成分為阿溫萜 (Anethol $C_9H_{10}O$)。此外含有少許鐵管邊 (Terpen $C_{10}H_{16}$)。

辨偽 同夢白云。日本大苗香者。為莽草 (Mulleum Feligiosum Sib. of Zucc.) 之果實。其形狀與八角苗香無甚差異。惟較精細小。替莖小艇形之頂端。較為尖銳。且帶彎曲。其氣味則與八角苗香全異。類似小荳蔻或薑渣。含有西根米 (Sai Kiminasho) 毒。性甚強。不可混入八角苗香中。前在江蘇醫科大學時。蘇城有因食八角苗香而致死者。驗之知非八角苗香。而為有毒之日本大苗香。即辨果。係藥舖以其形狀相同。而價格廉。用以作假藥者。故用

八角苗香時。宜特加注意焉。近人學說 張山雷曰。苗香始見於唐本草。據蘇頌謂結實如麥而小青。此今之所未見者。蘇又謂入藥多用苗香者。則今市肆之所謂八角苗香也。但八角者大辛

大溫。其性最烈。瀕湖綱目稱其氣味辛平。必非舶來品。八角苗香可知。故李亦謂結子大如麥粒。輕而有細稜。俗呼為大苗香。以寧夏出者為第一。其他處小者謂之小苗香。自番舶來者。實大如柏實。裂為八瓣。一瓣一核。大如豆。黃褐色。有仁。味更甜。俗呼舶苗香。又曰八角苗香。據此則綱目中所謂引古書一切主治。皆子如麥粒之苗香。唐本草謂治霍亂。馬志謂治膀胱腎間冷氣。調中止痛。嘔吐。大明謂治脚氣。癩疔陰疼。開胃下氣。東垣謂補命門不足。吳棗謂暖丹田。當皆指寧夏產品而言。惟李引諸方。有明言八角苗香。舶苗香者。則舶來品耳。頃按今肆中之大苗香。即舶來之八角者。以養雞鷄菜肉。及諸飛禽走獸。可辟腥臊氣。入藥殊不常用。二十年前。吾鄉人有患疝痛者。

得口傳方。謂一味八角苗香研末。熱酒調服。可治。而不背其分。此人竟至市中購二十大錢。作一服吞之。即曉七竅流血而斃。此雖服之太多所致。然即此可見其非常猛烈。凡用古方者。皆宜慎之。蓋誅食療本草謂苗香葉藥。治膀胱疝氣。及腎氣衝脇。如不刺痛。喘息不得者。生搗熱酒絞服。此非舶上苗香可知。石頭逢原引之。謂辛香不實。善降濁氣。頗謂辛香不實四字。大不可解。至孟英隨息居飲食譜。稱其調中開胃。止痛散寒。治霍亂。疝痛。殺蟲辟穢。肴饌所宜。制魚肉腥腥冷滯諸毒。又謂小便頻數而色清不渴者。苗香淘淨。鹽炒研末。炙粉米。食。不詳是何種苗香。願謂八角者。斷不可輕用。

配合應用 開胃進食。用苗香二兩。生薑四兩。同搗勻。入淨器內。濕紙蓋一宿。次以銀石器中文。武火炒黃魚為末。酒糊丸。梧子大。每服十九至二十五丸。溫酒下。(經驗方) 治瘵瘵發熱連背項者。苗香于搗汁服之。(孫真人方)

六九

①治大小便閉。鼓脹氣促。八角茴香七枚。大麻仁半兩。為末。生葱白三七根。同研煎湯。調五苓散末服之。日一服。(普濟方)

②治傷寒脫腸。小便不通。用茴香末。生薑自然汁調。傅腹上。外用茴香末。入益元散服之。(摘玄方)

③治腎消飲水。小便如膏油。用炒茴香。炒川棟子等分為末。每食前酒服二錢。(保命集方)

④治腎邪冷氣力弱者。大茴六兩。分作三份。生附子一個。去皮。分作三份。第一度用附子一份。茴香一份。同炒黃。出火毒。一夜。去附子。研茴香為末。空心鹽酒下一錢。第二度用二味各一份。同炒存性。出火毒。以附子去一半。留一半。同茴香為末。如前服。第三度各一份。同炒存性。出火毒。全研為末。如前服之。(朱氏集驗方)

⑤治腎虛腰痛。茴香炒研。以豬腰子批開。摻入末。漚紙裝煨熟。空心食之。鹽酒下。(戴原禮要訣方)

⑥治腰痛如刺。八角茴香炒研。每服二錢。食前鹽湯下。外以糯米一二升。炒熱袋盛。拴於痛處。(簡

便方)

①腰重對脹。八角茴香炒為末。食前酒服二錢。(直指方)

②治疝氣入腎。茴香炒作兩包。更換熨之。(兩便方)

③治小兒氣腫。八角茴香。小茴香。各三錢。乳香少許。水煎服。(直指方)

④治小兒疝氣痛不可忍。大茴。荔枝核。炒黑。各等分。研末。每服一錢。溫酒調下。(孫氏集效方) 又用大茴一兩。芒椒五錢。炒研。每酒服一錢。(瀕湖集簡方)

⑤治膀胱疝痛。舶茴香杏仁各一兩。葱白焙乾五錢。為末。每酒服二錢。嚼胡桃送下。(本事方)

⑥治疝氣膀胱小腸痛。用鹽炒茴香。鹽炒晚蠶砂。等分為末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。溫酒嚼下。(集要方)

⑦治疝氣偏墜。大小茴香各一兩。研末。牙擦尿管一個。連尿入二末於內。繫定罐內。以酒煮爛。連胞搗丸。梧子大。每服五十九。白湯下。(鄧才筆藥雜興方)

⑧治寒濕成疝。用茴香酒炒。川

棟子。荔枝核。橘核。肉桂。芥朮。木瓜。牛膝等分。

①治中惡腹痛。霍亂腹痛。吐逆。用茴香炒砂仁。食鹽等分。

②脇下刺痛。小茴一兩。炒枳殼五錢。熱炒為末。每服二錢。鹽酒調服。神效。(袖珍方)

③辟除口臭。用茴香煮羹。及生食並得。(食醫心鏡方)

④治蛇咬久潰。小茴搗末。傅之。(千金方)

能用宜忌 凡陰虛火旺。陽道數舉者禁用。

著名方劑 附子茴香散。治氣虛積冷。心腹絞痛。用附子一枚。肉荳蔻。乾薑各一兩。茴香。木香。白朮。人參。甘草各半兩。白茯苓。丁子各五錢。以水煎服。(和漢藥考方)

參攷資料 ①小茴香。性平。理氣。開胃。夏月祛蠅。辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜過用。古方有去鈴丸。用茴香二兩。連皮生薑四兩。同入坩器內。掩一伏時。慢火炒之。入鹽一兩。為末。糊丸。梧子大。每服三五丸。空心鹽酒下。此方本治脾胃虛弱病。

茴香得鹽則引入腎經。發出邪氣。腎不受邪。病自不生也。亦治小腸疝氣有效。(李時珍) ①茴香今交廣諸番。及近郡皆有之。入藥多用番舶者。或云不及近處者有力。三月生葉。似老胡荽。極細細。作叢。至五月莖粗高三四尺。七月生花。頭如傘蓋。黃色。結實如麥而小。青色。北人呼為土茴香。八九月採實陰乾。今近道人家園圃種之甚多。川人多食其莖葉。(蘇頌) ②茴香云似老胡荽者誤矣。胡荽葉如蛇狀。雖有葉之名。但散如絲髮。特異諸草也。(慈宗輿) ③茴香宿根。深冬生苗。作叢。肥莖絲葉。五六月開花。如蛇狀。花而色黃。結子大如麥粒。輕而有細稜。俗呼為大茴香。今惟以寧夏出者第一。其他處小者。謂之小茴香。自番舶來者實大如柏實。裂成八瓣。一瓣一核。大如豆。黃褐色。有仁。味更甜。俗呼舶茴香。又曰八角茴香。廣西左右江峒中亦有之。其形色與中國茴香迥別。但氣味同爾。北人得之。咀嚼蘆酒。(李時珍) ④茴香本舊根。而苗於冬。能回陽於剝落之時。故能補腎

中陽氣而膀胱遂藉之以施化。且其味辛中有甘而後微苦。辛而甘則能達腎陽以歸中土。故為調脾胃之妙品。由甘而苦。故又能下歸以宜小腸火腑之用。(趙其光)

【大茴香莖葉】

性實 辛平 無毒

主治 煮食治卒惡。心腹中不安。

參攷資料

治小腸氣卒。腎氣衝路如刀刺痛。喘息不得。生搗汁一合。投熱酒一合和服。(孟詵)

范汪方。療惡毒癰腫。或連陰卵。腫間。疼痛緊急。牽入小腹。不可忍。一宿即殺人者。用茴香苗葉搗汁一升服之。日三四服。其滓以貼腫上。冬月用根。此是外國神方。永嘉以來用之。起死回生神驗。(蘇頌)

【大荊子】即荊子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「荊子」條。

【大菓菜】即薇之古籍別名。與見本草綱目。詳「薇」條。

【大接骨草】即金不換之大葉者。與見綱目拾遺。詳「金不換」條。

【大理石】即理石之產於雲南大理縣者。參詳「理石」條。

三畫 大

【大瓠藤】即含水藤之古籍別名。典見綱目。詳「含水藤」條。即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「甘遂」條。

【大眼桐】即檜栲白皮之古籍別名。典見綱目。詳「檜栲白皮」條。

【大通綠】即木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木香」條。

【大麥】命名 本品苗粒皆大於麥故名。

古籍別名 牟麥有黏性者名糯麥。(本草綱目)

外國名詞 Hordeum astratum, Jess. Var. vulgare, L. (拉丁) ホムギ (日本)

基本 係禾本科。藥用大麥之子實。

形態 按大麥為穀類之一。年生或越年生。草本。能直立。高三四尺。莖中空。有明瞭之節。葉細長而尖。有平行脈。下部成鞘狀。圍於莖上。花排列成穗狀。各花之外。下面有二細長之穎苞。上端有長芒。穎果四列。相並。其小穗花序。由一花而成。內殼與外殼互相緊抱。故與小麥有區別也。

性質 微溫。微寒。無毒。

主治 消渴除熱。益氣調中。

歷代記述攷證 【唐】陳士良食性本草論大麥曰。補虛劣。壯血脈。益顏色。實五臟。化穀食。止洩。不動風氣。久食令人肥白。滑肌膚。為麵勝於小麥。無燥熱。【唐】蘇恭新修本草論大麥曰。麵平。胃止渴。消食。療脹滿。【唐】孟詵食療本草論大麥曰。久食頭髮不白。和針砂沒石子等。染髮黑色。【明】李時珍本草綱目論大麥曰。寬胸下氣。涼血消積。進食。

配合宜忌 石蜜為之使。

參攷資料 大麥性平。涼滑膩。有人患經喉風。食不能下。用此麵作稀糊。令嚥。以助胃氣。而平三伏。中朝廷作麵。以賜臣下。(寇宗奭) 大麥作飯食。麵而有益。煮粥甚滑。磨麵作醬。甚甘美。(李時珍) 大穰二麥。註者不一。按樊普本草。大麥一名穰麥。五穀之長也。王禎農書云。青稞有大小二種。似大小麥。而粒大皮薄。多麵無麩。西人種之。不過與大小麥異名而已。郭義恭廣志云。大麥有黑穰麥。

有穰麥。出涼州。似大麥。有赤麥。赤色而肥。據此則穰麥是大麥中一種。皮厚而青色者也。大抵是一類異種。如粟稷之種。近百總是一類。但方土有不同爾。故二麥主治不甚相遠。大麥亦有粘者。名糯麥。可以釀酒。(李時珍)

【大麥冬】即麥門冬之處方用名。見「麥門冬」條。

【大麥奴】基本 為大麥之穗。將熟時所生之黑黴。主治 解熱疾。消藥毒。

【大麥苗】主治 諸黃利小便。榨汁日服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論大麥苗曰。冬月面目手足皸瘃。麥汁洗之。

【大麥菴子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【大麥粉】性質 與子同。主治 平胃寬胸。涼血止渴。下氣消食。治經喉風。小兒傷乳。

【大麥醋糟】性質 酸。微寒。無毒。主治 氣滯風癱。手背脚膝痛。

炒熱布裹熨之。不愈再熨。三兩換當愈。

【大麥麩】


性質 甘。溫。無毒。主治 消食和中。下生胎破血。取五升。以水一斗。煮三沸。分五服。其子如糜。食之令母肥盛。

【大麥蘖】即大麥子之漬水數日。生根發芽而焙乾者。俗稱大麥芽。詳「麥蘖」條。

【大麻子】

目拾遺

古籍別名 牡麻。(陸機詩疏)青蒿(綱



大麻子

基本 係大麻之實。

性質 辛。平。有毒。

主治 下血。散腫。除痺。破積。利五臟。惟不宜多服。

配合宜忌 畏牡蠣。白薇。

【大麻子油】

主治 熬黑壓油。傅頭治髮落。

不生。煎熟時時吸之。治硫黃毒。發身熱。

【大麻子粥】

之粥。

主治 潤腸。治痺。

【大麻仁】

原名 麻。本品一名漢麻。蓋謂原屬漢產。以別胡麻之不同也。故名。

處方用名 大麻仁。麻子仁。

古籍別名 火麻仁。(日用本草)黃麻仁。(俗名)漢麻仁。(爾雅)雄者名稟。雌者名苴。(陸機詩疏)苧麻仁。(本經)

外國名屬 Cannabis Indica 學名 (Cannabis sativa) 基本 屬桑科。藥用大麻之子。

產地 生太山川谷。

形態 按大麻為一年生草。各地處處有之。種者尤多。莖幹直立。方而有稜溝。高七八尺。葉為掌狀複葉。其數或五或七。小葉形似披針。邊緣生有鋸齒。下部之葉。葉柄長而對生。上部之葉。葉柄短而互

生。花為單性。雌雄異株而生。雄花為總狀花序。色淡綠。多下垂。雌花梢頭為穗狀花序。色亦淡綠。花後結閉果。即麻子也。其子仁為鼠白色。球形之小堅果。有光澤。碎之則有一種芳香。中含微小之扁平種子。脂肪極多。

採取 九月間採之。勿採入土者損人。

製法 寇宗奭曰。凡使麻仁。必須去殼。但殼甚難去。須取帛包好。置沸湯中。浸至冷出之。垂入井中。一夜。勿令着水。次日日中暴乾。就新瓦上揆去殼。錢搗取仁。粒粒皆完。張仲景麻仁丸。即此大麻子中仁也。

性質 甘。平。無毒。

效能 潤燥通大便。殺蟲塗諸瘡。在胃中不起何等變化。入腸即激腸之粘膜。使分泌增多。蠕動加速。同時又能限止腸內固有水分。不使吸收。故用為通利二便及難產催生藥。但不宜多食。多食損人血脈。滑精氣。痿陽氣。婦人多食。即發帶疾。

主治 補中益氣。久服肥健。不

老神仙(本經)治中風汗出。逐水氣。利小便。破積血。復血脈。乳結產後餘疾。沐髮長潤。(別錄)

歷代紀述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論大麻仁曰。下氣去風。痺皮頑。令人心軟。炒香。浸小銀絞汁服之。婦人倒產。吞二十七枚。即正。

【唐】陳士良食性本草論大麻仁曰。潤五臟。利大腸。風熱結燥及熱淋。【唐】孟詵食療本草論大麻仁曰。取汁煮粥。去五臟風。潤肺。治關節不通。髮落。【宋】日華諸家本草論大麻仁曰。補虛勞。逐一切風氣。長肌肉。益毛髮。通乳汁。止消渴。徹生雞產。【明】李時珍本草綱目論大麻仁曰。利女人經脈。調大腸。下痢。塗諸瘡。殺蟲。取汁煮粥。食止嘔逆。【明】程希雍本草經疏論大麻仁曰。麻子即大麻仁。稟土氣以生。本經味甘。平。無毒。然其性最滑利。甘能補中。中得補則氣自益。甘能益血。血復則積血破。乳結產後餘疾皆除矣。風併於衛。則衛實而榮虛。榮者血也。陰也。經曰。陰病者汗自出。麻仁益血補陰。使榮衛調和。風邪去而汗自止也。逐水利

調和。風邪去而汗自止也。逐水利

小便者。滑利下行。引水氣從小便而出也。好古云。入手足陽明足太陰經。陽明病汗多及胃熱便難。三者皆燥也。用之以通潤。經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。麻仁之甘以緩脾潤燥。故仲景脾約丸用之。〔清〕黃宮繡本草求真論大麻仁曰。大麻仁即今作布火麻之麻所產之子也。與胡麻之麻絕不相似。味甘性平。按書皆載緩脾利腸潤燥。如傷寒陽明胃熱。汗多便閉。治多用此。蓋以胃府燥結。非此不解。更能止渴通乳。及婦人難產。老人血虛。產後便閉最宜。至云初服作瀉。其說固是。久服能令肥健。有補中益氣之功。亦是燥除血補。而氣自益之意。若云寬能益氣。則又滋人歧惑矣。但性生走熱。守入藥微炒研用。入丸湯泡去殼。取帛包。浸湯中。浸至冷出之。垂井中一夜。勿着水。次日日中曬乾。揆出殼。搗去殼。取仁。〔清〕鄒澍本經疏證論大麻仁曰。麻仁與地黃皆最能拔地力。故亦最能生陰津。其相比入炙甘草湯。則以地黃善宣陰津於陰分。麻仁善宣陰津於陽分也。其在麻

仁丸與芍藥同用。則以芍藥善破陰結。布陽氣。麻仁善行陽滯。布陰氣也。入陰入陽者。物之生理。所謂性也。破結行滯。宣布陰陽者。物之能事。所謂情也。性之與情。猶與馬相輔而行。是何也。麻仁丸中有小承氣湯。即不用麻仁芍藥杏仁。不患其大便不通。炙甘草湯有人參麥冬地黃。即不用麻仁。不患其大便不復。然復通便是二方作用之一端。不能會二病之全局。故麻仁在炙甘草湯爲人參麥冬地黃之先聲。以其氣鍾於至陽。易入上焦。引元陽爲生陽。人參繼之爲鼓元氣之驍。麥冬繼之以生胃氣之絕。地黃繼之以行經中之血也。其在麻仁丸。又爲小承氣湯之後勁。以枳實厚朴斂而行氣。大黃芍藥破而通血。皆舉瘕疾。絕無停執。治胃實之不大便。有餘。治脾約之大便難。不足。若得杏仁之潤降。麻仁之滑澤。脾必舒展而復約也。

咳嗽。並胸膈痛等。用爲乳劑。有緩和滋養之效。大便祕結者。此油能滑利之。患直腸尿道及膀胱內癆。飲痛者。以此注入。能使腫痛緩解。云云。印度所產之大麻葉。有麻醉鎮靜之效。取其葉作煙。能治喘息諸病。以其有麻醉性也。然他處所產之大麻葉。均無此功效。故欲作麻醉藥者。當專用印度之大麻葉。又日本藥局方所採收之印度大麻草云。印度大麻草 (Hoids Cannabis Indica; Cannabis sativa L.) 產於印度之北部。當子實初熟之時。自其雌草之枝梢。採摘其葉及種果乾而用之。其分葉形似細狹之披針。有粗闊之鋸齒。或裂傷。或與落花之穗本。黏連而成團塊。試用顯微鏡視之。見有毛茸之外。囊與油腺。其葉肉之組織中。則見有包含碳酸鹽族晶之細胞。此藥臭氣特異。有峻烈之麻醉性。但味不顯著。其莖似木。長約五密達。果實作卵圓形而帶稜。然數極少。收貯極須注意。又古今要覽稿第四百五十四卷大麻論曰。大麻之鮮葉。乃毒物也。誤服之令

人狂笑不止。嘗有人採園中繁茂之葉。切拌特油食之。旋即人事不知。甚有因此致廢木者。佐藤成祐曰。此草除花外。俱有毒。其實去皮食仁。則令人上氣。速皮服食。則有害。

配合應用 ①服食法。用麻子仁一升。自羊脂七兩。蜜蠟五兩。白蜜一合。和杵蒸食之。能不飢耐老。(食療方)

②耐老益氣。久服不飢。用麻子仁二升。大豆一升。熬香爲末。蜜丸。日二服。(藥性方)

③大麻仁酒。治骨節風毒。疼痛不可運動。用大麻仁水浸。用沉者一大升。曝乾於銀器中。旋旋慢炒。香熟。入木臼中。搗至萬杵。待細如白粉。即止。平分爲十帖。每用一帖。取家釀無灰酒一大碗。同麻粉用柳穗。攪入砂盆中。搗之。濾去殼。煎至減半。空腹溫服一帖。輕者四五帖。見效。甚者不出十帖。必失所苦。效不可言。(醫中方)

④麻仁粥。治風水腹大。腰膝重痛。不可轉動。用冬麻子半斤。研碎。水漉取汁。入粳米二合。煮稀粥。下

三畫 大

葱椒鹽鼓。空心食。(食醫心鏡方)
⑤治五淋澀痛。大便不通。麻子糞粥。如上法食之。

⑥治產後祕塞。許學士云。產後汗多則大便祕。難於用藥。惟麻子粥最穩。不惟產後可服。凡老人諸虛風祕。皆得力也。方用大麻子仁。紫蘇子各二合。洗淨研粗。再水研。澀取汁一盞。分二次糞粥啜之。(本草方)

⑦治產後瘀血不盡。麻子仁五升。酒一升。漬一夜。明旦去。溫服一升。不達再服一升。不吐不下。不得與男子通。一月將養如初。(千金方)

⑧治胎損腹痛。冬麻子一升。杵碎熬香。水二升。煮汁分服。(食醫心鏡方)

⑨治妊娠心痛。煩悶。麻子杵一合。研水二盞。煎六分。去滓服。(聖惠方)

⑩治月經不通。或兩三月或半年一年者。用麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熱酒一升。浸一夜。日服一升。(普濟方)

⑪治嘔逆不止。麻仁杵熬。水研

取汁。若少鹽喫。立效。(外臺祕要方)

⑫治虛勞內熱。下焦虛熱。骨節煩疼。肌肉急。大便不利。大小數。少氣呼吸。口燥熱淋。用大麻仁五合。研水二升。煮減半。分服四五劑。瘥。(外臺祕要方)

⑬治下治渴。麻子仁一升。水三升。煮四五沸。去滓。冷服半升。日二。(藥性論方)

⑭治消渴飲水。日至數斗。小便赤澀。用秋麻子仁一升。水三升。煮三四沸。飲汁不過五升。瘥。(肘後方)

⑮治乳石發渴。大麻仁三合。水三升。煎二升。時時啜之。(外臺祕要方)

⑯治飲酒咽爛。口舌生瘡。大麻仁一升。黃芩二兩。為末。蜜丸。含之。(千金方)

⑰治脚氣腫渴。大麻仁熬香水。研。取一升。再入水三升。煮一升。入赤小豆一升。煮熟。食豆飲汁。(外臺祕要方)

⑱治脚氣腹痛。大麻仁一升。研碎。酒三升。漬三宿。溫服大良。(外

臺祕要方)

①治血痢不止。用麻子仁汁煮綠豆。空心食。極效。(外臺祕要方)

②治小兒痢下。赤白。體弱。大困者。麻子仁三合。炒香。研細末。每服一錢。漿水服。立效。(子母祕錄方)

③治截腸怪病。大腸頭出寸餘。痛苦。乾則自落。又出名為截腸病。若腸盡。即不治。於初覺截時。用器盛脂麻油。坐浸之。飲大麻子汁數升。即愈也。(夏子益奇疾方)

④治金瘡瘀血積在腹中。用大麻仁三升。葱白十四枚。搗熟。水九升。煮一升半。頓服。血出不盡。更服。(千金方)

⑤治腹中蟲病。大麻子仁三升。東行茱萸根八升。漬水。平旦服二升。至夜蟲下。(食療本草方)

⑥治小兒疳瘡。嚼麻子傅之。日六七度。(子母祕錄方)

⑦治小兒頭瘡。麻子五升。研細。水絞汁。和蜜傅之。(普濟方)

⑧治白禿無髮。麻子炒焦。研末。豬脂和塗。髮生為度。(普濟方)

⑨治髮落不生。黃麻子汁煮粥。頻食之。(聖濟總錄方)

七四

①治聾耳出膿。麻子一合。花胭脂一分。研勻。作挺子。綿裹塞之。(聖惠方)

②治大風癩疾。大麻仁三升。淘。以酒一斗。浸一夜。研取白汁。濾入瓶中。重湯煮。數沸。收之。每飲一小盞。兼服茄根散。或乳香丸。取效。(聖惠方)

③治卒被毒箭。麻仁數升。杵汁飲。(肘後方)

④治解射固毒。大麻子汁飲之。良。(千金方)

⑤治辟穢溫疫。麻子仁赤小豆各二七枚。除夜着井中。汲水飲之。良。(龍魚河圖方)

⑥治赤遊丹毒。麻仁搗末。水和傅之。(千金方)

⑦治溼癬肥瘡。大麻諸傅之。五日瘥。(千金方)

施用宜忌。凡腸滑便澹者。禁用。畏牡蠣。白薇。茯苓。著名方劑。脾約麻仁丸。治腸胃熱燥。大便祕結。(金匱方)用麻仁五兩(另研)大黃一斤(蒸焙)厚朴(姜炒)枳實(麸炒)芍藥(炒)各五兩。杏仁(去皮尖)五兩

(炒)各五兩。杏仁(去皮尖)五兩

半。右研末蜜丸。梧子大。臨睡用白湯送下二十九丸。大便利即止服。

參攷資料

●麻從兩北在廣

下。象屋下治麻之形也。尤音派。廣音儼。云漢麻者。以別胡麻也。(李時珍) ●麻實即牡麻。牡麻無實。今人作布及履用之。(陶弘景) ●實即麻實。非花也。爾雅云。實泉實。儀禮云。苴麻之有實者。註云。有子之麻為苴。皆謂子也。陶弘景以實為麻。勃謂勃勃然如花者。復重出麻子誤矣。既以實為米穀上品。其花豈堪食乎。(蘇恭) ●麻子早春種為春麻子。小而有毒。晚春種為秋麻子。入藥佳。壓油可以油物。(陳藏器) ●麻子海東毛羅島來者。大如蓮實最勝。其次出上郡北地者。大如豆。南地者子小。(寇宗奭) ●大麻即今火麻。亦曰黃麻。處處種之。剝麻收子有雌雄。雄者為臬。雌者為苴。大科如油麻。葉狹而長。狀如益母草。葉一枝七葉。或九葉。五六月開細黃花。成穗。隨即結實。大如胡荽。子可取油。剝其皮作麻。其帶白而有稜。輕虛可為燭。心齊民要術云。麻子放勃時。拔去

雌者。若未放勃。先拔之。則不成子也。其子黑而重。可搗治為燭。即此也。本經有麻實麻子二條。謂實即麻勃。謂麻子入土者殺人。蘇恭謂實是麻子。非花也。蘇頌謂實子花為三物。疑而不決。謹按吳普本草云。麻勃一名麻花。味辛無毒。麻莖一名麻實。一名青葛。味辛甘有毒。麻葉有毒。食之殺人。麻子中仁無毒。先藏地中者食之殺人。據此說則麻勃是花。麻實是實。麻仁是實中仁也。普三國時人去古未遠。說甚分明。神農本草經以花為實。以藏土入土殺人。其文皆傳寫脫誤。爾陶氏及唐宋諸家。皆不考究而臆度疑似。可謂疏矣。今依吳氏改正之。(李時珍)

【大麻花】

原名 麻勃。麻實。性質 麻實辛平有毒。麻勃辛溫無毒。

主治 麻勃治一百二十種惡風。黑色。遍身苦癢。逐諸風惡血。治女人經候不調。藥性 麻實治五勞七傷。多服令人見鬼狂走。(本經) 利五臟。下血寒氣。破積止痺。散膿。久服通神明輕身。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論麻勃曰。治健忘及金瘡內漏。

近人學說

楊莘華曰。麻實即雌麻之花也。由實結實即為麻子。古人不曰麻花而曰麻實者。蓋因其形態不類花狀。且恐與雄花相混。故以麻實別之也。本草經以麻實為要藥。故列為專條。云味辛平。而未附麻子之主治。云味辛平。後人不識此意。翻刻本經。竟改麻為專條。而以麻實附之。惟千金翼內之本草經。仍以麻實為主。金匱傷寒論無麻實之名。此藥自別錄以後。即混淆莫辨。南齊陶弘景以麻實為牡麻之花。唐之蘇恭非陶氏之說。而以麻實即麻子。宋之蘇頌始疑麻花麻實麻子為三物。惜亦未能深考。只作疑詞而已。李時珍以麻勃為麻花。以麻實為代殺麻子。不思本草經明云麻實即麻勃。焉能分為二物。且既曰麻實即麻勃。而不曰即麻花。則必非麻花矣。又於麻實麻勃之名下。另敘麻子之主治。則必非麻子。尤明甚矣。况別錄云麻子無毒。麻實有毒。更為

鐵證。至清之本草備要。本草從新。更不載麻實之名。惟有大麻仁一條。(大麻之名由綱目而起) 今醫學大辭典以麻實為大麻子之別名。以麻勃為大麻花之別名。則愈去愈遠矣。究麻實所以失傳之故。因無花冠。僅有綠萼為苞。其狀不顯。不易辨識。以致淹沒至今。而世人反以印度產者。始可入藥。故植物辭典於大麻科云。產於印度者。可為麻醉藥及鎮經藥。安知世界之麻實功用盡同。其不同者為誤採之故耳。新採之時。嗅之久。致腦眩暈而痛。因內含元素甚富。為刺激性之麻醉劑。迨其果實已成。即為麻子。則體功已改。氣味已殊矣。僕考麻實之效。初以二十六釐(即庫秤四分五釐五毫)於晚八句鐘沖服。至二小時覺遍身癢。甚至夜半一時始眠。至第二日。以三十釐(庫秤五分二釐五毫)煎至一刻鐘。其色深綠。於夜服之。至一句鐘。覺首部與上肢作癢。漸及下肢。小時即睡。此為初驗時之早服劑。未敢多加。蓋此藥中分劑。僅能活氣血。足分劑即催眠矣。後

有一孕婦。喘息難臥。失眠三日。乃與以麻黃一錢。麻黃二錢。杏仁三錢。煎服二次即愈。又醫一腦充血症（非中風類）原因怒氣未發。以致氣血上充。日間無他疾。夜間時為夢驚。醒後數夜失眠。與以麻黃五分。令其煎汁沖服。溴化鉀十粒。一服即愈。後於小兒因驚夜啼。與此服之亦效。（分劑以小兒年歲酌加）本草經主五分七傷。是為中分劑。如為安眠藥。須用足分劑。本草經云。多食令人見鬼狂走。西醫亦謂過分劑則致癲狂。賀氏藥學云。此藥服過分劑令人不能自主。有可笑之小事。則大笑之。可崇之小事。則極樂之。如有憂悶。則以為將死。其腦之兩半球。各主其意。不能符合。若服過大之分劑。則呼吸必緩。然卒無殞命者。此藥常服致癡。又云。查格魯撒克遜人。服之無礙。此語似不足信。蓋人之體質。不能相去懸殊。凡可懸之物。任何民族。不能獨異。惟遲早有聞耳。古人發明重要之藥。且為隨地皆生之物。竟使失傳約二千載。此非醫藥界之遺憾乎。

配合宜忌 畏牡蠣。入行血藥。

竅蟲爲之使。

參攷資料 觀齊民要術有

放勃時拔去雄者之文。則勃爲花明矣。（李時珍）麻勃方藥少用。術家令人參服之。能逆知未來事。（陶弘景）按范汪方有治健忘方。七月七日。收麻勃一升。人參二兩爲末。蒸令氣過。每臨臥服一刀圭。能盡知四方之事。此乃治健忘服之能記四方事也。陶云逆知未來事。過言矣。又外臺言生疔腫人。忌見麻勃。見之即死者。用胡麻針砂。燭燒爲末。醋和傅之。不知麻勃與疔何故相忌。亦知人有見漆即生瘡者。此理皆不可曉。（李時珍）

麻黃一名麻勃。麻花上勃勃者。七月七日採之良。（本草經）

【大麻仁酒】

製法 取大麻子中仁。炒香。袋盛。浸酒。

主治 骨體風毒痛。不能動者。

【大麻葉】

性質 辛。有毒。
主治 搗汁服五合。下虺蟲。搗爛傅蝮毒。俱效。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論麻葉曰。湯浸沐髮。長潤。令白髮不生。

參攷資料 以葉一握。同于

五升。搗和浸三日。去滓沐髮。（甄權）按郭文疔科。心要烏金散。治癰疽疔腫。時毒惡瘡。方中用火麻頭同麻黃諸藥發汗。則葉之有毒攻毒可知矣。普濟方用之。截癰。尤可推焉。（李時珍）

【大寒節水】 卽儲氣水之一種。功用與鷹雪水同。參見『鷹雪水』條。

【大就】 卽黃環之古籍別名。典見本經。詳『黃環』條。

【大戟】 命名 本品味極辛苦。載人咽喉故名。今俚人俗呼爲下馬仙。言其利人甚速也。

處方用名 紅芽大戟。綿大戟。耶領（爾雅）下馬仙（本草綱目）

古籍別名 蒺藜。枝莖。澤莖。破軍。殺勒馬宜（和漢藥考）

外國名詞 Euphorbia Lax.

學名 (Euphorbia polino-nais, Rupr.)

基本 係屬大戟科。藥用大戟

之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。綿大戟產河南禹州府。紅芽大戟產廣西南寧。

形態 按大戟爲一年自生之宿根有毒草。莖高二三尺。葉互生。作長橢圓形或披針形。邊緣有細鋸齒。夏月莖梢五分。各生三葉。更分爲三枝。又各生二葉。中心開淡黃紫色小形單性花。雌花及雄花俱無花被。（卽花冠及萼）果實爲褐色山椒大實。有疣狀突起。傷其莖莖。俱有白汁流出。其根細長。外面赤黃色。內部白色。味稍辛。



種類 綿大戟。色黃白。味葶辛。根皮柔韌如綿。紫大戟。色紫黑。味微辛。根如桑格。（卽紅芽大戟）

採取 五月採苗。二月八月採根。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使勿用附生

根。陰乾。

雷斅曰。凡使勿用附生

根。陰乾。

雷斅曰。凡使勿用附生

者。誤服令人洩氣不禁。即煎薤苳解之。探得後。於枕砧上細剉。與海芋葉并蒸。從巳至申。去芋葉。晒乾。用李時珍曰。凡採得以藥水煮軟。去骨晒乾。用海芋葉煎而有毒。恐不可用也。

性質 苦寒。有小毒。

效能 大瀉六腑水飲。專作下泄劑。與治痰飲藥。

主治 蠱毒十二水。腹滿急痛。積聚中風。皮膚疼痛。吐逆頭眩。癰腫。頭痛發汗。利大小便。

張仲景之發明 大戟一味。經張仲景之實驗。認為主利水。勞治擊疝。咳嗽。茲考徵如下。十棗湯證曰。引脇下痛。又曰。咳嗽。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論大戟曰。下惡血。癖塊。腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論大戟曰。治墮胎。風及風毒脚腫。並煮水。日日熱淋。取愈。【宋】大明日華諸家本草論大戟曰。瀉毒藥。泄天行黃病。溫瘧。破癰結。【明】櫻希雅本草經疏論大戟曰。大戟稟天地陰毒之氣。以生。故味苦寒。而有小毒。甄權潔古

三畫 大

發辛。別錄兼甘。應是辛多。非辛則無毒矣。苦寒故善下走。而入腎肝。辛則橫走。無所不到矣。潔古又謂瀉肺損真氣。其主下蠱毒者。以蠱毒必熱必辛。辛則散走。隨腑。故假其辛寒。以搜其辛熱。是以善攻毒也。苦寒下洩。故能逐諸有餘之水。溼熱及留飲在中。下二焦。則為腹滿急痛。或成積聚。苦辛甘寒。故散頭眩癰腫。利大小便。瀉毒藥。通月水。苦辛有毒。故又墮胎也。天行黃病。非元氣實者。勿用。經曰。邪之所湊。其氣必虛。中風之人。其虛必矣。本經末又謂其主中風。皮膚疼痛。吐逆者。非也。焉有虛病。而可施苦寒。有毒下泄之藥哉。是重其虛也。【明】李士材本草圖解論大戟曰。大戟苦寒有毒。入肝與膀胱。利大小便。泄十種水病。破惡血。癖塊。用取同。煮軟。去骨曬乾。陰寒善走。大損真氣。非元氣壯實。水溼伏留。不可混施也。【清】黃宮繡本草求真論大戟曰。大戟氣味苦寒。性秉純陽。峻利居首。上瀉肺氣。下泄腎水。兼因味辛。旁行經脈。無處不到。浸水色綠。又入肝膽。故善治能治

十二水毒。蠱結腹滿急痛等症。李時珍云。凡痰涎為物。隨氣升降。無處不到。入於心。則迷竅而癰爛。入於肺。則發塞而成欬。唾稠粘。喘急背冷。入於肝。則留伏蓄聚。而成脇痛。乾嘔。寒熱往來。入於經絡。則麻痺疼痛。入於筋骨。則頭項胸背。腰脇手足。牽引隱痛。三因並以控涎丹主之。蓋有大戟能泄臟腑之水。溼。甘遂能行經隧之水。溼。白芥子能散皮裏膜外之痰氣。要必實症。實熱實脈。方可用。否則瀉肺傷腎。害人不淺。若中其毒者。惟苜蓿可解。枕蓀色紫者良。北蓀色白者。不堪入藥。水漿去。去骨用。得大損。則不損脾。畏苜蓿。反甘草。苗名澤漆。亦行水道。主治略同。【清】楊時泰本草逸鈞元論大戟曰。潔古謂甘遂純陽。大戟則陰中微陽。夫肝之為臟。乃陰中少陽也。本經大戟。兼主中風。痛吐逆。而蘇頌更有隱疹風及風毒脚腫之治。然則茲物逐水。殆有由肝而致其用者歟。肝為腎子。凡五行中母氣盛者。樂趨於子以泄之。茲或由子而泄母氣之淫。俾其不少留歟。錢仲陽療痘

證。黑陷有百祥膏。用大戟以瀉腎中之毒。非瀉腎水也。即本經首治蠱毒。日華子亦云瀉毒藥。又如玉樞丹。紫金錠。皆用以解毒。可知茲物瀉水。必其急痛積聚。或水所化之血。已為惡血。癖塊。大為真氣之毒。乃可投之。否則破泄致害。實所不免。抑本經所主中風。癰痛。即指溼風而言。原不離水之為病也。國外學說 日本學說謂大戟為有毒品。漢醫用為瀉飲下劑等。大戟雖有峻下劑之效。然其有效成分均未為詳載。蓋與甘遂同。當為刺戟腸胃而發下劑之毒。爾斯樣物質。田原學士亦未檢出其有效成分。又和漢藥考曰。大戟種類頗多。有岩大戟。炬大戟。伊吹大戟。白山大戟等。日本以本國產之紀州大戟。岩大戟供藥用。又日用藥品考曰。古時傳入日本者。有綿大戟。紫大戟等之真品。今則甚少。綿大戟根莖。揉之如綿。徑六七分。黃白色。味微辛。使明大腫。如時珍所言。紫大戟根黑赤色。揉之亦如棉。味微辛。明不致腫。較綿大戟性緩。以杭州紫大戟為上云。今日

七七

本藥舖呼唐大戟者。皆從他藥中
揀出。外面紫赤色。裏面淡褐色。皆
細長。味微澀不羶。此非真者。又有
呼和大戟者。多用野苧麻根。(黃
白色。易折)或赤苧根。(爲苧麻
一種。淡赤色。內白)或薤花根。(茶
褐色。內淡白。多混日本柴胡中)
李根皮(紫赤色。內褐色)等混
充。故不若自裁和產岩大戟。(即
紫大戟之一種)或漢種大戟採
用之。另有呼伏見大戟者。此爲草
間茹。非大戟。又手板發蒙曰。綿大
戟。古時傳來者。根如綿。黃白色。味
微辛。天明年間。有混他藥品中運
來者。今甚少。紫大戟(紅芽大戟)
紫黑色。如綿。味微辛。以杭州大戟
爲上。近來運到者。形似桑格之根。
有紫赤色者。即紫大戟。漢種大戟
享保年間傳入日本。爲紅芽大戟
種。惟與近來運到之紫大戟。大異
其形。日本產品類甚多。有土大戟
岩大戟。鹿飛大戟等。

方大熱大毒之蠱類。非苦寒峻下。
不足以解。十二水腫滿急痛積聚。
蓋謂十二經之水滯積聚。以致外
腫內滿。而爲急痛耳。然苟非體充
邪實者。亦不可概投。中風皮膚疼
痛。六字當作一句讀。蓋指風溼熱
之襲於肌膚者。則辛能疏散。而苦
寒又專瀉降。是以治之。非泛言外
受之風寒。石頑謂指風水膚脹。亦
頗有理。吐逆是指水飲停於上焦。
而不能下泄。以致上逆者。此以辛
苦泄破。通達下降。是以主之。別錄
主頭眩癱腫。皆痰飲凝滯之症。治
頭痛。亦指飲邪凝聚。水氣上凌者
而言。發汗則驅除水滯之溢於膚
腠者耳。利大小便。固通泄攻破之
專職矣。

配合應用 ①大戟入玉樞丹
紫金錠。解毒熱毒癰疽疔腫及
蛇蟲諸毒。內服外敷。取利爲度。
②百祥丸。治痘瘡變黑乾陷不
發。寒而大便閉結者。用大戟一兩
棗三枚。水一碗同煮。曝乾。去大戟。
以棗肉焙丸。服從三分服至五分
以利爲度。
③控涎丹。治痰涎留在胸膈上
下。變爲諸病。或頭項胸背腰脇手
足。勝臂隱痛。不可忍。筋骨牽引。釣
痛走易。及皮膚麻痺。似平癱瘓。不
可誤作風氣風毒及瘡疽施治。又
治頭痛不可舉。或睡中流涎。或欬
唾喘息。或痰迷心竅。用紫大戟。白
甘遂。白芥子。微炒。各一兩。爲末。薑
汁打麩糊丸。梧子大。每服七丸。或
二十九丸。以津液嚥下。若取利。則服
五六十丸。(三因方)
④治中風發熱。用大戟。苦參各
四兩。白酢漿一斗。煮熱洗之。寒乃
止。(千金方)
⑤治牙齒搖痛。大戟咬於痛處。
良。(生生方)
⑥治水腫喘息。小便澀及水蠱。
用大戟二兩。乾豎炮半兩。爲散。每
服三錢。生薑湯下。大小便利爲度。
(聖濟總錄方)
⑦治水病腫滿。不問年月淺深。
大戟。當歸。橘皮。各一兩。切。以水二
升。煮取七合。頓服。利下水二。三升
勿怪。至重者。不過再服便痊。禁毒
食一年。永不復作。此方出張尚書
(李祥兵部手集方)

⑧治水氣腫脹。大戟一兩。廣木
香半兩。爲末。五更酒服一錢。半。取
下。碧水。後以粥補之。忌鹹物。又簡
便方。用大戟燒存性。研末。空心酒
服錢七。
⑨治水腫腹大如鼓。或遍身浮
腫。用棗一斗。入鍋內。以水浸過。用
大戟根苗。蓋之。瓦盆合定。煮熟。取
棗無時食之。棗盡決愈。又大戟散。
用大戟。白牽牛。木香。等分。爲末。每
服一錢。以猪腰子一對。批開。糝末
在內。漚紙煨熟。空心食之。左則塌
左右則塌右。(活法機要方)
用量 五分至一錢。
施用宜忌 凡非氣壯邪實者
禁用。畏苜蓿。蘆葦。鼠屎。惡麩。積。反
甘草。赤小豆。爲之使。
著名方劑 解毒萬病丹。(即
玉樞丹)治一切藥毒。瘋子。鼠毒。
惡菌。疫死牛馬。河豚等毒。及時行
瘟疫。山嵐瘴氣。纏喉風痺。黃疸赤
眼。疥癬癰疽。發背。魚鱗。癰腫。百蟲
蛇犬所傷。男子婦人。癩邪。狂走。鬼
胎。鬼氣。並主之。用山茨菇(去皮
洗淨焙)二兩。川文蛤(龜破洗
刮內淨)二兩。千金子(去殼研
盡油成霜)二兩。麝香(研細)三

錢。紅芽大戟(洗焙)二兩。各研細末和勻。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合。如欲急用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服人。不具手足人。及鷄犬之類見之。此方或入硃砂雄黃各五錢尤效。

參攷資料 ①大戟得預。即不損脾。(李時珍) ②大戟苗似甘遂而高大。葉有白汁。花黃。根似細苦參。皮黃。肉黃白。五月採苗。二月八月採根用。(韓保昇) ③大戟近道多有之。春生紅芽。漸長。叢高一尺以來。葉似初生楊柳小團。三月四月開黃紫花。團圓似杏花。又似蕪黃。根似細苦參。秋冬採根。陰乾。淮甸出者莖圓。高三四尺。葉黃。莖至心亦如百合苗。江南生者。葉似芍藥。(蘇頌) ④大戟生平澤甚多。直莖高二三尺。中空。折之有白漿。葉長狹如柳葉而不圓。其梢葉密攢而上。杭州紫大戟爲上。江南土大戟次之。北地綿大戟。色白。其根皮柔韌如綿。甚稜利。能傷人。弱者服之。或至吐血。不可不知。(李時珍) 【大戟苗】即澤漆之原名。見『澤

三畫 大

漆」條。

【大棗】

原名 棗。

命名 大曰棗。小曰棘。棘者。酸棗也。以棗性高。故重束。棘性低。故並束。東音次。棗棘皆有刺。針。會意也。

處方用名 南棗。烏棗。紅棗。黑棗。

古籍別名 乾棗。美棗。(別錄)

桂棗。膠棗。墟棗。棗膏。棗脯。良棗。丹棗。棠棗。珍棗。白棗。紫棗。灌棗。氏棗。棗油。牛頭。羊角。狗牙。厥泄。雞心。燒髓。天蒸棗。撲落酥。(和漢藥考)

外國名詞 Jujube (拉丁)

Jujube. (英)

基本 係屬鼠李科。藥用棗樹之果實。採取其成熟者。蒸之。晒乾。用。棗爲落葉喬木。高二丈餘。往往有刺。葉互生。作平滑卵圓形。邊緣有鈍鋸齒。有三肋。初夏新枝生葉時。於葉腋開淡綠色小花。後結核果。以棗之生芽。較他樹爲遲。入夏乃生新葉。故日本呼棗爲夏芽。產地 ①陳仁山藥物生產辨云。烏棗產山東兗州府。乃由天津烟台青島出口。十月新。以樂昌磨

登棗爲最。但棗皆紅色。乃燒馬屎。用其烟熏之。變紅爲黑。則爲烏棗耳。②紅棗產山東舊武定府利津縣。九月新。③南棗產安徽省。來自鎮江。

形態 爲赤褐色。有光澤之橢圓形果實。外皮厚。有皺紋。肉層作髓狀。呈黃白色。味甘。中有褐色扁平卵圓形核仁。



大 棗

種類 棗之種類甚多。有狗牙。雞心。牛頭。羊角。彌猴。細腰。赤心。三星。駱白之名。又有水菱。棗御。棗木。棗。氏。棗。桂。棗。夕。棗。灌。棗。墟。棗。蒸。棗。白。棗。丹。棗。棠。棗。圓。棗。括。棗。實。大。棗。及安邑。信都。諸棗。穀城。紫。棗。長。二寸。羊角。棗。長。三寸。密雲。所出。小。棗。脆。潤。核。細。味。亦。甘。美。皆。可。充。果。食。用。不。堪。入。藥。藥。用。宜。取。青。州。管。州。及。朝。鮮。棗。爲。佳。以。棗。實。肥。大。長。寸。餘。前。端。尖。多。肉。質。

採取 每年八月採。

製法 用青州及齊地者。治淨地曝之下。鋪紙箔之類。承棗。日曬夜露。揮去。水。俟。乾。收。藏。

性質 甘平無毒。

成分 含有糖質及黏液質等。效能 補脾胃。治瀉痢。調營衛。療寒熱。治陰虛貧血。入胃後。與胃酸起作用。而成有效之糖素。至腸被腸壁吸收。而達血中。使血中氣化力增加。細胞繁殖力擴大。故用作緩和強壯藥。

主治 心腹邪氣。安中。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣。少津液。身中不足。大驚。四肢重。和百藥。(本經) 補中益氣。堅志。強力。除煩悶。療心下懸。除腸辟。(別錄) 張仲景之發明 大棗一味。經張仲景之實驗。認爲主治。強引。強急也。勞治咳嗽。奔豚。煩燥。身疼。脇痛。腹中痛。茲考徵如下。①十棗湯證曰。引脇下痛。又曰。咳逆。胸中痛。②葶藶大棗湯證曰。咳逆。上氣。喘鳴。迫塞。又曰。不得息。以上二方。以大棗爲君藥。一則十枚。一則十二枚。③蒼桂甘棗湯證曰。欲作奔豚。

越婢湯。生薑甘草湯。以上三方大棗皆十五枚。甘麥大棗湯證曰。躁。喜悲傷。以上一方大棗十枚。小柴胡湯證曰。項項強。又云。腸痛。小建中湯證曰。急痛。大青龍湯證曰。身疼痛。不出汗而煩躁。黃連湯證曰。腹中痛。葛根湯證曰。項背強。桂枝加黃耆湯證曰。身疼重。煩躁。吳茱萸湯證曰。煩躁。以上大棗皆十二枚。歷試此諸方。皆其所學諸證。而有學引強急之狀者。用大棗則治矣。不則無效也。且十劑湯大棗為君藥。而有引痛證。斯可以為徵已。

歷代醫述攷證。南北朝徐之才雷公對論大棗曰。殺烏頭附子天雄毒。唐孟詵食療本草論大棗曰。小兒患秋痢。與蛙棗食之良。宋日華諸家本草論大棗曰。潤心肺。止嗽。補五臟虛損。除腸胃癖氣。和光粉燒。治疳痢。元王好古湯液本草論大棗曰。主養脾胃。補津液。強志。三年陳者。核中仁。主腹痛。惡氣。卒疝。治心懸。經云。助十二經脈。治心腹邪氣。和百藥。

通九竅。補不足氣。生者多食。令人腹脹。注泄蒸熱。食補腸胃。腸中益氣。中滿者。勿食甘。甘者。令人中滿。故大建中湯。心下痞者。減飴棗與甘草同。元李東垣用藥法家論大棗曰。和陰陽。調營衛。生津液。明穆希雍本草經疏論大棗曰。大棗純得土之冲氣。兼感天之微陽。以生。本經味甘。氣平。無毒。東垣孟詵言。溫。氣味俱厚。陽也。入足太陽。陽明經。經曰。衰不足者。以甘補之。又日形不足者。溫之以氣。甘能補中。溫能益氣。甘溫能補脾胃。而生津液。則十二經脈自通。九竅利。四肢和也。正氣足。則神自安。故主心腹邪氣。及大驚。中得緩。則煩悶除。故療心下懸急。及少氣。脾得補。則氣力強。腸胃清。故主身中不足。及腸辟。甘能解毒。故主和百藥。脾胃足。氣血充。後天生氣。借此而盈。溢。故久服。輕身。長年不饑。神仙也。然亦指辟穀修煉者言之。非恒人所能耳。明李士材本草圖解論大棗曰。大棗甘平。脾之藥也。補脾益氣。潤肺止咳。殺附子毒。仲景治奔豚用大棗者。滋脾土。以平腎氣。

也。治水飲。腸痛。有十棗湯。益脾土而勝妄水也。棗能調臟腑。和百藥。為切要佳品。若食之太多。則損齒生蟲。食蛙棗。止秋痢。紅棗主治相同。功力稍遜。止瀉藥則用以作丸。清王士雄隨息居飲食譜論大棗曰。乾棗。甘溫。補脾養胃。滋營充液。潤肺安神。食之耐飢。亦可浸酒。取瓢作餠。單素皆宜。殺烏頭附子。天雄川椒毒。臥時口含一枚。可解悶香。以北產大而堅實肉厚者。補力最勝。名膠棗。亦曰黑大棗。色赤者。名紅棗。氣香味較清醇。開胃養心。醒脾補血。亦以大而堅實者勝。可取和粉作餠。餠之辟邪。穢欲。歲均可充糧。義烏所產為南棗。功力遠遜。僅供食品。嶽人所製。蜜棗。尤為膩滯。多食皆能生蟲。助熱損齒生痰。清黃元御長沙藥解論大棗曰。大棗味甘。微苦。微辛。微酸。微鹹。氣香。入足太陽脾。足陽明胃。經。生津潤肺。而除燥養血。滋肝而息風。療脾胃衰損。調經脈虛孔。金匱十棗湯。治中風。表解內有水。氣下利。嘔逆。頭痛。心下痞。滿引脇下痛。汗出不惡寒者。清黃宮。

補本草求真論大棗曰。大棗味甘。氣溫。色赤。肉潤。為補脾胃要藥。經曰。衰不足者。以甘補之。形不足者。溫之以氣。大棗甘能補中。溫能益氣。脾胃既補。則十二經脈自通。九竅利。九竅。口耳目鼻前後二陰也。四肢和也。正氣足。則神自安。故凡心腹邪氣。心下懸急者。得此則調。得補則氣力強。腸胃清。身中不足。及病見腸辟者。用此則安。甘能解毒。故於百藥中。得甘則協。且於補藥中。且突發散內。用為向導。則能於脾助其升發之氣。不似白朮性燥。不潤。專於脾氣則補。山藥性平。不燥。專於脾陰有益之為異耳。清張隱卷本草崇原論大棗曰。大棗氣味甘平。脾之果也。開小自花生。青熟黃。熟極則赤。烘燥則黑。稟土德之厚。精具五行之色。性經云。脾為五臟中央土。以灌四旁。主治心腹邪氣。安中者。謂大棗安中。凡邪氣上干於心。下干於腹。皆可治也。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經者。謂大棗養脾。則胃氣自平。從脾胃而行於上下。則通九竅。從脾胃而行於內外。則助十二經。

補少氣。少津液。身中不足者。謂大
聚補身中之不足。故補少氣而助
無形。補少津液而資有形。大聚四
肢重。和百藥者。謂大聚味甘多脂。
調和百藥。故大驚。而心主之神氣
虛於內。四肢重。而心主之神氣虛
於外。皆可治也。四肢者。兩手兩足。
皆機關之室。神氣之所暢達者也。
久服則五藏調和。血氣充足。故輕
身而延年。【清】葉天士本草經解
論大聚曰。大聚氣平。稟天秋收之
金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得
地中正之土味。入手太陰脾經。氣
味升多於降。陽也。心腹者。太陰經
行之地也。邪之所湊。其氣必虛。陰
陽形氣不足者。宜調以甘藥。大聚
味甘。可以調不足。故主心腹邪氣。
外為陽。內為陰。陰和則中安。甘平
益陰。所以安中。脾者。陰氣之原也。
胃者。陽氣之原也。甘平益陰。故養
脾氣。陰和則陽平。故平胃氣。中氣
不足。則九竅不通。甘能滿中。中氣
足。九竅通也。十二經者。三陰三陽
也。脾胃者。陰陽之原也。大聚養脾
氣。平胃氣。則十二經無不助矣。肺
主氣。而生津液。氣平益肺。所以主

少氣。少津液也。脾主一身之氣。脾
統一身之血。甘平益脾。脾中氣
血和。自無不足之症矣。血氣足。則
神安。所以定大驚。脾主四肢。味甘
益脾。脾氣充。四肢自輕。甘平解毒。
故和百藥。脾氣充。脾氣足。所以輕
身延年也。【清】陳修園本草經讀
論大聚曰。大聚氣平入脾。味甘入
脾。脾主一身之氣。脾主一身之血。
氣血調和。所以有以上諸效。【清】
汪劭庵本草備要論大聚曰。大聚
甘溫。為脾經血分藥。能補中益氣。
滋脾土。潤心肺。調營衛。緩陰血。生
津液。悅顏色。通九竅。助十二經。和
百藥。傷寒及補劑加用之。以發脾
胃升騰之氣。多食損齒。中滿證忌
之。【清】楊時泰本草述鈞元論大
聚曰。素問言聚為脾果。脾病宜食
之。指治病和藥說。若無故類食。則
生蟲損齒。丹溪云。補脾者。不常用
甘。食甘多脾必受病。蓋脾合四氣。
豈得常執一甘以補之。且甘為五
味主。諸藥味但兼有甘者。便有隨
甘引入各經之妙。以胃行氣於三
陰。三陽而脾更為胃行之也。【清】
鄒樹本草疏證論大聚曰。大聚入

散劑以安中。養脾胃。入補劑以
助經氣。除邪氣。則謂之和百藥也。
實與甘草之解百藥毒。殊。又與石
蜜之和百藥異矣。【清】黃元御玉
樞藥解曰。大聚之補土。補血。以化
氣也。人參之補土。補氣。以生血也。
又曰。凡內傷肝脾之病。土虛木燥。
風動血耗者。非此不可。而尤宜於
外感發表之劑。蓋汗血一也。又按
仲景於中風症。用桂枝湯。桂枝生
竅。開經絡而泄營菴。若不以大聚
補其營陰。則汗出。血亡。外感去而
內傷來矣。故用大聚。是補泄並行
之法也。肺癆症。用葶藶大聚湯。肺
湯。葶藶大聚。肺氣。必用大聚之甘
以緩之。庶瀉肺而不傷肺。此亦補
泄並行之義也。內有水氣。心下痞
鞭滿。引脇下痛。症用十棗湯。芫花
甘送大戟。大決積水。必用大聚十
枚。保其脾精。復名其湯為十棗者。
以防攻擊之太過。此亦補泄並行
之義也。然則大聚之用。亦可知矣。
辨偽 李時珍綱目云。聚木赤
心有刺。四月生小葉。尖觥光澤。五
月開小花。白色微青。南北皆有。惟
晉晉所出者肥大甘美。入藥為良。

買思誠齊民要術云。凡聚全赤時。
日日感而收。則紅。若半赤收
者。肉未充滿。乾即色黃。赤收者味
亦不佳。
國外學說 荷蘭藥鏡論大聚
曰。大聚有甘和滋潤功效。緩解傷
冷毒之酷厲液。癆咳嗽。聲啞。咽喉
刺痛等。胸肺諸症。治肺傷吐血。和
解血液燥熱。消小便嫩痛及石淋
腎痛。滑利大便。加於和劑。水煎
服。或作糖漿(Syrup)用之。尤有
效。或製為清涼飲。有甘味。
近人學說 賈九如曰。大聚
味甘甜。體黏潤。故助陰補血。氣味
厚。色紫黑。故入肝走腎。主治虛勞。
善滋二便。凡補肝腎藥中。如滋陰
降火湯。茯苓補心湯。產後芫歸調
血飲。保胎丸。養榮丸。四神丸。俱宜
為佐使。因性味甘溫。尤能扶脾。養
胃耳。且大聚之甘。與生薑之辛。二
味配合。經云。甘辛發散。為陽也。故
發表疏散劑中。必用之。若中滿氣
喘。嘔吐。牙疼。疔積。蟲病。皆忌用。
配合應用 調和胃氣。以乾
聚去核。緩火逼燥。為末。量多少。入
少生薑末。白湯點服。調和胃氣甚

良。(衍義方)

①治反胃吐食。大棗一枚。去核。用斑蝥一枚。去頭翅入棗內。煨熟。去蝥。空心食之。白湯下良。

②治小腸氣痛。大棗一枚。去核。用斑蝥一枚。去頭翅入棗內。紙包煨熟。去蝥食棗。以桂心畢澄茄湯下。(直指方)

③治傷寒熱病後。口乾咽痛。喜睡。大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。嚥汁甚效。(千金方)

④治婦人躁燥。悲傷欲哭。象若神靈。數欠者。大棗湯主之。大棗十枚。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。

⑤治疰疔腹痛。大紅棗十四枚。燒焦為末。以小便服之。(梅師方)

⑥治大便燥塞。大棗一枚。去核。入輕粉半錢。縛定煨熟食之。仍以大棗湯送下。(直指方)

⑦治煩悶不眠。大棗十四枚。葱白七莖。水三升。煮一升。頓服。(千金方)

⑧治上氣欬嗽。用棗二十枚。去核。以酥四兩。微火煎。入棗肉中。漬。取取之。當含一枚。後微嚥之。

取棗。(聖惠方)

⑨治肺疽吐血。因啖辛辣熱物。致傷者。用紅棗遠核燒。存性。百藥煎。煨過。等分為末。每服二錢。米飲下。(三因方)

⑩治耳聾鼻塞。不開聲音。香臭者。取大棗十五枚。去皮核。既麻子三百枚。去皮。和搗。綿裹塞耳鼻。日一度。三十餘日。聞聲及香臭也。先治耳後治鼻。不可並塞。(孟詵食療方)

⑪久服香身。用大棗肉。和桂心。白瓜仁。松樹皮為丸。久服之。(孟詵食療方)

⑫治走馬牙疳。新棗肉一枚。同黃蘗燒焦為末。油和傅之。若加砒少許更妙。(王氏博濟方)

⑬治諸瘡久潰不愈者。棗膏三升。煎水類洗。取愈。(千金方)

⑭治痔瘡疼痛。大肥棗一枚。剝去皮。取水銀掌中。以唾研令極熱。傅棗臚上。納入下部良。(外臺祕要方)

⑮治下部蟲癢。蒸大棗取膏。以水銀和捻。長三寸。以綿裹。夜納下部。中。明日蟲皆出也。(肘後方)

⑯治卒念心疼。訣云。一個烏梅。二個棗。七枚杏仁。一處搗。男酒女醋。送下之。不害心。疼直到老。(海上方)

⑰治食椒閉氣。京棗食之即解也。(百一選方)

⑱施用宜忌。凡小兒疳病。中滿。痰熱。以及齒痛等症。禁用。生者尤不宜多食。

⑲配合宜忌。與葱同食。令人五臟不和。與魚同食。令人腰腹痛。署名方劑。十棗湯。脉沉而弦者。懸飲內痛。此方主之。欬家其脉弦。為有水。此方主之。又支飲家欬。煩胸中痛者。不卒死。至一百日或一歲。亦宜此湯。用芫花。甘遂。大戟。各等分。搗篩。以水一升。五合。先煮肥大棗十枚。取八合。去滓。納藥末。強人服一錢。七。羸人服半錢。平旦溫服之。不下者。明日更加半錢。得快之後。糜粥自養。

好。小不及耳。江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡。不堪啖。(陶弘景) ⑳近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者。雖大而不及青州肉厚也。江南出者。堅燥少脂。今園圃種者。其種甚多。美者有水。莖葉御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛。故也。南郡人煮而曝乾。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之天蒸棗。亦不入藥。按郭璞註爾雅云。蠶棗大而銳。蠶猶瓠也。邊腹棗也。細腰。今謂之蠶棗。擗白棗也。子白乃熟。洗大棗也。出河東猗氏縣。大如雞卵。暹羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。棗酸棗也。木小而實酢。還味稔棗也。其味短。厥鴉苦棗也。其味苦。(蘇頌) ㉑大棗先青州。次晉州。皆可曬入藥。益脾胃。餘者止充食用耳。青州人以棗去皮核。焙乾為棗。以爲奇果。有御棗。甘美。輕肥。後衆棗熟。而易生蟲。今人所謂撲落酥者是也。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美。微酸。而尖長。二棗皆可噉。不堪收曝。(寇宗奭)

⑳道方藥以棗爲佳餌。其皮利肉補虛。所以合湯皆壁之也。(陶弘景) ㉑世傳河東猗氏縣棗特異。今青州出者形大而核細。多膏甚甜。鄧州元市者亦

【大椒】即秦椒之古籍別名。與見

好。小不及耳。江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡。不堪啖。(陶弘景) ㉑近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者。雖大而不及青州肉厚也。江南出者。堅燥少脂。今園圃種者。其種甚多。美者有水。莖葉御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛。故也。南郡人煮而曝乾。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之天蒸棗。亦不入藥。按郭璞註爾雅云。蠶棗大而銳。蠶猶瓠也。邊腹棗也。細腰。今謂之蠶棗。擗白棗也。子白乃熟。洗大棗也。出河東猗氏縣。大如雞卵。暹羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。棗酸棗也。木小而實酢。還味稔棗也。其味短。厥鴉苦棗也。其味苦。(蘇頌) ㉑大棗先青州。次晉州。皆可曬入藥。益脾胃。餘者止充食用耳。青州人以棗去皮核。焙乾為棗。以爲奇果。有御棗。甘美。輕肥。後衆棗熟。而易生蟲。今人所謂撲落酥者是也。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美。微酸。而尖長。二棗皆可噉。不堪收曝。(寇宗奭)

好。小不及耳。江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡。不堪啖。(陶弘景) ㉑近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者。雖大而不及青州肉厚也。江南出者。堅燥少脂。今園圃種者。其種甚多。美者有水。莖葉御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛。故也。南郡人煮而曝乾。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之天蒸棗。亦不入藥。按郭璞註爾雅云。蠶棗大而銳。蠶猶瓠也。邊腹棗也。細腰。今謂之蠶棗。擗白棗也。子白乃熟。洗大棗也。出河東猗氏縣。大如雞卵。暹羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。棗酸棗也。木小而實酢。還味稔棗也。其味短。厥鴉苦棗也。其味苦。(蘇頌) ㉑大棗先青州。次晉州。皆可曬入藥。益脾胃。餘者止充食用耳。青州人以棗去皮核。焙乾為棗。以爲奇果。有御棗。甘美。輕肥。後衆棗熟。而易生蟲。今人所謂撲落酥者是也。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美。微酸。而尖長。二棗皆可噉。不堪收曝。(寇宗奭)

爾雅詳「秦椒」條。

【大焰草】即無根草之古籍別名。與見百草鏡詳「無根草」條。

【大菊】即覆麥之古籍別名。典見爾雅詳「覆麥」條。

【大菊子】即覆麥之古籍別名。典見和漢藥考詳「覆麥」條。

【大黃】 命名 本品色黃。故名。大黃功能推陳致新。極其峻快。如戡定禍亂。至於太平。故又有將軍之號。

段方用名 牛舌大黃。(本草綱目) 錦紋。生軍。蛋結。生錦紋。製軍。川軍。製錦紋。生大黃。川紋。川錦紋。酒製軍。上廣軍。錦紋大黃。上湘軍。西開片。上湘黃。

古醫別名 黃良。(本經) 將軍。(李氏藥錄) 火參。膚如。(吳普本草) 破門。無聲虎。錦莊黃。(和漢藥考)

外國名詞 Radix rhei (拉丁) Rhubarb (英) Rhubarberwurzel (德)

學名 Rheum officinale, Baill.

基本 屬蓼科。藥用大黃之地

三畫 大

下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。大黃又名川軍。一名錦黃。一名黃良。川。陝。甘。滇。各省均有出。但以質紋顏色分別好醜。如有紅筋起。色鮮黃者為錦黃。最上等。有一種名西黃。無紅線紋。則次之。均產四川汶縣。灌縣。陝西興安。漢中。又有一種名馬蹄黃。又名川黃。又名雅黃。乃產四川雅州南川縣。又有一種名雲大黃。產雲南。與四川西黃無異。又有一種原個吉黃。陝西山西四川均有。亦佳。又有一種名台黃。產直隸。山西五台山一帶。又有一種名枝黃。產山西岐州。與台黃相類。立冬前後出新。如用於入藥。則取錦黃為正也。枝黃由直隸播種於安國縣。直連至山西五台山等處。三年乃有收成。以上兩台為正台黃。沖台黃野產於山西源潭州。以陽高縣為佳。其餘山西大同府及直隸獲鹿縣等均有出。秋後收成。

形態 按大黃為多年生宿根草。莖直立圓形。高四五尺。有微細溝線。葉大而互生。作掌狀分裂。兩

面有軟毛。具有長葉柄。花小而作黃白色。多數作穗狀排列。後結褐色長實。地下莖即大黃其佳者外面為黃色。作球形或不正圓形。大二三寸。質頗堅硬。稍有芳香苦味。截斷之。質呈白色。有褐赤色並帶光澤之髓線。咀嚼之作砂鳴黏著齒牙。涎液成爲黃色。



大黃

種類 大黃有亞洲產與歐洲產二種。但入藥用以中國者最佳。

採取 二月八月採根。火乾。

製法 雷斅曰。凡使大黃。須細切。以文如水旋班緊重者。剉片蒸之。從已至未晒乾。又晒臘水蒸之。從未至亥。如此凡七次。晒乾。却酒。

淡蜜水再蒸一伏時。其大黃必如鳥脊樣。乃晒乾用。陳藏器曰。凡用有蒸有生有熟。不得一概用之。陳承曰。大黃采時。皆以火石煨乾。貨賈更無生者。用之亦不須更多炮。

炎蒸。張元素曰。用之須酒浸。煨熟者。寒因熱用。酒浸入太陽經。酒洗入陽明經。餘經不用。酒。李杲曰。大黃苦峻。下走。用之於下。必生用。若邪氣在上。非酒不至。必用酒。漫引上至高之分。驅熱而下。知物在高。必射以取之也。若用生者。則遠至高之邪熱。是以愈後。或目赤。或喉痛。或頭腫。或關上熱疾生也。

性質 苦寒。無毒。

成分 大黃含有克里蘇番 (Crysophan.) C₁₄H₁₅OH₅ (OH)₂·O₂。愛瑪易仁 (Emodin) C₁₅H₁₀OH₃ (OH)₂·O₂ 及二種樹脂質阿波列丁 (Apo-

lin) 愛里斯洛列丁 (Erythrin) 此外含有苦味質。單寧。沒食子酸。揮發油。澱粉。漆酸。石灰等。

效能 瀉白分實熱。下有形積滯。在胃中略能助胃液之不足。以促進其消化作用。至腸能激腸之蠕動。使積滯瀉下。然一次瀉下後。因 Rho-Tannic acid 有收腸之功。故復行便秘。故專用爲緩下劑。又爲健胃藥及止瀉藥。

主治 下瘀血。血閉。寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。(本經)平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒血閉。腹小腹痛。諸老血留結。(別錄)

張仲景之發明 大黃一味。經張仲景之實驗。認為主治通利結毒。故能治胸滿腹滿。及便閉。小便不利。旁治發黃。瘀血腫脹。茲考徵如下。大陷胸湯證曰。從心下至少腹。硬滿而痛。(用大黃六兩)

小承氣湯證曰。腹微滿。大便不通。厚朴三物湯證曰。痛而閉者。大黃甘遂湯證曰。少腹滿。如敦狀。小便微難。大承氣湯證曰。腹滿痛者。大黃硝石湯證曰。黃疸。腹滿。小便不利。桃核承氣湯證曰。少腹急結。大黃牡丹湯證曰。少腹腫痞。大黃甘草湯證。不具也。調胃承氣湯證曰。腹脹滿。又曰。大便不通。(以上九方。大黃皆四兩)大黃附子湯證曰。脇下鞅痛。抵當湯證曰。少腹鞅痛。大黃黃連瀉心湯證曰。心下痞。按之濡。桂枝加大黃湯證曰。大黃

痛。(以上四方。大黃或三兩。或二兩。一兩。而亦四兩之例)歷觀此諸方。張仲景氏用大黃者。特以利毒而已。故各陪其主藥。而不單用焉。合厚朴枳實。則治胸腹滿。合黃連。則治心下痞。合甘遂阿膠。則治水與血。合水蛭蠪蟲桃仁。則治瘀血。合黃蘗梔子。則治發黃。合甘草。則治急迫。合芒硝。則治堅塊。學者審諸仲景方中。用大黃者。不止於茲。而以其用之之微。顯然著明於茲。故不復贅。

歷代配述攷證 【唐】甄權藥性本草論大黃曰。通女子經候。利水腫。利大小腸。貼熱腫毒。小兒寒熱。時疾煩熱。蝕膿。(宋)大明日華諸家本草論大黃曰。通宜一切氣。調血脈。利關節。泄壅滯。水氣。溫瘴熱瘧。(金)張元素珍珠囊論大黃曰。瀉諸實熱不通。除下焦溼熱。消宿食。瀉心下痞滿。(明)李時珍本草綱目論大黃曰。下痢赤白。裏急後重。小便淋瀝。實熱燥結。潮熱譫語。黃疸。諸火瘡。(明)繆希雍本草經疏論大黃曰。大黃稟乎地之陰氣。獨厚。得乎天之寒氣。亦深。故其

味至苦。其氣大寒。無毒。入足陽明。大陰厥陰。并入手陽明經。氣味俱厚。味厚則發泄。故其性猛烈。善下泄。推陳致新。無所阻礙。所至蕩平。有戡定禍亂之功。故號將軍。味厚則入陰分。血者陰也。故主下瘀血。血閉寒熱。癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。通利水穀。其曰調中化食。安和五臟者。概指腹脹積滯既去。則實邪散而中自調。腹自和也。別錄又云。平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒熱。女子因寒血凝閉。而作脹。少腹痛。因於血閉。及諸老血留結。皆由通利開導之力所致也。總之。此藥乃除實熱燥結。下有形積滯之要品。隨經隨證。以為佐使。則奏功殊疾矣。(明)李士材本草圖解論大黃曰。大黃性極猛烈。故有將軍之號。本血分之藥。若在氣分用之。未免誅伐無過矣。瀉心湯治心氣不足。衄血吐血。乃心氣不足。而邪火有餘也。雖曰瀉心。實瀉血中伏火也。又仲景治心下痞滿。用大黃黃連瀉心湯。此亦瀉脾胃之溼熱。非瀉心也。病發於陰。而反下之。則為痞滿。乃寒傷

營血。邪氣乘虛結於上焦。故曰瀉心。實瀉脾也。病發於陽。而反下之。則為結胸。乃熱邪陷入血分。亦在上焦。大陷胸湯丸。皆用大黃。亦瀉脾胃血分之邪也。若結胸在氣分。只用小陷胸。痞痞滿在氣分。只用半夏瀉心湯。成無己不知分別此義。欲行下者。必生用之。若邪在上者。必須酒服。引上至高。驅熱而下也。欲取通利者。須與穀氣相遠。下後亦不得驟進穀氣。大黃得穀氣。便不能通利耳。大黃辛熱助火。火熾者有偏絕之虞。宜慎用之。(清)黃宮繡本草求真論大黃曰。大黃大苦大寒。性沉不降。用走不守。歸入陽明胃府。大腸大瀉。陽邪內結。宿食不消。故凡傷寒邪入胃府。而見日晡潮熱。譫語。便硬。腹痛。手不可近。及瘟疫瘧疾。下痢赤白。腹痛裏急。黃疸水腫。積聚留飲。宿食。心腹痞滿。二便不通。與熱結血分。一切癥瘕。血燥血實。祕熱等症。用此皆能推陳致新。定亂致治。故昔人云。有將軍之號。然苦則傷氣。寒則傷胃。下則亡陰。故必邪熱實結。宿食不下。用之得宜。若使病在

上院。雖或宿食不消。及見發熱。只須積實黃連。以消痞熱。宿食自通。若誤用大黃。推蕩不下。反致熱結。不消。爲害不淺。况先聲立藥治病。原有成則。如大黃芒硝。則瀉腸胃之燥熱。牽牛甘遂。則瀉腸胃之溼熱。巴豆硫黃。則瀉胃之寒結也。雖其所通則一。而性質有不同。當爲分視。至於老人虛秘。腹脹少食。婦人血枯。陰虛寒熱。脾氣痞積。腎虛動氣。及陰疽色白不起等症。不可妄用。以取虛虛之禍。用產錦紋者。良。生用峻。熟用純。忌進穀食。黃芩爲使。【清】張隱庵本草崇原論大黃曰。大黃味苦。氣寒色黃。臭香。乃瀉清中土之劑也。其性走而不守。主下瘀血。血閉。氣血不和。則爲寒爲熱。瘀血行而寒熱亦除矣。不但下瘀血。且破癥瘕積聚。留飲宿食。夫留飲宿食在於腸胃。癥瘕積聚。陳垢不清。故又曰。瀉滯腸胃。推陳致新。夫腸胃和則水穀通利。陳垢去則化食調中。故又曰。通利水穀。調中化食也。玉機真藏論云。五臟者。皆稟氣於胃。胃者。五臟之本也。胃氣安則五臟亦安。故又曰。

三靈 大

安和五臟。愚按大黃抑陽養陰。有安和五臟之功。故無毒。而本經名曰黃良。但行洩太迅。下瘀破積。故別名將軍。而列於下品。西北之人。土氣敦厚。陽氣伏藏。重用大黃。能養陰而不破洩。東南之人。土氣虛浮。陽氣外洩。稍用大黃。卽傷脾胃。此五方五土之有不同也。又總察四方之人。凡稟氣厚實。積熱留中。大黃能養陰而推陳致新。用之可也。若素稟虛寒。雖據證當用大黃。亦宜量其人而酌減。此因稟質之有不同也。至傷寒陽明篇中。三承氣湯。皆用大黃。大承氣。調胃承氣。與芒硝同用。所以承在上之火熱。而調其腸胃。使之下洩也。小承氣湯。但用大黃。不用芒硝。所以行腸胃之燥結也。燥結行。而陰陽上下內外皆和。今人不知傷寒精義。初起但發散而消食。次則平胃而揆磨。終則用大黃以攻下。不察肌表經脈之淺深。不明升降出入之妙義。胸膈不舒。卽謂有食。按之稍痛。更云有食。外熱不除。必絕其穀。腸虛不便。必下其糞。處方用藥。必至大黃而後已。夫稟質敦厚。或感冒

不深。雖遭毒害。不卽殞。當一二日而愈者。必至旬日。當旬而愈者。必至月餘。身愈之後。醫得居功。若正氣稍虛。或病邪猖獗。亦以此醫治之。此醫但知此法。鮮不至死。噫。醫所以寄死生。可以盲瞽不明者。而察秋毫之末乎。不思結網。但知羨魚。恥也。旁門管窺。居之不疑。恥更甚焉。【清】葉天士本草經解論大黃曰。大黃氣寒。稟天寒冬之水氣。入手太陽寒水小腸經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。手少陽相火三焦經。氣味俱降陰也。濁陰歸六腑。味厚則洩。衆入足陽明胃經。手陽明大腸經。爲瀉滯之品也。味厚爲陰。則入陰分。血者陰也。心主者也。血凝則瘀。大黃入心。味苦下洩。故下瘀血。血結則閉。陰不和陽。故寒熱生焉。大黃味苦下洩。則閉者通。陰和於陽。而寒熱止矣。癥瘕積聚。皆有形之質邪。大黃所至。蕩平故能破之。小腸爲受盛之官。無物不受。傳化失職。則飲留食積矣。大黃入小腸而下洩。所以下留飲宿食也。味厚則洩。濁歸六腑。大黃味厚爲陰。故入胃與

大腸。而有瀉滯之功也。消積下血。則陳者去而新者進。所以又有推陳致新之功焉。其推陳致新者。以胃潤而能通利水穀。不使阻礙腸胃中也。腸胃無礙。則陽明胃與太陽脾。調和而食消化矣。飲食消化。則陰之所生。本自五味。五臟主藏陰。陰生而臟安和矣。【清】鄭澍本草疏證論大黃曰。大黃之用。人概不知。兼能行火。實得火能生土之機括。何者。大黃色黃氣香。因爲脾藥。然黃中道理。狀如綿文。質色深紫。非火之質於土中耶。千金諸風門。仲景三黃湯。心近熱者。加大黃。肝臟門。犀角地黃湯。喜忘如狂者。加大黃。解五石毒門。人參湯。嘔盛者。加大黃。以此見土氣必得火氣貫入。而後能行。火氣必得土氣之通。而後能舒。火用不行。則積聚脹滿。癥瘕遂生。土氣不行。則煩懊譫妄。嘔惡竝作。兩相濟而適相成。胥於此識之矣。或謂如是。則本經首推大黃通血。固不妄矣。乃仲景偏以爲承氣。何哉。曰。自金元人以順穆承是理。遂不可通。試以六

八五

微旨大論。元則害。承通制之義。參之則承氣者。非血而何。夫氣有餘。即是火。而火不徒燃。必著於物。是故津液精唾。便溺涕淚。留飲宿食。及血皆火之存也。因火盛而存耗。存耗則火愈燃。火愈燃。則膏更易竭。故必增膏以配火。斯火復而膏亦復。然其所著不一。故為病亦不一。治之者。黃芩。知母。門冬。地黃。皆所以增膏培火者也。其所著之物不一。則其所著之處亦不一。故黃芩主著肺與脾者。知母主著肺腎與胃者。門冬主著心脾與胃者。然諸味所治。皆火僅著津液精唾。未必涉血。其同為著於血。又同歸心與脾者。惟地黃與大黃為然。特地黃氣味厚。為陰中之陰。大黃氣味疏。為陰中之陽。故地黃所主。是血虛火盛。大黃所主。是火盛著血。緣血虛而盛者。究係無根之火。故能著血。能著津液精唾。不能著留飲宿食。若夫火盛而能著血。則無處不可著矣。故著隧道則為血閉。突熱。著橫絡則為癥瘕積聚。著腸胃則為留飲宿食。大黃通血閉。實火用於土中。在隧道則隧道通。

在橫絡則橫絡通。在腸胃停滯則下。本經著其功曰。落澹腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。詎有澹散。乃或者以其推逐迅疾。斤斤然計較其不可用之處。累原遠篤。殊不知執定緣火盛著物。非絲陰虛陽亢二語。又豈有他歧之誤耶。桃核承氣湯。抵當湯。抵當丸。下瘀血湯。下瘀血散。柴胡加龍骨牡蠣湯。蠶甲煎丸。除血閉。寒熱者也。大黃蠶蟲丸。大黃牡丹湯。破癥瘕積聚者也。大陷胸湯。大陷胸丸。已椒瀉黃丸。大黃甘遂湯。桂苓五味甘草加葶辛半夏大黃湯。祛留飲者也。厚朴七物厚朴三物湯。厚朴大黃湯。推宿食者也。火有微盛。著有淺深。宜緩宜急。為湯為丸。審而處之。而後知用大黃之慎也。血液津潤。涕唾。人身已化之水氣也。飲人身未化之水氣也。火氣著於血液津潤。涕唾。則血液津潤。涕唾。結而不行。遂不能洩澤骨節。滑利諸竅。用大黃去結於血液津潤。涕唾。唾之火。使血液津潤。涕唾。得復其用。可已未化之飲。非血液津潤。涕唾。唾比也。火亦著之。仍可以大

黃去其結耶。是則不然。蓋大黃之用。惟在火結於人身。實有之物。飲之為飲。雖已在人身。未與人身。飲則猶在虛處。未入實處也。未入實處之物。縱為火著。即以大黃去火。火去飲能仍留為患。故大陷胸湯丸。已椒瀉黃丸。大黃甘遂湯。皆有藉乎甘遂。葶藶。不全恃大黃。已然則溼熱發黃者。亦用大黃。夫溼又非飲比。乃溼漫發露之氣也。又何能與火結。而茵陳蒿湯。梔子大黃湯。大黃硝石湯。均不離大黃之峻且速耶。是又不然。蓋發黃之溼。非外感之溼。所謂溼漫發露者也。考傷寒金匱所載。痘證。一則曰。但頭汗出。餘處無汗。齊頸而還。小便不利。則當發黃。再則曰。發熱汗出。此為熱越。不能發黃。夫汗即津也。小便不得越下。不得洩。而生則仍是人身實有之物。反非如飲之未化者矣。雖然。觀所謂發黃者。曰。食飽則微煩。頭眩。小便難。曰。風寒相搏。食穀即眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。曰。食即頭眩。心腹不安。是發痘

者。氣有食而非徒溼矣。酒疸曰。小便不利。胸中熱。足下熱。曰。腹滿欲吐。鼻燥。脈沈弦。曰。心中懊憹。或熱痛。是酒疸之熱之盛。又非發痘可比矣。於此見大黃之用。火不盛者。必溼發黃。乃為得當也。

國外學說 日本學說謂日本大黃(於保志)者。清水直氏曾著有極有興味之實驗(於保志考) 豬子氏惜其埋沒。特抄錄於和漢藥論中。清水氏以為日本大黃。所以比中國大黃劣者。蓋有簡單之理由在。即甲含有過多之單羧酸。不異於乙。然尚有過多之單羧酸。存。因是妨下泄之效。氏乃欲除去單羧。因於日本大黃之浸劑。加膠液。有多量之沈澱。是即因有單羧故也。而其與膠質之抱合物。可去其收斂之效。以此法行人體試驗。得其成績。一以阿膠於保志之前。汁。與其澱相合。使一少年十六歲。平常壯健之人。於戌時服之。至翌日巳時。始通利。其性幾如中國大黃。其將下時。覺微悶。無腹痛。却比中國大黃為優。下後。即已霍然。然以多量之大黃。且使單羧之全無

者。此法尚不足信。因以於保志一錢。同膠三分。自試。合而煎服。翌早未如中國大黃之快通軟便。但會未腹痛。二一少年十六歲壯健者。作合法之前一方與之。亦無腹痛。得通便。又日本藥局方云。於消化不良。以〇・一至〇・五一日數回與之。爲下劑。則服大量。〇・五至五・〇可得通便一次。又日本龜田貞曰。大黃之原植物。乃屬於蓼科之植物。以中國西部青海山岳地方爲中心。而漸散布於甘肅、陝西、四川、西藏等一帶地方而產生。又有本邦輕津產大黃。及其他英國產、法國產、奧國產之大黃等。然其主成分之含量。皆少遜於中國產。而不適於內用者。故日本藥局方。咸採用中國產大黃也。本植物。乃多年性野生植物。葉爲掌狀而互生。有長葉柄。夏秋之間。開黃白色之小花。藥用者。乃於每年之九月十月之交。而採掘其約經五六年之根莖。而除去其外皮部及細根。再以刀橫截或縱割而陰乾之。其形有種種。有孔穴。質緻密。而類黃色者。其爲重量塊片之粉末。

三鹽 大

則深橙黃色也。本品用於消化不良。健胃止瀉。慢性腸加答兒等症。本品含有加他兒精（ガタルチン）酸。偏利叔仿（クリソフアン）酸。愛母精（エモチン）列音（レイン）酸。偏利叔仿（クリソフアン）酸。美督兒愛斯的兒（メチールエステル）愛利脫落立精（エリトロレン）否惡立精（フェネレチン）蒺藜鈣澱粉。灰鞣酸。香氣（揮發油）等之成分。而此等諸成分。皆溶解於水。酒精之混液。本品爲健胃劑。緩下劑。而使用之理由者。以大黃之諸成分。皆易溶解於水之膠樣醣糖質。而此物內服後。即由脾液之工作。與酸化作用所分解。而游離偏利叔仿酸。愛母精等。此偏利叔仿酸。愛母精之各一部分。由胃所吸收。其殘餘則轉入於大腸。而刺戟腸壁以催便通。其他之成分。如鞣模質（椽皮質）黏液質。石灰鹽等。均足使誘發下劑。上述之偏利叔仿酸。愛母精。乃由胃所吸收。故若用純粹之者。未必起下劑也。大黃以偏利叔仿酸。愛母精之與黏液

椽皮質。其他之成分共存在。故入於胃中。即爲黏液椽皮質而妨礙其所吸收。及轉輸於大腸。則刺戟其腸壁。以起下劑也。大黃之〇・〇三・〇・五。爲健胃止瀉之作用。此乃因含有苦味質鞣酸等多於起下劑之成分。故不起下劑也。大黃之一・二・〇之緩下作用者。爲椽皮黏液質。不刺戟小腸而主刺戟大腸。亢進蠕動而制止逆蠕動。使亢進排便反射機能。故糞便一入於大腸。即直與便意也。如上述大黃之成分。係工作於大腸。故服用後於八—十時間之後。即顯下劑也。但大黃之大量。得如峻下劑而劇起下劑也。本品以無副作用。故適用於貧血。或在恢復期之其他衰弱狀態之患者。雖妊娠。炎症等有忌濼峻下之候。即用之亦得無危險矣。惟在腸管發炎之狀態之候。則禁忌矣。大黃以含有鞣酸。故起下劑之後。有便秘之弊。故凡習性便秘者。爲不宜服也。然因服用後所下之便。爲軟下便。或粥狀便。倘與他藥劑之配劑之候。略爲斟酌。則得除去此弊矣。

英美學說謂大黃一名川軍。又名黃良。產滿洲、四川、與西藏等處。而俄國之南及阿富汗、波斯、土耳其亦產之。高約七尺。其根去皮令乾。可入藥。酒水均能提出功力。英國有一種。植於園圃中。專食其根。不入藥品。大黃之上等者。係產中國之滿洲及西藏。運至俄國。而轉售於各西國。今西國常出售之大黃。約分六種。第一種爲俄羅斯大黃。又名土耳其大黃。而俄羅斯國內名曰中國大黃。第二種爲滿加里大黃。第三種爲中國大黃。又名西印度大黃。第四種爲西伯利大黃。第五種爲雪山大黃。第六種爲英國大黃。近俄羅斯國與中國交界處。恰克圖（即買賣額）設大黃局。大黃之根形如蘿蔔。而每多蟲口。質頗脆。有紅黃白三線紋。現於其破口。作末則色呈黝黃。其氣香味苦。略澀。入口嘗試。令津黃而帶少沙。其性爲瀉藥。又爲收斂藥。輕補藥。令腸內顯其逐下斂實之力。所瀉之糞略稠。已瀉後則有收斂性。故此藥治泄瀉最佳。因其先放出腸內之質。後有補性。如食小服。則

為補藥。或為補胃藥。其顏色料易收入人之身體內。服後不久。其色即見於溺中。如小兒常服之。則為微利藥。可合於承(二)綠同服。又可合於澱酸之質與香料同服。凡欲服輕瀉藥。亦可用此。若將此藥研至極細。則其力愈大。因其易於入血也。如宜用之。能利大便。輕用則非特不能利。而反以止瀉。欲利大便。每服二分至三分。如僅服五分。則可助消化而益身。第此藥祇利大便。並非令水瀉。大瀉其功用能去積滯。助消化。治久痢疾。嬰兒霍亂。本品之處方。①大黃一兩。六錢粗末。沸水十三兩。浸二天。用布漉渣。加入冰花糖二十四兩。每服一錢至二錢。如小兒肚瀉。或大便秘結。均可服。②大黃一錢。粗到大茴香三分。半粗末。洋朴硝四錢。沸水五兩。浸漉分兩服。能輕瀉。③大黃二分。七釐。研細末。青礬二分。七釐。研細末。洋肥皂六分。八釐。研末。和清水作丸。四十顆。如小兒疳積或熱症。宜和沙糖同服。兼治大便秘結。胃不消化。午後服三四丸。甚驗。其用益。滋補開胃。每服

二釐至八釐。輕瀉。每服二分至三分。重瀉。每服三分半至一錢。瀉有佐他藥同服者。如與承(二)綠同服。即重瀉。

辨偽 ①鄭有慶云。大黃本經謂之黃良。後人謂之將軍。以其有伐邪去亂之功也。古人以出河西隴西者為勝。今以莊浪所產者為佳。故一名莊大黃。莊浪縣即古溼原隴西地。至川中所出。有錦紋者。亦可用。味苦氣寒。色黃臭香。紫地有錦紋。方堪入藥。若此種土大黃。中微淡不黃。只可用為香料。蓋其性不能通利。若誤服之。且能燥腸。護穢。當細辨之。②曹炳章云。按大黃九十月出新。陝西甘肅。涼州衛出者。堅硬緊結。色黃。頭起錦紋。似冰旋。斑為最佳。故俗名錦紋大黃。河南。西寧州出者。形狀與前相類。質略鬆。或曰中大黃。四川出者。空鬆。為馬蹄大黃。最次。山西亦出名。味黃。久而變黑。更次。皆不堪藥用。鄭君所云土大黃。或即此類也。

走。直達下焦。深入血分。無堅不破。滲滲積垢。有犁庭掃穴。攘除姦凶之功。因有將軍之稱。生用者。其力全迅。如走丸。一過不留。除邪而不傷正氣。此大將軍救民水火。而不擾閭閻者也。製過者。其力已緩。頗難速效。正猶縛育而使臨大敵。亦無以展其所長。東垣謂治在上者。非酒不至。必用酒浸。引上至高之分。驅熱而下。未免矯揉造作。用違其長。謂仲景瀉心法。可悟古人無此制度。而俗人見說不真。藉口和平兩字。以為嘗試之計。謬矣。但久製者可從小便。以導滯熱。惟清寧丸。能有此功。而尋常之酒製軍。非其倫比。近人亦有謂生者走後陰。熟者走前陰。殊不確也。金匱瀉心湯。治吐血衄血。明是陽明亢上。逆道血妄行。故以大黃。率連。直折其炎上之勢。而乃云心氣不足。必是傳寫有誤。致令古今諸家。為此節作說解者。皆囁嚅而不可解。不若醫宗金鑑。逕改為心氣有餘。何等直捷爽快。承氣法得根實。則其行尤速。得芒硝則頓堅。可化燥矢。為瀉糞。但其味大苦。最傷胃氣。胃

弱者得之。無不減食。且不知味。苟非溼熱羶結。不必輕率採用。凡老年氣弱。瘦人陰虛。即有大便秘結。欲解不解見症。頗恒用玄明粉七分。八分。或合枳實四五分。枳殼六七分。奏功甚捷。無礙胃腹痛之弊。且亦一過無餘。力亦不亞於生軍。較為輕微。淡遠。不動聲色。亦猶么麼小醜。尚非披險負嶠。則一偏裨之職。亦足以落平之。正不煩名將親征。小題大做云爾。③郭紹庭曰。大黃本經名為黃良。乃植物之一。其性寒。其味苦。氣味俱厚。為脾胃大腸肝與三焦血分之藥。當十四紀時。即輸入歐洲。其由印度及波斯。而而至紅海者。名曰東印度大黃。由波斯及裏海。而至西利亞安息。再自阿勒波斯。墨那(皆土耳其地)運往歐洲者。名曰土耳其大黃。吾國大黃。雖早已輸入歐洲。初未嘗見重。迨西曆一千六百五十年。吾國許俄國通商西鄙。而大黃乃歸俄人專賣。於是吾國所產者。始推為世界第一。以產自四川西部山中。色如錦紋。而潤者為最佳。餘如直隸。山西。陝西。甘肅。產者

稍次。英、法、奧各國所產者。皆屬劣品。不堪入藥。至大黃之形狀。各有不同。有如蘿蔔者。有如球狀者。有如圓筒者。有一面隆凸一面扁平者。大黃之質質。乃細胞組織及脈管而成。所含成分。為澱粉及羧酸鈣等之結晶。設使試以大黃放於口內嚼之。其聲如嚼沙泥。即澱粉與羧酸結晶相摩擦之證。其應用功效。須俟用量之多寡為定。若用少量則有強壯消化及止瀉之功。中量則有宣通便秘之效。大量則起峻烈之瀉下作用。故本品對於病弱者。老人及小兒。尤為適用。小量假使血枯便秘。氣虛便難。脾虛腹脹等病。妄用之。必啓虛虛之禍。總之藥用當而適。在乎用之者。得其權衡可耳。①顯子靜曰。大黃為中國中部并北部高嶺（亞細亞高地）所產。蓴科植物之大宿根草。及其他大黃屬植物之根莖。去其皮而乾燥之。成堅硬之截片。其形狀有種種。外面類黃色。多帶白色粉點。內部之質質白色。而錯雜以帶褐赤色之紋線。紋理一如大理石。有特異之臭與苦味。粉碎

之。則成淺褐黃色之粉末。歐洲產者。其根細長。無中國產之固有紋理。質亦較劣。藥用上皆中國大黃。大黃之成分。最著者有四種。一為有瀉下作用之卡泰林。二為苦味質。三為大黃鞣酸。四為格里索弗。此外尚有格里索弗。泛屋來辟。愛莫琴等。但不甚重要。上述之四成分。格里索弗。益酸。有強刺戟作用。但含量極少。因其吸收甚速。故稍能瀉下。又此質與格里索弗。益酸。皆為大黃之染色成分。吸收後分泌或排泄物。如尿汗乳汁。漿便。呈顯著之黃色或黃褐色。此尿若加鹼性溶液。則變赤色。他三者相合。另有一種作用。於用少量大黃時見之。（即一日數次。一釐半至一分半）則苦味質與大黃鞣酸。制止胃內之異常發酵。并抑止惡心嘔氣及下痢。而健全之人。可因此增進食慾。阻遏便通。稍大量（二分七釐至五分四釐）卡泰林遲作用。服食後五時至十時。下痢便。並不障礙食慾。但卡泰林極易排出體外。即瀉下全止。轉因滯留鞣酸。有起輕度之便秘者。大黃之

醫療應用。少量為消化藥。止瀉藥。一日數次。一釐半至九釐。用於消化不良。兼下痢者。大量一日數次。九釐至一分四釐。則緩下。更大量。一次五分四釐至一錢三分五釐。則強瀉下。凡老人。小兒。貧血家。病弱者等。常用之。以大量不害消化也。又用於常習性便秘。但久用。有反成便秘者。

配合應用 ①小承氣湯。用大黃。枳實。厚朴。治傷寒熱病。邪結中焦。

②治傷寒病發於陰而反下之。心下滿而不痛。按之濡。此為痞也。大黃黃連瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。分作二次溫服。

③潔古用以瀉諸實熱不通。及瀉心下痞滿。由於實。皆本仲景法也。

④瀉下赤白初起。壯實之人。可同枳殼。檳榔。當歸。甘草。滑石。作丸投之。是迎而奪之之法也。然不可過劑。過劑則傷胃氣。

⑤作癰腫圍藥。同白及。白欬。炒陳小粉。沒藥。乳香。醋蜜調得。

⑥治一切因夜發為怪證。凡人食已即吐。此胸中有火也。大黃一兩。甘草（炙）二錢五分。水一碗。煮半升。溫服。此真方。痰痰丸也。若入假天芥為丸更妙。（仲景金匱玉函方）

⑦治中上二焦有熱。因發偏頭風。諸藥不效。自將損者。用西大黃。并蜜及竹瀝。九蒸九晒。粉糊為丸。如麻子大。薄荷湯吞三錢。有殊功。又治中焦脾胃濕熱。下流客腎。以致飽後夜臥即夢。臨臥以升麻。陳皮湯吞三四錢。溼熱去即止。

⑧治吐血。血及心氣不足。瀉心湯主之。用大黃二兩。黃連黃芩各一兩。水三升。煮一升。熱服。取利。（金匱方）

⑨治吐血刺痛。川大黃一兩。為散。每服一錢。以生地黃汁一合。水半盞。煎三五沸。無時服。（簡要濟衆方）

⑩治熱病譫狂。川大黃五兩。剉炒。微赤。為散。用臘雪水五升。煎如膏。每服半匙。冷水下。（聖惠方）

⑪治腰脚風氣作痛。大黃二兩。切如棋子。和少酥炒乾。勿令焦。搗

三畫 大

每用二錢。空心以水三大合。入薑三片。煎十餘沸。取湯調服。當下冷膿惡物。即痛止。(海上方)

治風熱積滯。化痰涎。治痞悶。消食化氣。導血。用大黃四兩。牽牛子半。炒生四兩。為末。煉蜜丸。如梧子大。每服十丸。白湯下。並不損人。如要微利。加一二十丸。又衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸。名痰痰丸。又名全真丸。金宣宗服之有驗。賜名保安丸。(經驗方)

痰痰丸。治痰為百病。惟水瀉胎前產後不可服用。用大黃酒浸蒸熟。切晒八兩。生黃芩八兩。沉香半兩。青礬石二兩。以絹滑二兩。同入砂鑪。固濟。澱紅。研末二兩。右各取末。以水和丸。梧子大。常服一二十丸。小病五六丸。緩病七八丸。急病一百二十丸。溫水吞下。即臥勿動。候藥逐上。焦痰滯。次日先下。稍稍。次下痰涎。未下再服。王隱君每歲合四十餘斤。愈疾數萬也。(養生主論方)

治婦人經血不通。赤白帶下。崩漏不止。胎風下血。五淋。產後積血。瘀癥腹痛。男子五勞七傷。小兒

骨蒸潮熱等症。其效甚速。宜六癸日合之。用錦紋大黃一斤。分作四分。一分用童尿一盞。食鹽二錢。浸一日。切晒。一分用醇酒一盞。浸一日。切晒。再以巴豆仁三十五粒。同炒。豆黃去。豆不用。一分用紅花四兩。泡水一盞。浸一日。切晒。一分用當歸四兩。入淡醋一盞。同浸一日。去歸切晒。為末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。取下惡物為驗。未下再服。(醫林集要方)

治心腹諸疾。卒暴百病。大黃、巴豆、乾薑各一兩。搗篩。蜜和。搗一千杵。丸小豆大。每服三九。凡中客卒忤。心腹脹滿。痛如錐刀。氣急口噤。停尸卒死者。以暖水或酒服之。或灌之。未知更服三丸。腹中鳴轉。當吐下便愈。若口已噤者。折齒灌之。入喉即痊。此仲景方。司空裴秀改為散用。不及丸也。(圖經方)

治腹中痞塊。大黃十兩。為散。醋三升。蜜兩匙。和煎丸。梧子大。每服三十丸。生薑湯下。以吐利為度。(外臺祕要方)

治腹脇積塊。風化石灰末半斤。瓦器炒極熱。稍冷。入大黃末一

兩。炒熱。入桂心末半兩。略炒。下米醋。攪成膏。攤布貼之。又方。大黃二兩。朴硝一兩。為末。以大蒜同搗。膏和貼之。或加阿魏一兩。尤妙。(丹溪方)

治久患積聚。二便不利。上搶心腹。脹滿害食。大黃白芍各二兩。為末。水丸。梧子大。每湯下四十丸。日三。以知為度。(千金方)

治脾癖疳積。不拘大人小兒。錦紋大黃三兩。為末。醋一盞。沙鍋內文武火熬成膏。傾瓦上。日晒夜露三日。再研。用船上硫黃一兩。形如琥珀者。官粉一兩。同研勻。十歲以下小兒半錢。大人一錢。半。米飲下。忌一切生冷魚肉。只食白粥。中月。如一月不愈。半月之後再服。若不忌口。不如勿服。(聖濟總錄方)

治小兒無辜。閃癖癩癧。或頭乾黃。或午拘午瘥。諸狀多者。大黃煎主之。大黃九兩。錦紋絞新質者。若微朽。即不中用。削去皮。搗篩。為散。以好米醋三升。和置瓦盤中。於大鐵內浮湯上。炭火慢煮。至成膏。可丸。乃貯器中。三歲兒一服。七丸。梧子大。日再服。以下出背赤。腹為

度。若不下。或下少。稍稍加丸。若下多。又須減之。病重者。七八劑。方盡根。大人亦可用之。此藥惟下宿膿。不令小兒利也。須禁食毒物。乳母亦禁之。一加木香一兩。中。(世知梯方)

治小兒諸熱。大黃煨熟。黃芩各一兩。為末。煉蜜丸。麻子大。每服只可五丸。至十丸。蜜湯下。加黃連名三黃丸。(錢氏小兒方)

治骨蒸積熱。漸漸黃瘦。大黃四分。以童子小便五六合。煎取四合。去滓。空腹分為二服。如人行五里再服。(廣利方)

治赤白濁淋。好大黃為末。每服六分。以雞子一個。破頂入藥。攪勻。蒸熟。空心食之。不過三服。自愈。(簡便方)

治相火秘結。大黃末一兩。牽牛頭末半兩。每服三錢。有厥冷者。酒服。無厥冷而心煩。蜜湯服。(保命集方)

治諸痢初起。大黃煨熟。當歸各二三錢。壯人各一兩。水煎服。取利。或加用檳榔。(集簡方)

治熱痢甚急。大黃一兩。酒浸

半日煎服取利。(集簡方)

①治忽喘悶絕不能言語。涎流吐逆。牙齒動搖。氣出轉大。絕而復蘇。名傷寒併熱。霍亂。用大黃人參各半兩。水二盞煎一盞。熱服可安。(危氏得效方)

②治婦人血癰痛。大黃一兩。酒二升。煮十沸。頓服取利。(千金方)

③治產後血塊。大黃末一兩。頭醋半升。熬膏。丸梧子大。每服五丸。溫醋化服。良久下。(千金方)

④治乾血氣痛。錦紋大黃酒浸。晒乾四兩。為末。好醋一升。熬成膏。丸茨子大。臥時酒化一丸服。大便利一二行。紅漏自下。乃調經仙藥也。或加香附。(董氏集驗方)

⑤治婦人腰痛。小戶腫痛也。大黃一兩。酒一升。煮一沸。頓服。(千金方)

⑥治男子偏墜作痛。大黃末和醋塗之。乾則易。(梅師方)

⑦治溼熱眩暈不可當者。酒炒大黃為末。茶清服二錢。急則治其標也。(丹溪方)

⑧治小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服半

合。餘者塗頂上。乾即再上。(姚和衆至寶方)

⑨治暴赤目痛。四物湯加大黃酒煎服之。(傳信適用方)

⑩治胃火牙痛。含冰水一口。以紙擦蘸大黃末。隨左右嚔鼻立止。(儒門事親方)

⑪治風熱牙痛。去口氣。好大黃瓶內令燒。存性為末。早晚搽牙漱去。(千金方)

⑫治牙根常出血。漸至崩落。及口臭。大黃米泔浸軟。生地黄各旋切一片。合定貼上一夜即愈。未愈再貼。忌說話。恐引入風。(本事方)

⑬治口瘡糜爛。用大黃枯礬等分為末。以酒之吐涎。(聖惠方)

⑭治鼻中生瘡。生大黃。杏仁搗勻。猪脂和塗。又方生大黃。黃連各一錢。麝香少許為末。用生油調搽。(聖惠方)

⑮治從高墜下。木石壓傷。及一切損傷。瘀血凝積。痛不可忍。大黃酒煮一兩。杏仁去皮三七粒。細研酒一盞。煎六分。雞鳴時服。至曉取下。瘀血即愈。(三因方)又治跌壓瘀血在內。脹滿。大黃當歸等分。炒

研。每服四錢。酒溫服。取下惡物即愈。(和濟方)

⑯治打撲傷痕。瘀血滾注。或作潮熱者。大黃末。薑汁調塗。一夜。黑者紫。二夜紫者白矣。(集簡方)

⑰治杖瘡腫痛。大黃末醋調塗之。蜜尿亦可調之。(摘玄方)

⑱治金瘡煩痛。大便不利。大黃。黃芩等分為末。蜜丸。先食。水下十丸。日三服。(千金方)

⑲治凍瘡破爛。大黃末水調塗之。(衛生寶鑑方)

⑳治湯火傷灼。在浪大黃生研。蜜調塗之。不惟止痛。而且滅瘡。

㉑治灸瘡飛蝶。因艾灸訖。火瘡便退。瘡內鮮肉。片如飛蝶而去。痛不可忍。是火毒也。大黃朴硝各半兩。為末。水服取利。即愈。(張杲方)

㉒治螻蛄咬瘡。大黃末調塗之。(張杲方)

㉓治火丹赤腫。遍身者。大黃磨水。頻刷之。(救急方)

㉔治腫毒初起。大黃。五倍子。黃蘗等分為末。新汲水調塗。日四五次。(簡便方)

㉕治癰腫熾熱。大黃末醋調塗之。燥即易。不過數日即退。甚驗。神方也。(肘後方)

㉖治乳癰腫毒。用川大黃。粉草各一兩。為末。好酒熬成膏。收之。以粗攤貼瘡上。仰臥。仍先以溫酒服一大匙。明日取下惡物。(婦人經驗方)

㉗治大風癩瘡。大黃煨一兩。皂夾刺一兩。為末。每服方寸匕。空心溫酒下。取出惡毒物如魚鱗狀。未下再服。即取下如亂髮之蟲。取盡。乃服雄黃花蛇。藥名通天再造散。(十便良方)

施用宜忌 凡血分無熱。鬱結積者。禁用。

配合宜忌 忌冷水。惡乾漆。黃芩為之使。

著名方劑 ①三黃湯。治三焦實熱。一切有餘火症。大便祿結者。(本事方)用大黃。黃芩。黃連各等分。水煎服。②大黃蠶蟲丸。五勞虛極。羸弱。腹滿不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黑暗。此丸主之。(金匱方)用大黃十

分。黃芩二兩。甘草三兩。桃仁一

升杏仁一升。芍藥四兩。乾地黄十兩。蟬蛸一升。乾漆一兩。蠶蟲一升。水經百枚。蠶蟲半升。十二味爲末。煉蜜爲丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。⑤梔子大黃湯。治酒黃疸。心中懊憹或熱痛。此方主之。(金匱方)用梔子十四枚。大黃一兩。枳實五枚。豉一升。四味以水六升。煮取二升。分溫三服。⑥涼膈散。治心火上盛。中焦燥實。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便秘。諸風癩癧。發斑發狂。及小兒驚風。痘毒黑陷。(局方)用連翹四兩。大黃(酒浸)芒硝甘草各二兩。黃芩(酒炒)薄荷梔子各二兩。爲末。每服三錢。加竹葉生蜜煎。

西羌蜀地者佳。幽并以北者漸細。氣力不及蜀中者。(蘇恭)①凡用當分別之。若取和厚深沈能攻病者。可用蜀中似牛舌片緊硬者。若取瀉洩酸快。推陳去熱者。當取河西錦文者。(陳藏器)②本草稱大黃推陳致新。其效最神。故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒用處尤多。古人用毒藥攻病。必隨人之虛實寒熱而處置。非一切輕用也。梁武帝因發熱。欲飲大黃。姚僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊年高不可輕用。帝弗從。幾至委頓。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥。可漸宣通。僧坦曰。脈洪而實。此有宿垢。非用大黃無理。帝從之。遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其僥中便謂此方神奇。其差誤則不言用藥之失。可不戒哉。蓋用藥不中。皆由審病未得其源故也。(蘇頌)③金蜀川。河東。陝西州郡皆有之。以蜀川錦文者佳。其次秦隴來者。謂之土番大黃。正月內生青葉。似薤麻。大者如扇。根如芋。大者如盤。長一二尺。其細根如牛蒡。小者亦如芋。四月開黃花。亦有青

紅似薤麥花者。莖青紫色。形如竹。二八採根。去黑皮。切作橫片。火乾。蜀大黃乃作緊片。如牛舌形。謂之牛舌大黃。二者功用相等。江淮出者曰上大黃。二月開花。結細實。(蘇頌)④朔州出一種羊蹄大黃。治疥癬甚效。初生苗葉。累年長大。葉即似商陸而狹尖。四月內抽條出穗。五七莖相合。花葉同色。結實如薔麥而輕小。五月熟即黃色。呼爲金薔麥。三月採苗。五月採實。陰乾。九月採根破之。亦有錦文。亦呼爲土大黃。(蘇頌)⑤凡病在氣分。及胃寒血虛。并妊娠產後。並勿輕用。其性苦寒。能傷元氣。耗陰血。故也。(李時珍)⑥蘇說卽老羊蹄根也。因其似大黃。故謂之羊蹄大黃。實非一類。又一種酸模。乃山大黃也。狀似羊蹄。而生山上。所謂土大黃。或指此。非羊蹄也。(李時珍)⑦大黃佐以甘草。桔梗。可緩其行。佐以芒硝。厚朴。益助其銳。(張景岳)⑧大黃芒硝。瀉腸胃之燥熱。牽牛。甘遂。瀉腸胃之溼熱。巴豆。硫黃。瀉腸胃之寒結。各有定例。(張石頑)⑨大黃下走。用之於下。

必用生。若邪在上。必酒浸引上。至高之分。曬熱而下。若止用生。則導至高之邪熱。(李東垣)⑩石府能清陽明經熱。經熱清。邪鬼自除。大黃能清陽明腑熱。腑熱清。五臟自安。故此時之邪鬼。非石膏不能除。此時之五臟。非大黃不安。又曰。大黃生者走後陰。熟者走前陰。(陸九芝)⑪大黃內有苦味之質。並有松香類之質。以爲補瀉兼備之藥。用作藥品。大半取其瀉性。食物不消化。或胃中有酸。可與饑餐相和服之。痛風。可與水銀丸相和服之。雖能瀉瀉。不致腹痛。既瀉之後。略能令大便不通。西藥略釋。研至極細。功力愈大。蓋因其易入血也。每服二分至三分。則利大便。服五釐至一分。可助消化而益身。(儒門醫學)⑫大黃味苦而氣香。多用則瀉。少用則收斂。略補胃開胃。食一二刻後。小便必黃。因入血甚速之故也。(內科學說)⑬中國產大黃。由廣東及他港運至歐洲。日本。用木箱裝之。每箱重一百三十餘斤。係於初春未萌芽前。採掘其根。去外皮。陰乾二三日。貫以繩。

懸瀉處乾燥之。有因受濕氣而傾向腐敗者。則其質輕虛。且作海綿狀。易蠶蝕。第三版改正日本藥局方曰。大黃係採取亞細亞北部所產大黃屬 (*Rhoadulata*) 植物之根莖。去皮乾燥用之者。本品在新鮮時。破碎面作顆粒狀。略帶赤色。隨部有多數細小作放線狀之脈管束。其輪狀之新生組織及內方有篩脈管。本品味稍芳香而苦。第四版改正日本藥局方。收載大黃及唐大黃二種。日本藥舖所傳之大黃。昔時有唐大黃、真大黃 (產日本諸地、漢種) 種大黃 (御藥園者) 野大黃 (爲羊蹄根) 等。但普通多分大黃爲亞洲產與歐洲產二種。藥用則採用華產及俄產。歐產不甚用之。日本各地。如陸奧之津輕。大和之宇陀等。所栽植之大黃 (漢種大黃) 日名謂之於保志 (*Rhounundulata*, J.) 藥舖呼爲真大黃。形態類中國產。色深黃。質粗糙而不堅。切片或有紫紋。味微苦多澀。下利功效極微。非頓服其粉末一錢至三錢。不見功效。安政五年清水直著於保志

考。略謂服於保志。則起腹痛腹滿。此因該品中含有多量單寧質。與腸胃中之膠質結合。引起絞攣。奪其黏液。而妨礙下利。若預先配合阿膠服之。則腹全不痛。而奏下利之效云。著者每於保志一錢。加阿膠一錢。至三錢。合煎用之。(和漢藥考)

【大黃苗】 性質 苦寒。無毒。
主治 通大便。清腸熱。

【大黃葉】 性質 酸寒。無毒。
主治 置薦下。可以辟風濕。

【大黃蜂】 古籍別名 黑者名胡蜂 (廣雅) 蠶蜂。觚觚蜂。支觚蜂。(本草綱目)

形態 大黃蜂形大於蜜蜂。而色香。即在屋上簷下及大木間作房之觚觚蜂也。

性質 甘涼。有小毒。
主治 心腹脹滿痛。乾嘔。輕身益氣。

【現代配述攷】 【明】李時珍本草綱目論大黃蜂子曰。治雀卵斑。百餘。餘功同蜜蜂子。

參攷資料 ●按嶺南人取其

子作饌食之。其蜂黃色。比蜜蜂更大。按嶺表異錄云。宜欽人好食蜂兒。山林間大蜂結房。大者如巨鐘。其房數百層。土人採時。著草衣蔽身。以捍其毒螫。復以烟火熏去蜂母。乃致築綠崖木。斷其蒂。一房蜂兒五六斗至一石。揀狀如蠶蛹。瑩白者。以鹽炒暴乾。寄入京洛。以爲方物。然房中蜂兒三分之一。翅足已成。則不堪用。據此則木上作房。蓋觚觚之類。然今宣城蜂子。乃握地取之。似土蜂也。郭璞註爾雅云。土蜂乃大蜂在地中作房。木蜂似土蜂而小。江東人並食其子。實則二蜂皆可食久矣。大抵性味亦不相遠也。(蘇頌) ●凡物黑色者謂之胡。其蠶觚觚類。皆象形命名也。觚觚苦氣之名。楚辭云。支蜂若蠶是矣。大黃蜂色黃。觚觚蜂色黑。乃一類二種也。陶說爲是。蘇頌以爲一種非矣。然蜂蟻蜂房。功用則一。故不必分條。(李時珍)

【大黑黍】即黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「黍」條。

【大楊】即蒲柳之皮紅者。性質功用與水楊同。參見「水楊」條。

【大楓子】 命名 本品能治大風癩疾。故名。
處方用名 大風子。

外國名詞 *Gynocarpia* (拉丁) *Chaunagra* (英) *Geno-karia* (德)

基本 屬椅科。藥用大楓樹之子核。

產地 陳仁山藥物生產辨云。大楓子產安南。暹羅。印度等處。但以安南爲好。五六月新。

形態 大楓樹屬落葉喬木。其所結果實。爲大如橙果之球形。形果外殼硬固。作木質狀。被有鬚毛。果皮有多數子核。謂之大楓子。其形扁平。稍有稜角。作不正橢圓形。大寸許。外皮薄而滑澤。呈灰色。中藏有油狀富蛋白質之子芽。

製法 李時珍曰。凡取大風子油法。用子三觔。去殼及黃油者。研極爛。瓊器盛之。封口入滾湯中。蓋鍋密。勿令透氣。文武火煎至黑色。如膏。名大風油。可以入藥。

性質 辛熱。有毒。

成分 大風油中含有脂肪。其

色爲黃色或黃褐色軟膏狀之脂肪油。稍溶於酒精。善溶於伊打及哥羅仿姆。

效能 治癩癩。殺癩蟲。塗疥癬。大楓油爲治癩癩癩病之唯一良藥。在胃中與胃液起作用。而將 Cynocarbolic acid 分出。至腸由腸壁而吸入血中。使癩菌與之相遇而致死之。外用亦有同樣功用。內服最易刺激胃黏膜。使胃液分泌驟增。若久服之。則易起腸胃炎。

主治 風濕疥癩楊梅諸瘡。攻毒殺蟲。

歷代紀述攷證 【明】釋希雍本草經疏論大楓子曰。大楓子。稟火金之氣以生。故其味辛苦。氣熱有毒。辛能散風。苦能殺蟲。燥溼。溫熱能通行經絡。世人用以治大風癩疾。及風癬疥癩諸瘡。悉此意耳。然性熱而燥。傷血損陰。不宜多服。用之外治。其功不可備述也。【清】黃宮繡本草求真論大楓子曰。大楓子。木屬毒藥耳。按據諸書皆載味辛性熱。其藥止可取油。以殺瘡疥。若用此以治大風癩則先傷血

而失明矣。故凡血燥之病。宜用苦寒以勝。縱有瘡疥。宜辛宜熱。而血有受損。不更使病益劇乎。即或效以驟成功。以劫致。然烈毒之性。不可多服。惟用外敷。不入內治。其功或不沒也。凡入丸藥湯藥。俱宜除油爲妙。

國外學說 據日本豬子氏之實驗云。大楓子油。含有多量之遊離酸。此遊離酸。有生理上之作用。謂於腸內脂肪之吸收有效。是能使脂肪容易乳也。蓋脂肪遇腸之亞爾加里。即變化爲石礫。以助脂肪之吸收。此爲往年英國マセツト氏及奧國アリユツケ氏之所倡導。此乃近時生理化學上之輿論也。試驗大楓子油少許於試驗管。於其中加炭酸曹達之溶液。數滴而振盪之。則輒成乳劑。反是如換阿列布油扁桃油等。則無此作用。此大楓子油所以與他脂肪油異也。豬子氏云。大楓子油爲一種強壯藥。對於爲病因之分裂。微菌。固無直達之作用。然其性能與奮身體之代謝機能。以增加對於病因之抵抗力。然則大楓子油

雖不能視爲癩之特效藥。然往往能使輕快。蓋亦不可沒之事實也。而大楓子油之含有多量遊離脂肪酸。其量如左。

- 甲 一七・〇六
- 乙 一六・三六
- 丙 二三・三〇
- 平均 一八・九一%

以與他油類相比較。爲最多量如左。

- 老利兒油 〇・〇九
- 丁香油 一・一八
- 阿列布油 一・七六
- 亞麻仁油 二・五九
- 蓖麻子油 三・三三
- 蕪菁油 三・七七
- 椰子油 四・八一
- 雞蛋油 一〇・三一

又日本藥局方云。大楓子油爲類白色或類黃色之軟膏狀塊。微有特異氣味。味爲特異脂肪狀。不苛辣。於廿二度至廿三度。大部分液。化於廿五度至三十度。完全熔融。成爲透明液。藥學雜誌又云。大楓子油在常溫爲粒狀固體。如脂肪而更堅。溫度稍高。則成爲液體。芥

白色粒狀部分。漂流於易溶解之琥珀色液中。熔點點爲四十二度。比重〇・九三。冷後或即凝固。或數日仍爲流動質。此油有酸性辛味。留於舌上。又和漢藥論云。大楓子油。雖不能視爲癩病特效藥。但屢能使病勢減輕。爲不可掩之事實。又東京醫學會雜誌第二卷第十三號及中外醫事新報第二百五十九號載有博士論文云。大楓子油爲一種強壯藥。對於癩之分裂菌。雖無直接作用。但能與奮身體之代謝機能。有增加抵抗病原菌之力。曾使一患者日服二・〇。繼續至年餘之久。服藥中往往起惡心嘔吐。此因游離脂肪酸。刺激消化機所致。故須先由少量服起。漸增至大量云。

配合應用 ●治大風諸癩。大楓子油一兩。苦參末三兩。入少酒。糊丸。梧子大。每服五十九丸。空心溫酒下。仍以苦參湯洗之。【普濟方】 ●治大風瘡裂。大楓子燒存性。和麻油輕粉研塗。仍以殼煎湯洗之。亦治楊梅惡瘡。【衛生方】 ●治風刺赤鼻。大楓子仁。木鼈

子仁。輕粉硫黃爲末。夜夜唾調塗之。

◎治手背皸裂。大楓子持泥塗之。(壽域方)

施用宜忌 凡陰虛血熱者禁用。

參攷資料

◎粗工治大風病。佐以大楓油。殊不知此物性熱。有燥痰之功。而傷血。至有痲疹愈而先失明者。(朱震亨) ◎大楓子今

海南諸國皆有之。按周達觀真臘記云。大楓乃大樹之子。狀如椰子而圓。其中有核數十枚。大如雷

丸。子中有仁。白色。久則黃。而油不堪入藥。(李時珍) ◎大楓子出南

香子。固有油。搗爛。搾取其油。用功力全在於油也。久則油黃不可用。

(盧雄)

【大當歸】即當歸之處方用名。詳「當歸」條。

【大腹子】

古籍別名 雞心檳榔(本草綱目) 豬核

檳(新修本草圖經) 基本 爲大腹檳榔實內之子。

性質 辛。溫。無毒。主治 與檳榔同功。

【大腹皮】 命名 本品以形名。所以別雞心檳榔也。

處方用名 大腹殼。

古籍別名 大腹檳榔。(圖經

本草) 豬核檳。(本草綱目) 腹皮。草東床。(和漢藥考)

外國名詞 Cortex somon

arouco. (拉丁) Areca nut bark. (英) Arakanusseshale. (德)

基本 屬棕櫚科。藥用檳榔類之子皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。大腹皮產廣東瓊屬嘉積。海南等處。爲熱帶產物。

形態 大腹子實。酷類檳榔子。但扁圓而大。子皮外部呈褐黑色。內部有筋絲網羅。其狀類椰子皮。

製法 孫思邈曰。鳩鳥多集此樹上。凡用大腹皮。宜先以酒洗後。以大豆汁再洗過曬乾。入灰火燒煨切用。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 下氣。行水。用作水腫藥。

主治 冷熱氣攻心腹。大腸蠱毒。痰隔醋心。並以葶藶同煎。入疏

氣藥。用之良。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論大腹皮曰。下一切氣。止霍亂。通大小腸。健脾開胃。調

中。【明】李時珍本草綱目論大腹皮曰。降逆氣。消肌膚中水氣。浮腫。

脚氣。逆。瘴癘。痞滿。胎氣。惡阻。脹悶。【明】穆希雍本草經疏論大腹

皮曰。大腹皮。即檳榔皮也。其氣味所主。與檳榔大略相同。第檳榔性

烈。破氣最捷。腹皮性緩。下氣稍遲。入足陽明。太陰經。二經。虛則寒熱

不調。逆氣攻走。或痰滯中焦。結成膈證。或溼熱鬱積。酸味醋心。辛溫

煨胃。豁痰。通行下氣。則諸證除矣。大腸壅塞。以其辛散破氣。而走陽

明。故亦主之也。【清】黃宮繡本草求真論大腹皮曰。大腹皮。辛熱性

溫。比之檳榔。大有不同。蓋檳榔性苦沉重。能泄有形之滯積。腹皮其

性輕浮。能散無形之積滯。故痞滿膨脹。水氣浮腫。脚氣壅逆者。宜之。

惟虛脹禁用。以其能泄氣也。子似檳榔。腹大形扁。取皮酒洗後。以

豆汁洗過。曬乾煨切用。配合應用 ◎治水腫。大腹皮、

白朮、茯苓、車前子、木瓜、桑白皮、五加皮、猪苓、澤瀉、薏苡仁、鱈魚等分。虛者加人參。

◎治濕疔瘰癧。大腹皮煎湯洗之。(直指方)

◎治烏頭風瘡。大腹子生者。或乾者。逆全皮。勿傷動。以酒一升。浸之。慢火熬乾。爲末。臘豬脂調和。傅

(聖濟方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡虛而無溼熱者禁用。

著名方劑 五皮散。治風溼客於脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。

四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。家治皮水。妊娠胎水。(局方) 用大腹

皮。茯苓皮。五加皮。地骨皮。生姜皮。等分。每服三錢。水煎熱服。一方加

白朮。麝沉香。木香。參攷資料 ◎向陽者爲檳榔。

向陰者爲大腹。(陶宏景) ◎大腹生南海諸國。所出與檳榔相似。莖

葉根幹小異耳。(馬志) ◎大腹子出嶺表滇南。即檳榔中一種。腹大

形扁而味澀者。不似檳榔尖長味良耳。所謂豬核檳榔者是也。蓋亦土

產之異。今人不甚分別。陶氏分陰陽之說。亦是臆見。按劉珣嶺表錄云。交廣生者。非舶上檳榔。皆大腹子也。彼中悉呼爲檳榔。自嫩及老。采實。以扶留藤瓦屋。灰同食之。以祛瘴癘。收其皮入藥。皮外黑色。皮內皆筋絲。如椰子皮。又雲南記云。大腹檳榔。每枝有三二百顆。青時剖之。以一片葉及蛤粉卷和食之。卽減澀味。觀此二說。則大腹子與檳榔皆可通用。但力比檳榔稍劣耳。(李時珍)

【大腹檳榔】卽大腹皮之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『大腹皮』條。
【大腹絨】卽大腹皮之處方用名。詳『大腹皮』條。
【大葉冬藍】卽馬藍之古籍別名。典見山海經。詳『馬藍』條。卽甘藍之古籍別名。典見本草綱目。詳『甘藍』條。

【大葉青】 產地 生南安。形態 獨莖。高二三尺。灰綠色。有濇毛。中空。自如蘆莖。葉三叉形。中長寸許。大如掌。面淡青。背微白。濇毛粗紋。有露腺如麻。

葉子附莖而生。在葉下。大如麻子。薄殼青褐色。亦有毛。中有細紅子。一窠可供藥用。



大葉青

主治 下部濕痺。


【大葉蒿子】卽劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。
【大葉樸】卽樹實之古籍別名。典見綱目。詳『樹實』條。
【大綠】卽綠青之古籍別名。典見綱目。詳『綠青』條。

【大蒜】 原名 葫。命名 本品出胡地。故名曰葫。而氣類與小蒜相似。遂別稱曰大蒜。

處方用名 蒜頭。大蒜頭。古籍別名 葷菜。葷。(本草綱目) 天師葫。(和漢藥考) 外國名詞 Allium (拉丁) Garlic. (英) 學名 Allium Scorodopra.

蒜, L. 基本 屬百合科。藥用蒜之球根。

產地 多在暖地之原野間。形態 按大蒜爲多年生草本。臭氣強烈。地下有大鱗莖。謂之大蒜。供藥用。葉類水仙。細長扁平。且頗柔軟。夏月於葉間抽花軸。開類似蔥花之白色小花。作繖形花序排列。後結球形之實。莖之外皮作淡紅色。簇生六七瓣。作繖狀。葉枯時採掘大蒜。將莖相結成束。懸貯室中。



大蒜

種類 根莖俱小而瓣少辣甚者。此小蒜也。根莖俱大而瓣多辛而帶甘者。大蒜也。採取 常於五月葉枯時採掘。將莖相結成束。懸掛陰處。凡入藥須採獨子者尤佳。性質 辛。溫。有毒。成分 含有揮發性之含硫油。

及大蒜油 (C₁₅H₂₂S₂)。

效能 辟穢。通氣。消癰腫。治關格。及肺結核。爲鎮咳祛痰利尿藥。入胃後。被胃酸化。而所含各質。均漸次分解。刺激胃黏液。使胃液分泌增加。以促進其消化功能。至腸復激腸黏膜。使腸壁之吸收驟增。故能治一切不消化性之瀉痢。由腸壁吸入而達血中。卽能促進血液之流動。同時由中樞神經而傳於氣管枝神經。令氣管管四周之黏膜分泌增加。以迫痰之外出。主治 疔五臟。散癰腫。瘡。除風邪。殺毒氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論大蒜曰。下氣。消穀。化肉。【唐】陳藏器本草拾遺論大蒜曰。去水。惡瘴。氣。除風。溼。破冷氣。爛疔。解。伏邪。惡。宜通溫。補。療瘡。癰。殺鬼。去痛。【宋】日華諸家本草論大蒜曰。健脾胃。治腎氣。止霍亂。轉筋。腹痛。除邪。崇。解溫疫。療勞瘵。冷風。傳風。損冷痛。惡瘡。蛇。蠱。毒。溪。毒。沙。蟲。並。搗。貼。之。以。熱。醋。漫。經。年。者。良。【宋】寇宗奭本草衍義論大蒜曰。溫水搽。治中。暑。不。醒。持。貼。足。

心。止鼻衄不止。和豆豉丸服。治暴下血。通水道。【明】李時珍本草綱目論大蒜曰。搗汁飲。治吐血心痛。黃汁飲。治角弓反張。同鯽魚丸。治腦氣。同蛤粉丸。治水腫。同黃丹丸。治痢瘡。孕疔。同乳香丸。治痢瘡。持膏數疔。能達下焦。消水利大小便。貼足心。能引熱下行。治瀉瀉暴痢。及乾瀉。霍亂。止經血。積疔。中能通。陶門。治闕格不週。【明】穆希雍本草經疏論大蒜曰。葫。大蒜也。稟火金之氣。以生。故其味辛氣溫。辛溫太甚。故其性有毒。蒸臭異常。不宜多食。入足陽明大陰厥陰經。辛溫能辟惡散邪。故主除風邪。殺毒氣。及外治散癰腫。醫瘡也。辛溫走竅。無處不到。故主踰五臟。脾胃之氣最喜芳香。蒸臭損神耗氣。故久食則傷人。肝開竅於目。目得血而能視。辛溫太過。則血耗而目損矣。總之。其功長於通達走竅。去寒溼。辟邪惡。散癰腫。化積聚。煖脾胃。行諸氣。故蘇恭主下氣消積。化肉。殺器主風溼。破冷氣。爛疔瘡。伏邪惡宜通溫補。日華子主健脾胃。治腎氣。止霍亂轉筋。腹痛。除邪祟。解溫疫。

三蠶 大

等用也。【清】黃宮楨本草求真論大蒜曰。大蒜氣味辛溫。開胃健脾。宣竅辟惡。為祛寒除溼。解鬱散痰。消腫散毒。第一要劑。然究皆因味辛則氣可通。性溫則寒可辟。而諸毒諸濕。諸滯諸熱。諸積諸毒。莫不由此俱除矣。是以書云。功能破堅。化肉殺蟲。豈用此貼足。則鼻衄能止。用此導閉。則幽明能通。用此敷臍。則下焦水氣能消。用此切片艾灸。則癰毒惡毒疔腫核能起。但其氣蒸臭。多食恐能生痰動火。散氣耗血。損目昏神。忌與蜜同食。【清】王士雄隨息居飲食譜論大蒜曰。葫生者辛熱。熟者甘溫。除寒溼。辟陰邪。下氣煖中。消殺化肉。破惡血。攻冷積。治暴瀉腹痛。通闕格便秘。辟穢解毒。消痞殺蟲。外灸癰疽。行水止衄。制腥臊。介諸毒。入藥以獨子者良。昏目損神。不宜多食。陰虛內熱。胎產癆瘵。時病瘡毒。血證目疾。口齒喉舌諸患。咸忌之。子苗皆可鹽藏。菜亦可茹。性味相似。

日久則洩。其臭刺鼻。味辛而熱。為化痰藥。開胃藥。第不宜過食。過食則則。或致吐瀉。且身熱時亦不宜食。須俟熱退食之。方能見效。若搗汁而以之塗在皮膚上。則立見發紅。而有微痛。本草綱目謂其能解毒。此說非是。荷蘭藥鏡曰。球根味辛熱刺激。有不佳。單臭。如阿魏。貼於肌膚。欲腫發泡。又曰。此根含酷厲揮發油。內服之。其氣鑽透。迅速全身。稀釋疎解。排泄發汗。利小便。惟乾則油氣消失。失却效力。過用之。則衝動血液。熾熱而生酷厲液。凡體質脆弱者。易於觸動。或惡液壅滯。刺激各部。或多血壯熱而生熱熱症。故用之有害。惟一切寒性黏液質人之虛冷症。用之良佳。又曰。此根為殺蟲良藥。殺蚊蠅。尤能驅泄條蟲。取根之扁切者。二三片。不須嚼碎。空心嚥下。或浸水服。或細剉。用水或乳汁送下。或乳汁黃服。或搽於食物中服之。此根用於諸藥。同效之。蟲症。能將蟲驅泄。勝於各種苦味殺蟲藥。多獲殊效。凡小兒蟲症。用此根搗爛。取一盞斯。浸入乳汁十二盞斯。內空

心服二盞斯。至四盞斯。或置乳汁中。煮之。加糖。使美甘可口。每次服一二碗。能殺蟲。驅泄於大便中。或用此根水。搗爛成泥。貼臍及胃部。亦下蟲。服殺蟲劑後。如腹起劇痛。而發痞者。於局部擦石腦油。或用大蒜亞爾鮮牛膽和麵粉。為餅。夾布烘溫。貼患處。則速治。又曰。用此根一二個。細剉。每日空心用茶湯或冷水送下。連服數日。則其臭氣鑽透。刺激條蟲。且增腸之蠕動。致條蟲不能吸附於腸。而隨大便泄下。或云。有於七日中服大蒜二三次。或四次。後服瀉劑。則蟲下者。或每朝服大蒜二三個。十日而下條蟲者。又有一男子。患條蟲諸症多年。服大蒜六個月。一旦下其死塊甚夥。而治。此類傳說頗多。惟服此時。宜時時兼用瀉劑。將蟲驅除。又曰。搗此根浸湯中。用其蒸氣。時時薰肛門。則蠅蟲立死。泄下。又云。此藥有利尿發汗功效。能治水腫。小便閉。尤以用於黏液性水腫。能逐停水留飲。皆有一五十餘歲之男子。其體為黏液質。患水腫。小便不通。服此劑而治。此方用於停

九七

水留飲積滯諸症多驗。又有荷荷
 水飲方。用大蒜根二個。荷荷
 生一握。橙皮二錢。合對。沒於葡萄
 酒十六盞。斯中。每次服一小碗。日
 服三次。用於胸水。能利小便。逐污
 水。祛腎痛。通結石。用於日久之傷
 冷毒痛及風痛。能排泄其毒。用於
 煩固。開飲熱或三日熱。有殊效。適
 宜服之。能消化胃腸黏液。增進食
 慾。辟傳染疫氣。用此根搗爛。浸燒
 酒服之。尤良。又治胃虛冷。黏液壅
 滯諸症。擊急疝腹痛。或將根水煎
 或煮後搗爛。溫貼腹部。即速效。又
 此藥有鎮痙功效。能鎮靜子宮衝
 逆。擊急諸症。搗之。使吸其氣味。即
 治。又用於寒黏液性。及多黏痰之
 欬嗽。或痰涎壅塞。喘息。均能將痰
 疏豁。使易咯出。作沒劑。泡劑。煎服
 均可。又治寒黏液性之壞血病。將
 根搗爛。浸燒酒。去滓服。又患齒痛
 搗根貼患處。或煨熱灰貼。治傷冷
 毒齒痛尤佳。又未有煨衝之傷冷
 毒耳聾。及由粘液壅塞而起之耳
 聾。將此根搗爛。用紙蘸其汁。每日
 插耳孔。至耳孔燥腫即治。又寒粘
 液腫及疣贅。魚目。疔疔狀硬肉等。

搗此根貼之。則漸漸軟化除去。瘰
 癧。瘰癧。或寒性瘰癧。用之亦有效。
 又乾蒜類一切頑固皮膚病。用此
 根絞汁。同蜜研和。外敷即治。又云
 葱根性緩。多揮發鹽。煮之多。糝和
 粘液。有軟化解凝之效。能發汗。利
 大小便。治粘液壅滯之喘急。水腫
 腎痛。結石等。煨葱外敷。用作軟化
 解凝藥。貼腫瘍。醃臃止痛。使膿瘍
 潰破。軟化便毒。或與食鹽研和。貼
 治火傷。頭痛貼之。即寬解。
 配合應用 ①治背疥灸法。凡
 覺背上腫硬疼痛。用溼紙貼。尋疥
 頭。用大蒜十顆。淡鼓半合。乳香一
 錢。細研。隨瘡頭大小。用竹片作圈
 圍定。填藥於內。二分厚。着艾灸之。
 痛灸至痒。痒灸至痛。以百壯為率。
 與蒜錢灸法同功。(外科精要方)
 ②治疔腫惡毒。用門白灰一撮。
 羅細。以獨蒜或新蒜。煮灰。擦瘡
 口。候瘡自然出汗。再擦少頃。即
 消散也。雖發背。癰腫。亦可擦之。
 ③治五色丹毒。無常色。及發足
 蹠者。搗蒜厚。傅乾。即易之。(肘後
 方)
 ④治關格脹滿。大小便不通。獨

頭蒜燒熟。去皮綿裹。納下部。氣立
 通。(外臺秘要方)
 ⑤治乾溼霍亂。轉筋。用大蒜搗
 塗足心立愈。(永類鈴方)
 ⑥治水氣腫滿。大蒜。田螺。車前
 子等分。熬膏。攤貼臍中。水從便泄
 而下。數日即愈。象山人患水腫。
 一卜者傳此用之。有效。(仇遠稗
 史方)
 ⑦治山嵐瘴氣。生熟大蒜各七
 片。共食之。少頃腹鳴。或吐血。或大
 便泄。即愈。(攝生妙用方)
 ⑧治瘧疾寒熱。用獨頭蒜炭上
 燒之。酒服方寸匕。簡便用桃仁半
 片。放內關穴上。將獨蒜搗爛。卷之
 縛住。男左女右。即止。隣廬用此。治
 人屢效。(肘後方) 又端午日取獨
 頭蒜。煨熟。入礬紅等分。搗丸。芥子
 大。每白湯嚙下一丸。(普濟方)
 ⑨治寒瘧冷痢。端午日。以獨頭
 蒜十個。黃丹二錢。搗丸。梧子大。每
 服九丸。長流水下。甚妙。(普濟方)
 ⑩治泄瀉暴痢。大蒜搗貼兩足
 心。亦可貼臍中。並治小兒泄瀉。下
 痢。禁口。(千金方)
 ⑪治腸毒下血。用獨蒜煨。搗。和

黃連末為丸。日米湯服之。(濟
 生方)
 ⑫治暴下血病。用葫蒜五七枚。
 去皮研碎。入豆豉。搗丸。梧子大。每
 米飲下五六十九丸。無不愈者。(衍
 義方)
 ⑬治鼻血不止。服藥不應。用蒜
 一枚。去皮。研如泥。作錢大餅子。厚
 一豆許。左鼻血出。貼左足心。右鼻
 血出。貼右足心。兩鼻俱出。俱貼之。
 立瘥。(簡要濟衆方)
 ⑭治血逆心痛。生蒜搗汁。服二
 升。即愈。(肘後方)
 ⑮治鬼疰腹痛。不可忍者。獨頭
 蒜一枚。香豉如粟大。搗和。醬汁一
 合。頓服。(永類鈴方)
 ⑯治心腹冷痛。法醋浸。至二三
 年。蒜食至數顆。其效如神。(瀕湖
 集簡方)
 ⑰治夜啼腹痛。面青。冷露也。用
 大蒜一枚。煨研。日乾。乳香五分。搗
 丸。芥子大。每服七丸。乳汁下。(危
 氏得效方)
 ⑱治寒溼氣痛。端午日。收獨蒜。
 同辰粉。搗塗之。(唐瑤經驗方)
 ⑲治鬼毒風氣。獨頭蒜一枚。和

雄黃杏仁研爲丸。空腹飲下三丸。靜坐少時。當下毛出即安。(孟詵方)

治狗咽氣塞。喘息不通。須臾欲絕。用獨頭蒜二枚。削去兩頭。塞鼻中。左患塞右。右患塞左。候口中膿血出。立效。(聖惠方)

治喉痺腫痛。大蒜塞耳鼻中。日二易之。(肘後方)

治魚骨鯁咽。獨頭蒜塞鼻中。自出。(十便良方)

治牙齒疼痛。獨頭蒜煨熟。切熨痛處。轉易之。亦主蟲痛。(外臺秘要方)

治眉毛搖動。目不能交睫。喚之不應。但能飲食。用蒜三兩。杵汁調酒飲即愈。(夏子益奇疾方)

治腦瀉鼻淵。大蒜切片。貼足心取效止。(摘玄方)

治頭風苦痛。用大蒜研汁。噴鼻中。(易簡方)又用大蒜七箇。去皮。先燒紅地。以蒜逐個於地上磨成芥子。却以飯糰一兩。去頭足。安蒜上。覆一夜。勿令透氣。只取糰研末。塞入鼻內。口中含水。甚效。亦治小兒驚風。(聖濟總錄方)

三畫 大

治小兒疳風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口中有蒜氣即止。(黎居士簡易方)

治小兒氣淋。宋甯宗爲郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用大蒜。淡豆豉。蒸餅。三物搗丸。令以溫水下三十丸。日今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利故也。(愛竹翁談數方)

治產後中風。角弓反張。不語。用大蒜三十瓣。以水三升。煮一升。灌之即甦。(子母秘錄方)

治金瘡中風。角弓反張。取蒜一升。去心。無灰酒四升。煮極爛。并滓服之。須臾得汗即痊。(外臺秘要方)

治婦人陰腫。作痒。蒜湯洗之有效。(永類鈴方)

治陰汗作痒。大蒜。淡豉。搗丸。梧子大。硃砂爲衣。每空腹燈心湯下三十丸。

治小便淋瀝。或有或無。用大蒜一個。紙包煨熟。爲一。空。心。新

水送下。(朱氏集驗方)

治小兒白禿。圍團然。切蒜。日搗之。(子母秘錄方)

治閉口椒毒。氣閉欲絕者。煮蒜食之。(仲景方)

治射工溪毒。獨頭蒜切三分。厚貼上灸之。令蒜氣射入即痊。(梅師方)

治蜈蚣咬傷。孟詵曰。即時嚼蒜封之。六七易。仍以蒜一升。去皮。以乳二升。煮熱。空心頓服。明日又進。外以去皮蒜一升。搗細。小便一升。煮三四沸。浸損處。又梅師用獨頭蒜。酸草。搗絞。傳咬處。

治脚肚轉筋。大蒜。擦足心。令熱即安。以冷水食一瓣。(攝生方)

治食蠶中毒。乾蒜。煮汁飲之。(集驗方)

治蛇癩面光。發熱如火。炙人。即飲蒜汁一盞。吐出如蛇狀而安。(危氏方)

用量 一錢至錢半。應用宜忌 凡陰虛火旺者。禁用。參攷資料 商蒜。入太陰陽明。其氣薰烈。能通五臟。達諸竅。去

寒濕。辟邪惡。消癰腫。化積積肉。此其功也。故王禎稱之云。味久不變。可以養生。可以致遠。化臭腐爲神奇。調鼎俎代醴醢。搗之。旅塗。則炎風。瘴雨。不能加。食腐臘。毒不能害。夏月食之。解暑氣。北方食肉。麩尤不可無。乃食經之上品。日用之多助者也。蓋不知其辛能散氣。熱能助火。傷肺損目。昏神伐性之害。在吞受之而不悟也。嘗有一婦。血一晝夜不止。諸治不效。時珍令以蒜傅足心。即時血止。真奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕。騎馬。忽仆地。欲絕。同伴王相。取用大蒜。及道上熱土。各一握。研爛。以新汲水一瓊。和取汁。決齒。灌之。少頃。即甦。相傳。徐州市門。忽有版書。此方。咸以爲神。仙。救人云。(李時珍)昔有患瘧者。夢人教。每日食大蒜三顆。初服。送至。眩暈。吐逆。下部如火。後有人。取數片。合皮。裁却。兩頭。吞之。名曰內灸。果獲大效也。(陳藏器)經言。葫散癰腫。按李絳。兵部手集方云。毒瘡。腫毒。號叫。臥眠。不得人。不能別者。取獨頭蒜。兩顆。搗爛。蘸油和厚。傅瘡上。乾

九九

即易之。屢用救人。無不神效。盧坦侍郎肩上瘡作。遠心痛悶。用此便瘥。又李俊射患癩久不瘥。盧與此方亦瘥。又葛洪肘後方云。凡背腫取獨頭蒜。橫截一分。安腫頭上。炷艾如梧子大。灸蒜百壯。不覺漸消。多灸為善。勿令大熱。若覺痛即竚起蒜。蒜焦更換新者。勿令損皮肉。洪嘗苦小腹下患一大腫。灸之亦瘥。數用灸人。無不應效。又江甯府紫極宮刻石記其事云。但是發背及癩疽惡瘡腫核。初起有異。皆可灸之。不計壯數。惟要痛者灸至不痛。不痛者灸至痛極而止。洗贅之類。灸之亦便成瘡自脫。其效如神。乃知方書無空言者。但人不能以意詳審。則不得盡應耳。(蘇頌)

史源記蒜灸之功云。母氏背脾作痒。有赤暈半寸。自粒如黍。灸二十七壯。其赤隨消。信宿有赤流下。長二寸。舉家歸咎於灸。外醫用膏護之。日增一暈。二十二日。橫斜約六七寸。痛楚不勝。或言一尼病此。得灸而愈。予奔問之。尼云。劇時昏不知人。但聞范奉議坐守灸八百餘壯。方甦。約艾一節。予亟歸。以炷如銀杏大。灸十數。殊不覺。乃灸四旁。赤處皆痛。每一壯。燼則赤隨縮入。三十餘壯。赤暈收退。蓋灸週則初發處肉已壞。故不痛。直待灸到好肉方痛也。至夜則火熾滿背。瘡高阜而熱。夜得安寢矣。至曉如覆一甌。高三四寸。上有百數小竅。色正黑。調理而安。蓋高阜者。毒外出也。小竅多。毒不聚也。色正黑。皮肉壞也。非艾火出其毒於壞肉之裏。則內通五臟而危矣。庸醫傳貼涼冷消散之說。何可信哉。(李時珍) 初食不利。目多食却明。久食令人血清。使毛髮白。(陳藏器) 久食傷肝損眼。故嵇康養生論云。葷辛害目。此為甚耳。今北人嗜蒜宿炕。故盲者最多。陳氏乃云。多食明目。與

別錄相左何耶。(李時珍) 四月八月食葫傷神。令人嗜怪。口味多爽。多食生葫行房。傷肝氣。令人面無色。生葫合青魚鮮食。令人腹內生瘡。腸中腫。又成疝瘕。發黃疾。合蜜食殺人。凡服一切補藥。不可食之。(孫思邈) 按孫愷唐韻云。張窳使西域。始得大蒜葫荖。則小蒜乃中土舊有。而大蒜出胡地。故有胡名。二蒜皆屬五葷。故通可稱葷。(李時珍)

【大蒜梗】命名 本品即大蒜近瓣處中心之短梗。故名。 採取 以乾者入藥用。 主治 療諸疔。 配合應用 治凍瘡。大蒜煎湯洗之。(種福堂方) 治瘡成管。用大蒜梗燒灰。存性。擦患處。其管自消。(年希堯集驗方) 治坐板瘡。用蒜梗燒灰為末。先洗淨。去膩。將藥末擦上。(黃氏醫方) 治洗瀰立驗。夏應選試過效。防風。荊芥。地骨皮。川椒。藜艾。瓦松。各五錢。搗碎一兩。陳蒜梗二兩。共入麻布袋內。熬滾熱盪。止疼如神。(良朋藥集方) 蒸痔瘡。蒜梗陰乾。以火盆置微火。將梗投入。移火盆於木桶中。令患者坐熏之。四圍以衣被塞緊。勿走洩烟。三次自愈。(救生苦海方) 【大蒜頭】即大蒜之處方用名。詳『大蒜』條。 【大嘴鳥】即烏鴉之古籍別名。與見禽經。詳『烏鴉』條。 【大熱地】即熱地黃之處方用名。詳『熱地黃』條。 【大蔥】即馬薤之古籍別名。與見綱目。詳『馬薤』條。即紅草之古籍別名。與見綱目。詳『紅草』條。 【大適】即葶藶之古籍別名。與見本經。詳『葶藶』條。 【大澤蘭】即蘭草之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳『蘭草』條。 【大鋸草】即紅珠大鋸草之簡稱。與見王安痢采藥志。詳該條。 【大蕪】即荇菜之古籍別名。與見本經。詳『荇菜』條。 【大緒石】即代緒石之古籍別名。

真見和漢藥考。詳代格石條。

【大薊】

命名 薊猶鬚也。其花如鬚而有大小兩種。本品爲薊之大者。故名。

處方用名 大薊葉。大薊炭。

古籍別名 虎薊。豬薊。(陶弘景) 馬薊。(范汪) 刺薊。山牛蒡。(日華本草) 雞項草。千針草。(圖經本草) 野紅花。(本草綱目) 地疔。地丁香。地丁草。地下草。大居寒。牛溺刺。(和漢藥考)

外國名詞 Cirsium spicatum, Maxim. (拉丁)

基本 屬菊科。藥用大薊之地。下莖及葉。

產地 凡山谷田野間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。大小薊產廣東。從化。清遠。均有出。然葳器謂薊門以多薊得名。可見北方產量甚多。不僮廣東而已。

形態 按大薊(山薊)爲山野自生之宿根草。地下莖作白色紡錘狀。分枝多而有鬚根。莖作五稜。高三四尺。葉多刺而互生。作灰綠色。長披針形。有羽狀深裂。較精而生毛茸。花爲淡紫色筒狀花。

三畫 大

種類 大薊莖高而葉起皺。小薊莖低而葉不皺。

採取 四月採苗。九月採根陰乾。

製法 酒洗淨。或童便拌。微炒。

性質 甘。溫。無毒。

效能 涼血。散瘀。用作止血及水腫藥。

主治 女子赤白沃。安胎。止吐血。鼻衄。令人肥健。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論大薊曰。持根絞汁。服半升。主中血下立瘦。【宋】大明日華諸家本草論大薊曰。葉治腸癰。腹臥瘀血。作運撲損。生研酒并小便。便任服。又惡瘡疥癬。同鹽研罌之。

【明】繆希雍本草經疏論大薊曰。大薊根稟土之沖氣。兼得天之陽氣。故味甘氣溫而無毒。女子赤白沃。血熱所致也。胎因熱則不安。血熱妄行。溢出血上。或則吐衄。大薊根最能涼血。血熱解。則諸證自愈矣。其性涼而能行。行而帶補。補血涼血。則榮氣和。榮氣和。故令肥健也。【清】李士材本草圖解論大小薊

曰。大薊小薊。甘溫入脾肝二經。破宿血。生新血。安胎氣。止崩漏。定吐衄。但大薊力烈。健養消癰。小薊力微。只可退熱。不能消癰也。酒淨或童便拌。微炒。【清】黃宮繡本草求

真論大小薊曰。大小薊雖書載屬甘溫。可以養精保血。然究精之養血之保。則又賴於血榮一身。周流無滯。若使血瘀不消。而致見有吐衄唾咯崩漏之症。與血積不行。而致見有癰疼腫痛之病。則精血先已不治。安有保養之說乎。用此氣味溫和。溫不致燥。行不過散。瘀滯得溫則消。瘰癧得行斯活。懸醫既淨。自有生新之能。凝腫潛消。且有固益之妙。保養之說。義由此起。豈真具有補益之力哉。但小薊力微。不如大薊力迅。小薊只可退熱涼血。若大薊則於退熱之中。猶於氣不甚傷也。能理血疾。不治外科。若脾胃虛寒。飲食不思。泄瀉不止者。切勿妄服。兩薊相似。花如鬚。大薊莖粗而葉皺。小薊莖低而葉不皺。皆用莖。【清】楊時泰本草述鈞元論大小薊曰。桃仁紅花。皆自行血破滯。而大小薊能止吐衄崩下。似

乎功在止血也。夫行血者。猶不可藥求之血。況於血之妄行。是或激或壅。豈徒就血以求止塞。如防川而必潰哉。先哲謂小薊退熱。大薊能健養下氣。按諸方用小薊退熱者良然。惟大薊或熱或虛。皆隨所治之味而用之。是繆氏所謂涼而能行。行而帶補者。當於大薊較勝也。夫退熱固以止血。而下氣更是止血妙理。蓋氣之不下者。多由於陰之不降。以致陽亢也。氣下則血歸經矣。此非特氣爲血先之義。經曰。雲霧不瀉。則白昏不降。又曰。地氣上爲雲。然則地氣上際。而天氣合之。稠粗變化。而雨澤乃降。方是下氣療血之義。彼粗工止謂陽能生陰。至病乎陽亢而猶事益陽。可哂也。然則薊能益陰歟。曰。觀大薊兼療癰腫。癰腫固營氣逆於肉理。而生是則大薊所謂健養下氣者。乃營氣也。卽別錄所言令人肥健者。形體爲陰也。或曰。治血證宜降氣。不宜破氣。大薊固合於斯歟。曰。非也。氣降雖卽火降。然特降氣之劑。以降火療血。豈爲中的。使大薊而止。以降爲功。彼下行之血不益

劇乎。何以反能療之。然則此味之不止血而令血止者。固可熟思矣。(不用花。但用根。或並用葉可也)

大薊根葉。在別錄皆曰甘溫。惟日奉謂其葉涼。小薊根苗。別錄皆曰甘溫。而日華皆曰涼。然則用以退熱。小薊根苗皆可。大薊治虛而有熱者。須根兼葉用。別錄言大薊令人肥健。小薊保血養精。是小薊退熱療血。而有保血之益。不同於行血而不能保者。若大薊補養令人肥健。是更能由中充外。所謂其力更勝也。凡涼血者多滯。惟此乃能行之。又不以降火為行。蓋從下氣以為行也。行血者無補。惟此乃能保之。特大薊健養之力勝於保血。是又不就血以為止也。豈非至賤之物。而有至貴之用哉。

配合應用 治腸澼。腹澼。少腹癢。用大薊葉生搗絞汁。入地榆。茜草。牛膝。金銀花。四味濃汁。和童便飲良。

治崩中下血。用大薊。炒蒲黃。椶皮灰。調汁半升。立瘥。又用大小薊根一升。酒一斗。漬五宿。任飲。亦可酒煎服。或生搗汁溫服。又方。小

薊葉。洗切。研汁一盞。入生地黃汁一盞。白朮半兩煎。減半溫服。(千金方)

又治癩血作暈。跌撲損傷。痛俱生。取汁入酒。并童便服。

治心熱吐血口乾。用刺薊葉及搗根絞取汁。每頓服二小盞。(聖惠方)

治舌硬出血不止。刺薊搗汁和酒服。乾者為末。冷水服。(普濟方)

治卒瀉鮮血。小薊葉搗汁。溫服一升。(梅師方)

治墮胎下血。小薊根葉。益母草五兩。水二大盞。煮汁一盞。再煎至一盞。分二服。一日服盡。(聖濟方)

治金瘡出血不止。小薊苗搗爛塗之。(孟詵方)

治小便熱淋。馬薊根搗汁服。(聖惠方)

治鼻塞不通。小薊一把。水二升。煮取一升。分服。(外臺祕要方)

治小兒浸淫。瘡痛不可忍。發寒熱者。刺薊葉。新水調傅。瘡上乾即易之。(簡要濟衆方)

治癰瘡作疔。刺薊葉搗汁服之。又方同鹽搗碎之。(千金方)

治婦人陰痒。小薊煮湯。日洗三次。(廣濟方)

治諸瘡不合。虎薊根。貓薊根。酸棗根。根根。杜衡各一把。斑蝥三分。炒為末。蜜丸。重。大日一服。并以小丸納瘡中。(肘後方)

治丁瘡惡腫。干針草四兩。乳香一兩。明礬五錢。為末。酒服二錢。出汗為度。(普濟方)

用量 錢半至三錢。 應用宜忌 凡脾胃虛寒及無瘀滯者禁用。 參攷資料 大薊是虎薊。小薊是貓薊。葉並多刺相似。田野甚多。方藥少用。(陶弘景) 薊門以多薊得名。當以北方者為勝也。(陳藏器) 大小薊葉雖相似。功力有殊。大薊生山谷。根療癰腫。小薊生平澤。不能消腫。而俱能破血。(蘇恭) 小薊處處有之。俗名青刺薊。二月生苗。二三寸時。併根作菜。茹食甚美。四月高尺餘。多刺。心中出花。頭如紅藍花。而青紫色。北人呼為干針草。四月採苗。九月採

根。並陰乾用。大薊苗根。與此相似。但肥大耳。(蘇頌) 薊。猶鬻也。其花如鬻也。曰虎曰貓。因其苗狀猥獷也。曰馬者大也。牛勞因其根似勞根也。雞項因其莖似雞之項也。干針紅花。皆其花狀也。鄭樵通志謂。鬻。猶之鬻。曰狗。鬻者。即此。未知是否。(李時珍)

【大薊炭】即大薊焙成炭者之處方用名。詳【大薊】條。

【大薊葉】即大薊之處方用名。詳【大薊】條。

【大薊】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳【連翹】條。

【大薊】即新葉之古籍別名。典見別錄。詳【新葉】條。

【大薊杖】即虎杖之古籍別名。典見藥性。詳【虎杖】條。

【大薊珀】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳【琥珀】條。

【大薊骨】即虎骨之古籍別名。典見肘後方。詳【虎骨】條。

【大薊】即鬻麥之古籍別名。典見別錄。詳【鬻麥】條。

【大鬻子】即鬻麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳【鬻麥】條。

【大羅傘】即食鹽之原名。詳『食鹽』條。

【大羅傘】 產地 廣東北江。 主治 跌打損傷。

【女二天】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【女木】即巴棘之古籍別名。典見別錄。詳『巴棘』條。即白符之古籍別名。典見別錄。詳『五色符』條。

【女古】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【女本】即巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【女石下水】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【女匠】即巧婦鳥之古籍別名。典見揚雄方言。詳『巧婦鳥』條。

【女花】即菊花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菊花』條。

【女青】 古籍別名 雀瓢。(本草綱目) 大者名龍銜。(本草綱目)

基本 係蒼蠅科蛇舍屬。藥用女青之根。

產地 原野濕地多有出。

三畫 大 女

形態 女青為澤草類之野生草本。莖生。莖汁有臭氣。葉作卵形或長橢圓形。對生。夏月葉腋間開白花。

性質 辛。平。有毒。 主治 蟲毒逐邪。惡氣殺鬼。溫癰。辟不祥。(本經)

參攷資料 此草即雀瓢也。生平澤。葉似羅摩。兩相對。子似瓢形。大如棗許。故名雀瓢。根似白微。莖葉並臭。其蛇銜部非其類。又別錄云。葉嫩時似羅摩。圓端大莖實黑。莖葉汁黃白。亦與前說相似。若

是蛇銜根。何得苗生益州。根在朱厘。相去萬里餘也。羅摩葉似女青。故亦名雀瓢。(蘇恭) 羅摩是白環藤。雀瓢是女青。二物相似。不能分別。終非一物也。(陳藏器) 羅摩以子言。女青以根言。蛇銜以苗言。三者氣味功用。大有不同。諸註因其同名雀瓢。而疑為一物。又因其各出州郡。而復疑為二物。本草明言女青是蛇銜根。豈可以根苗異地而致疑。如蘼蕪芎藭。所產不同。亦將分為二物乎。如赤箭徐長卿。同名鬼督郵。亦將合為一物耶。

(汪機) 女青有二。一是藤生。乃蘇恭所說似羅摩者。一種草生。則蛇銜根也。蛇銜有大小二種。葉細者為蛇銜。用苗莖。葉大者為龍銜。用根。故王際外秘要龍銜青。用龍銜根煎膏。治癰腫金瘡者。即此女青也。陳藏器言女青羅摩不能分別。張揖廣雅言女青是葛類。皆指藤生女青。非此女青也。別錄明說女青是蛇銜根。一言可據。諸家止因其生朱厘致疑。非矣。方土各有相傳不同耳。况又不知有兩女青乎。又羅浮山記云。山有男青似女青。此則不知是草生藤生者也。(李時珍)

【女貞】 命名 此木凌冬青翠不凋。有貞守之操。故以女貞名之。

處方用名 女貞子。女貞實。熟女貞。熟女實。製女貞。冬青子。

古籍別名 貞女(山海經) 冬青。貞木。蠟樹(本草綱目) 鼠梓木。(和漢藥考)

外國名詞 Ligustrum Japonicum, Thunb. (拉丁)

基本 屬木犀科。藥用其實與

葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。女貞子產廣東北江連州樂昌等處。實則各處山野間。恒多有之。

形態 女貞為小灌木。高六七尺。葉厚革質。類似杜仲。有光澤。全緣。對生。經冬不凋。夏開小白花。實作長橢圓形。熟則呈紫黑色。狀類鼠矢。

種類 方書所用冬青。皆女貞也。所謂冬青者。一名凍青。乃女貞之別種也。葉微圓而子赤者。為凍青。葉長而子黑者。為女貞。女貞即今俗呼蠟樹者。冬青即今俗呼為凍青樹者。又有枸骨。即俗呼為結兒刺者。女貞之所以俗呼為蠟樹者。因於立夏前後。取蠟蟲之種子。裹置枝上。半月其蟲膠化。出廷而上。造成白蠟。民間大得其利故也。女貞之木皮。名曰鼠



女 貞

三靈女

木皮。

採取 每年冬十月間採實曝乾。葉採無時。

製法 李時珍曰。凡使女貞實。去梗葉。酒浸一日。夜布袋擦去皮。曬乾為細末。待旱蕝草出。多取數擔。搗汁熬濃和丸。每夜酒送百丸。不旬日骨力加倍。老者不夜起。又能變白髮為黑色。強腰膝。起陰氣。

性質 苦。平。無毒。

效能 補肝腎。強腰膝。治虛損。明耳目。用作強壯藥。

主治 補中安五臟。養精神。除百病。久服肥健。輕身不老。(本經)

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論女貞曰。強陰健腰膝。變白髮。明目。【明】經希羅本草經疏論女貞曰。女貞實。稟天地至陰之氣。故其木凌冬不凋。神農味苦氣平。別錄加甘無毒。觀今人用以為變白多效者。應是甘寒涼血益血之藥。氣薄味厚。入足少陰經。夫足少陰為藏陰之臟。人身之根本。虛則五臟雖無病。而亦不安。百疾叢生矣。經曰。精不足者。補之以味。蓋腎本寒。因虛則熱而轉。此藥氣

味俱陰。正入腎除熱補精之要品。腎得補。則五臟自安。精神自足。百疾去而身躬健矣。其主補中者。以其味甘。甘為主化。故能補中也。所主如上功能。則輕身不老。蓋有自矣。此藥有變白明目之功。累試輒驗。而經文不載。為闕略也。其葉長子黑色者為女貞。葉微圓子紅色者為凍青。亦能治風虛。補益肌膚。

【清】黃宮繡本草求真論女貞曰。冬青女貞。拘骨載之本草。已屬不同。如冬青即今俗呼凍青樹者。女貞即今俗呼蠟樹者。拘骨即今俗呼鷓兒刺者。冬青女貞。花繁子盛。藥滿樹。冬月鷓鴣喜食。木肌皆白。葉厚而柔長。綠色面青背淡。形色相似。但女貞則葉長四五寸。子黑色。冬青則葉微圓。子紅色。之為異耳。今人不知女貞即係蠟樹。僅以女貞茂盛。呼為冬青。致令兩物同名。拘骨樹。若女貞肌白。葉長青翠而厚。葉有五刺。子若冬青。緋紅。以致混特是物。亦列女貞項下。究之三物合論。在冬青苦甘而涼。諸書雖言補肝強筋。補腎健骨。而補仍兼有清。女貞氣味苦平。按書稱

為補虛上品。可以滋水黑髮。如古方之用旱蓮草桑椹子同入。以治虛損。然亦須審脾氣厚。稍涉虛寒。必致作瀉。拘骨氣味甘平。按書有言能補腰膝。及治勞傷失血。亦是補水培精之味。但性多陰不燥。用以治陰虛則宜。而於陽虛有礙。枝葉可以淋汁煎膏。以塗白癩風。脂亦可以為黏粘塗。三藥氣味不同。至就其子。紅黑以推。大約色紅則能入肝補血。色黑則能入腎滋水。色紅則能入血理血。故於失血血瘀有效。色黑則能補精化血。故於烏髮黑髮有功。然色紅而潤。其性陰兼有陽。色黑而潤。其性純陰不雜。故香有言女貞補中安臟。而又議其陰寒至極。凡此似同而異。在人平青細為考核。免至臨歧亡羊耳。冬日採佳。酒浸蒸潤曬乾用。

配合應用 ①能變白。用女貞地黃何首烏人參麥門冬旱蓮草南燭子牛膝拘骨子山藥沒食子桑椹子黃蘗椒紅蓮鬚等分。 ②能明目。用女貞甘菊花生地黃菟絲枸杞子等分。 ③治風熱赤眼。冬青子不拘多。

一〇四

少。搗汁。重湯蒸膏。淨瓶收固。每用點眼。(濟急信方)

●治一切眼疾。冬青葉研爛。入朴硝貼之。海上方也。(普濟方)

施用宜忌 脾胃虛寒作瀉。及陰虛無熱者。禁用。

著名方劑 二至丸。治虛損百病。返老還童。(簡便方)用女貞實(十月上巳日收。陰乾酒蒸曬乾)

二十兩。桑椹乾(三月收)十兩。旱蓮草(五月收)十兩。共研細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服七八十丸。淡鹽湯下。夏四月收桑椹搗汁和藥。七月收旱蓮搗汁和藥。則不必用蜜矣。

參攷資料 ●女貞實乃上品無毒妙藥。而古方罕知用者。何哉。與術云。女貞木乃少陰之精。故冬不落葉。觀此則其益腎之功。尤可推矣。(李時珍) ●此木凌冬青翠。有貞守之操。故以貞女狀之。琴操載魯有處女。見女貞木而作歌者。即此也。蘇頌頌序云。女貞之木一名冬青。負霜葱翠。振柯凌風。故清士飲其實。而貞女蘿其名是矣。別有冬青與此同名。今方書所用冬

青與此同名。今方書所用冬

青。皆此女貞也。近時以放蠟蟲。故俗呼爲蠟樹。(李時珍) 諸處時有葉茂盛。浸冬不凋。皮青肉白。與秦皮爲表裏。其樹以冬生可愛。仙方亦服食之。俗方不復用。人無識者。(陶弘景) 女貞葉似冬青樹及枸骨。其實九月熟。黑似牛李子。陶言與秦皮爲表裏誤矣。秦皮葉細冬枯。女貞葉大冬茂。殊非類也。(蘇恭) 女貞處處有之。山海經云。泰山多貞女是也。其葉似枸骨及冬青木。浸冬不凋。五月開細花青白色。九月實成似牛李子。或云即今冬青樹也。而冬青木理肌白。文如象齒。實亦治病。嶺南一種女貞花。極繁茂而深紅色。與此殊異。不聞入藥。(蘇頌)

【女貞子】即女貞之處方用名。詳【女貞】條。

【女貞皮酒】製法。用女貞皮切片。浸酒。

主治 風虛。補膜膠。

【女貞葉】性質 微苦。平。無毒。主治 除風散血。消腫定痛。治頭目昏痛。諸惡瘡腫。疥瘡潰爛久者。以水煮乘熱貼之。類

類換易。米醋煮亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。

【女桑】即桑之小而枝條長者。入藥較良。參見【桑枝】條。

【女草】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳【玉竹】條。

【女理】即知母之古籍別名。典見別錄。詳【知母】條。

【女莖】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳【菊花】條。

【女復】即女菀之古籍別名。典見廣雅。詳【女菀】條。

【女萎】即女萎之古籍別名。典見廣雅。詳【女萎】條。

【女苑】命名 本品乃紫苑之。色白者。根柔婉似女體。故名。

古醫別名 白苑。穢女苑。(別錄) 女復(廣雅) 莖(本草綱目) 羊鬚草(炮炙論)

外國名詞 Ascor fastigiatus, Fisch. et Moy. (拉丁) ヒメノラン ユジラン(日本)

基本 係菊科紫苑屬。藥用女菀之根。

產地 多在山野原澤濕地。

形態 女菀爲濕草類之宿根。

草本。莖高一二尺。有細長之葉。五生梢上。多分叉。夏月開白黃色之小頭狀花。如傘狀。

性質 辛溫無毒。

主治 風寒洗洗。霍亂。洩痢。腸鳴。上下無常。驚瀉寒熱百疾。(本經) 療肺傷欬逆。出汗久。寒在膀胱。支滿。飲酒夜食發病。(別錄)

參攷資料 按葛洪肘後方載治人面黑。令白方。用真女菀三分。醋丹一分爲末。醋漿服。一刀圭。日三服。十日大便黑。十八日面如漆。二十一日全白。便止。過此太白矣。年三十後不可服。忌五辛。孫思邈千金方。用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便出也。又名醫錄云。宋興國時有女任氏。色美。聘進士王公輔。不遂意。鬱久。面色漸黑。母家求醫。一道人用女真散酒。下二錢。一日二服。數日。面貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹女菀二物等分。攪此則葛氏之方。已試有驗者矣。然則紫苑治手大陰血分。白菀手太陰氣分藥也。肺熱則面紫黑。肺清則面白。三十歲以後。則肺氣漸減。不可復泄。故云不

可服之也。(李時珍) 女菀畏鹵。鹹。(徐之方) 女菀生漢中山谷。或山陽。正月二月採陰乾。(別錄)

比來醫方無復用之。復有白菀似紫苑。恐非此也。(陶弘景) 女菀即白菀。非二物也。唐修本草。刪去白菀甚合宜。(寇宗奭) 白菀即紫苑之色白者也。雷斅言紫苑白如練色者名羊鬚草。恐即此物也。(李時珍)

【女華】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳【菊花】條。

【女萎】古籍別名 女復。(廣雅) 蔓楚(蘇恭) 牡丹莖(日本)

外國名詞 Clematis spiro, DC. (拉丁) ホタンソル(日本)

基本 係毛茛科。錦線蓮屬。藥用女萎之莖。

105



(一) 萎女

形態 女萎為蔓草類之多年生草本。莖細長。以葉柄卷絡於他物。葉為複葉。自三小葉成。小葉卵圓尖形。緣邊有二三缺刻。有長葉柄對生。夏日莖梢腋開花。無花瓣。萼片四。枝白色。果實為閉果。有毛。密生。花實俱似大麥。



(二) 萎女

製法 雷斅曰。凡採得陰乾。去頭并白莖。於槐砧上剉碎。豆淋酒蒸之。從已至未。出曬乾。

性質 辛。溫。無毒。

主治 止下痢。消食。

參攷資料 女萎實似白斂。莖生。花白。子細。荊襄之間。名為女萎。亦名蔓楚。用苗不用根。與萎蕤全別。今太常諺以為白頭翁者是也。
(蘇恭)
【女葳】即紫葳之古籍別名。典見甄權藥性本草。詳『紫葳』條。
【女葳花】即凌霄花之古籍別名。典見甄權藥性本草。詳『凌霄花』條。

條。

【女雷】即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【女節】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【女麴】 命名 本品乃女人以完麥。釀成黃子者。故名。古籍別名 麴子。黃子。(綱目)

製法 女麴以完小麥為飯。和成。罌之待生。黃衣。曬乾取用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 消食下氣。止洩痢。下胎。破冷血。

【女蘭】即草蘭之古籍別名。典見綱目。詳『草蘭』條。

【女蘿】即松蘿之古籍別名。典見別錄。詳『松蘿』條。

【子午蓮】 命名 本品花蕾于開午斂。午開子斂。故名。

外國名詞 Nymphaea tot ragona, George. var. angustata, Casp. (拉丁)
產地 多生水澤陂澗間。
形態 子午蓮為水草類之一種。或謂即蘋之大葉者。其葉較荷

而小。缺口不圓。夏月開白花。可供藥用。

主治 小兒急慢驚風。煎湯服之。

【子母草】係廣信人呼金頂龍芽草之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『仙鶴草』條。

【子母黃黃】即黃黃與嫩芽相連者之古籍別名。典見本草綱目。詳『黃黃』條。

【子母懸】 產地 出貴州鉛礦中。

形態 子母懸為金屬之一種。係鉛之精氣所結。大者成塊。重數十觔。可供藥用。

主治 烏鬚髮。去洗貧息肉。明目。澤容澤肌。解毒。以生髮為洗盆。久沐之令髮至老不白。

【子明】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【子芥】即黃芥細者之處方用名。詳『黃芥』條。

【子桑】即桑之先結構而後生葉者。性質功用。與尋常桑相同。參見『桑枝』條。

【子規】即杜鵑之古籍別名。典見

綱目。詳『杜鵑』條。

【子魚】即鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱖魚』條。

【子麻】即大麻之雄者。功用與大麻同。詳『大麻』條。

【子鷓】即杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【子蓮】即秋日生芽之生薑根。狀如指列而無筋者。詳『生薑』條。

【子藜】即小藜之古籍別名。典見本草集註。詳『小藜』條。

【寸麥冬】即麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【小三七】即人參三七之產於湖南寶慶府境而色黑者。別名紅三七。詳『人參三七』條。

【小川朴】即厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【小川連】即黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【小天麥】 性質 甘。溫。無毒。主治 一切風虛羸冷。手足疼痛。無論老幼。輕重。浸酒及煮汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲行。

【小米】即粟米之古籍別名。典見

綱目詳「粟米」條。

【小羊】係羊之一種。產於陝西同華一帶。作饌在諸羊之上。其肉療虛尤良。

【小牡丹】佛桑之四時開花。作殷紅。水紅或黃紫色。比朱槿差小者。詳「佛桑」條。

【小豆】即豆之小者。如赤小豆綠豆等是。各詳本條。

【小豆蔻】**產地** 東印度。**形態** 本品為薑科植物之果。長卵圓形。有赤色仁五六粒。

主治 消食。驅風。

【小豆蔻】即小豆之葉。詳「小豆」條。

【小辛】即細辛之古籍別名。典見本經。詳「細辛」條。

【小兒羣】**產地** 生旌州。**形態** 小兒羣為淺生草本。高一尺左右。春夏生苗葉而無花。冬則枯。其根可供藥用。

性質 辛涼。無毒。

主治 淋疾。為末。酒服。

【小芥子】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【小青】**產地** 出山野原澤間。**形態** 小青為濕草類之一種。春月生苗。葉短小。多莖。不甚高。開花成簇。紅色。兩瓣。與大青同。但較細小耳。其葉可供藥用。



小青

採取 三月間採葉用。

性質 溫。無毒。

主治 生搗傳癰腫瘡癤甚效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論小青葉曰。治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。

【小青皮】即青皮之處方用名。詳「青皮」條。

【小青草】**古籍別名** 蜻蜒草。蒼蠅翅。綱目拾遺。

產地 閩省之福州諸田野間。均出之。

形態 小青草。係野生植物。為雜草類之一種。五月生苗。葉形短小。不甚高。三月開花成簇。紅色。兩瓣。與大青相同。採之可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 殺蟲。消積。理小腸。療風熱。小兒疳積。赤目腫痛。傷寒熱症。時行咽痛。

配合應用 治小兒疳積。小青草同牛肉。田雞。雞肝。食之即愈。

治雞盲雀目。白蠶見物。將暮即昏。用雞肝或羊肝一具。不落者。小青草五錢。安盆內。加酒漿蒸熟。去草食肝。三服即愈。加明雄五分尤妙。〔百草鏡方〕

【小青草】即金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草秘。詳「金鎖銀開」條。

【小便】即童便之古籍別名。典見素問。詳「童便」條。

【小南星】即由跋之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「由跋」條。

【小南強】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【小胡麻】即胡麻之處方用名。詳「胡麻」條。即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「益母草」條。

【小桃紅子】即鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳「鳳仙子」條。

【小秦王草】即鹿蹄草之古籍別名。典見綱目。詳「鹿蹄草」條。

【小粉】即小麥粉之簡稱。詳該條。

【小茴香】**原名** 蒔蘿。

命名 蒔蘿。蒔蘿。皆音言之音。故名。後人簡稱為小茴香也。

古籍別名 慈謀勒。〔開寶本草〕

四方別名 小茴香。

外國名詞 Foeniculum officinale, All. (拉丁) Fenne. (英)

學名 Coriandrum. (Coriander.)

基本 係繖形科防葵屬。藥用蒔蘿之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。小茴香產四川萬縣重慶上各屬。山西陝西均有出。三伏天出新。味純香甜。小粒。有產歐洲英屬各處。名洋小茴。味香辛辣而不甜。大粒色青。

形態 按蒔蘿為菜類之越年生草本。每年三四月間生苗。其子簇生。狀如蛇床子而短。微黑。氣辛。

三蠶小

臭。不及茴香。而實似馬芹子。

種類 薜蘿子實與馬芹子相似。但薜蘿色褐而輕。馬芹色黑而重為異耳。

採取 六七月間採之。

性質 辛溫無毒。

主治 祛冷。療痢。治小兒氣脹。發亂嘔逆。腹冷。不下食。兩肋痞滿。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論小茴曰。主腸氣消食。滋食味。【宋】日華諸家本草論小茴曰。健脾開胃氣。溫腸。殺魚肉毒。補水腫。治腎氣。壯筋骨。【清】黃宮繡本草求真論小茴曰。小茴形如粟米。辛香氣溫。與芫夏大茴功同。入肝燥腎溫胃。但其性力稍緩。不似大茴性熱。仍看症候。分別緩急用之耳。酒炒鹽水炒。各隨病症活用。辨僞 鄭肯巖曰。偽名洋小茴。類粒甚小。毫無香味。按茴香一名茴香。有大小之別。小茴性平。大茴性熱。以芫夏產者第一。功能理氣開胃。調中止嘔。匪特為治痢聖藥。若此種不香之小茴。既失茴香命名之義。又安能治病乎。曹炳章曰。按小茴陝西芫夏出者為最

佳。其氣香。粒粗短。黃綠色者。道地。去灰屑及梗用。山東出。粒細色綠者次之。

配合應用 治閉挫腰痛。薜蘿作末。酒服二錢。【永類鈴方】

治牙齒疼痛。船上薜蘿。薑子白芥子等分研末。口中含水隨左右噴鼻。神效。【聖惠方】

用量 八分至錢半。

參攷資料 薜蘿生佛骨園。

實如馬芹子辛香。【陳藏器】薜蘿按廣州記云。生波斯國。善滋食味。多食無損。即不可與阿魏同食。奪其味也。【李珣】薜蘿今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗。花實大類蛇牀而簇生。辛香。六七月採實。今人多用和五味。不聞入藥用。【蘇頌】俗呼薜蘿椒。內有黑子。但皮薄色褐不紅耳。【陳嘉謨】

小茴香苗

性質 辛溫無毒。

主治 下氣。利膈。

小荊實 即荊實之古籍別名。典見本經。詳「荊實」條。

小將軍

古籍別名 研星草。散血丹。【綱目拾遺】

產地 多生陰濕諸地。

形態 小將軍為濕草類之一種。立春後有苗葉。類狗卵草。略大。莖微紅。穀雨後開花。細小。結子二粒。如荷包草子。又似鷄不食草子。而略大。五月枯可供藥用。

採取 三月間採之。

性質 溫無毒。

主治 治黃疸脚氣。丹毒遊風。吐血咳血。癰腫。痰中帶血。洗疥瘡。跌打刀傷。搗汁酒服。渣傳患處。

參攷資料 跌撲用五蠶脂

三錢。辟香錢半。小將軍草三兩。鮮者取汁。先將酒煎上二味。待好去渣。再入藥汁。滾一二沸。取服。治腫如神。不論疔生何處。及何種疔皆可用。此搗極爛。敷疔口留頭。次日即乾。緊肉上。洗去再敷。至重者敷二次。即愈。輕者一塗即好。真救疔垂死之聖藥也。親試神驗。【全居士】此草治疔。【僑鑑平言】

小巢菜 即翅接之古籍別名。典見綱目。詳「翅接」條。

小接骨草 即金不換之細葉者。典見綱目拾遺。詳「金不換」條。

小連翹 即弟切草之古籍別名。

一〇八

典見和漢藥考。詳「弟切草」條。

小魚仙草 即石薺草之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「石薺草」條。

小鹿蹄 即兔耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳「兔耳一枝箭」條。

小麥 四方用名。小麥子。淮

古醫別名 來。【本草綱目】週


餅錯。【花書】

外國名詞 Triticum Sativum, Lam. Var. vulgare, Ha

pp (拉丁) ユムギ (日本)

基本 係禾本科小麥屬藥用小麥之子實。

形態 按小麥為穀類。一年或越年生之草本。幹能直立。高至四五尺。葉細長而尖。有平行鱗。花作複穗狀花序。其小穗狀花序。由四



小麥

五花成。兩側有穎如舟狀。其稈有赤白兩色。初夏花後結實。爲穎果。有芒刺甚長。成熟時採用。

種類 ①小麥子入水能浮於

水面者名浮小麥。②小麥成熟時其芒變爲黑微者名麥奴。

種植 田野間恒有栽植。下種於秋刈收於夏。

性質 甘。微寒。無毒。

效能 補心。止煩。除熱。止汗。用作滋養強壯藥。

主治 除客熱。止煩渴咽燥。利小便。養肝氣。止瀉血唾血。令女人易孕(別錄)

張仲景之發明 甘草小麥大黃湯。方用小麥一升。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論小麥曰。養心氣。心病宜食之。【唐】甄權藥性本草論小麥曰。蒸末服。殺腸中蛇虫。【宋】寇宗奭本草衍義論小麥曰。煎湯飲。治暴淋。【明】李時珍本草綱目論小麥曰。陳者煎湯飲。止虛汗。燒存性。油調。塗諸瘡。湯火傷灼。【明】繆希雍本草經疏論小麥曰。小麥稟四時中和之氣。故其味甘。氣微寒。無

三 蠶 小

毒。入手少陰經。少陰有熱則燥渴咽乾。解少陰之熱。則燥渴咽乾自止。心與小腸爲表裏。臟氣清。腑病亦自除。故利小便。肝心爲子母之臟。子能令母實。故主養肝氣。甘寒走二經而能益血涼血。故止瀉血。唾血也。麴性溫。所以能消穀止痢。麴性熱。故不能消熱止煩。北方霜雪多地氣厚。熱性減。凡入藥以北來者爲勝。浮麥卽水淘淨起者。能止自汗盜汗。亦以北方者良。古方有用寒食麴者。寒食日以紙袋盛麴。懸風處。數十年亦不壞。取其熱性去而無毒也。

近人學說 丁福保曰。小麥大抵與馬鈴薯之性質相同。所異者

含有多量石灰分也。是亦爲重要之食料品。其效能石灰爲組成骨質之要物。而少年體軀之成長時。尤以含有石灰分爲最良之食品。**配合應用** ①治消渴心煩。用小麥作飯及粥食(心鏡方) ②治老人五淋。身熱腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升。煮一升。飲之卽愈(奉親書方) ③治項下瘰氣。用小麥一升。醋

一升。漬之。曬乾爲末。以海藻洗研末三兩。和勻。每以酒服方寸匕。日三。(小品方)

④治眉練頭瘡。用小麥燒存性爲末。油調傅。(儒門事親方)

⑤治白癩風癬。用小麥攤石上燒。鐵物壓出油。搽之甚效。(醫學正傳方)

⑥治湯火灼傷。未成瘡者。用小麥炒黑。研入膩粉。油調塗之。勿犯冷水。犯之必致爛。(袖珍方)

⑦治金瘡。取出小麥五升。水九升。煮取四升。綿濾取汁。待極冷。令病人臥席上。含汁嚼之。腸漸入。十日中但略食美味。慎勿驚動。(劉涓子遺方)

參攷資料 ①小麥作湯。不許皮。拆則性溫。不能消熱止煩也。

(蘇恭) ②新麥性熱。陳麥平和。

(李時珍) ③來亦作秣。許氏說文云。天降瑞麥。一來二麩。象芒刺之

形。天所來也。如足行來。故麥字從來。從久。久音緩。足行也。詩云。貽我來牟是矣。又云。來象其寬。久象其

根。梵書名麥曰迦師錯。北人種麥漫撒。南人種麥撮撒。北麥皮薄麩

多。南麥反此。或云收麥以糞沙和之。辟蠶。或云立秋前以蒼耳到碎同曬收。亦不蛀。秋後則蟲已生矣。蓋麥性惡溼。故久雨水溼卽多不

熟也。(李時珍) ④小麥寒氣全在皮。故麴去皮則熱。熱則壅滯動氣。發渴助溼。令人體浮。皆其害也。凡

大人脾胃有溼熱。及小兒食積疳脹。皆不宜服。然北人以之代飯。常

御而不爲患者。此其地勢高燥。無溼熱熏蒸之毒。故麴性亦溫平。能

厚腸胃。強氣力。補虛。助五臟。其功不減於稻粟耳。東南卑溼。春多雨水。其溼熱之氣鬱於內。故食之過多。每能發病也。夏月瘧痢人。尤不

宜食。(經希雍)

【小麥子】卽小麥之處方用名。詳【小麥】條。

【小麥奴】命名。奴。黑也。本品黑微者。故名。

主治 熱煩。天行熱毒。解丹石毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論小麥奴曰。治陽毒溫毒。熱極發狂。大渴。及溫瘧。

參攷資料 朱肱南陽活人書

治陽毒溫毒熱極發狂發斑大渴倍常者用黑奴丸水化服一丸汗出或微利即愈其方用小麥奴梁上塵釜底煤窟突墨同黃芩麻黃硝黃等分爲末蜜丸彈子大蓋取火化者從治之義也麥乃心之穀屬火而奴則麥實將成爲溼熱所蒸上黑微者與釜煤窟墨同一理也其方出陳廷之小品方名麥奴丸初虞世古今錄驗名高堂丸水解毒救急良藥也(李時珍)

【小麥苗】

性質 辛寒無毒
主治 消酒毒暴熱酒疸目黃並搗爛絞汁日飲之又解毒麥汁瀉服

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論小麥苗曰除煩解時疾狂熱退胸膈熱利小腸作齋食甚益顏

【小麥粉】

性質 甘涼無毒
主治 補中益氣脈和五臟調經粘又炒一合湯服斷下劑

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論小麥粉曰醋熬成膏

消一切癰腫湯火傷

參攷資料 麥粉乃是麩麩洗筋澄出漿粉今人漿衣多用之古方詳用按萬表積善堂方云烏龍背治一切癰腫發背無名腫毒初發微熱未破者取效如神用隔年小粉愈久者愈佳以鍋炒之初炒如鴿久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆滾收之用時攤紙上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方蘇州杜水庵所傳歷用有驗藥易而功大濟生者宜收藏之(李時珍)

【小麥稈】

主治 燒灰入去疣
主治 燒灰入去疣

【小麥粉】

原名 稈
本品係以小麥磨所成之屑
性質 甘微寒無毒
主治 消渴止煩

【小麥麩】

主治 時疾熱瘡湯火瘡爛搽損傷折癢

血醋炒罨貼之

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論小麥麩曰和麩作餅止洩痢調中去熱健人以醋拌蒸熱發包熨人馬冷失腰脚傷折處止痛散血【明】李時珍本草綱目論小麥麩曰醋蒸熨手足風濕痺痛寒濕脚氣互易至汗出並良末服止虛汗

參攷資料 麩麥皮也與浮麥同性而止汗之功次於浮麥蓋浮麥無肉也凡人身體疼痛及瘡癩腫爛沾漬或小兒暑月出痘潰爛不能着席睡臥者並用夾得盛麥麩縫合藉臥性涼而軟誠妙法也(李時珍)

【小麥麩】

性質 甘溫有微毒
主治 補虛久食實人膚體厚腸胃強氣力

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論小麥麩曰養氣補不足助五臟【宋】寇宗奭本草衍義論小麥麩曰水調服治人中暑馬病肺熱【明】李時珍本草綱目論小麥麩曰傳癰腫損傷散血止痛生食利大腸水調服止鼻衄吐血

配合宜忌 畏淡椒蘿蔔

參攷資料 小麥麩不能消熱止煩(別錄) 小麥麩性微熱小動風氣發丹石毒(大明) 小麥麩多食長宿癖加客氣(孫思邈) 麩有熱毒者多是陳麩之色又爲麩中石末在內故也但榨食之即良(孟詵) 麩性熱惟第二磨者涼爲其近麩也河渭以西白麩其性涼以其春種闕二氣也(陳藏器) 東南卑溼春多雨水麥已受溼氣又不曾出汗故食之作渴動風氣助溼發熱西北高燥春雨又少麥不受溼復入地窖出汗北人稟厚少溼故當食而不病也(汪穎) 北麩性溫食之不渴南麩性熱食之煩渴西邊麩性涼皆地氣使然也吞淡椒食蘿蔔皆能解其毒按李廷飛延壽書云北多霏雪故麩無毒南方雪少故麩有毒顯元慶齋曝偶談云江南麥花夜發故發病江北麥花晝發故宜人又且魚稻宜江淮羊麩宜江洛亦五方有宜不宜也麩性雖熱而寒食日以紙袋盛懸風處數十

年亦不壞則熱性皆去而無毒矣

入藥尤良。(李時珍)

【小麥麩】原名 麩。命名 本品係以米麥包麩而成。字從米從麥。故名。

古籍別名 酒母(本草綱目)

酒藥(俗名)

製法 以六月作者良。凡入藥須以陳久者炒香用。

性質 甘溫無毒。

主治 消穀止痢。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論小麥麩曰平胃氣消食

痔治小兒食積【唐】陳藏器本草

拾遺論小麥麩曰調中下氣開胃

療腹中風寒【唐】孟詵食療本

草論小麥麩曰主霍亂心膈氣痰

逆除煩破瘕結【宋】日華諸家本

草論小麥麩曰補虛去冷氣除腸

胃中寒不下食令人有顏色【元】

吳瑞日用本草論小麥麩曰落胎

井下鬼胎。

參攷資料 麩有麥麩米造者

不一皆酒醋所須俱能消導功不

甚遠造大小麥麩法用大麥米或

小麥連皮并水淘淨曬乾六月六

日磨碎以淘麥水和作塊。積葉包

三畫 小

緊懸風處七十日可用矣。造麩

法三伏時用白麩五斤綠豆五斤

以麥汁煮爛辣末五兩杏仁泥

十兩和踏成餅積葉懸風處候

生黃收之造自麩法用麩五斤糯

米粉一斗水并微溼篩過踏餅積

葉包掛風處五十日成矣。又米麩

法用糯米粉一斗自然麥汁和作

圓丸積葉包掛風處七七日晒收

此數十麩皆可入藥其各地有入

諸藥草及毒藥者皆有毒惟可造

酒不可入藥也。(李時珍)

【小寒豆】即豌豆之俗名。詳「豌豆」條。

【小寒節水】小寒節所取之水也。

係節氣水之一種功用與臘雪水

同。參見「臘雪水」條。

【小黑豆】即稽豆之古籍別名。典

見綱目。詳「稽豆」條。

【小楊】即柳之古籍別名。典見說

文詳「柳」條。

【小葉金雞舌】即苦花子之古籍

別名。典見綱目拾遺。詳「苦花子」

條。

【小蜂兒】即蠶蛹之古籍別名。典

見日用本草。詳「蠶蛹」條。

【小蒜】原名 蒜。命名 蒜字從祿。諧聲

也。根象蒜根。故名。又因漢得葫蒜

於西域。遂謂此為小蒜。

古籍別名 茆蒜。葷菜。(本草

綱目)澤蒜。(王禎農書)配。(蜀

本草)蒿山蒜。(爾雅)

基本 係百合科。葱屬。藥用小

蒜之根。

產地 原野。

形態 按小蒜為菜類之野生

草本。苗葉如葱針。根白而大。其形

一似葫蒜。

採取 五月五日採根用。

性質 辛溫。有小毒。

主治 歸脾胃。主霍亂。腹中不

安。消穀。理胃。溫中。除邪。瘴毒。氣。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論小蒜曰。主溪毒。

【唐】孟詵食療本草論小蒜曰。塗

疔腫甚良。【宋】日華諸家本草論

小蒜曰。下氣。治蠱毒。傳蛇蟲沙虱

瘡。

參攷資料 此蒜與胡葱相

得。主惡毒。山溪中沙虱水毒。大

效。山人狸獫時用之。(蘇恭)古

方多用小蒜。治中冷霍亂。煮汁飲

之。南齊書澄治李道念雞瘕便瘕。

(蘇頌)華陀用蒜。即此蒜也。

(寇宗奭)按李廷壽南史云。李

道念病已五年。丞相褚澄診之曰。

非冷非熱。當是食白淪雞子過多

也。取蒜一升。煮食吐出一物。涎裏

視之。乃雞雞翅足。俱全。澄曰。未盡

也。更吐之。凡十二枚而愈。或以蒜

字作蘇字者誤矣。范曄後漢書云。

華陀見一人病噎。食不得下。令取

餅店家蒜。大可二升飲之。立吐

一蛇。病者懸蛇於車。造陀家。見璧

北縣蛇數十。乃知其奇。又夏子益

奇疾。方云。人頭面上有光。他人手

近之。如火熾者。此中蠱也。用蒜汁

半兩。和酒服之。當吐出如蛇狀。觀

三書所載。則蒜乃吐蠱要藥。而後

人鮮有知者。(李時珍)小蒜三

月勿久食。傷人志。同生魚食。令人

奪氣。陰核疼。(孫思邈)脚氣風

病人。及時病後忌食。(吳瑞)蒜

乃五葷之一。故許氏說文謂之葷

菜。五葷即五辛。謂其辛臭昏神伐

性也。鍊形家以小蒜。大蒜。韭。芸薹。

胡荽為五葷。道家以韭。薤。蒜。芸薹。

胡荽爲五葷。佛家以大蒜、小蒜、與渠、蔥、茗、葱爲五葷。與渠卽阿魏也。雖各不同。然皆辛熱之物。生食增毒。熟食發淫。有損性靈。故絕之也。(李時珍) ①小蒜卽藟也。苗如葱針。根白。大者如烏芋子。葉根黃。食謂之宅蒜。(慈宗爽) ②家蒜有二種。根莖俱小而瓣少。辣甚者蒜也。小蒜也。根莖俱大而瓣多。辛而帶甘者。葫也。大蒜也。按孫炎爾雅正義云。帝登葛山。遭齊辛毒。將死。得蒜嚼食。乃解。遂收植之。能殺屋蝨蟲魚之毒。又孫愐唐韻云。張騫使西域。始得大蒜種歸。據此則小蒜之種。自葛移栽。從古已有。故爾雅以葛爲山蒜。所以別家蒜也。大蒜之種。自胡地移來。至漢始有。故別錄以葫爲大蒜。所以見中國之蒜小也。又王禎農書云。一種澤蒜。最易滋蔓。隨劇隨合。熟時採子。浸散種之。吳人調鼎多用此根作菹。更勝葱韭也。按此正別錄所謂小蒜是也。其始自野澤移來。故有澤名。而寇氏誤作宅字矣。諸家皆以野生山蒜澤蒜。解家時之小蒜。皆失於詳考。小蒜雖出於葛。既經人

力栽培。則性氣不能不移。故不得不辨。(李時珍)

【小蒜葉】 主治 治心煩痛。解諸毒。小兒丹疹。

【小酸茅】 卽酢漿草之古籍別名。典見唐本草。詳『酢漿草』條。

【小箒】 卽箒葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『箒葉』條。

【小髭】 卽石龍芻之日本名詞。詳『石龍芻』條。

【小錦枝】 卽赤車使者之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『赤車使者』條。

【小龍牙】 卽蛇舍之古籍別名。典見綱目。詳『蛇舍』條。

【小還魂】 產地 粵省常有。而以番禺爲多出。

主治 跌打損傷。

性質 甘。溫。無毒。

【小薊苗】 主治 作菜食。除風熱。夏月煩熱不止。搗汁半升服。立瘳。

【小薊根】 外國名詞 Cirsium japonicum, DC. (拉丁)ノアサミ(日本)

基本 係菊科薊屬。藥用小薊

之根與苗。

形態 按小薊爲澤草類之多年生宿根草本。莖高二三尺。葉有深裂如羽狀。葉緣多刺。初夏開紫紅色之頭狀花。花冠筒狀。間有白花等之異品。

採取 四月採苗。九月採根。陰乾用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 養精保血。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論小薊曰。破宿血。生新血。暴下血。血崩。金瘡出血。嘔血等。絞取汁溫服。作煎和糖合金瘡。及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳。【宋】大明諸家本草論小薊曰。治熱毒風。并胸膈煩悶。開胃下食。退熱補虛損。

參攷資料 ①大小薊皆能破血。但大薊兼療癰腫。而小薊專主血。不能消腫也。(蘇恭) ②小薊力微。只可退熱。不似大薊能健養下氣也。(大明)

【小羅傘】 產地 粵省東北江均有出。

採取 二三月新時採之。

主治 跌打損傷。

基本 係小蘗科。藥用小蘗之木皮。

形態 小蘗爲落葉小灌木。高五六尺。狀如石榴。小枝繁茂。葉小倒卵形。對生。葉叢有刺。邊緣無凹。凸春夏之交。新葉間生花軸。花淡黃色。爲總狀花序。結實爲漿果。長橢圓形。赤色。熟則變爲黑色。其木皮亦供黃色染料。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 口瘡疥癩。殺諸蟲。去心腹中熱氣。

配合應用 治血崩。阿茄陀丸方中用之。(婦人良方)

參攷資料 ①小蘗與金梔子、



小蘗

杜鵑花，並名山石榴，非一物也。(李時珍) ①小藥樹皮白。陶云皮黃。恐謬矣。(蘇恭) ②今太常所貯乃小樹多刺而葉細者。名刺藜。非小藥也。(蘇恭) ③凡是藥木。皆皮黃。今既不黃。非藥也。小藥如石榴皮黃子赤。如枸杞子。兩頭尖。人刺子以染黃。若云子黑而圓。恐是別物。非小藥也。(陳藏器) ④小藥。山同時有之。小樹也。其皮外白。裏黃。狀如藥皮而薄小。(李時珍)

【小藥】即鐘乳石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鐘乳石』條。

【尸利瀝樹皮】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【山人參】即細辛之俗名。詳『細辛』條。

【山大黃】即酸模之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酸模』條。

【山不在】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【山丹】 古籍別名 紅百合。透百合。(日本) 志) 紅花菜。(本草綱目) 短百合。透百合。(日本)

三畫 小 尸 山

外國名詞 Lithum concolor, Sulph. (拉丁) ヒメユリス カシリ(日本)

基本 係百合科百合屬。藥用山丹之花。

形態 山丹爲菜類之多年生草本。其根頗似百合。小而瓣少。莖亦短小。高二尺餘。一莖直上。葉狹長而尖。極似柳葉。四月開紅花六瓣。不四垂。亦結細小子實。又有葉似芍藥。花似鹿葱。一莖百蕊。一蕊四球。爛若紅錦簇球。而花心有金粉者。亦名山丹。

性質 甘涼。無毒。

主治 瘡腫驚邪。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論山丹花曰。女人崩中。

【山牛】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【山牛蒡】即大薊之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『大薊』條。

【山牛膝】 古籍別名 蘇木紅。目拾遺) 蒞支紅透血紅。(綱目拾遺)

產地 出浙江富陽竹園內。

主治 活血化瘀。寬筋理跌打。

損傷。療破傷風。

參攷資料 山牛膝善能理瘡。及刀箭入肉。故凡七十二般惡疾。非此不除。功勝川產。(趙學敏)


【山半支】即馬牙半支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙半支』條。

【山奴】即何首烏之古籍別名。典見綱目經本草。詳『何首烏』條。

【山甘草】即紫金藤之古籍別名。典見綱目。詳『紫金藤』條。

【山生魚】即鯢魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鯢魚』條。

【山白竹】 外國名詞 Bambu- as Voitchii, Carh (拉丁)



竹 白 山

主治 燒灰入腐爛癰疽藥。

參攷資料 山白竹即山間小自竹也。(本草綱目)

【山石榴】即小藥之古籍別名。

典見新修本草圖經。詳『小藥』條。

①即金櫻子之古籍別名。典見綱目。詳『金櫻子』條。

【地栗】即土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【山百合】 命名 本品爲百合之野生於山者。故名。

形態 山百合爲百合之一種。其瓣狹長而味甘。花遲而不香。可供藥用。

種類 藻異云。百合有三種。一名山百合。花遲不香。二名檀香百合。可食。三名虎皮百合。食之殺人。

性質 甘平。無毒。

主治 清痰火。補虛損。治肺癆。取白花者搗汁和酒服。癰疽無頭。同鹽搗傳。

參攷資料 ①百合白花者入藥。紅花者名山丹。黃花者名夜合。今惟作盆玩。不入藥。百合以野生者良。有甜苦二種。甜者可用。取如荷花瓣無蒂無根者佳。能利二便。氣虛下陷者忌之。(百草鏡) ②余親見包山土中。蚶化百合。有變化未全者。大略野生百合。蚶化有之。其清熱解毒。散積消癥。乃蚶之

本性耳(本草逢原)

【山羊】

命名 羊之在原野者故名


古籍別名 野羊(圖經)羴羊(本草綱目)

外國名詞 Capra hircus L

(拉丁) Goat 或 I box Zingo

(英) 羊 (日本)

基本 係脊椎動物。哺乳類。有胎盤類。有蹄類。反芻偶蹄類。羊科。藥用山羊之肉。



山羊

形態 山羊為獸類之動物。其形似綿羊。體較狹。四肢強。頭長。頸短。額有角一對。角與綿羊異。牡者特長。角基略呈三角形。角尖常向後。表面有環紋。或前面呈瘤狀。耳大。上顎無門牙及犬牙。毛之形狀有種種。大抵不及綿羊之柔而長。

其色有灰或白。或黑白混交者。牡者額有總狀鬚。體長約二尺至四尺不等。

性質 甘。熱。無毒。

主治 男人食之。肥軟益人。治冷勞。山嵐瘴癘。婦人赤白帶下。

歷代記述攷證 【元】吳瑞日

用本草論山羊曰。療筋骨急強。虛勞。益氣。利產婦。不利時疾人。

參攷資料 山羊即爾雅羴

羊。出西夏。似羴羊而大。角隨者能陟峻坂。羌夷以為羴羊角。極長。惟一邊有節。節亦疎大。不入藥用。

(陶弘景) 山羊大如牛。或名野

羊。善鬪。至死。角堪為鞍橋。(蘇恭)

閩廣山中一種野羊。彼人謂之

羴羊。其皮厚硬。不堪炙食。其肉頗

肥。(蘇頌) 山羊似羴羊。色青。其

角有掛痕者為羴羊。無者為山羊

(吳瑞) 山羊有二種。一種大角

盤環。肉至百斤者。一種角細者。說

文謂之羴羊。音桓。陸氏云。羴羊狀

如驢而羴行。其角甚大。以時墮角。

暑天塵露在上。生草戴行。故代都

賦云。羴羊養草以盤桓。(李時珍)

南方野羊多。數石香鬪。故賜羴

頗熱。不宜多食之。(蘇頌)

【山羊皮】

主治 筋骨疼痛。作茵褥臥。

【山羊血】

採取 以產滇黔蜀者佳。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 止血消瘀。和傷散血。療吐衄便溺諸血。和酒服。跌撲損傷。酒服取醉。醉醒骨積。痘無漿不起。及解鮮菌河豚毒。

配合應用 治吐血。臨臥時

用廣西真山羊血。每服三分。功能

引血歸源。不過二三服。其血自止

(蔣莘田經驗方)

治跌打及一切癰腫。天竺黃

八分。牛黃四分。冰片四錢。三七四

錢。血竭四錢。兒茶四錢。麝香四分。

沒藥四錢。阿魏二錢。雄黃二錢。藤

黃四錢。孩兒骨一兩。山羊血製沒

藤黃。入藥共為細末。煉蜜為丸。如

龍眼大。陰乾。外用蠟殼封固。三白

酒服(黎响丸)

治一切痛風寒濕。筋骨疼痛

諸症。人參四兩。三七八兩。山羊血

二兩。千年健一筋。鑽地風一筋。肉

桂一筋。真川椒一筋。乳香一筋。沒

藥一筋。穿山甲半筋。小茴香一筋。

蒼朮一筋。真蘇艾四筋。甘草二筋。

麝香四兩。防風四筋。以上共為細

末。用綿紙一層。高方紙三層。紙寬

裁尺二寸五分。長一尺二寸。將藥

末薄薄鋪勻在上。一針約用藥七

八錢。緊捲如花炮式。務要緊實。兩

頭。用紙封固。外用印花布包面。亦

要齊整好看。用時將針以火焯著。

或按穴道。或在痛處。下襯以方寸

新紅布數層。將針按上。若火旺布

薄覺疼。多墊布數層。但針必須三

四枝。一針已冷。再換一針。連進七

針。無不立驗。(太乙神鍼方)

治喉癰喉症。惟此最遲。久則

失音不可救。西牛黃一分。真山羊

血二分。川連五分。血珀三分。冰片

一分。硃砂一錢。青果核灰三分。燈

草灰五分。共為細末。每一茶匙藥

用一茶匙。調放舌尖上。徐徐嚥

下。一日五次。兩月可愈。或加蠶蟬

灰更妙。(種福堂方)

山左馬家市。夾棍藥極效。方

用綿蛇膽二錢。山羊血一錢。牛

珀一錢。大白頭地龍七條。去泥。珍

珠三分。長砂一錢。兒茶八分。共研

爲細末。蜜丸。桐子大。金箔爲衣。每服一錢五分。好酒下。如不打夾者。用刀破皮。藥自出。(馬氏夾棍神方)

④治急心痛。用山羊血一分。燒酒化下。(集驗方)

⑤治中遇邪鬼。醫鈴謂此症。乃陽氣衰而陰甚。治須急補其陽。以存正氣。則陰邪自平。即或治痰。然亦當如意補正爲本。人參二錢。當歸六錢。白朮一兩。蒼朮二錢。半夏三錢。白芥子三錢。丹參五錢。皂角刺五分。山羊血八分。附子一錢。此方用山羊血。皂角刺。爲開闢聖品。以通邪祟之要路。半夏。白芥。消其寒痰。無寒之侵。斷不中鬼。大用參朮。以扶其陽。陽生陰滅。此不易之理也。

⑥專救五絕。及有邪祟昏迷。一時卒倒者。瀆之。有起死回生之效。宜端午日修合。備用濟急。大可救人。用山羊血三錢。蒼朮二錢。人參三錢。紅花一錢。皂刺一錢。製半夏三錢。蘇葉二錢。麝香一錢。各爲末。蜜丸如龍眼核大。酒化下。(石室秘錄方救絕仙丹)按山羊血以

三靈山

產滇黔及蜀者佳。以其地深山多。三七苗及理血定風諸草。山羊每食之。啊人追逐得之。山羊本迅躍。無一刻之停。其體血自項貫尾。終日旋運如飛。又被逐捕。則躁性頓發。血隨氣運。矯捷尤甚。黎啊人捕得。以竹鎗刺入其心。取血用。此上品也。其血成條。深紫有光。以少許入水中。自然旋運如飛。蓋矯捷之性猶存也。若網取刀剖而得者。血色黯滯。入水亦不能迅捷。他省產者。亦能如啊苗之合衆追逐。令其騰躍上下。而後刺取其心血。用亦可較次於滇黔山羊血。惟今之各處所獲山羊。皆用網取。其或鎗斃而後剖其死血。以僞充心血。則力微性緩。更有以他血代充者。則尤屬質實無用。故今市中每多此物。高索重價。非親歷其地。真知灼見而得者。勿用也。

參攷資料 ①山羊血一粒。入雞血半盃中。過宿變成水。或以久凝臭雞血一塊。投入山羊血。過宿反變成鮮血。乃真。(綱目拾遺) ②山羊生平樂山崖間。能陟峻坂。躡捷若飛。其血可治跌打損傷。及諸

血症。凡跌撲死者。未絕氣。以一分許。調酒飲之。透甦。神效立見。第捕甚難。每見人。則決驟而去。懸迅非常。非足力所能及。必密布繩網草間。習其足。始能生得之。刺其心血。待乾。凝結成塊。可以攜遠。蓋凡血皆患凝滯。山羊踰高歷險。且夕不休。則其血活矣。而心爲主。故心血最良。語云。流水不污。戶樞不蠹。親此益信。(常中丞筆記) ③山羊產

滇蜀諸山中。性善走逐。好鬪。肉能療冷勞。山嵐瘴痢。婦人赤白帶下。其心血瀨湖。綱目失載。苗人取血法。以藥竹通節。削鋒利。活刺心血。收乾者良。宰取者不堪用。爲和傷散血之神藥。其治跌撲損傷。單用酒服。取醉。醉醒其骨自續。每用不過分許。不可過服。雖不耗傷元氣。而力能走散陰血。然必初患便服。得效最速。若過三五日。血凝氣滯。無濟於治矣。價等牛黃。心血亦不易得。參血丹用之。眞虛勞失血之續命丹也。(本草逢原) ④山羊血產廣西諸土郡。山羊似羊而大。善鬪。能上絕壁。每登高處失足。或至骨折。少頃如故。喜食三七苗。其血

主治損傷極妙。輕者服數釐。重者二三分。以心血爲上。身血次之。色黑有光而質輕者爲眞。(柑園小識)

【山羊角】 主治 頭風。作火罐灸之。

【山羊油】 製法 以不落水者。荷葉包裹。掛風處。不可着雨。陰乾用。 主治 心疝。諸疝。每服三五錢。酒下或滾湯下。

【山羊蹄】 卽酸模之古籍別名。典見綱目。詳「酸模」條。

【山羊糞】 主治 遠近心痛。同頭風。燒研酒服。


參攷資料 ①山羊糞同水粉。各一升。浸一夜。絞汁。頓熱。午刻服。治疝痢。(綱目拾遺) ②山羊屎。燒灰。擦潰爛生肌。入外科收口藥用。(祝西葵) ③大菴丸。用山羊屎。曬乾。入鍋炒。炭存性。研細。收貯。每久爛不堪。將見內腑者。以大菴去皮。核。搗爛。如泥。後入前粉。搗至成丸。每服四錢。黑棗湯送下。此物大能斂潰爛諸口。神效無比。山遊散。用

大活鯽魚一尾。破腹去雜。以山羊屎塞實魚腹。放瓦上慢火炙乾。存性。研末。加麝香一錢。封貯。如遇潰瘍爛見內腑。止隔一膜者。以此藥搽上立愈。(祝氏效方)

【山李子】即鼠李子之古籍別名。與見圖經本草。詳「鼠李子」條。

【山芋】即山藥之古籍別名。與見吳普本草。詳「山藥」條。即番薯之俗名。詳「番薯」條。

【山芍藥】產地 生建昌。形態 叢生。綠莖。高三四尺。大葉如馬蹄而尖。甚長。深齒粗紋。面深綠。背淡青。秋深開紫花。瓣尖如針。端有鬚。綠附如刺。密撒而上。其根葉可供藥用。



山芍藥

效能 祛風寒。

【山豆根】命名 本品莖如大豆。而用其根。故名。

古籍別名 解毒。黃結。中藥。(本草綱目) 金鎖匙。(和漢藥考)

本藥綱目) 金鎖匙(和漢藥考)

外國名詞 Cajanus indians

(拉丁)

學名 Euclestia japonica, (Benth.)

基本 屬豆科。藥用山豆之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

山豆根產廣西南寧百色等處。又有一種甘草豆根。看之即甘草。但入口其苦異常。產四川。

形態 山豆根為常綠亞灌木。自生於暖地之深山樹下。莖柔軟。高一二尺。葉互生。為三片小葉而成之複葉。小葉作卵圓形。有長葉柄。夏日。葉腋開花。色白如蝶。簇生而為穗狀花序。果實為莢果。色紫黑。中藏種子一粒。根似烏藥。如母指大。長尺許。外色暗褐。內白。味極苦。

採取 八月間採根。

性質 甘寒。無毒。

效能 瀉熱解毒。治喉風。喉咽痛。為解毒藥。又為咽喉腫痛藥。

主治 解諸藥毒。止痛消瘡。腫毒。發熱欬嗽。治人及馬急黃。殺小蟲。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

佑圖經本草論山豆根曰。含之嚙汁。解咽喉腫毒極妙。【明】李時珍本草綱目論山豆根曰。研末湯服五分。治腹脹喘滿。酒服三錢。治女人血氣腹脹。又下寸白諸蟲。丸服。止下痢。磨汁服。止卒患熱厥。心腹。痛。五腫。痔瘡。研汁塗諸熱腫。疥瘡。蛇狗蜘蛛傷。【明】經希雅本草經疏論山豆根曰。山豆根得土之冲氣。而象感冬寒之令。以生。故其味甘苦。其氣寒。其性無毒。甘所以和毒。寒所以除熱。凡毒必熱。必辛。得清寒之味。甘苦之味。其諸毒自解。譬大人盛德。與物無競。即陰毒。枝害遇之不起矣。故為解毒清熱之上藥。凡痛必因於熱。毒解熱散。則痛自止。疥腫自消。人馬急黃。乃血熱極所發。故必發熱。熱氣上熏。則發欬嗽。諸蟲亦溼熱所化。故悉主之。而多獲奇效也。【清】黃宮樞本草求真論山豆根曰。山豆根大苦大寒。功尚瀉心保肺。及降陰經火逆。解咽喉腫痛第一要藥。緣少陰之脉。上循咽喉。咽喉腫痛。多因肺逼近於心。故凡咽喉腫痛。多因心火挾其相火交熾。以致逼迫不

寧耳。治常用此以降上逆之邪。俾火自上達下。而心氣因爾以除。且能以祛大腸風熱。及解藥毒。殺小蟲。并腹脹喘滿。熱厥心痛。並療人馬急黃。磨汁以飲。五痔諸瘡。服之。悉平。總賴苦以泄熱。寒以勝熱耳。但脾胃虛寒。作瀉者。禁用。【清】楊時泰本草述鈞元論山豆根曰。山豆根經冬不凋。似大得土之冲氣。而然。其味初嘗苦。後有甘意。但苦味多。夫苦以洩熱。後乃歸於甘。故能解所結之毒熱。以還於冲利。其治咽喉最效者。正以胃合諸經之氣。而絡於隘也。有人暑月感外熱。煩甚。至晚寤寢受寒。遂鬱熱作欬。咽痛。偶含山豆根汁嚙之。移時脫然。然則此味以散熱聚為功。不等於他物之苦寒直折也。如止以苦寒折熱。彼寒鬱熱者。不投之增劇乎。雖然。內經運氣多以咽痛屬寒。如無鬱熱於中者。亦須慎之矣。

近人學說 張山雷曰。山豆根。蘇頌圖經謂其莖如大豆。因有此名。開寶本草雖謂氣味甘寒。然其實甚苦。沈存中夢溪筆談。已言本草之誤。其功用則開寶謂解諸藥

毒。止痛。消瘴。發熱。咳嗽。治人及馬。急黃。殺蟲。蓋苦寒。泄降。其味甚厚。故能解毒。而療疔。癰之腫痛。兼能殺蟲。治黃。皆惟大熱之實症。為宜。又治發熱。咳嗽。則以脾胃熱。咳言之。非不問虛實。寒熱。可為咳嗽之通用品也。今人專以治咽喉腫痛。則本於圖經。謂含之。嚙汁。解咽喉腫毒。甚妙。石頑。謂水浸含嗽。煎湯細呷。皆可。蓋凡藥用根。多取其下行能降。而此又大寒大苦。則直折火毒之上炎。亦惟實熱閉塞者。始為合宜。而風邪外束之喉痛。尚須辛涼開泄者。則必不可早投。反恐遏抑不宣。重增其困。石頑所謂痘疹熱毒。及喉痺者。意固不差。但近今喉痧。為病最多。然有外感毒症未罷。及脾胃實熱如焚。兩候。先後不同。投藥即因而大異。如有表者。先投寒降。則外邪不散。適以內攻。如熱熾者。誤投清揚。則烈火見風。頃成焦土。臨症者。豈可不辨之於早。而石頑遠原。竟謂喉症皆屬陰氣上逆。故用苦寒以降之。真令人無可索解矣。瀕湖謂研末湯服。治腹脹喘滿。酒服。治女人血

氣腹脹。丸服。治下痢。則必皆屬於實熱壅塞者。庶乎相投。而言之不詳。其弊亦甚。又謂磨汁。服止卒患熱厥心腹痛。五種痔漏。研汁塗諸熱腫。禿瘡。蛇狗蜘蛛傷。則清火解毒之顯而易見者耳。

配合應用 ①解中蠱毒。密取山豆根。和水研服少許。未定再服。已禁聲者亦愈。(備急方)

②治五般急黃。山豆根末。水服二錢。若帶蠱氣。以酒下。(備急方)

③治霍亂吐利。山豆根末。用橘皮湯下三錢。(備急方)

④治赤白下痢。山豆根末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。空心白湯下。三服自止。(備急方)

⑤治水蠱腹大有聲。而皮色黑者。山豆根末。酒服二錢。(聖惠方)

⑥治卒患腹痛。山豆根。水研半盞。服入口即定。(備急方)

⑦治頭風熱痛。山豆根末。油調塗兩太陽。(備急方)

⑧治頭上白屑。山豆根末。浸油日塗之。(備急方)

⑨治牙齦腫痛。山豆根一片。含於痛所。(備急方)

⑩治喉中發癢。山豆根磨醋噀之。道涎即愈。勢重不能言者。頗以雞翎掃入喉中。引涎出。就能言語。(永類鈴方)

⑪治疥癬蟲瘡。山豆根末。臘猪脂調塗。(備急方)

⑫治喉風急證。牙關緊閉。水穀不下。山豆根。白藥等分。水煎噀之。嚙下三二口即愈。(楊青叟外科方)

施用宜忌 凡脾胃虛寒。而便溏瀉者。禁用。

參攷資料 ①山豆根生劍南。及宜州。果州山谷。今廣西亦有。以忠州。萬州者為佳。苗莖如豆莖。青經冬不凋。八月採根。廣南者如小槐。高尺餘。石鼠食其根。故嶺南人捕鼠。取腸胃曝乾。解毒攻熱。甚效。(蘇頌) ②按沈括筆談云。山豆根味極苦。本草言味甘。大誤矣。(李時珍)

【山奇糧】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【山松】即松之一種。穗可療疾。詳

【松穗】條。

【山松子】即飛松子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「飛松子」條。

【山松穗】即松穗之原名。詳「松穗」條。

外國名詞

【山枇杷柴】 *Epigaea asatica*, Maxim. (拉丁)



山 枇 杷 柴

主治 湯火傷。取皮焙研。蜜調傳之。

【山果子】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【山枝仁】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【山芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【山芥】即蒼朮之古籍別名。典見吳普本草。詳「蒼朮」條。

【山花菜】即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防風」條。

【山金】即金之雜於石英礦脈間者。詳「金」條。

【山金柑】即山金橘之古籍別名。與見綱目。詳「山金橘」條。


【山金橘】即金橘之樹高尺許。實如櫻桃。內止一枚。氣香味美者。又名山金柑。詳「金橘」條。

【山前獨活】即獨活之古籍別名。與見和漢藥考。詳「獨活」條。

【山扁豆】*Cassia Mimosoides* (拉丁) 學名 (*Cassia mimosoides*, L.)

外國名詞 *Herba nos Herb. Cass mimos. (拉丁)*

基本 屬豆科。藥用山扁豆之莖葉。



山扁豆

形態 山扁豆為一年生草本。莖高一二尺。葉互生。由多數小葉而成。偶數之羽狀複葉。夏秋之間。葉腋有穗。開黃色五瓣之假蝶形

花。果實為莢果。長寸許。形平扁。中藏多數褐色之種子。別有名合萌者。與前種頗相似。惟莖中空。稍柔軟。莢實中所藏之種子。粒粒隆起。且有節。此其異耳。

採取 採莖葉。烘焙如茶用。

效能 用為利尿藥。

主治 治腳氣腫滿水腫及消

化不良症。

用蠶 五錢。

【山枳鼠皮】即刺蝟皮之古籍別名。與見和漢藥考。見「刺蝟皮」條。

【山柏】即何首烏之古籍別名。與見嘉祐圖經本草。詳「何首烏」條。

【山柑皮】產地 本品為柑之出於浙江温州泥山。

主治 療咽喉痛。

【山查】原名 山檀。命名 本品味似檀子。

故亦名檀。後人簡作山查。

處方用名 山查炭。焦山查。炒查肉。生山查。

古稱別名 赤瓜子。鼠檀。羊株。(唐本草)猴檀。(危氏方)茅檀。(日用本草)梳子。梨梅。(爾雅)棠

核子。(圖經)山裏果。(食鑑本草)

猴梨。山果子。山查子。山棠子。山穉子。木梳子。地乙梨。和圓子。柿查子。糖毯子。山梨紅果。映山紅果。(和漢藥考)酸棗。鼻涕園。(百一選方)

外國名詞 *Mespilus crumeg.*, *S. or N. (拉丁)* *Crataegus Pinnatifida* (英)

基本 屬於薔薇科。藥用山檀之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。山檀產山東青州。東安。安邱等處。惟以青州者佳。十月新

採取 九十月間採實。暴乾。

製法 李時珍曰。凡用山查。九月霜後。取帶熟者。去核曝乾。或蒸熱。去皮核。搗作餅子。日乾用。

性質 酸。冷。無毒。

效能 破氣。散瘀。消肉積。化痰。涎。用於消化不良。及產後兒枕痛。又為收斂藥。諸種出血之止血藥。魚類中毒之解毒藥。漆瘡之鎮痒藥。



山查

形態 按山檀乃落葉灌木。高五六尺。枝極繁茂。處處生似針之枝葉。皆互生。長寸許。狀如楔。邊緣有鋸齒。花開於春日。與新葉並發。白色。五瓣。簇生似單瓣梅花。又若林檎花。後結實。實作球形。亦似林檎。有果梗。徑約六七分。頂端略

扁平而有柱頭。外面作暗紅黃色。味酸。核堅硬。色黑。似牽牛子。

種類 一種小者。山人呼為棠梳子。茅檀。猴檀。可入藥用。樹高

數尺。葉有五尖。極間有刺。三月開五出小白花。實有赤黃二色。肥者

如小林檎。小者如指頭。九月乃熟。小兒採而賣之。閩人取熟者。去皮

核。搗和精蜜。作為糖糕。以充果物。其核狀如牽牛子。色黑。質堅。一

種大者。山人呼為羊梳子。樹高丈餘。花葉皆同。但實稍大而色黃綠。

皮澀。肉虛。為異耳。初甚酸澀。經籍乃可食。功應相同。而採實者不收。

採取 九十月間採實。暴乾。

製法 李時珍曰。凡用山查。九月霜後。取帶熟者。去核曝乾。或蒸

熱。去皮核。搗作餅子。日乾用。

性質 酸。冷。無毒。

效能 破氣。散瘀。消肉積。化痰。涎。用於消化不良。及產後兒枕痛。

又為收斂藥。諸種出血之止血藥。

魚類中毒之解毒藥。漆瘡之鎮痒藥。

主治 煮汁服。止水痢。沐頭洗身。治瘡癩。

歷代記述攷證

【南北朝】陶弘景本草集註論山楂曰。黃汁澆漆瘡多瘰。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論山楂曰。治腰痛有效。【元】吳瑞日用本草論山楂曰。消食積。補脾。治小腸疝氣。發小兒疳疹。【元】朱震亨本草衍義補遺論山楂曰。健胃。行結氣。治婦人產後兒枕痛。惡露不盡。煎汁入砂糖服之。立效。【明】李時珍本草綱目論山楂曰。化飲食。消肉積。瘕瘕。痰飲。痞滿。吞酸。滯血。痛脹。【明】穆希雍本草經疏論山楂曰。山查稟木氣而生。本經云。味酸氣冷。然觀其能消食積。行瘀血。則其氣非冷矣。入足陽明大陰經。二經有積滯。則成下痢。產後惡露不盡。蓄於太陰部分。則為兒枕痛。山查能入脾胃。消積滯。散宿血。故治水痢及產婦腹中塊痛也。大抵其功長於化食健脾胃。行結氣。消瘀血。故小兒產婦宜多食之。本經誤認為冷。故有洗瘡瘰之用。【明】李士材本草圖解論山楂曰。山查酸溫。消油膩肉食之積。化血癥癰瘕之疴。祛小兒乳食停留。療女人兒枕作痛。理偏墜疝氣。

三畫 山

發痘疹不快。按山查味中和。消油垢之積。故幼科用之最多。若傷寒為重症。仲景以宿滯不化者。但用大小承氣。一百一十三方中。並不。用山查。為其性緩。不可以肩弘任巨耳。養老雞硬肉。入山查數枚。即易爛。則其消食積之功。蓋可推矣。核有功力。不可去也。【清】黃宮繡

本草求真論山楂曰。山查甘酸鹹平。何書既言健脾。又曰能伐脾胃。生化之氣。得非自相矛盾乎。使明其理以推。則知所謂健脾者。因其脾胃有食積。用此酸鹹之味。以為消磨。俾食行而痰消。氣破而泄化。謂之為健。止屬消導之健矣。如係胃味之壅。便以補益為名。以為用藥進步。詎知實而用此輕平消導。得此則健虛。而用此保無害云。伐生之說乎。按楂味酸與鹹。最能消化肉食。凡養老雞硬肉。但投楂肉數枚。則易爛。且人多食。則嘈煩易饑。服參太過。但用山楂即解。豈非我脾伐生之驗歟。至於兒枕作痛。力能以此。痘疹不起。力能以發。猶見通瘀運化之速。有大小二種。小者入藥。去皮核。搗作餅子。日乾用。出

北地。大者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論山楂曰。山楂酸甘溫。醒脾氣。消肉食。破瘀血。散結消脹。解酒化痰。除疝積。已瀉痢。大者去皮核。和糖蜜搗為餅。名楂餅。色味鮮美。可充食物。入藥以養烏產者勝。多食耗氣。損齒易飢。空腹及羸弱人或虛病後忌之。

配合應用 ①消肉積。山楂肉四兩。水煮食之。並飲其汁。又方。山楂肉同礬紅。黃連。紅麴。簡便方。 ②消食健脾。山楂肉同紅麴。麥芽。橘皮。白朮。肉豆蔻。厚朴。砂仁等分。 ③治產後兒枕作痛。用山楂肉同牛膝。生地。黃芩。續斷。益母草。澤蘭。牡丹皮。蒲黃。芍藥等分。 ④治偏墜疝氣。山查肉。茴香。炒各一兩。為末。糊丸。梧子大。每服一百丸。空心白湯下。【衛生易簡方】 ⑤治老人腰痛及腿痛。用棠棣子。鹿茸。〔炙〕等分為末。蜜丸。梧子大。每服百丸。日二服。 ⑥治腸風下血。用寒藥熱藥。及脾弱藥。俱不效者。獨用山裏果。俗名酸棗。又名鼻涕團。乾者為末。艾

得調下。應手即愈。【百一選方】 ①治痘疹不快。乾山楂為末。湯點服之。立出紅活。又法。猴棧五箇。酒煎入水。溫服即出。【危氏得效方】 ②治痘疹乾黑危困者。用棠棣子為末。紫草煎酒。調服一錢。【全幼心鑑方】 ③治難產。用山查核七七粒。百草霜為衣。酒吞下。【海上方】 用量 一錢至四錢。 施用宜忌 凡脾虛惡食。胃弱無積者禁用。

署名方劑 保和丸。治食積酒積。【丹溪方】 用山楂二兩。半夏。〔姜製〕。橘紅。神麴。麥芽。茯苓。各一兩。連翹。萊菔子。〔炒〕。黃連。各半兩。為末。水丸。加白朮二兩。名大安丸。 參攷資料 ①凡脾弱食物不化。胸腹酸刺脹悶者。於每食後嚼二三枚絕佳。但不可多用。恐反尅伐也。按物類相感志云。養老雞硬肉。入山楂數顆。即易爛。則其消肉積之功。蓋可推矣。鄰家一小兒。因食積黃腫。腹脹如鼓。偶往羊桃樹下取食之。至飽歸而大吐痰水。

其病遂愈。羊棧乃山檀同類。醫家不用而有此效。則其功應相同矣。

〔李時珍〕唐本草木部赤爪木。

宋陶經外類彙纂子丹溪補遺山檀皆一物也。山檀味似檀子。故亦名檀。世俗皆作查字誤矣。查音棧。

乃水中浮木。與檀何關。郭璞註爾雅云。枕音求。樹如梅。其子大如指頭。赤色。似小柰可食。此即山檀也。

世俗作棧字亦誤矣。棧乃槩實。於隸何關。檀枕之名。見於爾雅。自晉宋以來。不知其原。但用查棧耳。此物生於山原。茅林中。猴鼠喜食之。

故又有諸名也。唐本草赤爪木。當作赤棧。蓋棧爪音說也。檀狀似赤棧。故爾。范成大與衡志有赤棧子。王聖百一選方云。山裏紅果俗名酸棧。又名鼻滯園。正與此義相合。

〔李時珍〕赤爪棠林山檀一物也。古方罕用。唐本雖有赤爪。後人不知即此也。自丹溪朱氏始著山檀之功。而後遂為要藥。〔李時珍〕

凡服人參不相宜者。服山查即解。一補氣。一破氣也。〔吳儀洛〕

〔山查子〕即山查之古籍別名。與見和漢藥考。詳山查條。

見和漢藥考。詳山查條。

【山查木】

性質 苦寒。無毒。主治 水利。頭風。身痒。

〔山查炭〕

即山查焙成炭者之處方用名。詳山查條。

【山查核】

主治 吞之。化食。積。治癩疔。

【山查根】

主治 消積。治反胃。

【山查莖葉】

主治 煮汁。洗漆瘡。

【山柰根】

即山柰之處方用名。詳山柰條。

【山柰】

處方用名 山柰根。古籍別名 山辣。三奈。三賴。〔本草綱目〕三賴。舌香。三乃子。〔和漢藥考〕

外國名詞

Kaempferia

Galanga (拉丁) Capoor Cuta-hay. (英)

基本 屬薑荷科。藥用山柰之根。

產地 凡廣東、福建、四川諸省均有出。運銷於孟買、波斯及日本諸地。

形態 按山柰之地下莖酷似

良薑。徑四五分以上者。皆切斷運至。外色稍紅黃。切斷面之肉部凸出色白。氣味為芳香性。與辛夷、樟腦之香氣相混。味辛苦。

探取 五六月採之。

性質 辛溫。無毒。

效能 溫中散寒。止痛。辟穢。作香質性之消化藥。然大半配合香料。或用以防衣服之蠶。餘則研為粉末。與油煉合。製為膏藥。

主治 暖中。辟瘴。癩瘰。氣。治心腹冷氣痛。寒濕霍亂。風蟲牙痛。入合諸香用。

歷代記述攷證 〔清〕黃宮繡

本草求真論山柰曰。山柰氣味芳香。功能暖胃辟惡。凡因邪氣而見心腹冷痛。寒濕霍亂。暨風蟲牙痛。用此治無不效。以其氣溫芬芳。得此則能溫胃辟惡耳。若使諸症概非濕穢。不得妄用。出廣東。根葉與生薑同。合諸香藥用。

配合應用 治一切牙痛。三奈子一錢。麩包煨熟。入麝香二字為末。隨左右啗一字入鼻內。口含溫水漱去。神效。名海上。一字散。〔普濟方〕

治風蟲牙痛。用山柰為末。罌紙上捲作筒。燒燈吹滅。乘熱和藥吹入鼻內。痛即止。〔仁存方〕用肥皂一箇。去穢。入山柰。甘松。各三分。花椒。食鹽。不拘多少。填滿麩包。煨紅取研。日用擦牙漱去。〔攝生方〕

治面上雀斑。三奈子。麝。蜜。他。爵。薔。子。等分。研勻。以乳汁調之夜塗。且洗去。

治醒頭去屑。三奈。甘松香。零陵香。一錢。樟腦。二分。滑石。半兩。為末。夜擦。且洗去。〔水雲錄方〕

治心腹冷痛。三奈。丁香。當歸。甘草。等分。為末。醋糊。丸。梧子。大。每服三十丸。酒下。〔集簡方〕

用量 八分至錢半。

應用忌宜 凡陰虛血虧及胃有鬱火者禁用。

參攷資料 山柰俗訛為三奈。又訛為三賴。皆土音也。或云本名山辣。南人舌音呼山為三。呼辣如賴。故致謬誤。其說甚通。〔李時珍〕

山柰生廣中。人家栽之。根葉皆如生薑。作樟木香氣。土人食其根。如食薑。切斷暴乾。則皮赤黃色。肉白色。古之所謂廉薑。恐其類

也。段成式酉陽雜俎云。柰祇出拂林國。長三四尺。根大如鴨卵。葉似蒜。中心抽條甚長。莖端有花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。其早冬生夏死。取花壓油。塗身去風氣。按此說頗似山柰。故附之。(李時珍)

【山柳菊】別名 黃花母。九里明。

產地 南嶺山中皆有之。

形態 叢生。細葉似石竹。葉緣莖有節。秋開黃花如菊。心亦黃。可供藥用。

主治 洗腫毒。

【山珊瑚】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【山胡椒】外國名詞 Lindera

ヤマカウバシ カワキ シヤ ウフノキ(日本)

基本 係樟科釣樟屬。藥用山胡椒之子實。

產地 出雲南木邦土司。及熱帶諸地。

形態 山胡椒為多年木本。葉白綠色。有毛。枝之樹皮。具小皺。灰色。有裂孔或皮孔。果實為漿果。形

似胡椒。色黑。顆粒大如黑豆。

性質 辛。大熱。無毒。

主治 心腹冷痛。破氣化滯。

【山苧】即苧麻產於山野者之古籍別名。典見綱目。詳『苧麻』條。

【山茄子】即曼陀羅之古籍別名。典見綱目。詳『曼陀羅』條。

【山韭】命名 本品生於山野。而形似韭。故名。

古籍別名 薺。菘(本草綱目)

形態 山韭為菜類之一種。野韭葉如韭而細長。其形又與家韭相類。亦可供食與藥用。

性質 鹹。寒。瀉。無毒。

主治 宣腎。療大小便數。去煩熱。治毛髮。

參攷資料 薺。腎之菜也。腎病宜食之。諸家本草不載。而孫思邈千金方收之。他書薺字多訛作薺。字。薺乃豆葉也。陳直奉親養老書有薺菜羹。即此也。其方治老人脾胃氣弱。飲食不強。用薺菜四兩。鮑魚肉五兩。煮羹。下五味。并少麩食。每三五日一作之。云極補益。(李時珍)

【山梨】即板栗實之稍小者。性質

功用與栗同。詳『栗』條。

【山栗紅菓】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山哥】即何首烏之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『何首烏』條。

【山桂】即天竺桂之古籍別名。典見綱目。詳『天竺桂』條。

【山桃】係桃之一種。其仁不堪入藥。餘與桃同。參詳『桃』條。

【山桑】即桑之葉尖而長者。詳見『桑葉』條。

【山海子】即郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【山海螺】命名 本品生於山野。根有旋紋如海螺。故名。

古籍別名 白河車。(王安探藥方)

形態 山海螺為溼草類之一種。其葉四五瓣附枝。枝梗莖生。秋後結子如算珠。旁有四葉。抓之根似狼毒。而起疔瘡。損破有白漿而味多臭。生長雖在溼。而性喜燥。枝葉繁弱。可以入盆栽玩。其根莖莖可供藥用。

採取 二月間採之。

主治 腫痛癩癬。搗葉藥汁酒服。渣傳患處。楊梅惡瘡。搗根用。並療腸癰便毒。鼠毒乳癰。

【山翁】即何首烏之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。見『何首烏』條。即香蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香蒲』條。

【山茨菇】即山慈姑之處方用名。詳『山慈姑』條。

【山茨菰】即山慈姑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山慈姑』條。

【山茶萸】命名 本經一名蜀。酸。今人呼為肉棗。皆象形也。

處方用名 陳萸肉。炒萸肉。

古籍別名 蜀酸棗(本經)肉棗(本草綱目)魁實(別錄)鷄足鼠矢(吳普本草)石棗湯主。實棗兒樹(和漢藥考)

外國名詞 Cornus officinalis, S. et N. (拉丁)

基本 山茶萸科之實。

產地 蘇頌云。凡海州。兗州等處。山谷間恒有之。陳仁山藥物生產辨云。產浙江寧波府。十月新。向日朝鮮有出。無核而肉厚。萬

國藥方卷四八十七篇謂產英美兩國實屬不知出處。

形態

山茶黃之枝柯繁茂。高至丈餘。入春先葉開花。花有四片之苞葉上。黃色四出。形小而簇生。花瓣作披針形。向外反卷。花落之後。葉始發生。作長卵圓形。或長橢圓形。頭尖底圓。側脈甚顯。並行而集於尖端。皆兩兩對生。果實生綠熟紅。為長橢圓形之石果。中有種子二枚。果肉味甘酸。



山茶黃

採取

九十月間採實陰乾。

製法

雷斅曰。凡使以酒潤去核。核能滑精。故宜去之。取皮一斤。只取四兩。緩火熬乾用。

性質

酸。平。無毒。

效能

補肝腎。清精氣。用作強壯藥。

主治

心下邪氣。寒熱溫中。逐寒濕。去三蟲。久服輕身。(本經)腸胃風邪。寒熱疝瘕。頭風。風氣去。

來鼻塞。目黃。耳聾。面飽。下氣。出汗。強陰益精。安五臟。通九竅。止小便。利久服明目。強力長年。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論山茶黃曰。治腦骨痛。瘕耳鳴。補腎氣。興陽道。堅陰莖。添精。止老人尿不節。治面上瘡。能發汗。止月水不定。【宋】大明日華諸家本草論山茶黃曰。煨腰膝。助水。除一切風。逐一切氣。破癥結。治酒鼓。【金】張元素珍珠囊論山茶黃曰。溫肝。【明】經希雅本草經疏論山茶黃曰。山茶黃感天地春生之氣。兼得木之酸味。神農氣平。別錄微溫。總言其得春氣之正耳。岐伯甄權加辛。然嘗其味。必是酸多。辛少。入足厥陰。足少陰。經陽中之陰。降也。其治心下邪氣。寒熱。腸胃風邪。寒熱。頭風。風氣。去來鼻塞。面飽者。皆肝腎二經所主。二經虛熱。故見前證。肝為風木之位。經曰。諸風掉眩。屬肝木。此藥溫能通行。辛能走散。酸能入肝而斂。虛熱風邪消散。則心下腸胃寒熱自除。頭目亦清利。而鼻塞面飽悉愈也。逐寒濕。痺者。經曰。邪之所湊。其氣必虛。

總藉其辛溫散結。行而能補也。至於三蟲。亦腸胃溼熱所生。溼去則蟲自除。能溫中。則氣自下。汗自出矣。凡四時之令。春氣煖而生。秋氣涼而殺。萬物之性。喜溫而惡寒。人身精氣。亦賴溫煖而後充足。况肝腎在下。居至陰之位。非得溫煖之氣。則孤陰無以生。此藥正入二經。氣溫而主補。味酸而主斂。故精氣益而陰強也。精益則五臟自安。九竅自利。又腎與膀胱為表裏。膀胱虛寒。則小便不禁。耳為腎之外竅。腎虛則耳聾。肝開竅於目。肝虛則邪熱客之。而目黃。二經受寒邪。則為疝瘕。二臟得補。則諸證無不瘳矣。輕身強力。長年者。益精安五臟之驗也。【清】黃宮繡本草求真論山茶黃曰。山茶黃味酸性溫而瀉。何書載縮小便。秘精氣。以其味酸性瀉。得此則精與氣不滑。又云。能煖腰膝。及風寒溼痺。鼻塞目黃。以其氣溫克補。得此能入肝腎二經。氣分之故耳。且瀉本屬收閉。何書載使九竅皆通。耳鳴耳聾皆治。亦是因其精氣充足。則九竅自利。又易為瀉而不適乎。去核用。【清】黃

元御長沙藥解論山茶黃曰。山茶黃味酸性瀉。入足厥陰肝經。斂精液而縮小便。金匱八味丸用之。治男子消渴。小便反多。以其斂精液而止疏泄也。水主藏。木主泄。消渴之證。木能疏泄。而水不斂。精尿俱下。陽根失斂。久而陽根敗竭。則人死矣。山茶黃酸澀斂。固助壬癸。斂之令。收攝精液。以秘陽根。八味中之要藥也。八味之利水。則桂枝。芍藥之力。非山茶黃所司也。去核酒蒸。【清】楊時泰本草述鈞元論山茶黃曰。山茶黃結實於四月。而採於五月。其色赤。第此味秘精。而本經又言其逐寒溼痺。治效似幾相戾。不知用不離乎。體以固斂之陰。而達必宣之陽。(如通九竅。逐一切氣。逐一切風。)則精之秘者。乃所以為益精起陽之本。而益精起陽者。又所以為通九竅。逐邪氣。補風虛之本也。要之。瀉陰乃裕陽之本。而固陽又化陰之元。交益相需。烏能較然定其所主哉。故陰耗而滋陰同於此味。使陰有所育。陽虛而益陽同於此味。使陽有所守。即祛陰陽之邪者。亦或投此味。

守。即祛陰陽之邪者。亦或投此味。

於中。以爲元陰元陽之地。山萸之
用。大都不外此三例矣。石菟（即
山萸）木瓜同一味酸氣溫。但石
菟全以酸勝。故止於溫肝以益腎。
木瓜則酸居強半而有甘味。故又
能行土之用。而和血以去溼。方書
言酸甚扶肝。酸多損腎。此語亦須
酌量。如石菟酸勝。六味正用以益
腎。何以不如木瓜之多用。而損齒
及骨也。或亦酸如木瓜。以其兼行
土用。遂因土以制水。而腎乃病歟。
【清】鄒澍本經疏證論山萸黃曰
李瀕湖謂山萸黃與茶黃甚不相
類。未審何緣同名。予則謂惟其同
類。是以同名耳。蓋至九十月之交。
萬象蕭索。惟三種茶黃（吳山食）
巽然朱實。燦爛可觀。且三物者榮
茂最早。收成反遲。均爲善物。朱者
丹也。與者善也。以是得名。詎不允
協耶。且山萸黃於氣交溼令。與吳
茶黃俱有行所無事之概。惟吳茶
黃則既開花而於是時不結實。山
萸黃則既結實而於是時不長茂。
並作遊行跌落之態。故其主病關
中上。且在心下者。尤爲異曲同工。
第結實於秋者。其性溫和。故辛實

三畫 山

而峻結實於春者。其性醇和。故酸
潤而溫。惟其酸潤而溫。故氣深穩
而力優柔。不然則心下既有邪氣
寒熱在外。復有寒溼成痺。譬如天
下之事。已至內外雲擾。又何以
溫中解之。以溫中而能悉解內外
雲擾。必其乘疏通之智。具鎮定之
識。施練達之才。行敦厚之政者也。
故山萸黃之主心下邪氣寒熱。逐
寒溼痺也。以游行無礙於中土之
資。入其中而操之。乃施其春和發
越之令。俾出於外。則隨汗而能洩。
俾入於腸胃。則隨下而能通。在於
中者既行。閉於外者又安得而不
動。是知所謂邪氣寒熱與寒溼痺
者。必係肝以虛而失其疏通之職。
土遂礙瘠不能運邪。肌肉應之。亦
爲寒溼所著而痺阻。此本經之旨
皆論其因於中者耳。

國外學說 日本學者謂山萸
黃產中國、英國、美國等處。其樹皮
可入藥。內含一精。即口而年（O-
gic）爲收斂補藥。可代金雞納
以治瘧疾。處方用山萸黃皮一分。
水十六分。熬一刻鐘。濾渣。加水足
十六分爲度。每服二兩至三兩。

配合應用 ●添精固髓。煖腰
膝。益陽道。令人有子。用山萸黃、羌
絲子、肉蓯蓉、巴戟天、鹿茸、牛膝、白
膠、車前子、枸杞子、生地黃、沙苑蒺
藜、麥門冬等分。

●治老人小便淋瀝及遺尿。用
山萸黃、人參、五味子、牡蠣、益智子
等分。

●治腦骨痛。腦爲髓之海。髓足
則腦痛自除。用山萸黃、人乳、沙苑
蒺藜、熟地黃、人參、麥門冬、牛膝、甘
菊、花等分。

●治腎虛耳聾。用山萸黃、石菟
蒲、甘菊花、地黃、黃蘗、五味子等分。

●治腎虛腰痛。用山萸黃、杜仲
、牛膝、地黃、白膠、山藥等分。

●入六味地黃丸。爲腎虛而有
溼熱者所須。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡命門火熾及素
有溼熱者。禁用。惡桔梗、防風、防己。
麥黃爲之使。


著名方劑 韋選丹、益元陽、補
元氣、固元精、壯元神（扶壽方）用
山萸黃（酒浸取肉）一斤。補骨脂
（酒浸焙乾）半斤。當歸四兩。麝香

一錢。爲末。煉蜜糊丸。梧子大。每服
八十一丸。臨臥鹽湯下。

參攷資料 ●山萸黃生漢中
山谷。及瑯琊、宛旬、東海、承縣。九月
十月採實陰乾（別錄）●山萸黃
出近道諸山中大樹子。初熟未乾。
赤色如頰子。亦可噉。既乾。皮甚薄。
當合核用也。（陶弘景）●山萸黃
今海州兗州亦有之。木高丈餘。葉
似榆。花白色。雷斅炮炙論言一種
雀兒蘇真相似。只是核八稜。不入
藥用（蘇頌）●山萸黃葉如梅。有
刺。二月開花如杏。四月實如酸棗。
赤色。五月採實（蘇頌）●山萸黃
與吳茶黃甚不相類。山萸黃色紅
大如枸杞子（寇宗奭）●滑則氣
脫。清劑所以收之。山萸黃止小便
利。祕精氣。取其味酸。酸以收滑也。
仲景八味丸用之爲君。其性可知
矣（王好古）●雀兒蘇。即胡頰子
也（李時珍）

【山萸陳】即茵陳蒿之原名。見「
茵陳蒿」條。

【山茶子】 主治 婦人髮墮。研
末搽之。或搾取油擦



山茶子

【山茶花】

命名 本品枝葉似茶亦可作飲故名

處方用名 寶珠茶花

古籍別名 曼陀羅樹寶珠海

榴茶石榴茶躑躅茶宮粉茶串珠茶一捻紅千葉紅千葉白南山茶(本草綱目)

外國名詞 Thea japonica


ノオシ(拉丁)ツバキ ヤブツバキ(日本)

基本 係山茶科山茶屬藥用山茶之花蕾

產地 南方諸省均有出雲南出者尤佳

形態 山茶屬灌木類之常綠樹。凌冬不凋。變種甚多。高二三丈。嫩部平滑無毛。葉長橢圓形而尖。狀如木樨葉而硬厚有光澤。冬春開花大而美麗。有大小紅白斑之色。單瓣重瓣之別。雄蕊頗多。子房平滑。實爲蒴果。秋末成熟。自裂。散

出種子二三粒。淡黑褐色。果殼甚堅。



山茶花

採取 春季採花。秋採實。

性質 甘。微辛。寒。無毒。

效能 涼血止血。

主治 吐血衄血。腸風下血。並用紅者爲末。入童溺煎汁及酒調服。可代鬱金。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論山茶花曰。湯火傷。研末麻油調塗。【明】繆希雍本草經

疏論山茶花曰。山茶花得一陽之氣以生。故其花開於冬末春初之時。其味甘而微辛。氣平而微寒。色赤而入血分。故主吐血衄血。腸風下血等。並爲末。入童溺及酒調服。

【明】李士材本草圖解論山茶花曰。山茶花止吐衄腸風。取紅者爲末。童便調服。

參攷資料 山茶產南方。樹生。高者丈許。枝條交加。葉頗似茶葉。

而硬厚。有殼。中闊頭尖。面綠背淡。深冬開花。紅瓣黃蕊。格古論云。花有數種。寶珠者花簇如珠。最勝。海

榴茶花蒂青。石榴茶中有碎花。躑躅茶花如杜鵑花。宮粉茶串珠茶皆粉紅色。又有一捻紅千葉紅千葉白等名。不可勝數。葉各小異。或云亦有黃色者。虞衡志廣中有南山茶。花大倍中州者。色微淡。葉薄有毛。結實如梨。大如拳。中有數核。如肥皂子。大周憲王教裝本草云。山茶嫩葉燒熟。水淘可食。亦可蒸晒作飲。(李時珍)

【山馬蘭】

古籍別名 一枝香。仙橋。(百草鏡)

形態 山馬蘭爲山草類之一種。生於山側。形似劉寄奴。莖莖至繁。葉無極。不對生。花心微黃赤。其根可供藥用。

主治 風痰喉閉。小兒驚風。敷疔定痛。搗汁塗小兒蛇瘡。煎湯洗痔腫疥癩。

參攷資料 山馬蘭取根搗碎。用人乳浸。男病用婦女婦人乳。女病用哺男婦人乳。浸少頃。令病人

仰臥榻上。將頭倒垂。將乳汁男左。女右滴入鼻中。候喉中有痰涎壅塞。即轉身垂頭開口。任痰自流。痰完病愈。但此藥入鼻後。病人不許有聲。一作痰即止。小兒驚風。牙關緊閉。煎汁灌入喉中。即愈。又鎖喉風。頭面頭項俱腫。飲食不下。白馬

蘭搗爛。井花水取濃汁。白酒漿均調。下喉立效。又小兒頭項腫。肋。中潰爛。以馬蘭汁調六一散。搽之。即愈。又馬蘭搗爲膏。能治大人兩腿赤腫流火。或濕熱伏於經絡皮面上。不紅不腫。其疼異常。病人只叫腿熱。他人按之極冷。此謂伏氣之病。用此膏搽之立愈。又流注。山馬蘭煮熟。麻油拌油。作蔬伴食。半日自消。(綱目拾遺)

【山參】 卽丹參之古籍別名。典見日華諸家本草。詳丹參條。【山啄木鳥】 卽赤啄木鳥之古籍別名。典見嘉祐補注本草。詳啄木鳥條。

【山梔子】

原名 梔子。命名 卮者。酒器也。本品子實。形象似之。故名。後俗遂作梔子。

本品子實。形象似之。故名。後俗遂作梔子。

處方用名 焦山梔。黑山梔。山梔。炭。江山枝。炒山梔。煎汁炒山梔。豬膽汁炒山梔。

古籍別名 木丹(本經)越桃(別錄)鮮支(本草綱目)支子。芝子。枝子。鮮子。猪桃。越桐。山枝。仁。六梔子。紅梔子。黃梔子。黃香影子(和漢藥考)

外國名詞 (Fructus Cardamomi) (拉丁) 學名 (Gardonia Florida) 基本 屬茜草科。藥用山梔之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。梔子以廣東北江星子連州產者佳。其次樂昌英德清遠翁源亦可。廣西亦均有出。實則處處有之。凡山野川谷間恒多生焉。

形態 按山梔為常綠灌木。莖高六七尺。最高者至丈餘。葉對生。形橢圓或長卵圓。全緣有光澤。花。在梢頭。夏日開六瓣白花。瓣皆迴旋。有芳香。將謝時變淡黃色。入秋結實。色黃。其形長橢圓。霜降後採收。曬乾入藥。並作染料。果實類似梔子。色黃。形長橢圓。長一寸。

三畫 山

二三分。有縱列而突起之稜六七條。內皮薄。中藏紅褐色之內與多數種子。有芳香性。味苦。



山梔子

種類 身短而圓者為山梔。合藥用。身長而大者為水梔。藥料用。

採取 九月間採實。曝乾。製法 雷斅曰。凡使梔子。須要如雀腦。并鬚長有九路赤色者為上。先去皮。鬚取仁。以甘草水浸一宿。漉出焙乾。搗篩為末。用朱靈亭。日。治上焦中焦連殼用。下焦去殼。洗去黃漿炒用。治血病炒黑用。王好古曰。去心胸熱用仁。去肌表熱用皮。

性質 苦寒。無毒。成分 為魯比格魯兒酸(Berberic Saine) C₁₇H₁₉O₆。效能 萬三焦濕熱。解五志鬱火。故有解熱清血之效。用於頭痛。黃疸。火傷。吐血。衄血。咽痛。口糜。下。

劑等症。對神經系或有鎮靜之效。兼用於胸中作痛。主治 五內邪氣。胃中熱氣。面赤。酒飽。鼓鼻。白癩。赤癩。瘡瘍。瘰癧。目赤。熱痛。胸心大小腸大熱。心中煩悶。

張仲景之發明 山梔一味。經張仲景之實驗。認為主治心煩也。旁治發黃。茲考徵如下。大黃硝石湯證曰。黃疸。梔子。麩皮湯證曰。身黃(用梔子皆十五枚)。梔子。豉湯證曰。煩。梔子。甘草豉湯證曰。心中懊憹而少氣。梔子。生薑豉湯證曰。心中懊憹而嘔。枳實。梔子。豉湯證曰。心中懊憹。梔子。厚朴湯證曰。心煩。梔子。乾姜湯證曰。微煩。茵陳蒿湯證曰。心胸不安。久久發黃(以上七方。梔子皆十四枚)。梔子。大黃豉湯證曰。黃疸(用梔子十二枚)。歷觀此諸方。梔子主治心煩也。明矣。發黃者。其所旁治也。故無心煩之證者。而用之。則未見其效矣。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論山梔曰。解玉支毒(羊躑躅也)【唐】甄權藥性本草論山梔曰。去熱毒風。除時疾熱。解五種黃病。利五淋。通小便。解消渴。明目。主中惡。殺蠱毒。【唐】孟詵食療本草論山梔曰。主疔瘰癧。紫癩風。【金】張元素珍珠囊論山梔曰。治心煩懊憹。不得眠。臍下血滯。而小便不利。【元】朱丹溪本草衍義補遺論山梔曰。消三焦火。清胃。腕血。治熱厥心痛。解熱。行結氣。【明】李時珍本草綱目論山梔曰。治吐血。衄血。血痢。血淋。損傷。瘀血。及傷寒。勞復。熱厥。頭痛。疝氣。湯火傷。【明】繆希雍本草經疏論山梔曰。梔子。感天之清氣。得地之苦味。故其性無毒。氣薄而味厚。氣浮而味沈。入手太陰。平少陰。足陽明。經少陰。為君主之官。邪熱客之。則五臟皆失所主。清少陰之熱。則五內邪氣自去。胃中熱氣亦除。面赤。酒飽。鼓鼻者。肺熱之候也。肺主清肅。酒熱客之。即見是證。於開竅之所。延及於面也。肺得苦寒之氣。則酒熱自除。而面赤亦退矣。其主赤白癩瘡者。即諸痛癢。瘡毒皆屬心火之謂。瘡自赤熱痛。及胸心大小腸大熱。心中煩悶者。總

除心肺二經之火熱也。此藥味苦氣寒。瀉一切有餘之火。故能主如上諸證。【清】黃宮樞本草求真論。山梔曰。梔子味苦大寒。輕飄象肺。色赤入心。書言能瀉心肺熱邪。使之屈曲下。從小便而出。而三焦之鬱火以解。熱厥心痛以平。吐衄血淋血痢之病以息。且能治心煩。五黃五淋。亡血津枯。口噤目赤。風痞等症。此數語業已道其大要矣。然更就其輕清以推。則浮而上者。其治亦上。故能治心肺之火。而凡在上而見消渴煩燥。恍惚不眠。頭痛目赤。腫痛等症。得此以除。就其味苦而論。則苦而下者。其治亦下。故能瀉肝腎膀胱之火。而凡在下而見淋閉便結。黃疸疝氣。吐衄血痢。損傷血癥等症。得此以泄。惟其氣浮。故仲景用此以吐上焦之痰滯。惟其味苦能降。故丹溪用此以降內鬱之邪耳。但治上宜生。治下宜炒宜黑。雖其上下皆入。而究則由肺達下。故能旁及而皆治者也。此惟實邪實熱則相宜。若使並非實熱。概為通用。恐不免有損食泄瀉之虞矣。生用瀉火。炒黑止血。且

汁炒止煩嘔。內熱用仁。表熱用皮。【清】鄒澍本經疏證論山梔曰。仲景用梔子於熱邪煩燥證。取其於土中收清肅之氣以勝之。則梔子鼓湯。梔子甘草鼓湯。梔子生薑鼓湯。枳實梔子鼓湯皆是也。於溼熱成黃證。取其於鬱中鼓暢發之氣而開之。則茵陳蒿湯。梔子大黃湯。大黃硝石湯皆是也。特於清肅中偏同豆豉之散發。於暢發中偏協焦陽盛也。蓋下焦陰亦逆而阻陽之降焉。用豆豉洩其下焦之陰。使交鬱蒸之陽。於以供梔子清肅下行之化也。試即離豆豉未離梔鼓局之梔子厚朴湯。梔子乾薑湯。觀之一以寒下而中宮氣壅。則佐以枳朴之開洩。一以溫下而陽氣不羈。則佐以乾薑之守中。亦以煖梔子之清肅耳。發黃者火迫於中。津液不能自行。則蒸蘊而成焉。用大黃推其火以遠於津液。即津液中火有未盡。則藉梔子之嚴厲。以暢其機也。試即不用大黃之梔子。鑿皮湯觀之。則於黃疸中。竝兼發熱發熱則其陽猶足。達於外而結於

內者未深。遂不必大黃之峻利。但用梔子清肅暢達之可耳。於此見梔子於煩燥之火是化之。而非析之於黃疸之火。是暢之而非瀉之也。既曰。凡用梔子湯。病人舊微瀉者不可與服。又曰。下利後更煩。按之心下滿者。為虛煩也。梔子鼓湯主之何也。夫下利有熱證實證。便溼則一於虛寒而已。梔子鼓湯治熱證不治實證。下利後煩。可見非虛寒證矣。矧加一更字。益可見下利時本煩。及利止而煩愈甚。熱證已定矣。然尚恐其屬實也。故必按之按之而硬者。小承氣證也。必按之濡。始善為梔子鼓湯證焉。是兩條之義相去殊遠。非混也。然則便舊微瀉者。誤服梔子湯。應何如。夫固曰。梔子於熱溼燥得令時。反能暢茂條達。而葉本背黑。於寒與風得令時。則蓄縮黃瘁。其遇中虛中寒。亦惟氣萎敗而傷土。增其下利已耳。然則同以梔鼓枳實大黃成方。治差後勢復。挾宿食者。則曰枳實梔子鼓湯。治酒疸心中懊惱。或熱痛者。則曰梔子大黃湯。且枳實梔子鼓湯枳實僅三枚。而反以名

湯。梔子大黃湯。枳實用五枚。而反讓梔子居首何也。夫治煩非治黃比。前固曰。一取其清肅。一取其暢達耳。梔子大黃湯。則非煩與黃悉治之。若仍用梔鼓煎法。先發枳實。梔子後入豆豉。則嫌於治煩熱而非治黃。故不分先後。四味同煎。若別出方名。則嫌於治黃不治煩熱。故仍以梔子稱首。曰梔子大黃湯。正以其不盡合梔鼓法也。枳實梔子鼓湯。盡合梔鼓法矣。以勞復加枳實。復以宿食加大黃。本無黃證可治。又有煩熱可憑。詎可別出方名。不謂之梔鼓耶。譬如梔子厚朴湯。梔子乾薑湯。無豆豉而仍以梔子冠方。為其子冠方。為其有煩也。茵陳蒿湯。大黃硝石湯。何嘗不治黃。何嘗無梔子。而方名不出梔子。則梔子者。為治煩之要劑歟。梔子為治煩要劑。仲景治煩。不必以梔子各有故焉。蓋煩非一類。所當審察辨明。而後梔子之用。可無悞也。夫病在表有煩熱。在裏有煩燥。與梔子所治之煩。天淵固無庸辨。若夫小建中所治之煩。小柴胡所治之煩。嘔。瓜蒂散所治之煩。滿。胸

不能食。黃連阿膠所治之煩不得臥。豬膚湯所治之下利咽痛。胸滿心煩。烏梅丸所治之得食而嘔。又煩。桂枝所治之解後復煩。白虎所治之煩渴。亦與梔子所治之煩有別。而無庸辨。曰發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。此方是梔子所治之煩。夫發汗吐下後。是陽邪內入也。陽邪內入。不因汗吐下後。則為裏實。故曰陽明病不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。若夫汗吐下後。有乾嘔煩者。有嘔浮數煩渴者。有胸滿煩者。又非梔子所宜。則梔子所治之煩。必係誤治已後。胸中煩滿而不嘔不下利者。方為合劑也。然則大柴胡湯證。為下後有煩有嘔與梔子生薑豉湯證。究有何異。蓋此中分別相去逕庭。亦何難辨。夫若嘔之與嘔不止。心下急之與虛滿。鬱鬱微煩之與反覆顛倒。心中懊憹。已不啻天淵。况柴胡證仍在耶。且論病必先理其本末。柴胡證仍在。向中含無限象證。嘔不止。所以別於喜嘔。心下急。所以別於胸脅滿。鬱鬱微煩。所以別於心煩喜嘔。

三畫山

耳。豈得與煩滿懊憹而或嘔之梔子生薑豉湯比。若此可相比。則下後汗後之費日煩燥不得眠者。亦可相比乎。不揣本而齊末。此之謂矣。

配合應用 ①仲景治傷寒汗吐下後。虛煩不得眠。及心中懊憹者。有梔子豉湯。用梔子十四枚。香豉四合。水煎服。

②治傷寒濕熱。發黃腹脹。用茵陳大黃湯。梔子十四枚。茵陳六兩。大黃三兩。水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。分三服。小便當利。尿如皂角汁狀。正赤。一宿腹減。黃從小便出也。

③治發黃身熱。用山梔同甘草。黃蘗。名曰梔子熨皮湯。

④治傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安者。得吐即愈。有梔子厚朴湯。用山梔。厚朴。枳實等。

⑤治大病後。勞復。小便不利者。山梔用鼠矢作湯。小便利即愈。已上皆仲景法。

⑥瀉小腸火。用山梔。赤茯苓。木通。滑石。澤瀉等分。瀉心經有餘之火。用山梔。連翹。麥門冬。竹葉。燈心。

草。生甘草。黃連等分。

⑦治酒熱發黃。用山梔。茵陳。蒿。滑石。車前子。秦朮。黃連。連錢草。首。等分。

⑧治鼻中衄血。山梔子燒灰吹之。屢用有效。(黎居士簡易方)

⑨治小便不通。梔子仁十四個。獨頭蒜一個。澆鹽少許。搗貼臍及囊。良久即通。(普濟方)

⑩治血淋瀝痛。生山梔子研末。滑石等分。葱湯下。(經驗良方)

⑪治下利鮮血。梔子仁燒灰。水服一錢匕。(食療方)

⑫治酒毒下血。老山梔子仁焙研。每新汲水。服一錢匕。(聖惠方)

⑬治熱毒血痢。梔子十四枚。去皮搗末。蜜丸。梧子大。每服三丸。日三服。大效。亦可水煎服。(肘後方)

⑭治臨產下痢。梔子燒研。空心熱酒服一匙。甚者不過五服。(勝金丹)

⑮治婦人胎腫。因溼熱。山梔子一合。炒研。每服二三錢。米飲下。丸服亦可。(丹溪方)

⑯治熱水腫疾。山梔子仁炒研。米飲下三錢。若上焦熱者。連殼用。

(丹溪方)

⑰治攪亂轉筋。心腹脹滿。未得吐下。梔子二十七枚。燒研細。熱酒服之。立愈。(肘後方)

⑱治冷熱腹痛。疴刺不思飲食。用山梔子。川烏頭等分。生研為末。酒糊丸。如梧子大。每服十五丸。生薑湯下。若小腹痛。茴香湯下。(博濟方)

⑲治胃皖火痛。大山梔子七枚。或九枚。炒焦。水一盞。煎七分。入生薑汁。飲之。立止。復發者。必不效。用玄明粉一錢。服立止。(丹溪方)

⑳治五臟諸氣。益少陰血。梔子炒黑研末。生薑同煎。飲之。其效甚捷。(丹溪方)

㉑治五尸注病。沖發。心脇刺痛。纏綿無時。梔子三七枚。燒末。水服。(肘後方)

㉒治熱病食復。及交接後發動。欲死。不能語。梔子三十枚。水三升。煎一升。服。令微汗。(梅師方)

㉓治小兒狂躁。畜熱在下。身熱狂躁。昏迷不食。梔子仁七枚。豆豉五錢。水一盞。煎七分。服之。或吐或不吐。立效。(問孝忠集效方)

①治盤腸釣氣。越桃仁半兩。草烏頭少許。同炒過。去草烏。入白芷一錢。為末。每服半錢。茴香葱白酒下。(普濟方)

②治赤眼腫秘。山梔子七個。鑽孔煨熱。水一升。煎半升。去滓。并入大黃末三錢。溫服下。(普濟方)

③治喫飯直出。梔子二十個。微炒去皮。水煎湯服下。(怪證奇方)

④治風痰頭痛不可忍。梔子末和蜜。濃傳舌上。吐即止。(兵部手集方)

⑤治鼻上酒皰。梔子炒研。黃蠟和丸。彈子大。每服一丸。嚼細茶下。日二服。忌酒。蘇煎炙。又方。用山梔。桑黃。或桑白皮。黃芩。甘草。桔梗。五味子。乾葛等分。(許學士本事方)

⑥治火爛丹毒。梔子搗和水塗之。(梅師方)

⑦治火瘡未起。梔子仁燒研。麻油和封之。已成瘡。燒白糖灰粉之。(千金方)

⑧治眉中綠癬。梔子燒研。和油傳之。愈。(保幼大全方)

⑨治折傷腫痛。梔子白麩同搗塗之。其效。(集簡方)

⑩治痢大吹傷。梔子皮燒研。石硫黃等分。為末。傳之。(梅師方)

⑪治湯燙火燒。梔子末和雞子清。澆掃之。(救急方)

⑫用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡脾胃虛寒而無溼熱鬱火者禁用。

著名方劑 梔子仁湯。治陽毒傷寒壯熱。百節疼痛。(活人書方)

用梔子仁一兩。柴胡兩半。升麻。黃芩各二兩。赤芍一兩。大青一兩。石膏一兩。知母一兩。炙甘草半兩。杏仁(去尖)二兩。共搗為粗末。每服四錢。以水一盞。入生姜半分。豉百粒。煎至六分。去滓服。

參攷資料 ⑬今南方及西蜀

州郡皆有之。木高七八尺。葉似李而厚硬。又似楊蒲子。二三月生白花。花皆六出。甚芬香。俗說即西域菴蔔也。夏秋結實如詞子狀。生青熟黃。中仁深紅。南人競種以售。利史記貨殖傳云。梔子千石。與千戶侯等。言獲利溥也。入藥用山梔子。方書所謂越桃也。皮薄而圓。小刻房七稜。至九稜者為佳。其大而長者。雷欒炮炙論謂之伏尸。梔子入

藥無力。(蘇頌) ⑭仲景治傷寒發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者必反覆顛倒。心中懊憹。梔子鼓湯治之。因其虛。故不用大黃。有寒毒。故也。梔子雖寒而無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。腑臟無潤養。內生虛熱。非此物不可去也。又治心經留熱。小便赤澀。用去皮梔子火煨。

大黃連翹。炙甘草等分末之。水煎三錢服。無不利也。(寇宗奭) ⑮梔子輕飄而象肺。色赤而象火。故能瀉肺中之火。其用有四。心經客熱一也。除煩燥二也。去上焦虛熱三也。治風四也。(張元素) ⑯梔子瀉三焦之火。及痞塊中火邪。最清胃腕之血。其性風曲下行。能降火從小便中泄去。凡心痛積久。不宜溫散。反助火邪。故古方多用梔子以導熱藥。則邪易伏而病易退。(朱震亨) ⑰本草不言梔子能吐。仲景用為吐藥。梔子本非吐藥。為邪氣在上。拒而不納。食令上吐。則邪因以出。所謂其高者因而越之也。或用為利小便藥。實非利小便。乃清肺也。肺清則化行。而膀胱津液之府。得此氣化而出也。仲景治煩

燥用梔子鼓湯。煩者氣也。躁者血也。氣主筋。躁主血。故用梔子。色赤味苦入心而治煩。香鼓色黑味鹽入腎而治躁。(王好古) ⑱梔子器也。梔子象之故名。俗作梔。司馬相如賦云。鮮支黃燂。註云。鮮支即支子也。佛書稱其花為菴蔔。謝靈運謂之林蘭。曾端伯呼為禪友。或曰菴蔔金色。非梔子也。(李時珍) ⑲梔子葉如兔耳。厚而深綠。春榮秋瘁。入夏開花。大如酒盃。白瓣黃蕊。隨即結實。厚皮細子。有鬚。霜後收之。蜀中有紅梔子。花爛紅色。其實染物則赭紅色。(李時珍) ⑳梔子裏至苦大寒之氣。苦寒損胃而傷血。凡脾胃虛弱者忌之。血虛發熱者忌之。性能瀉有餘之火。心脾無邪熱者不宜用。小便不通。由於膀胱虛無氣以化。而非熱結小腸者。不宜用。瘡瘍因氣血虛不能收斂。則為久冷敗瘡。非溫煖補益之劑。則不愈。此所謂既潰之後。一毫寒藥不可用是也。世人又以治諸血症。不知血得熱則行。得寒則凝。凝血凝結於中。則反致寒熱。或發熱勞嗽。飲食減少。為難療之病。凡治

藥無力。(蘇頌) ⑭仲景治傷寒發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者必反覆顛倒。心中懊憹。梔子鼓湯治之。因其虛。故不用大黃。有寒毒。故也。梔子雖寒而無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。腑臟無潤養。內生虛熱。非此物不可去也。又治心經留熱。小便赤澀。用去皮梔子火煨。大黃連翹。炙甘草等分末之。水煎三錢服。無不利也。(寇宗奭) ⑮梔子輕飄而象肺。色赤而象火。故能瀉肺中之火。其用有四。心經客熱一也。除煩燥二也。去上焦虛熱三也。治風四也。(張元素) ⑯梔子瀉三焦之火。及痞塊中火邪。最清胃腕之血。其性風曲下行。能降火從小便中泄去。凡心痛積久。不宜溫散。反助火邪。故古方多用梔子以導熱藥。則邪易伏而病易退。(朱震亨) ⑰本草不言梔子能吐。仲景用為吐藥。梔子本非吐藥。為邪氣在上。拒而不納。食令上吐。則邪因以出。所謂其高者因而越之也。或用為利小便藥。實非利小便。乃清肺也。肺清則化行。而膀胱津液之府。得此氣化而出也。仲景治煩

吐血法。當以順氣爲先。蓋血隨氣而行。氣降則火降。火降則血自歸。經不求其止而止矣。此治療之要法。不可違也。(經希雍)

【山相炭】即山樞子焙成炭者之處方用名。詳『山樞子』條。

【山犀】即犀之居山林間者。性質功用與尋常犀同。參見『犀』條。

【山荷葉】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳『鬼臼』條。

【山葶子】即懸鉤子之古籍別名。典見爾雅。詳『懸鉤子』條。

【山莧菜】即牛膝之古籍別名。典見救荒本草。詳『牛膝』條。

【山連】即白朮之古籍別名。典見別錄。詳『白朮』條。

【山陵薊】即鼠尾草之古籍別名。典見吳普本草。詳『鼠尾草』條。

【山魚蘇】即紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。

【山麻】即玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【山梨】即鹿梨之古籍別名。典見毛詩。詳『鹿梨』條。

【山屠】即黃柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃柏』條。

【山棗】產地 出廣西潯慶府。形態 山棗爲棗類之一種。其葉如梅。其果如荔枝。其色青黃。其實可供藥用。

性質 甘溫無毒。

採取 九月間實熟時採之。

主治 和脾胃。強精神。

【山棗仁】即酸棗仁之古籍別名。典見綱目。詳『酸棗仁』條。

【山棘實】即營實之古籍別名。典見別錄。詳『營實』條。

【山棠子】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山椒】即川椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川椒』條。

【山椒魚】即鯢魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鯢魚』條。

【山管】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【山菌子】即竹雞之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹雞』條。

【山菜】即柴胡之古籍別名。典見吳普本草。詳『柴胡』條。

【山菩提】產地 出福建福州。各屬。

主治 去濕。

【山蛤】形態 山蛤在山石中。殼狀似蝦蟆而大。黃色。能香氣。飲風露不食雜蟲。

主治 小兒勞瘦及疳疾食之最良。

命名 本品即馬陸。在山而大者。故名。

外國名詞 Polychaeta (拉丁) オヒヤステ (日本)

基本 係節肢動物。多足類。馬陸屬山蛭蟲科。

形態 山蛭蟲狀如百足而大。烏斑色。長二三寸。更有大如指者。

性質 有大毒。

主治 人嗜酒不已。取一節燒灰。水服。便不喜開酒氣。過一節則毒入至死。又燒黑傅惡瘡。亦治蠶病白餅。燒灰粉之。

參攷資料 按本經馬陸一名百足。狀如大蛭。而此云狀如百足而大。更大者爲馬陸。則似又指百足爲一物矣。蓋此即馬陸之在山而大者耳。故曰山蛭。雞犬皆不敢食之。李時珍。

【山雄黃】即落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落得打』條。

【山黃荊】形態 山黃荊爲荊者爲楮。青色者爲荊。木心方。枝對出。一枝五葉或七葉。葉如榆葉而長。尖有鋸齒。五月開花。紫紅色。成穗結實。大如胡荽子。有白膜皮包裹。其子可供藥用。

主治 消食下氣。傷寒發熱。嘔逆。炒水煎服。

配合應用 專治痔漏之管。用黃荊條所結之子。炙燥爲末。五錢。一服。黑糖拌。空心陳酒送服。服至管自退。(退管方)

① 治骨蒸勞熱。六月雪、黃荊子、稀荻草、何首烏、當歸、川芎、熟地、白茯苓、水二鍾。薑三片。煎八分服。有痰加半夏。(養素園驗方)

② 治漆瘡。烏蛇草。不論鮮乾。一握。煎湯一洗即愈。(姚希周經驗方)

③ 治杖瘡起疔。黃荊子焙乾爲末。搽上即開。不用刀刮。

④ 治肝胃痛。黃荊子研末。和粉作團。食一二次。斷根。(周山人方)

【山黃荊葉】主治 九竅出血。搗汁和酒服。

脚娃搗卷之。

【山授】即藜蘆之古籍別名。與見和漢藥考。詳「藜蘆」條。

【山椿】即樗之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「樗枏白皮」條。

【山榆】即榆之古籍別名。與見綱目。詳「榆白皮」條。

【山檜】即檜之古籍別名。與見綱目。詳「蕪荑」條。

【山葫柳】即天燈籠草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「天燈籠草」條。

【山荀菊】即莫之古籍別名。與見唐註本草。詳「莫」條。

【山葱】即藜蘆之古籍別名。與見別錄。詳「藜蘆」條。即藜蘆之古籍別名。與見綱目。詳「藜蘆」條。

【山葵果】即山查之古籍別名。與見食鑑本草。詳「山查」條。

【山道年可】別名 海蒿。產地 出波斯、俄羅斯等處。與蒿草同類。

主治 殺蟲。

【山雄】即鷓雉之古籍別名。與見綱目。詳「鷓雉」條。

【山鳩】即青鳩之古籍別名。與見

動物學大辭典。詳「青鸚」條。

【山慈石】古籍別名 爰苾。(別錄)

形態 山慈石為雜草類之一種。正月生葉。如藜蘆莖有衣。其莖葉可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 女子帶下。

【山慈姑】命名 本品球根頗似慈姑。而有毛殼包裹者。後人遂有毛姑、毛慈姑之稱。

處方用名 白毛菇。毛慈菇。山慈姑。

古籍別名 金燈。(拾遺) 鬼燈檠。朱姑。鹿蹄草。無義草。(綱目) 紅燈籠。燈籠花。(俗名) 山茨菰。團慈姑。(和漢藥考) 白地栗。河兔苳。(俗名) 毛姑。

學名 Tulipa edulis, Bolk (拉丁)

基本 屬百合科。為山慈姑之球根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。山茨菰產廣西南寧。實則凡山谷原野之卑溼地方。恒有生長。

形態 按山慈姑為自生之多。年生草本。葉生於地下之鱗莖。細長似水仙葉。花軸抽於鱗莖之中央。高可尺許。其肥者有分枝。每枝之頂端開六瓣之白花。大寸許。瓣面雜暗紫色之條紋。鱗莖數重包裹。頗似山慈。其根端之球。形圓如卵。而被以茶褐色之外衣。內色白。採掘之。堪充食用。並入藥。

採取 四月間苗枯時採根。

性質 甘微辛。有小毒。

效能 解熱毒。療瘡瘍。專作瘡毒。腫脹。又解諸毒藥。

主治 癰腫瘡癤。癩癧結核疔毒。等用醋磨汁傳之。亦割人面皮除疔腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論山慈姑曰。主疔腫。攻毒破皮。解諸毒蟲毒。蛇蟲狂大傷。

【明】經希雍本草經疏論山慈姑曰。山慈姑味辛氣寒。善散熱消結。



山慈姑

故主癰腫瘡癤癩癧結核等。昔人用醋磨傳。今人亦入藥中服。產處州遂昌縣。實非金燈花與鹿蹄草。葉似車前。【清】黃宮繡本草求真論山慈姑曰。山慈姑味苦微辛。氣寒微毒。功消瀉熱。消結解毒。故凡症患癰疽。無名疔腫。癩疹癩瘡。蛇瘡。齒傷。癩癧結核等症。用此外敷。固可解散。內治亦可調治。總為結毒散結之方。但性寒冷。不可過服。根與慈葱小蒜相類。去毛殼用。

近人學說 張山雷曰。山慈姑之名稱。始見於嘉祐本草。然陳藏器拾遺已有之。則名金燈。即其花也。味甘微辛。能散堅消結。化痰解毒。其力頗峻。故諸家以為有小毒。藏器治癰腫瘡癤。癩癧結核。除疔腫。皆醋磨塗之。並不以為內服之藥。至王穆百一選方。乃有太乙紫金丹。亦名玉極丹。即今通行之紫金錠也。能解百毒。通治癰癢。堅腫癰瘍。楊梅瘡。癩疫時氣。瘰癧。蟲毒。中惡。胸腹攻痛。壅塞不通。諸證。及毒蛇蟲犬等傷。外證可敷。內證可服。其效最捷。則以合大戟。干金子。籍藟。香。皆道科迅疾之品。所以

行賦極速。取效最捷。而病重者遠服之。則必利下。是以攻逐惡物為專職。藥力之猛烈可知。此皆用以瀉滯腸胃。驅除積垢。以滅邪毒。惡陵之勢。亦非能通行百脈。消除皮裏膜外之堅積也。且氣味俱淡。以質為用。所以古來未入煎劑。乃近人不知古意。輒欲自謂新奇。別開生面。遂有用入煎方。以為消積攻堅之法。如瘰癧痞積之類。皆喜用之。而不能取效者。則以此物體質堅重。獨穎無枝。止能直下。而不能旁行。其力雖峻。而無宣絡通經之任。何能行於肢體脈絡。且瘰癧結核。病在上部。而此物又專於下趨。更無氣味薰蒸及上。又屬背道而馳。何能中病。彼徒知矜奇眩異。而於此中理法。全未體認。亦何怪乎往負心思。攻伐無過。而於病情之百無一當也。所以腸胃之病。如食積氣滯。胸脘不舒。服玉楸丹少許。則頃刻即效。此中微義。亦可深長思矣。用藥者。能於此等處用心。而融會貫通之。然後可讀古人之書。而治今人之病。竊願好學深思之士。有以三復斯言。袁淑範曰。按

三查山

山慈姑中含有多量之澱粉。故有緩和毒物及收斂等作用。其中尚含有一種心臟毒名 *Atropin* 者。故又有如一般屬百合科植物之強心作用也。

配合應用 ●治粉滓面黧。山慈姑根。夜塗且洗。(曾濟方)

●治牙齦腫痛。紅燈籠枝根煎湯漱吐。(孫天仁集效方)

●治癰疽疔腫。惡瘡及黃疽。慈姑連根。同蒼耳草等分搗爛。以好酒一鐘。濃汁溫服。或乾之為末。每酒服三錢。(乾坤生意方)

●治風痰癩疾。金燈花根似蒜者一箇。以茶清研如泥。日中時以茶調下。即臥日中良久。吐出如雞子大物。永不發。如不吐。以熱茶投之。(奇效良方)

●解諸毒。瘰癧瘡。利關節。治百病。起死回生。用山慈姑去皮。洗極淨。焙二兩。用五倍子洗刮焙二兩。千金子仁白研。紙壓去油一兩。紅芽大戟去蘆洗焙一兩。中麝香三錢。精心治藥。為末。重羅令勻。用糯米濃飲和之。木白杵干下。作一錢一錠。病甚者連服取利一二行。用

溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蟲毒。瘴氣。河豚土菌。死牛馬等毒。並用涼水磨服一錢。或吐或利即愈。癰疽發背。疔瘡楊梅等一切惡瘡。風癩。赤遊痔瘡。並用涼水或酒磨塗。日數次。立消。陰陽二毒。傷寒狂亂。瘟疫。喉痺。喉風。並用冷水入薄荷汁數匙。化下。心氣痛。并諸氣。用淡酒化下。泄瀉痢下。霍亂絞腸。用薄荷湯下。中風中氣。口緊眼垂。五癩。五癩。鬼邪。鬼胎。筋攣骨痛。並暖酒下。自縊溺水。鬼迷心頭。溫者冷水磨瀉之。傳尸癆瘵。涼水化服。下取惡物。蟲積為妙。瘧疾將發時。東流水煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五疳五疳。薄荷湯下。頭風頭痛。酒研貼兩太陽上。諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風蟲牙痛。酒磨塗之。亦吞少許。打撲傷損。松節煎酒下。湯火傷。毒蛇蠱犬一切蟲傷。並冰水磨塗。仍服之。(百一選方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非癰毒腫痛者禁用。
參攷資料 ●根狀如水慈姑。

花狀如燈籠而朱色。故有諸名。段成式酉陽雜俎云。金燈之花。與葉不相見。人惡種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。(李時珍) ●山慈姑處處有之。冬月生。葉如水仙花之葉而狹。二月中枯。一莖如箭。輪高尺許。莖端開花白色。亦有紅色。黃色。上有黑點。其花乃眾花簇成一朵。如絲。組成可愛。三月結子。有三稜。四月初苗枯。即掘取其根。狀如慈姑及小蒜。遲則苗腐難尋矣。根苗與老鴉蒜極相類。但老鴉蒜根無毛。慈姑有毛。壳包裹為異。爾用之當去其毛壳。(李時珍)

【山慈姑花】 主治 小便血淋。清痛。同地藥。花陰乾。水煎服。

【山慈姑葉】 主治 瘡腫。入蜜搗塗瘡口。候清血出效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論山慈姑葉曰。塗乳癰便毒。尤妙。

【山榴花】 即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【山漆】即三七之原名。詳「三七」條。

【山精】即蒼朮之古籍別名。與見抱朴子。詳「蒼朮」條。即何首烏之古籍別名。與見圖經本草。詳「何首烏」條。

【山苻藥】即風藤草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「風藤草」條。

【山蒜】命名 本品似大蒜而生山坂石磧間。故名。

古籍別名 藟(爾雅)藟野蒜。澤蒜(和漢藥考)藟(呂忱字林)

外國名詞 Allium nipponicum, Fr. et Sav. (拉丁) Wild rocambole. (英)

基本 屬百合科。藥用山蒜之鱗莖。



山蒜

形態 山蒜為多年生草本。自生於山野道旁之積間。鱗莖生地下。僅如棗大。形圓而色白。葉細長如管。而有微稜。色綠。有並行脈。夏

日。葉間伸出長一二尺之莖。頂上生球塊。色黑紫。如小肉芽。塊間抽長花梗。於此簇生多數之六瓣小花。色淡紫。頗可愛。後結實而下垂。

性實 辛溫無毒。效能 用治積塊。血癥藥。主治 山蒜治積塊及婦人血癥。用苦醋磨傳多效。澤蒜石蒜。並溫補下氣。滑水源。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。山蒜。山野溪澗之邊多生之。其葷氣淺。用根葉煮食。治噎膈有效。又炒黑可敷癰疔。消腫止痛。又和漢藥考曰。咽喉腫痛。山蒜炒黑研細末。以管吹入。噎膈。用土中掘取山蒜。杵爛。酒飲服。打撲傷。山蒜和小麥粉搗煉成膏。塗痛處。

參攷資料 澤蒜根如小蒜。葉如韭。又生石間者名石蒜。與蒜無異(陳藏器)江南一種山蒜似大蒜而臭(蘇頌)山蒜澤蒜石蒜。同一物也。但分生於山澤石間不同耳。人間栽蒔小蒜。始自三種移成。故猶有澤蒜之稱。爾雅云。薺山蒜也。今京口有蒜。山產蒜是也。處處有之。不獨江南。又呂忱字

林云。香。水中蒜也。則蒜不但產於山。而又產於水也。別有山慈姑。水仙花。老鴉蒜。石蒜之類。根葉皆似蒜。而不可食。其花亦異(李時珍)【山蜜】即蜂蜜之留於石中木上者。參見「蜂蜜」條。

【山狸】基本 本品為狸之產於山中者。

形態 山狸形似麝。後有一肉囊。囊中有香。滿則輒病。常就石上別出始安。其香狀似蘇合香而黑色。可供藥用。主治 療耳病。

【山辣】即山奈之古籍別名。與見綱目。詳「山奈」條。【山銀花】即金銀花之處方用名。詳「金銀花」條。【山韶子】即韶子之古籍別名。與見綱目。詳「韶子」條。【山樗】即樗之生於山中者。又名為樗。形與田樗無異。惟葉差狹耳。參見「樗櫟白皮」條。

【山穀】命名 本品煮粥食。味與穀無辨。故名。古籍別名 烏爾格納。(綱目拾遺)

產地 出蒙古諸地之水濱山溝間。

形態 山穀為穀類之一種。莖長尺餘。細如草。節如竹。葉亦如之。每二節一葉。秀穗類荊花。結實似穀。而色紅。採之曬乾。去其外皮。可供食與藥用。其根外皮細。內質粉白。亦可供食。詳見該條。

性實 甘香無毒。主治 行氣利水。清大小腸火。亦補脾胃。

參攷資料 山穀。蒙古人用以充饑。並可碎髮合茶及雜粟作食。(綱目拾遺)

【山穀根】古籍別名 墨克爾。性實 甘無毒。主治 生津利水。滋血脈。調營衛。用作調養藥。【山榧】即山查之原名。詳「山查」條。

【山節】即節蕒之古籍別名。與見別錄。詳「節蕒」條。【山蝸】即蝸牛之古籍別名。與見本草集註。詳「蝸牛」條。

【山蕨】即銀蕨之古籍別名。與見

和漢藥考。詳『銀箔』條。

【山橋】即橋樹小葉綠夏結冬熟大如土瓜。金色薄皮而味酸者。性質功用與金橋同。參見『金橋』條。

【山薺麥】即赤地利之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『赤地利』條。即杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杠板歸』條。

【山藟蕒】即土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【山龍子】即石龍子之古籍別名。典見別錄。詳『石龍子』條。

【山龍膽】產地 山野間多出之。其葉經霜雪不凋。採取 四時可採。性質 苦澆。主治 四肢疼痛。

探取 四時可採。性質 苦澆。主治 四肢疼痛。

【山龜甲】原名 秦龜甲。命名 龜則四方俱有。但秦地山中多老龜。大而壽。故名。

外國名詞 Damonia, roo-vosil, Gray peonc, Sturtle (拉丁) ヤマガメ (日本)

基本 係有椎動物爬蟲類、龜、鱉類、龜類、龜科藥用山龜之甲。

形態 山龜冬月藏土中。春夏出而遊溪谷。其大小不一。

採取 二月八月採之。製法 李珣曰。凡使以酥或酒炙黃用。

性質 苦溫。無毒。主治 除溼痺氣。身重。四肢關節不可動搖。

歷代記述攷證 【唐】孟誥食療本草論山龜甲曰。頑風冷痺。關節氣壅。婦人赤白帶下。破除積癥。【宋】寇宗奭本草衍義論山龜甲曰。補心。【明】李時珍本草綱目論山龜甲曰。治風痿。

參攷資料 山龜大於龜。蠶於物。故方家用以補心甚有驗。(寇宗奭)

【山龜頭】主治 陰乾炙研服。令人長遠入山不迷。參攷資料 山龜前膺骨佩之亦然。(陶弘景)

【山斂】即三斂子之俗名。詳『三斂子』條。

【山菌萎】即蠶本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蠶本』條。

【山覆】即山藥之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『山藥』條。

【山薺】即白朮之古籍別名。典見本經。詳『白朮』條。即蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【山薑】命名 本品根苗似薑。故名。處方用名 山薑根。山薑花。古籍別名 美草(藥性本草) 外國名詞 Alpinia japonica, Iga, Nic. (拉丁) ハナメウカ (日本)

基本 莖荷科山薑屬。藥用山薑之根。產地 凡閩廣諸地及暖地山麓均有出。

形態 山薑為芳草類之多年生常綠草本。莖高尺餘。葉似蕺荷而小。每株着四五葉。互生。葉背有柔軟之纖毛。撫之如天鵝絨。夏日自莖葉之葉心抽一花。莖長三寸許。花不整齊。白色紅斑。花柄甚短。作總狀花序。與穗狀花序相似。花後結實。實如豆蔻。熟則赤色。內多子。根似杜若。或如高良薑。

性質 辛熱無毒。

主治 腹中冷痛。炙服甚效。作丸散服時效止。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論山薑曰。去惡氣。溫中。惡霍亂。心腹冷痛。功用如薑。

參攷資料 東人呼為山薑。南人呼為美草。(陶弘景) 山薑根及苗。並如薑而大。作樟木臭。南人食之。又有蘆子薑。黃色而緊。辛辣破血。氣味強於此薑。(甄權) 山薑出九真交趾。今閩廣皆有之。劉侗嶺表錄異云。莖葉皆薑也。但根不堪食。亦與豆蔻花相似。而微小。爾。花生葉間。作穗如麥粒。嫩紅色。南人取其未大開者。謂之舍胎。花以鹽水淹藏入甜糟中。經冬如琥珀色。辛香可愛。用為膾。無以加矣。又以鹽殺治暴乾者煎湯服之。極除冷氣甚佳。(蘇頌) 與杜若之山薑名同物異也。(李時珍)

【山薑花】性質 辛溫無毒。主治 調中下氣。破冷氣作痛。止霍亂。消食殺酒毒。

【山薑根】即山薑之根。處方用名。詳『山薑』條。

【山薑實】性質功用與花同。詳『山薑』條。

一三三

山靈花」條。

【山薺】即薺壽之原名。詳『薺壽』條。即薺之古籍別名。與見爾雅。詳『薺』條。

【山薺】即川薺之古籍別名。典見綱目。詳『川薺』條。

【山檳榔】即檳榔之一種十餘餘。一幹十餘房。一房數百子。小而味苦甘者。參詳『檳榔』條。

【山歸來】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【山葵】即山葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山葵』條。

【山雞】即山雞之古籍別名。典見食經。詳『鴛鴦』條。即鴛鴦之古籍別名。典見食經。詳『鴛鴦』條。

【雞頭子】即金櫻子之古籍別名。典見綱目。詳『金櫻子』條。

【山獺】基本。係獺屬。藥用山獺之陰莖。

產地 出粵省之宜州嶺南。及南丹州等處山野有之。

性質 甘熱無毒。

主治 陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。瘰人爲補助要藥。

參攷資料 山獺人錢爲搗越。

其性淫毒。山中有此物。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。猶女春時成羣入山。以採物爲事。癩閉婦人氣。必躍來抱之。次骨而入。牢不可脫。因扼殺之。質歸。取其陰。一枚真金一兩。若得抱木死者尤奇。賞。

喇獺甚珍重之。私貨出界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞猴胎偽之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即燻然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖虞衡志。周草窗齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。(李時珍)

【山獺骨】 主治 解藥箭毒。研末少許。敷之立消。

原名 馨預。

命名 唐代宗名預。避諱改爲馨預。後因宋英宗諱。遂改爲山藥。

處方用名 淮山藥。淮山。拷山。炒山藥。懷山藥。

古籍別名 蒟蒻。土藷。山藷。(綱經) 修尾山芋。(吳普本草) 山薯山藷。玉藷。玉延。見草譜。餘于薯藥。預藥。青藜。銀條。德皇。白鳩。詩。

(和漢藥考)

外國名詞 Dioscorea japonica, Thunb. (拉卜)

基本 屬薯蕷科。藥用山藥之自生根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。山藥產河南懷慶府沁陽。武陟。溫。孟四縣。以溫縣爲最多。冬季出新。山西太谷亦有。但少出。僅供中日醫膳用。湖南湖北亦有出產。均作食品用。

形體 按山藥爲山野自生之宿根莖草。春發新芽。漸蔓延於地上。莖細長。纏繞他物而上。葉爲心臟形而略長。未端尖。有長葉柄。皆對生。花開於大暑之候。葉腋間淡綠色之小花。聚成繖形。狀皆單性花也。果實爲蒴果。有三翅。如團扇。葉腋間又生球形黑褐色之小粒。名零餘子。其自生者名野山藥。一名土山藥。亦呼白鳩。薯。根皮色灰褐。肉色白多肉。處處有細毛根及小疣。性脆易折。長三四尺。粗約一二寸以上。栽於圃園者名家山藥。根之生長者。長至六七尺。但風味遜於野山藥。入藥須擇山野

自生者用之。採此根者。冬日入山中。見懸有枯莖之樹餘。乃搜尋根之所在。而採掘之。藥用又須選藏至數年。乾而已去外皮。質重色白者爲佳品。



山藥

種類 薯蕷有野生。家生兩種。山谷間自然生長者。藤作紫色。葉似家山藥而大。且微尖。根細長而重硬。皮色微赤。爲野山藥。掘探以供藥用。其由人工種植於圃園者。爲家山藥。其味不如山野自生者。爲美。不堪入藥。祇供食用。

種植 山藥根每年替生。與他物異。故八月有新舊二根。蓋夏間新根漸生。自秋末後。則爲舊根。新根之形。與舊根同。頗爲奇異。播種時。可採其根。移植於圃園。須先作地作孔。則山藥隨孔之大小而生長。

採取 採掘時。宜擇山野歷年。頗久。肥皮赤者佳。每年二月八

月採取。尤於臘月採者更佳。

製法 雷斅曰。凡使山藥。勿用平田生。二三紀者。須要山中。生經年。干紀者。皮赤四面有鬚者。為妙。採取其根。以布裹手。用竹刀或銅刀刮去皮。洗去漚。竹篩盛之。懸置脣口風處。不得見日。日乾五分。陰乾收藏之。

性質 甘溫平。無毒。

成分 山藥之有效成分。尙未詳悉。其根中之粘質物。謂之苗生。係一種蛋白質。其所含之量。在乾根中。約有八%。若依營養上之分析。則水分八〇。七四。蛋白質二四。〇。脂肪〇。一六。炭水化合物一五。〇。九纖維〇。九。灰分〇。六四。

效能 瀉精。止帶。理瀉。治痢。為滋養強壯藥。

主治 傷中補虛。羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。強陰。主頭暈。遊風。頭風。眼眩。下氣。止腰痛。治虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱。久服耳目聰明。輕身不饑延年。
張仲景之發明 薯蕷丸。腎氣丸。二方用之。

三畫 山

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論山藥曰。補五勞七傷。去冷風。鎮心神。安魂魄。補心氣不足。開達心孔。多記事。【宋】日華諸家本草論山藥曰。強筋骨。主泄精健忘。【元】朱丹溪本草衍義補遺論山藥曰。生搗貼腫硬毒。能消散。【明】李時珍本草綱目論山藥曰。達腎氣。健脾胃。止洩痢。化痰涎。潤皮毛。【明】繆希雍本草經疏論山藥曰。薯蕷得土之冲氣。兼稟春之和氣。以生。故味甘溫平無毒。觀其生搗。敷癰瘡。能消熱腫。是散寒之驗也。甘能補脾。脾統血而主肌肉。甘溫能益血。脾治中焦。故主傷中。補虛羸。補中益氣力。長肌肉。充五臟。除煩熱。強陰也。其主寒熱邪氣。及頭面遊風。頭風。眼眩。下氣。止腰痛者。正以其甘能除大熱。甘能益陰氣。甘能緩中。甘溫平能補肝腎。藥性論云。薯蕷臣能補五勞七傷。去冷是也。蓋寒熱邪氣者。陰不足。則內熱。內虛則外邪客之。熱則生風。緩則下氣。下氣則陽交於陰。五勞既去。五臟既充。則久服耳目聰明。輕身延年之效。自著矣。【清】張

隱庵本草崇原論山藥曰。山藥氣味甘平。始出中嶽。得中土之專精。

乃補太陰脾土之藥。故主治之功。皆在中土。治傷中者。益中土也。補虛羸者。益肌肉也。除寒熱邪氣者。中土調和。肌肉充足。則寒熱邪氣自除矣。夫治傷中。則可以補中而益氣力。補虛羸。則可以長肌肉而強陰。陰強則耳目聰明。氣力益。則身體輕健。土氣有餘。則不饑而延年。【清】陳修園本草經疏論山藥曰。山藥生搗最多津液而稠粘。能補腎填精。精足則陰強。目明耳聰。不飢。是脾血之旺。身輕。是肺氣之充。延年。是誇其補益之效也。凡上品。俱是尋常服食之物。非治病之藥。故神農另提出久服二字。可見今人每取上品之藥。如此物。及人參。熟地。葳蕤。阿膠。芩絲子。沙苑。菴藥之類。合為一方。以治大病。誤人無算。蓋病不速去。元氣日傷。傷極則死。凡上品之藥。法宜久服。多則終身。少則數年。與五穀之養人相佐。以臻壽考。若大病而需用此藥。如五穀為養。脾第一品。脾虛之人。強令食穀。即可舉補脾之能事。有

是理乎。然操此技者。未有不得瘳名。薛立齋。張景岳。馮楚瞻輩。倡之於前。而近日之東延西請。日診百人者。無非是術。誠可慨也。【清】黃

宮繩本草求真論山藥曰。山藥本屬食物。古人用入湯劑。謂其補脾益氣。除濕。然究色白入肺。味甘入脾。氣雖溫而却不平。為補脾肺之陰。是以能潤皮毛。長肌肉。與麴同食。不能益人。不似黃芪性溫。能補脾陽。白朮苦燥。能補脾陽也。且其性瀉。能治遺精不禁。味甘兼鹹。又能益腎強陰。故六味地黃丸。用此以佐地黃。然性雖陰。而滯不甚。故能滲濕。以止泄瀉。生搗敷癰瘡。消腫硬。亦是補陰退熱之意。至云補脾消腫。補氣除滯。理有可通。語涉牽混。似非正說。至入湯劑。以治火虛危症。必多用之。方應以其秉性和緩。故耳。入滋陰藥中。宜生用。入補肺脾藥。宜炒黃用。淮產白色而堅者。良。建產雖白不佳。【清】王士雄隨息居飲食譜論山藥曰。薯蕷甘平。養食補脾腎。調二便。強筋骨。豐肌體。辟瘴露。清虛熱。既可充糧。亦堪入饌。不勞瀉瀝。廣種為宜。子名

零餘子功用相同。腫脹氣滯諸病均忌。清鄒樹本草疏證論山藥曰。子家有薯蕷一本。莖長至三四丈。春夏綠葉扶疎。屆秋垂實。纍纍者有年矣。會闢地治室。乃掘去之。根大如臂。攀磚附石。至三四尺。究未窮其所止。蒸而茹之。甚甘美。因是悟古人所謂種薯蕷者。先杵地作孔。則薯蕷隨孔之大小。以為大小。是欲其肥。不欲其長也。若野生者。隨地下之隙而直下焉。逾年月深久。仍能橫擴為肥。入藥取此。即以其入土深善附磚石耳。其為物也。有皮有筋。而肉最勝。又皮黃肉白。筋即仿其肉之色。又可悟其致厚肉之氣於皮。以為之體。而合皮（本為肺主。而屬金色黃。則土金相生而和合矣。）與肉（本為脾之所主。屬土色白。亦為金土和合）之氣。致之於筋。以為之用。肺者氣之所由行。肝者力之所由作。氣與力之受益。其端皆係於能補中。而肉最厚之物。此不可謂補中益氣力長肌肉乎。或曰。主傷中補虛羸。即補中益氣力也。而本經復言之何故。此蓋當連下句讀。主傷中補

虛羸。除寒熱邪氣云者。猶云補傷中而致之虛羸。除傷中而受之寒熱邪氣也。夫虛必有一處為先。他處乃連類及之者。邪之所湊。雖云其氣必虛。然亦有陰陽之分。五臟六府之異。譬之水決。定因其地窪下而灌之。乃泛濫及於他所。薯蕷所主之虛之邪。須審定其由傷中傷氣。方得無誤。不然傷血及他傷。亦能致虛羸。成寒熱。又何別焉。別錄所主補虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱。正與本經相印。惟下氣。止腰痛。強陰。三項為特出。此則以野生者。益善下行。最喜攀附磚石也。至於頭面游風。頭風。眼眩。唐以來醫家不甚用此味。故無從參其底蘊。然質之仲景。治風氣百疾。本經除寒熱邪氣。亦可默會其旨矣。仲景書中。凡兩用薯蕷。一為薯蕷丸。一為腎氣丸。薯蕷丸。脾肺之劑也。腎氣丸。肺腎之劑也。觀經脈別論。食氣者。先歸肝心。乃及於肺。飲氣則先歸脾。而亦及於肺。至肺而後布其精。其處惟不言。至於腎。蓋腎固藏精洩濁之總匯也。風氣百疾者。心肝脾之氣。懈於朝肺。肺送不能

輸精於皮毛。斯外邪乘而客之。是其責雖在肺。而其咎究在脾。故薯蕷丸以薯蕷補氣。藥為君。補血藥為臣。驅風藥為佐使。少腹有故。小便不調者。肺之氣。意輸精於皮毛。毛垢不能合精。以行氣於腑。斯清濁兩者。或泛其源。或塞其流。是其責雖在肺家。輸瀉之不肅。而其咎實當歸於腎家。為受之不成。故腎氣丸以薯蕷隨地黃。茱萸。牡丹。附子。桂枝。以撥正其翁受之機。又以薯蕷帥茯苓。澤瀉。以開通其輸瀉之道。曰腎氣丸者。明腎之氣。固當留其精。而瀉其髓也。曰薯蕷丸者。明脾之氣。固當散其精。而歸於肺也。是薯蕷丸雖謂之脾氣丸也。可腎氣丸雖謂之地黃丸也。亦無不可。是皆穀氣穀精。不充暢流動之咎也。薯蕷體滑。多涎。黏稠色白。其似肉中之脂液耶。不然何以生搗可消熱腫也。其似腎所藏之精耶。不然何以能強陰也。凡物功能固莫不由形色性味而發。然能此復能彼。又莫不有一貫之理。存乎其間。消肉中熱腫之與強陰。其義非可相直也。何哉。夫腫非一端。而

曰熱腫。則固當得陰濟。乃能解矣。矧不在皮膚。不在血脈。不在筋骨。而在肉。斯固為肉中之氣。運掉不靈。致有所壅也。得厚肉多脂不爽。生氣之物。其壅何能不解。且強陰非益精也。玩金匱之用薯蕷。蓋可以得其概矣。夫以陰中所由而貫。則精自精。滑自滑。其源不同。其所由化亦異。何以腎氣丸。在虛勞。在轉胞。則治小便不利。在消渴。則治小便過多。然惟此方。可見溺能固精。精亦能固溺也。金匱真言論曰。北方黑色。入通於腎。開竅於二陰。水熱穴。腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。是故精化為氣。方有以司開闔。而無不禁之虞。壅塞之患。水精四布。五經竅行。方有以容氣之游行。而開者送其開。闔者送其闔。此統二竅而言之者也。若就一竅而言。則此竅過通。彼竅必塞。如下利則溺短。小便多則大便艱。何獨於精與溺而疑之耶。故曰。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。此由蟲以致精也。曰精。食氣。形。食味。化生精。氣。生形。此精虛而提益以益之也。曰味。傷形。氣

傷精。精化爲氣。氣傷於味。則麤者不能益精。反足以害精矣。由此而親。則以滯熱下注而遺精。以精氣壅遏而溺澀。精溺凝下而爲濁。及以溺多而劫精。以溺塞而燥精。其源皆由脾胃之不咸。夫固曰腎者胃之關耳。夫不咸之始。必本於胃氣之不充。不咸之成。必歸於脾氣之不治。脾胃一臟一腑。皆在中宮。竝主出納。而其性情則異。胃司降而喜涼。脾司升而喜溫。薯蕷溫平之物。不寒不熱。不潤不燥。爲脾胃之所均喜。故其用爲能致胃津於脾。而脾胃以和。故經脈別論。謂食氣入胃。則散精於肝。而歸濁氣於心。惟飲入於胃。則輸精於脾。此不可易之常理也。

國外學說 大和本草曰。山藥卽薯蕷也。種於園圃者。其味不如山野自生者爲美。凡薯蕷根。每年替生。與他物異。故八月有新舊二根。蓋夏間新根漸生。自秋末後。則爲舊根。新根之形與舊根同。頗爲奇異。花後生三角之物。非花非實。乃零餘子也。入藥宜擇在山中歷年頗久。肥大。皮赤者爲佳。臘月採

三壘山

者尤良。雷斅以銅刀刮赤皮。去涎。洗淨。蒸過。乾用。園圃種者。不堪入藥。功能補腎。益脾胃。虛人可久服。加鹽煮食尤佳。然能塞氣。有積滯之人忌用。受金瘡及產婦。尤不可食。以有大毒也。或曰山藥頭小尾大。故有厚補下部之功。凡患硬腫之瘡者。敷此自消散。丹溪云。今欲試其有效與否。於婦人患乳腫痛不可忍者。研生山藥數之。立效。可知其不誣也。零餘子性味俱佳。又佛掌薯。亦薯蕷之類也。和漢三才圖會曰。薯蕷根長尺許。周二三寸。灰黃色。肉白。可煮食。名長芋。日本江戶產。肥大。殊佳。救荒本草曰。生山野間者。藤作紫色。葉似家山藥而大。且微尖。根比家山藥細。更兼瘦硬。皮色微赤。名野山藥。俗云自然生是也。病人食之無妨。藥學博士片山巖。嘗實驗薯蕷。及佛掌薯。中俱含有有消化力之消化素。報告醫界中人。並著論文一篇。登載藥學雜誌第三百十五號。題曰薯蕷及佛掌薯之消化素。略謂余嘗取薯蕷及佛掌薯製成薯蕷汁。試驗其消化若何。竟驗得其消化素

係一種卻斯他階。因定名曰迪司可卻斯他階 (Dioscorinase) 此消化素之精化力。在攝氏四十五。至五十五之溫度。最爲顯著。於此溫度之弱鹽酸性中。在三小時內。可使消化五倍分量之澱粉。其效力之偉大可知。且在亞兒加里液中。全然失其效力。至調理薯蕷汁之法。切須避高溫。以免消化素之分解云。又牧野富太郎亦曾在東京本草會演說薯蕷之大略。其言曰。昔本草大家小野蘭山翁。著本草綱目。啓蒙。明言山野自生之薯蕷曰山藥。園圃所種者曰長芋。卽家山藥。後世學者多引用之。今細檢植物。更披覽植物圖考。始知蘭山之說。未爲確當。俗稱之長芋。實爲野生物。薯蕷與長芋之葉莖果實。均有不同。而佛掌薯(此有數種)要不外長芋之變種。故知中國所稱之薯蕷。卽長芋與佛掌薯。所稱之山藥。乃獨立之植物。有未可牽強混同者。

苦降爲苦。於是吞酸煩雜之胃病。竟無適當治法。臨證指南醫案。脾胃病門。曾以脾胃分治立論。其言曰。大陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾嗜剛燥。胃嗜陰柔也。葉氏此言。予嘗嘆爲卓絕。故予每遇吞酸煩雜。恒和其胃而不運。其脾。山藥。葛衣。雲苓。苡仁。梗米。甘草。穀芽。均和胃之妙品也。治吞酸煩雜。雖不能立時見效。其病亦必稍殺。嘗考之西醫籍。胃酸過多。證其痛常發於食後二三小時。或空腹時。如投以蛋白質或亞爾加里劑。(按卽小蘇打之類)痛可緩解。夫山藥固富有蛋白質者。自者以其治胃酸過多之煩雜。豈不甚妙。倘醫者不解此。以芳香運脾。或辛開苦降之法。治吞酸煩雜。勢必亢進胃膜之分泌。而病益甚。吾兄銜之管胃葉天士。雖不能治傷寒病。雜病則固有可探處。今觀葉氏脾胃分治之論。信然。又近世以山藥治胃勞。欬嗽。蓋山藥富有蛋白質之故也。◎章太炎曰。薯蕷一味。開血痺。特有神效。血痺虛勞方中。風氣諸不足。用薯蕷丸。今雲南人

患脚氣者。以生薯蕷切片。散布履上。以布纏之。約一時許。履上熱痒即愈。(節錄章氏醫學叢書脚氣論) 華實孚曰。上海天廚味精創製人吳蘊初。患糖尿病。延醫診治。注射糖尿病最新特效藥。因蘇林 (Thalio) 無效。送有人勸吳改服中方黃芪。山藥。吳君曾留學日本精解化學。乃日服黃耆。而親驗其小便。一星期病如故。吳再易山藥服之。亦日驗其尿。自服山藥後。尿中糖分逐漸減少。未幾。病即霍然。實孚又謂。西人論糖尿病療法之外。以戒糖及禁止五穀粉食為緊要攝生法。因澱粉經消化作用。可變為糖。而使糖尿增劇也。余以為糖尿病絕對忌糖。乃西醫因噎廢食。消極的辦法。須知糖尿病之原因。為澱粉質。新陳代謝機能不趨正軌所致。蓋患者腸內所吸收之澱粉糖質。已不似常時之貯藏於肝內。其大部分均入血液而自尿質排出。今再禁絕食料中之糖質。是出納不相符。而人體中需要之糖質。必日形虧乏。故凡患糖尿病者。若將澱粉類食物。完全禁

止。即將發生危險。國醫以山藥治糖尿病。一方山藥富於澱粉。能增加人體中缺乏之糖質。一方山藥有收澱之性。更能遏止人體向外滲漏之糖質。準以上言之。西醫治糖尿病。禁止食糖。未必於病有益。國醫用含有澱粉之山藥。而病竟能愈。嗣後山藥治糖尿病。果屢試而屢驗。則西醫治糖尿病。絕對忌糖之學理。將有根本動搖之一日也。 張錫純曰。山藥。色白入肺。味甘歸脾。液濃益腎。能滋潤血脈。固攝氣化。甯欬定喘。強志育神。性平。可以常服。多服宜用生者。煮汁飲之。不可炒用。以其含蛋白質甚多。炒之。則其蛋白質焦枯。服之無效。若作丸散。可軋細。蒸熟用之。

配合應用 補益虛損。益顏色。補下焦虛冷。小便頻數。瘦損無力。用薯蕷於沙盆中研細。入銚中。以酒一大匙。熬令香。旋添酒一盞。攪合勻。空心飲之。每且一服。又方用山藥。地黃。枸杞。牛膝。甘菊花。白茯苓。五味子等分。又方。山藥。羊肉。肉蓯蓉作羹。(聖惠方)

◎ 治心腹虛脹。手足厥逆。或飲

苦寒之劑多。未食先嘔。不思飲食。山藥半生半炒為末。米飲服二錢。一日二服。大有功效。忌鐵器生冷。(普濟方)

◎ 治小便數多。山藥以礬水煮過。白茯苓等分為末。每水飲服二錢。(儒門事親方)

◎ 治下痢禁口。山藥半生半炒為末。每服三錢。米飲下。(衛生易簡方)

◎ 治痰風喘急。生山藥搗爛半碗。入甘蔗汁半碗。和勻。頓熱飲之。立止。(簡便方)

◎ 治脾胃虛弱。不思飲食。山芋。白朮一兩。人參七錢。半為末。水糊丸。小豆大。每米飲下。四五十丸。又方。用山藥。蓮肉。白朮。人參。白芍。藥。茯苓。炙甘草。橘皮等分。並止瀉。加木瓜。薑香。安吐瀉。(普濟方)

◎ 治溼熱虛泄。山藥。蒼朮等分。飯丸。米飲服。大人小兒皆宜。(瀨湖經驗方)

◎ 治腫毒初起。帶泥山藥。麩麻子。糯米等分。水浸研傳之。即散也。(普濟方)

◎ 治跨眼昏翳。山藥。沙糖同搗

塗上即消。先以麪塗四圍。乃上此。(簡便單方)

◎ 治項後結核。或赤腫硬痛。以生山藥一挺。去皮。麩麻子二個。同研。貼之。如神。(救急方)

◎ 治手足凍瘡。山藥一截。磨泥傳之。(儒門事親方)

用量 三錢至六錢。

應用宜忌 凡有溼熱實邪者。禁用。

配合宜忌 不宜與麵同食。薑甘送。忌銅鐵。紫芝為之使。

著名方劑 薯蕷丸。治虛勞。諸不足。風氣百疾。(金匱方) 用薯蕷三十分。當歸。桂枝。麩。乾地黃。豆黃卷。各十分。甘草二十八分。人參十分。芍藥。芍藥。白朮。麥門冬。各六分。柴胡。桔梗。茯苓。各五分。阿膠七分。杏仁六分。乾姜三分。白薇二分。防風六分。大棗百枚。為膏。上二十一味末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服。一丸。百丸為劑。 無比山藥丸。治丈夫久虛。百損。五勞。七傷。頭痛。目眩。支脈。或煩熱。或脾痛。腰腹不隨。飲食不生。肌肉。或少食。面黃。諸虛。無光澤。陽氣衰絕。陰氣不

行。(千金方)用熱地(酒浸)赤石脂(去心)茯苓(牛膝)(酒浸)山茱萸澤瀉各三兩乾山藥二兩五味子六兩肉蓯蓉(酒浸)四兩芎藭子(炒)各三兩上藥煉蜜丸。桐子大。每服二十九。至三十丸。食前溫酒。或米飲下。服七日後。令人身健體潤。面光音響。爲驗。此藥通中入腦。鼻必酸疼。勿怪。

參攷資料 ●薯蕷一名詩薯。一名兒草。一名修肥。齊魯名山芋。鄭越名土醫。秦楚名玉延。(吳普本草) ●凡體虛羸者。山藥宜加用之。(甄權) ●山藥利丈夫。助陰力。熟煮和蜜。或爲湯煮。或爲粉竝佳。乾之入藥更妙。惟和麩作飪。則動氣。爲不能制麩毒也。(孟詵)

●此有兩種。一者白而且佳。日乾搗粉。食大。美且愈疾而補。一者青黑。味殊不美。蜀道者尤良。(蘇恭) ●江閩人單呼爲薯。音若殊。及諸亦曰山藟。山海經云。景山北望少澤。其草多薜藹。音同薯蕷。則是一種。但字或音殊。或音諸不一。或語有輕重。或相傳之訛耳。(蘇頌) ●處處有。以北部四明者爲佳。春生

三靈山

苗。蔓延難拔。莖紫葉青。有三尖似白牽牛。葉更厚而光澤。夏開細白花。大類葎花。秋生實於葉間。狀如鈴。今人冬春採根。刮之。白色者爲上。青黑者不堪。近汴洛人種之。極有息。春取宿根。頭以黃沙和牛糞作畦種之。苗生似竹。稍作矮高一二尺。夏月頻澆之。當年可食。極肥美。南中一種。生山中。根細如指。極緊。實刮磨入湯煮之。作塊不散。味更真美云。食之尤益人。過於家園種者。又江湖間中一種。根如薑芋之類。而皮紫極。有大者一枚。可重數斤。削去皮。煎煮食俱美。但性冷於北地者耳。彼土人呼爲薯。南北之產。或有不同。故形類有差別也。(蘇頌) ●薯蕷入藥。野生者爲勝。若供饌。則家種者爲良。四月生苗。延蔓。葉莖綠。葉有三尖。似白牽牛。葉而更光潤。五六月開花成穗。淡紅色。結莢成簇。莢凡三種。合成堅而無仁。其子別結於一旁。狀似雷丸。大小不一。皮色土黃而肉白。養食甘滑。與其根同。王旻山居錄云。曾得山芋子。如荊棘子者。食之更愈於根。卽此也。霜後收子留種。

或春月採根。栽種皆生。(李時珍) ●**山藥酒** 基本 本品係用山藥粉和麴米釀成之酒。或同山茱萸五味子人參諸藥浸成之酒。 ●**山藥粥** 基本 本品係用山藥和米煮成之粥。 ●**山藥子** (綱目拾遺) 古籍別名 狀元子。 性質 微毒。 主治 益氣力。澤顏色。 ●**山藥子** 參攷資料 蟻有各種。入藥用窠。則取山蟻窠。蓋山蟻形大。在草中。或樹根內作窠。其子粗如粒米。入藥力太猛。用子以黃色細蟻所生子爲佳。蓋此蟻力最大。能舉等身鐵。故人食其子亦力大也。廣人美味有蟻子醬。於山間收蟻卵。淘淨滓垢。以爲醬。醃爲珍品。則其子亦無毒矣。(趙學敏)

●**山蟻窠** 古籍別名 虎頭蟻 蟻窠(綱目拾遺) 產地 出深山窮谷間。 形態 山蟻窠爲山蟻之窠。重如蜂窩。內有壑。掛樹枝間。有二種。大如升斗。色黃柔軟。形如乾黃爛葉。又若柔皮紙窠。皮上層層有刷紋。成叢若虎頭者。中多筋。筋係松毛草莖及泥土之類。又有色白。係泥土所築者。其形有類松皮者。俱可供藥用。 ●**山蟻窠上緣枝** 主治 蛙 存。 ●**山蟻窠中土** 主治 禿瘡。 藥瀉傳數日 卽愈。 ●**山蟻窠中壘** 主治 瘡。 ●**山鵲** 古籍別名 鸞。 (爾雅) 山鵲。赤喙鳥。(本

草綱目

形態 山鶴狀如鶴而鳥色。有文采。赤嘴赤足。尾長不能遠飛。亦能捕食鷄雀。

性質 甘。溫。無毒。

主治 解諸果毒。

【山礬】

命名 本品採葉燒灰。染紫為黝。不信礬而成。

故名。

古籍別名 芸香。椴花。柘花。瑒花。春桂。七里香。(本草綱目)

產地 山礬生江淮湖蜀之山野中。

形態

大者株高丈許。葉似扈子而不對生。光澤堅強。略有鋸齒。凌冬不凋。三月開花。繁白如雪。六出。黃蕊甚芬香。結子大如椒。色青黑。熟則黃色可食。其葉可供藥用。

性質 酸。澆。微甘。無毒。

主治 治久痢。止渴。殺蚤蠹。用三十片。同老薑。三片。浸水。蒸熱。洗爛。弦風眼。

卷致資料 芸。盛多也。老子曰。方物芸芸是也。此物山野叢生甚多。而花繁香馥。故名。按周必大云。柘音障。出南史。荆俗說柘為鄭呼。

為鄭礬。而江南又訛鄭為瑒也。黃庭堅云。江南野中椴花極多。野人採葉燒灰。以染紫為黝。按沈括筆談云。故人藏書辟蠹。用芸香。謂之芸草。即今之七里香也。葉類豌豆。作小叢。生暖嗅之極芬香。秋間葉上微白如粉。汚。辟蠹殊驗。又按蒼頡解詁云。芸香似邪蒿。可食。辟紙蠹。許慎說文云。芸似苜蓿。成公綏芸香賦云。莖類秋竹。枝象青松。郭義恭廣志有芸香膠。杜陽編云。芸香草也。出于闐國。其香潔白如玉。入土不朽。元載造芸暉堂。以此為屑塗壁也。據此數說。則芸香非一種。沈氏指為七里香。不知何據。所謂葉類豌豆。暖嗅芬香。秋間有粉者。亦與今之七里香不相類。狀頗似烏藥葉。恐沈氏亦自臆度耳。曾端伯以七里香為玉蕊花。未知的否。(李時珍)

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

【山礬皮】基本 為山礬樹之皮。

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

【山礬皮】基本 為山礬樹之皮。

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

【山礬皮】基本 為山礬樹之皮。

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

【山礬皮】基本 為山礬樹之皮。

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

【山礬皮】基本 為山礬樹之皮。

【山礬】即山礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「山礬」條。

【山礬】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳「當歸」條。

性質 平。

主治 熱毒。風癩腫毒。

【山櫻桃】即櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「櫻桃」條。

【山櫻桃】古籍別名。朱桃。英。普本草。奈桃。梅桃。(本草綱目)

李桃。(食療本草)

外國名詞 Prunus tomentosa, Thunb. (拉丁) ヌスラウ

メ ヌスラムメ(日本)

基本 係薔薇科櫻桃屬。藥用山櫻桃之果實。

形態 山櫻桃為山果類之落葉灌木。高至七八尺。仍覺纖弱。矮小。其嫩莖及葉下生毛甚密。葉卵形。或廣披圓形。有鋸齒不齊。互生。春日隨葉開花。花五瓣似梅花。果為核果。小而尖。生青熟黃赤。光澤。大如桃實。可供藥用。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【山櫻桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。



山櫻桃

採取 四月採陰乾用。

性質 辛。平。無毒。

主治 止洩腸澼。除熱。調中。益脾氣。令人好顏色。美志。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論山櫻桃曰。止洩精。

【山櫻桃核】主治 發麻疹。痘瘡。滅斑。痕。凍瘡。炒黃湯煎。療出痘。喉啞。磨水。搽眼皮生瘡。

卷致資料 山櫻桃核今人常用以洗疹瘡。服之亦發透疹。以其得春氣早而性熱。善達表也。綱目不載。豈以發風熱。故耶。逢原云。櫻桃核今人用以升發麻斑。力能助火。大非所宜。春夏時尤忌。入藥用山櫻桃核佳。(趙學敏)

【山櫻子】即山查之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「山查」條。

【山鶴】即山鶴之古籍別名。典見綱目。詳「山鶴」條。

【山巖泉水】基本 本品即山巖土石間所出之泉。流為溪澗者。

性質 甘。平。無毒。

主治 霍亂煩悶。嘔吐腹空。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

【山巖石】即野葛之古籍別名。典見綱目。詳「山巖石」條。

與見綱目拾遺。詳野蕪荷條。

【川山甲】即穿山甲之古籍別名。

與見和漢藥考。詳穿山甲條。

【川木通】即木通之處方用名。詳

木通條。

【川牛膝】即牛膝之處方用名。詳

牛膝條。

【川白芍】即白芍之處方用名。詳

白芍條。

【川石斛】即石斛之處方用名。詳

石斛條。

【川朴】即厚樸之產於四川者。詳

厚樸條。

【川朴絲】即厚樸之處方用名。詳

厚樸條。

【川肉桂】即肉桂之處方用名。詳

肉桂條。

【川扶筋】即狗脊之處方用名。詳

狗脊條。

【川杜仲】即杜仲之處方用名。詳

杜仲條。

【川芎】原名 芎藭。

命名 本品藥性上行。

專治頭腦諸疾。而出蜀中者為良。

故名川芎。

處方用名 川芎。川撫芎。大

三畫 川

川芎。沙撫芎。龍撫芎。刁芎。馬御芎

芎(本草綱目)

古籍別名 胡芎。香果。(別錄)

山鞠窮(本草綱目)杜芎。藥芹。九

元。蛇休草。蛇避草。京芎。(和漢

藥考) 閩莫伽(金光明經)

外國名詞 Conioseinum

natvifabum, Turcoz (拉丁)

基本 屬繖形科。藥用川芎之

根塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

產四川者名川芎。出自灌縣。小滿

出新。

形態 按川芎為多年生草本。

或自生。或栽種。春日抽苗。高一二

尺。葉似鱗。彷彿水芹菜。而分裂尤

細。秋間梢端開五瓣細小白花。攢

簇而為複繖花序。全草皆有香氣。

其根為結節塊狀。徑約一二寸。外

面頗不均勻。粗糙而現暗褐色。內

部多孔。帶黃色。臭氣峻烈。味辛而

甘。

種類 人工種植者形塊肥

大而重實多脂。山中天產者形

塊瘦細而其味苦辛。因產地與

形態之不同而異其名稱者。如出

胡戎曰胡芎。形如馬御曰馬御芎

對狀如雀腦曰雀腦芎。出關中曰

京芎。出天台曰台芎。出江南曰撫

芎之類。

採取 九十月間掘採暴乾。

製法 採來用鐮刀削去鬚根。

以水洗去土氣。入竹籃。架釜中。蓋

桶蒸之。候釜桶間蒸氣洩出。試以

蠶繭刺其根。以能串過為度。乃移

藥席上。日日晒之。必三十餘日而

後乾固。有於煮時加茶葉。梔子。片

糖。酒等者。乃取其色澤之可觀。不

知茶葉梔子。不合此藥之性。當糾

正之。

性質 辛。溫。無毒。

成分 含有揮發油及蔗糖等。

效能 潤燥結。化滯滯。升陽而

開血鬱。搜風而治頭痛。用於風邪

之頭痛眩暈。又為婦人之經血

病藥。

主治 中風入腦。頭痛寒痺。筋

攣緩急。金瘡。婦人血閉無子。(本

經) 除腦中冷動。面上遊風去來。

目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷

氣。心腹堅痛。中惡卒急。腫痛。腦風

痛。溫中內寒。(別錄)

歷代紀述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論川芎曰。齒根出

血。舍之多。搗。唐甄樞藥性本草

論川芎曰。腰脚軟弱。半身不遂。胞

衣不下。宋大明日華諸家本草

論川芎曰。一切風。一切氣。一切勞

損。一切血。補五勞。壯筋骨。調衆脈。

破癥結宿血。養新血。吐血。鼻血。瀾

血。腦癱發背。瘰癧瘰癧。痔瘡瘡。疥

長肉排膿。消瘀血。宋蘇頌嘉佑

圖經本草論川芎曰。蜜和大丸。夜

服治風痰。殊效。元王好古湯液

本草論川芎曰。搜肝氣。補肝血。潤

肝燥。補風虛。明李時珍本草綱

目論川芎曰。燥溼。止瀉痢。行氣開

鬱。明繆希雍本草經疏論川芎

曰。芎藭。稟天之溫氣。地之辛味。辛

甘。發散為陽。是則氣味俱陽。而無

毒。陽主上升。辛溫主散。入足厥陰

經。血中氣藥。肩謁言酸。以其入肝

也。故主中風入腦。頭痛寒痺。筋攣

緩急。金瘡。婦人血閉無子。別錄除

腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。

多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣。心腹

以其性走竄而絕無陰凝黏滯之性。故入血藥上行而不可多用耳。【考】陳修園本草經讀論川芎曰：川芎氣溫。稟春氣而入肝。味辛無毒。得金味而入肺。風為陽邪而傷於上。風氣通肝。肝經與督脈會於巔頂而為病。川芎辛溫而散邪。所以主之。血少不能養筋。故生寒而為痺。血少不能養筋。故生寒而為擊。筋縱而為緩。筋縮而為急。川芎辛溫而活血。所以主之。治金瘡者。以金瘡從腐而傷肌肉。川芎窠陽明金氣。能從肌肉而達皮膚也。婦人以血為主。血閉不通。則不生育。川芎辛溫通經。而又能補血。所以治血閉無子也。【清】黃宮繡本草求真論川芎曰：芎藭辛溫升浮。為肝膽心包血分中氣藥。故凡肝因風鬱。而見腹痛脇痛。血病寒瘧。筋攣目淚。及癰疽一切等症。治皆能痊。緣人一身血氣周流。無有阻滯。則百病不生。若使寒溼內搏。則血滯而不行。熱溼內搏。則血急而妄沸。氣鬱於血。則當行氣以散血。血鬱於氣。則當活血以通氣。行氣必用芍藥。以血得歸則靜。而血可活。

且血之氣。又更得芎而助也。況川芎上行頭目。下行血海。其辛最能散邪。血因風鬱。得芎入而血自活。血活而風自滅。又有癰有瘰。有痛有鬱。而致病變多端哉。是以四物用之。以散肝經之風。頭痛必用以除其鬱。然氣味辛竄。能泄真氣。單服久服。令人暴亡。蜀產大塊。裏白不油。辛甘者良。江南產者為撫芎。秦產者為西芎。

國外學說 古方藥品考曰。中

國來之芎藭。外皮茶褐色。肉黃白。所謂雀腦芎是也。不拘大小俱可用。日本產有數種。一種名大和川芎。形似中國產而瘦小。肉淡黃。帶綠色。以隔年色黃白者為佳。一種名仙臺川芎。形肥大。皮黃褐。肉黃白。味苦辛。氣芳烈。品稍次。一種名大葉川芎。苗葉如芹菜。鉤吻。根如當歸而小。味辛辣。刺人口舌。不可用。又深蕪為小葉川芎之葉。江蘇即大葉川芎之葉。一本堂藥選曰：凡選芎藭。以坊間呼雙後芎藭。復堅重實。裏色白。味辛氣烈者為佳。用時。水洗到細。山城芎塊肥大。而香味頗弱。以其肥養多。故也。丹

後芎似雙後芎。但少耳。徑用雙芎可也。家固種者。亦不多得。陶弘景所謂馬銜芎。蘇頌所謂雀腦芎。皆以形似名之。左傳有山鞠芎。即此也。又曰：瘰癧。疥。下疳。便毒。久瘡。血。結毒。諸瘡。疥癬。癰疽。排膿。眼疾。結毒。頭痛。腰痛。軟弱。手足筋掣。膿淋。血淋。婦人血閉。胞衣不下。難產。腹痛。催生。一切微毒。結滯。周身筋骨疼痛。諸患皆治。破宿血。活新血。日用藥品考曰：川芎形如雀頭者。名雀腦芎。蘇頌云。雀腦芎最有力。如馬銜者。名馬銜芎。本草原始所謂如算子者。力微是也。藥舖出售者。皆以雀腦芎為上品。此種外來者。少。自產為多。大抵出自大和者。色黃白。氣味烈。故佳。勢州出者。次之。雙後。仙臺。信濃。數處所出者。多帶黑色。氣味薄弱。品物亦劣。又有角川芎者。乃採川芎之根鬚。不堪用。馬銜芎。藥舖不售。又手板發蒙曰：川芎本名芎藭。出自川中。因名川芎。中法用熱湯。故香氣淡。日本產者生乾。故香氣極甚。角川芎係小葉川芎附生之粗鬚。取而製之者也。又日本藥學博士村山義

溫。板垣武藏云。市傳所傳之川芎。研究其成分者。衆矣。據試驗北海道產川芎之結果。知其中實含一種揮發油。此揮發油之生成分為 LACTON。此 LACTON 與 GLAMICIAN 及 SILBER 兩氏在 APIUM GRAVEOLE NSL. (UMBELLIF) 中所檢出之揮發油名 SEDANOLID 者。為同質異性體。僅在其 HYDROBENZOLKEM 之二重結合位置不同而已。其他尚含一種酸及石炭酸性之物質。惟尚未能確定其為何成分也。更就仙臺川芎及大和川芎兩種而試驗之。與北海道產者比較其發揮油。則可知其異同之點。大和產及仙臺產之揮發油主成分曰 CNDIDI DIMLACTON C₁₂H₁₈O₂。其係亦含有少量之酸及石炭酸性物質。若以此油之含有 LACTON 部分。在高溫度蒸溜之。其溜出之部分。因經歷時日。漸析出結晶性物質。此結晶性物質之熔點。即為 113。其性質與含於 APIUM GRAVEOLENS L. 之揮發油

中之 SEDANONSATRE 相一致。據 CIAMICIAN 氏之試驗。若使與鹽酸 HYDROXYL AMIN 相作用。則得熔融於 128° N. OXIM (據 CIAMICIAN 氏說 SEDANONSATRE 之熔點亦為 128°) 此 OXIM 為美麗之針狀結晶。能熔解於 ETHER, ALKOHOL 及沸水中。而不溶於冷水。大和仙臺兩種川芎揮發油之不鹼化性物質。為淡黃色油狀液。有芳香。加金屬鈉而蒸溜之。則於 161.2° (5MM) 沸騰。加無水醋酸與濃硫酸。則呈油污綠色。而移於紫紅色之反應。是恐為 SESQUITERPEN 然未能確定也。要之。綜試驗成績。市售川芎中。北海道大和仙臺三種之主成分。皆為 ONIDIMLACTON。而在大和仙臺二種。尚含少量之 SEDANONSATRE。此 SEDANONSATRE 之含有與否。實為北海道川芎與大和仙臺二種區別之要點。

三疊川

辨偽 ①鄭有巖曰。偽名洋川芎。形雖似而味薄。則功用自劣。按芎藭以四川產者為勝。故名川芎。氣味辛溫。根葉皆香。若此種洋川芎。味薄不辛。安能治病。更有一種南芎。止可煎湯沐浴。皆不堪入藥矣。②曹炳章曰。川芎。本草一名芎藭。蜀省產地首推灌縣。有野生家種之分。其莖高二尺。葉如芹。分裂尤細。秋間開白花五瓣。為繖形花序。全體芬馥。其根即芎藭也。產地聚集成都重慶者多。形大圓。為撫芎。藍田縣出者嫩小。曰藍芎。陝西出扁小。為西芎。皆次。浙江溫州及金華出。曰南芎。更次。川芎各處雖出。因地命名。除對產者外。皆不道地。近年對省產額頗廣。足敷全國所需求。所以除川芎外。他如藍芎。西芎。南芎等。現出產較少。已在淘汰之列。近年日本雖亦有產。其形似是而非。氣味尤惡劣。不堪入藥。國人亦無購之者。

近人學說 張山雷曰。芎藭有紋如雀腦。質雖堅實。而性最疎通。味薄氣雄。功用專在氣分。上升頭頂。旁達肌膚。一往直前。走而不守。醫猶勇敢之士。衝鋒陷陣。銳不可當。須賴為之將者。慎選良材。相與並進。方能擒搦掃穴。直搗虜庭。若聽其一意孤行。後援莫繼。則雖勇敢之氣。亦可以披戟自成一隊。而偏鋒制勝。終非專闢長材。考仲景方中用芎藭。唯金匱婦人篇獨多。其當歸芍藥散。則曰治懷妊腹中疝痛。其當歸散。則曰治懷妊宜常服。其白朮散。則曰治妊婦養胎。皆不論寒熱虛實。而渾渾然一方。可以統治。仲景必不若是之顛倒。此當是傳寫有所脫佚。惟膠艾湯溫經湯二方。歸芎並重。以阿膠厚膩。有餘。恐其遲滯。因以血中行氣者。為之疏通。庶幾守者走者。得互相調劑。(膠艾湯有阿膠。又有地芎。溫經湯有阿膠。又有麥冬芍藥。膩滯已多。非歸芎則呆笨不靈矣。)古方之於芎藭。其用意自可想見。後人四物湯。雖本於膠艾。而僅取芎歸芍地四者。謂為婦科調血主劑。終嫌籠統不切。古人必無此渾沌治法。近賢論四物。已謂守者太守。走者太走。其說甚是。而晚近俗手。且更有僅取歸芎二物。認為婦女必需之品者。則擾亂有餘。每况愈下矣。戴九嶽丹溪傳。已謂血虛發熱。非芎歸辛溫所宜。吳鞠通論產後。即申丹溪之旨。皆有卓見。奈何石頭蓬源。引用日華子芎藭治一切風氣之說。而申之以上行頭目。下行血海。且謂四物湯用之者。所以搜肝經之風云云。抑知肝陽不擾。風從何來。肝家之風。唯氣火旺盛者。乃習習生風。此自內而動。非外風襲可比。治肝風者。須斂以求其潛息。猶慮不及。豈有更用升騰。助其騰舉。果以芎之辛升。搜剔肝陽自動之風。寧不借越飛揚。天旋地轉。此誤以泄散外風之藥。作為疏通內風之用。其害伊於胡底。膠艾湯中之芎歸。其意何若。不可不統觀全方。而深思細味之也。石頭又謂芎治少陽厥陰頭痛。及血虛頭痛之聖藥。又謂助清陽之氣。去濕氣在頭。頭痛必用之藥。須知少陽火木。厥陰肝膽上陵。頭痛之證。固多。此是升陽太過。火盛生風。非鎮攝滋潛。其誠不息。即血虛之頭痛。亦是陰虛於下。而陽越於上。此豈可與風寒外束。清陽不升者。混作

一例論治。而謂芎能升清陽之氣者。可治肝膽氣升之病。抱薪救火而更風以揚之。那不烈。能熊。燎原不救。此誤認東垣頭痛必用川芎之旨。在盲人無識。信手亂投。為藥不可勝數。不謂石頑高明。更昌言其為厥少頭痛。血虛頭痛之聖藥。是惟恐患者之肝火不旺。而速其焦頭爛額也。石頑又謂血痢已適。而痛不止。乃陰虧氣鬱。藥中加芎。則氣行血調。其痛立止。頃按熱痢乍起。大忌升舉。惟積滯已化。而痛猶不止。則氣結於下。固有脾胃不振。清氣下陷之一症。木香芎藭。升清行氣。洵是一法。又引蠶苑方。驗胎法。生芎藭末。艾湯服一錢。七腹中微動者為胎。頃按歸芎試胎。以驗其動與不動。古書雖有此法。然無故而擾動之。體質柔弱者。且必因之而不安矣。為害不小。不可妄試。請觀下胎衣及治子死腹中二者。自當儼然有悟。嘗見安胎者。每恃芎歸為養血良藥。類服之。則胎已墮。而莫明其妙。總受讀書不多之累。

配合應用 ① 通主人血分補

益。用川芎、地黃、當歸、芍藥為四物湯。

① 治破傷風。用川芎、同荊芥、白芷、當歸、地黃、芍藥、甘草。冬月加桂枝。

② 治血癥。用川芎、當歸、地黃、乾漆、延胡索、五靈脂、芍藥、牡蠣粉、京三稜等分。

③ 同白芷、茜根、黃耆、金銀花、生地黃。能排膿消瘀血。

④ 治血虛頭痛。用川芎、甘菊花、當歸、地黃、天門冬、白芍藥、炙甘草。火盛者加童便服。

⑤ 去瘡明目。宋真宗賜高相國去痰清目。進飲食。犀角丸。用川芎十兩。緊小者粟米泔浸二日。換切片。子日乾為末。分作兩料。每料入麝腦各一分。生犀半兩。重湯煎。蜜和丸。小彈子大。茶酒嚼下一丸。痰加砂半兩。腦按加半黃一分。水飛鐵粉一分。頭目昏加細辛一分。口眼喎斜。加炮天南星一分。(御藥院方)

⑥ 治氣虛頭痛。真川芎藭為末。服茶調服二錢。甚捷。曾有婦人產後頭痛。一服即愈。(集簡方)

⑦ 治氣厥頭痛。婦人氣盛頭痛。及產後頭痛。用川芎、天台烏藥等分。為末。每服二錢。煎茶調下。加白朮。水煎服。(御藥院方)

⑧ 治風熱頭痛。用川芎、藜一錢。茶葉二錢。水一鍾。煎五分。食前熱服。(簡便方)

川芎、當歸尾、桂心、牛膝等分。(千金方)

⑨ 治崩中下血。晝夜不止。川芎、第一兩。清酒一大盞。煎取五分。徐徐進之。加生地黃汁二合。同煎。又方。用川芎、續斷、懷熟地、白膠、杜仲、山茱萸、五味子、人參、黃耆、酸棗仁等分。(聖惠方)

⑩ 治酒癖脇脹。時復嘔吐。腹有水聲。川芎、三稜、炮各一兩。為末。每服二錢。葱白湯下。(聖濟方)

⑪ 治小兒腦熱。好閉目。或太陽痛。或目赤腫。川芎、薄荷、朴硝各二錢。為末。以少許吹鼻中。(全幼心鑑方)

⑫ 治齒敗口臭。水煎芎藭含之。(廣濟方)

⑬ 治牙齒疼痛。大川芎、第一箇。入舊糟內。藏一月。取焙。入細辛。同研末。揩牙。(本事方)

⑭ 治諸瘡腫痛。搗芎藭。入輕粉。麻油調塗。(普濟方)

⑮ 治產後乳懸。婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小肚。痛不可忍。危亡須臾。名曰乳懸。將芎藭、當歸各一斤。以半斤對散於瓦石器

⑯ 治風熱上衝。頭目暈眩。或胸中不利。川芎、槐子各一兩。為末。每服三錢。用茶清調下。胸中不利。以水煎服。(潔古保命集方)

⑰ 治首風旋暈。及偏正頭疼。多汗。惡風。胸膈痰飲。川芎、藜一斤。天麻四兩。為末。煉蜜丸。如彈子大。每嚼一丸。茶清下。(河間宣明方)

⑱ 治一切心痛。大芎一箇。為末。燒酒服之。一箇住一年。兩箇住二年。(孫氏集效方)

⑲ 治損動胎氣。因跌撲舉重。損胎不安。或子死腹中者。芎藭為末。酒服方寸匕。一二服立出。又方用

內。用水浸煎。不拘多少。類服。仍以一斤半。到境。於病人桌下。燒烟。令將口鼻吸烟。用盡未愈。再作一料。仍以葶麻子一粒。貼其頂心。(夏子益奇疾方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火旺者。禁用。畏黃連。忌火。白芷爲之使。

著名方劑 川芎茶調散。治正偏頭痛。及目昏鼻塞。及婦人血風攻瘧太陽穴疼。(局方)用川芎。荆芥各四錢。薄荷三錢。防風錢半。細辛一錢。羌活。白芷。炙草各二錢。爲末。每服三錢。食後茶清調下。一方加殭蠶。菊花。名菊花茶調散。

參攷資料 ①川芎。伏雌黃。得細辛。療金瘡止痛。得牡蠣。療頭風吐逆。(徐之才) ②今出秦州。其歷陽出者不復用。其人間種者。形塊大重實多脂。山中探者。瘦細味苦辛。以九月十月探之爲佳。若三月四月。虛惡非時也。(蘇恭) ③關陝川蜀江東山中多有之。而以蜀川者爲勝。四五月生葉。似水芹。胡荽。蛇牀。輩作叢而莖細。其葉倍香。江東蜀人採葉作飲。七八月開碎白

三畫 川

花。如蛇牀子。花根堅瘦黃黑色。圓中出者。形塊重實。作雀腦狀者。爲雀腦芎。最有力。(蘇頌) ④今人用此最多。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。(寇宗奭) ⑤川芎上行頭目。下行血海。故清神及四物湯皆用之。能散肝經之風。治少陽厥陰經頭痛。及血虛頭痛之聖藥也。其用有四。爲少陽引經一也。諸經頭痛二也。助清陽之氣三也。去濕氣在頭四也。(張元素) ⑥頭痛必用川芎。如不愈。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。厥陰吳茱萸。少陰細辛是也。(李杲) ⑦川芎味辛。但能升散。而不能下守。血貴寧靜而不貴燥動。四物湯用之以暢血中之氣。使血自生。非謂其能養血也。卽癰疽諸瘡。諸痛藥中多用之者。以其入心而能散火邪耳。(朱震亨) ⑧芎本作營。名義未詳。或云人頭穿窬。窮高天之象也。此藥上行專治頭腦諸疾。故有芎藭之名。以胡戎者爲佳。故曰胡芎。古人因其根節狀如馬銜。謂之馬銜芎。後世因其狀如雀腦。謂之雀腦芎。其出關中者

呼爲京芎。亦曰西芎。出蜀中者爲川芎。出天台者爲台芎。出江南者爲撫芎。皆因地而名也。左傳楚人謂蕭子曰。有麥麴乎。有山鞠窮乎。河魚腹疾奈何。二物皆禦濕。故以論之。丹溪朱氏治六鬱。越鞠丸中用越桃。鞠窮。故以命名。金光明經謂之圓莫伽。(李時珍) ⑨芎藭。血中氣藥也。肝苦急以辛補之。故血虛者宜之。辛以散之。故氣鬱者宜之。左傳言麥麴鞠窮。禦濕。治河魚腹疾。子治濕瀉。每加二味。其應如響。血痢已通而痛不止者。乃陰虧氣鬱。藥中加芎爲佐。氣行血調。其病立止。此皆醫學妙旨。圓機之士。始可語之。(李時珍) ⑩蜀地少寒。人多栽蒔。深秋莖葉亦不萎也。清明後宿根生苗。分其枝橫埋之。則節節生根。八月根下始結芎。乃可掘取。蒸暴貨之。救荒本草云。葉似芹而微細。有丫叉。文似白芷。葉亦細。又似胡荽。葉而微壯。一種似蛇牀。葉而亦粗嫩。其葉可煨食。(李時珍) ⑪芎藭性陽味辛。凡病人陽上盛下虛。火炎上。嘔吐咳嗽。自汗易汗。盜汗。咽乾口燥。發熱作

渴。煩躁。法宜忌之。(櫻希雅)

【川芎藭】卽川芎之處方用名。詳

【川芎】條。

【川貝母】卽貝母之處方用名。詳

【貝母】條。

【川羌活】卽羌活之處方用名。詳

【羌活】條。

【川花椒】卽花椒之處方用名。詳

【花椒】條。

【川厚朴】卽厚樸之處方用名。詳

【厚樸】條。

【川軍】卽大黃之處方用名。詳

【大黃】條。

【川桂枝】卽桂枝之處方用名。詳

【桂枝】條。

【川烏】原名 烏頭。

命名 本品卽附子之母。如烏之頭。故名。而以川產者良。遂又有川烏之稱。

處方用名 川烏頭。烏頭尖。川烏尖。

外國名詞 Aconitum Sin-

ensis (拉丁)

基本 屬毛茛科。藥用烏頭之

根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

川烏頭產四川龍安府。陝西漢中兩處所產均適用。大個名小天雄。近日所用川烏草烏。長身細個者。俱由日本運來。以上均有毒。用宜優選用之。萬國藥方卷三。四十七篇論產於歐洲印度大謬。西名厄哥匿顏。即草烏頭精。化學名炭輕淡養。

形態 詳「附子」條。

採取 春季採之。

製法 李時珍曰。凡使烏頭。或生用或炮用。或以烏大豆同煎熟。去其毒用。

性質 辛。溫。有大毒。

效能 祛風。燥溼。用作麻醉劑。又為祛風藥。

主治 諸風。風痺。血痺。牛身不遂。除寒冷。溫養臟腑。去心下堅痞。感寒腹痛。

歷代記述攷證

【元】李東垣用藥法義論川烏頭曰。除寒濕。行經散風邪。破諸積冷毒。【元】王好古湯液本草論川烏頭曰。補命門不足。肝風虛。【明】李時珍本草綱目論川烏頭曰。助陽退陰。功同附子而稍緩。【明】李士材本草圖解

論烏頭曰。附烏頭而生者為附子。長身為天雄。大抵風症用烏頭。寒症用附子。而天雄之用與附子相彷彿。功用略通耳。按烏附天雄。皆是補下之藥。若係上焦陽虛。當用參耆。不當用天雄也。且烏附天雄之尖。皆是向下生者。其氣下行。其脾乃向上生苗之處。寇氏謂天雄之性。不肯就下。元素謂天雄補上焦陽虛。皆為誤筆。【清】黃宮繡本草求真論川烏頭曰。烏頭性輕逐風。不似附子性重逐寒。【清】黃元御長沙藥解論川烏頭曰。金匱烏頭湯治歷節腫疼。不可屈伸。烏頭去其濕寒也。烏頭赤石脂丸。治心痛徹背。背痛徹心。烏頭驅逐其寒邪也。大烏頭煎。治寒疝腹痛。腹滿。手足厥冷。烏頭破寒氣之凝也。又曰。烏頭溫燥下行。其性疏利迅速。開通關腠。驅逐寒濕之力甚捷。

近人學說 張山雷曰。烏頭為附子之母。既已旁生新附。是為子食母氣。其力已輕。故烏頭主治溫經散寒。雖與附子大略近似。而溫中之力。較為不如。且長為祛除外風外寒之嚮導者。亦以已經苗長

莖苗花實。發泄之餘。體質空鬆。則能散外邪。是其本性。潔古謂治諸風風痺血痺。半身不遂。東垣謂除寒濕。行經散風邪。固皆以泄散為其專職。而潔古又謂除寒冷。溫養臟腑。去心下痞壅。感寒腹痛。東垣又謂破諸積冷毒。則仍與附子同功耳。石頑謂治風為嚮導。主中風惡風。風寒濕痺。肩臂痛不可俯仰。又謂治陰疽久不潰者。及潰久瘡寒。惡肉不斂者。並宜少加以通血脈。壽頭案。癆患固間有寒溼交凝。頑腫不退。亦不成潰。及潰久氣血虛寒。悠久不斂之症。溫經活血。助其陽和。則腫久潰久之症。方能相應。用烏頭者。取其發泄之餘氣。善入經絡。力能疏通。痼陰溼寒。確是妙藥。但非真是寒濕者。不可妄用耳。石頑又謂小兒慢驚。搐搦。涎壅厥逆。生川烏全蝎。加生姜煎服。效則慢驚固是虛寒。而此能溫經以逐寒涎耳。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非真中風寒者禁用。

參攷資料 ●川烏頭即附子

之母。既已苗長莖苗花實。而又旁生附子。母氣已薄。故功用同於附子。而力量較輕。反不如附子之雄烈。且以其發泄之餘。形質已鬆。故專能散外寒。行經宜格。與附子堅實之質。長於溫中。溫下者。功力亦有所不同。【張山雷】●烏頭薄走。入肝經。逐風寒。蜜煎以緩其性。使之留連筋骨。以利其屈伸。且蜜之潤。又可益血養筋。並制烏頭燥熱之毒也。【趙以德】●草烏頭野生狀類川烏。亦名烏喙。辛苦大熱。搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒。頗勝川烏。然至毒。無所釀制。不可輕投。糞汁炒。或豆腐煮用。【盧飛鵬】

【川烏尖】即川烏之處方用名。見「川烏」條。

【川烏頭】即川烏之處方用名。詳「川烏」條。

【川紋】即大黃之處方用名。詳「大黃」條。

【川茶】即茶之產於川瀘交界處者。其性質功用與普洱茶同。詳「普洱茶」條。

【川骨】即萍蓬草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳「萍蓬草」條。

【川破石】產地 產四川各地及廣東從化等處。

性質 甘平。

主治 祛風活血。壯筋骨。理跌打。又治蠱脹酒頂酒風。

【川乾薑】即乾薑之處方用名。詳「乾薑」條。

【川強羶】即山丹之古籍別名。典見鄭樵通志。詳「山丹」條。

【川遠】即黃連產於四川者之處方用名。詳「黃連」條。

原名 蜀椒。

【川椒】命名 本品之葉。與果俱有香氣。而果實大如胡椒。故名曰椒。其產於川地者。遂名之曰川椒。即蜀椒也。

古醫別名 巴椒。(別錄)南椒。

(炮炙論) 舊椒。(本草綱目)

漢椒。(日華本草) 山椒。(和漢藥攷)

處方用名 開口川椒。

外國名詞 Fructus Xanthoxyli

Fruct. Xanthox. (拉丁) Japanese Peppor. (英)

基本 屬芸香科山椒類。藥用川椒之果實。

三畫 川

產地 陳仁山藥物生產辨云。產四川者為川椒。陝西。漢中。興安。山東等均有出。味溫香。

形態 椒為落葉喬木。日本各地產之大者樹幹高二丈。周圍達二尺。樹皮作暗褐色。有刺之疣。葉互生。為奇數之羽狀複葉。其小葉作披針狀。形卵圓。大六七分許。邊緣有稀疎之鋸齒。花為單性。雌花與雄花異株而生。春日葉腋簇生黃綠色之小花。夏秋間結實。其實為乾果。色褐。大如胡椒。葉與實俱有香氣。子實為球圓形之盆果。直徑約一二分。有短果梗。中藏黑子。其未熟者。果殼作綠色。熟則變為暗褐色。熟甚則殼自裂縫。子落於外。味辛烈。香氣極甚。

種類 秦椒即花椒。始產於秦地。故名。粒細者佳。蜀椒即川椒。此產於蜀地。故名。赤色者佳。崖椒即野椒。葉大於蜀椒。而子灰色不黑。氣不甚香。凡椒之子核。謂之椒目。椒目以蜀椒目光黑者佳。其樹皮謂之干葉皮。凡椒之去果殼之肉皮者。謂之椒紅。亦曰紅椒。

種植 蜀川。陝。洛等處之園圃中。恒有栽植者。

採取 八月採實。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使南椒。須去目及閉口者。以酒拌溼。蒸。從已至午。放冷。密蓋無氣。後取出。便入磁器中。勿令傷風也。寇宗奭曰。凡用秦椒蜀椒。並微炒。使出汗。乘熱入竹筒中。以梗搗去裏面黃殼。取紅用。未盡再搗。或只炒熱。隔紙鋪地上。以椀覆。待冷。碾取紅用。

性質 辛。溫。有毒。

成分 山椒主要之成分。為揮發油並脂肪等。

效能 助命火。散寒溼。止痛。吐瀉。消痰。飲腫。脹。用作解毒殺蟲藥。又作健胃藥。

主治 邪氣欬逆。溫中。逐骨節。皮膚死肌。寒熱痺痛。下氣。久服頭不白。輕身增年。(本經)除六腑寒。冷。傷寒。溫瘧。大風。汗不出。心腹留飲。宿食。腸辟。下痢。洩精。女子字乳。餘疾。散風。邪。癢。結。水腫。黃疸。鬼注。蠱毒。殺蟲。魚。毒。久服。開。腠。理。通。血。脈。堅。齒。髮。明。目。調。關。節。耐。寒。暑。可。作。膏。藥。(別錄)

張仲景之發明 大建中湯。烏梅丸。二方均用之。

歷代記述攷略 【唐】甄權藥

性本草論川椒曰。頭風。下淚。腰脚不送。虛損留結。破血。下諸石水。治欬嗽。腹內冷痛。兼除齒痛。【唐】孟詵食療本草論川椒曰。通神去老。益血。利五臟。下乳汁。滅癩。生毛髮。

【宋】大明諸家本草論川椒曰。破癥結。開胸。治天行時氣。產後宿血。壯陽。療陰汗。暖腰膝。縮小便。止嘔逆。【明】李時珍本草綱目論川椒曰。散寒除溼。解鬱結。消宿食。通三焦。溫脾胃。補右腎命門。殺蛟蟲。止

淇瀉。【明】程希雍本草經疏論川椒曰。蜀椒入手足太陰。衆入手厥陰經。其主邪氣欬逆。皮膚死肌。寒溼痺痛。心腹留飲。宿食腸辟。下痢。黃疸。水腫者。皆脾肺二經受病。肺出氣。主皮毛。脾運化。主肌肉。肺虛則外邪客之。為欬逆。上氣。脾虛則不能運化水穀。為留飲。宿食。腸辟。下痢。水腫。黃疸。二經俱受風寒溼邪。則為痺痺。或成死肌。或致傷寒。溫瘧。辛溫能發汗。開腠理。則外邪從皮膚而出。辛溫能煖腸胃。散結

滯則六腑之寒冷。腸胃得溫。則中焦治。而留飲宿食。腸下利。水腫黃疸。諸證悉愈矣。其主女子半乳餘疾者。亦指風寒外侵。生冷內停而言。洩精癥結。由下焦虛寒所致。此藥能入右腎命門。補相火元陽。則精自固而結癥消矣。療鬼疰瘴毒。殺蟲魚毒者。以其得陽氣之正。能破一切幽暗陰毒之物也。外邪散則關節調。內寒除則血脈通。佐補陰涼血之藥。則頭不白。齒髮堅。耐寒暑。輕身增年。【明】李士材本草圖解論川椒曰。椒性下達。命門益下不上。沖蓋導火歸元也。入肺而奏止咳下氣之功。入腎而奏扶陽益火之效。凡空心早起。以沸湯送生椒二十粒。有治熱治冷之妙。有消食散寒之奇。久服則永不受風寒溼。大能溫補下焦。亦神異之品也。邵武府張伯安。腰痛痰喘。足冷如冰。面赤如緋。六脉洪大。按之則軟。服八味無功。用椒紅茯苓蜜丸鹽湯下。甫二十日而安。【清】

王士雄隨息居飲食譜論川椒曰。川椒辛熱。溫中下氣。煖腎祛寒。開胃殺蟲。除溼止瀉。滋液舒鬱。消食辟邪。制魚腥陰冷諸物毒。辟蠅蚋蜈蚣蚊蟻等蟲。多食動火墮胎。陰虛內熱者忌之。閉口者殺人。中其毒者冷水解之。

辟邪。制魚腥陰冷諸物毒。辟蠅蚋蜈蚣蚊蟻等蟲。多食動火墮胎。陰虛內熱者忌之。閉口者殺人。中其毒者冷水解之。

國外學說 和漢藥考曰。山椒之種類極多。如中國所產者。有秦椒。川椒。漢椒。巴椒。蜀椒之別。產地不同。故名稱亦異。其原植物果否為一。猶未詳悉。但自昔以蜀州出產為佳品。故有蜀椒之名。在日本則以但馬之淺倉所產為勝。至今尚有淺倉山椒之名。和漢三才圖會曰。椒紅。俗名乾山椒。味微辛。經月則變苦。淺倉椒鮮紅。味辛烈。雖隔年味亦不變。但忌觸人手。殆即蜀椒歟。然蜀椒不華而結實。淺倉椒則有花。此蓋地土使然耳。凡蛇喜山椒樹。見則常棲之。蝮蛇尤然。司吞紐斯氏嘗以崖椒之果殼。與水同蒸餾之。而得極精之揮發油。此油頗似松節油。無色。發爽快之香氣。更以此油精製之。尚可得腦分 (Xanthoxylone C₂₀H₃₀O₂)

藥學博士朝比奈泰彥。藥學士今野運治。同於山椒油中。檢得台爾品 C₂₀H₃₀O₂。外更發見知托魯耐刺兒云。辨偽 ① 鄭育巖曰。川椒本經名蜀椒。列於中品。產於巴蜀。顆如小豆而圓。皮紫赤色。皮厚而裏白。味極辛烈而香。凡閉口者去之。近有土椒色黑無味。又安能溫中散寒乎。曹炳章曰。花椒山野自出。幹高五六尺至丈餘。梗生小刺。葉為對生羽狀複葉。春日開小花。黃綠色。初夏結實。圓小。始色青綠。熟則變赤。裂開香氣甚烈。即本草所謂之椒紅也。產地首推中州。名曰南椒。顆粒大。外紫裏白。氣味濃厚。椒多目少最佳。江浙間釀酒家皆需此。產於蜀者名川椒。產於秦嶺者名秦椒。顆粒略小。尚佳。產於山東即墨縣者名東椒。又名女姑椒。色紅黑。氣味較薄為次。江淮間產者名土椒。色青黑。粒小味淡。更次。

傷。目暗耳聾。服百日。覺身輕少睡。足有力。是其效也。服及三年。心智爽悟。目明倍常。面色紅悅。鬚髮光黑。用蜀椒去目及合口者。炒出汗。曝乾。持取紅一斤。以生地黃。持自然汁入銅器中。煎至一升。候稀稠。得所和椒末丸。梧子大。每空心暖酒下三十九。詩云。其椒應五行。其仁道六義。欲知先有功。夜間無夢寐。四時去煩勞。五臟調元氣。明目腰不痛。身輕心健記。別更有異能。三年精自祕。回老返嬰童。康強不思睡。九蟲頓消忘。三尸自逃避。若能久餌之。神仙應可冀。

稠。得所和椒末丸。梧子大。每空心暖酒下三十九。詩云。其椒應五行。其仁道六義。欲知先有功。夜間無夢寐。四時去煩勞。五臟調元氣。明目腰不痛。身輕心健記。別更有異能。三年精自祕。回老返嬰童。康強不思睡。九蟲頓消忘。三尸自逃避。若能久餌之。神仙應可冀。

① 仙方椒茶丸。補益心腎。明目駐顏。順氣祛風。延年。真川椒一斤。炒去汗。白茯苓十兩。去皮為末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯下。忌鐵器。(邵真人經驗方)

② 治虛冷短氣。川椒三兩。去目并合口者。以生絹袋盛。浸無灰酒五升中三日。隨性飲之。
③ 治腹內虛冷。用生椒擇去不折者。四十粒。以漿水浸一宿。令合口。空心新汲水吞下。久服暖臟腑。駐顏。黑髮明目。令人思飲食。(斗門方)
④ 治心腹冷痛。以布裹椒安痛處。用熨斗熨令椒出汗即止。(邵真人經驗方)
⑤ 治冷過心痛。川椒四兩。炒出汗。酒一椀。淋之。服酒。(壽域神方)

① 治陰冷入腹。有人陰冷。漸漸冷氣入陰囊腫滿。日夜疼痛欲死。以布裹椒包囊下。熱氣大通。日再易之。以消爲度。(千金方)

② 治呃噫不止。川椒四兩。炒研麩爛丸。梧子大。每服十九丸。醋湯下神效。(邵真人經驗方)

③ 治傳尸勞疰。用真川椒紅色者。去子及合口。以黃草紙二重。隔之。炒出汗。取放地上。以砂盆蓋定。以火灰密遮四旁。約一時許。爲細末。去殼。以老酒浸白糕。和丸。梧子大。每服四十丸。食前鹽湯下。服至一斤。其疾自愈。此藥兼治諸痺。用肉桂煎湯下。腰痛用茴香湯下。腎冷用鹽湯下。昔有一人病此。遇異人授是方。服至二斤。吐出一蟲如蛇而安。遂名神授丸。(陳言三因方)

④ 治歷節風痛。白虎歷節風痛甚。肉理枯虛。生蟲遊走。痒痛。發治痺疾。半身不遂。卽上治勞疰神授丸方。

⑤ 治寒溼脚氣。川椒二三斤。疏布囊盛之。日以踏脚。(大全良方)

⑥ 治諸瘡中風。生蜀椒一斤。以

少麩和搜裴椒。勿令漏氣。分作兩囊。於塘灰火中燒熟。刺頭作孔。當瘡上器之。使椒氣射入瘡中。冷卽易之。須臾瘡中出水。及遍體出冷汗。卽瘥也。(韋宙獨行方)

⑦ 治瘰癧痛痒。紅椒七粒。葱頭七箇。煮水洗之。一人途中苦此。湘山寺僧授此方。數日愈。名驅風散。(經驗方)

⑧ 治手足皴裂。椒四合。以水煮之。去渣。漬之。半食頃出。令燥。須臾再浸。候乾。塗豬羊腦髓極妙。(勝金方)

⑨ 治漆瘡作癢。用漢椒煎湯洗之。相感志云。凡至漆所嚼。川椒塗鼻上。不生漆瘡。(譚氏方)

⑩ 治夏月溼瀉。川椒炒取紅。肉荳蔻煨各一兩。爲末。粳米飯丸。梧子大。每最人米飲服百丸。

⑪ 治糞瀉不化。及久痢。小椒一兩。炒。蒼朮二兩。土炒。礬末。醋糊丸。梧子大。每米飲服五十九。(普濟方)

⑫ 治久冷下痢。或不痢。腹腹若冷。用蜀椒三升。酢漬一宿。麴三升。同椒一升。并作粥食。不過三升瘥。

(千金方)

⑬ 治小兒水瀉。及人年五十以上。患瀉。用椒二兩。醋二升。煮醋盡。慢火焙乾。碾末。磁器貯之。每服二錢。七酒及米飲下。(譚氏方)

⑭ 治食茶面黃。川椒紅炒礬末。糊丸。梧子大。每服十九丸。茶湯下。(簡便方)

⑮ 治傷寒嘔血。繼而齒縫出血不止。用開口川椒四十九粒。入醋一盞。同煎熟。入白礬少許服之。(直指方)

⑯ 治風蟲牙痛。川椒紅末。水和白麩丸。皂子大。燒熱咬之。數度愈。一方花椒四錢。牙皂四十九箇。醋一椀。煎漱之。(聖濟總錄方)

⑰ 治頭上白禿。花椒末。豬脂調傅。三五度便愈。(普濟方)

⑱ 治婦人禿髮。漢椒四兩。酒浸。密室內。日日擦之。自然長也。(聖惠方)

⑲ 治蠅螫作痛。川椒嚼細塗之。微麻卽止。(杏林摘要方)

⑳ 治百蟲入耳。川椒碾細。浸醋灌之。自出。(危氏方)

㉑ 治毒蛇咬螫。以閉口椒及葉

持封之良。(肘後方)

㉒ 治蛇入人口。用刀破蛇尾。納生椒二三粒。裹定。須臾卽自退出也。(聖惠方)

㉓ 治小兒暴驚。啼哭絕死。蜀椒左顧牡蠣各六銖。以酢漿水一升。煮五合。每灌一合。(千金方)

㉔ 治舌蹇語吃。川椒。以生麩包丸。每服十粒。醋湯送下。(救急方)

㉕ 治痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次卽收。(救急方)

㉖ 治腎風癱瘓。川椒。杏仁研膏。塗掌心。合陰囊而臥。甚效。(直指方)

㉗ 施用宜忌。凡陰虛火旺者。禁用。畏款冬花。防風。附子。雄黃。涼水。麻仁。杏仁。爲之使。得鹽味佳。

參攷資料 ① 蜀椒。生武都山谷。及巴郡。八月采。實陰乾。(別錄) ② 大熱。多食令人乏氣。喘促。口閉者。殺人。(別錄) ③ 川椒。可收水錢。中其毒者。涼水麻仁漿解之。(徐之才) ④ 五月食椒。損氣傷心。令人多忘。(孟詵) ⑤ 今歸峽及蜀川

陝洛間人家多作園圃種之。木高四五尺。似茱萸而小。有針刺。葉堅而滑。可煮飲食。四月結子無花。但生於枝葉間。類如小豆而圓。皮紫赤色。八月採實焙乾。江淮北土亦有之。莖葉都相類。但不及蜀中者良。而皮厚莖白味烈也。(蘇頌) 蜀椒肉厚皮皺。其子光黑如人之瞳人。故謂之椒目。他椒子雖光黑亦不似之。若土椒則子無光彩矣。(李時珍) 椒純陽之物。乃手足太陰右腎命門氣分之藥。其味辛而麻。其氣溫以熱。能入肺散寒。治欬嗽。入脾除溼。治風寒溼痺。水腫瀉痢。入右腎補火。治陽衰洩數。足弱久痢諸證。一婦年七十餘。病瀉五年。百藥不效。予以感應丸五十丸投之。大便二日不行。再以平胃參椒紅茴香羊肉爲丸與服。遂瘳。每因怒食舉發。服之卽止。此除溼消食。溫脾補腎之驗也。按歲時記言歲且飲椒柏酒。以辟疫癘。椒乃玉衡星精。大抵此方惟脾胃及命門虛寒有溼鬱者相宜。若脾胃素熱者。大宜遠之。故丹溪朱氏云。椒火。有下達之能。煎之既久。則火

自水中生。故世人服椒者。無不被其毒也。又上清訣云。凡人喫飯傷飽。覺氣上衝。心胸痞悶者。以水吞生椒一二十顆卽散。取其能通三焦。引正氣。下惡氣。消宿食也。又戴原禮云。凡人嘔吐服藥不納者。必有蛇在腸間。蛇聞藥則動。動則藥出而蛇不出。但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良。蓋蛇見椒則頭伏也。觀此則張仲景治蛇厥烏梅丸中用蜀椒。亦此義也。許叔微云。大凡腎氣上逆。須以川椒引之。歸經則安。(李時珍)

【川椒目】 命名 蜀椒之子光黑如目之瞳神故名。

處方用名 炒椒目。
性質 苦寒無毒。

效能 行水道。消腫脹。用作利尿藥。

主治 水腹脹滿。清利小便。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論椒目曰。治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾。膀胱急。【元】朱震亨本草衍義補遺論椒目曰。止氣喘。

配合應用 ● 治水氣腫滿。椒

目炒搗如膏。每酒服方寸匕。(千金方)

● 治留飲腹痛。椒目二兩。巴豆一兩。去皮心。熬搗。以棗膏和丸。麻子大。每服二丸。吞下。其痛卽止。又方。椒目十四枚。巴豆一枚。豉十六枚。合搗爲二丸。服之。取吐利。(肘後方)

● 治痔漏腫痛。椒目一撮。礬爲細末。空心水服三錢。其效如神。(海上方)

● 治崩中帶下。椒目炒碾細。每溫酒服一鈞。(金匱鈞玄方)

● 治眼生黑花。年久不可治者。椒目炒一兩。若朮炒一兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每服二十九。醋湯下。(本事方)

用量 五分至八分。

參攷資料 ● 椒氣下達。故椒目能治腎虛耳鳴。用巴豆。菖蒲同碾細。以松脂黃蠟溶和爲挺。納耳中抽之。治腎氣虛耳中如風水鳴。或如打鐘聲之聲。卒暴聾者。一日一易神驗。(甄權) ● 椒目治盜汗有功。將日微炒碾細。用半錢。以生豬上唇煎湯。一合。睡時調服。無

不效。蓋椒目能行水。又治水蠱也。(寇宗奭) ● 諸喘不止。用椒目炒碾二錢。白湯調服二三服以上。劫之後乃隨痰火用藥。(朱震亨) ● 椒目下達。能行滲道。不行殺道。所以能下水燥溼。定喘消蠱也。(李時珍)

【川椒根】 性質 辛熱微毒。主治 腎與膀胱虛冷。血淋色瘵者。煎湯細飲。色鮮者勿服。

【川椒葉】 性質 辛熱無毒。主治 奔豚伏梁氣及內外腎鈞。并雀亂轉筋和艾及葱熨。以醋拌熨之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論川椒葉曰。殺蟲洗脚氣及漆瘡。

【川葶藶】 卽葶藶之處方用名。詳

【川雅連】 卽黃連之處方用名。詳

【黃連】 條。

【川黃柏】 卽黃柏之處方用名。詳

【黃柏】 條。

【川黃連】 卽黃連之處方用名。詳

【黃連】 條。

【川棟子】即金鈴子產於四川者

之處方用名。詳『金鈴子』條。

【川當歸】即當歸之處方用名。詳

『當歸』條。

【川綿蔥】即野苧麻之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳『野苧麻』條。

【川彈子】即龍眼之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【川檉芎】即川芎之處方用名。詳

『川芎』條。

【川槿皮】命名 本品爲槿皮

之產於四川者。故名。

產地 出川中。

形態 按川槿爲灌木類之一

種。其皮厚而色紅。氣猛烈。與產於

他省者。俱可供藥用。

採取 以皮中有絲。白茸如杜

仲者。真而力厚。入藥良。

主治 殺蟲爲療癬瘡要藥。

配合應用 ①治癬瘡。以川槿

皮煎湯。用肥皂去核及內膜。浸湯

時時擦之。或以汁磨雄黃。搽尤妙。

(粉起筒便方)

②治頑癬多年不愈。川槿皮二

錢。輕粉五分。斑蝥七個。大楓子七

粒。河井水共一錢煎半。露一夜。俾

蠶塗之。又方。川槿皮四兩。輕粉。雄

黃各四錢。百藥煎四餅。斑蝥一錢。

巴霜錢半。大黃二兩。海桐皮二兩。

研如粉。陰陽水和。抓損敷之。必待

自落愈。(活人書方)

③治荷葉癬。川槿皮切片。海桐

皮。檳榔各二錢。輕粉錢半。紅娘子

五分。陰陽水浸一二日。用鷓鴣掃

上。如瘻以竹片刮破。搽此藥。夜露

三宿。更妙。(活人書方)

④治遍身頑癬。大楓子四十九

枚。川槿皮二兩。斑蝥去翅足五個。

川椒一錢。輕粉二錢。杏仁三錢。海

桐皮二錢。共末。河井水各一碗。浸

一夜。鷓鴣汁搽。

⑤治牛皮癬。川槿皮一筋。勿

見火曬燥。磨末。以好燒酒十觔。加

榆麵四兩。浸七日爲度。不時蘸酒

搽擦。二三十年者。搽一年。斷根。如

無川槿。土槿亦可代之。(毛世洪

經驗集方) 又治頑癬。川槿皮。海

桐皮。尖檳榔。樟冰。苦參。黃柏。白芨

各二錢。雷丸一錢五分。大風子。杏

仁各二粒。木鼈四個。用火酒浸七

日。將穿山甲刮薄。少碎。以酒搽之。

即愈。(種福堂方) 又五仙散治久

年頑癬。牛皮癬神效。紅粉霜五分。

明礬。川槿皮。杏仁各一錢。密陀僧

三錢。爲末。津調抹。一日三次。三日

全愈。(經驗廣集方)

⑥治粉刺。川槿皮一兩。硫黃二

兩。杏仁二兩。去皮尖。輕粉二錢。樟

腦五錢。麝香少許。爲末。雞子清調

早洗晚搽。(孫后石方)

⑦治牙落可以重生。用雄鼠骨

一具。生打活雄鼠一個。剃去皮雜。

用鹽水浸一時。炭火上炙。肉自脫

落。取骨炙燥。入藥案內。同研爲末。

香附。白芷。川芎。桑葉曬乾。地骨皮。

川椒。蒲公英。青鹽。川槿皮。旱連草。

共爲末。擦牙百日。復出。固齒。無不

效。(祕傳雄鼠骨散方)

參攷資料 川槿相傳爲武侯

遺植。殺蟲如神。生剝其皮。置蟻其

上。即死。故爲治癬良藥。他省產者

名土槿皮。薄而氣劣。今川人多用

黃葛皮代之。不得混用。(趙學敏)

【川藜】即水藜之日本名。詳『水

藜』條。

【川獨活】即獨活之處方用名。詳

『獨活』條。

【川錦紋】即大黃之處方用名。詳

『大黃』條。

【川薑】命名 本品乃薑之產

於四川者。故名。

古籍別名 木姜(本草綱目)

形態 川薑爲姜類之一種。

屈曲如枯枝。不類姜形。作羹味如

茶。黃醬。可供食料與藥用。

性質 辛熱。無毒。

主治 胃寒冷積。寒濕痰氣。

【川斷】即續斷之產於四川者之

處方用名。詳『續斷』條。

【川斷肉】即續斷之處方用名。詳

『續斷』條。

【川藟本】即藟本之處方用名。詳

『藟本』條。

【川紫參】即紫參之古籍別名。典

見紫參新研究。詳『紫參』條。

【川鬱金】即鬱金之處方用名。詳

『鬱金』條。

【弓皮】即蛇蛻之古籍別名。典見

本經。詳『蛇蛻』條。

四 畫

【不死草】產地 出廣西蒼柳

州府境。

形態 不死草爲雜草類之一

四畫 不丑中丹

種。高二三尺。狀如茅。可供藥用。

主治 食之延年。並可辟蠅。暑時置盤中。則食物不腐。

【不死葉】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【不死樹】即榕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『榕』條。

【不死麩】即茯苓之古籍別名。典見記事珠。詳『茯苓』條。

【不死麩】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【不灰木】以其色白如爛木。燒之不燃。故名。命名 本品石類也。

古籍別名 無灰木。(本草綱目)

產地 出上黨及澤潞山中。

形態 不灰木有木石之別。木類者葉如蒲。束以爲燎。一夜僅燒一二寸。不入藥用。石類者爲角閃石之屬。狀如絲。有彈力。質脆弱。易碎。色白。或爲灰色。綠色。光澤如絹。質軟如綿。故有石絨石綿之稱。所織之布。入火不燃。謂之火浣布。可供藥用。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 熱癩疥。和棗葉石灰爲粉。傅之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論不灰木曰。除煩熱。陽厥。

參攷資料 ●不灰木要燒成灰。但研破。以牛乳煮過。黃牛糞燒之。即成灰。(陳藏器) ●不灰木性寒。而同諸熱藥。治陰毒。瀉河間宣明方。治陽絕心腹疼痛。金針丸中亦用服之。蓋寒熱並用。所以調停陰陽也。(李時珍)

【不知奈】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【不重】即輕粉之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『輕粉』條。

【不借】即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【不流行】即王不留行之別名。典見吳普本草。詳『王不留行』條。

【不凋木】命名 本品四時不凋。故名。

產地 出山谷中。

形態 不凋木爲灌木類之一種。高二三尺。葉似槐。莖赤有毛。如棠梨。採得可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 調中補衰。治腰脚。去風氣。却老變白。

【不凋草】即巴戟天之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『巴戟天』條。

【不過】即桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳『桑螵蛸』條。 ●即螻螂之古籍別名。典見爾雅。詳『螻螂』條。

【不薪木】即鹿角藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹿角藤』條。

【丑牛】即牽牛子之處方用名。詳『牽牛子』條。

【丑玄】即牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛黃』條。

【丑寶】即牛黃之原名。詳『牛黃』條。

【中央節土】即麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【中庭】即百合之古籍別名。典見吳普本草。詳『百合』條。

【中逢花】即百合之古籍別名。典見別錄。詳『百合』條。

【中道首】即土菌之別名。典見綱目。詳『土菌』條。

【中粟】即粟米之在早晚粟中間成熟者。詳『粟米』條。

【中黃節土】即麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【中藥】即山豆根之古籍別名。典見綱目。詳『山豆根』條。

【中瓊珠】即真珠之處方用名。詳『真珠』條。

【丹】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【丹山】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【丹山月魂】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【丹皮】即牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【丹皮炭】即牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【丹田霖雨】即巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【丹沙草】即石長生之古籍別名。典見綱目。詳『石長生』條。

【丹芝】即赤芝之古籍別名。典見本經。詳『赤芝』條。 ●即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。 ●即五蝦脂之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『五嶽脂』條。

【丹柅】即蘋果色赤者之古籍別名。與見綱目。詳『蘋果』條。

【丹砂】即硃砂之原名。詳『硃砂』條。

【丹若】即酸石榴之古籍別名。與見古今注。詳『酸石榴』條。

【丹珀】即琥珀之古籍別名。與見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【丹桂】即肉桂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【丹桂木皮】產地 生江南深山中。

形態 丹桂木為雜木類之一種。狀似杉木。

主治 傷風。其皮可治瘰癧風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

【丹粉】即黃丹之處方用名。詳『黃丹』條。

【丹草】即石長生之古籍別名。與見本經。詳『石長生』條。

【丹荔】即荔枝之古籍別名。與見綱目。詳『荔枝』條。

【丹頂鶴】即鶴之最貴者。詳『鶴』條。

【丹參】命名 本品形似參而色赤。故名。

處方用名 紫丹參。赤丹參。豬血丹參。血丹參。

古籍別名 郡輝草。(本經)赤參。(別錄)木羊乳。吳普本草)逐馬。(陶弘景)奔馬草。(蕭炳)山參。(日華本草)

學名 (Soutellaria Indica, L. var. Japonica, Maxim.)

(拉丁) 基本 屬唇形科。丹參之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。丹參產四川龍安者為佳。名川丹參。有產安徽江蘇者。質味不如。

形態 按丹參為山野自生之草本。莖作方形。高尺餘。葉對生。作心臟形。花為青紫色。或白色。唇形。花作總狀花序排列。根為分枝根。其歧根長一寸至三寸許。外皮黃赤。內部紫褐色。味甘。

採取 五月間採之。採得陰乾。切片。有以醋心。血拌炒用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 去瘀生新。活血調經。專治萎黃病。臟燥症。入胃時。微有與

胃酸起作用。而助消化。至腸後。始次第分解。而被腸收吸。入血後。能促進血液循環。使赤血球產生極盛。細胞之新陳代謝力亦同時增加。用作通經強壯藥。為婦科要藥。

主治 心腹邪氣。腸鳴。胸膈如走水。寒熱積聚。破癥除癥。止煩滿。益氣養血。(本經)去心腹諸疾。結氣。腰脊強。脚痺。除風邪。留熱。久服利人。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論丹參曰。清酒飲。療風痺。足軟。【唐】甄權藥性本草論丹參曰。主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲。音鳴。吼。能定精。【宋】大明日華諸家本草論丹參曰。養神定志。通利關節。治冷熱勞。骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。癰疽。腫毒。丹毒。排膿止痛。生肌長肉。【明】李時珍本草綱目論丹參曰。活血。通心。包絡。治疝痛。又曰。丹參色赤。味苦。氣平。而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰二經。心與包絡。血分藥也。按婦人

明理論云。四物湯治婦人病。不問產前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散。主治與之相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩中帶下。調經脈。其功大類當歸。地黃。芍藥。芍藥故也。【明】羅希雍本草經疏論丹參曰。丹參本經味苦微寒。陶云性熱無毒。觀其主心腹邪氣。腸鳴。胸膈如走水。寒熱積聚。破癥除癥。則似非寒藥。止煩滿。益氣。及別錄養血。去心腹癥疾。結氣。腰脊強。脚痺。除風邪。留熱。久服利人。又決非熱藥。當是味苦平微溫。入手少陰。足厥陰。經。心虛。則邪氣客之。為煩滿。結氣。久則成病。疾。肝虛則熱甚。風生。肝家氣血凝滯。則為癥瘕。寒熱積聚。腎虛而寒溼邪客之。則腰脊強。脚痺。入三經。而除所苦。則上來諸證。自除。苦能洩。溫能散。故又主腸鳴。胸膈如走水。久服利人。益氣。養血之驗也。北方產者。勝俗名逐馬。【清】黃宮繡本草求真論丹參曰。丹參味苦。色赤。性平。而降。能入心。包絡。破瘀一語。已盡丹參功效矣。然有論其可以生新安胎。調經除煩。

四畫 丹

四壹 丹

養神定志。及一切風痺崩帶。瘕癥
日赤。疝病瘡疥腫痛等症。總皆由
其痰去。以見病無不除。非真能以
生新安胎。養神定志也。凡妊娠無
故大便不實者。切忌。

辨偽 鄭肯巖曰。丹參古出
桐柏川谷。今近道處有之。其根赤
色。大者如指長尺餘。一苗數根。氣
味苦。微寒無毒。主治心腹邪氣。寒
熱積聚。本草經原文。歷敘功用未
加益氣二字。蓋益正氣所以治邪
氣也。近今市肆有一種土丹參。服
之極能散血。又奚有益氣之功。不
知用何種草根混充。殊可恨也。
曹炳章曰。按丹參產安徽古城者。
皮色紅。肉紫有紋。質燥體鬆。頭大
無蘆為最佳。滁州全椒縣。形狀同
前。亦佳。產鳳陽定遠白陽山。涼浦
者。蘆細質鬆。多細枝。次產四川者。
頭小枝粗。肉糯有白心。亦次。鄭君
所云土丹參。或即川丹參也。抑或
福建土產之一種。別具形態。余未
之見也。

瘕癥。外之利關節而通脈絡。則腰
膝健而痺著行。詳核古人主治無
一非宜通運行之效。而其所以能
運行者。則必有溫和之氣。方能鼓
蕩之振動之。所謂主心腹邪氣。腸
鳴痢疾。其義已隱隱可見。然走竄
有餘。必非補養之品。即本經所謂
益氣。別錄所謂養血。皆言其積滯
既去。而正氣自伸之意。亦以通為
補耳。惟苦味泄降。故所主各病。皆
有下行為順之意。此則於行氣行
血之中。又必含有下達性質。而世
俗以為補血之用。及以之止崩中
帶下。皆非古人真旨矣。

配合應用 補心。用丹參入
天王補心丹。
健步。用丹參、牛膝、地黃、黃耆、
黃蘗等分。
治寒熱積聚。破癥除瘕。心腹
痼疾結氣。用丹參、鼈甲、牡蠣、牡丹
皮、青蒿、延胡索、牛膝、乾漆、水赤麥
子等分。
止煩滿。用丹參、麥門冬、沙參、
五味子、甘草、青蒿、栝樓等分。
益氣養血。用丹參、人參、麥門
冬、酸棗仁、地黃等分。

主腰脊強。脚痺。除風邪留熱。
用丹參、牛膝、草薢、木瓜、獨活、杜仲
續斷等分。
治婦人經脈不調。或前或後。
或多或少。產前胎不安。產後惡血
不下。兼治冷熱勞。腰脊痛。骨節煩
疼。丹參散。用丹參洗淨。切晒為末。
每服二錢。溫酒調下。(婦人明理
方)
治落胎下血。丹參十二兩。酒
五升。煮取三升。溫服一升。一日三
服。亦可水煮。又方。丹參、當歸、牛膝、
細辛。下死胎。(千金方)
治寒疝腹痛。小腹陰中相引
痛。自汗出。欲死。以丹參一兩為末。
每服二錢。熱酒調下。(聖惠方)
治小兒身熱。汗出拘急。因中
風起。丹參半兩。鼠屎炒三十枚。為
末。每服三錢。漿水下。(聖濟方)
治驚癇發熱。丹參、犀角、丹參、
雷丸各半兩。猪膏二兩。同煎。七上
七下。濾去滓。盛之。每以摩兒身上。
日三次。(千金方)
治婦人乳癰。丹參、白芷、芍藥
各二兩。以醋淹一夜。猪脂半
斤。微火煎成膏。去滓。傳之。(孟詵

一五四

必效方)
治熱油火灼。除痛生肌。丹參
八兩。剉。以水微調。取羊脂二斤。煎
三上三下。塗瘡上。(肘後方)
用量 錢半至三錢
施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。
畏鹽水、忌醋、反藜蘆。

參攷資料 丹參生桐柏川
谷及太山。五月採根。曝乾。(別錄)
此桐柏在義陽。是淮水發源之
山。非江東臨海之桐柏也。今近道
處處有之。莖方有毛。紫花。時人呼
為逐馬。(陶弘景) 冬採者良。夏
採者虛惡。(蘇恭) 今陝西河東
州郡及隨州皆有之。二月生。苗高
一尺許。莖方。有稜。青色。葉相對如
薄荷而有毛。三月至九月開花。成
穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如
指。長尺餘。一苗數根。(蘇頌) 丹
參治風軟脚。可逐奔馬。故名奔馬
草。曾用實有效。(蕭炳) 丹參降
而行血。血熱而滯者宜之。故為調
經產後要藥。設經早。或無血。經停
及血少不能養胎而胎不安。與產
後血已暢行者。皆不可感於功。兼
四物之說。併以其有參之名而濫

用之。即使功同四物。原治血分受病之藥。並非專爲補血之方。至補心之說。亦非如枸杞龍眼。真能補心之處者。以心藏神而主血。心火動則神不安。丹參清血中之火。故能安神定志。神志安定。則心得其益矣。凡溫熱之邪。傳入營分者。則用之。亦此義也。若邪在氣分而誤用。則反引邪入營。不可不慎。(王乘銜)

【丹烏】即益火之古籍別名。典見綱目。詳「益火」條。

【丹棘】即葦草之古籍別名。典見古今注。詳「葦草」條。

【丹雄雞】古籍別名。載丹(吳普本草)朱雞。

(本草衍義) 基本 係家禽類。藥用丹雄雞之內。

性質 甘。微溫。無毒。

主治 女人崩中漏下。赤白帶。通神。殺惡毒。辟不祥。(本經)補虛。溫中。止血。能愈久傷之瘡。不瘡者(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論丹雄雞曰。補肺。

【丹黍米】命名 本品乃黍米。之色赤者。故名。

古籍別名 野紅蓮米。赤黍米。赤蝦米。(本草綱目)

形態 丹黍爲穀類之一種。即黍之色赤者。皮赤。其米黃。惟可爲糜。不堪爲飯。粘着難解。穗熟色赤。亦可供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。
主治 欬逆上氣。霍亂。止洩利。除熱。止煩渴。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論丹黍米曰。治驚癇。以新熟者。淘汁。生服一升。不過三二度。愈。【宋】大明日華諸家本草論丹黍米曰。下氣。止欬。嗽。退熱。
參攷資料 ①丹黍米溫有小毒。不可合蜜及葵同食。(大明) ②丹黍米動風。性熱。多食難消。(寇宗奭)

【丹黍穰及根莖】性質 辛。熱。有小毒。

主治 煮汁服。解苦瓠毒。浴身。去浮腫。和小豆煮汁服。下小便。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論丹黍穰莖根曰。燒灰

酒服。治妊娠尿血。根莖煮汁服。利小便。止上喘。

【丹戩】古籍別名 飛龍。(別錄)

產地 出蜀郡。
形態 丹戩爲蟲類之一種。狀如鼠婦。背股赤頭。

採取 七月七日採。
性質 辛。有毒。
主治 心腹積血。

【丹陽草】即石長生之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石長生」條。

【丹陽木皮】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

【丹華】即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紅花」條。

【丹棗】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【丹精】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「銀箔」條。

【丹錠】即密陀僧之西名。詳「密陀僧」條。

【丹雞冠血】性質 鹹。平。無毒。

主治 中惡客忤。白癩風。
【丹礬】即礬之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「礬」條。

【丹窰泥】產地 出羅浮山。以羅浮沖虛觀後有稚川丹窰。取窰中土。以藥糟之水洗之。丸小粒投水中。輒有白氣數縷。沖射四旁。生泡不已。哈哈有聲。頃之一分爲二。二分爲四。四分爲八。然後融化服之。

主治 治腹疾。暈船及不服水土等證。爲丸。水調服。

【丹窰粉】即丹窰泥。中國醫學大辭典。以丹窰泥作丹窰粉。

【云聖蜜】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【互草】即常山之古籍別名。典見本經。詳「常山」條。

【五子實】命名 本品大如梨。而內有五核。故名。

產地 出嶺南及潮州山野中。
性質 甘。溫。無毒。
主治 霍亂。金瘡。

【五方草】即馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳「馬齒莧」條。

【五木香】即木香之古籍別名。典見綱目。詳「木香」條。

見綱目。詳「木香」條。

【五爪橘紅】即化橘紅五片如爪形者。詳「橘紅」條。

【五爪龍】即烏蘇葍之古籍別名。與見綱目。詳「烏蘇葍」條。

【五去風】即五倍子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「五倍子」條。

【五加】即五加皮之古籍別名。與見本經。詳「五加皮」條。

【五加皮】命名。本品以五葉根皮故名。交加者良。入藥係其

古籍別名 五加。行漆。(本經)對節。(別錄)五佳文章草。白刺。

(本草綱目)五花。(炮炙論)追風使木骨。(圖經本草)金鹽。(仙經)

自刺顛。五葉木。羽化魁。(和漢藥考)

外國名詞 Acanthopanax spinosum, Miq. (拉丁)

基本 屬五加科。藥用五加之根皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。香加皮產河南省。川加皮產四川。

西加皮產北江連州。土加皮產廣東。香加皮直隸獲鹿一帶。相連至山西亦有出。清明後收成。野產。

形態 按五加為山野自生之落葉灌木。高達六七尺。枝與葉多有刺。葉為掌狀複葉。每枝五葉相集而生。小葉略如稜形。尖端銳。面平滑而薄。邊緣有粗大之鋸齒。色鮮綠可愛。花朵甚小。五瓣。色白帶綠。相綴而成繖形花序。後結黑色之球果。根皮須冬日採掘。頗似荊之根皮。外面黃黑。內色白。除製酒外。又可泡之以代茶。炊飯以為食。



五加皮

採取 五七月間採莖。十月間採根。剝皮陰乾。

製法 凡使根皮。先剝去骨。陰乾。酒洗。週行周身。或用姜汁製過用。

性質 辛。溫。無毒。

效能 祛風濕。壯筋骨。用作驅風化濕藥。又為強壯藥。

主治 心腹疝氣。腹痛。益氣。療疔。小兒三歲不能行走。疳積。陰蝕。

(本經)男子陰痿。囊下濕。小便餘瀝。女人陰痒。及腰脊痛。兩脚痺痺。風弱。五緩虛羸。補中益精。堅筋骨。強志意。久服輕身耐老。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】雷斅雷公炮炙論論五加皮曰。作末浸酒飲。治目僻眼。【唐】甄權藥性本草論五加皮曰。破逐惡風血。四肢不遂。賊風傷人。軟脚。暨腰脊。主多年瘀血在皮肌。治痺溼內不足。【宋】大明諸家本草論五加皮曰。明目下氣。治中風骨節變急。補五勞七傷。藥作蔬食。可去皮。膚風溼。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論五加皮曰。釀酒飲。治風痺。四肢變急。

【明】穆希雍本草經疏論五加皮曰。五加皮味辛。其氣溫。其性無毒。別錄加苦微寒。氣味俱厚。入足少陰。足厥陰經。觀本經所主諸證。皆因風寒溼邪。傷於二經之故。而溼氣尤為最也。其治疝氣腹痛。療疔。小兒不能行。陰蝕。疔瘡。男子陰痿。囊下溼。小便餘瀝。女人陰痒。脊痛。兩脚痺痺。風弱。者何。莫非二經受風寒溼邪所致。經云。傷於溼者。下先受之。又云。地之溼氣。感則害人。

皮肉筋脈。肝腎居深。而主筋骨。故風寒溼之邪。多自二經先受。此藥辛能散風。溫能除寒。善能燥溼。二臟得其氣。而諸證悉廖矣。又溼氣浸淫。則五臟筋脈緩縱。溼氣留中。則虛羸氣乏。溼邪既去。則中焦治而筋骨自堅。氣日益而中自補也。其主益精強志者。腎藏精與志也。輕身者。除風溼之效也。耐老者。補肝腎之功也。昔人云。寧得一把五加。不用金銀滿車。寧得一斤地榆。安用明月寶珠。又昔魯定公母單服五加酒。以致不死。又東華真人。養石法。用玉趾金鹽。玉趾地榆也。金鹽五加也。世為僊經所須。其能輕身耐老。又可知矣。【明】李士材本草圖解論五加皮曰。五加皮辛溫。入肝腎二經。腎得其養。則妄水去而骨壯。故能主陰痿脊疼。腰痛脚軟諸症。肝得其養。則邪風去而筋強。故能理血癩。拘攣。疝氣。痛痺等症。仙經贊其返老還童。雖譽詞過溢。然五加造酒。久久服之。添精益血。搜風化痰。強筋壯骨。卓有神功。並其氣與酒相宜。酒得之其味醇佳也。【明】黃宮繡本草求真論

五加皮曰。五加皮今人止知能理脚氣。而不知脚氣之病。因於風寒。溼三氣而成。風勝則筋骨爲之拘攣。溼勝則筋脈爲之緩縱。男子陰痿。女子陰癢。蟲生小兒脚軟。寒溼。則血脈爲之凝滯。筋骨爲之疼痛。而脚因爾莫行。服此辛苦而溫。辛則氣順而化痰。苦則堅骨而益精。溫則祛風而除溼。凡肌膚之療。血筋骨之風邪。探不因此而治。蓋溼去則骨壯。風去則筋強。而脚安。有不理者乎。但此雖屬理脚之劑。仍不免有疎泄之虞。須於此內。參以滋補之藥。則用之歷久而不變矣。勿謂有五加之說。遂竟信爲理脚聖藥。而置金玉滿車於不問也。莖青節白。骨硬皮黃。根黑芽香。五葉者佳。【清】楊時泰本草述鈎元論五加皮曰。五加皮。治風溼痿痺。夫溼傷腎。腎不能養肝。肝自生風。遂成風溼。其本病於痺溼。內不足而血脈凝滯。其標見於筋傷不能束骨。而爲風弱軟脚。然則五加乃療溼之化風。非療風病。經曰。風從陽受之。溼從陰受之。其本固區以別矣。此味初辛次苦。苦勝於辛。

四畫 五

辛居先而即隨苦以直下。故入肝散風。入腎燥溼。而皆以氣之溫者。和之。人惟腎肝氣虛。故病於溼。溼者陰之淫氣也。陰溼則陽不化而爲風。風者陽之淫氣也。陽溼則陰愈不化而病於溼。至更病於溼。則陰病陽陽。陽病陰而成溼熱。如疽瘡。陰蝕及骨節。變急是也。夫既曰緩弱。又曰變急者。因溼鬱爲熱。熱傷血而不能養筋。故爲變急也。五加皮以辛苦溫散其陽實之淫氣。即行其壅滯不化之陰氣。是治風也。實由溼而治之。祛風本於宜溼。逐溼又卽以清熱。所以熱痺（如防風丸）冷痺（如巴戟天湯）皆用之。別錄言其益氣堅筋骨強志意者。固以元陽得暢。真陰能化。而生化之原不竭也。豈得與他味之宜風除溼者例論乎哉。

配合應用 ①治溼熱痿痺。腰已下不能行動。用五加皮、牛膝、木瓜、黃蘗、麥門冬、生地黃、慈苳仁、石斛、虎脛骨、山藥等分。

②治腎虛寒溼客之作腰痛。用五加皮、續斷、杜仲、牛膝、山茱萸、巴戟天、破故紙等分。

③治風寒溼成痺。用五加皮、二朮、葶藶、石菖蒲、薏苳仁、白茯苓、甘菊、花防風、羌活、獨活、白蘇皮、石斛等分。

④治下部溼瘡久不愈。兼治膿窠瘡如神。用五加皮、石菖蒲、連翹、蒼朮、黃蘗、黃耆、薏苳仁、金銀花、鼈蟲、胡麻、木瓜、土茯苓等分。

⑤治虛勞不足。五加皮、枸杞根、白皮各一斗。水一石五斗。煮汁七斗。分取四斗。浸麴一斗。以三斗拌飯。如常釀酒法。待熟任飲。（千金方）

⑥治男婦脚氣。骨節皮膚腫溼疼痛。服此進飲食。健氣力。不忘事。名五加皮丸。五加皮四兩（酒浸）遠志（去心）四兩。酒浸日乾爲末。以酒浸爲糊丸。梧子大。每服四五丸。空心溫酒下藥。酒壞。別用酒爲糊。（瑞竹堂方）

⑦治小兒行遲。小兒三歲不能行者。用此便走。五加皮五錢。牛膝木瓜二錢半。爲末。每服五分。米飲

入酒二三點。調服。（全幼心鑑方）

⑧治婦人血勞。憔悴困倦。喘滿虛煩。嗜嗜少氣。發熱多汗。口乾舌澀。不思飲食。名血風勞。油煎散。用五加皮、牡丹皮、赤芍藥。當歸各一兩。爲末。每用一錢。水一盞。用青錢一文。煎油入藥。煎七分。溫服。常服能肥婦人。（和劑局方）

⑨治五勞七傷。五月五日採五加莖。七月七日採葉。九月九日取根。治下篩。每酒服方寸匕。日三服。久服去風勞。（千金方）

⑩治目眩息膚。五加皮不開水。聲者。搗末一升。和酒二升。浸七日。一日服二次。禁醋。二七日。偏身生瘡。是毒出。以生熟湯浴之。取瘡愈。（千金方）

⑪治服石毒。或熱嚙向冷地臥。五加皮二兩。水四升。煮至二升。半發時便服。（外臺祕要方）

⑫治火窟丹毒。從兩脚起。如火燒。五加根葉燒灰五兩。取煨鐵家槽中水。和塗之愈。（楊氏產乳方）

用錢 錢半至三錢。

施用宜忌 凡下無風溼。及陰虛火旺者禁用。慈步參、蛇皮、遠志

爲之使。

參攷資料 ⑤五加皮樹本是白楸樹。其上有葉如蒲葉。三花者是雄。五花者是雌。陽人使陰。陰人使陽。剝皮陰乾。(雷斅) ⑥蕪州人呼爲木骨吳中俗名追風使者。(蘇頌) ⑦今江淮湖南州郡皆有之。春生苗。莖葉俱青。作叢。赤莖。又似藤葛。高三五尺。上有黑刺。葉生五枚。作簇者良。四葉三葉者最多。爲次。每一葉下生一刺。三四月開白花。結青子。至六月漸黑色。根若荊根。皮黃黑。肉白色。骨硬。一說今有數種。京師北地者大片。類秦皮。黃蘗。平直如板而色白。絕無氣味。療風痛頗效。餘無所用。吳中乃剝野椿根皮爲五加。柔韌而無味。殊爲乖失。今江淮所生者。根類地骨皮。輕脆芬香。其苗莖有刺。類薔薇。長者至丈餘。葉五出。香氣如楸。攪春時結實。如豆粒而扁。青色。得霜乃紫黑。俗但名爲追風使。以渣酒療風。乃不知其爲眞五加皮也。今江淮吳中往往以爲薔薇。正似薔薇金銀葉。而北方多不知用此種。(蘇頌) ⑧五加治風溼痿痺。壯

筋骨。其功良深。仙家所述。雖若過情。蓋獎詞多溢。亦常理耳。造酒之方。用五加根皮洗淨。去骨葉。葉亦可以水煎汁。和麴釀米酒。成時時飲之。亦可煮酒飲。加遠志爲使。更良。一方加木瓜。煮酒服。談野翁試驗方云。神仙煮酒法。用五加皮。地榆。刮去粗皮。各一斤。袋盛。入無灰好酒二斗。中大罐封固。安大鍋內。文武火煮之。罌上安米一合。米熟爲度。取出火毒。以渣曬乾。爲丸。每旦服五十九丸。藥酒送下。臨臥再服。能去風溼。壯筋骨。順氣化痰。添精補髓。久服延年益老。功難盡述。王輪醫論云。風病飲酒能生痰火。惟五加一味。浸酒。日飲數杯。最有益。諸浸酒藥。惟五加與酒相合。且味美也。(李時珍) ⑨此藥以五葉交加者良。故名五加。又名五花。楊慎丹鉛錄作五桂云。一枝五葉者佳。故也。蜀人呼爲白刺。譙周巴蜀異物志。名文章草。有贊云。文章作酒。能成其味。以金買草。不言其貴是矣。本草豺漆豺節之名。不知取何義也。(李時珍) ⑩春月於舊枝上抽條葉。山人採爲蔬茹。正如枸杞。

生北方沙地者皆木類。南方堅地者如草類也。唐時惟取峽州者充。雷氏言葉如蒲者非也。(李時珍)

【五加皮酒】 製法 用五加皮洗刮去骨。煎汁。和麴米釀酒。或切碎袋盛。浸酒。或加當歸。牛膝。地榆。諸藥。

主治 一切風溼痿痺。壯筋骨。填精髓。

【五加莖】 性質功用。與五加皮同。

【五加葉】 主治 皮膚風溼。

【五母麻】 古籍別名 鹿麻。歸澤麻。天麻草。若草。

(別錄) 產地 生田野。

採取 五月採。

性質 苦。有毒。

主治 痿痺。下痢。

【五羽石】 古籍別名 金黃。產地 生海水中。蓬葭山中亦有出。形態 五羽石爲石類之一種。其色黃如金。

主治 輕身長年。

【五色石英】 主治 心腹邪氣。女人小腹痛。

鎮心胃中冷氣。益毛髮。悅顏色。治驚悸。安魂定魄。壯陽道。下乳。隨臟而治。

【五色石斛】 命名 本品爲石斛之產於雲南。而以色紺紅者佳。故名。

主治 清胃熱。益虛羸。

【五色帛】 主治 盜汗。拭乾後藥道頭。

【五色石脂】 卽赤石脂之古籍別名。典見本經。詳「赤石脂」條。

【五色符】 古籍別名 白符名。女木。(別錄)

產地 生山谷中。

形態 五色符爲雜草類之一種。色有青。黃。赤。黑。白。五種。俱可供藥用。

性質 苦。微溫。

主治 欬逆。五臟邪氣。調中益氣。明目殺蟲。青符。白符。赤符。黑符。黃符。各隨色補其臟。

【五色美藥】 卽陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「陽起石」條。

【五色堯】即馬齒莧之古籍別名。與見和漢藥考。詳「馬齒莧」條。

【五色龍鬚】即龍鬚藤之有五色者。詳「龍鬚藤」條。

【五行丹】即煙油之別名。典見綱目。詳「煙油」條。

【五行草】即馬齒莧之古籍別名。典見綱目本草。詳「馬齒莧」條。

【五辛菜】命名。本品乃元旦立春以葱蒜韭薤蒿芥辛嫩之菜。雜和食之。取迎新之義。謂之五辛盤。

性質 辛溫無毒。

主治 溫中去惡氣。消食下氣。

參攷資料 ①五辛菜。歲朝食之。發五臟氣。陳藏器。②五辛菜。熱病後食。多損目。李時珍。

【五佳】即五加皮之古籍別名。典見綱目。詳「五加皮」條。

【五穀蟲】即五穀蟲之處方用名。詳「五穀蟲」條。

【五味子】命名。本品皮肉甘酸。核中辛苦而俱有鹹味。以其五味俱備。故名。

處方用名 北五味子。炙五味子。

古籍別名 葶藶(附雅)玄及(別錄)疎。壯味。會及嗽神。六亭劑。金鈴子。紅內消。紅內膠。(和漢藥考)

外國名 Kadamura China-ensis (Schizandra Chinensis) 或 (Kadamura Borries) (拉丁)

基本 屬木蘭科。藥用五味之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。五味子產奉天吉林兩省為最。由煙臺牛莊幫運來。八九月新。

形態 按北五味子為木質常綠之蔓性植物。山野自生。葉互生。為倒卵圓或卵圓形。色綠。葉端尖銳。邊緣有鋸齒。花朵頗小。色帶白。有細花梗。後結赤色之漿果。殼為穗狀而下垂。



子 味 五

種類 ①南產者色紅。名南五味子。②北產者色黑。名北五味子。

種植 刈取其根。亦可移栽於

園圃。其子實又可下種。惟移根植之。則當年繁茂。若於二月種子。則次年乃能繁茂也。

採取 八九月間採實陰乾。

製法 雷斅曰。凡使五味子。以鋼刀劈作兩片。用蜜浸蒸。從巳至申。却以漿浸一宿。焙乾用。李時珍曰。入補藥熟用。入嗽藥生用。劉公石保壽堂。治腎虛遺精。水浸去核用。

性質 酸。溫。無毒。

效能 斂肺。瀉腎。固精。止汗。用作祛痰藥。及為滋補收斂藥。

主治 益氣。欬逆。上氣。勞傷。羸瘦。補不足。強陰。益男子精。(本經) 養五臟。除熱。生陰。中肌。(別錄)

張仲景之發明 五味子一味。經張仲景之實驗。認為主治咳而胃者也。茲考徵如下。①小青龍湯證曰。咳。②苓桂五味甘草湯證曰。時復冒。(皆用五味子半升) 觀此二方。則五味子主治咳而胃者明矣。但五味子澤瀉雖皆治胃而有別。五味子治咳而胃者。澤瀉治眩而胃者也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論五味子曰。能治中下氣。止嘔逆。補虛勞。令人體悅澤。【宋】大明日華諸家本草論五味子曰。明目。暖水腫。壯筋骨。治風。消食。反胃。霍亂。轉筋。疲癆。奔豚。冷氣。消水。腫。心腹氣脹。止渴。除煩熱。解酒毒。

【元】李東垣用藥法象論五味子曰。生津止渴。治瀉痢。補元氣不足。收耗散之氣。墮子散大。【元】王好古湯液本草論五味子曰。治喘。欬嗽。壯水鎮陽。【明】繆希雍本草經疏論五味子曰。五味子本經味酸。氣溫。味酸。五而無毒。王好古云。味酸。微苦。鹹。入足少陰。手太陰。血分。足少陰氣分。主益氣者。肺主諸氣。酸能收。正入肺補肺。故益氣也。其主欬逆。上氣者。氣虛則上壅。而不歸元。酸以收之。攝氣歸元。則欬逆上氣自除矣。勞傷羸瘦。補不足。強陰。益男子精。別錄養五臟。除熱。生陰。中肌者。五味子專補腎。兼補五臟。腎藏精。精盛則陰強。收攝則真氣歸元。而丹田煖。腐熱水穀。熟糟粕。而化精微。則精自生。精生則陰長。故主如上諸疾也。藥性論云。五味子君能治中下氣。止嘔逆。補諸

一五九

虛勞。令人體悅澤。除熱氣。病人虛而有氣。兼嗽者。加而用之。日華子云。煖水藏。下氣。賁。冷氣。消水腫。反胃。心腹氣脹。止渴。除煩熱。解酒毒。壯筋骨。皆其極功也。【清】黃宮繡本草求真論五味子曰。五味味雖有五。而酸鹹居多。其性亦溫。故書載能斂氣。滋水。益氣生津。補虛明目。強陰濟精。止嘔除瀉。審嗽定喘。除煩止渴。消腫解酒。收耗散之氣。噫子散大。為保肺滋腎要藥。蓋氣發於胃。出於肺。若陰虛火氣。則氣散而不收。而煩渴咳嗽遺精汗散等症。因之互見。故必用以酸鹹。則氣始有歸宿。而病悉除。至云能以除熱者。是即氣收而火不外見之意也。所云能暖水臟者。是即腎因得溫。而氣得煖而藏之也。但寒邪初冒。脈實有火者。禁用。北產紫黑者。良。入補藥。蒸嗽藥。生用。惡。萎蕤。【清】楊時泰本草述鈞元論五味子曰。五味治嗽。惟久嗽及虛勞嗽。用之。補與收相取。而行。更無躡躡者。嗽未至於喘。即嗽而氣不逆者。便宜酌量。至為溼痰之阻氣。與溼熱之病乎。氣。以致病乎。主氣者。

更當慮其妄投之害矣。凡病因虛而熱。或久熱而虛。關於肺腎之相。因以為病者。用五味。乃無上妙藥。大抵元氣受傷之證。邪氣勝者。則以散邪為主。即以收陰召陽。歸元而全。正為助。其無邪氣而止。有虛乏者。則以補正為主。亦即有收之一法。合而奏效。其有元氣虛損。遂因虛鬱化熱者。則有清補一法。而收與散並行。其散不敵收之半。乃為得之。此義不獨療嗽為然。又凡元氣耗散之甚者。非惟補益可待。而收之一法。更有捷功。【清】鄒樹本經疏證論五味子曰。五味子所治之證。傷寒僅言欬逆。金匱要略則兼言上氣。如射干麻黃湯之欬。而上氣。喉中水雞聲。小青龍加石膏湯之肺脹。欬逆上氣。煩燥而喘也。夫傷寒有傷寒之關鍵。無論其為太陽少陽少陰。凡欬者。均可加入五味子。乾薑。雜證自有雜證之體裁。即欬而脈浮。厚朴麻黃湯主之一語。已通概全。書大旨。試觀金匱要略中有脈沉而用五味子者。否。蓋五味子原只能收陽中之陰氣。餘則皆非所宜。故收陰中之陽

氣者。必以附子乾薑。收陰氣者。必以地黃阿膠。收陽中之陽氣者。必以龍骨牡蠣。傷寒為陽病。則傷陽中之陰氣。為最易。故不必審其脈之為浮為沉。如真武湯病之脈。必沉無疑也。雜證者。或起於陽。或發於陰。則五味子之用。須審脈浮。斷不容孟浪。蓋雜證之起於陽者。多約陰。起於陰者。多消陽。約陰而更以五味收其陰。則陰遂竭。消陽之陰。更以五味收之。是誠認賊作子矣。故射干麻黃湯。厚朴麻黃湯。桂苓五味甘草湯。諸證。皆為上焦陽病。皆有停飲。則當執脈浮不渴為據。而後五味可用。其義見於桂苓五味甘草加乾薑細辛湯下曰。細辛乾薑為熱藥。服之當遂渴。渴反止者。為支飲也。此則與服小青龍湯已渴者。為寒去欲解。服小柴胡湯已渴者。為屬陽明。同條共貫。無傷寒雜證之分也。已。要之。小青龍湯證。未必不上氣。厚朴麻黃湯證。原不言上氣。故上氣不上氣。不足為用。五味扼要。惟脈浮不渴。乃其眼目所在耳。或曰。子言欬逆上氣。而不渴。為用五味子的據。頗似

近理。待千金方治消渴。備有用五味子者。其說遂不可通矣。曰。千金方論消渴。其源有四。一曰。渴利。後人謂之上消。二曰。內消。後人謂之中消。三曰。強中。四曰。消渴。此二種。後人謂之下消。五味子之用。在強中者。一方曰。治腎氣不足。消渴小便多。腰痛。增損腎瀝湯。在消渴者。二方曰。治虛勞。渴無不效。骨燼煎。曰。治虛熱。四肢羸乏。渴熱不止。消渴補虛。伏神散。渴利內消者。絕不用。及亦可以知與治欬逆之在上者。風馬牛不相及矣。夫欬逆在上。當防其有邪有火。若在下之火。正欲其引上焦陽中之陰。以相濟。奈何與在上者。視同一例耶。

國外學說 英美學說謂五味子一名。葦蕤。產中國南方北方等處。莖生。第南方所產者。其色紅。北方所產者。其色黑。皮肉甘酸。核中辛苦。都有鹹味。以其五味具備。故名五味子。能行氣。祛風。又為健胃劑。日本學說謂黑五味子係別一種。並非北五味子。牧野富太郎曾指述不同之處。刊入明治二十七年植物學雜誌第八十七號。其言

白。黑五味子學名 *Schizandra nigra*, Maxim. 葉柔而厚。兩面平滑無毛。作卵圓形。葉頭尖凸。嫩羣之葉。尤為尖銳。葉緣微凸之齒。頗為稀疎。表面之葉脈。雖不甚分明。然背面則顯呈綠色之網。惟絛不隆起。試採新鮮葉搗之。其臭似松。其結實為漿果。成熟則色黑。故名黑五味子。北五味子學名 *Schizandra chinensis*, Boill. (*Kadsura chinensis* Turcz., Maximowiczia chinensis Rupr., Maximowiczia arunensis, Rupr.) 葉較薄。成倒卵形。或為橢圓狀之倒卵形。葉脈面凹而背凸。因之全葉面呈極粗之皺。面雖光滑。背面之脈上則有微毛。葉緣微凸之齒。較密於前種。生時揉之。亦有松葉之臭。果熟色紅。又和漢三才圖會論五味子曰。高麗產最良。中國次之。日本又次之。日本所在多有。而以紀州之產為最。越州廣島及日向丹波之產次之。以梗(乾者形色如甘草)浸水。取其黏液塗髮甚佳。俗名美軟石。其義未詳。又古方藥品考曰。五味子有

數種。高麗產者。似胡椒而小。黑色滋潤。味酸微甘。其核苦辛。香者為最上。藥舖呼為黑五味子。時珍所謂北五味子是也。凡試其核。如黃蜀葵子而緒色者。真也。享保中高麗種始傳至本國。今人裁之。其實秋熟。作紅紫色。蒸乾則色黑。與高麗產無殊。日本產者。形狀亦緒似。惟大倍之。色紫黑。滋潤。氣味相同。但酸味不厚。此則次之。呼為熟五味子。復蒸之。則呼大熟五味子。凡黑色滋潤者。俱可用。其未熟作淡緒色。滋味亦薄者。下品也。生和州宇陀紀州熊野。別有一種。為名古屋五味子。其顆粒同前種。色紫赤。皮上白如霜。味酸鹹而滋潤微亦屬下品。生信州山谷間。製之者皆名古屋入。故名。市人取其未熟且小者。製以醋。故皮上發霜。呼為粉五味子。偽稱高麗五味子。又有小熟五味子。顆粒小。色黑。味苦。是南五味子之偽者。商人或用烏梅煎汁染之。令酸且黑。實不堪用。北五味子。莖延一二丈。春生芽。葉似杏葉。鋸齒粗。葉間開白花。內帶紅色。花後結實如蒴。莢子。秋熟。作紅紫

色。至冬葉落。日本產者。類高麗產。而葉似南五味子。鋸齒粗。實似葡萄而小。秋熟作紫色。入冬葉盡枯。又大和本草曰。五味子。高麗產者。合用。醫書所謂遼五味子是也。又名北五味子。顆粒大。色黑。滋潤。有五味。酸味極甚。日本產者。祇有苦味。初無五味。無滋補收斂之功。故不堪用。中國產者。顆粒小。味苦而燥。皆劣於遼五味子。來自高麗者。實苦辛。皮甘酸。皮實俱帶鹹。一物而五味俱全。此真不愧為五味子也。草木之實。有鹹味者。舉世罕觀。而竟有之。詎非奇事。但時醫每不用高麗五味子。多用日本五味子。不解何故。李中梓云。補藥用熟。嗽藥用生。今倭俗喜用五味子。豈浸水中。俟粘汁出。以塗髮。髮如中國婦人之用抱花水云。又草木有種曰。產日本之武藏。下野。甲斐等山中者。搗葉嗅之。有松香。是北五味子也。與高麗五味子。同入藥用。南五味子為下品。不堪入藥。種法多植於山陰之地。欲莖藤粗肥。須施以酒糟。人糞等肥料。以莖入土。不久即生根。然後截斷而分植之。又日

用藥品考曰。日本五味子。來自中國者。皆南五味子。必來自高麗。方書稱遼五味子者。乃為北五味子。入藥推上品。兩種藥肆俱有之。日本產者。南北兩種亦備。藥肆所售之北五味子。係倍州出產。與來自高麗者無異。因此分生熟兩種。俱呼高麗五味子。他處所產者。或呼名古屋五味子。稍大者。則呼大五味子。顆粒較巨者。或呼肉五味子。(肉五味子亦有生熟二種)實則通用北五味子一種可已。(他處藥肆。有發售南五味子者)和漢藥考曰。日本之有北五味子。始於享保年間。其種子係傳自高麗。取南五味子之莖莖。剝其皮。浸水中。黏汁自出。堪充製紙之糊料。又以之塗髮。使其潤澤。昔時男女皆用之。又歷世女裝考曰。近人將五味子莖切斷。入筒中。水浸置。未幾黏汁出。以毛刷引之。絲縷縷然。刷髮可代油。此五味子一名美軟石云。

近人學說 張山雷曰。五味子酸而性溫。本是溫和之溫。與溫燥不同。生津止渴。潤肺胃而益腎陰。

功用皆在陰分。孫真人謂五六月宜服五味子湯。以益肺金之氣。在上則滋源。在下則補腎。張潔古引孫氏千金月令。又曰夏月季夏之間。困乏無力。無氣以動。以五味。黃芪。門冬。少加生黃柏服之。使人精神頓加。皆其滋陰之捷效。別錄以除熱為一大綱。甄權藥性論亦謂除熱氣。日華子稱其除煩熱。其意固皆在虛熱一邊。本非以治實火之大熱症。獨寇宗奭惑於本經性溫一說。竟謂治肺虛寒。不取其除熱一說。而又曰今食之多致虛熱。蓋用之不當。酸收太過。閉而生熱。是為不善用藥之咎。必非藥性之真。且亦誤解本經性溫之旨。惟東垣又謂此為火熱必用之藥。治嗽以之為君。則又有語病矣。丹溪謂黃昏嗽。乃火氣浮入肺中。不宜用涼藥。宜五味子五倍子斂而降之。壽頭案此即陰火上衝。激肺之嗽。陰虛火浮。故當黃昏陰盛之時。虛熱發動。乃始作嗽。宜以收攝肺腎為治。然惟脈虛舌紅無痰者。乃合。若舌膩有痰。亦當知所顧忌。

配合應用 復脈通心。五味

子。人參。麥門冬。名生服散。

①潤腎強陰。入八味丸代附子。

②主令人有子。用五味子同懷

乾地黃。甘枸杞子。車前子。覆盆子。

肉苁蓉。白膠。麥門冬。人參。杜仲。白

茯苓。黃蘗等分。

③解酒毒。君乾葛。五味子。白蘗

豆。

④治痰嗽并喘。五味子。白礬等

分為末。每服三錢。以生豬肺炙熟

蘸末細嚼。白湯下。又方。五味子。天

麥。二冬。百部。阿膠。薄荷葉。主肺虛

久嗽。(普濟方)

⑤治陽事不起。新五味子一斤

為末。酒服方寸匕。日三服。忌豬魚

蒜。醋。蠶一劑。即得力。百日以上。可

御十女。四時勿絕。藥功能知。(千

金方)

⑥治腎虛遺精。北五味子一斤。

洗淨水浸。揆去核。再以水洗核。取

盡餘味。適置砂鍋中。布濾過。入好

冬蜜二斤。炭火慢熬成膏。瓶收。五

日出火性。每空心服一二茶匙。百

滾湯下。(劉公石保壽堂方)

⑦治五更腎泄。凡人每至五更

即溲泄一二次。經年不止者。名曰

腎泄。蓋陰盛而然。脾惡溼。溼則瀉

而困。困則不能治水。水性下流。則

腎水不足。用五味子以強腎水。養

五臟。吳茱萸以除脾溼。則泄自止

矣。五味子去梗。二兩。茱萸湯泡七

次。五錢。同炒香為末。每日陳米飲

服二錢。又方。五味子。吳茱萸。山茱

萸。肉豆蔻。補骨脂。人參。治腎洩良

(許叔微本事方)

⑧治女人陰冷。五味子四兩。為

末。以口中玉泉和丸。兔矢大。類納

陰中取效。(近效方)

⑨治爛弦風眼。五味子。蔓荊子

煎湯。類洗之。(談野翁種子方)

⑩治赤遊風丹。漸漸腫大。五味

子焙研。熱酒服。服一錢。自消。神效。

(保幼大千方)

用量 五分至八分。

應用宜忌 凡外有表邪。內有

實熱者。禁用。惡萎蕤。勝烏頭。從蓉

為之使。

參攷資料 ①今第一出高麗

多肉而酸甜。次出青州。冀州。味過

酸。其核並似諸腎。又有建平者。少

肉。核形不相似。味苦亦良。此藥多

背潤。烈日暴之。乃可搗篩。(陶弘

①葇生木上。其葉似杏而大。

子作房。如落葵。大如蠶子。出蒲州

及藍田山中。今河中府作葇實之

品。(蘇恭) ②葇生莖赤色。花黃白。

子生青熟紫。亦具五色。味甘者佳。

(韓保昇) ③今河東陝西州郡尤

多。枕越間亦有之。春初生苗。引赤

葇於高木。共長六七尺。葉尖圓似

杏葉。三四月開黃白花。類蓮花狀。

七月成實。殼生莖端。如豌豆許。大

生青熟紅紫。入藥主腫不去。子。今

有數種。大抵相近。雷斅言小頭皮

皺泡者。有白模鹽霜一重。其味酸

鹹。苦辛甘皆全者為真也。(蘇頌)

④今華州以西至秦多產之。方紅

熟時。彼人採得。蒸爛。研濾汁。熬成

稀膏。置酸甘入蜜煉勻。待冷。收器

中。肺虛寒人。作湯時時飲之。作果

可以寄遠。本經言其性溫。今食之

多致虛熱。小兒益甚。藥性論謂其

除熱氣。日華子謂其膠水臟。除煩

熱。後學至此多惑。今既用治肺虛

寒。則更不取其除熱之說。(寇宗

奭) ⑤五味大能收肺氣。宜其有

補腎之功。收肺氣非除熱乎。補腎

非暖水臟乎。乃火熱嗽必用之藥。

寇氏所謂食之多致虛熱者。蓋收補之驟也。何惑之有。又黃昏嗽乃火氣浮入肺中。不宜用涼藥。宜五味子倍子斂而降之。(朱震亨)

孫真人千金月令言五月常服五味。以補五臟之氣。過夏月季夏之間。困乏無力。無氣以動。與黃芪麥門冬。少加生黃蘗煎湯服之。使人精神頓加。兩足筋力涌出也。蓋五味子之酸。精人參能瀉丙火而補庚金。收斂耗散之氣。(張元素)

五味治喘嗽。須分南北。生津止渴潤肺。補腎勞嗽。宜用北者。風寒在肺。宜用南者。(汪機)

【五毒草】即赤地利之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「赤地利」條。即扛板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「扛板歸」條。

【五花】即五加皮之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「五加皮」條。

【五金陸玃】即鉛之古籍別名。典見土宿本草。詳「鉛」條。

【五金膠漆】即楮樹皮中白汁之古籍別名。典見綱目。詳「楮樹皮中白汁」條。

【五香】即木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木香」條。

和漢藥考。詳「木香」條。

【五香草】即落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「落得打」條。

【五倍頭】即澤漆之俗名。詳「澤漆」條。

【五倍子】原名 文蛤。命名 本品形似海中文蛤。故亦同名。百蟲倉會意也。百藥煎。隱名也。


古籍別名 百蟲倉。(本草拾遺) 法釀。百藥煎。(本草綱目) 五去風。五穉子。(和漢藥考)

外國名詞 Gallae japonicus. (拉丁) japonose Natgalla. (英) japonische Gallaeapfel. (德) キヌシ (日本)

基本 屬於漆樹科之鹽膚木。其葉柄或嫩葉為一種昆蟲所刺傷。因之該部逐漸膨大而成蟲窠。此即五倍子也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。五倍子產廣西桂林懷集柳州廣東樂昌連州等處。但以柳州最佳。染料多用之。實則凡川蜀山野間之腐木上。恒多生焉。

形態 按五倍子之形狀。為不整齊之塊塊。或似菱。或分枝作裂。鱗色灰褐。小者祇四分。大者可二寸。皮厚三釐至半分。堅脆如角質。破碎面光澤若玻璃。外有灰白如絲之毛被。且有穴孔。為蟲脫出之口。中係空洞。藏有灰白色之粉質。與已死之蟲。具一種特異之臭味。滲收斂性極強。



五倍子

採取 九月霜降前採收。

製法 五倍子多選用之。或去枝莖與蟲用。亦有炒焦入藥用。釀過為百藥煎。

性質 酸。平。無毒。

成分 百分中含有單寧酸六。十至七十七分之多。餘則為樹脂。脂肪。糖分。護謨。越幾斯質等。

效能 飲氣。瀉腸。鼻血。腸出血。腸結核。與阿黎勒同。惟功效較強。有收斂之效用。作慢性下痢。子宮出血。及其他出血之庇覆及制酸。

主治 齒宣疳疔。脾風毒。流溢皮膚。作風溼癩疥。膿水。五痔。下血不止。小兒面鼻疳疔。(開寶本草)

張仲景之發明 五倍子一味。經張仲景之實驗。認為主治意欲飲水者。茲考徵如下。文蛤湯證。曰。渴欲飲水而食飲者。文蛤散證。曰。意欲飲水反不渴者。又曰。渴欲飲水不止者。(有二方文蛤各五合) 據此二方證。則文蛤不問渴與不渴。但能治意欲飲水者。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論五倍子曰。腸虛泄瀉。為末。熟湯服之。【宋】日華諸家本草論五倍子曰。生津液。消酒毒。治中蠱毒。毒藥。【寇宗奭】本草衍義論五倍子曰。口瘡。搽之。便可飲食。【明】李時珍本草綱目論五倍子曰。飲肺降火。化痰飲。止咳嗽。消渴。盜汗。嘔吐。失血。久痢。黃病。心腹。痛。小兒夜啼。烏鬚髮。治眼赤。溼爛。消腫。毒喉。喉。飲。潰。瘡。金。瘡。收。脫。肛。子。腸。墜。下。【明】羅希雅本草經疏論五倍子曰。五倍子味苦酸澀。氣平。

無毒。氣薄味厚。入手太陰。足陽明經。本經主齒宜疳。風溼癩瘡。及小兒面鼻疳瘡者。皆從外治。取其苦能殺蟲。酸不能斂浮熱。性燥能主風溼。疥癩膿水。五痔下血者。大腸積熱也。大腸與肺為表裏。肺得斂則。則大腸亦自清寧也。葭器療。屬虛泄利。日華子主生津液。消酒毒。李時珍謂其斂肺降火。化痰飲。止咳嗽。消湯盜汗。斂潰瘡。金瘡。收脫肛。子腸墜下者。悉假其入肺清。金收斂固脫之功耳。【清】黃宮繡本草求真論五倍子曰。五倍子書既載味酸而清。氣寒能斂肺輕浮熱。為化痰溼。降火收清之劑。又言主於風溼。凡風癩瘡。目赤眼痛。用之亦能有效。得非又收又散。又升又降之味乎。詎知火浮肺中。無處不形。在上則有痰結咳嗽。汗出口乾。吐衄等症。在下則有泄痢。五痔。下血脫肛。膿水溼爛。子腸墜下等症。溢於皮膚。感冒寒邪。則必見有風癩瘡。瘡口不斂。攻於眼目。則必見有赤腫翳障。用此內以治眼。則能斂肺止咳。固脫止汗。外以治瘡。瘡洗。則能祛風除溼。殺蟲。

藥雖一味。而分治內外。用各不同。非謂既能入肺收斂。又能浮溢於表。而為驅逐外邪之藥乎。書載外感勿用。義實基此。染髮皂物。最妙生於鹽膚木上。乃小蟲食汁遺種。結穗於葉間。入藥或生或炒用。

國外學說 日本學說謂五倍子者。因好蟲 (Schlechtendalia chinensis, J. Bell) 刺蝟於鹽膚木 (Rhus javanica, L.) 之葉而生出之囊狀發生物也。此藥為不整齊之癭瘤塊。往往分枝而成裂瓣。粗一仙米至六仙米。皮堅脆似角質。帶灰褐色。覆以帶灰白色之毛被。光若絹絲。中空。藏灰白色之粉質。及好蟲。味極有收斂性。依日本藥局方云。主治為收斂藥。效用與鞣酸(單寧酸)同一回。

• 五至一。○罕用純品。製劑五倍子丁幾。效用相同。而一回。○七至一。○外用則塗布於凍瘡潰瘍。及和漢藥考曰。市上販賣者。有耳膚子與花膚子二種。耳膚子。又稱國子膚子。為總葉柄之兩側。與小葉間所生之癭瘤。狀如莖殼。往往三分五裂。粗大者為多。皮厚

質重。含單寧極多。花膚子乃生於枝間及小葉上。非生於葉柄上。薄而瘠。如花瓣分裂。有若海藻。皮薄質輕。含單寧頗少。故價值低廉。但依白井博士之說。則謂此藥之貴賤。不在外形而在好蟲。以好蟲有不同耳。又曰。阿仙藥一稱百藥煎。繙日阿仙藥係用五倍子製之。故無論阿仙藥與五倍子製劑。均可通稱百藥煎。中醫方書中所載之百藥煎。果為阿仙藥歟。抑為五倍子製劑歟。至今不詳。惟兩種所含之單寧。其效力相同耳。又曰。涅齒之謂也。此風起於鳥羽天皇御宇之際。當時習尚。男女並重玄服。自臣僚至婦人。不論貴賤。皆崇涅齒之儀式。各自染黑其齒。婦人嫁者。必涅齒以別之。消明治元年。始稍稍許通融。六年。下令廢止。此風遂革。又植物學雜誌第九卷第九十五號內。載理學博士白井光太郎研究鹽膚樹蟲癭之詳述。一曰。五倍子之種類。二曰。耳膚子之形狀。三曰。耳膚子之癭蟲。四曰。花膚子之形狀。五曰。花膚子之癭蟲。六曰。

癭蟲隔年之狀態。七曰。人工增殖五倍子法。八曰。五倍子之製法。九曰。鹽膚樹之名義。為不可不讀之參考書也。

配合應用 ●洗楊梅結毒。用五倍子。地骨皮。小薊。皮硝。甘草。苦參。葱頭煎湯洗。

●治白汗盜汗。用五倍子研末。津調。填臍中。縛定。一夜即止。(集驗方)

●化痰生津喻化丸。用五倍子。安大鉢頭內。用黍糯米粥湯浸。蓋好。安靜處七日後。常看。待發芽。黃色。又出黑毛。然後將箸試之。若透內無硬。即收入細瓦鉢中。播如罌。連鉢日中曬。至上皮乾了。又播勻。又曬。曬至可丸。方丸。彈子大。曬乾。收用。其味甘酸。能化一切膠痰。

●治腎經虛損。心氣不足。思慮太過。真陽不固。溺有餘瀝。小便白濁。如膏。夢中頻遺。盜汗。虛煩。食減。乏力。玉領丹。用五倍子一斤。白茯苓四兩。龍骨二兩。為末。水糊丸。梧子大。每服七十丸。食前鹽湯送下。日三服。此方性溫不熱。極有神效。(和劑局方)

①治發毒下血。五倍子不拘多少爲末。大鯽魚一枚。去腸胃鱗鰓。填藥令滿。入瓶內。煨存性。爲末。每服一錢。溫酒下。(百一選方)

②治大腸痔疾。用五倍子煎湯。薰洗。或燒煙薰之。自然收縮。(直指方)

③治風毒攻眼。腫癢澀痛。不可忍者。或上下險赤爛。或浮翳癢肉。侵睛。驅風散。用五倍子一兩。蔓荊子一兩半。爲末。每用二錢。水二盞。銅石器內煎汁。去滓。乘熱洗。大能明目去澀。(博濟方)

④治魚口疔毒。初起未成膿者。用五倍子炒黃。研入百草霜等分。以臘醋調塗患處。一日一夜即消。(杏林摘要方)

⑤治心疼痛腹痛。五倍子生研末。每服一錢。鐵杓內炒。起烟黑色者爲度。以好酒一鍾。傾入杓內。服之立止。(邵真人經驗方)

⑥治消渴飲水。五倍子爲末。水服方寸匕。日三服。(危氏得效方)

⑦治小兒嘔吐不定。用五倍子二箇。一生一熟。甘草一握。濕紙煨過。同研爲末。每服半錢。米泔調下。

立應。(積珍方)

⑧治小兒夜啼。五倍子末。津調。填於臍內。(楊超簡便方)

⑨治暑月水泄。五倍子末。飯丸。黃豆大。每服二十丸。荷葉煎水下。效。(徐居士選奇方)

⑩治熱瀉下痢。五倍子一兩。枯礬五錢。爲末。糊丸。梧子大。每服五十丸。米湯送下。(鄧筆峯雜興方)

⑪治瀉痢不止。五倍子一兩。半生半燒爲末。糊丸。梧子大。每服三十丸。紅痢燒酒下。白痢水酒下。水泄米湯下。用五倍子末。每飲米服一錢。(集靈方)

⑫治赤痢不止。文蛤炒研末。水浸。烏梅肉和丸。梧子大。每服七十丸。烏梅湯下。治脾泄久利。五倍子炒半斤。陳倉米炒一升。丁香細辛。木香各三錢。川椒五錢。爲末。每服一錢。蜜湯下。日二服。忌生冷魚肉。

⑬治瀉後下血。不拘大人小兒。五倍子末。艾湯服一錢。(全幼心鑑方)

⑭治小兒下血。腸風瀉毒。五倍子末。煉蜜丸。小豆大。每米飲服二十丸。(鄭氏方)

⑮治脫肛不收。用五倍子末三錢。入白礬一塊。水一碗。煎湯洗之。立效。(三因方) 又用五倍子半斤。水煮極爛。盛入桶上。蒸之。待溫。以手輕托上。內服參茸升麻藥。(簡便方) 又用五倍子。百草霜等分。爲末。醋熬成膏。鷄翎掃傅之。即入。

(普濟方)

⑯治產後腸脫。五倍子末敷之。(婦人良方)

⑰治女人陰血。因交接傷動者。五倍子末。摻之良。(熊氏方)

⑱治孕婦漏胎。五倍子末。酒服二錢。神效。(朱氏集驗方)

⑲治小便尿血。五倍子末。鹽湯搗和丸。梧子大。每空心酒服五十丸。(集簡方)

⑳治耳出膿。用五倍子末吹之。(普濟方) 又用五倍子焙乾。一兩。全蠍燒存性。三錢。爲末。摻耳中。(經驗方)

㉑治鼻出衄血。五倍子末吹之。仍以末同新綿灰等分。米飲服二錢。

㉒治牙縫出血不止者。五倍子燒存性。研末傅之。即止。(衛生易簡方)

簡方)

㉓治牙齒動搖及外物傷動。欲落者。五倍子。乾地龍炒等分。爲末。先以鹽揩過。然後傅之。(御藥院方)

㉔治牙齦腫痛。五倍子兩許。瓦焙研末。以半錢傅痛處。片時睡去。涎內服去風熱藥。(楊子建護命方)

㉕治唇緊作痛。五倍子。訶子等分。爲末。傅之。(瑞效方)

㉖治咽中懸癭。舌腫塞痛。五倍子末。白殭蠶末。甘草末等分。白梅肉。搗和丸。彈子大。噉嚙。其癭自破。(朱氏集驗方)

㉗治口舌生瘡。赴筵散。用五倍子。蜜陀僧。等分。爲末。醬水漱過。乾貼之。(儒門事親方) 院方加脫蠶蛾。又用五倍子一兩。滑石半兩。黃柏蜜炙半兩。爲末。漱淨。摻之。便可飲食。(濟察方)

㉘治走馬牙疳。五倍子。青黛。枯礬。黃蘗。等分。爲末。以鹽湯漱淨。摻之。立效。(便覽方)

㉙治白口惡瘡。狀似木耳。不拘大人小兒。並用五倍子。青黛。等分。

爲末。以筒吹之。(端效方)

⑤治小兒口疳。白礬裝入五倍子內。燒過。同研搽之。(簡便方)

⑥治陰囊溼瘡。出水不瘳。用五倍子。臘茶各五錢。膩粉少許。研末。以葱椒湯洗。香油調搽。以瘳爲度。(聖惠方)

⑦治一切金瘡。五倍子。降真香等分。炒研末。敷之。皮肉自痊。(拔萃方)

⑧治一切腫毒。五倍子。炒紫黑色。蜜調塗之。治一切腫毒。初起無頭者。五倍子。大黃。黃蘗等分。爲末。新汲水調塗。四圍。日三五次。(簡便方)

⑨治一切疥瘡。五倍子。去蟲。白礬。燒過。各等分。爲末。搽之。乾則油調。(簡便方)

⑩治癩頑軟癬及諸熱瘡。用五倍子。七箇。研末。香油四兩。熱至一半。布絞去渣。搽之。三四遍。勿以水洗之。(普濟方)

⑪治頭瘡熱瘡。風溼諸毒。用五倍子。白芷等分。研末。搽之。臘水即乾。如乾者。以清油調塗。(衛生易簡方)

⑫治瘡口不收。五倍子。焙研末。以臘醋調塗。四圍效。

⑬治手足皸裂。五倍子末。同牛骨髓。填納縫中。即安也。(醫方大成方)

⑭治雞骨哽咽。五倍子末。糝入喉中。即化下。(海上名方)

⑮治小兒脫肛。五倍子爲末。先以艾紙捲。倍子末成筒。放便桶內。以瓦盛之。令病者坐於桶上。以火點着。使藥烟燻入肛門。其肛自上。隨後將白礬爲末。復搽肛門。其肛自緊。再不復脫。

⑯治偏墜氣痛。用五倍子一箇。放食鹽少許在內。以火紙包定。用水浸透。放文武火灰內。煨存性。爲末。酒調服。

⑰染烏鬚髮。用針砂八兩。米醋浸五日。炒略紅色。研末。五倍子百藥煎。沒石子各二兩。訶黎勒皮三兩。研末。各包。先以皂莢水洗鬚髮。用米醋打蕎麥麵糊。和針砂末。傳上。荷葉包過。一夜。次日取去。以蕎麥糊四味。敷之一日。洗去。即黑。(聖濟方)

⑱又用五倍子一斤。研末。銅鍋炒。勿令成塊。如有烟起。即提

下。攪之。從容上火。慢炒。直待色黑爲度。以溼青布包扎。足踏成餅。收貯。聽用。每用時。以皂角水洗淨鬚髮。用五倍子一兩。紅銅末。酒炒一錢六分。生白礬六分。訶子肉四分。沒石子四分。砂一分。爲末。烏梅。酸榴皮。煎湯調勻。登盤。重湯煮四五十沸。待如餡狀。以眉掠刷於鬚髮上。一時洗去。再包。住次日洗去。以核桃油潤之。中月染一次。甚妙。(杏林摘要方)

⑲治中河豚毒。五倍子。白礬末等分。以水調下。(事林廣記方)

⑳用量 錢半至三錢

㉑施用宜忌 凡非虛羸而有實邪者禁用。

㉒著名方劑 文蛤散。治渴欲飲水不止者。傷寒論。治心煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。(金匱方)

㉓用文蛤五兩。杵爲散。以沸湯五合。和服。方寸匕。

㉔參攷資料 ①以野中者爲勝。用於腐木葉上。七月結實。無花。其木青黃色。其實青。至熟而黃。九月採子。曝乾。藥家用之。(蘇頌) ②五倍。當作五。補見山海經。其形似海

中文蛤。故亦同名。百蟲會。會意也。

百藥煎。隱名也。(李時珍) ③五倍子。宋開寶本草。收入草部。嘉祐本草。移入木部。雖知生於腐木之上。而不知其乃蟲所造也。腐木。即蠹。腐子木也。此木生叢林處者。五六

月。有小蟲如蟻。食其汁。老則遺種。結小球於葉間。正如蝸蠹之作。雀。斑。蠹。蟲之作。蠹子也。初起甚小。漸漸長。其大如拳。或小如莖。形狀圓長不等。初時青綠。久則細黃。藏於枝葉。宛若結成。其殼堅脆。其中空虛。有細蟲如蠶。山人霜降前。採取。蒸殺。食之。否則必穿壞。而

壳薄且腐矣。皮工造爲百藥煎。以染皂色。大爲時用。他樹亦有此蟲。球。不入藥用。水性殊也。(李時珍)

④五倍子性燥急而專收斂。咳嗽由於風寒外觸者忌之。洩利非腸虛脫者忌之。咳嗽由於肺火實甚者忌之。若誤服之。反致壅塞喘滿。以其酸飲太驟。火氣無從泄越。故

耳。(邵希雍) ⑤觀腐木爲落葉。腐木產於溫帶及輕寒地方。山野自生之。經五十年者。樹幹高至二丈餘。圍三尺。老樹高三丈餘。圍四尺。

樹皮色淡褐。平滑而有光澤。葉爲奇數之羽狀複葉。長尺許。有葉柄。每柄生小葉四對至九對。小葉無柄。形卵圓。長二三寸。葉端尖。邊緣有鋸齒。面色綠。有微毛。背淡綠。短毛密生。至秋則變淡紅色。甚美觀。七八月間。開白色五瓣小花。綴成覆總狀之花序。穗長可尺許。果實爲扁圓形之核果。長二分許。成熟則現淡紫色。外被白粉。其味鹹。村童因呼爲鹹果。(鹹膚木一名鹽麵木。又名白膠木。亦稱將軍木。其五倍子一名鹽膚子。因其子實之外面。生有白粉一層。有鹽味。故名。亦有略去鹽字。但稱膚子者。與外國產沒食子。似頗相類。)和漢藥考)昆蟲刺傷鹽膚木之葉柄或嫩枝。漸次起瘡而生五倍子。此五倍子中有蟲。蟲出則五倍子自然枯死。其效力卽有滅損之虞。以此欲採收者。必須在蟲未出之前。其時期隨地氣而異。大約在九十月間。若在日本之秩父地方。可採至二百十日。此瘡瘡採集之後。卽投熱水中。殺其蟲。俟蟲盡死。取出。連晒三四日。令乾。收貯備用。或蒸

四畫 五

熱殺蟲。晒乾。然據理學博士白井光太郎云。向來我國將五倍子蒸殺。及熱湯浸殺之法。均不免滅損有效成分。不如用火焙殺蟲之法。較爲有利無弊。讀中國寧鄉縣志。有云五倍子。卽五倍子之義。知中國亦以火製之也。醫藥家苟能確實試驗。以比較其優劣。則利益之溥。可斷言矣。(和漢藥考)

【五倍子內蟲】 主治 赤眼 爛弦。同爐甘石末。乳細點之。

【五鳥花】 卽紫參之古籍別名。典見綱目。詳「紫參」條。

【五稜子】 卽五斂子之古籍別名。典見桂海志。詳「五斂子」條。

【五葉木】 卽五加皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五加皮」條。

【五葉菴】 卽烏蘇菴之古籍別名。典見本草集註。詳「烏蘇菴」條。

【五葉草】 主治 移痘後眼翳。小餅。如左眼有翳。貼右眼角肉上。其翳卽移至右眼。再用此餅貼左眼角肉上。其翳移至鼻梁內。卽去此餅。翳膜便除。

熱殺蟲。晒乾。然據理學博士白井光太郎云。向來我國將五倍子蒸殺。及熱湯浸殺之法。均不免滅損有效成分。不如用火焙殺蟲之法。較爲有利無弊。讀中國寧鄉縣志。有云五倍子。卽五倍子之義。知中國亦以火製之也。醫藥家苟能確實試驗。以比較其優劣。則利益之溥。可斷言矣。(和漢藥考)

【五葉雲香】 卽芸香之生五葉者。詳「芸香」條。

【五葉蕪】 卽烏蘇菴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏蘇菴」條。

【五葉藤】 卽烏蘇菴之古籍別名。典見綱目。詳「烏蘇菴」條。

【五樁】 卽鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳「鹽麩子」條。

【五樁子】 卽五倍子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五倍子」條。

【五鳳草】 卽澤漆之古籍別名。典見綱目。詳「澤漆」條。

【五種石脂】 製法 火煨或研末水飛。

性質 甘平。無毒。

主治 黃疸洩痢。腸澀濃血。陰蝕下血。赤白邪氣癰腫。疔瘡惡瘡。頭瘍疥癩。久服補髓益氣。肥健不饑。輕身延年。五石脂各隨五色補五臟。

配合宜忌 長大黃、黃芩、官桂。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論五種石脂曰。治洩痢。血崩帶下。吐血衄血。瀉精淋瀝。除煩。療驚悸。壯筋骨。補虛損。久服悅色。治瘡癩。痔漏排膿。

謂之蛆。或曰沮洳則生也。人食五穀。其渣滓爲糞。蛆爲蟲類。又生於五穀所化之糞便中。故名。

【五穀蟲】 原名 蛆。命名 蛆行趨起。故謂之蛆。或曰沮洳則生也。人食五穀。其渣滓爲糞。蛆爲蟲類。又生於五穀所化之糞便中。故名。

處方用名 五穀蟲。古醫別名 屎蟲、糞蛆、糞蟲。天漿子(和濟局方)。

學名 Maggot (英) 基本 屬雙翅類。蠅類。食呀蠅科。天蠅之幼蟲。

形態 天蠅頭部爲半球形。軀體色黑。爲橢圓形。腹有條線。胸背赤黃色之毛。翅淡褐。質透明。外緣有茶褐色之斑點。本品爲其幼蟲。夏月生糞坑中。體爲圓柱狀。色帶白。有環紋數十個。長尾匍行。十月入土中。化爲蛹。此蟲夏月生糞尿中。初生如蠟白色。老則灰色。有節。長尾無足。滾行。形似菴菴子。莖羽化爲天蠅。天蠅形似虻。俗呼布卒布半蟲。

採取 六七月收糞蛆。洗淨。晒乾。

製法 和劑局方以糞蛆爲天漿子。綱目以雀壤中子爲天漿子。

製法 和劑局方以糞蛆爲天漿子。綱目以雀壤中子爲天漿子。

入門云。治驚風。可用雀糞子。治疳方。須用天漿子。六月取入布袋。置長流水中三日。夜漂洗潔淨。取出曬乾。爲末。張石頑曰。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罈內。取糞蛆不拘多少。河水漬養三五日。以食盡蝦蟆爲度。用麻布紮住罈口。倒懸活水中。令污穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上。焙乾。

性質 寒。無毒。

效能 清熱。消疳積。用作小兒消熱療疳藥。

主治 糞中蛆。治小兒諸疳積。疳疔熱病。譫妄。毒痢。作吐。

歷代記述攷證

【清】張石頑張氏醫通論五穀蟲曰。蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。治小兒疳積。腹大脚弱。膜昏遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

配合應用 ①治一切疳疾。六月取糞坑中蛆淘淨。入竹筒中封之。待乾研末。每服一二錢。入麝香米飲服之。又方用蛆糞米泔逐日浸洗。五日。再以清水浸三日。晒

焙爲末。入黃連末等分。每半兩入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米。大每服三四十九。米飲下。(聖濟總錄方)

②治小兒熱疳。尿如米泔。大便不調。糞蛆燒灰。雜物與食之。

③治小兒痺積。用糞中蛆洗淨。晒乾爲末。入甘草末少許。米糊丸。梧子大。每服五七丸。米飲下。甚妙。(總攷論方)

④治小兒諸疳。一服退熱。二服煩渴止。三服瀉痢住。用端午午時取蝦蟆金眼。大腹不跳不鳴者。隨死。置尿桶中。候生蛆食盡。取蛆入新布袋。懸長流水中三日。新瓦焙乾。入麝香少許爲末。每空心以砂糖湯調服一錢。或粳米糊爲丸。每米飲服二三十丸。(直指方)

⑤治齒鼻疳疔。糞蛆有尾者。燒灰一錢。搗衣灰五分。和勻。頻吹。神效無比。

⑥治熱痢吐食。因服熱藥而致者。用糞中蛆流水洗淨。晒乾爲末。每服一錢。米飲下。

⑦治瞎眼目赤。青泥中蛆。淘淨。日乾爲末。令患人仰臥。合目。每次

用一錢。散目上。須與藥行。待少時去藥。赤睛亦然。(保命集方)

⑧利骨散牙。普濟如神散。取牙用肥赤馬肉一斤。入礪砂二兩。拌和。候生蛆。取日乾爲末。每一兩入粉霜五分。研勻。先以針撥動牙根。四畔空虛。次以燈心蘸末少許點之。良久自落。又秘製利骨散。用白馬腦上肉一二斤。待生蛆。與烏骨白雞一隻食之。取糞陰乾。每一錢入礪砂一錢。研勻。用少許擦疼處。片時取之。即落。(普濟方)

用量 一錢至三錢。

【五澄藤】即烏蘇藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏蘇藤」條。

【五精金】即陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「陽起石」條。

【五精陰華】即陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「陽起石」條。

【五龍草】即烏蘇藤之古籍別名。典見綱目。詳「烏蘇藤」條。

【五飲子】 命名 本品有五稜。古醫別名 五人呼稜爲飲。故名。 陽桃。羊桃。(本草綱目)

學名 Averrhoa Curambo.

可卜(拉丁) コロンシ ヤウ タウ(日本)

基本 係酢漿科。爲五飲子之實。

產地 產東印度。及嶺南園中。

形態 五飲子爲果類之常綠灌木。高丈餘。葉作羽狀複葉。自許多小葉成互生。花係完全花。其實爲漿果。大如雞卵。長橢圓形。可供食。亦可供藥用。



五飲子

性質 酸。甘。溫。平。無毒。

主治 風熱。生津止渴。

參攷資料 五飲子。閩人呼爲陽桃。其大如拳。其色青黃潤綠。形甚醜異。狀如田家碌。上有五稜。如刻起作劍脊形。皮肉脆軟。其味初酸。久甘。其核如柰。五月熟。一樹可得數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦晒乾。以充果食。又有三稜子。蓋亦此類也。陳祈暢異物

志云。三廉出點安諸郡。南人呼稜為廉。雖名三廉。或有五六稜者。食之多汁。味甘且酸。尤宜與衆果參食。(李時珍)

【五蕤】即赤地利之古籍別名。與見本草拾遺。詳「赤地利」條。即杠板歸之古籍別名。與見和漢藥考。詳「杠板歸」條。

【五靈芝】即五靈脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「五靈脂」條。


【五靈脂】原名 寒蟾蟲。鳥之糞。如凝脂而受五行之靈氣故名。

古醫別名 查且。鴉鳴屎。獨脊屎。(本草綱目) 倪且。(廣志) 丹芝。白芝。龍芝。藥本。生常山。生泰山。生霍山。五靈芝。(和漢藥考) 馮且。(唐詩)

外國名詞 Pteropus psala-phon Jay. (拉丁) (Bonin Fouquetto) (英) オホカウモン (日本)

基本 屬脊椎動物哺乳。胎盤。翼手與食果類寒蟾蟲之屎。產地 陳仁山藥物生產辨云。

五靈脂產廣西南寧。百色。平南。貴平等處。乃雀屎也。西書斷此味有毒。仍用甘草水泡之。乃可用。形體 其屎恒集一處。氣甚腥惡。粒大如豆。採之有如糊者。有成塊如餅者。人亦以沙石雜而貨之。凡用以饒心潤澤者為真。味甘溫。



五靈脂

製法 蘇頌曰。凡使五靈脂。此物多夾沙石。絕難修治。凡用研為細末。以酒飛去沙石。晒乾收用。主治 心腹冷氣。小兒五疳。辟疫。治腸風。通利氣脈。女子血閉。歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論五靈脂曰。療傷冷積。【元】朱丹溪本草衍義補遺論五靈脂曰。凡血崩過多者。半炒半生。酒服能行血止血。治血氣刺痛。

【明】李時珍本草綱目論五靈脂曰。止婦人經水過多。赤帶不絕。胎前產後。血氣諸痛。男女一切心腹脇肋少腹諸痛。疝痛。血痢。腸風。腹痛。身體血痺刺痛。肝癰發寒熱。反胃消渴。及痰涎挾血成窠。血貫瞳子。血凝齒痛。重舌。小兒驚風。五癩癩疾。殺蟲。解藥毒。及蛇蝎蜈蚣傷。【明】繆希雍本草經疏論五靈脂曰。寒蟾蟲長寒喜燥。故其糞亦溫。味甘而無毒。氣味俱厚。入足厥陰。手少陰經。性專行血。故主女子血閉。味甘而溫。故療心腹冷氣。及通利氣脈也。其主小兒五疳者。以其亦能消化水穀。治腸風者。取其行腸胃之滯滯也。凡心胸血氣刺痛。婦人產後少腹兒枕塊諸痛。及痰挾血成窠。血凝齒痛諸證。所必須之藥。【清】黃宮繡本草求真論五靈脂曰。五靈脂即此地寒蟾蟲鳥矢也。以其受五行之靈。其矢狀如凝脂。故有五靈脂之號。其氣腥臭難聞。其味苦酸而辛。惟有腥穢難聞。故能入血凝臭穢之處。而療其病。惟其味苦酸而辛。故能入心與肝。而泄其滯。是以心中血氣刺

痛。婦人產後。少腹兒枕塊痛。及痰挾血成窠。血凝齒痛。目翳往來不定等症。皆為血分行氣。必須之藥。若女中血崩。經水過多。赤帶不止。宜半生半炒。酒調服之。亦治氣逆癩癩。及改蟲毒藥毒。但此氣味俱厚。辛煎不堪。綱目指為甘溫。張氏謂非正論。改為性寒。不為無見。故僅可治有餘之滯。若使氣血不足。服之大損真氣。腥更使人動吐。所當避也。酒飛去沙石。曬乾入藥。行血宜生。止血宜炒。

配合應用 治產後惡露不盡。腹中作疼。用五靈脂。澤蘭。牛膝。益母草。延胡索。牡丹皮。紅花。赤芍。藥。山查。生地黃等分。加桃仁。其效更速。勿過劑。

治胃脘瘀血作痛。用五靈脂。番降香。紅麴。川通草。紅花。延胡索。韭菜。童便。

治產後血暈。不知人事。用五靈脂二兩。半生半炒。為末。每服一錢。白水調下。如口噤者。特開灌之。入喉即愈。

治產後腹痛。五靈脂。香附。桃仁等分。研末。醋糊丸。服一百丸。白

① 牛膝。陳皮湯下。(丹溪方)

② 治胎衣不下。靈血衝心。用五靈脂半生半炒。研末。每服二錢。溫酒下。(產寶方)

③ 治痰血凝結。紫芝丸。用五靈脂水飛。半夏湯泡。等分。為末。姜汁浸蒸餅丸。梧子大。每米飲下二十丸。(百一選方)

④ 血讀怪病。凡人眼中白珠。渾黑。視物殊常。毛髮堅直如鐵條。能飲食。而不語如醉。名曰血讀。以五靈脂為末。湯服二錢即愈。(夏子益奇疾方)

⑤ 治兒枕作痛。五靈脂慢炒。研末。酒服二錢。(產寶方)

⑥ 治血氣刺痛。五靈脂生研三錢。酒一盞。煎沸熱服。又方。五靈脂同木香。烏藥。(靈苑方)

⑦ 治卒暴心痛。五靈脂炒一錢。半。乾薑炮三分。為末。熱酒服立愈。(事林廣記方)

⑧ 治心脾蟲痛。不拘男女。用五靈脂。檳榔等分。為末。水煎石菖蒲。調服三錢。即食猪肉一二片。(海上方)

⑨ 治小兒疳痛。五靈脂末二錢。

靈藥火飛半錢。每服一錢。水一盞。煎五分。溫服。當吐蟲出。愈。(閱孝忠集效方)

⑩ 治經血不止。五靈脂炒。煙盡。研。每服二錢。當歸兩片。酒一盞。煎六分。熱服三五度。取效。(經驗方)

⑪ 治血崩不止。用五靈脂十兩。研末。水五盞。煎三碗。去滓澄清。再煎。為膏。入神麴末二兩。和丸。梧子大。每服二十九。空心溫酒下。便止。極效。用五靈脂燒研。以鐵秤錘燒紅。滓酒調服。以效為度。(集要方)

⑫ 治子腸脫出。五靈脂燒煙薰之。先以鹽湯洗淨。(危氏得效方)

⑬ 治吐血嘔血。五靈脂一兩。盧會三錢。研末。滴水丸。芥子大。每漿水化服二丸。又治血妄行入胃。吐不止。五靈脂一兩。黃芪半兩。為末。新汲水服二錢。

⑭ 治吐逆不止。不拘男女。連日粥飲湯藥不能下者。即效。五靈脂治淨。為末。狗膽汁和丸。芥子大。每服一丸。煎生姜酒磨化。猛口熱吞。不得漱口。急將溫粥少許壓之。(經驗方)

⑮ 治化食消氣。五靈脂一兩。木

香半兩。巴豆四十枚。煨熟。去油。為末。糊丸。菘豆大。每次白湯下五丸。(普濟方)

⑯ 治久瘧不止。或一日二發。或一日二三發。或二三日一發。用五靈脂。頭垢各一錢。古城石灰二錢。研末。飯丸。芫子大。每服一丸。五更無根水下。即止。(海上方)

⑰ 治消渴飲水。竹籬散。用五靈脂。黑豆去皮。等分。為末。每服三錢。冬瓜皮湯下。無皮用葉亦可。日二服。不可更服熱藥。宜八味丸去附子。加五味子。若小渴者。二三服即止。(保命集方)

⑱ 治中風癱緩。追魂散。用五靈脂。研末。以水飛去上面黑濁。下面沙石。研末。每服二錢。熱酒調下。日一服。繼服小續命湯。(奇效方)

⑲ 治風冷氣血閉。手足身體疼。痛冷麻。五靈脂五兩。沒藥一兩。乳香半兩。川烏頭一兩。半。炮去皮。為末。滴水丸。如彈子大。每用一丸。生姜酒磨服。(本草衍義方)

⑳ 治骨折腫痛。五靈脂。白及各一兩。乳香沒藥各三錢。為末。熱水同香油調塗患處。(乾坤秘製方)

① 治損傷接骨。五靈脂一兩。尚香一錢。為末。先以乳香末於極痛處。傅上。以小黃米粥塗之。乃搽二末於粥上。尚裏木牌子夾定。三五日效。(儒門事親方)

② 治五疳潮熱。五靈脂水飛一兩。胡黃連五錢。為末。雄豬膽汁丸。香米大。每服一二十丸。米飲下。凡肚腹髮黑。不可用大黃黃芩。損傷胃氣。恐生別症。(全幼心鑑方)

③ 治欬嗽肺脹。鰾肺丸。用五靈脂二兩。胡桃仁八個。柏子仁半兩。研勻。滴水和丸。小豆大。每服二十丸。甘草湯下。(普濟方)

④ 治酒積黃腫。五靈脂末一兩。入麝香少許。飯丸。小豆大。每米飲下一丸。(普濟方)

⑤ 治目生浮翳。五靈脂。海螵蛸各等分。為末。熟豬肝。日嚙食。(明目經驗方)

⑥ 治重舌腫痛。五靈脂一兩。淘淨。為末。煎米醋漱。(經驗方)

⑦ 治惡血齒痛。五靈脂末。米醋煎汁含咽。(直指方)

⑧ 治血瘧潰血。一人瘧有三瘧。偶抓破血出一線。七日不止。欲死。

或用五靈脂末搽上即止也。(醫方選要方)

②治大風癩癩。油調五靈脂末塗之。(摘玄方)

③治蟲虺螫。凡蜈蚣蛇蝎毒蟲傷。以五靈脂末塗之立效。亦治毒蛇傷。金匱鈞玄方。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛而無瘀滯者禁用。惡人參。

著名方劑 ①失笑散。治男女老少心痛。腹痛。少腹痛。小腸疝氣痛。而諸藥不效者。及婦人妊娠心痛。產後心痛。諸欲欲死。百藥不效者。(局方)用五靈脂。蒲黃炒各等分。研末。先以醋二盃。調末。熬成膏。入水一盞。煎至七分。連藥熱服。未止再服。一方以酒代醋。一方以醋和丸。童便或酒服。②紫金丸。治產後惡露不快。腰痛。小腹痛。刺時作寒熱。頭痛。不思飲食。及久有瘀血。月水不調。黃瘦不食。亦療心腹諸痛。功同失笑散。(楊氏產乳方)用五靈脂一兩。以水淘淨炒末。以好米醋調稀。慢火熬膏。入真蒲黃末和丸。龍眼大。每服一丸。以水與童

便各半盞。煎至七分。溫服。少頃再服。惡露即下。血塊經閉者。酒磨服之。③五靈散。治丈夫痲積氣痛。婦人血崩諸痛。(永類鈴方)用五靈脂炒。烟盡。研末。每服一錢。溫酒調下。

參攷資料 ④五靈脂引經有功。不能生血。此物入肝最速也。常有人病日中昏。往來不定。此乃血所病也。肝受血則能視。目病不治。血為背理也。用五靈脂之藥而愈。又有人被毒蛇所傷。良久昏憤。一老僧以酒調藥二錢。灌之。遂甦。仍以滓傳咬。少頃復灌二錢。其苦皆去。問之。乃五靈脂一兩。雄黃半兩。同為末耳。其後有中蛇毒者。用之。成效。(寇宗奭)⑤楊氏丹鉛錄謂寒號蟲。即鷓鴣。今從之。鷓鴣詩作盍且。禮作曷且。說文作鷓鴣。廣志作侃且。唐詩作渴且。皆隨義借名耳。楊雄方言云。自關而西謂之鷓鴣。自關而東謂之城且。亦曰倒懸。周魏宋楚謂之獨春。郭璞云。鷓鴣夜鳴。求且之鳥。夏月毛盛。冬月裸體。晝夜鳴叫。故曰寒號。曰鷓且。古刑有城且。春謂晝夜春米也。故

又有城且獨春之名。月令云。仲冬。鷓且。不鳴。蓋冬至。陽生漸暖。故也。其屎名五靈脂者。謂狀如凝脂。而受五行之靈氣也。(李時珍)⑥鷓且。乃候時之鳥也。五靈諸山甚多。其狀如小雞。四足有肉翅。夏月毛采五色。自鳴者曰鳳凰。不如我。至冬毛落如烏雞。忍寒而號。曰得過且。過。其屎恒集一處。氣甚腥惡。粒大如豆。采之有如糊者。有黏塊如糖者。人亦以沙石雜而食之。凡用以隨心潤澤者為真。(李時珍)

【五靈脂肉】

性質 甘。溫。無毒。

主治 食之。補益人。

【五靈松】即海松之一叢五葉者。詳「海松」條。

【井口邊草】

古籍別名 雞足草(日本)

外國名詞 Peoria Scutellaria

イノモトサウ トリノアシ

ケイリクサウ(日本)

基本 係羊齒科蕨屬。藥用井口邊草之莖葉。

產地 井畔山麓間有之。

形態 井口邊草為倒生於井口邊之常綠雜草。根莖生毛。頗密。色濃褐。質硬而短。葉長尺許。叢生。有椽葉實葉之別。作羽狀分裂。往往排列如雞足狀。

採取 五月五日採之。

主治 小兒夜啼。私着席下。勿使母知。

參攷資料 井中倒生草。燒研水服。勿令知。即惡酒不飲。或飲亦不醉也。(李時珍)

【井中苔及萍藍】

基本 本品係生蘆

井中之苔萍。故名。

產地 廢井及磚土間恒有之。

惟生在井中者佳。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 漆瘡熱瘡。水腫。殺野葛。巴豆諸毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論井中苔曰。療湯火傷灼瘡。

【井底泥】

主治 研細塗湯火

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論井底泥曰。療妊娠熱

四畫 井 仁 元

病取傳心下及丹田。可護胎氣。

【井泉水】

性實 甘寒無毒。主治 清熱補陰。治

熱悶煩渴。宜煎補陰及清氣血痰火藥。

【井泉石】

命名 本品性寒如井泉故名。

別名 玲瑯石。

產地 出深州城西二十里劇家村及饒陽郡之田野中。

形態 井泉石穿地深可丈餘。形如土色。圓方長短不等。內實外則重重相疊。

性實

甘大寒。無毒。

主治 諸熱解心腹熱結。熱嗽小兒熱疳。雀目青盲。眼赤腫痛。消腫毒。得決明菊花。療小兒眼疳。生翳膜。得大黃。卮子。治眼險腫赤。

施用宜忌 凡用。細研水飛過。不爾令人淋。

【井華水】

古籍別名 井泉水。

性實

甘平無毒。

主治 酒後熱痢。洗目中腐翳。治人大驚。九竅四肢指歧皆出血。以水噴面。和朱砂服。令人好顏色。

鎮心安神。又治口臭。堪鍊諸藥石。投酒醋令不腐。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論井華水曰。宜煎補陰之藥。并一切痰火氣血藥。

參攷資料 ●井水新汲。療病

利人。平旦第一汲為井華水。其功極廣。又與諸水不同。凡井水有遠

從地脈來者為上。有從近處江湖滲來者次之。其城市近溝渠污水

雜入者成鹹。用須煎滾停一時。候鹹澄。乃用之。否則氣味俱惡。不堪

入藥。食茶酒也。雨後水渾。須播入桃杏仁澄之。汪穎。凡井以黑

鉛為底。能清水散結。人飲之無疾。入丹砂鎮之。令人多壽。按麻知幾

水解云。九疇昔訪靈臺太史。見銅壺之漏。水為太史司水者曰。此

水已三周環。水滑則漏迅。漏迅則刻差。當易新水。子因悟曰。天下之

水。用之滅火則同。活橋則同。至於性從地變。質與物遷。未嘗同也。故

蜀江濯錦則鮮。濟源烹楮則晶。南陽之潭漸於菊。其人多壽。遼東之

澗通於棗。其人多髮。晉之山產礬石。泉可愈疽。戎之麓伏硫黃。湯可

浴癩。楊子宜葺。淮菜宜醃。滄南能鹽。阿井能膠。藻垢以汚。茂田以苦。

澗。冰水。而重亂息。流水。飲而瘡。澗。通。雪水。洗目。而赤。退。鹹。水。濯。肌。

而。瘡。乾。菜。之。為。齏。鐵。之。為。漿。麴。之。為。酒。藥。之。為。醋。干。派。萬。種。言。不。可

盡。至於井之水。一也。尚數名焉。况其他者乎。反酌而傾曰。倒流。出甕

未放曰。無根。無時。初出曰。新汲。將且首汲曰。井華。夫一井之水。而功

用不同。豈可恣煮之間。將行藥勢。獨不擇夫水哉。昔有患小溲澀者。

衆不能療。張子和易之以長川之急流。煎同藥。一飲立沒。此正與靈

樞經治不暎。半夏湯用半里流水。同意味。後之用水者。當以子和之

法為制。予於是作水解。李時珍。仁瓊。即金鈴子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「金鈴子」條。仁榔。即檳榔之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「檳榔」條。仁類。即檳榔之古籍別名。典見

綱目。詳「檳榔」條。元女。即水銀之古籍別名。典見

石藥爾雅。詳「水銀」條。

【元寸香】即麝香之最上品者。詳「麝香」條。

【元水】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【元米】即糯米之古籍別名。典見飲食譜。詳「糯米」條。

【元明粉】即支明粉之處方用名。詳「支明粉」條。

【元明龍膏】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【元武版】即龜版之處方用名。詳「龜版」條。

【元金釵】即石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【元胡索】即延胡索之處方用名。詳「延胡索」條。

【元修菜】即翹搖之古籍別名。典見蘇東坡集。詳「翹搖」條。

【元珠】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【元參】即玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【元萎子】即胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡荽」條。

【元精石】即玄精石之處方用名。詳「玄精石」條。

【元慈勒】產地 出波斯國。

形態 元慈勒為木類之一種。狀似龍腦香。乃樹中脂也可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 心病流血。合金瘡。去腹內惡血。血痢下血。婦人帶下。明目去翳障。風淚。舒肉。

【元寶草】外國名詞 Hypo-
ricura Sampsoni,
Hoo. (拉丁)

產地 出江浙諸地之田際間。

及背陰近水處多有之。

形態 元寶草為雜草類之一種。穀雨後生苗。一莖直上。對節生葉。葉中闊。兩頭尖。形如梭子。又似元寶。穿莖而上。或三四層。或五六層。小滿後開黃花。



元寶草

性質 辛寒無毒。

主治 補陰。止吐血。衄血。療跌撲。因腹挫痛。難毒。

參攷資料 穀雨後生苗。其葉中潤。兩頭尖如梭子。形穿莖直上。或五六層。或六七層。小滿後開花。黃色。氣性涼。(百草鏡)

【內消】即紫荊之古籍別名。典見綱目。詳「紫荊」條。

【內虛】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【公丁香】即丁香之處方用名。詳「丁香」條。

【公公瓠】即王瓜之俗名。詳「王瓜」條。

【公石】即握雪舉石之古籍別名。典見唐本草。詳「握雪舉石」條。

【公乳】即鐘乳石之別名。典見和漢藥考。詳「鐘乳石」條。

【公孫樹】即銀杏之別名。詳「銀杏」條。

【公領孫】即瓊瑣葡萄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「瓊瑣葡萄」條。

【公蠟蛇】即水蛇之古籍別名。典見綱目。詳「水蛇」條。

【公薺】即薺之古籍別名。典見和漢藥考。詳「薺」條。

【六一泥】即蚯蚓泥之古籍別名。

典見綱目。詳「蚯蚓泥」條。

【六丁麴】即神麴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「神麴」條。

【六月冷】即六月霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「六月霜」條。

【六月浸】即曲節草之古籍別名。典見綱經本草。詳「曲節草」條。

○即衛矛。湖南俚醫呼衛矛為六月浸。見植物學大辭典。詳「衛矛」條。

【六月雪】即劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「劉寄奴草」條。

○曲節草之古籍別名。典見綱目。詳「曲節草」條。

【六月菊】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「旋覆花」條。

【六月實】即劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「劉寄奴草」條。

【六月霜】古籍別名 六月冷。蛇藍(綱目拾遺)

形態 六月霜為溼草類之一種。狀如薄荷而長大倍之。莖上綴白珠成穗。花似薄荷。葉似劉寄奴。供藥用。

採取 夏月採之。

性質 苦寒。

主治 解暑。消積滯。厚腸胃。止痢。開腸健胃。傷寒時疫。取一莖。逆子者煎服之。

參攷資料 丁未余館奉化。邑人暑月。俱以此代茶。云消食運脾。性寒。解暑如神。五月內。山村人率劉乾束縛。挑入城市售賣。予以百錢買得一束。如乾薄荷狀。而長大倍之。莖上綴白珠成穗。土人云。子能下氣消食。更甚於枝葉。偶得痞悶不快。因取一枝沖湯代茶飲。次日即健談異常。知所言信不妄也。(趙學敏)

【六安茶】命名 本品茶之產地。於安徽六安霍山者故名。

產地 產茶之地。周圍八百里。以仙人衝、黃溪湖、烏梅尖、佛寺、瀛海等處者為尤佳。

別名 白茶。

形態 六安茶為茶類之一種。其第一蕊尖。無汁。第二頁尖。皆一梗一葉。又稱一旗一槍。第三客尖。一梗二葉。第四細連枝。一梗三葉。第五白茶。有毛者。雖粗亦為白茶。

第一七三

四靈六分勾仇化

無毛者。雖至細亦是閉茶。皆為老葉。可供飲料與藥用。

主治 清竹醫中浮熱。功與常茶同。詳見茶葉條。

配合應用 有異傳終身不出天花法。用金銀花棟淨七兩。六安茶真正多年陳者三兩。共為粗末。沖湯代茶。每日飲數次。終身不出天花。雖出亦稀。極驗。(年希堯經驗方)

稀痘丹。用新拋羊屎一粒。六安茶一錢。甘草節二分。燈心二十寸。赤黑綠豆各二十一粒。珍珠一分。銀簪一枝。洗淨油氣。水二碗。煎八分溫服。(千金不易方)

治傷寒風咳嗽發熱。頭痛。傷食吐瀉。太上五神茶。陳細六安茶一觔。山查熟。麥芽。紫蘇。陳皮。厚朴。乾薑。俱炒各四兩。糜末。磁器收貯。高燥處。大人每服三錢。小兒一錢。感冒風寒。葱薑湯下。內傷瀉湯下水。瀉痢疾。加薑水煎。露一宿。次早空心溫服。(經驗廣集方)

消痘膏。治一切痘仙方。松香。官粉。細六安茶各三錢。革麻仁。去皮四十九粒。為末。先將革麻搗爛。

然後入藥末。搗成膏。如乾。少加麻油。搗勻。攤青布上。貼患處。再以棉紙大些。蓋好。扎住。七日全愈。(廣集方)

六耳茶 產地 粵之東江多出之。

採取 三四月採新。

主治 數瘡聖藥。

六畜心 主治 心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐感。

參攷資料 古方多用六畜心。治心病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。怒氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。(李時珍)

六畜毛蹄甲 性質 鹹平。有毒。

主治 治鬼疰。瘴毒。寒熱驚癇。駝駱毛尤良。

參攷資料 六畜謂牛、羊、豬、馬、雞、鴨也。騾驢亦其類也。(陶弘景)

六亭劑 即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五味子」條。

六梔子 即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

六神糖 即神糖之處方用名。詳「神糖」條。

六糖 即神糖之處方用名。詳「神糖」條。

分離草 即天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天麻」條。

勾金皮 主治 無名腫毒。惡毒。醃磨塗上。即消。牙疼。以皮塞牙縫中。即定。乳蛾。每用三五釐。細嚼嚥下。

勾鞋指 即生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「生薑」條。

仇里竹根 即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芷」條。

仇羅 即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉竹」條。

化公石 即石腦之古籍別名。典見綱目。詳「石腦」條。即握雪。礬石之古籍別名。典見圖經本草。詳「握雪礬石」條。

化金石 即消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「消石」條。

化州橘紅 命名 本品為東甯化州境者。故名。

外國名詞 Cortex aurantii (拉丁)

形態 按化州橘紅為橘紅之

一七四

一種。皮薄紋細。色紅潤。多筋脈。味苦而辛。入口芳香。煎之甜香。可供藥用。

性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 傷寒食積。消痰止咳。祛油膩。解蟹毒。噎隔嘔吐。羊癲風疾。

辨偽 鄧肯巖曰。按嶺南雜記。化州仙橋。相傳仙人羅辦稱橘於石龍之腹。惟此一株。在蘇澤堂為最。故梁氏家藏蘇澤堂化州橘皮。著有橘紅歌。歌長不錄。產清風樓者。次之。紅樹者。又次之。其實非橘。皮厚內酸。不可食。其皮釐為五片。或七片。不可成雙。每片真者可值一金。前朝每年所產。循例具文報明上臺。屆期督撫差親隨。跟同採摘批製。官斯土者。亦不多得。彼土人云。凡近化州。得聞謠樓更鼓者。其皮亦佳。故化皮質者多。真者難得。關嶺嶺南。隨筆有云。化州署橘樹。一月生一子。以其皮入藥。痰立解。後為大風所折。即其地補種。氣味更殊。今稱化州橘紅者。率以增城各處所出。香柑皮。偽代之。氣味辛溫而烈。氣虛及有火者。萬不可服。服之即有害。昔豐廟丁中丞

撫圍時。贈化州橋皮一個計五片。皮薄色黝黃。微有毛孔。氣香味甘。且蔭先君云。此予官化州學時。畧中檻前一株。每年只產數枚。朝夕調護。寶而藏之。且云。近代化州得聞畧中更鼓者。尙可用。舍此皆贗物也。今肆中辨有一種皮厚色綠者。皆柏皮偽充。醫者處方幸勿輕率。頗疏綠毛化。及化州皮等名。徒服僞藥。於病鮮濟。不知只用陳久橋皮。較爲穩當。願與同志商之。◎賈炳章曰。按梁紹玉云。化州橋樹。乃仙人羅辨種於石龍腹上。共九株。各相去數武。以近龍井略偏一株爲最。并在署大堂左廊下。龍口相近者次之。城以外。則臭味迥殊矣。廣西孝廉江樹玉著橋紅辨。謂橋小皮薄。柚大皮厚。橋熟由青轉黃。柚熟透綠轉黃。閒常坐臥樹下。細驗枝葉香味。明明柚也。而混呼之曰橋。且飾其皮曰紅。實好奇之過云。或有云。近龍井下有礫石。礫石能化痰。橋樹得礫石之氣。故化痰力更勝。識藥辨微云。化橋紅近日廣中來者。皆單片成束。作象眼塊。或三五十片。兩頭以紅繩繫成。

四畫 化 匹 升

一把。外皮綠黃色。內腹皮白色。週身有豬鬃皮。此種皆柚皮。亦能消痰。此近今名白毛紅。又一種爲世所重。每葉十片如爪。用化州印名五爪橋紅。亦柚皮所製。較鞏片略佳。究之較眞者遠甚也。眞化州橋紅。煎之作甜香。取其汁一點入痰盂內。痰變爲水。此爲上品。如梁氏家藏蘇澤堂橋紅。每一個七破反攪作七歧。曬乾氣甚香烈。此亦上品也。近今通行有黃色綠色兩種。均七歧對摺。質薄有毛。黃色較綠色尤貴。雖非眞品。皆屬柚皮之類。然用於寒痰溼痰病尙效。凡屬陰火熱痰。及肝火燥肺凝痰。皆忌誤用之。反增劇。甚則咳血。不可不知也。

配合應用 ●治羊癲瘋。雄黃、天竺黃、川貝各五錢。琥珀一錢。麝香一錢。膽星一兩。以上各另研。全蠍十四個。去足。酒洗。遠志肉、甘草汁製。鈎藤、防風、化州橋紅、薑衣、活茯苓、天麻、石菖蒲各五錢。以上不可見火。曬乾。蟬退三十個。白附子六錢。共爲末。煉蜜爲丸。如龍眼大。每服一丸。開水下。(集安方)

◎辰砂五香丸。治翻胃噎膈嘔吐。用血竭、乳香、沒藥、辰砂各一錢五分。胡一錢。化州橋紅一錢。共爲末。每三分酒服。(張氏祕要方)

參攷資料 ●按百草鏡廣東高州府化州。出陳皮。去白者名橋紅。今亦罕得。土人以柚皮代之。出售外方。價亦不貴。辨別之法。須先看皮色筋味。如皮皺粗。色黃而厚。內多白膜。味反甜帶辛者。乃乳柑皮也。只堪點茶。不堪入藥。皮極厚而泡鬆。紋極粗而色黃。內多膜。無筋。味甜多辛少者。乃柚子皮也。性忌冷服。紋細色紅潤而皮薄多有筋脈。味苦辛。入口芳香者。乃眞化州橋紅也。入藥以此種爲貴。然其性峻削。能代生氣。消痰雖捷。破氣損人。不宜輕用。近日有一種產仁和塘樓鎮。蜜橋皮所製。曰甜橋紅。清香入肺。醒脾消痰之功。不下化產。而性不峻削。名爲香金板。南人體弱者宜之。本草乘雅武林樓水出蜜橋。凡數十品。名金錢穿心者。雖秀色可觀。又不如佛肚。形小皮癩。甘美可口。霜降採取。氣足味足。密藏至春。剖皮抽脈。破囊吮汁。

亦可振醒精神。爲得句破疑之助。(趙學敏) ●化州蜜橋樹。一月生一子。以其皮入藥。痰立解。後爲風折。卽其地補種。氣味便殊。今稱化州橋紅者。以增城香柚皮僞代之。能化物而不能自化。(關嶺嶺南隨筆) ●蘇澤堂化州橋紅。每一個七破。反摺作七歧。曬乾。氣甚香烈。有橋紅歌云。石龍籬異不可測。首向青霄尾滑澤。有時聲吼洪如鷄。有時噴沙白似雪。鳴或宰相應期生。鳴或科甲蟬聯裏。由來州牧履其常。惟恐怪奇駭俗。寧碑鼓吹鎮其顛。重疊疊石填其穴。天生靈異無可忍。離奇屈曲化爲橋。橋之爲性溫且平。能愈傷寒兼積食。消痰止咳功更奇。誰先辨此眞龍脈。價值黃金不易求。寄語人間休浪擲。(梁氏家藏方)

【匹鳥】卽鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳「鴛鴦」條。

【升推】卽刺蒺藜之古籍別名。典見綱目。詳「刺蒺藜」條。

【升麻】 命名 本品莖葉如麻。而性上升。故名。

處方用名 絲升麻。炙升麻。

古籍別名 周麻(別錄)周升麻(吳普本草)黑升麻(日本)收歸雄麻。雄脚。既濟公。黑蛇根。(和漢藥考)

外國名詞 Cimicifuga booida, L. var. Simplex, Huth. (拉丁)

基本 屬虎耳草科。藥用升麻之根。

產地 蘇頌經本草云。升麻。蜀漢。陝西。淮南州郡皆有之。以川蜀者為勝。陝仁山藥物生產辨云。升麻產廣東樂昌。城口。星子。連州等處。

形態 按升麻為多年生草本。春生苗高三尺左右。葉似麻葉。數同複葉。其小葉尖頭。長卵形。有缺及鋸齒。四五月開花似粟穗。白色。雄蕊甚多。為總狀花序。六月後結黑色之實。根似蒟根。色紫黑。多鬚。



升 麻

種類 升麻高麗名雄脚。東亞數國皆產之。春日宿根生苗。每三枝九葉為一朶。葉似麻葉而短。又頗似榆葉及樺葉。至夏。叢葉中抽出獨莖。分為數穗。攪簇而開。小白花。蘇頌云。升麻。四五月著花。似粟穗。白色者。即是也。根作黃褐色。一種產日本之日光山。莖粗。黃褐色。有三枝或十一葉。葉較升麻為扁。葉面光澤。根橘褐色。功用亦佳。此二種並入藥用。小升麻即赤升麻。一名落新婦。春日。根上擡莖五六上分三枝。三枝之上。又分三枝。其枝葉尤繁。大約四十五葉為一朶。葉視別種細小而薄。莖葉俱微有毛。入夏。莖之中心。別抽一莖。五生兩三枝。其中心之莖。茸毛極多。始為黃色。後變白色。頂端歧分數穗。開五瓣之小白花。並有淡紅色之物。根頗似菖蒲根而短。又似黃精根而有節。或生長根無節。處則叢生鬚根。一種產日光山者。其葉極薄。長二寸半。闊一寸三四分。有鋸齒。上一葉。缺刻甚深。下二葉。在右者缺刻皆淺。在左者缺刻亦深。如上葉。又一種。葉稍闊。鋸齒深

而細。葉尖極銳。陳藏器云。落新婦亦大小有殊。殆即此歟。小升麻之別種。其本幹葉莖。並發於春間。全生細毛。一枝分三枝。每枝生九葉。其數大略相同。葉細長而厚。面背俱有光澤。本幹色青。有節處色紅。葉皆互生。四月。梢上抽出數莖。開五瓣之小白花。莖色白。其狀全似小升麻。細葉升麻一名雞骨升麻。其葉甚繁。凡九枝二十七葉為一朶。葉似鬼臉升麻。然極細小。有鋸齒。深且尖。根亦似之。惟較粗。外黑內青。日光山亦產一種。同屬九枝二十七葉。但缺刻深。有鋸齒。其上葉似小升麻。又此種三葉並生。其下二葉缺刻尤深。驟視之。儼若四葉。近江伊吹山產一種。味極苦。葉頗巨大。其根狀如雞骨。外皮黑色。內肉青綠。本草啓蒙謂之雞骨升麻。粟穗草乃鬼臉升麻之一種。春間宿根生苗。三枝九葉為一朶。一葉有兩缺刻。如地錦葉。綠色。有光澤。多鋸齒。夏抽長莖。葉互生。每節作紫黑色。至秋。梢上成穗。開六瓣小白花。根細小。外黑內白。採掘此根宜在九月之末。十月之

初。大葉升麻一名日光升麻。又名鬼臉升麻。此草一枝三葉。每節作紫黑色。其枝葉極大。凡三葉之內。中葉最為闊大。有鋸齒。缺刻深。面深綠。背淡青。葉間有七縱道。縱道間密布斜理。其左右兩葉。則較中葉為長。榴葉間有六縱道。惟葉根處之一縱道。歧分為二。又頗似七縱道。根較前種粗大。外黑內白。大葉升麻之別種。亦產於日光山。妙義山亦有之。一枝三葉。一如前種。惟葉如芋葉。大自六七寸至八九寸。中葉有深缺刻。二成三尖形。葉面有七縱道。左右兩葉亦較中葉為長。榴葉面有九縱道。開花採根。一如前種之時期。蓮花升麻。此種根如大葉升麻。多鬚。葉色深。有光澤。無毛。莖紫色。三四月開花。分三四枝。枝頭一萼。大如錢。有八九瓣。狀似蓮花。中心帶紫。採取 二月八月。採根日乾。製法 雷斅曰。凡使升麻。採得刮去粗皮。用黃精自然汁。浸一宿。曝乾。到蒸再暴用。李時珍曰。今人惟取裏白外黑而緊實者。謂之鬼臉升麻。去鬚及頭蘆。剉用。

一七六

性質 甘苦平微寒無毒。效能 升清降濁散風解毒。用作升提藥及爲一切風熱瘡癩藥。

主治 解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣癘毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒厲煩痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身長年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論升麻曰小兒驚癇熱壅不通療癰腫疔豆瘡水煎綿沾拭瘡上【宋】大明日華諸家本草論升麻曰安魂定魄鬼附啼泣疳積遊風腫毒【金】張元素珍珠囊論升麻曰治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺痿咳嗽膿血能發浮汗【元】王好古湯液本草論升麻曰牙根浮爛惡臭太陽氣劄爲瘡家聖藥【明】李時珍本草綱目論升麻曰消斑疹行瘀血治陽陷眩暈胸脇痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中淋下血陰痿足寒【明】繆希雍本草經疏論升麻曰升麻味甘苦平微寒無毒潔古云性溫味辛微苦氣味俱薄爲足陽明大陰引經藥得葱白

四畫 升

白芷緩帶脈之緩急亦入手陽明大腸升陽氣於至陰之下春氣生

生而上升升麻正得之故主解百毒感清陽之氣者必能被幽暗故殺白精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣癘毒入口皆吐出凡云甘者其氣必和升則必散和而散故主中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡者手少陽足陽明

太陰熱極故也散三經之火則二證愈矣未載久服不天輕身長年此豈發散之藥所能哉無是理也

【清】黃宮繡本草求真論升麻曰升麻似與葛根一類但此辛甘微苦能引葱白入肺發散風寒出汗引石膏能治陽明項顛頭痛齒痛引參耆能入脾胃補脾且同柴胡能引歸耆白朮甘溫之藥以補衛氣之散而實其表并治一切風陷下痢久泄脫肛足寒陰痿暨蠱毒

精鬼與一切風熱斑疹疥毒腫不隨手輒應以升其陽而散其熱俾邪盡從外解而濁自克下降故又曰能以解毒不似葛根功專入胃升津解肌而不能引諸藥以實衛氣也但升麻佐於葛根則入陽明

生津解肌有效同柴胡升氣則柴胡能升少陽肝經之陽升麻能升陽明胃經之陽一左一右相需而成但陰火動及氣虛汗出切忌裏白外黑緊實者良名鬼臉升麻細削皮青綠色謂雞骨升麻去鬚蘆蒸暴用入補劑蜜水炒用

國外學說 和漢藥考曰前人論功用往往牽強附會香川修德著一本堂藥選已闢其謬誤其言曰張元素謂升麻升陽氣於至陰之下李杲謂升麻升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補衛氣之散自二氏創此謬說後之醫家遂往往以升提爲言抑何深拘於升字乎自李杲定補中益氣湯方中用升麻柴胡二品後世遂崇視此方乃附會其說曰升麻引陽明清氣自有上行柴胡引少陽清氣自左上行一唱百和勳襲雷同惑世誣民莫此爲甚若然則每方加此二品可也豈其然乎况此方亦無甚奇古方中類此者不可勝舉何足道哉多見其妄而已矣一本堂藥選又曰凡選升麻以近年所出俗

呼日光升麻。肥大堅實青綠色味苦者爲佳他如近道諸山皆有形狀色味亦同唯較小於日光山產者耳此乃陶弘景所謂雞骨升麻李時珍所謂鬼臉升麻是也其來自中國之青升麻魚瘦輕虛亦且陳久性味頗劣遇闕亦可用此三者雖有精粗之分然均係眞品用時去鬚水洗到細舊法以黃精自然汁浸一宿晒乾到蒸再晒今已不行近數十年來日本中醫所用皆海根及春雪草二種之根藥舖稱東洋升麻此物味澆色淡褐大異升麻花葉亦不相似醫者不知辨別承訛襲謬實則斷不可用也

古方藥品考曰升麻有數種中國來者形似老薑而肥大皮紫黃肉帶褐色有羅紋者爲上品所謂鬼臉升麻是也又高麗產形似中國產色黑亦可用日本產者總稱眞升麻凡根肥大色黑味苦者最合用藥肆揀其佳者僞種係高麗產或混充中國產別有形狀瘦小皮黑肉白帶青色者爲下品所謂雞骨升麻是也更有三葉者有名小升麻者此二種俱不堪入藥日用

四畫 升

藥品考曰。弘景云。選好者細削。皮青綠。謂之雞骨升麻。時珍曰。今人惟取裏白外黑而堅實者。謂之鬼臉升麻。今日本多此種。乃中國販運之貨也。一種形如連珠。色紅或紅黃。氣味較薄。小升麻即赤升麻。一名落新婦。品不佳。手板發蒙曰。中國產之鬼臉升麻。上品也。高麗產藥舖多有。日本產者。根黑色。肉帶青色。其細者名雞骨升麻。俱真物也。

近人學說 張山雷曰。升麻體質甚輕。空鬆透徹。氣味又皆淡薄。輕清上升。其性質頗與柴胡相近。金元以來。亦恒與柴胡相輔並行。但柴胡宜發半表半裏之少陽。而疏解肝膽之抑遏。升麻宜發肌肉腠理之陽明。而升舉脾胃之鬱結。其用甚近。而其主不同。最宜注意。故脾胃虛餒。清氣下陷諸證。如久瀉久痢。遺濁崩帶。腸風淋瀝。久痔脫肛之類。苟非溼熱阻結。即當提舉清陽。非升麻不可。而柴胡猶為升麻之輔佐。東垣益氣升陽諸方。亦即此旨。並非以升柴並舉。揚鱗也。至於肝腎之虛。陰靜於下。陽浮

於上。則不可妄與升舉。以貽拔本之禍。亦與柴胡同耳。又曰。升麻能發散陽明肌腠之風邪。透表發汗。其力頗大。惟表邪之鬱遏者宜之。而陰虛之熱自內發者。不可妄試。又上升之性能除巔頂風寒之頭痛。然亦惟風寒外邪宜之。而肝陽上陵之頭痛。又為大忌。瀕湖謂升麻治陽陷眩暈。則頭目眩暈。肝陽最多。所謂陽陷。甚不可解。恐非升提之藥所宜也。東垣謂止陽明齒痛。蓋用以引清胃之藥。入於陽明經耳。非升麻之能止齒痛也。仲醇謂陰虛火動。腎經不足者忌之。景岳謂諸火炎上者禁用。石頑謂升麻能解毒。惟初發熱時可用。見點後即忌用。升麻葛根。以其氣升發動。蒸毒於上。為害莫測。又謂麻疹尤為切禁。誤投則喘滿立至。蓋麻疹本屬肺經虛熱。或者且挾濕痰。初非應用升散之病。若誤以為表邪宜散。而更為升發。則肺氣已虛。而復揚之。寧非大謬。又古有升麻透斑之說。蓋為胃熱鬱發。欲其疏泄透達耳。然熱鬱已極。清解且良不及。乃復撥而散之。譬如火起

室中。已有燎原之勢。不為撲滅於內。而反大啓門戶。引風以煽之。挑撥以揚之。是助其烈。罔飛騰矣。亦大誤也。

配合應用 升麻葛根湯。散足陽明之熱邪。發手太陰陽明之斑痧。及天行豌豆瘡。水煎綿沾拭之。

引葱白散。手陽明風邪。引石脊。止陽明經齒痛。或加生地黃。麥門冬。知母。牡丹皮。黃蘗。連翹。玄參。彌良。

治喉口痢。用醋炒綠色升麻。君蓮肉。人參。有神效。

治陽明熱極發斑。頭疼口渴。用升麻。石膏。知母。麥門冬。竹葉。

佐參耆。引清陽之氣上升。行陽道。故補脾胃藥中不可闕。

治陽氣鬱遏。及元氣不足。陽氣下陷。用升麻入升陽散火湯。

去皮膚風邪。用升麻。荊芥。防風。黃芩。甘草。白芷。

解肌肉間風熱。發發汗。用升麻同葛根。荊芥。菊花。甘草。

治牙根浮爛惡臭。用升麻同葛根。遠翹。玄參。甘草。生地黃。麥門

治蟲毒。用升麻同鬱金服。不吐則下。

治射工溪毒。用升麻同射干水煎服。并以滓塗之。

治小兒尿血。用升麻同生地黃。麥門冬。牛膝。蒲黃水煎。

用升麻佐黃連。紅麴。滑石。白芍藥。蓮肉。甘草。為治一切滯下藥。

辟瘴明目。七物升麻丸。升麻。犀角。黃芩。朴硝。梔子。大黃。各二兩。豉二升。微熱同搗末。蜜丸。梧子大。覺四肢大熱。大便難。即服三十丸。取效利為度。若四肢小熱。只食後服二十丸。非但辟瘴。甚能明目。(王方慶嶺南方)

治卒腫毒起。升麻磨醋類塗之。(肘後方)

治喉痺作痛。升麻片含嚙。或以半兩煎服。取吐。(直指方)

治胃熱齒痛。升麻煎湯。熱漱嚙之。解毒。或加生地黃。(直指方)

治口舌生瘡。升麻一兩。黃連三分。為末。綿裹含嚙。(本事方)

治熱毒發瘡。升麻煎湯飲。并

洗之(千金方)

①治產後惡血不盡。或經月或半年。以升麻三兩。清酒五升。煮取二升。分半再服。當吐下惡物極良。(千金方)

②解真毒。升麻煮汁多服之。(外臺祕要方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火炎。上實下虛者。禁用。忌火。

著名方劑 ①升麻葛根湯。治陽明表熱下痢。兼治痘疹初發。(錢乙小兒方) 用升麻三錢。葛根芍藥各二錢。炙甘草一錢。水煎服。

②升麻紫甲湯。陽毒之爲病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。此湯主之。(金匱方) 用升麻二兩。當歸一兩。蜀椒(炒去汗)一兩。甘草二兩。紫甲手指大一片。炙。雄黃半兩。水四升。煮取一升。頓服之。老小再服。取汗。

參攷資料 ①舊出寧州者第一。形細而黑極堅實。今惟出益州。好者細削。皮青綠色。謂之雞骨升麻。北郡亦有而形虛大。黃色。建平亦有而形大味薄。不堪用人。言是

四畫 升 及

落新婦根不然也。其形相似。氣色非也。落新婦亦解毒。取葉按作小兒浴湯。主驚悸。(陶弘景) ②落新婦。今人多呼爲小升麻。功用同於升麻。亦大小有殊也。(陳藏器) ③今蜀漢陝西。淮南州郡皆有之。以蜀川者爲勝。春生苗高三尺。葉似麻葉。並青色。四月五月着花。似粟穗。白色。六月以後結實。黑色。根如蒿根。紫黑色。多鬚。(蘇頌) ④其葉似麻。其性上升。故名。按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻。則周或指周地。如今人呼川升麻之義。今別錄作周麻。非省文。即說誤也。(李時珍) ⑤升麻引陽明清氣上行。柴胡引少陽清氣上行。此乃稟賦素弱。元氣虛。及勞役饑飽。生冷內傷。脾胃引經最要藥也。升麻葛根湯。乃發散陽明風寒藥也。時珍用治陽氣鬱遏。及元氣下陷諸病。時行赤眼。每有殊效。神而明之。方可執泥乎。一人素飲酒。因寒月哭母受冷。遂病寒中。食無滋味。不能一吸。至夏酷暑。又多飲水。兼懷拂鬱。因病右腰一點脹痛。牽引右脇。上至胸口。則必欲臥發

則大便裏急後重。顏登園。小便長而數。或吞酸。或吐水。或作瀉。或陽痿。或厥逆。或得酒少止。或得熱稍止。但受寒食寒。或勞役。或入房。或怒。或饑。即時舉發。一止則諸證混然。如無病人。甚則日發數次。服溫脾勝濕滋補消導諸藥。皆微止。隨發。時珍思之。此乃饑飽勞逸。內傷元氣。清陽陷遏。不能上升所致也。遂用升麻葛根湯。合四君子湯。加柴胡。蒼朮。黃芪煎服。服後仍飲酒一二盃助之。其藥入腹。則覺清氣上行。胸膈爽快。手足和煖。頭目清明。神采迅發。諸證如掃。每發一服。即止。神驗無比。若減升麻葛根。或不飲酒。則效便遲。大抵人年五十以後。其氣消者多。長者少。降者多。升者少。秋冬之令多。而春夏之令少。若稟受弱。而有前諸證者。並宜此藥活法治之。素問云。陰精所奉其人壽。陽精所降其人夭。千古之下。窺其奧而闡其微者。張潔古。李東垣二人而已。外此則著參同契。悟真篇者。皆與此同也。又升麻能解毒。惟初發熱時。可用解毒。痘已出後。氣弱或泄瀉者。亦可少用。

其升麻葛根湯。則見斑後必不可用。爲其解散也。本草以升麻爲解毒吐毒要藥。蓋以其爲陽明本經藥。而性又上升故也。按范石湖文集云。李燾爲雷州推官。鞠獄。得治瘧方。毒在上。用升麻吐之。在腹用鬱金下之。或合二物服之。不吐則下。此方活人甚多也。(李時珍)


【及己】 古籍別名 獐耳細辛。金剛。(俗名)

學名 *Chloanthus serrati* (R. & S.) (拉丁) フタリシソカ(日本)

基本 係金粟蘭科金粟蘭屬。藥用及己之根。

產地 凡山谷陰地恒多有出。形態 及己爲山草類之多年生草本。高至尺餘。莖有明顯之節。不分枝。其上部之節上。則生四葉。爲常葉對生。作橢圓形而尖。有鋸齒。春夏間開花。花細小。無花被。鱗莖短白色。多肉。殆如屈指之掌。而向於莖。雌蕊綠色。穗狀花序著於莖頂。其花序之數。有往往爲二枚者。其根色黑。狀如細辛。

其升麻葛根湯。則見斑後必不可用。爲其解散也。本草以升麻爲解毒吐毒要藥。蓋以其爲陽明本經藥。而性又上升故也。按范石湖文集云。李燾爲雷州推官。鞠獄。得治瘧方。毒在上。用升麻吐之。在腹用鬱金下之。或合二物服之。不吐則下。此方活人甚多也。(李時珍)



性質 苦平有毒。
主治 諸惡瘡。疥癩。瘰癧。及牛馬諸瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論及己曰。頭瘡白禿風瘙。皮膚蟲痒。可煎汁浸并傳之。【明】李時珍本草綱目論及己曰。殺蟲。參攷資料 ①及己生山谷陰虛軟地。其草一莖。莖頭四葉。隨者白花。根似細辛而黑。有毒。今人以當杜衡非也。二月採根日乾。(蘇恭) ②及己入口。使人吐血。(蘇恭) ③及己名義未詳。二月生苗。先開白花。後方生葉三片。狀如樟耳。根如細辛。故名樟耳細辛。(李時珍) ④今人不知及己。往往以當杜衡。却以杜衡當細辛。故杜衡語方多是及己也。(李時珍) 【反蕩】即澤蕩之古籍別名。與見別錄。詳澤蕩條。

【反毛雞】 主治 反胃。以一隻黃爛去骨。入人參。當歸。食鹽各半兩。再同黃爛。食之。至盡。

參攷資料 反毛雞即翻翅雞也。毛翮皆反生向前。治反胃者。速類之義耳。(李時珍)

【反舌】即百舌之古籍別名。典見綱目。詳百舌條。

【反古紙】即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳補骨脂條。

【反時生】即續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳續隨子條。

【反魂丹】即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳益母草條。

【反鼻】即蝮蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳蝮蛇條。

【反鼻蛇】即蝮蛇之古籍別名。典見綱目。詳蝮蛇條。

【天丁】即皂莢刺之古籍別名。典見綱目。詳皂莢刺條。

【天女】即燕之古籍別名。典見易占。詳燕條。

【天文冬】即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳天門冬條。

典見和漢藥考。詳木天蓼條。

【天水牛】即天牛之古籍別名。典見綱目。詳天牛條。

【天牛】 命名 本品有黑角如八字。似水牛角。故名。古籍別名 天水牛。八角兒。一角者名獨角仙。(本草綱目)

外國名詞 Apriona (Cora-mbyx) rugicollis Chev. Beck. Latar (拉丁) カミキリムシ或クハカミキリ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。鞘翅類天牛科。

產地 原野處處有之。

形態 天牛為化生蟲類。乃諸樹蠹蟲所變。夏月有之。大如蟬。甲黑如漆。上有黃白點。下有翅能飛。目前有兩黑角。甚長。前向能動。喙黑而扁如鉗。六足在腹。取得可供藥用。



性質 有毒。

天牛

主治 瘡疾寒熱。小兒急驚風。及疔腫箭簇入肉。去毒。參攷資料 ①蟬蛻云。蟬蠶在朽木中食木心。穿如錐刀。口黑身長。足短節慢。無毛。至春兩後。化為天牛。兩角狀如水牛。亦有一角者。色黑。背有白點。上下緣木。飛騰不遠。(陳藏器) ②按爾雅。螻蛄桑也。郭璞註云。狀似天牛。長角。體有白點。善嚼桑樹。作孔藏之。江東呼為嚼髮。此以天牛嚼桑為二物也。而蘇東坡天水牛詩云。兩角徒自長。空飛不服箱。為牛竟何益。利吻穴枯桑。此則謂天牛即嚼桑也。大抵在桑樹者。即為嚼桑。爾一角者名獨角仙。入藥並去甲翅角足用。(李時珍) ③天牛獨角仙。本草不載。宋金以來。方家時用之。聖惠治小兒急驚風。吹鼻定命丹。宣明方點身面。瘡。芙蓉膏中俱用。獨角仙。蓋亦毒物也。藥多不錄。蟻化天牛有毒。蟻化蟬無毒。又可見蟻。適與蟻之性味良惡也。(李時珍)

【天王鐵塔草】即瓦松之古籍別名。典見綱目。詳瓦松條。

【天仙子】即蟻蟻之古籍別名。

【天蓼】即天蓼之古籍別名。

【天門冬】即天門冬之古籍別名。

【天麻】即天麻之古籍別名。

【天葵】即天葵之古籍別名。

【天冬】即天冬之古籍別名。

【天南星】即天南星之古籍別名。

【天葵子】即天葵子之古籍別名。

【天麻子】即天麻子之古籍別名。

【天葵子】即天葵子之古籍別名。

【天葵子】即天葵子之古籍別名。

【天葵子】即天葵子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『雙銀』條。即真若子之處方用名。詳『真若子』條。

【天仙米】即葛仙米乾者之別名。典見綱目拾遺。詳『葛仙米』條。

【天仙屯】即天仙藤之處方用名。詳『天仙藤』條。

【天仙根】即天仙藤之處方用名。詳『天仙藤』條。

【天仙菜】即葛仙米鮮者之別名。典見綱目拾遺。詳『葛仙米』條。

【天仙蓮】主治惡毒瘡癤。搗葉傅之。(李時珍)

【天仙藤】處方用名。天仙根。天仙屯。

古籍別名 白毛藤(俗名) 形態 天仙藤為蔓生藤類之一種。四時不凋。葉如葛而圓小。有白毛。其根有鬚。與其藤莖俱供藥用。

採取 春秋採之。採得根及藤。陰乾切用。 性質 苦。溫。無毒。

效能 治妊娠水腫。疏氣血止痛。用作利尿藥。又為鎮痛藥。 主治 解風勞。同麻黃治傷寒。

四盤 天

發汗。同大黃墮胎氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論天仙藤曰。流氣活血。治心腹痛。【清】黃宮繡本草求真論天仙藤曰。天仙藤即青木香。馬兜鈴藤也。味苦氣溫。觀書所論主治。止屬妊娠子腫及腹痛風癆等症。而於他症則未及。即其所治之理。亦不過因此主於疎泄。性溫得以通活。故能活血通道。而使水無不利。風無不除。血無不活。痛與腫均無不治故也。昔有天仙藤散。以治子腫。其亦可以知其概矣。葉似葛圓而小有白毛。根有鬚。四時不凋者是。

近人學說 張山雷曰。天仙藤之名。綱目引蘇頌圖經本草有之。然今所通用者。乃土青木香之苗。莖土青木香入土甚深。一莖直行。小者甚細。年久者亦或大如拇指。其味甚苦。而氣極清芬。力能舒鬱開胸。醒脾胃。清溼熱。長夏鬱蒸之令。脾胃清陽之氣。受其蒙蔽。而恒覺無氣以動。倦怠納呆者。以少許細嚼吞之。即覺神情為之一振。去溼化濁。具有捷效。蓋香本地之

正氣。自能掃蕩陰霾。而苦味泄降。更能導去積積之濁垢。而恢復其胸中太和之元氣。功不在廣木香。茅朮。霍香之下。而又能久藏不腐。且氣味亦不以久年改變。堅貞之性。草藥中尤不易得。其藤亦能宜道經隧。導達鬱滯。疏肝行氣。止心胃痛。最為土產良藥。觀圖經天仙藤之主治。頗不相合。實非古之所謂天仙藤。而瀨湖又土青木香為馬兜鈴之根。與今亦不相符。惟瀨湖又謂天仙藤能流氣活血。治心腹痛。又引孫天仁集效方。謂治疝氣痛。以天仙藤一兩。好酒煎服。神效。庶為近之。

配合應用 ●治疝氣作痛。天仙藤一兩。好酒一盞。煮至半盞。服之神效。(孫天仁集效方)

●治痰注臂痛。天仙藤。白朮。羌活。白芷。梢各三錢。片子薑黃六錢。半夏製五錢。每服五錢。薑五片。水煎服。仍間服千金五奎丸。(楊仁齋直指方)

●治妊娠水腫。始自兩足。漸至喘悶。足趾出水。謂之子氣。乃婦人素有風氣。或衝任有血風。不可作

水。妄投湯藥。宜天仙藤散主之。天仙藤洗微炒。香附子炒。陳皮。甘草。烏藥等分。為末。每服三錢。水一大盞。薑三片。木瓜三片。紫蘇三葉。煎至七分。空心服。一日四服。小便利。氣脈通。腫漸消。不須多服。此乃淮南名醫陳景初秘方也。得於李伯時家。(婦人良方)

●治產後腹痛。見枕痛。天仙藤五兩。炒焦為末。每服炒生薑汁。童便和細酒調服。(經驗婦人方)

●治一切血氣腹痛。即上方用溫酒調服。

●治肺熱鼻瘡。桐油入黃連末。用天仙藤燒熱油傅之。(摘玄方)

用量 錢半至三錢

【天冬】即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【天台藥】即烏藥之處方用名。詳『烏藥』條。

【天瓜仁】即瓜囊仁之古籍別名。典見別錄。詳『瓜囊仁』條。

【天生】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【天生牙】即銀之生於銀坑內。石縫中。狀如亂絲者。以色紅為上。入

火紫自如草根者次之。銜黑石者最佳。性質功用詳『銀』條。

【天生朮】即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【天生磺】命名 本品為硫磺之成於天然者。故名。

產地 出雲南瀨野縣境之溫泉下。

形態 天生磺為地中熱氣。含有硫質所結成其質漸堅時。色瑩白。成熱則變為灰芥色。內如黃泥而淡。其體濃則而輕。堆聚巖下。碎玲瓏與巧石相似。採得可供藥用。

性質 苦。鹹。大溫。有毒。

主治 補命門真火。療虛寒腸症。

參攷資料

硫磺有人造者。有天生者。其天生者出於瀨野東城外五里之溫泉。乃昆明海再之委也。周圍三四里許。泉底產硫磺。水熱如湯。投以雞蛋可熟。中流時一平巖。名九氣臺。中空而旁穴。穴凡九。溫泉注其內。其氣蒸熱。上浮於石。沾濡流淡如垂乳。為泉之熱氣所結。質最輕清。經久而後成。故功

效遠邁於石硫磺。其性燥烈。故近火則易為養也。〔綱目拾遺〕

【天石】即天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【天名精】命名 本品乃天蔓菁之說音。

處方用名 天精葉。

古籍別名 麥句薑。蝦蟆籃。豕首。〔本經〕天蔓菁。天門精。玉門精。蟾蜍。鬚。鬚。〔別錄〕地菘。〔唐本草〕活鹿草。〔異苑〕豨首。蚘。蚊。草。〔爾雅〕劉。劉。草。〔本草〕母。母。芥。臭。花。娘。草。〔綱目〕

外國名詞 Carpesium abrotanoides, L. (拉丁) ヤブタバコ (日本)

基本 係菊科天名精屬。藥用天名精之葉。

產地 凡山野原澤間恒有出。

形態 天名精為溼草類之多。年生草本。宿根發葉。就地叢生。葉長作橢圓形。似煙草之葉而稍小。有鋸齒皺毛。臭氣甚烈。夏秋間抽莖一二尺餘。自莖分枝。而腋抽出短梗之形狀。花。花色黃綠。結實似茺蒿子。最黏人衣。臭氣尤甚。炒熱

則氣香。其根如牛膝而色白。根子葉俱供藥用。

採取 五六月間採之。陰乾。

性質 甘寒。無毒。

效能 散熱結破瘀血。殺蟲毒。吐風疾。用作解熱解毒藥。

主治 瘀血。血癥。欲死。下血。止血。利小便。除小蟲。去痺。除胸中結熱。止煩渴。逐水。大吐下。久服輕身耐老。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論天名精曰。破血生肌。止鼻衄。殺三蟲。除諸毒。腫丁。疔。瘡。痔。金瘡。內射。身癢。癢。不止者。措之立已。【宋】開寶重定新本草論天名精曰。地菘。主金瘡。止血。解蟲毒。蛇螫毒。按以傳之。【明】李時珍本草綱目論天名精曰。吐痰。止癩。治牙痛。口緊。喉痺。【明】繆希雍本草經疏論天名精曰。天名精味甘辛。氣寒而無毒。辛能散結。寒能除熱。故主瘀血。血癥。欲死。下血。止血。小便不利。由於內熱。除熱則小便自利也。小蟲者。溼熱所生也。辛寒能散溼祛熱。則小蟲自除也。除痺者。去溼之功也。除胸中結熱。止煩渴。

祛熱散結。發陰之功也。逐水者。濕熱散。則水自消矣。唐本注云。即活鹿草也。別錄一名天蔓精。南人呼為地菘。非鶴虱。亦非稀莧。乃荔枝草也。為消痔瘡之聖藥。味甘辛。故有蠶稱。其主破血生肌。利小便。殺三蟲。除諸毒。腫疔。瘡。癢。痔。金瘡。內射。身癢。癢。不止者。措之立已。涼血除熱散結之力也。

近人學說 張山雷曰。天名精之草。此間野生極多。莖細叢生。其葉甚細。有臭味。故俗稱為臭花娘。子草。莖節曲折。每節間突出如髒。俗又名為雞。雞。子。草。結子大如穀。老則有刺。整人衣。即鶴虱也。其性寒涼。能滑利下行。據古籍。則破血利水之力極大。本經別錄所載。主治是也。後人則惟用以解毒降火。唐本草以下諸書。所載主治是也。今則以治喉風腫塞。甚至腐爛危險之候。取莖葉搗汁。灌之。其效甚捷。冬令草枯。無從取汁。則於夏秋之間。預收莖葉。搗汁。澄定。俟其將乾。凝結之時。作為丸子。陰乾。密貯。臨用以清水化開。灌之。亦效。甚者。展蓬之。搗汁。稠。大。可。轉。危。為。安。

展蓬之。搗汁。稠。大。可。轉。危。為。安。

靈驗藥中之極有靈驗者。蓋消痰解毒。清熱降火。開結利竅。合數者之功用。兼而有之。宜其投之輒效。其餘諸證之應用此物者。大旨亦不外此十二字之作用矣。

配合應用 治男女吐血。鐵面草。即地菴。晒乾為末。每服一二錢。以茅花泡湯。調服。日二次。(衛生易簡方)

治咽喉腫塞。治痰涎壅滯。喉腫水不可下者。地菴一名鶴虱草。連根葉搗汁。鵝翎掃入。去痰最妙。(傷寒法要方) 用杜牛膝。敲碎草同搗汁。渣之。不得下者。灌鼻。得吐為妙。又方。土牛膝。春夏用莖。秋冬用根。一把。青礬半兩。同研。點患處。令吐膿血。痰沫立時即愈。(聖濟總錄方)

治經喉風腫。阿蚊草即皺面草。細研。以生蜜和丸。彈子大。每噉一二丸。即愈。乾者為末。蜜丸亦可。名救生丸。(經效濟世丸方)

治諸骨哽咽。地菴。馬鞭草。各一握。去根。白梅肉一箇。白礬一錢。搗作彈丸。綿裹含喉。其骨自軟而下也。(普濟方)

治風毒癩癧赤腫。地菴搗傳。乾即易之。(聖惠濟世良方)

治疔瘡腫毒。鶴虱草葉。浮酒糟同搗。傳之立效。(孫氏集效方)

治發背初起。地菴杵汁一升。日再服。遂乃止。(傷寒類要方)

惡瘡腫毒。地菴搗汁。日服三四次。(外臺祕要方)

治惡蛇咬傷。地菴搗爛傳之。(衛生易簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無實邪者禁用。垣衣地黃偽之使。

委政資料 天名精。即活鹿草也。別錄一名天蔓菁。南人名為地菴。葉與芫菁菜相類。故有此名。其味甘辛。故有葶稱。狀如藍。而蝦蟆好居其下。故名蝦蟆藍。香氣似蘭。故又有名蟾蜍蘭。(蘇恭) 郭璞注爾雅。蓬麥云。即麥句薑者。非也。陶公注釣樟條云。有一草似狼牙。氣辛臭。名為地菴。人呼為劉蠍草。主金瘡。按異苑云。宋元嘉中。青州劉楨射一獐。剖五臟。以此草塞之。驟然而起。懼怪而拔草。便倒。如此三度。遂因密錄此草種之主。

折傷。愈多人。因以名之。既有活鹿之名。雅與聲字相合。陶蘇俱說是地菴。定非二物。(陳藏器) 地菴所在皆有。生人家及路旁陰處。高二三寸。葉似菘菜而小。又曰鶴虱。出波斯者為勝。今土菴亦有。力勢薄於波斯者。(馬志) 天名精乃天蔓菁之訛也。其氣如豕鬣。故有豕首鬣顛之名。昔人謂之活鹿草。俗人因其氣腥。說為狐狸腥者是也。爾雅云。薊豕首也。郭璞注云。江東呼為豕首。可以燻蠶。蝨食。(李時珍)

按沈括筆談云。世人既不識天名精。又妄認地菴為火。秋本草又出鶴虱一條。都成粉亂。不知地菴即天名精。其葉似菘。又似芫菁。故有二名。鶴虱即其實也。又別錄有名未用豕鬣。即此地菴。亦係誤出。(李時珍)

天竹黃 即天竺黃之原名。詳【天竺黃】條。

天白 即鬼白之古籍別名。典見別條。詳【鬼白】條。

天成沙 即蘇木中沙之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【蘇木中沙】條。

天灸 即毛茛之古籍別名。典見本草衍義。詳【毛茛】條。

天豆 即石龍肉之古籍別名。典見別錄。詳【石龍肉】條。即雲實之古籍別名。典見吳普本草。詳【雲實】條。即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳【補骨脂】條。

天泡草 即酸漿之古籍別名。典見綱目。詳【酸漿】條。即龍葵之古籍別名。典見綱目。詳【龍葵】條。

天狗 即魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳【魚狗】條。即狗糧之古籍別名。典見綱目。詳【狗糧】條。

天社蟲 形態 天社蟲為化生蟲類之一種。其狀如犬而腰大。食草木之葉。有謂即蠅蛆。可供藥用。採取 三月採之。主治 益氣絕孕。

天竺桂 古醫別名 山桂。(本草綱目)

形態 天竺桂為桂類之一種。樹大花繁。結實如蓮。而色純青者。或有似橘者。其皮可供藥用。其實詳見該條。

四畫 天

性質 辛溫無毒。

主治 腹裏諸冷。血氣腹痛。血痢。腸風。暖腰膝。祛產後惡血。

【天竺桂實】

性質 甘辛溫。無毒。

主治 煖胃平肝。益腎。止咳。止胃院痛。

【天竺乾薑】

產地 生婆羅門國。

別名 胡乾薑(本草拾遺)。

形態 狀似薑小黃色。

性質 辛溫無毒。

主治 主冷氣寒中。宿食不消。腹脹下痢。腰背痛。瘰癧氣塊。惡血積聚。

【天竺】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【天芝麻】即望江青之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「望江青」條。

即益母草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「益母草」條。

【天竺黃】

原名 天竹黃。

命名 本品係天竹內所生之黃。故名。作天竺者非也。

園方用名 片竺黃。

古爾別名 竹黃(開寶本草)。

外國名詞 Tabashir. (拉丁) Tabashoor. (英)

基本 屬禾本科。為苦竹淡竹節孔中化生石狀之塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。西竹黃產自安南。東京。洋竹黃產南洋羣島。由石叻運來。廣西懷集。廣東廣寧縣等竹園均有出。惜乎甚少。

形態 按竹節孔中所生之天竺黃。乃竹類受一種病之作用。先分泌水液於其間。繼漸收乾。遂凝結而為石狀之塊。其塊片頗似砂礫。色白。灰。黑。灰不等。間或略帶光澤。作牙色。質堅。水難溶解。但稍透映。

性質 甘寒無毒。

成分 天竹黃之成分。百分中含珪酸七十分。鉀鈣有機物水分等凡三十分。

效驗 消熱。豁痰。涼心。安神。用治驚癇藥。又為中風神經痛藥。

主治 小兒驚風。天吊。去諸風熱。鎮心明目。療金瘡。滋養五臟。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論天竺黃曰。制藥毒發熱。

【宋】大明諸家本草論天竺黃曰。治中風痰壅。卒失音不語。小兒客忤癇疾。【明】穆希雅本草經疏論天竺黃曰。天竺黃竹之津氣結成。其氣味功用。與竹瀝大同小異。第竹黃氣微寒而性亦稍緩。故為小兒家要藥。人手少陰經。小兒驚風。天吊諸風熱者。亦猶大人熱極生風之候也。此藥能除熱養心。豁痰利竅。心家熱清。而驚自平。主君安而五臟咸得滋養。故諸證悉除也。明目療金瘡者。總取其甘寒涼血清熱之功耳。【清】黃宮繡本草求真論天竺黃曰。天竺黃係天竺園之竹精氣結成。其粉形如竹節。味甘氣寒。與竹瀝功用略同。皆能逐痰利竅。但此涼心去風除熱。為小兒驚癇風熱。痰湧失音。較之竹瀝。其性和緩。而無寒滑之患也。今市肆多竹灰葛粉雜入。不可不辨。

國外學說 手板發聲曰。天竺黃一名竹黃。亦稱竹脊。苦竹。淡竹中俱有之。初為水後變粉。終成塊。牙色者為上。黑者為下。古說以竹蟲為天竺黃非也。蟲蛀竹成屑。乃竹蛙屑也。和漢三才圖會曰。三四

月碎諸竹。經日破裂之內。多有天竺黃。蓋溼熱熾於內。暑熱蒸於外。自生者也。藥肆取竹節外所有黃粉。混充竹黃。不可用。一種為竹蛙。屏古竹生蠶。將內肌食盡。腐爛而生白粉。此與天竹黃一物而異名。瘡腐膿爛者。傳之愈。大和本草曰。天竺黃在大竹內。今俗以竹筴為天竺黃。亦非。竹棒。竹液也。色黃。附竹外而生。小兒食之。味甘香。時珍曰。如木耳。紅色。本草拾遺名竹肉。苦竹肉有大毒。小兒食之。能致死。和漢藥考曰。據白非理學博士言。當享保年間。獎勵栽種藥草。時代。周防吉川左京。曾獻天竺黃於幕府。有醫官名丹羽正伯者。曾記其事云。

辨偽 鄭有謾曰。天竹黃生南海諸竹中。此竹極大。又名天竹。故宗奭云。是竹內所生如黃土。著竹成片者。今割諸竹內。往往得之。按李時珍有言。竹黃乃大竹之精氣結成。其氣味功用與竹瀝同。而無寒滑之害。氣味甘寒。涼心經。去風熱。清痰火。真者難得。故肆中有偽品。或云即土石所造。色雜不可

一八四

禁。用者不可不慎也。○曹炳章曰。李時珍本草綱目釋名條下採註。吳僊贊寧荷譜云。天竺黃生南海。鑄竹中。又名天竹。此竹極大。其內生黃。可以療疾。本草作天竺之竺。非矣。李息齋竹譜詳錄云。鑄竹出廣南。絕大內空。節可容二升。交廣人持此以量出納。竹中有水甚清。溪澗四月後。水皆有毒。惟此竹水無毒。土人陸行皆飲用之。至深冬則凝結。竹內如玉。即天竹黃也。可療風濕疾。又如相迷竹。生黃州。狀與鑄竹大同小異。中亦有黃。堪作丸治病。然力不及鑄竹云。沈存中筆談補云。嶺南深山中。有大竹。即鑄竹。內有水甚清潔。溪澗中水皆有毒。惟此水無毒。土人陸行多飲之。至深冬則凝結如玉。即天竹黃也。昔王彥祖知雷州時。盛夏至官山。溪澗水皆不可飲。惟剖竹取水。烹飪飲。皆用竹水。次年被召赴閩東行。求竹水不可復得。問土人乃知。至冬則凝結。不復成水。適是夜野火燒林。木為煨燼。惟竹黃不灰。如火燒獸骨。色灰而輕。土人多以火後採集。以供藥品。不若

生得者為善。因生時與竹節貼牢。不易取擊耳。沈李二公所說竹黃。確是近今天生之老式竹黃。又考日本竹譜云。竹實酥竹膏。皆漢之天竹黃也。因竹枯筒中之露水。由溼熱凝結如麪粉者。名天竹黃。田中方男云。此物係生於竹節間凝結物。大抵由純粹琥珀而成。於東印度中國。以供藥劑之用。價甚貴。用於膽液性之嘔吐。痰瀉血痢痔疾。及其他相類之症。林氏本草云。竹條中之黃。乃竹所含有之乳汁。液乾而凝結者。性與新竹之甘味液相同。至於老竹則色液俱變。結為堅塊。恰如一種浮石。有異味。而收斂異常。儼如已燒之象牙。印度名之曰竹糖。漢醫名曰竹黃。植物字彙云。若竹幹過於堅密。則其節中以得太陽之溫度。而次第凝結之故。自然滴液如蜜。即古來所傳竹實酥也。法大字書云。竹節間有他物。伯希尹爾者為琥珀質。而雜以灰石質。少許。及有機性之物質。是昔所最珍奇者也。由是觀之。則老竹節間所滯留之甘露。次第凝結為砂石狀者也。其性為琥珀質。

琥珀質者。木賊麥稈等之堅質所具之質也。本邦九州。竹中有液者甚多。特薩州竹中。出有砂石狀之物。迄七八月割之。則出水。十月十一月則成砂塊。灰黃色。綜觀東西洋諸學說。其名雖有竹實酥。竹膏等之異。辨其生成形態。與沈李之發明。亦相符合。然亦足資參考。以補我中華舊有本草之所未詳。比較現行老式片天竹黃。一一符合。餘如大明云。此是南海邊竹塵砂結成者。宗奭曰。此竹內所生如黃土。著竹成片者。馬志曰。天竹黃生天竹國。今諸竹內往往得之。多燒諸骨灰。及蛤粉等雜之者云云。大抵知近人云。人造者。依據此說也。近時作偽者。不獨以蛤粉等製造。甚至有用水門汀偽造者。可謂天良傷盡者也。然偽造形態。易於鑑別。與天然生成者。形色不同耳。

配合應用 ●治小兒驚癇。癩疾。用天竺黃。牛黃。犀角。丹砂。茯神。琥珀。酸棗仁。遠志。釣藤。鈎。有痰者。加牛膽。南星。貝母。竹瀝。屬虛者。去南星。加人參。

●治小兒驚熱。天竺黃二錢。雄

黃。牽牛末各一錢。研勻。麵糊丸。粟米大。每服三五丸。薄荷湯下。(錢乙小兒方)

用錢 八分至錢半。

應用宜忌 凡無實熱痰火者。禁用。

【天芥菜】 命名 本品葉如芥。狀故名。

古籍別名 雞洞粘。(綱目)

外國名詞 Heliotropium porvianum, L. (拉丁) キンチルリサウ(日本)

基本 紫草科。天芥菜屬。藥用其莖葉。

形態 天芥菜。為雜草類之一種。其葉小如芥。

性質 苦。

主治 蛇傷。同金沸草入鹽搗。傅腋下腫毒。以鹽醋搗。膿已成者。亦安。并治一切腫毒。

【天花粉】 命名 昔謂栝藹形。象天瓜。本品係以裏根搗汁。澄粉而成。故名。天瓜粉。後稱曰天花粉。

四畫 天

處方用名 白花粉。

外國名詞 Trichosanthes

multiloba 或 Bryonia. (Tricho-

santhos Multiloba.) (Bry-

ony.) (拉丁)

基本 屬葫蘆科。為栝樓之根

中源粉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

天花粉產廣東陽江為最。本質最

幼滑。可借用硫磺煨過。致其變味。

所謂食其好色。送至轉性而不適

於用。廣西八屬等均有出。質略粗

亦用硫磺熏之。惟不亞於陽春也。

又有產自安徽安慶府亳州等處。

個頭略細。質粗。但無硫磺味。最宜

用之。又名括樓根。醫生用治咳症。

以為可以除痰清熱。孰料製造花

粉者。不惜硫磺工本。薰至質味轉

酸。不獨無益。而又害之。

形態 按本品根如葛根。或作

連珠狀。外面黃褐色。內部白色。含

多量澱粉。

採取 九月十月採根。凡秋後

採者。結實有粉。若夏月採者。有筋

無粉。

製法 周憲王曰。凡使天花粉。

須秋冬採根去皮寸切。水溫。逐日
換水。間四五日取出。搗如泥。以粗
衣濾汁。澄粉曬乾用。

性質 苦寒。無毒。

成分 主要素為 Bryonia,

餘為澱粉、樹膠糖。

效能 瀉火潤燥。生津止渴。在

胃不起變化。至腸被吸入至血中。

能使血液流動增速。促進肺臟之

呼吸迅速。令痰容易驅出。故用作

消渴潤燥藥。及為排膿生肌消腫

藥。

主治 消渴。身熱。煩滿。大熱。補

虛安中。續絕傷。除腸胃中痼熱。入

痘。身面黃。唇乾。口燥。短氣。止小便

利。通月水。

張仲景之發明 栝樓根一味。

經張仲景之實驗。認為主治渴。茲

考徵如下。①柴胡桂枝乾薑湯證

曰。渴而不嘔。②小柴胡去半夏加

栝樓湯證曰。發渴者。(以上二方

用栝樓根皆四兩) ③栝樓桂枝

湯證不具。然太陽病。其證備云。則

是全備。桂枝湯證之謂也。但身體

強。凡凡然云者。豈獨栝樓根所主

乎。凡凡然。是項背強急之狀也。故

桂枝加葛根湯證曰。項背強。凡凡。
葛根湯證曰。項背強。凡凡。然則凡
凡。是為葛根之證明矣。④栝樓

罷麥丸證曰。其人若渴。(以上二

方用栝樓根皆二兩) ⑤栝樓牡

蠣散證曰。渴不差者。⑥牡蠣澤瀉

散。此症為大病差後。腰以下有水

氣。必有渴證。據此諸方。則栝樓根

治渴明矣。凡渴有二證。煩渴者。石

膏主之。但渴者。栝樓根主之。是宜

分別而治之。按栝樓根者。蓋兼治

口中燥渴及黏者。然非栝樓根

一味之主治也。合用而後見其妙

要。宜考之於柴胡桂枝乾薑湯。栝

樓桂枝湯二方。

歷代記述攷證

【唐】蘇恭

新修本草論栝樓根曰。栝樓用根

作粉。潔白美好。食之大宜。虛熱人

【宋】大明日華諸家本草論天花

粉曰。治熱狂時候。通小腸。消腫毒。

乳癰發背。痔瘻瘡癩。排膿生肌。長

肉。消撲損瘀血。【元】成無己論

天花粉曰。津液不足。則為渴。栝樓

根味苦微寒。潤枯燥而通津液。是

為渴所宜也。【元】李東垣本草

賦訣論栝樓根曰。栝樓根純陰。解

煩熱。行津液。心中枯潤者。非此不
能入味。與辛酸同用。導腫氣。【明】

李士材本草圖解論天花粉曰。栝

樓根即天花粉。甘苦微寒。主內熱

乾渴。痰凝欬嗽。煩滿身黃。消毒通

經。苦能降火。甘不傷胃。故本經有

安中補虛之稱。虛熱燥渴者。與之

相宜。且清和疏利。又能消毒通經。

然畢究行秋冬之令。非所以生萬

物者也。去皮切片。水浸三日。逐日

換水。搗如泥。絹濾澄粉。薄荷微蒸

曬乾。【清】黃宮繡本草求真論

天花粉曰。天花粉即栝樓根也。味

酸而甘。微苦微寒。亦同栝樓。能降

膈上熱痰。兼因味酸。又能生津止

渴。故凡口燥唇乾。腫毒難乳痔漏

時熱狂燥。便數等症。服之立能解

除。但此品較之栝樓。其性稍平。不

似其性急迫。而有推牆倒壁之功

也。至經有言。安中絕續。似非正說。

不過云其熱除。自安之意。痰色清

稀者。忌服。澄粉食。大宜。水衰有熱

人。畏惡。反同栝樓。【清】鄒澍本

經疏證論天花粉曰。栝樓根亦非

能治虛也。觀小青龍湯。小薤胡湯。

苕胡桂枝乾薑湯中用之。皆不過

以渴不得用半夏而爲之代耳。半夏非治虛者也。雖然渴不得用半夏。何物不可用。乃慮慮代以栝樓根。蓋胸中者清虛之府。中氣之所貯。中氣者精明純粹。不寒不熱。不溼不燥。不受纖弱之侵者也。體中受邪。胸中焉能毫無所犯。其所犯者非寒即熱。非溼即燥。寒且溼之動爲嘔爲噦。熱且燥之動爲煩爲渴。兩者之不相兼。猶冰炭之不能相入也。是故嘔噦者用半夏以止逆。使寒與溼不與中氣久混。而難解。煩渴者用栝樓根以滋液。使熱突燥不與中氣相燥。而難復。所以栝樓根與半夏雖非相畏相忌。相反而始終不相。此其旨在傷寒論金匱要略中可尋釋而知者也。曰服小青龍湯已渴者。寒去欲解也。曰服小柴胡湯已渴者。屬陽明也。以法治之。曰嘔家渴爲欲解。其有支飲者。縱得熱藥不渴。以是知半夏栝樓根功用實相反。而適相同也。其所以不得爲補劑者。則以是物雖曰滋液。亦僅能啓脾家陰津上潮。不能使腎家陰津灌注。然則諸湯之配藥。何不取渴腎之物。

直滯其源。而取乎僅啓脾陰者也。夫煩渴之煎燥中氣。其望陰液之滋。蓋不啻歲旱之望雲霓也。若待滯腎陰滋之。其何能及。且凡物之取給於近者易成。亦易消。遠者難待。亦難解。假使胸中僅爲無形之燥熱所熾。遠渴有形之腎陰救之。燥熱既熄。汪洋之水繼至。不慮其熱病機已。寒病復起耶。若是則栝樓桂枝湯。得毋亦與此同耶。栝樓桂枝湯與小青龍湯。小柴胡湯。同有表邪。同宜解外。同有寒熱。其有不同者。小青龍。小柴胡。證皆未經誤治。栝樓桂枝湯。證則因誤治而致一也。太陽病證。脈反沉遲。爲陽證見陰脈。非小青龍。小柴胡所。有二也。雖然篇中。但言太陽證。備。並不提及誤治。陽證見陰脈。其病已危。乃用從容不迫之桂枝湯。此互文以見意也。篇中首述病狀。旋訂病源。縷縷可晰。其述病源。不曰感受何邪。而曰太陽病發汗太多。因致。曰風病下之則。復發汗。必拘急。曰瘡家雖疼痛。不可發汗。汗出則。歷敘三條。總因汗下。其非感觸即得。亦復何言。特瘥者方。

經汗下。內則陰液暴脫。外仍經絡。滯滯。以云乎陰液暴脫。且見陰脈。則外證不得仍備太陽。今太陽證。仍備。且項背強。凡九然。則沉爲陽。不入交於陰。遲爲。道泣。澀不前矣。夫陽欲入陰。而陰不承。則陰與陽。烏能交。則陰何自而化。陽何自而生。太陽證。遲治以治太陽之法。陰不承陽。則必取生陰之速者。以益上中之液。使得與陽交。生陰之速。益上中之液者。舍栝樓根。其誰取耶。是知栝樓桂枝湯之用栝樓。蓋使獨當一面。其任較之小青龍。小柴胡。以渴而去。半夏加入者。爲倍重。蓋陰在內。爲陽之守。陽在外。爲陰之使。明乎此。則將作剛。瘥之用葛根湯。以起陰而洩陽。既作剛。瘥之用大承氣。以存陰而承陽。一以貫之矣。用栝樓根最索解不得者。無如栝樓牡蠣散。蓋百合病。不成內傷。又非徒外感。絕無五臟。菴熱。八風五痺之實候。只在病人。意中。轉轉不適。又不能明言其所。以然。及從其草蛇灰線。處跡而尋之。其理似亦有可窮者。夫欲臥不得臥。欲行不得行。飲食或有美時。

或有不欲聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。得藥則劇吐利。如有神。等全在不可捉摸處。口苦小便赤。其。數。則在有形跡處。及至一月不解。而變成渴。則形跡遂大著。何况以百合湯洗之。而仍不差。則病氣爲傷中上之陰。無可疑者。雖然。僅曰渴。不曰欲飲水。且不煩不熱。究竟病本無駐足處。僅渴之一端。爲得所依藉耳。於此見昔之百。一宗。悉致其病者。今則上焦已化。而在下者。尙未化也。上焦已化。百。之病。已。其。中。而。下。焦。之。未。化。者。不。得。不。選。用。牡。蠣。使。之。召。陽。歸。陰。而。其。主。腦。尤。在。治。上。焦。之。已。化。者。故。方。中。配。以。從。陽。化。陰。之。栝。樓。根。兩。物。等。分。標。名。則。升。栝。樓。於。牡。蠣。之。上。爲。一。方。之。統。攝。也。是。方。也。最。無。意。味。之。中。意。味。牽。芳。由。是。思。之。則。栝。樓。根。之。用。不。得。僅。以。治。外。感。煩。渴。一。端。目。之。矣。其。次。牡。蠣。澤。瀉。散。之。用。栝。樓。根。亦。甚。不。易。解。以。栝。樓。根。多。爲。渴。用。牡。蠣。澤。瀉。散。證。則。豈。不。言。渴。也。雖然。此。有。說。焉。栝。樓。藥。麥。丸。則。渴。而。用。栝。樓。根。矣。又。何。以。用。附。子。

此固當與牡蠣澤瀉散對待而觀者也。夫牡蠣澤瀉散之證曰從腰已下有水氣。栝樓薤麥丸之效曰腹中溫。為知腰者在後。腹者在前後者。陽氣所由升。前者陰氣所由降。若為水氣所隔。則當升者不升。當降者不降。陽不升則下雖鬱熱。上仍不渴。陰不降則上縱化熱。下則仍寒。譬之冬月嚴寒。陽氣伏於下。則井中水溫。出井則冷。夏月酷暑。陰氣伏於內。則井中水冷。出井則溫。故牡蠣澤瀉散證。不渴而比投寒瀉。栝樓薤麥丸證。雖渴而終用溫。暖其竝用栝樓根。一則以助上之陰。為寒瀉諸藥守禦。俾得有恃不恐。一則以安上之擾。使溫燥諸藥下達。俾無反顧之憂。於栝樓薤麥丸。其功在正面。在正面故其名居一方之首。而不愧於牡蠣澤瀉散。其功在根柢。在根柢故不居其名而先則。於此又可見栝樓根之為物。既能應上焦假熱之渴。又能應下焦真熱之不渴。謂之能益陰津。可謂之能補真陰。亦無不可。

國外學說 英美學說謂天花粉產中國美國等處。乃栝樓根製

成之粉也。又和漢藥考曰。天瓜粉（天花粉）為白色澱粉。冬季採掘栝樓根製之。製法與葛根製葛粉同。酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火潤燥。滑痰解渴。生肌排膿。消腫行水。通經。止小便利。（膀胱熱解則水行。而小便不數）治熱狂時疾。並胃熱。黃疸。口燥。唇乾。腫毒。宜虛熱人。

辨偽 鄭肖巖曰。偽名次花粉。聞此種係馬前頭混充。其性不可知。匪特不能生津止渴。且服之令人頭暈目眩。按花粉即栝樓根。秋後掘者結實有粉。夏日掘者有筋無粉。入土最深。皮黃肉白。氣味苦寒。能啓在下之水精上滋。厥功甚偉。所在皆有。價亦不貴。貨者偏以偽亂真。藉博蠅頭之利。其居心尚可問乎。更有一種洋花粉。無筋色白而嫩。其塊較大。或云係洋粉偽造。煎之即腐爛。皆無益之品。幸勿誤服也。曹炳章曰。按花粉。江蘇上海南匯鎮等處。出為山花粉。皮細結。肉白。性糯。無筋。起粉為最佳。亳州出為亳花粉。性糯。色白。無皮無筋。亦佳。嘉定古城江北通州

等處皆出。亦名山花粉。皮色黃有筋。略次。山東園東出者。為洋花粉。極大。質鬆多筋。色黃白。為最次。鄭君云。洋粉偽造。即此。實非偽造。因其質鬆。如粉作造。非真以粉可造也。

近人學說 張山雷曰。天花粉。蘇頌固經本草別有專條。即是瓜蒌之根。瀕湖削之。并入蒌根條中。是矣。然藥肆之所謂天花粉者。即以蒌根切片用之。有粉之名。無粉之實。其搗細澄粉之法。千金方已言之。瀕湖引周憲王說。亦有之。蓋出朱字救荒本草。（嘗頌按明史列傳。周定王。太祖第五子。以國土夷曠。庶草蕃庶。考核其可以佐饌餼者。四百餘種。繪圖疏之。名救荒本草。與瀕湖所引不異。王以洪熙元年薨。子憲王有燉嗣。則著書者非憲王。瀕湖序例亦言。洪武初著書云云。又確是定王時事。惟其書史志不載。蓋已失傳。但瀕湖明人親見其書。不知何以與史不合。史又稱憲王博學。或有所附益之歟。今吾嘉人頗喜製之。載入邑乘。視為土產之一。法於冬月掘取

蒌根。洗盡其外褐色之皮。帶水磨細。去滓澄清。換水數次。然後曝乾。精瑩潔白。絕無纖塵。沸湯瀉服。雖稠滑如糊。而毫不黏滯。秀色鮮明。清散如玉。與其他市品之歸入雜質者。絕不相同。益胃生津。洵推妙品。最宜於老弱病後。無黏膩礙化之弊。雖同此蒌根。而幾經淘洗。渣滓皆去。苦寒本性。亦已消除淨盡。更不慮其有寒中滑泄之變。尤為全其所長。去其所短。非原質之可以同日語矣。

配合應用 治消渴飲水。作粉法。取大栝樓根去皮。寸切。水浸五日。逐日易水。取出搗研。漉過澄粉。曬乾。每服方寸匕。水化下。日三服。亦可入粥及乳酪中食之。（千金方）用栝樓根薄切。炙取五兩。水五升。煮四升。隨意飲之。（肘後方）用生栝樓根三十斤。以水一石。煮取一斗半。去滓。以牛脂五合。煎至水盡。用煖酒先食。服如雞子大。日三服。最妙。（外臺祕要方）用栝樓根黃連三兩。為末。蜜丸。梧子大。每服三十九。日二服。又玉璽丸。用栝樓根人參等分。為末。蜜丸。

梧子大。每服三十九丸。麥門冬湯下。
(聖惠方)

①治傷寒煩渴思飲。栝樓根三兩。水五升。煮一升。分二服。先以淡竹瀝一斗。水二升。煮好。銀二兩。半冷飲汁。然後服此。(外臺祕要方)

②治百合病渴。栝樓根。牡蠣。蒸等分爲散。飲服方寸匕。(永類鈴方)

③治黑疽危疾。瓜蒌根一斤。搗汁六合。頓服。隨有黃水從小便出。如不出再服。(楊起簡便方)

④治小兒發黃。用生栝樓根搗取汁二合。蜜二大匙。和勻暖服。日一服。(廣利方)

⑤治小兒熱病。壯熱頭痛。用栝樓根末。乳汁調服半錢。(聖惠方)

⑥治虛熱咳嗽。天花粉一兩。人參三錢。爲末。每服一錢。米湯下。(集簡方)

⑦治偏痛痛極。劫之立住。用綿袋包暖陰囊。取天花粉五錢。以醇酒一盃浸之。自卯至午。微煎滾。露一夜。次早低凳坐定。兩手按膝。飲下卽愈。未下再一服。(本草蒙筌方)

⑧治小兒發腫。天花粉一兩。炙甘草一錢。水煎入酒服。(全幼心鑑方)

⑨治耳卒烘烘。栝樓根削尖。以臘豬脂煎三沸。取塞耳內。三日卽愈。(肘後方)

⑩治耳聾未久。栝樓根三十斤。細切。以水煮汁。如常釀酒。久服甚良。(肘後方)

⑪治產後吹乳。腫硬疼痛。輕則爲妬乳。重則爲乳癰。用栝樓根末一兩。乳香一錢。爲末。溫酒每服二錢。(永類鈴方)

⑫治乳汁不下。栝樓根燒存性。研末。飲服方寸匕。或以五錢。酒水煎服。(楊氏產乳方)

⑬治癰腫初起。用栝樓根苦酒熬燥。搗篩。以苦酒和塗紙上貼之。(孟詵食療方) 用栝樓根赤小豆等分爲末。醋調塗之。(楊文蔚方)

⑭治天泡溼瘡。天花粉。滑石等分。爲末。水調搽之。(普濟方)

⑮治楊梅天泡。天花粉。川芎。麝各四兩。槐花一兩。爲末。米糊丸。梧子大。每空心淡鹽湯下。七八十九丸。效。(簡便方)

⑯治折傷腫痛。栝樓根搗塗。重布裹之。熱除痛卽止。(肘後方)

⑰治筋脈不出。栝樓根搗傅之。日三易自出。亦治針刺入肉。(海上方)

⑱治痘後目障。天花粉。蛇蛻洗焙等分。爲末。羊子肝批開。入藥在內。米泔沖。煮熱切食。(周密齊東野語方)

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡脾胃虛寒而無燥熱者。禁用。惡乾姜。畏牛膝。乾漆。反烏頭。忌鐵。杓相爲之使。

著名方劑 消渴方。治消渴。(千金方) 用栝樓根。生薑。麥冬。蘆根(切)各二升。茅根(切)二升。咬咀。以水一斗。煮取三升。分三服。

參攷資料 其根直下。生年久者。長數尺。秋後掘者。結實有粉。夏月掘者。有筋無粉。不堪用。其實圓長。青時如瓜。黃時如熟柿。山家小兒亦食之。內有扁子。大如絲瓜子。殼色褐。仁色綠。多脂。作青氣。炒乾搗爛。水蒸取油。可點燈。(李時珍)

古醫別名 天花菜。
【天花藪】(綱目)

產地 出山西五臺山中。
形態 天花藪爲菜類。單屬之溼生植物。形如松花而大。色白。氣香。其味甚美。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。
主治 益氣殺蟲。

參攷資料 ①天花藪性味有毒。(飲膳正要) ②五臺多蛇。單感其氣而生。故味美而無益。其價頗珍。段成式酉陽雜俎云。代北有樹。雞如扛捲。俗呼胡孫眼。其此類與。(李時珍)

【天門】卽天門冬之古籍別名。與見和漢藥考。詳「天門冬」條。

原名 覆冬。
【天門冬】 命名 凡草之繁茂者。爲覆。本品莖茂而功同麥門冬。故名。

處方用名 淡天冬。提天冬。炒天冬。

古醫別名 藟藟。蒲冬。(爾雅) 顧棘。地門冬。筵門冬。淫羊藿。管松。無不愈。百部。淫草。(抱朴子) 顧勒。(本經) 天棘。淡羅樹。萬歲藤。(綱目) 天冬。天門。金華。商棘。天文冬。(和漢藥考)

四畫 天

外國名詞 Asparagus lucidus, Lindl (拉丁)

基本 屬百合科藥用天門冬之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天門冬以產四川爲上。雲南次之。湖南廣西又次之。十一月出。新萬國藥方卷五八十一篇。論此味又名淫羊藿。是錯誤。天冬乃根強淨肉。羊藿乃原枝。專用其葉。產北江連州。生長出產種類均不同。特糾正之。本品凡山野川谷及暖地之海濱間。恒多生焉。



冬 門 天

形態 按天門冬爲多年生之宿根草。莖似藤。莖絡他物。高至丈餘。葉小若鱗片。葉腋生枝。其色綠。曲如針。驟視之酷似葉。夏日開淡黃色之小花。兩三朵簇生一處。果實大如豆。熟則紅。中藏黑子六粒。數根叢生於一莖。採摺之充藥。

用或製蜜餞。作乾點。根作紡錘狀。兩端尖。長二三寸。粗五六分。外色白。或帶褐。其味苦。

種植 藥園間恒有栽植者。生苗時。沃地栽種。其子亦堪下種。但收成較晚耳。

採取 二三月或七八月間。採根曝乾。

製法 雷斅曰。凡使天門冬。採得去皮心。用柳木飯及柳木柴。蒸一伏時。灑酒令過。更添火蒸。攤地暴乾。用寇宗奭曰。麥門冬之類。雖曰去心。但以水漬漉。使周潤。滲入肌。俟軟。緩緩擊取。不可浸出脂液。其不知者。乃以湯浸一二時。柔即柔矣。然氣味都盡。用之。不效。乃曰藥不神。其可得乎。

性質 苦。平。無毒。

效能 滋腎水。潤肺燥。治肺痿。肺癰。痰嗽。消渴。用作強壯藥。治與衰老者。神經衰弱者。肺結核者。又爲祛疾鎮咳藥。用於輕症之咳嗽。

主治 諸暴風溼。偏痺。強骨體。殺三蟲。去伏尸。保定肺氣。去寒熱。養肌膚。利小便。冷而能補。久服輕

身益氣。延年不飢。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論天門冬曰。肺氣欬逆。喘息促急。肺萎生癰。吐膿除熱。道腎氣。止消渴。去熱中風。治溼疥。宜久服。養食之。令人肌體滑澤。白淨。除身上一切惡氣。不潔之疾。【唐】孫思邈千金翼論天門冬曰。陽事不起。宜常服之。【宋】大明諸家本草論天門冬曰。鎮心。潤五臟。補五勞。七傷。治嗽消痰。去風熱煩悶。【元】王好古湯液本草論天門冬曰。主心病。噎乾。心痛。渴而欲飲。痿厥嗜臥。足下熱而痛。【明】李時珍本草綱目論天門冬曰。潤燥滋陰。清金降火。【明】繆希雍本草經疏論天門冬曰。天門冬。正稟大寒初之氣。以生。得地之陰精。獨厚。味雖微苦。甘而帶辛。其氣大寒。其性無毒。要

爲作強之宜。而主骨。濕熱不去。下流客腎。能使人骨痿。腎欲堅。食食苦以堅之。天門冬。黃蘗之屬。是已。且腎者。水臟也。平則溫。而堅。燥則熱。而軟。味苦氣寒。正入腎。而除熱。堅。故強骨也。三蟲伏尸。必生與脾腎俱虛。內熱氣弱之人。若能殺蟲。辛能散結。故殺三蟲。而除伏尸也。肺爲華蓋之臟。喜清肅。而惡煩熱。亦畏濕熱。平則安。利。發聲清亮。一受火熱。則爲賊邪所干。而痰壅欬逆。氣喘吐血。寒熱聲啞之證。出焉。熱洩則痰散。而肺清。肺清則津液流通。氣得下降。而諸證自止矣。養肌膚。益氣力。利小便者。肺主皮毛。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。又肺爲水之上源。朝百脈。而去氣熱邪。退則肺得所養。故能養肌膚。益氣力。利小便也。冷而能補者。熱盛則肺腎俱虛。除虛熱。即補肺腎也。久服輕身。益氣延年。不飢者。熱退則水足。水足則精固。精固則腎氣益實。腎爲先天真氣之源。腎實骨強。延齡可知已。要之道書所錄。皆指遺世。獨立辟殺服餌之流者設。非謂恒人亦可望此。

也。【清】黃宮積本草求真論天門冬曰。天門冬甘苦大寒。據書載。瀉肺火。及兼補腎。然究止屬苦寒。安能滋腎而補水乎。所云能補水者。以肺本清虛。涼則氣寧而不擾。熱則氣行而不生。且肺為腎母。肺金失養。則腎亦燥而不寧。腎氣上攻。則肺益燥而受尪。而凡咳嗽吐衄。痰粘燥渴。肺癰肺痿等症。靡不因之。畢呈得此清肅之品。以為化源之自。則腎未必即補。而補腎之基。未必不於所清而先具也。是以又云補腎。但其性滑利。脾胃虛寒。及無熱而泄者。最忌。取肥大而明亮者。良。去心及酒蒸。用二冬。熬膏。良。【清】楊時泰本草述鈞元論天門冬曰。二冬皆由胃而或入心。或歸腎。以同奏功於肺。麥冬味甘平而氣微寒。天冬味甘苦。苦勝於甘。而氣寒。二冬之味俱厚。一則清心而復脈滋陰。一則通腎而潤燥益精。以腎忌燥而喜潤。又精不足者。補之以味。故天冬力勝也。其能保定肺氣者。丹溪有云。片苓瀉肺火。若肺虛者。多用則傷肺。必先以天冬保定肺氣。而後用之。蓋肺有火者。

肺陰未虛為實。肺陰不足則為虛。虛者。概以清火之味攻之。則其陰愈亡。經曰。二陰至肺。惟腎陰虛者。不能至於肺。而肺虛。天冬不止苦寒除熱。兼以潤膩益精。俾虛火不燥於陰中。而陰氣能極於上際。故肺氣賴以保定。所以主喘逆急促。痰嗽吐血。并肺痿癰膿也。腎陰足而心火寧。故能鎮心。肺陰下降入心。故主噎乾煩渴。腎氣至於肺。肺氣運至於腎。故治痿躄嗜臥。及足下熱痛。更益氣力而利小便也。但潤滯之味。同於麥冬。而清冷之性。過於麥冬。於脾胃生發之氣。大資酌量而投之。如繆氏所云。與慈菴山藥甘芍同用。誠知言哉。仲淳云。凡病因陰虛水涸。火起下焦。上炎於肺。而發痰喘。天冬誠為要藥。然苦寒損胃。易致泄瀉惡食。要知陰虛精絕之病。正賴脾胃氣強。能納能消。以滋精氣。若脾胃先困。則生化之源絕矣。必不得已。當以瀉以茯苓山藥甘草白芍同用。或用麥冬以代之。誤必致泄。方書有云。天冬治痰之本。半夏治痰之標。意固謂腎主液而脾主濕也。但天冬治

火盛作燥之痰。本陰氣之厚。以化燥。而痰自清。半夏治濕盛作滯之痰。本辛燥之氣。以散濕。而痰自行。二者自是相反。標本之說。不知何見。【清】鄒澍本經疏證論天門冬曰。花實者。草木功能遂就之秋。花為其極盛。實則其收藏也。然種類既繁。稟性自別。而體致遂殊。故有花而不實者。有不花而實者。從未有隨時隨地如天壤冬之當其時。則花而實。過其時則不花而實。植於此乃不花而實。植於彼又花而實者。夫曰入夏開花。屆秋結子。若至伏時則不花而實。又隨地皆花而實。獨在嶺南則不花而實。夏者陽氣最暢之時。入伏則暢已極。其將退矣。百粵近赤道下。陽終歲不藏。為海氣所溷。故雖值酷暑。抵暮亦涼。終不如內地之充暢收藏。各盡其致。則可知是物偏能收功於陽氣最橫絕無忌憚之所。即使使用不及時。陽氣欲退。猶能不待冠履。急足先趨。不戲其元不已矣。枝葉者。草木賦伎效能之象。枝為行氣之道。葉則性所著見也。故凡物之性潤者。必其枝滑澤而葉柔輒。從

未有根本枝葉。性迥相違。如天聲冬為極柔潤之物。而枝葉不生。逆刺則澀而細散者。夫刺者根橫於中。澀者膚戟於外。乃能任其中外之橫。且戟不開其生氣之僥游。而乘陽氣之暢。以敷榮以成實焉。則又可知是物非芒硝大黃之開。又非甘遂芫花之瀉。偏能使其滋柔滑澤之氣。流行條暢。無梗不拔。無塞不通。而引其純粹清明。以積精化氣。積氣全生矣。暴風漏偏痺熱之著於體。三蟲伏尸氣之隱於中。既遇此刺。不能凝澀。不能阻之物。涌沐以導化之。著者隨之而行。隱者隨之而散。則百骸順遂。津液充盈。骨髓又烏能不強也。風濕偏痺之上。著一暴字。以及三蟲曰殺。伏尸曰去。最是耐人玩索。夫風濕之中人也。或著於陽。或著於陰。在陽者命曰風。在陰者命曰痺。然風與痺未必中而即發也。蓋待其人陽氣之怒。不肯容邪。欲挾而去之。斯時所中之邪。適亦化熱。將欲猖獗。遂與正交搏而病作焉。邪正交搏之時。正病之暴起也。其能與正相搏。則其勢方盛。其熱方熾。於

四畫 天

時不乘其隙。以天覆冬之滑澤通達者。導正氣。逐邪氣。刷至末傳寒中。天覆冬。遂非所宜用矣。謂之暴。正以明病之久者不可用也。巢元方云。三蟲。就蟲。赤蟲。燒蟲也。就蟲。動則吐清水。出則心痛。貫心則死。赤蟲動則腸鳴。燒蟲多則為痔。極則為癩。因人瘡處。以生癰疽癬瘰。高疥。無所不為。又云。人身自有三尸諸蟲。與人俱生。此蟲忌血。能與鬼蠱相通。常接引外邪。為人患害。蓋諸蟲之種。確與人俱生。其得生息繁蕪。多由大氣有阻。濕停熱聚。生類既衆。遂與人為梗。殺之之術。諒非一端。其屬熱搏氣阻。肺腎陰虛者。自當以天覆冬殺之。謂之殺。正以明為病之物有形有生。若既死方點。出者非所宜矣。巢氏又云。伏尸之病。隱伏在人五臟內。積年不除。未發之時。身體平調。都如無患。若發動則心腹刺痛。脹滿喘急。外發秘要。述蘇遊論曰。傳尸之疾。相剋而生。毒氣內傳。周循五臟。漸就羸瘦。以至於死。其初牛臥。半起。號為殭屍。氣急咳嗽。名曰肺痿。骨節中熱。稱為骨蒸。或由淋瀝。

或由勞極。隨其所起。以相剋。而傳各有形證。傳遠則死。夫病之始。候為肺痿。為骨蒸。若非屬熱。又將何屬。既肺痿矣。骨蒸矣。復五臟以剋相傳。是亦熱之極。潤之極矣。且肺痿肺病。骨蒸腎病。肺腎之熱。潤。適合天覆冬之治。滋其潤。則枯澀去。清其熱。則病氣去。謂之去。正以明其病旬留之久。伏而不去。確與風濕偏痺之暴者對照矣。凡此之或久或暫。宜用不宜用。正病機之消息所關。天覆冬之情性所在。蓋外感之候多。始傳熱中。末傳寒中。內傷之候。初耗真氣。繼耗真精。天覆冬之用。外感不厭其早。內傷不厭其遲。然外感惡寒。尚在內傷陽氣委頓。是又非其所宜。親傷寒論。麻黃升麻之用。天覆冬。與金一物。天覆冬。及大八風散。小八風散。之治。拘攣歷節。可以明治暴病之法。魏外臺秘要。延年枸杞子煎。崔氏落腎散。古今錄驗。通命丸。彭祖丸。之治。虛勞。可以明治久病之法。矣。甚矣。天覆冬之接根入湯。可以游練素令潔白也。夫質本非白。潔之未必能白。質本潔白。又烏容游。

蓋惟其質本白。或不純而糙。或被染而汗。方賴游以復其初。人之身。白者。肺也。肌肉也。骨髓也。腸胃也。膀胱也。凡為火熱燥濕。染而為病。咸可屬天覆冬之。在肺則別錄所謂保定肺氣也。在肌肉及骨。則本經所謂暴風濕偏痺。別錄所謂養肌膚去寒熱也。在腸胃。則本經所謂殺三蟲去伏尸也。在膀胱。則別錄所謂利小便也。在髓。則本經所謂強骨髓也。然數者之間。出語各有深意。曰主。曰殺。曰去。曰利。則除病之詞也。曰強。曰保定。曰養。則又不可與除病同觀。夫強云者。能增益而使之強盛。保定云者。僅能使之不耗。養云者。能滋育之。不能使之有為。蓋天覆冬之為物。質柔潤。性滋膩。惟與腎為最宜。故於其所主之髓。最能效力。肺為嬌臟。喜清潤而惡溫燥。則次之。顧能為之除病而已。以為補劑。宜斟酌之。

辨偽 鄭有巖曰。天門冬始出。奉高山谷。其根白色。或黃色。柔潤多汁。稟水精之氣。而上通太陽。氣味甘寒無毒。主治諸暴風濕偏痺。強筋骨。殺三蟲。本經列為上品。聞有用福州小番薯。炊熟晒乾。偽充。良可慨已。曹炳章曰。天門冬。浙江温州台州俱出。肥大性糯。色黃明亮者佳。鮮時用礬水泡透。剝去外皮晒之。大小有提揀統之別。四川山東福建河南陝西亦產。風要肥壯黃亮。糯潤者皆佳。偽者尙少。

近人學說 張山雷曰。天門冬。肥厚多脂。本經雖曰苦平。其實甚甘。氣薄味厚。純以柔潤養液為功。本經主暴風。蓋指液枯內動之風而言。滋潤陰。則風陽自息。此即治風先治血之義。痺亦血不養筋之病。正與風燥相因而至。故治風者亦能治痺。非以祛外來之風。痺惟濕為陰寒之邪。痺病固亦有因於濕者。然必無甘寒陰藥。可治濕痺之理。蓋傳寫者誤。符之。天冬柔潤。豈可以療陰蠱之濕邪痺者。經氏經疏以尊經之故。指濕字為濕熱。已是曲說。須知濕熱宜於清理。安有滋膩助虐之法。而於別錄所主諸證。又處處牽定濕熱二字。遂致此藥之真性情。竟無一條適合。作爾自縛。是之謂乎。張石頑反謂。

三蟲伏尸。皆濕熱所化。亦為停滯所誤。須知濕熱生蟲。非勞瘵之蟲也。本經又曰。強骨髓則固。益液滋陰之正旨。三蟲伏尸。即血枯液燥之勞瘵。甘寒清潤。原以滋燥澤枯。是以治之。久服輕身。益氣延年。則以養陰益液。而極言其功效耳。別錄謂保定肺氣。則以肺熱葉焦。燥金受灼而言。甘寒潤燥。本是補肺正將。去寒熱者。亦陰虛液耗之乍寒乍熱。非外感邪甚之寒熱可知。養肌膚。益氣力。皆陰液充足之義。利小便者。肺金肅降。而水道之上源自清。亦津液滲露。而膀胱之氣化自旺。固非為濕熱互阻之水道不利言也。而結之以冷。而能補一句。則可知天冬偏於寒冷。惟燥火熾盛。灼陰液者宜之。而陽氣式微者。即有不勝其任之意。此別錄所以有大寒二字。而六朝以來諸家本草。固無一非以治燥火之症也。

四畫 天

能清熱保肺。下通與腎。故同麥門冬。百部。桑白皮。枇杷葉。玄參。貝母。童便。竹瀝。為清肺消痰止咳必用之藥。

① 天門冬膏。去積聚風痰。補肺。療咳嗽失血。潤五臟。殺三蟲伏尸。除瘰癧。輕身益氣。令人不飢。以天門冬流水泡過。去皮心。搗爛取汁。砂鍋文武炭火煮。勿令大沸。以十斤為率。熬至三斤。却入蜜四兩。熬至滴水不散。瓶盛。埋土中。一七。去火毒。每日早晚白湯調服一匙。若動大便。以酒服之。(醫方摘要方)

② 補陰除熱。滋腎家燥。天冬。地黃。麥門冬。五味子。黃蘗。車前子。枸杞。牛膝。為丸。脾胃弱者加山藥。白茯苓。砂仁以佐之。

③ 治滋陰養血。溫補下元。三才丸。用天門冬去心。生地黃二兩。二味用柳甌。算以酒灑之。九蒸九晒。待乾。秤之人參一兩。為末。蒸棗肉搗和丸。梧子大。每服三十九丸。食前溫酒下。日三服。(活法機要方)

④ 治虛勞體痛。天門冬末。酒服方寸匕。日三。忌鯉魚。(千金方)

⑤ 殺三蟲而除勞瘵。天門冬。乾

漆。百部。鼈甲。青黛。麝肝。象膽。

① 駐顏不衰。用天門冬同熟地黃。胡麻仁和蜜。久服。駐顏不飢。

② 治肺痿咳嗽。吐涎沫。心中溫熱。咽燥而不渴者。生天門冬。搗汁。斗酒一斗。餵一升。紫苑四合。銅器煎至可丸。每服杏仁大一丸。日三服。(肘後方)

③ 益肺亦治消渴。天門冬。麥門冬。五味子。熬膏。入煉蜜。

④ 除肺痿吐膿血。天門冬。慈苣仁。桑葉。白芨。紫苑。百部。百合。

⑤ 治陰虛火動。有痰。不堪用燥劑者。天門冬一斤。水浸。洗去心。取肉十二兩。石白搗爛。五味子水洗去核。取肉四兩。晒乾。不見火。共搗丸。梧子大。每服二十九丸。茶下。日三服。(簡便方)

⑥ 治肺勞風熱。止渴去熱。天門冬去皮。心。煮食。或曝乾。為末。蜜丸。服尤佳。亦可洗面。(孟詵方)

⑦ 治一切風。能愈大風病。天門冬。甘菊花。釀酒。水煮。則除風熱。兼除煩悶。

⑧ 治風顛發作。則吐。耳如蟬鳴。引脇牽痛。天門冬去心皮。曝乾。搗

為末。酒服方寸匕。日三服。久服良。(外臺秘要方)

① 除大腸燥熱。天冬。麻子仁。麥門冬。生地黃。童便。胃強者略加桃仁。

② 治婦人骨蒸。煩熱。寢汗。口乾。引飲。氣喘。天門冬十兩。麥門冬八兩。並去心。為末。以生地黃三斤。取汁熬膏。和丸。梧子大。每服五十丸。以酒送散。去甘草煎湯下。又方。天門冬同青蒿。鼈甲。麥門冬。銀柴胡。牛膝。白芍藥。地骨皮。五味子等分。(活法機要方)

③ 治口瘡。連年不愈者。天門冬。麥門冬。並去心。玄參。等分為末。煉蜜丸。彈子大。每噉一丸。乃僧居寮所傳方也。(外科精義方)

④ 治小腸偏墜。天門冬三錢。烏梅五錢。以水煎服。(活人心鏡方)

⑤ 治面黑。令白。天門冬。曝乾。蜜搗作丸。日洗面。(聖濟總錄方)

⑥ 治諸般癰腫。新搗天門冬三兩。洗淨。沙盆搗細。以好酒澆汁。頓服。未效。再服必愈。此祖傳經驗方也。(醫學正傳方)

⑦ 治吐血。天冬。生地黃。麥門冬。

四畫 天

白芍藥、鷓鴣甲、牛膝、杜仲、續斷、童便、用灶 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛而泄瀉者禁用。畏曾青。忌鯉魚。垣衣地黃。貝母爲之使。

參攷資料 此有二種。一種苗有刺而滑。一種無刺而滑。皆是門冬。俗云顯棘澆草者。形貌詔之。雖作數名。終是一物。二根澆垢俱淨。門冬澆草五名也。詔音命。目之也。(蘇恭) 服天門冬。禁食鯉魚。誤食中毒者。浮萍汁解之。搗汁。製雄黃磁砂(楊損之) 列仙傳云。赤松子服天門冬。齒落更生。細髮復出。太原甘始服天門冬。在人間三百餘年。聖化經云。以天門冬夜荅等分爲末。日服方寸匕。則不畏寒。大寒時單衣汗出也。(唐慎微) 按爾雅云。齋藤冬。注云。門冬也。一名滿冬。抱朴子云。一名顯棘。或名地門冬。或云筵門冬。在東岳名淫羊糞。在中岳名天門冬。在西岳名管松。在北岳名無不愈。在南岳名百部。在京陸山阜名顯勒。在越人名澆草。雖處處有之。其名不同。其實一也。別有百部草。其根有

百許如一。而苗小異。其苗似菝葜。惟可治咳。不中服食。須別之。(韋禹錫) 處處有之。春生藤莖。大如銀股。高至丈餘。葉如茴香。極尖細而疏滑。有逆刺。亦有澀而無刺者。其葉如絲杉而細散。皆名天門冬。夏生細白花。亦有黃色及紫色者。秋結黑子。在其根枝旁。入伏後無花。暗結子。其根白或黃紫色。大如手指。圓實而長二三寸。大者爲勝。一科一二十枚同撮。頗與百部根相類。洛中出者。大葉粗幹。殊不相類。嶺南者無花。餘無他異。(蘇頌) 苦以泄滯血。甘以助元氣。及治血妄行。此天門冬之功也。保定肺氣。治血熱。使肺上氣喘促。宜加人參黃芪爲主。用之神效。(張元素) 草之茂者爲靈。俗作門。此草蔓茂而功同麥門冬。故曰天門冬。或曰天棘。爾雅云。鬚顯棘也。因其細葉如鬚有細棘也。顯天音相近也。按救荒本草云。俗名萬歲藤。又名婆羅樹。其形與治肺之功。頗同百部。故亦名百部也。藤藤乃營實苗。而爾雅指爲門冬。蓋古書錯簡也。(李時珍)

【天門冬酒】

條治 用天冬 去心煮汁。同麴 米釀酒。初熟微酸。久乃味佳。

主治 潤五臟和血脈。久服除 五勞七傷。癩癩惡疾。

【天門精】

即天名精之古籍別名。 典見別錄。詳【天名精】條。

【天青】

即扁青之古籍別名。典見 綱目。詳【扁青】條。

【天青地白草】

即野苧麻之古籍 別名。典見綱目拾遺。詳【野苧麻】 條。

【天南星】

原名 虎掌。 命名 本品之根。四 畔有圓牙。形如虎掌。又根圓色白。 形似老人星狀。故名。

處方用名 生南星。熟南星。膽 星。製膽星。陳膽星。膽南星。真京膽。 杜製膽星。

古籍別名 虎骨。綱目。鬼菊 蕒。日華本草。半夏精。蛇頭草根。

(和漢藥考)

外國名詞 Arisaema japo- nicum, Br. (拉丁)


基本 屬天南星科。藥用地下 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。 南星產自湖北。鎮江來者。京星。廣 西來者。西星。



(一) 天南星

形態 按天南星爲多年生草 本。自生於山野之陰地。莖高三四 尺。葉爲複葉。具長葉柄。小葉爲廣 披針形。數葉相湊。狀若鳥足。花爲 單性。排列作肉穗花序。花軸之上 部。鈍而不銳。被以紫黑色之佛焰 苞。果實成熟。則呈鮮美之紅色。兒 童每誤食之。則唇舌立即腫痛。其 地下莖。多澱粉質。可製澱粉。北海 道土人或竟煮食云。其根爲圓塊 狀。類似菊蕒。大可寸許。外灰褐而



(二) 天南星

內白。味辛烈如灼。

種類 普通南星之區別有四。大而四畔有圓牙者南星。小而四畔無圓牙者由致。用牛膽汁製成者曰陳膽星。用姜礬湯製成者曰南星。又和漢三才圖會曰。按南星本名虎掌。倭名抄亦祇有虎掌。無南星。南星之名蓋昉於唐時。今人無識虎掌者。疑南星即虎掌子所出。一物而二名也。南星又有二種。一種花房作淺青色。末如鼠尾。高不過尺許。一種無鼠尾。高約二尺。日本產。以日向薩摩所出為良。豐前、中津、藝州、廣島所出次之。又大和本草曰。南星有二種。其一葉似芋葉。有光而分枝為三。其實紅。多集於一處。如玉蜀黍實。十月而成熟。其一似菟藟。莖多黑點。花反張如鏡。根入藥用。然惟大根可用。小根則性薄矣。

採取 二月八月間採根。削去圓牙陰乾。

製法 李時珍曰。凡南星須用一兩以上者佳。治風痰有生用者。須以溫湯洗淨。仍以白礬湯或

四盡 天

入皂角汁浸三日。夜日日換水。暴乾用。若熟用者。須於黃土地掘一小坑。深六七寸。以炭火燒赤。以好酒沃之。安南星於內。瓦盆覆定。灰泥固濟。一夜取出。急用。即以濕紙包於煆灰火中炮製也。一法治風熱痰。以酒浸一宿。桑柴火蒸之。常酒灑入甑內。令氣猛。一伏時取出。竹刀切開。味不麻舌為熟。未熟再蒸。至不麻乃止。脾虛多痰。則以生薑渣和黃泥包。南星煆熟。去泥焙用。造星法。以薑汁礬湯和南星末作小餅。于安籃內。楮葉包蓋。待上黃衣。乃取曬收之。造星法。以南星生研末。臘月取黃牯牛膽汁和劑。納入膽中。繫懸風處乾之。年久者彌佳。

性質 苦溫。有大毒。

效能 散經絡風疾。治痲痺驚癇。用為鎮瘻。祛痰。健胃。發汗。驅蟲。藥。因含有安息香酸。故能祛痰。風濕痛與痛風。可用作鎮痛劑。

主治 心痛。寒熱結氣。積聚伏梁。傷筋痠拘。利水道。除陰下濕。風眩。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論。南星曰。主痲瘋。傷寒時疾。強陰。【唐】陳藏器本草拾遺論。南星曰。金瘡折傷。瘀血搏傳之。【宋】開寶重定新本草論。南星曰。主中風。痲痺。除痰下氣。利胸膈。攻堅積。消癰腫。散血墮胎。【宋】大明日華諸家本草論。南星曰。蛇蟲咬。疥癬惡瘡。【金】張元素珍珠囊論。南星曰。去上焦痰及眩運。【元】李東垣用藥法象論。南星曰。主破傷風。口噤身強。【元】王好古湯液本草論。南星曰。補肝風虛。治痰。功同半夏。【明】李時珍本草綱目論。南星曰。治驚癇。口眼喎斜。喉痺。口舌瘡。糜。結核。解頰。【明】釋希雍本草經疏論。南星曰。南星味苦。性烈而有毒。入手太陰經。為風寒鬱於肺家。以致風痰壅盛之要藥也。炎上作苦。苦則善燥。從革作辛。辛則善散。溫則開通。故主痲痺下氣。破堅積。消癰腫。利胸膈。散血墮胎。【明】李士材本草圖解論。南星曰。南星苦辛。有瘴脾肺之藥也。主風痰。痲痺。眩運。口噤。身強。筋脈拘攣。口眼歪斜。堅積癰腫。利水去濕。散血墮

胎。味辛而散。故能治風散血。氣溫而燥。故能特濕除涎。性緊而毒。故能攻堅拔膜。凡諸風口噤。需為要藥。治風痰。是其所長。若非西北人。真中風者。勿服。濕痰及陰虛燥痰者。均大忌。【清】黃宮繡本草求真論。南星曰。南星味辛而麻。氣溫而燥。性緊而毒。惟其味辛。則凡中風不語。及或破傷風。故書載能克治。以其辛能散風。故也。惟其性燥。則凡痲痰固結。筋脈拘攣。得以能通。以其燥能除濕。而痰自去也。惟其性緊。則凡疝瘕結核。胎產難下。水腫不消。得以攻逐。以其性緊急迫。而堅自去也。性雖有類半夏。然半夏專走腸胃。故嘔逆泄瀉。得之以為嚮導。南星指走經絡。故中風痲痺。亦得以之為嚮導。半夏辛而能散。仍有內守之意。南星辛而能散。決無有守之性。其性烈於半夏也。南星專主經絡風痰。半夏專主腸胃濕痰。功雖同而用有別也。但陰虛燥疾。服之為切忌耳。根似半夏。看如虎掌者良。以礬湯或皂角汁浸三晝夜。暴用。或酒浸一宿。蒸。竹刀切開。至不麻乃止。或置

渣黃泥和包煨熟。用造麵法。以煎汁。糝湯和南星末。作小餅子。安籃內。楮葉包蓋。待上黃衣。乃曬收之。曬製味苦性涼。能解小兒風痰熱滯。故治小兒急驚最宜。

辨偽 鄭肖巖曰。杜鰾星。名京鰾星。或云卽江南土製。色有花點不黑。質極硬不軟。不知何物偽造。誤人不少。南星氣味苦溫。有大毒。牛膽汁苦大寒無毒。以牛膽汁製南星。所以殺燥烈之性。而並解其毒。蘇頌云。治驚風有奇功。匪特除痰下氣攻積也。若偽製射利。貽害多已。曹炳章曰。按製造鰾星法。臘月黃牛膽汁。并漂淨生南星。研細末如稀糊。仍入膽皮內。懸掛有風無日處陰乾。至次年將皮剝去。再研細。用新臘牛膽同前製法。會手製至三年。其色猶黃白。至九年。棧揭色耳。此沈荈如法。其他如本草明辨製法略異。方亦錄下。以備參考。擇臘月庚申日。以漂天南星。川貝母各半。研極細末。以黃牛膽一具。上開一孔。不令汁出。將二味和入於膽中。懸掛於前風日之中。俟乾。去膽皮。另換一膽。如是

者九次。苟能一年一次。九年成功者最佳。今市上所售色黑如漆者。乃小元參研末。搗蜜如餅。裝入雞肚內。曬乾充用。害人匪淺。

近人學說 張山雷曰。南星本經稱為虎掌。瀕湖謂以其葉之形似得名。苦溫辛烈。故專逐停痰積滯。而亦能行氣導滯。本經主心痛寒熱結氣者。卽指痰濕凝滯。氣結不通而言。凡古人之所謂心痛。大率皆今之所謂胃氣痛。多屬氣滯寒凝。或爲濕痰阻塞之症。故辛溫氣烈。力能開泄壅塞之藥。皆其專主。固爲實證。而設。非肝腎陰虛者。所可誤投。且既能宣通。則亦可攻積破瘀。故又治積聚伏梁。伏梁蓋合五臟積聚。統稱其中。非內難兩經之伏梁。專爲一臟之病。痿與拘攣。皆濕盛傷筋之症。此爲逐濕專將。自是傷筋主藥。原與跌仆之傷不同。利水道者。濕無所容。水道自無不利之理。此乃泄導積滯之猛劑。與茯苓澤瀉等淡滲不同。別錄謂除陰下濕。則前陰濕汗。皆濕熱蘊蓄使然。此乃瀉濕淫專主之藥。雖性本溫燥。似非濕熱所宜。惟

燥能勝濕。亦正非此不可。况後世製藥之法。久已遠勝於古。則雖是濕熱。亦無慮其偏於辛溫矣。惟別錄又主風眩。蓋指濕痰蘊熱。生風上陵之眩暈。以此開痰滌濕。則風自息而眩自已。非虛風之眩暈可知。千金方以一味南星。醋製末服。治婦人頭風。攻目作痛。局方玉壺丸。以南星半夏。治風痰頭暈。目眩吐逆。開寶本草。亦謂天南星主中風麻痺。皆卽此理。豈謂血虛風眩。而亦可以此療之。而王氏海藏。竟謂此藥補肝風虛。則大謬矣。又曰。天南星產於陰濕膏密之處。不爲日照。則愈易長大。巨者莖高七八尺。大如人臂。其根可重數斤。然生長於濕濁之中。而偏善開泄濕邪。物理相反。最不可測。蓋辛溫善走。見其天職。功用與半夏相似。而燥烈過之。故非製過不可用。其生者僅可爲止血定痛消腫。外敷藥料中之輔佐品。後世盛行牛膽製法。今已久爲通用之品。則取用其開宣化痰之長。而去其峻烈傷陰之弊。古稱南星大毒。然如此用之。已可謂之無毒法至善也。但市肆中

之所謂陳腐星者。形色亦頗不一。價值甚有低昂。惟以黑色潤如膏者爲佳。其枯槁乾燥者。亦不堪用。

配合應用 南星得牛膽則燥氣減。得火炮則毒性緩。

- 治諸風口噤。天南星炮剉。大人三錢。小兒三字。生薑五片。蘇葉一錢。水煎。減半。入雄豬膽汁少許。溫服。又方。南星得薑桂附。主破傷風口噤身強。(仁齋直指方)
- 治小兒口噤。牙關不開。天南星一枚。煨熟。紙裹。斜包。剪一小孔。透氣於口中。牙關自開也。一方用生南星同薑汁擦之。自開。
- 治小兒驚風。墜涎散。用天南星一兩。重一箇。換酒浸。七伏時。取出。安新丸上。週迴炭火炙裂。合濕地。出火毒。爲末。入硃砂一分。每服半錢。荊芥湯調下。每日空心一服。午時一服。(經驗方)
- 治小兒吐瀉。或誤服冷藥。脾虛生風。痰慢驚。天王散。天南星一箇。重八九錢者。去臍。黃土坑深三寸。炭火五斤。煨赤。入好酒半盞。安南星在內。仍架炭三條在上。候發裂。取剉。再炒熟爲末。用五錢。天麻

煨熟研末一錢。辟香一字。和勻。三歲小兒用半錢。以生薑防風煎湯調下。亦治久嗽惡心。(錢乙小兒方)

⑤ 治風癱痰迷。堅痰丸。用天南星九蒸九曬爲末。薑汁麴糊丸。梧子大。每服二十丸。人參湯下。石菖蒲麥門冬湯亦可。又方。南星得桂枝。乾薑。甘草。細辛。江西北邊人真中風。風痰猝墮。僵仆。又方。南星得牛膽。皂角。川烏。茯神。牛黃。天竺黃。丹砂。治驚癇。加天麻。治一切風痰壅盛。(衛生寶鑑方)

⑥ 治癩利痰。天南星煨香一兩。硃砂一錢。爲末。猪心血丸。梧子大。每防風湯化下一丸。(普濟方)

⑦ 治口眼喎斜。天南星生研末。取自然薑汁調之。左貼右。右貼左。(仁存方)

⑧ 治角弓反張。南星。半夏等分。爲末。薑汁竹瀝灌下一錢。仍灸印堂。(摘玄方)

⑨ 治打撲金刃傷。及破傷風傷。濕發病。強直如癱狀者。胡氏奪命散。又名玉真散。天南星。防風等分。爲末。水調敷瘡。出水爲妙。仍以溫

酒調服一錢。已死心尚溫者。熱童便調灌二錢。關內傷墜壓者。酒和童便。連灌三服。即甦。亦可煎服。(三因方)

⑩ 傳金瘡折傷瘀血。用天南星同半夏搗細末。入降真香末。

⑪ 治婦人頭風。天南星一箇。搗地坑燒赤。安藥於中。以醋一盞沃之。蓋定。勿令透氣。候冷。研末。每服一字。以酒調下。重者半錢。(千金方)

⑫ 治風痰頭痛不可忍。天南星一兩。荊芥葉一兩。爲末。薑汁糊丸。梧子大。每食後薑湯下二十九丸。又上清丸。用天南星。茴香等分。生研末。鹽醋煮麵糊丸。如上法服。(經效濟世方)

⑬ 治風痰頭暈目眩。吐逆煩瀆。飲食不下。玉壺丸。用生南星。生半夏各一兩。天麻。牛兩。白麵三兩。爲末。水丸。梧子大。每服三十九丸。以水先煎沸。入藥煮五七沸。漉出。放溫以姜湯吞之。(和劑局方)

⑭ 治腦風流涕。邪風入腦。鼻內結硬。涕流。澀。大白南星切片。沸湯泡二次。焙乾。每用二錢。取七箇

甘草五分。同煎服。三四服。其硬物自出。腦氣流轉。澀涕自收。以大蒜。薑末作餅。隔紗貼額前。熨斗熨之。或以香附。薑末。吹入鼻中。(直指方)

⑮ 治小兒風痰。熱毒癩滯。涼心壓驚。抱龍丸。用牛膽南星一兩。入金錢薄荷十片。丹砂一錢。牛龍腦麝香各一字。研末。煉蜜丸。芥子大。每服一丸。竹葉湯化下。(全幼心鑑方)

⑯ 治壯人風痰。及中風中氣初起。星香飲。用南星四錢。木香一錢。水二盞。生薑十四片。煎六分。溫服。(王碩易簡方)

⑰ 治心膽被驚。神不守舍。或痰迷心竅。恍惚健忘。妄言妄見。壽星丸。天南星一斤。先掘土坑一尺。以炭火三十斤。燒赤。入酒五升。浸乾。仍安南星在內。盆覆定。以灰塞之。勿令走氣。次日取出。爲末。另用琥珀一兩。硃砂二兩。爲末。生薑汁打麵糊丸。梧子大。每服三十九丸。至五十九丸。煎人參石菖蒲湯下。一日三服。(和劑局方)

⑱ 治痰癱臂痛右邊者。南星製若此各等分。生薑三片。水煎服之。(摘玄方)

⑲ 治風痰咳嗽。大天南星一枚。炮製研末。每服一錢。水一盞。薑三片。煎五分。溫服。每日早午晚各一服。(千金博濟方)

⑳ 治氣痰咳嗽。玉粉丸。南星麴。半夏。陳橘皮各一兩。爲末。自然薑汁打糊丸。如梧子大。每服四十九丸。薑湯下。若寒痰去橘皮。加官桂。(東垣方)

㉑ 治中晚氣滯。痰涎煩悶。頭目不清。三仙丸。生南星。去皮。半夏各五錢。並湯泡七次。爲末。自然薑汁和作餅。鋪竹篩內。以楮葉包覆。待生黃成。麴。曬乾。每用二兩。入香附末一兩。糊丸。梧子大。每服四十九丸。食後薑湯下。(百一選方)

㉒ 溫中散滯。消導飲食。天南星炮。高良薑炮。各一兩。砂仁二錢。半爲末。薑汁糊丸。梧子大。每薑湯下五十九丸。(和劑局方)

㉓ 治酒積酒毒。天南星丸。用正端天南星一斤。土坑燒赤。沃酒一斗。入坑。放南星。盆覆。泥固封。一夜取出。酒和水洗淨。切片。焙乾。爲末。

入硃砂末一兩。薑汁麵糊丸。梧子大每服五十九丸。薑湯下。(楊氏家藏方)

治小兒解齒。齒開不合。鼻塞不通。天南星炮去皮爲末。淡醋調。餅船上貼額門。炙手頓熨之立效。(錢乙小兒方)

治小兒口瘡。白屑如鷄口。不須服藥。以生天南星去皮脂研末。醋調塗足心。男左女右。(關孝忠集效方)

治走馬疳蝕。透骨穿腸。生南星一箇。當心剉空。入雄黃一塊。麩裏燒。候雄黃作汁。以盞子合定。出火毒。去麩爲末。麝香少許。拂疳數日甚效。(經驗方)

治風蟲牙痛。南星末塞孔。以霜梅食住去涎。(摘女方)

治喉風喉痺。天南星一箇。剉心。入白僵蠶七枚。紙包煨熟。研末。薑汁調服一錢。甚者瀉之吐涎愈。名如聖散。(博濟方)

治痰疔結核。大者如拳。小者如粟。或軟或硬。不疼不癢。皆宜用此藥。不可輒用針灸。南星膏。生天南星大者一枚。研爛。滴好醋五七

點。如無生者。以乾者爲末。醋調。先用針刺。令氣透乃貼之。覺癢則頻貼取效。(嚴子禮濟生方)

治身面疥子。醋調南星末塗之。(簡易方)

用蠶 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛及有燥疾者禁用。畏附子。乾姜。生姜。防風。惡莽草。

著名方劑 青州白丸。治一切風。及小兒驚風。婦人血風。大人頭風。(局方)用南星三兩。白附子二兩。半夏七兩。川烏半兩。(各生用)爲細末。放磁器中。日曬夜露。春五夏三。秋七冬十日。以糯米粉。麥粥丸。姜湯下。風症溫酒下。驚風薄荷湯下。三生飲。治卒中昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。丹痰厥氣厥。(古方)用南星一兩。(生用)川烏五錢。(去皮生用)附子五錢。(去皮生用)木香二錢。爲末。每服五錢。薑水煎。加人參一兩。本方去烏附名星香散。治痰厥氣厥足矣。

銀液丹。治諸風痰涎。結心。腦滿。頭痛。目運。面熱。心忪。痰唾稠黏。精神昏憤。及風涎潮搐。並宜服

(局方)用南星三分。(爲末)硃砂半兩。(研飛)錢粉。水銀各三兩。(結砂子)膩粉一兩。(研)黑鉛

(煉十遍)秤三兩。與水銀結砂。爲水塊。同甘草十兩。水煮。半日候冷。研。研勻。麪和丸。梧子大。每服二丸。同薄荷蜜湯下。姜湯亦可。微爲度。食後服。如治風癩。不拘時候服。

卷致養料 天南星。卽本草虎掌也。小者名由跋。古方多用虎掌。不言天南星。南星近出。唐人中立此名。爾(蘇頌)虎掌。今河北州郡有之。初生根如豆。漸長大似半夏。而扁。年久者根圓及寸。大者如雞卵。周匝生圓牙三四枚。或五六枚。三四月生苗。高尺餘。獨莖。上有葉如瓜。五六出分布。尖而圓。一窠生七八莖。時出一莖作穗。直上如鼠尾。中生一葉如匙。莖葉作房。旁開一口。上下尖中有花。微青褐色。結實如麻子。大熟卽白色。自落布地。一子生一窠。九月苗殘。取根。今冀州人菜園中種之。呼爲天南星。又曰。天南星。處處平澤有之。二月生苗似荷梗。其莖高一尺。似

菜。葉如荷葉。兩枝相抱。五月開花。似蛇頭。黃色。七月結子作穗。似石榴子。紅色。二月八月採。根似芋而圓扁。與荷葉相類。人多誤採。了不可辨。但荷葉莖斑花紫。南星根小。柔膩。肌細。炮之易裂。爲可辨。爾。南星卽本經虎掌也。大者四邊皆有牙子。採時削去之。江州一種。草葉大如掌。面青背紫。四畔有牙如虎掌。生三四葉爲一本。冬青。不結花實。治心疼寒熱積氣。亦與虎掌同名。故附見之。(蘇頌)大者爲虎掌。南星。小者爲由跋。乃一種也。今俗又言大者爲鬼白。小者爲南星。殊爲謬誤。(李時珍)天南星之名。始自開寶。卽本經之虎掌也。以葉取象。則名虎掌。根類取名。故曰南星。雖具二名。實係一物。爲開瀉風痰之真藥。本經治心痛寒熱結氣。卽開寶之下氣利胸膈也。本經之治積聚伏梁。卽開寶之破堅積也。本經之治筋痿拘攣。卽開寶之治中風除麻痺也。本經之利水道。卽開寶之散血隨胎也。蓋緣一物二名。後世各執一例。是不能無兩歧之說。卽仲醇之明。尙以開寶之

文。衍之爲疏。而本經主治。置若罔聞。何怪諸家採集藥性。一皆舍本逐末乎。(張石頑) 按半夏辛而能守。南星辛而不能守。其性烈於半夏也。半夏治濕痰。南星治風痰。其用別於半夏也。故其根雖似半夏。有毒亦似半夏。但似同實異耳。(伏名)

【天垢子】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。
 【天姥連】即南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南連』條。
 【天胡荽】即石胡荽之古籍別名。典見綱目。詳『石胡荽』條。
 【天苴】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。
 【天茄】 產地。出粵地。及關中諸處。



茄 天

形態 天茄爲茄類之一種。其實大如拇指。而形似茄。有棧色。黑

四畫 天

質堅如石。擊之不散。蒂黃黑如醬色。其實可供藥用。
 主治 胃脘痛。水磨服。並解蠱毒。

參攷資料 天茄有一種似牽牛花嫩子。蘇人採爲蜜餞入食品者。亦名天茄。大能破氣。與此迥別。(趙學敏)

【天茄子】即龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳『龍葵』條。
 【天茄彌陀花】即曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅花』條。
 【天韭】即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳『垣衣』條。
 【天香菜】即苦菜之古籍別名。典見綱目。詳『苦菜』條。
 【天香油】即鬼香油之細葉者。詳『鬼香油』條。

【天師粟】 命名 傳說本品爲張天師學道於蜀所遺。故名。
 古籍別名 婆羅子。(本草綱目) 武吉。(楊春涯驗方)
 產地 出西蜀山中。及西歐等處。

形態 天師粟爲夷果類之一種。形似栗而味美。惟獨房若棗實。可供藥用。



粟 師 天

性質 甘。溫。無毒。
 主治 久食已風癩。

【天師葫】即大蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大蒜』條。
 【天草】即石花菜之日本名詞。詳『石花菜』條。
 【天馬】即螳螂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『螳螂』條。
 【天毯草】 古籍別名 盒子草。盒兒藤。龜兒草。鸞若木。水荔枝。(綱目拾遺)

形態 天毯草爲莖草類之一種。苗高三四尺。葉尖長。有鋸齒。如波斯花而有小絨。五月間結實如穗。或謂秋月結實。實如荔枝。色青有刺。殼上中有斷紋。兩截相合。毬

內藏子二粒。生則青。老則黑。每片渾如魚。其葉子可供藥用。

性質 有小毒。
 主治 蝨毒蛇傷。疥癩初起。搗傳之。

參攷資料 天毯草似預知子。近時人罕用。而吳氏遷程著從新。以預知子爲近日所無。真不知即天毯草也。世不用。而草醫又易以他名。(趙學敏) 天毯草丹術家取斗。伏硫汞。根伏雌雄。(趙學敏)

【天紫蘇】即黃麻葉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃麻葉』條。
 【天荷】即海芋之古籍別名。典見綱目。詳『海芋』條。

原名 赤箭。
 【天麻】 命名 本品乃赤箭之根。赤箭莖如箭。斵而色赤。故名。
 處方用名 明天麻。煨天麻。天麻片。

古籍別名 鬼督郵。離母。(本經) 赤箭。芝。定風草。(藥性本草) 獨搖芝。合離草。(抱朴子) 神草。(吳普本草) 御風草。(雷公炮炙論) 羊角天麻。醬瓜天麻。白龍皮。

四畫 天

(本草綱目)石筍。郭芝。分陸草。部羅木。(和漢藥考)

外國名詞 Gastrodia, Tsa-

g, Bl. (拉丁)

基本 屬蘭科。藥用天麻之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

天麻四川、雲南、陝西、漢中所產者

均佳。每年春秋兩季收成。貴州亦

有產。但全無氣味。不適用。日本亦

有產。亦無味。不適用。用姜汁漬。蒸

熟。吹爽開片。名曰製麻。

形態 按天麻為多年生草本。

寄生於山野林中之陰地。春日擢

芽。莖高三四尺。色紅黃。形圓直立。

中空有節。宛如箭筈。故有赤箭之

稱。莖之下部生鱗狀葉。無葉綠素。

至夏稍開不整齊之花。色亦紅

黃。相綴而為總狀花序。根為淡褐

色之塊根。長三五寸。徑寸許。上圓

下不尖銳。有皺紋。入藥。以根已成

熟開裂。透映而堅實者為佳品。藥

肆販賣者多切斷。

採取 四月八月採根。曝乾。

製法 雷斅曰。修事天麻。十兩

剉。安於瓶中。用藥蕪子一銖。緩火

熬焦。蓋於天麻上。以三重紙封緊。

從已至未。取出蕪藥。炒過。蓋繫如前。凡七遍。用布拭上氣汗。刀劈焙乾。單搗用。若用御風草。亦同此法。李時珍曰。此乃治風痺藥。故如此修事也。若治肝經風虛。惟洗淨。以濕紙包於糠火中。煨熟。取出切片。酒浸一宿。焙乾用。

性質 辛溫無毒。

效能 疏痰。熄風。治眩暈。驚瀾。瘧疾。寒濕。痺用。為退熱。鎮痙。鎮痛等藥。

主治 殺鬼精。物。蠱。毒。惡。氣。久服。益。氣。力。長。陰。肥。健。輕。身。增。年。消。腫。下。支。滿。寒。疝。下。血。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論天麻曰。治冷氣。癱。痺。癱。瘓。不。隨。語。多。恍。惚。善。驚。失。志。【宋】

開寶重定新本草論天麻曰。主諸風。濕。痺。四。肢。拘。攣。小。兒。風。癩。驚。氣。

利。腰。膝。強。筋。力。久。服。益。神。輕。身。長。年。【宋】大明諸家本草論天麻曰。

助。陽。氣。補。五。勞。七。傷。鬼。疰。通。血。脈。開。關。竅。服。食。無。忌。【金】張元素珍

珠囊論天麻曰。治風虛。眩暈。頭痛。【明】穆希雍本草經疏論天麻曰。

天麻味辛。氣平。無毒。大明云。暖入

足厥陰經。厥陰為風木之臟。諸風

濕痺。四。肢。拘。攣。小。兒。風。癩。驚。氣。皆

肝。臟。為。邪。氣。所。客。致。病。天。麻。入。肝。

味。辛。氣。暖。能。逐。風。濕。外。邪。則。肝。氣

平。和。前。證。自。穆。矣。肝。主。筋。位。居。於

下。故。能。利。腰。膝。強。筋。力。也。風。濕。經

注。則。身。重。氣。乏。能。除。風。濕。則。身。自

輕。氣。自。益。也。凡。頭。風。眩。暈。與。夫。痰

熱。上。壅。以。致。頭。痛。及。眩。或。四。肢。濕

痺。麻。木。小。兒。風。癩。驚。悸。等。證。所。必

須。之。藥。【清】黃宮繡本草求真論

天麻曰。天麻辛平微溫無毒。性升

屬陽。為肝家氣分定風藥。蓋諸風

眩掉。皆屬肝木。肝鬱不能榮筋。故

近人學說 張山雷曰。天麻氣

味。古皆稱其辛溫。蓋即因於本草

經之赤箭。而開寶甄權諸家。稱其

主諸風濕痺。冷氣癱瘓等症。皆因

辛溫二字而來。故視為驅風勝濕

溫通行痺之品。然潔古諸家。又謂

其主虛風眩暈頭痛。則不肝息風

適與祛風行痺宣散之法相背。使

其果屬辛溫宣散。則用以治虛風

之眩暈頭痛。寧不助其升騰而益

張其熱。何以羅天益且謂眼黑頭

旋。風虛內作。非天麻不能治。以此

知果是風寒濕邪之痺者。癱瘓等

證。非天麻之所能奏效也。蓋天麻

之質。厚重堅實。而明淨光潤。富於

脂液。故能平靜鎮定。養液以息內

風。古有定風草之名。能治虛風。豈

同詁語。今恒以治血虛眩暈。及兒

童熱痰風驚。皆有捷效。故甄權以

治語多恍惚。善驚失志。東垣以治

風熱。語言不遂。皆取其養陰滋液

而息內風。益氣味辛溫之說。本沿

赤箭之符。實則辛於何有。而溫亦

虛言。是以張景岳改作辛平。張石

頑亦作辛平微溫。誠恐以辛溫之

味。而治虛風。或以啓人疑竇耳。且

石頭之蓬源。不採濕痺拘攣一節。尤有卓見。其意亦知平肝息風之品。斷無驅濕通痺之理。然則俗醫猶信其宜通絡脈。疏散外風。亦未免為開寶所愚矣。或謂既多脂液。而能養血平肝。又何必不可以補益經絡。而治風痺。然柔潤之物。終無驅濕而治冷氣癱痺之理。蓋通經宣絡。散外感之風。必不能與潛降攝納。鎮定內動之風。并為一氣。要知痺痛拘攣。不仁不遂。癱瘓麻木諸證。本多肝陽上升。擾動腦經之病。必以潛陽鎮攝為治。乃有捷效。天麻重墜定風。正是專藥。古人固知此物之能治此病。開寶所謂利腰膝。強筋力者。亦是此旨。然古於痺痺癱瘓諸證。又無不誤內風為外風者。既知天麻能愈是病。遂非誤認為疏風逐濕之品。斯其所以一誤再誤。而糾結繆繆。令人不可索解者也。石頭又謂天麻。雖曰不燥。終屬風藥。若血虛無風。火炎頭痛。不可妄用。是猶誤認其升散。而故為叮嚀。其亦知陰虛頭痛。雖曰虛火上炎。實皆內風煽動。固未有火盛而不生風者。而天麻之

四靈 天

治風。則柔潤以息風陽。殊非升散疏泄之比。景岳且有性慍力緩。必須倍用之說。則善用之者。尤須重其任。而後乃能事其效。石頭固未達此一問者也。

配合應用 ①治痰厥頭痛。用天麻同朮。半夏。黃芩。前胡。橘皮。茯苓等分。

②治飲在心下作支滿。用天麻同朮。橘皮。茯苓。車前。

③治風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭暈欲倒。項急肩背拘攣。神昏多睡。肢節煩痛。皮膚瘙癢。偏正頭痛。鼻鼾。面目虛浮。天麻丸。天麻半兩。芎藭二兩。為末。煉蜜丸。如夾子大。每食後嚼一丸。茶酒任下。又方。治一切風痰。用天麻。南星。前胡。橘皮。白朮等分。(普濟方)

④治腰脚疼痛。天麻。半夏。細辛。各二兩。相袋二箇。各盛藥令勻。蒸熱。交互熨痛處。汗出則愈。數日再熨。(衛生易簡方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡陰虛及無真中風者禁用。

參攷資料 赤箭亦是芝類

其莖如箭。幹赤色。葉生其端。根如大魁。又云。如芋。有十二子。為衛。有風不動。無風自搖。如此亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭。莖有羽。其主瘰癧。並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。(陶弘景) ①赤箭是芝類。莖似箭。赤色。端有花葉赤色。遠看如箭。有羽。四月開花。結實似枯苦楝子。核作五六稜。中有肉。如麵。日暴則枯萎。其根皮肉汁。大類天門冬。惟無心脈。爾去根五六寸。有十餘子。衛之似芋。可生噉之。無乾服之法。(蘇恭) ②天麻生鄆州。利州。太山。勞山。諸處。五月採根。暴乾。葉如芍藥。而小。當中抽一莖。直上如箭。莖端結實。狀若續隨子。莖葉枯時。子黃熟。其根連一十二枚。猶如天門冬之類。形如黃瓜。亦如蘆菔。大小不定。彼人多生噉。或蒸食之。今多用鄆州者佳。(馬志) ③赤箭。今江湖間亦有之。然不中藥用。其苗如蘇恭所說。但本經云。三月四月八月採根。不言用苗。而今方家乃三月四月採苗。七月八月九月採根。與本經

參差不同。難以兼著。故但從今法

又曰。天麻。今汴京。東西。湖南。淮南。州。郡。皆有之。春生苗。初出若芍藥。獨抽一莖。直上。高三四尺。如箭。幹狀。青赤色。故名赤箭。莖中空。依半以上。貼莖。微有尖小葉。梢頭生成穗。開花。結子。如豆粒大。其子至夏不落。却透虛入莖中。潛生土內。其根形如黃瓜。遠生一二十枚。大者至重半斤。或五六兩。其皮黃白色。名曰龍皮。肉名天麻。二月三月。五月八月內採。初得。乘潤刮去皮。沸湯略煮。過。暴乾。收之。崑山。衡山。人或取生者。蜜煎作果食。甚珍之。(蘇頌) ④按抱朴子云。仙方有合離草。一名獨搖芝。一名離母。所以謂之合離。離母者。此草下根如芋。魁。有游子十二枚。周環之。以做十二辰也。去大魁數尺。皆有細根。如白髮。雖相須而實不相連。但以氣相屬。爾如兔絲之草。下有茯苓之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云。非俗所見。兎絲之下。有茯苓。亦不聞有見者。殆其種類時有神異者。而如此爾。(蘇頌) ⑤赤箭以狀而名。獨

四畫 天

搭定風。以性異而名。羅母合離。以根異而名。神草鬼督郵。以功而名。天麻即赤箭之根。(李時珍) 本經止有赤箭。後人稱爲天麻。甄權藥性論云。赤箭芝一名天麻。本自明白。宋人馬志重修本草。重出天麻。遂致歧疑。沈括筆談云。神農本草明言赤箭採根。後人謂其莖如箭。疑當用莖。蓋不然也。譬如麋尾牛膝。皆因莖葉相似。其用則根。何足疑哉。上品五芝之外。補益上藥。赤箭爲第一。世人惑於天麻之說。遂止用之治風。良可惜哉。沈公此說雖是。但根莖並皆可用。天麻子從莖中落下。俗名還筒子。其根暴乾。肉色堅白如羊角色。呼羊角天麻。蒸過黃皺如乾瓜者。俗呼響瓜。天麻皆可用者。一種形尖而空薄如玄參狀者。不堪用。抱朴子云。獨搖芝生高山深谷之處。所生左右無草。其莖大如手指。赤如丹素。葉似小莧。根有大魁如斗。細者如雞子。十二枚繞之。人得大者服之。延年。按此乃天麻中一種神異者。如人參中之神參也。(李時珍)

【天麻子】 原名 還筒子。主治 定風補虛。功同天麻。

【天麻片】 即天麻之處方用名。詳「天麻」條。

【天麻草】 即五母麻之古籍別名。典見別錄。詳「五母麻」條。

【天棘】 即天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【天棘仁】 即瓜蒌仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瓜蒌仁」條。

【天絲瓜】 即絲瓜之古籍別名。典見本事。詳「絲瓜」條。

【天陽石】 即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【天雄】 命名 本品乃種附子長而不生子故名。其有長而尖者。謂之天錐。亦以其象形而命名也。

處方用名 製天雄。

古籍別名 白薑(綱目)

基本 屬毛茛科。爲附子旁生細長之根莖。

形態 詳「附子」條。

採取 八月間採之。須以蜀產者佳。

製法 雷斅曰。宜炮炙去皮尖。底用。或陰制如附子法。亦得。大明曰。凡丸散炮去皮用。飲藥即和皮生使。甚佳。李時珍曰。然用一法。每十兩。以酒浸七日。掘土坑。用炭半秤。煨赤。去火。以醋二升沃之。候乾。乘熱入天雄在內。小盆合一夜。取出。去臍用之。

性質 辛溫。有大毒。

效能 補命門火。逐風寒濕。用作麻醉藥。

主治 大風寒濕痺。歷節痛。拘攣緩急。破積聚邪氣。金瘡。強筋骨。輕身健行。(本經) 療頭面風。去來疼痛。心腹結聚。關節重。不能行步。除骨間痛。長陰氣。強志。令人武勇。力作不倦。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論天雄曰。治風痰冷痺。軟脚。毒風。能止氣喘。促急。殺禽蟲毒。

【宋】大明諸家本草論天雄曰。治一切風。一切氣。助陽道。暖水臟。補腰膝。益精明目。通九竅。利皮膚。調血脈。四肢不遂。下胸膈水。破癥瘕。癰結。排膿止痛。續骨。消瘀血。背脊僵。澁。霍亂轉筋。發汗。止陰汗。炮含。

治喉痺。【明】李士材本草圖解論天雄曰。天雄之用。與附子相仿。但功力稍遜耳。【清】黃宮繡本草求真論天雄曰。天雄細長。獨夥無附。其身大於附子。其尖向下。能補下焦命門陽虛。然辛熱走竅。正屬主治風寒濕痺之品。【清】鄒澍本經疏證論天雄曰。天雄。仲景書惟天雄散中用之。而天雄散又不育所主何病。但附於桂枝龍骨牡蠣湯後。實使人無以測知其故。雖然。細意抽繹上文。亦可得其概矣。夫云男子平人。蝦大爲勞。極虛亦爲勞。以下凡六節。僅出一桂枝龍骨牡蠣湯。湯後即附天雄散方。豈不以六節之中。其證何者。合用桂枝龍骨牡蠣。何者。合用天雄散。令人自擇之耶。夫曰男子。則不可以婦人混之矣。曰平人。則不可以病人混之矣。蓋六節中有云。陰寒精自出。瘦削不能行者。有云。精氣清冷無子者。有云。陰頭寒者。是即天雄之所主歟。天雄乃附子之類。其性爲陽氣充實於中。而不他化者。精之爲物。過陰則凝。過陽則行。今陰既寒。而精自行。又焉得不以陽氣希。

寶不洩者治之耶。以此推本經附子天雄主治略同之處。凡欲其走者以附子爲佳。欲其守者以天雄爲善。大致亦可議矣。

辨偽 ●鄭省巖曰。天雄氣味亦是辛熱有大毒。本經主治稍異而旨則同。凡附子種在土中。不生側子。經年獨長大者爲天雄。仍是蜀地綿州所產者爲勝。近今每有以厚附僞充。施之重症必不能奏效矣。●曹炳章曰。按天雄與附子同物。亦產四川彰明者良。凡長大端正不生側枝。獨長本身。每個在三兩上下者。卽名天雄。非別有一物也。厚附片乃四川鮮附子製而切片。不經鹹漬洗漂。效力且比本漂淡附片勝數倍。凡用淡附片二錢。厚附片只能用一錢。因其力猛也。

配合應用 ●治元陽素虛。寒邪外攻。手足厥冷。大小便滑數。小便白渾。六脈沉微。除固冷扶元氣。及傷寒陰毒。三建湯用烏頭附子天雄。並炮裂。去皮臍。等分。咬咀。每服四錢。水二盞。葶十五片。煎八分。溫服(肘後方)

四畫 天

●治男子失精。天雄三兩。炮。白朮八兩。桂枝六兩。龍骨三兩。爲散。每酒服半錢。(金匱方)

●治大風惡癩。三月四月。采天雄。烏頭苗及根。去土。勿洗。搗汁。漬細粒黑豆。摩去皮不落者。一夜。取出晒乾。又浸。如此七次。初吞三枚。漸加至六七枚。禁房室。豬魚雞蒜。犯之卽死。

用量 五分至錢半。
施用宜忌 凡屬陰虛火旺。而無風寒濕邪者。禁用。惡腐婢。忌鼓汁。遠志爲之使。

參攷資料 ●今採用之八月。中旬天雄。似附子。細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種。本出建平。故謂之三建。今宜都假山者最好。謂爲西建。錢塘間者謂爲東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝。東白也。共用灰殺之。時有水。強者不佳。(陶弘景) ●天雄。附子。烏頭。並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有力。弱不相似。陶弘景以三物俱出建平。故名之者。非也。烏頭苗名葶。葶音斬。爾雅云。葶葶草是也。今訛葶爲建。遂以建平譯之矣。

(蘇恭) ●按淮南子云。天雄雄雞志氣。益注云。取天雄一枚。納雄雞腸中。搗食之。令人勇。(蒙萬錫) ●補虛寒。須用附子。風家多用天雄。亦取其大者。以其尖角多。熱性不肯就下。故取其數散也。(寇宗奭) ●天雄有二種。一種是蜀人種附子而生出長者。或種附子而盡變成長者。卽如種芋形狀不一之類。一種是他處草烏頭之類。自生成者。故別錄註烏喙云。長三寸已上者。爲天雄是也。入藥須用蜀產。曾經醱制者。或云須重一兩。半有象眼者乃佳。(李時珍) ●天以體言。雄以用言。不雜於陰柔。不惑於邪亂。若夫風寒濕痺。證及積聚邪氣。金瘡。癩於無陽者。乃是行險而不失其正。(盧子由)

【天雄草】 產地 生山澤中。形態 天雄草爲芳草類之一種。狀如蘭。其實如大豆。赤色。可供藥用。
性實 甘溫。無毒。
主治 益氣陰痿。
【天葵】 ●卽落葵之古籍別名。典見別錄。詳『落葵』條。●卽莧葵之古籍別名。典見綱經本草。詳『莧葵』條。
【天鼠】 卽蜈蚣之古籍別名。典見本經。詳『蜈蚣』條。
【天鼠矢】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。
【天鼠屎】 卽夜明砂之古籍別名。典見本經。詳『夜明砂』條。
【天葱】 卽水仙之古籍別名。典見本草會通。詳『水仙』條。
【天膩子】 卽竹蠟之古籍別名。典見綱目。詳『竹蠟』條。
【天壽根】 產地 出台州。性實 涼。
主治 胸膈煩熱。土人常用有效。
【天精】 卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。
【天楮子】 卽枸杞子之古籍別名。典見抱朴子。詳『枸杞子』條。
【天精葉】 卽天名精之處方用名。詳『天名精』條。
【天碧草】 卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。
【天芥藥】 卽金線釣蝦蟆葉之原名。詳『金線釣蝦蟆葉』條。

【天葵】即石葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石葵』條。

【天葵草】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【天蓋花】即石葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石葵』條。

【天劍草】即旋花之古籍別名。典見綱目。詳『旋花』條。

【天漿】即石榴實之古籍別名。典見綱目。詳『石榴實』條。

【天漿子】即葎蕪之古籍別名。典見圖經本草。詳『葎蕪』條。即五穀蟲之古籍別名。典見和濟局方。詳『五穀蟲』條。

【天麥】即葎草之古籍別名。典見別錄。詳『葎草』條。即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【天蔓菁】即天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【天骷體】命名。本品即經霜之老絲瓜。掛於鄉村樹枝。及屋簷間者。形如骷體。故名。古籍別名。子名烏牛子。(綱目拾遺)

主治 婦人白帶血淋。膨脹積

聚一切筋骨疼痛。並宜服之。

【天澤香】即乳香之古籍別名。典見內典。詳『乳香』條。

【天燈籠】即白毛藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白毛藤』條。

【天燈籠草】古籍別名。金燈籠。山珊瑚。珊瑚架。(採藥書)紅姑娘。(綱目拾遺)

形態 天燈籠草為雜草類之一種。形似辣椒而葉大。本高尺許。開花白色。結子如荔枝。外空。內有綠子。經霜乃紅。根旁有鬚。可供藥用。其根及子詳見各條。

性質 寒。無毒。

主治 治咽喉腫痛。清火。消鬱結。傳一切瘡腫疔痛。婦人血崩。及鎖喉風。阻腫。

參攷資料 天燈籠草。主治雖夥。惟咽喉是其專治。用之其功最捷。(趙學敏)

【天燈籠草子】主治 消毒。

【天燈籠草根】主治 療瘡。疾。反手採取。洗切酒煮。和鴨蛋食之。

【天壽葵】即金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草秘。詳『金鎖銀開』條。

【天錐】即附子根之尖長者。性味功用與天雄同。

【天龍】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『蜈蚣』條。

【天龍骨】原名 塔頂石灰。塔頂之石灰。功同龍骨。故名。

性質 溫和無毒。

主治 生肌。止血。塗惡瘡。腫毒。寒濕癩瘡。療心腹痛。烏痧脹。婦人血崩漏帶。男子久痢便血。及一切打撲損傷。惡血凝聚。腹痛欲死者。俱可服之。

參攷資料 白虎丸治一切青筋腹痛。用天龍骨不拘多少。去泥土。水飛過。丸似桐子大。每服五十丸。看重輕加減。燒酒下。初覺頭痛。惡心腹脹。即進一服。當時血散。若過三五日。青筋已老者。多服取效。禹氏家抄方。塔上石灰。受天陽風露之氣。變悍烈之性。而成溫和。故能定痛生肌。止血去濕。為金刃要藥。內服亦良。(趙學敏)

【天蘭】即苜蓿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苜蓿』條。

【天蘗】即蘗之俗名。詳『蘗』條。

【天蠶】即綠桑蠶之古籍別名。典見綱目。詳『綠桑蠶』條。

【天蠶】即蠶之古籍別名。典見本經。詳『蠶』條。即蠶繭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蠶』條。

【天燭葉】即南天燭之處方用名。詳『南天燭』條。

【天葵】即飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【天雞】即紺鑿之古籍別名。典見綱目。詳『紺鑿』條。

【天鷄】即鷄之古籍別名。典見綱目。詳『鷄』條。

【天羅】即絲瓜之古籍別名。典見事類合璧。詳『絲瓜』條。

【天羅水】基本 即絲瓜根汁之陳久者。

採取 於霜降後。擇粗大絲瓜藤。掘起根三四寸。剪斷。插瓶中。一宿。其根中汁滴入瓶內。封固埋土中。年久者佳。

主治 化痰。解毒。清內熱。消痰。

火。治雙單喉蛾。肺癆。肺痿。

【天羅勤】

產地 生江南平地。主治 溪毒。

【天羅勒】

即絲瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「絲瓜」條。

【天藕】

即翻白草之古籍別名。典見野榮譜。詳「翻白草」條。

【天靈草】

產地 生江湖池澤。形態 天靈草為濕草類之一種。狀如雞冠花。其葉亦似之。折之有黏液如乳。其汁可供藥用。

採取 五月間取汁用。

主治 可制雄黃硫黃。黃雌黃。煉砂用之。

【天靈草子】

即青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青葙子」條。

【天靈蓋】

命名 人頭圓如蓋。穿竅象天泥丸之宮。神靈所集。修煉家取坎補離。復其純乾聖胎圓成。乃開顛額而出入。故有天靈蓋之名。

古籍別名 腦蓋骨。仙人蓋。(綱目)頭顱骨。天石。聖鐵。人頂骨。人頭骨。人腦骨。靈山柴。鬪體骨。(和漢藥考)

基本 用人之頭蓋骨埋土中數年者。愈久愈佳。

製法 陳藏器曰。用彌腐爛者。佳。有一片如三指闊者。取得用糖。灰火罏一夜。待腥穢氣盡。却用童兒溺於竅。錫子中煮一伏時。漉出於屋下掘一坑深一尺。置骨於其中。俟一伏時。其藥魂歸神妙。用法 陽人使陰。陰人使陽。王好古曰。方家有。用檀香湯洗過。酥炙用。或燒存性用。

性質 鹹。平。無毒。效能 治傳尸。瘵勞瘵。瘵勞瘵。寒熱無時者。燒令黑研細。白飲和服。亦合丸散用。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論天靈蓋曰。治肺痿。乏力羸瘦。骨蒸盜汗等。酥炙用。【明】繆希雍本草經疏論天靈蓋曰。天靈蓋乃死人腦蓋骨也。不用他骨。而用此者。以人生時。腦為諸陽之會。而此骨則一身衆骨之主也。其主傳尸。尸疰。鬼氣。伏連者。取其同類之氣。引出邪魅。則其魂魄飛越。不復附人。故得瘵也。久瘵勞

瘵寒熱無時者。亦邪惡之氣。侵人也。辟惡散邪。是其能事。故亦主之。【明】李士材本草圖解論天靈蓋曰。天靈蓋治傳尸。鬼疰。邪癘。古人以掩暴骨為仁厚。方士取人骨為藥餌。有仁心者固如是乎。犬且不食犬骨。而人食人骨可乎。且以他藥代之。何所不可。乃必欲用之。傷德甚矣。

國外學說 日本明治三十五年時。大阪有所謂人首事件之發生。即有人將人首燒黑出售。當時日政府頗為注意。以為即屬無主屍體或骨灰。亦不應擅行拾取買賣。不特有闕國家體面。即在人道上。亦應嚴加禁止。故東京富山等藥舖。及黑燒商。當時皆受搜查。醫說亦有天靈蓋非出神農本經。乃後世醫家禁術之流。奇怪之論也。殊非仁人之用心也。云云。但天石之藥效。早已流傳日本。俗間迷信此藥甚深。故昔時以此供藥用者不少。當德川幕府時代。凡在千住利場斬首而無人領取之屍首。規定若干時日後。許劍子手領取。經東町奉行檢查。蓋印出售。黑燒商

承購燒之。呼為天已。待價而沽。又日本已故岸田吟香翁草成「天靈蓋說」一文。載藥學雜誌第二百四十一號。斥其藥效起因之愚妄。以解世惑。

配合應用 治傳尸瘵。用天靈蓋同鬼白。乾漆。象膽。麝肝。丹砂。胡黃連。入滋陰藥內。

治楊梅結毒。用天靈蓋。阿膠。黃象牙末。蛙竹屑。血竭。乳香。沒藥。黃蠟。明礬。真珠作丸。

治瘵瘡陷伏。灰平不長。此係虛寒證。用天靈蓋燒研酒服三分。(痘瘡經驗方)

治虛損骨蒸。用天靈蓋如桃大。炙黃。以水五升。煮取二升。分三服。起死神方也。(千金方)用人頭骨炙三兩。辟香半兩。為末。搗千杵。丸梧子大。每服七丸。飲下。日再服。若胸前有青脈出者。以針刺着血色未黑者。七日遂。(張文仲備急方)

治小兒骨蒸。體瘦心煩。天靈蓋酥炙。黃連等分。研末。每服半錢。米飲下。日二服。(聖惠方)

治諸瘵寒熱。天靈蓋煨研末。

四畫 天 太

水服一字取效。(聖惠方)

①治腸氣不食。天蠶蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水大升。降楊梅色。冷定取出。去豆不用。研末。每服一錢。溫酒下。(孫氏集效方)

②治下部疔瘡。天蠶蓋煨研末。先以黃藥湯洗淨。搽之神效。又方入紅絹。小紅珀等分。同燒研。(劉氏經驗方)

③治癩疥溼爛。人頂骨燒研二錢。龍骨三錢。金絲硫黃一錢。爲末。用冬蘿荷英陰乾。熬水洗之。乃貼。(劉松石方)

④治小兒白禿。大豆。鬲酸骨。各燒灰等分。以臘猪脂和塗。(姚僧坦集驗方)

用量 五分至一錢。
施用宜忌 天蠶蓋治勞瘵者。以其有尸鬼勞瘵爲害。取其逐散邪也。今人虛損勞怯。皆係色欲過度。損傷真陰。實無鬼氣淹伏。何得用此幽暗不祥之物治之哉。其痘瘡虛寒陷伏。或爲邪氣所觸。發不出者。不過借其陽氣所結之餘。遂散其邪。以發出耳。非正治也。若血

熱煩燥。瘡乾紫黑者。用之必致危殆。不救。慎之慎之。

參攷資料 ①天蠶蓋。乃死人頂骨。十字解者。方家婉其名。故曰天蠶蓋。(馬志) ②神農本草經人部。惟髮髮一物。其餘皆出後世醫家。或禁術之流。奇怪之倫。近見醫家用天蠶蓋治傳尸病。未有一效。殘忍傷神。非仁人之心。苟有可以仁者。宜盡心焉。不得已。宜以年深漬朽絕尸氣者。可也。(陳承)

③天蠶 卽蠶子之古籍別名。典見蠶草篇。詳「蠶子」條。

④天蠶 卽魁蛤之古籍別名。典見綱目。詳「魁蛤」條。

⑤太乙玄精石 卽玄精石之古籍別名。典見綱目。詳「玄精石」條。

命名 太一者。山名也。卽終南山。本品出於太一。故名。

古籍別名 石腦(本經)禹哀(吳普本草)

採取 九月採之。
製法 雷斅曰。凡修事用黑豆五合。黃精五合。水二斗。煮取五升。置瓷鍋中。下餘根四兩。煮之。旋添

汁盡爲度。其藥氣自然香如新米。搗後又研一萬杵方可用也。

性質 甘平無毒。
主治 欬逆上氣。癡瘕血閉。漏下。除邪氣。肢節不利。久服耐寒暑。不饑。輕身飛行千里。神仙(本經)治大飽。絕力身重。(別錄)

歷代記述攷證 南北朝雷斅池突論論太一餘糧曰。益脾安臟氣。配合宜忌 畏貝母、萆薢、鐵落、杜仲爲之使。

參攷資料 ①本草有太一餘糧。禹餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。不復識太一。登真隱訣長生四靈丸云。太一禹餘糧。定六腑。鎮五臟。合其二名。莫辨何者。爲是。今人亦總呼爲太一禹餘糧。有人於銅官。采空青於石坎。大得黃赤色石。極似今之餘糧。而色過赤好。疑此是太一也。彼人呼爲雌黃。塗物正如雄色。(陶弘景) ②凡使勿誤用石中黃。并卵石黃。二石真相似。其石中黃。句裏赤黑黃。味淡微。卵。阻石黃。味酸。箇箇印印。內有子一塊。不堪用。若誤食之。令人

腸乾。太一餘糧。看卽如石。輕敲之。便碎如粉。兼重如葉子。雌黃也。(雷斅) ③太一餘糧及禹餘糧。乃一物。而以精粗爲名爾。其殼若瓷。方圓不定。初在殼中。未凝結。猶是黃水。名石中黃。子久凝。乃有數色。或青或白。或赤或黃。年多變赤。因赤漸紫。紫及赤者。俱名太一。其諸色。通謂禹餘糧。今太山不見。采得而會稽王屋。澤潞州諸山。皆有。陶云。黃赤色。疑是太一。然無殼。殊非的稱。(蘇恭) ④太一餘糧。是用其殼也。故入藥。須火燒醋淬。石中黃。是殼中乾者。及細水者。石中黃。水是未成餘糧黃濁水也。(寇宗奭) ⑤禹餘糧。太一餘糧。石中黃。水性味功用皆同。但入藥有精粗之等。附故服食家。以黃水爲上。太一次之。禹餘糧又次之。列仙傳。言巴戎赤斧。上華山。餌禹餘糧。卽此。(李時珍) ⑥按別錄。言禹餘糧生東海池澤。及山島。太乙餘糧。生太山山谷。石中黃。出餘糧。處有之。乃殼中未成餘糧黃濁水也。據此。則三者一物也。生於池澤者。爲禹餘糧。生於山谷者。爲太一餘糧。其中

水黃濁者爲石中黃。其水凝結如粉者爲餘糧。凝乾如石者爲石中黃。其說本明。而注者隨度。反致義晦。晉宋以來。不分山谷池澤所產。故通呼爲太一。禹餘糧。而蘇恭復以紫赤色爲太一。諸色爲禹餘糧。皆由未加詳究本文也。寇宗奭及醫方。乃用石殼爲禹餘糧。殊不察。未成餘糧。黃濁水之文也。其殼粗頑不入藥。庚辛玉册云。太一禹餘糧。陰石也。所在有之。片片層疊。深紫色。中有黃土。名曰石黃。其性最熱。冬月有餘糧處。其雪先消。云。林石譜云。則州祈闔山出石。石中有黃土。目之爲太一。餘糧。色紫黑。礪塊大小圓扁。外多黏綴。碎石條。去黃土。卽空虛。可貯水。爲現滴。(李時珍)

【太子參】 命名 本品卽遼參之小者故名。
形態 按太子參爲遼參類之一種。幹細而短。小堅實而有蘆紋。可供藥用。
性質 甘苦。無毒。
主治 補氣益元。功侔遼參。
【太白石】 卽礬石之古籍別名。典

見別錄。詳『礬石』條。

【太甸首中石】 卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。
【太奈】 卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。
【太眞】 卽金之古籍別名。典見本草集註。詳『金』條。
【太峯黃於朮】 卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。
【太陰流珠】 卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。
【太和湯】 卽熱湯之古籍別名。典見綱目。詳『熱湯』條。
【太陽】 卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。
【水銀】條。

【太陽石】 主治 一切目疾。
參攷資料 劉守真宣明方。治遠近目疾。方用太陽石。太陰石。碧霞石。猪牙石。河洛石。寒水石。紫石英。代赭石。菩薩石。金精石。銀精石。禹餘糧。礬石。雲母石。爐甘石。井泉石。陽起石。滑石。烏賊骨。青鹽。銅青。各一兩。礬砂半兩。蜜陀僧一兩。礬砂三錢。乳香二錢。麝

香腦子一錢。輕粉一錢半。黃丹四兩。各爲末。熊膽一斤。白砂蜜二斤。并華水九盤。煎至四盤。點水內不散。爲度。濾淨收點。李時珍。

【太陽草】 卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。
【夫移】 卽扶移之古籍別名。典見楊江東。詳『扶移』條。
【夫須】 卽香附子之古籍別名。典見別錄。詳『香附子』條。
【夫編子】 產地 出安南武平。山谷中。及熱帶諸地。形態 夫編爲夷果類之一種。三月開花。連着子。五六月成熟。可入雞魚猪鴨羹中。味最美。亦可鹽食。又供藥用。
性質 甘平。無毒。
主治 寧心志。養血脈。解暑渴。利水道。生津液。止逆氣。喘急。除煩。清熱。潤肺。滋命門。益元氣。骨蒸勞熱。四肢痠削。如枯柴。用夫編子同白鴨爛煎。不用鹽醬。日日喫之。吃鴨三頭見效。
【天苴】 卽芭蕉之古籍別名。典見史記注。詳『芭蕉』條。
【天桃】 卽蜜望之正月開花。六月


熟而中大如木瓜者。詳『蜜望』條。
【孔公石】 卽孔公孽之古籍別名。典見綱目。詳『孔公孽』條。
【孔公附】 卽孔公孽之古籍別名。典見綱目。詳『孔公孽』條。
【孔公孽】 命名 孔竅空通。附於石。如木之芽孽。故名。
古籍別名 孔公石。通石。孔公爾。(綱目)
形態 孔公孽乃石類之一種。卽石鐘乳之根部。石鐘乳如乳頭。孔公孽如乳房。
性質 辛溫。無毒。
主治 治傷食不化。邪結氣壅。瘡疽瘰癧。利九竅。下乳汁。並治男子陰瘡。女子陰蝕。及傷食病。常欲眠睡。
歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論孔公孽曰。主腰冷膝痺。毒氣。能使喉聲圓亮。
配合宜忌 惡細辛。兪。忌羊血。木蘭爲之使。
參攷資料 ①孔公孽。段孽根也。青黃色。生梁山山谷。(別錄) ②二孽不堪丸散。止可水煮湯并酒

四靈 太夫 天 孔

四盡 孔

浸飲之。甚療脚弱脚氣。(陶弘景)
梁山屬馮翊郡。此卽今鍾乳牀也。亦出始興。皆大塊。打破之。凡鍾乳之類有三種。同一體。從石室上汁溜積久盤結者。爲鍾乳牀。卽孔公孽也。其以次小崩墜者。爲殷孽。大如牛羊角。長一二尺。今人呼此爲孔公孽也。殷孽復溜輕好者。爲鍾乳。雖同一類。而療體各異。貴賤懸殊。三鍾同根。而所生各處。當是隨其土地爲勝爾。(陶弘景)
此孽次於鍾乳。狀如牛羊角。中有孔通。故名通石。別錄誤以此爲殷孽之根。而俗猶呼爲孔公孽是也。(蘇恭)
孔公孽次於鍾乳。別錄誤以爲殷孽之根。殷孽卽孔公孽之根。俗人乃以孔公孽爲殷孽。陶氏依之。以孔公孽爲鍾乳牀。非矣。(蘇恭)
鍾乳之類凡五種。鐘乳。殷孽。孔公孽。石牀。石花也。雖同爲一體。而主療各異。(韓保昇)
孔公孽。殷孽。既是鍾乳同生。則有孽處皆當有乳。今不開有之。豈用之既寡。則探者亦稀乎。抑時人不知孽中有乳。不盡採乎。不能盡究也。(蘇頌)
以置石通石二石推之。

則似附石生而粗者爲殷孽。接殷孽而生以漸空通者爲孔公孽。接孔公孽而生者爲鍾乳。當從蘇恭之說爲優。蓋殷孽如人之乳根。孔公孽如乳房。鍾乳如乳頭也。(李時珍)
【孔方兄】卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳「古文錢」條。
【孔雀】 古籍別名 越鳥。南客。摩田邏(本草綱目)
外國名詞 Pavo cristatus
L. Pavo (Pavon) (雄) Prava (雌) (拉丁) クジャク (日本)
基本 係脊椎動物鳥類鸚鵡類。雉科。藥用孔雀之肉。
產地 產印度暹羅及熱帶等處。
形態 孔雀爲山禽類之動物。其形略似雉。體長三尺餘。翼短小。雄者頭上戴紅青色毛冠。面部裸出。翼長延長。紅青色。有紺色環紋。其兩側垂下線毛。色如黃金。頗美。頸部亦作紅青色。及帶金色之光澤。尾小。下有翼。開張作扇狀。雌較雄爲小。羽亦較不美。棲息山中。棲時先擇置尾之地。其肉等俱可



雀 孔

供藥用。
性質 鹹。涼。微毒。
主治 解藥毒。蠱毒。
參攷資料 出廣益諸州方家罕用。(陶弘景)
按紀開云。山谷夷人多食之。或以爲脯。味如雞。能解百毒。人食其肉者。自後服藥必不效。爲其解毒也。又續博物志云。李衛公言。鸚鵡。孔雀。辟惡。鳩。鵲。厭火。(李時珍)
按南方異物志云。孔雀交趾雷羅諸州甚多。生高山喬木之上。大如鴛。高三四尺。不減於鶴。細頸。隆背。頭裁三毛。長寸許。數十羣。飛棲遊。閱陵。晨則鳴聲相和。其聲曰都護。雌者尾短無金翠。雄者三年尾尙小。五年乃長二三尺。夏則脫毛。至春復生。自背至尾有圓文。五色金翠相繞。如錢。自愛其尾。山棲必先擇置尾之地。兩則尾重不能高飛。南人因

往捕之。或暗伺其過。生漸其尾。以爲方物。若回顧則金翠頓滅矣。山人養其雛爲媒。或探其卵。雞代出之。飼以豬腸生菜之屬。聞人拍手。欲舞則舞。其性妬。見采服者必啄之。壯戶錄云。孔雀不匹。以音影相接而孕。或雌鳴下風。雄鳴上風。亦孕。莫越集云。孔雀雖有雌雄。將乳時登木哀鳴。蛇至卽交。故其血膽猶傷人。禽經云。孔雀見蛇則宛而躍者是矣。(李時珍)
【孔雀血】 主治 生飲解蠱毒良。
參攷資料 熊太古言孔雀與蛇交。故血膽皆傷人。而日華及異物志言其血與首能解大毒。似不相合。按孔雀之肉。既能解毒。何血獨傷人耶。蓋亦猶雉與蛇交。時即有毒。而蛇伏蟄時。卽無毒之意耳。(李時珍)
【孔雀屎】 性質 微寒。 主治 女子帶下。小便不利。
歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論孔雀屎曰。治崩中帶下。可傳惡瘡。

【孔雀松】即梅松之一叢三葉者。詳「梅松」條。

【孔雀花】即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【孔雀花】即麗春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麗春花」條。

【少年老】即雁來紅之頂葉黃紅而脚葉綠者。詳「雁來紅」條。

【少辛】即細辛之古籍別名。典見本經。詳「細辛」條。

【少陽魚】即海鶴魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鶴魚」條。

【巴山虎】即羊躑躅根之古籍別名。典見綱目。詳「羊躑躅」條。

【巴仁】即巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【巴旦杏仁】即甜杏仁之原名。詳「甜杏仁」條。

【巴石】即礬石之煨枯色白如雪者。詳「礬石」條。

【巴朱】產地 出隴陽山野間。性質 甘無毒。

主治 祛寒止血。婦人帶下。

【巴豆】 命名 本品出巴蜀而形如菽豆。故名。 處方用名 巴豆霜。巴霜。

古籍別名 巴菽。(本經)剛子。(雷公炮炙論)老陽子。巴仁。江子。草兵。日剛子。巴菽剛子。巴霜剛子。(和漢藥考)

外國名詞 Croton Tiglium, (拉丁)

基本 係屬大戟科巴豆之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。巴豆產中國各省均有。廣東以龍門從化為多出。印度亦有出產。



形體 按巴豆為高丈半至二丈之圓柱狀。常綠灌木。皮光滑。作灰色。葉亦光滑。作尖橢圓形。邊緣有細鋸齒。其基部有蜜腺。花為綠色。短梗穗花。雄上雌下。果實分有三房。各房中有一種子。子為卵圓形。長約四分。闊約二分。五釐。之種子。稍帶扁平。邊緣稍隆起。有縫線。外被赤褐色子皮。中有黃褐

色之仁。其氣味有刺戟性。味辛烈如油狀。

種類 緊小色黃者為巴。三稜色黑者為豆。小而兩頭尖者為剛子。緊小者是雌。三稜及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩。

採取 八月採實陰乾。

製法 陶弘景曰。巴豆能瀉人。新者佳。用之去皮。心。熱令黃黑。搗如膏。乃和丸散。雷斅曰。凡用巴豆。敲碎。以麻油并酒等煮乾。研膏。用每一兩。用油酒各七合。大明曰。凡入丸散炒用。不如去心膜。換水煎五度。各一沸也。李時珍曰。巴豆有用仁者。用殼者。用油者。有生用者。熬炒者。醋煮者。燒存性者。有研爛以紙包壓去油者。謂之巴豆霜。

性質 辛溫有毒。

成分 含有脂肪油三〇至四〇%。揮發油。樹脂等。脂肪油為硬脂酸。軟脂酸。巴豆酸及其他脂肪酸之甘油化合物。其主成分為巴豆酸。

效能 治頑固性便秘。蟻蟲。攻痰積。瀉寒毒。為著名之峻下劑。凡頑固之便秘。他藥所不能見效者。

巴豆必能見效。此品入胃後即刺激胃壁神經。而覺熱感。至腸能直接刺激腸之黏膜。使之發炎。致分泌液增多。而蠕動亦增。速。使大便秘劇瀉下。由腸壁而吸入血中。即能減低血壓。令胸部苦悶。四肢疼痛。全身倦懈。甚至大腸神經紊亂而死。故絕對不宜服用大量。

主治 傷寒溫病寒熱。破癥瘕。結聚堅積。留飲痰癖。大腹瀉。練五臟六腑。開通閉塞。利水殺道。去惡肉。除鬼毒。瘰癧。疔毒。殺蟲魚。(本經)療女子月閉。爛胎。金瘡。膿血不利。丈夫。殺斑。登蛇。虺毒。可煉餌之益血脈。令人色好。變化與鬼神通。(別錄)

張仲景之發明 巴豆一味。經張仲景之實驗。認為主治心腹胸膈之毒。故兼治心腹卒痛。脹滿。吐膿。茲考徵如下。①桔梗白散證曰。欬而胸滿。及吐膿。②備急圓證曰。心腹脹滿。卒痛。③九痛丸證曰。心痛。及腹脹痛。(以上三方。巴豆各一兩)④走馬湯證曰。心痛腹脹。(巴豆二枚)據此諸方。則巴豆或一兩。或二枚。然本與諸藥等分。

二〇九

四畫 孔少巴

四畫 巴

但白散之方。巴豆一兩。以配桔梗。貝母各三兩。金匱要略九痛丸方。附子本作三兩。餘皆等分。千金方。但作一兩。蓋作一兩。則附子亦與諸藥等分。今從此。凡仲景之用巴豆也。雖備於急卒之病。皆是驅逐腸間之毒物。蕩滌腸胃之閉塞。故諸方皆為等分。夫巴豆同桔梗用。則使毒成膿。同貝母用。則能去咽喉之毒。同杏仁用。則能驅心胸之毒。同大黃乾薑用。則能吐下。心腹結毒急痛。同附子吳茱萸用。則能治心中寒冷毒痛。仲景之方用巴豆者。唯此四方。大抵足盡巴豆之功效矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論巴豆曰。治十種水腫。痿痺落胎。【宋】日華諸家本草論巴豆曰。通宜一切病。泄瀉滯。除風補勞。健脾開胃。消痰破血。排膿消腫。毒殺腹臟蟲。治惡瘡息肉。及疥癩。丁瘡。【金】張元素珍珠囊論巴豆曰。導氣消積。去臟腑停寒。治生冷積物所傷。【明】李時珍本草綱目給巴豆曰。治瀉利。寫瘡。心腹痛。疝氣。風鳴耳聾。喉痺牙痛。通利關竅。

【明】繆希雍本草經疏論巴豆曰。巴豆味辛氣溫。得火烈剛猛之氣。故其性有大毒。別錄言生溫熱寒。恐熱亦不甚寒。其主破癥瘕。結聚。堅積。留飲痰癖。大腹水腫。鬼毒蠱疰。邪物。女人月閉者。皆腸胃所治之位。中有實邪留滯。致生諸病。故腸胃有病。則五臟六腑閉塞不通。此藥稟火性之急速。兼辛溫之走散。入腸胃而能蕩滌。一切有形積滯之物。閉塞。開水數道。利月事通。而鬼毒蠱疰。邪物悉為之驅逐矣。溫瘧者。亦暑濕之氣入於腸胃也。腸胃既清。則溫瘧自止。火能灼物。故主爛胎及去惡肉。性熱有大毒。則必有損於陰。故不利丈夫。至本經所謂傷寒寒熱。及別錄煉餌之法。悉非所宜。豈有辛熱大毒之物。而能治傷寒寒熱。及益血脈好顏色之理哉。【明】李士材本草圖解論巴豆曰。巴豆稟陽剛雄猛之性。有斬關奪門之功。氣血未衰。積邪堅固者。誠有神功。老羸虛弱之人。輕妄投之。禍不旋踵。巴豆大黃。同為攻下之劑。但大黃性冷。腑病多熱者宜之。巴豆性熱。臟病多寒者

宜之。故仲景治傷寒傳裏惡熱者。多用大黃。東垣治五積屬臟者。多用巴豆。世俗未明此義。往往以大黃為王道之藥。以巴豆為劫竊之劑。不亦謬乎。若急治為水穀道路之劑。去皮心膜油生用。緩治為消堅磨積之劑。炒令紫黑用。炒至烟將盡。可以止瀉。可以通腸。用之合宜。效如桴鼓。此千古之秘。人所不知。紙包壓去油者。謂之巴霜。巴豆壳燒灰存性。能止瀉痢。【清】黃宮繡本草求真論巴豆曰。巴豆辛熱大毒。據書所載。生猛熱。緩。可升可降。能行能止。開竅宜滯。去臟腑沉寒。為斬關奪命之將。夫既能宜滯通竅。則藥能降能行。何書又言能升能止耶。此數字不無令人生疑。究之書之所言降者。因有沉寒固冷。積聚於臟。身入不毛。故欲去不能。不去不得。非用辛熱迅利。斬關直入。掃除陰翳。推陳致新。亦安能蕩滌而如斯哉。是即書之所謂能降能行者耳。至有久病瀉瀉。服升提瀉藥。而瀉反甚。脈滑而沉。是明脾胃久傷。冷積凝滯所致。法當用以熱下。則寒去。利止而脈始得上

升。是即所謂能升能止者是也。夫醫理玄遠。變化靡盡。在人引伸觸類。毋為書執。則用藥不歧。即如大黃亦屬開閉通利之品。然惟腑病多熱者最宜。若以臟病多寒。而用大黃通利。不亦自相悖謬乎。故曰。誤用有推牆倒壁之虞。善用有勸亂調中之妙。元素曰。世以治久病。隔氣。而以巴豆辛熱。通開腸胃。熱。第鬱結雖通。血液隨亡。其陰虧損。傷寒結胸。小兒疳積。用之不死亦危。奈何庸人。畏大黃。而不畏巴豆。以其性熱。劑小耳。試以少許。輕擦皮膚。須臾發泡。現下腸胃。能無潰灼。薰爛之患乎。即有急症。不得已而用之。歷去其油。取霜少許。入藥可也。能用殼用仁。用油。生用炒用。醋煮燒存性用。研去油。名巴霜。【清】黃元御玉楸葉解論巴豆曰。巴豆驅寒邪而止痛。開冷滯而破結。傷寒二白散。用之治寒實結胸。無熱證者。以寒實鬱結痞塞。不適。巴豆破寒實而決鬱塞也。又曰。巴豆辛苦大熱。破沈寒積冷。止心疼痛。泄停痰積水。下宿穀堅癥。治霍亂腹痛不能吐瀉。療寒痰阻

閉不得喘息。排膿血而去腐穢。蕩積滯而斷癰疽。消死肌。勞肉。點疣。疔疥。癬。種種奇功。神異非常。去殼炒研用。強人可服二釐。

國外學說 日本猪子氏曰。巴豆者。元來爲印度地方之產。其效分生巴豆油。及リチン。樣之酸。醇素。共有劇烈之作用。和語本草曰。巴豆。生者有毒。甚猛。炒熟則性緩。又云。於巴豆須炒熟用之。是純由經驗而得之成績。頗與當時之學理爲一致。中外醫事新報曰。巴豆油。如蓖麻子油。遇辟液則分解。變化爲クロトノール酸。及偏里設林。而クロトノール酸。能與奮腸之蠕動。以誘導下痢。藥物學綱要載。巴豆油之生理的作用。一。有極強之刺戟性。貼於皮膚。則發炎症。水泡。注入於皮下。則發皮下蜂窩織炎。二。內用少量。覺口內灼熱。胃部溫暖。發腹鳴。自三十分至三時後。發下痢。若用大量。則發劇烈之腸胃炎。將起嘔吐。三。若吸收於血中。則來中毒。來心悸。亢進。心下苦悶。四肢疼痛。疲勞。其效用。一。於服他下劑而不奏效之頑固便秘用。

四畫 巴

之。二。於因器械的狹窄及腸脊髓病之頑固便秘用之。三。於鉛毒疝毒用之。又於鉛毒便秘亦用之。四。爲引赤誘導藥。於吐酒石之適應症可用之。其用量用法。內用以四分之一至一滴。用白糖和之。又爲丸劑。極量一回爲〇、〇五。一日爲〇、一。但〇、〇五與一滴相當。而〇、一與二滴相當。又和漢藥考曰。巴豆酸 (Crotonic acid C₁₇H₃₂O₂) 爲美麗細毛狀結晶。攝氏二十度之溫水。可溶解其十二分。由水溶液徐徐結晶者。作菱角狀。氣味類醋酸 (Butyric acid) 與苛性鹼同熱。則變醋酸。其烜化點爲七十二度。沸騰點爲一百十八度。又巴豆酸有同分異性體。含於巴豆油中。作液狀。熱至一百七八十度時。則變巴豆酸。謂之異性巴豆酸。

配合應用 ●治飛尸鬼擊。中惡心痛。腹脹大便不通。走馬湯用巴豆二枚。去皮心。熬黃。杏仁二枚。以綿包椎碎。熱湯一合。捻取白汁服之。當下而愈。量老少用之。(外臺祕要方)

●治天絲入咽。凡露地飲食有飛絲入上食之。令人咽喉生瘡。急以白礬巴豆燒灰。吹入即愈。(瓊碎錄方)

●治耳卒聾閉。巴豆一粒。綿裹針刺孔通氣。塞之取效。(經驗方)

●治一切惡瘡有蟲者。巴豆三十粒。麻油煎黑。去豆。以油調硫黃輕粉末。類塗取效。(普濟方)

●治傷寒懷懷。滿悶。身無熱者。爲寒結胸。仲景三物白湯。用桔梗三分。巴豆一分。去皮心。熬黑。貝母三分。二味爲末。內巴豆白中杵之。以白湯和服。強人半錢。弱者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。

●治一切積滯。巴豆一兩。蛤粉二兩。黃蘗三兩。爲末。水丸。綠豆大。每水下五丸。(醫學切問方)

●治寒癖宿食不消。大便閉塞。巴豆仁一升。清酒五升。煮三日。三夜。研熟。合酒。微火煎。令可丸。如豌豆大。每服一丸。水下。欲吐者二丸。(千金方)

●治水蠱大腹。動搖水聲。皮膚

色黑。巴豆九十枚。去皮。熬黃。杏仁六十枚。去皮尖。熬黃。持丸。小豆大。水下一丸。以利爲度。切忌飲酒。(備急方)

●治食積積滯。巴豆皮心去淨二錢。皂莢去皮子六錢。搗研丸。如綠豆大一服。一丸。冷湯下。(肘后方)

●治積滯泄痢。腹痛裏急。杏仁去皮尖。巴豆去皮心。各四十九箇。同燒存性。研泥。溶蠟和丸。綠豆大。每服二三丸。煎大黃湯下。間日一服。一加百草箱三錢。(宣明方)

●治氣痢赤白。巴豆一兩。去皮心。熬研。以熟豬肝丸。綠豆大。空心米飲下三四丸。量人用此。乃擲。御所傳方也。(經驗方)

●治瀉血不止。巴豆一箇。去皮。以雞子開一孔。納入紙封。煨熟。去豆食之。其病即止。虛人分作二服。決效。(普濟方)

●治小兒下痢赤白。用巴豆煨熟。去油一錢。百草霜二錢。研末。飛羅麵。煮糊丸。黍米大。量人用之。赤用甘草湯。白用米湯。赤白用薑湯下。(全幼心鑑方)

四畫 巴

◎治夏月水瀉不止。巴豆一粒。針頭燒存性。化蠟和作一丸。倒流水下。(危氏得效方)

◎治小兒吐瀉。巴豆一箇。針穿。燈上燒過。黃蠟一豆。大燈上燒。滴入水中。同杵丸。黍米大。每用五七丸。蓮子燈心湯下。(危氏得效方)

◎治伏暑霍亂。傷冷吐利。用巴豆二十五箇。去皮心及油。黃丹炒研一兩二錢。半溶化。黃蠟和丸。綠豆大。每服五七丸。水浸少頃。別以新汲水吞下。(和劑應驗方)

◎治二便不通。巴豆連油黃連各半兩。搗作餅子。先滴葱鹽汁在餅內。安餅子上。灸二十七壯。取利爲度。(楊氏家藏方)

◎治寒痰氣喘。青橘皮一片。展開。入剛子一箇。麻絮定火上燒存性。研末。薑汁和酒一鍾。呷服。天台李翰林用此治莫秀才。到口便止。神方也。(張景岳說方)

◎治風濕痰病。人坐密室中。左用滾水一盆。右用炭火一盆。前置一桌。書一冊。先將無油新巴豆四十九粒。研如泥。紙壓去油。分作三餅。如病在左。令病人將右手仰置

書上。安藥於掌心。以盤安藥上。傾熱水入盤內。水涼即換。良久汗出。立見神效。病在右。安左掌心。一云。隨左右安之。(經驗方)

◎治陰毒傷寒。心結。按之極痛。大小便閉。但出氣稍暖者。急取巴豆十粒。研入麪一錢。捻作餅。安臍內。以小艾炷灸五壯。氣達即通。此太師陳北山方也。(直指方)

◎解中藥毒。巴豆去皮。不去油。馬牙硝等分。研丸。冷水服一彈丸。(廣利方)

◎治急喉痺。用巴豆。同白攀拈過。去巴豆。單用攀。研細。吹入喉中。流出熱毒涎。喉即寬。

◎治喉痺垂死。止有餘氣者。巴豆去皮。線穿內入喉中。牽出即甦。(千金方)

◎治輕喉風痺。巴豆兩粒。紙卷作用。切斷兩頭。以針穿孔內。入喉中。氣透即通。(勝金方)

◎治傷寒舌出。巴豆一粒。去油。取霜。以紙捲卷內入鼻中。舌即收上。(普濟方)

◎治中風口喎。巴豆七枚。去皮。研。左喎塗右手心。右喎塗左手心。

仍以暖水一盞。安藥上。須臾即止。(聖惠方)

◎治小兒口瘡。不能食乳。剛子一枚。連油研。入黃丹少許。剝去。上髮。貼之。四邊起粟炮。便用溫水洗去。乃以舊蒲湯再洗。即不成瘡。神效。(瑞竹堂方)

◎治風蟲牙痛。用巴豆一粒。煨黃去殼。蒜一瓣。切一頭。剝去中心。入豆在內。蓋定。綿裹。隨左右塞耳中。(聖惠方)

◎治風瘙癢疹。心下迷悶。巴豆出。煎痛處。三五次神效。(經驗方)

◎治風瘙癢疹。心下迷悶。巴豆五十粒。去皮。水七升。煮二升。以帚染拭之。隨手痛。(千金方)

◎治疥瘡搔痒。巴豆五十粒。泡黃。去皮心。右順手研。入酥少許。膩粉少許。抓破點上。不得近目。并外腎上。如熏目著腎。則以黃丹塗之。甚妙。(千金方)

◎治荷錢癬瘡。巴豆仁二三箇。連油杵泥。以生絹包。擦日一二三次。日痊好。(經驗方)

◎解一切瘡毒。及腐化瘻肉。最能推陳致新。烏金膏。巴豆仁炒焦。

二二二

研膏。點痛處。則解毒。塗於肉上。則自化。加乳香少許亦可。若毒深。不能收斂者。宜作摻純之。不致成痛。(外科精義方)

◎治疣痣黑子。巴豆一錢。石灰炒過。人言一錢。糯米五分。炒研點之。(怪症方)

◎治箭鐵入肉不可拔出者。用新巴豆略熬。與蠅同研。塗之。斯須痛定。微痒。忍之。待極痒不可忍。便撼拔動之。取出。速以生肌膏傅之。而痊。亦治疔腫。夏侯鄆在潤州。得此方。後至洪洲。旅舍主人妻病背痒。呻吟不已。鄆用此方試之。即痛止也。(經驗方)

◎治小兒痰喘。巴豆一粒。杵極爛。綿裹塞鼻。男左女右。痰即自下。(雙氏醫鑑方)

用量 五分至一錢。施用宜忌 凡非急症不可輕用。畏大黃。黃連。蘆筍。薇。紫。蘇。藜。鼓。冷水。得火良。惡蘆草。與牽牛相反。中其毒者。用冷水。黃連汁。大豆汁。解之。效。芫花爲之使。

著名方劑 八毒赤丸。治鬼疰病。(衛生寶鑑方)用雄黃礬石。礞

砂附子(泡)靈蓴丹皮巴豆各一兩蜈蚣一條爲末蜜丸小豆大每服五七丸冷水送下無時。

參攷資料

●巴豆主癥瘕瘕氣痞滿積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少頃腹內熱如火利出惡物雖利而不虛若久服亦不利人白膜破者不用(陳藏器)●今嘉州眉州戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤至十二月葉漸稠二月復漸生四月舊葉落盡新葉齊生即發花成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆莢漸漸自落乃收之一房有二瓣一瓣一子或三子子仍有殼用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等他處亦稀有(蘇頌)●若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張仲

四畫 巴

景治百病客件備急丸用之(王好古)●巴豆峻用則有戩亂劫病之功微用亦有撫綏調中之妙醫之齋曹絳灌乃真猛武夫而用之爲相亦能輔治太平王海藏言其可以通腸可以止瀉此發千古之祕也一老婦年六十飲病瀉泄巴五年肉食油物生冷犯之即作痛服調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚延余診之脈沉而滑此乃脾胃久傷冷積凝滯所致王太僕所謂大寒凝內久利瀉泄愈而復發綿歷年歲者法當以熱下之則寒去利止遂用蠟置巴豆丸藥五十九丸與服二日大便不通亦不利其泄遂愈自是每用治泄痢積滯諸病皆不瀉而病瘳者爲數甚夥妙在配合得宜藥病相對耳苟用所不當用則犯輕用損陰之戒矣(李時珍)●漢時方士言巴豆煉餌令人色好如神仙名醫別錄採入本草張華博物志言鼠食巴豆重三十斤一謬一誣陶氏信爲實語誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之(李時珍)●此物出巴蜀而形如菽豆故以名之宋

本草一名巴豆乃椒字傳訛也雷斅炮炙論又分緊小色黃者爲巴有三稜色黑者爲豆小而兩頭尖者爲剛子云巴與豆可用剛子不可用殺人其說殊乖蓋緊小者是雌有稜及兩頭尖者是雄雄者峻利雌者稍緩也用之得宜皆有功力用之失宜參朮亦能爲害况巴豆乎(李時珍)●巴豆房似大風子澀而脆薄子及仁皆似海松子所云似白豆莢者殊不類(李時珍)

【巴豆油】 命名 本品係壓榨巴豆所得之脂肪油

故名。

外國名詞 Crotonia Oleum

(Croton oil) (拉丁)

形態 巴豆油 (Croton oil) 爲黃色能帶褐色之濃厚液有不快臭氣比重爲〇·九四至〇·九五在空氣中乾燥現酸性反應酒精難溶伊打易溶用以塗擦皮膚經數分鐘即起灼熱引赤終而化膿味初緩和如油狀後辛辣如灼尋常出售之巴豆油有二種一爲印度者其色淡一爲英國者

其色機其性更烈。

製法 以巴豆研爛綿紙包壓榨取用。

成分 巴豆油之主要有效成分爲巴豆酸將此油塗於腹部臍傍有下瀉之效惟較巴豆爲劇。

主治 中風痰厥氣厥中惡喉痺一切急病咽喉不通牙關緊閉作擦點燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入喉內即時出涎或惡血便眩又舌上無故出血以燕舌之上下自止。

近人學說 丁福保曰巴豆油

爲重性瀉藥在瀉劑中爲上品能治頭痛腦熱中風昏倒疹子後變瘰症其性能大瀉極能感動人身如大便閉結或腸之行法無力或應用速瀉藥或引水瀉藥均可用之第服過限有大毒其病與霍亂吐瀉症相同間有數種腦筋之病如面部腦筋疼可用之又如水腫病服之能放出其水又如中風症不知人事藥不能下咽將此藥一二滴滴舌上即能大瀉腦中所有聚合之血即行下降又如發狂或牙關緊閉亦可依上法用之又如

肚腹脹等。服後即時大便而安。若瀉太過。可食粥水。牛乳。大麥水等。以止之。頭昏困倦者。可略飲酒。又如搽於皮膚。則為引炎藥。又常用之。則為惹性藥。引病外出。能治身內之病。又如將巴豆油二十分。合於尋常鉛膏藥八分。則為移病藥。又如塗此藥在皮膚。能生炎起瘡。癬。又能治風濕。酒風。脚癩。瘰癧。結核。胸內諸病。均宜搽病患各部。至解藥之解此毒。須先服吐劑。後服鴉片瀉水類。

【巴豆殼】 主治 消積滯。治瀉痢。

【巴豆樹根】 主治 癰疽發背。腫毒。瘰癧。疔毒。留頭妙不可言。收根陰乾。臨時水搗亦可。

【巴豆霜】 卽巴豆壓去油者之處方用名。詳「巴豆」條。

【巴蛇】 卽蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳「蜈蚣」條。

【巴砂】 卽砂之古籍別名。典見本草集註。詳「砂」條。

【巴斯草】 卽殺精草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「殺精草」條。

【巴戟天】 處方用名 巴戟肉。 連珠巴戟。

古籍別名 不凋草。(日華本草) 巴棘。女本。三莖草。葉柳草。丹川。練雨。老鼠刺根。(和漢藥考)

學名 *Damascanthus Indicus Gaertn. Var. Gigynthus Nak. (拉丁)*

基本 係茜草科。藥用巴戟天之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。巴戟天產廣東清遠三坑。羅定為好。下四府。南鄉等均次之。西江德慶。係種山貨。質味頗佳。廣西南寧亦有出。

形態 按巴戟天根如連珠。宿根青色。嫩根白紫。以連珠多肉厚者為勝。

採取 每年二月八月採根陰乾。

製法 雷敏曰。凡使。須用枸杞子湯。浸一宿。待稍軟。漉出。再酒浸一伏時。漉出。同菊花。熬焦黃。去菊花。以布拭乾。用。李時珍曰。今法惟以酒浸一宿。剉焙入藥。若急用。只以溫水浸軟去心也。

性質 辛。甘。微溫。無毒。 效能 溫腎。益精。祛風。治濕。用作強壯藥。

主治 大風邪氣。陰痿不起。強筋骨。安五臟。補中增志。益氣。療頭面遊風。小腹及陰中相引痛。補五勞。益精利男子。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論巴戟天曰。治男子夜夢。鬼交。精洩。強陰下氣。治風癩。【宋】日華諸家本草論巴戟天曰。治一切風。療水腫。【明】李時珍本草綱目論巴戟天曰。治脚氣。去風。疾。補血。海。【明】經希雅本草經疏論巴戟天曰。巴戟天味辛。別錄益之以甘。而本經又曰。微溫無毒。宜其然也。其主大風邪氣。及頭面遊風者。風為陽邪。勢多走上。經曰。邪之所。瘳。其氣必虛。巴戟天性能補助元陽。而兼散邪。况真元得補。邪安所留。此所以愈大風邪氣也。主陰痿不起。強筋骨。安五臟。補中增志。益氣者。是脾腎二經得所養。而諸虛自愈矣。其能療少腹。及陰中引痛。下氣。并補五勞。益精利男子者。五臟之勞。腎為之主。下氣。則火降。火

降則水升。陰陽互宅。精神內守。故主腎氣滋長。元陽益盛。諸虛為病者。不求其退而退矣。【清】黃宮繡本草求真論巴戟天曰。巴戟天辛甘微溫。性平。稱爲補腎要劑。能治五勞七傷。強陰益精。以其體潤。故耳熱氣味辛溫。又能祛風除濕。故凡腰膝疼痛。風氣脚氣水腫等症。服之更爲有益。觀守真地黃飲子。用之以治風邪。義實基此。未可專作補陰論也。川產中雖色紫。微有白粉。而理小暗者。眞。

國外學說 和漢藥考曰。日本不產巴戟天。有用遠志科植物柿葉草 (*Corydalis Fendleri* Fr. et G. Don) 根。充巴戟天者。或謂巴戟天係與遠志有同樣藥效者云。(柿葉草係山野自生之多年生草。高一尺許。葉類柿葉。故名。花作黃色) 又日本大久保氏之研究。謂本品含有種醣糖體。茲介紹其方法於下。以搗碎除去心部之巴戟天爲原料。取百二十五瓦。巴戟天加八十%酒精五百西西於水浴中加熱。浸出二回。集合其浸出液。加酒精。完全去其沈澱後。再加以確

酸去其鉛分。更加炭酸石灰於此液體中。和其中之硫酸。後於低溫處蒸發之濃縮。至呈厚餡狀。溶之於 Methylalcohol。如加少量之。以脫於其中時。則析出白色之沈澱。介吸以濾過之。更以脫十分洗滌而乾燥之。即可得白色之粉末。又謂本品爲白色之粉末。有強引濕性。燃化時僅少許之灰分。其溶液雖無元性。然如加鹽酸煮沸後。則著明能還元費林古氏液。卽本品具有糖體之本性。和鹽酸煮沸時生綠色之沈澱。加亞爾加里時變呈寶石紅色溶解之。

辨偽 ● 鄭育巖曰。巴戟天甘辛微溫。入腎經。血分。強陰益精。產蜀地者佳。如遠珠。擊破中紫而鮮潔者。僞也。中雖紫。微有白粉。粉色而理小。對者真也。近有以山豆根混充者。山豆色白性寒。或醋煮以亂之。則誤人不淺矣。● 曹炳章曰。按巴戟肉。廣東出者。肉厚骨細。色紫心白。黑色者佳。江西出者。骨粗肉薄。略次。浙江台州甯海縣出者。名遠珠。巴戟。擇其肉厚軟糯。層少。去骨用肉。亦佳。鄭君云。山豆根混

充。不但效用冰炭。且形態亦全不相類也。

近人學說 張山雷曰。巴戟陸冬不凋。味辛氣溫。專入腎家。爲鼓舞陽氣之用。本經主大風邪氣。別錄療頭面遊風。蓋以外來之寒風。言之。溫養元陽。則邪氣自除。起陰痿。強筋骨。益精。治小腹陰中相引痛。皆溫腎勝寒之效。安五臟。補五勞。補中增志。益氣。皆元陽布護之功也。別錄又謂其下氣。蓋腎陰不攝。寒水上凌。致有氣逆喘滿之證。巴戟溫腎以攝納其下。而上逆之氣自平。非熱痰上湧之氣逆也。又曰。巴戟味辛。其溫性雖不甚烈。而實爲腎臟益陽之品。雖曰溫和之氣。足以助五臟之長育。古人每以主虛損不足之病。然溫腎助陽。惟陽虛氣衰者爲宜。而陰虛血弱者。非用。不獨長其扶陽耗陰。亦以擾動相火。更令魂夢不安。易致強陽失精之禍。凡巴戟。仙茅。仙靈脾等物。溫腎與陽。古人恒以爲補腎主藥。而亦最易爲戕生之利器。今人體質柔脆。嗜慾少節。陰虛火旺者。多不可以古書稱其補益。而信手

拈來。誤人生命也。又曰。本經謂巴戟主大風。後人以治風病。其意正同。蓋古人之所謂風者。皆以西北寒風言之。故祛風多用溫藥。而今人之風病。則皆血耗生風。血熱血燥之病。恰與古之寒風。絕端相反。豈可更用溫藥。助其剛燥。此巴戟之必不可治今人之風病者也。仲淳經疏。謂巴戟助元陽而兼散邪。已是曲爲之解。陳修園乃爲大風邪氣四字。添出和風疾風等許。多空議論。直夢話耳。甄權藥性本草。謂其主夜夢鬼交。精泄。景岳井謂治濁。則因巴戟之強陰益精。而欲以補助其虛弱也。不知淫夢失精。皆至陰不攝。相火肆擾爲害。滋陰攝陽。最爲正治。而反用辛溫興陽之品。則火愈熾而魂愈不安。抱薪救火。反以助其驚張。爲禍更烈。胡可爲訓。近人頗有以溫腎之品。治腎陰不充者。豈不曰此皆補腎之主藥。然擾動龍雷。而長其慾。未有不速其斃者。冤鬼夜啼。醫者不悟。大可惜也。

配合應用 ● 治疝氣因於腎虛。用巴戟天同黃蘗。橘核。荔枝核。牛膝。川草薢。木瓜。金鈴子。懷生地黃。
● 治陰痿。用巴戟天。五味子。肉蓯蓉。鹿茸。山茱萸。栝子仁。補骨脂。枸杞子。去脂茸。肉蓯蓉。加黃蘗。牛膝。麥門冬。生地黃。車前子。治陰虛白濁久不愈。
● 治夜夢鬼交。泄精。用巴戟天。鹿角。栝子仁。天門冬。遠志。蓮鬚。覆盆。黃蘗。
● 治頭面上風。用巴戟天。甘菊。花。石菖蒲。何首烏。刺蒺藜。黑豆。山茱萸。天門冬。
● 治飲酒人脚弱。用巴戟天。熟大黃。
用量 一錢至二錢。
施用宜忌 凡病相火熾盛。思慾不得。便赤。口苦。目昏。目痛。煩躁。口渴。大便燥閉等症。禁用。惡雷丸。朝生。丹參。覆盆子爲之使。
參攷資料 ● 巴戟天生巴郡及下邳山谷。二月八月採根陰乾。
(別錄) ● 巴戟今亦用建平宜都者。根狀如牡丹而細。外赤內黑。用之打去心。(陶弘景) ● 巴戟苗俗名三莖草。葉如茗。經冬不枯。根如

連珠。宿根青色。嫩根白紫。用之亦同。以連珠多肉厚者為勝。(蘇恭)

◎巴戟天本有心。乾縮時。偶自落。或拍去。故中心或空。非自有小孔也。今人欲要中間紫色。則多偽以大豆汁沃之。不可不察。(寇宗奭)

◎巴戟今江淮河東州郡亦有。但不及蜀州者佳。多生山林內。內地生者。葉如麥門冬而厚大。至秋結實。今方家多以紫色為良。蜀人云。部無紫色者。采時或用黑豆同煮。欲其色紫。殊失氣味。尤宜辨之。又有一種山藤根。正似巴戟。但色白。土人采得以醋水煮之。乃以雜巴戟。莫能辨也。但破視之中。紫而鮮。潔者偽也。其中雖紫。又有微白。極有粉色。而理小暗者。真也。真巴戟。嫩時亦白。乾時亦黃。治使紫。力劣。弱耳。(蘇頌) ◎巴戟天。治陽虛之痿。淫羊藿。治陰虛之痿。(葉天士)

【巴戟肉】即巴戟天之處方用名。詳「巴戟天」條。

【巴棘】古籍別名。女木。(別錄)

產地 生山野高地。

形態 巴棘為山草類之一種。

藥用。葉白有刺。根連數十枚。其根可供藥用。

性質 苦。有毒。主治 疥癬。惡瘡。殺蟲。

【巴椒】即川椒之古籍別名。典見別錄。詳「川椒」條。

【巴菽】即巴豆之古籍別名。典見本經。詳「巴豆」條。

【巴菽剛子】即巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【巴霜】即巴豆之處方用名。詳「巴豆」條。

【巴霜剛子】即巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【弔脂】古籍別名。吉弔脂。弔脊。精名紫稍花(綱目) 係龍種為弔之脂膏。

產地 出嶺南諸地。

形態 弔為蛇頭龜身。宿水中。或棲木上。其脂質極輕。利透物。雖盛銅器中。亦能滲出。惟用玻璃瓶裝置。更以樟木盒重貯。或單以

雞卵殼盛之。庶不滲漏。其精色微青黃。或灰色。精與脂俱可供藥用。

性質 有毒。主治 風腫。癰毒。癩疹。赤瘡。疥癬。皮膚頑癢。跌跌折傷。內損。瘀血。以脂塗上。炙手熱摩之。即透。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論弔脂曰。治墜耳。不問年月。每日點入。半杏仁許便差。

資攷資料 姚和衆。延齡至寶方云。吉弔脂。出福建州。甚難得。須以琉璃瓶盛之。更以樟木盒重貯之。不爾則透氣失去也。孫光憲。北夢瑣言云。海上人言。龍每生二卵。一為吉弔。多與鹿遊。或於水邊遺瀝。值流槎。則附著木枝。如蒲菴。狀其色微青黃。復似灰色。號紫稍花。坐湯多用之。(蘇頌) ◎弔。舊無正條。惟蘇頌圖經載吉弔脂云。龍所生也。陳藏器拾遺有弔脂一條。引廣州記云。予蛇頭龜身。脊主姪刺云云。今考廣州記及太平御覽。止云弔蛇頭龜身。脊至輕利等語。並無所謂蛇頭龜身。脊主姪刺之說。蓋弔字似干龜字似姪。至輕利三字。似主姪刺傳寫訛誤。陳氏

遂承其誤耳。弔既龍種。豈有龜身。病中亦無姪刺之證。其誤可知。今改正之。(李時珍) ◎按裴姚二說相同。則弔脂即吉弔脂無疑矣。又陳自明。婦人良方云。紫稍花生湖澤中。乃魚蝦生卵於竹木之上。狀如鱗。澈去水用之。此說與孫說不同。近時房中諸術。多用紫稍花。皆得於湖澤。其色灰白。而輕鬆。恐非真者。當以孫說為正。或云紫稍花與龍涎相類。未知是否。(李時珍)

【弔殺爛麻】即弔殺爛麻。詳「楓上寄生」條。

【弔搭果】原名 倒弔果。(張揖廣雅) 原名 倒弔果。古籍別名 答選果。命名 諸果始生時皆上向。本品之花實獨下垂。故名。

別名 榕樹果。產地 出秦中。及遵化沿邊諸地。

形態 弔搭果為山果類之一種。枝葉俱如梨樹。結實似山梨而小。微長。生時堅澀。熟時多沙。其果可供藥用。

性質 暖。

主治 利胸膈。健脾消食。

【弔精】

原名 紫府蛇。性質 甘溫無毒。

主治 益陽秘精。療真元虛憊。陰痿遺精。餘瀝。白濁如脂。小便不禁。遺下濕痒。女人陰寒冷滯。入丸散用。

【弔脊】即弔脂之煎蒸成膏者。功用與弔脂同。詳「弔脂」條。

【弔藤鈎】即鈎藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鈎藤」條。

【引魚】即牛魚之古籍別名。典見異物誌。詳「牛魚」條。

【心太草】即石花菜之日本名。詳「石花菜」條。

【心月狐香】即靈貓香之古籍別名。典見星禽真形圖。詳「靈貓香」條。

【心痛草】即番慈茹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番慈茹」條。

【心黃】即牛黃之得自病死牛心者。詳「牛黃」條。

【戈共】

產地 生山谷。性質 苦寒無毒。

主治 驚風。傷寒。腹痛。羸瘦。【支子】即山梔子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【支連】即黃連之古籍別名。典見藥性。詳「黃連」條。

【支蘭】即狼牙之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「狼牙」條。

【文元參】即蒸參之處方用名。詳「蒸參」條。

【文旦】即柚之產於福建者。實色白。味香甜。功用與尋常柚相同。詳「柚」條。

【文石】

古籍別名 黍石。(別錄) 產地 出東郡山澤中。

形態 文石為雜草類之一種。有五色。莖有汁。周圍潤澤。

性質 甘。主治 寒熱心煩。

【文甲】即玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玳瑁」條。

【文豆】即綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【文希】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳「沙參」條。

【文具】即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳「紫貝」條。

【文昌子】即大腹子之產於廣東

文昌縣境者。詳「大腹子」條。

【文林郎果】即林檎之古籍別名。典見綱目。詳「林檎」條。

【文武實】即桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑椹」條。

【文虎】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳「沙參」條。

【文星草】即穀精草之古籍別名。典見綱目。詳「穀精草」條。

【文狸香】即靈貓香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「靈貓香」條。

【文章草】即五加皮之古籍別名。典見綱目。詳「五加皮」條。

【文章柳】即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

【文無】即當歸之古籍別名。典見綱目。詳「當歸」條。

【文魚】即鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱧魚」條。

【文蛤】 命名 本品形似蛤而有花紋。故名。

古籍別名 花蛤(綱目) 外國名詞 Cytharea more-

tris L. 或 Mercetrix morestris (Linn (拉丁) ハマグリ(日本)

基本 係軟體動物。瓣鰓類有

管類。瓣鰓類。文蛤科。藥用其壳。

產地 產暖地淺海沙中。形態 文蛤為介類之動物。大者長二三寸。其殼略似心臟形。色微白帶褐色。放細狀之帶紋。內面白色。水管甚長。足有強力。僅一二分時。能掘沙土埋藏其體。溫暖時伸縮其足以匍行。寒冷時則潛伏沙土中。肉可供食。殼可供藥用。

製法 同海蛤。性質 鹹平無毒。

主治 惡疔。蝕五痔。咳逆胸痺。腰痛脇急。鼠瘻。大孔出血。女人崩中漏下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論文蛤曰。能止煩渴。利小便。化痰軟堅。治口鼻中蝕疔。

參攷資料 ①文蛤生東海。表有文(別錄) ②文蛤小大皆有紫斑。(陶弘景) ③文蛤今出萊州海中。三月中旬。採背上有斑文者(韓保昇) ④文蛤大者圓三寸。小者圓五六分。(蘇恭) ⑤文蛤即今吳人所食花蛤也。其形一頭小一頭大。殼有花斑者便是。(李時珍)

四畫 弔 引 心 戈 支 文

二一七

【文鶴魚】古籍別名 飛魚。(本草綱目)

外國名詞 Cypselurus agoo

Schleg Flying fish (拉丁)

トヒノウオ或アク或トビウテ

或ツバクロウラ(日本)

基本 係脊椎動物魚類、喉鰓類、文鶴魚科。藥用文鶴魚之肉。

產地 生海洋中。

形態 文鶴魚為無鱗魚類之一種。體呈長紡錘狀。體長為體高之六倍有餘。又為頭長之五倍有餘。頭長為吻長之三倍餘。眼大口小。齒短。脊鰭小。有十四刺。胸鰭甚大。張之略如燕翼。能飛。雜水面二三尺。遠達十丈許。蒼文。白首。赤喙。腹白。背蒼黑。鱗圓大而易脫。其肉可供藥用。

性質 甘。酸。無毒。

主治 婦人難產。燒黑。研末。酒服。一錢。隨月帶之。令人易產。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論文鶴魚肉曰。已狂已痔。

【文鶴】即南天鶴赤色者之古籍別名。典見綱目。詳【南天鶴】條。

【方正草】產地 出福建晉永春州境。

形態 方正草為雜草類之一種。葉狹長。莖色。平分四方。攢莖而上。其實五瓣。可供藥用。

主治 金蠶蠱。

【方石】即長石之古籍別名。典見本經。詳【長石】條。

【方竹】即竹幹之作方形。其節或暴或無。或促或疏。形態不一者。功用與尋常竹同。詳【竹】條。

【方莖】即胡麻之古籍別名。典見吳普本草。詳【胡麻】條。

【方通草】即通草之處方用名。詳【通草】條。

【方勝板】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【雷公藤】條。

即碧飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【碧飛】條。

【方解石】命名 敲破塊塊如方解。故以為名。

原名 黃石。

學名 Calcit Kalkspat

外國名詞 Calc-spar. Calcite, Iceland spar. Doubly-refracting spar (英) Calcit, Kal-

吸收增大。故常用作制酸劑。

主治 胸中留熱。結氣。黃膽。瀉血脈。去蠱毒。

用量 一錢至三錢。

配合宜忌 惡巴豆。

參攷資料 ①方解石生方山。採無時(別錄) ②本經長石一名方石。療瘰相似。疑即此也。(陶弘景) ③此物大體與石膏相似。不附石而生。端然獨處。大者如升。小者如拳。甚大者方尺。或在土中。或生溪水。其土皮隨土及水蒼色。破之方解。今人以為石膏。用療風去熱。雖同。而解肌發汗不及也。(蘇恭) ④方解石本草言生方山。陶隱居疑與長石為一物。蘇恭云。療熱不滅石膏。若然。似可通用。但主頭風不及石膏也。其肌理形段剛柔皆同。但以附石不附石為言。豈得功力頓異。如雌黃雄黃。亦有端然獨處者。亦有附石生者。不聞別有名號。功力相異也。(蘇頌) ⑤方解石與硬石膏相似。皆光潔如白石英。但以敲之。段段片碎者為硬石膏。塊塊方稜者為方解石。蓋一類二種。亦可通用。唐宋諸方皆以

Leipath, Doppelpath (德)

基本 係鈣石類結晶屬六角晶系。

產地 方解石產江蘇沭陽縣。安徽貴池縣。四川瀘縣。浙江錢唐縣。和漢藥考云。產石灰山附近及花崗石中。其有名產地為冰島。日本遠江美濃地方亦產之。

形態 方解石為斜方六面體。或結晶塊。本為白色。但有因夾雜他物而變其色者。破碎面作貝殼狀。有類似玻璃。真珠。及脂肪等之光澤。硬度為三。○比重為二。六至二。八。其透明者。能折光線為二重。故用以視物。現出二形。本品加酸類。則發出炭酸瓦斯而溶解。

性質 苦。大寒。無毒。

成分 為炭酸鈣CaCO₃。此外雜有鐵。鋅。錳等炭酸鹽類。

製法 和漢藥考曰。凡使方解石。以明澈者為上品。研碎水飛用之。

效能 與胃液相遇。能中和胃液內之酸質。而成氯化鈣。至腸內被吹收而入血中。同時能使腸之

此爲石膏。今人又以爲寒水石。雖俱不是。而其性寒治熱之功。大抵不相遠。惟解肌發汗。不能如硬石膏爲異爾。(李時珍) ①方解石又名黃石。人參亦一名黃石。(和漢藥考)

【方圓】即桔梗之古籍別名。與見吳普本草。詳「桔梗」條。

【方實】即石龍芻之古籍別名。與見別錄。詳「石龍芻」條。

【方遺】即青蒿之古籍別名。與見本經。詳「青蒿」條。

【方棧】即椒櫬實之有三棧或四棧者。性味功用。與椒櫬同。詳「椒櫬」條。

【日及】即扶桑之古籍別名。與見綱目。詳「扶桑」條。即木槿之古籍別名。與見綱目。詳「木槿」條。

【日剛子】即巴豆之古籍別名。與見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【日精】即硃砂之古籍別名。與見石藥爾雅。詳「硃砂」條。即菊花之古籍別名。與見別錄。詳「菊花」條。

【日精曹公】即楊梅之古籍別名。與見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【日影葛】即石松之日本名。詳「石松」條。

【日陰登】即石松之日本名。詳「石松」條。

【月下紅】即兔耳一枝箭之古籍別名。與見百草鏡。詳「兔耳一枝箭」條。

【月月紅】即月季花之古籍別名。與見綱目。詳「月季花」條。

【月季花】命名 本品逐月開放而不結子故名。古醫別名 月月紅。勝春。瘦客。國雪紅。長春花。(本草綱目)

外國名詞 Rose indica, (拉丁)カウシンバラ チャウシエン(日本)

基本 係薔薇科。藥用月季花之花蕾。



月季花

形態 月季花爲蔓草類之灌木。高五六尺。嫩枝。莖有刺。葉爲複

葉。其小葉三枚至五枚。平滑而有光澤。托葉甚狹。花大有壺狀之花托。花冠淡紅色。而花瓣千葉厚瓣。逐月開放。不結子。其花可供製香水。并可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 活血。消腫。傳毒。

【月桂】性質 甘溫。主治 小兒耳後月蝕瘡。

【月魂】即蟾酥之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蟾酥」條。

【月魄】即蟾酥之古籍別名。與見綱目。詳「蟾酥」條。

【月萃吟】即香附子之古籍別名。與見金光明經。詳「香附子」條。

【木八角】古醫別名 金盤草。(綱目拾遺)

形態 木八角爲雜木類之一種。木高二三尺。葉如木芙蓉。八角有芒。其葉近蒂處有紅色者佳。秋開白花。細穢。其根皮可供藥用。

性質 苦辛。溫。有毒。

主治 麻痺風毒。打撲瘀血停積。其氣猛悍。能開通壅塞。痛麻立止。

施用宜忌 凡體虛者禁用。參攷資料 唐王周金盤草詩。註。金盤草生甯江巫山。南陵林木中。其根一年生一節。人採而服。可解毒也。其詩云。今春從南陵。得草名金盤。似有仁人性。生在林木端。根節處一節。食之甘而酸。風俗競採。撮俾人防急難。巴中地處海解之如走丸。巨葉展六出。軟幹分長竿。搖搖綠玉活。飄飄香荷寒。世云。酷暑月。豈有神物看。天之產於此。意欲生民安。云云。味詩意則似今之草八角。其性又能解蛇蟲毒也。(趙恕軒)

【木子】即獼猴桃之古籍別名。與見綱目。詳「獼猴桃」條。

【木中尊】即蘇枋木之中心紋。橫如紫角者。詳「蘇枋木」條。

【木丹】即山梔子之古籍別名。與見本經。詳「山梔子」條。


【木天蓼】命名 本品樹高而味辛如葱。故名。古醫別名 天蓼。蓬萊。獲留。天木。金蓮枝。南扶留。(和漢藥考)

外國名詞 Actinidia Poly-gama, Miq.(拉一)

四 薑 木

基本 屬獨飛桃科。藥用木天
蓼之枝葉。

形態 木天蓼為莖狀木質之
落葉植物。自生於冬地之山野。莖
細長。葉密生莖間。葉形卵圓或橢
圓。末端尖銳。邊緣有鋸齒。皆互生。
其嫩葉。花時往往變白。六七月間
葉腋抽出花梗。每梗開五瓣白花
一朵至三朵。稍似梅花。但常向下。
果實為漿果。大如指頭。尖而長。味
酸辛。別有一種。名深山木天蓼。為
落葉木質之莖葉本。亦自生於山
地。莖細。纏絡他物。葉尖端平闊。其
基部作心臟形。皆互生。花亦五
瓣。色白。果實為漿果。惟短而鈍耳。



木 天 蓼

採取 五六月間採子。三四月
間採葉。

製法 凡使子實去梗。瀝以熱
湯後晒乾用。

性質 辛。溫。有小毒。
效能 祛風治勞。用治疝氣風

藥 勞

主治 痰結積聚。風勞虛冷。細
切。醱酒飲。(唐本草)

國外學說 和漢三才圖會曰。
木天蓼生山谷中。高二三丈。如冬
青不凋。三四月開花似栢花。五月
結子。作毬形。如檉麻子。可藏作果
食。又為燭。明如胡麻。小天蓼樹如
栢子。冬月不凋。野獸食之。藤天蓼
生江南淮南山中。作藤莖。葉似栢
花。白子如棗許。無定形。中飄似茄
子。味辛。可作葷菜。按藤天蓼日本
亦產之。人家種植又多。其莖蒼黑。
葉似栢及櫻桃葉。而皺。三四月開
小白花。狀似梅花。而小。結實有雌
雄。雌者實如五倍子而青色。雄者
實如棗。人採其嫩葉。合酸醬食之。
貓尤愛此。倘見此樹。必抓穿根。食
皮為之枯。病貓食天蓼子。即起。人
亦可醱藏之。大和本草曰。天蓼有
三種。木天蓼。小天蓼。藤天蓼是也。
日本祇有藤天蓼。而無其他兩種。
木蓼。小蓼。皆木本也。惟藤蓼則莖
草耳。木天蓼。四五月開白花。好事
者摘去其葉。插臍瓶中。宛似梅花。
謂之夏梅。其子實有兩種。而味皆

辛。貓好食其新芽。如有病患。覓
食其根與莖葉。頗有自知之明。按
其質及芽葉。食之。確能治愈積聚。
並心腹冷痛痞塞等症。又風蟲牙
痛。塞之。性溫。然脾胃虛冷之人。及
泄瀉者。勿食。生芽食之。必瀉。

用量 錢半至三錢。

配合應用 ①天蓼酒治風有
奇效。木天蓼一斤。取皮細剉。以生
絹盛入好酒三斗。浸之。春夏一七
日。秋冬二七日。每空心。午下晚各
溫一盞飲。若常服。只飲一次。老幼
臨時加減。(聖惠方)

②治氣痢不止。寒日一百五日。
採木蓼暴乾。用時為末。粥飲服一
錢。(聖惠方)

③治大風白癩。天蓼刮去粗皮。
剉四兩水一斗。煎汁一升。煮糯米
作粥。空心食之。病在上吐。出在中
汗出。在下泄。出避風。又方。天蓼三
斤。天麻一斤。半生剉。以水三斗五
升。煎一斗。去滓。石器慢煎。如鴿。每
服半匙。荊芥薄荷酒下。日二夜一。
一月可以見效。(聖惠方)

參攷資料 ①木天蓼所在皆
有。生山谷中。今安州申州作藤莖。

葉似栢。花白。子如棗許。無定形。中
飄似茄子。味辛。噉之。可以當葷菜。
(蘇恭) ②木蓼。今時所用。出山南
鳳州。樹高如冬青。不凋。不當以藤
天蓼為注。既云木蓼。豈是藤生。自
有藤莖耳。藤蓼生江南淮南山中。
藤着樹。生葉如梨花。而薄。子如棗。
即蘇恭以為木天蓼者。又有小天
蓼。生天目山。四明山。樹如栢子。冬
月不凋。野獸食之。是有三天蓼。俱
能逐風。而小者為勝。頌曰。木天蓼
今出信陽。木高二三丈。三四月
開花。似栢花。五月採子。子作毬形。
似檉麻子。可藏作果食。蘇恭所說。
自是藤天蓼也。(陳藏器) ③天蓼
雖有三種。而功用彷彿。蓋一類也。
其子可為燭。其芽可食。故陸機云。
木蓼為燭。明如胡麻。薛田咏蜀詩
有地丁菜嫩和風採。天蓼芽新入
粉煎之句。(李時珍)

【木天蓼子】

性質 苦。辛。微
熱。無毒。
主治 賊風。口面喎斜。冷痺。
氣塊。女子虛勞。

【木天蓼枝】

性質 辛。溫。有
小毒。

主治 風勞虛冷。痰結積聚。氣
崩白瀉。

施用宜忌 不宜久服。能損氣
傷元。

【木天蓼根】 主治 風蟲牙
痛。搗丸塞之。連
易四五次。除根勿噉汁。

【木心石】 命名 本品係木之
脂液凝聚於中心。經
久而變形如石狀故名。

形態 木心石圓如雀卵。中色
正白。著木處燦如黃金。可供藥用。

主治 心氣痛。酒磨服之。

參攷資料 孝子某。母嘗患心
痛。日久不瘳。孝子日禱於神求治。

一夕夢神曰。爾母疾必得木心石
乃愈。醒而遍訪名醫。皆不知此藥。

一日入山。忽有二匠解木。下鋸有
聲。孝子乃悟。急止。告以故。視鋸下
有石。持歸磨酒。與母服。痼狀頓除。

(書影叢說)
【木王】 卽梓之古籍別名。典見綱
目。詳『梓』條。

四畫 木

綱目。詳『柑』條。○卽柯樹之古籍
別名。典見綱目。詳『柯樹』條。

【木瓜】 命名 本品實小如瓜。
味酸。得木之正氣故名。

處方用名 宜木瓜。
古籍別名 楸。(本草綱目) 櫻
桃。餓脚梨。(和漢藥考)

外國名 國 Cydonium Sine-
use. (Pyrus Cathayensis)
(Chinese Quince.) (拉丁)

基本 屬薔薇科。藥用木瓜之
果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
木瓜產湖北沙市。內資。邱爲最。其
次湖南津市。湘潭。四川更次。秋季
出新。

形態 按木瓜爲落葉灌木。種
於庭園。以供觀賞之用。高三尺至
六七尺不等。近枝之處有刺。葉作
卵圓或長橢圓形。邊緣有鋸齒。皆
互生。花開於春。先葉而發。似海棠

花。而有五瓣。有紅白及紅白交雜
諸色。兩朵至六朵攢簇而生。果實
爲漿果。色黃綠。形橢圓。長二三寸。
味酸甚。

種類 ○實圓如小瓜而有鼻。

(鼻乃花脫處。非腋芽也) 津潤味
不木者。謂之木瓜。○實圓小於木
瓜。味木而酢澆者。謂之木桃。○實
似木瓜而無鼻。大於木瓜。味澆者
謂之木李。亦曰木梨。卽櫻桃及和
圓子也。

採取 夏季瓜熟時採之。

製法 雷敏曰。凡使木瓜。勿犯
鐵器。以銅刀削去硬皮。并子切片
晒乾。以黃牛乳汁拌蒸。從已至未
待如膏煎。乃晒用也。李時珍曰。今
人但切片晒乾入藥耳。按大明會
典。宜州歲貢烏爛蟲蛙木瓜。入御
藥局。亦取其陳久無木氣如梨子
去木氣之義爾。

性質 酸。溫。無毒。

效能 斂肝。和脾。化溼。舒筋。用
治中暑。霍亂吐利。轉筋。及脚氣等
藥。

主治 溼痺脚氣。霍亂大吐下。
轉筋不止。

歷代記述攷證 【南北朝】雷
斡炮炙論木瓜曰。調營衛。助穀氣。

【唐】陳藏器本草拾遺論木瓜曰。
治脚氣衝心。取嫩者一顆。去子煎
服佳。強筋骨。下冷氣。止嘔逆。心膈

痰唾。消食。止水利後渴不止。作飲
服之。【宋】大明諸家本草論木瓜
曰。止吐瀉奔豚。及水腫。冷熱痢。心
腹痛。【元】王好古湯液本草論木
瓜曰。去溼和胃。滋脾益肺。治腹脹
善噫。心下煩痞。【明】櫻希雅本草
經疏論木瓜曰。木瓜實味酸氣溫。
性無毒。氣薄味厚。入足太陽陽明。
兼入足厥陰經。其主溼痺脚氣者。
以脾主四肢。又主肌肉。性惡溼而
喜燥。溼徒肌肉。則爲溼痺。傷足絡
則成脚氣。木瓜溫能通肌肉之滯。
酸能斂滯滯之溼。則脚氣溼痺自
除也。霍亂大吐下。轉筋不止者。脾
胃病也。夏月暑溼。飲食之邪傷於
脾胃。則揮霍撩亂。上吐下瀉。甚則
肝木乘脾而筋爲之轉也。酸溫能
和脾胃。固虛脫。兼之入肝而養筋。
所以能療肝脾所生之病也。藏器
治脚氣衝心。強筋骨。下冷氣。止嘔
逆。大明主吐瀉水腫。心腹痛。好古
治腹脹善噫。心下煩痞。無非取其
去溼和胃。滋脾益肺。利筋骨。調營
衛。通行收斂。有並行不悖之功也。

書載著其功曰。理脾舒筋斂肺。緣
暑溼傷人。揮霍撩亂。吐瀉交作。未
有不累脾胃而傷元氣。損營衛而
敗筋骨。木瓜性味酸溫。既於溼熱
可疏復於損耗可斂。故能於脾有
補。於筋可舒。於肺可斂。豈真脾胃
虛弱。可為常用之味哉。然使食之
太過。則又損齒與骨。及犯癘閉。以
其收澹甚而伐肝極。奈人僅知理
脚。而不審其虛實妄投。殊為可惜。
陳者良。清。王士雄隨息居飲食
譜論木瓜曰。木瓜酸平。調氣和胃。
養肝。消脹舒筋。息風去溼。蜜酒漬
浸。多食患淋。以酸收太過也。專治
轉筋。能健腰脚。故老人宜佩之也。
清。鄒澍本經疏證論木瓜曰。蛋
亂小小吐下。未必遂致轉筋。蛋亂
大吐下。則中氣潰敗。血液暴亡。筋
失所養。而絞旋收引焉。若僅見於
手足者。猶係血液不能運及四末。
如在四末。不急施治。則由外及中。
病遂危殆。故轉筋入腹則死也。然
曰轉筋不止。則又可見吐下止而
轉筋不止。霍亂既止。血液當復轉
筋自應漸止。乃猶不止。始用木瓜。
木瓜所以收合血液之餘。宣布筋

骸之養也。說者謂惟酸能集津液。
而梅與木瓜為尤甚。故談梅可以
已渴。呼木瓜名。書木瓜字。可以止
轉筋。二者畢竟如何分別。不得互
為用。蓋酸者陽在陰中。蠕蠕以動
之義也。但氣平者靜而降。氣溫者
柔而行。生氣通天論曰。陽氣者。靜
則養神。柔則養筋。惟其養神。故主
安心下氣。除熱煩滿。惟其養筋。故
主霍亂大吐下轉筋不止。神者行
於血脈。血脈不成。則為死肌。筋者
絡於骨節。骨節不利。則為溼痺。是
其不得互相為用處。

國外學說 英美學說謂木瓜
子產中國之江北及印度等處。其
種子可為藥品。在阿刺伯國。古人
已早知之。又謂木瓜子為潤性之
藥。配煮水或漿用。其功用與檀子
同。日本大和本草曰。日本產木瓜
有數種。一曰寒木瓜。花小紅而帶
黃。結實。二曰淫木瓜。花紅。無實。
三曰白木瓜。葉初生時。色鮮綠。四
曰長春木瓜。自十月開花。春夏不
斷。唯秋無花。十二月。正月花更好。
色鮮紅。五曰唐木瓜。花初開時。色
白。漸淡紅。後深紅。六曰草木瓜。高

一二尺。多野生。木有刺。花紅。結實
頗小。亦有大者。葉與實俱似櫻桃。
又一種。樹似梨而高大。長丈餘。矮
亦六七尺。莖幹有刺。結實大於木
瓜。又一種。花大。色有紅白二種。果
亦巨大。多刺。其品類極多。花開繁
盛。而又經久。故愛之者眾也。木瓜
不可與鯪鱈同食。又本草綱目啓
蒙曰。木瓜樹高丈餘。葉長大如桃
葉。春日未葉。先花。花似海棠。色鮮
豔。後實結。長二寸許。末端有凹。凹
處有鼻突起。如石榴尖。花紅者名
緋木瓜。紅白交雜者。即普通之木
瓜。此有雌雄。雌者結實。雄者不結
實。然視真木瓜為短。且無鼻。藥舖
所售外來之木瓜。長約寸半。縱剖
為二。形狀同中國種。此真木瓜也。
其呼真木瓜者。長八寸許。橫切二
三分厚之片。是乃檀子。非木瓜也。
其長二寸餘。縱破為四而乾者。又
係檳榔。亦非木瓜。日用藥品考曰。
木瓜中國來者多真。皆縱剖為二。
小者為上品。大者次之。或雜檳榔。
須挑選之。手板發蒙曰。真木瓜非
檳榔。凡縱破為四者。檳榔也。日本
所謂木瓜。實即中國之檀子。橫切

而為圓片者是。
辨偽 鄭肯巖曰。偽名洋木
瓜。大粒長式。光皮黑色。不知何種
果實。偽充。萬不可用。按木瓜處處
雖有。當以宣城產者為勝。陳久者
良。氣味酸溫。皮薄。色黃赤。味極芳
香。能調營衛。助發氣。平下利。腹痛
去溼和胃。及溼痺脚氣。霍亂轉筋
等症。聞又有木桃。木李。形質頗相
似。亦可偽充。用者當求真品也。曹炳章曰。按木瓜為落葉灌木之
植物。幹高五六尺。葉長橢圓形。至
春先葉後花。其花分紅白兩種。頗
美。秋季結實。長圓形。產地首推
浙江淳安縣。名淳木瓜。最佳。外皮
似縐紗紋。色紫紅。體堅。結肉厚。心
小。個勻。湖北宣城產者。名宣木瓜。
體結。色紫紋。亦佳。其餘紫秋。巴
東。濟南等處所產。雖亦有佳種。然
不及以上兩處之美。四川夔江縣
產者。名川木瓜。質鬆。色黃。皮粗糙。
無細紋。個大而肉薄。亦次。福建產
者。色黃而大。味香。不入藥用。又一
種。紅梨。皮光肉結實者。亦偽充木
瓜。不堪入藥。如鄭君所云。木桃木
李。或即此類。宜慎辨之。

配合應用 治轉筋。用木瓜

及白藕豆、薑香、石斛、雞舌香、白茯苓、橘皮、白梅、人參、白朮、甘草、砂仁、香薷、去石斛、雞舌香、治傷暑霍亂吐瀉不止。

治血虛轉筋。木瓜、當歸、石斛、牛膝、續斷、芍藥、橘皮。

治溼熱脚氣。木瓜、薏苡仁、朮、茯苓、五加皮、石斛、草薢、黃蘗。

治胃虛嘔吐。木瓜、人參、白茯苓、麥門冬、薑香、白豆蔻、竹茹、枇杷葉。

治楊梅結毒有效。木瓜一味為末。白湯吞三錢。日五服。

治暑月霍亂。用木瓜入六和湯服之。

治項強筋急。不可轉側。肝腎二臟受風也。用宣州木瓜二箇。取蓋去瓢。沒藥二兩。乳香二錢半。二味入木瓜內。縛定。飯上蒸三四次。爛研成膏。每用三錢。入生地黃汁半盞。無灰酒二盞。煖化溫服。(本事方)

治脚氣腫急。用木瓜切片。藁盛踏之。廣德願安中患脚氣筋急。腫脹。因附丹以足闊一袋上。漸覺

小痛。乃問舟子。袋中何物。曰。宣州木瓜也。及歸。製木瓜袋用之。頓愈。(名醫錄方)

治脚筋攣痛。用木瓜數枚。以酒水各半。煮爛。搗膏。乘熱貼於痛處。以帛裹之。冷即換。每日三五度。(食療本草方)

治膝下絞痛。木瓜三片。桑葉七片。大棗三枚。水三升。煮半升。頓服即愈。(食療本草方)

治小兒洞痢。木瓜搗汁服之。(千金方)

治霍亂轉筋。木瓜一兩。酒一升。煎服。不飲酒者。煮湯服。仍煎湯浸青布裹其足。(聖惠方)

治霍亂腹痛。木瓜五錢。桑皮三片。棗肉一枚。水煎服。(聖惠方)

四蒸木瓜圓。治肝腎脾三經氣虛。為風寒暑溼相搏。流注經絡。凡遇氣化更變。七情不和。必至發動。或腫滿。或頭暈。憎寒壯熱。嘔吐自汗。霍亂吐利。用宣州大木瓜四箇。切蓋剗空。聽用。一箇入黃芪。續斷。末各半兩於內。一箇入蒼朮。橘皮。末各半兩於內。一箇入烏藥。黃松節。末各半兩於內。(黃松節。即

茯神中心木也)一箇入威靈仙。苦苧。糜末各半兩於內。以原蓋簪定。用酒浸透。入飯內蒸熟。晒三浸。三蒸三晒。搗末。以榆皮末水和糊。丸。如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯任下。(御藥院方)

治腎臟虛冷。氣攻腹脇。脹滿疼痛。用大木瓜三十枚。去皮核。剗空。以甘菊花末。青鹽末各一斤。填滿。置籠內蒸熟。搗成膏。入新艾茸二斤。搜和丸。如梧子大。每米飲下三十丸。日二服。(聖濟總錄方)

治髮槁不澤。木瓜浸油梳頭。(聖惠方)

治反花痔瘡。木瓜為末。以鯉魚身上涎調貼之。以紙護住。(醫林集要方)

辟除壁虱。以木瓜切片。鋪於席下。(履仙神隱方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡無濕熱結聚者禁用。

配合宜忌 忌鐵。

參攷資料 木瓜最煖轉筋。如轉筋時。但呼其名。及書上作木瓜字。皆愈。此理亦不可解。俗人挂

木瓜杖。云利筋脈也。(陶弘景)木瓜山陰。南亭尤多。彼人以為良果。又有檇樹。大而黃。有種子。小而清。禮云。檇梨鑽之。古亦以檇為果。今則不也。(陶弘景)真木瓜皮薄。色赤黃。香而甘。酸不澀。其向裏子頭尖。一面方。食之益人。有和圓子。色微黃。蒂粗。其子小。圓。味澆。酸。能傷人。氣有蔓子。顆小。味絕澆。不堪用。有土伏子。味絕苦澆。不堪用。子如大棗。油麻。餌之。令人目色多赤。筋痛也。(雷斅)其樹枝狀如柰花。作房生子。形似栝樓。火乾。甚香。檀子似梨。而酢。江外常為果食。(韓保昇)木瓜處處有之。而宣城者為佳。木狀如柰。春末開花。深紅色。其實大者如瓜。小者如拳。上黃似者粉。宜入種。蔴尤謹。遍滿山谷。始實成。則鐵紙花粘於上。夜露日烘。漸變紅花色。其文如生。本州以充土貢。故有宣城花木瓜之稱。檇樹。酷類木瓜。但看蒂間。別有重蒂。如乳者。為木瓜。無者。為檇樹也。(蘇頌)按爾雅云。檇。木瓜。郭璞註云。木實如小瓜。酢而可食。則木瓜之名。取此義也。或云。木瓜味酸。

四盤木

四畫 木

得木之正氣故名。亦通。楸從林。矛諧聲也。(李時珍) ④木瓜可種可接。可以枝壓。其葉光而厚。其實如小瓜而有鼻。津潤味不木者為木瓜。則小於木瓜。味木而酢。清者為木桃。似木瓜而無鼻。大於木桃。味清者為木李。亦曰木梨。即檉棗及和圓子也。鼻乃花脫處。非脐蒂也。木瓜性脆。可蜜漬之為果。去子蒸爛搗泥。入蜜與藕作煎。冬月飲尤佳。木桃木李。性堅可蜜煎。及作糕食之。木瓜燒灰散池中。可以毒魚。說出淮南萬畢術。又廣志云。木瓜枝一尺。有一百二十節。可為數號。(李時珍) ⑤木瓜多食患淋。以酸收太過也。(王孟英) ⑥予治舉舟人病溺不得出。醫用通利藥罔效。迎予視之。問四面皆木瓜香。笑謂諸人曰。撤去此物。溺即出矣。盡傾其物。溺如舊。按即多食患淋之證也。(鄭真) ⑦予讀葉天士本草經解。其木瓜條下。有專一味。能治楊梅結毒之語。予以蜜丸。每服一錢。開水送下。與人服之。却多應手。然終莫測其理。意者木瓜之味辛酸。善行通絡。蓋格道則結散。結散

則毒自化矣。故爾速效也。此予臆度之說。未識當否。隨息居服食譜。微疔結毒。木瓜一味研末。水法丸。日以土茯苓湯下三錢。(盧朋飛)

【木瓜花】 主治 治面黑粉滓。用李花、梨花、櫻桃花、白葵花、白蓮花、紅蓮花、旋復花、秦椒各六兩。桃花、木瓜花、丁香、沈香、青木香、鐘乳粉各三兩。珍珠、玉屑各二兩。蜀葵花一兩。大豆末七合。為細末。瓶收。每日盥面時。用洗手面。百日光潔如玉。

【木瓜核】 主治 霍亂煩燥氣。急。每嚼七粒。溫水下。性質 酸。瀉。溫。無毒。

【木瓜枝葉皮根】 性質 酸。瀉。溫。無毒。主治 煮汁飲。並止霍亂吐下。轉筋。痲脚氣。歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論木瓜枝葉皮根曰。枝作杖。利筋脈。根葉煮湯淋足。可以已厥。木材作桶。濕足。甚益人。【明】李時珍本草綱目論木瓜枝葉皮根曰。枝葉煮汁飲。治熱痢。

【木甘草】 產地 生木間。形態 木甘草為雜

草類之一種。三月間寄生木上。大葉如蛇狀。四四相值。折枝種之。亦生。五月開花。白色。其實核色赤。可供藥用。採取 三月三日採之。

【木石】 即枳椇子之古籍別名。典見古今注。詳「枳椇子」條。

【木禾】 即飛廉之古籍別名。典見別錄。詳「飛廉」條。

【木竹子】 產地 出廣西。形態 木竹為夷果類之一種。其實之皮色形狀。一似枇杷。秋冬成熟。可供食與藥用。性質 味甘。平。無毒。


主治 吐逆不食。關格閉拒不通。脾虛下陷。肛門墜脫不收。清熱。涼大腸。去積血。利百脉。通調水臟。止渴生津。解暑消酒。利耳目。治咳嗽上逆。

【木羊乳】 即丹參之古籍別名。典見吳普本草。詳「丹參」條。

【木耳】 古語別名 木槲。木菌。木槲。樹雞。(韓愈文) 木蛾。(本草綱目) 木耳。(植物學大辭典)

外國名詞 Hirnocola, Polytichia, Fr. Schroet (Auricularia Auricula, Judae, Schroet.) (拉丁) キクラゲ (日本) 基本 係真正樹子菌類。為寄生物之木耳。

形態 木耳為菜類。寄生於諸木之菌屬。大者二三寸。形似人耳。裏面色暗褐而平滑。表面淡褐色。或作黃白色。其性質之優劣。隨其木而異。



性質 甘。平。有小毒。種類 木耳分桑、柳、槐、柏諸種。詳見「桑耳」、「槐耳」、「榆木耳」、「柳耳」、「柘耳」、「楊梅耳」、「杉菌耳」各條。

主治 益氣不飢。輕身強志。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木耳曰。斷穀治痔。【清】黃宮繡本草求真論木耳曰。木耳生非一木。良枯莫辨。擅書所

載。能治痔瘡。瘰癧。崩中。漏下。眼流冷淚。血注。胸痞。血痢。下血。一切牙痛等症。然性稟陰濕。生於枯木。徒有衰精冷腎之害。而無補脾益胃之功也。本經言其益氣不飢。輕身強志。恐譽詞耳。豈真謂哉。【清】王士雄。隨息居飲食諸論。木耳曰。木耳甘平。補氣耐飢。活血治跌仆傷。凡崩淋血痢。痔瘡腸風。常食可瘳。色白者勝。煮宜極爛。葷素皆佳。

參攷資料 ●木耳。惡蛇蟲。從下過者有毒。楓木上生者。令人笑不止。採歸色變者有毒。夜視有光者。欲爛不生蟲者。並有毒。並生持冬瓜蔓汁解之。【陳藏器】●按生。生編云。柳蛾補胃。木耳衰精。言者。柳之蛾能補胃理氣。木耳乃朽木所生。得一陰之氣。故有衰精冷腎之害也。【李時珍】●木耳生於朽木之上。無枝葉。乃濕熱餘氣所生。曰耳曰蛾。象形也。曰櫛。以軟濕者佳也。曰雞曰癩。因味似也。南楚人謂雞爲癩。曰菌。猶蠅也。亦象形也。蠅乃貝子之名。或曰地生爲菌。木生爲蛾。北人曰蛾。南人曰蠅。【李時珍】●木耳各木皆生。其良毒

四畫 木

亦必隨木性。不可不審。然今貨者亦多雜木。惟桑柳楮榆之耳。爲多云。【李時珍】●按張仲景云。木耳赤色及仰生者。並不可食。【李時珍】●一人患痔。諸藥不效。用木耳煮羹食之。而愈。極驗。【汪穎】

【木李】即榭之古籍別名。典見詩經。詳「榭」條。
【木芍藥】即赤芍之古籍別名。典見綱目。詳「赤芍」條。●即牡丹皮之古籍別名。典見綱目。詳「牡丹皮」條。

【木防己】即防己之處方用名。詳「防己」條。

【木別子】即木鼈子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木鼈子」條。

【木杏】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【木芙蓉】即芙蓉之原名。詳「芙蓉」條。

【木芝】即紫芝之古籍別名。典見本經。詳「紫芝」條。

【木屈律】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【木狗皮】產地 生廣東左右江山中。

形態 木狗爲獸類之一種。形如黑狗。能登樹木。其皮可供藥用。
主治 除脚痺風濕氣。活血脈。暖腰膝。

參攷資料 木狗皮爲衣料。能運動血氣。元世祖有足疾。取以爲袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。西川有玄豹。大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘。甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。食數日。猶溫。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。【李時珍】

【木便】即桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桔梗」條。

【木威子】古籍別名 烏欖。植物學大辭典。

外國名詞 Canarium Pinn. (日本) 基本 係橄欖科橄欖屬。藥用木威之子實。

產地 出嶺南山谷中。

形態 木威子爲橄欖之一種。樹高丈餘。葉似棟。其子似橄欖而堅。亦似棗。削去皮。可爲糧食。亦可供藥用。

性質 酸。辛。無毒。
主治 心中惡水。水氣。

【木兔】即鴟鵂之別名。典見動物學大辭典。詳「鴟鵂」條。

【木珊瑚】即枳椇子之古籍別名。典見廣志。詳「枳椇子」條。

【木英】即接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳「接骨木」條。

【木香】原名 蜜香。因其香如蜜。

命名 木香。草類也。緣沉香中有蜜香。遂說此爲木香耳。蓋蜜木二字。其音相近。昔人謂之青木香。後人呼馬兜鈴根爲青木香。乃呼此爲南木香。廣木香。以別之。

處方用名 廣木香。煨木香。青木香。

古籍別名 五木香。【圖經】南木香。【本草綱目】五香。一根草。大通株。木香神。土木香。【和漢藥考】

外國名詞 Aucklandia Co-stus. (Aplostaxis Auriculata) (Putehuk) (拉丁)

基本 屬菊科。

產地 陳仁山藥物生產辨云。木香產西藏。印度。敘利亞等處名

四畫 木

番木香。味濃厚。有產四川名川木。香味輕清。萬國藥方論開胃煖胃。驅大腸風。止痛。

形態 按木香為形似牛蒡之根而又分枝者。其質如角。長五六寸。外面色灰黃。有極細之縱皺。裂內。部色灰白。有一種香氣。味苦。咀嚼之。則粘附齒牙。

採取 冬月採根曬乾。

製法 李時珍曰。凡使木香。如入理氣藥。只生用。不見火。若實大腸。宜麵煨熟用。

性質 辛溫。無毒。

成分 主要素為 Inulin, C₁₂H₂₂O₁₁, Holonin 辛膠。揮發油。蠟質。

效能 行氣。導滯。止痛。治痢。增加胃酸之不足。促進消化之功能。井對於胃神經。微有麻醉作用。故用為健胃。發汗。收斂之藥。其粉末則用以夾置衣服。防生蠶害。或為熏物料。

主治 邪氣辟毒疫溫鬼。強志。主淋露。久服不夢寐驚寐。(本經) 消毒殺鬼精物。溫瘧蟲毒。氣劣氣不足。凡中傷寒引藥之精。(別錄)

歷代記述攷圖 【唐】甄權藥

性本草論木香曰。九種心痛。積年冷氣。疔瘕塊脹痛。壅氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣刺心。痛不可忍。末酒服之。【宋】大明日華諸家本草論木香曰。治心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂泄瀉痢疾。健脾胃。消食安胎。【金】張元素珍珠囊論木香曰。散滯氣。調諸氣。和胃氣。泄肺氣。【元】朱震亨本草衍義補遺論木香曰。行肝經氣。煨熟實大腸。【元】王好古湯液本草論木香曰。治衝脈為病。逆氣憂急。主膠滲小便秘。【清】黃宮繡本草求真論木香曰。木香味辛而苦。下氣寬中。為三焦氣分散藥。然三焦則又以中為要。故凡脾胃虛寒凝滯。而見吐瀉停食。肝虛寒入。而見氣鬱氣逆。服此辛香味苦。則能下氣而寬中矣。中寬則上下皆通。是以號為三焦宣滯要劑。至書所云能升能降。能散能補。非云升類升柴。降同沉香。不過因其氣鬱不開。得此氣克上達耳。况此苦多辛少。言降有餘。言升不足。言散則可。言補不及。一不審顧。任書混投。非其事矣。香船

上來。形如枯骨。味苦粘舌者良。名

青木香。非今所用馬兜鈴根者是也。入理氣藥。磨汁生用。若實大腸。麩煨熟用。今醫妄以西香代木香。治痢。殊謬。【清】黃元御玉楸藥解論木香曰。木香味辛微溫。入足太陰脾。足陽明胃經。止嘔吐泄利。平積聚癥瘕。安胎保胎。消脹止痛。麩煨實大腸。生磨治腫病。其辛燥之性。破滯攻堅。是其所長。庸工以治肝家之病。則不通矣。肝以風木之氣。凡病皆燥。最不宜者。【清】徐洵溪本草經百種錄論木香曰。木香以氣勝。故其功皆在乎氣。內經云。心主臭。凡氣烈之藥。皆入心。木香香而不散。則氣能下達。故又能通其氣於小腸也。

近人學說 張山雷曰。木香芳

香。氣烈而味厚。本經止言味辛。別錄則謂之溫。以氣用事。故上徹下。能升能降。非溫和燥休。何以致此。雖潔古謂氣味俱厚。當主沈降。然其氣濃郁。藥中有此一味。則煮之香聞滿屋。必不可概以為降。王海藏謂辛苦熱。味厚於氣。陰中之陽。立說頗允。本經主邪氣。辟毒疫溫

鬼者。芳香得以辟除穢惡。疫癘為害。無非陰靈惡臭。足以病人。木香芳烈。自可以消除穢濁之氣。強志者。芳香正氣。足以振刷精神也。淋露有因於清陽下陷者。木香溫升。故能治之。若熱結於下者。必非所宜。能除夢魘。亦以心神既振。而魂夢常寧耳。別錄消毒除蠱。殺鬼精物。與本經同意。治溫瘧者。亦即燥濕辟惡之義。治劣氣不足。則升動清陽。而助正氣也。行藥者。氣為血帥。自能為百藥導引耳。瀕湖本作引藥。其大旨正同。又曰。木香雖以木名。實為草類。以氣用事。故專治氣滯諸痛。於寒冷結痛。尤其所宜。然雖曰辛苦氣溫。究與大辛大熱不同。則氣火鬱結者。亦得用之。以散鬱開結。但不可太多。且味苦者。必燥。陰虛不足之人。最宜斟酌。過用則耗液傷陰。其氣將愈以紛亂。而痛不可解矣。近人更用之於滋補藥中。恐滋膩重滯。窒而不靈。加此以疏通其氣。則運行捷而消化健。是亦善於佐使之良法。疝瘕積聚。滯下腸澀。此為必須之藥。又曰。氣烈之藥。多升少降。惟木香大者。

則亦能降。而質本空。氣尤雄烈。究以升陽為主。日華本草謂治嘔逆反胃。在胃寒無火。食入反出者。頗為相宜。若胃火盛者。必不可用。海藏謂治衝脈為病。逆氣裏急。則腎氣不攝。衝激逆上為患。必非所宜。丹溪謂調氣用木香。其味辛。氣能上升。氣鬱不達者宜之。若陰火衝上者。則反助火邪。當用黃蘗。知母。而少以木香佐之。持論平允。勝於王氏多矣。

配合應用 ①殺一切蟲。用木香同牽牛雷丸檳榔。

②治一切瀉下。用木香佐黃連芍藥。惟身熱作嘔逆。口渴者勿用。③治中氣不省。閉目不語。如中風狀。南木香為末。冬瓜子煎湯灌下三錢。痰盛者加竹瀝薑汁。(濟生方)

④治氣脹懶食。即青木香丸。見發下熱者。牛乳下。冷者酒下。(聖惠方)

⑤治心氣刺痛。青木香一兩。皂角炙一兩。為末。糊丸。梧桐子大。每湯服五十丸。甚效。又方。用木香。延胡索。(攝生方)

四 薑 木

⑥治一切惡注。氣痛不和。廣木香溫水磨濃汁。入熱酒調服。(簡便方)

⑦治內釣腹痛。木香、乳香、沒藥各五分。水煎服之。(阮氏小兒方)

⑧治小腸疝氣。青木香四兩。酒三斤。煮過。每日飲三次。(孫天仁集效方)

⑨治氣滯腰痛。青木香、乳香、各二錢。酒浸。飯上蒸。均以酒調服。又方。木香同橘皮、砂仁、白豆蔻、紫蘇葉。調一切氣不通。順及冷氣攻痛作泄。大怒後氣逆。胸膈脹滿。兩脇作痛。(聖惠方)

⑩治耳卒聾閉。葛蒲真青木香一兩。切以苦酒浸一夜。入胡麻油一合。微火煎三上三下。以綿濾去滓。日滴三四次。以愈為度。(外臺祕要方)

⑪治耳內作痛。木香末。以葱黃染鵝脂。蘸末深納入耳中。(聖濟總錄方)

⑫治霍亂轉筋腹痛。木香末一錢。木瓜汁一盞。入熱酒調服。(聖濟總錄方)

⑬治一切下痢。不拘丈夫婦人

小兒。木香一塊。方圓一寸。黃連半兩。二味用水半升同煎乾。去黃連。薄切木香焙乾為末。分作三服。第一服橘皮湯下。二服陳米飲下。三服甘草湯下。此乃李景純所傳。有一婦人久痢將死。夢中觀音授此方服之而愈也。(孫兆祕寶方)

⑭治腸風下血。木香、黃連等分為末。入肥猪大腸內。兩頭繫定。煮極爛。去藥食腸。或連藥搗為丸服。(劉松石保壽書方)

⑮治小便渾濁如精狀。木香、沒藥、當歸等分為末。以刺棘心。自然汁和丸。梧子大。每食前鹽湯下三十九丸。(普濟方)

⑯治小兒陰腫。小兒陽明經風熱濕氣相搏。陰莖無故腫。或痛縮。宜用此一經自愈。廣木香炒枳殼二錢。炙甘草二錢。水煎服。(曾氏小兒方)

⑰治小兒天行壯熱頭痛。木香六分。白檀香三分。為末。清水和服。仍溫水調塗額頂上。取瘥。(聖惠方)

⑱治天行發斑赤黑色。青木香一兩。水二升。煮一升服。(外臺祕

要方)

⑲治一切癰疽疔瘡疔瘻。惡瘡下疳。膿潰後。外傷風寒。惡汗臭敗不斂。並主之。木香黃連檳榔等分為末。油調塗之。取效。(和劑局方)

⑳治蠱蛇虺傷。青木香不拘多少煎水服。效不可述。(袖珍方)

㉑治喉臭陰濕。凡腋下陰下濕臭。或作瘡。青木香以好醋浸。夾於腋下陰下。為末傳之。(外臺祕要方)

㉒治牙齒疼痛。青木香末入麝香少許。搽牙。鹽湯漱之。(聖濟總錄方)

用量 八分至一錢半。施用宜忌 凡氣弱有熱。血虛而燥諸症。禁用。忌火。

著名方劑 ①木香散。治單腹脹。(類方)用木香、青皮、白朮、薑黃、豆蔻各半兩。阿膠、薑瀝各一兩。為末。醋丸。如豆大。每服二十九丸。鹽湯下。②木香檳榔丸。治一切實積。萬病。食積脹滿等症。(子和方)用木香、檳榔、青皮(醋炒)、陳皮、枳殼(麸炒)、黃柏(酒炒)、黃連(臭黃

四蓋木

湯炒)三稜(醋煮)菝葜(醋煮)各五錢。大黃(酒浸)一兩。香附。牽牛各二兩。右共爲末。芒硝水丸。壯虛實服之。香連丸治赤白下痢膿血相雜。委急後重(局方)用木香四兩八錢(不見火)黃連二十兩(吳萸十兩同炒去吳萸)共爲末醋糊爲丸米飲下。

參攷資料

●青木香。大秦國人以療毒腫。消惡氣。有驗。今惟制蛀蟲丸用之。常以煮汁沐浴。大佳。(陶弘景)●隋書言樊子蓋爲武威太守。車駕入吐谷渾。子蓋以彼多瘴氣。獻青木香以禦瘴露之邪。(甄權)●南州異物志云。青木香出天竺。是草根。狀如甘草也。(甄權)●修養書云。正月一日。取五木香湯以浴。令人至老鬚髮黑。徐鑑注云。道家謂青木香亦云五木。多以爲浴是矣。金光明經謂之矩瓦化香(蘇頌)●今惟廣州舶上來。他無所出。根窠大類茄子。葉似羊蹄而長大。亦有如山藥。而根大開紫花者。不拘時採根芽爲藥。以其形如枯骨。味苦粘牙者爲良。野本草言孟詵苑中亦皆種之云。

苗高三四尺。葉長八九寸。皺軟而有毛。開黃花。恐亦是土木香種也。(蘇頌)●續傳信方。著張仲景青木香丸。主陽衰諸不足。用崑崙青木香。六路調子皮各二十兩。搗篩糖和丸。梧子大。每空腹酒下三十丸。日再。其效尤速。鄧駙馬去沙糖。用白蜜加羚羊角十二兩。用藥不類古方。而云仲景不知何從而得也。(蘇頌)●常自岷州出。葉得青木香。持歸西洛。葉如牛蒡。但狹長。莖高二三尺。花黃如一金錢。其根卽香也。生嚼卽辛香。尤行氣。(寇宗奭)●木香專泄決胸腹間滯塞冷氣。他則次之。得橘皮。肉豆蔻。生薑相佐。使絕佳。效尤速。(寇宗奭)●木香今皆從外國來。陶說爲是。蘇頌圖經所載廣州者。乃是木類。又載滌鬼海州者。乃是馬兜鈴根。治療冷熱。殊不相似。皆誤圖耳。(陳承)●調氣用木香。其味辛。氣能上升。如氣鬱不達者。宜之。若陰火衝上者。則反助火邪。當用黃蘗。如母。而少以木香佐之。(朱震亨)●本草云。生氣劣。氣不足。補也。通氣。氣導一切氣。破也。安胎健

脾胃補也。除疰癖癥塊破也。其不同如此。潔古張氏但言調氣不言補也。(王好古)●木香與補藥爲佐則補。與泄藥爲君則泄也。(汪機)●木香南番諸國皆有一統志云。葉類絲瓜。冬月取根曬乾。(李時珍)●木香詳其治療。與今白木香。當是兩種。按圖經謂生永昌。又云。今惟廣州舶上有來者。一云出大秦國。一云產崑崙。則所出地土各異。是名同而實異可知。已藥性論云。當以崑崙來者爲勝。此絕不可得。又云。西胡來者劣。今市肆所有。正白木香也。其味辛。其氣溫。專主諸氣不順。求其能辟毒疫。溫鬼殺鬼。精物。恐或未然也。肺虛有熱者。慎毋犯之。元氣虛脫。及陰虛內熱。諸病有熱。心痛。屬火者。禁用。傷寒類要所載。治天行熱病。若發赤豆斑。用青木香。水煮服者。蓋指崑崙來者一種。定非坊間所市。廣州舶上。世所常用之白木香也。(饒希雅)●凡選木香。以形如枯骨。味濃。苦粘牙者爲佳。祇此一種。乃海西所來貨。更無僞物。用時。水洗封緘。日本有一種木香。人家園

中多種之。極易繁衍。花葉根形狀。頗似本草所載。惟根味生嚼稍苦。曬乾幾無苦味。不堪入藥用。(一本堂藥選)●按古所稱木香。或是木類。今日本所產。葉甚似旋覆。葉極大而透。又似紫菀。葉與似羊蹄而長。大如牛蒡。而狹長者相近。莖高四五尺。甚者丈餘。花似菊花。而黃。亦似旋覆花。花謝成絮而飛。或腐於莖頭。根形極似木香。但味不苦耳。或是方土異。抑其下品耶。故詳說之。(一本堂藥選)●按木香。本草圖經。三才圖會。本草叢書。等所載葉狀。異說頗多。或云。葉似羊蹄而長大。或云。葉長八九寸。皺軟而有毛。或云。葉如牛蒡。但狹長。或云。葉類絲瓜。莫衷一是。今有軸木香。株木香二種。而軸木香爲佳。青木香乃木香也。後人又呼馬兜鈴根爲青木香。而呼木香爲南木香。但日本無馬兜鈴。故以似雞摩而有香氣者爲青木香。則雙而又實矣。此草蔓生。酷似蘿藦。莖葉俱有香氣。結子如零餘子。根似野生山藥而味苦。(和漢藥考)

【木香神】印木香之古籍別名。與

見和漢藥考詳「木香」條。

【木核】 採取 十月採。 主治 療腸辟花療不足。子療傷中根療心腹逆氣。止渴。

【木茄】 卽緬茄之產於廣東舊高州府境者。性味功用與緬茄同。詳「緬茄」條。

【木茸】 卽木耳之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「木耳」條。

【木桂】 卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

【木桃】 卽榿子之古籍別名。典見埤雅。詳「榿子」條。

【木桃子】 卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【木骨】 卽五加皮之古籍別名。典見圖經本草。詳「五加皮」條。

【木患子】 卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳「無患子」條。

【木斛】 形態 本品附生樸樹上。莖鬆軟。長尺餘。色深黃。有光澤。

主治 補虛。療脚膝。

【木犀】 別名 黃色者名金桂。白色者名銀桂。

外國名詞 Osmanthus tra.

四 薑 木

Grams, Lour. (拉丁)

基本 爲木犀科常綠喬木。藥用木犀之花。



(一) 犀木

形態 按木犀花叢生於葉腋。合冠花瓣。四裂。形小。有黃色、白色、黃赤色數種。雄蕊二枚。發特殊之芳香。



(二) 犀木

性質 辛溫。無毒。

主治 潤髮。辟臭。化痰。生津。美顏色。治風蟲牙痛。

【木犀花露】 性質 氣香。味微苦。

主治 明目。疎肝。除口臭。含漱牙齒。

【木細辛】 產地 生終南山。形態 木細辛爲山

草類之一種。苗如大戟。根似細辛。莖葉冬月不凋。其根可供藥用。

性質 苦溫。有毒。

主治 腹內結積癥瘕。大便不利。推陳去惡。破冷氣。

參攷資料 木細辛未可輕服。令人痢下至困。(陳藏器)

【木莓子】 卽懸鉤子之古籍別名。典見郭璞賦。詳「懸鉤子」條。

【木蛇】 形態 木蛇爲雜木類之一種。木皮有鱗甲如蛇。內紋黃色。如菊花瓣。可供藥用。

主治 狗咬傷。

【木通】 原名 古名通草。命名 本品有細孔兩頭皆通。故名。

處方用名 苦木通。潢木通。細木通。川木通。

古籍別名 附支。(本經) 丁翁。(吳普本草) 萬年藤。(甄權) 子名燕覆。(本草綱目) 通草。(本經) 倚商。蓄藤。丁年藤。附通子。出樓珊瑚。(和漢藥考)

外國名詞 Alcobia quinata, Done. (拉丁)

基本 屬木通科。藥用木通之

莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。木通以江西、湖北、資邱產者爲最。四川、巴東、陝西、漢中、河南、山東亦佳。湖南、廣西、廣東、連州等處次之。

形態 按木通爲落葉莖性灌木。自生山野。枝梢延長。纏絡他樹而繁茂。葉爲掌狀複葉。由小葉五片而成。皆互生。小葉有柄。全緣。爲橢圓形。花皆單性。四五月間。新葉初生。並抽花梗。雄花十餘朵。如穗而下垂。花被三片。形亦橢圓。末端帶尖。邊緣微向內卷。作淡紫色。雌花之花梗尤長。簇生二三朵。其大倍於雄花。花被亦較雄花爲厚。內凹而微有皺襞。作深紫色。果實爲漿果。作長橢圓形。長二三寸。熟則變淡紫色。縱裂而現白羶。味甘美。小兒喜生啖之。種子色黑。細小如球。莖爲似桿之藤。外皮作灰褐色。中有無數細孔管。故吸此一端。外氣卽自彼端吸入。橫切而視其斷面。則見有車輪狀之紋理。味苦。藥用以肥大聖。實白色者爲良。

種類 木通卽古之所謂通草也。通脫木卽今之所謂通草。

一二九

四畫 木

也。木通有白紫二色。紫者皮厚味辛。白者皮薄味淡。三葉木通亦為落葉。莖性瀼木。自生於山野之間。葉為掌狀複葉。由小葉三片而成。小葉形卵圓。或廣卵圓。邊緣多粗鋸齒。花與木通相似。雄花被三片。形橢圓。末端尖。邊稍內卷。色深紫。雌花大於雄花。殆及四倍。果實為漿果。作長橢圓形。長可三寸。熟則變紫紅色。果皮頗厚。縱裂而現白瓢。種子色黑。形卵圓。野木通為常綠。莖性瀼木。多自生山中。庭園亦栽種之。以供賞玩。葉為掌狀複葉。小葉嫩時。祇有三葉。漸長漸多。而五葉。而七葉。故又有七五三莖草之名。小葉實似革。形橢圓。面平滑。背現淡色。有網紋。殊美觀。花亦為單性。雌雄兩花。色白或淡紅。形狀大小俱相同。果實為漿果。形長圓。長二三寸。熟則變深紫色。果皮厚。縱裂現白瓢。種子色黑。形圓。有光澤。

作利尿藥。其樹皮作通乳藥。主治 除脾胃寒熱。通利九竅。血脉關節。令人不忘。去惡蟲。本經。療脾瘕。常欲眠。心煩。咳出音聲。治耳聾。散癰腫。諸結不消。及金瘡惡瘡。鼠瘻。膝折。鼻息肉。墮胎。去三蟲。別錄。歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論木通曰。治五淋。利小便。開關格。治人喜多睡。主水腫浮大。【唐】孟詵食療本草論木通曰。利諸經脈。寒熱不通之氣。【唐】陳士良食性本草論木通曰。理風熱。小便數急痛。小腹虛滿。宜煎湯并葱飲有效。【唐】陳藏器本草拾遺論木通曰。利大小便。令人心寬下氣。【唐】李珣海藥本草論木通曰。主諸瘕瘕。喉痺咽痛。濃煎含嗽。【宋】大明日華諸家本草論木通曰。安心除煩。止渴退熱。明目。治鼻塞。通小腸。下水。破積聚。血塊。排膿。治瘡。癰。止痛。推生下胞。女人血閉。月候不勻。天行時疾。頭痛。目眩。羸劣。乳結及下乳。【元】李東垣用藥法象論木通曰。通經利竅。導小腸。火。【明】繆希雍本草經疏論木通曰。

通草者。即木通也。稟清秋之氣。兼得土之甘淡。故其味辛平。別錄加甘無毒。又云。微寒。味甘而淡。氣平味薄。入足少陰太陽。亦入手少陰太陽。能助肺氣下降。故利小便。專瀉氣滯。肺受熱邪。津液氣化之源。絕。則寒水斷流。膀胱受濕熱。閉。則約束小便不通。宜此治之。其證胸中煩熱。口燥舌乾。咽乾。大渴引飲。小便淋瀝。或閉塞不通。脛痠脚熱。並宜此主之。本經主除脾胃寒熱者。以其通氣利濕熱也。其曰通利九竅。血脉關節。以其味淡滲而氣芬芳也。令人不忘者。心主記。心家之熱去。則心清而不忘矣。濕熱生蟲。故又主惡蟲。療脾瘕。常欲眠。心煩。嘔者。脾家濕熱壅盛。則成瘕。心脾之熱不清。則昏昏欲眠。而心煩。嘔音聲出於肺。肺家之濕熱去。則肺金之氣清。而音聲出矣。治耳聾者。洩腎家之濕火也。散癰腫。諸結不消。及金瘡惡瘡。鼠瘻。膝折。臄鼻息肉。墮胎。又藥性論治五淋。利小便。開關格。下水。排膿。止痛。及治人多睡。水腫浮大。陳士良主理濕熱。小便數急。少腹虛滿。日華子。

主婦人血閉。月候不勻。乳結。下乳者。皆通竅之所致也。【清】黃宮繡本草求真論木通曰。木通甘淡輕虛。據書開載。治效甚多。然究不外清火通竅。利水數端而已。緣人一身上下。外無風寒。暑濕。六淫。鬱而為熱。內無火氣。薰蒸。則水道順暢。一身安養。上自咽喉。以迄心胸。下自大腹。以迄二便。而無腸結不通之弊矣。東垣曰。凡人肺受熱邪。津液氣化之源。絕。則泉水斷絕。膀胱受濕熱。閉約束。則小便不通。朱二九曰。火在上。則口燥眼赤。鼻乾。在中。則心煩。嘔噦。在下。則淋閉。足腫。木通藤細。有孔。兩頭皆通。體輕質浮。味淡氣滲。能洩君火。火退。則小便自利。便利。則諸經火邪。皆從心水而下。降矣。是以行經下乳。破血除熱。止煩住痛。排膿生肌。開關利節。并凡因於濕熱而成者。無不藉此以爲開導。此雖類澤瀉。同爲滲利。但君火動。則宜木通。相火動。則宜澤瀉也。惟神氣虧損。汗多外泄。及虛弱孕婦者。切忌。以性通利故耳。【清】楊時泰本草述鈞元論木通曰。木通主治。類知爲利水。而。

本經所云通利九竅血脈關節。殊未深究。夫水與血是二是一。經曰津液已行。營衛大通。精粕乃以次傳下。然則水穀之入胃者。其清氣上注於肺。而清中之濁者。仍歸於胃。觀本經首言除脾胃寒熱。次乃及於通利九竅血脈關節。則知木通於脾胃之交。真有爲之承接脈絡。使其氣化通而血化利者。即其細孔通理。兩頭皆貫。不有合於主脈之心。化血之包絡乎。使清氣之營入脈。而流貫於諸經。即上下之九竅無不通。所謂精粕次下爲便溺者。皆分其化於一氣。而絕無等待。是利水與通利九竅血脈關節。原非二義也。抑多言其洩小腸者。以心主人身之血脈。而小腸爲心臟輸化之腑。小腸通利。則胸膈血散。腹中血聚。則小腸壅滯。是則血脈通利。即其通利小腸之本。而小腸通利。正其通利血脈之功也。木通可疎濕熱。以濕多屬血分不利之病也。至風熱之病於血者。亦用之以風臟即血臟也。總不外於通利血脈關節之義。至女子妊娠養胎。自肝始。臟腑相滋各三十日。惟

四畫 木

手少陰心手太陽小腸。不在養經之數。無胎則下爲月水。有胎則上爲乳汁。故此味通經閉。調月候。更有殊功。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。通草山野多有之。葉作長橢圓形。往往五葉一處攢集。其五葉中大者四五寸。小者以次遞減。大抵莖蔓葉大。新莖葉小。皆互生。四月嫩葉間生細枝。更分小杈。花開其間。花大四五分。有淡紫碧色與白色二種。其花朶皆下垂。花瓣三片。間雜生大花。亦三瓣。作深紫碧色。後結實。形似瓜。徑一寸。長二寸餘。葉舖呼爲肉袋子。惟此非老不結實。實皮厚肉白。核深黑。有光。採此莖入藥用。即名木通。切之成片。有車輻紋。取莖莖一段。自此端吹之。氣透彼端者。眞品也。外來者多攙入葡萄根。物理小識曰。淮木通能行氣。色似沈香。有車輻紋。川木通色白。止通小便。僞者乃葡萄藤也。三葉木通。葉如大豆。葉別一種。有粗鋸齒。更有似五葉木通而大。經久不凋。救荒本草所謂野木瓜是也。古方藥品考曰。通草即今木通。

有兩種。外來之一種。皮粗而厚。色黃褐。徑寸許。細者似黃芪。入藥須選肉黃白。有車輻紋。味苦者爲佳。本國產者。形如防己。皮灰色。截之作菊花紋。肉褐色。味微苦。可用。後世方書中所稱通草。乃通脫木也。

近人學說 張山雷曰。本經通草一名附支。御覽引吳普本草。謂神農黃帝辛。雷公苦。葉青。蔓延生。汁白。陶弘景注本草云。繞樹藤生。莖有細孔。兩頭皆通。含一頭吹之。則氣出彼頭者良。壽頤按。即通草命名之義。自南唐陳士良食性本草。謂此即今之木通。而世之所謂通草。則是通脫木。李氏瀕湖綱目。一仍陳氏之說。而穆仲醇以後諸家皆宗之。至今似已成爲定論。然尋常釋陶氏所謂莖有細孔。兩頭皆通。吹之氣出云云。其形固與今之木通相似。惟木通之味大苦。而本經止稱其辛。微嫌不類。且別錄又以爲甘。則尤爲可疑。但本經別錄所載主治。固無一與今之木通不合者。意者雷公謂之爲苦。最得其眞。而別錄之甘字。有誤與。抑別錄亦誤認通脫木爲通草。乃以

其淡而無味。遂以甘淡之義。謂之爲甘與。壽頤竊以甘之一字。終覺與木通不類。是以高郵王氏廣雅疏證。於附支通草一條。雖亦引食性本草莖名木通一句。而並不直言陳說之是。且謂後世本草諸家。無能證明其說者。蓋以其失傳久矣。云云。則念孫氏父子。固亦有疑於古之通草。未必果爲今之木通也。茲以古人所說通草主治。尙與今人所用之木通。情性無往不合。姑仍瀕湖之意。徑以木通標作正名。而附誌所疑如此。以俟知者更詳。○祝天一日。本草通串釋名木通。通脫木。釋名通草。今市上有木通。梗通。花通。三種。木通味大苦。蓋於連柏。體輕則浮。味苦則降。故必瀉心。胞小腸之火。然則大敗胃氣。素有胃寒。而非實火者。用之能致上曠下痢。本草從新尙言其甘淡。醫者不察。率意用之。誤矣。產婦乳汁不通。俗用猪蹄木通湯。每致嘔噦。余常勸人以花通易之。亦效。古人有指爲防己苗者。非無因也。梗通。濕草也。吾鄉多有之。潔白輕虛。故利肺氣。味淡。故滲泄。生於下窪

四畫 木

濕地。故利下焦濕熱最捷。李時珍云。木通有紫白兩種。白者皮薄味深。或即此也。花通即所謂通脫木。潔白如紙。婦人用以紫花。故得名。

配合應用 治膀胱濕熱。閉。用木通同茯苓澤瀉燈心車前子猪苓。

治尿血。用木通同牛膝生地黃天麥門冬五味子黃蘗甘草。

治婦人經閉及月事不調。用木通同牛膝生地黃延胡索。

治心熱尿赤面赤唇乾咬牙口渴。導赤散。用木通生地黃炙甘草等分。入水。淡竹葉七片。水煎服。

治金瘡。跌折。通草煮汁。釀酒日飲。亦治鼠瘻不消。

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡精滑便數。孕婦及無濕熱諸症者禁用。

著名方劑 導赤散。治心熱口糜。舌瘡。小便赤。莖中痛。熱淋不利。錢氏方。用生地黃木通生甘草各等分。為末。每服一錢。入淡竹葉水煎。

參攷資料 通草生石城山

谷及山陽。正月二月採枝陰乾。別錄。今出近道。遼樹藤生。汁白。莖有細孔。兩頭皆通。含一頭吹之。則氣出彼頭者良。或云即菑藤莖也。陶弘景。此物大者徑三寸。每節有三二枝。枝頭有五葉子。長三四寸。核黑。飄白。食之甘美。南人謂為燕覆子。或名鳥覆子。遇七八月採之。蘇恭。江東人呼為音菑子。江西人呼為孛孛子。如算袋。飄黃子。黑。食之去皮。蘇云。色白者乃猴菑也。陳藏器。今澤潞。漢中。江淮。湖南。州郡亦有之。藤生。莖大如指。其莖幹大者徑三寸。一枝五葉。頗類石草。又似芍藥。二葉相對。夏秋開花紫。亦有白花者。結實如小木瓜。食之甘美。即陳士良本草所謂梓椽子也。其枝今人謂之木通。而俗間所謂通草。乃通脫木也。古方所用通草。皆今之木通。其通脫木。稀有用者。或以木通為葡萄苗者。非也。按張氏燕吳行紀。載揚州甘泉東院兩廊前有通草。其形如椿。少葉。子垂梢際。如苦棟。與今所說不同。或別一物也。蘇頌。

必兼木通。其效乃捷。以能引心經之熱。從小腸出也。王孟英。

木通子 性質 甘寒。無毒。主治 厚腸胃。令人能食。下三焦惡氣。續五臟斷絕氣。使語聲足氣。通十二經脈。和核食之。

歷代記述攷證 唐陳士良食性本草論木通子曰。除三焦客熱。胃口熱閉。胃不下食。明李時珍本草綱目論木通子曰。止渴。利小便。

參攷資料 木通子。南人多食之。北人不知其功。孟詵。

木通根 主治 項下瘰癧。

木麻 產地 生江南山谷林澤中。

形態 木麻為灌木類之一種。葉似胡麻而對生。

性質 甘溫。無毒。

主治 老血。婦人月閉。風氣。弱瘦。癥瘕。久服令人有子。

木梨 即椶櫚之古籍別名。典見埤雅。詳椶櫚條。

木筆 即辛夷之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳辛夷條。

木葉 即苜蓿之古籍別名。典見綱目。詳苜蓿條。

木苗 即木耳之古籍別名。典見韓愈文。詳木耳條。

木蜂 即蜂之穴木而居者。其子之性味功用。與土蜂子同。詳土蜂條。

木堊 即木耳之古籍別名。典見韓愈文。詳木耳條。

木齒 即接骨木之古籍別名。典見綱目。詳接骨木條。

木蜜 即椶櫚子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳椶櫚子條。

蜜香 即蜜香之古籍別名。典見內典。詳蜜香條。

木椒 即胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳胡椒條。

木蛾 即木耳之古籍別名。典見綱目。詳木耳條。

木環 即龍眼之古籍別名。典見綱目。詳龍眼條。

木賊草 命名 本品草幹有節。面糙澀。治木骨者用之。磋擦則光淨。猶云木之賊也。故名。

古語別名 鐘草(和漢藥考)
外國名詞 Equisetum hio-
male, L. var. Japonica, Mill-
do. (拉丁)

基本 屬木賊科。藥用木賊草
之莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
木賊產奉天吉林兩省。冬季出新

形態 按木賊為多年生常綠
草之羊齒植物。地下莖匍匐。地上
莖呈綠色。挺立而不分枝。高二尺
餘。中空。如小筆管。有縱凸線十六
條。約距離二寸。即有一節。於此輪
生退化之鱗狀小葉。夏秋之交。莖
端生短穗。色綠。形若筆頭。此繁
殖器也。為多數如龜甲之鱗片所
構成。每片存子囊七。中藏孢子。

採取 四月採之。

製法 李時珍曰。凡用木賊。聖
惠方治月水不炒。用上古修治法。
又法去節。童便浸一宿。焙乾用。

性質 甘。微苦。無毒。

成分 主要之成分為珪酸及
木賊酸。

效能 發汗。利濕。退翳。去膜。用
作解肌利尿藥。及目疾藥。

四壺木

主治 目疾。退翳膜。消積塊。益
肝膽。療腸風。止痢。及婦人月水不
斷。崩中赤白。

歷代記述攷證

【明】李時

珍本草綱目論木賊草曰。解肌止
淚。止血去風。溫疝痛。治脫肛。【明】
繆希雍本草經疏論木賊草曰。木
賊草感春升之氣。故應味甘微苦
而性則無毒。入足厥陰少陽二經
血分。故首主目疾。及退翳膜。益肝
膽而明目也。又療腸風止痢。及婦
人月水不調。則消之中。又有止之
義矣。其主積塊療腸風止痢。及婦
人月水不調。崩中赤白。痔疾出血
者。皆入血益肝膽之功。肝藏血故
也。【清】黃宮繡本草求真論木賊
草曰。木賊味甘微苦。氣溫無毒。中
空輕揚。書云形質有類麻黃。升散
亦頗相似。但此氣不辛熱。且入足
少陽膽。足厥陰肝。能於二經血分。
驅散風熱。使血上通於目。故為去
翳明目要劑。初非麻黃味辛性燥。
專開在衛腠理。而使身汗大出也。
是以疝痛脫肛。腸風痔漏。赤痢崩
帶。諸血等症。審其果因風熱而成
者。得此則痛止。肛收。腸固。血止。而

無不治之症矣。至其去翳明目。功
雖有類穀精。能駕甘菊。而穀精則
去星障。甘菊則止調和血藥。於障
全不能退。此則能去翳障也。然氣
血虧損。則用穀精木賊。去障又當
兼以芍藥熟地。滋補肝腎。使目得
血能視。若徒用此二味。則障即
加以當歸補助。亦溫氣味辛散。非
其所宜。

國外學說

荷蘭藥鏡第十七

卷論木賊之形性及功效曰。此藥
往古盛行。近已不用。乃最近佛倫
大學教授聯虎攝氏醫實驗木賊
為利尿之峻藥。荷蘭醫家聞而試
用之。從此利尿之功大著。但其性
峻烈。過用必患血尿。戒之慎之。又
曰。此藥不觸動神經。又無關於血
之運行。而但通利小便。其性收瀉。
有保固強壯之效。水煎服之。則知
有收瀉之苦味矣。其應用之標準
如下。第一用於因腎臟衰弱分泌
小便機能減損而發之水腫及小
便閉。第二用於因腎臟血管虛弱
而發之血尿及小便混有帶黑色
之血。第三用於腎臟分泌力及尿
道諸器通利機能俱減損或廢弛

之症。此藥不惟增進小便之分泌。
兼使尿道諸器之纖維收縮堅固。
以誘起小便之運輸力。第四用以
驅泄腎臟。輸尿管膀胱等部壅積
之粘液。沙石等。小便之分泌。異常
增進。通利其壅滯之污物。而防制
腎臟膀胱之結石。第五用於表散
蒸氣壅塞之症。或發汗過多之症。
用於蒸氣壅塞之症。則利小便而
換蒸氣。排泄內鬱之病毒汚液。故
如疥毒內攻。遷延之傷冷毒痛。痛
風等症。用之多效。用於發汗過多
而虛罷之症。則增進小便之分泌。
減少皮膚之分泌。引其津液導泄
於小便。而汗自止。第六因蒸氣管
及吸收管機能衰弱而發水液壅
滯之水腫。其效逾於他藥。如因瘡
瘍內攻。癩疹。赤斑瘡(羅斯之一
種)後繼發之皮水。(水滯留於
皮肉間之症)及內部諸水腫。治
之殊驗。惟用於腦水腫無效。第七
用於一切無嫩衝而小便減少之
病。又曰。此草多用為散劑。然煎劑
尤佳。以此藥二錢至三錢。用水十
兩煎煮。濾過。小兒每時服一二匙。
大人每時服半茶匙。又曰。此藥忌

四畫 木

用之症。如腎臟有炎症者。小便過多。尿管血尿等症。尿道諸器腫痛。便結腫痛。痛腫諸症。及患者大虛脫。或諸液脫。泄過多。虛煩羸瘦之症。分療盜汗。虛脫下利等症。皆禁用之。一說此藥既有收瀉利尿之效。故於內外諸部潰瘍創傷吐血。下利赤痢。下血崩漏。白帶下。乾欬等症。製為泡劑煎劑投之。俱有奇驗。又以此藥搗貼。能愈諸創。治神經傷。

近人學說 張山雷曰。木賊以磨擦木器得名。雖有堅木。擦之則粉屑錯落。而草不損。其伐木之性甚強。故以治癩疥肝膽木邪橫逆諸病。能消目翳。破積滯。皆消磨有餘之用也。質輕中空。故丹溪謂其發汗至易。瀕湖謂與麻黃同形同性。亦能發汗解肌。升散火鬱。故能治眼目諸血之病。然則為目科要藥者。固不僅取其剋木。能磨擦障翳。亦含有疏風行血。泄化濕熱。升散鬱火諸義。其治喉痺。血刺。瀉血。血痔。血崩。月事淋漓。疝氣等證。固皆氣滯血瘀。肝鬱不疏。為病。疏泄壅滯。升散鬱熱。兼以伐肝木之橫。而

順其條達之性。木賊之用。盡於此矣。嘉祐本草謂主目疾。退翳障。消積塊。療腸風。止痢。及月事不調。崩中赤白。瀕湖解肌。止目淚。止血。去風。溫疝痛。大腸脫肛。石頑謂主目病。風熱暴腎。取其發散肝肺風邪。久翳及血虛者。非宜。且謂多服則令目腫。蓋疏散太過。反傷正氣矣。要知剋削之力甚強。即治下血。血痢。血崩。血痔諸症。皆惟有餘之體為宜。苟其氣虛。皆當審慎。而血痢便血崩中。及月事淋瀝諸病。則氣虛血不能攝者為多。尤不可不知所顧忌也。

配合應用 治目疾久不愈。消翳障有奇功。用木賊同穀精草。決明子。白蒺藜。蟬蛻。生地黃。甘菊。花蜜蒙花等分。

治目昏多淚。木賊去節。蒼朮。泔浸各一兩。為末。每服二錢。茶調下。或蜜丸亦可。

治急喉痺塞。木賊以牛糞火燒存性。每冷水服一錢。血出即安也。(聖惠方)

治舌硬出血。木賊煎水。漱之即止。(聖惠方)

治血痢不止。木賊五錢。水煎溫服。一日一服。(聖惠方) 又治瀉血不止。日二服。(廣利方)

治腸痔下血。多年不止。用木賊。枳殼各二兩。乾薑一兩。大黃二錢。並於銚內炒黑。存性。為末。每粟米飲服二錢。甚效也。又方。得槐角子。桑耳。煨存性。地榆。茜草根。治腸痔下血。多效。(蘇頌陶經本草)

治大腸脫肛。木賊燒存性。為末。搽之。接入即止。一加龍骨。(三因方)

治婦人血崩。血氣痛不可忍。遠年近日不痊者。雷氏木賊散。主之用。木賊一兩。香附子一兩。朴硝半兩。為末。每服三錢。色黑者酒一盞。煎。紅赤者水一盞。煎。和滓服。日二服。痔下痛者。加乳香。沒藥。當歸各一錢。同煎。忌生冷硬物。豬魚油。風酒麪。(醫聖元戎方)

治月水不斷。木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。日一服。(聖惠方)

治胎動不安。木賊去節。川芎等分為末。每服三錢。水一盞。入金銀花一錢。煎服。(聖濟總錄方)

二三四

治小腸疝氣。木賊細剉。微炒。為末。沸湯點服二錢。緩服取效。一方用熱酒下。(寇氏方)

治誤吞銅錢。木賊為末。雞子白調一錢服。

用量 一錢半至二錢。施用宜忌 凡陰虛火炎而無風寒者禁用。

參攷資料 木賊出秦隴。華成諸郡。近水地。苗長尺許。叢生。每根一莖。無花葉。寸寸有節。色青。凌冬不凋。四月採之。(掌禹錫) 木賊去節。烘過。發汗。至易。本草不曾言及。(朱實亨) 穀精去星障。木賊去翳障。其功在菊花之上。蓋菊花和血藥。止能調養眼目。而其餘星去翳。則不及也。(馮楚瞻)


【木棉】 古籀別名。古貝。吉貝。古終。斑枝花。欒枝花。(本草綱目) 賤。婆。迦。羅。婆。劫。(梵書)

外國名詞 Ceiba pentandra. G. Gaertn. (拉丁) Ban-y (日本)

基本 係木棉科。木棉屬。藥用其布與棉。

其布與棉。

產地 產熱帶諸地。
形態 木棉爲常綠喬木。高數丈。大可合抱。莖有刺。葉掌狀複葉。小葉五片。花紅色。果實長形。種子生長毛。白色質軟。中有白棉。茸茸如細糞。可作茵褥。抽其緒可紡織爲布。



棉 木

性質 甘。溫。無毒。
主治 血崩金瘡。燒灰用。
參攷資料 木棉有草木二種。交廣木棉樹。大如抱。其枝似桐。其葉大如胡桃葉。入秋開花。紅如山茶花。黃蕊。花片極厚。爲房甚繁。短側相比。結實大如拳。實中有白棉。棉中有子。今人謂之斑枝花。詭爲棉枝花。李廷諤南史所謂林邑諸國。出古貝。花中如鷓鴣。抽其緒紡爲布。張勃吳錄所謂交州永昌木棉樹。高過屋。有十餘年不換者。實大如杯。花中棉軟白。可爲縹絮。及

四畫 木

毛布者。皆指似木之木棉也。江南淮北所種木棉。四月下種。莖弱如蔓。高者四五尺。葉有三尖如楓葉。入秋開花。黃色如葵花而小。亦有紅紫者。結實大如桃。中有白棉。棉中有子。大如梧子。亦有紫棉者。八月採珠。謂之棉花。李廷諤南史所謂高昌國有草。實如繭中絲。爲細繖。名曰白疊。取以爲帛。甚軟白。沈懷遠南越志所謂桂州出古終藤。結實如鷓鴣。核如珠。珣治出其核。紡如絲。染爲斑布者。皆指似草之木棉也。此種出南番。宋末始入江南。今則徧及江北與中州矣。不蠶而綿。不麻而布。利被天下。其益大哉。又南越志言南詔諸蠻。不養蠶。惟收娑羅木子。中白絮。緝爲絲。織爲幅。名娑羅布。段祝穆方輿志言。平緬出娑羅樹。大者高三五丈。結子有綿。緝綿織爲白氈。兜羅綿。此亦斑枝花之類。各方稱呼不同耳。(李時珍)

【木棉子油】

採取 用兩餅合燒取瀝之。

性質 辛。熱。微毒。
主治 惡瘡疥癬。燈燈損目。

【木棉樹皮】即海桐皮之古籍別名。與見藥物生產辨。詳「海桐皮」條。

【木槿】

命名 槿者僅也。本品之花。晨放晚謝。僅榮一瞬之時。故名。

處方用名 木槿皮。木槿花。白槿花。木槿子。

古籍別名 檉。爾雅(舜)。(詩經)日及。朝開暮落花。藩籬草。花奴玉燕。(綱目)槿子花。(植物學大辭典)

外國名詞 Hibiscus sylv. G. (拉丁) ムクゲハチスキ ハチス(日本)

基本 屬錦葵科。木槿屬。藥用木槿之皮根與花子。

產地 原產亞細亞及印度地方。今則處處有之。凡原野間恒有生焉。

形態 木槿爲落葉灌木。高七八尺。葉爲互生。而如卵形。往往爲三裂片。有齒牙。夏秋之間。開紅紫白諸色之花。五瓣短柄。如蜀葵。晨開晚謝。雄蕊甚多。所結果實爲蒴。有毛大如指頭。體甚輕虛。中藏種

子。亦有毛。深秋自裂。其木皮可採纖維。色白而美。可供製紙或製紙之原料。



槿 木

採取 四五月採花。六七月採子。皮根採無時。

性質 甘。平。無毒。

效能 止血痢。療腸風。用作解熱涼血藥。

主治 止腸風。瀉血痢後熱瀉。作飲服之。令人得睡。並炒用。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木槿皮根曰。治赤白帶下。腫痛。疥癬。洗目。令明。潤燥活血。【明】繆希雍本草經疏論木槿皮根曰。木槿本經氣平無毒。詳其主治。應是味苦氣寒。清熱滑利之藥。腸風瀉血。濕熱留中也。痢後作渴。餘熱在經。津液不足也。夜臥少睡。心經熱。虛煩不寧也。苦寒能除諸熱。滑利能導積滯。故主如上等證。今人用治癩瘡。多取川中所

四靈木

產。肉厚而色紅者彌良。花功用相同。作湯代茶。兼能治風。

配合應用 ①治赤白帶下。槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一。碗。空心服之。白帶用紅酒甚妙。(纂要奇方)

②治頭面錢癬。槿樹皮爲末。醋調。重湯頓如膠傅之。(王仲勉經效方)

③治牛皮風癩。川槿皮一兩。大風子仁十五個。半夏五錢。到河水井水各一盞。浸露七宿。入輕粉用一錢。入水中禿筆掃塗。覆以青衣。數日有臭涎出妙。忌浴澡。夏月用尤妙。(扶壽方)

④治癩疥有蟲。川槿皮煎。入肥皂浸水。頻頻擦之。或以槿皮浸汁。磨雄黃尤妙。(簡便方)

⑤治痔瘡腫痛。藩籬草根煎湯。先煎後洗。(直指方)

⑥治大腸脫肛。槿皮或葉煎湯。薰洗。後以白礬五倍子敷。(救急方)

用益 一錢半至三錢。
施用宜忌 凡無濕熱者禁用。
參攷資料 ①木槿花如小葵。

淡紅色。五葉成一花。朝開暮斂。湖南北人家。多種植爲籬障。花與枝兩用。(寇宗奭) ①槿。小木也。可種

可插其木如李。其葉末尖而無極齒。其花小而豔。或白或粉紅。有早葉千葉者。五月始開。故逸書月令云。仲夏之月。木槿榮是也。結實輕

虛。大如指頭。秋深自裂。其中子如榆。茨泡桐馬兜鈴之仁。種之易生。嫩葉可茹。作飲代茶。今邊陲用皮

治瘡癬。多取川中來者。厚而色紅。(李時珍)

【木槿子】

性質 甘平。無毒。
主治 偏正頭風。燒烟熏患處。又治黃水濃疥。燒存性。猪骨髓調塗之。

【木槿花】

性質 甘平。無毒。
主治 腸風瀉血。赤白痢。並焙入藥。作湯代茶治風。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木槿花曰。消瘡腫。利小便。除濕熱。

【木槿皮】即木槿之處方用名。見【木槿】條。
【木槿】即蜀黍之古籍別名。典見廣雅。詳蜀黍條。

【木葛】即常春藤之日本名詞。詳【常春藤】條

【木蓮】即木蘭之古籍別名。典見綱目。詳【木蘭】條。即芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳【芙蓉】條。

【木蓮子】別名 木饅頭。鬼饅頭。性質 甘平。清。無毒。

主治 壯陽道

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木蓮子曰。固精。消腫。散毒。止血下乳。治久痢腸痔。心痛陰癩。

【木蓮葉】

命名 本品實形似蓮。故名。
古籍別名 薛荔(本草拾遺)

外國名詞 Magnolia obovata, Thunb. (拉丁) シモクレン モクレンケ モクレン

基本 係木蘭科。藥用木蓮之葉。

形態 木蓮爲蔓草類。常綠灌木。藤長數尺。葉作橢圓形。質厚。花細。全隱於花托中。

參攷資料 ①木蓮花如小葵。

一三六

性質 酸平。無毒。
主治 瘧風血。暖腰脚。變白不衰。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌經本草論木蓮葉曰。背癢乾末服之。下痢即愈。【明】李時珍本草綱目論木蓮葉曰。治血淋痛瀉。糜菜一握。甘草炙一分。日煎服之。

參攷資料 ①圖經言薛荔治背癢。近見宜興縣一老舉人。年七十餘。患發背。村中無醫藥。急取薛荔葉。爛研。絞汁和蜜飲數升。以滓傅之。後用包藥傅貼。遂愈。其功實

在薛荔。乃知圖經之言不妄。(唐慎微) ②薛荔實綠樹木三五年。漸大。枝葉繁茂。葉長二三寸。厚若石草。生子似蓮房。打破有白汁。停久如漆。中有細子。一年一熟。子亦入藥。採無時。(陳藏器) ③薛荔

格石極相類。莖葉粗大如藤狀。木蓮更大於格石。其實若蓮房。(蘇頌) ④木蓮延樹木垣牆而生。四

時不凋。厚葉堅強。大於格石。不花而實。實大如盃。微似蓮蓬而稍異。正如無花果之生者。六七月實內

空而紅。八月後則滿腹細子。大如

參攷資料 ①木蓮花如小葵。

稔子。一子一鬚。其味微清。其殼虛輕。鳥鳥童兒皆食之。(李時珍)

【木蓮藤汁】 主治 白癩風。癩瘡。惡瘡。疥癬。塗之。

【木蠹】 命名 本品以翼鳴。其聲。察。察。故名。

古籍別名 魂常(本經)

基本 木蠹為化生蟲類之一種。即蠹蟲屬之生於木上者。

產地 出漢中川澤間。

形態 木蠹生木葉上。卷葉如筒。其子初出如白蛆。漸化而為蟲。其形與蠅相同。而體較大。口有棘刺。雄雌四。五六月至七八月。羣飛道中。吮牛馬之血。捕取可供藥用。

採取 五月取之。

性質 苦。平。有毒。

主治 目赤痛。背傷。淚出。癩血。血閉。寒熱。酸傷。無子。

參攷資料 ①木蠹形狀似蠹而小。不啖血。近道草中不見有之。市人亦少。質者。方家惟用蠶耳。(陶弘景) ②木蠹從木葉中出。卷葉如子。形圓。著葉上。破之初。出如

四蠹木

白蛆。漸大。子化。拆破。便飛。即能嚼物。塞北亦有。嶺南極多。如古度化蟻耳。木蠹是葉內者。蠶蟲是已飛者。正如蠶蛹與蛾。總是一物。不合重出。因功用不同。故後人異注耳。

(陳藏器) ③蠹有數種。並能啖血。揚浙以南。江嶺間。大有木蠹。長大。綠色。始如蠅。漸大。或至顯。介。蠶。狀如蜜蜂。黃黑色。今俗多用之。又一種小者。名鹿蠹。亦名牛蠹。大如蠅。嚼牛馬亦猛。市人采買之。三種同體。以療血為本。雖小有異。同用之。不以為嫌。木蠹倍大。而陶云。似蠹而小。不啖血。蓋未之識耳。

(蘇頌) ④今處處有之。而襄漢近地尤多。(蘇頌) ⑤金幼。攷北征錄云。北虜長樂。鎮草間有蠹。大者如蜻蛉。拂人面。啖。元。橫。長。慶。集。云。巴蜀山谷間。春秋常雨。五六月至八九月。則多蠹。道路羣飛。啖牛馬血。流。嚼人毒劇。而毒不留肌。故無治術。據此。則藏器之說。似亦近是。又段成式云。南方溪澗中。多水蛆。長寸餘。色黑。夏末變為蠹。整人甚毒。觀此。則蠹之變化。有木有水。非一端也。(李時珍)

【木蝴蝶】 命名 本品乃樹之膜。色白。似蝴蝶形。故名。

產地 出廣中。

形態 按木蝴蝶四邊薄而明。中心微厚。不甚明透。似有子。壁錢白膜狀。可供藥用。

主治 肝氣痛。焙燥研細。好酒調服。下部濕熱。癰毒。瘡口不斂。貼之。

【木豎】 即豎之古籍別名。典見本草綱目。詳「豎」條。

【木猪苓】 即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【木猪腰子】 即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【木龍】 即製真藤之別名。典見綱目。詳「製真藤」條。

【木龍藤】 產地 出浙江杭縣錢塘橫山間。

形態 木龍藤為蔓草類。藤屬之一種。常沿牆壁或石崖而生。或謂即製真藤。可供藥用。 主治 肺癰。肚癰。腸癰。脇癰。搗汁酒服。

【木蓴】 即川蓴之古籍別名。典見綱目。詳「川蓴」條。

【木錡】 即鷓精。隨於木上者。功用同石錡。惟力較遜。其他詳「石錡」條。

【木槲】 即木耳之古籍別名。典見綱目。詳「木耳」條。

【木藍】 為藍之一種。莖長如決明。藥如槐葉者。功用同藍。詳「藍」條。

【木藍子】 即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【木鴿】 即根椶子之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「根椶子」條。

【木臘】 即紅木香之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「紅木香」條。

【木藜蘆】 古籍別名 黃蘆蘆。鹿藿(本草綱目)

外國名詞 Leonothoo Gra. yau, Maxim. (拉丁)



木 藜 蘆

形態 木蕓蕒爲毒草類之一種。高二三尺。似小樹。葉如櫻桃。狹而長。多皺紋。初夏開黃色細花。五月結子似小豆。可供藥用。

性質 苦辛溫有毒。

主治 疥癬殺蟲。

【木藥子】即黃藥子之古籍別名。典見綱目。詳『黃藥子』條。

【木蠶】即木蠶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木蠶子』條。

【木蠶頭】即木蠶子之俗名。詳『木蠶子』條。

【木蘭】 命名 本品香如蘭花。故名。

古籍別名 林蘭。(本經)杜蘭。(別錄)木蓮。黃心。(本草綱目)

外國名詞 Magnolia obovata, Thunb. (拉丁) モクレンゲ (日本)

基本 係木蘭科。木蘭屬。藥用其皮。

產地 山野平原均有出。

形態 木蘭爲香木類之落葉喬木。高數丈。葉大。倒卵形。互生。晚春在新葉之先枝梢苞圍而出花。

花大。外面暗紫色。內面淡紫色。花瓣長。倒卵形。殆如直立者。



(一) 蘭木



(二) 蘭木

採取 三月四月。採皮陰乾用。

性質 苦寒無毒。

主治 身大熱在皮膚中。去面熱赤。酒皴。惡風癩疾。陰下痒濕。明耳目。(本經)療中風傷寒。及癰疽水腫。去臭氣。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木蘭皮曰。治酒疽。利小便。療重舌。

參攷資料 ●木蘭生零陵山谷。及太山。皮似桂面者。十二月採皮陰乾。(別錄) ●零陵諸處皆有之。狀如楠樹。皮甚薄。而味辛香。今益州者皮厚。狀如厚朴。而氣味爲

勝。今東人皆以山桂皮當之。亦相類。道家用合香亦好。(陶弘景) ●所在皆有。樹高數仞。葉似菌桂。葉有三道縱文。其葉辛香。不及桂也。皮如板桂。有縱橫文。三月四月採皮陰乾。(韓保昇) ●今湖嶺蜀川諸州皆有之。此與桂全別。而韶州所上乃云與桂同。是一種。取外皮爲木蘭。中肉爲桂心。蓋是桂中之一種爾。十一月十二月採陰乾。任昉述異記云。木蘭洲在潯陽江中。多木蘭。又七里洲中有魯班刻木蘭舟。至今在洲中。今詩家云。木蘭舟出於此。(蘇頌) ●木蘭枝葉俱疎。其花內白外紫。亦有四季開者。深山生者尤大。可以爲舟。按白樂天集云。木蓮生巴峽山谷間。民呼爲廣心樹。大者高五六丈。涉冬不凋。身如青楊。有白紋。葉如桂而厚。大無脊。花如蓮花。香色豔膩。皆同。獨房蓋有異。四月初始開。二十日即謝。不結實。此說乃真木蘭也。其花有紅黃白數色。其木肌細而心黃。梓人所重。蘇頌所言韶州者是牡桂。非木蘭也。或云木蘭樹雖去皮亦不死。羅願言其冬花。實如小

柿甘美者。恐不然也。(李時珍)

【木蘭花】 **性質** 溫無毒。

主治 消痰。益肺。和氣。蜜漬尤良。婦人痛經不孕。取開放未足者。每歲一朶。煎服之。並療魚骨哽喉。

【木蘭國】即羊躑躅之日本名詞。詳『羊躑躅』條。

【木蓮子】即罌粟子之古籍別名。典見開寶本草。詳『罌粟子』條。

【木蠶蟲】 **古籍別名** 蝸。蝸蝓。蝸蟻。蛙蟲。(本草綱目)

基本 爲化生蟲類之木蠶蟲。

形態 木蠶蟲爲天牛桑牛等類之幼蟲。乳白色。無腳。有黃褐色短毛。覆被全體。背有顆粒狀突起之物。能支其體。以覆行。蝕諸木。能深入幹中。致樹枯死。其質多潔白而豐。故古人以比美人之頸。而有領如蝸蟻之稱。取得可供藥用。

性質 辛平有小毒。

主治 血瘀勞損。月閉不調。膜脊痛。有損血。及心腹間疾。

參攷資料 ●各木性味良毒不同。而益亦隨所居所食而異。未

不同。而益亦隨所居所食而異。未

可一概用也。古方用蠶，多取桑柳構木者，亦各有義焉。(李時珍) ①似蠶而在木中食木者爲蠹，似蠶而在樹上食葉者爲蠋。似蠶而小行則首尾相就，屈而後伸者爲尺蠖。似尺蠖而青小者爲螟蛉。三蟲皆不能穴木。至夏俱羽化爲蛾。惟穴木之蠶，宜入藥用。(李時珍)

【木蠶】即蟲白蠶之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蟲白蠶」條。

【木蠶】即鹽麩子之古籍別名。典見通志。詳「鹽麩子」條。

【木髓子】命名 本品核似髓。故名。

古籍別名 木蟹。木別子。土木髓。正木髓。蒲藍子。(和漢藥考)

基本 屬葫蘆科。藥用木髓之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。木髓子產安南東京等處。正二月出新。萬國藥方云。又名馬前子。大錯。按木髓子產安南東京。有殼像髓。故名木髓。馬前產新洲。會安。無殼。皮外有毛。此毛服之能斃命。刮去毛服之亦不至於死。分明兩種藥。何以混而一之。此萬國藥方之

四蠶木

錯誤也。和漢藥考曰。產於中國之浙江廣東湖南諸省。日本不產此。

形態 木髓子莢歲一枯。但根不死。春生苗作藤。生葉有五極。狀如山藥。又似葡萄。青色面光。四月開黃花。六月結實。似栝樓而大。生青熟則紅黃。肉上有軟刺。每一實有核三四十枚。形扁大如棋子。作髓及蟹狀。仁作青綠色。青核扁平。形圓而不正。或作龜殼狀。大六分至八分。厚一二分。殼之邊緣高起。表面粗糙。而有似網之脈理。中藏子葉。嚼之有聲。子葉含黃色油極多。

種類 ①有殼者曰土木髓。②無殼者曰番木髓。

採取 七月八月間採實。

性質 甘溫無毒。

效能 治瘡消腫。用作瘡瘍藥。

主治 折傷。消結腫。惡瘡。生肌。止痛。除粉刺。野雞。婦人乳癰。肛門腫痛。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論木髓子曰。醋磨消腫毒。【明】李時珍本草綱目論木髓子曰。治疔積痞塊。利大腸瀉痢。

痔瘡瘰癧。【明】繆希雍本草經疏論木髓子曰。木髓子味甘氣溫無毒。味厚於氣。爲散血熱除癰毒之要藥。夫結腫惡瘡。粉刺野雞。肛門腫痛。婦人乳癰等證。皆血熱所致。折傷則血亦瘀而發熱。甘溫能通行經絡。則血熱散。血熱散則諸證無不瘳矣。其止腰痛者。蓋指濕熱客於下部所致。而非腎虛爲病之比也。用者詳之。【清】黃宮繡本草求真論木髓子曰。木髓本有二種。一名土髓有殼。一名番木髓無殼。木髓味苦居多。略帶甘辛。諸書皆言性溫。以其味辛者故耳。究之性屬大寒。狗食即斃。人若誤用。中寒口噤。多致不救。常有因病錯用而斃者矣。故其功用。多從外治。如腫毒。乳癰。痔漏。腫痛。喉痺。用此醋漱於喉間。引痰吐出。以解熱毒。不可咽下。或同硃砂艾葉。捲筒薰疥。殺蟲最效。或用麻油熱擦。亦可。總不可入湯劑。以致寒毒內攻耳。番髓功與木髓大同。而寒烈之性尤甚。所治熱病喉痺。亦止可同山豆根。青木香。磨汁內含。使其痰涎引吐。逆流而上。不可咽下。斑痞入眼。

可用番木髓半個。輕粉。冰片。麝香。爲末。左目吹右耳。右目吹左耳。日吹二次。即住。狗性大熱。用此大寒內激。使之相反。立見斃耳。止入外科治療。用時除油。

國外學說 日本藥學士中尾萬三。檢查木髓子之成分。知其主要之成分。爲乾性脂肪油。百分中約含十四分。此外尚發見沙波寧。體兩種。並複糖體一種。又藥劑師津川福一。亦於木髓子中。檢得植物鹽基之沙波寧實。

配合應用 ①治酒世脾黃。木髓子磨醋服一二錢。見利效。(劉長春濟急方)

②治脚氣腫痛。木髓子仁每個。作兩邊。乾炒過。切碎再炒。去油盡爲度。每兩入厚桂半兩。爲末。熱酒服二錢。令醉得汗愈。(水類鈴方)

③治濕瘡脚腫。行履難者。木髓子四兩。去皮。甘遂半兩。爲末。以猪腰子一個。去膜切片。用藥四錢。在中濕紙包。煨熟。空心米飲送下。服後便伸兩脚。如大便行者。只喫白粥二三日爲妙。(楊琪醫方摘要方)

四盡 木止 豕 比

① 治陰疝偏墜痛甚者。木鼈子一個。磨醋。調黃蘗芙蓉末傳之即愈。(壽域方)

② 治久積有母。木鼈子。穿山甲泡等分爲末。每服三錢。空心溫酒下。(醫方摘要方)

③ 治腹中痞塊。木鼈子仁五兩。用積豬腰子二副。批開。入在內。簽定煨熟。同搗爛。入黃連末三錢。蒸餅和丸。綠豆大。每日湯下三十九丸。(醫方集成方)

④ 治小兒疳疾。木鼈子仁。使君子仁等分。搗泥。米飲丸。芥子大。每服五分。米飲下。一日二服。(孫天仁集效方)

⑤ 治疳病目瞭不見物。用木鼈子仁二錢。胡黃連一錢。爲末。米糊丸。龍眼大。入雞子內蒸熟。連雞子食之爲妙。(集效方)

⑥ 治倒睫拳毛。因風入脾經。致使風痒。不住手擦。日久赤爛。拳毛入內。將木鼈子仁。種爛。以絲帛包作條。左患塞右鼻。右患塞左鼻。其毛自分上下。次服蟬蛻藥爲妙。(集效方)

⑦ 治疔虛久賦。木鼈子。款冬花

各一兩爲末。每用三錢。焚之。吸煙良久。吐涎。以茶潤喉。如此五六次。後服補肺藥。一方用木鼈子一個。雄黃一錢。(聖濟總錄方)

⑧ 治小兒鹹癖。大木鼈子三四個。磨水飲。以雪糕壓下。即吐出痰。重者三服效。(摘玄方)

⑨ 治水瀉不止。木鼈仁五個。母丁香五個。麝香一分。研末。米湯調作膏。納臍中貼之。外以膏藥護住。(吳曼扶壽精方)

⑩ 治疾痢禁口。木鼈仁六個。研泥。分作二分。用麵燒餅一個。切作兩半。只用半餅作一竅。納藥在內。乘熱覆在病人臍上一時。再換半個熱餅。其痢即止。遂思飲食。(邵真人經驗方)

⑪ 治腸風瀉血。木鼈子以桑柴燒存性。候冷爲末。每服一錢。煨葱白酒。空心服之。名烏金散。(普濟方)

⑫ 治肛門痔痛。用木鼈仁三枚。砂盆搗如泥。入百沸湯一盞。乘熱先熏後洗。日用三次。仍塗少許。又瀨湖集簡方。用木鼈仁帶潤者。雌雄各五個。乳和作七丸。徑覆濕處。

勿令乾。每以一九。唾化開。貼痔上。其痛即止。一夜一九自消也。江夏鐵佛寺蔡和尙病此。痛不可忍。有人傳此方而愈。用治數人皆有效。(孫用和秘寶方)

⑬ 治癩癧經年。木鼈仁二個。去油研。以雞子白和入瓶內。安甌中。蒸熟食後食之。每日一服。半月效。⑭ 治小兒丹瘤。木鼈子仁研如泥。醋調傅之。一日三五次效。(外科精義方)

⑮ 治耳卒熱腫。木鼈子仁一兩。赤小豆。大黃各半兩。爲末。每以少許。生油調塗之。(聖惠方)

⑯ 治風牙腫痛。木鼈子仁磨醋搽之。(普濟方)

⑰ 治耳卒熱腫。木鼈子仁一兩。赤小豆。大黃各半兩。爲末。每以少許。生油調塗之。(聖惠方)

二四〇

及杭越全岳州皆有之。春生苗。作藤生。葉有五極。狀如山藥。青色。面光。四月生黃花。六月結實。似栝樓而極大。生青。熟紅黃色。肉上有軟刺。每一實有核三四十枚。其狀扁而如鼈。八九月採之。嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食。(蘇頌)按劉涓子雪錄云。木鼈子有毒。不可食。昔菊門有人生二子。恣食成痞。其父得一方。以木鼈子煮豬肉食之。其幼子當夜死。長子明日死。友人馬文誠方書亦載此方。因著此爲戒。(汪機)⑱ 南人取其苗及嫩實食之。無恙。則其毒未應至此。或者與豬肉不相得。或犯他物而然。不可盡咎木鼈也。(李時珍)

【止行】即刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳「刺蒺藜」條。【芍菊】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「旋覆花」條。【比目】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【比目魚】古籍別名。鱈。(爾雅) 鱈。第葉魚。(南方異物志) 鱈。(吳郡賦) 鱈。(上林賦) 奴馬魚。(臨海風土記) 婢鱈

魚(臨海志)版魚(越南志)鞋底魚(本草綱目)鮓(動物學大辭典)

學名 *Parrichthys olivacea* T. & S 或 *Pseudopleuronectes olivaceus* 或 *Pseudorombus olivaceus* 或 *Flatfish*

基本 尾脊椎動物魚類。硬骨類。軟鱗類。比目魚科。



比目魚

形態 體長橢圓甚闊扁。體長為體高之二倍餘。亦為頭長之四倍。頭長為吻長三倍半。亦為眼徑之十倍。鱗細而圓。且粘滑。下顎稍突出。齒列生於顎。尖銳為鈎狀。兩眼皆在左面。眼球隆起。能自由轉視。唇長。起於吻後至尾柄。有七十刺。背鰭亦長。有五十七刺。胸腹

四盡比毛

兩鱗皆小。性質 甘平。無毒。

主治 補虛。益氣力。多食動氣。

【比目沉香】即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。

【比目連理花】即高良薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『高良薑』條。

【比倫錢】即古文錢之古籍別名。典見肘後方。詳『古文錢』條。

【毛女兒茶】即鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠麴草』條。

【毛耳朶】即鼠麴草之古籍別名。典見綱目。詳『鼠麴草』條。

【毛茸】即鹿茸之處方用名。詳『鹿茸』條。

【毛角膠】基本 本品係鹿毛及鹿角熬成之膠。

主治 生精。添髓。益血。壯陽。通督脈。補命門。治一切虛損。女子崩中漏血。赤白帶淋。

【毛姑】即山慈姑之簡稱。典見綱目。詳『山慈姑』條。

【毛狗】即狼之古籍別名。典見綱目。詳『狼』條。

【毛刺皮】即刺蝟皮之古籍別名。

典見爾雅。詳『刺蝟皮』條。

【毛珀】即琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【毛建草】即毛茛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『毛茛』條。

【毛桃】即桃之實小而多毛。核黏味惡。仁充滿多脂者佳。功用詳『桃』條。

【毛茛】命名 其乃草烏頭之似之故名。苗本品形狀及毒性皆

古籍別名 毛建草。(綱目拾遺)毛茛。天灸。(本草衍義)自灸。水其。猴蒜。(本草綱目)

外國名詞 *Ranunculus acris*, *L. var. japonicus*, *Maxim.* (拉丁) *キンバウケ* *ウマノアシガタ* (日本)

基本 係毛茛科毛茛屬。藥用其葉與子實。



(一) 毛茛

形態 毛茛為毒草類之多年

生草本。莖葉皆有毛。高二三尺。單葉掌狀分裂。夏從其根出。葉間抽花莖。分枝開花於莖頂。色黃或白。花瓣五。又有複瓣者。其雌蕊有多數。排列成頭狀。結實為乾果。多而小。集成球形。

性質 辛溫。有毒。

主治 惡瘡癰腫。疼痛未潰。搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患癰人以一握攪碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。即便成瘡。和薑搗塗。腹破冷氣。



(二) 毛茛

參攷資料 ①陶注鈎吻云。或是毛茛。蘇恭云。毛茛是有毛石龍芮也。有毒。與鈎吻無干。葛洪百一方云。菜中有水其。葉圓而光。生水旁。有毒。蟹多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐血。以甘草汁解之。又曰毛建草。生江東地。田野深畔。葉如芥而大。上有毛。花黃色。子如蒺藜。(陳藏器) ②其乃草烏頭之

四畫 毛 水

苗。肘後方謂之水莧。又名毛建。亦其字音訛也。俗名毛莧。似水莧而有毛也。山人截瘡。採葉按貼寸口。一夜作泡如火燎。故呼為天灸。自灸。(李時珍) ①毛建毛莧。即今毛莧也。高者尺餘。一枝三葉。葉有三尖及細缺。與石龍芮莖葉一様。但有細毛為別。四五月開小黃花。五出甚光豔。結實狀如欲粒。青莖。構如有尖。與石龍芮子不同。人以為藕不食。草者大誤也。方士取汁煮砂伏硫。沈存中筆談所謂石龍芮有兩種。水生者葉光而未開。陸生者葉毛而未銳。此即葉毛者宜辨之。(李時珍)

【毛莧】 命名 本品即毛竹筍。為諸莧之大者。籜上有毛。故名。

古醫別名 貓兒頭。(綱目拾遺)

形態 毛莧為苞木類之一種。大者重一二十斤。未出土者。肉白如霜。墮地即碎。搯之頗柔軟。嗅之有蘭香。清明後方有出。其出於臘月及正月者。形短小。籜亦有毛。即所謂貓兒頭。俱可供食與藥用。

性質 甘平。

主治 利九竅。通血脈。化痰涎。消食脹。多食令人易饑。

產地 粵省東江。為

【毛射香】 多出處。

採取 六月採新。

主治 風濕。疥癬。

【毛脚茵】 係湖南人呼金頂龍芽草者之古籍別名。典見植物名實圖考。見「仙鶴草」條。

【毛犀】 即犀牛之古籍別名。典見廣志。詳「犀牛」條。

【毛蚌】 即魁蛤之俗名。而壳有縱綫。不甚高。色黑褐。有茸毛附着。性味功用詳「魁蛤」條。

【毛蓮子】 即苦花子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「苦花子」條。

【毛莖】 即毛莧之古籍別名。典見本草衍義。詳「毛莧」條。

【毛鹿角】 即鹿角之處方用名。詳「鹿角」條。

二四二

毛。三月開花。唇色。至五月間。其莖蔓延。粘土生根。兩頭如橋。或謂倒地生根。形如橋。葉如柳。厚背紫色者多。秋開紫花一條。俱可供藥用。

採取 三月採。去根用。

性質 寒。無毒。

主治 散風火。利濕熱。療火丹瘡。疥癬腫毒。搗汁酒服。及白濁。失力黃疔瘡。同蒼耳草酒煎服。

【毛慈姑】 即山慈姑之處方用名。詳「山慈姑」條。

外國名詞 Polygono-rum barbatum, L.

【毛蓼】 (拉丁) ケタテウツタテ (日本)

基本 係蓼科蓼屬。藥用毛蓼之莖葉。

形態 毛蓼為濕草類之野生草本。形似馬薊。葉上有毛。

性質 辛溫。有毒。

主治 癰腫。疔瘻。瘰癧。杵碎納瘡中。引膿血生肌。亦作湯洗。兼溫足。治脚氣。

參攷資料 ①毛蓼生山足。似馬薊。葉上有毛。冬根不死。(陳藏器) ②此即蓼之生於山麓者。非

澤瀉之蓼也。(李時珍)

【毛莖】 即竹碎補之俗名。詳「骨碎補」條。

【毛莖】 即葶麻之古籍別名。典見綱目。詳「葶麻」條。

基本 本品係人參

三七之一種。

性質 甘苦。無毒。

主治 止吐衄。去瘀血。跌打損傷。積血不行。用酒煎服。

參攷資料 水三七補而不峻。以未摻諸血中。血化為水者佳。

【水三稜】 即香附之古籍別名。典見江表傳。詳「香附」條。

【水中丹】 即次實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「次實」條。

基本 本品乃

【水中白石】 溪湖水中之石。藥用以白小者為佳。

形態 水中白石為石類之一種。大者如雞子。小者如指。其頂有黑白二色。

主治 食魚鱸多。脹滿成癭。痛悶。日漸羸弱。取數十枚。燒赤。投五升水中。七錫熱飲。如此三五度。當利出瘕也。又燒淨水中。納鹽三合。

參攷資料 ①毛蓼生山足。似馬薊。葉上有毛。冬根不死。(陳藏器) ②此即蓼之生於山麓者。非

澤瀉之蓼也。(李時珍)

【毛莖】 即竹碎補之俗名。詳「骨碎補」條。

【毛莖】 即葶麻之古籍別名。典見綱目。詳「葶麻」條。

清風盛暑。

歷代記述致遠。【宋】蘇頌

經本草論水中白石曰。治背上忽腫如盤不識名者取一二盤燒熱投水中。類洗之立瘥。

【水中金】即鉛之古籍別名。與見綱目。詳【鉛】條。

【水中萍子草】即浮萍之古籍別名。與見和漢藥考。詳【浮萍】條。

【水巴戟】即香附子之古籍別名。與見爾雅本草。詳【香附子】條。

【水牛肉】性質 甘平無毒。聖治 安中益氣消渴。晚洩。養脾胃。強筋骨。

【水牛乳汁】作酪濃厚。造石蜜用之。性質功用。詳【牛乳汁】條。

【水牛酥】酥之以水牛乳製成者。性質功用。與牛酥同。

【水仙】原名 水仙花。命名 本品宜植卑濕之處。不可缺水。故名。

處方用名 水仙根。

古籍別名 金盞銀盞。雅蒜。天葱。(會編)真水仙。玉玲瓏。(聖芳譜)水蘇。配支。雅客。儂閑。凌波客。

凌波仙子(和漢藥考)銀盞。(日

四盞水

(本) 接祇(西陽雜俎)

學名 *Narcissus tazetta*,

L. var. *Chinensis*, Room.

基本 屬石蒜科。藥用水仙之根。

形態 水仙為自生之多年生草本。葉狹長如線。具並行脈而稍振。自地下莖叢生數葉。入冬。叢葉中抽莖。高七八寸至尺許。頂生薄苞。破則開白色六瓣之花。有莖約有數朵。中有如杯之黃色花冠。一雌蕊。六雄蕊。向側而開。氣甚芳香。其地下莖為重重之鱗莖。頗為肥大。形卵圓或球圓。外面帶黑色。誤食之必腹痛暴瀉。



水仙

種植 人家多有栽於盆中。以供玩賞。每年九月間下種。其栽於肥壤者。則花茂盛。瘦地則無花也。

採取 五月間採根。

性質 苦。微辛。滑寒。無毒。

成分 含有亞爾加羅伊度。與

石蒜中所含里克林 (Lycorin) 之有毒成分相同。

效能 塗癰。消腫。根治腫瘍。藥。花為婦科藥。

聖治 癰腫及魚骨哽。

國外學說 日本大和本草曰。根去皮研。曬乾收貯。治眼傷和乳汁點之。神效。此本草所不載。又農業雜誌曰。婦人乳房腫痛。水仙球根。剝去外皮。搗爛。米飯同煉和攤白紙上。貼患處。漸散熱。止痛。腫亦消而自愈。

近人學說 袁淑範曰。水仙名見本草會編。謂其根味苦微辛。氣滑寒而無毒。李時珍謂主治癰腫及魚骨哽。其花則作香澤。塗身理髮去風氣。又療婦人之心發熱。按其地下莖為鱗莖。多粘液有毒。用治癰腫甚有功效。特別是婦人乳腫之時。將其根去皮。與飯共抹為練液。塗於患部時。則有散熱消腫之功。而有毒草木說中。亦謂水仙有毒。誤食時能暴瀉。而其粘液又適於接合臘質。石印材料等之缺損也。又曰。石蒜科之植物有毒而苦。且能發吐瀉。有利尿之功能及

可用作海葱之代用品。而用於心臟病者。為自古時各國民間之所熟知者也。最初 Gorrard 氏自

Narcissus Pseudonarcissus, L. 中抽出一種植物性類鹽基。其後

Bastochi, Eucherard 二氏雖亦曾自水仙屬中提出植物性類鹽基。但其比較精細的檢查。實在為

Fragner 氏曾自 *Amaryllis farinosisima* 及 *Amaryllis belladonna*, 二種植物中提出

Amaryllin 及 *Bolamarin* 二種植物性類鹽基。而 Eiharhardt 氏亦曾自 *Narcissus Poeticus* 中提出。名為 *Narcein* 之一種

植物性類鹽基。而 Robochek 氏在 *Amer Journal of Pharmacy*, 1893 中曾發表自 *Narcissus orientalis* 中。發見一種糖原質。及一種植物性類鹽基。其後日本

森島博士於一八九八年。曾自石蒜中。提出兩種植物性類鹽基。一為 *Lycorin* 一為 *Solisanin*。依

上所記。則石蒜科植物中。含有植物性類鹽基。殆無可疑也。明治三十五年。山內停吾氏曾研究水仙

四臺水

謂將其根莖葉等切碎。以九十六%之酒精冷浸之。蒸餾發散其濾液中之酒精時。則可得暗綠褐色樹脂樣之四味酸性稠液。加以適宜之水。濾去其樹脂。以炭酸鈉使呈鹼性反應。以『依的兒』振盪之。再蒸餾之時。則可得混有微細結晶之蜂蜜樣液體也。再溶之於酒精中。蒸發適度時。則能析出一種多角形之結晶。此結晶雖不溶於水。然易溶於稀酸中。對於一般之植物性類鹽基試藥。皆有反應。且其種種之理學的性質及反應。與前述之自石蒜所提出之 *Lycothol* 無大差別。且其生理的作用。亦與 *Lycothol* 相同。故水仙之有毒成分。似可斷為 *Lycothol* 也。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無熱毒及脾胃便滑者禁用。忌火。

參攷資料 ①作香澤塗身。理髮去風氣。又療婦人五心發熱。同乾荷葉赤芍藥等分爲末。白湯每段二錢。煎自退也。②李時珍。水仙花生下濕處。其根似蒜及薤而

長。外有赤皮裹之。冬月生葉似蕪及蒜。春初抽莖如葱頭。莖頂開花數朵。大如簪頭。狀如酒盃。五尖上承黃心。宛然蕪樣。其花盤韻。其香清幽。一種千葉者。花瓣下輕黃而上淡白。不作盃狀。人重之。指爲真水仙。蓋不然。乃一物二種爾。亦有紅花者。按段成式西陽雜俎云。捺祇出拂林國。根大如雞卵。葉長三四尺。似蒜。中心抽條。莖端開花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。冬生夏死。取花壓油。塗身去風氣。據此形狀。與水仙彷彿。豈外國名謂不同耶。③李時珍。水仙取汁。伏承黃雄黃。拒火。④土宿本草。

【水仙子】性質功用與花同。又即蛸蚪之俗名。詳「蛸蚪」條。

【水仙花】即水仙之原名。詳「水仙」條。

【水仙根】即水仙之處方用名。詳「水仙」條。

【水母】即海蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「海蛇」條。

【水玉】即半夏之古籍別名。典見本草。詳「半夏」條。即水晶之古籍別名。典見綱目。詳「水晶」條。

外國名詞 *Armonia elliptica*, *R. o. S.* (拉丁) *チャウジ* サウ(日本)

基本 係夾竹桃科藥用水甘草之莖根。

形態 水甘草爲蕪草類之野生水漬草。本莖高二尺許。葉互生。披針狀。四五月間。頂端分枝開花。聚繖花序。通常作濃桔梗色。花後結莢。

性質 甘寒。無毒。

主治 小兒風熱丹毒。同甘草煎飲。

參攷資料 生揚州。多在水旁。春生苗。莖青。葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。(蘇頌)

二四四

性質功能 與土當歸同。以代表劑亦可疎散。

【水安息】命名 本品爲安息香之產於波斯。安南等處者。焚其香。投水中。還結爲香故名。

形態 水安息形似荔枝而大。外有殼包。裏皮色亦如鮮荔枝。中有如膠漆之香。色黃褐而氣馥郁。如殺綻裂。香即外溢。以溼青熬化。滴之即止。焚之其烟白色如蠟。直上不散。其香可供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 通心神。除邪魅。辟穢毒。止心痛。除風寒。霍亂。煖腎與陽。療心腹蟲氣。直淋遺精。鬼交鬼胎。驚勞瘵。

配合應用 ①辟瘟丹。用紅棗二觔。茵陳切碎八兩。大黃切片八兩。水安息五錢。合爲錠。每晨焚之。(陳杰回生集方)

②潮腦飛升白霜一兩。麝香二錢。枯礬三錢。龍骨三錢。良薑三錢。五倍子二錢。明雄二錢。水安息。母丁香。蘇合油各五錢。官桂三錢。輕粉二錢。紫粉花二錢。大山茨菰三

許。白肉黑皮。氣味芬芳。時如白芷。

和漢藥考。詳「浮萍」條。

【水白芷】土當歸之一種。長僅尺許。白肉黑皮。氣味芬芳。時如白芷。

【水白芷】土當歸之一種。長僅尺許。白肉黑皮。氣味芬芳。時如白芷。

【水白芷】土當歸之一種。長僅尺許。白肉黑皮。氣味芬芳。時如白芷。

錢。其爲細末。煉蜜爲丸。桐子大。蠟丸封固。月信後納一丸。次日再納一丸。種子如神。并治血淋白帶。陰疝陰蝕。楊梅瘡毒等症。又方。真川附子一個。重一兩二三錢者。山茨菰四錢。此二味要童便浸透。焙乾研末。川烏八錢。五倍子三錢。此二味同研末。水安息五錢。生蠟酥八錢。此二味同研末。麻草烏五錢。明雄五錢。此二味同研末。官桂五錢。母丁香八錢。同研末。酥合油五錢。真鴉片三錢。同研末。紫梢花三錢。蛇床子一兩。倭硫黃五錢。輕粉五錢。右藥爲末。同白芨五錢。煎水。合前藥。打成錠。每行時用津磨少許。搽莖首。能治精滑。并久不生子。且能解毒。遇瘡不染。若早午晚各搽一次。久不斷。更有神效。與前方男婦同用更佳。或再加人參五錢尤妙。(周氏種子方)

①治穿腸起管。年久不愈。用水安息搽之。管化毒愈。(許氏方)

施用宜忌 凡氣虛及挾火者禁用忌火。

參攷資料 水安息入心經。通腎氣。尤益房室。故龜靈劑用之以

四畫 水

與陽。反魂丹用之以救急。然大耗真氣。凡虛者不可服之。(趙學敏)

【水竹葉】 外國名詞 Anoi-lone (拉丁) Iona Koisale, Ha-

基本 本品爲毒草類水竹之葉。似竹葉而小。



水竹葉

主治 殺蟻蟲。

【水老鴉】即鷓鴣之古籍別名。典見本草衍義。詳「鷓鴣」條。

【水衣】即陸釐之古籍別名。典見說文。詳「陸釐」條。

【水杉】即榿木之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「榿木」條。

【水李】係李之一種。果實甘美堪食。性質功用。與李實同。詳「李」條。

【水沉香】即沉香之處方用名。詳「沉香」條。

【水沙連茶】 形態 水沙連茶爲茶之產於臺灣島深山中者。葉木蔽虧。霧露

瀝瀝。晨曉晚照。總不能及。色綠如松蘿。採得焙製。可供飲料與藥用。

性質 大寒。無毒。

主治 療熱症。發痘瘡。

【水弩】即溪鬼蟲之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「溪鬼蟲」條。

【水松】 命名 本品狀似松。故

外國名詞 Codium muoro-natum, J. A. G. (拉丁)

基本 係管狀藻屬水松科之水松。

產地 出南海及交趾之淺水海岩上。

形態 水松爲水草類之濕生草本。色濃綠。長六七寸。其根稍帶錐形。上部則分枝爲數回叉狀。終呈複雜之總狀。狀如松而有多數細胞。如管密生。集成球。作圓筒狀。或扁平。其幹枝可供藥用。

性質 甘。鹹寒。無毒。

主治 水腫。溪毒。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論水松曰。治水腫。催生

【水狀元】即紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫蘇」條。

【水狐】即溪鬼蟲之古籍別名。典見玄記。詳「溪鬼蟲」條。

【水狗】即魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳「魚狗」條。即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳「水獺肝」條。

【水芝】即蓮肉之古籍別名。典見本經。詳「蓮肉」條。即冬瓜之古籍別名。典見本經。詳「冬瓜」條。即冬瓜子之古籍別名。典見本經。詳「冬瓜子」條。

【水花】即浮海石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「浮海石」條。即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【水芹菜】 原名 苦蕒。斷俗作芹。芹之生於池澤水中者。故名。

古籍別名 水英(本經)楚葵。(爾雅)

外國名詞 Oenanthe sibirica, DC. (拉丁) ヤリ(日本)

基本 係繖形科水蘗屬。爲水芹之莖葉。

形態 水芹爲菜類之多年生

四畫 水

平滑草本。有特殊之香氣。往往引長匍匐。莖藉以繁殖。春生苗。其葉二回羽狀複葉。自許多小葉成互生。夏日抽莖至一二尺。梢上開小花。色白。雄蕊五。與花瓣同數。花柱二。作複繖形花序。其嫩葉可供食用。即名芹菜亦可充藥用。



水 芹 菜

性質 甘平。無毒。
主治 女子赤沃。止血。養精。保血脈。益氣。令人肥健嗜食。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論水芹菜曰。去伏熱。殺石藥毒。持汁服。【唐】陳藏器本草拾遺論水芹曰。飲汁去小兒暴熱。大人酒後熱。鼻塞身熱。去頭中風熱。利口齒。利大小腸。【宋】大明諸家本草論水芹菜曰。治煩渴。扇中帶下。五種黃病。【清】黃宮繡本草求真論水芹菜曰。芹菜地出。有水有旱。其味有苦有甘。有辛有酸之類。考之張騫有言。旱芹得青陽之氣。

而生。氣味辛竄。能理胃中濕濁。水芹得濕淫之氣而生。氣味辛濁。考之綱目有言。旱芹氣味甘寒。能除心下煩熱。水芹氣味甘平。能治女子赤沃。兩說絕不相類。詎知旱芹種類。或有得於陽氣之厚。故味多辛。而燥得於陽氣之微。故味苦而多濕。水芹種類。得於陽氣之最。則氣雖濁而仍清。得於陰氣之勝。則味既苦而且濁。不得謂水芹盡屬陰類。旱芹盡屬陽類也。惟察辛多於苦。則芹多燥而不涼。苦勝於辛。則味多寒而不溫。辛勝於苦。則治當如本經所云。能治女子赤沃。俾濁濕去。胃氣清。而精血有賴。令人肥健嗜食。苦勝於辛。及質粘滑。則治當如唐本所云。能治癰腫馬毒。又安能入脾以助食。入陰以助精。入肝以保血乎。但芹在水。須防有蟲在於葉間。視之不見。令人為患。面青手背。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍痛。須服硬鴿二三筋。吐出便差。其根白。盈尺者曰馬斬。食之令人發瘡疥。以其濕熱之氣最盛也。和醋食之。損齒。有髓。撥人不可食。【清】王士雄隨息居飲食譜論水

芹菜曰。芹甘涼清胃。滌熱祛風。利口齒咽喉頭目。治崩帶淋濁諸黃。白煙者良。煮勿太熟。旱芹味遜。性味略同。
參攷資料 ①水芹和醋食損齒。蟹癩不可食。②孟詵 ③水芹生黑滑地。食之不如高田者。宜人。置酒醬中。香美。高田者曰芹。餘田者皆有蟲子在葉間。視之不見。食之令人為患。④孟詵 ⑤春秋二時。龍帶精入芹菜中。人誤食之。為病。面青手背。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。俱服硬鴿三二升。日三度。吐出。蜥蜴便瘥。⑥張仲景 ⑦芹菜生水涯。蛟龍雖云變化莫測。其精那得入此。大抵是蜥蜴。虺蛇之類。春夏之交。遺精於此。故爾。且蛇喜嗜芹。尤為可證。⑧李時珍 ⑨斬當作斬。从艸。斬。諸聲也。後省作芹。从斤。亦諸聲也。其性冷滑如葵。故爾雅謂之楚葵。呂氏春秋。菜之美者。有雲夢之芹。雲夢。楚地也。楚有蕪州。蕪。俱音淇。羅爾雅。翼云。地多產芹。故字从芹。亦音芹。徐鍇注說文。斬字从艸。斬。諸書無斬字。惟說文別出芹字。音銀。疑相承誤出。

二四六

也。據此則斬字亦當从斬作斬字也。⑩李時珍 ⑪芹有水芹旱芹。水芹生江湖。陂澤之涯。旱芹生平地。有赤白二種。二月生苗。其葉對節而生。似芍藥。其莖有節。稜而中空。其氣芬芳。五月開細白花。如蛇牀。花楚人採以濟帆。其利不小。詩云。鴛鴦浮。魯言。採其芹。杜甫詩云。飯糗泥坊底。芹。又云。香芹碧。翻糗。皆美芹之功。而列子言。鄉。濠。芹。蜚口。慘腹。蓋因未得食芹之法耳。⑫李時珍

【水芹菜花】

性質 苦寒。無毒。

主治 脈溢。

【水芹】即鼠尾草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鼠尾草』條。

【水流黃】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【水柏】即睡菜之日本名詞。詳『睡菜』條。

【水珀】即琥珀之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『琥珀』條。

【水苔】即陸釐之古籍別名。典見爾雅本草。詳『陸釐』條。

【水柳】即水楊之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「水楊」條。

【水苦蕒】

古籍別名 謝落菜。
〔圖經〕半邊山。〔本草綱目〕


外國名詞 Veronica Anagallis, L. (拉丁) カハチサ (日本)

基本

係元參科水苦蕒屬。藥用其根。

形態

水苦蕒為菜類之越年生草本。高尺餘。莖與葉皆平滑。葉廣披針形。長二三寸許。有鋸齒。無柄。似苦蕒而厚。有光澤。初夏其總狀花序生於葉腋。花小白色。有淡紅紫色之線。花冠四裂。筒短。萼亦四裂。雄蕊二枝。互相隔離。突出花外。雌蕊一枝。莖葉嫩時可供菜茹。其根似白朮而軟。可供藥用。



水苦蕒

採取 二月八月採根用。

性質 微苦。辛寒。無毒。

主治 風熱上壅。咽喉腫痛。及

四畫 水

項上風濕。以酒磨服。

【水英】

古籍別名 魚津草。海草。水節。水棘龍移草。海荏。〔唐天寶單方圖〕

外國名詞 Oenanthis Sp. Ionifera, DC. (拉丁) ヤリ (日本)

基本 係繖形科水蘄屬。藥用

水英之莖葉。

形態 水英為繖草類之多年

生草本。莖葉肥大。餘與水芹同。爾雅謂水芹一名水英。故水英即水芹。

主治 骨風。

歷代記述攷證 【宋】蜀人採

其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩脚腫滿。速膝脛中痛。風伸急強者。名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石。煮三斗。乘熱時將兩腳浸入水中。并淋膝上。日夜三四度。不經五日即瘥。數用神驗。其春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者。加生椒目三升。水二斗。用畢。即摩粉避風。忌油膩生菜。猪魚等物。

參攷資料 ●唐天寶單方圖。

言此草原生永陽池澤。及河海邊。臨汝人呼為牛荳草。河北信都人名水節。河內連內黃呼為水棘。劍南遂寧等郡名龍移草。淮南諸郡名海荏。嶺南亦有。土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。〔蘇頌〕

此草不著形狀氣味。無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。〔李時珍〕

【水香稜】即香附子之古籍別名。

典見圖經本草。詳「香附子」條。

【水栗】即芡實之古籍別名。典見風俗通。詳「菱」條。

【水栗子】即萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳「萍蓬草」條。

【水凌】即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

【水粉】即白粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。

即輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「輕粉」條。

【水荔枝】即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【水苒】即毛苒之古籍別名。典見綱目。詳「毛苒」條。

【水茸角】

古籍別名 合萌。〔綱目拾遺〕

形態 水茸角為蕈草類之一種。狀如鬼腰帶。竹小窠子。生三四月。開黃花。葉如百合。可供藥用。

採取 六七月間採之。

主治 疾婦人吹爛。新瓦煨乾。

為末。臨臥酒調服。即破者略出黃水亦效。

【水銀】即水銀之處方用名。詳「水銀」條。

【水荊】即石荊之古籍別名。典見綱目。詳「石荊」條。

【水馬】即海馬之古籍別名。典見綱目。詳「海馬」條。

即龜版之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龜版」條。

【水茄】即茄子之一種。生於水中者。子實長圓。味甘美。堪食。並可止渴。性質功能。與茄子同。詳「茄子」條。

即龍葵之古籍別名。典見綱目。詳「龍葵」條。

【水香】即草蘭之古籍別名。典見本經。詳「草蘭」條。

即鼠尾草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鼠尾草」條。

鼠尾草條。

【水香葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見吳普本草。詳『澤蘭葉』條。

【水馬兒】即水龜之古籍別名。典見綱目。詳『水龜』條。

【水參】即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【水宿】即白菖之古籍別名。典見別錄。詳『白菖』條。

【水笠】即萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳『萍蓬草』條。

【水莎】即香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【水莽草】即鈎吻之俗名。詳『鈎吻』條。

【水蛇】 古籍別名 公蠟蛇。(本草綱目)

基本 係蛇類。藥用水蛇之肉。

形態 水蛇為水族動物。形大如鱗。色黃黑。有縹紋。嚼人。不甚毒。

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 消渴煩熱。毒痢。

參攷資料 陶弘景言公蠟蛇能化鱗者。即此也。水中又有一種泥蛇。黑色。穴居成羣。嚼人有毒。與水蛇不同。張文仲備急方。言山中一種蛇。與公蠟相似。亦不嚼人也。

(李時珍)

【水蛇皮】 主治 燒灰油調。傳小兒骨疽。膿血不止。

【水連】即黃連之古籍別名。典見植物名彙。詳『黃連』條。

【水連頭】即川黃連之體鬚無硬刺者。詳『黃連』條。

【水豚】即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱒魚』條。

【水麻】即石蒜之古籍別名。典見圖經本草。詳『石蒜』條。即大麻雄者之古籍別名。典見綱目。詳『大麻』條。

【水葵豆】即豌豆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豌豆』條。

【水晶】 命名 本品瑩澈晶光如冰之精英。故名。

古籍別名 水精。綱目拾遺。

水玉。石英。青石英。(本草綱目)

外國名詞 Rock Crystal (英)

性質 辛。寒。無毒。

主治 熨目。除熱淚。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論水晶曰。亦入點目藥。

及穿串吞咽中。推引諸硬物。

參攷資料 水精亦頗黎之屬。有黑白二色。倭國多水精。第一南水精。白。北水精。黑。信州武昌水精。濁性。堅而脆。刀刮不動。色激如泉。清明而瑩。置水中無瑕。不見珠者。佳。古語云。水化。謬言也。藥燒成者。有氣眼。謂之硝子。一名海水精。抱朴子言。交廣人作假水精。登是此。

(李時珍)

【水晶葡萄】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【水晶鹽】即光明鹽之古籍別名。典見綱目。詳『光明鹽』條。

【水棘】即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳『水英』條。

【水粟】即萍蓬草之原形。詳『萍蓬草』條。

【水粟包】即萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳『萍蓬草』條。

【水粟根】即萍蓬草之處方用名。詳『萍蓬草』條。

【水菖蒲】即白菖之古籍別名。典見別錄。詳『白菖』條。

【水菖】即石龍肉之古籍別名。典見吳普本草。詳『石龍肉』條。

【水華】即蓮花之古籍別名。典見綱目。詳『蓮花』條。

【水華朱】即銀朱之古籍別名。典見綱目。詳『銀朱』條。

【水萍】即慈姑之古籍別名。典見別錄。詳『慈姑』條。即浮萍之原形。詳『浮萍』條。

【水荷葉】即紫萹之古籍別名。典見綱目。詳『紫萹』條。

【水蛭】 古籍別名 蚊。蟻。至掌。馬蛭。(別錄) 蚘。(爾雅) 馬蟻。馬蛭。(唐本草) 馬蟻。馬蛭。(本草衍義) 水游。草蟻。(本草綱目) 紅蛭。(和漢藥考)

學名 Hirudo nipponica Whitman 或 H. medicinalis Medicinal leech


外國名詞 Hirudinea (拉丁) Leech (英) Blutegel (德) ミツヘル (日本)

基本 屬扁形環節蟲類之水蛭。

產地 陳仁山藥物生產辨云。水蛭中國各省均有出產。即金邊。蟻。是也。

形態 按水蛭棲息於各地之

沼池溪流並水田溝渠等水中。每吸附人體而吮其血液。體略似蚯蚓而粗。有扁平之環節。長一二寸。大者至三寸。色有種種。大抵背帶黃褐色。有黃色之縱線五列。腹帶黃色。全體有百餘輪。雌雄同體。體之前後兩端。有大吸盤。前吸盤之中央。生顎板三枝。板皆有鋸齒。緣口爲三叉形。以之吸附動物之皮膚。而吮取其血液。傷口宛似人字形。又其體伸縮自在。縮則狀如小球。在水中。則爲波狀而游泳。離水則用吸盤而運動。



水蛭

採取 五六月間採取水中之小者。其乾。

製法 韓保昇曰。凡使水蛭。須採得以葦竹筒盛。待乾。用米泔浸一夜。暴乾。以冬猪脂煎令焦黃。然後用之。陳藏器曰。收乾水蛭。當展其身。令長。腹中有子者。去之。性最難死。雖以火炙。亦如魚子。烟熏經年。得水猶活也。大明曰。此物極難修。

四靈水

治。須細剉。以微火炒黃色。乃熟。不熱入腹。竟生子爲害。李時珍曰。昔有人途行飲水。及食水菜。誤吞水蛭入腹。生子爲害。噉噉膿血。腸痛黃瘦者。惟以川泥或搗黃土水飲數升。則必盡下出也。蓋蛭在人腹。忽得土氣而下。或以牛羊熱血一二升。同猪脂飲之。亦下也。

性實 鹹。苦。平。有毒。
效能 破瘀結。通月經。專作破血通經藥。又作癰疽腫毒藥。
主治 逐惡血。瘀血。月閉。破血。癥積。聚無子。利水道。(本經) 墮胎。(別錄)

張仲景之發明 水蛭一味。經張仲景之實驗。認爲主治血證也。茲考徵如下。●抵當湯證曰。少腹鞭滿云云。又曰。經水不利下。●抵當丸證曰。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。(皆用水蛭或三十個。或二十個) 觀此二方。則水蛭之所主治也明矣。爲則按。診血證也。其法有三焉。一曰少腹鞭滿。而小便利者。此爲有血。而不利者。爲無血也。二曰病人不腹滿。而言腹滿也。三曰病人喜忘。屎雖鞭。

大便反易。其色必黑。此爲有血也。仲景氏診血證之法。不外於茲矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論水蛭曰。治女子月閉。欲成血勞。【唐】陳藏器本草拾遺論水蛭曰。啞赤白游毒。及癰腫毒腫。【宋】寇宗奭本草衍義論水蛭曰。治折傷墜蹠。音血有功。【明】繆希雍本草經疏論水蛭曰。水蛭生於溪間陰溼之處。其味鹹。苦。氣平。有大毒。其用與虻蟲相似。故仲景方中。往往與之並施。鹹入血走血。苦泄結。鹹苦並行。故治婦人惡血。瘀血。月閉。血癥。積聚。因而無子者。血畜膀胱。則水道不通。血散而膀胱得氣化之職。水道不求其利而自利矣。墮胎者。以其有毒。善破血也。

【清】黃宮繡本草求真論水蛭曰。水蛭卽馬黃蛭。生於陰溼之處。善食人血。味鹹與苦。氣平有毒。與虻蟲功用相似。通利水道。破血墮胎。故月閉血癥。積聚無子。並腫毒。癰折傷。皆能有效。然焮之存性。見水復能化生。嚙入臟腑。破瘀之藥。甚多。何須用此。如犯之者。止用黃泥作丸吞之。必入泥而出。以土制

水故也。凡用須預先熬黑。七日。置水中不活者。方可用。畏石灰。食鹽。

【清】徐潤溪本草經百種錄論水蛭曰。凡人身瘀血方阻。尙有生氣者。易治。阻之久。則無生氣。而難治。蓋血既凝。經與正氣全不相屬。投之輕藥。則拒而不納。藥過峻。又反能傷未敗之血。故治之極難。水蛭最喜食人之血。而性又遲緩。遲緩則生血不傷。善入則堅積易破。借其力以攻積久之滯。自有利而無害也。【清】黃元御長沙藥解論水蛭曰。水蛭善破積血。能化堅癥。金匱抵當湯用之。治血結膀胱。少腹鞭滿。大黃蟅蟲丸用之。治虛勞腹滿。內有乾血。以其破堅而化積也。【清】楊時泰本草述鈞元論水蛭曰。水蛭以蠕動。吮血之物。與蠶蟲功用相似。故仲景方往往相輔而行。自有抵當湯丸。治傷寒蓄血。而後來治音血諸證。不因於傷寒者。亦不能外此。二味祇隨證以爲加減而已。簡成方治痛風血結。亦有用水蛭者。毋亦以茲物得水精氣。而血固水所化乎。不然何獨不合蠶蟲以用也。【清】鄒澍本經

二四九

四蠶水

疏證論水蛭曰。後人以蠶蟲水蛭仲景每兼用之。遂以謂攻堅破癥。莫過二味。試問攻堅破癥者甚多。獨抵當湯。抵當丸。大黃蠶蟲丸。何以用此二味。又何以並聯用此二味。至桃核承氣湯。蠶甲煎丸。下瘀血湯。亦未嘗不欲其攻堅破癥。又何以二味俱不用。成氏所見。進乎是矣。云鹹勝血。血畜於下。勝血者必以鹹為主。故以水蛭為君。苦走血。血結不行。破血者必以苦為助。故以蠶蟲為臣。此二味聯用之故也。而未及所以用此之故。張隱菴張令韶之見。更進乎是矣。云蠶蟲水蛭。一飛一潛。皆吮血之蟲也。在上之熱。隨經而入。飛者抵之。在下之血為熱所癥。潛者當之。此二味所以並用之故也。而未及所以不用此之故。夫蠶蟲固治血積堅痞。癥瘕寒熱。似與瘡久不愈相當矣。而不用者。則以蠶甲煎丸之癥結於腸下。今抵當湯。抵當丸。大黃蠶蟲丸。少腹硬滿。曰少腹。曰腹。滿。則可見蠶蟲之所主。在腹與少腹。不在腸下也。然則腹中有瘀血。著於下。宜用蠶蟲之至矣。乃下瘀

血湯方後注云。當新血下如豚肝。是其癥尚新。則蠶蟲止治腹中臍下已凝之癥。不能治新癥矣。水蛭者。本經固言其能利水道。抵當湯丸。證水道本利。故假此使血隨水。下。桃仁承氣湯。證不言小便自利。并不言腹滿。是非特水蛭不得用。蠶蟲亦不得用矣。合而推之。蠶蟲之性。飛揚。故治血結於下。而病在上者。水蛭之性。下趨。故治血結於上。欲下達而不能者。其逐瘀破積。兩者相同。而一為搜剔之劑。一為滑利之品。惟其滑利。故能墮胎。惟其搜剔。故治喉痹結塞耳。

國外學說 日本猪子氏之實驗

云。內用之全無效。唯能使血液之凝固緩慢。然或有妨礙。此作用頗奇。欲實驗之。可取水蛭十條。貯無水亞爾爾保爾(酒精)中數日。而自液內取出。切為小片。蒸發亞爾爾保爾後。以水浸出之。取浸出液。得九立方仙迷。以之注入一兔之外頸靜脈。頸後自後頸動脈取血液。測定其血液之凝固。需在何時間。如斯因水蛭妨血液之凝固。故為水蛭所傷之創口。止血不易。

因能使血液之凝固。比尋常緩慢五六倍也。又和漢藥考曰。蛭有數種。一為馬蛭。棲息於各地之池溝中。軀體肥大。長四五寸。運動緩慢。多出於梅雨之候。二為山蛭。常棲息於深山幽谷之濕地。體長圓如筒。色褐。有動物來。即被吸附。人若為所吸咬。脫離則出血不止。以傷口頗大也。往往有紅腫潰爛之虞。此種不適醫用。醫用水蛭。以鋸齒微細者為貴。粗大者傷口必甚。難收功而易化膿。歐洲所產者。謂之醫用水蛭。大於水蛭。合於吸收血液之用。日本產之蛭。雖劣於歐產。然其吸吮力頗佳。惟須多備為不便耳。又曰。生活之水蛭。醫家用之。遇血液凝滯及膨脹等症。則令其吸附咬。飽滿自然脫落。如遇折傷疼痛等。則為服藥而用之。又曰。以尋常玻璃蓋。盛清水四分之三。入水蛭數條。其中上以麻布覆口。蓋之。凡案之間。當天晴日麗之際。水蛭靜處蓋底。蟻屈不動。如天將雨。水蛭必上浮水面。非天放晴。必不居下。如將有風。水蛭益忙。但見其游行不已。倘暴風雨將起。在

二五〇

數刻前。水蛭已現不安之狀。發凝髮狀之動作。雪將來時。亦如雨兆。此理之不可曉者也。又水蛭之吸血者。須自尾向頭壓榨。以後時時養入精水中。則可貯藏久長。且每一星期內。可取用一次。至二次。見萬寶新書。又第四版改正日本藥局方曰。水蛭。普通重〇・二五至〇・三五。多黃綠色。上深下淡。背有黃色之縱線五條。環節凡五。但皆狹隘或間斷。惟在中央者。大抵粗而顯明。又兩側之邊緣。尋常亦有黃線。英美學說謂蛭即水蛭。各國均產。惟身體緊小。而有金黃點者為佳。英國所用之蛭。係產於西班牙國。法國。意大利。匈牙利。印度等處。蛭之用處。古人已早知之。印度人先用以吮血。阿刺伯人則從印度而得其法。昔法國兵丁在埃及征戰時。有蛭常食其血。因此受害甚大。名曰埃及蛭。蛭之常用者有二類。為同類而不同種。有一種名曰花點蛭。又名藥品蛭。又有一種名曰綠色蛭。藥品蛭為英國所常用者。此蛭產於歐羅巴各處。又有英國真蛭。棕色蛭等名。綠

色蟻產於歐羅巴之南及法國與日耳曼國。其有產於匈牙利國者則名匈牙利蟻。印度之蟻在孟加拉地方水池內遇見者甚多。又在印度西北並雪山之麓亦有之。蟻之合用者有六種。蟻之有毒者亦有六種。又謂蟻性喜吮人血。凡患之疾症皆因多血停聚。可用蟻在人身上任一處吮血。猶中國之用針砭也。用蟻吮血之法。凡人身內外。不論何處。熱痛紅腫。按定部位。先將皮膚洗淨。有毛髮處須剃去。洗淨。取蟻數條。多或一二十條。用蟻多少酌量病勢之輕重。小兒止須一二條或三四條。用軟布將蟻身擦淨。放玻璃杯內。如無玻璃杯。用磁酒杯亦可。以杯覆蓋腫處。任其噬吮。或不用杯而以布包蟻身。露其口。恣噬近患處。蟻吮飽則自然放落。不可猛力拔出。以防傷肉。倘久吮不落。用鹽或醋少許。擦之。蟻自縮落。炎輕者用蟻吮一二次。炎重者或用蟻吮多次。不妨。吮後用熱水助令血出。或用潤物如罌粟殼野菊花水等洗之。若欲止血。用艾絨着吮處。以手指

四畫 水

按壓即止。或擦止血藥如枯白礬末。沒石子末等。有時孔竅內生炎。如喉嚨子宮等處。可將蟻放入細竹筒內。令噬吮。已吮血之蟻。欲留養再用。防其血多脹死。當用鹽少許着蟻口。血即吐出。更用兩指偏去其血。置清水內能游泳者。可收養再用。鹽太濃則壞蟻口。不如用醋尤佳。有數種病宜用蟻者。如腹胞膜生炎。腎囊生炎。痔瘡。直腸下墜等是。又如身內之血過多。亦可用之。然用之而必斟酌其情形。否則有弊。每蟻約吮血一錢半。如先用熱水數吮血之處。則能吮血半兩。

配合應用 ①治漏血不止。水蛭炒為末。酒服一錢。日二服。惡血消即愈。(千金方)

②治產後血暈。血結聚於胸中。或偏於小腹。或連於脇肋。用水蛭炒。殺蟲去翅足炒。沒藥。麝香各一錢。為末。以四物湯調下。血下痛止。仍服四物湯。(保命集方)

③治折傷疼痛。水蛭新瓦焙為細末。酒服二錢。食頃作痛。可更一服。痛止。便將折骨藥封。以物夾定。

調理(經驗方)

①治跌撲損傷。瘀血凝滯。心腹脹痛。大小便不通。欲死。用紅蛭石。灰炒黃半兩。大黃。牽牛頭末各二兩。為末。每服二錢。熱酒調下。當下惡血。以盡為度。名奪命散。(濟生方)

②治墜跌打擊。水蛭。麝香各一兩。剉碎。燒令烟出。為末。酒服一錢。當下畜血。未止再服。其效如神。(古今錄驗方)

③治杖瘡腫痛。燒蛭炒研。同朴硝等分研末。水調傅之。(周密志雅堂方)

④治赤白丹腫。以水蛭十餘枚。令啞病處。取皮。燻肉自為效。冬月無蛭。地中掘取。暖水養之。令動。先淨人皮膚。以竹筒盛蛭合之。須臾咬啞。血滿自脫。更用飢者。亦治癰腫初起。

⑤級染白鬚。用水蛭為極細末。以龜尿調擦鬚梢。自行入根也。一用白烏骨雞一隻。殺血入瓶中。納活水蛭數十於內。待化成水。以豬膽皮包指。蘸擦鬚梢。自黑入根也。(普濟方)用大水蛭七枚為末。

一兩。以銀三兩作小盒盛之。用蛭蚓泥固濟半指厚。深埋馬糞中。四十九日取出。化為黑油。以魚膠指。每藥少許。擦鬚上。其油自然倒行至根。變為黑色也。又黑鬚倒捲。擦方。用大馬蟻二三十條。竹筒裝之。夜置露處受氣。餓過七日。以雞冠血磨京墨與食。過四五次。復陰乾。將豬脛骨打斷。放蟻入內。仍合定。鐵線纏住。鹽泥塗之。乾時。放地上。火煨五寸香二次。退開三寸火。又五寸香三次。再退遠火。又五寸香取出。為末。將豬膽皮包指承末。擦鬚梢。即倒上也。(談禁齋方)

用蠶 五分至八分。

施用宜忌 凡非瘀滯之實者。禁用。畏石灰。食鹽。

參攷資料 ①水蛭生雷澤池。澤。五月六月採暴乾。(別錄) ②處。處河池有之。蚊有數種。以水中馬。蟻得暇人腹中有血者。乾之為佳。山蚊及諸小者。皆不堪用。(陶弘景) ③有水蛭草。大者長尺許。並能啞牛馬人血。今俗多取水中小者用之。大效。不必食人血。滿腹者。其草蛭在深山草中。人行即着。

四蠱水

腥股。不覺入於肉中。產育爲害。山人自有療法。蘇恭云。惟採水中小者用之。別有石蛙。生石上。泥蛙生泥中。二蛙頭尖。膜粗。色赤。誤食之。令人眼中如生烟。漸致枯損。韓保昇云。汴人謂大者爲馬鼈。腹黃者爲馬蟻。寇宗奭云。李石續博物志云。南方水疔。似鼻。沸聞人氣。閃閃而動。就人體成瘡。惟以辟香珠砂塗之。卽愈。卽草蛙也。李時珍云。方音訛。蛙爲病。故俗有水疔草疔之稱。李時珍云。按買誼新書云。楚惠王食寒菹。得蛙。恐監食當死。遂吞之。腹有疾而不能食。令尹曰。天道無親。惟德是輔。王有仁德。病不爲傷。王病果愈。此楚王吞蛙之事也。王充論衡亦云。蛙乃食血之蟲。楚王殆有積血之病。故食蛙而病愈也。李時珍云。水蛙。蟻皆破逐。瘀血。血。發病之惡藥。而水蛙入腹。燬之。若尚存性。尙能變爲水蛙。噴人腸臟。非細故也。破瘀消血之藥。儘多。正足選用。奚必用此難制之物。戒之可也。如犯之。以黃泥作丸吞之。必入泥而出。釋希雅云。蟻一名馬蟻。一

名水蛙。以黃色金邊爲上。不大不小者。合用。其性喜吮人血。凡人身內外。不論何處。熱痛紅腫。取蟻數條。放於玻璃杯內。以杯覆蓋腫處。任其噬吮。吮飽自然放落。不可猛力拔出。以防傷肉。蜚蟲卽蠹蟲。啾牛馬血者。大如蜜蜂。腹四。微黃綠。色。伺其腹滿。掩取乾之。內科新說。

【水須】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳知母條。
【水黃芹】卽羊蹄之俗名。詳羊蹄條。

【水黃連】 基本 本品爲川產黃連之一種。
形態 生於澤旁。週身有黃毛。狀如狗脊毛。而細。產打箭爐者。形細長。少硬質。實重於他連。以皮肉帶青色者爲佳。
主治 鼻痔潰爛。

【水廉】 卽蘋之古籍別名。典見吳普本草。詳蘋條。
【水楊】 命名 本品宜生水涯。而枝硬揚起。故名。
古籍別名 蒲柳。爾雅。蒲楊。蒲柳。移柳。古今注。青楊。蓀。符。

（本草綱目）水柳。蒲根白。筐柳。白楊。和漢藥考）
外國名詞 Salix gracilistylis, Miq. (S. Thunbergiana, Bl.) (拉丁)
基本 屬楊柳科。藥用水楊之枝葉。
產地 多生河岸水隈間。
形態 水楊爲落葉亞喬木。多生於原野水邊。或植於河岸。利用其根之蔓延。以防護土質之崩壞。高低不一。小者祇有二三尺。大者則達一丈五尺。周圍至一尺五寸。樹皮色紅褐。枝皮平滑。色綠。或帶紫。葉皆互生。爲倒披針形。或如絲。或似寬長二三寸許。末端尖銳。至基底部。從而狹長。面平滑。色深綠。背有茸毛。乾則變暗色。邊緣爲小波狀。或有細鋸齒。具短葉柄。春日。先葉而花。花雌雄異株。密生圓柱形無梗之花穗。其鱗片帶紫色。基底部具有狀如小葉之苞數片。
種植 水隈恒多栽植。以固岸隄者。
性質 苦。平。無毒。
效能 行氣血。起痘漿。用作收斂解熱藥。
主治 久痢赤白。搗汁一升。服日二大效。
歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論水楊曰。主癰腫疔毒。水楊葉嫩枝生於涯溪之旁。得水士之陰氣偏多。故味苦氣平無毒。久痢赤白。腸胃溼熱也。得苦涼之氣。則溼熱散。劑自止。今人又用以治癰腫疔毒多效。魏直博愛心經云。痘瘡數日。陷頂。漿滯不行。或風寒所阻者。宜用水楊枝葉。無葉用枝五斤。流水一大釜。煎湯溫浴之。如冷添湯。良久。照見髮起。有茸絲者。漿行也。如不滿。再浴之力。弱者。只洗頭面手足。如膿浴不起者。氣血敗矣。不可再浴。始出及痒塌者。皆不可浴。痘不行。漿乃氣滯。血滯。腠理閉密。或風寒外阻。而然。浴令暖氣透達。和暢鬱蒸。氣血通。每隨暖氣而發。行漿貫滿。功非淺也。若內服助氣血藥。藉此升之。其效更速。直見一痘在村中。用此有驗。卽得其方。行之百發百中。慎勿易之。誠有笑理之妙也。

國外學說 日本和漢藥考曰

歐洲自昔以水楊之楡皮。代規那皮用之。水楊楡皮。乾則卷縮如管。纖維質多。不易研末。氣稍芳香。味苦。有收斂性。水與酒精。俱能浸出。其有效成分。其成分為水楊酸及鞣酸等。凡病後衰弱。腺病之虛症。及虛性出血等症。用之俱效。但其最驗者。則在解熱。

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 附雅。楊。蒲柳也。

其枝勁韌。可為箭筒。左傳所謂董澤之蒲。又謂之蘗。今河北沙地。多生之楊柳之類亦多。崔豹古今注云。白楊葉圓。青楊葉長。柳葉長而細。移楊葉圓而弱。水楊即蒲柳。亦曰蒲楊。葉似青楊。莖可作矢。赤楊霜降則葉赤。材理亦赤。然今人鮮能分別。(蘇頌)按陸機詩疏云。蒲柳有二種。一種皮正青。一種皮正白。可為矢。北土尤多。花與柳同。(李時珍)

【水楊木白皮及根】

性質 苦平無毒。

主治 金瘡痛楚。乳癰諸腫。痘

瘡。

參攷資料 按仲南永類鈴方云。有人治乳癰。持藥一根。生插貼。其熱如火。再貼遂平。求其方。乃水楊柳根也。葛洪肘後方。治乳癰。用柳根。則楊與柳性氣不遠。可通用也。(李時珍)

【水楊柳】

古籍別名 水滾子。(本草綱目)

產地 多生溪澗水旁。

形態 水楊柳為草本植物之一種。葉如柳葉。其莖春月色青。夏末秋初。色轉赤。而其枝條直上。不分枝。極至秋略含赤花。其枝葉及根。俱可供藥用。性質 微寒。無毒。採取 春夏採枝葉。秋冬採根。

主治 涼血解毒。痘瘡焦黑。浴之立起。並療跌打損傷。病瘡。疫疫。暑鬱惡毒。

配合應用 治手足拘攣。用草木水楊柳酒煎服。甚驗。(費建中救偏瓊言方)

治痔漏。用水楊柳根。煎湯洗之。俟蟲出愈。(傳信方)

治膀胱落下。又名茄病。其色紫者。可治。白者。不治。用黃連一錢。

狗脊。水楊柳根。五倍子。魚腥草。四味。不拘多少。加枯礬錢許。共為末。煎湯。先煎後洗。乘熱時。輕輕托進。睡臥一二日。即愈。後再服調理藥。(劉羽儀驗方)

參攷資料 治痘紅紫。乾燥不起。漿有水楊柳湯云。古方所載。是木細葉紅。梗枝上有圓果。果有白鬚散出。此等俗呼水楊梅。以其果似楊梅也。余未試用。余常用者。乃是草生水邊。葉如柳葉。其梗至秋則紅赤。無果結。此草冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡痘紅紫。乾枯不起水者。內服活血解毒之劑。外用此煎水。拭頭面。連拭數次。立見光潤。即具行漿之勢。所未洗者。其色不變。(張琰)

【水楊梅】

命名 本品生水邊。子實狀似楊梅。故名。

古籍別名 地椒。(本草綱目) 外國名詞 Geum japonicum, Thumb. (拉丁) 基本 屬薔薇科。藥用水楊梅之根。

形態 水楊梅為多年生草本。自生於山野之陰處。初夏抽莖。高二三尺。葉為不齊之羽狀複葉。梢頭開五瓣黃花。具五裂之六萼。果實為瘦果。其尖端如鉤。地下莖斜走。或直行。形如圓柱。叢生肥大之鬚根。

性質 辛。溫。無毒。



水楊梅

成分 含揮發油。鞣酸。樹脂等。

效能 用為強壯利尿及解熱藥。

主治 疔瘡腫毒。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。水楊梅。入藥用根。辛溫。芳香。收瀉。氣味如丁香。其收瀉之質。含有一種油。及苦味之鹽。能使神經心胃溫壯。強健。略有發汗利尿之效。乃壯神之一種良藥也。又能鎮靜痙攣之運動。故用於因諸管纖維。弛緩虛弱而起之症。殊能奏效。且驅風氣。治疝痛。用於腐敗熱或間歇熱。亦

屬妙藥。多有效驗。要之適用規那

之病。此藥無不宜之。他如起敬有

時之諸症。用之極驗。又治經久之

下利及赤痢之虛症。止婦人崩漏

白帶下。嘔血等。失血過多者。不妨

試服之。又以治療癩毒諸症。及大

潰爛之膿瘍。累效。其服法。用細末

半錢至一錢。或加丸藥。煉藥用之。

或以此根一兩。浸燒酒八兩。候藥

氣出。飲服一匙。日三四次。或以此

根一兩。加沸湯八兩。作為泡劑服

之。或以此根一兩半。入水十六兩

煎至減半。去滓。每半時服一匙。此

藥多加揮發強壯劑用之。故奏效

殊捷。

用量 八分至一錢半。

參攷資料 生水邊。條葉甚多。

生子如楊梅狀。庚辛玉册云。地椒

一名水楊梅。多生近道陰濕處。荒

田野中亦有之。叢生。苗葉似菊。莖

端開黃花。實類椒而不赤。實可結

伏三黃白。制丹砂粉霜。(李時

珍)

【水楊梅葉】

主治 牙痛。搗汁點眼角。閉目少頃即止。

【水楊藤】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【水煙】基本 煙草之一種。產地 甘肅蘭州府境五泉山者佳。

形態 葉與枇杷葉相似。與烟葉迥別。

主治 辟瘴。發疫。降氣。寬中。解蛇虺毒。

【水烟】即水蛭之古籍別名。典見綱目。詳『水蛭』條。

【水窟雄黃】基本 雄黃之產於山岩中有水流處者。

形態 大者如胡桃。小者如粟。豆上有孔。紋色深紅而紫。體極輕虛。

主治 與雄黃同。

【水葱】即荻葱之生於水澤者。詳『荻葱』條。

【水稗】即稗之生於淺水中者。詳『稗』條。

【水葵】即蓴之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『蓴』條。即荇菜之古籍別名。典見馬融傳。詳『荇菜』條。


【水蛭蝨】即蝨牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝨牛』條。

【水黽】古籍別名 水馬。(本草拾遺)

外國名詞 Hydrostichus remigator, Hor. (拉丁) ノメシボウ或カハグモ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。有吻類。水黽科之水黽。

形態 水黽為濕生蟲類之動物。體色黑褐。狹細而扁。腹大背硬。下有毛如絹絲。觸角前突。口亦突出。前翅為革質。有六脚。後四脚頗長。羣聚水面。捕食小蟲。取得可供藥用。



水 黽

性質 有毒。

主治 令人不渴。殺鷄犬。

參攷資料 水黽羣游水上。水涸即飛。長寸許。四脚非海馬之水馬也。(陳藏器)

【水團花】形態 水團花為繡眼梅。樹皮如大葉楊。五六月開白花。圓如楊梅。其皮及花葉俱可供藥用。

主治 療金刃傷。並年久爛脚瘡。以及葉或連花搗礬之。

【水槐】即苦參之古籍別名。典見本經。詳『苦參』條。

【水浸子】即水楊柳之古籍別名。詳『水楊柳』條。

【水精】即水晶之古籍別名。典見本草拾遺。詳『水晶』條。

【水辣菜】即牡蒿之古籍別名。典見救荒本草。詳『牡蒿』條。

【水銀】命名 本品質狀如水。色白如銀。故名。

處方用名 水銀。

古籍別名 承。瀆。(別錄) 鐵液。(本草綱目) 始女。(本草藥性) 生瀆。貝承。錯精。(和漢藥考) 神膠。元水子明。流珠。元珠。太陰流珠。白虎腦。長生子。元明龍。濟陽。明子。河上始女。天生。元女。青龍。神水。太陽。赤承。沙承。(石藥爾雅)

外國名詞 Hydrargyrum.

參攷資料 水黽羣游水上。水涸即飛。長寸許。四脚非海馬之水馬也。(陳藏器)

(拉丁) Quicksilver, Mercury.
(英) Quicksilver, Mercur (德)

基本 係金屬原素之一。由汞
礦提煉而成銀色光澤之液。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
水銀產中國、西班牙、美國等處。有
水銀礦。自然出者有用丹砂煉而
成者。中國以湖南、貴州、硃砂礦產
出者多。如硃砂米一百觔。可昇水
銀六十觔。

形態 水銀在尋常溫度有流
動性之金屬。僅水銀一種而已。色
自如銀。有光輝。比重一三·五。至
零下四十度。則結硬如錫。為等軸
八面之結晶體。在常溫微蒸發。熱
則盡蒸升。在冷處則凝結而附著。
至三百六十度而沸騰。稀酸類不
溶解。然強硝酸能溶解之。以水銀
與脂肪十分研磨。則成細末。變灰
白色。

種類 ①水銀粉。即輕粉。亦名
膩粒。係以汞升鍊而成粉者。②粉
霜。即水銀霜。亦名白髮砂。係用汞
轉以升鍊而成霜者。③銀丹。朱砂
係用水銀和石亭脂升鍊而成。貼
燒者為銀朱。貼口者為丹砂。④凝

砂又名氣砂。係用水銀和硫黃而
製者。

製法 雷斅曰。凡使水銀。勿用
草汞。并舊朱漆中者。經別藥制過
者。在戶中過者。半生半死者。其朱
砂中水銀色微紅。收得後用葫蘆
貯之。免遺失。若先以紫背天葵并
夜交藤自然汁二味。同煮一伏時。
其毒自退。若修十兩。二汁合七銖。

性質 辛寒。有毒。

效能 殺蟲。治瘡。治梅毒。有直
接殺滅微菌之功。并能令滲出物
吸收。以退局部炎症之效。故用作
殺蟲藥及驅微藥。用於諸種之皮
膚病。

主治 疹癩。疥癬。白禿。殺皮膚
中蟲。墮胎。除熱。殺金銀銅錫毒。鎔
化還復為丹。久服神仙不死。(本
經) 以傳男子陰。陰消無氣。(別
錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
本草拾遺論水銀曰。利水道。去熱
毒。【宋】大明諸家本草論水銀曰。
主天行熱疾。除風。安神。鎮心。治惡
瘡。癩疥。殺蟲。催生下死胎。【宋】寇
宗奭本草衍義論水銀曰。治小兒

驚熱。涎潮。【明】李時珍本草綱目
論水銀曰。鎮墜。拔逆。嘔吐反胃。【

明】繆希雍本草經疏論水銀曰。
水銀從石中迸出。為石汞。從丹砂
中出者為硃。汞。即丹砂中液也。
稟至陰之氣。而有汞。故其味辛。其
氣寒。而有毒。善能殺蟲。其性下走
無停歇。故本經以之主疥癩。癩瘡。
白禿。殺皮膚中蟲。及墮胎除熱也。
至陰之精。能消陽氣。故不利男子
陰也。神仙不死之說。必得鉛華相
合。乃能收攝真氣。凝結為丹。即道
家所謂太陽流珠。常欲去人。卒得
金華。轉而相因之旨也。伏鍊五金
為泥。以其性能殺金銀銅錫毒也。
鎔化還復為丹。亦出仙家烹鍊耳。

【明】李士材本草圖解論水銀曰。
水銀辛寒有毒。鎮墜痰氣。上逆。嘔
吐反胃。殺蟲墮胎。下死胎。性滑重
直入肉。頭瘡切不可用。恐入經絡。

【清】黃宮繡本草求真論水銀曰。
水銀從石中迸出者為石汞。從丹
砂中出者為硃。汞。究皆丹砂液
也。性稟至陰。辛寒有毒。質重着而
流利。得鹽礬為輕粉。加硫黃為銀
硃。煬成礬同硫黃。打火昇煉。則為

銀砂。同皂礬則為升降靈丹。藥之
飛騰。變。無有過是。故以之殺諸
蟲疥瘡也。然至陰之性。近於男子
陰器。則必消痿無氣。入耳能蝕人
腦。至盡。入肉令百節攣縮。外敷尚
防其毒之害。內服為害。不待言而
可知矣。得棗肉入睡。同研則散。得
鉛則凝。得硫黃則結。得紫河車則
伏。得川椒則收。【清】徐洵溪本草
經百種錄論水銀曰。水銀。五金之
精也。得五金之精氣。而未成質。煉
之。亦能為金銀等物。其所治皆皮
膚熱毒之疾。蓋肺屬金。而主皮毛。
亦以氣相感也。丹家爛鼎之術。以
水銀與針。為龍虎合煉成丹。服之
則能長生。久食飛昇羽化。自參同
契。以後其說紛紛。高明之士。為所
誤者。不一而足。夫水銀乃五金之
精。而未成全體者也。凡金無不畏
火。惟水銀則百鍊如故。以其未成
金質。中含水精。故火不得而傷之。
其能點化為黃白者。亦因藥物所
煉。變其外貌。非真能作金銀也。今
乃以其質之不朽。欲借其氣以固
形體。真屬支離。蓋人與萬物本為
異體。借物之氣。以攻六邪。理之所

四畫 水

四盞水

有借物之質。以永性命。理之所無。術士好作聰明。談天談易。似屬可聽。實則伏義畫卦。列聖繫辭。何嘗有長生二字。此乃假託大言。以愚小智。其人已死。詭云尚在。試其術者。破家喪身。未死則不悟。既死則又不知。歷世以來。昧者接踵。總由畏死貪生之念。迫於中。而反以自速其死耳。悲夫。清黃元御玉楸藥解論水銀曰。水銀大寒至毒。治疥癬痔瘡。楊梅瘡。滅白癩粉。但可塗搽。不可服。服之。後陽精產。筋絡骨痛。古人服方士燒煉水銀。以爲不死神丹。殞命天年。不可勝數。帝王將士。多被其毒。古來服食求神仙。多爲藥所誤。其由來遠矣。勿入瘡口。

國外學說 英美學說謂。水銀亦名活銀。入金類。亦屬流質。產中國。西班牙。南亞。美利加等處。有成於自然者。更有丹砂造成者。汞之狀如珠。色如銀。能返光。無臭。亦無味。汞所舍之異質。有鉛。錫。鉍等。淨汞則爲亮白之金。其體甚重。冷至零度下三十九度。則成軟韌之定質。受大熱則滲而化氣。以熱乾皮

包扭去渣。方可用爲藥品。或用研強水潔淨之。此藥在各國古已用之。羅馬人與阿刺伯人。用爲外科藥。至印度人。初則用爲內科藥。天然者爲汞硫。卽丹砂。間有與銀相合者。汞能治各種炎症。又能治各種疔毒病。因汞能專治此病。第服汞必先與鴉片相合。庶免從大便洩出之弊。且純服汞。或不效。然必研之極細。分析星珠。纔能發其功力。如因疔毒而眼。旋生炎。此藥亦最關緊要。又如骨衣生炎等病。神汞劑雖不能及。銀礦(沃刺)之功用。而汞入血中。則有感動血之性情。故謂之改血藥。改血藥中。惟汞首屈一指。緣汞入血中。歷若干時後。則行過周身之淋巴腺。而出。能感動所有之津液。如用爲海藥。則必先因感動肝臟。而得泄瀉。此爲常用之法。而汞劑可獨用之。又可合於他種海劑服之。如其人體胖血多。或有不消化之病。或痛風病。服之可以令消。其功效甚大。至小兒服之。亦最爲平穩。第不宜多服。多服則或流涎。或口損。不免滋生後患。且大小腸。或有爛處。其汞勢

必墜下。乘爛處而泄出。試觀製汞工匠。每被汞氣入血。而病端迭起。是知以汞入藥。必得其法。方能有濟。然用汞所得之益處。卽如肺胞。膜。肝。腦。生炎。各種炎症。其效固大。至痛風。風濕。病服之。亦能得其大益。如連服汞劑。至肌肉紅腫。或略痛。則不可再服。服汞之益處甚多。而亦有不得其益者。如昔有英國婦人。欲增其姿色。美艷。恒以汞內服。卒罔效。又有老人。每日服汞若干。連服九月。亦罔效。因其專服汞。固無效驗。惟和別藥。以作丸散。則有效。所以汞和入火石粉。則可作藥散。和入油類。則可作藥膏。卽與硫磺及伊打火酒等物。亦能相和。其功用。又能動膽汁。治肝腎積血。熱病類。楊梅毒類。外用能行血。作貼膏。油膏等用。外用與內服同效。第宜較多用。處方。以汞三兩。洋椒油九分。八釐。硫磺粉一分。四釐。密陀僧。貼膏六兩。先將洋椒油。入鍋熬熱。漸加硫磺粉。調極勻。入白加汞。細研。至不見星珠。再將密陀僧。貼膏。化開。加入。共調洽爲度。治魚口。瘡。骨節。及吸核。久炎。變大。又方

二五六

汞十六分。煉猪油十六分。煉羊油一分。共入臼。研至不見星珠爲度。又方。汞油膏六分。黃蠟三分。洋椒油三分。樟腦一分。半研末。先將黃蠟與洋椒油化勻。再加汞油膏。調勻。微涼時。加樟腦細調勻爲度。治瘰癧。頑瘡。癬瘡類。日本和漢藥考曰。天產之自然水銀。(自然水銀。日本產極微。多散存於硫化汞礦中。狀如細粒。或存於粘土中。)世不多見。故專以汞朱。或硫化汞。鑛之辰砂。與石灰相和。熱於錫鐵管中。使所得之水銀。蒸氣。凝縮。而製之前人。不知藏於鐵罐。或玻璃瓶中。故貯入葫蘆。或糊厚紙。數重貯之。云使不走洩。若散失在地。但以川椒末。或茶末。收之。或以真金及鉛石引之。卽上。

配合應用 治初生不乳。咽中有噤物。如麻豆許。用水銀米粒大與之下咽。卽愈。(聖惠方) 治小兒癩疾。能壓一切熱。水銀小豆許。安瓿中。沉湯內。煮一食頃。與服。卽兒頭。恐入腦也。(聖濟方) 治急爲墜。水銀中兩。生南

星一兩。麝香半分。爲末。入石脂油。同搗和丸。綠豆大。每服一丸。薄荷湯下。

①治失心風疾。水銀一兩。藕節八個。研成砂子。丸如芥子大。每服二丸。磨刀水下一二服。(經驗方)

②治反胃吐食。水不能停。用黑銻。水銀各一錢半。結砂。舶硫。黃五錢。官桂一錢。爲末。每服六錢。一半米湯。一半自然薑汁。調作一處服。(聖濟總錄方)

(聖濟總錄方)

③治消渴煩熱。水銀一兩。銻一兩。結砂。皂莢一挺。酥炙。麝香一錢。爲末。每服半錢。白湯下。(聖濟總錄方)

④治臍熱。煩。血上妄行。水銀。朱砂。麝香等分。爲末。每服半錢。新汲水下。(宣明方)

⑤治妊婦胎動。母欲死。子尚在。以此下之水銀。朱砂各半兩。研膏。以牛膝半兩。水五大盞。煎汁入蜜。調服半匙。(聖惠方)

⑥治婦人斷產。水銀以麻油煎。一日空心服。大丸一丸。永斷不損人。(婦人良方)

⑦治頭上生瘰。水銀和蠟燭油

指之一夜皆死。(摘玄方)

⑧治腋下胡臭。水銀。胡粉等分。以面脂和。頰搽之。(千金方)

⑨治少年面皯。水銀。胡粉等分。研。臘豬脂和。夜塗且拭。勿見水。三度。度。度。(肘後方)

⑩治老小口瘡。水銀一分。黃連六分。水二升。煮五合。含之。日十次。(普濟方)

⑪治白癩風痒。水銀數拭之。卽消。(千金方)

⑫治蟲癬癢痒。水銀。胡粉等分。研。傅。又水銀。蕪荑和。酥傅之。(外臺秘要方)

⑬治痔蟲作痒。水銀。棗膏各二兩。同研。綿裹納下部。隔一日蟲出。(梅師方)

⑭治惡肉毒瘡。一女年十四。胸軟處。生物如黃豆大。半在肉中。紅紫色。痛甚。諸藥不效。一方士以水銀四兩。白紙二張。揉熟。蘸銀擦之。三日自落而愈。(李樓怪證方)

⑮治一切惡瘡。水銀。黃連。胡粉。熬黃。各一兩。研勻。傅之。乾則以唾調。(肘後方)

⑯治楊梅瘡。水銀。黑銻各一

錢。結砂。黃丹一錢。乳香。沒藥各五分。爲末。以紙卷作小燭。染油點燈。日照瘡三次。七日見效。方廣附餘。

用水銀。黑銻。結砂。銀朱各二錢。白花蛇一錢。爲末。作紙燃七條。頭日用三條。自後日用一條。香油點燈。於爐中。放被內薰之。勿透風。頭上有瘡。連頭蓋之一方。水銀一錢。二分。黑銻。白錫各八分。共結砂。黃丹四分。朱砂六分。爲末。分作十二紙。燃。以香油浸燈盞內。點於小桶中。以被圍病人坐之。以鼻細細吸烟。三日後。口出惡物爲效。

⑰治痘後生腎。水銀一錢。鏡丹五錢。研作六丸。坩堝糊定。火煨一日。取出。薄綿裹之。左腎塞右耳。右腎塞左耳。自然墜下。(危氏方)

用量 三分至一錢。

施用宜忌 凡非外症之屬。實者。禁用。畏慈石。砒霜。

參攷資料 ①丹砂燒之。成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金永在九竅。則死人爲之不朽。况服食乎。(抱朴子)

②水銀入耳。能食人腦。至盡。入內。令百節變縮。倒陰。絕陽人

息瘡疥。多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡。切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。(陳藏器)

③水銀入藥。雖各有法。極須審謹。有毒故也。婦人多服。絕娠。今有水銀。燒成丹砂。醫人不曉。誤用。不可不謹。唐韓愈云。太學士李于。過方士柳泌。能燒水銀。爲不死藥。以銻滿一鼎。按中爲空。實以水銀。蓋封四際。燒爲丹砂。服之。下血四年。病益急。乃死。余不知服食。說自何世起。殺人不可計。而世慕尙之。益至此。其惑也。在文書所記耳。聞者不設。今直取目見。親與之游。而以藥敗者。六七公。以爲世賊。工部尙書歸登。自脫服水銀。得病。有若燒鐵杖。自願其下。推而爲火。射竅節以出。狂痛呼號。泣絕。其相席得水銀。發且止。唾血十數年。以斃。殿中御史李虛中。疽發其背。死。刑部尙書李邕。謂余曰。我爲藥。誤送死。刑部侍郎李建。一旦無病。死。工部尙書孟簡。邀我於萬州。屏人曰。我得祕藥。不可獨不死。今遺子一器。可用。取肉爲丸。服之。別一年而病。後有人至。視之曰。前所服藥

一器。可用。取肉爲丸。服之。別一年而病。後有人至。視之曰。前所服藥

四畫 水

四畫 水

誤方且下之。下則平矣。病二歲卒。東川節度御史大夫盧坦。溺血。肉痛不可忍。乞死。金吾將軍李道古。以柳泌得罪。食泌藥。五十死海上。此皆可為戒者也。薛不死。乃速得死。謂之智。不可也。五穀三牲。鹽醢果蔬。人所常御。人相厚勉。必曰強食。今惑者皆曰。五穀令人夭。三牲皆殺人。當務減節。一筵一饌。禁忌十之二三。不信常道。而務鬼怪。臨死乃悔。後之好者。又曰。彼死者皆不得其道也。我則不然。始動曰。藥動故病。病去藥行。乃不死矣。及且死又悔。嗚呼可哀也已。(寇宗奭) 水銀得銀則凝。得硫則結。併煮肉研則散。別法煨為膩粉。粉霜。唾研之死。風銅得之則明。灌戶中則後腐。以金銀銅鐵置其上。則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。蓋藉水銀之氣也。(寇宗奭) 今出秦州。商州。道州。邵武軍。而秦州乃來自西羌界。經云出於丹砂者。乃是山石中探粗次朱砂。作爐。置砂於中。下承以水上。覆以盆。器外加火煨養。則烟飛於上。水銀滯於下。其色小白。濁

陶氏言別出沙地者青白色。今不聞有此。西羌人亦云如此。燒取。但其山中所生極多。至於一山自拆。裂人采得砂石。皆大塊如升斗。碎之乃可燒煨。故西來水銀極多。於南方者。又取草乘法。用細葉馬齒。葛乾之。十斤得水銀八兩或十兩。先以槐木髓之。向日東作架。曬之。三二日即乾。如經年久。燒存性。盛入瓦甕內。封口。埋土坑中。四十九日。取出自成矣。(蘇頌) 荷葉。松葉。松脂。藪精。草。萱草。金星草。瓦松。夏枯草。忍冬。莖。若子。厲來。紅馬蹄。香。獨脚蓮。水慈姑。皆能制汞。(土宿真君) 水銀乃至陰之精。稟沈著之性。得凡火煨煉。則飛騰。變得人氣。熏蒸。則入骨鑽筋。絕陽蝕腦。陰毒之物。無似之者。而大明言其無毒。本經言其久服神仙。甄權言其還丹元母。抱朴子以為長生之藥。六朝以下。貪生者服食。致成廢篤。而喪厥軀。不知若于人矣。方士固不足道。本草其可妄言哉。水銀但不可服食爾。而其治病之功。不可掩也。同黑鉛。結砂。則鎮墜痰涎。同硫黃。結砂。拯救危病。此乃

應變之兵。在用者能得肯綮。而執其槓機焉。(李時珍) 汞出於砂。為真汞。雷欒言有草汞。陶弘景言有沙地汞。淮南子言弱土之氣。生白礬石。礬石生白頭。蘇頌言陶甕者不聞有之。按陳寔。墨談云。拂菻國。當日沒之處。地有水銀。海周圍四五十里。國人取之。近海十里許。掘坑井數十。乃使健夫駿馬。皆貼金箔。行近海邊。日照金光晃耀。則水銀滾沸。如潮而來。其勢若粘裹。其人即回馬疾馳。水銀隨趕。若行緩。則人馬俱撲滅也。人馬行速。則水銀勢遠。力微。遇坑甕。而溜積於中。然後取之。用香草同煎。則成花銀。此與中國所產不同。按此說。似與陶氏沙地所出相合。又與陳寔器言人服水銀病拘攣。但失金物。毀之。則水銀必出。蝕金之說相符。蓋外番多丹砂。其液自流。為水銀。不獨煉砂取出。信矣。胡演丹藥。祕訣云。取砂乘法。用瓷瓶盛朱砂。不拘多少。以紙封口。香湯養一伏時。取入水火鼎內。炭塞口。鐵盤蓋之。鑿地一孔。放盤一個。盛水。連盤覆鼎於盤上。鹽泥回柱。周圍加火煨

之。待冷取出。汞自流入盤矣。邕州溪。桐燒取極易。以百兩為一銖。銖之制。似豬脬。外糊厚紙數重。貯之。即不走漏。若撒失在地。但以川椒末。或茶末。收之。或以真金及礬石引之。即上。(李時珍) 升汞。上蓋一釜。釜中留一小孔。釜旁鹽泥。緊固。釜上用鐵打成一曲弓。溜管。其管用麻。極密。纏通梢。仍用鹽泥塗固。煨火之時。曲溜一頭。插入釜中。通氣。(插處一絲固密) 一頭。以中礬注水。兩瓶。插曲溜尾於內。釜中之氣。達於中礬之水而止。其煨五個時辰。其中砂未盡。化成。傾布於漚釜。冷定一日。取出掃下。此最妙。玄化全部天機也。又水銀製朱之法。係用礬口泥。礬。或用上下釜。每水銀一斤。入石亭脂(即硫黃製造者)二斤。同研。不見星。炒作青砂頭。裝於礬內。用鐵蓋蓋定。蓋上壓一鐵尺。錢線兜底。網縛。鹽泥固濟口縫。下用三釘插地。鼎足盛礬。打火三注。香久。類以廢筆蘸水。擦盡。則銀朱自成粉。貼於礬上。其貼口者。殊更鮮華。冷定。揭出。刮掃取用。其石亭脂。沉下。礬底。可取再用。

也。每升水銀一斤。得珠十四兩。次
 珠三兩五錢。(宋應星) ①先取筋
 竹爲筒。節密處全留三節。開孔如
 彈丸許。中節開小孔如筋頭許。而
 容汞溜下處。先鋪厚蠟紙兩重。致
 中節之上。次取丹砂細研。入於筒
 中。以麻緊縛其筒。蒸之一日。然後
 以黃泥包裹之。可厚三寸。埋入土
 中。令筒與地面平。筒四面築築。勿
 令泄漏。其氣便積。薪燒其上。一復
 時。令火透其筒上節。汞即流出於
 下節之中。壅分不析。忽火小。汞出
 未盡。尙重。而猶黑紫。依此更燒之。
 令其汞合大數足。(雲笈七籤)

【水銀粉】即輕粉之古籍別名。典
 見嘉祐補註本草。詳「輕粉」條。

【水銀草】 主治 治眼昏。每服
 三錢。入木賊少許。水
 煎服。

【水銀霜】即粉霜之古籍別名。詳
 「粉霜」條。

【水銀脂】即輕粉之古籍別名。典
 見和漢藥考。詳「輕粉」條。

【水碱】即巖香之俗名。詳「巖香」
 條。

【水劍草】即菖蒲之隱名。詳「菖
 蒲」條。

四畫 水

【水節】即水英之古籍別名。典見
 唐天寶單方圖。詳「水英」條。

【水綿】即陸釐之古籍別名。典見
 綱目。詳「陸釐」條。

【水膠】即黃明膠之古籍別名。典
 見外臺祕要。詳「黃明膠」條。

【水蓼】 古籍別名 薺。虞。蓼。(本
 爾雅) 澤。蓼。辣。蓼。(本
 草綱目) 柳。蓼。川。蓼。(日本)
 外國名詞 Polygonum Ma-
 oidum, Poko. (拉丁) ヤナ
 タギテ ミツタテ カハタテ
 (日本)

【水蓼】 基本 蓼科蓼屬。藥用水蓼之
 莖葉。

【水蓼】 形態 水蓼爲濕草類之一年
 生草本。葉有闊狹。色有綠紫而味
 辛辣。葉長五六寸而莖色赤。冬月
 頗見繁盛。

【水蓼】 性質 辛。無毒。



【水蓼】 主治 蛇傷。搗傳之。絞汁服之。
 止蛇毒入腹心悶。又治脚氣腫痛
 成瘡。水煎汁漬捋之。

【水蓼】 歷代記述攷證 【明】程希雍
 本草經疏論水蓼曰。水蓼味辛性
 冷而無毒。陰中微陽。冷而辛。所以
 能解蛇毒。入內心悶。及水煎漬捋。
 脚消氣腫也。

【水蓼】 參攷資料 ●水蓼生下濕水
 旁。葉似馬蓼。大於家蓼。莖赤色。水
 揆食之。勝於蓼子。(蘇恭) ●水蓼
 大概與水蓼相似。但枝爪耳。今造
 酒取葉。以水浸汁。和麴作麴。亦取
 其辛耳。(寇宗奭) ●按爾雅云。薺
 虞蓼也。山夾水曰虞。(李時珍) ●
 此乃水蓼所生之蓼。葉長五六寸。
 比水蓼葉稍狹。比家蓼葉稍大。而
 功用彷彿。故寇氏謂蓼實即水蓼
 之子者。以此故。(李時珍) ●水蓼
 丹治血痢瘡瘻。(醫學辭典)

【水蓼】即陸釐之古籍別名。典見
 正要。詳「陸釐」條。

【水蓼菜】即紫葢之古籍別名。典
 見嘉祐圖經本草。詳「紫葢」條。

【水蕉】即甘蔗之色白如霜者。典
 見嘉祐圖經本草。詳「甘蔗」條。

【水蕨】 命名 本品形似蕨而
 生水中故名。

【水蕨】 古籍別名 荳。(本草綱目)

【水蕨】 外國名詞 Corallorhiza
 diactyloides, Prodr. (拉丁)
 ミツワラビ ミソニンジン
 ミツパウフウ(日本)

【水蕨】 基本 係羊齒科。水蕨科。藥用
 其莖葉。

【水蕨】 形態 水蕨爲菜類之自生草
 本。水生者大陸生者小。其質柔滑。

【水蕨】 性質 甘。苦。寒。無毒。

【水蕨】 主治 腹中痞積。淡煮食一二
 日。即下惡物。並忌雜食一月餘。乃
 佳。

【水蕨】即海豚魚之古籍別名。典
 見異物志。詳「海豚魚」條。

【水磨芍】即苦蕎麥之古籍別名。
 典見植物學大辭典。詳「苦蕎麥」
 條。

【水錦花】即密蒙花之古籍別名。
 典見雷公炮炙論。詳「密蒙花」條。

【水龍骨】即船船油石灰之原名。
 詳「船船油石灰」條。

【水龍珠】即珠砂根之古籍別名。
 典見植物名彙。詳「珠砂根」條。

四畫 水

【水獺皮毛】

主治 產母帶之易產。



水獺

歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論水獺皮毛曰。煮汁服。治水癩病。亦作獺及履歷著之。

【水獺肉】

外國名詞 Juera Common otter Frischottor (拉丁)

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 煮汁服。療瘦氣溫病。及牛馬時行病。

歷代記述攷證

【宋】日華諸家本草論獺肉曰。治水氣脹滿。熱毒風。【宋】蘇頌綱目本草論獺肉曰。治骨蒸熱。勞血脈不行。營衛虛滿。及女子經絡不通。血熱。大小腸結。消男子陽氣。不宜多食。

參攷資料 ①水獺肉不可雜

兔肉食(陶弘景)患熱毒風水

虛脹者。取水獺一頭。去皮。連五臟

及骨頭。炙乾。爲末。水服方寸匕。日

三服。十日。瘥。若冷氣虛脹者。服之

益甚也。只治熱。不治冷。爲其性寒

耳。(孟詵)

【水獺肝】

命名 獺字從犬。以水獺之形似狗。故又有水狗之稱。

古籍別名 水狗。殺。損。損。(本草綱目)

基本 係哺乳類獺屬。

形態 水獺爲食肉動物類之一。體長二三尺。頭平頸短。肢長足短。趾間有蹼。爪小。裸出。耳亦小。尾長約尺餘。背部色暗褐。腹部帶白。灰褐。皮毛密而柔。可作裘領。其棲息於河邊。夜出捕魚。惟飲其血而不食肉。其皮毛骨髓等均可供藥用。

性質 甘。溫。有毒。

效能 補肝療虛損。殺蟲治傳尸。用作殺蟲解毒藥。

主治 鬼疰蟲毒。止久嗽。除魚鱗。並燒灰酒服之。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥

性本草論獺肝曰。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論獺肝曰。傳尸勞極。虛汗客熱。四肢寒痺。及產勞。【明】李時珍本草綱目論獺肝曰。殺蟲。【明】繆希雍本草經疏論獺肝曰。獺水中之獸也。本經味甘。有毒。藥性論鹹。微熱。無毒。詳其功用。應是鹹勝甘。微溫。小毒之物。入肝入腎之藥也。經曰。邪之所湊。其氣必虛。虛損勞極。則五臟之神俱不安。鬼邪相挾。而爲病。久嗽者亦勞極所致。此藥能益陰氣。補虛損。保勞極。故主如上諸證也。甘鹹善於解毒。故又主蠱毒。獺性嗜魚。故能卻魚鱗也。大抵其功長於治傳尸勞。及鬼疰邪惡有效。故張仲景治冷勞有獺肝丸。崔氏治九十種蠱疰。傳尸骨蒸。伏連。殘。諸鬼毒。痼疾。有獺肝丸。皆妙。

【清】黃宮繡本草求真論獺肝曰。獺有在山在水之別。山獺性稟純陽。其性最淫。故壅可治陽虛陰痿。精寒。取陰一枚。價值數金。若以婦人。燥熱。則壅躍然而動。水獺以水爲主。水性主澀。獺亦多慧性。最嗜魚魚之精氣。皆聚於肝。故獺亦得

諸魚之氣。而聚於肝也。按諸膏肝皆有定數。惟獺一月一葉。間有退葉。因其漸落復生者。故耳。獺味性寒。惟肝性溫。味鹹。微毒。搗入肝腎補虛除勞。補五臟安和。邪氣自卻。而鬼疰蠱毒。因得退除矣。葛洪言。屍疰。惟取獺肝一具。陰乾。爲末。水服方寸匙。日三。以瘥爲度。如無獺肝。獺爪亦可。小兒鬼疰。及諸魚骨。煎燒灰酒服。故仲景治冷勞。崔氏治蠱疰。皆有獺肝丸之用耳。

配合應用 ①治鬼魅。獺肝末。水服方寸匕。日三服。(千金方)

②治腸痔有血。獺肝燒末。水服一錢。(肘後方)

③治下血不止。用獺肝一副。煮熟。入五味食之。妙。(飲膳正要方)

用量 八分至錢中。

參攷資料 ①疰病一門。悉患

者。以獺肝一具。火燒水服方寸匕。日再服之。葛洪云。尸疰鬼疰。乃五

尸之一。又按諸鬼邪爲害。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱。沉沉默默。不知病之所苦。而無處不。積月累年。淹滯至死。死後傳之。乃至滅門。覺有此

儀。惟以狸肝一具。陰乾爲末。水服方寸匕。日三。以瘰爲度。(孟詵)○

江湖多有之。四足俱短。頭與身尾皆粗。毛色若故紫帛。大者身與尾長三尺餘。食魚。居水中。亦休木上。管際置大水囊中。在內旋轉。如風水皆旋。西戎以其皮飾羸服領袖。云圻下着染。如風。羸目。但就拭之即去也。(蘇頌)○王氏字說

云。正月十月。獺兩祭魚。知報本反始。獸之多賴者。其形似狗。故字從犬。從賴。大者曰獺。音資。曰獺。音編。又桓譚鹽鐵論。以獺爲獺。羸爲獺。如獺之與獨也。(李時珍)○獺狀似青狐而小。毛色青黑。以狗脊如伏翼。長尾四足。水居食魚。能知水信爲穴。鄉人以占潦旱。如鷓巢知風也。古有熊食鹽而死。獺飲酒而斃之。語物之性也。今川沔漁舟。往往馴畜。使之捕魚甚捷。亦有白色者。或云獺無雌。以援爲雌。故云。援鳴而獺候。(李時珍)

【水獺足】 主治 手足皸裂。歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論水獺足曰。煮汁服。治魚骨鯁。并以爪爬喉

下。【明】李時珍本草綱目論水獺足曰。爲末酒服。殺分癩蟲。

【水獺骨】 主治 舍之下魚骨。歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論水獺骨曰。煮汁服。治嘔噦不止。

【水獺腎】 性質 甘。鹹。寒。無毒。主治 益男子。

【水獺屎】 主治 魚臍疔研末。水和敷之。即膿出痛止。亦主疔馬蟲類及牛疫疾。研水灌之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論水獺屎曰。治下痢。燒末。清旦飲服一小盞。三服愈。赤用赤蠶。白用白蠶。【清】趙學敏本草綱目拾遺論水獺屎曰。消瘡用獺糞一兩。天南星三錢。麝香三錢。共研末。醋調塗上即愈。

【水獺膽】 性質 苦。寒。無毒。主治 眼翳黑花。飛蠅上下。視物不明。入點藥中。

【水獺髓】 主治 去癩痕。參攷資料 按集異記云。吳主鄧夫人。爲如意傷頰。血

流啼叫。太醫云。得白獺髓。雜玉與琥珀。傅之。當滅此痕。遂以百金購得白獺。合膏而塗。但琥珀太多。猶有赤點如痣。(李時珍)

【水滸】 卽澤滸之古籍別名。典見本經。詳『澤滸』條。

【水雞】 卽金線龜之古籍別名。詳『金線龜』條。

【水雞】 卽秧雞之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『秧雞』條。

【水雞冠】 卽半嬌紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『半嬌紅』條。

【水錢草】 卽苦菜之古籍別名。典見土宿本草。詳『苦菜』條。

【水藻】 命名 藻乃水草之有文者。潔淨如澡浴。故名。古籍別名 馬藻。(本草綱目) 基本 係隱花植物類。藻屬。形態 水藻爲水草類之濕生草本。生水底。形如馬齒相連。故有馬藻之稱。



水藻

種類 水藻葉長二三寸。兩兩對生。卽馬藻也。聚藻類如絲。及魚鰓狀。節節連生。夏日開小花。色淡紅。卽水蘊也。俗名鋤草。又名牛尾蘊。

性質 甘。大寒。滑。無毒。

主治 去暴熱。熱痢。止渴。搗汁服之。小兒赤白遊癩。火焮熱瘡。搗爛封之。

參攷資料 ①細葉蓬茸。如絲可愛。一節長數寸。長二三十節者。卽蘊也。水蘊與馬藻皆可食。入藥以馬藻爲勝。(郭璞) ②凡天下極冷無過蓬菜。但有熱熱毒腫。并丹毒者。取渠中蓬菜。切搗。傅之。厚三分。乾即易。其效無比。(孫思邈)

【水蘇】 卽雞蘇之原名。詳『雞蘇』條。 卽紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。 卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【水蘇葉】 卽雞蘇之處方用名。詳『雞蘇』條。

【水蘊】 卽聚藻之別名。詳『聚藻』條。

【水滸頭子】 卽困來草之古籍別

四畫 水

四畫 水火

名。典見綱目拾遺。詳『困來草』條。

【水蘇】即水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【水蠟燭草】即蒲包草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蒲包草』條。

【水蘿蔔】即拳黃雞子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『拳黃雞子』條。

【火口】即石硫黃之日本別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【火失刻把都】即番木鱉之古籍別名。典見綱目。詳『番木鱉』條。

【火母】即景天之古籍別名。典見別錄。詳『景天』條。

【火米】即陳粟米之古籍別名。典見綱目。詳『陳粟米』條。

【火把花】即鈎吻之古籍別名。典見綱目。詳『鈎吻』條。

【火芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【火秋】即益母草之古籍別名。典見本經。詳『益母草』條。

【火秋草】即豨薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『豨薟草』條。

【火柴頭】即撥火杖之古籍別名。典見綱目。詳『撥火杖』條。

【火炭母草】

基本 屬濕草類。藥用為火炭母草之葉。

性質 酸。平。有毒。

主治 去皮腐風熱流注。骨節癢腫疼痛。不拘時採。於坩堝中搗爛。以鹽酒炒。傳腫痛處。經宿一易之。

參攷資料 生恩州原野中。莖赤而柔似細麥。葉端尖近極形。方夏有白花。秋實如椒。青黑色。味甘可食。(蘇頌)

【火泉】即竹瀝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『竹瀝』條。

【火消】即消石之古籍別名。典見綱目。詳『消石』條。

【火酒】即燒酒之古籍別名。典見綱目。詳『燒酒』條。

【火參】即大黃之古籍別名。典見吳普本草。詳『大黃』條。

【火麻仁】即大麻仁之處方用名。詳『大麻仁』條。

【火斑】即四味果之古籍別名。詳『四味果』條。

【火硝】即消石之古籍別名。典見綱目。詳『消石』條。

【火葱】即薤之古籍別名。典見綱目。詳『薤』條。

【火漆】

命名 本品係封口所用之膠。質如漆。故名。

古籍別名 紫膠。(綱目拾遺)

製法 用樹脂六分。石蠟三分。加顏料製成用。

主治 血崩九種虛痛。燒研存性。酒服。腸風下血。用腐皮包吞。滾水下。(綱目拾遺)

參攷資料 火漆乃造胭脂紫梗水。以染脂胚所漉之渣滓也。紫梗本名紫劍。出波斯真臘。南番等處。有小蟲如蟻。緣樹枝造成。正同造白蠟一般。吾枕造胭脂者。藉以染製。然第用紫梗一味。則色不能紅。必須配以黃葉水同煎。色始紅。其所餘之渣。則火漆也。入藥只須研極細用之。中有枝梗不受研者。篩去之。(趙學敏)

【火腿】 古籍別名 蘭薰。(王士雄飲食譜) 薰蹄。風蹄。(東陽縣志)

產地 各處皆有。而以浙江金華者為最著。據云。金華一帶人家。多以木飯糗米作飯。不用錢煮。飯

湯醇厚者。以飼猪。其養猪之法。擇潔淨棚房。早晚以豆渣糠屑飼養。發糞溺以食之。夏則兼飼以瓜皮菜葉。冬則必以熟食。調其饑飽。察其冷煖。故肉細而體香。茅船漁戶所養尤佳。名船腿。其腿較小於他腿。味更香美。

製法 養猪作腿。其猪不甚大。極重者不過七八十觔。製為腿。乾之不過三四觔。或五六觔不等。四時皆可醃。惟冬腿為第一。冬醃者皮細無粟眼。手摸之潤膩。切開無黃膿。爪灣可久留不蛀。他時者易蛀。春腿多粟眼。夏腿爪直。秋腿皮粗。醃法每腿十觔。用炒鹽四兩。以木刻植如人手掌狀。搽醃後。用傘槍輕輕揉擦。四圍兼到。俟皮軟如綿。然後入缸。缸面蓋以辣蓼。竹匾覆之。待七日後。有瀉。翻攪一轉。令上下勻。再以炒鹽四兩。如前法。以手揉醃入缸。十日後出缸。即用缸中原汁洗淨。一一以草繩縛足。挂懸風處。能冬醃者。不滴油。李化楠醒園錄有醃火腿法。每十觔猪腿。配鹽十二兩。極多加至十四兩。將鹽炒過。加皮硝末少許。乘猪腿剛

熱。煮之令勻。置大桶內。用石壓之。五日一翻。候一月。將腿取起。晾有風處。四五個月可用。金華做火腿。每筋豬腿配炒鹽三兩。用手將鹽擦完。石壓之。三日取出。又用手竭力揉之。翻轉再壓。再揉。至肉軟如綿。挂風處。約小雪後。至立春後。方可挂起不凍。又戴幾養餘月。令有製火腿法。十一月內。因猪方殺下。只取四隻精腿。乘熱用鹽每一筋肉。鹽一兩。從皮擦入肉內。令如綿軟。以石壓竹榻上。至缸內二十日。次第三番五次。用稻草灰一重。間一重。疊起。用焗草烟露一週時。挂在烟處。初夏以水浸洗。仍前挂之。按此乃村鄉土醃火腿法。要不及金華之兩。蒸也。然較之杭市醃腿店所買火腿。則又不啻霄壤矣。故並載其法。造火腿法。用南火腿煮熟。切碎丁。如火腿過鹽。先用水泡淡。再煮去皮。單取精肉。用火將鍋燒得滾熱。將香油先下。滾香。次下甜醬。白糖甜酒。同滾煉好。然後下火腿丁。及松子。核桃。瓜子等仁。速炒翻。取起磁罐收貯。其法每腿一隻。用好麵醬一筋。香油一筋。白

糖一筋。核桃仁四兩。去皮打碎。花生仁四兩。砂去衣打碎。松子仁去衣四兩。瓜子仁二兩。桂皮五分。砂仁五分。又隨意居飲食譜云。十一月內。取壯麩花猪後腿。用力自爪向上緊持。有血一股。向腿面流出。即拭去。此血不擠出。則至夏必臭。晾一二日待乾。將腿面浮油細細剔淨。不可傷膜。若膜破或去蹄甲。則氣泄而不能香。每腿十斤。用燥鹽五兩。鹽不燥透。則鹹味入腿而帶苦。竭力擦透其皮。然後落缸。腳上懸牌。記明月日。缸半預做木板為履。屜擊數孔。將擦透之腿。平放板履之上。餘鹽勻灑腿面。腿多則重重灑之。不妨鹽拌為滿。則從履孔流之。缸底醃腿以此為要訣。蓋沾滿則肉霉而必苦也。既醃旬日。將腿翻起。再用鹽如初醃之數。逐腿灑勻。再旬日。再翻起。仍用鹽如初醃之數。逐腿灑勻。再旬日。自初醃至此。匝一月也。將腿起缸。浸溪中。平日刷洗極淨。隨懸日中曬之。故起缸必須晴日。若雨雪不妨遲待。如水氣曬乾之後。陰雨則懸當風處。晴霽再曬之。

必須水氣乾盡。皮色皆紅。可不曬矣。修圓腿面。入夏起花。以綠色為上。白次之。黃黑為下。並以菜油。細抹之。若生蟲。有蛙孔。以竹篾挑出。菜油灌之。入伏。裝入竹箱盛之。苟知此法。但得佳猪。處處可造。且後腿之外。餘肉皆可按法醃藏。雖補力較遜。而味亦香美。以為夏月及忌新鮮者之用。
性質 鹹。溫。性平。
主治 補脾開胃。滋腎生津。益氣血而充精髓。
配合應用 治噤口痢。醃肉脯。燻爛食。
解中諸肉毒及諸食停滯。惡痢不瘳。並用陳火腿骨煨存性。研開水下。按紀文達公云。油膩得灰。即解散。故油膩凝滯之病。即以其物燒灰。調服自愈。猶之以灰澆垢耳。余謂尚未盡然。如過食白果。荔枝而醉者。即以其殼煎湯飲之。立解。吾杭市脯獨香。黏味美者。其煮猪肉。或羊肉。鍋中之湯。永不輕棄。但日撇浮油。加鹽添水。煮之名曰老汁。故物易化也。即純用秋油。醇酒。燻雞鴨鹿豕等肉之。滴鍋亦功。

在老汁。故味美易糜。觀此則食物不消。當以本物消之之義。別有至理存焉。
歷代記載攷證 【清】王士禛隨息居飲食譜云。陶薰（一名火腿）甘鹹溫。補脾開胃。滋腎生津。益氣血。充精髓。治虛勞。任仲止。虛痢。泄瀉。健腰脚。愈漏瘡。以金華之東陽。冬月造者為勝。浦江。義烏。精邇。他邑不能及也。踰二年。即為陳腿。味甚香美。甲於珍饈。養老補虛。洵為極品。取脚骨上第一刀。俗名腰封。刮垢洗淨。整塊置盤中。飯鍋上乾蒸。悶透。如是七次。極爛而味全。力厚。切食最補。然必上上者。始堪如此。熟食。否則非鹹則辣矣。或老年齒落。或病後脾虛。少運。則熬湯。撇去油。但飲其汁可也。外感未清。溼熱內戀。積滯未淨。脹悶未消者。均忌。時病愈後。食此太早。反不生力。或致浮腫者。皆餘邪未淨故耳。
參攷資料 蕪蹄。俗謂火腿。其實烟蕪。非火也。醃蕪。蕪收如法者。勝常品。以所醃之鹽。必台鹽。所薰之烟。必松烟。氣香烈。而善入製

四畫 火

四盡 火爪 瓜片 牙

之及時如法。故久而彌旨。另一種名風蹄。不用鹽漬。名曰淡腿。浦江為盛。本邑不多。(東陽縣志)浦江淡腿。小於鹽腿。味頗淡。可以點茶。名茶腿。陳者止血。開胃如神。(陳達夫)火腿。醃過。味燥高挂。至次年夏間者。愈陳愈妙。出金華府屬邑者佳。(陳芝山)蘭蕪。金華豬腿也。南省在在能製。但不及金華者。以其皮薄而紅。薰淺而香。是以流傳遠近。目為珍品。然亦惟出浦江者佳。其製割於冬月。用鹽勻稱。使肉堅實不敗。最上者曰淡腿。味美香潔。可以佐茶。各處皆無此製。蓋此地畜豕。閑閑清潔。俟其將茁壯時。即宰割醃曬。或曰其豕種原異他處。而又得香溪等水飼之。亦近乎理。(常中丞筆記)凡收火腿。須擇冬醃。金華豬後腿為上。選皮薄色潤。日照之明亮通體。隱隱見內骨者佳。用香油遍塗之。每個以長繩穿脚。排勻一字式。下以毛竹對破仰承。以接油。置之透風處。雖十年不壞。倘交夏入梅。上起綠衣亦無害。或生毛蟲。見有蛀孔。以竹篾挑出。用香油灌之。如割

切刺者。須用鹽塗切口肉上。荷葉包好懸之。依此可久留不壞。(陳瑤)

【火齊】即琉璃石之古籍別名。典見綱目。詳「琉璃石」條。

【火齊】即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【火寶】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【火槽頭】即撥火杖之古籍別名。典見本草拾遺。詳「撥火杖」條。

【火樹】即珊瑚之紅色者。詳「珊瑚」條。

【火絨草】即菟絲子之古籍別名。典見綱目。詳「菟絲子」條。

【火醃菜】即蕪菜之莖葉根色紅紫者。典見植物學大辭典。詳「蕪菜」條。

【火蕉】即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳「無漏子」條。

【火龍珠】即珠砂根之古籍別名。典見植物名彙。詳「珠砂根」條。

【火藥】 基本 本品乃硝磺、硫磺、杉木炭所合。以為炸

燧鏡。諸藥者。

性質 辛。酸。有小毒。主治 疔瘡。殺蟲。辟濕氣。溫疫。

【火獸】即稀莖草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「稀莖草」條。

【爪兒血】即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「血竭」條。

【爪蓮華】即瓦松之日本名詞。詳「瓦松」條。

【爪龍】即稷根之古籍別名。詳「稷根」條。

【父階根】 古籍別名 齊魚。梓。性質 辛。有毒。主治 瘰癧。腫。腐。膜。

【片子薑黃】即薑黃之產於四川。色黃質嫩有髮。中空有眼。切之分為兩片者。詳「薑黃」條。

【片芩】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。

【片竺黃】即天竺黃之處方用名。詳「天竺黃」條。

【片蛇】即麗蛇之別名。詳「麗蛇」條。

【片腦】即冰片之古籍別名。詳「冰片」條。

二六四

【片鱗】即鱗魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱗魚」條。

【片瘡黃】即薑黃之處方用名。詳「薑黃」條。

【牙子】即狼牙之古籍別名。典見本經。詳「狼牙」條。

【牙皂】即豬牙皂莢之簡稱。詳「皂莢」條。

【牙皂樹蟲】 命名 本品即蟲。故名。形骸 牙皂樹蟲為化生蟲類之一種。其樹大如錢粗者。方得有蟲。其蟲子時下行。過午則上行。故須午後方可採得。以供藥用。採取 於午後以利刃速砍其樹。遲則蟲即下行入根。而不可得。主治 治一切腫毒初起。其蟲有大小。大者用一條。小者用二條。證輕者用一條。證重者用二條。或三條。搗爛酒調服。已膿者不治。

【牙硝】即馬牙硝之簡稱。詳「馬牙硝」條。

【牙疼子】即真蓉子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真蓉子」條。

【牙蕉】即芭蕉之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【牙蕉子】即芭蕉實之小於雞蕉而尤香嫩者。性質功能詳『芭蕉』條。

【牙癆】即癆之古籍別名。典見綱目。詳『癆』條。

【牛口涎】別名 牛口津。主治 反胃嘔吐。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛口涎曰。水服二匙。終身不噎。【明】李時珍本草綱目論牛口涎曰。吮小兒。治客忤。瀆一合。治小兒霍亂。入鹽少許。頓服一盞。治喉閉口瘡。

參攷資料 牛口涎之取法。以水洗老牛口。用鹽塗之。少頃即出。或以荷葉包牛口。使耕。力乏涎亦出。【日華】

【牛心】主治 虛忘補心。

【牛心柿】即柿實之狀如牛心者。性質功能詳『柿』條。

【牛心茄子】產地 出廣東瓊州島中。

性質 大毒。主治 入外科膏藥。作麻藥用。

參攷資料 牛心茄一核者。入口立死。兩核者可以鷄清解之。只可外用。不宜內服。【趙學敏】

【牛毛】主治 臍毛。治小兒久不行。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛毛曰。耳毛。尾毛。陰毛。並主通淋閉。

參攷資料 古方牛耳毛。陰毛。尾毛。治淋多用之。豈以牛性順而毛性下行耶。又治瘡病。蓋積之之義耳。【李時珍】

【牛毛石花菜】即鹿角菜之細如牛毛者。典見綱目拾遺。詳『鹿角菜』條。

【牛奶子】即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【牛奶柑】即金橘之葉成倒卵形者。性質功能同金橘。詳『金橘』條。

【牛奶柿】即君遷子之古籍別名。典見日用本草。詳『君遷子』條。

【牛皮】主治 水氣浮腫。小便澀少。以皮蒸熱。切入豉汁食之。參攷資料 牛皮以水牛者良。熬膠尤佳。【本草綱目】

【牛皮膠】即黃明膠之古籍別名。典見食療本草。詳『黃明膠』條。

【牛耳菜】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【牛肉】處方用名 黃牛肉。牛內汁。

古籍別名 大武肉。【禮記】四蹄肉。【史記】粗摩帝肉。【梵書】外國名詞 Bos Saurus Linn (Cattle) 或 (Common ox) Hausind (拉丁)

基本 屬脊椎動物哺乳類。有胎盤類。有蹄類。反芻偶蹄類。係數類原種所變之家畜牛之肌肉。

形態 牛為家畜類之一。有黃牛。水牛兩種。其齒有下無上。脫換與人齒同。滿三歲後。則門齒白。齒盡為永久齒。故視其齒可知其年齡。蓋三歲二齒。四歲四齒。五歲六齒。六歲以後。每年接脊骨一節。其耳聾。聽時用鼻。瞳子豎而不橫。其皮肉臄。臄骨體等。既可供食。又可供藥用。

採取 採無時。入藥須用黃牛青牛者良。

性質 甘。溫。無毒。

主治 安中益氣。養脾胃。效能 補脾胃。益虛羸。專作滋養強壯藥。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛肉曰。補益腰脚。止消渴及唾涎。【明】繆希雍本草經疏論牛肉曰。牛肉益脾胃。脾胃得所。養則中自安。氣自益矣。丹溪朱氏有倒食法。非為其有吐下之力也。特飲之既滿。或上湧下泄。爾此蓋借其補以爲瀉。故積聚去而腸胃得所。養亦奇法也。但病非關腸胃者不宜服。凡牛病死及黑身白頭。獨肝者。皆不宜服。合猪肉及黍米酒食。並生寸白蟲。合韭菜食。令人熱病。合生薑食。損齒。又云。牛乃穢穢之資。不可多殺及食。若以之療病。則藥物甚多。若以之供饌。則肥甘不少。似可無此一物也。好生君子。其當念及而力戒之。【清】黃宮繡本草求真論牛肉曰。牛肉本屬土。若屬黃牛。色猶得正治。能補土固中。益氣止渴。功與黃芪無異。故三樹久病。日服黃牛湯。能令日漸輕強。而無腫脹之病。其效可知。即丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

胃。丹溪倒食法。治停痰積血。膠聚於

四畫 牛

腸胃迴腸曲折之處。發為瘰癧癆瘵。瘰癧腸臌。非丸散所能及者。用此因瀉為補。借補為瀉。其曲折如洪水泛漲。陳朽順流而下。沈疴悉去。大有再造之功。中年後行一二次。亦卻疾養壽之一助。此為補中之劑。非若汗吐下藥。能以傷人亦奇方也。但病非腸胃者。不得遽行是法。牛有黃牛。水牛之分。故黃牛性溫。而水牛性平。白水牛可治反胃吐食。腸結不通。牛乳味甘溫寒。亦治脾胃枯槁。噎膈反胃。

近人學說 丁福保曰。牛肉古時不過供祭祀之用。自發明其富於滋養分。而需用頓增。至於現今。遂視為第一之食品。其成分自水分。蛋白質。纖維。脂肪等而成。就中水分脂肪尤多。其味甘溫而美。有滋養之效。人多嗜之。誠人世間有益之食品也。現今牛肉之盛用於食品者。雖因外人謂牛肉為最有效能之物而起。然亦由於甘美之適於嗜好故也。其效能強壯腸胃。治婦人之消渴。外人謂任何之重患皆得食之。

配合應用 小刀圭。凡一切

虛病皆可服之。用小牛犢兒未交感者一隻。臘月初八日或戊己日殺之。去血烤毛。洗淨。同臟腑不遺分寸。大銅鍋煮之。每十斤。入黃芪十兩。人參四兩。茯苓六兩。官桂。良薑各五錢。陳皮三兩。甘草蜀椒各二兩。食鹽二兩。醇酒二斗。同煮水以八分為率。文火煮至如泥。其骨皆槌碎。併濾取稠汁。待冷。以藥盛之。埋於土內。露出幾面。凡飲食中皆任意食之。或以酒調服更妙。肥犬及鹿皆可依此法作之。

返本丸 補諸虛百損。用黃健牛肉去筋膜切片。河水洗數遍。仍浸一夜。次日再洗三遍。水清為度。用無灰好酒同入壺內。重泥封固。桑柴文武火煮一晝夜。取出如黃沙為佳。焦黑無用。焙乾為末。聽用山藥鹽炒過。蓮肉去心鹽炒過。並去鹽。白茯苓。小茴香炒各四兩。為末。每牛肉半斤。入藥末一斤。以紅煎蒸熟去皮。和搗丸。梧子大。每空心酒下五十丸。日三服。(乾坤生意方)

食癆積自下。(經驗秘方) 治腹中癆積。黃牛肉一斤。恒山三錢。同煮熟。食肉飲汁。鮮必自消。甚效。(筆叢雜興方) 治牛皮風癬。每五更炙牛肉一斤。食以酒調輕粉敷之。(直指方) 用量 一錢半至三錢。施用宜忌 凡脾胃有濕熱痰火者禁用。參攷資料 牛有數種。本經不言黃牛。烏牛。水牛。但言牛。爾南人以水牛為牛。北人以黃牛為牛。為牛。牛種既殊。入用當別。(陳藏器) 倒倉論曰。腸胃為積穀之室。故謂之倉。倒者。推陳以致新也。胃屬土。受物而不能運。七情五味。有傷中宮。停痰積血。互相纏糾。發為癰瘕。為勞瘵。為蠱脹。成形成質。為窠為臼。以生百病。而中宮愆和。自非丸散所能去也。此方出自西域異人。其法用黃肥牡牛肉二十斤。長流水煮成糜。去滓。瀉取液。再熬成琥珀色。收之。每飲一鍾。隨飲至數十鍾。寒月溫飲。病在上則令吐。在下則令利。在中則令吐而

二六六

利。在人活變。吐利後湯。即服其小便一二碗。亦可落滯餘垢。睡二日。乃食淡粥。養半月。即精神強健。沉疴悉亡也。須五年忌牛肉。(朱翼亨) 按許慎云。牛作也。牛為大牲。可以作事。分理也。其文象角頭三封及尾之形。周禮謂之大牛。乃祭畜之室。牛牢。大羊牢。小故皆得牢名。內則謂之一元。大武。元頭也。武足跡也。牛肥則迹大。猶史記稱牛為四蹄。今人稱牛為一頭之義。楚書謂聖帝。牛之牡者曰牝。曰特。曰牝。曰犝。牝者曰牝。曰特。曰牝。曰犝。純色曰犧。黑曰輸。白曰楛。赤曰特。駁曰犛。去勢曰犝。又曰犝。無角曰牛。子曰犝。生二歲曰犝。三歲曰犛。四歲曰牯。五歲曰犝。六歲曰犝。李時珍云。張仲景云。噉蛇牛。毛髮白而後順者是也。中其毒者。惟人乳可以解之。內則云。牛夜鳴則瘡。臭不可食。病者死。有大毒。令人生疔。暴亡。食經云。牛自死。自首者。食之殺人。疥牛食之發瘡。黃牛水牛。內合豬肉及黍米酒食。並生寸白蟲。合雜食。令人熱病。合生澁食。損齒。煮牛肉。入杏仁。

蕙葉。易糶相宜。(李時珍) ①牛有
犍牛水牛二種。犍牛小而水牛大。
犍牛有黃黑赤白駁雜數色。水牛
色青若。大腹銳頭。其狀類豬。角若
撥矛。能與虎鬪。亦有白色者。豐林
人謂之州留牛。又廣南有稷牛。即
果下牛。形最卑小。爾雅謂之犍牛。
王會符謂之執牛是也。牛齒有下
無上。察其齒而知其年。三歲二齒。
四歲四齒。五歲六齒。六歲以後。每
年接脊骨一節也。牛耳聳。其聽以
鼻。牛腹堅而不橫。其聲曰牟。項垂
曰胡蹄。肉曰羶百葉。曰臄。角胎曰
臄鼻木。曰奉。嚼草復出曰臄。腹草
未化曰聖。牛在畜屬土。在卦屬
坤。土緩而和。其性順也。(李時珍)
②韓悉言牛肉補氣。與黃芪同功。
親丹溪朱氏倒倉法論。而引中觸
類。則牛之補土。可心解矣。今天下
日用之物。雖殿法不能禁。亦因肉
甘而補。皮角有用也。(李時珍)
【牛肉汗】即牛肉之處方用名。詳
【牛肉】條。
【牛舌】即車前草之古籍別名。典
見陸機詩疏。詳【車前草】條。
【牛舌大黃】即川大黃之古籍別

四畫 牛

名。典見綱目拾遺。詳【大黃】條。
【牛舌菜】即羊蹄之古籍別名。典
見綱目。詳【羊蹄】條。
【牛舌根】即商陸之古籍別名。典
見和漢藥考。詳【商陸】條。
【牛舌實】古醫別名。豕首。(別錄)
形態 牛舌實為水草類之一
種。葉大。長尺許。有謂羊蹄之實
採取。五月採實用。
性質 鹹。溫。無毒。
主治 益氣輕身。
參攷資料 ①牛舌實今東土
人呼田水中大葉如牛耳者。為牛
耳菜。(陳藏器) ②今人呼羊蹄為
牛舌菜。恐羊蹄是根。此是其實。否
則是羊蹄之生水中者也。(李時
珍)
【牛血】性質 鹹。平。無毒。
主治 解毒利腸。治金
瘡折傷垂死。又下水蛭。煮拌醋食。
治血痢便血。
參攷資料 按元史云。布智兒
從太祖征回回。身中數矢。血流滿
體。悶仆幾絕。太祖命取一牛。剖其
腹。納之牛腹中。浸熱血中。移時遂

甦。又云。李庭從伯顏攻鄂州。砲傷
左脇。矢貫於胸。幾絕。伯顏命剖水
牛腹。納其中。良久而甦。何孟春云。
予在職方時。問各邊將。無知此術
者。非讀元史弗知也。故書於此。以
備緩急。(李時珍)
【牛卵囊】原名 牯牛卵囊。
主治 疝氣。一具煮
爛。入小茴香。鹽少許。拌食。
【牛尾蒿】即蟠蒿。莖色青。葉細直
上。狀如牛尾。故名。性質功能。詳【
白蒿】條。
【牛尾狸】即狸之白面而尾似牛
者。性好攀登樹木。食百果。以充飢。
產於熱帶諸地。冬月頗肥。人多視
為珍品。大能醒酒。啗之可辟鼠。性
質功能。與貓同。詳【貓】條。
【牛尾蕪】即聚藻之古籍別名。詳
【聚藻】條。
【牛李】即李之一種。實甘美堪
食。惟核仁不入藥。性質功能。詳【
李】條。①即鼠李子之古籍別名。
典見別錄。詳【鼠李子】條。
【牛皂子】即鼠李子之古籍別名。
典見綱目。詳【鼠李子】條。
【牛肚】即牛胃之別名。詳【牛胃】

條。
【牛肝】主治 補肝明目。
歷代記述攷證 【唐】
孟詵食療本草論牛肝曰。治瘧及
痢。醋煮食之。【明】李時珍本草綱
目論牛肝曰。婦人陰虛。納之引蟲。
【牛角】性質 苦寒。無毒。
主治 水牛者燻之。治
時氣寒熱頭痛。
歷代記述攷證 【宋】日華諸
家本草論牛角曰。煎汁治熱毒風。
及壯熱。【宋】蘇頌圖經本草論牛
角曰。牛者。治喉痺腫塞欲死。燻
灰酒服一錢。小兒飲乳不快似喉
痺者。取灰塗乳上。嚙下即瘥。【明】
李時珍本草綱目論牛角曰。治淋
破血。
【牛角花】即百脈根之古籍別名。
典見植物名實圖考。詳【百脈根】
條。
【牛角胎】即牛角鱧之古籍別名。
典見綱目。詳【牛角鱧】條。
【牛角膠】即牛角鱧之古籍別名。
典見綱目。詳【牛角鱧】條。
【牛角鱧】命名 本品即角尖
中之堅骨。猶魚之有

四畫 牛

錫。故名。

古籍別名 牛角胎。牛角膠。(本草綱目)

性質 苦。溫。無毒。

主治 下閉瘵血疼痛。女人帶下血。燔之酒服。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論牛角膠曰。水牛者燒之。止婦人血崩。赤白帶下。冷痢。瀉血。水洩。【宋】寇宗奭本草衍義論牛角膠曰。燒灰主赤白痢。【明】李時珍本草綱目論牛角膠曰。治水腫。

參攷資料 ①水牛黃雜牛者可用。餘皆不及。久在糞土爛白者亦佳。【陳藏器】②角胎者。言在角內之骨也。【李時珍】

【牛乳】

外國名詞 Lact (Co. 拉丁)

性質 甘。微寒。無毒。

主治 補虛羸。止渴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論牛乳曰。冷補。下熱。氣和。蒜煎沸食。去冷氣。痲癖。【唐】孟詵食療本草論牛乳曰。患熱風人宜食之。【唐】孫思邈千金翼論牛乳曰。老人養食有益。入煎葱。止小

兒吐乳。補勞。【宋】日華諸家本草論牛乳曰。養心。解熱。潤皮膚。

【明】李時珍本草綱目論牛乳曰。治反胃熱。補益勞損。潤大腸。治氣痢。除痘黃。老人養粥甚宜。

參攷資料 ①牛乳以煉牛乳佳。【陶弘景】②後牛乳性平。生飲令人利。熱飲令人口乾。溫可也。水牛乳作酪。濃厚勝牛。造石蜜須之。【蘇恭】③黑牛乳勝黃牛。凡服乳必煮一二沸。停冷啜之。熱食即壅。不欲頓服。與酸物相反。令人腹中凝結。患冷氣人忌之。合生魚食作癥。【陳藏器】④反胃噎膈。大便燥結。宜牛羊乳時時啜之。並服四物湯。爲上策。不可用人乳。人乳有飲食之毒。七情之火也。【朱丹溪】

⑤牛乳能制秦羌。不灰木。【李時珍】⑥乳煎薑麥。治痢有效。蓋一寒一熱。能和陰陽耳。按獨異志云。唐太宗苦氣痢。衆醫不效。下詔訪問。金吾長張寶藏。曾困此疾。即具疏以乳煎薑麥方。上服之。立愈。宣下宰臣與五品官。魏徵難之。逾月不擬。上疾復發。復進之。又不因問左右曰。進方人有功。未見除授。何

也。徵懼曰。未知文武二吏。上怒曰。治得宰相。不妨授三品。我豈不及汝耶。即命與三品文官。授鴻臚寺卿。其方用乳牛半斤。薑麥三錢。同煎。減半。空腹頓服。【李時珍】

【牛乳蕪】 芭蕉實大如雞卵而味淡者。性質功能詳芭蕉條。【牛泥茨】 卽黃蘗葉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳黃蘗條。

【牛肺】 參攷資料 牛肺以水牛者良。【本草綱目】

主治 補肺。

【牛金子】 產地 江西處處有之。

形態 叢生硬莖。褐色。葉如榆葉而小。無齒。亦微圓。附莖甚密。秋開小紫花。繁如穗。多鬚。結實似龍眼。核灰黑色。頂上有小鈴。可供藥用。

子 金 牛



二六八

效能 散血。

【牛屎喇哥】 卽百舌之古籍別名。典見綱目。詳百舌條。

【牛屎菰】 卽馬勃之古籍別名。典見綱目。詳馬勃條。

【牛屎柴】 卽羊屎柴之古籍別名。典見綱目。詳羊屎柴條。

【牛扁】 命名 本品能療牛虱。故名。

古籍別名 扁特。扁毒。(唐本草)

外國名詞 Aconitum Lycostomum, L. (拉丁) ライジン サウ(日本)

基本 毛茛科。附子屬。藥用牛扁之根苗。

形態 牛扁爲毒草類之宿根草。莖長約二尺。根葉多五裂。爲掌狀。或爲裂片。或爲銳頭之缺刻。或爲齒牙狀。莖葉互生。色淺綠。花形小。頂生總狀花序。淡紫色。或綠黃。白色。萼片五狀如花瓣。甚不規則。上部最大。形如帽。作圓錐狀。細長而上端微曲。

採取 二月八月採根苗。日乾用。

性實 苦微寒無毒。

主治 皮膚熱氣。可作浴湯。殺牛虱小蟲。又療牛病。

參攷資料 牛扇生桂陽川

谷(別錄)此藥似葶藶石龍芮。漿根如秦尤而細。生平澤下地。田野人名爲牛扇。療牛虱甚效。大常名扇特。或名扇毒(蘇恭)今出寧州。葉似石龍芮附子等。(韓保昇)今潯州一種便特。六月有花。八月結實。採其根苗搗末。油調殺蠅虱。主療大都相似。疑即扇特也。但聲近而字訛耳。(蘇頌)

【牛虱】即虱蟲之古籍別名。典見綱目。詳「虱蟲」條。

【牛星草】即雀麥之古籍別名。典見綱目。詳「雀麥」條。

【牛洞】即牛糞之稱者。性質功能。詳「牛糞」條。

【牛胃】俗名 牛肚。性質 甘溫無毒。

主治 消渴風眩。補五臟。酪食食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛胃曰。補中益氣。解毒。養脾胃。

參攷資料 牛胃以黃牛水

牛者良。(本草綱目)青牛腸胃合大肉。犬血食。病人(陶弘景)

【牛胞衣】主治 曠瘡不斂。燒存性。研搽。

【牛菜】即牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牛黃」條。

【牛菜子】即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。

【牛脂】性質 甘溫微毒。

主治 諸瘡疥癬白禿。亦入面脂。

參攷資料 牛脂以黃牛者良。煉過用。(本草綱目)牛脂多食發痼疾瘡癩。(本草綱目)牛脂能軟銅(鑑源)

【牛脂芳】主治 七孔出血。爲粗末。每服一。瓦器煎服。以紗合頭項。并繫住小指根。(李時珍)

【牛骨】性質 甘溫無毒。

主治 燒灰治吐血鼻洪。崩中帶下。腸風瀉血水瀉。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛骨曰。治邪毒。燒灰同豬脂塗疔瘡。蝕入口鼻有效。

參攷資料 東夷以牛骨占卜

吉凶。無往不中。牛非含智之物。骨有先事之靈。宜其可入藥治瘡也。(李時珍)

【牛勒實】即營實之古籍別名。典見別錄。詳「營實」條。

【牛莖】即牛膝之古籍別名。典見廣雅。詳「牛膝」條。

【牛陰莖】主治 婦人漏下赤白。無子(蘇恭)

參攷資料 牛陰莖以黃牛、烏牛、水牛者良。(本草綱目)

【牛魚】命名 本品頭如牛。故名。古醫別名 引魚(異物志)

產地 出東海南海中。

形態 牛魚爲魚類無鱗屬之動物。狀如鱧。無鱗骨。其背有斑文。腹下有青毛。大者長丈餘。重三四百斤。其肉可供食及藥用。

性質 無毒。

主治 六畜疫疾。作乾脯爲末。以水和灌鼻。即出黃涕。亦可置病牛處。令氣相煎。

【牛喉】主治 小兒呷氣。

歷代記述攷證 【明】

李時珍本草綱目論牛喉曰。療反胃吐食。取一具。去膜及兩頭。逐節以醋浸炙燥。燒存性。每服一錢。米飲下神效。

參攷資料 牛喉以白水牛者良(本草綱目)牛喉嚨治呷氣反胃。皆以類相從也。按普濟方云。反胃吐食。藥物不下。結腸三五日。至七八日。大便不通。如此者必死。昔金州周禪師得正胃散方於異人。十痊八九。君子收之。可濟人命。用白水牛喉一條。去兩頭節。并筋膜脂肉。及如阿膠黑片收之。臨時旋炙用。米醋一盞浸之。微火炙乾。淨之。再炙再淨。醋盡爲度。研末。厚紙包收。或遇陰濕時。微火烘之。再收。過此疾。每服一錢。食前陳米飲調下。輕者一服立效。(李時珍)

【牛高非】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貫衆」條。

【牛黍】即黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「黍」條。

【牛棘實】即營實之古籍別名。典見本經。詳「營實」條。

【牛筋】即南天燭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「南天燭」條。

四畫 牛

【牛筋子】即鼠李子之古籍別名。臭見和漢藥考。詳「鼠李子」條。

【牛筋草】命名 本品莖韌如牛筋故名。

別名 千金草(綱目拾遺)

產地 多生階砌道左間。

形態 牛筋草為濕草類之一種。夏初發苗。葉似韭而柔。六七月起莖。高尺許。開花三叉。其莖弱。拔之不易斷。最難芟除。其根可供藥用。

主治 脫力黃。勞力傷。治勞瘵。遠根洗淨。入烏骨雞腹內。蒸熟。去草食雞良。

參攷資料 牛筋草入肝經。行血長力(百草鏡)

【牛脾】 主治 補脾。

李時珍本草綱目論牛脾曰。臘月淡煮。日食一度。治痔瘻。和朴硝作脯食。消痞塊。

【牛腎】 主治 補腎氣。益精。

孫思邈千金翼論牛腎曰。治濕痺。

【牛黃】 原名 牛屎。故隱其命名 牛屎。故隱其

名為丑寶。所謂黃者。牛之病也。牛病凝於肝膽而成黃。故曰牛黃。

處方用名 西黃。

古籍別名 照盧折娜。(金光明經) 土精。牛菜。丑玄。(和漢藥考) 心黃。(本草綱目)

外國名詞 Bezour. (拉丁)

(德) Cow-dozoar. (英)

基本 屬脊椎動物哺乳類。藥用牛膽凝結之黃。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牛黃以中國產者為上等。名為土牛黃。借乎少出。普通以印度產者為上。由架喇吉打聚處運來。但近日多偽造。如入價每觔三百餘元。沽出四六牛黃十淨者三百餘元。有等二百餘元。有沽百七八十元。有沽百四五十元。更有百一二十元者。三思之。不禁為服牛黃者悲。又為偽造四六牛黃者更悲。悲其見利忘義。草菅人命。暫願目前。不思後來報應也。

形態 按牛黃為黃色球形。形之塊。大者如雞子。小者若豆粒。質輕虛。壞則中現小白點。此圓塊係薄層重疊而成。試以熱針刺其中。

即有小片剝落。入水微溶解。作黃色。磨於白堊上。其磨處亦作黃色。唾液能溶解之。取少許嚥下。則催起嘔吐。有氣味。

種類 黃牛夜中身上放光。

眼紅如血。時時吼鳴。恐懼人。是時以大盆盛水。置牛前。鳴時。吐出水。中取得後。陰乾百日。勿令見日月。光。每塊大如雞子。輕虛者。名生神黃。價重似黃金。殺死病牛。其黃滲入角中者。名角中黃。牛既病死。殺而割其心。有物如醬水。其色黃。入水即成粘塊。大如豆。蕎麥者。名心黃。殺已死之病牛。於其肝膽中剝得之塊。名肝黃。真者有香氣。輕虛重疊。以指爪摩之。透甲黃。③ 犛牛之黃。出自西番。堅而不香。

製法 雷斅曰。凡使牛黃。用單搗細。研如塵。絹裏定。以黃燉牛皮。裹懸井中一宿。去水三四尺。隔日取之。

性質 苦。平。有小毒。

效能 消熱。利痰。通竅。定驚。用作解熱鎮驚藥。又為解毒藥。

主治 驚癇。寒熱。熱盛。狂癡。除邪。返鬼。(本經) 療小兒百病。諸癩。

二七〇

熱。口不開。大人狂顛。又墮胎。久服輕身。增年。令人不忘。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論牛黃曰。安魂定魄。辟邪。魅。卒中惡。小兒夜啼。【唐】孫思邈千金翼論牛黃曰。益肝膽。定精神。除熱。止驚。辟惡氣。除百病。【宋】日華諸家本草論牛黃曰。主中風。失音。口噤。驚悸。天行時疾。健忘。虛乏。【明】寧原食鑑本草論牛黃曰。清心化熱。利痰涼竅。【明】李時珍本草綱目論牛黃曰。痘瘡。紫色。發狂。諸語者可用。【明】經希雍本草經疏論牛黃曰。牛為土畜。其性甘平。惟食百草。其精華凝結為黃。猶人身之有內丹也。故能解百毒。而消痰熱。散心火。而療驚癇。為世神物。諸藥莫及也。凡牛生黃。則夜視。其身有光。皮毛潤澤。眼如血色。蓋得氣之精。而形質變化。自有異也。或云牛病乃生黃者。非也。本經味苦氣平。別錄有小毒。吳普云。無毒。然必無毒者為是。入足厥陰。少陽。手少陰經。其主小兒驚癇。寒熱。熱。盛。口不能開。及大人癲狂。癩瘡者。皆肝心二經邪熱膠痰為病。心熱

則火自生。肝熱則木自生。風火相搏。故發如上等證。此藥味苦氣涼。入二經而能除熱消痰。則風火息。神魂清。諸證自瘳矣。鬼邪侵著。因心虛所致。小兒百病。多屬胎熱。入心養神。除熱解毒。故悉主之也。性善通竅。故能墮胎。善除熱益心。故能令人不忘。非久服多服之藥。其云輕身延年者。蓋指病去則身自輕安。而得盡其天年也。〔清〕

黃宮繡本草求真論牛黃曰。牛黃味苦性涼。古人用此解心經熱邪。及平肝木。通竅利痰定驚。及痰涎上壅。中風不語等症。綠牛有黃牛之病也。牛黃在於心肝膽之間。凝結成黃。故選以治心肝膽之病。取其長於清心化熱故爾。用此以除驚痰之根耳。至於中風不語。必其邪已入臟。九竅多滯。方可投服。若使中腑。而見四肢不著。中經而見口眼喎斜。不為開痰順氣。養血活血。便用此藥投治。引邪深入。如油入甕。莫之能出。小兒純陽。病多胎熱。痰熱。屬於心肝二經之病。命在須臾者。用此多有回生之力。惟脾胃虛寒者。其切忌之。取麝指甲者

真。牛有黃必多吼喚。以盆水承之。伺其吐出。喝追即墜水。名生黃。如雞子黃大。重疊可揭。殺死自角中得者。名角黃。心中得者。名心黃。肝膽中得者。名肝膽黃。成粒。

國外學說 日本和漢藥考曰。

玉牛黃形球圓或橢圓。或作鈍三角體。色紅黃。天竺牛黃形稍大。然多碎片。又藥肆有呼為四六者。即彙集此等碎片而賣之也。價可較廉。日本產較中國產者略大。帶黑色。得自死牛者。較得自生牛者為佳。其效力不亞於中國產。但牛黃價值既貴。故贗品殊多。一種以白泥和膽汁煉合。製成球形。或破碎片。使凝結成形。一種以鬱金。蒲黃等與膠液調和。凝結而成。皆作偽害人之品也。伊藤傳二曰。余嘗得牛黃少許。略經試驗。悉此藥含有特異之黃色物體。該黃色物體。曾用多數之溶解藥溶化之。其中殆含有鐵質。因嘗取市販質品兩種。燒灰試驗之。並起鐵之反應。故也。此外尚含有複雜之化合物數種。他日苟更有所得。當續行報告。茲將牛黃反應之一部分。舉之如

左。取牛黃約小豆大兩三片。入試驗管中。加入試藥五CC。微熱之。

(一)加冰醋酸。則現綠色。(二)加硫酸。則現深綠色。(三)加鹽酸。不起顯著之色象變化。(四)加硝酸。則呈美庫希狀紅色。受熱則變與金狀赤色。(五)加安母尼亞。則現黃褐色。(六)加加里福汁。則現黃褐色。再加過剩之硫酸。則變綠色。(七)以第一試驗管(即有醋酸牛黃者)放冷。斜置之。俟冷透。以硫酸之同容積傾入。少頃視之。則見下層無色。中層生紅圈。上層現綠色。此反應最銳敏而鮮明。牛黃遇以上各種試驗藥。其溶解之難易。顯有不同。鹽酸幾全不溶解。濃厚之亞兒加里液。幾全溶解。其餘酸類。則半溶解。又牛黃對於數種溶解藥之關係。在水中微溶解。液呈黃色。此液遇利瑪瑪斯紙。殆無變化。在酒精八十分中。與在水中者大致相同。在伊打中。較在水中及酒精中者易於溶解。溶液現黃褐色。任其自乾視之。則留深黃色之渣滓。性粘而有牛黃特異之香。在哥羅仿中。溶解如伊打。現黃綠

色。以牛黃置白金片上熱之。則發含窒素有機體之特異臭氣。如毛羽被燒者然。繼發白色焰而燃燒。終變灰而止。

辨偽 鄧肯嶺曰。牛黃偽者

味苦不香。真者味甜氣香。真牛黃大者如雞子黃。小者如龍眼核。重疊可揭。其質輕虛。氣香有寶色者。佳。如黃土色者下也。出產川蜀者為正地道。喝取者為上。殺取者次之。能辨真牛黃。則假者無論若何造法。可一驗便知耳。曹炳章曰。牛黃者牛之病也。蓋牛食百草。偶誤食鹽氣之草。以致腸胃壅滯。鬱極生火。火炎肝膽。則肝火疏泄。膽汁外溢。凝結成黃。而胃少膽汁。則食物不化。而不嗜食。故肌瘦肉消。黃者乃膽汁日溢。胃中甜肉汁。自外層結。受熱蒸燥。則凝結成顯成塊。漸結漸大。而黃成矣。故黃多生於肝葉傍。傍側際。或另生皮蘊。裹之。或生膽之厚皮處。或生角中。角竅亦屬肝故也。其味苦兼甜者。膽汁與甜肉汁之結晶體也。其氣馨芳者。百草之精氣也。其通竅化濁清火化痰者。此膽之擅長本能也。

用以治人心膽之疾者。同氣相求之義也。然其性涼而有小毒。能治驚癇寒熱中風痰迷有餘之熱症者。乃以毒攻毒也。此發明生黃之理。治病之原。取黃之法。辨黃真偽。再辨於下。羌海雜誌云。牛黃有家黃野黃之分。家畜犛牛。犏牛。黃牛。皆能生黃。凡牛腹生黃。食草不食。行走不捷。目漸瘳立。兩眼胞皆黃色。或眼如血色。或夜分身有光。或鳴吼以恐懼人。計其吐黃之期。須終日按其脈而伺之。仰繫之則不吐。俯繫之則隨吐。隨食。必俯繫之。而以牛舌不能及地為率。又須防其蹄躄也。吐黃以後。牛體頗健。逾恒。如逾期不吐。牛必倒斃。剖腹取之。黃無精氣。非上品也。凡藥肆之常有者。大抵係家牛所吐及剖腹所得者為多。名曰牛黃。然真西黃則惟巖穴叢草中遇之。蓋犀牛吐黃亦隨吐隨食。惟吐藉草之上。吮食不淨。餘液下漏。沉入土中也。然探其穴藉草之下。有土光滑可鑑者。掘之始有犀黃。然亦不多。家牛黃者。色淡黃。紋理細。真犀黃者。金黃色。紋理粗。暑天蚊蟲不集。溼初

沸時。捺末少許撒之。沸湯頓無巨泡矣。取黃染指透爪甲者亦佳。古人取其黃又名照水。以盆注水承之。夜俟其吐水中。喝過而取之。為生黃亦佳。昔以隴西山西出者著名。故曰西黃。即牛黃也。產奉天省地屠牛廠。及與京。桓仁。寬甸。東豐。吉林。黑龍江省等均產。皆名東黃亦佳。近今所謂廣東黃者。皆馬黃也。蘇尖牛黃。即水牛之黃也。近代駱駝黃亦充牛黃。然考駱駝之黃。其形態與功用。確類真牛黃。凡治驚癇風痰熱痰。而功稍遜。惟氣不羸為異耳。惟駝亦食草。食亦反芻。與牛相類耳。至所謂片黃者。類皆南省所產之鱗黃是也。不堪入藥。宜禁除之。

配合應用 ●治初生胎熱。或身體黃者。以真牛黃一豆大。入蜜調齊乳汁化開。時時滴兒口中。形色不實者。勿多服。(錢氏小兒方) ●治小兒熱驚。牛黃一。杏仁大。竹瀝薑汁各一合。和勻與服。(總微論方) ●治驚癇嚼舌。迷悶仰目。牛黃一。豆大。研和蜜水灌之。(廣利方)

●治小兒驚候。小兒積熱。毛焦睡語。欲發驚者。牛黃六分。硃砂五錢。同研以犀角磨汁。調服一錢。(總微論方) ●治小兒驚癇百病。用牛黃。犀角。琥珀。天竺黃。鈎藤。鈎衣。神。真珠。金箔。麝香。丹砂等分。 ●治痘瘡黑陷。牛黃二粒。硃砂一分。研末。蜜浸。熊脂取汁調搽。一日一上。(王氏痘疹方) ●治小兒五色丹毒。用牛黃。犀角。生地黃。牡丹皮。竹葉。麥門冬。 ●治結毒。用牛黃。同鐘乳石。真珠。猪牙皂。角。象牙末。白殭蠶。紅鉛。片腦。明礬。沒藥。蛙竹屑。天蠶。蓋為丸。土茯苓湯下。 ●入外科內服藥。能解疔腫癰疽毒。并可入傳藥。止痛散毒如神。 用量 三分至五分

施用宜忌 凡營分無熱及孕婦禁用。惡龍骨。龍膽。地黃。常山。蜚蠊。畏牛膝。乾漆。人參為之。使得吐丹。菖蒲。利耳目。 ●參攷資料 ●此有四種。喝迫而得者名生神黃。殺死在角中得者名角中黃。牛病死後心中割得者名心黃。初在心中如黃漿汁。取得便投水中。沾水乃硬。如碎痰裂及豆與帝珠子者是也。肝膽中得者名肝黃。大抵皆不及生黃為勝。(雷斅) ●牛黃今出萊州。密州。淄州。青州。鄒州。戎州。牛有黃者。必多吼喚。喝迫而得者謂之生黃。最佳黃有三種。散黃粒如麻豆。漫黃若雞卵。中黃漿在肝膽間。則黃為塊形。有大小。並在肝膽中。多生於犛特牛。其犛牛未聞有黃也。(蘇恭) ●今出登萊州。他處或有不甚佳。凡牛有黃者。身上夜有光。眼如血色。時復鳴吼。恐懼人。又好照水。人以盆水承之。伺其吐出。乃喝迫即墮下水中。取得陰乾。百日一子。如雞子黃大。重疊可揭折。輕虛而香。氣者佳。然人多偽之。試法。但摺摩手甲上。透甲黃者為真。(蘇頌) ●牛黃輕鬆自然微香。西戎有犛牛黃。堅而不香。又有駱駝黃。極易得。亦能相亂。不可不審之。(寇宗奭) ●牛之黃。牛之病也。故有黃之牛多病而易死。諸獸皆有黃。人之病黃者亦然。因其病在心及肝膽之間。凝結成黃。故還能治心及肝膽

之病。正如人之淋石。復能治淋也。按宋史云。宗澤知萊州。使者取牛黃。澤云。方春疫癘。牛飲其毒。則結爲黃。今和氣流行。牛無黃矣。觀此則黃爲牛病。尤可徵矣。(李時珍)

①別錄言牛黃惡龍膽。而錢乙治小兒急驚。疳病涼驚丸。辟香丸。皆兩用之。何哉。龍膽治驚癇。解熱殺蟲。與牛黃主治相近。亦肝經藥也。不應相惡如此。(李時珍)

【牛蒡刺】即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大薊」條。

【牛腦】性質 甘溫。微毒。主治 風眩消渴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛腦曰。脾積痞氣。潤燥。入面脂用。

參攷資料 ①牛腦以水牛黃牛者良。(本草綱目) ②牛熱病死者勿食其腦。令生腸癰。(心鏡)

【牛葶】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【牛薺草】即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳「水英」條。

【牛蜂家】即蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂房」條。

四畫 牛

【牛酸漿】即龍葵之日本名詞。詳「龍葵」條。

【牛臄臄】命名 臄音毗。言其有比列也。牛羊食百葉。與他獸異。故其胃有臄。有蜂窠。亦與他獸異也。臄即胃之厚處。

古醫別名 百藥。(本草綱目) 主治 解熱。水氣。治痢。解酒毒。藥毒。丹石毒。發熱。同肝作生。以煎醋食之。

【牛蒡】見「牛蒡子」條。

【牛蒡子】原名 惡實。命名 本品實狀惡而多刺鈎。故名。

處方用名 大力子。鼠黏子。古醫別名 惡實子。夜刃頭。莠。莠菜。夜叉頭。便牽牛。牛菜子。(本草綱目) 惡疾。莠菜。如意草。道人頭。黍黏子。辟風胡麻。(和漢藥考)

學名 Archium Lappa, L. 外國名詞 Sisymbrium stovirens (拉) Burdock-Seed (英)

基本 屬菊科。藥用牛蒡之種

子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牛蒡子產區甚廣。湖北省宜昌府宜都。資邱。山東。四川。陝西。漢中。均有出產。奉天。吉林。由烟台。牛莊。運來最多。又有由日本幫運來者。日本原無牛蒡子出產。俱係奉天吉林貨。因大連關等屬日本該管。是以由大連運至日本而來。不可不細究。勿妄謂日本出產也。

形態 按牛蒡爲一年生草本。三月抽苗。莖高三四尺。葉大如芋。葉而長。四月開花成叢。色淡紫。結實如楓棧而小。莖上多細刺。百十撥簇之一。株有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。色灰黧。其子實細長扁平。狀似船。底頂有毛。外面色暗灰。

採取 七月間採收子實。曬乾。

製法 雷斅曰。凡使牛蒡子。須用揀淨。只酒并蒸。待有白霜重出。以布拭去。焙乾。搗粉用。或炒香用。

性質 辛平無毒。效能 宣肺。散結。清熱。解毒。爲解熱藥。用於傷風發熱。痧疹。猩紅熱等。兼有消炎鎮痛作用。

主治 明目。補中。除風。傷。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論牛蒡子曰。治風。善腫。諸瘻。【唐】甄權藥性本草論牛蒡子曰。研末。浸酒。每日服三二錢。除諸風。去丹石毒。利腰脚。又食煎熱。按三枚吞之。散諸結節。筋骨煩熱。【唐】蘇恭新修本草論牛蒡子曰。吞一枚。出癰疽頭。【唐】孟詵食療本草論牛蒡子曰。炒研煎飲。通利小便。【金】張元素珍珠囊論牛蒡子曰。潤肺散氣。利咽喉。去皮膚。風。通十二經。【明】李時珍本草綱目論牛蒡子曰。消斑疹。遊。【明】經希雅本草經疏論牛蒡子曰。惡實。本經言辛平。藏器兼苦。入手太陰。足陽明經。爲散風除熱解毒之要藥。辛能散結。苦能洩熱。熱結散則。風氣清明。故明目而補中。風之所傷。衛氣必逆。逆則發熱。辛涼解散。

採取 七月間採收子實。曬乾。

製法 雷斅曰。凡使牛蒡子。須用揀淨。只酒并蒸。待有白霜重出。以布拭去。焙乾。搗粉用。或炒香用。



牛蒡子

採取 七月間採收子實。曬乾。製法 雷斅曰。凡使牛蒡子。須用揀淨。只酒并蒸。待有白霜重出。以布拭去。焙乾。搗粉用。或炒香用。

則表氣和。風無所留矣。故除風傷。藏器主風毒腫諸痿。元素主潤肺。散結氣。利咽膈。去皮膚風。通十二經者。悉此意耳。故用以治癰瘰疔瘡。尤獲奇驗。【清】黃宮繡本草求真論牛蒡子曰。牛蒡子又名惡實。又名鼠粘子。辛苦冷滑。今人止言解毒。凡遇瘡癰癰腫痘疹等症。無不用此以投治。然猶未釋其義。凡人毒氣之結。多緣外感風寒。營氣不從。逆於肉裏。故生癰毒。牛蒡味辛且苦。既能降氣下行。復能散風除熱。是以感受風邪熱毒。而見面目浮腫。咳嗽痰塞。咽間腫痛。瘡癰斑疹。及一切臭毒。癩閉痘瘡紫黑便閉等症。無不藉此表解裏消。但性冷滑利。多服則中氣有損。且更令表益虛矣。至於脾虛泄瀉。為尤忌焉。實如葡萄而褐色。酒拌蒸待有霜拭去用。

近人學說 張山雷曰。牛蒡子始見別錄。本名惡實。一名鼠粘子。李氏綱目。一名大力子。其味則別錄稱其辛平。陳藏器稱其苦。潔古謂之辛溫。今按牛蒡之用。能疏散風熱。起發痘疹。而善通大便。苟非

熱盛。或脾氣不堅實者。投之輒有泄瀉。則幸泄可降。下行之力為多。潔古作溫。景岳又謂其降中有升。皆非真諦。其所以能泄散風熱。透達斑疹。起發痘瘡者。因其質滿體芒刺。如粟如茨。而其子又兩端尖銳。故能宣泄四達。通行經絡。此亦物理自然之性質。本不係乎溫而能升也。別錄稱其明目。則風熱泄而自自明。補中者亦邪熱去而正自安。除風傷者。以風熱言之也。其根莖。則瀨湖綱目謂之苦寒。別錄主治。皆除熱通利之意。蓋其功力本與子相近。而寒涼疏泄之性過之。因皆以清熱泄導為治。凡非實火。未可妄投。藏器謂子主風毒腫諸瘰。根浸酒服。去風及惡瘡。和葉搗敷。杖瘡金瘡。永不畏風。甄權謂子研末。浸酒服。除諸風。去丹石毒。利腰膝。又散諸結。去筋骨間煩熱。毒根莖。主面目煩悶。四肢不健。通十二經脈。孟詵謂子炒研煎飲。通利小便。根消腫脹。葉作泄瀉。去皮間風熱。習習如蟲行。入鹽花搗敷。一切毒腫。潔古謂子潤肺散氣。利咽膈。去皮膚風。通十二經。瀨湖謂

子消斑疹毒。景岳謂散瘡癰腫毒。喉痺。凡此功用。無一非清熱泄降消導之力。然凡肺邪之宜於透達而不宜於抑降者。如麻疹初起。猶未發泄。早投清降。則恒有遏抑氣機。反致內陷之虞。惟牛蒡則清泄之中。自能透發。且溫熱之病。大便自通。亦可少殺其勢。故牛蒡最為麻疹之專藥。餘如血熱發斑。濕熱發瘡。皆以此物外透其毒。內泄其熱。表裏兼順。亦無疑忌。非其他之寒涼清降可比。慎不可謂牛蒡泄降。宜於斑疹。而與岑地知存玄參等物一例視之。若此外癰腫水腫等證。則有非熱結。慎弗輕用。局方已有大便利者。弗服之禁。石頑亦謂氣虛色白。大便利者。不宜用此。櫻仲醇亦謂惟宜於血熱便閉之證。若俗醫止以為時病發散之通。用則此中之疑似辨別。皆未之知矣。

- 配合應用 ①牛蒡子同赤糧木為瘡家要藥。
- ②治風熱癰毒。用牛蒡子同浮萍等分為末。薄荷湯下。每服二錢。日送二服。
- ③治天行痘瘡。血熱。乾枯不得出。用牛蒡子同紫草。犀角。生地。黃。兩。炒研為末。每溫水服二錢。日三服。【聖惠方】
- ④治風熱浮腫。咽喉閉塞。牛蒡子一合。半生牛熟為末。熱酒服一寸匕。【經驗方】
- ⑤治痰厥頭痛。牛蒡子炒。旋覆花等分為末。臘茶清服一錢。日二服。【聖惠方】
- ⑥治頭痛速晴。牛蒡子。石膏等分為末。清茶調服。【醫方摘要方】
- ⑦治咽膈不利。疏風壅滯。牛蒡子。散炒。荊芥。穗一兩。炙甘草半兩。為末。食後湯服二錢。當緩緩取效。【寇氏方】
- ⑧治惡癰喉痛。風熱上搏也。牛蒡炒。甘草生等分。水煎含嚥。名啓關散。【普濟方】
- ⑨治喉痺腫痛。牛蒡子六分。馬蘭子六分。為散。每空心溫水服方寸匕。日再服。仍以牛蒡子三兩。鹽二兩。研勻炒熱。包熨喉外。【廣利方】
- ⑩治咽喉腫痛。牛蒡子二錢。桔

根一錢半。粉甘草節七分。水煎服。

(痘疹要訣方)

①治風熱癢疹。牛蒡子炒。浮萍等分。以薄荷湯每服二錢。日二服。

(古今錄驗方)

②治風齩牙痛。牛蒡子炒煎水含漱吐之。(延年方)

③治小兒痘瘡。時出不快。壯熱狂躁。咽喉壅塞。大便秘澀。小兒咽喉腫不利。若大便利者勿服。牛蒡子炒一錢二分。荊芥穗二分。甘草節四分。水一盞同煎。至七分溫服。已出亦可服。名必勝散。(和劑局方)

④治婦人吹乳。牛蒡一錢。麝香少許。溫酒細吞下。(袖珍方)

⑤治便毒腫痛。牛蒡子二錢。炒研末。入蜜一匙。朴硝一匙。空心溫酒服。(袖珍方)

⑥治蛇蝎蟲毒。牛蒡子煮汁服。(衛生易簡方)

⑦治水腫腹大。牛蒡微炒一兩。爲末。麩糊丸。梧子大。每米飲下十丸。(張文仲方)

⑧治歷節腫痛。風熱攻手指。赤腫麻木。甚則攻肩背兩膝。過暑熱

則大便秘。牛蒡子三兩。新豆豉炒。羌活各一兩。爲末。每服二錢。白湯下。(本事方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無寒熱者禁用。

參攷資料 ①牛蒡生魯山。魯山在鄆州東北。此草葉大如芋。子殼似粟狀。實細長如芫薺子。(蘇恭)

②牛蒡子其用有四。治風濕癢疹。咽喉風熱。散諸腫瘡。癩之毒。利凝滯。脹膝之風是也。(李杲) ③實殼多刺。鼠過之則緩。不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊負來之比。(蘇頌) ④惡質即牛蒡子也。處處有之。葉大如芋葉而長。實似葡萄核而褐色。外殼似栗核而小如指頭。多刺。根有極大者。作菜茹。益人秋後菜子入藥。(蘇頌) ⑤其實狀惡而多刺。鈎故名。其根葉皆可食。人呼爲謂菜。術人隱之呼爲大力也。俚人謂之便牽牛。河南人呼爲夜叉頭。(李時珍) ⑥牛蒡子古人種子以肥壤栽之。薊苗洵洵爲蔬。取根煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。三月生苗起莖。高者三四

尺。四月間花成莖。淡紫色。結實如楓。核而小。莖上細刺百十。攢簇之一株有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。其色灰黝。七月採子。十月採根。(李時珍)

【牛蒡根】 古醫別名 茄根。(和漢藥考) 蝠蝠刺。

(本草綱目)

外國名詞 Burdock-root

(英) 基本 屬菊科。藥用牛蒡之根莖。

形態 牛蒡爲二年生草本。多自生山中。菜園亦栽種之。莖高自二三尺至四五尺。葉巨大。作心臟形。前端尖。背生白毛。密布如棉。且甚粗糙。有長葉柄。初夏之交。梢頭開帶紫色似筒之花。排列爲頭狀花序。其總苞簇生細小之鱗片。果實爲複果。短而有鉤。易附他物。根多直而肥。長可一二尺。周圍六七寸。根皮外帶黑而內似白。堪作蔬菜食。其根爲紡錘狀之直根。橫斷用之。皮部色灰褐。有縱裂。內面色黃白。味稍苦。性粘滑。

採取 十月採根日乾。須揀取

經過兩年以上者佳。

製法 陳藏器曰。根須蒸熟。暴乾。用。不附。令人欲吐。

性質 苦寒無毒。

成分 牛蒡根多纖維質。供食用。難消化。以生根分析之。得水分七三·九二。蛋白質三·二〇。脂肪〇·一三。炭水化合物二〇·六一。纖維一·九四。炭分〇·八二。有植物粘液質。糖分。單寧酸。苦味質及伊努林等。

效能 用治腳氣。中風。疥癬諸症。

主治 傷寒寒熱。汗出中風。面腫消渴。熱中逐水。久服輕身耐老。

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新修本草論牛蒡根曰。根主牙齒痛。勞瘵諸風。脚緩弱。風毒癰疽。咳嗽傷肺。肺壅疝癥。冷氣積血。【唐】陳藏器本草拾遺論牛蒡根曰。根浸酒服。去風及惡瘡。和葉搗碎。傅杖瘡。金瘡。永不畏風。【唐】甄權藥性本草論牛蒡根曰。主面目煩悶。四肢不健。通十二經絡。洗五臟惡氣。可常作菜食。令人身輕。【唐】孟詵食療本草論牛蒡根曰。切根并豆

四畫 牛

四畫 牛

麩作飯食。消腫脹壅。莖葉煮汁作浴湯。去皮間習習如蟲行。又入鹽花生搗。搗一切毒腫。

配合應用 治時氣餘熱不退。煩燥發渴。四肢無力。不能飲食。用牛蒡根搗汁。服一小盞效。(聖惠方)

治天行時疾。生牛蒡根搗汁五合。空腹分爲二服。服訖。取莖葉一把。炙黃。以水一升。煮取五合。頓服。取汁。無葉用枝。(孫真人食忌方)

治熱攻心煩恍惚。以牛蒡根搗汁一升。食後分爲二服。(食醫心鏡方)

治傷寒瘧瘧。汗後覆蓋不密。致腰背手足搐搦者。牛蒡根散主之。牛蒡根十條。麻黃。牛膝。天南星。各六錢。到於盆內。研細。好酒一升。同研。以新布絞取汁。以炭火半秤。燒一地坑。令赤。掃淨。傾藥汁入坑內。再燒。冷黑色。取出。於乳鉢內細研。每服一錢。溫酒下。日三服。(活人書方)

各三升。用袋盛藥。浸無灰酒三升內。每任意飲之。(外臺祕要方)

治老人中風。口目掉動。煩悶不安。牛蒡根切一升。去皮晒乾。杵爲麩。白米四合淘淨。和作餠。餠。鼓汁中。煮。加葱椒五味。空心食之。恒服極效。(壽親養老書方)

治老人風濕。久痺筋攣骨痛。服此壯腎潤皮毛。益氣力。牛蒡根一升。切。生地黃一升。切。大豆二升。炒。以絹袋盛。浸一斗酒中。五六日。空心溫服。二三盞。日二服。(集驗方)

治頭面忽腫。熱毒風氣內攻。或連手足赤腫。觸着痛者。牛蒡子根一名蠅蝟刺。洗淨研爛。酒煎成膏。絹攤貼腫處。仍以熱酒服一二匙。腫消痛滅。(斗門方)

治頭風掣痛不可禁者。磨骨主之。取牛蒡莖葉。搗取汁二升。無灰酒一升。鹽花一匙。頭棘火煎稠成膏。以厚布貼。風毒自散。摩時須極力令熱。乃效。冬月用根。(醫中方)

治喉中熱腫。牛蒡根一升。水五升。煎一升。分三服。(延年方)

治小兒咽腫。牛蒡根搗汁細碾之。(普濟方)

治熱毒牙痛。熱毒攻風頭面。齒齦腫痛不可忍。牛蒡根一斤。搗汁入鹽花一錢。銀器中熬成膏。每用塗齒齦上。重者不過二三度。瘥。(聖惠方)

治項下瘰癧。牛蒡子根一升。水三升。煮取一升。分三服。或爲末。蜜丸。常服之。(救急方)

治耳卒腫痛。牛蒡根切。絞汁。二升。銀鍋內熬存塗之。(聖濟方)

治諸瘡腫毒。牛蒡根三莖。洗煮爛。搗汁。入米煮粥。食一椀。甚良。(普濟方)

治積年惡瘡。反花瘡。漏瘡。不瘥者。牛蒡根搗。和臘月豬脂。日月封之。(千金方)

治月水不通。結成癥塊。腹肋脹大欲死。牛蒡根二斤。到蕪三遍。以生絹袋盛之。以酒二斗。浸五日。每食前溫服一盞。(普濟方)

用量 三錢至四錢

參攷資料 根作脯食甚良。莖葉宜煮汁醃酒服。冬月採根。蒸暴入藥。掌禹錫傳信方。蘇恭中風。

二七六

用緊細牛蒡根。取時避風。以竹刀或荊刀刮去土。生布拭搗。絞取汁一大升。和好蜜四大合。溫分兩服。得汗出便瘥。此方得之岳鄂鄭中丞。鄭因食熱肉一頓。便中暴風。外甥盧氏爲穎陽令。以此方服之。當時便瘥。(蘇頌)

昔島原侯侍臣名佐久間文次者。家有僕某。一旦手指腫。患之漸及腕。且痛甚。佐久間見之。大驚。立命藩醫治。藩醫斷之爲脫疽。治之無寸效。僕偶奉主命。赴某家。某家有老嫗。見僕手指腫。其嫗之語之曰。生牛蒡葉搗爛。加食鹽茶糊和貼患處。數日即愈也。僕喜其歸。即後。隨購牛蒡葉。如嫗言試之。無何。痛漸減。腫亦消。三日而全愈。此係伊澤繁安所說。前翠柏軒聞其驗如此。爰筆之於書。即遇四肢關節焮痛。用之亦能消散。冬日無藥。則如方書所云。以根代之。惟根之效力弱於葉。乃依肘後方。以牛蒡葉製膏。收貯備用。會又有老婦患頭痛。諸醫皆束手。脈諸隱士。隱士給此膏少許。令擦之。俄而頭痛愈。厥後施諸風頭痛。梅萎頭痛。歷節風等。靡不驗。(日本

成百種士類(錄)

【牛蒡酒】 基本 乃牛蒡根切片所浸之酒。

主治 諸風毒。利腰膝。

【牛領藤】 命名 本品形扁如牛領故名。

產地 出嶺南高山中。

形態 牛領藤為蔓草類之一種。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 腹內冷痛。膝弱。小便白。數。陽道乏者。煮汁服。或浸酒服。

【牛鼻】 主治 消渴。同石燕煮汁服。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論牛鼻曰。治婦人無乳。作羹食之。不過兩日。乳下無限。氣壯人尤效。【宋】寇宗奭本草衍義論牛鼻曰。療口眼喎斜。不拘乾濕者。以火炙熱。於不患處熨之。即漸止。

參攷資料 牛鼻以水牛者良。(本草綱目)

【牛鼻拳】 基本 本品乃穿牛鼻繩木。

主治 木拳主小兒癩。草拳燒研。傳小兒鼻下疳。

四畫 牛

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論牛鼻拳曰。草拳灰吹喉風有效。木拳煮汁或燒灰。治消渴。

【牛蒡子】 卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠李子」條。

【牛膝】 命名 本品莖有節似牛膝故名。

處方用名 川牛膝。懷牛膝。淮牛膝。

古籍別名 百倍。(本經)牛莖。(廣雅)山莧菜。(救荒本草)對節菜。(本草綱目)

外國名詞 Achyranthes didontata, Bl. var. japonica, Mig. (拉丁)

基本 屬苋科植物。藥用牛膝之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。淮牛膝產河南淮慶府。武陟。溫。三縣。十一月收。成。杜牛膝產四川龍安府。味甘。冬季出新。川牛膝味苦。鮮。產湖北舊宜昌府。宜都縣。興山縣。資邱鎮。陝西舊興安府。漢中府。四川巫山縣等處。均有出產。

形態 按牛膝為自生之多年

生草本。春日抽苗。高自一二尺至三四尺。莖稍方。色青紫。有膨大之節。狀若牛之膝蓋。故名。葉對生。作長卵圓或橢圓形。全緣。皆尖。夏開花於梢頭及葉腋。五瓣。色綠。大祇分許。綴為穗狀花序。結實皆向下。果實存於莖內。為長橢圓形之小胞。多刺毛。易惹附衣服。別有一種名柳葉牛膝 (Achyranthes didontata, Bl. var. longifolia, Makino.) 葉長如披針。而稍滑澤。山林陰濕之地。處處有之。根為黃白色之長根。長六七寸至尺許。野生者。短瘠。堅實。移種沃壤。而培養之。則肥大而柔潤。

採取 八月十月間採根陰乾。



牛膝

製法 雷斅曰。凡使牛膝。須去頭蘆。以黃精自然汁浸一宿。漉出。剉焙乾用。李時珍曰。今惟以酒浸入藥。欲下行則生用。滋補則焙用。或酒拌蒸過用。

性質 苦酸。平。無毒。

效能 補肝腎。強足膝。散惡血。治痿躄。用治骨節疼痛及淋病藥。

主治 寒濕痿痺。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。久服輕身耐老。(本經)療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。益精。利陰氣。填骨髓。止髮白。除腦中痛。及腰脊痛。婦人月水不調。血結。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論牛膝曰。治陰痿補腎。助十二經脈。逐惡血。【宋】大明日華諸家本草論牛膝曰。治腰膝軟弱。破癥結。排膿止痛。產後心腹痛。并血暈。落死胎。【宋】寇宗奭本草衍義論牛膝曰。牛膝從發浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛。卷之。即出。

【元】王好古湯液本草論牛膝曰。強筋。補肝。散風。虛。【明】李時珍本草綱目論牛膝曰。治久癩寒熱。五淋。尿血。莖中痛。下痢。喉痺。口瘡。齒痛。癰腫。惡瘡。傷折。【明】釋希雍本草經疏論牛膝曰。牛膝味苦酸。平。無毒。味厚氣薄。走而能補。性善下行。故入肝腎。主寒濕痿痺。四肢拘攣。

四盡牛

稟。膝痛不可屈伸者。肝脾腎虛。則寒濕之邪客之而成痺。及病四肢拘攣。膝痛不可屈伸。此藥性走而下行。其能逐寒濕而除痺也必矣。蓋補肝則筋舒。下行則理膝。行血則痛止。逐血氣。猶云能通氣滯血。凝也。詳藥性氣當作痺。傷熱火爛。血焦枯之病也。血行而活。痛自止矣。入肝行血。故墮胎傷中少氣男子陰消。老人失溺者。皆腎不足之候也。腦為髓之海。腦不滿則空而痛。腦乃腎之髓。脊通髓於腦。腎虛則少。則腰脊痛。血虛而熱。則髮白。虛風勞頓。則傷絕。肝藏血。腎藏精。峻補肝腎。則血足而精滿。諸證自瘳矣。血行則水自適。血結自散。久服輕身耐老。悉如上說。不復具疏。【明】李士材本草圖解論牛膝曰。牛膝苦酸。腎肝藥也。補腎強陰。理腰脊膝脛之傷。補肝強筋。理血結拘攣之症。療淋家莖痛欲死。止久瘡寒熱不休。能落死胎。出竹木刺。按五淋諸症。極難見效。惟牛膝一雨。入乳香少許。煎服數劑。即安。任主下行。且能消痰。夢遺精者。在所當禁。尚千古神藥也。欲下行

則生用。滋補卽酒炒。【清】黃宮繡本草求真論牛膝曰。牛膝苦酸而平。按據諸書。雖載酒蒸溫補肝腎。強健筋骨。凡足痿筋攣。陰痿失溺。久瘡下痢。傷中少氣。治皆有效。又載生用則能活血。破瘀消腫。治痛通淋。引藥下行。但下部經絡血分鮮氣。則可。若使肺分氣薄。遺脫泄瀉。則又當知戒忌。不可因其氣虛而概用之。出於川者。性味形質。雖與續斷相似。服之可無精滑之弊。然肝主司疏泄。腎主閉藏。此則疎泄獨具。而鮮固鬱。書云益腎。殊覺未是。杜牛膝氣味更涼。嚼之味甘而不苦。主治多是解毒破血。消熱吐痰。較之川牛膝。微覺有別。牛膝出西川及懷慶府。長大肥潤者良。下行生用。入滋補藥酒蒸。【清】葉天士本草經解論牛膝曰。牛膝氣平。稟天秋降之金氣。入手太陰肺經。味苦酸無毒。得地木火之味。入足厥陰肝經。手厥陰心包絡。氣味俱降陰也。肺熱葉焦。發為痿痺。牛膝苦平清肺。肺氣清則通調水道。寒濕下逐。營衛行而痿痺愈矣。濕熱不燥。則大筋筋短。而四肢拘攣。

膝痛不可屈伸矣。牛膝苦酸。酸則舒筋。苦除濕熱。所以主之也。逐血氣者。苦平下洩。能逐氣滯血凝也。傷熱火爛者。熱湯傷火傷瘡也。苦平清熱。酸能收斂。則痛止而瘡愈也。苦味伐生生之氣。酸滑傷厥陰之血。所以墮胎。久服則血脈流通無滯。所以輕身而耐老也。【清】徐洵溪本草經百種錄論牛膝曰。此乃以其形而知其性也。凡物之根。皆橫生而牛膝獨直下。其長細而韌。酷似人筋。所以能舒筋道。脈下血降氣。為諸下達藥之先道也。筋屬肝。肝藏血。凡能舒筋之藥。俱能治血。故又為通利血脈之品。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。川牛膝者。出於蜀之川州。上品也。日本產有二種。採野生者。培養數年。名真牛膝。採自山野者。名土牛膝。皆屬下品。較來自中國之牛膝。根短而且不潤。中心味先苦後甘。其來自中國者。根長二三尺。肥軟而潤。色黃白。切斷視之。中有小白心。其味先甘後苦。此為上品。今試以柳葉牛膝。晒乾。驟視之。與中國產無異。實則尚有分別。因植語沃

二七八

壤者。其根肥大。固無差別。若野生者。其根瘠短。仍顯然不同也。用藥須知曰。牛膝不論中日產。皆真。但野生之土牛膝。不堪用。須經培養。方可入藥。與附子同。古今要覽稿曰。本草原始所圖之牛膝。根之形狀不同。獨根者為雄。多歧者為雌。竹之有獨枝雙枝者。亦由於雌雄也。但其說近於附會。岡村尙謙曰。凡治腰膝疼痛。癱瘓。經閉。淋病。血尿等症。山野自生之牛膝。皆可用。不必選其似莧葉與似柳葉也。惟舊說終以長大柔潤者為佳。此中日服食家所共表同情者。蓋以其用為滋補傷中之藥。殆不得不然耳。實則取山野自生者。晒乾用之。與自行培養者。何異耶。

辨偽 鄧育巖曰。偽名洋牛膝。與懷牛膝色不同。而性自異。按牛膝今時用根。味甘臭酸。其性微寒。惟懷慶及川中出者。為真根。皆長大柔潤。近道雖有。謂之土牛膝。別有治法。古方尚不用之。現此種洋牛膝。平。曹炳章曰。牛膝計有三種。功用各有專能。河南淮慶產者。曰淮牛膝。根長二三尺。肉肥色

黑白。皮光潔性糯。枝粗者佳。天津產者皮黃粗糙。有軟刺不圓。性硬者次。四川產者曰川牛膝。根莖粗無蘆。色黃黑。枝粗軟糯者良。去頭梢用。浙江各地出者曰杜牛膝。紫梗綠葉。對節而生。葉頗類芎。根細短。含有滑汁。治喉症能引吐惡痰。滋痰。利小便。進牛膝補筋健骨。滋肝腎之功。如牛之有力也。故名川牛膝。祛風利下焦。濕。種類不同。效用亦異。

近人學說 張山雷曰。川牛膝之名。不見於古書。惟張石頑本經逢原。謂慎產者長而無旁鬚。水道滯者宜之。川產者細而微黑。精氣不固者宜之。又謂川產氣味形質。與續斷彷彿。用之無精滑之虞。是牛膝之川產者。不專以滑泄見功。而宜通關節之力則一。頗爲有利無弊。肝腎陰虛。而機關不利者宜之。但今時市肆中之所謂川牛膝。則其形甚大。而性質空鬆。又與石頑之說不類。然用之於肩背手臂。疏通脈絡。流利骨節。其效頗著。蓋其質空疎。則其力能旁行上達。以視懷牛膝之堅實直下者。功用

大有區別。而世俗恒以川膝僞膝。視爲一類二種。隨筆拈來。含混用之。不知分別。誤矣。又曰。牛膝之根。一莖直達。入土最深。長者二三尺。性又柔潤多脂。故惟滑利下行。是其專職。又味苦性降。清熱降火。以外。已無餘義。古今主治。利腰膝。通經絡。破瘀活血。消積導滯。清利二便。皆在此範圍之內。張景岳謂其走十二經絡。亦即通經活絡之意。近又用以治咽喉口舌諸瘡。及胃火齒痛。皆有捷效。則皆實熱壅塞。氣火上炎。取其開泄宣通。導之下達耳。但其性直下。雖能通經絡而利機關。亦惟股膝足脛諸證。最爲捷應。而手臂肩背之病。亦非懷慶牛膝所能呈功。則以根莖下達。固不能橫行而上升也。又曰。牛膝乃流利疏通之品。古人稱其治痺痛。起痿弱。乃指濕熱壅積者言之。疏通而宣導之。則濕熱去而痿廢起。且下降滑泄之質。氣味必偏於寒涼。苟非濕火鬱滯。豈宜妄用。本經主寒濕。據太平御覽所引。則本是誤字。別錄補綴絕。填骨髓等句。未免言過其實。乃後人因此而變本

加厲。甄權直謂之補腎。海藏直稱其強筋補肝。寇宗奭亦謂同菴登。浸酒服益腎。是皆以疏通利之。物誤認其有滋填補益之功。寧有是理。乃景岳和之。更稱其助一身元氣。補髓填精。益陰活血。治腰膝痠疼。滋髮髮枯白。種種功用。更是可駭。其誤皆本於別錄之中。補綴絕等說。雖曰以通爲補。濕熱除則真陰長。其意亦無甚背謬。究之祛邪之品。與養正之功。必不可渾而爲一。試即以景岳之書證之。於補髓填精數句之下。即繼之曰。其性下走如奔。故能通經閉。破血瘀。則忽而大補。忽而大攻。自盾自矛。豈不令人捧腹。抑何信手拈來。而不顧其理。至於此極耶。景岳又謂藏寒便滑。下元不固者禁用。石頑亦謂性滑利。凡氣虛下陷。大便秘滯。夢遺精滑。妊娠崩漏。俱當禁用。石頑又謂此物專司疏泄。世俗妄謂益腎。而於培養下元藥中用之。則與延益入室何異。吳儀洛本草從新。亦謂氣虛下陷。因而足踏浮腫者。大忌牛膝。願按李瀕湖修治法。謂欲其下行則生用。滋補則酒

并蒸過用。蓋卽畏其滑泄。而借酒之上行。以監制之。然此物本非補益之品。亦何必多此一番矯揉造作。考李氏綱目。又謂牛膝得酒則補肝腎。且謂其治腰膝骨痛。足痿陰消。失溺久瀉。傷中少氣諸病。皆補肝腎之功。是瀕湖亦誤以爲補劑。此手頭極熱之藥。最易誤用。不可不正。又外臺祕要。以牛膝治癰。本文明謂治勞瘵積久不止。蓋癰病既久。必有痰濕互結。如癰母之類。非得消堅破積之品。不止。而一味牛膝能治之。則其消導之力。甚猛。正與破癥墮胎。通血結諸條。同其功用。何瀕湖反謂其補肝腎。亦不思之甚矣。

配合應用 ●治諸痺。用牛膝。同朮。仙茅。木瓜。石斛。茯苓。石南葉。五加皮。草薢。生地黃。黃香。芍藥。虎骨。沈香。桂。

●治一切痿痺。四肢拘攣。筋骨疼痛。用牛膝。同甘菊花。石斛。木瓜。何首烏。生地黃。虎骨。沈水香。人參。朮。黃香。天門冬。麥門冬。杜仲。續斷。芍藥。橘皮。黃蘗。桑寄生。白蘇皮等分。

四畫 牛

四畫 牛

① 治胞衣不下。用牛膝、當歸、地黃、加朴硝。能下死胎。

② 治鶴膝風。用牛膝、木瓜、石斛、草薢、生地、黃蘗、五加皮、骨碎補、續斷、金銀花、白芍、芍藥、甘草、甘菊、根、紫花地丁、茜草、蓮翹等分。

③ 治瘡在陰分久不瘥者。用牛膝根苗二三兩。濃煎。調鼈甲末三錢。空心服。三劑必已。胃虛者加人參兩許。橘皮去白五錢。

④ 治勞瘵積久不止者。長牛膝一握。生切。以水六升。煮二升。分三服。清早一服。未發前一服。臨發時一服。(外臺祕要方)

⑤ 治消渴不止。下元虛損。牛膝五兩。爲末。生地黃汁五升。浸之。日曝夜浸。汁盡爲度。蜜丸梧子大。每空心溫酒下三十丸。久服壯筋骨。駐顏色。黑髮。津液自生。(經驗方)

⑥ 治卒暴癱疾。腹中有如石刺。晝夜啼呼。牛膝二斤。以酒一斗。漬之。密封於灰火中。溫令味出。每服五合至一升。隨量飲。(肘後方)

⑦ 治痢下腸澼。凡痢下。應先白後赤。若先赤後白。爲腸澼。牛膝二兩。搗碎。以酒一升。漬經一宿。每服

一兩。每日三服。(肘後方)

⑧ 萬病丸。治女人月經淋閉。月信不來。邊脚寒疝痛。及產後血氣不調。腹中結積。散諸病。牛膝酒浸一宿。焙乾。漆炒。令煙盡。各一兩。爲末。生地黃汁一升。入石器內。慢火熬至可丸。丸如梧子大。每服二丸。空心米飲下。(拔萃方)

⑨ 治婦人血虛發熱。內熱口乾。舌苦。用牛膝、青蒿、生地、黃麥門冬、甘枸杞子、熬膏。

⑩ 治小便不利。壅中痛欲死。兼治婦人血結。腹堅痛。鮮牛膝三四兩。白酒煎。濃服之。立愈。

⑪ 治婦人陰痛。牛膝五兩。酒三升。煮取一升半。去滓分三服。(千金方)

⑫ 治生胎欲去。牛膝一握。搗。以無灰酒一盃。煎七分。空心服。仍以獨根土牛膝。塗麝香。插入牝戶中。(婦人良方)

⑬ 治產後尿血。川牛膝水煎。類服。(薛氏補遺方)

⑭ 治喉痺乳蛾。新鮮牛膝根一握。艾葉七片。搗和人乳。取汁。灌入鼻內。須臾。痰涎從口鼻出。即愈。無

艾亦可。一方牛膝搗汁。和陳醋。灌之。

⑮ 治口舌瘡爛。牛膝浸酒。含漱。亦可煎飲。(肘後方)

⑯ 治牙齒疼痛。牛膝研末。含漱。亦可燒灰。(千金方)

⑰ 治折傷閃肭。土牛膝搗。爲之。(衛生易簡方)

⑱ 治金瘡作痛。生牛膝搗。敷立止。(梅師方)

⑲ 治卒得惡瘡。人不識者。牛膝根。搗數之。(千金方)

⑳ 治癰節已潰。用牛膝根。略刮去皮。插入瘡口中。留半寸在外。以嫩橘葉及地錦草各一握。搗其上。牛膝能去惡血。二草溫涼止痛。隨乾隨換。有十全之功也。(陳日華經驗方)

㉑ 治風瘙癢疹。及瘡癩。牛膝末酒服。方寸匕。日三服。亦治骨疽癩病。(千金方)

用鹽 錢半至三錢。
施用宜忌 凡氣虛下陷諸症。禁用。惡蠶火。龜甲。陸英。畏白前。忌牛。牛乳。
參攷資料 ① 牛膝能引諸藥

下行。筋骨痛風在下者。宜加用之。凡用土牛膝。春夏用葉。秋冬用根。惟葉汁效尤速。(朱震亨) ② 今江淮閩粵閩中亦有之。然不及懷慶者爲真。春生苗。莖高二三尺。青紫色。有節如鴉膝。及牛膝頭。葉尖圓如匙。兩兩相對。於節上生花。作穗。秋結實。甚細。以根極長。大至三尺。而柔潤者爲佳。其莖葉亦可單用。(蘇頌) ③ 陳日華經驗方云。方夷吾所編集要方。予刻之。臨汀後在鄂。洛得九江守王南強書云。老人久苦淋疾。百藥不效。偶見鷓鴣打菜。要方中用牛膝者。服之而愈。又葉朝議親人患血淋。流下小便。在盆內。凝如筠筒。久而有變。如鼠形。但無足爾。百治不效。一村醫用牛膝根煎。濃汁。日飲五服。名地髓湯。雖未卽愈。而血色漸淡。久乃復舊。後十年病又作。服之又癒。因檢本草。見肘後方治小便不利。壅中痛欲死。用牛膝并葉。以酒煮服之。今再拈出。表其神功。又按楊士瀛直指方云。小便淋痛。或尿血。或沙石。痛。用川牛膝一兩。水二盞。煎一盞。溫服。一時愈。此近十年服之得效。

土牛膝亦可。或入麝香乳香尤良。
 (李時珍) ①本經又名百倍。隱語也。言其滋補之功如牛之多力也。其葉似莧。其節對生。故俗有山莧對節之稱。(李時珍) ②牛膝處處有之。謂之土牛膝。不堪服食。惟北土及川中人家栽蒔者為良。秋間收子。至春種之。其苗方莖。葉皆對生。頗似莧菜。而長且尖。輪秋月開花。作穗結子。狀如小鼠。負蟲有渣毛。皆貼莖倒生。九月末取根。水中浸兩宿。揆去皮。萎紫暴乾。雖白直可貴。而揆去白汁入藥。不如留皮者之力大也。嫩苗可作菜茹。(李時珍)

【牛膝莖葉】

主治 寒濕痿痺。老癆淋瀝。諸瘡。功同根。春夏宜用之。

配合應用 ①治氣濕痺痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切碎。以米三合。於煎汁中煮粥。和鹽。時空腹食。(聖惠方)

②治老瘡不斂。牛膝莖葉一把。切。以酒三升。漬服。令微有酒氣。不即斷。更作。不過三劑止。(肘後方)

③治溪毒寒熱。東間有溪毒中

四畫 牛

人。似射工。但無物。初病寒發熱。煩燥。骨節強痛。不急治。生蟲食。殺。人。用雄牛膝莖。紫色節大者。一把。以酒水各一盃。同搗絞汁。溫飲。日三服。(肘後方)

④治眼生珠管。牛膝并葉搗汁。日點三四次。(聖惠方)

【牛膝酒】

製法 用牛膝煎汁。袋盛。浸酒。煮飲。

主治 壯筋骨。治痿痺。補虛損。除久瘧。

【牛膝蛙】

命名 本品即生於牛膝草節中之蛙蟲。故名。

主治 指頭腫毒。疼痛。用香油浸製傳之。

【牛膠】即牛皮膠之簡稱。詳「牛皮膠」條。

【牛莖】即西草之古籍別名。典見綱目。詳「西草」條。

【牛蠶】古籍別名。牛蠶。(本草綱目)

外國名詞 *Heomatopinus*
Virid (拉丁) *ウシジラミ* (日本)

基本 係節肢動物。昆蟲類。有吻類。鱗科。藥用寄生牛體之蟲。形態 牛蠶為寄生蟲類之一種。狀如蓖麻子。有黑白二色。嘔血滿腹時。則自墜落。

採取 夏秋間。採其白色者。入藥用。

主治 預解小兒痘疹毒。焙研服之。

參攷資料 牛蠶古方未見用者。近世預解痘毒方時。或用之。按高仲武痘疹管見云。世俗用牛蠶治痘。考之本草不載。竊恐牛蠶吸血。例比蠶蟲。終非痘家所宜。而毒亦未必能解也。(李時珍)

【牛齒】參攷資料 六齋齋治六癩。皆比類之義也。耳珠先生有固牙法。用牛齒三十枚。瓶盛。固濟。煨赤。為末。每以水一盞。米二錢。煎熱。含漱。冷則吐去。有損動者。以末搯之。此亦以類從也。(李時珍)

【牛蕉子】芭蕉之浸冬不凋。四季恒實。中抽一梗。長數尺。節節有花。花根葉根有實。肉如綠柿。味極甘冷者。性質功能詳「芭蕉」條。

【牛蹄甲】即牛蹄之古籍別名。典見綱目。詳「牛蹄」條。

【牛蹄甲】主治 婦人崩中。漏下赤白。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛蹄甲曰。燒灰水服。治牛癩。和油塗腫瘡。研末貼臍。止小兒夜啼。

參攷資料 牛蹄甲以背牛者良。(本草綱目)

【牛遺】即車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【牛頭】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。見「大棗」條。

【牛頭香】即沉香之形似牛者。詳「沉香」條。

【牛頭蹄】性質 涼。主治 下熱風。

參攷資料 ①牛頭蹄以水牛者良。(本草綱目) ②牛蹄中巨筋。患冷人不宜食。多食令人生肉刺。(食經本草)

二八一

【牛欄藤】陸地 生深山中。形體 牛欄藤為莖

四盡牛

草類之一種。大如樹莖。中有粉。牛好食之。莖葉可供食用。

性質 甘溫無毒。

主治 救荒。令人不餓。

參攷資料 牛爛藤之根。食之令人髮落。(陳藏器)

【牛膽】 處方用名 牛膽汁。煉牛膽汁。淨牛膽汁。

古醫別名 陰獸當門。(和漢藥考)

外國名詞 Fol Bovinum. Fol Tauri. (拉丁) Ox-bile. Ox-gall (英) Oelsgall (德)

基本 屬反芻類。藥用牛之膽汁。形態 牛大於馬。四肢短而力強。末端有二蹄。體軀偉大。全身有短毛。色黑。或褐。或黃。或雜色。尾細長。牝牡俱有變角。矗立頭上。其角自前頭骨突出。被以上皮。呈角質狀。前額扁平。鼻頭闊大。喉下有垂肉。牛為草食動物。故其齒牙特異。上顎無門齒。但覆以厚皮。犬齒在下顎。凡三十二枚。白齒用以咀嚼。磨碎巨大之食物。其胃有四。以食物為反芻。強健。而性魯鈍。一

經發怒。則衝擊無已。且以角抵觸。勢不可當。往往殺人。其膽囊中之膽汁。自肝臟分泌而來。係一種稍透明之液汁。色暗褐。或暗褐綠。味先苦後甜。帶一種臭氣。易腐敗。又未秋初。往往發泡變壞。試煎熬之。祇餘乾涸物九·二%。入藥用者。須將此膽汁蒸發。令其稠厚。或晒乾。成暗褐色之越幾斯狀。

採取 臘月採黃牛青牛者良。性質 苦。大寒。無毒。成分 牛膽中所含之成分。為偏利可可澆克酸 (Chyco-cholic acid)。奎羅可澆克酸 (Tauro-cholic acid)。壳勒斯台林酸那篤留護 (Cholesterin Soda) 及膽色素粘液等。

效能 殺蟲。治驚疳。明目消癰。用作解凝藥。又為殺蟲藥。及作膽汁補償藥。主治 除心腹熱渴。止下痢。及口焦燥。益目精。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論牛膽曰。臘月釀槐子服。明目。治疳濕。綱目【唐】甄權藥性本草論牛膽曰。釀黑豆。百日後取

出。每夜吞一枚。靈肝明目。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論牛膽曰。釀南星末。陰乾。治驚風。有奇功。【明】李時珍本草綱目論牛膽曰。除黃殺蟲。治癰腫。【明】繆希雍本草經疏論牛膽曰。牛食百草。其精華萃於膽。其味苦。其氣大寒。無毒。經云。寒以勝熱。苦以泄結。故主心腹熱。及渴利口焦燥也。肝開竅於目。肝熱則目時不明。入肝泄熱。故益目精也。近世以南星末。釀入。陰乾。治驚風。有奇功者。取其苦寒制南星之燥。俾善於醫痰除熱耳。

國外學說 英美學說謂牛膽汁在昔藥品中已多用之。後漸去而不用。近則又有醫士多用之。凡哺乳類動物之膽汁。其形性大同小異。牛膽汁每百分中。計含土質與鹼性鹽類十分至十二分。燒之則土質與鹼性鹽類。存於灰內。如依法去此異質。則所得者為真牛膽汁。故必將牛膽汁提淨而熬濃之。始可入藥。其製法係用鮮牛膽汁二十分。濃酒十分。先將牛膽汁入燙鍋散氣。煎五分為止。加酒調和入瓶搖勻。候十二點鐘澄清。并

出上面之淨汁。以其餘過淋紙。加酒少許。淋渣。共入甑。將酒蒸回。再入燙鍋。散氣。成膏為度。其醫治作用。有輕瀉性。有人喜用之。為補藥。或改血藥。如胃不消化。服之。能得其益處。亦能補膽。如膽汁減少。宜服。每服八釐七釐半。至一分七釐半。裝空丸內吞服。日本和漢藥考曰。從前藥師發賣之牛膽。其製法。係將膽囊懸桿晒乾。(宜速)壓扁。使平。作暗褐色。四季俱粘潤。稍帶甜味。用以製膽之藥品。又曰。凡大便不通。及小兒疝蟲。水化牛膽。塗擦臍部。又痰核。痰塊。牛膽一味。塗擦患處。一日數次。不久消散。又耳鳴。牛乳化開牛膽。棉花蘸濕。納入耳中。又角膜斑點。蜜和牛膽點眼。第四版改正日本藥局方曰。稠厚牛膽。係取健全之牛膽汁。熱於瓷器中。濾過。再隔湯蒸之。使稠厚。如越幾斯為度。帶綠褐色。水大半溶解。起中性或微弱之鹼性。於其水溶液中。加蔗糖少許。再和硫酸。則現暗紫紅色。更加多量之水。以稀釋之。則其潤滑。其味先微甘。後苦。臭氣特異。有腐敗性。便不

可用。熱化之。百分中僅餘固性物八分至十分。

配合應用 ①治殺痘食黃。用牛膽汁一枚。苦參三兩。龍膽草一兩。為末。和少蜜丸。梧子大。每服湯下五十丸。

②治男子陰冷。以食茱萸納牛膽中百日。令乾。每取二七枚。嚼納陰中。良久如火。

③治痔瘻出水。用牛膽。麝香各一枚。膩粉五十文。麝香二十文。以三味和勻。入牛膽中。懸挂四十九日。然後取出。為丸。如大麥大。以紙裹送入瘻內。見有惡物流出。為驗也。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。而無風熱者。禁用。忌酸類。酸性鹽類。瀉利鹽。金屬鹽類。草率酸等。

參攷資料 ①淮南子。萬術云。牛膽塗熱釜。釜即鳴。牛膽塗桂。莫知其誰。註云。能變亂人形。尚。云。蛙得牛膽。則不鳴。此皆有所制也。

(李時珍)
【牛膽汁】即牛膽之處方用名。詳【牛膽】條。

四畫 牛 犬 王

【牛膽半夏麩】 原名 牛膽麩。命名 本品為半夏麩之一種。係和牛膽製成者故名。

探取 以陳久者良。
製法 用半夏末。入臘月黃牛膽汁。略加熱蜜。草窠七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治 療癩癩風痰。

【牛蕪】即馬蕪之古籍別名。典見爾雅。詳【馬蕪】條。

【牛類】即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳【羊蹄】條。

【牛蒨】即益母草之古籍別名。典見爾雅。詳【益母草】條。

【牛嘔草】 原名 船草。基本 本品即牛食而復出者。俗曰回嘔。主治 絞汁服。止嘔。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛嘔草曰。療反胃。霍亂。小兒口噤風。

參攷資料 牛胎治反胃噎膈。雖取象回嘔之義。而沾濡口涎為多。故所主療法。與涎之功用相同。(李時珍)

【牛髓】 命名 本品乃牛之骨髓。故名。性質 甘溫。無毒。

主治 補中填骨髓。久服增年。(本經)安五臟。平三焦。續絕傷。益氣力。止洩利。去消渴。皆以清酒暖服之。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛髓曰。平胃氣。通十二經脈。【唐】孟詵食療本草論牛髓曰。治瘦病。以黑牛髓。地黃汁。白蜜等分煎服。【明】李時珍本草綱目論牛髓曰。潤肺補腎。澤肌悅面。理折傷。擦損痛。甚妙。

參攷資料 牛髓以黑牛、黃牛、牽牛者良。練過用。(本草綱目)

【牛脣】 主治 喉痺氣癭。古方多用之。

參攷資料 牛脣。以水牛者良。(本草綱目)

【犬】即狗之古籍別名。典見說文。詳【狗】條。

【犬牙】即狼牙之古籍別名。典見吳普本草。詳【狼牙】條。

【犬肉】即狗之處方用名。詳【狗】條。

【犬伊日根】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳【百合】條。

【犬芥】即菘菜之日本名詞。詳【菘菜】條。

【犬胡麻】即蘇蘇之日本名詞。詳【蘇蘇】條。

【犬香薷】即石薺蒙之古籍別名。典見植物學大辭典。詳【石薺蒙】條。

【犬梨】即鹿梨之日本名詞。詳【鹿梨】條。

【犬酸漿】即龍葵之日本名詞。詳【龍葵】條。

【犬蓬】即蓬蒿子之日本名詞。詳【蓬蒿子】條。

【犬蠅】即狗蠅之別名。典見動物學大辭典。詳【狗蠅】條。

【犬頭猿】即狒狒之別名。典見動物學大辭典。詳【狒狒】條。

【王不留行】 命名 本品性走而不能留其行也。故名。處方用名 留行子。古釋別名 禁宮花。煎金花。(日華本草)不流行。(吳普本草)金盞銀盞。(本草綱目)王留孩兒。


四靈王

角蒿。莠蒿。木藍子。麥藍子。煎金子。長鼓草。(和漢藥考)

外國名詞 Vaccaria vulgaris, Host.

基本 屬石竹科。藥用王不留行之種子。

形態 王不留行為一年生或越年生草本。莖高一二尺。葉對生。呈淡綠色。作尖披針形。夏月於枝端開淡紅色五瓣花。萼筒作卵圓形。有五稜。花後結房。大如小指頭。有五稜。中含種子。供藥用。種子為正圓形。初白色。成熟則變黑色。酷似鳳仙花種子。



王不留行

採取 二月間採苗。八月間採子。

製法 雷斅曰。凡使苗子。採得。拌湯蒸之。從已至未。以漿水浸一宿。焙乾用。

性質 苦。平。無毒。行血脈。消腫。健生。下

乳。用作通經藥。又為消散癰疽瘡癤藥。

主治 金瘡止血逐痛。出刺。除風痺內寒。止心煩鼻衄。癰疽惡瘡。瘰癧。婦人難產。久服輕身耐老增壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論王不留行曰。治癰毒。通

血脈。【宋】日華諸家本草論王不

留行曰。遊風風癰。婦人血經不勻。

發背。【金】張元素珍珠囊論王不

留行曰。下乳汁。【明】李時珍本草

綱目論王不留行曰。利小便。出竹

木刺。【明】繆希雍本草經疏論王

不留行曰。王不留行。稟土金火之

氣。故味苦甘平。平者辛也。其氣應

溫而無毒。苦能洩。辛能散。甘入血

溫能行。故主金瘡止血。逐痛出刺。

除風痺內寒。癰疽惡瘡。瘰癧。婦人

難產。入血活血之要藥也。若夫心

煩鼻衄。應是血分熱病。非同涼血

藥用。未見其可也。入足厥陰肝經。

【清】黃宮繡本草求真論王不留

行曰。王不留行。在古時已命其名。

謂雖有王命。其性走而不守。不能

以留其行也。又按古書有云。穿山

甲王不留。婦人服之乳常流。亦云

行血之力也。觀此數語。已得氣味

主治大要矣。又著其味曰辛曰甘

曰平。其氣曰溫。其功則能入足厥

陰肝經血分。去風去痺。通經利便。

下乳。健生散癰腫。拔竹刺。與覆麥

同功。則知氣味疎泄。洩至極。又

安能有血而克止乎。何書又言止

血定痛。能治金瘡。似與行血之意

又屬相悖。詎知血瘀不行。得此則

行。血出不止。得此則止。非故止也。

得此氣味以為通達。則血不於瘀

口長流。而血自散各經。以致其血

自止。其痛即定。豈必以此為止哉。

但古人表著治功。多有如此立說。

以留後人思議。不可不細審焉。花

如鈴鐺。實如燈籠。子殼五稜。取苗

子蒸漿水浸用。【清】楊時泰本草

逸鈞元論王不留行曰。王不留行

稟土金火之氣。故味苦甘平。平者

辛也。其氣應溫。苦能泄。辛能散。甘

入血。溫能行。據其得名似於行血

為擅者。然細釋諸本草。應是和血

而活之。與行血有殊。且其功專於

諸活。可見散滯以活血。非以潰決

為專者也。繆氏列為厥陰肝藥。肝

二八四

固血。更司小水故也。【清】鄒澍

本經疏證論王不留行曰。王不留

行。多生麥地。且其成實。適與麥熟

同時。故每雜於麥中。凡麥中有此

則短不能純白。故須檢去之。檢之

之法。墊漆几令欹側。傾麥其上。以

手撫之。則紛紛自下。以其形渾圓

也。凡物之渾圓者。皆轉旋極速而

不滯。王不留行名義。大率亦不外

此。人身周流無滯者血也。觀本經

別錄。取治金瘡血出鼻衄。仍治婦

人難產。可見其能使諸血不旁流

逆出其常順流而下者。又能使之

無所留滯。內而隧道。外而經脈。無

不如之。則癰疽惡瘡。瘰癧。皆緣血

已順流。自然輕則解散。重則分消

矣。血流於鼻。風阻之為風痺。內塞

血不流暢。血中之氣內薄。為心煩。

能治之者。亦總由血分通順。故並

克取效也。仲景用治金瘡。蓋資本

此後人仿此義。用之病淋。亦大有

見解。

配合應用 治鼻衄不止。煎

金花連莖葉陰乾。濃煎汁。溫服立

效。(指南方)

治鼻後下血。王不留行末。水

服一錢(醫濟總錄方)

①治身殺刀斧傷亡血。用王不留行十分。八月八日採之。薊蕪細葉十分。七月七日採之。桑東南根白皮十分。八月三日採之。川椒三分。甘草十分。黃芩。乾薑。芍藥。厚朴各二分。以前三味燒存性。後六味爲散合之。每大指飲服方寸匕。小指但粉之。產後亦可服。(金匱方)

②治婦人乳少因氣鬱者。涌泉散。王不留行。穿山甲。炮龍骨。附麥。稷。麥門冬。等分爲末。每服一錢。熱酒調下。後食豬蹄羹。仍以木梳梳乳。一日三次。(衛生寶鑑方)

③治頭風白屑。王不留行。香白芷。等分爲末。乾糝一夜。篋去。(聖惠方)

④治癰疽疔乳。月蝕白禿。及面上久瘡。去蟲止痛。用王不留行。東南桃枝。東引菜。黃根皮。各五兩。蛇牀子。牡荊子。苦竹葉。養癸子。各三升。大麻子一升。以水二斗半。煮取一斗。頓頻洗之。(千金方)

⑤治誤吞鐵石骨刺不下危急者。王不留行。黃蘗。等分爲末。湯浸。燕餅丸。童子大青袋爲衣。線穿掛

風處。用一丸。冷水化灌之。(百一選方)

⑥治竹木針刺在肉中不出疼痛。以王不留行爲末。熱水方寸匕。兼以根傳卽出。(梅師方)

⑦治疔腫初起。王不留行子爲末。蟾酥丸。黍米大。每服一丸。酒下。汗出卽愈。(集簡方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無瘀滯及孕婦與失血者禁用。

參攷資料 ①所在有之。葉似菘藍。其花紅白色。子殼似酸漿。其中實圓黑。似慈子。大如黍粟。三月收苗。五月收子。根苗花子並通用。

(韓保昇) ②今江浙及並河近處皆有之。苗莖俱青。高七八寸已來。根黃色如薺根。葉尖如小匙頭。亦有似槐葉者。四月開花。色黃紫。葉

隨莖而生。如慈子狀。又似猪藍花。五月採苗莖。曬乾用。俗謂之崩金草。河北生者。葉圓花紅。與此小別。

(蘇頌) ③王不留行。能走血分。乃陽明衝任之藥。俗有穿山甲王不留。婦人服了。乳長流之語。可見其性行而不住也。按王執中實生經

云。婦人患淋。臥久。諸藥不效。其夫夜告予。予按既效方治諸淋。用崩金花十餘葉。煎湯。送令服之。明早來云。病減八分矣。再服而愈。崩金花一名禁宮花。一名金盞銀盞。一名王不留行是也。(李時珍)

【王瓜魚】卽鱸殘魚之古籍別名。詳『鱸殘魚』條。

【王母珠】卽酸漿之古籍別名。典見國經本草。詳『酸漿』條。

【王字蛇】卽蟒蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蟒蛇』條。

原名 土瓜。
【王瓜】命名 本品根作土氣。實形似瓜。或云根味似瓜。故名。

處方用名 土瓜根。王瓜根。
古籍別名 鈎野(郭璞)。老鴉瓜。(國經本草)。馬兜瓜。赤雹子。(本草衍義)。野甜瓜。(本草綱目)。

師姑草(土宿本草)。公公鬚。(俗名)。玉葦。釣蠟。新羅葛。莢。(和漢藥考)

學名 *Trichosanthes cucurbitoides*, Maxim.

外國名詞 *Snak-gourd* (英)
基本 屬葫蘆科。藥用王瓜之

根。形盤 王瓜爲平野自生之宿根草。春日從宿根發芽。葉互生。作心臟形。有三五淺裂。邊緣有鋸齒。面粗糙。有毛刺。每葉間有卷鬚。攀登他物而生。長。夏月於葉腋開白色單性花。雌雄異株。花冠白色。下部作筒狀。上部五裂。其邊緣分裂如白髮之散亂。花後結長二寸許之橢圓形實。初綠色。稍後變成美醜之紅色。其根附有長塊根。

種類 ①王瓜與黃瓜不同。黃瓜卽胡瓜。性味功用。實有霄壤之別也。②王瓜又稱土瓜。土字乃由王字之訛。實同物而異名也。

採取 三四月採根陰乾。
性質 苦寒。無毒。

效能 清熱。利水。行血。化痰。用作利尿藥及通經藥。

主治 消渴內瘵。瘀血月閉。寒



王瓜

四靈王

熱酸疼。益氣愈堅。(本經)療諸邪氣熱結鼠瘻。散癰腫留血。婦人帶下不通。下乳汁。止小便數不禁。逐四肢骨節中水。治馬骨刺人瘡。(別錄)

張仲景之發明 ①土瓜根散。

①土瓜根導法。二方均用之。土瓜根散。脈經作王瓜根散。本草或云土瓜。或云王瓜。禮記月令作王瓜。生。呂氏春秋作王善。淮南子亦作王瓜。則土字蓋王字之訛也。宜呼王瓜根散。

歷代紀述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論王瓜根曰。主蠱毒。小兒因癖。痞滿。痰癆。并取根及葉搗汁。少少服。當吐下。【宋】大明日華諸家本草論王瓜根曰。天行熱疾。酒黃。病壯熱。心煩悶。熱勞。排膿。消撲損瘀血。破癥瘕。落胎。【明】李時珍本草綱目論王瓜根曰。利大小便。治面黑面瘡。【明】繆希雍本草經疏論王瓜根曰。王瓜。蔓土中。清藉陰寒之氣。故味苦氣寒。而無毒。其能除濕熱。熱毒。大約與栝樓性同。故其主治內疽消渴。邪氣熱結。鼠瘻癰腫等證。皆與栝樓相似。而

此則入血分諸病為多耳。簡誤主治與栝樓亦略相當。不復贅。【清】楊時泰本草述鈞元論王瓜根曰。經云。寒泣血。王瓜乃以苦寒而效活血之用。知其所治之瘀血。皆因於熱者。第細釋其用。非專以通瘀為功。如能止溺數不禁。又逐四肢骨節中水。仲景既以治經水不利。又或一月再見。何為而有兩利之功哉。觀本經云。益氣。乃知此味所益之氣。為血中陰氣。故用於婦人經帶居多。且通治諸方。又於二便為多。則其氣不為陰中之陽。而精專於血分者乎。再以單方治黑疽。參之滋味之益陰氣。而俾血和也。信而有徵矣。【清】鄒樹本經疏證論王瓜根曰。王瓜與栝樓種種頗同。故其性情亦多相近者。特栝樓實中結樓子。攢樓上。故為啓脾陰。以奉極高之心肺。王瓜蔓上多鬚根。根疊接。三五相連。故為行脾精。以輸經絡。墜道。又栝樓之莖光滑。王瓜之莖鱗滿。栝樓之子酸。王瓜之子酸苦。是其性有純駁之分。純者主益。駁者主行。故栝樓功用多在滋養。王瓜則專事通行。似適相

反。然亦有相並而不相背者。蓋胸膈能乾潤枯澀。經絡間豈不能乾潤枯澀。但胸膈緣枯澀而不行者。必係燥痰凝結。經絡間緣枯澀而不行者。必係瘀血敗液。觀其不但曰消渴。而曰消渴內痺。不曰血閉。而曰瘀血月閉。寒熱酸疼。又如別錄所謂婦人帶下不通。小便數不禁。四肢骨節中水。並推挽備見之辭。可見其致病之源。皆有物留著。而其物僅能留而不能結。又烏可謂非緣所行之道。枯澀不通。如舟之阻淺者耶。經絡別論所列。飲入胃至下輪膀胱。周回曲折。乃爾。其經由之道。豈能不藉滋潤而有所耗減者。乃消渴之為病。則飲水一斗。小便亦一斗。飲已即溺。是其必不回環而徑情直行。不使他處得滋且澀。可見矣。則向之所謂四布並行之地。庸詎非因內痺而不納耶。又府詎非因不得滋且澀而遂內痺耶。五臟生成篇。諸血者皆屬於心。人臥則血歸於肝。肝受血而能視。足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能攝。臥出而風吹之。血凝於脈。為痺。凝於脈為泣。

凝於足為厥。彼其風吹之能凝。則熱燥之亦能凝。清則太衝。鹹不通。月事送不能應。然究係清而非結。結則近在一處。清則徧體皆然。在一處者為癥為瘕。為瘕為癖。已耳。徧體皆然。則氣道不利。陰陽相軋。而陰勝陽為寒。陽勝陰為熱。濕阻為酸。熱阻為疼。矣。脾陰既周。徑道滑澤。何清不利。何阻不通。譬之行舟阻淺。經緯挽棹。百夫齊奮。竭平生之力。不見其功。一朝水溢。舟浮。踴躍歡騰。揚帆遠引。舟中之人。盡色飛神旺。意氣百倍。而謂水溢為益氣。又寧有愧詞哉。愈疑亦愈氣道不能滑利之弊。因泣清而聰氣不自腎上潮。聲聞不自耳下達者耳。非老年精氣衰竭之驟也。雖然。消渴月閉之因不少矣。何以的知其為內痺。泣清而致者。夫內痺。泣清亦必有外候可尋。如消渴則病源所謂大渴數飲。其人必眩背寒而嘔。千金所謂日就羸瘦。咽哽。唇口焦燥。吸少氣。不得多語。心煩熱。兩脚痿。外壅所謂口乾數飲水。腰脚弱。膝冷。小便數。用心力即煩。則是也。月閉則金匱要略所謂雙

下經水不利。小腹滿痛。經一月再見是也。且血結則不能通。通則不得爲結。血結月閉而發熱者有之矣。未有血結月閉而寒熱者。縱使有之。若酸疼則終非血之所能兼矣。總之土瓜根之治。大率皆似通而實不通之候。故別錄所載。既云婦人帶下。緊接以不通。四肢骨節間有水。小便仍利。與金匱所謂經水不利。月事一月再行者。若合符節。卽陽明津液內竭。大便不通之不容下者。以此導之。則亦可知其旨趣之所在矣。

近人學說 張山雷曰。本經主治不言用根用實。瀕湖則列入根之主。治條中。苦寒清熱。頗與瓜萐根相近。宜乎古人命名。括樓。瓜萐。大同小異。正不獨以莖生結實。且各有根可用之形色相似也。本經謂主消渴。是卽萐根治渴之旨。其治內痔瘡血月閉者。則熱灼津枯。血燥瘀結。痺塞不通耳。蓋土瓜根產於北地。以視萐根。苦寒過之。故能通熱結之血瘀。亦與別錄言萐根通月水同義。非泛治諸虛不足。以葶著瘰血月閉也。寒熱酸疼。亦

四 薑 王

以熱勝而血液不足。則爲疼酸。所謂益氣者。亦以熱能傷氣。去熱卽所以益氣。又卽本經萐根補虛安中之義。其能愈癰者。熱必耳中隆隆。皆氣火上騰爲病。苦降清火。斯內無驚動而耳自聰矣。別錄治諸邪氣熱結。五字作一句讀。所謂邪氣者。卽熱邪也。鼠瘻癰腫。無非熱結留血之病。帶之與不通。雖似病狀絕異。然此之不通。仍以癰熱而言。帶下則固多有濕盛熱燥。灼成濁垢者。導其熱。清其瘀。則帶下自已。其止小便數。亦與萐根止小便利。同一功用。讀本經別錄所載。主治。幾無一不與萐根同符合。宜乎高誘之以王瓜。括樓爲一物矣。又曰。大明謂土瓜根。主天行熱疾。酒黃病。壯熱心煩悶。消撲損瘀血。破癥癖。子生用潤心肺。治黃病。炒用治肺萎吐血。腸風瀉血。赤白痢。甄權謂子主蠱毒。約而言之。無一非清火滑泄通瘀之義。

用土瓜根汁。平且溫。服一小升。午刻黃水當從小便出。不出再服。

① 治小便如泄。乃腎虛也。王瓜散用王瓜根一兩。白石脂二兩。菟絲子酒浸二兩。桂心一兩。牡蠣粉一兩。爲末。每服二錢。大麥粥下飲。

(衛生寶鑑方)

② 治小便不通。土瓜根搗汁。入少水解之。筒吹入下部。(肘後方)

③ 治大便不通。上方吹入肛門內。二便不通。前後吹之取通。(肘後方)

④ 治乳汁不下。土瓜根爲末。酒服一錢。一日二服。(產乳方)

⑤ 治一切漏疾。土瓜根搗傅。燥則易。(千金方)

⑥ 治中諸蠱毒。土瓜根大如指。長三寸。切以酒半升。浸一宿。服。當吐下。(外臺祕要方)

⑦ 治面上瘰癧。土瓜根搗末。漿水和勻。入夜別以漿水洗面塗藥。且復洗之。百日光彩射人。夫妻不相識也。曾用有效。(肘後方)

⑧ 治耳聾灸法。湯土瓜根削中寸。塞耳內。以艾灸七壯。每旬一灸。愈乃止。(聖惠方)

用量 一錢至三錢。

著名方劑 土瓜根散。治帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見。(金匱)用土瓜根芍藥桂枝。各三兩。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。

參攷資料 ① 王瓜有小毒。能吐下。人取汁制雄赤。(陳藏器) ② 四月生苗。莖莖似括樓葉。但無叉。有毛刺。五月開黃花。花下結子如彈丸。生青熟赤。根似葛而細多。糝謂之土瓜根。北間者其子纍纍相連。大如棗皮。黃肉白苗。子相似。根狀不同。若療黃痘破血。南者大勝也。(蘇恭) ③ 土瓜體如括樓。其殼徑寸。一種長二寸許。上微圓。下尖長。七八月間熟。紅赤色。殼中子如螳螂頭者。今人又謂之赤菘子。其根卽土瓜根也。於細根上又生淡黃根三五相連。如大指許。根與子兩用。紅子同白土子治頭風。(寇宗奭) ④ 月令。四月。王瓜生。卽此也。均房間人呼爲老鴉瓜。亦曰菟瓜。按爾雅云。菟瓜。郭璞注云。似土瓜。而土瓜自謂之葵。又名鉤藟。則菟瓜別是一物也。又曰藟。

非亦謂之土瓜。別是一物。非此土瓜也。異類同名者甚多。不可不辨。
(蘇頌) 土瓜。其根作土氣。其實似瓜也。或云根味如瓜。故名土瓜。王字不知何義。瓜似也。熟則色赤。鴉喜食之。故俗名赤鴉老鴉瓜。一葉之下一鬚。故俚人呼為公公鬚。與地黃苗名婆婆奶可為屬對。
(李時珍) 王瓜三月生苗。其莖多鬚。嫩時可茹。其葉圓如馬蹄。而有尖。面青背淡澁而不光。六七月開五出小黃花成簇。結子纍纍。熟時有紅黃二色。皮亦粗澁。根不似葛。但如括樓根之小者。澄粉甚白。須深掘二三尺乃得正根。江西人栽之沃土。取根作蔬食。味如山藥。(李時珍) 按土瓜非世俗所食之王瓜。又非世俗所食之甜瓜。本經雖有其名。今人未之識也。因仲景傷寒論有土瓜根為導之法。故存之。(張隱菴) 按月令所謂王瓜者。蔓延而生。莖葉上皆有細毛。其葉圓而上尖。一葉之下輒有一鬚。遇草木莖葉。即能纏繞。六七月開花。色黃五瓣。花下帶長。即其實也。(蘇頌) 王瓜之名最古。月

令四月王瓜生。爾雅釋草。餇。餇。郭注。餇。一名王瓜。實如瓜。正赤。味苦。陸氏釋文。引字林云。餇。王瓜也。廣雅。餇。餇。王瓜也。呂覽。孟夏紀。王善生。高誘注。善。或作瓜。餇。餇。又淮南時則篇。高注。亦曰。王瓜。括樓也。據高說。似瓜。王瓜。即是一物。惟本草經陶注。謂今土瓜。生離院間。亦有子。熟時赤。如彈丸。李頌。湖。胡。目。載。王瓜。莖。葉。根。實。形。狀。極。詳。確。非。瓜。莖。郝。氏。爾。雅。義。疏。亦。曰。王。瓜。五。月。開。黃。華。下。結。子。形。似。小。瓜。今。京。師。名。為。赤。瓠。子。說。與。瀕。湖。合。壽。頤。按。此。物。蓋。西。北。土。產。而。南。中。無。之。故。江。浙。人。恒。不。知。為。何。物。高。誘。謂。即。餇。餇。近。人。皆。以。為。高。氏。之。誤。壽。頤。則。謂。括。樓。二。字。為。果。蔬。之。轉。音。則。王。瓜。同。是。蔬。屬。而。施。於。雜。落。垣。牆。亦。何。必。不。可。同。得。是。名。高。氏。所。云。未。為。大。謬。且。誘。是。東。漢。建。安。時。人。其。時。必。有。所。受。之。不。可。以。今。人。之。見。強。古。人。以。從。吾。者。况。乎。張。雅。讓。(張。揖。之。字。曹。魏。人。著。廣。雅。者) 呂。忱。(著。字。林。卷。之。所。謂。餇。餇。郭。景。純。(郭。璞。字。注。爾。雅。者) 之。所。謂。餇。餇。

亦何必非果蔬之轉音。故孫強等加增玉篇。亦謂餇餇即是土瓜。蓋其形既似。古多有異物同名之例。何獨於此而必餇餇以譏高氏。即如呂覽之所謂王善善字。誠誤。鐵洋華氏校本。改善為善。謂善與實通。此即夏小正之四月王莢秀。亦即鄭注月令之所引。今月令王莢生也。郝氏之爾雅釋義。及高郵王氏之廣雅疏證。皆用畢秋帆本。逕謂呂覽孟夏紀是王善。然陽湖孫星衍輯刻本草經。則謂呂覽王善為王莢之誤。是孫淵如意中。亦即以王瓜作善。善解矣。惟其名可通。其實自別。而氣味情性。又復相近。此則言藥物學之不可不辨者。仲景蜜煎導條。下有土瓜根。大猪膽汁。皆可為導一說。即是此物。蓋搗取根汁。作瀉腸用。肘後方中亦載之。然今則瀉腸通大便之藥。別有良法。仲景舊說。已為大略。推輪亦不必言矣。(張山雷)

【王瓜子】 性質 酸苦。平。無毒。 主治 生用潤心肺。 治黃病。炒用治腹脹吐血。腸風瀉血。赤白痢。(大明) 主蠱毒。(甄權)

反胃吐食。(李時珍) 配合應用 治消渴飲水。蜜瓜去皮。每食後嚼二三兩五七度。(聖惠方) 治傳尸勞瘵。赤冠兒。俗名王瓜。焙為末。每酒服一錢。(十藥神書方) 治反胃吐食。馬冠兒。燈上燒存性一錢。入好棗肉。平胃散末二錢。酒服食。即可下。馬冠兒。即野甜瓜。北方多有之。(丹溪方) 治痰熱頭風。懸括樓一箇。赤冠兒七箇。焙。大力子(即牛蒡子)焙。四兩。為末。每食後。或茶酒服三錢。忌動風發熱之物。 治筋骨痛。馬冠兒子。炒。開口。為末。酒服一錢。日二服。(集簡方) 治赤目痛。瀉不可忍。小圓瓜。甄離上大如彈丸。紅色皮上有刺者。九月十月。採日乾。槐花炒。赤芍藥。等分。為末。每服二錢。臨臥溫酒下。(衛生家寶方) 治瘰癧。血作痛。赤冠兒。燒存性。研末。無灰酒。空心服二錢。(集簡方)

【治大馬下血】王瓜一兩。燒存性。地黃二兩。黃連半兩。爲末。蜜丸。梧子大。米飲下三十九丸。(指南方)

【王瓜草】卽菝葜之古籍別名。典見諸家本草。詳「菝葜」條。

【王瓜根】卽王瓜之處方用名。詳「王瓜」條。

【王爺】卽地膚子之古籍別名。典見山海經。詳「地膚子」條。

【王室瓜】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬兜鈴」條。

【王明】
古籍別名 王草。(別錄)

產地 生山谷中。
性質 苦。
主治 身熱。邪氣。小兒身熱。用以浴之。

【王孫】
古籍別名 牡蒙。(陶弘景) 黃孫。黃昏。旱藕。(別錄) 長孫。海孫。(齊名) 白功草。芟廷。(吳名)

外國名詞 Parisia totraphy-lla, A.Gr. (拉丁) ックバ子サウ(日本)

基本 係百合科。藥用王孫之根。

四畫 王

形態 王孫爲山草類之多年生草本。高四五寸。莖之中部。四葉輪生。形作橢圓而長有尖端。夏月莖頂着一花。有四瓣。色黃綠。雄蕊八枚。雌蕊一。其根長尺餘。似及己而皮肉皆作紫色。

性質 苦。平。無毒。

主治 五臟邪氣。寒濕痺。四肢痿痺。膝冷痛。(本經) 療百病益氣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論王孫根曰。旱藕。主長生不饑。黑毛髮。

參攷資料 ●王孫生海西川谷及汝南城垣下。(別錄) ●旱藕生太行山中。其狀如藕。(陳藏器)

●按陳廷之小品方。述本草牡蒙一名王孫。徐之才藥對。有牡蒙而無王孫。此則一物明矣。牡蒙葉似及己。而大根長尺餘。皮肉皆紫色。(蘇恭) ●紫參一名牡蒙。本部名合歡。一名黃昏。皆與此名同物異。

(李時珍) ●王孫葉生。頗頂似紫河車葉。按神農及吳普本草。紫參一名牡蒙。陶弘景亦曰。今方家呼紫參爲牡蒙。其王孫並無牡蒙之名。而陶氏於王孫下。乃云又名牡蒙。且無形狀。唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物。謂紫參葉似羊蹄。王孫葉似及己。但古方所用牡蒙。皆爲紫參。後人所用牡蒙。乃王孫。非紫參也。不可不辨。唐玄宗時。隱民姜撫。上言。終南山有旱藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取作湯餅。賜大臣。右驍騎將軍。甘守誠曰。旱藕者。牡蒙也。方家久不用。撫特易名。以神之。爾據此。牡蒙乃王孫也。蓋紫參止治血證。積聚。瘰癧。而王孫主五臟邪氣。痺痛。療百病之文。自可推也。(李時珍) ●楚名王孫。齊名長孫。又名海孫。吳名白功草。又名芟廷。(吳普本草)

【王孫皮枝】卽無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【王芻】●卽蓬草之古籍別名。典見爾雅。詳「蓬草」條。●卽藟藟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藟藟」條。

【王草】卽王明之古籍別名。典見別錄。詳「王明」條。

【王留】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【王蛇】卽蜂蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜂蛇」條。

【王蓮】卽黃連之古籍別名。典見本經。詳「黃連」條。

【王宮】●卽白井之古籍別名。典見別錄。詳「白井」條。●卽百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百部」條。

【王雄】卽雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雌黃」條。

【王黃瓜】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬兜鈴」條。

【王雌】卽鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【王鼓】卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地榆」條。

【王餘魚】卽鱧殘魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱧殘魚」條。

【王鱗】卽地膚子之古籍別名。典見爾雅。詳「地膚子」條。

【王鱗】卽鱗魚之古籍別名。典見爾雅。詳「鱗魚」條。

【王蟲】係昆蟲之一類。產於魯省。功能定驚寧神。餘詳「昆蟲」條。

【王鱗片】卽石背之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石背」條。

五畫

【世英】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【丙穴魚】即嘉魚之古籍別名。典見綱目。詳「嘉魚」條。

【主田】即甘送之古籍別名。典見別錄。詳「甘送」條。

【主簿蟲】即全蠖之古籍別名。典見開寶本草。詳「全蠖」條。

【厄子】即山梔子之原名。詳「山梔子」條。

【仙人衣】即人胞之古籍別名。典見綱目。詳「人胞」條。

【仙人杖】**產地** 出竹林中。**形態** 仙人杖為苞木類之一種。即筍欲成竹時而致枯死者。其色黑如漆。採得可供藥用。

採取 五六月間採之。**性質** 鹹平無毒。

主治 噯氣嘔逆。小兒吐乳。大人吐食。反胃。辟瘧。並水煮服之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論仙人杖曰。小兒驚癇及夜啼。置身伴睡。良。又接為末。水服。

方寸匕。主痔病。忌牛肉。【明】李時珍本草綱目論仙人杖曰。煮汁服。下魚骨哽。

【仙人杖子】即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳「枸杞子」條。

即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【仙人杖草】**產地** 生平澤間。

形態 仙人杖草為菜類之一種。葉似苦苣而叢生。其莖葉可供藥用。

性質 甘小溫。無毒。

主治 久服長生。堅筋骨。令人不老。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論仙人杖草曰。作茹食。去痰癖。除風冷。

參攷資料 仙人杖有三物同名。一是菜類。一是枯死竹筍之色黑者。一是枸杞之別名。此則菜類。可作菜茹者之仙人杖。【蘇頌】

【仙人凍】**古籍別名** 涼粉草。

產地 出廣東舊惠州府境。

形態 仙人凍為雜草類之一

種。莖葉秀麗。香猶蜜橙。夏月取汁和羹。其堅如冰。可供藥用。

主治 以汁和米粉食。療飢澤顏。

【仙人草】**形態** 仙人草為石草類之一種。高二三寸。葉細有鋸齒。其莖葉可供藥用。

主治 小兒醉瘡頭小而硬者。煮湯浴。并搗傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又接汁適目。明目去翳。

【仙人酒】即人乳之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人乳」條。

【仙人骨】**別名** 地骷髏。**命名** 本品相傳為仙人骨所化。故名。

產地 出雲南鎮南縣山中。

形態 仙人骨為石類之一種。碎細石質。狀如朴硝。瑩澈如水晶。可供藥用。

主治 取粉敷一切瘡。

參攷資料 丁藏行記。程楚雄府七十里至呂合。有呂祖廟。去村數里。山脚出仙人骨。如水晶。能療瘡癤。相傳仙人為呂祖所度。又三五十里為鎮南州。【杜真】

詔時張王二生遇呂仙於呂合。驛王得度。上昇。張不能從。憤而死。埋骨於山中。化為石。瑩澈如水晶。傳一切瘡瘍立愈。【漢略】

【仙人帽】**產地** 生土中。

類土菌屬之一種。生於燒灰地上。經秋雨遂生菌。即為土菌。作重囊狀。亦可藥用。

主治 血痢。

【仙人掌草】**命名** 本品貼生石上。似人之掌形。故名。【蘇頌】

別名 鳳尾笏。鳳栗。

產地 多生於山壁間。及產墨西哥高原。

形態 仙人掌草為石草類之一種。常綠多年生草本。高八九尺。其莖扁平。或圓柱形。色綠無葉。表面有多數之刺針。夏日開花。黃赤色。多瓣。實有毛刺。然可食。其莖可供藥用。

採取 四時可採之。

性質 苦澆寒。無毒。

主治 腸痔海血。與甘草同浸酒服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論仙人掌草曰。焙末油調。小兒白禿瘡。

【仙人掌】

產地 建昌南 贛山坡皆有之。

形態 叢生。高不盈尺。細莖。葉如柳葉。秋時梢端開紫筒子花。略似桔梗花而小。開久瓣色退白。黃蕊。莖其根葉可供藥用。



仙人過橋

主治 洗瘡毒。

【仙人掌】即天靈蓋之古籍別名。典見綱目。詳「天靈蓋」條。

【仙人精】即普賢線之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「普賢線」條。

【仙人餘糧】即黃精之古籍別名。典見本草集註。詳「黃精」條。

【仙女蕩花】即麗春花之古籍別名。典見綱目經本草。詳「麗春花」條。

【仙女嬌】即九仙子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「九仙子」條。

五靈仙

【仙半夏】

命名 本品爲製半夏之一種。據云其法

係仙人遺下者。故名。

製法 用大半夏根一斤。石灰一斤。滾水七八盞。入盆內攪涼。澄

清去渣。將半夏根入盆內。手攪之。日曬夜露。七日足。撈出控乾。用井水水洗淨三四次。泡三日。每日換水三次。撈起控乾。用白礬八兩。皮硝一斤。滾水七八碗。將礬硝共入

盆內攪涼。將半夏根入內浸七日。日曬夜露。取出。清水洗三四次。泡三日。每日換水三次。取出控乾。另以甘草、南薄荷各四兩。丁香五錢。白芷、薤三錢。沈香一錢。枳實、木香、川芎、肉桂各三錢。陳皮、枳殼、五味子、青皮、砂仁各五錢。切片。滾水

十五盞。煎涼。將半夏同前各藥投入。泡二七日。日曬夜露。攪之。將藥取出。與半夏同白布包住。放熱坑上。用器皿扣住。三炷香時。藥與半夏分胎。去藥取半夏乾收用。

性質 辛溫無毒。

主治 清痰開鬱。行氣。理痺。療痰疾。中風不語。研服七八粒。並以手摩運腹上。即醒。餘同「半夏」條。

施用宜忌 體虛而無痰者忌之。

參攷資料 ●仙半夏近日諸醫皆用之。藥肆亦多製備。能化痰

如神。若不信。將半夏七八粒。研入痰盞內。卽化爲清水。有痰火者服之一日。大便出。似魚膠。一宿盡除。痰根。永不生也。綱目半夏條附方。載法製半夏。其製法與此不同。今藥肆所售仙半夏。惟將半夏浸泡。盡去其汁味。然後以甘草浸曬。入口淡而微甘。全失本性。名曰仙半夏。並非照方製法。醫家亦視虛人有痰者用之。以爲性平和而不傷

於燥烈。是無異食半夏渣滓。何益之有。(趙學敏) ●仙方製半夏。化痰成水。皆治壯人老人有餘之症。服之有效。虛人痰火忌服。(雙雲林)

【仙朮】即蒼朮之古籍別名。典見綱目。詳「蒼朮」條。

【仙杖】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【仙姑】即蟻姑之古籍別名。典見古今注。詳「蟻姑」條。

【仙姑連】即南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「南連」條。

見綱目拾遺。詳「南連」條。

【仙居朮】卽白朮之處方用名。詳「白朮」條。

【仙沼子】卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【仙茅】

命名 本品葉似茅。久服輕身。故名。(李珣)

處方用名 仙茅根。古籍別名 獨茅。茅瓜子。(開寶本草) 乳羊。(范成大廣輿志) 河輪勒化。(海藥本草) 邊羅門益。(圖經本草)

外國名詞 Curculigo ensifolia, R. Br. (拉丁) Hypoxis minor (英) キンバイザサ (日本)

基本 屬石蒜科。爲 Anacalythidaceae 之地下莖。

產地 ●陳仁山藥物生產辨云。仙茅產廣東清遠北江一帶。●凡今大庾嶺、蜀川、江湖兩浙諸州間。及暖地之山中。恒多有之。●蘇頌云。仙茅生西域。

形態 按仙茅爲多年生草本。苗高尺許。至冬盡枯。春初乃生。葉

細長。色青如茅而軟。且略闊。面有縱紋。狀似初生棕櫚。三月開花。如梔子花。花梗長二寸許。花色黃。不結實。其根獨莖而直。大如小指。傍有細根相附。外皮稍粗。色褐。內肉色黃白。

種植 山野自生者多。

採取 每年二月八月採根曝乾用。

製法 雷斅曰。凡使仙茅。採得以清水洗刮去皮。於槐砧上用銅刀切豆許大。以生稀布袋盛。於烏豆水中浸一宿。取出。用酒拌濕。蒸之。從巳至亥。取出。暴乾。勿犯鐵器。及牛乳。班人髮鬚。大明曰。彭祖單股法。以竹刀刮切。糯米泔浸去赤汁。出毒後無妨損。

性質 辛。溫。有毒。

效能 補火。散寒。除痺。煖精。

主治 心腹冷氣不能食。腰脚風冷痺痺不能行。丈夫虛勞。老人失溺無子。益陽道。助筋骨。益肌膚。長精神。明日。久服通神強記。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草言仙茅。曰。治一切風氣。補腰膝。清安。五氣。丈夫五勞七傷。

明耳目。填骨髓。久服輕身益顏色。

【宋】大明日華諸家本草論仙茅。曰。開胃消食。下氣。益房事。增精髓。

【明】穆希雅本草經疏論仙茅曰。仙茅稟火金之氣。然必是火勝金微。雖云辛溫。其實辛熱有毒之藥也。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手足厥陰經。命門真陽之火。即

先天祖氣。天非此火不能生物。人非此火不能有生。故真火一衰。則虛勞無子。陽道痿弱。老人失溺。風冷外侵。為腰脚不利。痺痺不能行。井不能生土。以致脾虛。腹冷不能食。此藥味辛氣熱。正入命門。補火之不足。則諸證自除。筋骨自利。皮

膚自益也。命門之系。上通於心。相火得補。則君火益自振攝。故久服能通神強記也。長精神。明目。言真陽足。陰翳消。肝腎俱補之極功耳。

【清】黃宮繡本草求真論仙茅曰。仙茅辛熱微毒。據書皆載。功尚補火。助陽煖精。凡下元虛弱。陽衰精冷。失溺無子。並腹冷不食。冷痺不行。原不服之有效。以其精為火宅。火衰則精與血皆衰。而精自爾厥。逆不溫。滑亦自爾失。候不禁矣。此

與附、桂、硫黃、胡巴、破故紙、淫羊藿、蛇床子、遠志同為一例。但附子則能以除火衰寒厥。肉桂則能以通血分寒滯。胡巴則能以除火衰寒疝。淫羊藿則能以除火衰風冷。蛇床子則能以祛火衰寒濕。硫黃則能以除火衰寒結。破故紙則能以理火衰腎瀉。遠志則能以除火衰怔忡。雖其所補則同。而效各有攸建。未可云其補火而不分其主治

於其中也。故凡火衰病見。用之不能離附桂。餘則視症酌增。然亦須視稟賦素怯則宜。若相火熾盛。服之反能動火。為害叵測。【清】楊時泰本草述鈞元論仙茅曰。仙茅補命門真陽之火。夫陽以陰為主。經言出地者。陰中之陽。陽予之。正陰為之主。苟陰勝而陽不足者。陽不能為陰之政。豈謂仙茅非適治之味哉。如陰虛而陽亢。陰又不能為陽之主矣。此味固為禁劑。即陰陽俱虛之人。補陽亦必主以補陰。若漫言陽為陰先。不反絕其化原乎。或曰。桂附補陽。何以不切切致慎之。願云。仙茅功齊雄附。但雄附起真下之元。此更深深淫藥之毒。斯得

之。【清】吳儀洛本草重新論仙茅曰。仙茅辛熱。助命火。益陽道。明耳目。補虛勞。治失溺無子。心腹冷氣。不能食。腰脚冷痺不能行。專於補火。唯精寒者宜之。

近人學說 張山雷曰。仙茅見於宋之開寶本草。云辛溫有毒。主心腹冷氣。腰脚風冷。痺痺不能行。老人失溺。益陽道。李珣海藥本草謂其治一切風氣。補暖腰脚。日華直稱其益房事不倦。明是補陽溫腎之專藥。故亦能祛除寒痺。與巴戟天、仙靈脾相類。而猛烈又過之。惟稟性陰寒者。可以為回陽之用。而必不可以為補益之品。開寶又稱其主丈夫虛勞。則古人之所謂虛勞。本屬虛寒之病。金匱用建中等方。而千金外臺。皆用溫藥。其旨可見。正與今人陰虛火動之虛勞病相反。而又謂其助筋骨。長精神云云。李珣又謂其明耳目。填骨髓。皆因其助陽而故其言之不可為訓也。又曰。仙茅乃與陽助火之烈藥。比之烏頭、附子。殆又甚焉。而李瀕湖張景岳藥。乃引許慎書。修其功。則方士觀道之言。斷

不可信。惟酒清又謂仙茅性熱。陽
相火熾盛者。服之反能動火。尙屬
持平之語。觀沈存中夢溪筆談。稱
夏文莊睡則身冷如逝。故服仙茅
銀乳。硫黃。張季明醫說。稱中仙茅
毒者。舌脹出口。以刀斨之百數。始
得見血。煮大黃。朴硝服之。而後消
糖。其熱毒何如。宜乎張弼詠仙茅
詩。有使君昨日穰持去。今日人來
乞。慕銘之句矣。世有妄談溫補。盛

稱仙藥。仙茅等物之功效者。皆
惑於方士之謬說。如唐人喜服乳
石。石自戕生命之類。宜援左道
惑衆之例。誅之無赦可也。

配合應用 仙茅丸壯筋骨。益
精神。明目。黑髮。用仙茅二斤。糯
米泔浸五日。去赤水。夏月浸三日。
銅刀刮剝陰乾。取一斤。枸杞子一
斤。車前子十二兩。白茯苓去皮。苧
香炒。柏子仁去殼。各八兩。生地黃
焙。熟地黃焙。各四兩。爲末。酒煮糊
丸。如梧子大。每服五十丸。食前溫
酒下。日二服。(聖濟總錄方)

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 凡相火熾盛者。以

五靈仙

及水瀉精衰。不能孕育。老人孤陽
無陰。及失志陽痿。腎虛腰痛。脚膝
無力。並血虛不能養筋。偏枯痿痺
者。咸禁。忌鐵器。並牛乳牛肉。
著名方劑 神祕散。補腎寧心。
定喘下氣。(三四方)用仙茅半兩。
(米泔浸三宿。曬乾炒)團參二錢。
牛阿膠一兩半。(炒)鷄脆脂一兩。
(炒)共爲末。每服二錢。糯米飲湯
空心下。

參攷資料 ●仙茅。梵音呼爲
河輪勒陀。(李珣) ●仙茅根獨
生。始因西域婆羅門僧獻方於唐
玄宗。故今江南呼爲婆羅門參。蓋
言其功補如人參也。(蘇頌) ●五
代唐筠州刺史王顏著續傳信方
因國書編錄西域婆羅門僧服仙
茅方。當時盛行。云五勞七傷。明目
益筋力。宜而復補。云十斤乳石。不
及一斤仙茅。表其功力也。本西域
道人所傳。開元元年。婆羅門僧進
此藥。明皇服之有效。當時禁方不
傳。天寶之亂。方書流散。上都僧不
空三藏始得此方。傳與司徒李勉。
尙書路嗣。供給事齊抗。僕射張建
封服之。皆得力。路公久服金石無

效。得此藥。其益百倍。齊給事守晉
雲。日少氣力。風疹癢作。服之遂愈。
八九月採得。竹刀刮去黑皮。切如
豆粒。米泔浸兩倍。陰乾搗篩。然蜜
丸。梧子大。每且空心酒飲。任便下
二十九。忌鐵器。禁食牛乳及黑牛
肉。大減藥力。(蘇頌) ●仙茅味辛。
氣大熱。其爲毒可知矣。雖能補命
門。益陽道。助筋骨。除風痺。然而病
因不同。寒熱迥別。施之一誤。禍如
反掌。况世之人。火旺致病者。十居
八九。火衰成疾者。百無二三。幸溫
大熱之藥。其可常御乎。凡一概陰
虛發熱。咳嗽。吐血。衄血。齒血。溺血。
血淋。遺精。白濁。夢與鬼交。腎虛腰
痛。脚膝無力。虛火上炎。口乾。咽痛。
失志。陽痿。水瀉。精竭。不能孕育。老
人孤陽無陰。遺溺。失精。血虛。不能
養筋。以致偏枯。痿痺。胃家邪熱。不
能殺穀。胃家虛火。嘈雜。易飢。三消。
五疳。陰虛內熱。外寒。陽厥。火極似
水等證。法並禁用。(醫藥考) ●按
許真君書云。仙茅久服。長生。其味
甘。能養肉。辛。能養肺。苦。能養氣。酸。
能養骨。滑。能養膚。酸。能養筋。宜和
苦酒服之。必效也。又范成大處衛

志云。廣西英州多仙茅。其羊食之。
舉體悉化爲筋。不復有血肉。食之
補人名乳羊。沈括筆談云。夏文莊
公稟賦異於常人。但睡則身冷如
逝者。既覺。須令人溫之。良久乃能
動。常服仙茅。鍾乳。硫黃。莫知紀極。
觀此則仙茅亦性熱。補三焦命門
之藥也。惟陽弱精寒。稟賦素怯者
宜之。若體壯相火熾盛者。服之反
能動火。按張杲醫說云。一人中仙
茅毒。舌脹出口。漸大與肩齊。因以
小刀撈之。隨破隨合。撈至百數。始
有血一點出。曰可救矣。煮大黃朴
硝與服。以藥撈之。應時消縮。此皆
火盛性淫之人。過服之害也。(李
時珍)

【仙茅果】卽猴園子之古籍別名。
與見綱目拾遺。詳「猴園子」條。
【仙茅根】卽長松根之古籍別名。
與見綱目。詳「長松根」條。
【仙茆酒】原名 長松酒。
製法 用仙茆九蒸
九曬。浸酒飲。
主治 精氣虛寒。陽痿膝弱。腰
痛痺緩。諸虛。
【仙桃青桃】卽無花果之古籍別

名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【仙砂】即砂之古籍別名。典見石藥附雅。詳「砂」條。

【仙麻】即白如椶之別名。詳「白如椶」條。

【仙班】即仲思班之古籍別名。典見綱目。詳「仲思班」條。

【仙猴】即果然之古籍別名。典見綱目。詳「果然」條。

【仙禽】即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【仙鼠】即蝙蝠之古籍別名。典見唐本草。詳「蝙蝠」條。

【仙遺糧】即土茯苓之虛方用名。詳「土茯苓」條。

【仙蟄】即僂僂為蛤蚧之別名。典見綱目。參見「蛤蚧」條。

【仙鶴草】原名 金頂龍芽草。古籍別名 鐵胡蜂。

(百草鏡)瓜香草(救荒本草)老鶴嘴。子母草。毛脚齒(植物名實圖考)黃龍尾(滇南本草)金水引(日本)

外國名詞 Agrimonia pilosa, Ledeb. (拉丁)

基本 係蓴科龍芽草屬。藥

用金頂龍芽草之枝葉花莖。產地 江南諸省境內均有出。惟產於生輝縣鴨子口山野間者為最佳。

形態 按仙鶴草係野生植物。為多年生草本。立夏時展苗布地。着土叢生。總莖形圓。苗高尺許。莖多澀毛。葉為羽狀複葉。每莖互生七葉。尖端一葉。下列六葉。兩兩對生。每對葉下有小耳芽葉兩對。亦相對生。葉為圓卵形。而端銳尖。邊緣缺曲如鋸齒。葉面有糙毛。大地葉葉而稍寬。近根之老葉。極易枯萎。色紅褐而性堅劣。根形如茜草。有白色嫩芽。附生於上。形尖圓似龍牙。八月間莖端成穗。頂開黃色小花。故名金頂龍芽。花五瓣。總狀花序。長約尺餘。八月許結實。大如黍粒。狀似蓴突。有許多之刺毛。能附着於他種物質之上。採其莖葉可供藥用。



仙鶴草

性質 苦。澀。微溫。

效能 本品對於蛋白質及生膠質之化學的親和力。為其作用之主因。故對於黏膜之鬆解。細胞之繁殖。血管及結締組織之新生。物使之收縮稠固。並能凝固血液。及分泌物之蛋白質。若於黏膜管壁之創傷部分。接觸以多量之濃汁。則致結締組織之收縮。細胞壁及組織之稠化。又能限制營養液。及分泌液自血液而滲出。而於胃腸及氣道腎臟膀胱子宮之出血。及頑固性之下利。尤著效能。

主治 吐血。咯血。結核瘰癧。腸風下血。崩漏帶下。

用量 小量一錢至二錢。中量二錢半至三錢。大量三四錢。或至一兩。

參攷資料 有云仙鶴草非龍芽草之說。或誤以百草鏡之紫頂龍芽。或李氏草秘之石見穿。因仙鶴草開黃花。故曰金頂龍芽。開紫花者。即馬鞭草也。本草綱目拾遺龍芽草亦收於石打穿條下。石見穿云。即石打穿。據詳細考正。龍芽草當分二種。金頂龍芽。即仙鶴草。

紫頂龍芽即馬鞭草。石打穿即石見穿。別有一物(曹炳章)

【仙靈毗】即淫羊藿之古籍別名。典見柳宗元文。詳「淫羊藿」條。

【仙靈脾】即淫羊藿之古籍別名。典見唐本草。詳「淫羊藿」條。

【仙靈脾酒】製法 用仙靈脾一斤。袋盛。浸無灰酒二斗。密封三日飲。

主治 偏風不遂。強筋骨。

【代尾】即玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玳瑁」條。

【代赭石】命名 本品為出代故名。 郟而色赭赤之礦石。

處方用名 煨赭石。釘頭代赭。古籍別名 須丸(本經)血師。

(別錄)土朱(本草綱目)朱石。赤石。血石。紫朱。零陵鐵朱。鐵鐵。大赭石。黛赭石(和漢藥考)

外國名詞 Haematite (英)

Ocher (德)

基本 係金屬類。為結晶體之礦石。

產地 陳仁山藥物生產辨云。代赭石產於東順道。江蘇馬尾。

赭石。山西五台山產者。鋼鼓釘赭石。已上類似鐵質。另有一種紅色土質赭石。合藥有用。寫書亦有之。

形態。按代赭石為塊狀或纖維狀之礦石。質硬。碎之則成赤褐色之粉末。

種類。●作結晶者謂之輝鐵礦代赭。●半結晶者謂之赤鐵礦代赭。●表面作疣瘡狀者謂之釘頭代赭。

製法。雷斅曰。凡使代赭石。研細以風水重重飛過。水面上有赤色如薄雲者去之。乃用細茶脚湯煮一伏時取出。又研一萬匝。以淨鐵鑊燒赤。下白蜜臘一兩待化。投汲水中沖之。再煮一二十沸。取出曬乾。用時珍曰。今人惟煨赤醋淬三次或七次。研水飛過。取其相制。并為肝經血分引用也。相感志云。代赭石以酒醋煮之。插鐵釘於內。屑之成汁。

性質。苦寒。無毒。

成分。由氧化鐵及黏土而成。

效能。平肝火。鎮氣逆。用作收斂藥。

主治。鬼疰。賊風。蠱毒。殺精物。惡鬼。腹中瘴邪氣。女子赤沃漏下。(本經)帶下百病。產難胞不出。墮胎。養血氣。除五臟血脈中熱。血痺血癢。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。(別錄)

歷代記述攷證。【唐】大明日華諸家本草論代赭石曰。安胎建脾。止反胃。吐血。鼻衄。月經不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癇疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。【明】繆希雍本草經疏論代赭石曰。代赭石稟土中之陰氣。以生。本經味苦氣寒。別錄加甘無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入手少陰足厥陰經。少陰為君主之官。虛則氣怯。而百邪易入。或鬼疰邪氣。或精物惡鬼。或驚氣入腹。所自來矣。得鎮重之性。則心君泰定。而幽暗破。邪無從著矣。其主五臟血脈中熱。血痺血癢。賊風。及女子赤沃漏下。帶下百病。皆肝心二經血熱所致。甘寒能涼血。故主如上諸證也。甘寒又能解毒。故主蠱毒腹中毒也。經曰。壯火食氣。少火生氣。火氣太盛。則陰痿反不能起。苦寒泄有餘之火。所以

能起陰痿也。重而下墜。故又主產難胞不出。及墮胎也。【明】李士材本草圖解論代赭石曰。代赭入肝與心胞。專主二經血分之病。仲景治汗吐下後。心下輕噎氣。用旋覆代赭湯。取其重以鎮逆。赤以養陰血也。【清】黃宮樞本草求真論代赭石曰。代赭石味苦而甘。氣寒無毒。凡因血分屬熱。崩帶瀉痢。胎動產難。噎膈痞癢。驚癇金瘡等症。治之即能收效。以其體有鎮怯之能。甘有和血之力。寒有勝熱之義。專入心肝二經血分。涼血解熱。鎮怯祛毒。但小兒慢驚。及陽虛陰痿。下部虛寒者。忌之。以其沈降而乏生發之功耳。善載能治慢驚。其說似非。擊碎有乳孔者。真。火煨醋淬三次。研細水飛用。乾姜為使。長雄附。

近人學說。張錫純曰。赭石色赤。性微涼。能生血。兼能涼血。其質重墜。又善鎮逆氣。降痰涎。止嘔吐。通燥結。用之得當。能建奇效。其原質為鐵質化合而成。其結體雖堅。而層層如鐵鏽。(鐵鏽亦鐵質化合)生研服之不傷腸胃。即服其

稍粗之末。亦與腸胃無損。且生服則養氣純全。大能養血。故本經謂其治赤痢漏下。日華謂其治月經不止也。若煨用之。即無斯效。煨之後。以醋淬之。尤非所宜。且性甚和平。雖降逆氣。而不傷正氣。通燥結。毫無開破。原無需乎煨。其形為薄片。疊疊而成。一面點點作乳形。一面點點作窩形者。方堪入藥。

配合應用。●治急慢驚風。中眼撮口。搐搦不定。代赭石火燒醋淬七次。細研水飛。日乾。每服一錢。或半錢。煎真金湯調下。連進三服。兒脚脛上有赤斑。即是驚氣已出。病當安也。無者不治。如慢驚。用冬瓜仁煎湯調亦妙。(直指方)

●治婦人血崩。代赭石煨為末。白湯服二錢。(普濟方)

●治哮喘有聲。臥睡不得。土朱末。米醋調。時時進一二服。(普濟方)

●治傷寒無汗。代赭石。乾薑等分為末。熱醋調塗兩手心。合掌握定。夾於大腿內側。溫覆汗出乃愈。(傷寒種要方)

●治嬰兒癩疾。無計可施。代赭

石五枚。煨紅醋淬。朱砂五分。硃霜如一大豆。同以紙包七重。打濕煨乾。入麝香少許。為末。香油調一字。塗鼻尖上及眉心四肢等處。神效。

(保幼大千方)

④治小腸疝氣。代赭石火煨醋淬。為末。每白湯服二錢。(靈城方)

⑤治腸風下血。血餅一兩。火煨米醋淬。蠶醋一升。搗羅如麴。每服一錢。白湯下。又治吐血衄血。(斗門方)

⑥治墮胎下血不止。代赭石末一錢。生地黃汁半盞。調日三五次。以麩為度。(聖濟總錄方)

⑦治赤眼腫閉。土朱二分。石膏一分。為末。新汲水調。敷眼首尾及太陽穴。(真指方)

⑧治喉痺腫痛。紫朱煮汁飲之。(普濟方)

⑨治牙宣有膿。土朱、荊芥同研。搗之三日。愈。(普濟方)

⑩治諸丹熱毒。土朱、青黛各二錢。滑石、荊芥各一錢。為末。每服一錢。半蜜水調下。仍外傳之。(真指方)

⑪治一切瘡毒。土朱、靛丹、牛皮

膠等分為末。好酒一盃沖之。澄清服外。以渣敷之。乾則再上。(朱氏集驗方)

⑫治百合病發。已汗下復發者。百合七箇。擘破。泉水浸一宿。赭石一兩。滑石三兩。泉水二鐘。煎至一鐘。入百合汁。再煎一鐘。溫服。(傷寒蘊要方)

用量 三錢至一兩。施用宜忌 下部虛寒不宜用。陽虛陰寒者忌之。畏天雄。附子。

著名方劑 ⑬滑石代赭湯。百合病下之後者。主之。(金匱)用百合七枚。(璧)滑石三兩。(碎棉裹)

代赭石一枚。(如彈丸大。碎棉裹)先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭取一升。去滓。後和合。重煎取一升。五合。分溫服。⑭旋覆代赭湯。治傷寒汗出吐下。後心下痞硬。噎氣不除。此主之。(金匱)用旋覆花三兩。(棉包)人參二兩。生薑五兩。(切)半夏半升。(洗)代赭石一兩。大棗十二枚。炙草三兩。水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日

三服。

參攷資料

⑮代赭生齊國山谷。赤紅。青色如雞冠。有澤。葉爪甲不澀者良。採取無時。(別錄)⑯出代赭者名代赭。出姑蘇者名須丸。(別錄)⑰今河東江東山中亦有之。古方紫丸治小兒用代赭。云無真。以左顧牡蠣代使。乃知其者難得。今醫家所用。多擗取大塊。其上文頭有如浮漚。丁者為勝。謂之丁頭代赭。北山經云。少陽之山中多美赭。西山經云。石臚之山。澗水出焉。中有流赭。以塗牛馬無病。郭璞注云。赭。赤土也。今人以塗牛角。云辟惡。(蘇頌)⑱赭。赤色也。代。即雁門也。今俗呼為土朱。鐵朱。管子云。山上有赭。其下有鐵。鐵朱之名。或緣此。不獨因其形色也。(李時珍)⑲赭石。處處山中。有之。以西北出者為良。宋時虔州歲貢萬斤。崔昉外丹本草云。代赭。陽石也。與太乙餘糧並生。山峽中。研之作朱色。可點書。又可尋金。益色赤。張華以赤土拭寶劍。益精明。培光耀。即以此也。(李時珍)⑳代赭。乃肝與包絡二經血分藥也。故所主治皆二經

血分之病。昔有小兒。泄後。眼上三日不乳。目黃如金。氣將絕。有名醫曰。此假驚類也。宜治肝。用水飛代赭石末。每服半錢。冬瓜仁煎湯調下。(李時珍)

【冬不凋草】即萬年青之古籍別名。典見射日拾遺。詳萬年青條。【冬朮】即白朮之一種。莖直上。高不逾尺。葉尖長。旁有鋸刺。紋花如小菊。冬月採用最良。

【冬瓜】命名 賈思勰云。冬瓜。正二三月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。冬瓜之命名。或因此也。

處方用名 冬瓜皮。冬瓜子。古籍別名 白瓜。水芝。(本經)地芝。(廣雅)白冬瓜。(本草綱目)

基本 係葫蘆科。冬瓜屬。藥用其果實。

形態 冬瓜為菜類之一。年莖生草本。莖有卷鬚。藉以攀援於他物上。葉心臟形。往往五裂如掌狀。花單性。雌花與雄花同株。花冠五裂甚深。雌雄皆黃色。果實大。為漿果。橢圓形。長數寸。或數尺不等。外皮有毛。密生。成熟後。則其外皮分

湯白頭。



瓜冬

採取 八月採之。

製法 凡使入藥。須於霜後採置。候用。收瓜時。切忌酒漆麝香及糯米。觸之必爛。

性質 甘微寒。無毒。

效能 祛溼消熱。消腫。有利尿功用。

主治 小腹水脹。利小便。止渴。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論冬瓜曰。搗汁服。

止消渴煩悶。解毒。【唐】孟詵食療本草論冬瓜曰。益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。【宋】大明諸家本草論冬瓜曰。消熱毒癰腫。切片摩癩子甚良。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論冬瓜曰。利大小腸。壓丹石毒。

【明】繆希雍本草經疏論冬瓜曰。自冬瓜內稟陰土之氣。外受霜露之侵。故其味甘。氣微寒。而性冷利。無毒。水屬陰。瓜性亦屬陰。氣類相

五畫 冬

從。故能利小便。除小腹水脹也。甘寒解胃中之熱。故又能止渴也。弘景止消渴煩悶解毒。孟詵益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。大明消熱毒癰腫。切片摩癩子。蘇頌利大小腸。壓丹石毒。皆得其旨者也。

配合應用 治積熱消渴。白瓜去皮。每食後喫三二兩五七度良。【食療本草方】

治消渴不止。冬瓜一枚。削皮埋濕地中。一月取出。破開。取清水。日飲之。或燒熟絞汁飲之。【聖濟總錄方】

治消渴骨蒸。大冬瓜一枚。去頭。入黃連末。填滿。安甕內。待瓜消盡。同研。丸梧子大。每服三四丸。煎冬瓜湯下。【經驗方】

治產後痢渴。久病津液枯竭。四肢浮腫。口舌乾燥。用冬瓜一枚。黃土泥厚五寸。煨熟絞汁飲。亦治傷寒痢渴。【古今錄驗方】

治小兒渴利。冬瓜搗汁飲之。【千金方】

治小兒疳積。寒熱如疴。用冬瓜。煎湯各四兩。水二升。煎湯浴之。【千金方】

治嬰孩寒熱。冬瓜泡熱。絞汁飲。【子母秘錄方】

治水病危急。冬瓜不拘多少。任意喫之。神效無比。【兵部手集方】

治十種水氣。浮腫喘滿。用大冬瓜一枚。切蓋去。以赤小豆。填滿。蓋合。簽定。以紙筋泥固濟。日乾。用糯糠兩大籮。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同豆焙乾。為末。水糊丸。梧子大。每服七十丸。煎冬瓜子湯下。日三服。小便利為度。【楊氏家藏方】

治發背欲死。冬瓜截去頭。合疔上。瓜爛。截去。更合之。瓜未盡。疔已小。斂矣。乃用膏貼之。【肘後方】

治痔瘡腫痛。冬瓜煎湯洗之。【補珍方】

治馬汗入瘡。乾冬瓜燒研。洗淨。傅之。

治食魚中毒。冬瓜汁飲之。良。【小品方】

治面黑令白。冬瓜一個。竹刀去皮。切片。酒一升。水一升。煎爛。濾去滓。熬成膏。淨瓶收貯。每夜塗之。【聖濟總錄方】

用錢 三錢至一兩。施用宜忌 凡無濕熱者禁用。若虛寒腎冷。久病滑泄者。不得食。

參攷資料 熱者食之。佳。冷者食之。復人。食食練五臟。為其下氣。故也。欲得體瘦輕健者。則可長食之。若要肥。則勿食也。【孟詵】

凡患發背及一切癰疽者。削一大塊。置疔上。熱則易之。分散熱毒。氣甚良。【寇宗奭】今處處園圃。時之。其實生苗。莖下。大者如斗。而更長。皮厚而有毛。初生正青綠。經霜則白粉。人家多藏蓄。綱年。作菜果。入藥。須霜後取。置之。經年。破出核。洗燥。乃播取仁用之。亦堪單作服。何。【蘇頌】

【冬瓜子】 原名 白瓜子。命名 冬瓜經霜。遂生白衣。子色亦白。故名。蓋冬瓜成熟。比較其他瓜類。為遲。採於霜後者。為良品。故有此名也。

處方用名 冬瓜仁。

古籍別名 白花冬瓜仁。東瓜子。瓜厚子。瓜綠子。結瓜子。【和漢藥考】

學名 *Poincassa cerifera*.

221.

基本 屬葫蘆科。藥用冬瓜之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。冬瓜仁各省均有出。

形態 按冬瓜為一年生蔓草。莖藉葉腋之卷鬚而上昇。葉為心臟形。前端尖。作掌狀分裂。莖葉俱有毛刺。花為單性。雌雄同株。有黃色花冠。果實為淡綠色大漿果。作橢圓形。密生毛。成熟則於外面分泌白色蠟狀物質。中有長仁。

種植 二三月下種。十月種者尤勝。田圃間恒多栽植。以供菜茹。

採取 八月間採子暴乾。

性質 甘平無毒。

效能 清熱利濕。

主治 令人悅澤。好顏色。益氣不饑。本經除煩滿不樂。又可作面脂。別錄。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論冬瓜子曰。去皮膚風及黑黚。潤肌膚。【明】李時珍本草綱目論冬瓜子曰。治腸癰。【明】李士材本草圖解論冬瓜子曰。補肝。【明】經希雍本草經疏論冬瓜

子曰。冬瓜仁味甘寒。能開胃醒脾。【清】汪訥庵本草備要論冬瓜子曰。冬瓜子補肝明目。【清】楊時泰本草述鈞元論冬瓜子曰。冬瓜仁氣味甘平。治心經蘊熱。小水淋痛。並鼻面酒瘰。又療腸癰。主腹內結聚。破潰膿血。凡腸胃內壅。最為要藥。

配合應用 治胃虛嘔吐。用冬瓜子同橘紅。石斛。竹茹。枇杷葉。白芍藥。蘆根汁。人參。白茯苓等分。

治小兒慢脾風。用冬瓜子同人參。茯神。竹瀝。白茯苓。黃耆。甘草。白芍藥。酸棗仁。

服食法。取冬瓜仁七升。以粗袋盛投三沸湯中。須臾取曝乾。如此三度。又與清漬之二宿。曝乾為末。日服方寸匕。令人肥悅。明目。延年不老。又法。取子三五升。去皮為丸。空心日服三十丸。令人白如玉。五藏食療方。

悅澤面容。白瓜仁五兩。桃花四兩。白楊皮二兩。為末。食後飲服方寸匕。日三服。欲白加瓜仁。欲紅加桃花。三十日面白。五十日手足俱白。一方有橘皮。無楊皮。一肘後

治多年損傷不瘥者。瓜子末用溫酒服之。孫真人方。

治消渴不止。小便多用乾冬瓜子。麥門冬。黃連各二兩。水煎飲之。冬瓜苗葉俱治消渴。不拘新乾。摘玄方。

治男子白濁。陳冬瓜仁炒為末。每空心米飲服五錢。並治女子白帶。救急易方。

去雀斑。以冬瓜子與桃仁等分為粉。用蜂蜜煉和貼之。和漢藥考方。

用量 二錢至四錢。

施用宜忌 冬瓜子性寒。久服寒中。

冬瓜仁 即冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬瓜子」條。

即冬瓜子去殼者之處方用名。詳「冬瓜子」條。

功效 利濕熱。消腫滿。

主治 主腸馬汗入瘡腫痛。陰乾為末塗之。又主折傷損痛。參攷資料 冬瓜皮可作丸服。亦可製為面脂。蘇頌。

冬瓜葉 主治 治腫毒。殺蜂。療蜂叮。治寒熱癰疾。消渴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜葉曰。主消渴。癰疾寒熱。又焙研。傳多年惡瘡。

源名 瓜。源名 瓜。源名 瓜。

命名 瓜。源名 瓜。源名 瓜。

部。與瓜子相包連如絮。若練而多汁者故名。

性質 甘平無毒。

主治 絞汁服。止煩燥熱渴。利小腸。治五淋。墜丹石毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜葉曰。洗面澡身。去野蠶。令人悅澤白皙。

主治 燒灰可出瘡疥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜藤曰。搗汁服。解木耳毒。煎水洗脫肛。燒灰可淬銅錢。伏磁石。

即李子冬日結實者之古籍別名。典見綱目。詳「李子」條。

即麥門冬之古籍別

名。典見沙里。即麥門冬之古籍別

名。與見和漢藥考。詳『麥門冬』條。
 『冬花』即款冬花之處方用名。詳
 『款冬花』條。

【冬花葉】即款冬花之古籍別名。
 與見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【冬青】 命名 本品冬月青翠
 不凋故名。

處方用名 冬青子。冬青皮。冬
 青葉。

古籍別名 凍青(本草綱目)

外國名詞 Ilex peduncul-

ata, Miq. (拉丁)ソロ、スズ
 カシ(日本)

基本 屬冬青科。葉用冬青樹
 之子實與皮葉。



(一) 青 冬

形態 冬青為常綠亞喬木。高
 丈許。大者高二三丈。木肌細白有
 紋。葉互生。作卵形。全邊而尖。其質
 厚。有光澤。夏初開小花。花色黃白。
 雄花為聚繖花序。雌花各生於葉

腋。因雄花與雌花異株。雌花較雄
 花疎而不密。雄花蕊四。與花冠片
 數同。而往往數花相攢簇。其實圓
 形如赤小豆大。色赤。其葉所煎之
 汁。為褐色。充染料。



(二) 青 冬

種類 ●葉微圓而子色赤者
 為冬青。●葉形長而子色黑者為
 女貞。

採取 秋冬間採子。陰乾。莖葉
 採無時。

性質 甘。苦。涼。無毒。

效能 補血。祛風。用作滋養強

壯藥。

主治 浸酒去風虛。補益肌膚。

皮之功同。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

佑圖經本草論冬青葉曰。燒灰入

面膏。治皸瘃。滅癩痕。殊效。

配合應用 治痔瘡。冬至日取

凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸九曬。

煎收。每日空心酒服七十粒。臥時
 再服(集簡方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 凍青亦女貞別種
 也。山中時有之。但以葉微圓而子
 赤者為凍青。葉長而子黑者為女
 貞。按救荒本草云。凍青樹高丈許。

樹似枸骨子樹而極茂盛。又葉似
 樺子樹葉而小。亦似椿葉。微窄。而
 顯顯圓不尖。五月開細白花。結子
 如豆大。紅色。其嫩芽燂熟。水浸去
 苦味。淘洗五味調之。可食。(李時
 珍)

【冬青子】●即女貞之處方用名。

【女貞】●即冬青之處方用

名。詳『冬青』條。

【冬青皮】即冬青之皮處方用名。

【冬青葉】即冬青之葉處方用名。

【冬青子】●即冬青之處方用名。

【冬青皮】●即冬青之處方用名。

【冬青葉】●即冬青之處方用名。

【冬青子】●即冬青之處方用名。

【冬青皮】●即冬青之處方用名。

【冬青葉】●即冬青之處方用名。

【冬青子】●即冬青之處方用名。

【冬青皮】●即冬青之處方用名。

【冬青葉】●即冬青之處方用名。

【冬青子】●即冬青之處方用名。

【冬青皮】●即冬青之處方用名。

形態 冬栲為果類之一種。栲
 實肥厚。色紅紫。形如苦蕒。其絕精
 者入藥尤勝。

主治 解勞熱。

【冬桑葉】即桑葉之處方用名。詳
 『桑葉』條。

【冬栲筆筍】 性質 甘。寒。無
 毒。

主治 小兒痘疹不出。養粥食
 之。解毒。有發生之義。

施用宜忌 淡竹筍即中母筍。
 雖美。然發背脚氣。箭竹筍新者
 可食。陳者不宜。諸竹筍多食皆動
 氣。發冷瘧。惟苦竹筍。主逆氣。不發
 疾。(孟詵)

參攷資料 ●筍難化。不益人。
 脾病不宜食之。一小兒食乾筍三
 寸許。後吐。壯熱喘粗。如驚。服
 驚藥不效。後吐出筍。諸證乃定。其
 難化也如此。(孟詵)

●筍與竹
 溼功近。有人素患痰病。食筍而愈
 也。(汪穎)

●贊寧符譜云。筍雖甘
 美。而滑利大腸。無益於脾。俗謂之
 刮腸筍。惟生薑及麻油能殺其毒。

人以麻滓沃竹殼。則次年凋疎可
 驗矣。其蘇州最竹。毛斑竹。匡廬屬

二九九

竹、澧州方竹、嶺南筍竹、筍竹、月竹、諸竹皆苦朝不堪食也。時珍常見俗醫治瘧。往往勤飲筍湯。云能發瘧。蓋不知瘧瘡不宜大腸滑利。而筍有刮腸之名。則暗受其害者。不知若干人也。戒之哉。戒之哉。(李時珍)

【冬結石】即石硫黃之古籍別名。與見綱目。詳石硫黃條。即石硫黃之古籍別名。與見本草集註。詳石硫黃條。

【冬菜滴汁】基本 本品係冬菜中之鹽漬汁。

採取 以陳久者入藥良。
性質 鹹寒無毒。
主治 清肺火咳嗽。解咽喉腫毒。

參攷資料 鹽乾菜水滴着蜈蚣即死。鹽菜炒雞。則蜈蚣亦不食。(綱目拾遺)

【冬葵子】原名 葵子。命名 本品性極滑利。故俗有滑菜之名。又古人採葵必待露。並有露葵之稱也。古籍別名 粉(毛詩)菽。(爾雅)

雅(露葵)(本草綱目)滑菜。(俗名)滑葵子。奇菜子。葵菜子。阿郁子。向日葵子。(和漢藥考)

外國名詞 Helianthus annuus, L. (拉丁)
學名 Malva patcholla, Benth.

基本 屬錦葵科。藥用冬葵之子實。

形態 冬葵為生於海濱之宿根草。莖高二三尺。葉作掌狀淺裂。有茸毛及長葉柄。春季於葉腋開黃白色或青白色花。大三分許。後結實。子為灰黑色。扁圓。



冬葵子

種類 葵有多種。藥用以冬葵為良。

採取 春季採其子實。日乾。
性質 甘寒。溫無毒。
效能 利尿。殺利。濕熱。用治霍亂水腫。及孕婦分娩催生藥。
主治 五臟六腑寒熱。五

癆。利小便。(本經)療婦人乳內閉腫痛。(別錄)

張仲景之醫明 葵子茯苓散。治妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。用葵子一升。茯苓三兩。杵為散。每服方寸匕。日二服。小便利即愈。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論葵子曰。下丹石毒。【唐】孟詵食療本草論葵子曰。出癰疽頭。【明】李時珍本草綱目論葵子曰。通大便。滑水氣。滑胎治痢。【明】李士材本草圖解論葵子曰。冬葵子甘寒。達諸竅。疏大腸。利小便。催難產。通乳閉。出癰疽頭。下丹石毒。葵根功用。與子相做。小兒誤吞銅錢。煮汁飲之。神妙。葵性淡滑。為陽。故能利竅。通閉。關格者。恒用之。別有一種蜀葵根。腸胃生癰者。同白芷服。善能排膿散毒。【清】黃宮繡本草求真論葵子曰。冬葵子甘寒。淡滑。潤燥利竅。通營活衛。消腫利水。凡婦人難產不下。搗取一味。炒香為末。芎藭湯下三錢。則易生。取其晨夕向日轉動。靈活耳。婦人乳房脹痛。同砂仁等分為末。

熱酒服三錢。其腫即消。且能破五腫。利小便。並臍腹寒熱。羸瘦。同榆樹皮等分煎服亦效。十劑方云。滑可去者。冬葵子。榆白皮之屬是也。故清則去者。宜滑劑以利之。經冬至春。作子者。名冬葵子。春葵子亦滑。不堪入藥。蜀葵赤者。治血燥。白者。治氣燥。亦治血淋。皆取其寒潤滑利之功。【清】楊時泰本草述鈞元論葵子曰。虛不遠云。葵具五色。有多種。惟冬葵者為冬葵。冬葵為脾之藥。腎之藥。字從葵從冬。皆屬於腎。其子易生。用治胎產入神。功主助精益水。而輸水滑。非不返顧其根也。親於通關格。復止消中。多滑。可以想見矣。本經寒熱羸瘦。與五經並治者。蓋寒熱欲通而不通。致致肌肉羸瘦。五經欲成而不成。致水道閉塞。葵性滑養竅。能使礙者通。返顧衍根。能使通者藏。至病屬久藏而發者。如淋帶。死胎。痘疹。如消渴。丹石毒。如腸胃疝。瘡腫。無頭。及肉錐。任證。皆有奇效。世人但知能發宿疾。不知其性正不許人。有久藏患害也。【清】鄒澍本經疏證論葵子曰。虛芷圓曰。葵有多種。

冬茂者曰冬葵。字從葵從冬。皆屬於腎。其子易生。用治胎產。自然入神。其花向日而傾。有返顧衛根之義。觀其能通小便。又能治多溺。蓋可見矣。(外臺秘要。消中。日夜溺七八升。用冬葵根五斤。水五斗。煮三斗。每日平旦服二升。)本經主五臟六腑寒熱羸瘦。五癆。蓋寒熱雖欲其通。然過通則五臟六腑之氣不藏。能致肌肉羸瘦。水氣雖欲其藏。然過藏則溺道泣瀝。能致小便閉塞。葵性滑養。能使藏者通。返顧衛根。能使通者藏。若病屬久積而發者。如淋如帶。如痘疹如死胎。如丹石毒。如消渴。如癰腫沒頭。如腸癰胃疽。如肉錐怪證。皆有奇效。第有風疾宿病。天行病後。曾被犬傷者。忌之。世人但知其能發宿疾。不知其能使宿疾不留。免他日卒中之虞。正其功耳。凡物之生。各有至理。葵多子性滑。多子者歸腎。性滑者利竅。又其花向日而傾。返顧其本。故仲景於妊娠有水氣。小便不利。頭眩。用葵子茯苓散。夫他物利水。徑情直行。豈復返顧。則當防其導胎下墜。且小便不利在極

下。頭眩在極上。焉能聯絡為一。一味之用。具此兩義。其精有如此者。至別錄所主婦人乳內閉腫痛。亦取其滑以開閉。其色白衛根。仍不外返顧血海之義。擴而充之。其功蓋不止是二者而已。

辨僞 張山雷曰。花卉之中。以葵為名者最多。其實則種種不一。古人以葵為常食之品。如詩之烹葵。禮之夏用葵。最為習見之物。然今人皆不識為何物。考爾雅釋草。蒺藜葵。郭注似葵而小。啖之滑。是蒺藜固可啖。而曰似葵。則非葵矣。爾雅又有芹楚葵。即今之水芹。毛詩傳又有芣薹葵。說文有薹薹葵。廣雅作薹薹葵。即今之尊菜。則皆可食。然各自一種。雖同似葵名。而非即葵也。爾雅又有蓂葵繁露。郭注謂大莖小葉。近人以爲似今之西番蓮。則非葵之同類。李瀕湖謂即別錄之落葵。以落字爲即落字之誤。其說甚是。則即今之胭脂菜。性亦寒滑。與葵相近。因得葵名。此又別爲一種。許叔重說文解字。則曰葵菜也。而又有蓂葵。芹楚葵。薹薹葵。似許氏所稱之葵菜。即

此三者之總稱。然古人既以一字爲名。蘇恭亦謂當食之品。則固專有一種。必不能如蘇頌圖經之例。竟以蜀葵。錦葵。黃葵。終葵。菟葵等物。渾合言之。而曰皆有功用也。考爾雅載蚌蚌。郭注今荊葵也。似葵。紫色。說文載蚌蚌也。詩東門之枌。毛傳荊花菜也。正義引舍人注。蚌一名蚌蚌。陸機疏荊菜一名荊葵。廣雅荊葵。菟葵。羅願爾雅翼。荊葵花似五銖錢。大色粉紅。有紫文縷之一名。錦葵。郝懿行爾雅義疏謂荊錦葵。俱一聲之轉。阮文達謂菟葵。即經與之葵。今人不識。惟揚州人以爲常蔬。清油淡羹。味極甘滑。阮氏籍隸儀徵。博通今古。其說堪信。且與古人所謂葵性甘滑者。自然符合。然則葵之專名。自當屬之荊葵。非菟葵。楚葵。薹葵之別爲一物者可比。寇宗奭謂綠葉如黃荊葵。其花至小。如初開單葉蜀葵。有檀心。色如牡丹。姚黃者。即錦葵也。雖郭氏爾雅注謂荊葵似葵。則荊葵與葵。明非一物。然細玩郭氏注文。既謂菟葵似葵而小。又謂荊葵似葵。則菟葵荊葵。又皆非葵。試思其

所謂葵者。果是何物。豈欲以薹葵。紫葵當之乎。然郭注又以爲承露。大莖小葉。花紫黃色。則又與荊葵。菟葵皆不類。何得稱其似。此郝懿行爾雅義疏所以謂郭氏亦不識葵也。今推景純之意。未必果不識葵。其謂荊葵似葵紫色者。蓋謂荊葵之花。似蜀葵而色紫耳。似今本爾雅注文。脫一蜀字。是則蜀葵乃葵之大者。而荊葵則爲古人烹葵。葵苴之葵。其花紫色。洵是確鑿可據。再以阮氏芸台之意合之。乃知古人以葵爲菜。即今之錦葵。於古則亦謂之荊葵。其菟葵則爲葵類之較小者。而蜀葵則似葵而大。一莖直上。高者至八九尺。花似木樨而大。五色俱備。又有單瓣千瓣之不同。古人謂其疏莖密葉。單尊隨花。金粉檀心。頗堪寫照。爾雅則謂之戎葵。名警別錄。則謂之葵葵。爾雅則作胡葵。郝懿行謂戎蜀葵。胡皆謂其大。非自戎蜀葵胡得來。其說甚是。今京人呼爲穉棉花。登菜間呼爲穉芥花。吳人又呼爲淑共花。皆蜀葵之轉音也。又別有一種黃蜀葵。葉如雞爪。花則色黃而

五 蠶 冬

大與蜀葵又大異。今謂之秋葵。花而亦非一莖直上。其大如臂。其高盈丈。頂巔一花。大如盤。四周單瓣。中簇細蕊之向日葵也。廣雅又有地葵。地膚也。則即地膚子。廣雅又曰。蜀葵也。朱氏駿聲說文通訓。謂即今之秋葵。向日者。而王氏引之。廣雅疏證。則又以向日之葵。與詩之烹葵。合而為一。其實向日之秋葵。不堪作蔬。而為蔬之荊葵。花不向日。且向日之葵。高大。迥非為蔬之葵可比。亦萬不能合而為一。至近世更有所謂紫背天葵者。又別是一種。凡此數者。又同以葵名。然皆以二字連綴為名。本不在一類。數種之例。且皆不可以為蔬。其可以為蔬者。惟若之為菟葵。芹之為楚葵。藟之為葵。葵三種。而亦皆以二字連綴為名。惟荊葵。則後人又作錦葵。而古人止名為葵。是當分析言之。各還其本真。必不可因其同有葵名。而互相援引。更增紛擾。歷考諸書。雖爾雅說文等注。已不免有沿誤之處。以致諸家本草。更多彼此歧出。益令後人不易識別。孫氏是荷問經堂輯刻本草經。

猶以冬葵子與爾雅之終葵繁露為一物。以冬之與終。古書本通用也。實則終葵之合音為椎。乃形容之詞。言其上銳下大。其形如椎。繁露之葉及子。皆形圓而銳。故有終葵之名。其子色紫可染。今俗謂之胭脂子。雖其葉亦可為蔬。而非入藥之冬葵子。又粵地所產葵扇之葵。更別有一種。總之草類中以葵為名者太多。惟向日之秋葵。不入藥類。其餘皆有滑潤寒涼之性。意者古人命名之義。即因此。所以其體各殊。而其用相似。然正惟其性之相近。尤足令談醫者淆亂見聞。而莫衷一是。實則各有本真。不可誣也。

配合應用 ①治大便不通十日。至一月者。冬葵子三升。水四升。煮取一升。服。不遑更服。(肘後方) ②又用葵子末。人乳汁等分。和服。立通。(聖惠方)

治小便利血淋。葵子一升。水三升。煮汁。日三服。(千金方)

治胎前患淋。冬葵子一升。水三升。煮二升。分服。亦治妊娠下血。(千金方)

治產後淋瀝不通。用葵子一合。朴硝八分。水二升。煎八合。下硝服之。(集驗方)

治生產困悶。冬葵子一合。搗破。水二升。煮汁半升。頓服。少時便產。昔有人如此服之。登臍立撲兒於廟中者也。

治倒生口瘡。冬葵子炒黃。為末。酒服二錢。七效。(管股產寶方)

治胎死腹中。葵子為末。酒服方寸匕。若口閉不開者。灌之。藥下即甦。(千金方)

治胞衣不下。冬葵子一合。牛膝一兩。水二升。煎一升。服。(千金方)

治血崩產崩。秋葵子為末。每服二錢。入臘茶一錢。沸湯調服。日三。(聖惠方)

治痰喘邪熱。冬葵子陰乾。為末。酒服二錢。午日取花授手。亦去。

瘡。(聖惠方)

治瘰癧無頭。三日後取葵子二百粒。水香之。當日即開也。(孟詵方) 又云。只吞一粒。即破。如吞兩粒。則有兩頭也。(經驗方)

治便毒初起。冬葵子末。酒服二錢。(儒門事親方)

治面上皴瘡。冬葵子。柏子仁。茯苓。瓜瓣。各一兩。為末。食後酒服方寸匕。日三服。(陶隱居方)

治解蜀椒毒。冬葵子。煮汁飲之。(千金方)

治傷寒勞復。葵子二升。漿米一升。煮粥食。取汗立安。(聖惠方)

施用量。一錢至三錢。

施用宜忌。凡滑利之品。無凝滯者禁用。

參攷資料 ①冬葵子以黃芩為之使。(徐之才) ②葵性寒滑。似非孕婦所宜。何以金匱治妊娠水氣。用葵子在芍藥散。修園曰。有病則病受之也。千金以參朮等味。配其間。愈覺平安。③按爾雅。翼云。葵者。揆也。葵葉傾日。不使照其根。乃智以揆之也。古人採葵。必待解解。故曰葵。今人呼為滑菜。言其性

也。古者葵爲五菜之主。今不復食之。(李時珍) 向日葵質堅耐寒。入冬不凋。故名冬葵。性滑利。能治臟腑寒熱。破五淋。利小便。婦人乳房脹痛。同砂仁等分爲末。熱酒服三錢。其腫即消。孕婦難產。不下。專取一味炒香爲末。芎歸湯下三錢。則易生。取晨暮勞動。鹽活。亦取其寒滑利竅之用也。(張石頑)

【冬葵苗】

性質 甘寒。滑。無毒。主治 黃汁服。利小腸。治時行黃病。乾葉爲末。及燒灰服。治金瘡出血。

歷代記述攷證

【唐】孫思邈千金翼論冬葵苗曰。脾之菜也。宜脾。利胃氣。滑大腸。【唐】孟詵食療本草論冬葵苗曰。服丹石人宜食之。潤燥利竅。功與子同。【宋】蘇頌圖經本草論冬葵苗曰。宣導積滯。妊婦食之。胎滑易生。【明】汪穎食物本草論冬葵苗曰。除客熱。治惡瘡。散膿血。女人帶下。小兒熱毒。下痢丹毒。並宜食之。

配合應用 治肉錐怪疾。有人手足忽長。倒生肉刺如錐。痛不可忍。者。但食葵菜即愈。(夏子益奇疾方)

五畫 冬

可忍。者。但食葵菜即愈。(夏子益奇疾方)

治諸瘻不合。先以消清溫。洗拭淨。取葵菜微火烘暖貼之。不過二三百葉。引膿盡。即肉生也。忌豬魚蒜房事。(必效方)

治湯火傷瘡。葵菜爲末。傅之。(食物本草方)

治蛇蝎螫傷。葵菜搗汁服之。(千金方)

治誤吞銅錢。葵菜搗汁冷飲。(普濟方)

治丹石發動。口乾咳嗽者。每食後飲。冬月葵鹽汁一盞。便臥少時。(食療本草方)

參攷資料 爲百菜主。其心傷人。(別錄) 葵葉尤冷利。不可多食。(陶弘景) 其性雖冷。若熱食之。令人熱悶。動風氣。四月食之。發宿疾。天行病後食之。令人失明。霜葵生食。動五種留飲吐水。凡服百藥。忌食其心。心有毒也。黃背紫莖者。勿食之。不可合鯉魚。黍米。鮓食害人。(孟詵) 作菜茹甚甘美。但性滑利不益人。(蘇頌) 凡被狂犬咬者。永不可食。食之即發食。

葵須用蒜。無蒜勿食之。又伏磁黃。

(李時珍) 按唐王勣外臺秘要云。天行斑疹。須臾偏身。皆戴白漿。此惡毒氣也。高宗永徽四年。此病自西域東流於海內。但食葵菜。以蒜蘸啖之。則止。又聖惠方亦云。小兒發斑。用生葵菜葉絞汁。少少與服。散惡毒氣。按此即今痘瘡也。今之治者。惟恐其大小二便頻數。鴻其元氣。痘不起發。葵菜滑竅。能利二便。似不相宜。而昔人賴之。豈古今運氣不同。故治法亦隨時變易與。(李時珍) 凡久病大便澀滯者。宜食葵菜。自然通利。乃滑以養數也。(張從正)

【冬葵根】 性質 甘寒。無毒。主治 惡瘡。療淋。利小便。解毒。殺毒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論冬葵根曰。小兒吞錢不出。黃汁飲之甚妙。【唐】孟詵食療本草論冬葵根曰。治疔瘡。出黃汗。

【明】李時珍本草綱目論冬葵根曰。利竅滑胎。止消渴。散惡毒。

【冬葵子】 即乳葵實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「乳葵」條。

【冬霜水】

形體 冬霜係屬冰。類爲水氣凝露時。其他之溫度在冰度下。則結成微細顆粒而爲霜。其狀白色透明。嚴冬降者爲佳。

性質 甘寒。無毒。主治 食之解酒熱。傷寒。鼻塞。酒後諸熱面赤者。

歷代記述攷證 【宋】陳承本草別說論冬霜水曰。和蚌粉。傅唇。月痲瘡。及腋下赤腫立瘥。

參攷資料 凡收霜以雞羽掃之。瓶中密封。放陰處。久亦不壞。(陳承) 陰盛則露凝爲霜。霜能殺物。而露能滋物。性隨時異也。乾象占云。天氣下降而爲露。清風薄之而成霜。所以殺萬物。消侵淫。當降而不降。當殺物而不殺物。皆政弛而慢也。不當降而降。不當殺而殺物。皆政急而殘也。許慎說文云。早霜曰露。白霜曰皚。又有玄霜。(李時珍)

【冬蟲夏草】 命名 本品冬爲蟲。夏爲草。故名。

古籍別名 夏草冬蟲。(綱目)

拾遺)

外國名詞 *Cordyceps sinensis* (拉丁)

產地 四川雲南諸省多有出。

形態 按冬蟲夏草為山草類之一種。夏生草苗三四歧出。長數寸。形似韭菜而細。雜錯於莖草叢中。頗難辨識。凌冬苗葉萎枯。根如朽木。而化為蟲。長三寸許。色微黃。有毛。并有口眼。足有十二。狀如三眼之鼠。蟄蟄而動。嚴寒積雪中。恒行地上。每當夏至。則萬土為草。冬至發土為蟲。採得可供藥用。

採取 宜於冬日採其蟲用。

性質 甘溫平。無毒。

主治 益肺腎。補精髓。止血化痰。療勞嗽。喘症。理諸虛百損。

近人學說 曹炳章曰。考冬蟲夏草。據泰東西博物學家。謂是一種寄生菌。未嘗採作藥用。而我國發明醫治作用者。始於前清雍乾同。初見於吳遵程本草從新。繼見於趙恕軒綱目拾遺。此藥確有研究之趣味。爰將中外學說。彙集之以供實驗家之開發。日本新農報云。治黃蘗山。附河口。縣海者。遊西

藏歸。攜回有冬蟲夏草數種。出視理學博士伊藤篤太郎。言產雪山中。土人謂為蟲草。變遷云。惜其標本十數種。多損其首尾。完具者僅一焉。博士就其殘刊。一撮。揆成。形。比而觀之。則物幾燥矣。而小者長徑二寸。大者三寸。二三。全體分上下兩部。上部細長。帶黑褐色。各本有大小長短之差。上端肥大。作圓筒形。其下部則蟲體也。色褐黃。長徑五寸至一尺。不等。其肥大視上部過三倍。以上。博士曰。此物在昔。已自中國運致長崎。漢醫家以為藥餌。和漢諸書。備載其說。不遑枚舉。日本亦產此物。昔杉本常盤。曾於江州觀音寺傍之山中。尋見冬蟲夏草。較中土產者無異。後蒐者十三種。曾合印一圖。其謂蟲草。變遷者。與腐草化螢之說。同一謬見也。今日學理大明。無復信此俗說者矣。其實。乃蟲菌合成之體。蓋雖寄生於蟲體。由病理的狀態而生也。或言用作藥品。有奇效。此非俟化學家精密分析後。亦未可信。夫菌類中之寄生於動物體。或植物體。而遂其生活者。其數甚多。

此人所以知也。學術上名之以寄生菌。寄生菌者。可從其寄生之狀態。區別為二種。有寄生於動植物之死體者。亦有寄生於動植物之活體者。冬蟲夏草。即活物寄生菌之類。蓋寄生於昆蟲體。以吸取其養分。卒致蟲斃。菌長。其子實部。遂茁於地面耳。考冬蟲夏草之學名。曰哥諦瑟蒲西倫錫。此種之見知於歐洲學界也。在距今一百九十四年。即西歷一千七百二十三年。有法人巴拉南遊歷中國。蒐集藥品數種。以歸致諸巴黎學士會院。冬蟲夏草。其一種也。當時巴拉南曾言此物產自四川及西藏云。翌年。法國著名昆蟲學家列留氏著一書。以記之。由巴黎學士會院梓行於世。又有英人利維者。亦曾自中國蒐集藥品歸。度藏於博物院。逾一千八百四十二年。英國著名菌學家。自其中檢出冬蟲夏草。且說明之。因命以斯維利亞西倫錫之名。菌學專家之研究冬蟲夏草者。實以是為嚆矢矣。有巴格烈氏。為附言以釋之。曰。漢醫以此物為良藥。謂其功比人參。但不易覓。

惟御醫用之。其次則有意大利菌學家薩加禮德者。著一巨帙。搜輯世界菌類。賅博靡遺。乃以冬蟲夏草。入諸哥諦瑟蒲之屬。因改稱哥諦瑟蒲西倫錫。距今二十年前。而英國菌學家麥瑟氏。更著冬蟲夏草說。從學術解釋之。附以圖。且謂中國。日本。西藏。均產此物。至於此菌寄生之昆蟲。屬於何類。則麥瑟氏。引證英因昆蟲學家格力代之言。謂為蜂翅類科屬之螟蟲云。此外若英國昆蟲學家。莫斯脫得。與德國菌學家。林多等。亦就冬蟲夏草。著為圖說。而此物之所屬。與性質。益獲明瞭矣。又據日本中澤氏昆蟲世界云。頃訪某氏。見所得冬蟲夏草。一從馬蠅頭部。生細線狀。二莖。一從小蟲背部。生細棒狀。一莖。原來冬蟲夏草。種類甚多。學術上。屬諸擔孢子科。曩時以為動物所化者。誤也。蟲類斃死。土中腐生。下等植物。大半為菌類。其形狀。色澤。大小。長短。各不相同。某氏所有之一種。名蠟花。係梅雨後。樹蔭草間。所生之菌類。他一種。係如斑蝥等。甲翅蟲。青部所生之菌類。此類菌

三〇四

蠶或一二。或滋生。隨蟲體而具。種子飛散。易為細粉。此種子於去年之秋。潛入蠶蟲之體中。或附著外皮。蟲體腐敗。倘吸養分以發生。日本各地所常見者。蠶姑。蟬。鼠婦。蝸。蠟地。蟬。蛸等之寄生草也。新農報又云。日本近亦產一種蟬花。或曰蟬竹。蓋亦蟬在土中。尚未羽化之際。有奇詩瑟蒲寄生其體也。余謂此物亦宜入奇詩瑟蒲勞丹之屬。自苗學上言之。世界中所產冬蟲夏草之屬。非止一類。據麥瑟氏之說。則經學術上調查者。都六十二種。其中澳洲及新西蘭島所產者。有數種。形頗大。澳洲維多利亞所產者。曰奇詩瑟蒲亨力。長六寸餘。寄生於蛾子。其蛾子曰海披亞爾。又澳洲諷蘭比吉河沿岸地方。亦產一種。屬奇詩瑟蒲泰羅里。子實部作角狀。長六七寸。新西蘭學所產者。有一種屬奇詩瑟蒲候格利。其外形與中國所產者頗相類。但其形較大。長達一尺云。博物雜誌云。冬蟲夏草。相傳為蟲死所變。輩詭為奇。不知此係菌類之寄生於殭蟲者也。理本無常。無足為

怪。蜀省西南邊陲。產出甚夥。初生祇指一橫。形類鼠尾。色作灰褐。長二三寸。無旁枝雜莖。草中採取者。須伏地尋覓。因株及根蟲形未變。倒植土內。短足對生。背有豎屈紋。稜稜可辨。株從尾苗。每歲陽歷五月杪六月初採之。可以入藥。此皆科學家說明其種類狀態者也。四川通志云。冬蟲夏草。出襄塘撥溪工山。趙恕軒云。產四川江油縣化林坪。夏為草。冬為蟲。長三寸許。下生六足。頭以上絕類蠶形。青綠餘照云。四川產夏草冬蟲。根如蠶形。有毛能動。夏月其頂生毛。長數寸。至冬苗枯。但存其根。嚴寒積雪中。往往行於地上。新疆風土考云。冬蟲夏草。生雪山中。夏則葉枝類。莖葉根黃白色。如朽木。凌冬葉乾。則根蠕動化為蟲。性溫。入藥用。斷癰云。出烏蒙塞外。夏苗土為草。冬變土為蟲。從新云。產雲貴。冬在土中。身活如者。有毛能動。至夏則毛出土。上連身俱化為草。若不取。至冬俱化為蟲。文房四考云。邛州小識云。冬蟲夏草生打箭爐。春生土中。

如蠶。夏則頭上生苗。形長寸許。色微黃。較蠶差小。如三眠狀。有口眼。足有十二。宛如蠶形。苗不過三四葉。柳崖外編云。冬蟲夏草一物也。冬則為蟲。夏則為草。蟲形如蠶。色微黃。草形如莖。葉較細。入夏蟲以頭入地。尾自成草。雜錯於莖草間。不知其為蟲也。交冬草漸萎黃。乃出地。蠕蠕而動。其尾猶簌簌然。帶草而行。渣氣化轉移。理有然者。土人以燉鴨食之大補云。拾遺引。紹興朱萊仲先生言。其尊人曾任雲南麗江府中甸司馬。其地出冬蟲夏草。其草冬為蟲。一交春。蟲蛻而飛去。土人知之。其取也有期。過期則無用。唐容川本草問答云。冬蟲夏草。本草多不載。今考其物。真為靈品。此物冬至生蟲。自春及夏。蟲長寸許。粗如小指。當夏至前一時。猶然也。及夏至時。蟲忽不見。皆入於土。頭上生苗漸長。到秋分後。則苗長三寸。居然草也。此物生於西番草地。遍地皆草。莫可辨識。秋分後。即微雪。探蟲草者。看雪中。有數寸無雪處。一翻掘起。而蟲草即在。其中。觀其能化雪。則氣性純陽。

蓋蟲為動物。自是陽性。生於冬至。盛陽氣也。夏至入土。陽入陰也。其生苗者。則是陽入陰出之象。至蠶之品也。故欲補下焦之陽。則單用根。若益上焦之陰。則兼用苗。總顯其冬夏二令之氣化而已。趙恕軒云。夏草冬蟲。感陰陽二氣而生。夏至一陰生。故靜而為草。冬至一陽生。故動而為蟲。轉轉循環。非腐草為蠶。陳麥化蝶。感濕熱之氣者。可比。入藥。故能治諸虛百損。周象云。冬取者可種子。治蠶服。周稚圭云。須以秋分採者良。王士雄云。夏採者可治陽氣下陷之病。王秉衡云。冬蟲夏草。得陰陽之氣。既全。其溫和不補之性。可知。因其活潑。變動。隨時。故為虛癆。虛痞。虛脹。虛痛之聖藥。功勝九香蟲。且至冬而蠶。德比潛龍。凡陰虛陽元。而為喘逆。痰嗽者。投之悉效。(炳章按。陰虛陽元。不安。陰虛陽浮。最宜)藥性考云。冬蟲夏草。味甘性溫。秘精益氣。真補命門。本草從新云。甘平保肺。益腎。補精。髓。止血。化痰。已癆嗽。治腸症。皆良。朱排山云。冬蟲夏草。以酒浸數枚。吸之。治腰膝間痛。

五靈 冬

楚。有益腎之功。以番紅花同熨則不蛀。又與老鴨同煮食。宜老人。煨老鴨法。用冬豨夏草三五枚。老雄鴨一隻。去肚雜。將鴨頭劈開。納藥於中。仍以線紮好。加醬油酒如常。燻爛食之。其藥氣能從頭中直貫全身。無不透淡。凡病後調養。及虛損人。每服一鴨。可抵人參一兩。潘友新云。粵中鴉片丸。用冬豨夏草。鴉片人參。合成。乃房中藥也。此草性能與陽。則補腎可知。文房四考云。孔裕堂述其弟患怯弱。汗大泄。雖盛暑。處密室帳中。猶畏風。其病三年。醫藥不效。症在不起。適有戚自川歸。攜以冬豨夏草三觔。逐日和葷蔬作餚。漸至愈。因信此物補肺氣。實膜理。確有微驗。用之皆效。綜觀中外諸說。由鄙見而解決之。據青囊錄。謂此草根如蠶形。有毛能動。嚴寒積雪中。往往行於地上。新羅風土記。謂冬豨夏草。生雪山中。夏則葉歧如葉。凌冬葉乾。則根蠕動化為蟲。本草從新。謂冬豨在土中。身活如老蠶。有毛能動。柳岸外編。謂冬豨夏草。交冬豨前。黃方出地。蟻蟻而動。尼

猶簪簪帶草而行。朱萊仲乃父謂其草冬為蟲。一交春蟲蛻而飛去。故取之有期。其為蟲漸遷變。已無疑義。而科學家但就其標本觀之。謂為寄生菌。恐非確論。而據唐容川云。欲補下焦之陽。用根。益上焦之陰。兼用苗。以其得冬夏二令之氣化也。現今皆根苗並用。其為補肺陰。納腎陽。顯而易見。故王秉衡斷為甘溫平補之品。凡治陰虛陽浮。而為虛喘。痰嗽者。投之輒效。良有以也。

【冬蘇】即薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「薄荷」條。
【凹角】即犀角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「犀角」條。
【出樣珊瑚】即木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木通」條。
【加空弄果】即呂宋果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「呂宋果」條。
【加德】即沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「沙參」條。
【包穀】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。
【北五味子】即五味子之處方用名。詳「五味子」條。

【北杏仁】即杏仁之處方用名。詳「杏仁」條。
【北沙參】即沙參之處方用名。詳「沙參」條。
【北芩】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。
【北前胡】即前胡之處方用名。詳「前胡」條。
【北帝玄珠】即硝石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硝石」條。
【北柴胡】即柴胡之處方用名。詳「柴胡」條。
【北風】即防風之處方用名。詳「防風」條。
【北庭砂】即硝砂之古籍別名。典見四聲本草。詳「硝砂」條。
【北海珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。
【北秦皮】即秦皮之處方用名。詳「秦皮」條。
【北細辛】即細辛之處方用名。詳「細辛」條。

【北雁砂】形態 出關東。如珠。色如荳。豆投擲碗中有響聲者為真。可供藥用。

主治 療一切眼病。

參攷資料 用明月砂五分。用針刺入紅者佳。北雁砂三錢。再川羊肝一具。連膽不落。水刺開數路。不要割開。將二味研為末。入肝內。以無灰酒二斤。熬熱煎剩二碗。空心一服。晚飯後一服。以盡量為度。羊肝配之一服完。不論眼病內障外障。黑暗不明。無不神效。（洪清遠）

【北雲朮】形態 北雲朮為朮者。其朮初生土中。並無枝葉。生於暗地者多。天氣晴和則掘地求之。可得。色如枯楊柳。小大如筋。莖延數十步。屈曲而生。可供藥用。
主治 風寒傷食諸病。
參攷資料 北雲朮之產地無藥。凡有疾者。煎此朮湯服之。自愈。又可占病人之吉凶。若煎沸數次。藥淨者病即愈。半淨半沉者病久不愈。土人以此驗之。（趙學敏）
【北瀉】即瀉虛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瀉虛」條。
【半夏】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「半夏」條。

【半天回】即三稜之古籍別名。真見和漢藥考。詳「三稜」條。

【半天回】產地 生山野間。形態 半天回為石

草類之一種。春生苗。高二尺餘。赤斑色。冬則枯。其根可供藥用。

採取 夏月採之。性質 苦澆。溫無毒。

主治 理勞損婦人諸疾。

【半池蓮】即金錢草之俗名。詳「金錢草」條。

【半含春】即胡頹子之古籍別名。真見綱目。詳「胡頹子」條。

【半枝蓮】即續隨子之古籍別名。真見和漢藥考。詳「續隨子」條。

【半面砂】即硃砂之古籍別名。真見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【半夏】命名 禮記月令五月

半也。古稱守田會意也。水玉。因形也。

處方用名 生半夏。熟半夏。半夏粒。

古醫別名 守田。水玉。和姑。(本經)地文。(別錄)半下。示姑。雉毛色。雉毛。奴昌。白傍。幾子。羊眼半

夏。按宮野原(和漢藥考)外國名詞 Pinellia Tuberosa (拉丁)

基本 屬天南星科。藥用半夏塊根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。半夏產湖北荊州為最。其次湖南常德。又其次則雲南、四川、安徽、四月出新。西藥名守田。有產安南東京。名為東京夏珠。夏大粒。下四府西江等。利其價平。多用之。和漢藥考曰。日本各處產此。攝津、甲斐、相模、安房、下總、近江、安藝、周防、豐後。肥後尤多。為日本輸入中國藥品之一。



半夏

形態 按半夏為宿根草。春月從宿根生一二莖。莖頂生三小葉。葉柄生肉芽。惟夏月則另抽莖。更於頂上生苞。外部綠色。內部紫黑色。後縱裂如深七。內有雌雄二蕊。花軸之尖端細長如鼠尾。突出苞

外。其根外觀為白色。球狀大如指頭之根。內部則為白色散密之粉狀。氣味俱緩和。

採取 五月八月。採根暴乾。

製法 陶弘景曰。凡使半夏。須用湯洗十餘遍。令滑盡。不爾有毒。戟人咽喉。方中有半夏。必須用生薑者。以制其毒。故也。雷斅曰。修事半夏四兩。用白芥子末二兩。醃醃二兩。攪濁。將半夏中洗三遍用之。若洗不盡。令人氣逆。肝氣怒滿。李時珍曰。全治半夏。惟洗去皮垢。以湯泡浸七日。逐日換湯。曬曬乾。切片。薑汁拌焙入藥。或研為末。以薑汁入湯浸澄三日。漉去涎水。曬乾。用。謂之半夏粉。或研末以薑汁和作餅子日乾。謂之半夏餅。或研末以薑汁白礬湯和作餅。栝葉包置籃中。待生黃衣。日乾。謂之半夏麩。白飛散醫通云。痰分之病。半夏為主。造而為麩。尤佳。治濕痰。以薑汁白礬湯和之。治風痰。以薑汁及皂角汁和之。治火痰。以薑汁竹葉或荊瀝和之。治寒痰。以薑汁礬湯入白芥子末和之。此皆造麩炒法也。陳仁山曰。半夏拾斤。用清水泡

三日。夜每日換水三次。第四日用老薑二斤煎濃水泡之。五日六日同法。第七日取起。約蒸六點鐘。取出清薑汁。再蒸約四點鐘。取起。曬之。約曬七成乾。復用薑汁再漬透。再蒸四點或五點鐘。曬乾用之。其實變轉老紅色。四面若遇裂磁器一樣。用手揸之便碎。無容落粉。之。如此製法。可謂透矣。

性質 辛。平。有毒。

效能 燥濕。化痰。降逆。止嘔。半夏在胃無何等作用。至腸略能促進腸液之分泌。并和腸液化合。而被腸壁吸入血中。能激末梢神經。使精神振興。血液之循環增快。同時促進肺之呼吸作用。使痰沫容易驅出。故用作咳逆及吐逆鎮靜藥。

主治 傷寒寒熱。心下堅。胸脹。咳逆。頭眩。咽喉腫痛。腸鳴下氣。止汗。(本經)消心腹胸脇痰熱滿結。咳嗽上氣。心下急痛。墜疔。時氣嘔逆。消癰腫。療痿黃。悅澤面目。墜胎。(別錄)

張仲景之發明 半夏一味。經張仲景之實驗。認為主治痰飲嘔

吐也。旁治心痛逆滿咽中痛。咳唾腹中雷鳴。茲考徵如下。①大半夏湯證曰。嘔吐。以上一方。半夏二升。②小半夏湯證曰。嘔吐。殺不得下。③小半夏加茯苓湯證曰。嘔吐。又云眩悸。④半夏厚朴湯證曰。咽中如有炙餅。以上三方半夏皆一升。⑤半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。⑥生薑瀉心湯證曰。腸下有水氣。腹中雷鳴。⑦甘草瀉心湯證曰。腹中雷鳴。又云乾嘔。⑧小柴胡湯證曰。嘔。又云咳。又云心下悸。⑨大柴胡湯證曰。嘔不止。⑩小青龍湯證曰。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。又曰吐涎沫。⑪葛根加半夏湯證曰。嘔。⑫黃芩加半夏湯證曰。嘔。⑬茯苓甘草湯證曰。嘔。⑭瓜蒌薤白半夏湯證曰。心痛。⑮黃連湯證曰。欲嘔吐。⑯附子粳米湯證曰。腹中雷鳴。又云逆滿嘔吐。⑰小陷胸湯證曰。結胸病。正在心下。按之則痛。以上十四方。半夏皆半升。⑱半夏酒湯證曰。咽中傷生瘡。⑳甘遂半夏湯證曰。心下積聚。以上二方半夏十四枚。

或十二枚。近半升。⑳半夏散證曰。咽中痛。㉑半夏乾姜散證曰。乾嘔吐。逆吐涎沫。㉒半夏麻黃丸證曰。心下悸。以上三方。半夏諸藥等分。歷觀此諸方。半夏主治痰飲嘔吐也明矣。其餘諸證。嘔而有痰者。一是皆半夏治焉。

歷代配述攷證

【唐】甄權藥性本草論半夏曰。消痰。下肺氣。開胃健脾。止嘔吐。去胸中痰滿。生者摩癰腫。除瘰癧氣。【宋】大明諸家本草論半夏曰。治吐食反胃。霍亂轉筋。腸腹冷。痰癧。【金】張元素珍珠囊論半夏曰。治寒痰及形寒。飲冷傷肺而咳。消胸中痞。隔上痰。除胸寒。和胃氣。燥脾濕。治痰厥頭痛。消腫散結。【元】朱丹溪本草衍義補遺論半夏曰。治眉稜骨痛。【元】王好古湯液本草論半夏曰。補肝風虛。【明】李時珍本草綱目論半夏曰。除腹脹。目不得瞑。白濁。夢遺。帶下。【明】繆希雍本草經疏論半夏曰。半夏得土金之氣。象得乎天之燥氣。故其味辛平苦溫。火金相搏。則辛而有毒。濕古謂味辛苦性溫。氣味俱薄。沈而降。好古謂其辛

厚苦輕。入足太陰陽明少陽。亦入手少陰經。柴胡為之使。辛溫善散。故主傷寒邪在表裏之間。往來寒熱。苦善下泄。邪在胸中。則心下堅。胸脹咳逆。邪在上焦。則頭眩。邪在少陰。則咽喉腫痛。別錄亦謂其消心腹胸膈痰熱滿結。咳逆上氣。心下急痛。堅痞。時氣嘔逆。亦皆邪在下。急胸中之所致。故悉主之也。中焦者。足太陰之所治也。有濕有熱。清濁不分。則腸鳴。濕熱勝則自汗。入足太陰。故井主之。辛能散結。故消癰腫。脾家濕熱。盛則面色痿黃。實脾分水燥。濕則前證俱除。面目因而滑澤矣。辛溫有毒。故墮胎也。【清】黃宮繡本草求真論半夏曰。半夏書言辛溫有毒。體滑性燥。能走能散。能燥能潤。和胃健脾。補肝潤腎。數語藥已道其主治大要矣。第不詳悉註明。猶未有解。蓋半夏味辛。辛則液化而便利。故云能潤腎燥也。脾苦濕。必得味辛氣溫以為之燥。半夏辛溫。能於脾中滌痰除垢。痰去而脾自健。故云能以健脾也。胃為痰氣壅塞。則胃不和之極。半夏既能溫脾以除痰。又合生

姜煨胃以除嘔。若合柴苓以治少陽寒熱往來。則胃更見和諧。故云能以和胃也。他如氣逆能下。蠶結能開。暴死以末吹鼻能救。不眠以半夏湯通其陰陽。得臥。胸膈合瓜。萎等藥。名小陷胸湯。以除少陰咽痛生瘡。語聲不出。合雞子苦酒。名苦酒湯以服。亦何莫非半夏之妙用。而為開竅利濕之藥。但陰虛火盛。熱結胎滑。痰湧等症。則非所宜。不可不慎。則白面大。陳久者良。漫七日。逐日換水。滌去涎。同皂莢白礬。煎煮。或七日夜。用淨水淘浸。再用皂莢水浸七日夜。又用灰水淘浸七日夜。又用白礬水淘浸七日夜。又用生薑水淘浸七日夜。又用甘草水淘浸七日夜。洗淨焙乾。用柴胡。射干為使。畏生薑。秦皮。龜甲。雄黃。忌羊血。海藻。餉糖。惡皂莢。反烏頭。其用薑汁浸造。名生薑湯。礬水浸造。名礬湯。同皂莢。造名皂莢湯。同白芥子等分。造。名竹瀝湯。同麻油浸造。炒乾為末。造。成名麻油湯。同黃牛膽與蜜造。名牛膽湯。同香附。蒼朮。煨芍。和半熟。造。名同製。同芒硝與黃大黃。造。

音造。名宿黃。同海粉。雄黃。黃連。蜜。造。名海粉。同生黃。牛肉。熬膏。名。曰天。並照。造。法。草。食。七。日。待。生。黃。衣。懸。乾。掛。風。處。至。用。麴。治。之。症。則。隨。制。藥。能。治。病。症。之。性。以。爲。治。焉。【清】陳修園本草經讀論。半。夏。曰。半。夏。氣。平。稟。天。秋。金。之。燥。氣。而。入。手。太。陰。味。辛。有。發。得。地。西。方。酷。烈。之。味。而。入。手。足。陽。明。辛。則。能。開。諸。結。平。則。能。降。諸。逆。也。傷。寒。寒。熱。心。下。堅。者。邪。結。於。半。表。半。裏。之。間。其。主。之。者。以。其。辛。而。能。開。也。胸。脹。咳。逆。咽。喉。腫。痛。頭。眩。上。氣。者。邪。逆。於。巔。頂。胸。膈。之。上。其。主。之。者。以。其。平。而。能。降。也。腸。鳴。者。大。腸。受。濕。則。腸。中。切。痛。而。鳴。漉。漉。也。其。主。之。者。以。其。辛。平。能。燥。濕。也。又。云。止。汗。者。另。著。有。辛。中。帶。濕。之。功。也。仲。景。於。小。柴。胡。湯。用。之。以。治。寒。熱。瀉。心。湯。用。之。以。治。胸。滿。腸。鳴。少。陰。喉。痛。亦。用。之。金。匱。頭。眩。亦。用。之。且。嘔。者。必。加。此。味。大。得。其。開。結。降。逆。之。旨。用。藥。悉。遵。本。經。所。以。爲。醫。中。之。聖。又。曰。今。人。以。半。夏。功。專。祛。痰。概。用。白。礬。黃。之。服。者。往。往。致。吐。且。致。酸。心。少。食。製。法。相。沿。之。陋。也。古。人。只。

用湯洗七次。去涎。今人畏其麻口。不敢從之。余每年收乾半夏數十片。洗去粗皮。以生薑汁甘草水。浸一日。夜。洗淨。又用河水浸三日。一日一換。擗起。蒸熟。曬乾。切片。隔一年用之。其效。蓋此藥是太陰陽明。少陽之大藥。祛痰却非專長。仲景諸方。加減俱云。嘔者加半夏。痰多者加茯苓。未聞以痰多加半夏也。【清】楊時泰本草述鈞元論。半夏曰。液之聚爲飲。滯爲痰者。惟此可實其效。第痰之患。由於液不化。而液之結。由於氣不化。爲氣之病者。不一。故痰之病。亦不一。必本其所因之氣。而後可治。其所結之痰。豈得概謂半夏治痰。而獨用之。漫投之以資效哉。又液本於陰氣之所化。凡病有干於陰氣不足者。均宜慎之。【清】鄒澍本經疏證論。半夏曰。半夏味辛氣平。體滑性燥。故其爲用。辛取其開結。平取其止逆。滑取其入陰。燥取其助陽。大小柴胡湯。柴胡加芒硝湯。柴胡加龍骨牡蠣湯。柴胡桂枝湯。治傷寒熱心下堅之類也。小青龍湯。小青龙加石膏湯。射干麻黃湯。厚朴麻黃湯。

澤漆湯。越婢加半夏湯。桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯。治胸腹咳逆之劑也。小半夏加茯苓湯。治頭眩之劑也。苦酒湯。半夏散及湯。治咽喉腫痛之劑也。半夏瀉心湯。生薑瀉心湯。甘草瀉心湯。治腸鳴之劑也。葛根加半夏湯。黃芩加半夏生薑湯。竹葉石膏湯。麥門冬湯。大半夏湯。下氣之劑也。本經主治。惟止汗一語。仲景無專方。餘則悉相印合。或問半夏。傷寒寒熱非心下堅者不用。咳逆非胸脹者不用。以及咽腫腸鳴無不可屬之。下氣。今以葛根加半夏。黃芩加半夏。生薑等湯。係之。豈治嘔即所謂下氣歟。曰。他物下氣。未必不止嘔。如本經橘枳吳茱萸之類是也。他物下氣。未必盡止嘔。如本經旋覆花。杏核仁之類是也。半夏下氣。未必盡因止嘔。如心下堅。胸脹。咽腫。腸鳴是也。半夏止嘔。又未必不盡因下氣。如金匱要略厚朴七物湯。白朮散。竹葉湯是也。蓋非氣逆則不嘔。故千金方。婦人虛損篇。遠志湯。若其人心胸氣逆者。加半夏。淡竹茹湯。氣逆者。加半夏。竹葉湯。氣。

逆者。加半夏。小柴胡湯。胸中煩而不嘔者。去半夏。可見嘔緣氣逆。氣逆由水與氣相激。則半夏允爲的對之劑矣。曰。然則本經著他物之功。凡曰上氣者。與此蓋有別矣。其所以別者。安在。曰。考本經。葶藶。五味子。牡桂。射干。芫花。杏核仁。皆著其功。曰。主上氣。然未有不連及咳逆者。是知凡主上氣之物。皆能使逆氣自上焦而降。半夏等主下氣。則僅能使氣不自中焦逆爲其別矣。雖然。金匱要略曰。火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣者。麥門冬湯。主之。論證則曰。上氣。論治則曰。下氣。又可見諸氣。洩於肺者。謂之上氣。氣自中焦上逆。雖不必至肺。即謂之上氣。亦無不可。特半夏主中焦氣逆。不治諸氣。奔迫於肺也。且本經於杏核仁。既曰主咳逆上氣。又曰下氣。則又可見上氣下氣。終不可混。上氣下氣。終不可混。則半夏下氣之功。斷在中而不在上。又何可混耶。問小青龍湯。渴者去半夏。小柴胡湯。胸中煩而不嘔者。去半夏。湯者。去半夏。豈煩而不嘔。口渴者。遂盡無用半夏者乎。曰。是不然。

五蠹 半

蓋證必有因。因水與氣相軋而成者。皆不得有渴及不嘔而煩。若其因有不同。則溫經湯所主婦人下利。春即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。臂口乾燥。舉一病三者。皆犯之矣。何者。其病之因。緣於血在少腹故也。夫氣主煦之。血主濡之。氣留而不行。是氣有餘。血滯而不濡。是血有餘。氣有餘。便是火。血有餘。亦生火。特氣分之火。能消水耗陰。血分之火。不能消水耗陰。能消水耗陰者。見證在正面。不能消水耗陰者。見證只在側面。故不曰身熱心煩。而曰手掌煩熱。不曰口渴引飲。而曰唇口乾燥。則又何害其中。宮水停氣。搏可用半夏哉。若夫氣分之病。陷胸之大。取以當病之急。承氣之大。最急用之不密。又他當用大者。不可先試以小。而承氣獨以是垂法。他既用小者。不可更繼以大。而柴胡偏以是建功。既無一定之例可援。又無對待之義可審。是六方者。將無偶。黏以大小之名。竟無絲粟意義於其間耶。是蓋不然。夫青龍與雲致雨者也。陷胸與稟授伏者也。承氣以陰配陽者也。

建中既桂流俗者也。是四方者以功名名。則當大任者為大。當小任者為小。惟柴胡與半夏。則以藥命名。以藥命名。則柴胡主疏。主疏則疏之大者為大。疏之小者為小。半夏主和。主和則和之大者為大。和之小者為小。雖然。諸嘔嘔不待下。未得嘔與渴。本相背馳。故曰先嘔却渴者。此為欲解。先渴却嘔者。為水停心下。此屬飲家。嘔家本渴。今反不渴者。以心下有支飲故也。此屬支飲。又曰。支飲者。小半夏湯主之。半夏之治嘔。其反覆推明也。如此。至嘔渴並見之候。如豬苓湯之咳而嘔渴。五苓散之小便不利。渴欲飲水。水入即吐。均不用半夏。其嚴又如此。即嘔家有癰膿。不可治。嘔膿盡。自愈一節。雖不言及半夏。而不用半夏之旨。已隱然陰寓於其中。蓋半夏為治嘔專劑。今者嘔病中。兼患癰膿。癰者。煩必數。煩數者。口必渴。則知其嘔緣火氣犯胃。非復氣與飲搏矣。擴而充之。則非特嘔而渴者。不用半夏。雖謂之萬病見渴。則均不與半夏相宜可矣。

半夏曰。半夏為鎮嘔藥。西醫亦知其效驗。故中醫以為胃冷嘔嘔之最要者。猪子氏云。半夏所以奏鎮嘔之效者。雖未明瞭。然依化學上之實驗。則是物富於澱粉。豈因被覆胃之內面。以防粘膜之刺戟。故歟。又藥學雜誌載。醫學士江馬賤男氏云。鎮吐藥有葎酸。礬。酒。古加因等。其中如古加因。雖有功效。而價極昂。求其可代用者。乃得半夏用之。成績頗佳。因脚氣。慢性腎炎。肝臟膿瘍。慢性胃加答兒而起之頑固吐嘔。及因胃潰瘍而起之嘔吐等。以半夏為鎮嘔藥。而試用之。頗能收效。氏又由許多經驗後。處方如下。半夏煎(一五、〇)三〇〇、〇。生薑舍利別二〇〇、〇。(生薑搾出汁為適宜)上二日。量一日三回分服。其製法。煎出半夏。待其全冷。加生薑舍利別。或加搾出之汁。而振盪之。大人服量六、〇。至八、〇煎。(鎮吐)治諸頑固嘔吐。但弱病不用。和漢三才圖會曰。洗去皮垢。以湯浸七日。逐日換湯。令滑盡。燥切片。置汁拌焙入藥。日本之半夏種類甚多。如

半夏類。(洗淨土質。再用沸湯洗七次。去滑去皮。用白搗碎。取十兩。加生薑一兩。善加搗和。製如扁餅。置一二夜。成黃色。曬乾之。用時打碎。焙用。半夏餅(用半夏研末。以薑汁和勻作餅。日中曝乾用)豆(即煮半夏)麴下(下品者)大大(上品者)等。又有名粒半夏者。產攝津。頗有名。荷蘭藥鏡曰。乾根供藥用。(或云葉莖亦有效)生根苛斂。刺戟口舌。此因其粘液中含有精微脂質之故。但此根雖水煎或酒浸。其含有之精微刺戟質。仍難融解。若去其渣。祇用上清之液。則效力又微。故宜將乾根為細末。與蜜或糖漿等研合。或攪和於對症之煉膏乳劑。及其他粘滑劑。包攝其刺戟味。用之為佳。又云半夏有疎解。滯利。利尿。發汗等功效。應除胃中粘稠。污敗惡液。治胃腸粘液滯滯。污液鬱積諸症。凡胸中粘痰壅塞。咳嗽痰喘。及其他頑固胸病。用之有效。又痰咳喘息。用此根細末和砂糖服之。或和乾葡萄酒及蜜。加開水提混服之。善能疎粘黏痰。略而治。又肺癆咳嗽。用乳汁

者。能促進吐酸。則淨肺部。並治風痛。傷冷毒痛。其他潛結沈滯諸痛。開通內臟。擊塞通川。經治黏液病。萎黃病。處女病。黃疸。水腫。間歇熱。『依刺昆垓見』。神思憂鬱。病壞血病。有神效。以及起因於胃病。選廷之頑固頭痛。此藥甚有效。此症有舌苔。舌根尤多。用半夏健胃散最佳。方用半夏二錢。苜蓿根。地榆。桂各一錢。剝為亞斯一錢。密封玻璃瓶中。用十克冷至一錢。點入飲液服。日三四次。凡間歇熱用半夏黃石散效。方用半夏孕酒石。(或霸王國各十克冷)大黃。(五克冷)為散劑。無熱時。每半小時服。服量用細末自五克冷至十六克冷或半錢。和於適宜飲液服之。日服數次。或云和燒酒服發汗。外敷則能使腫毒消散。或使膿熱。欲排除潰瘍膿。淨除腐穢。則用此末摻之。或用水溶化。作洗藥。又能消除面部汚斑。小痘。赤疹。使肌膚美澤。加剝為亞斯少許。或酒石酸一二滴尤佳。

辨偽 偽貨名洋半夏。形雖似而粒不圓。不知何物偽充。誤服

五畫 半

有害。按半夏氣味辛平有毒。青齊江浙隨處有之。生於澤中者。名羊眼半夏。總以圓白為勝。陳久者良。若此種洋半夏。殆亦由跋混充歟。由跋即天南星之小者。絕類半夏。幸勿誤用。○半夏三四月出新。杭州富陽出者。蒂平粒圓。色白質堅實。惟顆粒不大為最佳。衢州嚴州出者。略扁。蒂凹陷。色白微黃亦佳。江南出者粒小。江北出者如帽頂形。皆次。四川荊州出者皆粒圓而大。色白質鬆。有筋。落水即胖。大易腐。亦次。饒州涇縣。揚州泰興出者。皆鬆碎。不道地。不能切片。漂作半夏粉用。尚可。福建出者。浸入水中即腐爛。更次。不入藥用。南星之小者。絕類半夏。然南星無論大小。皆極扁。不若半夏之圓。以此分辨。不能混偽也。○蘇製半夏。當以宋公祠所製為勝。因半夏性燥有毒。故用法製之。性較和平。去痰之功雖緩。然素體屬火者。頗見相宜。近今偽藥雜出。因蘇夏盛行。上海各處均有仿製。製法不同。功力自遜。而肆中所售土蘇夏者。係用半夏研末。調麵粉米泔搗為圓粒。假充上

海蘇夏。殊堪痛恨。○蘇州戈製半夏。製品甚多。惟偽者色黯不香。無玉桂氣。戈老二房真者。其色黃亮。氣香有玉桂氣。戈半夏方雖祕製。大約與本草綱目拾遺內宋公夏相類。有肉桂。性溫燥。治寒溼痰上。瘵氣喘確效。凡治陰虛熱痰氣喘。苟誤服之。必因燥熱而咳血自汗。愈速其死矣。

近人學說 張山雷曰。半夏最多涎沫。其體極滑。而味甚辛。生者以舌舐之。整人口吻。故善能開泄結滯。降氣定逆。本經所主諸病。皆是開宣抑降之力。本非專治痰飲。而所以能消痰止咳者。亦即此能開能降之功用。又非以燥勝溼。專治溼痰而燥脾溼之意。石頑謂古方治咽痛喉痺吐血。多用南星。半夏。並非禁劑。世俗皆以二物為性燥。誤矣。壽頤按俗本醫書。皆謂半夏專治溼痰。貝母專治燥痰。此其說實自汪詡庵開之。究之古用半夏治痰。惟取其涎多而滑降。且兼取其味辛而開泄。本未有燥溼之意。惟其涎甚。激刺之力甚猛。故為有毒之品。多服者必有喉痛之

惡。而生美則專解此毒。古無製藥之法。凡方有半夏者。必合生薑用之。正取其剋制之義。而六朝以降。始講製藥。且製法日以益密。而於此物之製造。則尤百出而不窮。於是浸之又浸。持之又持。藥物本真。久已消滅。甚至重用白礬。卷之悠。久而辛開滑降之實。竟無絲毫留存。乃一變而為大燥之渣滓。則古人所稱種種功用。皆不可恃。此所謂矯枉而過其正。最是覺道。或者又疑古書之不可信。不亦冤耶。靈樞謂陽氣滿。則陽踏盛。不得入於陰。陰虛則目不暇。飲以半夏湯。通其陰陽。其臥立至。昔人解此說者。輒曰半夏生於夏之半。故能通陰陽。頗等求其義而不可得。終無解於當夏之半。何以能通陰陽。其實所謂陽踏盛者。止是陽升太過。陰不涵陽。故不得眠。惟此善降。則陽入於陰矣。此治不得眠之真旨也。然如以久浸久製之半夏用之。吾知其亦必無濟。近人已有所謂半夏止當以生薑汁少許拌之。已能解毒。不當多製。是說也。頗極佩之。又曰古書每謂半夏善治風痰。既者

氣以辛能散風作解。遂謂治大人中風。小兒驚癇。皆其祛風搜風之功。其實半夏沈降。惟積痰生熱。積熱氣升。而內風自動者。此能降氣開痰。則風陽自息。決非可以發散外感之風。局方辰砂化痰丸。用半夏南星。辰砂枯礬。而曰搜風化痰。誤矣。且此之治內風。正是痰熱生風之實症。而王海藏竟謂南星半夏可補肝風之虛。尤其大謬。惟汪石山謂滋者脾之液。膏梁炙膠。能生脾胃濕熱。涎化為痰。久則痰化上攻。令人昏憤口噤。偏廢假仆。寔清不語。生死且夕。非半夏南星不治庶幾近之。

配合應用 ①化痰鎮心祛風 利隨。辰砂半夏丸。用半夏一斤。湯泡七次。為末篩過。以水浸三日。生精濾去滓。澄清去水。曬乾一兩。入辰砂一錢。薑汁打糊丸。梧子大。每晝湯下七十丸。(袖珍方)

②消痰開胃去胸膈滯滯。用半夏湯泡焙乾為末。自然薑汁和作餅。澄紙裏煨香。以熱水二盞。同餅二錢。入鹽五分。煎一盞。服之。大壓痰毒及酒食傷積。(斗門方)用

半夏。天南星各二兩。為末。水五升。入礬內。浸一宿。去清水。焙乾。重研。每服二錢。水二盞。薑三片。同煎服。(經驗方)

③玉液丸。治中焦痰涎。利咽。清頭目。進飲食。半夏泡七次。四兩。枯礬一兩。為末。薑汁打糊。或麥煎肉和丸。梧子大。每晝湯下十五丸。寒痰加丁香五錢。熱痰加寒水石煨四兩。(和劑局方)

④治老人風痰。大膽熱。不識人。及肺熱痰實不利。半夏泡七次。焙硝石半兩。為末。入白麵搗勻。水和丸。綠豆大。每晝湯下五十丸。(普濟方)

⑤治腦風痰。半夏半斤。酸漿浸一宿。溫湯洗五十道。去惡氣。日乾。為末。漿水搜作餅。日乾。再研。為末。每五兩入生龍腦一錢。以漿水濃脚和丸。雞頭子大。紗袋盛。避風處陰乾。每服一丸。好茶或薄荷湯嚼下。(御藥院方)

⑥治搜風化痰。定志安神。利頭目。辰砂化痰丸。用半夏三兩。天南星泡一兩。辰砂枯礬各半兩。為末。薑汁打糊丸。梧子大。每服三十

丸。食後薑湯送下。(和劑局方)

⑦治痰厥中風。省風湯。用半夏湯泡八兩。甘草炙二兩。防風四兩。每服半兩。薑二十片。水二盞。煎服。(奇效方)

⑧水養金花丸。治風痰頭暈。嘔逆目眩。面色青黃。脈弦者。用生半夏。天南星。寒水石煨各一兩。天麻半兩。雄黃二錢。小麥麩三兩。為末。水和成餅。水養浮起。漉出。搗丸。梧子大。每服五十九丸。薑湯下。極效。亦治風痰咳嗽。二便不通。風痰頭痛。(潔古方)

⑨青蠶丸。治風痰濕痰。半夏一斤。天南星半兩。各湯泡。曬乾。為末。薑汁和作餅。焙乾。入神麩半兩。白朮末二兩。枳實末二兩。薑汁麩糊丸。梧子大。每服五十九丸。生薑湯下。(藥氏方)

⑩治風痰喘逆。兀兀欲吐。眩暈欲倒。半夏一兩。雄黃三錢。為末。薑汁浸。蒸餅丸。梧子大。每服三十九丸。薑湯下。已吐者加檳榔。(潔古方)

⑪干湯湯治風痰喘急。用半夏湯洗七箇。甘草炙。皂莢炒。各一寸。薑二片。水一盞。煎七分。溫服。(和

劑局方)

⑫治上焦熱痰咳嗽。制過半夏一兩。片黃芩末二錢。薑汁打糊丸。綠豆大。每服七十丸。淡薑湯食後服。此周慙王親制方也。(袖珍方)

⑬治肺熱痰嗽。制半夏。栝樓仁各一兩。為末。薑汁打糊丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。或以栝樓煎養熱丸。(濟生方)

⑭小黃丸。治熱痰咳嗽。煩熱面赤。口燥心痛。脈洪數者。用半夏。天南星各一兩。黃芩一兩。為末。薑汁浸。蒸餅丸。梧子大。每服五七十丸。食後薑湯下。(潔古方)

⑮治小兒痰熱。咳嗽驚悸。半夏。南星等分。為末。牛膽汁和入。臚內。懸風處待乾。蒸餅丸。綠豆大。每晝湯下三五丸。(摘玄方)

⑯治溼痰咳嗽。面黃體重。嗜臥。驚。兼食不消。脈緩者。白朮丸。用半夏。南星各一兩。白朮一兩。半為末。薄糊丸。梧子大。每服五七十丸。薑湯下。(潔古方)

⑰玉粉丸。治氣痰咳嗽。面自氣促。酒澆惡寒。愁憂不樂。脈澀者。用半夏。南星各一兩。宜桂半兩。為末

開丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。
(溫古方)

①小陷胸湯。治小結胸痛。正在心下。按之則痛。賦淨滑者。半夏半升。黃連一兩。括樓實大者一箇。水六升。先煮括樓至三升。去滓內二味。煮取二升。分三服。(仲景方)

①治瀝痰心痛。喘急者。半夏油炒爲末。粥糊丸。綠豆大。每服二十丸。薑湯下。(丹溪方)

①治急傷寒病。半夏四錢。生薑七片。酒一盞煎服。(胡洽居士百病方)

①玉粉丸。治結痰不出。語音不清。年久者亦宜。半夏半兩。桂心一字。草烏頭半字。爲末。薑汁浸。蒸餅爲丸。茨子大。每服一丸。夜臥含嚥。(潔古方)

①橘皮半夏湯。治停痰冷飲。嘔逆。用半夏水煮熟。陳橘皮各一兩。每服四錢。生薑七片。水二盞。煎一盞。溫服。(和劑局方)

①茯苓半夏湯。治停痰留飲。胸膈滿悶。氣短惡心。飲食不下。或吐痰水。用半夏泡五兩。茯苓三兩。每服四錢。薑七片。水一盅。煎七分。

甚捷徑。(和劑局方)

①支飲作嘔。喘家本渴。不渴者心下有支飲也。或似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。心下憤憤。並宜小半夏湯。用半夏泡七次。一升。生薑半升。水七升。煮一升五合。分次服。(仲景方)

①治噦逆欲死。半夏生薑湯。卽上方也。亦治瘧瘧瘴氣。

①半夏加茯苓湯。治嘔噦眩悸。穀不得下。半夏一升。生薑半斤。茯苓三兩。切。以水七升。煎一升半。分溫服之。(金匱方)

①半夏麻黃丸。治心下悸。怔忡。半夏麻黃等分。爲末。蜜丸。小豆大。每服三十丸。日三。(金匱方)

①治傷寒乾嘔。半夏熱洗研末。生薑湯服一錢七。(梅師方)

①治嘔逆厥逆。內有寒痰。半夏一升。洗滑焙研。小麥麵一升。水和作彈丸。水煮熟。初吞四五枚。日三服。稍增至十五枚。旋煮旋吞。覺病減。再作。忌羊肉。鴛鴦。此乃許仁則方也。(外臺秘要方)

①大半夏湯。治嘔吐反胃。半夏三升。人參三兩。白蜜一升。水一斗

二升。和湯之一百二十遍。煮取三升。溫服一升。日再服。亦治臨問支飲。(金匱方)

①藿香半夏湯。治胃寒噦逆。停痰留飲。用半夏湯泡炒黃二兩。藿香葉一兩。丁香半兩。每服四錢。水一盞。薑七片煎服。(和劑局方)

①治小兒吐瀉。脾胃虛寒。齊州半夏泡七次。陳粟米各一錢。生薑十片。水一盞。煎八分。溫服。(錢乙小兒方)

①小兒痰吐。或風壅所致。或欬嗽發熱。飲食卽吐。半夏泡七次。半兩。丁香一錢。以半夏末水和包。丁香用麩重包。煨熟。去麩。爲末。生薑自然汁和丸。麻子大。每服二三十丸。陳皮湯下。(活幼口訣方)

①治妊娠嘔吐。半夏二兩。人參乾薑各一兩。爲末。薑汁糊丸。梧子大。每飲服十九丸。日三服。(金匱方)

①治霍亂腹脹。半夏、桂等分。爲末。水服方寸七。(肘後方)

①治小兒腹脹。半夏末少許。酒和丸。粟米大。每服二丸。薑湯下。不瘳加之。或以火炮研末。薑汁調貼

脾亦佳。(子注秘錄方)

①治黃疸喘滿。小便自利。不可除熱。半夏生薑各半斤。水七升。煮一升五合。分再服。有人氣結而死。心下暖。以此少許。入口遂活。(仲景方)

①消暑丸。伏暑引飲。脾胃不利。用半夏醋煮一斤。茯苓半斤。生甘草半斤。爲末。薑汁糊丸。梧子大。每服五十九丸。熱湯下。(和劑局方)

①半硫丸。治老人虛秘。冷秘。及痰癖冷氣。半夏泡炒。生硫黃等分。爲末。自然薑汁煮糊丸。如梧子大。空心溫酒下五十九丸。(和劑局方)

①治失血喘急。吐血。崩中。帶下。喘急痰喘。中滿宿癥。用半夏。蘆根。以薑汁和麩包煨。研末。米糊丸。梧子大。每服三十九丸。白湯下。(直指方)

①治白濁夢遺。半夏一兩。洗十次。切破。以木猪苓二兩。同炒。黃山藥糊丸。梧子大。每服三十九丸。茯苓湯送下。腎氣閉而一身積氣無所管攝。妄行而遺者。宜用此方。蓋半夏有利性。猪苓導水。使腎氣通

五盞半

也。與下元虛弱者不同。(本事方)

①治八般頭風。三次見効。半夏末入百草霜少許。作紙燃燒烟。就鼻內喘之。口中含水。有涎吐去。再合。(衛生寶鑑方)

②苦酒湯。治少陰咽痛。及生瘡不能言語。聲不出者。用半夏七枚。打碎。雞子一枚。頭開一竅。去黃。納苦酒。令小滿。入半夏在內。以雞子坐於炭火上煎三沸。去滓。置盃中。時時嚥之。極驗。未遂更作。(仲景方)

③治喉痺腫塞。生半夏末。嚥鼻內。涎出効。(集簡方)

④治骨哽在咽。半夏白芷等分。爲末。水服方寸匕。當嚥出。忌羊肉。(外臺祕要方)

⑤治重舌木舌。脹大塞口。半夏煎醋含漱之。又方。半夏二十枚。水煮過。再炮片時。乘熱。以酒一升。澆之。密封良久。熱漱冷吐之。

⑥治小兒顛陷。乃冷也。水調半夏末塗足心。

⑦治面上黑風。半夏焙研。米醋調敷。不可見風。不計遍數。從早至晚。如此三日。皂角湯洗下面。塗如

玉也。(精玄方)

⑧治癩風眉落。生半夏。羊屎燒焦。等分爲末。加自然痘汁。日調塗。(聖濟總錄方)

⑨治盤腸生產。產時子腸先出。產後不收者。名盤腸產。以半夏末類啼鼻中則上也。(婦人良方)

⑩治產後暈絕。半夏末。冷水和丸。豆大。納鼻中。卽愈。此扁鵲法也。(肘後方)

⑪治小兒驚風。生半夏一錢。皂角半錢。爲末。吹少許入鼻。名驚驚散。卽愈。(直指方)

⑫治卒死不寤。半夏末吹鼻中卽活。

⑬治五絕急病。一曰白縊。二曰癘。三曰溺水。四曰魘魅。五曰產乳。並以半夏末。約大豆一丸。入鼻中心溫者。一日可活也。(子母秘錄方)

⑭治癰疽發背。及乳癰。半夏末。雞子白調塗之。(肘後方)

⑮治吹奶腫痛。半夏一箇。煨研。酒服立愈。一方以末隨左右嚥鼻効。(劉長春經驗方)

⑯治打撲瘀血。水調半夏末塗

之一宿卽沒也。(永類鈴方)又治遠行足腫。(集簡方)

⑰治金刀不入。入骨脈中者。半夏。白欬。等分爲末。酒服方寸匕。日三服。至二十日自出。(李釜大白經方)

⑱治飛蟲入耳。生半夏末。麻油調塗耳門外。(本事方)

⑲治蝎螫人。半夏末水調塗之。立止。(錢相公錢中方)

⑳治蝎瘻五孔相通者。半夏末水調塗之。日二。(聖惠方)

㉑治咽喉骨梗。半夏白芷等分。爲末。水服方寸匕。當嚥出。忌羊肉。(外臺祕要方)

㉒用蠶 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無寒濕者禁用。惡皂莢。畏雄黃。生薑。乾姜。秦皮。龜甲。反烏頭。忌羊血。海藻。飴糖。

參攷資料 ①白傍癩子。真似半夏。只是咬着味微酸。不入藥用。

(雷斅) ②處處有之。以齊州者爲佳。二月生苗。一莖。莖端三葉。淺綠色。頗似竹葉。而生江南者。似芍藥。葉根下相重。上大下小。皮黃肉白。五月八月採根。以灰覆二日。湯洗

三一四

暴乾。封固。經云。五月採則虛小。八月採乃實大。其平澤生者甚小。名羊眼半夏。由跋絕類半夏。而苗不同。(蘇頌) ③熱痰佐以黃芩。風痰佐以南星。寒痰佐以乾薑。痰痞佐以陳皮。白朮。多用則瀉脾胃諸血。證及口渴者禁用。爲其燥津液也。孕婦忌之。用生薑則無害。(張元素) ④脾無留滯不生痰。故脾爲生痰之源。脾爲貯痰之器。半夏能主痰飲及腹脹者。爲其體滑而味辛性溫也。涎滑能潤。辛溫能散。亦能潤。故行滯而通大便。利竅而泄小便。所謂辛走氣。能化液。辛以潤之。是矣。潔古張氏云。半夏。南星。治其痰。而咳嗽自愈。丹溪朱氏云。二陳湯能使大便潤而小便長。聊攝成氏云。半夏辛而散。行水氣而潤腎燥。又和劑局方用牛虵丸。治老人虛秘。皆取其滑潤也。世俗皆以南星。半夏爲性燥誤矣。溼去則土燥。痰涎不生。非二物之性燥也。古方治咽痛喉痺。吐血下血。多用二物。非禁劑也。二物亦能散血。故破傷打撲皆主之。惟陰虛勞損。則非溼熱之邪。前用利竅行滯之藥。是

乃靈竭其精液。醫之學也。豈藥之皆哉。甲乙經用治夜不眠。是果性燥者乎。岐伯云。衛氣行於陽。陽氣滿不得入於陰。陰氣虛。故目不得瞑。治法飲以半夏湯一劑。陰陽既通。其臥立至。方用流水千里者。八升。揚之萬遍。取清五升。煮之。炊以蒸薪。大沸。入秫米一升。半夏五合。煎一升半。飲汁一盃。日三服。以知爲度。若病新發者。覆盃則臥。汗出則已。久者三飲而已。(李時珍) 俗以半夏性燥有毒。多以貝母代之。貝母乃太陰脾經之藥。半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥。何可代也。夫咳嗽吐痰。虛勞吐血。或痰中見血。諸鬱咽痛。喉痺。肺癆。肺痿。癰疽。婦人乳難。此皆貝母爲向導。半夏乃禁用之藥。若涎者脾之液。美味汗聚矣。燥皆能生脾胃溼熱。故溼化爲痰。久則痰火上攻。令人昏憤口燥。偏廢假仆。寢瀆不語。生死且夕。自非半夏南星。曷可治乎。若以貝母代之。則刻首待斃矣。(汪機) 丹溪言二陳湯治一身之痰。世醫執之。凡有痰者皆用。夫二陳內有半夏。其性燥烈。若風痰寒

痰濕痰食痰則相宜。至於勞痰失血諸痰用之。反能燥血液而加病。不可不知。(趙繼宗) 半夏味辛。辛能泄散。而多涎甚滑。則又速降。本經以主傷寒寒熱。是取其辛散之義。又治心下堅滿而下氣者。亦辛以開泄其堅滿。而滑能降逆逆氣也。咽喉腫痛。頭眩咳逆。皆氣逆上衝。多升少降使然。滑而善降。是以主之。胸膈卽心下之堅滿。腸鳴乃腹裏之壅塞。固無一非泄降開通之效用。止汗者。汗出多屬氣火上逆爲病。此能抑而不之。所以可止。固非肌腠空疏。衛氣不固之虛汗可知。後人止知半夏爲消痰主將。而本經乃無一字及於痰飲。然後知此物之長。全在於開宣滑降四字。初非以治痰專長。其所以能蕩滌痰濁者。蓋卽其開泄滑下之作用。本經主治。皆就其力量之所。以然者而詮次之。固非如後世藥物學之多說呆話可比。至別錄主治。大率皆與本經同意。惟多癰腫痿黃兩症。蓋癰腫仍是脈絡之結滯。痿黃又多溼熱之不通。此能主之。亦猶是開泄之力。悅澤面目。則

五畫 半

外敷之面脂藥也。(張山雷) 【半夏糊】卽半夏製成趨者之處方用名。詳『半夏』條。 【半夏精】卽天南星之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天南星』條。 【半夏麴】 命名 本品係半夏和諸藥製成之麴。故名。 種類 和假天脊製者名假天麴。詳見『假天半夏麴』條。和海粉製成者名海粉麴。詳見『海粉半夏麴』條。和硝磺製成者名硝磺麴。詳見『硝磺半夏麴』條。和香附芫製成者名開鬱麴。詳見『開鬱半夏麴』條。和牛胆製成者名牛胆麴。詳見『牛胆半夏麴』條。和皂角製成者名皂角麴。詳見『皂角半夏麴』條。和生薑製成者名生薑麴。詳見『生薑半夏麴』條。和麻油製成者名麻油麴。詳見『麻油半夏麴』條。和竹瀝製成者名竹瀝麴。詳見『竹瀝半夏麴』條。和礬水製成者名礬麴。詳見『礬石半夏麴』條。 主治 清痰開鬱。行氣理痺。痰疾。中風不語。功較仙半夏尤佳。

【半葦】卽艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。 【半嬌紅】 古籍別名 老鸛紅。形態 半嬌紅爲雜草類之一種。立夏後生苗。一莖直上。莖紅葉尖長而狹。八月結實六角。其角實可供藥用。 採取 五月採之。 主治 風痺跌蹶。煎羊肝食。湯目中紅瘰。 【半邊蓮】 命名 本品花如蓮狀。而止有半邊。故名。 古籍別名 急解索。(本草綱目) 外國名詞 Lobelia radicans, Thunb. (Isobalus radicans, A. DC.) (拉丁) ミソガクシ ハタケムシロ カラクサ(日本) 基本 係桔梗科山梗菜屬。藥用半邊蓮之根苗。 形態 半邊蓮爲濕草類之多年生草本。其莖就地延長。自各節

生綠根。深入地中。片根着地。即易繁殖。欲去之。頗不易。葉披針形。或長橢圓形。而有細鋸齒。互生。無葉柄。由春徂秋。自莖萌葉。腋出長梗。每梗開一淡紅或淡紫色花。花形甚小。不整齊。花冠五裂片。並偏於一方。恰如一花之半。狀如蓮花。至秋始止。

性質 辛。平。無毒。

主治 蛇虺傷。搗汁飲。以滓圍塗之。又治寒射氣喘。及積疾寒熱。同雄黃各二錢。搗泥。置內覆之。待色青。以飯丸。梧子大。每服九丸。空心鹽湯下。

參攷資料 牛邊蓮。小草也。生陰濕陸壟邊。就地細梗引莖。節節而生。細葉。秋開小花。淡紅紫色。止有半邊如蓮花狀。故名。又呼急解索。(李時珍)

【占米】即糯米之古籍別名。典見飲食譜。詳「糯米」條。

【占斯】(別錄)真無極。木占斯。(本草綱目)

產地 生山谷中。形態 占斯為占米類之一種。

乃寄生於樟樹上。皮如厚朴。色如桂白。木理有縱橫紋。採得可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 邪氣濕痺。寒熱。疽瘡。除水。堅積血癥。月閉無子。小兒疳不能行。諸惡瘡。癰腫。止腹痛。令女人有子。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論占斯曰。占斯解狼毒。毒。【雷】甄權藥性本草論占斯曰。主脾熱。洗手足水爛傷。

【占稻】即稻米之古籍別名。典見綱目。詳「稻米」條。

【印銀】即大戟之古籍別名。典見爾雅。詳「大戟」條。

【去水】即芫花之古籍別名。典見本草。詳「芫花」條。

【去母】即雀翅之古籍別名。典見別錄。詳「雀翅」條。

【古乙心】即燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「燈心草」條。

【古文錢】(方用名)古銅錢。古錢別名。泉孔方見。上清童子。青錢(本草綱目)比倫錢。(財

後方) 基本 係金屬原質之一。為銅鑄成之錢。

形態 古文錢色青褐。而大小不一。外圓中方。與普通之銅錢無異。

採取 入藥用。須以五百年以上者佳。

性質 辛。平。有毒。

效能 破瘀滯。散腎障。用作眼科藥。又為催生通淋藥。

主治 腎障明目。療風赤眼。鹽鹵。用婦人生產橫逆。心腹痛。月隔。五淋。燒以醋淨用。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論古文錢曰。大青錢。煮汁服。通五淋。入目主盲障。府赤和葱豉根。煮服。止心腹痛。【明】經希雅本草經疏論古文錢曰。古文錢其金毒火毒悉去。性應平無毒。而寇宗奭云。古錢其銅焦赤。有毒。不知本草內赤銅之毒已微。况古錢又多於古穴坑壘中得之。歷年既久。毒性必失。甚則有但存形質者。其味辛。氣平。平即涼也。日赤腎障。肝經風熱也。辛涼能散風熱。則

腎障赤痛除。目自明矣。婦人生產橫逆者。血氣壅塞。道路不閉也。心腹痛者。亦氣血積聚也。月隔者。月事不來。胞脈閉也。五淋者。衝任熱聚也。此藥能走下焦陰分。散凝滯之氣。血閉塞之道路。則諸證無不除矣。又能主跌撲損傷。其為散凝滯之藥無疑。【清】黃宮繡本草

求真論古文錢曰。古文錢氣味辛涼。雖曰屬銅有毒。然歷久氣化。其毒無多。治目赤腎障。則須用以生薑汁塗。刮青點目。治內障。生花不用。治婦人逆產五淋。則須煎汁以服。治便秘初起。則與胡桃肉同嚼。食二三枚即消。以金伐木者故耳。或煮湯。或刮青。或醋服。各依本方製用。

配合應用 ●治時氣欲死。大錢百文。水一斗。煮八升。入麝香末三分。稍飲至盡。或吐或下愈。(財後方)

●治時氣溫病。頭痛壯熱。脈大。始得一日者。比輪錢一百五十七文。水一斗。煮七升。服汁。須臾。復以水五升。更煮一升。以水二升。投中。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出也。

(肘後方)

①治心腹煩滿及胸脇痛欲死者。比輪錢二十枚。水五升。煮三升。分三服。(肘後方)

②治急心氣痛。古文錢一箇。打碎。大核桃三箇。同炒熟。入醋一盞。沖服。(楊誠齋經驗方)

③治霍亂轉筋。青銅錢四十九枚。木瓜一兩。烏梅炒五枚。水二盞。煎分溫服。(聖濟總錄方)

④治慢脾驚風。利痰奇效。用開元通寶錢背後上下有兩月痕者。其色淡黑頗小。以一箇放鐵匙上。炭火燒。四圍上下。各出珠子取出。候冷。傾入羹中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利痰。非胃家所好。須以木香佐之。(直指方)

⑤治下血不止。大古錢四百文。酒三升。煮二升。分三服。(普濟方)

⑥治赤白帶下。銅錢四十文。酒四升。煮取二升。分三服。(千金方)

⑦治小便氣淋。比輪錢三百文。水一斗。煮取三升。溫服。(千金方)

(普濟方)

⑧治傷水喘急。因年少飲冷水。驚恐所致者。古文錢七枚。洗淨。白梅七箇。水一鐘。同浸三宿。空心一呷。良久得吐效。(仁存方)

⑨治唇腫黑痛。痒不可忍。四文大錢。於石上磨猪脂汁塗之。不過數遍愈。(幼幼新書方)

⑩治口內熱瘡。青錢二十文。燒赤。投酒中。服之立癒。(藏器方)

⑪治眼赤生瘡。連年不愈。古錢一文。生蠶石一箇。洗淨。以錢於石上磨蜜。取濃汁三四滴。在裏覆瓦上。以艾灸瓦內七壯。蠶蜜取點之效。(普濟方)

⑫治赤目浮翳。古錢一文。鹽方寸七。治篩點之。(千金方)

⑬治目卒不見。錢於石上磨汁。注目中。(普濟方)

⑭治目生珠管。及膚翳。銅錢背一兩。細羅半兩。爲末。醋丸。白豆大。每以一九。乳汁。新汲水各少許。浸化點之。(聖惠方)

⑮治腋下胡臭。古文錢十文。鐵線串燒醋淬十次。麝香研末調塗。(應急良方)

⑯治跌撲傷損。古文錢五箇。火

假醋淬四十九次。甜瓜子五錢。真珠二錢。研末。每服一字。好酒調。隨上下食前後。(普濟方)

⑰治誤吞鐵錢。古文銅錢十箇。白梅肉十箇。漂過即爛。搗丸。綠豆大。每服一九。長流水吞下。即吐出。(聖濟總錄方)

⑱治百蟲入耳。青錢十四文。煎猪膏二合。少少滴之。(聖濟總錄方)

施用宜忌 凡無風熱者禁用。參攷資料 ①凡錫銅之物。多以錫考工記云。攻金之工。金有六劑是也。藥用古文錢。銅弩牙之類。皆有錫。故其用近之。(蘇頌) ②古錢其銅焦赤。有毒。能腐蝕壞肉。非特爲有錫也。此說非是。但取周景王時大泉五十。及寶貨秦半兩。漢英錢大小五銖。吳大泉五百。大錢當千。宋四銖二銖。及梁四銖。北齊常平五銖之類。方可用。(寇宗奭) ③予少時。常患赤目。腫痛數日。不能開。客有教以生蠶一塊。洗淨去皮。以古青銅錢刮汁點之。初甚苦。熱淚蔑面。然終無損。後有患者。教之。往往疑惑。信士點之。無不

一點遂愈。真不須再。但作瘡者。不可用也。(寇宗奭) ④管子言。禹以歷山之金鑄幣。以救人困。此錢之始也。至周太公立九府泉法。泉體圓舍方。輕重以銖。周流四方。有泉之象。故曰泉。後轉爲錢。魯褒錢神論云。爲世神寶。親愛如兄。字曰孔方。(李時珍) ⑤古文錢。但在五百年之外者。可用。而唐高祖所鑄開元通寶。得輕重大小之中。尤爲古今所重。蘇母氏錢神論云。黃金爲父。白銀爲母。鉛爲長男。錫爲適婦。其性剛堅。須水終始。體圓應天。孔方效地。此乃鑄錢之法也。三伏鑄錢。其汁不清。俗名爐凍。蓋火尅金也。唐人端午於江心鑄錢。亦此意也。(李時珍)

【古瓦】 原名 烏古瓦。採取 用屋上年久者。性質 甘寒無毒。主治 以水煮及黃汁飲。止消渴。取屋上年深者良。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論古瓦曰。煎湯服。解人心中大熱。【唐】陳藏器本草拾遺論古瓦曰。研末。塗湯火傷。【宋】大明

諸家本草論古瓦曰。止小便。煎汁服。【明】李時珍本草綱目論古瓦曰。治折傷接骨。

【古貝】即木綿之古籍別名。典見綱目。詳【木綿】條。

【古勇連】即黃連之處方用名。詳【黃連】條。

【古終】即木綿之古籍別名。典見綱目。詳【木綿】條。

【古貢】即牡蠣之古籍別名。典見異物志。詳【牡蠣】條。

【古路哥】即蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【蜂虎】條。

【古墓中石灰】原名 地龍骨。主治 頑瘡癩瘡。膿水淋漓。飲諸瘡口。積下者尤佳。

【古銅錢】即古文錢之處方用名。詳【古文錢】條。

【古銅鏡】古醫別名 鑑。照子。性質 辛。無毒。主治 驚癇邪氣。小兒諸惡。煮汁和諸藥煮服。文字謂古者佳。

歷代記述攷證 【宋】大明詩宗本草拾遺論古鏡曰。時一切邪

魅。女人鬼交。飛尸蟲毒。催生。及治暴心痛。並火燒淫酒服。百蟲入耳。鼻中。將鏡就敲之。即出。【明】李時珍本草綱目論古鏡曰。小兒疳氣。腫硬。煮汁服。

參攷資料 劉根傳云。人思形狀。可以長生。用九寸明鏡照面。熱視令自識己身形。久則身神不散。疾患不入。葛洪抱朴子云。萬物之老者。其精悉能託人形。惑人。唯不能易鏡中真形。故道士入山。以明鏡徑九寸以上者背之。則邪魅不敢近。自見其形。必反卻走。轉鏡對之。視有隨者。山神。無隨者。老魅也。羣書所載古鏡靈異。往往可證。設撮於左。方龍江錄云。漢宣帝有寶鏡。如八銖錢。能見妖魅。常常佩之。異聞記云。隋時王度有一鏡。歲疫令持鏡詣里中。有疾者照之。即愈。樵牧閑談云。孟昶時。張敵得一古鏡。徑尺餘。光照寢室。如燭。舉家無疾。致無疾鏡。西京雜記云。漢高祖得始皇方鏡。廣四尺。高五尺。表裏有明。照之則影倒。見以手捧心。可見腸胃五臟。人疾病照之。則知病之所在。女子有邪心。則鏡發心動。

西陽雜俎云。無勞縣舞溪石窟。有方鏡。徑丈。照人五臟。云是始皇照骨鏡。松窗錄云。葉法善有一鏡。照物如水。人有疾病。照見臟腑。宋史云。秦寧縣耕夫得鏡。厚三寸。徑尺二。照見水底。與日爭輝。病熱者照之。心骨生寒。雲仙錄云。京師王氏有鏡六。鼻常有雲烟。照之。則左右前三方事皆見。黃巢將至。照之。兵甲如在目前。筆談云。吳僧一鏡。照之。知未來吉凶出處。又有火鏡。取水。水鏡取水。皆鏡之奇異者也。【李時珍】

【古磚】主治 噴氣。水煮汁服。之。久下白痢。虛寒者。秋月小腹多冷者。並燒熱布裹坐之。令熱氣入腹。良。又治婦人五色帶下。以麵作餅。餅七箇。安於燒赤黃磚上。以黃瓜樓傳麵上。安布兩重。命患者坐之。令藥氣入腹。薰之。當有蟲出。如蠶子。不過三五度。瘥。【古藤】即千金藤之一種。狀似荷葉。大如錢。性質功用。與千金藤同。性質 酸。平。無毒。

【古鏡鼻】原名 錫銅鏡鼻。性質 酸。平。無毒。主治 女子血閉。癰瘡。伏陽結

孕。【本經】伏尸邪氣。【別錄】歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論古鏡鼻曰。產後餘疹刺痛。取七枚投醋中。熬叩之。亦可入當歸芍藥煎服。

參攷資料 古鏡鼻與胡粉異類。而共條者。以古無純銅作鏡。皆以錫雜之。即今破古銅鏡鼻。爾用時。當燒赤。納酒中。或醋中。出入百遍。乃可搗也。【陶弘景】古時鑄鏡皆用錫。不爾。即不明白。故言錫銅鏡鼻。【馬志】

【古鏡鋪】古醫別名 楊妃垢。基本 本品即鏡上之銅綠。主治 敗臭。又療下疳。同五倍子末等分。米泔洗後傳之。

【叩頭蟲】命名 本品以指壓之振動。而叩首有聲。故名。外國名詞 Melanotus legerus, Cand. 或 M. laticollis, Motsch.

形態 叩頭蟲為化生類。中小甲蟲之一種。長者七八寸。全體黑褐色。尾端有細頭。頭部環節甚強。大

如斑蝥。幼蟲至蛹。食積物之根。食盡一株。更移他株。數年之久。始化為蟲。出南方者小而力微。出北方者大而力厚。若翻背仰置。少頃便跳起三四寸。或跳起及尺許者。探得可供藥用。

參攷資料 ①叩頭蟲佩之令人愛媚(李時珍) ②叩頭蟲能入人耳。灌以生油則出。(李時珍)

【只殼】即枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳殼」條。

【可聚實】 古籍別名 長壽。(別錄)

形態 可聚實為雜草類之一種。稔如麥。葉如艾。其莖葉可供藥用。

採取 五月採之。

性質 甘溫。無毒。

主治 輕身。益氣。明目。

【可離】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【烏藥】即烏藥之處方用名。詳「烏藥」條。

【史君子】即使君子之處方用名。詳「使君子」條。

【史均子】即使君子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「使君子」條。

【四大天王】 產地 生南安。 形態 綠莖赤節。一莖四葉。聚生梢端。葉際抽短穗。開小白花。點點如珠。葉赤根繁密。可供藥用。



主治 風損跌打。無名腫毒。

【四大金剛】即及己之通俗用名。詳「及己」條。

【四川元參】即玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【四川柴胡】即柴胡之處方用名。詳「柴胡」條。

【四天王草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草根」條。

【四方如意草】 命名 本品 四方開花。形 象如意。故名。 古籍別名 地靈芝。乃瑞草。(綱目拾遺)

【四味果】 本草綱目)

【四味果】 形態 四味果為山果類之一種。狀如棗。剖以竹刀。則味甘。鐵刀則味苦。木刀則味酸。蘆刀則味辛。

形態 四方如意草。為雜草類之一種。其葉四處分開。莖多葉繁。可供藥用。

主治 活血追風。療神鬼二箭。

【四牛鬪草】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【四君子】即使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「使君子」條。

【四角風】即風車子之別名。參詳「風車子」條。

【四足魚】 產地 出閩省之高 山原。

形態 四足魚為魚類之一種。其色黑。大如人指。其鱗即皮。而有四足。可供食與藥用。

主治 小兒疳疾。調粥食之。

【四味果】 古籍別名 火棗。(本草綱目)

【四味果】 形態 四味果為山果類之一種。狀如棗。剖以竹刀。則味甘。鐵刀則味苦。木刀則味酸。蘆刀則味辛。

主治 旅行得之。能止饑渴。

【四味果】 古籍別名 火棗。(本草綱目)

【四味果】 形態 四味果為山果類之一種。狀如棗。剖以竹刀。則味甘。鐵刀則味苦。木刀則味酸。蘆刀則味辛。

【四味果】 古籍別名 火棗。(本草綱目)

產地 生建昌。

【四季青】 形態 如夢而莖細。無節。葉尖錯生。秋時梢開白花。成穗。如夢花而疏。其根可供藥用。



主治 敷傷。

【四季榴】即榴之四時開花。秋日結實者。

【四季寶】即香薷之一種。多生林木中。味甘而肌理粗糙。

【四岳近陽草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草根」條。

【四時美】即盟麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「盟麥」條。

【四葉細辛】即及己之古籍別名。典見綱目。詳「及己」條。

【四葉菜】即蕓之古籍別名。典見屈音。詳「蕓」條。

【四補草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草根」條。

【四脚蛇】即石龍子之通俗名。詳「四脚蛇」條。

五畫 四失 奴奶 尼左 巧巨 布

三二〇

【四腿虎骨】即虎骨之處方用名。詳「虎骨」條。

【四蹄肉】即牛肉之古籍別名。典見史記。詳「牛肉」條。

【四錫魚】即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱈魚」條。

【失刺孫】即豹之古籍別名。典見綱目。詳「豹」條。

【奴也只】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【奴角】即犀角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「犀角」條。

【奴柘刺】產地 產江南山野中。

形態 奴柘爲灌木類之一種。形似柘而小。節有刺。葉亦如柘。經冬不凋。葉可飼蠶。刺可供藥用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 老婦血癥。男子瘰癧。疔瘡。取刺和三稜草。烏蘘草作煎。如稠精。病在心。食後。在臍。空心服。當下惡物。

【奴哥撒兒】產地 出西域。

形態 奴哥撒兒爲雜草類之自生草。狀如桔。可供藥用。

主治 金瘡。續腸斷。筋斷。嚼爛傳之。

【奴會】即蘆薈之古籍別名。典見開寶本草。詳「蘆薈」條。

【奴會子】產地 出西域諸地。形態 奴會子爲莖草類之一種。其大小形如苦藥子。可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 小兒冷疝。虛濕。脫肛。損瘦。骨立。脾胃不磨。諸症。

【奴隸】即枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳殼」條。

【奴鱸魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【奶汁草】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【奶奶草】即澤漆之俗名。詳「澤漆」條。

【奶孩兒】即爛草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「爛草」條。

【奶草】即見腫消之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「見腫消」條。

【尼俱律陀木】即柳之古籍別名。典見本草衍義。詳「柳」條。

【左牡蠣】即牡蠣之處方用名。詳

【左秦朮】即秦朮之處方用名。詳「秦朮」條。

【左紋藤】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【左紐】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【左盤龍】即鴉鴉屎之原名。詳「鴉鴉屎」條。

【左纏藤】即忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳「忍冬藤」條。

【巧婦鳥】古籍別名 鸚鵡。桃子。女匠。方言。黃脰雀。本草綱目。

產地 生澗水之間。居澗離之上。原野處有之。

形態 巧婦鳥爲原禽類之一種。其體狀如黃鸝。嘴稍細長。翼短而圓。尾亦短。脚短趾長。全身灰色。有黑色褐色細斑。取芽。莖毛。莖爲果。果大如鷄卵。繫於麻髮。至爲精密。並營有附屬果。以備不良天時。以滑伏之。插食昆蟲。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 炙食其美。令人聰明。

【巧婦鳥窠】主治 燒烟。蠶手。令婦人巧。蠶。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論巧婦鳥窠曰。治腸氣。瘴疾。以一枚。燒灰。酒服。或一服三錢。神驗。

【巨芣麥】即芣麥之古籍別名。典見本經。詳「芣麥」條。

【巨竹】即澗疏之古籍別名。典見別錄。詳「澗疏」條。即師系之古籍別名。典見別錄。詳「師系」條。

【巨勝子】即胡麻之古籍別名。典見本經。詳「胡麻」條。

【巨勝酒】製法 用巨勝子二升。炒香。葱。薤。仁。二升。生地黃半斤。袋盛。浸酒飲。

主治 風虛。脾弱。腹膝疼痛。

【布瓜】即絲瓜之古籍別名。典見事類合璧。詳「絲瓜」條。

【布里草】形態 布里草爲雜草類之一種。莖高三四尺。葉似李而大。至夏不花而實。其根皮可供藥用。

性質 甘。寒。有小毒。

主治 瘰癧。疔瘡。

【布渣葉】產地 產廣東。以京江為多出。

性質 酸。甘平。

主治 解一切蟲腹藥毒。清熱。消積食黃道。作茶飲。

【布穀】即布鳩之古籍別名。典見列子。詳『鳩鳩』條。

【平地木】別名 石膏子。產地 山中多有之。

形態 葉如木樨。夏開粉紅細花。結實似天竺子而扁。其根可供藥用。

效能 行血。

主治 跌打和酒煎服。

【平面砂】即砂砂之古籍別名。典見雷公泡灸論。詳『砂砂』條。

【平婆】即蘋果之古籍別名。典見梵言。詳『蘋果』條。

【平猴】即風狸之古籍別名。典見綱目。詳『風狸』條。

【平葉】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【必似勒】產地 生崑崙山中。形態 必似勒為湯草類之一種。狀似馬齒。其子可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。
主治 冷氣。胸閉不消。心腹脹滿。

【必思答】產地 出西域。回回地方。

形態 必思答為山果類之一種。其實可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 調中順氣。

【必栗香】古籍別名 花木香。詹香（本草綱目）

形態 必栗香為香木類之一種。葉似老栲。其木可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 鬼疰。心氣。斷一切惡氣。煮汁服之。燒為香。殺蟲魚。

【戊己芝】即黃精之古籍別名。典見五符經。詳『黃精』條。

【戊戌酒】製法 用黃狗肉一雙。煮糜。連汁和麴米釀酒飲。

主治 大補元陽。
參攷資料 戊戌酒性大熱。陰虛無冷病人不宜飲之。

【打碗花】即旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【末利花】即茉莉花之古籍別名。典見草木狀。詳『茉莉花』條。

【末砂】即砂砂之古籍別名。典見本草集註。詳『砂砂』條。

【末摘花】即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。

【末藥】即沒藥之古籍別名。典見綱目。詳『沒藥』條。

【末麗花】即茉莉花之古籍別名。典見洪邁集。詳『茉莉花』條。

【朮】即白朮之古籍別名。典見本經。詳『白朮』條。

【朮律草】即鬼白之古籍別名。典見綱目。詳『鬼白』條。

【朮酒】製法 用朮三十斤。去皮搗。以東流水三石。漬三十日。取汁。露一夜。浸麴米。釀成飲之。

主治 一切風濕筋骨諸病。駐顏色。耐寒暑。

【正木髓】即木髓子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木髓子』條。

【正馬】即玄參之古籍別名。典見別錄。詳『玄參』條。

【母丁香】即丁香之處方用名。詳『丁香』條。

【母豬芥】即天名精之古籍別名。典見綱目。詳『天名精』條。

【母龍精】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【氏冬】即款冬花之古籍別名。典見別錄。詳『款冬花』條。

【氏取】即大取之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大取』條。

【玄】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【玄及】即五味子之古籍別名。典見別錄。詳『五味子』條。

【玄水】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【玄水石】即玄石之處方用名。詳『玄石』條。

【玄石】命名 本品黑色。故名玄石。

處方用名 玄水石。
古籍別名 鹿石（本草綱目）
基本 屬矽石類。為玄黑之石塊。

產地 凡銅礦中恒有出。

形態 玄石多生於山之陽。有銅礦之處。色黑。而理若雲母。與慈石相似。開發一重。輒有魚形。燒之。

五靈 玄

作魚背腥氣。

種類 能吸鐵者為慈石。

不能吸鐵者為玄石。

性質 熾溫無毒。

效能 治慈癩。止腹痛。用作鎮痛鎮驚藥。

主治 大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡非虛寒者禁用。

長松脂柏實苜蓿。

參攷資料 本經慈石一名玄石。別錄又出玄石一名處石。名既同。療體又相似。而寒溫鋼鐵畏惡有異。俗方不用。亦無識者。不知與慈石相類否。(陶弘景) 此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鐵。其無孔而光澤純黑者。玄石也。不能拾鐵。療體亦劣於慈石。(蘇恭) 今北

番以慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑即此玄石也。醫方罕用。(蘇頌) 慈石生山之陰。有鐵處。玄石生山之陽。有銅處。雖形相似。性質不同。故玄石不能似慈石之

吸鐵。(李時珍)

【玄衣骨郵】即龜版之古籍別名。與見本經。詳「龜版」條。

【玄明粉】命名。玄水之色也。之聲。故名。

古醫別名 白龍粉。(御藥院)

製法 李時珍曰。用白淨朴硝十斤。長流水一石。煎化去滓。星月下露一夜。去水取硝。每一斗用蘿蔔一斤。切片同煮。熱濾淨。再露一夜。取出。每硝一斤。用甘草一兩。同煎去滓。再露一夜。取出。以大沙羅一箇。裝實盛之。鹽泥固濟。厚半寸。不蓋口。置爐中。以炭火十斤。從文至武煨之。待沸定。以瓦一片蓋口。仍前固濟。再以十五斤頂火煨之。放冷。一伏時。取出。隔紙安地上。盆覆三日。出火毒研末。每一斤。入生甘草末一兩。炙甘草末一兩。和勻。瓶收用。

性質 辛。甘。冷。無毒。

效能 瀉熱。軟堅。通便。用作下劑。

主治 心熱煩躁。非五臟宿滯

積。

配合應用 治熱厥氣痛。玄明粉三錢。熱重便調下。(集簡方)

治傷寒發狂。玄明粉二錢。朱砂一錢末。之冷水服。(傷寒雜要方)

治鼻血不止。玄明粉二錢。水服。(聖濟總錄方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡胃虛而無實熱者。及孕婦禁用。忌苦參。畏三稜。惡麥句豆。

【玄芝】即黑芝之古籍別名。與見本經。詳「黑芝」條。

【玄武精】即玄參之古籍別名。與見和漢藥考。詳「玄參」條。

【玄胡索】即延胡索之原名。詳「延胡索」條。

【玄英石】即玄精石之古籍別名。與見綱目。詳「玄精石」條。

【玄香】即景之古籍別名。與見綱目。詳「景」條。

【玄眞】即玉之古籍別名。與見綱目。詳「玉」條。

【玄參】命名。本品之莖。微似人參。而色玄黑。故名。

處方用名 元參。大元參。黑元

參。京元參。四川元參。烏元參。查角參。陳元參。

古醫別名 重蕪。(本經)玄靈。鹿腸。鬼散。(吳普本草)正馬。威端。(別錄)逐馬。(藥性本草)龍草。(開寶本草)野脂麻。黑參。(本草綱目)山麻。野芝。麻。能消草。凌霄草。玄武精。鹿陽生。(和漢藥考)

外國名詞 Scrophularia Odhami, Oliv.

基本 屬玄參科。藥用玄參之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。玄參產浙江杭州三月新實則各處皆可培植。凡原野間及山谷恒多生焉。

形態 按玄參為多年自生之草本。莖幹方形。高五六尺。葉對生。作長卵圓形。其邊緣有鋸齒。夏秋之間。開淡黃綠色之唇形花。花冠作長圓鐘狀。花序排列。根為肥大

根。

參。京元參。四川元參。烏元參。查角參。陳元參。

古醫別名 重蕪。(本經)玄靈。鹿腸。鬼散。(吳普本草)正馬。威端。(別錄)逐馬。(藥性本草)龍草。(開寶本草)野脂麻。黑參。(本草綱目)山麻。野芝。麻。能消草。凌霄草。玄武精。鹿陽生。(和漢藥考)

外國名詞 Scrophularia Odhami, Oliv.

基本 屬玄參科。藥用玄參之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。玄參產浙江杭州三月新實則各處皆可培植。凡原野間及山谷恒多生焉。

形態 按玄參為多年自生之草本。莖幹方形。高五六尺。葉對生。作長卵圓形。其邊緣有鋸齒。夏秋之間。開淡黃綠色之唇形花。花冠作長圓鐘狀。花序排列。根為肥大

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。

根。



(一) 玄參

之直根長二三寸。狀如天門冬。又似薯蕷。生時木作白色。迨切成片後。其切面忽然變黑。故凡入藥者。概黑色而滋潤。



(二) 參玄

種植 田園間恒有栽植。其栽種要點。分述如下。①氣候及土質。元參喜溫和而略帶寒性之氣候。若嚴寒地方。甚不相宜。即有栽培。亦不適於供藥品之用。至於熱帶地方。更不能生長矣。土質則以帶有鹽汁之砂質混合土為最適。若栽培之。則形整而質良。根粗而長。次之則純粹之砂質壤土亦尚合宜。但其根則與前者相去遠甚。至於黏質土。埴土。及礫土等。皆不適宜也。②產地及種類。元參為浙江之特產。他省無之。雖有亦甚稀少。故不細述。然浙江元參之產地。非處處有之。亦有栽培者。有不栽培者。栽培者如杭縣之笕橋。喬司。及臨平等地方為多。笕橋。喬司產者。

五畫 玄

其參黑。故有黑元參之名。臨平產者。其參帶灰白色而心空。其質不及笕橋。喬司。至其種類亦甚少。僅有羊角種與蘿蔔種(土名)之二種。各種有雌雄之分。雌者生大根。為藥品。生子芽為種子。至於雄者。不生大根。亦無子芽(種子)且有一年生二年生之別。例如冬至下種。至翌年九月收穫者。為二年生。驚蟄下種。至九月收穫者。為一年生。一年生與二年生。各有短長。一年生者。收穫較二年生者豐。而其質劣。二年生者。收穫雖少。而品質較優。栽培者勿以貪收穫之豐。而圖其品質之優為要。③整地。畦短長不拘。幅闊約三尺五寸至四尺已足。每幅種四株或五株均可。每株相隔七八寸。每列相距亦可七八寸。畦規已定。可用點播器點穴於畦上。既畢。即可擇時下種。④下種。冬至或驚蟄。皆下種之時期也。種元參者。當於此時播種於畦間。而覆土於其上。切勿過厚。又不宜過薄。使之適當為度。若用灰泥等覆之。則更佳。如遇雨天或日光過烈時。不以播種為是。若播下則

必有妨其生長。故寧以天時光陰時播之為妙也。⑤施肥。元參喜人糞尿等之壘素肥料。故當以人糞尿助其生長。自下種至收穫。約施三四次。之人糞尿已足。若過多。則徒為莖葉之繁茂。於其根則無甚利益。第一次施肥。在下種前。是為基肥。後至露天。再施肥一次。並同時須上泥一次。後至夏伏前。再施肥一次。此後可毋庸再施。或者再施一次之稀薄人糞尿。亦無不可。當察其生長之如何而定之。⑥除草。除草視其生長之如何。而削減之為佳。且元參既有雌雄之別。雄者一無可用。(無根可取無子芽可收)任其生長。徒耗其養分。不如拔棄之為宜。故見畦上生有雄元參之時。則亦宜與草同除之。又日光猛烈之時。適於除草。因元參不畏日光。若此時除去。可即時枯死。以免後日之蔓延。又省勞力也。⑦害蟲預防。元參之害蟲有數種。數種中之最甚者。為一種之青蟲(土名)其體色呈青綠。長約二三分。屬於半翅類。專食元參之葉。當其食葉時。宜用捕蟲網捕而爾

之。勿使蔓延。然摘時以早晨為適。⑧收穫調製。秋冬之候。元參皆可逐漸收穫。收穫之法。以手掘其莖而拔起之。或用耙掘之。然把掘之元參。不如用手拔之為佳。因把掘時或受損傷。元參遂有碎腐之虞。用手拔者。乃可得完全之元參也。收穫之後。去其莖葉。則其子芽。若為種子用。則辨別其大小。而後再去其根之細毛。乃置日中四五日曬乾之。曬乾之後。或藏為種子。或即時賣於藥舖可也。⑨種子貯藏法。留種用者。必選佳良之種子。曝於日光中。比之供藥品用者。多曝數日為要。以後掘深一尺餘之穴。大小視種子之多寡而列。將曬乾之種子。納入其中。再以糞桿覆其上。竅上又覆以燥土。如是貯藏。至翌年播種時。取而播之。則無損傷也。凡栽培元參者。當取而試之。⑩計算栽培元參。每畝種子。約百斤左右。收穫量視乎栽培之良否。而生多寡。最佳者。每畝可得二千數百斤。一千六七百斤者。次之。市價無定。隨品質之良否而生高下。採取 三四月及八九月間。採

根是乾。

製法 雷斅曰。凡採得後。用蒲草重重相隔。入飯蒸兩伏時。因乾用。若犯銅器。何之。啞人喉。喪人目。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 滋陰液。清腎火。用治腫痔瘻瘰癧。及為強壯藥。

主治 腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目。(本經)

去暴中風。傷寒身熱支滿。狂邪。忽忽不知人。溫酒酒。血癥下寒。血除胸中氣。下水。止煩渴。散頸下核。瘰癧。心腹痛。堅癥。疔五臟。久服補。虛明目。強陰益精。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論玄參曰。熱風頭痛。傷寒勞復。治暴結熱。散瘡癩瘰癧。【宋】大明諸家本草論玄參曰。治遊風。補勞損。心驚煩燥。骨蒸傳尸。邪氣止健忘。消腫毒。【明】李時珍本草綱目論玄參曰。滋陰降火。解斑毒。利咽喉。通小便。血滯。【明】繆希雍本草經疏論玄參曰。玄參為足少陰經甘藥。其乃水色。苦能下氣。寒能除熱。既能潤下。軟堅。故主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。

令人明目者。益陰除熱。故補腎而明目也。熱則生風。故主暴中風。及瘰癧。至春變為溫病。身熱支滿。狂邪忽忽不知人。主溫瘧。酒酒者。邪熱在表也。胸中氣亦邪熱也。止煩渴。散頸下核。瘰癧者。解熱軟堅之效也。心腹痛亦熱也。堅癥者。內熱血瘀而乾也。益陰除熱。故定五臟。久服補虛。強陰益精也。散結涼血。而能軟堅。故主瘰癧也。散結涼血降火。故解斑毒利咽喉也。下寒血三。疑有誤。【清】黃宮繙本草求

真論玄參曰。玄參苦鹹微寒。色黑入腎。腎雖載能壯水。以制浮游無根之火。攻於咽喉。謂其腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。發為火病。得此色黑性潤。微寒以爲節制。則陽得陰歸。而咽喉不致腫痛。而莫己也。然此只可暫治。以熄其火。非若地黃性稟純陰。力能溫腎壯水。以制陽光。即書所言服此玄參。可以益精明目。消痰除嗽。凡治一切骨蒸傳屍發斑。懊憹煩渴。瘰癧癰疽等症。皆是從其浮游火熄起見。而音病無不治。非真真陰虧損。必藉此以爲之壯。若使病非火起。則服

此寒滑之味。不更使病轉劇乎。是以書載脾虛泄瀉。服此黑參爲大忌耳。蒸過焙用。勿犯鐵器。惡黃耆。山茱。葶朮。反藜蘆。【清】陳修園本草經讀論玄參曰。玄參。主產乳餘疾者。以產後脫血。則陰衰而火無所制。治之以寒涼。既恐傷中。加之

以峻補。又恐拒隔。惟元參清而帶微補。故爲產後要藥。【清】張隱庵本草崇原論玄參曰。玄乃水天之色。參者參也。根實皆黑。氣味苦寒。稟少陰寒水之精。上通於肺。故微有腥氣。主治腹中寒熱積聚者。啓腎精之氣。上交於肺。則水天一氣。上下環轉。而腹中之寒熱積聚自散矣。女子產乳餘疾者。生產則腎藏內虛。乳子則中焦不足。雖有餘疾。必補腎和中。玄參滋腎一之精。助中焦之汁。故可治也。又曰。補腎氣。令人明目者。言玄參補腎氣。不但治產乳餘疾。且又令人明目也。中品治病。則無久服矣。餘俱倣此。【清】黃元御玉楸藥解論玄參曰。玄參清金補水。凡瘡瘍熱痛。胸膈燥渴。便便紅瀉。膀胱澀閉之證。俱善。清房與陳皮杏仁同服。利水合

茯苓澤瀉同服。輕清飄灑。不寒中氣。最佳之品。【清】楊時泰本草述

鈞元論玄參曰。玄參色黑。爲水潤下本鹹。味苦。氣寒。爲足少陰的劑。與地黃功同益腎。而元參所主者陰氣也。地黃壯水以制火。玄參則管領諸氣。舉浮游之火。或炎或聚者。能清而散之。其補腎氣。是補腎氣方萌之機兆。非補腎臟欲藏之形質也。凡病本於氣化熱者。此能致其至陰於氣分。故熱所結之氣。不限上下。不分虛實。隨其或主或輔。而皆可煎清。夫實爲邪氣實。陰邪不能盡藉乎此。而以此味之陰。氣化氣之并於邪者。虛爲正氣虛。補正亦不能盡藉乎此。而以此味之陰氣。助氣之歛於正者。玄參之能事如是。用之者。宜量其所長也。配合應用 ①明目。用玄參同地黃。甘菊花。葵藜。枸杞子。柴胡。②治瘰癧。用玄參同貝母。連翹。甘草。栝樓根。薄荷。夏枯草。③治傷寒陽毒。汗下後熱毒蘊結不散。心下懊憹。煩不得眠。心神顛倒欲絕。用玄參知母。麥門冬等

①治諸毒具瘰。玄參漬酒。日日飲之。(開寶本草方)

②治年久瘰癧。生玄參搗碎之。日二易之。(廣利方)

③治赤脈貫瞳。玄參爲末。以米泔煮豬肝。日日蘸食之。(濟急方)

④治發斑咽痛。玄參升麻湯。用玄參升麻甘草各半兩。水三盞。煎一盞半。溫服。(南陽活人書方)

⑤治急喉痺風。不拘大人小兒。玄參鼠黏子半生半炒。各一兩。爲末。新水服一盞立遂。(聖惠方)

⑥治鼻中生瘡。玄參末塗之。或以水浸軟蒸之。(衛生易簡方)

⑦治三焦積熱。玄參黃連大黃各一兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服三四十丸。白湯下。小兒丸粟米大。(丹溪方)

⑧治小腸疝氣。黑參咬咀。炒爲丸。每服一錢半。空心酒服。出汗卽效。(孫天仁集效方)

⑨燒香治癆。用玄參一斤。甘松六兩。爲末。煉蜜一斤。和勻。入瓶中封閉。地中埋。晝十日。取出。更用灰末六兩。煉蜜六兩。同和入瓶。更晝五日。取出。燒之。當令聞香。疾自愈。

(經驗方)

用鹽 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛無熱。脾胃虛便溏者禁用。惡黃者。乾姜。大棗。山茱萸。反藜蘆。忌銅器。

參攷資料 ①腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。發爲火病。法宜壯水以制火。故玄參與地黃同功。其消癆瘰亦是散火。劉守真言結核是火病。(李時珍) ②合香家用之。故俗呼藜蘆草。(馬志) ③生冤旬山陽。三月生苗。其葉有毛。四四相值。似芍藥。黑莖。莖方。高四五尺。葉亦生枝間。四月實黑。(吳普本草) ④今出近道。處處有之。莖似人參而長大。根甚黑。亦微香。道家時用亦以合香。(陶弘景) ⑤玄參根苗並臭。莖亦不似人參。未見合香。(蘇恭) ⑥其莖方大。高四五尺。紫赤色。而有細毛。葉如掌大而尖。長根生青白。乾卽紫黑。新者潤膩。陶云莖似人參。蘇言根苗並臭。似未深識。(馬志) ⑦今用玄參。正如蘇頌所說。其根有腥氣。故蘇恭以爲臭也。宿根多地。蠶食之。故其中空。花有紫白二種。(李時珍)

【玄精石】卽大黃蜂之古籍別名。與見綱目。詳「大黃蜂」條。
【玄魚】卽蛭蚌之古籍別名。與見古今注。詳「蛭蚌」條。
【玄鳥】卽燕之古籍別名。與見禮記。詳「燕」條。
【玄蠶索】卽廷胡索之古籍別名。與見和漢藥考。詳「廷胡索」條。
【玄精石】 命名 本品乃鹹鹵故名。
處方用名 元精石。龜背玄精石。
古籍別名 太乙玄精石。陰精石。玄英石。(綱目)
外國名詞 Huanjingshi
(拉丁)
基本 係鹵石類。爲鹹鹵所結之石塊。
產地 陝西川蜀及山西蒲解兩縣均有出。
形態 玄精石爲鹵石類。係鹹鹵滲入土。年久結成。片片如龜甲。尖角端正。叩之則折。折處皆爲六角形。色青白通澈。燒過則悉解。折薄如柳葉。片片相離。白如霜雪。

平潔可愛。其出蜀中者。色稍紅潤。

性質 鹹。溫。無毒。

製法 採得洗淨。陰乾用。效能 消熱。滋陰。用作解熱滋養藥。

主治 除風冷邪氣。溫脾。益精氣。婦人病冷。渴下。心腹積聚。冷氣。止頭痛。解肌。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論玄精石曰。主陰虛傷寒。指甲面色青黑。心下脹滿。結硬。煩渴。虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利。腫痛。脈沉細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥。塗大風瘡。

【明】李士材本草圖論玄精石曰。傷寒陰證。不宜服鹹。能走血。用以引經入腎。則可。多則反瀉。腎傷血矣。戒之。【明】李時珍本草綱目論玄精石曰。玄精石。稟太陰之精。與鹽同性。其氣爽而不溫。其味甘鹹而降。同硫黃硝石。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。故鐵

輿中先生來復丹用之。正取其寒以配硝硫之熱也。開寶本草言其性溫。誤矣。【清】汪劬庵本草備要論玄精石曰。太陰玄精石。係太陰

之精。鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。出解池。通秦積。鬻處。鹹肉所結。青白。盤。片。皆六稜者良。今世用者。多是絳石。

配合應用 ①正陽丹。治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。用太陰玄精石。硝石。硫黃各二兩。硝砂二兩。細研。入甕瓶固濟。以火半斤。周一寸。燻之。約近半日。候藥青紫色。住火待冷。取出。用臘月雪水拌勻。入礬於中。置地上。陰乾。又入地埋二七日。取出。細研。麪糊和丸。雞頭子大。先用熱水浴。後以艾湯研下一丸。以衣蓋。汗出為瘥。(圖經方)

②治小兒風熱。按風。熱而體熱。太陰玄精石一兩。石苻七錢。半龍腦半兩。為末。每服半錢。新汲水下。(普濟方)

③治冷熱霍亂。分利陰陽。玄精石。半夏各一兩。硫黃三錢。同為末。麪糊丸。梧子大。每米飲服三十丸。(指南方)

④治頭風腦痛。玄精石末。入羊胆中。陰乾。水調一字。吹鼻中立止。(千金方)

⑤治目赤。用玄精石半兩。

黃蘗(炙)一兩。為末。點之良。(普濟方)

⑥治赤目失明。內外障翳。用太陰玄精石。陰陽火煨。石決明各一兩。蕤仁。黃連各二兩。羊子肝七個。竹刀切。晒為末。粟米飯丸。梧子大。每臥時。茶服二十九丸。服至七日。炙頂心。以助藥力。一月見效。宋丞相言黃典史病此。夢神傳此方。遂愈。(朱氏集驗方)

⑦治目生赤脈。玄精石一兩。甘草半兩。為末。每服一錢。小兒半錢。竹葉煎湯調下。(總微論方)

⑧治重舌。涎出水泉不入。用太陰玄精石二兩。牛黃。朱砂。龍腦一分。為末。以錢針舌上。去血涎。湯漱口。搽末。嚙津。神效。(聖惠方)

用費 錢半至三錢

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無熱邪者禁用。

【玄壘】即玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳「玄參」條。

【玄駒】即赤色鯉魚。典見圖經本草。詳「鯉魚」條。

【玄鱧】即鱧魚之古籍別名。典見神雅。詳「鱧魚」條。

【玉】 處方用名 玉屑。 古籍別名 玄真(本草綱目)

產地 出崑崙山谷。與砂礫同沉河底中。

形態 玉為石類之美石。其體溫潤縝密。光澤如脂肪。半邊透明。其硬度低於水晶。更低於寶石。琢成器皿。以為珍貴之物。其屑可供藥用。

種類 ①軟玉為輝石類。在火中易溶解。以純潔乳白色者為貴。②硬玉為角閃石類。較難溶解。色多鮮綠。翡翠即屬其類。

製法 陶弘景曰。玉屑是以玉為屑。非別一物也。仙經服穀玉。有搗如米粒。乃以苦酒漿消令如泥。亦有合為漿者。凡服玉皆不得用已成器物。及塚中玉璞。蘇恭曰。餌玉當以消作水者為佳。屑如麻豆服者。取其精潤臟腑。滓穢當完出也。又為粉服者。即使人淋瀝。屑如麻豆。其義殊深。

性質 甘。平。無毒。

主治 除胃中熱。噎息煩滿。止渴。解如煎豆服之。久服輕身長年。

歷代記載攷證 【唐】李珣海藥本草論玉屑曰。滋養五臟。止煩躁。宜共金銀麥門冬等同煎服。有益。【宋】大明諸家本草論玉屑曰。潤心肺。助聲喉。滋毛髮。

配合宜忌 惡鹿角。養丹砂。

【玉山果】即樺實之古籍別名。典見綱目。詳「樺實」條。

【玉女】即菟絲子之古籍別名。典見爾雅。詳「菟絲子」條。

【玉火石】 產地 生密州九仙山。東南隅地中。

形態 其狀如石。其色青白。擊之內有火。

性質 甘。微辛。溫。

主治 療傷寒發汗。止頭目昏眩。痛功等石膏。

【玉札】即玉泉之古籍別名。典見本經。詳「玉泉」條。②即地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地榆」條。

【玉瓜】 命名 本品剖之。肌白如冰玉。故名。

產地 出江西廣昌縣境。

形態 玉瓜為菜類瓜屬之一種。其莖蔓生。莢葉鱗葉。春種秋熟。

瓜形甚拙。圓者如瓠。或壽柯如箕。疣。無瓣無。長於沙土。外汙內潔。粗肌密理。剖而食之。清甘無滓。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 調中益氣。舒鬱化滯。消食。清大小腸火。生津滋血。和營衛。熟食補脾健胃。

參攷資料 玉瓜即廣昌土瓜。消煩釋滯。或熟食之亦佳。殆瓜中異品也。冬初始入市。無種。春深後切瓜連皮成小塊。用沙土覆於室內。久之芽生。於是就沙地為窰。令深而寬。藉以茅。欲其中通而根可旁達。既長密葉。莖生鬚。插竹引之。上行。培以雞糞。乃繁碩。土人又名玉瓜。抱朴子云。五原蔡謠入山而還。語家人曰。予至崑崙得玉瓜。以玉瓜井水洗乃軟可食。是豈其遺種耶。江西他縣亦有產者。然小而渣多。予食於元宵後。喜其味美。至郡覓之。東風送暖。瓜即不可留矣。(趙學敏)

【玉田沙】

命名 本品即河中沙之故名。

主治 夏月發麻疹。用之良。

【玉石】

形態 玉石為石類之一種。狀如毳。即礞玉砂也。凡玉須此石礞之乃光。探得可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 益氣。療消渴。久服輕身辟穀。

【玉如意】

古醫別名 箭頭草。銀剪刀。剪刀草。大風草。(綱目拾遺)白花地丁。(劉氏驗方)

產地 多生山野及田畔間。

形態 玉如意為山草類之一種。有紫白二種。與家種者無異。但藥上尖下圓。深青色。花亦較大。可供藥用。



玉如意

採取 以白花者入藥良。

主治 乳癰疔瘡。搗汁服渣傳患處。

配合應用 治乳癰初起。用玉如意草一兩。白酒煎。飽肚時服。

初起者二服即消。成膿者兩劑必潰。已潰者三服易斂。疼痛者服之能止。(百草鏡方)

治乳癰疔瘡。用白花如意草一名銀剪刀。生田野山間。較人家種者。葉狹花小。搗汁服之。渣敷患處。(救生苦海方)

治兒背生泡。凡小兒背上起白泡。藥如梭珠。一二月即破。膿血外流。瘻甚。一處方好。一處又起。用如意草搗爛敷之。長巾縛定。一夜而愈。(集驗方)

治脚上生瘡。亂孔如蜂窩者。用如意草搗爛敷之。或用乾如意草為末。雞子清調敷亦可。按此種又與地丁草不同。地丁小而此種大地丁葉深綠。此葉淺綠。有云家種如意草。亦有白花者。乃真玉如意。野生者仍是銀剪刀耳。性劣。不若家種者良。(集驗方)

治痘兒氣急。白花地丁不拘多少。煎湯服之。立止。(劉氏驗方)

治炎天火痘。偏身皆紅者。用白花地丁搗汁。白酒沖服立解。(劉氏驗方)

參攷資料 山野間如意草。葉

上尖下圓。深青色。與人家所種者無異。惟葉色稍深。綠耳。其花亦有紫白二種。至狹長之葉者。乃地丁草。所謂銀剪刀白花者及金剪刀紫花者是也。本品與如意草係一類二種。其性情功效亦不甚遠。(趙學敏)

【玉竹】

原名 本經作女萎。別錄作萎蕤。

命名 本品之葉。光瑩象竹。而根多節。故名。

處方用名 肥玉竹。製玉竹。

古醫別名 女萎(本經) 蕤蕤。烏女。蟲蟬。烏萎(吳普本草) 萎。萎蕤(爾雅) 地節。馬薺(別錄) 萎香(本草綱目) 威緩。委蛇。黃芝。女草。名莢。娃草。麗草。青黏。豆應。仇羅(和漢藥考)


外國名詞 Polygonatum

(拉丁)

基本 屬百合科。藥用萎蕤之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。玉竹產北江連州。樂昌一帶。名曰西竹。條長。開片好看。但糖質少。味鮮帶淡。夏至前後出新。有產河

北北山一帶。名曰海竹。又曰津竹。身短。味甜香濃。糖質重。凡食玉竹者。非此種莫屬。有產湖南。名曰廣竹。糖質與海竹同。凡山野邱谷之陰地間。恒有生焉。



(一) 竹玉

形態 按玉竹爲生於山麓陰地之多年生草。春月抽莖。粗大有三稜。莖端作紫色。節作紫黑色。高自一二尺至四五尺。葉互生。作淡綠色。長橢圓形。前端尖。脈絡作縱線。於葉腋著一二朵綠白色筒狀花。下垂如風鈴。花實及全形類黃精。爲外面黃褐色之長圓形地下莖。長二寸許。年久者長至一尺餘。其粗如指。有鬚根。味甘微辛。



(二) 竹玉

採以 二月七月間。採根陰乾。

製法 雷敫曰。黃精並鈎吻二物相似。萎蕤節上有鬚毛。莖莖葉尖處有小黃點爲不同。採得。以竹刀刮去節皮。洗淨。以蜜水浸一宿。蒸焙乾用。

性質 甘。平。無毒。
效能 潤燥。補氣血。扶正。祛風。溼。用治風溼。腰痛。藥。及爲爛弦風。與除顏面黑肝藥。

主治 女萎主中風暴熱。不能動搖。跌筋。結肉。諸不足。久服去面黑。好顏色。潤澤。輕身不老。〔本草〕萎蕤主心腹結氣。虛熱。溼毒。腰痛。莖中寒。及目痛。毗爛。淚出。〔別錄〕

歷代記述攷證 〔南北朝〕陶弘景本草集註論玉竹曰。服諸石人不調和者。煮汁飲之。〔唐〕甄權藥性本草論玉竹曰。時疾寒熱。內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之。良。〔唐〕蕭炳四聲本草論玉竹曰。補中益氣。〔宋〕大明諸家本草論玉竹曰。除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。〔明〕李時珍本草綱目論玉竹曰。主風溫自汗。

灼熱。及勞瘵寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。〔明〕趙希雍本草經疏論玉竹曰。萎蕤稟天地清和之氣。而得稔穡之甘。故本經味甘平無毒。主諸不足。久服好顏色。潤澤。輕身不老。別錄又主心腹結氣。虛熱。腰痛。莖中寒。目痛。毗爛。淚出。甄權主內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之。良。日華子謂其除煩悶。止渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。詳味諸家所主。則知其性本醇良。氣味和緩。醫諸盛德之人。無往不利。終始一節。故可長資其利用。而不窮。正如斯藥之能補益五臟。滋養氣血。根本既治。餘疾自除。夫血爲陰。而主駐顏。氣爲陽。而主輕身。陰精不足。則發虛熱。腎氣不固。則見骨痿。及腰脚痛。虛而火炎。則頭痛不安。目痛。毗爛。淚出。虛而熱壅。則煩悶消渴。上盛下虛。則莖中寒。莖則五勞七傷。精虧目枯。而成虛損之證矣。以一藥而所主多途。爲效良夥。非由滋益陰精。增長陽氣。其能若是乎。迹其所長。殆亦黃精之類歟。其主中風暴熱。不能動搖。跌筋。結

肉溼毒等證。皆是女萎之用。以本經二物混同一條。故耳。或謂卽青黏。理或有之。純而不駁。利而不偏。有益無損。故無簡誤。〔明〕李士材本草圖解論玉竹曰。葠蕤甘平入脾。柔潤入腎。故能補中益氣。逐熱除蒸。治一切不足之症。用代人參。不寒不燥。大有殊功。朱肱用治風溫。亦謂其能去風熱。與溼也。但性味和平。力量寬緩。譬之盛德之人。而短於才者也。水浸半日。飯上蒸透用。〔清〕黃宮繡本草求真論玉竹曰。萎蕤一名玉竹。味甘性平。質潤。擅善載能補肺陰。及入肝脾腎。以祛風溼。與人參地黃。稱爲補劑上品。并云可以當參。其說未嘗不是。但此氣平力薄。既與人參力厚不若。復與地黃味濃不合。卽使用至斤許。未有奇功。較之人參之補元。地黃之滋陰。不啻天淵矣。矧可用此當參。以挽垂絕之頃乎。况書載云。祛風除溼。不無疎泄。於補更云不及。曷云可稱上品耶。肥白者良。似黃精而差小。黃白多鬚。竹刀刮去皮節。發散用生。補劑用蜜水。拌飯上蒸熟用。〔清〕張隱庵本草

崇原論玉竹曰。葦蕤氣味甘平。質多津液。稟太陰濕土之精。以資中焦之汁。主中風暴熱不能搖動者。以津液為邪熱所燥也。跌筋者。筋不柔和也。結肉者。肉無膏澤也。諸不足者。申明以上諸證。皆屬津液不足也。久服則津液充滿。故去面上之黑黧。好顏色。而肌膚潤澤。且輕身不老也。又曰。陰柔之藥。豈堪重用。古人除治風熱以外。絕不收用。自李時珍有不寒不燥。用代參書之說。時醫信為補劑。虛症仗此百無一生。咎其誰識耶。清鄭澍本經疏證論玉竹曰。凡有節有液之物。皆能通。故竹溼通風。火阻經。百通風。疾阻竅。萎蕤則通風熱阻絡者也。原夫氣。人身之陽也。津。人身之陰也。若病邪以漸而來。彼此徐徐相引。或化為寒。或化為熱。久則自相朋比。倘受邪既驟。感化甚速。則陽之從之也。易。陰之即之也。難。且陰原係洩澤骨節之物。勢常依巖附險。乃適遭中風暴熱。陽已與之俱化。陰猶倚勢為梗。則陰之阻正足以助熱之熾。陽之留正足以戕陰之結。兩不相通。

而均不相下。近幹之短絡。遂成機核。因之廢弛矣。又何自能動搖耶。妙在萎蕤氣味甘平。節節有髮。充密滑澤。不徒使絡中之液。能柔熱之暴。且可使肌肉間熱。能化液之結。骨節既通。陽施陰化。血脈皆騰。自爾和暢。灑然其汗出。於是平始跌筋結肉者。巢氏云。人手足逸。忽生如豆。或如結筋。五十相連。肌理麤強於肉。謂之疝目。係風邪搏於肌肉而生。此非精與氣相遇。遂互結不解。而何曰不足。明非津與氣之有餘。治以萎蕤。實與機所云云不殊矣。他如澤瀉。而面生疥。而津枯。而面不潤澤。又何異於是哉。

近人學說 ●袁淑範曰。按魏明在氏所著之植物質 (Veh-ner Pflanzenstoffe) 中。謂萎蕤 (Polygonat. officinale) 與君影草 (Convallaria majalis) 含有同樣之類糖質 (Glykosido)。而君影草有比毛地黃葉 (Folia Digitalis) 強有數倍之強心作用者。早為滿醫藤井氏所研究之事實也。故萎蕤既與其含有同樣之類糖質。應具有強心作用者。此

亦吾人之所能推及者也。故試之於蛙心臟。果見有強心之作用。然多則反是。心搏動反減弱。終則停止。試注射於家兔之靜脈內。亦見有使血壓上昇之作用。故萎蕤之有強心作用者明矣。亦即久服萎蕤能潤澤顏色。輕身益氣之理也。張山雷曰。玉竹味甘多脂。柔潤之品。本草雖不言寒。然所治皆燥熱之病。其寒何如。古人以治風熱。蓋柔潤能息風耳。陰寒之質。非能治外來之風邪。凡熱邪燔灼。火盛生風之病最宜。今惟以治肺胃燥熱。津液枯涸。口渴噎乾等證。而胃火熾盛。燥渴消穀。多食易飢者。尤有捷效。千金及朱肱以為治風溫主藥。正以風之病。內熱蒸騰。由熱生風。本非外感。而熱勢最盛。津液易傷。故以玉竹為之主藥。甄權謂頭不安者。加用此物。亦指肝火猖狂。風陽上擾之頭痛。甘寒柔潤。正為息風清火之妙用。豈謂其能通治一切頭痛耶。又曰。本經諸不足三字。是總結上文暴熱諸句。隱卷之言甚是。乃昔人誤以為泛指諸虛不足而言。故甄權則曰內補

不足。甄權則曰補中益氣。日華則曰補五勞七傷虛損。瀕湖則曰主脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。且謂治虛勞寒熱。及一切不足之證。用代參者。不寒不燥。大有奇功。幾以此為勞瘵起死回生之神劑。亦知柔潤之性。純陰用事。已足以戕生生之機。况虛勞之病。陰陽並虧。縱使虛火鷓張。亦無寒涼直折之法。又豈有陰寒膩滯之質。而能補中益氣之理。諸家之說。皆誤讀本草經諸不足三字之符。而李瀕湖創作邪說。尤其荒謬。邇來以麥冬。玉竹。知母。花粉等品。製造勞瘵之良工。遍地多有。其近因固是誤於臨證。指南醫醇賡二種。其遠因實發源於瀕湖之綱目。張隱菴本草注。已謂玉竹陰柔之質。豈堪重任。古人於風熱以外。絕不採用。自李氏有不寒不燥之論。而時醫信為補劑。虛證得此。百無一生。陳氏修園亦詳辨之。乃近人猶不覺悟。竟於虛熱咳嗽等病。恣用陰柔膩滯之品。戀邪助痰。暗戕脾胃。明明將輕微之病。一力送入鬼門關者。比比而是。大率皆鑿於

五畫 玉

此可勝長歎。張石頑謂玉竹雖潤而不傷脾泄瀉。頗則謂陰寒之品無不礙中。石頑此說必不可信。又仲醇經疏。極贊此物則瀨湖之流亞也。且謂其滋長陽氣。更屬無微。配合應用。治赤眼痛。瀉瀉。赤芍藥。當歸。黃連等分。煎湯薰洗。(衛生家寶方)

治眼見黑花。赤痛昏暗。甘露湯。用萎蕤焙四兩。每服二錢。水一盞。入薄荷二葉。生薑一片。蜜少許。同煎七分。臥時溫服。日一服。(聖濟總錄方)

治小便卒淋。萎蕤一兩。芭蕉根四兩。水二大盞。煎一盞。入滑石三錢。分三服。(聖惠方)

治發熱口乾。小便澀。用萎蕤五兩。煎汁飲之。(外臺秘要方)

治乳石發熱。萎蕤三兩。炙甘草二兩。生犀角一兩。水四升。煮一升。分三服。(聖惠方)

治癩後虛腫。小兒癩病。後血氣上虛。熱在皮膚。身面俱腫。萎蕤。葵子。龍膽。茯苓。前胡。等分。為末。每服一錢。水煎服。(聖惠方)

月。一錢。至三錢。

施用宜忌 凡有痰積滯者禁用。忌鐵。惡南鹹。

著名方劑 萎蕤湯。治風濕咳嗽。兼療冬溫及月月中風。傷寒發熱。頭眩痛。喉咽乾。舌強。胸內疼。痞滿。腰背強。(活人方) 用萎蕤三分。石膏一兩。(粹碎) 白薇。麻黃。(湯泡焙乾) 川芎。葛根。(生者可用二兩尤妙) 大羌活。(去蘆) 炙甘草。杏仁。去皮尖。各半兩。青木香一分。冬一兩。春半兩。剉末。為丸。如麻豆大。每服五錢。水一盞。煎一盞。日三四服。

參攷資料 本經有女萎無萎蕤。別錄無女萎有萎蕤。而功用正同。疑女萎即萎蕤。惟名稱異爾。(爾雅) 本經女萎。乃爾雅委蕤二字。即別錄委蕤也。上古鈔寫。說為女萎爾。古方治傷寒風虛。用女萎者。即萎蕤也。皆承本草之訛而稱之。諸家不察。因中品有女萎。名字相同。遂致費辯。如此。今正其誤。只依別錄書萎蕤為綱。以便尋檢。其治洩痢女萎。乃蔓草也。見本草(李時珍) 按黃公紹古今韻會。五葳蕤。草木葳蕤之貌。此草根

長多鬚。如冠纓下垂之綬。而有威儀。故以名之。凡羽蓋旌旗之纓。綬皆象葳蕤是矣。張氏瑞應圖云。王者禮備。則葳蕤生於殿前。一名萎香。則威儀之義。於此可見。別錄作萎蕤。有文也。說文作萎蕤。音相近也。爾雅作委。委字相近也。其葉光瑩。而象竹。其根多節。故有莢及玉竹。地節。諸名。吳普本草。又有烏女蟲。蟬之名。宋本一名馬蕤。即烏萎之訛者也。(李時珍) 昔彭城樊阿少師。事華佗。佗授以漆葉青黏散。服之。利五臟。去蟲。輕身。益氣。年至五百餘歲。青黏生野浦彭城。及朝歌。一名地節。一名黃芝。主理五臟。益精氣。本出於遼。人入山見仙人服之。以告佗。佗以為佳語。阿乃秘之。人見阿之語。而氣力強盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復有人識青黏者。或云。即黃精之正葉者。又云。即萎蕤。同黃精。桑柘。何首烏。能駐顏。(經) 希雅) 萎蕤與黃精。為同屬異種之植物。世人往往混同之。但萎蕤之地下莖橫行。而長。且結節不顯明。此為不同之點。(利津藥考) 萎蕤所在多有。與

黃精為同屬異種。黃精有根節。如生葶。萎蕤無節。似地黃。(物類彙編) 萎蕤莖粗。帶暗紫色。有稜。條葉為長橢圓形。質厚而不光滑。根白色。略似黃精根。但長而橫行。結節亦不顯明。實可作吐劑。根甘微辛。外用除顏面嫩赤污點。又乾末和薔薇水。為保肌肉形態美。麗之良劑。(草木圖說) 今世所謂黃精。皆萎蕤也。藥舖所售者。亦非黃精。大抵根大節高。黃色者為黃精。平直節低。長而帶黃白色者為萎蕤。(本草辨疑)

【玉米】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。
【玉竹】即玉竹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉竹」條。
【玉乳】即梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。
【玉枝】即羊躑躅之古籍別名。典見別錄。詳「羊躑躅」條。
【玉版】即菘筍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「菘筍」條。
【玉版魚】即鱈魚之古籍別名。典見

見綱目。詳『質魚』條。

【玉芝草】即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【玉金】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【玉門精】即天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【玉星草】即望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江青』條。

【玉柏】古籍別名。玉遂。(別錄)千年柏。萬年松。(本草綱目)玉伯。(陳藏器)

外國名詞 Lycopodium

obscurum, L. (拉丁) ヲンチン スギ(日本)

基本 係羊齒門、石松科、石松類。藥用玉柏之莖葉。

形態 玉柏為苔草類之隱花植物。常綠草本。其莖分地上地下兩部。地下者匍匐地中。處處生莖。地上者莖直立。密枝簇生。高五六寸。葉小。密生如鱗片。宛如松杉。秋日梢頭生穗狀孢子囊。此即石松之小者。人皆採置盆中。養數年猶不死。
性質 酸。溫。無毒。

五畫 玉

主治 輕身。益氣。止渴。

【玉泉】 命名 本品乃玉之精華。質色明潔。可消為水。故名。

古籍別名 玉札。(本經)玉漿。(開寶本草)瑤漿。(本草綱目)

產地 出玉石中。

形態 玉泉為玉之泉。液明澈如水。採得可供藥用。

製法 青葙子曰。作玉漿法。玉屑一升。地榆草一升。稻米二升。取白露二升。銅器中煎米熟。絞汁。玉屑化為水。以藥納入。所謂神仙玉漿也。陳藏器曰。以玉殺朱草。汁化。成醴。朱草。瑞草也。術家取蟾蜍膏。軟玉如泥。以苦酒消之。成水。

性質 甘。平。無毒。

主治 五臟百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益氣。利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老。神仙。人臨死服五斤。三年色不變。(本經)療婦人帶下。十二病。除氣。釋明耳目。久服輕身長年。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論玉泉曰。治血塊。

配合宜忌 畏款冬花、青竹。

參攷資料 天寶遺事。楊貴妃含玉喉津。以解肺渴。王弄璋孔休玉曰。君面有疵。美玉可以滅瘰。後魏李預得養玉之法。乃探訪藍田。掘得若環璧雜器形者。大小百餘枚。植作屑。日食之。云有效驗。而好酒損志。及疾謂妻子曰。服玉當屏居山林。排寒嗜欲。而吾酒色不絕。自致於死。非藥之過也。尸體必常有異於人。勿使速殮。令後人知。養服之功。時七月中旬。長安毒熱。停尸四日。而體色不變。口無穢氣。(唐慎微)抱朴子云。服金者壽。如金。服玉者壽如玉。但其道遲成。須服一二百斤。乃可知也。玉可以烏米酒及地榆酒化之。為水。亦可以葱漿酒之。為粉。亦可餌。以為丸。亦可燒為粉。服之。一年以上。入水不沾。入火不灼。刀之不傷。百毒不死。不可用已成之器。傷人無益。得璞玉。乃可用也。赤松子以玄蟲血。漬玉。為水服之。故能乘烟霞上下。玉屑與水服之。俱令人不死。所以不及金者。令人數數發熱。似寒食散狀也。若服玉屑。宜十日一服。雄黃丹砂各一刀圭。散髮洗沐冷水。

迎風而行。則不發熱也。黃君異常。以玉醴與盲人服。旬日而自愈也。(馬志)漢武帝取金華。置和玉屑服。云可長生。即此物也。但玉亦未必能使生者不死。惟使死者不朽。爾。養尸招盜。反成暴棄。曷若速朽歸虛。之為見理哉。(李時珍)

【玉玲瓏】即茶菊之白色千葉者。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。即水仙之古籍別名。典見羣芳譜。詳『水仙』條。

【玉珊瑚】即南天燭子。色白者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南天燭』條。

【玉英】 古籍別名 石鏡。(別錄)

產地 生山紋中。

形態 玉英為石類之一種。其色光明若鏡。可供藥用。

採取 十二月採之。

性質 甘。無毒。

主治 風寒。皮膚痒。

【玉塵砂】即砂之古籍別名。典見電公泡灸論。詳『砂』條。

【玉屑】即玉之處方用名。詳『玉』條。

【玉桔梗】即桔梗之處方用名。詳『桔梗』條。

【玉槿】即海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【玉粉圍】即粉圍花之大者。典見綱目拾遺。詳『粉圍花』條。

【玉脂】即白玉髓之古籍別名。典見綱目。詳『白玉髓』條。

【玉脂芝】即淨海石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淨海石』條。

【玉荊】即井苦之古籍別名。典見別錄。見『井苦』條。

【玉高粱】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉接骨】即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉槿】即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉槿半支蓮】即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉液】即白玉髓之古籍別名。典見綱目。詳『白玉髓』條。

【玉淨瓶】古稱別名。序頭草。昔昔仙禽。并見僧。猪

屎草。氣殺郎中。白山桃。(綱目拾遺)

形態 玉淨瓶為雜草類之一種。春月發苗。葉尖長。排生。莖有白紋斑點。高數尺。葉對節生。夏開細白花。成簇如華蓋。結實如菜菔子。大青圓。霜降後紅。其根肥白。可供藥用。

採取 十月採之。

性質 甘。平。無毒。

主治 和血行血。疲勞傷跌。撲降火消癰毒。散腫。拔疔根。

【玉章】即王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王瓜』條。

【玉肢】即地榆之古籍別名。典見別錄。詳『地榆』條。

【玉連環】即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉釵草】古稱別名。開黃花。者名草裏金釵。(綱目拾遺)

產地 多生於近田澤水溝中。

形態 玉釵草為過草類之一種。對葉圓棍。細莖。獨苗直上。如醒頭草。可供藥用。

主治 打傷跌腫損折。搗汁服。渣卷諸腫毒。療金瘡。活血。男子遺精。白濁。婦女白帶。白淫。合白酒煎服。

【玉麥】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉椒】命名。本品即用胡椒而成。白玉色。故名。

古稱別名 白胡椒。(綱目拾遺)

形態 玉椒為椒類之一種。其色如雪。而味辛於他椒。以內通白者為上。皮白內黃者次之。

性質 辛。

主治 治胃氣痛。心痛。解魚蝦毒。

配合應用 ①治九種心疼。用丁香去頂蓋。廣木香。雄黃。巴豆。去油淨。白胡椒各三錢。枳殼。紅花。五靈脂各一兩。共為細末。好酒發為丸。如菜子大。候乾收貯瓶內。每服八釐。唾津送下。忌生冷油膩。半月除根。(葉天士方)

②治胃痛。用大紅棗去核七個。每個內入白胡椒七粒。棗好。飯

鍋上蒸七次。共荷為丸。如綠豆大。每服七丸。溫滾水下。如壯實者。用十九丸。服後痛止。而胃中作熱。作熾。以粥飯壓之。即安。此寒食痰飲皆治。(百草鏡方)

【玉晴子】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【玉番絲】即細辛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『細辛』條。

【玉絲皮】即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【玉蜀黍】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉蜀黍】命名。本品苗葉俱似蜀黍。故名。

古稱別名 玉高粱。戎菽。御麥。番麥。玉米。玉麥。玉蜀黍。包穀。紅鬚麥。(本草綱目)南蠻黍(日本)

外國名詞 Zea mays, T. (拉丁) タウモロユシ ナンパ

シキビ カウライキビ(日本)

基本 禾本科。藥用其種子。

產地 原產亞洲中國各地均有出。

形態 玉蜀黍為穀類之一。年

生草本。莖直立。高七八尺。莖長而

大枝針形。有平行脈。花單性。雄花與雌花同株。雌花則離花序。開於莖之頭頂。雄花生於葉腋。花軸多肉穗狀花序。有大苞包被。花柱如長毛狀露出苞外。色日如鬚。實爲穎果。其種子如梭子。黃白色。



玉蜀黍

性質 甘。平。無毒。
主治 調中開胃。

【玉蜀黍根葉】 主治 小便淋瀝砂石痛。

不可忍。煎湯類飲。

【玉遂】 卽玉柏之古籍別名。典見別錄。詳『玉柏』條。

【玉通】 卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【玉槿】 卽槿實之古籍別名。典見日用本草。詳『槿實』條。

【玉精】 卽人參之古籍別名。典見吳普本草。詳『人參』條。

【玉脊】 卽白玉髓之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白玉髓』條。

五畫 玉

【玉漿】 卽玉泉之古籍別名。典見開寶本草。詳『玉泉』條。

【玉莖菁】 卽甘藍之古籍別名。典見山西志。詳『甘藍』條。

【玉單】 卽香單之一種。潔白如玉。蒸之微硬。與尋常香單同。

【玉燕】 卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【玉甌】 卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【玉盤茄】 卽白茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白茄』條。

【玉盤龍】 卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉錢草】 卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉擎】 卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【玉棊】 卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【玉蕙】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【玉簪】 命名 本品花狀象簪。色白如玉故名。


【玉簪】 處方用名 玉簪根。玉簪花。玉簪葉。

古稱別名 白鶴仙。(本草綱目)

外國名詞 Houta Sibold, Kana, Enji (拉丁) タウギバウシ(日本)

基本 係百合科紫萼屬。藥用玉簪之根。

形態 玉簪爲多年生草本。高至四五尺。葉大綠色。卵形。有長葉柄叢生。葉面有白粉蠟質。夏日葉間抽圓莖上部開花。花白色。亦有帶淡紫色者。花蓋六片。互相結合。苞呈紫綠色。雄蕊六枚。總狀花序。其氣頗香。



玉簪

性質 甘。辛。寒。有毒。

主治 搗汁服。解一切毒。下骨。腫。塗腫。

歷代記述攷證 【清】黃元御 玉椒藥解論玉簪曰。玉簪花根。辛

寒透骨。能落牙齒。化骨。殺胎。妊。散腫毒。研塗一切腫腫。作湯不可。着牙最能損齒。

近人學說 張山雷曰。玉簪根。

性質 據瀨湖綱目下竹類。塗腫腫。取齒牙。頗與急性子約略相近。頭。管採鮮根搗自然汁。晒乾作小丸。

治牙痛欲落者。以一丸嵌痛處。聽其自化。一丸不落。再嵌二三次。無不自落。而無痛苦。確驗。又吾鄉有齒痛甚劇者。聞人言玉簪根汁點牙自落。乃搗汁嗽口。不一月而全口之齒無一存者。此是實事。可證此物透骨之猛。且其人年僅三十餘也。

參攷資料 玉簪處人家栽爲花草。二月生苗成叢。高尺許。柔莖如白蕊。其葉大如掌。圓而有尖。葉上紋如車前。葉背白色。頗嬌瑩。六七月抽莖。莖上有細葉。中出花。朵數十枚。長二三寸。本小末大。未開時。正如白玉搔頭簪形。又如羊肚蕪之狀。開時。微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根連生。如鬼白。射干生。莖。有鬚毛。舊莖死。則根有一白。新根生。則舊根腐。亦有

五畫 玉 瓜

紫花者。葉微狹。皆鬼臼射干之屬。
(李時珍)

【玉簪花】即玉簪之處方用名。詳

【玉簪】條。

【玉簪根】即玉簪之處方用名。詳

【玉簪】條。

【玉露霜】其本 本品即荔枝
之產於廣東新會崖

門山者。

形態 玉露霜為夷果類之一

種。其實白殼丹肉。經冬不落。採得
可供藥用。

性質 甘。酸。無毒。

主治 降肺火。止咳嗽。療怯症。

【玉簪】即茉莉花之古籍別名。與

見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【玉簪片】即石脊之古籍別名。與

見和漢藥考。詳『石脊』條。

【玉恩龍】即白蠶之古籍別名。與

見粵志。詳『白蠶』條。

【瓜丁】即瓜蒂之古籍別名。與見

千金食治。詳『甜瓜蒂』條。

【瓜香草】即金頂龍芽草之古籍

別名。與見救荒本草。詳『金頂龍

芽草』條。

【瓜片子】即冬瓜子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【瓜黃】即麥門冬之俗名。詳『麥

門冬』條。

【瓜蒂】即瓜蒂之古籍別名。與見

和漢藥考。詳『甜瓜蒂』條。

【瓜練子】即冬瓜子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【瓜蕒】即白藥子之古籍別名。與

見新修本草圖經。詳『白藥子』條。

【瓜蕒仁】原名 栝樓仁。亦作

簡稱之名也。

處方用名 全瓜蕒。瓜蕒實。

古籍別名 果藏仁。(本草綱

目) 天瓜仁。黃瓜仁。澤姑仁。(別

錄) 地樓仁。(本經) 天棘仁。樓活

仁。澤茹仁。(和漢藥考)

外國名詞 Trichosanthes

japonica, Fgl.

基本 屬葫蘆科。藥用瓜蕒之

子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

瓜蕒仁有大小之分。大者產廣西

南寧各屬。小者產廣東星子連州。

樂昌英德各屬。身扁而瘦。味好。又

有產江蘇鎮江者。身略橢圓。肉多。

若論其實味。想亦與廣東等不相
上下也。八九月新。

形態 按瓜蕒為山野自生之

蔓草。春季從宿根抽莖。長達十數

丈。葉作心臟形。有三五深裂。面綠

色。有光澤。葉腋生莖。鬚根纏繞他

物。夏季葉腋開白花。似王瓜花。花

後結綠色橢圓形實。較王瓜大而

稍短。至秋成熟。色作黃赤。中有黃

瓢。瓢中有子。即瓜蕒仁。其種子黃

褐色。仁為褐綠色。作長扁圓形。含
多量脂肪。

釋類 雷斅曰。栝圓黃。皮厚蒂

小。陽人服栝。樓則形長。赤皮蒂粗

陰人服栝。和漢藥考曰。栝樓仁。日

本出產頗多。藥舖所售者。有以

modo, Rindo 二種。甲仁多為上

品。乙仁少為下品。又有用王瓜仁

(玉章仁)充之者。非栝樓根。日本

產亦多。但往往有用王瓜根僞充

者。

採取 秋冬採處置陰處地上。

約三十日。待外皮腐爛。撒米糠入

盆踏之。移置席上。晒七八日。於箕

上扇之。則祇留種子於箕底。後用

白膠去其外皮。再上箕及白五六

三三四

次。而採取瓜蕒仁。

製法 雷斅曰。凡使栝樓皮子

莖根。其效各別。並去殼皮革膜及

油用。李時珍曰。栝樓古方全用。後

世乃分子製各用。

性質 苦。寒。無毒。

效能 瀉火潤肺。下氣。墜痰。用

作祛痰鎮靜藥。

主治 胸痺。悅澤人面。

張仲景之醫明 瓜蕒一味。經

張仲景之實驗。認為主治胸痺。勞

治痰飲。茲考徵如下。①小陷胸湯

證曰。結胸。②瓜蕒薤白湯。酒證

曰。胸痺。喘息咳唾。③瓜蕒薤白半

夏湯證曰。胸痺不得臥。④枳實蘆

白桂枝湯證曰。胸痺。(以上四方

瓜蕒實皆一枚。)觀此諸方。其治

胸痺及痰飲也明矣。所謂胸痺者

胸膈痞塞是也。又考枳實蘆白桂

枝湯條曰。胸痺云云。枳實蘆白桂

枝湯主之人。證湯亦主之。金匱要

略。往往有此例。此非仲景之古也。

夫疾醫之處方也。各有所主。豈可

互用乎。胸痺而胸滿上氣喘息咳

唾。則枳實蘆白桂枝湯主之。胸痺

而心下痞硬。則人參湯主之。此所

以不可替代也。讀者思諸。

歷代記述疏證 【宋】大明日

華諸家本草論瓜蒌仁曰。子炒用。補虛勞。口乾。潤心肺。治吐血。腸風。瀉血。赤白痢。手面皴。【明】李時珍本草綱目論瓜蒌仁曰。潤肺燥。降火。治咳嗽。痰核。利咽喉。止消渴。利大便。消癰腫疔毒。【明】李士材本草圖解論瓜蒌仁曰。實即栝樓。主胸痺腫毒。潤肺止咳。痰核解渴。丹溪贊其洗滌胸垢。為治渴神藥。其子功用約略相同。研爛去油用。【清】黃宮繡本草求真論瓜蒌仁曰。栝樓仁氣味甘寒。功帶降火下氣。墜痰。緣肺受火逼。則水必停而痰生。痰生則肺失養而氣壅。故有喘急胸滿咳嗽。咽閉口渴之病矣。栝樓性寒味甘。寒能除上焦傷寒。胸膈鬱結痰氣。使之入腸胃而下降。故仲景小陷胸湯。用此以治邪結在胸。又以小柴胡湯。用此易半夏。以治少陽症見口渴等症。然大要取其有清降之力。故能使之下行也。若謂此能補氣。正未必然。虛寒瀉利者忌。實圓長如熟柿子。扁多脂。去油用。【清】鄒澍本經疏證

五 薑 瓜

論瓜蒌仁曰。栝樓根入土最深且

能久在土中。生氣不竭。故歲歲引蔓發葉。開花成實。而味苦性寒。恰有合於脾臟之德。而能為効其用。其止渴也。則所謂脾氣散精。上歸於肺者也。腸胃皆隸於脾。脾陰効用。則腸胃中痼熱又烏能留。黃疸者。脾津被熱。約而不流。以致蒸盪而成者也。脾熱既解。疸亦何能不除。短氣。肺陰虛也。小便過利。肺火盛也。衝脈隸於陽明。為月水所從降。若因脾胃陰虛而血涸。或因熱結而不流。得此涼潤之劑。自然潤者滋。結者解。不通者轉。而能通。別錄之治。固與本經理無二致矣。栝樓根實。諸本草家咸謂功用略同。稍有差別。愚則謂其大相逕庭。何也。栝樓根主升。實主降。夫升即寓補。降即寓瀉。故仲景用實。多治結痛。治痺阻。治逆搶。隱然一下藥也。根則專治瀉。凡陰虛火熾。肺腎津液不相交濟者。咸用之。此不可為一補一瀉之驗乎。甚者同一小柴胡湯證。煩者加實去人參。渴者加根更加人蔞。夫人蔞之為物。和緩沖融。表未解者不用。裏未虛者

不用。乃一則與之為伍。一則不與之為伍。亦可以得其物之情矣。五常政大論曰。陰精所奉。其人壽。陽精所降。其人夭。故同一物也。升則為陽。降則為陰。陽則主生。陰則主殺。雖然。此亦以性寒者言耳。若氣味溫和。又不當作如是論矣。雖然。栝樓實非能治實也。亦不治虛。觀仲景之用栝樓實。在小陷胸湯曰。小結胸。病正在心下。按之則痛。在栝樓薤白白酒湯曰。喘息咳嗽。胸背痛。短氣。而其畧一則曰浮滑。一則曰寸口沉遲。關上小緊數。是皆陰中有陽。且踞於陽位者也。夫胸背痛。較按之方痛。則其痺則較結為輕。咳嗽喘息。是其勢為上沖。而居於心下。按之機病。似反靜而不動。此其澁緣緣氣與飲相阻。寒與熱相糾。熱甚於寒者。其束縛反急。而為結。寒甚於熱者。其蔽塞自盛。而為痺。是故結胸之病。伏胸痺之病散。伏者宜開。散者宜行。故一則佐以連夏之逐飲洩熱。一則佐以葶酒之滑利通陽。栝樓實之裏無形。攢聚有形。使之滑潤而下。則同能使之下。自是治實之方。僅能使

之下。不能使其必通。又非純乎治實之道矣。何以知不能使之必通。蓋有停飲痞甚。至不得臥。即當加半夏。若氣胸滿脅下逆搶心。則仍加枳朴桂枝。若竟能通。又何必如是哉。是知栝樓實之治。大旨在大與痰結於陽位。不純乎虛。亦不純乎實者。皆能裏之而下。此其擅長矣。 近人學說 張山雷曰。實實入藥。古人本無皮及子仁分用之例。仲景書以枚計。不以分量計。是其確證。蓋實既老。其殼空鬆。故能通胸膈之葶塞。而子又多油。善滲痰垢黏膩。一舉兩得。物理學之正旨如此。自日華子大明本草。有其子炒用一說。而景岳之本草正。祇用其仁。張石頑之逢源。亦云去壳紙包壓去油。則皆不用其壳。大失古人專治胸痺之義。且諸瘍湯症。消腫散結。又皆以皮子並用為捷。觀瀕湖綱目附方極多。全用者十之九。古人衣鉢。最不可忽。惟近今市肆。以蕪實老時。皮肉不黏。剖之不能成塊。凡用全瓜蒌者。皆乘其未老之時。持取曬乾而剖為數塊。

五盞瓜

方能皮肉黏合。以取美觀。然力甚甚薄。却無功效。所以願欲用其全者。寧以萎皮。列爲二物。乃能得其老者。始有實驗。若但書全瓜。萎三字。則用如不用。此亦治醫者不可不知藥物之真性情也。即使但用其皮。亦是老而力足。疏通中滿。確有奇能。惟景岳謂萎仁氣味惡劣。善令噁心嘔吐。中氣虛者不可用。是從閱歷經驗得來。且善動大便。令人滑泄。苟非實結。慎勿妄投。即搗碎去油。僅用其霜。亦非大府實結。不可輕使。石頑又謂萎根寒降。凡胃虛吐逆。陰虛勞嗽。誤用反傷胃氣。久必泄瀉喘咳。病根更深。凡痰飲色白清稀者。禁用。皆是至言。苟以尋常藥物。率爾操觚也。景岳又謂本草言瓜。萎仁補虛勞。大謬。蓋願案據綱目引大明。謂子炒用補虛勞云云。則景岳所謂。即指日華本草而言。病情藥性。本極悖謬。日華蓋誤讀本經補虛安中四字。而臆敢爲此妄說。日華之罪。豈不上通於天。是可知本經言。不善說之貽。不可辨言。日華所見。本多訛。殊不足資。而後之學

者。欲讀古書。慎不可不自具隻眼。

配合應用 治痰咳不止。瓜

萎仁一兩。文蛤七分爲末。以豉汁

澄濃脚。丸。彈子大。噙之。摘玄方

治乾咳無痰。熱瓜。萎。搗爛。絞

汁。入蜜等分。加白礬一錢。熬膏。類

含嚥汁。楊起簡易方

治咳嗽有痰。熱瓜。萎。十箇。明

礬二兩。搗和餅。陰乾。研末。糊丸。梧

子大。每寢湯下五七十丸。醫方

摘要方

治痰喘氣急。菰蘆二箇。明礬

一。大棗同燒。存性。研末。以熟蘿蔔

齏食。藥蘆病除。普濟方

治熱咳不止。用濃茶湯一鍾。

蜜一鍾。大熟瓜。萎一箇。去皮。將瓢

入茶。蜜湯。洗去子。以盤盛於飯上。

蒸至飯熟。取出。時時挑三四匙。嚥

之。摘玄方

治肺熱痰咳。胸膈塞滿。用瓜

萎仁。半夏湯泡七次。焙研。各一兩。

煎汁打。麩糊丸。梧子大。每服五十

丸。食後煎湯下。濟生方

治肺痿咳血不止。用梧樓五

十箇。連殼丸。煨。烏梅肉五十箇。焙。

杏仁去皮尖炒。二十一箇。爲末。每

用一捻。以豬肺一片切薄。搽末入

內炙熟。冷嚼嚥之。日二服。聖濟

總錄方

治酒痰咳嗽。用此救肺。瓜

萎仁。青黛等分。研末。豉汁。蜜丸。炙子

大。每噙一丸。丹溪心法方

治飲酒發熱。卽上方研膏。日

食數匙。一男子年二十。病此。服之

而愈。摘玄方

治飲酒痰癖。兩脅脹滿。時復

嘔吐。腹中如水聲。栝樓。實去殼。煨

一兩。神麩炒半兩。爲末。每服二錢。

用葱白湯下。聖惠方

治小兒痰喘。咳嗽。胸熱。久不

痊。瓜。萎。實一枚。去子。爲末。以寒食

麵和作餅子。炙黃。再研末。每服一

錢。溫水化下。日三服。效乃止。劉

河間宣明方

治婦人夜熱痰嗽。月經不調。

形瘦者。用瓜。萎。仁一兩。青黛。香附

童尿。浸晒一兩五錢。爲末。蜜調。噙

化之。丹溪心法方

治胸痺痰嗽。胸膈微背。心腹

痞滿。氣不得通。及治痰嗽。大瓜。萎

去殼取子。炒熟。和殼研末。麩糊丸。

梧子大。每水飲下二三十丸。日二

三三六

服。杜任方

治胸中痺痛。引背。喘息咳嗽。

短氣。寸脈沈遲。關上緊數。用大栝

樓實一枚。切。薤白半斤。以白酒七

斤。煮二升。分再服。加中夏四兩。更

善。金匱方

治清痰利膈。治咳嗽。用肥大

栝樓洗。取子切焙。半夏四十九箇。

湯洗十次。趙楮等分。爲末。用洗栝

樓水并麩同熬成膏。和丸。梧子大。

每寢湯下三五十九丸。楊文蔚

方

治中風喘斜。用瓜。萎。絞汁。和

大麥麵作餅。炙熟。熨之。正便止。勿

令太過。聖惠方

治熱病頭痛。發熱。進退。用大

栝樓一枚。取瀝。細剉。置盞中。用

熱湯一盞。沐之。蓋定。良久去滓。服

聖惠方

治時疾發黃。狂悶。煩熱。不識

人者。大瓜。萎。實。黃者一枚。以新汲

水九合。浸淘取汁。入蜜半合。朴硝

八分。盡分再服。便溲。綱經方

治小兒黃疸。眼黃。脾熱。用青

瓜。萎。焙研。每服一錢。水半盞。煎七

分。臥時服。五更湯下。黃物。立可名

還黃散。亦治消黃疔。 (普濟方)

①治小便不通。取瓜。用瓜囊格。每服二錢。熱酒下。頓服。以通為度。紹興劉註云。魏明府病此。御醫用此方治之。得效。 (聖惠方)

①治消渴煩亂。黃栝樓一箇。酒一盞。洗去皮子。取風。煎成膏。入白罌末一兩。丸。梧子大。每米飲下十丸。 (聖惠方)

①治燥渴腸秘。九月十月。熟菽。蘆實取。以拌乾葛粉。入銀石器中。慢火炒熟。為末。食後夜臥。各以沸湯點服二錢。 (冠宗爽衍義方)

①治吐血不止。栝樓泥。固煨存性。研三錢。糯米飲服。日再服。 (聖濟總錄方)

①治腸風下血。栝樓一箇。燒灰。赤小豆半兩。為末。每空心酒服一錢。 (普濟方)

①治久痢五色。大熱瓜囊一箇。煨存性。出火毒。為末。作一服。溫酒服之。胡大卿一僕。患痢半年。杭州一道人傳此方而愈。 (本事方)

①治大腸脫肛。生栝樓搗汁。溫服之。以猪肉汁洗手。按之。令暖。自入。 (肘後方)

五 薑 瓜

①治小兒脫肛。唇白齒焦。久則兩頰光。眉赤。唇焦。啼哭。黃瓜囊一箇。入白礬五錢。在內。固濟。煨存性。為末。糊丸。梧子大。每米飲下二十丸。 (摘玄方)

①治牙齒疼痛。瓜囊皮。露蜂房。燒灰。擦牙。以烏柏根。刺柴根。葱根。煎湯漱之。 (危氏得效方)

①治咽喉腫痛。語聲不出。經進方。用栝樓皮。白僵蠶炒。甘草炒。各二錢。半。為末。每調三錢。半。薑湯下。或以綿裹半錢。含。一日二服。名發聲散。 (御藥院方)

①堅齒烏髮。大栝樓一箇。開頂。入青鹽二兩。杏仁去皮尖三七粒。原項合。扎定。蚯蚓泥和鹽。固濟。炭火煨存性。研末。每日搽牙三次。令熱。百日有驗。如先有白髮。拔去。以藥投之。即生黑者。其治口齒之功。未易具陳。 (普濟方)

①治面黑令白。栝樓瓢三兩。杏仁一兩。猪脰一具。同研如膏。每夜塗之。令人光潤。冬月不皴。 (聖濟總錄方)

①治胞衣不下。栝樓實一箇。取子細研。以酒與童子小便各半。盪

煎七分。溫服。無實用根亦可。 (婦人良方)

①治乳汁不下。瓜囊子淘洗控乾。炒香。瓦上翁令白色。酒服一錢。七合。面臥一夜。流出。 (姚氏集驗方)

①治乳癰初發。大熱栝樓一枚。熟搗。以白酒一斗。煮取四升。去滓。溫服一升。日三服。 (子母秘錄方)

①治諸癰發背。初起微赤。栝樓搗末。并華水。服方寸匕。 (梅師方)

①治便毒初發。黃瓜囊一箇。黃連五錢。水煎連服。 (永類鈴方)

①治風瘡疥癩。生栝樓一二箇。打碎。酒浸一日。夜熱飲。 (乾坤秘製方)

①治熱遊丹腫。栝樓子仁末二大兩。醃醋調塗。 (楊氏集驗方)

①治楊梅瘡。小如指頂。遍身者。先服敗毒散。後用此解皮。風熱。不過十服。即愈。用栝樓皮。為末。每服三錢。燒酒下。日三服。 (集簡方)

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 惡乾姜。畏牛膝。乾漆。反烏頭。忌鐵。枸杞為之使。凡脾

胃虛寒。作瀉及無實熱者。禁用。 著名方劑 瓜囊散。治五色痢。久不愈者。 (古方) 用瓜囊一枚。以炭火上煨存性。蓋地上。出火毒。研細末。溫酒服盡。

參攷資料 栝樓生弘農川谷。及山陰地。根入土深者良。生齒地者有毒。二月八月採根。暴乾。三十日成。 (別錄) 所在有之。三四月生苗引藤。葉如甜瓜葉。而窄。作又有細毛。七月開花似蜜。花淺黃色。結實在花下。大如拳。生青。至九月熟。赤黃色。其形有正圓者。有銳而長者。功用皆同。根亦名白藥。皮黃肉白。 (蘇頌) 蘇與蒺藜同。許慎云。木上曰果。地下曰藤。此物蔓生附木。故得兼名。詩云。果臝之實。亦施於宇是矣。栝樓即果臝二字音轉也。亦作蒺藜。後人又轉為瓜囊。愈轉愈失其真矣。古者瓜姑同音。故有深姑之名。齊人謂之天瓜。象形也。雷斅炮炙論。以圓者為栝。長者為樓。亦出牽強。但分雌雄也可。其根作粉。潔白如雪。故謂之天花粉。 (李時珍) 栝樓實。潤燥開結。蕩熱滌痰。夫人知之。而不知

其舒肝。潤肝燥。平肝逆。緩肝急之功。有獨擅也。(王秉衡) 肝燥脇痛。大瓜葉一個。連皮搗爛。粉甘草二錢。紅花七分。水煎服。按火鬱日久。肝氣燥急。不得發越。故皮膚起。泡轉為脹痛。經云。損其肝者。緩其中。瓜葉為物。甘緩而潤。於鬱不逆。又如油之洗物。滑而不滯。此其所以奏功也。(便易經釋集) 瓜葉今之通稱。本經別錄俱作括樓。爾雅則作栝樓。釋草。果。瓜。之。實。栝樓。毛詩。果。臝。之。實。傳。云。果。臝。栝樓也。說文則作栝葉。云。栝。葉。果。臝。也。呂氏春秋。王善生。高誘註云。善。或作瓜。瓜。臝。也。(壽頤按。呂覽。善。字乃栝字之誤) 郝懿行爾雅義疏曰。臝。當為臝。栝。樓。當為栝。葉。皆假借也。說文在木曰果。在地曰臝。苦。葉。實。二名。李瀕湖本草綱目謂此物。莖。生。附。木。故。得。名。栝。樓。即果。臝。二。字。音。轉。亦。作。臝。後。又。轉為。瓜。葉。愈。轉。愈。失。其。真。矣。壽。頤。按瀕湖之說。固是。然。玉。篇。云。苦。葉。齊人。謂。之。瓜。葉。可。知。瓜。葉。之。稱。亦。舊。惟。臝。字。則。玉。篇。在。後。收。字。中。曰。臝。土。瓜。也。知。臝。二。字。確。為。最。後

之草生。非漢魏時之所固有。今攷桐藤。直。竅。發。於。蔕。名。曰。甘。直。色。青。其。狀。如。穀。實。臝。而。甲。乙。十。一。卷。則。作。瓜。葉。亦。可。為。今。本。經。權。晚。出之。明。證。也。壽。頤。嘗。聞。前。者。吾。吳。藥肆。有。瓜。葉。子。與。栝。樓。子。兩。種。之。別。其。所。謂。栝。樓。子。者。有。斑。駁。文。約。如苦。瓜。子。形。與。瓜。葉。子。絕。異。蓋。不。知是何。物。之。子。同。光。間。有。某。鎮。台。家人。服。藥。醫。方。中。有。栝。樓。子。市。肆。送以。有。斑。駁。者。與。之。而。某。鎮。固。知。栝樓。即。瓜。葉。之。別。稱。見。之。以。為。有。誤。傳。肆。中。人。問。之。則。以。市。上。瓜。葉。子栝。樓。子。本。非。一。物。為。對。某。鎮。又。問子。既。不。同。則。設。有。醫。生。用。栝。樓。根。市。上。又。將。有。何。種。之。別。而。肆。中。人乃。謂。止。有。天。花。粉。一。種。某。鎮。遂。謂市。肆。故。意。欺。人。發。縣。管。費。二。百。板。自。是。以。後。市。間。遂。不。復。有。栝。樓。子之。發。售。是。亦。可。備。藥。物。界。中。一。則故。事。其。所。謂。栝。樓。者。頭。管。問。市。肆而。親。見。之。與。苦。瓜。子。亦。復。不。同。苦。瓜。子。扁。方。有。稜。一。端。有。類。方。勝。而所。謂。栝。樓。子。者。形。亦。橢。圓。絕。無。稜角。真。不。知。是。何。果。蔬。之。實。也。(張山。雷)

【瓜葉皮】 主治 利膈寬胸。除痰寧嗽。解皮膚風熱。性實 酸寒無毒。

【瓜葉莖葉】 主治 中熱傷暑。性實 酸寒無毒。

【瓜葉實】 即瓜葉仁之處方用名。詳「瓜葉仁」條。

【瓜藤】 性質 甘涼無毒。主治 諸熱毒瘡。同刺絡茶。洗去粗皮。焙研。等分。用甘草水調貼之。

【瓜蘆】 即鼻蘆之古籍別名。典見本草集註。詳「鼻蘆」條。

【瓜練】 即冬瓜練之原名。詳「冬瓜練」條。

【瓦衣】 即屋遊之古籍別名。典見綱目。詳「屋遊」條。

【瓦松】 原名 昨葉何草。命名 本品如松子作屏。故名。

古籍別名 瓦花。向天草。天王鐵塔草。赤者名鐵脚婆羅門草。(本草綱目) 瓜蓮華(日本)

外國名詞 Coptelona Jap. Ponia, Maxim. (拉丁) ツメレンゲ(日本)

基本 係景天科石蓮華屬。葉用瓦松之莖葉。

產地 生於溫帶熱帶諸地之屋瓦間及深山石罅中。

形態 瓦松為苔草類之寄生植物。葉厚細長而尖。多數相重。遠望如松。夏月葉心抽莖。高四五寸。花成穗狀。色淡紅。

採取 六月七月採苗。日乾用。性質 酸平無毒。

主治 口中乾痛。水瀉。血痢。止血。

歷代記述攷證 【宋】馬志重定新本草論瓦松曰。生眉髮。背為要藥。【宋】蘇頌圖經本草論瓦松曰。行女子經絡。【明】李時珍本草綱目論瓦松曰。大腸下血。燒灰水服一錢。又塗諸瘡不斂。

參攷資料 按庚辛玉冊云。向天草。即瓦松。陰草也。生屋瓦上。及深山石罅中。莖如漆圓鏡。葉背有白毛。有大毒。燒灰淋汁。沐髮。髮即落。誤入目。令人昏。搗汁。能結草砂。伏雌雄砂。白礬。其說與本草無涉。及生眉髮之說相反。不可不知。(李時珍)

【瓦花】即瓦松之古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。②即景天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『景天』條。

【瓦屋子】即瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳『瓦楞子』條。

【瓦苔】即屋遊之古籍別名。典見嘉佑補註本草。詳『屋遊』條。

【瓦粉】即白粉之古籍別名。典見湯液本草。詳『白粉』條。

【瓦雀】即雀之古籍別名。典見綱目。詳『雀』條。

【瓦楞子】命名 本品殼面似屋之瓦。故名。

處方用名 瓦楞子。蚶子殼。

古符別名 魁蛤。魁陸。(別錄)蚶。射天。空。慈。子。伏。老。蜜。丁。(本草綱目)毛蚶。(俗名)瓦屋子。(嶺表錄)

基本 係軟體動物介屬蚌蛤類。無管類。與同柱類。藥用魁蛤之壳。

產地 瓦楞子產廣東新安平海汕尾者佳。棲於近陸之淺海泥中。凡江海鹹水中恒有生長。形體 按魁蛤光厚而堅硬。稍

五蠶 瓦

呈三角形。兩殼膨起。左右同形。表面有壘如瓦。稜。數約三四十。皆由殼嘴而散射。表皮薄為鱗片狀。殼頂略相接。近殼合部之外面。有外刺。較合面更有齒。二對。平直。各齒在兩端者粗而疎。在中央者密而小。殼外面淡褐色。殼內乳白色。肉柱不同形。外套膜線亦不彎曲。鰓皆黃色。而兼微赤。殼緣為鋸齒狀。殼長約五分至一二寸。產卵在六月至九月。生殖器雌者紅色。雄者黃色。孵化後。約三年而成熟。殼外常有突起者。此非殼之本質。乃附生於殼上之一種甲殼類。名曰藤壘者是也。魁蛤又可用人工種殖者。種殖此蛤之砂場曰蚶田。

種類 殼面多生細毛者曰毛蚶。殼小紋細。形如蓮子而扁者謂之珠蚶。

製法 凡用取陳久者。炭火煨赤。米醋淬三度。出盡火毒。研粉。

性質 甘。鹹。平。無毒。

效能 散血塊。消痰癖。用作祛痰藥。又為軟堅解凝藥。

主治 痿痺。洩痢。便膿血。

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡無癥結痰積者禁用。

歷代記載攷證 【宋】日華諸家本草論瓦楞子曰。燒過醋淬。醋丸服。治一切血氣冷氣。癥癖。【元】朱丹溪本草衍義補遺論瓦楞子曰。消血塊。化痰積。【明】李時珍本草綱目論瓦楞子曰。連肉燒存性。研傅小兒走馬牙疳有效。【清】黃宮繡本草求真論瓦楞子曰。瓦楞子即今所謂蚶子殼者是也。味鹹而甘。性平。故多主消血化痰除血。為婦人積塊癥瘕。治男子痰癖積聚要藥。是以昔人有云。此與魁甲。蠶蟲同為一類。皆能消癥除積。但蠶蟲其性最迅。此與魁甲其性稍緩耳。煨紅醋淬三次用。【清】楊時泰本草述鈞元論瓦楞子曰。蚶之肉甚甘。甘能和血。殼甘而兼以鹹。平。其效當更甚於諸殼之俱有鹹味者。

參攷資料 魁蛤一名伏老。說文云。老伏翼化為魁蛤。故名伏老。【蘇頌】魁者。羹斗之名。蛤形肖。故名也。蚶味甘。故從甘。案嶺表錄云。廣人重其肉。炙以荐酒。呼為

天爵。廣人謂之蜜丁。名醫別錄云。一名活東。誤矣。活東。蚶也。見爾雅。【李時珍】瓦楞子。鹹。走血而輕堅。故能消血塊。散痰積。【李時珍】

【瓦甌】命名 瓦甌者。炊具也。以瓦為之。故名。

主治 癡寐不寤。取覆人面。疾打破之。

參攷資料 黃帝始作甌釜。北人用瓦甌。南人用木甌。夷人用竹甌。衛家云。凡甌鳴釜鳴者。不得驚怖。但男作女。拜女作男。拜即止。亦無殃咎。類從相感志云。瓦甌之契。投桌自止。注云。取甌書契字。置牆上有。桌鳴時投之自止也。【李時珍】

【瓦壘子】即瓦楞子之處方用名。詳『瓦楞子』條。

三三九

【瓦楞子肉】性質 甘。平。無毒。

主治 痿痺。洩痢。便膿血。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論瓦楞子肉曰。心存冷氣。腋脊冷風。利五臟。健胃。令人能食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

曰。溫中。消食起陽。【宋】日華諸家本草論瓦楞子曰。益血色。

參攷資料 ①凡食訖。以飯壓之。否則令人口乾。【蕭梅】②魁蛤肉潤五臟。止消渴利關節。服丹石人宜食之。免生瘡腫熱毒。【張鼎】③炙食益人。過食則壅氣。【李時珍】

【瓦礫斑】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【瓦蘇】即屋遊之古籍別名。典見綱目。詳「屋遊」條。

【甘瓜】即甜瓜之古籍別名。典見唐本草。詳「甜瓜」條。

【甘石榴】性質 甘。酸。溫。瀉。無毒。

主治 咽喉燥渴。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論甘石榴曰。解理乳石毒。【明】李時珍本草綱目論甘石榴曰。制三尸蟲。

參攷資料 ①甘石榴多食損人肺。【別錄】②多食損齒令黑。凡服食藥物人忌食之。【孟詵】

【甘竹根】主治 煮汁服。安胎。止產後煩熱。

【甘杞子】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【甘松】原名 甘松香。命名 本品產川西松州。其味甘而氣香。故名。後世簡稱爲甘松。

古醫別名 苦彌哆。【金光明經】。厨男。人身香。【和漢藥考】。發里里安。【西名】

外國名詞 Valeriana officinalis, L. (拉丁) Spikenard (英)

基本 屬敗醬科。藥用甘松之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。甘松產四川松洋縣。江油縣。龍安府。茂州等。四季有出。萬國藥方卷三。四十七篇細詳。和漢藥考曰。產東印度。爪哇。中國四川省。日本不產此。

形態 甘松爲外部灰褐色。長三四寸。粗二三分許之地下莖。二葉對生。以殘痕成爲關節。或有副根。莖根稍屈曲。生有多數鬚根。適如蝦狀。謂之蝦狀甘松。販賣品將其浸水去土質。由此選出初生根。

名小蝦印。爲上品。其混合舊根與鬚根者。爲下品。一說名蝦狀甘松者。爲 Nardus indica 根。名葉甘松者。爲 Nardus Colica 之葉云。

採取 八月採之。

製法 凡使須以其根形長微歪。一端多鬚如蝦狀者。晒乾入藥用。

性質 甘。溫。無毒。

曰。甘松香甘溫無毒。主下氣。治心腹痛。浴體令香。辟惡氣。【海】黃宮積本草求真論甘松曰。甘松甘溫無毒。考書俱載芳香升氣。功能醒脾開鬱。凡因惡氣卒中而見心腹

痛滿。風疝尙盛者可用。白芷並附子並用。若脚氣膝腫。煎湯淋洗。此雖有類山柰。但山柰多辛膩。此則甘多於辛。故書載能入脾開鬱也。出涼州。葉如芳根。緊密者佳。此屬草部。而與松木松香不同。【清】楊時泰本草述鈞元論甘松曰。海威以甘松理元氣而去氣鬱。似不徒芳香擅醒脾之功。開準繩治澀血。方以桑寄生爲君。熱地。茯苓爲臣。而茲味逐隊爲佐。且云此方處劑乃補夫血之乘虛而妄行者。是茲味之爲元氣地。初不外於陽生陰中。籍之斡旋以俾流行也。豈僅香能醒脾而已哉。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論甘松曰。黑皮野雞。治風疝齒齲。野雞痔。得白芷附子良。【元】王好古湯液本草論甘松曰。理元氣。去氣鬱。【明】李時珍本草綱目論甘松曰。脚氣膝浮。煎湯淋洗。【明】李士材本草圖解論甘松

主治 惡氣。風疝。齒齲。卒心腹

痛滿。下氣。

國外學說 第四版改正日本藥局方云。根草根 (Raiisoms Valerianae) 者。以本國產 Valeriana officinalis, L. var latifolia, Miq. 之地下莖與根。

俱採取晒乾用之。略述如下。此藥

爲灰褐色之根莖。長一·五仙米。粗一仙米。上端帶萌芽或餘莖。旁遠歧生之走根或餘莖。及多數之根。根粗三密米。長二特西米。突。根莖之斷面。類似角質。有成自稍明。石核細胞之斑點。髓部有空洞。走根之斷面。因新生組織。與接近之暗色線。顯分皮部與木質之界限。脈管束數個。沿暗色線而散存。髓部有特異之石核細胞。根之橫斷面。現暗褐色。木質狹於皮部。遠甚。以顯微鏡檢之。見上皮細胞。延長而爲根毛。上皮細胞下。含有揮發油。木質與皮部之隔分。在於一層之內。木質。皮部之柔細胞。直徑有○·○二密米。澱粉粒充滿其間。此藥有特異之臭氣。味微苦。荷蘭藥鏡曰。此草有野生園生狹葉闊葉二種。自生山野之狹葉者。效力尤峻。根之臭氣。宜透。微帶貓尿臭。大如小指。卷縮多細鬚。園生者。效力較遜。根爲揮發衝動令人強壯之主藥。凡腦神經及心胃運動衰弱者。此藥能使其健達。失氣昏迷者。能令其蘇醒。諸脈管之營運。虛弱懈弛者。能揮發衝動之而復

其強健。兼能發熱氣及汗。利小便。治遲延任之神經病。與神經運動失常之熱病有特效。以之代攝爾扁答良。用於虛癯之熱病。能使其精力活潑。充盈。鎮定痙攣之運動。有神經熱。欲淨刷其胃腸者。用此藥。效迅速。此藥鎮痙之效。既甚偉大。故凡神經易受感觸。動發搐掣諸病之人。或虛癯特甚。搐掣頻發之人。用之尤驗。又並無病毒。惡液。滯滯爲患。而發虛弱之神經病。內服此藥。無不穩妥。無顯著之原因。而發尋常之病。此藥累經治愈。亦有他藥無效。必用此藥始愈之癰症者。惟多血及患癩衝性之症。用之爲有害耳。此藥能殺蚊蟲。故凡因蟲而發之癰症。服之亦佳。又患疥癩諸症。及因此而發之搐掣。或黑障眼。數數治愈。(疥癩。係蟲。服繭草根時。兼用下劑。頗效。)患在再之神經病。神經虛弱之子宮衝逆。因痙攣運動而發之喘急。痛腹。痛偏頭痛。寒黏液性之卒倒昏睡。頭眩。眩暈等症。用之亦妙。患上述之神經病。雖感觸甚。而精力不現。虛乏之象者。服此藥少許。便能見

效。若感觸鈍。而又確然虛衰者。雖多量亦能任之。共有一日可服至一兩半者。腹部諸臟衰弱。黏液滯滯。飲食難消化者。如在婦人。多因月經停滯而然。此藥殊效。更兼痙攣性疼痛症者。尤爲確當。因神經虛損而眼力疲弱。或患星翳。以此內服。或水煎蒸湯。俱有效。患劇及諸神經病。每服繭草根末一分半至一錢。一日數次。或加桂。麝香等香竄藥。及加耶普的油。尤良。小兒搐掣。用此末一錢。浸劑。須以二錢至四錢。浸水十六兩用之。但功效遠不及散劑。煎劑。以藥一兩。入水八兩。煎至六兩服之。或加對症之神經藥。連服一晝夜。易受感觸之人。每服祇可少許。若一頓多服。動輒惡心嘔吐。

近人學說 張山雷曰。近東瀛醫家。謂此藥善通經絡。專治轉筋。爲霍亂轉筋必需之要。頗自定霍亂藥酒方。用伊打和酒精。浸取濃汁。合姜附英。連諸味。治真寒霍亂。轉筋入腹。危急重症。極有捷效。知此物溫運。活絡通經。無出其右。此固向來治藥物學者之所未知者也。

配合應用 勞瘵煎法。用甘松六兩。玄參一斤爲末。每日焚之。(奇效方)

治風疔蟲牙。蝕肉至盡。甘松賦粉各二錢半。煎香半兩。豬腎一對。切炙爲末。夜漱口後貼之。有涎吐出。(聖濟總錄方)

治腎虛齒痛。甘松、硫黃等分爲末。泡湯漱之。神效。(經效濟世方)

治面黧風痛。香附子、甘松各四兩。黑牽牛半斤爲末。日用洗面。(婦人良方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡氣虛血燥及無溼滯者。禁用。

考攷資料 廣志云。甘松出姑蔑涼州諸山。細葉。引莖叢生。可合諸香及囊衣。(馬志) 甘松芳香。能開脾胃。少加入脾胃藥中。甚醒脾氣。杜寶拾遺錄云。嘉禪師妙醫術。作五香飲。更加別藥。止渴兼補益最妙。一沈香飲。二丁香飲。三檀香飲。四澤蘭飲。五甘松飲是也。(李時珍)

五靈甘

【甘家白藥】

形態 甘家白藥為莖草類之一種。葉如車前。根如牛夏。其汁如蜜。

性質 苦。大寒。有小毒。
主治 解諸藥毒。水研服即吐出。未盡再服。

參攷資料 甘家白藥性冷。不宜輕服。嶺南多毒物亦多解毒物。
(陳藏器)

【甘根】即白芨之古籍別名。典見本經。詳「白芨」條。

【甘海苔】即紫菜之日本名。詳「紫菜」條。

【甘茶】即土常山之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「土常山」條。

【甘除根】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎杖」條。

【甘草】

命名 本品味甘故名。而諸藥中以之為君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。功能調和諸藥。遂有國老之稱號。

處方用名 生草。生甘草。炙草。炙甘草。清炙草。粉草。粉甘草。草稍。甘草節。草節。甘草節。

古籍別名 國老。靈草。蔞草。(別錄) 美草。蜜草。蜜甘。(別錄) 草古。(古籍通用簡名) 汾草。(本草原始) 靈通。(記事珠)

學名 *Glycyrrhiza glabra*, L. var. *glaberrima*, Wald et Kitai's *Glycyrrhiza echinata*, L.

外國名詞 *Radix Liquiritiae*

(拉丁) *Süssholzwurzel* (德) *Liquorice Koot*. (英) *カンザウ* アマキ アマクサ (日本)

基本 甘草為山草類。屬豆科之多年生草。中國藥所用甘草為

Glycyrrhiza glabra L. var. *glaberrima* of *Radix Liquiritiae* 之根及走根。

產地 產於蒙古、四川、陝西、福州等處。南方亦有產。此陳仁山藥物生產辨云。甘草產內蒙古。俗稱王爺地。此處地廣人稀。每年收穫由山西雇工人去掘採。自正月收至清明前後十五天內完場。清明節後萌芽。不能再掘採。俱野生。

形態 按甘草多為人所栽植之宿根草。春季從宿根生苗。高二三尺。葉互生。為羽狀複葉。小葉作長卵形。葉莖俱有毛茸。夏秋間於葉腋開淡紫色蝶形花。花後結莢實。本品為粗三四分。長三尺許之鞭狀根。表面有縱皺。呈灰褐色。內面呈黃色。截斷面作長纖維狀。直根無鬚。橫生根則作五角形。味至甘。



甘草

採取 二月八月採根暴乾。

製法 雷欽曰。凡使甘草須用酒浸。蒸從巳至午。取出暴乾。剉細用一法。每斤用酥七兩。塗酥。盡為度。又法。先炮令內外赤黃。用李時珍曰。方書炙甘草。皆用長流水。瀝炙之。至熱刮去赤皮。或用漿水炙熱。未有酥炙酒蒸者。大抵補中宜炙用。瀉火宜生用。(生用能清火。炙用可補中。)

性質 甘平。無毒。

成分 甘草之主要的成分為 $C_{42}H_{64}O_{16}$

三四二

$\text{Traubzucker } C_6H_{12}O_6 \cdot H_2O$, $\text{Asparagin } C_4H_8(NH_2)COOH$, $CONH_2$ 此外含有一種辛辣性軟脂「阿斯巴拉精」(Asperagin) 餘為纖維樹脂灰水。又有另一化驗之報告。謂甘草之主要成分為甘草糖 (Glycyrrhizin) 即

甘草糖酸之安莫尼亞鹽類。屬於配糖質。依近來之研究。謂與鉀及鈣相結合存在之 $Glycyrrhizinsäure$ 之 $Diglycyrrhizinsäure$ 也。其含量為六—八%。

效能 清熱。解毒。和藥。補虛。並為專治瘡瘍癰毒以及貧血之藥。入胃後。與胃液起作用。而分出葡萄糖。及甘草糖。可使唾液分泌增加。至腸能激腸之蠕動。使大便緩下。半由腸壁吸入血中。能促進全身細胞。新陳代謝作用。同時咽喉部之分泌亦增。易使痰沫附着而咳出。且可免除久嗽咽喉之燥感。本品有此種種作用。故專用以為矯味及祛痰和緩等藥。

主治 五臟六腑。寒熱邪氣。擊筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡。癰疽。解毒。(本經) 溫中下氣。煩滿短氣。傷風

咳嗽止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。(別錄)

張仲景之發明 甘草一藥。配

入方中。經張仲景之實驗。認為能治寒急。急痛。暴急。厥冷。煩躁。衝逆等諸般。道急之毒。考徵如下。①芍藥甘草湯證曰。脚掣急。②甘草乾姜湯證曰。厥中乾。煩躁。③甘草瀉心湯證曰。心煩。不得安。④生薑甘草湯證曰。咽燥而渴。⑤桂枝人蓂湯證曰。利下不止。⑥甘麥大棗湯證曰。腹燥喜悲。傷欲哭。⑦甘草湯證曰。咽痛者。⑧桂枝甘草湯證曰。又手自冒心。⑨桂枝甘草龍骨牡蠣湯證曰。煩躁。⑩四逆湯證曰。四肢拘急。厥逆。⑪甘草粉蜜湯證曰。令人吐涎。心痛。發作有時。毒藥不止。⑫蒼桂甘蜜湯證曰。臍下悸。⑬蒼桂五味甘草湯證曰。氣從小腹上衝胸咽。⑭小建中湯證曰。裏急。⑮半夏瀉心湯證曰。心下痞。⑯小柴胡湯證曰。心煩。又云。胸中煩。⑰小青龍湯證曰。咳逆倚息。⑱黃連湯證曰。腹中痛。⑲人蓂湯證曰。逆搶心。⑳旋覆花代赭石湯證曰。心下痞硬。噫氣不除。㉑烏頭湯證

五薑 甘

曰。疼痛不可屈伸。又云。拘急不得轉側。⑳調胃承氣湯證曰。不吐不下。心煩。㉑桃核承氣湯證曰。其人如狂。又云。少腹急結。㉒桂枝加桂湯證曰。奔豚。氣從少腹上衝心。㉓桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯證曰。驚狂。起臥不安。歷觀上諸方。無論急迫。其他曰痛。曰厥。曰煩。曰悸。曰咳。曰上逆。曰驚狂。曰悲傷。曰痞硬。曰利下。皆甘草所主。而有所急迫者也。仲景用甘草也。其急迫劇者。則用甘草亦多。不劇者。則用甘草亦少。由是觀之。甘草之治急迫也明矣。古語曰。病者苦急。急食甘以緩之。其斯甘草之謂乎。仲景用甘草之方甚多。然其所用者。不過前證。故不枚舉焉。凡微多而證明者。不枚舉其微。下皆做之。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論甘草曰。甘草主腹中冷痛。治驚癇。除腹脹滿。補益五臟。腎氣內傷。令人陰不痿。主婦人血澀腰痛。凡虛而多熱者。加用之。【唐】孫思邈千金方論甘草曰。甘草解百藥毒。如湯沃雪。如中烏頭巴豆毒。甘草入腹即解。驗如反掌。古稱

大豆汁。解百藥毒。試之每不效。予加甘草為甘豆湯。其效乃奇。【宋】日華子諸家本草論甘草曰。甘草安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。驚悸煩悶。健忘。通九竅。利百脈。益精養氣。壯筋骨。【金】張元素素珠養論甘草曰。甘草稍生用。治胸中積熱。去壅中痛。【元】王好古湯液本草論甘草曰。五味之用。苦泄。辛散。酸收。鹹潤。下而斂。甘上行而發。而本草言甘草下氣何也。蓋甘味入中。有升降浮沉。可上可下。可外可內。有和有緩。有補有瀉。居中之道盡矣。仲景附子理中湯。用甘草恐其僭上也。調胃承氣用甘草。恐其速下也。此緩之之意。小柴胡有柴芩之寒。參半之溫。用甘草和之。建中湯用之。以補中而緩脾急。鳳髓丹用之。以緩腎急而生元氣。乃甘補之意。又能引諸藥直至病所。以甘味入脾。隨其所喜。此升降浮沉之理也。【元】李東垣用藥法象論甘草曰。甘草生用。洩火熱。熟用散表寒。去咽痛。除邪熱。緩正氣。養陰血。補脾胃而潤肺。又曰。甘草氣薄味厚。可升可降。陰中陽也。陽不

足者補之。以甘。甘溫能除大熱。故生用則氣平。補脾胃不足。而大瀉心火。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。除邪熱。去咽痛。緩正氣。養陰血。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急縮者。宜倍用之。其性能緩急。而又協和諸藥。使之不爭。故熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。寒熱相雜者。用之得其平。【元】朱丹溪本草衍義補遺論甘草曰。甘草顧生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血。消腫導毒。【明】李時珍本草綱目論此藥曰。甘草解小兒毒。降火止痛。又曰。甘草外赤中黃。色象坤離。味濃氣薄。資全土德。協和羣品。有元老之功。普治百邪。得王道之化。可謂藥中之良相也。【明】穆希雍本草經疏論甘草曰。甘草味甘。氣平無毒。正氣土中沖和之陽氣以生。故別錄稱之為九土之精。主五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨者。以其得土中沖陽之氣。味甘平。性和緩。故能解一切毒氣。安臟腑。除邪熱也。五臟之寒熱邪氣既解。則臟氣和而真氣生。氣日以盛。故筋骨堅長。肌肉倍力者。甘能益脾。脾

五畫 甘

主肌肉。兼主四肢。脾強則四肢生力。故長肌肉倍力也。主金瘡腫者。甘入血分而能緩中。且傷則熱。熱而後腫。甘溫益血而除熱。煩熱解。故腫散也。溫中下氣者。甘味屬土。土位乎中。故溫中。甘能緩中散結。故下氣。煩滿短氣者。是勞傷內乏。陽氣不足。故虛而煩滿短氣。甘溫能益血。除大熱助氣。故煩滿短氣。竝除也。甘平且和。能理傷。故治傷。傷則肺。甘氣上逆。嗽乃肺病。甘以緩之。故治咳嗽。血不足則內熱。內熱則津液衰少而作渴。甘能入脾。益血。故止渴。血虛則經脈不通。能益血。則經脈自通矣。甘能益血而溫氣分。故利血氣。其解一切金石草木蟲魚禽獸之毒者。凡毒遇土則化。甘草為九土之精。故能解諸毒也。久服輕身延年者。為其益血安和五臟也。〔清〕黃宮繡本草求真論甘草曰。甘草味甘性平。質中。外赤肉黃。生寒熱。昔人言其有火能消。是因火性急迫。用此甘味以緩火勢。且取生用性寒。以消焚燬害耳。至書有云。灸用補脾。是能緩其中氣不足。調和諸藥不爭。故

入和劑則補益。入涼劑則消熱。入汗劑則解肌。入峻劑則緩正氣。入潤劑則養血。并能解諸藥毒。及見胎毒。以致尊為國老。然使脾胃虛寒。及或挾有水氣。脹滿等症。服此最為不宜。未可云其補脾。而凡脾胃虛寒。皆可得而服也。若使滿屬虛致。則甘又能消滿。不可不知。稍止莖中溢痛。節消癰疽。及除胸熱。功各有宜。但用宜取大而且結。至書所載。甘反大戟。芫花。甘遂。又云亦有並用不悖。惟深達精微者。始可知之。〔清〕鄒樹本經疏證論甘草曰。甘草春苗夏葉。秋花冬實。得四氣之全。其色之黃。味之甘。迥出他黃與甘之上。以是協土德和衆氣。能無處不到。無邪不祛。此所謂主五臟六腑。寒熱邪氣也。土為萬物母。凡物無論妍媸美惡。莫不生於土。及其敗也。又莫不歸於土。化為生生之氣。則所謂能解百藥毒。安和七十二種石。千二百種草。也。人之氣。猶物之氣。和順者。其妍美也。急疾者。其媿惡也。蓋化急疾為和順。經脈自然通調。血氣自然滑利。於是肌骨堅。筋肉長。氣力

倍矣。特甘性緩。甘彌甚者。緩亦彌甚。凡一身之氣。因急疾為患者。能調之縱弛。而阻滯者。非所宜也。傷寒論。金匱要略。兩書中。凡為方二百五十。用甘草者。至百二十方。非甘草之主病多。乃諸方必合甘草。始能曲當病情也。凡藥之散者。外而不內。〔如麻黃。桂枝。青龍。柴胡。葛根等湯。〕攻者。下而不上。〔如調胃承氣。桃仁承氣。大黃。甘草等湯。〕溫者。燥而不濡。〔四逆。吳茱萸等湯。〕清者。冽而不和。〔白虎。竹葉。石膏等湯。〕雜者。寒而不膩。〔諸瀉心湯。烏梅圓等。〕毒者。暴而無制。〔烏梅湯。大黃蟻蟲丸等。〕若無甘草調劑其間。遂其往而不返。以為行險僥倖之計。不異於破釜沈舟。可勝而不可不勝。詎誠決勝之道耶。或謂甘草解毒。恐即是和藥性之一端。雖亦有是理。然其中別有精妙。非和藥性所能盡者。如前所謂凡物無論美惡。入土即化者。此其一也。金匱要略云。凡諸毒。多是假毒。以損元。知時宜。黃甘草。齊芫汁。飲之。適治諸藥毒。思可徐氏謂一錢之毒。何能殺人。乃假

些微毒氣。滲入元氣。反為毒氣。作使。至不可療。所謂星星之火。勢極燎原也。雖然。補元氣之物多矣。必取甘草者。則以上文云。凡養藥。飲汁以解毒。雖云救急。不可熱飲。諸毒病。得熱更甚。宜冷飲之。既欲其甘。緩元氣之急。又欲其涼。不使助毒。舍甘草其何從。此又其一矣。予嘗治一人。暑月煩懣。以藥搗鼻。不得。悶極。遂取藥四五錢。七服之。煩懣益甚。昏不知人。不能語言。蓋以藥中有生南星。生半夏等物也。予謂南星。半夏之毒。須得薑汁。乃解。盛暑煩懣。烏可更服薑汁。勢必以甘草解之。但甘草味極甘。少用則毒氣不解。服至一二錢。即不能更多。因以甘草一斤。蒸露飲之。飲盡而病退。是知孫真人云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。不我欺也。金創之為病。既傷。則患其血出不止。既合。則患其腫壅為膿。今日金創腫。則金創之腫而未膿。且非不合者也。千金方治金創。多係血出不止。箭鏃不出。故所用多雄黃。石灰。草灰等物。不重甘草。惟金匱要略。王不留行散。王不留行。蒺藜。細葉。桑

卓南根。皆用十分。甘草獨用十八分。餘皆更少。則其取意。正與本經陶合矣。甘草所以宜於金創者。蓋暴病則心火急疾赴之。當其未合。則迫血妄行。及其既合。則瘀結無所泄。於是自腫而膿。自膿而潰。不異於癰疽。其火勢鬱結。反有甚於癰疽者。故方中雖已有桑皮之續。絕合創。王不留行之貫通血絡者。率他藥以行經脈。貫營衛。又必君之以甘草之甘緩解毒。瀉火和中。淺視之。則曰急者制之以緩。其實泄火之功。爲不少矣。金創血病。血病不多用血藥。反以氣藥爲君。則以氣固血之帥。血去氣隨。則陽隨陰。陰陰爲陽潰而死矣。方下血而用王不留行。則血遂不可止。已成膿而用川椒乾薑。則痛不可忍。不後不先。正當金創腫時。而用是方。此仲景深入本經。非他人所能及者也。甘草之用生用炙。確有不同。大率除邪氣。治金創。解毒。皆宜生用。緩中補虛。止渴。宜炙用。消息意會之可矣。炙甘草之任。莫重於復脈湯。其用在通經脈。利血氣。可無論矣。而金匱要略附千金翼方。治

虛勞不足。汗出。則悶。蟻結悸。行動如常。非所謂煩滿短氣乎。又附外臺方。治肺痿。涎唾多。心中溫。溫液液者。非所謂傷臟咳嗽乎。特脈之動而中止。不能自還。因而復動者。有三。曰代。曰結。曰促。解之者。曰蠲數而止。謂之促。緩而止。謂之結。止有定時。謂之代。乃炙甘草湯。但治結而不治代。促。其義何居。曰此非甘草不治代。促。乃非治代。促之湯也。觀論中桂枝去芍藥湯證。促胸滿。芫根黃連黃芩湯證。促促下利。下後欲解證。蠲促不結胸。皆不忌甘草。即可知其旨不在甘草矣。【清】汪昂本草備要論本品曰。甘草有補有瀉。能表能裏。可升可降。味甘。生用氣平。補脾胃。不足而瀉心火。炙用氣溫。補三焦元氣而散表寒。入和劑則補益。入汗劑則解肌。入涼劑則瀉邪熱。入峻劑則緩正氣。入潤劑則養陰血。能協和諸藥。使之不爭。生肌止痛。通行十二經。解百藥毒。故有國老之稱。中滿證忌之。大而結者。良補中。炙用。瀉火生用。達莖中。腎莖用。梢。梢止莖中痛。淋濁證。白朮。苦參。

乾漆爲使。惡遠志。反大戟。芫花。甘遂。海藻。然亦有並用者。昂按。甘草之功用如是。故仲景有甘草湯。甘草芍藥湯。甘草茯苓湯。炙甘草湯。以及桂枝麻黃葛根。青龍。理中。四逆。調胃。建中。柴胡。白虎等湯。無不重用甘草。贊助成功。卽如後人益氣。補中。瀉火。解毒。諸劑。皆倚甘草爲君。必須重用。方能建效。此古法也。奈何時師。每用甘草。不過二三分而止。不知始自何人。相習成風。牢不可破。殊屬可笑。附記於此。以正其失。【清】陳修園本草經讀論甘草曰。物之味甘者。至甘草爲極。甘草主脾。脾爲後天之本。五臟六腑。皆受氣於脾。脾之本氣。則爲正氣。外來寒熱之氣。則爲邪氣。正氣旺。則邪氣自退也。筋者。肝所主也。骨者。腎所主也。肌肉者。脾所主也。氣者。肺所主也。力者。心所主也。但使脾氣一盛。則五臟皆循環受益。而得其堅之長之倍之之效矣。金瘡者。乃刀斧所傷。而成瘡。瘡甚而腫。脾得補而肉自滿也。能解毒者。如毒物入土。則毒化也。土爲萬物之母。土健則輕身延年也。

國外學說 日本學說謂漢醫以甘草爲諸藥之君長。解一切金石及草木之藥毒。且能調和諸藥。故有國老之名。日本普通用爲丸劑之配伍料。或爲調味料。其製劑爲甘草燕（尋常越幾斯）及甘草越幾斯。皆爲調味配伍之用。又日本藥局方曰。甘草係採集甘草之根。剝離其抱皮。晒乾者。本品之木部及皮部。作放線狀而鬆疎。木化部分作黃色。有特異甘味。又本草綱目啓蒙曰。甘草有同名。茶簕。甘藤。亦名甘草。中國產甘草。以南京者爲上。福州者次之。蓋福州者大而不實。南京者細小而潤。有一種名 Yohim。外皮有縱行小皺紋。可擇其緊實者用之。凡甘草不論根之大小。以外皮薄肉色深黃者爲佳。若根雖大而皮厚肉色淺而輕虛。或經蟲蛀。或朽而帶黑色者。俱不堪用。本經逢原云。中心黑者。有毒。勿用。市人名根之最細者。爲鷓手。或鷓草。爲下品之稱。擇形狀歪斜。有節者。判售之。謂之 Yohim。折碎者。謂之折甘草。朝鮮甘草味太甜。紅毛甘草大而

五畫 甘

味美。惟性較劣。今日本所植者有南京、福州二種云。英美學說謂甘草產中國歐羅巴等處。高約四尺。其根可為藥品。或地面下之幹亦可入藥。以其味甜。故名甘草。古人知甘草不一種。不獨阿刺伯人用之。即東方各國亦常用之。產之最多者為印度木耳丹。至英國亦種積之。有一種甘草。俗名俄羅斯甘草。在希臘國與俄羅斯常見此種。即至中國之北與滿洲亦俱有之。又有數種產於阿富汗者。從該處有甘草根運至印度出售。西國所用甘草。在米粹末種之甚多。於生長四年之後。則用大叉挖起其根。排成大堆以待用。每一英畝。一按一英畝。即四萬三千五百六十平方尺。每年能產出甘草一噸。

辨僞 陶隱居曰。赤皮斷理看之堅實者。是抱罕草。最佳。抱罕。莖地名也。陶經曰。今甘草有數種。以堅實理者為佳。其輕虛。縱理及細韌者。不堪入藥。李時珍曰。今人惟以大徑寸而結緊。斷紋者為佳。謂之粉草。其輕虛細小者。皆不及也。

近人學說 丁福保曰。甘草一物。除潤肺化痰外。餘則為和別藥之用。令易於入口。及用以交黏各種散藥。令易為丸。本草綱目詩。其能治臟腑寒熱。堅筋骨。長肌肉。通九竅。利百脈。益精養氣。定魄安魂。療瘡疽。治癰癩。能和百藥。能解諸毒。竊恐未必有此大用。又甘草亦多製自呂宋。為通行之品。法用鮮甘草根。將其根洗淨。曬至半乾。切碎。與水相煎。必煎至藥味盡出。俟其冷後。渣滓墜底。即倒出其上面之水。再煎至稠結。然後取出。以之製作藥條。每條長約五寸。徑約六分。其色黑。其味甜。夏則軟而潤。冬則硬而脆。張山雷曰。甘草大甘。其功止在補土。本經所敘皆是也。又甘能緩急。故麻黃之開泄。必得甘草以監之。附子之燥烈。必得甘草以制之。走竄者得之而少斂。其鋒攻下者得之而不傷於峻。皆緩之作用也。然若病勢已亟。利在猛進直追。如承氣急下之劑。則又不可加入甘草。以縛賁育之手。足而驅之戰陣。庶乎所向克捷。無投不利也。又曰。中滿者忌甘。啞

家忌甘。酒家亦忌甘。此諸證之不宜甘草。夫人而知之矣。然外感未清。以及溼熱痰飲諸證。皆不能進甘膩。誤得甘草。便成滿悶。甚且入咽即嘔。惟其潤膩大甚故耳。或謂仲景之麻桂諸方。以及後沖和湯等。無一不用甘草。即無一非外感之主方。則又何說。且素問明言辛甘發散為陽。是甘能散邪。尤為經訓。而近人之輯本草者。又有甘草能散表寒之說。抑知甘草之散表寒。乃屬氣虛之畏寒。故得補中而凜寒自解。非治外感之寒邪。凡草木諸藥。以氣勝者。迅而善行。以味勝者。滯而善守。固老味厚無氣。以堅守中州之質。而謂其有透泄肌表之能。用非所長。適得其反。似此論藥。最是誤人。須知經言辛甘發散。是指辛中之甘而言。如桂枝之類。決不用此甘膩濁滯之味。認作輕揚散表之劑。若古人解表方中。每用甘草。則以古者體質堅強。外感六淫。已非輕恙。故必得此補中之品。先扶中氣。而後可以託邪外達。亦非遲以此為解表之主將。參蘇飲敗毒散等方。參甘並用。皆是此意。頗聞今之湘省。無論何病。咸無一方不用參甘。蓋即此例。而吾儕實非所宜。凡在學者。不可誤讀古書。輕率援用。以貽中滿而引人嘔噦也。又按甘草治瘡癰。王海藏始有此說。李氏綱目亦曰。甘草頭主癰腫。張路玉等諸家。皆言甘草節治癰疽腫毒。蓋即從解毒一義而申言之。然癰瘍之發。多由於溼熱內熾。即陰寒之證。亦必寒溼凝滯為患。甘草甘膩。皆在所忌。若泥古而投之。多致中滿不食。則又未見其利。先見其害。至謂甘草之節專主外癰。則此物之節何在。是亦理想家之臆說耳。楊永華曰。徐之才云。甘草與甘遂相反。而金匱甘遂半夏湯。乃甘遂與甘草並用。予曾以甘遂一錢。甘草四錢。並服而驗之。至二十分鐘。覺腸鳴。至三小時後。腹痛旋止。至六小時。腹痛亦即止。無他異也。又單服甘遂末三分。至半小時。覺胃內炎熱。一小時。腸胃覺痛。其力上下賁豚。時而腸鳴。時而絞痛。此乃刺激腸腺之蠕動。以助其瀉瀉之力。至二小時。其疼由漸加重。三小時後。大

便一次。至四小時。又入廁。方見瀉便。後又水瀉二次。始愈。經此實驗之結果。乃知金匱二藥並用。非特不反。且用甘草正所以緩和甘遂之猛烈。此如大承氣湯中之用厚朴。以免芒硝絞腸之患。同一理也。可見徐氏之說。全世實據。且徐氏之書。遠在金匱之後。世人乃不遵金匱。反信徐氏。更有為迴護徐氏之說。而曲解令既者。如徐彬解甘遂半夏湯云。甘草反甘遂而加之。取其戰克之力也。尤在淫云。甘草與甘遂相反而用之者。蓋欲其一戰而留飲盡去。因相激而相成也。類此者多不勝指。徐巖胎云。後人之書。不可反以證前人。正為此等說而發也。雷欽云。醫甘草頭尾吐人。竊以古今人好為妄語者。當以雷欽為最。而其說能行之及今。不亦異乎。張元素云。甘草梢治胸中積熱。去莖中痛。醫學大辭典與中藥大辭典云。甘草頭。治小兒遺尿。其說或有偽驗。然不必分梢與頭也。

配合應用 ● 諸毒遇土則化。甘草為土精。故能化毒。解一切邪

五靈甘

氣。佐黃耆。防風。能運毒走表。為痘疹氣血兩虛者首尾必資之劑。
 ① 補脾。用甘草、白芍藥。
 ② 甘草同人參、黃耆、白朮、大棗。當歸身、麥門冬。加升麻、柴胡為補中益氣藥。專理飢飽勞役內傷。濁氣下陷發熱。同人參、乾薑、肉桂則溫中。
 ③ 下氣用甘草、麥門冬、蘇子、枇杷葉。
 ④ 解熱毒治下。用甘草、黃連、芍藥、升麻、滑石。
 ⑤ 清利咽喉虛熱。用甘草、桔梗、玄參、鼠黏子、栝樓根。
 ⑥ 治健忘。用甘草、人參、蒼朮、益智龍眼肉、遠志。
 ⑦ 除煩悶燥渴。頭疼解肌。用甘草、麥門冬、石膏、竹葉、知母。
 ⑧ 消一切疔腫。用甘草、紫花地丁、金銀花、甘菊、夏枯草、益母草、貝母、白芷。
 ⑨ 瀉心經有餘之火。用甘草同黃連、木通、赤芍藥、生地黃。
 ⑩ 灸則補傷寒病後血虛。故傷寒心動悸。灸甘草二兩。水三升。煮一升。服七合。日一服。

⑪ 治傷寒咽痛。少陰證甘草湯主之。用甘草二兩。蜜水炙。水二升。煮一升。服五合。日二服。(仲景方)
 ⑫ 治肺熱喉痛。有痰熱者。甘草炒二兩。桔梗米泔浸一夜。一兩。每服五錢。水一鐘。入阿膠半片煎服。(錢乙真訣方)
 ⑬ 治肺痿多涎。肺痿吐涎。頭眩小便數而不咳者。肺中冷也。甘草乾薑湯溫之。甘草炙四兩。乾薑炮二兩。水三升。煮一升。五合。分次服。(仲景方)
 ⑭ 治肺痿久嗽。涕唾多。骨節煩悶。寒熱。以甘草三兩。炙搗為末。每日取小便三合。調甘草末一錢。服之。(廣利方)
 ⑮ 治小兒熱嗽。甘草二兩。豬膽汁浸五宿。炙研末。密丸綠豆大。食後薄荷湯下十九丸。名涼膈丸。(聖惠方)
 ⑯ 治初生便閉。甘草根煨燥。各一錢。水半盞煎服。(全幼心鑑方)
 ⑰ 治小兒撮口發噤。用生甘草二錢。水一盞。煎六分。溫服。令吐痰涎。後以乳汁點兒口中。(金匱方)

⑱ 治嬰兒目澀。月內目閉不開。或腫羞明。甚至出血者。名慢肝風。用甘草一截。以豬膽汁炙為末。每用米泔調和少許灌之。(幼幼新書方)
 ⑲ 治小兒遺尿。大甘草頭煎湯。夜夜服之。(危氏得效方)
 ⑳ 治小兒尿血。甘草一兩二錢。水六合。煎二合。一歲兒一日服盡。(姚和衆至寶方)
 ㉑ 治小兒胎毒驚癇。用甘草、川黃連。
 ㉒ 治小兒羸瘦。甘草三兩。炙焦為末。密丸。綠豆大。每溫水下五丸。日二服。(金匱方)
 ㉓ 治大人羸瘦。甘草三兩。炙。每且以童子小便煮三四沸。類服之良。(外臺祕要方)
 ㉔ 治赤白痢下。崔宣州衍所傳方。用甘草一尺。炙劈破。以淡漿水煎水一升。半煎取八合。服之立效。(梅師方)。又用甘草一兩。炙。肉豆蔻七個。煨。剉。以水三升。煎一升。分服。
 ㉕ 治舌腫塞口。不治殺人。甘草

五 薑 甘

煎湯。熱飲。煩吐。(聖濟總錄方)

①治大陰口瘡。甘草二寸。白礬一粟大。同嚼。噉汁。(保命集方)

②治發背癰疽。李北海言。此方乃神授。極奇秘。用甘草三大兩。生搗篩末。大麥麩九兩。和勻。取好酥少許。入內。下沸水。按如餅狀。方圓大於瘡一分。熱傅臚上。以納片及故紙炙。臚便內消。仍當喫黃芪粥為妙。(崔元亮海上集驗方)又方。單用水炙百透。煎。煎斤許。治懸癰如神。

③治諸般癰疽。甘草三兩。微炙。切。以酒一斗。同浸。煎中。用黑鉛一片。溶成汁。投酒中。旋取出。如此九度。令病者飲酒至醉。寢後即愈也。(經驗方)

④治瘰癧。生甘草二錢。半。井水煎服。能疎導下惡物。(直指方)

⑤治乳癰初起。炙甘草二錢。新水煎服。仍令人啜之。(直指方)

⑥治些小癰。發熱時。即用粉草節。晒乾為末。熱酒服一二錢。速進數服。痛熱皆止。(外科精要方)

⑦治痘瘡煩渴。粉甘草。衣。栝樓

根等分。水煎服之。甘草能通血脈。發瘡痘也。(直指方)

⑧治陰下懸癰。生於發道前後。初發如松子大。漸如蓮子。數十日後。赤腫如桃李。成膿即破。則愈難也。用橫文甘草一兩。四寸截斷。以溪澗長流水一碗。河水井水不用。以文武火慢慢煎水。炙之。自早至午。令水盡為度。劈開視之。中心水潤乃止。細到。用無灰好酒二小碗。煎至一碗。溫服。次日再服。便可保無虞。此藥不能急消。過二十日方得消盡。(李迅癰疽方)

⑨治陰頭生瘡。密炙甘草末。頻頻塗之。神效。(千金方)

⑩治陰下溼癢。甘草煎湯。日洗三五度。(古今錄驗方)

⑪治凍瘡發裂。甘草煎湯洗之。次以黃連。黃蘗。黃芩末。入輕粉。麻油調傅。談禁翁方)

⑫治湯火瘡灼。甘草煎汁。密塗。(李樓奇方)

⑬治蠱毒藥毒。甘草節。以真麻油浸之。年久愈妙。每用嚼嚙。或水煎服。神妙。(直指方)又方。甘草同預知子。貫茶。解一切蠱毒。

⑭治小兒中蠱欲死者。甘草中兩水。一盞煎五分服。當吐出。(金匱方)

⑮治牛馬肉毒。甘草煮濃汁。飲一二升。或煎酒服。取吐。或下。如渴不可飲水。飲之即死。(千金方)

⑯治飲饌中毒。未審何物。卒急無藥。只煎甘草。薺菜湯。入口便活。(金匱方)

⑰治水真苦毒。菜中有水真若。葉。既而光。有毒。誤食令人狂亂。狀若中風。或作吐。以甘草煮汁服之。即解。(金匱方)

⑱用蠶 五分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃有溼滯而中滿。嘔噦者。禁用。反大戟。甘遂。芫花。海藻。惡遠志。惡豬肉。令人陰痿。尤苦參。乾漆。為之使。

君名方劑 ①炙甘草湯。治虛勞不足。汗出而悶。脈結心悸。行動如常。(傷寒論方)用炙甘草四兩。桂枝。生姜各三兩。麥冬半斤。麻仁半斤。阿膠。人參各一兩。大棗三十枚。生地黃一斤。以上九味。以酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去渣。滓。納膠。烱消盡。溫服一升。日三服。

②甘草瀉心湯。治心下痞。按之濡。關寸浮。關尺沉。下利。用炙甘草二兩。黃芩。芍藥。枳實。乾薑。大黃。各一兩。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

③甘草湯。治少陰咽痛。(傷寒論方)用甘草二兩。以水二升。煮取。去滓。溫服。日二服。

參攷資料 ①此草最為藥之主。經方無不用者。猶如香中有沈香也。固老即帝師之稱。雖非君而為君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。(陶弘景) ②諸藥中甘草為君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。(甄權) ③甘草枝葉。悉如槐。高五六尺。但葉端微尖。而髓溼。似有白毛。實作角。生如相思角。作一本。生子如小扁豆。齒嚼不破。今出河東西界。入藥須微炙。不爾亦微涼。生則味不佳。(釋宗奭) ④按孫思邈千金方論云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。有中烏

④甘草瀉心湯。治心下痞。按之濡。關寸浮。關尺沉。下利。用炙甘草二兩。黃芩。芍藥。枳實。乾薑。大黃。各一兩。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

⑤甘草湯。治少陰咽痛。(傷寒論方)用甘草二兩。以水二升。煮取。去滓。溫服。日二服。

⑥此草最為藥之主。經方無不用者。猶如香中有沈香也。固老即帝師之稱。雖非君而為君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。(陶弘景) ⑦諸藥中甘草為君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。(甄權) ⑧甘草枝葉。悉如槐。高五六尺。但葉端微尖。而髓溼。似有白毛。實作角。生如相思角。作一本。生子如小扁豆。齒嚼不破。今出河東西界。入藥須微炙。不爾亦微涼。生則味不佳。(釋宗奭) ⑨按孫思邈千金方論云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。有中烏

頭巴豆毒。甘草入腹即定。驗如反掌。方稱大豆汁解百藥毒。予每試之。不效。加入甘草為甘豆湯。其驗乃奇也。又葛洪肘後備急方云。席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥。並是常用之物。畏人得其法。乃言三百頭牛藥。或言三百兩銀藥。久與親狎。乃得其詳。凡飲食時先取炙熱甘草一寸。嚼之嚙汁。若中毒。隨卽吐出。仍以炙甘草三兩。生薑四兩。水六升。煮二升。日三服。或用都淋藤、黃藤二物。酒煎溫常服。則毒隨大小洩出。又常帶甘草數寸。隨身備急。若經含甘草而食物不吐者。非毒物也。三百頭牛藥。卽土常山也。三百兩銀藥。卽馬兜鈴藤也。(蘇頌) 今陝西河東州郡皆有之。春生青苗。高一二尺。葉如槐葉。七月開紫花。似奈冬。結實作角子。如畢豆根。長者三四尺。粗細不定。皮赤色。上有橫梁。梁下皆細根也。採得去蘆頭及赤皮陰乾用。今甘草有數種。以堅實斷理者為佳。其輕虛縱理及細軟者不堪。惟貨湯家用之。請按爾雅云。盤大苦。郭璞。鹽似地黃。又詩唐風云。采芩采

芩。首陽之嶺。是也。鹽與者通用。首陽之山在河東蒲坂縣。乃今甘草所生處相近。而先儒所說苗葉與今全別。豈種類有不同者乎。(蘇頌) 甘能緩中。故中滿者忌之。嘔家忌甘。酒家亦忌甘。諸溼腫滿及脹滿病成不宜服。(繆希雍) 甘草入足少陰經。生則分身梢而瀉火。炙則健脾而和中。梢止莖中之溼痛。節消瘡毒之腫結。二者生用之能也。又諸癰疽瘡瘍紅腫未潰者。宜生用。其已潰與不紅腫者。宜蜜炙用。宜少不宜多。多則泥腸而不思飲食。抑恐緩藥力而少效。若脾胃氣有餘。與心下滿及腫脹痢疾初作。皆不可用。下焦藥中亦宜少用。恐太緩不能自達也。按上說固是。蓋本邦人常不嗜濃肥。不飽獸肉。故腸胃脆薄而不任甘濃。如服藥分量纔起一錢半。止二三錢。如今用甘草適從古方之分量。則泥滯而滿悶。減大半而可也。然治咽喉腫痛甘桔湯。治腹肚絞痛建中湯。皆勿減。是甘緩急之義也。又按甘草修製古方。有炮炙之製。近世多用炙。而不用炮。又法隔紙

五畫 甘



甘 菊

焙數十過。俟其色黃赤而為度。因生熟而異寒溫之性。則炮製亦佳。(啓益) 甘草根深者至四五尺。與黃者無異。但黃者中空。屬氣分。是得土中水氣。甘草中實。是純得土氣之厚也。(唐容川)

【甘草梢】卽甘草之處方用名。詳【甘草】條。

【甘草節】卽甘草之處方用名。詳【甘草】條。

【甘液】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荔枝】條。

【甘菊】 古籍別名 四峯菊。(嘉佑圖經本草)

外國名詞 Chrysanthemum sinense, Seb.

產地 多生山野間。園圃亦有栽植之者。以產於杭州者為勝。

形態 甘菊為菊之一種。有黃白二色。其花細碎。蕊如蜂窠。中有細子。氣香味甘。

性質 甘。苦。微寒。無毒。

主治 平肝熄風。降火除熱。去翳膜。療目疾。逐游風。散溼痺。

【甘菊花】 卽菊花之處方用名。詳【菊花】條。

【甘菊花露】 基本 本品卽以甘菊蒸取之露。

處方用名 菊花露。

性質 甘。苦。微寒。無毒。

主治 去頭風眩暈。除目障翳。明目。消痰寬胸。久服耐老延年。

【甘遂】 古籍別名 甘藪。陵澤。重澤。主山。(別錄) 陵藪。甘澤。苦澤。白澤。鬼醜。(吳普本草) 甘遂。重遂。至田。整休。三層草。大瓠藤。金錢重。隨湯給事中。(不漢藥考)

外國名詞 Erythrodia Ste. doidiana

基本 係屬大戟科。藥用甘遂之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。甘遂產陝西山西諸省。按大明本草云。甘遂產西京者上。汴滄。吳者次之。

五畫 甘

形態 按甘遂為類似大戟之毒草。但其莖短小。葉闊大。自生山野間。春月抽莖。高一尺餘。葉互生。初紅後綠。作長橢圓形。或作寬狀。邊緣無鋸齒。葉莖含乳液。切斷之。滲出白汁。莖頂簇生五大葉。更分出五小枝。每枝生三葉。四五月間。通常抽二莖。於頂上開楊色花。後結滑澤之果實。其根為連珠狀。橫根。多關節。形似麥門冬。而稍長。皮部有赤色斑點。內部白色。

採取 二月八月採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡採得去莖於槐砧上細剉。用生甘草湯。齊芎白然汁。二味攪浸。三日。其水如黑汁。乃澆出。用東流水。淘六七次。令水清為度。澆出於土器中。煎臈用之。李時珍曰。今人多以麵煨熟。用以去其毒。

性質 苦寒。有毒。

效能 大瀉經隧水飲。概用作

治水腫梨。

主治 大腹疝瘕。腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。本經下五水。散膀胱留熱。皮中痞氣腫滿。別錄。

張仲景之發明 甘遂一味。經張仲景之實驗。認為主利水。旁治癰痛。咳嗽。短氣。小便難。心下滿。茲考徵如下。①十棗湯證曰。引胸下痛。乾嘔。短氣。又曰。咳嗽。②大黃甘遂湯證曰。小便微難。③甘遂半夏湯證曰。雖利。心下續堅滿。④大陷胸湯證曰。短氣躁煩。又曰。心下滿而硬痛。以上四方。其用甘遂。或三枚。或二兩。或一錢也。按芫花大戟甘遂。同是利水。而甘遂之效最勝矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論甘遂曰。能瀉十二種水疾。去痰水。【明】李時珍本草綱目論甘遂曰。瀉腎經及隧道水滯。脚氣陰囊腫墜。痰迷癩癩。噎膈痞塞。又曰。腎主水。凝則為痰飲。溢則為腫脹。甘遂能泄腎經滯氣。治痰之本也。不可過服。但中病則止。可也。張仲景治心下留飲。與甘草同用。取其相反而立功也。劉河間保命集云。凡水腫服藥未全消者。以甘遂末塗腹。繞臍令滿。內服甘草水。其腫便去。又王璆百一選方云。脚氣上攻。結成腫核。及一切腫毒。用

甘遂末水調。俾腫處。即澀煎甘草汁服。其腫即散。二物相反。而感應如此。清流韓詠病脚疾。用此。一服病去七八。再服而愈。【明】釋希雍本草經疏論甘遂曰。甘遂稟天地陰寒之氣。以生。故其味苦。其氣寒。而有毒。亦陰草也。水屬陰。各從其類。故善逐水。其主大腹者。即世所謂水蠱也。又主疝瘕腹滿。面目浮腫。及留飲。利水道。殺道。下五水。散膀胱留熱。皮中痞氣。腫滿者。謂諸病皆從滯水所生。水去飲消。溼除。是拔其本也。潔古謂其味苦性寒。苦性泄。寒勝熱。直達水氣所結之處。乃泄水之聖藥。水結胸非此不能除。故仲景大陷胸湯用之。但有毒不可輕用。其性之惡。可概見已。其根皮赤。肉白。作連珠。質重者良。【清】黃宮繡本草求真論甘遂曰。甘遂皮赤肉白。味苦氣寒。有毒。其性純陰。故書皆載能於腎經及隧道水氣所結之處。奔湧直決。使之盡從竅道而出。為下水選第一要藥。喻嘉言曰。胃為水穀之海。五臟六腑之源。脾不散胃之水精於肺。而病於上。肺不能通胃之水道

於膀胱。而病於中。腎不能司胃之開。時其滯。而病於下。以致積水浸淫。無所底止。故凡因實邪。元氣壯實。而致隧道阻塞。見為水腫蠱脹。疝瘕腹痛。無不伏此迅利。以為開決水道之首。如仲景大陷胸湯之類。然非症屬有餘。祇因中氣衰。弱。小便不道。水液妄行。脾莫能制。誤用泄之之品。益虛其虛。水雖暫去。大命必隨。甘草書育。與此相反。何以二物同用。而功偏見。亦以甘行而下。益急。非深於斯道者。未易語此。【清】張隱庵本草崇原論甘遂曰。上味曰甘。徑直曰遂。甘遂味苦。以其洩土氣而行隧道。故曰甘遂。土氣不和。則大腹。隧道不利。則疝瘕。大腹則腹滿。由於土不勝水。外則面目浮腫。內則留飲宿食。甘遂治之。洩土氣也。為疝為癥。則癥堅積聚。甘遂破之。行隧道也。水道利。則水氣散。殺道利。則宿積除。甘遂行水氣。而通宿積。故利水穀道。【清】鄒澍本經疏證論甘遂曰。甘遂根皮赤肉白。味苦下趨。氣寒協水。故專行著裏之水。無問頑堅也。水熱充竅之論水曰。水病者。下為

肺腫大腹。上爲喘呼。故腎爲之本。肺爲之標。大腹腹滿。面目浮腫。標本俱病矣。尤在溼之論。陷胸證曰。胃爲都會。水穀居。清濁未分。邪氣入之。夾雜痰食。相結不解。則成結胸。大小腸者。精華已去。糟粕獨居。邪氣入之。但與穢物結成燥糞而已。大承氣專主腸中燥糞。大陷胸并主心下水食。蠶在腸。必藉推送。故須枳朴。水食在胃。必兼破飲。故須甘遂。留飲宿食去。則水穀之道利矣。金匱要略用甘遂半夏湯。治雖利。心下續堅滿。又用大黃甘遂湯。治水與血結於血室。於此見水能爲痼。痼聚積聚之根。并可見洩利者。大黃不得用。甘遂仍可用。蓋其性徑情直行。不稍留戀。故非特能行停蓄泛濫之水。卽徘徊瞻顧欲行不行之水。并其所長矣。

國外學說 日本學說謂甘遂者。春季自生於山中及原野之根。爲有毒物之一也。漢醫於水腫病用之。據猪子氏之實驗云。甘遂有峻下之效。其有效成分。蓋爲刺戟腸管以發下痢之華爾斯樣物質。殆一種之無水酸賦。本品用量爲

五畫 甘

一·二至三·〇。

近人學說 張山雷曰。甘遂苦寒。攻水破血。力量頗與大戟相類。故本經別錄。主治腹滿浮腫。下水。留飲。破癥堅積聚。亦與大戟主治大同小異。但兼能消食。通利穀道。稍與大戟不同。則攻堅之力。殆尤爲過之。所主痼癥。蓋以溼熱壅結者言之。而寒氣凝滯之症。非其所宜。別錄又申之以熱氣腫滿一句。則此之能泄水腫。皆以溼熱實症。言而脾腎虛寒。以致水道不利諸症。誤用此藥。實爲鳩毒。從可知矣。五水者。蓋言五藏經脈中停留飲水氣耳。

配合應用 ①治傷寒水結胸。用甘遂入陷胸湯。有神效。

②治膜外水氣。甘遂末。大麥麴各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。(聖濟總錄方)

③治身面洪腫。甘遂末二錢。以雄猪腰子一枚。分作七片。入末在內。漚紙包煨令熟。每日服一片。至四五服。當覺腹鳴。小便利。是其效也。(肘後方)

④治心下留飲堅滿。脈伏。其人

欲自利。反快。甘遂半夏湯。用甘遂大者三枚。半夏十二枚。以水一升。煮半升。入芍藥五枚。水二升。煮半升去滓。以蜜半升同煎至八合。頓服之。(仲景方)

⑤治小便轉澀。甘遂末一錢。猪苓湯調下。立通。(筆峯雜興方)

⑥治體氣。甘遂末一錢。同猪肉煮食。於野地中掘一坑。令患人至彼處。向上風站立。以甘草末唾調入臍內。須臾。腹中作響。取利。下黑汁。亟從上風奔回。可絕。不絕再作一服。仍前用之。(秘方)

⑦治水腫腹滿。甘遂炒二錢二分。黑牽牛一兩半爲末。水煎。時時呷之。(普濟方)

⑧治腎水流注。腿膝變急。四肢腫痛。卽上方加木香四錢。每用二錢。煨熟。溫酒嚼下。當利黃水爲驗。(御藥院方)

⑨治正水脹急。大小不利欲死。甘草五錢。半生半炒。胭脂坏子十文。研勻。每以一錢。白麴四兩。水和作棋子大。水煮令浮。淡食之。大小便利後。用平胃散加熱附子。以二錢煎服。(普濟方)

⑩治小兒疳水。珠子甘遂。炒青橘皮。等分爲末。三歲用一錢。以麥芽湯下。以利爲度。忌酸鹹。三五日。名水寶散。(總微論方)

⑪治水蟲喘急。甘遂。大戟各一兩。慢火炙。研。每服一字。水半盞。煎數沸服。不過十服。(聖濟總錄方)

⑫治水腫喘急。大小便不通。十棗丸。用甘遂。大戟。芫花。等分爲末。以棗肉和丸。梧子大。每服四十九丸。侵晨熱湯下。利去黃水爲度。否則次午再服。(三因方)

⑬治妊娠腫滿氣急。小腹滿。大小便不利。已服猪苓散不瘳者。用大山赤皮。甘遂二兩。搗篩。白蜜和丸。梧子大。每服五十九丸。得微下。仍服猪苓散。不再服之。(小品方)

⑭治脚氣腫痛。腎臟風氣攻注。下部瘡痒。甘遂半兩。木鼈子仁四個爲末。猪腰子一個。去皮膜。切片。用藥四錢。揅在內。漚紙包煨熟。空心食之。米飲下。服後便伸。兩足大。便行後。可吃白粥二三日爲妙也。(本事方)

⑮治二便不通。甘遂末以生麴糊調。傳臍中及丹田內。仍艾三壯。

飲甘草湯。以通為度。又太山赤皮
甘送末一兩。煉蜜和勻。分作四服。
日一服。取利(聖惠方)

◎治疝氣偏腫。甘遂。茴香等分
為末。酒服二錢。(儒門事親方)

◎治婦人血結。婦人少腹滿如
敦狀。小便微難而不渴。此為水與
血相結在血室。大黃二兩。甘遂。阿
膠各一兩。水一升半。煮半升。頓服。
其血當下。(仲景方)

◎治臨氣硬。甘遂。麩煨五錢。
南木香一錢。為末。壯者一錢。弱者
五分。水酒調下。(怪病方)

◎治痞證發熱。盜汗。胸背疼痛。
甘遂。麩包。漿水。煮十沸。去麩。以細
練火炒黃。為末。大人三錢。小兒一
錢。以冷蜜水臥時服。忌油膩魚肉。
(普濟方)

◎治消渴引飲。甘遂。鉄炒半兩。
黃連一兩。為末。蒸餅丸。綠豆大。每
薄荷湯下二丸。忌甘草。(楊氏家
藏方)

◎送心丹。治風痰迷心。癩癩。及
婦人心風血邪。用甘遂二錢。為末。
以猪心取三管血。和藥。入猪心內。
縛定。紙裏煨熟。取末。入長砂末一

錢。分作四丸。每服一丸。將心煎湯
調下。大便下惡物為效。不下再服。
(濟生方)

◎治馬脾風病。(小兒風熱喘
促。悶亂不安。謂之馬脾風)甘遂
麩包。煮一錢半。辰砂水飛二錢半。
輕粉一角。為末。每服用一字。漿水
少許。滴油一小點。抄藥在上。沉下。
去漿水。瀉之名無價散。(全幼心
鑑方)

◎萬靈膏。治麻木疼痛。用甘遂
二兩。蓖麻子仁四兩。樟腦一兩。搗
作餅貼之。內飲甘草湯。(摘玄方)

◎治耳卒墜閉。甘遂半寸。綿裹
插入兩耳內。口中嚼甘草。耳卒自
然通也。(永類鈴方)

用量 五分至一錢。
施用宜忌 凡非氣壯邪實者
禁用之。惡遠志。反甘草。瓜蒂為之
使。

【甘遂根】即甘遂之處方用名。詳
「甘遂」條。

【甘蒲】即蒲葯之原名。詳「蒲葯」
條。

【甘登】即甘遂之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「甘遂」條。

【甘劍子】 古籍別名 海胡桃。
(本草綱目)

形態 甘劍子為山果類之一
種。狀如巴棧子仁。附內有白膜。能
發人病。不可食。其子仁可供藥用。
性質 甘烈無毒。

主治 脾胃虛寒。洩痢不止。取
七枚。連殼煨為末。空腹酒下。三服
效。

【甘蔗】 命名 本品側種蔗出。
其字從蔗而味甘美故
俗。

處方用名 蔗汁。甘蔗滓。甘蔗
皮。


古籍別名 竿蔗。草木狀。蘇
崑崙蔗。荻蔗。杜蔗。西蔗。芳蔗。蠟蔗。
紅蔗。紫蔗。(本草綱目)

外國名詞 Saccharum offi-
cinarum, L. (拉丁) サタウキ
ビ サタウノキ (日本)

基本 係禾本科甘蔗屬。
產地 凡閩廣江浙諸省。恒有
出產。原產熱帶亞細亞地方。

形態 甘蔗為果類之多年生
草本。莖直立。高丈許。徑寸許。葉狹
而尖。線狀披針形。長至二三尺。莖

之外形類於竹。有節。惟莖中不空。
其花作圓錐花序。花單性。雄花生
於莖梢。雌花生於葉腋。有巨苞包
之。結實為穎果。其莖色有青紫二
種。莖汁為製糖之原料。



蔗 甘

採取 九十月間收之。
性質 甘平。清無毒。

效能 潤燥。止渴。用作滋養藥。
又為解熱藥。

主治 下氣和中。助脾氣。利大
腸。

歷代配述攷證 【宋】大明諸
家本草論甘蔗曰。利大小腸。消痰
止渴。除心灼煩熱。解酒毒。【明】李
時珍本草綱目論甘蔗曰。止嘔噦。
反胃。寬胸膈。【明】繆希雍本草經
疏論甘蔗曰。甘蔗。稟地中之沖氣。
故味甘。氣平。無毒。日華子云。冷氣
薄。味厚。入手足太陰。足陽明經。甘
為稼穡之化。其味先入脾。故能助
脾氣。脾主中州。故主和中。甘寒除

熱潤燥。故主下氣利大腸也。大明謂其消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。今人用以治噎膈反胃嘔吐。大便燥結。皆取其除熱生津潤燥之功耳。【清】黃元御玉楸葉解論甘蔗曰。蔗漿甘寒。解酒清肺。故漢書有蔗漿折朝醒。王維有大官還有蔗漿寒之語。土燥者最宜。陽衰溼旺者服之。亦能寒中下利。本草謂其下氣止嘔。則雖屬甘緩。亦頗疏利不壅。與白沙糖性平功用相仿。【清】王士雄隨息居飲食譜論甘蔗曰。甘蔗甘涼清熱和胃潤腸。解酒節蛇。化痰充液。治瘴癘暑痢。止熱嗽虛嘔。利咽喉。強筋骨。息風養血。大補脾陰。榨漿名爲天生復脈湯。以皮青圓大節稀而形如竹竿者勝。故一名竹蔗。亦作竿蔗。與樞仁同嚼則渣軟。皮紫者性溫功遜。【清】楊時泰本草述鈞元論甘蔗曰。甘蔗助脾潤燥之益爲多。性殆甘溫。其治噎膈反食。或係陰中之陽不足。以此證原不專屬於熱也。先聲有謂共酒食發痰者。又有謂多食發虛熱動血者。然則速以甘寒定之可乎。

五畫 甘

配合應用 ①治發熱口乾。小便赤澀。取甘蔗去皮嚼汁嚙之。飯漿亦可。(外臺祕要方)
 ②治反胃吐食。朝食暮吐。暮食朝吐。旋旋吐者。用甘蔗汁七升。生薑汁一升。和勻。日日細呷之。(梅師方)
 ③治乾嘔不息。蔗汁溫服半升。日三次。入薑汁更佳。(肘後方)
 ④治眼暴赤腫。砂澀疼痛。甘蔗汁二合。黃連半兩。入銅器內慢火養。去滓點之。(普濟方)
 ⑤治虛熱咳嗽。口乾涕唾。用甘蔗汁一升半。青梁米四合。煮粥。日食二次。極潤心肺。(黃氏方)
 ⑥治小兒口疳。蔗皮燒研搽之。(簡便方)
 用量 三錢至五錢。
 施用宜忌 凡脾胃虛寒無熱者禁用。
 參攷資料 ①蔗有赤色者名暹羅蔗。白色者名荻蔗。竹蔗以蜀及嶺南者爲勝。江東雖有而劣於蜀產。會稽所作乳糖。殆勝於蜀產。(孟詵) ②甘蔗今川。廣。湖南。北。二。浙江。東西皆有。自八九月已堪食。

收。至三四月方酸壞。石蜜、沙糖、糖霜皆自此出。惟川浙者爲勝。(寇宗奭) ③今江浙閩廣湖南蜀川所生。大者亦高丈許。其葉似荻。有二種。荻蔗莖細短而節疎。但堪生噉。亦可煎糖。竹蔗莖粗而長。可搾汁爲沙糖。泉福吉廣諸州多作之。錄沙糖和牛乳爲乳糖。惟蜀川竹蔗少也。(蘇頌) ④甘蔗多食發虛熱。動衄血。相感云。同樞子食則渣軟。(吳瑞) ⑤蔗。脾之果也。其漿甘寒。能消火熱。素問所謂甘溫除大熱之意。煎煉成糖。則甘溫而助溼熱。所謂積溫成熱也。蔗漿消渴解酒。自古稱之。故漢書郊祀歌云。百味旨酒布蘭生。秦尊柘漿析朝醴。唐王維櫻桃詩云。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒是矣。而孟詵乃謂共酒食發痰者。豈不知其有解酒除熱之功耶。日華子大明又謂沙糖能解酒毒。則不知既經煎煉。便能助酒爲熱。與生漿之性異矣。按吳氏客語云。甘草過火則熱。麻油過火則冷。甘蔗煎過則熱。水成湯則冷。此物性之異。醫者可

不知乎。又野史云。盧絳中病痲疾。瘦瘵。忽夢白衣婦人云。食蔗可愈。及旦買蔗數挺食之。翌日疾愈。此亦助脾和中之驗與。(李時珍) ⑥蔗皆畦種。叢生。最困地力。莖似竹而內實大者。圍數寸。長六七尺。根下節密。以漸而疎。抽葉如蘆葉而大。長三四尺。扶疎四垂。八九月收。莖可留過春。充果食。按王灼糖霜譜云。蔗有四色。曰杜蔗。即竹蔗也。綠嫩薄皮。味極醇厚。專用作緝。曰西蔗。作霜色淺。白芳蔗。亦名蠟蔗。即荻蔗也。亦可作沙糖。曰紅蔗。亦名紫蔗。即暹羅蔗也。止可生啖。不堪作糖。凡蔗搾漿飲固佳。又不若咀嚼之味。荷永也。(李時珍)
 【甘蔗皮】即甘蔗之處方用名。詳【甘蔗】條。
 【甘蔗滓】 委治 燒存性研末。搗白朮。類診取。燒烟勿令人目。能使暗明。(李時珍)
 【甘蔗】即甘蔗之古籍別名。典見吳普本草。詳【甘遂】條。
 【甘蔗】即芭蕉之原名。詳【芭蕉】條。

【甘藷】即甘遂之古籍別名。典見別錄。詳「甘遂」條。

【甘藍】


古籍別名 藍菜。(千金方) 驛藍。(農政) 玉莖菁。(山西志) 大葉冬藍。(李時珍) 葉牡丹。(日本)

外國名詞 *Brassica oleracea* (拉丁) ハボタン ボタナ キヤベツ (日本)

基本 係十字花科芸薹屬。藥用甘藍之葉。

產地 原產亞洲之海邊。隨西諸地均有出。

形態 甘藍為溼草類之越年生草本。高二尺餘。葉平滑。帶有白色。嫩時聚成球狀。花大於莖葉之花。有四花瓣。淡黃色。總狀花序。



甘 藍

性質 甘平。無毒。

主治 久食大益腎。填髓腦。利五臟六腑。利關節。通經絡。中結氣。心下結代氣。明耳目。健人少睡。益

心力。壯筋骨。作菹。經宿色黃。和鹽食。治黃毒。

近人學說 張山雷曰。甘藍。載於陳藏器本草拾遺。謂產於西土。

葉闊可食。治黃毒。蓋亦清利熱結之品。故治發黃。亦藍之別一種。瀨湖綱目亦稱其葉長大而厚。煮食甘美。

參攷資料 此是西土藍也。葉闊可食。(陳藏器) 此亦大葉

冬藍之類也。按胡洽居士云。河東隴西。菹胡多種。食之。漢地少有。其葉長大而厚。煮食甘美。經冬不死。春亦有莢。其花黃。生角結子。其功與藍相近也。(李時珍)

【甘藤】

古籍別名 甜藤。(嘉佑圖經本草) 感藤。(本草綱目)

形態 甘藤為蔓草類藤屬之一種。其藤大如鷄卵。狀如木防己。其莖中空。斫斷。吹之。氣出一頭。可以通貫。其汁甘美如蜜。取汁可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 調中益氣。通血氣。解諸熱止渴。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論甘藤曰。除煩悶。利五臟。

治腎鈞氣。明李時珍本草綱目論甘藤曰。解熱痢及膝腫。

【甘藤葉】 主治 研傅蛇蟲咬傷。

【甘瀾水】

即流水之古籍別名。典見綱目。詳「流水」條。

【甘藷】 即番藷之原名。詳「番藷」條。

【甘露子】 即草石蠶之古籍別名。典見食物本草。詳「草石蠶」條。

【甘露水】 即荔枝汁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【甘露藤】 古籍別名 肥藤。(綱目拾遺)

形態 甘露藤為蔓草類之一種。其藤如人筋。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 風血氣諸病。久服調中溫補。令人肥健。好顏色。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論甘露藤曰。止消渴。潤五臟。除腹內諸冷。

【生人血】 即人乳之古籍別名。典見方家。詳「人乳」條。

【生大黃】 即大黃之處方用名。詳「大黃」條。

【生山查】 即山查之處方用名。詳「山查」條。

【生瓜菜】

命名 本品味作生瓜氣。故名。

形態 生瓜菜為菜類之一種。春生苗。長三四寸。作叢生。葉青而圓。似白苣。夏開紫白花。結細實。色黑。其莖葉可供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 走注攻頭面四肢。及陽毒傷寒。壯熱。頭痛。心神煩躁。利胸膈。搗汁飲之。又生搗貼腫。

【生半夏】 即半夏之處方用名。詳「半夏」條。

【生甘草】 即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【生白朮】 即白朮之處方用名。詳「白朮」條。

【生白芍】 即白芍之處方用名。詳「白芍」條。

【生白前】 即白前之處方用名。詳「白前」條。

【生石苻】 即石苻之處方用名。詳「石苻」條。

【生地炭】即大生地之炒枯成炭者。以爲止血之用。詳「大生地」條。

【生地黃】命名 本品係地黃之新鮮未經乾者故名。

處方用名 鮮生地。

外國名詞 Rhemannia

Glutinosus (拉丁)

基本 屬玄參科。藥用地黃之生根。

形態 按生地黃長一二尺不等。形細皮薄而肉厚。表面略有皺紋。色淡黃。味帶苦。

採取 八九月採之。

製法 採得其根。須和以泥。上下舖以枯草而密藏。用時洗淨泥土。及腐敗者入藥。如以鮮生地製。近世藥舖。均有出售。氣味甘寒。補腎陰。瀉心火。清燥金。平血逆。止吐衄。崩中。痢疾。瘟疫。痘毒。大熱大渴。凡諸實火。服之俱效。有養陰瀉心之力。無賦賦礙胃之弊。

性質 甘苦大寒。無毒。

效能 瀉火。清熱。止吐衄。療溫病。用作解熱藥。

主治 治婦人崩中。血不止。及

產後血上。薄心。閉絕。傷身。胎動。下血。胎不落。墮墜。折。瘀血留。血鼻。衄吐血。皆搗飲之。

歷代記述攷圖 【唐】甄權藥

性本草論生地黃曰。解諸熱。通月水利水道。搏數貼心腹。能消瘀血。【清】汪詒庵本草備要論生地黃曰。生地黃(大瀉火)甘苦大寒。入心腎。瀉丙火。(小腸爲丙火。心與小腸相表裏。故導赤散與木通同用。)清燥金。消瘀通經。平諸血逆。治吐衄崩中。(唾血者。血隨唾出。咯血者。隨痰咯出。或帶血絲。出腎經及肺經。自兩脅逆上吐出者。屬肝經。衄血者。血溢於腦。從鼻而出。咳血者。咳出痰內有血。並屬肺經。吐出嘔出成盆成碗者。屬胃經。經漏不止。曰崩。血熱則妄行。宜以此涼之。虛人忌用。用乾地黃可也。)傷寒陽強。痘證大熱。多服損胃。生掘鮮者。搗汁飲之。或用酒製。則不傷胃。生則寒。乾則涼。熱則溫。【清】黃宮楠本草求真論生地黃曰。生地黃性未蒸焙。掘起即用。甘苦大寒。故書皆載其性鮮補。但入手少陰。心足少陰腎。足厥陰肝。並足太

陰脾。手太陰小腸。力專清熱瀉火。涼血消瘀。故凡吐血咯血。鼻血。畜血。溺血。崩中。帶下。審其症果。因於熱成者。無不用此調治。並或傷寒陽強。痘症。毒盛。血燥。與折跌傷筋。而見血瘀血痺之症者。無不採其同入。以爲活血生新之用。第書有首。服此長肉生肌。止是熱除血活。以後長養之語。久服輕身不老。止是病去力健身安之詞。未可因此認爲辟穀成仙屬實也。若使血因寒滯。而猶用以生地。不更使寒益甚。而血愈出不返乎。掘生肥大者。洗淨搗汁以飲。或用酒製。以免傷胃。忌鐵。

配合應用 ●治小兒熱病。壯熱煩渴。頭痛。生地黃汁三合。蜜半合。和勻。時時與服。(普濟方)

●治熱暈昏沉。生地黃汁一盞服之。

●治熱瘧昏迷。煩悶。飲水不止。至危者。一服見效。生地黃根。生薄荷葉等分。搗爛。取自然汁。入麝香少許。井華水調下。覺心下頓涼。勿再服。(普濟方)

●治溫毒發斑。黑疔。治溫毒發。瘕。嘔逆。生地黃二兩六錢。二字中。好豆豉一兩六錢。二字中。以猪膏十兩合之。露一夜。煎減三分之一。絞去滓。入雄黃麝香。如豆大。攪勻。分作三服。毒從皮中出。則愈。忌蕪荳。(千金方)

●治血熱生癩。地黃汁頻服之。(千金方)

●治疔腫乳癰。地黃搗敷之。熱即易性涼。消腫無不效。(梅師方)

●治癰腐惡肉。地黃三斤。水一斗。煮取三升。去滓煎稠。塗紙上貼之日三易。(鬼遺方)

●治一切癰疽。及打撲傷損。未破疼痛者。以生地黃杵如泥。攤在患處。搽木香末於中。又攤地黃泥一重貼之。不過三五度。即內消也。(王堯博濟方)

●治打撲損傷。骨碎及筋傷。爛用生地黃熱香裹之。以竹筒編夾急縛。勿令轉動。一日一夕可十易之。則瘕類說云。許元公過橋。墮馬。右臂白脫。左右急送入臼中。昏迷不知痛苦。急召田錄事視之。曰。尙可救。乃以藥封腫處。中夜方甦。遂且痛止。痛處已白。日日換貼。其瘕

五畫 生

腫移至肩背。乃以藥下去黑血三升而愈。即上方也。(肘後方)

◎治物傷睛突。輕者驗胞腫痛。重者目時突出。但目系未斷者。即納入急搗生地黃綿裹傳之。仍以避風膏藥護其四邊。(聖濟總錄方)

◎治睡起目赤。腫起。良久如常者。血熱也。臥則歸於肝。故熱則目赤腫。良久血散。故如常也。用生地黃汁浸梗米半升。曬乾。三浸三曬。每夜以米煮粥食一盞。數日即愈。有人病此。用之得效。(醫餘方)

◎治眼暴赤痛。水洗生地黃黑豆各二兩。搗膏。臥時以鹽湯洗目。閉目以藥厚翳目上。至曉。水潤取下。(聖濟總錄方)

◎治厚內赤目。生地黄薄切。水浸貼。(小品方)

◎治牙疳宜露膿血。生地黄一斤。鹽二合。研末。自搗和團。以麵包煨。令烟斷。去麵。入麝一分。研勻。日夜貼之。(聖濟總錄方)

◎治牙齒長。出一分者。常啐生地黄甚妙。(張文仲備急方)

◎治牙動欲脫。生地黄為末。啐

之。令汁漬根并嚙之。日五六次效。(千金方)

◎治食蟹腫。肉弩出者。生地黄汁一盞。牙卓角數條。火炙。蘸盡地黃汁。為末傳之。(永類鈴方)

◎治耳中常鳴。生地黄截塞耳中。日數易之。或煨熟尤妙。(肘後方)

◎治鬚髮黃赤。生地黄一斤。生薑半斤。各洗。研自然汁。留滓。用不蛀卓角十條。去皮。煎汁。炙至汁盡。為度。同滓入罐內。泥固。煨存性。為末。用鐵器盛。末三錢。湯調。停二日。隨臥。刷髮。髮上即黑。(本事方)

◎治竹木入肉。生地黄嚼爛。卷之。救急方)

◎治毒箭入肉。煎生地黄汁。作丸服。至百日箭出。(千金方)

◎治獼犬咬傷。地黃搗汁飯餅塗之。百度愈。(百一選方)

用薑 三錢至一兩。施用宜忌 凡無熱熱實火者禁用。

【生廷胡】即廷胡索之處方用名。詳【廷胡索】條。

【生赤芍】即赤芍之處方用名。詳【赤芍】條。

【生杵石決明】即石決明之處方用名。詳【石決明】條。

【生附子】即附子之處方用名。詳【附子】條。

【生南星】即天南星之處方用名。詳【天南星】條。

【生苡仁】即苡仁之處方用名。詳【苡仁】條。

【生軍】即大黃之處方用名。詳【大黃】條。

【生桑皮】即桑白皮之處方用名。詳【桑白皮】條。

【生泰山】即五蠶脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳【五蠶脂】條。

【生硝】形態 生硝為石類硝石之重煉時而凝結於下者。狀類朴硝。可供藥用。性質 苦。大寒。無毒。

主治 風熱癩癩。小兒驚邪。瘰癧。風眩頭痛。肺癰耳聾。口瘡。喉痺。咽塞。牙頰腫痛。目赤熱多眵淚。

參攷資料 生硝石諸內地皆產之。而河北度陽諸縣。及蜀中尤

三五六

多。秋冬間遍地生。白。搗取煎煉而成。質者。苟且多不潔淨。須再以水煎化。傾盆中一夜。結成澄在。下者。狀如朴硝。又夕生硝。謂煉過生出之硝也。結在上者。或有鋒芒如芒硝。或有圭稜如馬牙硝。故硝石亦有芒硝牙硝之名。與朴硝之芒牙同稱。而水火之性則異也。(李時珍)

【生芻】即黃環之古籍別名。典見吳普本草。詳【黃環】條。

【生草】即甘草之處方用名。詳【甘草】條。

【生常山】即五蠶脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳【五蠶脂】條。

【生鹿角】即鹿角之處方用名。詳【鹿角】條。

【生麥芽】即麥芽之處方用名。詳【麥芽】條。

【生棗】性質 甘。辛。熱。無毒。參攷資料 生棗多食令人寒熱。凡羸瘦者不可食。(本草綱目) 生棗多食令人熱渴。膨脹動臟腑。損脾元。助溼熱。(孫思邈)

【生棗仁】即棗仁之處方用名。

詳「酸棗仁」條。

【生藥】即白苣之古籍別名。與見綱目。詳「白苣」條。

【生黃耆】即黃耆生用者之處方用名。詳「黃耆」條。

【生銀】 性質 辛寒。無毒。主治 熱狂。驚悸。發癩。恍惚。夜臥不安。譫語。邪氣。鬼祟。服之明目。鎮心。安神。定志。小兒諸熱。丹毒。並以水磨服之。功勝紫雪。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論生銀曰。小兒中惡。熱毒煩悶。水磨服之。【明】李時珍本草綱目論生銀曰。煮水入葱白。糯米作粥食。治胎動不安。瀉血。

配合宜忌 畏黃連。甘草。飛廉。石亭脂。砒石。慈石。慈錫。羊血。馬目毒公。忌生血。

參攷資料 ●生銀氣味冷。微毒。【大明】○荷葉。煎灰。能粉銀。羚羊角。烏賊魚骨。鼠尾。龜殼。生薑。地黃。慈石。但能瘦銀。羊脂。紫蘇子油。皆能柔銀。【李時珍】

【生蒲黃】即蒲黃之處方用名。詳「蒲黃」條。

【生蜜】即蜂蜜之未經煉過者。詳

「蜂蜜」條。

【生頤】即水銀之古籍別名。與見和漢藥考。詳「水銀」條。

【生穀芽】即穀芽之處方用名。詳「穀芽」條。

【生錦紋】即大黃之處方用名。詳「大黃」條。

【生蠶山】即五蠶脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「五蠶脂」條。

【生熟水】 命名 本品即新汲水與百沸水和合。故名。古醫別名 陰陽水。（本草綱目）

性質 甘。鹹。無毒。主治 調中消食。凡痰瀉及宿食毒惡之物。臍腹欲作霍亂者。即以鹽投中。進一二升。令吐盡。痰食便愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論生熟水曰。凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者。先飲數口即定。

參攷資料 上焦主納。中焦腐

化。下焦主出。三焦通利。陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣清亂。濁陰不降。清陽不升。故發為霍亂。嘔吐之病。飲此湯。輒定者。分其陰陽。使得其平也。（李時珍）

【生薑】 命名 薑能驅禦百邪。故名。初生嫩者其尖紫。名紫薑。或作子薑。宿根謂之母薑。處方用名 蜜炙薑。

古醫別名 薑根。百辣雲。勾絙。指。因地辛。炎涼小子。（和漢藥考）外國名詞 Nimgbor officinale, Rose. (拉丁)

基本 屬薑科。藥用生薑之根。

產地 凡原溼沙地。處處有之。以漢溫。池州。荊州。揚州者為良。



生薑

形態 按生薑為多年生草本。莖高二三尺。葉似竹葉而長。兩兩相對。苗青根黃。無花實。每年秋社

前後。新芽頓長。如列指狀。採食無筋。名子薑。秋分後者次之。霜降後則老矣。但其佳。愈溼潤。而畏日光。故秋熱則無薑。

種類 ●乾生薑。採掘後洗去泥。留皮切片晒乾者。●乾薑。用去皮泡製而成者。●炮薑。即黑薑。用乾薑炮炒成炭者。●薑衣。即薑皮。●薑汁。即用生薑搗取之汁。

種植 每年四月間。取母薑種之。不一月。即生苗。葉漸生長。時期須築一二尺高之草蓬。遮之。薑畏日光。故也。或供藥用。或供菜茹。故園圃恒多栽植。

採取 每年八九月間。帶泥採掘其根。

製法 凡使生薑。取肥大質潤而新者佳。洗去泥。生用。以生薑粗末一分。稀酒精五分。浸漬製成生薑酒。為健胃藥。以生薑酒一分。糖漿九分。攪和製成生薑糖漿。為芳香性矯味藥。

性質 辛。微溫。無毒。成分 生薑含有揮發油。軟性樹脂。越發斯質。澱粉。巴蜀林等。按其有效成分。為揮發油。其含量不

五畫 生

定。大抵為一%至二%之淡黃色稀薄油液。沸點點為百六十度。其餘為纖維等。

效能 散寒。發表。止嘔。開痰。能刺激胃神經。使胃之分泌增多。蠕動加速。又能刺激小腸。使腸之糜乳管吸收力強。并能減少其分泌。故用作止吐健胃藥。

主治 久服去臭氣。通神明。(本經) 歸五臟。除風邪寒熱。傷寒頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐。去痰下氣。(別錄)

張仲景之發明 生薑一味。經張仲景之實驗。認為主治嘔。故兼治乾嘔噦噦逆。茲考徵如下。●小半夏湯證曰。嘔吐穀不得下。●小半夏加茯苓湯證曰。卒嘔吐。又曰。先渴後嘔。●厚朴生薑半夏甘草人參湯證曰。發汗後脹滿。脹滿為厚朴所主。今用生姜半升。半夏半升。必嘔吐兼發無疑。●橘皮湯證曰。乾嘔噦。●橘皮竹茹湯證曰。噦逆。●橘皮枳實生薑湯證。不具。(按此方橘皮之證多。故為一斤。枳實之證少。故為三兩。今加生薑半斤者。豈無噦證乎。)(以上六方。生

薑各半斤。)(●生薑半夏湯證曰。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憤憤然無奈。梳按是疑非此方全證。何則。生薑半夏之為功。本惟治嘔吐。然今於此方。何其謂似嘔不嘔乎。若其然。則似無生薑半夏之所治之證矣。由是觀之。似嘔不嘔四字。蓋屬衍文。而有嘔吐之證。不具可知矣。雖然。似喘不喘。似噦不噦者。似有嘔吐兼發之證。故今煮半夏半升。以內生薑汁一升者。是欲大取生薑之功也。余故曰。半夏能治嘔吐兼發者。生薑能治但嘔者。又能治嘔多吐少者。故方內有生薑半夏併用者。則必謂嘔吐。或謂卒嘔吐。或謂嘔吐不止。若有生薑而無半夏。則謂但嘔。或謂乾嘔。或謂乾嘔噦。或謂噦逆。或謂食穀欲嘔。或謂嘔而胸滿。或謂諸逆。是可以徵焉。然則此方治嘔吐兼發者明矣。故法曰。嘔止停後服。豈其謂似嘔不嘔。而後謂嘔止停後服可乎。(右一方。生薑汁一升。)(●黃耆桂枝五物湯證。不具。(此方治嘔而不急迫者。)(●吳茱萸湯證曰。食穀欲嘔。又曰。

乾嘔。又曰嘔而胸滿。(右二方。生薑各六兩。)(●大柴胡湯證曰。嘔不止。又曰嘔吐。●生薑甘草湯證曰。咳唾涎沫不止。●梔子生薑湯證曰。噦逆。●旋覆代赭石湯證曰。噦氣不除。●厚朴七物湯證。不具。(此方生薑多於大棗。必有嘔吐。)(●厚朴半夏湯證曰。婦人胸中如有炙臑。豈因有此一證。而得用此方乎。今依千金方。則作治胸滿心下堅。(按千金方及翼。稹字皆作堅。此堅字亦稹字也。)(咽中帖帖。如有炙肉。噦吐之不出。咽之不下。是吐之不出。咽之不下。似有嘔逆之狀。故有生薑五兩。半夏一升。此方豈惟婦人之治耶。雖男子亦有此證。則宜施之。●當歸生薑羊肉湯證。不具。(以上七方。生薑各五兩。)(●茯苓澤瀉湯證曰。吐而渴。●生薑瀉心湯證曰。乾噦食臭。●茯苓飲證曰。自吐出水。(以上三方。生薑各四兩。)(●桂枝湯證曰。乾嘔。(凡桂枝湯出入諸方皆倣之。)(●真武湯證曰。嘔。●黃芩加半夏生薑湯證曰。嘔。●桂枝枳實生薑湯證曰。諸逆。●茯苓甘

草湯證。不具。梳按此方之證。以有茯苓生薑各三兩觀之。則有悸無嘔者。蓋屬脫誤也。故東洞翁曰。當有衝逆而嘔證。余曰。心下悸上衝而嘔者。此方主之。屢試屢驗。(以上五方。生薑各三兩。)(●乾薑人參半夏丸證曰。嘔吐不止。(右一方。生薑汁糊丸。)(據此諸方。則生薑但治嘔也。噦逆噦氣乾嘔。或乾噦食臭。皆嘔吐輕證也。故如欬唾涎沫不止。似噦不噦。亦生薑所兼治也。豈不嘔之餘證乎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論生薑曰。去水氣滿。瘵嗽嗽時疾。和半夏。主心下急痛。和杏仁作煎。下急痛氣實。心胸擁隔冷熱氣。神效。持汁和蜜服。治中熱嘔逆。不能下食。【唐】孟詵食療本草論生薑曰。散煩悶。開胃氣。汁作煎服。下一切結實。衝胸膈惡氣。神驗。【唐】陳藏器本草拾遺論生薑曰。破血調中。去冷氣。汁解藥毒。【唐】張鼎論生薑曰。除壯熱。治痰喘脹滿。冷痢腹痛。轉筋心滿。去胸中臭氣。狐臭。殺腹內長蟲。【金】張元素珍珠囊論生薑曰。益脾胃。散風寒。

【元】吳瑞本草日用論生薑曰。解菌竄諸物毒。【明】李時珍本草綱目論生薑曰。生用發散。熟用和中。解食野禽中毒。成喉痺。沒汁點赤眼。搗汁和黃明膠。熱貼風溼痛。甚妙。【明】繆希雍本草經疏論生薑曰。生薑所稟。與乾薑性氣無殊。第消痰。止嘔。出汗。散風。祛寒。止瀉。疎肝。導滯。則功僭於乾者。【清】黃宮繡本草求真論生薑曰。生薑氣味辛。竄。走而不守。據書圍載主治甚多。然總發表除寒。開鬱。散氣。辟惡。除邪。數端而已。其曰傷寒頭痛。傷風鼻塞可用者。以其主有宣散通肺之力也。咳逆口穢而必用者。以其具有開提散鬱之義也。水氣溼瀉血痺而必用者。以其具有逐陰行陽。除溼開導之力也。他如凍耳可擦。狐臭可擦。諸毒可解。亦何莫不由宣發之力。以為辟邪。夫辛入肺。肺旺則一身之氣。皆為吾用。中焦之元氣充而足。脾胃出納之令壯而行。邪氣不能容矣。凡中風。中惡。中氣。中毒。中酒。食厥。痰厥。屍厥。冷厥。霍亂昏暈。一切暴痛。得之必救。早能含薑。不犯穉穉之氣。及山

嵐不正之邪。皆能以正神明。而辟穢惡。真藥中之神聖也。但積熱患目。及因熱成痔者。切忌。至善有言。夜主固。而寢不宜食。秋主收。而寢不宜食。與孕婦食薑。而令兒指象形。此雖就其時令。及以物類相感立說。然亦未可盡拘。【清】楊時泰本草述鈞元論生薑曰。凡物皆有表裏。與人身無二。生薑味辛。留皮者。入肺而開胃。肺胃合。而陽氣乃行。故能開五臟六腑。通四肢關節。由表入裏。為行陽達氣之劑。非此可治風寒。而風寒之傷乎表者。尤其的對。若乾薑兩次去皮。有裏而無表。則似自裏而徐達之經也。【清】鄒澍本經疏證論生薑曰。薑有生者乾者之別。前人謂薑之皮涼。故留皮者辛溫。差減。止能散發是已。而猶有未盡者。薑桂之性。老而彌辣。乾薑受氣足。足則上達肺下通大腸。外及皮毛。中鎮逆。生薑受氣微。微則僅能由中及上。故止散外感。止嘔吐耳。不然。乾薑所主。本經謂其逐風溼。別錄謂其治皮膚間結氣。其病咸在皮毛肌肉間。此何說耶。小青龍湯。小青龍

加石膏湯。真武湯皆曰。心下有水。苔甘五味諸加乾薑法。又皆隸於痰飲。則可見乾薑所治為在中之水飲。非在上之痰矣。至其分數之不等。是愈下則愈少。愈上則愈多。故用一兩者。止真武湯。二兩則小柴胡湯。厚朴麻黃湯。苔甘五味加薑辛半夏湯。餘則盡用三兩矣。雖然。真武湯不用乾薑。豈不因方中有生薑乎。小青龍苔甘五味諸劑。其寒水之不化。正在胸中。合之本經乾薑主治。欬逆上氣。前冠胸滿二字。為不虛設矣。猶不可知薑為脾肺藥耶。【清】王士雄隨息居飲食譜論生薑曰。薑辛熱散風寒。溫中去痰溼。止嘔定痛。消脹殺蟲。治陰冷諸疴。殺鳥獸鱗介穢惡之毒。可醬漬。可糟醃。多食久食。耗液傷營。病非風寒外感。寒溼內蓄。而內熱陰虛。目疾喉患。血證瘡瘍。嘔瀉有火。暑熱時瘧。熱哮喘。胎產妨。及時病後痧痘前均忌之。【清】唐容川本草問答論生薑曰。生薑其氣升散。而又能降氣。止嘔者。因其味較勝。且係土中之根。是秉地火之味。而歸於根。故能降氣止嘔。

雖能升散。而與麻桂之純升者不同。故小柴胡。小半夏湯。皆用之以止嘔。 國外學說 日本學說謂。生薑者。為供香料之藥品。依日本藥局方。為健胃芳香調味藥也。又東洞吉益藥微曰。凡生薑之功。詳於諸家本草。雖然。其說非疾醫之善。蓋服傷家腐談。而誤世者。不為不少矣。曰。薑久服。通神明。曰。薑要熱。則去皮。要冷。則留皮。曰。薑製半夏厚朴之毒。曰。生薑屑。生乾薑。生薑。分別用之。曰。薑能彌禦百邪。以上諸說。非疾醫之義。奚俟余之育哉。嗚呼。如食之通神明之說。則出於偽書。本草經。朱子嘗取此說。以註論語。余雖未知其是否。何其說之迂也。陳藏器去皮留皮之育。彼豈知生薑之功。在一根之中矣乎。又至如彼生薑制半夏厚朴之毒之說。一何盲昧之至於此乎。若夫生薑制半夏之毒。則仲景何用生薑。半夏湯。小半夏湯乎。若夫生薑制厚朴之毒。則仲景何用厚朴。生薑半夏人蔘甘草湯。厚朴半夏湯乎。苟如李杲之育。半夏厚朴實為純物。

五畫 生

又與不用同焉。夫仲景之用生薑與半夏厚朴也。同取其毒之用耳。又何制之為。况生薑能禦邪百邪之旨。則時珍誤裁斷。王安石薑能驅我者也。於毒邪臭腥寒熱。皆足以禦之之說。而惟云禦邪百邪。於義不通。安石之說。猶且牽強。而况於時珍之言乎。是大惑後人。不可從焉。孫思邈曰。薑為嘔家聖藥。陶弘景嘗謂不撤薑食。不多食。言可常食。但不可多爾。有病者是所宜矣。二子之言為得焉。

配合應用 治痰癖卒風。用生薑二兩。附子一兩。水五升。煮取二升。分再服。忌豬肉冷水。(千金方)

治寒熱痰嗽。初起者。燒薑一塊含咽之。(本草衍義方)

治欬嗽不止。用生薑五兩。鵝半升。火煮熟食。盡。段侍御用之有效。(初虞世養生必用方)

治小兒欬嗽。用生薑四兩。煎湯浴之。(千金方)

治暴逆氣上。嚼薑二三片。壓效。(寇氏衍義方)

治嘔吐不止。又殺腹內長蟲。

用生薑二兩。醋漿二合。銀器煎取四合。連滓呷之。(食醫心鏡方)

治霍亂欲死。用生薑五兩。牛兒尿一升。水四升。煎取二升。分再服即止。(梅師方)

治霍亂轉筋。入腹欲死。用生薑三兩。搗酒一升。煮兩三沸。服。仍以薑搗貼痛處。(外臺秘要方)

治霍亂腹脹。不得吐下。用生薑一斤。水七升。煮二升。分作三服。(肘後方)

治溼熱發黃。用生薑時周身擦之。其黃自退。一方加茵陳蒿尤妙。(傷寒種法方)

治產後肉線垂下。用老薑連皮三斤。搗爛入麻油二斤。拌勻炒乾。先以熟絹五尺。摺作方結。令人輕輕盛起肉線。使之屈曲。作三團。納入產戶。仍以絹袋盛置。就近煎之。冷則更換。一日夜收入大半。二日盡入。但不可使線斷。斷則不治矣。(魏夫人秘傳怪病方)

某君云。薑汁可治疝氣。疝氣俗名小腸氣。有此病者。為學生之患。起居偶一不慎。即立時舉發。如受涼。忍飢。及種種勞神勞力過度。

皆足引起疝氣之發作。余亦夙有此患。發時恒數日臥床。去歲冬間。余方舉發。值余戚真君揚州來。教一方。用鮮生薑搗汁一茶杯。去渣。將汁貯瓷碗中。摺入浴室洗澡。俟周身汗出時。以腎囊置碗中。浸入薑汁之內。囊際微覺若針刺。即漸收縮。十分鐘後。腫如瓠瓠之腎囊。已縮小如常人。黃汗悉從毛孔吸入無餘。余數年舊患。由此永告脫離矣。

用量 五分至一錢。
施用宜忌 凡陰虛有熱者。與孕婦諸病禁用。

配合宜忌 薑黃芩。黃連。夜明砂。而秦椒為之使。殺半夏。南星。茵蘆。野禽毒。

著名方劑 生薑瀉心湯。治胃中不和。心下痞。乾噎食臭。腸下水氣。腹下雷鳴下痢。(傷寒論方) 用生薑四兩。炙甘草。人參。黃芩各三錢。半夏乾薑各一兩。大棗十二枚。以上七味。以水一升。煮取六升。去渣。煎取三升。溫服一升。日三服。

生薑半夏湯。治病人胸中似喘。不喘似嘔。不嘔似噦。不噦

心中憤憤然無奈者。以此湯主之。(金匱) 用生薑一斤。半夏半斤。用水七升。煮取二升。納生薑汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一。

參攷資料 生薑久服少志少智。傷心氣。今人噉辛辣物。惟此最常。故論語云。每食不撤薑。言可常食。但不可多爾。有病者是所宜矣。(陶弘景) 八九月多食薑。至春多患眼。損筋力。孕婦食之。令兒盈指。(孫思邈) 崔元亮集驗方。載救時薑茶。治痢方。以生薑切細和好茶一兩。盤任意呷之。便瘥。若是熱痢。留薑皮。冷痢去皮。大妙。(蘇頌) 薑能助陽。茶能助陰。二物皆消散惡氣。調和陰陽。且解溼熱及酒食暑氣之毒。不問赤白。通宜用之。蘇東坡治文潯公有效。

(楊士瀛) 生薑治暴噦氣。嚼三兩。皂子大。下嚥定。屢服屢定。初得寒熱痰嗽。燒一塊冷嚼之。終日間嗽自愈。暴赤眼無痛者。以古銅錢刮淨。置上。取汁於錢。腎點。自然淚出。今日點。來日愈。但小兒甚懼。不須疑。已試良驗。(寇宗奭) 生薑之用。有因制半夏厚朴之毒一也。

生薑瀉心湯。治胃中不和。心下痞。乾噎食臭。腸下水氣。腹下雷鳴下痢。(傷寒論方) 用生薑四兩。炙甘草。人參。黃芩各三錢。半夏乾薑各一兩。大棗十二枚。以上七味。以水一升。煮取六升。去渣。煎取三升。溫服一升。日三服。

生薑半夏湯。治病人胸中似喘。不喘似嘔。不嘔似噦。不噦

心中憤憤然無奈者。以此湯主之。(金匱) 用生薑一斤。半夏半斤。用水七升。煮取二升。納生薑汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一。

參攷資料 生薑久服少志少智。傷心氣。今人噉辛辣物。惟此最常。故論語云。每食不撤薑。言可常食。但不可多爾。有病者是所宜矣。(陶弘景) 八九月多食薑。至春多患眼。損筋力。孕婦食之。令兒盈指。(孫思邈) 崔元亮集驗方。載救時薑茶。治痢方。以生薑切細和好茶一兩。盤任意呷之。便瘥。若是熱痢。留薑皮。冷痢去皮。大妙。(蘇頌) 薑能助陽。茶能助陰。二物皆消散惡氣。調和陰陽。且解溼熱及酒食暑氣之毒。不問赤白。通宜用之。蘇東坡治文潯公有效。

發散風寒二也。與棗同用。辛溫益

脾胃元氣。溫中去溼三也。與芍藥

同用。溫經散寒四也。(李杲)古

人言秋不食薑。令人洩氣。蓋夏月

火旺。宜汗散之。故食薑不禁。辛走

氣瀉肺。故秋月則禁之。晦菴語錄

亦有秋薑。天人天年之語。(李杲)

①薑辛而不散。去邪辟惡。生痰熱

食。醋醬糟鹽蜜煎調和。無不宜之。

可蔬可和。可果可藥。其利溥矣。凡

早行山行宜含一塊。不犯霧露清

溼之氣。及山嵐不正之邪。案方廣

心法附餘云。凡中風中暑中氣中

毒中惡乾霍亂一切卒暴之病。用

薑汁與童尿服立可解散。蓋薑能

開痰。下氣。童尿降火也。(李時珍)

②食薑久積熱惡目。珍壓試有准。

凡病瘳人多食兼酒立發甚速。瘳

疥人多食則生惡肉。此皆昔人所

未言者也。相感志云。精薑瓶內入

蟬蛻。雖老薑無筋。亦物性有所伏

耶。(李時珍)③薑有大小。大者入

藥用。加入煎藥。小者作調和食品

之用。或作蔬菜。性畏寒暑。夏宜置

於涼處。冬則養於暖地。(大和本

草)④上牀蘿蔔下牀薑。羅能開

胃。蘿蔔消食也。(俗言)

【生薑半夏麴】

命名 本品為半夏麴之

一種。係和薑汁製成者。故名。

製法 用半夏入生薑汁浸透。

草。七日。待生黃衣。懸掛風乾。入

藥用。

採取 以陳久者良。

主治 痰淺近諸痰。

【生薑粥】

主治 酒中辟惡。

【生薑麥】即南天燭之別名。詳「南天燭」條。

【生薑】即城蠶之古籍別名。典見嘉佑補註本草。詳「城蠶」條。

【生薑】即礬石之別名。詳「礬石」條。

【生鐵】

基本 本品甫由鐵內探出。而為初次煉成之

鐵。

性質 辛。微寒。微毒。

成分 含有炭。磷。硫。砂等。百分

中約含炭三分至六分。

主治 脫肛。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論生鐵曰。鎮心。安五臟。治

癩疾。黑髮。治癬及惡瘡疥。蝸蛛

咬。蒜磨生油調敷。【明】李時珍本

草綱目論生鐵曰。散瘀血。消丹毒。

【生鐵落】即鐵落之處方用名。詳

「鐵落」條。

【生曬朮】即白朮之處方用名。詳

「白朮」條。

【生鐵甲】即鐵甲之處方用名。詳

「鐵甲」條。

【田中泥】

主治 馬蝗入人耳。取出。人誤吞馬蝗入腹者。酒和二升服。當利出。

【田五加木】即狼把草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「狼把草」條。

【田父】古籍別名。蛤。(本草綱目)

產地 出原野池澤。及陰溼石隙中。

形態 田父為蛙屬。即蝦蟆之大者。能食蛇。蛇行被逐。殆不能去。因啣其尾。久之蛇死。則食肉。僅留尾後數寸皮不損。捕得可供藥用。

性質 有毒。

主治 蠶咬。取脊背上白汁。和蟻子灰塗之。

【田母草】

形態 田母草為雜草類之一種。無花實。

其根可供藥用。

採取 三月採之。

性質 涼。

主治 除煩熱。小兒風熱尤效。

【田字草】即菝之古籍別名。典見綱目。詳「菝」條。

【田芥】即石龍芮之日本名詞。詳「石龍芮」條。

【田基黃】性質 苦。甘。平。主治 腫脹。解蟲毒。敷惡瘡。理疔瘡腫。

【田麻】外國名詞 Corcho。ropais. aronata. S. (拉丁) カラスノゴマ(日本)

基本 係田麻科。田麻屬。藥用其葉。

形態 田麻為雜草類之一年生草本。高二三尺。分枝甚多。葉卵形。緣邊有齒牙。五生。夏秋之候。花生葉腋。花瓣有五。黃色。雄蕊二十枚。其中五枚無葯。結實為蒴。細而長。約一寸許。如圓筒狀。生毛茸頗多。

採取 冬月採葉用。
主治 癰癤腫毒。

【田螺】

原名 田螺。
命名 本品殼有旋紋

而生於水田故名。

處方用名 田螺水。田螺壳。田

螺肉。


基本 係軟體動物腹足類蛤

蚌屬。其肉與壳可為藥用。

產地 凡水田池沼溝澤岸畔

側間多有產生。間有產在半淡半

鹹水中者。



螺 田

形態 螺與蝸牛相近。壳亦相
似。並均匍行。惟螺壳薄。呈圓錐形。
色蒼黑。螺層圓滑。壳口卵圓形。有
重輪紋之角質層。甲肉體之口吻
長。並具長錐形之觸角。其基部外
旁甚短。有具柄之眼。脚闊大。口在
頭之下。胃粗大。腸至後端。復折向

前。開口於外套腔內。而為肛門。螺
一枚。位於心臟前方之左。連壳之
筋條。與蛤類之肉柱相同。大塊之
筋肉。則在脚部。壳高約一寸許。食
植物性之物質。雌雄異體。初夏為
胎生。因其卵孵化於壳內。

製法 其入藥用。生搗。或滴汁
和藥。其汁俗稱田螺水。取汁之法。
用尖刀挑起螺管。入冰片末少許。
平放瓷盤內。其汁水即從螺竅內
滲出。

性質 甘。大寒。無毒。

效能 塗瘡癩。治目痛。醒酒。止

渴。用作解熱解毒藥。

主治 目熱。赤痛。止渴。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論田螺曰。煮汁療

熱。醒酒。用真珠黃連末。內入良久。

取汁。注目中。止目痛。【明】李時珍

本草綱目論田螺曰。利溼熱。治黃

疸。搗爛貼臍。引熱下行。止噤口痢。

下水氣。淋閉。取水擦痔瘡。狐臭。燒

研治瘰癧癬瘡。【明】穆希雍本草

經疏論田螺曰。田螺產於水田中。

稟水土之陰氣。故其汁大寒。味應

甘。性無毒。陶隱居以真珠黃連末。

內入良久。取汁點目。痛神效。以其
寒能除熱也。解一切有餘之熱。故
能止渴及醒酒。【清】黃宮繡本草
求真論田螺曰。田螺味甘大寒。產
於水田。性稟至陰。故能引熱下行。
凡人目患赤痛。只取田螺。以珍珠
末黃連末。納入良久。取汁點目。神
效。以寒能除熱也。且治噤口痢疾。

用活大田螺二個。搗爛。入麝香三
分。作餅烘熱。貼臍間。半日。熱氣下
行。即思食矣。至治小便腹脹如鼓。
只取田螺一個。鹽匙連殼搗碎。敷
臍下一寸三分。即通。并能止渴醒
酒。以除餘熱。此雖止屬外治。亦見
其性引下行之力耳。【清】王士雄

隨息居飲食譜論田螺曰。田螺甘
寒。清熱。通水利腸。療目赤黃痘脚
氣。痔瘡。多食寒中脾虛者。忌。性能
澄濁。宜畜水缸。

配合應用 ①治消渴飲水。日
夜不止。小便數者。心鏡用田螺五
升。水一斗。浸一夜。渴即飲之。每日
一換水。及螺淨煮食。能飲汁亦妙。

又用糯米二升。煮稀粥一斗。冷定。
入田中活螺三升。在內待食粥盡。
吐沫出。乃收飲之。立效。【聖惠方】

②治肝熱目赤。用大田螺七枚。
洗淨。新汲水養去泥穢。換水一升。
浸洗。取起於淨器中。着少鹽花於
甲內。承取自然汁。點目。逐箇用了。
放去之。【藥性論方】

③治爛弦風眼。方法同上。但以
銅綠代鹽花。
④治飲酒後口糜。螺蚌煮汁飲。
【聖惠方】

⑤治酒醉不醒。用水中螺蚌。葱
豉煮食。飲汁即解。【肘後方】
⑥治小便不通。腹脹如鼓。用田
螺一枚。鹽半匕。生搗。傳臍下一寸
三分。即通。熊彥誠曾得此疾。異人
授此方。果愈。【類編方】

⑦治噤口痢疾。用大田螺二枚。
搗爛。入麝香三分。作餅烘熱。貼臍
間。半日。熱氣下行。即思食矣。甚效。
【丹溪方】

⑧治腸風下血。因酒毒者。大田
螺五個。燒至殼白肉乾。研末。作一
服。熱酒下。【百一選方】
⑨治大腸脫肛。脫下三五寸者。
用大田螺二三枚。將井水養三四
日。去泥。用雞爪黃連。研細末。入螺
內。待化成水。以濃茶洗淨肛門。將

雞翎蘸掃之。以軟帛托上。自然不
再復發也。(德生堂經驗方)

⑤治反胃嘔噎。田螺洗淨水養。
待吐出泥渣。取晒半乾。丸梧子大。
每服三十九。薑香湯下。爛殼研服
亦可。(經驗方)

⑥治水氣浮腫。用大田螺。大蒜。
車前子等分。搗膏攤貼。水上水從
便旋而下。象山縣民病此。得是方
而愈。(仇遠釋史方)

⑦治酒疽諸疔。用田螺將水養
數日。去泥取出。生搗爛入好酒內。
用布帛濾過。將汁飲之。日三服。自
效。(晉城方)

⑧治脚氣攻注。用生大田螺搗
爛。傅兩股上。便覺冷。趨至足而安。
又可傅丹田。利小便。黃守約曾用。
有效。(釋史方)

⑨治痔漏疼痛。用田螺一個。入
片臘一分在內。取水搽之。仍先以
冬瓜湯洗淨。孫氏用田螺一枚。用
針刺破。入白礬末。同埋一夜。取螺
內水搽瘡上。又善能止痛也。甚妙。
柏珍用馬齒莧湯洗淨。搗活螺殼
傅上。其病即愈。

⑩治肢氣狐臭。用田螺一個。水

養。俟膠開。挑巴豆仁一個在內。取
置盂內。夏一夜。冬七夜。自然成水。
常取搽之。久久絕根。又方。大田螺
一個。入麝香三分在內。埋露地。七
七日取出。看患洗拭。以墨塗上。再
洗看有墨處。是患竅。以螺汁點之。
三五次即瘥。

⑪治瘰癧潰破。用田螺連肉燒
存性。香油調搽。(集要方)

⑫治疔瘡惡腫。用田螺入冰片。
化水點瘡上。(醫濟方)

⑬治風蟲癬疥。用螺十個。槓
樹皮末一兩。同入碗內。蒸熱搗爛。
入礬紅三錢。以鹽水調搽。(孫氏
方)

⑭治繞指毒瘡。生手足指上。以
活田螺一枚。生用搗碎。縛之即瘥。
(多能鄙事方)

⑮治妬精陰瘡。大田螺二個。和
殼燒存性。入輕粉同研。傅之有效。
(醫林集要方)

施用宜忌 凡無風熱實邪者
禁用。

【田螺水】即田螺之處方用名。詳
【田螺】條。

【田螺肉】即田螺之處方用名。詳

【田螺】條。

【田螺壳】即田螺之處方用名。詳

【田螺】條。

【田螺涎】基本 本品係田螺
中自吐出之涎沫。

製法 用田螺不拘多少。水漂
加香油一盞於水內。其涎自然吐
出。取而曬乾為末用。

主治 水腫。每服不過三分。酒
調下。水自小便下。氣自大便出。腫
即消。再服養脾胃藥全愈。

原名 田。 原名 田。

【田雞】 命名 本品肉味如雞。
故名。

古籍別名 長股。(別錄)青雞。
青蛙。坐魚。蛤魚。石雞。水雞。(本草
綱目)

外國名詞 *Rana esculenta*
(拉丁)



田 雞

形態 田雞為兩棲類蛙屬之
一種。其體小。色鮮綠。腹部白色。前
趾無蹼。後趾有半蹼。雄者將雨必
鳴。其肉可供食與藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 小兒赤氣肌瘠。臍傷。止
痛。氣不足。

歷代記述攷證 【宋】日華諸
家本草論田雞曰。小兒熱瘡。殺尸
疰病。急去勢劣。解熱毒。【宋】寇宗
爽本草衍義論田雞曰。食之解勞
熱。【明】李時珍本草綱目論田雞
曰。利水消腫。燒灰塗月蝕。【明】
陳嘉謨本草蒙詒論田雞曰。饑食
調疔瘡。補虛損。尤宜產婦。搗汁服。
治蝦蟆瘡病。

參攷資料 ①田雞。蝦蟆之屬。
居陸地。青脊善鳴。聲作蛙者是也。
(韓保昇) ②田雞。今處處有之。似
蝦蟆而背青綠色。尖嘴細腹。俗謂
之青蛙。亦有背黃路者。謂之金
線。陶氏所謂土鴨。即爾雅所謂
在水曰雉者是也。俗名石鴨。所謂
蛤子。即今水雞是也。閩蜀浙東人
以為佳饌。(蘇頌) ③南人食漬蛤
云。補虛損。尤宜產婦。(蘇頌) ④時

五 畫 田

行面赤項腫。名蝦蟆蠱。以金線澆

搗汁。水調空腹飲極效。曾活數

人。(陳嘉謨) ① 澆產於水。與螺蚌

同性。故能解熱毒。利水氣。但係溼

化之物。其骨性復熱。而今人食者

每同辛辣及脂油煎煉。是抱薪救

火矣。安能求其益哉。按載原禮證

治要訣云。凡渾身水腫。或單腹脹

者。以青雷一二隻。去皮炙食之。則

自治也。(李時珍) ② 田雞。水雞。土

鴨。形稱雖異。功用則一也。四月食

之最美。五月漸老。可採入藥。考功

記云。以短鳴者。謂之屬。農人占

其聲之早晚大小。以下豐歉。故唐

人章孝標詩云。田家無五行。水旱

卜蛙聲。蛙亦能化為蟹。語見列子

(李時珍) ③ 蛙。骨熱。食之小便秘

淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙食多

令人尿閉。膝下酸痛。有至死者。搗

車前水飲可解。吳瑞曰。正月出者

名黃蛤。不可食。(李時珍)

【田蠶】即田螺之原名。詳『田螺』

條。

【由比得】即忍冬藤之古籍別名。

【由胡】即白蒿之古籍別名。與見

爾雅。詳『白蒿』條。

【由跋】古屬別名。小南星。象

頭花。(植物圖考)

外國名詞 Arisaema tri-

lobata, Schott var. Sieboldii,

Engl. (拉丁)ムサシブミ(日

本)

基本 係天南星科天南星屬。

藥用由跋之新生球根。

形態 由跋為毒草類之多年

生草本。地下有球根。葉為掌狀複

葉。小葉三片。春日白二葉之中間

抽出花軸。花單性肉穗。花序頂端

延長而細。佛焰形大。上部卷曲。表

面暗黃綠色。裏面帶紫色。其嫩根

可供藥用。

性質 辛苦。溫。有毒。

主治 毒腫結熱。

參攷資料 ① 由跋本出始興。

今人亦種之。狀如烏髮而布地。花

紫色。根似附子。若酒磨塗腫亦效。

(陶弘景) ② 由跋生林下。苗高一

尺。似芍藥。根如雞卵。(陳藏器) ③

由跋是虎掌新根。大於半夏一二

倍。四畔未有子牙。其宿根即虎掌

也。(蘇恭) ④ 陶氏所說乃鳶尾根。

即鳶尾也。又言虎掌似半夏。是以

鳶尾為由跋。以由跋為半夏。非惟

不識半夏。亦不識鳶尾與由跋也。

今南人猶以由跋為半夏。(蘇恭)

⑤ 此即天南星之小者。其氣未足。

不堪服食。故醫方罕用。惟重八九

錢至一兩餘者。氣足乃佳。正如附

子之側子不如附子之義也。(李

時珍)

【甲香】即海螵之古籍別名。典見

交州記。詳『海螵』條。

【甲煎】基本 甲煎以甲香同

製成。可作口脂及焚蒸。也可入藥

用。功與甲香略同。

性質 辛。溫。無毒。

主治 甲疽。小兒頭瘡。吻瘡。口

旁瘰癧。其後月蝕。齋蜂蛇蚊之瘡

並傳之。

【甲疽】係瘰癧之藥商隱名。詳『

瘰癧』條。

【申煎】即骨碎補之處方用名。詳

『骨碎補』條。

【白丁香】原名 雄雀屎。

處方用名 白丁香。

古籍別名 青丹。(綱目拾遺)

雀屎。(雷公炮炙論)

基本 屬鳴禽類為雄雀之糞

尿。

形態 凡鳥左翼掩右者是雄。

其尿頭尖挺直。若其兩頭圓者。雌

尿也。

採取 五月間或臘月中採收。

雄雀者良。

製法 雷斅曰。凡使勿用雀兒

糞。雀兒口黃未經淫者也。底坐尖

在上是雄。兩頭圓者是雌。陰人使

雄。陽人使雌。臘月採得。去兩畔附

着者。鉢中研細。以甘草水浸一夜。

去水焙乾。又取白法。用漆桌一

張。將水打濕。桌面再以溼紙略搗。

去水。留些水氣。却將雀屎滿桌鋪

開。以篋頭輾轉抄之。其白粉俱粘

桌上。掠去黑屎。移桌於日中曬乾。

鷄翎掃下白用。

性質 苦。溫。微毒。

成分 白丁香之主成分。恐係

含液有機物之尿酸。安母尼亞。及

磷酸鹽類等。

效能 消積脹。治癰癩。用治疔

氣癰癩。積聚脹滿。目翳。肉。及一

切腫毒藥。

主治 療目痛。決瘧疽。女子帶下。溺不利。除疝瘕。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論白丁香曰。療蠲齒。

【唐】蘇恭新修本草論白丁香曰。和首生男子乳。點目中。弩肉赤。鼠貫瞳子者。即消神效。和蜜丸服。治瘕瘕久痼諸病。和少乾薑服之。大肥悅人。【唐】陳藏器本草拾遺論白丁香曰。癰癩不潰者。點塗即潰。急黃欲死者。湯化服之。立甦。腹中痰癖諸塊。伏梁者。和乾薑桂心艾葉為丸。服之能令消爛。【唐】孟詵食療本草論白丁香曰。和天雄乾薑丸服。能強陰。【明】李時珍本草綱目論白丁香曰。消積除脹。通咽寒口噤。女人乳腫。瘡瘍。中風。風蟲牙痛。【明】穆希雍本草經疏論白丁香曰。雀屎本經無氣味。察其所主。應是辛苦溫之物。性善消散。故外用療目痛。決瘧癰。內服治帶下。溺不利。疝瘕也。蘇恭以首生男子乳。研雀屎成泥。點目中。弩肉赤。鼠貫瞳子者。即消神效。蓋取其辛散。拔出火毒之義也。【清】楊時泰本草述鈞元論白丁香曰。雀糞乃

陽氣所轉化而出。所治水腫癰風。癰症滯下。皆人身之真陽氣化虛。乏以為病者。

配合應用 ①治雀亂不通。服

二十一粒。研末。溫酒服。未效再服。【總錄方】

②治目中昏膜。治目熱生赤白

膜。以雄雀屎和人乳點上。自爛。【肘後方】

③治風蟲牙痛。雄雀屎綿裹塞

孔中。日二易之效。【外臺祕要方】

④治咽喉噤塞。雄雀屎末溫水

灌半錢。【外臺祕要方】

⑤治小兒口噤中風。用雀屎水

丸。麻子大。飲下二丸。即愈。【千金方】

⑥治小兒不乳。用雀屎四枚。抹

之與吮。【總錄方】

⑦治小兒痘瘰。白丁香末入麝

少許。米飲服一錢。【保幼大千方】

⑧治婦人吹乳。白丁香半兩為

末。以溫酒服一錢。【聖惠方】

⑨治破傷風瘡。作白痴無血者。

殺人最急。以黃雀糞直者。研末。熱酒服半錢。【普濟方】

⑩治破決癰癩。諸癰已成。膿膿

銳者。取雀屎塗瘡頭。即易決。【梅

師方】

⑪治癩瘡作痛。用雀屎燕窠土

研傳之。【直指方】

⑫治浸淫瘡。洗淨。以雀屎齏

瓣和研。日塗之。【千金方】

⑬治喉痺乳蛾。白丁香二十個。

以沙糖和作三丸。每以丸綿裹

含嚥。即時遂愈。甚者不過一丸。極

有奇效。【普濟方】

⑭治面鼻酒皰。白丁香十二粒。

蜜半兩。早夜點。久久自去。【聖惠

方】

用量 八分至一錢半。

【白土】即落花花生出於豎樹鳥糞

粒細而味澁者之古籍別名。典見

綱目拾遺詳「落花生」條。

【白土粉】即白堊之古籍別名。與

見本草衍義詳「白堊」條。

【白大毒】即白朮之古籍別名。典

見和漢藥考詳「白朮」條。

主治 鴻痢腸辟。療心痛。破疝瘕。【白山桃】即玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺詳「玉淨瓶」條。【白丑】即牽牛子之處方用名。詳「牽牛子」條。【白及】即黃精之古籍別名。典見別錄詳「黃精」條。【白菝】原名詳「白菝」條。【白木耳】命名 本品附木而生。色白。狀似人耳。故名。處方用名 銀耳。基本 係擔子胞菌類膠菌科。產地 產於四川、貴州、湖北、福建等地。以四川重慶、通江、太平等縣所產者為最佳。其實厚而純潔。色更白。形態 白木耳為死物寄生菌類之一種。形如鷄冠。溼時觸手有膠質。色白。乾則變為角質。色轉微黃。收縮力甚著。能縮小至二十五分之一。遇水而膨漲。遇燥而乾縮。即其膠質之生殖體。既味淡薄。可供食與藥用。種植 銀耳一物。吾國用為珍

五靈白

五 變 白

品。然著名出產之地。厥為川鄂。實則銀耳與香蕈麻菇相同。可種香蕈麻菇者。無一不可種白木耳也。吾國西北嶺上千里。地多山林。可栽培白木耳者。徧於全國。茲錄曾濟寬氏所述之栽培法於下。銀耳常生於青岡(一名櫟樹)之枯木。故曰栽培銀耳。須先預備青岡木(如無青岡之地。用與青岡同類之木亦可。但以樹皮含有澀素者為佳)。即於前年十月中。樹葉變黃之時。代徑大五六寸之木。不可去皮。就地使其充分乾燥腐朽。至翌年三四月。鋸為五六尺之段。自小頭向大頭。縱橫每隔四五寸。用大刀砍口。深達材部。砍過。用石為枕。次第架成井字。架木之地。以有樹陰影者為宜。如積於森林內之傾斜地。則用木為枕。列成階段亦可。積木之後。乃行施種。如當地多已生銀耳之母木。則插數木於積木之間。或於五六月之頃。取方長勢之銀耳。浸於沸後冷靜之清水中。以水變白漿為度。然後用杓汲漿。注於已砍之口內。即可繁殖。如無已生銀耳之母木。而於產地時

種時。則選長銀耳已三四年之木一二段。(搬運之際務須不觸日光。強風。不使剛且不得過半月之久。)碎之為粉。和淨水調漿。如前法注之。再若此項種木不易得時。則惟向產地訂購七八分成熟之銀耳。囑其用包郵票之蠟紙。裹銀耳。摘下時用手輕壓。以紙裹落有白粉為止。(此白粉即銀耳種子)連藥數十枚。迅速用信封送寄。大約在二星期以內。還可種活。即依前法調漿注射可也。播種銀耳後之木。最忌陽光。須以樹枝或蒿桿覆之。約經三星期後。可以除去。若夏天陽光過烈時。宜陰蔭庇覆之。間遇雨水過多。又須取開。總期給與木以相當溼氣。春季播種後。至當年八九月。即有銀耳小體發生。此時不可採。若不見發生。而或疑未種成者。則將各木用斧砍進皮層。如皮不脫。而皮底帶白色絲狀者。即為銀耳已種成之證。此白絲即銀耳之根。(名曰菌絲)此時雖未結耳。然根已蔓延矣。如砍之皮脫。而裏帶他色者。其木已不能生耳。可取出而為他用。至翌年三

四月間。則於陰蔭適度之森林內。(無森林搭棚亦可)架木為又。又上橫梁。而以將生銀耳之木。斜立於左右。則五六月生耳必旺。適度採之。以日光曬乾。即可販賣。又若於秋季欲使銀耳盛生。則以木之兩端。用黏泥漿叩之。每三五日叩一次。約三禮拜。放置如前。則銀耳易生。以後做此。至第三第四年出產最多。至第六七年則減少。此時可預備其次栽培之木。而陸續以此為種木。則銀耳之收穫未可限量矣。

性質 甘。平。無毒。

主治 潤肺止咳。滋陰養胃。益氣和血。補腦強心。入肺胃腎三經。能清肺中熱。養胃陰。濟腎燥。治肺熱咳嗽。肺燥乾咳。久咳喉癢。咳痰帶血。或痰中血絲。或久咳絡傷。脅痛。及肺癰肺痿。婦人月經不調。肺熱胃炎。大便閉結。大便下血。

近人學說 ●吳冰心曰。白木耳發生於小柄櫟之朽木。為一種死物寄生菌。以其物質置顯微鏡下觀之。見有平行之長形細胞。四枚所成。每細胞各有一小柄。擔

三六六

孢子於此。乃擔子柄也。以是為擔子胞菌類。又因其菌類中位置甚低。所以決其為原始擔子胞菌類。在擔子細胞有二縱壁。則知為膠菌科。而非木耳科明矣。夫膠菌科之菌類。分類法全視分生子以定。種屬。今試將此孢子培養之。當見在濃厚之培養液中。其分生子甚大。而在稀薄之培養液。及蒸餾水中。則生釀母之小分生子。因是又可決其隸於白木耳屬。更就其形狀色澤審察之。乃知其即為白木耳。無疑義矣。若就其生殖上言之。則全核幾無不可栽培之處。偏南偏北。咸得孳生。今以研究孢子及菌絲性質之結果。述之如次。(一)孢子作卵形。直徑三至五密克倫。(二)孢子在蒸餾水或小柄培養液中。則在攝氏二十八度之溫度。歷四十八時間。可生釀母狀分生子。若在攝氏十六度。則須歷五十二時間。乃得發生。(三)孢子觸攝氏零度之寒氣。雖二十四時間。猶能不失發芽力。若華氏零度之寒氣。則二小時內。亦不失發芽力。(四)菌絲乾燥則枯死。(五)菌絲

韋爾氏氏零度之寒氣亦不枯死。(六)苗絲觸華氏零度之寒氣。歷二時間始枯死。綜上所記而觀之。白木耳之孢子苗絲。對於寒氣之抵抗力。其大無匹。其實性之堅強可知也。曹炳章曰。蓋白木耳色白形似肺葉。以其由長形細胞組織而成。亦與肺氣管枝。有多數氣胞之組織相同。白木耳之漲縮力。有二十五之一之比例。且與肺之漲縮力較而更強。其性喜陰多陽少陰靜之地。寄生於老朽古木上。結土間。得天地清靜之精氣最足。亦與肺臟具清靈肅殺之氣質相類。且無論攝氏零度之寒氣。亦不枯死。對於寒氣抵抗力甚強。其形質之堅強。更可知矣。其形氣既同於吾人肺體。而質性較強於肺臟。故以其作肺臟滋養品。必無疑義。凡肺熱肺燥。肝火燥肺。而為乾咳痰嗽。吐血咯血。使血痰中帶血。及肺癰肺痿者。故服之輒效。此就其性質生成之本能。以研究其治療上之效用。去面上黑斑。美容顏。凡癆瘵質。陰虛火旺之體。煩熱乾咳。或痰血等症。以作滋養調補之品。

五畫 白

為最宜。若風寒犯肺。溼熱癰痰致嗽。皆為禁忌。

【白木耳】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「落葉松茸」條。

【白毛刺】即鹿角藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹿角藤」條。

【白毛夏枯草】產地 杭州 甚多。以江蘇丹陽者佳。

形態 白毛夏枯草為夏枯草之一種。一根直豎。葉上有白毛。花如落花生而較大。可供藥用。

性質 苦寒。

主治 專清肝火。

【白毛菇】即山慈姑之處方用名。詳「山慈姑」條。

【白毛藤】古籍別名 天燈籠。和尙頭草。

形態 白毛藤為蔓草類之一種。莖葉皆有白毛。八九月開花。藕合色。結子小如豆而軟。生青熟紅。紅如珊瑚。霜後葉枯。惟赤子變黑。緩懸牆壁間。鳥雀喜食之。其藤可供藥用。

性質 熱。無毒。

主治 活血生血。追風清溼熱。治黃疸水腫。小兒蛔結腹痛。除骨節風溼痛。取乾者浸酒服。(綱目拾遺)

配合應用 ①治風痛。桑黃二兩。白毛藤二兩。切碎。用紹興原酒六觔。煎三炷香。每日服一飯碗。(楊氏驗方)

②治黃疸初起。白毛藤、神仙對坐草、大茵陳、三白草、車前草、各等分。白酒煎服。(百草鏡方)

③治大氣浮。用白毛藤。無灰酒服。(不藥良方)

近人學說 張山雷曰。白毛藤以效力而言。似亦溫和性質。然頗曾採而嘗之。略如青草。氣不含辛辣及惡劣等味。蓋蔓延走竄之性。即其全體大用。不在乎氣味之寒熱溫涼者。惟以趙氏所治諸症。釋其大旨。類皆溼熱為病。居其多數。而氣味頗清。蓋清熱理溼。而通水道。利關節。兼能消痰去癥。理氣解結者也。

【白水石】即寒水石之古籍別名。典見本經。詳「寒水石」條。

【白水者】即黃耆之一種。詳「黃耆」條。

者」條。

【白布】基本 本品即棉布之色白者。

主治 白布治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大炷。安刀斧上燒。令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布燒灰酒服。

【白冬瓜】即冬瓜之古籍別名。典見綱目。詳「冬瓜」條。

【白功草】即王孫之吳地別名。詳「王孫」條。

【白朮】命名 本品藥似薊。而味似薑芥。故有山芥山薊。天薊諸名。且揚州之域。恒多栽植。其狀如枹。遂有枹枹。枹薊等名。

處方用名 生白朮。生曬朮。炒白朮。焦冬朮。於潛朮。太紫黃於朮。湖廣朮。江西朮。仙居朮。野於朮。天生朮。炒於朮。製於朮。峯質王。焦朮。

古籍別名 朮山薊。(本經)山薊。山連。(別錄)枹枹。枹薊。馬薊。(本草綱目)吃力伽。(日華本草)浙朮。(蘇頌)白大朮。沙邑條根。(和漢藥考)

外國名詞 (Aishu) Atractylodes Lancea, Thunb. (拉

三六七

五畫 白

丁)

根。 蕪本 屬菊科。藥用白朮之

產地 陳仁山藥物生產辨云。

白朮產浙江省寧波府。八月新。西

藥名於朮。是錯誤。白朮祇有一種。

出寧波於朮則種類甚多。出產各

異。原產於江西修水縣者為天生

朮。天生朮實本白油。由寧波幫辦

回寧波。將嘴剖細。竭至其油色轉

黃。然後裝盒而來。江西又有一種

名野朮。小粒軟帶。正於朮產自於

潛縣。太原朮。標太原兩字。本屬山

西太原府乃合。但所批者出自徽

州。白油雲朮。黑油雲朮。均出自徽

州。

形態 按白朮莖高三尺許。葉

大而卵圓。披針形之細毛。下部之

葉。有深缺裂。葉質頗硬。邊緣微有

鋸齒。根莖為塊狀。表面呈褐色。內

部黃白色。

種類 ①白朮。出浙江寧波者。

②天生朮。出江西修水者。③野朮

亦出江西者。④於朮。出浙江於潛

者。⑤太原朮。出山西太原者。⑥欽

朮。出安徽徽州者。即俗名狗頭朮。

⑦雲頭朮。出浙江者。亦俗名。⑧削朮。片朮。即開暴乾者。⑨湖廣朮。出湖南者。⑩仙居朮。出仙居者。⑪野白朮。出山野自生者。⑫種白朮。出人工栽培者。

種植 大都係掘取宿根。移植

於田園者。尤以四川栽植者最多。

品質亦最佳。其栽培要點如下。①

氣候及土地。凡寒冷之氣候。並帶

乾燥者。始可栽培。使其生長。其土

地喜砂質土。栽培於山中。則更佳

也。②產地及種類。吾國產出之地

方。惟四川浙江二者而已。種類因

栽培之遲早。而別之。為早中晚之

三種。早植種為最佳。晚植種次之。

中植種最下。惟收穫較多。故各

有短長。③治地作畦。栽早種者。於

冬季十二月間。耕起砂質地。再作

高畦。畦幅約三尺至三尺五寸。長

短任意。栽中種者。於三四月之交。

耕起土塊。作如上之高畦。栽晚種

者。於八月中旬至九月中旬。耕起

土地。亦作如上之高畦。惟其幅以

二尺五寸為證。作畦既竣。可以擇

時栽種。④期節。早種於二月下旬

至三月上旬。可以栽種。中種五月

上旬為適。晚種則在九月下旬。始

可栽培也。⑤栽種。法先於畦上取

穴。而後取白朮之秧。分切之。斜置

於穴中。上蓋以土。微壓平之。中種

晚種。皆可依上法栽種。⑥管理。白

朮之管理。以施肥中耕為要。他之

管理。可不必行也。肥料以堆肥油

粕為最適。並少施以木灰。堆肥於

未栽前。先施一次。既栽之後。施以

木灰可也。施與木灰。分作二次。施

之。堆肥必須腐熟。後方可施。與作

為原肥。且當其中耕之後。施以一

次之人糞。其糞當與水混和。使

之稀薄。以助其生長也。⑦中耕。中

耕於栽種後四五日時行之可也。

⑧收穫。收穫之期。早種在十二月

下旬可穫。中種於次年三四月可

收。晚種於次年之六七月可採。收

穫之後。於日中曝乾之。擇木製之

箱。置於乾燥處。貯藏於其中可也。

⑨計算。每畝收穫之量。佳者約數

百斤。二三斤者。次之。價不一定。採

市價又無定規。故略之。

咀後。人乳汁潤之。製其性也。脾病。以陳壁土炒過。竊土氣以助脾也。

性質 甘溫無毒。

效能 補脾。化溼。益氣。生血。在

胃腸內。除激腸胃之分泌。增加蠕

動迅速外。其餘別無其他作用。入

血中。即能令血液之循環增進。血

壓加大。腎臟之血管。亦同時澎漲。

而利尿之機能。遂因之而增進。故

用作健胃藥。及利水與解熱藥。

主治 風寒溼痺。死肌癩疽。止

汗。除熱。消食。作煎餅。久服。輕身。延

年不饑。〔本經〕主大風。在身。面。風

眩。頭痛。目淚出。消痰水。逐皮間風

水。結腫。除心下急滿。霍亂吐下不

止。利腰膝間血。益津液。暖胃消穀

嗜食。〔別錄〕

歷代記述攷證 〔唐〕甄權藥

性本草論白朮曰。治心腹脹滿。腹

中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除寒

熱。止嘔逆。〔宋〕大明日華諸家本

草論白朮曰。反胃。利小便。主五勞

七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣瘕癖

氣塊。婦人冷癥瘕。〔金〕張元素珍

珠彙論白朮曰。除溼益氣。和中補

陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉利消

根暴乾。

製法 陳嘉謨曰。凡使白朮。須

足脛溼腫。除胃中熱。肌熱得積實。清痞滿氣分。佐黃芩。則安胎清熱。【元】王好古湯液本草論白朮曰。理胃益脾。補肝風虛。主舌本強。食則嘔。胃脘痛。身體重。心下急痛。心下水痞。衝脈爲病。逆氣裏急。臍腹痛。【明】李士材本草圖解論白朮曰。白朮味甘性溫。得中宮沖和之氣。故補脾胃之藥。更無出其右者。土旺則能健運。故不能食者。食停滯者。有痞積者。皆用之也。土旺則能勝溼。故患痰飲者。腫滿者。溼痺者。皆賴之也。土旺則清氣善升。而精微上奉。濁氣善降。而糟粕下輸。故吐瀉者不可闕也。別錄以爲利腰膝間血者。因脾胃統攝一身之血。而腰膝乃其分野。藉其養正之力。而閉血不敢稽留矣。張元素謂其生津止渴者。溼去而氣得周流。而津液生矣。謂其消痰者。脾無溼則痰自不生也。安胎者。除胃中熱也。米泔浸之。借穀氣以和脾也。壁土蒸之。藉土氣以助脾也。嫌其燥以蜜水炒之。嫌其滯以豉汁炒之。【清】黃宮繡本草求真論白朮曰。白朮緣何帶補脾氣。蓋以脾苦溼。

五靈白

急食者以燥之。脾欲緩。急食甘以緩之。白朮味苦而甘。既能燥溼。實脾。復能緩脾生津。且其性最溫。服之能以健食消穀。爲脾臟補氣第一要藥也。嘗言無汗能發。有汗能收。通瀉止泄。消痰治腫。止熱化癖。安胎止嘔。功效甚多。總因脾溼則汗不止。脾健則汗易發。凡水溼諸邪。靡不因其脾健而自除。吐瀉及胎不安。亦靡不因其脾健而悉平矣。故同枳實。則能治痞。同黃芩。則能安胎。同澤瀉。則能利水。同乾薑。則能散寒。同芍藥。則能止痛。同桂心。則能消飲祛癖。同地黃。爲丸。則能治血。瀉萎黃。同半夏。丁香。夏汁。則可以治小兒久瀉。同牡蠣。石斛。麥冬。則可以治脾虛盜汗。然血燥無溼。腎間動氣。築築燥渴。便閉者。忌服。謂其燥腎閉氣。則其氣益築。又寒溼過甚。水滿中宮者。亦忌。謂其水氣未決。苦不勝水。甘徒滋壅。必待腎陽培補。水氣漸消。腎氣安位。朮始可投。此又不得不變換於中也。蓋補脾之藥。不一。白朮專補脾陽。生則較熱。性更鮮補。不膩滯。能治風寒溼痺。及散腰膝間血。并衝脈爲病。逆氣裏急之功。非

若山藥止補脾臟之陰。甘草止緩脾中之氣。而不散於上下。俾血可生。燥症全無。若朮氣味過烈。散多於補。人參一味。沖和燥氣。悉化補脾。而更補肺。所當分別而異視者也。出浙江於潛地者。爲於潛朮。最佳。米泔浸。壁土拌炒。入清燥藥。蜜炙。入滋陰藥。人乳拌用。入清眼藥。麩皮拌炒用。國外學說 英美學說謂白朮產中國之安徽。浙江。江蘇等處。其根可爲藥品。其功用。能開胃暖胃。行氣。利小便。有白朮酒方。係用白朮一分。濃酒八分。先用酒六分。浸二天。間時搖動。裝淋筒。淋乾。加餘酒。漂淋。過淋紙。再加酒。仍足八分。爲度。每服五分。二釐半。至一錢。各五釐。辨偽 鄭省巖曰。白朮種類甚多。雲朮。肥大氣壅。台朮。條細力薄。寧國狗頭朮。皮赤稍大。皆栽灌而成。故其氣甚濁。却少清香之味。當以浙江於潛野生者。名於朮。爲第一。名天生朮。形小有鶴頭。甚長。內有硃砂點。朮上有鬚者。尤佳。以得土氣厚也。據云。機縣後山。脈

及黃塘至遠東橋一帶。西流水四十里地之朮。方有硃砂點。他處則無。但野朮入口。味甜氣極清香。總以白爲佳。以潤爲妙。近有一種江西種朮。其形甚小。與野朮相似。雖有鶴頭。而甚短。其體堅實。其味苦劣。不可用。商人多以此混充於朮。是不可以不辨也。曹炳章曰。按天生野於朮。體輕質瘦。小性糯味。甘色紫。皮細寬而層疊。蘆軟而圓。有鳳頭。鶴頭之象。切開有硃砂斑點。氣甚香。即鄭君所云。於潛山高塘至遠東橋一帶出者是也。爲最佳品。不易多得。他如近於潛山各山。亦得其山脈餘氣。野生者亦佳。然蘆硬皮不層疊。亦以鳳頭。鶴頭之形。其他鄒縣所出。別有一種。亦鳳頭。鶴頭。軟蘆如小算子。而圓。切開亦有硃砂點。質燥味薄。氣不甚者。價亦廉。俗名鈕扣朮。近時有充湖廣朮者。鄭君所云。江西朮。或卽此也。更有冬朮。移潛。名種朮。類甚大。重量大者。十餘兩。小者五六兩。皮黃肉白。無茸。亦有硃砂點。其味甘。兼辣。近時市肆作於朮者。此也。亦不甚佳。其帶藥者。名帶藥朮。爲

充野朮。裝玻璃盒。官場贈送為禮。品。此皆側路也。又有南京茅山出者。曰茅朮。亦有殊砂點。味甘辛。性糯形瘦長有細鬚根。利溼藥中用之。亦佳。泗安產者。形類毛朮。性燥味甘辣。切片逾日起白霜。亦次。惟朮之種類甚多。就與於朮有類似關係者。約辨數種。餘概略之。

近人學說 張山雷曰本草經及別錄。皆稱朮而無蒼白之分。陶氏弘景及宋之蘇頌。皆言朮以茅山為勝。似今之所謂茅山蒼朮。亦即古之所謂朮也。然弘景又別有赤朮之名。謂其苦而多膏。又似梁時已有蒼朮一種。今按本經主治。詳其功用。頗似今之茅朮。惟白朮健脾化溼。其力亦同。至名醫別錄又言味苦甘。增一甘字。則明是白朮。李瀕湖以本經別錄之文。兩係於白朮蒼朮二條。而張隱庵因之。真駁毋矣。又曰白朮氣味芳香。苦甘而溫。稟坤土中和之性。故專主脾胃。以補土勝溼。見長。溫能勝寒。燥能驅溼。而芳香之氣。能通脈絡。走肌肉。故主風寒溼痺。而治死肌。風溼著於關節。則瘰疬強直。脾家

溼熱鬱蒸。則發為黃疸。朮能勝溼而芳香宜絡。故主瘰疬。自汗亦脾家之溼熱。朮燥其溼。則汗自止。除熱者。除脾虛之發熱也。消食者。溼除而脾運自健也。特提出作煎餌一層。則以其豐於脂膏。故宜於煎劑。陳修園謂後人土拌炒燥。大失經旨是也。別錄主大風。蓋亦指風溼言之。芳香善走而主肌。故大風可除。風眩頭痛目淚。有溼盛而濁氣上蒙。有中虛而清陽不運。朮能勝溼除痰。補中升清。斯眩痛可止。目淚可除。非肝陽之目眩頭痛目淚也。消痰逐水。退腫除滿。皆勝溼健脾之效。霍亂吐利。亦脾溼有寒也。利腰膝間血。亦芳香之氣。可以疏利氣血之運行。即本經主死肌之意。益津液者。朮本富於脂膏也。暖胃消穀嗜食。無一非芳香醒脾。溫養健運之功也。又曰朮之功用。自唐以前。止言其燥溼逐水。所謂暖胃消食。亦燥能健脾醒胃也。蓋其氣甚烈。故能振動脾陽。而又疏通經絡。然又最富脂膏。故雖苦溫能燥。而亦滋津液。且以氣勝者。流行迅利。本能致津液通氣也。唐宋

以後。皆以為補益脾胃。其旨即從此出。顧謂白朮蒼朮。在古不分。而今已各別。則凡古人所稱燥溼逐水之用。今必以茅山蒼朮當之。其補益脾胃。則宜用白朮。蓋今之所謂冬白朮者。質潤而氣香。健運脾陽。滋養胃陰之力不小。且其氣既盛。不致呆守滿中。尤為健脾益胃之專劑矣。

配合應用 ①枳朮丸消痞強胃。久服令人食自不停也。白朮一兩。黃壁土炒過去土。枳實麩炒。去麩。一兩為末。荷葉包飯燒熟。搗和丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。氣滯加橘皮一兩。有火加黃連一兩。有痰加半夏一兩。有寒加乾薑五錢。木香三錢。有食加神麩麥蘖各五錢。(潔古家珍方)

②枳朮湯。治心下堅。大如盤。邊如旋。水飲所作。寒氣不足。則手足厥逆。腹滿脇鳴。陽氣不通。即水冷。陰氣不通。即骨疼。陽前通則懸寒。陰前通則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。宜此主之。白朮一兩。枳實七個。水五升。煮

三升。分三服。胸中軟即散。(金匱玉函方)

③白朮膏。止久泄痢。服食滋補。上好白朮十斤。切片。入瓦鍋內。水淹過二寸。文武火煎至一半。傾汁入器內。渣再煎。如此三次。乃取前後汁同熬成膏。入器中。一夜。傾去上面清水。收之。每服二三匙。蜜湯調下。(千金良方)

④參朮膏。治一切脾胃虛損。益元氣。白朮一斤。人參四兩。切片。以流水十五碗。浸一夜。桑柴文武火煎取濃汁。熬膏。入煉蜜收之。每以白湯點服。(集簡方)

⑤治胸膈煩悶。白朮末。水服方寸匕。(千金方)

⑥治心下有水。用白朮三兩。澤瀉五兩。水三升。煎一升半。分三服。(梅師方)

⑦治五飲酒癖。一留飲。水停心下。二澼飲。水在兩脇下。三痰飲。水在胃中。四溢飲。水在五臟間。五流飲。水在腸間。皆因飲食胃寒。或飲茶過多。致此。倍朮丸。用白朮一斤。乾薑炮。桂心各半斤。為末。蜜丸。梧子大。每溫水服二三十丸。(和劑

藥局方)

① 治四肢腫滿。白朮三兩。咬咀。每服半兩。水一盞半。大棗三枚。煎九分。溫服。日三四服。不拘時候。(本事方)

② 治中風口噤。不知人事。白朮四兩。酒三升。煮取一升。頓服。(千金方)

③ 治產後中寒。遍身冷直。口噤不識人。白朮一兩。澤瀉一兩。生薑五錢。水一升。煎服。(至寶方)

④ 治頭眩暈。經夕不寤。四體漸羸。飲食無味。好食黃土。用朮三斤。麴三斤。搗篩。酒和丸。梧子大。每飲服二十九。日三服。忌葷菜桃李青魚。(外臺祕要方)

⑤ 治中溼骨痛。朮一兩。酒三盞。煎一盞。頓服。不飲酒者。以水煎之。(三因方)

⑥ 治婦人肌熱。血虛者。吃力伽散。用白朮。白茯苓。白芍藥各一兩。甘草半兩。為散。煮棗煎服。亦治小兒蒸熱。脾虛羸瘦不能飲食。(外臺祕要方)

⑦ 治風痲癢疹。白朮為末。酒服方寸匕。日二服。(千金方)

⑧ 治面多黧點。雀卵色。苦酒漬朮。日日拭之。極效。(肘後方)

⑨ 治自汗不止。白朮末。飲服方寸匕。日二服。(千金方)

⑩ 治脾虛盜汗。白朮四兩。切片。以一兩同牡蠣炒。一兩同石斛炒。一兩同麥麩。揀朮為末。每服三錢。食遠粟米湯下。日三服。(丹溪方)

⑪ 治老小虛汗。白朮五錢。小麥一撮。水煮乾。去麥為末。用黃耆湯下一錢。(全幼心鑑方)

⑫ 治產後嘔逆。別無他疾者。白朮一兩二錢。生薑一兩五錢。酒水各二升。煎一升。分三服。(婦人良方)

⑬ 寬中丸。治脾虛脹滿。脾氣不和。冷氣客於中。壅遏不通。是為脹滿。用白朮二兩。橘皮四兩。為末。酒糊丸。梧子大。每食前木香湯送下三十丸效。(指迷方)

⑭ 治脾虛洩瀉。白朮五錢。白芍藥一兩。冬月用肉豆寇煨為末。米飲丸。梧子大。每米飲下五十九。日二。(丹溪方)

⑮ 治溼瀉暑瀉。白朮。車前子等分。炒為末。白湯下二三錢。(簡便

方)

⑯ 治瀉血痿黃。腸風。痔漏。脫肛。瀉血。面色萎黃。積年不瘥者。白朮一斤。黃土炒過。研末。乾地黃半斤。飯上蒸熟。搗和。乾則入少酒。丸。梧子大。每服十五丸。米飲下。日三服。(普濟方)

⑰ 治孕婦束胎。白朮。槁燻炒。等分。為末。燒飯丸。梧子大。一月一日。每食前溫水下三十丸。胎瘦則易產也。(保命集)

⑱ 治牙齒日長。漸至難食。名隨溢病。白朮煎湯。漱服。取效即愈也。(備急方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡腎虛者禁用。忌桃李。菘菜。雀肉。青魚。防風。地榆。為之使。

著名方劑 ① 七味白朮散。治一切吐瀉。煩渴。霍亂。虛損。氣弱。保養衰老。及治酒積。嘔噎。(錢氏方)
用白朮。人參。茯苓。甘草各二錢。薑香五錢。葛根一兩。木香二錢。共為末。每服二錢。白湯調下。② 神朮湯。主治三時外感寒邪。內傷生冷。而發熱。及脾泄腸風。(局方)用白

朮三錢。防風二錢。甘草一錢。以上三味。無汗用黃朮。加葱白。生薑。有汗用白朮。生薑。水煎服。

參攷資料 ① 朮。今處處有之。以茅山。嵩山者為佳。春生苗。青色。無稜。莖作諸幹狀。青赤色。長三二尺。以來。夏開花。紫碧色。亦似刺。花。或有黃白色者。入伏後。結子。至秋而苗枯。根似筵。而旁有細根。皮黑。心黃白色。中有膏液。紫色。其根乾溼並通用。陶隱居言。朮有二種。則爾雅所謂抱獨。即白朮也。今白朮。生杭越。舒宣州。高山。樹上。葉葉相對。上有毛。莖端生花。淡紫碧紅。數色。根作極生。二月三月八月九月。採暴乾用。以大塊。紫花為勝。古方所用朮者。皆白朮也。(蘇頌) ② 凡中焦不受溼。不能下痢。必須白朮。以逐水益脾。非白朮不能去溼。非枳實不能消痞。故枳實丸。以之為君。氣滯加橘皮。有火加黃連。有痰加半夏。有寒加乾薑。木香。有食加神麩。麥芽。(張元素) ③ 白朮。西域謂之吃力伽。故外臺祕要有吃力伽散。即今人謂朮曰吳木是也。(李時珍) ④ 蒼朮。山薊也。處處山

五 薑 白

中有之。苗高二三尺。其葉抱莖而生稍開。葉似棠梨葉。其脚下葉有三五又。皆有鋸齒小刺。根如老薑之狀。蒼黑色。肉白有油。香。白朮抱莖也。吳越有之。人多取根栽時。一年即稠。嫩苗可茹。葉稍大而有毛。根如指大。狀如鼓。亦有如大如拳者。彼人割開暴乾。謂之削朮。亦曰片朮。陳自良言白而肥者是浙朮。瘦而黃者是幕阜山所出。其力劣。昔人用朮不分赤白。自宋以來始言蒼朮苦辛氣烈。白朮苦甘氣和。各自施用。亦頗有理。並以秋採者佳。春採者虛軟易壞。番舍南方草朮狀云。藥有乞力伽。即朮也。瀕海所產。一根有至數斤者。採餌尤良。(李時珍) ① 枹乃鼓槌之名。古方二朮通用。後人始有蒼白之分也。(李時珍) ② 凡病屬陰虛血少。精不足。內熱骨蒸。口乾唇燥。咳嗽吐痰。吐血。鼻衄齒齦。咽塞便秘。滯下者。法咸忌之。朮燥腎而閉氣。肝腎有動氣者勿服。(穆希雍) ③ 手足懶學貪眠。多服益善。飲食怕進。發熱倍用。正宜開發痰癆殊功。卒暴注瀉立效。或曰製研散飲汗或草

味粥丸調脾。(陳嘉謨) ④ 奔豚積忌煎。常用閉氣癰疽毒禁用。為多生膿。(陳嘉謨) ⑤ 白朮與二陳同用。則健胃消食化痰除溼。與芍藥川歸枳實生地之類同用。則補脾胃而清脾家溼。再加乾薑。去脾家寒溼。與黃芪芍藥等同用。則有汗則止。少加辛散之味。無汗則發。(薛己) ⑥ 按凡使米泔水洗。去蘆及皮。細切微炒用之。(啓益) ⑦ 白朮兼參芪而補肺。兼杞地而補腎。兼歸芍而補肝。兼龍眼酸棗仁而補心。兼麥連而瀉胃火。兼橘半而醒脾土。兼蒼朴可以燥溼和脾。兼天麥亦能養肺生金。兼杜仲木瓜治老人之脚弱。兼麥芽枳朴治童幼之疳癥。溫中之劑。無白朮愈而復發。(本草真言) ⑧ 朮以色青白味苦。俗呼為三好嫩根。蒼朮者為佳。用時水洗到細。但夏日微炒用。世醫貴色白。故出朮之所。臨掘出時。削去外皮。米泔浸過數日。然後曬乾出售。近道諸山雖間有之。然不可多得。藥肆又以老根為蒼朮。嫩根為白朮。或老為白。嫩為蒼。皆非也。實則祇一種耳。惟老根多筋

為末尤惡。性味亦劣於嫩者。故以用嫩根朮為是。中國運來之蒼白二朮。形狀迥然各別。其白朮即陳嘉謨所謂雲頭朮。狗頭朮。李時珍所謂吳朮。狀者鼓槌者是也。意此種出於後世。而非古所用之朮矣。由今觀之。唐以前所用之朮。疑即今日本所產之朮。斷非中國之浙朮也。按止瀉日本朮最長。止汗日本朮與中國朮相同。其餘功用皆不甚相遠。蒼朮狀似老薑根。雖頗近古朮。然多脂氣。反不及日本朮。選藥者宜細心辨之。又後世醫者咸以朮味甘為貴。不知朮味本苦。初無甘味。其微甘者。多是米泔味滲透耳。苦乃本性。何以甘為。况苦以堅之燥之。古有是說。確為朮之性味效力乎。徒以欲其色白味甘。遂戕賊其天性。妄益其所無。自外鑠之。謬誤甚矣。凡人乳汁潤。陳壁土炒。脂麻同炒等制。皆所弗取。(一本堂藥選) ⑨ 朮古不分蒼白。後世始分之。陶弘景曰。白朮葉大有毛。而作極根甜而少香。赤朮葉細無毛。根小苦而多香。此言二朮之形狀甚明。今白朮。山中處處有

三七二

之。葉有五又者。有三又者。花白或紅。皆下品也。中國產上品白朮。專保中始傳種日本。藥五極有毛。形頗肥大。花紅如大菊花。根似佛掌。預種其實能生。斷根栽之。亦發芽。種後經一二年。可掘取其根。若經數年。其根重至數斤。蒼朮一名赤朮。亦處處產之。葉無極。花有紅白兩種。亦屬下品。中國產上品蒼朮。其嫩葉如棉花白。根味香烈。種實難成長。必分根如白朮乃生。(物類品鑑)

【白玉粉】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【白玉屑】製法 取白玉搗如碎軟如泥。惟已製成器物。及曾經殉葬者不可用。

性質 甘。平。無毒。

主治 胃中熱。喘息。煩滿。消渴。痰癆。鬼氣。去目翳。滅面身癩。瘰癧。

配合宜忌 惡鹿角。養丹砂。畏鱉肪。

【白玉釵草】即草裏銀釵之古籍別名。典見李氏草詒。詳「草裏銀釵」條。

【白玉漿】製法 以玉屑一升。地榆草一升。稻米一升。白露二升。置銅器中。煮米熟絞汁。玉屑即化為水。

性質 甘平無毒。

主治 五臟百病。血塊。氣癆。婦人帶下。久服耐寒暑。免饑渴。輕身長年。

【白玉髓】古籍別名 玉膏。玉液。 (本草綱目) 玉髓 (十洲記)

產地 出玉石間。

形態 白玉髓為石類玉之膏。流出時色鮮明如水精。以無心草末之。須臾成水。採得可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 婦人無子。不老延年。

【白瓜】即冬瓜之古籍別名。與見本經。詳「冬瓜」條。即冬瓜子之古籍別名。與見本經。詳「冬瓜子」條。即越瓜之日本名詞。詳「越瓜」條。

【白瓜子】即冬瓜子之原名。詳「冬瓜子」條。

【白甘菊】古籍別名 羊歡草。 (天寶單方圖)

產地 安徽滁縣者良。形態 菊之一種。葉如艾。花白。莖黃而形稍大。

性質 苦平無毒。主治 肝風頭眩。滋陰明目。黑髮。益顏色。

【白甘遂】即蚤休之古籍別名。與見綱目。詳「蚤休」條。即白殭蠶之古籍別名。與見和漢藥考。詳「白殭蠶」條。

【白甲魚】即白鼈之古籍別名。與見粵志。詳「白鼈」條。

【白皮子】別名 秋風子。 (綱目拾遺)

命名 本品即海蜃外之白皮。故名。

性質 鹹。溫。主治 消痰行積。止帶。祛風火。

配合應用 貼爛腿。用白皮子。照疥大小。剪作膏貼。內摻銀砂。 (救生苦海方)

治無名腫毒。用白皮子一片。白糖搗揉軟。中開一孔。貼上。重者。漬輕者散。又止痛。 (集驗方)

治流火。取海蜃皮薄者。貼上。燥則易之。 (文堂集驗方)

治頭痛。貼兩太陽。能拔風濕外出。

治膝腫風濕。以白皮子貼之。消痞。王聖俞云。有二方。一用白皮子。同葶藶燒酒浸服。一用白皮子。同葶藶。燒酒浸。自消痞也。程克庵云。凡小兒一切積滯。用葶藶與海蜃同煮。去蜃食。則諸積自消。亦以積非寒不滯而成。海蜃能煖水。葶藶化堅。相因而用。其效故捷也。同壽錄載其方。治痞。用大葶藶一百個。古錢二十個。海蜃一斤。皮硝四兩。燒酒三斤。共浸七日。後每早喫四錢。加至十個。止即愈。

參攷資料 蛇生南海。四五月初生如帶。至六月漸大如盤。形似白絲絮而無耳。目口鼻鱗骨一段。赤色破碎者。謂之蛇頭。其肉如水晶。以明礬醃之。吳人呼為水母。鮮久則漸薄如紙。俗呼為白皮紙。按今所云白皮紙。乃海蜃外面之皮。非陳久之海蜃也。一名秋風子。 (譚史) 海蜃上有白皮。潔白脆美。過於海蛇。謂之白皮子。 (朱排山) 海蜃名水母。人以石灰礬

水醃之。去其血水。色乃白。其形最厚者。謂蛇頭。味更勝云。而不錄其外皮之用。且其質性煖。可治河魚腹疾。敏曾居東嶽數年。見土人取鮫為生者。詢之。據言其物確係海水所結。東南海俱鹹。遇春夏天。兩在海中者。一滴雨水入海。輒有一小泡。凝聚海面。初則大如豆。隨波逐蕩。受日烘染。漸長大成形如笠。上頭下脚。塊然隨潮而行。土人撈鮫者。每於海塗間。插竹為小城。以稻草作網圍之。潮長。鮫隨潮而來。入竹城。為網所絡。不得去。然後取之。以刃斫其中段。巖然而開。有似腸胃穢積者。落落交下。名蜃花。食之亦最美。再以礬灰醃而售之。按海為陰水。天雨水屬陽。相入而感。便生此物。受太陽正氣。所以日漸長大而性煖也。 (趙學敏)

【白石】即陽起石之古籍別名。與見本經。詳「陽起石」條。

【白石木】即根椶子之木名。與見唐註。詳「根椶子」條。

【白石英】命名 英亦作瑛。玉光也。本品有五種。皆石之似玉而有光燦者。故名。

五靈白

古稱別名 赤石英。(別錄)銀華。廣石。(和漢藥考)

基本 係岩石屬。為石英類之一種。

產地 蘇恭云。白石英所在皆有。今澤州。魏州。洛州山中俱出。魏州者大徑三四寸。澤州者最勝。陳仁山藥物生產辨云。白石英產廣東北江。和漢藥考曰。日本各處產此。甲斐及信濃等處尤多。

形態 按白石英為無色明澈斜方六面形及六面柱狀形之二個集合體。有玻璃狀光澤。斷面有脂光。硬度七。比重二·八。其純精品無色。但中有夾雜物而有色者不少。藥用以純精品為上。

製法 坩堝內。火煨酒淬三次。用修治如法。中病即止。毋過劑焉。

性質 甘微溫無毒。

成分 為無水矽酸 SiO₂。故不溶於諸藥劑。

功效 入氣分。潤肺燥。治癆瘵。療欬逆。與雲母同。惟效力較強。用作緩和強壯藥。又為潤肺鎮咳藥。主治 消渴陰痿不足。欬逆。胸膈間久寒。谷氣除風澤痺。久服輕身長年。(本經)療肺痿。下氣。利小便。補五臟。通日月光。耐寒熱。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白石英曰。治肺癰吐膿。欬逆上氣。疽黃。元王好古湯液本草論白石英曰。實大腸。清黃宮。補本草求真論白石英曰。白石英味甘而辛。性溫無毒。按理似非潤藥。溼藥矣。而十劑偏指此屬。溼劑。謂枯則為燥。宜用白石英。紫石英之屬。以溼之。不幾令人眩惑乎。詎知書之言溼。有以溼為溼者。有以燥為溼者。以溼為溼人易知。以燥為溼人難明。茲而曰溼。是以燥以溫為溼矣。石性本辛溫。辛則能以化液。溫則能以滋潤。故雖辛若溼。是以寒燥不潤之症。得此辛以暢達。而滯不致見枯。此十劑所以以辛以溫為溼而言也。書曰。服此可治欬逆。胸寒消渴。陰痿風痺。溺閉。肺痿肺癰。吐膿吐血等症。是亦辛溫潤肺之一驗矣。但係石類。祇可暫用。凡服宜食冬瓜龍葵。以壓石氣。忌芥菜。葶藶。蕪荑。葵。薤。芫。白如水銀者良。

配合應用 服石英法。白石

英一斤。打成豆大。於砂盆中和粗砂。著水按二三千下。洗淨。又按。仍安柳箕中。入蕎麥少許。同水熱。按至光淨。即以綿袋盛懸門上。每日未梳前。以水或酒吞七粒。用飯二匙。壓下小腹。一切穢惡。白酒牛肉石家所忌者。皆不忌。久則新石推出。陳石。石常在小腹內。溫暖則氣息調和。經脈通達。腰腎堅強。百病自除。石若得力。一斤即止。若不得力。十斤亦須服。此物光滑。既無浮碎。著人腸胃。作瘡。又無石氣。發作諸病也。又法。澤州白石英。光淨無點。督者。打小豆大。去細者。水淘淨。袋盛懸釜內。清水五大升。煮汁一升。澄清平早服。以汁煮粥更佳。服後飲酒三三盃。可行百步。一袋可煮二十度。如無力。以布裹埋南牆下三尺土內。百日又堪用也。石煮豬肉法。白石英一兩。袋盛。水三升。煮四升。豬肉一斤。同葱椒鹽豉。煮以汁作羹食。石煮羊肉法。白石英三兩。打作小塊。精羊肉一斤。包之。荷葉裹之。於一石米飯中蒸熟。取出。去石。切肉和葱椒。作小饅。煮

三七四

熟。每日空腹冷漿水。吞一百箇。後以冷飯壓之。百無所忌。永不發動。石煮牛乳法。白石英五兩。搗碎。密絹盛。以牛乳三升。酒三升。同煎四升。去石。以瓶收之。每食前暖服三合。治虛損勞瘵。皮燥陰痿。脚弱煩疼。石飼犂牛法。白石英三斤。搗碎。取十歲以上生犂牛一隻。每日和豆與食。經七日。即可收乳。每且熱服一升。餘者作粥食。百無所忌。潤養臟腑。悅澤肌肉。令人體健。凡服石。並忌芥菜。葶藶。蕪荑。葵。薤。芫。芫。宜食冬瓜。龍葵。壓石氣。(千金方)

治風虛冷痺。諸陽不足。及腎虛耳聾。益精保神。白石英三兩。坩堝內。火煨酒淬三次。入瓶中。密封。勿洩氣。每早溫服一鍾。以少飯壓之。一法。磁石火煨。醋淬五次。白石英各五兩。絹袋盛。沒一升酒中。五六日。溫服。將盡更添酒。(千金方)

治驚悸善忘。心曠不安。上隔風熱。化痰安神。白石英一兩。硃砂一兩。為散。每服半錢。食後煎金銀湯下。(簡要濟衆方)

治石水腫。脹滿。用白石英

一雨。穗豆大。致瓶盛好酒二斗。浸之。以泥重封。將馬糞及糠火燒之。常令小沸。從卯至午。住火。次日暖一中。盡飲之。日三度。酒盡可再燒一度。(聖惠方)

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 止可暫用。不可久服。凡久病者禁用。惡馬目。毒公。

參攷資料 白石英生華陰山谷。及太山。大如指。長二三寸。六面如削。白澈有光。長五六寸者。彌佳。其黃端白稜名黃石英。赤端白稜名赤石英。青端赤稜名青石英。黑澤有光名黑石英。二月採亦無時。(別錄)

【白石英酒】 製法 用白石英。磁石。煨。醋。滓。七次。各五錢。絹袋盛。浸酒中。五六日。溫飲之。

主治 風溼周痺。肢節選痛。及腎虛耳聾。

【白石脂】 古醫別名 隨岐伯。白符。(吳普本草)
產地 出石脂中。
形態 白石脂爲石類五色石脂之一種。卽石脂之白色者。亦供

藥用 性質 甘。酸。平。無毒。

主治 養肺氣。厚腸。補骨髓。療五臟。驚悸不足。心下煩。止腹痛。下水。小腸。解熱。瀉便膿血。女子崩中。漏下。赤白沃。排癰疽瘡痔。久服安心不餓。輕身延年。

配合宜忌 惡松脂。畏黃芩。黃連。甘草。飛廉。馬目毒公。燕屎。爲之使。

歷代配伍攷 唐甄權藥性本草論白石脂曰。瀉大腸。
參攷資料 白石脂得厚朴木汁飲。止便膿。(徐之才)

【白石華】 產地 出山東島山中。
性質 辛。無毒。

主治 脾消渴。膀胱熱。

【白石梨】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【白仲寧】 卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【白地考】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【白地栗】 卽慈姑之古籍別名。典見圖經本草。詳「慈姑」條。卽

山慈姑之俗名。詳「山慈姑」條。

【白地草】 卽地膚子之古籍別名。典見綱目。詳「地膚子」條。

【白地草子】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【白如椶】 別名 仙麻。
產地 江西南湖山中多有之。

形態 狀如初生椶葉。色青白。有直紋。微皺。抽莖結實。如建蘭花實。獨根。可供藥用。



白如椶

主治 風損。婦女敗血。

【白羊石】 產地 出山東白羊山中。
形態 白羊石爲石類之一種。以瑩白者可供藥用。

採取 春月掘地採之。

性質 淡。生涼熱。無毒。

主治 解藥毒。
【白米】 卽罌粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「罌粟子」條。

【白羊鮮】 卽白鮮之古籍別名。典見本草集註。詳「白鮮」條。

【白羊鬚草】 卽紫菀之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫菀」條。

【白耳草】 卽金錢草之俗名。詳「金錢草」條。

【白肌石】 古醫別名 洞石。(別錄)

形態 白肌石爲石類之一種。其形狀與理石同。亦供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 強筋骨。止渴。不飢。除熱不足。

參攷資料 白肌石卽理石也。其形態氣味主療皆同。(李時珍)

【白衣】 卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「銀箔」條。

【白李】 卽李之一種。實黃時摘之。以鹽接去汁。去核。曝乾。薦酒作釘。皆佳。功用與尋常李同。

【白杏】 卽杏之一種。實色青白或微黃。味甘而不酸。功用與尋常杏同。

【白杉】 卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳「杉材」條。

【白杏仁】 卽杏仁之處方用名。詳

【杏仁糖】

原名 石蜜。

命名 本品係用甘

蔗汁煎煉。凝結如石。體輕。味甜如

蜜。故名。與蜂之石蜜同名異物也。

其純白色而結晶性如沙者。遂謂

之白沙糖。

處方用名 白沙糖。白糖。冰糖。

紅糖。

基本 屬禾本草。空科植物中

之甘蔗甜菜。蘆粟等。搾取其汁而

製成之結晶品。

產地 凡閩廣諸地恒多產焉。

和漢藥考曰。各國皆有產。日本則

以台灣為主產地。

形態 製法 沙糖之原料不同。

故其性狀亦略有區別。惟以蔗糖

為主。蔗糖多為純白之結晶塊。或

係結晶性之粉末。無臭。質緻密。味

甘。置空氣中不變化。酒精難溶解。

小能溶其半量。其反應呈中性。自

水溶液再結晶者。則為一斜系柱

狀之巨大結晶。受攝氏百六十度

之熱則溶融。放冷則成玻璃狀之

塊。熱至二百度則燒焦。變為浮石

糖。遇濃硫酸。則水分失脫而炭化

膨脹。其水溶液有旋光極光線。加
凡林拜氏液。不起反應。與稀酸類
一同煮沸。則轉化為葡萄糖與果
糖。

種類 沙糖之種類。隨製法之

精粗而有多種。故名稱亦異。精製

者。為白色結晶形之粉末。或粗末

或為巨大之結晶塊。是為白沙糖

及冰糖。粗製者。為褐色之結晶

形粉末。或粗末。雜有污物等。其尤

粗惡者。則為紫黑色之塊狀。或餅

狀等。是為赤砂糖及黑砂糖。茲述

其品類及名稱如下。①白沙糖（

亦名糖霜。練風箱）此為砂糖之

最純良者。無臭。味甘美。其間尚有

三級。最上者名三盆。市人呼之曰

雪白。或曰大白。（洋糖）又曰中白

（官糖）其對於黑砂糖。則呼褐色

糖為白沙糖。②冰糖（亦名石

蜜。冰晶糖）此係將上等之白砂

糖。入釜溶化。煮沸。投雞子白（白

砂糖十斤。用雞子白兩三枚）乘

熱攪拌。液面如有浮滓。則取去之。

至適宜稠厚。移入他器。放冷。聽其

結晶。此種之無色透映者。從前俗

稱水晶糖。帶色者。俗呼文冰。其

製自母液之砂糖。謂之冰粉。蓋三

盆之上品也。③太古糖。此係精製

糖之上品。來自西洋各國。現今日

本亦盛行之。製造頗多。即結晶糖

之粉碎者也。④棒砂糖。此係將砂

糖之精製品。入真空鍋製造之際。

乘時注入棒模型中。逾凝結後。自

成棒形。⑤角砂糖。此係將白砂糖

溼以糖液。注入角模型中。再加壓

搾。使其凝結而成。⑥赤糖（亦名

奮虎奮尾）此種作褐色。乃砂糖

之中品。俗稱下白。或名天光。俱屬

之。從前日本沖繩所產。推為佳品

⑦黑砂糖（亦名紫糖。紅糖。紫砂

糖）此種色褐黑。為砂糖之粗製

品。成球塊者曰玉砂糖。亦名球糖

成餅狀者曰餅糖。中國南部所產

皆此種也。東印度出產之粗糖。亦

與此相同。⑧糖蜜（亦名蔗糖）或

單稱蜜。此即使砂糖結晶之母液

種類頗夥。

製法 沙糖專以甘蔗甜菜絞

榨其汁而製成之。槓樹與蘆粟。不

過偶然製造而已。即有亦無多也。

凡製造沙糖。為大規模之化學工

業。其製造法。別有專書。茲特舉其

大略。自甘蔗及甜菜提取糖分。有

沒出壓榨二法。尋常多用壓榨法。

係用自動回轉之壓榨器。絞榨原

料。所得榨汁。集於溜桶。用篩濾去

其雜質。再加石灰乳於榨汁中而

熱之。以除去所含之蛋白質。護膜

質。並有機酸類。綠蛋白質。與護膜

質。一經受熱。俱凝結。而自浮液面

其有機酸類。則與石灰化。合而下

沈桶底。於是濾過。（欲除去過剩

之石灰分。須通以炭酸瓦斯。）取

濾過之液。用真空鍋。熱以攝氏六

十至八十度之溫度。蒸發使乾。倘

又有少許污質浮出。仍除去之。由

是逐漸收乾。變為濃厚。遂移入精

品槽。使冷。而自行結晶。其粘附不

結晶之糖蜜。謂之白下。另以遠心

器。或壓榨器。除去之。是名粗製糖

粗製糖之須精製者。當先以水溶

化。再以過煖酸石灰及石灰乳。

上鍋煮沸。一面攪拌。此時有不潔

物上浮。或下沉者。則再濾之。續通

過骨炭塔。使色澤純淨。仍移入真

空鍋。使其蒸發結晶。與粗製糖之

工程相同。依此而得之白色結晶

糖。普通稱之為白沙糖。

性質 甘寒。冷利。無毒。

成分 日本使用之砂糖惟蔗糖 (Sucrose) 一種。糖分在九十八分以上。但粗製品臭色俱深。味亦甚惡。且呈酸性反應。糖分減少。灰分增多。

效能 白者補肺益脾。赤者調營和血。專作營養及嗜好品。又為緩和祛痰藥。

主治 心腹熱脹。口乾渴。(唐本草)

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草論白沙糖曰。治目中熱膜。明目和棗肉巨膝末為丸。噙之潤肺氣助五臟。【明】李時珍本草綱目論白沙糖曰。潤心肺燥熱。治嗽消痰。解酒和中。助脾氣。緩肝氣。【明】程希聲本草經疏論白沙糖曰。石蜜乃煎甘蔗汁曝之凝如石。而體甚輕。今之白沙糖也。其味甘。其氣寒。其用在脾。故主心腹熱脹。甘寒能除熱生津液。故止口乾渴。及咳嗽生痰也。多食亦能害脾。以其味大甘耳。【清】黃宮繡本草求真論白沙糖曰。白糖因曬淨結而成。體輕味甘色白。主治亦頗相似。

久食反有熱壅上膈之虞。昔言能以清熱。似非正談。試以口燥之會食此。其燥益甚。口冷之會食之。其冷即除。且致轉為燥渴生痰。於此可視大概矣。又奚必過為辨論哉。

【清】王士雄隨息居飲食諸論曰。白糖曰。白沙糖。(即白糖)亦曰。白糖。古名石蜜。此乃竹蔗煎成。堅白如冰者為冰糖。輕白如霜者為糖霜。凡霜一類。其中品色亦自不同。故有冰花。上白。次白等名也。

甘平潤肺。和中緩肝。生液化痰。止咳解渴。折腥。殺魚蟹腥。制豬肉毒。辟非蒜臭。降濁怡神。辛苦潛移。酸寒頓改。調元贊化。變理功優。冰糖精霜均以最白者為良。多食久食。亦有損齒生蟲之弊。痞滿嘔吐。滯熱不清。諸糖並忌。

配合應用 ①下痢噤口。沙糖半斤。烏梅一箇。水二碗。煎一碗。時飲之。(摘玄方)

②治腹中緊脹。用白糖以酒三升煮服之。知不過則再服。(子母祕錄方)

③治痘不落痂。沙糖調新汲水一杯服之。白湯調服亦可。日二服。

(劉提點方)

④治虎傷人瘡。水化沙糖一椀服。并塗之。(摘方)

⑤治上氣喘嗽煩熱。食即吐逆。用沙糖薑汁等分相和。慢煎二十沸。每嚼半匙取效。

⑥治食非口臭。沙糖解之。(摘玄方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡滯滯中滿者禁用。汪謝城曰。諸糖時邪痧疹霍亂皆大忌。余見誤服致危者。不一其人。即夏日產後。用以行瘀。亦宜慎也。與鯽魚同食成疳蟲。與葵同食生流疔。與筍同食不消成癥。身重不能行。

參攷資料 ①石蜜川浙者最佳。其味厚。他處皆次之。煎煉以銅象物。達京師。至夏月及久陰雨。多自消化。土人先以竹葉及紙裹包。外用石灰埋之。不得見風。遂可免。今人謂之乳糖。其作餅黃白色者。謂之捻糖。易消化。入藥至少。(寇宗奭) ②按萬葉涼州異物志云。石蜜非石類。假石之名也。實乃甘蔗汁煎而曝之。則凝結如石而體

甚輕。故謂之石蜜也。(李時珍)

石蜜即白沙糖也。凝結作餅塊如石者為石蜜。輕白如霜者為糖霜。堅白如冰者為冰糖。實皆一物而有精粗之異也。以白糖煎化。模印成人物獅象之形者為糖糖。後漢書註所謂現糖是也。以石蜜和諸果仁及橙橘皮。縮砂。薄荷之類。作成餅塊者為糖糖。以石蜜和牛乳。酥酪作成餅塊者為乳糖。皆一物數變也。唐本草明言石蜜煎沙糖為之。而諸註皆以乳糖即為石蜜。殊欠分明。按王灼糖霜譜云。古者為飲蔗漿。其後煎為蔗錫。又曝為石蜜。唐初以蔗為酒。而製成糖霜。則自大曆間有鄒和尚者。來往蜀之遂寧嶺山。始傳造法。故甘蔗所在植之。獨有福建四明番禺廣漢送甯。有冰糖。他處皆類碎。色淺味薄。惟竹蔗綠嫩味厚。作霜最佳。西

蔗次之。凡霜一類。其中品色亦自不同。豈如假山者為上。團枝次之。瓊鑑次之。小顆塊又次之。沙脚為下。紫色及如水晶色者為上。深琥珀色次之。淺黃又次之。淺白為下。

(李時珍)

【白芍】即李子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「李子」條。

【白芍】

原名 芍藥。 命名 芍藥者。猶焯約也。焯約。美好貌。本品花容焯約。故名芍藥。而花色赤白兩種。遂有白芍赤芍之分稱。

處方用名 生白芍。奎白芍。東白芍。酸白芍。川白芍。炒白芍。杭白芍。焦白芍。

古籍別名 白者名金芍藥。《圖經本草》赤者名木芍藥。將降。《本草綱目》梨食。白朮。餘容。誕。《別錄》芍藥。牛草。可離。何離。吐鏡。冠芳。近容。隨友。婪尼春。黑辛夷。殿春客。錦櫛根。《和漢藥考》

外國名詞 Paeonia Albiflora. (拉丁) White peony Root. (英)

基本 屬毛茛科。藥用白芍藥之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白芍產四川中江。渠河為川芍。產安徽亳州為亳芍。產浙江杭州為杭芍。亳芍杭芍色肉氣味均同。川芍色略紅黃。質略結。味略苦。均五

六月新。西藥名金芍藥。

形態 按芍藥為多年生草本。春生紅芽。漸漸成長。莖高一二尺。有時高三四尺。葉三枝九葉。為複葉。小葉有頗深之三裂。形如卵圓。或若披針。初夏開大朵五瓣之花。酷似牡丹。色有白。紅。紫。數種。均鮮豔可愛。若欲詳細分別。則有單瓣。有雙瓣。約有五百餘種。本品為有分枝之紡錘根。粗三四分。長四五寸。外面淡褐色。有皺紋。內白色如粉。味苦。有收斂性。

採取 二月八月採根。曬乾。製法 雷教曰。凡使芍藥。須用



藥芍白

種類 ①白花者名白芍。即金芍藥。②赤花者名赤芍。即木芍藥。③葉有千葉單葉者。入藥宜單葉之根。④世謂深山自生者名山芍藥。人工種植者名草芍藥。其實皆非。

採取 二月八月採根。曬乾。製法 雷教曰。凡使芍藥。須用

竹刀刮去皮並頭上到細。以蜜水拌蒸。從已至未。曬乾。用。李時珍曰。今人多生用。惟避中寒者。以酒炒。入女人血藥以醋炒耳。

性質 苦平無毒。

成分 日本藥理學博士長井長義管於芍藥中發見安息香酸。故醫學博士猪子吉人。亦認安息香酸為芍藥之有效成分。凡須應用安息香酸或安息香酸鹽類者。投以芍藥。其效相同。

效能 瀉肝。斂陰氣。和脾。止痛。瀉。有鎮痛之作用。用於腹痛瀉痢等症。又有解熱之作用。用於感冒與肺病。婦人之調經藥中。亦可用之。

主治 邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛。利小便。益氣。《本經》通順血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱。大小腸。消癰腫。時行寒熱。中惡。腹痛。腰痛。《別錄》張仲景之發明 白芍藥一味。經張仲景之實驗。認為主治結實而拘攣也。旁治腫痛頭痛。身體不仁。疼痛腹滿。咳逆下利。腫脹。莖考

微如下。①桂枝加芍藥湯證曰。腹滿時痛。②小建中湯證曰。腹中急痛。③桂枝加大黃湯證曰。大實痛。《以上三方。芍藥皆六兩》。④枳實芍藥散證曰。腹痛煩滿。⑤排膿散證曰。《以上三方。芍藥一方等分。一方六分》。⑥芍藥甘草湯證曰。脚掣急。⑦桂枝加芍藥生薑人蔘新加湯證曰。身疼痛。⑧芍歸膠艾湯證曰。腹中痛。《以上三方。芍藥皆四兩》。⑨芍藥甘草附子湯證不具也。《自芍藥甘草湯。故主治諸病。腹痛拘急而痛者也。學者正焉。芍藥甘草附子湯。其條特舉惡寒之證。此附子之所主也。而脫芍藥甘草之所主治也。其用甘草者。治毒急迫也。其用芍藥者。治拘攣也。然則拘攣急迫而惡寒者。此湯主之。《以上一方。芍藥三兩。而亦四兩之例》。⑩小青龍湯證曰。咳逆。嘔吐而下利。⑪附子湯證曰。身體痛。⑫真武湯證曰。腹痛。又云沉重。疼痛。自下利。又云咳。⑬桂枝湯證曰。頭痛。又曰身疼痛。⑭烏頭湯證曰。歷節不可屈伸疼痛。又曰拘急。

○黃者桂枝五物湯證曰。身體不仁。(以上七方。芍藥皆三兩)○黃芩湯證曰。自下利。○柴胡桂枝湯證曰。肢節煩疼。(以上二方。用芍藥。或二兩。或一兩半。而亦三兩之例) 歷觀此諸方。曰腹痛。曰頭痛。曰腹滿。曰咳逆。曰下利。曰排膿。曰四肢疼痛。曰擊急。曰身體不仁。一。是皆結實而所致也。其所謂痛者。拘急也。若夫桂枝加芍藥湯。小建中湯。桂枝加大黃湯。皆以芍藥為主藥。而其證如此。由是觀之。主治結實而拘攣也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白芍曰。治臟腑壅氣。強五臟。補腎氣。治時疾骨熱。婦人血閉不通。能蝕膿。【宋】大明諸家本草論白芍曰。女人一切病。胎前產後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤。明目。腸風瀉血。痔瘡。發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾。助收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急。脹逆。喘欬。太陽熱。厥。

五靈白

自滿。肝血不足。陽維病。苦寒熱。帶脈病。苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論白芍曰。止下痢。腹痛後重。【明】繆希雍本草經疏論白芍曰。本經味苦平無毒。別錄加酸。微寒。氣薄味厚。升而微降。陽中陰也。又可升。可降。陰也。降也。爲手足太陰引經藥。入肝脾血分。圖經載有二種。金芍藥色白。木芍藥色赤。赤者利小便。散血。白者止痛。下氣。赤行血。白補血。白補而赤瀉。白收而赤散。酸以收之。甘以緩之。甘酸相合。用補陰血。通氣而除肺燥。故本經主邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱。疝瘕。通順血脈。散惡血。逐賊血。消癭腫。婦人血閉不通。目赤。腸風瀉血。赤所治也。緩中去水氣。利膀胱。大小腸。中惡。腹痛腰痛。女人一切病。胎前產後諸病。治風補勞。退熱除煩。益氣。瀉肝。安脾。助收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。氣。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急。脹逆。喘欬。太陽熱。厥。肝血不足。陽維病。苦寒熱。帶脈病。苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛。

後重。白所治也。芍藥味酸寒。專入脾經血分。能瀉肝家火邪。故其所主收而補。制肝補脾。健脾經。脾主中焦。以其正補脾經。故能緩中。土脾虛則水泛濫。脾實則水氣自去。故去水氣。土堅則水清。故利膀胱大小腸。中焦不治。則惡氣乘虛而客之。爲腹痛。補脾則中自和。而邪不能留。腹痛自止矣。脾虛則溼氣下流。客腎。故腰痛。得補則脾氣運而上行。故腰痛自愈。女人以血爲主。脾統血。故治女人一切病。胎前產後。無非血分所關。酸寒能涼血補血。故主胎產諸病。土實則金肅。而木氣自斂。故治風除熱。益血。故能補勞。退熱除煩。脾統後天元氣。得補則旺。故益氣。酸寒能瀉肝。肝平則脾不爲賊。邪所干。脾健則母能令子實。故安脾助胃。氣屬土。土虛則緩而散。木化作酸。故收胃氣。脾虛則中氣下陷。而成瀉利。東垣以中焦用白芍藥。則脾中升陽。又使肝膽之邪不敢犯。則瀉利自止矣。肺主皮毛。腠理。脾主肌肉。而爲肺之母。母能令子實。故固腠理。脾統血。脾和則血脈自和。酸斂入

陰。故收陰氣。斂逆氣。理中氣。脾虛則中滿。實則滿自消。治中則心下不痞。瀉肝則脇下不痛。善噫者。脾病也。脾健則不噫。肝脾之火上炎。則肺急。脹逆喘欬。酸寒收斂。以瀉肝補脾。則肺自寧。急脹逆喘欬之證自除。涼血補血。則太陽熱。厥。自愈。脾虛則目澀。得補則灑除。肝家無火。則肝血自足。陽維病。苦寒熱。及帶脈病。苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。皆血虛陰不足之候也。肝脾和。陰血旺。則前證自瘳矣。【清】黃宮繡本草求真論白芍曰。白芍有白有赤。白者味酸。微寒無毒。功入肝經。血分斂氣。緣氣屬陽。血屬陰。陽亢則陰衰。陰凝則陽伏。血盛於氣。則血凝而不行。氣盛於血。則血燥而谷枯。血之盛者。必賴辛之爲散。故川芎號爲補肝之氣。氣之盛者。必賴酸之收。故白芍號爲斂肝之液。收肝之氣。而冷氣不妄行也。至於書載功能。益氣除煩。斂汗安胎。(同桂枝)則斂風汗。同黃芪人參。則斂虛汗。補勞退熱。及治瀉痢後重。痞脹脇痛。肺脹噎逆。癰腫疝氣。鼻衄自滿。溺閉。何不一

五畫 白

由肝氣之過盛。而致陰液之不斂乎。是以昔言能補脾肺者。因其肝氣既收。則水不尅土。土安則金亦得所養。故脾肺自爾安和之意。產後不宜妄用者。以其氣血既虛。芍藥恐伐生氣之意也。(馮兆張曰。產後芍藥佐以薑桂。製以酒炒。合宜而用。又何方之可執哉。倘腹痛非因血虛者。不可誤用。蓋諸腹痛宜辛散。而芍藥酸收故耳。又曰。今人用芍藥。則株守前人一定之言。每於產後冬月。兢兢畏懼。及其苓遠樹子。視為平常之要藥。凡遇發熱。不論虛實。輒以投之。致令虛陽浮越。惜哉。)然用之得宜。亦又何忌。如仲景與神散。芍藥湯。非皆產後要藥耶。惟在相症明確耳。【清】陳修園本草經讀論芍藥曰。芍藥氣平。是夏花而稟燥金之氣。味苦。是得少陰君火之味。氣平下降。味苦下泄而走血。為攻下之品。非補養之物也。邪氣腹痛。小便不利。及一切諸痛。皆氣滯之病。其主之者。以苦平而泄其氣也。血痺者。血閉而不行。其則為寒熱不調。堅積者。積久而實。實則為疝。瘕滿痛皆

血滯之病。其主之者。以苦平而行其血也。又云益氣。謂邪氣得攻而淨。則元氣自然受益。非謂芍藥能補氣也。今人妄改聖經。以酸寒二字易苦平。誤認為斂陰之品。殺人無算。試取芍藥而嚼之。酸味何在。乎。【清】徐洄溪本草經百種錄論芍藥曰。芍藥花大而榮得春氣。為盛。而君百花之殿。故能收拾肝氣。使歸根反本。不至以有餘肆暴。犯肺傷脾。乃養肝之聖藥也。【清】張隱庵本草崇原論芍藥曰。芍藥氣味苦平。風木之邪。傷其中土。致脾絡不能從經脈而外行。則腹痛。芍藥疎通經脈。則邪氣在腹而痛者。可治也。心主血。肝藏血。芍藥稟木氣。而治肝。稟火氣。而治心。故除血痺。除血痺。則堅積亦破矣。血痺為病。則身發寒熱。堅積為病。則或疝或癧。芍藥能調血中之氣。故皆治之。止痛者。止疝瘕之痛也。肝主疎洩。故利小便。益氣者。益血中之氣也。益氣則血亦行矣。芍藥氣味苦平。後人妄改聖經。而曰微酸。元明諸家。相沿為酸。寒收斂之品。凡衰虛下利者。多用之。以收斂。夫性功

可以強辯。氣味不可訛傳。試將芍藥咀嚼。酸味何在。又謂新產婦人。忌用芍藥。恐斂血耳。夫本經主治邪氣腹痛。且除血痺寒熱。破堅積疝瘕。則新產惡露未盡。正宜用之。若衰虛下利。反不當用也。又謂白芍赤芍。各為一種。白補赤洩。白收赤散。白寒赤溫。白入氣分。赤入血分。不知芍藥花開亦白。其類總一。李時珍曰。根之赤白。隨花之色也。盧子由曰。根之赤白。從花之赤白也。白根固白。而赤根亦白。切片以火酒潤之。覆蓋過宿。白根轉白。赤根轉赤矣。今藥肆中。一種赤芍藥。不知何物草根。見醫書多用之。此習焉而不察。為害殊深。愚觀天下之醫。不察本經。不辨物性。因訛傳訛。固結不解。咸為習俗所誤。寧不悲哉。【清】鄒澍本經疏證論芍藥曰。芍藥。十月生芽。三月放花。破陰寒凝滯。而出。乘陽氣全盛而榮。故能破陰凝。布陽和。蓋陰氣結。則陽不能入。陰結破。則陽氣布。是布陽和之功。又因破陰凝而成也。特其味苦酸。苦者能降。不能開。故凡陰滯之結於上。非開無以致其

三八〇

力者。惡之。酸則能破能收。故凡陰結既破。不欲其大泄降者。宜之。此則所宜分別者也。統計傷寒金匱兩書用芍藥者六十四方。其功在合桂枝以破營分之結。合甘草以破腸胃之結。合附子以破下焦之結。其餘合利水藥。則利水。合通淋藥。則通淋。其體陰則既破。而又有容納之善。其用陰則能布而無燥烈之虞。雖必同他藥。始能成其功。實有非他藥所能兼者。世之人徒知其能收。而不知其收實破而不泄之功也。素問陰陽應象大論曰。陽之汗以天地之兩名之。陽之氣以天地之疾風名之。張子正蒙云。陽為陰累。則相持為雨。而降。陽在外不得入。則周旋不舍。而為風。是故陰結於內。衛陽不得入。則齋齋惡寒。漸漸惡風。齋齋發熱。營與衛周旋不舍。則鼻鳴乾嘔。營與衛相持而終不相舍。則汗出矣。與桂枝湯。芍藥桂枝。一破陰。一通陽。且佐以生薑。解其周旋不舍之維。使以甘草。緩其相持之勢。得微似有汗。諸證遂止。此實和營布陽之功。斷斷非酸收止汗之謂也。蓋川芎

藥以破陰結。則有便厥咽乾脚聾急之患。徒通陽氣。不破陰結。則有汗多亡陽之禍。茲則芍藥之功能。非他所克代矣。芍藥之任。莫重於小建中湯。其所治若煩。若悸。若裏急。若腹滿痛。爲陰氣結無疑。惟其治黃。則有不可解者。蓋小便自利。卽不能發黃。仲景固言之矣。今云小便自利。何以得成黃耶。用小建中。夫是以知芍藥能入脾開結也。胃能納受。膀胱能輸泄。水穀之道。一若無恙。乃病於黃。則獨爲脾病矣。黃者。水穀之精。鬱於中而變見於外也。小便不利爲黃。是水穀之氣皆不化。水穀之氣皆不化。是陰陽互結。陰陽互結者。其不得用芍藥審矣。今小便自利而爲黃。是水化。穀氣不化。水氣化而穀氣不化。是陰結而陽不布。食入於陰。不長氣於陽。與溼熱成黃。蓋有虛實之列矣。夫如是。焉得不用建中。焉得不重芍藥。抑非特此也。虛勞篇之。失精。四肢痠疼。咽乾口燥。似皆桂枝芍藥所宜。而不知皆由陰氣結。陽不得入。故浮游四射耳。陰氣閉。陽氣入。則浮火歸元矣。非芍

藥之功哉。仲景於是篇著一小建中湯證。於虛勞篇著一大黃蠱蟲丸證。可見實證中有虛。虛證中有實。學者最宜體察也。太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。同一滿也。而芍藥有去取之殊。何哉。芍藥之用。在痛不在滿。亦以滿爲陽痛爲陰耳。夫然。故建中芍藥最重。當歸芍藥散尤重。職是故也。結於上者多屬陽。結於下者多屬陰。故腹中滿痛。多用芍藥。如腹滿痛。中大柴胡湯。抵當烏頭。桂枝等湯是也。心下滿痛。則在所不用。如胸痺篇之桂枝生薑枳實湯。烏頭赤石脂丸。九痛丸等是也。小柴胡湯。通脈四逆湯。防己黃芪湯。皆以腹痛加芍藥。前言不爲謬矣。桂枝加芍藥湯。脾約麻仁丸。則似用芍藥爲下藥者。蓋因陰結而地道不行。得此卽可通降故也。乃真武湯則以下利去之。甘遂半夏湯則以下利用之。何哉。夫用芍藥以開結。甘遂半夏湯證曰。蟄伏其人。利反快。利而能快。留飲欲去。何必

更用芍藥甘遂。唯心下續堅滿。則開結行水。在所必須矣。真武湯何獨不然。既利而水氣行。腹痛止。則不必用芍藥。若利而腹痛不止。則芍藥尙在必用。此可意會而得者也。太陰篇云。蟄弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。夫不曰不可用。而曰宜減之。則因陰結而腹痛。因腹痛而下利。不得不用芍藥者在此。潔古製芍藥湯。治利爲有所本矣。蟄得諸其動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。火邪者。桂枝去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。二證迥乎不同。二湯相異。僅芍藥一味。其同其異。必能別之。而後芍藥之用可著也。夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。蟄極虛。乳遲。爲清穀亡血失精。太陽病以火熏之。不得汗。其人必燥。到經不解。必因血名爲火邪。共同亡血也。其異。少腹弦急也。亡血之因甚多。此則陰不交。陽陽氣四射。逼血外出。急變則亡。陽緩變則勞瘵。治此之法。當審其陰。何以不與陽交。若少腹弦急。則陰結也。其不由陰結者。必因爲佈

陽氣上出。陰氣下流也。陰氣下流。復用芍藥。是爲更虛其虛。必至陰氣亦溢。迫逐陽氣。陽氣無所駐足。拔隊外亡。不爲牡蠣龍骨而收。不爲桂枝生薑而通。不爲甘草大棗而緩矣。其由陰結者。則以陽不得入也。若用芍藥。陰結既破。陽氣遂布。陰陽和調。氣日生而血自益。諸證遂不作矣。夫豈非一味之攸繫耶。

近人學說 ●賈九如曰。白芍藥微苦。以能補陰。略酸。亦能收斂。因酸走肝。暫用之。生肝。肝性欲散。惡斂。又取酸以抑肝。故謂白芍能補復能消。真行血海。女人調經胎產。男子一切肝病。悉宜用之。調和血氣。其味苦酸。性寒。本非脾經藥。炒用製去其性。脾氣散能收之。胃氣熱能斂之。主平熱。嘔。止泄瀉。除脾虛腹痛。腸胃濕熱。以此瀉肝之邪。而緩中。魚脾氣。難經所謂損其肝者。緩其中。同炙甘草爲酸甘相合。調補脾陰。神妙良法。若久嗽者。藉此以收肺。又治痢疾腹痛。爲肺金之氣。鬱在大腸。酸以收緩。苦以去垢。故丹溪治痢。每劑用至三四

五靈白

錢大有功效。若純下血痢。又非其所宜也。其力不能通行滲泄。然主利水道者。取其酸斂能收諸濕而益津液。使血脈順而小便自行。利水必用以益陰也。若痘疹血不歸附者。用以斂血歸根。惟疹子忌之。凡諸失血後。及初產二十日內。肝臟空虛。不可以酸寒瀉肝。伐新生之氣。亦禁用。張山雷曰。本經芍藥。雖未分別赤白二者。各有所主。然尋繹其主治諸病。一為補血益肝脾真陰。而收攝脾氣之散亂。肝氣之恣橫。則白芍也。一為逐血導瘀。破積泄降。則赤芍也。蘇頌圖經本草。始有金芍藥（白）木芍藥（赤）之名。成無己謂白補而赤瀉。白收而赤散。故益陰養血。滋潤肝脾。皆用白芍。活血行滯。宣化癆毒。皆用赤芍藥。芍藥專治腹痛。仲聖之法。實即秦漢以前歷聖相傳之法。說者每謂腹痛是肝木凌脾。芍藥助脾土而剋肝木。故為腹痛之主藥。要知肝乘剛強之性。非藉陰液以涵濡之。則暴戾恣睢。一發而不可制。當其衝者。實惟脾土。先受其害。凡心胃痛。腹滿痛。胸脇刺痛。

支撐脹悶。無一非剛木凌脾之病。宋元以來。治此者多尚香燥氣藥。以剛濟剛。氣行而通則不痛。非不斂。圖目前之效。然愈燥而陰愈耗。肝愈橫。類發加劇。卒至肝脾之陰兩竭。而燥藥且不可復施。此行氣伐肝。適以變本加厲。非徒無益。而又害之矣。仲聖以芍藥治腹痛。一以益脾陰而攝納至陰耗散之氣。一以養肝陰而和柔剛木桀驁之威。與行氣之藥。直折肝家悍氣者。截然兩途。此洵肝與柔肝之辨。而芍藥所以能治腹痛脹滿。心胃刺痛。胸脇脹痛者。其全體大用。卽是此法。必不可與伐肝之劑作一例觀也。仲景云。太陰為病。脈弱其人續自便利。設當行大黃芍藥者。當減之。以其胃氣弱。易動故也。是指太陰虛症而言。可見凡腹痛之當用芍藥者。皆太陰氣滯。肝絡鬱結不舒為病。非屬於虛寒一邊。而中氣虛寒。則又有建中法在。非芍藥一味之所能治。此寇宗奭所以有氣虛寒人禁用之說也。（正譌）丹溪謂產後不可用芍藥。以其酸寒伐生發之氣故也。頗謂產後二字。

所該者廣博而無涯。芍是酸寒。虛寒者固不可用。然尙有小建中之成例在。若是實熱當下。確黃芩連。且皆不避。又安有獨禁芍藥一味。而乃曰產後不可用芍。則凡是媿身之後。獨忌此一味。其理安在。此必非丹溪之言。而大明本草。且謂女人一切病。胎前產後諸疾。則又是問寒熱虛實而概言之。適與丹溪相反。究之有為而言。兩者之說。是非非。各有所當。非可執死法以困活人者也。

國外學說 日本學說謂芍藥者。漢醫所用以治腹痛之藥也。據猪子氏之和漢藥論云。芍藥有興奮之作用。長井氏曾檢明其中有安息酸。然更無周到之記載。故猪子氏使伊藤修郎氏（當時醫科大學藥物學教室之補助）定量安息酸。依氏之成績（藥劑誌第三號）云。芍藥中約含五%。但其內一·五%在遊離之狀態。餘與鹽基抱合。猪子氏認此安息酸。為芍藥之效分。因謂用安息酸時。可投以芍藥。即肺勞。實扶的里。關節。癩瘡。質斯。小兒急性胃腸炎等均宜用之。古方藥品考曰。芍藥有數種。採根晒乾者。藥舖稱生乾。所謂赤芍藥是也。以出伊州。紀州者為勝。皮赤肥大。出城州。和州者。皮色淡紅。不拘根大小。肉白味苦。收者俱可用。又採根煮之。去黑汁。晒乾者。謂為真芍藥。氣味同上。而溫暖。皮色淡紅。肉白帶水紅。質極堅。頗似中國產。所謂白芍藥是也。成無己曰。赤者瀉。白者補。白者收。赤者散。正字通曰。根晒乾為赤芍。刮去根皮。蒸乾為白芍。此說得之前人云。根赤白者。隨花紅白者。非問有中國運來者。形如真芍藥而肥大。今人見來自中國者。卽視為貴重。故有取真芍藥之陳久。蛀蝕者。偽製混充。不可不辨。又有根屈曲。皮黑肉白。所謂草芍藥是也。或刮去黑皮。現出白色。亦呼為芍藥。與方中之白芍藥不同。人有誤為上品者。其原篤信則謂。山中自生。單瓣紅白者。便是草芍藥。日用藥品考曰。芍藥。中國來者少。且陳舊不佳。赤芍藥。不去粗皮而乾者也。白芍藥。去粗皮而蒸乾者也。日本產者。藥舖稱為生乾。皆去其粗皮而乾。

者呼爲真芍藥。以沸湯浸過。氣味薄。尚不如生乾爲勝。此外尚有白芍藥草芍藥。均不堪入藥也。一本堂藥選曰。凡選芍藥。不拘山生。園種。花紅花白。惟取根形肥大如指折之堅硬。外面淡紅色。內作淡白色。味苦澀。兼有香氣者爲佳。紫赤色者勿用。蓋芍藥經年久遠。則盡變成紫赤色。庸醫無知。必須中國產之赤芍藥。買人乃特選陳久紫色者以亂之。醫者不復詳察。不亦可笑之甚乎。本國信濃出一種草根。市人呼爲白芍藥。貨諸四方。此乃草芍藥之類。其花白。氣味亦異。非真芍藥也。又知州宇陀。近年多種植此種。呼爲宇陀芍藥。實卽信濃芍藥之類。凡芍藥。舊以山中生。單瓣淡紅色者爲良。今考山中所有。獨此種不可得。既已不可強求。則用人家園中種植者亦佳。法於八九月掘取其根。以竹刀刮去黑皮。洗淨。微蒸過。晒乾。市人呼爲家園芍藥。此與中國所來。初無二致。中國來者形肥大。決非山中自生。從來試用有效。故不必定須山中自生。單瓣淡紅色者。乃爲貴也。

五靈白

將此根蒸過。亦不得已耳。蓋不蒸過。則乾而柔。輒易霉蛀。減耗氣味。甚於蒸過之少力。故以微蒸爲宜。若蒸久。則損失性味。用時。水洗到細。亦不必定須用酒醋炒。或蜜水拌蒸。晒乾等。英美學說謂白芍產中國之河南。安徽等處。其根可爲藥品。其功用。能收斂。治痢疾。經漏。作泡。水及酒等之用。處方以白芍一分。搗爛。沸水十分。泡二點鐘。濾渣。每服二兩至三兩。又白芍一分。搗爛。淡酒五分。先用酒三分。浸二天。同時搖動。裝淋筒。淋乾。再加餘酒漂淋。仍足五分爲度。又荷蘭藥錢。收斂之芍藥。恐係洋產芍藥。其功效。芍藥生根。略有麻酸氣。乾根則無。微甘苦。性收斂。爲鎮瀉。止痛之藥。因神經感動而發之。痙攣。搐搦。諸症。神經性。肌肉。攣急。頭眩。眩暈。癩癩。睡覺。小兒。痙攣。子宮。衝逆。痛。痛風等症。用之。俱有殊效。爲煎劑。或散劑。用之。芍藥子。可製成糖漿。以治上述諸病。芍藥子。亦驗。但稍兼吐瀉之效。或謂此藥。用於瀉瀉。甚驗。惟一味。不克奏功。且前人所稱。治搐掣。急等神經病。有

特效者。晚近諸名家。歷經試驗。均屬無效。故聲價已漸低矣。

配合應用 ①白芍同黃連。滑石。甘草。升麻。人參。蓮肉。菟豆。紅麴。乾薑。爲治滯下之神藥。

②治脾虛洩瀉。白芍同人參。白朮。茯苓。炙甘草。肉豆蔻。橘皮。車前子。

③治腸風下血。白芍同荊芥。防風。生地黃。黃耆。炙甘草。

④治產後血虛發熱。白芍同當歸。地黃。牛膝。炒黑乾薑。續斷。麥門冬。五味子。

⑤治表虛傷風自汗。白芍同黃耆。防風。

⑥治腹中虛痛。白芍藥三錢。炙甘草一錢。夏月加黃芩五分。惡寒加肉桂一錢。冬月大寒再加桂一錢。水二盞。煎一半。溫服。(潔古方)

⑦治風毒骨痛在髓中。芍藥二分。虎骨一兩。炙酥爲末。夾絹袋盛。酒三升。漬五日。每服三合。日三服。(經驗方)

⑧治脚氣腫痛。白芍藥六兩。甘草一兩。爲末。白湯點服。(事林廣記方)

⑨治消渴引飲。白芍藥甘草等分爲末。每用一錢。水煎服。日三服。鄂渚辛祐之。患此九年。服藥止而復作。蘇朴投此方服之。七日頓愈。古人處方。殆不可曉。不可以平易而忽之也。(陳日華經驗方)

⑩治蝨血略血。白芍藥一兩。犀角末二錢半。爲末。新水服一錢。匕血止爲限。(古今錄驗方)

⑪治崩中下血小腹痛甚者。芍藥一兩。炒黃色。柏葉六兩。微炒。每服二兩。水一升。煎六合。入酒五合。再煎七合。空心分爲兩服。亦可爲末。酒服二錢。(聖惠方)

⑫治經水不止。白芍藥。香附子。熟艾葉各一錢半。水煎服之。(熊氏補遺方)

⑬治赤白帶下。年深月久不癒者。取白芍藥三兩。并乾薑半兩。到熱令黃。持末。空心水飲服二錢。七日再服。廣濟方。只用芍藥炒黑。研末。酒服之。(貞元廣利方)

⑭治金瘡出血。白芍藥一兩。熬黃爲末。酒或米飲服二錢。漸加之。仍以末傅瘡上。卽止。良驗。(貞元廣利方)

五畫 白

① 治痘瘡脹痛。白芍藥爲末。酒服半錢匕。(痘疹方) 又方。酒炒白芍藥二兩。炙甘草二錢。蓮子去心五十粒。水煎。治痘瘡有熱作洩。熱甚加酒炒黃連一錢。

② 治痘瘡血虛發癢。白芍、白芷、炙甘草。

③ 治木舌腫滿。塞口殺人。紅芍藥。甘草煎水熱飲。(聖濟總錄方)

④ 治魚骨哽咽。白芍藥嚼細嚥汁。(事林廣記方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃寒者禁用。經希推云。白芍酸寒。凡中寒腹痛。中寒作泄。腹中冷痛。腸胃中覺冷等。證忌之。惡石斛。芒硝。畏消石。蠶甲。小蘗。反藜蘆。忌鐵。須丸(即雷丸)爲之使。

著名方劑 芍藥湯。治滯下赤白。便膿血後重諸症。(仲景方) 用芍藥二兩。當歸黃連各五錢。枳殼。木香。甘草各二錢。桂一錢半。黃芩五錢。每服半兩。水煎服。痢不減。加大黃。

參攷資料 ① 傷寒太陰篇云。太陰爲病。脈弱。其人瀝自便利。設

當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱易動故也。乃後人不參經論。徒信偽書。流毒生靈。伊於何底。士宗云。仲師死而真傳絕。蓋絕於偽書之害道。而人不知。又曰。今人以四物湯爲補血主方。見湯內有芍藥。因信偽書之說。認爲斂陰之品。而芍藥遂列補劑矣。詭謬相承。至此已極。② 芍藥須用單葉紅花者爲佳。然氣虛寒人禁之。古人云。減芍藥。以避中寒。誠不可忽。(寇宗奭) ③ 芍藥瀉脾火。性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹痛多是血脈凝滯。亦必酒炒用。然止能治血虛腹痛。餘並不治。爲其酸寒斂斂。無溫散之功也。下痢腹痛必炒用。後重者不炒。產後不可用者。以其酸寒伐生發之氣也。必不得已。亦酒炒用之。(朱震亨) ④ 或言古人以酸瀉爲收。本經何以言利小便。白芍藥能益陰滋溼。而停津液。故小便自行。非因通利也。曰。又言緩中何也。曰。損其肝者緩其中。即調血也。故四物湯用芍藥。大抵酸瀉者爲收斂停溼之劑。故主手足太陰經收斂之證。(李杲) ⑤ 芍藥猶燥

約也。燥約。美好貌。此草花容燥約。故以爲名。羅願爾雅翼言。制食之毒。莫良於芍。故得藥名。亦通。鄭風詩云。伊其相贈。贈之以芍藥。韓詩外傳云。芍藥。離草也。董子云。芍藥一名將離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。(李時珍) ⑥ 芍藥古無赤白之分。而功用自別。白者苦而微酸。能益太陰之脾陰。而收斂散之大氣。亦補益肝陰。而安靖甲乙之橫逆。本經主邪氣腹痛。寒熱疝瘕。止痛益氣。別錄所謂緩中者。無一非養疏肝脾兩臟之真陰。而收攝兩臟之逆氣。斯邪氣退藏。正氣裨益。腹痛及心胃之痛皆除。中氣和調。寒熱自已。疝瘕自定。皆白芍藥養脾柔肝之功用也。赤者行滯破血。直達下焦。本經所謂除血痺。破堅積。別錄所謂通順血脈。散惡血。逐賊血。消癰腫。中惡腹痛。皆惟赤芍藥之能行滯逐瘀者。足以當之。利小便。去水氣。利膀胱。大小腸。亦赤芍導之功。石頑以本經之利小便三字。係於赤芍藥之下。良有以也。(張山雷)

三八四

【白豆】 古稱別名 飯豆。(本草綱目)

外國名詞 Phaseolus radiatus, U. var. (拉丁) シロアソキ シヤボンマン(日本)

基本 係豆科菜豆屬藥用白豆之子實。

形態 白豆爲穀類赤小豆之一種。乃小豆之色白者。大如綠豆而長。莖葉似赤小豆而大。其莢亦似之。四五月下種。種子可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補五臟。調中。助十二經脈。

歷代配製攷證 【唐】孫思邈千金翼論白豆曰。殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。【宋】日華諸家本草論白豆曰。煨腸胃。

【白豆葉】 主治 養食。利五臟。下氣。

【白豆蔻】 原名 多什。處方用名 帶殼蔻。白蔻仁。白蔻殼。

古稱別名 殼蔻。(本草綱目) 外國名詞 Amomum Car

Yunnanum. (拉丁) White Cardamom (英)

基本 屬薑荷科。藥用白豆蔻之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白豆蔻產安南菩薩山。東波山。又名東波蔻。為最正地道。暹羅次之。巨港。井里文所產者。為什路蔻。不適用。細看萬國藥方卷四三十一篇。所論有紫色者為紫豆蔻。分以其殼之紫白。是亦然也。至云苦者是益智子。又云中國廣州有產。則不特於出產處不知。且不識藥類。夫豆蔻為一種。益智又一種。何得混而為一也。豆蔻花。味淡。以豆蔻而比之。則不及豆蔻氣味十分之二。

形態 陳藏器曰。豆蔻草形如芭蕉。葉似杜若。長八九尺而光滑。冬夏不凋。其子為灰白色。圓形之果實。稍作鈍三稜形。揉之易破。處處生有短剛毛。內有三房。房九至十二個。種子呈淡黃色。有辛辣香氣。將此合於口內。則覺有極爽快之溫氣。
採取 七八月。採實曬乾。

五畫 白

製法 李時珍曰。白豆蔻圓大如白牽牛子。其殼白厚。其仁如縮砂仁。入藥去皮炒用。

性質 辛。大溫。無毒。

效能 煖胃行氣。用於嘔雜。嘔吐。噎酸。不消化。肺病等。

主治 積冷氣。止吐逆。反胃。消穀。下氣。

歷代述記攷證 【元】李東垣

用藥法象論豆蔻曰。散肺中滯氣。寬腸進食。去白睛翳膜。【元】王好古湯液本草論豆蔻曰。補肺氣。益脾胃。理元氣。收脫氣。【明】李時珍本草綱目論豆蔻曰。治噎隔。除瘧疾。寒熱。解酒毒。【明】繆希雍本草經疏論豆蔻曰。白豆蔻味辛。其氣大溫。其性無毒。好古大辛熱。味薄氣厚。輕清而升。入手太陰。亦入足陽明經。味大辛也。【明】李士材本草圖解論豆蔻曰。白豆蔻辛溫。入肺脾二經。散肺中滯氣。祛胃中停積。退目中雲翳。通噎膈。除瘧疾。解酒毒。止吐逆。其功全在芳香之氣。一經火炒。便減功力。即入湯液。但當研細。待諸藥煎好。乘沸點服。妙。

【清】黃宮繡本草求真論豆蔻曰。白豆蔻。本與縮砂密一類。氣味既同。功亦莫別。然此另有一種清爽妙氣。上入肺經氣分。而為肺家散氣要藥。且其辛溫香質。流行三焦。溫煖脾胃。而使寒熱膨脹。虛癆吐逆。反胃。腹痛。並弱。白背紅筋等症悉除。不似縮砂密辛溫香質兼苦。功和胃醒脾調中。而於肺腎他部。則止兼而及之也。是以肺胃有火。及肺胃氣薄切急。故凡用藥治病。最宜審諒氣味。分別形質。以為考求。不可一毫忽略。竟無分別於其間耳。

國外學說 英美學說謂白豆蔻亦有紫色者。謂之紫豆蔻。苦者謂之益智子。產中國之廣州及暹羅國等處。其果可入藥。以帶殼者為佳。其功用與草豆蔻同。

近人學說 張山雷曰。白豆蔻。開寶本草謂辛而溫。治精冷氣。止吐逆反胃。消食下氣。蓋溫胃醒脾。固亦與草豆蔻肉豆蔻異曲同工。共同得豆蔻之名。固亦以此。惟白豆蔻其氣清芬。辛烈視彼為尤。而無濕滯之味。則芳香之氣。尤善上行。開泄上焦氣滯。已與草果肉果

之專治中下者不同。東垣謂散肺中滯氣。海虞謂補肺氣。皆以其氣獨勝。辛升作用。功效必在上部。所以寬胸利膈。尤其獨擅勝場。而蘇恭竟謂氣味俱薄。專入肺經。得毋誤會。况乎此物氣味。皆極濃厚。必不可妄謂其薄。而咀嚼久之。又有一種清激冷冽之氣。隱隱沁入心脾。則先升後降。所以又能下氣。亦與其他辛升者。絕不相同。瀨湖綱目謂之大溫。頗嫌未允。此因蔻仁砂仁二者之特異性情。升降陰陽。各臻其妙。所以迥治肺脾肝腎諸氣。而為吹噓鼓動之無上妙品。寒熱虛實。無往不宜。楊仁齋謂治脾虛瘧疾。嘔吐寒熱。仍不外燥濕開痰溫煦以助脾家健運之義。

配合應用 ①治胃虛反胃及因寒嘔吐殊驗。用白豆蔻同人參。生薑。橘皮。麝香。
②治寒痰停胃作嘔吐似反胃。用白豆蔻。半夏。橘紅。生薑。白朮。茯苓。

③理脾虛白睛。生障翳。用白豆蔻。橘皮。白朮。白茯苓。決明子。甘菊。花蜜。蒙花。木賊草。穀精草。

五靈白

①理上焦滯氣。用白豆蔻、麝香、橘皮、木香、加烏藥、香附、紫蘇。治婦人一切氣逆不和。

②治秋深瘧疾。寒多熱少。嘔吐胃弱。飲食不進。用白豆蔻佐參、朮、薑、橘。

③解酒毒及中酒嘔吐惡心。用白豆蔻、薤豆、五味子、橘紅、木瓜。

④治胃冷惡心。食已即欲吐。用白豆蔻三枚。搗細好酒一盞。溫服。併飲數服佳。(張文仲備急方)

⑤治人忽惡心。多嘔白豆蔻子最佳。(肘後方)

⑥治小兒吐乳胃寒者。白豆蔻、縮砂蜜各十四個。生炙甘草各二錢。爲末。常摻入兒口中。(危氏得效方)

⑦治脾虛反胃。白豆蔻、縮砂蜜各二兩。丁香一兩。陳陳米一升。黃土炒焦。去土。細研。薑汁和丸。每二三錢。薑湯下。名太倉丸。(濟生方)

⑧治產後嘔逆。白豆蔻、丁香各半兩。研細。紙紅湯服一錢。少頃再服。(乾坤生意方)

用量 五分至一錢。
配合宜忌 凡嘔吐反胃腹痛

之由於火鬱熱症者。禁用。

參攷資料 ①白豆蔻氣味俱薄。其用有五。專入肺經本藥一也。散胸中滯氣二也。去感寒腹痛三也。溫暖脾胃四也。治赤眼暴發。去太陽經目內大管紅筋。用少許五也。(蘇恭)

②白豆蔻出伽古羅國。呼爲多骨。其草形如芭蕉。葉似杜若。長八九尺而光滑。冬夏不凋。花淺黃色。子作朵。如葡萄。初出微青。熟則變白。七月採之。(陳藏器)

③豆蔻今廣州宜州亦有之。不及番舶來者佳。(蘇頌) ④按楊士瀛云。白豆蔻治脾虛瘧疾。嘔吐寒熱。能消能磨。流行三焦。替衛一轉。諸證自平。(李時珍) ⑤豆蔻日本無此物。多產暹羅印度。新嘉坡。馬刺巴爾地方。(和漢藥考)

【白貝】即貝子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳貝子條。

古籍別名 脫毛羊草。

【白辛】(別錄)

形體 白辛爲雜草類之一種。其根色白氣香。可供藥用。

採取 三月採之。

性質 辛。有毒。

主治 療寒熱。

【白兔藿】古籍別名 白葛。(吳普本草)

形體 白兔藿爲葛草類之一種。苗似蘿藦。葉圓而厚。莖有白毛。蔓生山岡。其莖葉可供藥用。

採取 五六月間。採前日乾用。

性質 苦平無毒。

主治 蛇虺蜂蠆。狗咬。菜肉毒。毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末着痛上。立清毒。入腹者。煮汁飲即解。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論白兔藿曰。風邪熱極。煮汁飲。搗末。傳諸毒妙。

參攷資料 白兔藿解毒之功。莫之與敵。(陶弘景)

【白刺】即五加皮之古籍別名。典見綱目。詳五加皮條。

【白刺】即五加皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳五加皮條。

【白官砂】即礪砂之別名。詳礪砂條。

古籍別名 王宮。箭幹。

形體 白井爲葛草類之一種。

三八六

葉似小竹。根黃皮白。其根可供藥用。

採取 三月四月採根。曬乾用。

性質 苦無毒。

主治 肺欬上氣。行五臟。令百病不起。

參攷資料 白井氣味功用。俱近百部。(李時珍)

【白昌】即商陸之古籍別名。典見開寶本草。詳商陸條。

基本 白松香爲瓦

【白松香】上多年之積蠟。可供藥用。

製法 凡使須火煨用。

主治 風疰。蚊咬。厥作痛。辟瘴疫。療鼠瘡。

原名 銀杏。

【白果】命名 本品形似小杏。而核色白。故名。後稱爲白果者。銀杏也。

古籍別名 鴨脚子。(本草綱目) 公孫樹。(綱目拾遺)

外國名詞 Ginkgo biloba, L. (拉丁) Nut of Ginkgo (英)

基本 屬公孫樹科。藥用銀杏

之子仁。

形態 按銀杏係落葉喬木。高至數丈。葉扁圓。本作鴨脚形。通常皆二裂。葉脈平行。有雅致。至秋變黃色而脫。此樹在夏季開淡青色花。結實類無患子。核作二角或三角形。大六七分。中有白色仁。



果 白

採取 霜降後實熟時採之。

性質 甘苦平。澆無毒。

成分 含多量之脂肪與蛋白質。

效能 斂肺定痰喘。瀉收止帶濁。用作祛痰藥。又為滋養強壯藥。至治 生食引宿解酒。熟食益人。

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論白果曰。熟食溫肺益氣。定喘嗽。縮小便。止白濁。生食降痰消毒。殺蟲疔瘰癧。塗鼻面手足。去蟻。麤野。黠。及疥癬。疔。以陰。【清】黃宮繡本草求真論白果曰。

五 靈 白

白果雖屬一物。而生熱散分。不可不辨。如生食則能降痰解酒。消毒殺蟲。以漿塗鼻面手足。則去蛇蠍。野蠹。油膩。及同汞。澆衣。則死蟲。何其力銳氣勝。能使痰與垢之悉除也。至其熟用。則竟不相同。如稍食則可。再食則令人氣壅。多食則即令人臃脹。昏悶。昔已有服此過多。而竟眼悶欲死者。然究其實。則生苦未經火革。而性得肆其才而不察。熟則經火煨制。而氣因爾不伸。要皆各有至理。並非空為妄談已也。【清】王士雄隨息居飲食譜論白果曰。銀杏生苦平澆。消毒殺蟲。滋垢化痰。擦面去蝨。野蠹。疥。及疥癬。疔。陰。熱。甘。苦。溫。煨。肺。益。氣。定。喘。嗽。止。帶。濁。縮。小。便。多。食。壅。氣。動。風。小。兒。發。驚。動。疳。中。其。毒。者。昏。暈。如。醉。白。果。殼。或。白。煎。頭。煎。湯。解。之。食。或。太。多。甚。至。不。救。慎。生。者。不。可。不。知。也。【清】楊時泰本草述鈞元論白果曰。方書用銀杏治喘。蓋治喘之味者。是證緣胸中之痰。隨氣上升。黏結於喉。嚙以及會厭。懸雍。致氣出入不得快利。與痰引逆相擊。而作聲。是痰得之食。

味鹹酸太過。因積成熱。故丹溪云。治哮喘必薄滋味。必帶表散。而治哮喘。三方。未有能會麻黃者也。此果輕霜乃熟。稟收降之氣。最毒。故氣血之凝滯。而為痰為濁者。以是擯之。隔之。然必合於散劑。使氣能越。越血能宣。宣而後推之。陷之者。乃得收其全功焉。至於消毒殺蟲。毋亦以收令太過。俾氣血變管之凝於熱。而成毒。淫為風。而化蟲者。胥緣收者療之歟。

國外學說 和漢藥考曰。銀杏葉有驅除害蟲之功效。故農家用作驅蟲劑。兼肥料。又將其葉夾於冊間。可防蠹魚害。此樹長成甚遲。至孫代始得其用。故有公孫樹之名。

配合應用 治寒嗽痰喘。白果七箇。煨熟。以熱艾作七丸。每一果入艾一丸。紙包再煨香。去艾。喫。

（秘傳方） 治哮喘痰嗽。鴨掌散。用銀杏五箇。麻黃二錢。甘草炙二錢。水一鐘半。煎八分。臥時服。又金陵一舖。治哮喘白果定喘湯。服之無不效者。其人以此起家。其方用白果。

二十一箇。炒黃。麻黃三錢。蘇子二錢。款冬花。法製。半夏。桑白皮。蜜炙。各二錢。杏仁去皮尖。黃芩微炒。各一錢。甘草一錢。水三鍾。煎二鍾。隨時分作二服。不用鹽。（攝生方） 治咳嗽失聲。白果仁四兩。白茯苓。桑白皮。二兩。烏豆半升。沙蜜半斤。黃熟。日乾。為末。以乳汁半盞。并溼。九蒸。九曬。丸如綠豆大。每服三五丸。白湯下。神效。（余居士方）

治小便頻數。白果十四枚。七生。七煨。食之。取效止。 治小兒白濁。生白果十枚。搗水飲。日一服。取效止。 治赤白帶下。下元虛。白果。蓮肉。江米。各五錢。胡椒一錢。半。為末。用烏骨雞一隻。去腸。盛藥。瓦器。煮爛。空心食之。（集解方）

治腸風下血。銀杏煨熟。出火氣。食之。米飲下。 治腸風。銀杏四十九枚。去殼。生研。入百藥煎末。和丸。彈子大。每服二三丸。空心細嚼。米飲送下。（證治要訣方） 治牙齒齦。生銀杏每食後。

五靈白

膏一二箇良。(水類鈴方)

①治手足皴裂。生白果嚼爛。夜塗之。

②治鼻面酒皰。銀杏酒醱糟同嚼爛。夜塗且洗。(醫林集效方)

③治頭面癬瘡。生白果仁切斷。頻擦取效。(邵氏經驗方)

④治下部疳瘡。生白果。杵塗之。(趙原陽方)

⑤治陰風作痒。陽毛際肉中生。蟲如虱。或紅或白。痒不可忍者。白果仁嚼細。頻擦之。取效。(劉長春方)

⑥治狗咬成瘡。白果仁嚼細塗之。

⑦治乳癰潰爛。銀杏半斤。以四兩研酒服之。以四兩研傳之。(急救方)

⑧治水疔疔疔。水疔色黃。腐木不痛。疔疔凸色紅。使人昏狂。並先刺四疔。後用銀杏去殼浸油。終年久者搗舍之。(普濟方)

用蠶 錢半至三錢。

應用宜忌 凡有實邪者禁用。

參攷資料 ①多食氣動風。

小兒多食昏霍發驚。引肝同最宜。

魚食。患軟風。(吳瑞) ②銀杏宋初始著名。而修本草者不收。近時方藥亦時用之。其氣薄味厚。性瀉而收。色白屬金。故能入肺經。益肺氣。定喘嗽。縮小便。生搗能流油。賦則去痰濁之功。可類推矣。其花夜開。人不得見。蓋陰毒之物。故又能殺蟲。消毒。然食多則收。令大過。令人氣壅。腹脹昏頓。故物類相感。志言銀杏能醉人。而三元延壽書言白果食滿于箇者死。又云。昔有饑者。同以白果代飯食飽。次日皆死也。

(李時珍) ③原生江南。葉似鴨掌。因名鴨脚。宋初始入貢。改呼銀杏。因其形似小杏而核色白也。今名白果。梅堯臣詩。鴨脚類綠李。其名因葉高。歐陽修詩。絳囊初入貢。銀杏貴中州是矣。(李時珍) ④銀杏生江南。以宣城者為勝。樹高二三丈。葉薄。縱理。儼如鴨掌。形有刻缺。面綠背淡。二月開花成簇。青白色。二更開花。隨即卸落。人罕見之一枝。結子百十。狀如棗子。經霜乃熟。爛去肉。取核為果。其核兩頭尖。三稜為雄。二稜為雌。其仁嫩時綠色。久則黃。須雌雄同種。其樹則望乃

結實。或墜樹。臨水亦可。或墜一孔。內雄木一塊。泥之。亦結。陰陽相感之妙如此。其樹耐久。肌理白膩。術家取刻符印。云能召使也。文選。吳都賦。注。平仲果其實如銀。未知即此果否。(李時珍)

【白河車】即山海螺之古籍別名。典見王安採藥方。詳『山海螺』條。

【白油麻】即胡麻之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻』條。即白胡麻子之原名。詳『白胡麻子』條。

【白波串】即白附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白附子』條。

【白物】即人參之古籍別名。典見廣雅。詳『人參』條。即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

三八八

【白芥子】命名 本品乃芥之故名。一種。其子色白而大。

處方用名 白芥子。芥辣子。

古醫別名 胡芥。(唐本草) 蜀芥。(本草綱目)

外國名詞 Semen Sinapis Aliso. (拉丁) シノガラシ エドガラシ(日本)

基本 係十字花科芥屬。藥用白芥之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白芥子產中國張家口及綏遠等處。立秋前後收成。

形態 按白芥為菜類芥屬之一年生草本。高達三尺。葉為長橢圓形。或長卵圓形而尖。有長柄。互生。夏初葉腋出長梗。開帶黃色白花。花冠及萼作杯狀。先端五裂。雄蕊五。其果角色赤。有光澤。子大如粟米而色黃白。可供藥用。

採取 春夏間採之。

製法 採得去角取子。篩淨。曬乾用。

性質 辛。溫。無毒。行氣。豁痰。通經絡。消腫。

乾用。

性質 辛。溫。無毒。

效驗 行氣。豁痰。通經絡。消腫。

痛。專作祛痰藥。又可爲利氣及鎮痛藥。

主治 發汗。主胸膈痰冷上氣。面目黃赤。又醋研。傅射工毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論白芥子曰。禦惡氣。通尸飛尸。及暴風毒腫。試四肢疼痛。【唐】孫思邈千金翼論白芥子曰。欬嗽。胸膈支滿。上氣多睡者。每用溫酒吞下七粒。【明】李時珍本草綱目論白芥子曰。利氣豁痰。除寒暖中。散腫止痛。治喘嗽反胃。痺木脚氣。筋骨腰節諸痛。【明】繆希雍本草經疏論白芥子曰。芥菓火金之氣以生。而白芥則又得金氣之勝。故味辛氣溫無毒。辛溫入肺而發散。故有溫中除冷。發汗辟邪。豁痰利氣之功。朱震亨云。痰在脇下及皮裏膜外者。非白芥子莫能達。古方控涎丹用之。正此義爾。

【清】黃宮繹本草求真論白芥子曰。白芥子氣味辛溫。書載能治脇下及皮裏膜外之痰。非此不達。古方控涎丹用之。正是此義。蓋辛能入肺。溫能散表。痰在脇下皮裏膜外。得此辛溫。以爲搜剔。則內外宣

通。而無阻滯窳穢留滯之患矣。是以咳嗽反胃。痺木脚氣。筋骨難毒腫痛。因於痰氣阻滯。法當用溫用散者。無不藉此以爲宣通。然此大辛大熱。中病即已。久服耗損真氣。令人眩暈損目。若肺熱陰虛火盛者。忌之。芥菜豁痰利氣。主治略同。但較北芥子力微有別。【清】王士雄隨息居飲食諸論白芥子曰。芥辛甘而溫。禦風溼。根味尤美。補元陽。利肺豁痰。和中通竅。醃食更勝。開胃性平。以冬收細葉無毛青翠而煖者良。一名雪裏蕪。晴日刈之。晾至乾腐洗淨。每百斤以燥鹽五斤。壓實醃之。數日後懸缸一伏時。俾滴得浸漬。如齒少。泡鹽湯候冷加入。仍壓實一月後。開缸分裝。堪糞。送塔均以齒灌滿浸爲法。設滿不敷。仍以冷鹽湯加之。緊封塔口。久食不壞。生熟皆宜。可爲常饌。若將醃透之菜。於時燥時一日曬極乾。密裝乾潔罐內。陳久愈佳。香能開胃。最益病人。用時切食。薑素皆宜。以之燒肉。雖盛暑不壞。或切碎醃裝小罐。毋庸瀆浸。但須築實密封。尤堪藏久。醃芥漬煮食物味甚

鮮美。若墳墓埋土中久。則清徹如水。爲肺癆喉證神藥。春芥發風動氣。亦可醃食。病人忌之。白芥子研末。水調如糊。以紙密封半時。可作食料。辛熱爽胃。殺魚腥生冷之毒。多食動火。內熱者忌之。入藥治痰在脇下及皮裏膜外者。

近人學說 丁福保曰。芥子爲間接之食品。人之好否。各異其種類。亦頗多。爲藥爲菜者。以白芥子爲良。白芥子者。其苛烈性甚弱。有苛烈燒灼之味。有能使皮膚發泡之性。其揮發性與芥子油相同。白芥子爲對於胃腸病患之家常藥。

配合應用 ①治反胃上氣。白芥子末。酒服一二錢。【普濟方】
②治熱痰煩選。白芥子。黑芥子。大戟。甘遂。芒硝。硃砂等分。爲末。糊丸。梧子大。每服二十九丸。鹽湯下。名白芥丸。【普濟方】
③治冷痰痞滿。黑芥子。白芥子。大戟。甘遂。胡椒。桂心等分。爲末。糊丸。梧子大。每服十九丸。鹽湯下。名黑芥丸。【普濟方】
④治腹冷氣起。白芥子一升。微炒研末。湯浸蒸餅丸。小豆大。每鹽

湯吞十九丸。甚妙。【續傳信方】
⑤治小兒乳癖。白芥子研末。水調。攤膏貼之。以不爲期。【本草綱目方】

⑥治防痘入目。白芥子末。水調。塗足心。引毒歸下。令瘡疹不入目。【全幼心鑑方】
⑦治腫毒初起。白芥子末。醋調塗之。【瀕湖集簡方】

⑧治胸膈痰飲。白芥子五錢。白朮一兩。爲末。煎肉和搗丸。梧子大。每白湯服五十丸。【積玄方】
用鹽 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無風寒痰滯者禁用。

參攷資料 ①白芥子粗大白。色如白梁米。味甚辛美。從戎中來。【蘇恭】
②胡芥近道亦有之。葉大。子白且粗。入藥及啖最佳。而人間未多用之。【韓保昇】
③白芥子辛能入肺。溫能發散。故有利氣豁痰。溫中開胃。散痞消腫。辟惡之功。按醫家醫道云。凡老人若於痰氣喘嗽。胸膈懶食。不可妄投燥利之藥。反耗真氣。恐因人求治。其親解中。處三子。養親湯治之。隨試隨效。蓋

五靈白

五畫 白

白芥子白色。主痰。下氣寬中。紫蘇子紫色。主氣。定喘止咳。蘿蔔子白種者。主食。開痞降氣。各微炒研破。看所主為君。每劑不過三四錢。用生絹袋盛入。煮湯飲之。勿煎太過。則味苦辣。若大便素實者。入蜜一匙。冬月加薑一片尤良。南陵末齋子有辭贊之。李時珍曰。白芥子味極辛氣溫。能搜剔內外痰結。及胸膈寒痰冷涎壅塞者殊效。然而肺經有熱。與夫陰火虛炎咳嗽生痰者。法在所忌。其莖葉煮食。動風動氣。有瘡瘍痔疾便血者。咸忌之。〔釋希雅〕白芥子煎服治噎氣甚效。外用行氣行血。取粉末和胡麻子麩。溫水調成芥子泥。為引血疔瘻之用。治膈氣筋痛。肚腹痛。嬰兒抽風等。〔本草新義〕

【白芥莖葉】

性質 辛。溫。無毒。

主治 冷氣。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論白芥莖葉曰。安五臟。功與芥同。

參攷資料 凡熱病人不可食胡芥。為其性暖也。〔李時珍〕

【白芨】

原名 白芨。本品根色白而連及生長。故名。

處方用名 白芨片。

古稱別名 連及草。甘根。〔本草〕白給。〔別錄〕白根。〔吳普本草〕白根。竹葉膠。雪如來。紫蔥根。紫蘭根。〔和漢藥考〕箬蘭。蘭花紫蘭。〔羣芳譜〕同達羅喝悉多。〔金光明經〕

外國名詞 *Bolilla hyacinthina*, *Rehb. F.* 或 *Blestia hyacinthina* (拉丁)

基本 屬蘭科。藥用白芨之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。白芨產陝西漢中府。安徽安慶府等處。凡山野川谷間恒多生焉。



白芨

形態 按白芨為多年生草本。莖高尺餘。葉為廣披針形。葉面有並行脈。多縱皺。皆互生。夏日抽花梗。高一二尺。梢頭開花。有不整齊

之花被。色紅紫或白。往往數朵連綴而生。根黃白色。狀如扁螺。中含黏液頗多。

採取 八九月採根曬乾。

製法 水洗。微火略焙。

性質 苦。平。無毒。

效能 斂肺。生肌。化痰。止血。用作吐血藥。又為治瘡藥。

主治 癰腫。疔瘻。敗疽。傷陰死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。非緩不收。〔本經〕白給。主伏蟲。白癰腫痛。〔別錄〕

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白芨曰。除白癰疥蟲。結熱不消。陰下瘻。面上疥。令人肌滑。〔宋〕大明日華諸家本草論白芨曰。止疔邪血痢。癰疾風毒。赤眼癢。結溫熱癰疾。發背癩癧。腸風痔瘻。撲損刀箭。瘡湯火瘡。生肌止痛。〔元〕李東垣用藥法象論白芨曰。止肺血。〔明〕釋希雅本草經疏論白芨曰。白芨本經味苦平。別錄加辛微寒。李當之大寒。日華子加甘。東垣亦微寒。謂其性瀉。辛為金味。得季秋之氣。而兼金水之性者。故宜乎入肺理傷。有奇效矣。苦能洩

三九〇

熱。辛能散結。癰疽皆由榮氣不從。逆於肉裏所生。敗疽傷陰死肌。皆熱壅血滯所致。故悉主之也。胃中邪氣者。即邪熱也。賊風鬼擊。非緩不收。皆血分有熱。溼熱傷陰之所生也。入血分以洩熱。散結逐腐。則諸證隨不現矣。〔清〕黃宮繡本草求真論白芨曰。白芨味苦而辛。性瀉而收。微寒無毒。方書既載功能入肺止血。又載能治跌撲折骨。湯火灼傷。惡瘡癰腫。敗疽死肌。得非似收不收。似瀉不瀉。似止不止乎。不知書言功能止血者。是因性瀉之謂也。書言能治癰疽損傷者。是因味辛能散之謂也。此藥瀉中有散。補中有破。故書又載去腐逐瘀生新。至云重因補。有白芨一事。因割而見。色猶不變。雖云肺華損壞。可以復生。然終涉於荒唐。未可盡信。手足皸裂。面上黑皸。並跌打損傷。湯火灼傷。用治亦效。

國外學說 一本堂藥選曰。白芨及搗取生者。水洗去土。即剉入藥。尤良。若無生者。則曬乾者亦可。但不若生白芨之效為著。微火略焙。大則不宜。葉似蘭蕙。中心抽長莖。

開花紫紅色。甚可愛。亦有白花者。紫花易繁茂。白花易消失。入藥在所不拘。日俗呼爲紫蘭。大和本草曰。紫蘭多種。園中葉似海老根。四月開紫花。其根名白及。來自中國。花有紫白二色。均堪供賞玩。以紫白同種一處。則白者枯。別一種葉短。花尤好。亦有紫白二種。花園多有之。更有開黃花者。葉廣闊。

近人學說 張山雷曰。白芨古本皆作白及。惟太平御覽引本經則作芨。今皆作芨。蓋卽本此。本經主癰腫瘡敗疽。傷陰死肌。別錄除白癬疥蟲。皆以癰瘍外敷。及按藥言之。味苦辛而氣寒。故能消散血熱之癰腫。性黏而多脂。則能療敗疽之死肌。苦辛之品。又能殺蟲。則除白癬疥蟲。外癰消腫生肌之要藥也。主胃中邪氣者。則苦寒之品。能除胃熱耳。惟賦風鬼擊。瘧緩不收。其義未詳。不敢強解。又曰。白芨味苦氣寒。能內清肺胃邪熱。而外以涼血止痛。且賦黏之質。脂液富有。既可敷癰瘍未成。而消熱退腫。亦可搽既潰而去腐生肌。兼治金瘡湯火灼傷。皆本經之義也。後

五靈白

人以其清熱補傷。而治肺癰。頗有捷效。惟邪勢方熾之時。烈烈糾纏。強咳喘膿血。則宜大劑清降化痰。而白芨黏膩。猶嫌力薄。不勝重任。迨火燄少殺。卽可與清泄化痰之品。相輔成功。惟猶有稱其治跌打骨折。則未免譽之過甚。恐非實在也。又曰。白芨治肺癰。世每疑其膩滯。而不敢用。然苦寒本清肺胃。又能補傷。苟非火燄極盛之時。而臭痰腥穢之氣。已漸退舍。卽可用以兼補兼清。不致助痰留患。與二冬玉竹等比也。

配合應用 ①白及性清。破散中有收斂。蓋去腐逐瘀以生新之藥也。得白斂。紅藥子。加腦麝乳沒。治一切癰疽腫毒。止痛散結。排膿有神。

②治損肺吐血有奇效。白及一味爲細末。米飲調三錢服。
③治鼻衄不止。津調白及末。塗山根上。仍以水服一錢立止。(經驗方)
④治疔瘡腫毒。白及末半錢。以水澄之。去水。攤於厚紙上貼之。(袖珍方)

⑤治打跌骨折。酒調白及末二錢。服其功不減於自然銅。(永類鈔方)

⑥治手足皸裂。白及末水調。塗之。勿犯水。(濟急方)

⑦治湯火傷灼。白及末油調。傅之。(趙眞人方)

⑧治心氣疼痛。白及石榴皮各二錢。爲末。煉蜜丸。黃豆大。每服三丸。艾醋湯下。(生生編方)

⑨治重舌。白及末。乳汁調塗足心。(聖惠方)

⑩治婦人陰脫。白及川烏頭等分。爲末。絹袋一錢。納陰中。入三寸。腹內熱卽止。日用一次。(廣濟方)

⑪治刀斧傷損。白及石青煨等分。爲末。搽之。亦可收口。(濟急方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡肺胃有實火者。禁用。惡理石。畏李核。杏仁。反烏頭。

著名方劑 白芨枇杷丸。治咯血。(戴氏方) 用白芨一兩。枇杷葉(去毛蜜炙)藕節各五錢。上爲細末。另以阿膠五錢。蛤粉炒。用生地汁調之。火上頓化。入前藥爲丸。如龍眼大。每服一丸。

參攷資料 ①近道處處有之。葉似杜若。形根似薤米。節間有毛。方用亦稀。可以作糊。(陶弘景) ②山野人患手足皸拆者。嚼以塗之。有效。爲其性黏也。(蘇恭) ③凡吐血不止。宜加白芨。(朱丹溪) ④白芨性清而收。得秋金之令。故能入肺止血。生肌治瘡也。按洪邁夷堅志云。台州獄吏。憫一大囚。囚慙之。因言吾七次犯死罪。遭訊拷。肺皆損傷。至於啞血。人傳一方。只用白及爲末。米飲日服。其效如神。後其囚沒選。劍者剖其胸。見肺間數穴。數十處皆白及填補。色猶不變也。洪貫之聞其說。赴任洋州。一卒忽苦咯血甚危。用此救之一日卽止也。摘玄云。試血法。吐在水盃內。淨者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉者心血也。各隨所見。以羊肺羊肝羊心。煮熱。蘸白芨末。日日食之。(李時珍) ⑤其根白色。連及而生。故曰白及。其味苦而曰甘。根反膏也。吳普作白根。其根有白。亦通。金光明經。謂之同遠羅。喝悉多。又別錄有名。未用。白給。卽白及也。性味功用皆同。係重出。今併爲一。(李

五靈白

時珍) 蕋葉如生斑。發。十月花直上。紫赤色。根白。連。二月八月九月採。(吳普本草)

【白菝片】即白菝之處方用名。詳『白菝』條。

【白芩】即杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。②即冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【白花地丁】即玉如意之古籍別名。典見劉氏驗方。詳『玉如意』條。

【白花百合】即百合之處方用名。詳『百合』條。

【白花射干】即射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。

【白花根】性質功用與白花藤同。詳『白花藤』條。

【白花粉】即天花粉之處方用名。詳『天花粉』條。

【白花蛇】命名 諸蛇鼻向下。獨此鼻向上。背有花文而色白。故名。本品出於蕪州者。雖乾枯而目不陷。故後世遂有蕪蛇擅名也。

處方用名 蕪蛇肉。
古醫別名 蕪蛇(本草綱目)


黔蛇。賽鼻蛇。(和漢藥考)

外國名詞 Agkistrodon
nubos (拉丁)

基本 屬爬蟲類之蛇族。藥用白花蛇之肉。

產地 蘇頌云。今黔中及蕪州。鄧州皆有之。陳仁山藥物生產辨云。蕪蛇產浙江省金華府。八月新形態 按白花蛇狀龍頭虎口。

黑質白花。脇有二十四個方勝文。腹有念珠斑。口有四長牙。尾上有一佛指甲。長一二分。腸形如連珠。多在石南藤上。食其花葉。人以此尋獲。先撒沙土一把。則蟻不動。以叉取之。用繩懸起。剗刀破腹。去腸物。則反尾。洗滌其腹。以竹支定。屈曲盤起。紮縛炕乾。



蛇花白

採取 九十月間。捕白花者火乾。

製法 蘇頌曰。凡使白花蛇。如頭尾各一尺者。有大毒。不可用。只

用中段乾者。以酒浸去皮骨。炙過收之。則不蛀。其骨刺須遠棄之。傷人毒與生者同也。寇宗奭曰。凡用去頭尾。換酒浸三日。火炙去盡皮骨。此物甚毒。不可不防。李時珍曰。黔蛇長大。故頭尾可去一尺。蕪蛇

止可頭尾各去三寸。亦有單用頭用頭尾者。大蛇一條。只得淨肉四兩而已。久留易蛀。惟取肉密封。藏之十年。亦不壞也。按聖濟總錄云。凡用花蛇。春秋酒浸三宿。夏一宿。冬五宿。取出炭火焙乾。如此三次。以砂瓶盛。封口。埋入地中。一宿出火氣。去皮骨。取肉用。

性實 甘。鹹。溫。有毒。效驗 搜風溼。治癱瘓。定搐搦。療驚瀉。用作截風要藥。

主治 中風。溼痺。不仁。筋脈拘急。口面喎斜。半身不遂。骨節疼痛。脚弱不能久立。暴風。瘧疾。大風。疥癬。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白花蛇曰。治肺風鼻衄。浮風。瘧疾。身上自發風。瘧疾。疥癬。

三九二

【明】李時珍本草綱目論白花蛇曰。通治諸風。破傷風。小兒風熱。急慢驚風。搐搦。癩瘡。漏疾。楊梅瘡。痘瘡。倒陷。【明】繆希雍本草經疏論白花蛇曰。白花蛇生於土穴陰濕之處。其肉暗毒腐之氣。故其味雖甘。鹹。性則有大毒也。經曰。風者百病之長。善行而數變。蛇性走竄。亦善行而無處不到。故能引諸風藥

至病所。自臟腑而達皮毛也。凡癩風疥癬。喘急拘急。偏痺不仁。因風所生之證。無不藉其力以搜逐。本經著其功能。信非虛矣。【清】黃宮

緝本草求真論白花蛇曰。白花蛇何以名為搜風定搐之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性實尤急。又食石南藤。其藤辛苦。治風。故能內走臟腑。外澈皮膚。透骨

搜風。截毒定搐。並治風溼癱瘓。大風疥癬。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並麴造酒。服酒時。切忌見風。並於開樽時。須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其清道也。瘧風用

大楓子仁。服此而無效者。以其大楓子氣燥。傷血。服此血益受傷也。

大楓子仁。服此而無效者。以其大楓子氣燥。傷血。服此血益受傷也。

此術則龍頭虎口。異質白花。鵝有二十四方。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。【清】黃元御玉楸葉解論白花蛇曰。白花蛇穿經透骨。開痺搜風。治鼻口喎斜。手足癱瘓。骨節疼痛。肌膚腐爛。疥癩風癩之證。中風病因木鬱風動。血燥筋枯。外風虛邪表閉。筋縮四肢而成。而木鬱之由。全緣水寒土溼。生發不遂。白花蛇外達筋脈。則益其枯燥。內行臟腑。不能去其溼寒。非善品也。唐工習用諸方。標本皆背。無益於病。而徒殺生靈。甚無益也。讀柳子厚捕蛇之篇。至可傷矣。【清】楊時泰本草述鈞元論白花蛇曰。蛇藥隨風重罪之體。用乘於六陽盛氣用。益風大之力。故其性善。實可以療善行。斂變之風。但屬外中之風。固應所投。若投之內風。諸證。不能已疾。而反甚之矣。然而溼病有似中風者。醫學元戎曰。酒溼之為病。亦能作痺證。口喎喎斜。

五蠶 白

舌強不正。半身不遂。渾似中風。當瀉溼毒。不可作風治。而汗之。即是釋之。溼痺還有病風者。又不獨似風而已。蓋其血脈之所壅阻。即病於風。久之。血中鬱為風毒。以血脈固風。驟也。然則開寶所主中風溼痺者。乃指此證乎。不則先因風鬱。以病氣。送致血壅。而患於溼痺者乎。後學不揣。同謂茲物治風。則妄投貽害。殊不淺也。要知斷蛇甘鹹。固入血分。中風溼痺。乃風壅於血分之病。至諸風癱瘓。及癩癧楊梅。皆風之浸淫於血。以為患者。其對治固宜。如用以療陰虛陽缺之風。則過矣。

辨為 鄭育慶曰。真齊州所產之蛇。龍頭虎口。異質白花。鵝有二十四個方。腹有念珠斑。口有四長牙。尾上有一佛指甲。長二分。鵬形如連珠。市肆有用本地白花蛇。充欲辨真偽。但視蛇雖乾枯。而眼光不陷者為真。故羅願爾雅翼有云。蛇死目皆閉。惟齊蛇目開如生耳。曹炳章曰。按虞初廣志云。蝮蛇大者達十餘丈。圍可八九尺。為蛇中之最大者。故又名

王蛇。屬動物學蛇類中之開口類。其部分之構造。頭部以下。軀幹及尾。無顯然之別。皮膚中含有色素。成特有之體色。外皮半脫數次。謂之蛇脫。此係蛇類之特別機關。因蛇類外皮。無生長之力。故有軀幹增大。勢必脫去之也。心臟具二心耳。一心室。故生理學上之消化作用欠缺。而血行遲緩。其所以成冷血動物者此也。此蛇腹部之下。尚存有後足遺跡。由動物學之歷史考之。可知其脫變之跡。現多產熱帶諸地。嶺南亦著。皆夙以為貢品。如唐書地理所謂廣州土貢鱉甲。蝮蛇是也。常棲樹上。雖無毒齒。而筋肉強大。能咬殺人畜。候斃鹿過者。吸而吞之。至已溶化。即纏束大樹。出其頭角。乃不復動。土人每伺而殺之。其所以能吞蝮已大之動物者。即以此蛇無胸骨。而體中筋肉可任意漲縮也。金樓子有楚辭云。蛇有吞象。其大如何之句。或謂指巴蛇。或云。即指此也。埤雅云。蝮蛇尾圓無鱗。身有斑紋。故如暗錦。似覆行地。常俯其首。隨日轉。上自近頭。中自近心。下自近尾。

蝮蛇肉。俗謂食之。辟蠱毒。其牙長六七寸。土人云。利遠行。避不祥。每枚值牛數頭。其說亦見於括地志。然最貴者為鱗。能療疾。唐時勅令桂賀泉廣四州。輪次以進。段公路亦云。廣州南海縣。每年端午日。皆取其鱗貢進。蛇則諸郎探送。事參觀看出之。鄭重如此。實則由身中具一種特別之液體。利去風溼諸疾。其皮性堅韌。可鞣鼓。今潮州亦有為之者。其聲絕類象皮鼓。蓋蝮蛇全體殆無一非有用之材也。故叔夜養生論云。蝮蛇珍於越土。而南齊異物志亦云。蝮惟大蛇。既洪且長。采色駁雜。其文錦章。食豕吞鹿。腹成養創。實享嘉食。是豕是鹿。皆殺之也。特晉中興書所云。顏舍嫂病困。須蝮蛇膽。不能得。舍憂嘆累日。忽一童持青囊授舍。乃蛇膽也。其他如齊雲樓雜記云。沈公某其鄉人也。明萬曆間。巡撫滇南。初至文武來謁。有參將親甚醜陋。厥首僅存白骨。絕無領項輔頰。唯目光燦爛。注公大驚。獨留問故。自言茲地。蝮蛇。千歲以上者。高數丈。互四五里。恒皆游。遇豺虎諸獸。則

五靈白

吸而吞之。其於人亦然。某曾夜歸。覺為風攝去。既趨如坐丹爐中。萬火齊發。累積且逼人。某疑入蟒蛇腹矣。幸抽刀割之。約厚五六寸。任此蛇懸天搶地。奔竄數十里外。經時纔出。而此蟒蛇已死。某通體股紅。頰上皮肉俱盡。倦而寤。及寤始疼。因半裁方愈。此約長五里。山中人競取脂燧燈。燐火如笠云。據前辨蟒蛇。乃產兩廣深山熱帶地者。故其形甚大。我浙江金衙殿等所產亦多。惟大者絕少。是蛇一日中惟午時開眼。其捕法。以長竹竿端繫繩。打於叢草上。如下有蟒蛇。則草經打搖動。而蛇遂直立欲撲。狀即以繩固套於蛇身抽緊。則蛇將繩纏緊。遂持竹竿於石上。將竹竿壓於蛇上。以利刃剖蛇腹去腸。以竹筒撐而曬乾。惟膽亦取出收藏。以作藥用。鄭君有言。以白花蛇偶充。白花蛇甚小。重不及兩。乾蟒蛇大者十餘兩。小者五六兩。斷不能充。且白花蛇價昂。蟒蛇十倍。惟初生小蟒蛇充白花蛇。或亦合理。惟斑紋亦有不同耳。

頑痺疥癬。同苦參、首烏、威靈仙、胡麻、天冬、百部、鱗、菴、葎、葉、刺、蒺、藜。○ 驅風膏治風癱瘋風。遍身疥癬。用白花蛇肉四兩。酒炙。天麻七錢。牛蒡子、荊芥各二錢。半為末。好酒二升。蜜四兩。石器熬成膏。每服一盞。溫湯服。日三服。急於暖處出汗。十日效。(醫靈元戎方) ○ 世傳白花蛇酒治諸風。無新久。手足緩弱。口眼喎斜。語言蹇澀。或筋脈掣急。肌肉頑痺。皮膚燥痒。骨節疼痛。或生惡瘡疥癩等疾。用白花蛇一條。溫水洗淨。頭尾各去三寸。酒浸去骨刺。取淨肉一兩。入全蠍炒當歸。防風、羌活各一錢。獨活、白芷、天麻、赤芍藥、甘草、升麻各五錢。剉碎。以絹袋盛貯。用糯米二斗。蒸熟。如常造酒。以袋置缸中。待成。取酒同袋密封。煮熟。置陰地七日。出毒。每溫飲數盞。常令相續。此方乃斬人板印。以信蛇饋送者。不知所始也。(瀨湖集簡方)

密蓋。三七日取酒。以蛇曬乾為末。每服三五分。溫酒下。仍以濁酒并糟作餅食之尤佳。(瑞竹堂經驗方) ○ 瀨湖白花蛇酒治中風傷濕。半身不遂。口日喎斜。肌肉癢痺。骨節疼痛。及年久疥癬惡瘡風癩諸症。用白花蛇一條。取龍頭虎口。黑質白花。尾有佛指甲。目光不陷者為真。以酒洗潤透。去骨刺。取肉四兩。真羌活二兩。當歸身二兩。真天麻二兩。真秦艽二兩。五加皮二兩。防風一兩。各剉勻。以生絹袋盛之。入金華酒罈內。置入糯米。生酒醋。五盞。浸袋。管葉密封。安罈於大鍋內。水煮一日。取起。埋陰地七日。取出。每飲一二盞。仍以滓曬乾碾末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。用煮酒吞下。切忌見風犯慾。及魚羊雞麵發風之物。(李時珍方) ○ 雞峯白花蛇酒治營衛不和。陽少陰多。手足舉動不快。用白花蛇酒煮。去皮骨。瓦焙。取肉一兩。天麻、狗脊各二兩。為細末。以銀盂盛。無火酒一升。浸之。重湯煮稠如膏。銀匙攪之。入生薑汁半盞。同熱勻。

三九四

瓶收。每服半匙。頭用好酒或白湯化服。日二次。神效極佳。(備急方) ○ 治癩白花蛇膏。用白花蛇五寸。酒浸。去皮骨。炙乾。雄黃一兩。水飛研勻。以白沙蜜一斤。杏仁一斤。去皮研爛。同煉為膏。每服一錢。溫酒化下。日三須先服通天再造散。下去蟲物。乃服此除根。日三服。 ○ 白花蛇散治腦風頭痛。時作時止。及偏頭風。用白花蛇。酒浸。去皮骨。天南星藥水。煮軟。切炒。各一兩。石薺荊芥各二兩。地骨皮二錢。半為末。每服一錢。茶下。日三服。(聖濟總錄方) ○ 潔古白花蛇散治大風病。白花蛇、烏梢蛇各取淨肉二錢。酒炙。雄黃二錢。大黃五錢。為末。每服二錢。白湯下。三日一服。(家珍方) ○ 三蛇息風丹。治癱風手足麻木。眉毛脫落。皮膚瘙癢。及一切風癩。白花蛇、烏梢蛇、土蝮蛇各一條。並酒浸取肉。晒乾。苦參頭末四兩。為末。以皂角一斤。切酒浸。去酒。以水一碗。採取濃汁。石器熬膏。和梧子大。每服七十丸。煎通聖散下。以粥飯服之。日三服。三日一浴。取

汗透風。治倒無。蛇。有大。以。子。肉。三。兩。

③ 三因白花蛇散治九種瘰癧。發項腋之間。疼痛。憎寒發熱。白花蛇酒浸取肉二兩。焙。生厚角一兩。二錢五分。鈔研。黑牽牛五錢。半生半炒。青皮五錢。爲末。每服二錢。入膩粉五分。五更時糯米飲調。下利。下惡毒。爲度。十日一服。可經病根。忌發物。

④ 俗傳白花蛇丸治楊梅瘡。先服發散藥。後服此。用花蛇肉。酒炙。魚板酥炙。穿山甲炙。蜂房炙。輕粉。硃砂各一錢。爲末。紅棗肉搗丸。梧子大。每服七丸。冷茶下。日三。忌魚肉。服盡即愈。後服土茯苓藥調之。方廣心法附錄。治楊梅瘡。用花蛇肉一錢。銀絲二錢。鉛二錢。汞二錢。爲末。作紙捻九條。每用一條。於燈盞內。香油浸點燈。安烘熾。放被中。蓋臥。薰之。勿透風。一日三次。

五畫 白

用匙 八分至錢半。施用宜忌 凡非真有風邪而屬血虛生風者禁用。參攷資料 花蛇治風。速於諸蛇。野人治疥癬。遍體諸藥不效者。生取此蛇。劑斷。以磚燒紅。沃醋。令氣蒸。置蛇於上。以盆覆一夜。如此三次。去骨取肉。芫以五味。令爛頓食之。候睡一晝夜。乃醃瘡。疔腫皮便退。其疾便愈。(蘇頌) 羅願爾雅翼云。蛇死目皆閉。惟蕪州花蛇。目開如生。舒蕪雨界者。則一開一閉。故人以此驗之。又按元稹長慶集云。巴蛇凡百類。惟養鼻白花蛇。人常不見之。毒人則毛髮豎立。飲於溪澗。則泥沙盡沸。鴉鳥能食其小者。巴人亦用禁術制之。燕以雄黃烟。則腦裂也。此說與蘇頌所說。蛇相合。然令蕪蛇亦不甚毒。則野蜀之蛇。雖同有白花。而類性不同。故入藥。獨取蕪產者也。(李時珍)

【白花蛇眼睛】 主治 小兒蛇眼。睛一隻。爲末。竹瀝調少許。灌之。立效。

【白花蛇酒】 製法 用白花蛇肉一條。絹袋盛。先置麴於缸底。次置蛇肉於麴上。以糯米飯置蛇肉上。密蓋之。三七日。取酒飲。再以蛇肉曬乾。爲末服。

主治 諸風頑痺。癱緩。變急。疼痛。惡瘡。疥癩。性質 有毒。 【白花蛇頭】 主治 癩風毒癩。

【白花魚】 卽白魚之別名。詳『白魚』條。

【白花菜】 古籍別名 羊角菜。其花黃者名黃花菜。(本草綱目) 風鳥草(日本) 外國名詞 Podiollaria Vicia, Matamuna. (拉丁) フウテウサウヤウカクサウ(日本) 基本 係白花菜科。白花菜屬。

形態 白花菜爲菜類之一。生草本。春。月下種。莖莖莖。高三尺至三尺。有粘毛。一枝五葉。葉大如拇指。作掌狀複葉。小葉五片。倒卵形。全邊有微鋸齒。苞則以三小葉合成。夏。月莖頭開白色花。或帶

紫色。總狀花序。花後結角。長二三寸。其子作腎臟形。色黑而細。

性質 苦。辛。微毒。 主治 下氣。 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白花菜曰。煎水洗痔。搗爛敷風濕痺痛。搗酒飲。止痛。參攷資料 多食動風氣。滑腸。腑令人胃中悶滿。傷脾。(汪頌)

【白花藤】 外國名詞 Tracle-nodes, Lemaire. (拉丁) テイカカツラ セキダカツラ(日本)

基本 係夾竹桃科。榕石藤。藥用爲白花藤之莖葉與根。

形態 白花藤爲蔓草類之多。年生常綠木本。苗似野葛。葉似女貞。浸冬不凋。花色白。其根骨柔。皮厚肉白。 性質 苦。寒。無毒。 主治 解諸藥菜肉中毒。漬酒主虛勞風熱。 參攷資料 凡使勿用菜花藤。其相似。只是味酸澀。白花藤味甘。採得去根。剉。陸乾用(雷斅)

五畫 白

◎蘇言用根。雷言用苗。都可用。按葛洪肘後方云。席辨刺史在嶺南日久。言俚人皆因飲食入毒多。不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘴。急含白銀一宿。變色者。即是也。銀青是藍藥。銀黃亦是雷藥。茵音混草名也。但取白花藤四兩。出嶺州者為上。不得取近野葛生者。洗切。同乾薑黃四兩。水七升。煮取半空。腹頓服。少間勿怪。其毒即解。(李時珍)

【白芷片】即白芷之處方用名。詳【白芷】條。

【白芷】 命名 凡初生之根幹。為芷。本品色白氣香。形似初生根幹故名。

處方用名 香白芷。白芷片。

古籍別名 白芷。芳香。(本經)澤芬。存蘇。(別錄)發。發。藥名。藜麻。(本草綱目)蒼。藜。藜。百。滑。杜。若。藜。香。神。靈。團。塊。蔡。堯。仇。里。竹。根。(和漢藥考)

外國名詞 Anglica ana-mela(拉丁) 蘇木 屬繖形科。葉用白芷之根。

產地 白芷產四川為正。味馨香。有產浙江寧波杭州等名。杭芷又名寧波芷。又名老頭芷。味辣辛者。不適藥用。產於河南名會芷。如無川芷。則用會芷亦可。均夏季出新。又名芳香。其他川谷下澤間。恒多生焉。

形態 按白芷為三年生草本。藥園多培植之。春日抽苗。高約七八尺。葉為三出重覆之葉。皆相互生。葉柄之基部。膨起為葉鞘。而抱莖。小葉為披針狀。則相對而生。邊緣有細鋸齒。兩對至四對。別有抱莖之葉鞘。二至夏。梢頭開五瓣之小白花。相綴而為緩傘形之花序。果實為裂果。此草播種之後。經三年而開花結實。後乃枯死。本品為粗一寸至寸半之主根。有輪節。或隆起。上部有鞘狀之葉痕。其下多分枝之根。質柔軟。外面色淡黃褐。有溝紋。香氣頗甚。味甘辛。

種植 此種本年八月時實。來秋掘取其根。一年根小根用。其春植者。至二年則開花。根堅。入秋盡朽。故以八月種。來秋掘根為宜。採取 二月八月採根。暴乾。須採二年生之根者佳。

製法 古法。若白芷採得。刮去上。皮。細切。以黃精等分。同蒸一伏時。晒乾。去黃精。用。今人採根。洗刮。寸截。以石灰拌勻。晒乾。為其易炷。并欲色白也。入藥微炒。治便風炒。焦。治淋醋炒。

性質 辛溫。無毒。成分 其成分為揮發油。樹脂。安傑利加酸。安傑利精。蠟分。苦味質。鞣酸。澱粉。糖分等。效能 發表。解肌。散風。燥濕。能與香中樞神經。使全身血行增速。用作鎮痙藥。又為發汗鎮痛藥。用於感冒風邪之頭痛症。及為通經藥。用於婦人月經之不調。

主治 女人潮下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風。使目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可作面脂。(本經)療風邪。久渴。嘔吐。兩脇滿。頭眩。目痒。可作膏藥。(別錄)

歷代記述致豐 【唐】甄權藥性本草論白芷曰。能蝕膿。止心腹血刺痛。女人溼血。腰痛。血崩。宋大明諸家本草論白芷曰。治目赤。等肉。去齒疔。此藥。補胎。滑胎。破。

宿血。補新血。孔。發背。瘰癧。風。痔瘡。瘡。疥。癬。止。痛。排。膿。金。張。元。素。珍。珠。囊。論。白。芷。曰。解。利。手。陽。明。頭。痛。中。風。寒。熱。及。肺。經。風。熱。頭。面。皮。膚。風。草。燥。燥。元。李。東。垣。曰。白。芷。療。風。通。用。其。氣。芳。香。能。通。九。竅。表。汗。不。可。缺。也。明。李。時。珍。本。草。綱。目。論。白。芷。曰。治。鼻。淵。鼻。齩。齒。痛。眉。梭。骨。痛。大。腸。風。秘。小。便。去。血。婦。人。血。風。眩。暈。積。胃。咽。食。解。脫。毒。蛇。傷。刀。箭。金。瘡。明。經。希。瑞。本。草。經。疏。論。白。芷。曰。白。芷。得。地。之。金。氣。象。感。天。之。陽。氣。故。味。辛。氣。溫。無。毒。其。氣。香。烈。亦。芳。草。也。入。手。足。陽。明。足。大。陰。走。氣。分。亦。走。血。分。升。多。於。降。陽。也。性。善。祛。風。能。蝕。膿。故。主。婦。人。潮。下。赤。白。辛。以。散。之。溫。以。和。之。香。氣。入。脾。故。主。血。閉。陰。腫。寒。熱。風。頭。使。目。淚。出。辛。香。散。結。而。入。血。止。痛。故。長。肌。膚。芬。芳。而。辛。故。能。潤。澤。辛。香。溫。散。得。金。氣。故。療。風。邪。久。渴。風。能。勝。溼。也。香。入。脾。所。以。止。嘔。吐。療。兩。脇。風。痛。頭。眩。目。痒。祛。風。之。效。也。兼。可。作。膏。藥。面。脂。潤。澤。色。乃。祛。風。散。結。之。事。耳。黃。宮。精。本。草。綱。目。論。白。芷。曰。白。芷。色。白。味。辛。

三九六

氣溫力厚。道發行表。爲足陽明經。祛風散濕主藥。故能治陽明一切頭面諸疾。如頭目昏痛。眉稜骨痛。暨牙齦骨痛。面黑瘰癧者是也。且其風熱乘肺。上燥於腦。滲爲淵涕。移於大腸。變爲血崩。血閉。腸風痔瘻癰疽。風與濕熱。發於皮膚。變爲瘡癤燥癢。皆能溫散解托。而使腠理之風悉去。留結之癰腫潛消。誠祛風上達。散濕火要劑也。然其性升散。血熱有虛火者。禁用。色白氣香者佳。或微炒。用當歸爲之使。惡旋覆花。【清】徐洄溪本草經百種錄論白芷曰。凡驅風之藥。未有不枯耗精液者。白芷極香。能驅風燥濕。其質又極滑潤。能和利血脈。而不枯耗。用之則有利無害者也。蓋古人用藥。既知藥性之所長。又度藥性之所短。而後相人之氣血。病之標本。參合研求。以定取舍。故能有顯效而無隱害。此學者之所殫心也。【清】鄒澍本經疏證論白芷曰。苗短根長。本主攝陽入陰。以行陰中之化。遠志秦艽。莫不如是。惟白芷則以其味辛色白。性芳潔而專象陽明燥金。故宜歸陽明。第陽

明主歸胃。爲穢濁之所叢集。而性潔者喜行清道。則其最相近而相親屬者。莫如血海。故其用爲入衝脈爲之行其陽。用所去其穢濁無窮。陰之既成形者。水火之屬。血也。淚也。涕泗也。津也。溺也。今觀夫水一若流行坎止。任其自然。絕無爲之推挽者。然試思其所處之勢。或平坦曠蕩。而常停不動。若無風以澄泌其間。則凡納垢入汙。必不終日。而泥滓騰揚。淤濁泛濫。或高下懸絕。而傾瀉無餘。誠有風以宣障其間。則仍能傾者平。瀉者蓄。如潮汐之逆行。如東風之溢漲。則亦可知其故矣。女人漏下赤白。風頭。目淚出。肌膚枯槁。非水無風。以宣障耶。血閉陰腫寒熱。非水無風。以澄泌耶。是皆陽明血分所屬。上則陽明經脈所及。下則衝任所行也。雖然衝任者上行。陽明者下行。以爲有所隸屬。是何言歟。蓋惟其相竝而相違。斯可以爲節宣。若相竝而相順。則直推送已耳。故素問骨空論之述衝脈也。曰挾少陰而上行。難經二十八難之述衝脈也。曰竝足陽明之經夾臍上行。惟其相

違。乃所以相攝。且此以論脈絡。而無與於藥也。若夫白芷辛溫。則其氣味爲上行。有竝脈而論。則陽明下而此則上。衝脈上而陽明偏下。一順一逆之間。可見陽明能致衝脈不成。而白芷則宜陽明之流。是漏下赤白者。陽明穢濁墜於衝。而衝遂爲之逆也。血閉陰腫寒熱者。衝脈氣盛。陽明不能勝也。衝脈能鼓陽明之氣於上。以和陰。則自無風頭。目淚出之病。陽明能運衝脈之血於外。以和陽。則肌膚自長而潤澤。是白芷之用。爲其善致陽明之氣於衝脈。善調衝脈之血隨陽明。而其功只在去陽明之濁。致衝脈之清和矣。

其香味料樣之佳香。此結晶有弱酸性之反應。自其臭味並結晶形推考之。殆卽安傑里加酸。然尙須再爲試驗也。其用於衝動與雷藥中。爲○。八至四。○。又和漢三才圖會曰。白芷。日本所在有之。凡二種。一種高約五六尺。莖葉似川芎。而甚大。花亦似之。但葉色淡於川芎。無香氣。一種高三四尺。莖有細白毛。葉似川芎。而甚大。其色淡於川芎。香氣甚濃。根之形狀與中國產無異。惟經久則輕虛如朽木。故宜令禁傳之。祇准用中國產白芷。其切作大圓片者最佳。斜殺者名殺白芷。次之。細長似煙筒者。名吸口白芷。品最下。又大和本草。謂此根爲魚喜食。宜常常曝曬。別有一種類似白芷之物。有紫節。香氣少。世醫用薑香正氣散。無風邪頭疼者。必去白芷。謂不去則滯食氣。發嘔吐也。藥學雜誌謂藥學士村山長之助云。白芷新鮮之根。色黃褐。然日本產之根。因粘附土質。略現灰褐色。質稍疎鬆。根莖成於主根。短而且粗。其端帶有餘葉。具不明之輪節。其下則連帶多數

五 薑 白

五靈白

之主根。主根長十二至十八仙米。縱橫顯著。因除去副根之痕。而具橫隆起。間有帶細小之副根者。根莖之橫斷面不圓。直徑約二三仙米。外觀無異。安傑利加根。其最外面。致有抱層。木質之中央部。有至小之副髓。主根橫斷面不圓。直徑約〇・三至一仙米。中國種白芷。作紡錘狀。主根之頭端。帶有餘葉。往往又分枝生根。長可十六仙米。上部稍粗。直徑有二・七仙米。至下則漸狹細。其最下端粗僅〇・七仙米而已。因撒布石灰。故多帶灰藍色。其縱紋及橫隆起。亦皆顯然。質視日本種緻密且堅硬。橫斷面稍作白色。外觀較佳。以顯微鏡檢視之。見其皮內含黃色之油。各組織之細胞中。則含極多之澱粉。味為芳香性而稍甘。後轉辛辣。香氣極烈。中國種之香味。視日產稍弱。兩者俱易蛀蝕。

發背癰癤痔瘡疥癬。謂為破宿血。生新血。排膿止痛云云。潔古亦謂治頭面皮膚風痺燥痒。瀕湖且謂色白味辛。性溫氣厚。陽明主藥。癰疽為陽明濕熱。濕熱者溫以除之。故排膿生肌止痛。謂辛溫上升之品。可治寒溼。必不可治濕熱。而潰瘍為病。濕熱者十之九。而有餘寒濕者十之一。而不及。胡可以統治癰疽。抱薪救火。日華子排膿止痛一旬。實是無中生有。大乖醫藥原理。且潔古所謂皮膚燥痒者。明是火燥濕熱。又安得投此辛燥之藥。瀕湖所謂濕熱者。溫以除之一句。而何說得過去。總之諸公於瘍科理法。未能體會。人云亦云。皆是耳食之學。寇宗奭衍義。謂治帶下腸有敗膿。淋露不已。腥穢殊甚。臍腹冷痛。皆由敗膿血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白枯礬各半兩。為末。以蠟為丸。梧子大。每空心米飲下。十九或十五丸。俟膿盡乃補之云云。願謂此症。是帶下之一。寒濕凝結。互結不通。臍腹冷痛四字。是其寒結症。故宜用溫升而兼潰膿。

固瀉為治。雖曰敗膿。決非潰瘍。排泄之膿。可以等視。何得妄為比附。竟認作排膿要藥。則實熱諸病。必益張其熱。而痛不可言。願治癆廿餘年。煎劑中惟濕毒無火之症。間或用之。餘則不致妄試。若消腫數藥之如意。金黃散中有此。則取其辛以散結耳。大明又謂去面疔疵。瘰。固即本經面脂之義。然又以為治目赤翳肉。則風火升騰之熾甚。者。而亦以溫辛升之。日華子之願。預最是互古無匹。瀕湖謂治鼻淵。蓋鼻淵一症。本有風寒。風熱。及肺熱鬱熱三者之別。風寒鬱其肺氣。而鼻塞多涕。則白芷升陽可也。若風熱鼻淵。濁涕及肺熱而黃膿。腥臭之鼻淵。胡可一概而論。又謂治鼻衄齒痛。眉稜骨痛。則皆陽明熱熾。上攻為痛。古法偶用白芷。本以加入清瀉劑中。以引經為義。而乃列為專條。等於主要之君藥。豈非大謬耶。

女孕婦。皆可服之。用白芷一兩。生甘草半兩。薑三片。葱白三寸。棗一枚。豉五十粒。水二碗。煎服取汁。不汗再服。病至十餘日。未得汗者。皆可服之。(衛生家寶方)

① 治毒蛇傷。臨川有人被蠱傷。即昏死。一臂如股。少頃遍身皮膜黃黑色。一道人以新汲水。調香白芷末一斤。灌之。覺臍中攪攪然。黃水自口出。腥穢逆人。良久消縮。故云。以麥門冬湯調尤妙。仍以末搽之。又經山寺僧為蛇傷。一脚潰爛。百藥不愈。一遊僧以新水數洗。浮腐敗。見白筋。搗乾。以白芷末入。臍攀辟香。少許。搽之。惡水涌出。日如此。月平復。又方白芷同雄黃燒。可以避蛇。(洪邁夷志方)

② 治小兒身熱。白芷麥湯浴之。取汗避風。(子母秘錄方)

③ 治頭面諸風。香白芷切。以蘆薈汁浸透。日乾為末。每服二錢。白湯下。或以焙鼻。(直指方)

④ 治頭風。侵目淚出。用白芷。甘菊。細辛。黨本。決明子。藜蘆子。荆芥。穗。辛夷。

⑤ 治頭正頭風。百藥不治。一服

三九八

近人學說

張山雷曰。白芷氣味辛溫。芳香特甚。最能燥濕。本經所謂長肌。而潤澤顏色者。以溫養為義。初非謂通治外病。可以生肌長肉。乃大明本草。竟以治乳癰。

便可。天下第一方也。香白芷炒二兩五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟各一兩。為末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。(談禁藥試效方)

①治眉稜骨痛。屬風熱與痰。白芷片。酒炒。等分。為末。每服二錢。茶清調下。(朱丹溪方)

②治風邪。用白芷。羌活。獨活。防風。荆芥。薄荷。胡麻仁。甘菊花。何首烏。

③治風熱牙痛。香白芷一錢。硃砂五分。為末。蜜丸。炙子大。類用擦牙。此乃濠州一村婦以醫人者。盧州郭醫云。絕勝他藥也。或以白芷。吳茱萸等分。浸水漱涎。(醫林集要方)

④治一切眼疾。白芷雄黃為末。煉蜜為丸。龍眼大。硃砂為衣。每服一丸。食後茶下。日二服。名還睛丸。(普濟方)

⑤治口齒氣臭。用香白芷七錢。為末。食後井水服一錢。(百一選方) 又用白芷。川芎等分為末。蜜丸。炙子大。日噉之。(濟生方)

⑥治盜汗不止。太平白芷一兩。辰砂半兩。為末。每服二錢。溫酒下。

五靈白

屢驗。(朱氏集驗方)

①治脚氣腫痛。白芷。芥子等分為末。煎汁和塗之。(醫方摘要方)

②主漏下赤白。用白芷。芍藥。黃芪。當歸。地黃。續斷。杜仲。益母草。香附。白膠。加牛膝。主血閉陰腫寒熱。

③治婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤。淹三宿。去灰切片。炒研末。酒服二錢。日二服。(醫學集成方)

④治經泄。用白芷。同升麻。柴胡。乾葛。羌活。

⑤治婦人難產。白芷五錢。水煎服。(唐璠經驗方)

⑥烏金散治胎前產後虛損。月經不調。崩漏。及橫生產逆。用白芷。百草霜等分為末。以沸湯入童子小便。同醋調服二錢。丹溪加滑石。以芎歸湯調之。(普濟方)

⑦治大便風秘。香白芷炒為末。每服二錢。米飲入蜜少許。連進二服。(十便良方)

⑧治小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾。二兩。為末。煎水通甘草。酒調下一錢。連進二服。(普濟方)

⑨治鼻淵不止。就以所出血調白芷末。塗山根。立止。(簡便方)

⑩治小便出血。白芷。當歸等分為末。米飲每服二錢。(經驗方)

⑪治腸風下血。香白芷為末。每服二錢。米飲下。神效。(余居士選奇方)

⑫治痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。(直指方)

⑬治痔瘡腫痛。先以皂角烟薰之。後以鵝膽汁調白芷末塗之。即消。(醫方摘要方)

⑭治腫毒熱痛。醋調白芷末傳之。(衛生易簡方)

⑮排膿止痛消腫。用白芷。黃耆。甘草。茜草。皂角刺。金銀花。夏枯草。地黃。赤芍藥。

⑯白芷同單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥。白礬燒枯各半兩。別研為細末。黃蠟和丸。如梧桐子大。空腹及飯前米飲下十九或十五丸。為最妙之蝕膿方。俟膿盡。仍別以他藥補之。

⑰治乳癰初起。白芷。貝母各二錢。為末。溫酒服之。(外科方)

⑱消乳癰結核。用白芷。貝母。漏蘆。連翹。金銀花。夏枯草。蒲公英。紫花地丁。橘皮。

⑲治疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。搗酒一盞。溫服取汗即散。此陳指揮方也。(袖珍方)

⑳治瘡癩作痒。及皮膚癢痒。用白芷。白芍。

㉑治癰疽赤腫。白芷。大黃等分為末。米飲服二錢。(經驗方)

㉒治小兒丹瘤遊走。入腹必死。初發急以葶風散截之。白芷。寒水石。為末。生葱汁調塗。(全幼心鑑方)

㉓治刀傷傷瘡。香白芷。嚼爛塗之。(集簡方)

㉔治解砒石毒。白芷末。井水服二錢。(事林廣記方)

㉕治諸骨哽咽。白芷。半夏等分為末。水服一錢。即嚥出。(普濟方)

㉖用宜忌。凡陰虛及鬱火者。禁用。張雷山曰。白芷辛溫。芳香燥烈。疏風散寒。上行頭目。清竅。亦能燥濕。升陽。外達肌膚。內提清氣。功用正與川芎。本近似。本經治女人漏下赤白。血閉陰腫。皆其清陽下陷。寒濕傷於中下之症。溫升燥濕。始為合宜。若陰虛不攝。或濕熱

五靈白

浸淫。而爲此諸症。非可概治。頭風目暈。亦惟陽氣素虛。而風寒風熱乘之者。庶能令軀。如陽盛而風熱。熱已難概用。亦有陰虛肝木上乘。疏泄太過。而迎風淚流者。更非所宜。長肌膚。作齒脂。義皆與蠶本同。別錄療風邪。即以風寒外侵言之。久渴仰醇。謂當作久渴。其是。燥濕升清。振動陽明之氣。固治久渴之良劑。必非渴症所宜。且古今各家。皆未聞以此療渴也。其治嘔吐者。胃腸不振。食入反出者。宜之。而胃火熾盛。衝激逆上。不可誤用。腦滿乃木鬱土中。過抑少陽之氣。不得條達者。宜之。而肝膽火炎。指撥橫逆者。又在所禁。治風痛頭眩。亦惟陽和之氣。不司布達。而外風襲之者。始爲合轍。百一選方。謂都梁丸。因王定因病風頭痛。至都梁求治。楊介以白芷一味爲末。蜜丸彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。三服而病如失。遂以都梁名丸。是爲陽虛風眩之寶驗。若陰虛氣火上浮。而爲風眩。則又不可同日語矣。

已合宜忌 惡桂薑花。制蠶黃。

硫黃

參攷資料 凡採勿用四條一處生者。名喪公藤。又勿用馬蘭根。(雷斅)所在有之。吳地尤多。根長尺餘。粗細不等。白色。枝幹去地五寸以上。春生。葉相對。淡紫。色。闊三指許。花白微黃。入伏後。結子。立秋後。苗枯。二月八月採。暴以黃澤者爲佳。(蘇頌)徐鉉云。初生根幹爲芷。則白芷之義取乎此也。王安石字說云。藍香可以養鼻。又可養體。故藍字從藍。藍音怡。養也。許慎說文云。晉謂之藍。齊謂之藍。楚謂之藍。又謂之藥。生於下澤。芬芳與蘭同德。故騷人以蘭藍爲詠。而本草有芳香澤芬之名。古人謂之香白芷云。(李時珍)王璆百一選方云。王定國病風頭痛。至都梁求明醫楊介治之。連進三丸。即時病失。懇求其方。則用香白芷一味。洗晒爲末。煉蜜丸。彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。遂命名都梁丸。其藥治頭風眩暈。女人胎前產後。傷風頭痛。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣亦云。頭痛挾熱。項生毒塊者。服之甚宜。又羅仙神

隱書言種白芷能辟蛇。則夷堅志所載治蝮蛇傷之方。亦制以所畏也。而本草不曾言及。(李時珍)

【白芷葉】 主治 作浴湯。去尸瘳風瘰。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白芷葉曰。浴丹毒。瘳風瘰。

【白虎】 即石灰之古籍別名。典見綱目。詳「石灰」條。即石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石膏」條。

【白虎脂】 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【白金】 即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳「銀箔」條。

【白金砂】 即硃砂之古籍別名。典見雷公泡灸論。詳「硃砂」條。

【白附子】 命名 本品形如附子。故名。實非附子類也。

古籍別名 白波串。新羅白肉。(和漢藥考)

外國名詞 Jatropha Jani-pha (拉丁)

基本 屬毛茛科。藥用白附子

四〇〇

之根。 產地 陳仁山藥物生產辨云。白附子產河南禹州。

形態 白附子生於砂磧下濕地。獨莖似鼠尾草。細葉周匝生於穗間。其根正如草烏頭之小者。長寸許。乾者紋有節。因與附子相似。故名。別有附子曰黑附子者。與此不同也。

採製 三月間。採根曬乾。製法 李珣曰。入藥泡用。或以冷熱灰炮製用。

性質 辛甘。大溫。有小毒。效能 逐寒濕。祛風痰。用治中風失音。及一切冷風藥。

主治 心痛。血痺。面上百病。行藥勢。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論白附子曰。諸風冷氣。足弱無力。疥癬風毒。陰下濕癢。頭面斑痕。入面脂用。【宋】大明日華諸家本草論白附子曰。中風失音。一切冷風氣。面肝癩。【元】王好古湯液本草論白附子曰。補肝風虛。

【元】朱丹溪本草衍義補遺論白附子曰。治風痰。【明】程希雍本草

經疏論白附子曰。白附子感陽氣而生。故其味辛微甘。氣大溫。有小毒。性燥而升。風藥中之陽草也。東垣謂其純陽。引藥勢上行是已。其主心痛血痺者。風寒之邪觸心。以致痰壅心經則作痛。寒濕邪傷血分則成血痺。風能勝濕。辛溫散寒。故主之也。風性升騰。辛溫散散。故能主面上百病而行藥勢也。日華子用以治中風失音。一切冷風。氣面疔瘰癧。李珣用以治諸風冷。氣足弱無力。疥癬風疔。陰下濕痒。頭面斑痕。入面脂用。丹溪用以治風痰。皆祛風燥溼散結之功效也。

【清】黃宮繡本草求真論白附子曰。白附子辛甘有毒。性燥而升。爲風藥中之陽草。東垣謂其純陽。能引藥勢上行於面。爲陽明經要藥。又按諸書皆載。能治頭面遊風癩。斑。及中風不語。諸風冷氣。血痺冷。陰下瘰癧。皆當用此調治。玩此藥非性燥。何以可治冷氣虛癩。設非冷氣冷痰。又曷可用燥烈之藥以治乎。是以陰虛類中。並小兒脾虛。慢驚。皆不宜用。以其氣味辛烈。若故耳。此與白芷同爲一類。但白

芷則兼肌退同理。而不專及陽明風邪。此則專散陽明風冷。而於濕邪則未及耳。此藥多無真者。今惟涼州生。形如草烏頭之小者。長寸許。乾者紋有節。入藥炒用。【清】楊時泰本草述鈞元論白附子曰。東垣謂白附子純陽。引藥勢上行。與海藏補肝風虛之說相合。蓋風之爲病。有風淫。有風虛。陰不能爲陽之守。則風淫。是固病於陽也。陽不能達陰之氣。則風虛。是亦病於陽也。皆病於陽。故皆曰病於風耳。歷觀諸方。白附子之治。大約皆陽不能達陰。而陰反以病陽之證。又上行之治更多。要不越於風虛。而與風淫之用有別。以淫則陽之反氣有餘。虛則陽之化氣不足也。又謂此味辛勝於苦。而苦辛之間。兼有甘味。不離中土。以達陽。乃能達陽於陰中。而還以暢陰也。卽或用治風淫。亦不過借以升陽助風藥。而使之散耳。又舉風寒用溫。風熱用涼。多須此味以達陽。實不等諸風藥之專事於散而已。每笑世醫於風虛諸證。不知益陽達陰。輒投風劑。以耗陽場陰。噴噴如是不反

由耗之場之而益其疾也乎。

配合應用 ① 牽正散。治中風口喎半身不遂。用白附子白僵蠶全蝎等分。生研爲末。每服二錢。熱酒調下。(楊氏家藏方)

② 治小兒急驚。用白附子同膽星。全蝎白僵蠶鈞藤天竺黃白檀香牛黃。

③ 三生丸。治小兒暑風。凡暑毒入心。痰塞心孔。昏迷搐搦。此乃危急之證。非此丸生料。眩暈之劑。不能伐之。用白附子天南星半夏並去皮等分。生研。豬膽汁和丸。黍米大。量兒大小。以薄荷湯下。令兒側臥。嘔出痰水卽甦。(全幼心鑑方)

④ 豁風痰暴逆而有寒邪者。白附子同南星半夏。

⑤ 治風痰眩暈。頭痛氣鬱。胸膈不利。白附子泡去皮。臍半斤。石脊煨紅半斤。硃砂二兩。二錢半。龍腦一錢。爲末。粟米飯丸。小豆大。每服三十丸。食後茶酒任下。(御藥院方)

⑥ 能治痰厥頭痛。白附子同天麻。半夏。南星等分。生薑汁浸蒸餅丸。煮豆大。每服四十丸。食後姜湯下。

⑦ 治偏正頭風。白附子。白芷。豬牙皂角。去皮等分。爲末。食後茶清服。卽臥少頃。(普濟方)

⑧ 治赤白汗斑。白附子同硫黃等分。爲末。姜汁調稀。茄蒂蘸擦。一日數次。

⑨ 面上疔癩。用白附子爲末。臥時漿水洗面。以白蜜和塗紙上貼之。久久自落。

⑩ 治耳出膿水。白附子泡。羌活一兩。爲末。豬羊腎各一箇。每箇入末半錢。濕紙包煨熟。五更食。溫酒下。(聖濟總錄方)

⑪ 治喉痺腫痛。白附子末。桔槩等分。研末。塗舌上。有涎吐出。(聖惠方)

⑫ 治偏墜疝氣。白附子一箇。爲末。津調填臍上。以艾灸三壯。或五壯卽愈。(楊起簡便方)

⑬ 治小兒吐逆不定。虛風喘急。白附子馨香等分。爲末。每米飲下。半錢。(保幼大全方)

用量 八分至錢中。

施用宜忌 凡非真中寒者禁。

五靈白

五畫 白

參攷資料 此物久絕。無復

真者(陶弘景)白附子乃陽明經藥。因與附子相似。故得此名。實非附子類也。按楚國先賢傳云。孔休傷頰有瘰。王莽賜玉屑白附子香。與之消瘰。(李時珍)白附子燥藥也。似中風證。雖痰壅禁用小兒慢驚不宜服(繆希雍)

【白青】

古籍別名 碧青。(唐本草)魚目青。(本草綱目)

形態 白青爲石類之一種。卽石膏之屬。其形圓如鐵珠。色白而腹不空者。研之色碧。得鐵卽化爲銅。探得可供藥用。

性質 甘酸。鹹平。無毒。

主治 明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐殺諸毒。三蟲。久服通神明。輕身。

【白前】

處方用名 生白前。蜜炙白前。古籍別名 石藍。欬藥。(唐本草)

外國名詞 Vincoctoxicum japonicum, Morr. et Demo.

Var. purpurascens, Maxim.

(Vincoctoxicum purpurascens, Morr. et Demo.) (V. Yennii, Fr. et Sav.) (拉)

基本 屬白前科。藥用其根。產地 陳仁山藥物生產辨云。白前以廣東北江清遠一帶產者爲最。三水南沙等處亦有出。江蘇鎮江府亦有出。均十月新。市上所沽者。真偽兩種。凡入口覺舌痺而辛走者。正。入口不痺舌又不辛走。一片粉淡。便是偽貨。

形態 按白前爲山草類之多年生草本。莖高尺餘。葉爲倒卵狀橢圓形。或作長橢圓形。有短柄。端尖銳。葉底鈍形或銳形。夏秋間葉腋出花莖。分數枝。開白色或淡紅之小花。作繖房花冠。其根白色。長於細辛。堅實易斷。



白前

採取 二月八月間採根陰乾。製法 雷斅曰。凡使白前。須用生甘草水浸一伏時。漉出。去頭鬚。

焙乾收用。

性質 甘微溫。無毒。效能 宣肺。降氣。下痰。止咳。用作祛痰鎮咳藥。

主治 胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論白前曰。主一切氣。肺氣煩悶。賁豚腎氣。【明】李時珍本草綱目論白前曰。降氣下痰。【明】繆希雍本草經疏論白前曰。白前感

秋之氣而得土之沖味。故味甘辛。氣微溫。蘇恭又謂微寒。性無毒。入手太陰。肺家要藥。甘能緩。辛能散。溫能下。以其長於下氣。故主胸脇逆氣。咳嗽上氣。二病皆氣升氣逆。痰隨氣壅所致。氣降則痰自降。能降氣則病本立拔矣。【清】黃宮繡本草求真論白前曰。白前甘辛微溫。爲降氣祛風除痰要藥。緣人氣實則痰壅。痰壅則風作。風與痰氣膠固。則肺因而不寧。而有喘嗽氣促。體腫之病矣。若不用此以泄肺中實痰風邪。則氣曷降。而嗽曷止。是以金匱用以治咳嗽厥沉。深師白前湯。用此以治久咳上氣。皆取

降肺除痰之意。非若白微氣味鹹寒。泄肺胃燥熱。細辛辛熱。附發腎中寒邪也。此惟實者用之。虛者不宜用耳。似牛膝粗長。堅直易斷者良。若短小柔軟。能彎者是白微。去頭鬚。甘草水浸一晝夜。焙用。忌羊肉。【清】張隱卷本草崇原論白前曰。寇宗奭云。白前保定肺氣。治嗽多用。以溫藥相佐。使尤佳。李時珍曰。白前色白而味微辛甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。若虛而長。哽氣者不可用。張仲景治欬而脈浮者。澤漆湯中亦用之。愚以澤漆湯方有紫參。復有白前。故因紫參而附白前於此也。白前雖別錄收入中品。而仲祖方中先用之。則宏啟亦因古方錄取。但出處不若本經之詳悉。學者須知之。【清】黃元御長沙藥解論白前曰。白前降衝逆而止咳。破壅塞而清痰。金匱澤漆湯用之。治脈沈之欬。是緣水氣之裏衝。非由風邪之外閉。澤漆治其水氣。白前降衝逆而驅痰飲也。又曰。白前善降胸脇逆氣。心脾凝痰。嗽喘衝阻。子吸逆者之。得之清道立通。調

療悉下。宜於種中之類。並用乃效。
 【清】楊時泰本草述鈞元論自前
 曰。自前主治。首言胸膈逆氣。夫胸
 中固肺所治。而膈則陰陽升降之
 道路也。又主欬嗽。上氣呼吸欲絕。
 夫呼吸即升降之氣。陰陽之分而
 合者。肺為氣主。貫心脈而行呼吸。
 呼吸欲絕。是有升無降。或陰或陽。
 皆能病之。如下之真陰不足。不能
 召上之陽。即無以吸上而氣不降。
 上之真陽不足。不能生下之陰。即
 無以歸下而氣亦不降。此中氣
 大虛而失守。須大劑參耆而愈。
 二者皆虛證。非自前可治也。惟是
 後天氣血之病。偏勝所成。上實而
 下即虛。下實而上即虛。隨其所主
 之味。而以滋味為前導。庶乎近之。
 近人學說 張山雷曰。自前專
 主肺家。為治嗽降氣要藥。別錄謂
 其微溫。以其主治寒嗽。則能疏散
 寒邪。其性實必含溫養之氣也。然
 自前治嗽。亦不專於寒嗽。一面即
 痰火氣壅。上逆咳嗽。亦能定之。則
 又有似乎寒降。是以蘇恭竟作微
 寒。然其所以能止咳者。則在於平
 逆順氣。使膈下之濁氣。不上凌而

五畫 白

犯肺金。斯肺氣得順。其清肅之性。
 而咳自除。此以靜順為用。必不可
 違。謂其溫。且古今主治。恒用之於
 火逆氣升之證。無不應手。自當以
 蘇恭微寒之說為長。且寒邪寒飲
 之欬。辛溫開肺。別有專司。固非自
 前之長技。特徵寒順氣。非如沙參
 知母之寒涼直折。亦非如桑根皮
 枇杷葉之清降遏抑。故為定欬止
 嗽之主藥。而絕無流弊。雖不見於
 本經。而別錄主胸膈逆氣。咳嗽上
 氣。甚至稱其治呼吸欲絕。可見其
 清肅肺家。功效卓絕。日華謂其主
 肺氣煩悶。宗奭稱其能保定肺氣。
 漸潮謂其降氣下痰。肺氣逆實。而
 有痰者宜之。皆足以表其自前之
 功用。無餘蘊矣。又謂程鍾齡醫學
 心悟止咳散。治新久咳嗽。皆效。方
 用荊芥。紫苑。自前。百部。桔梗。甘草。
 陳皮為末。新感生薑湯下。久嗽米
 飲下。皆每晚臨臥服三四錢。立方
 極有深意。實即本於外臺秘要引
 近效之自前。桔梗。桑皮。甘草。治久
 咳唾血。及深師方之自前。紫苑。半
 夏。治久咳逆上氣。體腫短氣。腹滿。
 晝夜不得臥。喉中常作水鷄鳴之

自前湯兩方。而程氏且不用桑皮
 等之抑降。又加荊芥。陳皮之辛散。
 再合紫苑。百部之溫潤。意理周密。
 宜其投之輒效。然非為散而臨臥
 服。亦必不應。此中至理。習醫者能
 體驗深思而得之。方可許其共談
 此道也。
 配合應用 治久嗽唾血。白
 前。桔梗。桑白皮。三兩。炒甘草一兩。
 炙水六升。煮一升。分三服。忌猪肉
 燕菜。(外臺秘要方)
 治久欬上氣。體腫短氣。腹滿。
 晝夜倚壁不得臥。常作水雞聲者。
 自前湯主之。自前二兩。紫苑。半夏
 各三兩。大戟七合。以水一斗。漬一
 宿。煮取三升。分作數服。禁食羊肉
 鵝精。大佳。(深師方)
 治久患嘔呷欬嗽。喉中作聲
 不得眠。取自前焙搗為末。每溫酒
 服二錢。(深師方)
 用量 一錢半至二錢。
 施用宜忌 凡無實邪者禁用。
 參攷資料 自前出近道。根
 似細辛而大。色白不柔。易折。氣嗽
 方多用之。(陶弘景) 自前苗高
 尺許。其葉似柳。或似堯花。根長於

細辛。白色。生州渚沙磧之上。不生
 近道。俗名石藍。又名嗽藥。今用莖
 生者。味苦非真也。(蘇恭) 根似
 白微牛膝。二三月八月採陰乾用。
 (馬志) 自前根似白微。或似細
 辛。自前較白微稍溫。較細辛稍平。
 專搜肺竅中風水。非若白微之鹹
 寒。專泄脾胃之燥熱。亦不似細辛
 之辛實。能治腎肝之沉寒也。(盧
 飛鵬)
 【白扁豆】 原名 菽豆。
 品莢形扁。而豆色白。故名。
 處方用名 炒扁豆。
 古籍別名 沿籬豆。蛾眉豆。
 (本草綱目) 降。白菽。白蛾眉
 豆。雪眉。同氣。(和漢藥考)
 基本 屬豆科。藥用白菽豆之
 種子。
 產地 陳仁山藥物生產辨云。
 白扁豆產江蘇省鎮江府。名南扁
 豆。以陵湖為上。江北次之。均大粒
 身圓。另有一種由荷屬。暹羅。英屬
 等運來者。名洋扁豆。細粒。身扁。皮
 黃。
 形態 扁豆為一年生草。春月

五畫 白

下種。莖甚長。纏繞他物。葉類葛葉。以三小葉互生。葉間生長花梗。開白色或帶紫色。蝶形花冠之花。作總狀花序排列。莢果作扁平線狀。長二寸。闊五六分。莢中種子作扁圓形。

種類 ●花色白者豆色亦白。白者名扁豆而性微溫。●花色紫者豆色黑褐。黑者名鵲豆而性小冷。

採取 嫩時可充蔬茹。老則採供藥用。每年白露節後採之。

製法 李時珍曰。凡用取硬殼扁豆子。連皮炒熟。入藥。亦有水浸去皮。及生用者。從本方。

性質 甘微溫無毒。
效能 補脾。止瀉痢。化溼。治帶濁。用治霍亂藥。又為解酒毒藥。

主治 和中下氣。
歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論扁豆曰。補五臟。主嘔逆。久服頭不白。【唐】蘇恭新修本草論扁豆曰。療霍亂吐利不止。研末和醋服之。【唐】甄權藥性本草論扁豆曰。解一切草木毒。生嚼及煮汁飲。取效。【宋】蘇頌嘉祐圖經本

草論扁豆曰。行風氣。治女子帶下。解酒毒。河豚魚毒。【明】李時珍本草綱目論扁豆曰。止泄痢。消暑。煖脾胃。除溼熱。止消渴。【明】繆希雍本草經疏論扁豆曰。種豆稟土中沖和之氣。其味甘。氣香。性溫平無毒。入足太陰陽明經氣分。通利三焦。升清降濁。故專治中宮之病。和中下氣。消暑除溼而解毒也。孟詵主霍亂吐痢不止。及嘔逆。久食頭不白。日華子云。補五臟。蘇頌主女子帶下。解酒毒。河豚魚毒。寇宗奭主霍亂轉筋。皆取其益脾胃。開胃和中。氣除溼熱之功耳。葉氣味相同。故亦主霍亂。花有紫白二色。豆有黑白二種。入藥惟紫花白者良。豆黑色及紫色者名鵲豆。不入藥。亦不益人。【清】黃宮繡本草求真論扁豆曰。扁豆如何補脾。蓋脾喜甘。扁豆得味之甘。故能於脾而有益也。脾得香而能舒。扁豆稟氣芬芳。故能於脾而克舒也。脾苦溼而喜燥。扁豆得性之溫。故能於脾而克燥也。脾土既實。則水道自通。三焦不混。而太陰暑溼之邪。自爾克消。安能復藏於脾。而有渴瀉之病。

乎。但多食壅滯。(凡仁皆滯。)不可不知。子粗圓色白者佳。入藥連皮炒研用。亦有浸去皮。及生用者。【清】王士雄隨息居飲食譜論扁豆曰。扁豆甘平。輕煖。亦可為蔬。子以白者為勝。去皮煮食。補肺開胃。下氣止嘔。清暑生津。安胎去溼。治帶濁時痢。解魚酒藥毒。炒熟則溫。健脾止瀉。患瀉者忌之。

近人學說 ●閻丘陞曰。白扁豆。氣微溼無毒。其氣腥香。其性溫平。得乎中和。脾之穀也。入太陰氣分。通利三焦。能化清除濁。故專治中宮之病。能消暑。能除溼。能解毒。本草療霍亂吐利。主嘔逆。是其消暑也。緩脾胃。補五臟。治女子帶下。是其除溼也。解酒毒。河豚魚一切草木毒。皆用生嚼。或生研絞汁飲。是其解毒也。而今人用之。則因別錄之和。中下氣。而用以實脾利水。為最多。故夏月香齋飲。參苓白朮散。用之。皆取此義。若秋後用此。麥茶。恐夏月飲水過多。食之利水。又能和脾也。花治女子赤白帶下。乾米飲服。葉治霍亂吐下不止。入少許。搗服立瘥。●賈九如曰。白扁豆

四〇四

屬陽。體乾(鮮潤)入脾胃肺三經。味甘平而不甜。氣清香而不膩。性溫和而色微黃。與脾性最合。主治霍亂嘔吐。腸鳴泄瀉。炎天暑氣。酒毒傷胃。為和中益氣佳品。又取其色白。氣味清和。獨受清中之清。用清肺氣。故云清以養肺。肺清則氣順。下行通利大腸。能化清降濁。善療腸紅久瀉。清氣下陷者。此脾虛補瀉之法也。

國外學說 和漢藥考曰。扁豆係南洋諸島所產。豆類中一種名 Doichols Ensinomus, L 者之種子。謂之白扁豆。日本則以鵲豆(Doichos Tachab. L.)之種子充藥用。

辨偽 ●鄭有巖曰。洋扁豆類粒較大。皮復色微赤。不堪入藥。當以蘇州所產色白者為勝。氣味甘微溫。和中下氣。止泄痢。清暑氣。暖脾胃。除溼熱。止消渴。方有功效。●曹炳章曰。按扁豆浙江杭州。湖州。紹興。出者。開白花。其實要白而有光。體飽滿者佳。江南安慶。江西俱出。惟蘇州出者。類大扁形。名洋扁豆。為不道地。

配合應用 ①治霍亂吐利。扁豆、香薷各一升。水六升。煮二升分服。(千金方)

②治霍亂轉筋。白扁豆爲末。醋和服。(普濟方)

③治消渴飲水。金豆丸用白扁豆浸去皮。爲末。以天花粉汁同蜜和丸。梧子大。金箔爲衣。每服二十丸。天花粉汁下。日二服。忌炙煨酒色。次服滋腎藥。(仁存堂方)

④治赤白帶下。白扁豆炒爲末。用米飲每服二錢。(永類鈴方)

⑤治毒藥墮胎。女人服草藥墮胎。腹痛者。生白扁豆去皮爲末。米飲服方寸匕。濃煎汁飲。亦可丸服。若胎氣已傷未墮者。或口噤手強。自汗頭低。似乎中風。九死一生。醫多不識。如作風治。必死無疑。(永類鈴方)

⑥治中乾霜毒。白扁豆生研。水絞汁飲。(永類鈴方)

⑦治諸毒肉毒。生扁豆末。冷水服之。(事林廣記方)

⑧治惡瘡癩瘡作痛。以扁豆搗封。卽愈。(肘後方)

五畫 白

應用宜忌 凡有傷寒外邪者禁用。

【白扁豆葉】

主治 霍亂吐下不止。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論白扁豆葉曰。吐利後轉筋。生持一把。入少酢絞汁服立瘳。

【唐】孟詵食療本草論白扁豆葉曰。醋炙研服。治瘵疾。【明】大明諸

家本草論白扁豆葉曰。杵傅蛇咬。

【白扁豆藤】

主治 霍亂同煎。蘆澤人參。倉米

等分煎服。

【白柿】柿同柿。白柿卽柿之古籍

別名。典見綱目。詳【柿】條。

【白炭】卽炭灰之原名。詳【炭灰】

條。

【白珊瑚】卽越王餘算之別名。詳

【越王餘算】條。

【白砂糖】卽白沙糖之處方用名。

詳【白沙糖】條。

【白砒】卽砒霜之處方用名。詳【

砒霜】條。

【白秋霜】

基本 本品卽多年後所結之白霜故名。

古醫別名 養霜。(綱目拾遺) 採取 須以多年經風雨者入

藥良。

製法 炭火煨紅醋滓九次研

用。

主治 跌打損傷。因挫骨傷。極重者研末酒服。

參攷資料 ①凡多年崩坑底

石板。背後有白胎如雪結其間。擊

取。微有穢氣。陳久亦然。盡力透石

故其精華凝聚於此。能消火毒。王

聖俞云。一名養霜。曾見小兒疳疔

初愈者。忽然肺燥咽乾唇裂。目中

出火。滿面紅赤。此火毒壅遏未化。

滯於上焦。每服此藥一二錢。不數

日全愈。(陳海隱) ②按將儀藥鏡

云。泥宿養坑之底。疔腫發背止痛

當塗。而霜又其精華也。大抵清火

解毒。功用亦不其相遠。(趙學敏)

【白背】形態 白背爲雜草類

之一種。根似紫葍。葉似

燕廬。其莖根俱可供藥用。

性質 苦平無毒。

主治 寒熱。洗惡瘡疥疾。

【白胡麻子】

原名 白油麻。命名 本品爲

胡麻子之白者故名。

性質 甘大寒無毒。

主治 治虛勞。滑腸胃。行風氣。

通血脈。去頭上浮風。潤肌肉。食後

生啖一合。終身勿輟。又令乳母服

之。孩子永不生病。客熱可作飲汁

服之。生啖傳小兒頭上。諸瘡良

藥。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論白胡麻子曰。仙方蒸以

辟穀。

參攷資料 ①白胡麻子久食

抽人肌肉。其汁停久者。飲之發霍

亂。(孟詵) ②白胡麻子世用不可

一日闕者。亦不至於大寒也。(寇

宗奭) ③白胡麻子生者性寒而

治疾。炒者性熱而發病。蒸者性溫

而補人。(寧原)

【白胡椒】卽玉椒之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳【玉椒】條。卽

胡椒實乾時去其外面黑皮者之

別名。詳【胡椒】條。

【白芥】卽茯苓之處方用名。詳【

茯苓】條。

【白芥塊】卽茯苓之處方用名。詳

【茯苓】條。

四〇五

【白苣】

古稱別名 石苣。生菜。芭(本草綱目)

外國名詞 Lactuca. (Lactuca)

形態 白苣為菜類高苣屬之一種。形似高苣。而葉色自有毛。折之有白汁。正二月下種。四月開黃花。如苦苣。藉子亦同。八月十月可再種。其色紫者名紫苣。味苦者名苦苣。菜可生食。煮苣亦可供藥用。

性質 苦寒。其毒。主治 補筋骨。利五臟。開胸膈。撞氣。通經脈。止脾氣。令人面白。聰。明。少睡。可資食之。

歷代記述攷證 【明】寧原食。然本草論白苣菜曰。解熱毒。酒毒。止消渴。利大小便。

參攷資料 ①白苣不可共醋食。生蟲蠹(孫思邈) ②白苣味平。惡冷氣人食之。即腹冷。亦不至苦。損人產後不可食。令人寒。中小腸痛(唐灼) ③白苣苦苣。苣苣俱不可煮。蒸皆宜生揆。去汁。鹽醋拌食。道名曰生菜。而白苣稍美。故獨得專稱也(李時珍)

【白苣】即苣麻之古籍別名。典見綱目。詳「苣麻」條。

【白英】

命名 本品花色潔白。故名。

古稱別名 穀菜。白草。(別錄)

白苣。排風符。(綱目拾遺) 子名鬼目。(本草綱目)

外國名詞 Solanum Dulcamara, L. var. ovatum, Duran. (拉丁) ルバノホロシ(日本)

基本 係茄科茄屬。藥用白英之莖根。

形態 白英為莖草類之多年生草本。其莖纏繞他木。與葉平滑無毛。春生白莖。秋開白花。花作總狀花。雄蕊之藥。近集於花柱之周圍。開小孔。散放花粉。花後結實。熱則紫赤色。狀如龍葵子。

採取 春採葉。夏採莖。秋採花。冬採根。十月間採子。陰乾用。

性質 甘寒。無毒。主治 寒熱入疸。消渴。補中。益氣。久服輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論白英曰。煩熱。風癆。丹

毒瘴。癩突熱。小兒結熱。煮汁飲之。

【白英子】

性質 酸平。無毒。主治 明目。

【白英葉】

性質 甘寒。無毒。主治 癆瘵。作羹飲。

【白茄】

古稱別名 玉盤茄。(綱目拾遺)

形態 按白茄為茄之一種。有大小二種。大者如雞卵。小者如指頭。初生色白。老則皮黃。其實可供藥用。蒂根葉詳見各條。

採取 以東粵茄園產者良。主治 入骨追風。療一切癱瘓。臨硫磺。擦癩風大癩風。

【白茄根】

主治 功同實。宜合酒蒸服。

【白茄葉】

主治 腸風下血。用黃葉。陰乾煎服。

施用宜忌 凡曾被犬咬過之人勿用。

【白茄蒂】

主治 發育一切癩毒。初起時用七枚。同生首烏煎服。即消。

【白茅花】

性質 甘溫。無毒。主治 煎飲止吐血。

衄血。并塞鼻。又傳灸瘡不合。罾刀箭金瘡。止血并痛。

【白茅香】

命名 本品根似白茅。而氣香。故名。

處方用名 茅香根。

產地 陳藏器云。白茅香生安南。李珣云。廣志謂白茅香生廣南山谷。合諸名香。甚奇妙。勝於舶來品。

性質 甘平。無毒。主治 除惡氣。令人身香。煮湯服。治腹內冷。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論白茅香根曰。小兒遍體瘡泡。合桃葉煎湯浴之。

【白茅根】

命名 本品葉形如茅。其根牽連而色潔白。故名。


古稱別名 茹根。蘭根。(本經) 地筋根。(別錄) 絲茅。(本草綱目) 野菅根。(和漢藥考) 麥斛。(新中藥)

外國名詞 Tristema Fo-poa. (Couch Grass)

基本 屬禾本科。產地 陳仁山云。白茅根產廣

東清遠爲最。西江次之。日本產者味亦佳。又名麥斛。實則山谷郊野間恒多生焉。

形態 白茅爲宿根草。春日生芽。高一二尺。葉叢生。類稻葉。未生葉之前。莖上密生白毛。穗。卽俗呼茅花。其初生之苗。卽俗名茅針。



白茅根

種類 夏花者爲茅。秋花者爲菅。白茅短小。三四月開白花。成穗結細實。其根甚長。白軟如筋。而有節。味甘。俗呼絲茅。可以苦蓋。及供祭祀苞苴之用。本經所用茅根是也。其根乾之夜。視有光。菅茅只生山上。似白茅而長。入秋抽莖。開花成穗。如荻。火結實。尖黑。長分許。粘衣刺人。其根短硬。如細竹。絲。無節而微甘。亦可入藥。功不及白茅。爾雅所謂白華野菅是也。黃茅似菅茅。而莖上開葉。莖下有白粉。根頭有毛。根亦短而細硬。無節。秋深開花。穗如管。可爲索。絢。古

五畫 白

名黃菅。別錄所用菅根是也。香茅一名菁茅。一名瑤茅。生湖南及江淮間。葉有三脊。其氣香芬。可以包藉及縮酒。禹貢所謂荊州包匭菁茅是也。芭茅叢大。葉大如蒲。長六七尺。有二種。卽芒也。採取 春採針。夏採花及根。曝乾。

製法 凡使弗用露根者。搗得洗淨粘附之土質。去毛及皮用。

性質 甘寒。無毒。效能 瀉火。消痰。涼血。止血。用作利尿及止血藥。

主治 勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉寒熱。利小便。五淋客熱。在腸胃。止渴。堅筋。婦人崩中。久服利人。別錄。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論茅根曰。主婦人月經不勻。血脈淋瀝。【明】李時珍本草綱目論茅根曰。止吐衄諸血。傷寒噦逆。肺熱喘。水腫黃疸。解酒毒。【明】繆希雍本草經疏論茅根曰。茅根正稟土之沖氣。而兼感乎春陽生生之氣。以生。故其味甘氣寒而無毒。入手少陰足太陰陽明。勞

傷虛羸必內熱。甘能補脾。甘則雖寒而不犯胃。甘寒能除內熱。故主勞傷虛羸。益脾所以補中。除熱所以益氣。甘能益血。血熱則瘵。瘵則閉。閉則寒熱作矣。寒涼血。甘益血。熱去則血和。和則瘵消而閉通。通則寒熱自止也。小便不利。由於內熱也。熱解則便自利。淋者。血分虛熱所致也。涼血益血。則淋自愈。而腸胃之客熱自解。津液生而渴亦止矣。肝藏血而主筋。補血涼肝。則筋堅矣。血熱則崩。涼血和血。則崩自愈矣。血熱則妄行。溢出上竅。爲吐。爲咯。爲鼻衄。齒衄。涼血和血。則諸證自除。益脾補中。利小便。故亦治水腫黃疸。而兼理傷寒噦逆也。【清】黃宮繡本草求真論茅根曰。茅根味甘性寒。清熱瀉火。消痰利水。凡苦寒之藥。未有不傷氣敗胃。此藥味甘性純。專理血病。凡一切吐血。衄血。血瘀。血淋。血崩。血閉。並噦逆喘急煩渴。黃疸水腫等症。因熱因火而成者。服之熱除而血即理。火退而氣與水即消矣。且能解酒毒。潰癰疽。又癰毒諸疔。或用根搗敷。或用此煮汁調效毒等藥。或

以酒煮。亦無不可。此藥甘不泥膈。寒不傷中。爲治虛羸客犯中州之劑。至云能以補中益氣。雖出本經。然亦不過因其胃熱既除。而中氣自復。豈真補益之謂哉。經解之說。似未可信。茅以白者爲良。初生茅針。可以生噉。甚益小兒。功用亦同。屋上敗茅。止癰敷瘡最妙。【清】張隱菴本草崇原論茅根曰。白茅色白味甘。上剛下柔。根多津汁。稟於金水相生之氣。化。主治勞傷羸瀉。煩勞內傷。則津液不榮於外。而身羸瘦。茅根稟水精而多汁。故治勞傷羸瘦。補中益氣者。中土內虛。虛則氣不足。茅根稟土氣而味甘。故能補中益氣。除瘀血閉者。肝氣內虛。則血不榮經。而爲瘵。血閉之證。茅根稟金氣而色白。故除瘀血。血閉。肺金之氣外達皮毛。則寒熱自愈。皮毛之氣下輸。則小便自利。

四〇七

五 薑 白

治白淋。每服四兩至八兩。又日本和漢藥考曰。藥學書有將禾本科植物之 *Triticum repens*, L.

譯作茅根。記述其形態及效能等者。惟與本品實為二種。又曰。玉川茅根。品質極佳。供藥用。此係生於日本武藏國多摩川上流石原驛川邊白茅之根。每年三月間。白茅發芽。至七月而成長。最冬取其莖嚼之有甘味。此時採取其根最佳。根長三四尺。作竹鞭狀。用水洗淨。天晴晒乾。再削粗皮。晒三四日。又去薄皮。晒三日。至七日。然後束之。成把。售於藥舖。

近人學說 張山雷曰。白茅根甘寒。清熱涼血。本經稱其主勞傷虛羸。補中益氣。以寒能清熱。甘能益陰。邪熱不擾。而津液敷布也。除瘀血。血閉寒熱者。則血熱凝結而營衛不通。因發寒熱。茅根涼血而能通導下行。斯瘀者行閉者通而寒熱止矣。小便不利。亦以熱結言之。其苗主下水。亦清熱導水之效。別本皆以此為名醫別錄之文。茲從孫氏問經堂本係之本經。別錄主五淋崩中。除腸胃客熱。皆言其

清熱涼血之功效。止渴則甘寒能生津也。堅筋者。筋為熱灼。則輭短而拘攣。清熱滋液。斯筋骨堅強。又曰。白茅根。寒涼而味甚甘。能清血分之熱。而不傷於燥。又不粘膩。故涼血而不感其積滯。以主吐衄嘔血。泄降火逆。其效甚捷。故又主胃火嘔逆嘔吐。肺熱氣逆喘滿。且甘寒而多脂液。雖降逆而異於苦燥。則又止渴生津。而清滲肺胃腸間之伏熱。能療消穀燥渴。根長數尺。一莖直達。入土甚深。故又能直趨下焦。通淋閉而治洩血。下血。並主婦女血熱妄行。崩中淋帶。又通利小便。清熱結之水腫。導瘀熱之黃疸。皆甘寒通泄之實效。然其甘寒之力。清泄肺胃。尤有專長。凡齒痛銀腫。牙疳口舌諸瘡。及肺熱鬱窒之咽痛爛語。證。用以佐使。功效最著。而無流弊。乃隨處可得。微賤品中純良之物。李瀕湖謂世人因其易得而忽之。乃從事於苦寒之劑。致傷中和之氣。皆未知茅根之真相者也。

或石上晒乾搗末。水服方寸匕。可辟穀不饑。(肘後方)

① 治溫病冷厥。因熱甚飲水或禁冷胸者。茅根切。枳殼葉拭去毛。炙香。各半斤。水四升。煎二升。去滓。稍飲之。(顧安常方)

② 治溫病熱厥。乃伏熱在胃。令人胸滿則氣逆。逆則嘔。或大下。胃中虛冷。亦致嘔也。茅根。葛根切。各半斤。水三升。煎一升。每注飲一大匙。嘔止即停。(顧安常方)

③ 治傷寒胃熱嘔逆。用茅根、竹茹、麥冬、石膏、人參。

④ 治火炎內熱。反胃上氣。用茅根、枇杷葉、竹茹、麥門冬。

⑤ 治反胃上氣。食入即吐。茅根、蘆根二兩。水四升。麥二升。頓服得下良。(聖濟總錄方)

⑥ 治肺熱氣喘。生茅根一握。吹咀。水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服止。名如神湯。(聖惠方)

⑦ 治水腫。用茅根、芍藥、赤小豆、赤白茯苓、車前子、慈苳仁、木瓜、石斛、木通。

⑧ 治虛後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。

四〇八

水三升。煮乾。去茅食豆。水隨小便下也。(肘後方)

① 治五種黃病。黃疸、穀疸、酒疸、女疸、勞疸也。黃汗者。乃大汗出入水所致。身體微腫。汗出如黃藥汁。用生茅根一把。細切。以豬肉一升。合作羹食。(肘後方)

② 治解中酒毒。恐爛五臟。茅根汁飲一升。(肘後方)

③ 治小便熱淋。白茅根四升。水一斗五升。煮取五升。適冷暖飲之。日三服。(肘後方)

④ 治血熱經枯而閉。用茅根、牛膝、生地、黃蘗。

⑤ 治溺血。用茅根、生地、天麥門冬、車前子、牛膝、白茯苓、黃蘗、五味子、枸杞子、薏便。

⑥ 治勞傷內熱。用茅根、麥冬、生地、枸杞子。

⑦ 治小便出血。茅根煎湯。頻飲為佳。(談林藥方)

⑧ 治勞傷溺血。茅根乾薑等分。入蜜一匙。水二鍾。煎一鍾。日一服。

⑨ 治便血。用茅根、生地、麥冬、蘇子、枇杷葉、白芍藥、甘草、蒲黃、薏便。

⑩ 治鼻血不止。茅根為末。米泔

水煎二錢。(聖惠方)

◎治吐血不止。用白茅根一握。水煎服之。婦人良方。用根洗淨。搗汁。日服一合。(千金方)

◎治竹木入肉。白茅根燒末。豬脂和塗之。風入成腫者亦良。(肘後方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡虛寒而無實熱者禁用。忌錢。

著名方劑 茅花湯。治鼻衄。(活人方) 用茅花每服三錢。煎服。不拘時。

參攷資料 處處有之。春生。芽布地如針。俗謂之茅針。亦可噉。甚益小兒。夏生白花。茸茸然。至秋而枯。其根至潔白。六月採之。又有管。亦茅類也。陸機草木疏云。管似茅而滑。無毛。根下五寸中有白粉者。柔韌。宜爲索。澀之尤善。其未澀者。名野管。入藥與茅功等。(蘇頌)

◎茅葉如矛。故謂之矛。其根牽連。故謂之茹。易曰。拔茅連茹是也。有數種。夏花者爲茅。秋花者爲菅。一物功用相近。而名謂不同。詩云。白華菅兮。白茅束兮是也。別錄不分。

五 薑 白

茅管乃二種。謂茅根一名地管。一名地筋。而有名未用。又出地筋一名管根。蓋二物之根。狀皆如筋。可通名地筋。不可並名管也。特正之。

(李時珍) ①牡丹皮。茅根。藕節。側柏。俱能清血分中火。治血熱藥中須之。(劉涓子)

【白茅針】 命名 本品即白茅。未放之花。爲葉包裹。細尖似針。故名。

性質 甘平。無毒。

主治 下水。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茅針曰。治消渴。能破血。

【唐】陳藏器本草拾遺論茅針曰。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫軟腐未潰者。以酒煮服。一針一孔。二針二孔。生按傳金瘡止血。

【白茅莖】 性質 甘平。涼。無毒。

主治 消渴。鼻衄。下血。癰腫。癰硬未潰。

【白香茅木】 即香茅之古籍別名。典見圖經本草。詳「香茅」條。

【白庭砂】 即砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「砂」條。

【白扇】 基本 白扇爲雜草類之一種。其根可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 瘧疾。皮膚寒熱出汗。

【白扇檜】 即檜香之原名。詳「檜香」條。

【白根】 即白皮之古籍別名。典見吳普本草。詳「白皮」條。即白欽之古籍別名。典見別錄。詳「白欽」條。

【白桂目】 別名 狗果乾。

產地 產廣東清遠境內。

性質 酸平。

效能 用作欬氣止血藥。

主治 吐血。衄血。金瘡出血。

【白海精】 即礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「礪砂」條。

【白氣】 即雀腎草之古籍別名。典見別錄。詳「雀腎草」條。

【白海蛇】 即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【白桃花】 外國名詞 Dios

Pers. Alb. 或 Popsica Album 古翻別名 銷恨客。銷恨花。助

【白桂目】 別名 狗果乾。產地 產廣東清遠境內。

性質 酸平。效能 用作欬氣止血藥。主治 吐血。衄血。金瘡出血。

【白海精】 即礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「礪砂」條。

【白氣】 即雀腎草之古籍別名。典見別錄。詳「雀腎草」條。

【白海蛇】 即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【白桃花】 外國名詞 Dios Pers. Alb. 或 Popsica Album 古翻別名 銷恨客。銷恨花。助

【白桃花】 外國名詞 Dios Pers. Alb. 或 Popsica Album 古翻別名 銷恨客。銷恨花。助

桃花。親晨狂。(和漢藥考)

基本 屬薔薇科。爲桃樹之白花。形態 桃樹株高丈餘。葉互生。作披針形。花瓣五瓣。有單瓣重瓣二種。其色白。

採取 三月採花陰乾。製法 別錄曰。三月三日採陰乾之。雷斅曰。桃花勿用干藥者。令人鼻衄不止。日黃。收花揀淨。以絹袋盛。懸簪下令乾。

性質 苦平。無毒。效能 通便。消腫。用作和緩下劑。

主治 殺毒。惡鬼。令人好顏色。(本經) 悅澤人面。除水氣。破石淋。利大小便。下三蟲。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論白桃花曰。消腫。下惡氣。【唐】孟詵食療本草論白桃花曰。治心腹痛及瘡疥。【明】李時珍本草綱目論白桃花曰。利宿水。痰飲積滯。治風狂。研末。傅頭下。肥瘡。手足瘡瘡。

國外學說 日本醫事新誌載白桃花之治療的作用。依猪子吉

五靈白

人氏之實驗。謂白桃花者。即大同類聚方之所謂毛毛乃波奈也。夙有峻下劑之名。大同類聚方云。於浮腫便秘等。均可用之。又閱原南洋氏之醫事小言。有桃花湯（治水腫逆滿方）桃花散（下停飲方）之方。且註云。桃花未開者佳。猪子氏又云。依動物試驗等。知白桃花之發下劑在於其興奮腸壁神經。以亢進蠕動。是與蒴藋、大黃、葶藶等。同其作用者也。白桃花之有效成分。容易溶解於亞爾個保兒（即酒精）故可以亞爾個保兒。數回浸出之。既浸出以後。再以水製為越幾斯與動物。則無下泄之效矣。

①治瘧疾不已。桃花為末。酒服方寸匕。良。（梅師方）

②治痰飲宿水。桃花散。收桃花陰乾。為末。溫酒服一合。取利。覺虛食少。粥不似。轉下藥也。（崔行功纂要方）

③治脚氣腫痛。桃花一升。陰乾。為末。每服以溫酒細呷之。一宿即消。（外臺祕要方）

④治腰脊作痛。三月三日取桃花一斗一升。并華水三斗。麴六升。米六斗。炊熟。如常釀酒。每服一升。日三服。神效。（千金方）

⑤治膿瘻不止。桃花為末。猪脂和傅之。日二次。（千金方）

⑥治頭上禿瘡。三月三日。收未開桃花。陰乾。與桑葉赤者等分。作末。以猪脂和。先取灰汁。洗去。痴即塗之。（食療本草方）

⑦治頭上肥瘡。寒食節。收桃花為末。食後。以水半盞。調服方寸匕。日三。甚良。亦治黃水面瘡。（崔元亮海上方）

⑧治足上癩疥。桃花食鹽等分。杵勻。醋和傅之。（肘後方）

⑨治查卵面皴。桃花冬瓜仁。研末等分。蜜調傅之。（聖惠方）

⑩治乾蕪塞腸。腹痛不通。用毛桃花。過者一兩。和麩三兩。作餅。餽炙。然。空心食之。日午腹鳴如雷。當下惡物也。（聖惠方）

⑪治面上粉刺。獮子如米粉。用桃花。丹砂各三兩。為末。每服一錢。空心井水下。日三服。十日。知二十日。小便當出黑汁。面色即變白也。（聖惠方）

⑫令面光華。三月三日。收桃花。七月七日。收雞血。和塗面上。三二日後。脫下。則光華顏色也。（聖濟總錄方）

⑬用薑 三分至八分。

參攷資料 肘後方言服三樹桃花。則面色紅潤。悅澤如桃花也。頌曰。太清草木方。言酒漬桃花。飲之除百疾。益顏色。時珍曰。按歐陽詢初學記。載北齊崔氏。以桃花白雪。與兒戲。面云。令面妍華。光悅。蓋得本草。令人好顏色。悅澤。人面之義。而陶蘇二氏。乃引服桃花法。則因本草之言。而謾用者也。桃花性走泄。下利。大腸甚快。用以治氣實人病。水飲腫滿。積滯。大小便

四一〇

閉塞者。則有功無害。若久服。即耗人陰血。損元氣。豈能悅澤顏色耶。按張從正儒門事親。載一婦。滑泄數年。百治不效。或言此傷飲。有積也。桃花落時。以棘針刺取數十。勿犯人手。以麩和。作餅。煨熟。食之。米飲送下。不一二時。瀉下如傾。六七日。行至數百行。昏困。惟飲涼水而平。觀此。則桃花之峻利。可徵矣。又蘇鵬杜陽編。載范純佑。女喪夫。發狂。閉之室中。夜斷窗棧。登桃樹上。食桃花。幾盡。及旦。家人接。下。自是遂愈也。珍按。此亦驚怒傷肝。痰夾敗血。遂致發狂。偶得桃花。利痰。飲散滯血之功。與張仲景治積熱發狂。用承氣湯。蓄血發狂。用桃仁承氣湯之意相同。而陳藏器乃言桃花食之。患淋。何耶。（陶弘景）

【白粉】 原名 鉛粉。本品乃化鉛而成。其色由黑而轉白。故名。處方用名 胡粉。宮粉。

古稱別名 粉錫、解錫（本經）
定粉（藥性本草）五粉（湯液本草）
光粉（日華本草）鉛粉、鉛華
水粉、枕粉、官粉、白膏（和漢藥考）
鉛養、炭養、炭養鉛（化學名詞）

外國名詞 Corrasa 或 Plumbi Carbonas. (拉丁) White Lead 或 Carbonate of Lead (英) Meivotas (德)

基本 屬鉛礦。係用鉛製成板狀粒狀塊狀針狀之白色之粉。
產地 凡廣東之惠州、俄國之西伯利亞、恒有產焉。和漢藥考曰：日本之京都及大阪地方盛行製造。

形態 白粉為白色無氣味之粉末。或易破碎之凝塊。不溶於水。但溶於含有炭酸之水。又溶於稀硝酸。加硝酸時則生白雲。

種類 ①製成白色之粉者曰白粉。②製成不白。成爲黃色之粉者曰黃丹。③製成後之渣滓曰密陀僧。

製造 李時珍曰。按彼造化者。每鎔百斤。鎔化爲薄片。卷作筒。安木框內。飯下飯中。各安醋一瓶。

五靈白

外以鹽泥固濟。紙封甌縫。風爐安火。四兩養一七便。封入水缸內。依舊封養。次大如此。鉛盡爲度。不盡者。留炒作黃丹。每粉一斤。入豆粉二兩。蛤粉四兩。水內攪勻。澄去清水。用細灰按成溝。紙隔數層。置粉於上。將乾。裁成瓦定形。待乾收起。而范成大與衛志言桂林所作鉛粉最有名。謂之桂粉。以黑鉛者。糟中器化之。何孟春餘冬錄云。嵩陽產鉛。居民多造胡粉。其法鉛塊懸酒缸內。封閉四十九日。開之則化爲粉矣。化不白者。炒爲黃丹。黃丹滓爲密陀僧。三物收利甚溥云。

性質 辛寒無毒。
成分 爲鹽基性炭酸鉛 $PbO \cdot Pb(OH)_2$ 。和漢藥考曰。日本白粉與用荷蘭法及日耳曼法所製者。其成分比例大略相同。分析結果。爲養化鉛八六·四二。炭酸一一·六〇。水分二·〇〇。

效能 殺蟲治疥癬。磨積治癩。痢。能收縮粘膜之分泌。減少化膿。且亦有直接滅菌之功。故喜用作膏藥。用於潰瘍火傷皮膚剝脫發疹等。

主治 伏尸、毒螫、殺三蟲（本經）去癩癧、療惡瘡、止小便利、隨胎（別錄）
張仲景之發明 ①蛇牀子散。 ②脂膏湯。二方皆用之。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論白粉曰。治積聚不消。炒魚止小兒疳痢。【宋】大明諸家本草論白粉曰。治癰腫、癩爛、嘔逆、療瘰癧。治小兒疳氣。【宋】寇宗奭本草衍義論白粉曰。止泄痢久積痢。

【明】李時珍本草綱目論白粉曰。治食復勞復。除痰消脹。治疥癬、狐臭、黑鬚髮。【明】繆希雍本草經疏論白粉曰。粉錫。陶隱居云。卽化鉛所作胡粉也。其味辛寒無毒。體用與鉛相似。性善殺蟲。故去伏尸三蟲。驚癩寒能解熱毒。故療癩瘡毒。重而下。故能墮胎。澀而黏膩。故止小便利。甄權主積聚不消。炒魚止小兒疳痢。葳器主久痢成疳。和雞子白服。以煮黑爲度。皆爲其消積殺蟲止痢也。【清】黃宮繡本草求真論白粉曰。鉛粉一名胡粉。係黑鉛煨煉。變黑爲白。氣味辛寒。體用與鉛相似。但有豆粉給

粉同入。故止入氣而不入血。其功尚能止痛生肌。膏藥每取爲用。且力能化蟲殺蟲。金匱甘草粉蜜湯。用此以爲除蟲殺蟲藥也。【清】張隱菴本草崇原論白粉曰。伏尸者。伏於泉下之尸。相癩而爲傳尸鬼。疰之病。鉛粉從黑變白。從陰出陽。故主治伏尸。寒水氣而性寒。故消瘰癧。寒金氣而味辛。故殺三蟲。愚按黃丹鉛粉。皆本黑錫所成。而變化少有不同。變白者。得金水之氣。而走氣分。變赤者。得火土之氣。而入膏丹。主癰疽惡瘡之用。今時則用鉛粉收膏藥。以代黃丹。【清】黃元御長沙藥解論白粉曰。鉛粉味辛。善止泄利。能殺蛇蟲。傷寒猪膚湯用之。治少陰痢下利咽痛。以其止利而醫瘡也。甘草粉蜜湯用之。治蛇蟲吐涎心痛。以其燥溼而殺蟲也。鉛粉燥澀之性。能殺蟲而止滑瀉。其諸主治。止諸血。療諸癩。續折傷。染鬚髮。【清】楊時泰本草述鈞元論白粉曰。鉛本陰寒重墜之性質。蒸煨爲粉。由黑而白。是變化奇矣。第其法或安醋瓶於內。或者糝

五靈白

或懸酒缸中。皆假其氣以成變化。致重墜之質。輕陰寒之氣。且色黑化白。是金在水中者。出現金相。以為氣分之用。故能消積聚。療癥瘕。蓋積聚即陰氣凝結之所致。而癥瘕又即積聚之久而成形者也。此味根至陰。而有其變化。以達夫陰氣。故奏效如此。如小兒疳病。類由於脾陰大傷。陰氣傷則有積。積滯不能化。類下惡物而為疳病。久則化而為蟲。故能治積聚癥瘕者。即其能治小兒疳氣。並炒焦能止疳痢而殺三蟲者也。凡久痢赤白。脾虛損痛。及休息痢。羸瘦者。為有久積未消之故。非從至陰而有變化之氣。如茲粉者。不能奏同氣相求之功。第陰氣為病。即已不離血分矣。瀕瀕乃謂止入氣分者。宜指血中之氣而言。蓋凡有形而成積聚者。皆血之治也。若離血以言氣。則人身豈有分離之氣血哉。

配合應用 勞復食復欲死者。水服胡粉少許(肘後方)

治小兒脾泄不止。紅漿二十箇。去核。將宮粉入內。以陰陽瓦焙乾。去飛研粉。每服三分。米湯送下。

(孫真人集效方)

治赤白痢下。類數腸痛。定粉一兩。雞子清和炙焦為末。冷水服一錢(肘後方)

治小兒無辜疳。下痢赤白。胡粉熱蒸。鍋上熬令色變。以飲服半錢(子母秘錄方)

治小兒腹脹。胡粉鹽熬色變。以摩腹上。亦治腹皮青色。不速治須臾死(子母秘錄方)

治小兒夜啼。水服胡粉三豆大。日三服(子母秘錄方)

治身熱多汗。胡粉半斤。雷丸四兩。為末。粉身(千金方)

治婦人心痛。急者。好宮粉為末。葱汁和丸。小豆大。每服七丸。黃酒送下。即止。粉能殺蟲。葱能透氣。故也(邵真人方)

治寸白虻蟲。胡粉炒燥。方寸匕。入內服中。空心服。大效。(張文仲備急方)

治服藥過劑。悶亂者。水和胡粉服之(千金方)

治鼻衄不止。胡粉炒黑。醋服一錢。即止(聖惠方)

治齒縫出血。胡粉半兩。麝香

中錢為末。臥時搽牙(聖濟方)

治墜撲瘀血。從高落下。瘀血搶心。面青氣短欲死。胡粉一錢。和水服即安(肘後方)

折傷接骨。宮粉。研砂。等分為末。每服一錢。蘇木湯調下。仍頻飲蘇木湯。大效(接骨方)

治杖瘡腫痛。水粉一兩。赤石脂生一錢。水銀一分。以麻油杵成膏。攤油紙貼之。內消者。填滿緊縛(救急方)

治抓傷面皮。香油調鉛粉搽之。一夕愈(集簡方)

治食梅牙齦。韶粉搽之。(相感志方)

染白髮。胡粉。石灰等分。水和塗之。以油紙包。烘令溫煖。候未燥。即洗去。以油潤之。黑即如漆也(博物志方)

治腋下胡臭。常用胡粉粉之。或以胡粉三合。和牛脂煎稠塗之(千金方)

治陰股常溼。胡粉粉之。亦治乾溼癬瘡(備急方)

治黃水膿瘡。宮粉。煨黃松香。各三錢。黃丹一錢。飛礬二錢。為末。

四一二

香油二兩。蒸膏傅之(邵真人方)

治小兒疳積。熬胡粉。豬脂和塗。(張文仲方)

治燕口吻瘡。胡粉炒一分。黃連半兩。為末。傅之(普濟方)

治痘瘡癩痕。或凸或凹。韶粉一兩。輕粉一定。和豬脂調傅。(陳文中小兒方)

治妬精陰瘡。韶粉二錢。銀杏仁七箇。銅銕內炒。至杏黃。去杏取粉。出火毒。研搽效(集簡方)

治反花惡瘡。胡粉一兩。臘脂一兩。為末。鹽湯洗淨。傅之。日五次(聖惠方)

治血風腫瘡。用宮粉四兩。水調入盤內。以蘇州艾葉燒烟。熏乾。入乳香少許。同研。香油調作隔紙膏。反覆貼之。(孫氏集效方)用宮粉炒過。桐油調。作隔紙貼之。(楊氏簡便方)

治小兒丹毒。唾和胡粉。從外至內傅之。良(千金方)

治湯火燒瘡。胡粉羊髓和塗之(孫真人方)

治諸蛇螫傷。胡粉和大蒜搗塗。(千金方)

●治誤吞金銀及錢。胡粉一兩。豬脂調。分再服。令消烱出也。(外臺秘要方)

●治口中乾燥。煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮皮爛。入定粉一兩。研勻。丸如次子大。每含化一丸。嚥汁。(聖惠方)

●治腹中蠶癥。胡粉黍米淋汁。溫服大效。(衛生易簡方)

●接骨續筋。止痛活血。定粉。當歸各一錢。研砂一錢半。爲末。每服一錢。用蘇木煎湯調下。仍類飲湯。(衛生易簡方)

●治發背惡瘡諸癰疽。好光粉二兩。真麻油三兩。慢火熬。以柳枝急攪至滴水成珠。入白膠末少許。入器。水浸兩日。油紙攤貼。名神應膏。(直指方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛弱及無積滯者禁用。

參攷資料 ●胡粉能制硫黃。又雌黃得胡粉而失色。胡粉得雌黃而色黑。蓋相惡也。又入酒中去酸味。收蟹不沙。(李時珍) ●按墨子云。禹造粉。張華博物志云。紂燒

五壹 白

鉛錫作粉。則粉之來亦遠矣。今金陵。杭州。韶州。辰州。皆造之。而辰粉尤真。其色帶青。其鉛氣有毒。工人必食肥豬大肉。飲酒及鐵漿。以厭之。榜腹中其毒。輒病至死。長幼爲毒。薰蒸多。瘴黃癩變而斃。其法略皆不同。蓋巧者時出新意。以速化爲利。故爾。又可見昔人炒錫之誤。相感志云。韶粉蒸之。不以蘿蔔。子蒸之。則白。(李時珍)

【白苳】即白芷之古籍別名。典見本經。詳「白芷」條。

【白茯苓】即茯苓之白色者。處方用名。詳「茯苓」條。

【白茶】即雪茶之古籍別名。典見大觀本草。詳「雪茶」條。即六安茶之一種。詳「六安茶」條。

【白茶菊】命名 本品即茶菊之白花者。故名。

採取 以千葉者爲佳。性質 苦微甘。平無毒。

主治 通肺氣。止咳逆。清三焦。鬱火。痰熱。入氣分。

【白草】即白斂之古籍別名。典見本經。詳「白斂」條。即白英之古籍別名。典見別錄。詳「白英」條。

【白馬屎】即馬通之處方用名。詳「馬通」條。

【白馬骨】產地 出江東諸地。形態 白馬骨爲雜木類之一種。樹形似石榴而短小。其節對生。其莖葉可供藥用。

性質 無毒。主治 療癰惡瘡。蝕息肉。白癩風。和黃連。細辛。白芷。牛膝。雞桑皮等。燒末淋汁。搗破塗之。止水疔。黃汁服。

【白馬通】即馬通之處方用名。詳「馬通」條。

【白參】即沙參之古籍別名。典見吳普本草。詳「沙參」條。即高麗參之別名。詳「高麗參」條。

【白堊】命名 土以黃爲正色。白者爲惡色。故名。

古籍別名 白善土。(別錄)白土粉。(本草衍義)畫粉。(綱目)

外國名詞 Krida。產地 山野有出。江西。湖南。湖北間最多。

形態 白土爲土類之一種。即用以燒白瓷器。極者。非晶質之石灰岩也。往往含有孔蟲之遺體。爲

製造石灰及瓷器之原料。兼可製粉筆。及粉飾門屏。畫家多用之。可供藥用。

製法 雷斂曰。凡使勿用色青。井底白者。搗篩末。以鹽湯飛過。曬乾。用。則免粘澁。入腸也。每至二兩。用鹽一分。大明曰。入藥燒用。不入湯飲。

性質 苦溫無毒。主治 女子寒熱癥瘕。月閉積聚。(本經)陰腫痛。漏下無子。洩痢。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白土曰。療女子血結。瀝腸止痢。【宋】大明諸家本草論白土曰。治鼻衄吐血。痔瘡。洩精。男子水厥冷。女子子宮冷。【宋】寇宗奭本草衍義論白土曰。合王瓜等分。爲末。湯點二錢服。治頭痛。

參攷資料 ●白土辛無毒。不可久服。傷五臟。令人羸瘦。(別錄) ●白善土。京師謂之白土粉。切成方塊。質與人浣衣。(寇宗奭) ●諸土皆能勝溼補脾。而白堊土則兼入氣分也。(李時珍)

【白椴仁】即稊仁之古籍別名。典

見爾雅。詳「蕤仁」條。

【白梅】 命名 本品係用青梅與鹽汁製成。久乃生霜。色白故名。

處方用名 白梅乾。

外國名詞 Salved and dried plums (英)

基本 屬薔薇科。為梅樹之子實。於梅雨時節採取醃藏者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。霜梅以廣東羅洞新昌埠為最。各處亦有製成。福州來者次之。

種類 ①白梅係用全青梅子鹽醃曬乾者。②烏梅係用半黃梅子以烟薰乾者。

採取 五月採青梅實而醃藏之。

製法 取大青梅以鹽汁漬之。日曬夜漬。十日成矣。久乃上霜。

性質 酸。鹹。平。無毒。

效能 清熱解毒。醒酒。殺蟲。功同烏梅。

主治 開牙關。消腫毒。和藥點痣。蝕惡肉。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白梅曰。刺在肉中者嚼

傳之。卽出。【宋】大明日華諸家本草論白梅曰。治刀箭傷。止血研爛

傳之。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論白梅曰。除痰。【明】李時珍本草綱

目論白梅曰。治中風驚癇喉痺。痰厥假仆。牙關緊閉者。取梅肉搗擦

牙齦。涎出卽開。又治瀉痢煩渴。霍亂吐下。下血血崩。功同烏梅。又曰

烏梅白梅。所主之病。皆取其酸收之義。惟張仲景治蛇厥烏梅丸及

蟲瘻方中用者。則取蟲得酸卽止之理。稍有不同耳。【清】黃宮繡本

草求真論白梅曰。白梅由於鹽鹹。則能軟堅。若牙關緊閉。死肉黑痣。白梅用之更捷。

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非虛症而有實邪者禁用。

【白梅乾】 卽白梅之處方用名。詳「白梅」條。

【白條參】 卽百濟參之別名。詳「高麗參」條。

【白牽牛】 卽牽牛子之白色者。處方用名。詳「牽牛子」條。

【白瓷器】 基本 本品係以白土為坯。坯燒成器。

產地 出定州饒州者良。

性質 平。無毒。

主治 婦人帶下白崩。止嘔吐。破血止血。水瘰瘡瘻減癢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白瓷器曰。研末傳癰腫。可代針。又點目去翳。

【白砂砂】 卽人乳之古籍別名。典見方家。詳「人乳」條。

【白符】 卽白石脂之古籍別名。典見吳普本草。詳「白石脂」條。

【白荷花露】 基本 本品係用白荷花蒸取之露。

主治 定喘嗽痰血。除煩渴安胎。消暑安脾。止血化痰。

【白堊】 卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【白通草】 卽通草之處方用名。詳「通草」條。

【白朮】 卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【白魚】 命名 本品色白故名。古籍別名 鱈魚。鮪魚。

(本草綱目) 白花魚。陽鱈。形態 白魚為鱈屬魚類之一

種。長三四尺。色青白。頭尾向上。腹

扁鱗細。肉有細刺。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 開胃下氣。去水氣。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白魚曰。助脾氣。調五臟。理十二經絡。舒展不相及氣。【宋】

日華諸家本草論白魚曰。治肝氣不足。補肝明目。助血脈。灸瘡不發者。作鱈食之良。患瘡癩人食之。發

癩。

參攷資料 ①鮮者宜和豉作羹。難不發病。多食亦泥人。經宿者勿食。令人腹冷。炙食亦少動氣。或

醃或糟藏皆可食。【孟詵】②多食生痰。與葷同食患腹痛。【吳瑞】③白魚比他魚似可食。亦能熱中發

瘡。所謂補肝明目。調五臟。理十二經絡者。恐亦溢美之詞。未足多信。當以開寶注為正。【李時珍】

【白魚蘇】 卽紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫蘇」條。

【白鳥】 卽鸛鷺之古籍別名。典見綱目。詳「鸛鷺」條。

【白麻】即商麻之古籍別名。典見綱目。詳「商麻」條。

【白傍幾子】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「半夏」條。

【白善土】即白堊之古籍別名。典見別錄。詳「白堊」條。

【白棗】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【白棘】命名 獨生而高者為棗。列生而低者為棘。重東為棗。平東為棘。本品莖白如粉。故名。

古醫別名 赤龍爪。馬駒。(綱目) 棘刺。棘銳。莢(別錄) 塵地 原野有出。

形態 白棗為灌木類之一種。即棗樹之小而叢生者。其枝有皺紋。薄白膜。其棘刺與枝葉花實。可供藥用。

性質 辛寒。無毒。

主治 心腹痛。癰腫潰膿。止痛。決刺結(本經) 療丈夫虛損。陰痿。精自出。補腎氣。益精髓。棗棘療腰痛。喉痺不通(別錄)

【白棘枝】 主治 燒油塗髮。祛垢膩。

【白棘花】 古醫別名 刺原。性質 苦平。無毒。主治 金瘡內漏。

【白棘葉】 主治 脛腫瘡。搗傅之。亦可曬研。麻油調傅。

【白棘實】 主治 心腹痠痺。除熱利小便。

【白棘樹仁】 即郁李仁之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「郁李仁」條。

【白給】 即白芨之古籍別名。典見別錄。詳「白芨」條。

【白苑】 即女苑之古籍別名。典見別錄。詳「女苑」條。

【白菊】 即白甘菊之簡稱。詳「甘菊」條。

【白菊花】 即菊花之處方用名。詳「菊花」條。


【白菊瓣】 即菊花之處方用名。詳「菊花」條。

【白菖】 命名 本品形似菖蒲。而根肥白。故名。

古醫別名 昌歎(本草綱目) 水菖蒲。水菖。莖蒲。泥菖(別錄) 昌陽。溪孫(本草拾遺)

外國名詞 *Acorus calamus*, (拉丁) シヤウブアヤメグサ (日本) 基本 係天南星科石菖屬。藥用白菖之莖根。

形態 白菖為水草類之多年生草本。有長根。莖色淡紅。其全部具特殊之香氣。葉狹扁。為劍狀。無劍脊。有平行脈。長三四尺。夏月葉腋出穗。開花。花細小而多淡黃色。作內穗花序。



白 菖

種類 根大肥白而節疏。生池澤者。白菖也。俗謂之泥菖。與石菖蒲相異者。石菖蒲葉細。無中肋。白菖葉闊。有中肋也。根瘦色赤而節密。生溪澗者。溪菖也。俗亦謂之石菖蒲。氣味勝似白菖。並可殺蟲與服食。

性質 甘。無毒。主治 食諸蟲。歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論白菖曰。主風濕。欬逆。去蟲。斷益風。宋蘇頌圖經本草論白菖曰。研末油調。塗疥癬。

【白菜】 原名 菘。命名 本品性能凌冬。晚凋。四時常見。有松之操。而其色青白。故名。

古醫別名 黃芽菜。(植物學大辭典) 漬菜。唐菜(日本)

外國名詞 *Brassica chinensis*, (拉丁) ツケナミ カハシマナクウテ(日本)

基本 係十字花科。蕓薹屬。藥用菘之莖葉。

形態 菘為菜類之越年生草本。其葉闊大柔軟。有缺刻者。有無缺刻者。色淡青白。花冠四瓣。雄蕊有四。其子實如蠶殼。色灰黑。秋初下種。秋冬收穫。其莖葉供食。亦可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。主治 通利腸胃。除胸中煩。解酒濕。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四聲本草論菘曰。消食下氣。治瘴氣。止熱氣嗽。冬汁尤佳。【明】寧原食

惟本草論菘曰和中利大小便。

參攷資料 菘食之發風冷。

內虛人不可食。有熱人食亦不發病。性冷可知。菘有三種。牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦。白菘似芡菁也。菘菜不生北土。有人將子北種。初一年即半為蕪菁。二年菘種部絕。將蕪菁子南種。亦二年都絕。土地所宜如此。蘇恭曰菘有小毒不可食多。多則以生薑解之。蘇頌曰菘南北皆有。與芡菁相類。梗長葉不光者為蕪菁。梗短葉闊厚而肥瘠者為菘。舊說北土無菘。今京洛種菘都類南種。但肥厚不及爾。蘇頌曰菘州一種。葉圓而大。或若筵。啖之無渣。絕勝他土者。疑即牛肚菘也。蘇頌曰菘即今人呼為白菜者。有二種。一種莖圓厚嫩青。一種莖扁薄而白。其葉皆淡青白色。燕趙遼陽揚州所種者最肥大而厚。一本有重十餘斤者。南方之菘。畦內過冬。北方者多入窖內。燕京閩人。又以馬蕪入窖。培不見風日。長出苗葉皆嫩黃色。脆美無滓。謂之黃芽菜。秦貴以為嘉品。

蓋亦做非黃之法也。菘子如蠶蠶子而色灰黑。八月以後種之。二月開黃花如芥。花四瓣。三月結角。亦如芥。其菜作菘食尤良。不宜蒸晒。

李時珍曰白菘即白菜也。牛肚菘即最肥大者。紫菘即蕪菘也。開紫花。故曰紫菘。蘇恭謂白菘似芡菁誤矣。根葉俱不同。而白菘根堅小不可食。又言南北變種者。蓋指芡菁菘而言。紫菘根似芡菁。而葉不同。種類亦別。又言北土無菘者。自唐以前或然。近則白菘紫菘。南北通有。惟南土不種芡菁。種之亦易生也。李時珍曰菘氣味涼微毒。多食發皮膚風癢痒(大明)。

【白菜子】原名 菘子。性質 甘平無毒。

主治 作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。

【白菘菹】即菘菹之古籍別名。典見綱目。詳「菘菹」條。

【白菹菹】基本 蔓草類之一。形態 生於山野。葉圓而厚。莖有白毛。形似蘿藦。可療疾。性質 苦平無毒。

主治 風邪。熱極。風疰。鬼疰。解蠱。烏蛇。蜂蕪。刺犬。菜肉諸毒。

【白貴】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「銀箔」條。

【白雄雞】形態 白雄雞為原禽類。即雄雞之羽色潔白者。其肉可供食與藥用。性質 酸微溫無毒。

主治 下氣。療狂邪。安五臟。傷中消渴。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論白雄鷄肉曰。調中除邪。利小便。去丹毒風。

【白雲苔】即茯苓之處方用名。詳「茯苓」條。

【白微】即白薇之原名。詳「白薇」條。

【白楊】命名 本品樹身似楊。而色微白。故名。古籍別名 獨搖。高飛。(本草綱目)

外國名詞 Populus balsamifera, L. var. Slavocolora, Loud. (Populus alba, L.) (Populus tremula, L. var. Villosa, Wesm.) (拉丁)テロドロノキ

テロヤナギ(日本) 基本 係楊柳科白楊屬。藥用白楊之木皮。

產地 生於北方寒地原野間。


形態 白楊為落葉喬木。高數丈。木質堅直。樹皮暗灰色。初平滑。後生裂紋。葉互生卵形。或長橢圓形。而花有鈍齒鋸。春月開花。尖單性。雌花與雄花生於異株。排列成穗狀。花序。雄花穗較長。花後結實於花軸。疏而不密。熟則四裂。散出種子。種子有白毛如綿。

製法 雷敫曰。凡使劍刀刮去精皮。熬之。從已至未。以布袋盛掛屋東角。待乾用。

性質 苦寒無毒。

主治 毒風。脚氣腫。四肢緩弱。不隨。毒氣游易在皮膚中。痰癬等。酒漬服之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器



白楊

本草拾遺論白楊木皮曰去風痺

宿血折傷血澀在骨肉間痛不可

忍及皮膚風疹腫雜五木爲湯浸

損處【宋】大明諸家本草論白楊

木皮曰治撲損瘀血並煎酒服煎

膏可續筋骨【明】李時珍本草綱

目論白楊木皮曰煎湯日飲止孕

劑煎醋含漱止牙痛煎漿水入鹽

含漱治口瘡煎水酸酒消瘰癧

參攷資料 白楊木高大葉圓

似梨而肥大有尖面背而光背甚

白色有鋸齒木肌細白性堅直用

爲梁拱終不撓曲與移楊乃一類

二種也治病之功大抵彷彿嫩葉

亦可救荒老葉可作酒麪料（李

時珍）

【白楊皮酒】

製法 用白楊皮切片浸酒飲

主治 風毒脚氣腹中痰癖如

石

【白楊枝】

主治 消腹痛治吻

【白楊葉】

主治 飢齒煎水含漱又治骨疽久發骨

從中出類持傳之（李時珍）

【白滑】即滑石之古籍別名典見

和漢藥考詳滑石條

【白獅子石】

主治 白虎歷節風

【白膏歸】即膏歸之處方用名詳

【膏歸】條

【白筵草】

形體 白筵草爲雜草類之一種香草蟲

最畏之根葉可供藥用

主治 諸蟲疥癩疾煎水隔

日洗之

【白梁米】

形體 白梁米爲稷粟類梁米之色白者

可供食與藥用

性質 甘微寒無毒

主治 除熱益氣

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論白梁米曰除胸膈中容

熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并

嘔吐食及水者以米汁二合薑汁

一合和服之佳【明】李時珍本草

綱目論白梁米曰炊飯食之和中

止煩渴

【白葉茶】即雪茶之古籍別名典

見東溪詳雪茶條

【白葛】即白兔蕪之古籍別名典

見吳普本草詳白兔蕪條

【白葡萄酒】

主治 助腸胃消化力

【白蛾眉豆】即白扁豆之古籍別

名典見和漢藥考詳白扁豆條

【白蜂蠟】即白蠟之處方用名詳

【白蠟】條

【白雄】即白附之古籍別名典見

綱目詳白附條

【白雷丸】即雷丸之處方用名詳

【雷丸】條

【白鳩蒔】即山藥之古籍別名典

見和漢藥考詳山藥條

【白鼓釘】

產地 出口外沙漠地

形體 白鼓釘爲菜類之一種

即內地之蒲公英葉有鋸齒婆娑

鋪地與內地生者迥殊內地者花

早開單瓣生沙漠者花開於夏至

前宛似黃菊一望燦然滿地其莖

瓣重疊顏色嬌媚暮春草甫萌其

莖折斷有白汁一莖兩花高尺餘

掘下數尺根大如拳以有知人形

拱抱者佳可供藥用

主治 清火毒鬱熱通乳通淋

消腫療一切毒蟲蛇傷

【白蕪】即天雄之古籍別名典

見綱目詳天雄條即白英之

古籍別名典見本草拾遺詳白

英條即白蕪之古籍別名典

見別錄詳白蕪條

【白槿花】即木槿之處方用名詳

【木槿】條

【白苻】即白粉之古籍別名典見

和漢藥考詳白粉條

外國名詞 Tribu-
【白蒺藜】
Tribu-
Tribu-

基本 白蒺藜即刺蒺藜之色

白而去刺者亦供藥用

性質 甘溫無毒

主治 補腎治腰痛泄精虛損

勞乏

參攷資料 古方皆用有刺

者治風明目最良神仙方亦有單

服藥法云不問黑白但取堅實

者春去刺用（蘇頌）古方補腎

治風皆用刺蒺藜後世補腎多用

沙苑蒺藜或以熟苻和藥恐其功

亦不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺

磨麪作餅或煮食可以救荒（李

時珍）

命名 本品之色白於

衆蒿故名

五靈白

古籍別名 繁。由胡。晴蒿。(爾雅) 萋蒿。(食療本草) 蒿菹。(本草綱目)

外國名詞 Artemisia steol-Toriana, Boss. (拉丁) シロハネキ (日本)

基本 係菊科艾屬。藥用白蒿之苗葉及根。

形態 白蒿為濕草類中蒿屬之一種。多年生草本。有水陸二種。水產者名萋蒿。高四五尺。葉作羽狀複葉。略似青蒿而粗。面青背白。密生灰白毛。秋日開花。色褐。為小頭狀。花序排列如穗。結子白脆。與苗葉根。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 五臟邪氣。風寒濕痺。補中益氣。長毛髮。令黑。療心懸。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白蒿曰。生按醋淹為菹。食甚益人。持汁服。去熱黃及心痛。曝為末。米飲空心服一匙。治夏月暴水痢。燒灰淋汁煎。可治淋瀝疾。【明】李時珍本草綱目論白蒿曰。利腸開胃。殺河豚魚毒。

參攷資料 萋蒿可以為茹。

故詩箋云。以豆薦繁菹也。陸機詩云。凡艾白色為蒿。今白蒿先諸草。發生香美。可食。生蒸皆宜。(掌禹錫) 此草古人以為菹。今人但食萋蒿。不復食此。或疑白蒿即萋蒿。而孟詵食療又別著萋蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿為茵陳。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。(蘇頌) 本經列白蒿於上品。有功無毒。而古今方家不知用。豈不得服之之訣與。(李時珍) 白蒿有水陸二種。爾雅通謂之萋。以其易繁衍也。曰繁蒿。即今陸生艾蒿也。辛。薰不美。曰繁。由胡。即今水生萋蒿也。辛。香而美。曰繁之醜。秋為蒿。則通指水陸二種而言。謂其春時各有種名。至秋老則皆呼為蒿矣。曰類曰蒿曰萩。皆老蒿之通名。象秋氣蕭賴之氣。(李時珍) 白蒿處處有之。有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。故曰生中山川澤。不曰山谷平地也。二種形狀相似。但陸生辛。薰不及水生者香美爾。詩云。呦呦鹿鳴。食野之苹。即陸生蒿。俗呼艾蒿是矣。

鹿食九種解毒之草。白蒿其一也。詩云。於以采繁。於沼於沚。左傳云。蕪繁。菹藻之菜。可以薦於鬼神。羞於王公。並指水生白蒿而言。則本草白蒿之為萋蒿無疑矣。鄭樵通志謂。萋為萋蒿。非矣。鹿乃山獸。蕪乃水蒿。陸機詩。疏謂。萋為牛尾蒿。亦非矣。牛尾蒿。色青。不白。細葉。直上。狀如牛尾也。萋蒿生陂澤中。二月發苗。葉似嫩艾。而歧細。面青背白。其莖或赤或白。其根白脆。采其根莖。生熟菹。曝皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿。葹不沾薄。謂吳人善調酸滷。萋蒿為葹。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。(李時珍)

【白蒿子】 主治 鬼氣。為末酒服之良。

【白蚤】 即防風之古籍別名。典見吳普本草。詳「防風」條。

【白蜜】 即蜂蜜之白色者。詳「蜂蜜」條。
【白蠟】 即白蠟之處方用名。詳「白蠟」條。
【白銀香】 即檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

四一八

【白銅】 命名 本品為銅之白色者。故名。性質 辛涼。

主治 鎮氣不足。益肺下痰。伐肝明目。

【白銅鑊】 基本 白銅鑊為金然產生之質。脆白銅。可供藥用。性質 辛溫。

主治 治風散毒。敷牛馬瘡。亦續筋骨。

參攷資料 白銅鑊乃鑊中白銅。今時所用之白銅。係以赤銅和砒石煉成者。有毒。不堪用。(趙學敏)

【白鳳仙花】 即鳳仙花之白色者。功用參詳「鳳仙花」條。

【白鳳仙花漿】 製法 造白鳳仙花。採閉繭中令滿。以單葉白鳳仙花。採閉繭中令滿。以箬封口。再將泥塘之埋土內二三十年。方取用。繭中花悉化成水。割去滓。其清水即鳳漿也。另貯磁瓶聽用。性質 大寒。無毒。

主治 治痘疹焦陷。疎痰。解一切火毒。

施用宜忌 凡非實火熱毒者禁用。

參攷資料 白鳳仙花藥治痘疹不效。藥內加一茶匙。立能回焦更生。大有奇功。但性極寒。不可多用。

【白墮】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【白綠子】產地 出熱帶安南交趾諸地。

形態 白綠子為喬木類之一種。樹高丈餘。其實如胡桃。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 治山瘴。療疥癬。祛暑濕。

除煩渴。

【白膠】即鹿角膠之古籍別名。典見本經。詳『鹿角膠』條。

【白膠香】即楓香脂之古籍別名。典見綱目。詳『楓香脂』條。

【白蓮】即杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。

【白蓮子】即蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【白蓮肉】即蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【白蓮鬚】即蓮鬚之處方用名。詳『蓮鬚』條。

【白蓮仁】即白豆蔻之處方用名。詳『白豆蔻』條。

【白蔻殼】即白豆蔻之處方用名。詳『白豆蔻』條。

【白麩根】即薺菴之古籍別名。典見救荒本草。詳『薺菴』條。

【白綠木皮】即秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦皮』條。

【白澤】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳『甘遂』條。

【白糕】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【白糖】即白沙糖之處方用名。詳『白沙糖』條。

【白蕪荑】即蕪荑之處方用名。詳『蕪荑』條。

【白蓮】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【白隨子】即續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【白頭翁】命名 本品近根處有白茸。狀如白頭者。

翁。故名。

古醫別名 野丈人。胡王使者。

(本經) 奈何草。(別錄) 注之花。老翁鬚。(和漢藥考) 貓頭花。貓古都(植物名實圖考)

外國名詞 Anemone oer-nua, Thunb. 或 Pulsatilla (拉

丁) Pasque (英) Kitchense-hello (德)

基本 屬毛茛科。藥用其根。

產地 陳仁山藥物生產撰云。白頭翁以產安徽滁州為正。其苗

白。其身紅赤。梗若柴胡。故開其心有紅根。若檳榔等紋。到港及廣州

改易其名為北紫草。最解熱。麻痘下痢之聖藥也。廣東各藥肆俱以

聲色草作為白頭翁。可謂錯矣。聲色草產陽江水東。與白頭翁迥別。

宜從速改革。不准將聲色草充實。免誤醫師之用白頭翁也。



(一) 翁頭白

形態 按白頭翁為山野自生

之多年生草。春季自宿根叢生數葉。莖高五寸至尺許。葉為羽狀複

葉。與莖俱密生白毛。梢頂簇生小葉。且分生數枝。每枝倒垂暗赤色

或紫赤色之六瓣花。後結瘝果。中有白毛。狀如老人之白髮。故名白

頭翁。根粗縱橫分散。



(二) 翁頭白

採取 二月採花。四月採實。四五月或七八月採根日乾。

性質 苦。溫。無毒。

成分 含極辛之黃油。加水煮沸之即得 Anemoinin 及 Anemonic acid.

效能 清熱。涼血。療腸風。治赤痢。入胃後。與胃液起作用。所含各

質。均行分出。微能麻醉胃粘膜。入腸即激腸壁神經。使蠕動增速。由

腸壁吸入至血中。即能引起末梢神經之反激。使大腸興奮。一時血

運增加。由中樞神經而傳達卵巢。卵巢亦因此充血。同時又有麻醉

五鬪 白

作用。故用治月經停閉。及熱性下痢。

主治 治溫瘧狂揚。寒熱。癰癤。積聚。瘰癧。逐血。止腹痛。療金瘡。(本經)鼻頰(別錄)

張仲景之發明 白頭翁一味。經張仲景之實驗。認為主治熱痢。下重。茲考徵如下。白頭翁湯證曰。熱利下重。又曰。下利欲飲水。白頭翁加甘草阿膠湯證曰。下利。

匯代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論白頭翁曰。止毒痢。唐甄種藥性本草論白頭翁曰。赤痢腹痛。齒痛。百節骨痛。項下瘰癧。宋大明日華諸家本草論白頭翁曰。一切風氣。暖腰膝。明目消贅。明經希雍本草經疏論白頭翁曰。白頭翁本經味苦溫。無毒。吳綬益以辛寒。入手足陽明經血分。暴伏足陽明經。則發溫瘧。伏手陽明經。則病毒痢。滯下純血。狂揚鼻衄者。血熱也。寒熱者。血凝也。癰癤。癰癤。聚氣。不由血凝而成。積滯。滯留則腹痛。金瘡。血涼則痛自止。苦能下泄。辛能解散。寒能除熱。涼血。具諸功能。故悉主之。殆散熱

涼血行瘀之要藥歟。前人所謂腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。男子陰疝。偏墜。小兒頭禿。腥羶鼻衄。無此不效。毒痢有此獲功。熱毒下痢。紫血鮮血者宜之。清黃宮繡本草求真論白頭翁曰。白頭翁味苦性寒。何書用此以治痢。便膿血。經云腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。損故以純苦之劑以堅之。如仲景之治挾熱下痢之用。白頭翁湯之屬是也。若使熱結不除。則腎愈虛。愈解而痢愈愈。又書何以用此以治溫瘧寒熱。齒痛骨痛。鼻衄。疔瘡。疔瘡等症。亦因邪結陽明。服此熱解毒清。則腎不燥。擾而骨固。胃不受邪。而齒安。毒不上浸。而止頰。熱不內結。而疔與瘡皆卻。風無熱熾。而小兒頭瘡得除矣。總皆清解熱毒之力也。近根有白茸得酒良。

近人學說 ●袁淑範曰。白頭翁係屬毛茛科植物。依寇波氏言。凡屬毛茛科之植物。往往能使人蓄中毒。可為芫菁之代用品。塗抹其有效成分於皮膚時。呈強烈之刺激作用。使發生水泡。故嘗用作

發泡藥。如內服其新鮮植物或津汁時。則刺激胃腸炎。吸收後則起抽搐麻痺等中毒症狀。依死後解剖檢驗時。亦不外胃腸炎腎臟及腦髓等之刺激症狀。用其新鮮植物。雖有此種種之毒性。然用其乾枯植物時。則毫無作用。如外臺祕要載治陰癩偏腫。用白頭翁生者。不限多少。搗敷。炎腫處。一宿當作瘡。二十日可愈。亦可證古來已知白頭翁生者。有強烈之刺激作用。可用作發泡藥也。許小士曰。本品之主治。達原已詳。說無遺。據內經學說。凡苦藥有降下之作。用。近人統以本品為痢症要藥。蓋痢症初起。皆係腸中有積。生理乃起反應。遂誘起腸壁發炎。痢症作矣。本品之寒能勝熱。苦能下降。故用於熱痢。確為有效。據植物學。則謂本品有刺激性之毒質。鄙意本品之刺激性。必於腸胃有特殊效力。故治初痢甚效。因腸壁神經受刺激。其蠕動必劇。故順生理之要求。助腸壁以驅逐腸中積滯。然必用於急性痢症。若緩性下痢。則無效矣。吳公曰。如許君所說。本品

四二〇

之效能。僅限於初痢。以其富有刺激性。可以增加腸壁蠕動之故。顧吾之所知。則異於是。許君謂痢症初起。為腸中積有食滯。誘起腸壁發炎所致。其實此種痢症。按之西醫籍實為急性腸加答兒腸膜炎。食積之刺激。遂潮紅腫脹。而發炎分。泌加多。故而下利。其主要之症狀。為腹鳴腹脹。治療方法。仲景則理中丸。生姜瀉心湯。時方木香。白朮。神麴。山查。其目的。誠如許君所說。助腸壁以驅逐積滯。按之古人

設。助腸壁以驅逐積滯。按之古人。謂。許君謂。白頭翁可用於此等症候否。君又謂。本品用於熱痢。確為有效。所謂熱痢。當然是糞便中。渾有血液之赤痢。大腸粘膜由發炎而至出血。據許君謂。本品之刺激性。用於腸胃有特殊效力。然用於赤痢。不更促進腸膜之出血。與穿潰耶。白頭翁之功用。究如何。此當於仲景白頭翁湯分析之。吾嘗以吾國之熱痢。可當西籍有傳染性之赤痢。仲景白頭翁湯。黃連。可以滅低局部充血。有收斂性。可以遏止腸膜分泌。黃柏。藥皮。可以消腸膜之發炎。白頭翁之作用

發泡藥。如內服其新鮮植物或津汁時。則刺激胃腸炎。吸收後則起抽搐麻痺等中毒症狀。依死後解剖檢驗時。亦不外胃腸炎腎臟及腦髓等之刺激症狀。用其新鮮植物。雖有此種種之毒性。然用其乾枯植物時。則毫無作用。如外臺祕要載治陰癩偏腫。用白頭翁生者。不限多少。搗敷。炎腫處。一宿當作瘡。二十日可愈。亦可證古來已知白頭翁生者。有強烈之刺激作用。可用作發泡藥也。許小士曰。本品之主治。達原已詳。說無遺。據內經學說。凡苦藥有降下之作。用。近人統以本品為痢症要藥。蓋痢症初起。皆係腸中有積。生理乃起反應。遂誘起腸壁發炎。痢症作矣。本品之寒能勝熱。苦能下降。故用於熱痢。確為有效。據植物學。則謂本品有刺激性之毒質。鄙意本品之刺激性。必於腸胃有特殊效力。故治初痢甚效。因腸壁神經受刺激。其蠕動必劇。故順生理之要求。助腸壁以驅逐腸中積滯。然必用於急性痢症。若緩性下痢。則無效矣。吳公曰。如許君所說。本品

或屬於殺菌方面。又別錄謂本品可治鼻衄。宋元以後謂本品入血分可清腸熱。則本品即無殺菌作用。亦必有減低局部充血及消炎作用。若更渾合兩種作用。則本品可得一結論。張山雷曰。此藥之味微苦而淡。氣清質輕。本經雖謂苦溫。然以主治溼瀉狂瀉。而仲景且以專治熱利下重。則即熱毒滯下之候。古之所謂腸辟。腸有濕熱。質積而欲下不爽。故為裏急後重。此能泄之使通。則必非溫藥可知。石頑本經逢原。改作微寒。蓋從閱歷中體驗得來。其說較為可信。今以通治實熱毒火之滯下赤白。日數十次者。頗見奇效。向來說者。皆謂苦泄導滯。專以下行為天職。且有苦能堅骨。寒能涼骨之語。惟今人紹興何廉臣老輩。著有實驗藥物學。獨謂其氣質輕清。為升散腸胃鬱火之良藥。蔚頤案此草入藥。止用莖葉。本屬輕揚之質。且有白毛茸茸。故得此名。物質如是。而味苦又薄。合於經文輕清發散為陽之旨。其主熱毒滯下。雖曰苦固能瀉。而升舉脾胃清氣。使不陷下。則

裏急後重皆除。確是此藥之實在真諦。何翁此論。洵有特別見解。於物質病理。兩兩符合。頗極佩服。但終是苦泄宜通一路。不能竟以升散鬱火四字。簡直言之。與升麻柴胡作一例看耳。試觀別錄。以主鼻衄。其能清泄。尤為明白曉暢。故脾虛泄瀉者忌之。亦有滯下日久。元氣已虛。而見淡血水者。是為脾胃真陽兩憊。尤其不可妄投。輕用一錢至一錢五分。毒火甚者。可用至四五錢。

配合應用 ●治下痢咽腫。春夏病此。宜用白頭翁黃連各一兩。木香半兩。水五升。煎一升。分三服。(聖惠方)

●治陰癰偏腫。用根生搗。傳腫處一宿。當作疔。廿日愈。(外臺祕要方)

●治外痔腫痛。用白頭翁草。一名野丈人。以根搗塗之。逐血止痛。(衛生方)

●治小兒禿瘡。白頭翁根搗傅一宿。作瘡半月愈。(肘後方)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡血分無熱者禁。

著名方劑 白頭翁湯。治熱劑下重。(金匱方)用白頭翁黃連黃柏秦皮各三兩。上四味。以水七升。煮取二升。去滓溫服一升。不愈再服。

參攷資料 ●其葉似芍藥而大。抽一莖。莖頭一花紫色。似木槿。花實大者如雞子。白毛寸餘。皆披下似蠶頭。正似白頭老翁故名。為陶官近根有白茸。似不識也。(蘇恭) ●處處有之。正月生苗。作叢生。狀似白微而柔細。稍長。葉生莖頭如杏葉。上有細白毛而不滑澤。近根有白茸。根紫色。深如莖葉。其苗有風則靜。無風而搖。與赤箭獨活同也。蘇註言葉似芍藥。實如雞子。白毛寸餘者。誤矣。(蘇頌) ●丈人胡使。奈何。皆狀老翁之意。(李時珍)

【白頭翁花】 主治 瘡疾寒熱。白禿頭瘡。

【白頭蚯蚓】 即蚯蚓之處方用名。詳「蚯蚓」條。

【白餘糧】 即禹餘糧之古籍別名。典見和漢藥考。詳「禹餘糧」條。

【白鶴通】 即鶴尿之原名。詳「鶴尿」條。

【白龍】 ●即烏鴉骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏鴉骨」條。●即狗之俗名。詳「狗」條。

【白龍皮】 即天麻之古籍別名。典見綱目。詳「天麻」條。

【白龍沙】 即狗屎中粟之古籍別名。典見綱目。詳「狗屎中粟」條。

【白龍粉】 即玄明粉之古籍別名。典見御藥院。詳「玄明粉」條。

【白龍鬚】 外國名藥。Vince-nium, Morr. of Done. (A-L-I) イヨカツラ (日本) 基本 蘿藦科白微屬。藥用白龍鬚之莖。

產地 生水旁有石處。

形態 白龍鬚為石草類。寄生搜風樹節間之草本。乃樹之餘精。細如櫻絲。直起。無枝葉。

性質 平。無毒。

主治 男子婦人風溼。腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛。不可忍。並宜之。惟虛勞癯瘵不可。

五 蠶 白

五靈白

服。研末。每服一錢。氣弱者七分。無
灰酒下。密室臥。左右貼牀。臥待汗
出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀。見
風。一方得疾淺者。用末三錢。煮餅
煮酒一盞。每日先服。枯梗湯少頃
飲酒二盞。早一服。晚一服。

參攷資料 保壽方云。成化十
二年。虛玄真道士六十七歲。六月
偶得癰瘕。服白花蛇丸。牙齒盡落。
三年扶病入山。得此方。服百日復
舊。壽至百歲乃卒。凡男婦風溼腰
腿痛。先服小續命湯。及溼溼湯。後
乃服此。凡女人產後腰腿痛。先
服四物湯二服。次日服此。若癰瘕
年久。痰老氣微者。服前藥出汗。三
日之後。則日服龍鬚末一分。好酒
下。隔一日服二分。又隔一日服三
分。又隔一日服四分。又隔一日服
五分。又隔一日復從一分起。如前
法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂
之升陽降氣。調髓蒸骨。追風逐邪。
排血安神。但服藥期間。切忌房事
并魚鰾雞羊韭蒜蝦蟹及一切寒
冷動風之物。又不可過食滯厚滋
味。或飲酒及麪食。只宜米粥蔬菜
調養。(李時珍)

【白蘇】

命名 本品色白。斂瘡
方中多用之。故名。

處方用名 白蘇根。

古籍別名 白草(本經)白根。
兔核。昆崙。別錄。貓兒卵(本草
綱目)。鏡草(和漢藥考)

外國名詞 Ampelopsis ser-

janicaefolia, Rgl. (Vitissorjian-
iaefolia, Bge.)

基本 屬葡萄科。藥用白蘇之
根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
白蘇產廣東。以東江博羅等為多
出。實則近道處處有之。

形態 按白蘇為蔓性小灌木
狀之草。本春日宿根生芽。莖長三
四尺。帶紫色。每一葉柄。有一卷鬚
葉。互生。為掌狀複葉。色青綠。成自
三五小葉。其小葉深裂似羽。至夏
葉柄旁出花梗。開五瓣淡黃色小
花。攢簇如繖。果實為碧紫色之漿
果。熱則變白。本品為球圓形之塊
根。大如鵝卵。數塊連結於莖端。塊
根之兩端帶尖。外黑色。內白色。味
苦。而有收斂性者多。縱破之。日本
每以甘藷根偽充白蘇。

採取 二月八月採根。暴乾。
性質 苦。平。無毒。
效能 瀉火。散結。用治瘡瘍藥。
主治 癰腫疔瘡。散結氣。止痛
除熱。目中赤。小兒驚瀉。溫瘧。女子
陰中腫痛。帶下赤白(本經)殺火
毒(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸
家本草論白蘇曰。治發背瘰癧。面
上瘡瘡。疔風痔漏。血痢。刀箭瘡。撲
損。生肌止痛。【明】李時珍本草綱
目論白蘇曰。解狼毒。【明】繆希
雍本草經疏論白蘇曰。白蘇得金
氣。故味苦。平。不應作辛。別錄。甘
其氣微寒。無毒。苦則泄。辛則散。甘
則緩。寒則除熱。故主癰腫疔瘡。散
結止痛。蓋以癰疽皆由榮氣不從。
逆於肉裏所致。女子陰中腫痛。亦
由血分有熱之故。火毒傷肌肉。即
血分有熱。目中赤。亦血熱為病。散
結涼血除熱。則上來諸苦。葺不濟
矣。其治小兒驚瀉。溫瘧。及婦人下
赤白。則雖云驚瀉。屬風熱。溫瘧由
於暑。赤白淋瀝。溼熱。或可通用。然
病各有因。藥各有主。以類推之。或
非其任矣。尚俟後哲詳之。總之為

四二二

疔腫癰疽家要藥。乃確論也。【清】
黃宮繡本草求真論白蘇曰。白蘇
數腫疔瘡。清熱解毒。散結止痛。久
為外科所用要藥。然目赤驚瀉。溫
瘧。陰腫。溼下。淋濁。失精。金瘡。生血。
凡因溼熱溼毒而成者。何一不可
以為內科之用。如金匱聖散丸。用
此以解風氣百疾。藟藟。又書載同
地。則可以治淋濁失精。同白
芩。則可以斂金瘡失血。故曰血飲
同甘草。則可以解狼毒之毒。豈盡
癰腫解毒而已哉。但此味辛。主散
味苦。主降。味甘。主緩。故止可以散
結解熱。若胃氣虛弱。癰疽已潰者。
均非所宜。

配合應用 ●治發背初起。水
調白蘇末塗之(肘後方)亦治疔
瘡初起(聖惠方)

●治一切癰腫。白蘇、赤小豆、苧
草為末。雞子白調塗之(藥性方)
又用白蘇二分。麩蘆一分。為末。酒
和貼之。日三上(陶隱居方)

●治面鼻酒皰。白蘇、白石脂、杏
仁各半兩。為末。雞子清調塗。且洗
(御藥院方)

●治面生粉刺。白蘇二分。杏仁

半分。雞屎白一分。爲末。蜜和雜水
拭面。(肘後方)

⑤ 治凍耳成瘡。白蘇、黃蘗等分
爲末。生油調搽。(談藝錄方)

⑥ 治湯火灼爛。用白蘇末傅之。
(外臺祕要方)

⑦ 治諸物嘔咽。白蘇、白芷等分
爲末。水服二錢。(聖惠方)

⑧ 治錢刺諸嘔。及竹木哽在咽
中。白蘇、半夏泡等分爲末。酒服半
錢。日二服。亦治刺在肉中。(聖惠
方)

⑨ 治胎孕不下。白蘇、生半夏等
分爲末。滴水丸。梧子大。每榆皮湯
下五十丸。(保命方)

⑩ 治風痺筋急。腫痛。屈轉。易常
處。白蘇二分。熟附子一分。爲末。每
酒服半刀圭。日二服。以手中熱行
爲候。十日便覺。忌猪肉冷水。(千
金方)

⑪ 治諸瘡不斂。白蘇、赤蘇、黃蘗
各三錢。炒研。輕粉一錢。用葱白漿
水洗淨。傅之。(瑞竹堂方)

用量 八分至一錢半。

配合宜忌 反烏頭。代赭爲之
使。凡脾胃虛寒。及癰疽已潰。與無

五靈白

實火熱毒者禁用。

參攷資料 ① 根似天門冬。一

株下有十許根。皮赤黑。肉白如芍
藥。不似白芷。莖生枝端有五葉。所
在有之。(蘇恭) ② 今江淮及荆襄

懷孟商齊諸州皆有之。二月生苗。

多在林中作莖。赤莖。葉如小桑。五
月開花。七月結實。根如雞鴨卵。而

長三五枝。同一窠。皮黑肉白。一種
赤蘇。花實功用皆同。但表裏俱赤

爾。(蘇頌) ③ 同地膚子。治淋濁失
精。同白芨。治金瘡失血。同甘草解

狼毒之毒。其辛散之功可知。(張
石頭) ④ 斂。孫氏問經堂輯刻本

草經如此。別本多作蘇。蘇頌按斂
蘇似古今字。然許氏說文云。蘇白

蘇也。或作蘇。毛詩蘇莢於野。陸機
詩疏。蘇似栝樓。葉盛而細。其莖葉

莖以哺牛。除熱爾雅。莖莢。玉篇
莖白蘇也。則從草蘇之字。由來亦

古本經謂一名兔核。蘇恭謂莖生。

枝端有五葉。根似天門冬。一株下
有十許。壽頤按莖生五葉。與陸氏

詩疏似栝樓合。兔核以根形得名。
莖與蘇。兔與莢。莖與核。皆古字通
用。創今本皆作蘇。此古今字。下赤

白。李瀕湖綱目引作帶下赤白。以

爲出於本經。而問經堂本無之。繆

氏經疏無帶字。茲從孫本係於別
錄。又從繆本節帶字。(根和雷)

【白蘇根】即白斂之處方用名。詳

【白斂】條。

【白檀香木】 性質 辛。溫。無
毒。

主治 霍亂。中惡。冷氣。邪鬼。噎
膈。吐食。心腹痛。腎氣痛。風熱腫毒。
殺蟲。療面生黑子。

【白殭蠶】 命名 殭病風死。死
而不朽。其色自白。故
名。

處方用名 炒殭蠶。炒佳蠶。製
天蟲。

古籍別名 死冰。白甘遂。直殭
蠶。殭蠶子。(和漢藥考)

外國名詞 Silk-worm dried
(英)

基本 屬於昆蟲類中之鱗翅
類。當未成蛾之時。因有一種細菌

寄生其體。遂患疾病而死。體亦從
而殭硬之蠶。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
白殭蠶各省均有出。但以江蘇省

常州府爲最。五月新。

形態 按蠶之胃中侵入細菌。
因溼潤過度。細菌之芽胞。發生絲

狀體。蔓延蠶之營養器官。至於穿
破。是時蠶之動作。遂不活潑。食慾

亦即缺損。既而菌之繁殖愈盛。即
絲膜。脂肪。筋肉等。俱被侵襲。貫通

蠶體之皮膚。抽出絲狀體。至是蠶
體內外均爲白色之粉末。(此即

芽胞) 所包圍。堅硬而殭蠶。蠶患
白粉病之細菌。以顯微鏡照之。則


見爲彈丸形之細胞。此菌於蠶頭
眠後侵入。至二眠三眠而使殭蠶。

若大眠始感染者。則於結繭化蛹
後而死。此種殭蠶。如不立即收拾

淨盡。任其放置。則其芽胞飛散空
中。粘附於蠶室。蠶具及桑葉上。不

知者以之飼育蠶兒。細菌繁殖無
已。終必延及所養之蠶。悉數患病

殭斃而後已。故白粉病。爲養蠶家
之大患。



種類 ① 再養者曰原蠶。② 蠶

五蠶 白

之屎曰沙。蠶之皮曰殼。蠶之
蠶曰繭。蠶之蛹曰蟻。蠶之蟻
曰繭。蠶之卵曰殼。蠶之初出
曰紗。蠶之種紙曰遠。

採取 四五月間採收食桑自
死強直者佳。

製法 別錄曰。凡使白蠶。須
生額川平澤。四月取自死者。勿令
中溼。有毒不可用。陶弘景曰。人家
養蠶時。有合箱皆蠶者。即暴燥都
不壞。今見小白似有蠶度者。蘇恭
曰。蠶自強死。其色自白。云以蠶度
誤矣。蘇頌曰。所在養蠶處。有之不
拘早晚。但用白色而條直食桑葉
者佳。用時去絲綿及子炒過。寇宗
奭曰。蠶有三兩番。惟頭番強。最
佳。大而無蛆。雷斅曰。凡使蠶。先
以糯米泔浸一日。待蠶桑涎出。如
蠶涎淨水上。然後漉出。微火焙乾。
以布拭淨黃肉毛并黑口甲。搗篩
如粉。然後入藥。

性質 鹹。辛平。無毒。
效能 祛風。化痰。治驚癇。療喉
痺。用作中風失音癱瘓咽痛及諸
瘡藥。

空治 小兒驚癇。夜啼。去三蟲。

滅黑黯。令人面色好。男子陰痿病。
（本經）女子崩中赤白。產後腹痛。
滅諸瘡癩。為末封丁腫。拔根極
效。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論白蠶曰。治口噤發汗。
同白魚鱈。白等分。治瘡滅癩。瘰
【宋】大明日華諸家本草論白蠶
蠶曰。以七枚為末。酒服。治中風失
音并一切風症。小兒客忤。男子陰
痿。痛。女子帶下。【宋】蘇頌嘉佑圖
經本草論白蠶曰。焙研末。薑汁
調灌。治中風喉痺欲絕。下喉立愈。

【明】李時珍本草綱目論白蠶
曰。散風痰。結核癩。癰頭風。風蟲齒
痛。皮膚風瘡。丹毒作瘰。痰癭。瘰結。
婦人乳汁不通。崩中下血。小兒疳
蝕。鱗體。及金瘡。疔腫。風痔。【明】李
士材本草圖解論白蠶曰。白蠶
蠶。痰之病風者也。治風化痰。散結
行經。所謂因其氣相感。而有意使
之者也。蓋陰除陽明之藥。故又治
諸血病。癰與疔也。咽喉腫病及喉
痺。下咽立效。大能救人。去棉并黑
口炒之。【清】黃宮繡本草求真論
白蠶蠶曰。蠶蠶辛寒微溫。大率多

屬祛風散寒。燥濕化痰。溫行血脈
之品。故書載能入肝。兼入脾胃。以
治中風失音。頭風齒痛。喉痺咽腫。
是皆風寒內入。結而為痰。合薑湯
調工以吐。假其辛熱之力。以除風
痰之害耳。又云能治并毒瘰癧。亦
是風熱燥。得此辛平之味。拔邪
外出。則熱自解。又云能治癩癧。結
核。痰癭。血病。崩中帶下。亦是風木
乘肝。得此辛溫之味。以行血脈。則
血氣安和。而病自消。又云能治小
兒驚疳。癩如鱗甲。亦是胎元氣血
不足。得此辛鹹。煎湯除垢。則鱗自
去。即是諸症以推。則知古之用藥。
悉從物理。勘出。豈有他。譎奇巧於
其中者哉。但此非由外感。而用是
藥。則非治耳。頭蠶色白。條直者良。
米泔浸一日。待桑涎淨出。取起焙
乾。拭淨肉毛口甲。搗用。

近人學說 張山雷曰。蠶蠶乃
蠶之自強而死者。色白乾燥。絕不
腐爛。本經主治小兒驚癇。夜啼。壽
頤按。蠶為食桑之蟲。桑葉稟秋金
之氣。清肅除熱。是其專長。但葉則
輕揚。故能疏泄風熱。而蠶食其葉。
忽然強死。則桑葉清肅之氣未泯。

四二四

而蠶既食之下。使其輕揚之性。
一變而有陰降之意。凡小兒驚癇
夜啼。多屬胎火上。驚熱不通。宜
降宜清。庶乎有身。本經以蠶蠶為
是症主治。其為清肅降火之義。蓋
亦可想而知。別錄以治崩中赤白。
則為下焦熱而設。清降之意。尤
其昭然若揭。可知六朝以上。是藥
主治之大旨。並不以為祛風解表
之品。至唐甄權藥性本草始有治
口噤發汗之說。初不知其何所根
據。然尚未明言其專治風邪。宋蘇
頌圖經。則謂治中風喉痺欲絕。下
喉立愈。於是乃以有疏泄外風之
用。然喉痺終是內熱上竅為患。雖
有兼祛風陽者。而治必以泄熱為
主。疏風為佐。蘇說此藥。仍是清降
之義。亦不當專以散風視之。中風
兩字。必不可泥。惟此藥專治喉痺。
則信而有徵。王氏指迷方。亦謂凡
咽喉腫痛。及喉痺用此。下咽立愈。
無不獲效。丹溪謂取其清化之氣。
治相火。散濁逆結滯之痰。專以泄
降立說。不拘拘於散風一層。是從
物質中推闡得來。實能說明其所
以然之理。惟日華本草。乃有主治

中風失音一句。蓋頤竊謂風邪而至失音。則必為肺氣壅塞使然。法宜開宣。豈清涼過降之藥所可妄試。日華是說。縱曰輕清或能泄風。然涼降豈不重閉塞。自矛盾。必不可通。考唐宋諸家本草。惟日華一書。最是顛倒。且多蕪雜。此公所說。胡可為據。然潔古因之。則曰氣味俱薄。輕浮而升陽中之陽。故能去皮膚之陽云云。豈不與本經別錄主治大相刺謬。刺謬。即乖戾之意。刺音棘。字從東。與針刺之刺從東者不同。瀕湖因之。則曰散風痰頭風。風蟲刺痛。皮膚風痞。風痔云云。乃連舉許多風字。於是逐一變而為風家專藥。一頤案風痔二字。太奇。因風邪而為痔瘡。恐無此症。蓋因下血有腸風之說。而附會以成此奇特之病名耳。且更為附會。曰強毅乃瘧之病風者。豈頤按瘧之所以自強。其理誠不可測。然決非因風而然。弘景謂人家養蠶時。有合箔皆瘧者。不言其病風也。箔。即旋薄之薄。飼蠶古用旋薄。蠶之古書多借用箔字。今按蠶能自強。時或有之。並不以過

風而然。即置之。大風中。亦未見其能烈。瀕湖此說。更屬臆造。古所未聞。然近三百年。凡轉藥物學者。無不襲用瀕湖是說。數見不鮮。一似已為定論。蓋皆耳食之談。雖徐洵溪自命最高。尙復拾其唾餘。謂風邪中。人有氣無形。穿經透絡。愈久愈深。醫蠶感風。而癩反能治風者。因蠶本食桑之蟲。桑能治風。養血。故其性相近。氣亦相感云云。無非肆其臆見。大言欺人。徐氏此說。更以宋金人治外風之說。行為能治久留之風。可謂愈行愈歧。展轉變幻者已。且桑葉輕揚。桑枝通利。骨節。皆不可以養血。惟桑椹色赤而潤。乃為養血補血之品。今乃欲以桑葉當之。亦屬似是而非。至楊玉衡之寒溫條辨。又首推蠶。蠶為時行溫病之聖藥。每合蟬蛻。加入於升降雙解。涼隔神解。此皆方名。即出楊氏本書。三黃石膏諸方中。以為疏泄風熱之用。頗似楊氏獨得之經驗。實則強毅蟬蛻。清微淡泊之藥。何能獨建奇功。祇取其平淡。以欺人眩世。尤為無謂。

五畫 白

配合應用 ①用白蠶。丹砂。牛黃。膽星。全蠍。麝香。鈎藤。犀角。金箔。天竺黃。蟬蛻。治小兒急驚客忤。

②治一切風痰。白蠶。蠶七箇。直者細研。薑汁調灌之。(勝金方)

③治小兒驚風。白蠶。蠶。等分。天雄。尖。附子。尖。各一錢。微泡。為末。每服一字。或半錢。以薑湯調灌之。甚效。(寇氏方)

④治風痰喘嗽。夜不能臥。白蠶。蠶。研。好茶末。各一兩。為末。每用五錢。臥時。泡湯服。(瑞竹堂方)

⑤治酒後咳嗽。白蠶。蠶。研末。每茶服一錢。(怪症奇方)

⑥開關散。治喉氣喉痺。用白蠶。蠶。炒。白礬。牛。生。半。燒。等。分。為。末。每以一錢。用自然薑汁調灌。得吐。頑痰。立效。小兒。加薄荷。生薑。少許。同調。一方。用白梅。肉。和丸。棉。裹。含。之。嚙。汁。也。(存仁方) 又用白蠶。蠶。炒。中。兩。生。甘。草。一。錢。為。末。薑。汁。調。服。涎。出。立。愈。(朱氏集驗方) 又用白蠶。蠶。三七。枚。乳。香。一。分。為。末。每以一錢。燒。燻。入。喉。中。涎。出。即。愈。(聖惠方)

⑦如聖散治急喉風痺。用白蠶。蠶。天南星。等分。生研。為。末。每。服。一。字。薑。汁。調。灌。涎。出。即。愈。後。以。生。薑。汁。過。含。之。又。百。一。選。方。無。南。星。(王氏博濟方)

⑧治撮口。喉風。面黃。赤。氣喘。啼聲。不。出。由。胎。氣。挾。熱。流。毒。心。脾。故。令。舌。強。唇。青。聚。口。發。噤。用。直。蠶。蠶。二。枚。去。背。略。炒。為。末。蜜。調。傅。唇。中。甚。效。(聖惠方)

⑨治大頭風。小兒驚風。並用大。蒜。七。箇。先。燒。紅。地。以。蒜。逐。箇。於。地。上。磨。成。膏。却。以。蠶。蠶。一。兩。去。頭。足。安。蒜。上。梳。覆。一。夜。勿。令。洩。氣。只。取。蠶。研。末。每。用。啞。鼻。口。內。含。水。有。效。(普濟方)

⑩治偏正頭風。并夾頭風。連。兩。太陽。穴。痛。用。白。蠶。蠶。為。末。葱。茶。調。服。方。寸。七。葉。椿。治。頭。風。用。白。蠶。蠶。高。良。薑。等。分。為。末。每。服。一。錢。臨。臥。時。茶。服。日。二。服。(聖惠方)

⑪治卒然頭痛。白蠶。蠶。為。末。每。用。熱。水。下。二。錢。立。瘳。(斗門方)

⑫治牙齒疼痛。白蠶。蠶。直。者。生。薑。同。炒。赤。黃。色。去。薑。為。末。以。皂。角。水。調。擦。之。即。止。(普濟方)

⑬治風蟲牙痛。白直蠶。蠶。炒。蠶。

四二五

五畫 白

脫紙燒等分爲末。擦之良久。以鹽湯漱之。(直指方)

①治瘧疾不止。白礬蠶直者一箇。切作七段。綿裹爲丸。珠砂爲衣。作一服。日未出時。面向東。用桃李枝七寸煎湯吞下。(御藥院方)

②治腹內惡病。詩云。人間龜病不堪言。肚裏生成硬似磚。白死僵。蠶白馬尿。不過時刻軟如綿。神效。(普濟方)

③治面上黑黯。白礬蠶末。水和擦之。(聖惠方)

④治粉滓面黧。令人面色好。用白礬蠶。黑牽牛。細研。等分爲末。如溲豆日用之。(斗門方)

⑤治癩癧風疔。疼痛。白礬蠶焙研。酒服一錢。立瘳。(聖惠方)

⑥治野火丹毒。從背上兩脇起者。礬蠶二七枚。和慎火草搗塗。(楊氏產乳方)

⑦治小兒鱗體。皮膚如蛇皮。鱗甲之狀。由氣血否澀。亦曰胎垢。又曰蛇體。白礬蠶去嘴爲末。煎湯浴之一。加蛇蛻。(保幼大全方)

⑧治小兒久疳。體虛。不食諸病。後天柱骨倒。醫者不識。謂之五軟。

者。用白礬蠶直者炒研。每服半錢。薄荷酒下。名金蠶散。(鄭氏方)

⑨治小兒口疳。通白者。白礬蠶炒黃。拭去黃肉毛。研蜜和傅之。立效。亦治風疔蝕瘡。(小兒宮氣方)

⑩治項上瘰癧。白礬蠶爲末。水服五分。日三服。十日瘳。(外臺秘要方)

⑪治風痔腫痛。發歇不定者。是也。白礬蠶二兩。洗到炒黃爲末。烏梅肉和丸。梧桐子大。每蜜湯空心下五丸妙。(勝金方)

⑫治一切金瘡。及刀斧傷。白礬蠶炒黃研末。傅之。立愈。(斗門方)

⑬治乳汁不通。白礬蠶末二錢。酒服少頃。以脂麻茶一盞投之。梳頭數十遍。奶汁如泉也。(經驗方)

⑭治崩中下血不止。用白礬蠶衣中白魚等分爲末。井華水服之。日二。(千金方)

⑮治重舌木舌。礬蠶爲末。吹之吐痰。甚妙。一方。礬蠶一錢。黃連蜜炒二錢。爲末。搽之。涎出爲妙。(陸氏積德方)

⑯治腸風下血。礬蠶炒去嘴足。烏梅肉焙各一兩。爲末。米糊丸。梧

子大。每服百丸。食前白湯下。日三服。(筆峯雜興方)

用量 一錢半至三錢。
配合宜忌 惡桑螵蛸。桔梗。茯苓。茯神。葶藶。凡無風邪而屬於血虛者禁用。

【白環藤】即羅藤之古籍別名。與見拾遺。詳「羅藤」條。

【白薇】 原名 白薇。
本品根形細微而色潔白。故名。

處方用名 東白薇。白薇根。
古籍別名 春草。(本經) 薇草。白薇。(別錄) 苗。骨美。(本草綱目)

外國名詞 Cynanchum atratum, Ege. (Vincoxicum atratum Morr. et Dono.)

基本 係蘿藦科白薇屬。藥用 Asclepiadaceae 之根。

產地 蘇頌云。陝西諸郡多產之。滁潤遂州亦有之。陳仁山藥物生產辨云。白薇產廣東。北江清遠石潭等處。

形態 按白薇爲多年生草本。莖直立。高一二尺。葉對生。而成橢圓形。有短葉柄。背面有灰色或白

四二六

色毛。夏月葉腋簇生數花。花形小而五瓣。色紫黑。花序爲穗狀。實結莢。長二寸許。其根細而色白。帶黃。似牛膝而短小。

採取 三月八月間採根陰乾。製法 雷斅曰。凡採得以糯米泔汁浸一宿。取出。去麩。於槐砧上細剉。蒸之。從中至已。曬乾。用。李時珍曰。後人惟以酒洗用。

性質 苦。鹹。平。無毒。

效能 瀉血熱。治赤淋。用爲解熱藥。亦爲清涼藥。有減退組織細胞酸化機能之作用。能沈靜血液之循環。用於血熱。骨蒸熱。及不明原因之虛熱皆有效。

主治 暴中風。身熱肢滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘧。(本經) 療傷中淋瀝。下水氣。利陰氣。益精。(別錄)

歷代記載攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論白薇曰。治疔邪風狂。程病。百邪鬼魅。【明】李時珍本草綱目論白薇曰。風溫灼熱多眠。及熱淋遺尿。金瘡出血。【明】經希雅本草經疏論白薇曰。婦人調經種子方中。往往用之。不孕緣於

血少血熱。其源必起於真陰不足。真陰不足則陽勝而內熱。內熱則榮血日枯。是以不孕也。益陰除熱。則血自生旺。故令有孕也。其方以白薇爲君。佐以地黃白芍藥當歸。菴蓉白膠黃燐杜仲山茱萸天麥門冬丹參蜜丸久服可使易孕。凡溫瘧瘴癘久而不解者。必屬陰虛。除瘧邪藥中多加白薇主之。則易瘳。凡治似中風證。除熱藥中亦宜加而用之。良。天行熱病得愈。或愈後陰虛內熱。及餘熱未除者。隨證隨經應投藥中宜加之。【清】黃宮繡本草求真論白薇曰。白薇味苦而鹹。性寒無毒。凡人陰虛火動。則內熱生風。火氣焚灼。身體壯熱。支滿痰湧。忽不知人。與夫汗出血厥。酸痛淋閉。具在。婦人則或廷孔鬱結。神無所依。而見淋露不淨。並血枯熱勝。而見虛煩上嘔。非不用此。苦泄咸降利水。使陰氣自上而下。則熱何由泄乎。是以金匱安中益氣竹皮丸。用此以治婦人產中虛煩嘔逆。千金萎蕤湯用此。以治風溼身熱。汗出身重。又有白薇芍藥湯。以治婦人遺尿。不拘胎前產後。

五 白

皆能補陰平陽。而兼行肺。以清膀胱上源。並非虛寒不禁之可比也。【清】黃元御長沙藥解論白薇曰。白薇涼金泄熱。清肺除煩。金匱竹皮大丸。用之治乳婦中虛煩亂。嘔逆有熱者。倍白薇。以其泄熱而除煩也。又曰。白薇苦寒。長於清金而除煩熱。利水而通淋澀。其諸主治。通鼻塞。止血淋。清膀胱熱澀。斷胎產遺尿。

辨僞 ①鄭肖巖曰。假白薇卽土白薇。條大而硬。色少帶黃。按白薇本經名春生。出陝西及舒滌瀾。遠諸處。其根色黃微白。柔軟可曲者白薇也。色白微黃。堅直易斷者白前也。今此種土白薇。或云卽白前。僞充形質既異。功用懸殊。萬不可誤用也。②曹炳章曰。按白薇產山東者。根皮赤黃色。內白黃色。形類牛膝。實心頭下有細鬚根。短而柔軟可曲。乘雅云。根似牛膝。而細長色黃微白。此卽白薇。與本經之說。迥合。陳嘉謨曰。白前形似牛膝。粗長堅直。空心有節。色黃白色。折之易斷。乃與近時白前形狀亦符。合。本草崇原集說眉批云。蘇州藥肆。誤以白前爲白薇。白薇爲白前。相沿已久。近調查杭甬藥肆。相沿亦與江蘇同。近據鄭君說。福建亦沿此謬習。惟吾紹興幸早經考定。改正。吾望閩蘇甬各藥界。亦當速爲改正。免誤病家。

配合應用 ①治肺實鼻塞。不知香臭。白薇。貝母。款冬花。各一兩。百部二兩。爲末。每服一錢。米飲下。【普濟方】

②治婦人遺尿。不拘胎前產後。白薇。芍藥。各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。亦治血淋熱淋。【千金方】

③治婦人血厥。凡人平居無疾。一旦忽如死人。身不動搖。目閉口噤。或微知人。眩暈移時方寤。此名血厥。亦名鬱冒。出汗過多。血少陽氣獨上。氣塞不行。故身如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多。此證宜服白薇湯。用白薇。當歸。各一兩。人參。半兩。甘草。一錢。牛。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。【本事方】

④治金瘡血出。白薇爲末。貼之。【儒門事親方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血分無熱及中寒便滑。陽氣外越者。禁用。蘆黃芩。大黃。大戟。乾姜。大棗。乾漆。山茱萸。

參攷資料 ①古方多用治婦人。以本草有傷中淋露之語故也。【王好古】 ②微。細也。根細而白也。按爾雅。苗。春草也。薇。音相近。則白薇又音之轉也。別錄以說爲莽草之名。誤矣。【李時珍】 ③白薇苦鹹大寒。其治中風支滿神昏者。陰虛火旺。熱極則生風。火氣燔燥。故心下支滿。痰隨火湧。故神昏不知。益陰除熱則愈也。治邪氣寒熱。痲疹者。熱邪傷人。陰氣不足。則陽獨盛而爲熱。心腎俱虛。則熱收於內。而爲寒。寒熱作則榮氣不能內榮。而肢體痲疼。是熱淫於內。治以鹹寒也。遺溺血淋者。皆熱在下焦所致。益陰除熱自安也。調經種子者。經水先期。乃因血熱不孕。多由陰虛內熱。榮血日枯之故。益陰除熱。則血自生旺。而令能孕矣。【虛朋飛】 ④凡天行熱病後。餘熱未除。及溫瘧瘴癘。久而不解者。必屬陰虛。除瘧邪藥中。類中風除熱藥。

四 二七

中。俱宜加入。(顯松園) ③白薇涼降。清血熱。為女科要藥。溫熱證邪入血分者亦宜用之。何今世不用於女科。而視為升散藥。不問邪之在氣在血。往往亂投。實屬誤人不淺。(王秉衡)

【白薇根】即白薇之處方用名。詳

【白薇】條。

【白薇】即乾薇之古籍別名。典見綱目。詳【乾薇】條。

【白鮮】 命名 本品根皮色白。而氣似羊羶。鮮者羊之羶氣也。故名。

處方用名 白鮮皮。白鮮根。

古籍別名 白羶。白羊鮮。(陶

弘景)地羊鮮。(圖經本草)金雀

兒椒。(日華本草)

外國名詞 Dictamnus albus,

丁(拉丁)

基本 係芸香科白鮮屬。葉用

為 Rutaceae 之根皮。

產地 白鮮處處有之。凡山野

川谷間恒有生長。

形態 按白鮮為亞灌木。莖高二尺許。下部呈木質。葉為羽狀複葉。小葉成卵形。又倒卵形。邊緣有

細鋸齒。嫩葉可食。夏日梢頭開花。如繚狀。花色或白或紫或淡紅。又有白色而耐紅條者。似蜀葵花。子實紫熱如椒。根似小蔓菁。皮黃白而心實。但此植物一面具突起之油腺。香氣頗烈。

採取 四月五月間採之。

性質 苦寒。無毒。

效能 祛風濕熱毒。療疥癬惡瘡。用作風痺要藥。又為瘡毒藥。

主治 頭風黃疸。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。溼痺死肌。不可屈伸。起止行步。(本經)療四肢不安。時行腹中大熱。飲水大呼欲走。小兒驚癇。婦人產後餘痛。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論白鮮皮曰。治一切熱毒惡風。疥癬。赤爛。眉髮脫。胞皮肌

急。肚熱。惡寒。解熱黃酒黃急黃。數

黃勞黃。【宋】大明諸家本草論白

鮮皮曰。通關節。利九竅及血脈。通

小腸水氣。天行時疾。頭痛眼疼。其

花同功。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草

論白鮮皮曰。治嗽肺。【明】繆希雍

本草經疏論白鮮皮曰。白鮮皮稟

天地清燥陰寒之氣。其味苦寒。別

錄兼鹹無毒。苦能泄熱。寒能除熱。故主頭風。有火證。性寒而燥。能除濕熱。故主五癩。欬逆者。實火上衝也。得寒而散。則欬逆止矣。淋瀝及女子陰中腫痛。亦皆下部濕熱。乘虛客腎。與膀胱所致也。溼痺死肌。不可屈伸。起止行步者。地之溼氣。感則害人皮肉筋脈也。脾主四肢。惡溼而喜燥。今為溼邪所干。故四肢不安也。時行腹中大熱。因而飲水大呼欲走者。邪熱盛也。小兒驚癇。亦熱則生風之候也。散溼除熱。蔑不濟矣。婦人產後餘痛。應是血虛而熱。非所宜也。【清】黃宮繡本

草求真論白鮮皮曰。白鮮皮味苦與鹹。性寒無毒。蓋陽明胃土喜燥惡溼。一有邪入。則陽被鬱不伸。而熱生矣。有熱自必有溼。溼淫則熱益盛。而風更乘熱至。相依為害。以致關節不通。九竅不利。見為風瘡疥癬。毛脫。道黃。濕痺便結。溺閉陰腫。欬逆狂叫。飲水種種等症。治宜用此苦泄寒鹹之味。以為開關通竅。俾水行熱除。風息而症自克。平

奈世不察。誤以此為疥癬之外用。其亦未達主治之意耳。然此止可

施於脾胃堅實之人。若使素屬虛寒。切勿妄用。根黃白而心實者。良取皮用。惡桑螵蛸。茯苓。桔梗。葶藶。【清】楊時泰本草述鈞元論白鮮皮曰。白鮮皮味始微鹹。後微辛。後即純苦。苦中復有微辛。本草言其氣寒。夫鹹應入血。今苦寒之性。合之以辛。而入血。宜能清散血中之滯熱矣。肝為藏血之臟。又為風臟。不獨血虛能生風。即血滯者亦然。血之滯也。不獨寒能泣之。即熱而氣傷者亦能泣之。此味寒燥而性善行。故謂其通關節。利九竅及血脈也。

近人學說 張山雷曰。白鮮味苦氣寒。為勝濕除熱之品。而其根莖。入土深遠。故又能宣通肢節。經絡。內達肢腑。外行肌肉。皮膚。上清頭目之風熱。中泄脾胃之濕熱。又能通利機關。宣泄痺著。而燥濕清熱。外治皮毛肌肉濕熱之毒。特其餘事。惟諸痛癢瘡。服之亦大有捷效。乃合清火解毒。祛風勝濕。宜格利殺。蠲痺殺蟲。諸法。萃集為一。以成其全體大用。而後世俗醫。但以爲主治皮毛濕毒疥癬之

醫。但以爲主治皮毛濕毒疥癬之

用。豈足以盡白鮮之功用耶。

配合應用 ●瘰癧弱頑瘰。去下部溼熱。用白鮮、牛膝、石斛、慈苳仁、黃蘗、蒼朮。治下部一切濕熱。多加金銀花。佐以漢防己。

●治鼠瘻已破。出膿血者。白鮮皮。煮汁服一升。當吐若鼠子也。(肘後方)

●治產後中風。人虛不可服他藥者。一物白鮮皮湯。用新汲水三升。煮取一升。溫服。(陳延之小品方) 用量 一錢半至三錢。

應用宜忌 凡下部虛寒者。禁用。惡蠟、蛤、桔梗、茯苓、葶藶。

參攷資料 ●白鮮皮氣寒。善行。味苦性燥。足太陰陽明經去濕熱藥也。兼入手太陰陽明。為諸黃風痺要藥。世醫止癩之瘡科。淺矣。(李時珍) ●白鮮。今俗皆作白蘇皮。按蘇為苦蘇之蘇。古書之白鮮。無從草者。且此藥用根。亦不應稱之為皮。考舊本皆止作白鮮。而瀨湖綱目已有鮮皮之稱。則沿誤亦久。今人但用以治皮毛之病。而忘其通痺宣絡等許多大功。未始不因其多一皮字而誤會也。(張山)

【白鮮皮】即白鮮之處方用名。詳【白鮮】條。

【白鮮根】即白鮮之處方用名。詳【白鮮】條。

【白鷓鴣肉】基本 鷓鴣之羽毛純白者之肉。入藥最佳。性質 鹹平。無毒。

主治 消渴。疥癬。白癩風。癩癬。風風疥癬。解諸藥毒。預解毒毒。

【白歸身】即當歸之處方用名。詳【當歸】條。

【白扁豆】即白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳【白扁豆】條。

【白鰓】即白鰓之古籍別名。典見綱目。詳【白鰓】條。

【白鱈】即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳【鱈魚】條。

【白鵝肉】性質 甘平。無毒。主治 消渴。五臟間熱。

【白鵝膏】即鵝膏之原名。詳【鵝膏】條。

【礬石】即礬石之處方用名。詳【礬石】條。

【白蘗】即白鮮之古籍別名。典見

集註。詳【白鮮】條。

【白藥】即桔梗之古籍別名。典見別錄。詳【桔梗】條。

【白藥子】古籍別名 瓜蒌。(蘇恭)

形態 白藥子為蔓草類之一種。三月生苗。葉似苦苣。四月抽莖。色赤。長似蠶蘆。六月開白花。八月結子。其根皮黃色。可供藥用。

性質 辛溫。無毒。

採取 九月間葉落枝枯時。採根皮。陰乾用。

主治 金瘡生肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白藥子曰。治喉中熱痛不通。咽中常痛腫。【宋】馬志新詳定本草論白藥子曰。解野葛。生金巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之。能止血痛。【宋】大明諸家本草綱目論白藥子曰。消腫毒喉痺。消痰止咳。治瀉。并吐血。【明】李時珍本草綱目論白藥子曰。散火降血。消痰解毒。

參攷資料 白藥子江西。嶺南亦有之。江西出者。葉似烏柏。子如綠豆。至六月變成赤色。治馬熱方

用之。(蘇頌)

【白蟻】古籍別名 野飛蠆。蟻(本草綱目)

產地 出溫熱二帶之陰濕諸地中。

形態 白蟻為害蟲類之一種。舊說以為蟻類。實則與蟻同類。異種。其種別有雌蟻。雄蟻。職蟻。兵蟻之分。大抵雌雄有翅。職兵無翅。而職蟻營巢及蝕蝕梁柱樹木而空其中。洞口以兵蟻守之。雌雄生殖其內。一日可產八萬餘之卵。遺卵後。生翼而飛。變為黑色。尋亦隕死。性畏燂炭。桐油。竹鷄。其所攻蝕之泥。可供藥用。

採取 其泥以松木上者用。

主治 療惡瘡腫毒。同黃丹各炒黑研末。和香油塗之。

【白鯊】即石首魚之古籍別名。典見綱目。詳【石首魚】條。

【白寶】即棋棋子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【棋棋子】條。

【白礬】即明礬之處方用名。詳【明礬】條。

【白蘗】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳【當歸】條。

【白蘗】即當歸之古籍別名。典見爾雅。詳【當歸】條。

五畫 白

【白蠟】即蠟之古籍別名。典見綱目。詳『蠟』條。

【白蠟】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【白蠟】即燕參之古籍別名。典見燕參新研究。詳『燕參』條。

【白蠟】原名 蜜蠟。

【白蠟】命名 蠟猶鼠也。蜂造蜜蠟而皆成蠟。遂名蜜蠟。蜜蠟乃蜜之底也。因產蜜中復由人工煎煉而成白色者故名。

【白蠟】地方用名 蜂白蠟。白蜂蠟。白蜜蠟。

外國名國 Cora Alba 或 Co-ra Chinensis. (拉丁) White Wax 或 Chinese or Insect Wax (英)

產地 陳仁山藥物生產辨云。白蠟四川產者為川蠟。雲南產者為雲蠟。質一樣。藥材用者少。雜貨用者多。造蠟燭者必需之物。北海海口所產之黃蠟。因其蜜質未出。清其味頗香。故易生蟲。故起蠟殼。每殼蟲蛀。

種類 ①蜜蠟未經煎煉而色黃者即黃蠟。詳『黃蠟』條。②蜜蠟

煎煉而成白色者即白蠟。與蟲白蠟不同。詳『蟲白蠟』條。

採取 秋冬間採對蜂蜜煉過。濾入水中。候凝取之。

製法 將黃蠟置火上濾過。投入熱湯中。炸去污物。冷後。入開鍋。置火上炸之。於平滑薄板之正中。釘長釘為柄。用冷水細濕。投入所炸蠟中。則蠟黏於板之兩面。如厚紙。將此取出。則迅速凝結。投入冷水。則蠟脫落成為薄片。如此數次。集取其蠟。四五月間。於日光晒。後後撤水數次。或覆以塗蠟之布。以避塵埃。夜露置星下。其蠟潔白。硬脆易碎。須至嚼之不黏齒。乃入鍋置火上炸。放冷成塊貯之。或將黃蠟入鍋。置火上炸之。投水攪滾。則成碎片。將水換淹數次。瀉取攤布巾上。置盆中。日晒夜露。五六十日。至已成白蠟。再於火上炸之。加酒石英少許。抄去上面浮沫。濾過。放冷。使之凝結。而後收貯。

性質 甘。微溫。無毒。

成分 白蠟為白色或類白色塊。約於六十四度溶化。為無色液。比重〇・九六五至〇・九七五。

主治 蜜蠟主下痢。膿血。補中。續絕傷。金瘡。益氣。不饑。耐老。本經。白蠟療人洩瀉後重。見白膿。補絕傷。利小兒。久服輕身不饑。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白蠟曰。孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升服。立瘥。又主白髮。去消蠟點。乳中。即生黑者。【明】經希雍本草經疏論白蠟曰。蠟石蜜之凝結於底者也。蜜性緩。質柔。故主潤臟腑。經絡。蠟性清。質堅。故能療久痢。洩瀉。後重。下膿血也。甘能益血。補中。溫能通行經脈。故主續絕傷。及金瘡也。中得補則氣自益。故久服能。不飢。輕身。耐老也。男子。女人。大小。內外。皆可施。而別錄獨云。利小兒者。非也。【清】張隱菴本草崇原論白蠟曰。蜂採花心。釀成蜜。蠟。蜜味甘。蠟味淡。稟陽明。太陰土。金之氣。故主補中。益氣。蜜蠟味淡。今日甘者。淡附於甘也。主治下痢。膿血。補中。言蜜蠟得陽明中土之氣。治下痢。膿血。以其能補中也。續絕傷。金瘡。益氣。言蜜蠟得太陰金

精之氣。續金瘡之絕傷。以其能益氣也。補中益氣。故不飢耐老。【清】楊時泰本草述鈞元論白蠟曰。蠟味初嘗味甘。即轉為淡。五味以淡為本。今淡先有甘。是從中土而為。扶危救困之味也。夫淡本以養陰。入中土之甘而返之於元陰。固宜專於脾胃之陰氣。而續其絕傷。蓋此物凝蜜為質。不等於諸淡滲之淡。觀金匱千金治痢二方。蠟蜜同用。可以思矣。至華佗用治痢。不納食。更為能還脾陰之一證。而蠟攀護膜。亦由護其陰氣。得諸礬石之收陰。以奏功也。味者謂其性澆而收脫。不察其矣。【清】黃宮繡本草求真論蜜蠟曰。蠟本有二。一出於蜂。蜜之滓而成。即蜜凝結之初者也。其色有黃有白。一出於樹之蠟。其蠟由木之蟲而得。故又名蟲白蠟。二者氣味不同。性亦微別。如蜜蠟味淡。性平。其蠟本由蜜成。蜜本潤物。即蠟亦潤。故能主潤臟腑。經絡。而有續絕補傷生肌之妙。蠟止存蜜粗粕。其性最澆。故又能止瀉。絕痢。今人以情不投。而曰嚼蠟。即味淡之意也。又凡蕩除下焦之藥。

以此裹丸亦免傷上焦之意。蜜蠟之用如此。至於蟲蠟係生蠟樹所產。蠟樹屬金性最堅強。蟲食其葉而成。味甘氣溫。按甘能益血補中。溫能通經活絡。故膏載能止痛生肌。補虛絕續。與桑椹同有補虛之意。可為外科聖藥。是以鄧贊襄云。汪御章尿血。用白蠟加於涼血滋腎藥中。遂愈。又書云。用此合合散皮。同入長內膏中。神效。又治下疳。服之未成即消。已成即斂。以半兩入鯽魚腹中。煮食。治腸疝神效。則知蟲蠟亦皆生肌活血之味。但蜜蠟味甘淡。清微溫。蟲蠟則味甘不淡而溫也。蜜蠟因有清性。可以止瀉治痢。蟲蠟清性差減。而痢則鮮用也。蜜蠟本於蜂蜜之氣。僅得甘之餘氣而成。而所主在胃。蟲蠟得樹收斂堅強之氣。而所治專在筋肉骨血也。二者微似之中。恍惚之際。不可不知。

五蠶 白皮

油膠。與黃蠟同。處方以白蜂蠟三分。煉猪油七分。共化勻。調至冷為度。

應用宜忌 凡火熱暴痢者。禁用。惡光花齊蛤。

參攷資料 蠟生武都山谷。蜜廬木石間。別錄。蜂先以此為蜜。煎蜜亦得之。初時極香。軟人更煮煉。或少加醋酒。便黃赤。以作褐色為好。今醫家皆用白蠟。但取削之於夏月。暴百日許。自然白也。卒用之。烱內水中。十餘遍。亦白。陶弘景。和松脂。杏仁。棗肉。茯苓等分。合成。食後服五十九丸。便不飢。甄權。古人荒歲多食蠟。以度飢。但合大棗。咀嚼。即易爛也。蘇頌。白蠟乃蜜蠟之精英也。寇宗奭。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性瀋。質堅。故止洩痢。張仲景治痢。有調氣飲。千金方治痢。有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治

老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒。髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之。屢經效驗。乃知本經主下痢。膿血之言。深當府服也。李時珍。蜜甘蠟淡。猶瓜甜蒂苦。見物之樞也。素問以淡為五味本。此味由甘而淡。是返其始也。各臟不足。各取本味以調之。虛甚則取淡以維之。趙其光。

【白鷄】即鷄之白色者。詳【鷄】條。見綱目。詳【玉簪】條。

【白蠟】即合歡皮之處方用名。詳【合歡皮】條。

【白鱧】即鱧魚之白色者。典見動物學大辭典。詳【鱧魚】條。

【白蠟】即錫之古籍別名。典見綱目。詳【錫】條。

【白蟬】即蟬之古籍別名。典見綱目。詳【蟬】條。

【白蠟】即蠟之古籍別名。典見綱目。詳【蠟】條。

【白蠟】即蠟之古籍別名。典見綱目。詳【蠟】條。

【白鷓】 古籍別名。白鷓。閩客。白雉。本草綱目。出江南。

鹽地 出江南。

形態 白鷓為原禽類。雉屬之一種。其形似山鷄。而色白。有黑文如繖。尾長三四尺。體備冠距。紅翅。赤嘴。丹爪。可以養。其肉可供食。與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 補中。解毒。

【白鷓】即鷓鴣之別名。典見動物學大辭典。詳【鷓鴣】條。

【白雉】 命名。本品為鷓之白色者。故名。古籍別名。白甲魚。玉鷓。龍。綱目拾遺。

採取 以全體白色者良。甲白首足仍青者。不堪用。

主治 補虛。勞。愈。痰。火。滋。陰。降。氣。養。血。益。精。

【皮弁草】即酸漿之古籍別名。典見食療本草。詳【酸漿】條。

【皮金紙】 命名。本品紙之有銅箔在上。色如金者。故名。

主治 陰。瘡。癩。傷。凍。瘡。腫。爛。流。

水。以及打傷刀傷。皮赤潮濕。取金面貼之。

【皮硝】即朴硝之俗名。詳「朴硝」條。

【目比也吐】即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「益母草」條。

【矢甲】即蛭蟻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛭蟻」條。

【石三稜】基本 三稜之一種。產地 山西省永濟等處。

形態 莖高尺許。莖綠如薄。四月開白花。根淡黃色。形如釵股。可療疾。

主治 消積氣。

【石上草】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【石上螺螄】俗名 鬼螺螄。(綱目拾遺)

形態 石螺螄為介類之一種。形如海蛤而小。秋冬常在牆脚石隙中。夏月在濕地青苔間。取得可供藥用。

主治 黃疸、疔毒、火丹。並通婦人經閉。

配合應用 ①治黃疸。取石上

螺螄半碗。搗如泥。無灰白酒。頓熱沖服之。(慈航活人書方)

②黃風膏治疔瘡及頭面熱毒。雄黃一兩。釘鏽。白梅肉各五錢。消風散一兩。夏月加鬼螺螄二十個。共研細末。苦鹽酒調勻。貯磁罐內。凡患疔腫癰瘡。用銀針挑破毒頂。敷上此藥。以棉紙蓋定。其毒收斂不走。三日後即愈。(濟世方)

取細長小鬼螺螄搗爛。連殼數患處。露頭出膿。次日即可消。(黃氏醫抄)

③拔疔。鬼螺螄一個。荔枝核三個。煨存性。白梅肉六個。共搗爛成膏。貼之。取出疔根。後用八寶丹收功。(保合堂秘方)

④治鼻疔。花盆中青螺二三個。同鹽搗塗立效。(慈航活人書方)

⑤白火丹有五種。青黃赤白黑。黃白易治。黑丹莫救。青丹十日內可治。赤丹亦然。俱不可見燈火。食鹽物。治法取溪澗中鬼螺螄。酒煮食。即消瘰癧氣。悶者。食數次愈。(集聽方)

⑥三漏丸。治穿鼻漏。通腸漏。瓜藤漏。皆濕熱之邪毒。殺蟲退管。穢

當之劑。土蜂窩煨。鬼螺螄煨。蟬蛻煨。各七錢。乳香。沒藥。川草薢。酥炙。陳棕煨。管仲煨。各五錢。豬鬃。肺甲。煨十個。刺蝟皮。炙一個。雷丸三錢。黃蠟四兩。化開。加麻油六七匙。入藥為丸。桐子大。每服六七十九。空心白湯下。(活人書方)

⑦通經。鬼螺螄十四個。研碎。油紙攤貼臍上。縛定。週時。即能通經。此螺生在陰處。故也。(周氏家寶方)

【石下徐長卿】即徐長卿之古籍別名。典見別錄。詳「徐長卿」條。

【石下新】即石蠶之古籍別名。典見拾遺。詳「石蠶」條。

【石中黃子】產地 生大石中。出禹餘糧處有之。

形態 石中黃子為石類之一種。即禹餘糧未成之黃濁水液。多在石中。其石常潤濕不燥。打破其石。有數十層。始見赤黃溶溶如鷄子黃。在殼中。少頃漸即堅凝如石。一石之中。多則一升。少則數合。採得可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 久服輕身。延年不老。

【石毛蠶】即骨碎補之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「骨碎補」條。

【石打穿】古醫別名 龍芽草。(綱目拾遺)

形態 石打穿為雜草類之一種。春日發苗。高三尺許。大葉中間。夾雜小葉。層層。其色綠。對比相生。中有深紋。邊有鋸齒。闊不盈寸。長更倍之。枝相連抱。起生莖圓。秋開細花。黃色。結實扁小。攪簇形。如針刺。其莖藥可供藥用。

性質 苦辛平。

主治 瘀吐血。理反胃。噎膈。噎疾。喉痺。閃挫損傷。腸風下血。婦人崩中。乳癰。及黃白疽。疔腫。癰疽。疔癰。痔腫。

【石瓜】命名 本品形似瓜。堅如石。故名。

產地 出四川峨眉山諸地。

形態 石瓜為喬木類植物之一種。其樹幹直立。葉肥滑。如冬青狀。似桑。花淡黃色。結實如蠟。長而不圓。殼裂則子見。子液黃色。其質

不圓。殼裂則子見。子液黃色。其質

不圓。殼裂則子見。子液黃色。其質

不圓。殼裂則子見。子液黃色。其質

不圓。殼裂則子見。子液黃色。其質

可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 心痛。煎汁洗風痺。

【石生】即陽起石之古籍別名。與見和漢藥考。詳『陽起石』條。

【石生花】即紅花之由石叻來者。詳『紅花』條。

【石皮】即石葦之一種。三月開花。採作湯浴。可治瘋病。餘詳『石葦』條。

【石合草】產地 生山野間。形態 石合草為莖草類之自生草本。其藤纏木上。四時有葉無花。其葉可供藥用。

性質 甘涼。無毒。

主治 一切惡瘡。解毒。斂瘡口。焙研。溫水調貼。

【石帆】產地 生海底嶼石上。形態 石帆為草類之一種。高尺餘。無葉。根如漆色。至梢上漸軟。作交羅紋。其花離樓相貫。連死則浮水中。得於海邊。得之稀。有見其生者。其根莖可供藥用。

性質 甜鹹平。無毒。

主治 石淋。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

五靈石

本草拾遺論石帆曰。煮汁服。治婦女血結月閉。

【石灰】原名 石灰石。命名 本品石灰石封

密中。經焚燒而製成之灰質。故名。古籍別名 聖灰（本經）希灰（別錄）石聖（陶弘景）銀石（日華本草）白虎磷灰（本草綱目）劫灰。鏡炭。聖石（和漢藥考）外國名詞 Calx（拉丁）Lime（英）Kalk（德）

形態 按純粹之石灰。為純白色之粉末。或成塊。受大熱。亦不熔解。但發猛烈之白光。露置空氣中。則次第風化。注水於塊。則發熱消。化而崩壞。

種類 石灰之種類。大約可分生石灰。風化石灰。水石灰三種。生石灰者。燒石灰石而成石灰。其塊既不使觸受空氣。亦不注以水。乃有強甚之亞兒加里質者。風化石灰。以生石灰露置。使飽受空氣。自然吸收水分及炭酸瓦斯。而為白色之碎粉。水石灰者。以生石灰注水。使成碎粉。一名消石灰。此種之亞兒加里性。視前二者為弱。此外

尚有所謂肥石灰及瘦石灰者。凡石灰中夾雜他物極少者。謂之肥石灰。夾雜他物至百分之十者。謂之瘦石灰。夾雜他物至百分之二十者。無石灰之價值矣。

製法 李時珍曰。今人作窖燒之一層柴或煤炭。一層在下。上累青石。自下發火。層層自焚而散。入藥惟用風化不夾石者良。

性質 辛溫。有毒。

成分 石灰為酸化加爾叟膜（CaO）。消石灰為水酸化加爾叟膜（Ca(OH)₂）。

效能 堅肌肉。殺疥蟲。外治與鹽同用。有腐蝕性。又能彌補創口。凝固血液。故有止血之用。入胃後能中和多量之胃酸。至腸能阻止腸之蠕動。并能使腸之分泌減少。入血後。能助長白血球繁殖。使血液中加多凝固力。故用作腐蝕及止血藥。又為制酸藥。

主治 疽癰疥癩熱氣。惡瘡。癩疾。死肌。墮眉。殺痔蟲。去黑子。息肉（本經）瘰癧骨疽（別錄）

歷代記述攷證 【唐】韓保昇 蜀本草論石灰曰。墮胎。【唐】甄權

藥性本草論石灰曰。治癩疥。蝕惡肉。止金瘡。其良。【宋】大明日華諸家本草論石灰曰。生肌長肉。吐血。白癩。癰疽。癩疵。痔瘻。瘰癧。疣子。婦人粉刺。產後陰不能合。解酒酸。治酒毒。暖水臍。治氣。【明】李時珍

本草綱目論石灰曰。散血定痛。止水瀉血痢。白帶白淫。收脫肛。陰挺。消積聚。結核。貼口。嚼黑髮。【明】繆希雍本草經疏論石灰曰。石灰燒青石而成。故其味辛氣溫。本經不言其毒。觀所主皆不入湯。其為毒可知矣。火氣未散。性能灼物。故主去黑子。息肉及墮眉也。其主疽癰。疥癩。熱氣。惡瘡。癩疾。死肌。髓骨疽者。皆風熱毒氣。浸淫於骨肉皮膚之間。辛溫能散風熱毒氣。且能蝕去惡肉。而生新肌。故為諸瘡腫毒要藥也。辛而燥。故又能殺痔蟲。古方多用合百草團。末治金瘡。殊勝者。以其性能堅物。使不腐壞。且血見石灰則止。而百草又能活血。涼血故也。【清】黃宮繡本草求真

論石灰曰。石灰真壯火之烈。性非溫柔。味非甘緩。其治亦屬肌膚骨髓。瘡癰惡毒。時行熱氣。刀刃金傷。

五 畫 石

疔膠腫毒等症。其藥止屬外敷。而內竟不用及。則知性氣之烈。無是過也。故書所言能治黑子瘰癧肉腫眉者。以其火氣未散。性能灼物故也。書言能主疽瘍疥癩熱氣惡瘡癩痰死肌附骨疽者。以其風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間。得此辛溫以散之也。書言能蝕惡肉而生新肉者。以其燥能化濕。而肉自克生新之意也。書言能治金瘡者。以其性能堅物。使不腐壞。且血見灰即止之意也。但氣味辛烈。其用敷治務必視症酌施。如殺痔蟲等症。則必用以烏頭炮等為丸。敷刀斧傷。則必用以牛髓。以灰納於髓內。陰乾。點疣去根。則必和自糯米蒸透。止瀉痢崩帶陰挺。則必煎水洗取。造酒味酸。則必投以少許。即解。救溺死。則必用化過洗灰下。擻以滲其水。總得燥濕止血散血之味耳。風化自裂者良。煖灰火毒已出。主頑瘡膿水淋漓。斂瘡尤妙。

國外學說 英美學說謂生石

灰化名鈣養。舊名鈣養。即青石燒灰。(青石南名灰石)未見水者。尋常之石灰不淨。故不合於作藥品。

如自大理石、青石、及青石內含有蛤殼等質。均可燒取上等石灰。其在新燒成之石灰。力能化已萎之植物。故可用以糞田。石灰每百分能收水三十一分。且能發熱。足以燃木。以此生石灰遇水即鬆。能變為熟石灰。處方以新石灰入大瓶內。漸加冷水。見化氣。令病人吸之。能去白疔瘡假皮。又謂石灰粉即熟石灰。舊名鈣養。輕養。即新燒石灰用水化成。凡熟石灰之分劑數。共得三十七。凡生石灰遇水即能成此質。其變化時發澀漸之聲。至石灰塊則開裂成乾而白色之粉。此粉與水調和成膏。漸硬如石。可供製造之用。石灰粉之製法。係將新燒石灰置金類鍋中。用汽水傾其上。即發熱。待其霧已散。則蓋其鍋。置旁以待其冷。細察其熱度與空氣之熱度相等。用鐵絲篩篩之。置大口瓶內。以軟木塞密塞之。凡用石灰粉。以新者為佳。緣不耐久存。宜隨用現配。按石灰粉為滅酸藥。惟以乾者內服。不免壞水。須浸水濾淨服之。而後入胃。無傷。能解酸及止津液。兼治胃不消

化瀉瀉等病。第不可過服久服。又可作黑色洗藥。與黃色洗藥。以石灰消化於糖水中。為服法之最便者。如膀胱有石淋。以石灰水治之。為常用之法。又如砂淋或痛風。均可用石灰水。以二兩為一服。如牛乳一杯調和飲之。凡胃中有酸。此水能滅之。又如溺中有凝結之細粒。此水亦能治之。惟溺中結成之粒。入強水內能消化者。則不可服。又如除小兒血瘰。用新石灰洋肥皂等分。和研。另以軟皮剪一穴。小於瘰面。將皮穴蒙在瘰上。而以藥塗所露之瘰面。不久自除。又如耳孔喉際。及男婦前後陰出惡液。宜以石灰水洗之。又如金錢癬爛頭瘰。及惡瘡。用石灰水洗之。亦驗。又如婦人肛門前陰發癢。用石灰水洗之。亦可止。又如白帶。宜用石灰水射入。又如內傷。用石灰水化汽吸入肺內。石灰粉着於皮膚。稍有烙灸之性。與油相和。可為洗藥。治湯火傷。其功用能平胃。治肚酸作瀉。嘔吐不止。孕婦惡阻。內服皆用石灰水。而石灰粉則可用以滅臭。其處方：●用石灰粉一分。汽水酌

四三四

用。先用汽水將石灰粉類洗。不變。淨降散為止。再將石灰粉入瓶。加汽水八十分。搖二三時。候十二點鐘。將上面淨水。拌出。入綠色玻璃瓶。每兩內計有石灰粉八毫七絲。中。凡腸胃因酸作瀉及尿變酸者。宜服。痢症及作嘔吐。用此石灰水和牛奶各半同服。可治。噎食症。用此石灰水一牛奶二和服。服時。忌食別物。小兒舌生白苔及瀉背。便服此石灰水亦佳。●石灰粉一分。水八十分。和勻。候澄清。拌出上面淨水。為度。每兩內計有石灰粉八毫七絲。中。每服半兩至二兩。●石灰粉十兩。清水四斤。中。浸濾。凡患癩者。每日用此水洗一次。●石灰粉一分。煉白糖二分。研末。汽水二十分。共浸半天。間時搖動。候澄清。拌出上面淨水。入瓶。為度。每兩內計有石灰粉一分半。治胃中有酸。食物不消化。瀉瀉。痛風。風濕。砂淋。石淋等症。每服二分六釐至一錢。

配合應用 ●治人落水死。裹石灰。納下部中。水出盡。即活。(千金方)

① 治痰厥氣絕。心頭尚溫者。干
年石灰一合。水一盞。煎滾。去清水。
再用一盞。煎極滾。澄清。瀝之。少頃
痰下自甦。(集玄方)

② 治中風口喎。新石灰醋炒。調
如泥塗之。左塗右。右塗左。立便牽
正。(衍義方)

③ 治風牙腫痛。二年石灰。細辛
等分。研搽即止。(普濟方)

④ 治蟲牙作痛。磁灰。沙糖和塞
孔中。(普濟方)

⑤ 治風蟲牙痛。百年陳石灰爲
末。四兩。蜂蜜三兩。和勻。鹽泥固濟。
火煨一日。研末。擦牙神效。名神仙
失笑散。(張三聖方)

⑥ 治乾霍亂病。千年石灰。沙糖
水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落
盡湯。(摘玄方)

⑦ 治傷寒氣痛。陳石灰炒。五倍
子。山梔子等分爲末。麩和醋調敷
之一夜即消。(醫方摘要方)

⑧ 治產後血渴不煩者。新石灰
一兩。黃升半錢。湯時漿水調服一
錢。名桃花散。(張潔古活法機要
方)

⑨ 治白帶白淫。風化石灰一兩。

五 畫 石

白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每
服二三十丸。空心米飲下。絕妙。並
治水瀉不止。(集玄方)

① 治酒積下痢。石灰五兩。水和
作團。黃泥包。煨一日。去泥爲末。
醋糊丸。梧子大。每服三十丸。薑湯
空心下。(摘玄方)

② 治血痢十年。石灰三升。熬黃。
水一斗。投之。澄清。一服一升。日三
服。(崔如梯方)

③ 治虛冷脫肛。石灰燒熱。故帛
裹坐。冷即易之。(聖惠方)

④ 治產門不閉。產後陰道不閉。
或陰脫出。石灰一斗。熬黃。以水二
斗。投之。澄清。熏(肘後方)

⑤ 治產門生合不閉。用銅錢磨
利割開。以陳石灰傅之。即愈。(通
變方)

⑥ 治腹脇積塊。風化石灰半斤。
瓦器炒極熱。入大黃末一兩。炒紅
取起。入桂末半兩。略燒。入米醋和
成膏。攤絹上貼之。內服消塊藥甚
效。(丹溪心法)

⑦ 治瘧疾寒熱。一日一發。或二
三發。或三日一發。古煨石灰二錢。
頭垢五瓣脂各一錢。研末。飯丸。皂

子大。每服一丸。五更無根水下即
止。(集玄方)

① 治老小暴嗽。石灰一兩。蛤粉
四錢。爲末。蒸餅丸。豌豆大。焙乾。每
服三十丸。溫鹽汁下。(普濟方)

② 治卒暴吐血。石灰於刀頭上
燒研。井水下二錢。(普濟方)

③ 治髮落不止。乃肺有勞熱。癢
痒。用石灰三升。水拌炒。焦。酒三升
浸之。每服三合。常令酒氣相接。則
新髮更生。神驗。(千金方)

④ 染髮烏鬚。礦灰一兩。水化開。
七日。用鉛粉一兩。研勻。好醋調。搽
油紙包一夜。先以皂角水洗淨。乃
用。(集玄方)

⑤ 治身面疣目。苦酒浸石灰六
七日。取汁。頻滴之。自落。(千金方)

⑥ 治面皴疣。水調礦灰一盞。
好糯米全者半。插灰中。半在灰外。
輕宿。米色變如水精。先以針微撥
動。點少許於上。經半日。汁出。別去
藥。不得着水。二日而愈也。(集玄
方)

⑦ 治疣瘡瘡。石灰一兩。用桑
灰淋汁。熬成膏。刺破點之。(普濟
方)

⑧ 治疔瘡。瘰癧。石灰。半夏等分
爲末。傅之。(普濟方)

⑨ 治疔瘡。疔腫。醋調石灰傅之。
(便簡方)

⑩ 治痔瘡。有蟲。古石灰。川烏頭
炮。等分。爲末。燒飯丸。梧子大。每服
二三十丸。白湯下。(潔古活法機
要方)

⑪ 治血風濕瘡。千年陳石灰研
搽。痛即止。疔即愈。神效。(蘭氏方)

⑫ 治火蝕丹毒。醋和石灰塗之。
或同青酸塗之。(摘玄方)

⑬ 治夏月。搗炮。石灰煨一兩。蛤
粉二兩。甘草一兩。研撲之。(集玄
方)

⑭ 治湯火傷灼。年久石灰傅之。
或加油調。(肘後方)

⑮ 治杖瘡。腫痛。新石灰麻油調
搽甚妙。(集簡方)

⑯ 治誤吞金銀。或錢在腹內。不
下。石灰硫黃一。童子大。同研爲末。
酒調服之。(孫用和秘寶方)

參攷資料 ⑰ 古方多用合百
草團末。治金瘡。殊勝。今醫家或以
臘月黃牛膽汁。搜和。納入腔中。風
乾。研用。更勝。古方以諸草雜石灰

五畫 石

熬煎點瘻瘻黑子。丹竈家亦用之。
〔蘇頌〕石灰止血神品也。但不
可着水。着水即爛肉。(李時珍)
〔石灰石〕即石灰之原名。詳『石
灰』條。

〔石竹〕即野麥之古籍別名。典見
日華諸家本草。詳『野麥』條。

〔石竹根〕即抱雞母之別名。詳『
抱雞母』條。

〔石米刺〕即鳥不宿之古籍別名。
典見綱目拾遺。詳『鳥不宿』條。

〔石羊心血〕 主治 真心痛。

〔石羊皮〕 主治 筋骨疼痛。作
褥臥之。

〔石羊血〕 主治 跌打損傷。

〔石羊角〕 主治 頭風。燒紙爲
火罐灸之。

〔石羊骨〕 主治 去風活血。熬
存用。

〔石羊膽〕 產地 出黔粵諸地
之山中。

形態 石羊爲獸類之一種。狀
類家羊而高大。長角厚耳。矯捷非
常。其磨大如小指。瘦後。即破腹取

之。遲則裂散腹中。不可得。可供藥
用。骨皮角。心血。詳見各該條。
採取 採得以絨線繫其一頭。
陰乾。用尤以膽囊掛胸前。急行不
喘者。真入藥良。

主治 肝厥暴絕。酒服一二釐
卽醒。一切目疾。勞眼。背脊。並用人
乳調點。風火眼。防風汁調點。去翳
障如神。水調點。療跌撲損傷。功同
山羊血。

古籍別名 靈芝。(本
草綱目) 巖茸。巖苔。(

日本)
外國名詞 Gyrophora yellow,
Ach. (拉丁) イハダケ イハ
コケ(日本)

基本 係石耳科。石耳屬之。專
產地 生天台。四明。河南。宣州
等處之山巖崖石間。



石耳

形態 石耳爲菜類之多年生
隱花植物。苔草本。呈扁平狀。下面

黑色。生小突起。中央有短柄。附着
於岩石上面。頗平滑。色灰白。形如
地耳。大者成片。或作苔蘚碧色。遠
望如烟。採得晒乾。可供食與藥用。
性質 甘平無毒。

主治 久食益色。至老不改。令
人不飢。大小便少。

歷代記述攷證 〔明〕李時珍
本草綱目論石耳曰。明目益精。

參攷資料 ①韶陽諸洞多石
耳。其生必於青石。當大雪後。石滋
潤。微見日色。則生石耳。大者成片。
如苔蘚碧色。望之如烟。亦微有蒂。
大小朶朶如花。烹之面青紫。如芙
蓉。底黑而皺。每當味爽。擷取。則肥
厚。見日漸薄。亦微化爲水。凡香單
感陰濕之氣。而成。善發冷氣。多和
生薑食。乃良。惟石耳味甘。脾性平
無毒。多食。能潤肌童顏。在木
耳地耳之上。(粵志) ②凡青石以
烈日輻出汗。汗凝結。則成石耳。青
爲木氣。故生耳。若白石。則否。或曰
此亦單之類。厚者。數。薄者。耳。或曰
凡乳牀。必因石脈而出。不自頑石
出。其在陰洞者。爲乳牀。在陽崖者
爲石耳。石耳之美。見稱於伊尹。其

四三六

音曰。漢上石耳。蓋上古已珍之矣。
(南粵瑣記) ③石崖懸耳。氣並靈
芝。久食。色美。益精神。至老不毀。
瀉血脫肛。灰服愈矣。(藥性考) ④
安吉州梅溪石門中。產石耳。食之
止熱。(名勝志)

〔石血〕 即紫佳石之古籍別名。
典見別錄。詳『紫佳石』條。 ⑤即格
石之古籍別名。典見新修本草圖
經。詳『格石』條。

產地 出浙江台州
府境仙居縣一帶。多生
於峻嶺絕壁。海崖高處。

形態 石衣爲菜類之一種。乃
受陰陽雨露之氣。漸漬石上。年久
而生。鮮者翠碧可愛。乾者面黝背
白如雪。可供蔬茹與藥用。

性質 甘寒無毒。

主治 清腸熱。利小便。化痰消
痰。結滯氣。補血明目。益精增髓。

參攷資料 石衣有補血明目
之功。婦人食之。能潔子宮。易於受
胎。男子食之。益精增髓。以作羹餉。客
最爲珍品。煮法。用滾水一碗。投鹽
少許。泡石衣於中。用手細細攪揉。
去其細沙。待軟如綿。其細沙去淨。

色即變紫。如玫瑰。必得鹽水則所銜細沙始能吐盡。再過清水二三次。以雞湯下食。滑脆鮮美。味最香甘。爲山蔬第一。台州六屬惟仙居有之。或云各處深山皆有。非仙居人不能取。故仙居人有專業此爲生者。近則一二百里。遠則數百里。外向深巖危壑。人跡莫能躋攀者。始有此物。其取之法。人則腰兜飛架。衣雞羅鞋。趨捷如猿。採取之則銛鉤鋒鏟輪。入山有祭買路有楮。非仙土人莫能盡其術也。然結侶雖多。其採取只須一人。往不得兩人並採。亦奇也。每年必損人。故其值昂。而貪利者且競趨之。(趙學敏)

【石李】即枳椇子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「枳椇子」條。即烏韭之古籍別名。與見日華諸家本草。詳「烏韭」條。即陸釐之古籍別名。與見廣雅。詳「陸釐」條。【石夾子】即蛤蚧之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蛤蚧」條。

【石決明】**命名** 本品附石而名。生功能去翳明目。故名。

五畫 石

處方用名 生仔石決明。煨石決明。九孔石決明。眞海決。


古籍別名 九孔螺。(日華本草)殼名千里光。(本草綱目)石厥明。朱子房。海蚌殼。懷奇令史。(和漢藥考)

外國名詞 *Palicis Lin*
(拉丁) *Seaeor* 或 *Abalone*
或 *Onnor* (英) *Soobr* (德)

基本 屬單殼類中前鰓類。爲鮑魚之貝殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。石決明即鮑魚壳也。以日本爲多出。廣東瓊州府。水東。北海。平海等均有出。

形態 按石決明介殼單片。無顯形。圓如卵而扁。口闊。外有疣狀之吸水孔十個。大小依次並列。其中四五孔皆開口。且具不整之渦紋。或爲條線。或爲塊。色或褐。或青紫。兼黏有苔類。故外觀一如岩石。不以爲鮑也。其介殼之內面。則帶眞珠色。放光彩。殊美麗。大小不等。隨產地與種類而異。大者可七八寸至一尺。其臍面。在雄爲紫黑色。在雌爲淡褐色。



石決明

採取 採捕之期。普通自大暑至於寒露。獵人於是時各駕小舟。入海中迅速剝取。或用潛水器入水求之。或則以漁具捕集之。入藥用須以七孔九孔者良。

製法 李時珍曰。凡使石決明。須用麵裹煨熟。磨去粗皮。爛搗研細。如麵方堪入藥。雷斅曰。每五兩用鹽半兩。同東流水入磁器內煮一伏時。搗末研粉。再用五花皮地榆。阿膠各十兩。以東流水淘三度。日乾。再研一萬下入藥。服之十兩。永不得食山龜。令人喪目。李時珍曰。今方家只以鹽同東流水煮一伏時。研末水飛用。

性質 鹹平無毒。

效能 潛陽熄風。清熱明目。用作眼科藥。又爲解熱驅風藥。亦有用於留飲跌打等症。

主治 肝肺風熱。背脊內障。骨

蒸勞極。(海藥本草論)

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論石決明曰。明目解障。【宋】寇宗奭本草衍義論石決明曰。水飛。點外障。【明】李時珍本草綱目論石決明曰。通五淋。【明】繆希雍本草經疏論石決明曰。石決明得水中之陰氣以生。故其味鹹。氣應寒無毒。乃足厥陰經藥也。足厥陰開竅於目。目得血而能視。血虛有熱。則青盲赤痛障翳生焉。鹹寒入血除熱。所以能主諸目疾也。鹹寒又能入腎補陰。故久服益精輕身也。研細水飛。主點外障。【清】黃宮繡本草求真論石決明曰。石決明一名千里光。得水中陰氣以生。其形如蚌而扁。味鹹氣寒無毒。入足厥陰肝經。除熱爲磨翳消障之品。綠熱熾則風必生。風生則血破風阻。而障以起。久而固結不解。非不用以鹹寒軟堅。逐瘀清熱。祛風。則熱何能祛乎。故本事眞珠母丸。與龍齒同用。皆取清散肝經積熱也。但此須與養血藥同入。方能取效。且此氣味鹹平。入服消伐過當。不無寒中之弊耳。亦治骨

五蠶石

熱勞熱五淋。研細水飛點目。能消外障。痘後眼翳。可同穀精草等分細研。豬肝鹽食即退。七孔九孔者良。鹽水煮。麩裏煨熟。爲末水飛。惡旋覆。清汪詒庵本草備要論石決明曰。石決明。能平除肺肝風熱。青盲內障。水飛點目。外障。亦治骨蒸勞熱。通五淋。解酒酸。如蚌而扁。惟一片無對。七孔九孔者良。鹽水煮一伏時。或麩裏煨熟。研粉極細。水飛用。惡旋覆花。

配合應用 治羞明怕日。用千里光、黃菊花、甘草各一錢。水煎冷服。(明目集驗方)

治痘後目翳。用石決明火煨研。穀精草各等分。共爲細末。以豬肝鹽食。(鴻飛集方)

治小便便五淋。用石決明去粗皮。研爲末。飛過。熱水服二錢。每日二服。如淋中有軟硬物。即加朽木末五分。(勝金方)

治肝虛目翳。凡氣虛、血虛、肝虛、眼白俱赤。夜如雞啼。生浮翳者。用海蚌殼燒過成灰。木賊焙各等分。爲末。每服三錢。用薑棗同水煎和渣。通口服。每日服二次。(經驗

方)

治青盲雀目。用石決明一兩。燒過存性。外用蒼朮三兩。去皮爲末。每服三錢。以豬肝披開入藥末在內。扎定。砂罐煑熟。以氣薰目。待冷。食肝飲汁。(龍目論方)

治青盲障翳。用石決明、甘菊、生地黃、木賊草、穀精草、羚羊角、人爪、蟬蛻、空青、蜜蒙花、決明子、夜明沙。

解白酒酸。用石決明。不拘多少數個。以火煨過。研爲細末。將酒燙熱。以決明末投入酒內。蓋住一時。取飲之。其味即不酸。

應用宜忌 凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。畏旋覆花。

參攷資料 此是鮫魚甲也。附石生。狀如蛤。惟一片無對。七孔者良。今俗用紫貝全非。(蘇恭)

今嶺南州郡及萊州海邊皆有之。採無時。舊注或以爲紫貝。或以爲鮫魚甲。按紫貝即今蚌。殊非此類。鮫魚乃王莽所嗜者。一邊著石。光明可愛。自是一種。與決明相近也。決明殼大如手。小者如三兩指

大。可以浸水洗眼。七孔九孔者良。十孔者不佳。海人亦啖其肉。(蘇頌)

決明。千里光。以功名也。九孔。以形名也。李時珍。

石肝 產地 出常山。一種。形色如肝。可供藥用。

石芒 即芒之古籍別名。典見拾遺。詳「芒」條。

石見皮 即杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杠板歸」條。

石見穿 草類龍牙草之一種。葉小如艾。花高尺許。可供藥用。

石防風 (綱目) 古籍別名 珊瑚菜。基本 山草類。

形態 產於山石間。複葉青色。似芹。春發嫩苗。作菜辛甘而香。夏開白花。花序如複繖形。根如蒿根而黃。可療疾。

主治 頭風眩痛。

石乳 即鐘乳石之古籍別名。典

四三八

見和漢藥考。詳「鐘乳石」條。

石刺木 產地 南方森林中有出。

形態 石刺木爲木類之木。上寄生。其樹狀似棘。而大。枝上有逆鈎。其根皮可供藥用。

性質 苦平。無毒。主治 殺血。產後餘血結癥。煮汁服。神驗不可言。

石垂 產地 出福州及諸山野。

形態 石垂爲石草類之一種。三月開花。四月結實。其子可供藥用。

石松 命名 本品生於石間。而形似松。故名。古籍別名 日影葛。日蔭蔓。(日本)

外國名詞 Lycopodium clavatum, L. (拉丁) ヒカゲノカゾラ

基本 係石松科石松屬。藥用其根與莖。

產地 生天台山石間。及諸名山皆有出。

形態 石松爲苔草類之多年生隱花植物。莖匍伏地上。處處生根。長至數尺。有許多之枝。分枝爲數條。葉小細長而尖。如鱗片狀。密生莖上。其繁殖器生於直立之特別枝上。孢子熟時。色黃白。自孢子囊出。謂之石松子。



石松

性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 久患風痺。脚膝寒冷。皮膚不仁。氣力衰弱。久服去風血風。遂好顏色。變白不老。浸酒飲良。

參攷資料 石松即玉柏之長者(李時珍)

【石油】

即石腦油之簡稱。詳「石腦油」條。

古籍別名 乳淋。造石。

石淋(綱目) 石淋爲石類之一種。即鐘乳水滴下凝積而生。如笋如柱。日久與上乳相接。即爲鐘乳之柱。

採得可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 酒漬服。與殷孽同功。

【石肺】

形態 石肺爲石類之一種。狀如覆肺。黑澤有赤文。出水即乾。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 癘疾。寒欬。久痿。益氣明目。

【石芝】

原名 石腦芝。
命名 本品石類。以石象芝也。故名。

產地 出海隅山島嶼涯間有積石處。

形態 石芝爲石類。似芝類之一種。其狀如肉。有頭尾四足。似生物。附於大石。赤者如珊瑚。白者如截叻。黑者如澤漆。青者如翠羽。黃者如紫金。皆光明潤徹。大者十餘斤。小者三四斤。採得可供藥用。

主治 諸芝搗末。或化水服。令人輕身。長生不老。

參攷資料 ●石芝。有七明。九光二種。生臨水高山石崖之間。狀如盤盤。不過徑尺。有莖連綴之。起三四寸。有七孔者。名七明。九孔者

名九光。光皆如星。百步內夜見其光。常以秋分伺之。搗服方寸匕。入口則暗然身熱。五味甘美。得靈一斤。長生不老。可以夜視也。五脂之生於有玉之山。玉脊流出。千百年凝而成之。有鳥獸之形色。無常彩。多似玄玉。蒼玉及水精。得而未之。以無心草汁和之。須臾成水。服至二升。長生也。石蜜芝。生少室石戶。中有深谷。不可過。但望見石蜜。從石戶上入石。偃蓋中。良久。輒有一滴。得服一升。長生不老也。石桂芝。生石穴中。有枝條似桂樹。而實石也。高尺許。光明而味辛。(葛洪)

神仙之說。渺茫不知有無。然其所逸之物。則非無也。貴州普定分司界內。有假山。山間有樹根。幹枝條皆石。而中有葉如榴。與茂翠。開花似桂。微黃。嘉靖丁巳。俞事魚希程賦詩記之。以比唐子斷松化石之事。而不知其名。時珍按圖及抱朴子之說。此乃石桂芝也。海邊有石梅。枝幹橫斜。石柏葉如劍。柏亦是石桂之類云。(李時珍)

【石芥】 即石蕊之古籍別名。與見別錄。詳「石蕊」條。

【石花】

原名 乳花。
產地 出鐘乳中。

形態 石花爲石類之一種。即鐘乳滴於石上。迸散。日久積成如花。形如霜雪者。採得可供藥用。

採取 三月九月採之。

性質 甘。溫。無毒。

主治 壯筋骨。助陽道。腰脚風冷。與殷孽同功。

【石花菜】

古籍別名 珊瑚枝。稍粗如雞爪者。名雞脚菜。(綱目) 心太草。凝海菜。天草。(日本)

外國名詞 Callitima caris-

lagnum, Grev. (拉丁) テン

グサ トコロテングサ(日本)

基本 係紅色藻類石花菜屬。

藥用 石花菜之莖。

產地 生海中砂石間。

形態 石花菜爲藻類之隱花植物。紫紅色。纖細分枝。其狀略似灌木。又如珊瑚。高四五寸。枝有細齒。色有紅白。根埋沙中。能再生枝。其粗者形似雞爪。其脂冬令黃薄。凝凍可以成膠。謂之凍瓊脂。製成白炸。即謂之洋菜。

五畫 石



石花菜

性質 甘。鹹。大寒。滑。無毒。
主治 去上焦浮熱。發下部虛寒。

【石芸】

古語別名 螯烈。願啄。
(別錄)

形態 石芸為雜草類之一種。其莖葉可供藥用。

採取 三月五月採之。陰乾用。

性質 甘。無毒。

主治 胃痛淋瀝。寒熱溢血。

【石長生】 命名 本品四時不凋而生岩石之下。故名。

古語別名 丹草。(本經)丹沙草。(綱目)丹陽草。紅茂草。通仙草。陸筋草。(和漢藥考)

外國名詞 Adiantum (拉丁) Maidenhair. (英)

基本 屬水龍骨科藥用其莖葉。
產地 凡高山峻崖之上。川谷

石巖之下。恒多生焉。

形態 石長生為多年生羊齒植物。根莖被黃褐色之茸毛而斜行。葉為重羽狀複葉。長自六七寸至二尺。小葉為扁形。有極淺之二裂。子囊之包被作褐色。尋常多祇一個。葉柄紫黑色。有光澤。若塗漆然。此草四時不凋。春日帶紅色。頗美觀。故多採之以供賞玩。
採取 五六月間。採莖葉。陰乾用。

性質 鹹。微寒。有毒。

效能 用作胎前產後及痰飲之良劑。

主治 寒熱。惡瘡。大熱。辟鬼氣不祥。(本經)下三蟲。(別錄)

用量 八分至錢半。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論石長生曰。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。石長生之葉。入藥用。為和胸豁痰之藥。能緩和惡厲之液而使發汗。收滴微脈管而分利粘液。豁痰而易於咯出。緩解胃寒之欬嗽。喘滿。咽喉痛。傷冷毒諸症。或排除胸臆。對於

胸肺諸症。頗為有效。或云。此草汁中有石鹼質。故能稀釋凝結內臟之膠黏液。滲透惡厲之液。排除咯痰。利小便而開通壅塞。故能治內臟硬結。肝脾腸間膜之癰塞。脾病。心氣病。神思憂鬱病等。子宮衝逆。心動悸。搖掣。以此藥為細末。淡麥酒送下。有效。以此藥為泡劑。加砂糖少許。服。或加於對症之劑。煎服。或以此藥一握。加水四磅。文火煎熬。終加甘草少許。下火。去滓。適宜服用。製為糖漿。用以和胸。有奇效。海州骨碎補鐵脚鳳尾草。其形性效能。大抵與石長生同。又遠西醫方名物考曰。石長生糖漿者。取石長生莖葉到一磅。甘草到二盎斯。砂糖四磅。先以石長生甘草二味。加沸湯適宜。浸一晝夜。濾去滓。溶化砂糖。又濾之。取其濾液。煮稠。使成糖漿。此能開利胸中。緩和急喘。稀黏痰。令其易吐。故治欬嗽。喘急。胃寒。傷冷毒諸症。以沸湯攪和服之。能發汗。利小便。

參攷資料 ●俗中時有采者。方藥不復用。近道亦有。是細細草。葉花紫色。南中多生石巖下。葉似

四四〇

巖而細。如龍鬚。黑如光漆。高尺餘。不與餘草雜也。(陶弘景) ●苗高尺許。五六月採莖葉用。今市人用陸筋草為之。葉似青荷。莖細勁。葉色。今太常用者是也。(蘇恭) ●宋祁益部方物記。長生草。生山陰。地。修莖。葉色似檜而澤。經冬不凋。(李時珍)

【石青】 卽扁青之古籍別名。典見綱目。詳【扁青】條。

【石青子】 ●卽紫金牛之古籍別名。典見植物圖考。詳【紫金牛】條。

●卽平地木之別名。見【平地木】條。

【石亭脂】 ●卽石硫赤之古籍別名。典見圖經本草。詳【石硫赤】條。

●卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳【石硫黃】條。

【石南藥】 命名 本品生於石間。向陽之處。故名。浸酒或代茗飲。能愈頭風。又有風藥之稱。

古語別名 風藥。(本草綱目)

外國名詞 Rhododendron Metornichii, S. et Z. (拉丁)

基本 屬石南科。藥用石南之

葉。產地 別錄曰石南生華陰山谷。寇宗奭曰湖南湖北江西兩浙等處恒多產焉。



(一) 南石

形態 石南為常綠灌木。自生於深山之中。高七八尺。生深山中樹多蟠屈。葉作長橢圓形。長自二三寸至五六寸不等。質厚如革。面甚平滑。背則密生褐色之茸毛。似枇杷葉而小。每當花謝之際。則舊葉與新葉次第交換。夏間。梢頭開鮮艷之淡紅色花。形似喇叭。簇聚而生。至秋則結細小之紅實。



(二) 南石

種類 石南江湖間出者。葉如枇杷。上有細刺。凌冬不凋。春生白花成簇。秋結細紅實。石南關

五 蠶 石

臚間出者。葉似葶草。色青黃有紫點。兩多則併生。長二三寸。根橫細。色紫。無花實。石南能愈頭風。而藥茶亦能治頭風。今南人無所謂藥茶者。恐即石南也。

採取 每年四月間採葉。八月採實。陰乾。

性質 辛苦。平。有毒。

效能 治頭風。療腳弱。用作補腎祛風藥。

主治 養腎氣。內傷陰衰。利筋骨。皮毛。(本經)療腳弱。五臟邪氣。除熱。女子不可久服。令思男。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論石南葉曰。能添腎氣。治軟脚。煩悶。殺蟲。逐諸風。【明】李時珍本草綱目論石南葉曰。浸酒飲。治頭風。【明】李士材本草圖解論石南葉曰。石南葉苦辛平。有毒。主養腎氣。內傷陰衰。利筋骨。皮毛。療脚弱。五臟邪氣。除熱。【明】繆希雍本草經疏論石南葉曰。石南得火金之氣。故其味辛苦。氣平。有毒。然觀其用。當是金勝火微。其性應云有小毒。可升可降。陰中陽也。入

足厥陰。足少陰經。少陰屬水。得金氣之厚者能生水。故主養腎氣。又腎為陰中之陰。肝為陰中之陽。二經俱在下。而主筋骨。二經得所養。則內傷陰衰自起。筋骨皮毛自利。而脚弱自健也。溼熱之邪。留滯五臟。則筋骨皮毛氣血皆為之病矣。邪熱散。則諸病自移。女子久服思男者。以其補腎氣。助陽火耳。【清】黃宮繡本草求真論石南葉曰。石南葉味辛而苦。按辛則有發散之能。苦則具有堅腎之力。若使辛苦而熱。則云婦人久服思男。其理或有信矣。然此止屬辛苦。而性不熱。則治止可以言祛風。而補陰之說。亦止因苦堅腎。而腎不泄。因辛散風。而陰不受其蹂躪也。若竟以為補陰滋水。則理已屬有礙。而向可云補火以思男者乎。若果有之。則凡類於此者。何莫不為思男之品。而附桂之雄。又將置之於何等地位矣。李時珍亦明醫中人。何竟附和而有是言耶。劄庵之闕。宜有其是。【清】汪劄庵本草備要論石南葉曰。石南葉。辛散風。苦堅腎。補內傷。陰衰。利筋骨。皮毛。為治腎虛脚弱。

風痺要藥。婦人不可久服。令思男。【清】吳儀洛本草從新論石南葉曰。石南葉。辛苦平。有毒。散風。堅腎。利筋骨。皮毛。逐諸風。療風痺。脚弱。浸酒飲。治頭風。為末吹鼻。愈小兒通睛。【清】楊時泰本草述鈞元論石南葉曰。石南葉。凌冬不凋。具足水中之陽。觀其花於春。而葉即隨發。是本水中元氣。以暢春木生化之用者。其味辛。是木媾於金。而元氣得以上達也。本經所云。益腎氣。蓋益腎中陰氣。女子久服思男者。乃陰氣盛。則趨陽以化也。夫陰氣盛而趨陽以化。則出地之風化。得其正。而風省平。故是物功用之微。先於治風。在中風證多用之。亦以療熱痺。若不知本於腎氣具足。而趨所生。祇等於辛散之風劑。則失之遠矣。

辨偽 石南葉。以關中葉細者良。近市人恒以石葦偽充之。不可不辨。

配合應用 治腎經虛寒。精滑精冷。用石南葉。巴戟天。肉蓯蓉。瑣陽。鹿茸。枸杞子。山茱萸。

治肝腎為風寒濕所乘。以致

五畫 石

痿弱不能行動。用石南葉、白茯苓、桑葉、何首烏、淫羊藿、巴戟天、五加皮、菟絲子、威靈仙、虎骨。

◎治風痿不合。石南、生地黃、茯苓、黃藥、雌黃等分爲散。日再傳之。(肘後方)

◎治乳石發動。煩熱。石南爲末。新汲水服一錢。(聖濟錄方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡腎虛而陽道數舉。脚弱由於肝腎虛而無風寒濕者。禁用。惡小蘗。五茄皮爲使。

醫名方劑 石南散。治小兒誤跌。或打着頭腦受驚。肝系受風。致瞳人不正。觀東則見西。觀西則見東。(醫濟方)用石南一兩。藜蘆三分。瓜丁五七個。共研細末。每用少許。吹入鼻中。通頂。日三度。並內服牛黃平肝藥。

參攷資料 石南葉狀如枇杷葉之小者。但背無毛。光而不皺。

正二月間開花。冬有二葉。爲花苞。苞既開。中有十五餘花。大小如椿花。甚細碎。每一苞約彈許大。成一穗。一花六葉。一朶有七八穗。淡白綠色。葉末微淡赤色。花既開。萼滿

花。但見藥。不見花。花穠。去年綠葉盡脫落。漸生新葉。治腎衰脚弱最相宜。但京洛、河北、河東、山東頗少。人以此故。少用。湖南、北江、東西二浙。甚多。故多用。南實。今醫家絕可用。◎今東間皆有之。葉如枇杷

葉。方用亦稀。(陶弘景)◎葉似蔞草。凌冬不凋。閩中者葉細爲好。江山以南者葉長大如枇杷葉。無氣味。殊不任用。(蘇恭)◎石南葉。爲療風邪丸散之要藥。今醫家不復用。其貨矣。(蘇恭)◎石南葉。雖能養腎。亦令人陰痿。(甄權)◎終南斜谷有石處甚佳。今市人以石葦爲之誤矣。(韓保昇)◎今南北皆有之。生於石上。株極有高大者。江湖間出者。葉如枇杷。上有小刺。凌冬不凋。春生白花成簇。秋結細紅實。關隴間出者。葉似莽草。青黃色。背有紫點。雨多則併生。長及二三寸。根橫細紫色。無花實。葉至茂密。南北人多移植亭院間。陰翳可愛。不透日氣。入藥以關中葉細者爲良。魏王花木志云。南方石南樹。野

生。二月開花。連着實。實如燕卵。於八月熟。民採取核和魚羹。尤美。今

無用者。(蘇頌)◎古方爲治風痺腎弱要藥。今人絕不知用。識者亦少。蓋由甄氏藥性論。有令陰痿之說也。殊不知服此藥者。能令腎強。嗜慾之人。藉此放恣。以致痿弱。歸咎於藥。良可慨也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊桐草。搗汁浸米。蒸

作爲飯食。必採石南芽爲茶飲。乃去風也。暑月尤宜。楊桐卽南燭也。(李時珍)◎生於石間向陽之處。故名石南。桂陽呼爲風葉。充若及沒酒飲。能愈頭風。故名。按范石湖集云。俯江出錫茶。治頭風。今南人無所謂錫茶者。豈卽此物耶。(李時珍)◎石南。祛風通利。是其所長。補腎之說。未可信也。(吳儀洛)

◎石南。嚴冬不凋。凌霜正赤。性溫益腎可知。(張石頑)◎石南。在本經所云益腎氣者。是益腎中之陰氣。故下卽以內傷陰衰應之。又曰。在中風證多用之。亦用以療熱痺。

(劉潛江)◎石南生華陰山谷。三四月採葉。八月採實。陰乾。(別錄)

【石南實】 主治 殺蟲毒。破積聚。逐風痺。

【石南藤】 卽南藤之古籍別名。與

四四二

見圖經本草。詳「南藤」條。

【石柱參】 產地 遼寧省石柱灣地方產之。

製法 用枳子、故紙、附子、炙草、四味煎水。將參渣透蒸。蒸之以水合色爲度。吹爽焙乾。

【石炭】 命名 本品色焦如炭。故名。

古籍別名 煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。焦石。(本草綱目)

外國名詞 Kohna

產地 南北諸山礦中有出。形體 石炭爲石類之一種。乃太古時代之植物。經地殼之變動。埋入土中。遠歷年歲。次第變化而成石類。有無煙煤、黑煤、褐炭、泥炭之分別。石炭卽黑煤。採得可供藥用。

性質 甘。辛。溫。有毒。主治 婦人血氣痛。及諸瘡毒。金瘡出血。小兒痰癩。

參攷資料 人有中其煤氣毒者。卽昏昏至死。惟飲冷水卽解。(李時珍)◎能去錫擊。制三黃。確砂消石。(獨孤酒)

【石珀】 卽琥珀之古籍別名。與見

晉公炮炙論詳琥珀條。

【石珊瑚】即野薔薇子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳野薔薇子條。

【石砂】即丹砂之古籍別名。典見唐本草。詳丹砂條。

【石胡荽】古籍別名。鷄不食草。食性本草。雞腸草。千金翼。天胡荽。野園荽。(本草綱目)

外國名詞 Myriogynne mt. Hita, Ioga (拉丁) トキンサウ

基本 係菊科石胡荽屬。藥用石胡荽之莖葉。

產地 生原野陰濕諸地。及石縫間。



石胡荽

形態 石胡荽爲石草類之多。年生草本。莖高二三寸。恒多平臥地上。隨處生根。冬根簇生。莖葉本狹未廣。有鋸齒三五枚。夏日葉

腋生無數細花。相集成頭狀。花作綠色。

性質 辛寒無毒。

主治 通鼻氣。利九竅。吐風痰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論石胡荽曰。去目昏。按塞鼻中。腎膜自落。【唐】孟詵食療

本草論石胡荽曰。療痔疾。【明】李時珍本草綱目論石胡荽曰。解毒

明目。散目赤腫。雲昏耳聾。頭痛腦酸。治痰癆胸膈。鼻塞不通。塞鼻。瘰

癧。又散瘡腫。

參攷資料 ①石胡荽氣味辛

溫。汁制砒石雄黃。(李時珍) ②鷄

不食草。氣溫而升。味辛而散。陽也。

能通於天。頭與肺皆天也。故能上

達頭腦。而治頂痛。目病。通鼻氣。而

落瘰癧。內達肺經。而治胸膈痰癆。

散瘡腫。其除腎之功。尤顯神妙。按

倪惟德原機啓微集云。治目昏。噉

鼻。碧雲散。川鷄不食草。解毒爲君。

青黛去熱爲使。川芎之辛。破留除

邪爲使。升透之藥也。大抵如開網

蓋法。常欲邪毒不閉。令有出路。然

力小而銳。宜常嗜以聚其力。凡目

中諸病。皆可用之。生按更神。王鳳

集要詩云。赤眼之餘。腎怒生。草中鷄不食爲名。塞於鼻內。類類換。三日之間。復舊明。(李時珍)

【石苣】即白苣之古籍別名。典見綱目。詳白苣條。

【石英】即水晶之古籍別名。典見綱目。詳水晶條。

【石苔】即烏韭之古籍別名。典見唐本草。詳烏韭條。

【石風丹】基本 石風丹爲雜

草類之一種。可供藥

用。

產地 生石上。出雲南齊蒙化

府境。

主治 療瘡毒。

命名 本品頭中有

石狀小塊二顆。故名

【石首魚】石首魚(嶺表錄)

古籍別名 石頭魚(嶺表錄)

鮑魚(拾遺錄) 江魚(浙志) 黃花

魚(臨海志) 乾者名鰲魚。鱸魚。白

鰲(本草綱目)

外國名詞 Sciaenops ocellatus

Bleeker 或 Corvula schlegelii

(拉丁) アカグチ(日本)

基本 係脊樞動物魚類。屬硬

骨科。

產地 多棲於溫帶下之近海

處。凡淺海泥底之鹹水中。恒有出

惟產於寧波者爲佳。

形態 石首魚體側扁。爲紡錘狀。頭部不大。口闊。下顎突出。牙齒尖細。脊鰭有二棘。廿八刺。臀鰭有二棘。七刺。全體被細鱗。胸鰭略與臀鰭同。背首灰微帶青。腹部淡白。略帶金黃色。頭部亦有金光。去其頭頂之表皮。即見頭蓋骨。上面有斜方形樹格。頭蓋骨內。又有瑩潔如玉之骨二枚。堅如石。大如豆。故名石首。或謂其石爲感受聲浪起振動。以代聽覺之用。體長約二尺許。或七八寸。性好肉食。產卵在春夏。肉厚。鱗性甚黏。曝乾爲鰲。



石首魚

採取 以四月小滿爲頭水。五月端午爲二水。六月初爲三水。乾

五畫 石

製燄者。頭水者佳。二水勝於三水。八月捕者為桂花魚。臘月捕者為雪亮。初春捕者。稱曰報春。

性質 甘平無毒。

主治 開胃益氣。

效能 調中和胃。用作消化健胃藥。

歷代記述攷證 【明】程希雍

本草經疏論石首魚曰。石首魚味甘氣平。無毒能開胃。胃氣開則飲食增。五臟皆得所養。而氣自益矣。乾養其性疎利。故能入腸胃。寬中消食。止痢。頭中石堅重下走。故主下石淋也。凡泄痢腹痛。與夫腸胃諸疾。最忌油膩魚腥。惟白鯊不忌。蓋鯊飲鹹水。而性平不熱。且無脂膩。不惟少熱中之患。更有消食理脾實腸胃之功也。【清】王士雄隨息居飲食譜論石首魚曰。石首魚甘溫開胃。補氣填精。以大而色黃如金者佳。多食發瘡助熱。病人忌之。醃而腊之為白鯊。性即平和。與病無忌。且能消瓜成水。愈腹脹瀉痢。以之煨肉味甚美。太平所產。中伏時一日曬成。尾彎色亮味淡而香者最良。名松門台鯊。密收勿受

風濕。可以久藏。煮食開胃醒脾。補虛活血。為病人產後食養之珍。按

古人以乾魚為鮑魚。禮記謂之鮑。諸魚皆可為之。內經治血枯用之。後人聚訟紛紛。迄無定指。愚謂台

鯊雖生嚼不壓。性兼通補。入藥宜用此為是。其際甚薄。不為珍品。但可熬膠耳。

【石首魚頭中石鮓】 主治 水磨服。亦燒灰飲服。日三。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論石首魚頭中石曰。研末或燒研水服。主淋瀝。小便不通。煮汁服解疝毒野菌毒。蠱毒。

【石首魚鯊】 原名 白鯊。 主治 炙食能消瓜成水。治禁下痢。及卒腹脹不消。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論石首魚鯊曰。痢疾最忌油膩生冷。惟白鯊宜食。此說與本草主下痢相合。蓋鯊飲鹹水而性不熱。且無脂膩。故無熱中之患。而消食理腸胃也。

【石香薷】 原名 石香薷。 本品為香薷之產於山石中者。故名。 古籍別名 石蘇。【本草綱目】 性質 辛香溫無毒。 主治 調中溫胃。止霍亂吐瀉。心腹脹滿。腹痛腸鳴。

歷代記述攷證 【唐】蘇炳四

聲本草論石香薷曰。功比香薷更勝。【明】李時珍本草綱目論石香薷曰。制硫磺。

參攷資料 ●石香薷生對郡陵榮資。甯州及南中諸處。生山巖石縫中。二月八月採苗。莖花實俱可用。【馬志】●石香薷處處有之。但山中隨水附崖處。或有之。不必山巖石縫也。九十月尚有花。【寇宗奭】●香薷石香薷一物也。但隨所生而名爾。生平地者葉大。厓石者葉細。可通用之。【李時珍】

【石凍春】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。 【石栗】即栗之古籍別名。典見綱目。詳「栗」條。 【石桂】即莽草之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「莽草」條。

【石桂魚】即鹹魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鹹魚」條。

【石涅】即黑石脂之古籍別名。典見綱目。詳「黑石脂」條。

【石珠】即青琅玕之古籍別名。典見別錄。詳「青琅玕」條。

【石罈】 產地 出山中。 形態 石罈為石類之一種。可作刀劍如銅鐵。亦可作針。供藥用。 主治 刺百病癰腫。

【石笋】即石牀之古籍別名。典見綱目。詳「石牀」條。

【石納爛】即枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枸杞子」條。

【石者】 產地 生石間。 形態 石者為石類之一種。色赤如鐵脂。可供藥用。 採取 四月採之。

性質 甘無毒。 主治 欬嗽氣逆。

【石脂】 石類。有青黃黑。白。赤。各色。詳各該條。

【石茵陳】即茵陳蒿之古籍別名。典見大明本草。詳「茵陳蒿」條。

【石香薷】即石香薷之原名。詳「石香薷」條。

【石香薷】即石香薷之原名。詳「石香薷」條。

【石香薷】即石香薷之原名。詳「石香薷」條。

【石龍】即石龍芮之古籍別名。與見別錄。詳「石龍芮」條。

【石脂水】即石脂油之古籍別名。與見西陽雜俎。詳「石脂油」條。

【石荊】形態 石荊為水草類之一種。狀似荊而小。其莖葉可供藥用。

主治 燒灰淋汁。浴頭。生髮令長。

【石荊芥】即荊芥之古籍別名。與見綱目。詳「荊芥」條。

【石馬鬣】即馬非之古籍別名。與見綱目。詳「馬非」條。

【石骨】產地 出山中。形態 石骨為石類之一種。即鐘乳汁之細流凝結如骨。堅潤如玉者。亦可供藥用。

主治 服之力勝鐘乳。

【石堊】即石灰之古籍別名。與見本草集註。詳「石灰」條。

【石將軍】(綱目拾遺) 古籍別名 紫羅球。

產地 出浙江西湖鳳凰山。及諸高山石上多有之。

形態 石將軍為石草類之一種。立夏後生苗。葉類龍芽草略小。

五 壹 石

對節生葉。又如榭木。高不過尺。方莖紫色。秋開細紫花成球。上有紫色圓球。根本勁細似六月雪。可供藥用。

性質 淡平。

主治 活血疏風。消癥散腫。療一切跌打損傷。血瘀不散。搗汁服之。或以水酒同煎。風寒閉塞。或癰疽初起。服之俱效。

【石斛】命名 本品莖狀如金。故古有金銀石斛之稱。

處方用名 米心石斛。川石斛。元金銀。鐵皮石斛。扁石斛。原扁石斛。預石斛。金石斛。鮮扁石斛。蟹山石斛。金銀斛。鮮石斛。風斗石斛。原金銀。鮮金石斛。真風斗。

古籍別名 石薺。杜蘭。(別錄) 金銀。(本草綱目) 禁生。林蘭。(本經) 麥斛。石薺草。百丈鬚。長生草。千年潤。雀牌斛。鱗鯉甲。(和漢藥考)

外國名詞 Dendrobium moniforme, Sw. (拉丁)

基本 屬蘭科。藥用石斛之莖幹。

產地 陳仁山藥物生產辨云。金銀石斛產越南東京為多出。以宜安為上。河南次之。廣西南寧亦有出。但不多。藥商取名黃草。用意在於減納稅餉。實非黃草也。

形態 按石斛為多年生草本。自生於高山濕潤之巖石。或古木上。莖色青綠。高三四寸至六七寸。每離寸許。即有一節。稍似木賊。但內部充實。每節生葉。葉為披針形。具並行脈。厚而有光澤。初夏之際。每一梢端。開花兩朵。色有淡紅與白色二種。有不整齊之花被。花後亦能結實。似蘭莢而小。

種類 ①木斛者。生樸木上。其莖至虛長。大而色淺。②麥斛者。似大麥累累相連。頭生一葉而性冷。③雀牌斛者。莖大如雀髀。葉在莖頭。

種植 恒用砂石栽於盆中。或以物盛掛屋下。類澆以水。經年不死。俗稱千年潤。



石 斛

採取 七八月採莖陰乾。

製法 雷欒曰。凡使石斛。須去根頭。用酒沒一宿。曬乾。以酥拌蒸之。從已至西。徐徐焙乾。用入補藥乃效。

性質 甘平。無毒。

成分 主要素為 Triandrin C₁₈H₂₆O₆。餘為糖灰。

效能 養胃陰。除虛熱。在胃略能促進胃液。助消化之不足。至腸能激腸之蠕動。且能制止其吸收力。故能使積滯排出。同時亦能使體溫下降三度餘。乃用作健胃強壯藥。

主治 傷中除痺。下氣。補五臟。虛勞羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。(本經) 補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮府邪熱。瘧氣。脚膝疼。冷痺。弱。定志除驚。輕身延年。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論石斛曰。益氣除熱。治男子腰脚軟弱。健陽。逐皮肌風痺。骨中久疼。補腎益力。【宋】大明日華諸家本草論石斛曰。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。【明】李時珍本草綱

目曰。石斛。味甘。平。無毒。主傷中除痺。下氣。補五臟。虛勞羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。本經。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮府邪熱。瘧氣。脚膝疼。冷痺。弱。定志除驚。輕身延年。別錄。

甄權藥性本草論石斛曰。益氣除熱。治男子腰脚軟弱。健陽。逐皮肌風痺。骨中久疼。補腎益力。大明日華諸家本草論石斛曰。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。李時珍本草綱

目曰。石斛。味甘。平。無毒。主傷中除痺。下氣。補五臟。虛勞羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。本經。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮府邪熱。瘧氣。脚膝疼。冷痺。弱。定志除驚。輕身延年。別錄。

甄權藥性本草論石斛曰。益氣除熱。治男子腰脚軟弱。健陽。逐皮肌風痺。骨中久疼。補腎益力。大明日華諸家本草論石斛曰。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。李時珍本草綱

四 四 五

五靈石

目論石斛曰。治發熱自汗。癰疽。排膿內基。【明】繆希雍本草經疏論石斛曰。石斛。稟土中沖陽之氣。兼感春之和氣以生。故其味甘平而無毒。氣薄味厚。陽中陰也。入足陽明。足少陰。亦入手少陰。甘能除熱。甘能助脾。甘能益血。平能下氣。味厚則能益陰。氣故主傷中下氣。補五臟虛勞羸瘦。強陰益精。補內經不足。平胃氣。長肌肉。久服厚腸胃。輕身延年。定志除驚者。以其入胃入腎入心脾。補益四經。則四經所生病皆得治療。蓋皆益脾胃益腎益心之功力也。又主除痺逐肌。腐邪熱。癰氣。脚膝疼。冷痺弱。者。能除脾胃二經之濕故也。【清】汪詒庵本草備要論石斛曰。石斛甘淡入脾。而除虛熱。鹹平入腎。而清元氣。益精。強陰。暖水臟。平胃氣。補虛勞。壯筋骨。療風痺。脚弱。發熱自汗。夢遺滑精。囊澀餘瀝。光澤如金。銀。脫短而中實。生石上者良。名金銀石斛。長而虛者名水斛。不堪用。去頭根。酒浸用。【清】黃宮繡本草求真論石斛曰。石斛生於石上。體瘦不肥。色黃如金。旁枝如銀。甘淡

微苦鹹平。故能入脾而除虛熱。入腎而清元氣。及能堅筋骨。強腰膝。凡骨痿痺弱。囊澀精小。小便餘瀝。者最宜。以其本生於石。體堅質硬。故能補虛弱。強筋助骨也。但形瘦無汁。味淡難出。非經久熬。氣味莫泄。故止可入平劑。以治虛熱。補性雖有。亦惟在人。諒病輕重。於用可耳。【清】張隱菴本草原論石斛曰。石斛生於石上。得水長生。是稟水石之專精。而補腎。味甘色黃。不假土力。是奪中土之氣化而補脾。斛乃量名。主出入。治傷中者。運行其中土也。除痺者。除皮脈肉筋骨五臟外合之痺證也。夫治傷中則下氣。言中氣調和。則邪氣自下矣。除痺。則補五臟虛勞羸瘦。言邪氣散除。則正氣強盛矣。脾為陰中之至陰。故曰強陰。腎主藏精。故曰益精。久服則土氣運行。水精四布。故厚腸胃。本經上品。多主除痺。不曰風寒濕。而但曰痺者。乃五臟外合之痺也。蓋皮者肺之合。脈者心之合。肉者脾之合。筋者肝之合。骨者腎之合。故除痺。即所以治五臟之虛勞羸瘦。是攻邪之中。而有補

益之妙。用治傷中。即所以下氣。是補益之中。而兼有攻邪之神理也。【清】陳修園本草經讀論石斛曰。痺者。脾病也。風寒濕三氣。而脾先受之。石斛甘能補脾。故能除痺。上氣肺病也。火氣上逆。則為氣喘。石斛平能清肺。故能下氣。五臟皆屬於陰。而脾名至陰。為五臟之主。石斛補脾。而陰及五臟。則五臟之虛勞自復。而肌肉之消瘦自生矣。陰者宗筋也。精足則陰自強。精者陰氣之精華也。納穀多則精自儲也。【清】吳儀洛本草從新論石斛曰。石斛甘淡。微鹹微寒。平胃氣。除虛熱。安神定驚。療風痺脚弱。自汗發熱。囊澀餘瀝。

辨偽 張山雷曰。石斛清熱降氣。專泄腸胃虛火。而味亦不薄。故為益胃強陰之品。古人惟以色黃如金。莖壯如銀者為貴。又曰川產最良。然今市肆中之所謂川斛。則細小乾枯。最為賤品。金銀斛則軀幹較偉。色澤鮮明。能清虛熱。而養育脾胃陰液者。以此為佳。但市廛中欲其美觀。每斷為寸許。而以砂土同炒。則空罌而尤其壯觀。要之

四四六

一經炒透。便成枯槁。非特無以養陰。且恐不能清熱。形猶是而實已非。市僧伎倆。殊為可惡。所以吾吳醫家。每用其原枝不炒者。劈開先煎。庶得真味。且此物最耐久煮。一味濃煎始有效力。若雜入羣藥中。僅煮沸三四十分鐘。其味尚未出也。若脾胃火熾。津液已耗。舌質深赤乾燥。或焦黑嗜飲者。必須鮮解清熱生津。力甚尤偉。必以皮色深綠。質地堅實。生嚼之。脂膏黏舌。味厚微甘者為上品。名鐵皮鮮斛。價亦較貴。其賤者。皮作淡黃色。嚼之無脂。味亦淡薄。已不適用。且更有東瀛出品。氣味更淡。則完全無效矣。若老人虛人。胃液不足。而不宜大寒者。則發山石斛為佳。名醫別錄及范子計然。皆言石斛出六安。可知古時亦甚重之。其形甚細。而色作金黃。望之潤澤。嚼之味厚者。斯為上品。若晦黯枯槁。亦不足貴。而近時更有所謂綠毛乾風斛者。色作淡綠。質柔而軟。望之隱隱有綠色茸毛。亦產霍山。則僅顧其極嫩之尖。故乾之而不槁。嚼之且無渣滓。味濃厚而又富脂膏。養胃益

液。即無清涼凝滯之慮。確爲無上妙品。但最佳者。市肆中亦不可多得。且價貴兼金。非貧富之所可與共。又有鮮金石斛。支幹較偉。即金銀斛之新採於山崖者。浙省金處諸山多有之。

近人學說

徐究仁曰。石斛本經列爲上品。以其狀如金銀之股。故有金銀石斛之稱。荊州記云。來陽龍石山多石斛。精好如金銀是矣。神農本草載甘平無毒。補五臟虛勞。強陰益精。別錄平胃氣。長肌肉。甄權益氣除熱。總之石斛功能清胃生津。胃腎虛熱者最宜。按蘇沈良方。石斛夜光丸。專治目光不斂。神水散。張氏醫通石斛清胃湯。用治痲後熱。嘔吐不食。王孟英之挽脫湯。用石斛以救胃氣垂絕之證。蓋石斛專滋肺胃之氣。液氣液充旺。腎水自生。故以上諸證。皆主之也。然考古籍。雜證門中。姑置不論。而感症門之用石斛者。未有若近世之多。溯經氏經疏而詳。至葉天士王孟英輩。竟以石斛爲家常茶飯。一如張會卿之用熱地。幾於無方無之。流風於今不

五畫 石

衰。豈石斛之功。時於古而顯於今耶。抑今能用。而古人不能用耶。是殆有說焉。蓋仲景傷寒。重在救陽。葉氏溫病。重在救陰。自金劉河間倡議溫病以還。率皆混治而無辨。直至明清之際。頗知傷寒溫病之有別。西昌喻氏。大聲疾呼。謂胃爲元氣之海。消夫葉薛王吳諸賢輩。出溫熱之症。乃大白於天下。而石斛之用。於是乎棄矣。夫肺胃爲溫邪必犯之地。熱鬱灼津。胃液本易被劫。况復南人陰虛。溫邪爲多。如欲清胃救津。涌疹滋瘡。自非用石斛之甘滋輕靈不爲功。是蓋石斛之知遇時代也。然有不可徒恃石斛爲治者。若溫邪延久。傷及下焦。劫燥真陰。則鞠通吳氏。有三甲復脈大小定風珠等法。原爲挽救真陰而設。石斛未免嫌其輕浮耳。蓋真陰非氣液之謂。救真陰者宜濃厚。救氣液者宜清淡。苟以濃厚救氣液。則轉滋轉燥。而固邪愈深。以清淡救真陰。則杯水車薪。勢必不濟。抑有不可濫用石斛者。如溫溫尙未化燥。每見口乾欲飲。苔膩皮乾。理宜辛淡之法。若誤用石斛。則

舌苔立轉黑燥。濕退熱蒸。漸入昏譫者有之。是又不可不詳審者也。曹拙巢曰。石斛之用。全在滋養胃陰。除此別無他用。無奈世之庸俗。以之生津退熱。溫病初起。遭此抑遏。邪無從出。動輒白瘡。陽明腑病。火鬱於內。清之攻之。宜迅宜竣。甘涼清滋。於事何補。此葉桂吳瑭所以爲仲景罪人也。孫鳳翔曰。鮮石斛煎服。味已極淡。乾者無論金銀石斛。市中皆用熱砂湯黃發空。質如黍苗。雖煎百沸。亦無氣味。且碾之不碎。亦不能入丸散。耳環石斛極細小。尤爲無用。章次公曰。自神農本經直至明代。皆視石斛爲滋腎益陰之藥。無用之爲退熱者。自葉天士倡伏氣溫病之說。羣以麻桂能傷陰劫津。必生津清溫。乃爲正治。於是石斛遂爲溫病之退熱藥。夫溫病正當體溫亢盛。吾人不用石斛。知母以堵絕溫之來路。乃以此滋原之石斛。膠阻其邪。熱雖稍殺。然而纏綿時日。動成勞瘵。甚則致死。不寧惟是尋常之風溫咳嗽。蘇醫一見口渴痰厚。誤用石斛。造成肺炎。吾人遇之屢矣。

嗚呼。非謂天清也哉。蘇醫一見舌尖紅舌無胎。乃恣用石斛。抑知溫病初起。據此而用石斛。用愈多而舌愈絳者。自癰未必定係釀成。然溫病無用石斛必要。可斷言也。然則石斛我人將如何而用之。曰。熱性病退後。津液未復。此可用之。陰虛之喉症。可用之。病人臟無他病。口乾便用。所謂胃液不足者。可用之。總之。石斛爲滋養強壯藥。退熱藥。

配合應用

益胃強四肢。用石斛。麥門冬。白茯苓。橘皮。甘草。
理傷中補五臟虛勞羸瘦。及強陰益精。用石斛。麥門冬。五味子。人參。炙甘草。白芍藥。枸杞。牛膝。杜仲。
下氣。用石斛。枇杷葉。麥門冬。橘皮。
主諸瘧。及逐皮膚邪熱。拂氣。冷痺弱。用石斛。木瓜。牛膝。桑白皮。石南葉。白蘞皮。黃蘗。茯苓。菖蒲。
夏月一味酒蒸泡湯代茶。頓健足力。
治睫毛倒入。用石斛。川芎等分爲末。口內含水。隨左右噴鼻。日

四四七

二次。(補珍方)

②治飛蟲入耳。用石斛數條。去根。如筒子一邊。入耳中。四畔以蠟封閉。用火燒石斛盡則止。薰右耳則蟲從左出。未出更作。(聖濟總錄方)

用錢 二錢至四錢。

施用宜忌 凡虛而無熱者禁用。惡凝水石。巴豆。畏雷丸。鼠蠶。陸英爲之使。

著名方劑 石斛夜光丸。治神水寬大漸散。昏如霧。空中有黑花。親物成二。神水淡綠。淡白色者。(蘇沈良方) 用天門冬二兩。菟絲子七錢。人參。茯苓各二兩。甘菊。山藥。枸杞。石斛。杏仁各七錢。草決明八錢。麥冬。生地。熟地各一兩。肉蓯蓉。青葙子。羚羊角。蒺藜。川芎。炙草。黃連。防風。枳殼。烏犀各五錢。牛膝七錢。牛上二十四味爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服三十五丸。溫酒鹽湯送下。

【石液】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。
【石荷葉】即虎耳草之古籍別名。典見綱目。詳「虎耳草」條。

【石莧】

產地 生於河岸沙石間。

形態 石莧爲石草類之一種。春生苗。葉青。莖高尺餘。葉如水柳而短。其莖可供藥用。

採取 八九月採之。

性質 辛苦。有小毒。

主治 同甘草煎服。治胸膈。又吐風涎。

【石蛇】

外國名詞 Vermothus Ad. (拉丁)

產地 出南海水旁山石間。又南恩州海邊。有石山。蟹過則化爲石。蛇過亦然云。

形態 石蛇爲石類之一種。其形盤屈如蛇。無首尾。內空。紫紅色。其左盤良。可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 解金石毒。

【石道遙】

產地 出常州。

形態 石道遙爲雜草類之一種。冬夏常有。無花實。其莖葉可供藥用。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 癰瘕諸風。手足不遂。爲末。蜜丸。酒服。久服益氣輕身。

參攷資料 石道遙。初服時。微有頭痛。無害。(蘇頌)

【石斑魚】

古籍別名 石鱗魚。(延壽書) 高魚。(本草綱目)

形態 石斑魚爲鱗屬魚類之一種。長數寸或尺餘。白鱗。黑斑如虎紋。浮游水面。聞人聲則割然深入水中。形似鱈。有雌無雄。性淫。春月與蛇交。或與蜥交。故其子及屬皆有毒。

性質 有毒。

主治 令人吐瀉。用魚尾草汁少許解之。

【石菘】

即山菜黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山菜黃」條。

【石棠花】

即羊躑躅花之古籍別名。詳「羊躑躅花」條。

【石硫赤】

即石硫赤之古籍別名。典見本草集註。詳「石硫赤」條。

【石硫赤】

古籍別名 石亭脂。(圖經) 石硫丹。(陶弘景) 石硫芝。(本草綱目)

性質 苦。溫。無毒。

主治 婦人帶下。止血。輕身長年。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論石硫赤曰。壯陽除冷。治疥殺蟲。功同硫黃。

參攷資料 ①理知石者。生山石間。晉曰生羌道田谷。(別錄) ②此即硫黃之多赤者。名石亭脂。而近世通呼硫黃爲石亭脂。亦未考此也。按抱朴子云。石流丹石之赤精。石硫黃之類也。沒溢於涯岸之間。其澆濕者可丸服。堅結者可散服。五岳皆有。而箕山爲多。許由巢父服之。即石硫芝是矣。(李時珍)

【石硫赤】即石硫赤之古籍別名。典見綱目。詳「石硫赤」條。

【石硫青】(本草綱目) 冬結石。長年。

性質 酸。溫。無毒。

主治 痰洩。益肝氣。明日輕身。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論石硫青曰。治瘡殺蟲。功同硫黃。

參攷資料 ①生武都山石間。青白色故名。(別錄) ②此硫黃之多青色者。蘇頌謂經首石亭脂。冬結石。並不堪入藥。未深考此也。

【石硫青】(本草綱目) 冬結石。長年。

性質 酸。溫。無毒。

主治 痰洩。益肝氣。明日輕身。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論石硫青曰。治瘡殺蟲。功同硫黃。

(李時珍)

【石硫黃】 命名 本品秉純陽 火石之精氣而結成

性質通硫色賦中黃故名

處方用名 製硫黃

古醫別名 硫黃(吳普本草)

黃硫砂(藥性考)陽侯(外家)黃

牙將軍(本草綱目)黃英黃硫石

硫磺留黃留黃流黃留黃留黃

寔倭硫留黃香硫黃盆真珠黃山

不在九嶷黃童(和漢藥考)冬結

石石亭脂留石留石留石(本草

集註)留石留石留石(新本草

綱目)

外國名詞 Sulphur (拉丁)

Sulphur (英) Schwefel (德)

基本 非金屬原素之一為淡

黃色之細粉末

產地 陳仁山藥物生產辨云

硫黃各省各產但以日本來者為

多阿硫以產雲南為最荷蘭次之

形態 按天產品為黃色或黃

綠色透明結晶塊時或作橙黃色

或橙赤色破碎面作介殼狀有玻

璃狀光澤比重為二·〇七二精

煉品為黃色或黃綠色半透明結

晶狀塊比重為一·九五至二·

〇四五惟硫黃質脆弱摩擦則發

電氣熱至一百十四度即行融化

至四百度而沸騰遇火則發青色

硫燃燒並發出有刺激性臭氣之

亞硫酸瓦斯入水與酒精等不溶

置鹼液中加熱則溶但硫黃有消

絕腐香氣透性香氣之性故忌與

麝香配合

種類 石硫黃之赤色者曰

石亭脂即石硫赤青色者曰冬結

子即石硫青半白半黑者曰神驚

石石硫黃日名留石留石留石

為上品石硫赤日名留石留石

呈黃赤色為中品石硫青日名

留石留石留石為下品

採取 八月九月採之

製法 雷數日凡使勿用青赤

色及半白半青半赤半黑者自有

黃色內塗淨似物命者其也凡用

四兩先以龍尾蒿自然汁一盞東

流水三盞紫背天葵汁一盞粟逐

子壅汁四件合之攪令勻入坩鍋

內用六乙泥固濟底下將硫黃碎

之入鍋中以煎汁旋旋添入火煮

汁盡為度再以百部末十兩柳蟲

末二斤一簇草二斤細到以東流

水同硫黃煮二伏時取出去諸藥

用熟甘草湯洗了入鉢研二萬匝

用李時珍曰凡用硫黃入丸散用

須以蘿蔔剉空入硫在內合定稍

煉火煨熱去其臭氣以紫背浮萍

同煮過消其火毒以皂莢湯淘之

去其黑漿一法打碎以絹袋盛用

無灰酒煮三伏時用又消石能化

硫為水以竹筒盛硫埋馬糞中一

月亦成水名硫黃液日本製法入

豬大腸煲至透為度取出用清水

洗去肥膩用之

性質 酸溫有毒

成分 天產硫黃含有砂石等

雜物其純品者即化學上之所謂

單體天產品中呈橙赤色者含有

雄黃或鐵呈橙黃色者含有精

(Selenium)

效能 補命門真火消沉寒痛

冷殺蟲療瘡有殺蟲之效外用於

疥癬又有緩下之效內用於便秘

痔疾但非精製不可入口蓋服

下硫黃在胃中未有變化至腸則

為其中之鹼所溶解略起刺戟稍

發痲痛而通利故可用作緩下劑

(殺和消劑)治常習便閉及痔瘡

癆結又硫黃一經吸收即變成破

化輕從皮膚及肺排泄故可用作

發汗及祛痰藥治風痛喘息等又

因硫黃塗擦皮膚能吸收殺蟲故

用治疥癬等

主治 婦人陰蝕疽痔惡血壓

筋骨除頭禿能化金銀鋼鐵奇物

(本經)療心腹積聚邪氣冷痛

在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及

鼻衄惡瘡下部腫瘡止血殺疥蟲

(別錄)

歷代記述攷證 【魏】吳普本

草論硫黃曰治婦人血結【唐】甄

極藥性本草論硫黃曰下氣治腰

腎久冷除冷風頑痺寒熱生用治

疥癬錄服主虛損泄精【唐】李珣

海藥本草論硫黃曰長肌膚益氣

力老人風秘並宜錄服【宋】大明

諸家本草論硫黃曰壯陽道補筋

骨勞損風勞氣止嗽殺蟲辟邪魅

【明】李時珍本草綱目論硫黃曰

主虛寒久痢滑泄霍亂補命門不

足陽氣暴絕陰毒傷寒小兒慢驚

【明】繆希雍本草經疏論硫黃曰

石硫黃稟火氣以生本經味酸氣

五畫 石

五畫 石

溫有毒。別錄大熱。黃帝雷公賦有
毒氣。味俱厚純。經曰。寒淫於內。治
以溫熱。冷癖在腸。狀逆上氣。寒邪
在中也。非溫劑無以除之。又曰。秘
則氣堅。疏以輭之。心腹積聚。邪氣
堅積在中也。非散劑無以輭之。命
門火衰。則為脚冷。痿弱無力。下焦
濕甚。則為陰蝕。疝痔。酸濕。能
補命門不足。大熱能除下焦濕氣。
故主之也。其主頭禿。惡疥。疥蟲者。
悉取其除濕殺蟲之功耳。本經又
主堅筋骨。及別錄療鼻衄。止血者。
皆非其所宜。夫熱甚則骨消筋緩。
火載血上。則錯經妄行。豈有大熱
之物。反能治瘵是證哉。無是理也。
【明】李士材本草圖解論硫黃曰。
硫黃鹹熱有毒。主命門火衰。陽氣
暴絕。陰症傷寒。陽道痿弱。老人虛
秘。婦人血結。虛寒久痢。心腹積聚。
乘純陽之精。益命門之火。熱而不
燥。能潤腸結。亦救危神劑。故養正
丹用之。常收起死之功。能化錯為
水。修煉家尊為金液丹。下元虛冷。
真氣將絕。久患泄瀉。垂命欲盡。服
無不效。但中病則便已。不可盡劑。
【清】黃宮繡本草求真論硫黃曰。

石硫黃味酸有毒。大熱純陽。號為
火精。蓋人一身。全賴命門真火周
佈。始能上貫心肝。以主云為中。及
脾胃。以蒸水穀。下司開闔。以送二
便。旁達四肢。以應動作。此火既衰。
陽微陰盛。內寒先生。外寒後中。厥
氣逆胸旁。及於胃。胃為腎關。外寒
斬關直入。由是無熱惡寒。手足厥
逆。二便凝結。醫以朴硝攻下。猪澤
滲利。則二便不通。而凝結益甚。是
層冰不解。非不補火消陰。煉陽逼
胃。則寒莫去。而結莫消。香云。命門
火衰。服桂附不能補者。須服硫黃。
補之。按硫黃純陽。與大黃一寒一
熱。並號將軍。凡陽氣暴絕。陰毒陽
寒。久患泄瀉。脾胃虛寒。命欲垂盡
者。須用此主之。又治老人一切風
秘。冷秘氣秘。為補虛助陽之聖藥。
且能外殺疥疥。一切蟲毒。並
小兒慢驚。婦人陰蝕。皆能有效。但
必製造得宜。始可以服。余用法製
凡遇一切虛癆中寒。冷痢冷瘡。四
肢厥逆。并面赤戴陽。六脈無力。或
細數無倫。煩燥欲臥。并口苦咽乾。
漱水而不欲咽。皆屬虛火上浮。陽
欲陰格者。服無不效。今人不曉病

機。一見凝結不解。不分寒熱。輒用
承氣以投。詎知寒熱不同。水火迥
異。用之無益。適以致害。可不慎歟。
但火極似水。症見寒厥。不細審認。
即作寒治。連用此藥。其害匪淺。香
顏色黃。堅如石者良。土硫黃辛熱
腥臭。止可入瘡藥。不可服餌。
國外學說 英美學說謂硫磺
即硫質。化名磺。又名硫。產中國福
建臺灣。及舊金山等處。此外各國
皆產。而惟地中及近火山處為最
多。硫磺在古時。希臘。阿刺伯。印度
等。均用為藥品。此原質萬物中多
含之。植物質如十字花科植物。織
形花科植物。與蒜。薑。各種植物等。皆
含硫磺。動物質如雞蛋清等亦含
硫磺。地產之物內有含之者。氣質
墮類質。泉水內亦有含之者。金類
礦中常遇鐵硫(即自然銅)。銅硫
鉛硫。汞硫等。可將其硫磺取其硫
磺而收之。有數處硫磺產於地中。
可以開礦掘探。第由礦探得之硫
磺。不免瀾有沙泥。宜用錫熬鍊。去
其雜質。而取其淨硫磺。西國常用
之硫磺。從意大利國或相近之海
島探得。中國咸豐三年時。英國達

四五〇

口之生硫磺。約千餘擔。(一百十
二磅為一擔)將硫磺鎔化之。或
乾蒸之。即成硫磺條。或硫磺粉。硫
磺如遇熱或磨擦。則生一種臭
氣。其性最易燃燒。其焰為淡藍色。
以其着火易燒。故為火藥中要品。
西國藥肆中出售之硫磺。或塊或
條。或粉不一。中國藥肆中所售之
硫磺。須防潤有信石雜質。不可內
服。硫磺所結之顆粒。有二形。地內
產出者。為橢圓方形。鑄成者。為長
立方形。質脆。色黃。以水不能化。故
不成味。硫磺為發汗藥。改血藥。因
有改血之性。故痛風濕。可用之。
治各種皮膚之舊病。其效愈大。最
宜於治疥瘡。與魚鱗疥等。此兩病
可用硫磺作膏敷之。綠癬瘡等病。
由皮中有細蟲而成。用硫磺能殺
蟲。如硫磺而用其大服。則可為瀉
藥。尋常用之作輕瀉藥。又可與別
種瀉藥相和多服。治痔瘡。或可為
小兒便用之瀉藥。又如患濕氣及
風濕之人。宜先坐於透氣之椅。頭
項下。用衾圍覆。後在椅下。用厚炭
焚硫磺。蒸之。硫磺被焚。化為硫磺
(三) 酸氣。該症感其藥氣。而自

愈。又如蘇州等處多有之。泥之。亦能自愈。又如硫磺用火焚之。可以漂白別物。如薰草帽、蒸窩等物是也。又如病人久住之房。其四圍必沾染餘毒。如緊閉門窗。於房中焚硫磺。亦可以消除其毒。處方：用硫磺粉一錢至三錢。糖水開服。治久咳多痰及惡風濕。惟惡風濕則服藥後以硫磺膏外塗。隨以絨帶繫緊。硫磺粉一兩六錢。清水一斤。石灰八錢。擇其未過水者。勻和煎沸。沸時宜頻攪動。煎至水去一半爲度。彼惡病者宜先將燈水洗淨。後用此藥水搽之。硫磺粉一分。猪油四分。調勻爲度。常用以治疥疥。日本和漢藥考曰：天產硫磺。常夾雜砂石土質等。故須一度將其融化。除去砂石等而精製之。日本精煉硫磺法係將採得之硫磺。隨碎置大釜中燒融。用麻布囊濾過。凝結後再搗碎入釜。融後。靜置冷卻。則粗惡者沉下。純品成爲上層。再稍熱釜底。使硫磺塊與釜底分離。乃取出。削去其底部粗惡物。卽爲精製之硫磺矣。惟現今硫

五畫 石

黃特產地。已改用西法。精煉硫磺。日本之湯花。卽係土硫磺。或水硫磺。出上州草津者爲上品。取法。係將含有硫磺之泉。導之成小渠。疊石使作數派分流。數薦於水底。約經三月。待硫磺已沈降。卽閉塞上流。又待水涸。卽撈取晒乾。名曰湯花。又續日本記載。日本發見硫磺年代。係元明天皇和綱六年。西人以相模。信濃。陸奥。獻硫磺爲噶矢。

近人學說 丁福保曰：吾國古醫書。均以硫磺爲有毒。且大熱。用爲壯陽藥。皆因硫磺內含有信石所致。若純硫磺則無毒。且不熱。可爲輕瀉藥。

配合應用 ①金液丹。固真氣。暖丹田。堅筋骨。壯陽道。除久寒痼冷。補勞傷虛損。治男子腰腎久冷。心腹積聚。脇下冷痛。腹中諸蟲。失精遺尿。形羸力劣。腰膝痠弱。冷風頑痺。上氣喘血。欬逆寒熱。驚亂轉筋。虛滑下利。又治痔瘻濕癢。生瘡下血不止。及婦人血結寒熱。陰蝕疽痔等。用硫磺十兩。研水。用瓷盒盛。以水和赤石脂。封口鹽泥固

濟。在乾地內先埋一小罐。盛水令滿。安盒在內。用泥固濟。慢火養七日七夜。候足。加頂火一斤。燬。俟冷取出。研末。每一兩用蒸餅一兩。水浸爲丸。如梧子大。每服三十九。空心米飲服。又治傷寒身冷脈微。或吐或利。或自汗不止。或小便不禁。併宜服之。得身熱脈出爲度。(和劑局方)

②煖益腰膝。王方平通靈玉粉散。硫磺半斤。桑柴灰五斗。淋取汁。煮三伏時。以鐵匙抄於火上。試之。伏火卽止。候乾。以大火煨之。如未伏。更煮。以伏爲度。煨後。研末。穿地坑一尺二寸。投水於中。待水清。取和硫末。坩鍋內煎如膏。鐵匙抄出。細研飯丸。瘰子大。每空心鹽湯下。十丸。極有效驗。鄉人王曙。送服之。年至九十。顏貌如童子。力倍常人。(杜光庭玉函方)

③治風毒脚氣。痺弱。硫磺末三兩。鐘乳五升。煮湯。入水煎至三升。每服三合。又法。牛乳三升。煎一升。半。以五合調硫磺末一兩。厚蓋取汗。勿見風。未汗再服。將息調理數日。更服。北人用此多效。亦可煎

爲丸服。(肘後方)

④治陰虛傷寒。極冷厥逆。煩躁腹痛。無脈危極者。船上硫磺爲末。艾湯服三錢。就得睡。汗出而愈。(本事方)

⑤黑龍丹。治陰陽二毒。用舶上硫磺一兩。柳木髓研二三日。巴豆一兩。和殼計箇數。用三升童子一口。將破鋪底。安豆於上。以臘米醋半斤。澆之。蓋子緊合。紙固縫。類以醋潤之。文武火熬。候豆作聲。可一半爲度。急將鎗子離火。卽便入白中搗細。再以醋兩茶腳洗。鑊中藥。入臼。控下。蒸餅搗丸。雞頭子大。若是陰毒。用椒四十九粒。葱白二莖。水一盞。煎六分。熱吞下一丸。陽毒。用豆豉四十九粒。葱白一莖。水一盞。煎。同前吞下。不得嚼破。經五六日。方可服之。若未傳入。或未及日數。不可服。有孕婦人。吐瀉亦可服。(博濟方)

⑥治一切冷氣。積塊作痛。硫磺。煨消各四兩。結砂。背皮。陳皮各四兩。爲末。湯丸。梧子大。每空心米飲下三十九。(鮑氏方)

⑦治氣虛暴泄。日夜三二十行。

五靈石

腹痛不止。夏月路行。備急最妙。朝真丹。用硫黃二兩。枯礬半兩。研細水浸。蒸餅丸。梧子大。硃砂為衣。每服十五丸。至二十九丸。溫水下。或鹽湯任下。(孫尚藥秘寶方)

治伏暑傷冷。二氣交錯。中脘痞結。或泄或嘔。或發亂。或逆。二氣丹。硫黃消石等分。研末。石器炒成沙。再研糯米糊丸。梧子大。每服四十丸。新井水下。(濟生方)

治傷暑吐瀉。硫黃。消石。等分。為末。每服一錢。米飲下。即止。(救急良方)

治霍亂吐瀉。硫黃一兩。胡椒五錢。為末。黃蠟一兩。化丸。皂子大。每涼水下。一丸。(聖濟總錄方)

治小兒吐瀉。不拘冷熱。瀉吐反胃。一切吐利。諸治不效者。二氣散。用硫黃半兩。水銀二錢。半。研不見星。每服一字。至半錢。生薑水調下。其吐立止。(錢氏小兒方)

治久瀉不止。用硫黃。硃砂等分為末。每服一錢。五更服。當日或大作。或不作。皆其效也。寒多倍硫。熱多倍砂。(鮑氏方) 又用硫黃。臘茶等分為末。發日早冷水服二錢。二服效。寒多加硫。熱多加茶。(朱氏方)

治酒醞氣。嗜酒任氣。血凝於氣。則為氣。嗜酒酒。酒。敗血入酒。則為血。髓。搖頭掉尾。大者如髓。小者如錢。上侵人喉。下蝕人肛。或附脇背。或隱腸腹。用生硫黃末。老酒調下。常服之。(直指方)

治欬逆打呃。硫黃。燒烟。嗅之立止。(醫方摘要方)

治頭痛頭風。如神丹。光明硫黃。消石各一兩。細研水丸。芥子大。空心嚼一丸。茶下。(普濟方)

治腎虛頭痛。用硫黃一兩。胡粉為末。飯丸。梧子大。痛時冷水服五丸。即止。(聖惠方) 用硫黃末。食鹽等分水調。生麩糊丸。梧子大。每薄荷茶下五丸。(本事方) 又用生硫黃六錢。烏藥四錢。為末。蒸餅丸。梧子大。每服三五丸。食後茶清下。(普濟方)

四五二

治鼻上作痛。上品硫黃末。冷水調擦。(潛察方)

治酒。赤鼻。生硫黃半兩。杏仁二錢。輕粉一錢。夜夜擦之。又用舶上硫黃。雞心。檳榔等分。片腦少許。為末。糊包。日日擦之。加蓖麻油更妙。(瑞竹堂方)

治鼻面紫風。乃風熱上攻。陽明經絡。亦治風刺。癢疹。舶上硫黃。枯礬等分為末。每以黃丹少許。以津液和塗之。一月見效。(宣明方)

治身面疥目。蠟紙卷硫黃末少許。點之。疥之有聲。自去。(普濟方)

治濕癬風病。白色成片。以布拭醋。摩硫黃附子塗之。或硫黃。白礬。擦之。(集驗方)

治小兒聾耳。硫黃末和蠟作挺。插之日二易。(千金方)

治小兒口瘡。糜爛。生硫黃水調。塗手心足心。效即洗去。(危氏得效方)

治耳卒聾閉。硫黃。雄黃等分。研末。綿裹。塞耳。數日。即聞人語也。(千金方)

治諸瘡。肉。如蛇出數寸。硫黃末一兩。肉上傳之。即縮。(聖惠方)

治癰疽不合。石硫黃粉。以筋蘸。插入孔中。以瘻為度。(外臺秘要方)

真君妙神散。治一切癰疽。用好硫黃三兩。蕎麥粉二兩。為末。井水和捏。作小餅。日乾收之。臨用。細研。新汲水調。傳之。痛者。即不痛。不痛。則即痛而愈。(坦仙皆效方)

治疥瘡有蟲。硫黃末。以雞子煎香油調。搽極效。(救急良方)

治頑癬不愈。傾過銀。有盜。子。入硫黃一兩。溶化。取起。冷定。打。開。取硫。同。薑。研。末。搽。之。(孫氏集效方)

治癩風有蟲。硫黃末。酒調。少許。飲汁。或加大風子油。更好。(直指方)

治女子陰疥。硫黃末。傅之。癢乃止。(肘後方)

治玉門寬冷。硫黃煎水。頻洗。(心傳方)

治小兒夜啼。硫黃二錢。半。餉丹二兩。研勻。瓶固。煨過。埋土中。七日。取出。飯丸。黍米大。每服二丸。冷

水下(普濟方)

①治陰濕瘡。硫黃傳之。日三次。(梅師方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡陰虛陽強者禁用。使會青。畏細辛。飛廉。朴硝。鐵醋。

參攷資料 ①古方未有服何

硫黃者。本經所用。止於治瘡。蝕攻積聚。冷氣脚弱等。而近世送火煉

治為常服丸散。觀其治煉服食之法。殊無本源。非若乳石之有論議

節度。故服之其效雖堅。而其患更速。可不戒之。土硫黃辛熱腥臭。止

可治疥癩。蟲不可服。(蘇頌)②硫黃乘純陽之精。賦大熱之性。能補

命門真火不足。且其性雖熱。而疎利大腸。又與燥瀉者不同。蓋亦救

危妙藥也。但煉製久服。則有偏勝之害。况服食者。又皆假此縱欲。自

速其咎。於藥何責焉。按孫升談圃云。硫黃。神仙藥也。每歲三伏日。餌

百粒。去積疔積。滯有驗。但硫黃伏生於石下。陽氣溶液凝結而成。其

性大熱。火煉服之多發背疽。方勺泊宅編云。金液丹乃硫黃煉成。純陽之物。有瘡冷者所宜。今夏至人

五 蠶 石

多服之。反為大患。韓退之作文戒服食。而晚年服硫黃而死。可不戒

乎。夏英公有冷病。服硫黃。鐘乳。莫之紀極。竟以壽終。此其稟受與人

異也。洪邁夷堅志云。唐與正亦知醫能。以意治疾。吳巡檢病不得洩。

臥則徹通。立則不能消。瀉。遍用通利藥不效。唐問其平日自製黑錫

丹常服。因悟曰。此必鉛砂入膀胱。臥則偏重。猶可洩。立則正塞水道。

故不通。取金液丹三百粒。分為十服。煎蠶麥湯下。鉛得硫氣則化。累

累水道下。病遂愈。硫之化鉛。載在經方。苟無通變。豈能臻妙。類編云。

仁和縣一吏。早衰。齒落不已。二道人令以生硫黃入豬腦中。煮熟搗

丸。或入蒸餅丸。梧子大。隨意服之。飲煖倍常。步履輕捷。年逾九十。猶

康健。③有大毒。以黑錫煎湯解之。及食冷猪血。(甄權)④四黃惟陽

侯為尊。金石煨煉者不可用。惟草木制伏者。堪入藥用。桑灰。益母。紫

荷波稜。天園。桑白皮。地骨皮。車前。馬鞭草。黃蘗。何首烏。石菴。蕎麥。獨

帶。地榆。蛇牀。菟絲。菟麻。蠶砂。或灰或汁。皆可伏之。(葛洪)⑤硫能乾

汞。見五金而黑。得水銀則色赤也。

(獨孤酒)⑥凡產石硫黃之處。必有溫泉。作硫黃氣。魏書云。盤盤國

有火山。山旁皆焦。溶流數十里。乃凝堅。即石硫黃也。張華博物志云。

西域硫黃出且彌山。去高昌八百里。有山高數十丈。晝則孔中狀如

煙。夜則如燈光。庚辛玉冊云。硫黃有二種。石硫黃生南海琉球山中。

土硫黃生於廣南。以嚼之無聲者為佳。如上海硫黃亦佳。今人用配

消石作炸燧烟火。為軍營中要物。(李時珍)⑦劉守真製半硫丸。治

老年人。大腸虛秘。虛指陽而背。若非陽虛。則為腸燥。為脾約。不中與

矣。故用藥必辨病因。(仲氏)

【石脾】

古醫別名 胃石。背石。消石。(本草綱目)

形態 石脾為石類之一種。色黑如大豆。有赤文微黃。而輕薄如

菴子。有類人工造成者。色白如蠶。俱可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 胃中寒熱。益氣。令人有子。

參攷資料 ①皇甫士安胃消

石取石脾與消石。以水煮之一斛。得三斗。正白如雪。以水收中。即消

故名消石。按此說是取消石合養。成為真消石。不知石脾是何物。本

草有石脾石。人無識者。(陶弘景)②石脾生西戎內地。為鹹水

結成者。(陳藏器)③石脾乃生成者。陶氏所說是造成者。按九鼎神

丹經云。石脾乃陰陽結氣。五鹽之精。因礬而成。峨嵋山多有之。俗無

識者。故古人作成代用。其法用白礬。或鹽各一斤。為末。取苦參水二

升。鑊中煮五沸。下二物。煎減。中去滓。蒸乾。色白如雪。此為石脾也。用

石脾。朴硝。芒硝。各一斤。為末。苦參水二斗。銅鑊煎十沸。入三物。煮減

半。去滓。煎者。冷。水漬一夜。即成消石。可化諸石。為水。此與煇消

之消石不同。皆非真也。(李時珍)

【石腎】 形態 石腎為石類之一種。色白如珠。可供藥用。

性質 酸。

主治 洩劑。

【石菴蒲】 即菴蒲之處方用名。詳

【菴蒲】條。

四 五 三

五 瘞 石

【石華】即鹿角菜之類如牛毛。呼為牛毛石花者。與見郭璞海賦。詳「鹿角菜」條。

【石菴藿】即甘碎補之古籍別名。與見綱目。詳「甘碎補」條。

【石蛤蚧】命名 本品根如蛤。而堅如石。故名。

形態 石蛤蚧為山草類之一種。其苗長二三尺。莖方。葉似竹葉。花類杜鵑而稍大。單瓣色淡。若生滿山頭。其年必豐。有紅紫二色。紅者取汁可染物。其根皮紅色。可供藥用。

主治 煎洗楊梅瘡毒。能消風癩。酒磨服。療疔腫諸毒。並以醋磨塗傅。

配合應用 治風氣痛。地蜈蚣草。石蛤蚧草各等分。紹酒煎服。（祝穆效方）

治腸癰。生於小肚角。微腫而小腹隱痛不止者。是若毒氣不散。漸大。內攻而潰。則成大患。急宜以此藥治之。先用紅藤一兩許。以好酒二袋。午前一服。醉臥之。午後服紫花地丁一兩許。亦如前煎服。服後痛必漸止為效。然後再服末藥。

除根（景岳新方）又用當歸五錢。蟬退。鱗鱗各二錢。天龍。大黃各一錢。石蛤蚧五錢。老蜘蛛二個。新瓦。上以酒杯蓋住。外用火煨乾。存性。同諸藥為末。空心用酒調服一錢。許。日逐漸服自消。（未藥方）

參攷資料 周維新云。石蛤蚧乃映山紅之根。汪遠仕方云。映山紅根名翻山虎。土人呼搜山虎治瘰癧。能拔根。醫風。合巴山虎蒸酒服。名二虎丹。核其功用。雖不甚懸殊。而究其形狀。實非一種。（趙學敏）

【石黃】即雄黃之古籍別名。典見唐本草。詳「雄黃」條。即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【石黃香】即陳思安之古籍別名。典見本草拾遺。詳「陳思安」條。

【石腦】命名 本品狀如結腦。故名。古籍別名 石餠餅（別錄）石芝。化公石（本草綱目）

產地 產山嶺土石中。

形態 石腦為石類之一種。乃石鐘乳。形如甘青色白黑斑而軟。易破。初生爛石中。入土一丈以下。大如鵝卵。或如棗。觸者即散如麩。色黃白。或生滑石中。狀如石中黃子。但不常有。打破大滑石千計。乃可得一枚。初破在石中五色光明。探得可供藥用。

性質 甘溫無毒。主治 風寒虛損。腰脚疼痛。安五臟益氣。

參攷資料 俗方不見用。仙經有劉君導仙散用之。又真誥云。李整探服瘞風瘴虛損而得長生。

【石腦芝】即石芝之原名。詳「石芝」條。

【石腦油】古籍別名 石漆。（博物志）石脂水（酉陽雜俎）猛火油（廉聲之昨夢錄）石油。雄黃油。硫黃油（本草綱目）

性質 辛苦有毒。

四 五 四

主治 小兒驚風。化涎。可和諸藥作丸散。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論石腦油曰。塗指瘰癧。治針箭入肉。藥中用之。

參攷資料 眞者難收。多滲蝕器物。入藥最少。燒煉家研生。入油。再研如膏。入坩鍋內。瓦蓋。置火上。俟油泣盡。出之又研。又入油。又上火煉之。既即伏矣。（慈宗慶）

石油氣味與雄硫同。故殺蟲治瘡。其性走竅。諸器皆滲。惟瓷器琉璃不滲。故錢乙治小兒驚熱。歸寶。嘔吐痰涎。銀液丸中。用和水銀。輕粉。龍腦。蠟尾。白附子。諸藥為丸。不但取其化痰。亦取其能透絡。走竅。也。（李時珍）

石油所出不一。出陝之鄜州。鄜州。延州。延長。及雲南之緬甸。嶺之南。雄者。白石岩流出。與泉水相雜。汪汪而出。肥如肉汁。土人以草摺入。色黑。頗似淳漆。作雄硫氣。土人多以然燈。其明得水愈熾。不可入食。其烟甚濃。沈存中宣西時。掃其煤作墨。光黑如漆。勝於松烟。張華博物志載。廷壽縣南山石泉。注為澗。其水有

脂。指取著器中。始黃後黑。如凝膏。然之極明。謂之石漆。段成式西陽雜俎載高奴縣有石脂水。賦浮水上如漆。採以膏車及然燈。唐黎之昨夢錄載猛火油出高麗東。日煇石熱所出液也。惟真琉璃器可貯之。入水消流。烈燭遠發。餘力入水。魚鱉皆死。邊人用以禦敵。此數說皆石脂油也。國朝正德末年。嘉州開鑿井。偶得油水。可以照夜。其光加倍。沃之以水。則熾爛甚。撲之以灰。則滅作燧硫氣。土人呼為雄黃油。亦曰硫黃油。近復開出數井。官司主之。此亦石油。但出於井。附蓋皆地產。雄硫石脂。諸石源脈相通。故有此物。王冰謂龍火得濕而熾。過水而熾。光焰諸天。物窮方止。正是此類。皆陰火也。(李時珍)石脂油能化銅制鐵。(獨孤酒)

【石葦】 命名 本品莖廷石上。其葉柔如皮。韋者皮也。故名。古籍別名 石韋。石蘭。(和漢藥考) 外國名曰 Polypodium lin. Gue, Sw. (拉丁)

五盞石

基本 屬石葦科。藥用石葦之莖葉。 產地 陳仁山藥物生產辨云。石葦產廣東清遠大灣等處。實則凡山谷陰崖隙罅之處。恒多生焉。形態 石葦為多年生常綠之羊齒植物。莖圓密生茶褐色之鱗片。依次匍匐。葉柄長三四寸至七八寸。葉作長橢圓形。或廣披針形。長五六寸至尺許。質厚如革。故有石葦之名。色深綠。背淡褐。或深褐。密布似粒之子囊羣。

種類 其生古瓦屋上者名瓦葦。亦可療淋。其葉背有金星者名金星草。又有如香葉者。亦生石上者。其性相同。 採取 二月間採葉莖陰乾。須採於不聞水聲及人聲處者良。 製法 別錄曰。凡使石葦。須去黃毛。射人肺。令人欬不可療。大明曰。入藥去梗。須微炙用。一法以羊脂炒乾用。

性質 辛。平。無毒。 效能 消濕熱。通淋閉。用作利尿藥。 主治 勞熱邪氣。五癆閉不通。

原藥

利小便水道。(本經)止煩下氣。通膀胱。補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論石葦曰。炒末冷酒調服。治發背。【宋】日華諸家本草論石葦曰。治淋瀝遺溺。【明】李時珍本草綱目論石葦曰。主崩漏。金瘡。清肺氣。【清】黃宮繡本草求真論石葦曰。石葦苦甘微寒。功專清肺行水。凡水道不行。化源不清。以致水道益閉。石葦莖廷石上。生葉如皮。味苦寒寒。苦則氣行而金竅寒。則熱除而水利。是以勞力傷津。伏有熱邪。而見小便不通。及患發背等症。治當用此調治。俾肺肅而水道亦淋除而毒去矣。去梗及黃毛。微炙用。生於瓦上。名瓦葦。亦治淋瀝。張隱庵本草崇原論石葦曰。水草石葦。皆生在腎。石葦生於石上。凌冬不凋。莖葉少陰之精氣。葉背有金星有黃毛。乃金水相生。腎上連肺也。治勞熱邪氣者。勞熱在骨。邪氣在皮。腎肺之所主也。五癆者。五液癆閉。小便不利也。石葦助腎肺之精氣。上下相交。水精上

滋。則上竅外竅皆通。肺氣下化。則水道行而小便利矣。夫水聲洩腎氣。人聲洩肺氣。不聞水聲人聲者。厥水天之精。以助人之肺腎也。【清】黃元御長沙藥解論石葦曰。石葦味苦。清金泄熱。利水開竅。金既斃。甲煎丸用之治癰。日久結為癥瘕。以其泄水而消痰也。【清】吳儀洛本草從新論石葦曰。石葦苦甘微寒。清肺金以滋化源。通膀胱而利水道。治淋瀝發背。別錄謂其補五臟益精氣。亦止清熱利濕之功。非真有補性也。【清】鄒澍本經疏證論石葦曰。盧子綰曰。石者山骨葦為之皮。栗水之用。火之體。從堅凝閉密中。暢達敷布。故主勞熱邪氣。致五癆者。蓋假石性之悍悍宜道水道。捷於影響。或問五癆唐已前人無及。及此者。後世多以五淋目之。特五淋皆小便不通之候。古人文尙簡。本經既曰五癆閉不通矣。復曰利小便水道。得無有復而其間有隲義歟。曰。稽之素問。宜明五氣。筋筋不利為癆。五常政大論。其病癆。王注癆為小便不通。則以五癆為五淋。蓋亦未為非

五壺石

是若更證之以奇病論之有癯者。一日數十洩。甲乙經之氣。癯則遺溺。似有漏義。蓋熱冷氣。沙勞五淋者。皆小便之不通。而別其源。徵其象。有此五種也。若蠶糧五種。津液別篇之溺也。氣也。汗也。泣也。唾也。則所該者。廣五淋僅溺之一端矣。訓詁之書。說文最爲近古。其於腎下不詰爲小便不利。而詰爲罷病。亦可見癯之爲病。非暴病非實病矣。故夫癯之虛者。溺多。汗多。泣多。唾多。氣出而不反也。實者。溺秘。汗秘。目乾。舌燥。氣結而不解也。凡診病之道。虛中當求其實。實中當求其虛。癯本罷病。罷病之中。又有虛實如此者焉。於此見本經石菴主治分熱爲虛。邪氣爲實。邪氣著於分熱。是虛中有實。癯爲虛閉。不適爲實。五癯閉不通。亦是虛中。有實。石菴之爲物。惟其稟質柔輭。是以能治虛熱。惟其發生於剛悍。是以能通閉結。惟其性平。是以能下行利小便水道之功爲尤擅。於此又可見凡氣虛熱結目乾口燥。無汗便閉者。石菴均能治之。而於通小便爲最善。以是較之。訓五癯

爲五淋者。其義豈不廣且博耶。卽推之千金治血淋之石菴散。治虛勞渴無不效之骨瑱煎。及治五勞七傷八風十二痺方。可以思矣。
配合應用 ①治小便淋痛。石菴滑石等分爲末。每飲服。(聖濟方)
②治小便轉睵。石菴去毛。車前子各二錢。水二盞。煎一盞。食前服。(指迷方)
③治崩中漏下。石菴爲末。每服三錢。溫酒服甚效。
④治便前血。石皮爲末。茄子枝煎湯下二錢。(普濟方)
⑤治氣熱欬嗽。石菴。檳榔等分爲末。豈湯服二錢。(聖濟總錄方)
用量 一錢半至三錢。
施用宜忌 凡無濕熱者禁用。
著名方劑 ①石菴散。治血淋。(千金方)用石菴。當歸。蒲黃。芍藥等四味。治下節酒服方寸匕。日三服。②石菴散。治膀胱有熱。淋瀝不宜。或尿如豆汁。或便出砂石。並治之。(局方)用木通二兩。(剉)石菴二兩。去毛。滑石。白朮。覆盆。芍藥。葵子各三兩。當歸。炙草。王不留行

等爲細末。每服二錢。小麥湯調下。食前。日二三服。
參攷資料 ①治石。杏仁。射干爲之。使得直。蒲良。制丹砂。礬石。(徐之才) ②今晉絳。潯海。福州。江寧皆有之。叢生石上。葉如柳背。有毛而斑點如皮。福州別有一種。石皮。三月有花。採作沐湯。治風。(蘇頌)
【石蜂窠】卽露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。
【石蠅】卽螳螂之別名。詳『螳螂』條。
【石蝻】 古籍別名。紫蚨。紫蠅。龜脚。(本草綱目)龜脚
外國名詞 Pollicipes nutrix
Ila, Darwin 或 Mitella nivalis
(拉丁)
產地 出東南南海岩礁石間。
形態 石蝻爲介類動物之一種。狀似蚌蛤之屬。其肉質之柄。附於礁石。柄有細鱗如龜甲。上有殼二片。狀如蟹螯。色紫。多數簇集。形如手指之攢合。潮來。殼中伸出細脚。形如龜脚。能探取食物。其肉可

四五六

供藥用。



石 蝻

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 利小便。
【石解】 卽防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防己』條。 ②卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。
【石逆】 卽石斛之古籍別名。典見別錄。詳『石斛』條。
【石鼠】 卽鼠姑之古籍別名。典見古今注。詳『鼠姑』條。
【石淩】 卽石脂油之古籍別名。典見博物志。詳『石脂油』條。
【石綠】 ①卽綠鹽之古籍別名。典見綱目。詳『綠鹽』條。 ②卽綠青之處方用名。詳『綠青』條。
【石青】 命名 本品煨研醋調。同密其於脂膏蓋塗實與能而立名也。

處方用名 生石膏。煨石膏。石
粉。冰精。製石膏。

古籍別名 相理石。(別錄)寒
水石。(本草綱目)冰石。白虎。細石。
玉火石。玉環片。王蠶片。(和漢藥
考)

外國名詞 Calcii Sulpha.

(拉丁) Gypsum. (英) Gyps

(德)

基本 係鈣石類結晶屬。爲單
斜系之礦石。

產地 世界各國均有產額。每
與山壁相借。或存於礮土層中。或
產於火山近旁。我國產自湖北應
城縣。

形態 石膏之結晶。隨產地而
異。且因夾雜物之多少而異。其色
彩有爲白色之纖維狀。或結晶狀
之塊者。有帶紅黃褐綠青黑等色
其光澤亦有珍珠細絲玻璃諸光
芒。薄片者質透明。水微溶解。硬度
一·五至二·〇。比重二·一至
二·四。灼之則失結晶水而成白
色無形之粉末。

種類 軟石膏。大塊。生石中。
作層如厚扁米糕形。每層厚數寸。

五靈石

有紅白二色。紅者不可服。白者潔
淨。細文短密如束針。正如凝成白
蠟狀。整軟易碎。燒之即成白爛如
粉。其中明潔色帶微青而文長細
如白絲者。名理石。與軟石膏乃一
物二種。碎之則形色如一。不可辨
矣。硬石膏作塊而生直理。起稜
如馬齒。堅白。擊之則段段橫解。光
亮如雲母。白石英。有牆壁。燒之亦
易散。仍硬不作粉。其似硬石膏成
塊。擊之塊塊方解。牆壁光明者。名
方解石。燒之則始散。亦不爛。與硬
石膏乃一類二種。碎之則形色如
一。不可辨矣。昔人所謂寒水石
者。即硬石膏。所謂硬石膏者。即長
石。理石。方解石。石膏四種。性質皆
寒。俱能去大熱結氣。但石膏又能
解肌發汗爲異耳。所謂理石。即石
膏之類。所謂長石。即方解石之類。
俱可代用。色從其類也。又因石膏
有結晶者。有不結晶者。故鑄物學
上分爲左之三種。雪花石膏。白
色。緻密。質如大理石。可雕刻。此無
水石膏也。纖維石膏。爲白色如
束針。或如麻絲之結晶塊。是爲有
水石膏。有理石之名。鈣石膏。爲

白色薄片集合之塊。有玻璃光澤。
質堅實。亦屬有水石膏。別名曰石
膏。

採取 採無時。須採細理白澤
者良。

製法 凡使石膏。須石臼中搗
成粉。羅過。生甘草水飛過。澄晒篩
研用。李時珍曰。古法惟打碎如豆
大。稍包入湯煮之。近人因其性寒
并煨過。或糖并炒過。則不妨胃。

性質 辛。微寒。無毒。

成分 石膏之主要成分爲硫
酸加爾叟謨(CaSO₄·2H₂O)。此
外則夾雜矽酸。礬土。氧化鐵等。

效能 體重瀉胃。火氣輕解。肌
表生津。液除煩熱。止渴。治狂。爲清
涼解熱藥。能沈靜循環。鎮靜神經
因之亢奮。故心悸亢進。狂譫煩燥
大渴。全身重痛。神經痙攣等之因
於高熱者。用之有大效。胃熱肺熱
發斑。尤爲必要。

主治 中風寒熱。心下逆氣。驚
喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。產
乳金丹。(本經)除時氣。頭痛身熱。
三焦大熱。皮膚熱。腸胃中結氣。解
肌發汗。止消渴。煩逆腹脹。暴氣喘。

咽熱。亦可作浴湯。(別錄)

張仲景之發明 石膏一味。經
張仲景之實驗。認煩渴也。勞治
語煩躁身熱爲主治。茲考徵如下。

●白虎湯證曰。證語遺尿。●白虎
加入參湯證曰。大煩渴。●白虎加
桂枝湯曰。身無寒。但熱。(以上三
方。石膏皆一斤)●越婢湯證曰。
不渴。續自汗出。無大熱。(不渴非
全不渴之謂。無大熱非全無大熱
之謂也)●麻黃杏仁甘草石膏
湯證不具也。(以上三方。石膏皆
半斤)●大青龍湯證曰。煩燥。●
木防己湯證不具也。(以上三方。
石膏皆如鷄子大爲則。按鷄子大
即半斤也。木防己湯。石膏或爲三
枚。或爲十二枚。其分量難得而知
焉)歷觀上諸方。石膏主治煩渴
也明矣。凡煩燥躁者。身熱者。語
者。及發狂者。齒痛者。頭痛者。咽痛
者。其有煩渴之證也。得石膏而其
效驗焉。

歷代記述攷證 〔唐〕甄權藥
性本草論石膏曰。治傷寒。頭痛如
裂。壯熱。皮如火燥。和葱煎。搽去頭
痛。〔宋〕大明諸家本草論石膏曰。

痛。〔宋〕大明諸家本草論石膏曰。

四五七

五靈石

治天行熱狂。頭風旋。下乳搯齒。益齒牙痛。【金】張元素珍珠囊論石膏曰。止陽明經頭痛。發熱惡寒。日嘔潮熱。大渴引飲。中營潮熱。牙痛。【元】李東垣用藥法象論石膏曰。除胃熱肺熱。散陰邪。緩脾益氣。【明】繆希雍本草經疏論石膏曰。石膏味辛甘。其氣大寒而無毒。入足陽明手太陰少陽經氣分。辛能解肌。甘能緩熱。大寒而兼辛甘。則能除大熱。故本經主中風寒熱。熱則生風故也。邪火上衝則心下有逆氣及驚喘。陽明之邪熱甚。則口乾舌焦不能息。邪熱結於腹中。則腹中堅痛。邪熱不散。則神昏譫語。同乎邪鬼。肌解熱散汗出。則諸證自退矣。惟產乳金瘡非其用也。別錄除時氣頭痛身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中脹氣。解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹。暴氣喘息咽熱者。以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾後所致。惟喘息咽熱。略發手太陰病。此藥能散陽明之邪熱。降手太陰之痰熱。故悉主之也。甄權亦用以治傷寒頭痛如裂。壯熱如火。日華子用以治天行熱狂。頭風旋。搯齒。

東垣用以除胃熱肺熱。散陽邪。緩脾益氣者。邪熱去則脾得緩而元氣回也。潔古又謂止陽明經頭痛發熱惡寒。日嘔潮熱。大渴引飲。中營及牙痛者。無非邪在陽明經所生病也。理陽明則蔑不濟矣。足陽明主肌肉。手太陰主皮毛。故又為發斑發癍之要品。起死回生。功同金液。若用之甚少。則難責其功。世醫罔解。茲特表而著之。【清】黃宮繡本草求真論石膏曰。石膏甘辛而淡。體重而降。其性大寒。功入胃。清熱解肌。發汗消滯。綠傷寒邪入陽明胃腑。內鬱不解。則必日嘔熱蒸。口乾舌焦。唇燥。堅痛不解。神昏譫語。氣逆驚喘。溺閉渴飲。賢中昏自汗。胃熱發斑。牙痛等症。皆當用此調治。以辛能發汗解熱。甘能緩脾益氣。生津止渴。寒能清熱降火故也。按石膏是足陽明脾藥。邪在胃腑。肺受火制。故必用此辛寒以清肺氣。所以有白虎湯之名。脾主西方故也。但西有腐爛。而無生長。如不得已而用。須中病即止。切勿過食。以損生氣。况有親屬熱症。莫屬陰寒。而見斑黃狂燥。日嘔潮

熱便秘等症。服之更須斟酌。惟細就實明辨。詳求其真可也。取瑩白者良。研細或甘草水飛。或火煨。各隨本方用。雞子為使。忌豆豉。【清】張隱菴本草崇真論石膏曰。石膏質堅色白。氣辛味淡。紋理如肌膜。堅白若精金。稟陽明金土之精。而為陽明胃腑之涼劑。宣劑也。中風寒熱者。風乃陽邪。感陽邪而為寒。為熱也。金能治風。故主治中風之寒熱。心下逆氣。驚喘者。陽明胃絡上通於心。逆則不能上通。致有驚喘之象矣。口乾舌焦不能息。腹中堅痛者。陽明之上燥氣治之。口乾焦舌燥之極也。不能息燥極。而陽明之氣不和於上也。腹中堅痛燥極。而陽明之氣不和於下也。石膏質重。性寒清瀉。陽明之熱氣。故皆治之。稟氣則有腐殺之能。除邪鬼。生產乳汁。乃陽明胃腑所生。刀傷金瘡。乃陽明肌肉所主。石膏清陽明而和中胃。故皆治之。甄權經云。兩陽合明。是為陽明。又云。兩火并合。故為陽明。是陽明上有燥熱之主氣。復有前後之火熱。故傷寒有白虎湯。用石膏知母。甘草。粳米主

四五八

資胃腑之津。以清陽明之熱。又陽明主闔而居中土。故傷寒有越脾湯。石膏配麻黃。發越在內之邪。從中土以出肌表。蓋石膏質重。則能入裏。味辛則能發散。性寒則能清熱。其為陽明之宣劑涼劑者如此。【清】陳修園本草經疏論石膏曰。石膏氣微寒。稟太陽寒水之氣。味辛無毒。得陽明燥金之味。風為陽邪在大陽。則惡寒發熱。然必審其無汗煩燥而喘者。可與麻桂並用。在陽明則發熱而微惡寒。然必審其口乾舌焦。大渴而自汗者。可與知母同用。曰心下氣逆。即傷寒論氣逆欲嘔之互詞。曰不能息。即傷寒論虛痞少氣之互詞。然必審其為解後裏氣虛而內熱者。可與人參。半夏。竹葉。麥冬。甘草。粳米同用。腹中堅痛。陽明燥甚而堅。將至於胃實不大便之症。邪鬼者。陽明邪實妄言妄見。或無故而生驚。若邪鬼附之。石膏清陽明之熱。可以統治之。陽明之脈。從缺盆下乳。石膏能潤陽明之燥。故能通乳。陽明主肌肉。石膏外搽。又能愈金瘡之潰爛也。但石品見火則成石灰。今人

長其寒而燥用。則大失其本來之性矣。【透】楊時泰本草述鈞元論石膏曰。用此味全要認定是氣分除熱之藥。與血分全無涉。即其能退熱脈。亦以甘味爲血生化之原。更有辛以達之。而氣爲血主。正合於內經化原之義。先哲謂血虛發熱禁用者。又恐氣虛不能勝此味。更絕血之化原耳。即如除熱不傷用苦寒。因苦寒固入血分。令陽之鬱者愈不得散。亦欲救化原之意也。若夫內傷之證。由於陽分壅遏其正氣。以成有餘之熱者。皆能治之。如頭痛齒痛是也。若由於元氣不足。以生痰熱。則未可概施。又如內傷消渴。有勞傷脾破。以致心火乘土。善消水穀爲精粕。而不能化爲精血以養五臟者。與內傷實熱之消渴。自難例治。然則何以三焦熱在臟腑之中者。亦用石膏。曰。諸藥皆因熱病後食肉飲酒或犯房事而成。惟於益氣補血中更入石膏以清散其結熱。如虛煩消渴之治。諸方固可稽也。故在胃氣虛者不可投。至氣血不足而有結熱在氣分者。果使補瀉得宜。主輔中

五靈石

節。安能懲噎廢食。舍此中病之味。哉。【清】鄒樹本經疏證論石膏曰。凡物重則應堅。澤則應潤。辛則多煎。寒則多膩。石膏體質最重。光明潤澤。乃隨擊即解。紛紛星散。而絲絲縱列。無一縷橫陳。故其性主解化邪熱之尤斥。惟其辛。方足以通上下之道路。惟其澤。方足以攝浮越之元陽。譬之溽暑酷烈。萬物喘息。僅屬不敢自保。惟清颺乍動。霜降乃行。而化隨爽潔。於是欣欣然始有有生之樂焉。人病中風而至心下逆氣。噤口乾。舌焦不能息者。何以異是。病寒熱而至心下逆氣。噤口乾。舌焦不能息者。又何以異是。別錄之治暴氣喘喘熱。即本經所謂心下逆氣噤喘也。止消渴煩逆。即本經所謂口乾舌焦不能息也。身熱三焦大熱。皮膚熱解肌發汗。又所以明熱之散漫充斥也。惟本經之腹中壅痛。別錄之腸胃中結氣。及腹腹似熱。不儘散漫矣。夫熱邪既盛。內外相連。久延不解。焉能不與氣結。故暫時散漫。繼送

脹滿而壅痛。然曰腹中壅痛。曰結氣。腹脹。明其尚未與津液相結。猶可解以石膏也。若不待解肌發汗。而汗自出。腹中滿痛。小便自利。則其熱已與津液搏聚。非水氣不爲功矣。石膏又烏能爲。心下有水氣。肺脹欬上氣而喘。蠶浮皆小背龍湯證也。多一煩躁。則爲小背龍加石膏湯證。數之以大背龍湯之不出汗出而煩躁。自虎湯之大煩渴不解。竹皮大丸之中虛煩亂。是石膏爲煩欬矣。但傷寒金匱用石膏者。十一方。此幾得其四。其不煩而用者何多也。夫陰氣偏少。陽氣暴勝。外有所挾。內有所虧。或聚於胃。或犯於心。乃爲煩。煩之由來不一。本非石膏所主。化其暴勝之陽。解其在胃之聚。非治煩也。越婢加半夏湯候曰。胸脹欬而上氣。其人喘。目如脫狀。小青龍加石膏湯候曰。胸脹欬而上氣。煩躁而喘。木防己湯候曰。胸膈支飲。其人喘滿。心下痞堅。麻杏甘膏湯候曰。汗出而喘。無大熱。是石膏者爲喘而設歟。夫喘有虛有實。虛者無論。實者必邪聚於氣。軒舉不降。然邪又有不同。茲

四喘者。皆熱盛於中。氣被遏於上。則石膏所主。乃化其在中之熱。氣自得下。非治喘也。然則石膏氣寒而形津潤。本經以主口乾舌焦不能息。宜乎必治渴矣。乃傷寒金匱兩書用石膏方。並不言渴。越婢湯治風水。并證明不渴。白虎湯之治渴者。必加人蔞。其不加人蔞。亦並不言渴。豈石膏之治熱。必熱而不渴者。乃爲恰當乎。是可知石膏止能治六淫所化之熱矣。故仲景用石膏者。十一方。同麻黃用者。六方。同大黃用者。一方。同防己用者。一方。同桂枝白芍用者。一方。同人蔞用者。一方。而一方不可不同。惟竹葉石膏湯。卻必與葶藶同用。是石膏之治熱。乃或因風鼓蕩而生之熱。或因水因飲蒸激而生之熱。或因寒所化之熱。原與陰虛生熱者無干。其本經所謂口乾舌焦。乃心下逆氣。噤喘之餘波。故下更著不能息。爲句。蓋心下既有逆氣。而遇驚輒甚。則其口張不食。焉得不乾。口尚有食時。乾與焦亦有間時矣。他如竹葉石膏證之欲吐。竹皮大

四五九

五畫 石

丸之嘔逆。皆適與用石膏相值。亦可知為熱致虛。因虛氣逆。解熱氣自平。氣平嘔吐自止。非石膏能治嘔治吐矣。設者謂麻黃得石膏則發散不猛。此言難不經見。然以麻杏甘膏湯之汗出而喘。越婢湯之續自汗出證之。則不可謂無據矣。麻黃為用。所以從陰道陽。然陽厄於陰。其源不一。有因寒凝。有因熱壅。故其佐之者。不用桂枝。則加石膏。桂枝文理有縱有橫。石膏則有縱無橫。縱者象經橫者象絡。絡絡並通。與及經不及絡者。其俗至猛烈。自是不同。况因寒者所謂體若燔炭。汗出而散。(從丹溪章句)固其所當然也。因熱者。乃陽邪而陰不與交。欲使陰交於陽。非洩熱不可。第徒洩其熱。正恐陰反肆而迫陽。故一面任石膏洩熱。隨手任麻黃通陰。使陰之鬱勃者。隨陽而洩。柔和者與陰相交。是以石膏協麻黃。非特小青龙加石膏湯。厚朴麻黃湯。越婢加朮湯。越婢加半夏湯。文蛤湯。其禁忌較之大青龙湯。麻黃湯為弛。即如所謂麻杏甘膏湯。越婢湯者。并有汗亦治之。可見其

汗乃盛陽之加於陰。非陰陽交和而成。亦非營弱衛強而有矣。矧證之以千金用越婢加朮湯。治肉極熱。則身體津脫。腠理開。汗大洩。順何謂耶。夫亦以熱盛於中。內不與陰和。而外迫逐津液。與機所論者無異。特恐通其陰而陰遂逆。故凡象惡風者。即於湯中加附子耳。尚不可信麻黃石膏並用可治汗出耶。然則桂枝二越婢一證。謂之無陽者。又當作何解。夫發熱者。太陽之標。惡寒者。太陽之本。熱多寒少。標盛本微矣。而厥反微弱。則非因陽不足。乃表陽內伏也。表陽之所。以內伏。正為其本寒將盡。無事與相拒於外耳。故曰無陽。然陽者津液之所從化。汗之所由出也。不洩其標熱。而從陰中通其內伏之陽。表氣於何而和。營衛於何而調。故取桂枝之二以解外。取越婢之一以通中。此其義也。風寒搏熱。用麻黃石膏洩熱通陽。既知之矣。水飲與熱。其不相入。正同冰炭。何亦能合為患耶。不知寒與熱。猶本異而未同。水與熱。更本同而未異。何也。夫寒在人身。被陽氣激而化熱。既

化則一於熱。不更為寒。水則本屬太陽。原能盛熱。是以寒既化熱。熱已而寒無存。水中挾熱。熱去而水尚在其同用麻黃。在寒化之熱止。欲其通陽。在水挾之熱。更欲其去水矣。雖然。水與飲固自分。且同為水。復有近表近裏之分。曰風水。逐風。一身悉腫。厥浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。此比於大青龙者也。故麻黃分數多。曰吐後湯。欲得水而食飲者。文蛤湯主之。兼主微風。脈緊頭痛。此比於麻杏甘膏者也。故麻黃分數少。曰裏水。越婢加朮湯主之。此則比於麻黃附子甘草湯矣。以其是水與熱而非寒。故不用附子而用白朮石膏。是二證近表。一證近裏。既彰彰然矣。若夫飲則非如水之無畔岸。可隨處橫溢也。則必著臍膈而後為患。曰欬而上氣。此為肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯主之。此著於上者也。曰腸間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黎黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈者。木防己湯主之。此著於中者也。著於上者比於表。故用麻黃。著

四六〇

於中者比於裏。故不用麻黃。石膏則皆不可闕者也。然服木防己湯。虛者即愈。實者復發。則去石膏加茯苓芒硝。夫曰實乃去石膏。不去人蔘。似其助實反在石膏矣。然腸間支飲。則喘滿色黑。固其宜也。其間節只在心下痞堅。脈沉緊二者。痞猶可以桂枝下之。堅則非芒硝不為功矣。痞由於飲。猶可專以防己通之。飲而至堅。則非兼用茯苓不為功矣。其用人蔘。石韋。取義。原與白虎加人蔘同。欲其鴻熱生津。為已病數十日。曾經吐下也。歷經剝削。得和養。自然立能應手。然終以痞堅而脈沉緊。非剝削已極之徵。第初投之能獲效。必飲中之熱得清而解。其再發也。縱有熱亦殺於前。况經再與前方不愈。則病雖不去而熱未必復留矣。故於前方去石膏加茯苓芒硝。不去人蔘者。一則尚緣剝削之餘。一則所以取防己芒硝之暴也。

國外學說 ●英美學說謂石膏各國均有。係自然生成。其透光者為元精石。不透光者為石膏。在西國則不入藥用。煨石膏。化名紅

礬養(四)舊名鈣養(三)此物
管經細殼係錫養礬(三)加水
煨之。則所含之水。化散而成白粉
如煨燻中。度。再和水。則能堅凝
如石。故或以作脫胎鑄模。製法將
生石膏入爐。加熱不過三百度。存
性。研細為度。存貯玻璃瓶中。煨石
膏之醫治功用。能配錫礬。不宜內
服。僅填外用。緣此藥見水變硬。醫
家恒用塗抹布條內外。裹紮骨折
等症。遇水變硬。使骨不移動。

近人學說 ●張錫純曰。舊考
神農本草經。謂石膏性微寒。主治產
乳。後世解者。謂治產後無乳。不知
此乳字。當作字解。謂婦人生產之
時。若有實熱者。不妨用石膏也。迨
漢季仲景出。其生平用藥。皆宗乎
本經。是以所著金匱中。有竹皮大
丸。治婦人乳中虛。煩亂嘔逆。所謂
乳中者。即產後也。愚師仲聖之義。
凡產後寒溫證。陽明之腑熱已實。
者。治以白虎加人參湯。以玄參代
知母。生山藥代粳米。莫不隨手奏
效。夫產後最忌寒涼。而當用石膏
之時。雖產後亦分寒無忌。則石膏
非大寒。且性又純良。可知也。南方

五 礬 石

人果有寒溫實熱。又何所顧忌而
不用石膏乎。如謂互古醫學。皆起
於大江以北。本經之論石膏。或專
為北人設法。仲聖竹皮大丸。亦專
為北人立方者。而愚更進徵諸南
方名醫之用藥。吳江徐靈胎。南方
名醫也。其治陸炳若之夫人。產後
感風熱。重用石膏。其治朱炳臣陽
痿證。亦重用石膏。淮陰吳鞠通。亦
南方名醫也。其治何姓。手足拘
攣。誤服桂附人參加劇。每劑藥中
重用石膏八兩。服至三日。始收功。
又桐城余師愚。亦南方名醫也。其
所著疫疹一得。載清瘟敗毒散方。
亦重用石膏八兩。又歸安江筆花。
亦南方名醫也。其所著醫鏡中。載
有治時疫發斑一案。先後共用石
膏十四斤。始克向愈。香山劉蔚楚。
南方當時名醫也。其所著遇安齋
證治叢錄。載有為人治產後溫病
之案。亦每劑重用石膏八兩。連服
十八劑始愈。斯固皆明載諸書者
也。按石膏之原質。為硫酸鈣化
合而成。為其含有硫酸。是以涼
而能散。凡外感有實熱者。服後能
宣散外感之熱。息息自毛孔透出。

是以其性非涼於他藥。而其解熱
之性。實遠勝於其他涼藥。乃醫者
多誤信石膏。煨不傷胃之說。竟多
煨用之。則石膏經煨。其硫酸。輕皆
飛去。所餘之鈣。因煨而變作片灰。
能於水中結合。點豆腐者。煮其水
以代肉。其不可服明矣。若誤服之。
能將外感之痰。火凝結胸中。並能
凝結周身之血脈。使不流通。是以
煨石膏用至一兩。即足誤人生命。
豈知生石膏之性。與煨者有天淵
之分哉。所最可怪者。方中有石膏
未開生。亦未開煨。津沽中藥房。例
皆與以煨者。其尤甚者。方中明明
開生石膏。亦恒以煨者充之。因煨
者之細末。其所素備。且又以為與
以煨者。使不傷胃。是以醫者欲用
生石膏。宜親自監視。或取給
病家。親自監視。方妥。愚因此
事。所關非輕。而得一精粗甄別之
法。凡將藥煎成石膏之渣。凝於藥
罐之底。(此謂能於水中結合也)
而傾之不出者。必係煨石膏。其藥
即千萬莫服。凡方中用生石膏者。
宜將此甄別石膏之法。預告病家。
自不為藥房之所誤也。●黎伯樞

曰。石膏不堪入藥。血管不能吸收。
為一般時髦者所言。不知中醫用
石膏已數千年。相傳仲景經方。出
伊尹湯液。則白虎湯。來歷已久。石
膏為白虎圭藥。早經大用。特用。其
本質究竟若何。從前本草。祇云氣
味辛微寒而已。西醫化驗析之。知
為鈣養礬(三)加水而已。中國
本草之說。太覺簡單。氣味辛微寒
之藥。在中國本草。不知凡幾。何以
石膏獨退熱如此神速。本草絕無
發明。祇歸之於味辛微寒。臨疎德
統。又安得有確實之說。西醫錫養
礬(三)加水之說。信矣。然謂其
不能入藥。血管不能吸收。尚安望
其能談治效。是則石膏一物。至今
仍混混沌沌。議論無定也。茲將管
見所得。錄述如下。余相信西人錫
養礬(三)加水之考驗。故不再
為化學之工作。祇從中國本草所
說之氣味。一試其然否。則所謂辛
者。殊竟不然。余曾以一兩之生石
膏粉。一兩之煨石膏粉。分別兩器。
各浸以五兩之清水。經一夜。粉俱
沉澱。水色澄淨。與清水無異。但一
聞其味。則覺酸澀。無異一種礬泉。

四六一

五 薑 石

口腔粘膩俱感酸澀。水留口內不
過一分鐘。吐出後。滋味仍在。是有
十五分鐘之久。生熟兩種石膏水
液皆然。當余未嘗試之前。已悟到
製豆腐者以石膏收漿。必為有收
斂性。及一嘗試。竟不出所料。本草
味辛之說。絕對不當。而知石膏之
功用。即在酸澀收斂。以豆腐比例
之而益明。豆漿中多蛋白質。得石
膏即收斂而成豆腐。使流動鹽而
成固結。石膏所治人身之病。陽明
大熱。汗出。脈洪大。斯時即當需用
石膏。以平定其血脈。收斂其熱氣。
蓋發熱為肌肉組織。脈管血液等
酸化太甚。過度沸騰。津液開放。汗
腺分泌。斯時適用石膏。鎮定之。使
其徐徐恢復原狀。細胞血球。俱得
一種安穩。息其沸騰。滋其通流。降
其高漲。血液細胞液與豆漿不同。
豆漿為死物。故得石膏便凝結不
動。血液細胞液為生物。故得石膏
祇抑制其過度之沸騰。以趨於和
緩。俗謂石膏重墜。實即此酸澀性
味。非重墜也。彼西醫以石膏不溶
解於水。便為血管不能吸收。則余
所試驗。石膏粉悉沉澱水底。水自

水而粉自粉。在表面觀之。誠不溶
解。但水味澀。從何而來。此非石膏
中所分出之鈣。鈣為鹼金屬。性至
輕微。或以水浸出之。此為鹽類。故
有與酸結合之親和力。查西人藥
物。鈣歸入亞爾加里類。即鹽性類。
然則石膏不溶解於水之說。當酌
量修改。其一小部分之鈣。可以
純水浸出。其大部分之鈣。養(三)
為不溶解。醫藥所用之石膏。是取
鈣。鈣可以純水浸出。極有性味。
入於腸胃。即可以為血管吸收。從
來中醫用藥。皆取氣味性。所有煎
劑。無論草木金石蟲介。皆煎取其
氣味性。而棄其質。所遺之質。即為
藥渣。未嘗取用。石膏之煎取氣味
性。亦何嘗不然。原無取乎其溶解
全體。與水飽和。而後服食也。試證
之。張仲景用石膏。皆用綿裹。更足
見其取氣味性。不取質。一經綿裹。
而重濁之味。盡出者。略為減殺。仲
景治陽明病。用石膏。必如鷄子大。
以今秤計之。當有三兩餘。不為不
重。然一經綿裹。則鹽性稍減。較為
純粹。雖重不妨。此可見前賢用藥
之精細。而今世綿裹一法。廢棄不

講久矣。又安得為善用石膏哉。石
膏在古方中。無單用者。用石膏之
方甚多。以白虎湯為第一種方。意
義在於退熱止汗。必佐以知母之
苦。以使其降。甘草之甘。以緩其勢。
粳米之和。以養其液。使石膏鹽性
不能偏勝。引而歸於中和。此中國
經方之意。美法良。更有加人參竹
葉等味者。人參為生津之品。竹葉
為輕清之品。皆不使酸澀寒味。於
收斂之中。而仍有柔和清淡之致。
中國藥劑。以佐使配合。迥非西
方單簡之劑。所能及也。其餘如麻
杏石甘湯。大青龍湯。兩方皆為發
汗劑。皆有石膏。非石膏之能發汗。
實麻黃發汗。以麻黃外疎其閉塞。
石膏內息其沸騰。變管齊下。蓋熱
氣。而血脈。汗腺。因膨脹而
閉塞。非稍散抑其膨脹。而汗腺不
開。分泌猶疑。此石膏所以與麻黃
分頭異用。而實有協助相通之效。
別錄解肌發汗。亦即熱盛膨脹
閉塞。極小其勢。而後汗腺開。以斂
為發之理。血液與肌肉細胞皆多
蛋白質。促成酸化發熱。鈣為鹽類
性。與酸性親和。故能止熱止汗。汗

四六二

因熱漲而閉塞者。又能減熱開
陰而發汗。發汗止汗。同是一理。機
竅異耳。金匱竹皮大丸有石膏。小
青龍湯亦可如石膏。一用以收縮
胃膜腺。中和胃酸。一以下抑衝氣。
不使血脈。皆利用此澀味斂性。明
乎此而石膏之功用。坦然矣。余所
試生熟兩種石膏液。浸液。其酸澀
味同。無甚可言之分別。煨石膏之
所以異於生石膏。在燻去其所含
水分耳。其鈣養(三)仍在也。
在煎劑上之藥性。當無甚差異。俗
以礮者寒。煨者不寒。實則所用在
酸澀。似無關生煨。惟外科所用為
諸瘡收口之粉。煨當用煨者。纔有
結合水液之可能。俾之乾爽收口。
其次煨石膏見水即凝結。亦為相
當適合之水。乃能凝成。若水多不
能。今人用三五錢或一兩八錢。在
煎劑中。注以二碗之水。何嘗凝結。
余所試驗。一兩煨石膏粉。而五兩
水不見凝結。此水太多也。余以所
澀之水舍去。再注以清水。復經一
夜。則第二次之浸水。較第一次之
浸水。酸澀味略淡。余所用石膏。成
功頗多。不可盡錄。略述數條。以省

篇幅。歲辛丑。余與張弱士太僕。客遊巴達維亞。匝月飲酒過多。兼以草馬分頓。遂成積熱。太僕去而余留病發。幾日。雙足見厥。衝氣上逆。幾瀕於死。亟取紙筆書囑後事。草就置枕畔。預備俾友代為寄家。繼而臥床。尙能思索。知厥熱非石膏不可。忽憶傷寒論脈浮滑者。此表有寒。裏有熱。一俗本為表有熱裏有寒。非是。自虎湯主之。遂選用白虎湯重劑。去梗米。用生甘草。飭侍僮飛跑購藥。倉猝煎好。一服。衝氣即降。身即大熱。余拍床曰。不可不死矣。遂加服涼解之藥。每劑亦不脫石膏二句而愈。往年內子病熱。嘔不止。平常苦降之藥。如芩連等無效。余察知其胃膜必膨脹。遂以生石膏一塊。如鷄子大。打碎。不用絲裹。竹茹五錢。二味煎服。一劑而愈。丘君綺階。往年病頭痛兩旬。中西諸藥無效。聘余往治。知頭部血液濃厚。以一兩生石膏為君。佐以他藥。一劑痛止。再劑平服。丘君以為神。信仰益深。陳君順義病經多日。中西藥迭服無效。臥床覆帳。惡寒。診時猶身穿絨衫。頭戴絨帽。余

察其面垢。舌焦黃。脈滑。知有蘊熱。以生石膏八錢為主劑。佐以他藥。當處方時。家人猶慮石膏過涼。余力保無虞。然仍猶豫不決。不得已減少二錢。始放心服。一劑即除絨衫。去絨帽。不惡寒而發熱。帳幔盡捲。三劑全愈。一家佩服。且謂以前耗去多金。殊無寸效。不如此一劑。費廉功大。又一陳君某齒痛難耐。寢食不安。其戚某西醫診之。知故後就余門診。余察其上實下虛。以煨石膏八錢。佐以老熟地。淮牛膝。玉桂。五味子。骨碎補。丹皮。黃柏等味。一劑痛止。陳素輕中藥。至此始信中藥優長。改容稱謝。自近年西藥阿斯匹林盛行。凡患頭痛者。服之多驗。然亦甚多不驗者。或愈而仍復發者。余審其為血行壅滯。實性充血。輒投以石膏。各隨其病勢深淺。而加以佐使之藥。如上條所紀之熱地。玉桂。即其例也。大約石膏之本性已明。而又有佐使之法。不妨將仲景所用石膏諸方。脫胎而變化之。石膏之戒為寒症陰症。血液稀薄。皆非醜惡所宜。又如平常表邪。如太陽內熱未甚。病在輕

淺氣分。皆不宜用。俗謂恐其引隔。明未必如是。然收澀血液。留戀表邪。又不能外出。故仲景難用於表症。亦難以麻桂。內清蘊熱。外疎壅邪。不肯變解之法。若全屬陽明壯熱多汗。脈洪大。則血液酸化太盛。即以石膏為惟一之正治。白虎湯可用。此等昇燥。必分辨清楚。用藥秩序不可混淆。如減製方。隨產而施。不能盡說也。尙有一種血虛身熱之病。脈亦見洪大。須用當歸補血湯。萬不能用石膏。用則必危。前賢已有重戒。不可不知。愚而言之。酸澀之性。宜於熱度之高。血液之濃厚。不宜於熱度之低。血液之稀薄。固可信也。苟於陰症用之。則殺人矣。又考鈣性硬固。人體骨牙齒成分。皆含有鈣。平常由食物中輸入體內。故骨性堅硬。製豆腐者。石膏水過濃。則豆腐老而硬。人若有服石膏過多。而雙足覺沈墜者。似血液為澀性。凝持。而失去多少柔軟活潑之性也。鈣與鉀不同。鉀性溶解。鉀性寬透。鈣性硬固。三者皆體內之常成分。而為用不同。不可不辨。

配合應用 ①治傷寒發狂。墮垣上屋。寒水石二錢。黃連一錢。為末。煎甘草。冷服。名鴿石散。(本事方)

②治風熱心躁。口乾狂言。渾身壯熱。寒水石半斤。燒。半日淨。地坑內。盆合。四面灑土。攤起。經宿取出。入甘草末。天竺黃各二兩。龍腦二分。糯米糕丸。彈子大。蜜水磨下。(集驗方)

③治乳石發渴。寒水石一塊。含之。以漚為度。(聖濟總錄方)

④治男女陰痿。寒水石不拘多少。為末。用兩個飯筒。搗丸。梨子大。日乾。每用一丸。炭火煨紅。燒研。以淡酒調服。飲酒時湯投之。得汗愈。(蔡氏經驗必用方)

⑤治小兒丹毒。寒水石末一兩。和水塗之。(集玄方)

⑥治小兒身熱。石膏一兩。青黛一錢。為末。糕糊丸。龍眼大。每服一丸。燈心湯化下。(普濟方)

⑦治骨蒸勞病。外寒內熱。附骨而蒸也。其根在五臟六腑之中。必因患後得之。骨肉日消。飲食無味。或皮燥而無光。蒸熾之時。四肢漸

五畫 石

五 薑 石

細。足。跌。腫。起。石。膏。十。兩。研。如。乳。粉。水。和。服。方。寸。匕。日。再。以。身。披。為。度。
(外。臺。秘。要。方)

① 治熱盛喘嗽。石膏二兩。甘草炙。半兩。為末。每服三錢。生薑蜜調下。(晉濟方)

② 治痰熱喘嗽。痰涌如泉。石膏。寒水石各五錢。為末。每人參湯服三錢。(保命集方)

③ 治食積痰火。瀉肺火胃火。白石膏。煨出火毒。半斤。為末。醋和丸。梧子大。每服四五十九。白湯下。(丹溪方)

④ 治胃火牙疼。好軟石膏一兩。火煨。淡酒洋過。為末。入防風。荊芥。細辛。白芷五分。為末。日用揩牙甚效。(保壽堂方)

⑤ 治老人風熱。內熱日赤。頭痛。視不見物。石膏三兩。竹葉五十片。沙糖一兩。糯米三合。水三大盞。煎石膏。竹葉。去渣。取二盞。煎粥入糖食。(養老方)

⑥ 治風邪眼寒。乃風入頭系。敗血緩滯。不能上下流通。故風寒客之。而眼寒也。石膏煨二兩。川芎二兩。甘草炙半兩。為末。每服一錢。葱

白茶湯調下。日二服。亦治頭風滿淚。疼痛不已。(宣明方)

⑦ 治鼻衄頭痛。心煩。石膏。牡蠣一兩。為末。每新汲水服二錢。并滴鼻內。(普濟方)

⑧ 治筋骨疼痛。因風熱者。石膏三錢。飛羅麩七錢。為末。水和煨紅冷定。淡酒化服。蓋被取汗。連服三日。即除根。(筆峯雜興方)

⑨ 治雀目夜昏。百治不效。石膏末。每服一錢。猪肝一片。薄批。搗藥在上。纏定。沙瓶煮熱。切食之一日。一服。(明目方)

⑩ 治溼溫多汗。妄言煩渴。石膏。炙甘草等分。為末。每服二錢。匕漿水調下。(麗安常傷寒方)

⑪ 治小便卒數。非淋。令人瘦。石膏半斤。搗碎。水一斗。煮五升。每服五合。(肘後方)

⑫ 玉露散。治小兒吐瀉黃色者。傷熱也。用石膏。寒水石各五錢。生甘草二錢。半。為末。淡湯調服一錢。(錢乙小兒方)

李 樓 奇 方

① 治乳汁不下。石膏三兩。水二升。煮三沸。三日飲盡妙。(子母秘錄方)

② 一醉膏。治婦人乳癰。用石膏煨紅出火毒。研。每服三錢。溫酒下。添酒壺醉。睡覺再進一服。(陳日華經驗方)

③ 治油傷火灼。痛不可忍。石膏末。傅之良。(梅師方)

④ 治金瘡出血。寒水石。瀝青等分。為末。乾搽。勿經水。(積德堂方)

⑤ 治刀瘡。瘡。潰爛不生肌。寒水石。煨一兩。黃丹二錢。為末。洗敷。甚者加龍骨一錢。孩兒茶一錢。(積德堂方)

⑥ 治瘡口不斂。生肌肉。止疼痛。去惡水。寒水石。燒赤。研二兩。黃丹半兩。為末。搽之。名紅玉散。(和劑局方)

⑦ 治口瘡。咽痛。上膈有熱。寒水石。煨三兩。朱砂三錢。牛腦子半字。為末。搽之。(三因方)

四六四
淳公。長。鐵。雞。子。為。之。使。
醫。名。方。附。白。虎。湯。治。脈。滑。而。脈。疾。有。熱。也。又。治。三。陽。合。病。腹。滿。身。重。譫。語。遺。尿。自。汗。出。者。(仲。景。方) 用。石。膏。一。斤。(碎) 知。母。六。兩。甘。草。二。兩。粳。米。六。合。上。四。味。以。水。一。斗。煮。米。熟。湯。成。去。滓。溫。服。一。升。日。三。服。
參。攷。資。料。石。膏。與。方。解。石。大。體。相。似。而。以。未。破。為。異。今。市。人。皆。以。方。解。代。石。膏。未。見。有。真。石。膏。也。石。膏。生。於。石。旁。其。方。解。不。因。石。而。生。端。然。獨。處。大。者。如。升。小。者。如。拳。或。在。土。中。或。生。溪。水。其。上。皮。隨。土。及。水。苔。色。破。之。方。解。大。者。方。尺。今。人。以。此。為。石。膏。療。風。去。熱。雖。同。而。解。肌。發。汗。不。如。真。者。(蘇。恭) 孫。兆。音。四。月。以。後。天。氣。熱。時。宜。用。白。虎。但。四。方。氣。候。不。齊。歲。中。運。氣。不。一。亦。宜。兩。審。其。說。其。雅。(寇。宗。奭)
⑧ 本草藥之命名。多有意義。或以色。或以形。或以氣。或以質。或以味。或以能。或以時。是也。石膏。固。濟。丹。爐。苟。非。有。膏。豈。能。為。用。此。蓋。兼。質。與。能。而。得。名。昔。人。以。方。解。為。石。膏。誤。矣。石。膏。味。甘。而。辛。本。陽。明。經。藥。

陽明主肌肉。其甘也能釋脾氣。止渴去火。其辛也能解肌出汗。上行至頭。又入太陰少陽。彼方解石。止有體重質堅性寒而已。求其有膏而可爲三經之主治者焉在哉。
 (寇宗奭) 石膏今汾孟魏州興元府亦有之。生於山石上。色至瑩白。與方解石肌理形段剛柔相類。今難得真者。用時惟以破之。皆作方稜者爲方解石。今石膏中時時有瑩徹可愛。有縱理而不方解者。或以爲石膏。然據本草又似長石。或又謂石膏間往往有白脉貫徹。類肉之膏助者爲石膏。此又本草所謂理石也。不知石膏定是何物。今且依市人用方解石附(蘇頌) 石膏性寒味辛而淡。氣味俱薄。體重而沉降也。陰也。乃陽明經大寒之藥。善治本經頭痛。牙痛。止消渴。中暑潮熱。然能寒胃。令人不食。非腹有極熱者。不宜輕用。又陽明經中熱。發熱惡寒燥熱。日晡潮熱。肌肉壯熱。小便濁赤。大渴引飲。自汗苦頭痛之藥。仲景用白虎湯是也。若無以上諸證。勿服之。多有血虛發熱。象白虎證。及脾胃

五 蠶 石

虛勞。形體病證。初得之時。與此證同。醫者不識而誤用之。不可勝救也。(張元素) 東垣李氏云。立夏前多服白虎湯者。令人小便不禁。此乃降令太過也。陽明津液不能上輸於肺。肺之清氣亦復下降。故爾初虞世古今錄驗方。治諸瘧病。有五蒸湯。亦是白虎加人參茯苓地黃葛根。因病加減。王燕外產秘要治骨蒸勞熱久嗽。用石膏。文如東針者一斤。粉甘草一兩。細研如麵。日以水調三四服。言其無毒有大益。乃養命上藥。不可忽其賤而疑其寒。名醫錄言睦州楊士丞女病骨蒸。內熱外寒。衆醫不遑。處州吳醫用此方而體遂涼。愚謂此皆少壯脾胃火盛。能食而病者言也。若衰暮及氣虛血虛胃弱者。恐非所宜。廣濟林訓導年五十。病痰嗽發熱。或令單服石膏藥至一斤許。遂不能食。而效益頗。病益甚。遂至不起。此蓋用藥者之督督也。石膏何與焉。楊士瀛云。石膏煨過。最能收瘡。不至爛肌。按劉歧錢乙傳云。宗室子病嘔泄。醫用溫藥。加喘乙。曰。病本中熱。奈何以剛劑燥之。

將不得前後沒。宜與石膏湯。宗室與醫者不信。後二日。果來召乙曰。仍石膏湯證也。竟如言而愈。又按古方所用寒水石。是凝水石。唐宋以來諸方所用寒水石。卽今之石膏也。近人又以長石方解石爲寒水石。不可不辨之。(李時珍) 南方以寒水石爲石膏。以石膏爲寒水石。正與汴京相反。乃大誤也。石膏潔白。堅硬有瑩壁。寒水石則軟爛。以手可碎。外微背黑。中有細文。又一種堅白全類石膏。而敲之成方者。名方解石也。(閔孝忠)
 【石膏粉】卽石膏研成末者之處方用名。詳「石膏」條。
 【石蒜】 命名 本品根似蒜故名。
 古籍別名 水廡。(國經本草) 老鴉蒜。(救荒本草) 鐵色筒。烏蒜。蒜頭草。填填酸。一枝箭。(綱目) 花葉不相。(閩志) 捨子花。天蓋花。彼岸花。天蒜。石垂。艾納。兔耳草。重陽花。酸頭草。婆娑酸。脫紅換棉。雙珠沙華。(和漢藥考) 蠟蟬花根。(王部官方) 銀鎖匙。(綱目拾遺)
 外國名圖 Lycois radice,

Hom. (拉丁)
 基本 石蒜科。藥用 *Alip. Hicog. 之球根。*
 產地 凡山野平原之溼地。恒有生長。



(一) 蒜 石

形態 石蒜爲山野自生之多年生草。在溼地向陽處。則極易成長。故墾墾地等處多有之。初冬之時。自其地下莖發生細長之葉。色深綠。有並行脈。似水仙葉而瘦硬。入春則枯死。初秋乃自地下莖拍出一二尺高之花梗。而於其頂端開鮮紅色美麗之花。相繼而作繖狀。花莖分爲六瓣。片俱向外展。雌雄兩蕊俱突出花外。此草葉與花不同時而生。故有不見葉與不見花之名。亦呼子捨花。其地下莖。形如球。大寸許。外被以黑褐色之薄皮。內部爲白色之鱗片。食之必發嘔吐。小兒誤食之。則語言變澁。蓋有毒植物也。然其球莖則可

五靈石

製造澱粉。以供食用。



(二) 蒜石

採取 九月間採之。水洗陰乾。
性質 辛甘溫。有小毒。

成分 含有里可林(Lycoridin, $C_{21}H_{33}NO_6$)及賽扣撒密(Solimanin, $C_{21}H_{33}NO_6$)兩種之植物鹽基。

效能 探吐中毒。搗傳瘡腫。用作催吐藥。又為治瘡藥。

主治 傳貼腫毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論石蒜曰。疔瘡惡核。可水煎服取汗及搗傳之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐良。【清】趙學敏本草綱目拾遺論石蒜曰。喉風痰核白火丹腫癰疽酒服。

國外學說 ●日本外山清督

於石蒜根中析得植物鹽基。而檢定里可林與賽扣撒密含有之量。大約里可林含百分之〇・一五。賽扣撒密含百分之〇・〇七至

〇・〇八。又試驗石蒜屬之鐵色箭。鹿葱等植物。各該根中亦含有相同之植物鹽基。又醫學士森島庫太。見民間用石蒜根為吐藥。而其效顯著也。乃進而研究其有毒成分。先以石蒜根製為煎劑及酒精。越幾斯。給犬食之。以試驗其生理之徵候。復自石蒜根中析出里可林之植物鹽基。以試驗里可林生理之作用。兩兩比較。毫無二致。今試以他種吐藥注射皮下。除亞刺莫兒比涅外。該注射部。俱起劇烈之刺戟。或至腐蝕。且乏催吐之效。惟里可林則反之。不惟注射部絕無變化。皮下吸收。至為迅速。而且確能嘔吐。職是之故。以供藥用者不少。此即其實驗之證也。後藥學博士朝比奈泰彥。藥學士杉原善雄。總森島試驗之。將石蒜根中析出之植物鹽基 $C_{21}H_{33}NO_6$ 並其鹽酸鹽 $C_{21}H_{33}NO_6 \cdot HCl$ 試驗終結。遂說明里可林之分子式為 $C_{21}H_{33}NO_6$ 。●石蒜之科學的研究。於一八七九年。日本森島庫大博士。曾自其中抽出兩種有效成分。一為 Lycoridin。一為 Solimanin

而前者依動物試驗。確有催吐作用。且無局處刺激作用。可與 $Amorphin$ 同樣用作皮下注射催吐藥也。將生藥根切為細末。加八〇%酒精。次再加石灰乳。使呈鹼性。附以還流冷卻器於蒸鍋上。約浸至二時間後。濾過蒸散其濾液中之酒精。可得帶褐黃色之粘着物。以醋酸酸性水溶解之。再濾過以水酸化石灰。使其濾液呈鹼性反應。再以醋酸「以大」振盪之。蒸散其「以大」時則可得黃色 $Lycoridin$ 與 $Solimanin$ 混合結晶也。將此粗製之結晶。以酒精溶之。加動物炭脫色後。蒸散其酒精。分。再以醋酸「以大」溶之。加硫酸使呈酸性反應時。則 $Solimanin$ 沈澱。可濾過分離之。其濾液加以炭酸鈉中和。使呈鹼性反應時。則 $Lycoridin$ 亦沈澱矣。如斯用酒精再三反覆結晶時。則可得其純品也。

配合應用 ●治便毒諸瘡。一枝箭搗爛塗之。即消。若毒太甚者。洗淨之。生白酒煎服。得微汗即愈。(王永輔濟世方)

四六六

●治產腸脫下。老鴉蒜即酸頭草一把。以水三盤。煎一盤半。去滓。煎洗神效。(危氏得效方)

●治小兒驚風。大叫一聲就死者。名老鴉蒜。以散麻纏住脇下及手心。足心。以燈火爆之。用老鴉蒜曬乾。車前子等分為末。水調貼手心。仍以燈心榨手足心及肩膊心。心鼻心。即醒也。(王日新小兒方)

●治對口初起。用老鴉蒜搗爛。隔紙貼之。乾則頻換。其毒自消。(家寶方)

●洗痔漏。老鴉蒜。鬼蓮蓬搗碎。不拘多少。好酒煎置瓶內。先蒸待半日。湯溫傾出。洗之三次全愈。(沈惠如傳方)

●治痰火氣急。蟻螂花根。即老鴉蒜。洗焙乾為末。糟調酒下一錢。(王都官方)

●治雙單蛾。老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐而愈。(神醫十全鏡方)

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ●水麻生州州黔州。其根名石蒜。九月採之。或云金

燈花根，亦名石蒜。即此類也。(蘇頌)

【石蒜】石蒜處處下濕地有之。古謂之烏蒜。俗謂之老鴉蒜。一枝箭是也。春初生葉如蒜秧及山慈姑。葉背有劍脊。四散布地。七月苗枯。乃於平地拍出一莖如箭。幹長尺許。莖端開花四五朵。六出。紅色如山丹花狀。而瓣長黃。莖長鬚。其根狀如蒜。皮色紫赤。肉白色。此有小毒。而救荒本草言其可熬熱水浸過食。蓋為救荒爾。一種葉如大韭。四五月抽莖開花。如小萱花。黃白色者。謂之銀色箭。功與此同。二物並抽莖開花。後乃生葉。花葉不相見。與金燈同。(李時珍)

【石蜜】即蜂蜜之原名。詳「蜂蜜」條。即白沙糖之原名。詳「白沙糖」條。

【石鴉】即石龍子之古籍別名。典見別錄。詳「石龍子」條。

【石節】即蜂窠之古籍別名。典見本經。詳「蜂窠」條。

【石節餅】即石腦之古籍別名。典見別錄。詳「石腦」條。

【石劇】形態。石劇為雜草類之一種。其莖根可供藥用。

性實 甘。無毒。

主治 止消渴。

【石墨】即黑石脂之古籍別名。典見綱目。詳「黑石脂」條。即石炭之古籍別名。典見綱目。詳「石炭」條。

【石礎】即格石之古籍別名。典見別錄。詳「格石」條。

【石蓮】即石斛之古籍別名。典見別錄。詳「石斛」條。

【石箭】即天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天麻」條。

【石蓮子】基本 即蓮子經霜後堅黑而沈於水者。性實 苦寒。

效能 開胃進食。清心除煩。去濕熱。

主治 嘔逆不止。嘔口痢疾。淋濁。

辨偽 鄭育巖曰。蓮子至秋黑而沈水。為石蓮子。用者去黑殼。以水浸去赤膜。青心。方可入藥。氣味甘平。略瀉。無毒。止虛瀉。療久痢。健脾開胃。又能固精氣。今市肆有一種苦石蓮。狀似土石。味極苦。瀉

不知何物偽充。或云即樹上所生苦珠子之類。盧子由云。食之令人腸結。宜於建蓮子揀帶殼而色黑者。為是。雖未能沈水。遠勝多矣。曹炳章曰。按石蓮以霜降後。遊房枯散。而蓮子落於泥中。取用。外殼硬。色黑。肉內仍與乾蓮子同。味甜。心苦。與蓮子無異。市有廣東產者。一種木蓮。其色亦黑。兩頭略圓。殼光有細橫紋。性寒。味苦。為不道地。如無真者。不如代用蓮子為妥。

羅美東曰。石蓮子。甘溫而瀉。清心除煩。開胃進食。淋濁。嘔口痢症。皆能治之。為心腎脾三經之藥也。乃藥肆售者。有長圓兩種。圓者即蓮子。有殼。殼淺黑色。入水則沉。故名石蓮子也。長者乃一種樹木子。類似石蓮子。非石蓮子也。殼深黑色。打破無心。味苦辛。瀉。有毒。嚼爛吞下。刺舌痺喉。不得入藥。用之不但無效。且有危害之虞。此兩種藥性。已有天淵之別。用者須宜謹慎。余對此味。素甚注意。非輕手查驗。不敢輕投。黎伯樞曰。石蓮子有二種。一種是蓮房秋老。墜入池中。日久撈起者。其蓮子仍帶殼。一種

是不知何種樹木所結之實。或云鶴婆子。係因俗為名。前一種是真。後一種是假。蓋蓮子明是遊房內所結。所以謂之石者。因其入土日久堅實。此物大抵治虛熱痢有效。因其性瀉。蓮子本為健脾之物。復墜入池內。得水土之氣。蓮殼本帶有單寧酸。在池泥中亦吸有多少。瀉土氣性。於和平性中兼有收斂性。故治虛熱痢症。極為相宜。不但止下。亦且止嘔。若所謂鶴婆子之偽物。形色氣味。原質全然相反。其皮殼黑而光滑。其肉青黃而韌。其味絕苦。嘗之令人欲嘔。余昔診一痢症。為頗沉重。處方即開此味。病家留余久坐。有頃。購藥者歸。送余查視。則石蓮子一物。形質全非。金駭然。亟為除去。後即詢之藥店中人。始知有二種。是即所謂鶴婆子者。大抵藥店亦不一致。有純用真石蓮子者。有純用鶴婆子者。此由國內各地土俗不同。習慣各異。不能畫一。然而醫家則當慎察。查考。期購真物。不得疏方。即漠然不問矣。

應用宜忌 病久胃虛。或腎虛

五 蠶 石

五靈石

精滑。及無濕熱而虛寒者均忌之。

【石葍】 外國名曰 Olive Leaf Citrus, Lo. Tol. (拉丁) アラサ(日本)

草本 係綠色藻類絲藻屬石葍科。

形態 石葍為藻類之一種。其形如一葉似紫菜而色青。附石而生。高三四寸至七八寸。其體為平面狀。係二層細胞所成。



採取 春冬兩季採之。

性質 甘平無毒。

主治 下水。利小便。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論石葍曰。主風秘不通。五臟氣并膝下結氣。麥汁飲之。胡人用治疝疾。

【石髮】 卽烏韭之古籍別名。與見唐本草。詳『烏韭』條。卽陟釐之古籍別名。與見開寶本草。詳『陟釐』條。

【石榴】 形態 石髮為石類。為石榴之一種。形如菊。用作餅餌。但不常生。採得可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 谷氣調中。食之止饑。

【石榴】 詳『安石榴』條。

原名 酸榴皮。

榴之果皮。故名。

處方用名 炒榴皮。榴皮炭。

外國名詞 Granati Fructus Cortex (Pomegranate Fruit Rind) (拉丁)

基本 屬安石榴科。藥用酸榴之果皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。石榴皮。歐洲。小亞細亞。中國各省均有產。廣東以星子。連州為多出。

萬國藥方卷四一百六十九篇。論功用殺蟲收斂。治泄瀉。

形態 按石榴皮為不正而扁平之碎片。上端留有脆弱之萼冠少許。其中每存已死之雄蕊及花柱。外面色黃褐。或紅褐。有小瘤突起。內面色暗黃。或黃褐。具嵌入種子之凹痕。

種類 石榴花樹。有單瓣重瓣之別。其色有紅白黃諸種。

榴實味有甜酸二種。入藥惟用酸者之果及皮。花與根皮。詳各該條。

製法 雷欽曰。凡使石榴皮。或葉或根。俱勿犯鐵器。不論乾濕。取來以藥水一夜待乾。用其水如薑汁也。

性質 酸溫。清。無毒。

成分 果皮中含鞣酸二十八%。護謨二十四%。越幾斯二%。

效能 清腸。止痢。在胃中能制止胃內酵素過量之酸酵。入腸能收斂腸黏膜。使腸之分泌減少。繼蟲遇之。卽被殺死。而向大便排出。故用為收斂及殺蟲藥。

主治 止下痢。瀉精。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論石榴皮曰。治筋骨風。脚不遂。行步艱急。疼痛。瀉腸。取汁點目。止泪下。【唐】陳藏器本草拾遺論石榴皮曰。煎服。下蚊蟲。【明】李時珍本草綱目論石榴皮曰。止瀉痢。下血。脫肛。崩中帶下。【明】李士材本草圖解論石榴皮曰。石榴皮。止下痢。瀉精。腸風。瀉帶。性極酸。

皮。止下痢。瀉精。腸風。瀉帶。性極酸。

四六八

澀。善於收攝。新病者勿重服。也不拘乾濕。勿犯鐵器。藥水浸一夜。取出。用其水如薑汁。【清】汪純庵本草備要論石榴皮曰。石榴皮。酸。澀。而溫。能清腸。止瀉痢。下血。【蝦末服】崩帶脫肛。瀉痢。至於脫肛者。以石榴皮。陳壁土。加明礬少許。濃煎。洗。再用五倍子。炒研。敷。托而止之。【浸水汁】黑如墨。烏鬚。方。綠雲油。中用之。勿犯鐵器。【清】黃元御玉楸藥解論石榴皮曰。石榴皮。味酸。性溫。入手。陽明。大腸。足厥陰。肝經。斂腸。固腎。清精。止血。石榴皮。酸。澀。收斂。治下痢。遺精。脫肛。便血。崩中。帶下。之病。點眼。止淚。塗瘡。拔毒。【清】王士雄隨息居飲食譜論石榴皮曰。中蠱毒。用石榴皮煎。濃飲。腿肚生疔。初起如粟。擗之。漸開。黃水浸淫。痰痛潰爛。遂致纏臃。而成鋼疾。用酸榴皮煎濃汁。冷定。類埒。【清】吳儀洛本草從新論石榴皮曰。石榴皮。酸。澀。而溫。能清腸。止瀉痢。下血。崩帶。下脫肛。又能殺蟲。

國外學說 英美學說謂石榴皮。卽石榴樹所結之果皮。產中

國、歐、羅巴及小亞細亞等處。取該果之皮。無論鮮乾。均可為藥品。此樹之花與果肉。果皮樹根皮。東方各國自古及今皆用之。其花無香氣。味苦而澀。食之令口津變紅色。內含樹皮酸。如合於鐵之鹽類。則變黑色。近在英國則不入正藥品。至果皮則東方各國多用之。為收斂藥與染料。野生者較園種者性更重。有數國將此果皮以為製熱獸皮之料。其醫治作用。止泄瀉與惡久赤白痢。服之有效。其花亦可入藥。處方用石榴果皮一兩。汽水二十兩。入鍋熬至一半。濾渣為度。治肚瀉。蒸汗。作漱水。能療治咽喉生炎。作射水。能療治白帶。白濁。每服半兩至一兩。日本和漢藥考曰。石榴皮。中日藥俱用果皮。西洋藥則用枝幹根皮。然枝幹皮之效。不及根皮。今故專用根皮。

五靈石

為末。每米飲服方寸匕。日三服。效乃止。(肘後方)

② 治糞前有血。令人面黃。用酢石榴皮。炙研末。每服二錢。用茄子枝煎湯服。(孫真人方)

③ 治腸滑久痢。神妙無比方也。用石榴一箇。劈破。炭火燒存性。出火毒。為末。每服一錢。別以酸石榴一樹。水一盞。煎湯調服。(經驗方)

④ 治久痢久瀉。陳石榴皮。醉者焙研細末。每服二錢。米飲下。患二三年或二三月百方不效者。服之便止。不可輕忽之也。(普濟方)

⑤ 治小兒風疳。大生石榴一枚。割去頂。剗空。入全蠍五枚。黃泥固濟。煨存性。為末。每服半錢。乳汁調下。或防風湯下亦可。(聖濟方)

⑥ 治卒病耳聾。八九月間取石榴一箇。上作孔。如棗子大。內米醋令滿。以原皮蓋之。水和麩。蒸煨熟。取起。去蓋。入小黑李子。仙沼子末。取水滴耳中。勿動。腦中若動。勿驚。如此三夜。再作必通。按唐慎微本草收採此方。云出孫真人。而黑李子不知為何物也。其仙沼子即預

知子。

① 治食榴損齒。石榴黑皮。炙黃研末。並肉和丸。梧子大。每日空腹三丸。白湯下。日二服。(普濟方)

② 治丁腫惡毒。以針刺四畔。用榴皮着瘡上。以麩圍四畔。灸之。以痛為度。仍內榴末傅上。急裝。經宿連根自出也。(肘後方)

③ 治脚肚生瘡。初起如粟。搔之漸開。黃水浸淫。痒痛潰爛。遂致遠歷而成痼疾。用酸榴皮煎湯冷定。日日搗之。取愈乃止。(醫學正宗方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡有實火實邪者禁用。忌鐵。

【石榴根】 原名 酸榴東行根。Radix (Pomegranate Root Bark) (拉丁)

性質 酸。溫。滑。無毒。

主治 蛇蟲寸白。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論石榴根曰。昔者入染髮用。【宋】蘇頌圖經本草論石榴根曰。治口齒病。【明】李時珍本草綱

目論石榴根曰。止澀瀉痢帶下。功與皮同。

【石榴花】 主治 陰乾為末。和鐵丹服一年。變白髮如漆。

歷代記載攷證 【宋】蘇頌圖經本草論榴花曰。千葉者治心熱吐血。又研末吹鼻。止衄血立效。亦傳金瘡出血。

【石榴茶】 卽山茶花之古籍別名。與見綱目。詳「山茶花」條。

【石燕】 處方別名 煨石燕。古醫別名 土燕。(本草綱目)

基本 石類之一種。

性質 甘。涼。無毒。

效能 利溼。清熱。用作祛疔明目藥。又為利尿通淋藥。

主治 去目障。利小便。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論石燕曰。療眼目障翳諸病。淋瀝。久患消渴。臙脂類瀉。屬



石燕

五畫 石

風痺痿。年久不瘳。面色虛黃。飲食無味。婦人月水澀濁。赤白帶下。多行者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此為準。亦可為末。水飛過。每日服半錢。至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。【清】黃元御玉楸藥解論石燕曰。石燕味甘性涼。入足少陰腎。足太陽膀胱經。利水通淋。止帶。催生。石燕甘寒。滲利。泄膀胱濕熱。治淋澀熱瀉。溺血。便血。消渴。帶下。痔瘻。墮腎。齒動。牙疼。拳毛倒睫。【清】楊時泰本草述鈞元論石燕曰。石燕得土氣之精。專而氣味甘涼。即一二單方。多屬骨之合腎。以為治。是瀕湖所列諸疾。效當不謬也。

配合應用 ●治傷寒尿瀉。小腹脹滿。石燕為末。葱白湯調半錢。服通為度。【聖惠方】

●治小便淋痛。石燕子七枚。搗黍米大。新桑根白皮三兩。剉拌勻。分作七帖。每帖用水一盞。煎七分。空心午前各一服。【簡要濟衆方】

●治血淋心煩。石燕子。商陸。赤小豆。紅花等分。作末。每服一錢。葱白湯調下。【聖惠方】

●治久年腸風。石燕磨水。常服勿歇。【靈苑方】

●治赤白帶下。多年不止。石燕一枚。磨水服。立效。【徐氏家傳方】

●治極極吐乳。咳嗽久不愈。石燕子為末。以蜜調少許。塗唇上。日三五次。【衛生寶鑑方】

●治拳毛倒睫。石燕子一雌一雄。磨水點擦眼。先以錐子摘去拳毛。乃點藥。後以黃連水洗之。【乾坤生意方】

●牛牙止痛。石燕三對。火煨醋淬七次。青鹽乳香各一兩。細辛半兩。為末。搗之。荊芥湯嗽口。一方去乳香。細辛。加麝香

●齒疎不堅。石燕子五對。少煨米醋淬七次。為末。青鹽射香各少許。研勻。日用搽牙。後以溫酒嗽之。【元遺山方】

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡無溼熱者禁用。

參攷資料 ●永州祁陽縣西北一十里有土岡。上掘深丈餘。取之。形似蜡而小。堅重如石。俗云因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者。妾也。【蘇恭】●祁陽縣江畔沙灘

上有之。或云生洞中。凝儼似石者。佳。採無時。【蘇頌】●石燕性涼。乃利竅行滯熱之物。宋人修本草。以食鐘乳禽石燕混收入。此石燕下。故世俗誤傳此石能助陽。不知其正相反也。【李時珍】

【石燕】 命名 本品狀如花蕊。故名。

古籍別名 石燕。石芥。【別錄】雲茶。蒙頂茶。【本草綱目】

外國名詞 Cladonia rangiferina. Web. (拉丁) ハナユゲ (日本)

基本 係真南門地衣類之石蕊。產地 生山崖巖石間。其產於山東滋陽縣之蒙山者。即謂之蒙頂茶。形態 石燕為苔草類之一種。乃山石間感受煙霧熏染日久而結成之苔衣。如屋遊垣衣之類。早春青翠。端開四葉。故名石芥。春月刮取晒乾。謂之雲茶。其色白。輕薄如花蕊。氣香如雙。味甘澆如茗。性質 甘溫。無毒。主治 石燕明目益精氣。令人

四七〇

不饑渴。輕身延年。歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論石燕曰。長年不饑。【明】李時珍本草綱目論石燕曰。生津潤咽。解熱化痰。

【石頭】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貫衆」條。

【石頭魚】即石首魚之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳「石首魚」條。

【石鮓魚】 產地 生溪澗中。屬魚類之一種。長一寸。腹下赤。可供藥用。

性質 甘平。有小毒。主治 惡瘡疥癬。

【石龍】即葶草之古籍別名。典見別錄。詳「葶草」條。

【石龍子】 命名 本品生山石間。能吐蠶。可祈雨。故名。


古籍別名 山龍子。泉龍。石蟠。蜥蜴。【別錄】。結蟻。蛇。析易。【本草綱目】

外國名詞 Eumeces quini- quelineatus 或 Eumeces latiscutatus Hadowoll (拉丁) Lf-

本草綱目

石龍子 係爬蟲類、蜥蜴屬、

一種即蜥蜴之形細而長。尾與身皆似蛇。有四足。長七八寸至一二尺。頭扁尾長。形細而有四脚。似壁虎。俗稱四脚蛇。雌者色褐。雄者青綠色。舌短。尾易斷。斷後復生。常棲石壁之隙。捕食細蟲。捕得可供藥用。



石龍子

採取 五月取者石令乾。
用法 李時珍曰。古方用酥炙或酒炙。惟治傳尸勞瘵。天靈蓋丸。以石蜥蜴連腸肚。以醋炙四十九遍用之。亦一異也。
性質 鹹寒。有小毒。
主治 五癆邪結氣。利小便水道。破石淋下血。
歷代記述攷證 【明】李時珍

五靈石

本草綱目。石龍子曰。消水飲。陰瘻。潰破。血。凝。婦。忌。用。

參攷資料 ●石龍子。惡。硫。黃。蕪。黃。斑。蝥。徐之才。●有人見蜥蜴。從石罅中出。飲水數十次。石下有水。置一二升。行未數里。兩罇大作。今人用之。祈雨。蓋取此義。(寇宗奭) ●其功長於利水。故千金治癰結水腫。尸疰留飲。有蜥蜴丸。外臺治陰瘻用之。皆取其利水也。劉涓子用同斑蝥。地膽。治瘰癧。取其利小便。便解二物之毒也。(李時珍) ●生山石間者曰石龍。即蜥蜴。俗呼蝮。蝮。似蛇。有四足。頭扁尾長。形細。長七八寸。大者一二尺。有細鱗。金碧色。其五色全者為雄。入藥尤勝。生澤草間者曰蛇醫。又名蛇師。蛇舅母。水蜥蜴。蟻。蟻。俗亦呼蝮。蝮。蛇。有傷。則啣草以敷之。又能入水與魚合。故得諸名。狀同石龍。而頭大尾短。形粗。其色青黃。亦有白斑者。不入藥用。生屋壁間者曰蜥。即守宮也。似蛇。醫而短小。灰褐色。並不整人。詳本條。又按夷。聖。志。云。劉。居。中。見。山。中。大。蜥。蜴。百。枚。長。三。四。尺。光。膩。如。脂。吐。電。如。彈。丸。俄。頃。風。雷。作。而。雨。雹。也。(李時珍)

石龍子肝

主治 去生胎。

【石龍衣】即蛇蛻之古籍別名。詳「蛇蛻」條。

石龍芮

命名 本品生於石上。莖葉短小。實如桑椹而細。故名。

古籍別名 地椹。(本經) 天豆。石龍。魯果。能。彭。根。(別錄) 水菹。(吳普本草) 苦菹。(爾雅) 菹葵。(郭璞賦) 胡椒菜。(救荒本草) 田芥。(日本)

外國名詞 Ranunculus so. (Lepota, H. (拉丁) タガラシ タタラビ フカツミ (日本) 基本 係毛茛科。毛茛屬。藥用石龍芮之子與根皮。

產地 生山野川澤及諸淺水中。

形態 石龍芮為毒草類之一。年生或越年生。平滑草本。莖粗中空。高二三尺。葉互生。作掌狀分裂。黃綠色。葉面有光澤。椹葉殆如無柄者。裂片亦細。春至夏秋有花。

小五瓣。黃色。每花瓣長橢圓形。約一分許。其下部有一小孔。雌蕊甚多。構成長橢圓形之穗。實為乾果。多而小。亦橢圓形。攢集於花托之下。大如豆。色青綠。狀似桑椹。



石龍芮

採取 五月五日採子。二月八月採皮。陰乾用。

性質 苦平。無毒。

主治 風寒濕痺。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身。明目不老。(本經) 平腎胃氣。補陰氣不足。失精。莖冷。令人皮膚光澤。有子。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草。論石龍芮曰。逐諸風。除心熱燥。

配合宜忌 畏茶黃。蛇蛻皮。大戰為之使。

參攷資料 ●石龍芮有兩種。水中生者。葉光而子圓。陸地生者。葉毛而子銳。入藥須生水者。陸生

者又謂之天灸。而補不足。並冷失精。(寇宗奭)③石龍芮乃平補之藥。古方多用之。其功與枸杞。覆盆子相埒。而世人不知用。何哉。(李時珍)④蘇蕡言水菹即石龍芮。蘇頌非之非矣。按漢吳普本草。石龍芮一名水菹。其說甚明。唐本草。藥部所出水菹。實其苗也。本經石龍芮言其子也。寇宗奭所言。陸生者。乃是毛蕪。有大毒。不可食。水菹。即俗稱胡椒菜者。處處有之。多生近水下濕地。高者尺許。其根如薺。一月生苗。叢生。圓莖。分枝。一枝三葉。葉青而光滑。有三尖。多細缺。江淮人三四月採苗。治過。晒蒸黑色為蔬。四五月開細黃花。結小實。大如豆狀。如初生桑椹。青綠色。搗散。則子甚細。如芝麻子。即石龍芮也。宜半老時採之。范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。(李時珍)

【石龍芮葉】 性質 甘寒。無毒。

主治 搗汁。洗馬瘡。疥。并服之。又塗蛇蝎毒。及癩腫。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草。論石龍芮葉。曰。久食除心

下煩熱。主寒熱。肌癢癢。生瘡。結核。聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁。半升服。能殺鬼毒。即吐出。

參攷資料 石龍芮葉即水菹。葉。止霍亂。與香薷同功。(孟詵) 【石龍草】即石龍芻之處方用名。詳石龍芻條。

【石龍芻】 命名 本品生於水馬故名。石之處。而可刈束養。處方用名 石龍草。龍芻草。龍

古籍別名 龍鬚。龍珠。草。龍。 (本經)龍華。龍莖。方實。(別錄)龍

修。(山海經)縉雲草。西王母簪。(本草綱目)小龍。(日本) 外國名詞 Juncus Balfourii

Willd. var. japonicus, T. (拉丁)ユヒケ井 ユヒケ(日本) 基本 係燈心草科燈心草屬。藥用石龍芻之莖。

形態 石龍芻為濕草類之宿根草本。乃水田之耕作物。莖綠色。細長。其橫斷面為圓形。無尋常葉。夏日梢頭二三寸下。歧出花梗。開小花。花被為鐘狀。雄蕊六枚。雌

蕊之子房三室。胚珠多。形態與燈心草略同。惟莖較短。雄蕊之數。倍於燈心草。

性質 苦。微寒。無毒。 主治 心腹邪氣。小便不利。淋閉風濕。鬼疰惡毒。(本經)補內虛不足。痞滿。身無潤澤。出汗。除莖中熱痛。瘕疝。蟲腫。不消食。(別錄)

參攷資料 ①刈草包束曰芻。此草生多石之處。可以刈束養馬。故謂之龍芻。逸異記。周穆王東海

島中。養八駿。處有草名龍芻。是矣。故古語云。一束龍芻。化為龍駒。亦

孟子芻豢之義。龍鬚。王母簪。因形也。縉雲。縣名。屬今處州仙都山。產此草。因以名之。崔豹古今注云。世

首黃帝乘龍上天。羣臣攀龍。隨墜地生草。名曰龍鬚者。謬也。江東以草織席。名西王母席。亦豈西王母

騎龍而隨其鬚乎。(李時珍)②龍鬚。散生。狀如棕心草。及鳧此。苗直上。夏月莖端開小穗。花結細實。並無枝葉。今吳人多栽蔴織席。他處自生者不多也。本經明言龍芻。一名龍鬚。而陶弘景言龍芻似龍鬚。但多節。似以爲二物者非矣。(李

時珍)

【石龍腦】即粘石之古籍別名。與見別錄。詳「粘石」條。

【石龍皮】即秦皮之古籍別名。與見別錄。詳「秦皮」條。

【石蠶】即石蠶之古籍別名。與見綱目。詳「石蠶」條。

【石澆】即石澆之古籍別名。與見別錄。詳「石澆」條。

【石蕒】即鮮苔之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鮮苔」條。

【石膽】即膽礬之原名。詳「膽礬」條。

【石澤荷】即澤荷之古籍別名。與見和漢藥考。詳「澤荷」條。

【石蠶】即蠶殼之古籍別名。與見唐本草。詳「蠶殼」條。

【石藤草】即石斛之古籍別名。與見和漢藥考。詳「石斛」條。

【石螺螄】 產地 出廣東。

形態 石螺螄為石類之一種。其形似螺而體質為石。可供藥用。

主治 辟目眼疾。

參攷資料 石螺螄乃石質也。亦稱石蠶。石蛇之類。故主治亦大

略相似。

【石開干】即青琅玕之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『青琅玕』條。

【石竅沙】命名。本品乃沙漠石竅中之沙。故名。

產地 出於海地近澤面積三百里無水草處有之。

形態 石竅沙為石類之一種。其大者如瓜如拳。小者如芋栗。亦有如珠如豆者。皆五色如瑪瑙。有竅而中空。內含沙石。質堅。其外可碾。其中不可碾。故每因形成器。其竅所嵌之沙。可供藥用。

主治 能明目。

外國名詞 Morda punctata, Maxim.

(拉丁)イヌカウシユ(日本)

基本 係唇形科。莖葉厚。藥用莖葉之莖葉。



石 薺 草

形態 石薺草為雜草類之一種。莖葉皆有香氣。高二三尺。莖方

五 蠶 石

形。生枝甚多。葉長卵形。有鋸齒。對生。秋日開花。花小。生於莖枝之上部。總狀花序。花冠淡紅色。唇形二強雄蕊。其莖葉可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 祛風冷氣。瘡疥癢痔。痔瘻下血。養汁服。

【石藍】即白前之古籍別名。與見唐本草。詳『白前』條。

【石雞】即青蛙之別名。詳『青蛙』條。

【石蟹】形態 按石蟹為石類之一種。體質是石。其形似蟹。蓋係尋常之蟹。為海沫泥水相着。年久因化為石。其有一種入洞穴年深者亦然。採得可供藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 青盲目淫。膚腎丁醫。漆瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論石蟹曰。解一切藥毒。并蠱毒。天行熱疾。催生落胎。療血暈。並熱水磨服。【宋】蘇頌圖經本草論石蟹曰。醋磨傳癰腫。熱水磨服。解金石毒。

參攷資料 按願珍海槎錄云。

崖州翰林港內半里許。土極細膩。最寒。但蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之名石蟹。置之几案。云能明目也。(李時珍)

【石鏡】即海蛇之古籍別名。與見綱目。詳『海蛇』條。即玉英之古籍別名。與見別錄。詳『玉英』條。

【石陵】即絡石之古籍別名。與見吳普本草。詳『絡石』條。

【石鰓甲】即穿山甲之古籍別名。與見臨海記。詳『穿山甲』條。

【石攀】即膽攀之古籍別名。與見本經。詳『膽攀』條。

【石攀魚】即石斑魚之古籍別名。與見延壽書。詳『石斑魚』條。

【石蕪】即石蕪之古籍別名。與見綱目。詳『石蕪』條。

【石鐘乳】即鐘乳石之古籍別名。與見本經。詳『鐘乳石』條。

【石糖】即石糖之古籍別名。與見別錄。詳『石糖』條。

【石鹹】即兩鹹之凝結如石者。與見補遺。詳『兩鹹』條。

【石欄干】即青琅玕之古籍別名。與見本草拾遺。詳『青琅玕』條。

【石烟】即海鶴魚之古籍別名。與見綱目。詳『海鶴魚』條。

見綱目。詳『海鶴魚』條。

【石蘭】即石葦之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石葦』條。

外國名詞 Calligon (拉丁)

產地 產福建省晉泉州府境。安溪長潭山石壁間。又山中有如脊狀流出成川。行數里。入地面結成如醃腐者。

形態 石髓為石類之一種。其色有白有黃。質佳。採得可供藥用。

製法 採得澆淘如泥。作丸如彈子用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 寒熱羸瘦。無顏色。積聚。心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癆塊。腹內腸鳴。下痢。腰脚疼。冷性寒。宜寒瘦人。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論石髓曰。療內傷折骨。用酒研服三分。不可多服。多則骨大。

【石髓】即自然銅之古籍別名。與見綱目。詳『自然銅』條。

【石蠶】古醫別名。沙蠶。(本經)石蠶。蠶。(別錄)石

四 七 三

五盡 石 示 禾

下新。(本草拾遺)石似蠶。沙蟬。地
牌。(本草綱目)

外國名詞 Tonerium japo-
nicum, Wild(拉丁)

形態 石蠶爲蠶類之一種。其
狀如蠶。附生水石。作繭如銀股。長
寸許。以蔽其身。色如泥。蠶在其中。
春夏羽化出蛾。飛集水面。其殼肉
可供藥用。



石 蠶

性質 鹹。寒。有毒。
主治 五疳。破石淋。墮胎。其肉
解結氣。利水道。除熱。(本經)石蠶
蟲主石瘕。小便不利。(別錄)
【石蠶蟲】卽石蠶之古籍別名。典
見別錄。詳『石蠶』條。

【石鹼】 命名 本品狀如石類
之鹼。故名。

處方用名 鹼水。
古醫別名 灰鹼。花鹼。(本草
綱目) 枳砂。乾餅藥。(醫科書)
基本 係蒸麥屑製成之石塊。

產地 山東濟寧。山西大同諸
地咸有出。

形態 按石鹼體重質堅。色微
黃。而似石塊。碎之。內部光亮似冰
糖。世人用以滌衣去垢。亦可供藥
用。

製法 採蒸麥之屬。開窖浸水。
久之。漉起。曬乾燒灰。以原水淋汁。
每百引入麪粉二三斤。久之。凝結
如石。取用。

性質 辛苦。溫。微毒。
效能 磨積。去垢。專作消化健
胃藥。

主治 去濕熱。止心痛。消痰。磨
積塊。去食滯。洗滌垢膩。虛實用。
過服損人。

歷代記述攷證 【明】繆希雍
本草經疏論石鹼曰。石鹼。味辛苦
澆氣。溫微毒。性能除垢。磨積塊。
過服能損人。同石灰。桑礪。透肌肉。
潰癰。瘰癧。去瘀肉。點痣。癩疥。今
人用以滌衣。又曰。鹼乃軟堅消積
之物。食之。使人泄瀉。以其陰溼之
性。潤下。軟堅。透肉。故於腸胃非宜。
作泄胃導者。忌之。
配合應用 治消積破氣。石

鹼三錢。山查三兩。阿魏五錢。半夏
皂莢水製過一兩。爲末。以阿魏化
醋。煮糊丸服。(摘玄方)

治一切目疾。白睛。擦去黑碎
者。厚紙七層。包掛風處四十九日。
取研極細。日日點之。(普濟方)

治拳毛倒睫。川刀微刺動。以
藥泥眼胞上。睫自起也。石鹼一錢。
石灰一錢。醋調塗之。(摘玄方)

治患牙疼痛。范蠶填孔內立
止。(儒門事親方)

治瘰癧。疣贅。花鹼。以水
麥稈灰汁煎二味。令乾。等分爲末。
以針刺破。水調點之。三日三上。卽
去。須新合乃效。(聖濟總錄方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡中虛無積者禁
用。

【石鹽】 卽光明鹽之古籍別名。
典見唐本草。詳『光明鹽』條。
卽礬石之古籍別名。典見別錄。詳
『礬石』條。卽戎鹽之俗名。詳
『戎鹽』條。

【石鹼】 命名 本品形似土鹼。
故名。
形態 石鹼爲石類之一種。其

四七四

形大小似如麻蟲。蓋土鹼之化成
石類者。也可供藥用。

性質 甘涼。無毒。
主治 淋疾。血痢。磨水服。
【示姑】卽半夏之古籍別名。典見
和漢藥考。詳『半夏』條。

【禾蟲】 產地 出浙閩粵諸省
之海濱。及稻田間。

形態 禾蟲或如蠶。或如螞蟻。
或如蚯蚓。甚者長至丈餘。節節有
口。初生青色。至霜降前。稍熟。蟲亦
熟。色紅黃。常乘潮勢。斷節而出。日
浮夜沉。浮則水面皆成紫色。其蟲
可供藥用。

採取 以巨口狹尾之網。繫於
棹。逆流迎之。網尻有囊。重則傾瀉
於舟而取之。

製法 採得以鹽醋滴入。則裂
出。以白米泔水浸。再以濾過用。

主治 補脾胃。生血。利濕。行小
便。
施用宜忌 凡患疥癬者。食之
作膿。勿用。

參攷資料 禾蟲。閩人常以糞
食。或作膏食。餉客爲饈。云能補脾
健胃。或蒸鷄鴨蛋。牛乳。其味最鮮。

(類目拾遺)

【立制石】即理石之古籍別名。與見本經。詳『理石』條。②即滑石之古籍別名。與見和漢藥考。詳『滑石』條。③即膽礬之古籍別名。與見和漢藥考。詳『膽礬』條。

六 畫

【交加子】即根棋子之古籍別名。與見綱目。詳『根棋子』條。
【交時】即卷柏之古籍別名。與見別錄。詳『卷柏』條。
【交趾桂】即肉桂之產於交趾者。質鬆皮直起花。肉紫油黑。甜多辣少。為桂之上品。功用詳『肉桂』條。
【交蕓】即何首烏之古籍別名。與見和漢藥考。詳『何首烏』條。
【交麻】即胡麻之古籍別名。與見杜寶拾遺記。詳『胡麻』條。
【交蠶】即婦韶之古籍別名。與見說文。詳『婦韶』條。
【交蕓】即蕓參之古籍別名。與見趙蕓臣蕓參新研究。詳『蕓參』條。
【仰天皮】即地衣草之古籍別名。與見本草拾遺。詳『地衣草』條。

五 畫 立

【仰盆】

產地 生山野間。

形態 仰盆為蔓草類之一種。其根如仰盆。大如鷄卵。可供藥用。

性質 辛溫。有小毒。

主治 飛尸喉痺。蠱毒。水腫。服。并傳皮膚癢腫。

【仲思棗】

命名 昔北齊時有仙人仲思者。得種植之故名。

古籍別名 仙棗。(本草綱目)

形態 仲思棗為果類棗之別種。其實如大棗。長三四寸。圍五寸。紫色細紋。肉肥核小。可供食與藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 益氣補虛。潤五臟。治痰嗽冷氣。久服令人肥健。好顏色。成仙不飢。

【任】即楮實子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『楮實子』條。

【伊吹防風】即邪蒿之日本名。詳『邪蒿』條。

【伊祚】即全蠖之古籍別名。與見和漢藥考。詳『全蠖』條。

【伊勞白粉】即輕粉之古籍別名。

六 畫 交 仰 仲 任 伊 伏

與見和漢藥考。詳『輕粉』條。

【伏牛】即伏牛花之簡稱。詳『伏牛花』條。

【伏牛枝及根葉】

主治 一切腫痛風疾。細剉焙研。每服一錢。用溫酒調下。

【伏牛花】

古籍別名 虎刺。(圖經本草) 隔虎刺

花。鳳油刺。(和漢藥考)

外國名詞 Berberis vulgaria, L. (拉丁)

基本 屬於小蘗科。為伏牛之花與根。

產地 蘇頌圖經本草云。伏牛花生蜀地。所在皆有。今惟益州有之。多生川澤中。



(一) 花 牛 伏

形態 伏牛花根蔓延分枝。外面現淡褐色。有皺裂。木部作淡黃色。其外皮有苦味。



(二) 花 牛 伏

種類 名 Berberis Sibthoi, Miq. 名 Berberis Vulgaris, L. var Japonica, Reg.

採取 三四月採。陰乾。

性質 苦甘。平。無毒。

成分 伏牛花。根含有礆魯培林。按此礆魯培林。不惟伏牛花科植物之根中有之。即黃連根中亦有之。為苦味質之植物鹽基。乃其主要成分也。

效能 用為健胃藥。

主治 久風濕痺。四肢拘攣。骨肉疼痛。作湯治風眩頭痛。五痔下血。

用量 一錢至三錢。

著名方劑 伏牛花散。治男女一切頭風發作。有時甚則火膽熱。

秘。(楊子建護命方)用伏牛花。山茵陳。桑寄生。白牽。川芎。僵蠶。蠟梅。各二錢。荊芥。穗四錢。共為末。每服二錢。水煎一沸。連滓服。

四 七 五

六齋 伏

參攷資料 伏牛葉青細。似黃蘗葉而不光。莖亦有刺。開花淡黃色。作穗似杏花而小。三月採陰乾。又陳州所生虎刺云。凌冬不凋。彼人無時採根葉治風腫疾。(蘇頌) 伏牛花。治風濕有名。而用者頗少。楊子建護命方有伏牛花散用之。(李時珍) 伏牛山野自生之灌木。種植者多作賞玩用。日本之南部極多。前者莖高五六尺。分枝歧生。有針狀或三裂之刺。葉皆對生。為長倒卵圓形。或長橢圓形。邊緣有細毛。花小色黃。五六月間。作寸許之總狀花序排列。後則結球圓形之紅色漿果。後者高六尺。最高者達一丈。莖有長枝與短枝。長枝葉互生。為針狀。短枝葉叢生。為長倒卵圓形。葉緣皆有鋸齒。花小色黃。作總狀花序排列。後結長橢圓形之漿果。(和漢藥考) 外國產之 Berberis Vulgaris。亦為灌木。高五六尺。樹之外皮作灰褐色。木質黃色。枝間有刺。葉對生。為倒卵圓形。邊緣有細鋸齒。葉側開六瓣小花。排列為總狀花序。入藥者採用根上之外皮。謂之

Cortex Radicis Berberis 味苦。中含秘魯培林。其漿果兩端扁平。色鮮紅。中藏核二三個。成熟者含有林檎酸。謂之「Fructus Berberis」。亦供藥用。(和漢藥考) 【伏牛根】功用與伏牛枝同。見「伏牛枝」條。 【伏牛葉】功用與伏牛枝同。見「伏牛枝」條。 【伏老】即瓦楞子之古籍別名。與見綱目。詳「瓦楞子」條。 【伏兔】即飛廉之古籍別名。與見別錄。詳「飛廉」條。 【伏念魚】即杜父魚之古籍別名。與見今海志。詳「杜父魚」條。 【伏兔】即茯苓之古籍別名。與見本經。詳「茯苓」條。 【伏蛇皮】即旁行出土桑根之皮。與桑白皮性味不同。有毒。能治心痛。 【伏鹿麋】即地骨皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳「地骨皮」條。 【伏蟻】即飛廉之古籍別名。與見別錄。詳「飛廉」條。 【伏龍肝】原名 寇心土。命名 本品係寇中

釜月下之黃土。以寇有神。故名伏龍。伏龍者。寇神也。 處方用名 寇心黃土。 古醫別名 寇中黃土。釜月下土。(和漢藥考) 基本 寇底中心土。或寇額土。為火氣熏燒多年而成。 產地 陳仁山藥物生產辨云。寇心土。凡遇有人在大山修葺山墳。各工人在山掘地作寇。在該山左右取出草樹枝而燒者。此寇燒得一二月。收工拆去。即將該寇內之土掘掘出。此正寇心土也。不可多得。近日藥肆所用之寇心土。乃烟風爐也。 形態 伏龍肝乃寇心土。久經火氣結成如石。外赤中黃。或紫赤色。 採取 採無時。 製法 雷斅曰。凡使勿誤用寇下土。其伏龍肝是十年以來。寇額內火氣積久自結。如赤色石。中黃。其形似八稜。取得研細。以水飛過用。 性質 辛。微溫。無毒。 效能 溫中止吐。燥濕。止血。用

四七六

作鐵吐藥。及為止血藥。與婦科藥。 主治 婦人崩中吐血。止欬逆。血積調滯。癰腫毒氣。 張仲景之證明 黃土湯一方用之。 歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論伏龍肝曰。止鼻衄。腸風。帶下。尿血。洩精。儲生下胞。及小兒夜啼。【明】李時珍本草綱目論伏龍肝曰。治心痛。狂癩。風邪。癰毒。妊娠護胎。小兒疳積。重舌。風味。反胃。中惡。卒驚。諸瘡。【明】穆希雍本草經疏論伏龍肝曰。伏龍肝味辛。氣微溫。無毒。甄權言然。其實本土。味應有甘。以寇有神。故古方多以之治頭狂。瘰癧。及卒中邪惡等證。本經主婦人崩中吐血。止欬逆。止血者。蓋以失血過多。中氣必損。甘能補中。微溫能調和血脈。故主之也。消癰腫毒氣者。辛散酸軟之功也。日華子主儲生下胞。及小兒夜啼者。取其土中有神。而性本沖和。復能鎮重下墜也。【清】黃宮繡本草求真論伏龍肝曰。伏龍肝係寇心赤土。因其色赤如肝。故以肝名。味辛。氣微溫。無毒。按土為萬物之

母在人腹時。則以脾胃應之。故萬物非土不生。人身五臟六腑。非脾胃不養。是以土能補人脾胃。伏龍肝久經火熱。則土味之甘。已轉為辛。土氣之和。已轉為溫矣。凡人中氣不運。則是氣是血。靡不積聚為痰。是痰是水。靡不凝結作祟。昔言救逆反胃。腫脹疝瘕。可治者。以其得此補土燥濕之謂也。昔言吐血崩帶。尿血遺精。腸風可治者。以其失血過多。中氣必損。得此微溫調和血脈也。癰腫可消者。以其辛散頓堅之意也。日華子取其能催生下胞者。以其溫中而鎮重下墜也。要之皆為調中止血燥濕之劑耳。研細水飛用。【清】汪劭庵本草備要論伏龍肝曰。伏龍肝辛溫。調中止血。去濕消腫。治欬逆反胃。吐衄崩帶。尿血遺精。腸風癰腫。疝瘕丹毒。僮生下胎。釜心多年黃土。一云。應額內火氣。積久結成如石。外赤中黃。研細水飛用。【清】楊時泰本草逸鈎元論伏龍肝曰。伏龍肝乃脾與肝之劑。蓋取火土相生以為各證之主治。在人身惟脾胃應之。更為中土之主。以司其用者。不在

六壘 伏

風化之肝乎。第火土相生之義。如以為燥可去溼。猶止得其膚而未悉其微也。夫脾胃固司溼土之化。而同乾健之運。所以然者。有水中之真火為之母氣也。如土不得水中之火。則溼土無以行其化。水即不得土為之主。而寒水亦無以行其化。是水土合德以立地者。由是而兩困也。致令一陰之為獨使者。下失水之母氣。中失土之用氣。不病於風之虛。以為風貨。而還以侮所勝之土乎。故必本火土相生之義。俾水土各奠其位。又必因水土合德之義。俾土木互相為用。乃全其中土生育之化。是則黃土之用。非漫然去溼也。正欲用陽以化陰。而俾溼化得行也。溼化行而血乃化。所以治血症者。非以止溼為功。蓋藉其生化之原。乃為因脫耳。推之女子崩帶。男子洩精。胥效矣。亦非用其燥也。更欲化陰以和陽。而俾風化得平也。風化平而氣乃和。所以療風證者。非以疎散為功。蓋益其合化之原。乃為靜風耳。推之狂顛癡毒。中惡瘡癩。可愈矣。或曰。精土多用燥溼之劑。如白朮等味。

與茲種何別。而迥殊若是。曰。治血症多不用朮者。恐其燥陰而反劇耳。此味固用陽以化陰。非燥陰之劑也。先哲審處。夫豈苟然而已哉。【清】鄒澍本經疏證論伏龍肝曰。竈中黃土。治何等崩中吐血。此所當急知者也。夫血主於心。統於脾。藏於肝。主猶領也。統猶本也。制治也。藏懷抱之也。是故不能領攝者。病在心。如本經心腹內崩。崩中脈絕等治是也。不能制治者。病在脾。如本經崩中下血。崩中下血五色等治是也。不能懷抱者。病在肝。如本經崩中漏下。及凡言漏下赤白等治是也。則竈中黃土所主。乃脾病而崩中者也。夫以土為血本者。如輿雲致雨。必由於地。以土而制治血者。如江河之行。必循於地。苟地蔽其氣。則生長無源。若失其防。則潰決四出。下則為崩。為洩。上則為欬。為吐。則竈中黃土之用。乃脾不能制治夫血也。土之所以不能防水者。或以土之不埴。或以水力過猛。或以久溼漚漚。觀仲景黃土湯治血在便後。與甘草地黃白朮附子。阿膠黃芩並用。則竈中黃土

之功能於脾家。調運水火者也。夫土得溼則澤。復暴以熱則憤起。比之於癰腫。恰無以異。以常燔而不傷之土氣過之。則向之憤者消矣。即此亦可并證血病者也。

國外學說 日本陸軍藥劑官相模嘉作氏亦定為妊娠嘔吐之良藥。著有伏龍肝煎實驗談一篇。其文曰。中國方藥。目下甚為人所重視。緣其著有卓效者。勝於西洋新藥遠甚。即如今人所用妊娠嘔吐之藥劑。蓋西洋各種新藥。如亞柯尼欽。鹽酸礆。魯培林。羧酸攝備。鹽酸古加因。雙養汽水。沃度。阿蘇。番木甯酒之類。其奏效均不如中藥之確實。中藥維何。伏龍肝煎是已。按伏龍肝煎。本中醫發明之藥。日本無此土。則以土製煨爐（即赤土製之七輪）或焙焙燈明皿等代之。亦如伏龍肝之愈久者為佳。茲但選土製煨爐。此爐以黃土燒製而成。黃土係尋常陶土之一種。其主成分如珪酸。礆土。與水。此外尚略含酸化礆。水酸化礆。加里鹽類。加爾卑。苦土鹽等。愛知縣出品為最良。入藥用者。鐵錘擊

四七七

六畫 伏

碎其燄。使成極細。投炭火中燒之。俟碎片煖紅透散。巨鉢盛井水約九分滿。取碎片盡淬水中。經二三分鐘取出。再燒再淬。反覆至數十次乃止。棄碎片不用。而專用此淬碎片之水。將水濾淨。使成無色無臭無味之澄清液。收貯備用。用量每取二合。作一頓服。服後至遲不過一二時。氣分即見恢復。食慾儘進。曾實驗多次。治愈數人。無不立奏奇效。故余每勸人服用。毋貽後悔。暇時尙當研究其有效成分。貢之於世。

配合應用 ①治卒中惡氣。伏龍肝末一雞子大。水服取吐。(千金方)

②治髮癢暴絕。窻心對鍋底土研末。水服二錢。更吹入鼻。(千金方)

③治中風口噤。不語。心煩恍惚。手足不隨。或腹中痛滿。或時絕而復甦。伏龍肝末五升。水八升。攪澄清。漬之。(千金方)

④治狂顛謬亂。不識人。伏龍肝末。水服方寸匕。日三服。(千金方)

⑤治小兒夜啼。伏龍肝末二錢。

殊砂一錢。麝香少許。爲末。蜜丸。綠豆大。每服五丸。桃符湯下。(普濟方)

⑥治小兒重舌。釜下土和苦酒塗之。(千金方)

⑦治重舌腫水。伏龍肝末。牛蒡汁調塗之。(聖惠方)

⑧治冷熱心痛。伏龍肝末方寸匕。熱以水溫。冷以酒服。(外臺祕要方)

⑨治反胃吐食。窻中土。年久者爲末。米飲服三錢。(百一選方)

⑩治卒然欬嗽。釜月土一分。豉七分。搗丸。梧桐子大。每飲下四十九丸。(肘後方)

⑪治吐血衄血。伏龍肝末半升。新汲水一升。淘汁和蜜服。(廣利方)

⑫治吐血瀉血。心腹痛。伏龍肝地壘土。多年烟壁土。等分。每服五錢。水二盃。煎一盃。澄清空心服。白粥補之。(普濟方)

⑬治婦人血漏。伏龍肝半兩。阿膠。蠶沙炒各一兩。爲末。每空肚酒服二三錢。以知爲度。(衍義方)

⑭治赤白帶下。日久黃痒。六脈

微瀉。伏龍肝炒令烟盡。棕桐灰。屋梁上塵。炒烟盡。等分。爲末。入龍腦。麝香各少許。每服三錢。溫酒或淡醋湯下。一年者半月安。(大全力)

⑮治產後血氣攻心痛。惡物不下。用窻中心土研末。酒服二錢。瀉出惡物立效。(救急方)

⑯治妊娠熱病。伏龍肝末一雞子許。水調服之。仍以水和塗臍方寸。乾又上。(傷寒類要方)

⑰治子死腹中。母氣欲絕。伏龍肝末三錢。水調下。(十全博效方)

⑱治橫生逆產。窻中心對鍋底土。細研。每服一錢。酒調。仍揉母臍中。(救急方)

⑲治胸衣不下。窻下土一寸。醋調。納臍中。續服甘草湯三四合。卽下。(產寶方)

⑳治中諸蟲毒。伏龍肝末一雞子大。水服取吐。亦治六畜肉毒。(千金方)

㉑治陰冷發閉。冷氣入腹。腫滿殺人。釜月下土。和雞子白。傅之。亦治男陰卒腫。(千金方)

㉒治諸腋狐臭。伏龍肝末。頻傅之。(千金方)

四七八

⑳治野耳出汁。綿裹伏龍肝末塞之。日三易。(聖濟總錄方)

㉑治小兒辟瘡。伏龍肝末。傅之。(聖惠方)

㉒治小兒丹毒。多年窻下黃土末。和屋漏水。傅之。新汲水亦可。雞子白或油亦可。乾卽易。(肘後方)

㉓治小兒熱瘡。釜下土。生椒末等分。醋和塗之。(千金方)

㉔治瘰癧久爛。窻內黃土。年久者。研細末。黃髮。黃丹。赤石脂。輕粉末。等分。清油調。入油糊中。貼之。勿動。數日愈。縱痒忍之。(濟急方)

㉕治發背欲死。伏龍肝末。酒調。厚傅之。乾卽易。平乃止。(千金方)

㉖治一切癰腫。伏龍肝以蒜和作泥貼之。乾再易。或雞子黃和亦可。(外臺祕要方)

㉗治杖瘡腫痛。釜月下土。爲末。油和塗之。臥羊皮上。頻塗。(千金方)

㉘治灸瘡腫痛。窻中黃土末。煮汁淋之。(千金方)

㉙用蠶 五錢至一兩。

施用宜忌 凡無寒溼者禁用。

醫名方劑 黃土湯。治下血先

便後血。此遠血也。金匱方用甘草。乾地黃。白朮。附子。阿膠。黃芩。各三兩。隨中黃土半斤。以水八升。煮取三升。分溫三服。

參攷資料 按廣濟歷作瘧

忌日云。伏龍在。不可移作。則伏龍者。乃竈神也。後漢書言陰子萬。臘日晨炊而竈神見形。註云。宜市買豬肝泥。令婦孝。則伏龍肝之名。義又取此也。臨安陳與言。砌竈時。納豬肝一具於土。候其日久。與土為一。乃用之。始與名符。蓋本於此。獨孤酒丹書言。伏龍肝取經十年。窻下招深一尺。有色如紫。交者是真。可縮賀伏丹砂。蓋亦不知豬肝之義。而用窻下土以爲之也。(李時珍) 陰虛吐血者不宜用。以其中有火氣故也。癰腫毒盛。雖消者不得獨用。(經希雅)

【伏雞子】

古籍別名 承露仙。(本草綱目)

產地 生四明天台諸山野間。

形態 伏雞子爲蔓草類之一種。其莖蔓生。圓莖而薄如錢。其根似烏形者。可供藥用。性質 苦寒無毒。

主治 解百藥毒。諸熱煩悶。急黃。天行黃疸。癰瘡。中惡寒熱。頭痛。疳積。馬黃牛瘧。水磨服之。新者尤佳。亦傳癰腫。

【伏翼】 卽蝙蝠之原名。詳「蝙蝠」條。

【伏冥尿】 卽夜明砂之原名。詳「夜明砂」條。

【伏蠊】 卽伏苓之原名。詳「伏苓」條。

【伐曲火】 卽漏盧之古籍別名。典見和漢藥考。詳「漏盧」條。

【休】 卽無實李之古籍別名。典見爾雅。詳「無實李」條。

【休羽】 卽刺蒺藜之古籍別名。典見本草經。詳「刺蒺藜」條。

【光杏仁】 卽杏仁之處方用名。詳「杏仁」條。

【光明砂】 卽硃砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「硃砂」條。

【光明草】 卽狗尾草之古籍別名。典見綱目。詳「狗尾草」條。

【光明鹽】 命名 本品功能開胃明目。而如雲離日則光明也。故名。古籍別名 石鹽。(唐本草) 鹽

石。(蜀本) 水晶鹽。君王鹽。崖鹽。(本草綱目)

產地 生山崖間。或生鹽池底。

形態 光明鹽爲石類鹵鹽屬之一種。山產者塊如白礬。鑿潔似水晶。水產者狀類水晶。石。英。俱可供藥用。

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛。諸風。目赤痛。多眵淚。

參攷資料 光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風。眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽。而力差次之。(李時珍)

【光珀】 卽琥珀之處方用名。詳「琥珀」條。

【光風草】 卽苜蓿之古籍別名。典見綱目。詳「苜蓿」條。

【光香】 卽沉香之枯燼。如山石者。性質功用。與煎香同。參見「煎香」條。

【光粉】 卽白粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「白粉」條。

【光骨刺】 卽郭公刺之古籍別名。典見綱目。詳「郭公刺」條。

【光參】 卽海參之無刺者。詳「海參」條。

參」條。

【光燕】 卽燕窩之處方用名。詳「燕窩」條。

【全瓜蒌】 卽瓜蒌仁皮合用之處方用名。分見「瓜蒌仁」「瓜蒌皮」條。

【全胡】 卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「前胡」條。

【全當歸】 卽當歸之處方用名。詳「當歸」條。

【全福花】 卽旋覆花之處方用名。詳「旋覆花」條。

【全福梗】 卽旋覆花之處方用名。爲花與梗同用者。詳「旋覆花」條。

【全蠍】 原名 蠍。命名 蠍乃毒蟲。其毒在尾。入藥用尾者名蠍梢。全用者名全蠍。處方用名 蠍尾。蠍梢。古籍別名 螭。主簿蟲。(開寶本草) 蠶尾蟲。杜白(廣雅) 伊群。湯砂。蝮。蝮。和漢藥考) 外國名詞 Scorpion (拉丁) Scorpion (英)(德)

基本 屬蜘蛛類。爲節足動物之蠍。

六 蠶 伏 伐 休 光 全

產地 和漢藥考曰。蠶產高麗、中國、臺灣等處。凡陰溼石下及牆壁地板之下。恒多棲息焉。

形態 按蠶之頭胸部短。腹部較長。後腹部狹而尤長。末端具有毒鈞。全體凡十三環節。其中後腹部有六環節。眼有二。在頭之中央。尚有單眼四。足四對。末端有爪。觸鬚長大。能螫人。全體長二三寸至五寸。其大小隨產地而異。色有紅褐、青、黑種種。動作悉恃觸鬚。以之挾持他蟲。而以上顧噬嚼之。或則以其後腹部反轉頭上。而以毒鈞刺殺之。毒鈞之猛烈。出人意。外人若被其刺傷。竟有腫痛至死者。乃最可畏之節足動物也。



蠶全

製法 寇宗奭曰。凡使全蠶。捕得。以漫火逼之。或烈日中晒至蠶渴時。食以青泥。既飽。以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而傳之也。

用者當去其土。蘇頌曰。今汴洛河南州郡皆有之。採無時。以火逼乾死之。

性質 甘。辛。平。有毒。
效能 搜風。治驚。用治五疳驚風藥。

主治 諸風癱瘓。及中風半身不遂。口眼喎斜。語澀。手足抽掣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論全蠶曰。小兒驚癇風。搗大人痰瘕耳聾。疝氣。諸風。瘡。女人帶下。陰脫。【明】繆希雍本草經疏論全蠶曰。蠶甘辛有毒。然察其用。應是辛多甘少。氣溫入足。既陰經。諸風掉眩。屬肝木風客是經。非辛溫走散之性。則不能祛風逐邪。兼引諸風藥入達病所也。故大人真中風。及小兒急驚風。皆須用之。【清】黃宮繡本草求真論全蠶曰。全蠶味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝。驅風。凡小兒胎風發。搗大人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇塞。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蠶尾脊。以治胎風發搐。內用蠶梢二十一枚。入麝香少許。賦

效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蠶。同白附。磁石。為末。酒服甚效。又有同羌活。柴胡。當歸。生地。名丁香柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蠶以散血分之風熱耳。但帶下非風非熱。不用。并一切內虛似風等症。切忌。全用去足焙。或用尾。尾力尤緊。形緊小者良。忌蝸牛。

近人學說 張山雷曰。蠶乃毒蟲。味辛。其能治風者。蓋亦以善於走竄之故。則風淫可祛。而溼痺可利。若內動之風。宜靜不宜動。似非此大毒之蟲。所可妄試。然古人恒用以治大人風涎。小兒驚癇者。良以內風暴動。及幼科風癇。皆挾痰濁上升。必降氣開痰。始可暫平其熱。觀古方多用蠶尾。蓋以此蟲之力。全在於尾。而尾之性情。下行為順。且又筋節靈通。開宣之力。必然迅利。納氣泄痰。其旨如是。頗與蘇蛇烏蛇之專治大風惡瘡者。不可同日而語。且藥肆中此物皆以鹽漬。則鹽亦潤下。正與氣血上菴之病情。針鋒相對。入煎劑。輕者三尾。重用至四五尾。亦有入丸散用者。則可較多。然總之。是巨使之物。不可

專作園材也。
配合應用 治小兒驚風。宜風散。唇青口撮。出白沫。不乳。用全蠶二十一箇。無灰酒塗。炙為末。入麝香少許。每用金銀煎湯。調半字服之。(全幼心鑑方)

治慢脾驚風。小兒久病後。或吐瀉後。生驚。轉成慢脾。用蠶梢一兩。為末。以石榴一枚。剝空。用無灰酒。調末。填入。蓋定。坐文武火上。時時攪動。務取出。放冷。每服一字。金銀薄荷湯調下。又治吐利後。昏睡。生癲癩。慢脾症。全蠶。白朮。麻黃。去節。等分為末。三歲以下。一字。三歲以上。半錢。薄荷湯下。(本草方)

治天釣驚風。翻眼向上。用乾蠶全者一箇。瓦炒好。硃砂三綠豆大。為末。飯丸。綠豆大。外以硃砂少許。同酒化下一丸。頓愈。(聖惠方)

治小兒胎驚。蠶一枚。薄荷葉包。炙為末。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯。調下一字。效。(湯氏寶書方)

治小兒驚風。用蠶一箇。頭尾全者。以薄荷四葉。裝定。火上炙。魚同研。為末。分四服。白湯下。亦治火

八風流(經方)

①治風淫痺。手足不舉。筋節
攣疼。先與通關。次以全蠍七箇。瓦
炒。入麝香一字。研勻。酒三盞。空心
調服。如覺已透。則止。未透再服。如
病未盡除。自後專以婆蒿根洗淨。
酒煎日二服。(直指方)

②治破傷中風。乾蠍。麝香各一
分。爲末。傅患處。令風速愈。(普濟
方) 用乾蠍酒炒。天麻各半兩。爲
末。以蠟酥二錢。湯化爲糊。和搗丸。
綠豆大。每服一丸。至二丸。豆淋酒
下。甚者加至三丸。取汗。(聖惠方)

③定痛丸。治腎虛冷。氣攻脾
腹痛。不可忍。及兩脇疼痛。用乾
蠍七錢半。焙爲末。以酒及童便各
三升。煎如稠膏。梧子大。每酒下
二十九。又婢婦散。用婢婦三十枚。
頭足全者。搗一地坑。深闊各五寸。
用炭火五斤燒赤。去火淋醋一升。
入內。待溼乾。排婢婦於坑底。掩蓋
一夜。取出。木香。蘿蔔子。炒各一分。
胡椒三十粒。檳榔。肉豆蔻。一箇。爲
末。每服一錢。熱酒下。(聖惠方)

④治小腸疝氣。用紫小全蠍。焙
爲末。每發時服一錢。入麝香半字。

溫酒調服。少頃再進。神效。

⑤治腎虛耳聾。十年者。二服可
愈。小蠍四十九箇。生薑如蠍大。四
十九片。同炒。置乾爲度。研末。溫酒
服之。至一二更時。更進一服。至醉
不妨。次日耳中如有笙簧聲。卽效。
(杜玉方)

⑥治耳暴聾閉。全蠍去毒爲末。
酒服一錢。以耳中聞有水聲。卽效。
(周密志雅堂雜鈔方)

⑦治膿耳疼痛。蠟七枚。去毒
焙。入麝香半錢。爲末。挑少許入耳
中。日夜三四次。以愈爲度。(楊氏
家藏方)

⑧治偏正頭風。氣上攻。不可忍。
用全蠍二十一箇。地龍六條。土狗
三箇。五倍子五錢。爲末。酒調攤貼
太陽穴上。(德生堂經驗方)

⑨治風牙疼痛。全蠍三箇。蜂房
二錢。炒研。擦之。(直指方)

⑩治腸風下血。乾蠍炒。白礬燒
枯。各二兩。爲末。每服半錢。米飲下。
(聖惠方)

六蠶全共再冰

⑪治諸痔發瘡。用全蠍不拘多
少。燒烟熏之。卽效。祕法也。(袖珍
方)

⑫治諸瘡毒腫。全蠍七枚。梔子
七箇。麻油煎黑。去滓。入黃蠟化。成
膏。傅之。(濟察方)

⑬全蠍二隻至四隻。蠍尾
三隻至八隻。
施用宜忌 凡虛而無真中風
邪者禁用。

參攷資料 ⑭今青州山中石
下捕得。慢火逼之。或烈日中晒。至
蠍渴時。食以背泥。既飽。以火逼殺
之。故其色多赤。欲其體重而售之
也。用者當去其土。(寇宗奭) ⑮今
汴洛河陝州郡皆有之。採無時。以
火逼乾之。陶隱居集驗方。言蠍有
雌雄。雄者螫人。痛止在一處。用井
泥傅之。雌者痛牽諸處。用瓦溝下
泥傅之。皆可。畫地作十字。取土水
服方寸匕。或在手足以冷水漬之。
微暖卽易。在身以水浸布。搗之皆
驗。又有呪禁法。亦驗。(蘇頌) ⑯段
成式酉陽雜俎云。江南舊無蠍。開
元初。有主簿以竹筒盛過江。至今
往往有之。故俗稱爲主簿蟲。(馬

志) ⑰蠍出青州。形緊小者良。段
成式云。鼠負蟲巨者。多化爲蠍。蠍
子多負於背。子色白。纒如稻粒。陳
州古倉有蠍。形如錢。螫人必死。蠍
能食之。先以跡拒之。不復去也。(
馬志) ⑱按唐史云。劍南本無蠍。
有主簿將至。遂呼爲主簿蟲。又張
揖廣雅云。杜白蠍也。陸機詩疏云。
蠍一名杜白。幽州人謂之蠍。觀此
則主簿乃杜白之訛。而後人遂傳
會其說。許慎云。蠍。蠶尾也。長尾
爲蠶。短尾爲蠍。葛洪云。蠍前爲蠶。
後爲蠍。古語云。蚌蟹非世。其毒在
尾。今人藥有全用者。謂之全蠍。有
用尾者。謂之蠍梢。其力尤緊。(李
時珍)

四八一

【共石】卽滑石之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「滑石」條。
【再生丹】卽荊芥之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「荊芥」條。
【冰片】 原名 龍腦香。
 命名 本品白瑩如冰。
 而作梅花片者良。故名。所謂龍腦
 者。乃狀其名貴也。
 處方用名 梅片。梅花冰片。
 古籍別名 羯婆羅香。(本草

六畫 冰

衍發) 婆律香(蘇恭) 冰片腦。梅
花腦(俗名) 米腦。片腦。遠腦。金脚
腦。若龍腦(本草綱目) 原香。腦子
虛飯。元慈勒。固不婆律(和漢藥
考)

外國名詞 Borneo-Camp-
hor(英) Borneol(德)

基本 屬龍腦樹科之龍腦樹
Dyobalanops Camphora Co-
lob. 其樹幹縱裂之溝中。有作堅
實巨塊析出之揮發油C₉H₁₄
○遇空氣凝固結成之物。

產地 產南洋羣島。以龍牙吧
東為最正地道。其次山打根。蘇門
答臘。及渤尼等處。出無時候。又名
梅片。因其色白若梅花。故有梅花
冰片之稱。又有一種冲冰片。名為
機器片。由德國來者。質結而滑。由
日本來者。質淨。乃因樟腦入機器
水極打擊而成。入口味熱而不走
色。浮白。正冰片入口清涼而走。色
潤如蝦肉。機器片每觔銀一元餘。
十淨正梅片。每觔銀一百餘元。此
亦緊要之藥。作偽售之。其何以安
形態 龍腦樹為高大喬木。葉
硬。作卵圓形。末端尖。呈暗綠色。揉

嗅之。有龍腦香氣。開白色五瓣
花。後結內分三房之覆果。有香氣。
本品之純良者。為無色透明結晶
片。易破碎。味如灼。於一百九十八
度融解。二百十二度沸騰。比重○
九九。投於水中。則浮水面而旋
轉。點火則燃燒。不留殘渣。稍溶於
水。易溶於酒精。伊打等。



冰片

種類 ●龍腦香乃其乾脂。○
婆律香乃其清脂。

製法 蘇恭曰。龍腦香合糯米
炭相思子貯之。則不耗。李時珍曰。
或言以雞毛相思子。同入小竈。燒
密收之。佳。相感志言。以杉木炭。裝
之。更良。不耗。今人多以樟腦升打
亂之。不可不辨也。

性質 辛苦。微寒。無毒。
效能 通諸竅。散鬱火。去醫明
目。搜風治癩。本品用治中暑。霍亂
藥。又為胸腹止痛。與鎮咳等藥。入
胃後。能刺激胃。令人腹部覺

熱而爽。與胃液腸液等不起變化。
至腸能刺激腸壁神經。使腸蠕動
增進。且能殺殺菌。又能停止其
卵之發育。本品於未入血之前。
僅有極小部與胃腸中之葡萄糖
化合。及小腸。始被腸壁吸入血中。
即能大增白血球之數。使血液迅
速循環。大腸神經。亦被激而興奮。
心臟跳動亦較顯明。精神十分充
足。慾念亦勃然興起。若服量過多。
則腦神經因受激過度。反由興奮
而轉入麻痺狀態。

主治 心臟衰弱症。百日咳。婦
人難產。研末少許。新汲水服。立下。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新
修本草論冰片曰。心腹邪氣。風溼
積聚。耳聾明目。去目赤膚翳。【唐】
李珣海藥本草論冰片曰。內外障
眼。鎮心秘精。治三蟲五痔。入骨治
骨痛。【宋】寇宗奭本草衍義論冰
片曰。此物大通。利關隔熱。塞大人
小兒風涎閉塞。及暴得驚熱。甚為
濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。
佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩
茶氣。味甚清香。為百藥之先。萬物
中香無出其右者。【金】張元素珍

四八二

珠囊論冰片曰。治大腸脫。【元】王
好古湯液本草論冰片曰。散心盛
有熱。【元】李杲用藥法象論冰片
曰。龍腦入骨風。病在骨體者。宜用
之。若風在血脈肌肉。輒用腦。反
引風入骨髓。如油入麵。莫之能出
也。【元】朱震亨本草衍義補遺論
冰片曰。龍腦屬火。世知其寒。而通
利。然未達其熱。而輕浮飛越。喜其
香而貴細。動輒與麝同為桂附之
助。然人之陽易動。陰易虧。不可不
思。【明】李時珍本草綱目論冰片
曰。療喉痺。鼻痛。傷寒。苦
出小兒痘陷。通諸竅。散鬱火。【明】
總希雅本草經疏論冰片曰。龍腦
本經味辛苦。氣微寒。無毒。其香為
百藥之冠。凡香氣之甚者。其性必
溫熱。李珣言溫。元素言熱是矣。氣
芳烈。味大辛。陽中之陽。升也。散也。
性善走竅。開竅無往不達。芳香之
氣。能辟一切邪惡。辛熱之性。能散
一切風溼。故主心腹邪氣。及風溼
積聚也。耳聾者。竅閉也。開竅則耳
自聰。目赤膚翳者。火熱甚也。辛溫
主散。能引火熱之氣。自外而出。則
目自明。赤痛膚翳自去。此從治之

法也。別錄又主婦人難產者。取其善走。開通關竅之力耳。【清】黃宮燾本草求真論冰片曰。冰片辛香氣竄。無往不達。能治一切風濕。不留內在。引火熱之氣。自外而出。然必風病在骨髓者宜之。若風在血脈肌肉間。用之反能引風直入骨髓。如油入麵。故凡外入風邪。變而為熱。仍自外解得宜。若使火自內生。而用此為攻逐。其失遠矣。昔王綸云。世人誤以冰片為寒。不知辛散性甚似涼耳。諸香氣皆屬陽。豈有香之至極。而尚可云寒者乎。是以癆瘵痰迷。風果入骨。病應是治。火鬱不散。九竅不通。治應是行。目赤。府窮。瘡。風寒。清宜外解。他如瘡。濕。癩。熱。鬱。不。散。亦。當。用。此。發。達。或。令。入。油。煎。膏。或。研。末。吹。擦。然。瘡。毒。能。出。不。可。多。用。則。真。氣。立。耗。而。有。亡。陽。之。弊。矣。更。有。自。病。陰。虛。不。宜。入。點。出。南。番。老。杉。脂。白。如。冰。作。梅。花。片。者。良。但。市。人。每。以。樟。腦。代。充。

六 蠶 冰

六。樟。牧。亮。四。郎。氏。ベ。ラ。カ。ニ。氏。及。猪。子。氏。等。之。試。驗。云。龍。腦。有。鎮。靜。或。麻。痺。之。效。然。因。是。而。生。之。害。亦。不。少。試。我。龍。腦。於。溫。血。動。物。則。反。射。機。能。減。退。心。臟。及。血。管。亦。漸。漸。麻。痺。因。是。而。血。壓。大。為。沉。降。終。至。於。死。亡。故。以。龍。腦。之。有。害。也。寧。廢。棄。之。况。其。價。亦。不。廉。乎。又。和。漢。藥。考。曰。龍。腦。概。產。於。東。印。度。之。渤。泥。蘇。門。答。臘。之。南。海。岸。由。品。類。而。異。其。名。稱。價。格。亦。各。不。同。衛。生。試。驗。彙。報。第。三。號。載。有。『龍。腦。艾。片。樟。腦。談』。一。文。對。於。龍。腦。之。名。稱。品。位。性。質。等。皆。有。詳。細。論。述。茲。即。據。其。所。說。更。參。考。諸。書。列。載。其。品。類。如。左。藥。肆。所。售。龍。腦。有。二。種。一。為。純。正。龍。腦。一。為。白。手。龍。腦。純。正。龍。腦。為。無。色。透。明。或。污。白。色。半。透。明。板。狀。物。或。粒。狀。物。亦。有。由。結。晶。破。碎。而。作。粉。粒。狀。者。質。脆。弱。易。粉。碎。折。之。無。聲。可。整。然。兩。斷。香。氣。馥。郁。溫。和。投。於。火。中。則。發。煤。煙。燻。燒。比。重。〇。九。九。一。龍。腦。之。結。晶。片。大。者。狀。類。梅。花。落。瓣。一。稱。梅。花。龍。腦。價。貴。結。晶。片。小。者。價。低。分。有。二。梅。三。梅。四。梅。等。名。稱。大。頭。閃。口。係。一。

梅。二。梅。之。混。和。物。一。梅。為。結。晶。片。之。最。大。者。悉。從。龍。腦。中。選。取。一。呼。大。梅。花。或。本。梅。花。紅。毛。龍。腦。三。梅。係。結。晶。片。中。選。集。次。於。二。梅。者。四。梅。係。結。晶。片。之。細。小。者。中。國。藥。舖。呼。為。冰。片。米。腦。係。結。晶。片。之。細。碎。粗。粉。一。呼。糖。片。白。手。龍。腦。係。從。廣。東。海。南。諸。島。所。產。菊。科。植。物。名。艾。納。香 *Drimys Balanifera* 所。製。之。固。形。揮。發。油。一。呼。艾。搗。布。羅。艾。片。結。片。日。本。即。由。中。國。輸。入。為。雪。白。色。或。半。透。明。之。結。晶。體。大。小。不。定。其。最。大。者。長。七。分。許。折。之。發。聲。整。然。兩。斷。破。碎。面。有。玻。璃。狀。光。澤。比。重。一。〇。〇。四。香。氣。硬。軟。及。性。質。等。皆。與。純。正。龍。腦。相。同。從。樟。腦。製。白。手。龍。腦。法。即。將。樟。腦。混。和。苛。性。加。里。液。中。加。金。屬。鈉。熱。之。則。龍。腦。昇。華。於。冷。處。結。晶。日。本。明。治。二。十。三。年。有。德。島。縣。人。有。持。泉。平。氏。發。明。薄。荷。霜。或。薄。荷。油。混。和。酒。精。苛。性。鹼。置。密。閉。器。中。燒。熱。製。造。龍。腦。之。方。法。政。府。特。許。專。利。若。龍。腦。為。最。清。淨。純。良。者。其。結。晶。帶。青。色。功。效。頗。優。云。

名。樟。片。即。樟。腦。用。西。法。提。出。偽。充。按。冰。片。唐。本。草。名。龍。腦。香。以。自。壁。如。冰。及。作。梅。花。片。者。為。上。品。氣。味。辛。苦。微。寒。無。毒。故。喉。症。目。疾。痔。瘡。外。科。多。用。之。且。功。能。通。竅。散。鬱。火。若。樟。腦。之。性。辛。溫。判。若。天。淵。更。有。一。種。熟。老。片。係。將。樟。片。攪。用。以。偽。亂。真。害。人。匪。淺。近。日。黃。三。仙。且。有。陶。黃。研。末。攪。入。者。此。又。不。可。不。知。矣。曹。炳。章。曰。按。梅。冰。一。名。龍。腦。產。大。泥。者。色。白。光。亮。片。薄。最。佳。文。來。出。者。色。亦。白。光。略。呆。略。次。呼。喇。叭。出。色。呆。片。厚。有。木。屑。攪。雜。次。麻。城。丁。家。路。呂。宋。龍。門。泊。等。處。出。皆。次。廣。西。百。色。縣。蒸。熬。大。楓。葉。以。煉。液。結。晶。成。粉。為。製。冰。片。之。原。料。曰。艾。片。亦。偽。作。冰。片。惟。治。疥。瘡。能。殺。蟲。辟。臭。穢。亦。佳。祇。可。作。外。治。藥。用。凡。合。丸。散。內。服。藥。及。眼。藥。內。切。不。可。充。用。有。毒。用。之。皆。人。匪。淺。又。一。種。樟。冰。用。樟。腦。同。薄。荷。升。煉。亦。只。能。用。於。殺。蟲。疥。癬。重。要。丸。散。亦。不。可。用。此。皆。偽。貨。也。化。學。易。知。云。龍。腦。亦。樹。液。也。樹。上。鑽。孔。其。汁。流。出。而。自。結。取。而。蒸。之。即。得。但。其。性。與。樟。腦。不。同。更。能。飛。散。香。氣。顯。

四 八 三

六盡 冰

粒皆不同。此為長方形。樟冰為八面形。龍腦原質。比樟冰多輕氣二分。大抵真者別頭。梅二梅三梅。以片之粗細分貴賤耳。惟四梅片。細質不純。為最次。不宜合藥用。再冰片。忌與酒同服。若與酒同服。錢許。即正氣散亂。血脈沸騰。必致七竅流血。須臾而死。凡中其毒者。宜即飲新涼水。毒自解。

配合應用 ①傳一切疔腫癰疽。用龍腦乳香沒藥雄黃紅藥子烏雞骨白及白敏桑補城牛黃。

②治目生膚翳。龍腦末一兩。日點三五度。(聖濟總錄方)

③治目赤目膜。龍腦雄雀屎各八分。為末。以人乳汁一合調成膏。日點之。無有不驗。(聖惠方)

④治頭目風熱上攻。用龍腦末半兩。南蓬砂末一兩。并勻頻噴兩鼻。(御藥院方)

⑤治頭腦疼痛。片腦一錢。紙卷作捲。燒烟薰鼻。俟吐出痰涎即愈。(壽域方)

⑥治風熱喉痺。燈心一錢。黃藥五分。並燒存性。白礬七分。煨過。冰片腦三分。為末。每以一二分吹患

處。此陸一舉家傳絕妙方也。(瀨湖集簡方)

⑦治鼻中瘻肉垂下者。用片腦點之。自入。(集簡方)

⑧治傷寒舌出過寸者。梅花片腦半分。為末。搽之。隨手即愈。(洪邁夷堅志方)

⑨治中風牙噤無門下藥者。開闕散搽之。五月五日午時。用龍腦。天南星等分。為末。每以一字搽齒。二三十遍。其口自開。

⑩治牙齒疼痛。梅花腦。硃砂末各少許。搽之。立止。(集簡方)

⑪治痘瘡狂燥。心煩氣喘妄語。或見鬼神。瘡色赤未透者。用龍腦一錢。細研。旋以猪心血丸。炙于大。每服一丸。紫草湯下。少時。心神便定。得睡。瘡發。(經驗方)

⑫又用獐猪第二番血清半盞。酒半盞。和勻。入龍腦一分。溫服。良久。利下。瘀血一二行。瘡即紅活。此治痘瘡黑。屢候惡。醫所不治者。百發百中。(總微論方)

⑬治內外痔瘡。片腦一二分。葱汁化搽之。(簡便方)

⑭治酒皸鼻赤。腦子真酥。頻搽。

(尊濟方)

⑮治夢瀧口瘡。經絡中火邪。夢瀧恍惚。口瘡烟燥。龍腦三錢。黃藥三兩。為末。蜜丸。梧子大。每麥門冬湯下十九丸。(摘玄方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。參攷資料 ①龍腦香及香。

出婆律國。樹形似杉木。腦形似白松脂。作杉木氣。明淨者善。久經風日。或如雀屎者不佳。或云子似豆。蔻皮有錯甲。即杉脂也。今江南有杉木。未經試。或方土無脂。猶甘蔗之無實也。(蘇恭) ②西域記云。西方林羅短吐國。在南部度境。有羯布羅香。幹如松株。而葉異。花果亦異。溼時無香。木乾之後。循理折之。中有香。狀類雲母。色如冰雪。即龍腦香也。(寇宗奭) ③今惟南海香舶買客貨之。南海山中亦有之。相傳云。其木高七八丈。大可六七圍。如積年杉木狀。旁生枝。其葉正圓而背白。結實如豆蔻。皮有甲錯。香即水中脂也。膏即根下清液。謂之婆律膏。按段成式西陽雜俎云。龍腦香。樹名。固不婆律。無花實。其樹

四八四

有肥有瘦。瘦者出龍腦。肥者出婆律。香在木心中。波斯國亦出之。斷其樹剪取之。其膏於樹端流出。碎樹作坎而承之。兩說大同小異。唐天寶中交趾貢龍腦。皆如蠟蠶之形。彼人云。老樹根節方有之。然極難得。禁中呼為瑞龍腦。帶之衣袷。香聞十餘步外。後不復有。此今海南龍腦。多用火煨成片。其中亦容雜偽入藥。惟貴生者。狀若梅花片。其佳也。(蘇頌) ④龍腦者。因其狀如貴重之稱也。以白瑩如冰。及作梅花片者為良。故俗呼為冰片。腦。或云梅花腦。香中又有米腦。速腦。金脚腦。若龍腦等稱。皆因形色命名。不及冰片梅花者也。清者名腦油。金光明經謂之羯婆羅香。(李時珍) ⑤龍腦香。南番諸國皆有之。葉廷珪香錄云。乃深山窮谷中。千年老杉樹。其枝幹不曾損動者。則有香。若損動則氣洩無腦矣。土人解作板。板縫有腦出。乃劈取之。大者成片。如花瓣。清者名腦油。江南異聞錄云。南唐保大中。貢龍腦。漿云。以糠糞貯龍腦。懸於琉璃瓶。中少頃。滴漉成水。香氣馥烈。大

稍益元氣。按此藥與腦油稍異。蓋亦其類爾。宋史熙寧九年。英州雷豐。一山梓樹盡枯。中皆化為龍腦。此雖怪異。可見龍腦亦有變成者也。(李時珍)

【冰片子】 性質 辛溫。氣似龍腦。主治 下惡氣消食。散脹滿香入口。

【冰片腦】 即冰片之俗名。詳『冰片』條。

【冰石】 即石薺之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石薺』條。

【冰喉財】 即薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【冰鞋】 即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【冰鼠】 生北荒積冰之間。皮毛甚柔。臥其皮。可却寒食其肉。可退熱。

【冰室】 即艾葉之古籍別名。典見爾雅。詳『艾葉』條。

【冰糖】 即白沙糖之處方用名。詳『白沙糖』條。

【冰精製石膏】 即石膏用冰精製成者之處方用名。詳『石膏』條。

【列當】 處方用名 草薺蓉。古籍別名 粟當。花薺蓉。(日華本草) 粟列。紫花地丁。(和漢藥考)

外國名圖 Orobanche coerulea, Steph. var. typica, Boek (拉丁) Broomrape (英)

基本 屬列當科。為一種寄生植物。產地 多生在海濱沙地間。形態 列當為蒴果之寄生植物。每年暮春抽苗。莖作肉質狀。高五寸至七寸。葉著莖作鱗片狀。與莖俱呈淡黃褐色。較肉莖蓉為瘠。小花聚於莖之上部。為淡紫色。小花作長穗狀。

種類 草薺蓉根與肉莖蓉。形極相類。故有刮去花。壓扁。以代肉莖蓉者。

種植 山野自生者多。採取 每年四五月間。根初生。即掘取之。

製法 採得壓扁。日乾。性質 甘溫。無毒。效能 暖腎補腰。治分。理傷。與肉莖蓉同。用作強壯藥。

肉莖蓉同。用作強壯藥。

主治 男子五勞七傷。補腰腎。令人有子。去風血。煮酒浸酒服之。

配合應用 曾服食醫心鏡方。用粟當。好者二斤。即列當。搗篩。以好酒一斗浸之。經宿取起。隨性日飲之。治陽事不興。

用量 一錢至二錢。參攷資料 列當原州。秦州。渭州。靈州皆有之。暮春抽苗。四月中旬採取。長五六寸至一尺。以莖割白色。採取壓扁。日乾。(韓保昇) 列當生山岩石上。如藕根。初生掘取。陰乾用。(馬志)

【并醜】 即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【印頭】 即黃芩之古籍別名。典見吳普本草。詳『黃芩』條。

【吃力伽】 即白朮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『白朮』條。

【合子】 即楂藤子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『楂藤子』條。

【合子草】 形態 合子草為雜草類之一種。莖生草。本葉尖花白。其子實中間有兩片。如合子形。莖葉可供藥用。性質 有小毒。



【合子瑤瑤】 即瑤瑤之色黑如漆。中有一白線間之者。功用與尋常瑤瑤同。參見『瑤瑤』條。

【合玉石】 (本草綱目) 形態 狀如猪肝。性質 甘平。無毒。主治 消渴。久服輕身辟穀。

【合明草】 產地 生卑濕諸地。形態 合明草為濕草類之一種。其葉四出。其花向夜。即合其莖葉可供藥用。性質 甘寒。無毒。主治 暴熱淋病。小便赤澀。小兒痲疾。明目下氣。止血痢。搗絞汁服。

【合明草子】 即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【合骨】 即合歡皮之古籍別名。典見唐本草。詳『合歡皮』條。

六盡 冰 列 卉 印 吃 合

【合香】即靈香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「靈香」條。②即蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇合香」條。

【合情草】即和合草之別名。

【合掌消】產地 江西山坡有之。

形態 獨莖。應嫩如葎天葉。本方未尖。有疏格。面綠背青。白附莖。攢生。四面對抱。有如合掌。秋時梢頭發細枝。開小紫花。五瓣。絲心。子繁如罌粟米粒。根有白汁。氣臭。可供藥用。



合掌消

效能 消腫。追毒。

【合萌】即水韭角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「水韭角」條。

【合新木】產地 出遼東。形態 合新木為雜木類之一種。可供藥用。

性質 辛平。無毒。
主治 解心煩。止疔痛。

【合草】基本 生深山中。為香賈之一種。

形態 外褐色。而肌理瑩潔。蒸之釜中。香聞百步。

主治 見香單。其功用較香單為優。

【合離草】即天麻之古籍別名。典見抱朴子。詳「天麻」條。

【合歡皮】命名 合歡樹植之庭除。使人不忿而歡樂。故有萱草忘憂。合歡蠲忿之稱。本品為合歡樹之皮。故名。

處方用名 白歡皮。

古籍別名 合昏皮(唐本草) 夜合皮(日華本草) 青裳皮(圖經本草) 萌葛皮 烏賴樹皮(本草綱目) 葦花枝 躑躅條 有情樹皮 榮花樹皮 馬櫻樹皮 尸利灑樹皮(和漢藥考)

外國名詞 Albizia juliflora
am. Boiv. (拉丁)

基本 屬豆科。藥用合歡樹之樹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。合歡花產江蘇蘇州。五月新皮同該樹。借廣東人向以夜合花代之。

可謂謬甚。

形態 按合歡樹為日本四國九州山野自生之落葉喬木。高至數丈。葉為二回羽狀複葉。小葉作刀狀。七八月間。梢頭開花。雄蕊長。如集細絲者。呈淡紅色。頗為美麗。十一月間。結大莢實。中有扁平輕小之種子。小葉兩列。日暮相疊如睡。及朝。又漸分離。故有合歡夜合之名。本品為外面平滑。呈灰褐色。內面呈黃褐色之樹皮。破折面呈纖維狀。



合歡

採取 五月採花。其皮採無時。

製法 去粗皮炒用。

性質 甘平。無毒。

效能 調心脾。續筋骨。用治跌打接骨藥。又為消散腫痛藥。
主治 安五臟。和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。
歷代記述 陸遊【唐】陳藏器

本草拾遺論合歡皮曰殺蟲搗末。和篩下墨生油調。塗蜘蛛咬瘡。用葉洗衣垢【宋】大明諸家本草論合歡皮曰煎膏消癰腫。續筋接骨【宋】寇宗奭本草衍義論合歡皮曰折傷疼痛。研末酒調服二錢匕【明】李時珍本草綱目論合歡皮曰和血消腫。止痛【明】繆希雍本草經疏論合歡皮曰合歡味甘氣平無毒。入手少陰足太陰經。脾虛則五臟不安。心氣躁急。則遺事拂鬱多憂。甘主益脾。脾實則五臟自安。甘可以緩。心氣舒緩。則神明自暢。而歡樂無憂。神明暢達。則從照國通。所欲成遂矣。晉叔夜養生論云。合歡蠲忿。正此之謂歟。其主輕身明目。及大明主消癰疽。續筋骨者。皆取其能補心脾。生血脈之功耳【清】黃宮繡本草求真論合歡皮曰合歡因何命名。謂其服之。臟腑安養。令人歡欣怡悅。故以歡名。第此味甘氣平。服之雖能入脾補陰。入心緩氣。而令五臟安和。神氣自暢。及單用煎湯。而治肺癰吐瀉。合阿膠煎湯。而治肺癰吐血皆驗。與白蠟熬膏。而為長肉生肌。續筋

接骨之藥。然氣緩力微。用之非止錢許。可以奏效。故必重用。久服方有補益。怡悅心志之效矣。若使急病而求治。即欲悅其能之乎。合歡即合昏。本植於庭除。幹似梧桐。枝甚柔弱。葉似皂角。極細繁密。葉則夜合者矣。去粗皮炒用。

配合應用 ①治肺癆睡渴。心胸煩錯。取夜合皮一掌大。水三升。煮取一半。分二服。(韋宙獨行方)

②治撲損折骨。合歡皮。去粗皮。炒黑色。四兩。芥菜子炒一兩。為末。每服二錢。溫酒臥時服。以滓傳之。接骨甚妙。(百一選方)

③治髮落不生。合歡木灰二合。糝衣五合。鐵精一合。水滌末二合。研勻。生油調塗。一夜一次。(普濟方)

④治小兒撮口。夜合花枝濃煮汁。拭口中。并洗之。(子母秘錄方)

⑤治中風癱瘓。夜合枝酒。夜合枝。栝枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。細麴七斤半。先以水五斗。煎五枝。取二斗五升。浸米豆蒸熟。入麴與防風羌活。如常釀

酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉致吐。常令有酒氣也。(奇效良方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①其葉至暮即合。故云合昏。(陳藏器) ②此樹葉似皂莢及槐。極細。五月花發。紅白色。上有絲茸。秋實作莢子。極薄。網所。在山谷有之。今東西京第宅山池間亦有種者。名曰合昏。(蘇恭) ③崔豹古今注云。欲獨人之怒。則贈以青裳。青裳合歡也。植之庭除。使人不怒。故番康養生論云。合歡獨忿。萱草忘憂。(蘇頌) ④合歡花其色如今之繡翠。綠上半。白下半。肉紅散垂如絲。為花之異。其綠葉至夜則合也。燉時焙熟。水淘亦可食。(寇宗奭) ⑤按王隱百一選方云。夜合俗名萌葛。越人謂之烏賴樹。又金光明經謂之尸利濕樹。(李時珍)


【合歡荷】即荷之花開並頭者。詳「荷花」條。

【吉丁蟲】 *Sochnoa elegans*, Thumb(拉丁) & マムシ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。鞘翅類。吉丁蟲科。

產地 出嶺南。

形態 吉丁蟲為化生蟲類甲蟲之一種。長寸許。全體金綠色。有黑紫色之縱線。甚美。頭有短觸角六足。翅緊尾細。好吸收樹木及花卉之汁液。幼蟲白色。為松之害蟲。可供藥用。



吉丁蟲

主治 帶之令人愛媚。

【吉甲脂】即甲脂之古籍別名。典見綱目。詳「甲脂」條。

【吉吉香】即藏香之白色者。典見綱目拾遺。詳「藏香」條。

【吉利草】形態 山草類之一種。莖如金釵股。根似芍藥。可療疾。

性質 苦平。無毒。

主治 解蟲毒。

參攷資料 按稽含南方草木狀云。此草生交廣。莖如金釵股。形

類石斛。根類芍藥。吳黃武中。江夏李侯徒合浦。遇毒。其奴吉利。偶得此草。與服。遂解。而吉利即遁去。俟以此濟人。不知其數也。又高涼郡產良繡草。如麻黃。花白似牛。秋結子如小粟。煨食解毒。功亞於吉利草。始因梁纘得之。因以為名。轉梁為良耳。(李時珍)

【吉貝】即草棉之古籍別名。典見綱目。詳「草棉」條。

【吉林參】即人參之處方用名。詳「人參」條。

【吉祥杵】即桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桔梗」條。

【吉祥草】原名 廣東萬年青。 *China carnosa*, Kuhn(拉丁) キチシヤウサウ(日本)

古籍別名 解蠶草。(綱目拾遺)

產地 出粵中。多植庭園溼地。

形態 廣東萬年青。為澤草類之一種。葉長尺餘。狹而尖。有平行脈。如建蘭而深厚。四時青翠。入冬不凋。葉叢之下。復生根。根下生子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

子。初萌芽。作紫色。長則色青。夏開

六畫 吊 同名 后 吐 向 回

淡紫色花。成穗。亦如麥門冬狀。其根及根下子可供藥用。



吉祥草

性質 甘。涼。無毒。

主治 理血清肺。解火毒。為咽喉七十二症要藥。

參攷資料 ①吉祥草。時俗婦臨產。以此草連盆。移至產室。云能解產厄及血暈。此草色澤翠潤。葉葉勁直如箭。入產室則葉皆軟垂。色亦稿粹。必經數月。乃復鮮豔。(趙學敏) ②吉祥草根下子。大冷子宮。凡婦欲斷產。取子百粒。搗汁服。永不再孕矣。(綱目拾遺) ③吉祥草治小兒急驚。取根搗汁。加冰片少許。茶匙灌下。三匙立甦。(活人書方)

【吊殺狗猴】即楓上寄生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓上寄生』條。

【同力鳥】即鳩之古籍別名。典見

本草集註。詳『鳩』條。

【名香】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【名乳香】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【名莢】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【名薛】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【后殼】產地 粵東平海。水東汕尾。各處鹹水海。均有產之。

主治 擦瘡。治久嗽。

【吐月華】即牛黃之別名。詳『牛黃』條。

【吐吐古個里】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【吐血草】即金不換之別名。詳『金不換』條。

【吐哺魚】即杜父魚之別名。詳『杜父魚』條。

【吐蕤屏風】即艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【吐錦】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【吐嗜香】即乳香之古籍別名。典見綱目。詳『乳香』條。

【吐鐵】命名 本品吐舌含沙。沙黑如鐵。故名。古籍別名 麥螺。梅螺。泥螺。(綱目拾遺) 桃花吐鐵。(會稽志) 黃泥螺。(海味索隱)

產地 出浙江餘姚寧波諸地之海濱汙泥中。

形態 吐鐵為軟體動物螺類之一種。其狀似蝸螺。大如指。小如豆。殼薄而白。肉色青黑。體中有腹形如凝脂。殼中吐膏。大於本身。而光明潔白可愛。生於泥中。以泥為食。至八九月不復食泥。吐白脂。晶瑩至桃花時。味乃佳。大者多脂。其肉以鹽酒糟糝渣製之。可久藏。以供食與藥用。

性質 甘酸。鹹寒。無毒。

主治 補肝腎。益精髓。明耳目。潤喉燥。

【吐鐵肉】即吐鐵之肉。詳『吐鐵』條。

【向天草】即瓦松之古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。

【向日葵】即冬葵子之別名。詳『冬葵子』條。

四八八

冬葵子』條。

【向日葵子】即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【回甘子】即檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檳榔』條。

【回生香】即返魂香之古籍別名。典見內傳。詳『返魂香』條。

【回回米】即苡仁之古籍別名。典見救荒本草。詳『苡仁』條。

【回回豆】產地 出西域。形態 回回豆為豆之一種。狀如棗子。磨入麵中。極香。可供藥用。

主治 解麪毒。

【回回葱】即胡葱之古籍別名。典見綱目。詳『胡葱』條。

【回回蒜】即花紫蒜之古籍別名。典見綱目。詳『花紫蒜』條。

【回辛】即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【回味】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃練藤芽』條。

【回芸】即防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【回青】即扁青之產於回回國者。典見綱目。詳『扁青』條。

【回春果】基本 本品即荔枝之產於福建龍溪縣康仙祠者。

形態 回春果爲夷果類之一種。葉大如掌。色翠。與衆荔特異。其果葉俱可供藥用。

性質 苦澀酸。

主治 祛風除癩。療癩疾。

【回春葉】性質功用與回春果同。詳「回春果」條。

【回春菊】即甘菊之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「甘菊」條。

【回春】即防風之古籍別名。典見別錄。詳「防風」條。

【回燕膏】基本 回燕膏係朝北燕窩內之土。可供藥用。

主治 療癰研傳效。

【回頭青】即香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香附子」條。

【回鷓豆】即鷓豆之古籍別名。典見遼志。詳「鷓豆」條。

【因地辛】即生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「生薑」條。

【因陳】即茵陳蒿之簡稱。詳「茵陳蒿」條。

【因塵】即茵陳蒿之古籍別名。典見廣雅。詳「茵陳蒿」條。

【地乙梨】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【地丁】即肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉蓯蓉」條。

【地丁香】即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大薊」條。

【地丁草】即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大薊」條。

紫花地丁之處方用名。詳「紫花地丁」條。○即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【地下草】即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大薊」條。

【地不容】即解毒子之古籍別名。典見唐本草。詳「解毒子」條。

【地五瓜】即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【地文】即半夏之古籍別名。典見別錄。詳「半夏」條。

【地毛】即香附子之古籍別名。典見廣雅。詳「香附子」條。

【地仙】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【地仙子】即枸杞子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「枸杞子」條。

【地仙圓】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「當歸」條。

【地瓜兒】即草石蠶之古籍別名。典見綱目。詳「草石蠶」條。

【地白根】即馬蘭根之別名。詳「馬蘭根」條。

【地石草】即卷柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「卷柏」條。

【地羊】即狗之廣南別名。詳「狗」條。

【地羊鮮】即白鮮之古籍別名。典見圖經本草。詳「白鮮」條。

【地耳】命名 本品生於地。狀如木耳。故名。古醫別名 地踏菰。(本草綱目)

產地 生原野溼地。

形態 地耳爲菜類木耳屬之一種。狀如木耳。生地上。春夏遇雨即生。雨過則急採之。遲則不堪食。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 明目益氣。令人有子。

【地血】即茜草根之古籍別名。典見別錄。詳「茜草根」條。○即紫草之古籍別名。典見吳普本草。詳「紫草」條。

【地衣】即車前草之古籍別名。典見綱目。詳「車前草」條。

【地衣草】古醫別名 仰天皮。(本草綱目)

產地 生陰溼諸地。

形態 地衣草爲苔草類之一種。乃陰溼地被日光蒸熱而生之苔蘚土衣。形如草狀。故以草名。可供藥用。

性質 苦冷。微毒。

主治 卒心痛中惡。以人垢膩爲丸服七粒。又主馬反花瘡。生油調傅。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論地衣草曰。明目。【明】李時珍本草綱目論地衣草曰。治中惡。研末新汲水服。

【地沒藥】即紅茂草之古籍別名。典見圖經本草。詳「紅茂草」條。

【地疔】即大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大薊」條。

六畫 地

【地防】 產地 生黃陵土中。形態 地防爲溼生昆蟲類之一種。狀如蟻。居土中。可供藥用。

主治 令人不饑不渴。

【地芙蓉】 卽芙蓉之古籍別名。典見圖經本草。詳『芙蓉』條。

【地芝】 卽冬瓜之古籍別名。典見廣雅。詳『冬瓜』條。

【地芥】 產地 生腐水積草處。形態 地芥爲雜草類之一種。得雨而生。色黃白。其莖可供藥用。

採取 四月採之。性質 苦無毒。

主治 小兒痼疾。除邪養胎。風痺。洗寒熱。目中青翳。女子帶下。

參攷資料 地芥卽鬼蓋（人參之別名）之色黃白者。其功亦相近。（李時珍）

【地門冬】 卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【地鼠】 卽鼠婦之古籍別名。典見綱目。詳『鼠婦』條。

【地扁竹】 卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【地扁蛇】 卽蝮蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝮蛇』條。

【地枯蘿】 卽地骷髏之處方用名。詳『地骷髏』條。

【地柏】 外國名詞 Solaginella (拉丁) クラマゴケ アタゴゴケ ヤウラクゴケ (日本) 基本 係卷柏科卷柏屬。產地 生山野巖谷間。形態 地柏爲苔草類之多年生。莖綠。隱花植物。莖細長。上有黃子。匍匐地上。處處生根。葉小。鱗狀。無花葉。三月生。約長四五寸。根色黃。狀如絲。此乃卷柏之生於地上者。其葉可供藥用。

採取 四月採。曬乾用。或於九月採之。

主治 膿毒下血。同黃耆等分爲末。米飲調服。

【地珊瑚】 卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【地紅】 卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茜草根』條。

【地胡蜂】 卽石打穿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石打穿』條。

【地莓】 卽蛇莓之古籍別名。典見本草會編。詳『蛇莓』條。

【地茄】 產地 江西山崗。形態 鋪地而生。葉如杏葉而小。柔厚。有直紋三道。葉中開粉紫花。圓瓣如杏花。中有小缺。根大如指。長數寸。採得可供藥用。



地茄

主治 治勞損。煎酒服。

【地茄子】 形態 地茄子爲雜草類之一種。三月開花。結子。可供藥用。

採取 五六月採子。陰乾用。

性質 微辛。溫。有小毒。

主治 中風痰涎。麻痺。下熱解毒。破堅積。利胸膈。消癰腫。瘡癤。散血。墮胎。

【地朕】 卽地錦草之古籍別名。典見吳普本草。詳『地錦草』條。

【地槩】 卽葶藶之古籍別名。典見鄭樵通志。詳『葶藶』條。

【地烏橋】 卽豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。

四九〇

見圖經本草。詳『豬苓』條。

【地笋】 卽澤蘭根之原名。詳『澤蘭根』條。

【地茯苓】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【地茶】 卽陰地蕨之古籍別名。詳『陰地蕨』條。

【地骨】 卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【地骨子】 卽枸杞子之古籍別名。典見本經。詳『枸杞子』條。

【地骨皮】 命名 本品乃枸杞之根皮。入土極深。皮亦極厚。力能至骨。故名。

處方用名 淨骨皮。

古籍別名 苦杞。苦瀾。杞根。却骨。地精。枸櫞。地節。地仙。仙杖。仙人杖。却老根。紫念皮。地骨冠。伏塵。鹿西玉母杖。金山茄根。（和漢藥考）

外國名詞 Berberis Ly-gium (拉丁) Bark of Box-thornroot (英)

基本 屬茄科。藥用苦杞之根皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。地骨皮產江蘇。浙江。安徽等省。

皮。

由上海來。有產河南、陝西、甘肅等
省。氣味一樣。其味鮮而甘和清涼。
又有產湖北、遼陽、鄖陽、安陸、興安、
漢中等處。此種原來寫全皮。到港
改名外古。原名川古。鮮涼味不及
三江所產之佳。想必功用有別。以
俟識者。又按土地骨產江蘇、鎮江
者。三月新。各省均有。但較細。

形態 按苦杞爲小葉灌木。生
於原野路旁。通常高三尺。亦有達
一丈者。葉互生或叢生。作長橢圓
形。夏日葉腋開深紫色合瓣花。後
結卵圓形漿果。熟則紅色。根皮爲
黃褐色。筒卷狀。味甘苦。
採取 冬十月後。採根取皮。日
乾。

製法 雷斅曰。凡使根。搗得以
東流水浸刷去土。捶去心。以熱甘
草湯浸一宿。焙乾。

性質 苦寒無毒。
效能 清虛熱。除骨蒸。用作清
涼解熱藥。

主治 五內邪氣。熱中消渴。周
痺風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐
寒暑。(本經)下胸脇氣。容熱頭痛。
補內傷大勞。噎吸強陰。利大小腸。

六畫 地

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論地骨皮曰。細到并麵。煮
熟吞之。去腎家風。益精氣。【唐】孟
詵食療本草論地骨皮曰。去骨熱
消渴。【宋】陳承本草別說論地骨
皮曰。治金瘡神驗。【金】張元素珍
珠囊論地骨皮曰。解骨蒸肌熱。消
渴。風溼痺。堅筋骨。涼血。【元】李東
垣用藥法象論地骨皮曰。治在表
無定之風邪。及傳尸有汗之骨蒸。
【元】王好古湯液本草論地骨皮
曰。湯腎火。降肺中伏火。去胞中火。
退熱。補正氣。【元】吳瑞日用本草
論地骨皮曰。治上膈吐血。煎湯漱
口。止齒血。治骨槽風。【明】李時珍
本草綱目論地骨皮曰。去下焦肝
腎虛熱。【清】黃宮繡本草求真論
地骨皮曰。地骨皮即枸杞根也。味
甘氣寒。雖與丹皮同治骨蒸之劑。
但丹皮味辛。能治無汗骨蒸。此屬
味甘。能治有汗骨蒸。且丹皮原屬
入血散瘀之品。汗者血也。無汗而
見血瘀。則於辛於寒最宜。若有汗
骨蒸。而更用以丹皮辛散。不竟使
奪汗無血乎。經曰。熱淫於內。瀉以

甘寒。地骨皮是也。按地骨皮入肺
降火。入腎涼血。涼骨。凡五內熱淫
而見肌肉潮熱。二便澀閉。胸脇痛
楚。與夫於頭而見風痛不休。於表
而見潮熱無定。於肺而見消渴咳
嗽不寧。雖不用此解除。今人但知
岑連以治上焦之火。知藜以治下
焦之火。而不知地骨皮之甘淡微
寒。深得補陰退熱之義矣。時珍常
以青蒿佐此退熱。歷有殊功。李東
垣曰。地爲陰。骨爲裏。皮爲表。服此
既治內熱不生。而於表裏浮遊之
邪。無有不愈。此爲表裏上下皆治
之藥。而於下爲尤切焉。但脾胃虛
寒者。禁服。甘草水浸用。

國外學說 英美學說謂地骨
皮產中國之江蘇、河南、陝西、甘肅
等處。其樹根皮可入藥。其功用能
作補劑。解癆發汗。處方：用地骨
皮一斤。切片。淡酒四斤。先用酒二
斤。浸一天。裝淋筒淋乾。加餘酒漂
淋。入甑。將酒蒸回多半。再入饅
散氣成膏爲度。每服二分至三分。
若用以治瘧疾。每服三分半至五
分。地骨皮半兩。切片。沸水十兩。
納有蓋器內。浸一點鐘。濾渣爲度。

每服三錢至一兩。

辨僞 鄒晉巖曰。枸杞以陝
西甘州所出者爲勝。地骨皮即枸
杞之根。近今市肆所售。硬地骨。不
知何種草根。僞充。聞是風藥。其性
燥烈。大相反。若誤服之。則貽害多
矣。曹炳章曰。按地骨皮。非陝州
杞根之皮。乃長江土枸杞之根皮。
三月出新。江南、古城、亳州、蘇州、江
北出者。皮薄性糯。色黃黑。氣微香。
片大無骨者。爲最佳。湖北出者。皮
粗厚而大。性硬質鬆。色黃。兼有白
斑。較多爲次。鄒君所云硬骨皮。卽
此是也。

配合應用 地骨酒。壯筋骨。
補精髓。延年耐老。枸杞根。生地黃。
甘菊花各一斤。搗碎。以水一石。煮
取汁五斗。炊糯米五斗。細麪拌勻。
入甑。如常封釀。待成熟。澄清。日飲
三錢。(聖濟總錄方)

① 治虛勞客熱。枸杞根爲末。白
湯調服。有病疾人勿服。(千金方)
② 治骨蒸煩熱。及一切虛勞煩
熱。大病後煩熱。并用地仙散。地骨
皮二兩。防風一兩。甘草炙半兩。每
用五錢。生薑五片。以水煎服。(濟

生方)

⑤治熱勞如燎。地骨皮二兩。柴胡一兩。為末。每服二錢。麥門冬湯下。(聖濟總錄方)

⑥治虛勞苦渴。骨節煩熱。或寒。用枸杞根白皮切五升。麥門冬三升。小麥二升。煮至麥熟去滓。每服一升。口渴即飲。(千金方)

⑦治腎虛腰痛。枸杞根。杜仲。草薢各一斤。好酒三斗。漬之。罾中密封。鍋中煮一日。任意飲之。(千金方)

⑧治吐血不止。枸杞根子皮為散。水煎日飲之。(聖濟總錄方)

⑨治小便出血。新地骨皮洗淨。搗自然汁。無汁則以水煎汁。每服一盞。入酒少許。食前溫服。(簡便方)

⑩治帶下脈數。枸杞根一斤。生地黃五斤。酒一斗。煮五升。日服之。(千金方)

⑪治天行赤目暴腫。地骨皮三斤。水三斗。煮三升。去滓入鹽一兩。取二升。頻頻洗點。(龍上謝道人天竺經方)

⑫治風蟲牙痛。枸杞根白皮煎

醋漱之。蟲即自出。用水煎飲亦可。(肘後方)

⑬治口舌糜爛。地骨皮湯。治膀胱移熱於小腸。上為口糜。主瘡潰爛。心胃壅熱。水穀不下。用柴胡。地骨皮各三錢。水煎服之。(東垣方)

⑭治小兒耳疳。生於耳後。腎疳也。地骨皮一味。煎湯洗之。仍以香油調末搽之。(高文虎夢州閑錄方)

⑮應效散。又名托裏散。治氣瘕疝瘡。多年不愈者。用地骨皮。冬月者為末。每用紙燃。蘸入瘡內。頻用自然生肉。更以米飲服二錢。一日三服。(外科精義方)

⑯治男子下疳。先以漿水洗之。後搽地骨皮末。生肌止痛。(衛生寶鑑方)

⑰治婦人陰腫或生瘡。枸杞根煎水頻洗。(永類鈴方)

⑱治十三種疔。春三月上建日。採葉名天精。夏三月上建日。採枝名枸杞。秋三月上建日。採子名却老。冬三月上建日。採根名地骨。並曝乾為末。如不得依法採。但得一種亦可。用研粉一片。裹藥。牛黃一

梧子大。及鈎棘針三七枚。赤小豆七粒。為末。先於糲上鋪亂髮一雞子大。乃鋪牛黃等末。捲作團。以髮束定。熨斗中炒令沸定。刮搗為末。以一方寸匕。合前枸杞末二匕。空心酒服二錢。半日再服。(千金方)

⑲治癰疽惡瘡。膿血不止。地骨皮不拘多少。洗淨。刮去粗皮。取細白穰。以粗皮同骨煎湯洗。令膿血盡。以細穰貼之。立效。有一朝士。腹

腋間病疽。經歲。或以地骨皮煎湯淋洗。出血一二升。家人懼欲止之。病者曰。疽似少快。更淋之。用五升許。血漸淡乃止。以細穰貼之。次日結痂愈。(唐慎微本草方)

⑳治癩疽出汗。着手足肩背。累累如赤豆。用枸杞根。葵根葉。煮汁煎如飴。隨意服之。(千金方)

㉑治足趾雞眼。作痛作瘡。地骨皮同紅花研細。傅之。次日即愈。(閉關事宜方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡營分無熱。及中寒者禁用。

【地骨冠】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【地參】即知母之古籍別名。典見本經。詳「知母」條。
【地薺】即薺之古籍別名。典見救荒本草。詳「薺」條。

【地梧桐】即吳梧桐之古籍別名。典見濟世養生集。詳「吳梧桐」條。
【地連錢】即鏡面草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鏡面草」條。

【地麥】即地膚子之古籍別名。典見別錄。詳「地膚子」條。
【地豚】即雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雲母」條。

【地椒】形態 地椒為莖草類。椒之一種。其苗覆地面。生莖葉甚細。花作小朵。而色紫白。即荑椒之小。而貼地生者。其實可資羊肉食。甚香美。亦可供藥用。

性質 辛。溫。有小毒。
主治 淋瀝腫痛。可作殺蛙藥。

【地椒】即水楊梅之古籍別名。典見綱目。詳「水楊梅」條。
【地椒實】功用性質與地椒同。詳「地椒」條。

【地脾】即沙蟲之古籍別名。典見綱目。詳「沙蟲」條。

【地筋】即良良之古籍別名。典見綱目。詳「良良」條。

【地筋】處方用名。地筋根。黃芽根。紅芽根。

古醫別名。管根。土筋。(別錄)

性質。苦。平。無毒。

主治。益氣止渴。除熱在腹臍。

利筋。

歷代記述攷證。【明】李時珍

本草綱目論地筋曰。地筋根。苗花功與白茅同。

參攷資料

地筋如地黃根葉並相似。而細多毛。生平澤。功用亦同。地黃。李邕方中用之。(陳藏器)

地筋生溪中。根有毛。三月生。四月實。自三月三日採根。(別錄)

此乃黃管毛之根也。功與白茅根相同。詳見白茅條。陳藏器所說。別是一物。非管根也。(李時珍)

地筋。別錄有名未用。(本草綱目)

【地筋根】即白茅根之古籍別名。典見別錄。詳「白茅根」條。

【地筋】即松花之古籍別名。典見綱目。詳「松花」條。

【地慈】即天名精之古籍別名。典見唐本草。詳「天名精」條。

【地黃】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳「沙參」條。

【地黃花】功與生地黃根同。并治腎虛腰痛。

【地黃酒】基本。本品係地黃汁所製之酒。

製法。用生肥地黃絞汁。同麴米封密器中。五七日。啓之。中有綠汁者。其真精英也。宜先飲之。乃濾汁。藏貯。加牛膝汁。效更速。亦有加藥者。

主治。補虛弱。壯筋骨。通血脈。治腹痛。烏髮髮。

【地黃實】性質功用與生地黃根同。詳「生地黃根」條。

【地塘蟲】即守宮之別名。詳「守宮」條。

【地新】即蠶本之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蠶本」條。

【地棍】即石龍芮之古籍別名。典見本經。詳「石龍芮」條。

【地楊梅】外國名。Luzula campestris, DC.

Var. Cepitata, Miq. (荊) K

スモノヒエ シバイモ(日本) 基本。係燈心草科地楊梅屬之莖子。

形態。地楊梅為溼草類之多年生草本。高六七寸。葉叢生。細長而尖。生長毛。花莖自葉叢而出。花小。有花被六片。雄蕊六枚。其花密生如頭狀。其子可食。與莖葉俱可供藥用。



地楊梅

性質。辛。平。無毒。

主治。赤白痢。取莖子煎湯服。

參攷資料。地楊梅生江東溼地。苗如沙草。四五月有子似楊梅也。(陳藏器)

【地榆】命名。本品葉似榆而長。初生布地。故名。

處方用名。地榆炭。

古醫別名。玉鼓。酸結。(別錄)

酢棗(本草綱目)玉札。王鼓。炭棗。無名印。厥榆係(和漢藥考)

外國名。Sanguisorba of.

(英) (Fornalia, L. (拉)) Prunopend

基本。屬薔薇科。藥用其根。產地。陳仁山藥物生產辨云。地榆產廣東北江。星子。連州。湖南湖北亦有出。

形態。按地榆為宿根草。生於山野向陽之地。春季生苗。莖分歧。高三四尺。葉為羽狀複葉。作長橢圓形。邊緣有粗鋸齒。初秋於梢上簇生帶紅色小花。狀類土筆之穗。花後結紫黑色實。其根極係柔軟之直根。惟日本產者多橫生而堅硬。間亦有直根。外面帶褐色。內部黃色。稍有苦味。

採取。二月八月。採根曬乾。

製法。凡用須揀切之。如綿者。良。酒洗去蘆用。若治大小便血症。止血取上截切片炒用。其梢則能行血。不可不知。

性質。苦。微寒。無毒。

效能。涼血止血。用為止血收斂藥。

主治。婦人乳產疼痛。七傷。帶下。五漏。止痛。止汗。除惡肉。療金瘡。(本經)止血。諸瘰。惡瘡。熱瘡。補

六畫 地

六靈地

絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒除渴。明目(別錄)

歷代記述攷證 【宋】開寶重定新本草論地榆曰。止冷熱疔疔。極效【宋】大明日華諸家本草論地榆曰。吐血鼻衄。腸風。月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。【元】李東垣用藥法象論地榆曰。治膽氣不足【明】李時珍本草綱目論地榆曰。汁釀酒。治風痺補腦。搗汁塗虎犬蛇蟲傷【明】程希雍本草經疏論地榆曰。地榆味苦甘酸。氣則微寒而無毒。入足厥陰少陰。手足陽明經。婦人乳痲痛者。厥陰肝經有熱。以致血分熱壅所致也。七情傷於帶脈。故帶下也。五漏者。陽明大腸溼熱傷血病也。血熱則腫而作痛。惡肉者亦血熱極則瘵。故腫而成惡肉也。傷則出血。血出必發熱而作痛。金瘡是也。服血不止。皆血熱所致。諸瘵惡瘡。莫不由血熱所生。苦寒能涼血洩熱。熱散則血活腫消。故竝主如上諸疾也。性行而帶補。味酸甘酸。故補經傷及產後內塞也。消酒除渴明目。止衄血疔疔極效。治腸風者。皆

善祛溼熱之功也。沈寒入下焦。故多主下部溼熱諸病【清】黃宮繡本草求真論地榆曰。地榆苦酸微寒。性沉而瀉。諸書皆言。因其苦寒。則能入於下焦。血分除熱。俾熱悉從下解。又言性沉而瀉。凡人症患吐衄崩中腸風血痢等症。得此則能瀉血不解。按此不無兩歧。詎知其熱不除。則血不止。其熱既清。則血自安。且其性主收斂。既能清降。又能收瀉。則清不慮其過泄。瀉亦不慮其或滯。實為解熱止血藥也。但血熱者當用。虛寒者不宜用。久病者宜用。初起者不宜用。作膏可貼金瘡。搗汁可塗虎犬蛇蟲傷毒。飲之亦可。似柳根。外黑裏紅。取上載炒黑用。梢反行血。得髮良。惡麥冬。

近人學說 張山雷曰。地榆苦寒。為涼血之專劑。婦人乳痛帶下。多由於肝經鬱火不疏。苦寒以清瀉之。則肝氣疏達。斯痛可已。而帶可止。然氣滯痰凝之乳痛。及氣虛不攝之帶下。非其治也。止痛除惡。內皆以外傷言之。血熱火盛。則痛而多惡肉。地榆清熱涼血。故止痛

患作痛。而能除惡肉。本經又療金創。別錄謂止膿血。惡瘡熱瘡。可作金瘡膏。皆即此清火涼血之功用。且所謂主七傷。補絕傷。亦皆指外傷言之。非謂地榆苦寒。能治虛損之勞傷也。止汗而除消渴。苦寒以勝熱之效。消酒者。即苦寒以勝溼退熱也。本經乳痲痛之瘰字。殊不經見。玉篇博雅。瘰皆訓惡。當即此義。帶下病三字。別本作帶下五漏。一作帶下十二病。今從孫淵如問經堂本。又別錄有產後內塞一句。甚不可解。刪之。

配合應用 治血痢。地榆同金銀花等分。佐以芍藥甘草枳殼。黃連烏梅。如熱在心經。下利純鮮血。則加生犀角汁十五匙。神驗。 治橫痃魚口。綿地榆四兩。為君。加金銀花兩許。鐵釧甲三片。土炒。研細。水酒煎。空心溫熱服。雖甚。四服無不消者。若已成膿。更加鹽水炒黃者五錢。白芷二錢。主速潰。易合。去鱗鱗甲。并加牛膝木瓜。預煎黃藥。治下疳陰蝕極效。 治婦人漏下。赤白不止。令人黃瘦。地榆三兩。米醋一斤。煮十餘

四九四

沸。去滓。食前稍熱服一合。(聖惠方)

治赤痢骨立者。地榆一斤。水三升。煎一升半。去滓。再煎。如稠。餵絞。瀉。空腹時服三合。日再服。(崔元亮海上方)

治久病。弱風痛。攣不止。地榆五錢。蒼朮一兩。水二鍾。煎一鈞。空心服。一日一服。(活法機要方)

治下血不止。二十年者。地榆鼠尾草各二兩。水二升。煮一升。頓服。若不。斷。以水漬。屋塵。飲一小杯。投之。(肘後方)

治結陰下血。腹痛不已。地榆四兩。炙甘草三兩。每服五錢。水一盞。入精砂仁七枚。煎半盞。分二服。(宣明方)

治小兒疳痢。地榆煮汁。熱如飴。糖與服。便已。(肘後方)

治大指腫痛。地榆煮汁。漬之。半日愈。(千金方)

治男女吐血。地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。(聖惠方)

治毒蛇螫人。新地榆根。搗汁飲。兼以清酒。(肘後方)

◎治虎犬咬傷。地榆黃汁飲。并爲未傳之亦可爲末。白湯服。日三。

忌酒。(梅師方)

◎治小兒溼瘡。地榆黃濃汁。日洗二次。(千金方)

◎治小兒面瘡。熾赤腫痛。地榆八兩。水一斗。煎五升。溫洗之。(衛生總微方)

用鹽 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣血虛寒及病初起者禁用。得髮良。惡麥門冬。伏丹砂。雄黃。硫黃。

參攷資料 ①其根亦入釀酒。

道方燒作灰。能爛石。(陶弘景) ②

其性沉寒。入下焦。若熱血痢則可

用。若虛寒人及水瀉白痢。卽未可

輕使。(寇宗奭) ③地榆處處平原

川澤皆有之。宿根。三月內生。苗初

生布地。獨莖直上。高三四尺。對分

出葉。葉似榆葉而稍狹。細長。似鋸

齒狀。青色。七月開花如椹子。紫黑

色。根外黑裏紅。似柳根。(蘇頌) ④

按外丹方言地榆一名酸楮。其味

酸。其色楮故也。今蔚州人呼地

榆爲酸楮。又說楮爲重。則地榆酸

楮爲一物甚明。其主治之功亦同。

六畫 地

(李時珍) ①諸瘡痛者加地榆。撰者加黃芩。(楊士瀛)

【地榆炭】卽地榆之處方用名。詳

【地榆膠】

【地榆梢】 主治 功能行血。

【地榆蓋】 卽扁蓋之處方用名。詳

【扁蓋】條。卽琉璃草之別名。詳

【琉璃草】條。

【地葵】 卽地膚子之古籍別名。典

見本經。詳【地膚子】條。卽蒼

朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳

【蒼朮】條。

【地蜈蚣】 卽石打穿之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳【石打穿】條。

卽神仙對坐草之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳【神仙對坐草】條。

【地蜈蚣根】 性質功用與地蜈蚣

莖同。詳【地蜈蚣莖】條。

【地蜈蚣莖】 命名 本品葉

密對生。狀如蜈

蚣。故名。

古籍別名 過路蜈蚣。飛天蜈

蚣。(本草綱目)

外國名詞 Cassiope steller-

iana, DC. (拉丁) チムカテ

(日本) 基本 係石南科岩鬚屬。藥用

地蜈蚣之根苗。

形態 地蜈蚣爲澤草類。莖生

之常綠小灌木。狀如草本。莖伏於

地。密生鱗片小葉。其先端斜上。八

月間枝頭抽小花。開一花。萼爲

綠色。花冠呈淡紅色。深裂爲五。其

根苗可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 解諸毒。及大便不通。搗

汁。療癰腫。搗塗。并未服。能消毒。排

膿。蜈蚣傷者。入鹽少許。搗塗。或未

傳之。

參攷資料 ①生村落野間。

左蔓延。右有蔓延。左其葉密。而對

生。如蜈蚣形。其穗亦長。俗呼過路

蜈蚣。其延上樹者。呼飛天蜈蚣。根

苗皆可用。(李時珍) ②一切癰疽

及腸癰。奶癰。亦腫未破。或已破。而

膿血不散。發熱疼痛。能食者。並宜

排膿。托裏散。用地蜈蚣。赤芍藥。當

歸。甘草等分。爲末。每服二錢。溫酒

下。(和劑局方)

【地蜈】卽狗之道家別名。詳【狗】

條。

【地槐】卽苦參之古籍別名。典見

別錄。詳【苦參】條。

【地精】 卽人參之古籍別名。典

見和漢藥考。詳【人參】條。卽大

生地之古籍別名。典見和漢藥考。

詳【大生地】條。卽地骨皮之古

籍別名。典見和漢藥考。詳【地骨

皮】條。卽地黃之古籍別名。典

見和漢藥考。詳【地黃】條。卽肉

蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。

詳【肉蓯蓉】條。卽何首烏之古

籍別名。典見本傳。詳【何首烏】條。

卽雄黃之古籍別名。典見和漢

藥考。詳【雄黃】條。

【地蜚蠊】 卽蜚蠊之古籍別名。典

見綱目。詳【蜚蠊】條。

【地蜂蟻】 卽蜂蟻之古籍別名。典

見綱目。詳【蜂蟻】條。

【地樓】 卽栝樓之古籍別名。典見

本經。詳【栝樓】條。

【地樓仁】 卽瓜蒌仁之古籍別名。

典見本經。詳【瓜蒌仁】條。

【地漿】 命名 本品係掘陰地

掘濁之。待澄清。取其上用。謂之

地漿水。

六畫 地

處方用名 地漿水。土漿水。

古籍別名 土漿(本草綱目)

性質 甘寒。無毒。

效能 消熱解毒。

主治 解中毒煩悶。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論地漿曰。解一切魚肉

果菜藥物諸菌毒。療霍亂及中噁

卒死者。飲一升妙。【清】汪詒庵本

草備要論地漿曰。地漿甘寒。治泄

痢冷熱赤白。腹內熱毒絞痛。解一

切魚肉果菜藥物諸菌毒。及蟲蟻

入腹。中噁卒死者。以新水沃黃土

攪濁。再澄清用。(凡跌打損傷。取

淨土蒸熱。以布裹更互熨之。勿太

熱。恐破肉。雖療血凝積。氣絕欲死

者亦活。宋神宗皇子病瘵。經國醫

不能治。錢乙進黃土湯而愈。帝問

其故。對曰。以土伏水。水得其平。風

自止矣。

配合應用 ●治熱渴煩悶。地

漿一盞飲之。(聖惠方)

●治乾霍亂病。不吐不利。腹痛

欲死。地漿三五盞服。即愈。大忌米

湯。(千金方)

●治服藥過劑。悶亂者。地漿飲

之。(肘後方)

●治閉口椒毒。吐白沫。身冷欲

死者。地漿飲之。(金匱方)

●治中野芋毒。土漿飲之。(集

簡方)

●治黃鱧魚毒。食此魚。犯荊芥

能害人。服地漿解之。(集簡方)

●治中砒霜毒。地漿調鉛粉服

之。立解。(集文方)

用量 一杯或一碗。

【地漿水】即地漿之處方用名。詳

【地漿】條。

【地節】●即玉竹之古籍別名。典

見別錄。詳「玉竹」條。●即地骨皮

之古籍別名。典見和漢藥考。詳「

地骨皮」條。

【地節子】即枸杞子之古籍別名。

典見本經。詳「枸杞子」條。

【地膚子】原名 地膚。

子形似也。地葵因其苗味似也。鴨

舌因其形似也。妓女因其枝繁而

頭多也。益明因其子功能明目也。

子落則老莖可為帚。故有帚簪諸

名。

古籍別名 地葵。(本經)地葵。

(別錄)獨帶。鴨舌草。(圖經本草)

落帶。(日華本草)王簪。爾雅)王

帶。(郭璞)掃帚。(陶弘景)益明

(藥性本草)涎衣草。(唐本草)白

地草。(本草綱目)千心妓女。(土

宿本草)唐攝。千頭草。白地草。掃

帚菜。千心子。妓女子。錢掃帚子。略

芥草子。白地草子。落帶草。(和漢

藥考)

外國名詞 Chenopodium

Seoparia (拉丁) Broom seed

(英)

基本 屬藜科。

形態 按地膚為一年生草。或

自生。或栽植。莖高四五尺。分枝多

枝。葉互生。作深綠色。披針形。有毛

茸。夏月於葉腋開小黃白色花。後

結青白色之實。即為本品。形如蠶

砂。味甘苦。



地膚子

採取 八月十月。採實陰乾。

製法 楊時泰本草述鈞元曰。

四九六

清熱生用。如欲其起陰達陽。宜以

火酒浸一日。飯上蒸透。晒乾。以

去寒性和漢藥考曰。水洗去砂酒

浸焙。

性質 苦寒。無毒。

效能 通淋。洗瘡。用作利水藥。

主治 膀胱熱。利小便。補中益

精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。(

本經)去皮膚中熱氣。使人潤澤。

散惡瘡。疔癢。強陰。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論地膚子曰。治陰卵癩疾。

去熱風。可作湯沐浴。與陽起石同

服。主丈夫陰痿不起。補氣益力。(

宋)大明日華諸家本草論地膚

子曰。治客熱丹腫。【清】黃宮繡本

草求真論地膚子曰。地膚子治淋

利水清熱。功頗類於黃蘗。但黃蘗

其味苦烈。此則味苦而甘。黃蘗大

瀉膀胱溼熱。此則其力稍遜。凡小

便因熱而見頻數。及或不禁。用此

苦以入陰。寒以勝熱。而使溼熱盡

從小便而出也。但虛火偏旺。而熱

得恣因。當用以清利。若不佐以補

味。則入。則小便既利。而血益虛。血

虛則熱益生。熱生則淋益甚矣。故

宜佐以牡蠣山藥五味收瀉之類。俾清者清。補者補。通者通。瀉者瀉。滋潤條達。而無偏勝爲害之弊矣。且能以治因熱癩疔。並煎湯以治疥疥。至書所謂益精強陰。非真具有補益之能。不過因其熱除。而即具有堅強之意耳。類蠶沙。惡蠟。蝮。具有堅強之意耳。類蠶沙。惡蠟。蝮。

國外學說 日本學說謂地膚子爲細粒。青白色。如蠶砂。味甘。其用量爲二・〇至六・〇。地膚子治水腫及利尿有效。故俗以爲治脚氣病。有特效而用之。

配合應用 治風熱赤目。地膚子焙一升。生地黄半斤。取汁。和作餅。曬乾研末。每服三錢。空心酒服。(聖惠方)

治目痛。凡目痛及眯目中傷。有熱者。取地膚子。白汁。類注目中。(外臺秘要方)

治雷頭風腫。不省人事。落蒂子。同生薑研爛。熱沖酒服。取汗即愈。(聖濟總錄方)

治脇下疼痛。地膚子爲末。酒服方寸匕。(壽域神方)

治疝氣危急。地膚子炒香研末。每服一錢。酒下。(簡便方)

六畫 地

治狐疝陰癩。超越舉重。卒得陰癩。及小兒狐疝。傷損生並。癩用地膚子五錢。白朮二錢半。桂心五分爲末。飲或酒服三錢。忌生葱桃李。(必效方)

治久疹腰痛積年。有時發動。六月七月。取地膚子乾末。酒服方寸匕。日五六服。(肘後方)

治血痢不止。地膚子五兩。地榆。黃芩各一兩。爲末。每服方寸匕。溫水調下。(聖惠方)

治妊娠患淋。熱痛酸楚。手足煩疼。地膚子十二兩。水四升。煎二升半。分服。(子母秘錄方)

治肢體斑目。地膚子白礬等分。煎湯頻洗。(壽域神方)

用宜 錢半至三錢。凡虛而無溼熱者。禁用。惡蠟蝮。

參攷資料 地膚子生荊州平澤及田野。八月十月。採實陰乾。(別錄) 衆病皆起於虛。虛而多熱者。加地膚子甘草。(陳藏器)

田野人名爲地麥草。北人名涎衣草。葉細莖赤。出熱田中。苗極弱。不能勝舉。今云堪爲掃帚。恐未之識也。

也。(蘇恭) 今蜀川關中近地皆。有之。初生薄地。五六寸。根形如蒜。莖赤葉青大。似荊芥。三月開黃白花。結子青白色。八月九月採實。神仙七精散云。地膚子星之精也。或曰其苗即獨帶也。一名鴨舌草。陶弘景所謂莖苗可爲掃帚者。蘇恭言其苗弱不勝舉。二說不同。而今醫家皆以爲獨帶。密州圖上者云。根作叢生。每棵有二三十莖。莖有赤有黃。七月開黃花。其實地膚也。至八月而莖幹成可採。此正與獨帶相合。恐西北出者短弱。故蘇說云耳。(蘇頌) 地膚嫩苗可作蔬。茹一科數十枝。攢簇團團直上。性最柔弱。故將老時可爲帚耐用。蘇恭云不可帶。止言其嫩苗而已。其子最繁。爾雅云。蕒王簪。郭璞注云。王帶也。似蕒。可以爲掃帚。江東呼爲落蒂。此說得之。(李時珍)

性質 苦寒。無毒。

主治 搗汁服。主赤白痢。燒灰亦善。煎水洗目。去熱暗雀盲。滴痛。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論地膚苗葉曰。主大腸泄。

【地膚苗葉】 性質 苦寒。無毒。

主治 搗汁服。主赤白痢。燒灰亦善。煎水洗目。去熱暗雀盲。滴痛。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論地膚苗葉曰。主大腸泄。

和氣。清脾胃。解惡毒。【明】李士材本草綱目論地膚苗葉曰。煎水日服。治手足煩疼。利小便。諸淋。配合應用 治物傷睛陷。努肉突出。地膚洗去土。二兩。搗絞汁。每點少許。冬月以乾者煮漿汁。(聖惠方)

參攷資料 按虎搏醫學正傳云。博兒年七十。秋間患淋。二十餘日。百方不效。後得一方。取地膚草。搗自然汁服之。遂通。至賤之物。有回生之功。如此。時珍按聖惠方治小便不通。用地麥草一大把。水煎服。古方亦常用之。此物能益陰氣。通小腸。無陰則陽無以化。亦東垣治小便不通。用黃蘗知母滋腎之意。(李時珍)

主治 功同地膚苗。

【地蘗】 卽綿絮頭草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「綿絮頭草」條。

【地踏菰】 卽地耳之古籍別名。典見綱目。詳「地耳」條。

【地骷髏】 命名 本品係刈萊。蕪時。其根遺在土中。日久瘦而無肉。多筋。如骷髏然。非

命名 本品係刈萊。蕪時。其根遺在土中。日久瘦而無肉。多筋。如骷髏然。非

乾菜煎也。故名。

古籍別名 乾菜煎。仙人骨。

綱目拾遺)

效能 利水道。消腫脹。

主治 通肺氣。解煤炭蒸人之毒。

配合應用 治痞塊。陳年木

瓜一個。地結體四個。同煮煎汁。時

常服一小盞。數日除根。氣痞食痞

俱治。(醫中藥料方)

萬應丹。治黃疸變爲膨脹。氣

喘翻胃。胸膈飽悶。中胸疼痛。并小

兒疳疾結熱。喉口痢疾。結胸傷寒

傷力黃腫。并脫力黃各症。用人中

白。以露天不見黃者方佳。火煨醋

淬七次。一兩。神麩。白蘆子。地結體

(即土中蘿蔔)各五錢。砂仁二錢。

以上俱炒。陳香圓一個。共爲末。蜜

丸。桐子大。每服三五七丸。或燈草

湯下。或酒下。(海昌方)

地瘞 卽地錦之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳地錦條。

地葷 卽土菌之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳土菌條。

地錢草 卽積雪草之古籍別名。

典見唐本草。詳積雪草條。

外國名詞 Quinaia
Fricousidafa, Koo-

hno (拉丁) ツタ ナツツタ

ニシキツタ (日本)

基本 係葡萄科地錦屬。藥用

其莖根。

產地 生山野間。

形態 地錦爲蔓草類藤屬之

多年生小灌木。狀如草本。莖有短

卷鬚。生吸盤。攀緣於樹木。或牆壁

間。葉互生。其形甚雜而多。或卵圓

形。或心臟形。或全部分裂成三小

葉。春夏之間。葉腋出短複繖狀花

序。花小黃綠色。花瓣五片。花後結

漿果。球形。色黑。大如豆粒。



地 錦

性質 甘。溫。無毒。

主治 破老血。產後血結。婦人

赤白帶下。淋瀝不盡。及天行心悶

瘦損不能飲食。

地錦草 命名 本品赤莖布

地。故有地錦之稱。

古籍別名 地朕。夜光。承光。

吳普本草) 地瘞。(本草拾遺) 漿

瓣草。(玉冊) 草血竭。血見愁。血風

草。馬燈草。雀兒臥單。胡藤頭草。

(本草綱目) 乳草。(日本)

外國名詞 Euphorbia hu-

raiusa, Wild. (拉丁) ニシキ

サウ チチグサ (日本)

基本 係大戟科大戟屬。地錦

草之莖葉。

產地 生田野及牆垣階砌間。

形態 地錦草爲石草類之一

種小草本。其莖赤色。有副根。附着

於樹石林下而生。葉如鴨掌分裂。

有葉柄互生。經霜則呈紅色。春夏

間開淡黃色細花。結實成穗。色黑

味辛。冬則枯死。

性質 辛。平。無毒。

主治 地朕。主心氣。女子陰疝

血結。

歷代記述攷證 【唐】李萬錫

嘉祐本草論地錦草曰。地錦通流

血脈。亦可治氣。【明】李時珍本草

綱目論地錦草曰。主癰腫惡瘡。金

刃撲損出血。血痢下血。崩中能散

血。止血利小便。

參攷資料 地錦。方士秋月

探。黃雌雄丹砂硫黃。(李時珍) 地

錦又有一種爲葡萄科之植物。

係藤蔓之類。其莖有白汁。葉小而

對生。葉腋開黃褐色之小花。亦名

地錦者。與此同名異物。(植物學

大辭典)

地頭乙戶邑 卽獨活之古籍別

名。典見和漢藥考。詳獨活條。

地龍 卽蚯蚓之處方用名。詳

蚯蚓條。

地龍子 卽蚯蚓之古籍別名。典

見藥性本草。詳蚯蚓條。

地龍骨 卽古墓中石灰之原名。

詳古墓中石灰條。

地龍糞 卽蚯蚓泥之別名。詳

蚯蚓泥條。

地龍藤 形態 地龍藤爲蔓

草類藤屬之一種。莖

幹纏樹。鱗屑如龍。莖根可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 風血羸老。腹內腰脚諸

冷。飲食不調。不作肌膚。浸酒服。

地膽 命名 本品居地中。色

如膽。故名。

古籍別名 乾首。(本經) 首蟻。

(本草綱目)杜龍青虹。(吳普本草)

外國名詞 Meloe concolor


tus, Motsch. (拉丁) ツチハン

ミヨノ (日本)

基本 係節肢動物昆蟲類鞘翅類。為地臈科之地臈蟲。

產地 生地下或石隙中。

形態 地臈為卵生蟲類之一種。體細長寸餘。色黑藍有光澤。頭大尾赤。其翅尖細不達尾端。故不能飛。常棲石隙草叢中。可供藥用。



地臈

採取 二三月及八九月同採之。

性質 辛寒。有毒。

主治 鬼疰寒熱。鼠瘻惡瘡。死肌。破癥瘕。墮胎(本經)蝕瘡中惡肉。鼻中瘻肉。散結氣石淋。去子服

一刀圭。卽下。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論地臈曰。宜拔癥瘕。從小便中出。上亦吐出。又治鼻淵。【明】李時珍本草綱目論地臈曰。治疔積疼痛。餘功同斑蝥。

參攷資料 ①地臈今醫家多用斑蝥充青。而稀用亭長地臈。蓋功亦相類耳。(蘇頌) ②按楊氏直指方云。有痛瘡類。頭垂。裂如蚌眼。其中帶青。由是簇頭各類一舌。毒深穿孔。故男則多發於腹。女則多發於乳。或項或肩。令人昏迷。急宜用地臈為君。佐以白牽牛。滑石。木通。利小便。以宣其毒。更服童尿。滋滌餘邪。乃可得安也。(李時珍)

③地臈今處處有之。在地中或牆石內。蓋荒青亭長之類。冬月入蟄者。狀如斑蝥。本經別名荒青。尤為可證。既曰地臈。不應復在草葉上矣。蓋荒青青綠色。斑蝥黃斑色。亭長黑身赤頭。地臈黑頭赤尖。色雖不同。功亦相近。(李時珍)

【地臈草】 ①即苦地臈之原名。詳【苦地臈】條。 ②即苦芙之無花實者之別名。典見植物學大辭典。詳

【苦芙】條。

【地椒蒿】 卽白甘菊之古籍別名。典見天寶單方圖。詳【甘菊】條。

【地霜】 卽消石之古籍別名。典見蜀本草。詳【消石】條。

【地蕪】 卽柴胡之古籍別名。典見本經。詳【柴胡】條。

【地雞】 ①卽鳳婦之古籍別名。典見綱目。詳【鳳婦】條。 ②卽土菌之古籍別名。典見耐雅。詳【土菌】條。

【地膚】 卽地膚之原名。詳【地膚】條。

【地類根】 卽香附子之古籍別名。典見綱目。詳【香附子】條。

【地麩】 卽覆麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳【覆麥】條。

【地蘇】 卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳【茜草根】條。

【地蘇木】 卽土西草之別名。典見綱目拾遺。詳【土西草】條。

主治 辟蚤蟲。

【地鼈】 卽大生地之古籍別名。典見本經。詳【大生地】條。

【地鱉】 卽金蛇之古籍別名。典見綱目。詳【金蛇】條。

【地寶】 ①卽草石蠶之古籍別名。典見日川本草。詳【草石蠶】條。 ②卽蛭蝟之古籍別名。典見郭璞賦。詳【蛭蝟】條。

【地靈芝】 卽四方如意草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【四方如意草】條。

【地鼈】 卽鱉蟲之古籍別名。典見本經。詳【鱉蟲】條。

【地靈冬】 卽天靈冬之古籍別名。典見抱朴子。詳【天門冬】條。

【多香木】 卽蜜香之古籍別名。典見綱目。詳【蜜香】條。

【多骨】 卽白豆蔻之原名。詳【白豆蔻】條。

【多那】 卽蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蘇木】條。

【多伽羅香】 卽乳香之古籍別名。典見綱目。詳【乳香】條。

【多摩羅跋香】 卽麝香之古籍別名。典見法華經。詳【麝香】條。

六畫 地 多

六 蠶 夷 好 如 妃 守 安

【夷山】即鳥鼠之古籍別名。典見爾雅。詳「鳥鼠」條。

【夷目】即桑蠶之古籍別名。典見揚子方言。詳「桑蠶」條。

【夷蠶之】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「當歸」條。

【好女兒花】即鳳仙花之古籍別名。詳「鳳仙花」條。

【如生散】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。

【如何子】即四味果之古籍別名。典見類目拾遺。詳「四味果」條。

【如丁香】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【如意草】即牛旁之別名。詳「牛旁」條。

【如意菜】即澤瀉之別名。詳「澤瀉」條。

【妃子笑】基本 本品即荔枝之產於廣東佛山者。

形態 妃子笑為夷果類之一種。其質大如鵝卵。核小如豆。色如琥珀。漿滑如乳。可供食與藥用。

主治 除口氣。使之能使齒間經宿宿香。

【守山】即半夏之古籍別名。典見本經。詳「半夏」條。○即茵草之古籍別名。典見爾雅。詳「茵草」條。

○即狼尾草之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「狼尾草」條。

【守宮】即壁虎之原名。詳「壁虎」條。

【守宮槐】即槐花之晝夜合開者之別名。詳「槐花」條。

【守氣】即茵草之古籍別名。典見爾雅。詳「茵草」條。

【守神】即鼈之古籍別名。典見淮南子。詳「鼈甲」條。

【安化茶】命名 本品即茶之產於湖南安化縣者。

古籍別名 湘潭茶。(綱目拾遺)

形態 安化茶為茶之一種。粗梗大葉。煎之作濃黑色。可供飲料與藥用。

性質 苦。微甘。溫。無毒。

主治 清神和胃。下膈氣。消滯。去寒凝。

參攷資料 安化茶。須以水煎或滾湯沖入壺內。再以火溫之。氣味始出。(趙學敏)

【安石榴】即酸石榴之原名。詳「酸石榴」條。

【安南子】即胖大海之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「胖大海」條。

【安南桂】即肉桂之處方用名。詳「肉桂」條。

【安胡】即菘米之古籍別名。典見綱目。詳「菘米」條。

【安息香】命名 本品香能辟邪。安息諸邪。故名。或云。安息。國名也。

古籍別名 拙貝。羅香。(梵書)辟邪。椒香。安悉香。便率牛。千金木脂。安息香脂。命門錄事。(和漢藥考)

外國名詞 Benzoinum (Benzoe) (拉丁) Benzoin. (英) Benzoe (德)

基本 屬於安息香科為安息香樹及 *Styrax* 屬之樹幹。受損傷後。滲出樹脂質物。乾而結成紅黃褐色之塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。安息香產荷蘭屬。和漢藥考曰。日本無此物。係產於蘇門答臘。暹羅。勃泥。爪哇等處。

形態 安息香樹為落葉喬木。

五〇〇

樹幹作灰褐色。嫩枝初現紅褐色。有微毛。裂之後。乃無毛。而變暗褐色。葉互生。形卵圓。頭端尖。背生白毛。花瓣外白。內紅。極平滑。排列為圓錐花序。果實形球圓。兩端稍扁。平。色灰褐。其質硬。其香為黃褐或紅褐色之塊。外面平滑。塊中包有扁平不正之顆粒。破碎面色乳白。處處雜以褐色。有光澤。質脆弱。咀嚼之則變軟。過溫亦柔軟。受大熱則發其透性之蒸氣。比重一。一六三。酒精幾全溶解。遇濃硫酸則現洋紅色。其臭似華尼刺。味甘而有芳香性。



安 息 香

採取 六七月間待其凝結。乃採之。

製法 凡使入酒中煮一沸。藥酒。取沉降於水底而凝塊者晒乾用。

性質 辛。苦。平。無毒。

成分 百分中含兩三種樹脂

八十分。安息香酸 C₁₁H₇COOH
十二至十八分。

效能 行氣血。辟邪惡。開竅。安神。治老年哮喘。用作辟惡通竅藥。又為鎮咳祛痰藥。本品至胃後則安息香酸分出。略惹胃之粘膜。然其鹽礬之惹性較弱。及腸。由腸壁吸入至血中。半化為 Hippuric acid。半曾為安息香酸。由末梢神經之受激。而致中樞神經之興奮。半由尿中排出。并能令酸性尿而成酸性。半由肺臟而分離。故有祛痰之功。

主治 心腹惡氣。鬼疰。除邪辟惡。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論安息香曰。婦人夜夢鬼交。同臭黃燒薰丹穴。永斷。【唐】蘇頌四聲本草論安息香曰。燒之去鬼來神。【宋】大明諸家本草論安息香曰。邪氣魘魘。鬼胎血邪。辟蠱毒。霍亂風痛。男子遺精。暖腎氣。婦人血暈。并產後血暈。【明】李時珍本草綱目論安息香曰。治中惡。瘴氣。勞瘵。傳尸。【清】黃宮繡本草求異論安息香曰。安息香係西戎及

六 薑 安

南海波斯國樹中之脂。其香如膠。如餠。其氣馨。其味苦而兼甘。其性平。按凡香物皆燥。惟此香而不燥。香物皆烈。惟此質而不烈。洵佳品也。以此祀神。則異香滿室。而神若依。以之常薰。則惡氣悉絕。而心肺皆沁。神氣通暢。故凡傳屍癆瘵。霍亂嘔逆。蠱毒惡侵。夢魘鬼交等症。無不用此調治。俾其邪辟正復。所以蘇合香丸。紫雪丹。七香丸。亦皆用此。以其獨得香氣之正也。但元氣虛損陰火旺者。其切忌焉。書言燒之能集鼠者真。

國外學說 英美學說謂安息香產海南。波斯。及暹羅。國鄰近諸島。樹身徑約一尺五寸。種類分數等。入藥者有二種。一則成塊。如松香。一則顆粒黏連。內含一酸。即安息香酸。每百分中計有此酸十五分至二十分。是香有二種。如將樹皮砍破。令其自行流出而凝結為珠。其色略白。如將樹枝砍碎熬膠。濾淨後凝結為一團。其色棕黑。均堪取用。第藥肆中所售者。類多混雜。宜擇用之。若研細作散。嗅之即能令人噴嚏。其臭香。其味則初覺

甜而後辣。本品為行氣藥。及化痰藥。止血藥。如年老而久患咳症。可以酒化安息香。用法將安息香氣吹入口內。令其漸透進肺部。其一法則用炭火一爐。以安息香放入爐內。俟安息香發煙上騰。令咳者納其煙入口。又一法則用沸水一壺。以安息香放入壺內。俟安息香發氣上升。亦令咳者吸收入口內。以上各種療治之法。凡患咳症均能療治。至外治惡瘡。或用安息香酒及甘油調勻塗之。或用酒開搽之。均可。用量約每服一分七釐半至五分二釐半。日本學說謂主成分為安息香酸。用為祛痰藥。據日本藥局方云。本品只用為蒸餾散。及用以製造安息香酸而已。然其製劑安息香丁。幾供皮膚病化性洗滌藥之用。或為塗擦劑軟膏。於酒釀鼻皮脂潤等用之。第四版改正日本藥局方。載安息香之種類有二。一為蘇門答臘安息香。一為印度安息香。蘇門答臘安息香。為不整齊之塊片。色紅褐。或灰褐。甲有無數似白色之顆粒。在尋常溫度中。質塊堅脆。發爽快之香氣。

熱於玻璃管中。則變軟而發刺戟性之蒸氣。其結晶性物質。則昇華而上騰。以安息香半瓦。加入過滿飽酸加里溶液十立方仙米。約溫至四十度。則有揮發苦扁桃油之香氣。又以熱酒精十分浸之。任其自乾。餘下之物質。祇有百分之十五。又以之化為灰。餘下物質尤少。僅百分之五。強。印度安息香。此屬後印度所產之 *Sesbania* 為扁平或帶圓之塊片。外褐內白。於重湯煎上熱之。則發極爽快之香氣。受大熱。則發刺戟性之蒸氣。加酒精熱之。而取其濾過之液。則現酸性反應。和以水。則似乳。以此一分。加硫化炭素十分熱之。則變軟。候冷。其無色之液中。得析出安息香酸之結晶。以安息香半瓦。加入過滿飽酸加里溶液十五立方仙米。約溫至四十度。亦有揮發苦扁桃油之香氣。以熱酒精十分浸之。任其自乾。餘下之物質。不過百分之五。又以之化為灰。餘下物質更少。僅百分之二。強。

配合應用 ●治鬼疰。尸疰。殺癆蟲。瘵。暴亡。及大人小兒卒中

五〇一

邪惡氣。用安息香同鬼臼、犀角、牛黃、丹砂、乳香、蘇合香、龍齒、雄黃、麝香。

①治卒然心痛。或經年類發。安息香研末。沸湯服半錢。(危氏奇效方)

②治小兒肚痛。曲脾而啼。安息香丸。用安息香酒蒸成膏。沈香、木香、丁香、藜香八角、茴香各三錢。香附子、硝砂仁、炙甘草各五錢。為末。以膏和煉蜜丸。炙子大。每服一錢。紫蘇湯化下。(全幼心醫方)

③治小兒驚邪。安息香一豆許。燒之自除。(奇效良方)

④治歷節風痛。用精豬肉四兩。切片。裝安息香二兩。以瓶盛灰。大火上著一銅版片隔之。安香於上。燒之。以瓶口對痛處熏之。勿令透氣。(聖惠方)

用量 五分至一錢中。
施用宜忌 凡非關邪惡者禁。

參攷資料 ①按段成式酉陽雜俎云。安息香樹出波斯國。呼為辟邪樹。長二三丈。皮色黃黑。葉有四角。經寒不凋。二月開花。黃色。花

心微碧。不結實。刻其樹皮。其膠如餉。名安息香。六七月堅凝。乃取之。燒之。通神辟惡。(掌禹錫) ②今安南三佛齊諸番皆有之一。梳志云。樹如苦楝。大而且直。葉似羊桃。而長。木心有脂作香。葉廷珪香錄云。此乃樹脂。形色類胡桃。不宜於燒。而能發榮香。故人取以和香。今入和香有如鴿者。謂之安息油。(李時珍) ③或言燒之能集鼠者為真。(汪機)

【安息香脂】即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。
【安悉香】即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。
【安桂】即肉桂之產於安南者之別名。詳「肉桂」條。
【安神隊枝】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。
【安產樹】即含生草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「含生草」條。
【州留牛】即水牛之白色者。產於鬱林。性質功能。詳「水牛」條。
【年年松】即金雞尾之別名。詳「金雞尾」條。
【茂腹糧】即狗屎中粟之古籍別

名。典見綱目。詳「狗屎中粟」條。
【戎菽】即豌豆之古籍別名。典見爾雅。詳「豌豆」條。②即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。
【戎焉】即硝砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硝砂」條。
【戎葵】即蜀葵之古籍別名。典見爾雅。詳「蜀葵」條。
命名 本品前人以為西番所食之鹽。故名。
處方用名 青鹽。
古醫別名 胡鹽(別錄) 禿登鹽(唐本草) 羌鹽(日華本草) 陰土鹽(本草綱目) 石鹽(俗名) 淮鹽(生產遊) 絳鹽(張果玉)

基本 係由石類鹽類。為天然不須煎晒而成之鹽。
產地 陳仁山藥物生產辨云。淮鹽產河南陝西兩省。青色者為正名青鹽。有產江蘇江陰縣。其色白。名石鹽。醫學大辭典云。青鹽每產於甘肅寧夏縣境。蒙古每產於張掖縣境。
形態 按青鹽收潔如石。味鮮美。亦有青色紅鹽。色赤如桃花。隨

月盈縮。質亦美。
採取 十月採之。採得用溫水洗去塵土。淨。曬乾入藥。
性質 鹹寒。無毒。
效能 滋腎水。瀉血熱。用作解熱解毒藥。又為緩和滋養藥。
主治 明目。目痛。益氣。堅肌骨。去毒蟲(本經) 心腹痛。瀉血吐血。齒舌血出(別錄)

歷代配製攷證 【宋】大明諸家本草論戎鹽曰。助水臟。益精氣。除五臟癥結。心腹積聚。痛瘡疥癬。【明】李時珍本草綱目論戎鹽曰。解羌青斑毒。【明】經希雅本草經疏論戎鹽曰。戎鹽。涼水中至陰之氣凝結而成。不經煎煉。而生於淮。淡坂墳之陰。其味鹹。氣寒。無毒。入手足少陰經。經曰。熱淫於內。制以鹹寒。血熱則目痛不明。鹹寒能入血除熱。故主目痛明目也。心腹痛者。心虛而邪熱客之也。吐血齒舌下出血者。火迫血妄行。溢於上也。鹹主潤下。俾火氣不上炎。故能主諸證也。瀉血者。小腸熱也。心與小腸為表裏。心火降則小腸熱自除也。經曰。熱傷氣。又曰。腎主骨。

歷代配製攷證 【宋】大明諸家本草論戎鹽曰。助水臟。益精氣。除五臟癥結。心腹積聚。痛瘡疥癬。【明】李時珍本草綱目論戎鹽曰。解羌青斑毒。【明】經希雅本草經疏論戎鹽曰。戎鹽。涼水中至陰之氣凝結而成。不經煎煉。而生於淮。淡坂墳之陰。其味鹹。氣寒。無毒。入手足少陰經。經曰。熱淫於內。制以鹹寒。血熱則目痛不明。鹹寒能入血除熱。故主目痛明目也。心腹痛者。心虛而邪熱客之也。吐血齒舌下出血者。火迫血妄行。溢於上也。鹹主潤下。俾火氣不上炎。故能主諸證也。瀉血者。小腸熱也。心與小腸為表裏。心火降則小腸熱自除也。經曰。熱傷氣。又曰。腎主骨。

熱則氣散骨消筋耗。酸能入腎。寒能除熱。故主益氣堅肌骨也。鹹爲水化。諸毒得水則解。故又能去毒。日華子云。助水鹹。益精氣。除五臟痼結。心腹積聚者。取其入腎及輕堅除熱之功耳。【清】黃宮繡本草求真論戎鹽曰。青鹽卽戎鹽。稟至陰之氣。凝結而成。不經煎煉。生於涯溪之陰。其味鹹。氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分實熱。故凡病因腎起。而見小便不通。胃中瘵赤瀉昏。及吐血溺血。齒出血。牙齦熱痛。暨蠱毒邪氣固結而不解者。宜以此味投治。俾腎補而熱解。鹹入而堅軟。經曰。熱淫於內。治以寒寒。正此謂耳。出西羌。不假煎煨。方稜明潤。色青者良。【清】汪劬庵本草備要論戎鹽曰。青鹽甘鹹而寒。入腎經。助水鹹。平血熱。治目痛赤瀉。吐血溺血。齒舌出血。堅骨固齒。明目烏髮。餘同食鹽。出西羌。不假煎煉。方稜明瑩。色青者良。【清】張隱菴本草崇原論戎鹽曰。戎鹽由海中鹹水。凝結於土石中而成。色分青赤。是稟天一之精。化生地之五行。故主助心神而明目。補肝

六畫 戎

血而治目痛。實貯金而益氣。助脾胃而堅肌骨。五臟三陰之氣。交會於坤土。故去蠱毒。【清】黃元御長沙藥解論戎鹽曰。戎鹽味鹹。微寒。入足太陽膀胱經。清膀胱而泄熱。開癰閉而利水。金匱茯苓戎鹽湯。一茯苓半斤。戎鹽彈丸大。白朮二兩。治小便不利。以其土溼則水道不利。茯苓燥土而泄溼。戎鹽利水而泄熱也。戎鹽鹹宜之性。直走膀胱而清痰熱。長於利水。其他主治能止吐血。尿血。齒舌諸血。以鹹走血而性清降也。味鹹而甘。入藥殊勝。食鹽之苦。卽青鹽也。【清】楊時泰本草述鈞元論戎鹽曰。戎鹽從西戎來。同是潤下之氣所凝。而入藥似勝。且療諸血證。非食鹽所及。夫用戎鹽入潤補藥。藉元陰之氣和陽而歸諸陰也。如治鼻鳴。耳聾。沉香磁石丸及老人腰痛。二至丸是。或陰陽均配而用。以至陽根於至陰也。如治白淫之鎖精丸。是入固脫藥。所以和陰使爲陽守也。如治遺精之水中金丹。是或入於活血中。成元陰之本以和血也。如治腎勞淋瀝之地黃丸。是推此可

以盡其變矣。【清】鄒澍本經疏證論戎鹽曰。戎鹽爲明目治目痛清火降火之物。其堅肌骨。正與食鹽同。而其所以異者。食鹽則劫痰涎而使吐。戎鹽則挽血液而使凝也。夫食鹽未嘗不能凝血。而終滲洩津液。戎鹽未嘗不滲洩津液。而終凝血者。良亦以食鹽假火日烹煉。其成易。其化入津液亦易。戎鹽自然而生。其成難。其化入津液則難。其爲鹽能凝血雖同。而傷津液不傷津液則相逕庭矣。故別錄以之主瀉血吐血。齒舌血出。仲景以之利小便。止血者。止血之因火迫而散亂。利水者。利水之不歸壑而漫於土也。然則戎鹽所主之心腹痛。食鹽所主之心腹卒痛。同乎否乎。夫固可以一卒字而較二鹽之情性矣。且凡心腹痛之宜於鹽者。定係留痰停飲。惟其飲之積。力能攻衝擊撞。乍發乍止。故以食鹽劫而吐之。飲去而卒者。遂已。惟其痰之稠勢。則凝固膠黏。久留不動。故以戎鹽化而滲之。痰去而不卒者。能已。若必驗諸其外。則除卒與不卒。尙有緩急二者可懸。急者必有欲

吐不得。欲下不能等狀。緩者必有欬吐而仍留。瀉利而不去等候。不可不察也。

配合應用 ●治小便不通。戎鹽湯。用戎鹽彈丸大一枚。茯苓半斤。白朮二兩。水煎服之。【金匱方】

●治風熱牙痛。青鹽一斤。槐枝半斤。水四盆。煎汁二盆。麥鹽至乾。炒研。日用揩牙洗目。【唐氏經驗方】

●治牢牙明目。青鹽二兩。白鹽四兩。川椒四兩。煎汁并鹽炒乾。日用指牙洗目。永無齒疾目疾。【通變要法方】

●治風眼爛弦。戎鹽化水點之。【醫濟方】

●治痔瘡漏瘻。白礬四兩。青鹽四兩。爲末。猪尿脬一箇。盛之。陰乾。每服五錢。空心溫水下。【趙氏經驗方】

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡有瘀滯及水腫等症者禁用。

參攷資料 ●史書官房中鹽有九種。白鹽。食鹽。常食者。黑鹽。主腹脹氣滿。胡鹽。主耳聾目痛。柔鹽。

五〇三

六畫 戎 托 扞 收 早 曲 有 朱

主馬存瘡。又有赤鹽、駁鹽、臭鹽、駁
齒鹽四種。並不入食。馬齒即大鹽。
黑鹽疑是鹵鹹。柔鹽疑是戎鹽。而
此戎鹽又名胡鹽。二三相亂。今戎
鹽房中其有從涼州來。亦從煇煌
來。其形作塊片。或如雞鴨卵。或如
薺米。色紫白。味不甚鹹。口嘗氣臭。
正如雞子臭者乃真。又河南鹽
池泥中自有凝鹽如石片。打破皆
青黑色。善療馬存瘡。又疑此是戎
鹽。又巴東胸尾縣北崖有鹽井。鹽
水自凝。生穰子鹽一二寸。中央突
張如微形。亦有方如石膏博者。
(內弘京)陶氏所說九種。今人
不能遍識。醫家治眼及補下藥。多
用青鹽。恐即戎鹽也。本草云。北海
青。南海赤。今青鹽從西羌來者。形
塊方稜。明瑩而青黑色。最奇。北海
來者作大塊。而不光瑩。又多孔竅。
若蜂巢狀。色亦淺於西鹽。彼人謂
之鹽枕。入藥差劣。北胡又有一種
鹽。作片屑如碎白石。彼人亦謂之
青鹽。絨封於匣。與鹽枕并作禮贊。
不知是何色類。(蘇頌)戎鹽功
同食鹽。不經煎煉而味鹹帶甘。入
藥似勝。周禮注云。餒鹽味甜。即戎

鹽。不知果否。或云即以餒并鹽也。
(李時珍)本草戎鹽云。北海青。
南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本
文不合。按涼州異物志云。姜賴之
墟。今稱龍城。剛南千里。菱蕪之形。
其下有鹽。累基而生。出於胡國。故
名戎鹽。讀云。鹽山二岳。二色為質。
赤者如丹。黑者如漆。小大從意。鑲
之為物。作獸辟惡佩之為吉。或稱
戎鹽。可以療疾。此說與本草本文
相合。亦惟赤黑二色。不言白者。蓋
白者乃光明鹽。而青鹽赤鹽則戎
鹽也。故西涼記云。青鹽池出鹽正
方半寸。其形如石。甚甜美。真鹽記
云。山間有石。味勝於鹽。可琢為器。
梁杰公傳言交河之間。掘積下數
尺。有紫鹽。如紅如紫。色鮮而甘。其
下丈許有鹽珀。(本草疏)千年
者為鹽狀。北戶錄亦言張掖池
中出桃花鹽。色如桃花。隨月盈縮。
今寧夏近涼州地。鹽井所出青鹽。
四方皎潔如石山。丹衛即張掖。地
有池。產紅鹽。紅色。此二鹽即戎鹽
之青赤二色者。醫方但用青鹽。而
不用紅鹽。不知二鹽皆名戎鹽也。
所謂南海北海者。指西海之南北

而言。非炎方之南海也。張杲玉洞
要訣云。赤戎鹽出西戎。稟自然水
土之氣。結而成質。其地水土之氣
黃赤。故鹽亦隨土氣而生。味淡於
石鹽。力能伏陽精。但於火中燒汁。
紅赤凝定。色轉益者即真也。亦名
絳鹽。抱朴子書。有作赤鹽法。又嶺
南一種紅鹽。乃染成者。皆非真紅
鹽也。又丹房鑿源云。鹽可伏雌
雄。紅鹽為上。(李時珍)

【曲節草】古籍別名。六月後。
六月霜。蛇藍。(本草綱目)

形態。曲節草為溼草類之一
種。四月生苗。莖方。色青。有節葉似
劉寄奴而青軟。七八月著花。似澤
荷。後結子。其莖葉可供藥用。
採取。五六月採莖葉。陰乾用。
性質。甘平無毒。
主治。發背瘡。消癰腫。拔毒。同
甘草作末。米汁調服。
參攷資料。曲節草性寒。故有
凌霜綠豆諸名。(李時珍)

五〇四

【托胎蟲】即蛞蝓之古籍別名。典
見蔡鐵鐵園叢話。詳「蛞蝓」條。
【扞拏活】即接骨木之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「接骨木」條。
【收麻】即升麻之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「升麻」條。
【早竹茹】即竹茹之處方用名。詳
「竹茹」條。
【早竹葉】即竹葉之處方用名。詳
「竹葉」條。
【早稻】即秈米之古籍別名。典見
綱目。詳「秈米」條。
【曲方氏】即防風之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「防風」條。
【曲枝果】即枳椇子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【有乙梅】即苡仁之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「苡仁」條。
【有情樹皮】即合歡皮之古籍別
名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。
【朱子房】即石決明之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「石決明」條。
【朱石】即代赭石之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「代赭石」條。
【朱姑】即山慈姑之古籍別名。典

見綱目。詳『山慈姑』條。

【朱柿】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【朱柰】即蘋果色赤者之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【朱砂】即硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【朱芩】即豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。

【朱粉】即黃丹之古籍別名。典見綱目。詳『黃丹』條。

【朱栳】即山櫻桃之古籍別名。典見別錄。詳『山櫻桃』條。

【朱雀】即硃砂之古籍別名。典見石藥附雅。詳『硃砂』條。

【朱雀金】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【朱鳥】即硃砂之古籍別名。典見石藥附雅。詳『硃砂』條。

【朱提】即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【朱檀】即佛桑花丹色者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【朱喜】即香薷皮有紅色者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『香薷』條。

條。

【朱雞】即丹雄雞之古籍別名。典見本草衍義。詳『丹雄雞』條。

【朱櫻】即櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【朱薔】即番薔之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『番薔』條。

【朱槿】即柚之莖皮色白而風作淡紅者之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【朱鼈】產地 出南海。形態 朱鼈爲介類之一種。形大如錢。腹赤如血。浮波水面。天必大雨。亦供藥用。

主治 丈夫佩之。刀劍不能傷。女人佩之。有媚色。

【朴草】即藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【朴烏伊】即藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【朴硝】原名 硝石朴。命名 硝是本體之名。石乃堅白之號。朴者未化之義也。以其芒硝英硝皆從此出。故曰硝石朴也。

處方用名 芒硝。馬牙硝。風化

硝。硝石朴。(別錄)

古籍別名 鹽硝。(本草綱目) 皮硝(俗名) 霜花。紅雪。淨皮硝。熟皮硝。劍脊硝。飛風道者。大青草者。(和漢藥考)

外國名詞 Mirabilite, Glauber's Salt (英) Glaubersalts (德)

產地 陳仁山藥物生產辨云。朴硝產天津者佳。山東威海次之。

形態 朴硝爲無色透明棱柱狀結晶體。置空氣中。則失去其結晶水。風化成白色粉末。謂之風化硝。善溶於水。不溶於酒精。有稍苦之清涼酸味。

種類 ①朴硝乃初次煎煉。結於盆下之粗硝。②芒硝乃煎煉結於上面細芒如鋒者。③馬牙硝乃煎煉結於上面。生牙如圭角。作六稜而玲瓏可愛者。④風化硝。乃芒硝經風化成白粉末者。⑤玄明粉。乃朴硝與甘草製成者。⑥硝石。乃丹爐家用制五金八石。銀工家用化金銀。兵家用作烽燧火藥者。得火即熔。故有火硝之名。⑦甜硝。乃朴硝再三以蘆荷煎煉。去其鹹味

爲甜者。

製法 往昔係在秋冬時。撈取內地之結成霜柱狀者。溶化於水。使蒸發結晶而製成之。

性質 苦寒。無毒。

成分 朴硝即化學上之硫酸鈉。Na₂SO₄·10H₂O。今用作製造炭酸鈉之原料。

效能 消積。瀉熱。潤燥。軟堅。在胃中略能刺激胃壁神經。使膽汁稍增。由胃而進於腸。則刺激腸黏膜。令腸線之分泌增多。并促進其蠕動。腸內固有之液分。而又不使吸收。且半數在腸中自動分解。而成硫化水素。此物又能刺激腸黏膜。至釀風氣(屁)而與大便同時排出。故用作瀉劑及利尿藥。又治慢性便秘及慢性消化不良症。

主治 治百病。除寒熱邪氣。逐六臟積聚。結固留癖。能化七十二種石。鍊餌服之。輕身神仙。(本經) 胃中食飲熱結。破留血閉。痞。停痰。痞滿。推陳致新。(別錄)

六畫 朱 朴

五〇五

六畫 朴

華諸家本草論朴硝曰。通泄五臟百病。及癥結。治天行熱疾。頭痛。消腫毒。排膿。潤毛髮。【明】穆希雍本草經疏論朴硝曰。朴硝乃初次煎成者。其氣味烈於芒硝。主治皆同。總為除邪熱。逐六腑積聚。結固留癖。胃中食飲停滯。因邪熱結。停痰痞滿。破留血閉絕之要藥。與芒硝功用。曾無少別。【清】黃宮繡本草求真論朴硝曰。朴硝即皮硝。生於鹵地。刮取。初次煎成。為朴。由朴再煎為芒。其性最陰。善於消物。故以硝名。其味苦而且辛。凡五金八石。用此。俱能消除。况人臟腑積聚乎。然必熱邪深固。閉結不解。用以苦鹹。以為削伐。則藥與病符。自不見得。如仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯之類。雖其用有大黃。可以除熱。然亦不得不假鞅堅之藥耳。若使病非實熱。及或熱結不堅。妄用承氣。朴硝等。以為消劑。其不傷人性命幾希。但朴硝初煎性急。芒硝久煎差緩耳。大黃為使。【清】楊樹泰本經疏證論朴硝曰。凡藥之為物。有理焉。有情焉。理者物之所鍾。情者物之所向。而適與病機

會者也。盧氏劉氏所言物之理耳。其情則猶有不止如是者。夫火消本經以主五臟積熱。胃脹閉。水消本經以逐六腑積聚。結固留癖。是分明指火消入臟。水消入腑矣。臟藏精而不瀉者也。腑傳化物而不藏者也。藏而不瀉。則所積者皆無形。倘啓斂不以時。而有盛滿之患。遂仍移於六腑。故其積者惟熱。而能使胃脹閉。曰滯去。蓄結飲食。推陳致新。則去胃之脹閉也。胃之脹閉去。五臟積熱自已矣。傳化物而不藏。則所積皆有形。倘輸導不以時。亦有盛滿之患。遂致移於軀體。故其積者。皆飲食。痰涎。血液。皆能固結成癖。曰主百病。除寒熱邪氣。則其移於軀體者也。結固留癖下。軀體百病亦已矣。所以然者。火消性向陽。故解自陰而陽之盛熱。水消性向陰。故逐伏在陽中之實結。然皆即於物而化物。故能所入無間。所當必摧。此其一也。凡病之虛者。必自陽入陰。實者。多自裏出外。二消原治實之物。妙在一則遇燥輒發。一則逢水即化。故一能發陽之鬱於陰中。一能化陰之結於陽

內。此又其一也。雖然火非滯物者。水非逐物者。乃本經著兩消去病之功。在火消曰滯。在水消曰逐。何也。夫固不必拘滯以水逐以物矣。蓋滯者。溙詞。如大黃之滯滯腸胃。是在腸胃之病。無不滯滯淨盡。特彼曰滯。則有動之義。今祇曰滯。則僅滯滯之而已。以明凡病不受泛治者。不得用也。逐者。單詞。如乾薑之逐風溼痹。山茱萸之逐寒溼痹。地黃之逐血痹。黃芩苦瀉之逐水白頭翁之逐血。水蛭之逐惡血。皆特指一節。示不他及。則此亦僅能於六腑中去積聚之結固留癖者。以明凡病散而未結者。不得用也。試更參仲景之用二消。消石礬石散之治非臟中鬱熱耶。大承氣湯調胃承氣湯。柴胡加芒硝湯之治非腑中結熱耶。大陷胸湯。凡木防己。去石。薤白。加茯苓。芒硝湯之治非腑中留癖耶。是皆其性之所向。微之於理。固不悖。體之於情。尤膾合者也。而所謂適與病機會者。則更有精密焉。如芒硝豈能治渴。已椒瀝黃丸。偏加之以治渴。芒硝安能止利。小柴胡湯。偏加之以止利。是

五〇六

也。蓋津液與固癖結。遂不得上瀾為渴。去其固癖。正使津液流行。積聚結於中。水流流於旁。為下利。去其積聚。正所以止其下利耳。又豈有他奇也哉。赤硝想即朴硝之赤者。據別錄。能殺人。仲景豈甲煎丸用之。且與為君之鼈甲同用。至十二分。豈以服之最。不厭其毒耶。抑欲其鼈甲化堅開結。必不可闕耶。亦無從臆斷其是否矣。
國外學說 英美學說謂土朴硝一名磺強鎂。一名鎂磺(四)產土中。或與同。由煎煉而成。間或用苛礬與食鹽。或磺強水與食鹽。或磺強阿摩尼亞與食鹽等種種之法製成者。久貯則體內原含之水必化汽飛去。變為白散。其初變時色不光亮。而其分兩則略輕一半。此即元明粉。若藥肆中所出售之土朴硝。欲入煎劑。須用法淨之。方可。土朴硝為涼性藥。瀉藥。利小便。便藥。服之過限。則為惹胃之毒藥。或用以治皮膚病。與新發風溼症。外科中用之。能令清涼。又能洗去外皮臭惡之物。然以其性寒涼。功力較峻。能代洋朴硝以療各症。詳

朴硝 Magnesium Sulfate

一作舍利鹽。即硫酸。麻質。濕度。誤。爲西國最通行之品。若中國無此藥。則可以元明粉代之。惟不可過煎。外用能去眼內雲翳。須研細末點之。其用量輕瀉。每服二錢至四錢。大瀉。每服四錢至六錢。利小便。每服一錢。倘用白散(即元明粉)減半服之便可。

配合應用 治時氣頭痛不止。用朴硝二兩。搗羅爲散。用生油調塗於頂上。(聖惠方)

治乳石發動。煩悶。及諸風熱。用朴硝煉成者半兩。細研如粉。每服以蜜水調下一錢。日三四服。(聖惠方)

治小便不通。膀胱熱。白花散。朴硝不以多少。研爲末。每服二錢。溫酒香酒調下。不拘時服。(簡要濟衆方)

治一切積熱。天行時疾。發狂昏憤。或咽喉腫塞。口舌生瘡。心中煩躁。或大小便不通。胃火諸病。朴硝。芒硝。馬牙硝。硝石。石膏。(水飛)寒水石。(水飛)各一斤。以甘草一斤。煎水五升。入諸藥同煎。不住手

搜。令消得所。入青黛一斤。和勻傾盆內。經宿結成雪。爲末。每含嚙或吹之。或水調服二三錢。欲通利則熱水服一兩。(碧雪方)

治熱瘡。甘露飲。涼胸膈。驅積滯。芒硝末一大斤。用蜜十二兩。和勻入新竹筒內。半筒已上即止。不得令滿。卻入炊飯中。令有藥處在飯內。其虛處出在上蒸之。候飯熟取出。綿濾入磁鉢內。竹筴攪勻。勿停手。待凝。取入磁盒。每臥時含半匙。漸漸嚙之。如要通利。即多服之。(劉禹錫傳信方)

治赤眼腫痛。朴硝置豆腐上蒸化。取汁收點。(簡便方)

治喉痺腫痛。用朴硝一兩。細細含嚙立效。或加丹砂一錢。氣塞不通。加生甘草二錢。吹之。(外臺祕要方)

治口舌生瘡。用朴硝含之良。(孫真人方)

灸瘡飛蝶。因灸火瘡。痂退落。瘡內。鮮肉片子。飛如蝶狀。騰空飛去。痛不可言。是血肉俱熱。怪病也。用朴硝。大黃各半兩。爲末。水調下。殺利即愈。(夏子益奇疾方)

史記倉公傳云。苗川王美人。懷子不乳。來召淳于意。意往飲以葦葉藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診。其脈躁。躁者有餘病。即飲以硝石一劑。出血。豆比五六枚而安。此去蓄血之驗也。

治頭痛欲死。用硝石末吹鼻中。即愈。(炮炙論)

治骨蒸熱病。芒硝末。水服方寸匕。日二服良。(千金方)

治腹中痞塊。皮硝一兩。獨蒜一箇。大黃末八分。搗作餅。貼於患處。以消爲度。(經驗方)

治食物過飽不消。遂成痞臌。馬牙硝一兩。吳茱萸半斤。煎汁。投硝乘熱服之。良久未轉。更進一服立效。(經驗方)

治關格不通。大小便閉。腹欲死。兩三日則殺人。芒硝三兩。泡湯一升。服。取吐即通。(百一選方)

治風眼赤爛。明淨皮硝一盞。水二盞。煎化。露一夜。濾淨。澄清。朝夕洗目。三日其紅即消。雖牛世者亦愈也。(楊誠經驗方)

逐月洗眼。芒硝六錢。水一盞。六分。澄清。洗目。至一年。眼如童子也。(聖惠方)

治牙齒疼痛。皂莢濃漿。同朴硝煎化。淋於石上。待成霜後。擦之。(普濟方)

治食蟹誤腫。朴硝傳之即消。(普濟方)

退昏明目。白龍散。用馬牙硝光淨者。厚紙裝實。安在懷內。着肉養一百二十日。研粉。入少許龍腦。不計年歲深遠。眼生翳膜。遠視不明。但瞳人不散。散者。並宜日點之。(經驗方)

治小兒疳舌。馬牙硝塗於舌上下。日三。(姚和衆方)

治小兒疳口。馬牙硝。擦舌上。日五度。(簡要濟衆方)

治癰豆毒瘡。未成膿者。猪膽汁和芒硝末塗之。(梅師方)

治代指腫痛。芒硝煎湯。漬之。(聖惠方)

治火爛丹毒。水調芒硝末塗之。(梅師方)

治一切風疹。水麥芒硝湯拭之。(梅師方)

治漆瘡作痒。芒硝煎湯。塗之。(千金方)

六畫 朴

六畫 朴 朮 次 死 江

治婦人難產。芒硝末二錢。童子小便溫服。無不效者。又可治死胎不下。(信效方)

用蠶 一錢至三錢。

庭用宜忌 凡胃虛無實熱者及孕婦禁用。畏三稜。惡麥句菀。石差爲之使。

老致資料 朴硝生益州山谷。有鹹水之陽。採無時。色青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。又曰。芒硝生於朴硝。數曰朴硝中。棗出形似麥芒。號曰芒硝。(別錄) 朴硝是初採得一煎而成者。未經再鍊。故曰朴硝。可以熟生牛馬皮。及治金銀。有偽芒硝是朴硝淋汁再鍊者。(寇宗奭) 朴硝是初得一煎而成者。其味醱。所以力緊急而不和。治食膈不消。以此薄逐之。芒硝是朴硝淋過鍊成。故其性和緩。故今多用治傷寒。(寇宗奭) 以煖水淋朴硝。取汁鍊之。令減半。投於盆中。經宿乃有細芒生。故謂之芒硝也。又有英硝者。其狀若白石。英作四五稜。豈可愛。主療與芒硝同。亦出於朴硝。其煎鍊自別有法。亦呼爲馬牙硝。(馬志) 硝有三

品。生西蜀者。俗呼川硝。最勝。生河東者。俗呼鹽硝。次之。生河北青齊者。俗呼土硝。皆生於斥鹵之地。彼人刮掃煎汁。經宿結成。狀如未鹽。猶有沙土。猥雜。其色黃白。故別錄云。朴硝黃者傷人。赤者殺人。須再用水煎化。澄去滓。入蘆荀數枚。同煮。去蘆荀。傾入盆中。經宿則結成白硝。如冰如蠟。故俗呼爲盆硝。齊術之硝。則底多而上面生細芒如鋒。別錄所謂芒硝者是也。川芒之硝。則底少而面上生牙。如圭角作六稜。縱橫玲瓏。洞澈可愛。嘉祐本草所謂馬牙硝者是也。狀如白石。英。又名英硝。二硝之底。則適名朴硝也。取芒硝。英硝。再三以蘆荀煎鍊。去鹹味。卽爲甜硝。以二硝置之風日中。吹去水氣。則輕白如粉。卽爲風化硝。以朴硝。芒硝。英硝。同甘草煎過。鼎鑪升殿。則爲女明粉。陶弘景及唐宋諸人。皆不知甜硝是一物。但有精粗之異。因名迷實。謬稱亂。殊無指歸。(李時珍) 朴硝。下硝之粗者也。其質重濁。芒硝。牙硝。結於上。硝之精者也。其質清明。甜硝。風化硝。則又芒硝

牙硝之去氣味而甘緩輕爽者也。故朴硝止可施於肉瘻之人。及傳塗之藥。若湯散服餌。必須芒硝牙硝爲佳。張仲景傷寒論。只用芒硝不用朴硝。正此義也。硝稟太陰之精。水之子也。氣寒味鹹。走血而潤下。落滯。三焦腸胃實熱。陽強之病。乃折治火邪藥也。唐時臘日賜羣臣紫雪。紅雪。碧雪。皆同此硝鍊成者。通治積熱諸病。有神效。貴在用者中的耐。(李時珍) 硝者消也。五金八石。其堅莫比。惟硝能銷之。苟非大辛至鹹極苦最烈之味。其能消化之乎。硝石。朴硝。一經澄煉。便名芒硝。馬牙硝。風化硝。甜硝。若經煨過。卽名女明粉。究其功用。無堅不磨。無結不散。無熱不蕩。無積不推。可謂直往無前。物無留礙之性也。別錄謂煉餌服之。輕身神仙。失其本矣。故仲景於諸承氣湯用之。非邪結下焦。實不可按者不用。恐其誤伐下焦。眞陰故也。病不由於邪熱深固。閉結難通。斷不可用。(繆希雍)

【宋梯牙】 基本 宋梯牙爲石類之一種。可供藥用。

聖治 明目去昏。火煨水飛。和大海螺。糟搗爲末。點目中。

【杓子】 卽山查之古籍別名。典見爾雅。詳『山查』條。卽楊梅之古籍別名。典出綱目。詳『楊梅』條。

【次新】 卽檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檳榔』條。

【次蠶】 卽蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳『蜘蛛』條。

【死冰】 卽白殭蠶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白殭蠶』條。

【死裏逃生】 卽救命王之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『救命王』條。

【江子】 卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【江山枝】 卽山桐子之處方用名。詳『山桐子』條。

【江西朮】 卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【江西吩片】 卽吩茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『吩茶』條。

【江南荳】 卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【江珠】 卽琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【江瑤】 爲介類之一。殼長而薄。

爲直角三角形。殼頂在其尖端。面有鱗片。排列爲放射狀。殼內黑色有閃光。以足根之細絲附着近海之泥沙中。肉不中食。而柱味甚美。可療疾。詳本條。①即海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【江球柱】

性質 甘。辛。平。無毒。主治 調中。下氣。止渴。利五臟。縮小便。去積滯。令人能食。易饑。

【江梅】即梅之野生者。花小而香。實小而硬。性質功能。與尋常梅同。詳『梅』條。

【江豚】即豚魚生江中者。詳『海豚魚』條。

【江魚】即石首魚之古籍別名。典見浙志。詳『石首魚』條。

【江瑤】即江瑤柱之古籍別名。典見綱目。詳『江瑤柱』條。

【江豬】即豚魚之生江中者。詳『海豚魚』條。

【江雞】即胡梨之古籍別名。典見綱目。詳『胡梨』條。

【江鵝】即雁之俗名。詳『雁』條。

【江鱈】即鱈之產生於江中者。詳『鱈』條。

【江蘆】即蘆蕪之古籍別名。典見別錄。詳『蘆蕪』條。

【江離子】即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【池得勒】產地 生胡地原野。間。

形態 爲菜類之一種。其根可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。主治 破冷氣消食。

【池星】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【池菊花】即菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【池鹽】即食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【池鹽】即鹽之產於山西安邑縣。或甘肅鹽池縣之花馬池之鹽。性質功能。詳『食鹽』條。

【灰包】即馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【灰地區】即碧飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『碧飛』條。

【灰坯】即蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【灰花蛾】即榜雞之古籍別名。典見綱目。詳『榜雞』條。

【灰蚌】即土蝨之古籍別名。典見綱目。詳『土蝨』條。

【灰菝】即馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【灰滌菜】即灰蘆之古籍別名。典見綱目。詳『灰蘆』條。

【灰菹】命名 本品莖葉上有細灰如沙。而枝葉剉越故名。

古籍別名 灰滌菜。金鎖天。(本草綱目)

形態 灰菹爲菜類之一種。四月間生苗。莖有紫紅線稜。葉尖有刺。面青背白有粉。形似葵。高數尺。夏月開黃綠色細花。結實如毬。中有細子。其莖葉可供藥用。

製法 雷斅曰。灰菹即金鎖天。葉撲莖翠。往往有金星堪用。若白青色者。是妓女莖。不中用也。若使金鎖天。莖高二尺五六寸爲妙。若長若短。皆不中使。凡用勿令犯水。去根日乾。以布拭去肉毛。令盡。細剉焙乾用之。李時珍曰。妓女莖即地膚子苗。與灰菹莖相似。而葉不同。亦可爲蔬。

性質 甘。平。無毒。

主治 惡指蟲。蜈蚣等咬。搗爛和油傅之。亦可煮食。作湯浴疥。避風。燒灰納齒孔中。殺蟲。辟瘴。去甘疔。以灰汁飲瘰癧肉。除白癩風。黑子面。點着肉作瘡。

【灰菹子仁】

用法 凡使蒸。暴取仁炊飯。或磨粉食。

性質 甘。平。無毒。主治 殺三蟲。

【灰藥】如青灰。產地 嶺南陶姓家。主治 用以拭物。令人相愛。

【灰鶴】形態 體比丹頂鶴爲高。全身青灰色。頭項肩翼皆白。額頰全赤。眼亦赤。嘴微綠。脚淡紅。其肉可療疾。

性質 甘。溫。無毒。主治 蟲毒。殺蟲。

【灰鹼】即石鹼之古籍別名。典見綱目。詳『石鹼』條。

【灰蝨蟲】即蝨蟲之處方用名。詳『蝨蟲』條。

【化】即蟹之古籍別名。典見綱目。

六 羣 牟 豺 豺 犴 犴 百

詳「羣」條。

【牟尼光】 甚本 本品即荔枝之產於廣東潮州大

浦山中者。

主治 功同參苓。

【牟麥】 即大麥之古籍別名。典見綱目。詳「大麥」條。

【牟婆各】 即車渠之古籍別名。典見楚書。詳「車渠」條。

【豺狗】 即豺之古籍別名。典見綱目。詳「豺」條。

【豺漆】 即五加皮之古籍別名。典見本草。詳「五加皮」條。

【豺節】 即五加皮之古籍別名。典見別錄。詳「五加皮」條。

【豺】 形似貓狸而小。黃斑色。居於澤中。食蟲鼠及草根。性質功能與貓同。詳「貓」條。

【犴高】 即青蒿之古籍別名。典見蜀本草。詳「青蒿」條。

【犴血】 犴為犬屬。黑喙。善守。其血可治發背。陰疽。火毒。

【百丈青】 產地 生江南林澤中。

形體 百丈青為蔓草類之一種。莖葉厚。葉如磨齒而對生。其

莖葉可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 解諸毒物。天行瘧瘧疫毒。並煮汁。亦可生搗取汁服。

參攷資料 百丈青根。令人下利。(陳藏器)

【百丈鬚】 即石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。

【百尺杵】 即人參之古籍別名。典見圖經本草。詳「人參」條。

【百奶】 即百部之古籍別名。典見綱目。詳「百部」條。

【百本】 即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【百合】 命名 本品之根。由衆瓣合成。故名。

處方用名 花百合。白花百合。野百合。

古籍別名 薺。強羅。摩羅。重箱。中逢花。(別錄)重適。中庭。(吳普本草)蒜臙臙。(本草綱目)強仇。(圖經本草)途花。麻羅。鬼蒜。強仇。麻羅春。大伊日根。(和漢藥考)


外國名詞 Lilium japonicum (Thunb.) (拉丁)

基本 屬百合科。藥用百合之

球根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。百合以湖南湘潭。寶慶產者。名棟片外合。為最佳。由湘潭經北江到廣州在北江棧沽。以龍牙合為最。揀片次之一。產湖北麻城。名麻城合。用硫磺燻至其味酸。不適用。有產四川者。名川合。亦可用。有產江蘇者。名蘇合。南京所產甚有名。均夏季出新。

形體 百合為多年生草本。春日抽莖。高三四尺。葉為披針形。有短柄。似竹葉而厚。有光澤。夏間。梢頭開筒狀之大花。色或白或淡紅。花被無斑點。尖端分六片而反卷。藥用其球莖。有無數之鱗片。大者



(一) 合百 (二) 合百

五一〇

長寸許。闊半寸許。色白。下部微帶赤色。有纖維質。且含不少澱粉質。

種植 固園間恒有栽植。其栽培要點：①氣候及土質。氣候無論寒濕熱皆適其性。惟寒冷氣候。則更佳也。土地以砂質之壤土為最佳。砂土次之。石灰土亦可使其生長。但其品質甚劣。不可供藥品之用。價亦因之而低落也。②產地及種類。百合之產地。以吾國言之。四川為最多。次之則推湖北。其餘各省雖有栽培。其品質皆不及也。種類分為春夏秋之三。春種植最好。秋種植次之。夏種植不及也。故欲栽培百合者。當取四川產出之春種植而栽培之。始可使其生長繁盛。品質良好。收穫多也。③整地。春植者於冬季十二月之間。耕起土地。打碎土塊。使成粉細。再作高畦。畦高六七寸。闊約三尺至三尺五寸。長短可任意為之。整地既竣。作畦又完。待其擇時栽種可也。④擇期。欲春植者於春季二三月之交。可以栽種。夏植者於夏季四五月之交。亦可栽種。秋植者栽培之期。則在七月下旬至八月上旬。

始可栽培。若失其期。則不能長之。最宜注意。○栽植栽培之法。春植者。於栽植期以前二三日。先分其根。至期植於畦上。用手挖一穴。將根放入其中。上蓋以細泥。輕壓之。夏植秋植。均可照上法行之。惟栽夏植者。則其根不可先分。當挖穴之後。即將根分而植之。上覆以土。然其覆土之後。當再蓋以稻糠。為要也。○施肥。肥料以人糞尿及少量之廐肥為適。廐肥於栽後十五六月時施之。以一次為限。不可再施。以後當施者。僅人糞尿。作三次施之。第一次在中耕後施之。第二次均在除草後施之。○中耕。栽植之後。約過二月。即行一次之中耕。以防其生長不盛也。○除草。除草宜時時行之為要。至於利害。已述之於上。故略。○收穫。收穫之法。先用短柄小耙。掘鬆土地。後用手拔起之。再曝於日光中二三日。即可貯藏於乾燥之處也。○計算。每畝收量。佳者數百斤。次者二三百斤。百餘斤者為最劣。其價無定規。市價更不常一。

採取 二月八月間採根。宜取

六畫 百

白花者。水洗去蘆。陰乾。入藥用。

性質 甘平。無毒。

效能 潤肺。止咳。用治傷寒後之百合病。藥及為解熱鎮咳藥。

主治 治邪氣腹脹。心痛。利大小便。補中益氣。○本經。除浮腫。腫脹。痞滿。寒熱。通身疼痛。及乳難。喉痺。止涕淚。○別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論百合曰。百邪鬼魅。涕泣不止。除心下急滿痛。治脚氣熱欬。

【唐】孟詵食療本草論百合曰。心急黃。宜蜜煎食之。○宋。大明諸家本草論百合曰。安心定膽。益志。養五臟。治顛邪狂叫。驚悸。產後血狂。擊殺毒氣。脇癰。乳癰。發背。諸瘡腫。○宋。寇宗奭本草衍義論百合曰。治百合病。○金。張元素珍珠囊論百合曰。溫肺止咳。○明。繆希雍本草經疏論百合曰。百合味甘平。亦應微寒。無毒。入手太陰陽明。亦入手少陰。故主邪氣腹脹。所謂邪氣者。即邪熱也。邪熱在腹。故腹脹。清其邪熱。則脹消矣。解利心家之邪熱。則心痛自癒。腎主二便。腎與大腸二經有熱。邪則不通。利清二

經之邪熱。則大小便自利。甘能補中。熱清則氣生。故補中益氣。清熱利小便。故除浮腫。腫脹。痞滿。寒熱。通身疼痛。乳難。足陽明熱也。喉痺者。手少陽三焦。手少陰心家熱也。涕淚。肺肝熱也。清陽明三焦心部之熱。則上來諸病自除。○清。黃宮繡本草求真論百合曰。百合甘淡微寒。功有利於肺心。而能斂氣養心。安神定魄。然究止屬清邪除熱利溼之品。因其氣味稍緩。且於甘中有收。故於心肺最宜。而不致與血有礙耳。是以餘熱未靖。坐臥不安。咳嗽不已。涕淚不收。胸浮氣脹。狀有鬼神。用此治其餘孽。收其殘膚。安養撫恤。恩威不驟。故能安享無事。豈非寧神益氣之謂乎。仲景用此以治百合症病。義亦由此。但初嗽不宜遽用。花白者入藥。○清。王士雄隨息居飲食譜論百合曰。百合甘平。潤肺補胃。清心定魄。息驚。澤膚通乳。祛風滲熱。化溼散癰。治急黃。止虛嗽。殺蟲毒。療悲哀。辟諸邪。利二便。下平脚氣。上理咽喉。以肥大純白味甘而作檀香氣者。良。或蒸或煮而淡食之。專治虛火

勞嗽。亦可煮粥。煨肉。澄粉食。並補虛羸。不僞充飢也。入藥則以山中野生。潤小而味甘者勝。風寒痰嗽。中寒便滑者勿食。

國外學說 古方藥品考曰。百合葉如竹葉而厚。有光澤。夏抽一莖。高三四尺。莖頭開花如卷丹。色白或淡紅。根作塊。如貝母。百合形似貝母。味苦者為真。山谷皆有之。藥舖售者。皆卷丹根。非真百合也。他如天香百合。山丹等。種類甚多。俱不入藥用。大和本草曰。本草百合宜用白花者。卷丹非百合。祇可供食品。不入藥。從前百合之品類無多。今人賞其花。變種漸盛。雖不及百種。亦有數十種矣。其花有向天者。有向地者。有側向者。

近人學說 張山雷曰。百合乃甘寒滑利之品。本經雖曰甘平。然古今主治。皆以清熱泄降為義。其性可見。本經主邪氣。別錄主寒熱。皆以蘊結之熱邪言之。主腹脹心痛。利大小便。除浮腫。腫脹。痞滿。疼痛。乳難。喉痺。皆滑潤開結。通利泄導之功用。本經又以為補中益氣。日華又有安心益志等說。皆謂邪

熱去而正氣自旺。非徑以甘寒之品爲補益也。仲景金匱以主傷寒後之百合病。外臺祕要中更多此法。則百合病者。本爲傷寒病後餘熱未清之證。所以神志恍惚。莫名所苦。故謂之百脈一宗。悉致其病。百合能清泄肺胃之熱。而通調水道。導泄鬱熱。是以治之。然則凡臍腹浮腫等證。必係熱阻氣鬱。百合方爲正治。而寒溼交滯。脾腎陽衰者。皆當忌之。甄權謂其除心下急滿。治脚氣。亦必有熱者爲宜。甄權又主熱咳。潔古謂爲止咳。又必以肺熱熾甚。氣火燦金之證。乃爲合法。而風寒外束。肺氣不宜之咳。尤爲禁忌。古方以百合款冬花同熬成膏。名曰百合膏。治久咳痰血之病。亦以陰虛火旺。上燥燥金。故以百合之清潤降火。合之款冬之微溫開泄者。宜散氣火。滋益肺虛。是爲正治。而世俗或以百合通治外感之嗽者。又未免寒降遏抑。反令肺氣窒塞。外邪無從宣泄矣。又按百合之花。夜合朝開。以治肝火上浮。夜不成寐。甚有捷效。不僅取其夜合之義。蓋甘涼泄降。固有以

清浮陽而清虛火也。孫思邈以百合子酒炒研末。湯服。治腸風下血。亦取其甘苦下降。能息風陽而清血熱。且子尤重墜。固能直達大腸者也。又考李氏綱目。必以白花者爲真。百合。其紅花者則爲山丹。又一種紅花帶黃。花有黑斑。而其子先結於葉間者。則爲卷丹。此三類三種。本是大同小異。今則白花者甚少。通行之品。皆是紅花。但其味較苦。不及白花之甘美。其性則苦者尤寒。肺無熱象。及寒飲咳嗽。尤必避之。石頑謂紅花者活血。治婦人崩中。頭按花紅者其根亦有紅色。且莖色亦紫。故能入血分。而治血熱。瀕湖謂山丹花蕊。搗數疔腫惡瘡。石頑又引中吳紀聞。謂古稱百合。乃蚯蚓所化。此洵有之。余親見包山土罅中。有變化未全者。蓋野生之物。蟲化者間亦有之。野百合之能清熱解毒。散積消癥。固尚有蚓之本性云云。愚謂野生百合。形小質堅。苦味甚烈。蓋得地氣尤厚。其性尤寒。以治肺火更佳。而寒邪作咳尤忌。以治癰腫疔毒。固以寒涼爲治。蚓化一觀。殊不可信。擬

曰有之。亦必不恒有也。
配合應用 ①治肺熱欬嗽。及吐膿血。用百合同知母。貝母。天門冬。麥門冬。百部。桑根白皮。葶苈仁。枇杷葉。
②利大小便。用百合同麥門冬。白芍藥。甘草。通脫木。
③治寒熱邪氣。通身疼痛。用百合同知母。柴胡。竹葉。
④補中益氣。用百合同白芍藥。炙甘草。麥門冬。五味子。
⑤治浮腫。用百合同白芍藥。白茯苓。車前子。桑根白皮。
⑥百合知母湯。治傷寒後百合病。行住坐臥不定。如有鬼神狀。已發汗者。用百合七枚。以泉水浸一宿。明旦更以泉水煮取一升。卻以知母三兩。用泉水二升。煮一升。同百合汁再煮取一升。分服。百合雞子湯。治百合病已經吐後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。卻以代赭石一兩。滑石三兩。水

二升。煮取一升。同百合汁再煮。取一升。分再服。百合地黃湯。治百合病。未經汗吐下者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入生地黃汁一升。同煮取一升。分再服。(仲景方)
⑦治百合變渴。凡病已經月變成消渴者。百合一升。水一斗。煮一宿。取汁。溫浴。病人浴畢。食白湯餅。(陳延之小品方)
⑧治百合變熱。用百合一兩。滑石三兩。爲末。飲服方寸匕。微利乃良。(小品方)
⑨治百合腹滿作痛者。用百合炒爲末。每飲服方寸匕。日二。(小品方)
⑩治陰毒傷寒。百合麥濃汁。服一升良。(孫真人食忌方)
⑪治肺臟壅熱。煩悶欬嗽者。新百合四兩。蜜和蒸軟。時時含一片吞津。(聖惠方)
⑫治肺病吐血。新百合搗汁。和水飲之。亦可羹食。(衛生易簡方)
⑬治耳聾耳痛。乾百合爲末。溫水服二錢。日二服。(千金方)
⑭按自換集。七月七日。取百合

熟搗。用新發煎盛之。密封。挂門上。陰乾百日。每拔去白者。摻之。卽生黑者也。(便民圖彙方)

⑤治遊風陰疹。以楮葉摻動。用鹽泥二兩。百合半兩。黃丹二錢。醋一分。睡四分。搗和貼之。(摘玄方)

⑥治瘡腫不穿。野百合同鹽搗泥傅之良。(應驗方)

⑦治天泡溼瘡。生百合持塗。一二日卽安。(瀕湖集簡方)

⑧治魚骨哽咽。百合五兩研末。蜜水調團頸項。包住。不過三五次卽下。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

適用宜忌 凡中寒者禁用。

參攷資料 ①百合俗人呼爲強伏。伏卽覆也。聲之訛耳。(陶弘景)

②百合莖高三尺許。葉如大柳葉。四向攢枝而上。其顛卽開淡黃白花。四垂向下。覆長蕊花。心有橙色。每一枝顛須五六花。子紫色。四如楮子。生於枝葉間。每葉一子。不在花中。亦一異也。根卽百合。白色。其形如松子。四向攢生。中間出苗。(冠宗廣)

③百合三月生。苗高二三尺。葉粗如箭。四面有葉。如雞

距。又似柳葉青色。近莖處微紫。莖端碧白。四五月開紅白花。如石榴嘴而大。根如葫蒜。重疊生二三十瓣。又一種花紅黃。有黑斑點。細葉。葉間有黑子者。不堪入藥。按徐鉉歲時廣記。二月種百合法。宜雞糞。或云百合是蚯蚓化成。而反好雞糞。理不可知也。(蘇頌) ④百合之根以衆瓣合成也。或云專治百合病。故名。亦通。其根如大蒜。其味如山薑。故俗稱蒜腦。顧野王玉篇亦云。雖乃百合蒜也。此物花葉根皆四向。故曰強覆。凡物旁生謂之覆。義出韓詩外傳。(李時珍) ⑤按王維詩云。冥搜到百合。眞使當重肉。果堪止淚無。欲縱望江目。蓋取本草百合止涕淚之說。(李時珍)

六畫 百

⑥百合一莖直上。四向生葉。葉似短竹葉。不似柳葉。五六月莖端開大白花。長五六寸。出紅蕊。四垂向下。色亦不紅。紅者葉似柳。乃山丹也。百合結實。略似馬兜鈴。其內子亦似之。其瓣種之如種蒜法。山中者宿根。年年自生。未必盡是蚯蚓化成也。蚯蚓多處。不開盡有百合。其說恐亦浪傳耳。(李時珍) ⑦寇氏所說乃卷丹。非百合也。蘇頌所傳不堪入藥者。今正其說。葉短而闊。微似竹葉。白花四垂者百合也。葉長而狹。尖如柳葉。紅花不四垂者山丹也。莖葉似山丹而高。紅花帶黃而四垂。上有黑斑點。其子先結在枝葉間者卷丹也。卷丹以四月結子。秋間開花。根似百合。其山丹四月開花。根少少瓣。蓋一類三種也。吳瑞本草言白花者名百合。紅花者名強伏。不知何所據也。(李時珍) ⑧百合新者可蒸可煮。和肉更佳。乾者作粉食最爲有益。(王穎)

【百合子】 主治 酒炒微赤。研末湯服。治腸風下血。
【百合花】 主治 小兒天泡溼瘡。曝乾研末。菜子油塗良。
【百合粉粥】 主治 潤肺調中。
【百合草】 卽佛手草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「佛手草」條。
【百合舌】 命名 本品舌能反復。如百鳥之音。故名。
古籍別名 反舌。鸚鵡。(本草)

【百舌窠及蕪】 主治 諸蟲咬研末塗之。
【百足】 卽馬陸之古籍別名。與見本經。詳「馬陸」條。
【百足蟲】 卽蜈蚣之俗名。詳「蜈蚣」條。
【百里奚草】 古籍別名 豉羊齒。(綱目拾遺)
產地 多生陰溼諸地。
形態 百里奚草爲溼草類之一種。形似秋海棠。可供藥用。
性質 酸。
主治 牙疼。

【百里零】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【百兩金】處方用名。百兩金根。

外國名詞 Ardisia horb-

dum, Maxim. (拉丁) タチバナ カラタチバナ カウジ

(日本)

基本 係紫金牛科。紫金牛屬。藥用百兩金之根。

形態 百兩金爲山草類之常綠亞灌木。莖高尺餘。葉廣披針狀。長者達五寸許。互生。呈深綠色。其質厚。緣邊有隆起之細點。如微鋸齒。夏月葉腋出花梗。長寸許。着生數小綠花如繖。形帶白色。花冠如盞狀。五裂頗深。其果實紅。熟時如南天竹之實。至春尙存。其根色赤如莖著。

性質 苦。平。無毒。

主治 瘧熱咽喉腫痛。合一寸。嚙津。又治風濕。

參攷資料 百兩金生戎州雲安軍。苗高二三尺。有幹如木。葉似荔枝。初生背面俱青。結花實後。背紫面青。至冬不凋。初秋開花。青碧

色。結實大如豆。生青熟赤。採根入藥。蝕去心。河中府出者。根如莖著。赤色。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月採根。長及一寸。晒乾用。(蘇頌)

【百兩金根】即百兩金之處方用名。詳「百兩金」條。

【百果芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【百枝】即狗脊之古籍別名。典見本經。詳「狗脊」條。即防風之古籍別名。典見別錄。詳「防風」條。

即車蘂之古籍別名。典見吳普本草。詳「車蘂」條。

【百沸湯】即熱湯之古籍別名。典見綱目。詳「熱湯」條。

【百花精】即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【百花蕊】即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【百穿】即露蜂房之古籍別名。典見別錄。詳「露蜂房」條。

【百倍】即牛膝之古籍別名。典見本經。詳「牛膝」條。

【百脈根】古籍別名。柏脈根。(唐本草) 牛角花

(植物圖考) 都草。黃金花。(日本) 外國名詞 Lotus cornicu-

latus L. var. japonicus, Recl. (拉丁) ミヤコグサ コガネバナ キレンゲ(日本)

基本 係豆科百脈根屬。藥用百脈之根。

產地 產甘肅酒泉縣。及諸山野中均有出。

形態 百脈根爲山草類之多年生草本。高至一尺餘。莖細長而傾斜。葉作羽狀複葉。自五小葉成。其基部二小葉宛如托葉。花作蝶形花冠。黃金色。結實爲莢果。其根形似遠志。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 下氣止渴。去熱除虛。勞補不足。酒浸或水浸丸散兼用。

參攷資料 出肅州巴西。一似百留花。黃根如遠志。二月八月採根日乾。(蘇恭) 按唐書作栢脈根。肅州歲貢之。千金外臺大方中亦時用之。今不復聞此。或者名稱又不同也。(李時珍) 依古書之記載推之。似有止渴去熱。及滋養強壯之效力。(黃淑範)

【百草】基本 本品係採集百種之雜草而製成者。

採取 五月五日採之。陰乾用。

主治 金瘡出血。犬咬。燒灰和石灰爲團。煨研傳之。潤注下痢。燒灰吹入下部。瘰癧潰破。麥汁洗之。一身痛悶。燒灰和井華水作團。煨白。以醋和作餅。夾腋下。乾則易之。

【百草丹】即羊哀之俗名。詳「羊哀」條。

【百草花】基本 本品係採集百種雜草之花。非另有一百種草花者也。

主治 百病。卒死。麥汁釀酒。久飲長生成仙。

製法 用百種草花水漬。泥封。埋百日爲丸服。

【百草霜】命名 本品爲百草所成。而輕細似霜。故名。

處方用名 寇煙煤。寇煤。

古籍別名 寇突。寇額。寇。

(本草綱目)

基本 係寇突內爲雜草燒成之煙煤。

產地 陳仁山藥物生產詳云

凡山邊村屋專燒山草者將窠內之草灰貯滿。用清水溼之。適合用木格印之。如骨牌樣。即百草霜也。最好者。親自入山採草燒之。燒至八成。即熄其炭。然後用水印之。如此造法。更得其存性之妙。

形態 百草霜為雜草燃燒時之煙氣所結成。其體輕細。隨風可以飛揚。其色烏黑。無異於墨。故有窻煙墨窻額墨諸稱。

性質 辛溫無毒。

效能 治吐衄崩漏。消積滯瀉。瘡毒作止血藥。

主治 消化積滯。入下食藥中用。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論百草霜曰。止上下諸血。婦人崩中帶下。胎前產後諸病。傷寒陽毒發狂。黃疸癰病。噎隔。咽喉口舌一切諸瘡。【明】經希雍本草經疏論百草霜曰。百草霜乃煙氣結成。其味辛。氣溫無毒。辛主散。故能消化積滯及下食也。凡血見灰則止。此藥性能止血。復能散瘀滯。故主上下諸血。及崩中帶下。胎

六畫 百

前產後諸病。【清】黃宮繡本草求

真論百草霜曰。百草霜即窠突上烟煤。及釜裏煤鍋也。因燒雜草故名。味辛氣溫。觀其所主。與伏龍肝相似。凡血見黑即止。蠱毒惡氣。得辛溫則散。故本經謂主蠱毒中惡吐血血暈。以酒或水或醋。細研溫服。亦塗金瘡。止血生肌。至於傷寒發斑。痘腦癰病。咽喉口舌白禿諸瘡。亦須用此。以取火化從治之義。

配合應用 ①治衄血不止。百草霜末吹之立止也。

②治吐血及傷酒食醉飽。低頭損肺。咳吐血汗血。口鼻妄行。但聲未失者。用鄉外人家百草霜末。糯米湯服二錢。又一方。百草霜五錢。槐花末二兩。每服二錢。茅根湯下。【劉長春經驗方】

③治齒縫出血。百草霜末。摻之立止。【集簡方】

④治婦人崩中。百草霜二錢。狗膽汁并勻。分作二服。用當歸酒下。【經驗方】

⑤治胎動下血。或胎已死。百草霜二錢。槐灰一錢。伏龍肝五錢。為末。每服一二錢。白湯入酒及童尿

調下。【華華經驗方】

⑥治胎前產後。逆生橫生。瘦胎產前產後虛損。月候不調。崩中。百草霜。白芷等分。為末。每服二錢。童子小便。醋各少許。調勻。熱湯化服。不過二服。【杜于方】

⑦治婦人白帶。百草霜一兩。香金墨半兩。研末。每服三錢。豬肝一葉。批開。入藥在內。紙裏煨熟。細嚼。溫酒送之。【永類鈴方】

⑧治風毒下血。百草霜五錢。以米湯調露一夜。次早空心服。【邵真人經驗方】

⑨治暴作瀉痢。百草霜末。米飲調下二錢。【續千金方】

⑩治一切痢下。初起一服如神。名鐵刷丸。百草霜三錢。金墨一錢。半夏七分。巴豆煑十四粒。研勻。黃蠟三錢。同香油化開。和成劑。益大小。每服三五丸。或四五十丸。薑湯下。【滄江方】

⑪治小兒積痢。駐車丸。用百草霜二錢。巴豆煑去油一錢。研勻。以飛羅麵糊和丸。綠豆大。每服三五丸。赤痢甘草湯下。白痢米飲下。紅白露湯下。【全幼心鑑方】

⑫治挾熱下痢膿血。窠突中。黃連各一兩。為末。每酒下二錢。日

二服。【聖藥方】

⑬治癩瘰卒死。錫底墨。水灌二錢。并吹鼻。【醫說方】

⑭治尸厥不醒。脈動如故。窠突墨彈丸。漿水和飲。仍針百會足大趾中趾甲側。【千金方】

⑮治咽中結塊不通。水食危困欲死。百草霜蜜和丸。炭子大。每新汲水化一丸。灌下。甚者不過二丸。名百靈丸。【普濟方】

⑯治鼻瘡腥臭。百草霜末。冷水服二錢。【三因方】

⑰治白禿頭瘡。百草霜和豬脂塗之。【簡便方】

⑱治頭瘡諸瘡。以醋湯洗淨。百草霜入膩粉少許。生油調塗立愈。【證類本草方】

⑳治瘰癧出汁。着手足有背累。累如米。用窠突墨。窠屋壓。金下土。研勻。水一斗。煮三沸。取汁洗。日三四度。【外臺秘要方】

五 一五

用量 一錢半至三錢。施用宜忌 凡無瘰癧者禁用。參攷資料 ①百草霜。釜底墨。

梁上倒掛壁。皆是烟氣結成。但其體質有輕虛結實之異。重者歸中下二焦。輕者入心肺之分。古方治陽毒發狂。黑奴丸三者並用。而內有麻黃大黃。亦是攻解三焦結熱。兼取火化從治之義。其消積滯。亦是取其從化。故宜歸諸病諸病多用之。其治失血胎產諸病。雖是血見黑則止。亦不離從化之理。(李時珍) ①百草霜用塗金指止血生肌。但不可入傳藥中。其黑入肉如野。不能去也。雖有止血。無益腸胃。救標則可。治本則非。故不宜多服。(程希雍)

【百草薺】即建神薺之採百草卷成之別名。詳「建神薺」條。

【百部】

命名 本品根多者百十遠。屬如部伍然。故名。

處方用名 炙百部。野天冬。古籍別名 婆娑草(日華)百奶。野天門冬(本草綱目)王富。嗽藥。婆娑。百條根。婆娑香。(和漢藥考)

外國名詞 Stemonna sessilis (拉丁) Hokuia Miquel 基本 屬百部科。藥用百部之

根。

產地 陝仁山藥物生產辨云。百部產廣東北江。石潭。青遠。三坑。大灣。下四府等處。和漢藥考曰。日本產於奈良。山梨。長野諸處。

形態 按百部為多年生草本。莖高二三尺。春生苗葉。葉大而尖長。至夏自葉腋中抽出花梗。梗端開花一二朵。花散四片或六片。色淡綠或紫。其根塊為天門冬。數十顆連貫而叢生。外部黃白色。內部淡褐色。



百部

種類 ①草本者名草百部。草百部為多年生草本。莖高至二尺餘。葉形卵圓。具並行脈。每三五葉輪生。凡十餘層。春日通短葉柄。抽出花梗。而於其頂端開花一二朵。色淡綠。有紫暈。無萼。而有花被。花被四片至六片。作披針形。②蔓生者名蔓百部。蔓百部為多年生蔓草。莖細長如蔓。長達二三尺。

葉為長卵圓形。末端尖銳。每三四葉輪生。至夏。自葉之中肋抽出花梗。較草百部為長。且開相同之花。惟花瓣稍尖細。

採取 二三月及八月間。採根曬乾。

製法 雷斅曰。凡使百部。須採得以竹刀劈去心皮。花。作數十條。懸於下風乾。卻用酒浸一宿。漉出焙乾。到用。或一窠八十三條者。號曰地仙苗。若修事。餌之。可千歲也。

性質 甘。微溫。無毒。

成分 日本藥學博士古屋恒。管於百部根中。發見一種植物鹽。基名曰霍德林 (Hortonia C₉H₁₀O₄)。含量約 0.01-0.02%。其毒性微弱。

效能 溫肺治寒嗽。殺蟲療疥。內服專作鎮咳祛痰藥。用於一切咳嗽。外作皮膚殺蟲藥。殺滅人與牛馬之寄生蟲。如蚤虱疥癬之類。

主治 咳嗽上氣。火炙酒漬飲之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論百部曰。火炙酒浸。空

腹飲。治疥癬。去蟲殺咬。【唐】甄權藥性本草論百部曰。治肺熱潤肺。【宋】大明諸家本草論百部曰。治傳尸骨蒸勞。治疥殺蚊蟲。寸白蟲。燒蟲。及一切樹木蛀蟲。燻之即死。殺虱及蠅。【明】程希雍本草經疏論百部曰。百部根蜀本云。微寒。日華子言苦。本經言微溫者。誤也。苦而下洩。故善降肺氣。升則喘嗽。故善治咳嗽上氣。能散肺熱。故藥性論主潤益肺。其性長於殺蟲。傳尸骨蒸勞。往往有蟲。故亦主之。疳熱有蟲。及蚊蟲。寸白蟲。燒蟲。皆能殺之。又燒薰樹木。蛀蟲。觸烟即死。亦殺蠅。日華子論之詳。陶云殺蟲。濃煎洗牛馬。蟲即去。陳藏器云。火炙酒浸。空腹飲。去蟲殺咬。兼疥癬。【清】黃宮繡本草求真論百部曰。百部甘苦微溫。功尚殺蟲。能除一切蟲毒。及傳屍骨蒸。樹木蛀蟲。疳積疥癬。然亦能治寒嗽。及泄肺熱。以其氣味甘溫故也。李時珍云。二冬亦屬治嗽。但二冬性寒。治熱。此則氣溫治寒耳。百部雖云微溫。而苦過於甘。於氣總屬有礙。似於虛人不宜。不可不知。根多成

百。故以百名。取肥實者。竹刀劈去心皮。酒浸焙用。

國外學說 日本物類品鑑曰。百部有蔓生。特生二種。蔓生者葉如薯蕷（鄭樵通志）中國種上品。享保中傳至日本。今官園有之。特生者名百部草。其根有百許。相連而生。但苗小異。苗似菝葜。此種莖長尺許。葉有三縱文。似菝葜而小。更生旁莖而開花。今日本官園亦有之。其種亦傳自中國也。

近人學說 張山雷曰。百部善於殺蟲。蟲為濕熱所生。即勞瘵家肺中有蟲。亦是虛熱。此其專藥。似不可謂之性溫。故甄權以為甘。大明以為苦。蘇恭且以為微寒。繆氏經疏。直謂別錄為誤。蓋亦有理。然即曰微溫。亦如紫菀溫潤。專治肺咳之例。究非溫熱之溫。故凡有咳嗽。可通用之。本是草根。而多者可數十莖。性喜下降。故治上氣。瀕湖謂百部亦天門冬之類。故皆治肺病殺蟲。但百部氣溫而不寒。寒嗽宜之。天門冬性寒而不熱。熱嗽宜之。願謂瀕湖此說。尚嫌太泥。實則門冬甘膩。止可治燥熱之嗽。而肺

六畫 百

有寒飲痰滯者。皆其大忌。百部難曰溫寒。然潤而不燥。且能開泄降氣。凡嗽無不宜之。而尤為久嗽虛嗽必需良藥。程鍾齡醫學心悟止嗽散。頗有捷效。功力實在紫菀百部。二味宜通肺氣。千金方謂一味取汁。漫煎。可愈三十年嗽。有自來矣。石頑謂肺熱勞瘵喘嗽。有寸白蟲者宜之。鳩蟲痢及傳尸骨蒸多用之。又謂脾胃虛人弗用。以其味苦傷胃之故。願謂專主上氣。正其味苦之功。凡嗽皆肺氣上逆。非此不治。若療其致傷胃土中和。以參朮補中之品相輔而行可也。

配合應用 ●治一切虛嗽。用百部、桑根白皮、天麥二冬、貝母、枇杷葉、五味子、紫菀。但不能治食積嗽。
●治暴咳嗽。用百部根煎酒。每溫服一升。日三服。（張文仲方）又方用百部生薑各搗汁等分。煎服二合。（葛洪方）又方用百部、麻根、搗自然汁。和蜜等分。沸湯煎膏。噉嗽（續十全方）又方治卒欬不止。用百部根。懸火上炙乾。每含噉汁。勿令人知。（普濟方）

●治小兒寒嗽。百部丸用百部炒。麻黃去節。各七錢半。為末。杏仁去皮尖炒。仍以水略煮三五沸。研泥入熟蜜。和丸。皂子大。每服二三丸。溫水下。（錢乙小兒方）

●治三十年嗽。百部根二十斤。搗爛取汁。煎如飴。服方寸匕。日三服。深師加蜜二斤。外豎加飴一斤。（千金方）

●治遍身黃腫。搗新鮮百部根。洗搗。搗臍上。以糯米飯半升。泔水酒半合。揉轉。蓋在藥上。以帛包住。待一二日後。口內作酒氣。則水從小便中出。腫自消也。百部根一名野天門冬。一名百奶。狀如葱頭。其苗葉柔細。一根下約有百餘個數。（楊氏經驗方）

●治誤吞銅錢。百部根四兩。酒一斤。漬一宿。溫服一升。日再服。（外臺祕要方）

●治百蟲入耳。百部炒研。生油調一字於耳門上。（聖濟總錄方）

●薰衣去風。百部、秦朮為末。入竹籠燒煙。薰之。自落。亦可煮湯洗衣。（經驗方）
用蠶 八分至一錢半。

應用宜忌 凡脾胃虛寒。大便溼瀉者禁用。

參攷資料 ●山野處處有之。其根數十相連。似天門冬而苦強。但苗異爾。博物志云。九真一種草似百部。但長大爾。懸火上令乾。夜取四五寸。切短。含噉汁。主暴嗽甚良。名為嗽藥。疑此即百部也。其土肥潤。是以長大也。（陶弘景）●天門冬根有十餘。莖圓短。實潤味甘。百部多者五六十。莖長尖。內虛。味苦不同。苗莖亦別。今人以門冬當百部。說不明也。（陳藏器）●今江湖淮陝齊魯州郡皆有之。春生苗作藤莖。葉大而尖長。頗似竹葉。面青色而光。根下一撮十五六枚。黃白色。二三月採。曝乾用。（蘇頌）

●百部亦有細葉如茴香者。其莖青肥嫩時。亦可煮食。其根長者近尺。新時亦肥實。但乾則虛瘦。無脂潤爾。生時壁開去心。曝之。鄭樵通志。苜蓿如翠。實者謬矣。（李時珍）
【百部酒】 製法 用百部根切炒。袋盛。浸酒。類飲。
主治 一切久近咳嗽。
【百條根】 即百部之古籍別名。典

五 一七

見和漢藥考。詳『百部』條。

【百連】即參果根之古籍別名。典見別錄。詳『參果根』條。

【百勞水】即水之以杓揚百遍之勞水也。取以養藥。能與甘瀾水同功。詳『甘瀾水』條。

【百鵝】即蜈蚣之俗名。詳『蜈蚣』條。

【百腳草】形態 溼草類之一種。葉形如雞腳。生人家牆陰。

性質 苦寒。
主治 血毒痢。腸風便血。

【百稜藤】古醫別名 百靈藤。形態 百稜藤為蔓草類之一種。春生苗。莖莖木上無花葉。其皮可供藥用。

採取 冬月採之。
主治 盜汗。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論百稜藤曰。治一切風痛風痞。以五斤剉。水三斗。煮汁五升。熬膏。每酒服一匙。日三服。

【百歲城中木】即准木之古籍別名。典見本經。詳『准木』條。

【百鍊雲】即生薑之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『生薑』條。

【百落】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【百葉】即牛蒡之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡』條。

【百葦】即防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【百節】即馬陸之古籍別名。典見本草衍義。詳『馬陸』條。即蕪蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕪蓄』條。

【百節草】即蕪蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕪蓄』條。

【百齒】即梳齒上人頭垢之古籍別名。典見綱目。詳『人頭垢』條。

【百藥草】形態 百藥草為苦草類之一種。三月生苗。四月長及五六寸許。形似瓦松。莖葉俱青。有如松葉而無花。其根可供藥用。

採取 四時採根。晒乾用。
主治 順血脈。下乳汁。調氣甚佳。

參攷資料 烏韭是瓦松之生於石上者。百藥草是瓦松之生於地下者也。(李時珍)

【百頭】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【百濟參】即高麗參產於朝鮮百濟地方。而色白堅剛者之別名。詳『高麗參』條。

【百蟲倉】即五倍子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『五倍子』條。

【百藥長】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【百藥祖】產地 生天台山野中。

形態 百藥祖為雜草之一種。冬夏常青。其葉可供藥用。
主治 風疾。

【百藥棉】即黃耆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃耆』條。

【百藥煎】製法 李時珍曰。用一斤以真茶一兩。煎濃汁。入醋糟四兩。搗爛。拌和。器盛。置糠缸中。罨之。待發起如發麵狀。即成矣。捏作餅丸。晒乾。陳嘉謨曰。入藥者。五倍子鮮者十斤。容細。用瓷缸盛。稻草蓋。會七日。取出。再搗。入桔槌。又甘草末各二兩。又會一七。仍搗。仍會。滿七次。取出。捏餅晒乾用。如無蚌

者。用乾者水漬為之。又法五倍子一斤。生糯米一兩。淡水浸過。細茶一兩。同炒。共研末。入罐內。封固。六月。要一七。取開。配合用。又法。五倍子一斤。研末。酒麵半斤。細茶一把。研末。右用小麥汁。調勻。入鉢中。按緊。上以長稻草封固。另用雞一箇。多着稻草。將藥鉢坐草中。上以稻草蓋。置淨處。過一七後。看藥上長起長霜。則已藥成矣。或捏作丸。或作餅。晒乾。棧可收用。

性質 酸鹹。微甘。無毒。

主治 清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收濕消酒。烏鬚髮。止下血。久刺脫肛。牙齒宣露。面鼻疳蝕。口舌糜爛。風濕諸瘡。

配合應用 ①欬肺劫嗽。百藥煎。訶黎勒。荊芥穗。等分。為末。薑汁入蜜和丸。茨子大。時時噉之。(丹溪心法方)

②定嗽化痰。百藥煎。片黃芩。橘紅。甘草各等分。共為細末。蒸餅丸。蒸豆大。時時噉數丸佳。(瀨湖醫案方)

③清氣化痰。百藥煎。細茶各一兩。荊芥穗五錢。海螵蛸一錢。蜜丸。

④清氣化痰。百藥煎。細茶各一兩。荊芥穗五錢。海螵蛸一錢。蜜丸。

炙子大。每服膏一丸妙。(鄧筆萃
雜興方)

①染烏髮。川百藥煎一兩。針
砂醋炒蕎麥麵各半兩。先洗髮
以荷葉熬醋調刷。荷葉包一夜。洗
去即黑妙。(普濟方)

②沐髮除脂。百藥煎末。乾搽髮
上。一夜篋之。(普濟方)

③指牙烏鬚。川百藥煎半兩。玄
胡索三錢。雄黃三錢爲末。先以薑
擦去涎。用此指牙。以津洗目。日日
用之甚佳。亦治牙痛引頭。(普濟
方)

④治風熱牙痛。百藥煎泡湯噉
漱。(聖濟總錄方)

⑤治牙齦疳蝕。百藥煎。五倍子。
青鹽煨各一錢半。銅綠一錢爲末。
日搽二三次。神效。(普濟方)

⑥治煉眉疳癬。小兒面淫瘡。又
名銀瘡。乃母受胎時食酸辣邪
物所致。用百藥煎五錢。生白礬二
錢爲末。油調搽之。(外科精義方)

⑦治脚肚生疳。初起如粟米大。
搔之不已。成片包脚相交。黃水出。
痒不可忍。久成痼疾。用百藥煎末
唾調。逐瘡四圍塗之。自外入內。先

以黃黍煎湯洗之。日一次。(醫林
集要方)

⑧治乳結硬痛。百藥煎研末。每
服三錢。酒一盞。煎數沸。服之取效。
(經驗方)

⑨治腸癰內痛。大棗連核燒存
性。百藥煎等分爲末。每服一錢。溫
酒服。日一取效。(直指方)

⑩治大腸便血。百藥煎。荊芥穗。
燒存性。等分爲末。糊丸。梧子大。每
服五十九丸。米飲下。(聖惠方)

⑪治腸風下血。百藥煎二兩。半
生半炒存性爲末。飯丸。梧子大。每
服五十九丸。米飲下。名聖金丹。(百
一選方)

⑫治大腸氣痔。作痛下血。百藥
煎末。每服三錢。稀粥調服。日二次。
(集簡方)

⑬治腸風臟毒下血者。用百藥
煎燒存性。烏梅連核燒過白芷。不
見火爲末。水糊丸。如梧子大。每服
七十丸。米飲下。(濟生方)

⑭治酒痢下血。百藥煎。五倍子。
陳槐花等分。焙研末。酒糊丸。梧子
大。每服五十九丸。米飲送下。(本事
方)

⑮治下痢脫肛。百藥煎一塊。陳
白梅三箇。木瓜一握。以水一碗。煎
半碗。日二服。(聖濟總錄方)

⑯治男婦血淋。用真百藥煎。車
前子炒。黃連。各三錢。牛木香二錢。
滑石一錢爲末。空心燈心草湯服
二錢。日二服。(普濟方)

⑰消暑止渴。百藥煎。蠟茶等分
爲末。烏梅肉。搗和丸。炙子大。每含
一丸。名水驅丸。(事林廣記方)

參攷資料 百藥煎。功與五倍
子不異。但經釀造。其體輕虛。其性
淨收。且味帶餘甘。治上焦心肺欬
嗽。痰飲熱渴諸病。含嚙尤爲相宜。
(李時珍)

【百靈藤酒】 基本 本品即
以百稜藤所製
之酒。

製法 用百靈藤十斤。水一石。
煎汁三斗。入糯米三斗。神麴九斤。
如常法釀成。三五日炊糯米飯。投
之即熱。澄清日飲。

主治 諸風疾。
【百靈藤】即百稜藤之古籍別名。
典見綱目。詳「百稜藤」條。
【竹二青】即竹茹之處方用名。詳

「竹茹」條。

【竹大根】即黃精之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「黃精」條。

【竹子】即竹筍之古籍別名。典見
神異經。詳「竹筍」條。

【竹木】即草薺之古籍別名。典見
雷公炮炙論。詳「草薺」條。

【竹牛】即葶牛之古籍別名。典見
昨夢錄。詳「葶牛」條。

【竹付】 形態 竹付爲雜草類
之一種。可供藥用。

性質 甘無毒。
主治 止痛除血。

【竹米】即竹實小者之古籍別名。
典見本草拾遺。詳「竹實」條。

【竹肉】即竹實之古籍別名。典
見本草拾遺。詳「竹實」條。即竹
葶之古籍別名。典見本草拾遺。詳

「竹葶」條。

【竹油】即竹瀝之俗名。詳「竹瀝」
條。

【竹蠶】即竹虱之古籍別名。典見
綱目。詳「竹虱」條。

【竹佛子】即竹蠶之古籍別名。典
見綱目。詳「竹蠶」條。

【竹芽】即竹筍之古籍別名。典見

六畫 竹

符譜。詳竹符條。

【竹乳】即鍾乳石之古籍別名。典見和漢藥考。詳鍾乳石條。

【竹胎】即竹符之古籍別名。典見說文。詳竹符條。

【竹荅】即雷丸之古籍別名。典見綱目。詳雷丸條。

【竹根】 主治 除煩熱。解丹石發熱。瀉黃汁服。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草拾遺論竹根曰。消痰去風熱。驚悸迷罔。小兒驚癇。【明】李時珍本草綱目論竹根曰。同葉煎湯洗婦人子宮下脫。

【竹根】即連翹之古籍別名。典見別錄。詳連翹條。

【竹茹】 原名 淡竹茹。

【竹茹】 處方用名 早竹茹。萎竹茹。鮮竹茹。二竹茹。竹二青。

基本 屬禾本科。為淡竹之幹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。竹茹各省各屬均有出。淡竹茹廣東各屬均有產。以花縣從化下四府為多出。

形態 本品為竹幹上第二層

竹皮。色淡黃。有平行之線痕。因剝刮之關係。每條作數個環狀。多則榮起如棉團。

種植 園圃間恒多栽植。

採取 採無時。採時用刀輕輕刮去竹皮上粉青。取其背內之白皮。即俗謂之竹肉者是也。

製法 取來殺炙。或入生薑汁焙黃用。

性質 甘。微寒。無毒。

效能 清熱。涼血。利痰。止嘔。用為吐衄及嘔噎藥。

主治 嘔噎溫氣。寒熱吐血。崩中。張仲景之發明 橘皮竹茹湯。一方用之。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論竹茹曰。止肺痿。唾血。鼻衄。治五痔。【唐】孟詵食療本草論竹茹曰。噎膈。【明】李時珍本草綱目論竹茹曰。傷寒勞復。小兒熱癇。婦人胎動。【明】繆希雍本草經疏論竹茹曰。竹茹雖與竹葉同本。然竹茹味帶甘。氣微寒。無毒。入足陽明經。曰。諸嘔吐酸水。皆屬於熱。陽明有熱。則為嘔噎溫氣。寒熱。亦

邪客陽明所致。致寒解陽明之熱。則邪氣退而嘔噎止矣。甘寒又能涼血清熱。故主吐血崩中及女勞復也。【清】黃宮繡本草求真論竹茹曰。竹茹味甘而淡。氣寒而滑。凡因邪熱客肺。肺金失養。而致煩渴不寧。膈噎嘔逆。惡阻嘔吐。吐血。血等症者。皆當服此。蓋味甘則中可安。而煩不生。味寒則熱得解。而氣悉寧。所以金匱之治產後虛煩嘔逆。則有竹皮大丸。千金之治產後內虛煩熱短氣。則有甘竹茹湯。產後虛煩頭痛短氣。則有淡竹茹湯。皆有至理內存。不可不知。取竹刮去外膜。取二層如麻縷者良。

配合應用 ①治胃虛有熱。嘔嘔不止。用竹茹。木瓜。橘皮。麥門冬。枇杷葉。人參。蘆根。汁。石斛。 ②治傷寒愈後交接。女勞復。頭痛身熱。耳鳴口渴。腰痛。骨痛。男子卵腫。股痛。竹皮一升。水三升。煮五沸。服汁。【活人書方】 ③治婦人大病初愈。有所動勞。致熱氣衝胸。手足搖擗。拘急如中風狀。淡竹青。半斤。橘櫟二兩。水

五二〇

二升。煎一升。分二服。

④治產後煩熱。內虛短氣。甘竹茹一升。人參。茯苓。甘草各二兩。黃芩二兩。水六升。煮煎二升。分服。每日三服。【婦人良方】

⑤治婦人損胎。孕八九月。或墮傷。牛馬驚傷。心痛。用青竹茹五兩。酒一升。煎五合。服。【子母秘錄方】

⑥治月水不斷。青竹茹微炙。為末。每服三錢。水一盞。煎服。【普濟方】

⑦治小兒熱痛。口噤體熱。青竹茹三兩。米醋三升。煎一升。服一合。【子母秘錄方】

⑧治齒血不止。生竹皮醋浸。令人含之。嚙其背上。三過。以茗汁漱之。【千金方】

⑨治牙齒宜露。黃竹葉。當歸尾。研末。煎湯入鹽含漱。【永類鈴方】

⑩治飲酒頭痛。竹茹二兩。水五升。煮三升。納雞子三枚。煮三沸。食之。【千金方】

⑪治傷損內痛。兵杖所加。木石所逐。血在胸背。脇下刺痛。用青竹茹。亂髮各一團。炭火炙為末。酒一升。煮三沸。服之。三服愈。【千金方】

⑫治傷損內痛。兵杖所加。木石所逐。血在胸背。脇下刺痛。用青竹茹。亂髮各一團。炭火炙為末。酒一升。煮三沸。服之。三服愈。【千金方】

用益 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無風熱者禁用。

著名方劑 竹皮湯。治交接勞復。即腫腹痛。便絕欲死。(外臺秘要方)用青竹皮一升。水三升。煮五六沸。絞汁頓服。立愈。

竹茹湯。治噦逆者。此湯主之。(金匱方)用橘皮二升。竹茹二升。大棗三十枚。生薑半斤。甘草五兩。人參一兩。上六味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日三服。

竹皮大丸。治婦人乳中虛煩亂。嘔逆。安中益氣。(金匱方)用生竹茹二分。石膏二分。桂枝一分。甘草七分。白薇一分。上五味末之。棗肉丸如彈大。飲服一丸。日三夜二。有熱倍白薇。煩喘加柏實一分。

竹紙 命名 本品係竹製成之紙。故名。

主治 包犬毛燒末酒服。治瘧疾。餘同楮紙。

竹魚 產地 出廣西桂江中。形態 竹魚為鱗類魚屬之一種。狀如青魚。體大骨少。青翠如竹色。鱗下間有朱點。味如鱒魚。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 和中益氣。除濕氣。

音名 筍字從竹。句諧音也。故名。

古籍別名 竹萌(爾雅)竹芽(荀譜)竹胎(說文)竹子(神異經)萌筍。筍。初筍(僧贊寧)笋(俗名)

基本 係禾本科苞木類。為竹屬之萌芽。

種類 苦竹筍。乃苦竹之筍。淡竹筍。乃淡竹之筍。冬筍。筍。桃竹筍。刺竹筍。酸筍。各詳本條。

性質 諸竹筍。甘微寒。無毒。主治 消渴。利水道。益氣。可久食。

歷代記述攷證 【明】寧原食鑑本草論諸竹筍曰。利膈下氣。化熱消痰。爽胃。

參攷資料 諸竹同羊肝食。令人目盲。(吳瑞) 竹筍諸家惟以苦竹筍為最貴。然苦竹有二種。一種出江西者。本極粗大。筍味

殊苦。不可啖。一種出江浙及近道者。厚肉而葉長闊。筍味微苦。俗呼甜苦筍。食品所宜。亦不開入藥用也。(蘇頌) 陸佃云。句內為筍。句外為竹。故字從句。今謂竹為茹。母草。謂筍生旬有六日而齊母也。(李時珍) 晉武昌戴凱之。宋僧贊寧。皆著竹譜。凡六十餘種。其所產之地。發筍之時。各各不同。亦有可食不可食者。大抵北土鮮竹。惟秦蜀吳楚以南。則多有之。竹有雌雄。但看根上第一枝。雙生者必雌也。乃有筍。土人於竹根行鞭時。掘取嫩者。謂之鞭筍。江南湖南人。冬月掘大竹根下。未出土者。謂冬筍。東觀漢記謂之苞筍。豈可鮮食。為珍品。其他則南人淡乾者。為玉版筍。明筍。火筍。鹽曝者。為鹽筍。豈可為蔬食也。按贊寧云。凡食筍者。譬如治藥。得法則益人。反是則有損。探之宜避風日。見風則本堅。入水則肉硬脫殼。煮則失味。生着刃。則失柔。煮之宜久。生必損人。苦筍宜久煮。乾筍宜取汁為羹。茹。蒸之最美。煨之亦佳。味甚者。載人咽。先以灰湯煮過。再煮乃良。或薄荷數片

同煮。亦去其味。詩云。其箴伊何。惟筍及蕒。禮云。加豆之實。筍。蘆魚。則筍之為蔬。尚之久矣。(李時珍)

【竹萌】即竹筍之古籍別名。典見爾雅。詳【竹筍】條。

【竹蕒】即竹筍之古籍別名。典見綱目。詳【竹筍】條。

【竹粟膠】即白莠之古籍別名。典見和漢藥考。詳【白莠】條。

【竹黃】即天竺黃之古籍別名。典見開寶本草。詳【天竺黃】條。

【竹園莖】即海金沙之俗名。詳【海金沙】條。

【竹葉】 處方用名 早竹葉。青竹葉。鮮竹葉。淡竹葉。

基本 係禾本科竹屬。為竹類之葉。

形態 竹類甚多。入藥以淡竹葉為勝。淡竹為竹之一種。產於燥地。為常綠多年生植物。高有至三四丈者。地上莖中空。有顯明二條環狀突節。節較苦竹為短。被有白粉。節間挺小莖。莖生其上。三葉相對。如花如個。稻麥穎花。惟不常開。本品作披針形。有平行脈。色青。乾則萎枯泛黃色。入藥以新鮮作膏

六畫 竹

六畫 竹

色者為佳。故處方時。必冠以早青鮮等字樣。

採取 臨時採用。去尖入藥。

性質 辛平。大寒。無毒。

效能 清上焦風熱。除傷寒煩渴。

用作清涼解熱藥。

主治 胸中痰熱。欬逆上氣。

張仲景之發明 竹葉石存湯一方用之。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論竹葉曰。吐血熱毒風止消渴。歷丹石毒。【唐】孟詵食療本草論竹葉曰。喉痺鬼疰。惡氣煩熱。殺小蟲。【宋】大明諸家本草論竹葉曰。消痰。治熱狂煩悶。中風。失音不語。壯熱。頭痛。頭風。止驚悸。溫疫迷悶。妊婦頭旋倒地。小兒驚癇。天吊。【金】張元素珍珠囊論竹葉曰。涼心經。益元氣。除熱緩脾。【明】李時珍本草綱目論竹葉曰。煎濃汁。漱齒中出血。洗脫肛不收。【明】經希雅本草經疏論竹葉曰。竹葉稟陰氣以生。本經味辛平。氣大寒。無毒。甄權言甘寒。氣薄味厚。入足陽明。手少陰經。陽明客熱。則胸中生痰。痰熱壅滯。則欬逆上氣。辛寒能

解陽明之熱結。則痰自消。氣自下。而欬逆止矣。仲景治傷寒發熱大渴。有竹葉石膏湯。無非假其辛寒散陽明之邪熱也。【清】黃宮楠本草求真論竹葉曰。竹葉體輕氣薄。味甘而淡。氣寒微毒。據書皆載涼心緩脾。清痰止渴為治。上焦風邪。煩熱欬逆。喘促嘔吐。血一切中風。驚癇等症。無非因其輕能解上。辛能散鬱。甘能緩脾。涼能入心。寒能療熱。故耳。然大要總屬清利之品。合以石膏同治。則能解除胃熱。而不致煩渴不止矣。竹生一年嫩而有力者良。

配合應用 治上氣發熱。因奔趁走馬後飲冷水所致者。竹葉二斤。橘皮三兩。水一斗半。煎五升。細服。三日一劑。【肘後方】

治時行發黃。竹葉五斤。切。小麥七升。石膏三兩。水一斗半。煮取七升。細服。盡劑愈。【肘後方】

用量 二錢至四錢。

參攷資料 竹類甚多。入藥用篋竹。次用淡苦竹。又一種薄殼者。名甘竹葉。最勝。又有實中竹。篋竹。並以筍為佳。於藥無用。【陶弘景】

景）竹處處有之。其類甚多。而入藥惟用篋竹。淡竹。苦竹三種。人多不能悉別。按竹譜。篋竹堅而促節。體圓而質勁。皮白如霜。大者宜刺船。小者可為筍。苦竹有白有紫。甘竹似篋而茂。即淡竹也。然今之刺船者。多用桂竹。作笛自有一種。亦不名篋竹。苦竹亦有二種。一出江西閩中。本極粗大。筍味殊苦。不可噉。一出江浙。肉厚而葉長闊。筍微有苦味。俗呼甜苦筍是也。今南人入藥。燒溼惟用淡竹一品。肉薄節間有粉者。【蘇頌】諸竹筍性皆寒。故知其葉一致。張仲景竹葉湯。惟用淡竹。【寇宗奭】竹字象形。許慎說文云。竹冬生草也。故字從倒草。戴凱之竹譜云。植物之中。有名曰竹。不剛不柔。非草非木。小異實虛。大同節目。【李時珍】竹惟江河之南甚多。故曰九河鮮有五嶺實繁。大抵皆土中苞筍。各以時而出。旬日落籜而成竹也。篋有節。節有枝。枝有節。葉必三之。枝必兩之。根下之枝。一為雄。二為雌。雌者生筍。其根鞭喜行東南。而宜死。貓。畏刺油麻。以五月十

五二二

三日為醉日。六十年一花。花結實。其竹則枯。竹枯曰筍竹。實曰篋。小曰筍。大曰籜。其中皆虛。而有實心。竹出瀘廣。其外皆圓。而有方竹。出川蜀。其節或暴或無。或促或疎。筍節出蜀中。高節磳柯。即筍竹也。無節竹出涪州。空心直上。即通竹也。簞竹一尺數節。出荆南。節竹一節尺餘。出樊楚。篋竹一節近丈。出南廣。其幹或長或短。或巨或細。交廣由吾竹長三四丈。其肉薄可作屋柱。筍竹大至數圍。其肉厚可為梁棟。永昌淡竹可為榻斛。篋竹可為舟船。嚴州越王竹高止尺餘。辰州龍絲竹細僅如針。高不數尺。其葉或細或大。鳳尾竹葉細三分。龍公竹葉若芭蕉。百葉竹一枝百葉。其性或柔或勁。或滑或澀。澀者可以錯甲。謂之篋。滑者可以為席。謂之栲。枝勁者可以為戈刀。箭矢。謂之矛。竹箭竹。石。石。麻。柔者可為繩索。謂之筍竹。弓竹。苦竹。把髮。其色有青有黃。有白有赤。有烏有紫。有斑斑者。以文點染。紫者黝色。黝然。烏者黑而害母。赤者厚而直。白者薄而曲。黃者如金。青者如玉。

其別種有類竹。一名勞竹。芒較森然。大者圍二尺。可製盜賊。樓竹一名實竹。其葉似樓。可爲柱杖。慈竹一名義竹。叢生不散。人栽爲玩。廣人以筋竹絲爲竹布。物甚脆。(李時珍) ①竹葉內息肝膽之風。外清溫暑之熱。故有安神止癢之功。(王秉衡) ②一種草類。莖如鐵線。葉長尺餘。亦名淡竹。止用葉以利水治喉痺。(趙其光)

【竹葉香】卽一種沉香之古籍別名。典見綱目。詳「沉香」條。

【竹葉細辛】別名 獐耳草。(綱目拾遺)

性質 香勝細辛。主治 脫力虛黃。

【竹葉酒】製法 用竹葉煎汁。如常法釀成飲之。

主治 諸風熱病。清心暢意。

【竹葉菜】卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【竹葉柴胡】卽柴胡之處方用名。詳「柴胡」條。

【竹葉湯粥】

基本 本品以竹葉煎湯。和米

煮成之粥。

六畫 竹

主治 止渴。清心。

【竹筴】命名 本品係用竹製之篋簪。故名。

採取 以陳舊者良。

主治 療蜈蚣傷。將小頭燒過。伏土中。取少許研傅之。

古醫別名 笛師。(郭璞賦) 黑蜂。(楊子方


音) 留師。(綱目拾遺)

外國名詞 Osmia rufa, L.

(拉丁) オスミア(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。膜翅類。蜜蜂科。藥用竹蜂之蜜。

產地 出蜀中野竹間。



竹蜂

形態 竹蜂爲卵生蟲類之一種。體大如指。頭色黑。密生黃褐色

毛。頭突出。前頭有二角狀突起。其窠結於野竹上。窠作紺色。大如雞子。長寸許。有蒂。其蜜貯窠中。味甘倍常蜜。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 牙齒腫痛。及口瘡並含之良。

參攷資料 按今人家有一種黑蜂。大如指頭。能穴竹木而居。腹中有蜜。小兒扑殺取之。亦此類也。(李時珍)

【竹鼠】原名 竹鼯。命名 鼯狀其尾也。卽食竹根之鼠。故名。

古醫別名 竹鼯。

形態 竹鼠爲獸類鼠屬之一種。體大如兔。形似家鼠。毛蒼色。尾短目細而長。前足不分趾。爪行極遲鈍。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補中益氣。解毒。

【竹實】古醫別名 竹肉。竹米。(陳藏器)

參攷資料 ①竹實出藍田。江東乃有花而無實。頃來斑斑有實。

主治 通神明。輕身益氣。

參攷資料 ②竹實出藍田。江東乃有花而無實。頃來斑斑有實。

狀如小麥。可爲飯食。(陶弘景) 舊有竹實。鬱風所食。今近道竹間。時見開花。小白如梨花。亦結實。如小麥子。無氣味而澆。江浙人號爲竹米。以爲荒年之兆。其竹卽死。必非鬱風所食者。近有餘於人。育竹實大如雞子。竹葉層層包裹。味甘勝蜜。食之令人心曠清涼。生深竹林。茂盛鬱密處。頃因得之。但日久汁枯乾而味尚存耳。乃知鬱風所食非格物也。(陳承) ③按陳藏器本草云。竹肉一名竹實。生苦竹枝上。大如雞子。似肉樹。有大毒。須以灰汁煮二度。煉訖。乃依常法茹食。煉不熟則戟人喉。出血。手爪盡脫也。此說與陳承所說竹實相似。恐卽一物。但苦竹上者有卷耳。與竹米之竹實不同。(李時珍)

【竹精】古醫別名 五月五日雨後剖取者名神水。

基本 竹精爲新竹中之水。剖取。以不臭色清者。可供藥用。

主治 汗斑。以雞毛蘸刷之。立退。

【竹青】卽天竺黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天竺黃」條。

六 蠶 竹

【竹蓐】 命名 凡草更生曰蓐。本品係生朽竹根節間。狀如木耳故名。

古籍別名 竹肉(本草拾遺) 竹蕞(本草綱目)

形態 竹蓐為寓木類寄生菌屬之一種。色紅。狀似木耳。大若彈丸。味如白樹黴。可供食與藥用。

採取 以陳舊者良。性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 一切赤白痢和瘡贅食之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論竹蓐曰。苦竹肉灰汁。煉過。食殺三蟲毒。邪氣。破老血。

參攷資料 竹蓐生苦竹者有毒。(李時珍)

【竹節人參】 即粉沙參之古籍別名。與見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

基本 人參三七之形如竹節者。或謂昭參之一種。

產地 浙江溫台山中。

形態 色白如粉。每條上有凹痕如白。

主治 為自證良藥。嚼之又可

解醒。

【竹節烏頭】 即草烏頭之古籍別名。與見綱目。詳『草烏頭』條。

【竹蔗】 即杜蔗之別名。係蔗之一種。性質功能與尋常蔗同。詳『蔗』條。

古籍別名 竹佛子。天厭子(本草綱目)

外國名詞 Pulvinaria ja-ponica Chitt (拉丁) コナシラミ 或クワノコナシラミ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。有吻類粉蟲科。

形態 竹蟲為化生蟲類之一種。初生如粉點。久乃便能動。百十成簇。形大如蠶。蒼灰色。為濕熱氣化或卵蟲所生。其幼蟲可供藥用。

性質 有毒。

主治 中風半身不遂。能透經絡。追痰涎。

【竹蠶】 即竹蓐之古籍別名。與見綱目。詳『竹蓐』條。

古籍別名 山菌子。(本草拾遺)雞頭鵝(東坡集)泥滑滑(本草綱目)

形態 竹蠶為原禽類鷓鴣屬

之一種。其體較鷓鴣差小。尾短。羽褐色。多斑赤文。好食白蟻。而性好啼。見其啼必鬥。捕者以媒誘其鬥。因而網之。其肉可食與供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 野雞病。殺蟲。灸灸食之。參攷資料 竹雞多食半夏苗汁。灌之。(李時珍)

【竹雞草】 即鴨跖草之古籍別名。與見綱目。詳『鴨跖草』條。

古籍別名 火泉。(和漢藥考) 竹油。(俗名)

基本 係用生鮮淡竹炙曬之汁。

形態 竹瀝清致如水。毫不稠濁。

製法 汪機曰。凡使竹瀝。將竹截作二尺長。劈開。以磚二片對立。架竹於上。以火炙出其瀝。以盤承受。李時珍曰。一法以竹裁長五六寸。以瓶盛貯倒懸。下用一器承受。周圍以炭火逼之。其油瀝於器下也。

性質 甘。大寒。無毒。

效能 清火。滑痰。用作中風祛

五二四

痰藥。

主治 治禁中風。風痺。胸中大熱。止煩悶。消渴勞復。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論淡竹瀝曰。中風失音不語。養血清痰。風痰虛。痰在胸膈。使人癡狂。痰在經絡。四肢及皮裏膜外。非此不達不行。【明】李時珍本草綱目論淡竹瀝曰。治子冒風。瘧射。因毒。【明】程希雍本草經疏論淡竹瀝曰。竹瀝。竹之津液也。經云。大寒。亦言其本性耳。得火之後。寒氣應減。性滑流利。走痰逐痰。故為中風家要藥。凡中風之證。莫不由於陰虛火旺。煎熬津液。結而為痰。壅塞氣道。不得升降。熱極生風。以致猝然倒仆。或偏痺不仁。此藥能通走經絡。搜剔一切痰結。藥之甘寒能益陰而除熱。痰熱既結。則氣道通利。經脈流轉。外證自除矣。其主胸中大熱。止煩悶者。取其甘寒清熱益陰之功耳。觀古人以竹瀝治中風。則知中風未有不因陰虛痰熱所致。不然。如果外來風邪。安得復用此甘寒滑利之藥治之哉。【清】黃宮橋本草求真

語竹瀝曰竹瀝甘寒而滑。治諸滑
 風降火。潤燥行痰。養血益陰。凡小
 兒天吊驚癇。陰虛發熱。口噤胎產。
 血暈。痰在經絡四肢。皮裏膜外者。
 服之立能見效。蓋瀝之出於竹。猶
 血之出於人也。極能補陰。長於清
 火。性滑流利。走竅逐痰。故為中風
 要藥。以中風莫不由於陰虛火旺。
 煎熱津液成痰。壅塞氣道。不得升
 降。服此流利經絡。使痰熱去。氣道
 通。而外症愈矣。故火燥熱者宜之。
 若脾胃腸滑。寒痰濕痰。食積生痰。
 不可用也。煎瀝性味相近。但氣寒。
 多用則氣虛熱。多用竹。莖汁為使。
 但竹類甚多。惟取竹肉薄節用。

配合應用 治似中風。口眼喎
 斜。語言蹇澀。或半身不遂等證。用
 竹瀝同貝母。栝樓仁。段天齊。白芥
 子。蘇子。橘紅。鬱金。童便。麥門冬。
 ①治中風。口噤。竹瀝真汁等分。
 日飲之。(千金方)
 ②治小兒口噤。體熱。用竹瀝二
 合。煖飲分三四服。(兵部手集方)
 ③治產後中風。口噤。身直。面青。
 手足反張。竹瀝飲一二升即可甦。
 (梅師方)

六畫 竹

④治破傷中風。凡因脫折骨節
 痛。憤不可當。風用扇。中風則發症
 口噤。項急。殺人。急飲竹瀝二三升。
 忌冷飲食。忌酒。竹瀝卒難得。可合
 十許束併燒取之。(外臺祕要方)
 ⑤治金瘡中風。口噤欲死。竹瀝
 半升。微煖服。(廣利方)
 ⑥治大人喉風。筍竹油類飲之。
 (集簡方)
 ⑦治小兒重舌。竹瀝漬黃蘗。時
 時點之。(簡便方)
 ⑧治小兒傷寒。淡竹瀝。葛根汁
 各六合。細細與服。(千金方)
 ⑨治小兒狂語。夜夜便發。竹瀝
 夜服二合。(姚和衆至寶方)
 ⑩治婦人胎動。妊娠因夫所動
 困絕。以竹瀝飲一升。立愈。(產寶
 方)
 ⑪治孕婦子煩。竹瀝頻頻飲之。
 又方。伏苓二兩。竹瀝一升。水四升。
 煎二升。分三服。不瘥。更作之。(梅
 師方)
 ⑫治時氣煩燥。五六日不解。青
 竹瀝半盞。煎熱數飲之。厚覆取
 汗。(千金方)
 ⑬治消渴尿多。竹瀝恣飲。數日

愈。(肘後方)
 ⑭治欬嗽肺痿。大人小兒。欬逆
 短氣。胸中吸吸。欬出涕吐。嗽出臭
 膿。用淡竹瀝一合。服之日三五次。
 以愈為度。(兵部手集方)
 ⑮治產後虛汗。淡竹瀝三合。煖
 服。須臾再服。(產寶方)
 ⑯治小兒吻瘡。竹瀝和黃連。黃
 蘗。黃丹。傅之。(全幼心鑑方)
 ⑰治小兒赤目。淡竹瀝點之。或
 入人乳。(古今錄驗方)
 ⑱治赤目。背痛不得開者。肝經
 實熱所致。或生障翳。用苦竹瀝五
 合。黃連三分。綿裹浸一宿。頻點之。
 令熱淚出。(梅師方)
 ⑲治卒牙齒痛。苦竹燒一頭。其
 一頭汁出熱搯之。(姚僧垣集驗
 方)
 ⑳治丹石毒發。頭眩耳鳴。恐懼
 不安。淡竹瀝頻服二三升。(古今
 錄驗方)
 用量 一匙至二匙。
 施用宜忌 凡寒嗽及胃薄便
 瀉者禁用。
 配合宜忌 煎汁為之使。
 參攷資料 ①凡取竹瀝惟用

淡苦筍竹者。(陶弘景) ②竹瀝滑
 痰。非助以薑汁不能行。諸方治胎
 產。金瘡。口噤與血暈。自汗。消渴。小
 便多。皆是陰虛之病。無不用之。產
 後不凝。胎前不損。子本草實其
 大寒。似與石膏。黃芩同類。而世俗
 因大寒二字。棄而不用。經曰。陰虛
 則發熱。竹瀝味甘性煖。能除陰虛
 之有大熱者。寒而能補。與薯蕷寒
 補義同。大寒實其功。非獨言其氣
 也。世人食筍。自幼至老。未有因其
 寒而病者。瀝即筍之液也。又假於
 火而成。何寒如此之甚耶。但能食
 者用荊瀝。不能食者用竹瀝。(朱
 震亨) ③竹瀝性寒而滑。大抵因
 風火燥熱而有痰者宜之。苦寒濕
 胃。虛腸滑之人服之。則反傷腸胃。
 筍性滑利。多食滯人。僧家謂之刮
 腸筍。即此義也。丹溪朱氏謂大寒
 實其功。不言其氣。殊悖於理。謂大
 寒為氣。何害於功。淮南子云。橘竹
 有火。不鑽不烈。因苗稼人。以乾竹
 片相擊取火。則竹性雖寒。亦未必
 大寒也。神仙傳云。姜公服竹汁。餌
 桂。得長生。蓋竹汁性寒。以桂濟之。
 亦與用薑汁佐竹瀝之意相同。淡

六畫 竹 米

竹今人呼為水竹。有大小二種。此竹汁多而甘。沈存中言苦竹之外。皆為淡竹。誤矣。(李時珍)竹類甚多。溼則其液也。故能補血養經絡。達四肢而起廢疾。凡病人久不理髮。結而難梳者。用竹溼少加麻油和勻。潤之。即可梳通。故一切憂思鬱結之病。無不治之。世人但用以開痰結。陋矣。(王乘衡)竹葉兼行肌表。故能療瘡殺蟲。竹茹專清胃腑。故能止嘔除煩。竹瀝善透經絡。故能治筋脈拘攣。本經療筋急。專取竹瀝潤以濡之也。千金治四肢不收。則兼附桂羚羊之雄以振之也。一以舒急。一以收緩。妙用不可思議。(張石頑)

【竹瀝半夏】 命名 本品係用竹瀝所製之半夏故名。
製法 用大半夏。照法半夏之製。復以竹瀝漬焙乾用。
主治 痰之偏于黃稠者宜之。

【竹瀝半夏麴】 原名 竹瀝
命名 本品為半夏麴之一種。係和竹瀝製成者故名。

採取 以陳久者良。
製法 用半夏入白芥子三分之一。竹瀝和成。略加麴草。置七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。
主治 皮裏膜外結核。隱顯之痰癥。

【竹瀝麴】 即竹瀝半夏麴之原名。詳「竹瀝半夏麴」條。

【竹瀝人參】 即粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粉沙參」條。

【竹筴】 即籜筴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「籜筴」條。

【竹蠶蟲】 外國名詞 Lycena Brunneus Steph. (拉丁) タケシンクイ (日本) 基本 係節肢動物昆蟲類。類翅類。竹蠶蟲科。

形態 竹蠶蟲為化生蟲類之一種。其體小形細長。色赤褐。頭部隱於前胸下。觸角從眼前直出。分十一節。末部為棍棒狀。小頭鬚長。呈絲狀。翅輪多直。走之隆起。體長一分半。幼蟲形若小蠶。蠶竹中則竹桿旁有小孔而落粉屑。老則羽化硬翅為蛾。其幼蟲可供藥用。

主治 小兒蠟梨頭瘡。取慈竹

內者。搗和牛溲塗之。

【竹蠶蟲蛀末】 主治 聾耳 傷瘡。 出膿水。湯火

【竹鼠】 即竹鼠之原名。詳「竹鼠」條。

【米仁】 即苡仁之處方用名。詳「苡仁」條。

【米心石斛】 即鑿山石斛之古籍別名。典見綱目。詳「石斛」條。

【米布袋】 即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳「紫花地丁」條。

【米皮糠】 即米糠之古籍別名。典見綱目。詳「米糠」條。

【米油】 基本 本品係米和水而浮起澱滑之膏油。

採取 以大鍋能煮米五升以上者良。若以熱粥絞取之。油汁力薄甚次。

性質 甘。平。無毒。

主治 滋陰。長力。肥五臟。實毛竅。利小便。通淋。精清不孕。

參攷資料 ①米油黑瘦者食之。百日即肥白。以其滋陰之功。勝於熟地也。每日能撤出一碗。淡服

最佳。(綱目拾遺) ②米油加煉過食鹽少許。空心服下。其精自濃。即孕矣。(紫林方)

五二六

【米珠】 即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【米糝】 ①即米糠之原名。詳「米糠」條。②即米糠之古籍別名。典見食物本草。詳「米糠」條。

【米酒】 命名 本品入藥以米釀造醱者良。故名米酒。

處方用名 酒炒。酒浸。

古籍別名 釀。九醞。九醇。白醞。平葉。竹葉。玉蘗。杜康。玄水。花香。吳醞。富水。狂樂。土窟。春。石凍。春。百藥。長。秋。露。白。梨花。春。軟。口。湯。拋。青。春。般。若。湯。羅。浮。香。麴。米。春。(和漢藥考)

基本 係用米麥穀類。飯蒸醱醱。釀成黃色澄清之液體。

形態 酒為黃黃色澄清之液體。有辛烈之味。比重〇・九八至〇・九九。加水則色淡。而比重亦高。

種類 ①酒類頗多。凡供藥用者。須用米酒。其味甘辛。其色美麗。如琥珀者清酒也。即方書中所稱

之無灰酒也。清酒之初熟者爲白酒。其味甘辛。其性大溫。若味甜有沫。或味辛而色不純者。下品也。探取 每年九月下旬至來年三月中旬間爲造釀時期。製法 凡入藥用以陳久者良。其造酒之法。各地不同。舊法造酒之時期。以寒時爲最良。大約米十石五斗。麴三石五斗。清水十五石相和而製成。茲先論製麴之法。精米洗淨。水浸半日。入蒸飯蒸熟。取下鍋。候溫度至八十度。甬中敷蘆席。安放蒸米。其上蓋席三四張。經兩日一夜。入手試其溫度。(溫氣之生。隨節氣而有遲速。故須以手試之。)手揉攤布使其稍冷。仍如前查之。此後每經二時。輒盛麴於蓋。類類插手。探試溫度之適宜。(溫度太過。則麴腐敗不足。則不生白花。故須屢試。)至翌日午後。便生白花。其狀如糊。其味則甘。又如前洗淨精米。水浸半日。蒸熟。攤席拌勻。候冷。用手翻攪其麴。並加以水。如前宵浸者。則自明晨至黃昏。約須手拌十餘次。然後用圓棍搗爛。又用扁棍攪拌。日須十次。如

六 薑 米

是經八日之久。乃收藏桶中。包以蘆席。仍用圓棍攪拌。日約十次。如是經十五六日。以長桶(可入二斗。其形細長)盛熱湯。放入麴桶之中心。使得溫而發酵。滿一周時。(如清晨六時放入者。則於晚間六時取出)還將長桶取出。如是約六七次。麴便釀成。至此乃去其包桶之席。將棍攪拌。任其冷定。是爲酒母。釀酒之法。以米十五石。和酒母二石。麴六斗。水十五石。同入大桶中。七八日後。桶面生沫。經十日而發酵。發酵五六日。便須攪拌。又四五日。布袋盛之。約十七個。排列槽中。漸次層累而上。至五百個。則加壓蓋。上列枕木。橫以撐棹。棹之一端。嵌入柱內。一端下垂。墜石。此墜石凡十二塊。(每石約重六十餘斤)約經二日。榨完。移於桶中。放置三日。全然澄清。桶之上下。換裝注管。在上之注管。用以流出清酒。在下之注管。用以流出污滓。至是乃將澄澈之酒。傾入大桶。嚴密封閉。令勿洩氣。臨用。可隨時從注管流出。至五月初旬。(即八十八夜)以大釜與以九十度之溫

度。謂之火入。所得之酒。大約米十石。可得清酒十二石。性質 苦甘辛。大熱。有毒。效能 宣行藥勢。調氣和血。用作興奮及順血藥。主治 行藥勢。殺百邪。惡毒氣。歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論米酒曰。通血脈。厚腸胃。潤皮膚。散溼氣。消憂發怒。宜言暢意。【唐】孟詵食療本草論米酒曰。養脾氣。扶肝除風。下氣。【元】王好古湯液論米酒曰。酒能引諸經不止。與附子相同。味之辛者能散。苦者能下。甘者能居中。而緩用爲導引。可以通行一身之表。至極高分。味淡者則利小便而速下也。古人惟以麥造麴釀黍。已爲辛熱有毒。今之釀者。加以烏頭。巴豆。砒霜。薑桂。石灰。瘡灰之類。大毒大熱之藥。以增其氣味。豈不傷沖和。損精神。酒營衛。竭天癸。而天夫人壽耶。【元】朱震亨本草衍義補義曰。本草止言酒熱而有毒。不言其溼中發熱。近於相火。醉後振寒戰慄。可見矣。又性喜升。氣必隨之。痰鬱於上。溺瀝於下。恣飲寒涼。其熱內鬱。

肺氣大傷。其始也病淺。或嘔吐。或自汗。或瘡疥。或鼻齜。或泄利。或心脾痛。尙可散而去之。其久也病深。或消渴。或內疽。或肺痿。或鼓脹。或失明。或哮喘。或勞瘵。或癩癩。或痔漏。爲難名之病。非具眼未易處也。夫醇酒性大熱。飲者適口。不自覺也。理宜冷飲。有三益焉。過於肺入於胃。然後微溫。肺得溫中之意。可以補氣。次得寒中之溫。可以養胃。冷酒行遲。傳化以漸。人不得恣飲也。今則不然。祇圖取快。喉舌焉爾。【明】汪穎食物本草論酒曰。人知戒早飲。而不知夜飲更甚。既醉既飽。睡而就枕。熱癰傷心。傷目。夜氣收斂。酒以發之。亂其清明。勞其脾胃。停滯生瘡。動火助慾。因而以致病者多矣。朱子云。以醉爲節可也。【明】李時珍本草綱目論米酒曰。酒能解馬肉相油毒。丹石發動諸病。熱飲之甚良。【明】程希樞本草經疏論米酒曰。酒品類極多。醇醪不一。惟米造者入藥用。絕云。酒者熱穀之液。其氣悍。弘景云。大寒凝海。惟酒不冰。明其性熱。獨冠羣物。製藥多用之。以藉其勢。人飲多則

五 二 七

六畫 米

體察神昏。是其有毒故也。博物志云。昔三人冒務晨行。一人飲酒。一人飽食。一人空腹。空腹者死。飽食者病。飲酒者健。此酒勢辟邪惡毒氣之效。勝於他物也。藏器主通血脈。厚腸胃。潤皮膚。消憂發怒。宜胃暢意。無非取其橫行經絡。走散皮膚。開發宣通之功耳。【清】黃宮楠本草求真論米酒曰。酒性種類甚多。然總由水穀之精。熱穀之液。醱而成。故其味有甘有辛。有苦有淡。而性皆主熱。入胃則氣逆上壅。滿胸則肝浮膈橫。等於勇士。不可遏矣。若引經用為導。則其勢最遠。辛則通身達表。引入至高癩項之分。甘則緩中。苦則降下。淡則通利小便而速下也。熱酒傷中。溫飲和胃。怡神壯色。通經活脈。且霧露風障。風寒暑濕邪穢。得此亦可暫辟。若恣飽不節。則損胃燥精。動火生痰。發怒助慾。溼熱生病。殆不堪言。至於夜飲。更屬不宜。蓋夜氣主收斂。氣密則固。若用酒宣發。醉飲就枕。熱壅三焦。傷心損目。亂其清明。勞其脾胃。停滯動火。致病甚多。至入藥共釀。合煎則療厥逆客忤。

色紫則理。癭瘰偏風。葱豉則解煩熱。而散風寒。桑椹則益五臟。以明耳目。狗肉汁則大補元陽。葡萄酒則甚消痰癖。牛膝乾地則滋陰。枸杞仙靈脾則扶陽痿等。社酒指納嬰兒口中。可令速語。噴屋及壁。則逐蚊蠅。燒酒則散寒結。然燥金酒血。敗胃傷膽。水酒藉麵醱。其性則熱。酒藉水成。其質則寒。少飲未至有損。多飲自必見害。如陰虛酷好。其臟本熱。加以酒熱內助。其熱益增。不致逼血妄出不止。陽虛酷好。其臟本寒。加以酒寒內入。其害益甚。不致飽脹吞酸吐瀉不止。糟壘跌傷行瘀止痛。亦賦蛇毒。及食凍瘡。醇而無灰。陳久者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論米酒曰。酒大寒凝海而不冰。其性熱也。甘苦辛酸。皆不是其味異也。合飲成禮。祭祀宴賓。皆所必需。壯膽辟寒。和血養氣。老人所宜。行藥勢劑。諸肴殺鳥獸鱗介諸腥。陳久者良。多飲必病。故子弟幼時。總不令飲酒。到大來不戒而自不飲矣。凡民日食不過一升。而尋常之量。輒飲斗酒。是一人之飲。足供數人之食。至於

盛者饒多朋從。其費又不可勝計也。酒之為物。勤儉多妨。故禁酒可使民富。貞潔之人。以酒亂性。力學之人。以酒廢業。盜賊之徒。以酒結夥。剛暴之徒。以酒行兇。凡世間敗德損行之事。無不由於酒者。此書之所以作酒誥。漢時所以三人羣飲。罰金四兩也。酒之為物。志氣兩昏。故禁酒可以興民教。富之教之。誠富國坊民之善術。今養爾小邑。歲費造酒之米。必以萬石計。不但米價日昂。徑至釀成大劫。此其一端也。可不鑒哉。【清】鄭樹本經疏證論米酒曰。世之於酒。不謂其引藥性上行。即謂其引藥性入血。不曰性熱而驅寒。即曰性速能行氣。然別錄主治。不曰引藥性。助藥力。而曰行藥勢。豈不以是藥本治是病。特其機勢不張。藉此以行之耶。不曰解散邪毒。而曰殺百邪。蓋毒氣。豈不以邪與毒之燥烈者。受解散而不受殺。惟沉痾及積冷。非解散所能治者。必以此劫而行之耶。夫稻米之性本熱。且滯而鬱。而激之變。濡遲為迅烈。觀其隆冬。沍寒之際。不假烹煉。自然如鼎之沸。

五二八

使其質如弱之糜。以漸而消。不可謂其不行氣散結也。以穀而竟消成汁。始則變白為黃。久則變黃為赤。其性復動盪不羈。不可謂其不行血去瘀也。而其大旨所在。則有不僅是焉。請以仲景之用酒言之。傷寒論金匱要略兩書。凡水酒合煮之湯三。炙甘草湯用酒七升。水八升。當歸四逆加吳茱萸生薑湯。酒水各六升。芍藥膠艾湯。酒三升。水五升。即此可見補陰劑中。以此通藥性之滯。散寒劑中。以此破伏寒之凝結。而用之復有輕靈之差矣。凡以下丸者。五下散者。六。薯蕷丸。腎氣丸。天雄散。是藉以行補藥之滯。九痛丸。赤丸。侯氏黑散。是藉以通邪氣之結。大黃蘗蟲丸。土瓜根散。是藉以逐隱道之滯。當歸芍藥散。當歸散。白朮散。是藉以和血脈之甄矣。凡以洗藥者。三則為抵當湯。調胃承氣湯。大承氣湯之。大黃。是駛者復益之以駛。欲其過而不留。去病而不傷正耳。而去邪者。復有防已地黃湯之防已。防風桂枝甘草瀉四物。絞取其汁。合地黃汁服之。不取其助補劑之行。反

取其增散藥之烈。是欲其合散藥。隨補藥以驅邪。仍不傷正也。紅藍花酒之但漬一味。寓驅風於行血之中。卽行血於驅風之內。是欲其血和風自滅也。其用意微而情最曲屈者。莫如鼈甲煎丸之煎鼈甲爲膠。合諸藥成丸。下瘀血湯之煮丸而服。一則用於最先。一則用於極後。是則破瘀堅邪氣者。欲其自內而外。去瘀積積血者。欲其自上而下。故其所取。有在藥內。有在藥外之別也。能深研乎此。可以知行藥勢之說矣。白酒酒之新釀者。也。其色白。其味甘辛。其氣輕揚。故爲用上焦之肺。而治胸痺。

國外學說 和漢藥考曰。清酒之純粹者。其越幾斯分與酒精之比例。普通在一與四五之間。酒漸劣。則越幾斯分漸多。新釀之酒。有不明之揮發酸。且發一種固有之臭氣。糖分及糊精亦多。陳久則其量自少。其酸除醋酸外。并含有乳酸。牛醋酸等。清酒中酒精釀酵之副產物。爲甘油。琥珀酸。乳酸。牛醋酸。富攝爾油等。酸之總量。爲〇·二至〇·五。乃下等酒也。若

六畫 米

酸敗之酒。且多至〇·五。以上。富攝爾油多者。飲之易醉。糖分多者。飲之輒下利。又潤澤不清之酒。中含各種微菌。飲之亦易下利。又曰。酒之主要成分爲酒精。含十至十六。餘則爲越幾斯。二至四。若糖分。糊精。甘油。酸。灰分等。與越幾斯。酒精相較。不過一與四五之比例而已。

配合應用 治驚怖卒死。溫酒灌之卽醒。

治鬼擊諸病。卒然者。人如刀刺狀。胸膈腹內。切痛不可抑按。或吐血。鼻血。下血。一名鬼排。以醇酒吹兩鼻內良。〔肘後方〕

治馬氣入瘡。或馬汗。馬毛入瘡。皆致腫痛。煩熱入腹。則殺人。多飲醇酒。至醉卽愈。妙。〔肘後方〕

治虎傷人瘡。但飲酒。常令大醉。當吐毛出。〔梅師方〕

治蛇咬成瘡。煖酒淋洗瘡上。日三次。亦治蜘蛛瘡。毒蜂螫入。〔廣利方〕

治咽傷聲破。酒一合。酥一匕。乾薑末二匕。和服。日二次。〔十便良方〕

治三十年耳聾。酒三升。煮牡荊子一升。七日後。去滓。任性飲之。〔千金方〕

治天行餘毒。手足腫痛。欲斷。作坑深三尺。燒熱。灌酒着。居坑上。以衣覆之。勿令泄氣。〔類要方〕

治下部痔瘻。掘地作小坑。燒赤。以酒沃之。納臭菜。莢在內。坐之。不過三度良。〔外臺祕要方〕

治產後血閉。清酒一升。和生地黃汁煎服。〔梅師方〕

治斷酒不飲。酒七升。硃砂半兩。瓶浸緊封。安豬圈內。任猪搗動。七日取出。頓飲。又方。正月一日。酒五升。淋確頭。榨下。取飲。〔千金方〕

治丈夫脚冷。不隨不能行者。用醇酒三斗。水三斗。入甕中。灰火溫之。漬脚至膝。常着灰火。勿令冷。三日止。〔千金方〕

治海水傷。凡人爲海水鹹物所傷。及風吹裂痛。不可忍。用蠶中斤。水酒三十斤。防風。當歸。羌活。荊芥。各二兩。爲末。煎湯浴之。一夕卽愈。〔使琉球錄方〕

用量 一匙或一杯或少許。

應用宜忌 凡陰虛火旺。及非

寒滯氣鬱者。禁用。長根。檳。葛。花。赤豆。花。綠豆。粉。鹽。瀉。及諸甜物。

【米殼】卽粟殼之古籍別名。與見和漢藥考。詳【粟殼】條。

【米腦】卽冰片之古籍別名。典見綱目。詳【冰片】條。

【米漿水】製法 取炊熟粟米。投冷水中。浸五六日。味醇。生白花。漚其汁用之。性質 甘酸。微溫。無毒。功用 解渴。化滯。

【米醋】卽醋之原名。見【醋】條。

【米餿】卽黃精之古籍別名。典見本草。詳【黃精】條。

【米麴】命名 本品係糯米製成之麴。故名。製法 用糯米粉一斗。同麥白然汁。和作團丸。楮葉包掛。風處。七日。晒乾用。性質 甘溫。無毒。主治 消食。積。酒。積。糯米。研末。酒服。立愈。餘功。同小麥麴。

【米渣】卽粳米泔水之古籍別名。典見綱目。詳【粳米泔水】條。

【米糠】原名 米。批。命名 批。亦作。批。乃薄

六畫 米 羊

之義。本品即精米上之細糠。故名。古種別名 米枇(食物本草) 米皮糠(本草綱目)

性質 甘平無毒。

主治 通腸開胃。下氣磨積塊。作糞食不餓。克滑膚體。可以頤養。

參攷資料 糠諸粟穀之殼也。其近米之細者為米枇。味極甜。儉年人多以豆濁。或草木花質可食者。和劑蒸煮以救饑云。(李時珍)

◎現代營養學上有一種不可缺之養料。其功用雖不能直接造成組織。發生體力。但缺乏此種養料。則他種食物之功用。即不能如常進行。是為人類健康之必需品。已確實無疑。惟如何組織。尚未明瞭。故尚無化學名稱。但名為維他命而已。並因其對於溶液之易感性。而分為甲乙丙丁四種。米之外皮。含有乙種維他命。素。吾人日常食米。但求其白。不知米愈白。此種維他命素失去亦愈多。我國南方。有患脚氣病者。即因多食白米。缺乏乙種維他命素之故。蓋食物中缺少此素。則神經易於痲痺。四肢知覺失常。或兼水腫。行動不便。

如脚氣初發。可用米糠三四匙。滾水調服二三次。即可平復。綠米糠中。存有多量之乙種維他命素。故也。(尤學周)

【米露】 基本 本品以新鮮白花者之露。

主治 和中納食。清肺開胃。益虧損。

參攷資料 米露用稻花蒸者更佳。(本草綱目)

【米蘗】 即粟殼之古籍別名。與見和漢藥考。詳「粟殼」條。

【米蘗子】 即粟子之古籍別名。與見開寶本草。詳「粟子」條。

【羊七】 即螻蛄之古籍別名。典見揚子方言。詳「螻蛄」條。

【羊不食草】 即羊躑躅之古籍別名。典見本草拾遺。詳「羊躑躅」條。

【羊不喫草】 山 廩地 生蜀川山谷

形態 羊不喫草為毒草類之一種。葉細長。雜生諸草中。而羊不喫其莖根。可供藥用。

性質 苦辛。溫無毒。

主治 治一切風血。補益。攻諸

痛。

參攷資料 羊不喫草似羊躑躅。而云無毒。蓋別有此也。(李時珍)

【羊心】 性質 甘溫無毒。

主治 止憂。惡氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論羊心曰。補心。

參攷資料 白羝羊者良。有孔者殺人。

【羊毛】 主治 轉筋。醋炙。製脚良。

【羊汁粥】 基本 本品係以羊肉汁和米交成之粥。

主治 勞損。

【羊古米】 即粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粟子」條。

【羊皮】 主治 一切風。及脚中虛風。補虛勞。去毛作藥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論羊皮曰。溼皮。臥之。散打傷青腫。乾皮。燒服。治蠱毒下血。

【羊外腎】 原名 羊石子。

古種別名 羊卵。

五三〇

命名 外腎。羝丸也。本品乃羊之羝丸。故名。

主治 腎虛精滑。

【羊石子】 即雲實之古籍別名。典見國經本草。詳「雲實」條。

【羊石子】 即羊外腎之原名。詳「羊外腎」條。

【羊肉】 處方用名 羯羊肉。羝羊肉。

古種別名 羝肉。羝肉。羯肉。(本草綱目) 羔羊肉。青羊肉。綿羊肉。背有肉封如駝者名封羊。(俗名)

基本 係反芻動物羊屬之肉。

形態 羊為家畜類之一。孕四月而生。其目無神。其腸薄而彎曲。全身毛色黑白不一。毛甚長。剪取可為氈物原料。頭部有兩角。亦有無角者。其皮肉臟腑骨髓等。既可供食。又可供藥用。

性質 苦甘。大熱。無毒。

效能 補元陽。治虛羸。用作滋補強壯藥。

主治 治暖中。字乳。餘疾。及頭腦大風。汗出。虛勞。寒冷。補中益氣。安心止驚。

歷代記述攷證

【唐】孫思邈千金翼論羊肉曰止諸痛利產婦風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒疳癪【宋】日華諸家本草論羊肉曰開胃健力【金】李東垣用藥法象論曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣【明】李時珍本草綱目論羊肉曰羊肉味甘氣大熱無毒補可去弱人參羊肉之屬是已羊肉有形氣痿弱虛羸不足者宜之其主字乳餘疾者蓋產後大虛血氣暴損得甘熱之物補助陽氣則陰血自長餘疾自除矣中氣虛則心不安或驚惕陽氣弱則頭腦大風汗出補中則中自緩故能安心止驚益氣則陽自足故能療頭腦大風汗出及虛勞寒冷也【清】黃宮繡本草求真論羊肉曰羊肉氣味甘溫東垣載能補形此一句已盡羊肉大概矣復於十劑方中又云補可去弱人參羊肉之屬是明指參補氣而補形端在羊肉又何疑哉夫氣屬陽血屬陰體輕而燥者屬陽體重而潤者屬陰羊肉氣味雖溫然體潤肉肥其於肌膚血

六 羴 羊

液則易及若使泥於書載壯陽補氣健力等說及以陽生陰長之理牽引混指其何以清眉目而別治用哉【清】王士雄隨息居飲食譜論羊肉曰羊肉甘溫煖中補氣滋營禦風寒生肌健力利胎產愈痲止疼肥大而嬾易熟不羶者良秋冬尤美與海參蘆根筍栗同煨皆益人加胡桃煖則不羶多食動氣生熱不可同南瓜食令人壅氣發病時感前後癩疔疔疽腫滿顛狂哮喘霍亂諸病及痧痘瘡疥初愈均忌新產後僅宜飲汁勿遺食肉產後虛羸腹痛冷自汗帶下或乳少或惡露久不已均用羊肉切治如常煖糜食之兼治虛冷勞傷虛寒久瘵

配合應用 張仲景治寒勞虛羸及產後心痛疝痛用肥羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五兩黃芩八兩生薑六兩煮取二升分四服胡洽方無黃芩千金方有芍藥(金匱方) 胡洽大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半用水一

斗煮肉取七升入諸藥煮二升服 治產後虛羸腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調和食之(食醫心鏡方) 治產後帶下產後中風絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煮五升納酥一升更煮二升服(千金方)

治崩中垂死肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸各三兩煮三升分四服(千金方) 治補益虛寒用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餲餲子每日空腹時以冷漿水吞一百枚甚補益(千金方)

壯陽益腎用白羊肉半斤切生以蒜薤煮食之三日一度甚妙(食醫心鏡方) 治五勞七傷虛冷用肥羊肉一腿密蓋煮爛絞取汁服并食肉 治骨蒸久冷羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如泥下米煮粥食之(飲膳正要方)

治骨蒸傳尸用羊肉一掬大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鑪內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效(外臺祕要方) 治虛寒瘧疾羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖臥取汗(集驗方) 治脾虛吐食羊肉半斤作羹以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之(食醫心鏡方) 治虛冷反胃羊肉去脂作生以蒜薤空腹食之(外臺祕要方) 壯胃健脾羊肉三斤切柴米二升同煮下五味作粥食(飲膳正要方)

治老人腸癆不下飲食用羊肉四兩切白麩六兩橘皮末一分煎汁搜如常法入五味作臘食每日一次大效(多能鄙事方) 治胃寒下痢羊肉一片其蠶子末一兩和以綿裹納下部二度瘵(外臺祕要方) 治身面浮腫商陸一升水二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切入肉煮熟下葱豉五味調和如臘法食之(肘後方)

五三一

六畫 羊

①治腰痛脚氣。木瓜湯。治腰膝痛。脚氣。羊肉一脚。草葉五枚。梗米二升。回回豆。即胡豆半升。木瓜二斤。取汁入砂糖四兩。鹽少許。煮肉食之。(正要方)

②治婦人無乳。用羊肉六兩。燉肉八兩。鼠肉五兩。作履啖之。(崔氏方)

③治小兒嗜土。買市中羊肉一斤。令人以繩繫於地上。投至家。洗淨炒炙食。或煮汁亦可。(桃和衆方)

④治頭上白禿。羊肉如作脯法。炙香熱搗上。不過數次。瘰(肘後方)

應用宜忌 凡有痰火溼熱實邪者禁用。反半夏。菖蒲。忌銅器。

參攷資料 ①羊有三四種。入藥以青色殺羊為勝。次則烏羊。其現羯羊及虜中無角羊。止可啖食。為藥不及都下者。然其乳酪則肥好也。(陶弘景) ②河西羊最佳。河東羊亦好。若驅至南方。則筋力自勞損。安能補益人。今南方羊多食野草毒草。故江浙羊少味而發疾。南人食之即不憂也。惟淮南州郡

或有佳者。可亞北羊。北羊至南方一二年。亦不中食。何況於南羊。蓋土地使然也。(孟詵) ③仲景治寒疝羊肉湯。服之無不驗者。一婦冬月生產。寒入子戶。腹下痛不可按。此寒疝也。醫欲投抵當湯。予曰。非其治也。以仲景羊肉湯。減水二服。即愈。(冠宗廣) ④按開河記云。隋大總管麻叔謀。病風逆。起坐不得。煬帝命太醫令巢元方視之。曰。風入腹理。病在胸臆。須用嫩肥羊蒸熟。搗藥食之。則痊。如其言。未盡劑而痊。自後每殺羊。蒸同杏酪五味。日食數枚。觀此。則羊肉補虛之功。益可證矣。(李時珍) ⑤熱病及天行病。瘧疾。病後食之。必發熱。致危。妊婦食之。令子多熱。白羊黑頭黑羊。白頭獨角者。並有毒。食之生癩。禮曰。羊饒毛而羸者。積又云。養羊以杏仁。或瓦片。則易糜。以胡桃。則不糜。以竹籬。則助味。中羊毒者。飲甘草湯。則解。銅器煮之。男子損陽。女子暴下。物性之異如此。不可不知。(李時珍) ⑥說文云。羊字象頭角足尾之形。孔子曰。牛羊之字。以形似也。董子云。羊祥也。故吉禮用

之。牡羊曰羖。曰羝。牝羊曰羴。曰群。(音臧) 白曰羴。黑曰羴。多毛曰羴。羴。胡羊曰羴。無角曰羴。白羴。去勢曰羴。羊子曰羴。羔五月曰羴。(音寧) 六月曰羴。(音務) 七月曰羴。(音達) 未卒歲曰羴。(音兆) 內則謂之柔毛。又曰。少牢。古今注謂之長髯主簿云。(李時珍) ⑦生江南者為羴。羊頭身相等。而毛短。生秦晉者為羴。羊頭小。身大而毛長。土人二歲而剪其毛。以為氈物。謂之羴。廣南英州一種。乳羊食仙茅。極肥。無復血肉之分。食之甚補。人諸羊皆孕。四月而生。其目無神。其腸薄而紫。易繁而性熱。外柔而內剛。其性惡溼。喜燥。食鈎吻而肥。食仙茅而肪。食仙靈脾而淫。食膠鬲而死。物理之宜。忌不可測也。契丹以其骨占灼。謂之羊卜。亦有一羴。其皮極薄。南番以書字。吳人以畫采為燈。(李時珍)

【羊耳草】即接骨草之生於牆崖者。葉如羊耳形。詳接骨草條。性實 鹹平無毒。【羊血】 主治 女人血虛中風。及產後血閉欲絕者。熱飲一升即活。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論羊血曰。熱飲一升。治產後血攻下胎衣。治卒驚。九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。參攷資料 ①按夏子益奇疾方云。凡豬羊血。久食則鼻中毛出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。痛去復生。惟用乳石。硃砂等分為丸。隨臥服十丸。自落也。(李時珍) ②外臺祕要云。凡服丹石人。忌食羊血十年。一食前功盡亡。此物能制丹砂。水銀。輕粉。生銀。硃砂。砒霜。硫黃。乳石。鐘乳。空青。骨脂。靈母石。陽起石。孔公蕪等毒。凡覺毒發。刺飲一升。即解。又服地黃。何首。丸。諸補藥者。亦忌之。嶺表異錄言。其能解胡蔓草毒。羊血解毒之功用如此。而本草並不言及。誠缺文也。(李時珍)

【羊舌】 主治 補中益氣。用羊舌二枚。羊皮二具。羊腎四枚。麝香。檀香。肉汁。食之。【羊卵】 即羊外腎之古籍別名。典見綱目。詳羊外腎條。

【羊尾骨】 主治 益腎明目。補下焦虛冷。以殺羊者良。

【羊肚】 卽羊胃之俗名。詳「羊胃」條。

【羊肚菜】 卽磨菰之俗名。詳「磨菰」條。

【羊肝】 性質 苦寒。無毒。主治 補肝。治肝風虛熱。目赤暗痛。熱病後失明。並用子肝七枚。作生食神效。亦切片水浸貼之。

歷代記述攷證 【元】吳瑞日用本草論羊肝曰。解毒毒。參攷資料 ①羊肝合豬肉及梅子小豆食。傷人心。陶弘景②羊肝合生椒食。傷人五臟。最損小兒。合苦筍食。病青盲。妊婦食之。令子多厄。孫思邈③按三元延壽書云。凡治目疾。以青羊肝爲佳。有人年八十餘。瞳子瞭然。夜讀細字。云別無服藥。但自小不食畜獸肝耳。或以本草羊肝明目而疑之。蓋羊肝明目性也。他肝則否。凡畜獸臨殺之時。忿氣聚於肝。肝之血不利於目宜矣。〔汪機〕

【羊肝石】 原名 砥石。命名 本品形色一似羊肝。故名。

古醫別名 越砥〔別錄〕磨刀石〔陳藏器〕礪石〔本草綱目〕

形態 羊肝石爲石類。卽磨刀之一種。砥石細密而礪石粗糲。俱可供藥用。

性質 甘。無毒。主治 目盲止痛。除熱毒。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論羊肝石曰。磨汁點目。能除障翳。燒赤投酒飲。破血癥瘕。切。

【羊肝粥】 基本 本品係羊肝和米煮成之粥。

主治 補肝虛明目。

用法 凡使勿中溼。溼則有毒。

性質 鹹溫。無毒。

主治 青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣。輕身殺疥。入山燒之。辟惡鬼虎狼。〔本經〕療百節中結氣。風頭痛及蠱毒吐血。婦人產後餘痛。〔別錄〕

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論殺羊角曰。燒之辟蛇灰。治漏下退熱。主山障溪毒。

配合宜忌 菜絲爲之使。

【羊角子】 卽紫花地丁之古籍別名。典見秘經。詳「紫花地丁」條。

【羊角天麻】 卽天麻之古籍別名。典見綱目。詳「天麻」條。

【羊角瓜】 卽越瓜之長者。詳「越瓜」條。

【羊角菜】 卽白花菜之古籍別名。典見綱目。詳「白花菜」條。

【羊角參】 卽百濟參之參形如羊角者。詳「高麗參」條。

【羊角蕉】 卽芭蕉之實。長六七寸。銳似羊角。兩兩相抱。皮黃白色。詳「芭蕉」條。

【羊乳】 性質 甘溫。無毒。主治 補虛乏寒冷。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論羊乳曰。潤心肺。治消渴。

【唐】孟詵食療本草論羊乳曰。主心卒痛。可溫服之。又蚶蟹入耳。瀝之。卽化成水。〔宋〕日華諸家本草論羊乳曰。利大腸。治小兒驚癇。含之治口瘡。〔宋〕蘇頌圖經本草論羊乳曰。解蜘蛛咬毒。〔明〕李時珍

本草綱目論羊乳曰。治大人乾嘔及反胃。小兒嘔嘔及舌腫。並時時溫服之。

參攷資料 ①劉禹錫傳信方云。貞元十年。崔員外曾有人爲蜘蛛咬。腹大如妊。徧身生絲。其家素之乞食。有僧救。啖羊乳。未幾疾平也。〔蘇頌〕②羊乳療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛及男女中風。〔張鼎〕

【羊乳子】 卽枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳「枸杞子」條。

【羊刺蜜】 原名 刺蜜。產於羊刺草上者。故名。

古醫別名 草蜜〔本草拾遺〕給敦羅〔本草綱目〕

形態 羊刺爲雜草類之一種。其所含之蜜質。無藥者。蜜色白而味甘。葉大者。蜜色青而味薄。可供藥用。

性質 甘平。無毒。主治 治骨蒸發熱。痰嗽。暴痢。下血。閉胃。止渴。除煩。

【羊肺】 性質 甘溫。無毒。主治 補肺。止咳。嗽。

六 蠶 羊

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論羊肺曰傷中補不足去

凡邪【唐】蘇恭新修本草論羊肺曰治渴止小便數同小豆葉煮食之【明】李時珍本草綱目論羊肺曰通肺氣利小便行水解毒

參攷資料 羊肺在三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人痢下(孟詵)

【羊屎】

性質 苦平無毒
主治 矯之主小兒洩痢腸鳴驚癇

歷代記述攷證

【唐】陳藏器

本草拾遺論羊屎曰燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮長黑和雁肪塗頭亦良【唐】蘇恭新修本草論羊屎曰煮湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳熱大小便不通燒烟薰鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中痔瘻等治骨蒸彌良【宋】日華諸家本草論羊屎曰燒灰理痔耳并穿竹刺入肉治箭鏃不出
參攷資料 羊屎納鯽魚腹中五箇固濟燒灰塗髮易生而黑甚效(蘇頌) 羊屎制粉霜(李時珍)

【羊屎柴】

古籍別名 牛屎柴
(本草綱目)

形態 羊屎柴為溼草類之一種葉類天名精四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子其苗葉與根可供藥用

採取 夏採苗葉用冬採根用
主治 癰疽發背搗爛傅之合金瘡散膿血乾者為末漿水調傅

【羊屎柴根】

主治 下血如
傾水取生根一斤生白酒二斗煮一斗空心隨量飲

參攷資料 羊屎柴根可以毒魚(李時珍)

【羊屎菜】即稀荻草之古籍別名與見和漢藥考詳【稀荻草】條

【羊泉】即蜀羊泉之古籍別名與見別錄詳【蜀羊泉】條

【羊胃】

原名 羊膈脰
性質 甘溫無毒

主治 胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥
參攷資料 羊胃即羊肚和飯食久食令人多睡清水成反胃作噎病(孫思邈)

【羊胎】

製法 凡用炙乾入藥用

【羊茅】

補腎虛羸
命名 本品羊喜食之故名

基本 羊茅為雜草類之一種莖根可供藥用
主治 喉痺腫痛搗汁噉之
古籍別名 百草丹(綱目俗名)羊孩子(綱目拾遺)

【羊哀】

拾遺

形態 羊哀多生山羊腹中即腹中成團之爛草也形圓如彈丸大小不一輕鬆而氣類外則色澤光膩宛如油潤其體非石非酥若腐草之融結乃山羊食百草偶嚼異草或石乳膏液注胃中胃為精氣往來之所時為中氣所運動故日久凝結類多圓如丸取得可供藥用
主治 噎膈反胃解百草藥毒
參攷資料 羊哀形圓如彈丸大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精氣聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細賦

五三四

而疎鬆且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣類人多惜其不能如牛黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華又食異草孕結乃不堅重香凝僅成此物故哀之因名曰哀又常中丞宦遊筆記載軍營於羊腹中得石子名鮮答形如鵝卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭菜色青藍束帶上亦二白圈質細如玉滋潤如水輕耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆浸石子數枚持咒播弄其石子名鮮答產畜腹中牛馬皆有不必定羊也而羊哀又與鮮答異鮮答堅重細潤此則輕鬆羶燥亦無束帶白圈庚戌冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈如鵝卵黃勻圓光潔浮水盆上購歸示予予曰此羊哀也氣燥而凝非鮮答之類彼云屠者呼為百草丹云樂此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚼得異草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃為精氣往來

之所。日爲氣運動。故所結之物。多
固如丸。鮮答結於腹。不爲氣擾動。
故形圓如石。金什卽以此贈予。

予復取細視。其質鬆而亦堅。嗅之

作羊腥氣。外則色澤光膩。儼如油

潤。其體質非石非酥。如腐草融結

始信說略所載羊哀。如溼茅紙之

說爲不謬。因附記於此。以待折衷

於格物諸君子。按百草鏡羊膝結

成在羊腹中。色微黑。可治反胃。或

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

卽此歟。(趙學敏)

苳。銚弋。細子。(本草綱目)三斂子。
(綱目拾遺)

形態 羊桃爲蔓草類之野生

草本。形似家桃。莖長而弱。春生嫩

條。纏於他物。葉大如掌。上緣下白

有毛。狀如苧麻。而團結。質細如粟

核。不堪食。其莖葉浸水有涎滑。可

供藥用。

採取 二月間採。陰乾用。

性質 苦寒。有毒。

主治 燥熱身暴赤色。除小兒

熱風水積聚。惡瘍。(本經)去五臟

五水。大腹利小便。益氣。可作浴湯

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論羊桃曰。煮汁洗風痺。及

諸瘡腫。極效。【唐】陳藏器本草拾

遺論羊桃曰。根浸酒服。治風熱羸

老。

【羊駝子】卽羊哀之古籍別名。拾

遺另出一條。其性質功用。完全相

同。故併爲一條。詳『羊哀』條。

採取 白羊者良。

主治 潤肺燥。諸瘡瘍。

入面脂去野蠶。潤澤肌膚。消滅瘰

癧。

【羊脂】 性質 甘。熱。無毒。
主治 生脂止下痢脫

肛。去風毒。產後腹中絞痛。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論羊脂曰。治鬼疰。【宋】日

華諸家本草論羊脂曰。去遊風。及

黑野。【明】李時珍本草綱目論羊

脂曰。熱脂主賊風。癢痺。飛尸。辟溫

氣。止勞痢。潤肌膚。殺蟲。治疥癬。入

膏藥。透肌肉。經絡。徹風熱毒氣。

性質 甘。熱。無毒。以

殺羊者良。

主治 虛勞。寒中。羸瘦。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論羊脊骨曰。補腎虛。通

督脈。治腰痛。下痢。

【羊草】卽白辛之古籍別名。與見

別錄。詳『白辛』條。

【羊起石】卽陽起石之古籍別名。

與見別錄。詳『陽起石』條。

【羊婆奶】卽羅爾之古籍別名。與

見綱目。詳『羅爾』條。

【羊婆蠟】卽沙參之古籍別名。與

見綱目。詳『沙參』條。

【羊脛骨】 古籍別名 羊脛骨。

羊脛骨。(本草綱目)

性質 甘。溫。無毒。
主治 虛冷勞。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論羊脛骨曰。脾弱腎虛。

不能攝精。白濁。除濕熱。健腰脚。固

牙齒。去野蠶。治誤吞銅錢。

參攷資料 ●羊脛骨性熱。有

宿熱者勿食。(孟詵) ●齒者骨之

餘。腎之標。故牙疼用羊脛骨以補

之。(李杲) ●羊脛骨灰可以磨鏡

羊頭骨可以消錢。故誤吞銅錢者

用之。取其相制也。按張景陽七命

云。耶溪之鈺。赤山之精。消以羊骨

鐸以鍛成。註云。羊頭骨能消鐵也。

又名醫錄云。漢上張成忠女七八

歲。誤吞金鎖子一雙。胸膈痛不可

忍。憂惶無措。一銀匠炒末藥三錢。

米飲服之。次早大便取下。叩求其

方。乃羊脛灰一物耳。談藝翁亦有

此方。皆巧哲者格物窮理之妙也。

(李時珍)

【羊脛骨髓】 主治 痘痂後

粉。研成膏塗。

【羊眼半夏】卽半夏之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

與見和漢藥考。詳『半夏』條。

六畫 羊

【羊脬】 主治 下癩遺溺。以水盛入炙熱。空腹食之。四五次愈。

【羊葶藶】 卽葶藶之根皮。色淡紫。肉軟而脆者之別名。詳「葶藶」條。

【羊麻】 卽葶藶之古籍別名。與見別錄。詳「葶藶」條。

【羊棘】 卽山查之古籍別名。與見唐本草。詳「山查」條。

【羊筋】 主治 塵物入目。熟嚼。納目中。仰臥卽出。

【羊粟】 卽葶藶之古籍別名。與見別錄。詳「葶藶」條。

【羊棗仁】 卽酸棗仁之別名。與見新本草。詳「酸棗仁」條。

【羊腸蕈】 卽猴蕈之土名。與見藥物生產辨。詳「猴蕈」條。

【羊腎】 性質 甘溫無毒。主治 補腎氣虛弱。益精。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論羊腎曰。合脂作羹。療勞瘵甚效。同葶藶食之一升。療瘵瘵。【宋】日華諸家本草論羊腎曰。補腎虛耳聾。陰弱壯陽。益胃。止小便。治虛損盜汗。【明】李時珍本草綱

目論羊腎曰。治腎虛消渴。

參攷資料 千金外臺深師諸方。治腎虛勞損。消渴脚氣。有腎瀝湯方甚多。皆用羊腎煮湯煎藥。蓋用爲引嚮。各從其類是也。（李時珍）

【羊腎粥】 基本 本品係羊腎和米煮成之粥。主治 補腎虛諸疾。

【羊溺】 主治 傷寒熱毒攻手。足腫痛欲斷。以一升和鹽鼓搗漬之。

【羊睛】 主治 目赤及翳膜。曝乾爲末點之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論羊睛曰。熱羊眼中白珠二枚。於細石上和棗核磨汁。點目翳差明。頻用三四日瘥。

參攷資料 羊眼無瞳。其睛不應治。目豈以其神藏於內耶。（李時珍）

【羊腦】 性質 有毒。主治 入面脂手膏。潤皮膚。去野蠶。塗損傷丹瘤肉刺。

參攷資料 羊腦發風病和酒服。迷人心成風疾。男子食之損精。

氣少子。白羊黑頭。食其腦作腸癰。（承晚）

【羊腰子】 卽羊腎之俗名。詳「羊腎」條。

【羊腸】 卽羊桃之古籍別名。與見本經。詳「羊桃」條。

【羊腸三七】 卽水三七之細曲如羊腸形者。性質功能。詳「水三七」條。

【羊瞎】 卽羊肚之諧音。性質功能。詳「羊胃」條。

【羊實】 產地 生蜀中。形態 羊實爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦寒。主治 頭禿惡瘡。疥癬癩癧。

【羊脛】 卽羊胃之原名。詳「羊胃」條。

【羊飴】 卽蜀羊泉之古籍別名。與見別錄。詳「蜀羊泉」條。卽赤舉之古籍別名。與見別錄。詳「赤舉」條。

【羊齒】 採取 以殺羊者良。在三月三日採用。性質 溫。主治 小兒羊癩。寒熱。

五三六

【羊蹄】 命名 本品根似羊蹄。故名。

處方用名 羊蹄菜。禿菜。古醫別名 薺（詩小雅）薺。鬼目。東方宿。遠蟲陸（本經）禿菜。（陶弘景）羊蹄大黃（庚辛玉冊）水黃芹（俗名）敗毒菜。牛舌菜。金薺（本草綱目）黃菲根。牛蹄。猪耳菜（和漢藥考）

外國名詞 Rumex japonicus, Meian (拉) 根。基本 屬蓼科。藥用羊蹄菜之根。



形態 羊蹄菜爲山野自生之雜草。莖高四五尺。葉作長橢圓形。或爲廣披針形。彼此互生。有輪狀之托葉。花色淡綠。花軸頗長。每節簇生十餘朵。後結翅果。謂之牛舌。其種子名金薺。發微風吹之。墮與童擦之有聲。其根作黃白色。頗粗。大長尺許。形狀酷似胡蘿蔔。味苦。

採取 冬夏兩季採之。
性質 苦寒無毒。

成分 日本藥學士村山義溫氏研究羊蹄根之成分。刊入大正二年二月藥學雜誌第三百七十二號。其所論述大略謂羊蹄根中含有偈利蘇汎酸及沃肯米知兒安德膠非嫩諸物質。其成分頗似大黃。故民間常用以代大黃云。
效能 殺蟲毒。傳瘡癬。用治疥癬及禿瘡腫瘍藥。

主治 頭禿疥癬。除熱。女子陰蝕。(本經)浸淫疽痔殺蟲(別錄)
歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論羊蹄曰。療蠱毒。【宋】大明諸家本草論羊蹄曰。治癬殺一切蟲。醋磨貼腫毒。【宋】寇宗奭本草衍義論羊蹄曰。搗汁二三匙。入水半盞煎之。空腹溫服。治產後風秘殊驗。【宋】蘇頌圖經本草論羊蹄曰。新採者。磨醋塗癬速效。亦作丸服。採根不限多少。持絞汁一大升。白蜜半升。同熬如稠餈。更用防風末六兩搜和。令可丸。丸如梧子大。用括囊甘草煎酒下二三十丸。日二三服。

六 薑 羊

國外學說 荷蘭藥鏡云。別有一種洋產羊蹄 (Rumex Aquaticus, L.) 與此實係同種。其根與莖葉俱收。為強壯清血。愈創之藥。功能驅除血中之惡毒。強固纖維之弛緩。故用以治諸病。以治疥癬。乾癬。禿瘡。頑固惡瘡。潰瘍。浸淫。疥皮。上污穢不潔。及小皰。赤疹等。均有大效。取其根水煎。或絞汁。或製成散劑服。或加山牛蒡。土木香根同煎服。服根之煎劑或散劑。能治矢荷兒。利小便。療黃疸。水煎含漱。能止齒痛。以根或葉搗爛外敷。或煎水熏洗。或生去根皮。搗爛。與乳汁練和。製成軟膏。貼瘡瘍上。俱有奇效。或加土木香根搗爛。和乳汁或豚脂同煮。濾過。再入硫黃華少許。調并貼之。

配合應用 ●治大便卒結。羊蹄根一兩。水一大盞。煎六分溫服。(聖惠方)
●治腸風下血。敗毒。菜根洗切。用速皮老薑各半盞。同炒赤。以無灰酒淬之。盞蓋少頃。去滓。任意飲。(永類鈴方)

●治喉痺不語。羊蹄獨根者。勿

見風日及婦人雞犬。以三年醋研如泥。生布拭喉。外令赤塗之。(千金方)

●治面上紫塊如錢大。或滿面俱有野大黃四兩。取汁。穿山甲十斤。燒存性。川椒末五錢。生薑四兩。取汁。和研。生粗包擦。如乾。入醋潤溼數次。如初。累效。(陸氏積德堂方)

●治癩瘡風。羊蹄草根。於生鐵上磨好醋。旋旋刮塗。硫黃少許。更妙。日日用之。(聖惠方)
●治汗斑癩風。羊蹄根二兩。獨科掃帚頭一兩。枯礬五錢。輕粉一錢。生薑半兩。同杵如泥。以湯澡浴。用手抓患處。起粗皮。以布包裹。藥著力擦之。暖臥取汗即愈也。(簡氏經驗方)
●治頭風白屑。羊蹄草根。同羊膽汁塗之。永除。(聖惠方)
●治頭上白禿。獨根羊蹄。勿見婦女雞犬。風日以陳醋研如泥。生布擦赤敷之。日一次。(肘後方)
●治癬久不瘥。羊蹄根杵絞汁。入輕粉少許。和如膏塗之。三五次即愈。(簡要濟衆方)又治癬經年

者。敗毒菜根獨生者。即羊蹄根搗三錢。入川百藥煎二錢。白梅肉搗勻。以井華水一盞。濾汁澄清。天明空心服之。不宜食熱物。其滓抓破擦之。三次即愈。(永類鈴方)又治細癬。用羊蹄根五升。桑柴灰煮四五沸。取汁洗之。仍以羊蹄汁和。搗末塗之。(千金方)

●治漏瘡溼癬。浸淫日廣。痒不可忍。愈後復發。出黃水。羊蹄根搗和大醋洗淨。塗上一時。以冷水洗之日一次。
●治疥癬有蟲。羊蹄根搗和豬脂。入鹽少許。日塗之。(外臺祕要方)

用量 一錢半至三錢。
參攷資料 ●今人呼為禿菜。即蓄字音訛也。(陶弘景) ●所在有之。生下溼地。春生苗。高者三四尺。葉狹長。頗似高苣。而色深。莖節間紫赤。開青白花。成穗。結子三稜。夏中即枯。根似牛蒡。而堅實。(韓保昇) ●羊蹄能制三黃砒石丹砂水銀。(李時珍) ●羊蹄以根名。牛舌以葉形名。禿菜以治禿瘡名也。詩小雅云。言採其蔕。陸璣注云。

五 三七

莖卽苦字。卽今之羊蹄也。幽州人謂之蓮。根似長蘆。而其莖赤。亦可瀉爲茹。滑美。鄭樵通志指蓮爲爾雅之菲。及賁者誤矣。金齋麥以相似名。(李時珍) ①近水及溼地極多。葉長尺餘。似牛舌之形。入夏起莖。開花結子。花葉一色。夏至卽枯。秋深卽生。凌冬不死。根長近尺。赤黃色。如大黃胡蘿蔔形。(李時珍)

【羊蹄大黃】卽羊蹄之古籍別名。與見庚辛玉册詳「羊蹄」條。
【羊蹄葉】 性質 甘。滑寒。無毒。
主治 小兒疳蟲。殺胡夷魚。鮭魚。檀胡魚。毒作菜多食。滑大膽。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論羊蹄葉曰。作菜止痒。不宜多食。令人下氣。【明】李時珍本草綱目論羊蹄葉曰。連根爛蒸。一復食。治腸痔瀉血甚效。
【羊蹄菜】卽羊蹄之處方用名。詳「羊蹄」條。

【羊蹄實】 性質 苦。澁。平。無毒。
主治 赤白雜痢。
歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論羊蹄實曰。婦人血氣諸病。制鉛赤。

【羊頭骨】 性質 甘。平。無毒。
主治 風眩痲疾。小兒驚癇。
參攷資料 張景陽七命云。耶溪之鯁。赤山之精。消以羊骨。雖以鍛成。註云。羊頭骨能消鐵也。(李時珍)

【羊頭蹄】 性質 甘。平。無毒。
主治 風眩痲疾。小兒驚癇。
歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論羊頭蹄曰。安心止驚。緩中止汗。補胃。治丈夫五勞骨熱。熱病後宜食之。冷病人勿多食。【宋】日華諸家本草論羊頭蹄曰。腐熱頭眩。【明】李時珍本草綱目論羊頭蹄曰。療腎虛精竭。

參攷資料 羊頭蹄肉性極補。水腫人食之。百不一愈。(朱震亨)
【羊頭骨】卽羊頭骨之古籍別名。與見綱目詳「羊頭骨」條。
【羊頭骨】卽羊頭骨之古籍別名。與見綱目詳「羊頭骨」條。

【羊膽】 性質 苦。寒。無毒。
主治 青盲明目。
歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論羊膽曰。點赤障白翳。風淚眼解。蠱毒。【唐】蘇恭新修本草論羊膽曰。療疔濕時行熱。癩瘡。和醋服之良。【唐】孫思邈千金翼論羊膽曰。治諸瘡毒。能生人身血脈。【元】朱丹溪本草衍義補遺論羊膽曰。同蜜蒸九次。點赤風眼效。

參攷資料 肝開竅於目。膽汁減則目暗。目者肝之外候。膽之精華也。故諸膽皆治目病。夷聖志載二百味草花膏。治爛弦風。赤眼流淚。不可近光。及一切暴赤目疾。用羯羊膽一枚。入蜂蜜於內。蒸之。候乾。研爲膏。每含少許。並點之一日。淚止。二日腫消。三日痛定。蓋羊食百草。蜂採百花。故有二百花草之名。又張三豐真人碧雲膏。臘月取羯羊膽十餘枚。以蜜裝滿。紙套籠住。懸於下。待霜出。掃下點之。神效也。(李時珍)

【羊歡草】卽白甘菊之古籍別名。與見天寶單方圖詳「白甘菊」條。

【羊躑躅】 命名 本品羊食之則躑躅而死。故名。
古醫別名 玉枝。(別錄) 羊不食草。(本草拾遺) 黃杜鵑。(本草蒙筌) 黃躑躅。闊羊花。鷺羊花。老虎花。巴山虎。(本草綱目)

外國名詞 Rhododendron sinense, Sw. (拉丁) コウレンソツジ ニツツジ レンゲツツジ キツツジ ウマツツジ ワウレンソツジ キレンゲツツジ (日本)

基本 係石南科石南屬。爲羊躑躅之花。
形態 按羊躑躅爲毒草類之野生落葉灌木。幹高五六尺。葉倒披針形。或倒長卵形。長約二寸五分。內外初夏開淡黃色花。有花柄約長八分。排列作極短之總狀花序。花瓣結合。葯開孔子房上位。實爲乾果。果殼如連翹。仁似芝麻。根似鐵。其花可供藥用。
性質 辛。溫。有大毒。
主治 賊風在皮膚中淫淫癩。溫癩。惡毒。諸瘡。(本經) 邪氣。鬼疰。蠱毒。(別錄)

歷代記述攷證

【明】程希雍本草經疏論羊躑躅曰。羊躑躅毒藥也。然性能祛風寒溼。故可以治惡毒。瘡者。風寒溼所成也。然非元氣未虛。脾胃尚實之人不可用。凡用此等毒藥。亦須雜以安胃和氣血藥同用。

配合宜忌 惡諸石及麴。畏梔子。伏丹砂。礪砂。雌黃。

參攷資料 古之大方多用躑躅。如胡洽治時行赤散。及治五嗽四滿丸之類。并治風諸酒方皆雜用之。又治百病風溼等。魯王酒中亦用躑躅花。今醫方持脚湯中多用之。南方治蟲毒下血。有躑躅花散。云甚勝。(蘇頌) 所在有之。春生苗似鹿葱。葉似紅花。莖高三四尺。夏開花似凌霄花。山石榴翠正黃色。羊食之則死。今嶺南蜀道山谷道生。皆深紅色。如錦繡然。或云此種不入藥。(蘇頌) 此物有大毒。曾有人以其根入酒飲。遂至於斃。和劑局方治中風癱瘓。伏虎丹中亦用之。不多服耳。(李時珍)

【羊躑躅子】

性質 苦溫。無毒。

主治 風寒溼痺。惡癰腫脹。撲損疼痛。疽毒。疔瘡。

參攷資料 此物為活血疏風之品。善治七十二種風氣。及跌打損傷。為外科之聖藥。然大損新血。無瘀或體虛有癆者。均忌之。

【羊躑躅根】

主治 追風。定痛。療痔漏。

【羊鬚】

主治 小兒口疳。癰腫。尿疝。燒灰和油敷。

【羊鬚草】 即女苑之古籍別名。典見雷斅炮炙論。詳「女苑」條。

【羊鬚】

基本 鬚。咽也。即羊之會咽也。

性質 甘淡。溫。無毒。

參攷資料 按古方治瘰。多用豬羊鬚。亦述類之義。故王荊公瘰詩有內瘰煩羊鬚之句。然瘰有五氣。血。肉。筋。石也。夫鬚屬肺。肺司氣。故氣瘰之證。服之或效。他瘰恐亦少力。(李時珍)

【羊髓】

性質 甘。溫。無毒。

主治 男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脈。益經氣。以酒服之。

歷代記述攷證

【唐】孫思邈千金翼論羊髓曰。却風熱止毒。久服不損人。【唐】孟詵食療本草論羊髓曰。和酒服補血。主女人血虛。風闕。【明】李時珍本草綱目論羊髓曰。潤肺氣。澤皮毛。滅癩痕。

參攷資料 羊髓久食不損。故肺虛毛悴者用之。(李時珍)

【白水石】 即寒水石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「寒水石」條。

【白根】 即白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芨」條。

【宅護】 即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【未】 即黑豆之古籍別名。典見綱目。詳「黑豆」條。

【百草】 即常山之古籍別名。典見和漢藥考。詳「常山」條。

【尖檳榔】 即檳榔之處方用名。詳「檳榔」條。

【冲天室】 即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【羽衣草】 即著之日本名。詳「著」條。

【羽花魁】 即五加皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五加皮」條。

【羽客子】 即風仙子之古籍別名。典見綱目。詳「風仙子」條。

【羽涅】 即明礬之古籍別名。典見本經。詳「明礬」條。

【羽澤】 即明礬之古籍別名。典見別錄。詳「明礬」條。

【老少年】 即雁來紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雁來紅」條。

【老火照砂】 即雄砂之古籍別名。典見綱目。詳「雄砂」條。

【老公鬚】 即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【老米】 即陳陳米之古籍別名。典見綱目。詳「陳陳米」條。

【老君鬚】 古籍別名。老軍鬚。社公口鬚。(綱目拾遺)

形態 老君鬚為莖草類之一種。立夏後發苗。起藤二三尺。梗青色。葉似何首烏。微狹。對生。莖與葉俱微有白毛。不似首烏莖葉之光澤。四時常青。其根與莖牽連而生。如芋頭。有白鬚。又似白微。因白。極多。故名。可供藥用。

性質 辛熱。

主治 破癰消痞。療癩癧。並理

六齋 老耳肌肉

氣消腫。通利腸格。敗毒消癰。酒煎服。渣傳患處。

參攷資料 ●痞結年久成龜

隨者。累用極效。用老軍需一味。春夏用莖葉。秋冬用根。不拘多少。用好生酒一罇。外用鯽魚一雙。和藥同入罇內。日落時煮。以魚熟為度。令患人先食魚。次飲酒。再以藥渣撲痞結所至。次早去之。大小便見物下即效。知不應。速服三五次。追其物無跡。而神效難言(醫便) ●金銀草根名老君鬚。合龍虎丹。用治三十六種風症。癱瘓鶴膝等風。(王安樂藥方) ●治風痺。消血癥。面黃瘡塊。(余曉園)

- 【老君鬚】即菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菝葜」條。
- 【老禿鷲】即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟絲子」條。
- 【老兔】即鴟鵂之古籍別名。典見爾雅。詳「鴟鵂」條。
- 【老虎花】即羊躑躅之古籍別名。典見綱目。詳「羊躑躅」條。
- 【老虎草】即鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳥不宿」條。
- 【老軍需】即老君鬚之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「老君鬚」條。

【老葦】即鸚鵡菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鸚鵡菜」條。

【老翁花】即漏蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「漏蘆」條。

【老翁鬚】即忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳「忍冬藤」條。 ●即白頭翁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白頭翁」條。

【老酒】命名 本品係臘月釀造者。可經數年不壞。故名。

主治 和血養氣。暖胃辟寒。發痰動火。

【老梗】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

【老陰子】即杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杏仁」條。

【老陽剛子】即巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【老風花】即芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芫花」條。

【老鼠刺根】即巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴戟天」條。

【老鴉】即烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳「烏鴉」條。

【老鴉瓜】即王瓜之古籍別名。典見圖經本草。詳「王瓜」條。

【老鴉眼睛草】即龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳「龍葵」條。

【老鴉蒜】即石蒜之古籍別名。典見救荒本草。詳「石蒜」條。

【老鴉酸漿草】即龍葵之古籍別名。典見綱目。詳「龍葵」條。

【老薺】即荊葵之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「荊葵」條。

【老鶴紅】即牛膝紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「牛膝紅」條。

【老鶴草】基本 老鶴草為雜草類之一種。其莖嘴可供藥用。

產地 山東。

性質 苦。微辛。

主治 去風疏經。活血。健筋骨。通絡脈。損傷痺症。麻木皮風。浸酒常飲。大有效。或加桂枝。當歸。紅花。芍藥等味用。

【老鶴菜】即苦菜之古籍別名。典見救荒本草。詳「苦菜」條。

【老鸚嘴】係建昌人呼金頂龍草者之古籍別名。典見植物名實圖考中。詳「仙鶴草」條。

五四〇

【耳莖】即人耳垢之原名。詳「人耳垢」條。

【耳鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見山海經。詳「鼯鼠」條。

【耳癩草】蜀人呼蒲公英為耳癩草。詳「蒲公英」條。

【耳瑤】即芥耳子之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「芥耳子」條。

【耳環】即明茶之別名。而明茶係六安茶之一種。性質功能。詳「六安茶」條。

【耳環尻】即琉璃草之別名。詳「琉璃草」條。

【耳環草】古鑄別名 碧輝兒花。

形態 耳環草為雜草類之一種。莖葉可供藥用。

主治 治五痔。追膿納患處。

【耳環草】即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【肌石】即理石之古籍別名。典見別錄。詳「理石」條。

【肉杏】即杏之質扁大而色赤者。詳「杏」條。

【肉羊石】即礬石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「礬石」條。

【肉豆蔻】

命名 本品花實皆如豆蔻無核故名。

處方用名 煨肉果。肉果霜。

古醫別名 肉果(本草綱目) 迦拘勒。(本草拾遺) 脾家瑞氣。

(和漢藥考)

外國名詞 Semon myristica

icaco (拉丁) Nutmeg (英)

Muskatans (德)

基本 屬肉豆蔻科。藥用果中之肉核。

產地 陳仁山藥物生產辨云。


肉果又名肉豆蔻。有殼者名爲殼。殼果之名。更有長果。果果之分。產印度羣島。荷喇等屬。多由石叻運來。七八月新。

形態 按肉豆蔻爲常綠樹。高達三丈。葉互生。作長橢圓形。面滑澤。兩端尖。無鋸齒。花梗細長。開淡黃色鐘狀花。花爲單性。雌雄異株。果實爲肉果。初綠白色。後轉黃色。表面滑澤。熟則自上方裂開。落下種子。種子被有赤色多肉性種衣。包被種子之肉。帶線狀膜。呈紫赤色。曬乾則硬化。成橙黃色。有香氣。謂之肉豆蔻。用和香料。本品作

六畫 肉

卵圓形。表面平滑。被有黑褐色厚種殼。並有多數粗枝狀縱線。其間有網狀小脈。內種皮爲灰褐色。薄膜。包於仁外。仁即肉豆蔻。表面有褐色網狀隆起。其間稍呈白色。市上所售者。因欲保存香氣。浸漬於混和石灰食鹽水中。故其表面被有白粉。氣味俱辛烈。芳香微苦。又第四版改正日本藥局方曰。肉豆蔻係肉豆蔻樹種子之去殼者。作

純卵圓形或短卵圓形。長約三仙米。闊約二仙米。外面褐色。被有白色石灰粉。有縱行稍廣之淺溝。及作縱密網紋之狹溝。橫斷面見有褐色外胚乳線條。侵入包裹脂肪及澱粉之胚乳中。含有芳香性分泌物。本品氣味芳香而辛苦。(和漢藥考)



肉豆蔻

種類 肉蔻花。即肉果之花。功用相同。惟其氣味略遜。較肉蔻亦有七成氣味。肉蔻花及實狀。

雖似草豆蔻。而皮肉之類。則不同。類蓋肉蔻。外有皺紋。內有斑點。紋如檳榔紋。最易生蛀。須烘乾密封。則稍可留。

種植 今嶺南人家。亦有栽植者。

採取 七八月間採。日乾。

製法 雷敬曰。凡使須以糯米粉熱湯搜裹豆蔻。於糖灰火中煨熟。去粉用。勿令犯鐵。脾泄氣痢。醋調麵煨。

性質 辛。溫。無毒。

成分 肉豆蔻含有脂肪油。揮發油。澱粉等。

效能 溫脾治痛。瀉腸止瀉。痢。用小量。能促進胃液之分泌。使消化力增加。用大量。能增加心臟跳動。漸呈麻痺狀。或由麻痺狀態。而成血尿而死。故常用爲芳香性健胃藥。及驅風矯臭。調味藥。

主治 溫消食。止瀉。治積冷。心腹脹痛。霍亂中惡。鬼氣。冷症。嘔沫。冷氣。小兒乳疝。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論肉豆蔻曰。主心腹蟲痛。脾胃虛冷。氣併冷熱。虛瀉赤白痢。

研細末。粥飲服之。【唐】甄權藥性本草論肉豆蔻曰。治宿食痰飲。止小兒吐逆。不下乳。腹痛。【宋】大明日華諸家本草論肉豆蔻曰。調中下氣。開胃解酒。毒。消皮外。絡下氣。

【明】李時珍本草綱目論肉豆蔻曰。暖脾胃。固大腸。【明】繆希雍本草經疏論肉豆蔻曰。肉豆蔻。味辛氣溫。而無毒。入足太陽陽明經。亦入手陽明大腸。辛味能散。能消。溫氣能和中。通暢。其氣芬芳。香氣先入脾。脾主消化。溫和而辛香。故開胃。胃喜煖。故也。故爲理脾開胃。消宿食。止洩瀉之要藥。香能辟惡。除不祥。又中氣不虛。則邪惡之氣。不能入。故主鬼氣。及濕中。脾主中焦。胃爲後天生氣之本。脾胃之陽氣旺。則積冷。心腹脹滿。霍亂中惡。冷症。嘔沫。冷氣。食不消。洩不止。小兒乳疝。諸證自除矣。【清】黃宮繡本草求真論肉豆蔻曰。肉豆蔻。辛溫氣香。兼苦而瀉。功備燥脾。溫胃。滲腸行滯。治膨消脹。凡脾胃虛寒。挾痰食。而見心腹冷痛。泄瀉不止。服此氣溫。既能除冷消脹。復能滲腸。止痢。若合補骨脂同用。則能止腎

六 蠶 肉

虛泄也。至書所云能補脾氣。以其脾胃虛寒。服此則溫。而脾胃自健。非真具有甘補之意也。氣逆而服即下。以其脾胃既舒而氣自下。非若厚朴枳實之下為最峻也。但此止瀉溫胃滯腸之品。若鬱熱暴注者。禁用。出嶺南。似草薹。外有皺紋。內有斑紋。糯米粉裹煨。清黃元御玉楸藥解論肉豆蔻曰。肉豆蔻調和脾胃。升降清濁。消納水穀。分理便溺。至為妙品。而氣香燥。善行宿滯。實性斂瀉。專固大腸。消食止泄。此為第一。麪包煨。研去油。湯沖。肉蔻辛香。頗動惡心。服之欲嘔。宜蠶小丸烘乾湯送。

國外學說 日本學說謂肉豆蔻者。產於東印度地方。基本植物肉質中之子核也。成分為脂肪油。揮發油。澱粉等。乃健胃芳香調味藥也。故用為健胃驅風藥。於消化不良及膨脹等用。○五至一。○然用為香味料者多。英美學說謂肉豆蔻產印度羣島。蘇門答臘。摩鹿加列島等處。係豆蔻樹開花所結之果。去其外殼。而其子可為藥品。西國所用之肉豆蔻大半從

蘇門答臘並南洋產香料之列島運來。尋常運至英國之肉豆蔻。已去其殼與衣。其衣與子。分開曬乾。可出售。其核常浸於鈣養水內。則可免蟲食之弊。或為圓形。或略為橢圓形。上等者頗小而重。外面有槽形如網。內為淡紅灰色。中有更深色之脈紋。其臭香而可愛。味暖微苦。滓亦適口。有數種肉豆蔻較他種更長。英國收肉豆蔻之稅。其圓者較長者重六倍。第長者為野生。而圓者為園中所種。常用為行氣藥。祛風藥。食大服。則有寧睡之性。又在食物內用為香料。又常用之合於各藥。解他藥惡味。其用量為每服八釐七毫半。至二分六釐二毫半。至肉豆蔻衣。近則不入藥品。

近人學說 張山雷曰。肉豆蔻始見於唐本草。氣味辛溫。開寶本草謂消食止泄。治積冷心腹脹痛。霍亂嘔沫冷氣。皆溫脾土。專治寒中之意。而其味又澀。則能止虛寒之瀉。蓋其除寒燥濕。解結行氣。專理脾胃。頗與草果相近。則辛溫之功效本同。惟清味較甚。并能固及大腸之滑脫。四神丸中有之。溫脾即以溫腎。是為中下二焦之藥。與草果之專主中焦者微別。開寶又謂治中惡鬼氣冷疰。則亦辟除陰積之意。不可拘泥到鬼物上去。大明謂溫中下氣。開胃。解酒毒。甄權謂治宿食痰飲。止小兒吐逆。不下乳。腹痛。李珣謂主心腹蟲痛。皆專就寒溼一邊着想者。若溼熱鬱滯而為此諸症。則必不可一例論治。故李珣又謂主脾胃虛冷虛泄。源湖謂暖脾胃固大腸。要言不煩。最為精切。惟珣又謂治赤白痢。則溼熱者多。虛寒者少。不當泛泛言之矣。石頑謂溫中補脾。寬膨脹。固大腸。為小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥。又謂脾土性喜芳香。故肉果與脾胃最為相宜。能下氣者。脾得補則健運。非若厚朴枳實之峻削。惟熱鬱暴注禁用。以其辛溫溼滯之故。頭謂脾喜溫而惡寒。喜燥而惡溼。溫和則敷布有權。剛燥則清陽乾運。若中陽既衰。溼邪困之。即委靡倦怠。而索索無生氣矣。惟香砂蔻仁之類。溫脾芳香。足以振動陽氣。故醒脾健運。最有近功。則所

五四二

謂消食下氣。已服泄滿者。皆其助消化之力。固不可與剋削破氣作一例觀。

配合應用 肉豆蔻、人參、補骨脂、吳茱萸、五味子、砂仁、為治腎瀉及冷泄之聖藥。

肉豆蔻、縮砂蜜、橘皮、人參、紅麴、山查肉、茴香、麥芽、為開胃進飲食、消宿食、止瀉之上劑。

獨用修事為末。以棗肉和丸。或為末。縮砂湯下。名公子登筵散。皆服之即可赴席。其開胃進食消導之功烈矣。

治久瀉不止。用肉豆蔻一兩。木香二錢五分為末。棗肉和丸。米飲下。四五十丸。又方。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢為末。糊丸。米飲服。四五十丸。百一選方。

治老人虛瀉。肉豆蔻三錢。煨研。乳香一兩為末。瑞竹堂方。

治小兒泄瀉。用肉豆蔻五錢。乳香二錢半。生薑五片。同炒黑色。去薑研為膏。收入密器。旋丸。菴豆大。每量大小米飲下。全幼心鑑方。

治冷痢腹痛不能食者。肉豆

薤一兩。去皮醋和麵蒸煨。持末每服一錢。粥飲調下。(聖惠方)

① 煖胃除痰。進食消食。肉豆蔻二個。半夏姜汁炒五錢。木香二錢。為末。蒸餅丸。芥子大。每食後津液下五丸。或十丸。又方。蛋亂吐瀉。肉豆蔻為末。姜湯下一錢。(普濟方)

② 治脾泄氣痢。肉豆蔻一顆。米醋調麵煨令焦。和麵研末。更以搗子炒研末一兩。相和。又以陳陳米炒為末。和勻。每以二錢煎作飲。調前二味三錢。且暮各一服。便瘥。(續傳信方)

用量 八分至一錢半。
施用宜忌 凡熱瀉熱痢及病初起者禁用。

配合宜忌 忌銅鐵。

著名方劑 二神丸治腰痛腎虛。便瀉不食。(本事方)破故紙四兩炒。肉豆蔻二兩。為末。用大棗四十枚。生姜四兩。同煮糜爛。去姜棗皮核。研膏入藥末。丸。鹽湯下。
參攷資料 ① 肉豆蔻。生胡國。胡名迦拘勒。大舶來。即有中國無之。其形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。

六 蠶 肉

(陳藏器) ① 肉豆蔻對草豆蔻言之。去殼。只用肉。肉油色者佳。枯白味薄。瘦虛者。下等。亦善下氣。多服則泄氣。得中則和來其氣。(寇宗爽) ② 屬金。與土為丸。溫中補脾。日華子稱其下氣。以脾得補而善運化。氣自下也。非若陳皮香附之駛泄。寇氏不詳其實。遂以為不可服也。(朱丹溪) ③ 痢疾用此瀉腸。為傷乳泄瀉之要藥。(汪機)

【肉松容】即肉菴蓉之古籍別名。典見吳普本草。詳「肉菴蓉」條。
【內果】即肉豆蔻之古籍別名。典見綱目。詳「肉豆蔻」條。
【內果霜】即肉豆蔻之處方用名。詳「肉豆蔻」條。
【肉紅】即紫荊之古籍別名。典見綱目。詳「紫荊」條。

原名 桂。
【肉桂】 命名 本品係桂樹幹及根皮。以其較尋常桂皮為厚。故名。

處方用名 川肉桂。安南桂。真桂。交趾桂。官桂。桂心。猪桂。上玉桂。古籍別名 牡桂。(本經) 棧。(爾雅) 連桂。筒桂。(唐本草) 棟桂。

木桂。大桂。丹桂。嗜者。尉佗生。尉佗桂。丹陽木皮。(和漢藥考)
外國名詞 Cortex Cinnamomi Cinnamon (拉丁)
基本 屬樟科。藥用為桂木之樹幹及根皮。
產地 ① 陳仁山藥物生產辨云。肉桂產越南交趾國。北圻清花省。以淨挽。冷精。二山野生者為最良。皮壳紋橫生。入手幼滑。皮內有隔水白線一條。飄滑如玉。及有蘇合味為佳。並有清花公使堂烙印。其次中圻。會安產者。乃人力種成最多。有製企邊。清花庄。夾桂。條桂。數種。味辛辣。又有一種蒙羅桂。頗佳。通行之桂。俱產會安各屬。分高山。低山之別。又有一種冲清花庄。桂。俗呼西桂。實非西桂。此種桂產自欽州。緣欽州附近芒階。但此桂有木虱味之分。和漢藥考曰。中國為原產地。此外東印度安南等處亦產之。② 曹炳章曰。桂產越南廣西熱帶。當分數種。曰清化。曰猛羅。曰安邊。曰欽。曰潯。此總名也。又有曰鴉山桂。(即大油桂) 曰大石山。曰白石山。曰黃摩山。曰社山。

曰桂平。(即玉桂) 產雲南。曰蒙自。(即蒙自桂) 產廣東。曰羅定。曰信宜。曰六都。曰鹿步。及歐洲錫蘭。東印度。法國加夜那等處。曰桂油。產廣西。桂平。南等縣最盛。外國如錫蘭。加西那。產亦極多。

形態 肉桂為常綠樹。高二三丈。葉互生。而革質。作長橢圓形。前端尖。而有三大脈絡。夏月於枝梢及葉腋開淡綠色小形花。作叢繖花序。排列花後。結黑色長橢圓形果實。其樹皮多為瓦磚狀。或卷捲狀之樹皮。其質堅。呈赤褐色。表面有縱行隆線。有佳良辛味。

種類 ① 肉桂。係近根處之最厚者。② 桂心。係去其外層之粗皮。與內面之薄皮。而取其中心者。又名中桂。③ 牡桂。即大桂板。桂枝。薄而味淡。係取頂上細枝。以其皮薄者。又名薄桂。④ 柳桂。乃桂之嫩小枝條也。⑤ 苗桂。葉似稀葉而尖。



肉 桂

種類 ① 肉桂。係近根處之最厚者。② 桂心。係去其外層之粗皮。與內面之薄皮。而取其中心者。又名中桂。③ 牡桂。即大桂板。桂枝。薄而味淡。係取頂上細枝。以其皮薄者。又名薄桂。④ 柳桂。乃桂之嫩小枝條也。⑤ 苗桂。葉似稀葉而尖。

六畫 肉

狹。光淨有三縱文。而無鋸齒。其花有黃有白。岩桂。葉有鋸齒。似枇杷葉而粗澀。俗呼木犀。紅毛肉桂。係桂之上品。皮厚者味辛。薄者味淡。與他桂相反。無粗皮。作赭黃色。天竺桂極似桂。其皮薄。不甚辛熱。天竺僧稱為月桂。交趾桂。係枝皮之擔作兩三層者。即綱目所稱之茵桂。東京桂。形長尺許。皮較細薄。氣味重厚。堪稱佳品。安南桂。係產於越南。故名。桃桂。係產於雲南姚安縣者。體重皮不直。辣多甜少。為桂之下品。紫荊桂。係桂之一種。性質惡劣。不堪入藥。潯桂。亦係桂之一種。蒙自桂。係產於蒙自縣。廣南桂。功效略遜。即本經逢源所謂板桂是也。

有神桂之名。且如清化府合都山產皆良。而法禁申嚴。民採得者。擇其上品。先報官上貢。餘再私販出。境發售。所以得之者。皆異常寶之。且種桂之術。常視地之所宜。苟種非其法。往往十不一生。茲參湯氏物產誌種種法。分氣候。土質。肥料。藏子。下種。移植。除害。及種大油桂法。羅列如下。氣候。桂性雖喜高。溫而不忌溼潤。宜背南面北。或背西面北。不受熱氣。方易暢茂。栽宜向陽。性愛獨立。土質。越南土種。以石山浮土。如能以山嶺土。美栽種成株者為最佳。或家園潔淨土。亦可栽。物產錄云。種桂土質。以上面黑色。底黃色者為佳。又須底土鬆而深厚。若堅實乾燥肥鹹者。均不適宜。肥料。種桂多用肥料。惟於整地之時。即第一年八九月。伐木燒草。鋤翻土地。俟其腐朽。作為肥料。至第三年。春初移植時。尤不可施他種糞料。若施糞料。雖青秀可愛。移植時。亦易枯死。藏子。在春分前後。取以桂子熟勻。採取用水洗去外面黑皮。祇存其核。稱曰桂米。薄數篋。篋上陰乾。後再裝

入竹籬篋內。惟先須撒溼潤細沙一層。後撒桂米一層。敷放多層。皆當如是。若係購回種子。即擱往河邊。隨流洗滌。用手搓去外皮。陰乾。後將桂米與微溼沙拌勻。堆成山形。沙乾時。撒水潤之。下種。下種時期。概在清明前後。不得過穀雨後五日。下種之先。預將播種地選定。山麓不高不峻地為宜。山坡地次之。去冬深耕。今年驚蟄時。打碎其土。平均其地面。作寬二尺。長二丈。至三尺之畦。播時。以右手執竹刀。於畦面橫劃一行。深約一寸。左手握桂米。每寸許點一粒。點畢一行。隨撥泥覆之。復距第一行六七寸許。又用竹刀橫劃一行。如法點下。此行點畢。又點他畦。各畦點畢。每行用蕨草插蓋。以防炎熱。與雨水。或用草棚亦可。高約一尺八寸。五九兩月。各除草一次。至第二年四月。即撤蕨草。再除草一次。移植。第三年驚蟄春分前後。遇雨。即掘苗移植。移植之先。須摘去苗之旁葉。只留桂梢葉二三枚。又切去主根少許。多留側根。隨以黃泥糊根。令其滋潤。移植事畢。九月間除

五四四

草一次。第二年五九兩月。各除草一次。每年察看桂苗生活若干。至翌年三月。送一補種。至第四年。枝葉繁茂。於霜降前。採摘旁葉。俾桂易於生長。除害。大油桂每於夏至時。有一種羽蟲。形似毒雞。身有毛色淡黃。嚼破桂皮。產卵。宜時常察視。見有卵處。即用小鐵錘打死。勿令出卵成蟲。又有一種蟲。祇食桂葉。吐絲結窠。捲束枝葉。用烟梗。老糠臭草。百部等。於樹下燃烟薰之。自然消滅。

採取 西藥大成云。其樹生長六七年者。可割取。桂考云。採取之法。必雇工匠。然擅此技者。亦不多其人。要熟手法。看火候刀法。皆為必要。茲舉其法如下。時期。每年以陰曆春三四兩月。秋七月八月。為桂樹收漿之候。立即採取。過此為灌漿開花。皮肉膏潤不堪。若非其時。而強採之。則皮碎破。不成片張。且無油矣。取法。必須雇匠。或山。或碾全體。運歸取皮。或在山取皮。運回製造。取皮之先。先量樹株長寬。應用竹板合樹皮之長。大如法碼。展尺之有規矩準繩。用刀直

料。依竹板大小。成長條形桂片。塞材。皮取以離地二三尺不用。因有淤泥蟲紋破枝。氣枯節劣。皆屬棄材。非用上節至開枝處為止。開枝之上。氣散無膏。亦棄之。非用。惟枝葉產廣西桂平。平陽者。可製油。產越南廣東者。其枝葉煎蒸無油。僅供柴薪之用。

製法 取成片之皮。以溫水洗之。置風前隔背。陰乾水氣。用木箱墊以厚棉。四面以棉絮圍之。內藉桂葉二三寸厚。將桂皮合圍。圍包加以芭蕉葉外。置於箱內。四面上下。用桂葉充滿。以無漏氣為度。然晝夜須防察。初逾一宵。啓箱驗之。必上面半節先熟。其色紅潤。仍封好。將箱倒置。次日再啓。驗下面半節亦熟。色亦紅潤。方為得宜。過早則嫩。過遲則老。過嫩不熟。苦水未盡。過老太熟。油散不結。將熟之際。一夜數驗。此火候之功。非熟技者不能也。若兩頭熟。中未熟。亦不成。必須油氣相均勻。始可出箱。則渣氣苦水。因受暑蒸。盡出皮表。隨用熱水洗淨。渣氣苦水。當在此時去盡矣。即以利刀裁齊口邊。須一

六畫 肉

刀整裁。用舊竹筒。將桂片數於竹筒外面。以粗繩節數緊。懸至風前。每日解繩視驗。內有水氣。即卸苦水。用乾布揩淨。為度。仍繫紫風吹。次日照法解驗。須十日始能揩淨。水盡則收。裝於皮肉分明。苦水盡。而漿甜辣。再以竹皮縛緊。層層隔放。置高處。通氣疏風。逾半月。則皮乾。再分對紫好。或數十枝一紫。始入箱收藏。庶免斜歪。縮劣之患。此越南廣西製板桂筒桂之法也。桂商販運。以蠟封口。不洩氣。錫盒收之。不走油。考之越南民家所藏。則不同。他以汗衣或汗巾。裹藏近人氣之處。以採生氣。切不可良賤同收。新陳合藏。恐雜亂氣味。耗散油液。收處宜乾淨。忌潮濕。氣長近別種香品。能奪桂氣。好桂雖置風前。亦不損壞。宜稍疏風。不宜陰藏。即箱內亦不宜多置。恐熱氣太甚。氣內鼓而難開。既開口。則必須須貨。看視。以隨手摸數。轉鼻嗅其氣。不可動力。此安桂及油薄等桂。收藏法也。若大油。稀桂。藏宜長方形小錫箱。底貯白蜜。約四五分厚。上用圓竹片。編成竹篾。

同錫箱大小。按於篾上。約離篾一寸。篾上接桂。蓋用套式。亦宜獨藏。不與別物合藏。及與陳桂油。桂同收。皆能耗散油液。不可不知也。

性質 甘辛大熱。有小毒。

成分 為揮發油。樹脂。膠質。單寧等。

效能 散寒。止痛。化淤。活血。用作健胃強壯藥。

作用 入胃能使胃液及唾液之分泌增加。振起其消化機能。胃內之膽汁。一遇肉桂。即與肉桂內之單寧酸。和胃內未消化之蛋白質。化合作用。成為蛋白質單寧酸。此物有收斂制醉之功。餘一部之單寧酸。由腸壁吸入血中。有凝固白血球之力。而肉桂精在胃中。與脾液化合。至小腸始被吸收。而至血中。有促進血液。與振精神之功。且同時能使腸內膜之微血管收縮。阻止過量之分泌。

空論 利肝脾氣。心腹寒熱。冷痰。痰亂轉筋。頭痛腰痛。出汗。止煩。止咳。嗽。鼻。腫。胎。溫。中。堅。筋。骨。通。血。脈。理。疏。不。足。宣。導。百。藥。

歷代記述致謹 【唐】甄權藥

性本草論肉桂曰。九種心痛。腹內冷氣。痛不可忍。飲逆結氣。墮。脚。痺。不。仁。止。下。痢。殺。三。蟲。治。鼻。中。患。肉。破。血。通。利。月。閉。胞。衣。不。下。【宋】日華子諸家本草論肉桂曰。治一切風氣。補五勞七傷。通九竅。利關節。益精明目。暖腰膝。治風痺骨節。攣。縮。攣。筋。骨。生。肌。肉。消。瘀。血。殺。瘧。瘴。殺。草。木。毒。【金】張元素珍珠囊論肉桂曰。補下焦不足。治沉寒痼冷之病。滲瀉止瀉。去營衛中風寒。表虛自汗。春夏為禁藥。秋冬下部腹痛。非此不能止也。【元】王好古湯液本草論肉桂曰。補命門不足。益火消陰。肉桂入足少陰。大陰。經。血。分。桂。心。入。手。少。陰。經。血。分。【明】李時珍本草綱目論肉桂曰。治寒痺風瘧。陰虛失血。瀉劑驚癇。桂心治風僻失音喉痺。陽虛失血。內托癰疽痘瘡。能引血化汗。化風解蛇蠍毒。【清】黃宮繡本草求真論肉桂曰。肉桂氣味純陽。辛甘大熱。宜透肝腎血分。大補命門相火。益陽治陰。凡沈寒痼冷。營衛風寒。陽虛自汗。腹中冷痛。飲逆結氣。脾虛惡食。溼痿泄瀉。血脈不通。死胎

五四五

六盡 肉

不下。目赤腫痛。因寒因滯而得者。用此治無不效。蓋因氣味甘平。其色紫赤。有鼓舞血氣之能。性體純陽。有招導引誘之力。昔人云。此體氣清揚。既能峻補命門。復能竄上達表。以通營衛。非若附子氣味雖辛。復兼味苦。自上達下。止固真陽。而不兼入後天之用耳。故凡病患寒逆。既而溫中。及因氣血不和。欲其鼓舞。則不必用附子。惟以峻補血氣之內。加以肉桂。以為佐使。如十全大補。人參養營之類。用此即是此意。今人勿細體會。徒以附桂均屬辛溫。任意妄投。不細明別。豈衛身救本者所應爾歟。但精虧血少。肝盛火起者。切忌。桂出嶺南。色紫肉厚。體鬆皮嫩。辛甘者佳。得人參良。剉入藥。勿見火。

近人學說 閻丘陞曰。桂味甘辛。氣大熱。有小毒。忌生葱。石脂。稟天地之陽。而並得土金之氣。木之純陽者也。本草主利肝肺氣。心腹寒熱。冷痰。霍亂。轉筋。頭痛。腰痛。出汗。止煩。止吐。欬嗽。墮胎。溫中。堅筋骨。通血脈。理疏不足。宣導百藥。無所畏。補下焦不足。治沉寒痼冷之病。滲泄止渴。去營衛中風寒。表虛自汗。春夏為禁藥。秋冬下部腹痛。非此不能止。補命門不足。益火消陰。此桂性之所治也。然其類有肉桂。桂枝。官桂。體異而用各不同。不可不因其分而分之。所云肉桂者。如桂樹之老幹厚皮也。味厚甘辛大熱。入足少陰。太陰。經血分。下行而補腎。為溫中之藥。故凡傷寒在裏。而為心腹寒熱。脾胃虛寒。而為冷痰泄瀉。霍亂轉筋。秋冬腹痛。寒氣腹痛。甚至寒邪。心冷氣痛。不可忍。以及元陽不足。而沉寒痼冷。血凝血滯。而經水不通。痰癖癥瘕。奔豚寒疝。是皆命門真火不足。為寒邪乘虛客裏所致也。惟肉桂之甘辛而大熱者。能溫中以回陽。經曰。氣厚則發熱是也。所云桂枝。即桂樹之嫩小枝。條薄皮也。味甘辛。而氣不甚熱。氣味俱薄。入足太陽經。上行而發表。為實表祛邪之藥。專治上焦頭目。又能旁達四肢。橫行手臂。利肝肺氣。頭痛。出汗。止煩。開關節。通九竅。及風痺骨節攣痛。皮膚疏泄。表虛自汗。脈浮緩。風邪干於衛氣者。其病皆得之表虛。不

任風寒寒邪客之所致。惟桂枝能實表之虛。祛邪之出。故悉主之。經曰。氣薄則發泄是也。至於所稱官桂。即桂中尊貴之稱也。體近肉桂而稍薄。治易解表。與桂枝之旁達橫行。亦略相等。然其味甚辛。亦大熱。故手背冷痛。足膝酸疼。或惡露不行。或胞衣不下。或癰疽疔腫。之由。於營衛不調。或瘀血積血之由。於跌撲損傷者。官桂之行血調氣。則更有猛效者焉。而大槪則去肉桂不遠也。一物而分三用焉。蓋由於本天者。親上。本地者。親下。理之自然。性味有所不可移也。然此劑有疑而難辨。而又不不得不辨者。如別錄云。桂有小毒。好古復云。雖有小毒。亦從類化。何也。蓋與黃芩。黃連。為使。小毒何施。與烏頭。附子。為使。全取其性而已。與巴豆。礬砂。乾漆。穿山甲。水蛭等同用。則小毒化為大毒。與柴胡。紫石英。乾地黃同用。療吐逆。與人參。麥門冬。甘草同用。則調中益氣。乃可久服。此毒之化不化當辨也。如本經言桂枝能止煩出汗。張仲景治傷寒有當發汗處。每用桂枝湯以發散之。又云

五四六

無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。仲景又於汗過多者。用桂枝甘草湯。此又用桂枝以閉汗也。一藥兩用。毋乃兩相矛盾乎。然而非也。蓋桂善通血脈。本經言桂能止煩出汗者。非桂能開腠理而發汗也。以之調其營血。則衛氣自和。邪無容地。遂自汗出而解矣。仲景言汗多用桂枝者。亦非桂枝能閉腠理而止汗也。以之調和營衛。則邪自出。邪去而汗自止矣。味者不知此義。凡病傷寒。便用桂枝湯。幸遇太陽傷寒。風寒。自汗寒者。固獲奇效。倘遇太陽傷寒。無汗者。而亦用之。為害豈淺鮮哉。此出汗止汗之當辨也。又本經云。肉桂走裏而行血。除寒破血。抑肝木。扶脾土。入右腎命門。補相火不足。本其能事。而又大忌於血崩。血淋。尿血。血熱。經閉。血行作痛。產後血虛發熱。陰虛吐血。咯血。鼻血。齒血。汗血。小便熱結。大便血燥。肺熱咳嗽。以及一切中壅昏暈。盜病。熱病。頭疼。口渴。發狂。發狂。小兒痧疹。腹痛。痘瘡。血熱。腸風。瀉毒。夢遺。精滑等症。法並忌之。又宜用不

宜用之當辨也。臨症用藥。宜行其所明。毋行其所疑。慎勿以猛厲之劑。爲嘗試之物。至久服神仙。殺三蟲。治鼻中息肉。益精明目。皆非其性之所宜。所謂盡信書則不如無書。其斯之謂歟。

國外學說 英美學說謂肉桂產中國廣西及越南等處。與錫蘭肉桂相類。厚者爲肉桂。薄者爲桂皮。其樹枝爲桂枝。其醫治之作用。肉桂爲香藥。與補胃藥。少有收斂性。能治嘔吐之病。又能治胃中發氣與肚痛。如泄瀉病常用之。與他藥配合。又如身體軟弱。亦可合於他藥服之。以其性能補斂。若入補劑可止痛。治氣鬱。其功用又能祛風。加火石粉和服。治泄痢。加洋蘇木膏治內部血出。和蘭藥鏡曰。本品融和溫壯。神經活潑。健運精氣。收固脈管之縱緩。用於一切虛弱之證。能挽回精力。爲壯神之要藥。患者有虛憊之神經熱。腐敗熱性之熱病。尤宜胃腸諸證者有效。熱病之患者。虛脫而發嘔吐者。用桂爲泡劑良。

辨偽 鄭育巖曰。真桂出桂

六盡 肉

陽山谷及廣州交趾者最佳。必肉厚氣香。色紫黯。有油。味甘。嘗之舌上極清甜者。方可用。若嘗之舌上不清。及切開有白點者。是洋桂。大害人。洋桂尙不可用。近日有偽造肉桂者。聞用楊梅樹皮。其形似桂。曬乾。以薄桂熬取濃汁。浸潤透心。再晒再浸。以香油潤過。致色香既無以辨。屢以此等假桂。遠販外府。及窮鄉僻壤。各小肆混售。害人無算。安得有心人。爲之嚴行禁絕乎。曹炳章曰。肉桂爲樟科樟屬植物。常綠喬木。種類甚多。產越南廣西熱帶。當分數種。曰清化。曰猛羅。曰安邊。產安南外。曰密桂。產密川。曰欽短。曰薄桂。此總名也。又有猛山桂。即大油桂。曰大石山。曰黃摩山。曰社山。曰桂平。即玉桂。產雲南。曰蒙自桂。產廣東。曰羅定桂。曰信宜桂。曰六安桂。最盛產外國者。爲錫蘭加西耶。皆名洋桂。大抵桂之鑑別。一辨皮色。二辨氣味。辨皮之法。皆以形狀比喻。相似名之。曰荔枝皮。曰龍眼皮。曰桐油皮。曰龍鱗皮。曰鐵皮。曰五彩皮。曰砂砂皮。曰緞紗皮。皮以二

色。惟野生無定形。總不外結實。滑潤。淨潔。六字爲要。桂性直上。身如檳榔。直豎數丈。中無枝節。皮紋直實。肉如織錦。紋細而明者。爲上桂。然野生者。間有橫紋。其形狀必蒼老。堅結。橫直交錯。斑點叢生。皮色光潤。紋細而滑。亦爲野生佳品。若橫紋多而色紅。皮粗紋粗。如荊棘滯手。皆爲下品。此辨皮色之大要也。辨氣。觀其土產皮色。既知其外。又須嗅其氣。嘗其味。以知其內。辨氣亦有六法。如醇。厚。馨。燥。辣。木。虱。臭。是也。凡試桂。聞氣。以手摸桂肉數轉。聞之。即知。如清化桂。則氣醇而厚。猛羅桂。則氣厚而馨。安邊桂。則氣馨而不燥。薄桂。或燥或辣。或氣如木虱臭者。亦有氣醇而微帶木虱臭者。若收藏年久。燥辣之氣消。惟木虱臭。卒不能革除。或有馨香。得人工所製。亦帶木虱氣。皆屬偽種。要以察而純。如花之清香。不雜。若似花椒丁香氣。而燥。如山奈皂角氣。而辣。皆下品也。辨味。嗅氣之外。當試以味。試味之辨。以百沸湯沖水少許。涼而嘗之。當分醇。厚。燥。辣。爲四味。且湯汁入口。分辨較

鼻嗅更易明。必須味醇厚不燥辣者。爲最佳。不辣之中。先以水辨其味。曰清。曰濁。曰淡。茶色。曰米汁。曰乳汁。曰綠汁。曰白水。凡白水。淡茶。色。清者。味必醇。惟米汁。乳汁。綠水。皆有清濁之分。清者。味醇。濁者。味燥。然紅水。間有清濁難分。必嘗其味。厚而醇者。爲野生猛羅之類。味燥者。爲欽短薄桂之類。綠水亦不一類。如猛羅種。油黑者。水必綠。味多苦。亦有油薄者。水亦不綠。如薄桂之油。濃者。則水亦綠。其味必兼燥。清化安邊。其得氣清。其油必薄。神桂之油。雖亦厚。薄不一。惟五味俱全。有甜辣苦酸。亦有甜馨。而馨總以微帶苦酸爲正。總之。不得以油之厚薄爲定。見水綠紅。爲貴賤。須要別其水之清濁。味之醇燥。辛辣。斯可爲分辨的確耳。再辨口刀。一清化桂。荔枝皮。砂砂肉。刀口整齊。皮肉不起泡點。不見花紋。皮縮肉不凸。實而不浮。皮肉分明。或皮肉之界有線分之。曰銀線。最爲清品。二猛羅桂。龍眼皮。或五彩皮。或砂砂皮。樹紗皮。固有肉縮肉凸。肉不起。泡點不現。花紋正而不

五四七

六盡肉

淨亦為正品。(三) 欽蠟桂、淨桂(即精桂)二種皆粗皮橫紋。刀口邊口起泡。凸皮縮肉。凸紅色。泡點花斑皆燥烈。此為下品。(四) 神桂。樹油皮。龍鱗。鱗甲。縷紗肉。氣厚而翠。味厚而醇。為野生神桂之正品。玉板桂。今之蒙自桂也。片平而厚。邊薄而淺。肉色黯黃。皮粗而厚。油層不多。亦稱上品。他如皮色青黃。層捲如筒。亦名筒桂。即今安桂是也。又有官桂一種。桂枝即其枝也。出羅定。形如安桂。味淡性薄。捲作二、三層者皆次。此辨桂之種類優劣。參考前哲名官。微以實驗。約略從形態氣味言之。惟效用不及再詳。據鄭君所辨之種。皆非上品。如下品已賤。何必再作偽品。此我斷尙無之。

生地黃、赤芍藥、白殭蠶。
④ 治產後少腹兒枕作痛。用肉桂、蒲黃、黑豆、澤蘭、益母草、紅花、牛膝、生地黃、當歸。甚則加乳香、沒藥各七分。
⑤ 治元氣虛。人中寒。腹痛不可忍。用肉桂、吳茱萸、乾薑、附子。虛極則加人參。
⑥ 療瘡瘍潰後熱毒已盡。內差長肉良。用肉桂、佐參、香、五味、當歸、麥冬。
⑦ 入桂、芥、甘露飲。治中暑霍亂吐瀉殊驗。
⑧ 治怒氣傷肝。脇痛。用肉桂、豨黃、鬱金。
⑨ 治冬月難產。產門交骨不開。用肉桂、當歸、牛膝。
⑩ 肉桂、得當歸、牛膝、生地黃、乳香、沒藥、桃仁。治跌撲損傷。瘀血凝滯。腹中作痛。或惱怒勞傷。以治著血發寒熱。極令人不得眠。腹不痛。大便不祕。亦不甚渴。脈不洪數。不思食。食亦無味。熱至天明。得汗暫止。少頃復熱。小便赤。此其候也。和童子小便服之立除。
⑪ 陰痺。法。寒痺者。留而不去。

五四八

時痛而皮不仁。刺布衣者以火焯之。刺大人者以藥熨之。熨法。用醇酒二十斤。蜀椒一斤。乾薑一斤。桂心一斤。凡四物。咬咀。漬酒中。用棉絮一斤。細白布四丈。并納酒中。置馬矢壚中。封塗。勿使泄氣。五日。五夜。出布絮。暴乾。復漬。以盡其汁。每漬必擇其日。乃出乾之。并用滓與絮。覆布為覆巾。長六七尺。為六七巾。每一巾。生桑炭火炙巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入至病所。寒則復炙巾。以熨之。三十遍而止。汗出。以巾拭身。亦三十遍而止。起步內中。無見風。每刺必熨。如此病已矣。(靈樞經方)

取汗(千金方)
⑦ 治偏正頭風。天陰風雨。即發。桂心末一兩。酒調塗下額上及頂上。(聖惠方)
⑧ 暑月解暑。桂苓丸。用肉桂去粗皮。不見火。茯苓去皮。等分為細末。煉蜜丸。龍眼大。每新汲水化服一丸。(和劑局方)
⑨ 桂漿湯水。夏月飲之。解煩渴。益氣消痰。桂末一大兩。白蜜一升。以水三斗。先煎取一斗。入新瓷瓶中。乃下二物。打二三百轉。先以油紙一重覆上。加二重封之。每日去紙一重。七日開之。氣香味美。格韻絕高。今人多作之。(園經方)
⑩ 治九種心痛。用桂心二錢。半為末。酒一盞。煎至半盞。飲立效。(聖惠方)又桂末酒。服方寸匕。須臾六七次。(外臺祕要方)
⑪ 治心腹脹痛。氣短欲絕。桂二兩。水一升。二合。煮八合。服之。(肘後方)又治中惡心痛(千金方)
⑫ 治寒疝心痛。四肢逆冷。全不飲食。桂心研末一錢。熱酒調下。取效。(聖惠方)
⑬ 治產後心痛。惡血沖心。氣悶

欲絕。桂心爲末。狗膽汁丸。炙于大。每熱酒服一丸。(聖惠方)

治產後腹痛。桂末酒服方寸匕取效。(肘後方)

治死胎不下。桂末二錢。待痛緊時。童子小便溫熱調下。名親音救生散。亦治產難橫生。加麝香少許。酒下。比之水銀等藥。爲不損人。(何氏方)又方。用肉桂。朴硝。當歸。

治血崩不止。桂心不拘多少。砂鍋內煨存性爲末。每米飲空腹服一二錢。名神應散。(婦人良方)

治反腰痛。桂末和苦酒塗之。乾再上。(肘後方)

治吐血下血。用桂心爲末。水服方寸匕。王珍曰。此陰乘陽之症也。不可服涼藥。南陽趙宣德暴吐血服二次而止。其甥亦以二服而安。(肘後方)

治小兒久痢赤白。用桂去皮。以煎汁炙紫。黃連以茶葉炒過。等分爲末。紫蘇木瓜煎湯服之。名金鎖散。(全効心鑑方)

治小兒遺尿。桂末雄雞肝等分。搗丸。小豆大。溫水調下。日二服。(外臺秘要方)

治嬰兒臍腫。多因傷濕。桂心炙熱熨之。日四五次。(姚和衆方)

治外腎偏腫。桂末水調方寸匕塗之。(梅師方)

治食果腹脹。不拘老小。用桂末飯和丸。綠豆大。吞五六丸。白湯下。未消再服。(經驗方)

治打撲傷損。淤血瀰闊。身體疼痛。辣桂爲末。酒服二錢。(直指方)

治乳癰腫痛。桂心甘草各二分。烏頭一分。炮爲末。和苦酒塗之。紙覆住。膿化爲水。神效。(肘後方)

治重舌。桂末和薑汁塗之。(湯氏寶書方)

治諸蛇傷毒。桂心苦蕒等分爲末。竹筒密塞。遇毒蛇傷卽傳之。塞不密。卽不中用也。

治閉口氣欲絕。或出白沫。身體冷。急煎桂汁服之。多飲新汲水一二升。(梅師方)

治中鉤吻毒。解羌青毒。並煮桂汁服。用量三分至一錢。施用宜忌。凡非虛寒者禁用。忌生姜。石脂。

著名方劑 滋腎丸。治肺痿聲嘶。喉痺。小便不通。(東垣方)用黃柏二兩(酒炒)知母二兩(酒炒)肉桂一錢。研爲細末。熱水泛丸。每服五十丸。空心鹽湯下。腎氣丸。治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。肢腫腹脹。痰喘咳嗽。(資生方)

用乾地黃八兩。乾山藥。山茱萸各四兩。丹皮。茯苓。澤瀉各三兩。桂枝。附子各一兩。車前。牛膝各一兩。以上八味爲末。煉蜜爲丸。酒下十五丸。日再服。

參攷資料 南海卽是廣州。神農本草經。惟有牡桂。茵桂。俗用牡桂。屬厥殊。薄皮黃。脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不是別樹。是桂之老宿者。茵桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟以嫩枝破卷成圓者用之。非真茵桂也。並宜研訪。今俗又以半卷多脂者。單名爲桂。入藥最多。是桂有三種矣。此桂廣州出者好。交州桂州者形段小而多脂。肉亦好。湘州始興桂陽縣者卽是小桂。不如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮黃心赤。齊武帝時。湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。

氣粗相類。而葉乖異。亦能凌冬。尋是牡桂。人多呼爲丹桂。正謂皮赤爾。北方重此。每食羈須之。蓋禮所云。竇桂以爲芬芳也。(陶弘景)桂惟有二種。陶氏引經云。似柏葉。不知此言從何所出。單名桂者。卽是牡桂。乃爾雅所謂侵木桂也。葉長尺許。花子皆與茵桂同。大小枝皮。俱名牡桂。但大枝皮肉理粗。虛如木。而肉少味薄。名曰木桂。亦云大桂。不及小嫩。枝皮肉多而中帶。中必皺起。其味辛美。一名肉桂。亦名桂枝。一名桂心。出融州桂州交州甚良。其茵桂葉似柿。葉中有縱文三道。表裏無毛而光澤。肌理聚薄如竹。大枝小枝皮俱是筒。其大枝無肉。老皮堅版。不能重卷。味極淡薄。不入藥用。小枝薄而卷。及二三重者良。或名筒桂。陶云小桂是也。今惟出韶州(蘇頌)桂有三種。茵桂葉似枯葉。而尖狹光淨。花白蕊黃。四月開花。五月結實。樹皮青黃。薄卷若筒。亦名筒桂。其厚硬味薄者。名枝桂。不入藥用。牡桂葉似枇杷葉。狹長於茵桂葉一二倍。其嫩枝皮中卷多紫。而肉中皺起。

五九九

六畫 肉

肌理虛軟。謂之桂枝。又名肉桂。削去上皮。名曰桂心。其厚者名曰木桂。葉中以此為善。陶氏言牛卷多脂者為桂。又引仙經云。葉似柏葉。此則桂有三種明矣。陶雖是梁武帝時人。實生於宋孝武建元三年。歷齊為諸王侍讀。曾見芳林苑所植之樹。蘇恭只知有二種。指陶為誤。何臆斷之甚也。(韓保昇) ⑤ 茵桂。牡桂。桂心。三色。同是一物。桂林。桂嶺。因桂得名。今之所生。不離此郡。從嶺以南際海。盡有桂樹。惟柳泉州最多。味既多烈。皮又厚堅。厚者必嫩。薄者必老。探者以老薄為一色。嫩厚為一色。嫩既辛烈。兼又筒卷。老必味淡。自然版薄。薄者即牡桂。卷者即茵桂也。桂心即是削除皮上甲錯取其近理而有味者。(陳藏器) ⑥ 附雅。但言椶木桂一種。本草載桂及牡桂。茵桂二種。今嶺表所出。則有筒桂。肉桂。桂心。宜桂。板桂之名。而醫家用之。罕有分別。舊說茵桂。正則如竹。有二三重者。則今之筒桂也。牡桂。皮薄色黃。少脂肉者。則今之官桂也。桂是半卷多脂者。則今之板桂也。而今觀

宜韶欽諸州所闕上者。種類亦各不同。然總謂之桂。無復別名。參考舊注。謂茵桂。葉似柿。中有三道文。肌理緊薄。如竹。大小皆成筒。與今賓州所出者相類。牡桂。葉狹於茵桂。而長數倍。其嫩枝皮半卷多紫。與今宜州韶州所出者相類。彼土人謂其皮為木蘭皮。肉為桂心。此又有黃紫兩色。益可驗也。桂葉如柏葉。而澤。皮黃心赤。與今欽州所出者葉密而細。恐是其類。但不作柏葉形。為異爾。蘇恭以單桂。牡桂。為一物。亦未可據。其木俱高三四丈。多生深山。樹洞中。人家圍圍。亦有種者。移植於嶺北。則氣味殊少。辛辣不堪入藥也。三月四月生花。全類茱萸。九月結實。今人多以裝綴。花果作筵具。其葉甚香。可用作飲。尤佳。二月八月採皮。九月採花。並陰乾。不可近火。(蘇頌) ⑦ 按范成大桂海志云。凡木葉心皆一縱理。獨桂有兩道。如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宣導百藥。為之先聘。通使如執圭之使也。爾雅謂之授者。能侵害他木也。故呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。雷

公炮炙論云。桂釘木根。其木即死是也。桂即牡桂之厚而辛烈者。牡桂即桂之薄而味淡者。(李時珍) ⑧ 桂有數種。以今參訪。牡桂。葉長如枇杷。葉堅硬有毛。及鋸齒。其花白色。其皮多脂。茵桂。葉如柿葉。而尖狹光淨。有三縱文。而無鋸齒。其花有黃有白。其皮薄而卷。今商人所貨。皆此二桂。但以卷者為茵桂。半卷及板者為牡桂。即自明白。蘇恭所說。正合醫家見今用者。陳藏器陳承斷茵牡為一物者。非矣。陶弘景復以單字桂。為葉似柏者。亦非也。柏葉之桂。乃服食家所云。非此治病之桂也。蘇頌所說。稍明。亦不當以欽州者為單字之桂也。按尸子云。春花秋英。曰桂。替舍南方草木狀云。桂生合浦交趾。生必高山之顛。冬夏常青。其類自為林。更無雜樹。有三種。皮赤者為用。桂。葉似柿者為茵桂。葉似枇杷者為牡桂。其說甚明。足破諸家之辯矣。又有巖桂。乃茵桂之類。韓衆探藥詩云。閩河之桂。實大如棗。得而食之。後天而老。此又一種也。閩河不知在何處。(李時珍)

五五〇

【肉桂油】 產地 出粵之澳門。形態 肉桂油為肉桂之脂。或謂桂子所榨。其色紫。其氣香烈。如肉桂氣。可供藥用。

性質 辛熱。
主治 風寒發溼。結氣癱痺。沉寒痼冷。腕腹疼痛。陰疽。

參攷資料 麻木擦擦之一切瘧疾。用燈草一莖。約長三四寸。以水稍潤。再以肉桂油塗之。貼背脊風府穴下。至肺俞止。外以棉紙條封之。須臨發前一二時為之。或先一日更妙。貼後次日發。燭更重。嗣後漸減。(綱目拾遺)

【肉桂】 卽山茶萸之古籍別名。與見綱目。詳『山茶萸』條。

【肉菴蓉】 卽肉菴蓉之古籍別名。與見和漢藥考。詳『肉菴蓉』條。

【肉菴蓉】 命名 本品補而不峻。有從容和緩之貌。故名。

處方用名 淡菴蓉。鹹菴蓉。乾菴蓉。

古籍別名 肉松容。黑司命。(吳普本草) 金笱地丁。地精。別當。

肉菴蓉。碧水龍。紫花地丁。(和漢

藥考)


外國名國 Boechainia

Glabra, C. A. Mey. (拉丁)

基本 肉蓯蓉屬別當科。為一種寄生生物。六七月間選損長七八寸者晒乾。或漬鹽藏於壺中。以為藥用。

產地 日本富士山、日光山等均產。陳仁山藥物生產辨云。北方養馬之處。均有出產。但河南省、山西省、陝西省、出產者為多數。向日所來者。鹹肉蓯蓉。到廣東泡淡。切片晒乾。每劬得回一兩二錢。近日所來者。俱由出產地製妥晒乾而來。

形態 按肉蓯蓉多寄生榛木 (Alnus viridis, DC. var. Sibiriensis) 之根。高自六七寸至尺餘。作肉質柱狀。葉鱗集如松球。長則內部空虛。夏日頂部簇生唇形花。與葉莖俱呈黃褐色。



肉蓯蓉

六畫 肉

種類 有草蓯蓉。花蓯蓉。功力皆遜於肉蓯蓉。

採取 每年二月八月採。陰乾。製法 雷斅曰。凡使肉蓯蓉。先須清酒浸一宿。至明以椶刷去沙土浮甲。劈碎中心。去白膜一重。如竹絲草樣。有此能隔人心前氣不散。令人上氣也。以飯蒸之。從午至酉取出。又用酥炙得所。

性質 甘微溫。無毒。效能 補腎。興陽。滑腸。用作強壯藥。

主治 五勞七傷。補中。除莖中寒熱痛。養五臟。強陰益精氣。多子。婦人瘕瘕。久服輕身 (本經) 除膀胱邪氣。腰痛。止痢 (別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蓯蓉曰。益髓悅顏色。延年大補。壯陽。日御過倍。治女人血崩。【宋】大明日華諸家本草論蓯蓉曰。男子絕陽不興。女人絕陰不產。潤五臟。長肌肉。暖腰膝。男子洩精血。遠瀝。女子帶下。陰痛。【元】王好古湯液本草論蓯蓉曰。命門相火不足者。以此補之。乃腎經血分藥也。【明】繆希雍本草經疏論蓯

蓉曰。肉蓯蓉味甘酸鹹。微溫無毒。入腎入心。包絡命門。滋腎補精。血之要藥。氣本微溫。相傳以為熱者。誤也。甘為土化。酸為木化。鹹為水化。甘能除熱。補中。酸能入肝。鹹能滋腎。腎肝為陰。陰氣滋長。則五臟之勞熱自退。陰莖中寒熱痛自愈。腎肝足則精血日盛。精血盛則多子。婦人瘕瘕。病在血分。血盛則行。行則瘕瘕自消矣。膀胱虛。則邪客之得補。則邪氣自散。腰痛自止。久服則肥健而輕身。益腎肝。補精血之效也。若曰治痢。豈滑以導滯之意乎。此亦必不能之說也。輒而肥厚。大如臂者良。【清】黃宮繡本草求真論蓯蓉曰。肉蓯蓉甘酸鹹溫。體潤色黑。諸書既言峻補精血。又言力能興陽助火。是明因其氣溫。力專滋陰。得此陽隨陰附。而陽自見興耳。惟其力能滋補。故凡瘕瘕積塊。得此而堅即消。惟其滋補而陽得助。故凡遺精莖痛。寒熱時作。亦得因是而除。若謂火衰至極。用此甘潤之品。同於桂附。力能補陽。共失遠矣。况此既言補陰。而補陰又以蓯蓉為名。是明因其功力不

驟。氣專潤燥。是亦宜於便閉。而不宜於胃虛之人也。謂之滋陰。則可謂之補火。正未必然。長大如臂。重至劬許。有松子鱗甲者良。酒浸。則刷去浮。用劈。除肉筋膜。酒蒸。半日。酥炙用。【清】葉天士本草經解論蓯蓉曰。肉蓯蓉。氣微溫。泉天春升之木氣。入足厥陰肝經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。色黑而潤。製過味鹹。兼入足少陰腎經。氣味俱濁。降多於升。陰也。填精益髓。又名黑司命。五勞者。勞傷五臟之真氣也。勞者。溫之。蓯蓉氣溫。所以治勞也。七傷者。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡營衛氣傷之七傷也。七者皆傷真陰。肉蓯蓉甘溫滑潤。能滋元陰之不足。所以主之也。中者。陰之守也。甘溫益陰。所以補中。莖玉莖也。寒熱痛者。陰虛火動。或寒。或熱。而結痛也。蓯蓉滑潤。滑以去著。所以主之。五臟藏陰者也。甘溫潤陰。故養五臟。陰者。宗筋也。宗筋屬肝。肝得血則強。蓯蓉溫甘益肝血。所以強陰。色黑入腎。補益精髓。精足則氣充。故益精氣。精氣足。則顏御女。所以多

五五一

六盡肉

子也。婦人癥瘕。皆由血成。從容溫滑而鹹。鹹以輕堅。滑以去着。溫以散結。所以主之也。久服肝脾腎精氣充足。所以身輕也。【清】黃元御玉楸藥解論從容曰。肉從容。味甘。鹹氣平。入足厥陰肝。足少陰腎。手陽明大腸經。暖腰膝。健骨肉。滋腎肝精血。潤腸胃結燥。凡糞粒堅小。形如羊屎。此土溼木鬱。下竅閉塞之故。穀滓在胃。不得順下。零星傳送。斷落不聯。歷陽明大腸之燥。煉成顆粒。秘澹難通。總緣氣鬱。疎澀不行也。服地黃龜膠。反益土溼。中氣愈敗矣。滋木清風。養血潤燥。善滑大腸。而下結糞。其性從容。不迫。未至滋溼敗脾。非諸潤藥可比。方書稱其補精益髓。悅色延年。理男子絕陽不興。女子絕陰不產。非溢美之詞。

潤爲之。用者宜審。 近人學說 張山雷曰。從容爲極潤之品。市肆皆以鹽漬。乃能久藏。古書皆稱其微溫。而今則爲鹹味久漬。溫性已化除淨絕。縱使漂洗極淡。而本性亦將消滅無餘。故古人所稱補陰與陽。種種功效。俱極薄弱。蓋已習與俱化。不復可以本來之質。一例論矣。但鹹能下降。滑能通腸。以主大便不爽。頗得捷效。且性本溫潤。益陰通陽。故通腑而不傷津液。尤其獨步耳。 配合應用 主婦人不孕。肉從容得白膠。杜仲。地黃。當歸。麥門冬。

四兩。水煮令爛。薄細切研。精羊肉分爲四度。下五味。以米煮粥。空心食。藥性論方) 治腎虛白濁。肉從容。鹿茸。山藥。白茯苓等分爲末。米糊丸。梧子大煎湯下。每服三十丸。(濟聖總錄方) 治汗多便秘。老人虛人皆可。用肉從容酒浸二兩。研沉香末一兩爲末。麻仁子汁打糊丸。梧子大。每服七八丸。白湯下。(濟生方) 治消中易飢。肉從容。山茱萸。五味子爲末。蜜丸。梧子大。每服鹽湯下二十九。(醫學指南方) 治破傷風。病口禁。身強。肉從容切片曬乾。用一小盞底上穿定。燒煙於瘡上蒸之。累效。(衛生總錄方) 用量 一錢半至三錢。 施用宜忌 凡大便泄瀉及腎中有熱。陽易舉而精不固者。禁用。忌鐵氣。

著名方劑 從容丸。治腎虛耳聾。或風邪入於經絡。耳內虛鳴。(濟生方) 用肉從容。山茱萸。肉石龍芮。石菖蒲。兔絲子。羌活。鹿茸。石斛。磁石。附子。各一兩。全蠍七個。麝香半字。旋爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服百丸。空心酒下。或鹽湯下。 參攷資料 代郡屬門屬并州。多馬。處便有之。言是野馬。精液地所生。生時似肉。以作羊肉。藥補虛乏極佳。亦可生啖。河南開至多。今第一出隴西。形扁黃。柔潤多花。而味甘。次出北國者。形短而少花。巴東建平間。亦有而不嘉也。(陶弘景) 強筋健髓。以從容鯉魚二味爲末。黃精汁丸服之。力可十倍。此說出乾學記(雷敏) 出隴州福祿縣沙中。三月四月掘根。長尺餘。切取中央好者三四寸。纏穿陰乾。八月始好。皮有松子鱗甲。其草從容。四月中旬採。長五六寸至一尺。以來。莖圓紫色。(韓保昇) 肉從容。經以謂皮如松子。有鱗子字。當爲殺。於義爲尤。又曰。以酒淨洗去黑汁。作藥。黑汁既去。氣味皆盡。然嫩者。方可作藥。老者。苦入藥。少則不效。(慈宗爽) 洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者。方可作藥。味苦。入藥少則不效。(慈宗爽) 西人多用作食。只刮去鱗甲。以酒

五五二

浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹極美好。益人勝服補藥。(蘇頌) ④生牧落樹下井土壘上。此即非馬交之處。陶說誤爾。又有花菴蓉。即暮春抽苗者。力較微爾。(大明)

⑤河西混一之後。今方識其真形。何嘗有所謂鱗甲者。蓋菴蓉罕得。人多以金蓮根。用鹽盆製而為之。又以菴菴蓉充之。用者宜審。(朱震亨) ⑥菴蓉性滑而味重。能動大便。凡閉結不通。而虛不可攻。洗淡用三四錢。一服即效。(陳景岳)

⑦痢疾氣滯過甚。至固不爽者。重用菴蓉。輒取捷效。菴蓉滋潤滑腸。而世俗恒以為奇。不知一方中去積消滯。利水行氣。及和解之品全備。若不如滑腸之品。其滯濁何由而盡。水流則舟行。腸滑則垢去。自然之理也。(吳東陽) ⑧菴蓉滋腎。峻補精血之要藥。鎮陽功用相仿。可代菴蓉。(顧松園)

【肉殼】即香單白色者之古籍別名。典見日用本草。詳「香單」條。 ⑨即膠菴之古籍別名。典見綱目。詳「膠菴」條。

【肉餛飩草】即荷包草之古籍別

六畫 肉 臣 自

名。典見綱目拾遺。詳「荷包草」條。

【臣龜】即師系之古籍別名。典見別錄。詳「師系」條。

【自死】即麻伯之古籍別名。典見別錄。詳「麻伯」條。

【自炙】即毛萇之古籍別名。典見綱目。詳「毛萇」條。

【自然銅】 命名 本品色青黃。如銅。不從礦煉而成。故名。

古醫別名 石磁鉛。(本草綱目)

外國名詞 Kupfer

基本 係礦石類金屬。為銅之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。自然銅產廣東開平百定山。實則凡銅坑中恒有出焉。

形態 自然銅狀如苔蘚。或成片。或成塊。間為八面之結晶體。新出礦者。色若紅銅。久則面生斑爛之彩色。性極柔軟。可展薄延長。

製法 雷斅曰。採得石磁鉛。越碎。同甘草湯煮二伏時。至明漉出。攤令乾。入臼中。搗後重篩過。以醋浸一宿。至明用六一混泥瓷盒子

盛二升。文武火中養。三日夜才乾。用蓋蓋定。火煨兩伏時。去土。研如粉用。凡情事五兩。以醋兩盞為度。李時珍曰。今人只以火煨醋淬七次。研細水飛過用。

性質 辛平無毒。

效能 續筋骨。治折傷。續傷。止痛。

主治 折傷散血。止痛。破積聚。歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論自然銅曰。消瘀血。排膿。

續筋骨。治產後血邪。安心。止驚悸。以酒磨服。【明】李士材本草圖解論自然銅曰。自然銅辛平。消瘀血。

續筋骨。止痛排膿。不可多服。凡銅非煨不可用。然火金毒相煽。復挾香藥熱毒內攻。雖有接骨神功。頗多燥烈之損。務宜極酌慎用。【明】

繆希雍本草經疏論自然銅曰。自然銅味辛氣平無毒。乃入血行血。續筋接骨之神藥也。凡折傷則血瘀而作痛。辛能散瘀滯之血。破積聚之氣。則痛止而傷自和也。大明

主消瘀血排膿。續筋骨。治產後血邪。安心。止驚悸。以酒磨服者。可謂悉其用矣。寇宗奭云。有人以自然

銅飼折翅胡雁。後遂飛去。今人打撲損傷。研細水飛過。同當歸。沒藥。各半錢。以酒調服。仍以手摩痛處。即時見效。【清】黃宮繡本草求真論自然銅曰。自然銅因何用能接骨。蓋緣骨被折傷。則血瘀而作痛。得辛以散瘀破氣。則痛自止。而傷

自和也。而骨安有不接乎。且秉性堅剛。於骨頗類。故能入骨而接。是以有合乳香。沒藥。鱗蟲。五銖古錢。麻皮灰。血竭。胎骨作丸。煎膏。歸地。若續斷。牛膝。丹皮。紅花。濃湯送下。以治跌撲損傷最效。但中病即已。不可過服。以致真氣走泄耳。若產後血虛者。忌服。產銅坑中。火煨。醋淬七次。細研。【清】楊時泰本草述鈞元論自然銅曰。自然銅非火煨不可。凡諸損藥必熱。能生氣血。以接骨。此物火金相煽。燥熱愈甚。先哲云。凡刀斧跌墮。閃脫白者。初時不可便用自然銅。久後方可用之。折骨者宜便用之。若不折骨不碎。則不可用。然則茲物續筋骨。乃其所長。若非骨折骨碎。尚不須此。即宜用而輒早。猶以貽患也。

配合應用 治心氣刺痛。自

六畫 自至 芳 舌 艾

然銅火假醋洋九次。研末。醋調一字服即止。(衛生易簡方)

④治項下氣癭。自然銅貯水壺中。逐日飲食皆用此水。其癭自消。或火燒烟氣。久久吸之亦可。(直指方)

⑤治暑溼癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮五靈脂。若朮酒浸。各一兩。當歸二錢。酒浸為末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木即止。(陸氏積德堂方)

用量 一錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛有熱。及無瘵瘵者禁用。

參攷資料 ①今信州火山軍銅坑中。及石間皆有之。信州出一種如亂絲銅狀。云在銅鐵中山氣重。自然流出。亦若生銀。老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顯塊如銅而擊。重如石。醫家謂之錫石。用力薄。採無時。今南方醫者。說自然銅有兩三體。一體大如麻黍。或多方解。與錫相擬。至如斗大者。色煌煌明爛如黃金。鑲石入藥。最上一體成塊。大小不定。亦光明而

赤。一體如直錢屎之類。又有如不治而成者。形大小不定。皆出銅坑中。擊之易碎。有黃赤。有青赤。鍊之乃成銅也。其說分析頗精。而未常見似亂絲者。又云。今市人多以錫石為自然銅。燒之成青。解如硫黃者是也。此亦有二三種。一種有殼如禹餘糧。擊破其中。光明如鑑。色黃類鑛石也。一種青黃而有牆壁。成文如束針。一種碎理如團砂者。皆光明如銅。色多青白。而赤少者。燒之皆成烟燭。頃刻都盡。今醫家多誤以此為自然銅。市中所貨。往往是此。而自然銅用須火鍛。此乃畏火。不必形色。只此可辨也。(蘇頌) ②自然銅生葛州山巖間。出銅處。於坑中及石間採得。方圓不定。其色青黃如銅。(馬志) ③今辰州川澤中。出一種自然銅。形圓似蛇。含大者如胡桃。小者如粟。外有皮。黑色光潤。破之與錫石無別。但比錫石不作臭氣耳。入藥用之。殊驗。(陳承) ④自然銅世以為接骨之藥。然此等方儘多大抵宜補氣補血補胃。俗工惟在速效。迎合病人之意。而銅非煨不可用。若新出

火者。其火毒金毒相扇。挾香藥熱毒。雖有接骨之功。燥散之禍。甚於刀劍。戒之。(朱震亨) ⑤自然銅接骨之功。與銅屑同。不可誣也。但接骨之後。不可常服。即便理氣活血可爾。(李時珍)

【自然殼】即薛草之古籍別名。典見海藥。詳『薛草』條。⑥禹餘糧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『禹餘糧』條。

【至田】即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【至掌】即水蛭之古籍別名。典見別錄。詳『水蛭』條。

【芳根】即蘆根之古籍別名。典見新修本草。詳『蘆根』條。

【芳蔗】即荻蔗之別名。荻蔗係蔗之一種。性質功能。詳『甘蔗』條。

【舌香】即山柰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山柰』條。

五五四

見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【艾納香】產地 出西國。草類之一種。其狀似艾。可供藥用。性質 甘溫平無毒。

主治 去惡氣。療癩殺蟲。辟蛇。治傷寒瘧疫。脚氣腹冷。腹鳴洩痢。歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論艾納香曰。傷寒五瀉。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘧。疫。合蜂窠浴脚氣良。【唐】陳藏器本草拾遺論艾納香曰。治癩。辟蛇。

參攷資料 ①艾納香。案古樂府云。行胡從何方。列國持何來。麝麝毳毳五木香。迷迭艾納及都梁。是也。(掌禹錫) ②艾納香。廣志云。出西國。似細艾。又有松樹皮上綠衣。亦名艾納。可以合諸香。燒之。能聚其烟。青白不散。而與此不同。(馬志)

【艾菲】即艾茵細葉者之別名。性質功能。詳『茵陳』條。

【艾草】即黃香之古籍別名。典見別錄。詳『黃香』條。

【艾絨】即艾葉已經搗製可用者之處方用名。詳『艾葉』條。

【艾葉】 命名 艾可又疾，久而彌善。故字從艾。葉用其素。故名。


處方用名 艾葉、艾絨、陳艾、艾炭。

古醫別名 艾、醫草（別錄）、冰臺（爾雅）、黃草（埤雅）、艾蒿（本草綱目）、半茸、病草、灸草、吐裏屏風（和漢藥考）。

外國名詞 Artemisia vulgaris, L. Var. indica, Maxim. (拉丁)

基本 屬菊科。藥用其葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云：蘇艾江浙各省皆有。



艾 葉

形態 按艾為多年生之草本。春月生苗。高二三尺。葉互生。為長卵圓形而分裂。表面深綠色。裏面密生灰白色毛茸。秋季於梢上開淡褐色花。為筒狀花冠。作小頭狀花序排列。葉似菊葉。表面呈深綠

色。背面有毛茸。有芳香性。舊曆三五月間。採取晒乾。用手掌揉此葉。則碎成粉末。落下祇留毛茸。狀如棉花。謂之熟艾。

採取 三月或五月間採之。

製法 寇宗奭曰。凡使艾葉。須乾搗去青滓。取白入石硫黃末少許。謂之硫黃艾。灸家用之。得米粉少許。可搗為末。入服食藥用。李時珍曰。凡用艾葉。須得陳久者。治令細軟。謂之熟艾。若生艾灸火。則傷人脈。故孟子云。七年之病。求三年之艾。揀取淨葉。搗去塵屑。入石臼內。木杵搗熟。羅去渣滓。取白者。再搗。至柔爛如綿為度。用時焙燥。則灸火得力。治婦人丸散。須以熟艾。用醋煮乾。搗成餅子。烘乾再搗為末用。或以糯糊和作餅。及酒炒者。皆不佳。洪氏容齋隨筆云。艾難著力。若入白茯苓三五片同碾。即時可作細末。亦一異也。

性質 苦。微溫。無毒。

效能 溫氣血。逐寒溼。調經。安胎。止諸血。瀉腹痛。有疏解強壯之效。用作緩性通經藥。又為驅蟲解熱藥。及近用作消化不良藥。

主治 灸百病。可作煎。止吐血。下痢。下部腫痛。婦人漏血。利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令見風。

張仲景之發明 艾之一味。經張仲景之實驗。認為主治瀉下下血。

歷代記載攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論艾葉曰。搗汁服。止傷血。殺蛇蟲。【唐】蘇恭新修本草論艾葉曰。主衄血。下血。膿血。痢水。及丸散任用。【唐】甄權藥性本草論艾葉曰。止崩血。腸痔。血。損金瘡。止腹痛。安胎。苦酒作煎。治癰甚良。搗汁飲。治心腹一切冷氣。鬼氣。【宋】大明諸家本草論艾葉曰。治帶下。止霍亂轉筋。及痢後寒熱。

【元】王好古湯液本草論艾葉曰。治帶脈為病。腹脹滿。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論艾葉曰。溫中。逐冷。除溼。老人丹田氣弱。脾腹長冷者。以熟艾入布兜其臍腹。妙不可言。寒溼脚氣。亦宜以此夾入襪內。【明】繆希雍本草經疏論艾葉曰。艾葉稟天地之陽氣以生。故味苦微溫。熱則大熱。可升

可降。其氣芳烈。純陽之草也。故無毒。入足太陰厥陰少陰三經。燒則熱氣內注。通筋入骨。故灸百病。性能通竅。辟惡殺鬼。精。故止鬼擊吐血。芳烈之氣。必燥。故主下部腫痛。其治婦人漏血。利陰氣。生肌肉者。皆以之導引。涼血補血。藥為用者。也。使人有子。蓋指氣血兩虛之人。風寒乘虛入子宮。不孕者。設也。辟風寒。其性辛溫也。搗汁服。止傷血者。生寒而發辛散也。殺蛇蟲者。辛而苦也。主衄血者。傷寒邪熱。鬱而不汗。則發衄也。風邪入大腸。則下血。溼熱傷脾胃。則下痢。膿血。則上升。故亦止崩漏也。理金瘡。血熱則行也。胎為風寒之氣所犯。則不安。風寒散。則胎自安也。苦酒作煎。治癰甚良者。殺蟲之功也。治婦人帶下。溫中除溼而升也。止霍亂轉筋者。因寒而得也。為治白帶之要藥。調經之妙品。故婦人方多須之。

【清】黃宮繡本草求真論艾葉曰。艾葉辛苦性溫。其氣芳烈。純陽。故可用以取火。服之。則走肝脾與腎。能除沉寒痼冷。凡一切病。因寒溼。而見血衄崩帶。腹痛冷痢。霍亂轉

五五五

六畫 艾

筋胎動腰痛。氣鬱。經水不調。子宮虛冷。蟲動疥疥者。服之立能見效。若其陽氣將絕之候。灸之即能回陽。且能通諸經。以治百病。故古方有同阿膠以治虛病。及胎前後下血。同香附製丸。以調經血。而溫子宮。兼除心腹諸痛。同乾薑以蜜為丸。以除冷惡鬼邪諸氣。同白礬為末。以治疥疥。又以熟艾布兜。以治寒溼脚氣。及老人膀胱畏冷。用絹裹以擦風瘙癢疹。皆取辛溫則散之義。若使症非寒溼。而用是藥。燥烈以治。其失匪輕。是以膏載氣虛血熱者。禁用。取蕪州艾陳者良。揉搗如綿。謂之熟艾。灸火用婦人丸散。醋煮搗餅。再為末用。煎服生用。【清】楊時泰本草述鈞元論艾葉曰。艾葉生則微苦。大辛。熱則微辛。大苦。生溫。熟熱。純陽也。艾之用。惟宜於寒溼之血病。而燥熱之血病。正屬相反。胎漏腹痛。元陽下陷。血乃不固。是皆因虛化寒。因寒動溼之血病。夫因虛生寒。經固日氣虛者寒矣。其因寒動溼者。以陰中陽虛。氣不能化。而鬱為溼也。蓋熱之氣固就燥。寒之氣固就溼。水火之

應如此。如是等證。苟用四物而舍艾。豈中的之劑乎。若四生丸之治吐血。兼投艾葉於寒涼中。使陰血有主。而得以歸經。又治產後虛病。亦有入艾於寒涼者。總不欲傷其陰中之真陽也。古方調經多用艾與療崩漏及妊娠下血。皆合阿膠投之。以阿膠入手太陰。為氣中之陰。艾葉入肝脾腎三經。為血中之陽。有升有降。合和以調氣血。而即以固脫也。用醋煮者。亦飲而歸陰之義。故知所以用之。則此味生溫熱熱皆可奏效矣。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。溫燥。開達強壯。疏解。淨刷。為止痛之藥。輕通經閉。淨掃子宮。瘀血壅滯。利小便。治處女病。惡液腫萎黃病等。甚有效。水煎。蒸湯。腰脊陰處。亦通經閉。又和漢藥考曰。艾根為囊蕪 (Artemisia vulgaris, L.) 根。有主枝。刷三根。外面俱為褐色。有皺紋。質脆。其橫生根有葉痕。其前端變為芽。有光澤。作肉狀。有一種不快之臭味。甘辛。烈此根之經一年以上者。不適於藥用。成分為辛味軟性樹脂。揮發油。單甙糖質等。概

五五六

用治癩癩及舞蹈病。用薑五分至一錢。荷蘭藥鏡曰。於未生春葉時。取鬚根。洗去土沙。於文火上迅速烘乾。入玻璃瓶。固封貯之。舊根無效。須每年採新者用之。根為鎮痼之藥。於癩癩發作前用之。起歇無定期之症。於發作後速服。須使患者安臥。視其年齡。用根末半錢至一錢。為一服。溫啤酒少許送下。繼仍飲以溫啤酒少許。使臥床發汗。惟勿使蒙厚被。或藉爐火發汗。又勿使勞擾神思。不愈。可漸次增加。服量。若得全愈。不須久服。但有癩衝諸症者。須施防癩衝法 (刺絡下劑等) 治愈。癩衝後。乃用此藥。婦人有月經時。於通經後用之。用於頑固癩症。有迅速見效者。亦有毫不見效者。但病之未經久者。或不甚勞擾神思者。或體質等未有反常原因 (如腦之諸器官畸形。或因結石發病等) 及發歇有序者。或少女十二歲至十五歲。初有月信者。用此藥。概有效。由蟲而發之症。尤驗。年高者。及夜中發癩者。用之。少效。或反有害。或云。因神思過勞所發之呃逆。諸藥無效者。用

此根。即能見效。用作通經藥。有效。新藥百品考曰。艾根。越幾斯。係將艾根乾末。用酒精浸出。蒸散水氣。製成越幾斯者。此藥較之稱為癩癩妙藥之艾根。更為有效。又治小兒骨節脫臼。未有微衝之腹痛。疝痛。小兒及大人暴瀉。流行下利。赤利。傾向神經性之胃腸熱。嘔吐。困難。胃癩。慢性嘔吐。胃硬結。慢性頭痛。及顏面痛。萎黃病。經閉。痔血閉。癩癩等。用法。一日半錢至一錢。小兒每服一克。冷至三克。冷。用丸或乳劑。和漢藥考曰。熟艾。灸之能透諸經。治百病。惟血熱為病者。禁用。其中有曰。伊吹艾者。產近江國淺井郡。伊吹山。甚有名。此地之艾。非真艾。乃蕪蒿葉。背白毛最多。故名。五月採取。曬乾。民間治癩。除作灸治外。其用尚多。如治赤白下痢。或瀉瀉。或心腹痛。及痔血。用艾一錢。生薑三分。醋水各半。煎一杯。服。衄血。煎艾服之。中風。口噤。神思恍惚。手足麻痺。或腹中痛。或鼻絕。或息出。用艾一錢。水碗半。煎一碗。服。傷寒。熱強。用艾三錢。水三碗。煎一碗。服。中寒氣。手足受凍。腹痛。

用艾五錢。浸赤小豆湯。置入脐中。佳。吐痰狀如水。用艾一錢煎服。吐血煎艾服。大便前後下血。用艾生煎等分。水煎服。佳。出面上諸瘡。取艾二錢。用醋煎成濃汁。點之。佳。面上生疣。用艾灸三壯。佳。鹵用。用艾燒艾。以口先吸後吐。佳。懷孕中下血不止。取艾用酒煎飲之。佳。產後瘀血不下。用艾二錢。生薑二錢。水煎飲。佳。小兒疳症。嗜食一切。絕無停歇。大小便如水。泄。精神不振。用艾五分。水一碗。煎半碗服。吐逆。用艾一錢。水煎服。和漢藥考曰。本朝醫誌曰。艾以東國產者為上。近江伊吹艾之見稱於世。為永祿以來事。其時有外國耶教徒來行醫。得信長伊吹山五十町四方園地。由其本國取藥草。本三十餘種。植之。而艾亦在其中。遂遺留至今云。女同方言曰。東國舍筆記云。三河國寶飯郡水泉村。農人滿平。度長七。年生於該村。寬政八年。年一百九十四歲。云於享保年間受慶賀。被徵至江府。獻白髮。賜御米若干。今丙辰年復至。如享保故事。或問滿平。何術致長生。答言無他妙法。

惟我家自祖先相傳。灸三里。其灸法。每月自朔日。灸至八日而止。年中逐月無間。灸數不同。即如下。【右】朔（八壯）二日（九壯）三日（十一壯）四日（十一壯）五日（九壯）六日（九壯）七日（八壯）八日（八壯）【左】朔（九壯）二日（十一壯）三日（十一壯）四日（十一壯）五日（十壯）六日（九壯）七日（九壯）八日（八壯）（灸一灼。謂之一壯。義為使人壯健云。）

近人學說 ●閔丘陞曰。艾葉生微苦大辛。熟微辛大苦。生溫熱熱無毒。其氣芳烈。純陽之草也。可升可降。入足太陰少陰經。苦酒香附為使。可以取太陽真辛。可以回垂絕元陽。服之則走三陰而逐一切寒溼。轉肅殺之氣為融和。灸之則透諸經而治百種病邪。起沉痾之人為康泰。故本草以灸百病。取其熱氣內注。通筋入骨也。止鬼擊吐血。取治辟惡殺鬼精神也。主下部瘡。取其芳烈之氣燥也。其治婦人瀰血。利陰氣。生肌肉者。皆以之導引。涼血補血藥為用也。使人有子。蓋指氣血兩虛之人。風寒乘虛入子宮者也。搗汁服。止傷血者。生寒而兼辛散也。殺蚊蟲者。辛而苦也。主婦血者。傷寒邪熱。鬱而不汗。則發熱也。風邪入大腸。則不血。溼熱傷腸胃。則下痢。膿血。則上升。故不止萌也。理金瘡者。血熱則行也。胎為風寒之氣。則不安。風寒散則胎自安。苦酒作煎。治癩大良。者。殺蟲之功也。治婦人帶下。溫中陰溼而升也。止霍亂者。因寒而得也。約而論之。總為治白帶之要藥。調經血之妙品。故婦人方需之。然其性燥而烈。苦。婦人胎動不安。由於熱而不由於寒。妊娠下利。膿血。由於暑溼。腸胃熱甚。而非單溫為病。崩中由於血虛。內熱經事先期。由於血熱。吐血不由於鬼擊。中風霍亂。轉筋不由於寒邪。而由於肝胃虛弱。飲食停滯。或傷暑所致。不孕由於血虛。而不由於血虛。而不由於風寒入子宮者。並忌用之。張山雷曰。艾性純陽。可以取太陽真火。可以回垂絕元陽。入藥以駢州產者為上。古人灸法。本無一症不可治。艾之大有用。惟此最多。故

別錄以冠主治之首。其作煎以下。則湯液之治療也。止吐血者。宜生用。取其辛閉以疏經絡之壅。然溫升之性。必與上溢之症不合。古人有四生丸之制。以柏葉衛葉生地之清。瀉下降者為主。而反佐以艾葉之辛溫。欲其同氣相求。易於膠應。非艾之一味。可以止上升之吐衄也。其治下利。則以寒溼瀉瀉。而胃吐溫升舉。固其所宜。下部腫痛。則溼熱生蟲之恙。苦溫燥溼。又能殺蟲。是其專職。婦人下血。則中氣虛寒。下焦無攝納之權。以致血行失道。無故妄下。金匱膠艾湯。溫經升舉。固陰和陽。是其正治。非血熱妄行之下血也。生肌肉者。虛羸之人。血少形羸。得此以溫養之。則血氣旺而肌自豐。亦有潰瘍氣血兩虛。陽和不運。則新肌不長。艾能溫煦以利脈絡。而肌肉易長。若熱多燥液者。非其治也。辟風寒者。固溫和煖依之所長。使人有子。則即芎歸膠艾湯之專功。蓋古者最多虛寒之體。觀千金求嗣門中。多主溫養。其義可知。然在今日。則又血虛內熱。癰瘡消瘦者。比比而是。若誤

六畫 艾

六 薑 艾

讀別錄生肌有子之說。而不分涇渭。謂附古書其害亦不可勝數矣。
配合應用 ①治傷寒時氣。溫疫頭痛。壯熱脈盛。以乾艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服取汗。(肘後方)

②治姙娠傷寒。壯熱赤斑。變為黑斑。瀉血。用艾葉如雞子大。酒三升。煮二升半。分爲二服。(傷寒類要方)

③治中風口喎。以葉筒長五寸。一頭刺入耳內。四面以麵密封。不透風。一頭以艾灸之。七壯。患右灸左。患左灸右。(勝金方)

④治中風口噤。熱艾灸承漿一穴。頰車二穴。各五壯。(千金方)

⑤治中風擊痛。不仁不隨。並以乾艾斛許。揉團。結瓦飯中。並下塞諸孔。獨留一目。以痛處著。飯目而燒艾。薰之一時。卽知矣。(肘後方)

⑥治舌縮口噤。以生艾搗傳之。乾艾浸溼亦可。(聖濟總錄方)

⑦治癩癩諸風。熱艾於陰囊下。殺道正門當中。隨年歲數灸之。(斗門方)

⑧治鬼擊中惡。卒然着人。如刀刺狀。胸膈腹內疴刺。切痛不可按。或卽吐血。鼻中出血。下血。一名鬼排。以熱艾如雞子大三枚。水五升。煎二升。頓服。(肘後方)

⑨治小兒疳風。撮口。艾葉燒灰。填臍中。以帛縛定。或隔蒜灸之。候口中有艾氣。立愈。(簡便方)

⑩治狐惑蟲。病人齒無色。舌上白。或喜睡。不知痛痒處。或下痢。宜急治下部。不曉此者。但攻其土。而下部生蟲。食肛爛。見五臟便死。也。燒艾於管中。薰下部。令烟入。或少加雄黃更妙。罌中燒烟。薰之亦可。(肘後方)

⑪治頭風久痛。蕪艾揉爲丸。時時嗅之。以黃水出爲度。(青囊雜纂方)

⑫治頭風面瘡。痒出黃水。艾二兩。醋一升。砂鍋煎取汁。每薄紙上貼之一日。二三上。(御藥院方)

⑬治心腹惡氣。艾葉搗汁飲之。(藥性論方)

⑭治脾胃冷痛。白艾末煎湯服二錢。(衛生易簡方)

⑮治蚊蟲心痛如刺。口吐清水。白熱艾一升。水三升。煮一升。服吐蟲出。或取生艾搗汁。五更食香脯一片。乃飲一升。當下蟲出。(肘後方)

⑯治口吐清水。乾蕪艾煎湯服之。(怪症奇方)

⑰治霍亂吐下不止。以艾一把。水三升。煮一升。頓服。(外臺祕要方)

⑱老小白痢。艾豉丸。用陳北艾四兩。乾薑炮三兩。爲末。醋煮。倉米糊丸。梧子大。每服七十丸。空心米飲下。其有奇效。屢試皆驗。(永類鈴方)

⑲治諸痢久下。艾葉、陳皮等分。煎湯服之。亦可爲末。酒煮。爛飯和丸。每鹽湯下二三十丸。(聖濟總錄方)

⑳治暴泄不止。陳艾一把。生薑一塊。水煎熱服。(生金方)

㉑治葉後下血。艾葉、生薑煎濃汁。服三合。(千金方)

㉒治野雞痔病。先以槐柳湯洗。過。以艾灸上七壯。取效。郎中王及乘。驟入西川。數日病瘳。大作。如胡瓜。貫於腸頭。其熱如火。忽至。僣仆。無計。有主。郵云。須灸卽瘳。乃用上法。灸三五壯。忽覺一道熱氣入腸中。因大轉瀉。血穢併出。瀉後。遂失。胡瓜所在矣。(經驗良方)

五 五 八

⑳治姙娠下血。張仲景曰。婦人有漏下者。有半產後下血不絕者。有姙娠下血者。並宜膠艾湯主之。阿膠二兩。艾葉三兩。芍藥甘草各二兩。當歸地黃各三兩。芍藥四兩。水五升。清酒五升。煮取三升。乃納膠令消盡。每服溫酒一升。日三服。(金匱方)

㉑治姙娠胎動。或腹痛。或搶心。或下血不止。或倒產。子死腹中。艾葉一雞子大。酒四升。煮二升。分二服。(肘後方)

㉒治胎動迫心作痛。艾葉如雞子大。以頭醋四升。煎二升。分溫服。(子母祕錄方)

㉓治婦人崩中。連日不止。熱艾如雞子大。阿膠炒爲末。半兩。乾薑一錢。水五盞。先煮艾。覆至二盞。半。傾出入膠。烱化。分三服。一日服盡。

㉔治野雞痔病。先以槐柳湯洗。過。以艾灸上七壯。取效。郎中王及乘。驟入西川。數日病瘳。大作。如胡瓜。貫於腸頭。其熱如火。忽至。僣仆。無計。有主。郵云。須灸卽瘳。乃用上法。灸三五壯。忽覺一道熱氣入腸中。因大轉瀉。血穢併出。瀉後。遂失。胡瓜所在矣。(經驗良方)

(初虞世古今錄驗方)

治產後瀉血不止。乾艾葉半兩。炙熟。老生薑半兩。濃煎湯。一服立愈。(孟詵方)

治產後腹痛欲死。因感寒起者。陳薪艾二斤。焙乾。搗鋪臍上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則寒氣亦從艾氣而出。腹中之痛亦自然而止。其功不可輕視。(楊誠經驗方)

治忽然吐血一二口。或心忪。或內崩。熱艾三國。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服二錢。(千金方)

治鼻血不止。艾灰吹之。亦可。以艾葉煎服。(聖惠方)

治盜汗不止。熟艾二錢。白茯苓三錢。烏梅三個。水一鐘。煎八分。隨臥溫服。(通妙真人方)

治火眼腫痛。以艾燒烟。用盞覆之。俟烟盡。將盞上煤刮下。以溫水調化。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。(斗門方)

治面上疥瘡。艾灰桑灰各三升。以水淋汁。再淋至三遍。以五色布結於中。同煎。令可丸時。每以少許傳之。自爛脫甚妙。(外臺秘要)

方)

治婦人面瘡。名粉花瘡。以定粉五錢。菜子油調泥。盆內用艾一團。候烟熏之。喉烟盡。覆地上一夜。取出調搽。永無癩痕。亦良生肉。(談楚翁試驗方)

治身面疔目。艾火灸三壯即除。(聖惠方)

治鵝掌風病。薪艾真者四五兩。水四五盞。煮六七滾。入大口瓶內。盛之用麻布二層縛之。將手心放瓶上。熏之。如冷再熱。如神。(陸氏積德堂方)

治疥疥瘡。熟薪艾一兩。木然子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。為末。揉入艾中。分四條。每以一條安陰陽瓦中。置被裏。煖後服。通聖散。(醫方摘要)

治小兒疳瘡。艾葉一兩。水一升。煮取四合服。(備急方)

治小兒爛瘡。艾葉燒灰傳之。良。(子母秘錄方)

治瘰癧口冷不合。瘡熱艾烟熏之。(經驗方)

治白癩風瘡。乾艾隨多少。以浸麴醪酒如常法日飲之。覺瘳即瘳。(肘後方)

(肘後方)

治疔瘡腫毒。艾蒿一擔。燒灰於竹筒中。淋取汁。以一二合和石灰如糊。先以針刺瘡至痛。乃點藥三遍。其根自拔。玉山韓光。以此治人神驗。真觀初。衛州徐使君訪得此方。予用治三十餘人。得效。(千金方)

治發背初起未成。及諸熱腫。以選紙搗上。先乾處是頭。著艾灸之。不論壯數。痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。乃至其毒即散。不散亦免內攻。真神方也。(兵部手集方)

治癰疽不合。瘡口冷滯。以北艾煎湯洗後。自膠熏之。(直指方)

治咽喉骨哽。用生艾蒿數升。水酒共一斗。煮四升。細細飲之。當下。(外臺秘要方)

治誤吞銅錢。艾蒿一把。水五升。煎一升。頓服便下。(饒中方)

治諸蟲蛇傷。艾灸數壯甚良。(集簡方)

治風蟲牙痛。化蠟少許。攤紙上。鋪艾。以筋卷成筒。燒烟。隨左右熏鼻。及烟令使滿口呵氣。即疼止痛消。斬季謙病此月餘。一試即愈。

(普濟方)

用量 一錢至二錢。施用宜忌 凡陰虛血熱者禁用。苦酒香附為之使。參攷資料 近世有單服艾者。或用蒸木瓜和丸。或作湯。空腹飲。甚補虛羸。然亦有毒。發則熱氣衝上。狂燥不能禁。至攻眼有瘡出血者。誠不可妄服也。(蘇頌) 處處有之。以復道及四明者為佳。云此種灸百病尤勝。初生布地。生苗莖類蒿葉。背白。以苗短者為良。三月三日五月五日採葉曝乾。陳久方可用。(蘇頌) 王安石字說云。艾可又疾。久而彌善。故字從久。陸佃埤雅云。博物志言。削冰令圓。舉而向日。以了承其影。則得火。則艾名冰莖。其以此乎。醫家用灸百病。故曰灸草。一灼謂之一壯。以壯人為法也。(李時珍) 艾葉本草不著土產。但云生田野。宋時以湯陰復道者為佳。四明者。近代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。自成化以來。則以蕪州者為勝。用充方物。天下重之。謂之蕪艾。相傳他處艾。灸酒壘不能透。蕪艾一

五五九

六畫 艾血

灸。則直透微為異也。此草多生山原。二月宿根生苗成叢。其莖直生。白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分為五尖。極上復有小尖。面背背白。有茸而柔厚。七八月葉間出穗。如車前穗。細花。結實纒纒。盈枝中有細子。霜後始枯。皆以五月五日連莖刈去。曝乾。收葉。先君月池子諱官陶。著著艾傳一卷。有讚云。產於山陽。採以端午。治病灸疾。功非小補。又宗懷荆楚歲時記云。五月五日雞未鳴時。採艾似人形者。撻而取之。收以灸病甚驗。是日採艾為人懸於戶上。可禱毒氣。其莖乾之。藥麻油引火點灸。柱滋潤灸。瘡至愈不疼。亦可代著葉及作燭心。(李時珍)艾性純陽。故可以取太陽真火。可以回垂絕元陽。服之則走肝脾腎三陰。而逐一切寒濕。轉肅殺之氣為融和。生用則性溫。炒熱則大熱。用以灸火。則透諸經。而治百病。蘇頌言其有毒誤矣。(張石頑)

【艾實】 性質 苦辛。暖。無毒。主治 明目。療一切鬼氣。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論艾實曰。壯陽。助水。臟腰膝及暖子宮。

參攷資料 艾子和乾薑等分為末。蜜丸。梧子大。空心。每服三丸。以飯三五匙。壓之日。再服。治百惡氣。(孟詵)

【艾蒿】 即艾葉之古籍別名。與見綱目。詳「艾葉」條。

【血丹參】 即丹參之處方用名。詳「丹參」條。

【血片】 即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。

【血包】 即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。

【血石】 產於西班牙及德國之鐵坑中。

形體 為堅重有稜之塊。色深褐。無光澤。而有微黑色之條紋。其破碎面。則現朱色。鮮明之束針狀。研末。則呈血紅色。此石之類種極多。成分 乃代諸石之一種也。中

含養化鐵及土質。效能 為止血收斂藥。

國外學說 遠西名物考曰。性收斂。乾燥。凡失血吐血。用此立止。治白帶。下瀉。萎黃病。經閉。功效與鐵屑同。宜研為極細之末。用蠶自一分半至一錢。以適宜之飲液點服為佳。燒酒浸服。功能止一切血症。如吐血。血尿。咯血。衄血等。俱有效。外敷藥。以血石細末。和肉豆蔻油。少許。研極勻。塗敷潰瘍。或創面。候乾。自愈。

【血見愁】 即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草根」條。

【地錦草】 即望江青之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「望江青」條。

【骨】 即無骨草之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「無骨草」條。

【夏枯草】 即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【紅絲線】 即紅絲線之別名。詳「紅絲線」條。

【血珀】 即琥珀之處方用名。詳「珀琥」條。

【血風草】 即地錦草之古籍別名。典見綱目。詳「地錦草」條。

五六〇

【血切】 即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「血竭」條。

【血師】 即代諸石之古籍別名。典見別錄。詳「代諸石」條。

【血參】 即人參之古籍別名。典見別錄。詳「人參」條。

【血結】 即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「血竭」條。

【血竭】 原名 麒麟竭。故名。本品形如乾血。故名。為血藥之聖。又名麒麟。麒麟者。隱名也。

古籍別名 血結。血切。滿菓。麒麟。血獸。麟竭。海脂。石。爪兒血。(和漢藥考)

外國名詞 Sanguis draconis, Resina Draconis (拉丁)

Drachonblut, (德) Dragonsblood, (英)

基本 此實一種樹脂也。其樹即名麒麟血樹。樹上所結之果實。自然滴出樹脂。謂之血竭。或鐵刺樹幹。亦有樹脂滲出。凝乾用之。

產地 陳仁山藥物生處辨云。血竭產自荷蘭州府。由石叻運來。係用沙藤花熬成也。和漢藥考曰。

係用沙藤花熬成也。和漢藥考曰。

產亞非兩洲及美洲之熱帶地方。形態 上品為正圓形或長圓形之塊。大如榛子或胡桃。比重約一。二。外現暗紅褐色。有光澤。質鬆脆。破碎面呈不透明之紅色。研為末。色如磁砂。無臭味。投入火中。則烟煙上騰而燃燒。放松枝之臭。水不溶解。酒精及亞兒加里液。能溶解之。

種類 ①淚痕麒麟血。為小如豌豆。大若胡桃之圓塊。②桿狀麒麟血。作桿狀。長三特西米突。至五特西米突。皆包以樹葉。③餅狀麒麟血。作糕餅狀。長三四特西米突。廣一。五特西米突。亦包以樹葉。④板狀麒麟血。為方形或細小之板狀。

採取 採取血場有數法。其得自質中者。磁皿中注水一半。皿中蓋銅鐵絲網。實置網上。架皿火上。熱以水蒸氣。則血紅色之樹脂。自然積滲出。成小圓塊。即取該樹葉包裹。候其自乾。一法。取子搗爛。納布袋中。脂亦流出。為小圓塊。或投質水中同煮。俟樹脂溶出。即放冷成塊。或為餅狀。亦以葉包裹。

六畫 血

使凝結更堅。其得自樹幹者。或夏日採取自然滲出之樹脂。或鑽刻樹皮。俟樹脂滲出。亦皆以葉包裹。尤為簡易。

製法 雷獸曰。凡使血場。先研作粉篩過。入丸散中用。若同藥藥搗。則化作灰飛也。

性質 甘。鹹。平。無毒。

效能 和血。散瘀。斂瘡。定痛。為收斂及止血藥。用於下痢。或衰弱性盜汗等。他如製造牙粉。硬膏等。則加入少許。令作紅色。以求美觀。

主治 心腹卒痛。金瘡血出。破積血。止痛生肉。去五臟邪氣。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論血場曰。傷折打損。一切疼痛。血氣攪刺。內傷。血聚。袖虛。並宜酒服。【宋】大明日華諸家本草論血場曰。傳一切惡瘡。疥癬。久不合。性急。不可多使。卻引膿。【元】王好古湯液本草論血場曰。補心包絡。肝血不足。【明】李時珍本草綱目論血場曰。散滯血。諸痛。婦人血氣。小兒瘰癧。【明】繆希雍本草經疏論血場曰。麒麟場味甘。鹹。氣平。無毒。丹房鏡源云。夏於焚惑之氣。

生於湯石之陰。其色赤。象火而味鹹。則得陰氣也。入足厥陰。手少陰經。甘主補。鹹主消。散瘀血。生新血之要藥。故主破積血。金瘡。止痛。生肉。主五臟邪氣者。即邪熱氣也。帶下者。溼熱傷血。分所致也。甘鹹能涼血除熱。故悉主之。蘇恭主心腹卒痛。李珣以之治傷折打損。一切疼痛。血氣攪刺。內傷。血聚者。誠為此耳。此藥產外國。極難得真者。

理傷折有奪命之功。【清】黃宮繡本草求真論血場曰。血場係南番樹木之液。猶人之膏脂者是。謂甘而鹹。性平。色赤。按五味惟甘主補。鹹主消。血場味甘。雖能和血。收口止痛生肌。然味鹹則消。卻能引膿。性滲入肝經。血分破瘀。故凡跌撲損傷。氣血攪刺。內傷。血聚。並宜同酒調服。通氣。乳香沒藥。雖主血病。而亦兼入血分。此則滲入血分。而不兼入氣分者也。但性最急。切引膿甚利。不可多服。凡血病無積瘀者。不必用之。以染透甲指。燒灰。不變色者佳。藥肆偽造甚多。真者絕少。同藥藥搗用。得蜜陀僧良。國外學說 和漢藥考曰。可得

血場之麒麟血樹。有數種。多生於東印度地方。屬棕櫚科。名 *Ceryle* *Pottery* *L.* 為莖葉植物。幹粗二寸。覆以葉鞘。性柔撓。遍生尖刺。其幹纏繞他樹。葉為羽狀複葉。其小葉則作披針形。周緣有硬毛。花為黃白色之冠狀花。實圓如球。質硬。帶黃褐色之鱗片。其下滲出血紅色之樹脂。即血場也。又有一種。屬百合科。名 *Dracones*

Drao. L. 多產於非洲之坎那利島。是為喬木。樹頂分枝八九枝。各枝又一一分枝。特若華蓋。葉生於各枝之梢端。作長披針形。葉脊突隆。遍生硬刺。花則開於枝端。其瓣有六。結實淡黃。大如櫻實。撥簾若葡萄。試鑽刻此樹之皮。即有樹脂滲出。所謂血場是也。更有一種。為荳科植物。名 *Pokrocapus* *Drao. L.* 產於美洲及西印度。則皆自其質中滲出血紅色之樹脂。亦名血場。採得後。裝而售諸藥肆。荷蘭藥鏡曰。佳收滴乾。為止血之峻藥。內服治劇烈脫血。下血。吐血。及虛脫下瀉等。加枯礬。即為收清之峻劑。能使稀涼之血液。壓

六畫 血

凝而變稠黏。以治諸脫泄過多及婦人崩漏下血等。俱有速效。但亦祇可用於亡血過多虛脫之症。若在壯實多血者。則當先行刺絡。或投下劑。無效而後用之。然終不如用下方之尤妙。方係血竭末一錢。枯礬末三錢。糖漿適宜調和。以二分製一丸。早晚共服五丸。劇症半時服一丸至二丸。是名收斂攝血丸。血竭收斂之效。雖甚偉大。然晚近醫家。多不用血竭。而以阿仙藥與吉納樹膠等代之。尤為佳良。外敷。能使創傷潰瘍等。結痂治愈。入牙粉刷齒。能令齒牙堅固不搖。和漢藥考曰。往時藥肆分別血竭之品類。其小圓塊呼小棕樣。其黏有汚物而如餅之大塊。則呼槐樣。定為下品。今將手板發蒙。日用藥品考及本草紀開所載血竭之品類。摘錄如下。棕樣有大小二種。皆包以棕櫚樣之葉。大棕長一尺。寬寸許。小棕長一寸。寬六七分許。俱黑色。有光澤。為末則作深紅色。此上品也。別有呼長棕者。血竭既包樹葉。葉外更纏以藤。此中品也。並無樹葉包裹。但作二寸見方之餅塊。

者。呼曰盤樣。從前輸入者皆下品。近今輸入者為上。

辨偽 ①鄭肖巖曰。血竭一名騏驎竭。甘鹹平。色赤。專入血分。散瘀生新。止痛生肌。善收瘡口。南越志云。騏驎竭是紫錫樹之脂也。出南番。欲驗真偽。但嚼之不爛如蠟者為上。磨之色透指甲者方真。今有以海姆血偽充者。味大鹹。有腥氣。不堪入藥。須明辨之。毋為所誤。 ②曹炳章曰。按蘇恭曰。騏驎竭樹名渴留。紫錫樹名渴菓。二物大同小異。馬志曰。二物同條。功效亦別。紫錫色赤而黑。其葉大如盤。錫從葉上出。炳章按紫錫俗名紫草。茸乃此樹上蟲所造成。故綱目列入蟲部。騏驎竭色黃而赤。從木中出。如松脂。頌曰。今南番諸國及廣州皆出。木高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃。而有三角。其樹脂從木中流下。滴下似膠。粘狀。久而堅凝。乃成竭。色作赤色。採無時。舊說與紫錫相類。而別是一物。功力亦殊。一統志云。血竭樹略似沒藥樹。其肌赤色。採法亦於樹下掘坎。斧伐其樹。脂流於坎。旬日取之。多出大食。

國。考諸家辨正。血竭確別有一物。惟南越志言是紫錫之脂。或亦傳訛之辭。總之血竭色要鮮紅。有光質體要鬆。試之以透指甲者為真。以火燒之。有赤汗涌出。入紙無跡。舉久而灰不變本色者為騏驎竭。最佳。色紫黑質堅。外竹箬包裹者為鞭竭。略次。偽者以松香火漆做。成入火滴紙有跡。宜辨之。

配合應用 ①治一切打撲損傷。用血竭、乳香、沒藥、自然銅、麻皮、灰、狗脛骨、煨存性、鹿蟲、黃荊子、骨碎補。 ②搽一切金瘡及腫毒。生肌止痛。用血竭、髮灰、乳香、沒藥、片腦、輕粉、象牙末、紅粉、霜為細末。敷之。 ③治金瘡出血。騏驎竭末傳之。(廣利方) ④治產後血衝心胸。喘滿。命在須臾。用血竭、沒藥各一錢。研。童便和酒調服。(醫林集要方) ⑤收斂瘡口。血竭末一字。龍腦少許。大棗燒灰半錢。同研。津調塗之。(究原方) ⑥治腹中血塊。血竭、沒藥各一兩。滑石、牡丹皮各一兩。同煮過。

五六二

末。醋糊丸。梧子大。空心服之。(摘玄方) ⑦治散甲疼痛。血竭末調傳之。(醫林集要方)

⑧治白虎風痛走注。兩膝熱腫。用騏驎竭、硫黃末各一兩。每溫酒服一錢。(聖惠方) ⑨治新久腳氣。血竭、乳香等分。同研。以木瓜一箇。剉孔。入藥在內。以麪厚裹。砂鍋煮爛。連麪搗丸。梧子大。每溫酒服三十丸。忌一切生冷。(奇效方) ⑩治慢驚癇。安魂定魂。益氣。用血竭半兩。乳香二錢半。同搗成劑。火炙溶丸。梧子大。每服一丸。薄荷煎湯化下。夏月用人參湯。(御藥院方) ⑪治鼻出衄血。血竭、蒲黃等分為末吹之。(醫林集要方) ⑫治血痔腸風。血竭研末傳之。(直指方) ⑬治產後血暈不知人。及狂語。用騏驎竭一兩。研末。每服二錢。溫酒調下。(太平聖惠方) ⑭治膿瘡不合。血竭末傳之。以乾為度。(濟急仙方)

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡無瘰癧者禁用。

參攷資料 按南越志云。駝

駝場是紫樹之脂也。欲驗其偽。但嚼之不爛如蠟者爲上。(李珣)

●今南番諸國及廣州皆出之。木

高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃而作

三角。其脂液從木中流出。滴下如

膠飴狀。久而堅凝乃成。場赤作血

色。採無時。舊說與紫餅大都相類。

而別是一物。功力亦殊。(蘇頌)●

駝駝場是樹脂。紫餅是蟲造。按一

統志云。血場樹。略如沒藥樹。其肌

赤色。採法亦於樹下掘坎。斧伐其

樹。脂流於坎。旬日取之。多出大食

諸國。今人試之。以透指甲者爲真。

獨孤酒丹房鑑源云。此物出於西

湖。稟焚惑之氣而結。以火燒之。有

赤汁滴出。久而灰不變本色者爲

真也。(李時珍)

【血燕】即燕窩之別名。詳『燕

窩』條。

【血餘】即血餘炭之古籍別名。與

見綱目。詳『血餘炭』條。

【血餘炭】

原名 亂髮灰。
命名 本品係用梳

六畫 血

櫛下亂髮火煨而成。以髮爲血之

餘氣。故名。

古籍別名 血餘。人退。(本草

綱目)

外國名詞 *Pointe hair* (英)

製法 取梳下之髮。用皂莢煎

湯。洗淨。晒乾。入礮燒焦。但以年久

落髮爲最佳。

性質 苦。微溫。無毒。

效能 止血。和血。用爲淋病及

大小便不通藥。又作止血藥。

主治 咳嗽五淋。大小便不通。

小兒驚癇。止血鼻衄。燒灰吹之立

已。

張仲景之發明 ●豬膏髮煎。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論亂髮曰。燒灰。療轉胞。小

便不通。赤白痢。噎噎。腫。狐尿。刺

尸疰。疔腫。骨疽。雜疔。【元】朱丹溪

本草衍義補遺論亂髮曰。消瘀血。

補陰甚捷。【清】黃宮繡本草求真

論亂髮灰曰。血餘味苦微溫。據書

載能補腎壯氣。然總不如地茶參

者。爲補精補氣之最耳。又載功能

療驚癇。理咳嗽。固崩帶。止血。草血

痢血淋。舌血鼻血。暨轉胞不通。及

塗瘡疥。入膏敷毒。治皆有效。然總

皆屬通關開竅。涼血散瘀。生新之

品。若皆虛用之。多有吐瀉之弊。皂

炭洗煨用。

辨僞 ●鄭肖巖曰。血餘灰本

經列於中品。氣味苦溫無毒。主治

五癆。關格不通。利小便。水道。療小

兒驚。大人淫。仍自還神化。本草崇

原云。凡吐血衄血之症。皆宜用血

餘。當用髮髮近於頭皮之髮。剃下。

短髮尤佳。或用亂髮亦可。以皂莢

水洗淨。入瓶內固濟。煨灰存性。方

合經旨。近市肆有一種假餘灰。不

知何種獸毛所煨。色暗味臭。萬不

可用。若重症服之。誤人匪淺。噫。至

便之藥。亦有假充。爲醫者能不寒

心束手乎。●炳炳章曰。按古人造

血餘法。臘月取雞下短髮。以皂莢

水洗去泥垢。入鹽均鹽泥封固。外

用膠糠火煨一晝夜。俟冷取出。用

近時以兩鐵篋相合。亦用鹽泥封

口。用桑柴火上煨。時放米數十

粒。俟米焦熄火。候冷透開取。則血

餘黑亮鬆脆。其實輕無臭氣。若煨

若走氣則變灰無用矣。近時味利

者。以人髮一吡。再夾細石砂一吡。

煨如前法。形色亦光黑而亮。惟質

甚重。不如純血餘之輕也。

配合應用 ●治孩于熱瘡。亂

髮一團。如梨子大。雞子黃十箇。煮

熟。同於銚子內熬至甚乾。始有液

出。旋置盞中。液盡爲度。用傅瘡上。

即以苦參粉粉之神妙。(劉禹錫

傳信方)

●治小兒斑疹。髮灰飲服三錢。

(子母秘錄方)

●治小兒斷脾。即用清油調髮

灰傅之。不可傷水。脾溼不乾。亦傅

之。

●治小兒重舌欲死者。以亂髮

灰半錢。調傅舌下。不住用之。(簡

要濟衆方)

●治小兒燕口。兩角生疔。髮灰

三錢。飲汁服。(子母秘錄方)

●治小兒吻瘡。髮灰和豬脂塗

之。(聖惠方)

●治小兒驚啼。亂油髮燒研。乳

汁或酒服少許良。(千金方)

●治鼻血眩冒欲死者。亂髮燒

五六三

六畫 血

①治鼻血不止。血餘燒灰。吹之立止。永久不發。男用母髮。女用父髮。又方。用亂髮灰一錢。人中白五分。麝香少許。為末。噴鼻。名三奇散。(聖惠方)

②治肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白湯一錢。調服。(三因方)

③治咳嗽有血。小兒胎髮灰。入麝香少許。酒下。每箇作一服。男用女。女用男。(采氏集驗方)

④治齒縫出血。頭髮切入鉢內。炒存性。研搽之。(華陀中藏經)

⑤治肌膚出血。胎髮燒灰。傅之。即止。或吹入鼻中。(證治要訣方)

⑥治諸竅出血。頭髮。敗椹。陳蓮蓬。並燒灰等分。每服三錢。木香湯下。(聖惠方)

⑦治無故遺血。亂髮及爪甲燒灰。酒服方寸匕。(千金方)

⑧治小便尿血。髮灰二錢。醋湯服。(永類鈴方)

⑨治血淋苦痛。亂髮燒存性二錢。入麝香少許。米飲服。(聖惠方)

⑩治大便瀉血。血餘半兩。燒灰。雞冠花柏葉各一兩。為末。臥時酒服二錢。來早以溫酒一盞投之一

服見效。(普濟方)

⑪治女人漏血。亂髮洗淨。燒研。空心溫酒服一錢。(婦人良方)

⑫治月水不通。童男童女髮。各三兩。燒灰。斑蝥二十一枚。糯米炒黃。麝香一錢。為末。每服一錢。食前熱酒下。(普濟方)

⑬治婦人陰吹。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。宜豬膏髮煎導之。用豬膏半斤。亂髮雞子大三枚。和煎髮消藥成矣。分再服。病從小便中出也。(仲景方)

⑭治女勞黃疸。因大熱大勞。交接後入水所致。身目俱黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。用膏髮煎治之。即上方(肘後方)

⑮治黃疸尿赤。亂髮灰水服一錢。日三次。祕方也。(肘後方)

⑯治乾霍亂病。服滿煩躁。亂髮一團。燒灰。鹽湯二升。和服。取吐。十便良方)

⑰治尸疰中惡。用亂髮如雞子大。燒研水服。又一方。用亂髮灰半兩。杏仁半兩。去皮尖。研煉蜜丸。梧子大。每溫酒日下二三十丸。(子方) (普濟方)

⑱治破傷中風。亂髮如雞子大。無油器中熬焦。研以好酒一盞。沃之。入何首烏末二錢。灌之。少頃再灌。亦治沐髮中風。(本草衍義方)

⑲令髮長黑。亂髮洗晒。油煎焦枯。研末。擦髮良。(聖惠方)

⑳治擦落耳鼻。頭髮瓶盛。泥固。暇過。研末。以擦落耳鼻。乘熱。亂髮灰。殺定。輾帛縛住。勿令動。自生合也。(經驗良方)

㉑治聾耳出膿。亂髮裹杏仁末。塞之。(聖惠方)

㉒治吞髮在咽。取自己亂髮燒灰。水服一錢。(延陵至寶方)

㉓治蜈蚣咬。頭髮燒烟熏之。

㉔治疔腫惡瘡。亂髮鼠屎等分。燒灰。針入瘡內。大良。(聖惠方)

㉕治瘡口不合。亂髮。露蜂房。蛇蛻皮。各燒存性一錢。用溫酒食前調服。神妙。(蘇沈良方)

㉖治下疳溼瘡。髮灰一錢。棗核七箇。燒研洗貼。(心鑑方)

㉗治大風癩瘡。用新竹筒十箇。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿。於筒口。火盆內。煨之。長汁滴出。以塗

五六四

承接。翎掃瘡上。數日即愈。亦治諸疔。(邵真人經驗方)

用鹽一錢。半至三錢。

著名方劑 ①滑石白魚散。主小便不利。(金匱方) 用滑石二分。亂髮二分(燒) 白魚二分。杵為散。飲服半錢。日三服。②豬膏髮煎。諸黃主之。及治女子陰吹。(金匱方) 用豬膏半斤。亂髮如鷄子大三枚。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

參攷資料 ①俗中媪母為小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。雜雞子黃熬。良久得汁。與兒服。去痰熱。療百病。(陶弘景) ②髮乃血餘。故能治血病。補陰。療驚癇。去心竅之血。劉君安以已髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許。三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老唐方亦用自己亂髮。洗盡。每一兩。入川椒五十粒。泥固。入瓶。煨黑。研末。每空心酒服一錢。令髮長黑。此皆補陰之驗也。用煨者取其下達爾。(李時珍)

【血櫃】即牡丹皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牡丹皮」條。

【血蠶龜茸】即龜茸之處方用名。

【血藤】形態 血藤爲蔓草類藤屬之一種其根如大

母指。色黃。可供藥用。

採取 五月採之。

主治 攻血。治氣塊。

【血藤】即藤之古籍別名。典見綱目。詳「橘」條。

【血藤】

命名 本品周身紅如血故名。

產地 出浙江舊寧波府慈谿縣白龍潭。

形態 血藤爲魚類之一種。以白龍潭通身紅如硃砂者良。他產者尾尖而黑。不堪藥用。

主治 增氣力。壯筋骨。益血填精。取血沖酒飲。

【行夜】古籍別名 頁盤。(別錄)氣盤蟲。(陶弘景)

厚盤蟲。氣盤(本草綱目)放屁蟲。(俗名)

外國名詞 Phoropopopus

Josoonia, Mor. (拉丁) ヒ

リムシ 或 ミキテラハンメウ

(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。箱

六盡 血行衣西

形態 行夜爲化生蟲類之一種。體呈筒狀。色黃。形似斑蝥。頭部突出。有絲狀觸角。大顯具一齒。前胸部長。有黑直紋。翅鞘有黑紋二箇。及細直線七條。雄者之翅鞘。達於尾端。雌者尙露尾節二三節。胸下黃色。腹部黑色。脚亦黃而長。全身長八分許。遇有危害。則發出黃色氣體。甚臭。夏秋之間。陰天夜間。必外出行於地上。捕得可供藥用。

性質 辛溫。有小毒。

主治 腹痛寒熱。利血。

參攷資料 行夜今小兒呼厚盤蟲。或曰氣盤。即此也。(陶弘景) 氣盤有短翅。飛不甚遠。好夜中行。人觸之即氣出。雖與蜚蠊同名相似。終非一物。或人食之。味極辛辣。蘇恭所謂己人重頁蠶也。(陳藏器) 頁盤有三行夜。蜚蠊。蠱。皆同名而異類。夷人俱食之。故致混稱也。行夜與蜚蠊形狀相類。但以有廉蓋氣味者爲蜚蠊。觸之氣出者爲氣盤。作分別爾。張杲醫說。載鮮于叔明好食頁盤。臭。每使人採取三五升。浮溫水上。洩

味甚佳。即此物也。(李時珍)

【行唐】即莖管子之古籍別名。典見綱目。詳「莖管子」條。

【行粉】即番薯粉之連渣磨製者。其色黃而白。功效甚劣。詳「甘儲」條。

【行唐】即莖管子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「莖管子」條。

命名 本品生衣帛間。而狀似魚。故名。

古籍別名 白魚(本經)鰕魚。炳魚。壁魚(圖經本草)蠹魚(本草綱目)

外國名詞 Lepisma saccha-

ina, L. (拉丁)

基本 係節肢動物昆蟲類。彈尾類衣魚科之衣魚。

形態 衣魚爲化生蟲類之一種。其體長而扁。被銀色細鱗。頭胸腹之區別不甚顯明。頭小。觸角長而爲鞭狀。口器退化。無複眼。胸部最闊。無翅。下部有脚三對。腹部分十環節。至尾端漸細。有三條同長之尾毛。體長三四分。專蝕衣帛書籍。性畏日光。

主治 婦人疝瘕。小便利。小兒中風。項強。背起摩之。(本經)瘰癧。瘰癧。瘰癧。瘰癧。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論衣魚曰。小兒淋閉。以摩臍及小腹。即通。(宋)蘇頌圖經本草論衣魚曰。合瘰癧。瘰癧。同傳瘰癧。即滅。【明】李時珍本草綱目論衣魚曰。主小兒疝風。撮口。客作天疔。風癩。口喎。重舌。目翳。目眩。尿血。轉胞。小便不通。

配合宜忌 畏芸草。莽草。蒿苗。

參攷資料 范汪方治小便利。取衣魚二七枚。搗分作數丸。頓服。即通。濟書云。明帝病篤。勅產省求白魚爲藥。此乃神農藥。古方盛用。而今所罕知矣。(李時珍)

【西天草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草」條。

【西天莖】即前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「前胡」條。

【西王母杖】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【西王母杖子】即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳「枸杞子」條。

五六五

六盡血

①治鼻血不止。血餘燒灰。吹之立止。永久不發。男用母髮。女用父髮。又方。用亂髮灰一錢。人中白五分。麝香少許。為末。噴鼻。名三奇散。(聖惠方)

②治肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白湯一錢。調服。(三因方)

③治咳嗽有血。小兒胎髮灰。入麝香少許。酒下。每箇作一服。男用女。女用男。(朱氏集驗方)

④治齒縫出血。頭髮切入銚內。炒存性。研搽之。(華陀中藏經)

⑤治肌膚出血。胎髮燒灰。傅之。即止。或吹入鼻中。(證治要訣方)

⑥治諸竅出血。頭髮。敗糧。陳蓮蓬。並燒灰等分。每服三錢。木香湯下。(聖惠方)

⑦治無故遺血。亂髮及爪甲燒灰。酒服方寸匕。(千金方)

⑧治小便尿血。髮灰二錢。醋湯服。(永類鈴方)

⑨治血淋苦痛。亂髮燒存性。二錢。入麝香少許。米飲服。(聖惠方)

⑩治大便瀉血。血餘半兩。燒灰。雞冠花。柏葉各一兩。為末。臥時酒服二錢。來早以溫酒一盞投之一

服見效。(普濟方)

⑪治女人漏血。亂髮洗淨。燒研。空心溫酒服一錢。(婦人良方)

⑫治月水不通。童男童女髮。各三兩。燒灰。斑蝥二十一枚。糯米炒黃。麝香一錢。為末。每服一錢。食前熱薑酒下。(普濟方)

⑬治婦人陰吹。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。宜豬膏髮煎導之。用豬膏半斤。亂髮雞子大三枚。和煎髮消藥成矣。分再服。病從小便中出也。(仲景方)

⑭治女勞黃疸。因大熱大勞。交接後入水所致。身目俱黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。用膏髮煎治之。即上方。(肘後方)

⑮治黃疸尿赤。亂髮灰水服一錢。日三次。祕方也。(肘後方)

⑯治乾蝨亂病。眼滿煩躁。亂髮一團。燒灰。鹽湯二升。和服取吐。(十便良方)

⑰治尸疰中惡。用亂髮如雞子大。燒研水服。又一方。用亂髮灰半兩。杏仁半兩。去皮尖。研煉蜜丸。梧子大。每溫酒日下二三十九丸。(子母祕錄方)

⑱治破傷中風。亂髮如雞子大。無油器中熬焦黑。研以好酒一盞沃之。入何首烏末二錢。灌之。少頃再灌。亦治沐髮中風。(本草衍義方)

⑲令髮長黑。亂髮洗晒。油煎焦枯。研末。擦髮良。(聖惠方)

⑳治擦落耳鼻。頭髮瓶盛。泥固。煨過。研末。以擦落耳鼻。乘熱蘸髮灰。緩定。輒帛縛住。勿令動。自生合也。(經驗良方)

㉑治聾耳出膿。亂髮裹杏仁末。塞之。(聖惠方)

㉒治吞髮在咽。取自己亂髮燒灰。水服一錢。(延陵至寶方)

㉓治蜈蚣咬。頭髮燒烟。薰之。

㉔治疔腫惡瘡。亂髮鼠屎等分。燒灰。針入瘡內。大良。(聖惠方)

㉕治瘡口不合。亂髮露蜂房。蛇蛻皮。各燒存性一錢。用溫酒食前調服。神妙。(蘇沈良方)

㉖治下疳溼瘡。髮灰一錢。棗核七箇。燒研洗貼。(心鑑方)

㉗治大風癩瘡。用新竹筒十箇。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿於稻糠火盆內煨之。俟汁滴出。以蓋

五六四

承接。翎掃瘡上。數日即愈。亦治諸瘡。(邵真人經驗方)

用量 一錢半至三錢。

著名方劑 ①滑石白魚散。主小便不利。(金匱方)用滑石二分。亂髮二分。(燒)白魚二分。杵為散。飲服半錢。日三服。②豬膏髮煎。諸黃主之。及治女子陰吹。(金匱方)用豬膏半斤。亂髮如鷄子大三枚。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

參攷資料 ①俗中嫗母為小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。雜雞子黃。熬良久。得汁。與兒服。去痰熱。療百病。(附弘景)②髮乃血餘。故能治血病。補陰。療驚癇。去心竅之血。劉君安以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老唐方亦用自己亂髮。洗盡。每一兩。入川椒五十粒。泥固入瓶。煨黑研末。每空心酒服一錢。令髮長黑。此皆補陰之驗也。用煨者取其下達爾。(李時珍)

【血櫃】即牡丹皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牡丹皮」條。

【血蠟鹿茸】即鹿茸之處方用名。

詳『鹿茸』條。

【血藤】形態 血藤爲蔓草類。藤屬之一種。其根如大

拇指。色黃。可供藥用。

採取 五月採之。

主治 攻血。治氣塊。

【血槿】即槿之古籍別名。典見綱目。詳『槿子』條。

【血鱒】命名 本品周身紅如血故名。產地 出浙江舊寧波府慈谿縣白龍潭。

形態 血鱒爲魚類之一種。以白龍潭通身紅如硃砂者良。他產者尾尖而黑。不堪藥用。

主治 增氣力。壯筋骨。益血填精。取血沖酒飲。

【行夜】古籍別名 頁盤。(別錄) 氣盤蟲。(陶弘景)

限盤蟲。氣盤。(本草綱目) 放屁蟲。(俗名)

外國名詞 Phocopsophus

Jossonia, Mor. (拉丁) ヒ

リムシ 或 ミキテラハンメウ

(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。鞘

翅類。爲蚊科之行夜蟲。

形態 行夜爲化生蟲類之一種。體呈筒狀。色黃。形似斑蝥。頭部突出。有絲狀觸角。大頭具一齒。前胸部長。有黑直紋。翅鞘有黑紋。二筒及細直線七條。雄者之翅鞘。達於尾端。雌者尙露尾節二三節。胸下黃色。腹部黑色。脚亦黃而長。全身長八分許。遇有危害。則發出黃色氣體。甚臭。夏秋之間。陰天夜間。必外出行於地上。捕得可供藥用。

性質 辛溫。有小毒。

主治 腹痛寒熱。利血。

參攷資料 行夜今小兒呼

屨盤蟲。或曰氣盤。即此也。(陶弘景) 氣盤有短翅。飛不其遠。好夜中行。人觸之即氣出。雖與蜚蠊同名相似。終非一物。或人食之。味極辛辣。蘇恭所謂己人重頁蠶也。(陳藏器) 頁盤有三。行夜。蜚蠊。蠱。皆同名而異類。夷人俱食之。故致混淆也。行夜與蜚蠊形狀相類。但以有廉盤氣味者爲蜚蠊。觸之氣出者爲氣盤。作分別爾。張杲醫說。載鮮于叔明好食頁盤臭蟲。每使人採取三五升。浮溫水上。洩

盡臭氣。用酥及五味熬作餅食。云味甚佳。即此物也。(李時珍)

【行唐】即頁蠶子之古籍別名。典見綱目。詳『頁蠶子』條。

【行粉】即番薯粉之連渣磨製者。其色黃而不白。功效甚劣。詳『甘藷』條。

【行蕒】即頁蠶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『頁蠶子』條。

命名 本品生衣帛間。而狀似魚故名。

古籍別名 白魚(本經) 鯉魚。鱖魚。壁魚(圖經本草) 蠶魚(本草綱目)

外國名詞 Lepisma saccharinum, L. (拉丁)

基本 係節肢動物昆蟲類。彈尾類衣魚科之衣魚。

形態 衣魚爲化生蟲類之一種。其體長而扁。被銀色細鱗。頭胸腹之區別不甚顯明。頭小。觸角長而爲鞭狀。口器退化。無複眼。胸部最闊。無翅。下部有脚三對。腹部分十環節。至尾端漸細。有三條同長之尾毛。體長三四分。專蝕衣帛書籍。性畏日光。

性質 鹹溫。無毒。

主治 婦人疝瘕。小便不利。小兒中風。項強。背起摩之。(本經) 瘰癧。淋塗。疥。滅。瘰。胎。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論衣魚曰。小兒淋閉。以摩臍及小腹。即通。【宋】蘇頌圖經本草論衣魚曰。合蠶屎。碾。同傳瘡癩。即滅。【明】李時珍本草綱目論衣魚曰。主小兒臍風。撮口。客忤。天疳。風癩。口喘。重舌。目翳。目眩。尿血。轉胞。小便不通。

配合宜忌 畏莖草。莽草。蒿草。

參攷資料 范汪方治小便不利。取衣魚二七枚。搗。分作數丸。頓服。即通。濟書云。明帝病篤。勅蠶省求白魚爲藥。此乃神農藥。古方盛用。而今所罕知矣。(李時珍)

【西天王草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草』條。

【西天蓼】即前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『前胡』條。

【西王母杖】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【西王母杖子】即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳『枸杞子』條。

六蠶 血行衣西

【西王母菜】即羅勒之古籍別名。與見本草集註。詳「羅勒」條。

【西王母桃】即冬桃之別名。係桃之一種。質肉肥厚。形如苦棗。經霜始熟。性質功能詳「桃」條。

【西王母簪】即石龍芻之古籍別名。與見綱目。詳「石龍芻」條。

【西瓜】命名 本品自蟻征回。乾得此種歸。名曰西瓜。

古醫別名 水瓜。夏瓜。寒瓜。青登瓜。(和漢藥考)

外國名詞 Citrullus vulgaris, Schrad. (拉丁)

基本 屬葫蘆科。藥用為西瓜之瓜瓢與皮子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。西瓜皮各處均有。六月新。

形態 按西瓜為一年生蔓性草本。有卷鬚。葉有極深之缺裂。少者三多者七。宛似羽狀複葉。花單性。同株而生。為黃色之合瓣花。果實為漿果。形球圓。頗巨大。外皮初作白色。熟則有光澤。色亦轉綠。內部之瓤。或白或紅。或黃。漿液極多。味甘美。夏日食之。足以止渴解暑。種子或黑或白。作扁平卵圓形。末

端較尖。一枚西瓜中。有種子無數。



西瓜

種類 西瓜之種類頗多。果皮有白。黃。綠。斑。果肉有黃。白。紅。種子有黑。白。如西洋西瓜。長西瓜。白西瓜。皆最著者也。

種植 每年二三月間下種。恒多於田圃中栽植之。

採取 六七月間。採取熟實。性質 甘淡寒。無毒。

成分 藥效之成分未詳。自其營養上分析之。水分為九四。七。六。糖分四。七。七。纖維〇。一。〇。灰分〇。二。脂肪殊微。

效能 消暑。止渴。用為利尿藥。主治 止渴。解暑熱。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論西瓜曰。含汁。治口瘡。【明】李士材本草圖解論西瓜曰。西瓜甘寒。解暑消渴。止煩利水。西瓜性冷。世俗取一時之快。忘傷胃之憂。古人有天生白虎湯之

可絞汁灌之。以極甜而作梨花香者勝。一名天生白虎湯。多食積寒助溼。每患秋痢。中寒多溼。大便清澀。病後產後均忌之。食瓜腹脹者。以冬醃乾菜滷湯飲。即消。瓜瓢燥。猪肉。味美色佳而不膩。瓜肉曝乾。醃之亦可醫漬。以作小菜。食之。已目赤口瘡。肉外青皮。以瓷鋒刮下。名西瓜翠衣。入藥涼驚滌暑。

國外學說 日本藥學士吉本彌三。曾以西瓜絞汁。成淡紅色透明之液體。呈酸性。有甘味。比重一。〇。四。水分八九。四五。越幾斯分八。三四。窒素總量一。二五。脂肪〇。三二。林德酸〇。一八。糖分(轉化糖)四。二七。灰分〇。五二。更進而用化學試驗法。提出其中所含之有效成分。則至今尚未得云。西瓜有利尿之效。盡人所知。但其成分未詳。據日本吉本醫學博士之說。則謂西瓜中之糖分。確有利尿之效。又據新瀉醫學專門學校木村氏之說。則謂西瓜中含有少量鹽類。於腎臟炎有特殊功效。又和漢藥考曰。西瓜原為非洲產。歷永年間。日本曾得其種。

號。認其寒也。愚者妄以為不傷脾胃。可以多食。誤矣。【清】王穎食物本草論西瓜曰。療喉痺。【清】寧原食鑑本草論西瓜曰。寬中下氣。利小便。治血痢。解酒毒。【清】黃宮繡本草求真論西瓜曰。西瓜內稜。今人遇值三伏天燥。不論男婦大小。朝夕恣食。誠以燥渴之極。得此味甘色赤。能引心胞之熱。下入小腸膀胱而出。令其心胸頓冷。煩渴水消。故書載治太陽陽明胃中渴。及熱病大渴等病。宜投。並有天生白虎湯之譽。惟是稟氣素厚。遇熱消渴。及伏氣發。得此如湯澆雪。若以脾胃素虛。恣服轉濕。朝夕恣食。必待腸滯上湧。或瀉或腫。或脹。元陽已削。方為覺悟。悔莫及矣。衛生歌云。瓜桃生冷宜少食。免至秋來成瘡痢。又瓜本寒。曝之寒氣益聚而寒矣。猶之油性本熱。經火煎熬。則其性稍革而不熱矣。因述此以為好食瓜者一箴。【清】王士雄隨息居飲食譜論西瓜曰。西瓜甘寒。清肺胃。解暑熱。除煩止渴。醒酒涼營。療喉痺。口瘡。治火毒時證。雖蠻貊海濱。但因暑火為病者。竝

子。未幾遂絕。又五十餘年。至延寶中。東京及江戶始漸栽種。又日本枝松新氏。謂普通黃疸之治法。用西瓜奏效極著。有時且在他藥之上。但須除其外皮與皮質。中存儲質。可盡食之。尤有特效。若但飲絞汁。則效力減弱。患黃疸人食西瓜後。不惟小便通利。一說。西瓜利尿之有效成分。在瓜皮與肉瓢之間。即大便亦得調勻。大抵尿量增加。自可減少膽汁色素之含量。大便調勻。自可除去膽汁之鬱滯也。

參攷資料 ●西瓜甜瓜皆屬生冷。世俗以爲醍醐灌頂。甘露洒心。取其一時之快。不知其傷脾胃。溼之害也。眞西山衛生歌云。瓜枕主冷宜少殮。免致秋來成瘡痂。是矣。又李廷飛延壽書云。防州太守陳逢原。避暑食瓜過多。至秋忽腰腿痛。不能舉動。遇商助教。疾之乃愈。此皆食瓜之患也。故集書於此。以爲鑑戒云。又洪忠宜松漠紀聞言。有人苦目病。或令以西瓜切片暴乾。日日服之。遂愈。由其性冷降火故也。(李時珍) ●按相感志云。

六畫 西

食西瓜後食其子。即不噎瓜氣。以瓜剉破曝日中。少頃食。即冷如水也。得酒氣近糯米。即易爛。踏之即易沙。(李時珍) ●按胡嬌陷虜記言。嬌征回紇。得此種歸。名曰西瓜。則西北皆有。而南方者味稍不及。亦甜瓜之類也。二月下種。蔓生。花葉皆如甜瓜。七八月實熟。有圍及徑尺者。長至二尺者。其稜或有或無。其色或青或綠。其瓢或白或紅。紅者味尤勝。其子或黃或紅。或黑或白。白者味更劣。其味有甘有淡。有酸。酸者爲下。(李時珍)

【西瓜子仁】

性實 甘寒。無毒。

主治 腹內結聚。破潰膿血。最爲腸胃皮內塞要藥。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論西瓜子仁曰。止月經太過。研末去油。水調服。【清】王士雄隨息居飲食譜論西瓜子仁曰。生食化痰滌垢。下氣清營。一味濃煎。治吐血久嗽皆妙。剉配橙酢作餠甚美。帶殼炒香佐酒。爲雅俗共賞之尤大者盼。

【西瓜子殼】

主治 腸風下血。同地榆炭。白薇。蒲黃炭。桑白皮煎服。新久皆愈。吐血煎湯服即止。

【西瓜皮】

處方用名 西瓜翠衣。性實 甘涼。無毒。形態 清熱解暑。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論西瓜皮曰。口舌唇內生瘡。燒研噙之。

配合應用 ●治閃挫腰痛。西瓜青皮。陰乾爲末。鹽酒調服三錢。(攝生家妙方)

●治食瓜過傷。瓜皮煎湯解之。諸瓜皆同。(事林廣記方)

【西瓜翠衣】即西瓜皮之處方用名。詳「西瓜皮」條。

【西戎金】即金之產於古西戎地者之別名。與見糊目。性質功能。詳「金」條。

【西芎】即川芎之產於陝西者。性質功能。與川芎同。惟力較遜。典見綱目。詳「川芎」條。

【西貝】即貝母之產於陝西境者。性質功能。與川貝母同。但力較薄。

詳「川貝母」條。

【西血珀】即琥珀之處方用名。詳「琥珀」條。

【西河柳】即檉柳之處方用名。詳「檉柳」條。

【西河楊柳】即檉柳之處方用名。詳「檉柳」條。

【西芥】即黃芥之中空而色黯者。之古籍別名。與見綱目。詳「黃芥」條。


【西砂仁】即砂仁之處方用名。詳「砂仁」條。

【西施舌】命名 本品形如舌。狀謂之西施舌者。馳名可以遍傳也。

古醫別名 沙蛤。

外國名詞 *Tresus nutalli*

Conrad & Lutraris nutalli (Oster Shell)



西施舌

形態 西越舌爲介類體動物之一種。形如蛤蚧而長大。殼白。足突出。長可二寸許。足端有絲狀物。藉以附着沙際。仲冬始有。過正月半則無。其肉可供藥用。

採取 先以石碌磨沙岸。使沙上平實。視土際有小穴。出泡沫。即可掘取之。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 益精。潤臟腑。止煩渴。爲補陰之要藥。

【西施乳】即河豚魚之腹。性質功能詳「河豚魚」條。

【西洋參】 命名 本品出大西洋各國。故名。

外國名詞 America Ginseng (英)

基本 屬五加科植物 Panax quinquefolius 之根。

產地 本品出大西洋佛蘭西等處。美國則產於北加羅里那州。及坎拿大地方。即美國所產之人參。專運銷中國。有野生及栽植者二種。多數係將野生者移植。或於蔴種後經四年或七年。採取其根曬乾者。無有知高麗紅參之湯蒸

乾燥者。

形態 西洋參有種種者。有野生者。故其形態不一。大約與遼東糖參相似。

製法 入藥須選皮細潔。切開中心不黑。緊實而大者良。或飯鍋上蒸透。或用桂圓肉拌蒸用。

性質 苦。寒。微甘。無毒。

效能 降火。瀉熱。用作解熱藥。

主治 專補肺陰。清肺火。治久咳肺痿。

施用宜忌 反藜蘆。

辨偽 鄭省巖曰。西洋參。皮色微黃者。以小稀充之。皮色純白者。以沖白搗之。其味不苦。又以苦參煎湯。浸而晒之。虛架之體。誤服即瀉。花旗所產。又有一種肉色黃者。價最貴。竟以新山之太極參。充之。近人方劑。喜用洋參。若以貴價買假藥。且於病無益。而有害。洵堪浩歎。用者慎之。曹炳章曰。按西洋參。形似遼參而小。產於美國。向來祇有光白二種。近時更增毛皮參一種。因光參由日本人作偽。以生料小東洋參。擦去表皮。名曰副光。售與我國。貪利市。僞充西

參以害同胞。天良喪盡。恥莫大焉。蓋西參滋陰降火。東參提氣助火。效用相反。凡是陰虛火旺。勞嗽之人。每用真西參。則氣平火斂。咳嗽漸平。若用僞光參。則反現面赤舌紅。乾咳痰血。口燥氣促。諸危象焉。以致醫者見西參有表足不前之感。故近年美商有不去表皮之毛西參。運入我國。意在杜絕某國派人之作偽。詎知通行未逾十年。而某國原皮僞毛參。又混售市上。病家服藥。可不慎歟。僞西參之爲害。既如此。而卒不能革除者。何也。因真西參之價。每斤八九十元。而僞參每斤僅八九元耳。販賣真參者。得利甚微。混售僞參。則利市十倍。我國商人大抵目光淺短。素少公衆道德觀念。祇知草率爲利。不顧有害於民衆。作僞者。所以有如是之盛也。至欲鑑別其真僞。必須分氣味。形色。性質。真光西參。色白。質輕。性鬆。氣清。芬。切片內層肉紋。有細微菊花心之紋。味初嚼則苦。漸含則兼甘味。口覺甚清爽。氣味能久留口中。若副光僞參。色雖白。質重而堅。內層肉紋多。實心。無菊

花心紋眼。亦無清芬之氣。嚼之初亦先苦後甘。數嚼後。即淡而無味。不若真者能久留口中。毛西參。皮紋深。微灰黑色。內肉鬆白。質亦輕。性鬆。氣清。芬。味苦兼甘。含嚼清爽。鮮潔爲道地。僞毛參。皮紋深。陷而兼滴味黏舌者。此即僞也。如鄭君所謂苦參煎湯。浸入。亦非其本有之味也。苟誤用之。亦屬有害無益。願衛生家注意之。

近人學說 西洋參產於美洲。本非中土所有。是以古書無此。惟吳氏從新趙氏拾遺。收之。均稱其有補肺之功。然其味甚苦。其性必寒。聞彼中並不視爲藥品。惟吾國人。莫不於參之美名。競相爭購。價值日貴。而質庸亦日多。然其真者。亦不過苦寒泄火之品。惟肺胃有火。口燥咽乾者。頗有捷效。雖似有生津止渴之功。其實仍以瀉熱見長。而清養脾胃。尚是因其降火而加之美名。是以胃弱津枯。而不因於實熱者。已嫌其伐生生之氣。所謂補肺。亦可想見。吾國中清熱瀉燥之藥甚多。又何必侈談域外之奇

然耳食者猶必以服食貴價自誇。甚至畏其苦寒。則用龍眼肉并蒸。以爲制勝之術。斯又矯揉造作。自謂神奇。亦殊覺其多此一舉也。

配合應用 治腸紅用西洋參蘇桂圓服之神效(類要方)

用量 八分至一錢半

施用宜忌 凡非實火者禁用。

配合宜忌 忌鐵刀。火炒。反藜蘆。

參攷資料 西洋參對牛勞

閉。名片參不佳。(吳遵程) 洋參似遼參之白皮泡丁。味類人參。惟性寒。宜糯米飯上蒸用。甘苦補陰退熱。真製益元扶正氣。(藥性考)

美國人參始於一七一六年有名華薩拉布周者。在坎拿大地方之蒙得利爾發見。法人立即購集此根運售中國。數年間蒙得利爾貿易。因此大爲繁盛。又印度人亦採集蒙得利爾及克愛柏克野生人參。運售中國。(摘錄輸出重要

品要覽人參之部)

【西洋珠】即真珠之古籍別名。與見和漢藥考。詳「真珠」條。

【西香】即乳香產於南印度者之

古籍別名。詳「乳香」條。

【西秦朮】即秦朮之處方用名。詳「秦朮」條。

【西國米】 古籍別名 西穀米。沙孤米。沙木麵。番國米。(和漢藥考)都勾樹(本草綱目)

外國名詞 Pearl Sago (英)

基本 屬於棕櫚科之西穀椰子。其樹幹中含有一種澱粉。取而製之謂之西國米。以其形似也。

產地 和漢藥考曰。西國米產於印度羣島。運至新嘉坡。在新嘉坡精製成米。再運銷他國。

形態 西穀椰子爲常綠喬木。或野生。或種植。大樹也。高二丈。周圍可數尺。樹質堅實。葉爲羽狀複葉。叢立樹上。有長至二丈者。花

頂端。爲穗狀花序。果實爲球形。兩端壓扁。色黃。有光澤。所結果實。須三年始成熟。樹幹之外皮特厚。約有一寸半。至二寸許。其內部則爲純白之髓質。此樹祇結實一次。即失其白髓而枯死。採製西穀澱粉之西穀椰子。種類極多。就中更有刺類與無刺類兩種。凡有刺

類。樹幹俱矮。葉亦較小。惟收穫澱粉之量。無甚差異。大約每樹一株。可得澱粉七百磅之譜。其製成之西國米。佳者色純白。狀若顆粒。大小不一。以澱粉置顯微鏡下照之。則見爲卵圓形。或長橢圓形之細粒。一若二三相連而中斷之者。大

○。○一至○。○五密米。有輪兩三層圍其外。其中央爲圓孔。

製法 和漢藥考曰。西穀澱粉之製法。先斷樹幹。每段約六尺餘。更縱破之。投河中。浸軟其皮。剝去之。然後將木髓部製成粉末。亦如普通製造澱粉之法。水竅淘汰而曝乾之。是爲西穀粉。陸續運銷市場。惟自產地運出者。多裹以西穀椰子之葉。經時既久。其細胞組織及纖維等。每變壞而發惡臭。故至新嘉坡後。更須精製之法。以原包置篩中。注水搓捏。將澱粉篩過。再

以水篩之。最淨者色純白。次者色帶褐。因此仍分數等。其粒狀西穀。即爲西國米。乃以精製西穀澱粉塊。日中曬乾。候未十分乾透。即碎而納諸布袋中。搖成細粒。再行曬乾。粒之大小。隨篩眼之大小而區

別之。因之有大粒。小粒。細粒數種。最淨者名真珠西穀。

性質 淡微甘。無毒。效能 健脾。運胃。痢疾。或疝氣等症。以此煮粥。爲病人之食品。主治 淡微甘。煮粥食。健脾胃。隨病人用之。

參攷資料 莎菰米性味輕

淡。故俚俗病人煮粥食之。然變爽之物。未達其性。高貴家幸勿用之。

(卷懷食鑑) 西國米出西洋西國。煮不化。而色紫柔滑者。眞僞者以葛粉爲之。(嶺南雜記) 西國米今南楚兩粵專採葛根作粉食。其粉可作丸。曰葛粉丸。廣人以假西國米能醒酒。(通雅志) 西國米來自閩廣洋艘。大如綠豆。以色紫煮不化者眞。健脾運胃功最捷。久病虛乏者煮粥食最宜。(朱排山柑園小識)

【西國草子】即覆盆子之古籍別名。與見國經本草。詳「覆盆子」條。

【西雲珀】即琥珀之處方用名。詳「琥珀」條。

【西番朮】即苡仁之古籍別名。與見救荒本草。詳「苡仁」條。

六畫 西

五六九

六畫 西

【西開片】即大黃之處方用名。詳『大黃』條。
【西黃】即牛黃之處方用名。詳『牛黃』條。

【西楞魚】產地 出太平洋。形態 西楞魚為魚類之一種。上半身如男女形。下半身則魚尾。其骨可供藥用。

採取 以女魚者入藥良。
主治 止血。治一切內傷瘀損等症。

【西箱歸】即當歸之處方用名。詳『歸當』條。

【西葎參】即葎參之處方用名。詳『葎參』條。

【西蔗】即甘蔗之綠嫩皮薄者。味極醇厚。專用作糖。與見綱目。性質功能詳『甘蔗』條。

【西穀米】即西國米之古籍別名。與見和漢藥考。詳『西國米』條。

【西藏紅花】 處方用名 藏紅花。

命名 本品係產於西藏之紅花。故名。

形態 藏紅花為溼草類之一種。其根似胡根而呈暗綠色。九月

七畫 串 伯

間開花。似菊花而呈紫紅色。有雌蕊一雄蕊三。其花可作繪畫顏料等。亦供藥用。

種植 適地及氣候。藏紅花為溫帶植物。而無庸豐沃之土壤。如排水適宜之砂土。最適栽植。若混砂於黑壤土之處。亦適栽植。

栽培期。栽春花種者。春間播種於苗地內。秋花種以七月為宜。整地播種期前三十日頃耕。而以肥料混施之作幅二尺至三尺。株間五六寸至八九寸。深二寸之種床。修整注意。冬季被以藁。為防寒之準備。逾三年植換之。植換時不可永曝根部。肥料用堆肥。木炭。人糞。過磷酸石灰等。施肥法。整地之際。以堆肥木炭與和於細土。過磷酸石灰為原肥料。而施之。不可施於下種之時。迨長成。次第施以稀薄之水糞。但不可施於莖葉間。恐有枯死之患。故施肥時當離株二寸處。採收期。供藥用者。當十月與十一月之交。採收花之雌蕊頭。若欲得栽植用之種球。當四五月頃。葉莖枯萎時採收之。

雜記。雜草叢生。於本種生育上

不為大礙。除之更佳。不除亦無妨。

性質 辛。溫。無毒。

效能 用作健胃鎮瀉及活血通經藥。

主治 各種痞結痙癖。止吐血。辦傷 趙學敏曰。將一朶入滾水內。色如血。而可沖四次者。真。

參攷資料 藏紅花與番紅花及大薊之別名曰野紅花者。皆別。凡服者忌食油膩。鹽。趙學敏。

不論虛實。何經所吐之血。只須用藏紅花。將無灰酒一盞。花一朶。入酒內。隔湯傾出汁服之。入口血即止。屢試皆效。王士琦。

七畫

【串珠茶】即山茶花之古籍別名。與見綱目。詳『山茶花』條。

【伯勞】 古籍別名 伯鷗。博勞。 (詩疏)伯趙。(左傳)鷗。鷗。(孟子)

外國名詞 Lanius bucephalus T. & S. (Shrike) 或 (Bull-headed shrike) 或 (Butcher bird) W. Inger 或 Nounbaker (拉丁) モズ 或 ニウドウモズ (日本)

五七〇

基本 係脊椎動物鳥類。鳴禽類。伯勞科。藥用其羽毛。

形態 伯勞為鳴禽類之一種。嘴短。上嘴鈎曲。尖端銳。側緣有齒狀缺刻。尾長。脚黑。雄者頭呈赤茶色。至脊則為灰褐色。尾為黑褐色。裂色同而有白色小點。眼上有白眉。眼之前後及眼下皆黑。頤白。至胸部漸呈淡茶色。雌者腹下有斑紋。體長七寸。性猛。捕食昆蟲小鳥。實於棘枝而徐食之。



伯勞

性質 平。有毒。

主治 小兒癰疽。取毛帶之。織病者。母有娠乳兒。見病如癰疽。他日相繼腹大。或遂或發。他人有娠。相近。亦能相繼也。北人未識此病。參攷資料 按淮南子云。男子種蘭。美而不芳。繼子得食。肥而

不澤。情不相往來也。蓋情在腹中
之子故也。繼病亦作魅病。魅乃小
鬼之名。謂兒羸瘦如魅鬼也。大抵
亦丁奚疳病。(李時珍) 伯勞。即
鷓也。夏鳴冬止。乃月令候時之鳥。
本草不著形狀。而後人無識之者。
郭璞註爾雅云。鷓似鷓而大。腹
皮云。鷓音轄。乾白項。鷓也。張華
註禽經云。伯勞形似鷓。喙黃。伯
勞喙黑。許慎說文云。鷓。鷓似鷓而
有賴。顏師古註漢書。謂鷓爲子規。
王逸註楚詞。謂鷓爲巧婦。揚雄方
言。謂鷓爲鷓。陳正敏選齊閒覽。
謂鷓爲鷓。李華國史補。謂鷓爲布
毅。楊慎丹鉛錄。謂鷓爲鷓。九說
各異。竊謂鷓既可以候時。必非希
見之鳥。今通考其得失。王說已謬。
不必致辯。據郭說則似今苦鳥。據
張許二說。則似今之百舌。似鷓。鷓
而有賴者。然鷓好單栖。鳴則蛇結。
而百舌不能制蛇爲不同也。據顏
說。則子規名鷓。音弟桂。伯勞名
鷓。音決。且月令起於北方。子規非
北鳥也。據揚說。鷓乃寒號蟲。惟
晉地有之。據陳說。則謂其目擊。斷
然以爲臆矣。而不具其形。似與陳

七畫 伯 伽

藏器鷓即臆之說不合。而爾雅鷓
鷓一名鷓。與此不同。據李說則
布毅一名鷓。字音相近。又與月
令鷓。拂其羽相犯。據揚說則鷓
鷓乃鷓。小如鷓。三月即鳴。與
禮記五月鷓始鳴。幽風七月鷓
之義不合。八說不同如此。要之當
以郭說爲準。案爾雅謂鷓鷓之醜。
其飛也醜。斂足。棘翅也。既以鷓鷓
並稱。而今之苦鳥。大如鷓。黑色。以
四月鳴。其鳴曰苦苦。又名姑惡。人
多惡之。俗以爲婦被其姑苦死所
化。頗與伯奇之說相近也。但不知
其能制蛇否耳。淮南子云。伯勞之
血塗金。人不敢取。(李時珍)

【伯勞踏樹枝】 主治 小兒
速語。 語遲。鞭之即

參攷資料 伯勞所踏樹枝。鞭
小兒令速語者。以其當萬物不能
鳴時。而獨能鳴之故。以類求之也。
(李時珍)

【伯趙】 即伯勞之古籍別名。典見
左傳。詳「伯勞」條。

【伯都骨】 即虎骨之古籍別名。典
見綱目。詳「虎骨」條。

【伯鷓】 即伯勞之古籍別名。典見
陸璣詩疏。詳「伯勞」條。

【伽楠香】 古籍別名 棧香。(乘雅) 琪楠香。奇楠
香。奇南香。迦南香。茄楠香。綠結。蜜
結。虎斑金絲結。(綱目拾遺)

產地 多出熱帶諸地。及廣東
瓊州諸山中。

形態 伽楠香爲沈香之一種。
其香木枝柯竅露。大蟻穴其竅。蟻
食石蜜歸而遺香其中。歲久漸漬。
木受蜜氣。結而堅潤。則香成矣。香
成則木漸壞。其旁草樹成枯。海南
人見有蟻封高二三尺處。其下必
有異香。挖得可供藥用。

種類 ①生結香。即沉香。以刀
斫枝幹成穴。經雨水浸漬而結成。
上有點如鷓。斑者。燂之香極清
烈。爲沉香中之上品。②熟結香。即
伽楠香之膏脈凝結而自朽者。③
蜜結。即伽楠香之味辛辣。嗅之香
甜。入手柔嫩而體輕者。爲伽楠香
之上品。④糖結。即伽楠香之木死
本存。蜜氣膏於枯根。潤若錫片。而
質軟。色黑或黃。或黑質白點。較尋
常伽楠香爲良。⑤油結。即伽楠香

之產於粵東及占城等處者。摺之
痕生。釋之痕合。按之可圓。放之仍
方。結之細屑成團。色綠氣香。其香
常存。經久不滅。冬寒則香發。春暖
則香發。爲伽楠之最上品。⑥氣結。
即伽楠香樹中空腹內所結。藉伽
楠香氣。及雨露凝結而成。故名。多
產海南諸島。形同香塊。而質酥潤。
鬆膩不甚堅實。然頗難得。世不多
見。酒磨服。可治噎膈病。⑦綠結。即
伽楠香之色如鴨頭綠者。⑧鐵結。
即伽楠香之色黑而質堅者。爲伽
楠香之最下品。⑨蘭花結。爲伽
楠香之色微綠而黑者。⑩金絲結。爲
伽楠香之色微黃者。⑪虎斑金絲
結。爲伽楠香之歲月尚淺。木蜜之
氣未融。木性多而香味少者。⑫鷓
歌綠。爲伽楠香之色如鷓毛者。⑬
洋伽楠。爲伽楠香之產於南洋羣
島者。質料最佳。⑭土伽楠。爲伽楠
之產於廣東瓊州島者。草生。白質。
而有黑點。狀如油速。精多而氣厚。
劑之香氣特異。酷烈然其香動而
易散。多汗沾濡。數月即滅。須濯以
清泉。膏以蘇合油。或以甘蔗心蘸
之。以白蕁葉煎之。懸土數月。日中

七畫 伽低何

稍燥。而後香魂可復。①蟲漏。為伽
備香沉香之因。②蟲隙而結者。③脫
落。為伽備香沉香之因。木朽而結
者。

性質 辛。香。無毒。

主治 下氣。辟惡。風痰閉。蒸精
鬼蟲者。通竅醒神。

近人學說 程登瀛曰。奇南香。
一作伽羅。亦名伽楠。按伽羅為梵
語。乃黑之義。即黑沉香之謂。故日
本選以沉香為伽羅。潛確類書作
迦南。謂其木最大。枝柯致露。大蟻
穴之。蟻食石蜜。歸遺於中。木受蜜
氣。結而成香。香木未死。蜜氣復老。
謂之生結。上也。木死本存。蜜氣凝
於枯根。潤若鴿片。謂之糖結。次也。
生結紅而堅。糖結黑而軟。其虎斑
結。金絲結。木性多而香味少。斯為
下品矣。據古籍所載。伽羅也。迦南
也。即黑沉香之譯音。唯在醫藥界
心意中。奇南是一種極稀有之植
物。結奇南香。本草備要新增品有
伽南香。辛熱氣香。下氣辟惡。通竅
醒神。固脾。縮二便。益命火。能閉精
固氣。治一切心痛。胃痛。腹痛。氣痛。
極有驗。出兩廣。一作琪瑯。閩人名

為火旺。約有三種。一。即仙人掌。幹
扁闊。二。幹高五六尺。有靛稜六瓣。
橫剖成輪狀。各稜刃有針刺。無葉。
三。即世人謂能結奇南者。不具樹
木狀。俗稱不是樹。農人多植之於
園岸為籬。枝幹圓。高六七尺。末梢
生葉。長形橢圓。無柄。肉質脆嫩。折
之流乳汁甚多。葉落即結珠目。生
短刺。而成老幹。幹中空。農人每敲
取嫩莖。置於坑溝之上。澆魚食汁
水。即浮游而被捕也。其性苦寒。有
毒。去皮切片。以米泔漬之。滌淨乳
質。同猪肉煮食。治熱毒瘡癤。有特
效。閩南有奇南香。火旺。和孤山
獨木出。奇南的俚語。極言其珍貴。
余幼年習業時。亦常聽說此物之
性狀。但從不曾見過。近年到暹。始
知能結奇南者。與閩產大同小異。
暹產高至二丈。幹葉似國產。而生
枝却扁闊如仙人掌。末端生葉。枝
極至長三個掌狀。過長每被風摧
折。即在折傷部位結香。其乳流於
幹孔。凝結如通草。暹人曰色勝。內
入藥。苦寒有毒。多服作瀉。每次包
吞二三分。治腸癰。胃痛。有特效。此
種火旺。產於多石少土無樹之海

島。必偏枯破傷乃能結香。島上多
蛇蝎。船戶常上島覓取。然不易得。
最多者。一在萬崙。燕窩島。一在泗
南河口之關世淺。閣上多佛寺。猶
我國之南海。世人視為佛地。島上
全生火旺樹。土人於枯幹中覓取
奇南。禮佛節乃各出所有求售。回
國輪船停該處。亦往往上船
兜售。閩廣有此物。皆由洋客帶回。
因本國之火旺樹。未見能結香者。
其香結於幹頭者。堅緻而大。結於
枝極者。成長薄片。刺目宛然。紫色
多。黑色亦有。但無論紫黑。刮絲變
黑綠色者。其別種木結。無有能變
黃色者。以沉重多油者為上。其質
極易發火。味苦。氣不香。據一般人
實驗言之。性涼。功專止痛。治鬱熱
腹痛。痢疾。便血。極有效驗。
【伽耶牙】即象牙之古籍別名。典
見戶北錄。詳「象牙」條。
【伽藍鳥】即鴉鵂之別名。典見動
物學大辭典。詳「鴉鵂」條。
【低密】即犀角之古籍別名。典見
番名詳「犀角」條。

交。何即採食其根而有功。後人漸
以採人為名。
處方用名 鮮首烏。製首烏。
古籍別名 交藤。夜合。地精。
本傳 陳知白(開寶本草)桃柳
藤(日華本草)山奴。山哥。山伯。山
翁。山精(圖經本草)赤葛(斗門)
馬肝石。九真藤。積帶(本草綱目)
紅內消(外科精義)交莖。野苗。金
香草(和漢藥考)
外國名詞 Polygonum nutt.
Stilorum, Thunb. (拉丁)
基本 屬莖科。藥用何首烏之
根。其莖葉亦堪入藥。另見「何首
烏莖葉」條。
產地 陳仁山藥物生產辨云。
產廣東德慶為正。名曰何首烏。北
江。連州等處亦有出。以廣西。南寧
百色為多出。凡用首烏者。取補血。
南寧首烏用烏豈。透。用刀切之。
不數片。刀即蓋黑。用舌舐之。即將
舌苔撮起。味澀。其質極極。服之不
劫血。於顯足矣。尚望其有補血乎。
惟德慶產者則不然。味和。甜。甘。香。
帶有微甜。刀切不藍。入口不撮舌。
其能養血無疑矣。實則凡諸名山

五七二

【何首烏】 命名 其藥本草無
名。因何首烏見藤夜

深山間。恒多產焉。以朝鮮產者爲尤良。

形態 按何首烏爲山野自生之蔓草。春月從宿根抽莖。纏繞他物。長及丈餘。葉爲心臟形。前端尖。皆互生。秋季於莖梢葉腋。殺穗狀。細小白色花。花後結實。類蓼實。而繁廷甚長。似栝樓根。數塊相連。小者如蕃薯。大者如甜瓜。質堅硬。

採取 春末夏中。秋初三時。候晴明日。兼雌雄採之。以布帛拭去泥。勿損皮。烈日曝乾。張始生曰。其藤上紋直者。下必爲大首烏。藤上有橫紋者。其下必爲小首烏。其橫紋由大首烏之筋牽連起來。首烏之根鬚上皆爲小首烏。設一大首烏有根鬚數百。則小首烏亦有數百。而大首烏因以爛化。故所餘盡爲小首烏。其藤上橫紋。亦爲小首烏營養少及於藤之徵。

製法 馬志曰。凡使何首烏。布拭去土。暴乾。苦竹刀切。米泔浸。白搗。忌鐵器。微曰。新探去皮。銅刀切片。入飯甑。蒸無氣息。取出。暴乾。用李時珍曰。近世治法。用何首烏赤白各一斤。竹刀刮去粗皮。米泔

浸一夜。切片。用黑豆三斗。每用三升。三合三勺。以水泡過。砂鍋內鋪豆一層。首烏一層。重重鋪盡。蒸之。豆熟。取出。將何首烏曬乾。再以豆蒸。如此九蒸九晒。乃止。又張始生曰。鮮首烏欲製成熟首烏時。有一習慣。法以紅首烏一百斤。置鍋中。和以皂礬兩斤同煮。則首烏鐵急而不致有裂紋。首烏煮一度。即足。製藥者加礬。一取其不有裂紋。二取分量不致有巨量之減輕。如不加礬。則二百五十斤之首烏。將變爲一百斤矣。紅首烏味本微澀。一置皂礬。則味變微酸。蓋首烏外爲礬素。澀則內氣不能外達。又久浸水中。則發酸矣。是蓋漁利者之所爲。規以學理。殊屬荒謬。另一製法。則置紅白首烏於同一蒸籠中。一層首烏。一層野料豆。如是相間。大蒸籠可容四五百斤。小者可容百許斤。自正月蒸起。至六月止。蒸成後。氣味極爲甘芳。毫不覺酸。選料時。紅白首烏。皆須用鮮者。設用經礬石煮過之首烏。蒸之。則味仍酸澀。永不甘芳。故首烏之優劣。皆其味亦可決之。且鮮者經六月

之蒸成。剖開則內甚光亮。色黑而陰天不壞。礬石煮過者。其色不黑。苟和以熱地汁。則色亦黑。簡言之。紅白首烏與野料豆同煮。而味甘芳者。爲真。若酸澀者。爲偽。此不錯誤者也。

性質 苦。澀。微溫。無毒。

效能 補肝腎。斂精氣。本品入胃後。即能助胃之消化。至腸使分解。而被吸收。經此分解後之特效。糖素。入血內。能促進血液中之醇素作用。使細胞之新陳代謝作用。增進。故專用爲強壯藥。治各種貧血症。及神經衰弱。

主治 瘰癧。消癰腫。瘰癧。面風。瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑髮。悅顏色。久服長筋骨。益精髓。延年不老。亦治婦人產後。及帶下諸疾。

歷代記載攷證 【宋】大明日華諸家本草論何首烏曰。久服令人有子。治腹臟一切宿疾。冷氣腸風。【元】王好古湯液本草論何首烏曰。瀉肝風。【明】繆希雍本草經疏論何首烏曰。何首烏。本文味苦。澀。微溫。傳言味甘氣溫。入足厥陰。象入足少陰經。故爲益血祛風之

上藥。雌雄二種。過夜則交。有陰陽交合之象。故能令人有子。肝主血。腎主精。益二經。則精血盛。髮者血之餘也。故烏鬚髮。其主瘰癧者。肝膽氣鬱結。則內熱。營氣壅逆。發爲是病。十一臟皆取決於膽。與肝爲表裏。爲少陽之經。不可出入。氣血俱少。乃風木所主。行膽氣。益肝血。則瘰癧自消矣。調營氣。則癰腫消。治風先治血。血活則風散。故瘰癧面風瘡。腸癖爲痔。痔者。溼熱下流。傷血分。而無所施洩。則逼近肛門。肉分遂出。成形爲種種矣。風能勝溼。溼熱解。則痔將自平。心血虛。則內熱。熱則心搖。搖而作痛。益血則熱解而痛除。益血氣。黑髮。悅顏色。久服長筋骨。益精氣。延年不老者。皆補肝腎。益精血之極功也。亦治婦人產後。及帶下諸疾者。婦人以血爲主。月事通後。厥陰主之。帶下本於血虛。而兼溼熱。行溼益血。不除矣。【清】黃宮繡本草求真論何首烏曰。何首烏。諸書皆言滋水補腎。黑髮輕身。備極贊賞。與地黃功力相似。獨馮兆張辯論甚晰。其言首烏苦澀微溫。陰不甚滯。陽

七畫 何

不其燥。得天地中和之氣。熟地首烏。雖俱補陰。一為峻補先天真陰之藥。故其功可立救孤陽亢烈之危。一係調補後天營血之需。以為常服。長養精神。却病調元之餌。先天後天之陰不同。奏功之緩急輕重。亦有大異也。况名夜合。又名能嗣。則補血之中。尚有化陽之力。豈若地黃功尚滋水。氣薄味厚。而為濁中濁者。堅強骨髓之用乎。斯言論極透闢。直冠先賢。未有不可忽視。以大如拳五瓣者。良。三百年者。大如栲栳。服之成地仙。有赤雄白雌二種。凡使赤白各半。泔浸竹刀刮皮切片。用黑豆與首烏拌勻。鋪柳飯。入砂鍋。九蒸九晒。茯苓為使。忌豬肉。無鱗魚。菜。葱。蒜。鐵器。

網目。則自唐時始知其用。有赤白二種。遂以為有入氣入血之分。用者必兼而用之。亦即調劑陰陽。兩得其平之至理。開寶本草謂治瘰癧。消癰腫。療頭面風疔。蓋以根入深土。蔕又遠。故能有宣通經絡之效。且赤者直入血分。故耳。瀕湖綱目謂外科呼為瘡帶。及肛內消。斗門方亦有專治瘰癧結核一條。且謂根如雞卵。亦類癭子。恐未免近於附會。開寶又謂治五痔。止心痛。益血氣。黑髮。悅顏色。久服長筋骨。益精髓。亦治婦人產後。及帶下諸疾。則皆以養陰補血為義。無甚深意。大明謂治腹臟一切痼疾。冷氣。又無非溫潤以補益五臟耳。好古謂瀉肝風。仍是陰不涵陽。水不養木。乃致肝木生風。此能補陰。則治風先治血。血行風自滅。亦其所宜。但此是滋補以息風。必不可誤以為瀉肝。金元人之談醫。多有是書。亦皆類類有之。於王海藏何微焉。明邵應節有七寶美髯丹一方。進御世宗。盛行於世。祇是滋壇肝腎。方雖平穩。實亦不過尋常

之理耳。石頑謂其性稟陰中之陽。以產於南方者為勝。若北產則雖大不足珍。以其地偏於陰。無陽生之力。立論雖奇。却亦有理。石頑又謂治津血枯燥。大腸風秘。以鮮首烏數錢煎服即通。以其滋水之性最速。不及封藏。即已下泄。與從蓉之潤燥通大便無異。壽頤按鮮者生氣未滿。通絡走竄之力愈迅。故有此效。凡虛癆日久不止。並無痰溼積滯者。重用生首烏。加入補中益氣湯內。振動脾胃清陽之氣。亦甚有捷效。此不僅取其清味。可以固攝。亦以生用力。速宣布脾陽。尤易得力耳。若欲其專補下焦。厚重有力。則必以久蒸久晒。方能味厚入陰。填塞善守。正與生用之利於速行者。兩得其反。此皆以天然之精義。而分別其效力。吾國藥學之精義。在此。若化學家專論物質。則胡足以知此。

配合應用 ●治瘡邪在陰分。久而不解。用何首烏。牛膝。鱉甲。橘紅。青皮。如表氣已虛。脾胃已弱。則加入參三五錢。肺熱者去人參。換入當歸如其數。

●治頭面諸風。及大麻風。用何首烏。刺蒺藜。甘菊花。天門冬。胡麻仁。漆菜。白芷。荊芥。穗。苦參。地黃。百部。

●治瘡痂下純血。諸藥所不效者。用何首烏。金銀花。地榆。犀角。草石。雞。山豆根。黃連。芍藥。乾葛。升麻。甘草。滑石。

●治骨軟風。腰膝疼。行履不得。遍身瘙癢。何首烏大而有花紋者。同牛膝。各一斤。以好酒一升。浸一夜。曝乾。於木臼內搗末。蜜丸。每日空心食前酒吞三五十九。衆可治風痰久瘡不愈。(經驗方)

●治瘰癧或破或不破。下至胸前者。皆治之。用何首烏根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服即止。其藥久服。延年黑髮。用之神效。(斗門方)

●服食滋補。何首烏丸。專壯筋骨。長精髓。補血氣。久服黑髮。堅陽道。令人多子。輕身延年。月計不足。歲計有餘。用何首烏三斤。銅刀切片。乾者以米泔水浸軟切之。牛膝去苗一斤。切以黑豆一斗淘淨。用木飯鑪豆一層。鋪藥一層。重置

五七四

舖盡。瓦鍋蒸至豆熟。取出。去豆。曝乾。換豆又蒸。如此三次爲末。蒸飛肉和丸。梧子大。每服三五十丸。空心溫酒下。(和劑局方)又只用赤白何首烏各半斤。去粗皮。陰乾。石臼杵末。每日無灰酒服一錢。(鄭巖山中丞方)用赤白何首烏各半。極大者。八月採。以竹刀削去皮。切片。用米泔水浸一宿。曬乾。以壯婦男兒乳汁拌曬三度。候乾。木臼杵爲末。以蜜雲朮肉和杵爲丸。如梧子大。每服二十九丸。每日加十丸。至百丸止。空心溫酒鹽湯任下。一方不用人乳。(積善堂方)又用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黃汁浸。一分旱蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出。各曝乾。瓦焙。石臼爲末。蒸飛肉和丸。梧子大。每服四十九丸。空心百沸湯下。又方。用何首烏。甘菊花。枸杞子。地黃。牛膝。天門冬。赤白茯苓。桑椹。南燭子。則益精血。烏髮髮。駐顏延年。(筆峯雜興方)

服二錢。日二。(聖惠方)
 ① 寬筋治損。何首烏十斤。生黑豆半斤。同煎熟。阜茨一斤。煨存性。牽牛十兩。炒取頭末。薄荷十兩。木香。牛膝各五兩。川烏頭泡二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服三十丸。茶湯下。(永類鈴方)
 ② 治皮裏作痛。不知何處。用何首烏末。薑汁調成膏塗之。以帛裹住火炙。鞋底熨之。(經驗方)
 ③ 治自汗不止。何首烏末。津調封臍中。(集簡方)
 ④ 治腸風臟毒。下血不止。何首烏二兩爲末。食前米飲服二錢。(聖惠方)
 ⑤ 治小兒龜背。魚尿調紅。內消貼背上骨節。久久自安。
 ⑥ 治破傷血出。何首烏末傳之。卽止。神效。(筆峯雜興方)
 ⑦ 治癰疽毒瘡。紅內消。不限多少。瓶中文武火熬煎。臨熟入好無灰酒相等。再煎數沸。時時飲之。其滓焙研爲末。酒煮。麵糊丸。梧子大。空心溫酒下三十丸。疾退。宜常服之。紅內消卽赤何首烏也。產建昌者良。(外科精義方)

⑧ 治疥癬滿身。不可治者。何首烏。艾葉等分。水煎。濃湯洗浴。甚能解痛。生肌肉。(王褒博濟方)
 用薑 三錢至五錢。
 配合宜忌 忌諸血。無鱗魚。蒜。葱。蘿蔔。鐵器。同地黃。能伏磁砂。著名方劑 七寶美髯丹。補腎氣。烏髮髮。能延年益壽。(邵節應)用何首烏赤白各一斤。牛膝八兩。以首烏先用米泔浸一日夜。以竹刀刮去粗皮。切作大片。用黑豆鋪甌中一層。却鋪首烏一層。每鋪豆一層。却鋪牛膝一層。重重相間。上鋪豆覆之。以豆熟爲度。去豆。曬乾。次日如前。用生豆蒸如法。蒸七次。去豆用。破故紙半斤。(酒浸洗。用黑芝麻同炒。無聲爲度。去芝麻用)白茯苓半斤。(用人乳拌。蒸透。曬乾。蒸)菟絲子半斤。(酒牛乳浸。曬乾。蒸)菟絲子半斤。(酒浸一宿。洗。曬乾。蒸。曬二次)枸杞子半斤。(去蒂。枯者)共爲末。煉蜜丸。龍眼大。每日空心嚼三丸。溫酒或米湯。淡鹽湯下。製時不可犯鐵器。

州南河縣。今在處有之。嶺外江南諸州皆有。以西洛嵩山及河南柏城縣者爲勝。春生苗。莖延竹木。壁間莖紫色。葉葉相對。如薯蕷而不光澤。夏秋開黃白花。如葛勒花。結子有稜。似蕎麥而細小。纒如粟。大。秋冬取根。大者如拳。各有五稜。瓣似小甜瓜。有赤白二種。赤者雄。白者雌。一云春採根。秋採花。九蒸九曝。乃可服。此藥本名交藤。因何首烏服而得名也。唐元和七年。僧文象過茅山老人。遂傳此事。李翱乃著何首烏傳云。何首烏者。順州南河縣人。祖名能嗣。父名延秀。能嗣本名田兒。生而鬻。年五十八。無妻子。常慕道術。隨師在山。一日醉臥山野。忽見有藤二株。相去三尺餘。苗莖相交。久而方解。解了。又交。田兒驚訝其異。至旦。遂掘其根。歸問諸人。無識者。後有山老忽來。示之。答曰。子既無嗣。其藤乃異此。恐是神仙之藥。何不服之。遂杵爲末。空心酒服一錢。七日而思人道。數月似強健。因此常服。又加至二錢。經年舊疾皆痊。髮烏容少。十年之內。卽生數男。乃改名能嗣。又與

七畫 何

參攷資料 ①何首烏本出順

七畫 何佛

其子廷秀服。皆壽百六十歲。廷秀生首烏。首烏服藥。亦生數子。年百三十歲。髮猶黑。有李安期者。與首烏鄉里親善。竊得方服。其壽亦長。遂敘其事傳之云。明州刺史李遠附錄云。何首烏。以出南河縣及嶺南。恩州。韶州。潮州。賀州。廣州。潘州。四會縣者為上。邕州。桂州。康州。容州。高州。勒州。循州。晉興縣出者次之。真仙草也。五十年者如拳。大號山奴。服之一年。髮鬢青黑。一百年者如盤。大號山哥。服之一年。顏色紅悅。一百五十年者如益。大號山伯。服之一年。齒落更生。二百年者如斗。考栲。大號山翁。服之一年。顏如童子。行及奔馬。三百年者如三斗。栲栳。大號山精。純陽之體。久服成地仙也。(蘇頌)此藥流傳雖久。服者尙寡。嘉靖初。邵應節真人。以七寶美髯丹方上進。世宗廟皇帝服。既有效。速生皇嗣。於是何首烏之方。天下大行矣。宋懷州知州李治。與一武臣同官。怪其年七十餘而輕健。面如渥丹。能飲食。叩其術。則服何首烏丸也。乃傳其方。後治得病。盛暑中。半體無汗。已二年。

竊自憂之。造丸服至年餘。汗澀決體。其活血治風之功。大有補益。其方用赤白何首烏各半斤。米泔浸三夜。竹刀刮去皮切焙。石臼為末。煉蜜丸。梧子大。每空心溫酒下五十九丸。亦可末服。(李時珍)漢武時有馬肝石。能治人髮。故後人隱此名亦曰馬肝石。赤者能消腫毒。外科呼為瘡帚。紅內消。斗門方云。取根若獲九數者。服之乃仙。故名九真履。(李時珍)

【何首烏莖葉】 處方用名 夜交藤。效能 調營衛。治寒熱通經絡。除痺痛。主治 風疔疥癬作痒。煎湯洗。浴甚效。

【何離】 卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【佛手三七】 卽人參三七之產於廣西田州土司境者。儼似佛手上。有指節形。野生者尤良。

【佛手柑】 卽香橙之古籍別名。典見綱目。詳「香橙」條。

【佛手草】 古籍別名 百合草。(綱目拾遺)

【佛手參】 卽人參三七之別名。詳「人參三七」條。

【佛手露】 基本 本品係用佛手柑蒸取之露。性質 淡。無毒。主治 疎隔寬胸。解鬱開胃。舒肝悅脾。除煩清熱。

【佛指甲】 古籍別名 佛指甲。外國名詞 Crocalaria root。基本 屬景天科。石蓮華類。藥用佛指甲之葉。

形態 佛指甲草為自生巖石間之多年草本。亦有因賞玩而種之者。葉有極厚之肉質。充滿漿液。為長卵圓形。無葉柄。堆疊叢生。形如蓮華。夏秋之交。抽莖長尺許。莖莖細柔。柔澤如馬齒莧。互生鱗狀之小葉。花開於葉腋之間。五瓣淡紅色。為冠狀小花。多數相集而為穗狀。

採取 五六月間採之。性質 甘寒。微毒。效能 用治湯火灼傷藥。主治 湯火灼瘡研貼之。



佛手草

國外學說 和漢藥考曰。新鮮葉中所含之漿汁。用以治毒蟲螫傷及湯火傷。荷蘭藥鏡曰。佛指甲草。味鹹。含收斂之汁。性清涼。如消石。能刷淨污物。抑制惡毒。此生汁一味。或和砂糖。或和糖漿服之。能退壯熱。祛燥熱。止煩渴。消咽喉口舌之嫩腫。治泄瀉赤痢。亦驗。患鵝口瘡。咽喉口顎唇舌等嫩痛。潰瘍。瘡。或乳頭唇舌手指等疥裂。作痛。浸淫瘡。火傷等症。取此葉絞汁含漱。或塗患處。立愈。患咽喉口中潰瘍及其他不治之咽喉病。以此葉汁與玫瑰蜜等分研和。取少許含口中。有大效。但口顎唇舌等。若患如瘡之惡毒潰瘍。以加沒藥或

沒藥丁幾劑。研和外敷爲佳。方如下。佛甲草汁四錢。玫瑰蜜一兩。沒藥丁幾錢。龍腦五錢。右研和。攤棉紗上。貼患處。常常替換。名清刷。清毒膏。燄腫。火傷等。佛甲草葉汁。和胡桃油。燒酒各少許。塗之。卽消。散。咽喉燄腫。佛甲草葉汁。和礪砂少許。研勻。作含漱藥。靈驗如神。眼目燄腫。或角膜發生斑點。取此葉汁點之。消散極速。痔瘡燄痛。以此葉入乳汁。煮如膏。貼患處。腫消痛止。患生如疥。腫之老菌。雞眼等。新鮮佛甲草葉。浸醋中。取出。乾貼。硬肉自然漸緩而消矣。

參攷資料 佛甲草生筠州。多附石向陽而生。似馬齒莧而細小。且長。有花黃色。不結實。四季皆有。(蘇頌) 二月生苗。成叢。高四五寸。脆莖細葉。柔澤如馬齒莧。尖長而小。夏開黃花。經霜則枯。人多栽於石山五墻上。呼爲佛指甲。救荒本草言。高一二尺。葉甚大者。乃景天。非此也。(李時珍)

【佛耳草】 卽金錢草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「金錢草」條。

【卽鳳翅草之古籍別名。與見李

東垣用藥法象。詳「鳳翅草」條。

【佛見笑】 卽十姊妹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「十姊妹」條。

【佛豆】 卽蠶豆之古籍別名。典見食物本草。詳「蠶豆」條。

【佛花】 卽曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【佛指甲】 卽佛甲草之古籍別名。典見綱目。詳「佛甲草」條。

【鐵指甲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵指甲」條。

【佛茄兒】 卽曼陀羅花之古籍別名。典見新本草。詳「曼陀羅」條。

【佛座鬚】 卽蓮鬚之古籍別名。典見綱目。詳「蓮鬚」條。

【佛桑花】 古籍別名。福桑花。扶桑花。丹色者名朱槿。重臺者名愛老。(綱目拾遺)

【佛桑花】 形態 佛桑爲扶桑之別種。形似桑而略小。葉光潤且厚。高止四五尺。而枝婆娑。開花五出。有大紅或淺紅或黃色。一叢之上。日開數百朵。大如蜀葵。瓣捲起者。飛殿。中心層出如樓。較他花多一層。花瓣有蕊一條。比花瓣長而上綴金屑。

【佛桑花】 聖治 補血潤血。美顏潤容。

【佛退】 卽蠶殼之古籍別名。典見綱目。詳「蠶殼」條。

【佛製裝】 卽人胞之古籍別名。典見綱目。詳「人胞」條。

【佛掌花】 形態 佛掌花爲雜草類。狀如櫻桃。其根可供藥用。

【佛掌花】 聖治 疔瘡。同生。蜜研汁服之。外以天茄葉貼之。

【佛掌參】 卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粉沙參」條。

【佛掌參】 形態 佛掌參爲雜草類。狀如櫻桃。其根可供藥用。

【佛掌參】 聖治 疔瘡。同生。蜜研汁服之。外以天茄葉貼之。

【佛掌參】 聖治 補血潤血。美顏潤容。

【佛退】 卽蠶殼之古籍別名。典見綱目。詳「蠶殼」條。

【佛製裝】 卽人胞之古籍別名。典見綱目。詳「人胞」條。

【佛掌花】 形態 佛掌花爲雜草類。狀如櫻桃。其根可供藥用。

【佛掌花】 聖治 疔瘡。同生。蜜研汁服之。外以天茄葉貼之。

【佛掌參】 卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粉沙參」條。

【佛掌參】 形態 佛掌參爲雜草類。狀如櫻桃。其根可供藥用。

【冷油石】 卽寒水石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「寒水石」條。

【冷飯】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【冷飯塊】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【冷飯團】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【冷飯團】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【初筵】 卽竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳「竹筍」條。

【別仙棗】 卽徐長卿之古籍別名。典見圖經本草。詳「徐長卿」條。

【別枝】 卽別稱之古籍別名。典見別錄。詳「別稱」條。

【別直參】 卽高麗參之堅實力壯者之別名。詳「高麗參」條。

【別當】 卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉蓯蓉」條。

【別稱】 古籍別名。別枝。(別錄)

【別稱】 形態 別稱爲雜草類之一種。其莖葉可供藥用。

【別稱】 採取 二月八月採。

【別稱】 性質 苦。微溫。無毒。

【別稱】 聖治 風寒溼痺。身重。四肢痠痛。歷節痛。

【劫灰】即石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石灰』條。

【利如】即桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【利茹】即防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳『防葵』條。

【利殼丹】即海月之別名。詳『海月』條。

【利藪】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【助蠶花】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【卯白】即雞子白之原名。詳『雞子白』條。

【卵黃】即雞子黃之原名。詳『雞子黃』條。

【卵澁】即次實之古籍別名。典見管子。詳『次實』條。

【君子芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【君王鹽】即光明鹽之別名。詳『光明鹽』條。

【君石】即辟瘴之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『辟瘴』條。

【君莖】即藤伯之古籍別名。典見別錄。詳『藤伯』條。

【君遷子】原名 牛爛柿。古籍別名 櫻栗。軟栗。千金方。梔玳（廣志）牛奶柿。丁香柿（日本本草）紅藍栗（齊民要術）豆柿。猿柿（日本）

外國名詞 *Diospyros Lo-*
gata (拉丁) *シナノガキ*
メガキ サルガキ (日本)

基本 係柿樹科柿樹屬。藥用君遷子之實。

形態 君遷子為山果類柿屬之一種。落葉樹。高一二丈。葉長橢圓形。上面暗綠色。下面灰白色。葉柄平滑。長約五分許。互生。花作合瓣花冠。如壺狀。淡黃色。結實為漿果。球形或橢圓。徑六七分。狀如牛爛。嫩果流汁。可作漆料。熟則紫黑色。汁似乳而味甘美。

性質 甘。瀉。平。無毒。
主治 止消渴。去煩熱。令人潤澤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論君遷子曰。鎮心。久服悅人顏色。令人輕健。

【吟蛩】即蟋蟀之別名。詳『蟋蟀』條。

【含水藤】命名 本品藤莖中。含有多量之水液。故名。

古籍別名 大瓠藤（綱目）

形態 含水藤為莖草類之一種。葉似枸杞。莖如葛。高丈餘。斷之復生。含水汁甚多。山行者口渴。可取以止渴。其葉與莖中水汁。俱可供藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 解煩渴。心燥。瘴癘。丹石發動。亦宜服之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論含水藤莖汁曰。止渴。潤五臟。去溼痺。天行時氣。利小便。

【明】李時珍本草綱目論含水藤莖汁曰。治人體有損痛。沐髮令長。

【含水藤葉】性質 甘。平。無毒。
主治 搗傅水爛瘡皮皸。

【含生草】古籍別名 安產樹。
外國名詞 *Anastasis* *Hb.*
orchuntina, *L.* (拉丁) *アン*
サンシユ *エルユサウ* (日本)

基本 係十字草科含生草屬。

藥用含生草之葉。

產地 生熱帶高原諸地。

形態 含生草為莖草類之一年生草本。高五六寸。枝多分枝。全體成球形。葉倒卵形。生星狀之毛。花細小白。無花梗。撰簇於枝上。花瓣倒卵形。花期過。葉即脫落。乾燥則枝皆向內卷屈。溼潤復展開如初。故似卷柏而大。其葉可供藥用。

性質 平。無毒。
主治 婦人難產。含之嚙汁即生。

【含沙】即溪兔蟲之古籍別名。典見詩註。詳『溪兔蟲』條。

【含光】即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱈魚』條。

【含春藤】形態 含春藤為莖草類之一種。其苗蔓延木上。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治 諸風疾。

【含桃】即櫻桃之古籍別名。典見月令。詳『櫻桃』條。

【吳朮】即朮之產於浙江寧波縣天目山仙丈峯者。性質功用。與於朮同。

【吳羊】即山羊之古籍別名。與見綱目。詳「山羊」條。

【吳風草】即鹿御草之古籍別名。與見唐本草。詳「鹿御草」條。

【吳桃】即胡桃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「胡桃」條。

【吳茱萸】命名 本品南北皆故名。處方用名 淡吳萸。開口吳萸。古籍別名 蘇。吳椒。川葶。搜筵。辟邪翁。藥茱萸。九日三官。(和漢藥考)


外國名圖 Evodia pilulocarpa, Benth. (拉卜) 基本 屬芸香科為吳茱萸之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。吳萸產湖南常德者為最。廣西左江亦佳。右江雖略遜。亦作好論。日本亦有產。但其氣味大不如也。安南東京有來。想亦由廣西龍州運去耳。

形態 吳萸為植物落葉亞喬木。高自六七尺至丈餘。樹幹直立。堅實。枝展開作十字形。樹皮滑澤。

七畫 吳

色暗褐。而有白圈。葉對生。為奇數之羽狀複葉。小葉作橢圓形。前端尖。末端圓。全緣及葉脈。葉柄嫩枝。俱密生軟毛。五六月間。葉腋開黃綠色之小花。綴為短圓錐狀花序。苞葉五裂。若鱗片。果實為小蒴果。帶紅紫色。乾則變黑色。卵圓形之蒴果。大自二分至四五分不等。外皮厚似革。作五稜。油腺為無數之小孔。暴露於外。內分五房。每房藏種子兩粒。滑澤。而作倒卵圓形。味頗辛烈。香氣亦甚。



吳 茱 萸

種類 有大小兩種。小者入藥為勝。中國產者。實小而香氣薄。藥用以中國產者為良。日本產者。實大而香氣厚。採取 九月間採實陰乾。陳久者良。

製法 雷斅曰。凡使吳茱萸。須去葉梗。每十兩。以鹽二兩投東流水四斗中。分作一百度洗之。自然

無涎。日乾入丸散用之。若用醋煮者。每十兩用醋一盞。煮三十沸後。入茱萸熬乾用。寇宗奭曰。凡用茱萸。須深湯中浸去苦烈汁七次。始可焙用。

性質 辛。溫。有小毒。效能 溫肝。降逆。開鬱。化滯。果實有收斂之效。用於產後之血病。又為驅風藥。用於腹之脹滿。或作發汗藥。用於感冒。及為衝動藥。能鎮痛殺蟲。

主治 溫中下氣。止痛除濕。血痺。逐風邪。開腹理。咳逆。寒熱。(本經) 利五臟。去痰冷逆氣。飲食不消。心腹諸冷。絞痛中惡。心腹痛。(別錄)

張仲景之發明 吳萸一味。經張仲景之實驗。認為主治嘔而胸滿。故吳茱萸湯。用吳茱萸有一斤之多。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論吳萸曰。霍亂轉筋。胃冷吐瀉。腹痛。產後心痛。治遍身瘡痺。刺痛。腰脚軟弱。利大腸壅氣。腸風痔疾。殺三蟲。【唐】陳藏器本草拾遺論吳萸曰。殺惡蟲。牙齦蟲。蠶

鬼魅疰氣。【唐】孟詵食療本草論吳萸曰。主痢止瀉。厚腸胃。肥健人。【宋】大明日華諸家本草論吳萸曰。下產後餘血。治腎氣脚氣水腫。通關節。起陽健脾。【元】王好古湯液本草論吳萸曰。治痞滿塞胸。咽膈不通。潤肝燥脾。【明】李時珍本草綱目論吳萸曰。開鬱化滯。治吞酸。厥陰痰涎頭痛。陰毒腹痛。疝氣血痢。喉舌口瘡。【明】繆希雍本草經疏論吳萸曰。吳茱萸味辛氣溫。有小毒。甄權辛苦大熱。氣味俱厚。入足陽明太陰。兼入足少陰厥陰經。凡脾胃之氣。喜溫而惡寒。寒則中氣不能運化。或為冷實不消。或為腹內絞痛。或寒痰停積。以致氣逆發咳。五臟不利。辛溫燥脾胃而散寒邪。則中自溫氣自下。而諸證悉除。其主除濕血毒逐風邪者。蓋以風寒溼之邪。多從脾胃而入。脾胃主肌肉。為邪所侵。則腠理閉密。而寒熱諸瘧所從來矣。辛溫走散開鬱。故能使風寒溼之邪。從腠理而出。中惡腹痛。亦邪惡之氣干犯脾胃所致。入脾散邪。則腹痛自止矣。【清】黃宮繡本草求真論吳萸

五七九

曰。吳茱萸辛苦燥熱微毒。崑入厥陰氣分。散寒除濕。東垣云。濁陰不除。厥氣上逆。甚而脹滿。非吳茱萸不可治也。多用損人元氣。故吞酸吐酸等症。俱用至如咽喉口舌生瘡。以茶葉末醋調貼兩足心。一夜便愈者。以熱下行也。兼入脾胃。以除胸中寒冷。又脾經血分。濕痺。令其表裏宣通。而無拒捕之患矣。又兼入腎。而治膀胱受濕。陰囊作疝。久滑冷瀉。陰寒小腹作疼。暨脚氣水腫。并口舌生瘡。除蟲殺蟲。要皆氣味辛燥所致。但走氣動火。久服令人目昏發瘡。血虛有火者尤忌。陳者良。泡去苦烈汁。用止嘔黃連水炒。治疝鹽水炒。治血醋炒。【清】楊時泰本草述鈞元論吳茱萸曰。吳茱萸治濕熱有吐酸吞酸者。投明醋丸。用黃連為君。若芥陳茶為輔也。其濕熱滯氣甚者。投參朮丸。用六一散為君。吳茱萸為佐合服也。至治虛寒之吞酸。有醋心上攻。止用濃醋煎吳茱萸湯頓服者。有食已吞酸。將吳茱萸炮碎等分末服者。蓋是證有溼熱寒溼之殊。惟此味下氣除溼為其主要。如寒溼之治。治其因

寒而成溼。溼在寒之後也。溼熱之治。治其因溼而化熱。熱在溼之後也。又此味之治泄瀉。亦有溼熱寒溼之殊。其因溼化熱者。熱在溼之後。故用黃連燥之清之。更以此味行中土之滯。俾溼先化而奏功。至於寒溼泄瀉。類由於元陽虛。正經所謂中氣之溼也。必如吳茱萸之溫中下氣。乃能借諸味以回元陽於無何有之槲爾。再如疝證。亦有溼熱寒溼之治。其寒類從外受。不專責於元陽之虛也。因寒而陽不得化。陽不化而鬱於寒中。是為寒化溼。而溼因化熱。故丹溪論治。惟宜於通。或疎散。或分利。或針灸。皆通其由外而受之邪也。用此味導陰以達陽。則溼自化而熱自行。又脚氣一證。更有寒溼風溼溼熱之因。求其本而責之。總歸於陰不升而陽不降耳。陰下墜而陽上淫。墜者墜於極下之足。故統名脚氣也。第瀉與疝。多因於陰邪之有餘。而脚氣選病於真陰之不足。陰不足故陽不歸。如吳茱萸之用。似能下陽氣以歸陰。即能和陰氣以起陽。所謂治其本也。如責其本。則如寒溼風

溼溼熱之標。隨其所勝以投劑。仍歸之治本以奏效矣。其次治在積聚。惟吳茱萸本溫中而下氣。由氣下而除溼血痺。故五積中獨肺脾二積倚之。以肺主氣。而脾為胃行氣於陰陽也。肺積在右脇下。病於氣所從出之道。然由氣而病於血痺。則肝亦隨肺以同病。故息奔湯有桂心與他味等分。可見氣不病於血。不能成積也。又如脾積之痞氣丸。用白朮砂仁。豉烏梅。桂。以治虛寒矣。乃更用連芩為諸藥之君者。為積塊已堅。氣鬱已久。化溼化熱塊日益大。責其本在寒。治其標在溼熱。再以厚樸散結。吳茱萸下墜。茵陳導溼。而合芥澤以滲之。是其不專主清熱者。不猶是不以熱先溼之義乎。又有繁甲丸。治痞氣。當胃脘結聚如杯積久不散者。以繁甲為君。大黃為臣。更用附子行溼。木香升降諸氣。而吳茱萸佐之。另有破結散聚者。總因溼熱屬血分病。而脾土主溼化。此丸亦猶是治溼為先。不外於下氣除血痺之義爾。其次治嘔吐證。有丁香吳茱萸湯以治寒。又有明醋參黃等丸。以治溼熱。

至於霍亂。則有吳茱萸湯。治胃裏伏熱。腹痛作瀉。或胃寒忍飢。傷胃吐瀉。甚則頭眩眼暈。轉筋逆冷。其處方止。吳茱萸。木瓜。食鹽。三味也。又木瓜湯。治吐瀉轉筋。攪悶。止木瓜。吳茱萸。茵香。甘草。四味也。更有木瓜散。但以生薑易茵香。去甘草而已。數方雖以木瓜為主。而非吳茱萸不足以助之。其次治心痛。脛痛。有九痛丸。是因虛寒而疎越其滯氣者。又扶陽助胃湯。是驅寒而補其中土之虛者。又草豆蔻丸。是主客寒犯胃即熱。亦可用者。此其用吳茱萸之義易明也。又其次則治痺三方。一腸痺。二脾痺。諸痺。因風寒溼邪閉其正氣。以故患於不仁。第痺在腸。是六腑受病。其治疎利而兼以補。痺在脾。是五臟受病。其治補益而入以行。如吳茱萸者。或腑或臟。行氣暢血。皆不可少。概不越於下氣除溼血痺之義也。【清】鄒澍本經疏證論吳茱萸曰。據仲景之用吳茱萸。外則上至頭頂。下徹四支。內則上治嘔。下治利。其功幾優於附子矣。不知附子。吳茱萸。功力各有所在。焉得並論。附子之用。以氣。故能

不假系屬。於無陽處生陽。吳茱萸
之用以味。故僅能開陰。使陽
自伸。陰自戢耳。歷觀吳茱萸所治
之證。皆以陰墮陽爲患。其所墮之
處。又皆在中宮。是故乾嘔。吐涎沫。
頭痛。食穀欲嘔。陰墮陽於上。不得
下達也。吐利手足逆冷。煩躁欲死。
手足厥寒。煩細欲絕。陰墮陽於中。
不得上下。并不得外達也。傷寒論
中但言其所以而未及抉其奧。金
匱要略則以一語點明之曰。嘔而
胸滿。夫不墮何以滿。謂之胸滿。則
與不滿有間。可知不在他所矣。然
則溫經湯獨不以吳茱萸爲主歟。
何以其滿在腹。且云少腹裏急也。
此蓋有在氣在血之不同。故所處
之地亦不同。然其係於墮一也。夫
手掌煩熱。非大陰證所謂四肢煩
疼乎。卽其主證。唇口乾燥。腹之六
節。或象論所謂脾胃大小腸三焦
膀胱爲倉庫之本營之居。而其華
在唇。四白者。亦豈能外於中土乎。
惟其在血。則不得不在下。是卽本
經所謂溼血痺者也。或曰古之人
皆以吳茱萸爲肝藥。今若子言。則
似脾藥矣。不既顯相背耶。予謂中

品之藥。以疏通氣血而治病。烏得
以五臟六腑印定之。且土壅則木
不伸而爲病。土氣疏通則木伸而
病已。蓋其施力之所在脾。所愈者
實肝病也。謂之爲肝藥。又何不可
之有。

國外學說 日本學說謂吳茱
萸。自昔用爲刺衝。驅風。健胃。收斂。
驅蟲等藥。有偉效。至於吳茱萸之
成分。依藥學士慶松勝左衛門氏
(藥學雜誌第二百四十八號)之
試驗。析出針狀結晶物。無臭。味
苦。有純白色光輝。氏命名「エボ
チン」又依丹波敬三氏(中外
醫事新報第四百四號)之試驗
云。製出此結晶體之際。其物質或
溶液。觸於皮膚。則甚刺戟。覺痛癢。
故信其有類於「タフシヤ」之效
力。試混和五〇%於樟膏。及製一
五〇%之亞爾個保兒性丁。幾由三
浦博士實驗中所著明者。主使用
吳茱萸丁。幾。始試用二至五〇%之
樟膏。後用一・五〇%之酒精溶液。
則後比前患者不甚煩。且其效驗
亦著明。氏用本品治療者。爲位於
筋肉或皮膚之「パレステジ」

如於肋膜炎。神經痛等。或官能的
中樞性。末梢性之知覺脫失等。未
試用之。又據慶松藥學士之說云。
以吳茱萸丁。幾。代沃度丁。幾等之
用。亦有效。此殆爲該果實中揮發
油分之有效。與氏所析出之「エ
ボチン」全異其關係。要之如「
エボチン」之中性安定物質。藥
物學上之興味甚薄也。又古方藥
品考曰。吳茱萸來自中國者。粒小
色黑。味苦辛。爲上品。間有攪入羶
沙。當別去用之。又古人建六陳之
目。故後人單貴陳舊者。但若辛味
消失。則不堪藥用矣。日本產。粒大
倍中國產。其隔年者可用。藥舖稱
爲眞吳茱萸。又有一種小粒者。品
甚佳。功用亦無別。凡味極辛苦者
有奇效。宜爲丸藥用。日本之城州。
和州。紀州及西南諸州郡。俱有之。
又和漢藥考曰。吳茱萸爲六陳之
一。以陳久者爲貴。有中國產與日
本產兩種。中國產實小。香氣清。日
本產實大。香氣厚。藥用以中國產
爲良。日本之有此。約在千年以前。
惟移補中國種。則始於享保年間。
至研究吳茱萸之成分者。丹波藥

學博士實開其始。慶松藥學博士
繼之。至朝比奈藥學博士。尤精確
檢查其有效成分。詳述如下。丹波
藥學博士。初以伊打抽出吳茱萸
之脂肪油。復以酒精化之。其溶解
中。遂見有白色之針狀結晶體。此
結晶體或其溶液。觸於皮膚。覺刺
戟。頗甚而發痛癢。其效極似塔夫
夏。管製成五〇%樟膏。及一・五〇%
之酒精溶液。以供臨床試驗之用。
藥學士慶松勝左衛門。又用偏蘇
兒浸出法。自吳茱萸之浸液中。析
出一種無蜜素性之結晶體。定名
爲伊澤廷。曰。C₁₀H₁₆O。其化學之集
成爲C₁₀H₁₆O。熔點爲二百八十
五度。成類似拉庫香之化合物。又
藥學博士朝比奈泰彥。及藥學士
石尾正文。同自吳茱萸之酒精冷
浸液中。得結晶混合物。更以美企
兒酒精分離試驗之。始知慶松所
謂之伊澤廷者。並非吳茱萸之主
成分。以其中尚有極多含蜜素性
之結晶體也。衆知此生藥所以有
苛烈之臭味。實係於所含之揮發
油與其蜜素體。後朝比奈復與藥
學士柏木幸一。續加研究。以吳茱

七畫 吳

黃末浸於亞攝發液中。俟冷。蒸發而餘渣滓。繼以亞兒加里播置其渣滓。使吳茶莢之成分。為有系統之分離。於是揮發油之主成分。純粹析出。為一種物質。定名為伊薄登 Evodone $C_{15}H_{17}NO$ 。其酷似沃企孟 Ocimen 之結晶體。則為伊薄廷。此外尚有伊薄遮明 Evodiamin $C_{15}H_{17}NO$ 。及耳特加爾 $Rutaecarpin C_{18}H_{21}NO$ 。此兩種皆植物鹽基。朝比奈研究心切。又與藥學士前田仙太郎。同試驗該兩鹽基之化學構造。續行報告焉。

吳黃氣味皆淡。不入藥用。惟近年絕少(曹炳章)
配合應用 ①治風濕痺痺。茶莢一升。酒五升。煮取一升半。溫洗之。立止。(孟詵方)
②治賊風口偏不能語者。茶莢一升。薑鼓三升。清酒五升。和煎五沸。待冷。服半升。一日三服。得少汗即瘥。(孟詵方)
③治冬月感寒。吳茶莢五錢。煎服之。取汗。(孟詵方)
④治頭風作痛。茶莢煎濃湯。以綿染額。拭髮根良。(千金方)
⑤治嘔涎頭痛。吳茶莢湯。用茶莢一升。棗二十枚。生薑一大塊。人參一兩。以水五升。煎取三升。每服七合。日三服。亦治嘔吐胸滿。(仲景方)

辨偽 偽名洋吳莢。味較辛辣。顆粒又小。服之反有頭痛。貽害匪淺。按吳茶莢。江浙蜀漢皆有。多生吳地。故名吳莢。味辛。溫。有小毒。木高丈餘。葉紫色。似椿而闊厚。開紅紫花。結實。纒成簇。似椒子而無核。嫩時微黃。熟則深紫。形色可辨。幸勿用洋吳莢。而貽害不少也。
(鄭肖巖) 按吳茶莢。上春出新。湖南長沙。安化及廣西出者。粒大種亦多。氣味稠鼻。皆佳。浙江嚴州出者。粒細梗少。氣味略薄。亦佳。洋

門。關元。腎俞穴。用吳茶莢醋炒。熱橘皮。附子去皮各一兩。為末。麩糊丸。梧子大。每豈湯下七十丸。(孫氏仁存方)
②治陰溼傷寒。四肢逆冷。用茶莢一升。酒拌溼。相袋二箇。包蒸極熱。更互熨足心。候氣透痛。亦即止。累有效。(聖惠方)

③治中惡心痛。吳茶莢五合。酒三升。煮沸。分三服。亦治心腹冷痛。(楊氏產乳方)
④治冷氣腹痛。吳茶莢二錢。搗爛。以酒一鍾調之。用香油一盃入鍋煎熱。傾茶酒入鍋。煎一滾。取服立止。(唐瑤經驗方)
⑤治脾元氣痛。發歇不可忍。用茶莢一兩。橘仁一兩。和炒茶焦。去茶取橘仁。去皮尖。研細。葱白三莖。煨熱酒浸溫服。(經驗方)

⑥治寒疝往來。吳茶莢一兩。生薑半兩。清酒一升。煎溫分服。(肘後方)
⑦治小腸疝氣。奪命丹。治遠年近日小腸疝氣。偏際墜疼。膝下撮痛。以致悶亂。及外腎腫硬。日漸滋長。及陰間溼痒成瘡。用吳茶莢去

五八二

梗一斤。分作四分。四兩酒浸。四兩醋浸。四兩湯浸。四兩童子小便浸。一宿。同焙乾。澤瀉二兩。為末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯或酒吞下。(和劑局方)

⑧治小兒腎縮。乃初生受寒所致。用吳茶莢。硫黃各半兩。同大蒜搗研。塗其腹。仍以蛇牀子烟熏之。(聖惠方)
⑨治婦人陰寒。十年無子者。用吳茶莢。川椒各一升。為末。煉蜜丸。彈子大。綿裹內陰中。日再易之。但子宮閉即有子也。(經心錄方)
⑩治子腸脫出。茶莢三升。酒五升。煎二分。分三服。(兵部手集方)

⑪治醋心上攻如濃酸。用茶莢一合。水三盞。煎七分。頓服。近有人心如蠶破。服此二十年不發也。累用有效。(兵部手集方)
⑫治食已吞酸。胃氣虛冷者。吳茶莢湯泡七次。焙乾。蠶泡等分為末。湯服一錢。(聖惠方)
⑬治轉筋入腹。吳茶莢炒二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。得下即安。(聖濟總錄方)
⑭治霍亂乾嘔不止。吳茶莢泡

炒。乾蓮炮等分。水煎服之。(聖濟總錄方)

①治多年脾泄。老人多此。謂之水土同化。吳茱萸三錢。泡過。入水煎汁。入鹽少許。通口服。蓋茱萸能暖膀胱。水道既清。大腸自固。他藥難熱。不能分解清濁也。(孫氏仁存方)

②治臘寒泄瀉。倦怠減食。吳茱萸湯泡過。炒豬鬃半條。去脂洗淨。裝滿。紮定。文火煮熟。搗丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。日二服。亦治滑痢不止。(普濟方)

③治下痢水泄。吳茱萸炒。黃連炒。各二錢。水煎服。未止再服。(聖惠方)

④赤白下痢。戊己丸。治脾胃受溼。下痢腹痛。米穀不化。用吳茱萸黃連。白芍藥各一兩。同炒為末。蒸餅丸。梧子大。每服二三十丸。米飲下。(和劑局方) ⑤二色丸。治痢及水泄。屬風。用吳茱萸二兩。黃連二兩。同炒香。各自為末。以百草霜末二兩。同黃連作丸。以白芍藥末二兩。同茱萸作丸。各用飯丸。梧子大。各收。每服五十九丸。赤痢烏梅湯下。速

霜白痢米飲下。茱萸丸。赤白痢各半服之。(鄧筆山雜興方)

⑥治赤痢腹痛。茱萸合黑豆湯吞之。(千金方)

⑦治腸痔常血。下部痒痛。如蟲咬者。搗地作坑。燒赤。以酒沃之。搗茱萸二升。入坑。乘熱。坐有孔板。蒸之。冷乃下。不過三四度愈。(肘後方)

⑧治腹中穢塊。吳茱萸三升。搗和酒煮熱。布囊熨臍上。冷更炒熱。更番熨之。穢移走。逐熨之。消乃止。(姚僧坦集驗方)

⑨治產後盜汗。尙齒惡寒。吳茱萸一雞子大。酒三升。漬。半日煮服。(千金方)

⑩治口瘡口疳。茱萸末。醋調塗。足心。一夕愈。亦治咽喉作痛。(集簡方)

⑪治牙齒疼痛。茱萸煎酒含漱之。(孟詵方)

⑫治小兒頭瘡。吳茱萸炒焦為末。入米粉少許。豬脂醋調塗之。(聖惠方)

⑬治小兒瘰癧。一名火灼瘡。一名火爛瘡。茱萸煎酒拭之。良。亦治

老小風疹。(兵部手集方)

⑭治癰疽發背。及發乳諸毒。用吳茱萸一升。搗為末。用苦酒調塗。帛上貼之。(外臺祕要方)

⑮治陰下溼痒。吳茱萸煎湯。頻洗。取效。(外臺祕要方)

⑯治骨在肉中不出者。咀茱萸封之。骨當腐出。(孟詵方)

⑰治魚骨入腹。刺痛不得出者。吳茱萸水煮一盞。溫服。其骨必輒出。未出再服。(孟詵方)

⑱治蛇咬毒瘡。用吳茱萸一兩為末。冷水和作三服。立安。(勝金方)

⑲治肩疽白禿。並用吳茱萸鹽淹過。炒研。醋和塗之。(活幼口議方)

用量 五分至八分。施用宜忌 凡無寒溼者禁用。惡丹參。消石。白堊。長紫石英。麥寶為之使。

著名方劑 吳茱萸湯。嘔而胸滿者。此湯主之。及乾嘔吐涎沫。頭者亦主之。(金匱) 吳萸一升。人參三兩。生薑六兩。大棗十二枚。右四味以水五升。煮取三升。溫服七合。

日三服。

參攷資料 ①段成式首。椒氣好下。茱萸氣好上。言其衝膈不可為服食之藥。故多食衝眼又脫髮也。(蘇頌) ②朱氏集驗方云。中丞常于正苦痰飲。每食飽。或陰晴節變。率同。十日一發。頭疼背寒。嘔吐酸汁。即數日。伏枕不食。服藥罔效。宣和初。為順昌司祿。於太守蔡達道席上。得吳仙丹方。服之。遂不再作。每遇飲食過多。腹滿。服五七十丸。便已。少頃小便。作茱萸氣。消飲皆隨小水而去。前後服藥甚衆。無及此者。用吳茱萸湯泡七次。茯苓等分為末。煉蜜丸。梧子大。每熱水下五十九丸。梅楊柳方。只用茱萸酒浸三宿。以茯苓末拌之。日乾。每吞百粒。溫酒下。又咽喉口舌生瘡者。以茱萸末醋調貼兩足心。移夜便愈。其性雖熱。而能引熱下行。蓋亦從治之義。而謂茱萸之性上行不。下者。似不然也。有人治小兒痘瘡。口瘳者。搗茱萸一二粒。拌之。即開。亦取其辛散耳。(李時珍) ③今處處有之。江淮蜀漢猶多。木高丈餘。皮青綠色。葉似樺而潤厚紫色。三

月開紅紫細花。七月八月結實。似

椒子。嫩時微黃。至熟則深紫。或云

顆粒緊小。經久色青綠者。是吳茱

萸。顆粒大。經久色黃黑者。是食茱

萸。恐亦不然。按周處風土記云。俗

尚九月九日。謂之上九。茱萸到此

日氣烈熱色赤。可折其房以插頭。

云辟惡氣禦冬。又續齊諧記云。汝

南桓景隨費長房學道。長房謂曰。

九月九日。汝家有災厄。宜令急去。

各作絳囊。盛茱萸以繫臂上。登高

飲菊花酒。此禍可消。景如其言。舉

家登高。山夕還。見雞犬牛羊一時

暴死。長房聞之曰。此代之矣。故人

下。

【吳茱萸根及白皮】

性質 辛。

苦熱無毒。

主治 殺三蟲。(本經) 蟻蟲。治

喉痺欬逆。止洩。注食不消。女子經

產餘血。療白癬。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論吳茱萸根皮曰。殺牙齒

蟲止痛。【唐】甄權藥性本草論吳

萸根皮曰。治中惡。腹中刺痛。下痢

不禁。療漆瘡。

【吳茱萸葉】

性質 辛。苦。熱。無毒。

主治 霍亂下氣。止心腹痛。冷

氣。內外腎釣痛。鹽穢毒之神驗。乾

即易。轉筋者同艾持。以醋和卷之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論吳茱萸葉曰。治大寒犯

腦頭痛。以酒拌葉。袋盛蒸熟。更互

枕熨之。痛止為度。

【吳椒】即吳茱萸之古籍別名。典

見和漢藥考詳【吳茱萸】條。

【吳菝葜】即菝葜之古籍別名。典

見食性本草詳【菝葜】條。

【吳葵】即蜀葵之古籍別名。典見

別錄。詳【蜀葵】條。

【吳葵花】即蜀葵花之原名。詳【

蜀葵花】條。

【吳藍】

命名 本品為藍之一

種。莖長如蒿而開白花

者。故名。

性質 苦。甘。冷。無毒。

主治 寒熱頭痛。赤眼。天行熱

狂。丁瘡。遊風。熱毒腫毒。風癩。除煩

止渴。殺疔。解毒藥毒。筋。金瘡。血閉

毒。刺。蟲。蛇。傷。鼻。衄。吐。血。排。膿。產。後

血。暈。小。兒。壯。熱。解。金。石。藥。毒。狼。毒

射。罔。毒。

施用宜忌 凡無實火熱毒。而

血症係由陰虛者禁用。

【吳雞】即茨實之古籍別名。典見

和漢藥考詳【茨實】條。

【吳醇】即米酒之古籍別名。典見

和漢藥考詳【米酒】條。

【吸鐵石】即慈石之古籍別名。典

見本草集註詳【慈石】條。

【吸鐵石】即慈石之古籍別名。典

見直指方詳【慈石】條。

【吹沙】即鯀魚之古籍別名。典見

郭璞賦詳【鯀魚】條。

【吹吐魚】即河豚之古籍別名。典

見綱目詳【河豚】條。

【吻頭】即楸木之古籍別名。典見

本草拾遺詳【楸木】條。

【呀喇苦】即胡桐淚之古籍別名。

典見植物學大辭典詳【胡桐淚】

條。

【呂宋果】

命名 本品產於南

古籍別名 加空弄果。寶豆。(

綱目拾遺)

形態 呂宋果樹為喬木類之

一種。樹高大。其果肉核可供藥用。

性質 苦。

主治 解中寒服毒。蛇蝎蜈蚣

及刀斧傷。中風昏仆。腹痛瀉利。瘡

疾。小兒蛔蟲疳積。頭瘡癢爛。潮熱

並水腫服及外敷。

【呆礞石】即死礞石之處方用名。

詳【慈石】條。

【囫圇速剋】即速剋之處方用名。

詳【速剋】條。

【困來草】

古籍別名 水灌頭

子。(綱目拾遺)

形態 困來草為雜草類之一

種。其子如桑子而圓。如茶紙子而

綠不紅。可供藥用。

【吳茱萸枝】

主治 大小便

卒閉格不通。取

南行枝如手第二指中節。含之立

主治 黃疸。同石萎搗汁酒服。

【均靈】即乾薑之古籍別名。典見綱目。詳「乾薑」條。

【均享李子】即李子之南方產者。典見綱目。詳「李子」條。

【坎壘】即附帶之古籍別名。典見綱目。詳「附帶」條。

【坐孽草】基本 屬蕁草類。為坐孽草之莖葉。

產地 生江西及豫州。按統一志云。出吉安永豐縣。

性質 辛熱有毒。

主治 風痺。壯筋骨。兼治打撲傷損。

參攷資料 ①神醫普救方。治風藥中已有用者。(蘇頌) ②危氏得效方。煎藥煮酒方中用之。聖濟錄治臨上瘧熱。咽喉噎塞。小便赤澀。神困多睡。有坐孽丸。用坐孽草。

大黃、赤芍藥、木香、升麻、麥門冬、黃芪、木通、酸棗仁、慈苳仁、枳殼等分。為末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。麥門冬湯下。(李時珍)

【坐魚】即田雞之古籍別名。典見綱目。詳「田雞」條。

【壯味】即五味子之古籍別名。典見綱目。詳「田雞」條。

見和漢藥考。詳「五味子」條。

【夾竹桃子】即鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳「鳳仙子」條。

【夾胎瑪瑙】即瑪瑙之古籍別名。典見本草衍義。詳「瑪瑙」條。

【夾蛇龜】即攝龜之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「攝龜」條。

【妓女】即萱草之古籍別名。典見吳普本草。詳「萱草」條。

【妓女子】即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【妙砂砂】即砂砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「砂砂」條。

【孚乳甲】即鼈甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼈甲」條。

【字字丁菜】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【孝文韭】產地 生北方山谷中。

形態 孝文韭為菜類韭屬之一種。狀與韭同。可供食與藥用。

性質 辛溫。無毒。

主治 腹內冷。脹滿。洩痢。腸辟。溫中補虛。令人能食。

參攷資料 ①孝文韭傳為後漢魏孝文帝所種。又有諸葛韭。孔

明所種。彼人多食之。(陳藏器) ②孝文韭亦山韭之類。但因人命名耳。(李時珍)

【孝鳥】即慈鳥之古籍別名。典見說文。詳「慈鳥」條。

【尾花】即芒之日本名。詳「芒」條。

【尾墨】即鵝屎之古籍別名。典見綱目。詳「鵝屎」條。

【尿白鹼】即人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人中白」條。

【尿坑泥】主治 蟻蟻諸蟲咬。取塗之。

【局皮】即蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。

【訶茶】(綱目拾遺) 古籍別名 江西訶片。

性質 苦。無毒。

主治 消宿食。降火利痰。

施用宜忌 能峻伐生氣。虛人禁用。

參攷資料 訶茶出贛州府甯都縣。製法與江南之訶片異。茶疏

訶茶不炒。飯蒸熟。然後烘焙。此指江南者言耳。出江西者生晒。不經火氣。其性最消導。貯飯一甌。以茶泡之。經半日。飯不加漲而消少許。

故飽食者宜飲此茶。別有一種極細炒訶。乃採之他山。炒焙以歎好奇者。反非其真。然則茶亦不可以觀取也。(綱目拾遺)

【岐良】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【岑菜】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「魚腥草」條。

【希仙】即蕩草之古籍別名。典見綱目。詳「蕩草」條。

【希灰】即石灰之古籍別名。典見別錄。詳「石灰」條。

【希賢】即蕩草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕩草」條。

【延年卷雪】即桑白皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑白皮」條。

【延年草】即法製青皮之古籍別名。典見易簡方。詳「法製青皮」條。

【延命草】即胡草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡草」條。

【延胡索】原名 玄胡索。

原名 玄胡索。本品因避宋真宗諱。遂改玄為延也。

處方用名 元胡索。奎元胡。生延胡。炒延胡。

古籍別名 玄靈索。武胡索。滴

金卵(和漢藥考)

學名 *Corydalis bernaia*

Nakai.

基本 屬罂粟科。為延胡索之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。延胡索產浙江寧波。八月新。

形態 延胡索為多年生草本。自生於山野陰溼之地。莖高二三寸至五六寸。葉為掌狀複葉。具長葉柄。小葉有時三裂。花為不整齊之花。紫色。有短。數朵相綴而為總狀花序。本品為塊莖。日本產者。其地下膨大之塊莖。經年則漸枯朽。別於上部生新塊莖。附以葉芽。此新生塊莖。更出數條纖弱之莖。在我國種。一塊莖僅出一莖。又新鮮之塊莖。形圓如球。或似圓錐。或若棍棒。有突起如疣瘤。突起處即為他日出莖所在。間有留餘莖者。外皮灰褐色。皺紋不著。長〇·五至二·五cm。粗〇·二至一·〇cm。間有一·七cm。粗者。角質堅實。破折面平滑。或為顆粒狀。色灰黃。帶綠。或黃色。味微苦。無臭。我國產延胡索。外面多為壓扁之球

形。似半夏。色黃。或黃褐。表面皺裂顯然。

採取 立夏節採根。

製法 凡使須取粒粒金黃色者。行血酒製。止血醋炒。破血生用。調血炒用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 日本產延胡索。其主要成分為普羅托品 *Protopin* 及勃爾薄加浦甯 *Bulboos Pulin*。兩者含量相同。新鮮者俱為〇·一%。

效能 利氣止痛。活血散瘀。專治婦人之月經不調及帶下。又治疝氣。腰腹諸痛。及治周身肢體疼痛等症。

主治 破血。婦人月經不調。腹中結塊。崩中淋瀝。產後諸血病。血暈。暴血衝上。因損下血。煮酒或酒磨服。

歷代記載攷證 【唐】李珣海

藥本草論延胡索曰。散氣。治腎氣。通經絡。【宋】大明諸家本草論延胡索曰。除風。治氣。暖腰膝。止暴腰痛。破癥瘕。損瘀血。落胎。【元】王好古湯液本草論延胡索曰。治心氣。

小腹痛。有神效。【明】李時珍本草綱目論延胡索曰。活血和氣。止痛。通小便。【明】經希雍本草經疏論延胡索曰。延胡索味辛氣溫而無毒。入足厥陰。亦入手少陰經。溫則能和暢。和暢則氣行。辛則能潤而

走散。走散則血活。血活氣行。故能主破血及產後諸病。因血所為者。婦人月經之所以不調者。無他。氣血不和。因而凝滯。則不能以時至。而多後期之證也。腹中結塊。產後血暈。暴血衝上。因損下血等證。皆須氣血和而後愈。故悉主之也。崩中淋瀝。利守不利走。此則非與補氣血藥同用。未見其可。【清】黃宮繡本草求真論延胡索曰。延胡索氣味辛溫無毒。入足厥陰肝。手少陰心經。能行血中氣滯。氣中血滯。故凡月水不調。心腹卒痛。小腹脹痛。胎產不下。筋縮疝瘕。產後血衝血暈。跌仆損傷。不論血是氣。積而不散者。服此力能通達。以其性溫。則於氣血能行能暢。味辛則於氣血能潤能散。所以理一身上下諸痛。往往獨行功多。然此既無益氣之情。復少養營之義。徒仗辛溫

攻凝逐滯。世人當兼補藥同用。否則徒損無益。根如半夏。肉黃小而堅者良。酒炒行血。醋炒止血。生用破血。炒用調血。

國外學說 日本之有延胡索。始於享保年間。有攜中國種來者。試栽種之。乃漸傳播。今日販賣品。多日產延胡索。惟本草及其他中法醫書。皆云日產延胡索。無如中

產延胡索或中國種延胡索之性。能。又本草綱目啓蒙曰。享保中國種至日本。時有大葉。小葉二種。大葉名牡丹葉。一葉三枝。枝有三葉。葉之末細小。作牡丹葉狀。十二月或初春生苗。大葉苗高五寸許。小葉短。小葉皆厚。於日產。正二月開花。似紫堇花。先作紫色。後漸帶青。花後結小扁莢。四月苗枯。日產有大葉。中葉。小葉三種。大葉出濃州。葉似荷包牡丹葉。而小中葉出紀州。勢州。路旁往往見之。三月開花。與中國種相同。小兒每喜以此草之花。尊與紫花地丁之花。尊互相勾引。決訝為戲。小葉蘆深山幽谷間。葉至小。苗高纔二三寸。莖細如絲。花較中國種略小。四月開

花，以深山地冷故也。凡日本產延胡索，其根俱大。然色白如半夏。熊野所產，微帶黃色。中國種之上品也。根圓或不正圓。圓者外皮色黃，不正圓者黃褐。說見錫囊秘錄。又物類品隱曰：延胡索，日本所在皆有。花與葉，頗似中國產。然根白，甚小，不堪用。中國種之佳者，享保中始傳其種。有大葉、小葉二種。俗稱牡丹葉延胡索者，葉有三叉，略似牡丹葉。二月開紫花，似地錦苗。花根類半夏，作黃色。又一本堂藥選曰：凡選延胡索，以狀似半夏，色黃者為佳。中國來者，祇此一種。日本無之。用時水洗，剉細，凡醋炒、鹽炒，及上部酒炒、中部醋炒、下部鹽水炒等法，皆不取。近時官園有一種玄胡索，葉似魚子牡丹，而厚，花紫色。此與本草所云葉如竹葉狀者迥異。聊誌之以存疑焉。又草木本育種曰：中國種延胡索，名牡丹葉。其葉似牡丹，而小。根圓如零餘子，色黃。日本之尾張出一種，有三葉形，似牡丹葉。葉中有紫斑，花似地錦苗，而大。兩種俱入藥用。同為上品。又有竹葉者，葉最細，稍闊，根小，色

淡白，下品也。宜種以山野之土。秋冬，以灰及人糞少許作肥料，并入土，壟培之，則善長。兔好掘食其根，須圍置之。又日用藥品考曰：中國來之延胡索，多上品。日本產形小，質輕，色淡黃或帶白，實不堪用。藥舖所謂真延胡索，即此種也。又手板發蒙曰：延胡索，皆中國種。日本產非上品。來自中國之大葉、小葉兩種，有根小而帶黑色者，以中國種栽之，年久則根大而色黃。又荷爾藥鏡云：日本產延胡索之性能，與中國產者相同。延胡索根，有解凝、去穢、發汗、利尿、通經之效。治心腹痛、疝痛、疏解子宮之凝血、通月經、下血塊、胞衣、死胎，能刷淨胸肺之黏液，而排除之。小兒蟲症，以此末三分服之，蟲即下。黃痘、疥癬，延胡索根，研末一錢，以適宜之飲液送下，溫覆發汗而愈。服量：散劑，自五分至一錢，或水煎服，亦佳。咽喉腫痛，以此煎劑類類含漱，便能消散。創傷、潰瘍、痔瘡，搽此藥末，其效與馬兜鈴根同。

配合應用 ●治老小咳嗽。玄胡索一兩，桔梗二錢半，為末，每服二錢，饅餡一塊和含之。（仁存堂方）
 ●治鼻出衄血。玄胡索末，綿裹塞耳內，左側塞右，右側塞左。（普濟方）
 ●治小便尿血。玄胡索一兩，朴硝七錢半，為末，每服四錢，水煎服。（活人書方）
 ●治小便不通。捻頭散。治小兒小便不通，用延胡索、川苦楝子等分為末，每服半錢，或一錢，白湯滴油數點調下。（小兒真訣方）
 ●治膜外氣疼。及氣塊。延胡索不限多少，為末，豬膜一具，切作塊子，炙熱，爾末類食之。（勝金方）
 ●治熱厥心痛。或發或止，久不愈。身熱足寒者，用玄胡索去皮，金鈴子肉等分為末，每溫酒或白湯下二錢。（聖惠方）
 ●治婦女血氣。腹中刺痛，經候不調，用玄胡索去皮，醋炒，當歸酒浸炒各一兩，橘紅二兩，為末，酒煮米糊丸，梧子大，每服一百丸，空心艾醋湯下。（普濟方）
 ●治產後諸病。凡產後穢污不盡，腹滿及產後血暈，心頭硬或寒

熱不禁，或心悶手足熱，煩氣力欲絕諸病，並用延胡索炒研，酒服二錢，甚效。（聖惠方）
 ●治小兒盤腸氣痛。延胡索、茴香等分炒研，空心米飲，量兒大小與服。（衛生易簡方）
 ●治疝氣危急。玄胡索鹽炒，全蠟去毒，生用等分為末，每服半錢，空心鹽酒下。（直指方）
 ●治偏正頭痛不可忍。玄胡索七枚，青黛二錢，牙皂二箇，去皮子為末，水和丸，如杏仁大，每以水化一丸，灌入病人鼻內，隨左右口咬銅錢一箇，當有涎出，成益而愈。（永類鈴方）
 ●治墜落車馬，筋骨病不止。延胡索研末，豆淋酒服二錢，日二服。（聖惠方）
 用量 錢半至三錢。
 施用宜忌 凡血虛及無瘀滯者禁用。
 參攷資料 ●主腎氣，及破產後惡露，或兒枕，與三稜、甲大黃為散甚良。蟲蛀成末者尤良。（李珣）
 ●荆穆王妃胡氏，因食蕎麥麵着怒，遂病胃脘當心痛，不可忍。

醫用吐下行氣化滯諸藥。皆入口即吐。不能奏功。大便三日不通。因思雷公炮炙論云。心痛欲死。速覓延胡。乃以玄胡索末三錢。溫酒調下。即納入。少頃大便行而痛遂止。又華老年五十餘。病下痢腹痛。垂死。已備棺木。予用此藥三錢。米飲服之。痛即減。服之止。調理而安。按方勺泊宅編云。一人病遇體作痛。殆不可忍。都下醫或云中風。或云中暈。或云脚氣。藥悉不效。周鍾亨言是氣血凝滯所致。用玄胡索。當歸。桂心等爲末。酒溫服三四錢。隨量頻進。以止爲度。遂痛止。蓋玄胡索能活血化氣第一品藥也。其後趙待制寔因導引失節。肢體拘攣。亦用此數服而愈。(李時珍)自說器謂本品生奚國。奚乃東北夷也。今二茅山西上龍洞種之。每年寒露後栽。立春後生苗。葉如竹葉。樣三月長二寸高。根叢生如芋卵樣。立夏掘起。(李時珍)

【延委子】即胡委之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡委」條。
【延壽果】即薇衍子之原名。詳「薇衍子」條。


【弄丸】即蛟蝦之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛟蝦」條。

【弟切草】古籍別名。乙切草。小連翹。(和漢藥考)

外國名詞 Hypericum ororum, Thunb. (拉丁)

基本 屬金絲桃科。爲小連翹之莖葉。

形態 小連翹爲山野自生之多年生草。莖高二尺餘。葉皆對生。作長卵圓形。無葉柄。夏秋之間。於梢上及葉腋抽枝。叢生黃色五瓣花。葉面及花瓣俱有黑點。秋季結三稜莢。中有黑色細子。



草切弟

種類 弟切草有突拔弟切草。汗弟切草。姬弟切草。苦弟切草等數種。

效能 揉葉莖。貼金瘡。斬傷。及無名腫。有效。
國外學說 荷蘭藥鏡曰。用花穗。溫煖疎解。含有香脂狀油。能收

弟切草。(即斬弟草)

【形虞】即阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿魏」條。

【形鹽】即積齒所結成之鹽。詳「食鹽」條。

【形絲】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【役鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳「斑鳩」條。

【忍冬】即委門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳「委門冬」條。

【忍冬花】即金銀花之原名。詳「金銀花」條。

【忍冬藤】命名 本品蔓延藤。生凌冬不凋。故名。

處方用名 銀花藤。

古籍別名 金銀藤。鴛鴦藤。鷓鴣藤。老翁鬚。左纏藤。金銀股。(綱目) 通靈草。密栴藤。(土宿) 耐冬藤。左紐。甜藤。左紋藤。過東藤。水楊藤。雙鬚草。山比得。環兒花。蠻暖花。老公鬚。金銀花草。(和漢藥考)

外國名詞 Honey. Snake. (英) Cissidath. (德)

基本 屬忍冬科。爲忍冬之藤葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。忍冬藤產廣東各屬。別省亦均有。凡山野平原之樹林間。恒多生焉。其本 忍冬爲生於原野。園庭。山中之莖性小灌木。左纏樹木。春季生新葉。對生。作卵圓形或橢圓形。其端尖。有軟毛。初夏於葉腋開白花。後變黃。香氣強烈。由瓣脚吸其花。有甘味。兒童喜吸之。故日本俗呼「吸桂」。又其葉經冬不凋。故名忍冬。



忍冬

採取 十月至十二月間。採藤葉。陰乾。
用法 水煎或酒浸。或熬膏。或對末和作丸散。
性質 甘溫無毒。
效能 清熱解毒。用作疔瘡癰疽藥。
主治 寒熱身腫。久服輕身。延年益壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

七畫 忍

性本草論忍冬藤曰。治腹脹滿。能止氣下瀉。【唐】陳藏器本草拾遺論忍冬藤曰。熱毒血痢。水瀉。濃煎服。【明】李時珍本草綱目論忍冬藤曰。治飛尸遁尸。風尸沉尸。尸注鬼擊。一切風溼氣。及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸瘡。散熱解毒。

近人學說 張山雷曰。忍冬乃金銀花之藤葉。隆冬不凋。故得此名。別錄稱其甘溫者。蓋即以藤莖之能耐霜雪。非其溫和之氣。不能有此力量。實則主治功效。皆以清熱解毒見長。必不可以言溫。故陳藏器謂爲小寒。且明言其非溫。甄權則稱其味辛。蓋惟辛能散。乃以解除熱毒。權說是也。今人多用其花。實則花性輕揚。力量甚薄。不知枝莖之氣味俱厚。古人止稱忍冬。不言爲花。則并不用花入藥。自可於言外得之。觀綱目所附諸方。尙是藤葉爲多。更是明證。別錄謂主治寒熱身腫。蓋亦指寒熱癰腫之疔瘡而言。與陳自明外科精要之忍冬酒忍冬圓同意。非能泛治一切腫脹。甄權謂治腹脹滿。恐有誤會。雖微辛能散。而性本寒涼。必非

通治脹滿之藥。甄又謂能止氣下瀉。則熱毒蘊於腸腑之辟積滯下。此能清之。亦猶陳藏器謂治熱毒血痢耳。藏器又謂治水痢。則爲大便自利之水瀉。惟熱利或可用之。而脾胃虛弱之自利。非其所宜。瀕湖謂治諸腫毒癰疽疥癬。楊梅諸瘡。散熱解毒。則今人多用其花。壽頤已謂不如藤葉之力厚。且不僅煎劑之必須。卽外用煎湯洗滌。亦大良。隨處都有。取之不竭。眞所謂簡便賤三字畢備之良藥也。

配合應用 忍冬酒。治癰疽發背。不問發在何處。發眉發頰。或頭或項。或背或腰。或脇或乳。或手足。皆有奇效。鄉落之間。僻陋之所。貧乏之中。藥材難得。但虔心服之。俟其疽破。仍以神異膏貼之。甚效。甚妙。用忍冬藤生取一把。以葉入沙盆研爛。入生餅子酒少許。稀調得所。塗於四圍。中留一口洩氣。其藤只用五兩。木植植損。不可犯錢。大甘草節生用一兩。同入沙瓶內。以水二盞。文武火慢煎至一盞。入無灰好酒一大盞。再煎十數沸。去滓。分爲三服。一日一夜。喫盡。病勢

重者。一日二劑。服至大小腸通利。則藥方到。沈內翰云。如無生者。只用乾者。然力終不及生者之效速。
(陳自明外科精要方)

忍冬圓。治消渴愈後預防發癰疽。先宜服此。用忍冬草根。整花葉皆可。不拘多少。入瓶內。以無灰好酒浸。以糠火煨一宿。取出。晒乾。入甘草少許。碾爲細末。以浸藥酒。打麪糊丸。梧子大。每服五十丸。至百丸。湯酒任下。此藥不特治癰疽。大能止渴。亦治五痔諸瘡。(外科精要方)

治一切腫毒。不問已潰未潰。或初起發熱。用金銀花俗名番藤。採花連莖葉。自然汁半盞。煎八分服之。以渣敷上。敗毒托裏。散氣和血。其功獨勝。亦治疔瘡便毒。並喉痺乳蛾。(萬表積善堂方)

敷腫拔毒。金銀藤大者。燒存性。葉焙乾。爲末。各二錢。大黃焙爲末。四錢。凡腫毒初發。以水酒調搽。四圍。留心洩氣。(楊誠經驗方)

癰疽托裏。治癰疽發背。腸癰。奶癰。無名腫毒。嫩痛實熱。狀類傷寒。不問老幼虛實。服之。未成者內

五八九

七畫 忍 志 忘 快 戒 扶

治已成者即潰。忍冬葉黃芪各五兩。當歸一兩。甘草八錢。爲細末。每服二錢。酒一盞。煎一盞。隨病上下服。日再服。以渣傳之。(和濟局方)

治惡瘡不愈。左纏藤一把。搗爛。入雄黃五分。水二升。瓦礫煎之。以紙封七重。穿一孔。待氣出。以瘡對孔蒸之。三時久。大出黃水。後用生肌藥取效。亦治輕粉毒癩。(選奇方)

治瘡久成漏。忍冬草浸酒。日日常飲之。(錢原禮要訣方)

熱毒血痢。忍冬藤煎飲。(聖惠方)

治五腫尸注。飛尸者。遊走皮膚。河穿臟腑。每發刺痛。變動不常也。遺尸者。附骨入肉。攻擊血脈。每發不可見。死尸聞哀。便作也。風尸者。滯羅四末。不知痛之所在。每發恍惚。得風雪便作也。沉尸者。纏結臟腑。冲引心脇。每發絞切。遇寒冷便作也。尸注者。舉身沉重。精神錯雜。常覺昏廢。每節氣至則大作也。並是身中尸鬼。引接外邪。宜用忍冬葉葉。剉散。煎。取濃汁煎稠。

每服雞子大許。溫酒化下。一日二三服。(肘後方)

中野菌毒。急採爲草。吹之。即今忍冬草也。(洪邁夷堅志方)

治口舌生瘡。赤梗蜜桶藤。高脚地銅盤。馬蹄香等分。以酒搗汁。雞毛刷上。取涎出。即愈。(普濟方)

忍冬膏。治諸般腫痛。金刃傷。瘡惡瘡。用金銀藤四兩。吸鐵石三錢。香油一斤。熬枯去滓。入黃丹八兩。待熬至滴水不散。如常搽用。(乾坤秘製方)

用鹽 三錢至一兩。

施用宜忌 凡氣虛中寒而無熱毒者禁用。

參攷資料 忍冬煮汁釀酒。補虛療風。此既長年益壽。可常探服。而仙經少用。凡易得之草。人多不肯爲之。更求難得者。費遠賤近。庸人之情也。(陶弘景) 藤生纏覆草木上。莖苗紫赤色。宿莖有薄皮膜之。其嫩莖有毛。葉似胡豆。亦上下有毛。花白莖紫。今人或以格石當之。非矣。(蘇恭) 忍冬在處有之。附樹延蔓。莖微紫色。對節生葉。葉似葎草。而青。有清毛。三四

月開花。長寸許。一蒂兩花。二瓣。一大一小。如半邊狀。長莖花初開者。蒸瓣俱色白。經二三日。則色變黃。新舊相參。黃白相映。故呼金銀花。氣甚芬芳。四月採花。陰乾。藤葉。不拘時採。陰乾。李時珍云。日本靜岡縣下所製忍冬酒。係舂糯米。用水洗淨。盛於炊飯蒸之。待其適度。再加入陰乾忍冬花。蒸後。移置篩上。俟其冷定。置入他桶。加麴及火酒。混和密封。豫防空氣侵入。四十九日而全熟。乃取出。入布袋。置榨槽中。用壓木壓榨。從其槽。寬流出者。即忍冬酒。貯藏他桶。經五六十日。去其渣滓。歷二年而製成。

五九〇

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

扶老 即爲藤之古籍別名。典見古今注。詳爲藤條。

俱可供藥用。



扶芳藤

採取 須採樹上者良。塚墓間者忌用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 一切血一切氣。一切冷。大主風血腰痛。去百病。久服延年。變白不老。到細浸酒飲。

【扶桑】 命名 本品葉似桑。故名。

古籍別名 日及(綱目)赤槿(草木狀)朱槿。

外國名詞 Hibiscus Rosa-sinensis, L. (拉丁)

產地 出南方諸地及粵中。

形態 扶桑爲灌木類之一種。乃木槿之別種。其枝柔弱。葉色深綠如桑。其花有紅黃白三色。紅者尤貴。葉質光而厚。高四五尺。而枝葉婆娑。花開深紅。五出。大如芍藥。又似芍藥。一簇之上。常開數百朵。朝開暮落。自五月開放。至中冬乃

止。其子有蕊一條。比花瓣稍長。上綴金屑。日光所燦。狀如火燄。取枝插之。卽能生活。其葉與花。俱可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 癰疽腫。取葉或花。同白芙蓉葉。牛旁葉。白蜜研膏敷之。卽散。

【扶桑花】 卽佛桑花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【扶留藤】 卽狗脊之古籍別名。典見食療本草。詳『狗脊』條。

【扶筋】 卽狗脊之古籍別名。典見別錄。詳『狗脊』條。

【扶蓋】 卽狗脊之古籍別名。典見別錄。詳『狗脊』條。

【扶櫛】 卽狗脊之古籍別名。典見食療本草。詳『狗脊』條。

【把髮】 卽百葉竹之古籍別名。典見綱目。詳『竹』條。

【把梳杏】 卽巴旦杏之別名。詳『甜杏仁』條。

【折根】 卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【折草】 卽芒之古籍別名。典見本草拾遺。詳『芒』條。

【折傷木】 產地 生山野間。形態 折傷木爲莖草類藤屬之一種。其藤纏樹木。葉如莽草而光厚。其藤莖可供藥用。

採取 八月九月間採之日乾。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 折傷筋骨疼痛。散血補血。產後血閉。止痛。酒水各半。煮濃汁飲之。

【折腰蕩】 卽菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【拖腸草】 卽旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【早三七】 卽三七之古籍別名。典見植物考彙編。詳『三七』條。

【早半支】 卽馬牙半支之古籍別名。典見百草鏡。詳『馬牙半支』條。

【早地蓮】 卽金蓮花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金蓮花』條。

【早辛】 卽辛子之古籍別名。典見綱目。詳『辛子』條。

【早芹菜】 古籍別名 葶。葶葵。(唐本草)苦葶。(綱目)留。(爾雅)

性質 甘。寒。無毒。

主治 搗汁洗馬痔瘡。并服之。

又塗蛇蝎毒。及癰腫。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論早芹菜曰。久食除心下煩熱。主寒熱。鼠瘻癰。生疥結核。聚氣下瘀血。止霍亂。及生搗汁中升服。能殺鬼毒。卽吐出。

參攷資料 爾雅云。留。苦葶也。郭璞云。卽葶葵。本草言味甘。而此云苦葶。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。(掌禹錫)其性滑如葵。故得葵名。(李時珍)葶菜野生。非人所種。葉似葶菜。花紫色。(蘇恭)早芹性滑利。故洪舜俞賦云。烈有椒桂。滑有葶榆。一種黃花者。有毒殺人。卽毛芹也。又烏苗亦名葶。有毒。(李時珍)

【早珍珠】 卽鳳仙子之古籍別名。典見綱目。詳『鳳仙子』條。

【早草】 卽刺蒺藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蒺藜』條。

【早荷】 卽鬼白之古籍別名。典見綱目。詳『鬼白』條。

【早荷葉】 卽鬼白之古籍別名。典見綱目。詳『鬼白』條。

【早稗】 卽稗之生於高土者。詳『稗』條。

【早蒲子】即馬蘭子之古籍別名。典見禮記注。詳「馬蘭子」條。

【早辣了】醃地。以廣東南海大瀝多出。

性質 苦。清平。

主治 洗溼熱癰癤。擦癩。辟蚤。其汁能殺蚯蚓。

【早蓮子】即連翹之古籍別名。典見藥性。詳「連翹」條。

【早蓮草】即鱧腸之處方用名。詳「鱧腸」條。

【早藕】即王孫之古籍別名。典見別錄。詳「王孫」條。

【更生】即雀翅之古籍別名。典見別錄。詳「雀翅」條。即菊花之古籍別名。典見別錄。詳「菊花」條。

①即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【杉木】即杉材之處方用名。詳「杉材」條。

【杉木子】主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。

【杉木皮】主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮。燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。

【杉木油】採取 用紙糊碗面。以杉木屑堆碗上。取炭火放屑上燒之。少頃。火將近紙。即用鐵筋抹去燒數次。其油在碗中取用之。

主治 一切頑癬。先用穿山甲片刮破。用羊毛筆蘸油塗之。已破者不必刮。為治癬之神方。

【杉木葉】主治 風蟲牙痛。同芎藭細辛煎酒含漱。

【杉材】古籍別名 杉木。嫩木。野鴉斑。赤杉。白杉。綱目。倭木。槲。植物學大辭典。

外國名詞 Cypripedium japonica, Don. (拉丁)キギ(日本)

基本 係松杉科杉屬之木材。產地 凡山野之森林中恒有出。

形態 杉屬常綠喬木。幹直立。高數丈。葉小。似針狀。而扁似松葉。均向上面彎曲。夏月開花。花單性。雌花與雄花同株。但雌花內生黃粉。至秋結實。為毬果。呈毬形。如楓實。如指頭大。而果鱗尖裂。其邊材

白色。心材淡赤色。其中亦有呈暗黑色者。木理通直。堅韌得宜。恒供建築及器具之材料。



種類 色赤者為赤杉。木質實而多油。色白者為白杉。木質虛而乾燥。色有斑紋如雉者。謂之野鴉斑。出倭國者謂之倭木。

種植 每年驚蟄前後。取枝插種之。

製法 入藥須用油杉及臭者。良。採得陰乾。

用法 恒以削片煎湯。澆洗。間亦有和藥內服。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 散腫。消脹。用作祛風解鬱藥。

主治 漆瘡。煮湯洗之。無不癒。

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新修本草論杉材曰。煮水浸搗脚氣腫滿。服之。治心腹脹痛。去惡氣。

【宋】大明諸家本草論杉材曰。

治風毒奔豚。蠶亂上氣。並煎湯服。

【明】繆希雍本草經疏論杉材曰。杉材木經氣微溫無毒。日華子加辛氣味芬芳。入足陽明經。本經主癩漆瘡。及蘇恭療脚氣腫滿者。皆從外治。取其芬芳能解漆氣之穢。惡辛溫能散濕毒之衝逆也。蘇恭又云。服之。治心腹脹痛。去惡氣。日華子云。治蠶亂上氣。無非假其下氣散邪。辛溫開發之功耳。木皮主金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮。燒存性。研傅之。或入雞子清調敷。一二日愈。香油亦可。

配合應用 治脚氣瘡絕。脇塊如石。昏困且死。用杉木節一升。橘葉一升。無葉以皮代。大腹楨七枚。連子種碎。童便三升。姜分二服。救死方。

治暴月狂亂轉筋。用杉材。椴皮。木瓜。香薷。砂仁。白朮。豆石。斛。

治肺壅痰滯。上焦不利。卒然咳嗽。杉木屑一兩。皂角去皮。酥炙。三兩。為末。蜜丸。梧子大。每米飲下。十九。一日四服。聖惠方。

治小兒陰腫赤痛。日夜啼叫。數日退皮。愈而復作。用老杉木燻。

灰。入膩粉。清油調傳效。(危氏得效方)

①治肺癆失音。杉木燒炭。入盤中。以小盤裂之。用湯淋下。去盤飲水。不愈再作。音出乃止。(集簡方)

②治腫毒黑爛。多年老杉木節。燒灰。麻油調。隔簾葉隔之。絹帛包定。敷貼而愈。(救急方)

用蠶 錢半至三錢。
用宜忌 凡陰虛有熱者禁用。

【杉菌耳】 性質 甘。辛。微溫。無毒。

主治 心脾氣疼。及暴心痛。
委政資料 杉菌耳出宜州。生積年杉木上。狀若菌。(蘇頌)

【杉雞】 產地 出閩越諸地。
形態 杉雞爲禽類雉屬之一種。常居杉樹上。頭上有長黃毛冠。頰正青色。如垂纒。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 治野鷄病。殺蟲。

【李子】 命名 本品爲木之多子者。故字從木子而曰李。

七畫 杉 李

古籍別名 嘉慶子。何李子。早熟者名麥李子。遲熟者名晚李子。冬李子。核如杏子者名南居李。(嘉祐圖經本草) 北方產者名御黃李子。江南產者名均亭李子。熟而自裂者名墜李子。肥黏如餠者名餠李子。(綱目) 居陵迦(梵書) 椶蘆李(爾雅) 綠李(唐本草)

外國名詞 Prunus com.
munis, Pruda. (拉丁) スウメ
スウメ(日本)

基本 係薔薇科。櫻桃屬。爲李之果實。

產地 生山地原野間。
形態 李爲果類之落葉亞喬木。高丈餘。嫩葉包旋。葉長卵圓形。或廣披針形。有鋸齒。參差不齊。互生。春月後梅而開花。花有長花梗。有五瓣。白色。結實爲核果。球形。至夏成熟。呈赤色。有光澤。與其核仁根皮花葉樹膠俱可供藥用。

李



李

性質 苦。酸。微溫。無毒。
主治 曝食去病熱。調中。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論李子曰。去骨節間勞熱。【唐】孫思邈千金翼論李子曰。肝病宜食之。

參攷資料 ●李味甘酸。其苦澀者不可食。不沉水者有毒。不可食。(李時珍) ●李多食令人臃脹發虛熱。(大明) ●李嗜水食之令發痰癆。不可合雀肉食。合蜜食損五臟。(孟詵)

【李父骨】 即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳「虎骨」條。

【李耳骨】 即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳「虎骨」條。

【李花】 性質 苦。香。無毒。
主治 令人面澤。去粉滓野菌。

【李根白皮】 製法 以向東皮。炙黃入藥用。別錄不言用何等李根。亦不言其味。但藥性論云。入藥用苦李根皮。味鹹。而張仲景治奔豚氣。奔豚湯中用甘草李根白皮。則甘苦二種皆可用也。

李

性質 大寒。無毒。
主治 消渴。止心煩逆。奔豚氣。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論李根白皮曰。治瘡。【南北朝】陶弘景本草集註論李根白皮曰。煎水含漱。治齒痛。【唐】孟詵食療本草論李根白皮曰。炙黃煎湯。日再飲之。治女人卒赤白下有驗。【唐】甄權藥性本草論李根白皮曰。苦李根皮味鹹。治脚下一氣。主熱毒煩躁。煮汁服止消渴。【宋】大明諸家本草論李根白皮曰。煎汁飲主赤白痢。【明】李時珍本草綱目論李根白皮曰。治小兒暴熱。解丹毒。

【李核仁】 性質 苦。平。無毒。
主治 假仆。腰折。癱血骨痛。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論李核仁曰。令人好顏色。【唐】甄權藥性本草論李核仁曰。治婦人少腹腫滿。利小腸。下水氣。除浮腫。【宋】蘇頌圖經本草論李核仁曰。治面黧黑子。

【李桃】 即山櫻桃之古籍別名。典見食療本草。詳「山櫻桃」條。

李

七畫 李 杏

【李樹葉】 性質 甘。酸。平。無毒。主治 小兒壯熱疳疾。驚癇。煎湯浴之良。

【李樹膠】 性質 苦。寒。無毒。主治 治目翳。定痛消腫。

【李頭藤】 基本 為蔓草類之一種。其膠可代香用及藥用。

主治 止嘔。血。活絡。

【李葭珠】 卽真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『真珠』條。

【杏仁】 命名 杏字篆文象子核中之仁。故名。在木枝之形。入藥係以仁泥。苦杏仁。北杏仁。杏仁泥。苦杏仁。北杏仁。

古籍別名 甜梅(綱目) 德兒老陰子。草金丹。(和漢藥考)

外國名詞 Prunus Armeniaca L. var. Ansu, Maxim. (拉丁) Apricot-seed. (英) Ap-ricosokorn. (德)

基本 屬薔薇科。為杏子之核仁。產地 陳仁山藥物生產辨云。

北杏直隸。烟台。牛莊。山東均有出。山西。陝西。湖北。河南。襄樊。亦有。三伏後五月新。西藥名阿門子。以萬國藥方所論。苦杏內有毒。不可過服。

形態 杏樹為落葉喬木。樹高丈餘。葉為闊橢圓或卵圓形。末端尖銳。類似梅葉。春日開花。與梅花相似。色粉紅。五出稍大。果實為圓形之核果。生綠熟黃。果肉與核極易分離。熟者可啖。或乾製之。名曰杏脯。或作蜜餞。其核仁微扁。平。作心臟形。長約十五密米。廣十二密米。基部不均勻。色紅褐。有皺紋。帶褐色之粉末。子皮分內外二膜。外膜褐色。三層合成。內膜無色。或類白色。兩層合成。以杏仁浸水中片刻。其子皮便可剝去。子葉肥大。根芽在其尖端。莖芽則生於下端。殆無胚乳。味似苦扁桃。



種類 杏花單瓣者結實多。

杏仁

干瓣者不結實。形似梅實而大。黃白色。味美者。自杏也。形大似橘。黃赤色。味甘者。金杏梅杏也。味甘而有沙者。沙杏水杏也。

製法 陶弘景曰。凡用杏仁。以湯浸去皮尖。炒黃。或用麩炒過。雷斅曰。以湯浸去皮尖。每斤用白火石一斤。烏豆三合。以東流水同煮。從已至午。取出曬乾。用。李時珍曰。治風寒肺病藥中。亦有連皮尖用者。取其發散也。

性質 苦。溫。冷利。有小毒。

成分 杏仁所含之成分。如苦扁桃仁。含有亞亞哥他林。Prunin, C₁₅H₁₁NO₂ 及愛謨爾聖 Emulsin. 之卵白性酸醇素。脂肪油。護膜。糖質等。

效能 潤肺。解肌。下氣。潤燥。用作鎮咳祛痰藥。又解狗毒藥。作用 入胃後與胃酸分解而成青酸。至腸被腸壁吸收。至血中能抑制組織中之氫化機。使不攝取酸素。同時大腸神經被激。麻痺全身。知覺亦感不甚敏銳。而肺臟神經亦被麻木。故能制止咳嗽。又

五九四

治細枝氣管炎。慢性枝管炎。主治 咳逆。上氣。雷鳴。喉痛。下氣。產乳。金瘡。寒心。賁豚。(本經)驚癇。心下煩熱。風氣往來。時行頭痛。解肌。消心下急滿。痛殺狗毒。(別錄)

張仲景之發明 杏仁一味。經張仲景之實驗。認為主治胸間停水。故治喘咳。而旁治短氣。結胸。心痛。形體浮腫。茲考徵如下。麻黃湯。無汗而喘。用杏仁七十枚。杏仁甘草湯。治胸中氣塞短氣。麻黃杏仁甘草石膏湯。治喘。桂枝加厚朴杏子湯。治喘。以上三方。杏仁皆五十個。

大青龍湯治咳嗽。麻黃杏仁薏苡甘草湯。以上杏仁用四十個。大陷胸丸治結胸者。項亦強。走馬湯治心痛。以上杏仁諸藥等分。觀此諸方。杏仁主治胸間停水也明矣。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論杏仁曰。解錫毒。【唐】甄權藥性本草論杏仁曰。治腹痺不通。發汗。主溫病脚氣。咳嗽。

上氣喘促。入天門冬煎。潤心肺。和
啟作湯。潤腎氣。【金】張元素珍珠
囊論杏仁曰。除肺熱。治上焦風燥。
利胸膈氣逆。潤大腸氣秘。【明】李
時珍本草綱目論杏仁曰。殺蟲。治
諸瘡疥。消腫。去頭面諸風氣瘡泡。
【明】繆希雍本草經疏論杏仁曰。
杏核仁。味甘氣溫。別錄加苦有毒。
其言冷利者。以其性潤利下行之
故。非真冷也。氣薄味厚。入手太陰
經。太陰爲清肅之臟。邪客之則咳
逆上氣。火炎乘金則爲喉痺。杏仁
潤利而下行。苦溫而散滯。則咳逆
上氣。喉痺俱除矣。其主心下煩熱
者。邪熱客於心肺之分也。風氣去
來。時行頭痛者。肺主皮毛。風邪自
外而入也。溫能解肌。苦能泄熱。故
仲景麻黃湯中用之。亦取其有發
散之功也。主產乳金瘡者。亦指爲
風寒所乘者言之。消心下急者。以
其潤利而下氣也。心寒賁豚者。心
虛而腎邪凌之也。癆瘵者。痰熱盛
也。雷鳴者。大腸不和也。總之。取其
下氣消痰。溫散甘和。苦洩潤利之
功也。【清】黃宮繡本草求真論杏
仁曰。杏仁既有發散風寒之能。復

有下氣除喘之力。緣辛則散邪。苦
則下氣。潤則通秘。溫則宣滯。行痰。
杏仁氣味俱備。故凡肺經感受風
寒。而見喘嗽。咳逆。胸滿便祕。煩熱
頭痛。與夫蟲毒瘡瘍。狗毒麵毒。錫
毒金瘡。無不可以調治。東垣論杏
仁與紫苑。均屬宣肺除鬱開滯。而
一主於肺經之血。一主於肺經之
氣。杏仁與桃仁。俱治便祕。而一治
其脈浮氣喘便祕。於晝而見。一治
其脈沉狂發便祕。於夜而見。馮楚
瞻論杏仁括萎。均屬除痰。而一從
痰理中發散以祛。故表虛者最忌。
一從腸胃中清利以除。故裏虛者
切忌。諸藥親雖相同。而究實有分
辨。不可不細審而詳察也。但用杏
仁以治便祕。須用陳皮以佐。則氣
始通。至書所言久服令人鬚眉髮
落。亦是耗氣之故。今人以此混治
陰虛喘嗽。及於亡血家妄投。其亦
未明耗氣損血之義也乎。去皮尖
炒研。發散連皮尖研。雙仁者殺人。
得火良。【清】鄒澍本經疏證論杏
仁曰。麻黃湯。大青龍湯。麻黃杏仁
甘草石膏湯。麻黃加朮湯。麻黃杏
仁意。以甘草湯。厚朴麻黃湯。文始

湯。皆麻黃杏仁並用。蓋麻黃主開
散。其力悉在毛竅。非藉杏仁伸其
血絡中氣。則其行反濡緩。而有所
傷。則可謂麻黃之於杏仁。猶桂枝
之於芍藥。水母之於蝦矣。然用麻
黃者。不必盡用杏仁。在傷寒金匱
兩書可案也。惟喘家作。桂枝湯加
厚朴杏仁湯佳。凡麻黃湯證多兼
喘。則凡用杏仁。皆可謂爲喘設矣。
乃小青龍湯偏以喘去麻黃加杏
仁。其故何歟。此其義蓋見於金匱
痰飲篇。夫支飲冒而喘。既以服桂
苓五味甘草去桂加薑辛半夏湯。
水去嘔止矣。則不應腫。腫而無水。
卽所謂無水虛腫。爲氣水也。氣水
發其汗卽已。詎得用麻黃。乃不用
麻黃而用杏仁。云以其人血虛。則
其故有在矣。然則杏仁送爲補血
之劑歟。斯殆非也。夫杏仁外苞血
絡。內韞生機。無水虛腫爲氣水。分
明氣乘血絡之虛。襲而入之。遂爲
腫也。得杏仁致生氣於血絡。推而
行之。於以化腫氣爲生氣。於以除
壅遏而得節宣。腫遂愈矣。喘者腫
之根。腫者喘之漸。治腫以是。治喘
卽以是。猶不可知杏仁之所治。乃

氣入血絡。壅腫而不得外達之喘。
耶曰。太陽病下之後。其氣上衝者。
可與桂枝湯。若不上衝則不得與。
又曰。太陽病下之。微喘者。表未解
也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。汗能
傷陰。下後氣上衝。雖是邪還陽分。
然欲由外解。必經血絡而後及於
肌膚。多恐血絡既虛。則邪入之。遂
生癰腫。故加厚朴杏仁。一從直道
下降。一從血絡外出。仍與治腫同
一理也。雖然。麻黃協杏仁所治之
證。多有不喘者。蓋亦皆以血絡壅
遏。不能外達用之。玩麻黃連翹赤
小豆湯證。所謂傷寒熱在裏。身
必發黃條。只一療字。其關於血絡
可知矣。然則大陷胸丸。麻仁丸。亦
皆杏仁甘草湯。礬石丸之用杏仁。
盡以其能行血絡之氣耶。蓋亦有
之而稍異。夫旁通直降。杏仁之性
兩者兼備。是以合麻桂而播其先
聲。協硝黃而壯其後勁。且大陷胸
湯證。係於大陷胸丸證。麻仁丸證。
劣於小承氣湯證。大陷胸丸中全
有大陷胸湯。不必杏仁寧膠而可
通。麻仁丸中全有小承氣湯。不必
麻仁杏仁芍藥乃能降。所以然者。

七畫 杏

五九五

大陷胸湯所主無心上證。小承氣所主無不足證。假使大陷胸丸證用大陷胸湯。則結胸縱解。項強如柔痙難除。麻仁丸證用小承氣湯。則燥浮雖愈。枯澀難澤。延於下後能保其在上與不足之餘。愚不幻為他變耶。是故項強如柔痙者。結胸餘感。乘血格虛而溢於上也。厥瀉者。大便艱。小便自利之消耗。既使胃中液乏。復能吸傷血格也。是杏仁在大陷胸丸為導引。以助捕餘黨。在麻仁丸則為麻仁引導。以安帖反側。均為善後起見耳。觸類而長之。則產乳既傷其內。金瘡復傷其外。血液內外交洩。厥格勢將中絕之候。不可知杏仁乃添補血液劑中開道內外之使耶。胸痺胸中氣塞短氣。是飲閉於上。釋水閉不利。堅癖不止。中有乾血。下白物。是溼閉於下。飲閉於上。能使水液皆化。痰涎溼閉於下。能使血液皆成白物。在上者宜利之。利之而橫溢者不能全去也。在下者宜卻之。卻之而方來者猶將化也。故茯苓杏仁甘草湯中用杏仁。乃為茯苓搜溢入之飲。礬石丸

中用杏仁。乃為礬石直通血脈之氣。其一橫一直之間。已足見杏仁在直劑中能橫。在橫劑中能直。已引而伸之。則咳逆為由下而上。逆喉痺為由橫而阻中。以至金瘡賁豚。無非一橫一直。亦無非自下而上。不又可見杏仁原一經直達之物。而善帶與橫阻之邪。以出本非能橫行者耶。清問丘陸本草選旨論杏仁曰。杏仁味甘苦。氣溫。有小毒。惡黃芩。黃芩葛根。畏葶藶。入手太陰肺經。清肺之藥也。復入陽明大腸。潤大腸之燥。故肺氣不利。而咳逆喘急。肺受風寒。而咳嗽有痰。肺氣鬱閉。而為大腸燥結。是皆氣滯於肺之症也。用之不惟有理。氣潤肺之功。而且有潤腸治燥之效。蓋肺與大腸相為表裏。臟通則腑通。臟順則腑順也。審此則杏仁之能治氣潤燥。意可見矣。而且能散風解肌。消積理結。有發散之義。故張仲景麻黃湯。及王朔奉治傷寒氣上喘逆。並用杏仁者。為其利氣瀉肺。而又解肌也。考之元素。謂其能除肺熱。治上焦風燥。利胸膈氣逆。潤大腸氣閉。斯無剩義矣。時

珍復用以殺蟲。治諸疥疥消腫。此不過用其毒爾。然又聞之。施治之法。與杏仁不同。按東云。杏仁下喘。用治氣也。桃仁療狂。用治血也。俱治大便閉燥。但有氣血之分。實則便難。行陽氣也。夜則便難。行陰氣也。年高人便閉。不可泄者。脈浮在氣。宜杏仁陳皮治之。脈沉在血。宜杏仁陳皮主之。其所以必用陳皮者。以手陽明病。與手太陽相為表裏。故用之為使。其所以別於桃仁者。杏仁入太陰。桃仁入厥陰故也。實酸熱。多食傷筋骨。致瘰癧。熱作脯食止渴。去冷熱毒。心之果。心病宜食之。

○又第四版改正日本藥局方杏仁條云。杏仁即杏樹之種子。形扁平。稍如心臟。一端尖銳。一端形圓。圓處具有雀斑。子殼作褐色。外面易脫落。因厚壁性之上皮。細胞而為粉末狀。內則出自微點。而運行多數之脈管束。投熱湯中。即易變軟。子殼薄。易於剝離。露出純白之子葉。味苦。無敗油性。注水搗碎。則呈揮發苦扁桃油之香氣。又英美學說謂杏仁又名杏核仁。此藥產中國等處。其內含油質。與洋杏仁油相似。蓋杏仁之功用能化痰。又可作食物。又能作潤劑。治咳嗽類病。

近人學說 時逸人曰。異哉。醫治咳嗽之例用杏仁也。近代世醫無論矣。而前代名醫亦然。徵之於王孟英。陳修園。葉天士。張隱庵。以及明醫薛立齋。李士林。上進至金元四大家。溯源於千金。外臺。聖濟諸書。論咳嗽一症。於杏仁一物。咸無方不用。無法不收。延及後世。遂相習成風。牢不可破。奉為至典。即西醫亦用杏仁為鎮咳劑。以為對症療法。雖然。余嘗疑之。杏仁之

性。本草載其溫。杏仁之味。本草載其甘苦。杏仁之質。本草載其冷利。及觀其主治。上氣雷鳴。喉痺。產乳。奔豚等症。無非爲氣上之病。陳氏謂降氣二字。足以盡其功用。誠深。知夫杏仁者也。知杏仁之功用。專在降氣。則知其與咳嗽無涉焉。咳嗽之爲病也。六淫襲於軀壳。內氣不能外達。則上逆而咳嗽作矣。七情蓄於臟腑。氣機不能通暢。亦上逆而咳嗽作矣。不能外達者。表而散之。不能通暢者。宣而調之。事之常理之宜也。乃不散不調。惟用杏仁以降其氣。譬如投炭於瓶。則烟騰焰熾。斯時也不尋其出路。但嚴窒其瓶口。則烟雖除而烟愈鬱。豈祇無益而已哉。用杏仁於咳嗽初起者。當作如是觀。(市醫治咳初起。概用杏仁。均未見害。何也。以其雜有桑菊荊防麻桂在內也。然而咳嗽尙覺纏綿難已。曷是故耳。設單用獨用。其害必顯。)人之生。端賴呼吸。清吸入之天陽。導引君火下行。以交於水。然後水中之氣上達。此理猶以火煎水取汽。氣既出於水中。故含有水津。著於漆石。

七畫 杏

則成露珠。行於臟腑。則爲津液。乃生血化精之本。今因咳嗽之故。其津液之數布。失其平衡。隨氣而上衝於肺。停於肺衣之內。前者進。後者繼。勢必充滿肺葉。再加吸入之氣。亦不能盡達丹田。亂撞於肺葉之內。互相膠結而痰成矣。痰成而咳嗽愈甚矣。斯時也。若不急調其氣。急培其根。急滋其痰。而惟以杏仁是用。則氣因降而愈虛。痰乘虛而愈甚。且杏仁富有自散油毒質。最能傷肺泄氣。服之反足爲病樹。橫則咳嗽永無寧日矣。病咳者。亦何幸而遇杏仁哉。(市醫治咳嗽方。皆重用杏仁。未見害者。以其雜入香砂橘半之類。功力稍分。倘不然者。則流害更不知伊於胡底。)其始也。因咳而嗽。其繼也。因嗽而咳。及其終也。元氣震動。津液枯竭。斯時也。若不培其根。養其液。調其陽。滋其陰。而惟用杏仁以傷其肺氣。則內臟傷而百骸壞矣。無怪世人死於咳嗽者。累累也。及觀近世有傷風不醒。變成癆之句。果非杏仁遺害。則傷風輕症。何至於此極乎。古語有不履藥爲中醫之戒。誠

以業醫者之庸妄也。試觀杏仁之治咳嗽。世界共宗之。而其害若此。淺顯之處。尙誤謬如斯。况精微深奧者乎。余故嘗謂中西醫學。皆屬同類之幼稚者也。按傷寒金匱諸方。如小青龍。小柴胡。真武。四逆散。及射干麻黃。澤漆。麥門冬等湯。皆爲咳嗽立法。均未用杏仁。足徵杏仁之不宜於咳嗽也。且仲景諸方。加減。俱云咳者加乾姜五味。小柴胡。真武。四逆是也。喘者必用杏仁。如麻黃湯。及麻杏石甘症。而小青龍方內加減法云。喘者去麻黃。加杏仁。是杏仁爲喘病主藥。爲咳嗽禁藥。可斷斷然無疑矣。奈後世庸醫。是非顛倒。其治咳嗽。概用杏仁。以致病者枕藉。可勝痛哉。

配合應用 ①杏酥法。去風虛。除百病。搗爛杏仁一石。以好酒二石。研濾取汁一石五斗。入白蜜一斗五升。攪勻。封於新甕中。勿洩氣。三十日。看酒土酥出。卽掠取。納瓷器中貯之。取其酒滓。團如梨大。置空屋中。作格安之。候成餠脯狀。且服一枚。以前酒下。又法。用杏仁去皮研細。每一升入水一升半。搗稠汁。入生薑四兩。甘草一寸。銀石器中。慢火熬成稀膏。入酥二兩。同收。每夜沸湯點服一匙。

②萬病丸。治男婦五勞七傷。一切諸疾。杏仁一斗二升。童子小便。煮七次。以蜜四兩拌勻。再以童便五升。於槐內重蒸。取出。日曬夜露。數日。任意嚼食卽愈。

③補肺丸。治咳嗽。用杏仁二大升。山中者不用。去雙仁者。以童子小便二斗浸之。春夏七日。秋冬二七日。速皮尖於砂盆中研濾取汁。煮令魚眼沸候。轉如麵糊卽成。以粗布攤曝之。可丸卽丸。服之。食前後。總須服三五丸。茶酒任下。忌白水粥。(劉禹錫傳信方)

④治咳嗽寒熱。且夕加重。少喜多嘆。面色不潤。忽進忽退。積漸少食。脈弦緊者。杏仁半兩。去皮尖。童子小便浸七日。漉出。溫水淘洗。砂盆內研如泥。以小便三升煎如膏。每服一錢。熱水下。婦人室女服之尤妙。(千金方)

⑤治久患肺氣。喘急至咳甚者。不過二劑永痊。杏仁去皮尖二兩。童子小便浸。一日一換。夏月三四

五九七

七畫 杏

換。滿半月。取出焙乾。研細。每服一粟大。薄荷一葉。蜜一雞子大。水一錢。煎七分。食後溫服。忌腥物。(勝金方)

①治咳逆上氣。不拘大人小兒。以杏仁三升。去皮尖。炒黃。研碎。入蜜一升。杵熟。每食前含之。噤汁。(千金方)

②治上氣喘急。杏仁桃仁各半兩。去皮尖。炒研。用水調。生麩和丸。梧子大。每服十丸。蜜湯下。微利爲度。(聖濟方)

③治喘促浮腫。小便淋瀝。用杏仁一兩。去皮尖。熬研。和米煮粥。空心喫二合。妙。(心鏡方)

④治頭面風腫。杏仁搗膏。雞子黃和杵。塗帛上。厚裹之。乾則又塗。不過七八次。愈也。(千金方)

⑤風虛頭痛欲破者。杏仁去皮尖。曬乾。研末。水九升。研漉。煎如糜。取和藥。弱食。七日後。大汗出。諸風漸滅。此法神妙。可深秘之。慎風冷豬雞魚蒜醋。(千金方)

⑥治頭面諸風。眼閉鼻塞。眼出冷淚。用杏仁三升。研細。水煮四五沸。洗頭待冷。汗盡三度。愈。(千金方)

方)

①治偏風不遂。失音不語。生香杏仁七枚。不去皮尖。逐日加至七枚。周而復始。食後仍飲竹瀝。以瘥爲度。(外臺方)

②治破傷風腫。杏仁杵厚塗上。燃燭造灸之。(千金方)

③治金瘡中風。角弓反張。用杏仁杵碎。蒸令氣溢。絞脂服一小升。兼摩瘡上。良。(必效方)

④治溫病食勞。杏仁五兩。酢二升。煎取一升。服之。取汗瘥。(類要方)

⑤治心腹結氣。杏仁桂枝橘皮。訶黎勒皮。等分爲丸。每服三十九。白湯下。無忌。(孟詵方)

⑥治喉痺痰嗽。杏仁去皮熬黃。三分。和桂末一分。研泥。裹舍之。噤汁。亦治喉熱生瘡。亦治卒失音聲。(藏器方)

⑦治肺病咯血。杏仁四十個。以黃蠟炒黃。研入青黛一錢。作餅。用柿餅一個。破開。包藥。選紙裹。煨熟食之。取效。(丹溪方)

⑧治卒不小便。杏仁二十七枚。去皮尖。炒黃。研末。米飲服之。(古今錄驗方)

錄驗方)

①治五痔下血。杏仁去皮尖及雙仁者。水三升。研漉。煎減半。同米煮粥食之。(食醫心鏡方)

②治發道腫痛腫痒。杏仁取脊。類類傳之。(肘後方)

③治陰疔爛痛。杏仁燒黑。研成膏。時時傅之。(永類鈴方)

④治產門蟲疽。痛痒不可忍。用杏仁去皮。燒存性。杵爛。綿裹。納入陰中。取效。(孟詵方)

⑤治身面疣目。杏仁燒黑。研碎。擦破。日日塗之。(千金方)

⑥治面上疥癩。杏仁去皮。搗和雞子白。夜塗之。且以燉酒洗去。(孟詵方)

⑦治兩頰赤痒。其狀如拂。名頭面風。以杏仁類類指之內服。消風散。(證治要訣方)

⑧治耳卒聾閉。杏仁七枚。去皮拍碎。分作三分。以綿裹之。着鹽。如小豆許。以器盛於飯上。蒸熟。令病人側臥。以一麥捻油滴耳中。良久。又以一麥滴之。取效。(外臺方)

⑨治耳出膿汁。杏仁炒黑。搗膏。綿裹。納入。日三四易之。妙。(梅師方)

五九八

方)

①治鼻中生瘡。杏仁研末。乳汁和傅。(千金方)

②治疔瘡蝕鼻。杏仁燒壓。取油傅之。(千金方)

③治牙齒蟲齒。杏仁燒存性。研碎。髮裹。納齒孔中。殺蟲去風。其痛便止。重者不過再上。(孟詵方)

④治牙齦痒痛。杏仁一百枚。去皮。以鹽方寸匕。水一升。煮令汁出。含漱吐之。三度愈。(千金方)

⑤治風蟲牙痛。杏仁針刺。於燈上燒烟。乘熱搭病牙上。又復燒搭七次。絕不疼。病牙逐時斷落也。(普濟方)

⑥治目中赤脈痒痛。時見黑花。用初生杏子仁一升。古五銖錢七文。入瓶內。密封。埋門限下。一百日。化爲水。每夕點之。(總錄方)

⑦治胎赤眼疾。杏仁壓油。半雞子殼。食鹽一錢。入石器中。以柳枝一握。緊束。研至色黑。以熱艾一團。安碗內。燒烘之。令氣透火盡。卽成。每點少許。入兩管。甚妙。(總錄方)

⑧治目中腎遮。但瞳子不破者。用杏仁二升。去皮。麵裹。作三包。替

火煨熟。去麩研細。壓去油。每用一錢。入銅綠一錢。研勻點之。(總錄方)

①治目生弩肉。或痒或痛。漸裂墮入。用杏仁去皮二錢半。膩粉半錢。研勻。綿裹筋頭點之。(總錄方)

②治傷目生弩。用生杏仁七枚。去皮細嚼。吐於掌中。乘熱以綿裹筋頭。點弩肉上。不過四五度。愈。綿錄用杏仁研膏。人乳化開。日點三次。(廣利方)

③治小兒血眼。兒初生艱難。血瘀眼腫。透澀滲其睛。不見瞳人。輕則外胞赤腫。上下弦爛。用杏仁二枚。去皮尖。嚼乳汁三五匙。入膩粉少許。蒸熟。絹包頻點。重者加黃連朴硝最良。(全幼心盤方)

④治小兒脾爛成風。杏仁去皮研傅。(子母秘錄方)

⑤治小兒咽腫。杏仁炒黑。研爛。合酥。(普濟方)

⑥治針入肉內不出者。雙杏仁搗爛。以豬脂調貼。其針自出。(瑞竹堂方)

⑦治箭鏃在咽。或刀刃在咽膈。諸隱處。杵杏仁傅之。(肘後方)

七畫 杏

⑧治狐尿瘡痛。杏仁研爛。煮一兩沸。及熱浸之。冷即易。(必效方)

⑨治狗咬傷瘡。爛嚼杏仁塗之。(寇氏方)

⑩治食狗不消。心下堅脹。口乾發熱妄語。杏仁一升。去皮尖。水三升。煎沸。去渣取汁。分三服。下肉爲度。(梅師方)

⑪解狼犬毒。杏仁搗爛。水和服之。(千金方)

⑫治一切食停。氣滿膨脹。用紅杏仁三百粒。巴豆二十粒。同炒色變。去豆不用。研杏爲末。橘皮湯調下。(楊氏家藏方)

⑬治白癩風斑。杏仁連皮尖。每早嚼二七粒。搗令色赤。夜臥再用。(總錄方)

⑭治諸瘡腫痛。杏仁去皮。研濾取膏。入輕粉麻油調搽。神效。不拘大人小兒。(鮑氏方)

⑮治小兒頭瘡。杏仁燒研傅之。(事林廣記方)

⑯治蛆蟲入耳。杏仁搗泥。取油滴入。非出即死。(扶壽精方)

⑰用蠶 三錢至四錢。施用宜忌 凡虛而無感邪咳

嗽者。及雙仁者禁用。惡黃芩。黃耆。葛根。畏蘿蔔。得火良。

參攷資料 按醫餘云。凡紫麵豆粉近杏仁則爛。頃一兵官。食粉成積。醫師以積氣丸。杏仁相半。研爲丸。熱水下。數服愈。又野人閑話云。翰林學士辛士遜。在青城山道院中。夢皇姑謂曰。可服杏仁。令汝聰明。老而健壯。心力不倦。求其方。則用杏仁一味。每盥漱畢。以七枚納口中。良久。脫去皮。細嚼。和津液頓嚥。日日食之。一年必換血。令人輕健。此申天師方也。又楊士瀛直指方云。凡人以水浸杏仁五枚。五更端坐。逐粒細嚼。至盡。和津吞下。久則能潤五臟。去塵滓。驅風明目。治肝腎風虛。瞳人帶青。眼翳風痒之病。珍按杏仁性熱降氣。亦非久服之藥。此特其咀嚼吞納津液以消積穢則可耳。古有服杏丹法。云是左慈之方。唐慎微收入本草。云久服壽至千萬。其說妄誕可鄙。(李時珍)

杏處處有之。有數種。黃而圓者名金杏。相傳種出自濟南郡之分流山。彼人謂之漢帝杏。言漢武帝上苑之種也。今近汴洛

皆種之。熟最早。其扁而青黃者。名木杏。味醇不及之。山杏不堪入藥。杏仁今已從東來。人家種者爲勝。

(蘇頌) 金杏深赭色。核小而扁。乃接成者。其味最勝。又有白杏。熟時色青白。或微黃。味甘淡而不酢。生杏可嚥。隨作乾果食之。山杏輩只可收仁用耳。(寇宗奭) 杏仁潤肺利氣。宜去皮尖。若治風寒。則宜連皮尖。取其發散也。今人概去皮尖。殆未達此意。(陸以湜) 杏仁與紫苑。均屬宣肺。利小便。而紫苑主肺經之血。杏仁主肺經之氣也。杏仁與桃仁。俱治便秘。而杏仁治脈浮氣喘。晝便難行。桃仁治脈沉發狂。夜便難行也。馮楚階論杏仁枯莖。均屬除痰。而杏仁從腠理中發散以祛痰。枯莖從腸胃中清利以除痰也。(李東垣) 杏子似梅而稍大。略帶甘味。其仁自古入藥。神仙傳。昔董奉居廬山。日爲人治病。不取錢。凡來乞醫而治愈者。重症令植杏五株。輕者植一株。數年計十萬餘株。鬱然成林。號董仙杏林。古今醫家之稱杏林堂。或杏林醫院。皆由此也。然杏子不可

五九九

七畫 杏 杖 杜

多食。多食則動宿病。破筋骨。損精神。而且生痰。不可不慎。惟仁之為用甚大。能潤肺。消食。散滯氣。除風邪熱。止咳嗽。治大便秘結。(和漢藥考)

【杏實】 性質 酸熱。有小毒。主治 曝脯食。止渴。去冷熱毒。

參攷資料 ●杏實生食。多傷筋骨。(別錄) ●多食動宿疾。令人目盲。鬚眉落。(扁鵲) ●多食生痰熱。昏精神。產婦尤忌之。(寧原)

【杏樹枝】 主治 墮傷。取一握。三合和勻。分服。大效。

【杏樹根】 主治 痰多食。杏仁切碎煎湯服。即解。

【杖石】 即蜀葵之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【杖紅】 即蜀葵之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【杖葵】 即蜀葵之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【杜大黃】 即商陸之古籍別名。與見和漢藥考。詳「商陸」條。

【杜父魚】 古籍別名。渡父魚。黃魴魚。然可魚。(綱目) 伏念魚。(臨海志) 河鹿。鱧。(動物學大辭典) 鱧。土附。土部。

【杜父魚子】 主治 助相火。煨腰膝。燒酒醉。

【杏葉】 主治 人卒腫滿。身面。洪大。煮濃汁熱飲。亦少少服之。

【香葉沙參】 即薺芎之古籍別名。與見救荒本草。詳「薺芎」條。

【杏葉草】 即金盞草之古籍別名。

與見圖經本草。詳「金盞草」條。

土甞。菜花魚。薄魚。土甞。(俗名)

外國名詞 *Cottus polihm* *Cottus* (拉丁) カシカ (日本)

基本 係脊椎動物魚類。硬鱗類。杜父魚科之杜父魚。

產地 生池澤溪澗淡水中。

形態 杜父魚為鱗類魚屬之一種動物。體扁細長。頭大口巨。頭頂圓。前但生於頸。脊鱗有棘八九。及刺十六至十八。臀鱗有刺十一。至十三。尾鱗圓。皮府平滑。背部灰色或褐色。具橫帶紋五條。頭頂多暗色小點。腹面淡色或白色。腹臀兩鱗白色。胸腹尾之鱗刺。有暗色點而為一種之橫紋。全體長約二三寸。其鱗細。斑駁似黑。鱗如鱗。立冬後伏土中。閉目不食。冬至後乃出。沉而不浮。附土而行。清明後開眼。覓食小蟲蝦。搗得可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補脾胃。壯陽道。治噎膈。消水腫。療疥瘡。治小兒陰核大小。擊開口咬七下即消。

【杜木香】 即青木香之處方用名。詳「青木香」條。

【杜牛夕】 即馬鞭草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「馬鞭草」條。

【杜白】 即全蠍之古籍別名。與見廣雅。詳「全蠍」條。

【杜仲】 命名 昔有杜仲。服此得道。故名。

處方用名 厚杜仲。鹽水炒杜仲。川杜仲。綿杜仲。

古籍別名 思仲。(別錄) 思仙。(本草) 木棉。(吳普) 桐棉花。玉絲皮。亂銀絲。鬼仙木。(和漢藥考)

外國名詞 *Euonymus Japponicus* (拉丁)

基本 係屬大戟科杜仲之樹皮。

山之中。高可數丈。葉似辛夷及柝葉。

採取 每年二月五月六月九月。採皮曝乾。

製法 雷斅曰。凡使杜仲。須削去粗皮。每一斤用酥一兩。蜜三兩。和塗火炙。以盡爲度。細剉。用有鹽水炒者。

性實 辛平。無毒。

效能 補肝腎。強筋骨。益腰膝。除痠痛。用作強壯藥。

主治 腰膝痛。補中。益精氣。堅筋骨。強志。除陰下癢。溼。小便餘瀝。久服。輕身耐老。脚中酸疼。不欲踐地。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論杜仲曰。虛而身強直。風也。膜不利。加而用之。【宋】日華諸家本草論杜仲曰。治腎勞。腰脊酸。【元】李東垣用藥法家論杜仲曰。能使筋骨相着。【元】王好古湯液本草論杜仲曰。潤肝燥。補肝經風虛。【明】繆希雍本草經疏論杜仲曰。杜仲味辛。氣平。無毒。別錄加甘溫。甄權言苦。煖。應是辛甘勝。而苦次之。溫煖多。而平爲劣也。氣薄味

七畫 杜

厚。入足少陰。兼入足厥陰經。按本經所主。腰脊痛。益精氣。堅筋骨。脚中酸痛。不欲踐地者。蓋腰爲腎之府。經曰。動搖不能。腎將憊矣。又腎藏精。而主骨。肝藏血。而主筋。二經虛。則腰脊痛。而精氣乏。筋骨軟。而脚不能踐地也。五藏苦欲補。瀉云。腎苦燥。急食辛以潤之。肝苦急。急食甘以緩之。杜仲辛甘具足。正能解肝腎之所苦。而補其不足者也。強志者。腎藏志。益腎故也。除陰下癢。溼。小便餘瀝者。祛腎家之溼熱也。益腎補肝。則精血自足。故久服能輕身耐老。其主補中者。肝腎在下。藏中之陰也。陰足則中亦補矣。【清】張石頑張氏醫通論杜仲曰。杜仲古方。但知補腎。而本經主腰脊痛。補中益精氣等病。是補火以生土也。王好古言。是肝經氣分藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨強。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎。子能令母實也。【清】黃宮繡本草求真論杜仲曰。杜仲辛甘微溫。諸書皆言能補腰脊。爲筋骨氣血之需。以其色紫入肝。爲肝經氣藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充

則骨強。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎。子能令母實也。且性辛溫。能除陰癢。去瀝溼。痿痺癢。必需。脚氣疼痛。必用。胎滑夢遺。切要。若使遺精。有痛。用此。益見精脫不已。以其氣味辛溫。能助肝腎旺氣也。胎因氣虛。而血不固。用此。益見血脫不止。以其氣不上升。反引下降也。功與牛膝地黃。續斷相佐而成。但杜仲性補肝腎。直達下部。筋骨氣血。不以牛膝達下。走於經絡。血分之中。熱地滋補。肝腎。竟入筋骨。精髓之內。續斷調補筋骨。在於曲節。氣血之間。之爲異耳。獨怪今世安胎。不審氣有虛實。輒以杜仲牛膝續斷等藥。引血下行。在腎經虛寒者。固可用此。以固胎元。若氣陷不升。血隨氣脫。而胎不固者。用此。則氣益陷不升。其血必致愈脫不已。故凡用藥治病。須察脈症虛實。及於上下之處。有宜不宜。以爲審用。若徒守其一。曲以應無窮之變。非惟無益。且以增害。出漢中厚潤者。良。去粗皮。剉。或酥或酒或蜜炙。或煎或鹽或酒以炒。在人隨症活變耳。

辨僞 僞名洋杜仲。又名土杜仲。皮紅而厚。少絲。按杜仲之木。始出豫州山谷。得中土之精。皮色黑。而味辛平。折之。有白絲相連。不斷。象冥陽。明少陰。金水之精氣。故本經主治腰膝痛。補中。益精氣。堅筋骨。強志。除陰下癢。溼。小便餘瀝。若此種洋杜仲。皮色既紅。則性味自別。又安可用乎。【鄭肯巖】按杜仲乃樹之膜皮也。其樹之葉。作倒蠶之卵形。端尖。但能剝杜仲之樹幹。非高數丈。大可一二人抱者。不可考。其年齡。在數十年者。剝割之時。間自五月至九月。過此則不易分割矣。其皮在根間者。厚鬆。而次在中段者。皮厚細。鬆爲佳。枝杈以上。皮雖細。極薄。效力亦弱矣。產四川綏定。洛陽者。體質堅重。外皮細結。內皮光黑。中層絲厚。扯之。則長如絲者。最佳。巴河產者。亦佳。貴州及鄂之施南。湘之寶慶等處。產者。皮粗質輕。皆次。浙之溫。台。與閩省。雖皆有產。質鬆皮粗。內層絲皮甚薄。皆不道地。【曹炳章】

配合應用 ●治腎虛腰痛。及下部痿弱無力。用杜仲。牛膝。枸杞。

七畫 杜

子、續斷、白膠、地黃、五味子、菟絲子、黃藥、山藥。

●治腎虛腰痛。用杜仲去皮。酥炙黃一斤。分作十劑。每夜取一劑。以水一升。浸至五更。煎三分。減一。取汁去滓。以羊腎三四枚。切片。放下。再煎三五沸。如作羹法。和以椒鹽。空腹頓服。(崔元亮海上方)

●治風冷傷腎。腰背虛痛。杜仲一斤。切炒。酒二升。漬十日。日服三合。(得效方)

●治病後虛汗。及目中流淚。杜仲、牡蠣等分。爲末。臥時水服五匕。不止更服。(肘后方)

●治類憤墮胎。或三四月即墮者。於兩月前。以杜仲八兩。糯米煎湯。浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸焙乾。爲末。以山藥五六兩爲末。作糊丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。(簡便方)

●治產後諸疾。及胎臟不安。杜仲去皮。瓦上焙乾。木白搗末。麥棗肉和丸。彈子大。每服一丸。糯米飲下。日二服。(勝金方)

用蠶 一錢至三錢。
施用宜忌 凡腎虛火熾者禁

用。惡女參、蛇蛻。

參攷資料

●杜仲古方只知滋腎。惟王好古言是肝經氣分藥。潤肝燥。補肝虛。發昔人所未發也。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨強。肝充則筋健。風伸利用。皆屬於筋。杜仲色紫而潤。味甘微辛。其氣溫平。甘溫能補。微辛能潤。故能入肝而補腎。子能令母實也。按顧元英談薺。一少年新室後。得脚輭病。且疼甚。醫作脚氣治。不效。路鈴孫琳診之。用杜仲一味。寸斷片折。每以一兩。用半酒半水。一大盞煎服。三日。能行。又三日。全愈。琳曰。此乃腎虛。非脚氣也。杜仲能治腰膝痛。以酒行之。則爲效容易矣。(李時珍) ●杜仲生上虞山谷。及上黨漢中。二月五月六月九月採皮。(別錄) ●上虞在豫州虞魏之虞。非會稽上虞縣也。今用出建平宜都者。狀如厚朴。折之多白絲者爲佳。(陶弘景) ●今出南州成州峽州近處大山中。葉亦類柘。其皮折之白絲相連。江南謂之柘。初生嫩葉可食。謂之柘芽。花實苦澀。亦堪入藥。木可作屐。益脚。(蘇頌)

【杜仲嫩芽】

原名 柘芽。
主治 作蔬。去風毒脚氣。久積風冷。腸痔下血。亦可煎湯。

【杜宇】即杜鵑之古籍別名。典見禽經。詳「杜鵑」條。

【杜老草子】即羅麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羅麥」條。

【杜芎】即川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳「川芎」條。

【杜赤豆】即赤小豆之處方用名。詳「赤小豆」條。

【杜杭】即芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芫花」條。

【杜松子】

古籍別名 杜松實。
(和漢藥考)

外國名詞 Fructus juniperi (拉丁) Juniper berries (英) Wacholderbeeren (德)

基本 屬松柏科。爲杜松之果實。

產地 凡暖地深山間。恒多生焉。

形態 杜松爲常綠喬木。幹高丈餘。大者有高達六丈。周五尺者。枝作針狀三角形。多結節。各節輪

六〇二

生針狀三葉。葉長六分至一寸。上面作白色凹溝。下部中央隆起。夏月開雌雄兩花。後結肉質球果。大如拇指頭。初綠色。熟則變黑色。中有卵圓形種子。味甘而後苦。

效能 用作利尿藥。

國外學說 日本學說謂本品之成分。爲揮發油。樹脂。護膜。糖。分及蠟分等。於利尿藥用之。舉其生理的及醫治作用。則(一)刺戟腎臟。利尿爲吾人所希望者。然用大量。即起腎炎及血尿。則有害。(二)用小量。能催進消化。然不及他種健胃藥。用大量。則發胃腸炎。(三)稍與奮心悸。尿呈一種臭氣。(四)用於各種水腫病。如因萎縮腎。肺氣腫所致之水腫。用之尤有效。有時於膀胱加管兒。月經困難。亦使內服之。於糜瘻質新。用爲浴劑。至於煎劑用量。則一日八。〇至一五。〇。蓋此樹有芳香性。故日本謂之和白檀。又日本藥局方曰。杜松實係採集杜松果實曬乾者。本品作球圓形。直徑達九密米。呈黑褐色。間帶藍色粉霜。基部有一個至六個之三節性葉座。尖端有三

懸痕。果肉爲淡褐色。內有三堅硬種子。本品味甘。有強芳香性。或用未熟之杜松實。與水同蒸餾。則得揮發油。謂之杜松油。杜松油爲無色或帶黃色之液體。比重〇・八六至〇・八七三。於一四〇度至一五〇度沸騰。置空氣中。則凝爲樹脂。稍溶於酒精。善溶於伊打硫化炭。有消毒及利尿功效。

用量 三分至一錢。

參攷資料 荷蘭藥鏡曰。排泄表發蒸氣。治胃寒諸症。疏發胸中黏液。祛痰咳等。用於痛風。傷冷毒。流走痛。能驅逐其毒。而愈。但不適於熱症。嫩衝性病。有破氣驅風之效。治風痛。氣鬱。滿著寒黏液。痲痛。有健胃功效。治胃腸虛弱諸症。驅除黏液及積食不消。用於寒黏液。實症最佳。含松節油狀之油。利小便。故用於水腫。甚有效。全身水腫。脚腫。用下方極效(杜松驅水散)。
杜松實。(茨者一益斯) 地檜根。
(六錢) 薩葛倫安質沒紐。(四錢)
以上各別爲細末。調和爲散劑。服一錢至半錢。日服三四次。水腫。小便不利。腹水。胸水。或飲酒太過發

七 蠶 杜

水腫者。後方奇效。(杜松海葱酒) 海葱(一錢) 杜松實(一益斯) 益智(半錢) 葡萄酒(或燒酒二磅) 到末。入玻璃瓶內。固封。置煖處三日。去滓。用一匙。日三次。漸次增加服量。

【杜松實】即杜松子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜松子」條。

【杜羌】即羌花之古籍別名。典見別錄。詳「羌花」條。

【杜萑草】即雀麥之古籍別名。典見外臺。詳「雀麥」條。

【杜恒山】即杜堇山之古籍別名。典見綱目。詳「杜堇山」條。

【杜紅花】即紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【杜若】 處方用名 杜若根。 古籍別名 杜衡。(本

經) 杜蓮。若芝。白蓮。白芥。(別錄) 楚衡。(廣雅) 攬子。莖。藥性論) 山

莖。馬蹄香。土杏。懷香。衛薇香。(植物學大辭典) 土蘭。(爾雅)

外國名詞 Polia japonica, Houttuynia (拉丁) ヤブメウガ

メウガサウ(日本) 基本 係鴨跖草科杜若之根。

產地 凡山谷野陰地均有出。

形態 杜若爲芳草類之多年宿根生草本。春月抽莖一二尺。上部生七八葉。葉作披針形。略似翼

荷。味辛香。夏月莖頂開花。作圓錐花序。花瓣白色。萼片綠色。雄蕊六個。雌蕊之子房一體。而分爲三室。

果實黑綠色。不裂開。其根似蘆而味亦辛。

採取 二八月間採根曬乾。

製法 雷斅曰。凡使勿用鴨嘴草根。其相似。只是味效不同。凡採得根。以刀刮去黃赤皮。細到。用三重絹袋陰乾。曬使以蜜浸一夜。漉出。

性質 辛。微溫。無毒。

主治 胸脇下逆氣。溫中。風入腦戶。頭腫痛。涕淚。久服益精明目。輕身。令人不忘。(本經) 治眩倒。目

瞼。止痛。除口臭氣。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論杜若曰。杜若一名

山薑。去皮間風熱。可作燂湯。又主暴冷。及胃中逆冷。霍亂腹痛。

配合宜忌 得辛夷。細辛良。惡

柴胡。前胡。

參攷資料

●此草一名杜衡。而草部中品自有杜衡條。即爾雅所謂土蘭者也。杜若即廣雅所謂

楚衡者也。其類自別。古人多相雜引用。故九畝云。采芳洲兮杜若。離騷云。雜杜衡與芳芷。王逸。翠皆不

分別。但云香草。故二名相混。古方或用。今人罕使。故少有識者。(蘇頌)

●苗似山薑。花黃子赤。大如棘子。中似豆蔻。今出嶺南。峽州者甚好。范子計然云。杜衡。杜若。出南

郡。漢中。大者大善。(韓保昇) ●杜若。人無識者。今楚地山中時有之。山人亦呼爲良薑。根似蘆。味亦辛。

甄權註豆蔻。所謂攬子。蘇頌圖經。外類所謂山薑。皆此物也。或又以大者爲高良薑。細者爲杜若。唐

時。峽州貢之。李時珍

【杜若】即鮮草果之別名。典見綱目拾遺。詳「鮮草果」條。●即白

芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芷」條。

【杜若根】即杜若之處方用名。詳「杜若」條。

【杜兜鈴】即馬兜鈴之處方用名。

詳「馬兜鈴」條。

【杜蘆】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【杜細辛】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【杜莖山】(相目) 古醫別名 杜恒山。

形態 杜莖山爲毒草類之一種。莖高四五尺。葉如苦蕒。秋有花。冬結實如枸杞子大而白色。其葉可供藥用。

性質 苦寒。
主治 溫瘧寒熱煩渴。頭痛心燥。梓爛。新酒浸。絞汁服。取吐惡涎。甚效。

【杜蓬】即秘惡之古籍別名。典見別錄。詳「秘惡」條。

【杜當歸】即土當歸之處方用名。詳「土當歸」條。

【杜葵】即杜衡之古籍別名。典見綱目。詳「杜衡」條。

【杜榮】即芒之古籍別名。典見爾雅。詳「芒」條。

【杜蒺藜子】即使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「使君子」條。

【杜製胆星】即南天星製成者之

處方用名。詳「南天星」條。

【杜蓮】即杜若之古籍別名。典見別錄。詳「杜若」條。

【杜蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳「甘蔗」條。

【杜衡】 命名 本品俗名馬蹄。香蓋其葉似葵。形似馬蹄也。

處方用名 馬蹄香。土細辛。古籍別名 土爾(爾雅)金鎖匙(救急方)杜葵。土細辛(綱目)杜衡(俗名)土荇。木杏。覆香。杜細辛。馬蹄草。錢兒草。衡藪草。杜衡葵(和漢藥考)

外國名詞 Asarum blumei, Duch. Wild ginger.(英)

學名 Asarum blumei, Duch.

基本 屬馬兜鈴科杜衡之根。產地 凡山谷原野之溼地間恒有生長。

形態 杜衡爲山中陰地自生之多年生草。地下根莖有鬚根。葉革質。作心臟形。前端尖。大二三寸。往往有白斑。葉柄長。基部深凹。入冬季於根際開三裂暗紫色小

花。花被作笠狀。



杜 衡

採取 三月間採之。

製法 採得水洗。曝乾。

性質 辛溫。無毒。

效能 宜吐快胸膈。殺蟲消瘰。瘰用作催吐藥。

主治 風寒咳逆。作浴湯。香人衣籠。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論杜衡曰。止氣奔喘。促消痰飲。破留血項間瘰癧之疾。【明】李時珍本草綱目論杜衡曰。下氣殺蟲。

國外學說 荷國藥鏡曰。根及葉。有酷烈之氣。內服則嘔吐。但其效力緩弱。非用半錢不吐。此根善利小便。又有發汗通經功效。故用於水腫腹水等。治間歇熱。內服久塞及下利。將根末吹入鼻中。用作輕嗅藥。誘泄頭中膠黏汚液。治頑固頭痛等。

配合應用 ①治風寒頭痛。傷風傷寒。頭痛發熱。初覺者。馬蹄香爲末。每服一錢。熱酒調下。少頃飲熱茶一盞。催之出汗。即愈。名香汗散(三英杏林摘要方)

②治飲水停滯。大熱行極。及食熱餅後。飲冷水過多。不消。停滯在胸。不利呼吸。喘息者。杜衡三分。瓜蒂二分。人參一分。爲末。湯服一錢。日二服。取吐爲度(肘後方)

③治痰氣鬱結。馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃。吐出痰涎爲驗(普濟方)

④治噎食隔氣。馬蹄香四兩。爲末。好酒三升。熬膏。每服二匙。好酒調下。日三服(孫氏集效方)

⑤治吐血。聚凡吐血後。心中不悶者。必止。若燥悶。煩亂。刺服者。尚有瘀血在胃。宜吐之。方同飲水停滯條(肘後方)

⑥治喉閉腫痛。草藥金鎖匙。即馬蹄草。以根搗。并華水調下。即效。(救急方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非有實邪者。禁

參攷資料

古方吐藥往往用杜衡者。非杜衡也。乃及已也。及已似細辛而有毒。吐人。昔人多以已當杜衡。杜衡當細辛。故爾錯謬也。杜衡則無毒不吐人。功雖不及細辛。而亦能散風寒。下氣消痰。行水破血也。(李時珍) 爾雅杜又名土肉。然杜若亦杜衡名。或疑是杜若。而郭璞注云似葵。當是杜衡也。(蘇頌) 根葉似細辛。惟氣小異爾。處處有之。方藥少用。惟道家服之。令人身衣香。(陶弘景) 生山之陰。水澤下。溼地。葉似槐。形如馬蹄。根似細辛。白前等。今俗以及已代之。謬矣。及已獨莖。莖端四葉。葉間白花。殊無芳氣。有毒。服之令人吐。惟療瘡疥。不可亂杜衡也。(蘇恭) 今江淮間皆有之。春初於宿根上生苗。葉似馬蹄下狀。高二三寸。莖如麥藁粗細。每窠上有五七葉。或八九葉。別無枝莖。又於葉葉間罅內。莖頭上貼地生紫花。其花似見不見。暗結實。如豆。大窠內有碎子。似天仙子。苗葉後青。輕霜即枯。其根成空。有似假帶蜜。闊細長四五寸。粗於細辛。微黃白色。

七畫 杜

味辛。江淮俗呼為馬蹄香。謹按山海經云。大帝之山有草焉。狀如葵。其臭如薺蕪。名曰杜衡。可以走馬。食之已瘧。郭璞注云。帶之可以走馬。或曰馬得之而健走也。(蘇頌) 杜衡葉似葵。又如槐形。似馬蹄。根似細辛。白前等。李時珍曰。土細辛葉圓似馬蹄。紫背者良。按杜衡為帶綠草。本多年生細辛屬之植物。有根莖。葉形如心臟而無光澤。有長葉柄。花呈暗紫色。往時常以之代用細辛。本草書謂杜衡根粗。其味辛而帶腥氣。細辛根細。其味初雖無辛味。稍待則極辛。可以區別之云云。然似雞謂之完全。朝比奈博士嘗區別之。謂細辛葉菲薄而銳尖。呈腎臟形。其花筒之內部有縱線狀之突起。杜衡葉為革質。呈卵狀心形。或戟狀心形。往往有白斑。其花筒之內部有縱橫網狀之突起。況且細辛之葉為一年生。而杜衡之葉為常綠葉。 【杜衡】即杜若之古籍別名。典見本經。詳「杜若」條。 【杜草】即土茵之古籍別名。典見菌譜。詳「土茵」條。

【杜衡葵】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【杜龍】即地膽之古籍別名。典見吳普本草。詳「地膽」條。

【杜雞脚黃連】即酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳「酸模」條。

【杜鵑】 古籍別名。杜宇。(禽經)子鳩。子規。鷓鴣。催歸。怨鳥。周燕。陽雀。(綱目)

外國名詞 Cuculus poliocephalus Latham. (Little cuckoo) (拉丁) ホトトギス或トキハドソ或イモセドソ或タソガレトソ(日本)

基本 係存椎動物鳥類。攀禽類。杜鵑科。

產地 出對中山林間。

形態 杜鵑為攀禽類之一種。眼喙黃。嘴略彎曲。嘴根黃色。尖端暗色。體之上面灰黑。手冠之內側有白橫紋。頰部灰色。體之下面概白色。多暗色之橫條紋。尾灰黑。尾翹之中央沿羽軸。有白色小斑。在外側者有白橫紋。腳黃色。二趾向前。二趾向後。體長約九寸。棲處隨氣候為轉移。夏自南來。秋則復返。

夏間晝夜哀鳴。其肉可供藥用。性質 甘平無毒。

主治 瘡瘻有蟲。薄切炙熱貼之。蟲盡乃已。

參攷資料 按呂氏春秋云。肉之美者。荆燕之翠。則昔人亦嘗食之矣。(李時珍) 杜鵑小如鷓鴣。嗚呼不已。蜀王本紀云。杜宇為望帝。淫其臣繁。繁妻。乃禪位去。時子規鳥鳴。故蜀人見鷓鴣而悲。望帝。荆楚歲時記云。杜鵑初鳴。先聞者主別離。學其聲。令人吐血。登則聞之。不詳服法。但作狗聲應之。吳苑云。有人山行。見一鷓。聊學之。唾血便死。人言此鳥啼至血出乃止。故有唾血之事。(陳藏器) 杜鵑出對中。今南方亦有之。狀如雀。而色慘黑。赤口有小冠。春暮即鳴。夜啼達旦。鳴必向北。至夏尤甚。晝夜不止。其聲哀切。田家候之以與農事。惟食蟲。不能為果。居他巢生子。冬月則藏。 (李時珍)

【杜衡】即杜衡之俗名。詳「杜衡」條。

【杜蘇子】即紫蘇子之處方用名。詳「紫蘇子」條。

六〇五

【杜蘭】即木蘭之古籍別名。典見別錄。詳「木蘭」條。②即石斛之古籍別名。典見別錄。詳「石斛」條。【杞子】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【杞根】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。【杠谷樹】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。②即枸骨之日本名。詳「枸骨」條。

【杠板歸】古籍別名。五葦。五赤地利。石見皮。(和漢藥考) 毒草。山蕎麥。赤藤。荔

外國名詞 Polygonum perfoliatum, L. (拉丁)

基本 屬蓼科。為杠板歸之根。產地 凡原野間恒有產焉。



杠板歸

形態 杠板歸為一年生蔓草。莖葉俱有硬刺。葉作三角形。柄狀。具葉柄。托葉作圓形。莖穿其中心。夏日於梢頭綴白色短穗花。果實

為球形。形色不純。一其堅如石。根類莖。莖外面紫赤色。內部黃赤色。性質 苦。平。無毒。

效能 用治痢疾及折傷與金瘡。

主治 治赤白痢。及赤白帶下。癰疽。惡瘡。生肌肉。為折傷金瘡之要藥。

用錢 一錢至二錢。

【步驚】即夜蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「夜蘭」條。

【每始王木】 產地 生田野。木為蔓草類。藤屬之一種。繞樹蔓生。葉如蘿藦。其藤可供藥用。

採取 二月八月採莖。陰乾用。性質 苦。平。無毒。

主治 筋骨跌傷。生肌。破血。止痛。以酒水各半。煮濃汁飲之。

【求股】即卷柏之古籍別名。典見別錄。詳「卷柏」條。

【汞】即水銀之古籍別名。典見別錄。詳「水銀」條。

【汞砂】即砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「砂」條。

【汞粉】即輕粉之古籍別名。典見

本草拾遺。詳「輕粉」條。

【決完子】即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「決明子」條。

【決明子】 命名 本品功能明目。故名。

古籍別名 薺苳子。(爾雅) 槐豆。槐。藜。藜子。金豈兒。江南豈。狄小豈。江離子。決完子。合明草子。獨占釘子。(和漢藥考) 馬蹄草。馬蹄決明。(集註)

外國名詞 Cassia occidentalis (拉丁)

基本 屬豇科。為馬蹄決明之種子。

產地 凡山野平原及川澤間恒多生焉。

形態 馬蹄決明為山野自生之草。本高可二三尺。葉為羽狀複葉。其小葉作倒卵形。兩兩對生。如翼。其數或二或三。花開五瓣。瓣亦作倒卵形。其色淡黃。每一葉腋間。開花一二朵。實為扁平之莢。果長五六寸。中藏種子一行。約有數十粒。莢芒決明為一種蔓草。亦山野自生。尖端有卷鬚上升。葉為羽狀複葉。近底處有托葉二。皆作

三角式。花為黃色之蝶形花冠。排列為穗狀花序。莢果長一二寸。似馬蹄決明之莢。莢中藏種子數列。其種子色黃。質堅硬。有光澤。狀如小豆。一頭尖斜。



決明子

種類 ①馬蹄決明。莖高三四尺。葉大於苜蓿。而本小末大。晝開夜合。兩兩相帖。秋開淡黃花。五出。結角如初生細豇豆。長五六寸。角中子數十粒。參差相連。狀如馬蹄。青綠色。入眼目藥最良。而其苗角皆苦。不可食也。②芒芒決明。即救荒本草所謂山扁豆也。苗莖一似馬蹄。但本小末大。正似槐葉。夜亦不合。秋開深黃花。五出。結角大如小指。長二寸許。角中子成數列。狀如黃葵子。且扁。其色褐。味甘滑。而其嫩苗及花。與角子皆可淪茹。及點茶食也。

種植 氣候無論寒冷溫熱。皆適其生長。土地以黏質土為最

佳。砂質土則不適也。壤土亦可栽培。惟品質較栽於黏質土者稍劣。但其收穫之數量則較多。是其長也。②產地不多。吾國惟廣東、山西二省多有產出。產出廣東者。品質較產於山西者為佳。種類分為春秋二種。春種較優於秋種。故栽培決明者。多取廣東之春種。③栽於黏土者。則其土宜深耕。栽於壤土者。則其土宜淺耕。耕起之後。再打破土塊。使其細碎鬆鬆。平均土面。既終。再用點播器點穴於畦上。至於條播。則於畦上作小溝。可以播種也。④播春種者。則於春季二三月之間。可以播種。秋種者。則於秋季七月之下旬。至八月之上旬。即可播種也。⑤栽培決明。先取種子。選其粒大而色正者。始可供播種之用。點播栽培。則每穴中投入種子二三粒。若以條播栽培。則依小溝排放之可也。既播之後。再蓋以薄土。宜輕壓而不可重壓。以防其不出也。⑥肥料以人糞尿及油粕等為最適。故當施以一次之油粕。並施以二三次之人糞尿。油粕於播種後施之。人糞尿每於除草及

七靈 決

中耕後施之。⑦中耕施行二次。第一次在播種後一月餘行之。第二次與第一次相隔四十日時行之可矣。⑧除草雖毋庸注意。見其蔓生時。不可不加意除之。⑨春植者。至八九月間。可以採收。秋植者。至翌年一月。亦可收穫。收穫之法。用手帶葉莖拔起之。曝於日光中。待乾之後。即可貯藏也。⑩收量視其勤惰而別。價隨其品質之優劣而定。不能預定。

採取 十月間採收之。採得陰乾百日用。

性質 鹹。平。無毒。

成分 為依摩丁 C17H27O11。

○(○田) 與佩利蘇沉相類。

效能 清肝。益腎。祛風熱。明眼目。又可為蛇蟲咬傷之解毒藥。

主治 青盲目淫。膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光。輕身。(本經) 療唇口青。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論決明子曰。治肝熱風眼。

赤淚。每日取一匙。投淨。空心吞之。百日後。夜見物光。【宋】日華諸家本草論決明子曰。助肝氣。發精。以

水調末。塗腫毒。熅太陽穴。治頭痛。又貼胸心。止鼻洪。作枕治頭風。明目。其於黑豆。【元】采丹溪本草衍義補遺論決明子曰。益腎。解蛇毒。

【明】經希雅本草經疏論決明子曰。決明子得水。土陰精之氣。而兼稟乎清陽者也。故其味鹹。平。別錄。益以苦。甘。微寒。而無毒。鹹得水氣。甘得土氣。苦可洩熱。平合胃氣。寒能益陰。洩熱。足厥陰肝家正藥也。亦入膽腎。肝開竅於目。瞳子神光。屬腎。故主青盲目淫。膚赤白膜。眼赤痛淚出。別錄。兼療唇口青。本經。久服益精光。輕身者。益陰洩熱。大補肝腎之氣所致也。亦可作枕治頭風。明目。【清】黃宮繡本草求真論決明子曰。決明子氣稟清揚。味鹹苦甘。微寒無毒。能入肝經。除風散熱。凡人目淚不收。眼痛不止。多屬風熱內淫。以致血不上行。治常即為驅逐。按此苦能泄熱。鹹能驅風。甘能補血。力薄氣浮。又能升散風邪。故為治目收淚止痛要藥。並可作枕以治頭風。但此服之太過。搜風至甚。反招風害。故必合以痰藥。甘菊。枸杞。生地。女貞。貨。槐。質。殼。

精草相為補助。則功更甚。謂之決明。即是此意。狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎用。

國外學說 日本學說謂決明子者。日本於享保年中。始傳漢種。或以山扁豆為決明子之異名。然山扁豆為「カハラケツメ」之子。褐色之細豆也。又或名決明白草。決明。以與石決明為區別。然草決明者。青葙子之異名也。此物與草決明。同名異物。宜注意。決明子者。於肝臟病。癩瘡。斯喘息等。可內服之。又為蝮蛇及毒蟲所刺傷時。為外用藥。有偉效云。用量約二。

○至六。○又和漢藥考曰。決明中又有石決明(鮑之貝殼)者。因之決明子。特名草決明以示分別。草決明。又名青葙子。蓋此草本產暖地。享保年間。始自中國運至日本。暖地亦有之。即不施肥料。亦易成長。至藥用之決明子。種類頗多。有所謂望江南者。用之功效相同。或係同種之植物耳。故下山藥學博士管演述兩種植物之混同。衆報告其化學試驗成績。載入植物學雜誌第八十八號。其文曰。決

六〇七

七畫 決

明為望江南之通稱。以治昆蟲刺傷。毒蛇咬傷及腹痛。咳嗽諸病。俱有大效。民間慣收貯之。以備不時之需。其為人所重視。幾如古加因。是效驗可知矣。余偶在大阪友人處。得此草種子若干。曾細加檢查。知該兩種植物之形狀。記共一二。以供讀者之參考。一望江南 *Cassia occidentalis*, L. 葉形卵圓。末端頗尖。對生如翼。其數五。花開於莖下之葉腋間。莢果長可三寸。微扁。中藏種子數排。其數頗多。種子作扁圓形。而如卵。末端彎曲似嘴。二。決明學名 *Cassia Absus* *Stolia*, L. 葉作倒卵圓形。對生如翼之葉。僅兩三對。葉腋抽花一朶。至二朶。莢形扁方。長五六寸。種子不橫排而縱列。略似小豆。然其基礎部為斜面上部亦平行作斜面。末端遂成尖銳。與望江南異同者如此。至檢查決明子法。先取該種子搗碎。揀去油分。乃用酒精（比重〇・九三）溫浸數時之久。濾過。蒸餾。再收酒精分。次於渣滓中加水。並添注稀釋之那篤倫滿液。使成亞爾加里性。更注伊打。且

搗盪之。收取伊打分。次於水液中。加入鹽酸。使成酸性。亦反覆加伊打。且搗盪之。仍收取伊打分。任其自然蒸發。則遺留深褐色之物質。次以含有那篤倫滿液之水溶解之。此物質並加伊打搗盪。除去伊打分。次於該水液中。再加鹽酸。使成酸性。加伊打搗盪。收取伊打分。放置之。則遺留深黃色如粉末之物質。終以無水酒精溶解而放置之。則生帶紅黃色之結晶。此結晶水不溶解。酒精伊打。偏蘇兒。冰醋酸。皆能溶解。過亞爾加里。現櫻子紅色。而溶解。過炭酸亞爾加里。則現血紅色。而溶解。其熔點在二百五十度。余於原素雖未施行分析。然據其性質。疑即為大黃及昆需。關護皮等所含依摩金。蓋 $C_{21}H_{21}(OH)_9O_2$ 之化合物也。曩在帝國大學植物園。得馬蹄決明種子。試驗之後。亦得相同之物質。按依摩金之化合物。自其化學之本性觀之。實兼有佛爾屬及菲嫩屬化合物之本性。以治昆蟲刺傷。毒蛇咬傷。或者似苦列沙羅並之著特效。今同事醫藥博士高橋

順太郎。正在查驗依摩金之醫治功效。他日當能一觀其成績報告也。

配合應用 ●治肝臟熱。用決明、沙苑、葵藜、甘菊花、枸杞子、生地、黃女貞、實、槐、實、穀精草、補肝明目益精。

●治暴赤風眼淚痛。得生地、黃甘菊、花、荊芥、黃連、甘草、玄參、連翹、木通。

●治積年失明。決明子二升為末。每食後粥飲服方寸匕。（外臺方）

●治背首雀目。決明一升。地膚子五兩為末。米飲丸梧子大。每米飲下二三十丸。（晉濟方）

●補肝明目。決明子一升。蔓菁子二升。以酒五升煮。曝乾為末。每飲服二錢。溫水下。日二服。（聖惠方）

●治目赤腫痛。決明子炒研。茶調。傳兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。亦治頭風熱痛。（醫方摘要方）

●治癩瘡延蔓。決明子一兩為末。入水銀輕粉少許。研不見星。擦破上藥。立瘳。此東坡家藏方也。（

六〇八

奇效良方

●治發背初起。草決明生用一升。搗。生甘草一兩。水三升。煮一升。分二服。大抵血滯則生瘡。肝主藏血。決明和肝氣。不損元氣也。（許學士本事方）

●施用宜忌 凡非血熱陰虛而有風寒外邪者禁用。惡大麻子。者實為之使。

●參攷資料 ●相感志首。剛中種決明。蛇不敢入。丹溪朱氏。胃決明解蛇毒。本於此也。王長山居錄。首春月種決明。葉生採食。其花陰乾。亦可食。切忌泡茶。多食無不患風。按馬蹄決明。苗角皆軟而苦。不宜於食。縱食之有利。五臟明目之功。何遂至於患風耶。又鑑鏡流傳錄。盲人不可種決明。生子多跛。此迂儒誤聽之說也。不可信。（李時珍）

●今處處人家園圃所種。夏初生苗。高三四尺許。根帶紫色。葉似苜蓿而大。七月開黃花。結角。其子如青綠豆而銳。十月採之。按爾雅。藟。荇。決光。郭璞釋云。藥草決明也。葉黃銳赤華。實如山菜。莢。或

曰陵也。關西謂之蘇。音皆荷。其說與此種頗不類。又有一種馬蹄決明。葉如江豆。子形似馬蹄。(蘇頌)

【汾草】即甘草之古籍別名。典見本草原始。詳「甘草」條。

【沈丁花】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【沉水香】即沉香之古籍別名。典見綱目。詳「沉香」條。

【沉香】命名 本品係木之心節。置水中則沉。故名。又氣香如蜜。遂有蜜香之稱。

處方用名 貢沉香。塊沉香。沉香片。磨沉香。沈香屑。

古籍別名 沉水香。蘭粟香。燕口香。大如笠者名蓬萊香。蜜香水沉香。(綱目)附子香。芝附香。黃沉香。青桂香。(蘇頌)

外國名詞 Aquilaria Agal. Iocha, Roxb. Aloes Wood. (英)

基本 瑞香科之沉香樹木質中。偶然有黑色芳香性之樹脂凝結。木質因之變化。而增加重量者。即名沉香。

產地 陳仁山藥物生產辨云。沉香產廣東瓊州海南爲上。次則石叻內卑。印度。波斯等。再次安南。會安。四五月新。和漢藥考曰。產交趾。暹羅老根諸山。

形態 沉香樹係產於東印度地方之大常綠喬木。高達四五丈。葉互生。作卵圓或倒披針形。花爲白色筒狀。花序排列。實似檳榔子。熟則自裂。落下種子。木質呈褐色。中含脂肪。由無數平行纖維質而成。嚼之。稍有苦味。香氣並不甚佳。削屑投火中。則燃燒而發爽快香氣。



沉 香

種類 堅黑沉水者曰沉香。半沉半浮及與水面平者曰雞骨香。細枝緊實未爛者曰青桂香。其幹曰棧香。其根曰黃熟香。其根節輕大者曰馬蹄香。
製法 雷斅曰。凡使沉香。須要不枯如猪角硬。重沉於水下者爲

上。半沉者次之。不可見火。李時珍曰。欲入丸散。以紙裹置。待燥研之。或入乳鉢。以水磨粉曬乾。亦可。若入煎劑。惟磨汁臨時入之。

性質 辛微溫。無毒。

成分 本品之主要成分。爲溶於伊打及強酒精之樹脂狀物質。一芳香性。逢酒精性過綠化。呈美麗之藍色。溶於強酒精者。爲黑褐色。逢酒精性過綠化。呈帶綠藍色。此二種物質。熱之俱熔。發香氣而燃燒。瑞香科植物。本皆稍有芳香。本品亦屬本科。香氣甚佳。製爲丁幾(一與一〇)用之。當有健胃。強壯。奮興之效云。
效能 降氣納腎。調中平肝。用作香竄衝動藥。

主治 風水毒腫。去惡氣。

歷代記載攷證 【唐】李珣海藥本草論沉香曰。主心腹痛。霍亂中惡。邪鬼疰。氣清入神。宜酒煮服之。諸瘡腫宜入膏中。【宋】大明日華諸家本草論沉香曰。調中補五臟。益精壯陽。暖腰膝。止乾筋吐瀉。冷氣。破癥癖。冷風麻痺。骨節不

任。風溼皮膚。痿痿氣刺。【金】張元素珍珠囊論沉香曰。補右腎命門。【元】李東垣用藥法象論沉香曰。補脾胃及痰涎。血出於脾。【明】李時珍本草綱目論沉香曰。治上熱下寒。氣逆喘急。大腸虛閉。小便氣淋。男子精冷。【明】繆希雍本草經疏論沉香曰。沉香氣芬芳。其味辛而無毒。氣厚味薄。入足陽明。太陰少陰。發入手少陰。足厥陰經。本經療風水毒腫者。即風毒水腫也。風爲陽邪。鬱於經絡。遇火相煽。則發出諸毒。沉香得雨露之精氣。故能解風火之毒。水腫者脾溼也。脾溼淫而喜燥。辛香入脾而燥溼。則水腫自消。凡邪惡氣之中人。必從口鼻而入。口鼻爲陽明之竅。陽明虛則惡氣易入。得芬芳清陽之氣。則惡氣除而脾胃安矣。【清】黃宮繡本草求真論沉香曰。沉香辛苦性溫。體重色黑。落水不浮。故香載能下氣墜痰。氣香能散。故香載能入脾調中。色黑體陽。故香載能補火。緩精壯陽。是以心腹疼痛。禁口毒痢。癥癖邪惡。冷風麻痺。氣痢氣淋。善其病。因屬虛寒。俱可用此調

治。蓋此溫而不燥。行而不泄。同驚香。附則治諸虛寒熱。並婦人強忍入房。或過忍尿。以致胞轉不通。同丁香。肉桂。則治胃虛呃逆。同紫蘇。白豆蔻。則治胃冷嘔吐。同茯苓。人參。則治心神不足。同川椒。肉桂。則治命門火衰。同肉蓯蓉。麻仁。則治大腸虛秘。古方四磨飲。沉香化氣丸。痰痰丸用之。取其降泄也。沉香降氣散用之。取其散結導氣也。黑錫丸用之。取其納氣歸元也。但降多升少。氣虛下陷者。切忌。色黑中實。沉水者。良。香甜者。性平。辛辣者。熱。入湯劑。磨汁用。入丸散。紙裹置懷中。待燥。破之。忌火。

次之。酸者為下。又以脂多不含有白木者為佳。如有白處。務須刮去。如是則入水必沉。故名沉香。若雜白木。入水不沉。又沉香因產地或形態等之不同。故其名稱頗多。沉香與伽羅之分。不在其脂膏凝結之多寡。一說由生樹與枯樹。而異其脂膏之凝結。故大不相同云。今將文政六年刊行大阪屋四郎兵衛著『手板發蒙』所載沉香與伽羅之差別及其品類等。轉錄如左。沉香為死樹結香者。欲分別伽羅沉香。可柱銀盤上別之交趾。係產交趾之沉香。木色帶赤者。日俗呼赤油樣。帶黑者。呼真盤樣。香氣尚佳。太泥。香氣薄。柱之有作錢臭者。又有黑油狀者。謂之真盤。選羅。此種黑白相交。多附泥土。香氣尚佳。又選羅之最上品。木理如絲。稍有油而似伽羅者。日藥肆呼為『似』。占城。下品。生沉香。係生木所結者。細樣。今甚少。此種亦係生木所結。削亦係生木所結。刻福印。盤印。二種。為極下品。不堪入藥。蓋伽羅與沉香。為南方奇木。有生結死結之別。木之形狀。詳載廣東新語。本草

啓蒙等。按伽羅係木之枯死數年而結香者。沉香則係伐取其木。埋置土中。經數年而結香者。故時見有釘孔。伽羅無釘孔。其本根埋土中結香。故多油。此即生結之證。沉香係截下入土。故雖結香而油少。此即死結之證。凡堅實沉香木。在土中數年結香。或成伽羅。或成沉香。祇生結與死結有異耳。有一種名生沉香者。非埋木。即生木之沉香也。一說沉香以入水下沉者為真。浮不定者。謂之棧香。浮上者謂之黃熟香。其形態如犀角者。謂之犀角沉。如燕口者。謂之燕口沉。如附子者。謂之附子沉。如梭者。謂之梭沉。

辨別 ●真黑沉香以海南黎喇所出者為勝。最不易得。次則真臘。次則交廣崖州等處。入藥須取色純黑。質不枯。硬重能沉於水者。為上。半沉者次之。近有以老束香有紫油者。偽充。性燥烈。質重不能沉水。誤人匪淺。鄭肯應●按南方草木狀云。交趾有蜜香樹。幹如栝柳。其花白而繁。其葉如橘。欲取香伐之。經年其根幹枝節。各有別色也。木心與節堅黑。沉水者為沉香。與水面平者為雞骨香。其根為黃熟香。其幹為棧香。細枝堅實未爛者為青桂香。其根節輕而大者為馬蹄香。其花不香。成實乃香。為雞舌香。同出一樹。皆珍異之物也。香譜云。沉水香出天竺。單于二國。與棧香雞骨同出一樹。其葉似橘。經冬不凋。夏生花。白而圓細。秋結實如橫櫚。色紫。似楮而味辛。樹皮青色。木如梓柳。重實黑色。沉水者即沉香。今復有色黃而沉水者。謂之蠟沉。丁香傳云。香之類有四。曰沉。曰窈。曰生結。曰黃熟。其為類也。有二。沉香得其八焉。曰烏交格。曰黃蠟。曰牛眼。曰牛角。曰牛蹄。曰雞頭。曰雞腿。曰雞骨。皆為沉香也。雞骨香以其枯燥清淨。故名。青桂香即沉香。黑斑者也。倦游雜錄云。沉香木嶺南諸郡悉有之。潮州尤多。交趾連枝。岡嶺相接。數千里不絕。葉如冬青。大者合數人抱。木性虛柔。山民或以構茅屋。或以為橋。梁。為飯飯尤善。有香者百無一二。蓋木得水方結香。多在折枝枯幹中。或為沉。或為煎。或為黃熟。自枯

死者謂之水槃香。今上南恩高賢等州。惟產生結香。蓋山民入山見香木之曲斜斜枝。必以刀斫之成坎。經年得雨水所漬遂結香。復以鏹取之。刮去白木。其香結為斑點。亦名鷓鴣斑。燻之甚佳。沉香之良者。惟在瓊崖等州。俗謂角沉。乃生木中取者。宜用燕窩黃熟乃枯木中得之。宜入藥用。其依木皮而結者。謂之青桂香。氣尤清。在土中藏久不待別別而精者。謂之龍鱗。亦有削之自卷。咀之柔韌者。謂之黃蠟沉香。尤難得。此即伽楠香也。鐵圍山叢談云。香木初一種也。膏脈貫溢。則其結沉實。此為沉水香也。其類有四。謂之氣結。自然其間凝實者也。謂之脫落。因木朽而自解者也。謂之生結。先以刀斧傷之。而後膏脈凝聚其間也。謂之蠱漏。因傷蠱而後膏脈亦聚也。四者以自然脫落為上。而其氣和。生結蠱漏。則其氣烈。為下焉。其外則有半結半不結。為弄水沉。因其半結則實而色黑。半不結則不實而色褐。有謂之鷓鴣斑是也。復有名水盤頭。其結實厚者。亦近乎沉水香。但香水

被伐。其根盤必有膏脈湧溢。故亦結。但數為兩淫。其氣頗腥烈。雖有香氣。不大凝實。謂之籠香。三者其產占城。國不若真臘。真臘不若海南。黎峒。又皆不若萬安。吉陽兩軍之間。黎母山。至是為冠絕天下之香。無能及之矣。范成大曰。沉水香。上品出海南。黎峒。亦名土沉香。少大塊。其次如蠶粟角。如附子。如芝菌。如茅竹葉者。皆佳。至輕薄如紙者。入水亦沉。香之節因久墊土中。滋液下向。結而為香。採時而香悉在下。其背帶木性者。乃出上。環島四郡。果皆有之。悉冠諸蕃所出。尤以出萬安者為最勝。蓋萬安山。在島之正東。鍾朝陽之氣。香尤醞藉。豐美。大抵海南香。氣皆清淑。焚一博許。氣鬚滿室。四面悉香。至煤盡氣亦不焦。此南海香之辨也。占城真臘等香。近年又貴。丁流眉來者。予試之。乃不及海南中下品。舶香往往腥烈。意味又短。帶木性。尾烟必焦。海北生交趾者。善舶皆聚欽州。謂之欽香。質重實。多大塊。氣尤酷烈。難可入藥。南人賤之。蓬萊香者。亦出海南。即沉水香。結未

成者。多成片如小笠及大菌之狀。有徑一二尺者。極堅實。色狀如沉香。惟入水則浮。刺其背帶木處。亦多沉。鷓鴣斑香。亦得之於海南。沉水蓬萊及絕好籠香。中搓牙輕。蠶色褐黑。而有白斑點。點如鷓鴣斑。上毛。氣又清婉。如蓮花。籠香出海南。香如蠟皮。栗蓬及漁蓑狀。蓋俯治時。雖鑿費工。去木留香。棘刺森然。香之精。鍾於刺端。芳氣與他處。籠香迥別。黎岐紀聞云。沉水香。俗人以爲海南寶。牛角沉為最上。細花次之。粗花又次之。其有成片者。渾沌形。類帽者。為帽頭沉。蟲蝕而有蟲空者。為蟲口沉。象形取義。各不同也。又有一種曰飛香。如牛筋飛。大練飛。苦瓜飛。麻雀飛等。其形各殊。命名亦異。然飛香內。亦有牛角沉。細花粗花之分。未可概論。大概各香以沉水不沉水分貴賤耳。然香之出也。有神。黎中人往往於山內。偶遇香。用草縛其樹。以作記。急取斧斤斫之。及再至其處。則草移別樹。而原香亦不可復得耳。綜觀諸賢辨香之產地。結香之原因。香類之鑑別。已闡發無遺。毋庸再

辨矣。茲據前賢所名牛角沉。即今之黑沉。最上品是也。所謂鷓鴣斑。蓬萊香。帽頭沉。蟲口沉。即今之將軍帽。魚片沉之類是也。今之所謂毛沉者。實為前賢所謂香外削去之木也。為最次。不入藥用。不可不知也。(曹炳章)

近人學說 程登瀛曰。沉香樹為常綠喬木。高六七丈。大有兩人合抱者。生於平壤水涯。原林中。葉為箭頭形。開小白花。實似桂子而小。微有香氣。結子不多。未知有何作用。故無人採收。枝幹子葉之形狀。絕似我閩之白仁香樹。其木質蠶不成製品材。市肆所用之沉香片。即生伐沉木。故亦稱有束柴。乃木心中所結之結晶。就觀察所及言之。古者之沉樹。被風搖折。或人斧伐其枝極。樹木枯死後。木質腐化。油質聚集凝結而成。有許多結於木心中。無孔道可通者。似不必有蟻營巢於其中。生活之樹不結香。故其外皆挾朽木。內多空洞。孔中滿貯腐化之柴粉。亦有如蟻營窠所遺之土屎。據老於此業者云。生結與死結。殆難以分別。則以極

七 蠶 沉

七靈 沉

聖教之香心香節目言。假定其在香樹未死時或偏枯時。已結成塊片。然亦必待枯朽後乃能完成。樹幹大而結香無多。活時剝取不易。且往往無所得。故覓取沉香者。必於枯幹中求之。以是前人乃誤會謂什木所成。取各種香木。先斷其根。以其材浸水多年。皮幹朽腐而木心與枝節不壞。質堅色黑。在水而沉者。謂之沉香。此說似是而非。各種香結。確有多半是從枯幹中取出之節目木心。但一種木結一香不相混也。法屬安南高綿（即東埔寮。產東埔豆蔻最著名）及暹羅東北部。所產香柴類。暹人入藥有十餘種之多。專營此業者為香柴。運銷中國以沉香。檀香。紫檀為大宗。南洋沉水木極多。而沉香能沉水者不易得。諸木皆浮。而沉香獨沉。說不足信。楊國忠以沉香為開。或云以之雕刻佛像。想是別種香木。或有其名耳。沉香皆條片洞孔。無數尺長方之堅實塊。可以製器。品者香柴。廠收買後。即挖淨木屑。以純黑多油之香目為上。條片起黑色斑點者次。枯赤少油

者更次。揀選後。入大蒸籠蒸熟。每擔可漲加三四斤。色質亦較黑。深好看。市肆寫着老熟沉。就是在原頭已經蒸熟者。本品含多量樹脂。揮發油。糖分。氣香烈。味微苦帶甜。性溫平。滑下。細嚼之。口滑生清涎。功能調中助化。下氣化痰。治腸胃脹滿結痛。痢疾諸症。

配合應用 治思慮傷心。心氣鬱結不舒。用沉香。人參。首烏。遠志。茯苓。酸棗仁。生地。黃芩。麥門冬等。治中惡腹中疝痛。辟一切惡氣。沉香。木香。藜香。砂仁。治胸中氣結。或氣逆不伏。沉香。蘇子。橘紅。枇杷葉。白豆蔻。人參。麥門冬。

治胞轉不通。非小腸膀胱厥陰受病。乃強忍房事。或過忍小便所致。當治其氣。則愈。非利藥可通也。沉香。木香。各二錢。為末。白湯空腹服之。以通為度。醫藥元戎方。

治諸虛寒熱。冷痰虛熱。冷香湯。用沉香。附子。炮等分。水一盞。煎七分。露一夜。空心溫服。王好志醫藥元戎方。

治胃冷久呃。沉香。紫蘇。白豆蔻。仁。各一錢。為末。每柿蒂湯服五七分。吳球活人心鏡方。

治心神不足。火不降。水不升。健忘驚悸。朱雀丸。用沉香五錢。伏神二兩。為末。煉蜜和丸。小豆大。每食後。人參湯服三十丸。日二服。王璆百一選方。

治腎虛目黑。煖水臟。用沉香一兩。蜀椒。去目。炒出汗。四兩。為末。酒糊丸。梧子大。每服三十九丸。空心鹽湯下。普濟方。

治大腸虛閉。因汗多津液耗涸者。沉香一兩。肉蓯蓉。酒浸焙。二兩。各研末。以麻仁研汁。作糊丸。梧子大。每服一百丸。蜜湯下。嚴子禮濟生方。

治痘瘡黑陷。沉香。檀香。乳香等分。熱於盆內。抱兒於上。熏之。即起。鮮子桐鈎玄方。

用宜忌 凡陰虛火旺。及氣虛下陷者。禁用。忌火。

著名方劑 沉香琥珀丸。治水腫。一切急難症。小便不通。古方。琥珀。杏仁。紫蘇。赤芍。澤瀉。各五錢。厚樞。郁李仁。去皮尖。沉香。各一

六一二

兩半。陳皮。防己。各七錢半。共為末。蜜丸。如梧子大。以麝香為衣。每服二十五丸。加至五十丸。空心人參湯下。量虛實加減之。

參攷資料 沉香。青桂。雞骨。馬蹄煎香。同是一樹。出天竺諸國。木似檉柳。樹皮青色。葉似橘葉。經冬不凋。夏生花。白而圓。秋結實。似檳榔。大如桑椹。紫而味辛。蘇恭。

沉香枝葉並似檉。云似橘者。恐未是也。其枝節不朽。沉水者。為沉香。其肌理有黑脈。浮者。為煎香。雞骨馬蹄。皆是煎香。並無別功。止可蒸衣去臭。陳藏器。沉香。青桂等香。出海南諸國。及交廣崖州。沈懷遠南越志云。交趾蜜香樹。彼人取之。先斷其積年老木根。經年。其外皮幹俱朽爛。木心與枝節不壞。堅黑沉水者。即沉香也。半浮半沉。與水面平者。為雞骨香。細枝。聚實未爛者。為青桂香。其幹為棧香。其根為黃熟香。其根節而輕大者。為馬蹄香。此六物。同出一樹。有精粗之異。爾。並採無時。劉恂嶺表錄異云。廣管羅州多棧香。樹身似拒柳。其花白而繁。其葉如橘。其皮堪作

紙名香皮紙。灰白色。其紋如魚子。沾水即爛。不及楮紙。亦無香氣。沉香雞骨。黃熟。棧香。雖是一樹。而根幹枝節。各有分別也。又丁謂天香傳云。此香奇品最多。四香凡四十二狀。出於一木。木體如白楊。葉如冬青。而小。海北賈化高雷皆出香之地。止海南者優劣不侔。既所稟不同。復售者多而取者速。其香不待稍成。乃趨利伐賤之深也。非同播管黎人。非時不妄剪伐。故木無天札之患。必得異香焉。(蘇頌) 葉廷珪云。出渤泥古城。真臘者謂之番沉。亦曰舶沉。曰藥沉。醫家多用之。以真臘為上。蔡條云。占城不若真臘。真臘不若海南。黎峒。黎峒又以萬安黎母山東峒者。冠絕天下。謂之海南沉。一片萬錢。海北高化諸州者。皆棧香爾。范成大云。黎峒出者。泥土沉香。或曰崖香。雖薄如紙者。入水亦沉。萬安在島東。鍾朝陽之氣。故香尤醞藉。土人亦自難得。舶沉香多腥烈。尾烟必焦。交趾海北之香。聚於欽州。謂之欽香。氣尤焦烈。南人不甚重之。惟以入藥。(李時珍) 按李珣海藥本草

七畫 沉 沐 沒

謂沉者為沉香。浮者為檀香。梁元帝金樓子謂一木五香。根為檀。節為沉。花為雞舌。膠為薰陸。葉為薰香。並誤也。五香各是一種。所謂五香一木者。即前蘇恭所言沉棧青桂馬蹄雞骨者是矣。(李時珍) 諸香如木香。草也。丁香。檀香。沉香。俱木類。然皆產於南土。故類言其辛溫辛熱也。至如木香之專調滯氣。丁香之專療寒氣。檀香之升理上焦氣。皆不得如沉香之功能。言其養諸氣。保和衛氣。降真氣也。蓋諸香得南土之氣厚者。其功效功能。皆衷於各草木之氣味。惟沉香之木。稟受乎地之陽。而蘊釀乎天之陰。如諸書所云。木得水方結。多在枝枯幹中。因雨露之所浸漬。又得於朝陽之久照。而膏脈凝聚。若然是真於陽而醞於陰。更醞諸陰。而仍發諸陽。蓋氣化所成。不同於諸香。獨衷各草木之氣味者也。(劉涓子)

【沉香片】即沉香之處方用名。詳【沉香】條。

【沉香屑】即沉香之處方用名。詳【沉香】條。

【沉香】即沉香之處方用名。詳【沉香】條。

【沉麝】即麝之古籍別名。典見綱目。詳【麝】條。

【沉麝藤】即曼遊藤之古籍別名。典見綱目。詳【曼遊藤】條。

【沐猴】即獼猴之古籍別名。典見史記。詳【獼猴】條。

【沒石子】即無食子之古籍別名。典見開寶本草。詳【無食子】條。

【無食子】即無食子之處方用名。詳【無食子】條。

【沒多僧】即蜜陀僧之古籍別名。典見唐本草。詳【蜜陀僧】條。

【沒利花】即茉莉花之古籍別名。典見龜齡集。詳【茉莉花】條。

【沒食子】即無食子之處方用名。詳【無食子】條。

【沒香】即蜜香之古籍別名。典見綱目。詳【蜜香】條。

【沒藥】 命名 沒末。皆梵音也。處方用名 製沒藥。飛沒藥。

古籍別名 末藥。(綱目)

外國名詞 Myrrha (Myrrh)

基本 屬於橄欖科之蜜兒拉。鑽刻其樹。即有一種樹脂滲出。乾則成塊。即沒藥也。

產地 陸仁山藥物生產辨云。沒藥產亞拉伯及印度。亞非利加。波斯等處。由唎米。架喇吉打運來。屬樹產。質臭。味苦。色紅黃。或棕色。有仁。而果之氣味者為上品。和漢藥考曰。產於亞拉伯之南部。及亞比西尼亞之北部。日本不產此物。

形態 為形圓不整之塊。小者僅如穀粒。大者有若雞卵。外面色似黃。或紅褐。表面蒙塵粉。破碎面或粗糙。或有似蠟之光澤。往往雜有特異之白斑。比重一。一二至一。一八。不易成爲粉末。必與水同研磨。始爲帶白似乳之汁。遇酒精。僅溶解少許。餘留之護膜。與夾雜物。則依然如故。暖之則柔軟。發清香。投火中不熔。但放淡焰而燃燒。香氣甚烈。味苦辛。遇硝酸或鹽酸。立變紫色。

製法 同乳香或酒磨。或微炒。

性質 苦。平。無毒。

效能 活血散瘀。消腫。定痛。消化機能弛緩者。可以此強健之。此外又用爲防腐。止血藥。

主治 破血止痛。療金瘡杖瘡。

諸瘰癧。痔漏。卒下血。目中野蠶痛。膚赤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論沒藥曰。防胎及產後心腹血氣痛。竝入丸散服。唐甄權藥性論沒藥曰。凡金刃所傷。打損墮跌。墜馬。筋骨疼痛。心腹血瘕者。並宜研爛。熱酒調服。推陳致新。能生好血。宋大明日華諸家本草論沒藥曰。破癥瘕宿血。損傷瘀血。消腫痛。元王好古湯液本草論沒藥曰。心腹虛。肝血不足。明李時珍本草綱目論沒藥曰。散血消腫。定痛生肌。明繆希雍本草經疏論沒藥曰。沒藥味苦平無毒。然平應作辛。氣應微寒。氣薄味厚。入足厥陰經。凡惡瘡痔漏。皆因血熱滯滯而成。外受金刃及杖傷作瘡。亦皆血肉受病。血肉傷則癰而發熱作痛。此藥苦能泄。辛能散。寒能除熱。水屬陰。血亦屬陰。以類相從。故能入血分。散瘀血。治血熱諸瘡。及卒然下血證也。肝開竅於目。目得血而能視。肝經血熱。則目為赤痛。肝竅散。肝經之血熱。則目病除矣。清黃宮繡本草求真論沒藥

曰。沒藥苦平。兼辛。諸書亦載能補心膽與肝。蓋謂瘀血不除。則新血安生。乳香氣味辛溫。既能行氣活血。又有沒藥之苦。以破其瘀。則推陳致新。自有補益之妙。是以古方乳香必同沒藥兼施。謂其可止痛。義由此也。今人不明藥品氣味。動以香載補益。豈不誤甚。出南香色赤。類琥珀者良。治同乳香。

國外學說 日本學說謂沒藥

物學綱要云。本品於氣道分泌過多。而無略出之力者。用之即可用為祛痰藥也。用。一回。〇。三至一。〇。又日本藥局方曰。自古作薰香及香料之沒藥。即密兒拉。其基本植物為一種小樹。產非洲東部之蘇瑪利海岸之阿爾山。及賽勒脫山。阿拉伯海岸亦有之。枝條交互開展。帶有尖棘。其葉凡三並帶側葉二。但甚小。同為倒卵圓形。末端反鈍。邊緣毫無缺裂。間或微有齒裂之痕。其葉皆短。叢生枝上。花多雌性。極小有短梗。作叢束狀。萼如杯。又似水壺。四瓣分枝。而不散落。花冠亦四瓣。作長橢圓形。儼如直立萼上。雄蕊八。短而如杯。

生於花林之邊緣。亦直立不倚。實總分二三房。房各藏胚子二。雌蕊柱極短而粗。有或自三瓣鈍端之柱頭。果實為石果。中有石核一枚。至三枚。形卵圓。作褐色。尖端滑澤。分裂為兩片。至四片。種子有似膜之子衣覆之。此樹之外皮及髓中。俱存有腺體。與骨液波樹及祕魯脂樹甚相似。又密兒拉。乃一種樹脂。或為顆粒。或為不整之塊片。色帶黃。或帶紅。或褐。內部處處現帶白色。破碎之小片。可透映。香氣甚烈。味苦而辛辣。咀嚼之。則黏齒。以水研磨。則成黃色之乳劑。又以沒藥之粉末一瓦。加伊打三立方仙米搖蕩。濾過。則得黃色之液。使其揮散。以其餘渣與發烟硝酸之蒸氣相接觸。則現紅紫色。又於沒藥中加熱酒精。令十分浸出。其餘渣。百分中尚留七十分。更以之化為灰。百分中僅留六分。以上之固性物。又和漢藥考曰。從前藥舖。尚有煉沒藥花沒藥二種。煉沒藥即上述之沒藥。花沒藥如粒如片。色深紅或黃。質堅脆。透映。香氣及苦味俱少。嚼之。則唾津變紅。產於暹羅。

錫蘭。名曰紫梗。英美學說謂沒藥產印度。亞非利加。波斯等處。係樹幹流出松香類之膠質。其產南方者。則與乳香同處得之。近時歐羅巴各國所用之沒藥。大半從孟買運來。即從阿刺伯與波斯兩處海灣運至孟買。阿刺伯亦有產沒藥之處。然其所產無多。其樹與亞非利加產沒藥之樹為同類。在西人則尚未知沒藥為何樹所產。或為一種樹。或數種樹所產。英國所得之沒藥。有各種相雜。謂之雜沒藥。間有分出其細者。謂之土耳其沒藥。又謂之煉沒藥。如在英國煉之。則其物可待。如在他國煉之。則多不淨。其粗者常與他種松香類質膠類質雜合。從阿比西尼亞帶至英國之沒藥。其顆粒有圓粒形與平面顆粒形之二種。今藥肆中出售之沒藥。有上下二等。其形色與氣味。上等者色紅黃或紅棕。質頗脆。略透光。其成塊。有大有小。若研末。則為黃白色。其臭。香味。苦。下等者色黑。不過光。係有雜質在內。而其香味亦少。至醫治作用。沒藥為化痰藥。行氣藥。補胃藥。又為治轉

筋藥。調經藥。如胃不消化。腹內有風。及大便結均宜服。惟身有熱症。則未可速服。其功用又能開胃。暖胃助消化。治痰喘。久咳嗽。經閉。婦女經閉。外用能治牙齦潰爛。口瘡。處方。沒藥二分。衣必格一分。朴硝五分。共研作散。分四次服。每二點鐘服一次。治咳嗽。氣喘。痰不能出。用藥。去痰止咳。每服一分至四分。尋常則與他種補藥或瀉藥相配合用之。

配合應用 ①治產後血暈。同延胡索。乳香。乾漆。玃甲。玃珀。爲末。

②治兒枕痛。及惡露未盡。腹痛寒熱等證。加人參。澤蘭。生地。益母草。蘇木。作湯送前藥。

③治一切癰疽疔腫。同乳香。白及。白欒。紫花地丁。半枝蓮。夏枯草。忍冬藤。連翹。甘菊。貝母。

④治內傷胸脇骨痛。同乳香。當歸。牡丹皮。牛膝。續斷。川芎。香降香。穿山甲。

⑤入一切膏藥。能消毒止痛長肉。

⑥筋骨損傷。米粉四兩。炒黃。入沒藥。乳香末各半兩。酒調成膏。攤

貼之。(御藥院方)

①金刃所傷。未透膜者。乳香。沒藥各一錢。以童子小便半盞。酒半盞。溫化服之。(奇效良方)

②治婦人血暈。腹痛。內傷。疔刺。沒藥末一錢。酒服立止。(醫經本草方)

③治產後惡血。沒藥。血竭末各一錢。童便溫酒各半盞。煎沸服良。(婦人良方)

④女人異疾。月事退出。皆作禽獸之形。欲來傷人。先將棉塞陰戶。乃頓服沒藥末一兩。白湯調下。即愈。(危氏得效方)

⑤治歷節諸風。骨節疼痛。晝夜不止。沒藥末半兩。虎脛骨酥炙爲末。三兩。每服二錢。溫酒調下。(圖經方)

⑥治小兒盤腸氣痛。沒藥。乳香等分爲末。以木香磨。水煎沸。調一錢服。立效。(楊氏方)

⑦治血氣心痛。沒藥末二錢。水一盞。酒一盞。煎服。(醫林集要方)

⑧用宜。凡無瘀滯及癰疽已潰者禁用。

參攷資料 ①乳香活血。沒藥散血。皆能止痛。消腫。生肌。故二藥每每相兼而用。(李時珍)

②沒藥凝結成塊。色黑微香。狀似安息。或大或小。斷碎之則光瑩可愛。(本草綱目)

③沒藥之總彙集處。在印度之孟買。品類之分別。即出於該處之商人。其最上品。運銷英國。最劣者。運至中國。日本藥局。屏棄其舊稱之沒藥。而採密兒拉之原名。選用其佳者。(和漢藥考)

【沙木】即補茄之古籍別名。典見高濂珍異藥品。詳「補茄」條。

【沙木】即杉材之古籍別名。典見綱目。詳「杉材」條。

【沙牛白羊酥】 性質 甘。微寒。無毒。主治 補五臟。利大小腸。治口瘡。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論沙牛白羊酥曰。除胸中客熱。益心肺。【宋】日華諸家本草論沙牛白羊酥曰。除心熱。肺痿。止渴。止咳。止吐血。潤毛髮。【明】李時珍本草綱目論沙牛白羊酥曰。益虛勞。潤臟腑。澤肌膚。和血脈。止急

痛。治諸瘡。溫酒化服良。

【沙田栢】即栢之產於廣西容縣者。詳「栢」條。

【沙田隨】即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃精」條。

【沙米】 原名 沙蓬米。古稱別名 黍喇棘。蓬蒿。(綱目拾遺)

產地 出張家口內保安沙城。及西套蒙古諸處之沙地間。

製法 採得杵去皮用。形體 沙蓬爲穀類之一種。苗莖如麻。葉類艾而稍圓。有刺。高約尺許。枝葉叢生如蓬。結實又如葵。黍生子成房。粒細似粟米。似胡麻而小。亦如稗子。其米可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。主治 清熱消風。利大腸。消宿食。療噎膈反胃。服之不饑。

參攷資料 沙米性暖。益脾胃。助消化。好吐者多食有益。煮粥滑膩可食。或屑之。可充餅餌茶食之需。(綱目拾遺)

【沙米】即東廣之古籍別名。典見保德州志。詳「東廣」條。

七畫 沙

【沙角】 產地 出於臨平湖一帶。

形態 沙角爲菱芰質角之小者。止有兩角。而色紅。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 補中益氣。解酒。歷丹石。

生食之。

參攷資料 沙角大補脾土。而不滯氣。(學敏)

【沙角】 卽菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【沙承】 卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【沙色條根】 卽白朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白朮』條。

【沙刺片】 卽鮫魚刺之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鮫魚刺』條。

【沙孤米】 卽西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【沙果】 卽林檎之別名。詳『林檎』條。

【沙苑蒺藜】 卽刺蒺藜之處方用名。詳『刺蒺藜』條。

【沙草秀根】 卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

條

【沙參】 命名 本品與人參、玄參、丹參、苦參。主療頗同。故有參名。而白色宜於沙地。故名。

處方用名 南沙參。北沙參。鮮沙參。

古籍別名 知母。(本經)白參。(吳普)羊乳。鈴兒草。苦心。文希。誠美。志取。地黃。虎鬚。文虎。(別錄)羊婆。爛。(綱目)烏羊婆。爛。加德。(和漢藥考)

外國名詞 Adenophora verticillata, Fisch. var. verticillata, Fr. of Sav. (拉丁)

基本 屬桔梗科 Campanulaceae 植物 Adenophora verticillata, Fisch. 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。沙參產山東萊陽。挑選最好者裝小箱而來。其餘劣貨盡行沽與威海庄。由威海運來。其實威海無沙參出產。六月新。光滑雪白者係種出。性質脆。均卽折。枝劣色黃。均而不折者。係野種。次之。

形態 沙參爲多年生草本。種類極多。春日抽苗。莖高一二尺。或三四尺。葉爲廣披針形。或作長卵


圓形。末端尖銳。邊緣有細鋸齒。各葉皆輪生。夏秋開喇叭花。有青紫、淡紫、白諸色。排列而爲圓錐狀花序。後結實。似冬青。根莖俱有白汁。其根細長。有橫皺。外面淡黃色。內面白色。質輕虛。是爲中國產之上品。



(一) 參沙



(二) 參沙



(三) 參沙

類。生於沙地者。根長尺餘。形如紡錘。生於黃土者。根短而小。南沙參。空鬆而肥。北沙參。堅實而

六一六

瘦。春採者微黃而虛。秋採者色白而實。

種植 袁淑範曰。關於沙參形態之記載。始見之於吳氏本草。曰。二月生苗如葵。葉青色。根白。實如芥根。大如蕪菁。三月採。韓保昇亦謂其根若葵根。其花白色。然此亦不過極粗漏之記載。至李時珍始爲詳細之記載。曰。二月生苗。葉如初生小葵葉。而團扁不光。八九月抽莖。高一二尺。莖上之葉。有尖長如枸杞葉。而小有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐺。五出白蕊。亦有白花者。並結實。大如冬青。實中有細子。霜後苗枯。其生沙地者。長尺餘。大一虎口。黃土地者。則短而小。根莖皆有白汁。八月採者。白而實。春月採者。微黃而虛。小人往往熱蒸壓實。以亂人參。但體輕鬆。味淡而短耳。沙參爲屬桔梗科植物 Adenophora verticillata, Fisch. 之根。呈細長棒狀之形。外面呈淡黃色。有橫皺。內面呈白色。其質極輕虛也。至其原植物 Adenophora verticillata 則爲野產之多年生草本植物。問

亦有栽培於庭園之中。為觀賞用者。其種類極多。春月生苗。抽莖高一二尺。乃至三四尺。葉呈廣披針狀。或長卵圓形。先端尖。緣有細齒。環輪狀而生。至夏秋則開青紫花。淡紫色。或白色。排列如圓錐狀之鐘狀花。後乃結如冬青之實。其根生沙地者長尺餘。呈紡錘形。黃土地者短而小。根莖皆有白汁。供藥用者皆屬根部。多於秋後採之。用河水浸數日。待其外皮腐爛後。乃洗去之。曬乾備用。故多呈白色。然氣味則薄。以經二年後八九月採者為最佳良之品也。

採取 八九月間。採掘經過二年之根。曬乾。

製法 凡採得其根。以長流水浸數日。俟外皮腐爛。水洗去腐爛乾用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 清肺火。養胃陰。除虛熱。治咳嗽。用為祛痰藥。

主治 血結驚氣。除寒熱。補中益肺氣。(本經)療胸痺。心腹痛。結熱邪氣。頭痛。皮間邪熱。安五臟。久服利人。又云。羊乳主頭腫痛。益氣。

七畫 沙

長肌肉。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論沙參曰。去皮肌浮風。疝氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宜五臟風氣。【宋】大明諸家本草論沙參曰。補虛。止驚煩。益心肺。并一切惡瘡疥癬。及身癢。排膿。消腫毒。【明】李時珍本草綱目論沙參曰。清肺火。治久咳肺痿。【明】李士材本草圖解論沙參曰。沙參微苦微寒。以補陰清肺為用。故久咳肺痿。有寸數實者。頗為相宜。但體質輕虛。性用寬緩。非肩弘任重之品也。【清】黃宮繡本草求真論沙參曰。沙參甘苦而淡。性寒體輕。故能入肺以泄熱。及瀉肺火。凡久嗽肺痿。金受火尅者。服此最宜。蓋以熱氣薰蒸。非用甘苦輕淡。不能以制焚燬之勢。故嗽必藉此止。若寒客肺中作嗽。切勿妄用。以嗽既屬寒成。復以寒藥為治。不更使寒益甚乎。至書有言補肺養肝。及益脾胃。皆是從肺。子母受累。推究而出。服此肺不受利。子母皆安。即肝亦不受累。諸臟並見安和耳。非真能以補陰也。凡查所載藥性補瀉。類多如斯。不

獨參為然。似人參而體輕。鬚白質者良。生沙地長大。生黃土者瘦小。

【清】陳修園本草經讀論沙參曰。按本經人參味甘。沙參味苦。性皆微寒。後人改人參微溫。沙參味甘。不知人參味甘。甘中稍苦。故曰微寒。沙參全寒。苦中帶甘。故曰微寒。先聖立言。自有深意。後人不思體會。而審察之。擅改聖經。誤人最甚。【清】徐洄溪本草經百種錄論沙參曰。肺主氣。故肺家之藥。氣勝者為多。但氣勝之品。必偏於燥。而能滋肺者。又膩滯而不清。虛惟沙參為肺家氣分中理血之藥。色白體輕。疎通而不燥。潤澤而不滯。血阻於肺者。非此不能清也。【清】黃元御玉楸藥解論沙參曰。沙參涼肺沖淡。補肺中清氣。退頭上體火。而無寒中敗土之弊。但情性輕緩。宜多用乃效。山東遼東者佳。堅脆潔白。迥異他產。一切疥癬疥癬腫痛。瘙癢皆效。

國外學說 和漢三才圖會曰。

沙參屈曲。如卷細繩。亦有剝防風皮卷成偽製者。又日用藥品考曰。從前運至日本者皆真品。今不多

見。且蛙壞。不堪用。邇來進口貨。形甚細。且乾脆易折。殆非真品。日本產藥。銷路多。恐係劈防風根而偽製之也。又手板發蒙曰。日本所稱之沙參。為南沙參。中國種也。日本自種者。味不佳。中國產之似防風者。為上品。乃北沙參。

辨偽 鄭竹巖曰。偽名洋沙

參。色帶黃。味辣不甜。又有南沙參。皮極粗。條大味辣。性味與北產相反。按此沙參色白條小。而結實。氣味苦中帶甘。故本經云微寒。又云補中益肺氣。以上所述二種之偽品。味既辛辣。又安能補益乎。曹炳章曰。按北沙參。山東日照。故嫩萊陽。海南各縣俱出。海南出者。條細質堅。皮光潔。色白。鮮活潤澤。為最佳。萊陽出者。質略鬆。皮略糙。白黃色。亦佳。日照故嫩出者。條粗質鬆。皮糙黃色者。次。關東出者。粗鬆質硬。皮糙黃黃色。更次。其他台灣。福建湖廣出者。粗大鬆脆。為最大。不入藥用。惟無外國產。所云南沙參。為塊根。亦能補肺。鄭君云。有辣味。或別有一種耳。

近人學說 張山雷曰。沙參之

六一七

七 盡 沙

味。本經謂之苦。王濬藏以為微苦。至其岳則改作微甘。石頑則作甘淡。其實雖不甚苦。而寒性獨著。體質輕清。氣味俱薄。具有輕揚上浮之性。故專主上焦。而色白屬肺。則專走肺家。本經稱其益肺氣者。去其邪熱。即所以益其正氣。本非補益之正義。而後人竟誤認爲補肺專藥。以潔古海藏之賢明。而猶有代人參補五臟之陰之說。則吳遵程之所謂專補肺陰。洵非倡議。不知肺有餘熱。清之固宜。而肺氣不足。清之已謬。乃晚近庸夫。每遇虛人咳嗽。不問有邪無邪。有痰無痰。率以沙參、麥冬、玉竹、知母等寒涼膩滯之品。靡雜亂投。自謂可以補肺。以致膠結濁垢。澹化無門。遂以製造癆瘵之根柢。而不可救藥。葉氏之醫案。賈氏之醫醇。鼎鼎大名。猶犯此禁。無惑乎庸耳俗目。日操殺人之筆。而毫不覺悟。雖曰沙參輕清。尚不至如蕤麥知母之膩滯。然寒性頗盛。肺無熱邪。亦足以暗戕生機。而驟寒變。經仲醇僅禁用於肺寒咳嗽。猶嫌其疏而未密耳。李瀕湖綱目以沙參主肺痿。亦取

其補肺也。若中言之。則肺癰肺痿。證情近似。而一實一虛。大相反背。癰者壅塞。本是實熱。愈須清瀉。不嫌寒涼。瘵者萎敗。已是虛怯。所宜扶持。豈容苦寒。惟肺痿一候。固多咳噴痰涎。虛火猶熾。則沙參清熱而不膩。猶爲相宜。經氏經疏沙參天冬、麥冬、百部、五味子、桑白皮治肺痿肺熱。又沙參、貝母、枇杷葉、瓜蒌、甘草、桑白皮、百部、天冬、款冬花治久嗽。頭暈肺痿一方。補肺清熱。於虛熱之肺痿甚宜。然若咳吐痰多。則二冬五味。皆在禁例。非可輕用。若久嗽一方。則惟虛熱肺燥者可用。而痰濁未清者。已爲大戒。或更挾外邪。則陰柔滋膩。降氣燥邪。又釀造癆瘵之不二法門矣。又曰沙參古無南北之別。石頑逢原始言沙參有南北二種。北者質堅性寒。南者質虛力微。趙氏綱目捨遠引藥性考。謂南沙參形粗似蘆。參而硬。味苦性涼。清胃火解癉。止咳寧肺。頤按今市肆中北沙參堅實而瘦。南沙參空鬆而肥。皆微甘微苦。氣味輕清。而富脂液。故專主上焦清肺胃之熱。養肺胃之陰。

性情功用。無甚區別。必謂北產性寒。南產不寒。似亦拘執成見。趙氏所引止咳寧肺。亦主肺熱作嗽而言。非泛治痰飲之寒嗽。吳氏從新謂南沙參形稍瘦小。則非今日市廛中物矣。
配合應用 ①治肺癰肺熱。同天門冬、麥門冬、百部、五味子、桑白皮。
②治久嗽。同貝母、枇杷葉、桔梗、甘草、桑白皮、百部、天門冬、款冬花。
③治卒得諸病。少腹及陰中相引痛如絞。自汗出欲死。搗細末酒服方寸匕。立差。(葛洪方)
④治婦人白帶。多因七情內傷。或下元虛冷所致。沙參爲末。每服二錢。米飲調下。(證治要訣方)
⑤治肺熱咳嗽。沙參半兩。水煎服之。(衛生易簡方)
用量 錢半至四錢。
施用宜忌 凡非陰虛肺燥而屬寒嗽者。禁用。恐防已反。襲虛。
參攷資料 ①肺寒者用人參。肺熱者用沙參代之。取其味甘也。(張元素) ②人參甘苦溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。

六一八

故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒。其體輕虛。專補肺氣。因而益脾與腎。故金能受火尅者宜之一補。陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨之也。(李時珍) ③沙參白色。宜於沙地。故名。其根多白汁。但人呼爲羊婆奶。別錄有名。未用。羊乳卽此也。此物無心。味淡。而別錄一名苦心。又與知母同名。不知所謂也。鈴兒草。象花形也。(李時珍) ④沙參生河內川谷。及宛旬穀陽。嶺山。二月八月採根。曝乾。又名羊乳。一名地黃。三月採。立夏後母死。(別錄) ⑤今滄州路隨江淮荊湖州郡皆有之。苗長一二尺以來。叢生。匡壁間。葉似枸杞。而有又丫。七月開紫花。根如葵根。大如指許。赤黃色。中正白。質佳者。二月八月採根。而土生者。葉有細有大。花白。瓣上仍有白點。此爲小異。(蘇頌) ⑥沙參處處山原有之。二月生苗。葉如初生小葵葉。而圍扁不光。八九月抽莖。高一二尺。莖上之葉。則尖長如枸杞葉。而小有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐺。五出。白蕊。亦有白花者。並結實。大如

冬青實。中有細子。霜後苗枯。其根

生沙地者長尺餘。黃土地者則短

而小。根莖皆有白汁。八九月採者

白而實。春月採者微黃而虛。小人

亦往往繁蒸壓實。以亂人參。但體

輕寢味淡而短耳。(李時珍)

【沙犀】即兕犀之古籍別名。典見

綱目。參見『犀角』條。

【沙魚】即鮫魚之古籍別名。典見

本草拾遺。詳『鮫魚』條。

【沙魚翅】即鮫魚翅之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳『鮫魚翅』條。

【沙鹿】即麋之別名。詳『麋』條。

【沙棠】產地 生山中。

形體 沙棠為喬木類

之一種。木狀如棠。花色黃。其實色

赤。味如李而無核。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 食之却水病。

【沙蛤】即西施舌之古籍別名。典

見綱目。詳『西施舌』條。

【沙鱗魚】即鱗魚之古籍別名。典

見綱目。詳『鱗魚』條。

【沙葱】命名 本品為葱蒜之

生於沙地者故名。

拾遺)

產地 生口外沙石間。

形體 沙葱為菜類蔥屬之一

種。其葉形同家葱。根大如鷄卵。似

蒜頭。味辣尤甚。莖細如草莖而攢

生甚密。隨之調羹食。頗佳。其根可

供藥用。

主治 寬中下氣。消食解肌。活

血發汗。表風寒。滯宿滯。

參攷資料 沙葱與沙蔥草相

似。人食之心迷亂。馬食之腹隱痛。

惟宜於藥院。採者折以辨之。沙葱

本應折易斷。沙蔥草則柔韌難折

為異。(綱目拾遺)

【沙葱】即葱蒜之生於沙地者。詳

『葱蒜』條。

【沙蟬】即沙蟬之古籍別名。典見

綱目。詳『沙蟬』條。

【沙蟻】即海參之別名。典見動物

學大辭典。詳『海參』條。

【沙蕪苳】即川苳之處方用名。詳

『川苳』條。

【沙蓬米】即沙米之原名。詳『沙

米』條。

【沙蠶】即石蠶之古籍別名。典見

【沙橘】即橘子細小而甘美者之

古籍別名。典見綱目。詳『橘子』條。

【沙薺】即薺菜之細小者。典見綱

目。詳『薺菜』條。

【沙雞母】形體 沙雞母為溼

種。能旋土成窩。可供藥用。

主治 療口瘡。同金盞塗之。

【沙糖】即赤沙糖之古籍別名。

典見唐本草。詳『赤沙糖』條。即

赤沙糖之原名。詳『赤沙糖』條。

【沙鱸】即鱸魚之古籍別名。典見

綱目。詳『鱸魚』條。

【沙蘆薈】即胡蘆薈生於沙壤者

之古籍別名。典見綱目。詳『蘆薈』

條。

【牡丹毛燕】即燕窩之處方用名。

詳『燕窩』條。

【牡丹皮】命名 本品以色丹

者為上。雖結子而根

上生苗。入藥用其根皮。故名。

處方用名 丹皮。粉丹皮。湖丹

皮。炒丹皮。丹皮炭。

古醫別名 風姑。鹿韭。(本經)

百兩金。(唐本)木芍藥。花玉。(綱

目)花相。血櫃。(和漢藥考)

外國名曰 Bark of peony.

30。(英)

基本 屬毛茛科牡丹之根皮。

產地 陳仁山藥物生蘆辨云。

牡丹皮產山東濟南。安徽。江蘇。均

有出。六月新。日本朝鮮亦有出。爾

國論以朝鮮為好。向日多到。近日

不見其來。惟氣味萬不及中國所

產也。

形體 牡丹為落葉灌木。高三

四尺。葉作重複羽狀。小葉有三三

片深缺刻。初夏開美麗大形花。有

單瓣及重瓣。色有白。紅。紫等。九月

結莢實。中有黑色如豆大之種子。

其根皮作鵝管狀。長三四寸。外面

為暗褐色。有皺紋。內面呈淡紅色。

味微苦而爽快。

種類 或以地名。或以人名。或

以色名。凡三十餘種。詳見歐陽修

花譜中。入藥宜取花色紅白單瓣

者為佳。其餘氣味不純。不宜藥用。



牡丹皮

七靈 牡

種樹 園庭間恒有栽植。以供
觀賞者。

採取 二月八月間採之。尤宜
到取三年之根皮為佳。

製法 雷敦曰。凡採丹皮根日
乾。以銅刀劈破去骨。如大豆許。用
酒細拌蒸。從巳至未。日乾用。

性質 辛寒。無毒。

成分 長井理學博士實驗牡
丹皮。從其中發見一新化合物。名
之為醜奧椰爾 Peonol。其為
性也。作針狀結晶。有一種固有芳
香及辛味。化學記號為 $C_{21}H_{30}O_6$ 。
構造上與一梅吉爾二養化阿塞
萬費隆 Monomethylidioxya-
cephanon 相同。於攝氏五十
度。熔於冷水難溶。熱湯稍易溶。酒
精。伊打哥羅仿姆。硫化炭等。可隨
意溶化。又溶於苛性鹼。與鹼結合。
構成易結晶之鹼鹽類。但不溶於
安母尼亞及炭酸鹼。逢濃硫酸無
色溶化。逢發煙硝酸。呈鮮綠色溶
化。(長井理學博士談)此外田原
藥學博士。又於牡丹皮中發見有
安息酸及伊蘇郁列斯堉林 Ta-
cholosterin 之脂肪酸伊打。欲

知詳細。可參閱東京化學會誌第
十二卷二二〇頁。但是否果有有
效之成分。則現今尙屬疑問。故牡
丹皮者。實際上固甚少價值也。

效能 瀉伏火。散瘀血。止吐衄。
除煩熱。用為通經藥。此外痔瘡。腰
痛。關節炎。亦用之。間有用作強壯
劑者。

主治 寒熱中風。惡寒驚癇。邪
氣。除癥堅瘀血。留舍腸胃。安五臟。
療癰瘡。(本經)除時氣頭痛客熱。
五勞勞氣。頭腰痛。風噤。癩疾。(別
錄)

作用 在胃不起作用。至腸始
與膠液化合而被腸吸收。在血中
能助血液之氣化。使全身血液旺
盛。并能激生殖神經。而令卵巢充
血。

歷代記述攷證 【唐】吳普蜀
本草論牡丹皮曰。久服輕身益壽。
【唐】甄權藥性本草論牡丹皮曰。
治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血
澀腰痛。【宋】大明諸家本草論牡
丹皮曰。通關脈。血脈。排膿。消撲損
瘀血。續筋骨。除風痺。治胎下胞。產
後一切冷熱血氣。【金】張元素珍

珠囊論牡丹皮曰。治神志不足。無
汗之骨蒸。衄血吐血。【元】李杲用
藥法象曰。心虛。腸胃積熱。心火熾
甚。心氣不足者。以牡丹為君。【明】
李時珍本草綱目論牡丹皮曰。和
血生血。涼血。治血中伏火。除煩熱。
古方以此除相火。故仲景腎氣丸
用之。後人乃專以黃柏治相火。不
知牡丹之功更勝也。赤花者利。白
花者補。【明】繆希雍本草經疏論
牡丹皮曰。牡丹皮味苦而微辛。其
氣寒而無毒。其色赤而象火。故入
手少陰厥陰足厥陰。亦入足少陰
經。辛以散結聚。苦寒除血熱。入血
分。涼血熱之要藥也。寒熱者。陰虛
血熱之候也。中風痲痺。瘧疾。皆
坐陰虛內熱。榮血不足之故。熱去
則血涼。涼則新血生。陰氣復。陰氣
復則火不炎。而無因熱生風之證
矣。故悉主之。癰瘡者。熱壅血瘀而
成也。涼血行血。故療癰瘡。辛能行
血。苦能泄熱。故能除血分邪氣。及
瘀堅瘀血。留舍腸胃。臟腑陰而蔽
精。喜清而惡熱。熱除則五臟自安
矣。別錄并主時氣頭痛客熱。五勞
勞氣。頭腰痛者。泄熱涼血之功也。

甄權又主經脈不通。血澀腰痛。此
皆血因熱而枯之候也。血中伏火。
非此不除。故治骨蒸無汗。及小兒
天行痘瘡。血熱。東垣謂心虛腸胃
積熱。心火熾甚。心氣不足者。以牡
丹皮為君。亦此意也。【清】黃宮繡
本草求真論牡丹皮曰。牡丹皮辛
苦微寒。能入手少陰心。足少陰腎。
足厥陰肝。以治三經血中伏火。李
時珍曰。伏火即陰火也。陰火即相
火也。相火熾則血必枯。必燥必滯。
與火上浮而見為吐衄。虛損與
風與痰與火相搏。而見五癆瘵癩
癧。癧瘕結而見瘡癤。癰毒產難。並
無汗骨蒸。用此不特味辛而散血
中之實熱。且有涼相火之神功。世
人專以黃柏治相火。而不知丹皮
之功更勝。蓋黃藥惡寒而燥。初則
傷胃。久則敗陽。苦燥之性。徒存。而
補陰之功。絕少。丹皮赤色。象離。能
瀉陰中之火。使火退而陰生。所以
入足少陰。而佐滋補之用。較之黃
蘗。不啻霄壤矣。張元素曰。丹皮治
無汗之骨蒸。地骨皮治有汗之骨
蒸。神不足者。手少陰心。志不足者。
足少陰腎。腎氣丸用丹皮。治神志

不足也。但補性少而泄性多。凡虛寒血崩。經行過期不盡者。爲並禁焉。赤者利血。白者兼補氣。酒拌蒸用。〔清〕鄒澍本經疏證論牡丹皮曰。牡丹入心通血。脈中壅滯與桂枝頗同。特桂枝氣溫。故所通者血。脈中寒滯。牡丹氣寒。故所通者血。脈中熱結。桂枝究係枝條。其性輕揚。故凡沉寒痼冷。未必能通。牡丹則木屬根皮。爲此物生氣所藉。故積熱停瘀。雖至成膿有象。皆能削除淨盡。此則非特性寒性熱之殊矣。皆讀素問大奇論而疑之。謂心脈滿大。癰迫筋瘰。肝脈小急。癰迫癢。肝心同爲血臟。滿大小急之殊。不啻霄壤。何以發病正相同也。解之者曰。心屬火。火有餘則脈滿大。而血乾潤。肝屬木。木感寒則脈小。急而既窘迫。不知癰因於驚。驚則氣血亂。氣亂則入於經脈。心氣爲之滿大。血亂則出於血室。肝氣爲之小急。是心之盛與肝之衰。理實相遠不可分也。雖然。此非牡丹所能治也。由驚而癰。由癰而瘰。瘰或由中風而瘰。此則牡丹之所能治矣。本經言牡丹主中風瘰瘰。

七畫 牡

驚癰邪氣。明瘰瘰有由於中風者。有不由於中風者。曰中風瘰瘰。則與瘰瘰之不由中風者有別矣。驚癰有有邪氣者。有無邪氣者。曰驚癰邪氣。則與驚癰之無邪氣者有別矣。再證之以別錄所主時氣頭痛客熱。五勞勞氣。頭腰痛。風際癩疾。則凡風熱之中血分者。爲牡丹所專治。無可疑矣。獨是牡丹入心。通行血分。能行血中久癰瘀結。雖至化膿。亦所擅長。假如血結不流。不有血脈虛而縱弛者乎。不有脈隨血聚而拘急者乎。不有因血結而熱生。因熱蒸而驚癰者乎。由此以觀。則牡丹之用。未爲不廣也。巢元方曰。寒溫失節。致臟腑虛弱。食飲不消。聚結在內。漸染生長。塊段盤牢不動。移者爲瘰。言其形狀可徵驗也。又曰。冷熱不調。飲食不節。積在腹中。或腸胃之間。與臟相結。擗其牢強。推之不移曰瘰。又曰。產後臟虛。餘血不盡。爲風冷所乘。血則凝結成瘰。由是推之。瘰堅不必皆由瘰。特動者爲在氣。不動者爲在血。故瘰不能不謂爲血分之病。則病瘰堅者。不必不有瘰。特瘰有

不爲瘰堅者。故曰瘰堅瘰血也。瘰堅瘰血。有舍於臟腑之隙者。有留於經絡之交者。不能盡在腸胃。惟在腸胃者。爲牡丹所主。故曰治瘰堅瘰血。留舍腸胃也。何以知其在此腸胃耶。蓋在胃必妨食飲。在小腸必妨溲溺。在大腸必妨大便。氣血既結。則不能流動之氣血聚而歸之。故腹中既有形。兼嘔血者。瀉血者。下血者。皆爲牡丹所宜。以此類推。百無一失矣。仲景治瘰堅瘰血用牡丹者。推桂枝茯苓丸。溫經湯兩方。兩方所主之證。不得云在腸胃也。其亦有說歟。夫桂枝茯苓丸證。胎動在上。漏下不止。是爲瘰。在小腸故血從前陰下也。溫經湯證。少腹裏急。腹滿煩熱。唇乾下利。是瘰在大腸。故穀道窘急而利也。且瘰有暫有常。自其同者觀之。則熱迫衝任而下血。滯積腸胃而腸澀。計亦不甚相遠也。自其異者觀之。則妊娠下血必不久。而胎墮決不能按期自行自止。至三月矣。腸澀善即發熱。不劇必差。未有常常如是。能至數十日者。此何以故。則以下血腸澀爲瘰病故也。若瘰堅瘰

血。積久方病。既病亦不驟愈。故雖同在腸胃。而有久暫之殊。遂使治有天淵之別。本經於瘰堅瘰血。在腸胃必下留舍二字者。此也。或謂瘰在大腸。未必下利。或者阻礙水道。故小水入大腸而下利歟。非也。夫滯在大腸。亦能下利。瘰何獨不然。若小便則必不以瘰而礙。傷寒論云。小便不利者。爲無血也。小便自利者。血證諦也。以小便由氣化。氣分無病。小便必調。爲可據矣。溫經湯證。暮即發熱。手掌煩熱。唇口乾燥。大黃牡丹湯證。時時發熱。自汗出。復惡寒。可知瘰血癰膿在大腸者。必兼表證。蓋大腸與肺爲表裏。大腸病必延及肺。肺主皮毛。則寒熱矣。溫經湯證。少腹裏急。腹滿下利。而不云小便不利。大黃牡丹湯證。少腹痞。按之即痛如淋。小便自調。又可知大腸雖逼處膀胱。但氣不病。終不爲膀胱害也。牡丹本經主瘰瘰瘰。金匱要略中排膿散。排膿湯。王不留行散。皆不用腸澀二方。則一用一不用。千金方治諸丁腫癰疽瘰瘰皆不用腸澀三方。畢用之。可知牡丹爲物。非特主瘰

七畫 牡

聖藥血。留舍腸胃。即凝膿亦必涉及腸胃方可用矣。然牡丹何以獨能去腸胃中癰結瘰癧也。蓋心屬火而主降。牡丹氣寒味辛。微苦。辛則能開。苦則能降。故心交於腎而膀胱之化行。若有所隔礙者。牡丹在所必須。此腎氣丸用之也。非特此也。胃者受盛之府。腸者傳化之府。既受而盛。則非火莫化。既化而傳。則非火莫行。牡丹非能助火之行也。凡火結不行者。牡丹能開降之。此所以專主留舍腸胃中癰堅瘰癧也。腎氣丸之治。在金匱要略中有四。而皆涉及小便。與牡丹無涉者也。牡丹果何為者哉。是方也。養陰之力雖厚。振陽之力亦雄。養陰之力厚。恐其水中之熱延留。故必以牡丹泄陰中之陽者佐之。振陽之力雄。恐其燥急而難馴。故以山茱萸於陰中攝陽者輔之也。【清】閩丘陸本草選旨論牡丹皮曰。牡丹皮味辛苦。氣寒。陰中微陽。無毒。長貝母。大黃。菟絲子。忌蒜。胡荽。伏砒。入手厥陰經。足厥陰經。能瀉血分之火。故主冷熱血氣。無汗。骨蒸。神志不足。及一切吐血。衄血。

瘰癧。積血。跌仆損血。女子經脈不調。產後惡血不止。小兒風癩驚搐。外科癰腫排膿。並能治之。皆取其和血生血涼血。能治血中伏火之意也。故心虛。腸胃積血。心火熾甚。心氣不足者。必以牡丹皮為君。犀角地黃湯用之以治諸血。四物湯加之以治婦人骨蒸。丹溪別旨地骨皮治有汗之骨蒸。牡丹皮治無汗之骨蒸。仲景八味丸用之。以主心血不足。無非是也。後人專以黃柏治火。而不知牡丹皮之功更勝。此千載秘奧。人所不知。故予嘗同歸芍治陰中之火。同歸芍而治產後諸疾。同芍連以涼血止血。同破血以破血行血。同柴芩以治無汗骨蒸。同知貝以治驚癩鬱熱。同官桂以排膿定痛。同紅花以調經順脈。蓋深見其能制血分之火。故所向而多功也。

瘵疾用之。其用量自二。○至六。辨偽 ●鄭有慶曰。偽名洋丹。皮肉紅皮黑條。大何種草根。偽充本不可知。按牡丹始出蜀地山谷。及漢中。今江南江北皆有。而以洛陽為盛。入藥惟取野生。花開紅白。單瓣者之根皮用之。氣味辛寒而香。皮色外紅紫內粉白。乃心主血脈之要藥。奚容以贗品誤混。用者當買蘇丹皮為美。●曹炳章曰。按丹皮產蘇州閶門外。張家山關口者。皮紅肉白。體糯性粉。無鬚無潮。久不變色。為最佳第一貨。產鳳凰山者。枝長而條嫩。外用紅泥漿。過極易變色。亦佳。產甯國府南陵縣木猪山者。名搖丹皮。色黑帶紅。肉色白起粉者。亦道地。潯州同陵。及恩陽府定遠出。亦名搖丹。有紅土黑土之分。紅土者。用紅泥漿上。待後其土色紅汁。侵入肉內。白色變紅。黑土乃本色。帶紫。久遠不變。亦佳。產太平府者。內肉起砂。星明。亮性極硬。為次。以上就產地分物質高下。其發售再以支條分粗細大小。以定售價之貴賤。選頂粗大者。

六二二

散裝木箱曰丹王。略細小者曰二王。再下者作把。曰小把丹。最細碎作大把者。曰大把丹。其產地好歹與粗細。以別道地與否。然皆本國出品。非外國貨也。配合應用 ●治癰疽偏墜。氣脹不能動者。牡丹皮。防風。等分。為末。酒服二錢。甚效。〔千金方〕 ●治婦人羸血。攻聚上面。多怒。牡丹皮半兩。乾漆燒烟盡。牛兩。水二鐘。煎一錢服。〔諸證辨疑方〕 ●治傷損瘰癧。牡丹皮二兩。蜜蟲二十一枚。熬過同搗末。每日溫酒服。方寸匕。血當化為水下。〔貞元廣利方〕 ●治金瘡內漏。牡丹皮為末。水服三指撮。立尿出血也。〔千金方〕 ●治下部生瘡。已決洞者。牡丹末。湯服方寸匕。日三服。〔肘後方〕 ●解中蠱毒。牡丹根搗末。服一錢。日三服。〔外臺方〕 用量 錢半至三錢。 應用宜忌 凡脾胃虛寒者。禁用。畏貝母。大黃。菟絲子。忌蒜。胡荽。伏砒。 參攷資料 牡丹以色丹者為

上。雖結子而根上生苗。故謂之牡丹。唐人謂之木芍藥。以其花似芍藥。而宿幹似木也。羣花品中以牡丹第一。芍藥第二。故世謂牡丹為花王。芍藥為花相。(李時珍) 今丹廷青越濠和州山中皆有。但花有黃紫紅白數色。此當是山牡丹。其莖梗枯燥。黑白色。二月於梗上生苗葉。三月開花。其花葉與人家所種者相似。但花瓣止五六葉。爾五月結子黑色。如雞頭子大。根黃白色。可長五七寸。大如筆管。近世人多貴重。欲其花之詭異。皆秋冬移接。培以壤土。至春盛開。其狀百變。故其根性殊失本真。藥中不可用。此絕無力也。(蘇頌) ①牡丹花亦有緋者。深碧色者。惟山中單葉花紅者。根皮入藥為佳。市人或以枝梗皮充之。尤誤。(寇宗奭) ②牡丹惟取紅白單瓣者入藥。其千葉異品。皆人巧所致。氣味不純。不可用。花譜載丹州延州以西及褒斜道中最多。與荊棘無異。土人取以為薪。其根入藥尤妙。凡栽花者。根下着白斂末辟蟲。穴中點硫黃殺瘡。以烏賊骨針其樹必枯。此物性

七畫 牡

亦不可不知也。(李時珍) ③丹皮色味亦類紅花。而根性下達。與花不同。故主在內。乃漢中焦之血。(唐容川)

【牡丹莖】即女萎之日本名。見「女萎」條。

【牡桂】 基本 桂之一種。性質 辛溫無毒。主治 冷風疼痛。中風逆冷。中風口喎。上氣咳逆。結氣。皮膚風溼。偏正頭痛。

【牡桂】即肉桂之古籍別名。典見本經。詳「肉桂」條。

【牡桂枝】即桂枝之古籍別名。典見本經。詳「桂枝」條。

【牡荊子】即牡荊實之處方用名。詳「牡荊實」條。

【牡荊根】 性質 甘。苦。平。無毒。主治 水瘖。服治心風頭風。肢體諸風。解肌發汗。參攷資料 牡荊苦能降。辛溫能散。降則化痰。散則祛風。故風痰之病宜之。其解肌發汗之功。世無知者。按王氏奇方云。一人病風數年。予以七葉黃荊根皮。五加根皮。接骨草等分煎湯。日服。遂愈。蓋得

此意也。(李時珍)

【牡荊莖】 採取 八月十月採。陰乾用。主治 灼爛。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論牡荊莖曰。治灼瘡發熱。瘡瘻有效。【明】李時珍本草綱目論牡荊莖曰。同荊芥。煎水。漱風牙痛。

參攷資料 牡荊莖即荊杖也。黃汁堪作染料。(陳藏器)

【牡荊葉】 性質 苦寒。無毒。主治 久痢。霍亂轉筋。血淋。下部瘡。溼。腫。脚。主脚氣腫滿。

參攷資料 ①腰脚風溼痛不止。蒸法。用荊葉不限多少。蒸置大甕中。其下着火溫之。以病人置葉中。須臾當汗出。蒸時常旋旋喫飯。稍飽即止。便以被蓋避風。仍進葱豉酒。及豆酒亦可以。瘳為度。(海上方) ②蒸法雖妙。止宜施之野人。李仲南永類方云。治脚氣諸病。用荊莖於壇中燒烟。熏滴泉穴。及痛處。使汗出則愈。此法貨賤皆可。用者。又談藝翁試驗方。治毒蛇。望

板歸整傷滿。身洪腫發泡。用黃荊嫩頭搗汁。塗泡上。渣置咬處。即消。此法乃出於葛洪肘後方。治諸蛇。以荊葉搗爛。袋盛。薄於腫上者。也。物類相感志云。荊葉辟蠱。(李時珍)

【牡荊實】 命名 古者荊杖以荊故字從荊。其生成澀而疎爽。故又謂之楚。從林。從疋。疋即疎字也。濟楚之義。取此。荊楚之地。因多產此而名也。

處方用名 牡荊子。

古籍別名 小荊實。(本經) 黃荊實。(圖經) 楮。楚實。(綱目) 人參木實。(日本)

外國名詞 Viox Negundo, フ(拉丁) ニンジンボク (日本)

基本 係馬鞭草科。為荊屬牡荊之子實。

產地 凡荊楚諸地恒多產焉。其原產在東印度。

形態 牡荊為落葉灌木。屬荊之一種。高四五尺。枝幹堅勁。對生葉為掌狀複葉。有長柄。小葉有鋸齒。七八月開青色或紫色之小花。花序錐圓成穗狀。花後結實。色青

七畫 牡

黃。類似荜荊子而較細小。故有小荊之稱。



荊 實 牡

採取 八九月間採實。陰乾用。性質 苦溫無毒。

效能 用作祛風滌痰鎮咳藥。主治 除骨間寒熱通利胃氣止咳逆下氣。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論荊實曰。得柏實青柏。煎。蔡風【元】朱丹溪本草衍義補遺論荊實曰。炒焦爲末。飲服。治心痛。及婦人白帶【明】李時珍本草綱目論荊實曰。用半升炒熟。入酒一盞。煎一沸。熱服。治小腸疝氣甚效。浸酒飲。治耳聾【明】穆希雍本草經疏論荊實曰。牡荊實。味苦氣溫無毒。入足陽明厥陰經。其主骨間寒熱。通利胃氣。止咳逆下氣者。蓋足陽明爲十二經脈之長。厥陰爲風木之位。外邪傷於二經。則寒熱留連於筋骨。而胃氣壅滯。

苦溫能通行散邪。則胃氣利。而寒熱自除。欬逆亦邪氣壅胃所致。邪散氣下。則欬逆自止矣。

配合應用 治溼痰白濁。牡荊子炒爲末。每酒服三錢【集簡方】用釐 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無風寒實邪者禁用。畏石膏。防己爲之使。

參攷資料 ①牡荊卽作樺杖者。所在皆有之。實細黃色。莖勁作樹生。漢書郊祀志。以牡荊莖爲燔竿。則明知非荜荊也。有青赤二種。以青者爲佳。今人相承多以牡荊爲荜荊。此極誤也。【蘇恭】②牡荊處處山野多有。樵採爲薪。年久不樵者。其樹大如盤也。其木心方。其枝對生。一枝五葉或七葉。葉如榆葉。長而尖。有鋸齒。五月杪間開花成穗。紅紫色。其子大如胡荽子。而有白膜皮。裹之。蘇頌云。葉似疏麻者。誤矣。有青赤二種。青者爲荊。赤者爲樛。嫩條皆可爲篋。古者貧婦。以荊爲篋。卽此二木也。按斐淵廣州記云。荊有三種。金荊可作枕。紫荊可作牀。白荊可作履。與他處牡荊荜荊全異。甯浦有牡荊。指病

自愈。節不相當者。月卽時刻之。與病人身齊等。置牀下。病雖危。亦無害也。杜寶拾遺錄云。南方林邑諸地。在海中山中。多金荊。大者十圍。盤風瘤。盛文如美錦。色如真金。工人用之。貴如沉檀。此皆荊之別類也。春秋運斗樞云。玉衡星散而爲荊【李時珍】

【牡荊瀝】製法 時珍曰。取法。用新採荊莖。截尺五長。架於兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取熱氣。能入藥中。又法。截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外。以糠火煨燒。其汁瀝入下瓶中。亦妙。

性質 甘平無毒。

主治 飲之去心悶煩熱。頭風旋運。目眩。心頭澀澀欲吐。卒失音。小兒心熱驚癇。止消渴。除痰唾。令人不睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論荊瀝曰。除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱劑。

參攷資料 ①荊瀝氣平味甘。化痰去風。爲妙藥。故孫思邈千金翼云。凡患風人多熱。常宜以竹瀝。

六二四

荊瀝。豈汁。合五合。和勻熱服。以達爲度。陶弘景亦云。牡荊汁。治心風。爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝【李時珍】②汁同功。並以豈汁助送。則不凝滯。似氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荊瀝【朱丹溪】

【牡麻】卽大麻之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「大麻子」條。

【牡菊】卽菊花無子者之古籍別名。典見綱目。詳「菊花」條。

【牡蛤】卽牡蠣之古籍別名。典見別錄。詳「牡蠣」條。

【牡蒙】卽紫參之古籍別名。典見本草經。詳「紫參」條。卽王孫之古籍別名。典見本草集註。詳「王孫」條。

【牡鼠屎】卽鼠糞之處方用名。詳「鼠糞」條。

【牡蒿】 古籍別名 齊頭蒿。唐本 水辣菜。救荒

野【爾雅】

外國名詞 Artemisia japonica, Thunb. (拉丁) ヲトモギ (日本)

基本 係菊科艾屬。爲牡蒿之

基本 係菊科艾屬。爲牡蒿之

苗葉。

產地 生山野田澤間。

形態 牡蒿爲澤草類蒿屬之一種。多年生野草。本高二三尺。葉楔形。上部有缺刻。頗尖銳。互生。夏日枝梢上點綴小花。呈淡褐色。略呈穗狀。花形酷似艾。惟比艾較小。球形而有光澤。故相差耳。



牡蒿

性質 苦。微甘。溫。無毒。

主治 充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脈滿溢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牡蒿曰。搗汁服。治陰腫。

參攷資料 附雅詩。牡蒿之無子者。則牡之名以此也。諸蒿葉皆尖。此蒿葉獨參而禿。故有齊頭名。【李時珍】齊頭蒿。三月四月生苗。其葉扁而本狹。末參有禿枝。嫩時可茹。鹿食九草。此其一也。秋開細黃花。結實大如車前實。而內

子微細。不可見。故人以爲無子也。【李時珍】

【牡蠣】

命名 蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣曰蠃。言其粗大也。

處方用名 左牡蠣。煨牡蠣。古藥別名 牡蛤。【別錄】蠣蛤。【本經】古貢。【異物志】蠃。蠃山。蠃甫。【和漢藥考】


外國名詞 Ostrea toshao (拉丁) Oyster shell (英) An-shenshan (德)

基本 係屬錘類中單柱類牡蠣之貝殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牡蠣產處有出。廣東新安。沙井等處有出。凡煨牡蠣。煨起必須浸水十天。每日換水二次。乃可用之。若不浸水。即煨殺灰也。合藥實難入口。并能壞腸。慎之。和漢藥考曰。牡蠣產熱帶及溫帶諸國之海岸。尤多產於有淡水流注。鹹氣不強之海中。岩礁或沙泥上。肉味美。富滋養。歐美諸國。盛行養殖。日本之廣島及岡山縣下亦久已養殖。其

種類頗多。日本產者。有牡蠣。長牡蠣。板牡蠣等。

形態 牡蠣爲扁圓形。作不正葉狀之貝殼。由鑄狀薄片而成。上下二殼。其邊緣作波狀。下殼稍凹。陷。上殼作扁平蓋狀。長約二三寸。外面由反射光而呈灰褐。綠。青諸色。內作乳白色。有光澤。



牡蠣

種類 石牡蠣。極似牡蠣。惟圓如龜殼。而頭邊皆大。小夾沙石。

海牡蠣雖可用。但丈夫服之。令人無髭。牡蠣形短不入藥。製法 寇宗奭曰。凡用牡蠣。須泥固燒爲粉。亦有生用者。雷斅曰。凡真牡蠣。先用二十箇。以東流水入鹽一兩。煮一伏時。再入火中煨赤研粉。李時珍曰。按溫隱居云。牡蠣將童尿浸四十九日。五日一換。取出以硫黃末和米醋塗上。黃泥固濟煨過用。

性質 鹹。平。微寒。無毒。

成分 爲碳酸鈣。磷酸鈣。珪酸。動物質等。

效能 輕堅。滑腸。化痰。消癥。癥結核。治崩帶遺泄。用作制酸性健胃藥。能治胃液溢。肺結核。佝僂病。

作用 入胃後。即能中和胃內之鹽酸。使消化力增大。入腸後。能減少腸之分泌。使大便燥結。一部分由腸壁而入血。增大白血球效用。使血液凝固力強硬。并有小部之磷酸鈣。能促進全身細胞之新陳代謝。而於腦神經尤有顯明之功效。

主治 傷寒寒熱。溫瘧酒酒。驚悸怒氣。除拘緩肌瘰。女子帶下赤白。久服強骨節。殺邪鬼。延年。【本經】除留熱在關節。發衛。虛熱去。來不定。煩滿心痛。氣結。止汗止渴。除老血。療洩精。澀大小腸。止大小便。治喉痺咳嗽。心膈下痞熱。【別錄】

張仲景之發明 牡蠣一味。經張仲景之實驗。認爲「主治胸腹之動。勞治驚狂煩燥。」如桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯證曰。

七畫 牡

驚狂。起臥不安。方用牡蠣五兩。○
牡蠣湯證曰。瘧牡。○牡蠣澤瀉散
證曰。有水氣。○柴胡姜桂湯證曰。
○桂枝甘草龍骨牡蠣湯證
曰。煩燥。○柴胡加龍骨牡蠣湯證
曰。煩驚。歷觀此諸方。牡蠣所治。驚
狂。煩躁。似與龍骨無復差別。則為
從事於此也。久之始知牡蠣治胸
腹之動矣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
本草拾遺論牡蠣曰。粉身止大人
小兒盜汗。同麻黃根蛇牀子乾薑
為粉。去陰汗。【唐】孟詵食療本草
論牡蠣曰。治女子崩中止痛。除風
熱。癆瘵。鬼交精出。【唐】李珣海藥
本草論牡蠣曰。男子虛勞。補腎安
神。去煩熱。小兒驚癇。【元】王好古
湯液本草論牡蠣曰。去腸下堅滿。
瘰癧一切疔。【明】李時珍本草綱
目論牡蠣曰。化痰。癭。瘰。瘰。除溼
止心脾氣痛。痢下赤白濁。消疝瘕
積塊。瘰癧。結核。【明】程希雍本草
經疏論牡蠣曰。牡蠣得海氣。結成。
故其味鹹。平。氣微寒。無毒。氣薄。味
厚。陰也。降也。入足少陰。厥陰。少陽
經。其主傷寒。寒熱。濕瀉。酒。驚。悲。

怒氣。留熱在關節。去來不定。煩滿
氣結。心痛。心脇下痞熱等證。皆肝
膽二經為病。二經受寒邪。則為
傷寒。寒熱。夏傷於暑。則為溫病。酒
酒。邪伏不出。則熱在關節。去來不
定。二經邪鬱不散。則心脇下痞熱
邪熱甚。則驚悲。怒氣。煩滿。氣結。心
痛。此藥味鹹。氣寒。入二經。而除寒
熱。邪氣。則營衛通。拘攣和。而諸證
無不瘳矣。少陰有熱。則女子為帶
下赤白。男子為洩精。解少陰之熱。
而能斂瀆精氣。故主之也。鹹屬水。
因陰而潤下。善除一切火熱為病。
故又能止汗。止渴。及鼠瘻。喉痺。咳
嗽也。老血者。宿血也。鹹走血。而軟
堅。所以主之。其性收斂。故能瀆大
小腸。止大小便利也。腎主骨。入腎
益精。則骨節自強。邪本因虛而入。
肝腎足。則鬼邪自去。人以腎為根
本。根本固。則年自延矣。更能止心
脾氣痛。消疝瘕。積塊。瘰癧。結核。脇
下堅滿等證。皆寒能除熱。鹹能軟
堅之功也。【清】黃宮繡本草求真
論牡蠣曰。牡蠣。鹹。微寒。功入
腎。燥。堅。化痰。散結。收澀。固脫。故瘰
癧。結核。血瘕。遺精。崩帶。咳嗽。盜汗。

遺尿。滑泄。綠瀉。濕瀉。赤痢等症。皆
能見效。然鹹味獨勝。走腎斂瀆。居
多。久服亦能寒中。或生用。鹽水煎
煨成灰用。此本海氣化成。純雄無
雌。故曰牡蠣。【清】鄒澍本經疏證
論牡蠣曰。傷寒。金匱。兩書。用龍骨
者。七方。用牡蠣者。十二方。龍骨牡
蠣。同用者。五方。用龍骨不用牡蠣
者。二方。用牡蠣不用龍骨者。七方。
夫不參其同用。不足知其相聯之
奧妙。不參其獨用。不足顯其主治
之功能。欲參其獨用之最親切有
味者。在外感。莫如蜀漆散。牡蠣湯
之。並治牡蠣。在內傷。莫如天雄散
之。治遺勞。白朮散之。養胎氣。夫適
之。發必由痰固於中。痰則水為火
搏而成者也。邪火搏痰。身中之火
與俱。斯外達無從。雖表間但惡寒
多。而不知正惡熱盛也。故伏蜀漆
吐去痰涎。以剷其根。以雲母龍骨
使陽返於土。邪達於外。當留者留。
當去者去。倘若外更東寒。毛竅痺
阻。則必用麻黃甘草。大開其外。以
散其寒。然蜀漆之吐。僅使陽從土
達。雲母龍骨引陽使還土而已。麻
黃則使陽從水達。故當易以牡蠣。

六二六

使當返木之陽歸水中。而不得用
龍骨矣。以是知龍骨之用。在火不
歸土而持水。牡蠣之用。在陽不歸
陰而化氣也。人之精氣。稟於有生
之先。既已損削。必賴後天方能生
長。以故天雄於至陰中壯陽。白朮
於淳澤中助氣。苟徒倚以入腎。適
足以耗陰。乃欲其生氣生精。無是
理也。用龍骨是斂二物之氣。入脾
使脾充而氣旺。氣旺而精生矣。妊
娠者。鍾陰於下。吸陽於上。故每經
信乍阻。胎元尚稚。吸取不多。則陰
陽交阻於土。為胸膈壅滯者。見
此未免用清。殊不知削其陽。正以
傷其胎耳。豈若芎藭於血中出其
不合盛之陽。白朮於中宮扶其不
合衰之土。蜀椒以降陽氣。下歸牡
蠣以召入陰中之為愈乎。於是又
知龍骨之引火歸土。可藉以化氣
生精。牡蠣之召陽歸陰。可藉以平
陽。秘陰矣。龍骨牡蠣聯用之證。曰
驚狂。曰煩燥。曰煩燥。似二物多為
驚與煩。而所因不必盡同。何
也。蓋驚怖火邪。皆從驚發得之。故
太陽傷寒。加溫針必驚。少陽吐下
則悸而驚。是知驚者。不必泰山崩。

於前見聞駭於驟也。隨證可致。隨處異源。善哉。素問舉痛論曰。心無所依。神無所歸。感無所定。數言括盡驚之狀。是則心無所依。神無所歸。感無所定。即可謂之驚。豈必別有他故也。然曰傷寒。蟻浮。醫以火迫劫之。謂之亡陽。治以救逆。豈救逆湯。遂可與四逆比耶。夫心也。神也。感也。皆陽之作用也。無所依。無所歸。無所定。是陽不守舍矣。非陽亡而何。雖然。陽之亡有別。以發汗而致者。先動其陰。後動其陽。故陽動而陰逆。惟止陰之逆。陽氣乃得奠安。以驚而致者。先動其陽。僅曳動其陰。故陽雖動。而陰不逆。則安其陽。召使歸陰。自弭帖矣。是故厥浮更道火迫。以致亡陽。迥非發汗多。或重發汗可比。桂枝去芍藥。加芍藥。牡蠣龍骨救逆湯。又豈可與四逆同日語哉。然此可為太陽溫針。少陽吐下者言耳。若虛勞之桂枝加龍骨牡蠣湯。中風之風引湯。其可以為說耶。夫桂枝加龍骨牡蠣之證。曰。蠱動微緊。男子失精。女子夢交。孔動者。陽之越。微緊者。陰之結。惟其陽不歸陰。是以陰

氣為結。惟其陰愈結。斯陽愈不歸。土者生陰之源。水者元陽之配。土不藏陽。水不攝陽。則陽之無所依。無所歸。無所定。與因驚者不異矣。和其外之陽。使受攝於內。奠其陽之窟。使吸引於外。一轉移間。安內攘外。強幹弱枝之義。備焉。絕不因驚與因驚之證。無有不合矣。若夫風引湯之除熱癰癩。仍緣邪鬱生驚。因驚而甚。其與柴胡加龍骨牡蠣湯。黍錄不爽者也。大率龍骨牡蠣。推挽空躍之陰陽。與他發斂著物之陰陽者異。故桂枝柴胡承氣湯。無不可會合成劑。而攝陽以歸土。據陰以召陽。實有聯絡相應之妙。此所以治內傷治外感。均可隨地奏功。無顧此失彼之隔閡也。小柴胡湯。柴胡桂枝乾薑湯。以胸脇滿結。而用牡蠣。所謂主傷寒熱。溫瘧。瀉瀉中驚。恚怒氣者。然驚恚怒氣。所以為胸脇滿結何故。夫當潮盛漲之時。其氣正如怒而不洩。惟其怒而不洩。斯噴沫聚泡湧於水上。乃遂不與水化。而隨水激蕩。倘適與崖石相著。日久遂成有生之物。以與水相吞吐。人之陰盛漲

而寒。陽盛漲而熱。其因風發之時。豈無怒氣。當先如噴沫。如聚泡者。其濕處寒熱中者。仍隨寒熱為聚散。其適著於窠與之區。則遂凝結不散。而滿且覆矣。治之以牡蠣。是欲致生氣於其間。使仍與寒熱相化。而俱消也。然則腰已下水氣。百合病滿不已。亦豈噴沫聚泡所可擬耶。是則不然。是皆病在下。而其源在上。牡蠣澤瀉散。水畜於下。上焦之氣。不能為之化。故類萃商陸葶藶。以從上下。澤瀉水蘗。以啓水中清氣上行。栝樓牡蠣。則一以上濟其清。一以下召其濁。而使之化耳。况栝樓牡蠣散。原係百合病。既歷久變渴。又彌久不差。則為上已化。而下不化。用栝樓生上之陰。以和其渴。用牡蠣為下之藥。竊吸已化之陽。使下歸而化陰。濟上之亢。通下之道。俾滯時得快。然百合病。遂淨盡無餘。又何不可。惟侯氏黑散之治四肢煩重。心中惡寒不足。是陽氣困於內。而浮越於四末。既以桂朮細辛乾薑振作其中陽矣。召四末之陽。使歸於內者。誰耶。則牡蠣之用。可知矣。因是

識召陽歸陰。非止一端。凡上為陽。則下為陰。外為陽。則內為陰。均可。以是推之者也。

配合應用 ①治心腎虛。盜汗。同生地黃。黃耆。龍眼。五味子。酸棗。仁。麥門冬。白芍藥。茯神。黃芩。當歸。

②治夢遺。遺精。同黃藥。五味子。地黃。山茱萸。枸杞子。車前子。沙苑。蒺藜。蓮鬚。杜仲。加牛膝。則兼治赤白濁。

③止婦人崩中下血。及赤白帶下。同地黃。黃藥。阿膠。木耳。炒熟香。附。白芍藥。地榆。麥門冬。續斷。青蘗。鼈甲。蒲黃。

④同龍骨入柴胡桂枝各湯內。取其收斂浮越之陽氣。固脫而鎮驚。更能除胸脇中痞硬。(仲景方)

⑤同麻黃根。蛇牀子。為粉。去陰汗。(藏器方)

⑥治虛勞盜汗。牡蠣粉。麻黃根。黃耆。等分為末。每服二錢。水煎服。(本事方)

⑦傷寒傳成百合病。如寒無寒。如熱無熱。欲臥不臥。欲行不行。欲食不食。口苦小便赤色。得藥則吐。變成渴疾。久不瘳者。用牡蠣煎二

七畫 牡

七畫 牡

兩。栝樓根二兩為細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。(仲景金匱玉函方)

① 治水病發腫。牡蠣粉二兩。乾姜炮一兩。研細。冷水調稠。搗上。須臾熱如火。乾則再上。小便利即愈。一方用葱汁白麩同調。小兒不用乾姜。(古今錄驗方)

② 治男女癩瘰。用牡蠣粉四兩。玄參末三兩。甘草一兩。麩糊丸。梧子大。每三十九丸。酒下。日三服。服盡除根。不拘已破未破皆效。(經驗方)

③ 治月水不止。牡蠣煨研。細米醋攪成團。再煨研末。以米醋調艾葉末。熬膏丸。梧子大。每用醋湯下四五十丸。(普濟方)

④ 治心脾氣痛。氣實有痰者。牡蠣煨粉。酒服二錢。(丹溪心法)

⑤ 治瘧疾寒熱。牡蠣粉。杜仲等分為末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。溫水下。亦治氣虛盜汗。(普濟方)

⑥ 治產後盜汗。牡蠣粉。麥麸炒黃等分。每服一錢。用猪肉汁調下。(經驗方)

⑦ 治清湯飲水。臘日或端午日。用黃泥固濟。牡蠣煨赤。研末。每服一錢。用活鮓魚煎湯調下。只二三服愈。(經驗方)

⑧ 治病後常嘔。小勞即作。牡蠣十分。石存五分。為末。酒服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。(肘後方)

⑨ 治小便淋瀝。服血藥不效者。用牡蠣粉。黃蘗炒。等分為末。每服一錢。小茴香湯下取效。(醫學集成方)

⑩ 治小便數多。牡蠣五兩。燒灰。小便三升。煎二升。分三服。神效。(乾坤生意方)

⑪ 治夢遺便滑。牡蠣粉。醋糊丸。梧子大。每服三十九丸。米飲下。日二服。(丹溪方)

⑫ 治金瘡出血。牡蠣研粉。傅之。(肘後方)

⑬ 治破傷濕氣。口禁強直。用牡蠣粉。溫酒服二錢。仍外傅之。取效。(三四方)

⑭ 治發背初起。古黃粉。灰。以雞子白和塗四圍。類上取效。(千金方)

⑮ 治癰腫未成。用此拔毒。水調牡蠣粉末塗之。乾更上。(姚僧垣集驗方)

⑯ 治甲疽潰漏。豕肉。裝甲。膿血不瘥者。用牡蠣頭厚處。生研為末。每服二錢。紅花煎酒調下。日三服。仍用敷之。取效。(勝金方)

⑰ 治面色黧黑。牡蠣粉。研末。蜜丸。梧子大。每服三十九丸。白湯下。日一服。并炙其肉食之。(普濟方)

⑱ 治用宜忌。凡虛而有寒者。禁用。惡麻黃。辛夷。吳茱萸。伏磁砂。得甘草。牛膝。遠志。蛇牀子。良貝。母為之使。

著名方劑 ① 牡蠣澤瀉散。治大病後。從腰以下有水氣者。主之。(傷寒論) 牡蠣。澤瀉。括萎根。蜀漆。(洗去腥) 葶藶。商陸根。海藻。(洗去鹹各等分) 右七味。異搗下篩。為散。更入白中治之。白湯和服。方寸匕。小便利。止後服。日三。② 牡蠣湯。治牡瘕。(外產秘要方) 牡蠣四兩。麻黃四兩。(去節) 甘草。蜀漆各二兩。右四味。以水八升。先煎蜀漆。麻黃。去上沫。得六升。納諸藥。煎取二升。溫服一升。若吐。則勿更服。

參攷資料 ① 牡蠣入足少陰。

為曠堅之劑。以柴胡引之。能去腦下硬。以茶引之。能消項上結核。以大黄引之。能消股間腫。以地黃為使。能益精收澀。止小便。腎經血分之藥也。(王好古) ② 牡蠣之鹹。以消胸膈之滯。以泄水氣。使痞者消。硬者軟也。(成無己) ③ 牡蠣道家方。以左頤是雄。故名牡蠣。右頤則牡蠣也。或以尖頤為左頤。未詳孰是。(陶弘景) ④ 牡蠣須燒為粉用。兼以麻黃根等分。同搗研為極細末。粉。盜汗及陰汗。本方使生者。則自從本方。左頤。經中本不言。止從陶隱居說。其酉陽雜俎。已言牡蠣。言牡非為雄也。且如牡丹。豈可更有牡丹也。今則合於地人。面向午位。以牡蠣頂向子視之。口口在左者為左頤。此物於無目如此。焉得更有顧盼也。(寇宗奭) ⑤ 牡蠣今出東海。永嘉晉安云。是百歲鴨所化。十一月採。以大者為佳。其生著石。皆以口在上。舉以腹向南。視之。口斜向東。則是左頤。出廣州。南海者亦同。但多有顧。不堪用也。丹方及灸鹽者。皆以泥金云。耐水火不破。湯。皆除其甲口。止取臑臑如粉。

耳(陶弘景)①牡蠣今海旁皆有之。而通泰及南海閩中尤多。皆附石而生。硯相連如房。呼爲蠣房。晉安人呼爲綠膏。初生止如拳石。四面漸長至一二丈者。嶄巖如山。俗呼礮山。每一房內有肉一塊。大房如馬蹄。小者如人指面。每潮來諸房皆閉。有小蟲入。則合之以充腹。海人取者。皆鑿房以烈火運之。挑取其肉當食品。其味美好更有益也。海族爲最貴。(蘇頌)②牡蠣南海人以其蠣房砌牆。燒灰粉壁。食其肉。謂之蠣黃(李時珍)

【牡蠣肉】 性質 甘溫無毒。主治 煮食治虛損。調中解丹毒。婦人血氣。以蠶醋生食。治丹毒。酒後煩熱止渴。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論牡蠣肉曰。炙食甚美。令人細肌膚。美顏色。

【狂奔草】 卽葶藶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葶藶子」條。

【狂藥】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【狙砂】 卽硝砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硝砂」條。

【拖耳草】 卽馬齒莧大葉者之古籍別名。典見綱目。詳「馬齒莧」條。

【狹尾芥】 卽黃芥之古籍別名。典見唐本草。詳「黃芥」條。

【狹腸草】 卽旋花之古籍別名。典見綱目。詳「旋花」條。

【狄小豈】 卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「決明子」條。

【狄隴】 卽硝砂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「硝砂」條。

【男王】 卽雄黃之別名。詳「雄黃」條。

【男生】 卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【男精】 卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【男續】 卽南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【疔見怕】 卽山馬蘭之古籍別名。典見百草鏡。詳「山馬蘭」條。

卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉淨瓶」條。

【疔瘡草】 卽毛葉仙橋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「毛葉仙橋」條。

【疔瘡藥】 卽蛇莓之古籍別名。典見南安。詳「蛇莓」條。

【疔頭草】 卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉淨瓶」條。

【皂斗】 卽椴實之古籍別名。典見說文。詳「椴實」條。

【皂斗皮】 卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【皂君】 卽鶴之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「鶴」條。

【皂李】 卽鼠李子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「鼠李子」條。

【皂角半夏麴】 原名 皂角。命名 本品爲半夏麴之一種。係和皂角製成者。故名。

製法 用皂角汁煉成膏。入半夏末。稍加麴香或南星草。查七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 祛風痰。舒經絡。

【皂角刺】 卽皂莢刺之處方用名。詳「皂莢刺」條。

【皂角莢】 卽皂莢之處方用名。詳「皂莢」條。

【皂角麴】 卽皂角半夏麴之原名。詳「皂角半夏麴」條。

【皂莢】 處方用名 皂角。猪兒牙皂。皂角莢。

古俗別名 雞樞子。烏犀。懸刀。(綱目)

基本 屬荳科爲皂角樹之莢。


產地 陳仁山藥物生產辨云。皂角產陝西興安及漢中。四川湖北省均有出。有大中小之分。以最小隻飽肉爲上。廣東產者大隻。名大皂角。洗用。

形態 皂莢爲落葉喬木。樹高三丈。周圍三尺。老樹高至六丈。周圍八尺。樹皮色枯黑。初本平滑。後乃粗糙。終至割裂。幹枝多刺。長三四寸許。刺上更枝生小刺。堅銳鋒利。葉似槐葉。爲一重至兩重之羽狀複葉。其小葉爲卵圓形或長橢圓形。大五六分。約有二十片。夏間葉腋發淡綠黃色之扁平小花。連綴而爲短穗狀。果實爲莢果。長一尺。闊寸許。扁平巨大。狀似刀。故有懸刀之名。秋時成熟。變黑褐色。遂彎掇而不正直。莢中藏種子十餘枚。子堅實。稍扁平。似大豆。褐色。

七 蠶 牡 狂 狽 狄 男 疔 皂

七靈皂

有光澤。



理類 有小如猪牙者。有大而肥厚。多脂而黏者。有長而瘦薄。枯燥不黏者。

採取 九月十月間採茨。陰乾。取如猪牙及多脂者良。若因其樹多刺。不能採茨。以篋籠其樹。一夜則茨自落矣。

製法 雷欽曰。凡使皂茨。須用赤肥井不姓者。以新汲水浸一宿。用銅刀削去粗皮。以酥反復炙透。搗去子皮。每用茨一兩。酥五錢。王好古曰。凡用有蜜炙酥絞汁或燒灰之用不一。各依方法。

用法 恒以剉末。和作丸散。
性質 辛。咸。溫。有小毒。
效能 宣通竅。搜風痰。用作衝動藥。殺蟲藥。及為噴嚏藥。
主治 風痺死肌。邪氣。頭風。濕出。利九竅。殺精物。本經。療腹脹滿。消穀。除欬嗽。瘰結。婦人胞不落。

明目益精。可為沐藥。不入湯。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論皂茨曰。破堅癥。腹中痛。能隨胎。又將浸酒中。取盡其精。煎成膏。塗帛。貼一切腫痛。【宋】大明日華諸家本草論皂茨曰。通關節。頭風。消痰殺蟲。治骨蒸。閉胃。中風口噤。【宋】寇宗奭本草衍義論皂茨曰。海暑久雨時。合蒼朮。燒烟。辟瘴疫邪。溼氣。【元】王好古湯液本草論皂茨曰。搜肝風。瀉肝氣。【明】汪機本草會編論皂茨曰。燒烟。薰久刺脫肛。【明】李時珍本草綱目論皂茨曰。通肺及大腸氣。治咽喉痺塞。痰氣喘欬。風癩疥癬。【明】繆希雍本草經疏論皂茨曰。皂茨味辛。微鹹。氣溫。有小毒。氣味俱厚。入足厥陰。手太陰。陽明經。厥陰為風木之臟。其主風。痺死肌。頭風。淚出者。皆厥陰風木為病。得金氣之厚者。能勝木。稟辛散之性。者能利竅。木氣平。關竅利。則神自通。精物邪也。關竅既利。則神自通。精物邪氣。安得不去哉。又厥陰之脈。循陰器。而絡於肝。厥陰客寒為囊結。辛

溫散厥陰之寒。則凝結解矣。肺受風寒。所迫為欬。入肺散邪。則咳嗽止矣。鹹能軟堅。溫主通行。辛能開竅。橫走。故又主腹脹滿。消殺。及婦人胞不落也。宜導滯之性。而云益精明目。無是理矣。【明】李士材本草圖解論皂茨曰。皂茨味辛。散。其性燥烈。吹喉鼻。則通上竅。導二陰。則通下竅。入腸胃。則理風溼。痰喘。腫滿。殺蟲。塗肌膚。則清風去。瘰癧。散腫。消毒。又治急喉痺。癰喉風。用大皂茨四十挺。切水三斗。浸一夜。煎至斗半。入人參末五錢。甘草末一兩。煎至五升。去渣。入無灰酒一升。釜煤二七。煎如饅。入瓶封埋地中。一夜。每溫酒下一匙。或掃入喉內。取涎涎盡為度。後含甘草片。又治中風。涎潮昏悶。宜稀涎散。大皂茨末一兩。明礬五錢。每服五分。水調灌。不大吐。只微涎出。核治大腸燥結。瘰癧。腫毒。刺能治癰。未成。即消。已成。即潰。直達瘡所。甚驗。又治癰風。殺蟲。頗著神功。【清】黃宮繡本草求真論皂茨曰。皂角辛鹹性燥。功通竅。驅風。故凡風邪內入。而見牙關緊閉。口噤不語。胸

六三〇

滿喉痺。腹癰胎結。風痰癰喘。腫滿。堅癥。囊結等症。用此吹之。導之。則通上下之竅。煎之。服之。則治風痰。喘滿。塗之。擦之。則能散腫。消毒。以去面上風氣。蒸之。蒸之。則通大便。祕結。燒烟。蒸之。則治癰瘡。溼毒。然種類甚多。形如猪牙。名為牙皂。較之大皂。稍有不同。大皂則治溼痰。更優。牙皂則治風痰。更勝也。一種皂角刺。氣味辛溫。功治略同。但其鋒銳。直透急處。潰散癰疽。及妬乳風癩。惡瘡。皂子治大便燥結。殺存性用。

國外學說 古方藥品考曰。皂茨來自中國者有二種。一為猪牙皂茨。質堅硬。栗殼色。闊二三分。長二三寸。反張者為上品。一為肥皂。形似扁豆。茨而豐肥。中貯三四子。圓黑若無患子。日本產者。類似猪牙皂茨。闊寸許。長六七寸。味淡薄。不堪入藥。其實為皂角子。刺針為皂角刺。又大和本草曰。皂茨。樹高大。刺多。葉如槐。夏開細黃花。結實。茨如豆茨。即皂茨也。又名皂角。功用最多。為喉痺及卒中風之妙藥。茨直而厚。多肉而黏者為上。猪

牙皂。其莢曲如猪牙。故名。皂角子爲莢中之子。形如豆。俱入藥用。近人學說。余雲岫曰。皂莢之爲物。含有石鹼素甚多。故鄰間多用以滌瑕落垢。今肥皂行而皂莢廢矣。吾輩所用之去痰劑。如西尼加根。如遠志。如桔梗。皆含有石鹼素。所謂刺戟性驅痰劑者也。今用牙皂之莢。以代西尼加根。頗可驅痰。用法。取牙皂去其核。刮去其外皮。每日用一克。蘭姆作浸劑。已足驅痰之用。若日用兩克。蘭姆則服之者口中清涎垂下矣。其催促分泌之力之大。於此可想見矣。欲進而試驗溶血作用及動物試驗。今未遑也。余用此已二三年。今年遇日本藥學博士中尾萬三。偶談及此。彼謂對於皂莢。已有工作。其中確含有石鹼素頗多。且與西尼加同類。用以代西尼加。甚合理云。章次公曰。本品刺戟性甚強。爲涌吐風痰之要藥。余嘗治中年某咳嗽氣逆。不能平臥。形體素豐。其爲溼痰無疑。遂用二陳湯合降氣之品。加入皂角灰五分（以皂角去皮子焙焦爲末）沖服。服後

七畫 皂

三小時。而諸症悉平。其效有不可思議者。咳嗽上氣。然必審此爲溼痰者。方可施用。若陰虛久嗽之腎氣不納。痰飲喘嗽之衝氣上逆。投之或差。死可立待。用之者其慎諸。配合應用。治中風口噤不開。涎潮壅上。皂角一挺。去皮。猪脂塗。炙黃色爲末。每服一錢。溫酒調下。氣壯者二錢。以吐出風涎爲度。（簡要濟衆方）

治中風口噤。皂角五兩。去皮爲末。三年大醋和之。左囑塗右。右囑塗左。乾更上之。（外臺祕要方）

治中暑不省。皂莢一兩。燒存性。甘草一兩。微炒爲末。溫水調一錢。灌之。（濟衆方）

治鬼壓不寤。皂莢末刀圭吹之。能起死人。（千金方）

治自縊將死。皂莢末吹鼻中。（外臺祕要方）

治水溺卒死。一宿者尙可活。紙裹皂莢末納下部。須臾出水即活。（外臺祕要方）

治急喉痺塞。透巡不救。皂莢生研末。每以少許點患處。外以醋調厚封項下。須臾便破。出血即愈。

或按水灌之亦良。又用皂角肉半載。水醋半盞。煎七分。破出膿血即愈。（直指方）

治咽喉腫痛。牙身一挺。去皮。米醋浸炙七次。勿令太焦。爲末。每吹少許。入咽吐涎即止。（聖濟總錄方）

治風癩諸痰。五瀉膏。治諸風。取痰如神。大皂角半斤。去皮子。以蜜四兩塗上。慢火炙透。槌碎。以熱水浸一時。按取汁。慢火熬成膏。入麝香少許。攤在夾綿紙上。晒乾。剪作紙花。每用三四片。入淡漿水一小盞中洗。淋下。以筒吹汁入鼻內。待痰涎流盡。吃脂麻餅一箇。涎盡即愈立效。（普濟方）

治風邪癩疾。皂莢燒存性四兩。蒼耳根莖葉日乾四兩。蜜陀僧一兩。爲末。成丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三四十九丸。棗湯下。日二服。稍退。只服二十九丸。名抵住丸。（永類鈴方）

治一切痰氣。皂莢燒存性。蘿蔔子炒等分。薑汁入煉蜜丸。梧子大。每服五七十九丸。白湯下。（簡便方）

治胸中痰結。皂莢三十挺。去皮切。水五升。浸一夜。按取汁。慢熬至可丸。丸如梧子大。每食後鹽漿水下十九丸。又釣痰膏。用半夏醋煮。過以皂角膏和勻。入明礬少許。以柿餅搗膏。丸如彈子。噙之。（聖惠方）

治欬逆上氣。睡濁不得臥。皂莢丸。用皂莢炙去皮子研末。蜜丸。梧子大。每服一丸。棗膏湯下。日三夜一服。（仲景方）

治痰喘咳嗽。長皂莢三條。去皮子。一莢入巴豆十粒。一莢入半夏十粒。一莢入杏仁十粒。用薑汁制杏仁。麻油制巴豆。蜜制半夏。一處火炙。黃色爲末。每用一字。安放手心。臨臥。以薑汁調之。喫下神效。（金房士選奇方）

治卒寒欬嗽。皂莢燒研。豉湯服二錢。（千金方）

治牙疳喘息。喉中水雞鳴。用肥皂莢兩挺。酥炙。去肉爲末。蜜丸。豆大。每服一丸。取微利爲度。不利更服。一日一服。（必效方）

治腫滿入腹。脹急。皂莢去皮子。炙黃爲末。酒一斗。石礬煎沸。服

七 蠶 皂

一斗。日三服。(肘後方)

①治二便閉格。用皂莢燒研。粥飲下三錢。立通。(千金方) 錢脚丸。

用皂莢炙。去皮子爲末。酒麴糊丸。每服五十丸。酒下。(宣明方) 用皂莢燒烟於桶內坐上熏之。即通。

(聖惠方)

①治食氣黃腫。氣喘胸滿。用不蛙皂莢。去皮子。醋塗炙。焦爲末。一錢。巴豆七枚。去油膜。以淡醋研好。

蠶和丸。麻子大。每服三丸。食後陳橘皮湯下。日三服。隔一日增一丸。以愈爲度。(經方)

①治胸腹脹滿。欲令瘦者。猪牙皂角相續量長一尺。微火煨。去皮子。搗篩蜜丸。大如梧子。服時先喫羊肉醬汁三兩口後。以肉汁香藥十丸。以快利爲度。覺得力更服。以利清水。即止藥。癢後一月不得食肉及諸油膩。(海上方)

①治身面卒腫洪滿。用皂莢去皮炙黃。對三升酒。一斗。漬透。煮沸。每服一升。一日三服。(肘後方)

①治卒熱勞疾。皂莢續成一尺。以土酥一大兩。微塗。緩炙酥。盡搗。蜜丸。梧子大。每日空腹飲下十

五丸。漸增至二十丸。重者不過兩劑。愈。(海上方)

①治急勞煩熱。體瘦。三皂丸。用皂莢。皂莢樹皮。皂莢刺各一斤。同燒灰。以水三斗。淋汁。再淋如此三五度。煎之。候少凝。入麝香末一分。以童子小便浸蒸餅丸。小豆大。每空心溫水下七丸。(聖惠方)

①治脚氣腫痛。皂角赤小豆爲末。酒醋調貼腫處。(永類鈴方)

①治傷寒初得。不問陰陽。以皂角一挺。肥者燒赤爲末。以水五合和。頓服之。陰病極效。(千金方)

①治時氣頭痛煩熱。用皂角燒研。新汲水一中盞。姜汁蜜各少許。和二錢服之。先以煖水淋浴。後服藥。取汗即愈。(聖惠方)

①治卒病頭痛。皂角末吹鼻取嚏。(斗門方)

①治腦宣不止。不蛙皂角去皮子。蜜炙。鎚碎。入水。按取濃汁。熬成膏。啗鼻口內。咬定良久。涎出爲度。(張子和儒門事親方)

①治鼻塞不通。皂角研末吹之。(千金方)

①治風熱牙痛。皂角一挺。去子。

入鹽滿殼。仍加白礬少許。黃泥固濟。煨研。每日擦之甚效。(經驗方)

①治風蟲牙痛。用皂莢末塗齒上。有涎吐之。(外臺秘要方) 用猪牙皂角食鹽等分爲末。日日搯之。(十全方)

①搯牙烏鬚。大皂角二十挺。以姜汁地黃汁。藥炙十遍爲末。日用搯牙甚妙。(普濟方)

①治霍亂轉筋。皂角末。吹豆許入鼻。取嚏即安。(梅師方)

①治腸風下血。用長尺皂角五挺。去皮子。酥炙三次。研末。精羊肉十兩。細切。搗爛。和丸。梧子大。每溫水下二十丸。(聖惠方)

六 三 二

①治大腸脫肛。不蛙皂角五挺。鎚碎。水按取汁二升。浸之。自收。上收後。以湯澆其腰肚上下。令皂角氣行。則不再作。仍以皂角去皮。酥炙爲末。棗肉和丸。米飲下三十九丸。(聖惠方)

①治下部腫痛。皂莢燒研。綿裹導之。(肘後方)

①治外腎偏疼。皂角和皮爲末。水調傅之良。(梅師方)

①治便毒腫痛。皂角炒焦。水粉炒。等分研末。以熱醋調攤。貼患處。類以水潤之。即效。又方。用猪牙皂角七片。煨黃。去皮。出火毒爲末。空心溫酒服五錢。(袖珍方)

①治便毒癰疽。皂角一條。醋熬膏。傅之。屢效。(直指方)

①婦人吹乳。用猪牙皂角去皮。蜜炙爲末。酒服一錢。又詩云。婦人吹奶法如何。皂角燒灰。蛤粉和熱酒一盃。調八字。管致時刻笑呵呵。(袖珍方)

①治丁腫惡瘡。皂角去皮。酥炙。焦爲末。入麝香少許。人糞少許。和塗。五日後根出。(普濟方)

①治小兒頭瘡。黏肥。及白禿。用皂角燒黑爲末。去癩傳之。不過三次即愈。(鄧筆叢雜興方)

①治小兒惡瘡。皂莢水洗拭乾。以少麻油搗爛塗之。(肘後方)

①治足上風瘡。作痒甚者。皂角炙熱烙之。(潘氏方)

①治積年疥瘡。猪肚內放皂角。煮熟。去皂角食之。(袖珍方)

①治射工水毒生瘡。皂莢長尺二者。苦酒一升。煎汁。熬如飴。塗之。(肘後方)

●治魚骨咬喉。皂角末吹鼻取嚏。(聖惠方)

●治九里蜂毒。皂莢鑽孔。貼叮處。艾灸孔上三五壯。即安。(救急方)

●治腎風陰痒。以稻草燒皂角。烟薰十餘次。即止。(濟急仙方)

●治犬風諸癩。長皂角二十條。去皮子。以酒煎稠。漉過。候冷。入雪糕丸。梧子大。每次酒下五十丸。(直指方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非實邪危急者。禁用。惡麥門冬。畏空青。人參。苦參。

著名方劑 ●稀涎散。治中風

牙關緊急。並治單蛾雙蛾。(局方) 牙皂三錢。明礬一兩。江子仁六粒。

右先化開礬。入二味。待礬枯爲末。每用三分。吹入喉中。或溫水調服。

●皂莢丸。治欬逆上氣。時時睡濁。但坐不得眠。此方主之。(金匱) 皂

莢八兩。(刮去皮酥炙) 有一味末之。蜜丸。梧子大。以棗膏和湯。服三

丸。日三夜一服。●勝金丹。治中風。忽然昏倒。若醒。形體昏悶。四肢不

收。風涎潮於上。腦氣閉不通。(本

七蠶 皂

事方) 牙皂二兩。(搗碎) 生薄荷牛兩。(與牙皂用水三升。浸一處。

取汁。研成膏) 瓜蒂一兩。麝香二兩。硃砂五錢。另研) 右將硃砂末二分。與二味研勻。用管子搜和。丸

如龍眼大。以硃砂一分爲衣。溫酒化下一丸。甚者二丸。以吐爲度。得吐即醒。不醒者不治。

參攷資料 ●處處有之。長尺二者良。俗人見其有蟲孔而未嘗

有蟲形。皆言不可近。令人惡病。殊不爾也。(陶弘景) ●此物有三種。

猪牙皂莢最下。其形曲及薄。全無滋潤。洗垢不去。其尺二者粗大

長虛而無潤。者長六七寸。圓厚節促直者。皮薄多肉。味濃大好。(蘇

恭) ●所在有之。以懷孟者爲勝。木極有高大者。本經用如猪牙者。

陶用尺二者。蘇用六寸圓厚者。今醫家作疎風氣丸。煎。多用長皂莢。

治齒及取積藥。多用牙皂莢。所用雖殊。性味不甚相遠。其初生嫩芽。以爲蔬茹。更益人。(蘇頌)

【皂莢子】 蘇本 屬豇科。爲皂莢之種子。

採取 九十月間成熟時。採之

陰乾。

製法 雷斅曰。揀取圓滿堅硬不蛀者。以瓶煎熟。剝去硬皮。一重。

取向裏白肉兩片。去黃。以銅刀切晒用。其黃消人腎氣。

性質 辛溫無毒。效能 通便秘。療疥癬。

主治 炒香去赤皮。以水浸軟。煎熟。精煮食之。疎導五臟風熱。癩

歷代記述攷圖 【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論皂角子曰。核中白

肉。入治疔藥。核中黃心。嚼食。治腦痰吞酸。【元】李東垣用藥法象論

皂角子曰。仁和血潤腸。【明】李時珍本草綱目論皂角子曰。治風熱

大腸虛秘。療癰。腫毒。疥癬。【清】張隱庵本草崇原論皂角子曰。治疔氣并舉丸腫痛。

配合應用 ●治腰脚風痛。不能履地。皂角子一千二百箇。洗淨

以少酥熬香爲末。蜜丸。梧子大。每空心以葵子酸棗仁湯下三十

丸。(千金方) ●治大腸虛秘。或秘或利。用上

方服至百丸。以通爲度。 ●治下痢不止。諸藥不效。服此

三服。宿垢去盡。即變黃色。屢驗。皂角子瓦焙爲末。米糊丸。梧子大。每

服四五十丸。陳茶下。(醫方摘要) ●治腸風下血。皂莢子。槐實一

兩。用占殼絲炒香。去糠爲末。陳粟米飲下一錢。名神效散。(聖惠方)

●治寒急後重。不蛀皂角子。米糠炒過。枳殼炒。等分爲末。飯丸。梧

子大。每米飲下三十丸。(普濟方) ●治小兒流涎。脾熱有痰。皂莢

子仁半兩。半夏湯泡七次。一錢二分爲末。姜汁丸。麻子大。每溫水

下五丸。(聖濟總錄方) ●治惡水入口及皂莢水入口。熱痛不止。以皂莢子燒存性。一分

沙糖半兩。和齊舍之。(博濟方) ●治婦人難產。皂角子二枚吞

之。(千金方) ●治風蟲牙痛。皂角子末。綿裹

彈子大兩顆。醋煎熟。更互熨之。日三五度。(聖惠方)

●治粉滓面黚。皂角子。杏仁等分研勻。夜以津和塗之。(聖惠方)

●預免瘡癩。凡小兒。每年六月六日。照年歲。吞皂莢子。可免瘡癩

之患。大人亦可吞七枚。或二十一

七畫 皂

林靜齋所傳方也。(吳吳扶壽方)

①治便癢初起。皂角子七箇。研末。水服效。一方用年歲香之。(儒門事親方)

②治一切丁腫。皂莢子仁作末。傳之五日愈。(千金方)

③治年久癩癧。用不蛀皂角子一百粒。米醋一升。酒砂二錢。同煎乾。炒令酥。看癩子多少。如一箇。服一粒。十箇服十粒。細嚼。米湯下。酒浸煎亦可服。聖濟總錄言虛人不可用。確砂也。(阮氏經驗方)

用薑 八分至錢中。

【皂莢木皮根皮】 性質 辛。溫無毒。

主治 風熱痰氣殺蟲。

【皂莢豆】 卽刀豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刀豆」條。

【皂莢刺】 處方用名 皂角刺。古醫別名 天丁。(綱目) 皂角刺。(和漢藥考)

基本 屬豆科。爲皂莢之木刺。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產廣東樂昌。廣西懷集。浙江等省。亦有出。實則此物生於皂莢樹上。

各處皆產之。

性質 辛溫無毒。

效能 療惡瘡。潰癰毒。

主治 米醋熬嫩刺作煎。塗瘡癬。有奇效。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論角刺曰。治癰腫。妬乳。風癩。惡瘡。胎衣不下。殺蟲。【明】繆希雍本草經疏論角刺曰。刺功用與莢同。第其銳利。能直達瘡所。爲癰疽。妬乳。丁腫。未潰之神藥。蘇頌

以米醋熬嫩刺作煎。塗瘡癬。有奇效。又治癩風。惡瘡。胎衣不下。殺蟲。凡癰疽已潰。不宜服。孕婦亦忌之。

【清】張隱庵本草崇原論角刺曰。去風。化痰。敗毒。攻毒。定小兒驚風。發瘡。攻痘。瘡起發。化毒成漿。

配合應用 ①治小兒重舌。皂

角刺灰。入朴硝或腦子少許。漱口。擦入舌下。涎出自消。(聖惠方)

②治小便淋閉。皂角刺燒存性。破故紙等分爲末。無灰酒服。(聖濟總錄方)

③治腸風下血。便前近腎肝。便

後近心肺。皂角刺灰二兩。胡桃仁。破故紙炒。槐花炒各一兩。爲末。每

服一錢。米飲下。(普濟方)

④治傷風下痢。傷風久不已。而

下痢。澀血。日數十度。用皂角刺。枳實。麩炒。槐花生用。各半兩。爲末。蜜丸。梧桐子大。每服三十九丸。米湯下。日二服。(袖珍方)

⑤治胎衣不下。皂角刺燒爲末。

每服一錢。溫酒調下。(熊氏補遺方)

⑥治婦人乳癰。皂角刺燒存性

一兩。蚌粉一錢。和研。每服一錢。溫酒下。(直指方)

⑦治乳汁結毒。痛後乳汁不泄

結毒者。皂角刺。莢。荊子。各燒存性。等分爲末。每溫酒服二錢。(袖珍方)

⑧治腹內生瘡在腸臟。不可治

藥者。取皂角刺不拘多少。好酒一椀。煎至七分。溫服。其膿血悉從小便中出。極效。不飲酒者。水煎亦可。(經驗方)

⑨瘡腫無頭。皂角刺燒灰。酒服

三錢。嚼葵子三五粒。其處如針刺爲效。(儒門事親方)

⑩治瘡癩惡瘡。皂角刺燒存性。研白及少許爲末。傳之。(直指方)

六三四

①治大風癩瘡。選奇方。用黃粟末。皂角刺灰各三錢。研勻。空心酒服。取下蟲物。並不損人。食白粥兩

三日。服補氣藥數劑。名神效散。如血肢腫。用針刺出水。再服。忌一切魚肉發風之物。取下蟲。大小長短。其色不一。約一二升。其病乃愈也。(仁存方)

②治發背不潰。皂角刺。麥麩炒黃一兩。綿黃芪焙一兩。甘草半兩。爲末。每服一大錢。酒一瓊。乳香一塊。煎七分。去滓溫服。(普濟本草方)

用薑 八分至錢中。

施用宜忌 凡癰疽已潰。及孕婦禁用。

參攷資料 皂莢刺治風殺蟲。功與莢同。但其銳利。直達病所。爲異耳。神仙傳云。左親騎軍。崔言。一旦得大風惡疾。雙目昏盲。眉髮自落。鼻梁崩倒。勢不可救。遇異人傳方。用皂角刺三斤。燒灰。蒸一時久。日乾爲末。食後濃煎大黃湯。調一七飲之。旬。眉髮再生。肌潤目明。後入山修道。不知所終。又劉守真保命集云。瘡風乃營氣熱風。寒客

於賦而不去。宜先用樟皮散。服五
七日。後灸承漿穴七壯。三灸後。每
日早服樟皮散。午以升麻葛根湯
下錢氏消青丸。晚服一聖散。用大
黃末半兩煎湯。調皂角刺灰三錢。
乃緩疎泄血中之風熱也。仍戒房
室三年。服之便出黑蟲為驗。數日
再服。直候蟲盡為絕根也。新蟲啖
赤者蟲嗜黑(李時珍)

【皂莢葉】 主治 洗風瘡。

【皂莢】 性質 辛有毒。
主治 積垢作痛。泡
湯飲之。微瀉效。未已再服。又治腫
毒初起。磨醋塗之良。

參攷資料 皂莢。係生皂樹
上之木耳也。不可食。採得焙乾。以
備外用。用(李時珍)

【皂莢】 即綠蠶之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「綠蠶」條。

【皂莢蠶蟲】 性質 辛。
主治 蠅入人
耳。害人。研爛。同鯉魚血點之。

【皂蠶】 即蠶之古籍別名。典見綱
目。詳「蠶」條。

【皂蠶】 即綠蠶之古籍別名。典見

綱目。詳「綠蠶」條。

【禿登鹽】 即戎鹽之古籍別名。典
見唐本草。詳「戎鹽」條。

【禿菜】 即羊蹄之處方用名。詳「
羊蹄」條。

【禿瘡花】 即紅茂草之古籍別名。
典見綱目。詳「紅茂草」條。

【禿鴛】 即禿鷄之古籍別名。典見
綱目。詳「禿鷄」條。

【秀榮】 係陸英榮而不實者之別
名。典見爾雅。詳「陸英」條。

【系系葉】 即虎耳草之古籍別名。
典見簡易草藥。詳「虎耳草」條。

【良棗】 即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【良無極】 即占斯之古籍別名。典
見綱目。詳「占斯」條。

【良達】 產地 生山陰間。
形態 良達為雜草類
之一種。其莖蔓延。大如葵。子滑小。
可供藥用。

主治 齒痛。止渴。輕身。

【良醫七首】 即莎摩之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「莎摩」條。

【良耀草】 命名 初發見此草
之功用者為梁耀。故

名。良。梁之訛音也。

基本 山草類之一種。
產地 廣東陽江縣。

形態 葉如麻。黃花白如牛李。
秋結子。

主治 解毒。

【芫蘭】 即蘿藦之古籍別名。典見
陸瓊詩疏。詳「蘿藦」條。

【芋】 即芋子之原名。詳「芋子」條。
原名 芋。

【芋子】 古籍別名 土芝。(別
錄) 陸瓊(綱目) 青芋。紫芋。真芋。
白芋。野芋。連禪芋。(蘇恭) 里芋。
(日本) 芋。芋。(俗名) 旱芋。蔓芋。味
芋。君子芋。百里芋。青邊芋。旁巨芋。
車穀芋。雞子芋。九面芋。(綱目)

外國名詞 Colocasia sagittata,
Quorum, Schott. (拉丁) サト
イモ (日本)

基本 天南星科芋屬之球根。
產地 各省均有。出江蘇丹徒
縣屬之龍潭。以產芋名。

形態 芋為菜類之多年生草
本。高至四五尺。其根多肉如塊狀。
埋存於地下。含有許多澱粉。葉如
荷葉而長圓。有大缺刻。葉柄肥大

而長。色綠。秋開黃色花。花單性。作
肉穗花序。雄花集於花序之上部。
雌花集於花序之下部。其花序之
下有大苞。出地下莖。及乾葉柄。其
球根色黑。外被絨狀毛。內實而多
白色黏液。可供食用。

性質 辛。平滑。有小毒。

主治 寬腸胃。充肌膚。滑中。

歷代配製攷證 【唐】蘇恭新
修本草論芋子曰。冷煖燥煩熱。止
渴。【唐】陳藏器本草拾遺論芋子
曰。令人肥白。開胃通腸。閉產婦食
之破血。飲汁止血。【唐】孟詵食
療本草論芋子曰。芋色白者無味。
紫色者破氣。煮汁噴之。止渴。十月
後曬乾。收之。冬月食不發病。他時
月不可食。又和鯽魚鱈魚作臘。良
久。食治人虛勞無力。又煮汁洗膩
衣。白如玉也。【宋】大明諸家本草
論芋子曰。破宿血。去死肌。和魚羹
食。甚下氣。調中補虛。【清】黃宮繡
本草求真論芋子曰。芋子種類甚
多。據書述其功能。有宜生用則可
以治腹中瘕氣。頭上軟癬。熱用則
充飢。深膚。解毒。稀痘。冷啖則能止
渴生津。療熱除煩。通腸。筋結。和血

七畫 芋 芎 芩 芭 芒

食則能下氣寬中。煮汁產婦食。則能破血通瘀。及浴身上遊風。燒灰則能以治瘡。胃風邪。然此生則齋。熱則滑滯。故書載此多食則不免有動氣。發冷泄瀉。及難化之弊矣。若在芋葉與莖。味辛冷滑。功能除煩止瀉。療妊娠心煩。迷悶。胎動不安。并敷蛇蟲。癰腫。毒瘡。痘瘡。潰爛成瘡。野芋性。莖與芋相似。芋種三年不採成根。亦能殺人。食之宜用土漿。羹汁。大豆汁以飲。清。王士雄隨息居飲食譜論芋子曰。芋煮熱甘滑利胎。補虛滋垢。可單可去。亦可充糧。消渴宜餐。脹滿勿食。生嚼治絞腸痧。持塗癰疽初起。丸服散瘰癧。並奏奇功。煮汁洗膩衣。色白如玉。搗葉卷毒箭及蛇蟲傷。

參攷資料 ①芋子生則有毒。味莖不可食。性滑下石。服餌家所忌。陶弘景。②按徐鉉註說文云。芋猶吁也。大葉實根。駭吁人也。吁音芋。疑怪貌。又史記卓文君云。岷山之下。野有蹲鴟。至死不饑。註云。芋也。蓋芋魁之狀。若鴟之蹲坐。故也。芋魁。京漢書作芋。芋魁義同。

【李時珍】今處處有之。閩蜀淮楚尤多。植之種類雖多。大抵性效相近。蜀川出者形圓而大。狀若蹲鴟。謂之芋魁。彼人種以當糧食。而度饑年。江西閩中出者。形長而大。其細者如卵。生於魁旁。食之尤美。凡食芋。竝須栽蔴者。其野芋有大毒。不可食。蘇頌。③芋屬雖多。有水旱二種。旱芋山地可種。水芋水田蔴之葉皆相似。但水芋味勝。莖亦可食。芋不開花。時或七八月間有開者。抽莖生花黃色。旁有一長蔓護之。如半邊蓮花之狀也。按郭義恭廣志云。芋凡十四種。君子芋魁大如斗。赤鴟芋即速禪芋。魁大子少。百果芋魁大子繁。敵收百斛。青邊芋旁巨。芋車穀芋三種。竝魁大子少。葉長丈餘。長味芋味美。莖亦可食。雞子芋色黃。九面芋大而不美。青芋曹芋象芋皆不可食。惟莖可作茹。旱芋九月熟。莖芋綠枝生。大者如二三升也。李時珍。

【芋芳莖葉】 性實 辛冷滑。無毒。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論芋芳莖葉曰。極療蜂蟻尤良。明。李時珍本草綱目論芋芳莖葉曰。汁塗蜘蛛傷。

參攷資料 處士劉陽隱居王屋山。見一蜘蛛。為蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚼破芋根。以瘡就嚼處磨之。良久。腹消如故。自後用治蜂螫。有驗。由此。李時珍。

【芋芳粥】 主治 寬腸胃。令人不饑。

【芎】 即芋莖之古籍別名。典見鄧樞通志。詳「葵菴」條。

【芍藥】 即白芍之原名。詳「白芍」條。

【芎藭】 即川芎之原名。詳「川芎」條。

【芋】 即大生地之古籍別名。典見本經。詳「大生地」條。

【芭】 即大生地之古籍別名。典見本經。詳「大生地」條。①即稷米之白色者。典見綱目。詳「稷米」條。②即黍之色白者。典見爾雅。詳「黍」條。

【芭實】 即苡仁之古籍別名。典見別錄。詳「苡仁」條。

六三六

【芒】 古籍別名 石芒。折草。綱目拾遺。芭。杜榮。爾雅。芭芒。芭宇志。芭芽。綱目。薄尾花。萱。日本。

外國名詞 Micrantha angras, Arctost. (拉丁) ススキ ラバナ カヤ(日本) 基本 係禾本科芒屬之莖。 產地 山野間。

形態 芒為山草類之多年生草本。高至五六尺。葉細長而尖。有平行脈。質堅利如鋒刃。秋月開花。花集成長穗狀。花序簇生於莖之上部。呈黃褐色。果實多絨毛。然則飛散如絮。有紅白二種。其穗可為草履。其葉可葺屋頂。其莖與敗芒箔。可供藥用。



芒

性質 甘平。無毒。 主治 人畜為虎狼等傷。恐毒入內。取莖葉根濃煮汁服。亦生取汁服。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論芒曰。黃汁服散血。

參攷資料 ①芒爾雅作蒺。今

俗謂之芭茅。可以爲簾箔故也。

李時珍 ②爾雅蒺。杜榮。郭璞注

云。草似茅。皮可爲繩索履屨也。今

江東多以爲箔。又曰石芒。生高山

如芒而節短。江西呼爲折草。六七

月生穗如荻。陳藏器 ③芒有二

種。皆叢全葉者。皆如茅而大。長四

五尺。甚快利。傷人如鋒刃。七月抽

長莖。開白花。成穗如蘆葦者。芒也。

五月抽短莖。開花如芒者。石芒也。

並於花將放時。剝其鋒皮。可爲繩

箔草履諸物。其莖穗可爲掃帚也。

李時珍

【芒芋】卽澤瀉之古籍別名。與見

別錄詳澤瀉條。

【芒硝】 命名 本品內朴硝結

成。細芒如鋒。故名芒硝。

古醫別名 宵石。煉成盆中者

名盆硝。嘉祐圖經本草。

外國名詞 Natrum Sulph

jeum 一作硫酸曹達。又名硫酸

那葛倫。

製法 用朴硝再以水煎化。滌

七畫 芒

去脚。入蘿蔔數枚同煮。熟。傾入盆

中。經宿。又結成如冰如蠟之硝。其

在上面細芒如鋒者。卽芒硝也。

性質 辛。苦。大寒。無毒。

成分 芒硝之主要成分爲硫

酸鈉。

效能 瀉熱。潤燥。輕堅。用作下

劑。

主治 五臟積聚。久熱。胃閉。除

邪氣。破留血。腹中痰實。結搏。通經

脈。利大小便。及月水。破五淋。推陳

致新。

張仲景之發明 芒硝一味。經

張仲景之實驗。認爲主輕堅。故能

治心下痞堅。心下石硬。小腸急結。

結胸。燥屎。大便硬。而旁治宿食。腹

滿。小腹脹痞之等諸般難解之毒

也。茲考徵如下。①大陷胸湯證曰。

心下痛。按之石硬。以上芒硝一升。

分量可疑。故從千金方。大陷胸丸

作大黃八兩。芒硝五兩。②大陷胸

丸證曰。結胸。項亦強。以上芒硝半

斤。分量亦可疑。故從千金方作五

兩。③調胃承氣湯證曰。腹脹滿。又

曰大便不通。又曰。不吐不下。心煩。

以上芒硝半斤。分量亦可疑。今考

千金方。外臺秘要。此方無有焉。故

姑從桃核承氣湯。以定芒硝分量。

④柴胡加芒硝湯證。是小柴胡湯

而加芒硝者也。而小柴胡湯主治

胸脇苦滿。不能治其塊。所以加芒

硝也。以上芒硝六兩。⑤大承氣湯

證曰。燥屎。又曰大便硬。又曰腹滿

又曰宿食。⑥大黃牡丹湯證曰。小

腹腫痞。⑦木防己去石膏加茯苓

芒硝湯證曰。心下痞堅云云。復與

不愈者。以上芒硝皆三合。⑧大黃

硝石湯證曰。腹滿。以上硝石四兩

⑨橘皮大黃朴硝湯證曰。餓食之

在心胸間。不化。吐腹不出。⑩桃核

承氣湯證曰。少腹急結。以上朴硝

芒硝皆二兩。⑪硝礬散證曰。腹脹

以上硝石等分。歷觀此數方。芒硝

主治堅塊明矣。有輕堅之功也。故

旁治宿食腹滿。少腹腫痞之等諸

般難解者也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論芒硝曰。下瘰癧。黃疸病。

時疾。瘰癧。能散惡血。胎前。傳膝疔。

【金】張元素珍珠囊論芒硝曰。芒

硝氣薄味厚。沈而降。陰也。其用有

三。去實熱一也。滋腸中宿痞二也。

破堅積熱塊三也。孕婦惟三四月

及七八月不可用。餘皆無妨。【明】

繆希雍本草經疏論芒硝曰。芒硝

味苦辛。性大寒。乃太陰之精。以消

物爲性。故能消五金八石。况乎五

臟之積聚。其能比之金石之堅哉。

久熱卽是邪熱。傷寒熱邪結中。魚

或停飲食。則胃脹閉。少少投之。可

立蕩除。除邪氣者。寒能除熱故也。

破留血者。鹹能軟堅。辛能散結也。

邪熱盛則經脈閉。熱淫於內。治以

鹹寒。結散熱除。則經脈自通。二便

自利。月水復。故五淋中惟石淋皆

淋爲膠結難解。病由於積熱。非得

辛苦大寒之藥。以推蕩消散之。不

能除也。推陳致新。總過其體用之

功耳。由朴硝再煎而成。故曰生於

朴硝。

國外學說 日本學說謂依日

本藥局方。芒硝爲主要之鹽類下

劑。凡慢性便秘。因心肝腎病而發

之。水腫。膈充血。急性漿液膜炎之

宜於下泄者。皆用之。又於慢性胃

加答兒。胃潰瘍。亦用之。頓服一〇

、〇至三〇、〇或二回分服。又

和漢藥考曰。硫酸鈉(芒硝)爲無

六三七

七畫 芒 見 角

色結晶。有稍帶苦味之清涼鹹味。能於乾燥空氣中風化。善溶於水。現中性反應。不溶於酒精。熱之易熔。將本品於無色火焰中熱之。則火焰變為黃色。其水溶液。和以硝酸銀溶液。則生不為酸類所溶之白堊。

配合應用 ①治傷寒七八日後。邪結下焦。少腹按之堅痛。下之愈。以芒硝加入大承氣湯。

②治傷寒邪熱失汗。苦血少腹。或先因內傷。留血下焦。下之愈。以芒硝加入桃仁承氣湯。

③療漆瘡。用湯漬芒硝。令濃塗之。如乾即易之。(千金方)

④治小兒赤遊行於體上。下至心即死。以芒硝納湯中。取濃汁以拭丹上。(子母秘錄方)

⑤治癩國格大小便不通。脹滿欲死。兩三日則殺人。以芒硝三兩紙裏三四重。炭火燒之。令內一升湯中。盡服。當先飲湯一升。已吐出乃服之。(百一選方)

⑥主眼有翳。取芒硝一大兩。置銅器中。急火上煉之。放冷後。以生絹細羅點眼角中。每夜欲臥時。一

度點妙。(孫真人食忌方)

⑦治小兒重舌。馬牙硝塗於舌上下。三日效。(姚和衆方)

⑧治小兒鵝口。用馬牙硝擦舌上。日五度效。(簡要濟衆方)

⑨治火燄丹毒。水調芒硝末塗之。(梅師方)

⑩治死胎不下。用芒硝末二錢。童便溫服。(信效方)

⑪治風熱喉痺。及纏喉風。玉鉤匙用鹽硝一兩半。白強羅一錢。白礬砂半兩。腦子一字。研勻。取少許。數數吹之。(三因方)

⑫治重舌。用竹瀝同該硝點之。(救濟方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡胃虛無實熱者。及孕婦禁用。畏三稜。惡麥句薑。石葦爲之使。

【芒草】即莽草之古籍別名。典見山海經。詳「莽草」條。

【見腫消】古籍別名。土三七。乳香草。奶草。(綱目拾遺)三七(植物學編)

基本 屬溼草類。爲見腫消之根葉。

蘇頌云。生荊州。採藥錄云。生各處溪澗中。



(一) 消腫見



(二) 消腫見



(三) 消腫見

形態 春生苗。莖面青背紫。似羊角菜。多歧。莖紫色。高一二尺。秋開小黃花。如菊。垂絲可愛。根似芋。人多種之。

性質 酸。澀。有微毒。

歷代記載攷證 【宋】馬志開寶本草曰。見腫消爲跌打損傷。消腫散瘀要藥。【宋】蘇頌圖經本草曰。消腫腫及狗咬。搗葉貼之。【元】

六三八

吳棗傷寒論要曰。毒發於耳之前後。及項下腫硬。用見腫消草。生白及。生白斂。土大黃。生大薊。野苧麻根。搗成餅。入芒硝一錢。和貼。留頭。乾即易之。若加金線重棹。及山慈姑尤妙。百草鏡曰。見腫消治乳癰腫毒。金瘡止血。杖丹痔瘡。喉癰。雙蛾。咳嗽。

【角沈香】即生結香之古籍別名。典見本草衍義。詳「沈香」條。

【角刺】即烏茨刺之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏茨刺」條。

【角胎】即牛角鱗之古籍別名。典見綱目。詳「牛角鱗」條。

【角烏】即烏木之別名。詳「烏木」條。

【角楸】即楸白色結角者之別名。詳「楸」條。

【角落木】產地 生山谷中。形態 角落木爲雜木類之一種。狀似茱萸而細莖。其木皮可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 赤白痢。麥汁煎。古籍別名 玉不留行。(和漢藥考)

外國名詞 Incarvillea Sin.

ensis, Lam. (拉丁) カクカウ

(日本)

基本 係紫葳科角蒿屬之莖

葉。

產地 在山野原澤間。

形態 角蒿爲連草類莖屬之

一種。多年生草本。莖葉如青蒿。開

淡紅紫花。經三四分。花冠結角。長

二寸許。微彎。實黑而細。蘇恭本草

曰。角蒿似白蒿。花如蜀麥。紅赤可

愛。子似玉不留行。黑色作角。其莖

葉可供藥用。

採取 七八月採之。

製法 雷斅曰。凡使勿用紅蒿。

并邪蒿。二味真似角蒿。只是此香

而角短爾。採得於槐樹上。細細剉

用之。

性質 辛苦。有小毒。

主治 乾溼癩。諸惡瘡有蟲者。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論角蒿曰。治口齒瘡。結

疔。

【角鴟】即鴟鴞之古籍別名。真見

說文。詳「鴟鴞」條。

【角雞】即雞之一種。產奉天遼陽

縣者。典見綱目。詳「雞」條。

【角鷹】即鷹之古籍別名。典見綱

目。詳「鷹」條。

【谷茴香】即大茴香之處方用名。

詳「大茴香」條。

【豆叩】即草豆蔻之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【豆艾】即蕪棍之別名。詳「蕪棍」

條。

【豆柿】即君遷子之日本名。詳「

君遷子」條。

【豆砂】即砂砂之古籍別名。典見

本草集註。詳「砂砂」條。

【豆菰】即草豆蔻之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【豆萁】即萁上亭長之別名。典見

動物學辭典。詳「萁上亭長」條。

【豆烏黃】即無根草之古籍別名。

典見李氏草秘。詳「無根草」條。

【豆淋酒】 命名 本品係用黑

豆之淋汁製成者。故

名。

製法 用黑豆五升。炒焦令煙

盡。於瓷器內以酒一斗。浸淋一晝

夜。去豆溫飲之。

主治 破血去風。治男子中風

口噴。陰毒腹痛。及小便尿血。婦女

產後一切中風諸病。

【豆斑蝥】即斑蝥之古籍別名。典

見新本草。詳「斑蝥」條。

【豆黃】 製法 用黑豆一斗。蒸

熟。鋪席上。以蒿覆之。如

奮發法。待生黃。取出曬乾。搗末用。

性質 甘溫無毒。

主治 溼痺膝痛。五臟不足。脾

胃氣結積。壯氣力。潤肌膚。益顏色。

填骨髓。補虛損。能食肥健人。以鍊

諸脂和丸。每服百丸。神驗。祕方也。

肥人勿服。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論豆黃曰。生嚼塗陰痒

汗出。

配合宜忌 忌豬肉。

【豆黃卷】即大豆卷之處方用名。

詳「大豆卷」條。

【豆腐】 製法 凡黑豆黃豆白

豆泥。豆豉。豆綠。豆之類。

皆可造之。其法水浸。磨碎。濾去滓。

煎成。以鹽。醋。酒。或山藥。或酸醬。

醋。或就釜中收之。又有傾入缸內。

以煨石膏末收之者。大抵其漿得

鹹苦。酸辛之物。皆可收斂爾。

性質 甘。鹹。寒。有小毒。

主治 寬中益氣。和脾胃。消腫

滿。下大腸濁氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論豆腐曰。清熱散血。

參攷資料 ①豆腐發腎氣。瘡

疥。頭風。服杏仁可解。(吳瑞) ②豆

腐中毒。以萊菔湯解之。因萊菔入

豆漿中。則腐不成故也。(李時珍)

【豆腐皮】 基本 本品係腐漿

所結之皮。

性質 甘。平。無毒。

主治 養胃滑胎。解毒。及小兒

遍身起羅網蜘蛛瘡。腫癢難忍。煨

灰香油調傅自愈。

配合應用 ①治落頭疽。用鹽

上。蠟子五六隻。腐皮包好。吃完即

愈。(慈惠小兒方)

②治冷嗽。乾豆腐衣燒灰。存性

爲末。熱陳酒調下。吃四五十張。即

愈。(劉羽儀驗方)

③治水鼓脹。陳芭蕉扇去筋。燒

灰。存性五分。干金子去油。微二分

五錢。滑石二分。共爲細末。以腐衣

包。滾水送下。十服愈。(種福堂方)

七畫 角 谷 豆

【豆腐乳】 基本 本品係以豆腐醃過。加酒精。或醬製成者。

古籍別名 菽乳。(綱目拾遺) 性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 養胃調中。

【豆腐沫】 基本 本品係豆腐泔水上所結之浮沫。

主治 鵝掌癬。

參攷資料 鵝掌癬生手掌或足掌。層層剝皮。血內外露。用腐沫熱洗即愈。(趙學敏)

【豆腐泔水】 基本 本品即豆腐所瀝之泔水。

性質 清涼。無毒。

主治 通便下痰。利小便。去垢膩。

【豆腐糲】 基本 本品係腐漿鍋內所結之魚巴。

古籍別名 鍋炙。(綱目拾遺)

製法 晒乾研末入藥。或生搗作丸用。

主治 開胃。消滯。逐積。

配合應用 ①治淋濁補血。有五效丸。用豆腐糲一兩。加川連

一錢。同搗丸。知桐子大。每服五錢。赤帶蜜糖滾水吞下。白帶砂糖湯下。熱淋尿血白湯下。腸風下血陳酒下。又治血風瘡。先將豆腐泔浸洗去醫。以布拭乾。用前末藥。真麻油調搽。乾則再塗三四次。自無不愈也。(活人書方)

②治翻胃。用豆腐鍋把黃色者佳。炒研末。每服三錢。砂糖湯調服。白湯下。

③治痢疾。陳冬米炒。豆腐鍋把二味各等分。為細末。空心白湯調服二三錢。服後宜餓半日自愈。(袖珍方)

【豆腐渣】 基本 本品係製豆腐所剩之渣滓。

古籍別名 雪花菜。(慈航活人書)

採取 以生者入藥良。

主治 療一切惡瘡。無名腫毒。神效。入砂鍋內焙熱。看紅腫處大小。作餅子貼上。冷即更換。以愈為度。

配合應用 ①治大便下血。用不見水豆腐渣炒黃。清茶調服即愈。(古今良方)

②治腫潰疔毒。疔毒爛臭起。生豆腐渣。捏成餅。如疔大小。先用清茶洗淨。絹帛拭乾。然後貼上。以帛經之一日一換。其疔漸小。肉漸平。此效。啓彰親試有效之方也。又可敷脚蛙。又治脚上皮膚生小孔。而皮溼爛者。不藥良方。豆腐渣貼三日即愈。不要落生水。(養素園方)

③治腸風下血。雪花菜。即豆腐渣。用未曾瀝出漿者。帶水鍋內炒燥。為末。每服三錢。紫血塊者。白糖湯下。紅血塊者。砂糖湯下。日三次。雖遠年垂危者。服之神效。(活人書方)

【豆腐漿】 基本 本品係製豆腐時。將黃豆浸胖。磨出之汁。煮熟成漿。而尚未點化成腐者。

性質 甘。微酸。平。無毒。

主治 清咽祛風。解鹽毒。消熱下氣。利便通腸。止淋濁。入銀杏研服。

配合應用 ①治傷寒十日不汗。用末點豆腐漿一大碗。調好白蜜。熱服即出汗。神效。又脚氣腫痛難走者。熱豆腐漿加松香末。搗

勻敷過夜。即可行走。永無後患。(張翊子妙方)

②治大便下血。葶藶一劬。糖牛筋。豆腐漿不沖水者一大碗。待腐漿極熱。搗葶藶汁。乘熱沖入飲之。(古今良方)

③治鹽疔。用豆腐漿點糖少許。日日早服一碗。不間斷。過百日自愈。(救生苦海方)

④治黃痘。每日空心冷吃生豆腐漿一碗。吃四五次。自愈。忌食生蘿蔔。(劉羽儀方)

⑤治痰火吼喘。餡糖二兩。豆腐漿一碗。煮化頓服愈。(經驗廣集方)

⑥治勞及自汗。用黑豆淘淨。磨成腐漿。鍋內熱結成皮。每食一張。用熱黑豆腐漿送下。即效。凡人每日清晨吃黑豆腐漿。大有補益。可以免癆瘵之患。(回生集方)

⑦治肺癆肺痿。用芥菜瀝陳年者。每日將半酒杯沖豆腐漿服。服後胸中一塊必塞。上塞下塞至數次。方能吐出惡膿。日服至愈。

⑧治血崩。生豆腐漿一碗。生韭菜汁半碗。入漿內。空心服一二次。

(不藥良方)

① 治產後并弱症。用頭鍋腐漿一碗。腐皮一張。生雞蛋一個。打碎沖入漿內。再加圓眼肉十四枚。白糖一兩。入漿內滾服。五更空心食。(都文虎傳方)

參攷資料 豆腐漿入陰分。洩火通濁淋。凡淋症用六一散。沖腐漿食最妙。五更沖雞蛋。白糖點服。寧嗽補血。粵人以腐漿煮粥食。名甜漿粥。大能補虛羸。(陳廷慶)

【豆蔻檳榔】 形態 豆蔻檳榔為檳榔之一種。形似雞心。一端尖。一端圓。大如小指。外有包殼。色白如豆。莖形尖如橄欖。長半寸。常多雜於豆蔻中。可供藥用。

【豆蔻檳榔】

形態 豆蔻檳榔為檳榔之一種。形似雞心。一端尖。一端圓。大如小指。外有包殼。色白如豆。莖形尖如橄欖。長半寸。常多雜於豆蔻中。可供藥用。

主治 反胃噎膈。

配合應用 ① 治耳聾灸法。用雞心檳榔一個。將臍內挖一窩。如錢眼大。實以麝香。坐於患耳內。以艾炷灸之。不過三四次即效。(經驗廣集方)

② 治唇耳下腫。豈蔻檳榔為末。吹入立愈。(救生苦海方)

【豆蔻】 即玉竹之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「玉竹」條。

【豆欄草】 即麻黃之日本名。詳「麻黃」條。

【豆蘗】 即大豆卷之古籍別名。典見綱目。詳「大豆卷」條。

【豆蔻】 即草豆蔻之原名。詳「草豆蔻」條。

【豕肉】 即豬肉之原名。詳「豬肉」條。

【豕首】 ① 即天名精之古籍別名。典見本經。詳「天名精」條。② 即牛舌實之古籍別名。典見別錄。詳「牛舌實」條。

【豕首子】 即馬蘭子之古籍別名。典見本經。詳「馬蘭子」條。

【豕椒】 即茛菪椒之古籍別名。典見別錄。詳「茛菪椒」條。

【豕葵】 即菘菘之古籍別名。典見莊子。詳「菘菘」條。

【貝子】 古籍別名 貝齒。(別錄) 貝(日華) 蚌。海。貝(綱目) 貽。朋。支。委。貝。浮。貝。惠。貝。滄。貝。碧。貝。餘。泉。螺。巴。壓。鷲。壓。鷲。螺。海。巴。子。白。海。肥。管。貝。齒。(和漢藥考)

外國名詞 Species of country.

外國名詞 Species of country.

外國名詞 Species of country.

七畫 豆 豕 貝

(英)

基本 屬腹脚類。為貝子之殼。產地 和漢藥考曰。貝子產熱帶之海中。日本之琉球。薩摩。紀伊。八丈島。小笠原島等處。亦多產之。多在海底淺岩礁上。

形態 貝子之形態與種類頗多。小者如豆。大者至三四寸。兩頭狹。一面作球形。一面稍扁平。自左右卷向內方。有一長孔。其左右邊緣。縐刻如齒。外面滑澤。色有白紫黑黃褐等。有美麗白斑。殼質極堅硬。

種類 在陸者曰陸。在水者曰水。其大者曰蚌。其小者曰蛤。色黑者曰玄。色赤者曰貽。黃質白文者曰餘貽。白質黃文者曰餘泉。博而標者曰肥。大而險者曰蠟。小而狹者曰蟻。其狀如赤電。黑雲者曰紫貝。素質紅章者曰珠貝。清池綠文者曰綬貝。黑文黃畫者曰霞貝。

製法 李珣曰。凡入藥燒過用。雷斅曰。凡使勿用花蟲殼。其相似只是無效。貝子以蜜醋相對浸之。蒸過取出。以清酒淘研。

性質 鹹。平。有毒。

主治 目昏。五癆。利水道。鬼疰。蠱毒。腹痛下血。(本經) 溫疰寒熱。解肌散結熱。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論貝子曰。燒研。點目去翳。【唐】甄權藥性本草論貝子曰。傷寒狂熱。【唐】李珣海藥本草論貝子曰。下水氣浮腫。小兒疳蝕吐乳。【明】李時珍本草綱目論貝子曰。治鼻淵。出膿血下痢。男子陰疝。解漏腫。驅諸毒。射罔毒。藥箭毒。

配合應用 ① 治目花腎痛。貝子一兩。燒研如麵。入龍腦少許。點之。若有瘕肉。加真珠末等分。(千金方)

② 治鼻淵膿血。貝子燒研。每生酒服二錢。日三服。

③ 治二便閉格不通。開服。二三日則殺人。以貝齒三枚。甘遂三銖。為末。漿水和服。須臾即通也。(肘後方)

④ 治小便不通。白海肥一對。生一個。燒一個為末。溫酒服。(田氏方)

⑤ 治下疳陰瘡。白海肥三個。煨

七畫 貝

紅研末搽之(簡便方)

治食物中毒貝子一枚。含之自吐(單方)又治漏肺毒麵腫毒及射罔在諸肉中有毒。並用貝子燒研。水調半錢服。亦治中射罔毒(聖惠方)

治藥箭簇毒。貝齒燒研。水服三錢。日三服。(千金方)

參攷資料 ●貝字象形。其中

二點象其齒刺。其下二點象其垂尾。古者貨貝爲寶龜。用爲交易。以二爲朋。今獨雲南用之。呼爲海肥。以一爲庄。四庄爲手。四手爲苗。五苗爲索。(李時珍) ●有刻如魚齒。故曰貝齒。(蘇頌) ●貝子。小白貝也。大如拇指。頂長寸許。背腹皆白。諸貝皆背隆如龜背。腹下兩開相向。有齒刻如魚齒。其中肉如蛎蚌。而有首尾。故魏子才六書精義云。貝介蟲也。背穿而澤。以象天之陽。腹平而垢。以象地之陰。古有相貝。經甚詳。其文云。朱仲受之於琴高。以道會稽太守殿助曰。徑尺之貝。三代之正。瑞璽奇之祕寶。其次則盈尺。狀如赤電黑雲者。謂之紫貝。素質紅章。謂之珠貝。青池綠文。謂

之綬貝。黑文黃畫謂之霞貝。紫貝愈疾。珠貝明目。綬貝消氣障。霞貝服蛆蟲。雖不能延齡增壽。其禦害一也。復有下此者。應暉輝者。但逐溼去水。無奇功也。貝之大者如輪。可以明目。南海貝如珠。礫白。駁性寒味甘。可止水毒。浮貝使人寡慾。勿近婦人。黑白各半是也。潤貝使人善驚。勿近童子。黃唇齒有赤駁。是也。雖貝使人病瘧。黑鼻無皮是也。嚼貝使人胎消。勿示孕婦。赤帶通存是也。惠貝使人善忘。赤熾內殼有赤絡是也。醫貝使童子愚。女人淫。青唇赤鼻是也。碧貝使人盜。脊上有縷勾唇。雨則重。霽則輕。是也。委貝使人惡夜行。能伏鬼魅。百獸赤而中圓。兩則輕。齊則重。是也。(李時珍)

【貝母】 命名 本品根形似聚貝子故名。

處方用名 川貝母。京川貝。

古籍別名 勳母。苦菜。苦花。空草。(別錄) 商(爾雅) 虻。藥實。(綱目) 編笠百合(日本) 蕪。商草。空菜。勳母。勳母。商勳母。母龍精。瓦龍。斑。游冬。蘇母。(和漢藥考) 甜貝母。

(綱目拾遺)

外國名 藥 貝母 (英)

學名 *Fritillaria verticillata*, Willd. var *Thunb. Balc*

基本 屬百合科貝母之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

川貝母以產四川打箭爐、松潘縣

等爲正地道。其餘灌縣、大寧府、雲

南等均可。味甘苦者即以上各處

所產。又有陝西產者。味甘淡而無

苦。藥力不及不甚適用。夏季出新

形 貝母爲宿根草。春季抽

莖。高一二尺。葉作長披針形。對生

二葉至數葉。但亦有互生者。莖頂

更有狹小而尖端卷曲之三葉。夏

季每葉腋間。倒垂碧綠色六瓣花


其狀如編笠。故日俗亦呼爲編笠

百合。根爲球圓形。嫩者如半夏。老

者肥大。如水仙或大蒜根。其片多

肉。相合作圓塊。但不如百合根之

作鱗狀。味甘苦。



貝母

六四二

種類 川產者名川貝。形小而

味淡。浙產者名浙貝。形大而味苦。

即土貝。大貝。貝。本條專指川貝

而言。浙貝另見「貝目」條。

種植 ●氣候宜溫和而略帶

突性者爲佳。若熱溫天氣。皆不

宜。至於土質。以肥沃壤土爲最佳。

砂質壤土。及含有多量之砂礫者

次之。若皆不能得。則易於排水者

亦可。惟於其生長。稍有不適。故氣

候與土質。務求其合宜。否則不但

厚利難獲。即生長亦已難矣。●貝

母之產地甚少。惟四川及浙江之

杭州象山。皆著名之產地也。其他

氣候土質適宜之地方。雖有栽培

亦不甚多。若種類因其產出之地

方而異。例如產於四川者。曰川貝。

產於杭州者。曰浙貝。產於象山者

曰象貝。此外因栽培者少。又不定

栽。亦無專名。僅曰貝母而已。●先

耕起土壤。使之輕鬆細碎。而後築

畦。畦之長短不拘。惟闊以三尺左

右爲準。畦上細碎之土壤。使之平

均。畦平之後。每隔四五寸。以點播

器點穴。穴深二三寸。不可過深。亦

不宜過淺。過深則有不發芽之虞。

過淺則不沒土。恐有外界之刺激。(鳥類之啄食大雨之漂溺)故整地一事亦當留意於此。③畦之整理既已完備。乃可下種。下種時期為五月至九月(夏至後)栽種之法。先以貝母斜置畦上之穴間。後覆以土。覆土以與畦面平齊為度。不可過厚。又不可過薄。(其利害已述之於整地)貝母所以必使其斜置者。豫防霉天時之蒸腐。雨水之積滯。必致枯死而不發芽。故斜置與平置。皆有關於其生長也。其每畝所需之種子量。約四百八十餘斤云。④肥料以羊糞為最佳。若羊糞未得之時。施以人糞尿亦可。惟必多施數次為要。下種之前宜施基肥一次。若土壤肥沃。不施亦可。種後施肥一次。至立春生芽時。再施一次。其後採花除草時。均宜施肥。自下種至收穫。約施肥四五次。總以察其生長之如何。而施之為宜。⑤下種時期。少有早晚。亦無甚妨礙。然下種雖有早晚。必至冬至。始能生根。至次年春則發芽。芽出土面。謂之苗。每株生二苗。一由於根以上之基部而生。一則在

七畫 貝

根以下而生。如是生長至春分時。始盛開花。既開之後。當即採去。以使其養分不致浪費。而後可得良大之塊根。若任其生長。而不採去。則塊根之養分。必為花所吸奪。以致結根不良。且其所結者亦甚小也。⑥花既能吸奪其養分。而近旁之雜草。其吸奪養分更甚。故有除草之必要。除草之次數及時期。均不一定。如草之生長已盛。雖時期未至。亦不可不免除。否則貝母之養分。必為所吸盡。遂有枯死之患。故當視其雜草之生長如何而除之。為佳。且動除雜草。決無害而有利也。⑦自下種後。至翌年秋。始達收穫之期。然其收穫之多寡。有關於收穫之早晚。若過其收穫之期而掘取之。不但不能增其收量。而反有減少之虞。每百斤約減五斤。若幾達收穫之期而掘取之。則有收量可增(每百斤約增三四斤)故遲收不如早收。然過早過遲。究不相宜。蓋作物固有之通性。在未達黃熟期以前。其養分尚未十分充足。一達黃熟期以後。則其養分漸漸減少也。至收穫之法。用短柄小

把掘掘之。掘掘之時。當留意不可掘碎為要。既掘之後。置日中曝之可也。⑧若實於藥舖者。曝日中三四日已足。過乾則減輕其重量。得價必少。若供種子用者。宜多曝數日。恐其腐爛也。曝乾之後。用木製桶。桶置以燥氣。上置貝母。既滿。仍覆以燥葉。而後乃閉桶蓋於上。再過幾日。仍曝日中。如是以至播種。不可或忽。⑨每畝收穫之量。佳者可得九百六十餘斤。九百斤者。次之。八百餘斤者。為最下。其價視品質之良否而不同。川貝最貴。象貝次之。浙貝為最賤。且其市價。又不一律。有時每百斤值洋十餘元。有時至數十元不等。

採取 八月十月間採根曝乾。

製法 雷啟曰。凡使貝母。先於柳木炭中炮黃。劈去內口鼻中有米許大者。心一顆。後并糯米於鐵上同炒。待米黃去米用。集效方治憂鬱不伸。薑汁炒去心。救急易方。孕婦咳嗽。去心。蘇炒黃為末。

性質 辛。平。無毒。

成分 含有一種有機鹼質。名曰 Trillarin, 其化學分子式

為 C12H17NO。

效驗 潤肺。清火。解鬱。專作祛痰鎮靜藥。用於諸種咳嗽。妊娠原因不明之咳嗽。尤適為緩和之藥劑。此外有用於煎物與毒蟲之刺傷。及急性枝氣管炎。

作用 在胃不起作用。至腸即漸次被腸壁吸入血中。使白血球進行迅速。且由末梢神經受激而達腦神經。則中樞神經奮興。呼吸深速。積極。痰易驅出。同時又使肺臟分泌減少。可免多量痰沫之釀成。

主治 傷寒煩熱淋瀝。邪氣疝瘕。喉痺乳難。金瘡風痺(本經)瘰癧中結實。心下滿。洗洗惡風寒。目眩項直。咳嗽上氣。止煩熱渴出汗。安五臟。利骨節。(別錄)

張仲景之發明 貝母一味。經張仲景之實驗。認為『主治胸膈鬱結痰飲』。如桔梗白散證曰。時出濁唾腥臭。久久吐膿。用貝母三分。仲景氏用貝母。特此一方已。然考之本草。古人用貝母。主治鬱結痰飲。旁治咳嗽乳汁不下也。乃與仲景氏治濁唾腥臭其歸一也。

六四三

七畫 貝

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論貝母曰服之不
饑斷穀【唐】甄權藥性本草論貝
母曰主胸脇逆氣時疾黃疸研末
點目去腐腎以七枚作末酒服治
產難及胞衣不出與連翹同服主
項下瘤癭疾【宋】大明諸家本草
論貝母曰消痰潤心肺末和沙糖
丸含止嗽燒灰油調傳人畜惡瘡
飲瘡口【明】繆希雍本草經疏論
貝母曰貝母味辛平別錄兼苦微
寒無毒入手太陰少陰肺有熱因
而生痰或為熱邪所干喘嗽煩悶
必此主之其主傷寒煩熱者辛寒
兼苦能解除煩熱故也淋瀝者小
腸有熱也心與小腸為表裏清心
家之煩熱則小腸之熱亦解矣邪
氣者邪熱也辛以散結苦以泄邪
寒以折熱故主邪氣也經曰一陰
一陽結為喉痺一陰者少陰君火
也一陽者少陽相火也解少陰少
陽之熱除胸中煩熱則喉痺自愈
矣乳難者足厥陰足陽明之氣結
滯而不通辛能散結氣通其結滯
則乳難自瘳熱解則血涼血涼則
不痛故主金瘡熱則生風故主風

濕別錄又療腹中結實心下滿洗
洗惡風寒者肺主皮毛也目眩者
熱上攻也項直即風痙也咳嗽上
氣氣上逆也煩熱渴邪不解汗不
出者邪熱盛也其性專能散結除
熱則上來諸證皆自愈矣病去則
五臟自安骨髓自利也【明】李士
材本草圖解論貝母曰貝母味苦
微寒主煩熱心下滿潤肺消燥痰
散項下癭瘰傳惡瘡收口俗以半
夏有毒用貝母代之不知貝母寒
潤治肺家燥痰之藥半夏溫燥治
脾胃溼痰之藥兩者天淵何可代
乎去心同糯米炒米熟為度去米
用【清】黃宮樞本草求真論貝母
曰貝母辛苦微寒世多用為治痰
之藥殊不知痰有因燥因溼之不
同如果肺因火刑水飲不化鬱而
為痰此痰因於燥者也脾胃虛寒
水飲停滯壅而不通此痰因於溼
者也因於燥者非用苦以消火辛
以散鬱寒以折熱莫治因於溼者
非用辛以散寒溫以燥溼莫投貝
母味苦而辛其性微寒上於心肺
燥鬱痰食壅盛及虛勞煩熱肺痿
肺癰喉痺咯血吐血目眩淋瀝

瘡乳閉難產惡瘡不斂等症服之
卒能有效若使因於脾虛而見咳
嗽不寧混以貝母妄伐其失遠矣
蓋一宜半夏一宜貝母况半夏兼
治脾胃貝母獨清肺金半夏用其
辛貝母用其苦半夏用其溫貝母
用其涼半夏性速貝母性緩半夏
散寒貝母清熱氣味陰陽大有不
同彼此誤投為害不淺大者為土
貝母大苦大寒清解之功居多小
者川貝母味甘微寒滋潤脾於清
解不可不辨川產開瓣者良獨瓣
不堪入藥去心米拌炒用【清】鄒
澍本經疏證論貝母曰貝母者治
涎唾之藥也惟心胸間聚涎唾斯
陰不下降而傷寒有煩熱淋瀝之
候咽噎間聚涎唾斯有邪氣者腸
難上達而有喉痺之候不化血歸
衝而有乳難之候疝瘕者涎唾自
心胸阻任脈之行也風痙者涎唾
聚心胸督脈不得陰以瀉散也惟
金瘡則無與於涎唾然血出既多
陰匿而無以續氣聚而不及化則
反鬱結於心胸間為涎為唾者有
之矣主以貝母使之速化化則能
變而赤也或曰涎唾二字在金匱

六四四

要略則曰多唾口燥在千金方則
曰涎唾多心中溫溫液液而說文
玉篇廣韻皆謂為口液則金匱千
金所指當在口中之液又烏得聚
心胸間縱使聚心胸間矣其與痰
飲水氣何異而金匱肺痿肺癰咳
嗽上氣篇痰飲篇咸不用貝母何
也曰口之液固生於口中即貯於
口中者歟抑亦分夫輸脾歸肺之
津而上以滋於口者也生於口而
即貯口決無之理則其生也捨心
胸間更在何處惟其不隨氣以薰
膚充身澤毛不為液以注於骨使
骨節屈伸潤澤不為津使腠理發
洩汗出溼溼不變為赤而入於中
以周行經脈此所以為陰鬱此所
以為陽不化耳痰飲水氣則與是
異蓋皆劫水之未化者為之其被
火燥而稠者謂之痰其過窪則停
而稀者謂之飲其漫無拘束而隨
處浸淫者謂之水氣與涎唾屬已
為肺化而不宜布者自迥不相侔
如之何可以肺痿痰飲等篇之治
梅貝母之用耶未化之水宜化故
其治法近外則散著裏即溫稍下
則利已化之水宜分恐因其津竭

而透及其精微。此貝母之開解。體結正。以使其清者歸清。濁者歸濁。隨清而不留濁。去濁而不傷清。試證以自散之治。是護其清者。不使巴豆劫燥無餘也。當歸貝母苦葶丸之治。是分其濁者。隨苦葶而洩入於下也。

辨偽 鄭育巖曰。川貝母偽名魯貝。粒扁洗後皮脫。其粉即出。按貝母惟川蜀出者為佳。其子在根下。內心外瓣。其色帶白。如聚貝子。故名貝母。蓋色白味辛。生於西川。故屬肺金之藥。浙貝尚不可混用。况魯貝乎。更有一種名西珠貝。母係山慈菰偽充。又有一種偽貨名西貝。其性不能潤肺化痰。更相反也。曹炳章曰。按川貝。四川瀘縣產者。底平頭尖。肉白光潔而堅。味微苦兼甘。為最佳。平瀘縣產者。粒圍寬略鬆。頭微尖。肉色白而無神。味亦微苦兼甘。亦佳。敘富產者。顆大而扁。肉白黃色。質鬆味淡。為次。魯京州大白山松盤等處產者。曰魯京川。黃白色頭尖。亦次。湖北荊州巴東縣產者。皮色帶黑。性硬而光。頭尖。肉呆白色。味苦。更次。陝

七畫 貝

西新開山產者。曰西貝。或名尖貝。顯扁頭尖。味甚苦。更不道地。鄭君所云。或指此種。然非山慈菰偽充。所云珠貝者。即小象貝也。蓋川貝中有獨顯不分瓣。不作二瓣合抱。皮無皺者。名單龍精。宜揀去之。誤服令人筋脈不收。惟用黃精小藍汁可解之。鄭育巖曰。川貝粉今人肺燥咳嗽。每以川貝粉蒸梨。亦清潤單方也。詎料射利藥肆。研便之川貝粉。率以懷山藥研粉偽充。雖山藥無毒。其奈有外邪未罷者。服之則留邪黏痰難出者。服之則助痰。為害匪淺。如用川貝粉。須當面看其研末。方無此弊。曹炳章曰。按項元麟云。川貝粉。市者以象貝漂洗代之。或以小山藥。天花粉偽充。余謂未必皆是。此屬少數。市侖味良之行為。非可指普通而言如此也。

近人學說 張山雷曰。川產之貝母。今人恒視為貴重之品。每以為功用必在象貝之上。然考古書。竟無川產之說。則古人本不以川貝為珍品。且貝母之為用雖多。約言之。僅苦寒泄降而已。川產不

苦而淡。已失貝母之作用。後人強以甘字加之。乃市肆所售之物。其甘又復何在。惟趙氏拾遺引用藥識。微有龍安所產一種。稱其皮細白而帶黃斑。其味甘。謂為川貝中之第一。不可多得。則雖有此甘味之一種。而非普通之品。既不可恒有。亦必不能恒用。復何所取。義而尊之重之。但以今時臨證所得之川貝。功力言之。其效力固遠在象貝之下。雖曰虛人痰咳。不宜象貝之苦澀。然用川貝。其功效亦不可見。而世俗珍之者。徒以價值漸昂。以耳為目。作坡公想當然之意見。耳。石頑雖謂川產味甘最佳。而今則甘者既未得見。即佳處自不可知。豈從前有此味甘之佳品。而市肆所售之非其真耶。抑石頑亦不過過人云亦云。非其真知灼見耶。果其所謂佳者。即是今日通行之品。則前人雖有補肺一說。亦不過徒付之想像而已。惟嬰兒肺熱痰嗽。不肯飲味苦氣烈之藥者。則以川貝研末。拌冰糖粉飼之。取其無氣無味。不為嬰兒所拒絕。此則無法之法。不藥之藥。亦尚覺其差有效

力。然較之用象貝者。功效之遲。亦自鑿鑿有據。此最岳所以有功力頗緩。用須加倍之說。則何如投以象貝。而價廉物美。一舉兩得之為愈乎。又曰貝母之與半夏。俗醫恒以為通用之藥。一見咳嗽有痰。往往互相更換。顧雜亂投。實則一偏一潤。一以健脾。一以清肺。各有一長。豈容相混。汪石山已謂俗以中夏有毒。代以貝母。不知貝母主肺家之火。半夏主脾胃之濕。何可相代。若虛勞咳嗽吐血咯血。肺痿肺癰。婦人乳癰。及癰疽諸變之證。半夏燥。以貝母為嚮導可也。若脾胃溼熱生痰。因而氣逆上凌。豈貝母所能代乎。張景岳亦謂半夏貝母。俱治痰嗽。但半夏兼治脾肺。貝母獨善清金。半夏用其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏散寒。貝母清熱。性味陰陽。大有不同。俗以代用。其謬執甚。繆仲醇亦謂寒痰溼痰。非貝母可治。李士材又謂腎虛水泛成痰。非貝母所司。而石頑亦謂貝母寒潤。治肺家燥痰。半夏性燥。治脾胃溼痰。二者天淵。何可混用。諸說皆最明晰。辨

六四五

之極細。惟虛勞咳嗽一證。如其邪熱甚熾。消燬肺金。貝母清降。固猶可用。若其陰虛火動。象貝苦寒。已宜相度。其火熾之盛衰。而與為消息進退。不得恣肆過劑。以戕生氣。如至虛甚。則不獨象貝苦降。非所宜投。即以川貝之淡。亦舍寒潤之性。傷中敗脾。當知顧慮。弗謂川貝甘能補肺。一往無前。死而後已也。彼夫專以二母二冬之類。加減出入。以治勞損咳嗽者。則專以殺人為天職。前已論之。茲勿重贅。考貝母之名。自瀨湖綱目以前。尚無川象之分。景岳之本草正。則已於貝母之外。別出土貝母一條。至石頑逢原。則曰川者味甘最佳。西者味薄次之。象山者味苦又次之。一種大而苦者。僅能解毒。象山貝母之名。始見於此。然據其所言。以一種大者特提。即景岳之所謂土貝母也。頗似石頑之所稱川者。西者象山者。皆不如土貝母之大。然今則市肆通行。象貝土貝大貝。其形皆大。絕不與川貝相類矣。趙氏拾遺。又引百草鏡曰。出川者曰川貝。有一種出巴東者。獨大。出陝西者名

西貝。又號大貝。且川中更有大者一種。搗粉作漿。不入藥用。則皆土貝之類矣。然則川產之小者為一種。而各處及象山所產者為一種。不必於象貝之外。更別立一土貝母之名矣。茲故不復以象貝土貝分晰云。象貝之用。世恒以為消痰止咳。輔佐之品。司空見慣。往往視為無足輕重。不知降氣化痰。且能除熱解結。其力頗猛。抑且破堅消核。治癰腫癩瘍。痰核。其效甚速。則其性之峻利。尤可想見。故用之得當。其功奇捷。而用之過劑。為害亦巨。且苦寒泄降。無不傷脾敗胃。而人多忽之。亦不可不察者也。黃勞逸曰。貝母為化痰藥。其化痰之藥理。全在收斂微血管。使支氣管壁之分泌減少。則痰自稀。痰稀則款自愈。(咳嗽本為驅痰外出之救濟作用) 惟咳嗽重者。宜用麻酔劑。非貝母所能勝任矣。貝母之治出血。亦在收斂作用。而近世醫工多不取用。蓋古義浸失矣。寒實結胸。徐靈胎云。即痰飲。痰飲之主證。為咳嗽吐痰氣喘。雖與結胸不伴。然該方用桔貝以化痰。巴豆以

平喘。(按巴豆能使腸部蠕動亢進。分泌加多。引起下部之充血。下部臟器充血。上部血勢勢必減少。而神經之感覺力。亦因以遲鈍。喘乃得止) 對於痰飲。確屬相宜。人謂「仲景方書症用之輒效」。觀於此而益信矣。白芷為麻醉藥。貝母為化痰藥。二味相合。功能止痛消腫。故水類鈴方用治便癰腫痛也。
配合應用 ①治陽明斑疹初發。壯熱喘嗽。有痰。不得眠。即本經所謂傷寒煩熱邪氣。用貝母。知母。前胡。葛根。麥冬。甘草。
②治痰癩。用貝母。橘皮。前胡。石青。知母。麥門冬。竹瀝。
③治肺熱咳嗽。及胸中煩熱。用貝母。知母。天麥門冬。桑白皮。枇杷葉。百部。桔梗。甘草。
④治一切熱毒。消一切癰疽。貝母。生甘菊。紫花地丁。金銀花。白及。白欬。鼠黏子。甘草。夏枯草。
⑤治風癩。貝母。鼠黏子。玄參。桔梗根。白僵蠶。甘草。桔梗。
⑥消一切結核。乳癰。瘰癧。貝母。雙金。橘葉。連翹。桔梗根。鼠黏子。夏枯草。山茨菇。山豆根。玄參。

①治肺熱吐血。貝母。百部。百合。忍冬仁。麥冬。蘇子。雙金。童便。竹瀝。魚腥草。
②同香降香。鬱金。橘紅。遠志。蘇梗。蘇子。香附。白豆蔻。開鬱痰。加撫芎。神麴。并解一切氣鬱。
③治憂鬱不伸。胸膈不寬。貝母。去心。薑汁炒研。薑汁糊丸。每次七十九丸。征士鎮甲煎湯下。(集效方)
④治化痰降氣。止咳解鬱。消食除脹。有奇效。用貝母。去心。一兩。薑製厚朴。半兩。蜜丸。梧子大。每白湯下五十九丸。(邵筆華雜興方)
⑤治小兒哮喘。百日內咳嗽痰壅。貝母五錢。甘草。中生。炙二錢。為末。沙糖丸。茨子大。每米飲化下一丸。(全幼心鑑方)
⑥治孕婦咳嗽。貝母。去心。麸炒。黃芩。末。沙糖拌丸。茨子大。每含嚙一丸。神驗。(急救方)
⑦治妊娠尿難。飲食如故。用貝母。苦參。各歸四兩。為末。蜜丸。小豆大。每飲服三九至十九丸。(金匱方)
⑧治乳汁不下。二母散。貝母。知母。牡蠣粉。等分為細末。每猪蹄湯

調服二錢。此祖傳方也。(王海藏湯液本草方)

①治冷淚目昏。貝母一枚。胡椒七粒。爲末點之。(儒門事親方)

②治目生努肉。貝母、真丹等分爲末。日點。(肘後方)又用貝母、丁香等分爲末。乳汁調點。(摘方)

③治吐血不止。貝母炮研。溫漿水服二錢。亦治鼻衄。(聖惠方)

④治小兒鵝口。滿口白爛。貝母去心爲末。半錢。水五分。蜜少許。煎三服。繳淨抹之。日四五度。(聖惠方)

⑤治吹奶作疔。貝母末吹鼻中大效。(危氏得效方)

⑥治乳癰初腫。貝母末酒服二錢。仍令人吮之即通。(楊仁齋直指方)

⑦治便癢腫痛。貝母、白芷等分爲末。酒調服。或酒煎服。以滓貼之。(永類鈴方)

⑧治紫白癩斑。貝母、南星等分爲末。生薑帶汁擦之。又用貝母、乾薑等分爲末。如溲豆。入密室中浴擦。得汗爲妙。(德生堂方)又以生薑擦動。隨磨貝母塗之。(談藝翁

方)又用貝母、百部等分爲末。自然薑汁調。(聖惠方)

⑨治蜘蛛咬傷。縛定咬處。勿使毒行。以貝母末酒服半兩。至醉良久。酒化爲水。自瘡口出。水盡仍塞瘡口甚妙。亦治蛇蟻咬傷。(楊仁齋直指方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。及有溼痰者禁用。羅桃花。畏秦艽。莽草。礬石。反烏頭。厚朴。白薇。爲之使。

參攷資料 ①貝母治惡瘡。唐人記其事云。江左皆有商人。左膺上有瘡。如人面。亦無他苦。商人戲以酒滴口中。其面赤色。以物食之。亦能食。多則膺內肉脹起。或不食。則一臂痺焉。有名醫。致其歷試。諸藥。金石草木之類。悉無所苦。至貝母。其瘡乃聚眉閉目。商人喜。因以小葦筒毀其口。灌之。數日成痂。遂愈。然不知何疾也。本經主金瘡。此豈金瘡之類與。(蘇頌) ②詩云。首采其商。卽此一作商。謂根狀如蚕也。苦菜。藥實。與野苦蕒。黃藥子同名。李時珍。 ③其葉似大蒜。四月蒸熟時採之。良。若十月苗根枯。亦

不佳也。出潤州。荊州。襄州者最佳。江南諸州亦有。(蘇恭) ④今河中江陵府。鄖陽。隨。鄖。蔡。涇。泗。州皆有之。二月生苗。莖細青色。葉亦青似蕎麥。隨苗出。七月開花。碧綠色。形如鼓子花。八月採根。根有瓣。子黃白色。如聚貝子。此有數種。陸機詩。疏云。商。貝母也。葉如栝樓。而細小。其子在根下。如芋。子正白。四方相連。累着有分解。今近道出者。正類此。郭璞注爾雅。言白花。葉似韭。此種罕復見之。(蘇頌) ⑤貝母中有獨顯團。不作兩片無瓣者。號曰丹龍精。不入藥用。誤服令人筋脈永不收。惟以黃精小藍汁服之立解。(雷斅) ⑥半夏。貝母。俱治痰嗽。但半夏兼治脾肺。貝母獨善清金。半夏用其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏性速。貝母性緩。半夏散寒。貝母清熱。性味陰陽大有不同。俗有代用者。其謬執甚。(張景岳) ⑦象貝。治時感風痰。土貝。治外科痰毒。大者爲土貝。母。大苦大寒。清解之功居多。象貝亦土貝之一種。小者爲川貝。母。微苦微寒。滋潤勝於清解。(失名)

【貝甲】 古籍別名 貝香。(和漢藥考)

基本 扇腹脚類田螺之屬。形態 爲黃褐色圓形之薄片。上有輪紋。效能 有利尿作用。又將貝甲投火中。能發一種芳香。故亦用以配合香藥。

【貝石】 卽雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雲母」條。

【貝汞】 卽水銀之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水銀」條。

【貝香】 卽貝甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝甲」條。

【貝商】 卽貝子之古籍別名。典見別錄。詳「貝子」條。

【赤女腸】 產地 生山野深谷中。

形態 赤女腸爲雜草類之一種。乃白女腸之色赤者。可供藥用。性質 辛溫無毒。

主治 洩痢腸瀉。燥心痛。破疔瘻。與白女腸同。

七畫 貝 赤

七畫 赤

處方用名 杜赤豆。野赤豆。
古籍別名 赤豆(蘇恭)紅豆。
(俗名)苔。葉名蠶(廣雅)豬肝赤。
外國名詞 Red Bean (英)
基本 屬豆科。為赤小豆之種子。

形態 赤小豆為一年生草本。莖高二尺餘。葉為複葉。由小葉三片所成。小葉形卵圓。末端帶尖。有時有極淺之三裂。花生於葉腋。色黃。形如蝴蝶。果實為細長之莢。果中藏紅色之種子。即赤小豆也。其品類頗多。一如大豆。



赤小豆

種植 農家恒以栽種。充為雜糧。每年於夏至後下種。

採取 秋季採果。蒸乾。

製法 金匱方曰。赤小豆浸令芽出。曝乾。用和漢藥考曰。取新鮮者微炒。或生用。

性質 甘酸。平。無毒。
成分 赤小豆藥效之成分未

詳。於營養上分析之。含窒素物一八·五五。無窒素物五七·七二。脂肪〇·八九。木纖維八·八〇。水分一三·一〇。灰分二·九四。效能 清溼熱。排膿毒。用作利水藥及腫瘍藥。

主治 下水腫。排癰腫膿血。(本經)療寒熱。熱中消渴。止洩痢。利小便。下腹脹滿。吐逆卒辟。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權

藥性本草論赤小豆曰。治熱毒。散惡血。除煩滿。通氣。健脾。胃。令人美食。搗末同雞子白塗。一切熱毒癰腫。麥汁洗小兒黃爛瘡。不過三度。【唐】陳士良食性本草論赤小豆曰。積氣行風。堅筋骨。抽肌肉。久食瘦人。【唐】孟詵食療本草論赤小豆曰。散氣。去關節煩熱。令人心孔開。暴病後氣滿不能食者。煮食一頓即愈。與鯉魚煮食。甚治脚氣。【宋】大明日華諸家本草論赤小豆曰。解小麥熱毒。煮汁解酒病。解衣黏縷。【明】李時珍本草綱目論赤小豆曰。辟濕疫。治產難。下胞衣。通乳汁。和鯉魚鱖魚鱒魚黃雌雞

煮食。並能利水消腫。【明】繆希雍本草經疏論赤小豆曰。赤小豆味甘酸。氣平無毒。然詳其用。味應有辛。非辛平則不能排癰腫膿血。及療寒熱熱中消渴也。凡水腫脹滿。洩瀉。皆溼氣傷脾所致。小豆健脾燥溼。故主下水腫脹滿。止洩利小便也。十劑云。燥可去溼。赤小豆之屬是矣。吐逆者。氣逆上升也。卒辟者。大腸溼熱也。甘酸斂逆氣。辛平散溼熱。故亦主之。【清】黃宮繡本

草求真論赤小豆曰。赤小豆甘酸。色赤。心之穀也。其性下行。入陰適小腸。而利有形之病。故與桑白皮同為利水除溼之劑。是以水氣內停。而見溺閉腹腫。手足攣痺。癰腫瘡疽。非此莫治。且能止溼解酒。通胎下乳。至十劑取此為燥。亦以水行而燥自生之意。並非因其藥性本燥而言也。故書又戒多服。則令人津液枯槁而燥。取緊小而赤黯色者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論赤小豆曰。赤豆甘平補心脾。行水消腫。化毒排膿。多食耗液。蛇敵者百日內忌之。以緊小而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色

六四八

者止為食用。故本草以赤小豆名之。後人以廣產木牛紅牛黑之相。思子亦有紅豆之名。遂致誤用。亦猶黑大豆有緊小為雄。一貫而味者。為馬料豆也。

辨偽 鄭育巖曰。赤豆出江淮間。今關西河北汴洛皆有。入藥以緊小赤黯者為良。氣味甘酸平無毒。主下水腫。排癰腫膿血。今藥肆中有一種赤黑相間者。聞是相思子。每以偽充赤小豆。其謬已甚。

夫既名為豆。豈可於五穀外求之耶。曹炳章曰。按赤豆。浙江慈谿餘姚。蒼山。蔚山。近沙地皆產之。粒小細長如腰子。紫紅色。腰間有白紋如鳳眼。名杜赤豆。入藥能利小便。泄血分之溼熱。為最道地。又一種色紅赤。粒大圓形。比黃豆略小。名紅飯豆。各處皆出。僅供食品。不入藥用。又一種名海紅豆。出海南。其子大而扁。今人亦誤作赤小豆。誠大謬矣。半紅半黑者。名相思子。俗呼赤小豆。屬木本植物。與梅冰性相合。能令香不耗散。故近今梅冰中多拌有此物。服食須知。云相思子出嶺南。樹高丈餘。白色。其葉

似槐。其花似皂莢。其莢似扁豆。其子似赤小豆。惟半截紅半截黑爲異。今廣東擔子上。以線綴成串。或作首飾以貨之。其性味苦平。有小毒。能吐人。及治貓鬼夜道病。俗又呼爲雲南豆子。又能治蠱毒。除一切蟲。搜神記云。大夫韓憑妻美。宋康王奪之。憑自殺。妻投之壑。下死。王怒。令塚相望。宿昔有文梓木生二塚之端。根交於下。枝錯其上。康王哀之。因毀相思子。此說段公路北戶錄亦載之。

近人學說 郭可則曰。赤小豆爲二種同名之藥。主治迥別。有辨之者。借弗明也。其一種爲菽類。卽本經中品所載。氣味甘酸平無毒。主下水腫。排癰腫膿血者。今稱之爲杜赤豆。以示別也。然醫者仍多用赤小豆之舊名。其一種爲非菽類。半紅半黑。俗名蟹眼豆。時珍謂爲苦平。有小毒。吐人。研服卽當吐。名之曰相思子。列之於木類。而藥肆中則以赤小豆名之。吳鞠通辨焉而未考也。反謂此種不入藥。未免過甚。余考此二種。蓋在古同名。而以味別。如杏仁栝樞之以甜苦

分類是也。不親夫傷寒經方藥味下之註乎。其於瓜蒂散中之赤小豆。則註曰酸溫。其於麻黃連軻赤小豆湯中。則下註曰甘平。卽此可知其爲二種同名。而以味別無疑。其酸溫而與瓜蒂散同爲吐劑者。俗稱蟹眼豆是也。時珍以爲相思子誤也。相思之形如扁豆子。純赤無雜色。出常熟。其甘平而與麻黃連軻同爲清溼之方者。今之稱爲杜赤豆是也。二方之治療服法。列若天淵。卽二種之性味主治。示如指掌者也。自成氏而後。註傷寒家刪去此註。以至千餘年。皆以赤小豆爲一種。反以蟹眼豆爲不入藥。卽吐劑如瓜蒂散之赤小豆。亦且註爲菽類。牽強附會。與治療實相悖。其所以致誤之由。實以本經赤小豆。味兼甘酸。而藥肆所用蟹眼豆。時珍又稱苦平。一似傷寒方中藥下所註爲贅疣。故置而不論。刪而去之。徒以本經爲敷衍。斯不求於有。而求於無。不知甘與酸。雖本經並舉。而溫與平。則傷寒獨異。且菽類之赤小豆。其味實甘。當歸赤小豆散。下血用之。所以補統血之

臟。本經稱酸者。衍文也。而釋經之家。乃有生則酸。熱則甘平。其望文生義。強辭奪理。可晒如斯。若非菽類之赤小豆。味實酸澁。時珍所稱苦平者。未當也。蓋時珍於酸苦。每不能別。如芍藥本經稱爲苦。而時珍誤爲酸之類。然酸苦總主湧泄。斷無甘平而名爲吐劑者。此可證明經方中之赤小豆。實爲二種同名。以二物爲一物。既拘於名。而不知其用。以蟹眼豆爲相思子。又強爲合。而不知其誤。蟹眼豆入藥。相思子原不入藥也。以僞傳僞。欲求其真。惡可得乎。故特拈出而矯正之。

配合應用 治溼氣痺腫。赤小豆和桑根白皮煮食。(陳藏器本草方)

治脚氣。赤小豆和鯉魚煮食。(孟詵食療方)

治熱毒癰腫。赤小豆爲末。雞子白調塗。(甄權藥性方)

治脚氣。以袋盛此豆。置足下。朝夕展轉踐踏之。(蘇頌圖經方)

治水氣腫脹。用赤小豆五合。大蒜一握。生薑五錢。商陸根一條。並碎破。同水煮爛。去藥空心食豆。旋旋吸汁令盡。腫立消也。(蘇頌)

又治水腫。從脚起入腹。則殺人。赤小豆一斗。煮極爛。取汁五升。溫漬足膝。若已入腹。但食小豆。勿雜食。亦愈。(韋宙獨行方)

治水腫。以東行花染枝。燒灰一升。淋汁煮赤小豆一升。以代飯良。(梅師方)

治水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。用赤小豆三升。白茅根一握。水煮食。以消爲度。(肘後方)

辟穢瘴疫。正月朔旦及十五日。以赤小豆二十七枚。麻子七枚。投井中。辟瘴疫甚效。又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中。三日取出。男吞七粒。女吞二七枚。竟年無病也。(五行書)

治辟厭疾病。正月元旦。面東。以鹽水吞赤小豆三七枚。一年無諸疾。又七月立秋日。面西。以井華水吞赤小豆七枚。一秋不犯痢疾。

治下部卒痛如鳥喙之狀。用小豆大豆各一升。蒸熟。作二蓬更互坐之。卽止。(肘後方)

治水穀痢疾。小豆一合。鑊蠟

七畫 赤

七靈 赤

三兩。頓服取效。(必效方)

①治熱毒下血。或因食熱物發。赤小豆末。水服方寸匕。(梅師方)

②腸痔下血。小豆三升。苦酒五升。煮熟。日乾。再浸。至酒盡乃止。為末。酒服一錢。日三服。(肘後方)

③治舌上出血。如管孔。小豆一升。杵碎。水三升和。絞汁服。(肘後方)

④治熱淋血淋。不拘男女。用赤小豆三合。慢炒為末。煨葱一莖。搗酒熱調二錢服。(修真秘旨方)

⑤治重舌。口赤。小豆末。醋和塗之。(普濟方)

⑥治小兒不語。四五歲不語者。赤小豆末酒和敷舌下。(千金方)

⑦治牙齒疼痛。紅豆末擦牙吐涎。及吹鼻中。一方入銅青少許。一方入花鹼少許。(家寶方)

⑧治中酒嘔逆。赤小豆黃汁。徐徐服之。(食鑑本草方)

⑨治類致墮胎。赤小豆研末酒服方寸匕。日二服。又治妊娠行經。(千金方)

⑩治婦人難產。用赤小豆生吞

七枚佳。(產寶方) 又治難產。日久氣乏。用赤小豆一升。以水九升。煮取汁入炙過黃明膠一兩。同煎少時。一服五合。不過三四服即產。(集驗方)

①治胞衣不下。用赤小豆男七枚。女二七枚。東流水吞服之。(救急方)

②治產後目閉心悶。赤小豆生研。用東流水服方寸匕。不達更服。(肘後方)

③治產後腸滿不能食。用赤小豆二七枚。燒研。冷水頓佳。(千金方)

④治乳汁不通。赤小豆黃汁飲之。(產寶方)

⑤治婦人吹奶。赤小豆酒研溫服。以淨敷之。(脂氏方)

⑥治婦人乳腫。小豆莖草等分為末。苦酒和敷佳。(梅師方)

⑦治癰疽初作。赤小豆末。水和塗之。毒即消散。頗用有效。(小品方)

⑧治石癰諸癰。赤小豆五合。納苦酒中五宿。炒研。以苦酒和塗即消。加括樓根等分。(范汪方)

①治痘後癰毒。赤小豆末。雞子白調塗敷之。

②治題頰熱腫。赤小豆末和蜜塗之。一夜即消。或加芙蓉葉末尤妙。

③治丹毒如火。赤小豆研末和雞子白時時塗之。不已。逐手即消。(小品方)

④治風癢癰癩。赤小豆。荊芥穗等分為末。雞子青調塗之。

⑤治金瘡煩滿。赤小豆一升。苦酒浸一日。熬燥。再浸滿三日。令黑色。為末。每服方寸匕。日三服。(千金方)

⑥治六畜肉毒。小豆一升。燒研。水服正方寸匕。神效。(千金方)

⑦治六畜肉毒。小豆一升。燒研。水服正方寸匕。神效。(千金方)

⑧治六畜肉毒。小豆一升。燒研。水服正方寸匕。神效。(千金方)

⑨治六畜肉毒。小豆一升。燒研。水服正方寸匕。神效。(千金方)

六五〇

湯七合。煮作稀糜。去滓取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

①赤小豆當歸散。治傷寒。感病者。脈數無熱。微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眇黑。若能食者。膿已成也。此

湯主之。並治下血。先血後便。此近血也。亦主之。赤小豆三升。漫令芽出。曝乾。當歸上二味。杵為散。漿水服方寸匕。日三服。

②麻黃連軀赤小豆湯。治傷寒。熱在裏。身必發黃。此湯主之。(傷寒論方) 麻黃二兩(去節) 連軀二兩 赤小豆一升 杏仁四十粒 甘草二兩 生梓白皮一升 生薑二兩 大棗十二枚 上以潦一斗。先煮麻黃去沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

③按陳自明婦人良方云。予婦食素。產後七日。乳脈不行。服藥無效。偶得赤小豆一升。煮粥食之。當夜遂行。因閱本草。載此漫記之。又朱氏集驗方云。宋仁宗在東宮時。患疳。命道士贊寧治之。取小豆七七粒。為末。傅之。而愈。中貴人任承亮後患疳。近死。

④瓜蒂散。治太陽病。胸中痞硬。氣上沖。胸不得息。此胸中有寒也。又或手足厥冷。脈乍緊。心中煩滿。不能食。病在胸中。並當吐之。(傷寒論方) 瓜蒂(熬) 赤小豆各一分。各別搗篩為散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱

湯七合。煮作稀糜。去滓取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

①赤小豆當歸散。治傷寒。感病者。脈數無熱。微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眇黑。若能食者。膿已成也。此湯主之。並治下血。先血後便。此近血也。亦主之。赤小豆三升。漫令芽出。曝乾。當歸上二味。杵為散。漿水服方寸匕。日三服。

②麻黃連軀赤小豆湯。治傷寒。熱在裏。身必發黃。此湯主之。(傷寒論方) 麻黃二兩(去節) 連軀二兩 赤小豆一升 杏仁四十粒 甘草二兩 生梓白皮一升 生薑二兩 大棗十二枚 上以潦一斗。先煮麻黃去沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

尚書即得永投以藥。立愈。叩其方。赤小豆也。予苦腸疽既至五臟。醫以藥治之甚驗。承亮曰。得非赤小豆耶。醫謝曰。某用此活三十口。願勿復言。有僧發背如爛瓜。鄰家乳婢用此治之如神。此藥治一切癰疽疔疥及赤腫。不拘善惡。但水調塗之無不愈者。但其性黏。乾則難揭。若入芋根末。即不黏。此法尤佳。(李時珍) ① 磨食足輕。人食身重。(陳藏器) ② 按詩云。黍稷稻粱禾麻菽麥。此即八穀也。董仲舒註云。菽是大豆有兩種。小豆名荳。有三四種。王禎云。今之赤豆。白豆。綠豆。豇豆。皆小豆也。此則入藥用赤小者也。(李時珍) ③ 此豆以緊小而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病。俱於夏至後下種。苗科高尺許。枝葉似豇豆。葉微圓。而小。至秋開花似豇豆花而小。淡銀褐色有腐氣。結莢長二三寸。比綠豆莢稍大。皮色微白帶紅。三青二黃時即收之。可煮可炒。可作粥飯。餛飩。餛飩並良也。(李時珍)

七靈 赤

之粥。主治 利小便。消水腫脚氣。辟邪癘。【赤丹】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳【黃丹】條。【赤丹參】即丹參之處方用名。詳【丹參】條。【赤木草】即蛇林子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蛇林子】條。【赤瓜子】即山查之古籍別名。典見唐本草。詳【山查】條。【赤朮】即蒼朮之古籍別名。典見別錄。詳【蒼朮】條。【赤目草】即蛇林子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蛇林子】條。【赤石】即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳【代赭石】條。【赤石英】即石英。赤端赤稜白者之古籍別名。典見別錄。詳【白石英】條。

【赤石脂】命名 膏之凝者曰脂。本品性黏。固濟。爐鼎甚長。蓋兼體用而名也。古籍別名 五色石脂。(本經) 形態 赤石脂。赭色。質膩而細滑。有黏性。種類 色赤者為赤石脂。赤名。赤符。色白者為白石脂。赤名。白符。又名隨歧。伯色。黑者為黑石脂。赤名。黑符。又名石黑。石涅。色黃者為黃石脂。赤名。黃符。色青者為青石脂。赤名。青符。製法 雷斅曰。凡使赤脂。研如粉。新汲水飛過三度。晒乾用。李時珍曰。亦有火煨水飛者。性質 甘酸。辛。大溫。無毒。效能 瀉腸止瀉痢。和營療瘡。用作收斂藥。主治 養心氣。明目益精。療腹瀉。腸辟。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產後胞衣不出。久服補髓。好顏色。益智不饑。輕身延年。歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論赤石脂曰。補五臟虛乏。【明】李時珍本草綱目論此藥曰。補心血。生肌肉。厚腸胃。除水溼。收脫肛。【明】經希雍本草經疏論赤石脂曰。赤石脂味甘酸辛。氣大溫。無毒。氣薄味厚。入手陽明大腸。兼入手少陰經。經曰。澀可去脫。大小腸下後虛脫。非澀劑無以固之。

故主腹痛腸辟。及小便利。女子崩中漏下也。甘溫有入血益血之功。故主養心氣。及益精神。好顏色也。血足則目自明。心氣收攝。則得所養而下交於腎。故有如上功能也。癰疽因營氣不從。所生瘡疔。因腸胃溼熱所致。甘溫能通腸血脈。下降。能滲除溼熱。故主之也。其主難產。胞衣不出者。以其體重。下降而酸。辛能化惡血。惡血化則胞胎無阻滯之患矣。東垣所謂胞衣不出。澀劑可以下之。此之謂也。不飢。輕身延年。乃方士煉餌之法耳。凡洩利腸辟。久則下焦虛脫。無以閉藏。其他固澀之藥。性多輕浮。不能達下。惟石脂體重而澀。直入下焦。陰分。故為久利洩瀉之要藥。【清】黃宮繡本草求真論赤石脂曰。赤石脂與禹餘糧。皆屬收澀固脫之劑。但稟氣體輕微寒。其功止入氣分。斂肺。此則甘澀實重。色赤能入下焦血分。固脫。及兼瀉濁。收口。長肉生肌也。禹餘糧甘本性瀉。其重過於石脂。此則功尚主瀉。其曰鐵堅。終滯萬餘之力耳。是石脂之益。則能益氣生肌。石脂之酸。則

七畫 赤

能止血固下。至云能以明目益精。亦是精血既脫。得此固斂。而見目明精益矣。催生下胎。亦是味兼辛溫。化其惡血。惡血去則包與胎自無阻耳。故曰固腸有收斂之能。下胎無推蕩之峻。細膩粘舌者良。赤入血分。白入氣分。研粉水飛用。

辨偽 鄭育巖曰。赤石脂始出南山之陽。及廷州。蘇州。吳郡山谷中。今四方皆有。乃石中之脂。故揭石取之。以色如桃花。理膩粘舌。綴唇者為上。為少陰腎臟之藥。又色赤象心。甘平屬土。近有偽品。即黃土混充。色粗不能粘舌。勿用為要。曹炳章曰。按時珍曰。膏之凝者曰脂。此石性粘。能固濟爐鼎。蓋象體用而名也。石脂有五色之分。赤石脂原出濟南。今蘇州餘杭亦出。性不甚佳。石雅云。石脂即黑土。堊。白土也。方書名其石脂者具五色。今以赤白二種驗之。亦高嶺之類。其赤者殆即所謂紅高嶺也。吳地餘杭山有白堊。色如玉。甚光潤。號曰石脂。則白石脂即白堊。愈無疑矣。赤石脂色淡紅如桃花色。細膩滑潤者佳。近有新式石脂。色赤

質粗。不細滑。不知何種土質。其次無疑。不可入藥。

配合應用 治小兒疳瀉。赤石脂末。米飲調服半錢。立瘥。加京芎等分更妙。(斗門方)

治大腸寒滑。小便精出。赤石脂。乾薑各一兩。胡椒半兩。為末。醋糊丸。梧子大。每空心米飲下五七十九丸。有人病此。熱藥服至一斗二升不效。或教以服此。終四劑而息。(寇氏方)

治赤白下痢。赤石脂末。飲服一錢。(普濟方)

治冷痢腹痛。下白凍如魚腦。桃花丸。赤石脂。煨乾。薑炮。等分為末。蒸餅和丸。量大小服。一日三服。(和劑局方)

治老人氣弱虛冷。赤石脂五兩。水飛。白粳六兩。水煮熟。入葱醬。作露。空心食。三四次即愈。(養老方)

治傷寒下痢。便膿血不止。桃花湯主之。赤石脂一斤。一半全用。一半末用。乾薑一兩。糯米半升。水七升。煮米熟。去滓。每服七合。納末方寸匕。日三服。愈乃止。(仲景方)

治痢後脫肛。赤石脂。伏龍肝。為末。傅之一加白礬。(錢氏小兒方)

治反胃吐食。絕好赤石脂。為末。蜜丸。梧子大。每空心薑湯下一二十丸。先以巴豆仁一枚。勿令破。以津吞之。後乃服藥。(聖惠方)

治痰飲吐水。無時節者。其原因冷飲過度。遂令脾胃氣弱。不能消化飲食。飲食入胃。皆變成冷水。反吐不停。赤石脂散主之。赤石脂一斤。搗篩。服方寸匕。酒飲自佳。稍加至三七服。盡一斤。則終身不吐痰水。又不下痢。補五臟。令人肥健。有人痰飲服諸藥不效。用此遂愈。(千金翼方)

治心痛激背。赤石脂。乾薑。蜀椒各四分。附子炮二分。烏頭炮一分。為末。蜜丸。梧子大。先食服一丸。不住稍增之。(金匱方)

治經水過多。赤石脂。破故紙。一兩。為末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

治小便不禁。赤石脂。牡蠣。煨。各三兩。鹽一兩。為末。糊丸。梧子大。每鹽湯下十五丸。(普濟方)

六五二

用散 三錢至四錢。施用宜忌 凡非虛滑而有實邪者禁用。畏羌花。惡大黃。松脂。著名方劑 赤石脂。禹餘糧。傷寒服湯藥。下痢不止。心下痞。腹瀉。心湯已。復以他藥下之。痢不止。醫以理中湯治之。痢益甚。理中者。理中焦。此痢在下焦。此湯主之。(傷寒論方) 赤石脂。(碎)禹餘糧。(碎)各一斤。以水六升。煮取二升。去滓。三服。

參攷資料 赤石脂。古人亦單服食。云發則心痛。飲熱酒不解。用綿裹葱豉。煮水飲之。(蘇頌) 五色石脂。一名五色符。晉符生南山。或海涯。黃符生嵩山。色如琉璃。腐羅。黑符生洛西山。空地。白符生少室。天婁山。或太山。赤符生少室。或大山。色滑滑如脂。(吳普) 今俗惟用赤石。白石。二脂。好者出吳郡。亦出武陵。建平。義陽。義陽者。出鄆縣界。東八十里。狀如琉璃。赤者鮮紅可愛。隨採復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂。入畫用爾。(陶弘景) 義陽。即申州。所出乃桃花石。非石脂也。白石脂。今出慈陽。

諸山。勝於餘處者。赤石脂今出鏡州盧氏縣。澤州陵川縣。又慈州呂鄉縣。宜州諸山亦有。並色理鮮膩。爲佳。二脂大山不開有之。舊出蘇州餘杭山。今不收採。(蘇恭)⑤今蘇州見實赤白二石脂。但入藥不甚佳。惟延州山中所出最良。揭兩石中取之。(陳承)⑥白石脂赤石脂。今惟蘇州出之。潞與慈州相近也。(蘇頌)⑦膏釋脂凝。皆肌肉中液也。肌肉有餘。則其氣揚於外。凝中大有不凝義。世人止知固濟。未盡石脂大體。之頤云。石中之脂。如骨中之髓。故揭石中取之。而用必以粘緩唇舌者爲上也。本草述今所用石脂唯赤者居多。以其甘溫合而得陽之化。又酸辛合而能散能收也。又云。赤者以色如絳。滑如脂者良。(盧復)

【赤地利】

古醫別名 五毒草。蛇蘭。五葦。(拾遺)山蕎麥。(圖經)赤薜荔。(綱目)

外國名詞 Polygonum Chi-

nonso, L. var. Thunbergianum, Meisn. (拉丁) ムルソノム (日本)

基本 係蓼科蓼屬。爲赤地利之根與葉。

形態 赤地利爲蔓草類之一種。自生草本。春夏生苗作莖。纏繞草木之上。莖色青。葉似蘿藦。又似蕎麥。七月開白花。亦似蕎麥。結子色青。其根似菝葜。皮赤黑。肉黃。與葉俱可供藥用。

採取 二月八月採之。採得細剉用。藍葉并根同入生絹袋盛之。蒸一伏時。去曬用。

性質 苦。平。無毒。
主治 赤白冷熱諸痢。斷血破血。帶下赤白。生肌肉。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論赤地利曰。主癰疽。惡瘡。毒腫。赤白游移。蟲蠶蛇犬咬。並醋磨傅之。亦搗莖葉傅之。恐毒入腹。煮汁飲。伏丹砂。

參攷資料 ①唐張仲文備急方治青赤黃白等痢。鹿茸丸方中用之。則其功長於涼血解毒。可知矣。(李時珍)

【赤地利】即杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杠板歸」條。
【赤杉】即杉材之古籍別名。典見

綱目。詳「杉材」條。
【赤汞】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【赤沙糖】

原名 沙糖。本品色赤而結晶性如沙者。故名。

處方用名 赤砂糖。紅糖。古醫別名 沙糖。(唐本草)砂糖。(和漢藥考)

性質 甘寒。無毒。效能 化痰。和血。用作和緩營養。

主治 心腹熱脹。口乾渴。
歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論紫沙糖曰。潤心肺。大小腸熱。解酒毒。臘月瓶封密。瘡坑中。患天行熱狂者。絞汁服甚良。【明】李時珍本草綱目論紫沙糖曰。和中助脾。緩肝氣。【明】經希雍本草經疏論紫沙糖曰。沙糖。蔗汁之清而煎煉至紫黑色者。本經雖云與石蜜同功。然而不逮石蜜多矣。既經煎煉之久。則未免有溼熱之氣。故多食損齒。生蟲。發疔。脹滿。令人心痛等害。與鱈魚同食。成疔。蟲。與葵同食。生流澀。與笋同食。不消成

瘡。身重不能行。今醫家用作湯。下小兒丸散。殊爲未當。【清】黃宮繡本草求真論紫沙糖曰。沙糖本於甘蔗所成。甘蔗氣稟中和。味甘氣寒。已爲除熱潤燥之味。其治則能利腸解煩。消痰止渴。至於沙糖。經火煅煉。性轉爲溫。色變爲赤。與蔗又似有別。故能行血化痰。是以產婦血暈。多有此。與酒沖服。取其得以入血消痰也。小兒丸散。用此調服。取其溫以通滯也。烟草用以解毒。亦取其有開導之力也。然性溫則消而下。故虛熱過服。則有損齒消肌之病。味甘主緩。主壅。故痰溼過服。則有戀膈脹滿之弊。此又不可不深思而熟察耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論紫沙糖曰。赤沙糖甘溫。煨胃緩肝。散寒活血。舒筋止痛。制鴉片烟。吳人產後用以行瘀。多食損齒生蟲。

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡有溼熱中滿者禁用。

【赤芍】 命名 本品乃芍藥之赤色者。故名。
處方用名 生赤芍。炒赤芍。

七畫 赤

古籍別名 木芍藥。(綱目)

外國名詞 Paeonia rubra

基本 屬毛茛科。爲赤芍之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

赤芍原產陝西省漢中府。向日均

以漢口來之狗頭芍爲最好氣味。

俱不能開片。藥肆不用。近所用者

俱產自北口外。由天津運來。三伏

天出新。山西產者。爲京芍。粉白色。

四川亦有出。次之。

採取 二月八月採之。

製法 酒或醋炒。亦有生用者。

性質 苦平無毒。

效能 散瘀活血。用治癰腫瘡

瘍藥。又爲鎮痛調經藥。

歷代記述攷證 【明】經希雍

本草經疏論赤芍曰。木芍藥色赤。

赤者主破散。主通利。專入肝家血

分。故主邪氣腹痛。其主除血痺破

堅積者。血瘀則發寒熱。行血則寒

熱自止。血痺疝瘕皆血滯而成。

破凝滯之血。則痺和而疝瘕自消。

涼肝故通順血脈。肝主血。入肝行

血。故散惡血。逐賊血。營氣不和。則

逆於肉表。結爲癰腫。行血涼血。則

癰腫自消。婦人經行屬足厥陰肝

經。入肝行血。故主經閉。肝開竅於

目。目赤者肝熱也。酸寒能涼肝。故

治目赤。腸風下血者。溼熱腸血也。

血涼則腸風自止矣。【明】李士材

本草圖解論赤芍曰。赤者破血下

氣。利小便。【清】黃宮繡本草求真

論赤芍曰。赤芍與白芍主治略同。

但白則有斂陰益營之力。赤則止

有散邪行血之意。白則能於土中

瀉木。赤則能於血中活滯。故凡腹

痛堅積。血瘀疝痺。經閉目赤。因於

積熱而成者。用此則能涼血逐瘀。

與白芍主補無瀉。大相遠耳。大明

指爲赤白皆補。其說不切。日華子

指爲赤能補氣。白能治血。其說尤

不切耳。不可不知。至云產後忌用。

亦須審其脈症。及臟偏勝若何耳。

不可盡拘。【清】賈九如辨藥指南

論赤芍曰。赤芍味苦能瀉。帶酸入

肝。專瀉肝火。蓋肝藏血。用此清熱

涼血。入洞然湯。始暴赤眼。入犀角

湯。清血衄血。入神仙活命飲。攻諸

毒熱癰。以消散毒氣。入六一順氣

湯。瀉大腸閉結。使血脈順下。以其

能主降。善行血滯。調女人之經。消

瘀通乳。以其性寒。能解熱煩。祛

內停之溼。利水通便。較白芍味苦

重。但能瀉而無補。

配合應用 ①治小便五淋。赤

芍藥一兩。檳榔一箇。麩裏煨爲末。

每服一錢。水一盞。煎七分空心服。

(博濟方)

②治衄血不止。赤芍藥爲末。水

服二錢七。(專林廣記方)

③治血崩帶下。赤芍藥。香附子。

等分爲末。每服二錢。鹽一捻。水一

盞。煎七分溫服。日二服。十服見效。

名如神散。(婦人良方)

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡血虛及無瘀滯

者禁用。惡芒硝。石斛。長蘆。甲小蘆。

反發蘆。

【赤豆】即赤小豆之古籍別名。典

見新修本草圖經。詳「赤小豆」條。

原名 腐婢。

命名 本品氣如腐

臭。故名。

採取 七月採之。陰乾用。

性質 辛平無毒。

主治 痰癩寒熱。邪氣洩痢。陰

不起。止消渴病酒頭痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

六五四

性本草論赤豆花曰。消酒毒明目。

下水氣。治小兒丹毒熱核。散氣滿

不能食。煮一頓食之。【明】李時珍

本草綱目論赤豆花曰。治熱中積

熱。痔瘡下血。

主治 妊娠數月。經

【赤豆芽】水時來。名曰漏胎。或

因房室。名曰傷胎。用此爲末。溫酒

服方寸匕。日三。得效乃止。

原名 蠶。

【赤豆葉】主治 去煩熱。止小

便數。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論赤豆葉曰。養食明目。

參攷資料 小豆利小便。而蠶

止小便。與麻黃發汗而根止汗同

意。物理之異如此。(李時珍)

古籍別名 小

錦枝(炮炙)鱗

蛇草(日本)

外國名詞 Ulaostemma

umbellatum, Bl. var. ma. Jua,

Maxim. (拉丁)ウハバミサウ

ムカユミソ(日本)

基本 係蕁麻科赤車使者之

根。

產地 多在山野溪谷間之陰地。

形態 赤車使者為芳草類之野生草本。莖高尺許。通常斜上。無直立者。葉似爵棘。互生。作淡綠色。四五月葉腋開花。作淡黃綠色。至秋葉腋生肉芽。以事繁殖。

採取 八九月間採根日乾。

製法 雷斅曰。此草原名小錦枝。凡用並粗搗。以七歲童子小便拌蒸。晒乾入藥。

性質 辛苦。溫。有毒。

主治 風冷。邪疰。蠱毒。癰瘕。五臟積氣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。赤車使者曰。治惡風冷氣。服之悅澤肌皮。好顏色。

參攷資料 ①古方治大風風痺。有赤車使者酒。今人稀用。鮮有識者(蘇頌) ②上古辟瘟疫邪氣。有赤車使者丸。此藥不怪。苟加詢探。必能得之。但古今名稱或不同耳(李時珍) ③赤車使者苗似香葉蘭香。葉莖赤。根紫赤色。八月九月採根日乾(蘇恭) ④赤車使者生荊州襄州。根紫如荷根。二月八

月採(韓保昇) ⑤赤車使者與爵棘相類。但以根色紫赤為區別爾(李時珍)

【赤卒】即赤蜻蛉之別名。典見綱目。詳「蜻蛉」條。

【赤果】即樾實之古籍別名。典見日用本草。詳「樾實」條。

【赤芝】 命名 本品為芝之一種。而色赤者。故名。

古籍別名 丹芝(本經) 性質 苦平。無毒。

主治 胸中結。益心氣。補中。增智慧。不忘。久食。輕身不老。延年神仙。

【赤芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【赤芫】即芫花之古籍別名。典見吳普本草。詳「芫花」條。

【赤芹】即紫葢之古籍別名。典見綱目。詳「紫葢」條。

【赤帝】即硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「硃砂」條。

【赤帝精】即硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「硃砂」條。

【赤帝髓】即硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「硃砂」條。

【赤砂糖】即赤沙糖之處方用名。詳「赤沙糖」條。

【赤英】即紫佳石之古籍別名。典見別錄。詳「紫佳石」條。

【赤孫施】即酢漿草之古籍別名。典見圖經本草。詳「酢漿草」條。

【赤根】即麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麻黃」條。

【赤根菜】即菠菜之古籍別名。典見綱目。詳「菠菜」條。

【赤涅】 產地 生蜀中山石間之陰溼地。

形態 赤涅為雜草類之一種。其莖根可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 益氣止血。崩中疰疾。

【赤珠】即龍珠之古籍別名。典見綱目。詳「龍珠」條。

【赤翅蜂】 命名 本品毒蜂也。其翅赤色。故名。

外國名圖 Vespa similis (拉丁)アカバチ(日本)

基本 係節肢動物。昆蟲類。膜翅類。黃蜂科之赤翅蜂。

形態 赤翅蜂為卵生蟲類。屬之一種。其體較大。赤色。有黑褐與黃褐色之斑紋。頭大。色黑。為三角形。前胸黃褐。中胸及後胸黑褐。前後兩翅皆透明。略帶赤褐。呈長橢圓形。各腹節之中央及後半。有黑褐色橫紋。體長約九分。展翼闊約一寸半。七八月間穿土造窠。而產卵。專覓蜘蛛為食。螫人甚毒。捕得可供藥用。

種類 ①獨蜂作窠於木。亦此類也。其窠大如鵝卵。皮厚蒼黃色。只有一箇蜂。大如小石。燕子人馬。被螫立亡也。②蜂出巴中。在窠鼻蛇穴內。其毒倍常。中人手足。癢斷。中心胸。即塌裂。非方藥可療也。

性質 有毒。

主治 療蜘蛛咬。及疔腫疽病。燒黑和油塗之。或取蜂窠土。以酢和塗之。蜘蛛咬處。當得絲出。

【赤茯苓】 命名 赤茯苓為茯苓之色赤者。

主治 破結氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論赤茯苓曰。萬小腸膀胱溼熱。利竅行水。

七畫 赤

【赤參】即丹參之古籍別名。典見別錄。詳「丹參」條。

【赤眼老母草】即爵牀之古籍別名。典見唐本草。詳「爵牀」條。

【赤眼魚】即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱒魚」條。

【赤棠棹】即棹棹之古籍別名。典見綱目。詳「棹棹」條。

【赤椒】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【赤黍米】即丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳「丹黍米」條。

【赤楊】即檉柳之古籍別名。典見古今注。詳「檉柳」條。

【赤棟蛇】即黃領蛇之色赤者。典見綱目。詳「黃領蛇」條。

【赤葛】即烏蘇莓之古籍別名。典見綱目。詳「烏蘇莓」條。即何首烏之古籍別名。典見斗門方。詳「何首烏」條。

【赤葡萄酒】 主治 除腸中 障害。

【赤雹子】即王瓜之古籍別名。典見本草衍義。詳「王瓜」條。

【赤榕】即榕赤色而上狹廣大者之古籍別名。典見泉州志。詳「榕

鬚」條。

【赤綱】即菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳「菟絲子」條。

【赤蜜】即石蜜之別名。詳「石蜜」條。

【赤赫】 產地 生山谷間。 形態 赤赫為雜草類之一種。其莖根可供藥用。

採取 二月八月採之。 性質 苦寒有毒。

主治 惡敗瘡痂。除邪氣。殺三蟲。

【赤嘴鳥】即山鵲之古籍別名。典見綱目。詳「山鵲」條。

【赤檀】即朱檀之古籍別名。典見草木狀。詳「扶桑」條。

【赤澄藤】即烏蘇莓之古籍別名。典見綱目。詳「烏蘇莓」條。

【赤箭】即天麻之原名。詳「天麻」條。

【赤箭芝】即天麻之古籍別名。典見藥性。詳「天麻」條。

【赤節】即草薺之古籍別名。典見別錄。詳「草薺」條。即狗脊之古籍別名。典見吳普本草。詳「狗脊」條。

【赤膠】即紫蠟之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「紫蠟」條。

【赤蝦米】即丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳「丹黍米」條。

【赤撲】即厚撲之古籍別名。典見別錄。詳「厚撲」條。

【赤頭】即斑貓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「斑貓」條。

【赤頭鷄】即鷄鶩之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「鷄鶩」條。

【赤龍爪】即白棘之古籍別名。典見綱目。詳「白棘」條。

【赤龍皮】即松木皮之古籍別名。典見綱目。詳「松木皮」條。即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。即樹木皮之俗名。詳「樹木皮」條。

【赤檀】即紫檀之古籍別名。典見綱目。詳「紫檀」條。

【赤檉】即檉柳之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「檉柳」條。

【赤舉】 古籍別名 羊飴陵湯。 (別錄)

產地 生山野陰地。

形態 赤舉為雜草類之一種。二月開花。莖葉草上。五月結實。色

黑有核。其葉可供藥用。

採取 三月三日採葉陰乾用。 性質 甘無毒。

主治 腹痛。

【赤薔薇】即玫瑰花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玫瑰花」條。

【赤薔荔】即赤地利之古籍別名。典見綱目。詳「赤地利」條。即杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杠板歸」條。

【赤雞】即槐耳之古籍別名。典見綱目。詳「槐耳」條。

【赤羅】即鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳「鹿梨」條。

【赤藤】即省藤之古籍別名。典見綱目。詳「省藤」條。

【赤藥】即黃藥子之古籍別名。典見圖經本草。詳「黃藥子」條。

【赤寶】即枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枸杞子」條。

【赤蘇】即紫蘇之古籍別名。典見肘後方。詳「紫蘇」條。

【赤鬚】即燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「燈心草」條。

【赤鳩龜】即鳩龜之食軟體動物者。典見醫學大辭典。詳「鳩龜」條。

【走珠】即真珠之古籍別名。真見和漢藥考。詳「真珠」條。

【走馬胎】產地 廣東龍門縣深山中。

形態 走馬胎為雜草類之一種。其莖如柴根。乾者內白。研之細膩如粉。氣甚幽香。人可供藥用。
主治 長肌化毒。傳癰疽。斂瘡口。

【走盤珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【車下李仁】即郁李仁之古籍別名。典見別錄。詳「郁李仁」條。

【車前子】製法 李時珍曰。凡沙。晒乾。入湯液炒過。用入丸散。則以酒浸一夜。蒸熟。研爛作餅。晒乾。焙研。



車前子

性質 甘寒無毒。
效能 利水。清熱。止瀉痢。通淋瀝。用作利尿藥。

七畫 走車

主治 氣癰。止痛。利水道。小便。除溼痺。久服輕身耐老。(本經)
男子傷中。女子淋瀝。不欲食。養肺。強陰益精。令人有子。明目。療赤痛。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論車前子曰。去風毒。肝中風熱。毒風衝眼。赤痛障翳。腦痛淚出。壓丹石毒。去心胸間煩熱。【唐】蕭炳四聲本草論車前子曰。養肝。【明】李時珍本草綱目論車前子曰。導小腸熱。止溼瀉痢。【明】繆希雍本草經疏論車前子曰。車前子味甘寒而無毒。別錄兼鹹。故走水道。其主氣癰。止痛。通腎氣也。小便利則溼去。溼去則痺除。傷中者必內起煩熱。甘寒而潤下。則煩熱解。故主傷中。女子淋瀝不欲食。是脾胃交病也。溼去則脾健而思食。氣通則淋瀝自止。水利則無胃家溼熱之氣上熏。而肺得所養矣。男女陰中俱有二竅。一竅通精。一竅通水。命門真陽之火。即係先天之元氣。道家謂之君火。後天之精氣亦與之合而繫焉。膀胱者溼熱瀾陰之水。滲出下竅為小便。道家謂

之民火是也。二竅不竝開。故水竅常開。則小便利而溼熱外洩。不致鼓動真陽之火。則精液常閉而無漏洩。久久則真火寧謐。而精用益固。精固則陰強。精盛則生子。腎氣固即是水臟足。故明目及療赤痛。輕身耐老。即強陰益精之驗。肝腎膀胱三經之要藥也。【清】黃宮繡本草求真論車前子曰。車前子甘鹹性寒。據書所載。能治膀胱溼熱。以通水道。然余謂膀胱之清。由於肝肺之肅。凡人溼利暴作。小水不通。並溼痺五淋。暑熱瀉利。難產目赤。雖有膀胱水潤。不能化陽。然亦有為肝肺感受風熱。以致水不充生。故須用此以清肝肺。象鹹下降。以清水道。是以五子衍宗丸。同此以為四子之佐。金匱腎氣丸。用此以為諸藥之助。且此肝肺既清。風熱悉去。則肺不受熱。而化源有自。肝不被風。而疎泄如常。精與溺二竅。本不相兼。火得氣而通。精得水而泄。故水去而火益盛。精盛而氣益固。所謂服此令人有子。及滲利而不走氣。與茯苓同功者。正謂此也。但氣虛下陷。腎氣虛脫。切勿服

耳。酒蒸搗碎焙研用。
國外學說 日本依扶氏之藥學云。車前子者。為粘漿性之子實。與槲櫟子同其性狀。蓋槲櫟子者。黏液之含量約居百分之二十。藥房方上所以可為製劑。供醫藥之用者。因含有此黏液也。其主治用量。於利尿藥用之。用三。○至八。○又和漢藥考云。車前子者。俗云治疳眼時。炙八目。加此子少許。食之良。

辨偽 ①鄭肯啟曰。車前草本經名當道。詩云。采芣苢。好生道旁。及牛馬足跡中。故有車前當道。及牛遺馬鳥之名。江湖淮甸處處有之。主治氣癰。治溼痺。市中有大小車之別。大車為真品。小車係土荊芥子偽充。萬不可用。蓋車前甘寒。荊芥辛溫。性既相反。又奚容混傳乎。②曹炳章曰。按車前子。江西吉安廬江出者。為大車前。枝粗色黑。江南出者。曰土車前。俱佳。淮南出者。粗而多壳。衢州出者。小而亮淨。皆次。河北孟河出者。為小車前。即荊芥子也。不入藥用。宜注意之。
配合應用 ①治氣癰。車前子。

七靈車

木通、沈香、橘皮、升麻。

①治濕痺。車前子二朮、宣木瓜、石斛、川草薜、茯苓、五加皮。

②治暴瀉。車前子獨用爲末。米飲下二錢匕。

③治水泄。車前子、白芍藥、白茯苓、白藳豆、炙甘草。

④治尿血及婦人血淋。車前子、生地黃、牛膝、天門冬、麥門冬、黃蘗、五味子、甘枸杞子、人參、白膠。

⑤入五子衍宗丸爲生精種子要藥。

⑥入金匱腎氣丸。則固精益陰。

⑦獨用炒爲末。專治溼勝水瀉。

⑧強陰固精種子。用車前子、五味子、覆盆子、蓮子、蓮鬚、山茱萸、肉苁蓉、沙苑、菟絲、人參、麥門冬、牛膝、白膠魚膠。

⑨治暴赤目痛。車前子、生地黃、甘菊花、決明子、玄參、蜜蒙花、連翹、黃連、柴胡、生甘草。

⑩治小便血淋作痛。車前子晒乾爲末。每服二錢。車前葉煎湯下。

(普濟方)

⑪治石淋作痛。車前子二升。以絹袋盛水八升。煮取三升服之。須

臬石下(肘後方)

①治老人淋病。身體熱甚。車前子五合。綿裹煮汁。入青粱米四合。煮粥食。常服明目。(壽親養老書方)

②治孕婦熱淋。車前子五兩。葵根切一升。以水五升。煎取一升半。分三服。以利爲度。(梅師方)

③治滑胎易產。車前子爲末。酒服方寸匕。不飲酒者。水調服。詩云。采采芣苢。能令婦人樂有子也。陸璣注云。治婦人產難故也。(婦人良方)

④治橫產不出。車前子末。酒服二錢。(子母秘錄方)

⑤治陰冷。漸入囊內。腫滿殺人。車前子末。飲服方寸匕。日二服。(千金方)

⑥治癰入腹。體腫舌強。車前子末粉之良。(千金方)

⑦治陰下痒痛。車前子煮汁頻洗。(外臺祕要方)

⑧治久患內障。車前子、乾地黃、麥門冬等分爲末。蜜丸如梧子大。服之累試有效。(聖惠方)

⑨治風熱目暗。瀉痛。車前子、宜

六五八

州黃連各一兩爲末。食後溫酒服一錢。日二服。(聖惠方)

用宜忌 一錢至三錢。凡腎虛而無濕熱者禁用。

著名方劑 駐景丸。治肝腎俱虛。眼昏黑花。或生障翳。迎風流淚。

(和劑局方) 車前子三兩。(用熟地黃酒蒸焙) 兔絲子(酒浸)五兩。共研細末。煉蜜爲丸。每服溫酒下三十九。日二服。

參攷資料 ①車前子能利小便而不走氣。與茯苓同功。(王好古) ②按神仙服食經云。車前一名地衣。雷之精也。服之形化。八月探之。今車前五月子已老。而云七八月者。地氣有不同爾。唐張籍詩云。開州午月車前子。作樂人皆道有神。慚愧文君憐病眼。三千里外寄閑人。觀此亦以五月採開州者爲良。又可見其治目之功。大抵入服食。須佐他藥。如六味地黃丸之用。深滋可也。若單用則瀉太過。恐非久服之物。歐陽公嘗得暴下病。國醫不能治。夫人買市人藥一帖。遂之而愈。力叩其方。則車前一

味爲末。米飲服二錢匕。云此藥利水道而不動氣。水道利則清濁分而殺穀自止矣。(李時珍) ③按爾雅云。芣苢馬牛遺車前。陸璣詩疏云。此草好生道邊及牛馬跡中。故有車前當道馬牛遺之名。寫足履也。開州人謂之牛舌。盤蓋喜藏伏於下。故江東稱爲蝦蟆衣。又韓詩外傳言直曰車前。謂曰芣苢。恐亦強說也。芣乃生於兩旁者。(李時珍) ④功用似澤瀉。但彼生水中。專去腎之邪水。此生陸地。則兼去脾之積熱。彼用根。此用子。兼潤心腎。又甘則能補。故古人謂其強陰益精。然要之行水去熱。是其所長。能治溼痺五淋及暑熱瀉痢。通利小便。若補腎令人有子。則虛語也。詩序芣苢篇。婦人樂有子之文。始相附會耳。以子治產難。能生下胎。則信有之。亦誠能轉壅。滑能利關節之功耳。(汪雙池) ⑤車前之根。葉子。俱有收瀉。清涼。去污之效。而根之效力尤勝。又能使血液稠厚。治下利。血痢。吐血。婦人月經過多。白帶。下諸症。以根藥煎水。服。又久咳。咳血。肺癆。下痢等症。生

根加水搗取汁。加砂糖或糖漿服。有殊效。又春日發熱。服車前根。頗甚秋發者。不易治。又口中潰瘍。咽喉焮腫。以根葉煎水。作含漱藥。眼焮腫。作洗眼藥。跌打損傷。肌膚脫爛。焮街火傷諸症。均以生葉搗爛貼敷。便愈。又車前葉。以水蒸縮。名車前水。可作洗眼藥。有清涼焮熱。淨刷汚液之功。又車前子一錢。爲末。或水煎服。治下利。(荷爾藥鏡) ⑤有人手指被創出血。適野行。懷中覓紙拭之。不可得。偶見道旁車前草。其葉潔淨可愛。姑摘取數片。且行且自拭其血。無何血立止痛。亦頓失。其殆有止血之功耶。(和漢藥考)

【車前草】 命名 本品好生道邊及牛馬跡中。故有車前。當道。馬馬。牛遺諸名也。

古籍別名 當道。(本經) 芣苢。馬馬。牛遺。蝦蟆衣。(別錄) 牛舌。(詩疏) 車輪菜。(救荒) 地衣。(綱目) 車錢。烏足。魚草。勝馬。勝寫。陵馬。車過路野甜菜。(和漢藥考)

外國名詞 Semen Phn-tags Major (拉丁)

七 蠶 車

產地 陳仁山藥物生產辨云。車前草各省各屬均有。俗名錢貫草。多生田野間。

形態 車前爲多年生草本。春日自地下生葉五六張。長三四寸。形橢圓或卵圓。有葉柄。尋常有肋線五條。集合如匙。至夏叢葉中抽出花莖。長可七八寸。開淡紫色之小花。作穗狀花序排列。小花有四片卵圓形之萼。作筒狀。有一片鱗葉護之。花冠狀似喇叭。前端五裂。果實爲蒴果。中分二室。每室藏種子數粒。種子色黃褐。有光澤。作長橢圓形。背隆起。底扁平。似胡麻而略小。味微苦。

採取 五六月採苗。陰乾。
製法 雷敎曰。凡使須一窠。有九葉。內有蕊莖。可長一尺二寸者。和蕊葉根。上了秤一銖者。力全。使藥勿使蕊莖。剉細。於新瓦上攤乾用。

性質 甘寒。無毒。
效能 利小便。通五淋。
主治 金瘡。止血。翳鼻。瘀血。血癢。下血。小便赤。止煩下氣。除諸小蟲。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論車前草曰。主陰濟。【唐】甄權藥性本草論車前草曰。葉主泄精病。治尿血。能補五臟。明目。利小便。通五淋。

配合應用 ①治小便不通。車前草一斤。水三升。煎取一升。分三服。一方入冬瓜汁。一方入桑葉汁。(百一選方)

②治初生尿瀝不通。車前搗汁入蜜少許灌之。(全効心鑑方)

③治小便尿血。車前搗汁五合。空心服。(外臺秘要方)

④治鼻衄不止。生車前葉。搗汁飲之。甚善。(圖經本草方)

⑤治金瘡血出。車前葉搗傳之。(千金方)

⑥治熱痢不止。車前葉搗汁。入蜜一合。煎溫服。(聖惠方)

⑦治產後血滲入大小腸。車前草汁一升。入蜜一合。和煎一沸。分二服。(崔氏方)

⑧治溼氣腰痛。蝦蟆草連根七科。葱白連鬚七科。玳七枚。煮酒一瓶。常服。終身不發。(簡便方)

⑨治喉癢乳蛾。蝦蟆衣。鳳尾草。

搗爛入葡萄酒。各少許。再研絞汁。以鷄翎引患處。隨手吐痰即消也。(趙養荷漫筆方)

⑩治目赤作痛。車前草自然汁。調朴硝末。臥時塗眼胞上。次早洗去。又小兒目痛。車前草汁和竹瀝點之。(聖濟總錄方)

⑪治目中微翳。車前葉。枸杞葉等分。手中揉汁出。以藥葉兩重裹之。懸陰處。一夜破桑葉取點。不過三五度。(十便良方)

用量 二錢至五錢。

【車脂】 命名 本品乃車軸頭之油質。故名。

古籍別名 車殼脂。軸脂。轄脂。紅膏。(綱目)

性質 辛。無毒。

主治 卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如蠶子大。熱醋攪消服。又主婦人婦乳乳癰。取熱塗之。併和熱酒服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論車脂曰。去鬼氣。溫酒炸熱服。【明】李時珍本草綱目論車脂曰。治蠶亂中蠶。妊娠諸腹痛。催生。定驚。除癩。消腫。瘡諸瘡。

六 五 九

【車渠】命名 本品乃海中大貝也。背上堅紋如車輪之渠。故名。

古籍別名 海扇。(綱目) 辛淡各。碎碎。揭拉婆。(梵書)

外國名圖 Tridacna gigas (拉丁) アザガヒ (日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類。有管類。全緣類。介屬。爲車渠之殼。

產地 生海中。

形態 車渠爲介類蛤屬之一種。即始之大者。長二三尺。闊尺許。厚二三寸。殼溝壟如紺而深。大皆縱文如瓦溝。無橫紋。殼內白質如玉。有光澤。外則褐色。其殼可作裝飾品。并可作杯。注酒能滿。過分計不溢。又可供藥用。

性質 甘。鹹。大寒。無毒。

主治 安神鎮宅。解諸毒藥。及蟲螫。同玳瑁等分。磨人乳服之。極驗。

參攷資料 車渠。蓋瓦壟之大者。故其功用亦相彷彿。(李時珍) 【車載板】即鸚鵡之古籍別名。與見綱目。詳「鸚鵡」條。 【車過路】即車前草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「車前草」條。 【車輪菜】即車前草之古籍別名。典見救荒本草。詳「車前草」條。

【車錢】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

古籍別名 蠶。(綱目) 碑。移角。(臨

海水土記)

產地 生海中。

形態 車螯爲介類蛤屬之一種。其殼色紫。璀璨如玉。斑點如花。以火炙之。則殼開。肉與殼皆可供藥用。

性質 甘。鹹。冷。無毒。

主治 解酒毒。消渴。并避腫。

參攷資料 車螯一名蠶。與較。之。暨同名異物。(李時珍)

車螯肉不可多食。(孟詵)

【車螯殼】性質 甘。鹹。冷。無毒。

主治 瘡癤腫毒。燒赤醋洋二度爲末。同甘草等分酒服。并以醋調傳之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論車螯殼曰。消積塊。解酒毒。治瘰癧。發背。瘰癧。參攷資料 車螯味鹹氣寒而

降陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少如何可也。今外科診知用者。(李時珍)

【車殼辛】辛子之古籍別名。典見綱目。詳「辛子」條。

【車殼脂】即車脂之古籍別名。典見綱目。詳「車脂」條。

命名 夷者。夷也。本品花苞初生如黃。而味辛。故名。

地方用名 辛夷花。

古籍別名 辛雉。候桃。房木。(本經) 木筆。(拾遺) 辛矧。迎春。(綱目) 玉照。候木。候抄。流夷。新華。望春。猴佛。猪心花。朝天蓮。報春花。朝天木蓮花。(和漢藥考)

外國名圖 Magnolia Kobus, DC. (拉丁)


基本 屬木蘭科。爲辛夷之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產辨云。辛夷產河南省。安徽省。實則各處皆有之。

形態 辛夷爲落葉喬木。自生於山野間。高二三丈。枝柯繁茂。若

樹高可五丈。周圍達一丈。幹皮帶紫灰色。枝皮青白色。嫩皮深青色。葉形卵圓。長四寸許。末端尖銳。底部爲楔狀。邊緣略作波狀。葉面色深綠。殊滑澤。背色淡褐。葉脈有茸毛。有葉柄。皆互生。花先葉而開。六瓣。色白。花瓣片片似匙。長二寸許。其蕾有苞裹之。苞綠褐色。亦有茸毛。大五分許。形似筆頭。香氣極烈。果實作長橢圓形。長三寸許。各房俱藏有種子二粒。其色紅。又大和本草曰。辛夷。大木也。其葉似栒花。未開時。厥狀似筆。故名木筆。二月開白花。外紫內白。極似玉蘭。故名名玉蘭。葉生於花謝之後。在南方多先春而花。故又有迎春花之名。結實如桃。有苞。種子甚多。半出於苞外。半藏於苞中。色紅如相思子。又本草綱目啓蒙曰。辛夷。自生於山中。其木高大。枝條繁密。夏間枝端生蕾。形如筆頭。故名木筆。更經秋冬。其葉凋落。而花蕾漸大。色白。微揭。有毛如小桃。至二三月。葉尚未生。花已先開。似木蘭花而小。六瓣。白色而有紅條。一種淺紅色者。名紅石蕊。亦得紫蘭。白色者呼玉

隱。日本呼爲白木蓮。樹高二三丈。仲春開花。大如木蘭花。形亦相似。香氣極烈。色白。微帶綠。花謝後。始生新葉。一種名垂辛夷。樹高二三尺。或至丈餘。枝條亦殊繁盛。同時開花。每朵大二三寸。瓣細而長。可二寸許。一朶有十二三瓣。色白。每瓣有一淡紫條。



夷 辛

種類 年淺者有花無實。年久者方能結子。

採取 春二月間採之。曝乾。

製法 雷斅曰。凡使辛夷。拭去

赤肉毛後。以芭蕉水浸一宿。用漿水煮之。從已至未取出焙乾。若治

眼中患。卽一時去皮用。向裏實者。大明曰。入藥微炒。

性質 辛溫。無毒。

效能 散上焦風熱。通七竅。不利。用治頭風。腦痛。鼻病藥。

主治 五臟身體寒熱。風頭腦

七 蠶 辛

痛。面黧。久服下氣輕身。明目。增年耐老。〔本經〕溫中解肌。利九竅。通鼻塞。涕出。治面腫。引齒痛。眩冒。身兀兀。如在車船之上者。生髮髮。去白蟲。〔別錄〕

歷代記述攷證 【宋】大明曰

華諸家本草論辛夷曰。通關脈。治頭痛。憎寒。體噤。瘰癧。入面脂。生光澤。〔明〕李時珍本草綱目論辛夷

曰。鼻淵鼻熱。鼻窒鼻癢。及痘後鼻疳。並用研末。入麝香少許。葱白蘸入數次。甚良。〔明〕穆希雍本草經

疏論辛夷曰。辛夷味辛氣溫。性無毒。氣清而香味薄。而散。入手太陰

足陽明經。其主五臟身體寒熱。風頭腦痛。面黧解肌。通鼻塞。涕出。面

腫。引齒痛者。皆二經受風邪所致。足陽明主肌肉。手太陰主皮毛。風

邪之中人。心自皮毛肌肉。以達於五臟。而變爲寒熱。又鼻爲肺之竅。

頭爲諸陽之首。三陽之脈會於頭面。風客陽分。則爲頭痛。面黧。鼻塞

涕出。面腫。引齒痛。辛溫能解肌散表。芳香能上竅。頭目。逐陽分之風

邪。則諸證自愈矣。眩冒及身兀兀如在車船之上者。風主搖動之象

故也。風邪散。中氣溫。則九竅通矣。大風之中人。則毛髮脫落。風溼之

浸淫。則腸胃生蟲。散風行溼。則鬚髮生而蟲自去矣。久服下氣。輕身

明目。增年耐老。悉非風藥所能。雖出自神農本經。然而易世相傳。得無謬說。存而不論可也。〔清〕黃宮

樞本草求真論辛夷曰。辛夷辛溫。氣浮。功耑入肺。解散風熱。緣入鼻氣通天。肺竅開。鼻主肺風熱移於腦。則鼻多濁涕而淵。風寒客於腦。則鼻塞。經曰。腦滲爲涕。膽液不

澄。則爲濁涕。如泉不已。故曰鼻淵。並頭痛面黧。目眩齒痛。九竅不利。皆是風熱上攻。是宜用此芳香。上

竅頭目。象逐陽分風邪。則諸症自愈。但辛香走竅。血虛火燥。及偶感

風寒。不聞香臭者。其並禁焉。卽木筆花。去外皮毛微炒。

配合應用 治風寒入腦頭痛。或鼻寒流涕。或鼻淵涕下不止。屢

用。用辛夷。甘菊花。芥耳子。薄荷細辛。甘草。羌活。藁本。防風。川芎。

用。量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛者及非由外感者。禁用。惡五石脂。畏菖蒲。蒲

黃。黃連。石存。黃瓊。芎藭爲之使。書名方劑 辛夷散。治鼻生惡

肉。氣息不通。不聞香臭。〔嚴氏方〕辛夷。白芷。升麻。藁本。防風。川芎。細辛。木通。甘草各等分。爲末。每服二

錢。茶清下。

參攷資料 ●夷者。夷也。其苞初生如夷而味辛也。揚雄甘泉賦云。列辛雉於林薄。服虔注云。卽辛夷。雉夷聲相近也。今本草作辛矧。傳寫之誤矣。〔李時珍〕●辛夷花未發時。苞如小桃子。有毛。故名桃桃。初發如筆頭。北人呼爲木筆。其花最早。南人呼爲迎春。〔陳藏器〕

●辛夷處處有之。人家園亭亦多種植。先花後葉。卽木筆花也。其花未開時。苞上有毛。尖長如筆。故取象而名。花有桃紅紫色二種。入藥當用紫者。須未開時收之。已開者不佳。〔寇宗奭〕

【辛夷花】卽辛夷之處方用名。詳『辛夷』條。

【辛那】卽蔚那之別名。典見藥物大成。詳『香薷汁』條。

【辛芳】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【辛夷】即辛夷之古籍別名。典見綱目。詳「辛夷」條。

【辛夷】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【辛夷】即辛夷之古籍別名。典見本經。詳「辛夷」條。

【辰砂】即辰砂之處方用名。詳「辰砂」條。

【辰砂神】即辰砂用辰砂并赤者之處方用名。詳「辰砂神」條。

【辰砂冬】即麥門冬之處方用名。詳「麥門冬」條。

【辰砂心】即燈心草之處方用名。詳「燈心草」條。

【辰砂砂】即辰砂之古籍別名。典見雷公泡灸論。詳「辰砂」條。

【迄利加】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【那骨】即龍骨之古籍別名。典見楚書。詳「龍骨」條。

【那者悉】古籍別名。龍花。本經綱目。

產地 西南諸地。

形態 那者悉為雜木類之一種。可供藥用。性質 苦寒。無毒。

主治 熱結熱黃。大小便瀉。赤丹諸熱。明目。取汁洗之。治赤爛熱障。

【邪蒿】命名 本品葉紋皆斜。故名。

古籍別名 伊吹防風。日本外國名詞 Seseli libanotis, Koch var. daucifolia, DC.

(拉丁) イブキバウフウ(日本) 基本 係繖形科邪蒿屬。藥用邪蒿之莖根葉。

產地 生山野間。

形態 邪蒿為菜類之一種。自生草本。高二三尺。四月生苗。葉作二回羽狀複葉。有大小。其下部之葉羽狀分裂。葉紋皆斜。色似青蒿而不臭。其花作繖形花序。花小白色。其根莖葉皆可茹與藥用。



邪蒿

性質 辛溫。平。無毒。主治 胸膈中臭。邪氣。利腸胃。通血脈。積不足氣。

歷代記述攷證 【唐】管啟食醫心經論邪蒿曰。養熱和醬醋食。治五臟惡邪氣。厥數者。治脾胃腸癖。大渴熱中。暴疾惡瘡。參攷資料 邪蒿生食微動風。作羹食良。不與胡荽同食。令人汗臭氣。(孟詵)

【里木】即宜母之古籍別名。典見粵語。詳「宜母果」條。

【里辛】即辛子之日本名。詳「辛子」條。

命名 本品喻世之勇健者。幸災樂禍。好亂成性。但善用之則可防敵。故名。

地方用名 木防己。漢防己。古籍別名 解離(本經)石解。房苑。房慈。載君行(和漢藥考)。

外國名詞 Cocculus Diver-sifolium, Miq (Sinomenium acutum, Makino S. Diersifolium Diels)

基本 屬防己科。為防己之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。防己產廣東清遠。平崗。程定。連瀛等處。實則川谷間俱多生焉。

形態 防己為山野自生之蔓草。莖細小而頗長。呈綠色。稍作木質狀。葉互生。作心臟形。夏月於葉腋叢生淡綠色小形花。雌雄異株。後結圓形實。作青黑色。大三分許。

種類 漢防己為粗根。處處有肉塊。外部白色。內部黃色。類桔梗根。皮部在直徑六分之一處。內有黑紋。以白色輕虛者為良品。

木防己為莖莖。外皮灰褐色。內部污白色。有氣孔。吹其一端。則氣從他端出。如木通。

採取 二月八月。採根陰乾。製法 雷斅曰。凡使防己。勿用木條色黃腥皮。上有丁足子。不堪用。惟要心有花文黃色者。細剉。以車前根相對。蒸半日。晒乾。取用。李時珍曰。今人多去皮剉。酒洗晒乾用。

性質 辛。平。無毒。效能 治下焦濕熱。療風水要。



防己

燕爲優廉質斯之鑽痛藥。有特效。及爲利尿藥。用於水腫膀胱熱痛風症。

作用 在胃中大激胃黏膜。使胃液分泌驟增。入腸能激腸壁神經。使吸收力強大。同時又能阻止腸液之分泌。入血中令全身黏膜充血。而以腎臟爲尤顯。全身之過量水分。即被驅向腎臟。而腎臟之工作。亦就此而迅速。

主治 風寒溫癰熱氣諸癩。除邪。利大小便。(本經) 療水腫風腫。去膀胱熱傷。寒熱邪氣。中風。手脚擊急。通腰理。利九竅。止洩。散癰腫。惡結。諸癩疥癬蟲瘡。(別錄)

張仲景之發明 防己一味。經考徵如下。①木防己湯證曰。支飲。②防己茯苓湯證曰。四肢腫。③防己黃耆湯證曰。身重。又曰。腫及陰。以上三方。防己皆四兩。④己椒瀝黃丸證曰。腸間有水氣。以上一方。防己一兩。

歷代配製攷證 【唐】甄權藥性本草論防己曰。治溼風。口面。疔斜。手足拘痛。散留痰。肺氣喘嗽。

七畫 防

【金】張元素珍珠囊論防己曰。治中下溼熱腫。洩脚氣。通行十二經。

【明】李時珍本草綱目論防己曰。木防己。主治男子肢節中風。毒風不語。散結氣。癰腫。溫瘧。風水腫。去膀胱熱。【明】經希雍本草經疏論防己曰。防己味辛苦。平溫無毒。潔古謂其大苦。辛寒爲得之。然性燥而不淳。善走下行。長於除溼。以辛能走散。兼之氣悍。故主風寒溫癰。熱氣諸癩。除邪氣。除溼下行。故利大小便。此本經所載也。別錄療水腫風腫。去膀胱熱。通腰理。利九竅。止泄者。皆除溼之功也。其曰傷寒寒熱。邪氣中風。手脚擊急。則寒非燥藥可除。不宜輕試。又曰散癰腫。惡結。諸癩疥癬蟲瘡。非在下部者。亦不宜用。治溼風。口眼喎邪。手足拘痛。真由中風溼而病者。方可用之。留痰。非由脾胃中溼熱而得者。亦不宜服。肺氣喘嗽。不因風寒溼所鬱。發理癰滯者。勿用。惟治下焦溼熱腫。洩脚氣。行十二經溼爲可任耳。生漢中。內有淡黑紋。如車輻解者良。【清】黃宮繡本草求真論防己曰。防己辛苦大寒。性險而

健。善走下行。長於除溼。通竅利道。能瀉下焦血分溼熱。及療風水要藥。故凡木溼喘嗽。熱氣諸癩。溫癰脚氣。水腫風腫。癰腫惡瘡。及溼熱流入十二經。以致二陰不通者。皆可用此調治。若屬氣腫痛。如溼則加蒼朮。惡改木瓜。熱加黃芩。黃藥。風加羌活。蕪麻。痰加竹瀝。南星。痛加香附。木香。血虛加四物。大便祕加桃仁。紅花。小便祕加牛膝。溼瀉。痛連臂。加桂枝。威靈仙。痛連脇。加膽草。隨症通治。斯爲善矣。但此氣味苦寒。藥力猛迅。若非下焦血分實熱。實溼。及非二便果不通利。妄用此藥投治。其失匪輕。不可不知。此雖有類黃藥地膚子。但黃藥之瀉膀胱溼熱。則并入腎瀉火。味苦而不辛。此則辛苦兼見。性險而健。故於風水脚氣等症。兼理地膚子之瀉膀胱溼熱。味苦而甘。力稍遜於黃藥。此則健險異常。有幸有甘。而爲亂階之首也。其一瀉熱與溼。而氣味治功。各別如此。已有二種。曰漢曰木。治風須用木防己。治水須用漢防己。漢已根大而虛。通心有花紋。色黃。木已黑點。黃膠木

強。酒洗用。【清】鄒澍本經疏證論防己曰。防己之爲物。有黑紋貫於黃肉中。其用爲治水。侵於脾無感矣。然仲景治風水皮水。所謂身重。汗出惡風。水氣在皮膚中。四肢腫。聾聵動者。均與此合。以身重固係脾病。四肢爲脾之合故也。獨木防己湯之腸間支飲。已椒瀝黃丸之腸間水氣。一在上。一在下。似不關乎脾者。亦皆用之何也。蓋此上下。盡病治其中也。夫支飲不關乎下。何以用芒硝。腸間有水氣。不關乎上。何以用葶藶。故脈沉緊。面色黧黑。即病根於下之徵。口舌乾燥。乃病及於上之徵。支飲之心下痞。腸間水氣之腹滿。雖於脾有略上。略下之差。然究竟不得不爲脾病。且病在上吐之則愈。在下下之則愈。吐下之不愈。病不在中。而何在哉。此可見水飲等病。在經絡肌肉者多。虛在胸膈腸胃者多。實。在胸膈者。猶實中之虛。惟在腸胃乃爲實中之實耳。然虛者反挾熱。實者反挾寒。此其間則亦有故。蓋惟其虛與熱。斯瀉於外。舉於上。惟其實與寒。斯著於內。沉於下。此防己黃

七 薑 防

芪湯。防已茯苓湯。所以用芪用朮。木防已湯。所以用參。已椒瀝黃丸。所以用椒目也。防已地黃湯。地黃最重。防風桂枝次之。防已甘草最少。偏以防已名湯。且冠於地黃之上何歟。夫固因證之主為之名耳。靈樞經狂言曰。狂言驚亂。善笑好歌樂。妄行不休者。得之大恐。取手陽明太陽太陰。素問舉痛論曰。恐則精卻。卻則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行。今日病如狂狀。妄行獨語。不休不與。精卻而上焦閉者。合乎用地黃。是治精之卻也。用防已是治上焦之閉。下焦之脹也。曰無寒熱。恐其誤以為外感也。曰其脈浮。恐其直以為內傷也。夫氣之乍動。上下拂逆。顛倒。命曰傷。而實未有所去。命曰無所傷。則方之奉我生者。且倒戈反與我為難矣。然與我為難之氣。終不能復奉我以生。如火之既煙。則不能復反於薪。而既煙。則薪中非有未燃者在也。故治之道。以補為行。以行為補。以補為行。是地黃之潤上。使得大便而已。下焦之脹。即藉以谷精。而安其居。使不卻

也。以行為補。是防已逐腎氣之實於肌肉血脈者。使潤其道而通且降。防風使氣之可復。反還者於衛。以布一身。則血脈肌肉中得其常。不反攻以凌於心也。如此。又何能不以二物名湯。又安得不以防已冠地黃耶。傷寒論曰。發汗過多。其人又手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。彼因汗多心虛。胸中飲氣凌心。此則血脈中水氣凌心。然胸中之飲。乃實有是物。血脈中水。則但有其氣。並無其實。故一則實煎與之一。則以酒浸取汁。亦僅取其氣也。防已之莖如木。故名木防已。後世以其出漢中。故又名漢防已。非二物也。故仲景但以防已名湯。則曰木防已湯。連他物以為名。則除去木字。以便稱謂耳。後人以莖為木。以根為漢。及治風治水之說。均可弗論。

國外學說 和漢藥考曰。防已有二種。一為漢防已。一為木防已。藥舖所售者。多以防已科植物木防已之根名漢防已。其莖莖則名木防已。一說木防已即用木防已莖。漢防已則用防已科條防已之根云。

近人學說 張山雷曰。防已絞如車輻。體質空鬆。蘇頌謂其折莖吹之。氣從中貫。故專以通泄疎導為用。而味又辛。則外達肌膚。下通二便。昔人謂其散風者。亦以輕能外達言之。實則疏泄而清利溼熱。是其專職。頗與木通之體用相近。則專治溼熱有餘。二便不利。而實非風家主藥。名曰防已者。以脾胃為已土。喜燥惡溼。溼淫於內。則氣化不行。而水失故道。為腫為瘡。為脚氣。皆已土受邪之病。而此能防礙之。是為古人命名之真義。非所謂名之以其能者耶。古今主治。無不從溼熱二字着想。此物產於漢中。范子計然。已有此說。故名漢防已。藏器雖謂治風用木防已。治水用漢防已。張石頑亦有根苗分治之說。似乎二者功力頗近。正不必拘牽舊說。執而不化。東垣李氏。獨謂其如人之險而健。幸災樂禍。能為亂階。又歷舉其三不可用。駁之最甚。然持論皆不切實。一說詳瀕湖綱目。而石頑逢原亦歷歷言之。而又謂十二經溼熱。莖莖不遇。下

六 六 四

注脚氣。膀胱積熱。非此不可。真行經之仙藥。忽抑忽揚。殊覺無謂。要之藥以治病。對症自有奇功。譬如巴豆烏附。大毒最劇。苟能用得其宜。起病乃極迅速。何必專責其短。等於吹毛求疵。反以眩惑人心。望而生畏。且以啓後學之疑。非治藥物之正旨矣。東垣又謂此是血分藥。瀉血中溼熱。既亦不確。此物空鬆。氣疏以達。行經利水。正其以氣用事。且味薄質輕。豈可認作瀉血攻破之劑耶。

配合應用 ●治皮水腫。按之沒指。不惡風水。氣在皮膚中。四肢善動者。防已茯苓湯主之。防已黃耆桂枝各三兩。茯苓六兩。甘草三兩。水一升。煎半升。日二服。（張仲景方）

●治風水惡風。汗出身重。脈浮。防已黃耆湯主之。防已一兩。黃耆二兩。二錢半。白朮七錢半。炙甘草半兩。對散。每服五錢。生薑四片。棗一枚。水一盞半。煎八分。溫服。良久再服。腹痛加芍藥。兼治風溼相搏。關節沈痛。微腫惡風。（張仲景方）

●治小便淋瀝。三物木防已湯。

用木防已。防風。葵子各二兩。以咀水五升。煎二升半。分三服。(千金方)

②治傷寒喘急。防已人參等分。爲末。桑白湯服二錢。不拘老小。

③治肺痿喘嗽。漢防已末二錢。漿水一錢。煎七分細呷。(儒門事親方)

④治肺痿咯血多痰者。漢防已。葶藶等分爲末。糯米飲下。每服一錢。(古今錄驗方)

⑤治鼻衄不止。生防已末。新汲水服二錢。仍以少許啗之。(聖惠方)

⑥治霍亂吐利。防已白芷等分爲末。新汲水服二錢。(聖惠方)

⑦治目睛暴痛。防已酒浸三次。爲末。每一服二錢。溫酒下。(摘玄方)

⑧解雄黃毒。防已煎汁服之。用薑 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛而無濕熱者。禁用。惡細辛。畏草薺。女苑。肉桂。伏硝石。殺雄黃毒。以殷壁爲之。使

著名方劑 ①防已地黃湯。治痢如狂狀。妄行獨語不休。無寒熱。

七畫 防

其脈浮。(金匱方)防已一分。桂枝。防風各二分。甘草一分。四味以酒

一杯浸之。絞取汁。生地黃二斤。以

咀蒸之。如斗米飯久。以銅器盛其

汁。更較地黃汁。和分再服。②木防已湯。治腸間支飲。其人喘滿。心下

痞堅。面色黧黑。其脈沈緊。得之數

十日。醫吐下之不愈。此湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈

者。宜此湯去石膏。加茯苓芒硝湯

主之。(金匱方)木防已三兩。石膏

鷄子大十二枚。桂枝二兩。人參四

兩。以水六升。煮取二升。分溫再服。

參攷資料 ①去下焦溼腫及痛。并泄膀胱火邪。必用漢防已。草

龍膽爲君。黃藥知母甘草佐之。防已乃太陽本經藥也。(張元素)②

動者。防已茯苓湯主之。千金方。治

遺尿小便澀。三物木防已湯主之。

而李東垣有云。防已乃下焦血分

之藥。病在上焦氣分者禁用。試觀

金匱諸方。所治之證。果在氣分乎。

血分乎。抑在上焦乎。下焦乎。蓋防

已乃平氣通上之藥。其性功與烏

藥木通相類。而後人乃以防已爲

下部藥。不知何據。東垣又云。防已

大苦寒。能瀉血中溼熱。比之於人

則險而健者也。幸災樂禍。能爲亂

階。然善用之。亦可敵兇突險。此駭

弘景曰。今出宜都建平。大而青白

色。樹軟者好。黑點木強者不佳。服

食亦須之。蘇頌曰。今點中亦有之。

但漢中出者。破之文作車輪解。黃

實而香。莖梗甚嫩。苗葉小。類牽牛

折其莖。一頭吹之。氣從中貫如木

通。然他處者。青白虛軟。又有腥氣

皮嫩。上有丁尼。子名木防已。蘇恭

言木防已不任用。而古方張仲景

治傷寒。有增減木防已湯。及防已

地黃湯。五物防已湯。黃芩六物湯

等。孫思邈治遺尿小便澀。亦有三

物木防已湯。啟器曰。如陶所說。漢

木二防已。卽是根苗爲名。(李杲

【防已實】

製法 採得焙研用。主治 脫肛。煎飲代

【防風】

命名 防者禦也。本品爲療風要藥。故名。

古籍別名

銅芸(本經)回草。屏風(別錄)蒲根。百枝(別錄)回

藥方用名

黃防風。青防風。北

古籍別名

回草。屏風(別錄)蒲根。百枝(別錄)回

藥方用名

黃防風。青防風。北

古籍別名

回草。屏風(別錄)蒲根。百枝(別錄)回

藥方用名

黃防風。青防風。北

七畫 防

百蓋(吳普本草)

外國名詞 Sisor. C. ventosa. fumi. B. of H.

基本 屬繖形科防風之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。

防風以黑龍江省洮南縣產最多。春秋兩季出新。必經烟台。牛莊運來。名曰牛莊風。又有一種產河北。古北口熱河等一帶。清明前後收成。出天津運來。名曰津風。均野生。

形態 防風為自生之宿根草。早春生苗。色初紫。葉互生。及高一二尺。莖葉俱作青綠色。莖深而葉淡。似青蒿而短小。五月間開細白花。中心攢聚作大房。似薔薇花。實如胡荽而大。其根與薔薇根相類。作紡錘狀。色黃白。長尺餘。形極似胡蘿蔔。脆而易折。乾則不脆。生根味甚美。

種類 漢種防風。日本於享保年中傳入。漢種栽植於山城八幡。大和宇陀。是為和防風。(和即日本)名宇陀防風。或藤助防風。供藥用。真防風(邪蒿之一種)為山野自生之雜草。高二三尺。葉類胡蘿蔔。無毛。花實俱類芹。此草伊吹

山最多。故名伊吹防風。或名筆防風。江戶防風。山人參。其根供藥用。濱防風。或自生於海濱沙地。或栽培於園圃。莖高尺餘。葉略似芹菜。一柄作三極。各著三葉。夏月於莖端發白色複繖花。花軸及花梗。密生白毛。根長六七寸。粗如拇指。有疣瘰。謂之伊勢防風。或八百屋防風。栽培者與自生者稍異。其葉芳香。且有辛味。可用以調味。此根時或用於和方。白川防風。產日本京都白川山。故有此名。亦有稱山人參。石防風。山防風者。其葉類芹菜。故又名芹菜防風。根長六七寸。黃白色。質堅。不適藥用。又五島防風。(防葵)一名牡丹人參。木防風。削防風。瀨戶防風。薩摩防風。以產日本肥前五島者最佳。故有此名。本草綱目啓蒙記其形狀曰。現在所傳之種。世人不察。誤呼朝鮮人參。葉似牡丹葉而小。帶白色。如數粉者然。子生三年。而有花實。其葉初叢生。三年者。抽莖三四尺。乃互生。葉間生枝。夏月每枝梢開小白花。成傘。如大葉芎藭。花後結實。亦如大葉芎藭。實熟則苗根俱枯。故取

二年秋根用之。

種植 土質以多含細砂之輕鬆土地為最適。氣候以溫和者為最適。故欲栽培防風。必擇其細砂輕鬆之土地。溫和之氣候。而後可以栽培也。防風多自生於海濱。而無專栽者。惟外國多有專栽者。其所產地方甚廣。如法德俄美及日本等諸國。皆有栽培。其種類無可分別。不能表述其詳。故略。作畦。幅三尺五寸至四尺五寸。高四五寸。長短不一。而後於畦上作條播之小溝。不可過深。大又不宜過淺。狹使之勻。均為度。且其間之土。必須細碎。既畢。乃可擇時播種。播種之期。恒在四月上旬。直播種子於畦上之小溝中。既播之後。上覆以細砂土。微微壓之。而後待其發芽生長可也。當其種子未播之二十日以前。當施基肥一次。其肥以腐熟之堆肥充之。既播之後。其肥以人糞尿充之。自種至收。分作四次施與。第一次在播種後十餘日施之。第二次在播種後二十日施之。第三次在中耕後施之。第四次在培土後施之。如

六六六

此施與甚適。播種之後。發芽至三四寸時。可行中耕。不可過深。亦不宜過淺。何則。過深恐害防風之根株。且易遭旱魃之患。過淺則與不耕無異。徒耗多量之勞力。故耕至二三寸處。為最適也。培土。所以使其莖葉軟化也。其培土之時期。在其生長至一尺餘時。正可使之軟化。以充藥用也。培土高約六七寸已足。不可過高。過高則濕。其株頂恐不軟化。而反有枯死之患。過低則不能軟化。不可供藥用。故培土時。當以六七寸為最適。且既培之後。宜少壓之。以防其土倒下。自四月下種。至十月十一月之時。其莖率皆軟白。於是可以從事收穫。收穫之法。即由根際除去所培之土。由根元而切取之可也。栽培防風一畝。約需種子三四升。收穫量視栽培之良否而分。其價不甚貴。故所獲之利。較之栽培他種藥用作物之利稍下也。採取 二月十月間。採根曬乾。製法 吳棗曰。凡使以黃色而潤者佳。白者多沙。條不堪用。或宜實而潤。頭節堅者。去蘆井。又頭又

尾及形者弗用。能令人吐。

性質 甘溫無毒。

效能 散風勝溼。用於感冒及痛風。為緩和之發汗藥。有鎮痛祛風起痺之效。對於神經有刺激鼓舞作用。服大有發口渴舌乾耳鳴頭眩等副作用。

主治 大風頭眩痛。惡風。風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身（本經）煩滿脇痛。風頭面去來。四肢暴急。字乳。金指內癢（別錄）

醫代記述攷證 【宋】大明諸家本草論防風曰。治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚。及癢。通利五臟。關脈。五勞七傷。氣損。盜汗。心煩。體重。能安神定志。勻氣脈。【金】張元素珍珠囊論防風曰。治上焦風邪。瀉肺實。散頭目中滯氣。經絡中留溼。主上部見血。【元】王好古湯液本草論防風曰。搜肝氣。【元】李杲藥物法象論防風曰。防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至者。風藥中潤劑也。若補脾胃。非此引用不能行。凡脊痛項強。不可回頭。腰

七畫 防

傾折。項似拔者。乃手足太陽證。當用防風。凡瘡在胸臑已上。雖無手足太陽證。亦當用之。為能散結去上部風病。人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於上中瀉本也。【明】繆希雍本草經疏論防風曰。防風味甘溫。別錄兼辛而無毒。氣厚味薄。入手陽明足少陽厥陰風藥也。治風通用。升發而能散。故主大風頭眩痛。惡風。風邪。周身骨節疼痛。脇痛。風頭面去來。四肢暴急。下乳。金瘡。因傷於風。內運。其云主目無所見者。因中風邪。故不見也。煩滿者。亦風邪客於胸中。故煩滿也。風寒溼三者合而成痺。祛風燥溼。故主痺也。發散之藥。務可久服。其曰輕身亦溼去耳。別錄云。又頭者令人發狂。又尾者發痼疾。子似胡妥而大。調食用之。香而療風更優也。【清】黃宮繡本草求真論防風曰。防風味甘微溫。雖入足太陽膀胱。以治上焦風邪。頭痛目眩。脊痛項強。周身盡痛。然亦能入脾胃二經。以為去風除溼。蓋此等於卑賤卒伍。任主使喚。能循諸經之

藥。以為追隨。故同解毒藥。則能除溼持瘡。同補氣藥。則能取汗升舉。實為風藥潤劑。比之二活。則質稍輕。氣亦稍平。凡屬風藥。皆可通用。但血虛症急。頭痛不因風寒。泄瀉不因寒溼。陰虛盜汗。陽虛自汗。火升發嗽者。則並當知所禁矣。出北地黃潤者佳。酒風車風。不堪入藥。上部用身。下部用梢。【清】徐澗溪本草經百種錄論防風曰。凡藥之質輕而氣盛者。皆屬風藥。以風即天地之氣也。但風之中人。各有經絡。而藥之受氣於天地。亦各有專能。故所治各不同。於形質氣味。細察而詳分之。必有一定之理也。防風治周身之風。乃風藥之統領也。【清】張隱庵本草崇原論防風曰。防風莖葉花實兼備五色。其味甘。其質黃。其臭香。稟土溼之專精。治周身之風證。蓋土氣厚則風可屏。故名防風。風淫於頭。則大風頭眩痛。申明大風者。乃惡風之風邪。頭痛不已。必至目盲無所見。而防風能治之。又風邪行於周身。甚至骨節疼痛。而防風亦能治之。久服則土氣盛。故輕身。元人王好古曰。病

頭痛。肢節痛。一身盡痛。非羌活不能除。乃御亂反正之主。君藥也。李東垣曰。防風治一身盡痛。隨所引而至。乃卒伍卑賤之職也。愚按神農以上品為君。羌活防風。皆列上品。俱散風治病。何以貴賤迥別。若是後人發明藥性。多有如此謬妄之論。雖曰無國治法。學者遵而信之。陋習何由得洗乎。【清】鄭樹本經疏證論防風曰。防風獨活。氣味俱薄。性浮以升。防風自上達於周身。獨活則自下達於周身。獨活能治風。然其所治之風。是溼化風。本於陰者也。防風亦能治溼。然其所治之溼。是風化溼。本於陽者也。獨活散溼以化風。然時與防風合奏散風之功。防風祛風以行溼。然時與獨活協為除溼之助。若僅以謂風能勝溼。風能燥溼者。亦淺之乎。二味之治矣。金瘡痛者。經脈以血去而瀉。四肢舉者。經脈以溼釀而拘。經曰。經脈者。所以行血氣。營陰陽。濡筋骨。利關節者也。夫營行脈中。每患於溼。以為血病。血病則邪氣惡血住留。住留則傷經絡。經絡傷則不能行血氣。營陰陽。故患為

六六七

七 盡 防

諸痺。甚者且不得濡筋骨利關節。致骨節酸痛。機關不得屈伸。且拘攣矣。其脊痛項強不可回顧。腰似折。項似拔。又皆由溼以化風。蓋真陽不暢。水鬱即溼生。溼鬱又能化風。獨活湯水中之陽。以杜溼之根。防風通陽中之陰。即除溼以絕風之源。此所以無間久新之百節痛風。及骨節痛煩滿。由於風行周身者。均可分析治之矣。衛氣失常。篇黃帝曰。衛氣之留於腹中。蓄積不行。菴菴不得常所。使人支脇胃中滿。喘呼逆息。伯高曰。其氣積於胸者。上取之。積於腹者。下取之。今之責豚癩瘰。女子疝瘕。非積於下者耶。大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。非積於上者耶。風寒所擊。金瘡泄其一處。諸處護衛皆疏也。溼其源。使來者自盛。則護衛仍密矣。故其功係之獨活。風行周身。骨節疼痛煩滿。諸處皆有阻。非一處之病也。若更溼其源。使來者益甚。不更慮其阻亦益甚耶。故必導其流。使之暢行無阻。其功不得不屬防風矣。更覈之金匱要略。侯氏黑散。桂枝芍藥知母湯。薯蕷丸。竹葉湯。

之用防風。千金三黃湯之用獨活。其義不益可明哉。曰大風四肢煩重。心中惡寒不足。曰支節疼痛。身體羸羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。曰虛勞諸不足。風氣百疾。曰產後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。其病皆弛。其本皆虛。虛者宜益。弛者宜張。宜益宜張。則有合乎防風。辛甘之陽。曰中風手足拘急。百節疼痛煩熱。心亂惡寒。經日不欲飲食。其病煩急。其本不虛。不虛而急者。宜追逐擊散之。則有合乎獨活之苦辛。自陰及陽矣。大率獨活氣峻。防風氣緩。緩者比於補益。峻者比於攻伐。補劑多自下及上。防風者偏自上而至下。是以得為補劑之佐。獨活者偏自下而上。是以專為攻劑之佐。體相似而用不同。職此故耳。

近人學說 張山雷曰。防風為風病之主藥。本經所主皆風門重症。故首以主大風一句。表揚其功用。則驅除外風。兼能通痺起廢。其效最弘。本經列於上品。正以其足當大任而推重之。非無故也。後人但以爲感冒風寒。輕疏發散之用。未免視之太淺。而東垣且謂之爲卒伍卑賤之職。抑何薄之至於此極。又曰。防風爲泄風之上劑。然以走竅宣散成功。必其人氣血充足。體質堅實。猝爲外邪所乘。乃能任此辛溫宣泄。而無流弊。凡古人治風諸方。皆不能輕用於今時東南之人者。以質脆陰薄。不能勝此燥烈之性也。防風雖不至如烏附姜辛之剛烈。然溫燥之氣。撲人眉宇。確是溫辛一類。故治此邦柔脆之人。常須識得此中消息。方不至徒殺父喪。誤人生命。所以溫熱之風邪外受。凡柴葛羌防皆當審慎。而肝陽之動風。血虛之風溼。又必柔潤息風。方爲正治。散風諸劑。非徒無益。而又害之。纏仲醇已謂南方中風。血虛溼急。陰虛盜汗。陽虛自汗。皆忌防風。石頑亦謂婦人產後。血虛發瘧。嬰兒瀉後。脾虛發搐。皆爲切禁。洵是見到之語。

配合應用 ①防風能制黃芪。黃芪得防風。其功愈大。乃相畏而相使者也。 ②得葱白能行周身。得澤瀉。藥本療風。得當歸芍藥湯起石再餘。

六 六 八

糧療婦人子隨風。 ①防風同黃耆芍藥。則能實表止汗。同荊芥穗白芷生地黃地榆黃耆。治破傷風有神。同甘草桔梗紫蘇桑根白皮杏仁細辛。解利傷風。去紫蘇換薄荷。加石膏。兼除風熱。用麻黃易紫蘇。治風寒鬱於腠理。皮膚致密無汗。入羌活湯。兼除大陽經傷風突頭痛。亦入治風痺藥用。若入治大風腐風藥中。須加殺蟲藥活血藥。乃可不宜純用風藥也。 ②治自汗不止。防風去蘆爲末。每服二錢。浮麥煎湯服。防風用麩炒。猪皮煎湯下。(朱氏集驗方) ③治睡中盜汗。防風二兩。芍藥一兩。人參半兩。爲末。每服三錢。臨臥飲下。(易簡方) ④治消風順氣。老人大腸秘澀。防風枳實麩炒一兩。甘草半兩。爲末。每食前白湯服二錢。(簡便方) ⑤治偏正頭風。防風白芷等分爲末。煉蜜丸。彈子大。每嚼一丸。茶清下。(普濟方) ⑥治破傷中風。牙關緊急。天南星。防風等分爲末。每服二三匙。薑

子小便五升。煎至四升。分二服。即止也。(經驗方)

①治小兒解頤。防風、白及、柏子仁等分爲末。以乳汁調塗。一日一換。(養生主論方)

②治婦人崩中。獨聖散用防風去蘆頭。炙赤爲末。每服一錢。以麴酒糊調下。更以麴糊酒投之。此藥累經效驗。一方加炒黑蒲黃等分。(經驗方)

③解烏頭毒。附子、天雄毒。並用防風煎汁飲之。良。亦解芫花毒。及野菌毒。(千金方)

④解諸藥毒已死。只要心間溫暖者。乃是熱物犯之。只用防風一味。插冷水澀之。(萬氏積慶堂方) 用鹽 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火炎而無風邪者禁用。畏葶藶。殺附子毒。惡象蘆。白欬。乾姜。芫花。

著名方劑 防風通聖散。治風熱壅盛。表裏三焦皆實者。此方主之。(河間方) 防風、川芎、當歸、芍藥、大黃、薄荷、麻黃、連翹、芒硝各半兩。石膏、黃芩、桔梗各一兩。滑石、甘草各三兩。荊芥、白朮、梔子各二錢。生

七畫 防

姜三片。右爲細末。每服三錢。

參攷資料 ①防者禦也。其功療風最要。故名。屏風者。防風隱語也。曰芸。曰苗。曰間者。其花如茴香。其氣如芸薹蘭爾也。(李時珍)

②防風生沙苑川澤。及邯鄲鄆郡上。二月十月採根暴乾。(別錄) ③鄆縣名無沙苑。今第一出彭城關陵。卽近鄆郡者。鄆州百市亦有之。次出襄州義陽縣界。亦可用。惟以實而脂潤。顛節堅如蚯蚓頭者爲好。(陶弘景) ④今出齊州龍山最善。淄州兗州青州者亦佳。葉似牡

蒿附子苗等。沙苑在同州南。亦出防風。輕虛不如東道者。陶云無沙苑誤矣。(蘇恭) ⑤今汴東淮浙州郡皆有之。莖葉俱青綠色。莖深而葉淡。似青蒿而短小。春初時嫩紫紅色。江東宋亳人採作菜茹。極爽口。五月開細白花。中心攢聚。作大房。似薔薇花。實似胡荽子而大。根土黃色。與蜀葵根相類。二月十月採之。關中生者三月六月採之。然輕虛不及齊州者良。又有石防風。出河中府。根如蒿根而黃。葉青花。白。五月開花。六月採根曝乾。療頭

風脹痛。(蘇頌) ⑥江淮所產者。多是石防風。生於山石之間。二月採嫩苗作菜。辛甘而香。呼爲珊瑚菜。其根粗醜。其子亦可種。(李時珍)

【防風子】

主治 療風疾更佳。水調食之。

【防風花】

主治 四肢拘急。行履不得。經脈虛羸。骨節間痛。心腹痛。

【防風葉】

主治 中風。熱汗。(別錄)

【防葵】

命名 本品葉似葵。根似防風。香味亦似之。故名。

處方用名 防葵根。

古籍別名 梨蓋(本經)房苑。

(別錄)利茹。爵離方。蓋農果。(吳普本草)

外國名詞 Ponedanum

Japonicum, Thunb. (拉丁) * タンパウフウ(日本)

基本 係繖形科防葵之根莖。產地 凡山野海邊之向陽處。恒多有出。

形態 防葵爲毒草類之多年生草本。莖高二尺餘。葉爲分裂不

規則之羽狀複葉。質厚而硬。夏日枝梢上開白色五瓣之小花。複繖形。花序狀如葱花。至秋結實。其根似防風可供藥用。

採取 三月採根。曝乾。

製法 雷斅曰。凡使須揀去紳末。用甘草湯浸一宿。漉出。曝乾。用黃精自然汁一二升。拌勻。土器中炒。至汁盡用。

性質 辛寒。無毒。

主治 疝瘕腸洩。膀胱熱結。瀉不下。咳逆溼痞。癩癩。驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。(本經)療五臟虛氣。小腹支滿。臄脹。口乾。除腎邪。強志。中火者不可服。令人恍惚。見鬼。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論防葵曰。久服主邪氣驚狂。【唐】甄權藥性本草論防葵曰。主癱瘓氣塊。膀胱宿水血。氣痛。大如碗者。悉能消散。治鬼疔。百邪。鬼魅。精怪。通氣。【明】李時珍本草綱目防葵條曰。爲神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火者服之。令人恍惚。見鬼。陳廷之小品方云。防葵

七畫 防

多服令人迷惑恍惚如狂。按雞羅云。重陽者狂。脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎。是豈寒而無毒者乎。不然則本經及蘇恭所列者。是防葵功用。而別錄所列者。乃似防葵之狼毒功用。非防葵也。狼毒之亂防葵。其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘕。鼈腹大方中。多用防葵。皆是狼毒也。

參攷資料

① 莖葉如葵。上黑黃。二月生根。根大如桔梗。根中紅白。六月花白。七月八月實白。三月採根。(吳普) ② 今惟出襄陽地。他郡不聞也。其葉似葵。每莖三葉。一本十數莖。中發一幹。其端開花如葱花。景天翠而色白。六月開花。即結子。根似防風。香味亦如之。依時採者乃沉水。今乃用枯朽狼毒當之。極爲謬矣。(蘇頌)

八畫 乳

八 畫

【乳汁】即人乳之處方用名。詳「人乳」條。

【乳汁草】即乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「乳藤」條。

【乳汁藤】即乳藤之別名。詳「乳藤」條。

【乳羊】即仙茅之古籍別名。典見范氏大虞衡志。詳「仙茅」條。

【乳牀】即石牀之古籍別名。典見綱目。詳「石牀」條。

【乳花】即石花之原名。詳「石花」條。

【乳門草】即乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「乳藤」條。

【乳柑】即柑之花香實圓。膚理瑩澤。擊之有香。務喚人者。爲柑中絕品。詳「柑」條。

原名 薰陸香。

【乳香】 命名 本品乃乳香樹皮中之津液。垂滴如乳頭。其氣芬芳。故名。

處方用名 製乳香。明乳香。滴乳香。

古籍別名 馬尾香。(海藥)天

六七〇

梨子形乳頭形。鐘乳形等之膠質樹脂。表面蒙有白色粉塵。破碎面有似鱗之光澤。咬之則黏附齒牙。涎液成爲乳狀。氣香而味苦。燒之則發出香氣爽快之煙。而遺留黑灰。



乳 香

採取 由乳香樹採取乳香之方法。即於二三月間。於樹幹皮部。順次刺傷於其下部。刺離皮部約四寸許。再開一狹溝。則從刺傷處。泌出之乳液。流於溝中。待其凝結。即採集之。

製法 蘇頌曰。凡使乳香。性至粘難碾。用時以綫袋掛於窗隙間。良久取研。乃不黏也。大明曰。入丸散。微炒殺毒。則不黏。李時珍曰。或首乳香入丸藥。以少酒研如泥。以水飛過。曬乾用。或首以燈心同研。易細。或首以糯米數粒同研。或首以人指甲二三片同研。或首以乳鉢坐熱水中研之。皆易細。外丹本

澤香。(內典)浴香。吐嚙香。摩勒香。多伽羅香。(綱目)麻刺香。名香。纏木香。名乳香。的乳香。明王珍。(和漢藥考)

外國名詞 *Platanus terstina* on, L. (拉) (Indian Frankincense) (英)

基本 係將橄欖科乳香樹屬之樹幹刺傷。使滲出津液而凝結者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乳香產自印度羣島。由架喇吉打運來。和漢藥考曰。產亞拉伯東南部之巴葛拉馬葛。非洲東部之蘇馬里及東印度地方。

形態 乳香樹爲高一丈至二丈之小喬木。葉互生。作翼狀。花甚小。呈白色或淡赤色。其種類甚多。有 *B. floribunda*, *Roylo*, *B. Carteri*, *Bierd*, *B. sacra*, *Thiuck*, *B. serrata*, *Rozb*, *B. glabra*, *Rozb*, 等等。此等所採取之乳香。可大別爲二種。即從非洲採取者。謂之亞拉伯種。孟買甲谷倫及其他諸國所產者。悉謂之印度種。其形狀爲黃白色或灰白色。作圓球形。

草云。乳香以非質。悉吞服。伏成汁。最柔五金。丹房鑿源云。乳香。嘔。調。

性質 微溫無毒

成分 由揮發油七%。樹脂五〇至五五%。膠質三〇至三五〇而成。

效能 調氣活血。伸筋定痛。治跌傷。用作消解癰疽瘡瘍藥。

主治 主風水腫。腫去惡氣。伏尸。癰瘡。瘰癧。乳香同功。

歷代記述攷證 【南北朝】徐

之才雷公藥對論乳香曰。治不眠。

【唐】陳藏器本草拾遺論乳香曰。

治耳聾。中風。口噤。不語。婦人血氣。

止。大腸洩。痔瘡。諸瘡。令內消。能發

酒。理風冷。【唐】李珣海藥本草論

乳香曰。仙方用以辟穀。【宋】大明

諸家本草論乳香曰。下氣益精。補

腰膝。治腎氣。止霍亂。衝逆。中邪氣。

心腹痛。疰氣。煎膏止痛。長肉。【金

張元素珍珠囊論乳香曰。補腎。定

諸經之痛。【明】李時珍本草綱目

論乳香曰。消癰疽。諸毒。托裏護心。

活血定痛。伸筋。治婦人產難。折傷。

【明】繆希雍本草經疏論乳香曰。

乳香辛熱微毒。元素苦辛氣厚。入

八畫 乳

足大陰手少陰。兼入足厥陰經。風水毒腫。邪干心脾。惡氣內侵。亦由二經虛而邪易犯。癰瘡。瘰癧。總因心脾為風濕熱邪所干致之。脾主肌肉而痛癢。瘡瘍皆屬心火。此藥正入二經。辛香能散一切留結。則諸證自瘳矣。日華子云。煎膏止痛。長肉。陳藏器云。治婦人血氣。療諸瘡。令內消。則今人用以治內傷諸痛。及腫毒。內服外敷之藥。有自來矣。【清】黃宮繡本草求真論乳香曰。乳香即書所云。薰陸香者是也。香。質性溫不潤。諸書曷言於血有補。詎知血因氣逆。則血凝而不通。以至心腹絞痛。毒因氣滯。則血聚而不散。以至痛處異常。乳香香竄入心。既能使血宣通。而筋不伸。復能入腎溫補。使氣與血互相通活。俾氣不令血阻。血亦不被氣礙。故云功能生血。究皆行氣活血之品耳。非如沒藥氣味苦平。功專破血散瘀。止有推陳之力。而無致新之妙。是以書載乳香功能活血調氣。托裏護心。生肌止痛。治心腹諸痛。口噤耳聾。癰腫折傷。癩狂。但遇癰疽已潰。及膿血過多者。不可妄投。

恐其復開走洩之路。其意已可見矣。豈若當歸辛潤。而為補血第一要藥也。出諸香。如乳頭明透者良。惟黏難研。水飛過。用鉢坐熱水研之。或用燈心同研。則易細。市人多以楓香偽售。勿用。

國外學說 英美學說謂乳香

產中國之廣東等處。而印度等處

亦產之。係一種樹膠結成。而印度

產較為貴重。蓋洋乳香為行氣藥。

間有用以治內皮膚病。尋常用以

作膏藥。又用為發香滅臭之藥。又

能化酒內止血。處方以洋乳香二

分。伊打一分。共化勻為度。用時以

棉花蘸塞牙穴內補牙。(洋乳香

伊打方) 用量。每服三分半至七

分。大抵用以配他藥為丸料。單服

者少。

辨偽 鄭育岩曰。乳香。名薰

陸香。苦溫辛香。善竄入心。活血舒

筋。生肌止痛。能通行十二經。西出

天竺。南出波斯等國。圖大如乳頭。

明透者良。為瘍科要藥。今市肆多

以楓脂松脂混充。誤人不少。曹

炳章曰。按乳香出暹羅等處。為薰

陸樹之脂。以透明黃亮。形如乳頭

者。為滴乳香最佳。去油以水煎。去底脚皮。滓。投入冷水內。乳香則凝結成顆粒。如黃荳。沈於水底。油得如脂。則浮於水面。去之。以此製法。為最遠地。炒之。則油仍不淨。且增火氣。又一種名包乳。色黃如粉。屑。砂石。摻和甚多。價雖較廉。然質次。不堪藥用耳。

配合應用 治一切癰疽疔

腫。用乳香。紫花地丁。白及。白斂。金

銀花。夏枯草。白芷。連翹。貝母。甘菊

甘草。穿山甲。沒藥。

治內傷胸脇作痛。用乳香。續

斷。牛膝。當歸。紅麴。牡丹皮。沒藥。地

黃川芎。

治產後兒枕作痛。用乳香。沒

藥。牛膝。澤蘭。黑豆。蒲黃。五靈脂。延

胡索。牡丹皮。山查。

入一切膏藥。能消毒止痛。

治口目喎斜。乳香燒烟。蒸之。

以順其血脈。(證治要訣方)

治祛風益顏。真乳香二斤。白

蜜三斤。瓷器合煎如餲。每日服二

匙。(奇效方)

治急慢驚風。乳香半兩。甘遂

半兩。同研末。每服半錢。用乳香湯

八 薑 乳

下。小便亦可。(王氏博濟方)

① 治小兒內釣腹痛。用乳香、沒藥、木香等分。水煎服之。(阮氏小兒方)

② 治小兒夜啼。乳香一錢。燈花七枚。為末。每服半字。乳汁下。(聖惠方)

③ 治心氣疼痛不可忍。用乳香三兩。真茶四兩。為末。以臘月鹿血和丸。彈子大。每溫醋化一丸服之。(瑞竹堂經驗方)

④ 治冷心氣痛。用乳香一粒。胡椒四十九粒。研入豉汁。熱酒調服。(潘氏經驗方)

⑤ 治陰證。逆。乳香同硫黃燒烟嗅之。(傷寒癘要方)

⑥ 辟穢瘴疫。每臘月二十四日五更。取第一汲井水。浸乳香。至元且五更。溫熱。從小至大。每人以乳一塊。飲水三杯。則一年無時災。孔平仲云。此乃宜聖之方。孔氏七十餘代用之也。

⑦ 治夢寐遺精。乳香一塊。搗指大。臥時細嚼。含至三更。嚥下。三五服即效。(醫林集要方)

⑧ 治淋瘕弱血。取乳香中夾舌

者。研細米飲一錢。(危氏得效方)

⑨ 治難產催生。用黃明乳香五錢。為末。母猪血和丸。梧子大。每酒服五丸。(簡要濟衆方)

⑩ 治心氣痛。用乳香三兩。真茶四兩。為末。以臘月鹿血和丸。彈子大。每溫醋化一丸服之。(瑞竹堂經驗方)

⑪ 治冷心氣痛。用乳香一粒。胡椒四十九粒。研入豉汁。熱酒調服。(潘氏經驗方)

⑫ 治陰證。逆。乳香同硫黃燒烟嗅之。(傷寒癘要方)

⑬ 辟穢瘴疫。每臘月二十四日五更。取第一汲井水。浸乳香。至元且五更。溫熱。從小至大。每人以乳一塊。飲水三杯。則一年無時災。孔平仲云。此乃宜聖之方。孔氏七十餘代用之也。

⑭ 治夢寐遺精。乳香一塊。搗指大。臥時細嚼。含至三更。嚥下。三五服即效。(醫林集要方)

⑮ 治淋瘕弱血。取乳香中夾舌

者。研細米飲一錢。(危氏得效方)

置中庭。安劍一口。夜於北極下視。禱。去盒子蓋。露一夜。次日入飯中。蒸炊三斗米。熟即止。夜間依前祝。露。又蒸如此。三次乃止。每服一茶匙。空心及晚食前溫酒調服。服後當有惡物出。至三日三夜乃愈也。(聖惠方)

⑯ 治漏瘡膿血。乳香二錢。牡蠣粉一錢。為末。雪糕丸。麻子大。每薑湯服三十丸。(直指方)

⑰ 治斑痘不快。乳香研細。猪心血和丸。炭子大。每溫水化服一丸。(聞人規痘疹論方)

⑱ 治癰疽寒額。乳香半兩。熱水研服。頓發於脾。乳香能入脾故也。(仁齋直指方)

⑲ 治甲疽唇肉。濃血疼痛不愈。用乳香為末。麝香燒研。等分。傅之內。消即愈。(靈苑方)

⑳ 治玉莖作腫。乳香葱白等分。搗傅。

㉑ 治野火丹毒。自兩足起。乳香末。羊脂調塗。(幼幼新書方)

㉒ 治癩瘍風敗。薰陸香。白斂。同研。日日搽之。并作末水服。(千金方)

者。研細米飲一錢。(危氏得效方)

六七二

⑳ 治杖瘡潰爛。乳香煎油擦瘡口。(永類鈴方)

㉑ 用薑 八分至錢半。施用宜忌 凡無癢滯及癰疽已潰而膿多者禁用。

參攷資料 ① 乳香香竄入心經。活血定痛。故為癰疽瘡瘍心腹痛要藥。素簡云。諸痛痒瘡。皆屬心火是矣。產科諸方多用之。亦取其活血之功爾。陳自明婦人良方云。知蘇州施少卿。得神效丸方於蘇州徐太丞云。婦人臨產月服之。令胎滑易生。極有效驗。用通明乳香半兩。枳殼一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每空心酒服三十丸。葛洪抱朴子云。浮炎洲在南海中。出薰陸香。乃樹有傷穿木。膠流墮。夷人採之。恒患結痼。獸咬之。此獸斫刺不死。以杖打之。皮不傷而骨碎乃死。觀此則乳香之治折傷。雖能活血止痛。亦其性然也。楊清叟云。凡人筋不伸者。敷藥宜加乳香。其性能伸筋。(李時珍) ② 佛書謂之天澤香。其潤澤也。又謂之多伽羅香。又曰杜路香。李珣言薰陸是樹皮。乳是樹脂。陳藏器言乳是薰陸之

者。研細米飲一錢。(危氏得效方)

置中庭。安劍一口。夜於北極下視。禱。去盒子蓋。露一夜。次日入飯中。蒸炊三斗米。熟即止。夜間依前祝。露。又蒸如此。三次乃止。每服一茶匙。空心及晚食前溫酒調服。服後當有惡物出。至三日三夜乃愈也。(聖惠方)

⑯ 治漏瘡膿血。乳香二錢。牡蠣粉一錢。為末。雪糕丸。麻子大。每薑湯服三十丸。(直指方)

⑰ 治斑痘不快。乳香研細。猪心血和丸。炭子大。每溫水化服一丸。(聞人規痘疹論方)

⑱ 治癰疽寒額。乳香半兩。熱水研服。頓發於脾。乳香能入脾故也。(仁齋直指方)

⑲ 治甲疽唇肉。濃血疼痛不愈。用乳香為末。麝香燒研。等分。傅之內。消即愈。(靈苑方)

類。寇宗奭言是一物。陳承言薰陸是總名。乳是薰陸之乳頭也。今考昔諸言乳有十餘品。則乳乃薰陸中似乳頭之一品爾。(李時珍) 薰陸香形似白膠香。出天竺者色白。由單于者夾綠色。香亦不甚。(蘇恭) 乳香今人多以楓香雜之。惟燒之可辨。南香諸國皆有。宋史言乳香有一十三等。按葉廷珪香錄云。乳香一名薰陸。香出大食國南。其樹類松。以斤斫樹。脂溢於外。結而成香。聚而成塊。上品為棟香。圓大如乳頭。透明。俗呼滴乳。又曰明乳。次為瓶香。以瓶收者。次為乳塌。雜沙石者。次為黑塌。色黑。次為水溼塌。水漬色敗。氣變者。次為斫削雜碎不堪。次為纏末。播揚為塵者。觀此則乳有自流出者。有斫樹溢出者。諸說皆言其樹類古松。寇氏言類棠梨。恐亦傳聞。當從前說。道書乳香檀香。謂之浴香。不可燒祀上真。(李時珍) 得沒藥大止諸痛。(陶節庵) 紫赤色者最良。但恐不易得。黃色而明瑩如滴乳者。等盛烘燥。燈草同插。若合散丸。羅細和入。倘煎湯液。臨熟加調。

八畫 乳 亞

(盧飛鵬) 乳香以附於樹幹凝結者為良品。落於地下者。稍不潔。呈暗色。為下品。藥用者。謂之上品。乳香或土乳香。以透明者為貴。暗色無形之塊。為下品。(和漢藥考) 【乳香草】即見腫消之古籍別名。典見綱目拾遺。詳見腫消條。 【乳香藤】即金錢草之俗名。詳見金錢草條。 【乳草】即地錦草之日本名。詳見地錦草條。 【乳梨】即雪梨之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳見梨條。 【乳腐】 古醫別名 乳餅。(綱目) 製法 諸乳皆可造之。惟以牛乳者為勝。臞仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾入釜。煎五沸。水解之。用醋點入。如豆腐法。漸結成。漉出。以帛裹之。用石壓成入鹽甕底收之。又造乳團法。用酪五升。煎滾。入冷漿水半升。必自成塊。未成更入漿一盞。至成。以帛包摺如乳餅。收之。又造乳線法。以牛乳盒盛晒。至四邊清水。出煎釜。以酸漿點成。漉出。揉擦數次。扯成塊。又

入釜盪之。取出。捻成薄皮。竹箬捲。扯數次。曬定。乾。以油煨熟。食。 性質 甘。微寒。無毒。 主治 潤五臟。利大小便。益十二經脈。殺動氣。 歷代記載攷證 【唐】蕭炳四聲本草論乳腐曰。治赤白痢。切如豆大。麵拌。酸漿水。煮二沸。十頓服。小兒服之。彌良。 【乳膏】即蛭蟪之古籍別名。典見本草集註。詳見蛭蟪條。 【乳餅】即乳腐之古籍別名。典見綱目。詳見乳腐條。 【乳蟲】 古醫別名 土蟪。蜜蟲。(廣雅) 產地 廣東韶州府境內。 製法 掘地成管。以粳米粉鋪入管中。用草蓋之。候雨過氣蒸。則發開。米粉皆化為蟪。如蛭蟪狀。是謂乳蟲。取蟪作汁。和粳米粉。漬而蒸成乳食。味甘。甘美。可供藥用。 性質 甘。溫。無毒。 主治 補虛羸。益胃氣。溫中明目。 參攷資料 乳蟲亦蛭蟪之類。乃出自人為者。淮南萬畢術所謂

置委溝中。即生蛭蟪。廣雅所謂土蟪。蟪蟲者。皆此物也。服食用此代。蟪蟪更覺有功。無毒。(李時珍) 【乳藤】 命名 本品莖生。莖葉斷之。有白汁。如乳。故名。 古醫別名 乳門草。乳汁草。土爛。實名冬榮子。乳汁藤。(綱目拾遺) 產地 生山麓林野間。 形態 乳藤為莖草類。藤屬之一種。高二三尺。葉似葡萄而尖長。斷之有白汁。莖莖莖如懸鉤。倒挂。結實藍色。大如柚子。中有蠟。瓣瓣相疊。白如豬脂。味甘。美。有香氣。其莖初生嫩條。可供食。與藥用。子根及藤莖細者。名遍地金。 性質 寒。涼。無毒。 主治 排膿散毒。生肌止痛。消腫。益血通乳。為諸乳毒癰瘡中之聖藥。 【乳藤子】 主治 行血。通乳汁。 【乳藤根】 主治 止痢疾。 【亞荔枝】即龍眼之古籍別名。典見開寶本草。詳見龍眼條。

八畫 亞 京 佩

【亞麻】

古籍別名 鴨麻。(圖經本草) 壁虱胡麻。(本草綱目) 滑胡麻。(日本)

外國名詞 Linum usitatissimum, L. (拉丁) アマイ

チネンアマ ヌノゴマ アカゴマ(日本) 基本 係亞麻科。亞麻屬。為亞麻之子實。

產地 生原野間。形態 亞麻為穀類麻屬之一。年生草本。高三尺餘。葉細披針形。互生。其色青。初夏開花。紫碧色。萼片五。無腺毛。列為繖房花序。其子性黏稠。可供藥用。



亞 麻

採取 八月間採子用。性質 甘微溫無毒。

主治 大風疥癬。

參攷資料 亞麻今陝西諸地亦種之。即壁虱胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗

類荊芥。但子不同。(李時珍)

【京三稜】即荊三稜。

【京川貝】即貝母之處方用名。詳【貝母】條。

【京元參】即玄參之處方用名。詳【玄參】條。

【京杏仁】即巴旦杏仁之別名。詳【甜杏仁】條。

【京芎】即芎藭之出關中者。亦名西芎。功用與川芎同。詳【川芎】條。

【京芥】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荊芥】條。

原名 蕪草。命名 本品夏月佩之辟穢。氣香如蘭。故名。而探置髮中。則髮不膩。遂有省頭草之俗稱。

古籍別名 蕪草(別錄) 零陵香。香草(開寶本草) 黃零草。(玉册) 燕草(綱目) 省頭草(俗名) 香蘭。

產地 多生於溼地。其出太湖下游吳縣等處者佳。

形態 佩蘭為芳草類。多年生草本。夏初生苗。方莖。葉似麻。作橢圓形。端尖。兩兩對生。七月開紅花。其香氣如醴蕪。結黑實。其莖葉可

供藥用。性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 明目止淚。療洩精。去臭。惡氣。傷寒頭痛。上氣。腰痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論佩蘭曰。治鼻中瘻。肉。鼻。齧。唐李珣海藥本草論佩蘭曰。主風邪衝心。虛勞。疝。腫。得升麻細辛煎飲。治牙齦腫痛。宋開寶重定新本草論佩蘭曰。惡氣。心。腹痛。滿下氣。宋大明諸家本草論佩蘭曰。血氣。腹脹。煎酒服。宋寇宗奭本草衍義論佩蘭曰。婦人浸油。飾頭。香無以加。

配合應用 治傷寒下痢。蕪草湯。用蕪草。當歸各二兩。黃連四兩。水六升。煮二升。服。日三服。(范汪方)

治傷寒。狐惑。食。肛。者。蕪草。黃連各四兩。以白酸漿一斗。漬一宿。煮取二升。分三服。(小品方)

治頭風。旋運。痰逆。惡心。懶食。真零陵香。馨香。葉。莎。草。根。(炒)各等分。為末。每服二錢。茶下。日三服。(本事方)

治小兒鼻塞。頭熱。用蕪草一

六七四

兩。羊脂三兩。銕內慢火熬成膏。去滓。日摩背上三四次。(聖惠方)

治頭風。白屑。零陵香。白芷等分。水煎汁。入鷄子白。攪勻。傅數十次。終身不生。(聖惠方)

治牙齒疼痛。零陵香。櫻桃。煎水含漱之。(普濟方)

治風牙疳牙。零陵香。(洗炙) 蕪荻(炒)研末。搽之。(普濟方)

治夢遺失精。蕪草湯。用蕪草。人參。白朮。白芍藥。生地黃各二兩。茯神。桂心。甘草(炙)各二兩。大棗十二枚。水八升。煮三升。日服。(外臺秘要方)

治婦人斷產。零陵香。為末。酒服二錢。每服至一兩。即一年絕孕。益血。開香。即散也。(醫林集要方)

治五色諸痢。返魂丹。用零陵香。草。去根。以鹽酒浸半月。炒乾。每兩入廣木香一錢。中。為末。真急腹

痛者。用冷水服一錢。中。通三四次。後用熱米湯服一錢。中。止痢。只忌生梨一味。(集簡方)

用量 二錢至四錢。

施用宜忌 凡氣虛血虛者。禁用。忌火。

參攷資料 ● 蕙草芳馨。其氣

辛散上達。故心腹惡氣。胸膈鼻塞。皆用之。脾胃喜芳香。芳香可以養鼻。是也。多服作喘。為能耗散真氣也。(李時珍) ● 古者燒香草以降神。故曰蕙曰蕙。蕙者蕙也。蕙者和也。漢書云。蕙以香自燒是矣。或云古人拔除。以此草薰之。故謂之薰。亦通。范成大虞衡志言。零陵。即今永州。不出此香。惟融宜等州甚多。土人以編席薦。性煖宜人。謹案。零陵舊治。在今全州。全乃湘水之源。多生此香。今人呼為廣零。零香者。乃真蕙草也。若永州。道州。武岡州。皆零陵屬地也。今鎮江丹陽皆時。而刈之。以酒灑制貨之。芬香更烈。謂之香草。與蘭草同稱。楚辭云。既滋蘭之九畹。又樹蕙之百畝。則古人皆栽之矣。張揖廣雅云。蘭蕙也。其葉謂之蕙。而黃山谷言。一幹數花者為蕙。蓋因不識蘭草。蕙草強以蘭花為分別也。鄭樵修本草言。蘭即蕙。蕙即零陵香。亦是臆見。殊欠分明。但蘭草蕙草。乃一類二種耳。(李時珍) ● 蕙草一名蕙草。生下溼地。三月採陰乾。脫節者良。又

八 盞 佩 使

曰。蕙實生魯山平澤。(別錄) ● 桐君藥錄。蕙草葉如麻。兩兩相對。山海經云。浮山有草。麻葉而芳。莖赤華而黑。實氣如醜。名曰蕙草。可以已癩。今俗人皆呼蕙草。狀如茅而香者為蕙草。人家頗種之者非也。詩書家多用蕙。而竟不知是何草。尚其名而迷其實。皆此類也。(陶弘景) ● 蕙草即是零陵香。蕙乃蕙草根也。志曰。零陵香生零陵山谷。葉如羅勒。南越志云。土人名蕙草。又名蕙草。即香草也。山海經蕙草即是此。(陳藏器)

【佩蘭梗根涕】 命名 本品中之黏液如涕。故名。 主治 傷寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論佩蘭梗根涕曰。治五痔脫肛有蟲。

【使君子】 命名 俗傳潘州郭使君。療小兒獨用此物。後醫家因號為使君子。

【佩蘭實】 性質 辛。平。無毒。 主治 明目補中。

【使君子】 命名 俗傳潘州郭使君。療小兒獨用此物。後醫家因號為使君子。

處方用名 使君肉。使君子。 古醫別名 留求子。(綱目) 史均子。四君子。杜蒺藜子。風稜御史。(和漢藥考)

外國名詞 Quinquaria Chr. Inonis (Quinquaria Indica) 基本 屬使君子科。

產地 陳仁山藥物生產辨云。使君子中國各省各屬均有出。以四川為多出。廣東則以新會。東莞為好肉。連州。羅定。次之。廣西則南寧。百色。皆有。七八月出。新安。南東。京。河內。亦有出。



使君子子

形態 使君子為常綠蔓性木本。本產於東印度。中國亦有之。纏他物而成。大者莖長二丈。葉對生。形卵圓。有短柄。夏秋之候。莖端葉腋。俱抽花軸。花梗極長。尖端滿開小花。綴為總狀而下垂。實為長卵圓形。與榧子相似。長寸許。有五稜角。兩端尖銳。果皮茶褐色。薄

而脆弱。內作白色。藏有油氣之種子。

採取 七月採之。

製法 凡使去殼取仁。或兼殼用。勿使油黑者。

用法 水煎。或剉末。或煎。或炒食之。

性質 甘。溫。無毒。 效能 補脾潤腸。治疳。用為殺小兒蟲症之要藥。

作用 入胃後。稍能促進胃腸之蠕動。至腸與蛔蟲相遇。能殺蟲。而由大便驅出。若服大量。則惹起腸胃黏膜炎。入血中。能使血減低。

主治 小兒五疳。小便白濁。殺蟲。療消痢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論使君子曰。健脾胃。除虛熱。治小兒百病。瘡癬。【明】繆希雍本草經疏論使君子曰。使君子味甘氣溫。其性無毒。甘入脾。故入足太陰陽明。為補脾健胃之要藥。小兒五疳。便濁瀉利。及腹蟲。莫不皆由脾虛胃弱。因而乳食停滯。濕熱癆塞而成。脾健胃開。則乳飲自消。溼熱自散。水道自利。而前證俱

八 薑 使

除矣。不苦不辛而能殺疳。此所以爲小兒上藥也。【清】黃宮繡本草求真論使君子曰。使君子味甘氣溫。功補脾胃。殺蟲除積。凡人患五疳便濁。瀉痢腹脹。皆脾胃虛弱。因而乳停食滯。溼熱瘀塞而成。服此氣味甘溫。以助脾胃。則積滯消。溼熱散。水道利。而前症盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子樞子而殺蟲亦異也。每月上旬。蟲頭向上。中旬。蟲頭向中。下旬。蟲頭向下。於上旬空心服此數枚。則蟲皆死而出也。但忌熱茶同服。則令人作瀉矣。出閩蜀。五瓣有穢。內仁如概。亦可煨食。久則油黑不可用。

國外學說 日本學說謂使君子於小兒一切蟲症。用之有效。然在歐洲。注意於此藥品者蓋寡。近時有學士ワリソ氏。著印度殺蟲藥說論其功用。初知其效能之顯著。漢醫從來用爲驅蟲藥。其用量一。二至四。○英美學說謂使君子產中國之福建。廣東。四川等處。而安南亦產之。其原產地在海南交趾。今福建之紹武。四川之

眉州。多種植之。其子可爲藥品。用薑每服用子四五個。打碎取仁。加蜂蜜調勻。空心服之。

近人學說 張山雷曰。使君子始見開寶本草。謂其甘溫無毒。治小兒五疳。小便白濁。殺蟲。療瀉痢。善頭案小兒疳積。多緣食物太過。使胃力不及消化。馴致腸亦窒滯。日積月累。腹膨如鼓。溼與熱蒸。乃生蟲積。使君子專於殺蟲。而健運化。最爲五疳馴良之藥。瀕湖謂凡殺蟲藥。多爲苦辛。惟使君子甘能殺蟲。亦其異也。蓋其他殺蟲諸物。多峻利而氣味亦烈。惟此二者。氣味皆和。然殺蟲極捷。故小兒疳積方中。必以此爲主藥。石頑謂殺蟲而不傷脾胃。并治大人小兒蟲病。蓋甘溫是溫和之溫。殊非溼燥可比。故能助飲食之運化。而疏導腸中積滯。且富有脂液。所以滑利流通。開寶所謂小便白濁者。卽指疳積疳疔而言。凡小兒腹脹有積。每小便便如粉漿。此蓋腎中輸尿之路。分泄不清。卽以飲食所化之精液。并入小溲而出。所見最多。非大人之赤白濁。不可誤認。又謂其主瀉

痢。亦是疳積中之一症。惟其消化失職。以致大便改常。或爲泄瀉。或爲積滯。此物既能助消化。且去積滯。故并治之。卽瀕湖所謂能益脾胃。除虛熱。治小兒百病之意也。

配合應用 治小兒脾疳。使君子。蘆薈等分爲末。米飲每服一錢。(儒門事親方)

治小兒痞塊腹大。肌瘦面黃。漸成疳疾。使君子仁三錢。木鼈子仁五錢爲末。水丸。龍眼大。每以一九用雞子一箇破頂。入藥在內。飯上蒸熟。空心食之。(楊起簡便方)

治小兒蛔痛。口流涎末。使君子仁爲末。米飲於五更時調服一錢。(全幼心鑑方)

治小兒虛腫。頭面陰囊俱浮。用使君子一兩。去殼。蜜五錢。炙盡爲末。每食後米湯服一錢。(簡便方)

治頭面瘡。使君子仁。以香油少許。浸三五箇。臨臥時細嚼。香油送下。久而自愈。(普濟方)

治蟲牙疼痛。使君子煎湯。類嗽。(集簡方)

用 錢半至三錢。

六七六

臨用宜忌 凡無蟲積者禁用。參攷資料 凡殺蟲藥多是苦辛。惟使君子甘而殺蟲亦異也。凡大人小兒有蟲病。但每月上旬。侵晨空腹食使君子仁數枚。或以殼煎湯。下次日蟲皆死而出也。或云七生七煨。食亦良。忌飲熱茶。犯之卽瀉。此物味甘氣溫。既能殺蟲。又益脾胃。所以能敵虛熱而止瀉痢。爲小兒諸病要藥。俗醫乃謂殺蟲至盡。無以消食。鄙俚之言也。樹有盜屋有竊。國有盜。福耶禍耶。修養者先去三尸。可以類推矣。(李時珍)

按橘含南方草木狀。謂之留求子。瘵嬰孺之疾。則自魏晉已用。但名異耳。(李時珍) 生交廣等州。形如梔子。稜瓣深而兩頭尖。似訶梨。勒而輕。(馬志) 今嶺南州郡皆有之。生山野中。及水岸。其莖作藤。如手指大。其葉如兩指頭。長二寸。三月生花淡紅色。久乃深紅。有五瓣。七八月結子。如拇指大。長一寸許。大類梔子。而有五稜。其壳青黑色。內有仁。白色。七月採之。(蘇頌) 原出海南交趾。今閩之紹武。蜀之眉州皆栽種之。亦

易生。其藤如葛。繞樹而上。莖青如五加葉。五月開花。一簇一二十葩。紅色。輕盈如海棠。其實長寸許。五瓣合成。有稜。先時中黃。老則紫黑。其中仁長如榧仁。色味如栗。久則油黑不可用。(李時珍)

【使君肉】即使君子之處方用名。詳「使君子」條。

【侃且】即寒蟬蟲之古籍別名。典見廣志。詳「五蠹脂」條。

【來】即小麥之古籍別名。典見綱目。詳「小麥」條。

【來甘實】即白石英之別名。詳「白石英」條。

【來莓草】即莓草之古籍別名。典見別錄。詳「莓草」條。

【來禽】即林檎之古籍別名。典見法帖。詳「林檎」條。

【兒茶】即孩兒茶之處方用名。詳「孩兒茶」條。

【見草】即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。即「花之」古籍別名。典見吳普本草。詳「山藥」條。

【見】即山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳「山藥」條。

【兒膠】即藥本之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「藥本」條。

【見腫草】即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

【見腫草】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

【兔毛】探取 臘月採之。主治 燒灰治灸瘡不瘥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論兔毛曰。燒灰。治婦人小便不利。

【兔皮毛】探取 臘月採收之。主治 燒灰酒服方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血滯心。腹刺欲死者極驗。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論兔皮曰。煎湯洗疔。豆疔。

【唐】陳藏器本草拾遺論兔皮曰。頭皮灰。主鼠瘻及鬼疰毒氣在皮中。如針刺者。【明】李時珍本草綱目論兔皮曰。皮灰。治婦人帶下。

【兔矢】即兔屎之處方用名。詳「兔屎」條。

【兔耳一枝箭】命名 本品苗葉布地而生。類如兔耳。每枝只開一花。狀如

箭狀。故名。

【古籍別名】小鹿脚。銀茶匙。忍冬草。一枝箭。月下紅。百草鏡。苗名金茶匙。葉底紅。(綱目拾遺)

產地 生陰山脚下。

形體 兔耳一枝箭。為溼草類之一種。立夏節時發苗。其葉如橄欖形。邊有針刺。每株只七八葉。八月抽莖高尺許。花如柏穗。而有倒生萌刺。莖葉俱有毛。可供藥用。

探取 七月採之。

製法 凡入藥須用綿裹煎飲。恐毛較射肺。令人咳。

八畫 使 侃 來 兒 兔

基本 兔耳酸。為雜草類之一種。可供藥用。

主治 跌打損傷。

【兔肉】(芫書) 性質 辛平。無毒。主治 補中益氣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論兔肉曰。臘月作醬食。去小兒疔。豆疔。【宋】日華諸家本草論兔肉曰。石毒熱氣溼痺。止渴健脾。炙食。歷丹。【明】李時珍本草綱目論兔肉曰。涼血。解熱毒。利大腸。

參攷資料 食兔去尻。不利人也。風俗通云。食兔髓多。令人面生瘡骨。(李時珍) 兔至冬月。斂木皮。已得金氣。而氣內實。故味美。至春食草。麥而金氣衰。故不美也。今俗以飼小兒。云令出痘。穉蓋亦因其性寒而解熱耳。故又能治消渴。壓丹石毒。若痘已出及虛寒者。宜戒之。劉純治例云。反胃結腸。甚者。難治。常食兔肉。則便自行。又可證其性之寒利矣。(李時珍)

【兔耳酸】古籍別名 穿地鈴。(綱目拾遺)

配合應用 治腸癰。肺癰。縮脚癰。用白石楠葉。嫩臘十二箇。兔耳草二兩。好酒煎服。肺癰二服。腸癰指脚癰。一服。即愈。(活人書方)

治骨蒸勞法。用兔耳一枝箭。蒸雞服。(吳普仁方)

【兔耳草】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【兔耳酸】古籍別名 穿地鈴。

性質 鹹寒。無毒。

主治 涼血活血。解胎

六七七

八畫 兔

中熱毒。催生易產。

【兔肝】

主治 目暗。
歷代記述攷證 【唐】

孟詵食療本草論兔肝曰。切洗生食如羊肝法。治丹石毒發。上衝。目暗不見物。【宋】日華諸家本草論兔肝曰。明目補勞。治頭旋眼眩。

參攷資料 ●兔肝和決明子作丸服。甚明目。【日華】●按劉守真云。兔肝明目。因其氣有餘。以補不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目瞭而性冷故也。【李時珍】

【兔肝草】

古籍別名 雞肝草
（陳藏器）

形態 兔肝草為雜草類之一種。初生細葉。輒似兔肝。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 療金瘡。止血生肌。解丹石發熱。

【兔屎】

處方用名 明月砂。兔矢。兔糞。望月砂。

古籍別名 翫月砂。【集驗】兔屎。【炮炙】望月砂。【綱目】

基本 係齧齒動物類。藥用兔之糞。

形態 兔為獸類。有家野兩種。

體長二尺許。耳殼長。上唇厚。中有縱裂。上達於鼻。有鬚。以司感覺。後肢比前肢為長。善走。尾短。色灰褐。冬季有變白者。謂之白兔。則耳較短。家兔飼養於庭院。可以翫娛。一年生產八次。每次產五六頭。以菜葉為飼料。其糞及肉骨皮毛等俱可入藥用。

採取 兔矢。臘月收集之。
製法 收得兔矢。陰乾用。

性質 辛平無毒。

效能 祛翳明目。用作眼科藥。

主治 目中浮翳。勞瘵五疳疳疔痔瘻。殺蟲解毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論兔屎曰。兔屎能解毒殺蟲。故治目疾疳疔瘡疔方中。往往用之。諸家本草並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病勞。四體如焚。寒熱煩燥。一夜夢一人腹擁一月光明。使人心骨俱寒。及寤。而孫元規使人遺藥。服之遂平。叩之。則明月丹也。乃悟所夢。

【清】黃宮繡本草求真論兔屎曰。兔屎即名望月砂者是也。兔屎太陰之精。復餌殺精草明目之藥。是

以屎能明目。以除目中浮翳。且瘡癩五疳。痔漏。蝨食。痘瘡等症。服之皆治。亦由熱結毒積而成。得此寒以解熱。辛以散結。圓以象目。故能服之有功。若陰氣上乘。目障不清。未可用焉。

配合應用 ●明月丹。治勞瘵

迫蟲用。兔屎四十九粒。硝砂如兔屎大。四十九粒。為末。生蠶丸。梧子。大月望前。以水浸甘草。一夜。五更初。取汁送下。七丸。有蟲下。急銚入油鍋內煎殺。三日。不再服。【蘇沈良方】

●治五疳下痢。兔屎炒半兩。乾蝦蟆一枚。燒灰為末。綿裹如蓮子。大納下部。日三易之。【聖惠方】

●治大小便秘。明月砂一匙。安臍中。冷水滴之。令透自通也。【聖惠方】

●治痔瘡下蟲不止者。用翫月砂。慢火炒黃為末。每服二錢。入乳香五分。空心溫酒下。日三服。即兔糞也。【集驗方】

●治月蝕耳疳。望月取兔屎。納蝦蟆腹中。同燒末。傅之。【肘後方】

●治痘瘡入目。生醫用兔屎日

六七八

乾為末。每服一錢。茶下即安。【普濟方】

●治痘後目昏。直往山中東西地上。不許回顧。尋兔屎三七粒。以雌雄檳榔各一枚。同磨不落地。井水調服。百無一失。其效如神。【蘭氏經驗方】

【兔核】即白斂之古籍別名。典見別錄。詳「白斂」條。

【兔骨】 主治 熱中消渴。煎汁服。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論兔骨曰。治鬼疰疥疥。刺風。【明】李時珍本草綱目論兔骨曰。煎汁服。止霍亂吐利。

參攷資料 ●崔元亮海上方。治消渴。羸瘦。小便不禁。兔骨和大麥苗煎汁服。極效。【蘇頌】●兔骨醋磨。塗久疥瘡。【陳藏器】

產地 原野間。

【兔屎】 形態 兔屎為雜草類之一種。高尺許。結實如粟。可供藥用。

性質 酸無毒。

主治 益氣輕身。

【兔絲】即茯苓之古籍別名。典見

和流藥考。詳「茯苓」條。

【兔絲子】即兔絲子之處方用名。

詳「兔絲子」條。

【兔絲餅】即兔絲子之處方用名。

詳「兔絲子」條。

【兔腦】

採取 臘月取之。活者尤良。

主治 塗凍瘡。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論兔腦曰。同髓合治耳聾。

【明】李時珍本草綱目論兔腦曰。

儲生滑胎。

參攷資料 兔腦爲兔髓之精。

性善滑胎。故爲婦人儲生之要藥。

(醫學辭典)

【兔屎】即兔屎之古籍別名。典見

雷公炮炙論。詳「兔屎」條。

【兔頭骨】

採取 臘月採收之。性質 甘酸平。無毒。

主治 頭眩痛。頭疾。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌圖

經本草論兔頭骨曰。連皮毛燒存

性。米飲服方寸匕。治天行嘔吐不

止。以瘞爲度。【宋】日華諸家本草

論兔頭骨曰。連毛燒灰酒服。治產

難下胎。及產後餘血不下。【明】李

時珍本草綱目論兔頭骨曰。燒末

傳婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服

治小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。

【兔糞】即兔屎之處方用名。詳「

兔屎」條。

【兕角】即犀角之古籍別名。典見

綱目。詳「犀角」條。

【兩金藤】即馬兜鈴之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「馬兜鈴」條。

【兩頭尖】即草烏頭之古籍別

名。典見本經。詳「草烏頭」條。即

烏喙之古籍別名。典見綱目。詳「

烏喙」條。即鼠糞之處方用名。

詳「鼠糞」條。

【兩頭蛇】

古籍別名 枳首蛇。 (附雅) 越王蛇。越王

約髮。(綱目)

形態 兩頭蛇爲蛇類之一種。

其形與常蛇同。長二三尺。兩頭分

歧。背有錦文。腹下鱗紅。或謂大如

小指。首尾各有頭。一頭無口。目兩

頭俱能行。其肉可供藥用。

性質 無毒。

主治 瘧疾。收乾佩於項上。

【兩頭發】即兩頭尖。

【刮腸筴】即竹筴之別名。詳「竹

筴」條。

【刺】即鳥不宿之古籍別名。典見

汪連仕採藥書。詳「鳥不宿」條。

【刺竹筴】

性質 甘苦。有小毒。食之落人髮。(竹譜)

參攷資料 生交廣中。叢生。大

者圍三尺。枝節皆有刺。夷人種以

爲城。伐竹爲弓。根大如車輪。一名

芭竹。(李時珍)

【刺兒菜】

命名 本品即紫花

沙漢者。葉有刺毛。故名。

形態 刺兒菜爲澤草類之一

種。夏至後開花。大如蒜頭。色紫可

愛。暮春萌芽時。掘取其根。狀如大

枝人參。色較微白。巨者如蘆。可供

藥用。

主治 清火疎風。舒痰。解一切

疔瘡。癰疽腫毒。如神。

參攷資料 刺兒菜其清火之

功。勝於金銀花。解毒之用。更捷於

山茨菇。一物而兼二物之效力。故

用之如神。(綱目拾遺)

【刺芥】即青芥之古籍別名。典見

綱目。詳「芥」條。

【刺花實】即營實之古籍別名。典

見綱目。詳「營實」條。

【刺虎】 古籍別名 薔星草。(

綱目)

形態 刺虎爲雜草類之一種。

凌冬不凋。其根葉枝。俱可供藥用。

性質 甘。

主治 一切腫痛風疾。剉焙爲

末。酒服。

參攷資料 薔城方治丹瘤。用

刺虎即薔星草搗汁塗之。又伏牛

花。一名陷虎刺。與此不同。(李時

珍)

【刺原】即白棘花之古籍別名。典

見別錄。詳「白棘花」條。

【刺根白皮】即鳥不宿之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「鳥不宿」條。

【刺桐皮】即海桐皮之古籍別名。

典見綱目。詳「海桐皮」條。

【刺參】即海參之有刺者。詳「海

參」條。

【刺梨】 命名 本品形似梨而

多芒刺。故名。

產地 出黔中。

形態 刺梨爲梨屬之一種。狀

似棠梨而多芒刺。不可觸。其汁同

蜜煎之。可成膏。不減於楂梨。花於

八盡 刺

夏實於秋。花有單瓣重臺之別。名為送春歸。密萼繁英。紅紫相間。植之園林。可供玩賞。獨黔中有之。移於他境則不生。殆亦類優曇花之獨見於南嶺。其實可供藥用。

性質 甘酸。瀉。無毒。

主治 解悶消積滯。

【刺梨子】即金櫻子之古籍別名。典見開寶本草。詳「金櫻子」條。

【刺猬心肝】

主治 蟻瘻。蜂瘻。癩癧惡瘡。燒灰。酒服一錢。



刺 猬

【刺猬肉】 性質 甘。平。無毒。主治 反胃。炙黃食之。亦煮汁飲。又主瘰。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論刺猬肉曰。炙食肥下焦。理胃氣。令人能食。

參攷資料 刺猬為胃之獸。其

肉治胃病。食時須去其骨。誤食令人瘦劣。諸節漸小。(陳藏器)

【刺猬脂】

性質 甘。平。無毒。主治 溶滴耳中。治聾。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論刺猬脂曰。治腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論刺猬脂曰。塗禿瘡。疥癬。殺蟲。

參攷資料 刺猬脂可煎五金八石。伏雄黃。柔鐵。(孟詵)

【刺猬腦】

主治 療狼瘡。

【刺猬膽】

主治 療瘰癧病。(寇宗奭)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論刺猬膽曰。點目止淚。化水塗痔瘡。(李時珍)

【刺暈】

命名 本品有刺。刺人即暈。故名。

形態 刺暈為雜木類之一種。其樹形似烏桕而有刺。其葉可供藥用。

主治 癰疽發背腫毒。痛甚者入醬板鹽花卷之即止痛。不論潰

與不潰皆效。

【刺楸】即楸之有刺如柘者。典見爾雅。詳「楸白皮」條。

【刺楸】即楸之皮色蒼白。上有斑點。而枝梗間多刺者。詳「楸」條。

【刺蒺藜】 原名 蒺藜。命名 蒺藜也。甄利也。本品有刺傷人甚疾而利也。故名。

處方用名 刺蒺藜。白蒺藜。沙苑蒺藜。夕利。潼蒺藜。潼沙苑。

古籍別名 茨(爾雅)旁通。屈人。止行。休羽(本經)升推(綱目)旱草。即藜。秦尖(和漢藥考)

基本 屬蒺藜科。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蒺藜產湖北襄陽樊城。但不及河南懷慶禹州之多。出秋季新直隸武城縣亦有出。三伏後收成。野產。山東曹州亦有出。九月新。沙苑以陝西潼關為正。其次直隸一帶。亦可三伏時收成。又有一種外沙苑。產江蘇鎮江。五月新。凡平澤道旁恒多生焉。

形態 蒺藜為一年生草本。自生於海濱砂地。如蔓偃伏地上。葉

六八〇

為羽狀複葉。小葉作長橢圓形。每五葉至七葉。排列為偶數。夏間。葉腋抽出花梗。開黃色之小蓮花。果實似菱。長三四分。表面突起如角。角頂具有鋒利之刺。此實初現白綠色。熟則變黃白色。

種類 為刺蒺藜。生於海濱沙地。葉如剗搖而蔓延。開黃花。結實多刺。為白蒺藜。又名沙苑蒺藜。葉似合歡木葉。至秋結蒺。形如綠豆。莢有微刺。熟則莢之有節處易折。

採取 七月八月間採實曬乾。

製法 雷斅曰。凡使蒺藜。揀淨蒸之。從午至酉日乾。木白。春令刺盡。用酒拌再蒸。從午至酉日乾。用大明曰。入藥不計丸散。並炒去刺用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 平肝熄風。瀉肺勝濕。用治諸癆瘵作強壯藥。

主治 惡血。破積。積聚。喉痺。乳難。久服長肌肉。明目輕身。(本經)身體風癢。頭痛。欬逆傷肺。肺痿。止煩下氣。小兒頭瘡。癰腫陰瘡。可作摩粉。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蒺藜曰治諸風癱瘓。吐膿。去燥熱。【宋】大明諸家本草論蒺藜曰治奔豚腎氣。肺氣胸膈滿。催生墮胎。益精。療水臌冷。小便多。止遺溼泄精。溺血腫痛。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蒺藜曰痔漏陰汗。婦人發乳帶下。【明】李時珍本草綱目論蒺藜曰治風秘及魘蟲心腹痛。【明】經希雅本草經疏論蒺藜曰蒺藜有二種。一種同州沙苑白蒺藜。一種秦州刺蒺藜。白者感馬精所生。刺者感地中陽氣所生。本經苦溫。別錄加辛及微寒。並無毒。夫苦能泄。溫能宣。辛主散。主潤。故刺蒺藜主惡血。破癥結。積聚。喉痺。乳難。身體風癢。頑疔。欬逆。小兒頭瘡。癰腫。陰瘡。葉主風癢。可煎以浴。辛入肝。肝主風也。藥性論云白蒺藜味甘微腥。甘中必有辛。辛能潤。故主欬逆傷肺。肺痿。止煩下氣。久服長肌肉。明目。輕身。以其入腎益精故也。專餌長年。效可貴矣。單行雜按。主治良多。本草諸方。咸堪選用。形如羊腎。圓而細。色如菘豆。嚼之作菘豆腥氣。爲末煎之。

八畫 刺

則香同新茶者真。【明】李士材本草圖解論蒺藜曰蒺藜有二種。一出秦州刺蒺藜。感地中陽氣所生。一出同州沙苑白蒺藜。感馬精所生。故主治各不同。刺蒺藜乃破血。有孕之婦宜忌。沙苑蒺藜甘溫。善走腎肝二經。主補腎益精。止腰痛。遺洩。種玉方中。尊爲奇品。沙苑蒺藜性固精。命門火熾。陽道數舉。交媾不得出者勿服。【清】汪訥庵本草備要論蒺藜曰蒺藜子。苦溫補腎。辛溫瀉肺氣。而散肝風。益精明目。治虛勞腰痛。遺精帶下。欬逆。肺痿。乳閉。癰癤。痔漏。陰瘡。腎肝肺三經之病。催生墮胎。沙苑蒺藜。綠色似腎。炒用。亦可代茶。刺蒺藜。三角有刺。去刺。酒拌蒸。風家宜刺蒺藜。補腎則沙苑者爲優。餘功略同。瑞竹堂方。齒牙打動者。蒺藜根燒灰敷之。【清】黃宮繡本草求真論蒺藜曰白蒺藜。質輕色白。辛苦微溫。按據諸書。雖載溫能補腎。可治精黃溺失。豎腰疼勞傷等症。然總宜散肝經風邪。凡因風盛而見目赤腫翳。并遍身白癩。癢癩難當者。服此治無不效。且此味辛兼苦。則

凡癢癥結聚。喉痺乳難。及胎產不下。服此力能破鬱宣結。蓋肝雖藏血之經。而血非可留之物。若竟認此作補。而不審兼苦泄辛散。以明其治。其失靡輕。緣此可升可降。可散可補。故服涼劑則宜速。刺生擠。用補劑則宜去刺。酒拌蒸。若沙苑蒺藜。質細色綠。似腎。功專入腎。故書載能益精強腎。亦須炒用。但不辛香宜散耳。【清】黃元御玉楸藥解論蒺藜曰蒺藜味苦微溫。入足少陰腎。足厥陰肝。泄溼驅風。斂精補瀉。蒺藜子疏木驅風。治肝氣較泄。精滑溺數。血淋白帶。白者與沙苑同性。【清】張隱庵本草崇原論蒺藜曰蒺藜子。堅勁有刺。寒陽明之金氣。氣味苦溫。則屬於火。經云兩火合併。故爲陽明。是陽明寒火氣而屬金也。金能平木。故主治肝木所癢之惡血。破腸胃邪郭之癥瘕積聚。陰陽交結之喉痺。陽明胃土之乳難。皆以其稟銳利之質。而攻伐之力也。久服則陽明土氣盛。故長肌肉。金水相生。故明目。長肌肉。故輕身。其沙苑蒺藜一種。產於沙地。形如羊腎。主補腎益精。

治腰痛虛損。小便遺瀝。所以然者。味甘帶腥。稟陽明土金之氣。土生金而金生水也。【清】葉天士本草經解論蒺藜曰蒺藜氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣升味降。乘火氣而生陽也。主惡血者。心主血。肝藏血。溫能行苦能洩也。癥者有形可徵也。有形之積聚。皆成於血。白蒺藜能破之者。以入心肝而有苦溫氣味也。痺者閉也。喉痺。火結於喉。而閉塞不運也。溫能散火。苦可去結。故主喉痺。乳難。乳汁不通也。乳房屬肝。氣溫達肝。其乳自通。白蒺藜一名旱草。乘火氣而生。形如火而有刺。久服心火獨明。火能生土。則飲食倍而肌肉長。肝木條暢。肝閉斂於目。故目明。木火通明。元陽舒暢。所以身輕也。【清】楊時泰本草述鈞元論蒺藜曰刺蒺藜成熟於秋。外刺壓勁。稟金之形與色。而更兼乎火之氣與味。爲肝之用藥。雖爲風劑。卻與辛散風氣者不同。人身火爲金之主。則氣化而燐於風化之木。金爲火之用。則血化而靜乎血臟之

風。葉。葉。葉。金火合稟。故別錄謂其下氣。日華子謂治肺氣胸膈滿。而木經首言治惡血破癥聚等證也。夫風木之陽。原乘於三焦之氣。而金以合於火者主之。風臟之血。原根於至陰之水。而金以爲火用者化之。是則本經首言治惡血者。以肺之氣化在血。而是物結實於秋。固得金氣之專也。金氣專而不得火爲主以致用。則氣化不全。火爲主而實不結於深秋以趨水。則血化不裕。惟全其氣化者。乃能裕其血化。金固以火爲夫。水爲子也。方書用治水氣腫滿及痰飲熱結諸證。非因氣化之在血者。從陽透陰而陰乃化。陰化則歸腎。所謂上焦之陽。得陰降而隨之以下者歟。夫人身氣血之病。每由於後天。凡下焦之虛而不固者。緣上焦之氣不能下周於氣海。而血並不得下歸於血海。經所謂天氣盛則地氣不足是也。如氣下而血化。則天氣降矣。此日華本草所以療水臃冷。小便多。而止遺溺泄精溺血也。凡病由下之陰虛以致陽實於上者。亦當先治其標。清上之痰熱。乃可補

接真陰也。蓋血化則氣下。氣下則熱散。氣虛者卽是可以代清熱之劑矣。統釋斯義。知茲味以金燐於木而爲氣先。木燐於金而爲血先。不謂之風劑不可。直謂之風劑而與辛散同功則不可。試思痰癥能治風秘。倘不原於血化氣行而止曰辛散。不將愈散而愈秘乎。

辨僞 ●鄭省巖曰。沙苑蒺藜俗名北沙苑。苦溫補腎。強陰益精。明目。產陝西潼關者真。狀如腎子。微帶綠色。今市中所賣。有用紅花草子僞充。貽害匪淺。曹炳章曰。按沙苑蒺藜。七月出新。陝西潼關外出者。名潼關蒺藜。色紅帶黑。形如腰子。飽綻性糯。味厚氣香。滾水泡之。有芳香氣者爲最佳。亳州出者。曰毫蒺藜。細而且瘦。性硬。泡之無芳香者次。山東出者。名東蒺藜。色黃粒扁粗大。性更硬。最次。揚州出者。爲荷花郎郎之子。徧地皆有。土名草蒺藜。卽南方紅花草子之子。不入藥用。

近人學說 張山雷曰。刺蒺藜乃三角芒刺之蒺藜子也。詩言牆有茨。不可掃。卽此。惟其多刺而質

輕揚。故能泄散外風。本經雖稱其氣味辛溫。然今皆用以宜散風熱。甚有效力。而風寒外感。俱不用此。甄權亦謂能去燥熱。則本經溫字。恐是傳抄有誤。別錄則曰辛微溫。輕用一錢至錢半。重至二三錢。古書多謂此與同州沙苑蒺藜一類。二種。瀕湖綱目亦不爲二物分析。然有刺者。今止用以泄散風熱。而沙苑蒺藜。則爲滋填肝腎之藥。形質亦復大異。必不可以其同有蒺藜之名。而混爲一例者。茲區而別之。以沙苑蒺藜入補腎藥中。瀕湖綱目承蘇頌寇宗奭之說。皆以沙苑蒺藜爲白蒺藜。而有刺者則止稱蒺藜。以其色比沙苑蒺藜之黝者。較爲淡白也。似蘇頌寇宗奭之說。未甚確當。祝天一日。市上蒺藜有兩種。一曰刺蒺藜。亦名白蒺藜。一曰潼關蒺藜。亦名沙苑蒺藜。蓋刺者言其形也。白者言其色也。潼與沙苑皆地名。綱目以沙苑蒺藜爲白蒺藜。誤也。夫蒺藜惡草也。毛詩有牆茨之譏。言有刺而不可掃也。無刺者。不當稱蒺藜明矣。今之曰刺曰白者。不幾與曰瀕曰沙苑之

輕揚。故能泄散外風。本經雖稱其氣味辛溫。然今皆用以宜散風熱。甚有效力。而風寒外感。俱不用此。甄權亦謂能去燥熱。則本經溫字。恐是傳抄有誤。別錄則曰辛微溫。輕用一錢至錢半。重至二三錢。古書多謂此與同州沙苑蒺藜一類。二種。瀕湖綱目亦不爲二物分析。然有刺者。今止用以泄散風熱。而沙苑蒺藜。則爲滋填肝腎之藥。形質亦復大異。必不可以其同有蒺藜之名。而混爲一例者。茲區而別之。以沙苑蒺藜入補腎藥中。瀕湖綱目承蘇頌寇宗奭之說。皆以沙苑蒺藜爲白蒺藜。而有刺者則止稱蒺藜。以其色比沙苑蒺藜之黝者。較爲淡白也。似蘇頌寇宗奭之說。未甚確當。祝天一日。市上蒺藜有兩種。一曰刺蒺藜。亦名白蒺藜。一曰潼關蒺藜。亦名沙苑蒺藜。蓋刺者言其形也。白者言其色也。潼與沙苑皆地名。綱目以沙苑蒺藜爲白蒺藜。誤也。夫蒺藜惡草也。毛詩有牆茨之譏。言有刺而不可掃也。無刺者。不當稱蒺藜明矣。今之曰刺曰白者。不幾與曰瀕曰沙苑之

對待耳。李時珍曰。潼蒺藜苗如初生。皂莢葉。莢長寸許。內有子如脂麻。狀似羊腎。據此說。類近吾鄉之野翹。殆非首蓄之一種歟。今人多呼爲沙苑子者得矣。

配合應用 ●治遍身風癢。刺蒺藜同何首烏。菴菴葉。胡麻。地黃。木瓜。荊芥。穗。天門冬。黃蘗。

●同州白蒺藜得蓮鬚。山茱萸。五味子。蓮肉。覆盆子。魚膠。龍骨。白膠。能固精益腎。令人有子。兼主小便遺瀝。

●得甘菊花。甘枸杞子。決明子。女真實。槐角子。能明目。

●服食法。蒺藜子一石。七八月熱時收取。日乾。吞去刺。杵爲末。每服二錢。新汲水調下。日三服。勿令中絕。斷穀長生。服之一年以後。冬不寒。夏不熱。二年者復少。髮白復黑。齒落更生。服之三年以後。身輕。(長生神仙祕旨方)

●治腰脊引痛。蒺藜子搗末。蜜和丸。胡豆大。酒服二丸。日三服。(外臺祕要方)

●治通身浮腫。杜蒺藜日日煎湯洗之。(聖惠方)

⑤治卒中五尸。痰藜子搗末。蜜和丸。胡豆大。每服二丸。日三服。(肘後方)

⑥治大便風秘。痰藜子炒一兩。猪牙皂。炭去皮。酥炙五錢。爲末。每服一錢。鹽茶湯下。(普濟方)

⑦治月經不通。杜痰藜當歸等分爲末。米飲每服三錢。(儒門事親方)

⑧治催生下衣難產。胎在腹中。并包衣不下。及胎死者。痰藜子。貝母各四兩。爲末。米湯服三錢。少頃不下。再服。(梅師方)

⑨治蚊蟲心痛吐清水。七月七日採痰藜子陰乾。方寸匕。日三服。(外臺祕要方)

⑩治萬病積聚。七八月收痰藜子。水煎熟。晒乾。蜜丸。梧子大。每酒服七丸。以知爲度。其汁煎如飴服之。

⑪治三十年失明。補肝散。用痰藜子七月七日收陰乾。搗散。食後水服方寸匕。日二。(外臺祕要方)

⑫治牙齒動搖疼痛。及打動者。土痰藜去角。生研五錢。淡漿水半盞。蘸水入鹽。溫漱甚效。或以根燒

灰貼。牙卽牢固也。(御藥院方)

⑬治牙齒出血不止。動搖。白痰藜末。且日擦之。(道藏經方)

⑭治打動牙痛。痰藜子或根爲末。日日搗之。(瑞竹堂方)

⑮治鼻塞出水。多年不聞香臭。痰藜二握。當道車碾過。以水一大盞。煎取半盞。仰臥。先以滿口含飯。以汁一合灌鼻中。不過再灌。嚏出一兩箇息肉。似赤蠅蟲卽愈。(聖惠方)

⑯治面上瘰癧。痰藜子。山梔子各一合。爲末。醋和。夜塗。且洗。(急效方)

⑰治白癩風疾。白痰藜子六兩。生搗爲末。每湯服二錢。日二服。一月絕根。服至半月。白處見紅點甚效。(孫真人食忌方)

⑱治一切丁腫。痰藜子一升。熬搗以醋和封頭上拔根。(外臺祕要方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 搗精難出者。沙苑禁用。烏頭爲之使。

參攷資料 ①古方皆用有刺者。治風明目最良。神仙方亦有單

服痰藜法云。不問黑白。但取堅實者。吞去刺用。(蘇頌) ②古方補腎

治風。皆用刺痰藜。後世補腎多用沙苑痰藜。或以熬膏和藥。恐其功亦不甚相遠也。刺痰藜炒黃去刺。磨麵作餅。或蒸食。可以救荒。(李時珍) ③其性宜通。久服不冷。而無壅熱。當以性溫爲是。(馬志) ④多生道上及牆上。葉布地。子有刺。狀如蓬而小。長安最饒。人行多着木履。今軍家乃鑄鐵作之。以布敵路。名鐵痰藜。易云。據於痰藜。言其凶傷。詩云。牆有茨。不可掃也。以刺梗穢。方用甚稀。(陶弘景) ⑤痰藜子。生馮翊平澤。或道旁。七月八月採實。曝乾。(別錄) ⑥冬月亦採之。黃白色。郭璞注爾雅云。布地莖生。細葉。子有三角。刺人是也。又一種白痰藜。今生同州沙苑。牧馬草地最多。而近道亦有之。綠葉細莖。綿布沙上。七月開花。黃紫色。如豌豆花而小。九月結實。作莢子。便可採。其實味甘而微腥。揭綠色。與蠶種子相類。而差大。又與馬瀝子酷相類。但馬瀝子微大。不堪入藥。須細辨之。(蘇頌) ⑦痰藜有二等。一

杜痰藜。卽今之道旁布地而生者。開小黃花。結芒刺。一種白痰藜。出同州沙苑。牧馬處。子如羊內腎。大如黍粒。補腎藥今人多用。風家常用刺痰藜也。(寇詵) ⑧痰藜葉如初生皂莢。葉整齊可愛。刺痰藜狀如赤根菜子。及細莖三角。四刺。實有仁。其白痰藜結莢。長寸許。內子大如脂麻。狀如羊腎而帶綠色。今人謂之沙苑痰藜。以此爲分別。(李時珍) ⑨白痰藜性升而散。入肝腎經。爲治風明目要藥。目病爲風木之邪。風盛則目病。風去則目明矣。本經專破惡血積聚。治喉痺乳難。以苦能泄。溫能宣。辛能潤也。此言刺痰藜之功用耳。久服長肌肉。明目輕身。以其入腎益精氣也。此則專主沙苑痰藜而言。又云。酒浸焙焦。去刺研用。按涼劑則宜連刺生搗用。補劑則宜去刺酒拌蒸。(張石頑) ⑩刺痰藜用者。類以爲風劑。卽如虛復所云。刺痰藜。其子成熟於秋。而外刺堅勁。得金之堅固氣。爲肝之用藥。明矣。又曰。刺痰藜。其色白。故古方用之。亦曰白痰藜。而本草概指白痰藜。俱卽同

八畫 刺

八蠶 刺

州蕨藜。遂致混淆。如水氣脹滿。痰飲熱結。以理準之。定是刺蕨藜。(劉涓子) ①味苦微辛微甘微涼。涼血養血。亦善補陰。(張景岳)

②向來本草書。蕨藜二種。性味功用皆渾言。然其所主實迥然各別。(沈金鏗) ③白蕨藜苦辛溫。沙苑蕨藜甘溫。(張石頑) ④沙苑者強陰固精。功專補腎。有刺者明目治風。兼入肝矣。(顧松園) ⑤同州蕨藜。性能固精。命門火熾。陽道數舉。交媾精不得出者勿服。(邵希雍)

【刺蕨藜花】 乾為末用。 製法 採得陰

【刺蕨藜苗】 疥癬風 疥作癢。煎湯洗之。

【刺蕨藜】 即羊刺蕨藜之原名。詳『羊刺蕨藜』條。

【刺蕨】 本品乃小蕨。有四角。尖如針芒。刺手。故名。

產地 出浙江杭州。西湖裏六橋一帶多有之。

形態 刺蕨為蕨屬之一種。野

生水。中根苗與大蓀不殊。葉下有氣管。開花紫色。結實大者如蠶豆。小者如黃豆。味絕鮮美。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。 主治 生食補脾健胃。止渴生津。平肝氣。通腎水。益血消食。老者煎食。健脾。止洩痢。

參攷資料 刺蕨性能通達肝腎。凡一切病多忌生冷。惟此獨不忌食。而最能開胃生津。其未曝乾。可供茶點。(綱目拾遺)

【刺蕨根】 主治 利水通淋。

【刺蝟皮】 命名 本品頭足似鼠。故有謂鼠之稱。 處方用名 炙蝟皮。蝟皮。謂(本經)

古籍別名 蝟皮。毛刺皮。(爾雅) 蝟皮。(綱目) 蝟鼠皮。虎鼠皮。山積鼠皮。(和漢藥考)

外國名詞 Hedgehog skin. (英) 基本 屬食蟲類刺蝟之皮。 產地 陳仁山藥物生產辨云。蝟皮一產湖北省。一產江蘇鎮江。

八月新。和漢藥考曰。概產於非洲北部及亞洲西北部。台灣亦產之。

形態 蝟體矮而肥。大自五寸至一尺。足尾俱短。全體叢生刺毛。惟腹部則非刺毛。刺毛作褐色。尖端作白色。腹毛為白色。體能自由伸縮。若遇猛獸。立蜷縮如栗。喜食鼠。蚯蚓。及昆蟲。本品表面叢生褐色刺毛之皮。內作白色。質堅易破。刺毛長三四分。尖端為白色。或黑色。剝下攤平曬乾用。

製法 焙炒稍黑。或炙黃。粗剉入藥。

性質 苦平。無毒。 效能 涼血消痔。專作治療痔漏藥。又為婦人癆瘵藥。

主治 五痔陰蝕。下血赤白。五色血。汁不止。陰腫痛引腰背。酒洩殺之。(本經) 療腹痛。疝積。燒灰酒服。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蝟皮曰。治腸風瀉血。痔痛有頭。多年不瘥。灸末飲服。方寸匕。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。【清】黃宮繡本草求真論蝟皮曰。刺蝟皮其皮如刺。因以刺名。其

獸屬胃而入胃。因以蝟號。何書載治五痔陰蝕。以其溼熱下注。得此味辛入腸。金屬大腸。故能以破其血耳。何書又載能治噎膈反胃。以蝟屬獸。兼味辛苦。故能散邪泄熱。使其胃氣調和。而不上逆。故耳。但食肉切宜除骨。若誤食則令人瘦劣。節節漸小也。似鼠而圓。火褐色。撥毛外刺如栗。房。煨黑存性用。

六八四

配合應用 ①治五痔下血。行義云。用蝟皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空腹熱米飲服一錢。妙。外塗用蝟皮三指大。薰黃如棗大。熟艾一錢。穿地作坑。調和取便煎之。取口中有烟氣為佳。火氣消盡即停。三日將息。更熏之。三度永遼。勿犯風冷。藥屬將養。切忌鷄魚猪生冷。二十日後補之。(本草衍義方)

②治腸痔有蟲。蝟皮燒末。生油和塗。(肘後方)

③治腸風下血。白刺蝟皮一枚。銚內煨焦。去皮留刺。木賊半兩。炒黑為末。每服二錢。熱酒調下。(楊氏家藏方)

④治蠱毒下血。蝟皮燒末。水服

方寸匕。當吐出毒。(千金方)

⑤治五色痢疾。猬皮燒灰。酒服二錢。(壽域方)

⑥治大腸脫肛。猬皮一斤。燒磁石煨五錢。桂心五錢爲末。每服二錢。米飲下。(葉氏摘方)

⑦治塞鼻止齩。猬皮一枚。燒末半錢。綿裹塞之。(聖惠方)

⑧治鼻中瘡肉。猬皮炙爲末。綿裹塞之。日三。(千金方)

⑨治眼睫倒刺。猬刺取針。白芷青黛等分爲末。隨左右目。嚙鼻中口含冷水。(瑞竹堂方)

⑩治反胃吐食。猬皮燒灰。酒服或煎汁飲。或五味淹炙食。(普濟方)

⑪治小兒驚啼。狀如物刺。用猬皮三寸。燒末。傅乳頭飲兒。(子母祕錄方)

⑫治樹大傷人。猬皮。頭髮等分。燒灰水服。(外臺祕要方)

用殼 一錢至二錢

配合宜忌 畏桔梗。麥門冬。參攷資料 ⑬謂之頭。似鼠刺。毛似。蟻。踏。則形如。交。房。及栗房。撥毛外刺。尿之。卽開。炙。殺。子

八畫 刺 卑 卷

云。刺端分兩頭者爲。如。棘。針。者。爲。蜂。廣。韻。云。似。而。赤。尾。者。名。暨。居。(李時珍) ⑭蠅皮之用。唯。專。於。大。腸。以。故。療。痔。病。爲。多。(劉。涪。子)

⑮淮南子云。蠅使虎伸。以其能入虎腹。食其腸胃。當亦能入人腸胃。去其瘀血積熱之毒。且居地下穿穴。搜毒固其能也。(汪。雙。池)

⑯刺猪苓 卽土茯苓之古籍別名。典見圖經本草。詳「土茯苓」條。

⑰刺薊 卽大薊之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「大薊」條。

⑱刺藜 卽小藜多刺而葉細者之古籍別名。典見本草集註。詳「小藜」條。

⑲卑山竹 卽茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵芋」條。

⑳卑共 卽茵芋之古籍別名。典見別錄。詳「茵芋」條。

㉑卑相 卽麻黃之古籍別名。典見別錄。詳「麻黃」條。

㉒卑菜 卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃精」條。

㉓卑蓮 卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

㉔卑鹽 卽麻黃之古籍別名。典見

別錄。詳「麻黃」條。

【卷耳子】卽蒼耳子之古籍別名。典見詩經。詳「蒼耳子」條。

【卷柏】 命名 本品苗如柏而細卷。故名。

處方用名 卷柏葉。卷柏炭。古籍別名 萬歲。求股。交時。(別錄) 長生不死草。(綱目) 豹足。(吳普本草) 含生草。地石草。(和漢藥考) 萬年松。九死還魂草。(俗名)


外國名詞 Selaginella in. volvoni, spring.

基本 屬卷柏科。爲卷柏之莖葉。產地 陳仁山藥物生產辨云。卷柏產廣東從化縣。安南新州亦多出。但其形粗散。不如廣東之圓結。實則各地皆有。凡山谷石壁間恒多生焉。

形態 卷柏自生於深山絕壁。爲多年生之羊齒植物。莖高三五寸。分枝頗多。末端略呈四角形。子囊卽生於此。中藏大小二種之胞子。葉小如鱗。四時青翠。遇日則乾。枝向內卷。受溼則向外開展。故名

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論卷柏曰。通月經。治尸疰。鬼疰。腹痛。百邪鬼魅。啼泣。【宋】大明日華諸家本草論卷柏曰。鎮心。除面疔。頭風。暖水。服。生用。破。血。夾。用。止。血。【明】釋希雍本草經疏論

卷柏。



柏 卷

園植 恒有栽種於園圃之陰。溼地。以供玩賞者。

採取 五月七月間採。曬。陰。乾。製法 李時珍曰。凡用以鹽水煎半日。再以井水煎半日。晒乾。焙用。

性質 辛。平。無毒。效能 涼血。止血。用於下血脫肛。最爲相宜。

主治 五臟邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕。血閉。絕子。久服。輕身。和顏色。(本經) 止欬逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩。痿躄。強陰。益精。令人好容顏。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論卷柏曰。通月經。治尸疰。鬼疰。腹痛。百邪鬼魅。啼泣。【宋】大明日華諸家本草論卷柏曰。鎮心。除面疔。頭風。暖水。服。生用。破。血。夾。用。止。血。【明】釋希雍本草經疏論

八畫 卷郝叔周味呵呬呼命咄和固垂夜

卷柏曰。卷柏。稟石之氣。兼感天之

陽氣以生。故味辛溫。別錄益之以

甘平。微寒無毒。入足厥陰少陰。血

分藥也。故主五臟邪氣。女子陰中

突熱痛。癥瘕血閉。絕子。又主痿癱

強陰益精。久服輕身和顏色。當是

理營血之要藥。行而能補者也。別

錄又謂止欬逆。治脫肛。散淋結頭

中風眩。其亦辛能散結。辛能潤燥。甘能緩中。甘能益血之謂歟。【清】

口服。【百一選方】

用。錢半至三錢。凡非虛症而有實

火者以及孕婦禁用。參攷資料。卷柏。約足。象形

也。萬歲長生。言其耐久也。【李時珍】。出近道叢生石上。上細葉

似柏。風藏如雞足。背黃色。用之去下近沙石處。【陶弘景】。今關陝

及沂兗諸州亦有之。宿根紫色多鬚。春生苗。似柏葉而細。卷擊如雞足。高三五寸。無花子。多生在石上。【蘇頌】

【卷柏炭】。即卷柏焙炒成炭者之處方用名。詳「卷柏」條。

【卷柏葉】。即卷柏之處方用名。詳「卷柏」條。

【郡輝草】。即丹參之古籍別名。典見本經。詳「丹參」條。

別錄。詳「升麻」條。

【味芋】。即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【味蒺】。即橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【呵子】。即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「訶子」條。

【阿溟魚】。即鯪魚之古籍別名。典見綱目。詳「鯪魚」條。

【呬蛇龜】。即攝龜之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「攝龜」條。

【呼吟鷹】。即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【命門錄事】。即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。

【命蒂】。即臍帶之古籍別名。典見綱目。詳「臍帶」條。

典見綱目。詳「檀子」條。即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【固不婆律】。即冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冰片」條。

【固羊石】。即礬石之古籍別名。典見本經。詳「礬石」條。

【固活】。即鈎吻折之有青烟出者。典見綱目。詳「鈎吻」條。

【垂水】。即薇之古籍別名。典見爾雅。詳「薇」條。

【垂柳】。即檉柳。詳「檉柳」條。

【垂珠】。即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【垂絲柳】。即檉柳之古籍別名。典見綱目。詳「檉柳」條。

【夜刃頭】。即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。

【夜叉頭】。即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。

【夜干】。即射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳「射干」條。

【夜交藤】。即何首烏之古籍別名。典見本經。詳「何首烏」條。

何首烏莖葉之處方用名。詳「何首烏莖葉」條。

【和圓子】。即椴子之古籍別名。

【和尙頭草】。即白毛藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「白毛藤」條。

【和姑】。即半夏之古籍別名。典見本經。詳「半夏」條。

【和尙頭草】。即白毛藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「白毛藤」條。

【和圓子】。即椴子之古籍別名。

分。每用一兩。水一盞。煎數十沸。通

方) 治遠年下血。卷柏。地榆。焙等

配。合。應用。治大腸下血。卷

柏。側柏。棕櫚。等分。燒存性。爲末。每

服三錢。酒下。亦可飯丸服。(仁存

【夜光】即螢火之古籍別名。與見本經。詳「螢火」條。②即地錦草之古籍別名。典見吳普本草。詳「地錦草」條。

【夜合】即何首烏之古籍別名。典見本傳。詳「何首烏」條。

【夜合皮】即合歡皮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「合歡皮」條。

【夜呼】即商陸之古籍別名。典見本經。詳「商陸」條。

【夜明砂】原名 伏翼屎。出而有翼。故名伏翼。其屎黑如砂粒。而功能去障明目。遂命之曰夜明砂。

古籍別名 天鼠屎。鼠法。石肝。(本經)黑砂星。(綱目)鼠真。千里光。天鼠矢。黑殺屋。爛砂星。爛紫精。(和漢藥考)飛鼠屎。(生產辨)

外國名詞 Batung (英) 基本 屬翼手類。為蝙蝠之糞。產地 陳仁山藥物生產辨云。夜明砂各省有出。廣東以番禺新造為多。

形態 蝙蝠之種類頗多。其普

八畫 夜

通者體似鼠。全身黑色。帶一種臭氣。骨節有如鳥類。前肢形狀特異。除拇指外。餘皆特長。其間張以皮膜。達於後肢及尾端。以便飛翔。後肢有爪。用以倒懸樹枝。晝間隱於暗處。或岩穴。或屋隙。或叢樹之間。黃昏則鼓翼而出。覓食飛蟲。本品兩端皆尖。其色褐黑。狀似鼠糞。中混未消化之蟲。如蚊蚋等。

採取 冬季採之。
製法 李時珍曰。凡採得。以水淘去灰土惡氣。取細砂晒乾焙用。其砂乃蚊蚋眼也。

性質 辛寒。無毒。
效能 活血。明眼目。消熱。療癆瘵。疳。用作眼科藥。又為小兒疳積藥。主治 頭面癰腫。皮膚洗滌時。痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。(本經)去面上黑肝(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論夜明砂曰。燒灰酒服方寸匕。下死胎。【宋】日華諸家本草論夜明砂曰。炒服。治瘰癧。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論夜明砂曰。治馬撲損痛。以三枚投熱酒一升。取清服立止。數服便痊。【宋】寇宗奭

本草衍義論夜明砂曰。治疔有效。

【明】李時珍本草綱目論夜明砂曰。治目盲障翳。明目除癩。【明】繆希雍本草經疏證論夜明砂曰。天鼠夜出。喜食蚊蚋。故其屎中淘出細砂。皆未化蚊蚋眼也。所以今人主明目。治目盲障翳。取其氣類相從也。其味辛寒。乃入足厥陰經藥。本經所主諸證。總屬是經所發。取其辛能散內外結滯。寒能除血熱。氣壅故也。然主療雖多。性有專屬。明目之外。餘皆可略。【清】黃宮繡

本草求真論夜明砂曰。夜明砂即名天鼠屎也。其屎因食蚊蚋而化。蚊蚋善食人血。是即蚊蚋之眼。故能入肝經血分。活血。為治目盲障翳之聖藥。凡人目生障翳。多緣肝有血積。以致上攻於目。其或見為翳府。或見為血氣腹痛。得此辛以散邪。寒以勝熱。則血自活。而病無不可愈。以其蚊善食血。故即可以食血者。治其血耳。并能燒烟辟蚊。是即以此蚊治蚊之意。淘淨焙用。惡白微白斂。

配合應用 ①治內外障翳。夜明砂末。化入豬肝內煎食。飲汁效。

(直指方)

②治青盲不見。夜明砂。糯米炒黃一兩。柏葉炙一兩。為末。牛膽汁和丸。梧子大。每夜臥時。竹葉湯下二十九。至五更米飲下二十九。盡乃止。(聖惠方)

③治小兒雀目。夜明砂炒研。豬膽汁和丸。綠豆大。每米飲下五丸。一方加黃芩等分為末。米泔煎豬肝。取汁調服半錢。

④治五癆不止。夜明砂末。每冷茶服一錢。立效。又方。治癩發作無時。經久不癒。用蝙蝠糞五十粒。砂半兩。麝香一錢。為末。糯米飯和丸。小豆大。未發之時。白湯下十九丸。(聖惠方)

⑤治胎前癩疾。夜明砂末三錢。空心溫酒服。(經驗秘方)

⑥治欬嗽不止。蝙蝠去翅足。燒酒為末一錢。食後白湯下。(壽域神方)

⑦治小兒疳病。以紅紗袋盛夜明砂佩之。(直指方)

六八七

⑧治一切疔毒。夜明砂五錢。入瓦瓶內。以豬肉三兩。薄切。入瓶內。水煎熟。子前以肉與兒食。飲其

八畫 夜奇奈妬姑

汁。取下腹中胎毒。次用生薑四兩。和皮切炒。同黃連末一兩糊丸。黍米丸。米飲服。日三次。(全幼心鑑方)

①治聾耳出汁。夜明砂二錢。麝香一字爲末。拭淨捺之。(聖惠方)

②治潰腫排膿。夜明砂一兩。桂半兩。乳香一分爲末。入乾砂糖半兩。井水調傳。(直指方)

③治腋下胡臭。夜明砂末。鼓汁調。

④治風神牙痛。夜明砂炒。吳茱萸湯泡炒。等分爲末。麝酥和丸。麻子大。綿裹二丸。含之吐涎。(普濟方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無療熱者禁用。

豆白斂。白薇。

參攷資料 ①夜明砂及蝙蝠。

皆厥陰肝經血分藥也。能活血消積。故所治目昏盲障。瘧瘡疔毒。淋帶。瘰癧。癰腫。皆厥陰之病也。按類說云。定海徐道亨患赤眼。食蟹遂成內障。五年忽夢一僧。以藥水洗之。令服羊肝丸。求其方。僧曰。用洗淨夜明砂。當歸。煆。木賊。去節。各

一兩。爲末。黑羊肝四兩。水煎爛。和丸。梧子大。食後熱水下五十丸。如法服之。遂復明也。(李時珍)

【夜明犀】即犀角之一種。夜視有光者。詳「犀角」條。

【夜金】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【夜焰】即螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳「螢火」條。

【夜食鷹】即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【夜牽牛】即紫葳之古籍別名。典見斗門方。詳「紫葳」條。

【夜遊將軍】即蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蠊」條。

【夜燕】即蝙蝠之古籍別名。典見綱目。詳「蝙蝠」條。

【夜繁花】即紫茉莉之古籍別名。典見綱目。詳「紫茉莉」條。

【夜關門】

產地 出浙江杭屬

形態 夜關門有草木二種。葉似槐。開黃花。晝開夜合。秋結長莢。莢中有子。其莢可供藥用。

探取 以草木者入藥良。主治 疝氣。

【夜關門皮】 主治 肺癰。斂瘡。生肌。收口。熬膏貼之。

【夜蘭】 古籍別名 步驚。蚊驚。樹神符樹。葉名鬼畫符。(綱目拾遺)

產地 出粵地多生道旁。

形態 夜蘭爲香木類之一種。狀如木蘭。亦似紫微。高一二尺。葉如槐。大如指頭。頗帶藍色。老則上有白蒙文如蝸涎葉。下有小花如粟米。至夜則香聞數十步。恍若芝蘭。折插門上。可辟蚊。其葉可供藥用。



夜蘭

主治 一切風寒諸病。取葉煎湯。服少頃。大吐痰涎。或行路侵寒。屢吐瀉危篤。採數葉嚼。或吐或不吐。病即愈。

參攷資料 ①夜蘭。生羅浮幽谷中。有香無形。與肉芝同爲神物。與此名同物異。(關嶺嶺南隨筆)

參攷資料 ①夜蘭。生羅浮幽谷中。有香無形。與肉芝同爲神物。與此名同物異。(關嶺嶺南隨筆)

六八八

①粵志步驚木。以嫩葉和米數粒。微炒。煎湯飲之。可愈嘔瀉。寒痰。花有幽香。步行遇之。往往驚爲惡。關故亦曰步驚。永安人以嫩葉乾之。持入京師作人事。核其功用形狀。或即夜蘭歟。(趙學敏)

【奇良】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【奇菜子】即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬葵子」條。

【奇楠香】即伽楠香之別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

【奇糧】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【奈何草】即奈何草。參見「白頭翁」條。

【妬婦】即黃芩之古籍別名。典見吳普本草。詳「黃芩」條。②黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。

【姑活】 古籍別名 冬葵子。雞精(別錄)

基本 姑活爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。主治 大風邪氣。溼痺寒痛。久

服益氣。輕身耐老。

【慈致盜料】姑活爲藥無用者。其有固活丸者。卽是野葛之名。冬莢子。亦非菜之冬莢子也。(陶弘景)

【姑勞】卽車螯之薄殼者。

【姑楸仁】卽蕪夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕪夷』條。

【姑楸木子】卽桃榔子之古籍別名。典見臨海異物志。詳『桃榔子』條。

【姑壞菜】卽酸漿之古籍別名。典見救荒本草。詳『酸漿』條。

【委貝】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【委蛇】 古籍別名 玉竹。(和漢藥考)

產地 生原野及園中。

形態 委蛇爲雜草類之一種。

大枝長鬚。多葉而兩兩相對。子如芥子。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 消渴少氣。令人耐寒。

【委萎】卽玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【孟】卽狼尾草之古籍別名。典見

爾雅。詳『狼尾草』條。

【孟娘菜】 古籍別名 魚腥草。(和漢藥考)

產地 生山野間。

形態 孟娘菜爲雜草類之一種。冬夏常有葉似升麻。方莖。其莖葉可作菜茹與藥用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 婦人腹中血結。羸瘦。男子陰發溼痒。強陽道。補虛弱。去痔瘻。瘰癧。

【孟推】卽青雌之古籍別名。典見別錄。詳『青雌』條。

【季春李子】卽李子之冬花春實者。典見綱目。詳『李子』條。

【孤兒菊】卽蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。

【孤兒菊葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見綱目。詳『澤蘭葉』條。

【官白芷】卽白芷之色白而有香味者。功用與『白芷』同。詳該條。

【官桂】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【官粉】卽白粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白粉』條。

【官脂】卽藥脂之古籍別名。典見

本經。詳『藥脂』條。

【定心草】卽雄鼠薺之別名。詳『鼠薺』條。

【定風草】卽天麻之古籍別名。典見藥性。詳『天麻』條。

【定粉】卽白粉之古籍別名。典見藥性。詳『白粉』條。

【定參草花】卽隨春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『隨春花』條。

【宛童】卽桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

【宜母果】 命名 本品孕婦肝虛者宜嗜之。故名。

古籍別名 宜穰子。藥果。黎藤子。(綱目拾遺)果木。(粵語)舍利別。(梵名)

產地 出粵中。

形態 宜母果爲夷果類之一種。其形似橙而小。二三月間成熟。

黃色而味極酸。汁可代醋。又菜大紅。必以調和。其果可供藥用。

採取 以陳久者良。

性質 酸。無毒。

主治 辟暑解渴。下氣和胃。能安胎。鹽醃。並療傷寒痰火。

【宜男】卽葦草之古籍別名。典見

綱目。詳『葦草』條。

【宜南草】 命名 本品生南方。故名。

產地 生山谷間。

形態 宜南爲雜草類之一種。有莖長二尺許。內有薄片似紙。大小如蟬翼。

主治 除邪辟惡。止驚。緋縹發盛。佩臂上。

參攷資料 宜南與葦草之宜男不同。(李時)

【宜穰子】卽宜母果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『宜母果』條。

【居陵迦】卽李子之古籍別名。典見梵書。詳『李子』條。

【居塞蓮】卽夾實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夾實』條。

【風人】卽刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳『刺蒺藜』條。

【屈草】 基本 屈草爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生川澤間。

採取 五月採之。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 胸脇下痛。邪氣。腸間寒熱。陰痺。久服輕身益氣。耐老。

八畫 姑 委 孟 季 孤 官 定 宛 宜 居 屈

八畫 屈岡罔帕帛幸底庚彼忠忽怪房承抱

【屈鳩】即鴿嘔之古籍別名。典見爾雅。詳「鴿嘔」條。

【罔桐】即白桐之古籍別名。典見本草集註。詳「桐」條。

【罔達羅嗎悉多】即白芨之古籍別名。典見金光明經。詳「白芨」條。

【帕拉聘】產地 出亞洲帕米爾高原諸地。

形態 帕拉聘為山草類之一種。其根全似三七。但色藍或黑。可供藥用。

主治 一切陰冷痲疾。

參攷資料 帕拉聘回地人多往採取。重價貨於回城。云可治病。但中土人多勿識。不敢輕嘗試也。
(綱目拾遺)

【帛】 命名 本品係素絲所織。成長狹如巾。故名。

古籍別名 緙(綱目) 基本 帛為服料類之一種。其入藥之功用。詳見「緙帛」「五色帛」條。

種類 帛者即今謂之綢。其厚者古謂之紵。其雙絲者又謂之縠。帛為絲織品。其以染絲而造者。古謂之五色帛。又謂之緙帛。

【幸胡】即鴿之古籍別名。典見綱目。詳「鴿」條。

【底野迦】產地 出西戎。形態 底野迦係用豬膽作成。狀如久壞丸藥。赤黑色。可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 百病中惡。客忤邪氣。心腹積聚。

【底珍】即無花果之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「無花果」條。

【庚申薔薇】即月季花之日本別名。詳「月季花」條。

【彼子】即披子之原名。詳「披子」條。

【彼岸花】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【忠臣】即橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【忠果】即橄欖之古籍別名。典見記事珠。詳「橄欖」條。

【忽野薔】即阿勃勒之別名。詳「阿勃勒」條。

【忽鹿麻】即巴旦杏仁之古籍別名。典見綱目。詳「甜杏仁」條。

【怪鷓】即鷓鴣之古籍別名。典見

爾雅。詳「鷓鴣」條。

【房木】即辛夷之古籍別名。典見本經。詳「辛夷」條。

【房花】即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

【房苑】即防葵之古籍別名。典見別錄。詳「防葵」條。即防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防己」條。

【房圖】即桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳「桔梗」條。

【房慈】即防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防己」條。

【承光】即地錦草之古籍別名。典見吳普本草。詳「地錦草」條。

【承夜】即地錦草之別名。詳「地錦草」條。

【承存草】即鹿御草之古籍別名。典見別錄。詳「鹿御草」條。

【承腹草】即鹿御草之古籍別名。典見吳普本草。詳「鹿御草」條。

【承露】即落葵之古籍別名。典見綱目。詳「落葵」條。

【承露仙】即伏雞子之古籍別名。典見綱目。詳「伏雞子」條。即人肝藤之古籍別名。典見本草拾

遺。詳「人肝藤」條。

【抱木茯神】即茯神之處方用名。詳「茯神」條。

【抱牙】即狼牙之古籍別名。典見吳普本草。詳「狼牙」條。

【抱娃子椒】即黎椒之俗名。詳「黎椒」條。

【抱娘蕊】即瓊蕊之古籍別名。典見綱目。詳「瓊蕊」條。


【抱槍】即溪鬼蟲之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「溪鬼蟲」條。

【抱蘭】即蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼朮」條。

【抱雞母】別名 石竹根。一洞

產地 生嶺信。

形態 柔莖。下紫上綠。莖上發苞如玉簪花。苞中抽莖。葉生莖端。如竹葉而寬。有直紋三稜。面背背綠。背紋稍多。柄弱下垂。薄葉偏反。絡根圓長。可供藥用。



抱雞母

主治 跌打損傷。番疔痔。

【抱燈居士】即香附之古籍別名。典見記事珠。詳「香附」條。

【抹利花】即茉莉花之古籍別名。典見佛經。詳「茉莉花」條。

【抹厲花】即茉莉花之古籍別名。典見洛陽名園記。詳「茉莉花」條。

【押不蘆】草本。押不蘆。爲毒草類之一種。可供藥用。

產地 出西域諸地。

主治 製麻藥。

參攷資料 押不蘆以少許磨酒飲。即通身麻痺而死。加以刀斧亦不知覺。三日後以藥解之。即活。麻藥中可用之。(李時珍)

【抽花】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【抱青春】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【拒冬】即續隨子之古籍別名。典見開寶本草。詳「續隨子」條。

【拒斧】即蜂蟻之古籍別名。典見說文。詳「蜂蟻」條。

【拒斧窠】即桑螵蛸之古籍別名。典見爾雅。詳「桑螵蛸」條。

【拒霜】即芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳「芙蓉」條。

【拔】即烏欒蕪之古籍別名。典見爾雅。詳「烏欒蕪」條。

【拔麻】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【拔萃團】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麝香」條。

【拔屨子】即無食子之古籍別名。典見西陽雜俎。詳「無食子」條。

【拔爾撒摩】產地 產自外洋諸國。

形態 拔爾撒摩。爲香木類之一種。樹生脂膏。氣極香烈。可供藥用。

主治 傳金刃傷痘瘡則無癢。

【拔綠】即綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【拔穀】即菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菝葜」條。

【拖白練】即練鵲之俗名。詳「練鵲」條。

【拙員羅香】即安息香之古籍別名。典見梵書。詳「安息香」條。

【拙魚】即嘉魚之古籍別名。典見綱目。詳「嘉魚」條。

【招頭藤】即紫藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紫藤」條。

【放光石】即菩薩石之古籍別名。典見綱目。詳「菩薩石」條。

【放屍蟲】即行夜之俗名。詳「行夜」條。

【放杖木】命名 本品老人服之一月可以放杖。故名。

產地 生山中。

形態 放杖木爲灌木類之一種。其樹似木天葵。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 一切風血。理腰脚。輕身。變白不老。浸酒服之。

【放杖草】即淫羊藿之古籍別名。典見諸家本草。詳「淫羊藿」條。

【放棍行】即七葉黃荊之俗名。詳「七葉黃荊」條。

【於朮】命名 本品即野朮之。產於浙江於潛縣者。故名。

古籍別名 善朮。(清異錄)吳

外國名詞 Atractylis Yuen Onien

形態 於朮以出縣治後鶴山者爲佳。其朮如鶴頭。頭足俱全。皮細帶黃。切開有砂點。猩紅如澀。乾則清香。有鬚。得土氣。獨厚。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 甘補脾。溫和中。補氣生血。無汗能發。有汗能止。開胃補脾。則能進飲食。去勞倦。止肌熱。化瘕癖。和中能已嘔吐。定痛安胎。燥澀利小便。生津液。止瀉瀉。化胃經痰。水理心下急滿。利腰脚。血結。去周身濕痺。

近人學說 張山雷曰。朮之種類不一。古今皆以於潛產者爲上品。然實是野生者。久已無聞。今市肆之所謂於朮。皆江西萍鄉產也。人功培植。較之尋常白朮。氣稍和平。實稍柔潤。以補脾胃。頗合沖和之性。今安徽有野朮一種。非市肆所有。乃土人四出尋覓而得者。氣味芳香異常。而不燥烈。中有砂點甚多。雖敲之極燥。而剖之則砂點皆是。砂色之油。最是上品。以入煎劑。清芬之氣。縈繞一室。補脾醒胃。大有奇功。非尋常之冬白朮。非

八 壘 抱 抹 押 抽 拋 拒 拔 拖 拙 招 放 於

八畫 於 昆

瘳。所能望見項背者也。

配合應用 ①代參膏。於朮十

煎。白米泔水浸三晝夜。洗淨浮皮。

煎。十次。有脂沾手爲度。切片熬

膏。一次收成。滴紙不化。用白茯苓

十觔。杵末水飛去浮。只取沉香蒸

曬十次。沾手如膠。與朮膏攪勻。每

服兩許。米湯送下。(楊春涯驗方)

②治虛弱枯瘦。食而不化。用於

朮酒浸九蒸九曬。一觔。菟絲子酒

煮。菟絲曬乾一觔。共爲末。蜜丸。梧

子大。每服二三錢。(九製於朮丸)

③治盜汗不止。此藥如神。於朮

四兩。分四製。一兩黃芪煎汁炒。一

遇腹痛。腰酸作脹。即宜服之。成孕

三月。即服起。直至足月。不但保胎。

即臨產亦可保易生無恙。(良方

集要)

④治三日瘧。九製於朮一觔。廣

皮八兩。熬膏。用飴糖四兩收。(古

今良方)

專治四日兩頭。或一二年。至三

四年不愈者。或愈而復發。速補不

已者。用於朮一兩。老薑一兩。水煎。

數日五更溫服。即愈。重者二服。永

不發矣。(久瘧方)

參攷資料 凡下焦陰氣不脫。

上焦陽氣驟脫者。無力用參。重用

(吳普本草)

外國名詞 Laminae ja-

Ponica, Aresch. (拉丁) プン

ブエンブコブヒロメ(日本)

基本 係昆布科昆布屬。爲昆

布柔軟之葉。

產地 昆布產地。不概在暖海。

而寒海亦有之。不概在淺海。而深

處亦間有之。世界有名之產地。如


英領加拿大等。概以太平洋及大

西洋之北部爲多。若在太平洋尤

多特產。如南美西南海岸所產之

一種名 *Laminaria* 葉柄之直徑。

達於二十生的邁者。南冰洋所產



形態 全體革質。下生假根。以

附着海中巖石。假根部分枝如樹

根。其分歧之末端。各爲圓盤狀。令

附着強固。不爲海流衝去。假根部

之上。爲短而略圓之葉柄。與爲平

而長之葉狀體。葉狀體隨其種類

而各異其形。長自數百尺至一二

尺。幅廣自四五寸至一尺以上。質

柔軟而黏滑。中含葉綠素。外含褐

色素。故外呈褐色。惟此色素爲

可溶性。故以昆布煮沸時。即失褐

色而呈青色。至葉狀體之形。或分

裂或否。當有以附着地之深淺。採

集時之冬夏。而異其色澤形狀者。

若其內部形態。則由表皮。外皮內

皮及髓四部而成。表皮在最外層。

與在內微層之內部細胞。皆含色

素。以爲同化組織。外皮占葉狀體

之大部。其細胞愈向內則愈大。含

有多量之富哥森粒 (Fucoxanthin)。

以爲貯蓄。並有充滿黏液之黏液

【昆布】 命名 本品形長似布

處方用名 淡昆布。鹹昆布。

古經別名 綸。(爾雅) 綸布。

【於潛朮】 即白朮之處方用名。詳

見左傳。詳「虎骨」條。

【白朮】條。

【於菟骨】 即虎骨之古籍別名。典

禁忌同白朮。(趙學敏)

道。內皮由絲狀細胞而成。膜厚而堅。亦含富哥森粒。是兼強固及貯蓄之官能者也。髓由篩狀細胞與內皮發生之纖維狀細胞相為交錯。如菌體之於菌絲然。以司轉輸養液之作用者。若其柄之構造。略與葉狀體同。惟其表皮細胞。逐次分裂。以為肥大。故數年之後。得見如年輪之層紋。



(二) 布昆

製法 雷致曰。凡使昆布。每一筋用飯碗大小十個。同剉細。以東流水煎之。從已至亥。待鹹味去。乃曬焙用。

性質 鹹。寒。滑。無毒。

成分 昆布含有碘1.23%。灰21.14%。水23.08%。粗蛋白1.11%。粗脂肪0.81%。無氮物5.17%。纖維10.60%。

效能 消癰腫水腫。破積聚痰結。用作軟堅藥。又治淋巴腺炎。肋膜炎。初期效毒。

八畫 昆 昌

作用 在胃中僅將含有之碘質分出幾許。而合成碘化物。至腸始次第吸收至血中。能撲滅血中之病原菌。及腐敗質。又能促進細胞之新陳代謝作用。且可將一切黏膜之滲透質重吸入之。故有退炎之功。

主治 十二種水腫。癰疽。聚結氣。瘰癧。

歷代記載攷證 【唐】孫思邈千金翼論昆布曰。破積聚。【唐】陳藏器本草拾遺論昆布曰。治陰瘻腫。含之噀汁。【唐】甄權藥性本草論昆布曰。利水道。去面腫。治惡瘡鼠瘻。【明】經希雅本草經疏論昆布曰。昆布得水氣以生。故味鹹氣寒。而性無毒。鹹能軟堅。其性潤下。寒能除熱散結。故主十二種水腫。癰疽。聚結氣。瘰癧。東垣云。癰疽如石者。非此不除。正鹹能軟堅之功也。

配合應用 ●昆布腫。治膀胱結氣。急宜下氣。用高麗昆布一斤。白米泔浸一宿。洗去鹹味。以水一斛。煮熱。勞細入葱白一握。寸斷之。更煎極爛。乃下鹽酢。搽痔橋椒末。

調和食之。仍宜食粟米梗米飯。極能下氣。無所忌。海藻亦可依此法作之。【廣濟方】

●治癰氣結核。癰腫腫硬。以昆布一兩。洗去鹹。曬乾為散。每以一條。綿裹。好醋中浸過。含之噀汁。味盡再易之。亦治項下五癭。【聖惠方】

●治項下卒腫。其囊漸大欲成癭者。昆布海藻等分為末。蜜丸杏核大。時時含之噀汁。【外臺祕要方】

用量 八分至錢中。
施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁。

參攷資料 ●昆布下氣。久服。瘦人無此疾者。不可食。海島之人。愛食之。為無好菜。只食此物。服久相習。病亦不生。遂傳說其功於北人。北人食之。皆生病。是水土不宜耳。凡是海中菜。皆損人。不可多食。【孟詵】●按吳普本草論布一名昆布。則爾雅所謂似綸。東海有之者。即昆布也。綸音關。青絲綸也。訛而為昆耳。陶弘景以綸為青苔。紫菜。謂組為昆布。陳藏器又謂

綸組是二種藻。不同如此。【李時珍】●昆布生南海。葉如手。大似蓴菜。紫赤色。其細葉者。海藻也。【陳藏器】●其草順流而生。出新羅者。葉相黃黑色。胡人搗之為索。陰乾。從舶上來中國。【李珣】●昆布生登萊者。槎如繩索之狀。出閩浙者。大葉似菜。蓋海中諸菜。性味相近。主治一致。雖稍有不同。亦無大異也。【李時珍】

【昌支】即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

【昌文】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

【昌本】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【昌羊】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【昌陸】即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

【昌魚】即鱈魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鱈魚」條。

【昌陽】即菖蒲之古籍別名。典見別錄。詳「菖蒲」條。●即白菖之古籍別名。典見本草拾遺。詳「白菖」條。

【昌鼠】即鉛魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鰻魚』條。

【昌歌】即白昌之古籍別名。典見綱目。詳『白昌』條。

【明天麻】即天麻之處方用名。詳『天麻』條。

【明月】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『真珠』條。

【明月砂】即兔屎之處方用名。詳『兔屎』條。

【明王珍】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【明瓦】即海月壳之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【明石】即格石之古籍別名。典見別錄。詳『格石』條。◎即明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【明乳香】即乳香之處方用名。詳『乳香』條。

【明附片】即附子之處方用名。詳『附子』條。

【明琥珀】即琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【明珀】即琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【明眼草子】即枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【明礬】原名 礬石。命名 礬者。煇也。本品煇石而成。且色自光明。故名。處方用名 白礬。枯礬。

古籍別名 羽涅(本經)羽澤。(別錄)馬齒礬。(本草集註)涅石。(綱目)明石。燄風石。(和漢藥考)晉礬。生礬。

外國名詞 Alunon (拉丁) Alum. (英) Alun. (德)

產地 各國俱有之。惟天產明礬為八面形之結晶塊。色白。間或如絲附於石面而生。其產量甚少。故須待人工製造。以供需用。

形態 明礬為無色透明八面形之大結晶或結晶塊。往往被以白粉。味甘而澀。水能溶解。其水溶液。有使蛋白質及膠質凝結之性。熱則熔化。受大熱則結晶失其水分而膨脹。成輕虛似海綿之塊。是為枯礬。亦稱燒明礬。明礬為整齊之八面晶。或結晶性粉末。無色。質堅硬。透映。外面每帶有白粉霜。味微甘。有收斂性。溶解於十分之一

水。現酸性反應。酒精幾不能溶解。熱則漸熔。甚者膨起。成白色疎鬆之塊。

種類 枯礬。係煇乾者。雪礬。係白礬之潔白者。明礬。係白礬之光明者。波斯白礬。係文如束針。狀如撲粉者。礬精。係礬成塊光瑩如水精者。柳絮礬。係煎煉之後。輕虛如棉絮者。巴石。係其汁燒至盡。色白如雪者。雞屎礬。係色黃黑者。凡溫泉。泉氣所發之山。皆有之。山中地熱。而焰氣未發。人取其土。復撒置地上。略注水。覆蠟。則相蒸。蠶繭上殖。如麴花。是乃礬也。此時最忌雨水。故須候晴天作之。又爬得其土。盛器。水攪洗之。澆過。如此數時。其滓仍撒置地上。以其澆出之水。和木灰汁。煎兩三時。盛入大桶。冷定成礬。然未精。復以甕盛。澆取之。則如粉。又熬之如膏。桶盛冷定。則潔白。堅硬如厚冰。是乃明礬也。

製法 雷斅曰。凡使白礬石。以瓷瓶盛於火中。煇。令內外通赤。用錯搗起。蓋旋。安石。蜂窠入內。燒之。每十兩。用巢六兩。燒盡為度。取出。放冷。研粉。以紙裹。安五寸深土坑

中。一宿取用。又法。取光明如水晶。酸鹹清味全者。研粉。以瓷瓶用六一泥泥之。待乾。入粉三升。在內。旋入五方草。紫背天葵。各粗汁一盞。待汁乾。蓋住瓶口。更泥封。下用火一百斤。煇之。從已至未。去火取出。其色如銀。研如輕粉用之。時珍曰。今人但煇乾汁用。謂之枯礬。不煇者為生礬。若入服食。須循法度。按九鼎神丹秘訣。煉礬石入服食法。用新桑合。煇一具於密室。淨掃以火燒地。令熱。灑水於上。或灑苦酒於上。乃布白礬於地上。以蠟覆之。四面以灰攪定。一日夜。其石精皆飛於桑上。採取收上。未盡者。更如前法。數遍乃止。此為礬精。若欲作水。即以搗下礬精一斤。納三年苦酒一斗中。清之。號曰礬華。百日則佳。若急用之。七日亦可。和漢藥考曰。明礬之製法有數種。其原料用明礬石及黏土。(一)碎明礬石。燒之。至瓦斯發生而止。乃以水溶解。濾過。蒸發。濾液。使成結晶。再精製之。(二)明礬石。燒後。加硫酸。製成明礬。與第一法同。(三)黏土中加硫酸。使成硫酸礬土。再加硫酸

加里。製成明礬。與第一法同。(四) 在有溫泉地方。盛黏土於亞硫酸 瓦斯發生之孔。復灌以水。覆以礬 煎。使化生硫酸礬土。乃以水溶解 澆過。加木灰汁。又澆過。蒸發濃液。 使成結晶。再精製之。日本製造明 礬。即此法也。

性質 酸寒。無毒。

成分 化學上謂之硫酸亞爾

密紐誤加價誤 $Al_2(SO_4)_3$

$SO_3 \cdot H_2O$ 。一名加里明礬。

效能 燥溼。解毒。殺蟲。止癢。用 爲收斂止血藥。

主治 寒熱洩痢。白沃。陰蝕惡 瘡。目痛。聖骨齒。煉餅服之。輕身不 老增年。(本經)除固熱在骨髓。去 鼻中息肉。(別錄)

歷代配註攷證 【唐】甄權藥

性本草論明礬曰。生含噤津。治急 喉痺。療鼻白。麤鼻鼠漏。療癩疥。癬 瘡。【宋】大明日華諸家本草論明礬 曰。除風去熱。消痰止渴。煖水服。治 中風失音。和桃仁葱湯浴。可以出 汗。【宋】寇宗奭本草衍義論明礬 曰。枯礬貼嵌甲牙縫。中血出如蝸 蝨。【明】李時珍本草綱目論明礬曰。

八 堊 明

吐下痰涎。飲辟燥溼。解毒迫涎。止 血定痛。蝕惡肉。生好肉。治癰疽疔 腫。惡瘡。癩癧。疔疾。大小便。口齒 眼目諸病。虎犬蛇蝎百蟲傷。【明】 繆希雍本草經疏論明礬曰。礬石 味酸氣寒而無毒。其性燥急收溼 解毒除熱。墜濁。蓋寒熱洩痢。皆溼 熱所爲。婦人白沃。多由虛脫。溼以 止脫故也。陰蝕惡瘡。亦緣溼火。目 痛。多由風熱。除固熱在骨髓。聖骨 齒。髓爲熱所劫。則空。故骨痿而齒 浮。礬性入骨除熱。故亦主之。去鼻 中息肉者。消毒除熱。燥溼之功也。 【清】黃宮楨本草求真論明礬曰。 白礬氣味酸寒。則其清熱收熱。可 知。何書又言燥痰。若於寒字相悖。 書言能治風痰。若於收字溼字相 悖。不知書之所云。能燥痰者。非其 氣味溫熱。而可以燥而卽化。實以 收其燥溼初起。使之下墜。不使留 滯而不解也。且其酸而兼鹹。則收 溼之中。尙有迫涎逐降之力。非卽 不燥之燥乎。所謂能治風痰者。其 酸苦涌泄。兼因風邪初客。合以皂 莢等味研服。則能使之上涌。豈其 風熱歷久。深入不解。而卽可以上

涌乎。是以風痰泄痢崩帶。用此以 收卽愈。諸血脫肛。陰挺崩帶。風眼 痰飲瘡癤。用此以溼卽效。喉痺癰 疽。蛇傷蟲毒。用此酸寒以解卽除。 治雖有四。然總取其酸溼寒鹹爲 功。以爲逐熱去涎之味。但暫用則 可。久服則於精血有損。古言服損 心。肺傷骨。義根於是。豈正本求源 之始歟。取潔白光堊者佳。火煨用。 【清】張隱卷本草原論明礬曰。 礬石以水煎石而成。光亮體重。酸 寒而溼。是裏水石之專精。能爛清 其穢濁。主治寒熱洩痢白沃者。謂 或因於寒。或因於熱。而爲洩痢白 沃之證。礬石清滌腸胃。故可治也。 陰蝕惡瘡者。言陰盛生蟲。肌肉如 蝕。而爲惡瘡之證。礬石酸溼殺蟲。 故可治也。以水煎石。其色光明。其 性本寒。故治目痛。以水煎石。凝結 成礬。其質如石。故堅骨齒。煉而餌 服。得石中之精。補養精氣。故輕身 不老增年。

國外學說 日本學說謂明礬 者。自昔用爲止血收瘡藥。日本藥 局方。亦爲收斂劑。而於淋疾白帶 下咽頭加答兒。足腫多汗。氣管枝 加答兒。均血。外用之。於咯血下痢 等。內用之外。用時。用粉末。或百倍 至十倍之溶液。吸入時。用五百倍 至二百倍之溶液。內用時。一回○ 一至○。五。爲丸劑或水劑。英 美學說謂白礬一名礬強。鉍。一 作鉍(二)鉍(二)礬(四)養(四) 產火山及出煤等處。更有用礬石 煉成。天方國有數種礬。名曰希白 礬。類之統稱。白礬亦在其中。白 礬能令羊毛之顏色變清明。能令 渾濁之水變潔淨。埃及國與印度 國自古以來。卽用白礬以印花布 與染物。印度人亦以礬養白礬爲 提淨渾濁水之用。並爲工藝中之 用。此礬養白礬。在印度西隆格止 地方造之。歐羅巴初造白礬。在敘 利亞國之綠卡。此處所造白礬。較 勝於他處。故謂之綠卡礬。前明景 泰元年。意大利國始設造白礬之 廠。後西班牙與日耳曼等國。亦設 造白礬之廠。英國則設造白礬廠 於約爾克省。每年造白礬極多。或 作藥品。或爲工藝之用。第古人所 用者。爲礬養白礬。近則以煤汽水 內所含之淡輕(四)養礬養(三)

用此質造成淡輕(四)養白礬較爲便捷。而工藝中之功用亦與養白礬相同。故同治六年以前英國則以養白礬爲藥品中之用。以後則惟以淡輕(四)養白礬代之。白礬爲吐藥又爲收斂藥。能斂汗止瀉。治尿變甜。嘔吐痰涎。此藥收斂之性極大。無論身之一處或全體。俱有此性。服之則爲胃腑所收。停入血內。令身內之各津液減少。又能令離身遠處。(如手指足指之類)亦不流血。瀉血。吐血。血欬血等病。服之均有益。第其功效大小初無一定。然亦可減便血之病。又如因鉛病而肚疼。食大服亦能有益。或能泄瀉而減鉛毒之害。因鉛毒能被含硫養(三)之質化分。又如肺胃或大小腸內腎等處出血諸症。每服此藥末一分半至二分半。每日服四五次。自能療治。又如久痢。每服此藥末一分。用清調服。每四點鐘服一次。外科用之能收斂尿管。止血。治白帶。白濁。更能作收斂性之漱喉藥。洗眼藥。與外導藥。又可作洗眼藥等。

配合應用 礬石即白礬得

巴豆同煨令枯。取礬研末。以鷄翎管吹入喉中。流出熱涎立解。喉痺其證俗呼爲纏喉風是也。

①明礬得硫黃雄黃白附子海金沙。蜜陀僧。擦汗斑殊效。一年者去皮一次。十年者去皮十次。擦後坐臥勿當風。勿行房搖扇。

②制半夏能散溼痰及食積痰。兼除五飲。

③明礬同芒硝。可燒水銀成粉。治一切瘡中有蟲。

④明礬得黃蠟和丸。名蠟礬丸。治一切腫毒有神。凡治癰疽。當服之以護膜。膜苟不破。雖劇必痊。

⑤治中風痰厥。四肢不收。氣閉。腦塞者。白礬一兩。牙皂角五錢。爲末。每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。(陳師古方)

⑥治牙齒腫痛。白礬一兩。燒灰。大露蜂房一兩。微炙。每二錢。水煎。含漱去涎。(簡要濟衆方)

⑦治發斑怪證。有人眼赤鼻張。大喘。渾身出斑。毛髮如銅鐵。乃熱毒氣結於下焦也。白礬。滑石。各一兩。爲末。水三盞。煎減半。不住服。盡即安。(夏子益奇疾方)

⑧爛弦風眼。白礬煨一兩。銅青三錢。研末。湯泡澄清點洗。(永類鈴方)

⑨婦人陰脫作痒。礬石燒研。空心酒服方寸匕。日三。(千金翼方)

⑩治胸中痰癖。頭痛不欲食。礬石一兩。水二升。煎一升。納蜜半合。類服。須臾大吐。未吐飲少熱湯引之。(外臺祕要方)

⑪治風痰癩病。化痰丸。生白礬一兩。細茶五錢。爲末。煉蜜丸。如梧子大。一歲十丸。茶湯下。大人五十丸。久服痰自大便中出。可斷病根。(鄧筆華雜藥方)

⑫治小兒胎寒。纏啼發癩。白礬煨半日。煎肉丸。黍米大。每乳下一丸。愈乃止。最良。(保幼大千方)

⑬治產後不語。明氏孤風散。用生白礬末一錢。熱之。調下。(婦人良方)

⑭治風熱喉痛。白礬半斤。研末。化水。新磚一片。浸透取曬。又浸又曬。至水乾。入羹中。浸一月。取洗。安陰處。待霜出。持收。每服半錢。水下。(普濟方)

⑮治懸壺垂長。明中煩悶。白礬

煨灰。鹽花等分爲末。筋頭類點。在上去涎。(孫用和祕寶方)

⑯治小兒舌膜。初生小兒。有白膜。皮裂舌。或遍舌根。可以指甲刮破。令血出。以燒礬末。牛綠豆許。傅之。若不搗去。其兒必噤。(婦和衆至寶方)

⑰治患齒碎壞欲盡者。常以綿裹礬石含嚼吐去汁。(肘後方)

⑱治齒斷血出不止。礬石一兩。燒水三升。煮一升。含漱。(千金方)

⑲治木舌腫強。白礬。桂心等分。爲末。安舌下。(聖惠方)

⑳治口舌生瘡。下虛上壅。用白礬泡湯溫足。(定齊方)又用白礬末。黃丹水飛炒。等分研擦之。(張子和方)

㉑治小兒鵝口。滿口白爛。枯礬一錢。朱砂二分。爲末。每以少許傅之。日三次。神驗。(普濟方)

㉒治口中氣臭。明礬入麝香爲末。擦牙上。(生生編方)

㉓治鼻中息肉。用礬燒末。豬脂和綿裹塞之。數日息肉隨藥出一

方用明礬一兩。寬麻仁七個。鹽梅肉五箇。麝香一字。杵丸綿裹塞之。化水自下也。(千金方)

⑤治眉毛脫落。白礬十兩。燒研。蒸餅丸。梧子大。每空心溫水下七丸。日加一丸。至四十九日。減一丸。周而復始。以愈爲度。(聖濟錄方)

⑥治目昏弩肉。白礬石。納黍米。大入目。令淚出。日日用之。惡汁去盡。其疾日減。(外臺祕要方)

⑦治目生白膜。礬石一升。水四合。銅器中煎半合。入少蜜調之。以綿濾過。每日點三四度。(姚和衆至寶方)

⑧治赤目風腫。甘草水磨明礬。傅眼胞上。效。或用枯礬類擦眉心。(集簡方)

⑨治聾耳出汗。枯礬一兩。鉛丹炒一錢爲末。日吹之。(聖濟錄方)

⑩治卒死壯熱。礬石半斤。水一斗。煮湯浸脚及踝。即可得甦也。(肘後方)

⑪治風溼膝痛。脚氣風溼。虛汗少力多痛。及陰汗。燒礬末一匙。頭投沸湯。淋洗痛處。(御藥院方)

⑫治黃腫水腫。推車丸。用明礬

二兩。青礬一兩。白麵半斤。同炒令赤。以醋煎米粉糊爲丸。煎湯下三十九。(濟急方)

⑬治婦人黃疸。因經水不調。房事觸犯所致。白礬黃蠟各半兩。陳橘皮三錢爲末。化蠟丸。梧子大。每服五十丸。以滋血湯或調經湯下。(濟陰方)

⑭治男婦遺尿。枯白礬。牡蠣粉等分爲末。每服方寸匕。溫酒下。日三服。(徐居士還奇方)

⑮治二便不通。白礬末填滿臍中。以新汲水滴之。覺冷透腹內。即自然通。濟平者以紙圍環之。(經驗方)

⑯治霍亂吐瀉。枯白礬末一錢。百沸湯調下。(華陀危病方)

⑰治伏暑瀉瀉。玉華丹。白礬煨爲末。醋糊爲丸。量大小用木瓜湯下。(經驗方)

⑱治老人泄瀉不止。枯白礬一兩。訶黎勒煨七錢半。爲末。米飲服二錢。取愈。(太平聖惠方)

⑲治赤白痢下。白礬飛過爲末。好醋飛羅麵爲丸。梧子大。赤痢甘草湯。白痢乾薑湯下。(生生方)

⑳治氣痢不止。巴石丸。取白礬一大斤。以炭火淨地燒。令汁盡。其色如雪。謂之巴石。取一兩研末。熟豬肝作丸。梧子大。空腹服。量人加減。水牛肝更佳。如素食人。以蒸餅爲丸。或云白礬中青黑者名巴石。(劉禹錫傳信方)

㉑治冷勞泄痢。食少。諸藥不效。白礬三兩。燒羊肝一具。去脂。醃醋三升。煎爛。搗泥和丸。梧子大。每服二十丸。米飲下。早夜各一服。(普濟方)

㉒治瘧疾寒熱。卽上方用東南桃心七個煎湯下。

㉓治反胃嘔吐。白礬硫黃各二兩。鉢內燒過。入硃砂一分爲末。麴糊丸。小豆大。每齋湯下五十九丸。又方。枯白礬三兩。蒸餅丸。梧子大。每空心米飲服十五丸。(普濟方)

㉔治化痰治嗽。明礬二兩。生薑末一兩。苦醋二升。熬爲膏子。以油紙包收。旋丸。豌豆大。每用一丸。放舌下。其嗽立止。痰卽消。又只用明礬末。醋糊丸。梧子大。每睡時茶下二三十丸。(定西侯方) 又用明礬半生半燒。山梔子炒黑等分爲末。

㉕煎汁糊爲丸。如上服。(摘要方) 又用白明礬。建茶等分爲末。糊丸服。(雜興方)

㉖治諸心氣痛。方用生淨一皂子。大醋一澆。煎七分服。立止。(儒門事親方) 又用明礬一兩。燒硃砂一錢。金箔三個爲末。每服一錢。半空心白湯下。(邵真人方)

㉗治中諸蟲毒。管礬。建茶等分爲末。新汲水調下二錢。瀉吐卽效。未吐再服。(濟生方)

㉘治蛇蟲諸毒。毒蛇射工沙虱等傷。人口噤。目黑。手足直。毒氣入腹。白礬。甘草等分爲末。冷水服二錢。(瑞竹堂方)

㉙治刀斧金瘡。白礬。黃丹等分爲末。傅之最妙。(救急方)

㉚治漆瘡作痒。白礬煎湯拭之。(千金方)

㉛治牛皮癬瘡。石榴皮。隔明礬末。抹之。切勿用醋。卽蟲沉下。(直指方)

㉜治小兒風癱作痒。白礬燒投熱酒中。馬尾搵酒塗之。(子母秘錄方)

六九七

八畫 明

燒灰傳之(聖惠方)

①治乾溼頭瘡。白礬半生牛煨酒調塗上(生生方)

②治身面癢子。白礬地膚子等分。煎水頻洗之(多能鄙事方)

③治腋下胡臭。礬石細袋盛之。常粉腋下甚妙(許堯臣方)

④治魚口瘡毒。白礬枯研。寒食麵糊調傅上即消(救急方)

⑤治足瘡生蟲。南方地卑溼。人多患足瘡。歲久生蟲如虻。乃風熱攻注而然。用牛或羊或猪肚。去屎不洗。研如泥。看瘡大小。入煨過泥礬半兩已上。研勻。塗帛上貼之。須臾痒入心。徐徐連帛取下。火上炙之。蟲出絲髮馬尾千萬。或背白赤黑。以湯洗之。三日一作。不過數次。蟲盡瘡愈(南宮從崎樓神書方)

⑥治雞眼肉刺。枯礬黃丹。朴硝等分。為末。搽之。次日浴。二三次即愈(多能鄙事方)

⑦治冷瘡成漏。明礬半生牛飛。飛者生肉。生者追膿。五瓖脂水飛。各半錢。為末。以皮紙裁條。唾和末。作小撚子。香油捏溼。於未拖過。剪作大小撚。安入漏。早安午換。候膿

出盡。後有些小血出。方得乾水住。藥自然生肉全好(普濟方)

⑧治丁瘡腫毒。雪白礬末五錢。葱白煨熟。搗和丸。梧子大。每服二錢五分。以酒送下。未效再服。久病孕婦不可服(衛生寶鑑方)

⑨治陰汗溼痒。枯礬撲之。又泡湯沃洗(御藥院方)

⑩治交接勞復。卵腫。或縮入。腹痛欲絕。礬石一分。硝三分。大麥粥清服。方寸匕。日三服。熱毒從二便出也(肘後方)

⑪治女人陰痛。礬石三分。炒甘草末半分。綿裹導之。取瘞(百一選方)

用蠶 五分至錢半。施用宜忌 凡陰虛而無溼熱。實邪者禁用。畏麻黃。惡牡蠣。甘草為之使。

著名方劑 ①礬石丸。治經水閉不利。腹臌。辭不止。中有乾血。下血物(金匱方)礬石(三分燒)杏仁(二分)二味末之。煉蜜丸。棗核大。納臍中。劇者再納之。②礬石礬石散。治黃家日晡發熱。而反惡寒。此為女勞。得之膀胱急。少腹滿。身

盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溇。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。此方主之(金匱方)礬石礬石(燒等分)二味為散。以大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。③稀涎散。治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾(局方)明礬一兩。江子仁六粒。牙皂三錢。先化開礬。再入二味。待礬枯為末。每用三分。吹入喉中。

④礬石湯。治脚氣衝心(金匱方)礬石二兩。以漿水一斗五升。煎沒脚底。

參攷資料 ①礬石之用有四。吐利風熱之痰涎。取其酸苦涌泄也。治諸血痛脫肛陰挺瘡毒。取其酸澀而收也。治痰飲泄痢崩帶風眼。取其收而燥溼也。治喉痺癰疽中蠱蛇蟲傷螫。取其解毒也。按李迅癰疽方云。凡人病癰疽發背。不問老少。皆宜服黃礬丸。服至一兩以上。無不作效。最止疼痛。不動膿。活人不可勝數。用明礬白礬一兩。生研。以好黃蠟七錢。溶化和丸。梧子大。每服十九丸。漸加至二十九丸。

熟水送下。如未破則內消。已破即便令如服金石發瘡者。引以白礬末一二匙。溫酒調下。亦三五服見效。有人遍身生瘡。狀如蛇頭。服此亦效。諸方俱稱奇效。但一日中服近百粒則有力。此藥不惟止痛生肌。能防毒氣內攻。護膜止瀉。托裏化膿之功甚大。服至半斤尤佳。不可欺其淺近。要知白礬大能解毒也。今名為蠟礬丸。用之委有效驗(李時珍)②紅心灰。礬制礬(獨孤酒)③今出益州北部西川。從河西來。色青白。生者名馬齒礬。煉成純白名白礬。蜀人以常礬石。其黃黑者名雞屎礬。不入藥用。惟堪絞作以合熟銅。投苦酒中。塗鐵皆作銅色。外雖銅色。內質不變。(陶弘景)④波斯大秦所出白礬。色白而瑩淨。內有束針文。入丹竈家功力逾於河西石門者。近日文州諸番。往往有之。波斯又出金線。打破內有金線文者為上。多入燒煉家用(李珣)⑤白礬自礬石煉成。色白透光。味甜而澀。後則略酸。功用收斂吐衄。解血中鉛毒。主治血崩久痢疾。消渴。尿變甜。內腎血出。

⑥治冷瘡成漏。明礬半生牛飛。飛者生肉。生者追膿。五瓖脂水飛。各半錢。為末。以皮紙裁條。唾和末。作小撚子。香油捏溼。於未拖過。剪作大小撚。安入漏。早安午換。候膿

出盡。後有些小血出。方得乾水住。藥自然生肉全好(普濟方)

⑦治丁瘡腫毒。雪白礬末五錢。葱白煨熟。搗和丸。梧子大。每服二錢五分。以酒送下。未效再服。久病孕婦不可服(衛生寶鑑方)

⑧治陰汗溼痒。枯礬撲之。又泡湯沃洗(御藥院方)

⑨治交接勞復。卵腫。或縮入。腹痛欲絕。礬石一分。硝三分。大麥粥清服。方寸匕。日三服。熱毒從二便出也(肘後方)

⑩治女人陰痛。礬石三分。炒甘草末半分。綿裹導之。取瘞(百一選方)

用蠶 五分至錢半。施用宜忌 凡陰虛而無溼熱。實邪者禁用。畏麻黃。惡牡蠣。甘草為之使。

著名方劑 ①礬石丸。治經水閉不利。腹臌。辭不止。中有乾血。下血物(金匱方)礬石(三分燒)杏仁(二分)二味末之。煉蜜丸。棗核大。納臍中。劇者再納之。②礬石礬石散。治黃家日晡發熱。而反惡寒。此為女勞。得之膀胱急。少腹滿。身

盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溇。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。此方主之(金匱方)礬石礬石(燒等分)二味為散。以大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。③稀涎散。治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾(局方)明礬一兩。江子仁六粒。牙皂三錢。先化開礬。再入二味。待礬枯為末。每用三分。吹入喉中。

④礬石湯。治脚氣衝心(金匱方)礬石二兩。以漿水一斗五升。煎沒脚底。

嘔吐痰涎。(陳仁山)

【明黨】即人參中實透明者之別名。詳「人參」條。

【昏樹晚娘棒】即鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳥不宿」條。

【昔邪】即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳「垣衣」條。

【朋】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【服翼】即蛭蝟之古籍別名。典見爾雅。詳「蛭蝟」條。

【杭白芍】即白芍之處方用名。詳「白芍」條。

【杭粉】即白粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白粉」條。

【杭菊花】即菊花之處方用名。詳「菊花」條。

【杭橋皮】即橋皮之處方用名。詳「橋皮」條。

【柿】原名 柿。命名 柿字從木。音滹。諧聲也。故名。世俗誤作爲柿。

處方用名 柿餅。柿乾。

古醫別名 烘柿。白柿。烏柿。白柿又名柿花。鎮頭迦。(綱目)

外國名詞 Diopyrosaliki.

基本 係柿樹科柿樹屬之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柿霜產山東河南。有柿出者。便有柿霜出。

形態 柿爲落葉喬木。高二三丈。春末生枝葉。葉作橢圓形。或卵圓形而尖。外面淡綠色。互生。葉柄約有三分。帶毛。初夏開花。作合瓣花冠。帶黃色。雄花雌花。常生於同株。或有生於異株者。其實爲漿果。八九月成熟。徑約二寸許。色黃赤。然其形狀有扁圓橢圓。大小不一。



柿

禮類 烘柿乃青綠之柿。置器中自然紅熟如烘成者。則澀味去而轉甘如蜜。

去而轉甘如蜜。白柿一名乾柿。即柿餅。亦即柿花。乃用大柿去皮。即柿餅。亦即柿花。乃用大柿去皮。即柿餅。亦即柿花。乃用大柿去皮。

拾扁。日曬夜露。至乾。置壺中。待生霜後取出者。則色黑質潤而味極

甘甜。柿霜即柿乾所生之霜。色白。性潤。味亦甘甜。烏柿乃柿用火熏而乾者。醃柿乃柿用水浸藏。或鹽水浸藏。或以熟柿用灰汁

深三四度。令汁盡。器藏十餘日而成者。柿糕乃柿與糯同搗成粉而蒸食者。棹柿即漆柿。乃柿之小而卑者。縱至成熟。色仍青黑。可生啖。搗汁謂之柿漆。柿盤乃柿核形扁狀如木。髓子仁而硬。其根甚固者。黃柿乃生汴洛諸州者。朱柿乃出華山似紅柿而圓小皮薄可愛。味更甘珍。

採取 七八月間採之。

製法 李時珍曰。白柿即乾柿生霜者。其法用大柿去皮。拾扁。日曬夜露。至乾。內壺中。待生白霜。乃取出。今人謂之柿餅。亦曰柿花。其霜謂之柿霜。

性質 甘平。無毒。

效能 潤肺。瀉腸。生津。寧嗽。用作祛痰鎮咳藥。又爲收瀉藥。

主治 通耳。鼻氣。腸胃不足。解酒毒。壓胃熱。止口乾。

歷代記述攷證 (唐)陳藏器本草拾遺論柿乾曰。溫補。多食面

點。唐孟詵食療本草論柿乾曰。補虛勞不足。消腹中宿血。瀉中厚

腸。健脾胃氣。宋大明諸家本草論柿乾曰。開胃瀉腸。消痰止渴。治

吐血。潤心肺。療肺痿心熱。咳嗽。潤聲喉。殺蟲。明李時珍本草綱目

論柿乾曰。治反胃。咯血。血淋。腸澼。痔漏。下血。柿霜清上焦。心肺熱。生

津止渴。化痰寧咳。治咽喉口舌瘡。痛。明繆希雍本草經疏論柿曰。柿稟地中之陰氣。以生。故味甘氣

寒無毒。入手足太陰經。鼻者肺之竅也。耳者腎之竅也。金水二臟。最忌火熱。二臟有火上炎。則外竅閉而不通。得甘寒之氣。俾火熱下行。竅自清利矣。肺與大腸爲表裏。溼熱傷血分。則爲腸澼不足。甘能益血。寒能除熱。臟氣清而腑病亦除也。乾柿寒氣稍減。能厚腸胃。補不足。潤肺止渴。功同於前。清王士

八畫 柿

胸腹痞悶。產後病後。瀉痢瘧疴。痧症。後皆忌之。不可與蟹同食。乾柿甘平。健脾補胃。潤肺瀝腸。止血充飢。殺疳瘵痔。治反胃。已腸風。老稚咸宜。果中聖品。以北產無核者勝。惟太柔。腴不堪。久。柿餅。柿花。功用相似。體堅耐久。並可充糧。

配合應用 ①治小便血淋。用乾柿三枚。燒存性。研末。陳米飲服。(葉氏方) ②又用白柿烏豆鹽花煎湯。入薑汁服之。(經驗方)

③治熱淋瀝痛。乾柿。燈心等分。水煎日飲。(朱氏方)

④治小兒秋痢。以粳米煮粥。熟時入乾柿末。再煮三兩沸。食之。奶母亦食之。(食療本草方)

⑤治反胃吐食。乾柿三枚。連蒂。搗爛。酒服甚效。切勿以它藥雜之。

⑥治腹瀉食減。凡男女脾虛腹瀉。食不消化。面上黑斑者。用乾柿三斤。酥一斤。蜜半斤。以酥蜜煎勻。下柿煮十餘沸。用不津器貯之。每日空腹食三五枚甚良。(孟詵方)

⑦治痰嗽帶血。青州大柿餅。飯上蒸熟。批開。每用一枚。摻真青黛一錢。臥時食之。薄荷湯下。(丹溪

方)

⑧治產後咳逆。氣亂心煩。用乾柿切碎。水煮汁呷。(產寶方)

⑨治婦人蒜髮。乾柿五枚。以茅香煮熟。枸杞子酒浸。焙研。各等分。搗丸。梧子大。每服五十丸。茅香湯下。日三。(普濟方)

⑩治面生野雞。乾柿日日食之。(普濟方)

⑪治鼻塞不通。乾柿同粳米煮粥日食。(聖濟總錄方)

⑫治耳聾鼻塞。乾柿三枚。細切。以粳米三合。豆豉少許。煎粥。日日空心食之。(聖惠方)

良。

⑬治痘瘡入目。白柿日日食之。

⑭治喉腫爛瘡。用柿霜。柿蒂等分。燒研傳之。甚效。(筆峯雜興方)

⑮治解桐油毒。乾柿餅隨食之。(普濟方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡屬虛寒者禁用。

參攷資料 ①柿乃脾肺血分之果也。其味甘而氣平。性澆而能收。故有健脾瀉腸。治嗽止血之功。

蓋大腸者。肺之合而胃之子也。真正柿霜乃其精液。入肺病上焦藥尤佳。又經驗方云。有人三世死於反胃病。至孫得一方。用乾柿餅。同乾飯日日食之。絕不用水飲。如法食之。其病遂愈。此又一微也。(李時珍)

②柿南北皆有之。其種亦多。紅柿所在皆有。黃柿生汴洛諸州。朱柿出華山。似紅柿而圓小。皮薄可愛。味更甘珍。梓柿色青可生。諸柿食之皆美。而益人。又有一種小柿。謂之軟棗。俗呼為牛奶柿。世傳柿有七絕。一多壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲蠹。五霜葉可玩。六嘉實。七落葉肥滑。可以臨書也。(蘇頌)

③柿高樹大。葉圓而光澤。四月開小花。黃白色。結實青綠色。八九月乃熟。生柿置器中。自紅者謂之烘柿。日乾者謂之白柿。火乾者謂之烏柿。水浸藏者謂之醃柿。其核形扁狀如木髓。子仁而硬。堅其根甚固。謂之柿盤。按事類合璧云。柿。朱果也。大者如椽。八稜稍扁。其次如拳小。或如雞子。鴨子。牛心。鹿心之狀。一種小而如折二錢者。謂之猴棗。皆以核小者為佳。(李

時珍)

【柿木皮】 主治 下血。曬乾研末。米飲服。湯火瘡。燒灰油調傅。

【柿木根】 主治 血崩血痢。下血。

【柿查子】 卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【柿乾】 卽柿之處方用名。詳「柿」條。

七〇〇

時珍

【柿蒂】 原名 柿蒂。命名 本品乃柿之果蒂。俗作柿。故名。其如錢者。又有柿錢之稱。

基本 為柿子之果蒂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柿蒂產廣東福建。山東河南各省。

形態 柿蒂乃柿花之蒂。結實後。其蒂不落。漸次萎硬。然尚牢着於柄。不能脫落。四出。其色褐。

採取 柿子果熟時採之。

製法 採得曬乾用。

性質 澆平。無毒。

效能 下氣。止嘔。用治呃逆藥。

主治 咳逆噦氣。黃汁服。

歷代記述攷證 【清】黃宮楠

【清】黃宮楠

【清】黃宮楠

【清】黃宮楠

本草求真論柿蒂曰。柿蒂味苦氣平。雖與丁香同爲止呃之味。然一辛熱而一苦平。合用深得寒熱兼濟之妙。如係有寒無熱。則丁香在所必用。不得固執。從治必當佐以柿蒂。有熱無寒。則柿蒂在所必需。不得泥以兼濟之必雜以丁香。是以古人用藥。有合數味而見效者。有單用一味而見效者。要使藥與病對。不敢悖謬而枉施耳。【清】楊時泰本草述鈎元論柿蒂曰。呃逆所因不一。有痰有火。有陰火。有氣鬱。有胃寒。有死血。就所因而投治。其劑亦不一。如丁香柿蒂之治。止寒呃之一因耳。

配合應用 治咳逆不止。濟生柿蒂散。治咳逆胸滿。用柿蒂丁香各二錢。生薑五片。水煎服。或爲末。白湯點服。潔古加入參一錢。治虛人咳逆。三因加良薑甘草等分。衛生寶鑑加青皮陳皮。王氏易簡加半夏生薑。

用量 錢半至三錢。

卷收資料 咳逆者。氣自臍下沖脈。直上至咽喉。作呃忒逆逆之聲也。朱肱南陽書以噦爲咳逆。

八畫 柿 東

王履涉泗集以咳嗽爲咳逆。皆誤矣。噦者乾嘔有聲也。咳逆有傷寒吐下後。及久病產後。老人虛人。陰氣大虧。陽氣暴逆。自下魚逆至上。魚而不能出者。有傷寒失下。及平人痰氣抑遏而然者。當視其虛實陰陽。或溫或補。或泄熱。或降氣。或吐或下可也。古方單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散加以丁香生薑之辛熱。以開痰散鬱。蓋從治之法。而昔人亦常用之。收效矣。至易水張氏。又益以人參。治病後虛人咳逆。亦有功績也。【李時珍】柿之生青熟赤。生清熱甘。獨帶之瀉。始終不改。濟生方治呃逆。專取柿蒂之瀉。以散外內蘊之熱。丁香生薑之辛。以散外鬱之寒。深得寒熱兼濟之妙用。

【柿餅】即柿之處方用名。詳「柿」條。

【柿餅】 命名 本品係用柿乾與糯米和作之餅。故名。

製法 用糯米洗淨一斗。乾柿五十個。同搗成粉。蒸食。乾則可入煮粥泥和拌和之。

主治 治小兒秋痢下血。

【東山茶】即樂山茶之別名。詳「樂山茶」條。

【東方宿】即羊蹄之古籍別名。與見本經。詳「羊蹄」條。

【東瓜子】即冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬瓜子」條。

【東白芍】即白芍之處方用名。詳「白芍」條。

【東白薇】即白薇之處方用名。詳「白薇」條。

【東芥】即黃芥之處方用名。詳「黃芥」條。

【東門雞榎木】即東家雞榎木之古籍別名。典見綱目。詳「東家雞榎木」條。

【東阿膠】即阿膠之處方用名。詳「阿膠」條。

【東洋參】 命名 本品出東倭地方。而形似參。故名。

外國名詞 Tenuifolia Ginseng

基本 屬五加科植物之根。

產地 本品出日本之福島長野。山形。栃木。島根。鳥取諸縣。以及旅順。大連等處。即日本人參。爲日本輸出我國之一種重要產物。皆係栽植而無野生。

製法 凡入藥須飯鍋上蒸透曬乾。用磁瓶收存。而免蛀壞。

性質 甘溫。無毒。

效能 補脾陽。除虛羸。用作強壯健胃藥。

主治 助漿解滯。治小兒痘瘡。補中益氣。療虛寒百病。

辨偽 曹炳章曰。按東洋參。爲熟參之一種。日本雲州產者。曰老山參。會津產者。曰新山參。老山參形條邊圓。或三角稜。皮黃白色。近梢處有紅點刺。甘微苦。兼微甘。氣微香。煎湯清而黃赤色者。爲道地。新山參。形條混圓。皮色黃白而淡。無紅刺點。氣味較老山參淡薄耳。

又如日記一種。形條雖極粗。然色白無神。味兼澀。煎湯混濁。如淡米泔。切片貯藏。能起白霜。此種參出於陰山肥土。用人工栽培。二年。卽成。爲側路。實不堪入藥用。若老山參。栽於陽面之山。得天然陽氣。最足。凡陽虛氣陷。久痢脫肛之症。尙有寸效。至於宇宙天鳳等記。爲名者。非分高下。實辨別枝條大小。而作記號也。新山老山。皆以大小爲記。用者總以認識貨物。辨明高下。

八畫 東

爲主要。亦不能以包裝爲標準。綠包裝可改換耳。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①東洋參出日本

東倭地。其參外皮糙中油。熟蒸之亦清香。與遼參味同。微帶羊羶氣。入口後微辣。爲各別耳。然性溫平。與西洋佛閉參性寒平者又別。此參近日頗行。無力之家。以之代遼參用。亦有效。每枝皆重一錢許。亦有二三錢者。總以枝根有印日本二字名。價八換。無字。價五換。蓋有印字者乃彼土之官參。最道地。無印者皆彼土之私參也。亦有通身皮糙。內肉白色者不佳。桂圓肉并蘇曬用。(汪玉于) ②癸丑三月。予在李愛堂先生處。見有東洋參二種。一種大者粗如拇指。儼似西洋參。最堅實。多肉。一種小者每枝不過二三分。亦有分許者。肉薄不甚堅實。據言二種皆日本洋客帶來。新時俱色白。皮皆有皺紋。其大者切片口含。過夜皆化而無滓。小者含口中。三夜皆不化。大者煎湯。色淡少味。小者反濃厚。二種俱出日本倭地。而小者何以色味獨厚。豈

生產之土。又不同耶。又一種亦出東洋。近奉天旅順等處者。皮上有紅紋。云彼倭國中亦珍之。言其力更十倍於此。船商多以貴價售得。轉販中土。今蘇州有東洋參店。專市此參者。蓋因上年壬子冬。江浙疫痘遍染小兒。死者不下千百計。有敬服東洋參能助漿解毒。服之果驗。遂大行於時。入藥內須飯鍋上蒸透。曬乾。用磁瓶收存。方免蛀壞。(趙學敏) ③初寬政年間。德川幕府求人參種子於高麗。高麗王吝不肯與。後幕府又遣使至高麗。曰將軍有病。百方不驗。倘得參人參根一服。或可得救云云。高麗王竟贈以人參一盆。此蓋出醫員某之畫策。於是幕府試栽之於野州日光。今市等地。卽世稱日光人參者是也。當時會津藩藩主松平欽文。僅得種子三顆。種之於若松城內花園。因地質相宜。逐年繁殖。老職田中女宰。頗有志於物產。乃使於城西太郎兵衛新田。及城東御山村。諏訪原野試種。亦甚繁殖。後復於黑岩村南青木村山口長藏園內專設藥園栽植。於是更爲蕃

殖。傳播遠近。(和漢藥考)

【東流水】卽流水之古籍別名。典見本草拾遺。詳「流水」條。

【東風菜】 命名 本品先春而生。故有東風之稱。一名冬風。蓋謂其得冬氣也。

古籍別名 冬風(綱目)

外國名詞 Aster Seabor.

〔Rumb. (拉丁) シラヤマギク (日本) 基本 係菊科。紫莖屬。爲東風菜之莖葉。

產地 生山野原澤間。

形態 東風菜爲菜類之多年生草本。高二三尺。下部之葉大如心臟形而尖。上部之葉長卵形而尖。互生似香葉而長。極厚軟。有細毛。花白色。頭狀花序。生於莖之上部。其花序周圍之花。作舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。其莖葉可食與藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 風溼痠熱。頭痛目眩。肝熱眼赤。堪入羹臠食。

【東家雞棲木】 命名 東家者謂其得陽

氣。氣之先也。故名。

古籍別名 東門雞棲木。(綱目)

基本 東家雞棲木。爲雜木之一種。可供藥用。

性質 平。無毒。

主治 失音不語。燒灰水服。盡一升效。

【東根】卽知母之古籍別名。與見別錄。詳「知母」條。

【東海夫人】卽淡菜之古籍別名。典見綱目。詳「淡菜」條。

【東陽酒】 原名 金華酒。江金華所產之酒。故名。

性質 甘。辛。無毒。

主治 用制諸藥良。

【東菟麻子】卽曼陀羅子之古籍別名。典見新本草。詳「曼陀羅」條。

【東壁土】 基本 本品係屋東壁上之土也。

性質 甘。溫。無毒。

主治 下部瘡。脫肛。歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論東壁土曰。療小兒風墮。【唐】陳藏器本草拾遺論

東壁土曰。止洩痢。霍亂煩悶。【唐】甄權藥性本草論東壁土曰。溫瘧點目去昏。同規殼爲末。傳疏豆瘡。【唐】蘇恭新修本草論東壁土曰。摩乾溼二癬。極效。

參攷資料 ①東壁土可除油垢衣。勝石灰滑石。②昔一女忽嗜河中汚泥。日食數盃。玉田隱者以壁間敗土調水飲之。遂愈。又凡脾胃溼多吐瀉霍亂者。以東壁土新汲水。攪化澄清服之。卽止。蓋脾主土喜燥而惡溼。故取太陽真火所照之土。引真火生發之氣。補土而勝溼。則吐瀉自止也。嶺南方治瘴瘴香椿散。內用南壁土。近方治反胃嘔吐。用西壁土者。或取太陽離火所照之氣。或取西方收斂之氣。然皆不過借氣補脾胃也。（李時珍）

【東廡】 古籍別名 沙米。登相子（保德州志）
產地 生田野間。
形態 東廡爲穀類之一種。其苗如蓬子似葵子。青黑色。可供食與藥用。
採取 九月十月採之。

八壺 東 杲 柀 柀 松

性質 甘。平。無毒。
主治 益氣輕身。久服不飢。堅筋骨。能步行。
【杲】 卽梅之古籍別名。典見綱目。詳「梅花」條。
【柀】 卽柀之古籍別名。典見夏書。詳「柀粉白皮」條。

【柀木】 卽芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳「芙蓉」條。
【柀皮樹】 卽芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳「芙蓉」條。
【松子仁】 卽海松子之處方用名。詳「海松子」條。
【松子仁粥】 主治 潤心肺。調大腸。

【松化石】 古籍別名 康于石。（唐書）雷燒松。雷燒石。（地輿紀）
基本 係礦物質之化石類。爲古松折入澗水中。得地氣所化之石也。
產地 蜀中永州縣來蘇鎮相近處產之。惟出於東境康于河畔者爲最佳。

形態 松化石。爲石質而成。松理。細膩堅勁。皮有水紋。或松皮紋。


亦有作節狀者。或謂本石氣。石裂受沙則產松。松至年深久遠。則更化爲石。以全化不帶松質者爲佳。色黃或紫。高二三尺許。大可合抱。取之可供藥用。
性質 甘。淡。微寒。無毒。
主治 情思抑鬱。所欲不遂。神志憂悶。諸七情病。

參攷資料 松化石。使能有情者化爲無情。爲陽極反陰之象。男女愛慕。結想成病。致慾火妄動。燥耗真陰。魂狂魄越。神不守舍。非此反折之使。入和平不可。正取其貞。凝冰潔之氣。以釋妄緣也。（趙學敏）
【松木仙翁花】 卽剪春羅之日本名。詳「剪春羅」條。

【松木皮】 古籍別名 赤龍皮。（綱目）
主治 癰疽潰口不合。生肌止血。治白禿。杖瘡。湯火瘡。

【松毛】 原名 松葉。松針。性質 苦。溫。無毒。
主治 風溼瘡。生毛髮。安五臟。守中。不饑延年。
歷代配製致證 【南北朝】陶

弘景本草集註論松毛曰。細切。以水及麵飲服之。或搏屑丸服。可斷穀。及治惡疾。【宋】大明諸家本草論松毛曰。灸得凍瘡風瘡佳。【明】李時珍本草綱目論松毛曰。去風。痛。脚。痺。殺米蟲。



松 毛

【松皮膏】 古籍別名 松樹膏。藥（綱目拾遺）

形態 松皮膏。爲松皮熬成之膏。色黑如漆。煎之色如琥珀。微有香氣。可供藥用。
採取 以古松皮。厚有二三尺者。煎取汁。熬成膏用。
性質 溫。無毒。

主治 一切虛怯勞瘵。婦女血枯血閉諸症。
【松衣】 原名 艾納。命名 本品乃生老松樹上之棘苔衣也。故名。
主治 合諸香燒之。烟清而聚不散。能辟穢惡疫氣。

參攷資料 嶺南海島中檳榔木上有一種苔如松之艾納者單蒸極臭用合泥香則發香如甲香也(李時珍)

【松衣介】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【松卵】即松實。以形如卵。詳「海松子」條。

【松明】即松節。詳「松節」條。

【松油】 古籍別名 濯油。(綱目拾遺)

採取 以有油老松柴裁二三寸長劈如燈心粗用麻線扎把如茶杯口大再用水盆一個內盛水中盆以盤一隻坐於水盆內用簾一塊蓋於盤上中挖一孔如錢大再以扎好松把直豎於簾孔中間以火點著少時再以燼灰週圍上下蓋緊勿令走烟如走烟其油則無候溫養一二時其油盡滴盤內去灰簾取出聽用
主治 疥瘡久遠不愈百藥不效以此油新浴後擦之或加白礬末少許和擦更妙
【松狗】即貂鼠之古籍別名。典見綱目。詳「貂鼠」條。

【松肪】即松脂之古籍別名。典見本經。詳「松脂」條。

【松花】 古籍別名 松黃。(綱目)

性質 甘溫無毒。
主治 潤心肺。益氣。除風止血。亦可釀酒。

參攷資料 ①松花多食發上焦熱病(朱震亨) ②松花即松黃。拂取正以蒲黃酒服。令輕身療病。勝似皮葉及脂也(蘇恭) ③松花上黃粉。山人及時拂取作湯點之甚佳。但不堪持久故鮮用寄遠。(蘇頌) ④今人收花和白沙糖印為餅膏。充果餅食之且難久收。恐輕身療病之功。未必勝於脂葉也。(李時珍)

【松花煎】即松黃。詳「松黃」條。

【松香】即松脂之處方用名。詳「松脂」條。

【松根白皮】 性質 苦溫無毒。

主治 辟穀不餓。
歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論松根白皮曰補五臟益氣。

【松脂】 命名 本品乃松樹之脂肪故名。

處方用名 松香。松節。松膠。古籍別名 松肪(本經) 澀青(綱目) 黃香。琥珀孫(和漢藥考)

外國名詞 Resina Pini. (拉丁) Resin (英) Fichtenharz (德)

基本 屬松脂科。為松樹節油滲出受空氣凝結之脂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。松脂各省與外洋均有出產。廣東西江六步廣寧等處。北江東江亦多出。廣西懷集亦有。

形態 松脂為鮮黃色不透明或鮮褐色透映之樹脂。外面多被粉塵質脆。易於粉碎。破碎面為介殼狀。酒精殆能溶解。比重一·〇七至一·〇八。

採取 六月間採之。

製法 陶弘景曰。凡使松脂。須採鍊以桑灰汁或酒蒸軟。按納寒水中數十過。白滑則可用。頌曰。用松脂須以大釜加水置飯。用白茅藉飯底。又加黃砂於茅上厚寸許。然後有松脂於三炊以桑薪湯減。

類添熱水。候松脂盡入釜中乃出之。投於冷水。既凝又蒸。如此二次。其白如玉。然後入用。

性質 苦甘溫無毒。

成分 含有同質異性之樹脂酸。如亞字來欽酸 Abretin Sauro. $C_{20}H_{30}O_2$ 畢麻爾酸 Pimar-Sauro. $C_{20}H_{30}O_2$ 希兒混酸 Sylvinsaur. $C_{20}H_{30}O_2$ 等。此外則為無水物及酸化物之類。

效能 燥溼祛風殺蟲治瘡。專作製為膏藥之原料。又為鎮咳祛痰藥。

主治 癰疽惡瘡。頭瘍白禿。疥癢風氣。安五臟除熱。久服輕身不老。延年(本經) 除胃中伏熱。咽乾消渴。風痺死肌。鍊之令白。其赤者主惡瘡(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論松脂曰煎膏生肌止痛。

排膿抽風。貼諸瘡膿血癰爛。塞牙孔殺蟲【宋】大明諸家本草論松脂曰除邪下氣潤心肺治耳聾古方多用辟穀【明】李時珍本草綱目論松脂曰強筋骨利耳目治崩帶【明】羅希雍本草經疏論松脂

曰。松脂味苦而寒甘。其氣則溫。性燥無毒。燥則除濕散風。寒苦而燥。則能殺蟲。甘能除熱。胃中伏熱散。則咽乾消渴自止。瘴者風寒溼合。而為病也。地之溼氣。感則害人皮肉筋脈。此死肌之所由來也。溼熱之邪散。則血不凝敗。營氣通調。而無壅滯。故主疽惡瘡。營和熱散。則頭髮自禿。疥癬風氣俱愈矣。熱清則營血和。風溼去則衛氣安。脾胃健。五臟無病可知。溼去則身輕。可必。久服不老延年。固可想見。【清】黃宮繡本草求真論松脂曰。松脂即屬松木津液。流於皮幹之中。經久結成。其液如脂。芳香燥結。內可祛風除溼去痺。外可貼瘡長肉殺蟲。緣人風溼內淫。則氣血受阻。故瘡疥癰腫。身重痺痛等症。靡不因是而生。得此苦以泄熱。溫以祛風除溼。則病悉愈。然必蒸煉得法。始堪服食。至云久服輕身延年。雖出經解。未可盡信。其亦過為稱譽之意也乎。但火質有熱者忌服。

八 蠶 松

紅松之樹幹。令其流出。凝結而收。集之。黑松為常綠喬木。在暖帶之海岸地方。殊為繁茂。幹高十餘丈。幹皮現深褐色。葉狀似針。二葉叢生。剛強而粗。新芽帶白色。花皆單性。雌花如小穗。雄花若小穗。生於新條之上端與下部。至明年之秋。結鱗片旋裂之果實。而飛散種子。紅松亦為常綠喬木。日本山野。處處生之。幹高十餘丈。幹皮現紅褐色。叢生二針狀之葉。惟較黑松為柔。新芽作紅褐色。花雌雄同株而生。開於嫩枝之頂端。與其基部。果實長圓如卵。小於黑松。按日本松脂之主產地。在廣島島根秋田諸處。為農人及漁業家之副業。然尚非純品也。收集之法。陰曆三四月間。以山刀斫去黑松或紅松向南之樹皮。令樹脂得漸次滴出。候秋間凝結。收入竹筒。其堅凝之樹脂塊。一入沸湯。依然柔軟。可任意搓捏。而以簞皮包之。是為粗製松脂。入鍋熔融。麻布濾去其渣。放冷凝結成塊。是為精製松脂。又松脂為松類幹身滲出之松節油。凝乾而成樹脂也。色黃。或帶褐黃。成塊粒。

有略似松節油之氣。微透映。易破碎。其破碎面呈介殼狀。熱之則熔融。酒精及加里油。俱溶解之。其為酒精所溶解者。祇餘不溶之混雜物而已。古羅仿紐誤。此係除去揮發油而得之樹脂。為極易破碎之塊。色帶黃。或淡褐。透明如玻璃。外帶粉霜。破碎面作大貝殼狀。熱之亦熔融。為證明黏稠之液。受大熱則變白色。發芳香之蒸氣。以等分之濃酒精。與加倍之冰醋酸。能溶解之。和八分之稀薄荷性加里溶液。亦溶解而為證明之液。

而復延齡。身輕清爽。(千金方)
●強筋補益。四聖不老丹。用明松脂一斤。以無灰酒沙鍋內。乘柴火煮數沸。竹枝攪稠。乃住火。傾入水內。結塊。復以酒煮九遍。其脂如玉。不苦不澀。乃止。為細末。用十二兩。入白茯苓末半斤。黃菊花半斤。柏子仁去油取霜半斤。練蜜丸。如梧子大。每空心好酒送下。七十二丸。又松梅丸。用松脂以長流水。桑柴煮拔三次。再以桑灰滴汁。煮七次。拉拔。更以好酒煮二次。仍以長流水煮二次。色白不苦為度。每一斤。入九蒸地黃末十兩。烏梅末六兩。練蜜丸。梧子大。每服七十丸。空心鹽米湯下。健陽補中。強筋潤肌。大能查人。(白飛霞方外奇方)
●揩齒固牙。松脂出鎮定者佳。稀布盛入沸湯煮。取浮水面者。投冷水中。不出者不用。研末。入白茯苓末和勻。日用揩齒。漱口亦可。曠之固牙駐顏。(蘇東坡仇池筆記方)

七〇五

●治歷節諸風。百節酸痛不可忍。松脂三十斤。練五十遍。以鐵甌三升。和脂三升。攪令極稠。每日空

八 燴 松

心酒服方寸匕。日三服。數食麪粥為佳。慎血腥生冷。醉物果子。一百日瘥。(外臺祕要方)

⑤ 治肝虛目淚。鍊成松脂一斤。釀米二斗。水七斗。麴二斗。造酒釀飲之。

⑥ 治婦人白帶。松香五兩。酒二升。煮乾。木白杵細。酒糊丸。如梧子大。每服百丸。溫酒下。(摘玄方)

⑦ 治小兒禿瘡。用松香五錢。猪油一兩。熬擦。一日數次。數日即愈。又衛生寶鑑。用瀝青二兩。黃蠟一兩半。銅綠一錢半。麻油一兩半。文武熬收。每擦貼之神效。(簡便方)

⑧ 治小兒緊唇。松脂炙化貼之。(聖惠方)

⑨ 治風蟲牙痛。刮松上脂。滾水泡化。一漱即止。已試驗。(集簡方)

⑩ 治齩齒有孔。松脂紐塞。須臾蟲從脂出也。(梅師方)

⑪ 治久聾不聽。鍊松脂三兩。巴豆一兩。和搗成丸。薄綿裹塞。一日二度。(梅師方)

⑫ 治一切癩疥。鍊成松脂末。填令滿。日三四度。(聖惠方)

⑬ 治一切腫毒。松香八兩。銅青

二錢。蓖麻仁五錢。同搗作膏。攤貼甚妙。(李樓奇方)

⑭ 治軟節類發。翠玉膏。用通明瀝青八兩。銅綠二兩。麻油三錢。雄豬膽汁三個。先溶瀝青。乃下油膽。傾入水中。扯拔。器盛。每月緋帛攤貼。不須再換。

⑮ 小金絲膏。治一切瘡癤腫毒。瀝青。白膠香各二兩。乳香二錢。沒藥一兩。黃蠟三錢。又以香油三錢。同熬。至滴下不散。傾入水中。扯干。遍收貯。每捻作餅貼之。

⑯ 治疥癬溼瘡。松膠香研細。少入輕粉。先以油塗瘡。膠末在上。一日便乾。頑者三二度愈。(劉涓子鬼遺方)

⑰ 治陰囊溼痒。欲潰者。用板兒松香為末。紙卷作筒。每根入花椒三粒。浸燈盞內三宿。取出。點燒淋下油。搽之。先以米泔洗過。(簡便方)

⑱ 治金瘡出血。瀝青末。少加生銅屑末。摻之。立愈。(唐瑤經驗方)

⑲ 治猪疔成瘡。松脂鍊作餅貼之。(千金方)

⑳ 治刺入肉中。百理不痊。松脂

流出如乳頭香者。傳上。以膏浸三日。五日。當有根出。不痛不痒。不覺自安。(兵部手集方)

用蠟 錢半至三錢。施用宜忌 凡陰血不足而無寒溼者禁用。

參攷資料 ① 道人服餌。或合茯苓。松柏實。菊花作丸。亦可單服。(蘇頌) ② 松葉松實。服餌所須。松節松心。耐久不朽。松枝則又樹之津液精華也。在土不朽。流脂日久。變為琥珀。宜其可以辟穀延齡。葛洪抱朴子云。上黨趙襄。病癩歷年。垂死。其家棄之。送置山穴中。翌忽泣。經月有仙人見而哀之。以一囊藥與之。覆服百餘日。其瘡都愈。顏色豐悅。肌膚玉澤。仙人再過之。謂謝活命之恩。乞求其方。仙人曰。此是松脂。山中便多此物。汝鍊服之。可以長生不死。翌乃歸家。長服。身體轉輕。氣力百倍。登危涉險。終日不困。年百餘歲。齒不墜。髮不白。夜臥忽見屋間有光。大如鏡。久而一室盡明如晝。又見面上有采女一人。戲於口鼻之間。後入抱懷。山成地仙。於時人聞。覆服此脂。皆競服

之。車運負。積之盈室。不過一月。未覺大益。皆輒止焉。志之不堅如此。張杲醫說。有服松丹之法。(李時珍) ③ 松樹環柯。修幹多節。其皮粗厚有鱗形。其葉後凋。二三月抽蕤生花。長四五寸。採其花蕤為松黃。結實狀如猪心。登成鱗砌狀。老則子長鱗裂。然葉有二針三針五針之別。三針者為栝子松。五針者為松子松。其子大如栝子。惟遠海及雲南者。子大如巴豆。可食。謂之海松子。孫思邈云。松脂以衡山者為良。衡山東五百里。滿谷所出者。與天下不同。蘇軾云。鎮定松脂亦良。抱朴子云。凡老松皮內自然聚脂為第一。勝於擊取及煮成者。其根下有偽處。不見日月者為陰脂。尤佳。老松餘氣結為茯苓。千年松脂。化為琥珀。玉策記云。千年松樹。四邊枝起。上杪不長。如偃蓋。其精化為青牛。青羊。青犬。青人。伏龜。其壽皆千歲。(李時珍)

【松茸】即松茸之日本名。詳「松茸」條。

【松針】即松毛之原名。詳「松毛」條。

【松針】即松毛之原名。詳「松毛」條。

【松針】即松毛之原名。詳「松毛」條。

【松針】即松毛之原名。詳「松毛」條。

【松寄生】即松蘿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「松蘿」條。

【松毬】原名 山松毬。命名 本品即山松所結之卵毬。故名。

形態 松毬初色青。久乃裂作鱗狀。片片四開。老則內有細子如粟米。其毬可充茶爐代炭。能益茶味。並可供藥用。

採取 以青嫩者入藥用。
主治 白癩風。先以葱、花椒、甘草、三味煎湯洗之。後用此藥。雞子白硫黃。日磨如粉。搽之。

【松液酒】製法 大松樹下掘坑。置瓊。承取其津液。一斤。糯米五斗。釀酒。或以松脂和米麴釀成飲。

主治 一切風痺脚氣。
古籍別名 地腎。(綱目拾遺)

產地 粵省羅浮山中。土鬆石潤。處常有之。

形態 松黃為松花之於三月間入土。至四五月。經雨後而生。至八九月。又生於地面。狀如彈丸。大者如雞卵。無根無蒂。散布松地下。

八畫 松

紅黃雜錯。其質鮮肥滑嫩。可供素齋與藥用。

性質 甘平。無毒。
主治 生津消痰。療洩瀉不禁。

【松黃】即松花之古籍別名。典見綱目。詳「松花」條。
命名 本品木材如松。其身如楊。故名。

古籍別名 椋子木。(綱目)涼木。(綱目拾遺)
形態 松楊為喬木類之一種。其葉兩相對生。子細圓如牛李。生青熟黑。木質堅重。煮汁赤色。可供藥用。

採取 八月九月。採木日乾用。
性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 瘀折傷破。療生新。安胎止痛生肌。

【松楊木皮】性質 苦。平。無毒。
主治 水痢。不問冷熱。濃煎令黑服。

【松腹】即茯苓之古籍別名。典見記事珠。詳「茯苓」條。

【松葉】即松毛之原名。詳「松毛」條。

【松實】即海松子之別名。詳「海松子」條。

【松膏】即松脂之古籍別名。典見本經。詳「松脂」條。
性質 苦。溫。無毒。

【松節】主治 百邪久風風虛脚痺。疼痛。
歷代配述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論松節曰。醱酒。主脚弱。骨節風。元朱丹溪本草衍義補遺論松節曰。炒焦。治筋骨間病。能燥血中之溼。明李時珍本草綱目論松節曰。治風。蛀牙痛。煎水含漱。或燒灰日搽有效。

參攷資料 松節。松之骨也。質堅氣勁。久亦不朽。故筋骨間風溼諸病宜之。(李時珍)

【松節酒】製法 用松節煮汁。煎汁亦可。同麴米釀酒飲。松葉煎汁亦可。

主治 冷風虛弱。筋骨痠痛。脚氣緩痺。

【松膠】即松脂之處方用名。詳「松脂」條。

【松樹膏藥】即松皮膏之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「松皮膏」條。

【松澗】基本 諸音讀。乃火燒松枝所取之液也。

主治 瘡疥。及馬牛瘡。
古籍別名 松茸。(日本)

外國名詞 Armillaria odorata (拉丁) マツダケ (日本)
基本 係擔子菌帽菌族。松茸屬。為松上寄生之菌。

產地 凡山野赤松林樹下恒有出。
形態 松茸為菌類之一種。隱花植物。大者單傘徑四寸許。柄長三寸許。傘之下面有皺褶。中生微細之孢子。香氣芬烈。可供藥用。



松 茸

性質 甘平。無毒。

主治 洩瀉不禁。食之有效。

參攷資料 松茸味脆而美。鮮者。或煮或煨。亦可鹽藏糖藏。及陰

乾者乾而貯之。以供食用。(植物學大辭典)

【松蕊】即松花。詳「松花」條。

古醫別名 女蘿。(別

【松蘿】錄)松寄生(綱目)為蘿。蔓蘿。蔓女蘿。金縷草。(和漢藥考)

外國名詞 *Traueplicata,*

Hoffm. Var. Annulata, Muell

(拉丁)サルラガセ(日本)

基本 菌藻門。地衣類。松蘿科。

松蘿屬之松蘿。

產地 生山野松樹間。及雜樹

上亦有之。

形態 松蘿為木類之一種。

寄生植物。常自樹梢懸垂。全體絲

狀。作淡黃色分枝。為多數枝條。往

往長達數尺或數丈。其老成部之

表面。有多數輪狀裂紋。其莖葉可

供藥用。

採取 五月間採於松上者陰

乾用。

性質 甘。平。無毒。

主治 喘怒邪氣。止虛汗頭風。

女子陰寒腫痛(本經)瘵疾熱溫

瘡。可為吐瀉利水道。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論松蘿曰。治寒熱。胸中客熱。痰涎。去頭瘡。項上瘤。令人得眠。

國外學說 和漢藥考曰。明治

三十五年。三田幸藏氏曾以金線

草送東京帝國醫科大學。請其分

析。經藥學士石津利作氏試驗。報

告其成績如下。金線草。為菌類及

藻類所成之複合植物。屬於灌木

狀之異層地衣。乃地衣之一種也。

以此草陰乾。碾為細末。試驗之。所

得成績如左。①水分含一四・三

%。②伊打越幾斯分含一〇・九

二%。③巴爾巴欽酸 *Barbaleic acid,*

re, CaH₂O₄ 含五・七二%。素

寧酸 *Usnin saure, CaH₂O₄*

含五・二〇%。④酒製越幾斯分

含一四・六二%。尚含有巴爾巴

欽酸及素寧酸外性質未詳之結

晶性物質。⑤鎂物性物質含二・

〇%。尚有燒碱。加里等。他如水性

浸出液中。尚溶存極多之地衣澱

粉。名里配寧 *Lichenin*。據試驗

所得成績。可證明此藥草顯然不

含毒性。惟地衣酸與其中性物質。

猶未悉其性狀。又明治三十七年

一月及三月。藥學會開例會時。石

津利作氏曾演述金線草成分之

研究。刊入同學會彙報。錄之如左。

余之研究金線草也。皆取此草浸

於伊打中。分取其素寧酸及巴爾

巴欽酸。再浸於酒精中。分取其

一種澱粉糖之物質。然後一一試驗。

見素寧酸作黃色。以硫酸溶解其

黃色。則發一種螢石彩。以苛性亞

兒加里溶解之。仍現黃色。以此亞

兒加里性液置空氣中。則漸萎化

而變色。改用其餘金屬鹽類。略有

還元之性。又以水性加里酒精製

加里。曾達鎔融加里。發烟鹽酸等

試驗。使素寧酸發生作用。這加里

鎔融。即生一定之分解物質。明治

三十六年。三田幸藏。千葉勝景。二

人。宣言金線草治療癩。心臟諸病。

早期肺患等。俱有卓效。一時醫學

中人。宛如發見新藥。醫者製成酒

劑。用以治愈上述諸病者。不可勝

數。此藥維何。即寄生於深山森林

中之松蘿也。

參攷資料 松蘿能平肝邪。去

寒熱。同瓜蒂諸藥。則能吐痰。非松

蕪能吐人也。葛洪肘後方。治胸中

有痰頭痛。不欲食。氣壯者。用松蘿。

杜衡三兩。瓜蒂三十枚。酒一升。二

合。液再宿。且飲一合。取吐。不吐晚

再服一合。孫思邈千金方。治胸膈

痰辟積熱。斷腸湯。用松蘿。甘草各

一兩。恒山三兩。瓜蒂二十一枚。水

酒各一升。半。煮取一升。分一服。吐

(李時珍)

【松蘿茶】命名 本品為茶葉

蕪者。故名。之產於安徽歙縣松

蘿者。故名。

主治 消積滯。油膩。清火。下氣

除痰。

配合應用 ①治病後大便不

通。用松蘿茶葉三錢。米白糖半碗。

先煎滾入水碗中。同茶葉煎至一

碗。服之。即通神效。(吳興錢守和

慈惠小編方)

②治頑瘡不收口。或觸穢不收

口。上好松蘿茶一撮。先水漱口。將

茶葉嚼爛敷瘡上。一夜。次日搗下

再用好人參細末。拌油胭脂塗在

瘡上。二三日即愈。(梁氏集驗方)

③治羊兒瘋。好松蘿茶末八兩。

生礬末四兩。米粥搗為丸。隨發日

清晨及當日各服三錢。米飲湯下。
(集效方)

① 治水噤氣噤。藥集。服此藥。不
噤。一服立消。活魚一尾。重七
八兩。去鱗甲。將肚剖開。去腸淨。入
好黑礬五分。松蘿茶三錢。男子用
蒜八片。女七片。共入魚腹內。放在
磁器中蒸熟。令病人吃魚。連茶蒜
皆食更妙。從魚頭吃起。就從頭上
消起。如從魚尾吃起。即從脚上消
起。立效。

② 治癩瘡。五倍子炒。松蘿茶
各五錢。研末茶和敷。(活人書方)

③ 治黃病。生芝麻八合。好松蘿
五合。砂仁二合。以上三味。先將芝
麻研細。再另將茶葉烘脆。再將
砂仁研。各為細末和勻。每日常服。
如年久病深者。服到黃退乃止。如
因好食茶葉者。成黃。此方不可用。
(劉羽儀驗方)

④ 治一切風熱者。蕞麥為細
末。用豬膽汁拌過。焙鼻中作噤立
愈。如兼瀉者。以瓜蒂松蘿茶為末。
噤鼻中出黃水立愈。(王站柱不
藥良方)

⑤ 治五癩。破結散。用海蛤、通草、

昆布、海藻、洗膽草、枯礬、松蘿茶各
三分。牛夏貝母各二分。麥麵四分。
為末。酒調服。日三次。忌鯽魚猪肉。
(醫學指南)

⑥ 治痢疾神方。核桃五個。帶殼
敲碎。松蘿茶、生薑、糖各三錢。用水
三盞煎。如紅痢用赤糖。如白痢用
白糖。如紅白相兼。用紅白糖各一
錢五分。煎服。重者連渣服。

⑦ 治五噤驗方。松蘿茶研末。雞
毛管炒研各等分。每服二錢。白湯
下。二十服全愈。忌鹽百日。

⑧ 治牛身不遂。白糖、槐豆子、化
皮、紅谷子、松蘿茶各五錢。水三盞
煎一鍾服。出汗即愈。十日後方可
出門。(秘方集驗)

⑨ 治小兒牙疳。松蘿茶、花椒去
目。烏龍尾、食鹽各一錢。童便一鍾。
水一鍾。煎湯漱口。口內含之。不可
嚥下。(同壽錄方)

⑩ 治白濁。車前草五六棵。陳松
蘿茶一二錢。燈心一二十根。三味
煎服。止後宜服水陸二仙丸以固
之。(古今良方)

⑪ 除瘧救苦丹。專治一切瘧疫
時症。傷寒感冒。不論已傳未傳。百

發百中。方用天麻、麻黃、松蘿茶、綠
豆粉各一兩二錢。雄黃、硃砂、甘草
各八錢。生大黃一兩。共為細末。煉
蜜為丸。彈子大。收磁器內。勿令洩
氣。大人每服一丸。小兒半丸。涼水
調服。出汗即愈。重者連進二服。未
汗之時。切不可飲熱湯。食熱物。汗
出之後不忌。

⑫ 治爛眼皮方。用掛金燈淨殼。
每殼一個。摻入研細透明綠膽礬
二殼。或用殼十個。或二十個裝套
好。外用淨黃泥包裹好。勿洩氣。炭
火煨至中間殼將成黑灰。存性放
地上。用盤蓋熄火。將中間灰研細
包好。放土地上一夜。出火毒。每用
灰少許。放在茶杯內。以冷松蘿茶
浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶
滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日
五六次。二三日即愈。(種福堂方)

⑬ 烏鬚方。王守副家傳烏鬚藥
甚驗。用五倍子二錢。皂礬四分。八
釐。青鹽六分。紫桐末一分五釐。榆
香末六分。松蘿茶三錢。共為末。蒸
透用。(吉靈旅抄)

⑭ 板扛歸。即雷公藤之古籍別名。
典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【板枝】即蒲包草之古籍別名。典
見汪連仕採藥書。詳「蒲包草」條。

【板油】即豬脂之處方用名。詳「
豬脂」條。

【板栗】即栗之古籍別名。典見綱
目。詳「栗」條。

【板蕉】即芭蕉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【板藍】即馬藍之俗名。詳「馬藍」
條。

【板藍根】即馬藍之根。

【枇杷木白皮】主治 止吐
咽汁。或煮汁冷服尤佳。

【枇杷花】主治 頭風。鼻流涕
清。辛夷等分。研末酒
服二錢。日二服。

【枇杷核】性質 大寒。無毒。
主治 化痰。去穢。垢。
疏肝實。痰肝經有餘諸症。

參攷資料 ① 枇杷其核大寒。
伐肝脾。以之同落蘇入鉄醬則色
青翠。同蟹入鍋則至熟不赤。性寒
走肝可知。(張石頑) ② 石頑所說
其核能駐色不變。斷為性寒。不知
枇杷獨具先天四時之氣。其性溫

八畫 松板枇

八 棗 枇

平。其核能化一切毛羽。親花陶人貯雞鷄毛水以灌花者。患其難化。輒搗枇杷核數枚。投於缸水中。不三日則雞鷄毛皆爛化。知其直走厥陰捷利也。按祝士校游說方枇杷核。委蛤蚧能脫了。則其性又善。蓋枇杷具四時全氣。其實能令分者合。故肺嗽能斂。核能令合者離。故肝實可疏。一合一離。正見互爲乘除之妙。(趙學敏)

【枇杷葉】

命名 本品葉形似琵琶故名。

古籍別名 盧橘葉(文選)無憂扇(和漢藥考)

基本 屬薔薇科。爲枇杷之葉。產地 陳仁山藥物生產辨云。枇杷葉產廣東清遠三坑大灣石潭青連等處。東江各屬亦不少。俗名盧橘葉。各省均有。日本亦多。

形態 枇杷爲常綠喬木。老樹幹高二丈餘。周圍達二尺許。樹皮現紫黑色。狀如鱗甲。剝離之。則爲板片。葉爲長橢圓形。長約五六寸。末端尖銳。邊緣有粗鋸齒。質堅厚。有皺裂。背面密生淡褐色之軟毛。皆互生。春開五瓣之黃白花。簇生

而爲繖繖狀。頗芳香。果實爲漿果。作球圓形。大八九分。夏日成熟。帶黃色。表面有軟毛。中藏子二三個。味甘酸佳美。供食用。



枇杷葉

採取 四五月間採葉曬乾。

製法 蘇恭曰。凡使枇杷葉。須火炙。以布拭去毛。不爾。射人肺令咳不已。或以粟秆作刷刷之。尤易潔淨。雷斅曰。凡採得秤溼葉重一兩。乾者三葉重一兩。乃爲氣足堪用。粗布拭去毛。以甘草湯洗一遍。用綿再拭乾。每一兩以酥二錢半塗上。炙過。用李時珍曰。治胃病以煎汁塗炙。治肺病以蜜水塗炙。乃良也。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉肺下氣。治熱咳。止嘔逆。用作火嗽之鎮咳藥。淋病之利尿藥。及爲夏季之清暑藥。

主治 卒喘不止。下氣。黃汁服。歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論枇杷葉曰。煮汁飲。主渴疾。治肺氣熱咳。及肺風瘧。胸面上瘡。【宋】大明諸家本草論枇杷葉曰。治嘔咳不止。及婦人產後口乾。【明】李時珍本草綱目論枇杷葉曰。和胃降氣。清熱。解水毒。療脚氣。【明】繆希雍本草經疏論枇杷葉曰。枇杷葉四時不凋。其味苦氣平。平即涼也。無毒。入手太陰足陽明經。氣薄味厚。經曰。諸逆衝上。皆屬於火。火氣上炎。則爲卒喘不止。嘔者嗽也。其聲濁惡而長。經曰。樹枯者葉落。病深者聲嗽。病者見此。是爲危證。枇杷葉性涼。善下氣。氣下則火不上升。而胃自安。故卒喘止也。其治嘔吐不止。婦人產後口乾。男子消渴。肺熱咳嗽。喘息氣急。脚氣上衝。皆取其下氣之功。氣下則火降痰順。而嘔者不嘔。渴者不渴。咳者不咳。衝逆者不衝逆矣。又治婦人發熱咳嗽。經事先期。佐補陰清熱之藥服之。可使經期正而受孕。【清】黃宮繡本草求真論枇杷葉曰。枇杷葉味苦氣平。諸書皆言瀉肺治嗽。緣嗽多由胃氣不和。肺氣不順。以致火氣痰蒸。因而咳嗽

不已。丹溪云。氣有飲便是火。火起則痰生。服此味苦而不。則肺金清。斯而氣不得上逆而順矣。氣順則痰與火皆順。而逆者不逆。嘔者不嘔。咳者不咳。渴者不渴。是以昔人用此。合以款冬花。紫苑。杏仁。桑皮。木通等分。大黃減半。蜜丸。以治肺熱火嗽。身如火炙。令其食後夜臥。含化一丸。劑未終而病即愈。則知此爲清肺治火止咳之要劑也。取葉乾重者三錢。爲氣足。拭淨毛。以免射肺作咳。或薑炙。或蜜炙。各依方用。【清】王士雄隨息居飲食譜論枇杷葉曰。毛多質韌。味苦氣平。隆冬不凋。盛夏不萎。稟激濁揚清之性。抱忘炎耐冷之姿。靜而能宣。比風溫濕熱暑燥諸邪在肺者。皆可藉以保柔金而肅治節。香而不燥。凡溼溫疫癘穢毒之邪在胃者。皆可用以澄濁氣而廓中州。本草但言其下氣止渴。專治嘔咳喘嗽。何其疎耶。宜以夏前採葉。刷毛洗淨切碎。淨鍋炒燥。入研密收。用以代茶常飲。可免時氣沾染。真妙法也。亦可蒸露。

配合應用 ●治陰虛咳嗽吐

血。用枇杷葉、生地黃、麥門冬、白芍、藥、炙甘草、枸杞子、桑根白皮、童便、芽根、天門冬、蘇子、五味子、栝樓根。

① 入喻化丸。治肺熱咳嗽。

② 治噎膈反胃。枇杷葉、竹茹、木瓜、蘆根汁、石斛、麥門冬、人參、白茯苓。治胃熱嘔吐。加童便、人乳、竹瀝、蘇子、白芍藥煎漿。

③ 治婦人經行先期。發熱無孕。枇杷葉、白芍藥、生地黃、青蒿子、五味子、黃藥、阿膠、枸杞子、杜仲、牡丹皮、鼈甲作丸。

④ 治妊娠惡阻。枇杷葉、人參、白芍藥、茯苓、竹茹、橘紅、蘇子、麥門冬、木瓜。

⑤ 治消渴。枇杷葉、栝樓根、天門冬、枸杞子、五味子、石斛、白芍藥、黃連、甘草、蘆根汁、童便、竹葉。

⑥ 治溫病發喘。因飲水多者。枇杷葉去毛。炙香。茅根各半斤。水四升。煎二升。稍稍飲之。(龐安常方)

⑦ 治反胃嘔噦。枇杷葉去毛。炙丁香各一兩。人參二兩。每服三錢。水一盞。煎三片煎服。(聖惠方)

⑧ 治衄血不止。枇杷葉去毛。焙研末。茶服一二錢。日二。(聖惠方)

八 薑 枇 枳 枳 枳

① 治酒瘰赤鼻。枇杷葉、梔子仁等分。為末。每服二錢。溫酒調下。日三服。亦治面上風瘡。(本事方)

② 治痔瘡腫痛。枇杷葉、蜜炙。烏梅肉焙為末。先以烏梅湯洗貼之。(集要方)

③ 治痘疔潰爛。枇杷葉煎湯洗之。(摘玄方)

用量 錢半至三錢。或二張至四張。

施用宜忌 凡胃冷作嘔及寒嗽者禁用。

參攷資料 ① 治肺熱嗽甚有功。一婦人患肺熱久嗽。身如火炙。肌瘦將成癆。以枇杷葉、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑白皮各等分。大黃減半。如常治。訖為末。蜜丸。櫻桃大。食後夜臥各含化一丸。未終劑而愈矣。(寇宗奭) ② 枇杷葉若不暇煮。但嚼汁咽。亦瘥。卒喘不止。(陶弘景) ③ 枇杷舊不著所出州土。今襄漢、吳蜀、閩嶺、江西南、湖南、北皆有之。木高丈餘。肥枝長。葉大如磨耳。背有黃毛。陰密。葉可愛。四時不凋。盛冬開白花。至三四月成實。作球。生大如彈丸。熟時色如黃

杏。微有毛。皮肉甚薄。核大如茅栗。黃褐色。四月採葉。暴乾用。(蘇頌)

④ 枇杷葉治肺胃病。取其下氣之功也。氣下則火降。痰順。而逆者不逆。嘔者不嘔。渴者不渴。咳者不咳矣。(蘇海峯) ⑤ 枇杷四季長青。葉上多毛。凡草木之生毛者。皆主治肺多刺者。花開於秋者。皆得堅金之氣。而能制風。枇杷初秋結蕊。深秋放花。夏時果熟。又得冬令之氣。能引寒水以上滋。利肺氣以下降。故主治咳嗽。卒喘。並能下氣消痰。(張隱卷)

【枇杷葉露】 命名 本品係枇杷葉蒸取之露。

主治 清肺與嗽。潤燥解渴。和胃。

【枇杷實】 外國名詞 Eriobotrya japonica, Lindl. (拉丁)

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 止渴下氣。利肺氣。止吐逆。除上焦熱。潤五臟。

參攷資料 枇杷實多食發痰熱傷脾。同炙肉及熱麵食。令人患

熱黃病。(孟詵)

【粉】 ① 即冬葵子之古籍別名。典見毛詩。詳「冬葵子」條。② 即榆白皮之白色者。功力較勝。詳「榆白皮」條。

【枳椇】 古籍別名 枳椇。(古飛。(指豹)獨搖夫移。(本草綱目)夫移。(楊江東)

基本 係薔薇科。枳椇屬。入藥用其木皮。

產地 江南諸省境內。均有產之。

形態 枳椇為落葉喬木。與白楊類同。異種。樹幹高約一二丈。周徑十數圍。葉橢圓形。有鋸齒。嫩時具有白毛。葉柄甚弱。遇風即搖。暮開花。花呈穗狀。白色。花瓣五。細而長。雄蕊多於花瓣。與葉共翻於風中。有奇觀。實熟時赤色如小豆。



八 蠶 析 枕 林 果 枝 武

性實 苦平。微毒。
效能 去風和血殺瘰癧。治痛瘰。

主治 脚氣痛痺。臨損瘰血。
配合應用 治婦女白崩。取
扶移皮八兩。牡丹皮四兩。升麻牡
蠣煨各一兩。每用一兩。酒二鍾。煎
一鍾。食前服。(集驗方)

治損痺諸腫。疼不可忍。取白
楊移皮。並雜五木皮。煮湯薰洗。
所謂五木者。桑。槐。桃。楮。柳也。(木
皮湯方)

【析目】即疥癩之古籍別名。典見
吳普本草。詳「疥癩」條。

【析易】即蜥蜴之古籍別名。典見
綱目。詳「蜥蜴」條。

【枕】即烏樟之古籍別名。典見綱
目。詳「烏樟」條。

【林檎】命名 本品即奈之小
於林。故名。而四者味甘。能來衆禽

古醫別名 來禽。(法帖)文林
耶果。(綱目)林檎。花紅。沙果。

外國名詞 Pirus malus, L.
Vartomentosa, Kooh. (拉丁)
ソノナ(日本)

萼本 係薔薇科。梨屬。爲林檎
之果實。產地 生山野中。

形態 林檎爲果類之落葉喬
木。高丈餘。枝柔弱。展布甚廣。春月
生葉。卵形而尖。緣邊有毛狀之鋸
齒。花蕾紅色。開後。花瓣白而有紅
暈。實爲梨名。內含軟骨質。或紙質
之心皮。夏末成熟。形圓略扁。大約
寸許。向陽色鮮紅。可供食。其質與
根俱可供藥用。

性質 酸。甘。溫。無毒。
主治 療水殺痢。洩精。

歷代記載攷證 【宋】大明諸
家本草論林檎曰。下氣消痰。治霍
亂腹痛。【宋】蘇頌圖經本草論林
檎曰。消渴者宜食之。【明】李時珍
本草綱目論林檎曰。小兒閃癖。

參攷資料 林檎氣味酸苦
平。瀉。無毒。多食令人百脈弱。(孫
思邈) 林檎多食發熱。及冷痰
澀氣。令人好睡。或生瘡癩。閉百脈。
其子食之。令人心煩。(馬志) 亦
有甘酢二種。白者早熟而味脆美。
酢者差晚。須爛熟。乃堪噉。今醫家
乾之入治傷寒藥。名之曰林檎散。

(蘇頌) 林檎即奈之小而圓者
其味酢者。即楸子也。其類有金林
檎。紅林檎。水林檎。蜜林檎。黑林檎。
皆以色味立名。黑者色似紫奈。有
冬月再實者。林檎熟時。嚼乾研末。
點湯服甚美。謂之林檎麩。僧贊寧
物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋
蠶蟻於下。或以洗魚水澆之。即止
皆物性之妙也。(李時珍)

【林檎根】主治 白蟲。蚊蟲。消
渴好睡。

【林檎麩】即林檎之果實晒乾研
成粉末者。詳「林檎」條。

【林檎】即木蘭之古籍別名。典
見本經。詳「木蘭」條。即石斛之
古籍別名。典見本經。詳「石斛」條。
【果瓜】即甜瓜之古籍別名。典見
綱目。詳「甜瓜」條。

【果宗】即梨之古籍別名。典見綱
目。詳「梨」條。
【果油】即落花生油之原名。詳「
落花生油」條。
【果然】古醫別名 禹。狄。蛙。仙
猴。裸猴。(綱目)
產地 出非洲印度等處。
形態 果然爲猴類猿屬之一

七 二 二

種。其狀如猿。面白頰黑。多鬣。其毛
白。有黑紋。尾長於身。性機敏捷。羣
居樹上。而喜羣行。老者前。少者後。
食相讓。居相愛。生相聚。死相赴。乃
仁獸也。其肉可供藥用。

性質 鹹平。無毒。
主治 瘰癧寒熱。同五味煮臘
食之。併坐其皮取效。

參攷資料 案鍾毓果然賦云。
似猴象猿。黑頰青身。肉非佳品。惟
皮可珍。而呂氏春秋云。肉之美者。
獲採之矣。亦性各有不同也。(李
時珍)

【果殼】即裸猴。參見「蜥蜴」條。
【果殼仁】即瓜萎仁之古籍別名。
典見相目。詳「瓜萎仁」條。
【枝子】即山梔子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【枝矩子】即枳椇子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。
【枝莖】即大戟之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大戟」條。
【武吉】即娑羅子之古籍別名。典
見楊春洋驗方。詳「娑羅子」條。
【武杖】即虎杖之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「虎杖」條。

【武威花】即凌霄花之古籍別名。與見吳普本草。詳「凌霄花」條。

【武胡索】即延胡索之古籍別名。與見和漢藥考。詳「延胡索」條。

【武彝茶】命名 本品為茶葉之產於福建武夷山者。故名。

性質 苦。酸。溫。無毒。

主治 消食下氣。醒脾解酒。療休息痢。

參攷資料 諸茶皆性寒。胃弱者食之多停飲。惟武彝茶性溫。不傷胃。凡茶癖停飲者宜之。(綱目拾遺)

【歧頭蛇】即兩頭蛇之別名。詳「兩頭蛇」條。

【毒公】即草烏頭之古籍別名。與見吳普本草。詳「草烏頭」條。

【毒冒】即玳瑁之古籍別名。與見和漢藥考。詳「玳瑁」條。

【毒砂】即礬石之古籍別名。與見和漢藥考。詳「礬石」條。

【毒根】即鈎吻之古籍別名。與見吳普本草。詳「鈎吻」條。

【毒魚】即堯花之古籍別名。與見別錄。詳「堯花」條。

【河上姪女】即水銀之古籍別名。與見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【河白草】即雷公藤之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【河伯從事】即鼈甲之古籍別名。與見古今注。詳「鼈甲」條。

【河車】即紫河車之簡稱。

【河東野】即硝石之古籍別名。與見和漢藥考。詳「硝石」條。

【河柳】即檉柳之古籍別名。與見爾雅。詳「檉柳」條。

【河砂】命名 砂字從少從石。故謂河流中之小石也。

主治 風溼頑痺不仁。筋骨痠痛。冷風癢癢。血脈斷絕。六月取河砂。烈日曝令極熱。伏坐其中。冷即易之。取熱微通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論河砂曰。石淋。取細白砂三升。炒熱。以酒三升。淋汁服。一合。日再服。又主絞腸痧痛。炒赤。冷水淬之。澄清服一二合。

【河豚】命名 豚。言其味美也。古醫別名 鯷魚。鮭魚。

鯷魚(拾遺) 鯷魚。鯷魚。鯛魚。(日華) 吹肚魚。氣包魚。(綱目) 鮪(字書)

外國名詞 Spheroides vomicularis T. & S. 或 Logocopt-micularis T. & S. 或 Logocopt-micularis T. & S. 或 Logocopt-micularis T. & S.

(Globe fish) (英) フグ或シホサイフグ或ナゴヤフグ(日本)

基本 係脊椎動物魚類。固頭類。河豚科。

產地 河海間皆有出。



河 豚

形態 河豚為無鱗魚類之一種。其體圓長。肥滿。頭部扁。至尾漸細。口小。上下兩顎之中央。有縫合線。脊兩骨。位於近尾處。上下對生。為鱗狀。各有十二至十五刺。無腹鱗。皮面平滑。又有鈎。鈎多在腹部。背若黑。有濃黑紋。腹面白色。腎

鱗紫赤色。長大者體長二尺。游泳水之中。層有物觸之。則吸空氣入胃。膨脹其腹部。如球。浮於水面。其卵巢中含有毒質。食之往往致死。肉可供烹食與藥用。

製法 凡使須去子與嘴目。及脊中肝內惡血。周身脂膜用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補虛。去溼氣。理腰脚。去痔疾殺蟲。

配合宜忌 忌煤炔落中。與荊芥。菊花。桔梗。甘草。附子。烏頭相反。宜荻。荷。藜。藜。禿。菜。長。檉。檉。甘蔗。蘆根。養汁。

【河豚肝及子】性質 有大毒。

主治 疥癬蟲瘡。用子同蜈蚣燒研。香油調搽之。

參攷資料 河豚子肝入口爛舌。入腹爛腸。無藥可解。惟橄欖木魚若木煎根。烏菰草根。麥汁可解。(陳藏器)

【河豚魚目】主治 治婦人脚上雞眼。并以輕粉。埋土中。化水搽之。可以搗根。

【河鹿鰓】即杜父魚之別名。與見

八畫 河 沸 油 治

動物學大辭典。詳「杜父魚」條。

【河煎】 基本 河煎為雜草類之一種。可供藥用。

產地 生海中。

採取 八月九月採之。

性質 酸。

主治 結氣癰在喉頭者。

【河燒芭】 即慈姑之古籍別名。

典見圖經本草。詳「慈姑」條。

山慈姑之俗名。詳「山慈姑」條。

【河輪勒佗】 即仙茅之古籍別名。

典見海藥本草。詳「仙茅」條。

【河鮪魚】 即河豚魚。詳「河豚」條。

【河邊木】 命名 本品為河邊之雜木。故名。

主治 令人飲酒不醉。五月五日取七寸長。投酒中。飲二遍。則後能多飲也。

【沸波】 即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【沸泉】 即溫湯水之古籍別名。典見綱目。詳「溫湯水」條。

【油胡桃】 命名 本品即胡桃仁之日久生油者。

性質 辛熱有毒。

主治 殺蟲攻毒。治癰腫癩風。

疥癬。楊梅。白禿諸瘡。潤髮髮。

參攷資料 油胡桃有毒。傷人咽喉。而瘡科取之。用其毒也。胡核制銅。此又物理之不可曉者。洪邁云。適有痰疾。因晚對上遣使諒令以胡桃肉三顆。生薑三片。臥時嚼服。即飲湯兩三呷。又再嚼桃。還如前數。即靜臥必愈。邁還玉堂。如旨服之。及旦而痰消嗽止。又深陽洪輯幼子病痰喘。凡五晝夜不乳。食醫以危告。其妻夜夢觀音授方。令人服人參胡桃湯。輯急取新羅人參寸許。胡桃肉一枚。煎湯一瓊亮許。瀆之。喘即定。明日以湯剝去胡桃皮。用之。喘復作。仍速皮用。信宿而瘳。此方不載書冊。蓋人參定喘。胡桃連皮能斂肺故也。(李時珍)

【油桐】 即罌子桐之古籍別名。典見綱目。詳「罌子桐」條。

【油珠子】 即無患子之古籍別名。典見綱目。詳「無患子」條。

【油胭脂】 古籍別名 碗兒胭脂(綱目拾遺)

製法 以紅花汁一杯。白蠟二兩。殺火溶化攪勻。傾於磁盤內。待成薄餅。用碾麵杖碾數百遍。則膠

粘如膏藥矣。假者係胭脂脚所造。不入藥用。

主治 活血解毒。療痘疔。塗蜂咬。潤膚除面皴。龜手皸裂。傅乳頭破裂。

配合應用 痘初起時。預免壞眼。用鹽清濟甯好油胭脂。點眼大昏(救生苦海方)

四聖丹。治小兒痘中疔。或紫黑而大。或黑壞而臭。或中有黑線。此痘十死八九。惟牛都御史得祕傳此方。點之最妙。用豌豆四十九粒。燒存性。頭髮灰三分。真珠十四粒。炒研為末。以油胭脂同杵成膏。先以簪挑破。啞去惡血。以少許點之。即時變紅活也。(普濟方)

治疹子眼。用雞膽將油胭脂調勻塗上。雖眼突出。亦能好。無雞膽用田雞膽代之亦可。(眼科要覽方)

【油梳】 即梳之用過有油者。功用詳「梳」條。

【油麻】 即胡麻之古籍別名。典見食療本草。詳「胡麻」條。

【油菊】 即野菊花之日本名。詳「野菊花」條。

七一四

【油菜】 即莢莢子之古籍別名。典見綱目。詳「莢莢子」條。

【油菜子】 即莢莢子之處方用名。詳「莢莢子」條。

【油菜粥】 主治 調中下氣。

【油橋】 即橋實之皮似油飾。中舉外黑者。功用詳「橋」條。

【油當歸】 即當歸之處方用名。詳「當歸」條。

【油鴉】 即鴉鷂之別名。典見綱目。詳「鴉鷂」條。

【治鳥】 形態 治鳥為山禽類之一種。大如鳩。其色青。穿樹作巢。大如五六升。口徑數寸。飾以土。赤白相間。狀如射候。伐木者見此樹。即避之。犯之則能殺虎害人。燒人廬舍。白日見之。鳥形也。夜聞其鳴。鳥聲也。時或作人形。長三尺。入淵中取蟹。就人問火炙食之。故謂此鳥係背有人。遇洪水食都樹皮餓死。化為此鳥。云其窠表可供藥用。

主治 作履履。治脚氣。

【治菊】 即菊花之古籍別名。典見爾雅。詳「菊花」條。

【沿鈎子】即懸鈎子之處方用名。詳「懸鈎子」條。

【沿籬豆】即白扁豆之古籍別名。典見綱目。詳「白扁豆」條。

【泊萍】即貫衆之古籍別名。典見別錄。詳「貫衆」條。

【泔製芥朮】即芥朮用米泔水製成者之處方用名。詳「芥朮」條。

【法半夏】命名 本品係法製半夏之簡稱。

製法 用大半夏湯洗七次。焙乾再洗。如此七轉。以濃米泔浸一日夜。每一兩用白礬一兩半。溫水化浸五日。焙乾。以鉛白霜一錢。溫水化。又浸七日。以漿水慢火內煮。沸焙乾用。

主治 消痰化飲。壯脾順氣。

參攷資料 法半夏之性質。介於姜半夏與竹瀝半夏之間。痰之不寒不熱者宜之。(醫學大辭典)

【法魚】即鮑魚之風乾者。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【法落梅】產地 出雲南東川府境。

形態 法落梅爲山草類之一種。其根如上黨參。色亦黃白。可供

藥用。

性質 甘苦。

主治 心腹痛。

【法酸】即五倍子之古籍別名。典見綱目。詳「五倍子」條。

【泡桐】即桐之古籍別名。典見綱目。詳「桐」條。

【波波丁】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【波殺】即蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓬莪朮」條。

【波斯白礬】形態 波斯白礬爲鹵石類之一種。即礬石之文如束針。狀如粉。撲者可供藥用。

性質 酸。溫。無毒。

主治 赤白瀉下。陰蝕洩痢。瘡疥。解一切毒蛇蟲等。去目赤。蒸腫。齒痛。火煉之良。

【波斯皂莢】即阿勃勒之古籍別名。典見綱目。詳「阿勃勒」條。

【波斯草】即波菜之古籍別名。典見綱目。詳「波菜」條。

【波斯莖】即無漏子之古籍別名。典見本草拾遺。詳「無漏子」條。

【波斯菜】即波菜之古籍別名。典見綱目。詳「波菜」條。

見綱目。詳「波菜」條。

【波稜菜粥】主治 和中。潤燥。

【波羅蜜】命名 波羅蜜三字。梵語也。以其味甘。故借以名之。

古籍別名 義伽結。婆那婆。阿薩。譯(綱目)

外國名詞 Artocarpus in. ferricola, Forst. (拉丁) ハラミツ(日本)

基本 係桑科。波羅蜜屬。爲波羅蜜之類。其核仁亦入藥用。

產地 出嶺南及印度等處。



波羅蜜

形態 波羅蜜爲喬木類之常綠樹本。高五六丈。葉倒卵形而光淨。不分裂。花小單性。有許多之花。集於長橢圓形之花托成穗狀。肥大而成假果。果亦長橢圓形。長六七寸。黃綠色。表面有無數之柔軟突起。其肉層似似糖。剖之香氣

四溢。味甜如蜜。其種可供藥用。

性質 甘。香。微酸。平。無毒。

主治 止渴解煩。醒酒益氣。令人悅澤。

【波羅蜜核仁】性質 甘。香。微酸。平。無毒。

主治 補中益氣。令人不饑。輕健。

【泥中蛆】基本 本品係生於爛泥中之蛆。

主治 目赤。洗淨晒研貼之。

【泥丸脂】即人耳垢之古籍別名。典見綱目。詳「人耳垢」條。

【泥油】即石油之別名。詳「石油」條。

【泥洛】即犀洛之古籍別名。典見別錄。詳「犀洛」條。

【泥莖】即白莖之古籍別名。典見別錄。詳「白莖」條。

【泥黃】即鹽筍乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹽筍乾」條。

【泥滑滑】即竹雞之古籍別名。典見綱目。詳「竹雞」條。

【泥莖黃】即莖筍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「莖筍」條。

【泥精】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳「寒水石」條。

八畫 沿 泊 泔 法 泡 波 泥

八畫 泥 注 炊 炎 炒

見綱目。詳「寒水石」條。

【泥綠】即綠青尾爛如碎土者之古籍別名。與見綱目。詳「綠青」條。

【泥薄】即舊薄之古籍別名。與見和漢藥考。詳「舊薄」條。

【泥鱗】即吐鐵之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「吐鐵」條。

【泥鰱】原名 鱒魚。古籍別名。海鰱。鱒魚。

（爾雅）小者名鰱魚。（綱目）

外國名詞 Murgurus ang.

nilicaudatus Cantor (拉丁) (Loach) (英) トシヨ一或トチ

ヤウ(日本)

基本 係脊椎動物魚類。喉鰓類。泥鰱科。

產地 生湖水泥中。

形態 泥鰱為無鱗魚類之一種。其體圓長。至尾漸側扁。口有鬚五對。兩對生於下顎。口藉皮膜而能伸縮。眼小。脊鱗有一棘六刺。略與腹鱗對生。體面無鱗。常粘滑。背色蒼黑。有多數小斑點。腹面淡褐。或灰色帶黃。全長三四寸。形似鰻。常潛居淡水之泥中。其肉可食。并可供藥用。



泥 鰱

性質 甘。平。無毒。

主治 同米粉煮羹食。調中收痔。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論泥鰱曰。腹中益氣。醒酒。解消渴。

配合宜忌 忌白大血。

【注之花】即白頭翁之古籍別名。與見和漢藥考。詳「白頭翁」條。

【炊單布】 命名 本品係飯巾。所以以蒸物之布。故名。

主治 墜馬。及一切筋骨損傷。

參攷資料 一人因開飯。熱氣蒸面。即浮腫眼閉。一醫以意取久用炊布為末。隨傳隨消。蓋此物受湯上之氣多。故用此引出湯毒。亦猶鹽水取鹹味。以類相感也。（李

時珍）

【炎涼小子】即生薑之古籍別名。與見和漢藥考。詳「生薑」條。

【炒山樞】即山樞子焙炒成者之處方用名。詳「山樞子」條。

【炒山藥】即山藥焙炒成者之處方用名。詳「山藥」條。

【炒丹皮】即牡丹皮炒過者之處方用名。詳「牡丹皮」條。

【炒天冬】即天門冬焙炒成者之處方用名。詳「天門冬」條。

【炒白朮】即白朮炒過者之處方用名。詳「白朮」條。

【炒白芍】即白芍焙炒成者之處方用名。詳「白芍」條。

【炒米湯】即粳米湯之原名。詳「粳米湯」條。

【炒延胡】即延胡索焙炒成者之處方用名。詳「延胡索」條。

【炒於朮】即白朮焙炒成者之處方用名。詳「白朮」條。

【炒赤芍】即赤芍焙炒成者之處方用名。詳「赤芍」條。

【炒知母】即知母焙炒成者之處方用名。詳「知母」條。

【炒芡實】即芡實炒成者之處方

七一六

用名。詳「芡實」條。

【炒阿膠】即阿膠炒成者之處方用名。詳「阿膠」條。

【炒阿膠珠】即阿膠以蛤粉拌炒成珠者之處方用名。詳「阿膠」條。

【炒佳蠶】即白殭蠶炒成者之處方用名。詳「白殭蠶」條。

【炒扁豆】即白扁豆焙炒成者之處方用名。詳「白扁豆」條。

【炒查肉】即山查肉焙炒成者之處方用名。詳「山查」條。

【炒紅麴】即紅麴炒成者之處方用名。詳「紅麴」條。

【炒苡仁】即苡仁焙炒成者之處方用名。詳「苡仁」條。

【炒香豉】即淡豆豉焙炒成者之處方用名。詳「淡豆豉」條。

【炒神麴】即神麴炒過之處方用名。詳「神麴」條。

【炒萸肉】即山萸肉炒過者之處方用名。詳「山萸肉」條。

【炒荊芥】即荊芥炒過者之處方用名。詳「荊芥」條。

【炒常山】即常山焙炒成者之處方用名。詳「常山」條。

【炒麥芽】即麥芽之炒過者。詳「

【麥芽】條。

【炒棗仁】即酸棗仁炒過者之處方用名。詳『酸棗仁』條。

【炒椒目】即川椒目炒過者之處方用名。詳『川椒目』條。

【炒蒲黃】即蒲黃焙炒成者之處方用名。詳『蒲黃』條。

【炒穀芽】即穀芽焙炒成者之處方用名。詳『穀芽』條。

【炒麵入粥】 聖治 止白痢。

【炒榴皮】即石榴皮焙炒成者之處方用名。詳『石榴皮』條。

【炒蝦蟇】即白蝦蟇炒過者之處方用名。詳『白蝦蟇』條。

【炒蘇子】即紫蘇子炒過者之處方用名。詳『紫蘇子』條。

【炒鹽】即食鹽炒成者之處方用名。詳『食鹽』條。

【炙五味子】即五味子焙炒成者之處方用名。詳『五味子』條。

【炙內金】即雞內金之處方用名。詳『雞內金』條。

【炙升麻】即升麻焙炒成者之處方用名。詳『升麻』條。

【炙甘草】即甘草焙炒成者之處方用名。詳『甘草』條。

方用名。詳『甘草』條。

【炙甲片】即穿山甲切片焙炒成者之處方用名。詳『穿山甲』條。

【炙百部】即百部焙炒成者之處方用名。詳『百部』條。

【炙坎版】即龜版焙炒成者之處方用名。詳『龜版』條。

【炙桑皮】即桑白皮焙炒成者之處方用名。詳『桑白皮』條。

【炙草】即艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【炙草】即甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【炙紫菀】紫菀之處方用名。即紫菀之用水或蜜炙過者。性較和善。詳『紫菀』條。

【炙細辛】即細辛炙過者之處方用名。詳『細辛』條。

【炙麻黃】即麻黃炙成者之處方用名。詳『麻黃』條。

【炙黃耆】即黃耆炙過者之處方用名。詳『黃耆』條。

【炙遠志】即遠志炙過者之處方用名。詳『遠志』條。

【炙蝟皮】即刺蝟皮焙炒成者之處方用名。詳『刺蝟皮』條。

【炙蘇子】即紫蘇子炙過者之處方用名。詳『紫蘇子』條。

【炙鼈甲】即鼈甲焙炒成者之處方用名。詳『鼈甲』條。

【版魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳『比目魚』條。

【牝牛】 古籍別名 犏牛。(爾雅)犏牛。(綱目)

產地 出甘肅臨洮諸地。

形態 牝牛爲獸類牛屬之一種。狀如水牛。體長多力。能載重。迅行如飛。性極粗。梗幹。膝尾。背腹下皆有黑毛。長尺許。尾最長。大如斗。亦自愛護。草木鉤之。則止而不動。乃西南徼外之野牛。人亦多畜之。肉味美。可供食。其喉嚨可供藥用。

主治 項下瘰癧。

參攷資料 牝牛古方未見用者。近世羅仙壽域方載。治瘰癧。方用其喉嚨。亦因類之義也。其方用犏牛喉嚨骨。二寸許。一節。連兩邊肩動脆骨。取之。或炙或燒。仰臥頓服。仍取巧舌。即嚼子也。嚼爛嚙之。食頃乃嚙。病人容貌必復減。而痰自內消矣。不過二服即愈。云神妙無比也。(李時珍)

【牧宿】即首宿之古籍別名。典見郭璞賦。詳『首宿』條。

【物象珀】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【物羅】即阜蘆之古籍別名。典見綱目。詳『阜蘆』條。

【狀元子】即山鱗子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山鱗子』條。

【狀元紅】即紫茉莉之古籍別名。典見花鏡。詳『紫茉莉』條。

【狎客】即茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳『茉莉花』條。

【狐】 命名 狐者孤也。狐性疑。疑則不可以合類。故字從孤而名狐。

外國名國 *Canis vulgaria*

或 *Vulpes japonicus* Gray

(拉丁)キツ子(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂脚類。犬科。

產地 出寒帶。穴居山林邱壠中。

形態 狐爲獸類之一種動物。形似犬而瘦小。軀幹細長。四肢細。肢有五爪。爪不能出入口。吻尖突。有黑鬚。耳殼呈三角形。不甚大。聽

八畫 炒 炙 版 牝 牧 物 狀 狎 狐

八 畫 狐

嗅兩覺皆敏捷。尾長達體之半。能屈伸。毛茸蓬鬆。全體黃赤色。胸腹白色。混有黑褐色。冬月有變色者。亦有因棲處而異者。體長四五尺。行則以踐。性狡狴。盜食生物。其肉可供藥用。



狐

性質 甘。溫。無毒。
主治 同腸作臘食。治瘡疥。久不癒。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論狐肉曰。炙炙食。補虛損。宜多食之。五臟邪氣。惡毒寒熱。【宋】蘇頌圖經本草論狐肉曰。作胎生食。暖中去風。補虛勞。

【狐口中涎液】 採取 取法。用小口瓶盛肉。置狐常行處。狐爪不得徘徊於上。涎入瓶中。乃收取之。
主治 入煎藥。

【狐五臟及六腑】

性質 苦。微寒。有毒。

主治 蟲毒。寒熱。小兒驚瀾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論狐臟腑曰。作羹臠。治大人見鬼。【宋】日華諸家本草論狐臟腑曰。補虛勞。隨臟而補。治惡瘡。疥生食。治狐魅。【明】李時珍本草綱目論狐臟腑曰。肝燒灰。治風癩。及破傷風。口緊掙強。

參攷資料 古方治諸風癩癩。有狐肝散。及衛生寶鑑神應散。普濟方治破傷中風。金烏散中並用之。【李時珍】

【狐四足】

主治 痔漏。下血。

【狐皮】

主治 燒燻。辟邪魅。頭尾燒灰水調。治牛疫。

【狐目】

採取 臘月採取陰乾。製法 凡使以兩目一副。炭火微燒。存性。研末。無灰酒服。

主治 破傷中風。

【狐尾】

主治 燒灰。辟惡。

【狐尾草】

產地 多生水澤旁。形態 狐尾草為溼

草類之一種。花如狐尾。九節而生。其根可供藥用。葉詳見該條。
主治 吐血。療金瘡。一切腫毒。搗傳用。

【狐尾草葉】

主治 諸疥水煎洗。

【狐豆】 卽鹿藿之日本名。詳「鹿藿」條。

【狐屎】

原名 雄狐屎。
採取 須採在竹木石上有尖頭者。是雄狐入藥良。

主治 燒之辟惡。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌新修本草論狐屎曰。去瘧疫氣。【唐】孫思邈千金翼論狐屎曰。療惡刺入肉。燒臘月豬脂封之。【宋】蘇頌

圖經本草論狐屎曰。治肝氣心痛。顏色蒼蒼如死灰。喉如喘息者。以二升燒灰。和薑黃三兩。搗末。空腹酒下方寸匕。日再甚效。
【狐香】 卽狐麝之原名。詳「狐麝」條。

【狐唇】

主治 療惡刺入肉。杵爛和鹽封之。

【狐陰莖】

性質 甘。微寒。有毒。
主治 女子絕產。陰

七一八

中疖。小兒陰癩卵腫。
歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狐陰莖曰。治婦人陰脫。

【狐媚花】 卽狐尾草之花。

【狐絲】 卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【狐實】 卽飛松子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「飛松子」條。

【狐鼻】

主治 狐魅病。同豹鼻。黃食。

【狐頭】

主治 燒之辟邪。同狸頭。燒灰。傳療瘰。

【狐膽】

採取 臘月採取之。性質 有毒。

主治 人卒暴亡。卽取雄狐膽。溫水研灌。入喉卽活。移時者無及。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狐膽曰。辟邪瘴。解酒毒。

【狐麝】

原名 狐香。命名 本品為狐之結

香如麝。而較常麝香氣尤烈。故名。主治 佩之辟邪。趨惡夢。定怪

【狐麝香】

命名 本品生於狐腹中。以其結如麝。而

較尋常麝香。其氣尤烈。故名。

產地 出雲南東川昭通等處。
主治 佩之定驚。絕惡夢。辟邪。

【狒狒】

古籍別名 獬廌。鼻羊。狗頭猴。(山海經)野人。

人熊。(綱目)大頭猿。(動物學大辭典)

外國名 1. Cynocephalus

或 Papio (Baboon) Pavian

(拉丁) ヒヒ 或 パーブン 或 イヌカシラザル (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。猿長類。猿類。狹鼻類。犬猿科之狒狒。

產地 出阿非利加洲。

形態 狒狒為獸類猿屬之一種動物。其體長三尺餘。頭似犬。口吻突出。顏及兩頰角大。四肢同長。便於匍匐。指趾各五。尾小。毛稍長。全體呈橄欖色。容貌醜惡。性凶暴。力強。其肉可供藥用。

性質 無毒。

主治 作脯。遠脂薄割。炙熱。貼人癩疥。能引蟲出。類易取瘞。

【狄】即果然之古籍別名。其見綱目。詳「果然」條。

目。詳「果然」條。

八 蠶 狒 狒 狄 狗

【狗】

命名 狗者。叩也。吠聲有節。如叩物。故名。

古籍別名 犬(說文)地羊。(廣南名)烏龍。白龍。(俗名)地厭。(道家名)

外國名 1. Canis familiaris (Hund) (拉丁)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂脚類。犬科。


形態 狗性輕猛。好鬥。視聽聽覺嗅覺皆銳敏。其有一種肥體者可供饌。名食犬。為補益之品。

採取 採用黃犬為上。黑者白者次之。

製法 水麥取汁。或焙搗和藥。性質 鹹。酸。溫。無毒。

效能 溫補脾胃。祛寒助陽。用作溫養強壯藥。

主治 安五臟。補痿傷。輕身益氣。



狗

氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論狗肉曰。補五勞七傷。益陽事。補血脈。厚腸胃。實下焦。填精髓。和五味。養空心食之。凡食犬不可去血。則力少不益人。【唐】孫思邈千金翼論狗肉曰。宜腎。【宋】日華諸家本草論狗肉曰。補胃氣。壯陽道。暖腰膝。益氣力。【清】黃宮繡本草求真論狗肉曰。犬肉味鹹性溫。屬土有火。故凡人履地。雖臥必醒。其肉食之。能令脾胃溫煖。且脾胃溫則五臟皆和。故又能補絕傷。壯陽道。煖腰膝。益氣力。補血脈。厚腸胃。實下焦。填骨髓也。色黃者。則於脾益補。色黑者。則於腎更妙。而腎能助陽事。但肉炙食益熱。令人消渴。妊婦食之。令子無聲。熱病後及中滿症服。更能殺人。畏杏仁。

配合應用 ① 戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮一伏時。搗如泥。和汁拌炊糯米三斗。入麴如常釀酒。候熟。每旦空心飲之。(養老方)

② 戊戌丸。治男子婦人一應諸虛不足。骨蒸潮熱等證。用黃童子

狗一隻。去皮毛腸肚。同外腎。於砂鍋內用酒醋八分。水二升。入地骨皮一斤。前胡黃芪。肉蓯蓉各四兩。同煮一日。去藥。再煮一夜。去骨。再煮肉如泥。搗入當歸末四兩。蓮肉。蒼朮末各一斤。厚朴。橘皮末十兩。甘草末八兩。和杵干下。丸梧子大。每空心鹽酒下五七十九。(乾坤秘製方)

③ 治脾胃虛冷。腹滿刺痛。肥狗肉半斤。以水同鹽鼓煮粥。類食一兩頓。(食醫心鏡方)

④ 治虛寒癱瘓。黃狗肉煮爛入五味食之。

⑤ 治氣水鼓脹。狗肉一斤。切和米煮粥。空腹食之。(食醫心鏡方)

⑥ 浮腫尿澀。肥狗肉五斤。熱蒸空腹食之。(食醫心鏡方)

⑦ 治卒中惡死。破白狗搗心上。即活。(肘後方)

⑧ 治痔漏有蟲。用狗肉煮汁。空腹服。能引蟲出也。危氏用熟犬肉。煎藍汁。空心食。七日效。(永類鈴方)

施用宜忌 凡非虛寒者禁用。反商陸。畏杏仁。同蒜食損人。同菱食生癩。

虛不足。骨蒸潮熱等證。用黃童子

八 犬 狗

參攷資料 ①白狗。烏狗。入藥用。黃狗肉大補虛勞。牡者尤勝。(陶弘景) ②黃犬大補益人。餘色微補。古言察嶺涼而能補。犬肉煖而不補。雖有此言。服終有益。但因食穢。不食者衆。(大明) ③世言犬能治勞損陽虛之疾。然人疾多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能指手哉。(朱實亭) ④或云。爲物苟且。故謂之狗。韓非云。蠅營狗苟是矣。卷尾有懸蹄者爲犬。犬字象形。故孔子曰。視犬字如畫狗。齊人名地羊。俗又諱之以龍稱狗。有烏龍白龍之號。許氏說文云。多毛曰屬。長喙曰檢。(音敝)短喙曰揭。(音歇)去勢曰狗。高四尺曰癸。狂犬曰獼。(音折)生一子曰獼。曰獼。(音其)二子曰獼。三子曰獼。其類甚多。其用有三。田犬長喙善獵。吠犬短喙善守。食犬體肥供饌。凡本草所用皆食犬也。犬以三月而生。在畜屬木。在卦屬艮。在禽應羆。星豺見之斃。虎食之醉。犬食香木髓則死。物性制伏如此。又遼東有羆背狗。乃羆產三卵。一羆一鷄一犬也。以禽乳獸。古所未聞。又有老木

之精。狀如黑狗而無尾。名曰彭侯。可以烹食。無情化有情。精靈之變也。(李時珍)

【狗心】 主治 憂患氣。除邪。歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論狗心曰。治風痺鼻衄。及下部瘡。狂犬咬。

【狗心血】 主治 心痺心痛。取和蜀椒末。丸梧子大。每服五丸。日五服。

【狗毛】 歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論狗毛曰。項下毛。主小兒夜啼。絳囊盛繫兒背上。

【明】李時珍本草綱目論狗毛曰。燒灰湯服一錢。治邪瘧。尾燒灰。敷犬傷。

【狗牙】 即大羆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大羆」條。

【狗牙半支】 產地 多生陰溼諸地。

形態 狗牙半支。爲半支類之一種。立夏前發苗。其葉細尖。作品字式。解覆而生。夏至時。開黃花。似瓦松。花後即死。雨水多。則繁茂。可供藥用。其葉大者。名虎牙半支。詳

見該條。



支 中 牙 狗

主治 癰疔便毒。黃疽。天蛇頭。搗爛加鹽少許。傅之。喉痺同京墨磨汁漱之。

【狗皮】 主治 腰痛。灸熱黃狗皮。裹之。頻用取瘰。燒灰。治諸風。

參攷資料 淮南畢萬術云。黑犬皮毛燒灰。揚之。止天風。則治風之義。有取乎此也。(李時珍)

【狗耳草】 即牽牛子之古籍別名。典見救荒本草。詳「牽牛子」條。

【狗肉】 即狗之處方用名。詳「狗」條。

【狗舌草】 古籍別名 澤小車。九葉草(日本)

外國名詞 Senecio campodes, DC. (拉丁) サハラグルマ サハヂシヤ クエフサウ (日本) 基本 係菊科望江南屬。爲狗

七二〇

舌草之莖葉。

產地 原野溼地均有出。

形態 狗舌草爲澤草類之多。年生草本。葉革質深綠色。密生白色之軟毛。根生葉。較大於莖生葉。全邊或微有齒牙。其初叢生地面。春末抽莖二三尺。中空。外多白毛。夏日莖頭分多枝。著數個之頭狀花序。中部頭狀花冠。外圍舌狀花冠。舌狀花冠作長橢圓形。花黃色。冠毛帶白色。總苞裸性。其莖可供藥用。

性質 苦寒。有小毒。

主治 蠱疥瘡疥。殺小蟲。爲末和塗之即瘳。

參攷資料 狗舌生溼墮溼地。取生葉。似車前而無文理。抽莖開花。花黃白色。四月五月採莖曬乾。(蘇恭)

【狗血】 性質 鹹。溫。無毒。

主治 白狗血治癩疾。發作。烏狗血治產難。橫生。血上搶心。和酒服之。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論狗血曰。補安五臟。【明】李時珍本草綱目論狗血曰。熱飲。

家本草論狗血曰。補安五臟。【明】李時珍本草綱目論狗血曰。熱飲。

治虛勞吐血。又解射罔毒。點眼治痘。瘡入目。又治傷寒熱病。發狂見鬼。及鬼擊病。辟諸邪魅。

參攷資料 ①白狗血。和白雞內。烏雞內。白雞肝。白羊肉。蒲子羹等食。皆病人(陶弘景)②黑犬血。瀝蟹燒之集鼠(李時珍)③術家以犬爲地厭。能禳辟一切邪魅妖術。按史記云。秦時殺狗。磔四門。以禦災。殺白犬血。題門。以辟不祥。則自古已然矣。又華陀別傳云。瑯琊有女子。右股病瘡。痒而不痛。愈而復作。陀取稻糲色。大一隻。繫馬。馬走五十里。乃斷頭向瘡處。合之。須臾。一蛇在皮中動。以鈎引出。長三尺許。七日而愈。此亦怪證。取狗之血。腥以引其蟲耳。(李時珍)

【狗卵草】 (綱目拾遺)

產地 多生荒園牆垣石砌間。
形態 狗卵草爲雜草類。葉類小將軍草。而小較。雨後開細碎花。極間結細子似腎。內有兩細核。又類椒形。青色微毛。蔓延而生。喜生土牆頭上。三四月採。五月無二月發苗。乃小草也。其子可供藥用。

八畫 狗

採取 立夏時採之。

性質 溫。無毒。
主治 發汗。癩腰痛。疝氣。

【狗尾半支】 卽狗尾草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳狗尾草條。

【狗尾草】 古籍別名 莠。光明草。阿羅漢草。(綱目)

狗尾半支。(綱目拾遺)狗草。(日本)

外國名詞 *Scaria viridis*

Boary (拉丁) *エノユロクサ*

エノユロクサ *ネユヂヤラ*

シ(日本)

基本 係禾本科狗尾草屬。

產地 山野原澤間。

形態 狗尾草爲澤草類之一。年生草本。高一二尺。莖葉穗均似粟而小。有綠色之芒。至秋種子成熟。其形似稗。其莖可供藥用。



草尾狗

主治 洗目貫髮。穿之卽乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫者。翻轉目驗。

以一二莖蘸水。浸去惡血。甚良。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論狗尾草曰。治疔癰。瘡。面癩。取數莖。揉軟。不時搗之。

配合應用 ①治癩疹。狗尾草。刮出瘀血。避風。數次自效。(杭集三方)

②治羊毛癢。一名羊毛癩。以狗尾草煎湯內服。外用銀針挑破紅癩。用麻線擠出瘻中白絲。如羊毛狀者。卽愈。否則服死。(家寶方)

參攷資料 ①莠。莠而不實。故字從秀。穗形象狗尾。故俗名狗尾。其莖治目痛。故方士稱爲光明草。阿羅漢草。(李時珍)②原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。黃白色而無實。採莖筒盛。以治日病。惡莠之亂苗卽此也。(李時珍)

【狗肝】 **主治** 肝同心腎搗塗。狂犬咬。又治脚氣攻心。切生以酒醋造之。取洩。先洩者勿用。

參攷資料 狗肝和土泥。能令婦妾孕順。(李時珍)

【狗乳汁】 **主治** 十年背育。取乳頻點之。狗子目開卽癒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狗乳汁曰。赤禿髮落。頻塗甚妙。

【狗乳草】 關中呼蒲公英爲狗乳草。詳蒲公英條。

【狗兒釋】 卽旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳旋花條。

【狗青】 卽狗脊之古籍別名。典見吳普本草。詳狗脊條。

【狗屎】 **性質** 熱。有小毒。
主治 疔瘡。水絞汁服。治諸毒不可入口者。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論狗屎曰。瘰癧。破骨。瘡者。燒灰塗瘡。勿令病者知。又和臘酥脂。敷瘰癧腫毒。疔腫出根。【明】李時珍本草綱目論狗屎曰。燒灰服。發痘瘡倒陷。治霍亂癱瘓。止心腹痛。解一切毒。

參攷資料 狗屎所治諸病。皆取其解毒之功耳。(李時珍)

七二一

【狗屎中粟】 古籍別名 白龍沙。戊腹糧

八畫 狗

(本草綱目)

採取 以白狗者良。

主治 噎膈。風病。痘瘡倒陷。能解毒也。

【狗屎中骨】

主治 寒熱。小兒驚癇。

【狗涎】

主治 諸骨梗咽。頻滴骨上自下。脫肛塗之。自及誤吞水蛭。

【狗脂及脰】

主治 手足皴。擦入面脂。去野

雞。柔五金。

【狗脊】

命名 本品根長多歧。狀如狗之脊骨。故名。

處方用名 金毛狗脊。川扶筋。

古籍別名 百枝。(本經)強脊。

扶筋。扶益。(別錄)狗青。赤節。(吳

普本草)猴奴。(和漢藥考)

外國名詞 Woodwardia

radicans, Sm. var. japonica,

Linn. (W. japonica, Sw.)

學名 Polypodium baro-

metz, L. Br.狗脊之學名不一。植

物名葉與和漢藥考。皆訂其學名

爲屬蕨科植物 Ornunda rega-

lis, L. var. japonica, Mild,

而 Stuart, Chinese Materia

Medica.則訂其學名爲 Polypo-

dium brometz.前者恐係日本

所產之狗脊。故以後者爲適當也。

基本 屬蕨科狗脊之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

狗脊產廣東各屬。以清遠從化爲多。

形態 狗脊爲諸國山野溼地

自生之宿根草。春季生嫩芽。捲曲

作渦狀。如小兒拳。被有黃褐色綿

毛狀薄膜。及長。分小枝。著黃粉。後

生由長卵圓形小葉所成之複葉。

莖高達二三尺。

採取 二月八月。採取曝乾。

製法 雷斅曰。凡修治火燎去

鬚。細到後。酒浸一夜。蒸之。從已至

申。取出晒乾。用。李時珍曰。今人惟

到炒去毛鬚用。

性質 苦平無毒。

效能 通血脈。利關節。治頑痺。

強腰背。用作緩和強壯藥。又爲腰

痛藥。

主治 腰背強。機關緩急。周痺。

寒溼膝痛。頰利老人。(本經)瘵失

溺不節。男女脚弱。腰痛風邪淋露。

少氣。目闇。堅脊。利俛仰。女子傷中。

關節重。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論狗脊曰。男子女人毒風

軟脚。腎氣虛弱。續筋骨。補益男子。

【明】李時珍本草綱目論狗脊曰。

強肝腎。健骨。治風虛。【明】繆希雍

本草經疏論狗脊曰。狗脊味苦。其

氣平。別錄云。甘微溫。無毒。兼火化

也。苦能燥溼。甘能益血。溫能養氣。

是補而能走之藥也。入足少陰。腎

主骨。骨者。腎之餘也。腎虛則腰背

強。機關有緩急之病。滋腎益氣血。

則腰背不強。機關無緩急之患矣。

周痺寒溼膝痛者。腎氣不足。而爲

風寒溼之邪所中也。茲得補則邪

散。痺除而膝亦利矣。老人腎氣衰

乏。肝血亦虛。則筋骨不健。補腎入

骨。故利老人也。失溺不節。腎氣虛

脫。故也。經曰。腰者腎之府。動搖不

能。腎將癯矣。此腰痛亦指腎虛而

爲溼邪所乘者言也。氣血不足。則

風邪乘虛客之也。淋露者。腎氣與

帶脈衝任俱虛所致也。少氣者。陽

虛也。目得血而能視。水旺則瞳子

精明。肝腎俱虛。故目闇。女子傷中。

七二二

關節重者。血虛兼有溼也。除溼益

腎。則諸病自瘳。脊堅則俯仰自利

矣。【清】黃宮繙本草求真論狗脊

曰。狗脊味苦甘平微溫。何嘗既育

補血滋水。又曰去溼除風。能使脚

弱腰痛失溺周痺俱治。是明因其

味苦。苦則能以燥溼。又因其味甘

甘則能以益血。又因其氣溫。溫則

能以補腎養氣。蓋溼除而氣自周

氣周而溼不失。血補而筋自強。筋

強而風不作。是補而能走之藥也。

故凡一切骨節諸疾。有此藥味燥

人。則關節自強。而俯仰亦利。非若

巴戟性兼辛散。能於風溼則真除

耳。去毛切片酒蒸。草薺爲使。熬膏

良。【清】鄒澍本經疏證論狗脊曰。

人之脊爲骨之長。凡骨之屈伸以

節節之能屈伸以脫。脫則屈伸之

機括。究在筋而不在骨。惟脊寸寸

有節。節皆不脫。仍能屈伸。是骨也

而含筋之用。爲一身機關之所屬。

狗脊者。皮黑肉青綠。律以肝主筋

腎主骨之義。絕似骨含筋用。周痺

者。風寒溼之氣。內不在臟。外未發

於皮。致真氣不能周也。故其治在

刺法則痛。從上下者。先過其下。後

脫其上。從下上者。先過其上。後脫其下。是截其流以探其源。狗脊之所治腰痛強是其源。關機緩急。寒溼膝痛是其流。關機緩急。所謂左緩右急。右緩左急者也。寒溼膝痛所以別溼熱膝痛。風溼膝痛也。夫衆痺之痛。各在其處。更發更止。更起更居。以右應左。以左應右。是以不得爲周。今日關機緩急。則非以右應左。以左應右矣。曰寒溼膝痛。則必更發更止。更起更居。各在其處矣。故關機緩急。冠於周痺之前。而寒溼膝痛。係於周痺之後。以明寒溼膝痛之非周痺。惟關機緩急乃爲周痺。而腰背強則狗脊之主證。爲兩病之所均有也。此本經之最明析周詳。適應靈樞周痺篇。黍銖無漏者也。雖然。味苦氣平則性專主降。惟其苦中有甘平而微溫。乃爲降中有升。降中有升。是以下不能至地。本專主降。是以上不能至天。而盤旋於中下之際。爲活利之所憑藉。非補虛亦非洩邪。有邪者能活利。無邪者亦能活利。是以顏利老人句。著於周痺膝痛兩證之外。以見其不專治邪耳。

八靈狗

近人學說 袁淑範曰。本經曰狗脊氣味苦平無毒。主治腰背強。關機緩急。周痺寒溼膝痛。頗利老人。別錄曰。療男女脚弱。腰痛。風邪。女子傷中。關節重。李時珍曰。強肝腎。健骨。治風虛。觀此狗脊似有強壯鎮痛作用。而同屬水龍骨科之葦蕪中含有之 Piperin 有麻痺作用。且用狗脊者常與葦蕪併用。故狗脊似具有麻痺作用也。張山雷曰。狗脊本有二種。一種似狗之脊骨。古之所用也。一種有金毛而極似狗形。今謂之爲金毛狗脊。瀕湖綱目已備載之。趙氏拾遺。據職方典。謂出於粵西之南甯府。卽穀根也。按此物雖藏之多年。拔盡其毛。尙能自生。不多時而茸茸如故。可見其生機洋溢。雖枯槁而餘氣盎然。今之所用。皆卽此種。故能溫養肝腎。通調百脈。強腰膝。堅脊骨。利關節。而驅痺著。起痿廢。又能固攝衝帶。堅強督任。療治女子經帶淋露。功效甚宏。誠虛弱衰老恒用之品。且溫而不燥。走而不泄。尤爲有利無弊。頗有溫和中正氣象。而人多忽之。不以爲重。殊可惜也。

也。又曰。穆氏經疏謂腎虛有熱。小便不利。或短澹赤黃。口苦舌乾者。忌用。蓋以其性溫而示之禁例也。然狗脊性溫。乃溫和溫養之用。非溫熱溫燥之例。如果肝腎之虛。陰不涵陽。以此固攝下元。引經導導亦無不可。

配合應用 治男子諸風。四寶丹。用金毛狗脊。鹽泥固濟。煨紅。去毛。蘇木。葦蕪。川烏。頭生用。等分。爲末。米醋和丸。梧子大。每服二十丸。溫酒鹽湯下。(普濟方)

治室女白帶。衝任虛寒。鹿茸丸。用金毛狗脊。燎去毛。白斂各一兩。鹿茸酒蒸焙二兩。爲末。用艾煎醋汁。打糯米糊丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。(濟生方)

能固精強骨。金毛狗脊。遠志。肉。白茯苓。當歸身。等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每酒服五十丸。(集簡方)

治病後足腫。但節食以養胃氣。外用狗脊煎湯漬洗。(吳綬庭要方)

得鹿茸、白斂、艾、茯苓、蛇牀子。治室女衝任帶脈三經虛寒。下白帶。

得牛膝、菟絲子、地黃、山茱萸、白膠、杜仲。功能固精強骨。並壯腰腎。

得沉香、牛膝、石斛、木瓜、五加皮、白蘇皮、菊花、漆葉、藜蘆子。能通利關節。除五緩六急。

用錢 錢中至三錢。

施用宜忌 凡非虛寒者禁用。惡敗醬、莎草、葦蕪爲之使。

參攷資料 強督扶筋以功名也。別錄又名扶蓋。乃扶筋之誤。本經狗脊一名百枝。別錄葦蕪一名赤節。而吳普本草謂百枝爲葦蕪。赤節爲狗脊。皆似誤也。(李時珍) 今太行山瀋溫州亦有之。苗尖細碎青色。高一尺以來。無花。其莖葉似貫衆而細。其根黑色。長三四寸多歧。似狗之脊骨。大有兩指許。其肉青綠色。春秋採根曝乾。今方亦有金毛者。(蘇頌)

狗脊有二種。一種根黑色如狗脊。一種有金黃毛如狗形。皆可入藥。其莖細而葉花兩兩對生。正似大葉蕨。比貫衆葉有齒。面背皆光。其根大如拇指。有硬黑鼠蹯之按。

八靈 狗

張揖廣雅云。菝葜。狗脊也。張華博物志云。菝葜與草薺相亂。一名狗脊。觀此則昔人以菝葜為狗脊。然菝葜。草薺。狗脊三者。形狀雖殊。而功用亦不甚相遠。(李時珍)狗脊為強筋骨要藥。其性味形類。與草薺相似。而功用亦不甚相遠。按草薺苦平。根葉骨勝。亦其腰脊強痛。骨節風寒溼周痺。與狗脊同也。(張路玉)

【狗草】即狗尾草之日本名。詳『狗尾草』條。

【狗骨】性質 甘。平。無毒。主治 燒灰。生肌。敷馬瘡。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論狗骨曰。燒灰。療諸瘡。及妬乳癰腫。【唐】韓保昇蜀本草論狗骨曰。燒灰。補虛。理小兒。為癰客忤。【唐】陳藏器本草拾遺論狗骨曰。煎汁。同米煮粥。補婦人。今有子。【明】李時珍本草綱目論狗骨曰。燒灰。米飲。日服。治休息久痢。豬脂調。敷鼻中瘡。和漢藥考。詳『麻黃』條。

【狗陰卵】主治 婦人十二疾。燒灰服。

【狗陰莖狗精】採取 於六月。上月伏日。取陰乾。百日用。性質 鹹。平。無毒。主治 傷中。陰痿不起。令強熱。大生子。除女子帶下。十二疾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論狗陰莖曰。補精髓。【宋】日華諸家本草論狗陰莖曰。治絕陽。及婦人陰痿。

【狗魚】即海鏡鱧之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『海鏡鱧』條。

【狗椒】即芫椒之古籍別名。典見別錄。詳『芫椒』條。

【狗腎】主治 婦人產後腎勞。如瘡者。婦人體熱。用豬腎。體冷。用狗腎。

【狗溺泥】主治 治妊娠傷寒。塗腹上。能令胎不墮。

【狗溺硝】命名 狗溺在石上。多年。結成青白色。如硝者。產地 鄉村中及人家石物上。多有之。

性質 涼。主治 咽喉腫痛。

【狗腦】主治 頭風。鼻中瘡。肉下部。置瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狗腦曰。狗咬傷。取本犬。臍敷之。後不復發。

【狗脊】即菝葜草之古籍別名。典見唐本草。詳『菝葜草』條。

【狗髓睡魚】即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰻魚』條。

【狗麻】即胡麻之古籍別名。典見別錄。詳『胡麻』條。

【狗齒】採取 於三伏時採之。性質 平。無毒。主治 癩癰。寒熱。卒風。痲。伏日取之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狗齒曰。臍汁。治大癩。燒研。醋和。敷發背。及馬鞍瘡。同人齒。燒灰。湯服。治瘡。疔。倒。陷。有效。

【狗蹄肉】性質 酸。平。主治 下乳汁。煮汁服。

【狗頭灰】即馬勃之俗名。詳『馬勃』條。

七二四

【狗頭骨】採取 以黃狗者良。性質 甘。酸。平。無毒。主治 金瘡。止血。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狗頭骨曰。燒灰。治久痢。勞痢。和乾薑。煮。妙。見相為丸。空心。白飲。服。十丸。極效。【唐】蘇恭新修本草論狗頭骨曰。頰骨。主小兒諸癩。諸瘡。燒灰。酒服。【宋】日華諸家本草論狗頭骨曰。燒灰。壯陽。止癰。【明】李時珍本草綱目論狗頭骨曰。治癰疽。惡瘡。解頰。女人崩中帶下。

【狗頭瘻】即獬狔之別名。詳『獬狔』條。

【狗蒸蝮】即蛇之俗名。詳『蛇』條。

【狗膽】性質 苦。平。有小毒。主治 明目。敷瘡。癩。癰。瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狗膽曰。療鼻。鼻中。瘡。肉。【唐】孟詵食療本草論狗膽曰。去腸中。膿水。又和通草。桂。為丸。服。令人。隱形。【宋】日華諸家本草論狗膽曰。治刀。箭。瘡。【明】李時珍本草綱目論狗膽曰。主鼻。鼻。耳。止。

【狗頭瘻】即獬狔之別名。詳『獬狔』條。

【狗蒸蝮】即蛇之俗名。詳『蛇』條。

【狗膽】性質 苦。平。有小毒。主治 明目。敷瘡。癩。癰。瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狗膽曰。療鼻。鼻中。瘡。肉。【唐】孟詵食療本草論狗膽曰。去腸中。膿水。又和通草。桂。為丸。服。令人。隱形。【宋】日華諸家本草論狗膽曰。治刀。箭。瘡。【明】李時珍本草綱目論狗膽曰。主鼻。鼻。耳。止。

【狗頭瘻】即獬狔之別名。詳『獬狔』條。

【狗蒸蝮】即蛇之俗名。詳『蛇』條。

【狗膽】性質 苦。平。有小毒。主治 明目。敷瘡。癩。癰。瘡。

消渴。殺蟲。除積。能破血。凡血氣痛及傷損者。熱酒服半箇。瘀血盡下。

參攷資料 ①狗膽功能明目。

上伏日採膽酒服。(張鼎) ②按魏志云。河內太守劉劭女。病左膝瘡痒。華陀視之。用蠅繫犬後足。不得行。斷犬腹。取膽向瘡口。須臾有蟲。若蛇着瘡上。出長三尺。病即愈也。(唐慎微) ③以青狗白狗者良。

【狗養】即營實之古籍別名。與見和漢藥考。詳「營實」條。

【狗養】即寧虛之古籍別名。典見別錄。詳「寧虛」條。

【狗蠅】 命名 本品係蠅之茸。總於狗體。冬月則藏於狗耳中者。

古籍別名 大蠅蠅。(動物學大辭典)

外國名詞 Hippoboscæ carponia, Olf. (拉丁) イヌシラミ

八一(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。雙翅類。蠅蠅類。蠅蠅科之狗蠅。

形態 狗蠅為卵生蟲類之一種。寄生狗體。其狀如蠅。體形扁。色暗黃。有光澤。複眼小。脚有黑褐環。

紋。能飛。味尖銳。噉狗血為食。冬日藏卵於狗毛中。捕得可供藥用。

製法 凡使去翅足用。

主治 痰瘡不止。活取一枚。麴麥為丸。衣以黃丹。發日早米飲吞之。得吐即止。或以蠅丸酒服亦可。又搗酒服。治痘瘡倒靨。

參攷資料 狗蠅古方未見用者。近世醫方大成載治瘡方。齊東野語載托痘方。蓋亦虱負牛蟲之類耳。夫痘瘡固是危事。然不可擾。大要在固膿氣之外。任其自然。爾然或有變證。則不得不資於藥也。(李時珍)

【狗蠅梅】即蠅梅花之不經接者。與見綱目。詳「蠅梅花」條。

【狗寶】 形態 狗寶生癩狗腹中。其狀如白石而帶青色。其理層疊。為難得之物。可供藥用。

性質 甘。鹹。平。有小毒。

主治 噎食及癰疽瘡毒。

參攷資料 ①噎病數月不愈者。用狗寶為末。每服一分。以威靈仙二兩。鹽三錢。搗如泥。將水一盅。拌勻。去滓調服。日三。不過三日愈。

後服補劑。(合林摘要) ②按買似道悅生隨抄云。任邛縣民家一犬。甚惡。後病衰。為衆犬所噬而死。剖之。其心已化。似石。非石。其重如石。而包膜格之。如寒灰。觀其脈理。猶是心。不知何緣致此。嘗聞人患石淋。有石塊。刀斧不能破。又嘗見龍脛骨中髓。皆是白石。虎目光落地。亦成白石。星之光氣落地。則成石。松亦化石。蛇蟹蠶皆能成石。萬物變化如此。不可一概斷也。時珍嘗靜思之。牛之黃狗之豎。馬之黑鹿之玉。犀之通天。獸之鮮。皆物之病。而人以為寶。人鑿於物。而猶不免此病。况物乎。人之淋病。有沙石者。非獸之鮮。答乎。人之病。鮮有心似金石者。非狗之寶乎。此皆固於物而不能化者。故禽鳥有生卵如石者。焉。按程氏遺書載有波斯人發國中古塚。棺內俱盡。惟心堅如石。錫蘭觀之。有山水青碧如畫。傍有一女。觀粧凭欄。蓋此女有愛山癖。朝夕注意。故融結如此。又宋潛溪文集載臨川浮屠法循。行般舟三昧法。示寂後。火焚。惟心不化。出五色。光有佛像高三寸。非骨非石。

百體具足。又傲水有優婆塞行禪觀之法。及死。火葬。心內包觀音像。如刻成。此皆志局於物。用志不分。精靈氣液。因感而凝形。正如孕女感異像而成鬼胎之類。非祥也。病也有情之無情也。(李時珍)

【狗養】即鴉之一種。功用詳「鴉」條。

【狗獾】 原名 獾。肥純。故名。古籍別名 天狗。(綱目)

產地 山野間。

形態 狗獾為獸類之一種。形似小狗。而尾尖。喉矮。足其趾有五。尾稍長大。毛黃褐色。有斑點。覓食蟲。鱗。瓜果等物。穴土而居。其皮可為裘領。肉可供藥用。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 補中益氣。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論狗獾肉曰。治小兒疳積。殺疳蟲。【明】李時珍本草綱目論狗獾肉曰。功與豬獾同。

【狙】即獼猴之古籍別名。典見綱目。詳「獼猴」條。

【柑骨】即虎骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎骨」條。
【珽】即青玉之古籍別名。典見綱目。詳「青玉」條。

【玫瑰花】 處方用名 紅玫瑰。
古籍別名 赤薔薇。

(和漢藥考)

外國名詞 Rosa Gallica.

(R. Cinnamomea or Rugosa.) (Red Rose.)

基本 屬薔薇科。為玫瑰之花苞。
產地 產浙江及江蘇。

形態 玫瑰為各地自生之小灌木。高二三尺。枝間多刺。葉為奇數羽狀複葉。其小葉為橢圓形。夏開單瓣紅色花。香氣甚佳。花托似莖。表面有刺。花後結紅色之實。宛似茄子。



玫瑰 花

採取 立夏前採含苞未放者。

陰乾。

製法 採得。去萼蒂。速令乾。去異質。密貯瓶中。不見日光。則香味不散。

性質 甘。溫。微苦。氣香。無毒。

成分 玫瑰花之主要素為單寧酸 $C_{15}H_{10}O_6 \cdot 2H_2O$ 。沒食子酸 $C_6H_7(OH)_2CO_2H$ 。Quercetin $C_{15}H_{10}(OH)_2O_6$ 。餘為葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$ 。灰纖維。

效能 行氣。解鬱。柔肝。醒脾。有輕緩之收斂性。故有柔肝止血之功。

主治 入脾肝二經。和血行血。理氣。治風痺。

歷代記述攷證 【清】王士雄

隨息居飲食譜論玫瑰花曰。玫瑰味甘辛溫。調中活血。舒鬱結。辟穢和肝。蒸露煎茶糖。收作餠。浸油澤髮。烘粉悅顏。釀酒亦佳。可消乳癖。國外學說 英美學說謂玫瑰花產中國西國等處。即紅薔薇。又名法國玫瑰花。又名日耳曼玫瑰花。又名奧地利玫瑰花。為歐羅巴中與南之各國所產。又有一種真紅玫瑰花。即英國用以作藥品者。

係紅薔薇花內之一種。與他種不同。英國之米梓末。多種此種玫瑰花。玫瑰花之花瓣。無論鮮乾。均可入為藥。然藥品中所準用者。為半開之苞。先去其萼蒂等物。速令乾。飾之。去其異質。密貯瓶中。不見日光。則其香最佳。久不變色。更有一種大玫瑰花。藥品中用其已開而新鮮之花瓣。此種玫瑰花。歐羅巴各國多種植之。原由東方各國而來。或言原產於高加索山。波斯國有百藥玫瑰花。此種花瓣最香。故各國多種植之。其花最為可觀。而英國之米梓末等處。亦多種此種玫瑰花。如印度國各處。則多種大紅玫瑰花。以作玫瑰油及作玫瑰水。其新鮮之花瓣。面軟如剪絨。色紅而少帶紫。面有極細白色軟毛。新鮮者香少。乾時則香多。味微苦。而澀。有收斂之性。配佐他藥。取其色。至其處方。則用乾玫瑰花瓣。分搗碎。淡礦強水半份。沸汽水四十分。浸半點鐘。濾渣為度。能收斂。每服一兩至二兩。宜佐他藥同服。作漱水。漱口亦可。又荷蘭藥鏡。曰。須用新鮮有芳香之花瓣。香氣

散。即無效。又性稍收斂。功能刷淨污液。令體內清潔強壯。又胸病吐血。勞咳。疝。白帶。下月。經過多。下瀉等症。以之作輕性收斂藥。自來稱為有效。法用花與砂糖研和沖服。或泡湯代茶飲之。又諸失血。衄血。嘔血。婦人崩漏等。以下方治之。有異常之速效。方用玫瑰花（去萼者）四錢。沸水二斤。絞藥油（再餾者）半錢。砂糖一握。先將玫瑰花入磁罐。沸水浸二時。加綠礬油去滓。溶化砂糖。每一時服三匙。是名收斂玫瑰浸。又醫學博士久留春三氏。研究玫瑰花。確有止痛之效。嘗將其心得。載入實驗醫報。第四年第四十號之坐談內。摘錄如左。玫瑰花之止痛。亡友濱中廣也氏。家傳秘方。治急性及慢性赤痢。與類似之下痢。往年予患大腸炎。久而不愈。心竊苦之。友人某為予。歷述濱氏遺方之功效。予以久困於藥。聞而姑試之。不愈。二三日後。向之一日。須下黏液。至十數次者。竟能銳減。從此速速服用。宿病遂愈。自後予以此方。迭治病者。功效百不爽一。處方如下。規那皮（五

○(一)玫瑰花(五)○至一〇
○(二)大黃根(〇)三(水)一〇
○(〇)右製煎劑。一日分三次服。

辨偽 ①鄭有慶曰。玫瑰花色紫氣香。味甘性微溫。入脾肝二經。和血調氣。平肝開鬱。惟蘇州所產者。色香俱足。服之方能見效。近有以本地所生之土玫瑰。及月季花。陰乾混售。不可不知。②曹炳章曰。按玫瑰花產杭州笕橋者。花瓣紫紅。花蒂青綠色。氣芳香甚。濃者佳。產湖州者。色紫淡黃。紅色。長。蒂綠黃色。且有小點。香味淡。略次。蕭山。蕭山產者。桃紅色。味淡氣香。而濁。受潮極易變色。為最次。且玫瑰花具有特性。人尿尿澆著立死。凡正月終抽紅芽。剪新抽嫩條。每類二三枝。種斜形。生根較易。次年其花盛開。根旁亦有嫩枝發出。隔二三年。宜遷種換地。此花名離根草。必須移東植西。方得起發。若同園有開紅花之果木。如石榴。薔薇等類。則滿園玫瑰。忌不開花。速將穿色之花遷遠。則玫瑰及時而開。亦其特性也。

八盡 玫 的 肝 直 知

配合應用 ①治吐血。玫瑰膏。用玫瑰花一百朵。初開者。去心蒂。河水二碗。煎半。再用河水一盤。煎中去渣。和勻。共有盤半。復煎至一盤。白糖一斤。收成調膏。不時服之。(救生苦海方)

②治噤口痢。用玫瑰花陰乾煎服。又治乳癰。玫瑰花七朵。母丁香七粒。無灰酒煎服。自愈。

③治腫毒初起。玫瑰花去心蒂。焙為末。一錢。好酒和服。(百草鏡方)

④治乳癰初起。鬱症宜此。玫瑰花初開者。陰乾。燥者三十朵。去心蒂。陳酒煎。食後服。(百草鏡方)

⑤治肝胃氣痛。用玫瑰花。陰乾沖湯代茶服。

⑥治新久風痺。玫瑰花去淨蘆蒂。陰乾。三錢。紅花。全當歸各一錢。水煎去滓。好酒和服。七劑除根。永不再發。(百草鏡方)

⑦治吐紅。集聽方。用玫瑰花不拘多少。去蒂。搗汁。熬膏。貯瓶內。每早空心茶匙挑四五匙。白滾水沖服。一二日即愈。又少林拳經。玫瑰花能治跌打損傷。

⑧治風痺藥酒。用白樺花。大紅月季花。玫瑰花。去蒂各一兩。隔羊花。五錢。風茄花。五朵。龍眼肉。北棗。肉各一兩。紹酒五壺。浸封七日。隔水煮之。罇上置白米一撮。米熟成飯。為度。取出。每服二三杯。蓋暖臥。避風即愈。(救生苦海方)

⑨朱排山柑園小識。保真丸能通經絡。和百脈。壯腰腎。健脾胃。加飲食。健步履。除一切痼疾。能固真元。用玫瑰花去蒂。搗瓣。以竹紙糊袋裝之。薄攤曬乾。取淨末一斤。不宜見火。此花色能益血。香能補氣。妙難盡述。補骨脂一斤。淘淨泥土。用廿九。荑。各五錢。煎汁一碗。拌曬。以汁盡曬乾。炒菘絲子一斤。用芎歸。芍。生地。各五錢。煎汁去滓。以汁煎菘絲子。俟吐絲為度。曬乾。炒。胡椒仁六兩。連皮搗如泥。杜仲四兩。鹽水炒去絲。韭子四兩。淘淨。微火炒。各為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每晨空心白湯服四錢。忌羊肉。蠶。並諸血。一方加魚。鱸。四兩。男婦共服。可以種子極效。或加鹿角膠。枸杞子。(保真丸方)

【玫瑰露】 基本 本品係玫瑰花蒸取之露。

主治 和血平肝。養胃寬胸。散鬱。酒服。治肝氣胃氣立效。

【的】 即蓮實之別名。詳「蓮肉」條。

【的乳香】 即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「乳香」條。

【肝】 即蛇牀子之古籍別名。典見爾雅。詳「蛇牀子」條。

【直石】 即長石之古籍別名。典見別錄。詳「長石」條。

【直脚】 即鹽荷乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹽荷乾」條。

【直羅殼】 即白羅殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白羅殼」條。

【知母】 原名 蚺母。初生子根狀如蚺。故謂之蚺母。後俗說為知母。蚺母。

處方用名 肥知母。炒知母。古醫別名 蚺母。苳母。連母。葛母。貨母。地參。(以上本經) 水參。水須。水波。苳。苳。苦心。兒草。兒。種草。女理。女雷。鹿列。非蓬。東根。野。荖。昌支。(別錄) 昌文。薊穴。美。澤。者。槩。紙母。兒。羅。草。(和漢藥考)

Phodoloides. Anemarrhena As-

基本 屬百合科。為知母之根。產地 蘇頌圖經本草言知母產潁河。懷衛彰德諸郡。解州。滁州亦有之。陳仁山藥物生產辨云。知母產直隸東陵西陵等。

形態 知母為多年生草本。葉莖俱類麥門冬。根部叢生細長葉。末端細。質稍厚。基部作鞘狀。夏月從葉間抽莖。高達三四尺。莖上附有小鱗片。頂上開淡紅紫色六瓣小花。作穗狀花序排列。實為長橢圓形。有六稜之蒴果。中藏小黑子。其根橫生。狀類萬年青根。有多數紋。有鬚根。外部黃褐色。內部茶褐色。味甘辛。



知母

種類 中國產者。肥大而有鬚根。為上品。朝鮮產者。形態較短。為次品。日本產者。細長而輕。虛為下品。

採取 二月八月間。採掘。曬乾。尤須取經三年以上者。

製法 雷斅曰。凡使知母。先於槐砧上剉細燒乾。木臼杵搗。勿犯鐵器。李時珍曰。凡用揀肥潤裏白者。去毛切。引經上行。則用酒浸焙乾。下行則用鹽水潤焙。

性質 苦寒無毒。效能 滋腎補水。瀉火滑腸。其效能有三。一為解熱藥。用於熱之亢進期。及骨蒸熱。二有寧靜作用。用於神經勃起過度遺精等。三小便熱閉不通。用之有利尿之效。

主治 治渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。本經。療傷寒久瘧煩熱。脇下邪氣。膈中惡及風汗內疽。多服令人洩。別錄。張仲景之醫明。知母一味。經

張仲景之實驗。認為主治煩熱。茲考徵如下。一白虎湯證曰。表有熱。又曰。裏有熱。二白虎加人參湯證曰。大煩渴。又曰。裏裏俱熱。舌上乾燥而煩。又曰。發熱。又曰。身熱而渴。三酸棗湯證曰。虛煩。四白虎加桂枝湯不具證。有四方俱用之。觀此則知母能治煩熱也明矣。

歷代記載攷證 唐甄權藥性本草論知母曰。心煩燥悶。骨熱勞往來。產後羸勞。腎氣勞。骨寒虛煩。宋大明諸家本草論知母曰。熱勞。傳尸。疰痛。通小腸。消痰。止嗽。潤心肺。安心。止驚悸。金張元素珍珠囊論知母曰。涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱。腎經火。熱厥頭痛。下痢腹痛。喉中腥臭。元王好古湯液本草論知母曰。瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。明李時珍本草綱目論知母曰。安胎。止子煩。辟射工溪毒。明繆希雍本草經疏論知母曰。知母味苦氣寒而無毒。藥性論兼平。日華子兼甘。皆應有之。入手太陰。足少陰經。苦寒能除煩熱。至陰能入骨。故主消渴熱中。除邪氣。脾胃俱虛。則溼熱客之。而成肢體浮腫。肺為水之上源。腎屬水。清熱。滋肺金。益水臟。則水自下矣。補不足者。清熱以滋金水之陰。故補不足。熱散陰生。故益氣。苦寒至陰之性。煩熱得之即解。故療傷寒久瘧煩熱。及脇下邪氣。凡胃邪者。皆熱也。膈中惡。即邪惡之氣中於膈中也。風汗者。熱則生風而

汗自出也。內疸者。即女勞色疸也。熱火既散。陰氣即生。故主上來諸證也。多服令人洩者。陰寒之物。其味復苦。則必傷脾胃生發之氣。故作洩也。明李士材本草圖解論知母曰。知母苦寒。氣味俱厚。沉而下降。為腎經本藥。兼能清肺者。為其肅清龍雷。勿使僭上。則手太陰無銷燬之虞也。瀉有餘之相火。理消渴之煩蒸。凡止咳安胎。莫非清火之用。多服令人泄瀉。亦令人減食。此惟實火燔灼者。方可暫用。若施之於虛損之人。如水益深矣。蓋苦寒之味。行天地燔殺之令。非長養萬物者也。近世未明斯義。誤以為滋陰上劑。務療神丹。因而天枉者。不可勝數。余故特表而出之。永為鑒戒。凡用須去毛剉碎。以鹽酒久炒如褐色。清黃宮樞本草求真論知母曰。知母辛苦微滑。能佐黃蘗。以治膀胱熱邪。緣入水腫。閉水有屬血屬氣之分。肺伏熱邪。不能生水。膀胱絕其化源。便秘而渴。此當清肺以利水者也。熱結膀胱。真陽乾涸。陽無以化。便秘不瀉。此當清膀胱以導溼者也。黃柏氣

味純寒。雖能下行。以除膀胱濕熱。但肺金不肅。則化源無滋。又安能上達於肺。而得氣分俱肅乎。知母味辛而苦。沉中有浮。降中有升。既能下佐黃柏以泄腎水。復能上行以潤心肺。俾氣清肺肅。而溼熱得解。是以昔人有云。黃柏無知母。猶水母之無蝦。誠以見其金水同源。子母一義。不可或離之義。此書皆言。用此在上則能清肺止渴。却頭痛。潤心肺。解虛煩喘嗽。吐血衄血。去喉中腥臭。在中則能退胃火。平消痺。在下則能利小便。潤大腸。去膀胱肝腎溼熱。腰脚腫痛。并治癆瘵內熱。陰火熱淋。崩漏等症。若謂力能補陰。則大謬矣。景岳謂此性最沉寒。本無生氣。用以清火。則可用以補陰。則何補之有。第其陰柔巽順。似乎有德。猶之小人在朝。固宗元氣受其剝削。而有陰移而莫之覺者。是不可不見之。真而辨之。早也。讀此可爲妄用知母黃柏一箴。得酒良。上行酒浸。下行鹽水拌。忌鐵。清。鄧澍本經疏證論知母。曰。知母能益陰清熱。止渴。人所共知其能下水。則以古人用者甚罕。

八 靈 知

千金外臺兩書。用知母治水氣各一方。千金曰。有人患水腫。腹大。其堅如石。四肢細。少勞苦。足脛即腫。少飲食。便氣急。此終身之疾。服利下藥不瘳者。宜服此藥。微除風溼。利小便。消水穀。歲久服之。乃可得力。瘳後可常服。其所用藥。則加知母於五苓散中。更增鬼箭羽。丹參。獨活。秦朮。海藻也。外臺曰。古今錄驗。澤漆湯。療寒熱富風。飲多暴腫。身如吹。脈浮數者。其所用藥。則澤瀉。知母。海藻。茯苓。丹參。秦朮。防己。豬苓。大黃。通草。木香也。其曰。除風溼利小便。曰。療寒熱富風。飲多暴腫。可見本經所著下水之效。見於除肢體浮腫。而知母所治之肢體浮腫。乃邪氣肢體浮腫。非泛常肢體浮腫比矣。以寒熱外盛。邪火內著。渴而引飲。火氣不能化水。水遂泛溢四射。治以知母。是泄其火。使不作渴引飲。水遂無繼。蓄者旋消。由此言之。仍是治渴。非治水也。於此見凡腫在一處。他處反消瘦者。多是邪氣勾留。水火相阻之候。不特千金方水腫腹大四肢細。卽金匱要略中桂枝芍藥知母湯。治身

體羸羸。脚腫如脫。亦其一也。金匱方邪氣水火交阻於下。千金方邪氣水火交阻於中。阻於下者。非發散不爲功。阻於中者。非滲利何由泄。此千金方所以用五苓散。金匱方所以用麻黃附子防風。然其本則均爲水火交阻。故其用桂朮知母。則同也。桂朮治水之阻。知母治火之阻。於此遂可見矣。

配合應用 ①治陽明經前證。入白虎湯。解傷寒陽明證。口渴頭疼。煩熱鼻乾。不得眠。加竹葉。麥門冬。名竹葉石膏湯。大渴引飲。頭疼欲破。因作勞而得者。加人參。名人參白虎湯。汗後煩熱不解。亦用之。

②治久瘧煩熱而渴。同麥門冬。石膏。貝母。橘紅。鱉甲。青蒿。牛膝。

③治陰虛咳嗽。同貝母。天門冬。麥門冬。沙參。甘草。桑白皮。枇杷葉。五味子。百部。

④治強陽不痿。同黃蘗。車前子。木通。天門冬。生甘草。

⑤治久近痰嗽。自胸膈下塞。停飲。至於臍腹。用知母。貝母。各一兩。爲末。巴豆三十枚。去油研勻。每服一字。用生薑三片。二面蘸藥。細嚼。

嚙下。便唾。次早必瀉一行。其嗽立止。壯人乃可用之。一方不用巴豆。(醫學集成方)

⑥治久嗽氣急。知母去毛切。五錢。隔紙炒。杏仁。薑水泡。去皮尖。焙。五錢。以水一盅半。煎成一盅。食遠溫服。次以蘿蔔子。杏仁。等分。爲末。糊丸服。五十丸。豈湯下。以絕病根。(鄧筆錄雜興方)

⑦治妊娠子煩。因服藥致胎氣不安。煩不得臥者。知母一兩。洗焙。爲末。斑肉丸。彈子大。每服一丸。人參湯下。醫者不識此病。作虛煩治。反損胎氣。(楊婦厚產乳集驗方)

⑧治妊娠腹痛。月未足。如欲產之狀。用知母二兩。爲末。蜜丸。梧子大。每粥飲下二十九。(陳廷之小品方)

⑨治溪毒射工。凡中溪毒。知母連根葉。搗作散服。亦可投水搗絞。汁飲一二升。夏月出行。多取其屑。自隨。欲入水。先取少許。投水上。流便無畏。兼辟射工。亦可煮湯浴之。甚佳。(肘後方)

⑩治紫癩風疾。醋磨知母。搽之。日三次。(衛生易簡方)

七 二 九

①治嵌甲腫痛。知母燒存性。研搽之。(多能郵事方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾虛便瀉及無

實火者禁用。得黃柏與酒良。

參攷資料 ①知母治諸熱勞

惡人虛而口乾者。加用之。(甄權)

②知母入足陽明手太陰。其用有

四。瀉無根之腎火。療有汗之骨蒸。

止虛勞之熱。滋化源之陰。仲景用

此入白虎湯。治不得眠者。煩燥也。

煩出於肺。躁出於腎。君以石膏。佐

以知母之苦寒。以清腎之源。緩以

甘草。梗米。使不速下也。又凡病小

便閉塞而渴者。熱在上焦。氣分。肺

中伏熱。不能生水。膀胱結。其化源

宜用氣薄味薄淡滲之藥。以瀉肺

火。清肺金而滋水之化源。若熱在

下焦。血分而不渴者。乃真水不足。

膀胱乾涸。乃無陰則陽無以化。法

常用黃蘗。知母。大苦寒之藥。以補

腎與膀胱。使陰氣行而陽自化。小

便自通。(李杲) ③按范子云。提母

出三輔。黃白者善。郭璞釋附雅云。

薺。提母也。生山上。葉如韭。(掌禹

錫) ④凡治虛勞之證。當分已成

未成二候。丹溪心法有云。虛損吐

血。不可純用苦寒。恐致相激。只宜

瓊玉膏主之。此就已成虛勞者言

之也。其所用滋陰百補丸。並用知

柏二味。此就未成虛勞者言之也。

蓋此以苦補腎之法。惟丹溪知之。

丹溪而後。則一遇咳嗽吐血。而早

用此二味。則其誤甚矣。(理虛元

鑑)

【知母】即沙參之古籍別名。典見

本經。詳「沙參」條。

【知杖】 基本 知杖為雜草類

之一種。可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 療疔。

【知風草】 外國名詞 Erago-

Beauv. (拉丁)

產地 出廣東、舊瓊州、雷州諸

地。



形態 知風草為莠草類之一

種。引莖而生。春日視其苗有一節。

則知一次有風。探得可供藥用。

探取 以無節者入藥用。

主治 一切風痺入骨。能拔外

出浸酒用。

【社公口鬚】即老君鬚之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「老君鬚」條。

【社壇餘酢酒】 主治 小兒

佳。又以噴屋四角。辟蚊子。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論社壇餘酢肉酒曰。飲

之治學。

【祁婆藤】 形態 祁婆藤。為莖

莖蔓延木上。四時常有。其葉可供

藥用。

主治 諸風疾。

古籍別名 占稻。早稻。

【秬米】 (綱目)

形態 秬為穀類粟屬之一種。

成熟最早者。顆粒似粳米而大同

小異。色有赤者。亦有白者。其米可

供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 溫中益氣。養胃和脾。除

溼止洩。

【秬米粥】 性質 甘。溫。平。無毒。

主治 利小便。止煩

渴。養腸胃。

【秬米稻稈】 主治 反胃。燒

灰淋汁。溫服。令

吐。蓋胃中有蟲能殺之也。

【秬粟】即粟米之古籍別名。典見

別錄。詳「粟米」條。

【空心菜】即蕹菜之別名。詳「蕹

菜」條。

【空沙參】即齊苳之處方用名。詳

「齊苳」條。

【空青】 命名 本品質空青色。

故名。

處方用名 養空青。

古籍別名 楊梅青。(綱目)

基本 係礦石類。為銅坑之礦

石。

產地 在山谷銅礦中。

形態 空青大者如雞卵。小者

如相思子。或成片塊。或成豆粒。其

形色如楊梅。故有楊梅青之稱。腹

中空。洞破之有漿水。

探取 採無時。或於三月間採

之。

用法 恒以剉末和藥。

性質 甘酸寒無毒。

效能 磨障翳。治青盲。專作眼科明目藥。

主治 青盲耳聾。明目。利九竅。通血脈養精神。益肝氣。久服輕身延年。本經。療目赤痛。去膚翳。止淚。出利水道。下乳汁。通關節。破堅積。令人不忘。志高神仙。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論空青曰。治頭風。鎮肝。瞳人破者。得再見物。【宋】大明諸家本草論空青曰。鑽孔取漿。點多年青盲內障。翳膜。養精氣。其殺摩翳。【明】李時珍本草綱目論空青曰。中風口喎不正。以豆許含嚙甚效。【明】繆希雍本草經疏論空青曰。空青感銅之精氣而結。其味甘酸。其氣大寒。無毒可知。已色青。主目盲。目者肝之竅。瞳子神光屬腎。肝腎虛則內熱。怒則火起於肝。故生內外障翳。此目病所由成也。甘寒能除積熱。象之以酸。則火自斂而降矣。熱退則障自消。目自明。耳者腎之竅。水涸火炎。故耳聾。腎家熱解。則火息水生。而聽復聰矣。九竅

八畫 空

不利。無非火型。肝家有火。則血熱氣逆。故血脈不通。涼肝除熱。則精氣自益。陰足火清。則竅自利。而血脈自通。精神自長矣。目赤痛。膚翳淚出。皆肝氣不足之候。益肝氣。則諸證自除矣。其曰利水道。下乳汁。通關節。破堅積者。皆以熱除。則氣血和平。陰氣自復。五臟清寧。則諸證自解。聖藥神功。於斯顯矣。【明】

李士材本草圖解論空青曰。空青甘酸寒無毒。生於有銅處。銅精氣聚則生。今信州時有之。其腹中空。破之有漿者。絕難得。大者如雞子。小者如豆子。治眼翳障為最要。又有曾青。出銅處。色理亦無異。但其形巒疊連珠相綴。其中不空。與空青功效不相上下。

配合應用 得真珠。貝子。珊瑚。石決明。點內外障翳有神效。治眼目眩暈不明。空青少許。漬露一宿。點之。千金方。

治黑翳覆瞳。空青。礬石。燒各一兩。貝子四枚。研細日點。聖濟總錄方。治府翳昏暗。空青二錢。菴仁。去皮一兩。片腦三錢。細研末日點。

（聖濟總錄方）

一切目疾。雀目赤目。青盲內障。翳。風眼。用此。覺目中涼。冷為驗。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢。半槐牙。日未出時。採之。入青竹筒內。候乾。為末。一錢。半。入龍腦一字。密收。每臥時。嗽口。仰頭吹一字。入兩鼻內。便睡。隔夜便用。聖濟總錄方。

用量 八分至錢半。配合宜忌 畏菟絲子。

攷證資料 空青生益州山谷。及越嶲山。有銅處。銅精聚則生。空青。其腹中空。三月中採。亦無時。越嶲屬益州。益州諸郡無復有。恐久不採之故也。今出銅官者。色最鮮深。出始興者。弗如涼州。高平郡。有空青山。亦甚多。今空青。但圓實如鐵珠。無空腹者。皆鑿土石中取之。而以合丹。成則化鉛為金。諸石藥中。惟此最貴。醫方乃稀用之。而多充畫色。殊為可惜。陶弘景。出銅處。兼有諸青。但空青為難得。今出蔚州。蘭州。宣州。梓州。宣州者。最好。塊段細。時有腹中空者。蔚州。蘭州者。片塊大。色極深。無空腹

者。陶氏所謂圓實如鐵珠者。乃白青也。蘇頌。張果玉洞要訣云。空青似楊梅。受赤金之精。甲乙隱隱之氣。近泉而生。久而含潤。新從坎中出。鑽破。中有水。久即乾如珠。金星燦燦。庚辛玉册云。空青。陰石也。產上饒。似鍾乳者佳。大片含紫色。有光彩。次出蜀嚴道及北代山。生金坎中。生生不已。故青為之丹。有如拳大及卵形者。中空有水。如油。治盲立效。出銅坎者亦佳。堪輿又有楊梅青。石青。皆是一體。而氣有精粗。點化以曾青為上。空青次之。楊梅青又次之。造化指南云。銅得紫陽之氣而生。緣。按二百年而生。石緣。銅始生其中焉。曾空二青。則石緣之得道者。均謂之鑽。又二百年得青陽之氣。化為鉛石。觀此諸說。則空青有金坑銅坑二種。或大如拳卵。小如豆粒。或成片塊。或若楊梅。雖有精粗之異。皆以有藥為上。不空無藥者為下也。方家以藥塗銅物。生青刮下。偽作空青者。終是銅青。非石緣之得道者也。李時珍。余昔在杭州。遇一滿洲老人。雙目皆障。藥不能立時齊

效。有貨空青者。其人酬以重價。將用之矣。始問之。余曰。此物生銅坑中。必銅精也。銅性能伐肝。有餘之症。自無不愈。今公年老而脈症俱虛。當用溫補之品。若用此當無益有損。其人且信且疑。乃破青取水。光點右目。一夜大痛。目精爆炸。始悔不用余言。而猶賴余獲全。其左目也。後用養肝滋陰之劑。將及一載。左目復明。觀此益知審症用藥。辨品宜精。未可輕用也。(廣陽雜記)

【羌活】

命名 獨活之出於西羌者。故名羌活。又母根

稱獨活。子根稱羌活。故本經獨活一名羌活也。

處方用名 川羌活。

古籍別名 獨活。護羌使者。

(本經)胡王使者。(吳普本草)

基本 屬繖形科爲羌活之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

羌活產四川打箭爐瀘縣。龍安府江油縣等處爲佳。陝西次之。雲南又次之。

形體 羌活爲山野川谷之自

生草本。春生苗。葉如青麻。六月開花。花色或黃或紫。結實時葉黃者是夾石上所生。葉青者是土脈中所生。其根有鬚頭。纏節者。有白如鬼眼者。其氣味較獨活爲猛烈。而體亦較軟潤焉。

採取 二月八月採根曬乾。

製法 去蘆汲皮。水洗或焙用。

性質 苦。甘。平。無毒。

效能 發表。治瘧。搜風。勝溼。用治中風。頭痛及瘧風等症。

【羌青】即獨活之古籍別名。典見本經。詳「獨活」條。

【羌活】子根稱羌活。故本經獨活一名羌活也。

【羌活】屬繖形科爲羌活之根。

【羌活】陳仁山藥物生產辨云。

【羌活】江油縣等處爲佳。陝西次之。雲南又次之。

【羌活】形體 羌活爲山野川谷之自

生草本。春生苗。葉如青麻。六月開花。花色或黃或紫。結實時葉黃者是夾石上所生。葉青者是土脈中所生。其根有鬚頭。纏節者。有白如鬼眼者。其氣味較獨活爲猛烈。而體亦較軟潤焉。

採取 二月八月採根曬乾。

製法 去蘆汲皮。水洗或焙用。

性質 苦。甘。平。無毒。

效能 發表。治瘧。搜風。勝溼。用治中風。頭痛及瘧風等症。

主治 風寒所繫。金瘡止痛。奔豚。癩瘕。女子疝瘕。久服輕身耐老。(本經)又療諸賊風。百節痛風。無問久新。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論羌活曰。羌活治賊風失音不語。多瘁。手足不送。口面喎斜。

通身痛痺血癩。【宋】大明諸家本草論羌活曰。羌活治一切風并

氣。筋骨攣拳。骨節酸疼。頭旋目赤。疼痛。五勞七傷。利五臟及伏梁水

氣。【金】張元素珍珠囊論羌活曰。散癰疽敗血。【元】李東垣用藥法

象論羌活曰。治風寒溼痺。酸痛不仁。諸風掉眩。頭項難伸。【元】王好

古湯液本草論羌活曰。去腎間風邪。搜肝風。瀉肝氣。治項強腰脊痛

【明】李士材本草圖解論羌活曰。羌活乃一類兩種。中國生者

名獨活。羌胡來者名羌活。氣味辛溫。爲手足太陽引經之藥。又入足

少陰厥陰。小無不入。大無不通。故能散肌表八風之邪。利周身百節

之痛。頭旋掉眩。失音不語。手足不隨。口眼歪斜。目赤膚癢。理女子疝

積。散癰疽敗血。

國外學說 和漢三才圖會曰。獨活二月生苗。似蘆筍而有節。有短毛。色青碧。有帶紫黃白之微斑。且有小點。謂之獨活芽。堪爲蔬菜。和酸茹之。香味殊美。既長。高四五尺。一極五葉。有細鋸齒。面背皆有細毛。六月開白花作叢。婆娑如絲。毛秋結實。以根上近莖帶紫處爲羌活。以根株塊而黃色處爲獨活。如白朮。蒼朮之分別。蓋花色中日不同。今來自中國之羌活。間有無節者。疑卽是土當歸。選用日產羌獨可也。日本產以羽州最上。其獨活芽有長二三尺者。柔軟可食。又

古方藥品考曰。中國來之獨活。形似虎杖根。中空。皮紫黑色。大者徑寸許。味辛芳烈者佳。藥舖呼爲馬

皮羌活。實則乃獨活也。其稱眞羌活者。實日產獨活。形色與中國產無異。但味辛烈耳。陳久者可用。其

稱眞獨活者。乃土當歸老根。稱日

本羌活者。係採土當歸嫩根。刮去

粗皮充之。味皆淡泊。不堪用。又大

和本草曰。本草約言云。獨活與羌

活。原無二種。後人強分之耳。今按

日俗自昔以母爲獨活。其小根爲

獨活。

獨活。

獨活。

獨活。

羌活。本草大明云。獨活乃羌活母也。一種葉似前胡。又似藥而壯大。莖與根皆紫。葉莖有毛。無香氣。云是羌活。未知是否。本草云。羌活氣雄。獨活氣細。今試中國產果。然日產與此異。不可用。又本草辨疑曰。羌活。獨活。中日所產。微似之。中國產又有二種。一有節如鞭。一無節。黑皮。有節者真。現今來自中國之無節者。決為土當歸。按土當歸日本諸山有之。據諸家本草說。謂日產形異。惟按諸事實。自來用日產者。累有效驗。凡染胡防風。羌活。誤用日產。歷有年所。究其功用。殊無少異。古之採藥使者。不得中藥。則改用日產以代之。且從前中國產物。來者無多。即來亦道遠費時。動輒經年。往往蛙蝕。藥力減損。則不如徑用日產之為愈也。又本草綱目。啓蒙曰。羌活。獨活。多生山中。苗與葉大抵相似。不堪食用。莖葉有毛。糙澀。夏後起。葉互生。至秋高六七尺。枝端開小白花。數百攢簇。如蓋。後乃結實。並如大葉。莖弱。根白。氣烈。微香。曬乾。內淡白色。外皮淺黑色。俗呼真羌活。非也。乃一種

下品之獨活耳。此種氣味最為猛烈。患者每憎厭之。不肯飲服。惟醫者仍多代用。中國自古以獨活。羌活。混而為一。日本則分為三類。統稱羌活。販諸四方。一曰日本手。為真羌活。二曰前胡手。質輕。虛色黃。味辛。為真獨活。從前有之。今已久不至矣。三曰馬皮手。近尚運至。然實下品物也。以獨活根曬乾。則色紫。有鞭節。發香氣。與稱本手之羌活相似。雖氣味少異。尚可代用。此草生於東京之清瀧河岸。苗葉花質不異。獨活。惟莖葉節作深紫色。斷之有香氣。別一種。根有節。且多橫紋。紫黑色。味辛。亦有香氣。是謂竹節手。今不復來。東京之嵯峨嵐山。出一種草。葉大於獨活。如蘿蔔葉。五月開花。似獨活。花惟花朶之中。邊特長。饒有風韻。根生乾。俱白。氣較烈。市人每以之偽充羌活。用時宜仔細別淨。又古今要覽稱曰。獨活。即紹興本草所圖之茂州獨活。此草一莖五極。枝葉各對生。葉似獨活。而狹長。有網鋸齒。第一枝左右各生五葉。葉有深缺刻。遠望之一葉宛如三葉。第二枝生三葉。葉

之深缺刻如前。又頗似五葉。中枝同第一枝。全為五葉。惟在下之兩葉。較第一枝稍形巨大。按圖經本草。獨活如青麻。六月開花。此草處處有之。一種名高。雄羌活。蓋即紹興本草所稱之文洲獨活。此草出日本之高雄山。其名極著。苗葉花質。俱似獨活。但稍小。節節作深紫色。根亦紫色。節有香氣。此其異也。今人以紫色節密者為羌活。殆即此歟。又日用藥品考曰。日產獨活無真品。俱以他物偽造。如土當歸老根之類是也。又手板發蒙曰。正保年間。以土當歸之宿根為獨活。或以全根為獨活。其實皆非也。獨活。羌活。每混於一櫃之內。至日本之長崎。始分本手。前胡手。馬皮手三種。前胡手。輕。虛。色黃。味辛。是真獨活。文政五年冬。中國又以羌活。獨活。至。則分為二物矣。從前販運至日之本手。馬皮手。為真羌活。又有稱竹節手者。推為上品。今以獨活根曬乾。紫色。有鞭節。發香氣。與稱本手之羌活相似。氣味亦相近。可代用。惟出自官園者佳。

近人學說 張山雷曰。羌獨二

活。古皆不分。本經且謂獨活一名羌活。所以本經別錄。止有獨活。而無羌活。李氏綱目。尚沿其舊。然二者形色既異。氣味亦有濃淡之殊。雖皆以氣勝。以疏導血氣為用。運利機關。宣行脈絡。其功若一。而羌活之氣尤勝。則能直上頂巔。橫行支臂。以盡其搜風通痺之職。而獨活止能通行胸腹腰膝耳。考甄權藥性本草。已分羌獨各為一條。而所言治療。尚無甚區別。惟張潔古謂羌活與川芎同用。治太陽少陰頭痛。透利關節。治督脈為病。脊強而厥。玉海藏亦謂羌活氣雄。治足太陰風溼相搏。頭痛。肢節痛。一身盡痛者。非此不能除。二家之言。深識羌活雄烈之真相。頭之師門。恒以羌活專主上部之風寒溼邪。顯與獨活之專主身中以下者。截然分用。其功尤捷。而外癘之一切風溼寒邪。若於肌肉筋骨者。亦分別身中以上。身中以下。而以羌獨各為主治。若在腰脊背脊之部。或肢節牽掣。手足上下交痛。則竟合而用之。宜通絡脈。更能神應。固不僅內科若痺。應手輒效。而外科之風

八畫 羌 肥

寒溼邪亦莫不投劑立驗。考岳景石頑等諸家本草皆以羌獨各立條目。猶未分析羌活主上。獨活主下之治。但自潔古以來亦已隱隱微露其端倪。茲特揭而出之。為學者明示以準則。而發明從古未伸之義蘊。蓋二活之宜通關節。既有同功。而唐宋以後必為區而別之者。其微義正在於此。庶乎各有專主。而是物之長技亦顯矣。又按羌活本含辛溫之質。其治療宜於風寒風溼。而獨不宜於溼熱。以溼邪化熱。即為溫病。似無再用辛溫之理。然此惟內科證治為然。若外癆之屬於溼熱者。苟腫勢延蔓。引及骨節。肌肉伸縮不利。非以羌獨之善走宜通為治。則效力必緩。故雖熱病亦不避用。但僅以為嚮導。而任佐使之職。則分量甚輕。其主任之君藥。固猶是理溼清熱之正劑。此亦發表不遠熱之大旨。非抱薪救火者。所得以為藉口也。

羌活三兩為末。每服五錢。酒水各一盞。煎減半服。(小品方)
① 治產後腹痛。羌活二兩。煎酒服。(必效方)亦治產腸脫出。(子母秘錄方)
② 治妊娠浮腫。羌活、蘿蔔子同炒香。只取羌活為末。每服二錢。溫酒調下。一日一服。二日二服。三日三服。乃嘉興簿張昌明所傳。亦治風水浮腫。(本事方)
③ 治歷節風痛。獨活、羌活、松節等分。用酒煮過。每日空心飲一盃。(外臺秘要方)
④ 治喉閉口噤。羌活三兩。牛蒡子二兩。水煎一盞。入白礬少許。灌之取效。(聖濟總錄方)
⑤ 人睛忽睡至鼻。如黑角塞。痛不可忍。或時時大便血出而痛。名曰肝眼。用羌活煎汁。服數盞自愈。(夏子益奇疾方)
⑥ 治太陽頭痛。羌活、防風、紅豆等分為末。噓鼻。(玉機微義方)
用量 八分至錢中。
施用宜忌 凡血虛而無風寒實邪者禁用。穢質為之使。
著名方劑 羌活補髓丸。療瘧

虛腦痛不安。膽腑中寒。(千金方)
羌活、川芎、當歸各三兩。桂心二兩。人參四兩。酥一升。大麻仁(二升。熬研脂)棗肉(一斤。研脂)牛髓。羊髓各一升。右十味。先篩前五味為散。後用棗肉麻仁打勻。再下二髓及酥。重湯煮之為丸。梧子大。酒服三十九日再服。
卷致資料 ① 羌活色紫氣雄。可理避風。獨活色黃氣細。可理伏風。(王好古) ② 羌活治肢節疼痛。手足太陽本經風藥也。羌活雖為太陽風藥。而足太陽與少陰腎為表裏。羌活亦入之。但專力於達巨陽之氣分。而少陰血分。猶首推獨活耳。所以治歷節風痛者。必兼羌獨二味。並用松節也。(張潔古)
③ 痲風宜用獨活。兼水宜用羌活。風能勝溼。故羌活能治水溼。與芍藥同用。治太陽厥陰頭痛。發汗散表。透關利節。非時感冒之仙藥也。(蘇恭) ④ 升舉中魚。則柴胡升麻升舉下魚。用藥本羌活。(金德生)
【羌桃】即胡桃之古籍別名。典見名物志。詳「胡桃」條。
【羌精子】即萊菔子之古籍別名。

七三四

典見和漢藥考。詳「萊菔子」條。
【羌鹽】即戎鹽之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「戎鹽」條。
【肥玉竹】即玉竹之處方用名。詳「玉竹」條。
【肥皂仁】即肥皂莢之處方用名。詳「肥皂莢」條。
製法 凡使去硬殼及黃膜。用否則傷胃氣。
性質 甘。腥。溫。無毒。
主治 除風氣。治大腸虛秘。
【肥皂莢】 命名 本品形似皂。處方用名 肥皂核。肥皂仁。
外國名詞 Acaciae Conci-nnae Pulpa (Gleditschia Sinensis.) (Chinese Soap Balls.) (拉丁) ヒサウケノ(日本)
基本 屬豆科。為肥皂之子莢。形態 肥皂為喬木類之植物。幹高大。葉似檉。夏開白花。結莢長三四寸。肥厚多肉。內有黑子數粒。大如指頭。甚堅。中有白仁。莢與子實俱可供藥用。
採取 九十月間。採之陰乾。

製法 凡使莢。去皮及弦子。取淨肉。使子去硬殼及黃膜。取仁炒研用。否則傷腎氣。

用法 恒以剉研或生搗和藥。性質 辛溫。微毒。

效能 瀉熱毒。治疥癬。專作外科瘡癤藥。

主治 去風溼下痢。便血。瘡癬。腫毒。

歷代記述攷證 【明】經希雅

本草經疏論肥皂莢曰。味辛氣溫。有毒。凡腸胃有垢膩。穢惡之氣。鬱於中。則外生癩癧。惡瘡。腫毒。泄於外。則為腸風。下痢。膿血。此藥專能盪滌垢膩。宜通穢積。腸胃潔淨。則諸證自除也。【清】黃宮繡本草求真論肥皂莢曰。肥皂莢生於六陽之盛。成於秋金之月。氣味平溫。有發。不滅。皂莢。臭刺之性。凡因腸胃素有垢膩。穢惡。發於外。則為癩癧。惡瘡。腫毒。泄於下。則為腸風。下痢。膿血。俱可用此以除。以其力能滌垢除膩。潔淨腑故也。是以癩癧。疥癬。丹。用此滌發。不使穢性留於腸胃。療癩用此去核。加藥為丸。以追其毒。且能潔身洗血。及療無名

腫毒。其子亦治大腸風秘。及頭面。癩瘡有效。但其仁須炒研為用。庶於腎氣不傷。

配合應用 ①治腸風下血。獨子肥皂。燒存性。一片為末。糊丸。米飲下。(普濟方)

②治下痢禁口。肥皂莢一枚。以鹽質其內。燒存性。為末。以少許入白米粥內。食之。即效。(乾坤生意方)

③治風虛牙腫。老人腎虛。或因涼藥擦牙致痛。用獨子肥皂。以青鹽質之。燒存性。研末。搽之。或入生樟腦十五文。(衛生家寶方)

④治頭耳諸瘡。眉鬚燕窩瘡。並用肥皂。煨存性。一錢。枯礬一分。研勻。香油調塗之。(摘玄方)

⑤治小兒頭瘡。因傷湯水成膿。出水不止。用肥皂。燒存性。入膩粉。麻油調搽。(海上方)

⑥治癩癧頭瘡。不拘大人小兒。用獨核肥皂。去核。填入沙糖。入巴豆二枚。扎定。鹽泥包煨。存性。入核椰粉。粉五七分。研勻。香油調搽。先以灰汁洗過。溫水再洗。拭乾。乃搽。一宿見效。不須再洗。(普濟方)

⑦治癩瘡不愈。以川槿皮煎湯。用肥皂去核及內膜。浸湯。時時搽之。(楊起簡便方)

⑧治便秘初起。肥皂搗爛。傅之。甚效。(楊起簡便方)

⑨治玉莖溼癢。肥皂一箇。燒存性。香油調搽。即愈。(攝生方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 肥皂莢生高山中。其樹高大。葉如椴及皂莢。葉五六片。開白花。結莢。長三四寸。狀如蠶寶之莢。而肥厚多肉。內有黑子數顆。大如指頭。不正圓。其色如漆。而甚堅。中有白仁。如粟。煨熱可食。亦可種之。十月採莢。煮熟。搗爛。和白酒。及諸香。作丸。浸身。面。去垢。而膩。潤。勝於皂莢也。相感志。旨。肥皂莢。水。死。金魚。辟。馬。蠅。鉄。見。之。則。不。就。亦。物。性。然。耳。(李時珍)

【肥松節】即松節之肥實者。

【肥知母】即知母之處方用名。詳「知母」條。

【肥珠子】即無患子之古籍別名。典見綱目。詳「無患子」條。

【肥藤】即甘藤之古籍別名。典見本草拾遺。詳「甘藤」條。

【肥蟻】即蟻之古籍別名。典見別錄。詳「蟻」條。

【肺砂】即珠砂之古籍別名。典見綱目。詳「珠砂」條。

【舍利別】即宜母果之蒙古名。詳「宜母果」條。

【舍利鹽】即海利鹽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「海利鹽」條。

【舍迦肉】即兔肉之古籍別名。典見梵書。詳「兔肉」條。

【花石華】即紫石華之古籍別名。典見別錄。詳「紫石華」條。

【芙蓉】原名 木芙蓉。處方用名 芙蓉花。古籍別名 地芙蓉。(圖經)木蓮。華木。椴皮樹。椴木。拒霜。(綱目)

外國名詞 Hibiscus mutabilis, L. (拉丁) フヨウ モクフヨウ キハチス(日本)

基本 係錦葵科。木樺屬。形態 芙蓉為落葉灌木。高丈許。葉作心臟形。掌狀。淺裂。五枝或七枝。柄長五生。其在寒地者。年年枯萎。自宿根叢生。高僅三四尺。秋冬之際。梢端開花。花大有長柄。生於葉腋。色有紅黃白數種。頗美麗。

八畫 芙 芝 芡

或單瓣。或複瓣。雄蕊甚多。雌蕊一
枚。柱頭五裂。果實爲蒴。種子有纖
毛。易飛散。

採取 霜降前後。採花與葉。

製法 凡採得陰乾入藥。

性質 微辛。平。無毒。

效能 清血熱。消腫毒。專作瘡
瘍消腫解毒藥。

主治 清肺涼血。散熱解毒。治
一切大小癰疽。腫毒。惡瘡。消腫。排
膿。止痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論芙蓉曰。芙蓉花并葉
氣平而不寒不熱。味微辛而性滑
澀黏。其治癰腫之功。殊有神效。近
時瘍醫。祕其名爲清涼膏。清露散。
鐵箍散。皆此物也。其方治一切癰
疽發背。乳癰。惡瘡。不拘已成未成。
已穿未穿。並用芙蓉葉或根皮或
花。或生研或乾研末。以蜜調塗於
腫處。四圍中間留頭。乾則類換。初
起者即覺清涼。痛止腫消。已成者
即膿聚毒出。已穿者即膿出易斂。
妙不可言。或加生赤小豆末尤妙。
【清】黃宮繡本草求真論芙蓉花
曰。芙蓉花爲外科癰疽藥也。凡清

涼膏。清露散。鐵箍散。卽是此物。蓋
此味辛氣平質滑。功專清肺涼血。
散熱止痛。消腫排膿。凡一切癰疽
腫毒。無論花葉及根。皆可搗研爲
末。調蜜塗四圍。留中患處。乾則類
換。初起者即覺清涼。痛止腫消。已
成者即膿出。已潰者即易斂。或加
赤小豆荳耳子同入爲末。功效殊
見。然必毒輕不重。用此方可。若大
毒陰毒。其勢莫遏。則非輕小平劑
所能治矣。此又不可不知也。

配合應用 ●治經血不止。拒
霜花。蓮蓬殼。等分爲末。每用米飲
下二錢。(婦人良方)

●治杖瘡腫痛。芙蓉花葉研末。
入皂角末少許。雞子清調勻塗之。
(方廣附錄方)

●治湯火灼瘡。油調芙蓉末敷
之。(奇效方)

●灸瘡不愈。芙蓉花研末敷之。
(奇效方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡非實熱者禁用。
參攷資料 ●此花類如荷花。
故有芙蓉木蓮之名。八九月始開。
故名拒霜。俗呼爲柃皮樹。相如賦

謂之華木。注云。皮可爲索也。蘇東
坡詩云。呼作拒霜猶未稱。看來却
是最宜霜。蘇頌圖經本草有地芙
蓉。云出鼎州。九月採葉。治瘡腫。蓋
卽此物也。(李時珍) ●木芙蓉處
處有之。括條卽生小木也。其幹叢
生如荊。高者丈許。其葉大如桐。有
五尖及七尖者。冬凋夏茂。秋半始
着花。花類牡丹芍藥。有紅者白者。
黃者千葉者。最耐寒而不落。不結
實。山人取其皮爲索。川廣有添色
拒霜花。初開白色。次日稍紅。又明
日則深紅。先後相間如斂色。霜時
採花。霜後採葉。陰乾入藥。(李時
珍)

【芙蓉花】卽芙蓉之花。處方用名。
詳「芙蓉」條。

【芙蓉砂】卽砂之古籍別名。典
見雷公炮炙論。詳「砂」條。

【芙蓉】卽蓮花之古籍別名。典見
古今注。見「蓮花」條。

【山桐子】卽山桐子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「山桐子」條。

【紫草】卽紫草之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「紫草」條。

【芝麻油】卽胡麻油之古籍別名。

七三六

典見和漢藥考。詳「胡麻油」條。
【芝麻蟲】 命名 本品係生芝
麻梗中之蟲。故名

形態 芝麻蟲爲昆蟲。孵化類
之一種。形如蠶。色綠。三更輒從下
而上。至頂食盡。五更乃下。可供藥
用。

採取 須於夜間採之。
性質 熱。
主治 去痔管。焙研水服。助腸
入韓箔川。

【芝苗香】卽沈香之別名。詳「沈
香」條。
【芝麻】卽胡麻之處方用名。詳「
胡麻」條。

【芝蘭】卽珠蘭之別名。詳「珠蘭」
條。
【灰子】卽灰質之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「灰質」條。

【灰粉】 命名 本品係以灰質
搗澄之粉。故名。
主治 益精氣。強智力。聾耳目。
固精添髓。

【灰質】 命名 其苞形類雞臘
頭。故有雞頭臘頭諸名。
處方用名 南灰質。大灰質。李

灰質。炒灰質。

古籍別名 雞頭。(本經)雁頭。

雁頭。(古今注)鴻頭。(韓退之)雞

瘡。(莊子)卵蕒。(管子)鴛子。水流

黃。茨子。莠。莠弟。鴛頭。吳雞。鴛頭。

雁。雁。雁。雁。雁。雁。雁。雁。雁。雁。

雞足。雞頭。雞頭。雞頭。雞頭。雞頭。

兒。雞頭。菜。茨。雞。雁。雁。雁。雁。雁。


居塞道。(和漢藥考)

外國名詞 Euryale forox,

Scitish.

基本 屬睡蓮科。為灰之種子。

產地 凡池澤水中處處有之。



灰 質

形態 灰為生於暖地池沼之

水草。葉頗大。直徑自五六寸至二

三尺不等。上浮水面。葉面色深綠。

有光澤。背帶紫色。有皺紋。葉脈凸

起。密生軟刺。莖有孔有刺。夏月莖

抽水。上頂端開四層之四瓣花。作

深紫色。日中盛開。日沒即萎縮。果

八 薑 芡

實狀如烏喙。大一寸許。迨既成熟。

則為三寸許之球實。果肉中包藏

種子。少則八粒。多者二十。為圓形

之種子。與無患子相似。外皮呈淡

黑色。乾則變灰白色。中有仁。

採取 三四月間。採取嫩莖。可

充蔬茹。即所謂葎菜是也。七八月

間採實。曬乾。

製法 孟詵曰。凡用蒸熟。烈日

曬裂。取仁。亦可奪取粉用。李時珍

曰。新者養食良。入澀精藥。速殼用

亦可。按陳彥和暇日記云。灰質一

斗。以防風四兩。煎湯過用。且經

久不壞。

性質 甘。平。滑。無毒。

效能 補脾治帶濁。益腎療遺

精。為強壯滋養藥。

主治 溼痺腰脊膝痛。補中除

暴疾。益精氣。強志。令耳目聰明。久

服輕身不饑。耐老神仙。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論灰質曰。開胃助氣。【明】

李時珍本草綱目論灰質曰。止渴

益腎。治小便不禁。遺精白濁。帶下

【明】羅希雍本草經疏論灰質曰。

雞頭質。味甘氣平無毒。入足太陰

少陰。補脾胃固精氣之藥也。脾主

四肢。足居於下。多為溼所浸。以致

腰脊膝痛。而成痺。脾氣得補。則溼

自不容留。前證皆除矣。脾主中州。

益脾故能補中。腎藏精與志。入腎

故主益精強志。暴病多屬火。得水

土之陰者。能抑火。故主除暴疾也。

精氣足。脾胃健。則久服能耳目聰

明。輕身不饑。耐老神仙。所自來矣。

【清】徐洄溪本草經百種錄論灰

質曰。雞頭質生於水中。而其質甘

淡。得土之正味。乃脾腎之藥也。脾

惡溼而腎惡燥。雞頭質雖生於水

中。而淡滲甘香。則不傷於溼。質黏

味滑。而又滑澤肥潤。則不傷於燥。

凡脾腎之藥。往往相反。而此則相

成。故尤足貴也。【清】黃宮繡本草

求真論灰質曰。灰質如何補脾。以

其味甘之故。灰質如何固腎。以其

味滑之故。惟其味甘補脾。故能利

溼。而泄瀉腹痛。可治。惟其味滑固

腎。故能閉氣。而使遺帶小便不禁。

皆愈。功與山藥相似。然山藥之陰

本有過於灰質。而灰質之滑。更有

勝於山藥。且山藥兼補脾陰。而灰

質則止於脾腎。而不及於肺。用或

竊熱搗粉。或連殼同服。【清】王士

雄隨息居飲食譜論灰質曰。灰質

(一名雞頭)甘平補氣。益腎固精

耐肌渴。治二便不禁。強腰膝。止崩

淋帶濁。必蒸極熱。枚齒細咀。使

津液流通。始為得法。鮮者鹽水帶

殼煮而對食亦良。乾者可為粉作

餅。養弱代糧。亦入藥劑。惟能滯氣

多食難消。禁忌與蓮子同。其壅礙

時可茹。能清虛熱。根可煮食。陸遊

濟飢。葉一張(須國圖者)煎湯服

治胞衣不下。

配合應用 ●君山藥、白茯苓、

白朮、人參、蓮肉、薏苡仁、白扁豆為

補脾胃要藥。

●雞頭粥法。用雞頭質三合。煮

熟去殼。粳米一合。煮粥。日日空心

食。能益精氣。強志。利耳目。(經

驗方)

●四精丸。治思慮色欲過度。損

傷精氣。小便數。遺精。用秋石、白茯

苓、灰質、蓮肉、各二兩為末。蒸棗和

丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯

送下。(永類鈴方)

●分清丸治濁病。用灰質粉、茯

苓粉、黃蠟、化蜜和丸。梧子大。每服

八 薑 芡 苳 芥

百丸。鹽湯下。(摘玄方) 用鹽 一錢至二錢。 應用宜忌 大小便不利者禁用。

著名方劑 水陸二仙丹。治精關不固。夢遺滑精。補下益人。芡實金櫻子。右以芡實子搗爛。曬乾。再搗篩末。以金櫻煎膏和丸。

參攷資料 芡實必蒸。極熟。枝嚼細。噴使津液流通。始為得法。(王孟英) 按孫升談固云。芡本不益人。而俗謂之水流黃。何也。蓋人之食芡。必咀嚼之。終日咀嚼而味甘平。脾而不脫。食之者能使華液流通。轉相灌溉。其功勝於乳石也。淮南子云。狸頭愈癩。雞頭已癩。註者云。即芡實也。(李時珍)

【芡實根莖】

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 小腹結氣痛。麥食之。

【芡實粉粥】

主治 固精氣。明耳目。

【芡實鹽】 即芡實之古籍別名。與見和漢藥考。詳「芡實」條。

【芡苳】 即車前草之古籍別名。與見別錄。詳「車前草」條。

【芡菜】 即薺之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「薺」條。

【苳】 即葱白之古籍別名。典見綱目。詳「葱白」條。

【芥】

古稱別名 梨葉。(別錄) 刺芥。(綱目)

外國名詞 Brassica oleracea, Thunb. (拉丁)

形態 芥為雜草類之一種。其葉狀似大青。可供藥用。



芥

性質 苦。寒。無毒。

主治 消渴。止血。除痺。婦人痰疾。

【芥子】

原名 芥。 命名 芥者。界也。發汗散氣。界我者也。又其氣味辛烈。菜中之介然者。食之有剛介之象。故字從介。而名曰芥。藥用其子。遂謂芥子。非白芥之子也。

處方用名 辣芥子。 古稱別名 萹南芥。夏芥。芥藍。

芥醬。夏薺。蘆菜。辛芳。辛菜。小芥子。花芥子。紫芥子。家芥子。(和漢藥考)

外國名詞 Semen sinapis. (拉丁) Mustard seeds. (英) Sansamon. (德)

基本 屬十字科。芥菜之種子。

形態 芥菜為一年或越年生。草本。初夏莖高達四五尺。葉互生。似油菜而小。鋸齒甚細。皺紋甚多。葉腋開黃色花。作總狀花序排列。花後結長角質。本品略作球圓形。大一·五密米。帶黃褐色。或暗褐色。用擴大鏡觀之。見有極細小之凹窩。子葉帶黃綠色。作鞍狀重疊。 性質 辛熱。無毒。

成分 芥子中除脂肪油外。含有「密倫酸加里」Myronats of Potash。『密洛辛』Myrosin。此

密倫酸加里。受密洛辛之酸醇作用。化生芥子油 C₁₅H₂₅SN(C₉H₇IS + KNO₃S = C₁₅H₂₅SN + CaH₂O₆ + KHSO₄)。芥子油 Mustard oil 為無色或淡黃色之液體。日久者則變黃褐色。比重 1.01 至 1.02。稍溶於水。逢酒精。硫化炭

等。善能溶解。沸點一百四十八度至一百五十度。氣味俱辛辣劇烈。效能 治肺寒咳嗽。消腫脹。瘰癧。專作引赤發泡藥。或作催進消化藥。

主治 歸鼻。去一切邪惡。疰氣。喉痺。

歷代記述攷圖

【唐】蘇恭新修本草論芥子曰。疰氣發無常處。及射工。洋丸服之。或搗末醋和塗之。隨手有驗。【唐】孟詵食療本草論芥子曰。研末作餅食。香美。通利五臟。【宋】日華諸家本草論芥子曰。治風毒腫。及麻痺。醋研傳之。撲損瘀血。腰痛。腎冷。和生薑。研塗貼之。又治心痛。酒調服之。【宋】吳瑞日用本草論芥子曰。研末水調。塗頂額。止衄血。【明】李時珍本草綱目論芥子曰。溫中散寒。豁痰利氣。治胃寒吐食。肺寒咳嗽。風冷氣痛。口噤唇緊。消散腫脹瘰癧。 國外學說 日本學說謂專用為引赤藥。又於消化機愈慢。香排等用之。其主治用。據日本藥局方云。為皮膚刺戟劑。於水倒。瘰癧。瘰癧。斯性病。胃痛。急性氣管枝

加管兒等之咳嗽發作。喘息等。爲芥子泥。外用之。(芥子泥者。新鮮芥子末。和適宜之微溫湯。塗於布片貼之。)於脚浴或手浴。投芥子末五〇、〇至一〇〇、〇。於全身浴。投一五〇、〇至二五〇、〇。英美學說謂芥末係以黑白二種芥子研成之。產於中國等處。而西國等處亦產之。分黑白二種。黑色者有油。白色者則否。藥品中所用之芥末須用黑白各半研末者佳。此二種在藥品中用之已久。在古時希臘人亦知用此二種入藥品。至歐羅巴所產之黑白二種。其性情大同小異。芥末既爲藥品中之要物。又可合於各種肉菜食之。尋常出售之芥末。內含異質。因黑芥子之味過辣。須多和白芥子以磨粉。成末後須加麵粉。鹽。金花椒。乾薑等物。其味始能適口。然藥品中所用之芥末。必淨芥末方合用。芥末之功用。能作吐劑。行氣。又能引痰。如外敷皮膚。能發紅熱而起水泡。功能引痰。其用法。用芥末粥渣各半。和勻敷之。其用法。用麥糠八兩。甘菊花一錢。先以沸

八 薑 芥

水攪勻。鋪在布上。後以清水開調。芥末加上。然後外敷。約一刻鐘時。即發痛異常。宜撤去。隨洗淨。而塗以清油。此二法不宜久敷。敷久則能作水泡及爛肉。至婦女皮膚較薄。亦宜慎用。其用法。用芥末雞蛋清調爲濃漿敷之。此法在小兒。亦可用。綠芥末而與雞蛋清相調。便不患其酷烈。如牙痛宜敷頰部。喉症宜敷心口。關節作疼。骨絞發腫。及惡走風脚症。宜敷患處。又如臟腑內若發炎。須按定其部位敷之。又如肚疼。心痛。及風溼骨疼。外敷亦甚有驗。又如頭上或作痛。或發炎。及癩狂等症。宜敷脚心。又如傷風頭刺。及惡風溼等症。用芥末調水浸足。亦頗獲效。芥末之色黃。味苦而辣。如用法以榨去其油。則其苦辣略減。芥末爲吐藥。行氣藥。又爲引痰藥。如將芥末一小匙。至一大匙。合於水半斤服之。則爲有效之吐藥。此藥有大群性。又如將白芥子不研末而服之。則其膠形之皮質。在胃中消化至盡。可得芥末之行氣性。又如泡之飲其水。能利小便。又如誤服鴉片。用此藥救

之頗效。外用能大行氣。令皮膚發紅而熱。運血。故常用此質爲芥末外敷膏。芥末四錢。牛奶半斤。同煮服。能調胃。每服一茶杯。每日服三四次。(芥末牛奶方)又方。芥末二錢一分。沸水四兩。泡半點鐘。過濾紙爲度。每服一兩。治噎氣甚效。(芥末泡水平)作吐劑。每服一錢至二錢。溫水送下。能解鴉片等毒。胃不消化。每服三分。每日服三次。配合應用 ①治感寒無汗。水調芥子末。填臍內。以熱物隔衣熨之。取汗出妙。(楊起簡便單方) ②治身體麻木。芥菜子末。醋調塗之。(濟生秘覽方) ③治中風口噤。舌本縮者。用芥菜子一升。研入醋二升。煎一升。傳頰頰下效。(聖惠方) ④治小兒唇緊。用馬芥子搗汁。曝濃。搗破類塗之。(崔氏要方) ⑤治喉痺腫痛。芥子末水和傅喉下。乾即易之。又用辣芥子研末。醋調取汁。點入喉內。待喉內鳴。却用陳麻骨燒烟吸入立愈。(聖惠方)

⑥治耳卒聾閉。芥菜子末。人乳汁和。以綿裹蒸之。(外臺秘要方) ⑦治雀目不見。真紫芥菜子。炒黑爲末。用羊肝一具。分作八服。每用芥末三錢。捻肝上。筍縛蒸定。煮熱冷食。以汁送下。(聖濟總錄方) ⑧治目中翳膜。芥子一粒。輕手投入眼中。少頃。以井華水雞子清洗之。(聖濟總錄方) ⑨治眉毛不生。芥菜子。半夏。等分爲末。生薑自然汁調搽。數次即生。(孫氏集效方) ⑩治鬼疰勞氣。芥子三升。研末。絹袋盛入三斗酒中。七日溫服。一日三次。(廣濟方) ⑪治霍亂吐瀉。芥子搗細。水和傅臍上。(聖濟總錄方) ⑫治反胃吐食。芥子末。酒服方寸匕。日三服。(千金方) ⑬治上氣嘔吐。芥子末。蜜丸。梧子大。井華水。實時下七丸。申時再服。亦治臍下絞痛。(千金方) ⑭治腰脊脹痛。芥子末調酒貼之立效。(摘玄方) ⑮治走注風毒作痛。用小芥子末。和雞子白塗之。(聖惠方) ⑯治一切癰腫。豬膽汁和芥子

七 三 九

八畫 芥

末貼之。日三上。猪脂亦可。(千金方)

①治癰腫熱毒。家芥子研末。同柏葉搗塗。無不愈者。得山芥更妙。(千金方)

②治熱毒瘰癧。小芥子末醋和貼之。看消即止。恐損肉。(肘後方)

③治五種瘰癧。芥子末。以水蜜和。乾即易之。(廣濟方)

④治射工中人。有瘡。用芥子末和酒厚塗之。半日痛即止。(千金方)

⑤治婦人經閉不行。至一年者。臍腹痛。腰腿沉重。寒熱往來。用芥子二兩。為末。每服二錢。熱酒食前服。(仁存方)

⑥治陰證傷寒。腹痛厥逆。芥菜子研末。水調貼臍上。(生生編方)

用量 八分至二錢。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。參攷資料 芥子功與菜同。其味辛。其氣散。故能利九竅。通經絡。治口噤耳聾鼻衄之證。消瘀血。癰腫痛痺之邪。其性熱而溫中。故又能利氣豁痰。治嗽止吐。主心腹諸痛。(李時珍) 芥子多食。昏目。

動火。泄氣傷精。(李時珍)

【芥子殼】即罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「罌粟殼」條。

【芥子薊】即苦菜之日本名。詳「苦菜」條。

【芥心草】形態 芥心草為雜草類之一種。引蔓白色。根黃色。其莖葉俱可供藥用。採取 四月採之。

主治 瘰癧疥。搗末用。

【芥苳】即雞蘇之古籍別名。典見別錄。詳「雞蘇」條。

【芥菜】基本 屬十字科。為芥菜之莖葉。性質 辛溫無毒。

主治 歸鼻。除腎經邪氣。利九竅。明目。安中。久食溫中。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論芥菜曰。主咳逆下氣。去頭面風。【宋】日華諸家本草論芥菜曰。止咳嗽上氣。除冷氣。【明】李時珍本草綱目論芥菜曰。通肺豁痰。利膈開胃。

參攷資料 芥性辛熱而散。故能通肺開胃。利氣豁痰。久食則積溫成熱。辛散火盛。耗人真元。肝

七四〇

木受病。昏人眼目。發人瘡癤。而別錄謂其能明目者。蓋知暫時之快。而不知積久之害也。素問云。辛走氣。氣病無多食辛。多則肉脆而昏。此類是矣。陸佃云。望梅生津。食芥隨涎。五液之自外至也。蕞而涎垂。媿而汗出。五液之自內生也。(李時珍) ① 養食動氣與風。生食發丹石。不可多食。大葉者良。細葉有毛者害人。(孟詵) ② 有瘡疥痔疾。便血者。忌之。(寧原) ③ 同兔肉食成惡邪病。同鱈魚食則發水腫。(孫思邈) ④ 芥似菘而有毛。味辣。可生食。及作芥。其子可以藏冬瓜。又有莢。音耶。作菘甚辣。(陶弘景) ⑤ 芥有三種。葉大子麤者。葉可食。子入藥用。葉小子細者。葉不堪食。子但作齏。又有白芥子。粗大。白色如白粳米。甚辛美。從西戎來。(蘇恭) ⑥ 芥處處有之。有青芥似菘。有毛。味極辣。紫芥莖葉純紫。可愛。作齏最美。有白芥。見本條。其餘南芥。旋芥。花芥。石芥之類。皆菜茹之美者。不能悉錄。大抵南土多芥。相傳嶺南無蕞。有人播種至彼。種之。皆變作芥。地氣使然耳。(蘇頌)

【芥菜粥】

主治 豁痰辟惡。基本 本品係醃芥菜中之清汁。

製法 以芥漬貯甕中。埋行人處。三五年取用。性質 鹹涼無毒。

主治 肺癰喘脹。緩緩呷之。清

熱下痰定嗽。

【芥菴】即雞蘇之古籍別名。典見別錄。詳「雞蘇」條。

【芥辣子】即白芥子之處方用名。詳「白芥子」條。

【芥藍】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【芥醬】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【芥】即椶實之別名。詳「椶實」條。

【芥栗】即栗之實小如指頂者之別名。詳「栗」條。

【菰】即草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳「草烏頭」條。

【菰】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。

【芥菴】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【芥雞舌草】即鴉片草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鴉片草」條。

【芫花】
處方用名 陳芫花
古醫別名 去水（本

經）杜芫。毒魚。蜀桑。（別錄）赤芫。兇草。敗華。根名黃大戟。（吳普本

草）頭痛花（綱目）杜杭。老風花。黃芫花。備身毒（和漢藥考）

外國名詞 Daphne Genkwa, S. of N.

基本 屬瑞香科。為芫花之花

產地 別錄曰。芫花生淮源川谷。吳普曰。芫根生邯鄲。山海經云。首山其草多芫也。

形體 芫花係落葉灌木。高可三四尺。葉形橢圓。邊緣密生細毛。兩兩對生。春日在生葉之先。開青紫色之合瓣花。尖端分裂而成四瓣。每柄叢生。作長穗狀。然有毒性。試投葉與根（根名蜀桑。又名黃大戟）於魚池中。魚盡死。故有魚毒之名。



芫花

採取 三月採花。五月採葉。八月採根。陰乾。

製法 陶弘景曰。用當微熟。不可近眼。李時珍曰。芫花留數年。陳

久者良。用時以好醋煮十數沸。去醋。以水浸一宿。曬乾用。則毒滅也。或以醋炒者次之。

性質 辛溫。有小毒。

效能 大瀉五臟水飲。用作治

主治 咳逆上氣。喉鳴喘。咽腫。短氣。蟲毒。鬼瘡。疔癰。癰腫。殺蟲魚（本經）消胸中痰水。喜睡。水腫。五水在五臟皮膚。及腰痛。下寒。毒肉毒根。療疥瘡。可用毒魚（別錄）

張仲景之發明 芫花一味。經張仲景實驗。認為主逐水也。勞治咳。喘。痛。茲考徵如下。十棗湯證曰。引脇下痛。又曰。咳。張仲景氏用芫花。莫過於十棗湯也。試服芫花一味。必大瀉水。則其逐水也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論芫花曰。治心腹脹滿。去水氣。寒痰。涕唾。如膠。通利血脈。治惡瘡。風痺。濕。一切毒風。四肢痲急。不能行步。【宋】大明日華諸家本草論芫花曰。療咳嗽。瘵瘵。【明】李時珍本草綱目論芫花曰。治水飲痰。疝。腸下痛。【清】黃宮繡本草求真論芫花曰。芫花味辛而苦。氣溫

有毒。亦反甘草。主治願與大戟甘遂。皆能逐水。飲竄。竄。隱。僻。之。處。然此味苦而辛。苦則內泄。辛則外搜。故凡水腫。痰癰。皮膚脹滿。喘急。痛引胸脇。咳嗽。腹癰。裏外水閉。危迫殆甚者。用此。逐性至緊。無不立應。不似甘遂苦寒。止泄。經。隨。水。溼。大戟苦寒。止泄。隨。水。溼。藥。花。與。此。氣。味。雖。屬。相。同。而。性。較。此。多。寒。之。有。異。耳。此。雖。取。效。甚。捷。誤。用。多。致。天。折。不。可。不。慎。根。名。蜀。桑。止。可。敷。瘡。毒。魚。及。搗。汁。浸。線。繫。落。瘡。瘡。他。不。宜。用。葉。似。柳。花。紫。碧。色。葉。生。花。落。陳。久。者。良。隨。煮。過。水。浸。瀝。用。

近人學說 張山雷曰。芫花氣味。本經雖稱辛溫。然所主諸病。皆溼熱痰水為虐。功用專在破潰積水。而非可以治脾胃虛寒之水腫。則辛雖能散。必非溫燥之藥。故別錄改作微溫。據吳普謂神農黃帝有毒。扁鵲岐伯苦。李氏大寒云云。似以李氏當之之說為允。本經主咳逆上氣。喉鳴。及喘。而短氣。皆水飲停積上焦。氣壅逆行。閉塞不降之症。咽腫。亦熱毒實痰。壅滯清竅。此等苦泄攻通。猛將。均為溼熱實

八畫 芥 芫 芩 苳 芫

閉。斬關奪門。衝鋒陷陣。一擊必中之利器。非為虛人設法可知。蠱毒乃南方溼熱毒蟲。入人腸胃。非滲瀉直泄不治。故古人用藥。無一非猛烈急下之物。鬼瘡蓋指山嵐瘴毒。惡屬之氣。無端感觸。飄忽中人有似鬼祟。故有是名。此乃古人神道設教之時。假託鬼物而言。究竟非真有物惡之。實即古之所謂瘴瘴。故治宜瀉導熱毒。亦非其他諸瘴之所可混投者也。疝瘕亦指溼熱蘊結之一症。不可以概一切之疝氣。瘕聚。癰腫。則固專指陽發實熱之癰患矣。別錄謂消痰水。水腫及五種水氣之在五臟者。固皆以實症立論。仍是本經之義。喜睡乃飲積胸中。水氣上溢。而口多涎沫耳。皮膚腰痛。亦指水氣泛溢之一症。惟寒毒二字。富有說誤。此乃寒瀉之藥。非其所主。豈淺者以本經氣味。有溫之一說。而姑妄言之耶。總之名醫別錄。雖集成於貞白居士之手。然六朝以降。傳寫屢經。亦難保無妄人隱雜之句。是當衡之以理。而必不可一味盲從者。肉毒是肉食之毒。食物得毒。固必泄之

而毒始解。根療疥瘡。即本經之治癰腫矣。

配合應用 ①治卒得咳嗽。芫花一升。水三升。煮汁一升。以漿十枚。煮汁乾。日食五枚。必愈。(肘後方)

②治卒嗽有痰。芫花一兩。炒。水一升。煮四沸。去渣。白糖入半斤。每服漿許。勿食酸鹹物。(張文仲備急方)

③治喘嗽失音。暴傷寒冷。喘嗽失音。取芫花連根一虎口。切曝乾。令病人以薦自裹。令灰飛揚入其七孔中。當眼淚出口。鼻皆辣。待芫根盡乃止。病即愈。(古今錄驗方)

④治乾嘔脇痛。傷寒有時頭痛。心本痞滿。痛引兩脇。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。表解裏未和也。十棗湯主之。芫花熬甘遂。大戟各等分。為散。以大棗十枚。水一升。半煮取八合。去渣。枳殼。強人服一錢。羸人中錢。平且服之。當下利。病除。如不除。明旦更服。(傷寒方)

⑤治水腫支飲。及癖飲。用十棗湯加大黃甘草五物各一兩。大棗十枚。同煮如法服。一方加芒硝一

兩。(胡洽百病方)

⑥治天行煩亂。凝雪湯。治天行毒病。七八日。熱積胸中。煩亂欲死。則芫花一斤。水三升。煮取一升。半。漬故布薄胸上。不過再三薄。熱則除。(千金方)

⑦治久澀結癖。在腹脇堅痛者。芫花炒二兩。硃砂五錢。為末。蜜丸。梧子大。每服十丸。漿湯下。(直指方)

⑧治水蠱脹滿。芫花枳殼等分。以醋煮芫花至爛。乃下枳殼。煮爛。搗丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。(黃濟方)

⑨治酒疸尿黃發黃。心懊痛。足腫滿。芫花。椒目等分。燒末。水服半錢。日二服。(肘後方)

⑩治背腿間痛。一點痛不可忍。者。芫花根末。米醋調傅之。如不住。以帛束之。婦人產後有此者。尤宜。(袖珍方)

⑪治諸般氣痛。用芫花醋煮中兩。玄胡索炒一兩。半為末。每服一錢。男子元臟痛。葱酒下。瘧疾。烏梅湯下。婦人血氣痛。當歸酒下。諸氣痛。香附湯下。小腸氣痛。茴香湯下。

(仁存方)

⑫治鬼胎癡癢。經候不通。芫花根三兩。剉炒黃為末。每服一錢。桃仁煎湯調下。當利惡物而愈。(聖惠方)

⑬催生去胎。芫花根剝去皮。以綿裹點腐香。套入陰穴三寸。即下。(攝生方)

⑭治產後惡物不下。芫花。當歸等分。炒為末。調一錢服。(保命集方)

⑮治心痛有蟲。芫花一兩。醋炒。雄黃一錢。為末。每服一字。溫醋湯下。(乾坤生意方)

⑯治牙痛難忍。諸藥不效。芫花末。擦之。令熱。俟痛定。以溫水漱之。(永類鈴方)

⑰治白禿頭瘡。芫花末。豬脂和傅之。(集效方)

⑱治癰腫初起。芫花末。和膠漆之。(千金方)

⑲治癰腫已潰。芫花根皮。搗作餅。插入則不生。令膿易竭也。(集簡方)

⑳治痔瘡乳核。芫根一握。洗淨。入木臼搗爛。入少水。絞汁於石器

中。慢火煎成膏。將絲線於膏內度過。以線繫痔。當微痛。候痔乾落。以紙燃藥膏。納竅內。去根。當永除根也。一方只搗汁浸線一夜用。不得使水。(經驗方)

⑤ 治瘰癧初起。氣壯人用芫根搗水一盞服。大吐利即平。(集簡方)

⑥ 治便毒初起。芫根搗水服。以漬傅之。得下即消。(集簡方)

⑦ 治贅瘤焦法。甘草煎膏。筆粧瘤之四圍。上三次。乃用芫花。大戟。甘遂等分。爲末。醋調。別以筆粧其中。勿近甘草。次日縮小。又以甘草膏粧小。第三次。如前。仍上此藥。自然縮。(危氏得效方)

⑧ 一切菌毒。因蛇蟲毒氣蒸蒸所致。用芫花生研。新汲水服一錢。以利爲度。(危氏得效方)

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者及孕婦禁用。反甘草。決明爲之使。

參攷資料 ① 芫或作栲。其義未詳。去水言其功。毒魚言其性。大戟言其似也。俗人因其氣惡。呼爲頭痛花。山海經云。首山其草多芫。

八畫 芫 芭

是也。(李時珍) ① 芫根生部鄂。二月生葉。青色。加厚則黑。華有紫赤白者。三月實落。莖葉乃生。三月採花。五月採葉。八月九月採根。陰乾。(吳普) ② 芫花近道處處有之。苗高二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發紫碧。葉未生時。收採日乾。葉生花落。即不堪用也。(韓保昇) ③ 芫花在處有之。宿根舊枝。莖紫長一二尺。根入土深三五寸。白色似榆根。春生苗葉小而尖。似楊柳枝葉。二月開紫花。頗似紫荊而作穗。又似藤花而細。今絳州出者花黃。謂之黃芫花。(蘇頌) ④ 顧野王玉篇云。芫木出豫章。煎汁藏果及卵。不壞。洪邁容齋隨筆云。今饒州處處有之。莖幹不純是木。小人爭鬪者。取葉擦擦皮膚。輒作赤腫如被傷。以誣人。至和鹽擦則。則又染其外若赭色也。(李時珍) ⑤ 芫花內搜腸胃。外達毛孔。又曰。與大戟彷彿。以致其用。但苦寒辛溫。不惟上下區別。即恐決逐與開散。似猶未可一視。直指方云。破癖須用芫花行水。行後便養胃可也。(本草述)

【芫青】即青娘子之原名。詳「青娘子」條。

【芭】即白芭之古籍別名。典見綱目。詳「白芭」條。① 即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【芭芒】即芒之古籍別名。典見寶字志。詳「芒」條。

【芭苴】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【芭茅】即芒之古籍別名。典見綱目。詳「芒」條。

【芭蕉】原名 甘蕉。本品一葉舒則一葉焦。又俗謂乾物爲巴。巴亦蕉意。故名。

處方用名 芭蕉根。


古籍別名 甘蕉(別錄)天苴。(史記注)芭苴。天苴。板蕉。牙蕉。膠瓶蕉。無耳聞響。(和漢藥考)優曇華。(梵語)寶名香蕉。(綱目拾遺)

水蕉(喜佑本草圖經)

外國名詞 Musa, Baxjoo, (Sioo) (拉丁)

基本 屬芭蕉科芭蕉之根。

產地 閩廣四川及熱帶地方。



(一) 蕉 芭

形態 芭蕉爲多年生草。熱帶地方最爲繁殖。莖軟虛如芋莖。高至五六尺。葉作長橢圓形。長丈餘。闊一二尺。中肋兩側有並行脈。受風輒裂。花蕾類蓮華。呈黃白色。以長莖下垂。果實爲肉質。作五稜。熟時味類葡萄。可供食。每開花後。葉莖俱枯死。旁生小苗。根形似芋魁。類青色。



(二) 蕉 芭

用法 搗探生搗。取汁用。性質 甘大寒。無毒。效能 清胃火。解熱毒。用作水腫藥。

主治 癰腫疔熱。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草。論芭蕉根曰。搗爛傅腫去。

八畫 芭 苳 菱 花

七四四

熱毒。搗汁服。治產後血脹悶。【唐】孟詵食療本草論芭蕉根曰。主黃

之良。【直指方】
●治瘡口不合。芭蕉根取汁抹

煎。【宋】大明日華諸家本草論芭蕉根曰。治天行熱狂煩悶。消渴。患

用釐 一錢至錢半。
參攷資料 ●粵地溼熱。人多

瘴毒。并金石發動。燥熱口乾。並絞汁服之。又治頭風遊風。【清】趙學

染麻瘋。所居室。人不敢處。必種香

敏本草綱目拾遺論芭蕉曰。收麻

蕉木本結實者於院中。一二年後。

煎毒。【清】吳儀洛本草從新論芭蕉根曰。芭蕉根甘大寒。治一切腫

其毒盡入樹中乃敢居。兩廣雜志

毒。發背欲死。赤遊風。痧風。熱頭痛。產後血脹。消渴飲水。天行熱狂。血

第一。名龍奶奶者。乳也。言若龍之

淋瀝痛。

乳不可多得。然食之寒氣沁心。頗

配合應用 ●治發背欲死。芭蕉根搗爛塗之。亦治一切腫毒。赤

有邪甜之目。其葉有珠砂斑點。植

遊風。癆。風熱頭痛。【肘後方】

必以木夾之。否則結實時。風必吹

●治風蟲牙痛。芭蕉自然汁一椀。煎熱含嗽。【醫濟方】

折故又名折腰娘。凡蕉葉必三三

●治天行熱狂。芭蕉根搗汁飲之。【日華方】

開則三落。落不至地。但懸挂莖間。

●治消渴飲水。骨節煩熱。用生芭蕉根搗汁。時飲一二合。【聖惠方】

乾之可以作書。花出於心。每一心

●治血淋澀痛。芭蕉根。旱蓮草各等分。水煎服。日二。【聖惠方】

輒抽一莖。作花。開雷而坼。坼者如

●甘蕉本出廣州。今江東並有。根葉無異。惟子不堪食耳。【陶弘景】
●甘蕉出嶺南者。子大味甘。北間者。但有花無實。【蘇恭】
●蕉三年已上。即有花。自心中抽出一莖。止一花。全如蓮花。瓣亦相似。但色微黃綠。中心無葶。悉是花葉也。花頭常下垂。每一朵。自中夏開。直至中秋後方盡。凡三葉。開則三葉脫落也。【寇宗奭】
●芭蕉汁 採取 以竹筒插入芭蕉皮中。自然有汁流出。再取瓶盛之。
性質 甘冷無毒。
主治 頭風熱。止煩渴。及湯火傷。梳頭止女人髮落。令長而黑。
歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論芭蕉油曰。暗風。癩病。涎作。暈悶。欲倒者。飲之。取吐。頗有奇效。
【芭蕉花】 主治 心痛。痺。燒存性。研。鹽湯點服。
【芭蕉根】 即芭蕉之處方用名。詳【芭蕉】條。
【芭蕉葉】 主治 腫毒初發。研末。和生薑汁塗之。

【芭蕉實】 性質 甘。大寒。無毒。主治 生食。止渴。潤肺。蒸熟。酒製。吞取。仁。食。通血脈。填骨。髓。
歷代記述攷證 【明】吳瑞日用本草論芭蕉實曰。生食。破血。合金瘡。解酒毒。乾者。解肌熱。消煩渴。【明】李時珍本草綱目論芭蕉實曰。除小兒寒熱。壓丹石毒。
參攷資料 芭蕉實性冷不益人多食。助冷氣。【蘇恭】
【苳】 即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荔枝】條。
【菱草】 即黃香之古籍別名。典見別錄。詳【黃香】條。
【菱荷葉】 即荷葉之古籍別名。典見綱目。詳【荷葉】條。
【菱實】 即菱之原名。詳【菱】條。
【花方通】 即通草之處方用名。詳【通草】條。
【花木香】 即必栗香之古籍別名。典見綱目。詳【必栗香】條。
【花王】 即牡丹皮之古籍別名。典見綱目。詳【牡丹皮】條。
【花奴玉燕】 即木槿之古籍別名。典見綱目。詳【木槿】條。

【花交菜】即黃矮菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃矮菜』條。

【花地左味】即醋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『醋』條。

【花百合】即百合之處方用名。詳『百合』條。

【花乳石】即花蕊石之原名。詳『花蕊石』條。

【花芥子】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【花青】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【花珀】即琥珀之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『琥珀』條。

【花相】即牡丹皮之古籍別名。典見漢和藥考。詳『牡丹皮』條。

【花紅】即林檎之別名。詳『林檎』條。

【花香】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【花粉】即天花粉之簡稱。詳『天花粉』條。

【花草】即翹搖之別名。詳『翹搖』條。

【花梓】即梓之古籍別名。典見日用本草。詳『梓』條。

【花椒】原名 秦椒。本品始產於秦地之椒。故名。即今世俗所稱之花椒也。

處方用名 開口花椒。川花椒。古籍別名 秦椒（本經）大椒。（爾雅）檉（綱目）

外國名詞 Zanthoxylum piperitum DC. (拉丁) サンセウ ハジカミ (日本)

基本 屬芸香科。為山椒類。花椒之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產廣東北江英德清遠大灣陽山七拱青連等處。名花椒。

形態 花椒亦屬落葉喬木。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目亦不及蜀椒目之光黑。其餘一似蜀椒。惟味短實細耳。

採取 八九月採實。

用法 水煎內飲。或剉末外治。或和作丸散。

性質 辛。溫。有毒。

成分 含揮發油及脂肪等。

效驗 散寒燥溼。下氣。溫中有

能進食慾之效。用於慢性胃炎。此外又作殺菌止痛藥。

主治 除風邪氣。溫中。去寒痺。堅齒髮。明目。久服。輕身。好顏色。耐老。增年通神。（本經）療喉痺吐逆。疝瘕。去老血。產後餘疾。腹痛。出汗。利五臟。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論花椒曰。上氣咳嗽。久風溼痺。【唐】甄權藥性本草論花椒曰。治惡風。通身。四肢痠痺。口齒浮腫。搖動。女人月閉不通。產後惡血。崩。多年痢。療腹中冷痛。生毛髮。滅癩。【元】朱丹溪本草衍義補遺論花椒曰。能下腫溼氣。

配合應用 ●治膏痺尿多。其人飲少。用秦椒二分。出汗。瓜蒂二分。為末。水服。方寸匕。日三服。（傷寒類要方）

●治手足心腫。乃風也。椒鹽末等分。醋和。傅之。良。（肘後方）

●治損瘡中風。以麩作餅。包秦椒於灰中。燒之。令熱。斷開口。封於瘡上。冷即易之。（孟詵方）

●治久患口瘡。大椒去閉口者。水洗。麩并。煮作粥。空腹吞之。以飯

壓下。重者可再服。以達為度。（孟詵方）

●治牙齒風痛。秦椒煎醋含漱。（孟詵方）

●治百蟲入耳。椒末一錢。醋半盞。浸良久。少少滴入。自出。（續千金方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火旺者。禁用。惡苦寒。防癸。畏雌黃。

參攷資料 ●花椒生溫熱。有毒。（別錄）●秦椒生秦山山谷。及秦嶺上。或鄧州。八月九月採實。（別錄）●今從西來。形似椒而大。色黃黑。味亦頗有椒氣。或云即今櫻樹子。櫻乃楮椒。恐謬。（爾雅疏）

●今秦鳳明。越金商州。皆有之。初秋生花。秋末結實。九月十月採之。爾雅云。檉。大椒。郭璞注云。椒。叢生。實大者。為檉也。詩唐風云。椒聊之實。繁衍盈升。陸機疏。義云。椒樹似檉。實有針刺。葉堅而滑澤。味亦辛香。蜀人作茶。吳人作茗。皆以其葉合煮為香。今成皋諸山。有竹葉椒。其木亦如蜀椒。小毒熱。不中合藥。也可入飲食中。及蒸雞豚用。東海

八畫 花

八靈花

諸島上亦有椒。枝葉皆相似。子長而不圓。甚香。其味似橘皮。島上墜鹿食其葉。其肉自然作椒橘香。今南北所生一種椒。其實大於蜀椒。與陶氏及郭陸之說正相合。當以實大者為秦椒也。(蘇頌)此秦地所產者。故言秦椒。大率椒株皆相似。但秦椒葉差大。粒亦大。而紋低不著。蜀椒紋為高異也。然秦地亦有蜀椒種。(寇宗奭)秦椒。易善衍。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目亦不及蜀椒。目光黑也。范子計然云。蜀椒出武都。赤色者善。秦椒出隴西天水。粒細者善。蘇頌謂其秋初生花。莖不然也。(李時珍)

【花椒粥】

主治 辟瘴。禦寒。

【花蛤】即文蛤之古籍別名。典見綱目。詳「文蛤」條。

【花葉石相】即石蒜之古籍別名。典見閩志。詳「石蒜」條。

【花賊】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【花管草】即琉璃草之別名。詳「琉璃草」條。

【花蜘蛛】即蜘蛛之花者。詳「蜘蛛」條。

【花蔞蓉】即列當之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「列當」條。

【花蕊石】原名 花乳石。命名 本品出黃石中間。有淡白點似花狀。故名。

【花乳石】醫學大辭典曰。花乳石產天台寶華山之硫黃礦中。形體 花乳石體重。色如琥珀。有黃花點。登潤堅潔。形之大小方圓無定。可供刻印及藥用。

【製法】李時珍曰。凡入丸散。以罐固濟頂。火煨過。出火毒。細研。水飛。晒乾用。

【性質】酸。澀。平。無毒。

【效能】化痰。止血。

【主治】金瘡出血。刮末傳之。即合。仍不作膿。又療婦人血暈惡血。

【歷代記載攷證】「明」李時珍本草綱目論花蕊石曰。治一切失血傷損。內瀉。自腎「明」繆希雍本

草經疏論花蕊石曰。花乳石本經無氣味。詳其所主。應是酸辛溫之藥。其功專於止血。能使血化為水。婦人血暈。惡血上薄也。消化惡血。則身自止矣。以酸斂之氣。復能化瘀血。故傳金瘡即合。仍不作膿也。【清】黃宮繡本草求真論花蕊石曰。花蕊石雖產硫黃山中。號為性溫。然究味酸而澀。其氣亦平。故有化血之功耳。是以損傷諸血。胎產惡血。血暈。並子死腹中。胞衣不下。服之。體即疏通。瘀血俱化為黃水。金瘡血流。敷即合口。誠奇方也。但此原屬劫藥。下後止後。須以獨參湯救補。則得之矣。若使過服。則於肌血有損。不可不謹。以罐固濟。頂火煨過。出火毒。研細水飛。曬乾用。【清】黃元御玉楸藥解論花乳石曰。花乳石功專止血。治吐血。崩漏胎產。刀杖一切諸血。善療金瘡。合硫黃煨煉。敷之神效。亦磨遠年障腎。化瘀血。老癥。落死胎。胞衣。煨研水飛用。

【配合應用】花蕊石散。治五內崩損。噴血出斗升。用此治之。花蕊石煨存性。研如粉。以童子小便一

七四六

鍾。男入酒一半。女入醋一半。煎溫。食後調服三錢。甚者五錢。能使瘀血化為黃水。後再以獨參湯補之。(葛可久十藥叢書方)

【花蕊石散】治一切金刃箭簇傷。及撲打傷損。狗咬至死者。急以藥塗傷處。其血化為黃水。再搽便活。更不疼痛。如內損血入臟腑。煎童子小便入酒少許。熱調一錢服。立效。豬牲抵觸。腸出不損者。急納入桑白皮線縫之。搽藥血止立活。婦人產後敗血不盡。血暈。惡血奔心。胎死腹中。胎衣不下至死。但心頭溫暖者。急以童子小便調服一錢。取下惡物如猪肝。終身不患血風血氣。若膈上有血化為黃水。即時吐出。或隨小便出。甚效。硫黃四兩。花蕊石一兩。並為粗末。并勻。以膠泥固濟。日乾。瓦罐一箇。盛之。泥封口。焙乾。安在四方磚上。用炭一秤。簇。從巳午時。自下生火。煨至炭消。冷定。取出為細末。瓶收貯。聽用。(和劑局方)

【治多年障翳】花蕊石水飛。焙防風。川芎。菊。甘菊花。白附子。牛蒡子。各一兩。甘草炙半兩。為末。每服

牛錢。煎茶下。(衛生家寶方)

●脚縫出水。好黃丹入花蕊石末摻之。(談禁藥試效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。

參攷資料 ●花蕊石古方未

有者。近世以合硫黃同煨。研末。傳

金瘡其效如神。人有倉卒中金刃

不及煨治者。但刮細末傳之亦效。

(蘇頌)●出陝州閿鄉。體至堅重

色如硫黃。形塊有極大者。陝西人

鑄爲器用。採無時。(蘇頌)●玉册

云。花乳石。陰石也。生代州山谷中

有五色。可代丹砂。眞藥。蜀中汶山

彭縣亦有之。(李時珍)●方書如

王宇泰證治準繩。於諸血證。絕未

一見者何哉。豈本草綱目之論治

盡屬妄耶。第如釋仲醇氏所云。吐

血諸證。多因於火炎迫血以上行

如斯藥性非宜。亦是確論也。然有

血證不盡因於陰虛者。則此味又

爲中之劑矣。蓋不屬陰虛。而患

於血逆者。應有療證。有療證而以

化爲止。是亦奇效也。(劉潛江)

【花蕊石】即花蕊石之處方用名。

詳【花蕊石】條。

【花蔞】即蕎麥之古籍別名。典見綱目。詳【蕎麥】條。

【花厥】即陰地厥之古籍別名。典見植物學大辭典。詳【陰地厥】條。

【花龍骨】即龍骨之處方用名。詳【龍骨】條。

【花檳榔】即檳榔之處方用名。詳【檳榔】條。

【花欄木】即欄木有花紋者之古籍別名。典見綱目。詳【欄木】條。

【花蘇芳】即紫荊花之日本名。詳【紫荊花】條。

【花鱸】即石鱸之古籍別名。典見綱目。詳【石鱸】條。

【芳香】即白芷之古籍別名。典見本經。詳【白芷】條。

【芳蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳【甘蔗】條。

【芸香】古醫別名。葉如韭形。者名韭葉芸香。(雙南志)

外國名詞 Ruta (拉丁)

Ruta (英) Ruta (德)

基本 屬芸香科芸香之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

芸香產中國南方及亞非利加等

處。功用與乳香相仿。

形態 芸香爲香氣強烈之多

年生草本。莖高一二尺。下部作木

質狀。葉互生。爲灰綠色羽狀複葉

有類似香茅之氣味及苦味。夏月

於枝梢開黃綠色小花。作繖形花

序排列。



芸香

採取 每年於開花前採葉陰

乾。

性質 辛。香。無毒。

成分 含有揮發油、樹脂、芸香

酸等。芸香油。取自芸香葉中所含

之揮發油。呈淡黃色。有苦味。性酸

味。及不快臭氣。比重0.911。

水中溶化。較伊打及揮發油更易。

效能 用作鎮痙風通經藥。

主治 疥癬等疾。專能解蟲。搗

汁服之。截瘧瘧。

國外學說 和漢藥考曰。芸香

原爲歐洲南部所產。生花戶呼爲

【邊魯答】爲荷蘭藥之一種。今將

荷蘭藥鏡所載芸香之效能。摘錄

如左。爲香質。發健胃。利尿。通經

之奇效。驅散風氣痞滯。凡神經病

癱症。昏睡。小兒搐搦。癩症。子宮

逆痛。頭痛。疝痛。神思憂鬱。病等。用

之有殊效。用作泡劑。或取露水作

洗眼藥。能恢復視力。肺部嫩衝。用

芸香加入加密列薄荷。實爲醫布

復加燒酒少許。貼於胸部。更危險

之症。加龍腦用之。有特殊功效。此

因其能宜透皮膚神經。而奏疏散

之效也。

參攷資料 ●職方考出雙南

府。能治瘡疔。入夾方者。搗以自隨

如嚼此草無味。即知中蠱。急服其

汁吐之可解。●按雲南志。出昆明

有二種。五葉者名五葉芸香。非葉

者名韭葉芸香。治瘧瘧。●藥性考

云。生成五葉。產昆明。治疥癬等疾

專能解蠱。搗汁服之。非葉芸香能

截瘧瘧。夷人多邪蠱。搗此草嚼之

無味。即知中毒。

【芸蒿】即柴胡之古籍別名。典見

別錄。詳【柴胡】條。

【芹菜】分水芹旱芹兩種。詳見各

八畫 花 芳 芸

八畫 芹 芙 茵 虎

該條。

【芹菜粥】 聖治 去熱。利大小腸。

【芙樹】 聖治 去熱。利大小腸。 產地 生深山中。 形態 芙樹爲雜木類之一種。葉長而厚。冬月不凋。其枝葉可供藥用。

性質 有大毒。

主治 風痺偏枯。筋骨變縮。癱瘓。皮膚不仁。疼痛。取枝葉搗碎。大飯蒸熱。鋪牀上。冷則易之。汗出爲度。

【茵草】 古籍名別 皇。守田。守氣。(爾雅)

外國名詞 Beclmannia erucoides, Host. (拉丁) ミノコメ(日本)

基本 係禾本科。茵草屬之茵草。

產地 生池澤水田中。

形態 茵草爲穀類之越年生草本。苗似小麥而小。秆高尺餘。斜生水面。其子實成熟似麥子。可供食與藥用。

採取 四月間採之。 性質 甘寒。無毒。

聖治 作飯去熱。利胃腸。益氣力。久食不飢。

【虎子桐】 即罌子桐之古籍別名。 典見綱目拾遺。詳「罌子桐」條。

【虎爪】 採取 爪與指骨毛俱可用。須以雄者良。

聖治 繫小兒臂。辟惡魅。 參攷資料 外臺辟惡魅。用虎爪。蟹爪。赤朱。雄黃。爲末。松脂和丸。每正旦焚之。

【虎牙】 基本 本品乃虎之齒牙也。

聖治 丈夫陰瘡。及疽癩。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論虎牙曰。殺勞蟲。治獼犬傷發狂。刮末酒服方寸匕。

【虎牙半支】 基本 本品即狗牙半支之葉大者。

聖治 生山背陰谷諸地。

形態 虎牙半支爲半支類之一種。其狀一似狗牙半支。惟葉大。亦供藥用。其葉片較大者。名羊角半支。葉扁而大者。名馬牙半支。詳見各條。

性質 寒。涼。無毒。

聖治 疔腫。火毒。痔漏。 古籍別名 卓昆。(莊子)

【虎皮】 聖治 瘧疾。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論虎皮曰。辟邪魅。

參攷資料 虎者。陽物。百獸之長。能辟鬼魅。今人卒中惡病。燒皮飲之。或繫衣服。亦甚驗也。起居雜記云。虎豹皮上睡。令人神驚。其毛入瘡有大毒。(李時珍)

【虎目樹】 即檮欏白皮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「檮欏白皮」條。

【虎耳草】 命名 本品葉狀如虎耳故名。

古籍別名 石荷葉。(綱目) 系系葉(簡易草藥)


外國名詞 Saxifraga sarma, Otago, I. (拉丁) ユキノシク

基本 係虎耳草科。虎耳草屬。爲虎耳草之根。

聖治 生山野及陰溼地方。

形態 虎耳草爲石草類之多。年生常綠草本。高尺餘。生長匍匐。

枝如絲狀。有細毛。一莖一葉。如荷蓋。大如錢狀。初生如髮。葉如虎耳。赤紫色。夏秋之交。葉叢間生花莖。花小白。不整齊。花瓣五片。二大三小。可供玩賞。亦有植於庭院及假山石間。其根可供藥用。



虎耳草

性質 微苦。辛寒。有小毒。

主治 瘟疫。播酒服。治耳。搗汁滴之。痔瘡腫痛者。陰乾燒煙。桶中熏之。

參攷資料 虎耳草。生用令人吐利。熟用則止吐利。其汁可煮砂。(李時珍)

【虎肉】 性質 酸平。無毒。

聖治 惡心欲嘔。益氣力。止多睡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論虎肉曰。食之治癰癬。三十六種精魅。

參攷資料 虎肉熱食。壞人齒。(陶弘景) 虎肉作土氣味。不

甚佳。鹽食稍可。(李時珍)

【虎肋骨】即虎骨之處方用名。詳

【虎骨】條。

【虎血】

主治 壯神強志。

【虎杖】

命名 虎言其斑。杖言其莖。

處方用名 虎杖草。

古籍別名 苦杖(拾遺)大蟲

杖(藥性)斑杖(日華)酸杖(綱

目)武杖(枯杖)續著(甘除根)醋筒

草(酸桶草(和漢藥考)孩(爾雅)

外國名詞 Polygonum cus-

pidatum, S. et Z. (拉丁)

基本 屬蓼科。為虎杖之宿根。

產地 凡山野原澤及路旁恒

有生焉。

形態 虎杖為多年生草本。春

日抽芽。莖中空。高二三尺。最大者

可丈許。葉互生。作卵圓形。頭端尖。

有葉柄。葉脚有截形者。故葉之形

狀亦有多種。夏間。葉腋開小白花。

綴成複穗狀花序。果實為三角式

之小果。色帶白。大三四分許。狀似

翅。根外作黃褐色。內作白色。狀若

柳根。

八畫 虎



虎杖

採取 二月三月。採根日乾。

製法 雷斅曰。凡使勿誤用天

藍及斑袖根二味。根形味皆相似

也。採得細剉。却用葉包一夜。晒乾

用。

性質 甘。微溫。無毒。

效能 破血。行水。用作通經及

淋病藥。

主治 通利月水。破留血。癥結。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論虎杖曰。漬酒服

主暴癘。【唐】陳藏器本草拾遺論

虎杖曰。風在骨節間及血癥。煮作

酒服之。【唐】甄權藥性本草論虎

杖曰。治大熱煩躁。止渴利小便。歷

一切熱毒。【宋】大明諸家本草論

虎杖曰。治產後血暈。惡血不下。心

腹脹滿。排膿。主瘡癤。撲損瘀血。破

風毒結氣。【宋】蘇頌嘉祐圖經本

草論虎杖曰。燒灰貼諸惡瘡。焙研

煉蜜為丸。陳米飲服。治腸痔下血。

【明】李時珍本草綱目論虎杖曰。研末酒服。治產後瘀血痛。及墜

撲昏悶有效。

國外學說 和漢三才圖會曰。

虎杖根出於金剛山者。良。小兒折

其莖。剉去皮。噉之。味酸。故名酸杖。

大抵高者不過三四尺。然松前之

虎杖。高丈餘。而如木。(款冬亦有

甚大者)蜀本草言。木高丈餘。而

宗輿疑以為非。蓋土產隨地不同。

豈惟虎杖耶。又大和本草曰。虎杖

苗如竹筍。小兒食之。日本產者。亦

似樹。高一丈許。有破血之性。本草

云。夏月以根和甘草煎服。甚甘美。

墜井中。令冷。飲之。較茶為佳。能解

暑毒。其汁染米。可作糜糕。姪婦勿

服。

配合應用 ①治小便五淋。苦

杖為末。每服二錢。用飯飲下。(集

驗方)

②治月水不利。用虎杖三兩。浸

香花。浸藥一兩。為末。熱酒每服一

錢。又治月經不通。腹大如瓠。氣短

欲死。虎杖一斤。去頭暴乾。切。土瓜

根汁。牛膝汁二斗。水一斛。浸虎杖

一宿。煎取二斗。入二汁。同煎如餲。

每酒服一合。日再。夜一。宿血當下。(聖惠方)

③治時疫流毒。或手足。腫痛欲

斷。虎杖根。剉。黃汁漬之。(肘後方)

④腹中暴癥。硬如石。痛刺不治。

百日內死。取虎杖根。石餘。洗乾。搗

末。黍米五升。炊飯。納入。攪之。好酒

五斗。漬之。封。候。藥消。飯淨。可飲一

升。勿食。鮭魚。及鹽。但取一斗。乾

者。薄浸。飲。從少起。日三服。亦佳。癥

當下也。此方治癥。有效驗。大勝諸

藥也。(外臺祕製方)

⑤治氣奔怪病。人忽偏身。皮膚

混混。如波浪聲。痒不可忍。抓之。血

出。不能解。謂之氣奔。以苦杖。人參

青鹽。細辛。各一兩。作一服。水煎。細

飲。盡便愈。(夏子衮奇疾方)

⑥治消渴引飲。虎杖燒過。海淨

石。烏賊魚骨。丹砂。等分。為末。湯時

以麥門冬。湯服二錢。日三次。忌酒

色。魚。魮。鮓。醬。生。冷。(衛生家寶方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯。及小便

不禁。與孕婦。禁用。

參攷資料 ①暑月。以根和甘

草。同煎。為飲。色如琥珀。可愛。甚甘

八 蠶 虎

美。瓶置井中。令冷激如冰。時人呼為冷飲子。啜之。且尊於茗。極解暑毒。其汁染米作糜。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕人勿服。甄權。孫真人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沈重。亦治丈夫積聚。有虎杖煎。取高地虎杖根。到二斛。水二石五斗。煮取一斗半。去滓。入醇酒五升。煎如餵。每服一合。以知為度。又許學士本事方。治男婦諸般淋疾。用苦杖根洗淨。到一合。以水五合。煎一盞。去滓。入乳香麝香少許。服之。郵縣尉耿夢得。內人患沙石淋。已十三年。每澀痛楚。不可忍。溺器中小便下沙石。剝剝有聲。百方不效。偶得此方服之。一夕而愈。乃予自擊者。李時珍。自今出汾州。越州。蘇州。處處有之。三月生苗。莖如竹筍狀。上有赤斑點。初生便分枝。子葉似小杏葉。七月開花。九月結實。南中出者無花。根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。菘。虎杖。郭璞注云。似菘草而粗大有細刺。可以染赤是也。蘇頌。此草葉也。蜀本草作木高。

丈餘者非矣。大率皆似寒菊。然花葉莖葉差大為異。仍莖葉有淡黑斑。六七月間旋開花。至九月中。方已。花片四出。其色如桃花。差大。而外微深。陝西山麓水次甚多。寇宗奭。

【虎杖草】即虎杖之處方用名。詳【虎杖】條。

【虎沙】即沙魚背茶色微紅體側有紅斑長三尺許者之別名。詳【沙魚】條。

【虎肚】原名 虎胃。主治 反胃吐食。取生者勿洗。存滓。新瓦固煨存性。入平胃散末一兩和勻。每白湯服三錢神效。

【虎豆】即黎豆之古籍別名。典見綱目。詳【黎豆】條。

【虎刺】即伏牛花之古籍別名。典見圖經本草。詳【伏牛花】條。

【虎油】主治 療疥癩。狗咬傷。五痔下血。反胃。並治大。

麻瘋疾。

【虎屎】主治 惡瘡。歷代記述攷證 【唐】

陳藏器本草拾遺論虎屎曰。治鬼氣。【明】李時珍本草綱目論虎屎曰。療瘰癧疔瘡。燒研酒服。治獸骨。

【虎屎中骨】主治 研屑。治火瘡。歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論虎屎中骨曰。破傷風。【虎珀】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳【琥珀】條。

【虎胃】即虎肚之原名。詳【虎肚】條。

【虎茄】即荑苳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荑苳子】條。

【虎脂】主治 療打碎頭骨。熱酒浸服。患處青者不治。並治反胃。浸清油和溫酒服。

【虎骨】命名 虎字從虍從儿。象其踞蹠之形。入藥。係用其骨節故也。處方用名 虎脛骨。四腿虎骨。

七五〇


虎頭骨。虎脊骨。虎肋骨。

古籍別名 烏麴骨。大蟲骨。肘後。於菟骨。左傳。烏擇。漢書。伯都骨。隨骨。李父骨。魁骨。李耳骨。麴骨。綱目。威骨。猓骨。猓骨。務大骨。和漢藥考。

外國名詞 Felis tigris Linn (拉丁) Tigerbone. (英) 基本 屬哺乳獸中食肉類貓族。藥用虎之骨。產地 陳仁山藥物生產辨云。虎骨以中國為最。可惜難得。兩粵西北江出者更佳。其次安南。再次暹羅。此兩地最多出。但暹羅來者。每有猪熊狗熊猴骨等混雜。又白虎膠用虎骨洗淨熬之。香港水同福每年必熬十次。以應各客。和漢藥考曰。產於南亞及美洲。日本無之。

形態 虎為似貓之猛獸。體軀甚長。自鼻端至尾尖。長至五尺或八尺。尾長二尺五寸至三尺。最大者連尾可長丈餘。高準之者視牡為小。頭圓。四肢粗大有力。每趾末端。俱有鋒利之鈎爪。步行無音。犬齒殊發達。便於嚼碎獸骨。白齒。

利若鋸齒。便於嚼斷筋肉。並破碎骨質。毛有光澤。色黃褐或紅褐。而雜以暗黑色之橫紋。惟脚部略白。故其色如斑紋。渾似周圍之草木。一時不易見之。所謂保護色也。晝間隱匿山穴。入夜則出而覓食。鹿野豬。孔雀等。又往往突入村落。掠奪牛馬或其他家畜而食之。五官銳敏。能探知遠方之食餌。力既強大。行亦迅捷。其種類隨產地而異。大抵亞洲產虎。棲息亞洲之熱帶與溫帶間。以東印度地方為最。凡蘆葦叢中及卑溼之地。皆其徘徊之所。有時且能泳水。該處人民之受其害者。歲約千二百人。美洲產虎。在南美及北美之一部。脚稍短於亞洲虎。多棲身於樹木繁茂之湖濱河岸等處。雖在樹梢上之野



虎

八畫 虎

獸。亦能捕之。為其餌料。其骨之入藥者。第一莫如脛骨。因虎之一身。筋骨氣力。皆出前足。故以脛骨為勝也。藥肆謂之虎脛骨。頭骨脛骨。則間用之。其骨以稍帶黃色者為佳品。

製法 蘇頌曰。凡使虎骨。用頭及脛骨。色黃者佳。凡虎身數物俱用。雄虎者勝。藥箭射殺者不可入。藥其毒浸漬骨血間。能傷人也。李時珍曰。凡用虎之諸骨。並槌碎去髓。塗酥。或酒或醋。各隨方法炭火炙黃入藥。

用法 水煎或酒浸。或熬膠。或剉末和作丸散。

性質 辛。微熱。無毒。效驗 追風。治痿痺。辟邪魅。用為健骨藥。又作痛風藥。

主治 邪惡氣。殺鬼疰毒。止驚悸。治惡瘡。風癩。頭骨尤良。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論虎骨曰。雜朱畫符。療頭骨作枕。辟惡夢。置戶上辟鬼。【唐】甄權藥性本草論虎骨曰。治筋骨毒風。變急。屈伸不得。走注疼痛。治尸注腹痛。傷寒溫氣

溫病。殺大咬毒。【唐】孟詵食療本草論虎骨曰。煮汁浴之。去骨節風。毒腫。和醋浸膝。止脚痛腫。脛骨尤良。初生小兒煎湯浴之。辟惡氣。去疥疥癩。癩鬼疰。至長大無病。【明】李時珍本草綱目論虎骨曰。追風定痛。健骨。止久痢脫肛。獸骨。【清】鄭樹本經續疏論虎骨曰。假猛厲之威。驅隱賊之毒。操制勝之氣。厭素伏之禽。別錄虎骨主療。似只如是。竝無甚難明者。特今世用虎骨。全注意甄權治筋骨毒風。變急。屈伸不得。走注疼痛一節。得無以其能生風者之骨。矯強悍疾。若正是所以使筋骨因風溼而變急。搖者起。然筋骨因風溼而變急。致不能屈伸。較之因風者。其多不啻倍蓰。因溼而用虎骨。詎非大害。亦何以的知其不因溼而必因風耶。夫固當以走注疼痛一句足之矣。溼係滯滯之氣。能阻於一處。為痛。不能走注而痛也。驗之更有一法。風以動生。溼由動去。凡變急之候。搖動而痛甚者。為風。痛緩者。為溼。

配合應用 ●治健忘驚悸。預

知散。用虎骨酥炙。白龍骨。連志肉等分。為末。生薑湯服三日。服久則令人聰慧。【永類鈴方】

●治臂脛疼痛。虎骨酒治之。不計深淺皆效。用虎脛骨二大兩。搗碎炙黃。粉羊角碎一大兩。新芍藥二大兩。切三物以無灰酒浸之。至七日。秋冬倍之。每日空腹飲一盃。若要速服。即以銀器物成於火爐中。煖養三二日後。即可服也。【兵部手集方】

●治腰脚不隨。變急冷痛。取虎脛骨五六寸。刮去肉膜。塗酥炙黃。搗細。絹袋盛之。以瓶盛酒一斗。浸之。燂火微溫。七日後。任其情而飲之。當微利便效也。又方。虎腰脊骨一具。前兩脚全骨一具。並於石上以斧槌碎。安鐵床上。文炭火炙。待脂出。則投無灰濃酒中。密封。春夏七日。秋冬三七日。任性日飲三度。患十年以上者。不過三劑。七年以下者。一劑必痊。【海上方】

●治白虎風痛走注。兩膝熱腫。用虎脛骨。塗酥炙黃。黑附子炮裂。去皮。各一兩。為末。每服二錢。酒服下。日再。【經驗良方】

八靈虎

①治歷節痛風。虎脛骨酒炙三兩。沒藥七兩爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。(聖濟總錄方)

②治歷節走痛。百節皆痛不可忍。用虎頭骨一具。塗酥炙黃。槌碎。粗袋盛。置二斗中。清酒浸五宿。隨性飲之妙。(聖惠方)

③治筋骨急痛。虎骨和通草煮汁。空肚服半升。覆臥少時。汗出爲效。切忌熱食損齒。小兒不可與食。恐齒不生。(食療本草方)

④治休息痢疾。經年不愈。取大蟲骨炙黃焦。搗末飲。服方寸匕。日三取效。(張大仲方)

⑤治痔漏脫肛。虎脛骨兩節。以蜜二兩炙赤。搗末蒸餅。丸梧子大。每凌晨溫酒下二十九丸。取效。(勝金方)

⑥治肛門凸出。虎骨燒末。水服方寸匕。日三。(外臺祕要方)

⑦治獸骨腫咽。虎骨爲末。水服方寸匕。(外臺祕要方)

⑧治惡犬咬傷。虎骨刮末。水服方寸匕。并傳之。(小品方)

⑨治湯火傷灼。虎骨炙焦。研敷神效。(醫氏易簡方)

⑩治月蝕疳積。虎頭骨二兩。搗碎。豬脂一斤。熬膏塗之。(神效方)

⑪治小兒白禿。虎骨末油調塗之。(普濟方)

⑫治足瘡嵌甲。以橘皮湯浸洗。輕剪去。以虎骨末敷之。痛即止。(便民圖纂方)

⑬治癰腫爛疔。以醋汁洗拭。刮虎骨末敷之。(便民圖纂方)

⑭用宜忌 凡血虛火盛者禁用。

⑮參攷資料 虎之強悍。皆賴於腥。雖死而腥猶屹立不仆。故治脚腫無力用之。(汪機)

⑯虎象其聲也。魏子才云。其文從虛從几。象其踞踞之形。從人者非也。揚雄方言云。陳魏之間。謂之李父。江淮南楚之間。謂之李耳。或謂之鷓鴣。自關東西。謂之伯都。珍按李耳當作狸兒。蓋方音轉狸爲李。見爲耳也。今南人猶呼虎爲貓。卽此意也。郭璞謂虎食物。值耳則止。故呼李耳。觸其諱。應劭謂南郡李翁化爲虎。故呼李耳。皆穿鑿不經之言也。爾雅云。虎淺毛曰魏。音棧。白虎曰

七五二

魏。(音舍)黑虎曰鷓。(音育)似虎而五指曰狸。(音區)似虎而非真。曰彪。似虎而有角曰甝。(音嘶) (李時珍)

【虎骨酒】製法 用虎脛骨一具。炙黃。槌碎。同麴米釀酒飲。或以絹袋盛。浸酒亦可。主治 臂脛疼痛。歷節風疼。腎虛。膀胱寒痛。

【虎眼】卽柃柃白皮之古籍別名。典見本草拾遺。詳「柃柃白皮」條。

【虎脛骨】卽虎骨之處方用名。詳「虎骨」條。

【虎骨】條。

【虎麻】卽馬先蒿之古籍別名。典見綱目。詳「馬先蒿」條。

【苦參】條。

【虎掌】卽漏藍子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「漏藍子」條。

【天南星】條。

【虎腎】主治 瘰癧。

參攷資料 虎腎懸於虎腹中。不形於外。頗似瘰癧。隱於頤之肌肉間者。然故可治之。(醫學大辭典)

【虎斑金絲結】卽伽楠香之歲月尙淺。木蜜之氣未融。木性多而香味少者之古籍別名。典見本草拾遺。詳「伽楠香」條。

【虎睛】製法 蘇頌曰。虎睛多。須自獲者。乃真。置數日。凡使虎睛。須問獵人。有雌有雄。有老有嫩。有殺得者。惟中帶自死者勿用之。能傷人。虎睛以生羊血沒一宿。流出。微火焙乾。搗粉用。李時珍曰。千金治狂邪。有虎睛。搗虎睛丸。並用酒浸炙乾用。

主治 癩疾。

歷代記載攷證 【唐】孟誥食療本草論虎睛曰。瘡病。小兒熱疾。驚悸。【宋】日華諸家本草論虎睛曰。驚啼。客忤。疳氣。鎮心安神。【明】李時珍本草綱目論虎睛曰。明目去翳。

【虎鼠皮】卽刺蝟皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刺蝟皮」條。

【虎膏】命名 本品卽虎脂已。經熬成膏者。故名。

主治 狗噬瘡。

歷代記載攷證 【唐】孟誥食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔。

【唐】孟誥食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔。

【唐】孟誥食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔。

【唐】孟誥食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔。

【唐】孟誥食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔。

下血。【明】李時珍本草綱目論虎骨曰。服之治反胃。煎消塗小兒頭瘡白禿。

◎即天南星之古籍別名。典見綱目。詳『天南星』條。◎即豨薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『豨薟草』條。

【虎蒲蕪】即澤蘭蕪之古籍別名。典見別錄。詳『澤蘭蕪』條。

【虎狸】即狸之一種。有斑如狸虎而尖頭方口者。善食蟲鼠果實。功用詳『狸』條。

【虎鼻】 主治 齒疾。小兒驚癇。北朝陶弘景本草集註論虎鼻曰。懸戶上令生男。

參攷資料 虎鼻懸門中一年。取熬作屑。與麴飲。便生子。勿令人及婦知。則不驗云。又懸於門上。宜子孫。帶印綬。此與古者胎敬。欲見虎豹。皆取其勇壯之義。(李時珍)

【虎頭骨】即虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【虎頭蕉】 古籍別名 苗高者。名美人蕉。(綱目拾遺)

八 蠶 虎 虹 虱 蚬 迎

遺)

產地 福建臺灣。五虎山等處。形態 虎頭蕉為蕉類之一種。一莖獨上。葉抱莖生。不相對。形類蕉而小。苗高五六寸。秋月開花。似蘭色。紅結實有刺。類蓖麻子。外面有苞狀。若高三四尺者。即所謂美人蕉。乃一類二種。可供藥用。

採取 以美人蕉入藥良。性質 溫熱有毒。主治 祛風療風痺。血淋白帶。一切吐血。

參攷資料 草實虎頭蕉。性溫力猛。有毒。能治風痺。凡服者不得過二錢。服後須避風。倘不謹慎。必發風疹。(綱目拾遺)

【虎頭蟻窠】即山蟻窠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山蟻窠』條。

【虎膽】 主治 打傷垂死。飲食不進。前後不通。乃瘀血在心。命在旦夕者。去外皮。用黃酒研細。入白茯苓為末。酒下。並治小兒驚癇疳痢。水服之。

【虎薊】即大薊之古籍別名。典見本草集註。詳『大薊』條。

【虎薺】即豨薟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豨薟草』條。

【虎蘭葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見本經。詳『澤蘭葉』條。

【虎鬚】 基本 本品乃虎之鬚也。 主治 齒痛插之。

◎即款冬花之古籍別名。典見本經。詳『款冬花』條。◎即沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【虎鬚草】即燈心草之古籍別名。典見綱目。詳『燈心草』條。

【虹蛭】即蛭之古籍別名。典見爾雅。詳『蛭』條。

【虱】即人虱之古籍別名。典見綱目。詳『人虱』條。

【虱建草】 產地 生山野溼地。形態 虱建草為雜草類之一種。其葉似山丹。色微赤。高一二尺。可供藥用。 性質 苦無毒。 主治 蟻虱按汁沐頭。又治諸蟲瘡。

【虱草】即狼把草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼把草』條。

【虱】即水蛭之古籍別名。典見爾雅。詳『水蛭』條。

雅。詳『水蛭』條。

【迎春】即辛夷之古籍別名。典見綱目。詳『辛夷』條。

【迎春花】 古籍別名 金腰帶。(翠芳譜)金梅。(漢志)黃梅。(日本) 外國名詞 Jasminum nudiflorum, Lindl. (拉丁)ワウバイ(日本)

基本 為素馨科。迎春之葉。形態 迎春花為澤草類之落葉小灌木。高至數尺。上部之莖略似莖狀。嫩莖呈綠色。葉複葉。自三小葉成對生。早春先新葉開花。花單生。合瓣。花冠六裂。黃色。萼亦六裂。雄蕊二枚。著生於花冠上。雌蕊一枚。此為春花之最早者。其葉可供藥用。



花 春 迎

性質 苦。溫。平。無毒。 主治 腫毒惡瘡。陰乾研末。酒服二三錢。出汗便瘥。

參攷資料 迎春花處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉如初生小椒葉而無窗面背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實(李時珍)

【迎陽子】即菟絲子之古籍別名。與見和漢藥考詳「菟絲子」條。

【近客】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考詳「白芍」條。

【返魂香】古醫別名。馬精香。振靈香。卻死香。驚精香。(海藥本草)

形態 返魂香為香木類之一種。樹狀類乎楓柏。花葉甚香。可開百里。採其根煮汁。煉之如漆。乃成香。焚之其氣甚香。可供藥用。

主治 辟瘴疫。起死回生。

參攷資料 按漢書云武帝時西國進返魂香。內傳云西海聚窟州有返魂樹。狀如楓柏。花葉香聞百里。採其根於釜中水煮。取汁煉之如漆。乃香成也。其名有六曰返魂。驚精。回生。振靈。馬精。卻死。凡有疫死者。燒豆許。熏之。再活。故曰返魂。(李均) 張華博物志云武

帝時西域月氏國度弱水。貢此香三枚。大如燕卵。黑如桑椹。植長安大疫。西使謂燒一枚。辟之。宮中病者。聞之即起。香聞百里。數日不歇。疫死未三日者。熏之皆活。乃返生神藥也。此說雖涉詭怪。然理外之事。容或有之。未可便指為謬說也。(李時珍)

【返魂草】即紫菀之古籍別名。典見綱目。詳「紫菀」條。即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烟草」條。

【邵陽魚】即海鰓魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰓魚」條。

【采雞】即鷲雉之古籍別名。典見周書。詳「鷲雉」條。

處方用名 金箔。

【金】古醫別名 金漿(拾遺) 太真(弘景) 黃牙(鏡源) 金屑 蘇伐羅(綱目) 鑿鑿飯(爾雅) 金王女古黃物。按彈阿羅金少翁。(和漢藥考)

外國名詞 Aurum. (拉丁) Gold (英·德)

基本 係金屬化學原質之一。產地 凡山礦及沙土中恒有

之。和漢藥考曰。自然金在火山岩及片山岩之石脈中。若山岩崩壞。遂隨流水入於江河之沙土中。

形態 為光豔極強。金黃色之軟性金屬。比重一九·三。置空氣中。毫不變化。水及諸酸類俱不能溶解。熔點為二千二百五十度。富有引伸。延展兩性。金屬中此為第一。

採取 採沙金自流水中淘汰得之。俟其沉澱而後收之。採自然金。在有金礦處開掘之。和漢藥考曰。自然金中。每含有銀銅並稀有之金屬。而合成金。故其彩色各有不同。而精鍊山金之法。碎金成粉。淘汰如沙。金法而收之。或加水銀。使成亞瑪爾加。再熱之。蒸發其水銀。或先為青化物。續用電氣分解法。精鍊其金。

製法 寇宗奭曰。不日金而更加屑字者。是已經磨屑可用之義。必須添鍊。鍛屑為箔。方可入藥。用法 凡使金銀銅鐵。只可渾安在藥中。借氣生藥力而已。勿入藥服。能消人脂。然其已鍊為箔者。恒以和丸為衣用。

性質 辛。平。無毒。效驗 鎮驚癇。安魂魄。用為解熱及解毒藥。

主治 鎮精神。堅骨體。通利五臟。邪氣。服之成仙。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論金屑曰。療小兒驚傷。五臟風痙。失志。鎮心。安魂魄。【唐】李珣海藥本草論金屑曰。癩癩風熱。上氣咳嗽。傷寒肺損。吐血骨蒸。勞極。作渴。並以薄入丸散服。【明】繆希雍本草經疏論金屑曰。大清法云。金裏中宮陰已之氣。性本剛。服之傷肌損骨。予見今之以雞來死者。服金一二分。則心腹痙痛。腸胃如裂而斃。其為損傷肌骨。概可見矣。惟作箔入藥。可為鎮心安神之劑。如或止因心氣虛。以致神魂不安。或無驚邪外入者。當以補心安神為急。而非金箔所能定矣。【清】黃宮繡本草求真論本品曰。金裏剛健之性。最能殺人。故欲尋短者。服一二錢。則心腹痙痛。即斃。惟作箔。乃無傷耳。銀箔亦然。二箔性皆辛平。其治俱屬除邪殺毒。鼓煩。快魂定魄。養心和血。止割除狂。驚厥。

祛風。幼科鎮心丸。衣以爲飾。皆取金能鎮木。重以鎮怯之意云耳。但銀箔色白入氣。金箔色黃入血。各有差別。長錫水銀。入丸爲衣。入湯煎水煮用。〔清〕黃元御玉楸藥解。論金屑曰。金屑服之殺人。性同燒酒。古人賜死。往往用此。本草謂其能止咳。嗽吐血。驚悸癩癧。方士製煉服餌。以爲長生不死。荒妄極矣。或謂生者有毒。熟者無毒。胡說之至。庸工每常用之。卽至少服不至殺人。而驚悸自有原本。鎮重之物。何能效。

配合應用 ①用金箔入至寶丹。治中風不語。氣絕中惡。蠱毒尸注。難產血暈等證。

②入牛黃清心丸。治諸風緩縱不隨。語言蹇澀。恍惚怔忡。痰涎壅塞。驚恐怖怖。或喜怒無時。癩狂昏亂。

③入紫雪。治內外煩熱。口舌生瘡。狂呼呌走。瘵瘦癯癯。卒死溫瘧。五尸五疰。蠱毒卒黃。小兒驚癇百病。紅雪治瘵略同。

④金箔鎮心丸。治小兒風壅痰熱。驚悸譫妄。心神不寧。

八 盡 金

①磨細屑。挑開疔瘡頭。上沒入。能拔疔根。作針針疔瘡。納藥拔疔。②治風眼爛弦。金環燒紅。掠上下脰肉。日數次甚妙。〔集簡方〕

③治牙齒風痛。火燒金銀針之。立止。〔集簡方〕

④治輕粉破口。凡水腫及疔病。服輕粉後。口瘡銀爛。金器煮汁。頻頻含漱。能殺粉毒。以愈爲度。〔外臺祕要方〕

⑤治水銀入耳。能蝕人腦。以金枕耳邊自出也。〔仲景方〕

⑥治水銀入肉。令人筋掣。惟以金物熨之。水銀當出。候金白色是也。頻用取效。此北齊徐玉方也。〔本草拾遺方〕

用量 三分至五分。

施用宜忌 凡無實熱驚邪者。禁用。惡錫。畏水銀。

參攷資料 ①金性能制木。故瘵癯風熱肝膽之病。而古方罕用。惟服食家言之。淮南三十六水法。亦化爲漿服餌。葛洪抱朴子言。餌黃金不亞於金液。其法用豕頁草。肪苦酒。鍊之百遍。卽柔。或以楊皮治之。或以牡荊酒。蒸石消之。爲

水。或以雄黃雌黃合餌。皆能地仙。又言丹砂化爲聖金。服之昇仙。別錄陳藏器亦言。久服神仙。其說蓋自秦皇漢武時。方士傳流而來。豈知血肉之質。水穀爲糧。可能堪此。金石重墜之物。久在腸胃。求生而喪生。可謂愚也。故太清法云。金稟中宮。陰巳之氣。性本剛。服之傷損肌肉。又東觀祕記云。亡人以黃金塞九竅。則尸不朽。此雖近於理。然亦誨盜也。葛若速化歸虛之爲愈哉。〔李時珍〕

②洗金以鹽。駱駝驢馬脂。皆能柔金。金遇鉛則碎。翡翠石能屑金。亦物性相制也。金蛇能解生金毒。腎買后飲金屑酒而死。則生金有毒可知矣。凡用金箔。須辨出銅箔。〔李時珍〕

③按許慎說文云。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不逸。生於土。故字左右注。象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之璣。美者謂之璣。餅金謂之銀。絕澤謂之銑。獨孤謂之云。天生牙謂之黃牙。梵書謂之蘇伐羅。〔李時珍〕

④日本產金有數種。經鍛鍊者。爲熱金。其色深黃。滑澤。質不堅者。良。唯好金及金箔。可入

藥。淡黃色者。下品也。生金有毒。不堪入藥。〔古方藥品考〕

【金丸】卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【金口規】卽規口黃。如金者。詳「規」條。

【金山茄根】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【金子瑪瑙】卽截子瑪瑙之別名。詳「瑪瑙」條。

【金不換】古籍別名。救命玉。鉢孟。大接骨草。細葉者名小接骨草。〔綱目拾遺〕

產地 出自西域。

形態 金不換爲雜草類之一種。葉圓短。不甚高。立春後生。夏至後枯。根似羊蹄根。可供藥用。其葉詳見該條。

性質 平。無毒。

主治 破癰生新。止血行血。療跌打。消癰腫。疥癬。肺癰。

配合應用 ①治腫毒初起。金不換草根葉不拘。搗碎五錢。陳酒煎服。〔百草鏡方〕

②治疔瘻。金不換草取根一兩。

或葉七瓣。搗汁酒煎服三次。愈。不論口臭吐酸物者皆效。(百草鏡方)

②治風痛。金不換錢半。小活血。枳殼。蘇葉。當歸。各三錢。烏藥。川芎。各二錢。花粉五錢。老酒一觔。煎熱服。(楊氏驗方)

【金不換】①即三七之古籍別名。典見綱目。詳「三七」條。②即無骨。芋蕨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「無骨芋蕨」條。

【金不換葉】 性質 平。無毒。 主治 搗傅蟲傷。跌傷。風痛。並能伸臂力。餘同根條。

參攷資料 ①金不換能伸臂力。開硬弓。臂痛或力弱不能弓者。取其葉。揉軟覆臍上。以帛束之。過夜痛者即定疼。且全力俱攝入臂上。開弓更不費力。營伍需爲要藥。(趙學敏)

②跌打疼痛風氣。金不換葉如冬菜葉。春夏用葉。冬用根。搗汁沖酒服。渣加毛鷄。搗爛敷。如風氣。只用渣敷。(活人書)

【金井玉爛】即人參之古籍別名。典見綱目。詳「人參」條。

【金公】即紹之古籍別名。典見綱目。詳「紹」條。

【金少翁】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「金」條。

【金毛狗脊】即狗脊之處方用名。詳「狗脊」條。

【金水引】即金頂龍芽草之日本別名。典見植物學大辭典。詳「仙鶴草」條。

【金牙石】 古籍別名 黃牙石。 (綱目)

產地 出川陝諸地山中。 形態 金牙石爲石類之一種。形似蜜梨子而有金點者。可供藥用。

採取 以色如金者良。 製法 大明曰。入藥燒赤。去粗乃用。 性質 鹹。平。無毒。 主治 鬼疰毒蟲諸疰。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論金牙石曰。治一切冷風氣。筋骨掣急。腰脚不遂。燒酒浸服。 【宋】大明諸家本草論金牙石曰。煨腰膝。補水臟。驚悸。小兒驚風。

參攷資料 ①金牙惟酒散及

五疰丸用之。餘方少用。(陶弘景) 葛洪肘後方。治風痿厥。有大小金牙酒。但浸其汁飲之。孫思邈千金方。治風毒及鬼疰。南方瘴氣。傳尸等。各有大小金牙散之類是也。小金牙酒。主風疰百病。虛勞。淫冷。緩弱不仁。不能行步。近人用之多。效。故著其法云。金牙。細辛。莽草。防風。地膚子。地黃。附子。茵陳。續斷。蜀椒。蒟蒻。根各四兩。獨活一斤。十二物。金牙搗末。別盛練麩。餘皆薄切。同入一大甕。以清酒四斗。漬之。密器泥口。四宿酒成。溫服二合。日二次。取效。(蘇頌)

【金牛兒】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目。詳「蟬蛻」條。

【金牛草】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳「紫金牛」條。

【金王】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「金」條。

【金母蛻】即蟬金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蟬金」條。

【金汁】 原名 糞清。 命名 本品係淋糞濾取之汁。曰金汁者。隱名也。

處方用名 金汁露。

古籍別名 黃龍湯。(陶弘景) 避元水。(菽園記)

形態 金汁清如泉水。全無穢氣。

採取 採用年久者更佳。

製法 金汁製法。用椶皮。繅紙。其上鋪黃土。澆糞淋土上。濾取清水。入新甕內。椶埋土中。經年取出。用多年更良。

用法 溫飲。或和藥服。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 治熱病。療痘瘡。用作清熱解毒藥。

主治 時行大熱狂走。解諸毒。

歷代記述攷證 【明】李士材本草圖解論金汁曰。主熱病發狂。痘瘡血熱。勞極骨蒸。解一切熱毒。 【清】黃宮繡本草求真論金汁曰。金汁係取糞入罇。埋於土內。三年取出。澄清如水者是耳。味苦氣寒。置於土中時久。得其土氣最厚。故能入胃。大解熱毒。凡濕熱時行。毒勢衝迫。勢危莫制者。用此瀉之。下咽稍減。以其氣味相投。故能直入其巢。而破其毒耳。即初生小兒。周時內。毒氣方張。用此服一二分。既

能化毒。且能免後痘疹。此最靈驗。但稟體氣寒。體瘦色白者不可誤用。恐其反奪天眞耳。不可不審。灌花用此最良。

用盤 五錢至一兩。

施用宜忌 凡非有實熱火毒者禁用。

參攷資料 ①金汁濁陰歸下竅。有降無升。入土既久。去濁留清。身中諸火逆上。仍用身中降火之品治之。此竹破須將竹補。抱雞選用卵爲之法也。陽明實熱發狂。痘瘡紫黑乾枯。非此莫能治。療。(李中梓) ②金汁治陽明入腑之實熱。即用陽明腑轉化之濁陰。可謂善於對待矣。然何以別於小水之用乎。蓋綠澀同爲濁陰。而此之濁更甚於小水。濁甚而氣之陰亦甚。故曰其氣味苦寒。與小水之酸寒者不同也。濁陰皆歸下竅。而濁之甚者尤善降。此其異於小水之用者也。至解諸毒。如希雅所云以苦寒除辛熱。良然。第苦寒之味不少矣。何爲臭穢之物較勝耶。蓋毒之傷人臟腑。卽解以臟腑所轉化之苦寒。不更親切而善於脫化乎哉。

八 蠶 金

〔劉涓子〕 ①人尿。臘月截淡竹。去青皮。浸透取汁。治天行熱疾中毒。名蠶清。(大明) ②近城市人以空罈塞口。納糞中。積年得汁。甚黑而苦。名黃龍湯。療溫病垂死者皆靈。(陶弘景)

〔金汁〕 卽人中黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人中黃」條。

〔金汁露〕 卽金汁之處方用名。詳「金汁」條。

〔金石〕 命名 本品卽石中有金屑而色赤褐者。故名。產地 出五台山清涼寺。

製法 凡使飛煉用。性質 甘溫無毒。

主治 療羸瘦不食。益顏色。健腰膝。暴熱脫髮。

〔金石斛〕 卽石斛之處方用名。詳「石斛」條。

〔金妃〕 卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「銀箔」條。

〔金竹〕 命名 本品乃竹莖如金色者。故名。產地 出廣東。

形態 金竹爲苞木類之一種。竹莖黃色。竹內衣膜。及竹莖外顯

層青皮。其茹澀。俱可供藥用。

採取 以鮮者劈取用。主治 一切勞嗽。喉啞。

參攷資料 金竹衣治一切勞瘵。痰嗽聲啞不出。難治者。服之神效。用鮮竹衣一錢。竹茹彈子大一丸。卽金竹青皮也。刮取之。竹瀝卽取。金竹燒取。麥冬二錢。甘草。橘紅各五分。白茯苓。桔梗各一錢。杏仁七粒。去皮尖。研水一鍾半。加竹葉十四片。煎七分。入竹瀝一杯。和勻服。(景岳方)

〔金耳環〕 產地 以南海大灘爲最多。採取 三四月新。

效能 蛇咬塗之立效。

〔金衣公子〕 卽鶯之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「鶯」條。

〔金佛花〕 卽旋覆花之處方用名。詳「旋覆花」條。

〔金佛草〕 卽旋覆花之處方用名。詳「旋覆花」條。

〔金芍藥〕 卽白芍之古籍別名。典見圖經本草。詳「白芍」條。

〔金谷香〕 卽紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紅木香」條。

〔金豆子〕 古籍別名 金花豹子。(綱目拾遺)

形態 金豆子爲豆之一種。三月生苗。十月枯。雖豆類卻不起莢。本高一二寸。分枝成叢。葉似槐而稍大。處暑時開黃花五出。瓣口似梅似之。結莢向上。類蜂腰而短。長只二三寸。實似綠豆而扁。皮有紫斑。較綠豆稍大。其子可供藥用。葉詳見該條。

性質 淡。


主治 疔癰。

〔金豆葉〕 主治 腫毒。晒乾。醋研傳。

〔金房〕 卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「露蜂房」條。

〔金拂草〕 卽旋覆花之古籍別名。典見本經。詳「旋覆花」條。

〔金松〕 產地 出浙江天台山。同。



形態 金松爲松屬之一種。

八 蠶 金

條而生。結實如碧珠。三年一熟。每年續生。穰燦其間。其子可供藥用。
主治 痰腸風。

【金果】即無漏子之古籍別名。典見輟耕錄。詳「無漏子」條。

【金果攬】(柑園小識) 古籍別名 金苦椏。

產地 出廣西蒼梧藤縣諸地。
性質 苦寒。

形態 金果椏為蔓草類之一種。蔓藤而生。結實如橄欖。皮似白朮。有疙瘡。剖之色微黃。其根入土深或至丈許。與藤俱可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 解毒。明喉急痛。口爛目痛。耳膜熱嗽。鼠瘻吐衄。俱可磨服。直瀝發背。焮赤疔瘰。蛇蟻蟲傷。俱可磨塗。

【金沸草】即綿絮頭草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「綿絮頭草」條。

【金狗脊】即金毛狗脊之簡稱。詳「狗脊根」條。

【金芙蓉】即金蓮花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金蓮花」條。

【金芝】即黃芝之古籍別名。典

見本經。詳「黃芝」條。即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【金花豹子】即金豆子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金豆子」條。

【金花草】即首蓓之別名。詳「首蓓」條。

【金花龜】即金龜子之別名。詳「金龜子」條。

【金星八角盤】即八角盤起金星者之古籍別名。典見汪連仕草藥方。詳「鬼臼」條。

古籍別名 銀星石。
【金星石】(本草衍義)

產地 浙江樂清縣之金星溪。安徽歙縣之龍虎溪。新疆之于闐諸地。皆有出。

形態 金星石為石類之一種。其色似靛青。而有淡黃斑點。其石可作現與藥用。

種類 有金色鈇片者。為金星石。有銀色鈇片者。為銀星石。

性質 甘寒。無毒。
主治 療肺壅毒。及肺損吐血。嗽血下熱。澀解衆毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論金星石曰。水磨少許。服鎮心神不寧。亦治骨酸。

即金精石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金精石」條。即雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雲母」條。

【金星地鱗】即金蛇之古籍別名。典見綱目經本草。詳「金蛇」條。

【金星砂】即硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「硃砂」條。

命名 本品即石葦者。故名。
【金星草】之深冬葉背有金星者。故名。

古籍別名 金劍草(綱經)鳳尾草。七星草(綱目)鷄掌金星草(植物名實)金雞脚(日本)

外國名詞 Polypodium ha-statum, Thunb (拉丁)ウラボシ ミツテウラボシ(日本)

基本 羊齒門羊齒類。水龍骨科。為金星草之根莖。

產地 生山野巖石陰溼諸地。

形態 金星草為石草類之常綠草本。根莖橫臥。有緒紫色之毛茸。葉生於根。莖長二三尺。常不分裂。而為單葉。亦有分裂為二出三

出五出之複葉者。子囊蘖着生於葉背。排列如星點。色如金。無花實。凌冬不凋。其根盤屈如竹節。而細析之有筋。與其葉俱可供藥用。

七 五 八

探取 五月和根採之。或採無時。

質性 苦寒。無毒。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論金星草曰。烏髭髮【明】李時珍本草綱目論金星草曰。解熱通五淋。涼血。

參攷資料 金星草是瘡毒皆可服之。然性至冷。服後下利。須補治乃平復。老年不可輒服。(蘇頌) 丹石毒發於背。及一切癰腫。以其根葉二錢半。酒一大盞煎服。取下黑汁。不惟下所服石藥。兼去毒瘡也。如不飲酒。則為末。以新汲水服。以知為度。(寇宗奭) 此藥大抵治金石發毒者。若覺鬱氣血凝滯而發毒者。非所宜也。(李時珍)

【金星鳳尾】即鳳尾金星。詳「鳳尾金星」條。

【金星碧石】即碧石之古籍別名。典見綱目。詳「碧石」條。

【金星碧石】即碧石之古籍別名。典見綱目。詳「碧石」條。

【金星碧石】即碧石之古籍別名。典見綱目。詳「碧石」條。

【金星碧石】即碧石之古籍別名。典見綱目。詳「碧石」條。

【金星碧石】即碧石之古籍別名。典見綱目。詳「碧石」條。

【金柑】即金橘之古籍別名。典見《橘譜》詳「金橘」條。

【金柳】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。

【金苦椀】即金果椀之古籍別名。典見柑園小識。詳「金果椀」條。

【金香草】即何首烏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「何首烏」條。

【金剛石】命名。本品之砂可。以鑽玉補竅。故名。

古籍別名 金剛鑽(俗名)
外國名詞 Diamond
產地 出南非洲及巴西印度等處。

形態 金剛石為石類之一種。係由純灰質而成。為八面或十二面體之結晶。硬度在萬物中為最高。其最上等者。無色透明。折光力至強。故輝輝有光。以層琢磨之。可製首飾之屬。綠黃茶褐諸色者。次之。黑而不透明者。為下。其屑可供藥用。

主治 磨水。塗湯火傷。作銀鏡。服佩。辟邪惡毒氣。

辨偽 李時珍曰。欲辨真偽。以燒赤。淬醋中。其形如故而。不酥碎。

八畫 金

者為真。

【配合靈芝】畏羚羊角。紫背鉛。

【金剛刺】即菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菝葜」條。

【金剛拙】即菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菝葜」條。

【金剛根】即菝葜之古籍別名。典見諸家本草。詳「菝葜」條。

【金剛草】基本。金剛草為雜草類之一種。可供藥用。

主治 肺癆。痔漏。疔腫。

【金剛骨】即菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菝葜」條。

【金剛纂】古籍別名。純陽草。(丹房本草)

產地 出雲南。緬甸等處。

形態 金剛纂為灌木類之一種。其狀似椶櫚。亦有形似雞冠者。樹長不滿三四尺。枝幹多屈曲。雖春夏亦無葉。其色青碧。尤多峭芒。每觸其枝。往往曳裾不前。其枝幹可供藥用。

性質 有大毒。

主治 伏硫。

參攷資料 金剛纂對末浸水。

水必毒。飲者立死。謂之人瘴。牛馬飲之。其肉亦毒。食之必死。(綱目拾遺)

【金剛鑽】即金剛石之俗名。詳「金剛石」條。

【金屑】即金烹鍊而成屑者之古籍別名。典見綱目。詳「金」條。

【金座砂】即砂砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「砂砂」條。

【金桂】即木犀之開黃花者。詳「桂」條。

【金翁】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【金茶匙】即菟耳一枝箭苗之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「菟耳一枝箭」條。

【金針菜】即萱草花之古籍別名。典見隨息居飲食譜。詳「萱草」條。

【金寄奴】即劉寄奴草之古籍別名。典見大明本草。詳「劉寄奴草」條。

【金梅】即迎春花之古籍別名。典見滇志。詳「迎春花」條。

【金毯皮】即橙皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橙皮」條。

【金第】即番薯之別名。詳「番薯」條。

【金荳兒】即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「決明子」條。

【金莖】古籍別名。葉金草。(別錄)

產地 生澤中高處。

基本 金莖為雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 療金瘡。治內漏。

【金蛇】命名。本品色如金。故名。

古籍別名 金星地鱗。(圖經) 銀蛇。錫蛇。(綱目)地鱗。(本草綱目)

形態 金蛇為鱗類蛇屬之一種。大如中指。長尺許。常登木飲露。體作金色。照日有光。其肉可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 解中金藥毒。令人肉作雞脚裂。夜含銀。至曉變為金色者。是也。取蛇四寸。炙黃。煮汁。類飲。以差為度。銀蛇解銀藥毒。

歷代配製 宋蘇頌圖經本草論金蛇曰。解衆毒。止洩瀉。

陰邪熱。明李時珍本草綱目論金蛇曰。療久痢。

參攷資料 嶺南多毒足之藥。金蛇白藥是矣。(陳啟器) 聖濟總錄治久痢不止。有金星地錦散。用金星地錦。醋炙。鉛丹。白礬。燒各五錢。爲末。每服二錢。米飲下。日二。(李時珍)

【金鈎梨】即根槓子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「根槓子」條。

【金劍草】即金星草之古籍別名。典見圖經本草。詳「金星草」條。

【金釵】即石斛之古籍別名。典見綱目。詳「石斛」條。

【金釵股】即忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳「忍冬藤」條。即釵子股之古籍別名。典見海藥。詳「釵子股」條。

【金釵草】即九龍草之古籍別名。典見綱目。詳「九龍草」條。即千里光之別名。詳「千里光」條。

【金釵斛】即石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【金陵草】即鱧腸之古籍別名。典見圖經本草。詳「鱧腸」條。

【金雀豆】即鹿藿之日本名。詳「鹿藿」條。

鹿藿條。

【金雀兒】即金雀花之原名。詳「金雀花」條。

【金雀兒椒】即白鮮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「白鮮」條。

【金雀花】 原名 金雀兒。 古籍別名 黃雀花。 假雀花。飛來鳳。(綱目拾遺)

外國名詞 Scoparius. (Broom.)

產地 生山野間。

形態 金雀花爲雜木類之一種。枝幹如迎春。葉如槐。而有小刺。仲春開黃花。其形尖。旁開兩瓣。勢如飛雀。可供藥用。



金雀花

性質 平。無毒。

主治 發痘瘡。跌撲損傷。乾者。研末酒下。

參攷資料 金雀花。得先春之氣。故能解毒攻邪。入肝脾二經。活血祛風。亦入乳癰藥煎。鹽浸。可供

茶點。(綱目拾遺)

【金雀根】 製法 採得去外黑皮。取內骨用。

主治 跌打損傷。及咳嗽。煖筋骨。療疔風。追風活血。通脈消積毒。搗汁和酒服。渣以外傳之。

【金頂龍芽草】即仙鶴草之原名。詳「仙鶴草」條。

【金魚】 古語別名 珠砂魚。(綱目拾遺)

外國名詞 Carassius auratus L. var. (拉丁) (Goldfish)

(英) キンギヨロ或キンギヤウ (日本)

基本 係脊推動物。魚類。喉嚨類。爲鮭科之變種之金魚。



金魚

形態 金魚體形似鮭。亦有頭

腹俱大而粗短者。鰭皆大。尾多分爲三葉。或四葉。而披散全體。赤色。或白色。或紅白相間。或五色俱備。有金光。甚惹目。幼時色多蒼黑。其小者。長二三寸。大者有達三四寸。其子生草上。好自吞嚼。亦易化生。自宋以來。家家畜養。以供玩賞。其肉可供藥用。

種類 鱈魚中有一種紅鱈。名金鯉。與鯉魚中有一種紅鯉。名金鯉。皆有金魚之名。與此全別。金魚初生時黑色。久乃變紅。其變白色者名銀魚。

性質 苦。鹹。有小毒。

主治 解脫瀉毒。療瘋癲。石蠱水。取黃煎。取三尾。同甘蔗搗絞取汁。服得吐痰涎自愈。

參攷資料 李時珍本草綱目金魚條。氣味下云。甘平無毒。乃指紅鯉而言。非今之金魚。其主治下云。主痢疾。乃指金鯉之功。又非今之金魚。蓋金魚。自宋南渡始有一。名珠砂魚。乃人家畜玩於盆盎中者。有三尾。四尾。品尾。金管。銀管。之分。有蛋魚。名龍蛋。文蛋。虎頭。反鱗。諸品。純紅。純白。或紅白相同。體具

五色極大者三四寸小者寸許。金魚雖有鯉鯽諸種。殊不知金鯉金鯽皆有金魚之名。與此全別。而東壁合爲一則誤矣。(賴學敏)

【金稜藤】

產地 生原野間。形態 金稜藤爲莖草類。藤屬之一種。四時有葉。無花。經冬不凋。可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 筋骨疼痛。同續筋根馬接脚洗去粗皮。焙乾研末。酒服。

【金椒】即胡椒之古籍別名。典見圖經本草。詳「荳椒」條。

【金荷】即肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉蓯蓉」條。

【金絲虎斑】即虎斑金絲結之古籍別名。典見本草拾遺。詳「伽備香」條。

【金絲橘】即橘金娘之古籍別名。典見花鏡。詳「桃金娘」條。

【金絲草】

古籍別名 落蘇。(救急方)

基本 係旋花科菟絲子屬之金絲草。

產地 甘肅省舊慶陽府境內及諸山野間有出。

八畫 金

性質 苦寒無毒。

主治 吐血咳血。衄血下血。血崩。瘴氣。解諸藥毒。療癰疽疔腫。惡瘡。涼血散熱。

【金絲結】即伽備香。色微黃者之古籍別名。典見本草拾遺。詳「伽備香」條。

【金絲鰓鱧】即鰓鱧背黃色者之古籍別名。典見綱目。詳「鰓鱧」條。

【金華】即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天門冬」條。

【金華酒】即東陽酒之原名。詳「東陽酒」條。

【金菰】即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【金黃】即五羽石之古籍別名。典見別錄。詳「五羽石」條。

【金盞花】即金盞草之古籍別名。典見救荒本草。詳「金盞草」條。

【金盞草】古籍別名 杏葉草。(嘉祐圖經本草)長

春花。金盞花。醒酒花。(救荒本草)

外國名詞 Calendula (拉丁) (Marigold) (英) キンセンワク (日本)

基本 係菊科金盞草屬。

形態 金盞草爲澤草類之越年或一年生草本。高尺餘。葉廣披針形。互生。其開花有春秋之別。在二年生者。花開春秋。一年生者。花開秋冬。花帶赤黃色。頭狀花序。周圍之花。舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。結實爲小乾果。彎曲有刺。其花可供藥用。



草盞金

性質 酸寒無毒。

主治 腸痔下血不止。

參攷資料 ①金盞其花形也。長春言耐久也。(李時珍) ②杏葉草一名金盞草。生常州。蔓延籬下。葉葉相對。秋後有子。如雞頭實。其中變生一小蟲。脫而能行。中夏採花。蘇頌。③金盞兒花。苗高四五寸。葉似初生萵苣。葉厚而狹。抱莖而生。莖柔脆。莖頭開花。大如指頭。金黃色。狀如盞子。四時不絕。其葉味酸。熱水浸過。油鹽拌食。(周遊王) ④夏月結實。在萼內。宛如

尺蠖蟲數枚蟠風之狀。故蘇氏言其化蟲。實非蟲也。(李時珍)

【金盞銀盞】即王不留行之古籍別名。典見綱目。詳「王不留行」條。

【金腰帶】即迎春花之古籍別名。典見華芳譜。詳「迎春花」條。

【金脚靴】即靴之色白而有黃鞞者。詳「靴鞞」條。

【金脚膠】即冰片之古籍別名。典見綱目。詳「冰片」條。

【金賊】即礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「礪砂」條。

原名 苦棟實。

【金鈴子】命名 本品乃苦棟之實。形如小鈴。熟則色黃。故名。

處方用名 川棟子。


古籍別名 棟子(本經)苦棟子(圖經)仁楨(和漢藥考)

外國名詞 Azadirachtae Fructus (Fruit) of Melia Azadirachta.

基本 屬楝科苦棟之子實。其花葉及根皮。皆可入藥。另見各條。

產地 陳仁山藥物生薑辨云。金鈴子產四川重慶。冬節前後出新。

形態 苦棟為暖國自生之落葉喬木高二三丈。老丈者達五丈。葉為二重至三重之羽狀複葉。小葉作長卵圓形。前端尖。花為淡紫色。五瓣花。以圓錐花序排列。作穗狀。有香氣。本品為苦棟之子。作橢圓或球圓形。大五六分。初綠熟黃下垂。有苦味。



金鈴子

採取 十二月採子。

製法 雷斅曰。凡使棟實。須探得蒸乾。酒并令透。蒸待皮軟。刮去皮。取肉去核用。凡使肉不使核。使核不使肉。如使核搗碎。用漿水煮一伏時晒乾。其花落叶謂之石茱萸。不入藥用。嘉謨曰。石茱萸亦入外科。

性質 苦寒。有小毒。
成分 含一種苦味質。與兩藥

之括矢亞木有效成分相同。

效能 瀉溼熱。治疝氣。止腹痛。殺三蟲。用為健胃藥。又治心腹疝氣諸痛。

主治 溫疾傷寒。大熱煩狂。殺三蟲疥癬。利小便水道。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論金鈴子曰。主中大熱狂失心躁悶。作湯浴。不入湯使。【元】李東垣用藥法義論金鈴子曰。入心及小腸。止上下部腹痛。【元】王好古湯液本草論金鈴子曰。瀉膀胱。【明】李時珍本草綱目論金鈴子曰。治諸疝蟲痔。【明】櫻希雅本草經疏論金鈴子曰。棟實稟天之陰氣。得地之苦味。故其味苦氣寒。極苦而寒。故其性有小毒。氣薄味厚。入足陽明手足太陰經。經曰。冬傷於寒。春必病溫。其主溫疾傷寒。大熱煩狂者。總因寒邪鬱久。至春變為溫病。邪在陽明也。苦寒能散陽明之邪熱。則諸證自除。膀胱為州都之官。小腸為受盛之官。二經熱結。則小便不利。此藥味苦氣寒。走二經而導熱結。則水道利矣。溼熱鬱積。則內生諸蟲。溼熱浸淫。

則外為疥癬。得大寒極苦之物。則溼熱散。故能療諸蟲及疥癬也。根氣味相同。故亦主殺蟲利大腸耳。【清】黃宮繡本草求真論金鈴子曰。川棟子即苦棟子。因出於川。故以川名。又名金鈴子。棟實者是也。味苦氣寒微毒。凡人冬時感冒寒邪。至春而發。則為溫。以致症見狂燥。並疝瘕。熱被寒束。症見囊腫莖強。制引作痛。與夫寒熱積聚。三蟲內蝕者。俱宜用此調治。以苦正有滑熱之功。寒有勝熱之義。故能使熱悉除。而毒盡癯疝亦得。因其自心下降。由於小便。而乃泄矣。但人止知此為除疝之味。而不知有逐熱解狂之力。以至廢而不治。即其治疝。亦不分其是寒是熱。是偏是平。與夫偏有錯雜多寡之異。其痛亦不分其所痛之處。是否自下而上。從上而下。惟計古方茴香川棟。歷為治疝千古祖豆。詎知疝屬於熱則痛。必見囊腫莖強。其痛亦必從下而上。用以川棟內入以為嚮導。則熱可除。如其疝並未熱。其痛自上而下。痛引入腹。且有厥逆吐涎。非用辛溫不能見效。若以川棟

同入。則於理不免歧而二矣。然古人立方治疝。偏以川棟同投。其意奚似。蓋緣邪有錯雜。則治不得不爾。若以錯雜之邪。而概用以辛燥。不更使病相左乎。續醫諸同人。凡人用藥治病。須當明其偏平。偏症偏治。平症平治。錯雜多寡不一之症。則即當以錯雜不一主治。昔繡治一族叔字次周陰疝。其症是偏不平。毫無一症混雜。乃有附城一醫。必執古方。用以川棟。繡謂病症不雜。何須用是。然終謂其古方所用川棟。稽書何無一語活動。間有指屬反佐。亦無一語申明。以致蒙混不解。繡只據理投服。隨手輒應。而不為方所執。及閱張璐本經逢原。其辨川棟功用。分為陰陽二疝。及有錯雜之邪。必用川棟之說。始嘆理道本同。而古人則先我而獲。繡益信己所治族叔之病。而不敢用川棟者。未始不有理存。而竟所換如一也。否則幾為古方所誤矣。故凡疝因熱邪。及因蟲蝕內蝕。宜於川棟。若使脾胃虛寒。症屬陰疝。則川棟其切忌焉。棟以川蘆為正。去皮取肉。去核用根。有雌雄二

種。雄根色赤。無子大毒。忌火。雌根白子多。微毒。可採去青留白。單味酒投煎服。殺蟲治瘧。煎湯洗之。可治中蠱。即時吐出。

國外學說 日本學說謂味極苦。俗用爲殺蠹藥。據近年下山平野兩氏之實驗云。含所謂「クワツシン」之苦味素。但其量甚少。僅〇・〇二%而已。「クワツシン」亦爲括矢亞(瓜沙)之有效成分。故黃棟樹亦如括矢亞。用爲苦味劑(健胃劑)據現今藥物治療學之理論云。凡苦味藥。能使胃腸壁內之白血球增殖。且興奮蠕動。以催食物之吸收。黃棟之煎汁。有殺蠹之效。而於人體無害。若爲健胃藥之用。量一日數回〇・五至二・〇。但每回量僅可服〇・二至一・〇。又日藥舖所售苦棟子爲日產苦棟之子實。少苦味。華產爲唐苦棟 *Melia toosendan* S. & N. 之子實。較日產爲大。苦味亦甚。又日產苦棟子。日名苦木 *Picrasma Quassoides*, Penn. (*P. alontheoides*, Pl.) 係屬苦木科之有毒落葉亞喬木。幹葉俱

八畫 金

苦。味甚烈。樹皮用作驅蟲劑。其浸汁。可注殺菜蟲。民間又常用以驅風。英美學說謂苦棟子即棟樹所結之子。該樹開紅紫色之花。結實與小鈴相似。其生時色青。比熟時則呈黃色。故又名金鈴子。能作補劑。驅蟲。

配合應用 治熱厥心痛。或發或止。身熱足寒。久不愈者。先灸大溪崑崙。引熱下行。內服金鈴散。用金鈴子玄胡索各一兩。爲末。每服三錢。溫酒調下。(潔古活法機要方)

治小兒冷疝氣痛。膚囊浮腫。金鈴子去核五錢。吳茱萸二錢。牛爲末。酒糊丸。黍米大。每鹽湯下二三十丸。(全幼心鑑方)

治丈夫疝氣。本臟氣傷。膀胱連小腸等氣。金鈴子一百箇。溫湯浸過。去皮。巴豆二百箇。微打破。以麵二升。同於銅鍋內。炒至金鈴子赤爲度。放冷取出。去核爲末。巴豆不用。每服三錢。熱酒或醋湯調服。一方入鹽炒茴香半兩。(經驗方)

分作五分。一兩用破故紙二錢炒黃。一兩用小茴香三錢。食鹽半錢同炒。一兩用萊菔子一錢同炒。一兩用牽牛子三錢同炒。一兩用斑蝥七枚去頭足同炒。揀去食鹽。萊菔。牽牛。斑蝥。只留故紙茴香。同研爲末。以酒打麵糊丸。梧子大。每空心酒下五十丸。(濟察方) 又棟實丸。治一切疝氣腫痛。大有神效。用川棟子酒潤取肉一斤。分作四分。四兩用小麥一合。斑蝥四十九箇同炒熟。去蝥。四兩用小麥一合。巴豆四十九粒同炒熟。去豆。四兩用小麥一合。巴戟肉一兩同炒熟。去戟。四兩用小茴香一合。食鹽一兩同炒熟。去鹽。加破故紙酒炒一兩。廣木香不見火。一兩。爲末。酒煮麵糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯空心下。日三服。(得效方) 又棟實丸。治外腎脹大。麻木痛破。及奔豚疝氣。用川棟子四十九箇。分七處。切取肉。七箇用小茴香五錢同炒。七箇用破故紙二錢半同炒。七箇用黑牽牛二錢半同炒。七箇用食鹽二錢同炒。七箇用蘿蔔子二錢半同炒。七箇用巴豆十四箇同炒。七

箇用斑蝥十四箇去頭足同炒。揀去蘿蔔子。巴豆。斑蝥。三味不用。入青木香五錢。南木香。官桂各二錢半。爲末。酒煮麵糊丸。梧子大。每服三十丸。食前用鹽湯下。一日三服。(直指方)

治臟毒下血。苦棟子炒黃爲末。蜜丸。梧子大。米飲每吞十九至二十丸。(經驗方)

治腹中長蟲。棟實以醇苦酒漬一宿。綿裹塞入穀道中。三寸許。日二易之。(外臺祕要方)

治耳卒熱腫。棟實五合。搗爛。綿裹塞之。頻換。(聖惠方)

治腎消痔淋。病在下焦。苦棟子。茴香等分炒爲末。每溫酒服一錢。(聖惠方)

治小兒五疳。川棟子肉。川芎。藟等分爲末。豬膽汁糊丸。米飲下。(摘玄方)

用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡虛寒而無實火。溼熱者禁用。茴香爲之使。參攷資料 熱厥暴痛。非此不能除。(元素) 按羅願爾雅翼云。棟葉可以練物。故謂之棟。其子

如小鈴。熱則黃色。名金鈴。象形也。
 (李時珍) 此有雌雄兩種。雄者無子。根赤。有毒。服之使人吐不能止。時有至死者。雌者有子。根白。微毒。入藥當用雌者。(蘇恭) 棟實以蜀川者為佳。木高丈餘。葉密如槐而長。三四月開花。紅紫色。芬芳滿庭。實如彈丸。生青熟黃。十二月採之。根採無時。(蘇頌) 棟長甚速。三五年即可作椽。其子正如圓棗。以川中者為良。王禎農書言鴉食其實。應劭風俗通言。獾豸食其葉。宗懷歲時記言。蛟龍畏棟。故端午以葉包棧。投江中。祭弔屈原。(李時珍) 昔人以川棟為疝氣腹痛。殺蟲利水葯。然多有不用之。不效者。不知川棟所主。癰腫莖強。木痛溼熱之疝。非痛引入腹。厥逆嘔涎之寒疝所宜。夫疝竅由寒束熱邪。每多擊引作痛。必需川棟之苦寒。兼茴香之辛熱。以解錯綜之邪。(張石頑)

【金鈴根木皮】 外國名詞
 tos Cortox (Bark of Malia Azedarach)
 性質 苦。微寒。微毒。
 主治 殺蚊。利大腸。
 歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論金鈴根木皮曰。苦酒和塗疥癬甚良。【宋】大明諸家本草論金鈴根木皮曰。治遊風熱毒。風癩。惡瘡。疥癩。小兒壯熱。並煎湯浸洗。
 國外學說 英美學說謂棟根皮產中國。印度。歐羅巴。及亞美利加等處。該樹高約三丈。取該樹根皮。無論鮮乾。均可入藥。味苦寒。而有微毒。為收斂藥。驅蟲藥。惟不宜過服。過服則或頭暈目眩。及筋微抽。務宜慎用。方用鮮棟根皮二兩。水二十兩。入鍋熬至十兩為度。如小兒腹內生蟲。宜服一酒杯。每三點鐘服一次。服至作嘔。嘔瀉為率。如此方見功效。(棟根皮煮水方)
 又棟根皮二兩。半搗爛。淡酒一斤。納有蓋器內。浸七天。間時搖動。絞渣。過淋紙。再加酒仍足一斤為度。

作補劑。每服五分至二錢。驅蟲。每服二錢至四錢。(棟根皮酒方)
 卷致資料 金鈴根木皮。雄者根赤。有毒。吐瀉殺人。不可誤服。雌者入服食。每一兩可入糯米五十粒。同煎殺毒。若瀉者以冷粥止之。不瀉者以熱葱粥發之。(大明)
 【金鈴草】即金縷釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金縷釣蝦蟆』條。
【金鈴菊】 形態 金鈴菊。為溼小如鈴。幹高與人等。而菊葉五山。此獨尖長七出。花與葉層層相間。不獨生於枝頭。亦有家野兩種。其花可供藥用。
 性質 苦寒。
 主治 作枕除頭風。目疾。洗風火眼疾。搗傳一切腫毒。諸蟲咬。並去內熱。止熱瀉。
 配合宜忌 凡胃虛便滑。無寒熱者禁用。
【金鈴葉】 主治 療疝入囊痛。隨發時煎酒飲。
【金鈴盃】 即金不換之大葉者。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

即紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫接骨』條。
【金鈎子】 即根槓子之古籍別名。典見綱目。詳『根槓子』條。
【金鼎蟻砂】 即蟻砂之古籍別名。典見綱目。詳『蟻砂』條。
【金鼓草】 即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。
【金箔】 即金之處方用名。詳『金』條。
【金精石】 古籍別名 金星石。
 產地 出福建永春縣雙鬢山等處。
 形態 金精石為石類之一種。其石似鐵礦而鬆。色如黃金。
 主治 去翳明目。入眼科用。
【金銀花】 原名 忍冬花。
 白二色。故名。
 處方用名 二寶花。淨銀花。銀花炭。忍冬花。山銀花。密銀花。濟銀花。
 基本 屬忍冬科。為忍冬之花。
 產地 陳仁山藥物生產辨云。頂銀花。產河南禹州府繁縣。名曰

蜜銀花。中蜜花。產山東濟南府。名曰清銀花。又有一種淨山銀花。由嶺江來。廣東產者為土銀花。廣西亦有產。均名土銀花。稍次。以上均秋夏出新。廣東則以東江增城。派潭。新安。惠州一帶為最好。北江連灘。羅定次之。廣西南寧又次之。

形態 金銀花為蔓性小灌木。多自生於山野之間。初夏開花於葉腋。帶紫白色。尖端五裂如唇。為長合瓣花冠。中貯蜜。其芳香。經二三日。花冠變黃。當開花時則黃白相間。美麗可觀。故有金銀花之名。採摘陰乾。則現黃褐色。

採取 四月間。採花陰乾。
用法 水煎或酒浸。或蒸露飲。
性質 甘寒。無毒。
效能 清熱治痢。解毒療瘡。

主治 寒熱身腫。久服輕身。長年益壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論銀花曰。治腹脹滿。能止氣下痢。【唐】陳藏器本草拾遺論銀花曰。治熱毒血痢水痢。濕煎服。【明】李時珍本草綱目論銀花曰。

八畫 金

治飛尸遁尸。風尸沉尸。尸疰鬼擊。一切風溼氣。及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。【明】李士材本草圖解論銀花曰。金銀花甘而微寒。主腸滿下痢。消癰散毒。補虛療風。近世但知其消毒之功。昧其脹風風虛之用。余於諸症中用之。屢屢見效。奈何忽之耶。【清】黃宮繡本草求真論銀花曰。金銀花經冬不凋。故又名忍冬。味甘性寒無毒。諸書皆言補虛養血。又言入肺散熱。能治惡瘡腸癰癰疽痔漏。為外科治毒通行要劑。按此似屬兩歧。殊不知書言能補虛者。因其芳香味甘。性雖入內。逐熱而氣不甚迅利。傷損之意也。書言能養血者。因其毒結血凝。服此毒氣頓解。而血自爾克養之謂也。究之止屬清熱解毒之品耳。是以一切癰疽等病。無不藉此內入。取其氣寒解熱。力主通利。至云能治五種屍疰。事亦不虛。如謂久服輕身。延年益壽。不無過談。凡古人表著藥功。類多如是。是在用藥者。審認明確。不盡為藥治效所惑也。花與葉同功。其花尤妙。【清】黃元御玉楸藥

解論銀花曰。金銀花清散風溼。消除腫毒。治一切瘡瘍。楊梅疥癬。痔瘻痢疾之類。數飲俱妙。功次木芙蓉。辨偽 鄭肯巖曰。金銀花甘平。除熱解毒。能和營衛。療風養血。除痢寬脹。匪特為瘡科要藥也。隨地皆有。以河南所產為良。近有以柔花偽充。為禍最烈。柔花短小。梗多。色黑不香。為異。亦易辨已。曹炳章曰。按金銀花產河南淮慶者。為淮密。色黃白。軟糯而淨。柔粗長。有細毛者為最佳。禹州產者曰禹密。花柔較小。無細毛。易於變色。亦佳。濟南出者為濟銀。色深黃。柔碎者次。亳州出者。柔小性梗更次。湖北廣東出者。色黃黑。梗多層重。氣味俱濁。不堪入藥。

配合應用 治鬼擊身背作痛。用金銀花一兩。水煎飲之。【李樓怪病奇方】 治脚氣作痛。筋骨引痛。以熱酒。即金銀花為末。每服二錢。熱酒調下。【衛生易簡方】 用量 三錢至四錢。 應用宜忌 凡脾胃虛寒。而無

熱毒者禁用。 著名方劑 銀翹散。治太陰風溫。溫熱溫疫。冬溫初起。但熱不顯。寒者此方主之。【溫病條辨方】 銀花。連翹各一兩。苦桔梗六錢。薄荷六錢。竹葉四錢。生甘草五錢。荊芥穗四錢。香豉五錢。牛蒡子六錢。杵為散。每服六錢。鮮萊根湯煎服。 參攷資料 花葉同功。花香尤佳。釀酒代茶。熬膏並妙。忍冬酒。治癰疽發背。一切惡毒初起。便服。奇效。乾者亦可。不及生者力速。忍冬五兩。甘草二兩。水二碗。煎至一碗。再入酒一碗。略煎。分三服。一日一夜吃盡。重者日二劑。服至大小便通利。則藥力到。【汪昂】 金銀花。李士材已表其治痢治脹之功。而不知尚有清絡中風火濕熱。解溫疫穢惡濁邪。息肝膽浮越風陽。治瘧厥癩癩諸症也。【王秉衡】 【金銀花草】 即忍冬藤之古籍別名。與見和漢藥考。詳【忍冬藤】條。 【金銀花露】 即金銀露之古方用名。詳【金銀露】條。 【金銀藤】 即忍冬藤之古籍別名。與見綱目。詳【忍冬藤】條。

七六五

【金銀露】 命名 本品係忍冬藤花蒸取之露。

處方用名 金銀花露。銀花露。

性質 甘。平。無毒。

主治 開胃寬中。散暑清火。解毒。

參攷資料 金銀花露。取鮮花蒸者香。乾花者稍遜。氣芬郁而味甘。暑月以之代茶。飼小兒無疥毒。(趙學敏)

【金鳳毛】 古籍別名 翠翎草。為羅(綱目拾遺)

形態 金鳳毛。為雜草類之一種。翠透如翎。塌地而生。葉細。今人編竹為亭臺。以植之盆中。秋開大紅小花。以供玩賞。可供藥用。

主治 耳疔。痔漏。

【金鳳花子】 卽鳳仙子之古籍別名。典見綱目。詳『鳳仙子』條。

【金漿】 製法 用金和豬脂苦酒。或牡荊慈石煉而成之。

性質 辛。平。有毒。

主治 長生神仙。久服腸中盡為金色。

參攷資料 金為鑄貨之物。人

為血內之蠶。久服損肌傷肉。未有不喪生者。此乃方士之言。不可深信。(醫學大辭典)

【金漿】 卽口津之古籍別名。典見綱目。詳『口津』條。卽金之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金』條。

【金瘡小草】 外國名詞 *Ca. Pygmaea*

△ *Ca. (拉丁)* キランサウチヨクノカマノフタ(日本)

基本 唇形科金瘡小草之莖葉。

產地 生山野田澤間。

形態 金瘡小草為溼草類之自生草本。莖高二三寸。不直立。布地而生。葉深綠色。略帶紫色。有缺刻。對生。莖與葉皆有毛。初春花生於莖之頂端及葉腋。唇形花冠。青紫色。其莖葉可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 療金瘡。止血長肌。斷鼻中衄血。取葉揉傅。亦可煮汁服。瘀血下血。和石灰杵為丸。刮傅之。

【金箭頭】 古籍別名 風藥菊。(綱目拾遺)

形態 金箭頭。為溼草類菊屬

之一種。花長而未銳。枝葉可茹。並供藥用。

主治 頭風。功倍他菊。

【金線巴豆】 巴豆之一種。殼有縱文。隱起如線。一條至兩三條者。詳『巴豆』條。

【金線重樓】 卽金線釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金線釣蝦蟆』條。

【金線草】 卽松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『松蘿』條。

【金線草】 卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

古籍別名 挂金藤。金鈴草。獨脚蟾蜍。金線重樓。(綱目拾遺)

【金線釣蝦蟆】 古籍別名 產地 生田野山石間。

形態 金線釣蝦蟆。為蔓草類之一種。小滿節時發苗。引蔓而生。色紫紅。而細莖折之有液出。如乳汁。葉如三角風。又似金鎖匙。又似黃龍藤。而柔軟光潤。帶青黃色。上有蜘蛛紋。芒種節時開花。如穀精花。結子。狀如鈴。根似蝦蟆。有疙瘩。入土不深。年久根旁發生數十根。

結。探得可供藥用。其莖葉汁。詳見各條。

性質 苦。涼。平。

主治 追風敗毒。吐痰涎。療傷寒熱成瘡。托癰疽。散腫毒。消瘰癧。跌撲損傷。

配合宜忌 忌鐵器。

參攷資料 金線釣蝦蟆根性涼。托癰疽。追散腫毒。治瘰癧。為外科聖藥。(百草鏡) 金線釣蝦蟆生者力最大。乾者稍次。凡大癰服之必吐。人多懼畏。勿用。然吐後其病如失。毒即內消。凡發背毒。氣攻心。非此不治。若係小毒。斷不可用。因藥力性大。病不能相當也。不能相當。則有偏勝之害。(綱目拾遺) 金線釣蝦蟆。探得去外黑皮。用石槌打碎。勿犯鐵器。晒乾為末。小磁瓶收貯。凡遇一切要吐痰涎之症。用代瓜蒂最妙。(扁鵲心書)

【金線釣蝦蟆莖汁】 主治 伏雄制

硫。煉雄。煮汞。作霜用。

【金線釣蝦蟆葉】 原名 天芥菜。

主治 疥瘡。惡毒。流注。痔毒。鼠瘻。合酒搗服。心疼煎酒服。搗貼腫毒。捺痔瘡。

參攷資料 金線釣蝦蟆葉。多食之令人吐瀉。(綱目拾遺)

【金線蛙】即田雞之一種。體色淡綠。背有黃色縱線。腹白。口中有舌及齒。趾有蹼。性機警。善鳴。常棲息水田中。食昆蟲。有益農家。性質功用與田雞同。詳『田雞』條。

【金線藤】即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【金剪刀】即玉如意之別名。詳『玉如意』條。

【金剪花】即玉不留行之別名。詳『玉不留行』條。

【金蓮子】即蓉菜之古籍別名。典見說文。詳『蓉菜』條。

【金蓮枝】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【金蓮花】古籍別名 旱地蓮。金芙蓉。(綱目拾遺)

產地 出山西五臺山野。

形態 金蓮花爲山草類之一種。其葉綠色。瘦尖而長。有五尖或七尖。花金黃色。七瓣兩層。花心亦

八畫 金

黃。一莖數朵。宛若蓮花而小。六月盛開。至秋花乾不落。結子如粟米而黑。其花可供藥用。



金蓮花

性質 苦寒。無毒。

主治 明目解風毒。並療口瘡。喉腫。齒熱牙宣。耳疼。目痛。疔瘡。大毒。諸風。

【金鴉】即草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【金橘】命名 本品生時青虛色。黃熟則如金。故名。

古籍別名 金柑。(綱目) 盧橘。(漢書) 夏橘。(廣州志) 山橘。(北戶錄) 給客橙。(魏王花木志)

外國名詞 Citrus nobilis, Lour var. microcarpa Hassk.

(拉丁) キンカン マルヤキン カン(日本)

基本 係芸香科柑屬。爲金橘之果實。產地 出嶺南川廣等省。

形態 金橘爲果類之常綠灌木。高六七尺。葉橢圓形。或卵形。有透明之小點。葉柄之先端。有關節。夏月開花。花白色。五瓣。冬月果實成熟。球形。帶黃色。大如指頭。氣味酸。皮却甘美。芳香。生食蜜漬皆良。亦可供藥用。



金橘

性質 酸。甘。溫。無毒。

主治 下氣。快腸。止渴。解醒。辟臭。皮尤佳。

【金橘脯】即金橘餅之通俗名。詳『金橘餅』條。

【金橘餅】基本 本品係金橘和糖製成之餅。故名。

古籍別名 金橘脯。(俗名) 金錢橘。(綱目拾遺)

形態 金橘餅。形小如錢。明如琥珀。可供食與藥用。

產地 以產自福建莆田縣者良。性質 甘。溫。無毒。

主治 消食下氣。開胃醒酒。捷於砂仁豆蔻。

【金燈】即山慈姑之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山慈姑』條。

【金燈籠】即天燈籠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天燈籠草』條。

【金盤草】即木八角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『木八角』條。

【金蕊】即菊花之古籍別名。典見綱目。詳『菊花』條。

【金薺】即羊蹄之古籍別名。典見綱目。詳『羊蹄』條。

【金錢松】即羅漢松之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【金錢花】即旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳『旋覆花』條。

【金錢重寶】即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【金錢草】古籍別名 遍地香。佛耳草。白耳草。乳香藤。九里香。半池蓮。千年冷。遍地金錢。(綱目拾遺)

形態 其葉對生。圓如錢。錢見草。葉形圓。二瓣對生。象錢狀。生郊野。地。十月二月發苗。蔓生。滿地。

開淡紫花。同一二寸則生二節。節布地生根。葉四圍有小缺痕。皺面。以葉大者力勝。乾之清香者真。可供藥用。

採取 三月間採之。

性質 微甘寒。

主治 跌打損傷。瘧疾。產後驚風。肚癰。便毒。痔漏。癩癩。掌風。汁漱牙疼。去風散毒。煎湯洗一切疥疥神效。發散頭風。風邪。治腦瀰。白濁。熱淋。玉莖腫痛。搗汁沖生酒下痰定喘。能去肺脹。止咳寧嗽。

近人學說 繆永祺曰。膀胱石一症。俗稱沙淋。或石淋。用藥物治療。不獨不能根治。且實難收效。而中醫書所存之砂淋方。予曾屢次試驗。實無效果之可言。或只有一時之輕快耳。惟西醫之剖取術。至為可靠。惟剖取術。手術既繁。且剖取後。不能起坐於牀月餘。困苦殊甚。故人多畏懼。而不願就此治療也。余於民國八年七月時。在石龍搭車往香港。順在車站訪陳君紫泉。見其呻吟牀席間。問其故。則曰。今患砂淋症。本欲函請先生來調治。今適來甚佳。並道其病歷曰。前

二十餘天。小便刺痛不利。滴瀝而下。吾嘗如此。以為溼熱。略飲去溼之茶。則愈。今則飲去溼熱之茶。不獨不愈。且漸甚。已延數醫治之。皆無寸效。昨至今日。連滴瀝之溺。亦不能出。下腹部則膨脹不安。余以手撫其腹。確為溺蓄於膀胱中也。余即入石龍友人處。借得放溺管與之。放溺。放出約有磅半之多。放時。順將管探其膀胱。果探得二石。一大如胡桃。一大如雀卵。且堅實而圓。溺放出後。陳君即能起坐。囑余為之治療。余告之曰。欲根治之。必須就醫院中剖取。陳君言。吾寧死。亦不願就此麻煩之治療也。予謂除此之治法外。實無別法。可以根治的。故却之。越二月。道經此。順再訪陳君。欣然有喜色。取一小白鐵罐示余。並問罐中是何物。予視之。乃半罐極微之砂也。予問此砂之來。曰。先生前言吾之砂淋。除西法剖取外。實無他法者。今則不用剖取。只服一味草藥。而能將膀胱內之砂打碎而出。此即由小便溺出之砂也。先生輕視中藥。謂除剖取外。無別法。特留以待先生之

研究耳。予訝其神奇。余意砂在膀胱內。又如是大且堅。雖用藥直浸此石。亦難使其化。至如是之微。假雖有藥能化。至如是之微。必不能入口。可入口之藥。焉能有此之猛力。假既有此之猛力。堅硬之石。既可化。豈人身之柔軟臟腑。不能化耶。余有此疑。圖於心。故不信其言也。余曰。可否為余一再探乎。曰。可。余又即往借探膀胱管探之。確不能探得二砂矣。余始信其言不謬。而訝其藥之奇。故問是何藥。陳君言。受一客人口傳。即取出數扎與余看。乃金錢草也。並曰。可將此執歸。為將來之試驗。其用法。乃用一扎約十兩重。煎一大壺水。作茶飲。越飲多越妙。吾不過飲了五六次。而竟獲愈矣。余持歸。曾試一人。此人先覺小便刺痛。有時不利。以致點滴而下。或時沖出砂粒一二枚。及微砂些少。月餘不愈。求治於余。用探膀胱管探其膀胱。探得有石二三枚。如荔枝核大。即給與金錢草三扎。使服。服後出砂頗多。而刺痛不利大減。囑再自覓煎服。服三四次。則溺已無砂見而愈矣。又一小

兒五六歲。有一砂如橋核大而扁。塞在溺管之中。近溺管口深半寸之處。以致小便不利。及刺痛。余試與金錢草服之。二日全無效。則用剖取術。剖開溺管口。而取出之後。經數年。欲再試用。而無機會。直至民國十三年四月。又有一農人。患砂淋七八年。時時小便刺痛。若行路多時。覺小腹有重物牽墜之感。起覺動搖的麻痺及痛。近來更甚。故來求治云云。余用探膀胱管探之。探得其石如鵝卵大。形橢圓。另有二粒如桂圓之核。余即給金錢草四大扎。分二日用。每日用二扎。煎水一大壺。作一日之用。量。二日後。來診云。服後刺痛大減。砂粒亦有疳出。余再給以二日量。囑小便時。以器貯之。不料第四日所見器中。積有微砂甚多。權之有七兩餘。再給以金錢草二日量。服後再查貯尿器中。其微砂大減。以探膀胱管探其膀胱。不復能得其砂。故知其已愈矣。直至今未復發。由是觀之。金錢草對於溺管中之石。大約無效。對於膀胱石。則有效。雖未敢斷為定論。然亦不得謂為無效也。惜後欲

研究耳。予訝其神奇。余意砂在膀胱內。又如是大且堅。雖用藥直浸此石。亦難使其化。至如是之微。假雖有藥能化。至如是之微。必不能入口。可入口之藥。焉能有此之猛力。假既有此之猛力。堅硬之石。既可化。豈人身之柔軟臟腑。不能化耶。余有此疑。圖於心。故不信其言也。余曰。可否為余一再探乎。曰。可。余又即往借探膀胱管探之。確不能探得二砂矣。余始信其言不謬。而訝其藥之奇。故問是何藥。陳君言。受一客人口傳。即取出數扎與余看。乃金錢草也。並曰。可將此執歸。為將來之試驗。其用法。乃用一扎約十兩重。煎一大壺水。作茶飲。越飲多越妙。吾不過飲了五六次。而竟獲愈矣。余持歸。曾試一人。此人先覺小便刺痛。有時不利。以致點滴而下。或時沖出砂粒一二枚。及微砂些少。月餘不愈。求治於余。用探膀胱管探其膀胱。探得有石二三枚。如荔枝核大。即給與金錢草三扎。使服。服後出砂頗多。而刺痛不利大減。囑再自覓煎服。服三四次。則溺已無砂見而愈矣。又一小

試驗而無機會。未足以爲定論耳。
 配合應用 ①白虎丹。鮮野甜菜。即車前草。洗淨。加遍地香。搗爛。用白酒和汁絞出。鷄毛藤。搗患處即消。(祝氏效方)

②治疥瘡。鈹兒草。加鹽少許。搽熱。頻擦全化。再洗浴。三次必愈。若用煎洗。反不見效。(救生苦海方)

③治疔瘡。走黃。毒歸心。銅錢草。即道地香。採葉搗爛。童便煎服。服後再飲好菜油二三碗。今吐。如吐即不必服矣。再加生豬鬃一個。同白粽子搗勻敷。(慈航活人書方)

【金錢草】即菟絲子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【金錢橋】即金橋餅之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「金橋餅」條。

【金錢薄荷】即薄荷之古籍別名。與見綱目。詳「薄荷」條。

【金龜子】別名 金花蟲。金龜。蟻蟻餅。
 產地 出嶺南。生草叢中。

形態 金龜爲甲蟲類。吉丁蟲之一種。體長六七分。身首皆如泥金裝成。甲黑。似如龜狀。四足二角。大如刀豆。頭面似鬼。可供藥用。

八畫 金

主治 佩之令人媚愛。

【金簪草】即蒲公英之古籍別名。與見土宿本草。詳「蒲公英」條。

【金髮】即番薯根形。圓而色黃者。詳「番薯」條。

【金龜】即金龜子之別名。詳「金龜子」條。

【金鎖天】即灰蘿之古籍別名。與見綱目。詳「灰蘿」條。

【金鎖匙】即荷包草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「荷包草」條。

④即杜衡之古籍別名。與見救急方。詳「杜衡」條。⑤即山豆根之古籍別名。與見和漢藥考。詳「山豆根」條。

【金鎖銀開】命名 本品能治喉閉諸症。故名。
 古籍別名 鐵邊箕。(百草鏡) 天蕎麥。野蕎麥。小青草。(李氏草秘) 金鬚針。(綱目拾遺) 象毛。(汪連仕採藥書)

產地 生山野樹林。及石砌間。處處有之。
 形態 金鎖銀開。爲莖草類。藤屬之一種。形似蕎麥。莖質柔而性

堅。折之不斷。上有倒刺。細如稻芒。葉如天冬。又似土茯苓及蕎麥。開粉紅花。結藍色子。其根黑色。兩旁有細刺。狀如邊箕。但山產者皮黃。出汗泥中者色黑。可供藥用。其莖詳見該條。


主治 輕堅化痞。散鎖纏喉。風喉中風火。喉閉喉毒。並療痔漏。白濁。乳癰。風毒。蛇傷。木蛇毒。

【金鎖銀開莖葉】主治 痰核。瘰癧。搗汁和酒服。並和米粉作餅食。

【金雞】即鷄雄之古籍別名。與見綱目。詳「鷄雄」條。

【金雞爪】即枳椇子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【金雞尾】別名 年年松。
 產地 生建昌山中。



形態 叢生。莖莖。葉如箭葉。排生。中有金黃粗紋一道。面綠背後微白。露根。似貫衆。狗脊。可供藥用。

效能 解水毒。
 【金雞勒】別名 規那樹。(植物學大辭典)

學名 Cinchona (Cinchona Bark) キナノキ キナ
 基本 茜草科。規那樹屬。

產地 熱帶。以亞美利西亞爲原產。近則印度。錫蘭。爪哇等處皆移植之。

形態 本品係常綠木本。莖高七八十尺。葉卵圓形。或橢圓形。有光澤。對生。圓錐花序。花小。合瓣花冠。筒狀。五裂。白色。或帶紅色。其皮可爲藥用。市上流行之金雞納霜。即由此提煉而出。

種類 規那皮。往時分黃色。赤色。褐色三種。黃皮爲上。赤色次之。褐色又次之。而今之流行市者。以印度所產之一種赤色者爲最多。



性質 辛。熱。有小毒。

七六九

八畫 金

成分 規那皮之成分。以規那並爾加魯乙度爲主。又含希諾委坦 (Chinovin $C_{14}H_{19}O_2$) 之偏單古知度。規那酸 (Chinasauric acid $C_6H_7(OH) - COOH$) 並規那鞣酸 (Chinagerbsaure) 之一種。鞣酸而以規那皮熱於小試驗管中時。則生美麗紅色之參兒者。因化生規那赤色素 (Chinaroth) 故也。由此鞣酸分解而來規那亞爾加魯乙度。種種不一。其最主要者。爲規尼涅 (Quinin) 及規尼質 (Chinidin) (共 $CaNa_2N_2O_2$) 並聖古尼涅 (Cinchonin) 及聖古尼質 (Cinchonidin) (共 CaH_2N_2O)。規那亞爾加魯乙度之在規那皮中。其量不同。近時專行之印度規那樹皮。含有亞爾加魯乙度百分之六至百分之十。規尼涅百分之一至百分之四。

主治 治癒。解酒。
 用量 一錢至二錢。
 【金雞脚】即金星草之日本名。詳【金星草】條。
 【金雞樹】即樹之古籍別名。典見綱目。詳【樹】條。

【金雞獨立草】即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【翠羽草】條。

【金礫石】即礫石之處方用名。詳【礫石】條。

【金邊兔耳】 產地 生沙土間。

形態 金邊兔耳。爲山草類之一種。形如兔耳草。貼地生葉。葉面淡綠。背微白。有筋脈。邊緣有黃毛茸茸。作金色。初生時。葉捲如兔耳狀。可供藥用。
 性質 甘淡。

主治 虛勞吐血。

【金寶相】即紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【紫接骨】條。

【金罌】即酸石榴之古籍別名。典見綱目。詳【酸石榴】條。

【金罌子】即金罌子之處方用名。詳【金罌子】條。

【金鐘草】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳【王不留行】條。

【金鐘薄荷】即金鐘薄荷之古籍別名。典見王采安。詳【金鐘薄荷】條。

【金鐘薄荷】 古籍別名 金鐘薄荷。(綱目拾遺)

形態 金鐘薄荷爲細葉薄荷之山產者。其葉細。根堅硬。葉可供藥用。根詳見該條。

主治 止吐血。黃疸。跌打。諸般風氣。

效能 治跌打損傷。殺腹蟲牙痛。一切風氣。吐血。黃疸。煎湯服之。

【金鐘薄荷根】 主治 蝨刺。傷。諸瘡。

【金鐘草】即酸漿之俗名。詳【酸漿】條。

【金鯽魚】即鯽魚之別名。詳【鯽魚】條。

【金櫻子】 命名 本品一作金罌。其子形如黃罌。故名。

處方用名 金罌子。
 古籍別名 刺梨子(開寶) 石榴。山雞頭子。(綱目)

外國名詞 Rosa Canina (R. Hystrix or Levigata.) (Dog Rose.) (拉丁) ナニハイ

七七〇

バラ セツカイバラ(日本) 基本 係薔薇科。爲薔薇屬金櫻子之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。金櫻子各省均有。廣東則清遠至北江一帶有出。十月新。

形態 金櫻子屬灌木類。其木攀緣植物。莖生甚長。枝幹均有密刺。狀如薔薇。葉爲複葉。小葉三或五個。有光澤。托葉着生於葉柄之上。夏初開白色花。單瓣。大三寸許。甚美。亦有重瓣及淡紅色者。萼筒作鐘狀。亦有刺。雌蕊多數。隱於萼筒之內。秋時結子。又有刺大如指頭。色黃味淡。

採取 九十月間實熟時採之。製法 凡使金櫻子入藥。去核并淨白毛。否則須以棉包入藥。因核內白毛。恐射肺病。咳。與他藥水煎。或熬膏。或製末。和作丸劑。

性質 酸。清。平。無毒。
 成分 金櫻子之主要藥質爲鞣酸 $(C_{26}H_{34}O_{16})$ 。檸檬酸 $(C_6H_8O_7)$ 。糖質。鞣酸樹膠糖質。
 效能 酒精治遺精。固腸止瀉。

均。用作收斂藥。又治腸黏膜炎。

作用 入胃後。微有助胃液之不足。以促進消化之功能。入腸能使腸壁之黏膜收縮。分泌減少。至血中。略能將微血管收縮。白血球之運動。亦稍被壓滅。故有止瀉退熱之效。

主治 脾洩下痢。止小便利。瀉精氣。久服令人耐寒輕身。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論金櫻子曰。金櫻子味酸。澀。氣平。溫。無毒。氣薄。味厚。入足太陽手陽明。兼入足少陰經。十劑云。澀可去脫。脾虛滑洩不禁。非澀劑無以固之。膀胱虛寒。則小便不禁。腎與膀胱為表裏。腎虛則精滑。時從小便出。此藥氣溫。味酸。澀。入三經。而收斂虛脫之氣。故能主諸證也。精固則精氣日生。而陽氣充。骨節滿。故耐寒輕身也。【清】黃宮繅本草求真論金櫻子曰。金櫻子生者酸澀。熟者甘澀。用當用其將熟之際。得微酸甘澀之妙。取其澀可止脫。甘可補中。酸可收陰。故能善理夢遺。崩帶。遺尿。且能安魂定魄。補精益氣。壯筋健骨。此雖收瀉

八畫 金

佳劑。然無故熬膏類服。而令經絡隧道阻滯。非惟無益。反致增害。諸凡藥品。須當審顧。不可不知。似榴而小。黃赤有刺。取半黃者去刺。核熬膏。甘多澀少。【清】閱立陞本草選旨論金櫻子曰。金櫻子味甘微澀。氣平。溫。無毒。主治脾洩下痢。精滑自流。夢中積泄。小便數。去睡後遺尿。取其溫且澀也。若世人待紅熱時。取汗熬膏。味甘。全斷澀味。誤矣。故法取半黃者。搗末熬膏。正恐其太熱也。

國外學說 英美學說謂金櫻子產中國西國等處。取該樹所結之果。可為藥品。其味酸。而澀。能解熱。收斂。作糕用。處方以鮮金櫻子一分。去核。煉白糖二分。先將金櫻子入石臼搗爛。過羅。再加白糖研勻。為度。配丸藥用。每服一錢。零五釐。至二錢一分。此金櫻子糕方也。
配合應用 ①同次實粉為丸。名水陸丹。益氣補真。
②金櫻子煎。霜後用竹火子。搗取入木臼中。杵去刺。擊去核。以水淘洗過。搗爛。入大鍋水煎。不得絕火。煎減半。濾過。仍煎似稀餡。每服

一匙。用燈酒一盞調服。活血駐顏。其功不可備述。(孫真人食忌方)

③補血益精。金櫻子即山石榴。去刺及子。焙。四兩。橘砂二兩。為末。煉蜜和丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒服。(奇效良方)

④治久痢不止。嚴緊絕妙方。罌粟殼。炒。金櫻子。花葉及子。等分為末。蜜丸。芥子大。每服五七丸。陳皮煎湯化下。(普濟方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡有實火邪熱者禁用。

製法 金櫻子。係用金櫻子所熬之膏。其味化澀為甘。而補益之功尤勝。凡肝脾腎三經陰虛症。見遺精便溲。以及羸弱諸病。咸可服之。

參攷資料 ①金櫻當作金罌。謂其子形如黃罌也。石榴雞頭。皆象形。又杜鵑花小蘗。並名山石榴。非一物也。(李時珍) ②金櫻子在處有之花。白。子形似椗棒。而小。色黃。有刺。方術多用之。(韓保昇) ③今南中州郡多有。而以江西劍南嶺外者為勝。叢生郊野中。大類薔

薇。有刺。四月開花。白。夏秋結實。亦有刺。黃赤色。形似小石榴。十一月十二月採。江南蜀中人熬作煎酒服。云補治有殊效。宜州所供云。本草謂之營實。今校之。與營實殊別也。(蘇頌) ④山林間甚多。花最白。賦其實大如指頭。狀如石榴。而其核細碎。而有白毛。如營實之核。而味甚澀。(李時珍)

【金櫻東行根】 命名 本品東生者良。故名。

性質 酸澀。平。無毒。

主治 寸白蟲。到二兩。入糯米三十粒。水二升。煎五合。空心服。須臾瀉下神驗。其皮炒用。止瀉血及崩中帶下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論金櫻東行根曰。止瀉劑。煎醋服。化骨哽。

【金櫻花】 性質 酸澀。平。無毒。
主治 止冷熱痢。殺寸白蟲。和鐵粉研勻。拔白髮。塗之即生黑者。亦可染髮。

【金櫻葉】 主治 癰腫。嫩葉研爛。入少鹽塗之。留頭

洩氣。又金瘡出血。五月五日採。同桑葉。等葉等分。陰乾研末。傳之血。止口合。名軍中一捻金。

【金銀針】即金鎖銀開之古籍別名。典見綱目遺拾。詳『金鎖銀開』條。

【金鹽】即五加皮之古籍別名。典見仙經。詳『五加皮』條。

【長生子】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【長生不死草】即卷柏之古籍別名。典見綱目。詳『卷柏』條。

【長生果】即落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【長生韭】即韭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『韭』條。

【長生草】即獨活之古籍別名。典見綱目。詳『獨活』條。即紅茂草之古籍別名。典見圖經本草。詳『紅茂草』條。即石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。

【長石】 古籍別名 方石。(本經)直石。土石。(別錄)硬石膏。(綱目)

基本 係單斜晶系或三斜晶系之長石。

形態 長石為石類之一種。乃構成地殼之主要岩石。色多白。有珠光。或作玻璃光。種類有正長石。與斜長石等。自然分解而為黏土。或為泡沸石類。入土壤中為植物必需之養分。探得其石。可供藥用。

成分 為石灰。加里。蘇達。礬土等之含水矽酸化合物。

主治 身熱。胃中結氣。四肢寒厥。利小便。通血脈。明目去翳。眇。下三蟲。殺蟲毒。久服不饑。(本經)止消渴。下氣。除脇肋肺間邪氣。(別錄)

參攷資料 長石即俗呼硬石膏者。狀似軟石膏而塊不扁。性堅硬。潔白。有粗理。起齒稜。擊之則片片橫碎。光瑩如鏡。母。白石英亦有牆壁。似方解石。但不作方塊。耐燒之亦不粉爛。而易散。方解燒之亦然。但燒聲為異。爾昔人以此為石膏。又以為方解。今人以此為寒水石。皆誤矣。但與方解乃一類二種。故亦名方石。氣味功力相同。通用無妨。唐宋諸方所用石膏。多此石。昔醫亦以取效。則亦可與石膏通用。但不可解肌發汗耳。(李時

珍)

【長豆】即豇豆之俗名。詳『豇豆』條。

【長命草】即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【長命菜】即馬齒莧之處方用名。詳『馬齒莧』條。

【長松根】 命名 本品葉如松名。 針功亦長生壽年。故

古籍別名 仙茆根。(綱目)海松根。(植物名彙)

學名 Pinus Pumila, Regel

基本 係松柏科。為長松 *Con. terao* 之根。

產地 凡陝西關內及西北諸山谷中皆有出。

形態 長松根長三五寸。略成紡錘形。而有凹凸。外部有輪狀之橫皺紋。而呈褐色。

性質 甘溫。無毒。

效能 有驅風強壯等作用。多製酒用之。

主治 風血冷氣。宿疾。溫中去風。 歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論長松根曰。治大風。羸疾。眉髮墮落。百骸腐潰。每以一斤入甘草少許。水煎服。旬日即愈。又解諸蟲毒。補益長年。

近人學說 袁淑範曰。長松不僅市醫不常用。即普通藥店亦不能常見。故研究之人猶少。况現今研究國藥者。多屬外人。如此等藥不著世之物。何能惹起彼等之注意。故其科屬學名。至今猶未能一定也。按北京協和醫學校 B. E. Reed 氏所著之 Chinese Material Medical Reference list 中。謂長松之學名為 *Codium divaricatum* 屬 *Chlorophyceae* 中 *Siphonaceae* 科之植物。而 *Strat. art.* 氏所著之 *Chinese Material Medical* 及松村任三所著之植物名彙。皆謂長松屬 *Coniferae* 科之植物。學名為 *Pinus pumila*, *Regel*。按本草證類大全。與本草綱目之圖。及其記載者。更加以市中販賣之實物相比較時。恐非屬 *Chlorophyceae* 科之植物。故余定其科屬曰 *Coniferae* 科。定其學名曰 *Pinus Pumila*。

Paragon

參攷資料 其葉如松。服之

長年。功如松脂及仙朮。故有二名。

(李時珍) 長松生古松下。根色

如薺。長三五寸。味甘微苦。類人

參。清香可愛。按張天覺文集云。僧

普明居五臺山。患大風。眉髮俱墮。

哀苦不堪。忽遇異人。教服長松。示

其形狀。明探服之。旬餘毛髮俱生。

顏色如故。今并代間。土人多以長

松雜甘草。山藥為湯煎甚佳。然本

草及方書皆不載。獨釋慧祥清涼

傳。始敘其詳如此。韓悉登題云。長

松產太行西北諸山。根似獨活而

香。(李時珍)

【長松酒】 命名 本品係用長

松製成之酒。故名。

製法 長松一兩五錢。狀似獨

活而香。乃酒中聖藥也。熱地黃八

錢。生地黃黃芪蜜炙。陳皮各七錢。

當歸。厚朴。黃蘗各五錢。白芍藥。煨

人參。枳殼各四錢。若朮米泔製。半

夏。製。天門冬。麥門冬。砂仁。黃連各

三錢。木香。蜀椒。胡桃仁各二錢。小

紅棗肉八個。老米一撮。燈心五寸。

長一百二十根。一料分十劑。絹袋

盛之。凡米五升。造酒一罇。煎一袋。

穿久乃飲。

主治 滋補一切風虛。

【長松酒】 卽仙朮酒之原名。詳「

仙朮酒」條。

【長股】 卽田雞之古籍別名。典見

別錄。詳「田雞」條。

【長青】 卽羅漢松之長者。典見綱

目拾遺。詳「羅漢松」條。

【長春花】 卽月季花之古籍別

名。典見綱目。詳「月季花」條。卽

金盞草之古籍別名。典見救荒本

草。詳「金盞草」條。



長春花

【長孫】 卽王孫之齊地別名。詳「

王孫」條。

【長鼓草】 卽王不留行之古籍別

名。典見和漢藥考。詳「王不留行」

條。

【長壽】 卽可聚寶之古籍別名。典

見別錄。詳「可聚寶」條。

【長壽仙人柳】 卽櫻柳之古籍別

名。典見綱目。詳「櫻柳」條。

【門冬】 卽麥門冬之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【門白塵】 命名 本品卽門白

中所積之塵。故名。

主治 治諸般毒瘡。(一切毒癩

擦至汗出卽消) 並治金瘡出血

(搽之立止)

【阿井膠】 卽阿膠之處方用名。詳

「阿膠」條。

【阿井膠皮膠】 卽阿膠之處方用

名。詳「阿膠」條。

【阿月渾子】 卽無名子之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「無名子」條。

【阿片】 卽鴉片之古籍別名。典見

綱目。詳「鴉片」條。

【阿仙藥】 卽孩兒茶之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「孩兒茶」條。

【阿只草】 卽遠志之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「遠志」條。

【阿利阿陀】 卽華撥之古籍別名。

典見西陽雜俎。詳「華撥」條。

【阿兒只】 產地 出西域諸地。

形態 阿兒只爲雜

草類之一種。狀如苦參。可供藥用。

主治 跌撲損傷。婦人損胎用

豆許。噉之。又治魚鼠瘡。

【阿刺吉酒】 卽燒酒之古籍別名。

典見飲膳正要。詳「燒酒」條。

【阿芙蓉】 卽鴉片之古籍別名。典

見綱目。詳「鴉片」條。

【阿勃勒】 古籍別名 婆羅門

英。(綱目) 阿梨。忽野。檉。

產地 舊出西域諸地。

形態 阿勃勒爲喬木類之一

種。樹高二三丈。圍四五尺。葉似橘

櫟而短小。經冬不凋。不花而實。莢

長二尺。中有髓。髓內有一子。大如

指頭。色赤極堅硬。中黑如墨。味甘

如飴。可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 心膈悶熱。骨蒸寒熱。殺

三蟲。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論阿勃勒曰。莢黃入藥。治

熱病。下痰。通經絡。療小兒疳氣。

【阿勃參】 產地 西康西藏諸

境。

形態 阿勃參爲灌木類。樹幹

長達一丈有餘。皮色青白。葉細互

生。兩兩相對。花形似薑。青色正黃。

子實如胡椒。赤色。斫其枝汁流出如脂油。極為珍貴。可入藥用。

主治 取油擦塗疥癬。收效神速。

【阿郁子】即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬葵子」條。

【阿息兒】產地 出西域諸地。形態 阿息兒為雜草類之一種。狀如地骨皮。可供藥用。

主治 婦人產後胞衣不下。又治金瘡腫不出。嚼爛塗之。

【阿浪魚】即鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳「鯊魚」條。

【阿迷酒】產地 出東洋。製法 以紅花芫胡桃等入麴釀成用。

性質 甘辛。無毒。

主治 通百脈。益元氣。療沒數。祛疾。

參攷資料 阿迷酒。性格實達。一滴入口。精神百倍。較鴉片尤速。

(綱目拾遺)

【阿梨】即阿勃勒之別名。詳「阿勃勒」條。

綱目。詳「阿魏」條。

【阿炭裁】即阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿魏」條。

【阿路巴】即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳「銀箔」條。

【阿慈勃他】即臘肺之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「臘肺」條。

【阿膠】原名 傳致膠。命名 山東兗州府陽穀縣東北六十里。即古之東阿縣也。東阿縣有井。膠以阿井水煎成。故名。

處方用名 真阿膠。翅皮膠。阿膠珠。炒阿膠。炒阿膠膠。上阿膠。阿井膠。阿井膠皮膠。清阿膠。東阿膠。陳阿膠。蛤粉炒阿膠。蒲黃炒阿膠。

古籍別名 盆膠。烏膠。膠膠。顯明把。覆盆膠。(和漢藥考)

外國名詞 Asagosa Gum (英)

基本 係用膠皮與阿井水煎熬而成之膠。

產地 陳仁山藥物生產辨云。阿膠原產山東省東阿縣。以阿泉井之水。將膠皮熬膠而成之。但近日阿泉井已毀。祇有京都同仁堂敬信堂兩號。專派人往該處。仍用

膠皮。在阿泉井附近。取水熬之。雖非阿泉井之水。但附近之水。亦可用。此外市上所沽之阿膠。俱在烟台。庄口。用牛皮。馬皮。鞋皮。履皮。用膠皮者。間或有之。就在烟台。取水熬之。頭一次膠清。作鹿膠。第二次作鏡盒阿膠。第三次作布盒阿膠。第四次作龍板膠。十月出新。業醫者其慎用之。惟香港永同福。常沽正貨。尤學周云。阿膠一物。有名無實。不特阿井已毀。無水可取。且膠皮亦少用。多以牛皮充之。故其功用。往往不彰。近年朋壽堂在無錫設廠。用第二泉水煎膠。行銷各處。雖非道地。品較為上。因用第二泉水煎成。故又名二泉膠。其製法另詳二泉膠條。

形態 為琥珀色透映之板片。無臭。面上多印有製造之牌號。雖暑天亦不變軟。投入水中。則漸膨脹。遇溫湯。則漸溶化。

製法 每年十月至二三月。為製造期間。係用膠皮熬煎而成。其有用沙牛。水牛。膠皮者。為上用。馬。驢。駝。皮者。次之。用舊皮者。為下煎膠所用之水。以鹹苦者為妙。其製法俱用生皮。水浸四五日。漉刮極淨。熬煎時。時攪之。慎添水。至爛。漉汁。再熱成膠。傾盆內待凝。近盆底者。為盆膠。陶弘景曰。凡用阿膠。皆火炙之。雷斅曰。凡用洗以豬脂。浸一夜。取出。柳木火上炙。煨研用。李時珍曰。今方法。或炒成珠。或以麵炒。或以火炙。或以蛤粉炒。或以草灰炒。或酒化成膏。或水化膏。當各從本方。

用法 潤肺以蛤粉炒用。止血以蒲黃炒用。與他藥入水煎服。或酒化和作丸劑。

性質 甘平。無毒。

數能 養血。熄熱。潤肺。柔肝。為滋養潤補藥。又作皮膚損傷及皸裂湯火外敷藥。

主治 心腹內崩。勞極。酒瀉。如瘧狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血。安胎。久服。輕身。益氣。(本經) 丈夫小腹痛。虛勞。羸瘦。陰氣不足。脚腫不能久立。養肝氣。(別錄)

張仲景之發明 阿膠一味。輕張仲景實驗。認為主治諸血症。故兼治心煩不得眠者。茲考徵如下。

●芍藥當歸膠艾湯證曰。妊娠下

血。①白頭翁加甘草阿膠湯證。不具。②大黃甘遂湯證。曰水與血俱結在血室。上三方。阿膠各二兩。③黃連阿膠湯證。曰心中煩。不得臥。④黃土湯證。曰下血吐血。⑤上二方。阿膠各三兩。⑥猪苓湯證。曰心煩。不得臥。上一方。阿膠一兩。據此諸方。則阿膠主治諸血證。心煩不得眠者。明矣。然心煩有數證。不得眠亦有數證。若無血證。則屬他證也。故法無血證者。皆為脫誤矣。芎藭血歸膠艾湯證。曰婦人有漏下者。有（右一證）有半產後。因續下血。都不絕者。有（右一證）有妊娠下血者。有（右一證）假令妊娠。腹中痛為胞阻。有（右一證）按此條。古來未得其解。余嘗如此段落。分裁為四章。其義始明。其證亦可得治之。解曰。婦人有漏下。腹中痛。心煩。不得眠者。此方主之。有第二章。婦人有半產後。下瘀血。都不絕。腹中痛。心煩。或不得眠者。此方主之。有第二章。婦人有妊娠。下血。腹中痛。心煩。不得眠。或頓仆。失跌。或胎動不安者。此方主之。有第三章。婦人有妊娠。腹中痛。漏胞。經水時來。心煩。

八畫 阿

不得眠。或因房室所勞傷胎者。此方主之。有第四章。以上諸證。皆婦人妊娠。或半產。或產後下血。而心煩腹痛者。此方所宜治也。諸證當須有不得眠之候。然無血證。則非此方所宜也。白頭翁加甘草阿膠湯證。不具。但云產後下利。此方豈惟產後下利治之乎。凡本方證而下血。心煩。急迫不得眠者。此方主之。由此觀之。豈惟婦人乎。雖男子亦有熱利下重。大便血。心煩。急迫不得眠者。則宜用此方。夫下重者。下利重多也。非後世所謂痢病。肛門下墜。利急後重之謂也。蓋利愈後重者。下利愈迫重多也。古者便為之後。故後重者。下重也。下重者。下利重多也。是此方所治也。黃連阿膠湯證。曰心中煩。不得臥。蓋此方治下利腹痛。大便血。心中煩。不得眠者。夫黃芩之於下利。黃連之於心中煩。芍藥之於腹中痛。主以治之。惟阿膠之於心煩。不得眠。亦不見血。則無所奏其效。然則此方治下利腹痛。心中煩。不得眠。而見血者。明矣。若不見血。而施此方。豈其謂之得其治法乎。大黃

甘遂湯證。曰婦人少腹滿。如敦狀。小便微難。而不渴者。是乃此方所主也。脈經。敦狀。敦音堆。敦敦者。不移不動之謂也。若作敦狀。則敦音對。器名。棊按。其此證。謂之有血。亦非也。謂之無血。亦非也。然謂之小便微難。則謂之非血。亦非也。是所謂因法立略。因略取法。法略相熱。則雖未見其血。亦有此證。則施此方。施此方。則血自下。血自下。而後其證自差。故仲景曰。其血當下。其此可謂之略而已。夫略也者。不熱其法。則不可得此者也。生後者。此為水與血。俱結在血室也。此章蓋後人所妄添也。生後產後也。產後若有前證者。此為水與血。俱結在血室。水血本無二。血是指瘀血。血室謂其分位。義屬想像。臆度。今不取焉。夫水血若有二。則仲景何其不謂水與血當下乎。今謂其血當下者。為水血無二之謂也。醫者其思諸。諸苦湯證。曰脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。主之。又曰少陰病。下利六七日。欬而嘔。渴心煩。不得眠者。主之。夫少陰病者。脈微細。但欲寐也。又曰欲吐不

吐。心煩。但欲寐。五六日。自利而渴者。是雖今見此少陰本證。若其人。有血證。則心煩不能眠也。故見其下血。而後施此方。則未嘗有不蓋者。若不見其血下。則雖屢施此方。亦未嘗見奏其功者。數試數驗。不可不知矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論阿膠曰。堅筋骨。益氣。止痢。【元】李東垣用藥法象論阿膠曰。止血。安胎。兼除嗽痢。【明】李時珍本草綱目論阿膠曰。療吐血。衄血。淋尿。血。腸風。下痢。女人血痛。血枯。經水不調。無子。崩中。帶下。胎前產後諸疾。男女一切風病。竹節疼痛。水氣浮腫。虛勞咳嗽。喘急。肺痿。唾膿血。及癰疽腫毒。和血滋陰。除風潤燥。化痰清肺。利小便。調大腸。聖藥也。【清】黃宮繡本草求真論阿膠曰。阿膠味甘。氣平。質潤。專入肝經。養血。何書又言。除風化痰。蓋以血因熱燥。則風自生。阿膠得阿井純陰之濟水。又得純黑補陰之驢皮。氣味俱陰。既入肝經。養血。復入腎經。滋水。水補而熱自制。故風自爾不生。又膠潤而不燥。膠性既

能潤肺。復能趨下降瀉。使痰不致上逆耳。至於痔漏癆風。婦血血淋下痢。腎經枯弱。胎動癰腫。治克有效。亦是因血枯燥。伏熱而成。故能得滋而解。此為血分養血潤燥。養肺除熱要劑。不似首烏功崇入肝。補血祛風。烏鬚黑髮。而於肺經潤燥定喘則未及。鹿膠性專溫督。與衝以益其血。而於肺經清熱止嗽則未有。龜膠力補至陰。通達於任。退熱除蒸。而於陰中之陽。未克有補。古人云。阿膠養神。人參益氣。正謂此也。以黑光帶絲。至夏不軟者。良中膠治能養血祛風。然終不如阿膠養血治風之為最耳。【清】徐洵溪本草經百種錄論阿膠曰。阿井為濟水之伏流。濟之源為流水。自流水以至於阿井。伏見不常。若夏書所謂溢為榮。出於陶邱北者。皆伏流從下泛上者也。阿井在陶邱北三百里。泉雖流而不上。泛尤為伏脈中之靜而沈者。過此則其水皆上泛成川。且與他泉水亂而不純矣。故阿井之水。較其旁諸水。重十之一二不等。人之血脈。宜伏而不宜見。宜沈而不宜浮。以之

成膠。真止血調經之上藥也。其必以驢皮煎者。驢肉能動風。肝為風藏而藏血。乃借風藥以引入肝經也。又凡皮皆能補脾。脾為後天生血之本。而通血。故又為補血藥中之聖品。【清】黃元御長沙藥解論阿膠曰。金匱膠艾湯。治妊娠胎阻腹痛下血者。阿膠養血而清風燥也。推之猪苓黃連阿膠諸方。用之者。皆以滋肝木之風燥也。阿膠用烏驢皮阿井水煎成。真者色帶油綠。光明脆嫩。歷夏不柔。亦無臭氣。但最難得。貨者多偽雜皮造成。實濁氣穢不堪入藥。【清】鄒澍本草疏證論阿膠曰。諸家論阿膠者。於阿井水。黑驢皮。津津言之。類多中竅。但以合之本經別錄。主治傷寒。金匱功能殊有不盡符者。予則謂阿膠能清血之源。潔水之流。何則。夫不因經產非關六淫而生血之所。氣潰敗以不繼。血奔溢以難止。內則五臟之氣不凝。外則經絡之血不榮。所謂心腹內崩。勞極瀉瀉。如瘧狀者。則仗其取肺所主之皮。腎所主之水。以火煎熬融洽成膠。恰有合於體中火。金水相媾生血

之義。導其源而暢其流。內以充臟腑。外以行脈絡也。痰與飲。皆為水屬。血亦水屬。水非熱不濁。非燒亦不濁。水濁於中。則渾停於四畔。及窪坎不流之處。所謂腰腹痛。四肢痠疼者。則仗其取氣薰津灌之皮。假水火烹煉成膠。膠成之後。隨亦水消火熄。恰有合於澄水使清。各歸其所。俾外廓之氣。悉會於中。中宮之津。得行四末。流激則源自清。外安則內自定也。云安胎。則定係婦人治女子下血。為婦人安胎。亦疏其源。而裕其流。云丈夫。則無與童稚。童稚天真。小腹無因。火痛者。故惟治丈夫小腹痛。亦潔其流。而通其源耳。其虛勞羸瘦。陰氣不足。即心腹內崩所致。膠酸不能久立。即腰腹痛四肢酸疼之互文也。肝藏血。血衰則肝家之氣失所。戀而耗散。血復則氣得所養。而充旺矣。千金翼炙甘草湯之治曰。虛勞不足。汗出而悶。外寒炙甘草湯之治曰。涎唾多。心中溫溫液液。皆胸中津不流也。黃連阿膠湯證。無溼在中。何以用芩連。黃土湯證。無溼在中。何以用白朮。附子。甘草。黃土。統

是觀之。阿膠固欲其澄水使清。歟。抑亦不止於是也。津液在中。寒滯不化。則非激射外洩。必致逆外吐。滯化血之源。俾有去路。則壅者自消。尚何激射致逆之有名。曰導液。實以益血。一舉而兩利存焉矣。火婚於上。有溼不足以濟之。是以徒見火之燎原。不見溼之停伏。在今日。不過煩擾難安。而他日。下利膿血。即歸於是矣。溼鬱於上。有火不足以宣之。是以徒見溼之下溜。而無火之熨煦。在今日。不過便後下血。而他日。土崩瓦解。已兆於是矣。阿膠隨芩連。是化陰以濟陽。隨芩附。是和陽以存陰。名曰益血。實以導液。亦一舉而兩利存焉者也。若夫邪氣牢固。劫氣血而結癥。則用厚朴。烏扇。半夏。桂枝。行氣而使。人參。防其太溢。用紫葳。牡丹。桃仁。驅蟲。適血而使。阿膠挽其過當。羸瘦過甚。氣血空而風氣襲之。則用薯蕷。白朮。甘草。益氣。以人參率之。用地黃。芍藥。芍藥。當歸。和血。以阿膠導之。此鼈甲煎丸。薯蕷丸之任。阿膠亦不為輕矣。陽明病。脈浮黃。熱渴欲飲水。小便不利。少陰病。下

利欬而嘔渴。心煩不得眠。皆用豬
苓湯。其中有阿膠。當以何者爲用
阿膠確證。兩者所患絕異。惟渴則
均有之。得毋綠湯而用之歟。殆非
也。夫五苓散無阿膠。亦能治渴。陽
明病。豬苓湯證。有怵惕煩躁。不得
眠。少陰病。又有心煩。不得眠。再證
之以心中煩。不得臥。黃連阿膠湯
用阿膠。則阿膠當爲不得眠設矣。
然太陽病。虛煩不得眠。梔子豉湯。
虛勞虛煩不得眠。酸棗仁湯皆不
用阿膠何也。夫固曰阿膠治有津
液。有水溼不能化血之候。梔子豉
湯證。有火無陰。酸棗仁湯證。陰虛
有火。何可與用阿膠者比也。人臥
則血歸於肝。血以枯澀不歸肝者
有之。血爲火擾不歸肝者有之。若
阿膠所主則有化血之物。停而不
化。反致無血歸肝者也。譬如豬苓
湯證。有發熱。溫經湯證。暮即發熱。
白頭翁加甘草阿膠湯證。亦應有
熱。豨甲煎丸證。寒熱不止。則發熱
亦可謂應用阿膠之證耶。溫經湯
證。至唇口乾燥。且不言渴。黃連阿
膠湯證。至用芩連亦不言渴。炙甘
草湯證。用滋補。併不言渴。渴者非

用阿膠之據也。血是水之津。水是
血之澆。血雖欲其流。不欲其洩。水
但欲其澤。不欲其停。經脈別論。所
謂飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。
脾氣散精。上歸於肺。此其共源也。
所謂通調水道。下輸膀胱。水精四
布。五經並行。決氣寫。所謂中焦受
氣。取汁變化而赤。此其分源也。故
血之病多在洩。洩則不流。化源反
竭。水之病多在停。停則不澤。反能
生火。水停而生火。則豬苓湯。黃連
阿膠湯。炙甘草湯。白頭翁加甘草
阿膠湯。溫經湯。皆其治也。血不流
而化源竭。若芎歸膠艾湯。所治之
胞阻。豨甲煎丸。所治之瘧母。溫經
湯。所治之少腹瘀血。大黃甘遂湯。
所治之血室瘀血。一似用阿膠行
血者。殊不知惟其流。是以生生不
已。惟其生。是以蓄洩有常。能不妄
行。惟其妄行。是以蓄洩無常。而有
瘀。惟其有瘀。是以不流而化源反
不繼。阿膠者。取千里伏流不潰不
決之濟水。熬統護血內之皮。以成
皮者。肺之合。火者。心之合。水者。腎
之合。三合相聚。不正似血之化源
乎。化源已賴。斯瘀自行。瘀者行。則

決洩自止。猶可謂之行血乎。雖然。
瘀之爲瘀。有非阿膠所能通者。何
則。如傷寒之蓄血。虛勞之乾血。產
後之瘀血。帶下之少腹滿痛。所以
不用阿膠者。良以阿膠止能滯血
之源。倘中焦無汁可化。則非其所
能任。他如因熱邪而蓄者。熱邪去
而蓄自行。因舍空而留者。逐其所
留。道自無阻。本無藉於阿膠耳。玩
大黃甘遂湯證。水與血俱結。溫經
湯證。已下利數十日。仍入暮發熱。
種種耗陰之候。乃僅辟口乾燥。能
終不渴。可知阿膠之用。屬陰不虧。
而不化血者。不治血之化源竭也。
【清】張石頑張氏醫通論阿膠曰。
阿井本潤水之源。色黑性輕。故能
益肺補腎。煎用烏膠。必陽谷山
中。驗其舌黑。其皮表裏通黑者。用
以熬膠。則能補血止血。本經治心
腹內崩。下血安胎。爲諸失血要藥。
勞症咳嗽喘急。肺痿肺癰。潤燥。滋
大腸。治下利便膿血。所謂陰不足
者。補之以味也。

國外學說 日本學說謂阿膠
者。山東省泰安府東阿縣所產之
黑驢皮（一說曰牛皮）製造之膠
質也。其最良品。爲黃色無臭之透
明體。婦人多服用之。其說曰。能使
血液循環故也。（和漢藥考）阿膠
又有白色之製品。此用鹿角所製
造者。名曰白膠。或曰鹿角膠。據豬
子氏之和漢藥論云。阿膠者。漢醫
之強壯劑也。古方藥物考云。專主
補益。可療虛煩。在泰西往時。亦供
治療之用。千八百四十六年刊行
之「ペレラフツハイム」
氏藥性論云。鹿角膠於熱性病者
之決復期。用之有效。然從今日學
術之程度。則凡膠質不可爲藥劑。
不過爲一種營養品而已。依「フ
オイト」氏等之試驗云。其營養
之價值。僅可代蛋白質之半。（新
本草）又湯本求真曰。阿膠之止
血作用。既於二千有餘年前。均已
周知矣。致曰。雖不俟洋方之教。對
於止血作用。固知爲血液之凝固
性減弱。或血勢強弛。因血液之
滲透亢進。而出血也。況本品乃一
種之黏滯藥。以其緩和和包攝作用。
能緩解組織之緊縮。或包攝糜爛
面。且其滋潤性。能醫組織之枯燥。
故因此所發之疼痛。出血。排膿。尿

利減少。或類數咳嗽者。亦為木藥之主治。此不可不知也。又和漢藥物學云。阿膠應用治虛勞病及體液脫泄與精力虛耗之消削病。并止血藥劑也。一回用量三至五。

辨偽。偽藥條辨曰。阿膠偽名上清膠。又一種名瑞芳膠。皆用尋常之水煎牛皮而成。並雜他藥。偽造。色雖明亮。氣臭質濁。不堪入藥。張際老本草原辨之。最詳。按古法先取狼溪水。以浸黑膠皮。後取阿井水以煎膠。考狼溪發源於洪範泉。其性陽。阿井水發源於濟水。其性陰。取其陰陽相配之意。火用桑柴。煎煉四日。夜而後成膠。近時阿井水甚不易取。而煎法又失其真。故真阿膠最難得也。貨者既多。質偽辨之不明。不如不用。為是或第用江浙所煮黑膠皮。膠雖無阿井之水。而用寶莊之泉。其補血滋陰。平木熄風。功同阿膠。較之用假阿膠者。不更勝一著耶。曹炳章曰。阿膠出山東阿縣。以純黑膠皮。阿井水煎之。故名曰阿膠。考阿井在東阿縣城西。縣志云。昔有猛虎居西山。爪剝地得泉。飲之久。化

為人。後遂將此泉為井。然此水實為濟水之源。其色綠。其性趨下。東阿城內。又為狼溪河。其水為謀水之源。乃洪範九泉之水所會歸。其性甘溫。故合此二水製膠為最善。再按定每年春季。選擇純黑無病健髓。飼以獅耳山之草。飲以狼溪河之水。至冬宰殺取皮。浸狼溪河內四五日。刮毛滌垢。再浸漂數日。取阿井水。用桑柴火熬三晝夜。去滓濾清。再用銀鍋金鏟。加參耆歸芎藭桂甘草等藥汁。再熬至成膠。其色光潔。味甘鹹。氣清香。此即真阿膠也。按本草經云。阿膠性甘溫。清肺養肝。滋腎益氣。補陰祛風。化痰潤燥。止喘。善治虛勞咳嗽肺癰。吐膿吐血。婦血崩。風下痢。崩帶胎動。經水不調。及肺毒癰疽。一切風症。服之無不效驗。其偽者。以碎舊牛馬雜獸皮煎成膠。塊色亦如阿膠。名曰清膠。味利者。以此炒成珠。曰阿膠珠。此等贗品。服之不但無效。而反發瘡生毒。因雜皮多器用。皮含有毒汁。故其為害甚烈。大抵鑑別之法。真阿膠烱化後。氣清香。有麻油氣。汁色黃白色。稠而不黏。

賦。味甘微鹹。其原塊在十年以內者。蒼翠色。質尚堅。至五六十以內者。色轉黃而質鬆脆。更佳。肺勞服之。殊有奇功。若本煎膠皮膏。烱化氣微腥。陳則無腥氣。汁黑褐色。甚黏膩。味亦微鹹。兼甘。用作補血藥亦佳。以治肺病血病則凝。胃反不佳也。若清膠化烱。純屬臭穢腥濁氣。令人欲嘔。服之有毒。切勿沾唇。戒之。和漢藥考曰。本經別錄皆云。煮牛皮製之。後世資黑驢皮。俱以東阿井水製之。故名。今載來者。乃牛皮膠也。有兩種。一廣寸許。長三寸許。厚一分。透明。色黃。一闊五分。長三寸許。色黃黑。大抵以色黃透明如琥珀。或紅黯明澈。夏月不溼軟者為佳品。其色黑不光澤。多作皮臭者為劣品。從前又有進口貨數種。一形如現。廣三寸許。長五六寸。黑色。有款識。一形如龜甲。色黑。一形如絲卷。方二寸餘。黑色。有金泥繪畫。一廣三寸餘。長五寸餘。色近褐。三塊合一斤。一闊七八分。長六七寸。色黃而微紅。質透澈。諸本草皆云。此數種真者多。但未必盡上品耳。日本製造

之黃明膠。色黃明淨。皮臭少者。儘可選用。不必定須真阿膠也。更有剉炒作細珠者。名阿膠珠。亦係下品。其黑色似漆者。可膠物。

近人學說。章次公曰。阿膠之止血。事實上不諱。然根究所以能止血之原理。據前人紀載。則殊不能滿意。如「紅見黑止」滋陰降火。純屬想像。吾人生理學上研究人身所以出血之故。則阿膠之止血。不難了然矣。康健之人。血液循環無滲漏之慮。以血液運行血管之中。若車之於軌。相安無事。設以種種原因。血管受傷。於是出血之症乃起。平日最多見之出血症。厥為吐血。尿血。婦人崩血等。各種病症之起。原因雖多。要不外體內各部血管有破綻之處。治療方法。因症施治。亦有多種。而用藥收斂血管。止血液分泌。誠屬要圖。阿膠非收斂藥。無收縮血管之功。然亦呈止血之效者。徒以此藥富於膠黏性質。便破綻之血管。易於凝結。或增加血液凝固。不致內外滲漏而已。阿膠止血作用在膠質上。僅能使綻破血管。易於凝結。或增加血液

凝固。不致內外滲漏。準此以觀。阿膠之止血。限於出血症之輕者。血管破處不大。其若吐血盈碗。湧湧而至。決非阿膠之所能爲力。根據阿膠止血作用。全在阿膠之質液上。則阿膠不當炒用。炒之既喪失其固有之膠質。更不宜烱化。實際上等於無用。嘗致仲景所用之方。必先煎他藥。再內阿膠烱盡。無用炒用者。千金外臺始爇用之。大失仲景之舊矣。近世視本品爲補血要藥。按之此藥之構成。恐未必耳。但此藥帶有滋養強壯之效。

配合應用 ①治肺腎俱虛。咳嗽吐血。阿膠同天麥門冬、栝樓根、白藥子、五味子、桑白皮、剪草、生地、黃枸杞子、百部、蘇子、白芍藥。

②治婦人崩中漏血。阿膠同杜仲、枸杞子、白芍藥、山藥、麥門冬、地黃、黃耆、人參、青蒿、續斷、黃蘗。

③治婦人胎痛。或胎漏下血。阿膠、白芍藥、炙甘草、麥冬、地黃、白膠、當歸、枸杞子、杜仲、續斷。

④治老人虛秘。阿膠炒二錢。葱白三根。水煎化。入蜜二匙。溫服。(直指方)

八畫 阿

⑤黃連阿膠湯。治少陰病得之二三日以上。心中煩。不得臥者。用阿膠三兩。黃連四兩。黃芩一兩。芍藥二兩。雞子黃二枚。以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠烱盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三。(仲景方)

⑥治腸胃氣虛。冷熱不調。下痢赤白。裏急後重。腹痛。小便不利。用阿膠二兩。炒黃連三兩。茯苓二兩。爲末。搗丸。梧子大。每服五十九丸。米湯下。日三。(和劑局方)

⑦治吐血不止。阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。水五升。煮三分。服。兼治衄血。(千金翼方)

⑧治妊娠下血不止。阿膠三兩。炙爲末。酒一升。煎化。服。即愈。(梅師方) 又方。入生地黃汁。

⑨膠艾湯。治妊娠胎動。阿膠艾葉各二兩。葱白一升。水四升。煮一升。分服。(產寶方)

⑩治癱緩偏風。治癱緩風。及諸風。手脚不遂。腰脚無力者。麝皮膠微炙。熱。先煮葱豉粥一升。別又以水一升。煮香豉二合。去滓。入膠。更煮七沸。膠烱如餒。頓服之。乃啜喫

葱豉粥。如此三四劑。卽止。若冷喫粥。令人嘔逆。(廣濟方)

⑪治肺風喘促。涎潮眼窳。用透明阿膠切炒。以紫蘇烏梅肉焙研等分。水煎服之。(直指方)

⑫治胞轉淋瀝。阿膠三兩。水二升。煮七合。溫服。(千金方)

⑬治吐血不止。大人小兒吐血。用阿膠炒蛤粉各一兩。辰砂少許。爲末。藕節搗汁。入蜜調服。(經驗方)

⑭治肺損嘔血。并開胃。用阿膠炒三錢。木香一錢。糯米一合。半。爲末。每服一錢。百沸湯點服。日一。(普濟方)

⑮治大衄不止。口耳俱出。用阿膠炙。蒲黃半兩。每服二錢。水一盞。生地黃汁一合。煎至六分。溫服。急以帛繫兩乳。(聖惠方)

⑯治月水不調。阿膠一錢。蛤粉炒成珠。研末。熱酒服。卽安。一方入辰砂末半錢。

⑰治月水不止。阿膠炒焦爲末。酒服二錢。(秘傳方)

⑱治妊娠尿血。阿膠炒黃爲末。食前粥飲下二錢。(聖惠方)

⑲治妊娠血刺。阿膠二兩。酒一升。煎一升。頓服。

⑳治產後虛悶。阿膠炒。枳殼炒一兩。滑石二錢。半爲末。蜜丸。梧子大。每服五十九丸。溫水下。未通再服。(和劑局方)

㉑治久嗽經年。阿膠炒。入人參各二兩。爲末。每用三錢。鼓揚一盞。葱白少許。煎服。日三次。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃薄弱。瀉瀉嘔吐者。以及消化不良。症。均勿服。食。畏大黃。礬。礬。爲之。使得火良。

著名方劑 ①補肺阿膠湯。治肺虛火盛咳嗽。(錢氏方) 阿膠兩半。馬兜鈴。鼠粘子。甘草。糯米各一兩。杏仁七錢。②膠艾四物湯。婦人有漏下者。有半產後。因續下血不止者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。膠艾湯主之。(金匱) 阿膠。芍藥。甘草各二兩。艾葉。當歸各三兩。芍藥四兩。乾地黃六兩。

參攷資料 ①阿膠大要。只是補血與液。故能清肺益陰。而治諸證。按陳自明云。補虛用牛皮膠。去

風用臙皮膠。成無已云。陰不足者。補之以味。阿膠之甘以補陰。血。楊士瀛云。凡治喘嗽。不論肺虛肺實。可下可溫。須用阿膠以安肺潤肺。其性和平。為肺經要藥。小兒驚風。後。瞳人不正者。以阿膠倍人參煎服。最良。阿膠育神。人參益氣也。又痢疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者。則能疎導。無熱毒留滯者。則能平安。數說足以發明阿膠之蘊矣。(李時珍) 余嘗逢東阿煎膠者。細加詢訪。聞其地所貨阿膠。不但用牛馬諸畜雜皮。並取舊箱匣上膠皮。及鞍轡靴履一切爛損舊皮。皆充膠料。人問尚黑。則入馬料豆汁。以增其色。人嫌穢氣。則加樟腦等香。以亂其氣。然美惡猶易辨也。今則作偽者。日益加巧。雖用舊皮浸洗。日久臭穢全去。然後煎煮。并不入豆汁。及諸般香味。儼與真者亂矣。按膠色有黃。有黑。冬月所煎者。汗不妨嫩。入春後。嫩者難於堅實。煎汁必老。嫩者色黃。老者色黑。昔人謂光如盤漆。色帶油綠者為真。猶未悉其全也。又謂真者拍之即

碎。夫拍之即碎。惟極陳者為然。新膠安得如此。至謂真者絕無臭氣。夏月亦不甚溼軟。則今之偽者。亦未嘗不然。不可以是定美惡也。然真膠非甚難得。特以偽者難陳。并得真者而亦疑之耳。聞古法先取狼溪水浸皮。後取阿井水煎膠。狼溪發源於洪範泉。其性陽。阿井水性陰。取其陰陽相配之意。火用桑薪煎煉。四日夜而後成。又謂燒酒為服膠者所最忌。尤當力戒。此皆前人所未言者。故并記之。(琢崖) 阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里。即古之東阿縣也。有官舍禁之。膠道元水經注曰。東阿有井。大如輪。深六七丈。歲常煎膠。以真天府者即此也。其井乃濟水所注。取井水煎膠。用攪濁水則清。故人服之。下膈疎痰。止吐。蓋濟水清而重。其性趨下。故治於濁及逆上之痰也。(李時珍) 今東都亦能作之。用皮有老少。膠有清濁。熟時須用一片鹿角即成膠。不附不成也。膠有三種。清而薄者。董家用。清而厚者。名覆盆膠。入藥用。濁而黑者。不入藥。但可膠物爾。(陶弘景) 今鄆州亦能作之。以阿縣城北井水作煮者為真。其井宜禁。真膠極難得。貨多者偽。其膠以烏臙皮得阿井水煎成。乃佳爾。今時方家用黃明膠。多是牛皮。本經阿膠。亦用牛皮。是二皮可通用。但今牛皮膠制作不甚精。止可膠物。故不堪入藥也。陳藏器言。諸膠皆能治風止洩補虛。而臙皮膠主風為是。此阿膠所以勝諸膠也。(蘇頌) 凡造諸膠。自十月至二三月間。用沙牛水牛驢皮者為上。豬馬驢駝皮者次之。其舊皮鞋履等物者為下。俱取生皮水浸四五日。洗刮極淨。熬黃時時攪之。恒添水至爛。濾汁再熬成膠。傾盆內。待凝。近盆底者名坐膠。煎膠水以鹹苦者為妙。大抵古方所用多是牛皮。後世乃賣臙皮。若偽者皆雜以馬皮。舊革鞍靴之類。其氣濁臭。不堪入藥。當以黃透如琥珀色。或光黑如盤漆者為真。真者不作皮臭。夏月亦不溼。(李時珍)

【阿膠珠】即阿膠之處方用名。詳【阿膠】條。
【阿膠】即無花果之古籍別名。與

見綱目。詳【無花果】條。
【阿膠】即琥珀之古籍別名。與見梵書。詳【琥珀】條。
【阿膠】即蜜香之古籍別名。與見綱目。詳【蜜香】條。
【阿膠】即波羅蜜之古籍別名。與見綱目。詳【波羅蜜】條。
【阿魏】 命名。夷人自稱曰阿。故名。本品極臭。為阿之所畏。古醫別名。薰渠。(唐本草)形。阿。阿。哈。昔。泥。隱。展。(綱目)阿。阿。魏。去。疾。(和。漢。藥。考) 外國名詞 Ferula Scorodanma, B. et H. 甚本 屬繖形科之 Ferula Scorodanma, Benth. et Hook. 及 Ferula Narther, Biss. 等。割破其根。或切斷之。自有漿汁滲出。乾而製為護膜。薩爾斯。產地 陳仁山藥物生產辨云。阿魏產孟米。喇喇吉打運來。無砂淨白者名肉魏。一產印度之阿佛。干。取該樹莖汁製成。有紅白彩色者。名為彩魏。味苦而辛。其臭味頗烈。和漢藥考曰。產於波斯。阿。富。汗

尼斯丹及其鄰邦。大部自孟買運出。

形態 阿魏為多年生草本。在初生之數年內。祇生一種基立葉。至抽莖結實。則枯萎而死。其基立葉。直立地上。長二三尺。帶青綠色。而有灰色之短毛。為五重翼狀。其小葉作披針形。數年後莖始生。作圓筒形。色綠。不分歧。莖葉膨起於葉柄之下部。其狀如靴。頂葉變為苞葉。苞葉腋間。伸花梗二三十枝。各於梗之頂端。開五瓣之小黃花。相綴而為覆繖形花序。果實為扁平裂果。色稍黃褐。作卵圓或長卵圓形。背有茸毛。根肥大。作圓錐狀。外色灰褐或帶紫。內色白。中含乳汁。此乳汁有不快之臭氣。Formula *Zanthoxylon* 與前者相似。基立葉為羽翼狀。葉柄隆起於腹部。分枝而為三稜形。小葉對生。作卵圓或長圓形。邊緣有缺裂。無茸毛。其莖亦矗立。高可七八尺。其間有莖葉。皆互生。色暗灰。略呈圓錐形。有葉柄。花為五瓣之小花。三五十朵綴於一處。儼若一傘。果實為裂果。色灰黃。形卵圓。一端尖銳。根肥

八畫 阿

大。作圓錐狀。外色暗褐。內色白。根上如有損傷。自有漿汁滲出。凝結而黏附於外。則收而存貯之。或於根之周圍挖孔。攤物其下。俟滲出之漿汁下垂物上。凝結而收採之。該處土人。多伺葉枯萎時。斷其莖。挖去根株周圍之土。而即取其葉。或莖。覆其上。以禦風雨。如是約月餘。去其根。斷其根之上端。立有漿汁滲出。又覆之。約二日。漿汁盡凝結。收採之。即阿魏也。又覆之。約二三日。二次汁出且凝。再收採之。此為稀薄之汁。品質惡劣。必和以石膏。澱粉及穀類之粉末。然後入市發售。二次收採後。間八日至十日。仍如前法。每二日收採阿魏一次。可連收兩個月。至三個月之久。此乃稠厚之汁。為最上品。阿魏為分離或黏連之大小顆粒。又或為不整齊之塊。色或灰。或黃。或帶紅褐。新鮮者。破碎面帶青白色。漸變微紅。又變褐色而止。寒冷時。質脆弱。受微溫則柔軟。臭如蒜而不快。味先甘。後苛辣而苦。陳年者。則不苦。酒精較水易溶解。加水研磨。則成白色之乳汁。遇那篤倫汁及安

母尼亞。則變黃色。



阿 魏

種類 阿魏之基本植物既多。收採之法又異。不惟形態不能一致。且混有夾雜物。故品類亦頗不齊也。其純粹品。出產極少。最佳之品。無運銷他國者。其自孟買運輸出口之阿魏。多波斯南部之產。市面上分為三種。①為顆粒狀阿魏。為大小不勻之圓形顆粒。比重約一。三。有脂肪之光澤。其新鮮者。色類白而柔軟。可搓捏。經日則變紅紫。質堅硬。然搥以手掌。仍柔軟如前。破碎面色白。燭空氣則微紅。終變為與外相同之褐色。阿魏中此其最佳也。②為塊狀阿魏。一稱無形阿魏。為不整齊之塊片。其間稍稍黏連。色暗褐。有黏著性。中有稍淡明之顆粒狀阿魏。顆粒多則價貴。少則價較廉。每雜有根之截片。茸毛等。坊間以此為最多。③

為含砂阿魏。亦無形之堅塊。色暗褐。破碎面有玻璃光澤。中雜石膏砂石等。品最劣。
採取 冬月採之。
製法 雷歌曰。凡用乳鉢研細。熱酒器上。蒸過。入藥。
用法 水化。或到末和作丸散膏丹。
性質 辛。平。無毒。
成分 含樹脂七十至七十一%。護膜二十至三十%。含硫性揮發油六至九%。樹脂一稱阿橙脫 (Asphalt) 本係白色。燭空氣則變紅。乾餾阿魏中之樹脂。與乾餾一般繖形科植物之樹脂相同。亦得有安母培爾里佛倫 (Umbelliferon, $C_{10}H_{16}O_2$) 之結晶體。並留得綠。藍褐三種油類。加苛性加里液於樹脂中。則化生列曹丁 (Resorcin) 護膜中含有汎爾拉酸 (Formic acid, $C_2H_4O_2$)。此酸與桂皮酸有密接之關係。揮發油含有硫黃。有阿魏特異之臭氣。以阿魏與水同蒸餾而得之。其餘渣不惟無蒜臭。而反有芳香。此因含有華尼甯故也。

八畫 阿

效驗 消肉積。殺細蟲。散痞。辟穢。用爲衝動鎮痙。祛痰調經。驅蟲驅風藥。

主治 殺諸小蟲。去臭氣。破癖積。下惡氣。除邪鬼熱毒。

歷代紀述攷證 【唐】李珣海

藥本草論阿魏曰。治風邪鬼疰。心腹中冷。【宋】大明諸家本草論阿魏曰。傳尸冷氣。辟瘟治瘧。主霍亂心腹痛。腎氣。疽瘰。瘰一切。蠶菜毒。

【元】汪機本草會編論阿魏曰。解自死牛羊馬肉諸毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論阿魏曰。消肉積。

【明】穆希雍本草經疏論阿魏曰。阿魏味辛平溫而無毒。氣味俱厚。入足太陽陽明經。其氣臭烈。殊

常。故善殺諸蟲。專辟惡氣。辛則走而不守。溫則通而能行。故能消積

利諸竅。除穢惡。邪鬼蠱毒也。蘇恭曰。體性極臭。而能止臭。亦奇物也。

【明】李士材本草圖解論阿魏曰。阿魏辛溫。破結塊。殺細蟲。消肉積。辟鬼截瘧。止痢解毒。止臭。譚遵久

瘧。用阿魏砂各一兩。研勻。米糊丸。皂子大。每空心人參湯化服一

丸。卽愈。如痢疾以黃連木香湯下。

丸卽愈。如痢疾以黃連木香湯下。

七八二

蓋瘧痢多起於積滯故耳。【清】黃宮繡本草求真論阿魏曰。阿魏出西波斯番國中。阿麻木枝梗汁。味辛氣平而溫。且極臭烈。故書載能殺諸辟惡。又其味既兼辛與溫。則

氣更活不滯。故書載治痞積。是以溫滯鬼魅。蠱毒。傳屍。惡氣。痞積等症。服之最爲得宜。但人血氣聞

香則順。遇臭則逆。故胃虛氣弱之人。雖有痞積。但當溫胃和氣。俾痞

自消。切勿用此臭烈。以傷胃氣。至辨真偽。則但取少許。安置銅器一

宿。沾處白如銀色者真。以真最屬難得。古人已有黃芩無假。阿魏無

真之說矣。用味研細。熱酒氣上烙過入藥。

國外學說 日本學說謂本品鎮瘧驅風祛痰。宜用於歇私的里

此外於月經閉止。慢性氣管支加管兒等。一日數回。自〇・二五至

一・〇。爲丸劑散劑。與之瀧腸則以三・〇至五・〇。爲一〇〇・

〇之乳劑。又日本藥局方曰。阿魏產於敘里亞。乃 Ferula 屬之各

種植物。如 Ferula Asa foetida, L. Ferula Nanthox, Boiss.

L. Ferula Nanthox, Boiss.

Ferula foetida Rgl. 皆有一種似護膜之樹脂。卽此物也。或顯顯分離。或互相黏合。或爲稍大之塊片。外色似黃似紫。或似粉。新鮮

之破碎面白色。漸現紅色之鞣輪。終成褐色。有蒜臭。味苦辛。以此藥

一分。加水三分研磨之。則爲類白色之乳劑。加安母尼亞水少許。則

變黃色。以熱酒精十分浸透。取其不溶之物質。熱以百度之溫度。則

收乾而祇餘其半。又以之化爲灰。百分中祇餘十五分以上之固形

物。此藥須研成粉末。以除溼器收乾其水分。密閉瓶中。勿令洩氣。又

遠西醫方名物考曰。阿魏產於波斯等熱國。取草根之脂液。曝乾。結

成大小之碎塊。上者爲顆粒。色黃或紅而帶緒。透明有光澤。或雜以

淡紫之斑。乾亦黏潤。嚼之則黏齒。握之軟如蠟。必經歲始稍硬。帶緒

黑色。臭氣如蒜。甚臭。透觸之令人嘔噦。投於火。臭益烈。此爲最上品。

密藏之。雖經數年。臭氣不減。效力亦不弱。味辛苦。嚼之。作黯黑色。

中雜污物。或軟如脂膏。或枯燥而不黏潤。臭氣較微者。便不堪入藥。

有以白色之華爾斯類。加大蒜絞汁。搗乾。攪下品之阿魏。以作偽者。其實必鬆脆易碎。且光滑。浸以燒酒。必盡溶化。可立辨之。此草新鮮

之生汁。臭氣極烈。生汁一錢之臭氣。甚於乾者百磅。其實爲護膜華

爾斯。大約華爾斯二分。護膜三分。故浸以燒酒。雖亦溶化。沈渣尙多。

若浸以水。則護膜質完全溶化。浸以濃醋。盡成乳白色之液。浸以油。

祇少許溶化。此皆護膜質多之積也。此外尙含有精微之油及揮發

鹽。又曰。取此脂液之草。產於亞洲之波斯。敘里亞及印度諸國。初時

根上生葉。長一尺五寸餘。極粗。粗形似芍藥。質如刺發新葉。梗圓。粗

幾如指。梗間又歧生小梗。小葉。後乃抽莖。經歲。高五六尺。粗可如腕。

髓充其中。莖端開花。大而如繖。旋結子。此草生長四年。根長五尺許。

粗如腿。外色褐。若葉殼。內色白。如蘿蔔。其間多色白似乳之汁。蒜

臭極烈。根歷年愈多。其汁益充足。且黏稠。燻空氣。自凝結爲黃褐色。

此草多年不枯。土人於初夏截去莖葉。並以土覆其根。候月餘。發生

新芽。截根之頂。則白汁充溢其間。經太陽之暖氣。自乾而凝結。再截其頂。再乾。再取。如是屢屢。截取。至於無汁而止。取得之液汁。更暴乾令堅。土人以之調和膳羞。猶他國人之用葱蒜也。

辨偽 ●鄧肯巖曰。阿魏辛平入脾胃。消肉積。殺細蟲。去臭氣。出西番。木脂熬成。氣味極臭。試取少許。安銅器一宿。沾處白如銀。乘者真。今人多以胡蒜白偽造之。用者不可不慎。按新疆雜記云。阿魏橄欖形科之多年生草本也。高三四尺。莖徑寸許。葉淡紅色。五六月間。花叢生於頂如茴香。氣甚臭。偶一沾之。數日不能去。其液名阿魏精。人取之販賣。每斤價錢八錢。根莖如蘿蔔。徑三四寸。長尺餘。人取之以熬膏。每斤價錢三四錢。此即真阿魏也。五種粗云。黃金無假。阿魏無真。本草綱目則云。黃芩無假。阿魏無真。皆言其得之之難。而不知新疆塔城伊犁嶺西以及迪化之學遠奇壑等處。徧野漫山。直有用之不竭之勢。牽羊毒羊之說。尤為謬妄矣。且產於伊犁者。其味特香尤

八畫 阿

為奇品。瓶牒云。諾皋載波斯國出阿魏。長八九尺。皮色青黃。三月生葉似鳳耳。斷其枝汁如鉛。久而堅凝。名阿魏。本草亦從之。近有客自滇中來。言彼處蜂形甚巨。結窩多在絕壁。垂如雨蓋。滇人於其下掘一坎。置膠羊於內。令善射者飛騎發矢。落其窩。急以物覆坎。則蜂與羊共相刺撲。二者合併。取出。用是名阿魏。所聞特異。此說謬妄。不能取信。附錄以待考正。據諸家本草亦多從植物類而生。並無此議。考近今市用色黃者。曰濇魏。佳。黑者名砂魏。次。按阿魏有三試法。以牛錢阿魏安於銅器中。一宿。有魏沾處如銀者。真。以一錢入五野草自然汁中。一宿。至明日如鮮血者亦佳。一錢安柏樹上。立乾者亦佳。

●治尸疰中惡。近死尸惡氣入腹。終身不愈。用阿魏三兩。每用二錢。并麵裹作餅。十餘枚。煮熟食之。日三服。至二七日。永除。忌五辛油物。(聖惠方)

●治癩疔疼痛。敗精惡而結在陰囊所至。用阿魏二兩。醋和蕎麥麵作餅。裹之。煨熱。大橫櫛二枚。鑽孔。溶乳香填滿。亦以蕎麥麵裹之。煨熱。入礪砂末一錢。赤芍藥末一兩。糊丸。梧子大。每食前酒下三十丸。(危氏得效方)

●治小兒盤腸。內用腹痛不止。用阿魏為末。大蒜半瓣。炮熱。研爛和丸。麻子大。每艾湯服五丸。(總微論方)

●治脾積結塊。雞子五個。阿魏五分。黃蠟一兩。同煎化。分作十服。每空心細嚼。流水送下。諸物不忌。腹痛無妨。十日後。大便下血。乃積化也。(保壽堂經驗方)

●治痞塊有積。阿魏五錢。五靈脂炒烟盡。五錢。為末。以黃雄狗膽汁和丸。黍米大。空心唾津送下。三十九丸。忌羊肉醋麵。亦治五噎膈氣。(扶壽精方)

●治痰癆寒熱。阿魏、麝香各一豆大。研勻。以蒜膏和覆虎口上。男左女右。(聖濟方)

●治牙齒蟲痛。阿魏、臭黃等分。為末。糊丸。綠豆大。每綿裹一丸。隨左右插入耳中。立效。(聖惠方)

●治一切肉食堅積。同人參、補紅、京三稜、蓬莪朮、砂仁。入膏藥。同麝香。硫黃蘇合油。貼一切痞塊。

●治尸疰惡氣。同安息香、百部、青黛、丹砂。

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡脾胃虛弱者禁。

著名方劑 擅氣阿魏丸。治五種瘧疾。九般心痛。癰癧氣塊。冷氣攻刺。及脾胃停寒。胸膈膨脹。嘔吐酸水。丈夫小腸氣痛。婦人氣血等疾。(局方) 阿魏二錢半。(醋浸一宿。以麸為丸) 茴香(炒) 陳皮(去白) 青皮 川芎 丁香 皮 蓬莪朮(泡) 甘草(泡) 各一兩。縮砂仁 肉桂(去粗皮) 各半兩。生薑 四兩(鹽醃黑炒) 白芷(泡) 半兩。胡椒二錢半。上為末。用阿魏丸。雞頭大。每藥丸一斤。用礪砂一斤為衣。丈

八靈阿陀附

夫氣痛。炒鹽湯下一二丸。婦人血氣。醋湯下。常服一丸。嚼爛。茶酒任下。


參攷資料 ●夷人自稱曰阿。此物極臭。阿之所畏也。波斯國呼為阿虞。天竺國呼為形虞。涅槃經謂之央匿。家古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名種展。云淹羊肉而香美。功同阿魏。(李時珍) ●阿魏生西番及崑崙。苗葉根莖酷似白芷。搗根汁。日煎作餅者為上。截根穿暴乾者為次。體性極臭而能止臭。亦為奇物也。又婆羅門云。蕪渠即是阿魏。取根汁暴之如膠。或截根日乾。並極臭。西國持呪人禁食之。常食用之。云去臭氣。戎人重此。猶俗中貴胡椒。巴人重貢藥也。(蘇恭) ●今惟廣州有之。云是木膏液滴醃結成。與蘇恭所說不同。按段成式酉陽雜俎云。阿魏水生波斯國。及伽蘭那國。即北天竺也。木長八九尺。皮色青黃。三月生葉。似鼠耳。無花實。其枝汁出如髓。久乃堅凝。名阿魏。摩伽陀僧言取其汁。和米豆屑合釀而成。其說與廣州所上者相近。(蘇頌) ●阿

魏有草木二種。草者出西域。可晒可煎。蘇恭所說是也。木者出南番。取其脂汁。蘇頌所說是也。校一統志所載有此二種云。出火州及沙鹿海牙國者。草高尺許。根株獨立。枝葉如蓋。臭氣逼人。生取其汁。熬作膏。名阿魏。出三佛齊及暹羅國者。樹不甚高。土人納竹筒於樹內。脂滿其中。冬月破筒取之。或云其脂最毒。人不敢近。每採時。以羊繫於樹下。自遠射之。脂之毒著羊。羊斃。即為阿魏。觀此則其有二種明矣。蓋其樹底小如枸杞。牡荊之類。西南風土不同。故或如草如木也。繫羊射脂之說。俗亦相傳。但無實據。該云。黃芩無假。阿魏無真。以其多偽也。劉純詩云。阿魏無真卻有真。臭而止臭。乃為珍。(李時珍) ●驗法有三。第一以半銖安熱銅器中一宿。至明。沾阿魏處白如銀。永無赤色。第二將一銖置於五畝草自然汁中一夜。至明如鮮血色。第三將一銖安於柚樹上。樹立乾。便是真者。(雷敔)

【阿羅魚】 形態 阿羅魚。為鱗類魚屬之一種。一首十身。音如犬吠。相傳可以擊火。並可供藥用。
 主治 療癰疽。
 【阿羅漢草】 即狗尾草之古籍別名。與見綱目。詳「狗尾草」條。
 【阿鷓】 即鷓鴣之古籍別名。與見綱目。詳「鷓鴣」條。
 【陀得花】 (馬志) 古籍別名 三勒漿。基本 陀得為雜草類之一種。其花可供藥用。性質 甘。溫。無毒。主治 一切風血。
 【陀僧】 即蜜陀僧之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蜜陀僧」條。
 【附子】 命名 本品附烏頭而。生如子之附母。故名。處方用名 生附子。熟附子。淡附子。附片。明附片。古籍別名 黑附子。兩子。(綱目) 尖長者名天維。外國名詞 Aconitum Fis. 基本 屬毛茛科。為烏頭根旁

七八四

附生之塊根。產地 陳仁山藥物生產辨云。附子產四川龍安府江油縣。六月新。又名天雄。製附子之法。如附子拾觔。用清水洗淨刮去皮。每個切五片。泡清水一夜。用老薑煎濃水。泡之。翌早取起。蒸約六點鐘。預備竈。將渣透。再蒸約二點鐘。取出曬乾。便是製附片。若取出用鐵線。鑿炭火炮之。名為炮附片。近日熱藥肆俱用生甘草水泡之。其法似不適。因附子乃患中寒腎虧等之所服用。生甘草乃寒而濕中。若用甘草水而製。服之無效也。世人多謂甘草能去毒。不知生甘草濕中之害。惟用附子加入炙草則不同。又有一種原來白附片。乃在四川出新時。生開片曬乾而來。未經製者。安南多用此。何嘗有毒且功力倍焉。



附子

形態 附子為多年宿根草烏頭之子。苗高三四尺。莖作四稜。葉如艾。其花紫碧色。作穗。其實細小如桑椹。其根如芋魁者為烏頭。如芋子者附子。蓋一物也。

採取 八月採八角者良。

製法 韓保昇曰。附子烏頭天雄。個子烏喙。採得。以生熟湯浸半日。勿令滅氣。出以白灰浸之。數易使乾。又法以米粥及糟麵等淹之。並不及前法。蘇頌曰。五物收時。一鳥造醱。其法先於六月內。造大小麴。未採前半月。用大麥煎成粥。以麴造醱。候熟。去糟。其醋不用。太酸則以水解之。將附子去根鬚。於新窰內淹七日。日攪一週。撈出。以疎篩攤之。令生白衣。乃向慢風日中晒之。百日。以透乾為度。若猛日則斃。而皮不附肉。李時珍曰。按附子記云。此物最多。不能常熟。或種美而苗不茂。或苗秀而根不充。或已醱而腐。或已曝而變。若有神物陰為之者。故因人常貯於神。目為藥妖。其醱法。用醋醱。安密室中。淹覆。覆月。乃發出。曝乾。方出醱時。其大有如拳者。已定。輒不盈握。故

八畫 附

及一兩者。極難得。土人云。但得半兩以上者。皆良。蜀人餌者少。惟秦陝。閩浙。繞得其中者。其上品。則皆費人得之矣。陶弘景曰。凡用附子。烏頭。天雄。皆熱灰微炮。令折。勿過。焦。惟宜附湯生用之。俗方。每用附子。須甘草。人參。生薑。相配者。制其毒。故也。雷斅曰。凡使烏頭。宜文武火中。炮令殼。析。破。用。若用附子。須底平。有九角。如鐵色。一個。重一兩者。即是氣全。勿用雜木火。只以柳木。灰火。中。炮。令。殼。析。以。刀。刮。去。上。孕。子。并。去。底。火。擊。破。於。屋。下。乾。地。上。掘。一。土。坑。安。之。一。宿。取。出。焙。乾。用。若。陰。制。者。生。去。皮。尖。底。薄。切。以。東。流。水。并。黑。豆。浸。五。日。夜。漉。出。日。中。晒。用。朱。豎。亭。曰。凡。用。烏。附。及。天。雄。須。用。童子。小便。浸。透。煎。過。以。殺。其。毒。并。助。下。行。之。力。入。鹽。少。許。尤。好。或。以。小。便。浸。二。七。日。揀。去。壞。者。以。竹。刀。每。個。切。作。四。片。并。水。淘。淨。逐。日。換。水。再。浸。七。日。晒。乾。用。李。時。珍。曰。附。子。生。用。則。發。散。熱。用。則。峻。補。生。用。者。須。如。陰。制。之。法。去。皮。碎。入。藥。熱。用。者。以。水。浸。過。炮。令。發。

折。去。皮。臍。乘。熱。切。片。再。炒。令。內。外。俱。黃。去。火。毒。入。藥。又。法。每。一。個。用。甘草。二。錢。鹽。水。煮。汁。童。尿。各。半。盞。同。煎。熟。出。火。毒。一。夜。用。之。則。毒。去。也。

性質 辛。溫。有。大。毒。

效能 補命門真火。逐風寒溼邪。其效能有四。①為強心回蘇藥。用於一切疾病之虛脫。若脈搏沈弱。細慢。或將停頓。大汗不止。體溫降低。手足離伏。以及大失血。大吐瀉。後。呈。虛。脫。狀。應。者。可。急。用。之。②本品為興奮神經。鼓舞細胞。增進體溫。喚起全身一切機能之力。為興奮劑。激藥。治痛風。神痛。痺痛。血行障礙。及一切機能衰弱之病。無不奏效。③用於慢性消化不良。胃腸擊痛。泄瀉。不止。或完穀不化。與他藥同用。奏藥痛止利之效。④有利尿發汗作用。用於心臟腎臟病。水腫有效。

主治 風寒欬逆。邪氣寒溼。腰膝拘攣。膝痛。不能行步。破癥。堅積。聚。血。癥。金。瘡。本。經。腰。脊。風。寒。脚。氣。冷。冷。弱。心。腹。冷。痛。蠶。亂。轉。筋。下。痢。赤。白。溫。中。強。陰。堅。肌。骨。又。產。胎。

為百藥長(別錄)

張仲景之發明 附子一味。經張仲景之實驗。認為「主逐水」。故能治惡寒。身體四肢及骨節疼痛。或沉重。或不仁。或厥冷。而旁治腹痛。失精。下痢。茲考徵如下。①大烏頭煎證曰。逸。臍。痛。若。發。則。自。出。汗。手足厥冷。②烏頭湯證曰。歷節疼痛。不可屈伸。③烏頭桂枝湯證曰。腹中痛。逆冷。手足不仁。(以上三方。烏頭皆五枚。而為君藥也)④桂枝附子湯證曰。身體疼痛。不能自轉側。⑤桂枝附子去桂加朮湯證曰。前證而小便不利。⑥大黃附子湯證曰。脇下偏痛。⑦天雄散證。關(以上四方。附子皆三枚)⑧桂枝甘草附子湯證曰。疼痛不得屈伸。⑨附子湯證曰。背惡寒。又曰。身體痛。手足寒。骨節痛。(以上二方。附子皆二枚)⑩四逆湯證曰。下利清穀。不止。身疼痛。又曰。手足厥冷。⑪真武湯證曰。腹痛。又曰。四肢沉重。疼痛。自下利。⑫桂枝加附子湯證曰。四肢微急。難以屈伸。⑬桂枝去芍藥加附子湯證曰。惡寒。⑭附子粳米湯證曰。切痛。⑮麻黃附

子甘草湯證不具也。(說在麻黃部) ①麻黃附子細辛湯證不具也。(說在細辛部) ②附子瀉心湯證曰惡寒。③桂枝湯黃辛附湯證不具也。(說在朮部) 以上九方附子皆一枚。歷觀此諸方其證一是皆水病也。桂枝附子去桂加朮湯條曰。一服覺身痺半日許。再服三服都盡。其人如冒狀。勿旌。即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳。烏頭桂枝湯條曰。初服二合不知。即服三合。又不知。復加至五合。其知者如醉狀。得吐者為中病也。此二者言附子逐水眩之狀也。凡附子中病則無不瞑眩。甚者脈絕色變。如死人狀。頃刻吐出水數升。而其所患者頓除也。余嘗於烏頭煎知之。附子之逐水也明矣。

而厥。【明】李時珍本草綱目論附子曰。治三陰傷寒。陰毒陰疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痙痙癰。小兒慢驚風。濕痺腫滿。脚氣頭風。腎厥頭痛。暴瀉脫陽。久痢脾泄。寒瀉瘧氣。久病嘔噦。反胃噎膈。瘰癧不斂。久漏冷瘡。合葱涕塞耳治。【明】繆希雍本草經疏論附子曰。附子氣味皆大辛大熱。微兼甘苦。而有大毒。氣厚味薄。入手厥陰命門。手少陽三焦。兼入足少陰太陰經。其性走而不守。得甘草則性緩。得肉桂則補命門。本經主風寒咳逆。邪氣寒溼。腰膝拘攣。膝痛脚疼。冷弱不能行步。以此諸病皆由風寒溼三邪客之所致也。邪客上焦則咳逆。邪客下焦則成痿痺拘攣。膝痛脚疼。冷弱不能行步。此藥性大熱而善走。故亦善除風寒溼三邪。三邪祛則諸證自瘳矣。微堅積聚血癥。皆血分虛寒。凝而不行所成。血得熱則行。故能療之。其主金瘡亦謂金瘡為風寒所鬱。擊血瘀不活之證。而非血流不止之金瘡也。別錄又主腰脊風寒。脚氣冷射。心腹冷痛及脾虛寒客中焦為霍亂客

下焦肝腎之分為轉筋。供諸補氣藥則溫中。補血藥則強陰。聖肌骨火能消物。氣性熱極。入血善行。故善墜胎。為百藥長。引參朮黃者。伏著則溫脾胃。除脾泄。祛腎寒。補下焦陽虛。佐之以桂。則除臍腹沈寒。三焦厥逆。溼淫腹痛。胃寒虺動。氣虛經閉。補陽虛。散虛癰。亦可入足太陽少陰。故治督脈為痛脊強而厥。督脈夾脊而上。並足太陽膀胱經。膀胱者。腎之府。故主之也。天雄烏頭子。本是同生。第其形質有異。老嫩或殊。大熱大毒。則未始有別也。【清】黃宮楨本草求真論附子曰。附子味辛大熱。純陽有毒。其性走而不守。通行十二經。無所不至。為補先天命門真火第一要劑。凡一切沈寒痼冷之症。用此無不奏效。故書皆載能治寒毒厥逆。嘔逆嘔噦。腸噎脾泄。冷痢寒瀉。霍亂轉筋。拘攣風脾。癱瘓積聚。督脈為病。脊強而厥。小兒慢驚。痘瘡灰白。癰疽不斂。其入補氣藥中。則遺失散之元陽。入發散藥中。則能開腠理。以逐在表之風寒。入溫暖藥內。則能以祛在裏之寒溼。獨書所云

入補血藥。則能以滋不足之真陰。緣陰與陽相為依附。補陽即所以滋陰。若使水虧火盛。用以辛熱純陽。不更使火益盛而水益虧乎。故崔氏八味丸中。用此以為補陰嚮導。使陰從陽復。然丹溪謂其雄悍無補。而且殺人。其言似謬。但陰極似陽。服之不宜熱投。發散附子須生用。補附子宜熱。以西川彰明赤水蘆者為最。皮黑體圓。底平八角。重三兩者良。水浸麵裹。煨令發折。乘熱切片。中其毒者。黃連犀角甘草節煎湯解。黃土水亦解。【清】張隱菴本草崇原論附子曰。附子稟雄壯之質。具溫熱之性。故有大毒。本經下品之藥。大毒有毒者居多。素問所謂毒藥攻邪也。夫攻其邪而正氣復。是攻之即所以補之。附子味辛性溫。生於彰明赤水。是真大熱之氣。而益太陽之標陽。助少陽之火熱者也。太陽陽熱之氣。不循行於通體之皮毛。則有風寒咳逆之邪氣。附子益太陽之標陽。故能治也。少陽火熱之氣。不遊行於肌關之骨節。則有寒溼痿痺拘攣膝痛。不能行步之證。附子助少陽

之火熱。故能治也。穢堅積聚。陽氣虛而寒氣內凝也。血凝乃陰血聚而為癥。金瘡乃刀斧傷而潰爛。附子具溫熱之氣。以散陰寒。稟陽火之氣。以長肌肉。故能治之。今陝西亦壽補附子。謂之西附。性辛溫而力稍薄。不如生於川中者。土厚而力雄也。又今藥肆中零賣製熟附子。皆西附之類。蓋川附價高。市利者皆整買。不切片賣。用者須知之。凡人火氣內衰。陽氣外馳。急用炮熟附子。助火之原。使神機上行。而不下頹。環行而不外脫。治之於微。奏功頗易。奈世醫不明醫理。不識病機。必至脈脫既冷。神去魄存。方謂宜用附子。夫附子治病者。何能治命。甚至終身行醫。而終身視附子為蛇蝎。每告人曰。附子不可服。服之必發狂。而九竅流血。服之必發火。而燧毒頓生。服之必內爛五臟。今年服之。明年發。發。嗟。以若醫而遇附子之證。何以治之。肯厚利輕名。而自謝不及乎。肯自居庸淺。而薦賢以補救乎。必至今日藥之明日藥之。神氣已變。然後覆之。斯時雖有仙丹。莫之能救。賢者

八盡附

於此。或具熱衷。不忍立視其死。間投附子以救之。投之而效。功也。投之不效。亦非後人之過。前醫惟恐後醫奏功。祇幸其死。死後推過。謂其死由飲附子而死。噫。若醫而有良心者乎。醫不通經。旨牛馬而襍裾。醫云乎哉。如用附子。本身有一兩餘者。方為有力。側子分兩須除去。土人欲增分兩。用大杯將側子敲平於上。故速側子重一兩五六錢者方好。土人又恐南方得種。生時以戎鹽醃之。然後入杯敲平。是附子本無鹹味。而以鹽醃之。故鹹也。【清】陳修園本草經讀論附子曰。案問謂以毒藥攻邪。是回生妙手。後人立補養等法。是模稜巧術。究竟攻其邪而正氣復。是攻之所。以補之也。附子味辛氣溫。火性迅發。無所不到。故為回陽救逆第一品藥。本經云。風寒咳逆邪氣。是寒邪之逆於上焦也。寒溼腰膝。拘攣膝痛。不能行步。是寒邪著於下焦。筋骨也。凝堅積聚血氣。是寒氣凝結。血滯於中也。考大觀本草。咳逆邪氣。句下有溫中。金瘡四字。以中寒得燧而溫。血肉得燧而合也。大

意上而心肺。下而肝腎。中而脾胃。以及血肉筋骨營衛。因寒溼而病者。無有不宜。即陽氣不足。寒自內生。大汗。大瀉。大喘。中風。卒倒等症。亦必仗此大氣大力之品。方可挽回。此本經言外意也。又曰。附子主寒溼。諸家俱能解到。而仲景用之。則化而不可知之謂神。且夫人之所以生者。陽也。亡陽則死。亡字分二字。一無方切音忘。逃也。即春秋傳出亡之義也。一微夫切音无。無也。論語亡而為有。孟子問有餘曰。亡矣之義也。誤藥大汗不止。為亡陽。如唐之幸蜀。仲景用四逆湯。真武湯等法。以迎之。吐利厥冷。為亡陽。即周之守府。仲景用通脈四逆湯。豈附湯以救之。且太陽之標陽。外呈而發熱。附子能使之交於少陰。而熱已少。陰之神機。病。附子能使自下而上。而脈生。周行通達。而厥愈。合苦甘之芍草。而補虛。合苦淡之苓芍。而溫固。元妙不能盡述。按其立法。與本經之說不同。豈仲景不創見歟。然本經謂氣味辛溫。有大毒。七字。仲景即於此悟出附子大功用。因大毒二字。知附子之

溫為至極。辛為至極也。仲景用附子之溫。有二法。雜於芍芍甘草中。雜於地黃澤瀉中。如冬日可愛。補虛法也。佐以薑桂之熱。佐以麻辛之燥。如夏日可畏。救陽法也。用附子之辛。亦有三法。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加白朮湯。甘草附子湯。辛燥以祛除風溼也。附子湯。芍藥甘草附子湯。辛潤以溫補水臟也。若自通湯。通脈四逆湯。加人尿豬膽汁。則取西方秋收之氣。保復元陽。則有大封大固之妙矣。【清】徐洄溪本草經百種錄論附子曰。凡有毒之藥。性寒者少。性熱者多。寒性和緩。熱性峻速。入於血氣之中。則暴駁。性發不支。臟腑嬌柔之物。豈能無害。故須審用之。但熱之有毒者。速而易見。而寒之有毒者。緩而難察。尤所當慎也。【清】關立陞本草經旨論附子曰。附子味大辛。微甘。大熱。氣厚。味薄。陽中之陰。降多升少。有大毒。地膽為使。蠶蜈蚣。畏防風。黑豆。甘草。人參。黃芪。綠豆。烏韭。黃便。厚角。忌鼓汁。稟天中火土燥烈之氣。而兼得乎天之熱氣。以生。入手厥陰命門。手

七八七

少陽三焦。象入足少陰太陰經。其性走而不守。浮中沉無所不至。雄壯之質。有斬關奪將之氣。能引補氣藥行十二經。以追復散之元陽。引補血藥入血分。以滋養不足真陰。引發散藥開腠理。以驅逐在表之風寒。引溫燥藥達下焦。以祛在裏之冷溼。乃真陰傷寒虛寒風溼之劫劑也。然古人之論如戴禮云。附子無乾薑不熱。得甘草則性緩。得肉桂則補命門。得生能發散。導虛熱下行。以除冷病。所謂熱以熱用也。又有熱因寒用者。如陰寒在下。虛陽上浮。治之以寒。則陰氣益甚。而病增。治之以熱。則又拒格而不納。可謂烏附熱藥。並宜冷飲。下咽之後。冷體既消。熱性便發。而病氣隨愈。不違其情。以至大善。此反治之法也。仲景治寒疝內結。用蜜煎烏頭。近效方治喉痺。用蜜炙附子。舍之嚔汁。丹溪治疝氣。用烏頭。梔子並熱因寒用也。又聞趙嗣真曰。然附配麻黃。發中有補。仲景麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯是也。生附配乾薑。補中有發。仲景乾姜附子湯。通脈四逆湯是也。丹

溪曰。氣虛熱甚者。宜稍用附子。以行參芪。肥人多溼。亦宜少加烏附。行經八味丸。用之取為少陰向導也。好古曰。烏附非身涼四肢厥者。不可借用。時珍亦曰。烏附毒藥。非危病不用。補藥少加引導。其功甚捷。歷覽諸家所著。雖云傷寒傳變三陰。及中寒夾陰。或厥冷腹痛。昏背囊縮者。有退陰回陽之力。起死回生之功。然必附補藥以培元陽。溫經散寒。非謂附子即補藥也。乃世徒見其於陽虛之候。腎肺本無熱症者。服之有起死之功。而認為補劑。不辨其為陰寒溼。陽虛氣弱。竟誤投於陰虛內熱。血液衰少。傷寒溫病。熱病陽厥等症。驟不立斃者。慎之慎之。

子究非如漢醫所稱道之貴重品。而自毒物學上觀察之。則與味頗多。如彼蝦夷人之箭毒。即草烏頭也。松前志卷之八。蝦夷實記卷之二。草烏頭之效用。前已述之。而附子之效用。與之大同小異。故從略。

辨偽 鄭有巖曰。附子以蜀地綿州出者為良。氣味辛熱。有大毒。主治風寒咳嗽。邪氣寒熱。蹇蹇拘攣。膝痛不能行步。破癥堅積。聚血。癩金瘡。今陝西亦蒔植附子。謂之西附。性雖辛溫。而力稍薄。不如生於川中者。土厚而力雄也。聞肆中有一種洋附混售。性味既劣。力量更遜。一經炮製。既難辨認。不免害人。更有一種臭附。尤不可用。慎之慎之。曹炳章曰。按附子八九月出。新四川成都彰明產者。為川附。底平有角。皮如鐵。內肉色白。重兩許者。氣全最佳。性潮。鮮時用鹽漬醃。蓋不醃易爛。然綠鹽漬過。性味已失。效力大減。景岳先生已辨之詳矣。陝西出者為西附。黑色乾小者次。

近人學說 陳中樞曰。同一藥

也。而一生一熟。力有大小。主治亦異。附子其一例也。附子為辛甘大熱之品。助元陽。逐寒溼。為藥品中斬關奪門之將。與半夏大黃同為國產藥品之佼佼。每歲輸出以數十萬計。論其生熟功能之比較。根據古醫籍所載。大致熟附用之。溫脾補腎。凡脾胃陽虛。有寒溼等用之。均可治。如傷寒少陰病。麻黃附子細辛湯。用熟附以振腎中之陽。麻黃附子甘草湯。用熟附以補元陽。防發汗太過。太陽病。芍藥甘草附子湯。用熟附以補腎陽。皆是也。其主用終關於溫補方面者。生附性味之烈。遠過於熟。凡元陽暴亡。霍亂厥逆。病在危急之際。非此不救。如少陰病白通湯。用生附以救治陰盛於下。陽格於上之症。通脈四逆。用生附以救陰盛於內。格陽於外之症。霍亂四逆湯。用生附以回陽救逆。皆是也。其主用終用於救急方面者。頗倒。用無益有害。至於強心定瀉。亦惟生附能之。以生附大辛大熱。有刺激麻痺之性也。又經方所謂一枚炮者。皆熟附子。乾者可重七八錢。生用去皮

破八片。至少亦五六錢。生附之治
蠶亂。確有大效。章太炎勸中醫
蠶亂之治云。蠶亂其甚者。厥利交
作。漸至脈脫。在中醫則以四逆湯
通脈。四逆湯救之。在西醫則以樟
腦針鹽水針救之。四逆湯二方。並
以生附子爲君。強其心藏。以乾薑
爲臣。止其吐利。二者相合。脈自得
通。樟腦針亦強心之術。與此同意。
且川東葛府瀾西辰沅一帶。三伏
日即以生附子豬肉合煮飲之。以
防霍亂。此固強心健胃之要劑。若
以熟附片進。則無絲毫之效矣。生
熟附子功能之比較。不過如是。時
醫昧於古方。不能治今病之說。不
能將古方臨時視病輕重消息行
之。懼熟附辛烈不敢用。違言其生
動用輕清之藥以治病。彼以爲不
求有功。但求無過。而不知過即伏
於是矣。真不知殺死人多少也。柯
韻伯亦曰。『今之畏事者。用烏附
數分。必製熟而後敢用。更以苓連
監制之。焉能挽回危證哉。』此語
於醫界惡習可謂儆乎言之。○詔
陽謝安之曰。附子之功用偉矣。簡
單言之。爲大燥回陽補腎命火。逐

八畫 附

風寒溼之妙品也。然則仲景之用
附子。頗能闡發本經主治之真義。
蓋上而心肺。下而肝腎。中而脾胃。
以及血肉筋骨榮衛。因寒溼而病
者。無不用之。即陽氣不足。寒自內
生。大汗瀉。大喘逆。中風卒倒等症。
亦必仗此挽回。陳修園以附子之
溫。雜於芍芍甘草地黃澤瀉中。爲
冬日可愛之補虛法也。佐以姜桂
麻辛中。如夏日可畏之救陽法也。
又以附子之辛。桂枝附子湯。桂枝
附子去桂如白朮湯。甘草附子湯。
辛燥以祛除風溼也。附子湯芍藥
甘草附子湯。辛潤以溫補水臟也。
白通湯。通脈四逆加人參猪胆汁。
保復元陽之法也。此外如臟腑錮
冷。經絡不通。腹中如扇。以及雷鳴
腸虛陰走。精寒自遺。莫不佐諸藥
以挽人命於頃刻。仲景真善於用
附子矣。吾人考仲景所謂脈象沉
微。一身疼痛。四肢厥冷。麻木不仁。
惡風寒。致痲痺等語。似呈亡陽證
狀。可知附子實有強心作用。即具
奮興細胞生活之特能也。是以西
醫余巖認爲麻醉品。未始無因也。
至於陳修園。徐靈胎。張石頑。鄭潤

安。東洞翁。張壽甫。黃席豐。許小士。
章成之。諸醫。均有確切發揮。而羽
翼本經之主治也。余考仲景方。有
炮用生用之不同。一枚至十枚之
不等。故傷寒論一百十三方。用附
子者二十一。方。炮用十有二。方。如
桂枝加附子湯。桂枝去芍藥加附
子湯。芍藥甘草附子湯。真武湯。麻
黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。
甘草附子湯。附子瀉心湯。桂枝附
子湯。桂枝附子去桂加朮湯。烏梅
丸。附子湯。又外加減法中用附子
者三方。小青龍湯後噎者。去麻黃
加炮附子一枚。四逆散後腹中痛
者。加炮附一枚。理中湯後腹滿者。
去朮加附子一枚。合計用炮附者
共十五矣。然用必佐以麻桂芍連
芍芍細辛大黃等藥。其生用如乾
姜附子湯。四逆湯。白通湯。白通加
人參猪胆汁湯。通脈四逆湯。通脈
四逆加猪胆汁湯。四逆加人參湯。
茯苓四逆湯。以上八方是也。然用
必以大辛大熱之乾姜爲輔。未見
用炮附佐乾姜也。金匱用之。除傷
寒方外。僅十三方而已。均係炮用。
如桂枝芍藥知母湯。頭風摩散。近

效朮附湯。八味腎氣丸。葱豉附子
湯。烏頭赤石脂丸。九痛丸。附子橫
米湯。大黃附子湯。瓜蒌薤白丸。麻
黃附子湯。桂枝去芍藥加麻辛附
子湯。黃土湯。葱豉附子散。竹
葉湯等是也。外台千金三黃湯。後
云。先有寒者。加附子一枚。合共十
五方。學者如於傷寒金匱二書中。
熱加玩索。附子之功用。是有得焉。
奈何晉邑諸醫。對於本經主治不
明。仲景用意不曉。每一問及。竟瞠
目結舌。無言以對。欲求治病。焉可
得乎。○張山雷曰。附子本是辛溫
大熱。其性善走。故爲通行十二經
純陽之要藥。外則達皮毛而除表
寒。裏則達下元而溫痲冷。徹內徹
外。凡三焦經絡。諸臟諸腑。果有真
寒。無不可治。但生者尤烈。如其羣
陰用事。汨沒真陽。地加於天。倉猝
暴症之肢冷膚清。脈微欲絕。或上
吐下瀉。澄澈不臭者。非生用不爲
功。而其他寒症之尙可緩圖功
者。則皆宜熟用較爲馴良。惟此物
善熾市肆中皆是醃製之藥。而又
沒之水中。去淨鹹味。實則辛溫氣
味。既一制於醃之鹹。復再制於水

七八九

之沒。久久炮製。真性幾於盡失。故用明附片者。必以乾姜吳萸等相助。為理。方有功用。獨以錢許。其力甚緩。薛頤嘗於臨症之餘。實地體驗。附片二錢。尚不如桂枝三五分之易於浮應。蓋真性久已洩汰。所存者寡矣。是以荷過大症。非用至一二錢。不能有效。甚者必三五錢。弄致孟浪從事。實緣物理之真。自有非此不可之勢。若用生附。或兼用烏頭草烏。終嫌毒氣太烈。非敢操必勝之券矣。

配合應用 治傷寒陰盛格陽。其人必躁熱而不飲水。脈沉手足厥逆者。是此證也。露癩散用大附子一枚。燒存性為末。蜜水調服。運散寒氣。然後熱氣上行而汗出乃愈。(孫兆口訣方)

治熱病吐下及下利身冷。脈微發燥不止者。附子炮一枚。去皮。分作八片。入鹽一錢。水一升。煎半升。溫服立效。(經驗良方)

治陰毒傷寒。房後受寒。少腹疼痛。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作嘔逆。並宜退陰散。用川烏頭乾薑等分。切炒。故冷為散。每服

一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。溫服。得汗解。(孫兆口訣方)又玉女散。治陰毒心腹痛。厥逆惡候。川烏頭去皮。臍冷水浸七日。切曬。紙裹收之。遇有患者。取為末一錢。入鹽八分。水一盞。煎八分。服。壓下陰毒。如猪血相似。再進一服。(本事方)

又同陽散。治陰毒傷寒。面青四肢厥逆。腹痛身冷。一切冷氣。大附子三枚。炮裂。去皮臍。為末。每服三錢。薑汁半盞。冷酒半盞。調服。良久。臍下如火。煖為度。(濟生方)又治陰毒傷寒。煩躁悶迷。急者用半兩重附子一個。生破作四片。生薑一大塊。作三片。糯米一撮。以水一升。煎六合。溫服。煖臥。或汗出。或不出。俟心定。則以水解散之。類解之。不得與冷水。如渴更煎。滓服之。屢用多效也。(續傳信方)

治中風痰厥。昏不知人。口眼喎斜。并體虛之人。患瘧疾寒多者。五生飲。用生川烏頭。生附子。並去皮臍各半兩。生南星一兩。生木香二錢。五分。每服五錢。生薑十片。水二盞。煎取一盞。溫服。(和劑局方)

治中風偏廢。羌活湯。用生附子一個。去皮臍。羌活。烏藥各一兩。每服四錢。生薑三片。水一盞。煎取七分。服之。(王氏簡易方)

治風病癱緩。手足羸曳。口眼喎斜。語言蹇澀。步履不正。宜神驗烏龍丹。主之。川烏頭去皮臍。五靈脂各五兩。為末。入龍腦麝香五分。滴水為丸。如彈子大。每服一丸。先以生薑汁研化。暖酒調服。一日二服。至五七丸。便覺手捏移得步。十丸可以梳頭也。(梅師方)

治風寒溼痺。麻木不仁。或手足不遂。生川烏頭末。每以香白米煮粥一碗。入末四錢。慢熬得所。下薑汁一匙。蜜三大匙。空腹啜之。或入葱豉末二錢。左傳云。風淫末疾。謂四肢也。脾主四肢。風淫客肝。則侵脾而四肢病也。此方極有力。予每授人良驗。(本事方)

治體虛有風。外受寒溼。身如在空中。生附子。生天南星。各二錢。生薑十片。以水一盞。半。慢火煎服。(本事方)

內急。攪以絹。攪取酒。微溫服。一小盞。取汗。若口不開。拗開灌之。未效。加烏雞糞一合。炒納酒中。服。以蠶為度。(小品方)

治諸風血風。烏荊丸。治諸風。縱緩。背語蹇澀。偏身麻痺。皮膚瘙癢。及婦人血風。頭痛。目眩。腸風。驢毒。下血不止者。服之。尤效。有痛風。攪指。頭額不收者。服六七服。即癒也。川烏頭炮。去皮臍。一兩。荊芥穗二兩。為末。醋糊丸。梧子大。溫酒或熱水。每服二十丸。(和劑局方)

治諸風痲疾。生川烏頭。去皮二錢。半。五靈脂。半兩。為末。猪心血和丸。梧子大。每薑湯化服一丸。

治小兒慢驚。驚搐。涎壅。厥逆。川烏頭。生去皮臍。一兩。全蠍十個。去尾。分作三服。水一盞。薑七片。煎服。(醫氏嬰孩寶鑑方)

治小兒頭軟。乃肝腎虛風邪。入用附子。去皮臍。天南星。各二錢。為末。薑汁調。貼天柱骨內。服消膏丸。(全幼心鑑方)

治小兒額陷。綿烏頭。附子。並生。去皮臍。二錢。雄黃。八分。為末。蠶根。搗和。作餅。貼陷處。(全幼心鑑

治產後中風。身如角弓反張。口噤不語。川烏頭。五兩。剉塊。黑大豆。半升。同炒。半熟。以酒三升。傾鍋

方)

①治麻痺疼痛。仙桃丸。治手足麻痺。及癱瘓疼痛。腰膝痠痛。或打撲傷損。閃腦。痛不可忍。生川烏不去皮。五靈脂各四兩。咸豐仙五兩。洗焙為末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。至十九丸。鹽湯下。忌茶。此藥常服。其效如神。(普濟方)

②治風痺肢痛。營衛不行。川烏頭炮去皮。以大豆同炒。至汗出為度。去豆焙乾。全蠍半錢焙為末。醋熬稠丸。綠豆大。每溫酒下七丸。日一服。(聖惠方)

③治腰脚冷痺疼痛。有風。川烏頭三個。生去皮。為散。醋調塗帛上貼之。須臾痛止。(聖惠方)

④治脚氣腫久不瘥者。黑附子一個。生去皮。為散。生薑汁調如膏塗之。藥乾再塗之。以隨消為度。(簡要濟衆方)

⑤治十指疼痛。麻木不仁。生附子去皮。木香各等分。生薑五片。水煎溫服。(王氏簡易方)

⑥治搜風順氣。烏附丸。用川烏頭二十個。香附子半斤。薑汁淹一宿。焙炒為末。酒糊丸。梧子大。每溫

酒下十九丸。肌體肥壯。有風疾者。宜常服之。(潘察方)

⑦治頭風頭痛。臘月烏頭一升。炒令黃末。以絹袋盛。浸三斗酒中。逐日溫服。(外臺方)用附子炮石。香煨等分。為末。入麝少許。每服半錢。茶酒任下。(孫兆口訣方)用附子一枚。生去皮。附綠豆一合。同入鉢子內。煮豆熟為度。去附子。食綠豆立瘥。每個可煮五次。後為末服之。(修真秘旨)

⑧治風毒頭痛。治風毒攻注。頭目痛不可忍。大附子一枚。泡去皮。為末。以生薑一兩。大黑豆一合。炒熟。同酒一盞。煎七分。調附末一錢。溫酒服。又方。治二三十年頭風。不愈。用大川烏頭。生去皮。四兩。天南星。炮一兩。為末。每服二錢。細茶三錢。薄荷七葉。鹽梅一個。水一盞。煎七分。臨臥溫服。(聖惠方)又治頭痛。速時者。生烏頭一錢。白芷四錢。為末。茶服一字。仍以末噴鼻。有人用之。甚得效。(朱氏集驗方)

⑨治風寒頭痛。治風寒客於頭中。清涕。項筋急。胸中寒。痰。嘔吐。清水。用大附子或大川烏頭二枚。

去皮。蒸過。川芎。生薑各一兩。焙研。以茶湯調服一錢。或剉片。每用五錢。水煎服。隔三四日一服。或加防風一兩。(十便良方)又必效散。治風寒流注。偏正頭痛。年久不愈。最有神效。用大附子一個。生切四片。以薑汁一盞。浸炙。再浸再炙。汁盡。乃止。高良薑等分。為末。每服一錢。臘茶清調下。忌熱物少時。(三因方)

⑩治頭風摩散。沐頭中風。多汗。惡風。當先風一日。則痛甚。用大附子一個。炮。食鹽等分。為末。以方寸匕。摩頭上。令藥力行。或以油調稀。亦可。一日三上。(仲景方)

⑪治年久頭痛。川烏頭。天南星。等分。為末。葱汁調塗太陽穴。(經驗方)

⑫治痰厥頭痛如破。厥氣上衝。痰塞胸膈。炮附子三分。釜墨四錢。冷水調服。方寸匕。當吐即愈。忌豬肉冷水。

⑬治氣虛頭痛。氣虛上壅。偏正頭痛。不可忍者。大附子一枚。去皮。臍。研末。葱汁糊丸。綠豆大。每服十丸。茶清下。又取附丸云。氣虛頭

痛。惟此方最合造化之妙。附子助陽扶虛。歸乳補陽。全蠍取其鑽透。葱涎取其通氣。湯使用椒以達下。鹽以引用。使虛氣下歸。對證用之。無不收效。大附子一枚。剉心入全蠍去毒三枚在內。以餘附末同鍾乳粉二錢。半白麵少許。水和作劑。包附煨熟。去皮研末。葱涎和丸。梧子大。每椒鹽湯下五十九丸。(續編洪濟方)

⑭治野氣上攻。頭項不能轉移。椒附丸。用大熟附子一枚。為末。每用二錢。以椒二十粒。用白麵填滿。椒口水一盞。中。薑七片。煎七分。去椒。入鹽。空心點服。椒氣下達。以引逆氣歸經。(本事方)

⑮治鼻淵腦泄。生附子末。葱涎和如泥。會涌泉穴。(普濟方)

⑯治耳鳴不止。無盡夜者。烏頭燒作灰。舊蒲等分。為末。綿裹塞之。日再用取效。(楊氏產乳方)

⑰治耳卒聾閉。附子醋浸。削尖。插之。或更於上灸二七壯。(本草拾遺方)

⑱治耳膿血。生附子為末。葱湯和灌耳中。(肘後方)

●治喉痺腫塞。附子去皮炮令拆。以蜜塗上炙之。令蜜入舍之。勿噴汁。已成者即服。出。未成者即消出。(本草拾遺方)

●治久患口瘡。生附子為末。醋熬調貼足心。男左女右。日再換。(經驗方)

●治風蟲牙痛。用附子一兩燒灰。枯礬一分為末。搗之。又方。川烏頭。川附子生研。麩糊丸。小豆大。每綿包一丸咬之。(普濟方) 又用炮附子末納孔中乃止。(劉繁方)

●治眼暴赤腫。腫痛不得開。淚出不止。削附子赤皮末如蠶砂大。着背巾。以定為度。(張文仲備急方)

●治一切冷氣。去風痰。遍身疼痛。益元氣。強力固精益髓。令人少病。川烏頭一斤。用容五升大瓠鉢子盛。以童子小便浸七日。逐日添令流出。揀去壞者。不用。餘以竹刀切作四片。新汲水淘七次。乃浸之日日換水。日足。取焙為末。酒煮麩糊丸。綠豆大。每服十九丸。空心鹽湯下。少引粥飯壓之。(經驗方)

●治升降諸氣。暖則宜流。熱附

子一大個。分作二服。水二盞。煎一盞。入沉香汁溫服。(和劑局方)

●治中寒昏困。羸弱陽。治體虛中寒。昏不知人。及臍腹冷痛。攪亂轉筋。一切虛寒之病。生附子一兩。去皮。乾薑炮一兩。每服三錢。水二鐘。煎一鐘。溫服。(和劑局方)

●治心腹冷痛。冷熱氣不和。山梔子。川烏頭等分。生研為末。酒糊丸。梧子大。每服十五丸。生薑湯下。小腸氣痛。加炒茴香。葱酒下。二十丸。(王氏博濟方)

●治寒厥心痛。及小腸膀胱痛。不可止者。神砂一粒。丹。用熟附子去皮。鬱金。橘紅各一兩。為末。醋麩糊丸。如酸棗大。朱砂為衣。每服一丸。男子酒下。女人醋湯下。(宣明方)

●治寒疝腹痛。膝躄。手足厥冷。自汗出。脈弦而緊。用大烏頭煎主之。大烏頭五枚。去臍。水三升。煮取一升。去滓。納蜜二升。煎令水氣盡。強人服七合。弱人服五合。不瘥。明日更服。(仲景方)

●治寒疝。引脇肋心腹皆痛。諸藥不效者。大烏頭五枚。去角。四破。

以白蜜一斤。煎令透。取焙為末。別熟蜜和丸。梧子大。每服二十九丸。冷鹽湯下。永除。(崔氏方)

●治寒疝滑泄。腹痛。自汗。厥逆。熱附子去皮。臍。玄胡索炒各一兩。生木香半兩。每服四錢。水二盞。薑七片。煎七分。溫服。(濟生方)

●治虛寒腰痛。鹿茸去毛。酥炙。微黃。附子炮去皮。臍。各二兩。鹽花三分。為末。薑肉和丸。梧子大。每服三十九丸。空心溫酒服。又夷堅志云。時康祖大夫病心胸一漏。數竅流汗。已二十年。又苦腰痛。行則僂僂。形神憔悴。醫不能治。通列韓子溫為檢聖惠方。得此方。令服。旬餘。腰痛減。久服。遂瘳。心漏亦瘳。精力倍常。步履輕捷。此方本治腰而效乃如此耳。

●治元陽傷冷。用附子炮去皮。臍。為末。以水二盞。入藥二錢。鹽葱。薑。同煎。取一盞。空心服。去積冷。暖下元。腸肥益氣。酒食無礙。(經驗方) 二虎丸。補元陽。進飲食。壯筋骨。用烏頭附子合四兩。醋浸。三宿。切作片子。搗一小坑。炭火燒赤。以醋三升。同藥傾入坑內。用盆

合之一宿。取出。去砂土。入青鹽四兩。同炒。赤黃色為末。醋打麩糊丸。如梧子大。空心冷酒下。十五丸。婦人亦宜。(梅師方)

●治胃冷有痰。脾弱。嘔吐。生附子。半夏各二錢。薑十片。水二盞。煎七分。每服空心溫酒下一方。並炮熱。加木香五分。(奇效方)

●治久冷反胃。用大附子一個。生薑一兩。剉細。同煮。研如麩糊。每米飲化服一錢。(經驗方) 用薑汁打糊。和附子末為丸。大黃為衣。每溫水服十九丸。(衛生家寶方) 又用長大附子一個。坐於磚上。四面着火。漸近。以生薑白然汁。滓之。依前再過。再滓。約薑汁盞半碗。乃止。研末。每服一錢。粟米飲下。不過三服。遂以猪腰子切片。炙熟。食。(斗門方) 又用大附子一個。切下頭子。剉一竅。安丁香四十九個。在內。仍合定。線紮。入砂鉢內。以薑汁。浸過。文火熬乾。為末。每挑少許。置掌

心。抵喫。日十數次。忌毒物及生冷。(方便集)

●治脾寒。瘧疾。五臟氣虛。陰陽相勝。發為瘧。寒多熱少。或但寒

相勝。發為瘧。寒多熱少。或但寒

不熱。宜七菴湯主之。用附子一枚。炮七次。鹽湯浸七次。去皮臍。分作二服。水一碗。生薑七片。棗七枚。煎七分。露一宿。發日空心溫服。未久再進一服。(濟生方)又寒痰宜附子。風痰宜烏頭。若用烏頭。則寒多者。火炮七次。熱多者。湯泡七次。去皮焙乾。如上法。用烏頭性熱。炮多則熱散也。又果附湯。用熟附子去皮。草果仁各二錢。牛水一盞。薑七片。棗一枚。煎七分。發日早晨溫服。(玉樞百一選方)又臨發時以醋和附子塗於背上。(肘後方)

①治寒熱瘧疾。附子一枚。重五錢者。麩煨。人參。丹砂各一錢。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服二十九。未發時。遠進三服。中病則吐。或身體麻木。未中病。來日再服。(廣常安傷寒論方)

②治冷瘧寒熱往來。頭痛身疼。嘔痰。或汗多引飲。或自利煩躁。宜薄附湯主之。大附子一枚。四破。每以一片。水一盞。生薑十片。煎七分。溫服。李侍制云。此方極妙。章傑云。嶺南以啞瘧爲危急。不過一二日而死。醫謂極熱感寒也。用生附子

一味治之。多愈。非得謂以熱攻熱而發散寒邪乎。此真起死回生之妙藥也。(嶺南衛生方)

③治小便虛閉。兩尺脈沉微。用利小水藥不效者。乃虛寒也。附子一個。炮去皮臍。鹽水浸良久。澤瀉一兩。每服四錢。水一盞。燈心七莖。煎服即愈。(普濟方)

④治腫疾喘滿。大人小兒男女。腫因積得。既取積而腫再作。小便不利。若再服利藥。性寒而小便愈不通矣。醫者到此多束手。蓋中焦下焦氣不升降。爲寒痞隔。故水凝而通。惟服沉附湯。則小便自通。喘滿自愈。用生附子一個。去皮臍。切片。生薑十片。入沉香一錢。磨水同煎。食前冷飲。附子雖至三五十枚亦無害。小兒每服三錢。水煎服。(朱氏集驗方)

⑤治脾虛溼腫。大附子五枚。去皮四破。以赤小豆半升。藏附子於中。慢火煮熟。去豆焙研末。以葱苡仁粉打糊丸。梧子大。每服十九。羅蔔湯下。(朱氏集驗方)

⑥治陰水腫滿。烏頭一升。桑白皮五升。水五升。煮一升。去滓。桐器

盛之。重湯煎至可丸。丸小豆大。每服三五丸。取小便利爲佳。忌油膩酒麵魚肉。又方。大附子童便浸三日。夜逐日換尿。以布擦去皮。搗如泥。酒糊和丸。小豆大。每服三十丸。煎流氣飲送下。(聖濟總錄方)

⑦治大腸冷秘。附子一枚。炮去皮。取中心如棗大爲末。二錢。蜜水空心服之。(聖濟總錄方)

⑧治老人虛泄不禁。熟附子一兩。赤石脂一兩。爲末。醋糊丸。梧子大。米飲下五十丸。(楊氏家藏方)

⑨治臟寒脾泄及老人中氣不足。久泄不止。肉荳蔻二兩。煨熟。大附子去皮臍。一兩五錢。爲末。粥丸。梧子大。每服八十九。蓮肉煎湯下。又十便方。治脾胃虛冷。大腸滑泄。米穀不化。乏力。用大附子十兩。連皮同大棗二斤。於石器內。以水煮一日。常令水過兩指。取出。每個切作三片。再同煮半日。削去皮。切焙爲末。別以棗肉和丸。梧子大。每空心米飲服三四十丸。

⑩白龍丸。治小兒吐泄注下。小便少。用熟附子五錢。白石脂煨。龍骨煨。各二錢。半爲末。醋糊丸。黍

米大。每米飲量見大小服。(全幼心鑑方)

⑪治霍亂吐泄不止。用附子重七錢者。炮去皮臍。爲末。每服四錢。水二盞。鹽半錢。煎一盞。溫服立止。(秘寶方)

⑫治水泄久痢。川烏頭二枚。一生用。一以黑豆半合。同煮熟。研丸。綠豆大。每服五丸。黃連湯下。(普濟方)

⑬治久痢休息。熟附子中兩。研雞子白二枚。搗和丸。梧子大。傾入沸湯。煮數沸。漉出。作兩服。米湯送下。(聖濟總錄方)

⑭治下血虛寒。日久腸冷者。熟附子去皮。枯白礬一兩。爲末。每服三錢。米飲下。又方。熟附子一枚。去皮。生薑三錢。水煎服。或加黑豆一百粒。(聖惠方)

⑮治陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩。半。去皮。臍。切片。入汁內。石器煮成膏。取附片焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和。搗丸。梧子大。每空心米飲下。三十九。昔葛察列妻。苦此疾。百藥皆試。得此而愈。屢發屢效。(余居士

還奇方)

①治瘦斂白濁。熟附子爲末。每服二錢。煎三片水一盞。煎六分。溫服。(普濟方)

②治虛火背熱。虛火上行。背內熱如火炙者。附子末。津調塗涌泉穴。(摘玄方)

③治經水不調。血厥冷痛。此方平易捷徑。熟附子去皮。當歸等分。每服三錢。水煎服。(普濟方)

④治斷產下胎。生附子爲末。淳酒和塗右足心。胎下去之。(小品方)

⑤卓氏膏。治折胸損傷。用大附子四枚。生切以豬脂一片。三年苦醋同漬三宿。取脂煎三上三下。日摩傅之取效。(深師方)

⑥治癱疽腫毒。川烏頭炒。黃蘗炒各一兩。爲末。唾調塗之。留頭乾。則以米泔潤之。(深師方)

⑦治癰疽久漏。瘡口冷。膿水不絕。內無惡肉。大附子以水浸透。切作大片。厚三分。安瘡口上。以艾灸之。隔數日一灸。灸至五七次。仍服內托藥。自然肌肉長滿。研末作餅子亦可也。(薛己外科心法方)

⑧治癱疽胥肉。如眼不斂。諸藥不治。此法極妙。附子削如菽子大。以唾黏貼上。用艾火灸之。附子焦復睡以溼之。再灸令熱氣徹內。即瘳也。(千金方)

⑨治丁瘡腫痛。醋和附子末塗之。乾再上。(千金方)

⑩治久生疥癬。川烏頭生切。以水煎洗甚驗。(聖惠方)

⑪治手足凍裂。附子去皮爲末。以水麪調塗之良。(談楚翁試驗方)

⑫治足釘怪疾。兩足心凸腫。上生黑豆。瘡硬如釘。脛骨生碎孔。髓流出。身發寒顫。惟思飲酒。此是肝腎冷熱相吞。用炮川烏頭末。傅之內服。葦子湯效。(夏子益奇疾方)

⑬施用宜忌。凡非虛寒者禁用。蠶蜈蚣。長防風。黑豆。甘草。人參。黃耆。綠豆。烏韭。童溲。犀角。忌鐵汁。地胆爲之使。

⑭參攷資料。補虛寒須用附子。風家即多用天雄。大略如此。其烏頭烏喙附子。則量其材而用之。(寇宗奭) 按王氏究原方云。附

子性重滯。溫脾逐寒。川烏頭性輕疎。溫脾去風。若是寒疾。即用附子。風疾即用川烏頭。一云凡人中風。不可先用風藥及烏附。若先用氣藥。後用烏附乃宜也。又凡用烏附藥。並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒在下。虛陽上浮。治之以寒。則陰益甚。而病增。治之以熱。則拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷體既消。熱性便發。而病氣隨愈。不違其情。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝內結。用蜜煎烏頭。近效方治喉痺。用蜜炙附子含之。嚙汁。朱丹溪治疝氣。用烏頭梔子。並熱因寒用也。李東垣治馮翰林姪。陰盛格陽傷寒。面目赤。煩渴引飲。脈來七八至。但按之則散。用薑附湯加人參。按半斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙也。(李時珍) 附子乃陰證要藥。凡傷寒傳變三陰。及中寒夾陰。雖身大熱。而脈沉者。必用之。或厥冷腹痛。脈沉細。甚則昏背凝縮者。急須用之。有退陰回陽之力。起死回生之功。近世陰證傷寒。往往疑似。不敢用附子。直待陰極陽竭而用之。已遲矣。且夾陰

傷寒。內外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈。以益其原。佐以附子。溫經散寒。捨此不用。將何以救之。(吳綬) 附子真雄壯之質。有斬關奪將之氣。能引補氣藥行十二經。以追復散失之元陽。引補血藥入血分。以滋養不足之真陰。引發散藥開腠理。以驅逐在表之風寒。引溫燥藥達下焦。以祛除在裏之冷溼。(虞博) 烏附毒藥。非危病不可用。而補藥中少加引導。甚捷。有人棧服錢七。即發燥不堪。而昔人補劑用爲常藥。豈古今運氣不同耶。荊府都昌王體瘦而冷。無他病。日以附子煎湯飲。兼嚼硫黃。如此數歲。蘇州衛張百戶。平生服鹿茸附子藥。至八十餘。康健倍常。宋張杲醫說載。始知府虬酒色。每日煎乾薑熟附湯。吞硫黃金液丹百粒。乃能健咳。否則倦弱不支。壽至九十。他人服一粒。卽爲害者。此數人皆其臟腑稟賦之偏。服之有益無害。不可以常理概論也。又瓊碎錄言滑蓋風土極寒。民喫附子如喫芋栗。此則地氣使然爾。(李時珍) 烏頭與附子同根。附子八

月採。八角者良。烏頭四月採。春時
蕔初生。有鬚頭如烏鳥之頭。故謂
之烏頭。有兩歧。其蒂狀如牛角者。
名烏喙。取汁煎爲射爾。天雄似附
子。細而長。乃至三四寸。側子即附
子。邊角之大者。並是同根。而本經
附子出僂爲。天雄出少室。烏頭出
期陵。分生三處。當各有所宜也。今
則無別矣。(爾弘景) 出蜀土。其
種出於龍州。冬至前。先將陸田耕
五七遍。以猪糞。然後布種。逐
月耘。至次年八月後方成。其苗
高三四尺。莖作四稜。葉如艾。其花
紫碧。色作穗。其實細小如桑椹狀。
黑色。本只種附子一物。至成熟後。
乃有四物。以長二三寸者爲天雄。
割削附子旁尖子爲側子。附子之
細小者。亦名側子。元種者爲烏頭。
其餘大小者皆爲附子。以八角者
爲上。綿州彰明縣多種之。惟赤水
一掃者最佳。然收採時日。與本草
不同。謹按本草冬採爲附子。春採
爲烏頭。博物志言附子烏頭。天雄
一物也。春秋冬夏採之各異。而廣
志云。烏頭附子也。一歲爲側子。二
年爲烏喙。三年爲附子。四年爲烏

頭。五年爲天雄。今一年種之。便有
此五物。豈今人種時之法。用力倍
至。故爾繁盛乎。(蘇頌) 烏頭有
兩種。出彰明者。即附子之母。今人
謂之川烏頭是也。春末生子。故曰
春採爲烏頭。冬則生子已成。故曰
冬採爲附子。其天雄烏喙側子。皆
是生子多者。因象命名。若生子少
及獨頭者。即無此數物也。其產江
左山南等處者。乃本經所列烏頭。
今人謂之草烏頭者是也。故曰其
汁煎爲射爾。弘景不知烏頭有二。
以附子之烏頭注射爾之烏頭。遂
致諸家疑貳。宋人楊天惠著附子
記云。綿州乃故廣漢地。領縣八。惟
彰明出附子。彰明領鄉二十。惟赤
水廉水昌明會昌四鄉產附子。而
赤水爲多。每歲以上田熟。耕作壟
取種。於龍安龍州齊歸木門青翅
小坪諸處。十一月下種。春月生苗。
其莖類野艾而澤。其薄類地麻而
厚。其花紫瓣黃莖長苞而圓。七月
採者謂之早水。拳縮而小。蓋未長
成也。九月採者乃佳。其品凡七。本
同而未異。其初種之小者爲烏頭。
附烏頭而旁生者爲附子。又左右

附而偶生者爲鬚子。附而長者爲
天雄。附而尖者爲天錐。附而上出
者爲側子。附而散生者爲鬚鬚子。
皆脈絡連貫。如子附母。而附子以
貴。故專附名也。凡種一而子六七
以上則皆小。種一而子二三。則稍
大。種一而子特生則特大。附子之
形。以蹲坐正節角少者爲上。有節
多。風乳者次之。形不正而傷缺。風
皺者爲下。本草言附子八角者良。
其角爲側子之說甚謬矣。附子之
色以花白者爲上。鐵色者次之。青
綠者爲下。天雄烏頭天錐。皆以豐
實盈握者爲勝。漏藍側子則園人
以乞役夫不足數也。(李時珍) 附
子生於根下。與枝葉皮核不同。
故不入止中焦。其色純黑而味辛
烈。乘坎中一陽之氣所生。單從下
焦扶補陽氣。(唐容川) 附子稟
雄壯之質。有斬關之能。必重用參
朮。駕驅。否則爲禍不少。試思古人
參附者。附朮附等湯。其理可見。譬
如勇將當先。必軍糧繼後。方能成
功也。(馮楚瞻) 退陰寒。益陽火。
兼除寒溼之聖品。得肉桂則入命
門。益相火。引人參挽回散失之元

陽。同生薑發散在表之風寒。佐白
朮善除寒溼。得甘草能緩熱性。(
顧松園)

【附子香】即沉香之別名。詳「沉
香」條。

【附支】即木通之古籍別名。典見
本經。詳「木通」條。

【附片】即附子之處方用名。詳「
附子」條。

【附地菜】即雞腸草之別名。詳「
雞腸草」條。

【附米】即香附子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「香附子」條。

【附風蓂蓂】即黨參之古籍別名。
典見黨參新研究。詳「黨參」條。

【附草】即狼把草之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「狼把草」條。

【附蚓】即蚯蚓之古籍別名。典見
吳普本草。詳「蚯蚓」條。

【附通子】即木通之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「木通」條。

【附蝸】即蛞蝓之古籍別名。典見
別錄。詳「蛞蝓」條。

【附蠟尸】即馬夜眼之別名。詳「
馬夜眼」條。

【佳】即斑鳩之小而無斑者。典見

八畫 附 佳

綱目詳「斑鳩」條。

【佳茗】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【雨前茶】 命名 本品為茶葉之採於發雨節前者故名。

古籍別名 蓮心。旗槍。(綱目拾遺)

產地 出浙江杭州之龍井。

採取 以三年外陳久者入藥。良。因新採者有火氣不可用。

性質 甘寒。無毒。

主治 清咽喉。明目。益心神。補氣。通七竅。消宿食。下氣去噎。

配合應用 ①治下疳。用雨前茶。麻黃各一錢五分。用連四紙方七寸許。用鉛粉錢半。擦紙上。鋪前二藥。捲用筒子。火灼存性。研末加冰片各一分。研勻用之。(外科全書)

②治偏正頭風。升麻六錢。生地五錢。雨前茶四錢。黃芩一錢。黃連一錢。水煎服。又治頭風。百發百中。赤白首烏各一兩。真川芎一兩。黨本二錢。細辛一錢。蘇葉一錢。此散邪方也。風寒甚者。可加川羌活。川

烏服。以此散邪不愈。便進後方。真雨前茶四錢。赤白首烏各二錢。北細辛四分。米仁一錢五分。炒牛膝八分。大川芎一錢五分。甘草五分。煎藥時。令病者以鼻引藥氣。服後宜密室避風。至重者。四帖全愈。加金銀花二錢更效。若生過楊梅瘡者。加土茯苓四兩。煎湯煎藥。(醫方集驗方)

③治肚脹。凡人肚脹。不思飲食。用五虎湯治之。核桃。川芎。紫蘇。雨前茶。以上藥。先煎好。好時加老薑。砂糖在湯內。即服。(醫方集驗方)

④治三陰虛。真雨前茶三錢。胡桃肉五錢。敲碎。川芎五分。寒多加胡椒三分。未發前。入茶壺內。以滾水沖泡。乘熱頻服之。吃到臨發時。不可住也。(醫方集驗方)

⑤治不諭新久諸癩。白芥子一兩。炒為末。雨前茶。和服一撮。瘡久者。不過二次。即愈。(慈航活人書方)

⑥治遺年痢。臭椿皮一兩。五錢。雨前茶錢半。扁柏葉二錢五分。烏梅。東頭各二枚。酒水各一碗。煎好。緩緩服。恐泛。(風聯堂驗方)

⑦治五色痢。慈惠編。陳年年糕。陳雨前茶。冰糖。茉莉花。共煎湯一盞。服之立愈。

⑧消痰止咳。青。米白糖一斤。豬板油四兩。雨前茶二兩。水四碗。先將茶葉煎至二碗。再將板油去膜。切碎。連苦茶。米糖。同下。熬化。聽用。白滾湯沖數匙服之。

⑨治痞。蜈蚣一條。用頂好細茶葉煎服。以身癢為度。(醫學指南)

⑩治傷寒無汗。用白糖。雨前茶。入水熬。數沸。服下。汗出即愈。加生薑。又治紅白痢疾。(彙集方)

⑪治豬鬃羊兒瘋。用晉鑾一斤。雨前茶一斤。為末。茶汁。米飲。為丸。每服四十九丸。發日前。用二服茶送下。(陳氏筆記方)

⑫治風痰癩病。生白礬一兩。細茶五錢。為末。蜜丸。梧子大一歲十丸。茶湯下。大人五十丸。久服痰自大便中出。斷病根。(醫學指南方)

⑬治頭風滿頭作痛。川芎七錢。明天麻三錢。雨前茶一錢。酒一碗。煎六分。渣再用酒一碗。煎四五分。晚服。過夜即愈。(家寶方)

⑭治楊梅瘡。雄黃四兩。雨前茶四兩。生芝麻四兩。共為細末。黃米磨細粉。糊為丸。梧子大。每早白湯下三錢。(家寶方)

⑮上清丸。蘇薄荷二兩。雨前茶。白礬砂七錢。烏梅肉。貝母。詞子各三錢。冰片三分。煉蜜為丸。

⑯治風寒無汗。發熱頭痛者。用核桃肉。葱白。雨前茶。生薑等分。水一鐘。煎七分。熱服。覆衣取汗。

⑰治氣虛頭痛。不藥良方。用上春茶末。調成膏。置瓦盞內。覆轉。以巴豆四十粒。作二次燒烟。薰之。曬乾。搗細。每服一字。別入好茶末。食後。絞白湯服之。立愈。

⑱治肩背筋骨痛。槐子。核桃肉。細茶葉。脂麻。各五錢。入磁罐內。二碗。熬一牛。熱服神效。(醫學指南)

⑲五虎湯。治外邪在表。無汗而喘者。麻黃三錢。杏仁去皮尖。三錢。石膏五錢。甘草一錢。細茶一撮。有

痰加二陳湯。生薑葱水煎熱服。加桑白皮一錢尤效。(醫學指南方)

◎千杯不醉。乾葛、檳榔、細茶等分爲末。逢半酣時。以茶服下。

【雨韭】

原名 慈菇花。基本 本品爲慈菇花之青色者。

產地 生水澤旁。

主治 散一切疔腫。消痔漏。明目去溼之功同茵陳。

【雨師】即檉柳之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「檉柳」條。

【雨絲】即檉柳之古籍別名。以其垂垂狀如雨絲故也。典見綱目。詳「檉柳」條。

【青大蛇】即黃領蛇之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「黃領蛇」條。

【青子】即橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【青小豆】即豌豆之古籍別名。典見千金食治。詳「豌豆」條。◎即綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【青丹】即白丁香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「白丁香」條。

見綱目拾遺。詳「白丁香」條。

【青介石】即磐石之古籍別名。典見本經。詳「磐石」條。

【青木香】原名 馬兜鈴根。香故名。命名 本品氣似木香故名。

古籍別名 都淋藤。(肘後方) 獨行根。土青木香。(唐本草) 雲南根。三百兩銀藥。(綱目)

處方用名 土木香。杜木香。外國名詞 Aristolochia recurviflora

基本 係馬兜鈴之根。產地 詳馬兜鈴條。

形體 青木香即馬兜鈴之根。形扁堅實。長尺許。作葛根氣。亦似溪防己。又似木香。大如小指。色黃赤。

採取 二月八月採之。製法 採得陰乾用。性質 辛苦。冷有毒。效能 散風溼。辟瘴惡。用作解毒藥。

主治 鬼疰積聚。諸毒熱腫。蛇毒。水磨爲泥封之。日三四次立瘳。水煮一二兩。取汁服。吐蟲毒。又搗末水調。塗丁腫大效。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論青木香曰。利大腸。治頭風。瘡疥禿瘡。【清】黃宮繡本草求真論青木香曰。青木香即馬兜鈴根。又名土木香者是也。味辛而苦。微寒無毒。諸書皆言可升可降。可吐可利。凡人感受惡毒。而致胸膈不快。則可用此上吐。以其氣辛而上達也。感受風溼。而見陰氣上逆。則可用此下降。以其苦能泄熱也。故肘後治蠱毒。同酒水煮服。使毒從小便出矣。惟虛寒切禁。以其味辛與苦。泄人真氣也。禿瘡瘰癧可敷。

配合應用 治五種蠱毒。席辨刺史言嶺南俚人。多於食中毒。人漸不能食。胸皆漸脹。先寒似瘧。用都淋藤十兩。水一斗。酒二升。煮三升。分三服。毒逐小便出。十日蠱食毒物。不瘳更服。土人呼爲三百兩銀藥。又支太醫云。兜鈴根一兩爲末。水煎頓服。當吐蠱出。未盡再服。或爲末。水調服亦驗。(肘後方)

治中草蠱毒。此術在西良之西及嶺南人中。此毒入咽欲死者。用兜鈴苗一兩爲末。溫水調服一錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

治腸風漏血。馬兜鈴藤。殺精草。荊三稜。川烏頭。炒過。三味各等分。煎水。先煎後洗之。(普濟方)

治疔腫復發。馬兜鈴根搗爛。用蜘蛛網裹。傅少時根出。(肘後方)

治惡蛇所傷。青木香半兩煎湯飲之。(拾珍方)

用量 錢中至三錢。施用宜忌 凡無量穢溼毒者禁用。

參攷資料 青木香氣味有毒。不可多服。若多服則吐利不止。(馬志) 青木香治風濕。菖蒲湯用之。并治癰腫。痰結氣凝。諸痛。治熱腫蛇毒。水磨傅之。治蠱毒。酒水和煎服之。毒從小便出。(張石頑) 青木香亦爲散氣藥。故疝家必備。(馮楚辭)

【青木香】即木香之處方用名。詳「木香」條。

【青水蘗】即葵之古籍別名。典見綱目。詳「葵」條。

【青布】命名 本品即棉布之用。藍青染青者故名。

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

錢。即消化蠱出神效。(聖惠方)

主治 青布解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。并水漬取汁飲之。浸汁和生薑汁服。止霍亂。燒灰傳惡瘡。經年不癒者。及灸瘡止血。令不傷風。水燒烟薰。殺蟲。黑虎頭咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫。狐尿等惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論青布曰。燒灰酒服。主唇裂生瘡口臭。仍和脂塗之。與藍靛同功。

【青玉】 命名 本品爲玉之色青者故名。

古籍別名 穀玉。穀玉。(綱目) 形態 青玉爲玉石類。玉屬之一種。青色者。較諸玉爲上。色淡青而帶黃色。及深綠色者。佳。可入藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 婦人無子。久服輕身。長年不老。

【青白蘇】 卽蘇蘇之古籍別名。典見綱目。詳『薺草』條。

【青皮】 原名 青橘皮。
命名 本品乃橘之未黃而青色者。故名。

處方用名 小青皮。醋炒青皮。細青皮。

外國名詞 *Hex macro-poda*, *Kig.* (拉丁)

基本 係芸香科。爲未黃熟之橘皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。青皮產廣東新會。

形態 青皮色青。皮薄而光。頭破裂。如蓮瓣。其氣芳烈。其味苦辛。形如小柑。小柏。小橙。今人恒以柑。柚。橙之小者。僞充青皮。不可不辨。



皮 青

採取 七月八月間採。曬乾。
製法 李時珍曰。凡使青皮入藥。以湯浸去鹽。切片。醋并瓦炒過用。

性質 苦。辛。溫。無毒。
主治 破氣。散積。疎肝。止痛。爲氣滯下食。破積結。及膈氣之要藥。
歷代記述攷證 【金】張元素

氣塊。及一切肉食堅積。

◎治冷膈氣及酒食後飽滿。用青橘皮一斤。作四分。四兩用鹽湯。沒。四兩用白沸湯。沒。四兩用醋。沒。四兩用酒。沒。各三日取出。去白切絲。以鹽一兩。炒微焦。研末。每用二錢。以茶末五分。水煎溫服。亦可點服。(快膈湯方)

◎理脾快氣。青橘皮一斤。日乾。焙。研末。甘草末一兩。檀香末半兩。和勻。收之。每用一二錢。入鹽少許。白湯點服。

◎法製青皮。常服安神。調氣。消食。解酒。益胃。不拘老人小兒。宋仁宗每食後。咀數片。乃邢和璞真人所獻。名萬年草。劉跋改名延年草。仁宗以賜呂丞相。用青皮一斤。浸去苦味。去鹽。煉淨。白鹽花五兩。炙甘草六兩。舶茴香四兩。甜水一斗。煮之。不住攪。勿令著底。候水盡。慢火焙乾。勿令焦。去甘草茴香。只取青皮。密收用。(易簡方)

◎治瘧疾寒熱。青皮一兩。燒存性。研末。發前溫酒服一錢。臨時再服。(聖惠方)

◎治傷寒呃逆。聖聞四聲。四花

珍珠囊論青皮曰。破堅癸。散滯氣。去下焦諸濕。兼治左脇肝經積氣。【明】李時珍本草綱目論青皮曰。治胸膈氣逆。脇痛。小腹痛。氣。消乳腫。疏肝膽。瀉肺氣。【明】繆希雍本草經疏論青皮曰。青皮古方無用者。至宋時。醫家始用之。其色青。其味極苦而辛。其氣溫而無毒。氣味俱厚。沉而降陰也。入足厥陰少陽。苦泄辛散。性復刻削。所以主氣滯下食。破積結。及膈氣也。元素破堅癸。散滯氣。治左脇肝經積氣。亦此意耳。【明】李士材本草圖解論青皮曰。橘之小者。爲青皮。功用悉同。但性較猛耳。青皮如人當年少。英烈之氣方剛。陳皮如年至老。成則燥急之性已化。青皮入肝者。以其色也。究竟主脾脾之症居多。膈脹自弦。肝風之崇。青皮入肝散邪。入脾滌痰。故藥家必需之品。

配合應用 ①青皮同人參。紫甲。能消癭母。
②青皮同枳實。肉桂。川芎。治左脇痛。
③青皮同人參。白朮。三稜。蓬萊。阿膠。礞石。紅山查。紅麴。木香。消痰癖。

青皮。全者研末。每服二錢。白湯下。
〔醫林集要方〕

◎治產後氣逆。青橘皮爲末。葱白。童子小便煎二錢服。〔經驗方〕

◎因久積憂鬱。乳房內有核。如指頭。不痛不痒。五七年成癰。名乳岩。不可治也。用青皮四錢。水一盞。半煎一盞。徐徐服之。日一服。或用酒服。〔丹溪方婦人乳癰方〕

◎治疔耳出汗。青皮燒研末。綿包塞之。

◎唇燥生瘡。青皮燒研。豬脂調塗。

用量 一錢至錢半。
施用宜忌 凡氣虛無積者。禁用。

著名方劑 清脾湯。治熱多腸瀉。〔濟生方〕青皮。厚朴。柴胡。黃芩。半夏。甘草。茯苓。白朮。草果。〔煨〕上九味。加薑三片。水煎服。

委效投料 ◎陳皮治高。青皮治低。與枳壳治胸膈。枳實治心下同意。〔玉好古〕◎青皮乃肝膽二經氣分藥。故人多怒。有滯氣。腸下有積。或小腹痛。疼用之。以疏通二經。行其氣也。若二經實者。當先

補而後用之。又云。疏肝氣加青皮。炒黑。則入血分也。〔朱震亨〕◎久癰熱甚。必結癰塊。宜多服清脾湯。內有青皮。疏利肝邪。則癰自不結也。〔陳嘉謨〕◎青橘皮乃橘之未黃而青色者。薄有光。其氣芳烈。今人多以小柑小柚小橙。僞爲之。不可不慎。辨之。入藥以湯浸去酸。切片。醋拌。瓦炒過用。〔李時珍〕

【青石子】即膽礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「膽礬」條。

【青石莖】即石莖。青稜赤者之別名。詳「石莖」條。

【青石脂】古籍別名 青符。之色青者。故名。

性質 酸平。無毒。

主治 養肝膽氣。明目。療黃疸。洩痢腸澼。女子帶下百病。及疽痔惡瘡。久服補益氣。不饑延年。

【青竹筍】命名 本品即青竹之筍。

產地 山野間遍地有之。

形態 青竹爲苞木類竹屬之一種。即野生之竹。莖細小。俗謂之水竹者是。其筍色青。可供食與藥

用。性質 甘。無毒。

主治 肺癆吐血。鼻衄五痔。並宜妊娠食之。

【青竹葉】即竹葉之處方用名。詳「竹葉」條。

【青羊肉】見「羊肉」條。

【青杞】即蜀羊泉之古籍別名。典見救荒本草。詳「蜀羊泉」條。

【青沙】即沙魚青色者之別名。詳「沙魚」條。

【青芋】命名 本品爲芋之葉柄。綠色者。外國名詞 Colocasia sativa quorum, Schott. (拉丁)



芋 青

製法 凡使青芋。其性有毒。須以灰汁易水煮之用。

主治 止瀉。療冷熱。
【青芋】即芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「芋子」條。
【青防風】即防風之處方用名。詳

【防風】條。

【青明礬】即綠礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「綠礬」條。

【青果】即橄欖之處方用名。詳「橄欖」條。

【青芝】命名 本品爲芝草之色青者。古籍別名 龍芝。〔別錄〕

性質 酸平。無毒。

主治 明目補肝氣。安精魂。仁恕。久食輕身不老。延年神仙。

歷代記述攷證 〔唐〕蘇恭新修本草論青芝曰。不忘強志。配合宜忌 皆惡常山。畏扁青。茵陳。商。芝皆以瘴氣爲之使。得髮良。得麻子仁。白瓜子。牡桂。甚益人。

【青芥】即芥之似白菜而有柔毛者。功用與「芥」同。

【青花豆】產地 出雲南。舊永昌府境。

主治 療瘡。
【青花龍骨】即龍骨色青者之別名。詳「龍骨」條。
【青金】即鎔之古籍別名。典見說文。詳「鎔」條。
【青金丹】即麝砂之古籍別名。典

見綱目。詳『靈砂』條。

【青缸粉】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【青背仙禽】即玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【青苔】即乾苔之日本名。詳『乾苔』條。

【青茄】即茄子之古籍別名。典見國經本草。詳『茄子』條。

【青虹】即地膽之古籍別名。典見吳普本草。詳『地膽』條。

【青娘子】原名 芫青。命名 本品居芫花間而色青。故名。世俗諺之呼為青娘子也。

外國名詞 Lytta Vossica (H. E. 拉丁) アナハンメウ (日本)

基本 係節肢動物。昆蟲類。鞘翅類。地膽科之芫青蟲。

產地 生芫花上。處處有之。

形態 青娘子為卵生蟲類之一種。小甲蟲。形如斑蝥。其色純青。觸角色黑。翅鞘上有一黃色縱線。其喙尖。三四月間芫花開放時。乃生。捕得可供藥用。

採取 夏月就芫花上取之。或

連芫花莖葉探置地上。一夕盡出。曝乾用。

製法 與斑蝥同。詳斑蝥條。

性質 辛。微溫。有毒。

主治 蟲毒。風疔。鬼疔。墮胎。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論青娘子曰。治鼠瘻。【明】李時珍本草綱目論青娘子曰。主疔氣。利小水。消癰。癰下痰。結。治耳聾。目翳。樹犬傷毒。餘功同斑蝥。

參攷資料 青娘子之功用同斑蝥。而毒尤猛。蓋芫花有毒故也。(李時珍)

【青桂香】即沉香緊實細枝不朽爛而香氣尤烈者之別名。典見嘉祐圖經本草。詳『沉香』條。

【青烟白鶴草】古籍別名 汁名阿魏。

綱目拾遺)

產地 生海島中。

形態 青烟白鶴草。為雜草類之一種。色綠如翠。可供藥用。其汁即名阿魏。詳見該條。

主治 消積氣。散鬱血。續筋骨。煎膏。療一切內外諸症。

參攷資料 青烟白鶴草。性最行氣。味甚猛烈。能入氣分血分。能治內外諸症。近日方士。取樹脂為充射利。又有以秦皮代充者。真者亦稀見矣。(綱目拾遺)

【青珠】即青琅玕之古籍別名。典見綱目。詳『青琅玕』條。

【青笋乾】基本 本品即青竹乾者。

產地 出浙江臨安縣。天目山等處最佳。

形態 青笋乾。綠色如鷄哥。而有尖上。尖穗子。二尖等名。以分鮮之優劣。可供食與藥用。

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 爽胃消痰。

命名 本品係用靛藍所染成之紙。故名。

採取 以陳久者良。

主治 妬精。瘡以唾黏貼。數日即愈。且護痛。含有青黛原質。又能殺蟲解毒。

古籍別名 蚌蟬。無蟬。蠟蟬。蒲魚。魚父。魚伯。(綱目)

【青紙】

【青蚌】

【青參】即紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫參』條。

【青啄木鳥】即啄木鳥背尾皆綠。頭灰白。額頰黑色者之別名。詳『啄木鳥』條。

【青琅玕】命名 琅玕者。象其為勝。故名。

古籍別名 石珠。(別錄)石蘭

產地 生南海諸山中。

形態 青蚌為卵生蟲類之一種。其形如蟬而長。色青有光。蟬雌常在一處。不相捨。春生子於草葉上。大如蠶子。八八為行。或九九為行。取得其子。則母飛來。煎食甚辛而美。捕得可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 補中。益腸道。去冷氣。令人悅澤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海草本草論青蚌曰。移精。縮小便。

參攷資料 青蚌血及其子血。各塗錢上。留子用母以市物。則仍自飛歸。留母用子亦然。(綱目)

【青蚌】即古文錢之古籍別名。典見綱目。詳『古文錢』條。

【青參】即紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫參』條。

【青啄木鳥】即啄木鳥背尾皆綠。頭灰白。額頰黑色者之別名。詳『啄木鳥』條。

【青琅玕】命名 琅玕者。象其為勝。故名。

古籍別名 石珠。(別錄)石蘭

干(拾遺)青珠。(綱目)珠樹。(山海經)

外國名詞 Chinglanjan (Malachite)

產地 生西北諸山中。及海邊山崖間。

形態 青瑛珩爲石類之一種。狀如筍。質似玉。亦有生成若樹。猶海中珊瑚之狀者。可供藥用。

性質 辛平無毒。

主治 身痒。火瘡。癩癬。疥癩。死肌。(本經)白禿。浸淫在皮膚中。煮銀服之。起陰氣。可化爲丹。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論青瑛珩曰。療手足逆。【唐】陳藏器本草拾遺論青瑛珩曰。主石淋。破血。產後惡血。磨服或煮服。亦火燒投酒中服。

配合宜忌 畏雞骨。得水銀良。

【青符】即青石脂之別名。詳【青石脂】條。

【青荷葉】即荷葉之處方用名。詳【荷葉】條。

【青雀】即桑扈之古籍別名。典見郭璞賦。詳【桑扈】條。

八畫 青

【青魚肉】 性質 甘平無毒。主治 腳氣溼痺。

歷代記述攷證 【唐】張鼎增補食療本草論青魚肉曰。同非白。煮治脚氣脚弱煩悶。益氣力。

參攷資料 青魚肉氣味微毒。服北人忌之。(日華)青魚肉作鮓。食不可合生胡荽。生葵菜。豆醬。麥醬同食。(陶弘景)

【青魚眼睛汁】 主治 注目。能夜視。

參攷資料 青魚喜噉螺蛳。故有明目之功。(醫學辭典)

【青魚頭枕骨】 主治 水腫。氣痛。服療心腹卒。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論青魚頭枕骨曰。治血氣心痛。平水氣。(明)李時珍本草綱目論青魚頭枕骨曰。作飲器。解毒。

【青魚膽】 命名 青魚鱗作青。故名。色本品爲青魚之膽。

古籍別名 鱈魚膽。鱈魚膽。(綱目)

採取 臘月採之。

製法 採得陰乾用。

用法 到末和藥。

性質 苦寒無毒。

效能 治喉痺。祛障翳。用作眼科喉科要藥。

主治 點暗目。塗熱瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論青魚膽曰。消赤目腫。痛。吐喉痺。痰涎。及魚骨。癩。惡瘡。

【清】黃宮繡本草求真論青魚膽曰。魚膽本屬苦寒。可以點目去障。以膽入膽故也。至於青魚之膽。氣味亦同。且色青入肝。開竅於目。故膽有點目治障之功。目睛生汁。注眼。能黑夜視物。以其好噉螺蛳。螺蛳能明目也。又味苦氣寒。能涼血熱。故又主塗痔瘡。擦火瘡。吹喉痺。功與熊膽相同。臘月收陰乾。

配合應用 ①治乳蛾喉痺。青魚膽含嚥。一方用汁灌鼻中。取吐。萬氏用膽藥盛青魚膽中。陰乾。每用少許。點喉。取吐。一方用朴硝代膽藥。

②治赤目障翳。青魚膽頻點。之一方加黃連。海螵蛸各等分。又

用黃連切片。并水熬濃。去滓。煎成膏。入大青魚膽。和汁。就入片。曬少許。瓶收密封。每日點之。甚妙。(張氏易簡方)

③魚膽丸。治一切障翳。用青魚膽。鯉魚膽。青羊膽。牛膽。各半兩。熊膽。二錢半。麝香少許。石決明一兩。爲末。糊丸。梧子大。每空心茶下十丸。(龍木論方)

用蠶 三分至八分。

總用宜忌 凡非風熱實火者禁用。

參攷資料 青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。似鱸而背青。南人作鮓。古人所謂五侯鯖。卽此。其頭中枕骨。蒸令氣通。曝乾。狀如琥珀。荆楚人愛拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者。非(蘇頌)

【青鳥】卽鷓之古籍別名。典見左傳。詳【鷓】條。

【青斑豆】卽豌豆之古籍別名。典見別錄。詳【豌豆】條。

【青稗】卽稗之古籍別名。典見廣志。詳【稗】條。

【青登瓜】卽西瓜之古籍別名。

與見和漢藥考。詳「西瓜」條。
【青菴】即紫菴之古籍別名。與見別錄。詳「紫菴」條。

【青菜】即菘之別名。詳「菘」條。

【青蛙】即田雞之古籍別名。與見綱目。詳「田雞」條。

【青蛤粉】即青黛之古籍別名。與見綱目。詳「青黛」條。

【青楊】即水楊之古籍別名。與見綱目。詳「水楊」條。

【青稞】產地 出川、滇、新、西、藏等高原寒地。

形態 青稞為穀類之一種。形似大麥而實露於外。皮薄子脆。可供釀糟酒。及為食品。亦供藥用。

性質 鹹平。無毒。
主治 下氣寬中。壯筋益力。除溼。發汗。止洩。

參攷資料 青稞子多食脫髮。損顏色。(綱目拾遺)

【青梁米】命名 本品為梁米之青色者。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 胃痺。熱中消渴。止瀉痢。利小便。益氣補中。輕身長年。養粥食之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論青梁米曰。健脾。治洩精。

參攷資料 今粟中有大而青黑色者是也。其穀芒多米少。其性最涼而宜病人。(李時珍) 青梁米可辟穀。以純苦酒浸三日。百蒸百曬。藏之。遠行。日一餐之。可度十日。若重餐之。四十九日不飢也。又方以米一斗。赤石脂三斤。水漬。置暖處一二日。上青白衣搗為丸。如李大。日服三丸。亦不飢也。按靈寶五符經中。白鮮米九蒸九曝。作辟穀糧。而此用青梁米。未見出處。(孟詵)

【青腰蟲】形態 青腰蟲為卵生蟲類之一種。狀大如蠶。色赤。腰間青黑似狗。獨有尖尾。短翅能飛。春夏有之。捕得可供藥用。

性質 有大毒。

主治 除印字至骨。療惡瘡。消肉。殺癩蟲。

參攷資料 青腰蟲着人皮肉。即腫起。能剝人面皮。故印字至骨者。能食盡。(陳藏器)

【青箱子】原名 草決明。處方用名 青箱子。草決明。

古籍別名 草葯子。葵葯子。昆。青葯子。(唐本) 野雞冠子。雞冠葯子。(綱目) 青囊子。蓬蘽子。囊葯子。天羅草子。野雞頭子。(和漢藥考) 外國名詞 Colosia argem. f. (拉丁)

基本 屬莧科。為青箱之種子。產地 陳仁山藥物生產辨云。青箱子各省均有出。凡原野道旁及卑溼地恒多生焉。本以雞冠花仁為正。但近日俱用門青仁代之。九月新海坦多出。此味仍要研究。



(一) 子箱青

形態 青箱子為一年生草本。多生於暖地之田野。莖圓亦間種之。莖直立。高一二尺。略帶紅色。葉形卵圓。或作披針形。全緣帶紅色。末端微尖。具葉柄皆互生。花作淡紅色。後變白。其花被似膜。連綴而

為穗狀花序。其狀有如拳頭。果實為胞果。中藏類似雞冠子之種子。其狀為扁圓之種子。大分許。色黑。極類雞冠花子。



(二) 子箱青

採取 三四月採莖葉。六八月採子陰乾。

製法 雷斅曰。凡使青箱。須先燒鐵杵白乃搗用之。

性質 苦。微寒。無毒。
效能 清肝火。明眼目。用作眼科藥。

主治 昏口青。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論青箱子曰。治肝臟熱毒。衝眼。及赤障。青盲。翳腫。惡瘡。疥癩。【宋】大明諸家本草論青箱子曰。治五臟邪氣。益腦髓。鎮肝明目。目。擊筋骨。去風寒。溼痺。【清】張石頑本經逢原論青箱子曰。治風熱目疾。與決明子同功。本經雖不曾治目疾。而主昏口青。為足厥陰經藥。

其明目之功可推。其治風痿身痠。皮膚中熱。以能散厥陰經中血脈之風熱也。【清】張景岳景岳全書曰。青葙子。野雞冠子也。味微苦微寒。能清肝火血熱。故治赤眼。退赤障。消翳腫。鎮肝明目。亦去風溼。慈瘡疥癩。

近人學說 張山雷曰。青葙卽雞冠花之同類。古書雖分兩條。但以花穗扁闊成片者爲雞冠。花穗分歧如麩麥者爲青葙。其莖葉子形色性情。功用皆同。故古人有以青葙子爲卽雞冠花子者。非誤也。且本是莧之同類。莖葉花穗及子亦復皆同。但花色不一。莧資本治目疾。其功用又合。亦卽一類中之數種耳。古人用其莖葉。以爲燥溼。清熱殺蟲之用。蓋苦寒滑利之品。最善理溼清熱。而疏泄厥陰。是以專清血分。本經主邪氣。亦卽以溼熱之邪言之。其子專療目疾。本經雖未明言。然治昏口青。卽厥陰肝經熱氣滯之證。非肝腎虛寒之昏口變色也。苦寒滑利。善滲溼熱。故目科風熱肝火諸症。統以治之。日華謂其鎮肝明目。甄權謂其治

八畫 青

肝熱熱毒衝眼。赤障青盲。翳腫。雖寇宗奭謂青葙明目。始於藥性論。及日華子與經意不合。然按治目疾。往往有驗。未可誣也。其雞冠花之莖葉。瀕湖稱其治瘡癤及血病。雞冠花則稱其主持瀉下血。赤白下痢。崩中。赤白帶下。其子則藏器稱其止腸風瀉血。赤白痢。日華稱其主崩中帶下。蓋雞冠花紅。其莖葉亦多赤色。則專走血分。而性寒涼。故爲止血之用。然其義仍與青葙無甚區別也。

配合應用 治鼻衄不止。眩暈欲死。青葙子汁三合。灌入鼻中卽止。【貞元廣利方】

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛火旺。噎子散大者禁用。

參攷資料 青葙子名義未詳。胡麻葉亦青葙。此草又多生子。胡麻與之同名。豈以其似而然耶。青葙亦名草葙。其相似而名亦相同何哉。其子明目。與決明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。嫩苗似莧。故謂之雞冠莧。鄭樵通志管俗名牛尾蒿者誤。【李時珍】

此草苗高尺餘。葉細軟。花紫白色。實作角子。黑而扁光。似莧實而大。生下溼地。四月五月。蒴囊人名爲昆嵩草。【蘇恭】青葙生田野間。嫩苗似莧可食。長則高三四尺。苗葉花實。與雞冠花一樣無別。但雞冠花穗或有大而扁或圓者。此則稍開出。花穗尖長四五寸。狀如兔尾。水紅色。亦有黃白色者。子在穗中。與雞冠子及莧子一樣難辨。蘇恭言其結角誤矣。蕭炳言黃花者名陶珠術。與陳藏器所說不同。又有天靈草。亦此類也。【李時珍】

【青葙莖葉】 性質 苦微寒。無毒。

主治 邪氣。皮膚中熱。風痿身痠。殺三蟲。【本經】惡瘡疥。殺痔蝨。下部匿瘡。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論青葙莖葉曰。搗汁服。大療溫癩。【宋】大明諸家本草論青葙莖葉曰。止金瘡血。
【青葙】卽大麻子之別名。詳「大麻子」條。
【青葙】卽鉛之處方用名。詳「鉛」條。

【青雌】 古醫別名 蟲種。孟推。蟲撰。【別錄】

產地 生山谷中。
基本 青雌爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。
主治 惡瘡疥。敗瘡火氣。殺三蟲。

【青鼠】卽鼯鼠皮毛作青色者之古籍別名。與見綱目。參見「黃鼠」條。

【青精子】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枸杞子」條。

【青精乾石鮑飯】 古醫別名 烏飯。
綱目 製法 用南天燭莖葉。搗澄清汁。浸粳米。九浸九蒸。九晒。米粒緊小。黑如豎珠用。

性質 甘平。無毒。
主治 日進一合。不饑。益顏色。堅筋骨。能行。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌新修本草論青精乾石鮑飯曰。益腸胃。補骨髓。減三蟲。久服變白。爲黑。御老延年。

【青蒿】

命名 本品莖葉俱青。雖至深秋色青猶如松檜。而形微似茵陳。故名。

處方用名 統青蒿。純青蒿。青蒿子。青蒿梗。

古籍別名 草蒿。方漬。(本經) 葍。狐蒿。(蜀本草) 香蒿。(衍義)

基本 屬菊科。為青蒿之莖葉。產地 陳仁山藥物生產辨云。青蒿各屬均有出。以英德縣為多。

形態 青蒿為一年生草本。自生於河岸或海濱。春日抽莖。初旬於地漸高至三五尺。葉為複葉而細裂。葉面平滑。梢端之葉。幾如線狀。葉腋生枝。枝頭開花。色黃綠。狀如筒。頗細小。相綴而為頭狀花序。結實如麻子。

種類 青蒿葉極細。莖瘦而堅。其青色。雖屆深秋猶然。且氣芬芳。黃蒿葉較粗。莖柔而輒。其青色未屆深秋已萎黃。且氣微香。

採取 四五月採莖葉。日乾。八月採子。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使青蒿。惟中為妙。到膝即仰。到腰即俛。使子不使葉。使根不使莖。四件者若司使。

翻然成痼疾也。採得葉。用七歲小兒七個溺浸七日。七夜。漉出曬乾用。

性質 苦寒。無毒。

效能 清暑熱。療骨蒸。為解熱藥。用於熱之有起伏性者。效如壯熱及病勢亢進期。其效不確。本品有制止撲滅發熱之發酵素。及細菌之繁殖作用。用於肺癆熱及產褥熱。含有原因療法之意義。此外用於骨蒸熱。虛熱之原因不明者。亦均有效。無副作用。無刺激性。不起虛脫症狀。為解熱藥之最佳者也。

主治 疥癩。痲疹。惡瘡。殺蟲。治留熱在骨節間。明目。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論青蒿曰。鬼氣尸疰。伏留。婦人血氣腹內滿。及冷熱久痢。秋冬用子。春夏用苗。並搗汁服。亦曝乾為末。小便入酒和服。【唐】蘇恭新修本草論青蒿曰。生搗傳金瘡。止血止痛。良。【唐】孟詵食療本草論青蒿曰。燒灰。隔紙淋汁。和石灰煎。治惡瘡。瘰癧肉。【宋】大明諸家本草論青蒿曰。補中益氣。輕

身補勞。駐顏色。長毛髮。令黑。不老。兼去蒜髮。殺風毒。心痛熱黃。生搗汁服。并貼之。【明】李時珍本草綱目論青蒿曰。治瘧疾寒熱。【明】釋希雍本草經疏論青蒿曰。草蒿。青蒿也。稟天地芬芳烈之氣。以生。故其味苦。其氣寒而芬芳。其性無毒。疥癩痲疹惡瘡。皆由於血熱所致。留熱在骨節間者。是熱伏於陰分也。肝胃無熱。則目明。苦能泄熱。苦能殺蟲。寒能退熱。熱去則血分平和。陰氣日長。前證自除。故悉主之也。諸苦寒藥。多與胃氣不宜。惟青蒿之氣。芬芳可人。香氣先入脾。故獨宜於血虛有熱之人。以其不犯胃氣。故爾。是以尋勞虛熱。非此不除矣。【清】黃宮繡本草求真論青蒿曰。青蒿性稟芬芳。味甘微辛。氣寒無毒。陰中有陽。降中有升。能入肝腎三焦血分。以療陰火伏留骨節。故凡骨蒸勞熱。及風毒熱黃。久癩久痢。瘰癧惡瘡。鬼氣屍疰等症。當須服此。以其苦有泄熱殺蟲之能。陰有退熱除蒸之用。辛有升發舒脾之功。而又於胃中氣不犯。以其得春升之令最早也。其形有類山

茵陳。又能清上虛熱。以治目疾。且燒灰淋汁。點治惡瘡。瘰癧肉。癰疽。生搗可敷金瘡。止血止痛。但性偏寒不溫。雖曰於胃不犯。亦止就其血虛有熱。服之得宜。而首若使脾胃素虛。及見泄瀉。則於此終屬有忌矣。童便浸藥。用熬膏良。使子勿使葉。使根勿使莖。

國外學說 日本大和本草曰。黃花蒿亦有微香。但不如青蒿香氣之烈。採藥者不識青蒿。往往與黃花蒿混而一之。青蒿治虛勞骨蒸。功用之多。固斑斑可考也。又廣惠濟急方曰。青蒿春生苗。冬枯。葉極細小。六七月。開淡黃色細花。結實如粟粒。其莖莖花實。與氣之芬芳。俱極似黃花蒿。但黃花蒿之葉較粗。似胡蘿蔔。未屆深秋而色已黃。青蒿則雖至深秋。而色猶青。又青蒿之莖瘦而堅。黃花蒿則柔輒可辨也。又荷蘭藥鏡載有歐洲產青蒿之功效。與日本所產者。功用大致相似。惟其基本植物。是否相同。今尚未詳。至青蒿之功用。味苦香宜。微收瀉。有疏解。刷淨。利尿。發汗。殺蟲之效。大抵如亞爾鮮。又通

八〇四

經閉。以治萎黃病、處女病、白帶下、痛風。俱有效。又疏解肝痺之瘰癧。治頑滯之同飲熱及黃疸。爲未服最佳。又用於小兒頭疔、淫疔。善排膿而淨。若以袋盛青蒿。貼小兒腹部。能治小兒蟲症。用水煎服。又治咳嗽喘急。若以之製爲布或蒸湯。能消散腫瘍。防護腐敗。水煎爲洗藥。或塗藥。治惡性疥癬。乾癬。小兒頭疔等之皮膚病。及諸毒蟲螫刺咬傷。

近人學說 張山雷曰。青蒿本經名爲草蒿。以其氣味苦寒。列於下品。然清芬之氣。撲人眉宇。以氣用專。故能散風火。善解暑熱。且生發最早。暮春初少陽升陽之氣。則通於肝。隨兩經。而清解血中鬱熱。本經謂治留熱在骨節間。以能升入肝腎陰分。而疏泄久留之蘊熱也。故爲勞瘵骨蒸煩熱之妙品。又氣本芳香。味亦清冽。則能振動脾胃清陽之氣。而理導溼熱。可以通利溼阻之溼滯。石頑謂與精茵陳不其相遠。洵不誣也。又治癩病。亦理溼之功耳。其子則爲治虛勞內熱之專品。蓋丸子皆重。故主裏證。

八 盞 青

且氣味清芬。則宜利血滯而清血熱。尤有專長。與其他大苦大寒之能伐生氣者不同。所以雖爲虛勞。亦堪重任。

配合應用 ①青蒿得鼈甲、地黃、牛膝、枸杞、麥門冬、五味子。除一切產後虛熱。寒熱掩延不解。亦治一切虛勞寒熱。陰虛。五心煩熱。腎水真陰不足。以致骨蒸勞熱。此爲要藥。

②治男婦勞瘵。青蒿細剉。水三升。童子小便五升。同煎取一升半。去滓。入器中。煎成膏丸。如梧子大。每空心及臥時溫酒吞下二十九丸。(斗門方)

③治虛勞寒熱。肢體倦疼。不拘男婦。八九月青蒿成實時。採之。去枝梗。以童子小便浸三日。曬乾。爲末。每服二錢。烏梅一箇。煎湯服之。(靈苑方)

④治骨蒸鬼氣。童子小便五大斗。澄清。青蒿五斗。八九月揀帶子者最好。細剉相和。納大釜中。以猛火煎取三大斗。去滓。澆釜令淨。再以微火煎可二大斗。入豬膽一枚。同煎一大斗半。去火待冷。以磁器

盛之。每欲服時。取甘草二三兩。炙熟爲末。以前和搗乾杵爲丸。空腹粥飲下二十九丸。漸加至三十九丸止。(崔元亮海上神效方)

⑤治骨蒸煩熱。青蒿一握。豬膽汁一枚。杏仁四十箇。去皮尖炒。以童子小便一大盞。煎五分。空心溫服。(十便良方)

⑥治虛勞盜汗。煩熱口乾。用青蒿一斤。取汁熬膏。入人參末、麥門冬末各一兩。熬至可丸。丸如梧子大。每食後米飲煎服二十九丸。名青蒿煎。(聖濟總錄方)

⑦治瘧疾寒熱。用青蒿一握。水二升。搗汁服之。(肘後方) 五月五日。天未明。採青蒿陰乾四兩。桂心一兩。爲末。未發前。酒服二錢。(存仁方) 又端午日。採青蒿葉陰乾。桂心等分爲末。每服一錢。先寒用熱酒。先熱用冷酒。發日五更時服之。切忌發物。(經效方)

⑧治溫瘧痰甚。但熱不寒。用青蒿二兩。童子小便浸焙。黃丹半兩。爲末。每服二錢。白湯調下。(存仁方)

⑨治赤白痢下。五月五日。採青

蒿艾等分。同豆豉搗作餅。日乾。名蒿鼓丹。每用一餅。以水一盞半。煎服。(聖濟總錄方)

⑩治鼻中衄血。青蒿搗汁服之。并塞鼻中極。 (衛生易簡方)

⑪治酒痔便血。青蒿用藥不用莖。用莖不用葉。爲末。煎前冷水。後水酒調服。(永類鈴方)

⑫治金瘡撲損。用青蒿搗封之。血止則愈。一方用青蒿麻葉石灰等分。五月五日搗和。曬乾。臨時爲細末。搗之。(肘後方)

⑬治牙齦腫痛。青蒿一把。煎水漱之。(濟急方)

⑭治毒蜂螫人。嚼青蒿封之。即安。(肘後方)

⑮治耳出膿汁。青蒿末搗麥納耳中。(聖惠方)

⑯治鼻中瘻肉。青蒿灰、石灰等分。淋汁熬膏點之。(聖濟總錄方)

⑰用蠶 錢半至三錢。

⑱施用宜忌 凡脾胃虛寒而大便泄瀉及無熱者禁用。

⑲參攷資料 ①青蒿能伏穉黃。(李時珍) ②草蒿江東人呼爲猓蒿。爲其氣息似猓也。北人呼爲青

青。爾雅云。蒿。藪也。孫炎注云。荆楚之間謂蒿為藪。郭璞注云。今人呼青蒿香中夾味者為藪是也。(韓保昇) ⑤ 芘子云。蒿。草之高者也。按爾雅諸蒿。獨藪得單稱為蒿。豈以諸蒿葉青皆白。而此蒿獨青。異於諸蒿故耶。(李時珍) ⑥ 嫩時醋淹為菹。自然香葉似茵陳蒿而青。不自高四尺許。四五月採日乾入藥。詩云。食野之蒿。即此蒿也。(韓保昇) ⑦ 青蒿春生。苗葉極細。可食。至夏高四五尺。秋後開細淡黃花。花下便結子如粟米大。八九月採子陰乾。根莖子葉並入藥用。乾炙作飲香尤佳。(蘇頌) ⑧ 青蒿得春最早。人別以為蕘。根赤葉香。沈括夢溪筆談云。有二種。一種黃色。一種青色。本草謂之青蒿。亦有所別也。陝西銀綬之間。蒿叢中時有一兩窠。迥然青色者。土人謂之香蒿。莖葉與常蒿同。但常蒿色淡青。此蒿深青如松檜之色。至深秋餘蒿並黃。此蒿猶青。其氣芬芳。恐古人所用以深青者為勝。不然諸蒿何嘗不青。(寇宗奭) ⑨ 青蒿專解濕熱。而氣芳香。故為溼溫病疫癘

藥。又清肝膽血分之伏熱。故為女子淋帶。小兒痢瘧疳腫神劑。本草未言。特為發之。(王秉衡) ⑩ 青蒿是陰血衰少。陽氣陷入陰中。而為蕘蒸之熱也。諸經血熱。亦陽勝陰也。青蒿為補陰退熱之妙劑。人每忽之而不用。惜哉。(類明)

【青蒿子】

性實 甘冷無毒。
主治 明目開胃。妙用。治身瘦。壯健人。小便沒用之。治惡瘡疥癬。風癩。煎水洗之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論青蒿子曰。治鬼氣。為末酒服。【明】李時珍本草綱目論青蒿子曰。功同葉。

【青蒿子】

即青蒿之處方用名。詳【青蒿】條。

【青蒿酒】

製法 用青蒿搗汁和麴釀成飲。

【青蒿梗】

即青蒿之處方用名。詳【青蒿】條。

【青蒿露】

命名 本品即青蒿蒸取之露。故名。
性實 苦寒無毒。
功用 明目。退熱。清暑。辟穢。

蠶繭 勞瘦。骨蒸。虛熱。虛煩。盜汗。久癩。久痢。辟勞。

【青蒿蠶蟲】

命名 本品乃生於青蒿節間之蠶蟲。故名。

形態 青蒿蠶蟲為化生蟲類之一種。狀如小蠶。久乃成蛾。捕得可供藥用。

主治 急慢驚風。用蠶搗和硃砂。米粉各五分。丸粟粒大。一歲一丸。乳汁服。

參攷資料 青蒿蠶蟲。古方不見用者。保嬰集用治驚風云。十不功。只在青蒿節。任殺死去也。還魂服時須用生人血。(李時珍)

【青蒿皮】

即合歡皮之古籍別名。與見圖經本草。詳【合歡皮】條。

【青膠】

即牛皮膠之別名。詳【牛皮膠】條。

【青橘】

即橘實之青而未黃者。性實 苦辛溫。無毒。功用 消痰。破滯。削堅。散痞。下食。發汗。疏肝。膽。瀉肺氣。

【青橘皮】

即水銀之古籍別名。與見

石藥爾雅。詳【水銀】條。

【青蘗】

即蘗莖。詳【蘗莖】條。

【青蘗子】

即青蘗子之古籍別名。與見和漢藥考。詳【青蘗子】條。

【青蘗】

即味木鳥之古籍別名。與見動物學大辭典。詳【味木鳥】條。

【青黏】

即玉竹之古籍別名。與見和漢藥考。詳【玉竹】條。

【青黛】

命名 黛。眉色也。劉熙代之。故謂之黛。其色青。遂名青黛。處方用名 真青黛。飛青黛。陳青黛。漂青黛。

古籍別名

靛花。青蛤粉。(綱目) 花青。藍青。藍露。澱花。螺青。羅青。青缸粉。螺子黛。螺兒青。(和漢藥考)

產地

陳仁山藥物生產辨云。青黛乃藍靛缸底之渣。各處均有。

形態

青黛為無臭。無味。輕靈之青藍色粉末。水酒精糖醃類。亞兒加里等。俱不溶解。置日光及空氣中。亦不起變化。遇酸化劑。則變白色。熱則放青紫色之焰。而昇華。

製法

採集屬於藍科之藍

葉曬乾揉碎。入水適宜。令其發酵。約數星期。再入水少許。一併搗杵。捏成團塊。更破碎之。與木灰、紙皮、石灰同納甕中。加溫水攪拌。且微溫之。經一二期。令再發酵。遂得黃色之汁。謂之藍汁。以浸布帛絲類。用染青、紺等色。又攪動藍汁。則紫碧色之氣沫。聚合而為輕鬆之塊。上浮汁面。謂之藍花。採取而乾燥之。謂之青黛。供藥用及畫工著色之顏料。

製法 但取潑桶中浮起者。曬乾。用時水飛去脚。綠中有石灰。宜飛淨。服餌也。若外傳則旋亦可。用。並其脚不去亦可。

性質 鹹寒無毒。

成分 青黛之主成分。為靛素 (Indigotin, $C_{16}H_{10}N_2O_2$)。在印度藍。則尚含有蛋白質、膠質、無機物等。

效能 瀉肝散鬱火。治疔瘡。瘡。用治疔瘡及諸咬傷。藥。又為止血藥。

主治 解諸藥毒。小兒諸熱。驚。別發熱。天行頭痛寒熱。并水研服之。亦磨得熱瘡惡瘡。金瘡下血。蛇

犬等毒。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論青黛曰。解小兒疔熱。殺蟲。【唐】陳藏器本草拾遺論青黛曰。小兒丹熱。和水服之。同雞子白。大黃末。敷瘡。蛇蝎螫毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論青黛曰。瀉肝散五臟鬱火。解熱消食積。【明】李時珍本草綱目論青黛曰。去熱。煩。吐血。瘰癧。陰瘡。殺惡蟲。【明】櫻。希雅本草經疏論青黛曰。青黛。外國藍靛之英華也。其味鹹寒而無毒。甄權謂其甘平。以其得土氣之厚也。故可解諸藥毒。及小兒諸熱。驚癇。發熱。天行頭痛寒熱。煎水研服之。亦磨得熱瘡惡瘡。金瘡下血。蛇犬等毒。波斯國來。及太原產者。勝如不可得。即用染窰浮沫之紫碧色者亦可。【清】黃宮繡本草求真論青黛曰。青黛係藍靛淨沫。攪澄掠出。取乾而成。味鹹性寒。色青。大瀉肝經實火。及散肝經火鬱。故凡小兒風熱驚癇。疔毒丹熱。癰瘡。蛇犬等毒。金瘡血出。瘡腫。食。並天行頭痛。痘疫熱毒。發斑吐血。咯血。痢血等症。或磨作丸為衣。或用

為末乾滲。或用水調敷。或入湯同服。或作餅子投治。皆取苦寒之性。以散風。燥燥結之義。即云功與藍等。而止血拔毒之功。與治腫化毒之力。似較藍而更勝也。和溷白。逐冰片。吹口疔。最妙。取礪碧者。水飛淨。石灰。用藍靛。兼有石灰。敷瘡。殺蟲。最奇。蟲屬下屬。非此不除。藍葉與莖。即名大青。大瀉肝膽實火。以祛心胃熱毒。故於時疾。陽毒。發斑。喉痺等症。最利。藍子。止能解毒。除疔。故於鬼疫。瘰癧之症。最妙。

國外學說 和漢藥考曰。印度及埃及等熱帶地方。則以屬於豇科之木藍製造此物。其法。刈取木藍。製乾。納水槽中。灌水。放置。任其自然發酵。遂生藍汁。於藍汁中。加石灰水。攪拌。候青黛沈降。採集而乾燥之。是名印度藍。近年多。以之作染料。又曰。藍葉中含有之藍素。殷地各欽 (Indigotin, $C_{16}H_{10}N_2O_2$)。與葡萄糖抱合。為殷地甘 (Indican, $C_{24}H_{18}NO_7$) 之糖原質。此質一次受發酵作用。即行分離。更因乳酸發酵。變為亞兒加里。液能溶解之。白藍。然一觸空氣。再

酸化而仍為青藍。故發酵所得之藍汁。於藍葉中攪拌。則觸空氣。而變青藍。汁面輕鬆之浮遊物。可凝結也。又曰。印度藍。為深青色之假子形。或不整之塊片。接於舌上。則被染。以指甲壓摩之。則留紅銅色之條痕。比重一。三至一。五七。又手板發聲曰。青黛。即水飛藍。日本大阪製者。和頂上之胡粉。入藥者。為棒藍。水飛一度用之。吉字牌為上品。桔梗牌為中品。此外各種牌子甚多。藍露 (一名潑花。又名潑花) 即粉藍。別一種名水飛藍。亦屬上品。其上中品及下品亦殊夥。又日用藥品考曰。外國來者。即波斯青黛。真品也。中國來者。採製藍靛之淨沫。乾而成之。所謂藍花是也。本草藥言謂之土青黛。其取藍葉上之沫。乾而製之者。外科正宗謂之青缸花。日本製之青黛。多雜給粉。不入藥用。

近人學說 張山雷曰。青黛。古時產於波斯。後人以藍靛之淨沫為之。故李瀕湖謂之潑花。其功用亦與藍同。但藍之淨沫。乾之。則所存無多。今市肆之物。乃以藍之

八 蠶 青

凝結下沈者爲之。純是石灰木質。與澁花之質。清濁絕異。考古方多用青蠶爲內服之藥。必非今時重濁之物。若今之青蠶。則止宜外敷。以爲燥溼殺蟲。及金瘡止血之用。瀨湖已有貨者。多以乾澱充之。中有石灰。服餌宜慎之。而俗醫不知辨別。猶復以爲內服之藥。亦誤讀古書。不詳物理之咎矣。

配合應用 ①得無黃。使君子肉。胡黃連。蘆薈。殺蟲除熱。及小兒一切疳積病。

②治心口熱痛。煎汁調青蠶一錢服之。(醫學正傳方)

③治內熱吐血。青蠶二錢。新汲水下。(聖惠方)

④治肺熱咯血。青餅子用青蠶一兩。杏仁。以牡蠣粉炒過一兩。研勻。黃蠟化。和作三十餅子。每服一餅。以乾柿半個。夾定。漚紙裹。煨香。嚼食。粥飲送下。日三服。(華陀中藏經方)

⑤治小兒疳積。青蠶最大小。水研服之。亦治小兒夜啼。(生生編方)

⑥治小兒疳疔。宮氣方歌云。孩

兒雜病變成疔。不問強羸女與男。煩熱毛焦鼻口燥。皮膚枯槁四肢痠。腹中時時更下痢。青黃赤白一般般。眼溼面黃鼻孔赤。穀道開張不可看。此方便是青蠶散。孩兒百病服之安。

⑦治耳疳出汁。青蠶。黃蘗末。乾擦。(談楚翁方)

⑧治爛弦風眼。青蠶。黃連。泡湯日洗。(明目方)

⑨治產後發狂。四物湯。加青蠶水煎服。(摘玄方)

⑩治傷寒赤斑。青蠶二錢。水研服。(活人書方)

⑪治豌豆瘡毒。未成膿者。波斯青蠶一束許。水研服。(梅師方)

⑫治瘰癧未穿。澁花馬齒莧同搗。日日塗傳取效。(簡便方)

⑬治諸毒蟲傷。青蠶。雄黃。等分研末。新汲水服二錢。(古今錄驗方)

用釐 五分至八分。

施用宜忌 凡陰虛無熱及中寒者禁用。

參攷資料 ①青蠶乃蠶爲之者。有一婦人患臍下腹上下連二

陰。偏生瘰癧。狀如馬爪指。他處並無。痒而痛。大小便溼。出黃汁。食亦減。身面微腫。醫作惡瘡。治用鯢鱈魚。松脂。黃丹之藥。塗之。熱痛甚。問其人嗜酒。食喜魚蟹。發風等物。急令洗其膏藥。以馬齒莧四兩。杵爛入青蠶一兩。再研勻塗之。即時熱減。痛痒皆去。仍以八正散日三服。之分。散客熱。藥乾即止。如此二日。減三分之一。五日減三分之二。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當作腸癰內痔。仍須禁酒。色發風物。然不能禁。後果患內痔。(急宗爽) ②波斯青蠶亦是外國藍花。既不可得。則中國控花亦可。或不得已。用青布浸汁代之。貨者復以乾澱充之。然有石灰入服。藥中當詳之。(李時珍) ③青蠶乃藍澱浮沫。攪澄掠出。收乾。瀉肝膽。散鬱火。治溫毒發斑。及產後熱痢下重。千金藍青丸用之。天

行寒熱頭痛。水研服之。與藍同類。而止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。又治疔腫之疾。取其化蟲之力也。和溼白蠟冰片。吹口疳最效。(張石頑) ④青蠶味微鹹而寒。性與

八〇八

藍青大同。解諸熱毒。蟲毒。金瘡。熱瘡。或乾。或以水調敷。若治諸熱瘡毒。或用馬齒莧加青蠶同搗。傳若治天行頭痛。瘟疫熱毒。及小兒諸熱。疔疔發熱。並宜用水研服之。(張景岳)

【青蠶實】即藍實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藍實」條。

【青蠶】即田雞之古籍別名。典見綱目。詳「田雞」條。

【青蠶石】即礞石之處方用名。詳「礞石」條。

【青藤】即清風藤之古籍別名。典見綱目。詳「清風藤」條。

【青藤仔】即假蘇黎之原名。詳「假蘇黎」條。

【青邊芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【青鴉】古醫別名。黃楊侯。(拾遺) 山鳩。綠鳩。(動物辭典)

外國名詞 Treron Siboldi Tomm. Green Pigeon 或 Trite dor Papeguitaube ノオハト 或 ヤマバト 或 ヤクハチバト (日本)

【青鸚】係節肢動物，鳥類，鸚鵡類。鸚鵡科之青鸚。

產地 生山中。

形態 青鸚為山禽類之一種。其狀如鳩。稍大。全體淺綠色。頭部黃綠色。腹部白色。雄者翼面饒暗赤色。雌者無之。鳴聲如小兒吹竽。體長約一尺二寸。翼長約五寸。脚趾短小。四趾踏地赤色。其肉可食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 蟻瘻瘰癧。五味淹炙食之。極美。

歷代記述攷證 【唐】寧禹錫

嘉祐本草論青鸚曰。安五臟。助氣。補虛損。排膿活血。并一切瘡癤。瘰癧。

【青鸚】即綠鸚之古籍別名。典見唐本草。詳「綠鸚」條。

【青鸚】即胡麻葉之原名。詳「胡麻葉」條。

【青鸚】即建蘭青色者之別名。詳「建蘭」條。

【青鸚】即地膽之古籍別名。典見綱目。詳「地膽」條。

【青鸚】即戎鹽之處方用名。詳「戎鹽」條。

戎鹽條。

【青鹽陳皮】 命名 本品為陳皮之用青鹽及各藥製成者。故名。

製法 青鹽陳皮。即蘇州宋公祠之遺法也。陳皮二斤。河水浸一日。竹刀輕刮去渣白。貯竹籠內。沸湯淋三四次。用冷水洗淨。不苦為度。曬至半乾。可得淨皮一斤。初次用甘草。烏梅肉各四兩。煎濃汁。拌曬夜露。俟酥捻碎如豆大。再用川貝母去心四兩。青鹽三兩。研為細末。拌勻曬露乾收貯。

性質 苦。辛。溫。潤。無毒。

主治 消痰降氣。生津開鬱。還脾調胃。解毒安神。

【青鹽陳皮】橋皮用青鹽製成者之處方用名。詳「橋皮」條。

九 壺

【侯木】即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【侯抄】即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【侯桃】即辛夷之古籍別名。典見本經。詳「辛夷」條。

【侯莎】即香附子之古籍別名。典見爾雅。詳「香附子」條。

【侯騷子】 形態 侯騷為夷果。結子大如雞卵。可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 消酒除溼。解煩熱。治癰毒。輕身延年。

【便牽牛】即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。

【保心石】 主治 治大熱燥渴。小便不通。泄瀉。俱水調服。胸傷憂悶無熱者。或酒或水調服。有熱者。酒水各半調服。病後體弱。酒水各半調服。胸肉傷心痛。風寒氣痛。吐衄。咯血吐血。皆水調服。毒蛇毒蟲傷。不拘酒水服。刀箭傷。犬毒物傷。以粉敷瘡口外。以布包即愈。

參攷資料 此石生鹿腹中。鹿食各種解毒之草。其精液久積結而為石。亦名寶石。有二種。一是鹿獄生成。一是泰西至小西洋采珍藥製成。服之令毒氣不攻於心。故

曰保心石。用法以刀刮如麥大者六粒。為粉調服。多用亦無害。更增加精神。常服此藥酒水隨人。能令腹中不生蛔蟲。體健神旺。

【保生蠶】即蠶本之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蠶本」條。

【保和枝】 基本 為荔枝之一種。產地 產於福建晉江縣北。陳巖山遊花峯。

形態 保和枝為夷果類荔枝之一種。其實大而色黃。可供藥用。核詳見該條。

主治 治胸膈煩悶。調逆氣。導滯。

【保和枝核】 主治 燒灰酒服。止腹痛。痢疾。

【保樂】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【保蠶龜】即蠶龜之青色暗綠有主紋片十三枚者。喜食植物。功用與蠶龜同。參詳「蠶龜」條。

【促織】即蟋蟀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蟋蟀」條。

【俠客蟻】即蟻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蟻」條。

九畫 價冠 削前

【信石】即砒霜之古籍別名。典見綱目。詳「砒霜」條。

【冠方】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【冠雉】即突厥雀之古籍別名。典見綱目。詳「突厥雀」條。

【冠冕】即冕之頭上有冠者。乃石首魚所化。功用與尋常冕同。參見「冕」條。

【冠輝】即輝花之古籍別名。典見禮記。詳「輝花」條。

【削堅都尉】即三稜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「三稜」條。

【前山朴】即厚樸之處方用名。詳「厚樸」條。

【前胡】原名 前胡。處方用名 嫩前胡。北前胡。

古鑄別名 全胡。血藤。西天蔓。射香菜。幽香菜。(和漢藥考)

外國名詞 Ponedanum deourivum Maxim. Angelica deouriva, Mlg. (拉丁)

基本 屬繖形科。為前胡之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。前胡產浙江省杭州府為上。其餘

河南懷慶府、信州、廣西各屬。均有出產野生。

形態 前胡為多年生草本。自生於山野之間。莖高三四尺。大者至五六尺。葉為羽狀複葉。具廣闊之葉鞘。但小葉全不分離。下半竟至連合。形卵圓。或作披針形。末端帶尖。邊緣有鋸齒。上葉之葉鞘頗膨大。入秋。開深紫色之五瓣細花。連綴如複繖狀。黑實似大麥。形橢圓而扁平。大二分許。有條理。其邊緣如翼。本品為類似柴胡之根。外面色污黑。內部白色。質柔韌。氣芳香。味微苦。

採取 二月八月間採根。暴乾。

製法 雷斅曰。凡使前胡。先用竹刀刮去蒼黑皮。并髭。細剉。以甜竹瀝浸令潤。日中曬乾用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 散風。化痰。下逆氣。治咳嗽。用作祛痰藥。

主治 痰滿胸膈。中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。

推陳致新。明目益精。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論前胡曰。能去熱質。及時

氣。內外俱熱。單煮服之。【宋】大明諸家本草論前胡曰。治一切氣。破癥結。開胃下食。通五臟。主霍亂轉筋。骨節煩煩。反胃嘔逆。氣喘咳嗽。安胎。小兒一切疳氣。【明】李時珍本草綱目論前胡曰。清肺熱。化痰熱。散風邪。【明】經希雍本草經疏論前胡曰。前胡味苦微寒。無毒。應有甘辛平寒而能降。所以下氣。故除痰滿。胸膈中痞。心腹結氣。痰厥頭風痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。推陳致新。能去實熱。及時氣內外俱熱。單煮服之。亦治一切氣。破痰結。及邪熱骨節煩煩。氣喘咳嗽。兼散風邪也。【明】李士材本草圖解論前胡曰。前胡味苦微寒。肺肝藥也。散風驅熱。消痰下氣。開胃化食。止嘔定喘。除嗽安胎。止小兒夜啼。柴胡前胡。均為風藥。但柴胡主升。前胡主降。為不同耳。種種功力。皆是搜風下氣之效。肝膽經風痰為患。者。舍此莫能療。忌火。【清】黃宮繡本草求真論前胡曰。前胡味苦微寒。功出下氣。凡因風入肝膽。火盛痰結。暨氣實哮喘。咳嗽嘔逆。痞悶霍亂。及小兒疳氣等症。升藥難投。

須當用此苦瀝。俾邪去正復。不似柴胡性主上升。引邪外出。而無實痰實氣。固結於其中也。按二胡均是風藥。一升一降。用各不同。若使兼有外感風邪。與痰火實結。而用柴胡上升。不亦如火益熱乎。故必用此下降。但症外感絕少。祇屬陰虛火動。並氣不歸元。胸膈逆滿者。切忌。皮白肉黑。味甘氣香者良。

國外學說 和漢三才圖會曰。前胡味始甘終苦。中日所產。形狀氣味有異同。蓋中國前胡。亦有數種也。日本產者。苗高一二尺。葉似桑葉。而無鋸齒。兩兩對生。八九月開黃花。似旋覆花。亦有白花者。皆十月結實。有核似牽牛子。其色黑。又日用藥品考曰。中國來者甚少。且陳久多不堪用。日本產者。氣味差劣。藥舖有之。又手板發謨曰。一種細葉者。名前胡。日本之和州甚多。又有田舍前胡。黑色。下品也。其堅實而有滋味者。則品尤劣矣。

辨偽 鄭肖巖曰。真前胡以吳興產者為勝。根似柴胡而柔。味亦香美。為疎風清熱。化痰妙藥。聞有一種土前胡。其根硬。其心無

須當用此苦瀝。俾邪去正復。不似柴胡性主上升。引邪外出。而無實痰實氣。固結於其中也。按二胡均是風藥。一升一降。用各不同。若使兼有外感風邪。與痰火實結。而用柴胡上升。不亦如火益熱乎。故必用此下降。但症外感絕少。祇屬陰虛火動。並氣不歸元。胸膈逆滿者。切忌。皮白肉黑。味甘氣香者良。

紋。決不可服。曹炳章曰。前胡十月出新。浙江湖州。寧國。廣德皆出。類大光白無毛。性輕糯。氣香。觸鼻者佳。若梗硬心白。即土獨活之類。與前胡同類異種耳。爲不道地。

配合應用 前胡同白前。杏仁。桑白皮。甘草。桔梗。能豁風熱痰。壅喘嗽下氣。

入青礬石滾痰丸中。代黃芩。治一切實痰。有殊功。其用黃芩者誤也。

治時疫寒熱用前胡。羌活。乾葛。柴胡。黃芩。枳椇根。

治小兒夜啼。前胡。搗碎。蜜丸。小豆大。日服一丸。熱水下。至五六丸。以瘥爲度。(普濟方)

用錢 錢半至三錢。

施用宜忌 凡內無實熱。外無感邪者。禁用。惡皂莢。畏藜蘆。半夏。爲之使。

著名方劑 前胡丸。治心頭痰積。宿水嘔逆。不下食。(古方)前胡白朮。甘草(炙)各五分。麥冬(去心)六分。旋覆花。豆蔻各三分。人參六分。枳實。大黃各四分。爲末。蜜丸。桐子大。空腹酒下二十九。漸加

至三十九。忌桃李魚蒜等物。

參攷資料 陝西梁漢江淮。荊襄州郡。及相州。孟州。皆有之。春生苗。青白色。似斜蒿。初出時有白芽。長三四寸。味甚香美。又芸薹七月內開白花。與葱花相類。八月結實。根青紫色。今鄧廷將來者。大與柴胡相似。但柴胡赤色而脆。前胡黃而柔。轉爲不同。一說今諸方所用前胡皆不同。汴京北地者。已黃白枯脆。絕無氣味。江東乃有二種。一種類當歸皮。斑黑肌黃。而脂潤。氣味濃烈。一種色理黃白。似人參而細短者。味都微。一種如草烏頭。膚赤而堅。有兩三歧爲一本。食之亦較人咽喉。中破以薑汁漬。搗服之。甚下膈解痰實。然皆非真前胡也。今最上者。出吳中。又鬱春生者。皆類柴胡。而大氣芳烈。味亦濃苦。療痰下氣。最勝諸道者。(蘇頌)

凡使勿用野蒿。根綠真似前胡。只是味粗酸。若誤用之。令人反胃不受食。若是前胡。味甘微苦也。(雷敳)前胡有數種。惟以苗高一尺。色似斜蒿。葉如野菊。而細瘦。嫩時可食。秋月開。白花。類蛇

林子花。其根皮黑肉白。有香氣。爲真。大抵北地者爲勝。故方書稱北前胡云。(李時珍)

【渤勒回】即博落迴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「博落迴」條。

【南山茶】即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【南山參】即黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳「黨參」條。

【南天竹】即南天燭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「南天燭」條。

【南天竺草】即羅麥之古籍別名。典見綱目。詳「羅麥」條。

九畫 前 渤 南

【南天燭】原名 南燭。處方用名 天燭葉。南竹葉。

古籍別名 南燭。(開寶)南燭。草木。猴藥。男憤。染殺。猴救草。草木之王。惟那木。(隱訣)牛筋(拾遺)烏飯草(日華)墨飯草。赤色者名文燭。楊桐(綱目)南天竹。(綱目拾遺)生羅麥。烏葉。

外國名詞 Cardon maritima (英)

基本 屬小蘗科。爲南天燭之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。南竹子。產江蘇鎮江。凡吳楚之地。恒多生焉。

形態 南天燭爲灌木類。多年生植物。叢生直上。高四五尺。間有丈餘者。莖幹微紫。經冬不凋。其葉由多數披針形小葉而成。數回作羽狀。初夏開複總狀花序之白色五瓣花。果實作球形。初綠色。至冬季成熟。則呈美麗之赤色。時亦有白色或黃色者。變形亦多。其葉可供藥用。子枝詳見各條。

性質 苦。平。無毒。

成分 據緒子氏之實驗云。南天燭含有稱爲「ナルヂニン」之類鹽基。其醫治效果。大略與黃連同。

效能 黃連自赤腫痛。並治三



南天燭

九靈南

陰瘧疾。兼用作強壯藥。
主治 止泄除睡。強筋益氣力。
久服輕身長年。令人不飢。變白却老。

歷代記述攷證 【明】李士材
本草圖解論南燭曰。主止泄降腫。
強筋益氣。【明】羅希雍本草經疏
論南燭曰。南燭稟春升之氣。以生
本經言其味苦氣平性無毒。然嘗
其味亦多帶微瀉。其氣平者。平即
涼也。入心脾腎三經之藥。十劑云。
瀉可去脫。非其味帶瀉。則不能止
瀉。非其氣本涼。則不能變白。髮者
血之餘也。顏色者血之華也。血熱
則髮變早白。而顏枯槁。脾弱則困
倦嗜臥。而氣力不長。腎虛則筋骨
羸弱。而行步不前。入心涼血。入脾
益氣。入腎添精。其云輕身長年。令
人不飢者。非虛語矣。凡變白之藥。
多是氣味苦寒。有妨脾胃。惟南燭
氣味和平。兼能益脾。為修真家所
須。其子味甘酸。而其功效尤勝枝
葉。真變白駐顏輕身卻老之良藥
也。牧童食之。輒止飢渴。亦一驗矣。
【清】趙學敏本草綱目拾遺論南
天燭曰。明日烏鬚。解飢熱。清肝火。

活血散滯氣。

參攷資料 洗眼。去風火熱腫。

膨脹赤痛。及小兒疳積。取其葉煎

湯代茶服。又卻疫仙方行篋檢秘

凡人稍覺頭疼。身酸困倦。便即感

胃寒邪。急宜服此藥發散。毋使傳

經。變成時疫。此方經驗多人。神效

異常。用烏梅紅棗各三枚。燈心三

十根。南天竹葉三十片。羌萎梗三

段。無羌萎。以葱白三節代之。亦

可。甘草。麥冬各三錢。小柴胡二

錢。水二鐘。煎一鐘。不拘時溫服。微

汗即愈。

配合應用 ●南燭煎。益鬚髮

及容顏。兼補暖。三月三日。採葉并

葦子。入大淨瓶中。以童子小便浸

滿瓶。固濟其口。置酒處。經一周年。

取開。每用一匙。溫酒調服。極有效

驗。〔孫思邈千金月令方〕

●同早蓮草。沒食子。地黃。桑椹。

枸杞。山茱萸。何首烏。白蔘。為烏

鬚髮之聖藥。

●治一切風疾。久服輕身明目。

黑髮駐顏。用南燭樹。春夏取枝葉。

秋冬取根皮。細剉五斤。水五斗。慢

火煎取二斗。去滓。淨鍋慢火煎如

稀餡。裝瓶盛之。每溫酒服一匙。日

三服。一方入童子小便同煎。〔聖

惠方〕

●治誤吞鋼鐵不下。用南燭根。

燒研熱水調服一錢。即下。

●治療癰初起。百草鏡。南竹葉。

威靈仙。夏枯草。金銀花。各四兩。陳

酒四壺。隔水煮透。一日三服。半月

除根。每服藥酒須吞丸藥。每蠶一

斤。炒研砂糖和丸。桐子大。每次吞

一錢。〔丸藥方〕

用蠶 一錢半至三錢。

參攷資料 ●今惟江東州郡

有之。株高三五尺。葉類苦棟而小。

凌冬不凋。冬生紅子。作穗。人家多

植庭院間。俗謂之南天燭。不拘時。

採枝葉用。陶隱居登真隱訣。載太

極真人青精乾石髓飯法云。其種

是木而似草。故號南燭草木一名

男續。一名猴藥。一名猴草。一名惟

那木。一名草木之王。凡有八名。各

從其邦域所稱。而正號是南燭也。

生嵩高少室。抱嶺。雞頭山。江左。吳

越。至多。土人名曰猴菽。或曰染菽。

粗與真名相彷彿也。此木至難長。

初生三四年。狀若菘菜之屬。亦頗

似栴子。二三十年乃成大株。故曰
木而似草也。其子如茱萸。九月熟。
酸美可食。葉不相對。似茗而厚。
味小酢。冬夏常青。枝莖微紫。大者
亦高四五丈。而其肥脆易摧折也。

〔蘇頌〕●南燭。吳楚山中甚多。葉

似山礬。光滑而味酸澀。七月開小

白花。結實如朴樹子。成簇。生青。九

月熟。則紫色。內有細子。其味甘酸。

小兒食之。按古今詩話云。即楊梅

也。葉似冬青而小。臨水生者尤茂。

寒食採其葉。漬水染飯。色青而光

能資陽氣。又沈括筆談云。南燭草

木本草及傳記所說。人少識者。北

人多誤以烏白為之。全非矣。今人

所謂南天燭是矣。莖如葫蘆。有節

高三四尺。廬山有盈丈者。南方至

多。葉微似棟而小。秋則實赤如丹

〔李時珍〕●畫譜名闌天竹。其葉

似竹生。生子成穗。紅如丹砂。經久

不脫。可入糖蜜供食。〔和漢三才

圖繪〕●南天燭。葉相傳用以去

乾蛙蠱。甚有效。試盛滿桶。置入鹽

鮭一二尾。及南天燭葉數十葉。經

一晝夜。則蠱氣全消。與生鮭無異

云。〔園藝文庫〕

【南天燭子】

古籍別名 紅色者名紅杷子。

白色者名玉珊瑚。(綱目拾遺)

採取 九月間採之。

性質 酸。甘。平。無毒。

主治 強筋骨。益氣力。固精駐顏。

配合應用

◎治八角蟲。同水銀搗爛擦之即除。亦可浸酒去風痺從。

◎治小兒天哮。方用經霜天燭子。臘梅花。各三錢。水煎一椀。俱預收。臨用水煎服。一劑即愈。

◎下疳久而潰爛。名蝦燭疳。紅杷子。燒灰存性。一錢。梅花冰片五釐。麻油調擦即愈。(不藥良方)

◎治陰莖泄。紅杷子。燒灰存性一錢。加冰片五釐。麻油和搽。(慈航活人書方)

◎治三陰瘰。南天竹。隔年陳子。取來蒸熟。每歲一粒。每早晨白湯下。

◎治解砒毒。劉涓子曰。凡人食砒垂死者。用南天竹子四兩。搗水服之。立活。此方劉在松江府署親試驗者。如無鮮者。即用乾子一二

兩煎湯服亦可。

【南天燭枝梗】

主治 一切風疾。緩緩煎如飴酒服。療腸食隔氣。作筋用。

【南木香】即木香之古籍別名。典見綱目。詳木香條。

【南瓜】

命名 本品種出南番。故名南瓜。

古籍別名 番南瓜。變南瓜。(和漢藥考)

外國名詞 Cucurbita Pepo, L. (拉丁) Flat Yellow Pumpkin. (英)

基本 屬葫蘆科。南瓜之果實。產地 南瓜種出南番。轉入浙閩。今燕京諸處亦有之。(本草綱目)

形態 南瓜原屬暖地產物。為栽植園圃之一年生蔓草。有卷鬚。纏繞他物而生。長葉作圓心臟形。有淺裂五葉柄長。夏日於葉腋開黃色合瓣花冠之單性花。雌雄同株。花後結巨大漿果。即為本品。有種種形狀。但多為扁球形。有縱溝數條。表面有疣瘡。初呈綠色。後變橙黃色。中藏多數扁橢圓形種子。

子。

採取 深秋瓜熟時採之。

性質 甘。溫。無毒。

效能 和中。益氣。有殺蟲之效。用以驅除絲蟲。

主治 補中益氣。

歷代記載攷證 【清】黃宮繡本草求真論南瓜曰。南瓜味甘氣溫。體潤質滑。食則令人氣脹溼生。故書載此品類之賤。食物之所不宜。凡人素患脚氣。於此最屬不宜。食則溼生氣壅。黃疸溼痺。用此與羊肉同食。則病尤見劇迫。惟有大陰溼土。口渴舌乾。服差見其有益耳。至經有言補中益氣。或以津枯燥涸。得此津回氣復。以為補益之自乎。否則於理其有不合矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論南瓜曰。南瓜早收者煖。可充饌。甘溫耐飢。同羊肉食則壅氣。晚收者甘涼。補中益氣。蒸食味同番薯。既可代糧救荒。又可和粉作餅餌。蜜漬充果食。凡時病疴瀉。疰痢脹滿。脚氣痞悶。產後痧瘧。皆忌之。

配合應用 解亞片毒。用生南瓜搗汁煎瀉。(隨息居方)

◎戒亞片癮。宜用南瓜蒸熟多食。永無後患。(隨息居方)

◎治火藥傷人。用生南瓜搗傳。煎湯火傷。(隨息居方)

◎治槍子入肉。用南瓜瓢傳之。即出。晚收南瓜浸鹽水中。備用。亦良。(隨息居方)

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡有脚氣黃疸病者。禁用。忌羊肉。

參攷資料 南瓜。二月下種。宜沙沃地。四月生苗。引蔓甚繁。一蔓可延十餘丈。節節有根。近地即着。其莖中空。其葉狀如蜀葵。而大如荷葉。八九月開黃花。如西瓜花。結瓜正圓。大如西瓜。皮上有稜。如甜瓜。一本可結數十顆。其色或綠或黃。或紅。經霜收置暖處。可留至春。其子如冬瓜子。其肉厚。色黃。不可生食。惟去皮穢淪食。味如山藥。同猪肉煮食更良。亦可蜜煎。按王禎農書云。浙中一種陰瓜。宜陰地種之。秋熟。色黃如金。皮膚稍厚。可藏至春。食之如新。疑此即南瓜也。(李時珍) 日本之有南瓜。或云係元和年中。自中國傳入。或云係

天文年中。西人始攜此至豐後。獻於國主大友宗鄰者云。京都地方。則云係寬文年中傳入。秋田地方。則係元和年中始種此云。(和漢藥考)

【南瓜蒂】

主治 保胎。消疔毒。配合應用 保胎。

用黃牛鼻一條。煨灰存性。南瓜蒂一兩。煎湯服。永不墮。(神妙湯方)

◎治疔瘡。用老南瓜蒂數個。焙研爲末。麻油調塗立效。(行德檢秘方)

參攷資料 綱目。南瓜主治。止

胃補中益氣而已。至其子食之。脫髮。今人以爲蔬。多食反壅氣滯腸。昔人皆未知也。吳秀峯言。凡瓜熟皆蒂落。惟南瓜其蒂堅牢不可脫。昔人曾用以入保胎藥中。大妙。

【南瓜籐】

製法 虛癆內熱。秋後將南瓜籐齊根剪

斷。插瓶內取汁服。(王士雄隨息居飲食譜)

【南竹葉】

卽南天燭之處方用名。詳【南天燭】條。

【南扶留】

卽木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳【木天蓼】條。

【南沙參】卽沙參之處方用名。產於江浙兩省。故加南字以別產於北地者。力較北產爲微。詳【沙參】條。

【南豆】卽蠶豆之古籍別名。典見食物本草。詳【蠶豆】條。

【南居李】卽李之核如杏子者之別名。典見嘉祐圖經本草。功用與尋常李同。參見【李子】條。

【南灰質】卽灰質之處方用名。詳【灰質】條。

【南芥】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【芥子】條。

【南威】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳【橄欖】條。

【南客】卽孔雀之古籍別名。典見綱目。詳【孔雀】條。

【南星】卽天南星之簡稱。功用詳【天南星】條。

【南榮胡】卽榮胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳【榮胡】條。

【南洋椰子】卽椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳【椰子】條。

【南珀】卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳【琥珀】條。

【南海珠】卽真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳【真珠】條。

見和漢藥考。詳【真珠】條。【南珠】卽真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳【真珠】條。

【南草】卽續斷之古籍別名。典見綱目。詳【續斷】條。

【南蛇】卽蝮蛇之古籍別名。典見綱目。詳【蝮蛇】條。

【南連】 古醫別名 仙姑連。天姥連。虞連。土連。(綱目拾遺)

處方用名 水黃連。 產地 浙溫台金華山中俱有之。出處州者名處連。

形態 以形大毛輕者爲最佳。性質 大寒。極苦。

主治 鼻疳。 參攷資料 川中打箭爐所出者。形細長。周身有黃毛。如狗脊狀。名水黃連。市人以之僞充川連用。但以皮肉帶青色者爲佳。出小西天。色黑有毛者亦佳。無毛光黃者次之。(百草鏡)

【南棗】 產地 金華東陽縣茶場。以透明如血七枚長一尺者佳。

性質 甘。酸性。溫。無毒。

主治 補脾胃。生津液。

配合應用 眼疾中有一種名紅線。銀目乾。治法。取南棗核二十一粒。將核截兩斷。去仁淨。以綢絲塞孔中。仍將棗核合上。以紙黏封一起。放爐中燒紅。取出。以碗蓋存性。每日只用七個。研極細末。調生男乳水。抹三日。立效。

◎治腸紅下血。南棗五枚。同黃芪二錢。煎湯五更服。神效。又方。南棗十枚。槐米一兩。同煎。去米食棗。日三次。卽愈。(不藥良方)

◎治痔瘡。南棗一枚。去核。龍頭骨一個。搗碎。銅青裝滿棗內。紫蠟火煨烟盡。伏土存性。研細。用秋海棠煎洗。然後用藥和水敷之。三日消。(救生苦海方)

◎除壁蝨。大南棗去核。入水銀火煨熟。(集驗方)

◎走馬牙疳。陳年南棗核燒灰研末。搽之。(不藥良方)

◎飛參丸。用大南棗十枚。蒸軟去核。配人參一錢。布包。飯鍋內蒸爛。搗勻。爲丸。如彈子大。收貯用之。補氣最捷。(醒園錄方) 又大南棗一斤。好柿餅十塊。芝朮半斤。去

皮炒。糯米粉半斤炒。特芝蔴研成細末。和棗柿同入飯中。蒸熟取出。去皮核子蒂。搗極爛。和糯米二粉。再搗勻爲丸。曬乾收貯。加參更妙。(仙果不饑方)

參攷資料 金華東陽縣茶場。

出聚。其大如拳。核尖細如黍。決之即脫。清甘香脆。以此名聞天下。明中葉尙存數柯。今此種已絕矣。惟東南諸鄉於高阜地種之。雖不及茶場。亦美甲於他處。其製法不一。未熟輒擊以湯沃之。使變色。謂之湯紅。乾則其色紫。已熟者名樹頭紅。乾則其色丹。過熟者以所煮餘汁煮之。色味似蔗糖。謂之糖棗。此則以時食爲美。不作乾也。又有一種棘差。小而圓。味殊勝。棗。(宦遊雜記)

【南棗】即大棗黑者之處方用名。詳「大棗」條。

【南椒】即川椒之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「川椒」條。

【南香珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【南硼砂】即硼砂之產於南方者。功用詳「硼砂」條。

【南燭】即南天燭之古籍別名。典見開寶本草。詳「南天燭」條。

【南燭草木】即南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【南薄荷】即薄荷之古籍別名。典見本草衍義。詳「薄荷」條。

【南藤】 命名 本品生依南樹。故有是稱。

古籍別名 丁公寄。丁父。(別錄) 丁公孫。(開寶) 石南藤。(圖經) 風藤。(綱目)

產地 寄生於山石間。

形態 南藤爲蔓草類藤屬之一種。引蔓木上。其莖圓而細。紫綠色。一節一葉。葉深綠色。似杏葉而微短厚。莖貼樹處有小紫瘤。中有小孔。四時不凋。其莖葉皆臭而極辣。可供藥用。

採取 七月七日採之。

性質 辛溫無毒。

主治 金瘡痛。延年。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論南藤莖葉曰。主風血補衰老。起陽強腰脚。除痺變白。逐冷氣。排風邪。煮汁服。冬月浸酒服。 【明】李時珍本草綱目給南藤莖

葉曰。治氣上欬嗽。煮汁服。

參攷資料 ●按南史云。解叔謙。雁門人。母有疾。夜禱。聞空中語云。得丁公藤治之。即速。訪醫及本草。皆無此藥。至宜都山中。見一翁伐木。云是丁公藤。拔之。乃拜泣求。翁并示以煎酒法。受畢。失翁所在。母服之。遂愈。(馬志) ●近俗醫治諸風。以南藤和諸藥熬膏市之。號南藤膏。白花蛇喜食其葉。治諸風。狗捷。(李時珍)

【南藤酒】 製法 用南藤煎汁。同麴米釀酒飲。

主治 風虛。逐冷氣。除痺痛。強腰脚。

【南藤】 即蒸參之古籍別名。典見蕭參新研究。詳「蒸參」條。

【南藤砂】 即蓬砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓬砂」條。

【南藤胡椒】 即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【南藤草】 即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烟草」條。

【南藤黍】 即玉蜀黍之日本名。詳「玉蜀黍」條。

【卻死香】 即返魂香之古籍別名。

典見海藥本草。詳「返魂香」條。

【卻老子】 即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳「枸杞子」條。

【卻老根】 即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【卻行】 即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蚯蚓」條。

【卻暑】 即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【卻節】 即臭藤之古籍別名。典見李氏草移。詳「臭藤」條。

【卻藤】 即臭藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「臭藤」條。

【卻焰】 即釜火之古籍別名。典見吳普本草。詳「釜火」條。

【卻梨】 即刺梨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刺梨」條。

【厚皮】 即厚樸之古籍別名。典見別錄。詳「厚樸」條。

【厚杜仲】 即杜仲之處方用名。詳「杜仲」條。

【厚實】 即厚樸子之古籍別名。典見別錄。詳「厚樸子」條。

【厚樸】 命名 本品木質樸而皮厚。味辛烈。而色紫赤。故有厚烈。赤諸名。

九畫 厚

處方附名 川厚朴製捲朴。紫油朴。製川朴。製小朴。野朴。小川朴。乾筒朴。神朴。川朴絲。前山朴。

古稱別名 赤樸。厚皮。(別錄)烈樸。(日華)重皮。(廣雅)淡伯(和漢藥考)


外國名詞 Magnolia hypoleuca (拉丁)

基本 屬木蘭科之落葉喬木。為 Magnolia hypoleuca 之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。厚朴產四川打箭鎮為正。湖北施南府亦可用。湖南次之。雲南又次之。一產福建福州府。亦可用。但氣味略遜。出產最多。近日藥肆俱用福州來者。因四川、湖北、湖南少出。不能供足市上之需。湖北溫州有出。全無氣味。不適用。日本亦有出現市上所沽之板樸。厚樸筒。厚樸耳。均由日人運往浙江做手過賣。出市面。由上海幫辦來。身厚無油。無味。此種實非朴樹。

形態 厚樸為落葉喬木。高三四丈。徑一二尺。膚白肉紫。春生葉如槲葉。其皮起鱗皺而厚寬。色深紫而棧。多潤者良。五六月開細紅

花。結實如冬青子。生青熟赤。亦有核。七八月採食味甘美。



厚 樸

種類 紫油厚朴。乃皮厚多潤。色紫褐。而味苦辛者。山厚朴。乃皮薄色淡褐。味苦甘者。商州厚樸。即日本藥舖中所稱之和厚朴。或朝鮮厚朴。薩摩厚朴。皆係淨爛羅勒。為厚朴之一種。乃下品也。

採取 七八月採食其子味甘可口。九十月間採皮陰乾。

製法 雷斅曰。凡使厚朴。要紫色味辛者為好。刮去粗皮。入丸散。每一斤用酥四兩炙熟。用若入湯。飲用自然薑汁八兩炙盡為度。大明曰。凡入藥去粗皮用。薑汁炙或浸炒。宗奭曰。味苦不以薑製。則棘人喉舌。

性質 苦。溫。無毒。效能 散氣。燥溼。化食積。消脹滿。用作利水及霍亂中藥。

作用 在腸胃中。均不顯何等作用。入血後。專激腎臟。使促進其利尿機能。且促進血液之循環。以強心臟之功。

主治 中風。傷寒。頭痛。寒熱。驚悸。氣血痺死肌。去三蟲。(本經)溫中益氣。消痰下氣。療霍亂。及腹痛。腹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢。淋露。除穢。去留熱。心煩滿。厚腸胃。(別錄)

張仲景之發明 厚樸一味。經張仲景之實驗。認為「主治胸腹脹滿也。旁治腹痛」。茲考徵如下。●大承氣湯證曰。腹脹滿。又曰。腹中滿痛。●厚朴二物湯證曰。痛而閉。(本條。無腹脹滿。此湯即大承氣湯。而無芒硝者也。然則有腹脹滿證也。可知已。其無芒硝者。以無堅塊也)●厚朴七物湯證曰。腹滿。●厚朴生薑甘草半夏人參湯證曰。(腹脹滿。以上四方。厚朴皆半斤)●枳實薤白桂枝湯證曰。胸滿。●梔子厚朴湯證曰。腹滿。(以上二方。厚朴皆四兩)●半夏厚朴湯證曰。咽中如有炙燔。(以上一方。厚朴三兩)●小承氣湯證

曰。腹大滿。不通。(以上一方。厚朴二兩)歷觀此諸方。厚朴主治脹滿也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論厚朴曰。治積年冷氣。腹內雷鳴。虛吼。宿食不消。去結水。破宿血。化水穀。止吐酸水。大溫胃氣。治冷痛。主病人虛而尿白。【宋】大明曰。華諸家本草論厚朴曰。健脾。治反胃。霍亂。轉筋。冷熱氣。瀉膀胱。及五臟一切氣。婦人產前產後。腹脹不安。殺腸中蟲。明耳目。潤關節。【元】王好古湯液本草論厚朴曰。主肺氣脹滿。膨而喘欬。【明】李士材本草圖解論厚朴曰。厚朴苦溫。體重而降。脾胃藥也。溫中下氣。是其本功。凡健脾寬腹。消痰止吐。滯食止痛。厚腸利水。皆溫中之力也。又能消胃實。故平胃散收之。寒脹必需。乃結者散之之義。然行氣峻猛。虛者勿多與也。【明】繆希雍本草經疏論厚朴曰。厚朴味苦。其氣溫。甄權苦辛大熱。應是辛熱。苦溫之藥。辛熱太過。則其性宜有毒。以其得陽氣之正。故無毒耳。氣味俱厚。陽中之陰降也。入足太陰。手足

陽明經。其主中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌者。蓋以風寒外邪。傷於陽分。則爲寒熱頭痛。風寒溼入於腠理。則氣血凝滯而成痺。甚則肌肉不仁。此藥辛能散結。苦能燥溼。溫熱能祛風寒。故悉主之也。別錄又主溫中消痰。下氣。痰涎亂。及腹痛脹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢心煩滿者。何莫非腸胃氣逆滯滯。及痰飲留結。飲食生冷所致。得此下洩。開道。溫熱煖腎。則諸證不求其止而止矣。至於淋露。雖屬下焦爲病。然多因胃家溼熱下流。三蟲亦腸胃溼熱所生。苦能燥溼殺蟲。故亦主之也。本經又主驚悸。及別錄除驚去留熱者。皆非其所宜。驚悸屬心虛。於脾胃絕無相干。氣味大溫之藥。又豈能去留熱哉。至益氣厚腸胃。蓋亦指邪氣去正氣自益之謂。積滯消腸胃自厚之意耳。非消散之外。復有補益之功也。用者詳之。【清】黃宮繡本草求真論厚朴曰。厚朴辛苦。善言同根實大黃。卽承氣湯。則於實滿能消。同若朮橘皮。卽平胃散。則於溼滿能除。同解利藥。則於傷寒頭痛可治。

九畫 厚

同瀉利藥。則於腸胃能厚。大抵氣辛則散。故於溼滿則宜。味苦則降。故於實滿則下。今人不解。悞以書載厚朴溫中益氣。及厚腸胃數語。不論虛實輒投。詎知實則於氣有益。虛則於氣無損乎。實則腸胃可厚。虛則腸胃不薄乎。至云破血殺蟲。亦是氣行而血自通。味苦而蟲則殺之意。凡書表藥功能。總是由藥氣味勘出。非是別藥善治。以自逞其意見也。朴卽榉樹皮。以肉厚紫色者良。【清】葉天士本草經解論厚朴曰。厚朴氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味升多於降陽也。難經云。傷寒有五。中風傷寒。溼溫熱病。溫病是也。中風傷寒者。中風症也。風氣通肝肝脈與督脈會於頂巔。風爲陽邪而傷上。所以頭痛。其主之者。厚朴入肝溫散也。寒熱驚悸者。病寒熱而驚悸也。心虛則悸。肝虛則驚。厚朴氣溫。可以達肝。味苦可以清心也。肝藏血。心生血。血凝結則成痺。苦可以洩。溫可以行。故主血痺死肌者。亦血泣而皮毛不仁麻木也。

苦洩溫行。故亦主之。三蟲溼所化也。味苦燥溼。可以殺蟲。所以去蟲也。【清】陳修園本草經讀論厚朴曰。厚朴氣溫。稟木氣而入肝。味苦無毒。得火味而入心。然氣味厚而主降。降則溫而專於散。苦而專於泄。故所主皆爲實症。中風有便溺阻隔症。傷寒有下之微喘症。有發汗後腹脹滿症。大便硬症。頭痛有濁氣上冲症。俱宜主以厚朴也。至於溫能散寒。苦能泄熱。能散能泄。則可以解氣逆之驚悸。能散則氣行。能泄則血行。故可以治氣血痺及死肌也。三蟲本溼氣所化。厚朴能散而泄之。則三蟲可去也。寬脹下氣。經無明文。仲景因其氣味苦溫而取用之。得本經言外之旨也。【清】楊時泰本草述鈞元論厚朴曰。此味苦中覺有微甘。所以直歸中土。而散結氣。苦味從溫。所以能就氣分而散之。凡病乎寒溼之邪者。實爲的對。其病乎溼熱者。有苦寒以清熱燥溼。而假此苦溫以散其結。亦同不奏功。至先哲首以除脹滿爲言。惟虛而無邪之脹滿。不宜混用。若寒溼實邪。固其正治。卽

溼熱爲病。如厚味積熱及外感鬱熱者。亦實脹也。苦寒藥中。可假厚樸以除之。或中氣虛而患溼熱。則必審虛與實。孰多孰少。更審乎時之久暫。以定攻補之多少。此味又未可去也。如苦寒除邪之味多。而健脾胃者少。用此散溼熱之結。恐苦寒直攻。不能徑散也。又如苦甘健脾之味多。而除熱者少。用此化補益之驟。恐苦甘徑補不能直受也。卽此推之。他證凡可投厚樸者。悉如斯矣。【清】鄭樹本經疏證論厚朴曰。中風傷寒頭痛寒熱正三陽表證也。厚朴非表藥。何以獨推爲首功耶。夫厚朴固非表藥。驚悸氣血痺死肌。又豈盡表證也。本經之旨。蓋謂厚朴主傷寒中風頭痛寒熱之或驚悸。或氣血痺。且有死肌者耳。劉潛江謂草木能四時不彫者。或得於純陰。或得於純陽。如厚朴則所謂純陽者。故取木皮爲用。而氣味苦辛。性赤烈也。夫味之苦者。應於花赤皮紫。是味歸形也。形色紫赤者。應於氣溫。是形歸氣也。苦能下洩。然苦從乎溫。則不下洩而爲溫散。若苦從乎寒。則直下

九疊 厚

洩。如枳實是已。且氣之生化在中土。此物雖味苦。苦後覺有微甘。所以直歸中土。而散結氣。斯言也。可為治傷寒中風根於中土者之確據也。夫傷寒中風變幻雖多。大旨不越乎傷陰傷陽二者。傷陰為燥。化則驚悸。傷陽為濕。化則氣血痺。瘡。實包謂妄煩燥等候。氣血痺。實包脹滿嘔洩等候。兩候者皆與表邪連橫。表以裏為根。但散其表。不究其裏。則枝葉不能復生。裏以表為應接。但通其裏。不究其表。則外邪因之內陷。此厚朴不必治傷寒中風。而傷寒中風內外牽連者。必不可無厚朴。此所以推為首功歟。所謂死肌。當與他死肌有別。後世論證。有謂之麻者。有謂之木者。仲景無是也。在仲景書。則麻曰蟲行皮中。木曰不知痛處。麻為表氣久虛之候。木為陽氣拂鬱之候。此條死肌。當作木解。斯厚朴之用。可無惑。劉潛江云。枳實味苦而辛。苦多辛少。苦中又含酸意。夫苦酸洩洩其氣。又寒且結於降令。故本下行之性。乘降令之旺。以就陰最烈而速。厚朴始嘗之。苦中微微

有甘。最後有辛意。非辛也。乃苦溫之餘烈。俗所云麻味也。然則厚朴從苦溫以散結者。不若枳實從苦寒以洩滯歟。夫氣以溫熱為升。為補。苦甚者。轉從升補以散之。以寒涼為洩。為降。苦甚者。轉從降洩以導之。故厚朴之治。宜於寒。或宜於溼。枳實之治。宜於熱。或宜於燥。各從其對待以投之。反是。則厚朴施於燥熱之結者。猶可。借從治以奏功。若枳實誤施於寒溼。是氣本下而復降之。不惟無益。且有害矣。

國外學說 長井理學博士曾研究漢產厚朴之揮發性芳香成分。據云其物質與蒼朮中之阿篤拉克吉連 (Atractylon) 相似。又發見同樣之揮發性芳香結晶體。惟市上所售之和產厚朴中。未見有該物質云。日本和名鈔訓厚朴為朴皮。故市場用商州厚朴樹皮充之。惟藥用須用漢產厚朴云。商州厚朴 (浮爛羅勒) Magnolia hypoleuca, S. et N. 係屬木蘭科之落葉喬木。多生深山中。高三四丈。葉互生。長一尺許。作倒卵圓形。惟前端稍尖。表面滑

澤。背作灰白色。有軟毛。全緣。作波動狀。夏季開黃白色花。香氣頗烈。後結長圓形實果。夏秋之間。剝取樹皮陰乾。其外面被有灰褐色木栓層。內部呈茶褐色。破碎而作纖維狀。味苦辛。帶收斂性。此樹皮即藥舖所稱之和厚朴。用代漢產厚朴。

辨偽 蘇頌曰。厚朴今洛陽陝西江淮湖廣蜀川山谷中。往往有之。尤以梓州龍州者為上。但須皮極鱗皺而厚。紫色多潤者。佳好。皮薄而色白者。不堪用。寇宗奭曰。今伊陽縣及商州亦有出。但皮薄而色淡。不如梓州者。厚而色紫有油也。

配合應用 治月水不通。用厚朴三兩。炙切。水三升。煎一升。分二服。空心下。不過三四劑。神驗。一加桃仁。紅花。(梅師方) 厚朴煎丸。大補脾胃虛損。溫中降氣。化痰進食。治嘔吐泄瀉等症。用厚朴去皮。同生姜二斤。速皮切片。以水五升。同煮乾。去姜焙朴。再以乾姜四兩。甘草二兩。仍同厚朴。以水五升。煮乾。去草。焙姜朴為

八一八

末。用棗肉生姜同煮熟。去姜。搗棗和丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。一方加熟附子。(百一選方)

治痰壅嘔逆。心胸滿悶。飲食不下。用厚朴一兩。姜汁炙。黃芩末。非時米飲調下。二錢七。(聖惠方)

治男女氣脹。心悶。飲食不下。冷熱相攻。久患不愈。用厚朴姜汁炙。焦黑為末。以陳米飲調服。二錢七日。三服。(斗門方)

治中滿洞瀉。用厚朴。乾姜等分。為末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。(鮑氏方)

治小兒吐瀉。胃虛及有痰驚。用梓州厚朴一兩。半夏湯泡七次。姜汁浸半日。曬乾。一錢。以米泔三升。同浸一百刻。水盡為度。如未盡。茄火熬乾。去厚朴。只研半夏。每服半錢。或一錢。薄荷湯調下。(梓朴散方)

治霍亂腹痛。用厚朴。姜汁炙。研末。新汲水服。二錢如神。(聖惠方)

治下痢水穀。久不瘳者。用厚朴三兩。黃連三兩。水三升。煎一升。空心細服。(梅師方)

① 治大腸乾結。用厚朴生研。豬
臍煑搗和丸。梧子大。每姜水下三
十九。(十便良方)

② 治心脾不調。尿渾白濁。用厚
朴姜汁炙一兩。白茯苓一錢。水酒
各一碗。煎一碗。溫服。(經驗方)

③ 治傷食腹脹。厚朴、陳皮、枳殼、
麥蘖、草果、山查、砂仁、礬紅。

④ 治溼熱作瀉。厚朴、橘皮、黃連、
甘草、蒼朮、葛根。

⑤ 治滯下初起。厚朴、檳榔、木香、
黃連、滑石、橘皮、甘草、白芍藥。

⑥ 消腹脹。厚朴、白朮、人參、白芍
藥、茯苓。

⑦ 止胃寒嘔吐。厚朴、生薑、橘皮、
藜香、砂仁、半夏。

⑧ 治積年冷癖墜塊。厚朴、三稜、
蓬朮、檳榔、人參、青皮。

⑨ 治胸中敦厚之氣。使飲食倍
增。厚朴、蒼朮、橘皮、甘草、爲平胃散。

⑩ 治腹脹脈數。厚朴三物湯。用
厚朴半斤。枳實五枚。以水一斗二
升。煎取五升。入大黃四兩。再煎取
三升。溫服一升。轉動更服。不動勿
服。(張仲景金匱方)

⑪ 治腹痛脹滿。用厚朴半斤。甘

九 薑 厚

草、大黃、各三兩。棗十枚。枳實五枚。
桂二兩。生薑五兩。以水一斗。煎取
四升。溫服八合。日三。嘔者加半夏
五合。(七物厚朴湯方)

用量 八分至一錢。
施用宜忌 凡脾胃虛弱。真元
不足者。禁用。孕婦服之。大損胎元。
惡澤瀉。硝石。寒水石。忌豆。犯之動
氣。乾姜爲之使。

著名方劑 ① 平胃散。治溼淫
於內。脾胃不能剋制。有積飲痞腸
中滿者。(東垣方)厚朴(姜汁炒)
三斤。蒼朮(米泔水浸七日)五斤。
陳皮(去白)三斤。甘草(炙)三
十兩。上爲末。每服二錢。姜湯下。日
三服。或水煎。每服五錢。② 厚朴大
黃湯。治支飲胸滿者。(金匱)厚朴
一尺。大黃六兩。枳實四枚。上三味。
水五升。煮取二升。分溫再服。③ 厚
朴麻黃湯。治欬而喘浮者。(金匱)
厚朴五兩。麻黃四兩。石膏(鷄子
大)杏仁、半夏各半斤。乾姜、細辛
各二兩。小麥一升。五味子半升。上
九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。
去滓。納諸藥。煮取三升。溫服一升。
日三服。

參攷資料 ① 厚朴之用有三。

平胃一也。去腹脹二也。孕婦忌之
三也。雖除腹脹。但虛弱人宜斟酌
用之。誤服脫人元氣。惟寒脹大熱
藥中兼用。乃結者散之之神藥也。
(張元素) ② 厚朴屬土。有火。其氣
溫。能瀉胃中之實也。平胃散用之。
佐以蒼朮。正爲瀉胃中之溼。平胃
土之太過。以致於中和而已。非謂
溫補脾胃也。習以成俗。皆謂之補
衰哉。其治腹脹者。因其味辛。以提
其滯氣。滯行。則宜去之。若氣實人
誤服參。藥多。補氣脹悶。或作喘
宜此瀉之。(朱震亨) ③ 本草言厚
朴。治中風。傷寒。頭痛。溫中。益氣。消
痰。下氣。厚腸胃。去積滯。果泄氣乎。
果益氣乎。蓋與枳實。大黃同用。則
能泄實滿。所謂消痰下氣是也。若
與橘皮。蒼朮同用。則能除溼滿。所
謂溫中益氣是也。與解利藥同用。
則治傷寒頭痛。與瀉利藥同用。則
厚腸胃。大抵其性味苦溫。用苦則
泄。用溫則補也。故成無己云。厚朴
之苦。以泄腹滿。(王好古) ④ 厚朴
生交趾。宛旬。三月。九月。十月。採皮
陰乾。(別錄) ⑤ 厚朴今出建平宜

都。極厚。肉紫色爲好。壳薄而白者
不佳。俗方多用。道家不須也。(陶
弘景) ⑥ 厚朴氣味辛溫。性復大
熱。其功長於泄結散滿。溫燥脾胃。
一切飲食停積。氣壅暴脹。與夫冷
氣逆氣。積年冷氣。入腹腸鳴。虛吼
痰飲吐沫。胃冷嘔逆。腹痛泄瀉。及
脾胃壯實之人。偶感風寒。氣實人
誤服參者。致成喘脹。誠爲要藥。然
而性專消導。散而不收。略無補益
之功。故凡嘔吐。不因寒痰冷積。而
由於胃虛。火氣炎上。腹痛。因於血
虛。脾陰不足。而非停滯所致。洩瀉
因於火熱暴注。而非積寒傷冷。腹
滿。因於中氣不足。氣不歸元。而非
氣實壅滯。中風。由於陰虛。火炎。猝
致。僂仆。而非西北真中寒邪。傷寒
發熱。頭疼。而無痞塞脹滿之候。小
兒吐瀉。乳食。將成慢驚。大人氣虛
血弱。見發關證。老人脾虛。不能運
化。偶有停積。娠婦惡阻。水穀不入。
娠婦胎升。眩暈。娠婦傷寒。傷風。產後
婦腹痛。瀉利。娠婦傷寒。傷風。產後
血虛。腹痛。產後中滿。作喘。產後洩
瀉。反胃。以上諸證。法所咸忌。若誤
投之。輕病變重。重病必危。世人不

九畫 厚 叛 咬 咸 哈 垣 奎 奔 姚 姜 姬 姪 威

究其原。一概濫用。雖或一時未見其害。而清純中和之氣。默爲之耗矣。可不慎哉。(穆希雍)

【厚樸子】 原名 逐折。古醫別名 百合厚實。(別錄)

形態 七月熟。黑如大豆。性質 甘溫無毒。

主治 療鼠瘻。明目益氣。

參攷資料 杜仲子亦名逐折。(陶弘景) 別錄厚朴條下。已言子名逐折。而有名未用。中復出逐折。主治相同。惟鼠瘻殺鼠字誤。未知孰是爾。所云厚實乃厚朴實也。故皮謂之厚皮。陶氏不知援引杜仲爲註。皆誤矣。今正之。(陶弘景)

【叛奴鹽】 卽鹽麩子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹽麩子」條。

【咬人狗】 命名 本品葉有刺。刺入毛孔。甚癢。搔之發紅而腫痛。如狗咬。故名。

產地 出臺灣島。

形態 咬人狗爲雜木類之一種。木質甚鬆。高丈餘。葉長大似烟葉。有毛刺。可供藥用。

主治 療瘰。

【咸】 卽玄參之古籍別名。典見別錄。詳「玄參」條。

【哈昔泥】 卽阿魏之古籍別名。典見綱目。詳「阿魏」條。

【哈薩喇】 卽蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「蜘蛛香」條。卽蜘蛛抱蛋之南安呼名。詳「蜘蛛抱蛋」條。

【垣衣】 命名 本品乃古垣培陰之苔衣。故名。古醫別名 垣蕨。天韭。鼠韭。青邪。(別錄) 苔衣。(綱目)

種類 屋遊。爲垣衣之生於屋瓦上者。詳見屋遊條。青邪。烏韭。爲垣衣之生於石上者。詳見烏韭條。

採取 三月三日採。陰乾用。

性質 酸冷無毒。

主治 黃疸。心煩欬逆。血氣暴熱。在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論垣衣曰。搗汁服。止衄血。燒灰。油和。傳湯火傷。

【垣衣】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【垣蕨】 卽垣衣之古籍別名。典見別錄。詳「垣衣」條。

【奎元胡】 卽延胡索之處方用名。詳「延胡索」條。

【奎白芍】 卽白芍之處方用名。詳「白芍」條。

【奎杞子】 卽枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【奎角參】 卽玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【奎天寶】 卽天寶之處方用名。詳「天寶」條。

【奎璣珠】 卽眞珠之處方用名。詳「眞珠」條。

【奔馬草】 卽丹參之古籍別名。典見四聲本草。詳「丹參」條。

【桃桂】 卽桂之產於雲南姚安縣者。體重而皮不直。辣多甜少。爲桂之下品。餘詳「肉桂」條。

【姜公魚】 卽鱖魚之俗名。詳「鱖魚」條。

【姜竹茹】 卽竹茹用姜汁焙成者之處方用名。詳「竹茹」條。

【垣百合】 卽山丹之日本名。詳「山丹」條。

山丹」條。

【姪女】 卽水銀之古籍別名。典見藥性。詳「水銀」條。

【威骨】 卽虎骨之古籍別名。典見綱目。詳「虎骨」條。

【威蛇】 卽蛇舍之古籍別名。典見大明本草。詳「蛇舍」條。

【威棲】 卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉竹」條。

【威靈仙】 命名 威言其性猛也。靈言其功神也。鐵脚威靈仙。處方用名 鐵脚威靈仙。古醫別名 能消壽祖。(和漢藥考)

外國名詞 Veronica Virg-nis, L. (拉丁)

基本 屬毛茛科。爲鐵腳威靈仙之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。威靈仙產廣東北江。連州。清遠。大灣。石潭等處。

形態 威靈仙爲多年蔓生草。本生先於叢草。初生莖莖如銀。其葉數葉相對。七月生花六出。淺紫或碧白色。作穗如葡萄子。亦有似菊花頭者。實青色。根稠密。多鬚。

每年旁引。年深轉茂。一根造鬚數百條。長二尺許。生時黃黑色。乾則深黑。此即俗稱鐵腳威靈仙。別有數種。皆不入藥。



威靈仙

採取 九月至十二月間採根。陰乾。並須採於不聞水聲者良。

製法 去蘆。酒洗用。

性質 苦溫無毒。

效能 通五臟經絡。療頑瘡痛。風。用為利尿及通經藥。

主治 諸風。宣通五臟。去腹內冷滯。心膈痰水。久積痰癖。瘴癘氣塊。膀胱宿膿。瀝水。腰膝冷疼。療折傷。久服無有瘕瘕。

歷代記述攷證 【元】李東垣用藥法象論威靈仙曰。推新舊積滯。消胸中痰唾。散皮膚大腸風邪。

【明】李士材本草圖解論威靈仙曰。威靈仙辛。入太陽經。搜逐諸風。宣通五臟。消痰水。破堅積。丹溪曰。威靈仙痛風之要藥也。其性好

走。通十二經。朝服暮效。辛能散邪。故主諸風。鹹能瀉水。故主諸濕。壯實者誠有殊功。氣弱者反成痼疾。

九靈 威

【清】黃宮繡本草求真論威靈仙曰。威靈仙辛。鹹氣溫。其性善走。能宣疎五臟十二經絡。凡一切風寒溼熱。而見頭風。頑痺。癢癢。積聚。黃疸。浮腫。大小腸秘。風溼痰氣。腰膝腿脚冷痛等症。得此辛能散邪。溫能瀉水。苦能破堅。服此性極快利。通經達絡。無處不到。誠風藥中之善走者也。是以威靈其性靈驗其效。仙喻其神耳。氣壯者服之神效。

若氣弱服之。則能瀉其氣矣。和砂仁。砂糖煎。治諸骨哽。根鬚鬚數百條。長者二尺餘。色深黑。為鐵脚威靈仙良。

國外學說 和漢藥考曰。威靈仙有二種。一為屬玄參科之九蓋草。草本威靈仙。一為屬毛茛科之鐵線蓮。鐵脚威靈仙。俱於冬季採掘其根。供藥用。通常概用鐵脚威靈仙。九蓋草為自生於山地之多年生草。人家亦多植之。春從舊根抽出圓莖。高三四尺。葉作深綠色。廣披針形。邊緣有鋸齒。

每節對生五葉。重疊數層。夏日莖頂開長六七寸之穗狀花。花為白色。或青紫色。之六片合瓣花冠。鐵線蓮為蔓生灌木狀之多年生草。以葉柄纏絡他物。葉為複葉。於花梗基部。對生卵圓形小葉。夏季開花。大一寸許。為白色或青紫色。之六片花。根於冬月採取陰乾。以色黑者為上。黃白色者不適藥用云。

鐵脚威靈仙。一株叢生數十條細長根。外部呈黑色。或黑褐色。質易折。木部較皮部為小。呈黃白色。味苦。鐵脚威靈仙。有唐鐵脚威靈仙和(日本)鐵脚威靈仙二種。甲為細長根。乙為長大根。又大蓼(仙人草)根。其形酷似鐵脚威靈仙。故有充鐵脚威靈仙用者。但其質難折。

近人學說 張山雷曰。威靈仙。開寶本草謂為苦溫。瀕湖謂微辛不苦。性善通行。故得此名。開寶謂主治諸風。宣通五臟。去腹內冷滯。心膈痰水。久積痰癖。瘴癘氣塊。腰膝冷疼。東垣謂推新舊積滯。消胸中痰唾。皆以走竅消剋為能事。較溼停痰。血凝氣滯。諸實宜之味有

微辛。故亦謂祛風。然惟風寒溼三氣之留於關節。關節不利諸病。尚為合宜。而性頗銳利。命名之義。可想而知。乃唐人著威靈仙傳。竟謂治中風不語。手足不遂。口眼喎斜云云。則又有誤會矣。石頑謂痘疹毒壅於上。不能下達。腰下膝脛起。澀者。用為下引。立效。其性利下。壯實者有殊效。氣虛者服之。必致虛瀉。血虛而痛。不因風溼者。不可服。

配合應用 治脚氣入腹。脹悶喘急。用威靈仙末。每服二錢。酒下。痛減一分。則藥亦減一分。(簡便方)

治腰脚諸痛。用威靈仙末。空心溫酒服一錢。逐日以微利為度。(千金方)又用威靈仙一斤。洗乾。好酒浸七日。為末。麵糊丸。梧子大。以浸藥酒。每服二十丸。(驗經方)

治腎臟風癩。腰膝沉重。威靈仙末。蜜丸。梧子大。溫酒服八十九丸。平明微利。惡物。如背腰膠。即是風毒積滯。如未利。再服一百丸。取下。後食粥補之。一月。仍常服溫補藥。孫兆方名放杖丸。(集驗方)

八二一

九靈 威 娃 孩

①治筋骨疼痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥。年久不愈者。威靈仙三斤。水酒十瓶。封裝一柱香。出火毒。逐日飲之。以愈為度。(集簡方)

②治破傷風病。威靈仙半兩。獨頭蒜一個。香油一錢。同搗爛。熱酒衝服。汗出即愈。(衛生易簡方)

③治手足麻痺。時發疼痛。或打撲傷損。痛不可忍。或癱瘓等證。威靈仙炒五兩。生川烏頭。蠶脂各四兩。為末。醋糊丸。梧子大。每服七丸。用鹽湯下。忌茶。(普濟方)

④治男婦氣痛。不拘久近。威靈仙五兩。生韭根二錢半。烏藥五分。好酒一盞。雞子一個。灰火煨一宿。五更視雞子殼軟為度。去渣溫服。以乾物壓之。側睡。渣再煎。次日服。甚刺痛。是其驗也。(摘玄方)

⑤治噎塞膈氣。威靈仙一把。醋蜜各半碗。煎五分服之。吐出宿痰。愈。(唐瑤經驗方)

⑥治停痰宿飲。喘咳嘔逆。全不入食。威靈仙焙。半夏薑汁浸焙。為末。用皂角水熬膏。丸綠豆大。每服七丸。至十九丸。鹽湯下。一日三服。一月為驗。忌茶麵。

⑦治腹中痞積。威靈仙。楮桃兒各一兩。為末。每溫酒服三錢。名化錢丸。(普濟方)

⑧治大腸冷積。威靈仙末。蜜丸。梧子大。一更時。生薑湯下。十九至二十丸。(經驗良方)

⑨治腸風瀉血。久者。威靈仙。雞冠花各二兩。米醋二升。煮乾。炒為末。以雞子白和作小餅。炙乾。再研。每服二錢。陳米飲下。日二服。(聖濟總錄方)

⑩治痔瘡腫痛。威靈仙三兩。水一斗。煎湯。先煎後洗。冷再溫之。(外科精義方)

⑪治諸骨哽咽。威靈仙一兩二錢。砂仁一兩。沙糖一盞。水二鍾。煎一鍾。溫服。又乾坤生意。用威靈仙米醋浸二日。晒研末。醋糊丸。梧子大。每服二三丸。半茶半湯下。如欲吐。以銅青末半匙。入油一二點。茶服。探吐。又聖濟錄。治雞鵝骨哽。赤莖威靈仙五錢。并華水煎服。即輟。如綿吞下也。甚效。

⑫治飛絲纏陰。腫痛欲斷。以威靈仙搗汁。澆洗。昔有一人病此得效。(李機怪症方)

⑬治痘瘡黑陷。錢脚威靈仙炒研一錢。腦子一分。溫水調服。取下。瘡痂為效。意同百祥丸。(儒門事親方)

用量 八分至錢中。

施用宜忌 凡血虛筋瘻及無風溼實邪者。禁用。忌茗麵。

參攷資料 唐貞元中。嵩陽子周君巢。作威靈仙傳云。威靈仙去衆風。通十二經脈。朝服暮效。疏宜五錢。冷膿宿水。變病微利。不消。人服此。四肢輕健。手足微煖。並得清涼。先時商州有人。病手足不遂。不履地者數十年。良醫殫技。莫能療。所親置之道旁。以求救者。遇一新羅僧。見之。告曰。此疾一藥可活。但不知此土有否。為之入山求索。果得。乃威靈仙也。使服之。數日能步履。其後山人鄧思齊知之。遂傳其事。此藥治丈夫婦人中風。不語。手足不遂。口眼喎斜。言語蹇澀。筋骨節風。遠勝風。胎風。頭風。暗風。心風。風狂。大風。皮膚風。痒。白癩。風熱毒。風疔。頭旋目眩。手足頑痺。腰膝疼痛。久立不得。曾經損墜。臂腰痛。腎毀風。癱。傷寒成氣。憎寒壯熱。頭痛。

流涕。黃疽黑痘。頭面浮腫。腹內宿滯。心頭痰水。膀胱宿膿。口中涎水。冷熱氣壅。肚腹脹滿。好喫茶。津心痛。注氣。腸氣。冷氣。攻衝。脾肺諸氣。痰熱。咳嗽。氣急。坐臥不安。氣衝眼。赤攻耳。成膿。陰汗。盜汗。大小腸秘。服此立通。氣痢痔疾。癩癧疥癬。婦人月水不來。動經多日。氣血衝心。產後。秘塞。孩子無辜。並皆治之。其法。採得根。陰乾。月餘。搗末。剉一錢。七空。腹服之。如人本性。殺藥。可加及六錢。利過兩行。則減之。病除。乃停服。其性甚善。不觸諸藥。但惡茶及麪湯。以甘草。梔子。代飲可也。又以一味。洗焙為末。以好酒。和令微溼。入在竹筒內。緊塞。九蒸。九曝。如乾。添酒。酒之。以白蜜。和丸。梧子大。每服二十至三十丸。溫酒下。崔元亮海上集驗方。著其詳如此。(蘇頌)

【娃草】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉竹」條。

【孩兒】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【孩兒茶】原名 烏麥泥。處方用名 兒茶。

古籍別名 烏參泥。烏丁。烏參泥。(綱目)喀提求。(西藥名)阿仙藥。(和漢藥考)粉口兒茶。

外國名詞 Catechu (拉·英) Kutochu (德)


基本 兒茶凡充藥用者。須取

屬豆科之 *Acacia catechu*, Will. 及 *Acacia Suma*, Kurz. 之木心。入水煎熬。凝結而成水製。越幾斯。或採摘屬茜草科之 *Casia Gambir*, Roxb. 葉與葉。入水煎熬。凝結製之。或榨取屬棕桐科橫櫛之汁。乾而入水煎熬。凝結製之。

產地 ①陳仁山藥物生產辨云。見茶產緬甸。印度來自仰光。二三月新。近日市上所沽者。乃由佛山等處製造而來。不適用。②和漢藥考曰。阿仙藥產於東印度諸島。凡屬於豆科。茜草科。棕桐科等之植物。其樹心。樹皮。樹葉。果實等。皆含有單寧酸極多。種植家擇其含最最多之處。收採之。造成水製。越幾斯。以供藥用。其需用最多者。莫如糖皮。爲印度貿易品之大宗。入藥者須精選佳品。始堪收用。

九盤 孩

形態 阿仙藥之種類不同。故形態亦不一。培克阿仙藥。爲暗褐色。不整之硬塊。有時或作扁平狀。裹以木葉。外面無光澤。破碎面爲貝殼狀。色黑褐。光澤似蠟。酒精。醋。溫湯。幾全溶解。冷水祇能溶解其一半。燒之初。但膨脹。不熔融。繼即被燃而餘白灰。無香臭。味收澇而帶甘苦。幹雙爾阿仙藥。爲骰子形。或粒柱狀之小片。外現淡褐或暗褐色。破碎面作灰黃色。無光澤。味苦。淡微甘。古倫撲阿仙藥。爲板片狀之硬塊。寬五至八仙。厚三仙。米色黑褐。有光澤。其餘性質。略似培克阿仙藥。



孩兒茶

製法 時珍曰。烏參泥。出南番。瓜哇。暹羅諸國。今雲南老撾。蕃雲。場地方造之。云是細茶末。入竹筒中。堅塞兩頭。埋汚泥溝中。日久取出。搗汁熬製而成。其塊小而潤澤者。爲上。塊大而焦枯者。次之。

性質 苦。澇。平。無毒。
效能 收澇。消熱。生肌。用作收斂止血藥。又治腸黏膜炎。

作用 入胃後。能助胃液以增加消化之功能。又能防止 Pepsin 過量之作用。在腸中能收縮腸壁之黏膜。使腸之分泌減退。腸之吸收力增加。
主治 清上腸熱。化痰生津。滋金瘡。一切諸瘡。生肌定痛。止血收澇。

歷代記載攷證 【明】魏希雍本草經疏論孩兒茶曰。烏參泥。本是茶末。又得土中之陰氣。其味苦。澇。氣應作寒。性無毒。其主清上腸熱。化痰生津者。茶之用也。得地中之陰氣。能涼血清熱。故主金瘡止血。及一切諸瘡。生肌定痛也。苦能燥澇。能斂。故又主收澇氣。【清】黃宮繡本草求真論孩兒茶曰。孩兒茶味苦微澇。性涼無毒。功清上腸熱。化痰生津。收澇涼血生肌。凡一切口瘡喉痺。行時瘟瘧。煩燥口渴。並一切吐血。衄血。便血。尿血。血崩。及婦人崩淋。經血不止。陰疝痔腫者。服之立能見效。出南番。是細

茶末入竹筒。埋土中。日久取出。搗汁熬成。塊小潤澤者。上。大而枯者。次之。眞偽莫辨。氣實莫考。用宜慎之。

國外學說 英美學說謂兒茶一名孩兒茶。產緬甸。印度。新嘉坡等處。樹高約一丈五尺至二丈。間有高至三丈者。其源流。雖不甚清楚。然自古以來。惟印度人知之最早。因印度人用橫櫛椒時。必將兒茶合於橫櫛椒同食。兒茶有淡色。黑色之別。黑色者。爲兒茶樹心之木所出。淡色者。係由兒茶樹之葉與嫩枝煮成。向祇準用淡色兒茶。而工藝中則最喜用其黑色者。因其收斂性更大。黑色兒茶。由印度北城。運至英國。淡色兒茶。則大中國。新嘉坡。運來。近中國藥肆所出售之兒茶。分棕黑二種。而棕者則其力較稍遜。上等兒茶。每百分中。計含炭氫酸(單寧酸)五十四分。其功用能大收斂。微補。治澇瀉。痢疾。積滯。吐酸。胃氣無力。懸舌變大。膠膠懸膜。若以兒茶二錢。半研末。柱皮五分。末。沸水八兩。同浸半點鐘。濾淨。治婦人患白帶。用此藥水。

射入陰戶。若痔流血及鼻流血。用此藥水洗之。或糝以藥末亦妙。如牙齦浮腫。宜取兒茶一粒。含化可愈。每服八錢至一兩六錢。(見茶桂皮藥水方) 又以兒茶一錢末。猪油八錢。和勻。敷臍疔等症。奇效。(兒茶藥膏方) 和漢藥考曰。Agal-cha Catechu, Will. 常綠樹也。產於前印度及後印度。老樹莖幹高至四丈。葉皆對生。為雙套之羽狀複葉。有小葉四十至五十對。具有輻毛。花色黃。作穗狀。果實為莢果。中藏種子五六枚。此樹木材堅緻。木色暗褐或黑褐。土人取此樹心。劈作碎片。納磁罐中。入水煎熬。乾而凝結。此種專行銷培克市面。故稱培克阿仙藥。又名孟買阿仙藥。俗呼榜葛刺阿仙藥。中國人所謂兒茶。或百藥煎者。蓋即屬此種也。又曰 Uncaria Gambier, Roxb. 為莖生常綠灌木。產於蘇門答臘。新嘉坡等處。幹高丈許。葉對生。為長卵圓形。具有如鈎之棘。花小。紫色。粉紅。相集如繡球。採其葉與葉梢。入水煎熬。可製乾燥越幾斯。此種稱幹雙爾阿仙藥。亦名檳榔膏。

從前來自中國之阿仙藥。大半屬此檳榔樹之果實。味有收斂性。壓搾而絞取其汁。彙集晒乾。或以水煎熬。乾而凝結。此種稱古倫揆阿仙藥。中國人謂之藥葉膏。日本藥局方中。初僅採用幹雙爾阿仙藥。至後乃加入培克阿仙藥。略舉如下。(甲) 幹雙爾阿仙藥。乃以植物葉及嫩梢煎熬。製成乾燥越幾斯。雖成塊。極易破碎。色類褐。內色淡。(乙) 培克阿仙藥。此係取兩種植物之木心。入水煎熬。製成乾燥越幾斯。其塊內外均作暗褐色。時有穴孔。破碎面作大具殼狀。上述之阿仙藥。味皆為收斂性。始稍苦。後微甘。以稀薄之酒精溶解之後。再於該溶液中加過綠化鐵液。則現綠色。以此藥一分。入水十分煮沸。則生酸性之潤濁液。帶褐紅色。將其不溶物撇去。但留澄清之液。冷後。又起極多之褐色沈澱。如將前不溶物洗以熱湯。熱以百度之溫度。則百分祇餘十五分。又以此藥加熱酒精。充分浸之。繼將餘剩之物質。熱以百度之溫度。則百分祇餘三十分。以此藥燒令成灰。百分

中祇餘六分以上之硬性物。又曰。阿仙藥之品類極多。歷來依其形態。色澤等。定品位之高下。此種習慣。今市上尙盛行之。藥用之阿仙藥。專取殼子形者為貴。如質輕。色淡。收斂性不甚者。上品也。反此為下品。其收斂愈久。物品愈陳者。價值亦愈貴。若依其形狀分之。則有角樣(殼子形) 算木樣(稜柱狀) 錢樣(圓片形) 盤樣(不整形) 等各種名稱。阿仙藥之品位。全在所含單寧酸之多寡。收斂甚而色深者。悉以供鞋皮。染色之用。必收斂味少而色淡者。始堪供醫藥用。從前日本藥商。製造丸劑錠劑。向以阿仙藥作賦形藥。邇來漸知進步。作賦形藥用者。亦選收斂味少而色淡之阿仙藥。往年進口之阿仙藥。隨其形態。色澤而定品位之高下。至日本自製之阿仙藥。詳見荷蘭藥鏡(文政十一年刊行) 第十六卷百藥煎條。當時有四郎兵衛者。於大阪屋開設藥舖。頗研究各種藥物。皆論述阿仙藥之品類。特轉錄如下。日本自製並中國所稱之百藥煎。乃以五倍子製之。如本

草綱目時珍所云。其來自外國及中國者。恐均非五倍子所製。藥商樂只亭清雅云。阿仙藥有五種。楸樣。圓樣。小圓樣。角樣。麻刺拔爾是也。楸樣最佳。形扁而有皺紋。來自中國者。皆此品。圓樣亦中國貨。中品也。其形圓。外有蕪稈。或蕪稈粘之。黏蕪稈者。上黏蕪稈者。次小圓樣。乃別一種。非圓樣之小者。品最下。滋味甚。外灰而內白。形小。大如李。文化八年冬。始自中國來。角樣。大半下品。大一寸見方。有布紋。亦中國來。別一種呼小角樣者。大祇半寸許。寬政二年來。麻刺拔爾為大小不等之塊。大者長一尺。寬六七寸。重三十二三兩。小者亦二兩四五錢。形橢圓。文政四年。始自西洋來。藥肆收買後。輒碎而分售之。日本自製之品。始創於菊屋之某藥商。今則清兵衛等兩家繼續製此。其以五倍子和好茶末。而用麩粉煉製者。實阿仙藥之贗品。不堪入藥用也。又和漢三才圖會曰。阿仙藥來自歐洲。氣味微甘。功似百藥煎。邊境人視為頭腹痛及解毒等要藥。兼為製萬金丹。透頂香

等所必需。此藥凡三種。色皆淺黑而微帶紅。一種形如芋魁。名曰猿胞。一種如燒石。名曰猿胞。一種小而較破之色微紅。頗潤澤。名曰猿胞。推為上品。尚有一種。係本國產出於泉州。形扁圓。廣尺許。厚七八分。色純黑。印牌號發賣。名曰猿胞。製透頂香（即外郎藥）者多用之。大和本草曰。孩兒茶。倭俗呼阿仙藥。以五倍子煉製之。藥商云。孩兒茶與百藥煎有別。塊形圓。色紅白。味不甘。是百藥煎也。須選紫色而雜白點者用之。塊扁平。色黑味淡。藥商稱阿仙藥。此孩兒茶也。

配合應用 ①治鼻淵流水。孩兒茶末吹之良。（本草極度方）

②治牙疳口瘡。孩兒茶、硃砂等分。為末。搽之。又治走馬牙疳。用孩兒茶、雄黃、貝母等分。為末。米泔漱淨。搽之。（積德堂方）

③治下疳陰瘡。外科用孩兒茶末。米泔洗淨。傅之神效。或加胡黃連等分。孩兒茶一錢。真珠一分。片腦半分。為末。傅之。唐氏用孩兒茶一錢。輕粉一分。片腦一字。為末。搽之。（藥奇方）

九畫 孩 客 宜 封 屋

④治痔瘡腫痛。孩兒茶、麝香、末。睡津調傅。（孫氏集效方）

⑤治脫肛氣熱。孩兒茶二分。熊膽五分。片腦一分。為末。入乳。搽肛上。熱汁自下。而肛收也。亦治痔瘡。（靈炳方）

用量 一錢至二錢。

應用宜忌 本品恒多用以外治。而內服者絕少。凡非關於外治者禁用。

參攷資料 ①烏參或作烏丁。皆番語。無正字。（李時珍）②見茶。該樹產種甸。印度及西印度等處。若兒茶一物。乃取此木熬水煎煉。至稠。然後或攤席上。或置器上。用以晒成者也。功用能斂。每服宜用三五分。（西藥略釋）③見茶。此樹印度新嘉坡等處俱有。取其汁晒乾成塊。切作四方形。用以入藥。性收斂。身虛瀉瀉。及大小腸血出者。宜之。能止瀉止痛。大有功力。喉嚨。輕弱。語音不響者。用兒茶水漱之。（內科新說）

【孩兒參】即人參形如孩兒者之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人參」條。

【孩兒魚】即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱒魚」條。

【孩兒菊】即草蘭之古籍別名。典見綱目。詳「草蘭」條。

【孩兒菊葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見綱目。詳「澤蘭葉」條。

【孩兒揀傘】即草八角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「草八角」條。

【客尖】即六安茶之一種。功用見「六安茶」條。

【宜木瓜】即木瓜之處方用名。詳「木瓜」條。

【宜砂】即硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【宜連】即宜黃連之簡稱。

【宜黃連】即南連之產於安徽寧國府宣城縣境者。用治血痢頗良。

【封石】基本 封石為石類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 消渴熱中。婦女疽蝕。

【封羊】即羊之背部有肉封如駝者之俗名。亦稱駝羊。功用與尋常羊同。詳「羊肉」條。

【封華】基本 封華為雜草類之一種。可供藥用。

採取 夏至日採之。

性質 甘。有毒。

主治 疥瘡。養肌。去惡肉。

【屋上敗茅草】基本 本品草久而陳敗者。

性質 苦。平。無毒。

主治 止吐血。療斑瘡。發癰瘡。瘡潰爛。

參攷資料 屋上敗茅草。感受風雨露之氣最多。有清熱利溼之功效。（醫學辭典）

【屋炎】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【屋遊】命名 本品乃屋瓦陰處之苔衣。故名。

古籍別名 瓦苔（嘉祐本草）

瓦衣 瓦蘇。博邪。地蘇。（綱目）

採取 八月九月剝採之。

性質 甘。寒。無毒。

主治 浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸。膀胱氣。

歷代記述致因 【南北朝】徐之才雷公藥對論屋遊曰。止消渴。【宋】開寶新詳定本草論屋遊曰。小兒痢熱。時氣煩悶。【明】李時珍

本草綱目論屋遊曰。煎水入鹽漱口。治熱毒。牙齦宣露。研末。新汲水調服二錢。止鼻衄。

參攷資料 ①屋遊生古屋上。其長數寸者。即爲瓦松也。(李時珍) ②別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類。性氣不甚遠也。(李時珍)

【屋漏水】 性質 辛苦。有毒。主治 洗犬咬瘡。更以水澆屋簷。取滴下土傳之效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論屋漏水曰。塗臍目。傳丹毒。

【屎蟲】即五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五穀蟲」條。

【屏風】即防風之古籍別名。典見別錄。詳「防風」條。

【帝力】即葶藶之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葶藶」條。

【帝女血】即雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雌黃」條。

【帝王椰子】即椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「椰子」條。

【帝休】 產地 生嵩山間。形態 帝休爲雜木類。

之一種。枝有五衝。黃花黑實。亦有效用。

主治 帶之銷愁。

【帝男血】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【帝男精】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【帝秋】即草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳「草烏頭」條。

【帝香】即蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇合香」條。

【幽樟皮】即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【度厄翅】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【度穀】即黃環之古籍別名。典見唐本草。詳「黃環」條。

【建水草】 產地 出福州。形態 建水草爲雜草類之一種。枝葉如桑。四時常青。其葉可供藥用。

主治 走注風痛。研末酒服。

【建神麴】即神麴之處方用名。詳「神麴」條。

【建參】 命名 出於福建。形似參故名。

古籍別名 福參(綱目拾遺) 性質 辛苦甘溫。主治 益氣。瘵虛寒。

參攷資料 ①福參出閩浙。頗似人參而性味辛熱。虛寒病宜之。歌云。又有福參。辛苦甘齊。性溫益氣。虛冷人宜。註福參多食則喉痛。故知性熱(藥性考) ②建人參性熱。獨不宜於產婦。與遼參形色氣味真相似。但遼參入口回味生津。此則回味稍澀。故功用亦殊。河南出光山參。嵩山參。儼與遼參無別。惟嚼之有渣。不糯。味亦淡。(金御乘) ③乙未予館刻川。故鄆屬也。聞有市建參者。往覓得之。儼如產參中油熟一種。大者。惟不能純透。亦有蘆無竹節紋。味亦苦甘。以竹刀剖之。心空。不似遼參之堅實。劉贊之自閩回。言閩中近日大行。亦清補。凡患風火牙疼。煎湯漱口立愈。則性又帶寒散。或言其性熱者。猶未確也。(趙恕軒)

【建蓮】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建蓮肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。


【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建肉】即蓮肉之處方用名。詳「蓮肉」條。

【建蘭】 古籍別名 素心蘭。青蘭。蘭蕙蘭(綱目) 學名 Cymbidium ensifolium Sw. var. suruganense Thunb. 形態 本品爲多年生常綠草。本高至二三尺。葉細長而光。有平行脈。叢生。夏秋之間。花莖自葉叢之間生。其上部有數花。總狀花序。花不整齊。淡黃色。帶有紫色。芳香馥郁。其花可供藥用。根葉另詳該條。

古籍別名 蜜蘭。



主治 素心建蘭花乾之。可備生。除宿氣。解鬱。密漬青蘭花點茶。飲調和氣血。寬中醒酒。

【建蘭根】 主治 嗽血。起痘漿。

配合應用 ①治咳 嗽後吐血。先咳嗽後吐血而氣急者。用天冬。麥冬。生地。白芍。紫苑。山梔。桑皮。地骨皮等藥。如氣急。去天

冬。麥冬。生地。白芍。紫苑。山梔。桑皮。地骨皮等藥。如氣急。去天

冬。麥冬。生地。白芍。紫苑。山梔。桑皮。地骨皮等藥。如氣急。去天

冬。加真蘇子。取蘭花根搗汁沖服尤妙。(劉羽儀經驗方)

●清地散花飲。凡痘見標三日。此方主之。有火疹者。加蘭花根。額上灰滯色。加菊花。蘭花。梅花。或蘭花根亦可。(靈程醫慈幼筏方)

【建蘭葉】 產地 產閩中者力勝。產江浙者力薄。

性質 辛平甘寒。

主治 生津止渴。開胃解鬱。調月經。養營氣。

【後庭花】 即臭梧桐之樹大而花微紅者之別名。典出學圃餘疏中。

【臭梧桐】 係

【思仙】 即杜仲之古籍別名。典見本經。詳『杜仲』條。

【思仲】 即杜仲之古籍別名。典見別錄。詳『杜仲』條。

【思安茶】 即茶之產於思安地方者。性質功用。詳『茶葉』條。

【思益】 即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【急性子】 即風仙子之處方用名。詳『風仙子』條。

【急流水】 即流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【急急救】

產地 江西山坡。形態 根鬚黃柔。一莖一葉。葉嫩綠。似初生蜀葵。葉無歧而尖。深齒如鋸。面背皆有細毛。其根可供藥用。



(一) 救急急



(二) 救急急

功效 同紅蕉浸酒。通骨節。達四肢。

【急解索】 即半邊蓮之古籍別名。典見綱目。詳『半邊蓮』條。

【怨鳥周燕】 即杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【恒山】 即常山之古籍別名。典見吳普本草。詳『常山』條。

【扁石斛】 即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【扁竹】 即蕭蓄之古籍別名。典見本草集註。詳『蕭蓄』條。●即射干之古籍別名。典見綱目。詳『射干』條。●即薤尾之俗名。詳『薤尾』條。

【扁豆花】 主治 女子赤白帶下。乾末。米飲服。



花 豆 扁

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論扁豆花曰。焙研服。治崩帶。作饅餛食。治泄痢。搗水飲。解中一切藥毒。垂死。功同扁豆。

【扁毒】 即牛扁之古籍別名。典見唐本草。詳『牛扁』條。

【扁青】 命名 本品形扁色青。故名。

古籍別名 石青。回青。大青。天青。(綱目)

產地 生西南山谷中。

形態 扁青為石類之一種。其色青翠。塊大如拳。即畫家所用之石青。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 目痛明目。折跌癰腫。拿瘡不癒。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。(本經)去寒熱風痺。及丈夫莖中百病。益精。(別錄)

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論扁青曰。治丈夫內絕。令人有子。【明】李時珍本草綱目論扁青曰。吐風痰癩癩。平肝。

【扁前】 產地 生山陵中。

形態 扁前為化生蟲類之一種。狀如牛虱。赤翼。可供藥用。

採取 五月八月採之。

性質 甘。有毒。

主治 風濕癱閉。利水道。

【扁苳】 即貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【扁柏葉】 即柏葉之原名。詳『柏葉』條。

【扁特】 即牛扁之古籍別名。典見唐本草。詳『牛扁』條。

【扁統】 即射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【扁蓄草】 即蕭蓄之處方用名。詳『蕭蓄』條。

【扁菱】即蒹葭之古籍別名。典見吳普本草。詳「蒹葭」條。

【扁蟲】即壁蟲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「壁蟲」條。

【扁辨】即蒹葭之古籍別名。典見吳普本草。詳「蒹葭」條。

【扁螺】即蛻之古籍別名。典見綱目。詳「蛻」條。

【括把草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【括樓仁】即瓜蒌仁之原名。詳「瓜蒌仁」條。

【括蕒根】即天花粉之原名。詳「天花粉」條。

【拱鼠】即黃鼠之古籍別名。典見韓文。詳「黃鼠」條。

【拷山】即山藥之處方用名。詳「山藥」條。

【指南石】即慈石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「慈石」條。

【按彈】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「金」條。

【故絲綿】主治 下血。及金瘡。出血不止。以一握煮汁服。

【斫合子】即蓮屋之原名。詳「蓮

屋」條。

【星洛】即犀洛之古籍別名。典見別錄。詳「犀洛」條。

【映山紅葉】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【映日果】即無花果之古籍別名。典見便民圖纂。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【映日紅】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

要縣羚羊峽者。性質功用與秋海棠同。詳「秋海棠」條。

【春草】即白薇之古籍別名。典見本經。詳「白薇」條。

【春酒】命名 本品係清明釀造之酒。亦可經久者。主治 常服令人肥白。

參攷資料 蠟燭尿瘡。飲之至醉。須臾蟲出如米也。(李時珍)

【春魚】即鱸魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱸魚」條。

【春葵】即冬葵經年收採。於正月復種者。性質功用。詳「冬葵子」條。

【味履支】即胡椒之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「胡椒」條。

【昨葉何草】即瓦松之原名。詳「瓦松」條。

【昭參】命名 金沙江誌云。形如人參。產雲南昭通縣。古籍別名 人參三七。銅皮鐵骨。蘇家三七。(綱目拾遺)

形態 金沙江誌云。人參三七較參紅潤。大小亦不等。皮上間有帶竹節紋者。百草鏡云。人參三七頗似人參。入口生津。切開。內瀝青色。外皮細而綠。一種廣西山峒來

者。形如白菝。長者如老乾姜。黃有節。

性質 微苦。甜。

主治 消痰。除跌打損傷。積血不行。

配合應用 治吐血。用雞蛋一個。打開。和人參三七末一錢。藕汁一小杯。隔湯燉熱食之。不過二三枚自愈。(種福堂方)

治刀傷收口。用好龍骨、象皮、血竭、人參三七、乳香、沒藥、降香末各等分。為末。溫酒下。或搗上。(仇氏傳方)

陳氏回生集載軍門止血方。人參三七、白蠟、乳香、降香、血竭、五倍、牡蠣各等分。不經火。為末。敷之。

【曷旦】即寒號蟲之古籍別名。典見禮記。詳「寒號蟲」條。

【枯杖】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎杖」條。

【枯芥】即黃芥中虛者之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芥」條。

【枯桑葉】即桑葉之處方用名。詳「桑葉」條。

【枯腸】即黃芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芥」條。

【**枯餅**】 基本 枯餅爲雜木類之一種。其皮葉可供藥用。

主治 下積除垢。燒灰敷瘡疾。煎洗風癢痒。

【**枯蟬**】 卽蟬蛻之古籍別名。典見別錄。詳「蟬蛻」條。

【**枯蟻**】 卽明礬煨成者之處方用名。詳「明礬」條。

【**枳首蛇**】 卽兩頭蛇之古籍別名。典見爾雅。詳「兩頭蛇」條。

【**枳拒**】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【**枳茹酒**】 基本 本品爲枳殼刮茹所浸之酒。

主治 中風身直口僻眼急。

【**枳椇子**】 命名 本品果實拳曲如鷄距。故俗有鷄距之名。

處方用名 鷄距子。枳椇子。

古籍別名 蜜楮。蜜屬律。(廣記) 木蜜。木鷄。(拾遺) 木珊瑚。(廣志) 鷄距子。(蘇文) 鷄瓜子。(俗名) 萬壽果。(生產辨) 木名白石木。(唐註) 石李。白寶。棋。子。枳拒。枳子。枳棗。枳棋。枳狗。爛瓜。爛

橋。木屬律。白石梨。曲枝果。枝炬子。金鈞梨。金雞爪。皆棋。子。雞。杓。子。(和漢藥考) 交加子。枳棋。枳。杓。子。棘。杓。子。雞。杓。子。金。鈞。子。結。留。子。曹。公。爪。梨。瓠。樹。癩。漢。指。頭。(綱目) 木石樹。蜜。(古今注)

九畫 枳

外國名詞 Eriovonia dulcis, (Panda) (拉丁)

基本 屬鼠李科。爲枳椇之果實。

產地 在山野間。又陳仁山藥物生產辨云。枳椇子又名萬壽果。產廣東英德。石潭。清遠等處。

形態 枳椇爲自生之落葉喬木。老樹幹高二三丈。周圍六尺餘。樹皮粗糙如鱗。春日發生新葉。爲廣卵圓形。長三四寸許。邊緣有鋸齒。作暗綠色。自其基部出三大脈。有柄互生。夏月。枝梢開五瓣白花。花梗肥大。屈曲。花皆簇生。果實形似雞爪。振轉成肉質狀。色紫褐。味甘。氣如梨子。其上端結實。形圓。大如豆。色紫褐。有光澤。中藏子三粒。子圓或廣橢圓。成於革質。胚乳爲

肉質。子葉圓。幼根短。



子 枳 椇

採取 八九月採實暴乾。性質 甘平無毒。

效能 清溼熱。解酒毒。或用作利尿藥。

主治 頭風。小腹痛急。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論枳椇子曰。止渴除煩。去腸上熱。潤五臟。利大小便。功用同蜂蜜。枝葉煎膏亦同。【明】李時珍本草綱目論枳椇子曰。止嘔逆。解酒毒。辟蟲毒。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 治男子年三十餘。因飲酒發熱。又兼房勞虛乏。乃服補氣血之藥。加葛根以解酒毒。微汗出。人反懈意。熱如故。此乃氣血虛。不禁葛根之散也。必須雞距子解其毒。遂煎藥中。加而服之。乃愈。(朱實亨) 枳椇本草止言木

能敗酒。而丹溪朱氏治酒病。往往用其實。其功當亦同也。按蘇東坡集云。眉山揭穎臣。病消渴。日飲水數斗。飯亦倍常。小便頻數。服消渴藥逾年。疾日甚。自度必死。予令延蜀醫張肱診之。笑曰。君幾誤死。乃取麝香當門子。以酒濡漚。作十許丸。用棘杓子煎湯吞之。遂愈。問其故。肱曰。消渴消中。皆脾胃腎敗。土不制水而成疾。今穎臣脾脈極熱。而腎氣不衰。當由果實酒物過度。積熱在脾。所食多而飲水。水飲既多。滯不得不多。非消非渴也。麝香能制酒果花木。棘杓亦勝酒。且外有此木。屋內釀酒多不佳。故以此二物爲藥。以去其酒果之毒也。棘杓實如雞距。故俗謂之雞距。亦曰癩漢指頭。食之如牛乳。本草名枳椇。小兒喜食之。呼古人重格物。若肱蓋得此理矣。醫云乎哉。(李時珍) 枳椇徐鍇註。說文作楮。楮又作枳椇。皆屈曲不伸之意。此樹多枝而曲。其子亦卷曲。故以名之。曰蜜曰鷄。因其味也。曰珊瑚。曰雞距。曰雞爪。象其形也。曰交加。曰枳椇。言其實之組屈也。枳椇枳椇之

九畫 枳

名。按雷公炮炙序云。斂竄淡鹵如酒。酒交。註云。交加枝。即蜜柑也。又詩話云。子生枝端。橫折枝出。狀若枳拱。故土人謂之枳拱也。珍謂枳拱。及俗稱雞矩。蜀人之稱枳枸。棘枸。滇人之稱雞橋子。巴人之稱金鈎。廣人之稱結留子。散見書記者。皆枳枸雞距之字。方音轉異。爾俗又訛雞爪為曹公爪。或謂之梨棗樹。或謂之狗漢指頭。崔豹古今注。一名樹蜜。一名木石。皆一物也。
【李時珍】詩小雅所謂南山有枸也。陸璣疏義云。楮樹樹高大如白楊。所在皆有。枝柯不直。于着枝端。噉之甘美如飴。八九月熟。江南特美之。謂之木蜜。能敗酒味。若以其木為柱。則屋中之酒皆薄也。
蘇頌 ①木蜜樹生南方。人呼白石木。枝葉俱甜。嫩葉可生啜。味如蜜。老枝細破煎汁成蜜。倍甜。止渴解煩也。
陳藏器 ②枳拱木高三四丈。葉圓大如桑柘。夏月開花。枝頭結實如雞爪形。長寸許。紐曲。開作二三歧。盡儼若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。嚼之味甘如蜜。每開枝盡處結一二小子。狀如芟荊

子。內有扁核。赤色如酸。滑仁形。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云。枳枸來巢。曲禮云。婦人之贊。枳椇脯。修即此也。鹽藏。荷裏。可以備冬儲。
李時珍

【枳椇木汁】 性質 甘平無毒。 主治 功用與枳椇子同。

【枳椇木皮】 性質 甘溫無毒。 主治 五痔和五臟。

【枳殼】 命名 本品即枳實之老熟者。皮薄中虛而多穰。故別名之。 處方用名 陳枳殼。鉄炒枳殼。 古醫別名 只殼。奴隸。商殼。洞庭奴隸。
外國名 ① Angio sapientaria (Citrus aurantium) 基本 屬芸香科。為枳樹之熟實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。枳殼產四川為最。江西次之。福州又次之。日本亦有產。但質味不佳。大小畧出新。 採取 九十月採其熟實陰乾。

製法 雷斅曰。枳實枳殼。性效不同。若使枳殼。取辛苦腥。并有鹽油者。要陳久。年深者為佳。并去穰核。以麥麸炒至鉄焦。去麸用。 性質 苦酸。微寒。無毒。 效驗 破滯氣。寬腸胃。用作祛痰。燥溼。消化藥。

主治 風痺淋痺。通利關節。勞氣咳嗽。背膊悶倦。散留結。胸膈痰滯。逐水。消脹滿。大腸風。安胃。止痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論枳殼曰。遍身風彩。肌中如麻豆。惡瘡。腸風。痔疾。心腹結氣。兩脇脹虛。關隔壅塞。【宋】大明諸家本草論枳殼曰。健脾開胃。調五臟。下氣。止嘔逆。消痰。治反胃。霍亂瀉痢。消食。破癥結。疝瘕。五膈氣及肺氣水腫。大小腸除風明目。炙熱熨痔腫。【金】張元素珍珠囊論枳殼曰。泄肺氣。除胸痞。【明】李時珍本草綱目論枳殼曰。治憂急後重。

【明】繆希雍本草經疏論枳殼曰。枳殼氣味所主。與枳實大略相同。但枳實形小。其氣全。其性烈。故善下達。如少年猛悍之將。勇往直前。

八三〇

而一無回顧者也。枳殼形大。其氣散。其性緩。故其行稍遲。是以能入胸膈脾胃之分。及入大腸也。其主風痒麻痺。通利關節。止風痛者。蓋肺主皮毛。胃主肌肉。風寒溼入於二經。則皮膚發痒。或作痛。或麻木。此藥有苦泄辛散之功。兼能引諸風藥入於二臟。故為治風所當。風邪既散。則關節自然通利矣。其療勞氣咳嗽。背膊悶倦者。蓋亦指風寒鬱於上焦。則肺氣滯而為悶倦咳嗽。經曰。肺苦氣上逆。急食苦以泄之。枳殼味苦。能泄至高之氣。故主之也。又肺與大腸為表裏。風邪入肺。則并入大腸。風熱相搏。而為腸風下血。苦寒下泄之氣。則血熱清而風自除矣。其主散留結胸膈痰滯。逐水。消脹滿。安胃諸證。悉與枳實相同。第其氣稍緩耳。【清】黃宮繡本草求真論枳殼曰。枳殼苦酸微寒。功善下氣開胸。利肺開胃。凡人或因風寒食滯熱積。滯停氣鬱。而見咳嗽胸滿。便閉痰癆。癥結嘔逆。水積腸痛。瀉利痔腫。腸風溼痺等症。治皆能除。至香有云。枳殼益氣明目。似屬詭誕。但人誠勝本

貴清利。清利則氣自益而自明。枳殼體大氣較之枳實功雖稍遜。而利氣寬胸謂之益氣非其宜乎。但多用則能以損胸中至高之氣。雖束胎瘦胎亦有遂用枳殼之味。然必氣實可投若使氣虛而用。則不免有虛虛之禍矣。【清】楊時泰本草遺鈞元論枳殼曰。枳殼與實味苦而辛。苦多辛少。又含酸意。夫苦酸滯泄。其氣且寒。本由上降下之性味。更結於降令時。故取降泄者無驗。茲物矣。夫人身正氣非可降泄。其宜降泄者。正氣為邪所傷。有壅塞處而不能降也。然壅塞有輕重。雖總是氣病。卻有陰陽之不同。如因氣病以及於血。則氣之陰者傷。而病乎結實。不止病於細縷無形之陽也。枳實性烈而速。一往直前。凡細縷之氣。不能詳緩以散。而若實着手之處。乃能決之潰之。枳殼性稍緩。辛味稍多。故能從統氣之肺。於細縷無形而疎利之。不以潰決為功也。此一物而分氣血之義。細釋乎此。則不必執定所列治效。凡熱傷正氣。使不得降。抑或溼熱為病。而不得降者。伏其所傷

九畫 枳

之邪。而用此佐之以下歸於寒水之化。豈曰不宜。若不責其所因而漫為滯滯氣之主劑。則惑矣。然則枳殼治心下堅痞。其說非歟。詎知肺氣不降。入心則胃氣病。而不能生血。即不能化血。此之滯肺氣以下降。乃能使之生。遂能化也。以此義思枳殼之用。不同於實之潰堅決壅。豈不然哉。其治腸痞也。以兩脇為肝膽所經。苦中有酸。自能降肝膽之逆氣。大抵治氣之不降。宜於氣為熱傷者。若寒溼滯氣。則溫散而氣自行。不則寒溼久而化熱者。猶可投也。【清】陶立陸本草選旨論枳殼曰。枳殼氣味並與實同。但大則性詳而緩。專於治高。高則主氣。入手少陰肺經。治胸膈皮毛之病。能破氣舒溼。化痰泄肺。走大腸者。多用之。故治胸中結氣。胃痞。將成兩脇虛脹。遍身風癢。亦破痰癖。亦散積聚。亦利關節。亦消宿食。亦止瀉痢。但功力稍緩耳。配以蘇梗。有順氣瘦胎之功。配以黃連。有解毒散鬱之妙。古方多合二陳。用以理氣。蓋枳殼處於下氣。二陳處於行氣。行而不下。則濁氣妄行於

上。而為咳嗽、氣逆之症。下而不行。則清氣妄行於下。而為腸鳴、瀉泄之症。故每相配而不離也。然有損胃中至高之氣。止可二三服而已。稟受素壯。而氣刺痛者。看何部經分。以別經藥導之。若氣血弱者。則全不可服。此殼與實高下緩急之辨也。合而論之。大抵枳實、枳殼。其功皆主於利氣。氣下。則痰喘止咳。氣行。則痞脹消。氣通。則痛刺止。氣利。則後重除。故以枳殼利胸膈。枳實利腸胃。然張仲景治胸痞痞滿。以枳實為要藥。諸方治下血痔痢。大腸秘塞。裏急後重。又以枳殼為通用。則枳實不獨治下。而枳殼不獨治高。惟善用者之神明而已。抑又聞之。橘皮治高。青皮治低。均為治氣之藥。似乎相類。然枳實消胸中充實之滿。枳殼去胸中至高之氣。陳皮清腸間之痰。青皮治腹下之痛。是雖體質相近。而功效自相遠也。讀者不可混而無別。

辨偽 ① 鄭省巖曰。偽名洋枳殼。不知何種果實偽充。或云六七七月採小香藥偽為枳實枳殼。或云採梅橘混充。又福州多橘。土人於夏秋間。橘子未大。經風雨搖落者。拾而晒之。偽充枳殼。性既不同。誤用有害。按周禮云。橘逾淮而北為枳。今江南枳橘皆有。江北有枳無橘。江西多枳。不逾淮而始變也。七八月採者為枳實。九十月採者為枳殼。氣味苦酸微寒。臭香。形圓。花白多刺。穰內黃白。皮色深綠。故又名綠衣枳殼。主散留結。胸膈痰滯。逐水消脹。滿能海上魚氣分實。邪為治病要藥。若以偽品混售。真草皆人命矣。② 曹炳章曰。按枳殼枳實。為老嫩大小之分別。江西沙河出者。細皮肉厚而結。色白氣清香而佳。龍虎山出者亦佳。四川出者。名川枳殼。色黃肉厚。味帶酸。次之。江浙衢州出者。皮粗色黃。捲口心大肉薄。亦次。浙江黃埠出者。肉鬆而大有燈盞之名。更次。洋枳殼者。或即此也。七八月採者。小而嫩肉厚。乾之黑褐色。為枳實。九十月採者。殼大肉略薄。色白為枳殼。每個對切為兩。皆以翻肚如盆口唇狀。須陳久者良。近時有一種臭橘形亦相似。其氣惡濁。不堪入藥。

配合應用 ① 治上焦壅氣脹

九畫 枳

滿。因於寒。用枳殼、蘇子、橘皮、桔梗、木香、白豆蔻、香附。

⑤ 治腸風下血初起。枳殼、黃連、槐花、乾葛、防風、荊芥、芍藥、黃芩、當歸、生地黃、地榆、側柏葉。

⑥ 治風疹作痒。枳殼、荊芥、苦參、防風、蒼耳草、敗蒲、煎湯沐浴。

⑦ 治滯下裏急後重。枳殼、檳榔、芍藥、黃連、升麻、葛根、甘草、紅麴、滑石。

⑧ 治氣虛。大便不快。枳殼、人參、麥冬。

⑨ 治右脇痛。枳殼、肉桂。

⑩ 治傷寒呃噎。枳殼半兩。木香一錢為末。每白湯服一錢。未止再服。(本事方)

⑪ 治老幼腹脹。血氣凝滯。用此寬腸順氣。名四炒丸。商州枳殼。厚而緣背者。去穢四兩。分作四分。一兩用蒼朮一兩同炒。一兩用蘆薈一兩同炒。一兩用乾漆一兩同炒。一兩用茴香一兩同炒。黃去四味。只取枳殼為末。以四味煎汁。煮麵糊和丸。梧子大。每食後米飲下五十丸。(王氏簡易方)

⑫ 消積順氣。治五積六聚。不拘

男婦老幼。但是氣積。並皆治之。乃仙傳方也。方用枳殼三斤。去穢。每個入巴豆仁一個。合定扎煮。慢火水煮。一日湯減再加。須用熱湯。勿用冷水。待時足汁盡。去巴豆。切片曬乾。勿炒為末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服三四十丸。隨病湯使。(邵真人經驗方)

⑬ 治順氣止痢。枳殼炒二兩。四錢。甘草六錢為末。每沸湯服二錢。(嬰童百問方)

⑭ 治疏導脚氣。即上方用木瓜湯服。(直指方)

⑮ 治小兒秘澀。枳殼煨去穢。甘草各一錢。以水煎服。(全幼心鑑方)

⑯ 治痔瘡腫痛。用枳殼煨熟。熨之。七枚立定。(必效方) 又用枳殼末入瓶中。水煎百沸。先熏後洗。(本事方)

⑰ 治懶胎腹痛。枳殼三兩。麵炒。黃芩一兩。每服五錢。水一盞半。煎一盞服。若脹滿身重。加白朮一兩。(活法機要方)

⑱ 治產後腸出不收。枳殼煎湯浸之。良久即收也。(袖珍方)

⑳ 治產後腸出不收。枳殼煎湯浸之。良久即收也。(袖珍方)

㉑ 不驚丸。治小兒因驚氣吐逆。作搐。痰涎壅塞。手足掣。眼睛斜視。枳殼去穢。炒。淡豆豉等分為末。每服一字。甚者半錢。急驚薄荷自然汁下。慢驚荊芥湯入酒三五點下。日三服。(陳文中小兒方)

㉒ 治牙齒疼痛。枳殼浸酒含漱。(聖惠方)

㉓ 治小兒輕癆。大枳殼一箇。去白。磨口平。以麵糊抹邊。合癆頭上。能自出膿血。盡更無疤痕也。(危氏得效方)

㉔ 利氣明目。枳殼一兩。炒為末。調湯下。

㉕ 治下早成痞。傷寒陰證。下早成痞。心下滿。不痛。按之虛。輒。枳殼。檳榔等分為末。每服三錢。黃連湯調下。(宣明方)

㉖ 治脇骨疼痛。因驚傷肝。炒枳殼一兩。桃枝生牛兩。為細末。每服一錢。薑棗湯下。

㉗ 治胎前腹痛。凡脾胃虛寒而無滯積者。及孕婦體弱者。禁用。

㉘ 參攷資料 枳殼主高枳實主下。高者主氣。下者主血。故攷主

胸膈皮毛之病。實主心腹脾胃之病。大同小異。朱肱活人書言治痞。宜先用桔梗枳殼湯。非用此治心下痞也。果知誤下。氣將陷而成痞。故先用此。使不致於痞也。若已成痞。而用此。則失之矣。不惟不能消痞。反損胸中之氣。先之一字有謂也。(王好古) 枳實枳殼。氣味功用俱同。上世亦無分別。魏晉以來。始分實殼之用。潔古張氏。東垣李氏。又分治高治下之說。大抵其功皆能利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通則痛刺止。氣利則後重除。故以枳實利胸膈。以枳殼利腸胃。然張仲景治胸痺痞滿。以枳實為要藥。諸方治下血痔痢。大腸祕塞。裏急後重。又以枳殼為通用。則枳實不獨治下。而殼不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一氣而已。則二物分之可也。不分亦無傷。杜壬方載湖陽公主苦難產。有方士進瘦胎飲。方用枳殼四兩。甘草二兩。為末。每服一錢。白湯點服。自五月後。一日一服。至臨月。不惟易產。仍無胎中惡氣也。張景古活法機要。改以枳朮丸

日服。令胎瘦易生。謂之束胎丸。而寇宗奭衍言。胎壯則子有力。易生。令服枳殼藥。反致無力。象子亦氣弱難養。所謂縮胎易產者。大不然也。以理思之。寇氏之說。似覺爲僞。或胎前氣盛壅滯者。宜用之。所謂八九月胎。必用枳殼蘇椹。以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。若氣莫弱者。即大非所宜矣。僞亭曰。難產多見於鬱悶安遠之人。富貴奉養之家。古方復胎飲。爲湖陽公主作也。予妹苦於難產。其形肥而好。皇予思此與公主正相反也。彼奉養之家。其氣必實。故耗其氣。使不則易產。今形肥則氣虛。久坐則氣不運。當補其母之氣。以紫蘇飲。加補氣藥十數貼。服之。遂快產。(李時珍)

【枳距子】即枳椇子之處方用名。詳「枳椇子」條。

【枳實】 命名 枳乃木名。實乃其子。故名。

處方用名 陳枳實。麸炒枳實。古籍別名 洞庭。黏刺。破胸。枳。種胸。羅歷。(和漢藥考)

外國名詞 Nolumbina

九畫 枳

Zizyosium

基本 屬芸香科。爲枳樹之青。產地 在四川、江西、福建、浙江諸省之山野川谷間。

形態 根木似檣而小。樹高五七尺許。葉如橙而多刺。春開花。秋成實。生時皮厚而堅實。色則青綠。熟時皮薄而空虛。色則黃褐。

種類 枳實乃實之嫩小皮厚中實者。故曰實。枳殼乃實之老皮薄中虛者。故曰殼。

採取 七八月間。採其嫩實。陰乾。

製法 陶弘景曰。枳實採破令乾。除核殼。炙令乾。用以陳者爲良。俗方多用。道家不須。

性質 苦寒。無毒。

效能 破氣消積。化痰利胸。用作祛痰。利尿。發汗。消滯。化藥。

主治 大風在皮膚中。如麻豆。苦痒。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五臟。益氣輕身。(本經)除胸脇痰癖。

逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞。痛。逆氣。脇風痛。安胃氣。止瀉。瀉明目。(別錄)

張仲景之發明 枳實一味。經張仲景之實驗。認爲「主治結實之毒。旁治胸滿。胸痞。腹滿。腹痛。」茲考證如下：①枳實芍藥散證曰：腹痛煩滿。②桂枝枳實生薑湯證曰：心懸痛。③大承氣湯證曰：腹脹滿。④厚朴三物湯證曰：痛而閉。⑤厚朴七物湯證曰：腹滿。⑥梔子大黃湯證曰：熱痛。⑦大柴胡湯證曰：心下急。⑧鬱鬱微煩。⑨枳實薤白桂枝湯證曰：胸滿。⑩梔子厚朴湯證曰：心煩腹滿。⑪小承氣湯證曰：腹大滿不通。⑫枳實梔子豉湯證曰：梔子香豉。主治心中懊憹。而更加枳實。則其有胸滿之證明矣。⑬橘皮枳實生薑湯證曰：胸痞。歷觀諸方。枳實主治結實之毒也。明矣。仲景氏用承氣湯也。大實大滿。結毒在腹。則大承氣湯。其用枳實也。五枚。嗉腹滿不通。則小承氣湯。其用枳實也。三枚。枳實主治結實。斯可以見已。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論枳實曰：解傷寒結胸。主上氣喘咳。腎內傷冷陰痿。而有氣加而用之。【金】張元素珍珠囊論

枳實曰：消食。散敗血。破積。去胃中滯熱。【明】羅希雅本草經疏論枳實曰：枳實味苦氣寒。無毒。別錄雷公如酸。甄權加辛。察其功用。必是苦爲最。而酸辛次之。細詳神農主治。與本藥氣味大不相同。究其所因。必是枳殼所主。蓋二物古文原同一條。後人分出時。誤入耳。其別錄所主除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣。胸氣痛。安胃氣。止瀉。洩者。是其本分內事。皆足陽明大陰受病。二經氣滯。則不能運化。精微。而痰癖停水。結實脹滿。所自來矣。胃之上口名曰賁門。賁門與心相連。胃氣壅則心下亦自急痞痛。邪塞中焦。則升降不舒。而氣上逆。肝木鬱於地下。則不能條達。而脇痛。得其破散衝走之力。則諸證悉除。所以仲景下傷寒腹脹實結者。有承氣湯。胸中痞痛者。有陷胸湯。潔古療心下痞滿者。有枳朮丸。整潔既去。則胃氣自安。而清濁亦止矣。宋云明目者。經曰：目得血而能視。氣旺乃能生血。損氣破散之性。豈能明目哉。無是理也。【清】黃宮樞本草求真論

九畫 枳

枳實曰。枳實氣味。與枳殼苦酸微寒無異。但實小性酷。下氣較殼為迅。故書載有倒墻倒壁之功。不似枳殼體大氣散。而僅為利肺開胸寬腸之味耳。是以氣在胸中。則用枳殼。氣在胸下。則用枳實。氣滯則用枳殼。氣壅則用枳實。雖古有云。枳殼治氣。枳實治血。然氣行則血自通。究皆利氣之品。而非通血之劑耳。故同白朮則可調脾。同大黃則可推蕩。若氣虛痞滿。而用枳實。枳殼則與抱薪救火者無異矣。

國外學說

古方藥品考曰。來自中國之枳實。大小相和。小者如無患子。或如黑豆。大者剖分。肉反張如菴子。大皮厚。青黑色。味苦辛。此為上品。高麗產者。形色如中國產。味亦略同。次之。日本產有大小之別。形味如中國產者。亦有之。商人每以高麗枳實混充。今九州產多臭橙。其枝葉花實。與枳實相似。享保中所傳之中國種。土人每以回青橙。香橙及橘之未熟者。偽為枳實。回青橙者。與枳實鬻鬻。香橙及柚。皆不堅實。苦味薄。總稱東洋枳實。不堪入藥。俗呼臭橘為枳殼。

尤謬。又大和本草曰。枳實之葉如柑。與臭橘葉不同。有以臭橘充枳實者。不堪用。日本自來誤以臭橘為枳實。凡枳實。枳殼之來自中國者。皆可用。但亦兩者攙雜。小而肉厚者為枳實。大而肉薄者為枳殼。以水洗去瓢與核。同熬炒。麩焦取。去麩切細用。枳實。枳殼。並以陳久者為佳。亦有攙和臭橘者。須揀淨。又本草紀開曰。享保中始有中國種來。今駿河之藥園所種者。多結實。葉酷似柑。厚而深綠色。多刺。經冬不凋。實如臭橘。而大。熟則皮厚。臭橘熟則皮薄。青皮曰枳實。熟則名枳殼。從前日本每以臭橘作偽。故有臭橘之名。本草蒙筌曰。臭橘皮微綠。不堪供藥用。今商人多以此欺世。無益有損。故凡入藥劑。必以黑色者為真。云。殼實俱用中國產。實如菴子。花落時採之。大三分許者。上品也。是名鷓眼枳實。說見本草原始。藥性奇方云。初生如鷓眼大者。枳實也。已大如彈子許者。枳殼也。今藥舖多以大七八分者為枳實。誤矣。實則此乃殼也。枳實須以皮厚。翻止如盆口者為勝。

若皮稍薄。便是臭橘。必係贗品。今藥舖所售。皆高麗枳殼。且兩者皆小。偽造無疑。又物類品鑑曰。實小者為枳實。老者為枳殼。日俗以枸橘為枳殼。枳實。大誤。中國種傳於享保年間。駿府官園有之。樹似橘。葉似橙。實亦似橙。而小。又日用藥品考曰。青而未熟者曰枳實。已熟而大者曰枳殼。來自中國之枳實。枳殼多真品。枳實之最小者。謂之鷓眼枳實。日本向無此物。有之自高麗來。然甚少。今藥舖所稱枳殼。枳實者。皆臭橘耳。其稱為高麗枳殼。枳實。及薩摩枳殼。枳實者。其形與中國種相同。皮色微綠。然剖視其內。則為白色。此係將臭橙或回青橙之小者。偽製而成。或曰。剖視其中。穰有十二三者。枳實也。穰祇六七者。臭橙也。說亦非是。曾見臭橙之類。其穰亦有十二者。又手板發蒙曰。枳殼。中國產為真。且係上品。產於日本之薩摩者。乃薄皮枳殼。蓋枸橘也。枳實。亦以中國產為真。薩摩產者。名東洋薄皮。亦曰鐵離塞。

配合應用 ●枳實同三稜蓬

八三四

殼。青皮。檳榔。為消磨堅積之劑。然須能食脾胃健者宜之。

●治卒胸痺痛。枳實搗末。湯服方寸匕。日三夜一。(肘後方)

●治胸痺結胸。胸痺。心下痞。留氣結胸。脇下逆氣。搶心。枳實。蘆白湯。主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。蘆白半斤。括樓一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳朴。取二升。去滓。納餘藥。煎三兩沸。分溫三服。當愈。(金匱要略方)

●治傷寒胸痛。傷寒後。卒胸脇閉痛。枳實。麩炒。為末。米飲服二錢。日二服。(濟生方)

●治產後痛腹。枳實。麩炒。芍藥酒炒。各二錢。水一盞。煎服。亦可為末服。

●奔豚氣痛。枳實。炙為末。飲下方寸匕。日三夜一。(外臺秘要方)

●治婦人陰腫。壓痛。枳實。半斤。碎炒。帛裏熨之。冷即易。(子母秘錄方)

●治大便不通。枳實。皂莢。等分。為末。飯丸。米飲下。(危氏得效方)

●治積刺脫肛。枳實。石上磨平。蜜炙黃。更五熨之。積乃止。(千金

方)

①治小兒久痢。水穀不調。枳實搗末。飲服一二錢。(廣利方)

②治腸風下血。枳實半斤。麸炒黃芪半斤。為末。米飲非時服二錢。七糊丸亦可用。(經驗方)

③治小兒五疳。不以年月。枳實為末。煉蜜丸。梧子大。空心飲下三十九丸。(集驗方)

④治小兒頭瘡。枳實燒灰。豬脂調塗。(聖惠方)

⑤治皮膚風疹。枳實醋浸。火炙熨之即消。(外臺秘要方)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡脾胃虛寒而無濕積者。及孕婦體弱者禁用。

著名方劑 ①枳朮丸。治痞積消食強胃。(潔古方) 枳實一兩。白朮二兩。二味為末。用荷葉裹燒飯為丸。梧子大。每服五十九丸。本方加木香砂仁。即香砂枳朮丸。②枳朮湯。治心下痞。大如盤。邊如旋杯。水飲所作。(金匱方) 枳實七枚。白朮二兩。二味以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中輒即如故。③枳實梔子散。治大病後復勞。復。(金匱

方) 枳實三枚。(炙) 梔子十四枚。(擘) 豉一升。(綿裹) 三味以清漿水七升。空煮取四升。納枳實梔子。煮取二升。下豉。更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃如博碁子大五六枚。

參攷資料 ①心下痞及宿食不消。並宜枳實黃連。(張元素) ②益氣則佐之人。參白朮。乾薑。破氣則佐之以大黃。牽牛。硝芒。此本經所以言益氣而復昔消痞也。非白朮不能去滯。非枳實不能除痞。故潔古製枳朮丸。方以調胃脾。張仲景治心下堅。大如盤。水飲所作。枳實白朮湯。用枳實七枚。朮三兩。水一斗。煎三升。分三服。腹中輒即消也。(玉好古) ③枳實枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。皆取其疏通決泄。破結實之義。他方但導敗風瀉之氣。可常服者。故用枳殼。其義如此。(寇宗奭) ④今洛西江湖州郡皆高五七尺。葉如橙多刺。春生白花。至秋成實。七月八月採者為實。九

月十月採者為殼。今醫家以皮厚而小者為枳實。完大者為枳殼。皆以翻肚如盆口狀。陳久者為勝。近道所出者。俗呼臭橘。不堪用。(蘇頌)

【枳樹根皮】

主治 浸酒。漱齒痛。

歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論枳樹根皮曰。煮汁服。治大便下血。水服。治野鷄病有血。

【枳樹茹】

基本 本品係枳樹皮與枳殼上刮下之皮也。

主治 樹莖及皮。主水服暴風。骨節疼急。

歷代記述攷證

【宋】蘇頌圖經本草論枳樹茹曰。中風身直不得屈伸。反復。及口僻眼斜。刮皮一升。酒三升。放一宿。每溫服五合。酒盡再作。

【枳樹嫩葉】

主治 祛風。煎湯代茶。

【枳葉】 即枳樹子之古籍別名。典見和漢藥考。詳枳樹子條。

【枸子】 即枳樹子之古籍別名。典見和漢藥考。詳枳樹子條。

見和漢藥考。詳枳樹子條。【枸忌子】 即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳枳樹子條。

【枸杞子】

命名 本品棘如枸。之刺。莖如杞之條。故兼名之曰枸杞。而藥用其子實。故名。

處方用名 甘杞子。奎杞子。杞子。棗杞。蓋棗王。頂棗王。

古籍別名 枸杞子(爾雅) 枸棘子(衍義) 苦杞子(詩疏) 甜棠子(圖經) 天棗子(抱朴) 地骨子(地節子) (本經) 地仙子(日華) 却老子(羊乳子) 仙人杖子(西王母杖子) 拘忌子(別錄) 赤實(雜類) 二尸籙(三尸籙) 石納納(青精子) 明眼草子(雪壓珊瑚) (和漢藥考)

外國名詞 Bortokorn fruit (英)

基本 係屬茄科枸杞之子實。

產地 陳仁山藥物生處辨云。產甘肅寧夏。攝海寧安等處。各地平澤及諸丘陵阪岸間。雖有產。生。但品小味澁。不堪入藥。

形體 枸杞子。為類似蕃椒之紅色圓形或橢圓形漿果。中有無

九 薑 枳 枳 枳

九畫 枸

數種子。味稍甘。春生苗葉如石榴。葉鞣滑堪食。俗呼甜菜。其莖幹高三五尺。作叢生而多刺。六七月間開小紅紫花。隨結紅實。



子 杞 枸

種極 枸杞恒多野生。亦有掘取其根。移植於園圃者。

採取 每年八九月間採子。暴乾。尤以常山出者上。甘州出者為極品。

製法 李時珍曰。凡用子。揀淨枝梗。取鮮明者。洗淨酒潤一夜。搗爛入藥。

性質 苦寒。無毒。效能 補肝腎。療虛羸。用作強壯藥。

主治 枸杞主五內邪氣。熱中消渴。周痺風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。本經。下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。噓吸強陰。利大小便。別錄。

歷代記述要目 〔唐〕甄權藥

性本草論枸杞曰。補精氣。諸不足。易顏色。變白。明目安神。令人長壽。〔唐〕孟詵食療本草論枸杞子曰。堅筋骨耐老。除風去虛勞。補精氣。

〔元〕王好古湯液本草論枸杞子曰。主心病。噎乾。心痛。渴而引飲。腎病消中。〔明〕李時珍本草綱目論杞子曰。滋腎潤肺。榨油點燈。明目。

〔明〕張介賓景岳全書論杞子曰。枸杞子。味甘微辛氣溫。可升可降。味重而純。故能補陰。陰中有陽。故能補氣。此物微助陽而無動性。故用之以助熱地最妙。其功則明耳目。壯神魂。添精固髓。健骨強筋。善

補勞傷。尤止消渴。真陰虛而臍腹疼痛不止者。多用神效。〔明〕李士材本草圖解論枸杞子曰。枸杞子味甘氣平。腎經藥也。補腎益精。水旺則骨強而消渴。目昏而腰疼。膝痛。無不愈矣。陶弘景云。離家千里。勿食枸杞。甚言其補精強陰之功也。按枸杞平而不熱。有補水制火之妙。與地黃同功。而除蒸者未嘗用之。惜哉。〔清〕黃宮繡本草求真論枸杞子曰。枸杞甘寒性潤。據書皆載祛風明目。強筋健骨。補精壯

陽。然究因於腎水虧損。服此甘潤。陰從陽長。水至風熄。故能明目強筋。是明指為滋水之味。故書又載能治消渴。今人因見色赤。妄謂枸杞補陽。其失遠矣。豈有甘潤氣寒之品。而尚可言補陽耶。若以色赤為補陽。則紅花紫草。其色更赤。何以不言補陽。而曰活血。嗚呼。醫道不明。總由看書辨藥。不細體會之故耳。試以虛寒服此。不惟陽不能補。且更有滑脫泄瀉之弊矣。不可不慎乎。出甘州。紅潤少核者良。〔清〕黃元御玉楸葉解論枸杞子曰。枸杞子味甘微甘。性寒。入足少陰腎

足厥陰肝經。補陰壯水。滋木清風。枸杞子苦寒之性。滋潤腎肝。寒泄脾胃。土燥便堅者宜之。水寒土溼。腸滑便利者服之。必生瀉。本草謂其助陽。甚不然也。根名地骨皮。清肝泄熱。涼骨除蒸。止吐血齒齩。金瘡血漏。止熱消渴。

辨偽 鄧肯巖曰。枸杞子以陝西甘州所產者為勝。近有一種粒小色淡。味不甚甘。皆本地所出之土枸杞。非甘州上品也。曹炳章曰。按枸杞子。陝西潼關長城邊

八三六

出者。肉厚輪潤。紫紅色。顆粒粗長。味甘者為佳。寧夏產者。顆大色紅。有蒂。略次。東北關外行之。甘肅鎮。蕃長城邊出者。粒細紅圓。活。味亦甘。此貨過霉天即變黑。甚難久藏。略次。他如閩浙及各地產者。薄地皆曰土杞子。粒小。味甘淡兼苦。肉薄性微涼。不入補益藥。為最次。

配合應用 ① 甘枸杞子得地黃。五味子。麥門冬。地骨皮。青蒿。鱉甲。牛膝。為除虛勞。內熱。或發寒熱之要藥。加天門冬。百部。枇杷葉。象可治肺熱咳嗽之因陰虛者。

② 金匱煎。枸杞子逐日搗紅熟者。不拘多少。以無灰酒浸之。蠟紙固封。勿令洩氣。兩月足。取入砂盆中。搗爛。取汁。同浸酒。入銀鍋內。慢火熬之。不住手攪。恐黏滯不勻。候成膏如餠。淨瓶密封。每早溫酒服二大匙。夜臥再服。百日身輕氣壯。積年不輟。可以羽化也。〔經方〕

③ 枸杞酒。變白耐老。輕身用枸杞子二升。十月壬癸日。東採之。以好酒二升。磁瓶內浸三七日。乃添生地黄汁三升。攪勻密封。至立

出者。肉厚輪潤。紫紅色。顆粒粗長。味甘者為佳。寧夏產者。顆大色紅。有蒂。略次。東北關外行之。甘肅鎮。蕃長城邊出者。粒細紅圓。活。味亦甘。此貨過霉天即變黑。甚難久藏。略次。他如閩浙及各地產者。薄地皆曰土杞子。粒小。味甘淡兼苦。肉薄性微涼。不入補益藥。為最次。

配合應用 ① 甘枸杞子得地黃。五味子。麥門冬。地骨皮。青蒿。鱉甲。牛膝。為除虛勞。內熱。或發寒熱之要藥。加天門冬。百部。枇杷葉。象可治肺熱咳嗽之因陰虛者。

金匱煎。枸杞子逐日搗紅熟者。不拘多少。以無灰酒浸之。蠟紙固封。勿令洩氣。兩月足。取入砂盆中。搗爛。取汁。同浸酒。入銀鍋內。慢火熬之。不住手攪。恐黏滯不勻。候成膏如餠。淨瓶密封。每早溫酒服二大匙。夜臥再服。百日身輕氣壯。積年不輟。可以羽化也。〔經方〕

春前三十日。開瓶。每空心煖飲一杯。至立春後。髭髮卻黑。勿食蕪菁葱蒜。(經驗方)

④四神丸。補虛益損治腎經虛損。眼目昏花。或雲翳遮睛。甘枸杞一斤。好酒浸透。分作四分。一分同蜀椒一兩炒。一分同小茴香一兩炒。一分同芝朮一兩炒。一分獨炒。揀取枸杞。加熟地黃。白朮。白茯苓各一兩爲末。煉蜜丸。日服。(瑞竹堂方)

⑤療肝虛下淚。枸杞子二斤。絹袋盛。浸一斗酒中。密封三七日。飲之。(龍木論)

⑥療目赤生翳。枸杞搗汁。日點三四次。神驗。(肘後方)

⑦治面黧斑。枸杞子十斤。生地三斤。爲末。每服方寸匕。溫酒下。日三服。久則如童顏。(聖惠方)

⑧療注夏虛病。枸杞子五味子。研細。淡水泡。代茶飲。(攝生方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡脾胃薄弱。大便溼澇者禁用。

參攷資料 ①按劉禹錫枸杞井詩云。僧房藥樹依寒井。井有清

九靈 枸

泉藥有鏡。紫葉生。石斲。殷紅子。熟照銅餅。枝繁本。是仙人杖。根老能成瑞犬形。上品功能甘露味。還知一勺可延齡。又續仙傳云。朱孺子見溪側二花。犬逐入於枸杞。澆下。掘之得根。形如二犬。蒸而食之。忽覺身輕。周密浩然齋日鈔云。宋徽宗時。順州築城。得枸杞於土中。其形如獒狀。馳獻闕下。乃仙家所謂千歲枸杞。其形如犬者。據前數說。則枸杞之滋益不獨子。而根亦不止於退熱而已。但根苗子之氣味稍殊。而主治亦未必無別。蓋其苗乃天精。苦甘而涼。上焦心肺客熱者宜之。根乃地骨。甘淡而寒。上焦肝腎虛熱者宜之。此皆三焦氣分之藥。所謂熱淫於內。瀉以甘寒也。至於子則甘平而潤。性滋而補。不能退熱。止能補腎潤肺。生精益氣。此乃平補之藥。所謂精不足者。補之以味也。分而用之。則各有所主。兼而用之。則一舉兩得。世人但知用黃芩黃連苦寒。以治上焦之火。黃藥知母。苦寒以治下焦陰火。謂之補陰降火。久服致傷元氣。而不知枸杞地骨。甘寒平補。使精

氣充而邪火自退之妙。情哉。予嘗以青蒿佐地骨退熱。屢有殊功。人所未喻者。兵部尚書劉松石諱天和。麻城人。所集保壽堂方。載地仙丹云。昔有異人赤脚張傳。此方於猗氏縣一老人。服之壽百餘。行走如飛。髮白反黑。齒落更生。陽事強健。此藥性平。常服能除邪熱。明目輕身。春採枸杞葉。名天精草。夏採花名長生草。秋採子。名枸杞子。冬採根。名地骨皮。並陰乾。用無灰酒浸一夜。曬露四十九晝夜。取日精月華氣。待乾爲末。煉蜜丸。如彈子大。每早晚各用一丸。細嚼。以隔夜百沸湯下。此藥採無刺味甜者。其有刺者服之無益。(李時珍) ⑨仙人杖有三種。一是枸杞。一是桑類。葉似苦苣。一是枯死竹竿之黑者也。(蘇頌) ⑩今處處有之。春生苗。葉如石榴葉。而輕薄堪食。俗呼爲甜菜。其莖幹高三五尺。作叢。六月七月生小紅紫花。隨便結紅實。形微長如棗核。其根名地骨。詩小雅云。集於苞杞。陸璣詩疏云。一名苦杞。春生作莢。莢微苦。其莖似葎。其子秋熟。正赤。莖葉及子。服之輕身

益氣。今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類。其實形長而枝無刺者。真枸杞也。圓而有刺者。枸棘也。不當入藥。馬志注。澠疏條云。澠疏有刺。枸杞無刺。以此爲別。澠疏亦有巨骨之名。如枸杞之名地骨。當亦相類。用之宜辨。或云澠疏以高大者爲別。是不然也。今枸杞極有高大者。入藥尤神良。(蘇頌) ⑪枸杞枸棘。徒勞分別。凡杞未有無刺者。雖大至於成架。尙亦有棘。但此物小則刺多。大則刺少。正如酸漿與棘。其實一物也。(寇宗奭) ⑫古者枸杞地骨。取常山者爲上。其他丘陵阪岸者皆可用。後世惟取陝西者良。而又以甘州者爲絕品。今陝之蘭州靈州九原以西。枸杞並是大樹。其葉厚根粗。河西及甘州者。其子圓如櫻桃。蒸乾緊小。少核。乾亦紅潤。甘美。味如葡萄。可作果食。異於他處者。沈存中筆談亦言。陝西極邊生者高丈餘。大可作柱。葉長數寸。無刺。根皮如厚朴。則入藥大抵以河西者爲上。種樹書言。收子及根。種於肥壤中。待苗生。翻爲蔬食。其佳。(李時珍)

九疊 枸

【枸杞子粥】

爲粥。

主治 補精血。益腎氣。血虛腎虧者服之最宜。

基本 本品以枸杞子和米煮

【枸杞苗】

性質 苦寒。效驗 除煩。益志。祛風。明目。消熱毒。散瘡腫。

【枸杞酒】

製法 用甘州枸杞子煮爛。搗汁。和麴米釀酒。或以杞子同生地黃。袋盛浸酒飲。

主治 補虛弱。益精氣。去冷風。壯陽道。止目淚。健腰脚。

【枸杞莖葉】

主治 和羊肉作羹。益人。除風明目。作飲代茶。止渴。消熱煩。益陽事。解類毒。與乳酪相惡。汁注目中。去風障赤膜。昏痛。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論枸杞莖葉曰。除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒。散瘡腫。【明】李時珍本草綱目論枸杞莖葉曰。去上焦心肺客熱。

【枸杞蟲】

古籍別名 蠅(爾雅) 蝮烏蠅(爾雅)

形態 枸杞蟲爲溼生蟲類之一種。生枸杞上。食其葉。狀如蠶。亦有五色者。老則作繭化蛾。生子於草木上。其蟲可供藥用。

採取 於作繭化蛹時採之。曝乾收用。

性質 鹹。溫。無毒。主治 益陽道。令人悅澤。有子。炎黃。和地黃末爲丸服之。大起陽益精。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論枸杞蟲曰。治腎家風虛。

【枸骨】

處方用名 枸骨皮。枸骨枝。

古籍別名 貓兒刺。黏精。(綱目) 扛谷樹。

外國名詞 Osmanthus equifolium, B. of B. (拉丁) ヒヒラギ ヒラギ(日本)

基本 係木犀科。爲木犀屬枸骨之木皮與枝葉。

產地 凡暖地山野森林中均有出。



(一) 骨 枸

形態 枸骨爲常綠亞喬木。高丈餘。木理白滑。葉爲卵形而對生。長二三寸。有大鋸齒而銳如劍狀。質厚光澤。秋冬間開小白花。花冠四裂。雄蕊二。雌蕊一。往往數花生於葉腋。花之香氣清烈。頗佳。花後結實。爲漿果。形橢圓而長。熟則紫紅。作碧色。皮薄。味甘。核有四瓣。



(二) 骨 杞

採取 九月採子。餘採無時。

製法 採得陰乾。用法 水煎或酒浸。或到末用。亦可熬膏。

性質 微苦。涼。無毒。效能 補肝腎。健腰膝。用作滋養強壯藥。

主治 木皮浸酒。補腰脚。令健。

八三八

枝葉燒灰淋汁。煎膏。塗白癩風。

歷代記述攷證 【明】經希雍本經疏證論枸骨曰。枸骨。本經附出女貞條下。不載氣味所主。然觀陳藏器云。其皮堪浸酒。補腰膝。令健。枝葉燒灰。淋汁。或煎膏。塗白癩風。亦可作調劑傳之。應是苦寒無毒。氣味俱陰。入肝入腎之藥也。惟其入肝。故主白癩風。蓋肝爲風木之位。藏血之臟。血虛則發熱。熱甚則生風。苦寒能涼血清熱。故主之也。其補腰膝。令健者。腰爲腎之府。腎爲作強之官。虛則熱而轉。故其性欲堅。愈食苦以堅之。此藥味苦入腎。正遂其欲堅之性耳。腎氣既實。則溼熱自除。而腰膝自健矣。

用量 三錢至四錢。製法 以枸骨葉製露。味辛者平。功能散風通絡。逐諸風。利筋骨。皮毛。治風痺脚弱。爲去風通利之佳品。

參攷資料 ● 枸骨葉有五刺。如貓之形。故一名貓兒刺。又衛才亦名枸骨。與此同名。(李時珍) ● 枸骨樹如杜仲。詩云。南山有枸是

有出。

也。陸璣詩疏云。山木也。其狀如楓。木理自滑。可爲函板。有木直在葉中卷之如子。羽化爲蠶(陳藏器)。

① 枸骨多生江浙間。南人取以旋盆器甚佳。(蘇頌) ② 枸骨樹如女貞。肌理甚白。葉長二三寸。青翠而厚硬。有五刺角。四時不凋。五月開細白花。結實如女貞。及菴菴子。九月熟時。緋紅色。皮薄味甘。核有四瓣。人採其木皮煎膏。以黏鳥雀。謂之黏膏。(李時珍)

【枸骨】即衛矛之古籍別名。典見綱目。詳「衛矛」條。

【枸骨皮】即枸骨之處方用名。詳「枸骨」條。

【枸骨枝】即枸骨之處方用名。詳「枸骨」條。

【枸棘子】即枸杞子之古籍別名。典見本草衍義。詳「枸杞子」條。

【枸橘】古籍別名。臭橘。(綱目) 唐橘。(植物學大辭典)

外國名詞 Aegle Sapparia, D. C. (拉丁) カラタチ (日本)

基本 係芸香科柑屬。爲枸橘之葉。其實核樹皮。刺詳見各條。

九 薑 枸 栲 被 柏

形態 枸橘爲灌木類之落葉。木本。即恒栽植庭園。以爲得籬者。莖高丈餘。常呈綠色。樹枝分歧甚繁。變成銳針之刺。葉作掌狀複葉。自三小葉而成。其總葉柄有翅。春夏枝梢開花。白色。結實黃色。球形。大如彈丸。狀似枳實而殼薄。不香。其葉可供藥用。



枸 栲

性質 辛。溫。無毒。

主治 下痢膿血後重。同草薢等分。炒存性。研。每茶調二錢服。又治喉癢。消腫導毒。

【枸橘刺】 主治 風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。

【枸橘核】 主治 腸風下血。不止。同栲根白皮等分炒研。每服一錢。皂莢子煎湯調服。

【枸橘實】 採取 以陳者入藥。

性質 辛。溫。無毒。

主治 瘰癧。疔毒。及疝氣。解酒毒。

胃脘結痛。煨存性酒服。內傷諸痛。以醋浸熱膏貼之。

參攷資料 ① 枸橘實功能破氣散熱。(趙學敏) ② 枸橘實之小實。可以僞充枳實及青橘皮。不可不辨。(李時珍)

【枸橘樹皮】 主治 中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服。半升。酒盡再作。

【枸櫞子】即枸杞子之古籍別名。典見爾雅。詳「枸杞子」條。

【枸櫞】即香櫞之原名。詳「香櫞」條。

【栲】即櫟之小而叢生者。典見綱目。詳「櫟」條。

【栲櫟】即白朮之古籍別名。典見綱目。詳「白朮」條。

【栲】即栲之原名。詳「栲」條。

【栲蒂】即栲蒂之原名。詳「栲蒂」條。

【栲錢】即栲蒂之別名。詳「栲蒂」條。

【披子】 原名 披子。

外國名詞 Torreya nucifera, S. et Z. (拉丁) カヤ

基本 係松柏科榧屬。爲披之子實。

(日本)

基本 係松柏科榧屬。爲披之子實。

形態 披爲果類榧類之一種。即榧之木理粗而色赤。其實稍肥。大則而不尖者。可供藥用。

性質 甘。溫。有毒。

主治 腹中邪。去三蟲。蛇螫毒。鬼疰伏尸。

參攷資料 榧實披子。治療相同。當爲一物無疑。但本經披子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲。蕪。汪穎以粗榧爲披子。但終是一類。不甚相遠也。(李時珍)

【披子】即榧實圓而不尖者之古籍別名。典見本經。詳「榧實」條。

【柏子仁】即側柏子仁之簡稱。

【柏枝節】 主治 煮汁釀酒。去油。療癩疥及蟲癩良。

【柏油】即側柏油之簡稱。

【柏脈根】即百脈根之古籍別名。典見唐本草。詳「百脈根」條。

【柏根白皮】 性質 苦。平。無毒。

主治 火灼爛瘡。長毛髮。

九畫 柏 柑 染 柔 柘

八四〇

【柏葉汁】即柏葉之處方用名。詳『柏葉』條。

【柏葉酒】製法 用東向側柏葉。煮汁。同麴米釀酒飲。

主治 風痺。歷節作痛。

【柏實】即柏子仁之原名。詳『柏子仁』條。

主治 身面疣目。同松脂研勻塗之。數夕自失。

【柏瘻】命名 本品即柏樹上所生之瘻塊。狀如瘡。故名。

主治 胃痛。

參攷資料 柏性西指。其秋金之氣。故能平胃土而治痛。乃取其氣相攝服耳。(綱目拾遺)

【柑】命名 本品經霜後。味甚甜。故名。

古籍別名 木奴。饒頭柑。(綱目) 瑞皇奴。海紅柑。(綱目) 乳柑。

外國名詞 Citrus Nobilis, Yau (拉丁) カン (日本)

基本 係芸香科柑屬。為柑之果實。其實皮質核葉詳見各條。

產地 出閩浙諸地。尤以浙之溫州最著名。

形態 柑為果類之常綠喬木。高丈餘。葉長卵形。互生。葉柄之上端有節。初夏開花。花有柄。五瓣。白色。花後結實為漿果。扁圓。至冬成熟。外皮黃赤。有特殊之香氣。皮緊細。紋不易剝。多液。甘香沁齒。其果肉可供藥用。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 利腸胃中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。

參攷資料 多食令人肺冷。生痰。脾冷。發痲癩。大腸瀉利。發陰汗。(馬志) 柑。南方果也。而閩廣溫台蘇撫荊州為盛。川蜀雖有。不及之。其樹無異於橘。但刺少耳。柑皮比橘色黃而稍厚。理稍粗而味不苦。橘可久留。柑易腐敗。柑樹畏冰雪。橘樹略可。此柑橘之異也。柑橘皮今人多混用。不可不辨。詳見橘下。按韓彥植橘譜云。乳柑出溫州諸邑。惟泥山者為最。以其味似乳酪故名。彼人呼為真柑。似以他柑為假矣。其木婆娑。其葉纖長。其花香韻。其實圓正。府理如澤蠟。其

大六七寸。其皮薄而味珍。服不黏。食不留滓。一顆僅二三核。亦有全無者。擘之香芬。噴人為柑中絕品也。生枝柑形不圓。色青。膚粗。味帶微酸。留之枝間。可耐久也。俟味變甘。乃帶葉折。故名。海紅柑。樹小而顆極大。有圍及尺者。皮厚色紅。可久藏。今獅頭柑亦是其類也。洞庭柑。種出洞庭山。皮細味美。其熟最早也。甜柑。類洞庭而大。每顆必八瓣。不待籍而黃也。木柑。類洞庭。膚粗。顆大而少液。故謂之木也。朱柑。類洞庭而大。色絕嬌紅。其味酸。人不重之。饒頭柑。近蒂起如殼。頭尖。味甜美也。(李時珍)

【柑實皮】性質 辛。甘。寒。無毒。主治 產後肌浮。為末酒服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論柑實皮曰。下氣調中。

【宋】大明諸家本草論柑實皮曰。解酒毒及酒渴。去白焙研末。點湯入鹽飲之。【明】李時珍本草綱目論柑實皮曰。傷寒飲食勞復者。濃煎汁服。

參攷資料 橘皮苦辛溫。柑

皮辛甘寒。外形雖似。而氣味不同。(李時珍) 柑皮多食令人肺燥。(孟詵)

【柑實核】主治 作塗而藥。

【柑樹葉】主治 聾耳流水。或膿血。取嫩頭七箇。入水數滴。杵取汁。滴之愈。(蘭氏) 【染指甲草子】即鳳仙子之別名。與見救荒本草。詳『鳳仙子』條。 【染菽】即南天燭之古籍別名。與見登真隱訣。詳『南天燭』條。 【染緋草】即茜草根之古籍別名。與見對本草。詳『茜草根』條。 【柔骨】即烏鬪骨之古籍別名。與見和漢藥考。詳『烏鬪骨』條。 【柔黃雄】即雄黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【柘木】產地 生山野間。形態 柘為常綠灌木。其幹疏直。木裏有紋。葉厚而尖。積硬於葉。亦可倒置。實如桑椹而圓。其木白皮。與根皮俱可供藥用。採取 根皮以東行根上者良。性質 甘。溫。無毒。主治 婦人崩中血結。瘧疾。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論柘木曰。黃汁醱酒服。主風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷。夢與人交接洩精者。

參攷資料 柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴耳聾一二十年者。有柘根酒。用柘根二十斤。薑蕪五斗。各以水一石。麥取汁五斗。故鐵二十斤。煨赤。以水五斗浸取清。合水一石五斗。用米二石。麴二斗。如常釀酒成。用真磁石三斤爲末。浸酒中三宿。日夜飲之。取小醉而眠。聞人聲乃止。(李時珍)

【柘耳】 古籍別名 柘黃。(綱目)

外國名詞 Hirnecola polytricha, Fr. Schroet. (拉丁) キクラケ(日本)

基本 本品係真正擔子菌類。爲柘樹上之菌耳。

主治 肺癰咳唾膿血。腥臭不問。膿成未成。用一兩研末。同百齒霜二錢。糊丸。梧子大。米飲下三十丸。效甚捷。

【柘花】 卽山攀之古籍別名。典見綱目。詳『山攀』條。

九疊 柘 柚 柘 柘

【柘根酒】 基本 本品以柘根黃汁和麴釀成之酒。主治 耳聾。勞損虛羸腰腎冷。夢遺。

【柘黃】 卽柘耳之古籍別名。典見綱目。詳『柘耳』條。

【柘蠶屎】 基本 本品爲生於柘樹蠶蟲之糞。主治 破血。

【柚】 命名 柚色油然。其狀如前故名。古籍別名 壺柑。(唐本草) 檮條。(爾雅) 臭橙。(食性) 朱綱。蜜箱。香瓣。檮。檮。臭柚。沙田柚。文且(綱目)

外國名詞 Citrus Medica, L. Var. acida, Hook. (拉丁) コス モチコス(日本)

基本 係芸香科柑屬。爲柚之果實。其花。葉。實。皮。詳見各條。

產地 出園廣諸地。形態 柚爲果類之常綠喬木。與柑相似。高丈餘。枝有刺。葉作長卵形。互生。葉柄有翼。上端生節。初夏開花。花五瓣。白色。實爲漿果。扁圓形。徑四五寸。大如兒拳。熟則鮮



柚

黃色。外皮具特殊之香氣。皮厚。不易剝。其果肉可供藥用。

性質 酸。寒。無毒。主治 消食。解酒毒。治飲酒人口氣。去腸胃中惡氣。療疔瘡。不思食。口淡。

參攷資料 柚樹葉皆似橙。其實有大小二種。小者如柑如橙。大者如瓜如升。有圍及尺餘者。亦橙之類也。今人呼爲朱綱。形色圓正。都類柑橙。但皮厚而粗。其味甘。其氣臭。其瓣堅而酸。不可食。其花甚香。南人種其核。長成以接柑橘。云甚良也。蓋橙乃橘屬。故其皮黧厚而香。味苦而辛。柚乃柑屬。故其皮粗厚而臭。味甘而辛。如此分柚與橙。橘自明矣。郭璞云。檮大柚也。實大如護。皮厚二三寸。子似枳。食之少味。范成大云。廣南臭柚。大如瓜。可食。其皮甚厚。築墨打碎。可代麩刷。且不損紙也。列子云。吳越之

間。有木焉。其名爲檮。樹而冬青。實丹而味酸。食其皮汁。已憤厥之疾。渡淮而北。化而爲枳。此言地氣之不同如此。(李時珍)

【柚實皮】 外國名詞 Citrus Corok(英) 性質 甘。辛。平。無毒。主治 下氣。宜食。不入藥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論柚實皮曰。消食快腸。化痰。散積滯之氣。

【柚樹花】 主治 蒸麻油作香澤面脂。長髮潤燥。

【柚樹葉】 主治 頭風痛。同葱白搗貼太陽穴。

【柘冬】 卽續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【柘】 卽樹之日本別名。詳『樹』條。

【柘子】 卽標實子之古籍別名。典見綱目。詳『標實子』條。

【柘木】 古籍別名 擊子木。(綱目)

外國名詞 Myroxylon racemosum, O. Kuntze. (拉丁) クストイゲ(日本)

九靈 柞 查 柯 柰 柳

基本 係柞科柞木屬。爲柞木之皮。其葉、枝詳見各條。

產地 生山野間。

形態 柞木爲灌木類之常綠木本。高六七尺。大者高丈餘。莖常有銳針。葉爲常綠之革質。呈卵形。小而光滑。緣邊有鋸齒。凌冬不凋。八月頃。葉腋着短總狀花序。綴小花。呈黃白色。花後結球狀漿果。其木皮可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 黃疸病。燒末水服方寸匕。日三。

【柞木枝】

主治 催生。

【柞木葉】

主治 腫毒癰疽。

【柞】即柞木之古籍別名。典見綱目。詳「柞木」條。

【查克木】

產地 出西域推河。及塞外諸地。

形態 查克木爲灌木類之一種。叢生。樹高五尺許。無皮。枝幹青

翠可愛。葉似三春之柳。細如絲而不垂。性耐霜雪。經冬不凋。伐取爲薪。着火即燃。形似炭。有紅焰而無烟。置徑寸於爐中。可歷一二日乃燼。惟因生於瀚海砂磧之地。地質鬆而不堅。根莖易朽。故遇大風。根株輒被拔起。其木可供藥用。

主治 難產。臨得時。握其木則易生。心痛。燒灰服之。

古籍別名 木奴。(綱目)

【柯樹】

外國名詞 *Pasania Cuspi-*
dasa, Ocote. (拉丁) *ミヒノキ*
シヒガシ(日本)

基本 係殼斗科。柯樹屬。藥用柯樹之白皮。

產地 出廣南山谷中。

形態 柯樹爲喬木類之常綠木本。高三四丈。葉長橢圓形而厚。有粗鋸齒。下面灰褐色。夏月開花。花單性。雌雄同株。作穗狀花序。稍向上。實爲堅果。橢圓形。殼斗如囊狀。初包果實。熟則裂而實出。可食。其樹皮可供染料與藥用。

性質 辛。平。有小毒。

主治 大腹水病。採皮煮汁。去

澤煎令可丸。如梧子大。平旦空心飲下三丸。須臾又一丸。氣水並從小便出也。

【柯子】即謂子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「訶子」條。即樅實之別名。

【柰】即蘋果之原名。詳「蘋果」條。

【柰杏】即杏之一種。實色青而帶黃者。詳「杏仁」條。

【柰何草】即白頭翁之古籍別名。典見別錄。詳「白頭翁」條。

【柰花】即茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳「茉莉花」條。

【柰桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「山櫻桃」條。

【柳】命名 本品枝弱而垂流。故名。

古籍別名 小楊。楊柳。(綱目) 尼俱律陀木。(衍義)

外國名詞 *Salix babylon-*
ica. (拉丁) *シダンヤナギ*
ヤナギ(日本)

基本 係楊柳科楊柳屬。

形態 柳爲喬木類之落葉木本。高三四丈。枝細長而下垂。葉披

八四二

針形如線狀。有鋸齒。互生。春月先葉開花。花紫色。單性。排列成穗狀花序。花中結黑細子。實熟則花萼落而絮出。白如絨。飛散如雪。其花絮。蘆實。膠枝。及根皮。俱可供藥用。詳見各該條。



柳

【柳耳】命名 本品爲木耳之生於柳樹上者。故名。

主治 補胃理氣。

【柳枝及根白皮】性質 苦。寒。無毒。

主治 痰熱淋疾。可爲浴湯。洗風腫。苦。寒。酒漱齒痛。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論柳枝及根白皮曰。小兒一日五日寒熱煎枝浴之。【明】李時珍本草綱目論柳枝及根白皮曰。煎服治黃疸。白濁。酒煮熨諸痛腫。去風。止痛消腫。

參攷資料 柳枝皮及根亦入藥。葛洪肘後方。治癰疽腫毒新

乳等多用之。韋宙獨行方。主下疳及反花瘡。並煎柳枝葉作膏塗之。今人作浴湯。齊藥。牙齒藥。亦用其枝。為最要之藥。(蘇頌)○柳枝去風消腫止痛。其嫩枝削為牙籤。滋齒甚妙。(李時珍)

【柳花】

採取 以未開放時採

性質 苦寒。無毒。

主治 風水黃疸。面熱黑。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論柳花曰。止血治瘰癧。四肢掣急。膝痛。

【柳屑】

基本 本品為空心柳樹中之細屑。

主治 腳氣腿腫。

用法 柳屑篩細炒熟。用臭泔水浸溼。再炒。加麴少許。拌勻。趁熱俾息。俟有水出。再炒。俾如是數次即愈。

【柳桂】 卽桂之產於廣西蒼梧柳州府境者。性質功用與桂枝同。參見【桂枝】條。

【柳寄生】

命名 本品為寄生在柳樹上者。故名。

性質 苦平。無毒。

九畫 柳

主治 腦氣刺痛。搗汁服。

【柳絮】

命名 本品為柳花之隨風飛散。狀如絮者。故名。

性質 苦寒。無毒。

主治 疔疥惡瘡。金瘡止血。

【柳絮礬】

命名 本品為礬石之輕白如柳絮者。故名。

性質 酸寒。無毒。

主治 消痰止咳。潤心肝。

【柳椹】

命名 本品卽柳蕊未放時其枝下垂。狀似椹形。故名。

性質 苦寒。無毒。

主治 明目驅風。壯筋骨。堅齒牙。

參攷資料 ①嶠嶠神書。有柳椹牢牙法。以柳椹揩牙。去其宜露。諸風不生。明目。駐顏。黑髮。聰耳。并壯筋力。益壽。輕身。(綱目拾遺) ②柳椹陰乾。為末。日用擦牙。去風明目。烏髮固齒。久用不徹。可咀金石。(急救方)

【柳葉】

性質 苦寒。無毒。主治 惡疥。癩瘡。馬疥。

煎麥洗之。立愈。又療心腹內血止痛。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論柳葉曰。煎水洗漆瘡。【宋】日華諸家本草論柳葉曰。天行熱病。傳尸骨蒸。勞下水氣。煎膏積筋骨。長肉止痛。主服金石。入發大熱。悶湯火瘡毒。入腹熱。悶及下疳。【明】李時珍本草綱目論柳葉曰。療白濁。解丹毒。

【柳葉菜】

基本 本品屬柳葉菜科。

形態 柳葉菜為水邊自生之多年生草。高一二尺。葉作卵圓形。類柳葉而對生。邊緣有鋸齒。缺葉柄。初呈綠色。至夏秋。則變紫紅色。故或呼紅花。夏月。於莖梢葉腋。開大二分許之淡紅色四瓣花。下生長子房。萼亦四片。花後結蒴果。長寸餘。四裂。綻出種子。種子頂部有長毛。故能隨風飛散。 國外學說 荷蘭藥鏡柳葉菜條下。載有各種效能如左。莖葉花根皆可用。為緩性收瀉藥。治經久下利。赤痢。下血。婦人月經過多等。虛弱之症尤有效。掩滯下利。先投

以萬劑。持淨胃腸污液。乃用此藥為末。一錢或錢餘。日服兩次。虛症下利。赤痢。試用此末。十九皆效。大抵初服下劑。後用此末。一錢或四錢。朝夕服。其病未久。或胃腸虛弱之症。大抵三四日即治。經久頑滯。諸藥皆不能見效之症。三週中即治。或驅除病毒。或因胃腸虛弱。下利。荏苒不愈症。此藥皆適用。或云。久延之下利。赤痢。用此草根煎湯。或用莖葉。花。為末服之。皆有效。或云。此藥用於痢疾有效。勝於他種。緩和劑。為末。每一小時或一時半服一錢。或煎服。或云。此藥雖能治險重虛瀉下利。但多惡液質及膿狀敗液者。則忌用。惟乾葉收瀉之性。微用之。無妨。痢疾用之。亦無閉滯之害。用於癆瘵。血液溶崩。下利。能使其脫泄靜止。寬解其呼吸。塞難苦悶等。外敷愈創止血。消散嫩腫。

【柳實】

性質 苦寒。無毒。主治 療潰癰。逐膿血。取汁止渴。

【柳膠】

主治 療惡瘡。及結砂子。

九 薑 柳 柴

【柳麥】即水荵之日本別名。詳『水麥』條。

【柳葦】 命名 本品乃柳樹上之葦故名。

主治 心痛煎服之。

【柳蕊】 性質 苦寒無毒。主治 驅風明目聰耳。

烏髮駐顏。堅齒。

【柳蠹蟲】 基本 本品係蠹蟲之生於柳木中者。

形態 柳蠹蟲為化生蟲類之一種。內外潔白。至春夏間。遂化為天牛。其蠶之幼蟲可供藥用。

性質 甘辛平。有小毒。

主治 瘀血。腰脊澀痛。心腹血痛。風疹風毒。目中府翳。功同桑蠶。

【柳蠹蟲糞】 主治 腸風下瀉。耳腫。齒齲風毒。血產後下痢口瘡。

原名 莖胡。

【柴胡】 命名 本品嫩則可茹。老則採而為柴故名。

處方用名 賴柴胡。嫩柴胡。紅柴胡。淨柴胡。北柴胡。竹葉柴胡。四

川柴胡。鱉血柴胡。

古稱別名 地蕪(本經)芸薹。(別錄)山菜。茹草(吳普)南柴胡。萎陵菜(和漢藥考)

外國名詞 *Dupleurum fol.* *castrum, L. (拉丁)*

基本 屬繖形科。為柴胡之根與莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柴胡產湖北襄陽。鄖陽各屬。荆紫關。馬山口等為上。其次則河南禹州府。南陽府。冬季出新。直隸各屬亦有出。三伏後收成。又曰賴柴胡。產安徽者。廣西亦有出。

形態 委陵菜屬薔薇科。一名河原柴胡。為多年生草本。自生於河原之沙地。莖高尺許。葉為羽狀複葉。其小葉亦分裂為羽狀。裏面白色。彼此互生。夏秋之候。自葉腋抽出花梗。於此開黃色五瓣之小花。其狀頗似蛇莓。北柴胡一名非蕪柴胡。又稱竹葉柴胡。屬繖形科。亦多年生草本。自生原野間。莖高二三尺。葉互生。為長橢圓或披針形。末端尖銳。全緣。葉脈縱貫。夏日葉腋生枝。開黃色小花。連枝而為複繖形之花序。南柴胡亦

屬繖形科之植物。為山野自生之多年生草本。莖高三五尺。葉互生。作長橢圓或披針形。或細長作倒卵圓形。末端尖銳。無葉柄。脚部抱莖而生。花生於葉腋之枝頭。夏日開小黃花。綴而為複繖花序。殊美麗可觀。

種類 我國產之見於本草者。為委陵菜。北柴胡。南柴胡三種。採其根供藥用。然在唐宋以前。尚以河原柴胡作此胡用。或且與前胡相混。唐宋以後。始用南柴胡與北柴胡。日本產之北柴胡。即鎌倉柴胡。稱為佳品。河原柴胡之生於沙地者。其根直如牛蒡。粗於鼠尾。外現紫赤色。生於原野者。視前尤為肥大。鎌倉柴胡之根。長二三寸。大者可六七寸。亦直而不曲。色紅黃。有時作暗色。嫩根柔如鼠尾。老則大而攢腫。多疣贅。河原柴胡。證類本草曰。引名醫別錄云。柴胡一名芸蒿。(他書又有山芹。山菜。地蕪等之別名)辛香可食。生洪農川谷。二八月採根曬乾。又集註本草云。今出近道。狀如前胡。而強。博物志云。芸蒿葉似邪蒿。春秋有白

蕪。長四五寸。香美可食。長安及河內並有之。此花胡療傷寒第一用。救荒本草曰。委陵菜生田野中。苗初搗地。生後分莖。又莖節稠密。上有白毛。葉彷彿類柏葉。而極闊大。邊如鋸齒形。面背皆白。又似雞腿兒。葉而窄。又類鹿藿葉。亦窄。莖葉梢間。開五瓣花。其葉味苦。微辣。本草綱目曰。其苗如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解語云。芸。蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。故蘇恭以為非柴胡。和漢三才圖會曰。河原柴胡。根長四五寸許。紫赤色者為上。純紫者次之。白者為下。本草綱目啓蒙曰。河原柴胡。葉似蘿蔔葉。背有白毛。仲夏開五出之黃花。根枯黑色。藥舖去粗皮。乾而貨之。鎌倉柴胡。證類本草曰。引關經本草云。柴胡今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者為勝。二月生苗。甚香。莖青紫。葉似竹葉稍緊。亦有似麥門冬而短者。七月開黃花。生丹州。結青子。與他處者不類。根赤色。似前胡而強。莖頭有赤毛。如鼠尾。獨窠長者佳。本草綱目曰。北地所

產者似前胡而轉。今人謂之北柴胡是也。入藥良。其苗有如韭葉者。有如竹葉者。以竹葉者爲勝。和漢三才圖會曰。按柴胡有河原。錄倉二種。以錄倉柴胡爲上。中國亦遠道求之。錄倉柴胡根短。長者二三寸。色淡紅。本相州之產。今則武陽者良。日向薩摩。屢後次之。本草綱目啓蒙曰。錄倉柴胡。眞品也。集解所謂竹葉韭葉者是。春日掘地。叢生。其葉細長。謂之韭葉。及後葉短。謂之竹葉。非二物也。炮炙全書云。然。但今日指一種。閩業者呼爲竹葉柴胡。尋常者則呼爲韭葉柴胡。業肆所稱之錄倉柴胡。多攙雜偽物。不堪使用。轉以草稱柴胡者爲佳。其葉似麥門冬。短而多縱條。亦有稍圓似竹葉者。莖間俱有紫膜。至秋長二三尺。葉互生。形漸短小。葉間歧生分枝。開小黃花。攢簇若芹花。其形則似茴香花。實亦似茴香而小。極易生。中國來者形如防風。莖頭有毛。今此種少矣。以單莖細長無澁味者爲眞。藥舖所稱爲三島柴胡者。卽單莖也。多入藥用。南柴胡。本草綱目曰。北柴胡根

九 薑 柴

如前胡而轉。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。強硬不堪使用。本草綱目啓蒙曰。城州白川山。有一種大葉者。其葉如紫萼葉。長尺餘。闊二三寸。至秋擡出粗莖。高六七尺。枝末開花。花實亦相同。但微大耳。集解所謂南柴胡是也。爲最下品。今藥舖所稱錄倉柴胡。係出自薩州肥後。數蘆連生。有澁味。是實南柴胡根。

採取 二月八月。採根曝乾。

製法 雷斅曰。凡使柴胡。採得去鬚及頭。用銀刀削去赤薄皮。少許。以粗布拭淨。到用。勿令犯火。立便無效也。

性質 苦。平。無毒。

效能 疎肝開鬱。和解表裏。用作升陽解熱藥。又爲瘧之特效藥。

主治 心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身明目。益精（本經）除傷寒心下煩熱。諸痰熱結實。胸中邪氣。五臟間遊氣。大腸停積。水脹及溼痺拘攣。亦可作浴湯（別錄）。

張仲景之發明 主治胸脇苦滿。旁治寒熱往來。腹中痛。脇下痞

鞭。小柴胡湯證曰。胸脇苦滿。往來寒熱。又云。腹中痛。又云。脇下痞鞭。柴胡加芒消湯證曰。胸脇滿。柴胡去半夏加瓜蒌湯證不具（柴胡去半夏加瓜蒌湯。其證不具也。以渴。故代半夏以瓜蒌也。今試諸世所謂瘧疾。胸脇苦滿而渴者。甚有效焉。其証有胸脇苦滿證。則終不知也。然則胸脇苦滿證。其脫也明矣。）柴胡豨莶湯證曰。胸脇滿。微結。又云。往來寒熱。大柴胡湯證曰。心下急。鬱鬱微煩。又曰。往來寒熱。又曰。心下滿痛。以上五方。柴胡皆八兩。柴胡桂枝湯證曰。心下支結。（以上一方。柴胡四兩而八兩之例。）右歷觀此諸方。柴胡主治胸脇苦滿也。其他治往來寒熱。或腹中痛。或嘔吐。或小便不利。此一方之所主治。而非一味之所主治也。爲則按傷寒論中寒熱。腹痛。嘔吐。小便不利。而不用柴胡者多矣。胸脇苦滿而有前證。則柴胡主焉。此可以見柴胡之所主治也。

歷代記載攷圖 【唐】甄權藥性本草論柴胡曰。治熱勞。骨節煩疼。熱氣。肩背疼痛。勞之羸瘦。下氣

消食。宣暢氣血。主時疾。內外熱不解。單服之良。【宋】大明諸家本草論柴胡曰。補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止咳。潤心肺。添精髓。健忘。【金】張元素珍珠囊論柴胡曰。除虛勞。散肌熱。去早晨潮熱。寒熱往來。胎前產後。後諸熱。心下痞。胸脇痛。【明】李時珍本草綱目論柴胡曰。治腸氣下陷。平肝膽。三焦包絡相火。及頭痛眩暈。目昏赤痛。障翳。耳聾。諸瘧。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。【明】繆希雍本草經疏論柴胡曰。柴胡味苦平。微寒而無毒。爲少陽經表藥。主心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。除傷寒心下煩熱者。足少陽膽也。膽爲清淨之府。無出無入。不可汗。不可吐。不可下。其經在中表半裏。故法從和解。小柴胡湯之屬是也。其性升而散。屬陽。故能達表散邪也。邪結則心下煩熱。邪散則煩熱自解。陽氣下陷。則爲飲食積聚。陽升則清氣上行。脾胃之氣行陽道。則飲食積聚自消散矣。諸痰熱結實。胸中邪逆。五

八 四 五

九薑 柴

賤間遊氣者。少陽實熱之邪所生。病也。柴胡苦平而微寒。能除熱散結而解表。故能愈以上諸病。大腸停積。水脹。及溼痺拘攣者。柴胡為風藥。風能勝溼故也。【清】黃宮繡本草求真論柴胡曰。柴胡味苦微辛。氣平微寒。據書載治傷寒熱傳足少陽。隨緣為清淨之府。無出無入。邪入是經。正在表裏之界。汗吐與下當禁。惟宜和解。故仲景之治傷寒。邪入少陽。而見寒熱往來。脇痛耳聾。婦人熱入血室。用之以瀉其邪。胎前產後。小兒痘疹五疳。羸熱諸病。並癰疽瘡毒。咸宜用之。若病在大陽。用之太早。猶引賊入門。病則陰經用之。則重傷其表。必得邪至少陽。而藥始可用矣。至云能治五癆。必其諸臟諸腑。其癆挾有實熱者。暫可用此解散。真虛而挾實熱。亦當酌其所宜。雖引清陽之氣。左旋上行。然升中有散。若無歸者同投。其散滋甚。虛熱不可寒。血衰火毒者不可燥。豈容誤哉。兼之性滑善通。凡渣泄大便者。當善用之。熱結不通者。當佐當歸黃芩以投。差無誤耳。是以陰虛火炎。骨

蒸勞熱。腎虛泄瀉。書載不應服解。散宜北柴。胡虛熱宜海陽。藥柴胡為良。酒炒用。如元氣下脫。虛火上炎。以及陰虛發熱等類。非可妄投矣。【清】鄒澍本經疏證論柴胡曰。劉涓子云。經曰。五臟者。藏精氣而不瀉。六腑者。傳化物而不藏。又曰。臟隨骨。腑隨女子胞。此六者。地氣之所生也。皆藏於陰而象於地。故藏而不瀉。是臟雖為腑。實不與胃大小腸三焦膀胱同為天氣之所生。傳化物而不藏矣。居陽之位。稟陰之體。是以為陽之少倡。率五臟根陰達陽。然五腑達陽。其用在瀉。膽達陽。其用在不瀉。恰象春生之氣。首暢萬化。奮決而出。出乎陽未離乎陰。是以為中表半裏也。柴胡於仲冬根生白莖。於仲春生苗。於仲夏極茂。於仲秋成實。隨陽氣始生而萌。至陰氣既平而萎。其香徹霄。其質柔輭。全有合乎少陽之義。此所以為中表半裏和解之劑。能助陽行上升生發之氣。為十一臟所取決矣。然則柴胡既以升陽為用。將無與於此陰之病歟。曰。陰陽分於動靜。靜中有動。動中有靜。柴

胡於仲冬根生白莖。是靜中有動也。識此義。則所云能達陰中之陽者。何止舉陽之透陰而出哉。即舉陰之包陽而藏者。悉皆托出矣。必陽上徹而陰未盡。須臾與離。用此升舉。乃為無弊。蓋柴胡非徒暢陽。實能舉陰。非徒能暢陽以化滯。竝能俾陽唱陰隨。是以心腹腸胃之間。無結不解。無陳不新。譬之春氣一轉。萬化改觀。自有不期然而然者矣。夫然。則六氣因鬱而升降之機阻者。將可竝用柴胡以轉其樞乎。夫肝膽陽升。陰即隨之者。以脾胃之陰原至於肺也。肺為陽中少陰。三陰之氣。至於陽中之陰。自降。陽亦隨之降矣。蓋下之陰裕。必藉陽之先導。以為上際。上之陽裕。亦必資陰之先導。以為下蟠。故三陰之經脈上行。三陽之經脈下行。固有為之先導者而得通也。其或升降不前。如有窒之者。宜細參其陰陽之虛實。以為主治矣。當導陽而下者。必陽實陰虛者也。當導陰而上者。必陰實陽虛者也。如下之陰不足。以納陽。上之陽不足。以化陰。則升降之原已戾。可期其升

八四六

降相因。推移氣化乎。即是思之。則柴胡為用。必陰氣不舒。致陽氣不達者。乃為恰對。若陰氣已虛者。陽方無依。而欲越更用升陽。是速其斃耳。可乎。故凡元氣下脫。虛火上炎。及陰虛發熱。不因血凝氣阻。為寒熱者。近此正如曉鳩矣。仲景著小柴胡湯之效曰。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濼然而汗出。解。以是知柴胡證。皆由於上焦不通。上焦不通。則氣阻。氣阻則飲停。飲停則生火。火炎則嘔吐。半夏生薑能止吐。錫飲。然不能散熱。黃芩能散熱。然不能通上焦。能通上焦者。其惟柴胡乎。故往來寒熱。為小柴胡主證。而往來寒熱。悉本於上焦不通。蓋惟痰凝氣滯。升降之機始阻。當升不升。則陽怫怒為熱。當降不降。則陰鷙張為寒。治其阻者。固不可無。而伐樹尋根。終必求其致阻之因。以拔其本。則謂非柴胡之力不可也。雖然。柴胡證仍有不往來寒熱者。何居。柯韻伯曰。柴胡為樞機之劑。凡風寒不全在表。未全入裏者。皆可用。夫傷寒則嘔逆。中風則乾嘔。凡傷寒中風。無不黃桂

枝證。但見喜嘔一證。則雖發熱者。便可用柴胡湯。不必具往來寒熱也。發熱而嘔。則人瀝當去。桂枝亦非所宜矣。其目赤耳聾。胸滿而煩者。去蒼夏。加栝樓實。絳弦細頭痛發熱者。去人瀝。加桂。故曰證不必悉具。方亦送無定品也。愚按嘔固是上焦不通。特仍有不往來寒熱。不用柴胡湯者。亦終有上焦不通形象。為掉。如心下滿。脇下滿。胸脇滿。脇下硬滿。心下支結。胸脇滿。微結。心下急。鬱鬱微煩是也。乃仍有非上焦不通而用柴胡。如陽絳。瀉。陰絳。弦。腹中急痛。之用小柴胡。少陰病四逆。或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或洩利下重。之用四逆散。則又當揣其義者。夫柴胡之通上焦。似乎主降。不知其所以降。實係升之之力。蓋肺不得肝膽之陽上轉。則無以復陰下歸。復其升降之常。陽絳瀉。陰絳弦。腹中急痛。是陽鬱陰中。陰為陽累。既用小建中湯調其肝。不愈。勢必舉其陽。陰則隨之以轉。此小柴胡在所不得。不投矣。欬悸。小便不利。不降也。腹中痛。洩利下重。不升也。病同一源。

九 柴

或為不升。或為不降。亦可見其為中樞不旋。旋其中樞。舍柴胡其誰與歸。觀蠶甲煎丸。專預丸二方。知古人用意深遠。未容淺窺也。夫蠶甲煎丸。其意在攻堅。堅去而樞機不轉。則病邪與氣血相滯。必復結於他所為患。專預丸其意在補虛。虛復而樞機不轉。則新受之補。與宿存之病相搏。必轉結而為患。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘隨之。此其旨矣。兩方皆用桂枝。皆用柴胡。蓋太陽者。諸陽之長也。少陽者。陰陽之軸也。虛勞癥瘕。病深在內。雖無與於諸陽。然病氣深伏。不使從陽分消。以殺其勢。欲專精華力。蠶萃攻之。曠日持久。未見其成。猝為他氣所乘。以致敗者。蓋亦多矣。太陽實統營衛。營衛行於身。日夜共五十周。無間不入。無微不至。太陽既治營衛。經由病所。病必避而讓之。此其時豈不能稍稍帶去病根。積微成著。未見其必無功也。何況少陽能轉陰陽之樞機。使升降各得其所。不更能帶去病邪耶。兩者相較。欲補虛者。通營衛為長。欲攻堅者。轉樞機為要。故蠶

甲煎丸用柴胡。得君藥十分之五。桂枝得君藥四分之一。專預丸桂枝得君藥三分之一。柴胡得君藥六分之一也。五臟之間。為虛邪所鬱。因致血氣滯而不暢。則表裏之間。虛邪作熱。惟虛邪故四時皆有。之唯虛邪不若表邪之傳經更變。故可以一方隨時加減治之。柴胡為半表半裏和解之品。且能暢發少陽生生之氣。四時咸用焉。後人遺遺散等方。此其嚆矢也。蠶甲煎丸用柴胡小柴胡湯。治婦人熱入血室。必以為柴胡亦入血分矣。不知所謂血者。即前所云能為陽累之陰。柴胡仍為氣結用也。曰婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如癰狀。夫血去則熱隨血行。血止則熱與血結。結之久則為癥為瘕。其暫者亦不過適與相聚。原未根深抵固也。拔去其邪。熱與誰結。此仲景治病不異庖丁解牛。批卻導線。兩無所傷。不必泥於治血。血分之病。自無不愈矣。【清】賈九如辨癩指南論柴胡曰。柴胡性輕清。主升散。味微苦。主疏肝。若

多用二三錢。能祛散肌表。腐足少陽膽經藥。治寒熱往來。癩癧疾。除潮熱。若少用三四分。能升提下陷。佐補中益氣湯。提元氣而左旋。升達參芪。以補中氣。凡三焦膈熱。或偏頭風。或耳內生瘡。或潮熱膈痛。或兩脇刺痛。用柴胡清肝散。以疏肝膽之氣。諸症悉愈。凡肝痺血虛。骨蒸發熱。用逍遙散。以此同白芍。抑肝散火。恐柴胡性涼。製以酒拌。領入血分。以清抑鬱之氣。而血虛之熱自退。若真臟虧損。易於外感。復受邪熱。或陰虛勞怯。致身發熱者。以此佐滋陰降火湯。除熱其效。所謂內熱用黃芩。外熱用柴胡。為和解要劑。

國醫學說 日本猪子氏之和漢藥論云。柴胡者在泰西往時。亦供治療之用。然奏效不確實。故廢棄之。不知含有何等成分。其用量從來為解熱及利尿劑。用二〇至六〇。又一本堂藥選曰。凡選柴胡。以坊間呼鐵倉柴胡。狀如鼠尾。淡紅黃色。味苦者為佳。此非柴胡也。用時去蘆及鬚洗。剉細。又有稱河濱柴胡者。即本草之委陵

九壘 柴

柴。醫久慣用。不能改正。反之為辭。曰。此物亦能解熱。其實不然。皆文飾之詞耳。不用可也。更有來自中國之銀柴胡。此即李時珍所謂近時有一種根似桔梗。沙參。白色而大。市人以此偽充銀柴胡。殊無氣味。又杉頭柴胡。即白頭翁根。此二品亦勿用。按本草自陶弘景以下。諸說紛紜。且有銀柴胡。北柴胡。樸柴胡之別。由今視之。終難歸一。姑用錄倉柴胡為準的耳。又古方藥品考曰。柴胡有數品。稱錄倉者。形如鼠尾。皮結黑色。肉淡褐色。出陝州。日州。鳳州等處。稱三島者。形瘦小。皮結色。肉淡褐色。出豆州。陵州。遠州等處。並稱佳品。其餘南方諸州俱有之。形色亦各不同。大抵不拘根之大小。但氣味苦而發香。無油臭者。皆可用。其味辛有油臭者。不堪用。固有中國貨。形味如錄倉者。但較肥大。又有銀柴胡。根似沙參。色白。味淡甘。又有加波柴胡。根似柴胡。色紫黑。此委陵菜也。二種皆非真。藥舖販之。則有誤用者矣。其南柴胡及雞腿兒等。概非真品。特以根似柴胡。遂朱紫亂色耳。柴

胡秋生新苗。葉似覆麥。紫色。至春漸長如竹葉。秋枝數枝。發小黃花。結細子。入冬。莖葉俱枯。又用藥須知曰。柴胡。日本產亦可用。中國產多陳舊。其蛙蝕而性味已脫者。則不堪用。須剔去之。究以用錄倉者為勝。又大和本草曰。錄倉柴胡。與本草所記之形狀。及自中國來者。俱相同。故合用。向來用雞腿兒。即所謂河原柴胡者。其形狀性味均異。不可用。而用。可謂習而不察也。陋俗勿泥。望諸來者。來自中國之銀柴胡。視錄倉柴胡為大。又日本藥品考曰。日本產柴胡頗多。然今藥舖。俱以錄倉柴胡及三島柴胡兩種為真。錄倉為上。三島次之。若河原柴胡。乃救荒本草所收之委陵菜。實非柴胡類。然日本方中。往往用之。又手板發源曰。日本產以錄倉。三島等處野生者為佳。根白而柔。其出自房州者。根雖大。本品也。南柴胡根亦大。其品亦劣。薩州。日州海濱沙地所生者。根細長。色黑。乾則硬甚。此為中品。河原柴胡種類極多。有三葉者。有七葉者。三葉者名翻白草。七葉者名雞腿兒。別有一種大葉者。亦雞腿兒之類也。

別有一種大葉者。亦雞腿兒之類也。辨偽。曹炳章曰。柴胡之良窳。宜審慎辨明。如蘇浙通銷者。以江南古城產者為多。柴胡者。在地上。葉莖為柴。地下根蘆為胡。如古城產者。葉綠甚。而短。無梗。地下根皮紫黃色。肉淡黃色。形似紫草。尚佳。福建廈門銷行者。乃廬州府無會州白陽山所出。裝籃運出。梗略硬。或曰北柴胡。略次。山東本地不行。兩湖通銷者。為川柴胡。葉綠黃色。根黑黃色。性糯味淡。亦佳。他如湖北襄陽。出梗硬者為次。滁州。全椒。鳳陽。定遠。俱出。泥屏略多。尚可用。江南浦陽。有春產者無蘆。枯秋產者有蘆。枯亦次。關東出者如雞爪。更不道地。

能宜布使然。柴胡。其升之氣。能振舉其清陽。則大氣轉旋。而積滯自化。徐澗溪謂其能於頑土中疏理滯氣。蓋合於東方生發之木德。故能使土氣宜化。而扶助肝木。遂其暢茂條達之性。正是木能疏土之本旨。昔人每以柴胡為少陽藥者。亦以其既具春升性質。而又疏土達木。最合少陽生發之氣也。其治外邪寒熱之病。則必寒熱往來。邪氣已入於裏。不在肌表。非僅散表諸藥所能透達。則以柴胡之氣味輕清。芳香疏泄者。引而舉之。以祛邪。仍自表分而解。故柴胡亦為解表之藥。而與麻桂荊防等。專主肌表者有別。此則所謂柴胡為少陽專藥。而少陽之經。屬於半表半裏者也。仲景小柴胡一方。主治不一。而必以寒熱往來。胸脇苦滿。心煩喜嘔。或脇下痞硬而痛。或乾嘔。或往來寒熱。休息有時。如瘧等證。為柴胡證。蓋諸證皆少陽經症。亦皆肝膽之氣。鬱而不宣之證。則邪已不復在表。而亦未嘗及裏。既非表證。又非裏證。無以名之。乃名之為中表半裏。蓋病勢如此。乃

八四八

邪熱鬱結於半表半裏之間。非一半在表。又一半在裏之謂。至此而柴胡疏達肝膽之鬱。又能芳香透泄。可以驅邪達表而散。是為正當主治。然味者又因其可以達表。而遽認為發表之品。一見發熱。動輒亂投。是又大謬不然矣。且柴胡證之嚙逆。又胸痞痛諸症。固皆肝膽木邪。積滯為患。乃以柴胡之升騰疏泄者治之。既非鎮攝之品。何以能制剛木之橫。則以病由外來之邪所乘。肝膽之陽。遏抑不得宣布。失其條達之本性。因而攻動恣肆。柴胡能疏泄外邪。則邪氣解而肝膽之氣亦舒。木既暢茂。斯諸證自已。乃或又因此而謂柴胡能平肝膽之橫。凡遇木火上凌。如頭痛耳眩。眩暈嘔逆。脇肋腹痛等症。不辨是鬱非鬱。概投柴胡。愈以助其鳴。致是為致。致升木。則又落釐之差。千里之謬矣。且柴胡之治寒熱往來。本主外感之病也。故傷寒溫熱溼溫諸病。始則大寒大熱。已而寒熱間斷。發作有時。胸脇不舒。舌苔潤膩者。斯為邪在半表半裏。柴胡縱滿透表。固是專司。若乍病之時。

九 柴

忽寒忽熱。一日數作。則邪在氣分。尙是表病。柴胡亦非其治。若至病久氣虛。亦復寒熱來往。而脈見虛軟。舌色光滑。疑謂虛熱。又非邪盛之寒熱可比。則柴胡升舉。亦非所宜。惟必審知其為脾陽不振。中氣下陷。則東垣補中益氣之方。乃堪採用。然升柴升清。特其少少之輔佐品耳。至如瘧病之寒熱往來。既有不移時刻。又似仲景小柴胡成法。正為此證一定不易之主方。然在寒熱方盛之初。或多寒。或多熱。亦當分別見證。各為治療。並非用一味柴胡。便可自謂通治瘧病之秘鑰。惟必至寒熱發作雖定時。而日至日晏。則邪入漸深。乃為正氣不足。清陽下陷之候。所謂陽病漸入於陰。非柴胡升舉其清氣。不能提出陰分。還歸於表而病解。則柴胡乃是必不可少之藥。又瘧經既久。邪勢已衰。而正氣亦憊。是又所謂脾陽不振之候。亦必以柴胡升舉中氣。使其清陽敷布。而後寒熱可止。則須與補脾之藥並用。東垣之補中益氣湯方。最為合拍。是乃虛癘之宜於柴胡者。此外則雖是

往來之寒熱。而柴胡亦非必月之藥矣。乃歷觀古今議論。信之者必謂柴胡為瘧瘧之主藥。而畏之者。且謂瘧病必不當用柴胡。是皆一偏之見。徒以逞其辭鋒。肆其攻擊而已。吾未見其有當也。若專論脾氣不振。清陽下陷一證。是為脾虛之候。其源因於飢飽勞役。傷其脾胃之陽。因而氣息奄奄。精神疲憊。或能食而無氣以動。或不能食而倦輟異常。而又絕無別種見證。但面色萎黃。形神委頓。脈來濡弱而已。此惟察警之體。操勞耐苦。又服田力穡。任勞任餓。或受風雨寒冷。傷其脾氣者。乃有是證。則宜補養脾土。而少少升舉其下陷之清陽。投之輒效。東垣之升陽益氣等方。皆為此病而設。蓋東垣當時。值金之末世。大兵大疫。其人民流離顛沛。皆受飢飽勞役。寒風淅雨之傷。最多此種病證。所以一生事業。皆用升麻柴胡。幾如朝饔夕飧之不可一日而缺。而脾胃之論。尤其生平絕大著作。專為此證而設。是又應用柴胡之一端。而膏梁之體。及大邑通都之中。此證又百不得一。

則雖有此升清舉陷之妙法。又將苦於無所用之。乃或者又謂東垣佳方。無施不可。開口益氣。動手升柴。如薛立齋趨養葵翠。吾究不知其從何處覓得此許多對藥發病之人也。若夫富貴之家。晏安之輩。恒多虛證。則又嗜慾之害。下元之傷。同是虛也。而病證迥異。方且陰薄於下。陽浮於上。滋憤潛鎮之。不暇。又安得漫與升清。致令木已搖而速之立厥。乃或者又謂柴胡能通治虛勞發熱。不又荒謬之尤者乎。約而言之。柴胡主治。止有二層。一為邪實。則外邪之在半表半裏者。引而出之。便避於表。而外邪自散。一為正虛。則清氣之陷於陰分者。舉而升之。使返其宅。而中氣自振。此外則有肝絡不疏之症。在上為脇肋痞痛。在下為臍腹脹脹。實皆陽氣不宜。木失條達所致。於應用藥中。少入柴胡。以為佐使。而作嚮導。奏效甚捷。此則柴胡之真實功用。以外別無真義。凡古今各家之論。苟有不合此三層作用者。皆其立說之不無可議者也。(正論)柴胡稟春升之性。而以氣勝。故能

八四九

九畫 柴

宜通陽氣。祛散外邪。是去病之藥。非補虛之藥。在脾虛之病用之者。乃藉其升發之氣。振動清陽。提其下陷。以助脾土之轉輸。所以必與補脾之參芪朮並用。非即以柴胡補脾也。甄權藥性論謂治熱勞骨節煩疼。虛乏羸瘦。蓋亦指脾氣不振。清陽陷入陰分者言之。故下文更有宜揭氣血四字。明謂此是氣血不暢。用柴胡以振舉其清氣。則氣血自能宣暢。且可透泄其熱。斯為熱勞羸瘦之正治。初非謂勞瘵既成之後。血液耗竭。灼熱將枯。而亦以柴胡升散之也。乃後人不知辨別。竟誤以為勞瘵通治之良方。日華本草竟有補五勞七傷之句。以升陽散邪之藥而妄稱為補大錯歸成。實源於此。潔古因之。亦直以除虛勞三字為言。蓋至此而柴胡遂為虛勞之專主矣。亦知勞有五臟之分。虛亦有中下之異。而無不發內熱者。心脾之勞。陽氣鬱結。而為灼熱。以柴胡升舉而泄散其熱。宜也。若肝腎之勞。陰精耗燥。而為蒸熱。亦以柴胡拔本而發揚其熱。可乎。中虛之熱。為陽入於陰。以

柴胡提出陰分。是使之返歸本位。如人墜深淵。挈之登岸。是也。若下虛之熱。為陰出之陽。亦以柴胡舉之上升。是使之脫離根柢。如百穀麗土。拔之石上。可乎。況東南之人。體質多薄。陰液本虛。而在膏粱之家。又復多逸少勞。嗜慾不節。肝腎陰虛。十恒八九。而脾胃陽虛。十不一二。則治虛熱而不辨陰陽。浪用柴胡者。真殺人惟恐其不速矣。寇宗奭已謂柴胡治勞。誤世甚多。若無實熱。不死何待。張景岳亦謂柴胡善泄善散。大能走汗。大能泄氣。凡病陰虛水虧。而孤陽勞熱者。不可再損營氣。固未有散而不泄氣者。亦未有汗而不傷血者。陰既虛矣。又何可再損其陰云云。皆是剴切詳明之論。若王海藏之所謂產後血熱。必用柴胡。李漸湖之以治小兒五疳羸熱。則皆含渾言之。其流弊固不淺也。仲景小柴胡湯主治。以胸膈滿痛。心煩喜嘔。脇下痞滿。等為柴胡證。本為外感之邪。遏抑正氣。肝膽剛木。不得條達。故以柴胡疏散其邪。使肝膽之氣條暢。而諸證自安。前已明言之矣。乃後

者猶因此而誤認柴胡能統治肝病。遂於肝火凌厲之頭痛眩暈。耳鳴耳脹。目痛耳聾。脇痛臑脹等證。亦復以柴胡為必需之品。不知既無外感遏抑。則為木火自旺。法宜潛陽泄降為亟。而亦妄與宣散。適以張其烈燄。不至痛徹頂巔。脹塞胸膈不止。是又藉寇兵而資盜糧。治病反以增病。皆粗心讀書。如其一不知其二之弊。貌似神非。能無噴飯。然潔古亦止謂柴胡治心下痞。胸膈滿。瀕湖綱目且謂平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩暈目昏赤痛障翳。耳聾耳鳴。景岳亦謂治肝膽火炎。胸膈結痛。少陽頭痛。又皆因鬱吞積。最易有抱薪救火之禍。俗醫之不知辨別。實即諸先輩有以教之也。惟過諸般肝膽實火之證。能於潛攝抑降隊中。少加柴胡二三。分以通木氣。藉作嚮導。收效亦捷。(近人用醋炒柴胡。即為此等證治而設。)固不可漫不加察。而誤認肝家主將。無施不可也。仲景本論。熱入血室證。凡三條。而以小柴胡湯主治者。獨係於經水適斷之一條。此之適斷。蓋謂件事

八五〇

已淨。而自然停止。非以熱盛灼燥成瘀而中途中止。是其血室空虛。而邪熱因以陷入。故宜以柴胡提其下陷之熱邪。而大棗參甘補虛諸品。恰合分寸。(本論此節其血必結四字。必是經水適來兩條中之錯簡。不然豈有其血已結而不為攻破。反投以參朮補住其瘀之理。古今注家。望文生義。皆不可解也。)觀其經水適來兩條。一則曰胸膈下滿。如結胸狀。讎語者。此為熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。一則曰晝日明了。暮則讎語。如見鬼狀者。此為熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。必自愈。豈非以發熱之時。適值好事與夫既熱之後。婢事本不及期而熱過經行者。皆為血室熱盛之候。熱邪深入。其血為瘀。故宜刺肝之募穴期門。以瀉肝經實熱。并宜破血攻瘀。直疎下焦。因以無犯胃氣。及上二焦為戒。尋釋此經水適來兩條。皆為實證。則經水適斷一條。明是虛證。兩兩對勘。極為曉暢。而適斷者之主以柴胡參朮等藥。其旨尤顯。然則適來兩條之萬萬不能視同一例。而主

以柴胡湯者。亦可於言外得之。今人治熱入血室之晝日明了。暮則顯語。如見鬼狀者。恒用犀角地黃及桃仁承氣等涼血逐瘀之品。其效最捷。皆是熱暈經行。經水適來之症。治而如仲聖所謂適斷之熱入血室。宜於小柴胡之證。殊不多有。即有熱盛而經水適斷者。亦是熱邪蒸灼。察而不行之適斷。亦宜逐瘀。必不可徒讀父書。謬引小柴胡助藥為虐。陸九芝陽明病釋第二卷。於經水適來。暮則顯語。如見鬼狀一條。釋之曰。此言證語之來路有不同。熱入血室。亦能顯語。而病則不在胃家。即非承氣之證。故曰無犯胃氣。然則外證所引小品犀角地黃湯。正是對病之方矣。仲景於熱在血室。必曰無犯胃氣。則仲景於熱在胃氣。必曰無犯血室。可知。此余所以有犀角地黃之辨也。云云。可證九芝意中。於經水適來兩條。亦知為血療之實證。宜涼血逐瘀。而不宜於小柴胡湯。奈何。王海藏竟謂經水適來適斷。易老俱用小柴胡湯。加以四物湯。及秦艽丹皮等。為調經之劑。易老此

九畫 柴

法。非惟不辨虛實。且合用四物。尤其庸陋。更不可訓。李氏綱目亦謂柴胡治熱入血室。石頑逢原亦謂必用柴胡。而徐燈胎之傷寒類方。竟於如見鬼狀一條。補出治以小柴胡湯之說。尤為可駭。夫以徐氏之高明。而猶有此不辨虛實之謬。宜乎今人讀書。大非易事。願謂果以柴胡治經事適來之實熱證。勢必發熱在裏。陽氣上浮。不僅助其昏憤。可使發狂而踰垣上屋。亦可使其逆經倒行。變為吐衄。是不可不深長思也。

配合應用 ●補中益氣湯。治元氣勞傷精神倦怠。用參者。白朮炙甘草當歸。佐以柴胡升麻。引脾胃之氣行陽道。清暑益氣湯。上方去當歸。加茯苓猪苓澤瀉乾葛神類。

●治熱入血室。用柴胡入四物湯去當歸。加澤蘭益母草青蒿。

●柴胡同升麻乾葛等。能升陽散火。

●治暴赤眼。柴胡生地黃黃芩黃連甘草甘菊玄參連翹羌活荆芥。

●治傷寒餘熱。傷寒之後。邪入經絡。體復肌熱。推陳致新。解利傷寒時氣。伏暑倉卒。並治不論長幼。柴胡四兩。甘草一兩。每用二錢水一盞煎服。(許學士本草方)

●治小兒骨熱。十五歲以後。遺身如火。日漸黃瘦。盜汗咳嗽。煩渴。柴胡四兩。丹砂三兩。為末。獐猪膽汁拌和。飯上蒸熟。丸菘豆大。每服一丸。桃仁烏梅湯下。日三服。(聖濟總錄方)

●治虛勞發熱。柴胡人參等分。每服三錢。薑同水煎服。(濟察方)

●治濕熱黃疸。柴胡一兩。甘草二錢。半作一劑。以水一盞。白茅根一握。煎至七分。任意時時服。盡為止。(孫尚藥秘寶方)

●治眼目昏暗。柴胡六銖。決明子十八銖。治歸人乳汁和。傅目上。久則夜見五色。(千金方)

●治積熱下痢。柴胡黃芩等分。半酒半水。煎七分。浸冷。空心服之。(濟急方)

用量 五分至八分。

應用宜忌 凡陰虛於下。陽炎

於上者禁用。

配合宜忌 惡色。莢。畏女苑。惡蕪。惡火。半夏為之使。

著名方劑 ●小柴胡湯。治少陽中風。往來寒熱。胸脇苦滿。心煩喜嘔。腹痛心悸。頭汗出。舌苔白。及婦人熱入血室等症。(傷寒論)柴胡半斤。黃芩人參甘草各三兩。半夏半升。(洗)生薑三兩。(切)大棗十二枚。(擘)上七味。水一斗二升。煮取六升。去滓。再煮取三升。溫服一升。日三服。●大柴胡湯。治傷寒十餘日。柴胡症仍在。嘔而心下急。心中痞硬。而利熱結在裏。往來寒熱等症。(傷寒論)柴胡半斤。黃芩三兩。芍藥三兩。半夏半升。(洗)生薑五兩。(切)枳實四枚。(炙)大棗十二枚。(擘)大黃二兩。上八味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

參攷資料 ●柴胡得桔梗。大黃。石膏。麻子仁。甘草。桂。以水一斗。煮取四升。入硝石三方寸匕。療傷寒熱頭痛。心下煩滿。(王之才)

●柴胡能去臟腑內外俱乏。既能引清氣上行。而順腸道。又入足少

九盡 柴 柵 毘 泉

陽在經主氣。在臟主血。前行則惡熱。却退則惡寒。惟氣之微寒味之薄者。故能行經。若佐以三稜廣茂巴豆之類。則能消堅積。是主血也。婦人經水適來適斷。傷寒雜病。易老俱用小柴胡湯。加以四物之類。并秦艽牡丹皮。證為調經之劑。又昔為婦人產後血熱必用之藥也。(王好古) 柴胡本經並無一字治勞。今人治勞方中鮮有不用者。嗚呼。凡此誤世甚多。皆原病勞有一種。其惡虛損。復受邪熱。因虛而致勞。故曰勞者牢也。當須斟酌用之。如經驗方中治勞熱。青蒿煎之用柴胡。正合宜爾。服之無不效。熱去須急止。若或無熱。得此愈甚。雖至死人亦不怨。目擊甚多。日奪于又謂補五勞七傷。藥性論亦謂治勞乏羸瘦。若此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。注釋本草一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮。可不謹哉。如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯。正合其宜也。(寇宗奭) 柴字有柴紫二音。苳蓐藥草之柴皆音紫。苳胡之苳音柴。苳胡生山中。嫩則可茹。老則

採而為苳。故苗有芸蒿。山菜。苳草之名。而根名柴胡也。(李時珍) 北地所產者亦如前胡而輕。今人謂之北柴胡是也。入藥亦良。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。強硬不堪使用。其苗有如韭菜者。竹葉者。以竹葉者為勝。其如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解詁云。芸。蒿也。似邪蒿。可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。按柴胡為少陽藥者。因傷寒少陽證之用柴胡湯也。夫邪入少陽。將有表邪漸解。裏邪漸著之勢。方以柴芩對峙。解表清裏的為少陽和解之法。而柴胡實未印定少陽藥也。蓋以柴胡之性。苦平微寒。味薄氣升。與少陽半表之邪。適合其用耳。乃有病在太陽。服之太早。則引賊入門。若病入陰經。復服柴胡。則重虛其表之說。此恐後人誤以半表半裏之品。為認病未清者。模糊混用。故設此二端以曉之也。不觀之景岳新方中。諸柴胡飲。柴芩煎。柴胡白虎煎諸方。信手拈用。頭頭是道。是誠知柴胡之用。而先得我心之同然矣。余於風邪初感之輕症。

及邪氣淹留。表熱不解之久病。用之並臻神效。奈何將此有用之良品。拘泥成說而畏之。(唐學吉)

【柴胡苗】 主治 卒然耳聾。搗汁滴之。

【柴紫】 基本 柴紫為雜草類之一種。可供藥用。探取 二月七月採之。性質 苦。

主治 利小腹。破積聚。長肌肉。久服輕身延年。

【柵木皮】 產地 出廣南山野間。

形態 柵木為雜木類之一種。樹似桑。其木皮可供藥用。性質 苦。溫。無毒。

主治 霍亂吐瀉。小兒吐乳。瘦弱。胃理氣。並宜水煎服。

【昆尸沙】 卽旋覆花之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「旋覆花」條。

【毗沙擊】 卽犀角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「犀角」條。

【毗陵茄子】 卽畢澄茄之古籍別名。典見綱目。詳「畢澄茄」條。

【毗梨勒】 命名 本品木似訶梨勒。而子亦相似。但

八五二

圓而毗。毗卽臍也。故名。古醫別名 三果(綱目)

產地 出西域及嶺南諸地。

形態 毗梨勒為喬木類之一種。樹似胡桃。實亦似之。核似訶梨。而圓短無稜。其實可供藥用。性質 苦寒。無毒。

主治 風虛熱氣。功同菴摩勒。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論毗梨勒曰。暖腸腹。去一切冷氣。作漿染髮。變黑色。【唐】李珣海藥本草論毗梨勒曰。燒灰乾血有效。【宋】大明諸家本草論毗梨勒曰。下氣。止瀉痢。

參攷資料 ●毗梨勒味苦帶澀。微溫無毒。作漿性熱(李珣) ●毗梨勒。古方罕用。惟千金方補腎鹿角丸。用三果漿吞之云。無則以酒代之。則此果亦餘甘之類。而性稍溫清也。(李時珍)

【泉】 卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳「古文錢」條。

【泉州神龜】 卽建神龜。以產於舊泉州府境。故名。功用詳「神龜」條。

【泉龍】 卽石龍子之古籍別名。典見別錄。詳「石龍子」條。

【洋尖砂】即砂砂之處方用名。詳「砂砂」條。

【洋伽楠】即伽楠香之產於南洋羣島者。功用詳「伽楠香」條。

【洋紅花】即紅花之自外洋來者。味辛辣。色不嬌紅。遠差國產諸品。詳「紅花」條。

【洋桃】即羊桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊桃」條。

【洋粉團】即粉團花小者之別名。典見綱目拾遺。詳「粉團花」條。

【洋菜】即菠菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「菠菜」條。即石花菜之俗名。詳「石花菜」條。

【洋煙】即鴉片煙之俗名。詳「鴉片」條。

【洋鴨】產地 出洋海邊。形態 洋鴨為水禽類之一種。其形如鴨。紅冠翠羽。馴而善飛。雄者重至十斤。雌者如常。其性甚淫。雌雄相交。日必四五次。卵大如鴉子。味極美。以母雞伏之。月餘而雛出。雛亦極易長大。可供藥用。

主治 助陽道。健腰膝。補命門。煖水臟。

九蠶 洋

【洋蟲】 古籍別名 九龍蟲。(綱目拾遺)

產地 出自外洋。形態 洋蟲為卵生蟲類之一種。形似米蟬子。初生如小蠶。久乃變黑如豆瓣。有雌雄性。畏寒。人以養之竹筒中。飼以茯苓屑。紅花。交桂等物。冬月懷袖中。夜則置衾褥。得人氣生殖極繁。可供藥用。其尿詳見該條。

探取 入藥以色紅而光澤者良。

性質 溫。無毒。

主治 行血分。煖脾胃。和五臟。健筋骨。壯陽道。療怯弱。祛風化溼。

配合應用 治老人不寐。茯苓引。

治小兒夜啼。砂砂引。

治女童夜溺。枸杞引。

治少婦陰寒。附子引。

治癰疽發背。沉香末引。

治舌燥作渴。麥冬引。

治眼目閉痛。甘草引。

治耳鳴耳聾。當歸引。

治感冒風寒。防風引。

- 治跌打損傷。全蝎引。
- 治酒醉傷人。葛花引。
- 治怒氣傷人。沉香引。
- 治絞腸痧痛。青蒿引。以上十四症俱用蟲十四個。好陳酒沖服。
- 治刀斧傷。用蟲搗敷即愈。
- 治瘋癲。用蟲九個。木香湯送。
- 治打傷。用蟲九個。黑棗薄荷湯送。
- 治黃疸癆。用蟲十二個。薄荷燈心湯送。
- 治哮喘。用蟲九個。薄荷湯送。
- 治眼脹。用蟲七個。薄荷湯送。
- 治傷食。用蟲九個。薑湯送。
- 治水毒。用蟲九個。薄荷燈心湯送。
- 治氣痛。用蟲九個。檳榔湯送。
- 治中風不語。用蟲二十四個。薄荷燈心湯送。
- 治小腹痛。用蟲九個。薑湯送。
- 治急慢驚風。用蟲九個。薄荷杏仁湯送。
- 治喉痛。用蟲二十四個。薄荷銀花湯送。
- 治脾風。用蟲二十四個。酒送。
- 治胃痛心疼。用蟲七個。木香

- 末沖酒送。
- 治其名腫毒。用蟲十六個。陳酒送。五更服。
- 治痘疹。用蟲七個。米湯沖服。
- 治膨脹。用蟲二十四個。薄荷陳皮湯送。
- 治嘔吐痰火。用蟲七個。淡薑湯送。
- 治年寒午熱口乾舌燥。用蟲七個。陳皮半夏煎酒沖服。
- 治五勞七傷。白茯苓三錢。用蟲七個。搗爛。每日空心酒沖服。以復元為止。
- 治遺後寒熱不調。用蟲七個。以未發之先沖酒服。三次即止。
- 治夢遺白濁血淋白帶。以灰實三錢。微炒研末。白果五枚。去皮心。先將藥搗爛。再加淫羊藿二錢。去邊皮。二錢。韭子三錢。同煎。用蟲七個。酒沖服。
- 治赤白帶及產後等症。以香附。炙茱。烏劍骨。各八分。酒煎。用蟲七個。沖服即愈。
- 治氣急咳嗽。以川貝母二錢。牛蒡子。當歸。陳皮。淮牛膝。各八分。水煎服。如婦人去牛蒡子。加益母

炒香附各三錢。水煎沖服。三次神效。

①治腰痛。以破故紙二錢。雄豬腰一對。竹刀剖開。去衣。將破故紙內入。酒蒸熟爛。加桔梗二錢。爲末。用蟲七個。持沖酒服神效。

②治痢疾。白痢用紅糖。紅痢用白糖。用蟲七個。陳酒沖服。

③治水瀉不止。猪苓、白朮各一錢。用蟲七個。陳酒煎沖服。忌油膩魚腥等物。

④治偏正頭風。以川芎、防風、荆芥、蠅各一錢。細辛八分。用蟲七個。陳酒煎沖服之。忌生冷葱韭等物。

⑤治骨節酸痛。痛胃寒等症。以川芎、白朮各八分。用蟲七個。酒煎沖服。三次即愈。

⑥治吐血不止。喘息燥熱等症。以古墨研澱。貝母三分。研末。用蟲七個。陳酒沖服。七次愈。

⑦治小便不通。以燈心、車前各七根。用蟲七個。陳酒沖服。

⑧治飽悶成痞。肚腹腫脹。用蟲七個。酒沖服三次。

⑨治翻胃隔食。以生薑七片。裝

布袋內。入糞坑浸七日。取起。清水洗淨。埋土中。一層蓋一層土。七日

取起。用陰陽瓦焙乾研末。每次一分。用蟲七個。沖酒服三次愈。

⑩治吐血。以藕節、茅草根洗淨。酒煎。用人乳酒各半。用蟲七個。沖服三次愈。

⑪治筋骨疼痛。以核桃肉三錢。用蟲七個。陳酒沖服。

⑫治勞嗽。以牛骨髓三錢。核桃肉三錢。共爲末。入蟲七個。再摻爲丸。每丸三錢。每日五更。柳化一丸。九日見效。

⑬治痿症。蛇牀子三錢。煎湯用蟲九個。沖服三次。即愈。久服延年種子。

⑭治經水不調。以香附、陳皮、益母草、當歸、元胡索各八分。水煎和酒。用蟲七個。沖服之。即愈。久遠者連服數次。其效如神。

⑮治產後崩症。以香附、白芍、益母草、當歸、陳皮、茯苓、白果、蘇木各八分。酒沖用蟲七個。服三次。即愈。

⑯藥性考。洋蟲色黑。形如壁蟲。活吞數枚。止血勞法。藥。【洋海菜】即香海菜之處方用名。

詳「香海菜」條。

【洋蘆薈】即蘆薈之處方用名。詳「蘆薈」條。

【消夫藍】即番紅花之古籍別名。典見綱目。詳「番紅花」條。

【洗瘰丹】即檳榔之古籍別名。典見綱目。詳「檳榔」條。

【洗錫羅瓜】即絲瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「絲瓜」條。

【洛神珠】即酸漿之古籍別名。典見圖經本草。詳「酸漿」條。

【洛陽】即羅麥家種者之古籍別名。典見綱目。詳「羅麥」條。

【洞石】即白肌石之古籍別名。典見別錄。詳「白肌石」條。

【洞庭】即枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳實」條。

【洞庭奴隸】即枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳殼」條。

【洞庭柑】即柑之產於洞庭山者。實熟最早。皮細味美。詳「柑」條。

【洞裏神仙】即一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「一粒金丹」條。

【津桃肉】即胡桃之處方用名。詳「胡桃」條。

【胡桃】條。

【津符子】基本 津符爲山果類之一種。其子可供藥用。

產地 生種句。性質 苦平滑無毒。

主治 止渴生津。益心血。養脾金。安五臟。治遺精。肺癰。癆瘵。咳嗽。吐血。聲啞。欲死。每日噴十枚。一月勿令間斷。即效。

參攷資料 津符子多食能令人口爽。不知五味。(李時珍)

【洮羊】基本 本品爲羊之產於臨洮諸地者。

形態 洮羊爲獸類羊屬之一種。大者重百斤。尾如麋鹿。可供食與藥用。

主治 功與尋常羊同。而尤良。

【活水蘆根】即蘆根之處方用名。詳「蘆根」條。

【活石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【活血丹】即七葉草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉草」條。

即土茜草根之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「土茜草」條。即接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾

骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾

遺。詳「接骨仙桃」條。

【活東】即蜈蚣之古籍別名。典見爾雅。詳「蜈蚣」條。

【活師】即蜈蚣之古籍別名。典見山海經。詳「蜈蚣」條。

【活菴】即通草之古籍別名。典見爾雅。詳「通草」條。

【活鹿草】即天名精之古籍別名。典見異苑。詳「天名精」條。

【活磁石】即慈石之處方用名。詳「慈石」條。

【活蘆根】即蘆根之處方用名。詳「蘆根」條。

【流水】古稱別名 千里水。東流水（酸酩）甘瀾水。勞水（綱目）急流水。逆流水。順流水。（綱目）楊泛水（綱目）倒流水（衍義）

性質 甘。平。無毒。

主治 病後虛弱。揚之萬通。養藥禁神最驗。

歷代紀述攷證 【明】李時珍本草綱目論流水曰。主五勞七傷。腎虛脾弱。陽盛陰虛。目不能眠。及驚亂吐利。傷寒後。欲作奔豚。

參攷資料 ● 江水流泉。遺涉

九疊 活 流 炭 炮

順勢歸海。不逆上流。用以治頭必歸於下。故治五勞七傷羸弱之病。煎藥宜以陳蘆勞水。取其水不強。火不盛也。無江水則以千里東流水代之。如涇渭之類（孫思邈）

勞水即揚泛水。張仲景謂之甘瀾水。用流水二斗。置大盆中。以杓高揚之。千萬遍。有沸珠相逐。乃取煎藥。蓋水性本鹹而體重。勞之則甘而輕。取其不助腎氣而益脾胃也。處博醫學正傳云。甘瀾水溫甘而性柔。故寒傷寒陰證等藥用之。順流水性順而下流。故治下焦腰膝之證。及通利大小便之藥用之。急流水上峻急之水。其性急速而下達。故通二便風脾之藥用之。逆流水洄瀾之水。其性逆而倒上。故發吐痰飲之藥用之也。（李時珍）

● 東流水取其性順疾速通膈下關也。倒流水取其回旋流止上而不下也。（寇宗奭） ● 昔有患小便閉者。藥工不能治。令取長川急流之水。煎煎藥一飲立洩。則水不可擇乎（張從正）

【流夷】即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【流星草】即穀精草之古籍別名。典見綱目。詳「穀精草」條。

【流珠】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【流黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【流螺】即海螺之古籍別名。典見爾雅。詳「海螺」條。

【流離】即鴉之古籍別名。典見詩經。詳「鴉」條。

【炭皮】即占斯之古籍別名。典見別錄。詳「占斯」條。

【炭灰】原名 白炭。主治 誤吞金銀銅鐵在腹。燒紅急為末。煎湯呷之。甚者刮末三錢。并水調服。未效再服。又解水銀輕粉毒。帶火炭納水底。能取水銀出也。上立炭帶之。辟邪惡鬼氣。除夜立之戶內。亦辟邪惡粉」條。

【炭養鉛】即白粉之化學名。詳「白粉」條。

【炮薑】原名 黑薑。命名 本品即以乾薑炮黑者。故名。

製法 以乾薑切成厚片。入鐵鍋中。以烈火燒至饒面火燃。略噴以水。急挑數轉。置罎中。深藏勿使濕氣。候冷則裏外通黑。入藥用。

性質 辛苦大熱。無毒。

主治 去臟腑沉寒。銅冷。濕瀉。脾胃元陽。化瘀生新。止血定痛。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛有熱者。及孕婦禁用。

參攷資料 ● 炮薑與乾薑功用略同。但乾薑性能升發。炮則稍苦。性轉止而不走。非若附子之走而不守也。故凡有陰無陽諸症者。宜之。亦能引血藥入氣分而生血。血虛發熱。產後大熱者宜之。蓋此發熱非有餘之熱。乃陰虛而陽無所附之故也。忌用寒藥。寒藥常用炮薑入肝引藥。藥生血。與補陰藥同施。而熱自退。所謂熱因熱用。從治之法。故亦治目睛久赤（遵經）

● 按神農本草經。止有生薑。乾薑。而無炮薑。後人以乾薑炮黑。謂之炮薑。金匱要略。治肺痿。用甘草乾薑湯。其乾薑亦炮。是炮薑之用。仲祖其先之矣。薑味本辛。炮過是辛味

八五五

九靈 炮 爰 柞 柞 猪 玳 玲 玳

精液。主治產後血虛。身熱及寒。吐血。衄血。便血之證。若炮製太過。本質不存。謂之盡炭。其味微苦不辛。其質輕浮不實。又不及炮製之功能矣。即用炮製。亦必須三衝開化之母。始為有力。今藥肆中多以傷水變味之生。曬乾炮用。未免有名無實。(崇原)

【爰玳】即藥蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藥蘆」條。
 【爰石】即山慈石之古籍別名。典見別錄。詳「山慈石」條。
 【柞牛】即柞牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳「柞牛」條。
 【柞牛卵囊】即牛卵囊之原名。詳「牛卵囊」條。

【猪鬃】即風狸之古籍別名。典見綱目。詳「風狸」條。
 【玳】命名。本品毛柔而長如絨。可以藉。可以緝。故名。
 古別名 玳(綱目)

外國名詞 Hapalo jacchus L. (Marmosot 或 ouistiti) Soicunifchen. (拉丁)キヌミザル或キヌサル(日本) 基本 係脊椎動物哺乳類。有

胎盤類。鬚長類。猿類。麝鼻類。玳科。產地 出川峽深山中。
 形態 玳為獸類之一種。其體矮小。被黃色絲狀軟毛。頭圓頸無耳。上有白色長鬚毛。鼻孔側向。吻短。後肢指為扁爪。他皆鈎爪。尾長。生密毛。無纏繞性。有白黑環紋。棲樹上。似松鼠。甚愛尾。或中藥矢。即自啣之。其肉皮血可供藥用。主治 食之。治五痔病。久坐其皮亦良。

【玳奴】即狗脊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「狗脊」條。
 【玳脂】主治 疥疥。塗之妙。
 【玲瓏費去病】即藿香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藿香」條。

原名 玳玳。
 命名 本品功能解毒。為毒物之所媚嫉者。故名。
 處方用名 明玳玳。
 古別名 文甲。代尾。斑希毒。冒。蟻。蟻。除。雙。牙。

外國名詞 Chelonia imbricata L. 或 Eretmochelys imbricata (拉丁) Tortoise. 基本 屬龜類。為玳玳之背甲。

基本 屬龜類。為玳玳之背甲。產地 在海洋之水域間。和漢藥考曰。日本之琉球諸島。小笠原島等產此。台灣亦產之。

形態 玳玳為棲息熱帶海洋之一種。爬蟲類。體頗大。形似龜。而嘴尖。背甲以十三片主甲。鱗列重疊。如瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鬚。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。刺之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接



玳 玳

合甲片。可於接合處塗薄蛋白。加熱壓之。
 用法 水煎或煎汁。或剉末用。寇宗奭曰。入藥須用生者。性味全也。既經湯火。即不堪用。與生熟厚義同。
 性質 甘。寒。無毒。
 效能 清熱。潛陽。熄風。專作解毒藥。
 主治 解嶺南百藥毒。

八五六

歷代記述攷證 【唐】陳士良食性本草論玳玳曰。療心風。解煩熱。行氣血。利大小腸。功用與肉同。【宋】日華諸家本草論玳玳曰。破癥結。消痰毒。止驚癇。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論玳玳曰。磨汁服。解蠱毒。生似之。辟蠱毒。【明】李時珍本草綱目論玳玳曰。解痘毒。鎮心神。急為客作。傷寒熱結狂言。【明】繆希雍本草經疏論玳玳曰。玳玳龜類也。氣寒無毒。而解一切熱毒。其性最燥。凡遇飲食有毒。則必自搖動。然須用生者。乃靈。死者則不能矣。嶺南人善以諸毒藥造成蠱。人中之則昏憤悶亂。九竅流血而死。惟用活玳玳。刺其血飲。或生者

玳玳為棲息熱帶海洋之一種。爬蟲類。體頗大。形似龜。而嘴尖。背甲以十三片主甲。鱗列重疊。如瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鬚。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。刺之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接

玳玳為棲息熱帶海洋之一種。爬蟲類。體頗大。形似龜。而嘴尖。背甲以十三片主甲。鱗列重疊。如瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鬚。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。刺之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接

玳玳為棲息熱帶海洋之一種。爬蟲類。體頗大。形似龜。而嘴尖。背甲以十三片主甲。鱗列重疊。如瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鬚。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。刺之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接

玳玳為棲息熱帶海洋之一種。爬蟲類。體頗大。形似龜。而嘴尖。背甲以十三片主甲。鱗列重疊。如瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鬚。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。刺之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接

磨濃汁服之可解。日華子主破瘰結。消癰腫。止癆痢。陳士良主心風解煩熱。行氣血。利大小腸。以其性稟純陰。氣味至寒。故治如是等病也。又能解痘毒神效。

配合同用 ①解蟲毒。生玳瑁磨濃汁水服一盞即消。(楊氏產乳方)

②預解痘毒。過行時服此。未發內消。已發稀少。用生玳瑁生犀角各磨汁一合。和勻溫服。牛合。日三服最良。(靈苑方)

③治痘瘡黑陷。乃心熱血凝也。用生玳瑁生犀角同磨汁一合。入猪心血少許。紫草湯五匙。和勻溫服。(開人規痘疹論方)

④治迎風目淚。乃心腎虛熱也。用生玳瑁羚羊角各一兩。石燕子一雙。爲末。每服一錢。薄荷湯下。日一服。(鴻飛集方)

用量 八分至錢半。
應用宜忌 凡虛寒而無熱毒者禁用。

參攷資料 ①玳瑁解毒清熱之功。同於犀角。古方不用。至宋時至寶丹始用之也。(李時珍) ②按

九 璽 玳 瑁 珂 珊

范成大虞衡志云。玳瑁生海洋深處。狀如龜而殼稍長。背有甲十二片。黑白斑文相錯而成。其殼邊缺如鋸齒。無足而有四鬣。前長後短。皆有鱗斑。文如甲。海人養以鹽水。飼以小魚。又顧玲海槎錄云。大者難得。小者時時有之。但老者甲厚而色明。小者甲薄而色暗。世言鞭血成斑。謬矣。取時必倒懸其身。用滾醋澆之。則甲逐片應手落下。南方異物志云。大者如鑿。背上

有鱗。大如扇。取下乃見其文。爰柔作器。治以鮫魚皮。疊以枯木葉。卽光輝矣。陸佃云。玳瑁不再交。望卵影抱。謂之護卵。(李時珍) ③日本婦女喜戴玳瑁飾於頭上。云能冷頭熱。有鎮上逆功效云。(和漢藥考) ④日本呼玳瑁甲爲鼈甲。蓋因享保年間。玳瑁爲禁制品。商賈牟利。遂呼玳瑁爲鼈甲。私相交易。故至今仍呼玳瑁等爲鼈甲云。(草茅危言)

【玳瑁肉】 性質 甘平。無毒。主治 諸風毒。逐邪熱。去風隔風熱。行氣血。鎮心神。利大小腸。通婦人經脈。

【玳瑁血】 主治 解諸藥毒。刺出血飲之。

【玻璃】 古籍別名 頗黎。水玉。(綱目)

種類 ①碎玻璃。以炭酸鉀。石灰。白砂等製成。質堅韌。宜作化學器具。②鉛玻璃。以鉛丹。炭酸鈉。石灰。白砂製成。折光力頗強。宜作光學器具。③鈉玻璃。以炭酸鈉。炭酸石灰。白砂製成。可作平板。瓶管之屬。以上皆由人工造成者。④古之所謂玻璃。乃玉石之類。其瑩如水。其堅如玉。故有水玉之稱。

性質 辛寒。無毒。
主治 爲淨心熱。能安心明目。去赤眼。熨熱腫。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論玻璃曰。摩訶羅。命名。到馬勒飾也。本品似之。故名。

古籍別名 馬柯羅。玳(綱目)
產地 出海中。

形態 玳瑁爲介類貝屬之一種動物。其大者圍九寸。細者七八寸。長三四寸。外黃黑。而骨白色。其殼可爲飾品。亦供藥用。

製法 雷斅曰。玳瑁冬採色白膩者。并有白旋水。勿令見火。卽無用也。凡用以鋼刀刮末。研細。置羅。再研千下。不入婦人藥也。

性質 鹹平。無毒。
主治 目昏。止血。生肌。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論玳瑁曰。消腎膜及筋。骨刮點之。【明】李時珍本草綱目論玳瑁曰。去面黑。

【珊瑚】 古籍別名 鉢羅婆羅(梵書)火樹(綱目)
外國名詞 Corallium Coral
(拉丁)サンゴ(日本)

基本 係腔腸動物珊瑚屬之骨體。
產地 生暖海中。



珊瑚樹

形態 珊瑚爲一種小蟲結合而成。多爲樹枝狀之羣體。枝上之表。有肉附之。肉上具多數水螅體。

九疊 珊瑚 珍界 疥 皆 皇 盆 相

稱爲珊瑚蟲。蟲體分泌之石灰質或角質之骨酪。即尋常所稱之珊瑚。其形如樹枝。明潤紅色。中多有孔。亦有無孔者。即古稱珊瑚樹。實非樹也。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 去目中昏。消宿血。爲末吹鼻。止鼻衄。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論珊瑚曰。明目。安心。止驚瀉。【明】李時珍本草綱目論珊瑚曰。點眼去飛絲。

參攷資料 ●珊瑚主治與金相似。【李珣】●今人用爲點眼。治目翳。【寇宗奭】●珊瑚刺之汁流如血。以金投之爲丸。名金漿。以玉投之爲玉髓。久服長生。【陳藏器】●珊瑚生海底。五七株成林。謂之珊瑚林。居水中。直而輓。見風日則曲而硬。變紅色者爲上。漢趙佗謂之火樹是也。亦有黑色者不佳。碧色者亦良。昔人謂碧者爲青瑣。珎俱可作珠。許慎說文云。珊瑚色赤。或生於海。或生於山。據此說則生於海者爲珊瑚。生於山者爲瑣珎。尤可徵矣。【李時珍】

【珊瑚花】即薊蕪之別名。典見植物學大辭典。詳「薊蕪」條。

【珊瑚架】即天燈籠草植於盆內者之古籍別名。典見採藥書。詳「天燈籠草」條。

【珊瑚配】即七葉黃荊之俗名。詳「七葉黃荊」條。

【珊瑚菜】即石防風之古籍別名。典見綱目。詳「石防風」條。

【珍珠母】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【珍珠兒】即真珠之古籍別名。典見開寶本草。詳「真珠」條。

【珍珠倒捲簾】即落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「落得打」條。

【珍珠藥】即紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫參」條。

【珍珠蘭】即珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「珠蘭」條。

【界橋茶】即茶之產於江西舊袁州府境者。功用較尋常茶爲良。

【疥拍腹】基本 疥拍腹爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月採。陰乾用。

性質 辛。溫。無毒。主治 除痺。輕身。

【皆治藤】醜。生糖漿。皆治藤爲蔓草類之一種。引蔓而生。長丈餘。葉似泥藤。其根葉可供藥用。

主治 中寒。作粉食。虛損。和糖胃養食之。

【皆棋子】即棋棋子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「棋棋子」條。

【皇】即苜蓿之古籍別名。典見爾雅。詳「苜蓿」條。

【盆布】即海帶之日本名。詳「海帶」條。

【盆砂】即蓬砂煉時結成於盆中者之古籍別名。典見綱目。詳「蓬砂」條。

【盆桂皮】即秦皮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「秦皮」條。

【盆硝】即芒硝煉成盆中者之古籍別名。典見嘉佑圖經本草。詳「芒硝」條。

【盆膠】即阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿膠」條。

【盆飯草】即牽牛之古籍別名。典見綱目。詳「牽牛子」條。

【相思子】命名 昔有人沒於樹下而卒。因以名之。

古籍別名 紅豆(綱目) 美人豆(唐) 小豆(相樞子) 耶君子(和漢藥考) 雞翅木子。

外國名詞 Jogyity (拉丁) Indian Lignorce (英) India-cho Suroto (德)

基本 屬豆科。爲相思樹之種子。

產地 和漢藥考曰。產於印度、美洲、非洲及中國之熱帶地方。日本則產於琉球及臺灣南部。

形態 相思樹爲纏繞性灌木。高可丈餘。葉爲偶數之羽狀複葉。長五六寸。小葉爲長圓形。每一葉梗上。對生八片至十五片。花梗抽於葉腋之間。梗之頂端。開似蝴蝶之小花。色白。時或帶紅。連綴而成繖狀花序。果實爲莢果。長寸許。寬闊而稍扁。中藏種子四粒至六粒。即爲相思子。本品種子形圓似球。又似卵。類赤小豆。色深紅。有光澤。臍部之周圍有黑斑。故紅黑各半。甚美麗。子皮堅硬。內有柔艱色白。

之唇芽。其臭。味如豆。



相思子

採取 子實老熟時採之。性質 苦平。有小毒。吐人。

成分 含有帶楊黃色之粉末。為可溶性之類似蛋白質。名曰亞李林 (Abrin) 及與亞李林相似之物質。名之曰奇魁利欽 (Quitelein)。

效能 殺蟲。吐痰。解毒。並作眼藥。

主治 通九竅。去心腹邪氣。止熱。頭痛。風痰癆瘵。殺腹蠱及皮膚內一切蟲。除毒。取二七枚研服。即當吐出。

國外學說 英美學說謂相思子產印度。南亞。美利加等處。取其樹子可為藥品。其功用。外用能治皮類病。及眼內生米粒瘡。相思子三分研末。涼水五百分。泡一天。再加沸水。分數與涼水同。俟涼過。淋紙為度。每日三次。點眼內。令

九靈相

其生炎出膿。運靈醫。並用治米粒瘡。相思子泡水方。又方。相思子二分。去皮。涼水五百分。沒一天。入白打粉。再加水。足八百分。為度。用毛筆蘸搽。治皮類病。(相思子糊方) 日本小林九一著有調劑術。謂本。曾研究相思子。盛舉其名。稱產地。母植物。藥用部分。成分。效用。用法等等。謂某氏曾於此樹之枝葉及根中。發見酷似甘草之成分。定名 Chroonein。千八百十二年。又有人以相思子投沸騰酒精中。發見一種酸性之白色結晶體。此酸於冷水中。稍能溶解。千八百八十三年。又有兩人在相思子內。發見一種物質。名曰阿爾加雷特。此兩種成分。是否係有效成分。與其化學性質若何。尙未精究。千八百八十五年。復有專家檢查相思子之有效成分。果見其浸劑中。存有一種醱酵素。以此點結膜上。有能起特異炎症之性。此人曾取發芽前後之相思子。冷浸。繼於此冷浸液中。加酒精九十五分。則見奇魁利欽沈澱。此沈澱物係一種複合體。加以醱酵。即分解為二。其

一為水不能溶之無效物質。其二為水全溶解之純粹醱酵素。(錄藥劑誌第二十三號小林九一記述) 又和漢藥考曰。熱帶地方土人。以此子作食料。入藥者。以此製為彩劑。外用。醫神經痛。或皮膚病。其浸劑。治慢性顆粒狀眼炎。有奇效。當初點時。結膜頓起劇甚之嫩。衝然。眼炎頓即隨之而愈。殆依其反動。而促進治愈也。然慎勿濫用。否則必有不治之危害。歐美醫家。懼其有害。必歷試他藥無效。始偶一用之。印度土人。則以此根代甘草。根長不一定。直徑約自六密米至二十五密米。現淡紅褐色。微帶不快之臭氣。味初苦。後轉甜似甘草。有人以此子三十二枚。研為細末。浸冷水五百瓦中。經二十四時後。再加熱水五百瓦。俟冷。濾過。取此浸液洗眼。(一日數次) 或以毛筆蘸水點眼。至發微腫而止。後又有人以此子十至十二枚。(約合一瓦) 浸熱水中。片時。按去外皮。研為粉末。入沸水二百瓦。浸二十四時。濾過。應用。較前法尤妥。此液之比例。為1/10。美國費府眼科

專門病院所用之浸劑。則係三十瓦水內。含相思子末。〇·五六。若加入硼酸。〇·二四。便可防其腐敗。巴西人之以此為眼藥也。始於千八百八十二年。時人呼此樹為天氣植物。因此樹葉。設變更位置。翌日之天氣。必身驗之。不應。殆無稽之談也。日本相模。嘉作。曾將奇魁利欽。研細。冷水浸液。以之塗。眼。使起微腫。厥後慢性眼炎。果然治愈。惟其作用。頗為危險。故普通人均不敢嘗試也。(錄藥劑誌第二十三號小林九一記述。醫藥學雜誌第二百三十七號相模嘉作記相思子) 用量 八分至錢半。 施用宜忌 凡氣虛胃寒及無熱毒。蟲積者。禁用。 【相思草】 即秋海棠之古籍別名。與見桐目拾遺。詳秋海棠。條。 即烟草之古籍別名。與見和漢藥考。詳烟草。條。 古醫別名 烏葵。(以目) 產地 生山陽。 形態 相鳥為茅草類之一種。

八五九

壘赤氣香。如佩蘭。其莖葉可供藥用。

採取 五月十五日採陰乾用。
性質 苦。
主治 陰毒。

【相摠子】即相摠子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳「相摠子」條。

【省頭草】即蘭草之古籍別名。

與見綱目。詳「蘭草」條。即佩蘭之俗名。詳「佩蘭」條。

【省藤】

古籍別名 紅皮藤。(綱目拾遺) 赤藤。紅藤。

(綱目)紫藤(植物學大辭典)縛木藤。

外國名詞 Calamus rotang.

(拉丁)タウ(日本)

基本 係棕櫚科。為省藤之莖。產地 出熱帶諸地。



省藤

形態 省藤為灌木類之常綠木本。有刺。其數甚多。莖細而長。倚於他木。得於上升。有長至數十丈。

者。周圍僅數寸。葉大。長六尺許。羽狀複葉。自許多小葉成。其莖多以縛物及編椅及籃之原料。亦可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 蚊蟲煮汁服之。齒痛打碎合之。煮粥飼狗。去癩。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論省藤曰。治諸風。通五淋。殺蟲。

參攷資料 赤藤善殺蟲。利

小便。洪邁夷堅志云。趙子山苦寸

白蟲病。醫令戒酒而素性耽之一日。寓居郡武天王寺。夜半醉歸。口

渴甚。見廬間甕水映月。螢然。即運

酌飲之。其甘如飴。逾曉。蟲出盈席。

心腹頓寬。宿疾遂愈。皆驚異之。視所飲水。乃寺僕織草履浸紅藤根

水也。(李時珍) 浙江杭州錢塘

門外道姑橋下。有紅皮藤。凡患牛

肢風及大麻風者。取藤四兩。浸無

灰酒一大壺。入鍋內隔湯煮三柱

香。取起飲酒。量好者。以醉為度。每

酒一碗。入藥酒三四匙。陸續飲。至

藥酒完。則風氣自愈。其風從指甲

縫中出。對指尖以竹紙鋪。凡上發

之。如紙能吹動。即是指尖風出也。(趙學敏)

原名 縮砂礬。

【砂仁】命名 縮砂。實結根下。

仁藏殼內。如藕下白莖多。薺之狀。

本品乃縮砂礬之仁。故名。

處方用名 縮砂仁。縮砂礬。春

砂仁。香砂仁。西砂仁。砂米。

古籍別名 賽桂香。風味圓頭。

(和漢藥考)

外國名詞 Amomum Xanthoides. (Grains of Paradise.)

基本 屬薑荷科。為縮砂之子

實。產地 陳仁山藥物生產辨云。

春砂產廣東陽春縣為最。以蟠龍

山為第一。大八山為第二。陽春縣

屬為第三。其次羅定。懷鄉。西鄉。東

安新與等處。均有出產。惟氣味大

不如也。凡蟠龍大八陽春三處所

產者。酸甜苦辣味皆備。餘均不備。

蟠龍大八山兩處所出之春砂。均

屬單粒散子。無梗。用瓦埕裝貯。使

其時常剝開。其肉仍溼。則味更佳。

形態 砂仁。為長圓球形之裂

果。多數攢集於果梗。長四五分。闊

三分許。果殼褐色。質似皮革。密生

柔輭之刺。中含多數暗褐色多角

形之堅硬種子。謂之縮砂仁。或單

稱砂仁。有香氣甚烈。

種類 產各屬及安南等處者

曰縮砂仁。產廣東之陽春縣者曰

陽春砂。陽春砂飽滿堅實。氣味芬

烈。其他砂仁。乾縮扁薄。氣味俱弱。

本品醒脾行氣。溫中去寒。惟陽春

砂仁功力可操。他產者氣力薄弱。

即收效亦迂緩也。

採取 七八月間採之。

製法 略炒。吹去衣。研用。

性質 辛溫。潤。無毒。

效能 行氣止痛。胸中吐噎。用

作香竇衝動藥。用於消化不良及

膨脹等症。

主治 虛勞冷瀉。宿食不消。亦

白洩痢。腹中虛痛下氣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論砂仁曰。主冷氣痛。止休

息氣痢。治勞損。消化水穀。溫暖肝

腎。【唐】陳藏器本草拾遺論砂仁

曰。上氣咳嗽。奔豚。鬼疰。驚癇。邪氣

【宋】大明日華諸家本草論砂仁

曰一切氣。霍亂轉筋。能起酒香味。【金】張元素珍珠論砂仁曰。治脾胃氣結滯不散。【明】李時珍本草綱目論砂仁曰。補脾醒脾。養胃益腎。理元氣。通滯氣。散寒飲。脹痞。噎膈。嘔吐。止女子崩中。除咽喉口齒浮熱。化銅鐵骨硬。【清】黃宮繡本草求真論砂仁曰。縮砂辛溫而潤。故善號為醒脾調胃要藥。然亦發入肺腎大小腸膀胱。是以同檀香。白豆蔻。則能入肺。同人參。益智。則能入脾。同黃蘗。茯苓。則能入腎。同赤石脂。則能入大小腸。其言醒脾調胃。快氣調中。則於腹痛痞脹有功。入大腸則於赤白痢病有效。入肺則於咳嗽上氣充理。至云止痛安胎。並咽喉口齒浮熱能消。亦是中和氣順之意。若因實熱而云胎氣不和。水衰而見咽喉口齒燥結者。服之豈能是乎。故虛實二字不可不細辨而詳察耳。出嶺南研碎用。

九畫 砂

實也。形似桑椹。皮薄色白。實黑似牽牛子。以充縮砂。非是。故禁用。藥學士相川銀次郎氏記藥用植物云。伊豆縮砂。產伊豆對馬村陰溼之地。方言謂之血草。因此草於十二月下旬。果實成熟。色便血赤。小鳥喜食之。採之者須及早。收得後埋入土中。俟果殼漸爛。乃採集其中之子。子為胡麻大之褐色顆粒。酷似西洋產之小豆蔻。兩相比較。無甚懸殊。竟堪代用。故收採者。輒售與藥舖云。又和漢藥考曰。縮砂。益智為同屬。翼荷科之草本植物。惟果實不同。縮砂之果實。有囊帶突起。且為擴大之樽狀。或裂瓣。或不裂。益智則為角狀。無囊帶突起。初版日本藥局方曾收入縮砂。旋改譯為小豆蔻。從西洋藥局方例也。無日本產。主產於亞洲之暹羅及非洲之熱帶地方。縮砂為多角形之堅硬種子。有暗褐色之子衣。多團集而生。形如長圓球。果被似皮革。被外帶優伏之硬刺。香氣峻烈而不苦。須密閉器中貯之。

種廣扣。仁大味苦。均非真品。按縮砂仁產嶺南山澤間。近以陽春出者為佳。故一名春砂。狀似豆蔻。皮緊厚而黝色黃赤。外有細刺。氣味甚香。胡得搗用洋扣廣扣。魚目混珠。殊可恨也。曹炳章曰。按縮砂即名陽春砂。產廣東番禺府陽春縣者。名陽春砂。三角長圓形。兩頭微尖。外皮刺蠟紅紫色。肉紫黑色。嚼之辛香微辣。為最道地。羅定產者。頭平而圓。刺短皮紫褐色。氣味較薄。略次。廣西出者。名西砂。顆圓皮薄。刺更淺。色赭黑色。香味皆淡。薄更次。鄭君所說味辣不香。或是西砂。必非洋扣。西砂圓形。惟亮與蔻不同。似雜混充耳。鄭君曰。土蜜砂縮砂仁在山採下。用蜜生浸。所以殺其燥烈之氣也。聞有以原殼砂水浸透。以蜜煮過。其性仍燥。用者慎之。曹炳章曰。按近時之縮砂仁。外粉白色。內肉紫色。嚼之味辣。氣味香。皆廣西產。即西砂內仁也。其性質燥。亦次。不若帶壳春砂之為道地也。

治虛勞冷瀉。宿食不消。腹中虛滿。下氣。蓋氣味功力。皆與豆蔻相類。故大明謂治一切氣。霍亂轉筋。楊仁齋謂和中行氣。止痛。潔古謂治脾胃氣結滯不散。瀨湖謂醒脾養胃。理元氣。通滯氣。散寒飲。脹痞。噎膈。吐。亦皆與白豆蔻同一主治。惟此物雖為草實。而開花結穗成實。皆在根下。是其特異之件。故雖辛溫能升。未嘗不治中上二焦之氣。而本乎地者。親下。尤以專治肝腎為特長。甄權謂溫暖肝腎。熯器謂治上氣奔豚。蓋皆有見於此。又得腸辟滯下一症。腹痛皆由氣滯。必以調氣為要務。然須疏通開泄。宜降而不宜升。故芳香辛溫升陽動火之藥。皆在禁例。惟砂仁既能治虛寒之泄瀉。似乎亦在升清滯一途。而開寶竟以主治赤白痢疾。此症惟溼熱積滯為獨多。溫升之品。豈非大忌。不知砂仁氣辛。雖似溫升。而開泄下降。是其本色。且能破滯解結。則雖溫熱質積。亦不妨藉為引導。直入下焦。而通滯滯。不患其升舉穢濁。上逆為虐。故甄權又以為止休息氣病。瀨湖引藥

九畫 砂

性論。謂治冷滑下痢不禁。則溫瀉之中。尚有行氣消積之作用在。固不可與肉蔻。益智之一味溫瀉者同日而語。石頑謂今人治血痢亦多用之。若積欲盡時。良非所宜。豈不以消滯導滯。是其所長。故適宜於積滯初下之症。又謂新產忌之。恐其氣辛燥而動血。此以知砂仁滲降下氣。力量頗專。與其他辛芳香之藥。以氣用事。能升而不能降者。顯然有別。考芙蓉之本。其名曰密。蒲本亦曰菑。皆有深藏於密之義。此藥名密。其義蓋亦如是。所以主治肝腎諸氣。尤有特長。蓋有積藏收攝之意。尚不可與其他辛散之專於破氣消耗者。作一例觀。瀕湖引溫隱居方。謂縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癆昏胃。安胎止痛皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開運氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

入脾。得黃蘗。茯苓為使。入腎。得赤白石脂為使。入大小腸。
① 治冷滑下痢。不禁虛瀉。用縮砂仁熬為末。以羊子肝。薄切。搽之。瓦上焙乾為末。入乾薑末等分。飯丸。梧子大。每服四十丸。白湯下。日二服。又縮砂仁。炮附子。乾薑。厚朴。陳橘皮等分為末。飯丸。梧子大。每服四十丸。米飲下。日二服。(藥性論方)
② 治大便瀉血。三代相傳者。縮砂仁為末。米飲熱服。二錢。以愈為度。(十便良方)
③ 治小兒脫肛。縮砂去皮為末。以猪腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟。與兒食。次服白礬丸。如氣逆腫喘者不治。(保幼大全方)
④ 治遍身腫滿。陰亦腫者。用縮砂仁。土狗一箇。等分。研和。老酒服之。(直指方)
⑤ 治痰氣喘脹。砂仁搗碎。以蘿蔔汁浸透。焙乾為末。每服一二錢。食遠湯服。(簡便方)
⑥ 治上氣咳逆。砂仁洗淨。炒研。生薑連皮等分。搗爛。熱酒食遠泡服。(簡便方)

⑦ 治子癆昏胃。縮砂和皮炒黑。熱酒調下二錢。不飲者。米飲下。此方安胎止痛皆效。不可盡述。(溫隱居方)
⑧ 治妊娠胎動。偶因所觸。或跌墜傷損。致胎不安。痛不可忍。者。縮砂熨斗內炒熟。去皮用仁搗碎。每服二錢。熱酒調下。須臾覺腹中胎動極熱。即胎已安矣。神效。(孫尚藥方)
⑨ 治婦人血崩。新縮砂仁。新瓦焙研末。米飲服三錢。(婦人良方)
⑩ 治熱癰疔痛。縮砂殺為末。水服一錢。(戴原禮方)
⑪ 治牙齒疼痛。縮砂常嚼之良。(直指方)
⑫ 治口吻生瘡。縮砂殺。煨研。擦之即愈。此蔡醫博祕方也。(黎居士簡易方)
⑬ 治魚骨入咽。縮砂。甘草等分為末。熱酒含之。嚥汁。當隨痰出矣。(百一選方)
⑭ 治誤吞金銀銅錢等物不化者。濃煎縮砂湯飲之。即下。(危氏得效方)
⑮ 治一切食毒。縮砂仁末。水服

八六二
一二錢。(事林廣記方)
用量 八分至錢中。
應用宜忌 凡陰虛及有實熱者。禁用。得詞子。豆蔻。白蘇。艾。繫甲良。
【砂仁炒熟地】 即熟地和砂仁拌炒成者之處方用名。蓋熟地經砂仁拌炒之後。可免泥隔之弊。詳「熟地黃」條。
【砂仁酒】 製法 用縮砂仁炒研。袋盛。浸酒飲。
主治 消食和中。下氣。止心腹
【砂米】 即砂仁之處方用名。詳「砂仁」條。
【砂活】 即大生地之古籍別名。與見和漢藥考。詳「大生地」條。
【砂按子】 古籍別名。倒行狗子。睡蟲。(綱目拾遺)
鹽地 生砂石間。
形態 砂按子為溼生蟲類之一種。其狀作旋孔。大如大豆。背有刺。能倒行。性好睡。可供藥用。
性質 有毒。
主治 生取置枕中。令夫婦相好。合射同用。能殺飛禽走獸。

【砂糖】即赤沙糖之古籍別名。典見和漢藥考詳「赤沙糖」條。

【砂糖椰子】即桃椰子之日本名。詳「桃椰子」條。

【符標】即紫貝之古籍別名。典見和漢藥考詳「紫貝」條。

【砒石】即砒霜之原名。詳「砒霜」條。

【砒黃】基本本品為砒之未經煉製者。性質苦酸暖有毒。

主治瘰癧腎氣帶之辟蛋虱。歷代記述致證【宋】陳承本草別說論砒黃曰冷水磨服解熱毒治痰癩【宋】寇宗奭本草衍義論砒黃曰磨服治瘰癧積氣【明】李時珍本草綱目論砒黃曰除胸膈積刺爛肉蝕瘡腐瘰癧。

卷致資料 砒黃有殺蟲祛痰之奇效。然祇可作丹丸並須用醋煮過再和他藥作丸服時須用冷水送下。服後屏絕飲食。靜臥一日或一夜。可不作吐。然毒烈之性。時於鈞吻射回。猶犬鼠雀食少許立斃。人服一錢許即死。若得燒酒則解。爛腸胃尤能頃刻殺人。雖有綠

豆冷水亦難解其毒也。(醫學大辭典)

【砒黃】即雌黃之古籍別名。典見和漢藥考詳「雌黃」條。

【砒霜】原名砒石。命名本品性猛如鏡。故名。惟出信州。故人呼為信石。而又隱信字為人言也。

處方用名 白砒。紅砒。古醫別名 信石。人言。金脚砒。(綱目)

外國名詞 Arsenic. (英) 基本 係金屬岩類。為神礦中所含之白色粉末。

產地 陳仁山藥物生產辨云。信石產廣東北江平石樂昌等處。有紅白之分。

形態 燒含砒礦而得之昇華物。為白色之粉末。使再三昇華而精製之。則為透明如玻璃之塊。置空氣中。漸變白色。仍為粉末。熱水微溶解之。置木炭上熱之。則發蒜臭。

種類 生者名砒黃。色赤者良。鍊者名砒霜。色白者良。

製法 雷斅曰。凡使用以小盞

瓶。後入紫背天葵。石龍芮二味。火煨。從已至申。便用甘草水浸。從申至子。取出拭乾。入瓶再煨。別研三萬下。用時珍曰。草家皆言生砒。輕見火則毒甚。而醫氏治法。用火煉。今所用多是飛煉者。蓋皆欲求速效。不惜其毒也。曷若用生者為愈乎。

用法 恒以剉研。和入外傳藥。間有和作丹丸用。

性質 苦酸暖。有大毒。效能 殺蟲。劫痰。塗瘡。用為載劑。及疥漏痔漏藥。

作用 服小量。能刺激胃黏膜。使胃液分泌增加。以促進消化之機能。使食慾增加。至腸始漸次被腸壁吸入至血中。能令赤血球繁殖迅速。血液之循環增高。若服大量。則惹起腸胃炎。而呈中毒現象。外用有直接防腐殺菌之能。但用之過久。反有釀成腐爛之虞。

主治 砒霜療諸癩風。痲在胸膈。可作吐劑。不可久服。傷人。

歷代記述致證 【宋】大明諸家本草論砒霜曰。治婦人血氣衝心。崩落胎。【明】李時珍本草綱目

論砒霜曰。蝕癩疽敗肉。枯痔殺蟲。殺人及禽獸。【明】李士材本草圖解論砒霜曰。砒石辛酸。大熱大毒。主老痰諸癩。腐爛癬積。蝕癩腐瘰。癩砒石大熱大毒。煉成霜。其毒尤烈。人服至七八分即死。得酒頃刻殺人。雖綠豆冷水亦難解矣。入丸藥中。劫約喘痰癩。誠有立地奇功。須冷水吞之。不可飲食。靜臥一日。即不作吐。少物引發。即作吐也。惟宜生用。不可經火。【清】黃宮繡本草求真論砒霜曰。砒石出於信州。故名信石。即錫之苗。故錫亦云有毒。色白。有黃者。名金脚砒。煉過者曰砒石。色紅最烈。性味辛苦而鹹。大熱大毒。煉砒時。人立上風。十餘丈。其下風所近草木皆死。毒鼠鼠死。猶犬食亦死。人服至一錢者立斃。若酒服及燒酒服。則腸胃腐爛。頃刻殺人。雖煮豆冷水亦無解矣。奈何以必死之藥。治不死之病。惟照法牢固。為毒為癩。果因寒結。不得已。借此酸苦涌泄吐之。及殺蟲枯痔外敷。

國外學說 日本和漢藥考曰。燒含砒礦而生之昇華物。別導入

八六三

九靈砂研砒

九靈 砒

一室。使凝結而製之。含砒鏡有種種。其主要者。如稱毒砂之砒鏡。鏡。稱毒砂之砒鏡。皆是。所謂毒砂者。即礬石。為最著名之殺鼠藥。又自然砒。一名礬石。為徑五六分之金來糖狀。外面簇生針方六面。發之小結晶。亦供製砒霜之用。又曰。日本藥局方所規定亞砒酸。一次之極量。為〇・〇〇五。亞砒酸中。日本藥局方載有砒石解毒劑。若砒霜中。則因如也。茲將從前所定之種種解毒劑。摘錄數則。如左。黃礬散。服毒者。砒信為重。用小荷根搗汁飲之。立效。或用下方。亦有奇效。大黃一兩。明礬五錢。共為末。每服三四錢。冷水調下。瀉毒神丹。服砒霜中。五臟欲裂者。腹必大痛。舌必伸出。眼必流血而死。最可慘也。急用下方。當歸三兩。大黃一兩。白礬一兩。甘草五錢。水煎湯數碗飲之。立時大瀉。則生。否則不治。救急丹。世間毒藥。莫此為甚。救法必須吐其毒。甘草二兩。瓜蒂七個。玄參二兩。地榆五錢。水煎服。一下喉即吐。再煎渣服之。又吐。砒霜之毒。必然。苦參湯。苦參三兩。

煎湯一碗。一氣服之。即大吐而愈。總以吐解毒為度。醒後仍不語者。每日以綠豆湯飲之。毒盡自愈。砒霜服未久者。取雞蛋一二十個。打入碗內。攪勻。入明礬三錢。瀉之。吐則再瀉。吐盡便愈。解砒毒神驗方。白礬三錢。調水飲之。立解。誤中砒毒。全身紫黑。百解不效。此名砒霜癩瘡。黃土地上。挖一斗大坑。以井水滿之。攪令渾濁。以一碗與之。少刻又與之。待紫癩散盡。一吐即愈。雖冬月亦宜用此法。甚效。解砒霜毒。煩躁如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾者。黑鉛四兩。磨水一碗。瀉之。又方。麻油一碗。瀉之。又方。白扁豆。不拘多少。為細末。入青黛等分。細研。再入甘草末少許。巴豆一枚。去殼不去油。別研為細末。取一半。入藥內。以砂糖一大塊。水化開。添成一大盞飲之。毒隨利去。夜服五苓散之類。又方。急以人尿汁灌之。即解。若在胸中作痛者。急以磨礬三分。研細。冷水調灌。即吐出。若在腹中痛甚者。宜用黑鉛四兩。磨水兩三碗。漸瀉之。即大瀉。出毒氣而愈。在臨上。則瓜蒂散吐之。

在腹中。則萬病解毒丹下之。
配合應用 治中風痰厥。四肢不收。昏倒吞酸。砒霜如綠豆大。研。新汲水調下少許。以熱水投之。大吐即愈。未吐再服。(聖藥方)
治寒熱痞疾。用信砒二兩。研粉。寒水石三兩。別搗末。生鐵銹一箇。鋪石末。後鋪砒在上。又以石末蓋之。厚蓋覆定。醋糊紙條。密封十餘重。炭火一斤。煨之。待紙條黑時。取出候冷。刮盡上砒末。乳細。粟米飯丸。綠豆大。辰砂為衣。每用三四丸。小兒一二丸。發日早以鹽茶清下。一日不得食吐物。男人患。女人者。藥入口中。女人患。男人者。藥入口中。本方用人言一錢。綠豆末一兩。為末。無根井水丸。綠豆大。黃丹為衣。陰乾。發日五更井水下五七丸。衛生寶鑑。一剪金。用人言醋。麥硫黃。綠豆等分為末。每一豆許。用紅絹包之。絲紮定。每剪下一粒。新汲水空心吞下。治瘡聖藥也。醫藥元戎丸。轉靈砂丹。用砒霜。黃丹。紫河車各一錢。為末。雄黑豆一百粒。水浸一夜。研泥和丸。梧子綠。豆。黍米三樣大。每服一二十丸。發

八六四

日五更向東。無根水下。紫河車綠豆。黑豆皆解砒毒也。本草極度不。二散。用砒一錢。麵二兩。和勻。香油一斤。煎黃色。以草紙壓去油。入茶三兩。為末。每服一錢。發日早冷水下。(孫真宗秘寶方)
治一切積痢。砒霜。黃丹等分。攪和。收旋丸。綠豆大。每米飲下三丸。(普濟方)
治休息下痢。經一二年不痊。羸瘦衰弱。砒霜成塊者。為末。黃丹各半兩。化入。砒柳條。攪。魚則換。至七條。入起。之。每旋丸。梧子大。冷水送下。小兒黍米大。冷水下。亦治脾疼。腹痛。(和劑局方)
治走馬牙疳。惡瘡。砒石。錫綠。等分為末。攤紙上貼之。其效如神。又方。砒霜半兩。醋調如糊。發內盛。待乾。刮下。用粟米大。綿裹。安齒縫。來日取出。有蟲自死。久患者。不過三日即愈。(普濟方)
治頂上瘰癧。梁州砒黃研末。濃墨汁丸。梧子大。鋪肉炒乾。竹筒盛之。每用針破。將藥中丸。貼之。自落。蝕盡為度。(靈苑方)
治一切漏瘡。有孔。用信石。新

五火熾。研末。以津調少許於紙捻上。插入。飲去惡管。瀉多勿齊。上最妙。(急救易方)

用量 三釐至五釐。

應用宜忌 凡非氣壯邪實者

禁用。畏綠豆、冷水、羊血。

參攷資料 ①此乃大熱大毒

之藥。而砒霜之毒尤烈。鼠雀食少許即死。猶犬食鼠雀亦殆。人服至一錢許亦死。雖鈎吻射罔之力。不過如此。而宋人著本草。不甚言其毒。何哉。此亦古者砒石之一種也。若得酒及燒酒。則腐爛腸胃。頃刻殺人。豈綠豆冷水亦難解矣。今之收瓶酒者。往往以此烟熏瓶。則酒不壞。其亦嗜利不仁者哉。飲酒滯受其毒者。徒歸咎於酒耳。此物不入湯飲。惟入丹丸。凡痰癆及胸喘。用此真有起病立地之效。但須冷水吞之。不可飲食杯勺之物。靜臥一日或一夜。亦不作吐。少物引發。即作吐也。其燥烈純熱之性。與燒酒眉消同氣。寒疾濕痰。被其劫而傷。墮頤開故也。今烟火家用少許。則爆聲更大。急烈之性可知矣。此藥亦止宜於山野藥醫之人。若嗜

九盡 砒 禹

酒膏梁。非其所宜。疾亦再作。不慎口慾故爾。凡頭瘡及諸瘡見血者。不可用此。其毒入經。必致殺人。李樓奇方云。一婦病心痛數年不愈。一醫用人言半斤。茶末一分。白湯調下。吐瘀血一塊而愈。得日華子治婦人血氣心痛之旨乎。(李時珍) ②砒霜不著所出郡縣。今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鷄子黃。明澈不雜。此類本處自是難得之物。一兩大塊。真者人競作之。不啻千金。古服食方亦載用之。必得此類。乃可入藥。其市肆所言片如細屑。亦夾土石。入藥服之。為害不淺。(蘇頌) ③信州玉山有砒井。官中封禁甚嚴。生不夾石者。色亦甚於雄黃。以冷水磨。解熱毒。近火即殺人。所謂不啻金價者此也。今市貨者。取山中夾砂石者。燒烟飛作白霜。乃碎屑而芒刺。其傷火多者。塊大而微黃。所謂如鷄子色明澈者此也。古方並不入藥。惟燒煉丹石家用之。近人多以治瘡。但以搗木傷。而此物生者能解熱毒也。今俗醫不究其理。即以所燒霜服之。必大吐下。

因此幸有安者。送為所損極多。宜謹慎。初燒霜時。人在上風十餘丈外。立下風所近草木皆死。又和飯毒鼠。猶犬食之亦死。毒過於射罔遠矣。街山所出。一種力差。劣於信州者。(陳承) ④今信鑿坑井下取之。其坑常封鎖。坑中有濁綠水。先絞水盡。然後下墜取生砒。謂之砒黃色。如牛肉。或有淡白路。謂石非石。謂土非土。磨酒飲。治積氣。有火便有毒。不可造次服也。取法將生砒就置火上。以器覆之。令烟上飛。著器凝結。勢然下垂。如乳尖者。入藥為勝。平短者次之。大塊乃是下等。片如細屑者極下也。(宗奭) ⑤此乃錫之苗。故新錫器盛酒。日久能殺人者。為有砒毒也。生硫黃以赤色者為良。然砒霜以白色者為良。(李時珍) ⑥痰喘胸膈。凡天兩便發。坐臥不得。飲食不進。乃肺竅久積冷痰。遇陰氣觸動。則發也。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入砒霜末一錢。枯白礬三錢。丸綠豉大。每用冷茶冷水送下。七丸。甚者九丸。小兒五丸。忌食熱物。(劉涓子) ⑦信石有大毒。服之令胃熱

劇。驟生大炎。甚至潰爛而死。至苦。信石雖有大毒。少用些微。藥則大有功力。作信石水母。用上等信石一錢二分。加鹽二錢。兩水一斤。微火熬至十二兩。鹹與信石融合。兩俱不見。是為信石水母。每用信石水母一兩。加清水十二兩。每服一兩。日服二三次。計服每一兩。兩水中僅有信石十二分釐之一耳。此水治發寒熱。應證。大有效驗。並能治皮病各種癬。(內科新說)

【禹穴石】 命名 出石泉禹穴之下故名。

產地 在四川龍安府石泉縣

石組類 以紅如濕血者佳。

形體 以紅如濕血者佳。

主治 催生難產。

【禹韭】 即麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳「麥門冬」條。

【禹孫】 即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤瀉」條。

【禹哀】 即六一餘糧之古籍別名。典見吳普本草。詳「六一餘糧」條。

【禹餘糧】 即土茯苓之原名。詳「土茯苓」條。

九 璽 禹

【禹餘糧】

命名 本品係石類。石中有細粉如麵。相

傳夏禹棄其所餘食於江中。化而爲此。

處方用名 餘糧石。

古醫別名 白餘糧。自然穀。(和漢藥考)

產地 陳仁山藥物生產辨云。

禹餘糧產廣東北江各屬。和漢藥考曰。日本之大和越中。信濃美濃

長門讚岐。土佐伊勢等處產之。

形態 爲黃褐色。作不正形之固塊。礦物。大一寸至三寸許。外殼

厚一二分。質堅硬。碎之。內部有赭褐色細末。供藥用。

製法 陶弘景曰。凡使禹餘糧。須用細研。水洗取汁澄之。勿令有

沙土也。

性質 甘。寒。無毒。

效能 用作重瀉固下。清熱止血。及貧血萎黃藥。

主治 咳逆寒熱煩滿。下赤白血閉。癥瘕大熱。鍊餌。服之不饑。輕

身延年。(本經)療小腹痛結煩疼。

(別錄)

國外學說 日本和漢三才圖

會曰。禹餘糧。卽石中黃麵。其未凝者。名石中黃水。本邦石中亦稀有之。然係秘藥。不常用。故識者亦鮮焉。以爲禹王食餘者。浮說也。又手板發蒙曰。禹餘糧。日本諸州皆產之。惟以中國產者爲上。太一餘糧(石腦禹哀)係中國所產。日本者

多產和州生駒山。禹餘糧。太一餘糧。其初俱爲石中水。後凝爲粉。又日用藥品考曰。禹餘糧(藥用)殼中粉。所謂糧也。禹餘糧。太一餘糧。二品。祇其實有精粗。性味效用皆同。時珍亦言可通用。以中國運來者爲真。日本產亦多。惟今藥舖有以土殷摩搗碎者。宜審用。又禹餘糧一呼鳴石。產大和國奈良郡三笠山。該處呼爲饅頭石。據云

止血有奇效。又日本信州北部出產亦多。相傳此石係昔時親鸞上人巡遊該地時所遺。上人之法力。寄於此石。頭痛及其他種種病症。用之立效。又安東伊三次郎氏著『礦物界之現象』一書。其中對於鳴石與禹餘糧。分別記載。其記鳴石之成因云。鳴石初於沼澤內。以土地爲中心。其周圍有泥鐵礦

(Clay Iron Ore) 沉澱固結。成爲皮殼。經滄桑之變。由水而陸。及漸乾燥。其內部之黏土。漸失水氣。減小容積。變成小塊。卽爲鳴石。其泥鐵礦多一部。或全部變成褐鐵礦。又記禹餘糧云。禹餘糧爲大小不一之圓石片及砂粒。由褐鐵礦膠黏成爲皮殼。內有空房。含有黏土者。卽變岩之一種。其成因與上述鳴石相似。所含之黏土。昔時卽用作傷藥。爲人所重。蓋此黏土。其實細淨。用作止血劑頗有效也。(原書一百九十二頁)

配合應用 治大腸咳嗽。咳則遺矢者。赤石脂禹餘糧湯。主之。方同下。(潔古家珍方)

治冷勞腸泄不止。神效。太一丹。禹餘糧四兩。火煨醋淬。烏頭一兩。冷水浸一夜。去皮。焙爲末。醋糊丸。梧子大。每食前溫水下五丸。(聖惠方)

治傷寒下痢不止。心下痞。斬利在下焦者。以赤石脂禹餘糧湯。主之。赤石脂禹餘糧各一斤。並碎之。水六升。煮取三升。去滓。分再服。(仲景傷寒論方)

八 六 六

治赤白帶下。禹餘糧火煨。醋淬。乾薑等分。赤面乾薑。爲末。空心服二錢七。(勝金方)

治崩中漏下。青黃赤白。使人無子。禹餘糧煨研。赤石脂煨研。牡蠣煨研。烏賊骨。伏龍肝。炒。桂心等分。爲末。溫酒服。方寸七。日服。忌葱蒜。(張文仲備急方)

治官腸氣痛。婦人少腹痛。禹餘糧爲末。每米飲服二錢。日二服。極效。(衛生易簡方)

治產後煩燥。禹餘糧一枚。狀如酸饅者。入地理一半。緊築炭灰一斤。煨之。溼土罌一宿。打破。去外面石。取裏面細者。研水。淘五七度。日乾。再研萬遍。用甘草湯服二錢。一服立效。(經驗方)

治身面癢痕。禹餘糧。半夏等分。爲末。雞子黃和敷。先以布拭赤。勿見風。日三十日。雖十年者亦滅。(聖濟方)

治大風癩疾。眉髮俱落。遍身頑瘡。禹餘糧二斤。白礬一斤。青鹽一斤。爲末。罐子固濟。炭火一秤。煨之。從辰至戌。候冷。研粉。埋土中三日。取出。每一兩入九蒸九曝炒熟。

胡麻末三兩。每服二錢。荊芥茶下。日二服。(聖惠方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡非虛症而有實邪者禁用。

著名方劑 禹餘糧丸。治十種水氣。脚腫上氣。喘滿。小便不利。但是水氣。悉皆治之。許學士及丹溪皆云。此治膨脹之要藥。即針砂丸。又曰蛇含石丸。禹餘糧三兩。真針砂五兩。以水淘淨。炒乾。入餘糧一處。用米醋二升。就鉢內煮醋乾。為度。後用銚並藥入炭火中燒紅。銚出。傾藥淨。磚地上。候冷。研細。蛇含石火者三兩。以新鐵鉢盛。入炭火中燒。石與銚子一般紅。用銚取。蛇黃。傾入醋中。候冷。研極細末。用上三物為主。其次量人虛實。入下項諸藥。羌活。木香。茯苓。川芎。牛膝。桂心。白豆蔻。大茴香。蓬朮。附子。乾姜。青皮。三稜。白蒺藜。當歸。各半兩。浸一宿。為末。入煎藥。拌勻。以湯浸。蒸餅。搗去水。和藥。再拌為丸。梧子大。食前。溫酒白湯。任下。三十丸至五十丸。最忌鹽食。犯之愈甚。此方兼治有形之積塊。

九靈 禹 禹 秋

參攷資料 禹餘糧手足腸

明血分重劑也。其性瀉。故主下焦前後諸病。李知先詩曰。下焦有病。人難會。須用餘糧赤石脂。抱朴子云。禹餘糧丸。日再服。三日後。令人多氣力。真擔遠行。身輕不極。(李時珍) 禹餘糧生東海池澤。及山島中。或池澤中。(別錄) 今多出東陽。形如鵝鴨卵。外有殼。重疊。中有黃細末。如蒲黃。無沙者佳。近年茅山墜地。穴得之。極精好。狀如牛黃。重重甲錯。其佳處乃紫色。際際如麵。嚼之無復。嗚。仙經服食用之。南人又呼平澤中一種藤葉。如莖。莖根作塊。有節。似莖。莖而色赤。味似薯蕷。謂為禹餘糧。此與生池澤中復有髮。或疑今石即是太一也。(陶弘景) 今惟澤州潞州有之。舊說形如鵝鴨卵。外有殼。今圖上者。全是山石之形。都不作卵狀。與舊說小異。採無時。張華博物志。首扶海洲。上有藟草。其實食之。如大麥。名自然穀。亦名禹餘糧。世傳禹治水。棄其所餘食於江中。而為藥。則藟草與此異物同名。抑與生池澤者同種乎。(蘇頌) 禹餘

糧乃石中黃粉。生於池澤。其生山谷者。為大一餘糧。陶引藤生禹餘糧。蘇引草生禹餘糧。雖名同而實不同。蓋皆太一禹餘糧也。(李時珍)

【禹餘糧】即麥門冬之古籍別名。典見別錄。詳『麥門冬』條。即藟草之古籍別名。典見綱目。詳『藟草』條。

【禹瀉】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【禹】即果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【秋白霜】即人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中白』條。

【秋石】 命名 本品係用石膏和入秋露水而製成者。故名。

處方用名 淡秋石。淡秋冰。鹹秋石。

古醫別名 秋冰。(綱目)

外國名詞 Urea as medicinal (Chi.)

產地 陳仁山藥物生產辨云。淡秋石用泡淡人中白粉。瓦盆裝貯。一交秋天。日未出時。身臨禾田。

將禾尾之秋露水用白夏布接之。至夏布溼透。則將此水絞於人中白盆內。務須漬至透為度。用搗鉢杵勻。再用新階磚一塊。用銅挑挑於階磚上。略一爽身。即取去曬乾。如此造法。方可稱為淡秋石。否則有名無實。害人不淺。鹹秋石。產自湖北省漢口。查係用石鹽煮而成之。

形體 秋石色白質重。而堅似石塊。其粒大小不一。味有鹹淡兩種。其秋冰為輕虛雪白之凝結粉末。

種類 人尿和石膏。再入秋露水而製成者為秋石。秋石和秋露水。再以養化升煉者為秋冰。

製法 嘉謨曰。秋月用童便一缸。入石膏末七錢。桑枝攪澄。傾去清液。如此三次。乃入秋露水一桶。攪澄。又如此數次。滓穢盡。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。刮去在下重濁。惟取其輕清在上者。便為秋石。男用童女溺。女用童男溺。製之。再以秋石入秋露水。養化。入陽城罐內。新紙蓋定。鹽泥固濟。昇打三炷香。取出再研用。如再昇打。

九 蠶 秋

邊內徐徐用水塗之。水不可過多。過少。從辰至未。退火冷定。邊上昇起者。便是秋冰。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 滋腎水。退骨熱。降火。明目。用作滋養強壯藥。

主治 滋腎水。養丹田。返本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰咳。退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論秋石曰。虛勞冷疾。小便遺數。溺精白濁。【清】黃宮繡本草求真論秋石曰。秋石本於人溺。因秋露水攪澄。曬乾刮取而成。故名秋石。味鹹氣溫。投書載能滋陰潤燥。退熱軟堅。治癆止咳。通利便。清精固氣。且云經火煨煉。去其鹹寒。轉為溫補。溫而不燥。潤而不滯。清不損元。降不敗胃。為滋陰降火之聖藥。然竊竊謂補虛少而清虛多。溫虛少而寒虛多。虛勞火重服此。似不甚礙。間有微力。亦非補中正劑。若使氣薄火衰。水泛。縱經煨煉。終不免有虛虛之禍矣。

配合應用 ①秋石還元丹。久

服去百病。強骨髓。補精血。開心益志。補暖下元。悅色進食。久則臍下常如火暖。諸般冷疾皆愈。久年冷勞虛癯者。服之益壯盛。其法以男子小便十石。更多尤妙。先搗大鍋一口。於空室內。上用深瓦甑接鍋口。以紙筋杵石灰泥。飯糲。并鍋口勿令通風。候乾。下小便約鍋中七八分。以夾爐下。用焗火煮之。若湧出。即少少添冷小便。候煎乾。即人中白也。入好磁子內。如法固濟。入炭爐中煨之。旋取二三兩。再研如粉。煮棗瓢和丸。如綠豆大。每服五七丸。漸加至十五丸。空心溫酒或鹽湯下。其藥常要近火。或時復養火三五日。則功效甚大也。（經驗良方）

②陰陽二煉丹。世之煉秋石者。

但得火煉一法。此藥須兼陰陽二煉。方為至藥。火煉乃陽中之陰。得火而凝。入水則釋。歸於無體。蓋質去味存。此陰中之虛也。水煉乃陰中之陽。得水而凝。過曝而潤。干歲不變味。去質留此坎中之質也。二物皆出於心腎二臟。而流於小腸。水火既蛇玄武正氣。外假天地之

水火。凝而為體。服之。選補太陽相火。二臟實為養命之本。空心服陽煉。日午服陰煉。此法極省力。與常法功用不侔。久疾服之。皆愈。有人得瘵疾。且嗽。諸方不效。服此。即瘵有人病。顛腹鼓。日久。加喘滿。垂困。亦服此而安也。陽煉法。用人尿十餘石。各用桶盛。每石入皂莢汁一甕。竹杖急攪百千下。候澄去清留渣。并作一桶。如前攪澄。取濃汁一二斗。濾淨。入鍋熬乾。刮下搗細。再以清湯煮化。符箕鋪紙。淋過再熬。如此數次。直待色白如雪。方止。用沙盒固濟。火煨成質。傾出如藥。未成更煨一二次。候色如瑩玉。細研入沙盒內固濟。頂火養七晝夜。取出攤土上。去火毒為末。覆膏丸。桐子大。每空心溫酒下三十九。陰煉法。用人尿四五石。以大缸盛。入新水一半。攪干。回澄。定去清留渣。又入新水攪澄。直候無臭氣。澄下如膩粉。方以曝乾。刮下再研。以男兒乳和如膏。烈日曬乾。蓋假太陽真氣也。如此九度為末。搗膏和丸。梧子大。每午日溫酒下三十九。（葉石林水雲錄方）

八 六 八

③秋水乳粉丸。固元陽。壯筋骨。

延年不老。却百病。用秋水五錢。頭生男乳。曬粉五錢。頭生女乳。曬粉五錢。乳香二錢。五分。麝香一分。為末。煉蜜丸。灰子大金箔為衣。烏金紙包。黃蠟固收。勿令洩氣。每月用乳汁化服一丸。仍日飲乳汁助之。秋水法。用童男童女尿。並各一桶。入大鍋內。桑柴火熬乾。刮下。入河水一桶。攪化。隔紙淋過。復熬。刮下。再以水淋煉之。如此七次。其色如霜。或有一斤。入礪內。上用鐵燈。蓋定。鹽泥固濟。昇打三炷香。看秋石色白如玉。再研。再如前昇打。燈。蓋上用水徐徐擦之。不可多。多則不結。不可少。少則不昇。自晨至未。退火冷定。其蓋上昇起者。為秋冰。味淡而香。乃秋石之精英也。服之滋腎水。固元陽。降痰火。其不昇者。即尋常秋石也。味鹹苦。醜肉食之。亦有小補。（楊氏顯真堂經驗方）

④直指秋石丸。治濁氣。干清精。

散而成膏。淋黃白赤。如肥膏。蠟油之狀。用秋石。鹿角膠。炒桑螵蛸。炙。各半兩。白茯苓一兩。為末。糕糊丸。梧子大。每服五十丸。人參湯下。

(直指方)

③秋石交感丹。治白濁遺精。秋石一兩。白茯苓五錢。菟絲子炒五錢。爲末。用百沸湯一盞。并華水一盞。煮糊丸。梧子大。每服一百丸。鹽湯下。(鄭氏家傳方)

④秋石四精丸。治思慮色欲過度。損傷心氣。遺精。小便數。秋石。白茯苓各四兩。蓮肉。芡實各二兩。爲末。蒸棗肉和丸。梧子大。每空心鹽湯下三十丸。(永類鈴方)

⑤秋石五精丸。常服補益。秋石一兩。蓮肉六兩。真川椒紅五錢。小茴香五錢。白茯苓二兩。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服三十丸。鹽湯溫酒空心下。(劉氏經驗方)

⑥治腫脹忌鹽。只以秋石拌飲食。得腫脹消。以鹽入。鹽煨過。少少用之。(摘玄方)

⑦治赤白帶下。真秋石研末。蒸棗肉搗丸。梧子大。每服六十丸。空心醋湯下。(摘玄方)

⑧治噎食反胃。秋石每用一錢。白湯下妙。(醫方摘要方)

⑨治服丹發熱。有人服伏火丹藥。多腦後生瘡。熱氣冉冉而上。一

道人教灸風市數十壯而愈。仍時復作。又教以陰煉秋石。用大豆黃卷煎湯下。遂愈。和其陰陽也。(王濟明餘話方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛無熱。脾虛便滑者禁用。

【秋冰】即秋石之古籍別名。典見綱目。詳「秋石」條。

【秋風子】即白皮子之別名。典見綱目拾遺。詳「白皮子」條。

【秋海棠】 古籍別名 八月春。斷腸草。相思草。斷腸花。(綱目拾遺)



秋海棠

形態 秋海棠爲溼草類之多。年生草本。高二尺餘。葉大。爲心臟形。端尖。中肋之兩側。成不等形。色綠如翠羽。背多紅絲。成界紋。莖色微紅而脆。性喜背陰而生。其花單性。四出。色粉紅。瓣治柔媚。以葉下有綠筋者。開花尤多。雅趣。有紅白

二色。一朵謝。則旁生二朵。二生四。四生八。遂漸增。放至末朶。乃結鈴子於枝極間。其花葉可供藥用。梗詳見該條。

性質 酸寒。無毒。
主治 擦癬殺蟲。潤肌澤面。除凍裂。浸蜜用。

【秋海棠梗】 主治 搗汁含漱。療咽喉痛。

【秋麻子】即大麻子。晚春種者之別名。典見本草拾遺。詳「大麻子」條。

【秋葉】即臭梧桐之古籍別名。典見採藥書。詳「臭梧桐」條。

【秋葵】即葵之種於初秋者。功用詳「冬葵子」條。

【秋蝴蝶】即射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳「射干」條。

【秋露白】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【稭米】即稭米之別名。典見綱目。詳「稭米」條。

【穿山甲】 原名 鱧鯉甲。穴陵而居。故曰鱧鯉。後俗稱爲穿山甲者。以其性喜穿山。而身被鱗

甲也。藥用其鱧甲。

處方用名 炙甲片。
古籍別名 龍鯉甲(郭璞)石鱧甲(臨海記)川山甲。透石鳥。鱧鯉甲(和漢藥考)

外國名詞 Manis-scala.
Pangolin-scala (英)

基本 屬哺乳動物貧齒類。爲鱧鯉魚之鱧甲。
產地 陳仁山藥物生產辨云。山甲片產安南東京等各埠。廣西各屬。南寧。百色等。均有出。和漢藥考曰。產東印度羣島及非洲。臺灣亦產一種。

形態 穿山甲軀體龐大。長三尺餘。頭小。有四足而短。其形稍似蜥蜴。體與尾不分明。僅次第變爲細長而已。全身被有鱗片。質堅如石。末端尖銳。並列若屋瓦狀。一似甲胃之在身。口吻稍長。無齒。舌如絲而長。以之捕食蟻等。爪長且銳。便於掘土之用。蓋聞穴居不出。夜則徘徊草叢。以覓食。性不活潑。步行亦遲。設遇外敵。則拳縮如蠅。舉起鱗片。以免危害。甲爲堅硬。如石之鱗片。色淡褐或黑褐。有光澤。大

九畫 秋 稭 穿

九盡穿

小不等。略成三角形。中央厚。邊緣薄。如刀鋒。甲之表面。自底部向末端。有無數之條線隆起。莖面則扁平。滑澤。

製法 李時珍曰。凡使穿山甲。方。用時或炮。或燒。或酥炙。醋塗炙。童便炙。或油煎。土炒。蛤粉炒。當各隨本方。未有生用者。仍以尾甲乃力勝。

性質 鹹。微寒。有毒。

效能 通經絡。潰癰疽。用作麻疹。痘疥。疥癬之內攻藥。兼用為通乳藥。

主治 五邪。驚啼。悲傷。燒灰酒服。方寸匕。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論穿山甲曰。療蟻瘻。瘡癩。及諸疔疾。【唐】甄權藥性本草論穿山甲曰。燒灰。傳惡瘡。又

治山嵐瘴氣。【宋】大明日華諸家本草論穿山甲曰。小兒驚邪。婦人鬼魅。悲泣。及疥癬痔漏。【明】李時珍本草綱目論穿山甲曰。除痰癆寒熱。風痺。強直。疼痛。通經脈。下乳汁。消癰腫。排膿血。通竅殺蟲。

配合應用 ①錢鯉甲。俗名穿

山甲。土炒。同乳香。沒藥。番降香。紅麴。山查。川通草。童便。治上部內傷。胸膈間疼痛。

①治癰腫未潰。資為引導。同當歸。白芷。金銀花。連翹。紫花地丁。夏枯草。牛蒡子。乳香。沒藥。甘草。貝母。皂角刺。

①得紫草。犀角。生地黃。治痘瘡毒盛。不得起發。色帶乾紅。枯燥者有功。

①治中風癱瘓。手足不舉。用穿山甲。左癱用右甲。右癱用左甲。炮熟。大川烏。頭炮熟。紅海蛤。如葶子大者。各二兩。為末。每用半兩。搗葱白汁。和成厚餅。徑寸許。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻。汁出。急去藥。宜謹避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根忌口。遠色調養。亦治諸風疾。

(衛生寶鑑方)

①治熱濕不寒。穿山甲一兩。乾薑十箇。同燒存性。為末。每服二錢。發日五更。井花水服。(楊氏家藏方)

①治下痢。寒急。穿山甲。蛤粉等分。同炒。研末。每服一錢。空心溫酒

下。(普濟方)

①治腸痔。氣痔。出膿血。用穿山甲。燒存性。一兩。肉豆蔻。三枚。為末。每米飲服二錢。甚者加蠟皮灰一兩。中病即止。(衍義方)

①治鼠痔。成瘡。腫痛。用穿山甲。尾尖處。一兩。炙存性。鼈甲。酥炙。一兩。麝香。半錢。為末。每服一錢。真茶湯服。效。(直指方)

①治蟻瘻。不愈。鱧鯉甲。二七枚。燒灰。豬脂調傅。(千金方)

①治婦人陰癩。硬如卵狀。隨病之左右。取穿山甲。之左右。邊五錢。以沙炒。焦黃。為末。每服二錢。酒下。(摘玄方)

①治乳汁不通。涌泉散。用穿山甲。炮研末。酒服。方寸匕。日二服。外以油梳梳乳。即通。亦治乳岩。乳癰。(單驗方)

①治吹奶。疼痛。穿山甲。炙焦。木通。各一兩。自然銅。生用。半兩。為末。每服二錢。酒下。取效。(圖經方)

①治痘瘡。變黑。穿山甲。蛤粉。炒。為末。每服五分。入麝香。少許。溫酒服。即發。紅色如神。(直指方)

①治腫毒。初起。穿山甲。插入殼

八七〇

芒熱灰中。炮焦。為末。二兩。入麝香。少許。每服二錢。半溫酒下。(直指方)

①治馬疔。腫毒。穿山甲。燒存性。貝母。等分。為末。酒調服。三四次。乃用下藥。利去惡物。即愈。(鮑氏方)

①治便毒。便毒。穿山甲。半兩。猪苓。二錢。並以醋炙。研末。酒服。二錢。外穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。或以土塗之。或與地榆。同用。亦有效。(直指方)

①治瘰癧。潰壞。用鱧鯉甲。二十一片。燒研。傅之。(集驗方) 又用穿山甲。土炒。斑蝥。熟艾。等分。為末。傅之外。以烏柏葉。貼上。灸四壯。亦效。(壽域方)

①治眉。鍊癬。癬。生眉中者。穿山甲。前胸。炙焦。為末。清油。和輕粉。調傅。(直指方)

①治鱧。入耳內。鱧鯉甲。燒研。水調。灌入。即出。(肘後方)

①治耳。出膿。穿山甲。燒存性。入麝香。少許。吹之。三日。水乾。即愈。(鮑氏小兒方)

①治耳。內疼痛。穿山甲。二個。夾土狗。二箇。同炒。焦黃。為末。每吹一

字入耳內。亦治耳聾。(普濟方)

①治耳鳴耳聾。聾及腎虛耳內如風水鐘鼓聲。用穿山甲一大片。以蛤粉炒赤。搗七箇。磨香少許。爲末。以麻油化蠟。和作挺子。綿裹塞之。(攝生方)

②治火眼赤痛。穿山甲一片。爲末。銷白紙上。紙捲作繩。燒烟蒸之。(醫城方)

③治倒睫拳毛。穿山甲。竹刀刮去肉。將羊腎脂抹甲上。炙黃。如此七次爲末。隨左右眼。用一字墮鼻內。口中噙水。日用三次。二月取效。(儒門事親方)

用蠶 錢半至三錢。
施用宜忌 凡瘡疔已潰而元虛者禁用。

參攷資料 ①穿山甲入厥陰陽明經。古方鮮用。近世風濕瘡科。通經下乳。用爲要藥。蓋此物穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡。達於病所。故也。按劉伯溫多能鄙事云。凡油能滲透。對穿山甲裏面肉質。投入自至漏處補住。又永州記云。此物不可於陸岸上殺之。恐血入土。則陸岸滲漏。觀此二說。

九畫 穿 突 竿 紅

是山可使穿。陸可使漏。而又能至滲處。其性之走竄可知矣。蘇曰。穿山甲王不留。婦人食了乳長流。亦言其迅速也。李仲南言其性專行散。中病即止。不可過服。又按德生堂經驗方云。凡風溼冷痺之證。因水溼所致。渾身上下。強直不能屈伸。痛不可忍。者。於五積散加穿山甲七片。看病在左右手足。或背脇疼痛處。即於鱧鯉身上。取甲炮熟。同全蝎炒十一箇。葱薑同水煎入。無灰酒一匙。熱服取汗。避風。甚良。(李時珍)

④形似鱧而短小。又似鯉而有四足。黑色。能陸能水。日中出岸。張開鱗甲如死狀。誘蟻入甲。即閉而入水。開甲。蟻皆浮水。因接而食之。(陶弘景) ⑤鱧鯉狀如鱷而小。背如鯉而闊。首如鼠而無牙。腹無鱗而有毛。長舌尖喙。尾與身等。尾鱗尖厚。有三角。腹內臟腑俱全。而胃獨大。常吐舌誘蟻食之。曾剖其胃。約蟻升許也。(李時珍)

【穿山甲肉】 性質 甘。溫。有毒。
參攷資料 ①鱧鯉肉最動風。風疾人幾食數樹。其疾一發。四肢

頓廢。(李杲) ②鱧鯉肉性竄而行。血風人多血虛故也。然其氣味俱惡。亦不中用。(李時珍)

【穿心排草根】 即甘松之別名。典見植物學大辭典。詳「甘松」條。
【穿地鈴】 即兔耳酸之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「兔耳酸」條。

【突厥白】 產地 出潯州。
形體 突厥白爲莖草類之一種。莖高三四尺。春夏間葉如薄荷。花如牽牛而紫。上有白稜。其根黃白色。狀如茯苓而虛軟。可供藥用。

採取 二月八月。採根曝乾用。
性質 苦。
主治 金瘡止血生血。補腰續筋。

【突厥雀】 命名 本品出北方沙漠。古突厥地。
古籍別名 鷓鴣冠雉。(綱目)
外國名詞 Pallas's three-toed sand-grouse

基本 係脊椎動物鳥類。鷓鴣類。沙鷄科之突厥雀。
形態 突厥雀爲原禽類。鷓鴣之一種。大如鷓鴣。形似雀。脚無後趾。

飛則雌前雄後。隨其行止。其肉可供藥用。
性質 甘。熱。無毒。
主治 補虛暖中。

【竿蔗】 即甘蔗之古籍別名。典見草木狀。詳「甘蔗」條。
【紅三七】 即小三七之古籍別名。典見綱目拾遺。見「小三七」條。

【紅小姐】 產地 生南安。
形體 莖葉略似秋海棠。與紅孩兒相類。而葉面綠。無赤脈。背淡紅。紋赤。可供藥用。



紅小姐

性質 味甘。溫。
效能 順經絡。升氣。補不足。
主治 婦人內竅不通。

【紅內消】 即何首烏之古籍別名。典見陳自明外科精義方。詳見「何首烏」條。 ②即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五味子」條。

【紅內消】 即五味子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「五味子」條。
【紅心灰蕓】即藜之古籍別名。典見庚辛玉冊。詳「藜」條。

【紅木香】 古籍別名。廣福藤。紫金皮。金谷香。緊骨香。木腹。(綱目拾遺)

形態 紅木香爲蔓草類藤屬之一種。立夏後生苗。枝莖蔓延。葉似桂而略尖軟。葉帶紅色。咀之微香而有滑澀。其根可供藥用。

製法 採得以水洗淨。去外粗皮。取內皮紅色者用。

性質 辛涼無毒。
主治 風氣痛。傷力。跌撲損傷。胃氣痛。食積痞脹。酒煎服。

【紅毛子】即小蝦之出於遠東平海者。功用與尋常蝦同。而作蝦醬爲尤佳。

【紅毛石皮】

產地 產自粵南澳瓊諸地。

形態 紅毛石皮。係屬石類。爲火石之外皮。色白如粉。質甚鬆脆。取之可供藥用。

效能 止血生肌。

主治 金瘡。

參攷資料 紅毛石皮。可以黏

合皮膚裂痕。其功用勝於千年石灰。

【紅毛茶】

產地 福建台灣諸地。

形態 紅毛茶係茶之一種。草生。葉形如瓜子。五瓣。開黃色小花。亦五瓣。根鬚如藤。可供藥用。

主治 時氣腹脹。悶鬱不舒。

參攷資料 紅毛茶於胸腹不快。壅塞痞悶之證。服之甚著效果。如能曬乾陳藏者。功用更良。

【紅毛參】

產地 南粵海外均有產。

形態 紅毛參。係參類之一種。形長三四尺。而粗如姆指。色紫黑。折之中有白點。痕起花紋。與建參相似。採之可供藥用。

主治 瀉痢。服之神效。

【紅半夏】

製法 用大半夏。先以每一兩入龍腦五分。硃砂爲衣。染之。先鋪燈草一重。約一指厚。排半夏於上。再以燈草蓋一指厚。以炒豆焙之。候乾取出用。

主治 清風熱。消痰涎。降逆氣。利咽喉。

【紅白蓮花】

性質 甘平。無毒。

主治 久服令人好顏色。變白却老。

【紅皮】即橋皮之古籍別名。典見湯液本草。詳「橋皮」條。

【紅皮藤】即省藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「省藤」條。

【紅百合】即山丹之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「山丹」條。

【紅豆】即相思子之古籍別名。典見綱目。詳「相思子」條。即赤小豆之俗名。詳「赤小豆」條。

【紅豆蔻】即高良薑子之原名。詳「高良薑」條。

【紅姑娘】即苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳「苦瓜」條。即天燈籠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天燈籠草」條。

【紅姑娘窠】即雀巢之古籍別名。典見綱目。詳「雀巢」條。

【紅杷子】即南天燭子。色紅者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「南天燭」條。

【紅松脂】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳「琥珀」條。

【紅林檎】即檳榔之日本別名。詳「檳榔」條。

【紅果草】

產地 出廣西。

形態 紅果草爲雜草類之一種。種有二。其果大者葉略尖。不可用。其果小如指頭者。葉四邊花。梗有軟刺。可供藥用。

性質 辛。

主治 牙痛。煎湯漱之。並擦酒刺。

【紅玫瑰】即玫瑰花之處方用名。詳「玫瑰花」條。

【紅花】

原名 紅藍花。命名 本品花色鮮紅。而葉頗如藍。故名紅藍花。紅花者。簡稱也。

處方用名 杜紅花。散紅花。藏紅花。結紅花。粒紅花。原紅花。

古籍別名 丹華。紅闌花。摘花。黃藍花。(開寶本草)未摘花。紅花。菜。(和漢藥考)

基本 屬菊科。爲紅花之花樹。產地 陳仁山藥物生產辨云。紅花產四川。河南。安徽爲最。雲南次之。有山石叻來者。名石生花。即洋紅花是也。原出長白山。遷往

洋紅花是也。原出長白山。遷往

洋紅花是也。原出長白山。遷往

洋紅花是也。原出長白山。遷往

由吉打後。附結而來。先到石叻沽售。故名石生花。實非產石叻。味辛辣。四川河南出產之貨。味辛香而不辣。色嬌鮮紅。洋花色淡。紅少黃多。粒花出自河南安徽。但近日結少到市。所有沽者。俱在廣州。市用紅花碎麵糊爲之。開染料亦有辦之。和漢藥考曰。產於中國。埃及印度及德法等國。日本產於關東九州及羽前。羽後等處。均係種植。非自生也。羽前。羽後所產。最爲有名。

形態 紅花爲二年生草本。莖高四五尺。葉爲廣披針形。邊緣有銳鋸齒。似荷而互生。莖與葉俱有利刺。花開於梢頭。色紅黃。狀如荷爲頭狀花序。總苞之邊緣。亦有利刺。紅花乃去莖與實。但取管狀之花苞。尖端五裂。長六七分。新鮮者帶紅黃色。陳久則現淡紅色。有一種不快之氣味。



紅花

九畫 紅

採取 採取期間。須在夏至後。每日朝露未晞之前。及須在枝刺未硬時。免指頭之刺傷。

製法 紅花採取後。去其莖。用花搗成小餅。曬乾。謂之錢餅。可作藥用。其僅曝乾者。謂之散紅花。入藥用。凡色紅而新鮮者佳。水煎則養血。酒煮則破血。

性質 辛。溫。無毒。

成分 爲紅色素（紅色素。卽俗所稱腦脂）之加年蜜克酸（Carthaminic acid $C_{17}H_{19}O_7$ ）

效能 功能去瘀血。生新血。用治婦人經病。藥及爲發汗解熱藥。其作用與鬱金相似。惟效較強。

主治 產後血暈。口噤。腹內惡血不盡。絞痛。胎死腹中。並酒煮服。亦主蠱毒。

歷代配述 攷曰 【元】朱丹溪本草衍義補遺論紅花曰。多用破留血。少用養血。【明】李時珍本草綱目論紅花曰。活血潤燥。止痛散腫。通經。【明】穆希雍本草經疏論紅花曰。紅藍花。乃行血之要藥。其主產後血暈。口噤者。綠惡血不下。逆上衝心。故神昏而暈及口噤。入

心入肝。使惡血下行。則鼻與口噤自止。腹內絞痛。由於惡血不盡。胎死腹中。非行活血。則不下。瘀行則血活。故能止絞痛。下死胎也。凡蠱藥之毒。必傷血分。此藥能行活血。活則毒可解。

國外學說 日本大和本草曰。紅花須候其開放時。於每日清晨採摘。久則花瓣脫落。不堪用。惟初開色黃。不可取。宜經日色變鮮紅。然後採之。其苗可食。此物忌沈香。麝香。凡用紅花染製之衣。如納沉麝之香。或置香囊。立即變色。又和漢藥考曰。紅花含有之成分。隨產地種類及栽培法等之不同而稍有不同。但其平均之數。大抵百分

中含水分七·三〇。加年蜜克酸〇·四一。黃色素及硫酸鹽三〇·六三。蛋白質三·七六。越幾斯質四·八九。木糖維四八·一二。酸化鐵及礬土〇·八七。酸化錳〇·二〇。又曰。日本之種。於南部者。曰南部種。莖高二尺許。花瓣短小。紅色美麗。佳品也。紀州產者。曰紀州種。高三四尺。瓣微長。不如南部種。間有外國來者。形色如本國

產。色深紅。有番紅花氣。亦可用。番紅花。卽別種也。

辨偽 鄭肯巽曰。僞名洋紅花。形雖似而色不清。不知何物僞充。按紅花卽紅藍花。生梁漢及西域。今處處有之。人家場園多種。花如大菊。色甚清紅。氣味辛溫。功能活血潤燥。止痛散腫。通經化滯。易僞之藥。亦至難信。有眞方無眞藥。良可慨已。曹炳章曰。按紅花三四月出新。河南歸德州出者。名散紅花。尙佳。亳州出者。亦名散紅花。略次。浙江寧波出者。名杜紅花。亦佳。皆紅黃色。山東出者。名大散花。次之。孟河出者。更次。河南淮慶出者。名淮紅花。略次。湖南產者。亦佳。陝西產者。名西紅花。較次。日本出者。色淡黃。味薄。名洋紅花。又有片紅花。色鮮紅。別是一種紅花。鮮搗壓成薄片。曬乾。大紅染坊作染眞紅用者。多。河川出者。名結子花。其色紅紫者佳。宴州出者。爲大結子花。此亦大紅染坊所用。結子花。僞者以蘇木研末。用麵糊搗透。做成粒。子。甚次。不如用杜紅花之爲妥。又有西藏紅花一種。花絲長。色

九鑿紅

黃傘微紅。性潤潤。氣微香。入口沁入心肺。效力甚強。為紅花中之極品。

近人學說 張山雷曰。紅花。其

葉如藍。而其花色紅。故古有紅藍花之名。始見於開寶本草。已名紅花。稱其辛溫。主治產後血暈。口噤。惡瘵。不盡。絞痛。胎死腹中。蓋以其色。殷紅。體質又輕。揚疏達。故專入血分。為疏通經絡。活血行滯之品。海藏謂辛甘苦溫。肝經血分之藥。得酒尤良。丹溪謂多用則破瘀。少用則養血。瀕湖謂活血潤燥。止痛散腫。通經。景岳謂達痘瘡血熱之難出。散斑疹血滯之不清者。石頭謂其解毒。散赤腫。治產後血暈。癢痛。宜和童便用之。過用亦使血行不止。且能上行。不可不知。要之性本溫和。氣兼辛散。凡瘀滯內積。及經絡不利諸證。皆其專主。但走而不守。迅利四達。不宜大劑。獨任。苟僅以為疏通和血之用。小劑亦無流弊。若養荷漫筆。所謂產悶已絕。以紅花數十斤煮湯。蒸之。半日乃蘇之說。則小說家無稽之言。必不足信。李瀕湖雖以許胤宗為

柳太后中風一法相比。或試以醫藥之實在功用言之。許案治病在膝理。藥氣薰蒸。以通皮毛之氣。猶可說也。若產後閉絕。則是裏病。豈薰蒸之氣所能達到。且病在血分。又非僅通其氣分。可以有功。況紅花又非氣分之藥。頗每謂文學家不明醫理。所載醫家治案。異想天開。不合醫藥之原理者。所在而是。二十四史方術傳中。已多怪怪奇奇之事。更何論乎。昌志家乘。傳記厄言。頗輯錄古今醫案。平議。皆戲以怪誕不經諸案。編為附錄一種。頗覺牛鬼蛇神。無乎不有。而考其原本。多出正史。多出志乘。若小說調言。猶不在。其列學者。必須辨得真。是非。而後醫藥之真相。乃不為邪說淫辭所蔽。則此道其庶乎有昌明之一日也。

配合應用

●治熱病。胎死腹中。新汲水濃煮紅藍花汁。和童便熱飲之。立瘥。胞衣不下。產後血暈。竝同此法。無不立效。

●紅花同延胡索。當歸。生地黃。牛膝。赤芍藥。益母草。川芎。或丸。或煎。治經阻少腹作痛。及結塊良。

●燕脂係紅花汁所造也。痘瘡初發時。以之抹眼。及眼角。可免瘡子入眼。

●紅花。薄荷。金絲荷葉汁。入蟬末少許。滴入耳中。治聾耳。

●紅花。冰片。真珠細末。治痘毒及痘疔。別破。令人吮出惡血。抹入瘡眼中良。

●治六十二種風。張仲景治六十二種風。兼腹內血氣痛。用紅花一大兩。分為四分。以酒一大升煎。鍾半頓服之。不止再服。(圖經本草)

●治一切腫疾。紅花熱搗。取汁服。不過三服便瘥。(外臺秘要方)

●治喉痺壅塞不通者。紅藍花搗絞取汁。一小升服之。以椶為度。如冬月無生花。以乾者浸溼。絞汁煎服。極靈驗。(廣利方)

●治產後血暈。心悶氣絕。紅花一兩。為末。分作二服。酒二盞。煎一盞。連服。如口噤。挖開灌之。或入小便尤妙。(子母秘錄方)

●治聾耳出水。紅藍花三錢。半。枯礬五錢。為末。以綿杖絞淨吹之。無花則用枝葉。一方去礬。(聖惠

八七四

方)

●治時腦拒食。端午採頭次紅花。無灰酒拌焙乾。血竭瓜子。揀者等分。為末。無灰酒一盞。隔湯頓熱。徐噉。初服二分。次日四分。三日五分。(楊起簡便方)

用重 八分至錢半。

應用宜忌 凡無瘀滯者禁用。

參攷資料 ●紅藍花即紅花也。生梁漢及西域。博物志云。張騫得種於西域。今魏地亦種之。(馬志)

●今處處有之。人家場圃所種。冬月布子於熟地。至春生苗。夏乃有花。花下作棘葉多刺。花出棘上。國人乘醫採之。採已復出。至盡而罷。林中結實。白顆如小豆。其花曝乾。以染真紅。又作胭脂。(蘇頌)

●紅花二月八月十二月皆可以下種。雨後布子。如種麻法。初生嫩葉。苗亦可食。其葉如小薊葉。至五月開花。如大薊花而紅色。侵晨採花。搗熟。以水淘。布袋絞去黃汁。又搗。以酸粟米泔清。又淘。又絞。袋去汁。以青荷覆一宿。曬乾。或揀成薄餅。陰乾。收之。入藥。搗碎。用其子。五月收採。淘淨。搗碎。煎汁入醋。

并蔬食極肥美。又可為車脂及燭者(李時珍)⑤辛溫則血調和。故少用則能入心養血。過於辛溫則血走散。故多用則能散(寇宗奭)

【紅花子】 性質 辛溫無毒。 主治 天行瘡痘。水吞數顆。

【紅花苗】 性質 辛溫無毒。 主治 生搗塗遊腫。

【紅花茶】 基本 為茶之一種。 或謂即係紅花之嫩苗製成者。

產地 出廣西省。 功用 消脹滯宿食。辟烟嵐瘴氣。

【紅花菜】 ①即山丹之古籍別名。 與見綱目。詳『山丹』條。 ②即紅花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『紅花』條。

【紅芽大戟】 即大戟之處方用名。 詳『大戟』條。

【紅孩兒】 產地 生南安。 形態 高尺許。根如

蠶而嫩。紅黃色。莖似魚兒牡丹。葉似木芙蓉而尖。秋冬開花。極肖秋海棠。結實作角如魚尾形而末小

九畫 紅

圓。皮薄如榆莢子。紅黃色。與魚子相似。



紅孩兒

主治 腰痛。

【紅孩兒】 即草八角之古籍別名。 與見綱目拾遺。詳『草八角』條。

【紅柴胡】 即柴胡之處方用名。 詳『柴胡』條。

【紅砒】 即砒霜之處方用名。 詳『砒霜』條。

【紅茂草】 古籍別名 地沒藥。 長生草(爾雅)通泉草(玉册)禿瘡花(綱目)

產地 生古道邱壘荒蕪諸地。 形態 紅茂草為石草類之一種。葉似地丁草。中心抽一莖。開黃白花。摘下。經年不槁。根入地至泉。其根葉可供藥用。

採取 春月採之。 性質 苦大涼。無毒。

主治 癰疽疔腫。焙研為末。冷水調傳。

【紅茂草】 即石長生之古籍別名。 典見和漢藥考。詳『石長生』條。

【紅茶】 命名 係茶之經製煉後而變成紅色者。

製法 取嫩茶葉佈於竹席之上。曝諸日光之中。時時攪拌。至葉逐漸萎縮。乃入袋揉搓。復曬於日以蒸散其水分。便入箱內。堆積壓緊。上蓋以布。迄變紅褐色。發佳香。即取出曝之。如前。使漸乾燥。再用爐焙乾即成。

主治 開胃消食。去油滯。餘與尋常茶同。

【紅茅根】 即地筋之處方用名。 詳『地筋』條。

【紅娘子】 即榜雞之頭翅皆作赤色者之別名。典見綱目。詳『榜雞』條。

【紅海粉】 命名 本品為海珠所吐之紅絲。故名。

古籍別名 海珠。海粉。 產地 出嶺南諸地。

形態 海珠為魚類軟體動物之一種。狀如蛤蜊。大如臂。所吐海菜。生於海濱或水中。其吐之絲。即謂海粉。鮮時或紅色。或綠色。隨海

菜之色為轉移。若曬曝不得法。則色變黃。其五色者。通稱為紅海粉。可供藥用。

主治 赤痢。風痰。瘰癧。瘰癧。同殺精草。小青草俱炒。飛青黛。刺蒺藜使君肉。共研末。用羊肝拌煎食。

【紅珠】 即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【紅珠大鋸草】 基本 為雜草類之一種。 可供藥用。

主治 膨脹。黃疸。並清火。消腫。敗毒。

【紅參】 即高麗參之別名。詳『高麗參』條。

【紅梅花】 即梅花之處方用名。 詳『梅花』條。

【紅梔子】 即山梔子花開爛紅色者之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【紅通草】 即通草之粉紅色者。 詳『通草』條。

【紅雪】 即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【紅棗】 即大棗色紅者之處方用

九聲紅

名詳大燕條。

紅絲線

古醫別名。血見愁。產地。南安。

形態 綠莖有毛。葉如山查花而薄。長柄下垂。結實如珠。生育熟紅。綠蒂托之。可供藥用。



紅絲線

主治 搗敷紅腫。

紅綿 卽麻脂用蘇木製成。浸入絲綿中者。詳麻脂條。

紅嫩 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳荔枝條。

紅蓮米 卽丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳丹黍米條。

紅蕉 卽芭蕉之葉瘦類。蘆箬者。花紅如榴。中有一點鮮綠可愛。自春開至秋方謝。性質效能與尋常芭蕉同。參見芭蕉條。

紅蔗 卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳甘蔗條。

紅燈籠 卽山慈姑之俗名。詳山慈姑條。

山慈姑條。

紅糖 卽赤沙糖之處方用名。詳赤沙糖條。

紅龍鬚 卽龍鬚藤之紅色者。詳龍鬚藤條。

紅螺 卽海螺之色微紅者。詳海螺條。

紅麴米 卽紅麴之處方用名。詳紅麴條。

紅藍花 卽紅花之原名。詳紅花條。

紅藍棗 卽君遷子之古籍別名。典見齊民要術。詳君遷子條。

紅藏 卽藏香之紅色者。功用詳藏香條。

紅藤 卽省藤之古籍別名。典見綱目。詳省藤條。

紅藥子 卽黃藥子之古籍別名。典見綱目。詳黃藥子條。

紅麴 命名 本品製法一如神麴。而成紅色故名。

處方用名 炒紅麴。紅麴米。基本 係用粳米製成之麴。

形態 紅麴爲粳米製而成。其粒之大小與粳米同。惟色則赤褐耳。

耳。

採取 春秋採製。

製法 李時珍曰。紅麴本草不載。法出近世。亦奇術也。其法白粳米一石五斗。水淘浸一宿。作飯。分作十五處。入麴母三斤。搗揉令勻。併作一處。以帛密覆。熱即去帛。攤開。覺溫急堆起。又密覆。次日日中。又作三堆。過一時。分作五堆。再一時。合作一堆。又過一時。分作十五堆。稍溫。又作一堆。如此數次。第三日用大桶盛新汲水。以竹筴盛麴。作五六分。糵完。又作一堆。如前法作一次。第四日如前。又糵。若麴半沉半浮。再依前法作一次。又糵。若盡浮則成矣。取出。日乾收之。其米過心者。謂之生黃。入酒及醱醢中。鮮紅可愛。未過心者不甚佳。入藥以陳久者良。

性質 甘溫無毒。

效能 破血瘀。消食積。用作健胃消化藥。

主治 酒食活血。健脾燥胃。治赤白痢下水穀。

歷代記述攷證 明吳瑞日用本草論紅麴曰。醱酒破血。行藥勢。殺山嵐瘴氣。治打撲傷損。明

李時珍本草綱目論紅麴曰。治女人血氣痛。及產後惡血不盡。搗酒飲之。良。明魏希雅本草經疏論紅麴曰。紅麴以白粳米雜麴母。蒸爲之。亦奇術也。人之水穀入於胃。受中焦濕熱。蒸熟。精氣變化而赤爲血。紅麴以白米飯受濕熱。蒸而變爲紅。皆造化自然之微妙也。故紅麴治脾胃營血之功。有同氣相求之理。消食健脾胃。與神麴相同。而活血和傷。惟紅麴爲能。故治血痢尤爲要藥。

配合應用 紅麴得香降香。通草。鯁甲。沒藥。治上部內傷。胸膈作痛。或怒傷吐血。和童便服。有神效。

紅麴同黃連。白藜豆。蕤內。黃芩。白芍藥。升麻。乾葛。烏梅。甘草。滑石。橘紅。治瀉下有神。

紅麴同續斷。香降香。延胡索。當歸。通草。紅花。牛膝。沒藥。乳香。治內傷血瘀作痛。

紅麴同澤蘭。牛膝。地黃。續斷。蒲黃。赤芍藥。治產後惡露不盡。腹中痛。

治濕熱泄痢。丹溪青六丸。用

耳。

六一散。加炒紅麴五錢爲末。蒸餅和丸。梧子大。每服五七十丸。白湯下。日三服。(丹溪方)

①治小兒吐瀉頗作。不進乳食。手足心熱。用紅麴年久者三錢半。白朮炒一錢半。甘草炙一錢。爲末。每服半錢。煎葦子米湯下。(經濟方)

②治心腹作痛。紅麴、香附、乳香等分爲末。酒服。(續古方)

③治小兒頭疔。因傷溼入水成毒。濃汁不止。用紅麴嚼碎之。甚效。(百一選方)

用錢 錢半至三錢。
應用宜忌 凡無血滯及氣滯者禁用。

【紅麴酒】 基本 本品係用紅麴釀成之酒。

主治 婦人腹中及產後瘀血。
【紅麴】 卽香麴紅皮者之別名。與見植物學大辭典。詳「香麴」條。

【紅蘆葭】 卽胡蘆葭之別名。與見隨息居飲食譜。詳「胡蘆葭」條。

【紅縷】 卽海縷之古籍別名。與見本草拾遺。詳「海縷」條。

九靈 紅 缸 美 舜 耐 胃 胆 胸 胎 胖

見黨參新研究。詳「黨參」條。

【紅蘭】 卽建蘭花之紅色者。其氣臭濁。不堪入藥。

【紅蘭花】 卽紅花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「紅花」條。

【紅鬚麥】 卽玉蜀黍之古籍別名。與見綱目。詳「玉蜀黍」條。

【紅鱧】 卽鱧魚之紅色者。與見動物學大辭典。詳「鱧魚」條。

【紅麴】 卽乾苦之古籍別名。與見綱目。詳「乾苦」條。

【紅鹽】 卽戎鹽之紅色者。詳「戎鹽」條。

【紅膏】 卽車脂之古籍別名。與見綱目。詳「車脂」條。

【美人豆】 卽相思子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「相思子」條。

【美人草】 卽罌粟殼之俗名。詳「罌粟殼」條。

【美人蕉】 卽虎頭蕉之苗高者。詳「虎頭蕉」條。

【美原烟】 卽烟草之產於美原地方者。功用與尋常烟草同。參見「烟草」條。

【美草】 ①卽甘草之古籍別名。與見別錄。詳「甘草」條。②卽旋花之

古籍別名。與見別錄。詳「旋花」條。

③卽山薑之古籍別名。與見藥性詳「山薑」條。

【美草】 卽大草之古籍別名。與見別錄。詳「大草」條。

【舜先】 卽葵蓬之古籍別名。與見陸機詩疏。詳「葵蓬」條。

【耐冬】 卽格石之古籍別名。與見新修本草圖經。詳「格石」條。

【耐冬藤】 卽忍冬藤之古籍別名。與見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【胃石】 卽石牌之古籍別名。與見綱目。詳「石牌」條。

【胆星】 卽天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【胆南星】 卽天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【胸殼】 卽蚯蚓之古籍別名。與見綱目。詳「蚯蚓」條。

【胎衣】 卽人胞之古籍別名。與見綱目。詳「人胞」條。

【胎雀】 卽鷓鴣之古籍別名。與見綱目。詳「鷓鴣」條。

【胖大海】 古籍別名 安南子。大洞果。(綱目拾遺) 胡大海。(俗名)

外國名詞 Burfatia (Eurythoeum)

產地 出於安南大洞山。

性質 甘淡。

主治 火鬱散閉。

參攷資料 出安南大洞山產至陰之地。其性純陰。故能治六經之火。土人名曰安南子。又名大洞果。形似乾青菓。皮色黑黃。起皺紋。以水泡之。層層脹大如浮靈然。中有軟殼核。殼內有仁二。甜味淡。治火閉痘服之立起。並治一切熱症。勞傷吐衄下血。消毒去暑。時行赤眼。風火牙疼。蟲積下食。痔瘡漏管。乾咳無痰。竹瀝內熱。三焦火症。諸瘡皆效。功難盡述。(趙思軒)

近人學說 此藥因產於外國。故俗稱胡大海。亦曰大發。以其一得沸水。卽裂皮發脹。幾盈一瓖。故也。近人用之。皆以治傷風咳嗽。鼻塞聲重等症。幾宜性溫。故能散寒。風然其味極淡。微含甘意。溫散之藥。決不如此。蓋全以胖大之性情作用。故善於開宣肺氣。并能通泄皮毛。風邪外閉。不問爲寒爲熱。並皆主之。抑能開音治瘡。爽嗽豁痰。

九疊 胖 胞 胡

趙謂治火閉之症。蓋熱毒壅於肌膚。而痘出不快者。此物開發最捷。宜有速效。想軒之說。當有徵也。經用二三枚。如肺閉已甚。咳不出聲。或金壅音嘶者。可用至五六枚。此蓋植物之果。與苗葉情性不同。故發汗。而極有應驗。絕無溫升擾動之弊。尤其可據。(張山雷)

【胖頭魚】即鱈魚之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「鱈魚」條。

【胞衣】即人胞之古籍別名。典見本草拾遺。詳「人胞」條。

【胡大海】即胖大海之俗名。詳「胖大海」條。

【胡巴】即胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡盧巴」條。

【胡王使者】即白頭翁之古籍別名。典見本經。詳「白頭翁」條。

【胡羌活】之古籍別名。典見吳普本草。詳「羌活」條。

【胡瓜】即黃瓜之原名。詳「黃瓜」條。

【胡沙】即虎沙之古籍別名。典見綱目。詳「虎沙」條。

【胡豆】即豌豆之古籍別名。典見本草拾遺。詳「豌豆」條。

即豆之古籍別名。典見綱目。詳「豆」條。

【胡芥】即白芥子來自胡地者之古籍別名。典見唐本草。詳「白芥子」條。

【胡芹】即馬薺之古籍別名。典見通志。詳「馬薺」條。

【胡面芥】產地 生嶺南諸地。形體 胡面芥為溼草類之一種。葉如地黃。可供藥用。性質 甘溫。無毒。主治 去風解冷氣。止腹痛。煮服之。

【胡桌子】即蒼耳子之古籍別名。典見本經。詳「蒼耳子」條。

【胡韭子】即補骨脂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「補骨脂」條。

【胡孫】即獼猴之古籍別名。典見格古論。詳「獼猴」條。

【胡核】即胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡桃」條。

【胡桃】命名 本品出羌胡。自漢張騫使西域始得種。選種之故名胡桃。羌桃。處方用名 胡桃肉。津桃肉。核

桃肉。 古籍別名 羌桃。(名物志)核桃。(綱目)播羅子。(梵書)胡桃。吳桃。唐楸子。陳平珍果。(和漢藥考) 基本 屬胡桃科之胡桃樹所結之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。核桃產於山東青州。及關襄等處。以關襄者為佳。十月新。

形態 胡桃樹為落葉喬木。幹高六丈餘。圍可六尺。大樹也。葉為羽狀複葉。小葉作長卵圓形。色深綠。有光澤。背面密生茸毛。幼樹之小葉。冠三片複葉。五六年後。則有七片複葉。夏間葉腋開黃白色之莖莢花。狀如穗而下垂。後結實。果為核果。中隔淡褐色之子皮。皮內包藏子仁。仁為白色胚乳。形若雙翼。此樹長成之後。幹身愈高。分枝愈少。故結實轉不如幼樹之多。

製法 剝去外殼。取果之核。曝於日中。切勿搖動。動則核仁生油。性味大變而有毒。

用法 剝去核殼。取仁。或生剉用。或炒對用。或連核殼杵碎。與他藥入水煎服。

性質 甘平。溫。無毒。

成分 胡桃在藥效上之成分。是否為脂肪油。尙未可知。其營養之價值。則為水分四。七四。蛋白質二八。四七。脂肪五九。一八。無氮素有機物三。一九。纖維一。五四。灰分二。八八。以胡桃壓榨而得之脂肪油。謂之胡桃油。初澄明。色淡黃。經日則作深黃色。易變性。臭味一如胡桃。

採取 每年十月間。採取其果實。曬乾。

出者。則氣味變為辛辣有毒。功用另見「油胡桃」條。

另見「油胡桃」條。

山胡桃。核殼為卵圓形。厚而堅硬。殼外有無數凹凸。難破。碎。必須以炭火焙之。再入水浸之。然後用小刀於其開口部破之。乃得子仁。

又有陳倉胡桃。核殼作心臟形。扁狹平滑。殼較薄。亦易破。此兩種油少而味美。

採取 每年十月間。採取其果實。曬乾。

製法 剝去外殼。取果之核。曝於日中。切勿搖動。動則核仁生油。性味大變而有毒。

用法 剝去核殼。取仁。或生剉用。或炒對用。或連核殼杵碎。與他藥入水煎服。

性質 甘平。溫。無毒。

成分 胡桃在藥效上之成分。是否為脂肪油。尙未可知。其營養之價值。則為水分四。七四。蛋白質二八。四七。脂肪五九。一八。無氮素有機物三。一九。纖維一。五四。灰分二。八八。以胡桃壓榨而得之脂肪油。謂之胡桃油。初澄明。色淡黃。經日則作深黃色。易變性。臭味一如胡桃。

選種之故名胡桃。羌桃。處方用名 胡桃肉。津桃肉。核

命名 本品出羌胡。自漢張騫使西域始得種。

和漢藥考。詳「胡桃」條。

胡核。即胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡桃」條。

胡孫。即獼猴之古籍別名。典見格古論。詳「獼猴」條。

胡羌活。之古籍別名。典見吳普本草。詳「羌活」條。

胡王使者。即白頭翁之古籍別名。典見本經。詳「白頭翁」條。

胡巴。即胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡盧巴」條。

胡沙。即虎沙之古籍別名。典見綱目。詳「虎沙」條。

胡豆。即豌豆之古籍別名。典見本草拾遺。詳「豌豆」條。



胡桃

種類 油胡桃。乃胡桃之油

效能 補肝腎。煖腰膝。治遺泄。療痰嗽。係滋養強壯藥。肉能潤養。皮能斂滯。

主治 食之令人肥健。潤肌。黑髮。多食利小便。去五痔。搗和胡粉。拔白髮。內孔中。則生黑毛。燒存性。和松脂研傳瘰癧瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論胡桃曰。食之令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論胡桃曰。治損傷石淋。同破故紙蜜丸。服補下焦。【明】李時珍本草綱目論胡桃曰。補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰脚重痛。心腹筋痛。血痢腸風。散腫毒。發痘瘡。制銅毒。【元】李東垣用藥法象論胡桃曰。去痔疾。消瘰癧。【明】繆希雍本草經疏論胡桃曰。胡桃稟火土之氣。以生。本經雖云甘平。然其氣多熱。而性潤。益血脈。補命門之藥也。血不充則消瘦。肌膚不澤。及鬚髮易白。益血。故令人肥健。潤肌。黑髮也。多食利小便者。以其能入腎固精。令水竅常通也。傳瘰癧者。甘熱能解毒散結。去五痔。取其

九畫 胡

潤腸除溼之功也。能脫人眉者。熱極則生風。風甚則萬物搖落之象也。青皮性瀉。故能染髮。【清】王士雄隨息居飲食譜論胡桃曰。胡桃甘溫潤肺。益腎利腸。化虛痰。止虛痛。健腰脚。散風寒。助痘漿。已勞喘。通血脈。補虛虛。澤肌膚。煖水腰。制銅毒。療諸癧。殺羊癩。解齒癰。【清】黃宮繡本草求真論胡桃肉曰。胡桃味甘氣熱。皮瀋肉潤。汁黑諸書皆言能通命火。助相火。利三焦。溫肺潤腸。補氣養血。斂氣定喘。瀋精固腎。與補骨脂一水一火。大補下焦。有同氣相生之妙。若使多食。則能動風。脫人眉毛。同錢細嚼。即與錢俱化。與甘蔗同嚼。則蔗渣消融。蓋因味甘則三焦可利。汁黑則能入腎通命。皮瀋則氣可斂而喘可定。肉潤則肺得滋而腸可補。氣熱則食不宜多。而有動風脫毛。火鍊消融。化銅之弊耳。是以瘡腫鼠瘻痰核。取其用能通鬱解結。惟肺有熱痰。暨命門火熾者。切忌。殺燒灰存性。治乳癰。反塗鬚髮皆黑。養血去皮用。斂滯連皮用。

著名方劑 青娥丸。治腎虛。為

風冷所乘。或坐臥溼地。或墜墮損傷。皆令腰間似有物垂墜也。悉主之。【局方】胡桃二十個。去殼。破故紙。【酒炒】六兩。杜仲。【姜炒】十兩。右共研末。為丸。如桐子大。溫酒下三十丸。

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 凡肺有痰熱。及陰虛吐衄等症。切勿服食。切勿與酒同食。

配合應用 ①胡桃一味。勿去黃皮。空腹食之。最能固精。

②胡桃補骨脂。菟絲。蓮鬚。鹿茸。麥門冬。巴戟天。覆盆子。山茱萸。五味子。魚膠。益命門。種子最效。

③胡桃入青娥丸。能黑髮。補右腎。

④胡桃丸。益血補髓。強筋壯骨。延年明目悅心。潤肌。能除百病。用胡桃肉四兩。搗膏。入補骨脂。杜仲。草薢末。各四兩。杵勻。丸。梧子大。每空心溫酒鹽湯任下五十九丸。【御藥院方】

⑤治產後氣喘。胡桃肉。人參各二錢。水一盞。煎七分。頓服。【普濟方】

⑥誤吞銅錢。多食胡桃。自化出也。【李德方】

⑦搗齒烏髮。胡桃仁燒過。貝母各等分。為散。日日用之。【聖惠方】

⑧治血崩不止。胡桃肉五十枚。燒存性。研。作一服。空心溫酒調下。神效。【聖濟總錄方】

⑨治便毒初起。胡桃七箇。燒研。酒服。不過三服。效。【儒門事親方】

⑩治魚口便毒。端五日中午時。取樹上青胡桃。筐內陰乾。臨時全燒。為末。酒服。少行一二次。有膿自大。便出。無膿即消。二三服。平。上二方。應加全蝎穿山甲尤妙。【楊試經方】

⑪治跌撲損傷。胡桃仁搗。和溫酒頓服。便痊。【圖經本草方】

⑫服胡桃法。凡服胡桃。不得併食。須漸漸食之。初日服一顆。每五日加一顆。至二十顆止。周而復始。常服令人能食。骨肉細膩。光潤。鬚髮黑澤。血脈通潤。養一切老病。

⑬消腎溢精。胡桃丸。治消腎病。因房慾無節。及服丹石。或失志傷腎。遂致水弱火強。口舌乾。精自溢出。或小便赤黃。大便燥實。或小便

八七九

九 薑 胡

大利而不甚渴。用胡桃肉、白茯苓各四兩。附子一枚。去皮切片。薑汁蛤粉同焙。爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。(普濟方)

⑤ 治小便頻數。胡桃煨熟。臥時嚼之。溫酒下。

⑥ 治石淋痛楚。便中有石子者。胡桃肉一升。細米煮漿粥一升。相和。頓服即愈。(海上方)

⑦ 治風寒無汗。發熱頭痛。核桃肉。葱白。細茶。生薑。等分。搗爛。水一鐘。煎七分。熱服。覆衣取汗。(談楚翁方)

⑧ 治老人喘咳。氣促。睡臥不得。服此立定。胡桃肉去皮。杏仁去皮尖。生薑各一兩。研膏入煉蜜少許。和丸。彈子大。每臥時嚼一丸。薑湯下。(普濟方)

⑨ 治嗽不止。核桃仁五十個。煮熱去皮。人參五兩。杏仁三百五十個。麩炒湯浸。去皮研勻。入煉蜜丸。梧子大。每空心細嚼一丸。人參湯下。臨臥再服。(齋大尹方)

⑩ 治食物醋心。胡桃爛嚼。以生薑湯下立止。(傳信適用方)

⑪ 食酸物齒酸。細嚼胡桃即解。

(日華方)

⑫ 治眼目暗昏。四月內取風落小胡桃。每日午時食飽。以無根水吞下。俛臥。覺鼻孔中有泥腥氣爲度。(衛生易簡方)

⑬ 治赤痢不止。胡桃仁。枳殼各七個。皂角不蛀者一挺。新瓦上燒存性。研爲細末。分作八服。每臨臥時一服。二更一服。五更一服。荊芥茶下。(聖濟總錄方)

⑭ 治急心氣痛。核桃一個。棗子一枚。去核夾桃紙裏煨熟。以生薑湯一鐘。細嚼送下。永久不發。名靈落湯。(趙氏經驗方)

⑮ 治小腸氣痛。胡桃一枚。燒灰研末。熱酒服之。(奇效良方)

⑯ 治一切癰腫。背癰附骨疽未成膿者。胡桃十個。煨熟。去殼。槐花一兩。研末。杵勻。熱酒調服。(古今錄驗方)

⑰ 治疔瘡惡腫。胡桃一個。平破。取仁爛爛。安殼內。合在瘡上。氣換甚效。(普濟方)

⑱ 治痘瘡倒陷。胡桃肉一枚。燒存性。乾胭脂半錢。研勻。胡荽煎酒調服。(儒門事親方)

⑲ 治小兒頭瘡。久不愈。胡桃和皮煨上燒存性。盤蓋出火毒。入輕粉少許。生油調塗一二次。愈。(保幼大全方)

⑳ 治耳出汁。胡桃仁燒研。狗膽汁和作挺子。綿裹塞之。(普濟方)

㉑ 治傷耳成瘡出汁者。用胡桃杵取油納入。(普濟方)

㉒ 治火燒成疔。胡桃仁燒黑研傅。

㉓ 治疥瘡癢癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包夜臥。裘陰囊。歷效。勿洗。(集簡方)

㉔ 用薑 錢半至三錢。施用宜忌 凡非虛寒者禁用。

委攷資料 破故紙屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬木。主潤血養血。血屬陰。陰惡燥。胡桃以潤之。佐破故紙有木火相生之妙。故古有云。黃柏無知母。破紙無胡桃。猶水母之無鰓也。(韓愈)

㉕ 胡桃仁。味甘氣熱。皮澁。肉潤。孫真人言其冷滑。誤矣。近世醫方。用治痰氣喘嗽。醋心及癘風諸病。而酒家往往醉後嗜之。則食多吐水。

吐食。脫眉。及酒同食。略血之既。亦未必盡然也。但胡桃性熱。能入腎。肺。惟虛寒者宜之。素有積熱者。不宜多食也。(李時珍) 此果外有背皮。肉包之。其形如桃。胡桃乃其核也。羌音呼核如胡。名或以此。或作梵音名播羅師。(李時珍) 胡桃生北土。今陝洛間甚多。大株厚葉多陰。實亦有房。秋冬熟時。采之出。陳倉者薄皮多肌。出陰平者大而皮肥。急提則碎。汴州雖有而質不佳。江表亦時有之。惟南方則無。

【蘇頌】胡桃樹高丈許。春初生葉。長四五寸。微似大青葉。兩兩相對。頗作羶氣。三月開花。如梨花。種若黃色。結實。至秋如青桃狀。熟時溼爛皮肉。取核爲果。人多以櫻柳接之。案劉侗續表錄云。南方有山胡桃。底平如檳榔。皮厚而大。堅多肉。少穢。其殼甚厚。須椎之方破。然則南方亦有但不佳耳。(李時珍)

【胡桃肉】即胡桃之處方用名。詳「胡桃」條。

【胡桃油】 基本 本品即將胡桃仁榨取之油。 主治 補火。

參攷資料 胡桃油若以槓桃榨取者有毒。味劣。不宜食。(趙學敏)

【胡桃青皮】 基本 本品爲胡桃核外之青皮。

性質 苦。澆。無毒。

主治 染髭及烏。皆黑。

參攷資料 胡桃青皮。壓油。和詹詹香塗毛髮。色黑如漆。(馬志)

【胡桃殼】 基本 本品即胡桃核之外硬殼。

主治 燒存性。入下血崩中藥。

【胡桃樹皮】 主治 止水痢。春月斫皮。汁沐頭。至黑。煎水可染褐。

【胡桃律】 即胡桃淚之古籍別名。與見綱目。詳「胡桃淚」條。

【胡桃脂】 即胡桃淚之處方用名。詳「胡桃淚」條。

【胡桃淚】 命名 本品係胡桃樹脂。脂汁下流。狀似眼淚。故名。

處方用名 胡桃脂。

古醫別名 胡桃樹。胡桃律。胡桃溼。(綱目)呀喇菩。(植物學大

辭典)

九 壺 胡

外國名詞 Calophyllum in-

ophyllum, H. (拉丁) ヤラボ

テノハボク (日本)

基本 係金絲桃科。胡桃屬。爲

產地 凡甘肅、蒙古等處之山

谷中恒有出。

形態 胡桃係香木類。初生似

柳。大則似桐。蟲食其樹。而樹脂滲

入土中。久則結成堅實之塊。其狀

極類黃礬。

採取 冬月採之。

性質 鹹。苦。大寒。無毒。

效能 治濕菌。療喉痛。用作解

熱解毒藥。

主治 大毒熱。心腹煩滿。水和

服之。取吐。牛馬急黃。黑汗。水研三

二兩。灌之立瘥。

論胡桃淚曰。咽喉熱痛。水磨掃之取涎。【明】程希雍本草經疏論胡桃淚曰。胡桃淚味鹹苦。氣大寒。無毒。入足陽明經。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。又曰。在高者因而越之。苦以湧吐。寒以勝熱。故主大毒熱。心腹煩滿。取吐而效也。牛馬性熱。而又犯熱病。所以急黃黑汗也。鹹寒能除大熱。故亦主之。日華子以之治風蟲牙齒痛。李珣謂其能治骨槽風。齒齩。元稹言瘰癧非此不能除。皆資其苦能殺蟲。鹹能入骨軟堅。大寒能除極熱之用耳。

配合應用 ①治濕熱牙疼。喜吸風。胡桃淚入麝香搽之。

②治牙疼出血。胡桃淚半兩。研末。夜夜貼之。或入麝香少許。(聖惠方)

③治走馬牙疳。胡桃殼、黃丹等分爲末搽之。(醫林集要方)

搽之。(聖濟總錄方)

用錢 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無熱毒蟲蝕者禁用。

【胡桃溼】 即胡桃淚之古籍別名。與見綱目。詳「胡桃淚」條。

【胡桃殼】 即胡桃淚堅實如花者之古籍別名。與見綱目。詳「胡桃淚」條。

【胡荽】 即白粉之古籍別名。與見本草集註。詳「白粉」條。

【胡荽】 即荊芥之古籍別名。與見綱目。詳「荊芥」條。

【胡乾菴】 即天竺乾菴之古籍別名。與見本草拾遺中。詳「天竺乾菴」條。

【胡荽】 命名 荽。許氏說文作菴。云。菴。可以香口也。其莖柔葉細而根多鬚。殺殺然也。張騫使西域。始得種歸。故名胡荽。今俗呼爲苜蓿。荽乃莖葉布散之象。俗作芫花之芫。非矣。

處方用名 胡荽子。胡荽葉。胡荽根。

古醫別名 菴。(說文)香荽。(拾遺)胡菜。(外臺)元荽子。高柴

八八一

九畫 胡

子。延委子。萎委子。蓴委子。燕委子。團委子。鹽委子。(和漢藥考)

外國名詞 Fructus Coriandri (拉丁) Coriander. (英) Koriander. (德)

基本 屬繖形科。藥用為胡荽之果實與根葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。胡荽于中西各國均有出產。和漢藥考曰。其原產地在中海沿岸。後始移植於歐洲全土及東洋各國。

形態 胡荽為一年生草本。多自生水邊。或栽植園圃。有麻醇性之惡臭。莖細長中空。高一二尺。葉互生。薄而平滑。色淡綠。脚葉往往消失。多為單羽或複羽狀。裂片廣闊。上葉更分裂若細線。夏秋之交。稍頭開五瓣小花。色白。或帶紅。攢簇而作繖繖形花序排列。其小繖之底有苞片。中藏三四子。果實作球圓形。色黃白。有芳香。根似紡錘。而向各方彎曲。其果為分裂果。形似色黃白。或黃褐。中分二房。子黏附殼內。長一分至分半。尖端有萼。製作五瓣。儼如冠。頂端有屈曲之

花柱。然多無果梗。外有縱線十條。第一畦線。隆起而彎曲。第二畦線。始正直。中心空虛。依線而包裹之。子仁形如半月。藏於內壁。子莖在胚乳之頭端。又有油腺。則在分果片之背線中。氣芳香。味甘。



胡荽

種植 恒以栽植於田圃。以供菜茹。七八月下種。種於肥地者良。

採取 五月間採子。餘時採其根葉。

性質 辛溫。微毒。

成分 百分中有揮發油一分。脂肪油十三分。餘為蛋白質。單寧酸等。

效能 發痘疹。辟穢氣。用作健胃驅風祛痰藥。

主治 消穀。治五臟補不足。利大小腸。通小腹痛。拔四肢熱。止頭痛。痰沙癩瘡。豆瘡。不出。作酒噴之。立出通心竅。

歷代記述攷圖 [唐]孟詵食

八八二

胡荽曰。胡荽辛溫散寒。辟邪解穢。殺蟲止痛。下氣通腸。殺魚腥。發痘疹。多食損目。凡病忌之。子性味略同。

國外學說 和漢藥考曰。胡荽子油 Olum Coriandri. 即胡荽中之揮發油。乃其主成分也。為無色或淡黃色之液體。有胡荽子特異之香氣。酒精。伊打。濃醋酸等。俱能溶解之。比重 〇・八五九・至 〇・八七一。

配合應用 經驗後方。癰疽出不快。用胡荽二兩。切以酒二大盞。煎沸。沃之以物蓋定。勿令洩氣。候冷去滓。微微含噴。從頂背至足。令濕勿噴頭面。

肛門脫出。胡荽一升。切。燒烟。熏之。即入。(子母秘錄方)

治熱氣結滯。經年數發者。胡荽一斤。五月五日採。陰乾。水七升。煮取一升半。去滓分服。未盡更服。春夏葉。秋冬根。並可用。(必效方)

治小兒赤丹。用胡荽汁塗之。(譚氏方)

治面上黑子。煎荽煎湯。日日

煖本草論胡荽曰。補筋脈。令人能食。治腸風。用熱餅裹食。甚良。【元】吳瑞日用本草論胡荽曰。合諸菜食。氣香。令人口爽。辟飛尸鬼。注。蠱毒。【明】經希雍本草經疏論胡荽曰。胡荽味辛。香氣溫。微毒。入足太陰。陽明。經。辛香。走竅。而入脾。故主消穀。利大小腸。通少腹氣。脾胃為邪熱所干。則頭痛。四肢熱。辛溫發散二經之邪。則頭痛。四肢熱。自拔。癩瘡。疔毒。出不快者。外為風寒所侵。或發氣所觸也。辛溫祛風。寒香。竅辟穢氣。則腰理通暢。而癩癧。疔毒。皆出矣。通心竅。治五臟補不足者。總言其辛香。內通心脾。外達腸胃。除一切不正之氣。則真氣安和。斯有補益之道耳。子亦能發痘癩。殺魚腥。【清】黃宮繡本草求真論胡荽曰。胡荽辛溫香。氣。內通心脾。小腹。外行腰理。達四肢。散風寒。及除一切不正之氣。是以發熱頭痛。能除穀食停滯。俱消。痘瘡不齊。煎酒噴之。即出。目翳不退。寒之鼻中。即祛。然多食久食。損人精神。令人多忘。能發液臭。非同補藥。可以常服。【清】王士雄隨息居飲食譜論

洗之(小說方)

④產後無乳。乾胡荽煎湯飲之效。(經驗方)

⑤小便不通。胡荽二兩。葵根一握。水二升。煎一升。入滑石末一兩。分三四服。(聖濟總錄方)

⑥解中蠱毒。胡荽根搗汁半升。和酒服。立下神驗。(必效方)

⑦蛇虺螫傷。胡荽苗合口椒等分。搗塗之。(千金方)

用益 五分至錢半。

施用宜忌 凡患脚氣金瘡及口鼻腫痛者。禁食。又不可久食。令人多忘。根發病疾。若服一切補藥。及藥中有白朮牡丹者。不可食此。并不可與邪蒿同食。令人汗臭難產。

參攷資料 ①胡荽辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。能辟一切不正之氣。故痘瘡出不爽快者。能發之。諸瘡皆屬心火。營血內攝於脾。心脾之氣。得芳香則運行。得臭惡則壅滯。故爾。按楊士瀛直指方云。痘疹不快。宜用胡荽酒噴之。以辟惡氣。床帳上下左右皆宜掛之。以禦汗氣。胡荽天癸淫伏之氣。一應

九 薑 胡

穢惡。所不可無。若兒虛弱。及天時陰寒。用此最妙。如兒壯實。及春夏晴暖。陽氣發越之時。加以酒麴助。瘧以火益火。胃中熱熾。毒血聚蓄。則變成黑陷矣。不可不慎。(李時珍)

⑧胡荽石勒諱胡。故井汾人呼胡荽為香荽。(陳藏器) ⑨胡荽處處種之。八月下種。時日尤良。初生柔莖圓葉。葉有花枝。根軟而白。冬春采之。香美可食。亦可作菹。道家五葷之一。立夏後開細花。成簇如芹菜。花淡紫色。五月收子。子如大麻子。亦辛香。按賈思勰齊民要術云。六七月布種者可。竟冬食。春月按子沃水生芽種者。小小供食而已。王禎農書云。胡荽於蔬菜中。子葉皆可用。生熟俱可食。甚有益於世者。宜肥地種之。(李時珍)

⑩此物甚臭。善却諸臭。亦如阿魏極臭。而能止臭。洵奇物也。夫沈香。檀香之類。取其香以薰物。此理之常也。阿魏。胡荽。胡蒜之類。取其臭以掩物。此理之變也。凡痘疹不正者。胡荽子酒煎。口含噴病兒背足。頭面切不可噴。胡荽子與葉入雞鴨豬鹿之羹。能令味美。去腥臭。生藥

發臭。熟食則無臭氣。能退丹毒痘瘡之餘毒。又手足頭面俄而發紅。作痛者。食胡荽菜。火熱腫痛。風腫甚痛者。以胡荽葉與莖煎湯洗。佳。食五葷或蘆薈等臭物者。續食此實。口即不臭。食菌中毒。服此實即解。其為人利用如此。故人家必備之。八月下種。李時珍曰。合諸菜食。氣香。令人口爽。(大和本草)

【胡荽子】 性質 辛。酸。平。無毒。 製法 炒用。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金方云。消穀能食。【唐】陳藏器本草拾遺云。蠱毒五痔。及食肉中毒。吐下血。黃汁冷服。又以油煎塗小兒禿瘡。【明】李時珍本草綱目云。發痘疹。殺魚腥。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。胡荽子為破氣驅風之良藥。兼有溫暖強壯健胃之效。加香竄藥。同沒齒荷酒或燒酒。堪作溫暖強壯劑。用於諸症。俱有大效。方如下。溫壯胡荽飲。苜蓿根。土木香根。橙皮各四錢。桂三兩。茴香。胡荽子各一兩半。調勻燒酒十四兩。浸一晝夜。去滓。每服一匙。日三四次。此劑用於虛

寒之胃痛。效極著。如薄荷尤妙。或患諸器發運意慢虛乏之症。加薄荷油。或揮發香竄精用之。奏效至捷。惟在虛弱異常之人。不勝此等峻烈之藥。祇可改用溫和驅風之藥草。葡萄酒浸服。胡荽子末和砂糖服。能治痞氣鬱滯諸症及疝痛。於間歇熱尤有奇效。

【胡荽子】 即胡荽之處方用名。詳【胡荽】條。

【胡荽根】 即胡荽之處方用名。詳【胡荽】條。

【胡荽菜】 即胡荽之處方用名。詳【胡荽】條。

【胡荽】 條。

【胡連】 條。

【胡麻】 命名 中國止有大麻。其實為寶。漢使張騫自大宛得種。形體類麻。故名胡麻。以別中國之大麻也。

處方用名 三角胡麻。小胡麻。大胡麻。蠶胡麻。芝麻。

古籍別名 巨勝子(本經)方莖(吳普)鴻臚狗彘(別錄)油麻(食療)脂麻(衍義)交麻(拾遺記)白油麻。麻枯餅(綱目)藤弘

九畫 胡


(張母廣種)

外國名詞 *Nosmunum indicum*

nn, r (拉丁)

基本 胡麻屬於胡麻科。其種子入藥用。須選其黑色者。所謂烏胡麻是也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。胡麻在中國各省有出。近日俱由天津運來者多。西國亦有出。名洋胡麻。



胡麻

形態 胡麻為一年生草本。供食用及製油。故栽種者多。莖高三四尺。形方直立。具有茸毛。葉互生。或對生。作長橢圓或長卵圓形。葉細而長。基葉間割裂為三瓣。夏日稍頭及葉腋。俱開白色似筒之管形花。五裂若桐花。往往有紅紫或黃色之暈。下唇長於上唇。故向前突出。雄蕊四。雌蕊一。果實為蒴果。有長橢圓形之核角。長八九分。熟則縱裂。中藏多數扁平細小之

種子。有黑、白、褐三種。而俱發一種芳香。

種類 ①胡麻有黑、白、黃三種。

藥用祇取黑胡麻。粒有大小。大者名巨勝子。作巨勝子圓必用之。近日來自外洋之巨勝子。皆荒蕪子也。②胡麻方莖高二三尺。葉長而對生。有三尖。如閉草葉。夏月葉間開花。如地黃花色。色白微紫。後結角長八九分。熟則作黑色。角有二稜。四稜。六稜。八稜之分。二稜。四稜者。皆白胡麻。故俗呼二方。胡麻四方。胡麻六稜。八稜者。皆黑胡麻。故俗呼六稜為六方胡麻。而呼八稜為胡麻。其子色微黃者。即集解及時珍所說之黃麻子也。與大麻子同名。而異物。大和本草則謂與商麻

同種。每年春三四月間。耘土下種。其在沃地種者。八稜。山田種者。四稜。此因種植之土地有異故耳。

採取 每年七八月間。拔取其枯幹。以器具盛之。曬於日中。待其角燥自裂。則敲取其子。

製法 陶弘景曰。凡使胡麻。須

取黑色者。當九蒸九曝。熱搗餌之。斷穀長生充饑。雖易得。而學者未能常服。况餘藥耶。蒸不熱。令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之甚少。時以合湯丸劑。雷斅曰。凡修事以水淘去浮者。曬乾。以酒拌蒸。從已至亥。出攤曬乾。白中盡去粗皮。留薄皮。以小豆對拌同炒豆熟。去豆用之。

性質 甘平。無毒。

成分 胡麻之有效成分。為胡麻油。即其脂肪油也。於營養上。分析之如左。白胡麻。蛋白質二〇。五四。脂肪五一。五七。無氮素有機物一二。六〇。灰分八。三六。水分六。九三。黑胡麻。蛋白質一九。六五。脂肪四四。一五。無氮素有機物一九。四三。灰分二〇。一二。水分六。六五。

效能 益肝。補腎。養血。潤燥。為滋養強壯藥。

主治 傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。(本經)堅筋骨。明耳目。耐饑渴。延年。療金瘡止痛。及傷寒溫瘧。大吐後虛熱。羸困。(別錄)

八八四

歷代記述攷證

【唐】蘇恭新修本草論胡麻曰。生嚼塗小兒頭瘡。煎湯浴。瘡及婦人陰瘡。大效。【宋】日華諸家本草論胡麻曰。補中益氣。潤養五臟。補肺氣。止心驚。利大小腸。耐寒暑。逐風溼氣。遊風。頭風。治勞氣。產後羸困。能生落胞。細研塗髮。令長。白蜜蒸餌。治百病。【明】繆希雍本草經疏論胡麻曰。胡麻稟天地之冲氣。得稼穡之甘味。故味甘氣平無毒。入足大陰。兼入足厥陰少陰。氣味和平。不寒不熱。益脾胃。補肝腎之佳穀也。宏景云。八穀之中。惟此為良。仙家作飯餌之。斷穀長生。故主傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。堅筋骨。填髓腦。及傷寒溫瘧。大吐後虛熱。羸困。久服明耳目。耐飢渴。輕身不老。延年也。金刃傷血。則療而作痛。甘平益血潤燥。故療金瘡止痛也。【清】黃宮楠本草求真論胡麻曰。胡麻本屬潤品。故書載能填精益髓。又屬味甘。故書載能補血燥脾耐飢。凡因血枯而見二便艱澀。髮變不烏。風溼內乘。發為瘡疥。並小兒痘疹。變黑。醫見有燥象者。宜以甘

緩滑利之味以投。若使下元不固。而見便溏腸瘕。精滑白帶。皆所忌用。麻油甘寒。滑利腸胃。凡胞衣不下。用蜜同煎。溫服。登血熱。癰腫。惡瘡。癩疥。用此煎膏以治。皮肉俱黑者。良。出於胡種大宛者尤佳。【清】王士雄。寔真居飲食諸論。胡麻曰。胡麻甘平。補五內。填髓。長肌肉。充胃津。明目息風。能生化毒。有黑白二種。白者多脂。生熟皆可食。爲着爲餌。榨油並良。而不堪作飯。本草列爲八穀之麻。誤矣。古人救飢用火麻。卽本經之大麻。殆卽八穀之麻也。【清】黃元御。玉楸藥解。論胡麻曰。芝麻味甘氣平。入足厥陰。肝。手陽明大腸經。潤肺開閉。補益精液。潤肝腸。治大便秘塞。養血舒筋。療語塞步遲。皮燥髮枯。澀酒肉。減乳少。輕阻諸證。醫一切瘡瘍。敗毒消腫。生肌長肉。殺蟲。生髮。髮滑。產儘衣皆善。

九靈 胡

更不效。余思肝氣橫逆。固非順氣不可。但肝爲剛臟。治之宜柔。前醫所用。皆有剛意。故肝不受治。宜甘以緩之。兼養陰以平肝。然非兼通氣之品。亦難速效。惟通氣之藥。難免剛燥。偶思芝麻。外直內通。其色黑。可通達腎。其性微涼。毫無剛意。遂用一枝。助以金橘餅三錢。一服而效。數服全愈。嗣後凡遇肝氣必用之。無不應手。所謂軟通於肝最宜也。因思凡人臟腑之氣。無不貴通。內經云。通則不痛。痛則不通。固已。而推廣其意。通則不脹。脹則不通。通則不逆。逆則不通。凡治氣病。無不宜通。正不獨肝病爲然也。余曾治多年哮喘。腎氣上逆。用六味地黃加減爲丸。每服五錢。以芝麻一支。煎湯送下。竟能漸愈。又治肝氣犯胃。飲食阻滯。欲成肝症。余以滋腎平肝。清金暢胃之品。加芝麻。金橘餅。十數劑而愈。又遇脹症。幾有單腹之象。余用甘麥大棗湯。加芝麻。金橘餅。連服月餘。而愈。其他諸氣爲病。服此得效者。不可數計。

何首烏。茅山蒼朮。白茯苓。苜蓿。桑葉。牛膝。當歸。續斷。地黃。桑寄生。①治似中風。口眼喎斜。半身不遂。胡麻。甘菊花。天門冬。黃檗。生地黃。何首烏。柏子仁。桑葉。牛膝。枸杞子。麥門冬。作丸。久服不輟。有神驗。②胡麻一味。九蒸九曝。加茅山蒼朮。乳蒸三次。作丸。能健脾燥熱。益氣延年。③服食胡麻。抱朴子云。用上黨胡麻三斗。淘淨。飯蒸令氣通。日乾。以水淘去沫。再蒸如此九度。以湯脫去皮。絞淨。炒香爲末。白蜜或棗膏丸。彈子大。每溫酒化下一丸。日三服。忌毒魚狗肉生菜。服至百日。能除一切痼疾。一年身面光澤。不飢。二年白髮返黑。三年齒落更生。四年水火不能害。五年行及奔馬。久服長生。若欲下之。食葵菜汁。孫真人云。用胡麻三升。去黃褐者。蒸三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。杵三百下。丸。梧桐子大。每旦服五十丸。人過四十以上。久服明目。洞視。腸柔如筋也。仙方傳云。魯女生服胡麻。偶丸。絕穀八十餘年。甚少壯。日行三百里。走及驛廬。

④治腰脚疼痛。新胡麻一升。麩香。芥末。日服一小升。服至一斗。永痊。溫酒蜜湯。薑汁皆可下。【千金方】⑤治手脚酸痛。微腫。用脂麻熱研五升。酒一升。浸一宿。隨意飲之。【外臺秘要方】⑥治入水肢腫作痛。生胡麻搗傅之。【千金方】⑦治傷感風寒。脂麻炒焦。乘熱搗酒飲之。煨臥。取微汗出。良。⑧治中暑毒死。救生散。用新胡麻一升。微炒令黑。攤冷爲末。新汲水調服三錢。或糊丸。彈子大。水下。【經驗後方】⑨治嘔吐不止。用白油麻一大合。清油半斤。煎取三合。去麻溫服。【近效方】⑩治牙齒痛腫。胡麻五升。水一斗。煮汁五升。含漱吐之。不過二劑。神良。【肘後方】⑪治熱淋莖痛。烏麻子。蔓菁子。各五合。炒黃。緋袋盛。以井華水三升。浸之。每食前服一錢。【聖惠方】⑫治小兒下痢。赤白。用油麻一合。搗和蜜湯服之。【外臺秘要方】

九畫 胡

解下胎毒。小兒初生。嚼生脂麻。綿包與兒啞之。其毒自下。

治小兒急疳。油麻嚼爛傳之。

(外臺秘要方)

治小兒軟癆。油麻炒焦。乘熱嚼爛傳之。(譚氏小兒方)

治頭面諸瘡。脂麻生嚼傳之。

(普濟方)

治小兒瘰癧。脂麻。連翹等分。

為末。類類食之。(簡便方)

治疔腫惡瘡。胡麻燒灰。針砂等分。為末。醋和傳之。日三。(普濟方)

治痔瘡風腫作痛。胡麻子煎湯洗之。即消。

治坐板瘡疥。生脂麻嚼傳之。

(筆案雜與方)

治陰瘻生瘡。胡麻嚼爛傳之。

(肘後方)

治乳瘡腫痛。用脂麻炒焦研末。以燈窩油調塗即安。

治婦人乳少。脂麻炒研。入鹽少許食之。(唐氏方)

治湯火傷灼。胡麻生研如泥塗之。(外臺秘要方)

治蜘蛛咬疔。油麻研爛傳之。

亦治諸蟲咬傷。(經驗後方)

治蝨蟻入耳。胡麻炒研。作袋枕之。(梅師方)

治穀賊尸咽。喉中痛癢。此因誤吞穀芒。刺刺癢痛也。穀賊屬咽尸咽。屬喉。不可不分。用脂麻炒研白湯調下。(三因方)

治癰疽不合。烏麻炒黑搗傳之。(千金方)

治小便尿血。胡麻三升。杵末。以東流水二升。浸一宿。平旦絞汁頓熱服。(千金方)

用蠶一錢至三錢。

施用宜忌 凡精氣不固。大便滑瀉者禁用。

參攷資料 胡麻取油。以白者為勝。服食以黑者為良。胡地者尤妙。取其黑色入通於腎。而能潤燥也。赤者狀如老茄子。殼厚油少。但可食爾。不堪服食。惟錢乙治小兒痘瘡變黑。歸腎百祥丸。用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云即胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦云。巨勝可延年。還丹入口中。古以

八八六

胡麻為仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益而已。耶劉阮入天台。遇仙女食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯。為仙家食品。焉爾。又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉。與鹽醋醬菜厚味。及梗米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻。即黑脂麻。同去皮茯苓。入少白蜜為麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此乃養生要訣。但易知而難行爾。據此說。則胡麻為脂麻。尤可慰矣。其用茯苓。本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻搗爛。去滓。入綠豆粉。作腐食。其性平潤。最益老人。(李時珍)

胡麻初食利大小腸。久食則否。去陳留新。(陳士良)

按沈存中筆談云。胡麻即今油麻。更無他說。古者中國止有大麻。其實為藪。漢使張騫始自大宛得油麻種來。故名胡麻。以別中國大麻也。寇宗奭衍義亦據此釋胡麻。故今併入油麻焉。巨勝即胡麻之角。巨如方勝者。非二物也。方莖以莖名。狗蠶以形名。油麻脂麻。謂其多脂油也。按張揖廣雅。胡麻一名麻弘。弘亦巨也。

別錄一名鴻臚者。乃麻弘之誤也。又杜寶拾遺記云。隋大業四年。改胡麻曰交麻。(李時珍)

胡麻處處種之。稱復野生。苗梗如麻。而葉圓銳光澤。嫩時可作蔬。道家多食之。本經謂胡麻一名巨勝。陶弘景以莖之方圓分別。蘇恭以角稜多少分別。仙方有服胡麻巨勝二法。功用小別。是皆以為二物矣。或云。即今油麻。本生胡中。形體類麻。故名胡麻。八穀之中。最為大勝。故名巨勝。乃一物二名。如此則是一物而有二種。如天雄。附子之類。故葛洪云。胡麻中有一葉兩尖者。為巨勝。別錄序例云。細麻即胡麻也。形扁扁爾。其莖方者名巨勝是也。今人所用胡麻之葉。如荏而狹尖。莖高四五尺。黃花。生子成房。如胡麻角而小。嫩時可食。甚甘滑利大腸。皮亦可作布。類大麻。色黃而肥。俗亦謂之黃麻。其實黑色。如韭子而粒細。味苦如鹽。杵末略無膏油。其說各異。此乃服食家要藥。乃爾差誤。豈復得效也。(蘇頌)

胡麻即脂麻也。有遲早二種。黑白赤三色。其莖皆方。秋開白花。亦有帶紫點。

者。葉若結角。長者寸許。有四稜六稜者。房小而子少。七稜八稜者。房大而子多。皆隨土地肥瘠而然。蘇恭以四稜爲胡麻。八稜爲巨勝。止謂其房特大也。其莖高者三四尺。有一莖而上者。角纏而子少。有一枝而散者。角繁而子多。皆因苗之稀稠而然也。其葉有本圓而未銳者。有本圓而未分三丫如鴨掌形者。葛洪謂一葉兩尖爲巨勝者。指此。蓋不知烏麻白麻皆有二種葉也。按本經胡麻一名巨勝。吳普本草一名方莖。抱朴子及五符經並云巨勝一名胡麻。其說甚明。至陶弘景始分莖之方圓。雷敫又以赤麻爲巨勝。謂烏麻非胡麻。嘉佑本草復出白油麻。以別胡麻。並不知巨勝卽胡麻中丫莖。巨勝而子昂者。故承誤啓疑如此。惟孟詵謂四稜八稜爲土地肥瘠。意宗與據沈存中之說。斷然以脂麻爲胡麻。足以證諸家之誤矣。又買思遠齊民要術。種麥胡麻法。卽今種麥脂麻之法。則其爲一物尤爲可據。今市肆間因莖分方圓之說。遂以充蔚子爲巨勝。以黃麻子及大麥

九 薑 胡

子爲胡麻。誤而又誤矣。充蔚子長一分許。有三稜。黃麻子黑如粗韭子。味苦。大麥子狀如壁。蠶及酸漿核仁。味辛甘。並無脂油。不可不辨。梁簡文帝勸醫文有云。世誤以灰洪菜子爲胡麻。則胡麻之說。其來久矣。(李時珍)

【胡麻油】 原名 香油。命名 本品係以胡麻子榨取之脂肪油。故名。

古醫別名 芝麻油。清油。(和漢藥考)

外國名稱 Ojuna Sesami (拉丁)

形態 胡麻油爲淡黃色或金黃色之油狀液體。露置之。不易乾。無臭氣。味緩和。比重約〇・九二。加硝酸及硫酸同量之混和液。初變綠。後現暗紅。可供藥用。性質 甘。微寒。無毒。主治 利大腸。產婦胎衣不落。生油摩腫。生禿髮。歷代記載攷證 【唐】孫思邈千金翼論胡麻油曰。去頭面遊風。【唐】陳藏器本草拾遺論胡麻油曰。主天行熱悶。厨內結熱。煎一合。

取利爲度。【唐】孟詵食療本草論胡麻油曰。主瘡癩。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治蛇心痛。得一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合和雞子兩顆。老頭一兩。攪服少時。卽消下熱毒。其良。【宋】日華諸家本草論胡麻油曰。陳油煎脊。生肌長肉。止痛。消癰腫。補皮裂。【宋】蘇頌經本草論胡麻油曰。治癰疽熱病。

【明】李時珍本草綱目論胡麻油曰。解熱毒。食毒。蟲毒。殺諸蟲。蠅蟻。委汝資料 生榨者良。若蒸炒者。止可供食及然燈耳。不入藥用。(陶弘景) 炒熱乘熱壓出油。謂之生油。但可點照。須再煎鍊。乃爲熟油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵自火中出。而謂之生鐵。亦此義也。(寇宗奭) 入藥以烏麻油爲上。白麻油次之。須自榨乃良。若市肆者。不惟已經蒸炒。而又雜之以偽也。(李時珍) 普通所稱之胡麻油。係將胡麻先炒而後榨得之油。色黃褐。有特異之臭氣。作食料用。名香油。再煎熟之。名熟油。配合鉛丹類。製成存藥。皆用此種。其取生白胡麻榨出之油。色深黃。

入藥用。並製婦女用之生髮油。黑胡麻生榨之油。名黑榨油。勝於白榨油。(和漢藥考)

【胡麻花】 採取 七月採最上標頭者。陰乾用之。性質 甘寒。無毒。主治 生禿髮。歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論胡麻花曰。潤大腸。人身上生肉丁者。擦之卽愈。

【胡麻枯餅】 基本 本品乃榨去油之麻滓也。古醫別名 麻帆。(綱目) 主治 殺疽瘡蟲。生麻油滓貼之。委汝資料 胡麻滓。荒歲人亦食之。又可以養魚。肥田。(李時珍)

【胡麻莖】 原名 麻稈。古醫別名 麻藟。(綱目) 性質 甘寒。無毒。主治 燒灰入點。去惡肉。方中用。

【胡麻粥】 基本 本品以胡麻和米煮成之粥。

主治 潤腸治痔。

【胡麻葉】原名 青葙。古經別名 苗名 夢

神。(別錄)

性質 甘寒。無毒。

主治 五臟邪氣。風寒溼痺。益氣補腦。堅筋骨。久服耳目聰明。不飢不老。增壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論胡麻葉曰。治崩中血凝

注者。生搗一升。熱湯絞汁。半升服

立愈。【唐】孫思邈千金翼論胡麻

葉曰。主傷暑熱。【宋】日華諸家本

草論胡麻葉曰。作湯沐頭。去風潤

髮。滑皮膚。益血色。【明】李時珍本

草綱目論胡麻葉曰。祛風解毒。潤

腸。又治飛絲入咽喉者。嚼之即愈。

參攷資料 ①青葙。即油麻葉

也。以湯浸良久。涎出稠黃色。婦人

用之梳髮。與日華作湯沐髮之說

相符。則胡麻之爲脂麻無疑。(寇

宗奭) ②按服食家有種青葙作

菜食法云。秋間取巨勝子。種畦中

如生菜之法。候苗出。采食。滑美不

澀於葵。則本草所著者亦藉蔬之

功。非入丸散也。(李時珍)

【胡麻殼】

主治 半身不遂。酒煎服。湯火傷。燒研麻油調傅。溼爛者搽之。

【胡麻腐】

基本 本品係以胡麻子小粉所製成之腐。

性質 甘平。無毒。

主治 清胃滑腸。潤肌解毒。

【胡梨】即蚌蛭之小而黃者。與見

崔豹古今注。詳「蚌蛭」條。

【胡椒】

命名 本品因其辛辣如椒。故名。實非椒也。


處方用名 胡椒。

古經別名 昧履支。(酉陽雜俎) 章木椒。胡椒。(和漢藥考)

外國名詞 Piper. (拉丁) Popper. (英) Pfeffer. (德)

基本 屬於胡椒科。爲胡椒所結之果實。

產地 胡椒原產印度。今則中國及南美洲諸處皆有產焉。



(一) 椒 胡

形態 胡椒爲蔓生灌木。自生於熱帶地方。然種植者爲多。莖圓而直。長達丈許。葉對生。厚似革。作長橢圓形。或爲斜心形。前端尖。有葉柄。亦有一葉不發育者。則不對生而互生。花小而白。梗若長穗。或單生於梢端。或與上部之葉對生而懸垂。果實爲肉果。大如豆。形圓若球。果皮生綠熟。紅。終變黃褐色。採摘此果。日中曬乾。即收縮。果皮發皺。變褐色。是名黑胡椒。採其成熟者。曬乾。除去果皮。是名白胡椒。黑胡椒爲未熟之肉果。作球形。帶褐色。徑一分半至二分許。無果梗。外皮有皺。作網膜狀。中藏一子。子有胚乳。子芽在其小腔中。白胡椒爲成熟之肉果。果皮既去。故外面滑澤。色灰白。或黃白。底連臍帶。兩者俱有刺戟性之芳香。味辛辣。胡椒係在未熟時採而乾之。其狀圓如球。無果梗。直徑約五密米。果殼極薄。有黑褐色之皺。中藏種子一枚。與果殼粘連。種子成於外胚乳。外胚乳中空。帶黃褐色。似角質。內作白色。狀似粉。氣味峻烈。有芳香性。如灼。以胡椒

化爲灰。百分中祇有硬性物五分。(和漢藥考)



(二) 椒 胡

種類 胡椒本來一種。無黑白之分。結子嫩或墜地。或先收成者。因其尚嫩。未得堅老。質弱皮嫩。而黑心略一丸白色。名曰黑胡椒。倘長至老熟。質堅。兩去皮。便白色。論氣味。香者。以暹羅爲最。因其乾。晒皮。不溼水。香味不走。論色。白者。以石叻山打根等爲好看。因其用水浸透。然後晒皮。其色略爲白些。但香味已洩。反生一種水味。侵入。故香味不如暹羅也。

採取 五六月間。採實曬乾。

用法 常以對末用。或有製圖吞服。

性質 辛。大溫。無毒。

成分 爲胡椒素。鞣樹脂。揮發油。脂肪。澱粉。有機酸。鹽類等。

效能 溫中。煖胃。下氣。消痰。辛

味。刺激胃腸。促其蠕動。爲健胃驅

風。散寒。止痛。消腫。殺菌。殺蟲。

殺毒。治嘔吐。泄瀉。痢疾。疝氣。

牙痛。喉痛。耳痛。目痛。鼻痛。

皮膚痛。神經痛。風濕痛。關節

痛。腰痛。背痛。手足痛。全身

痛。一切痛症。均有奇效。

附註 胡椒。性熱。辛。大溫。無毒。

成分 爲胡椒素。鞣樹脂。揮發

油。脂肪。澱粉。有機酸。鹽類等。

效能 溫中。煖胃。下氣。消痰。辛

味。刺激胃腸。促其蠕動。爲健胃驅

風。散寒。止痛。消腫。殺菌。殺蟲。

風寒。用於胃弱與消化不良。及腹
脹諸症。但寒量過多。反害胃。又
作香辛料。以供食用。又能醫治癆
疾。消化不良。

作用 入胃後。能激刺胃壁神
經。使胃蠕動增進。分泌加多。消化
力強。至胃及腸壁。吸收而入血。
能增大血球。制止白血球數。既
可與香精。又能退除癆熱。功用
略與金雞納霜相似。
主治 下氣溫中。去痰。除眩。磨
中風冷。

歷代記述攷證 【唐】李珣海
藥本草論胡椒曰。去胃口虛冷氣。
宿食不消。霍亂氣逆。心腹疼痛。冷
氣上衝。【宋】大明日華諸家本草
論胡椒曰。調五臟。壯腎氣。治冷痢。
殺一切魚肉。醫瘰癧。【宋】寇宗奭
本草衍義論胡椒曰。去胃寒吐水。
大醫藥論【明】李時珍本草綱目
論胡椒曰。暖胃。除寒。溼。反胃。虛
寒。冷。積。除毒。牙齦浮熱。作痛。【明】
饒宗魯本草經疏論胡椒曰。胡椒
味辛。氣大溫。性熱。無毒。然辛溫太
甚。過服去氣有害。其主下氣。溫中
去痰。除胃中風冷者。總因屬胃

九 盜 胡

爲寒冷所乘。以致積滯不消。積氣
逆上。幸溫發腸胃而散風冷。則痰
氣降。積滯利。諸證悉瘳矣。【清】黃
宮楠本草求真論胡椒曰。胡椒辛
熱純陽。比之蜀椒。其熱更甚。凡因
火衰寒入。痰食內滯。腸滑冷痢。及
陰毒腹痛。胃寒吐水。牙齦浮熱。作
痛者。治皆有效。以其寒氣既除。而
病自可愈也。但此止有除寒散邪
之力。非同附桂。終有補火益元之
妙。况走氣動火。陰熱氣薄。最其所
忌。舉茹向陰所生。性遲胡椒。主治
略同。

外國學說 日本學說謂胡椒
者。無日本產。以產於印度地方者
爲主。用爲健胃驅風藥。又依藥物
學綱要云。用於間歇熱有效。本品
自昔用爲香料。其成分爲「ピペ
リン」揮發油。脂肪。澱粉。有機酸
及鹽類等。又和漢藥考曰。胡椒素
Niponchinone。者。胡椒中
之植物鹽基。乃無色無臭無味之
柱狀結晶體也。熱至華氏二百
十二度則融解。冷水不能溶解。沸
湯及酒精。均能溶解。遇硫酸現血
紅色。遇硝酸。初現黃綠。繼變橙黃。

終成紅色。入加里酒汁溫之。則分
離而爲胡椒精 (Piperin) 與胡
椒素。酸加里。糖樹脂。爲胡椒特有
之臭味。成於紅綠兩色之樹脂質。
酒精。伊打俱能溶解之。惟所含之
揮發油。遇此二者。亦不溶解。英美
學說謂胡椒產安南大小呂宋及
印度羣島等處。其子可入藥。內含
一精。即排野仁精。有一種黑胡椒。
西名黑華撥。此爲未熟而作乾之
果。初查得胡椒之性情者。爲印度
人。緣此樹多產於印度馬拉巴爾
海邊相近處。從此處並巫來由隔
及蘇門答刺等。以運至歐羅巴。如
去其黑色之殼。則得白胡椒。爲尋
常出售之品。且出售之胡椒粉。多
含雜質。如麵粉。小粉等物。有一種
長粒胡椒。西名長粒華撥。在印度
之古時。卽用爲藥品。可以代黑胡
椒。若論形色與氣味。胡椒有黑白
二色。如撞碎之則發香。有熱辣香
味。白者則較黑者略淡。胡椒之作
用。爲熱性行氣藥。又爲淨性香料。
常添入食物之內。其用處大半爲
治他種藥有吐性。其功用又能祛
風開胃。暖胃。在直腸及尿管內發

其功力。治痔瘡。白帶。和桂尼精同
服。可治濕痰。
配合應用 ●治心腹冷痛。胡
椒三七枚。清酒吞之。(孟詵食療
本草方)
●治夏月冷瀉及霍亂。用胡椒
碾細。飯丸。梧子大。每米飲下四十
丸。(衛生易簡方)
●治心下大痛。用胡椒四十九
粒。乳香一錢。研勻。男用生薑。女用
當歸酒下。又方。用椒五分。沒藥三
錢。研細。分二服。溫酒下。又方。胡椒
綠豆各四十九粒。研爛。酒下神效。
(普救方)
●治霍亂吐利。用胡椒三十粒。
以飲吞之。(孫真人方)用胡椒四
十九粒。綠豆一百四十九粒。研勻。
木瓜湯服一錢。(直指方)
●治反胃吐食。用胡椒醋浸日
乾。如此七次。爲末。酒糊丸。梧子大。
每服三四十九。醋湯下。(原禮方)
又用胡椒七錢半。煨薑一兩。水煎
分二服。(聖惠方)用胡椒。半夏。
湯泡。等分。爲末。薑汁糊丸。梧子大。
每服湯下三十九。(是齋百一方)
●治赤白下痢。胡椒綠豆各一

八 八 九

九 薑 胡

歲一粒爲末。糊丸。梧子大。紅用生。真。自。用。米。湯。下。(集簡方)

①治大小便閉。閉格不通。脹悶。二三日則殺人。胡椒二十一粒。打碎。水一盞。煎六分。去滓。入芒硝半兩。煎化服。(聖濟總錄方)

②治小兒虛脹。塌氣丸。用胡椒一兩。蠟尾半兩。爲末。麵糊丸。粟米大。每服五七丸。陳米飲下一加菜。煎子半兩。(錢乙小兒方)

③治虛寒積癖。在背膜之外。流於兩脇。氣逆喘急。久則營衛凝滯。漬爲癭疽。多致不救。用胡椒二百五十粒。蝦尾四箇。生木香二錢半。爲末。粟米飯丸。綠豆大。每服二十丸。橘皮湯下。名磨積丸。(濟生方)

④治房勞陰毒。胡椒七粒。葱心二寸半。麝香一分。持糊。以黃蠟溶和。做成條子。插入陰內。少頃汗出。即愈。(孫氏集效方)

⑤治驚風內釣。胡椒。木鱉子。仁等分。爲末。醋調。黑豆末和。杵糊丸。綠豆大。每服三四十九丸。荊芥湯下。(聖惠方)

⑥發散寒邪。胡椒。丁香各七粒。碾碎。以葱白搗碎。和塗兩手心。合

掌握定。夾於大腿內側。溫覆取汗。則愈。(傷寒種要方)

⑦治傷寒咳逆。日夜不止。寒氣攻胃也。胡椒三十粒。打碎。麝香半錢。酒一鐘。煎半鐘。熱服。(聖惠方)

⑧治風蟲牙痛。用胡椒。葛根等分。爲末。蠟丸。麻子大。每用一丸。塞蛀孔中。(衛生易簡方) 治風蟲客寒。三般牙痛。呻吟不止。用胡椒九粒。綠豆十一粒。布裹。搗碎。以絲綿包作一粒。患處咬定。涎出吐去。立愈。(韓氏醫通方) 又用胡椒一錢半。以羊脂拌打四十九丸。擦之。追涎。

(普濟方) ⑨阿伽陀丸。治婦人血崩。用胡椒。紫椶香。鬱金。茵陳。小蘗皮。等分。爲末。水丸。梧子大。每服二十九丸。阿膠湯下。李時珍曰。按西陽雜俎。胡椒出摩伽陀國。此方之名。因此而訛者也。

用量 五分至一錢。 施用宜忌 凡陰虛有火者。禁用忌火。

參攷資料 ⑩胡椒大辛熱。純陽之物。腸胃寒溼者宜之。熱病人食之。動火傷氣。陰受其害。時珍自

少嗜之。歲歲病目。而不疑及也。後漸知其弊。遂痛絕之。目病亦止。後食一二粒。即便昏澀。此乃昔人所未試者。蓋辛走氣。熱助火。此物氣味俱厚。故也。病咽喉口齒者。亦宜忌之。近醫每以綠豆同用。治病有效。蓋豆寒。椒熱。陰陽配合得宜。且以豆制椒毒也。按張從正儒門事親云。噎膈之病。或因酒得。或因氣得。或因胃火。醫氏不察。火裏燒薑。湯中煮桂。丁香未已。豈寇繼之。薑機未已。胡椒繼之。雖曰和胃。胃本不寒。雖曰補胃。胃本不虛。况三陽既結。食必上潮。止宜湯丸。小小潤之可也。時珍竊謂此說雖是。然亦有食入反出。無火之證。又有痰氣鬱結。得辛熱暫開之證。不可執一也。(李時珍) ⑪胡椒多食損肺。令人吐血。(李珣) ⑫按段成式酉陽雜俎云。胡椒出摩伽陀國。呼爲味羅支。其苗蔓生。莖極柔弱。葉長寸半。有細條。與葉齊。條條結子。兩兩相對。其葉長開。暮合。合則裂其子於葉中。形似胡椒。至辛辣。六月採。今食料用之。(唐慎微) ⑬胡椒今南番諸國。及交趾。滇南。海南。諸地

八九〇

皆有之。蔓生附樹。及作棚引之。葉如扁豆山藥。正月開黃白花。結嫩紫漿。經夏而生。狀如梧桐子。亦無核。生青。熟紅。青者更辣。四月熟。五月採收。曝乾。乃斫。今通中國食品。爲日用之物也。(李時珍) ⑭畢澄茄。茄與胡椒一類。兩種。正如大腹之與檳榔也。(李時珍) ⑮畢澄茄類。言與胡椒同其主治。然其溫脾胃。同而療腎氣。膀胱冷者。少類於蜀椒。其下氣同。而治陰逆下氣。寒者。少類於吳萸。投劑亦宜。知所用之。(劉涪江)

【胡椒粥】基本 本品係胡椒和米煮成之粥。 主治 治心腹疼痛。

【胡椒菜】卽石龍芮之古籍別名。典見救荒本草。詳石龍芮條。 【胡椒】卽胡荽之古籍別名。典見外臺。詳胡荽條。卽碎薑子之古籍別名。典見胡居士百病方。詳碎薑子條。

【胡荽草】 產地 生山田中。 形態 胡荽草爲雜草類之一種。枝葉似小荳菜。花紫色。似蓮翹花。一枝七葉。其葉可供

藥用。

採取 春月採之。

性質 辛滑無毒。

主治 瘰癧瘡。止痛散血。搗汁塗打撲損傷筋骨。惡瘡。腫毒。同松枝。乳香。亂髮灰。桑柴炭。搗丸酒服。

【胡黃連】 命名 本品性味功用似黃連。故名。

古籍別名 胡黃連。和漢藥考。

學名 *Picrorhiza kurrosa*, Royle.

基本 屬玄參科胡黃連之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。胡黃連產自梨樹吉打。六七月新。今南方亦有之。

形態 胡黃連。初生似蘆。乾則似楊柳枯枝。心黑。外黃。折之。歷出如煙者。乃真。其根頭似鳥嘴。拆之內似鳥嘴者。乃良。其葉似秋開白花。而市上所售者。根似地黃。粗約二三分。外面色黃白。有疣狀突起。內作紫黑色。有白點五小點。味極苦。

種類 胡黃連本非黃連同類。皮色雖黃。而剖之色黑。以其味苦。

九 薑 胡

性寒。與黃連之性味功用差近。又其種來自異域。因得胡黃連之名耳。

採取 每年八月間。採根曬乾。

性質 苦平無毒。

成分 按胡黃連根有苦味。健胃劑之功效。而其有效成分則為 *Picrorhizin*, (胡黃連精) 及 *Cathartin-Säure* (加答兒精酸) 兩種 (*Glykoxide*) 配糖體是也。

效能 清濕熱。療驚疳。退夜熱。除骨蒸。用作健胃或殺蟲藥。

主治 補肝膽明目。治骨蒸勞熱。三消。五心煩熱。婦人胎蒸虛癆。冷熱洩痢。五痔。厚腸胃。益顏色。浸人乳汁點目甚良。

歷代記述攷證 【唐】開寶重定新本草論胡黃連曰。治久痢成疳。小兒驚癇。寒熱不下。食積亂下。痢。傷寒咳嗽。溫瘧。理腰腎。去陰汗。

【元】朱丹溪本草衍義補遺論胡黃連曰。去果子積。【明】繆希雍本草經疏論胡黃連曰。胡黃連味至苦。其氣大寒。性則無毒。善除濕熱。故主久痢成疳。及冷熱洩痢。厚腸。

胃。傷寒咳嗽者。邪熱在手太陰足陽明也。溫瘧骨蒸者。熱在骨間也。理腰腎去陰汗者。腎虛濕熱下流。客之使熱伏腎間也。小兒驚癇寒熱不下食者。熱則生風。故發驚癇。熱在胃口。故不下食也。心主五色。脾胃主肌肉。二經溼熱去。則顏色自佳也。三消五痔。大人五心煩熱者。無非溼熱在腸胃。及火在五臟間也。大寒至苦。極清之性能清熱。自腸胃以次於骨。凡一切溼熱邪熱。陰分伏熱所生諸病。莫不消除。【清】黃宮樞本草求真論胡黃連曰。胡黃連出於波斯國。近時秦隴南海亦有。氣味功用亦同黃連。因以連名。但此性尚達下。大伐臟腑。骨髓淫火熱邪。凡骨節勞熱。五心煩熱。三消五痔瘰癧。瀉痢惡毒等症。皆得以治。故同豬胰以療楊柳惡瘡。且同乾薑以治小兒菓積。同雞肝以治小兒疳眼。同烏梅以治小兒血痢。同甘草豬胰以治瘰癧。又治婦人胎蒸。較之黃連。治功同而稍異耳。

國外學說 日本向無此物。醫家即以屬玄參科之 *Picro*

liza Kurrosa, Royle 代之。其實誤也。故其基本植物與形態等。至今不詳。○大和本草曰。胡黃連。似黃連而大。味甚苦。莖頭亦似黃連。此物來自中國。秋開白花。葉細。日本之小草原野間有之。或曰。國俗好之。用以殺蟲消積。實則非也。

近人學說 張山雷曰。胡黃連始見於唐本草。蘇恭謂味苦大寒。治三消。五心煩熱。泄利五痔。厚腸胃。浸人乳汁點目赤。其功用與川連皆同。又謂其補肝膽明目。治骨蒸勞熱。則因其結熱而過甚。言之非篤論矣。開寶稱其治小兒驚癇。疳熱。泄亂下利。溫瘧。理腰腎。去陰汗。亦皆清熱燥溼之力。丹溪獨稱其除果子積。以苦能澀降。而亦燥溼也。石頭謂苦寒直降。能伐臟腑。骨節邪熱。為小兒疳積積氣之峻藥。同豬胰治楊梅瘡。酒水煎服。二劑輒效。以其直達下焦。善搜淫火之毒也。按胡連之用。悉與川連同。功惟質重色黑。沈降之性尤速。故清導下焦溼熱。其力愈專。其效較川連為捷。凡熱痢脫肛。痔漏瘡。血刺血淋。沒血濁血。及梅毒瘡。

八九一

九 薑 胡

等症。濕火結聚。非此不能直達病所。而小兒疳積腹膨之實證。亦可用之。蓋苦降直墜。導熱下趨。最為迅疾。且不致久留中州。妨礙脾胃。沖和之氣耳。又曰胡連大苦大寒。純陰用事。且較川連尤為峻烈。自蘇恭有主婦人胎熱之說。而後之本草。皆仍其舊。須知胎前實火。止是百病中之一端。惟妊身養胎。最重脾胃。苦寒峻藥。胡可輕投。蘇恭又以治骨蒸勞瘵。則熱入骨髓。精血已枯。雖曰火炎。實由陰竭。大寒大苦。伐伐生機。火縱可息。而大命何如。適以速之。既耳。繆氏經疏又謂主久痢或疳。似以小兒疳勞言之。然久痢之餘。豈可峻用苦寒。再戕脾胃乎。噫。西昌已謂小兒五疳。猶之大人五勞。實熱而用苦寒。必於初起之時。乃可得效。若胃虛得此。有死而已。臆草、蘆薈、川連、胡連。極苦大寒。豈虛勞所能堪。此設妄謂虛勞之外。又有實勞。而恣用苦寒。則醫殺之也。張石頑亦謂兒童腎實。故實熱可用苦寒。若脾胃腎陰不足者。服此奪人壽算。為害不淺。凡用苦寒峻厲之品。皆當識此。

弗恣意也。仲醇又謂治傷寒咳嗽。則寒邪在表為咳。而可用此。大是駭人。自注謂邪熱在太陽陽明。則冠以傷寒二字。殊是不合。其實即是脾胃熱咳。亦萬萬用不到胡連也。

配合應用 ●治傷寒勞復身熱。大小便赤如血色者。胡黃連一兩。山梔仁二兩。入蜜半兩。拌和炒令微焦。二味搗羅為末。用豬膽汁和丸。梧子大。每服用生薑二片。烏梅一枚。童便三合。浸半日。去滓。食後燈籠便令溫。下十九丸。臨臥再服。甚效。(蘇頌附經方)

●治小兒疳熱。肚脹潮熱。髮焦。不可用大黃黃芩傷胃之藥。恐生別證。以胡黃連五錢。五穀脂一兩。為末。雄豬膽汁和丸。菉豆大。米飲服一二十丸。(全幼心鑑方)

●治脾熱疳疾。用胡黃連、川黃連各半兩。砂砂二錢。半為末。入豬膽內。紮定。以杖子約懸於砂鍋內。漿水煮一炊久。取出研爛。入蘆薈麝香各一分。飯和丸。麻子大。每服五七丸。至一二十丸。米飲下。(錢氏小兒方訣)

●治小兒黃疳。胡黃連、川黃連各一兩。為末。用黃瓜一箇。去瓤留蓋。入藥在內。令定。麪裹煨熟。去麪。搗丸。菉豆大。量大小溫水下。用蠶八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛弱者。禁用。即欲用之。須與健脾安胃藥同用。惡菊花、玄參、白蘚皮、忌豬肉。解巴豆毒。令人漏精。胡黃連散。治小兒發熱不退。胡黃連一分。砂砂半兩。牛黃一分。麝香半分。犀角一分。右為散。用乳汁調下一字。

參攷資料 胡黃連。其性味功用似黃連。故其名乃爾。第觀其治勞。則又未能盡似也。五勞證中。或發寒熱。或骨蒸作熱。或往來潮熱。或五心常熱。或自汗盜汗。如胡黃連。正為主治之味。是其不盡似者也。第先賢類以療小兒疳疾。雖黃連亦多用之。治疳。然不如茲味有專功。是則尤為可參耳。又曰。胡黃連。本草言苦平。蘇恭乃云大寒。然嘗其味。其苦不及黃連。則大寒之說。宜再審之。(李東壁)

【胡蘆蘆】即骨碎補之古籍別名。典見綱目拾遺。詳骨碎補條。

胡葱 命名 本品根似胡蒜。而來自胡地。故名。

古稱別名 蒜葱。回葱。蒜本 係百合科葱屬。為胡葱之根葉。

形態 胡葱為菜類之多年生草本。高一二尺。折莖。則出液汁。葉為覆葉。細長而稍扁平。地下莖為鱗狀。春夏秋皆開黃色五瓣花。子實細小。根葉可供藥用。其子亦有功用。詳見「胡葱子」條。

採取 五月六月採之。

製法 雷斅曰。凡採得依紋。碎。用綠梅子相對拌蒸一伏時。去梅子。砂盆中研如粉。瓦器曬乾。用。

性質 辛溫。無毒。

主治 溫中下氣。消穀能食。殺蟲。利五臟。不足氣。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論胡葱曰。療腫毒。

參攷資料 ●胡葱生則辛。熟則甘溫。(李時珍) ●胡葱亦是薑物。久食傷神損性。令人多忘。損目。明經血脈。發病疾。患胡臭。醫齒人食之。轉甚。(孟詵) ●胡葱四月勿食之。令人氣喘多驚。(孫思邈) ●

方術者溪澗白石爲椹。及麥牛馬。隨骨令輒。皆用胡葱。則亦槩堅之物也。陶弘景言葱能化五石。消桂爲水。則是諸葱皆能輒石。故今人採蒼葱黃石。謂之胡葱也。(李時珍) ①胡葱卽蒜葱也。非野葱也。野葱名蒼葱。似葱而小。胡葱乃人種。葉似葱。而根似蒜。其味如薤不甚臭。江西有水晶葱。蒜根葱葉。蓋其類也。(李時珍)

【胡葱子】 主治 中諸毒肉。吐血不止。萎黃悴者。以一升水煮冷服半升。日一夜。血定乃止。

【胡葵】 卽對葵之古籍別名。典見爾雅。詳『蜀葵』條。

【胡蜂】 卽大黃蜂黑色者之古籍別名。典見廣雅。詳『大黃蜂』條。

【胡蝶子】 卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【胡樣子】 卽無名子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無名子』條。

【胡蝶娘】 卽蝶娘之處方用名。詳『蝶娘』條。

【胡蔓草】 卽鈎吻之古籍別名。典見圖經。詳『鈎吻』條。

【胡蘆殼】 卽蘆殼之處方用名。詳『蘆殼』條。

【胡燕卵黃】 主治 卒水浮腫。每吞十枚。參攷資料 胡燕爲燕之有黑斑而鳴聲大者。可入藥。其紫胸輕小者。不入藥用。(陶弘景)

【胡燕脂】 卽燕脂以紫鈔染綿而成者之別名。典見綱目。詳『燕脂』條。卽落葵取汁和粉製成者之別名。詳『落葵』條。

【胡燕窠土】 性質 無毒。主治 同尿作湯浴小兒。去驚邪。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論胡燕窠土曰。主風痿癱瘓。及惡刺瘡。浸淫瘡。遍身至心者死。並水和傅之。三兩日卽瘳。

【明】李時珍本草綱目論胡燕窠土曰。主口吻疳。白禿諸瘡。

【胡燕糞】 主治 小兒驚邪。同。

【胡頹子】 古籍別名 雀兒酥。子。半含春。黃婆爛。(綱目)

外國名詞 Elnaeagnus punn.

Genae, Thunb. (拉丁) ナハシログミ タワラグミ (日本)

基本 係胡頹子科。胡頹子屬。爲胡頹子之果實。其根葉俱入藥用。詳胡頹子根胡頹子葉條。

產地 生林野間。



(一) 子頹胡

形態 胡頹子爲灌木類之常綠木本。高丈許。枝葉而稍柔。葉密生。褐色及銀色之鱗片。作橢圓形。緣邊有波狀。冬月枝梢葉間開花。花有合片。萼帶白色。翌年初夏果實成熟。長橢圓形。約五分。赤色。而有散布母色之小星點。採得可供藥用。



(二) 子頹胡

性質 酸。平。無毒。主治 止水痢。

參攷資料 凡有寒熱病者不可用。(陶弘景)

【胡頹子根】 性質 酸。平。無毒。主治 煎湯洗惡瘡疥。并大馬瘡疔。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論胡頹子曰。吐血不止。煎水飲之。喉痺痛塞。煎酒灌之。皆效。

【胡頹子葉】 性質 酸。平。無毒。主治 肺虛短氣。喘咳劇者。取葉焙研。米飲服二錢。

參攷資料 蒲葯治喘咳。方出中藏經云。甚者亦效。如神云。有人患喘三十年。服之頓愈。甚者服藥後。胸上生小塊。癢作痒。則瘳也。唐其如人參等分。清肺散大抵皆取其酸。清收斂。肺氣耗散者之功。用耳。(李時珍)

【胡薄荷】 卽連錢草之古籍別名。典見天寶丹方圖。詳『連錢草』條。

【胡蝶】 卽蝶花產於邊外者之別名。典見毛詩。詳『蝶花』條。

【胡蔓】 卽川芎產於邊外者之別

名。真見別錄。詳『川芎』條。

【胡蘆巴】命名 本品乃海南

音相近。遂說名爲胡蘆巴也。

古符別名 苦豆(胡日)胡巴。

庶巴。庶巴子。皆曹都尉。曹都尉說。

番嘉荀子(和漢藥考)

外國名詞 Sennu Fooni

Crucif. (拉丁) Fenugreek

(英) Fenchonarnon. (德) 蕓本 屬蕓科。爲胡蘆巴之種

子。產地 陳仁山藥物生產辨云。胡蘆巴產自湖北。

形態 胡蘆巴爲一年生草本。莖圓直立。中空。高二三尺。葉互生。

爲長倒卵形。複葉小而平滑。其數三葉柄長。其梢頭分數極。夏月

每葉腋間。開深黃色花一二朵。形似缺蝶。果實爲莢果。初結時挺立。

然則向下彎曲。莢長四寸至六寸。其底部有萼片。漸變狹長。頂端留

凋萎之花瓣。狀若鐮刀。外平滑。微扁。中藏種子十粒至二十粒。有

一種峻烈之臭氣。其種子作斜方形。色淡黃。或黃褐。長二分許。厚一

分許。子皮極薄。發育皺裂。質頗堅

時帶在一角之中央。內作黃色。微

帶油氣。其臭峻烈不快。味微苦。類似

似說粉。

採取 秋季採之。

製法 李時珍曰。凡使胡蘆巴。淘淨。以酒浸一宿。曬乾。蒸熟。或炒

過用。

性質 苦。大溫。無毒。

成分 百分中含黏液質二十分。脂肪油六分。餘則爲揮發油。苦

味質。單寧酸。黃色素等。胡蘆巴中

不含澱粉。其臭氣之原質未詳。某氏

管於此中。發見非沃林奧託利角耐林

Triptonellin. C₁₅H₂₅NO₃之植物鹽基云。所含之脂肪油。爲

黃金色之液體。有特異之臭。比重

○.九四七一。露置之。則易乾。遇伊打。偏蘇兒。硫化炭素。石油伊打

等。俱易溶解。又其中尙含有沙波寧。其構造爲 C₁₅H₂₅O₃。效能 壯元陽。逐寒溼。理脚氣。治疝瘕。用爲滋養緩和藥。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論胡蘆巴曰。治冷氣。疝

瘕。寒溼脚氣。益右腎。暖丹田。【明】

李士材本草圖解論胡蘆巴曰。胡

蘆巴苦溫。純陽之品。補火之藥也。

主元臟虛寒。疝瘕寒溼。腹脹脹滿。

脚氣。胡蘆巴乃海南番中所產。羅

荀子也。溫補下元。導火歸經。與肉

桂同功。至宋時始出。故圖經本草

未之及耳。【清】黃宮楨本草求真

論胡蘆巴曰。胡蘆巴苦溫純陽。亦

能入腎補命門。故書裁煖丹田。壯

元陽。治腎臟虛冷。並疝瘕冷氣。小

腸偏墜。寒溼脚氣。功與仙茅。附子

硫黃。恍惚相似。然其力則終遜於附子。硫黃。故補火仍須兼以附苗。硫黃胡荽等藥同投。方能有效。係海外乾難子。因聲音相近。故名。酒浸。暴乾。炒用。

責此末。製爲布貼。腹痛之部。痛

即消散。疝痛。以此子煎汁。乘熱

腹。則痛自止。大便亦通。大便

粘。以此藥煎水服。便實自能

而通利。一切腫毒。以此末作

布貼之。能消散。或搗細。熱而

排出。殊效。跌打損傷。具有青斑。以

此末和乳汁中。製成布貼之。青斑

自消散而愈。以此藥浸沸湯。取

其黏汁。外敷。善治眼腫。眼爛。

近代學說 張山雷曰。胡蘆巴

始見嘉祐本草。言其味苦大溫。主

治元臟虛冷。氣。腹脹脹滿。面色青

黑。得藥香子。治膀胱氣。其效。乃溫

寒。因而目盲者。然目病此證極少。即口有之。亦非一物所能奏效。而子和過甚。言之。殊不足信。直指方紅蘆巴一疾。炒研末。茴香湯下。治小腸氣痛。類按此亦腎氣虛寒者為宜。辨之不可不審。

配合應用 ①治小腸氣痛。葫蘆巴炒研末。每服二錢。茴香湯下。(直指方)

①治腎氣虛冷。或臨腰痛。葫蘆巴炒二兩。熟附子。硫黃各七錢五分。為末。酒煮糊丸。梧子大。每鹽湯下三四十九丸。(醫濟通錄方)

②治冷氣疝。葫蘆巴酒浸晒乾。香多炒研各四兩。小茴香一兩。為末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯或鹽酒下。服至兩月。大便出自腹則除根。(廣心法附方)

③治陰虛腰痛。或小便頻數。下元虛冷。久不愈者。沉香肉內丸。主之。沉香。木香各半兩。葫蘆巴酒浸炒。小茴香炒各二兩。為末。酒糊丸。梧子大。每服五七十丸。鹽酒下。

九靈 胡

酒浸焙各半兩。乾薑炮二錢。半為末。厚湯或溫酒。每服二錢。(濟生方)

④治寒濕脚氣。腿膝疼痛。行步無力。葫蘆巴酒浸一宿。焙。破。故紙炒香。各四兩。為末。以木瓜切頂去瓢。安藥在內。令滿。用頂合住。釐定。烟蒸。搗丸。梧子大。每服七十九丸。空心溫酒下。(楊氏家藏方)

用量 八分至錢半。
應用宜忌 凡非火衰沉寒而屬陰虛火旺者禁用。

參攷資料 ①勝此氣用此。合核仁。鉄炒等分為末。半為散。半以酒糊和。梧子大。每服五七十丸。空心鹽酒下。其散以熱米飲下。與丸子相間。空心服。日各一二服。(寇宗奭) ②葫蘆巴。右腎命門藥也。元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元者宜之。宋惠民和劑局方。有葫蘆巴丸。治大人小兒小腸奔豚。傷墜及小腹有形如卵。上下走痛。不可忍者。用葫蘆巴八錢。茴香六錢。巴戟去心。川烏頭炮去皮各二錢。棟實去核四錢。桑葉五錢。並炒為末。酒糊丸。梧子大。每服十五丸。小

見五丸。鹽酒下。太醫詳已云。一人病寒。筋陰。發。五。茶。諸藥不效。與此而不平也。(李時珍)

【葫蘆服】即葫蘆。之古籍別名。典見因息居飲食譜。詳「葫蘆」條。

【胡蘿蔔】命名 本品元時始自胡地而來。氣味似似蘿蔔。故名。

處方用名 葫蘿蔔根。
古籍別名 葫蘆服。紅蘆服。(飲食譜)

外國名詞 Ducus carota,
D(拉丁)ニンジン ニンジン
ナ(日本)

基本 係繖形科葫蘿蔔屬。為葫蘿蔔之根。
產地 原產歐羅巴。今各省均有出。

形態 葫蘿蔔為菜類之越年生草本。高四五尺。根黃赤色。長大約尺餘。徑寸許。肉質味甘。葉大而細。裂有長葉柄。夏月開小花。白色。雄蕊五。與花瓣同數。而互生。花作複繖形。花序總苞自羽狀葉。其子似蒴果。



胡蘿蔔

種類 赤葫蘿蔔。形甚短。色鮮。味殊甘美。紫葫蘿蔔。色深紫。中心黃色。野葫蘿蔔。一似家葫蘿蔔。惟根細小。味亦甘。沙蘿蔔。根長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筋。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣味。

採取 冬月採掘。
製法 採得。洗淨泥土用。
用法 生喫或煮食。入藥搗汁和服。

性質 甘。辛。微溫。無毒。
效能 利胸膈。助腸胃。用作消化藥。

主治 下氣補中。利胸膈腸胃。安五臟。令人健食。有益無損。
歷代記述攷證 【唐】黃宮繡本草求真論。胡蘿蔔。胡蘿蔔。始於元時。胡地而至。形以蘿蔔。故以是名。按香所列主治。止是寬中下氣。及散腸胃邪氣。數種。他則無有。

九畫 胡 胥 致 芥 苔 苕 苜 苜 苜

論及。蓋因味辛則散。味甘則和。質重則降。蘊白甘辛微溫。其質又重。故能寬中下氣。而使腸胃之邪。與之俱去也。但書又言補中健食。非是中虛得此則補中虛。不食得此則健食。因邪去而中受其補益之謂耳。苕不可食。子可以用作食料。

【清】王士雄隨息居飲食譜論胡蘿菔曰。胡蘿菔辛甘溫。下氣寬腸。氣微腥。雖可充食。別無功用。

近人學說 丁福保曰。胡蘿菔含有水分糖分。及微量之灰汁。於蔬菜中積分最強。其味甘美而僅微之苦味。尤有養腎之特效。

參攷資料 胡蘿菔。今北土山東多蒔之。淮楚亦有種者。八月下種生苗。如邪蒿。莖有白毛。辛臭如蒿。不可食。冬月掘根。生熟皆可。兼果蔬之用。根有黃赤二種。微帶蒜氣。長五六寸。大者盈握。狀似鮮掘地黃。及羊蹄根。三四月莖高二三尺。開碎白花。攢簇如傘。狀似蛇狀花。子亦如蛇狀。子稍長而有毛。褐色。又如蒔蘿子。亦可調和食料。按周憲王救荒本草云。野胡蘿菔苗葉花實皆同家胡蘿菔。但根

細小味甘。生食熟食皆宜。花子皆大於蛇狀。又金幼孜北征錄云。交河北有沙蘿菔。根長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筋。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿菔氣。此皆胡蘿菔之類也。(李時珍)

【胡蘿菔子】

主治 久痢。

【胡蘿菔根】 即胡蘿菔之處方用名。詳「胡蘿菔」條。

【胡蘿菔粥】

成之粥。

基本 本品以胡蘿菔和米煮

主治 寬中下氣。

【胡鹽】 即戎鹽之古籍別名。典見別錄。詳「戎鹽」條。

【胥椒】 即椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「椰子」條。

【胥餘】 即椰子之古籍別名。典見綱目。詳「椰子」條。

【致神】 即桑螵蛸之古籍別名。典見綱目。詳「桑螵蛸」條。

【芥】 即茯苓。諸芥之簡稱。各詳本條。○即白芷之別名。典見和漢藥考。詳「白芷」條。

【芥乳糕】 即茯苓之處方用名。詳

【茯苓】條。

【苦苣】 即垣衣之古籍別名。典見綱目。詳「垣衣」條。

【苦菜】 即紫莖之古籍別名。典見圖經本草。詳「紫莖」條。○即乾苕之古籍別名。典見本草綱目。詳「乾苕」條。

【苕苕】 即翅播之古籍別名。典見綱目。詳「翅播」條。

【苜麻】 即苜麻之古籍別名。典見綱目。詳「苜麻」條。

【苕子】 即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「訶子」條。

【苜蓿】 古舊別名。木粟。光風草。(綱目)懷風。連枝草。

外國名詞 Medicago dentata, Willd. (拉丁)ウマヤシ ムマコヤシ(日本)

基本 係豆科苜蓿屬。為苜蓿之莖葉。

產地 生原野間。

形態 苜蓿為菜類之越年生草本。平臥地上。長二尺餘。葉作羽狀複葉。自三小葉成。無卷鬚。托葉細裂。葉腋出花軸。生三花至五花。

花小黃色。蝶形花冠。實為莢果。呈蝶狀。有刺。頗尖銳。中有黑子如蒜米。可作飯與釀酒。其莖葉可作菜茹與供藥用。



苜蓿

性質 苦平。瀉無毒。

主治 安中。利人。可久食。

歷代記述攷證 【唐】孟誥食

按本草論苜蓿曰。利五臟。輕身。健人。洗去脾胃間邪熱氣。通小腸。諸惡熱毒。實和脾胃。亦可作羹。【生】寇宗奭本草衍義論苜蓿曰。利大小腸。【宋】蘇頌圖經本草論苜蓿曰。乾食令人。

參攷資料 苜蓿多食則冷氣入筋中。令人瘦。(孟誥)○苜蓿同蜜食。令人下利。(李廷飛)

性質 寒。無毒。

【苜蓿根】 主治 熱病煩滿。目黃赤。小便黃。酒疸。搗服令人吐利。即愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論首帶根曰。搗汁煎飲。治沙石淋痛。

【苟斗】即苟印之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「苟印」條。

【苟印】古籍別名。苟斗。（陳藏器）

產地 出粵省潮州。

形態 苟印為蛇類之一種。如蛇而有四足。其背可供藥用。

主治 海耳中。治聾。令左右耳微。

【苟格】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【苡仁】原名 慈苡仁。送有米仁之稱。本品形狀似米。

總方用名 慈苡仁。生苡仁。炒苡仁。苡米。米仁。

古籍別名 解苡。（本經）芑實。苡米。（別錄）苡珠。（南氏）糙米。（雷氏）西番苡。草珠兒。回回米。（救荒本草）慈珠子（圖經）玉米。米珠。起目。慈米。屋炎。慈委。草魚目。珠子仁。苡藤。有乙梅（和漢藥考）

外國名詞 (Curt Burloy, (英))


若本 係屬禾本科慈苡之子

九壹 苟 苡

仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。苡仁產山東牛莊為上。其次廣西昭平等處。

形態 苡仁為一年生草本。稈高四五尺。七月中旬於梢間葉腋開白色數花。後結淡褐色有光澤之橢圓形小實。實中有孔。以指頭壓之。則實皮自破。其仁類麥粒而狹長。外部被有淡褐色薄皮。內部白色。嚼之如糯米。黏著齒間。



苡 仁

種類 形尖而殼薄。嚼之黏牙。仁色白如糯米者曰慈苡仁。形圓而殼厚。質地堅硬者曰菩提子。即念佛珠。藥舖所售之苡仁。亦有用小兒玩弄川穀。Cock's Apple, Hour. 實用石臼粗磨。以所得之仁充之。

採取 八九月間採之。

製法 借取。凡使每一兩。以糯米一兩同炒熟。去糯米用。亦有

更以鹽湯煮過者。

用法 與他藥水煎。或焙到和作丸散。亦可煮熟及和白米煮粥食之。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 慈苡仁據日本駒場農學校分析慈苡仁之成績云。苡仁在禾本科植物中。為最富滋養。易於消化之穀類。蛋白質含量之多。他穀罕有其匹。並含有與小麥相等之多量鈣質 (Calcium)。

脂肪亦多。其質透明。殆無色纖維極少。有機成分中。脂肪之多。有似燕麥。但其滋養則遠過之。惟其灰成分。則與通常禾本科植物無異。

苡仁與白米之比較。在風乾狀態。百分中。慈苡仁之蛋白質為一七。五八。白米為七。七二。慈苡仁之脂肪為七。一五。白米為〇。七七。慈苡仁之炭水化物為六二。四一。白米為七六。七九。觀此可知慈苡仁所含之蛋白質及脂肪。均較白米為多。惟炭水化物則稍遜耳。世人莫不知白米為富於滋養力之食料。而慈苡仁之滋養力。較諸白米。實有過無不及。以

其所含之石灰質及磷質亦富。石灰質為構造我人骨骼之原料。磷質足以滋補衰弱之腦系也。然則慈苡仁之滋養力。不亦大乎。

效能 生用利溼熱。炒用止瀉痢。常作利尿及健胃藥。又治腎臟炎。

主治 筋急拘攣。不可伸屈。久風溼痺。下氣。久服輕身益氣。（本經）除筋骨中邪氣不仁。利腸胃消水腫。（別錄）

張仲景之發明 苡仁一味。經張仲景之實驗。認為「主治浮腫也」。茲考徵如下。慈苡附子散。證不具也。以上一方。慈苡仁十五兩。慈苡附子散。證曰。腹皮急。按之濡。如腫狀。以上一方。慈苡仁十分。麻黃杏仁慈苡甘草湯。證不具也。以上一方。慈苡仁半兩。慈苡附子散。證不具也。而慈苡附子散。證言如腫狀。則主治浮腫明矣。麻黃杏仁慈苡甘草湯。亦就麻黃杏仁甘草石膏湯。而去石膏。加慈苡。則用之於咳嗽浮腫可也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論苡仁曰。治肺癰。肺氣積

腹血。欬嗽涕唾。上氣。煎服破毒腫。
 【唐】孟詵食療本草論苡仁曰。去
 乾溼脚氣。大陰。【唐】陳藏器本草
 拾遺論苡仁曰。炊飯作麪食。主不
 饑。煮飲止消渴。殺蛇蟲。【宋】寇宗
 奭本草衍義論苡仁曰。補脾益肺。
 除溼清熱。下氣和營。主筋促拘攣。
 不可伸屈。【明】李時珍本草綱目
 論苡仁曰。健脾益胃。補肺清熱。去
 風勝溼。炊飯食。治冷氣。煎飲利水。
 治熱淋。【明】繆希雍本草經疏論
 苡仁曰。苡仁味甘淡微寒。無毒。
 經曰。地之溼氣。感則害人皮肉筋
 脈。又曰。風寒溼三者。合而成痺。此
 藥性燥能除溼。味甘能入脾補脾。
 兼淡能滲泄。故主筋急拘攣。不可
 屈伸。及風溼痺。除筋骨邪氣。不仁。
 利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕
 身。總之溼邪去則脾胃安。脾胃安
 則中焦治。中焦治則能榮養乎四
 肢。而通利乎血脈也。甘以益脾。燥
 以除溼。脾實則腫消。脾強則能食。
 溼去則身輕。如是則已上諸疾。不
 求其愈而自愈矣。【清】黃宮繡本
 草求真論苡仁曰。苡仁書載上
 清肺熱。下理脾溼。以其色白入肺。

性寒瀉熱。味甘入脾。味淡溼故
 也。然此升少降多。凡虛火上乘。而
 見肺痿肺癰。因熱生溼。而見水腫
 溼深。脚氣疝氣。泄痢熱淋。並風熱
 筋急拘攣等症。皆能利水而使筋
 不縱弛。非若白朮氣味苦溫。寒性
 不見。號為補脾要藥矣。此止清熱
 利水之味。用於湯劑。性力和緩。須
 倍他藥。若津枯便秘。陰寒轉筋。及
 有孕婦。不宜妄用。以性甜下泄
 也。殺虻取根。同糯米炒熟。或鹽湯
 煮過用。【清】鄭澗本經疏證論苡
 仁曰。朮溫。而苡微寒。朮甘辛。而
 苡甘淡。且朮氣味俱厚。苡氣
 味俱薄。為迥不相侔也。此其義見
 於金匱要略。溼溼喘篇曰。溼家身
 煩疼。當與麻黃加朮湯。發其汗為
 宜。慎勿以火攻之。曰病者一身盡
 疼。發熱日晡所劇者。此名風溼。此
 病傷於汗出當風。或久傷取冷所
 致也。可與麻黃杏仁苡甘草湯。
 夫身煩疼者。溼而兼寒。一身盡疼
 者。溼而兼風。寒從陰化。風從陽化。
 故身煩疼者。屬太陽。發熱日晡所
 劇者。屬陽明。屬太陽者宜發汗。屬
 陽明者宜清熱。發汗所以洩陽邪。

清熱所以折陽邪。實之以用朮用
 桂者。為發汗。苡則為清熱矣。雖
 然苡既治風溼。又主筋急拘攣。
 不能屈伸。彼風溼相搏。骨節疼痛。
 不得屈伸。風溼相搏。身體疼痛。不
 能自轉側。獨不用苡。何耶。夫適
 固言之矣。苡是治久風溼痺。非
 治暴風溼痺者也。然則麻黃杏仁
 苡甘草湯證。非暴病耶。玩汗出
 當風。久傷取冷之因。決知其似暴
 病。實非暴病也。發熱日晡所劇。風
 與溼勢將化熱。故以苡合麻黃
 杏仁甘草。迎其機而奪之。彼風溼
 相搏者。上既冠以傷寒八九日。已
 可知其非久病。下出所治之方。或
 有取乎附子生薑。或有取乎附子
 桂枝。且俱用朮。其不能雜入苡
 決矣。朮與苡非相反相惡也。既
 用此即不用彼者。無他。朮性急。苡
 性緩。合而用之。恐其應速。則嫌
 於緩。應遲。又傷於燥也。【清】關立
 陸本草選旨論苡仁曰。苡仁。味
 甘微寒。無毒。正得地之燥氣。稟
 乎天之秋氣。以生。經曰。地之溼氣
 感則害人皮肉筋骨。又曰。風寒溼
 三者。合而成痺。此藥性燥。能除溼。

味甘能入脾。補胃。兼淡。淡能滲泄。
 故本經主筋急拘攣。不可屈伸。及
 風溼痺。久服輕身。別錄治筋骨中
 邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能
 食。總之溼邪去則脾胃安。脾胃安
 則中焦治。中焦治則能榮養乎四
 肢。而通乎血脈也。甘以益脾。燥以
 除溼。脾實則腫消。脾強則能食。溼
 去則身輕。如是則已上諸疾。不期
 愈而自愈矣。甄權又曰。治肺痿肺
 膿者。土為金之母。虛則補其母也。
 所以用之之法。當同天麻以治肺
 同蒼朮以治脾。同蒼朴以治胃。同
 牛膝以治腎。同木瓜以治足。同人
 參以治心。同二陳以治痰。同平胃
 以治溼。同蒼柏以治癢。同歸芍以
 治癆。同檳榔以治脚氣。同五苓
 以治水溼蘊蓄之不利也。但其藥
 力和緩。凡用須得加倍乃效。且其
 性燥。若病人大便秘結。小便短少。
 因寒轉筋。脾虛無溼。婦人妊娠者。
 悉宜忌之。然按之衍義云。本經謂
 主筋急拘攣。須分兩等。大筋縮短。
 拘急不伸。此是因熱拘攣者。可用。
 若因寒拘攣。不可用也。丹溪又曰。
 寒則筋急。熱則筋縮。急因於堅強。

指因於短促。若受溼則強。強則引長。然寒與溼未嘗不挾熱。又三者未嘗不因於溼。慈苡仁去溼藥二家之說。實有不同。以衍義言之。則筋病因熱可用。因寒者不可用。以丹溪言之。則寒熱溼皆可。蓋寒而留受。亦變爲熱。况外之寒溼與熱。皆由內溼啓之。方能成病。謂之日三者。未始不因於溼。是誠盲者之日月。聾者之雷霆矣。

國外學說 英美學說謂慈苡仁之功用。與大麥仁同。病人得此易化。又日本和漢藥解曰。慈苡仁者。漢醫用於肺癆。謂有特效。吾國甄權本草。治肺癆。肺氣積。積血。咳嗽。喘。上氣等證。而晉。褚子氏以慈苡仁治肺癆有效爲疑。以爲此非真藥物。不過一種營養品而已。又和漢藥考曰。慈苡仁治痰有效。耳之已久。但復之諸籍。如吉益東洞著藥徵云。主氣浮腫也。香川大冲著一本藥選云。治風寒溼痺。又日本一抱著和語本草綱目云。療水腫。健脾胃。增食云云。等。皆用作利尿劑及健胃劑。未有言及治純功效者。據予所檢素片

九畫 苡

倉元周著青囊瑣探治痰神方中。有云。用慈苡仁二錢。甘草一錢。水一盞半。煎一盞。溫服。四五日。痰脫如掃。又石黑忠德著外科說約治痰法中云。自昔喜用慈苡仁末內服。予嘗聞其說於柳元永翁。因其理不明。故不之信。邇來逢全身生有小疣數個者五人。使試服慈苡仁末。其中二人經三四月而全治。全疣皆脫落。因實之友人。皆云有效。雖尙未詳其理。但實際有效。故附記於此云。關於慈苡仁之用法。或以其粉末外敷。或用於內服。予則將慈苡仁連同其殼。細剉。用爲煎劑。使黏滑無味。便於下服。小兒一日量三。○至五。○成人八。○至三〇。○

配合應用 治萎厥。慈苡仁。木瓜。石斛。草薢。黃蘗。生地。黃。麥門冬。

治胸痺偏緩。慈苡仁同五加皮。牛膝。石斛。生地。黃。甘草。主筋拘急。加二朮。苜蓿。甘菊花。可治痺。佐以附子。

慈苡仁飯。治冷氣。用慈苡仁。黍熟。炊爲飯食。氣味欲如麥飯。乃佳。或煮粥亦好。(黃齊方)

慈苡仁粥。治久風溼痺。補正氣。利腸胃。消水腫。除胸中邪氣。治筋脈拘攣。慈苡仁爲末。同粳米。煮粥。日日食之良。

治風溼身疼。日噴劇者。張仲景麻黃杏仁慈苡仁湯主之。麻黃三兩。杏仁二十枚。甘草。慈苡仁各一兩。以水四升。煮取二升。分再服。(金匱方)

治水腫喘急。用郁李仁二兩。研。以水瀝汁。煮慈苡仁飯。日二食之。(獨行方)

治沙石熱淋。痛不可忍。用玉桂。即慈苡仁也。子葉根皆可用。水煎熱飲。夏月冷飲。以通爲度。(楊氏經驗方)

治消渴飲水。慈苡仁煮粥飲。并煮粥食之。

治肺痿咳嗽。唾膿血。慈苡仁十兩。杵破。水三升。煎一升。酒少許服之。(梅師方)

治肺癆咳嗽。唾心。胸甲錯者。以淳苦酒煮慈苡仁令濃。微溫頓服之。肺若有血。當時即吐出愈。(汪范方)

治肺癆咯血。慈苡仁三合。搗爛。水二大盞。入酒少許。分二服。(濟生方)

治喉卒癰腫。吞慈苡仁二枚良。(外臺祕要方)

治癰疽不潰。慈苡仁一枚。吞之。(姚僧坦方)

治孕中有癰。慈苡仁黃汁。香頻頻飲之。(婦人良方)

治牙齒腫痛。慈苡仁。桔槎生研末。點服。不拘大人小兒。(永類鈴方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡無溼熱者禁用。

著名方劑 慈苡仁附子散。治胸痺緩急者。(金匱) 慈苡仁十五兩。大附子(泡)十枚。右二味杵爲散。服方寸匕。日三服。慈苡仁湯。治筋痺不可伸屈。(千金方) 慈苡仁。白朮。芍藥。桂心。酸棗仁。乾薑。牛膝。甘草各一兩。附子三枚。右藥以酒。醇酒二斗。漬一宿。微火煎三沸。每服一升。日三服。不耐酒服。五合。一方有車前子。慈苡仁子敗醬散。治腸癰。(金匱方) 慈苡仁十分。附子二分。敗醬五分。右藥杵

九 薑 苡 苳 若 苦

為散。每服方寸匕。清水二升。煎減半。頓服。小便當下。⑤苡苳瓜。治腸癰。千金方。苡苳仁三合。瓜瓣六合。丹皮。桃仁各一兩。右藥清水煮。分二服。一方有芒硝六錢。

參攷資料

⑥苡苳仁。本經微寒。主筋急拘攣。拘攣有兩等。索問註中大筋受熱則縮而短。故舉急不伸。此是因熱而拘攣也。故可用苡苳。若素問言因寒則筋急者。不可更用此。蓋受寒使人筋急。寒熱使人筋攣。若但受熱不會受寒。亦使人筋緩。受溼則又使人筋引長無力也。此藥力勢和緩。凡用須加培即見效。冠宗爽。⑦寒則筋急。熱則筋縮。急因於堅強。縮因於短促。若溼則弛。弛則引長。然寒與溼未嘗不挾熱。三者皆因於溼。然外溼非內溼。啓之不能成病。故溼之為病。因酒而魚肉。繼之甘滑。陳久燒炙。并辛香。皆致溼之因也。朱震亨。⑧苡苳仁。肺痿肺癰。用之筋骨之病。以治陽明為本。故拘攣筋急。痺者用之。土能勝水。除溼。故泄痢水腫用之。按古方小續命湯註云。中風筋急拘攣。語遲脈弦者。

加苡苳仁。亦扶脾抑肝之義。又後漢書云。馬援在交趾。嘗餌苡苳實。云能輕身實慾。以勝瘴氣也。又張師正倦游錄云。辛稼軒忽患痢疾。重墜。大如盃。一道人教以苡苳珠。用東壁黃土炒過。水煮為膏。服數服。即消。程沙隨病此。稼軒授之。亦效。

本草苡苳乃上品養心藥。故有此功。李時珍。⑨苡苳仁。心肺之藥。多用之。故治肺癆。張仲景治風溼胸痺。並有方法。濟生方治肺損咯血。以熟豬肺切。蘸苡苳仁末。空心食之。苡苳補肺引經也。蘇頌。⑩苡苳名義未詳。其葉似薑。實葉而解散。又似芑黍之苗。故有解薑芑實之名。藜米乃其堅硬者。有積強之意。苗名屋莖。救荒本草云。回回米。又呼為西番秬。俗名為草珠兒。李時珍。⑪真定縣屬常山郡。近道處處有之。人家種之。出交趾者。子最大。彼土呼為寶珠。故馬援在交趾。餌之。載還為種。人糲以為珍珠也。實重疊者為良。取仁用。陶弘景。

【苡仁根】

性質 甘。微寒。無毒。主治 下三蟲。

歷代記載攷證

【南北朝】陶弘景本草集註論苡仁根曰。黃汁糜食。甚香。去魃蟲大效。【唐】陳藏器本草拾遺論苡仁根曰。煮服。隨胎。【宋】蘇頌圖經本草論苡仁根曰。治卒心腹煩滿。及胸脇痛者。到黃濃汁服三升。乃定。【明】李時珍本草綱目論苡仁根曰。搗汁和酒服。治黃疸有效。

【苡仁酒】

製法 用苡仁粉。同麴米釀飲。或袋盛浸酒中。

主治 祛風溼。強筋骨。健脾胃。

【苡仁粥】

主治 除溼熱。利腸胃。

【苡仁葉】

主治 作飲氣香。益歷代記載攷證

【明】李時珍本草綱目論苡仁葉曰。暑月煎飲。暖胃。益氣血。初生小兒用此浴之。無病。

【苡米】即苡仁之處方用名。詳「苡仁」條。

【苡蕒】

原名 苡苳。產地 出廣西昭平縣。性質 微寒。

主治 下三蟲。

【昔瓜】即干歲蕒之古籍別名。典見陸璣草木疏。詳「干歲蕒」條。

【若芝】即杜若之古籍別名。典見別錄。詳「杜若」條。

【若草】即五母麻之古籍別名。典見別錄。詳「五母麻」條。

【若裏木皮】即秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦皮」條。

【若榴】即澁石榴之古籍別名。典見廣雅。詳「酸石榴」條。

【若蟹】即蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳「蟾蜍」條。

【若丁香】即瓜蒂之古籍別名。典見象形。詳「瓜蒂」條。

【苦丸】即羅離之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羅離」條。

【苦心】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳「沙參」條。即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

【苦木通】即木通之處方用名。詳「木通」條。

【苦瓜】命名 本品乃瓜類之味苦者。故名。古稱別名 錦荔枝。獼葡萄。紅姑娘。救荒本草。蔓荔枝。日本。

命名 本品乃瓜類之味苦者。故名。古稱別名 錦荔枝。獼葡萄。紅姑娘。救荒本草。蔓荔枝。日本。

外國名詞 Momordica cha-


rentia, L. (拉丁) ツルレイシ

ニガウリ(日本)

基本 係葫蘆科苦瓜屬之果實。

產地 原產南番。今閩廣及各省均有出。

形態 苦瓜爲菜類之一。一年蔓生草本。莖細長。由卷鬚而上升。葉作掌狀。深裂。夏月開花。花單性。雌花與雄花同株。皆有含瓣花冠。色黃。結實細長。徑二寸許。長三寸。外面有許多疣狀突起。初呈綠色。熟則變爲黃色。裂開。現出許多種子。果肉味苦。其種子被以紅色之肉。大如小指頭。柔軟甘美。內有一核。形狀頗奇。



苦瓜

性質 苦寒。無毒。

主治 除邪熱。解分乏。清心明目。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

九畫 苦

本草求真論苦瓜曰。苦瓜卽錦荔枝。其種有長有短。何善哉。言用長宜取青皮。去子。煮肉充蔬。蓋謂生則性寒。熟則性溫。用此生青性寒。以爲除熱解煩。清心明目之品。何書又言。用短宜待熟。赤。取子爲食。蓋謂其子苦甘。能破真火。用此性熱。以爲壯陽益氣之功。共此一味。而生熱不同。寒熱迥別。故其所用。其亦各有別如此。【清】王士雄隨息居飲食譜論苦瓜曰。苦瓜青則苦寒。熟則明目清心。可醫可醃。鮮時燒肉先淪去苦味。雖盛夏而肉汁能凝。中寒者勿食。熟則色赤。味甘性平。養血滋肝。潤脾補腎。

參攷資料 ●錦荔枝。卽類葡萄。蔓延草本。莖長七八尺。莖有毛。葉似野葡萄。而花又開黃花。實大如雞子。有皺紋似荔枝。(周憲王)

●苦瓜原出南番。今閩廣皆種之。五月下子。生苗引蔓。莖葉卷鬚。並如葡萄。而小。七八月開小黃花。五瓣如槐形。結瓜長者四五寸。短者二三寸。青色。皮上瘰癧如癩。及荔枝殼狀。熟則黃色。自裂。內有紅瓤。裹子。瓢味甘可食。其子形扁。

如瓜子。亦有瘰癧。南人以青皮煮肉。及鹽醬充蔬。苦澀有青氣。按費

信星樓勝覽云。蘇門答刺國一等瓜皮若荔枝。未剖時甚臭。如爛蒜。剖開如蒜。味如蘇。香甜可口。疑此卽苦瓜也。(李時珍)

【苦瓜子】

性質 苦甘。無毒。主治 益氣壯陽。

【苦瓜花】

主治 微瘡。胃氣疼。爲末。滾湯下。目痛。燈草湯下。

【苦瓜葉】

主治 一切丹火毒。氣。金瘡。結毒。脂麻。疔。大疔。痛不可忍。曬乾爲末。酒下。三錢。神效。

【苦地膽】

原名 地膽草。命名 本品汁苦如膽。故名。產地 出粵西諸地。

形態 苦地膽爲溼草類。苦芙之開花而不結實者。其葉可供藥用。

主治 貼熱毒瘡。

【苦竹根】

主治 下心肺五臟。熱毒氣。對一斤。水五升。煮汁一升。分三服。

【苦竹茹】

主治 下熱瀉。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論苦竹茹曰。止尿血。水煎服。

【苦竹筒】

外國名詞 Phyll-ostachys quilloi, Poir. (拉丁)

性質 苦甘。寒。無毒。

主治 不睡。去面目并舌上熱黃。消渴。明目。解酒毒。除熱氣。健人。

歷代記述攷證 【明】常效先心鏡篇論苦竹筒曰。理心煩悶。益氣力。利水道。下氣化痰。理風熱。脚氣。并蒸羹食之。【明】汪穎食物本草論苦竹筒曰。治出汗。中風失音。

【明】李時珍本草綱目論苦竹筒曰。乾者燒研入鹽。擦牙疳。

參攷資料 四川敘州宜賓。長寧所出苦竹。彼人重之。宋黃山谷有苦竹賦云。夾道苦竹。冠冕兩川。甘脆候當。小苦而成。味溫潤。穠密多。啖而不捐。食者以之。啓迪酒客爲之流涎。蓋許之也如此。(李時珍)

【苦竹葉】

性質 苦冷。無毒。主治 口瘡。目痛。明。

目利九竅。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論苦竹葉曰治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗療中風瘡瘡【明】李時珍本草綱目論苦竹葉曰殺蟲燒末和碯磨塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡類用取效。

【苦竹瀝】

主治 口瘡目痛。明目利九竅。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論苦竹瀝曰苦瀝竹功同淡竹【明】李時珍本草綱目論苦竹瀝曰治牙疼。

【苦低草】即益母草之古籍別名。典見圖經本草詳「益母草」條。

【苦杏仁】即杏仁味苦者之處方用名詳「杏仁」條。

【苦杖】即虎杖之古籍別名。典見綱目拾遺詳「虎杖」條。

【苦杞子】即枸杞子味苦者之古籍別名。典見陸璣詩疏詳「枸杞子」條。

【苦杞根】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考詳「地骨皮」條。

【苦豆】即胡盧巴之古籍別名。典見綱目詳「胡盧巴」條。

見綱目詳「胡盧巴」條。

【苦辛】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考詳「苦參」條。

【苦板】即苦芙之古籍別名。典見綱目詳「苦芙」條。

古醫別名 鈎芙。(爾雅)苦板(綱目)大者名苦藉(造化指南)無花實者名地膽草(植物學大辭典)

外國名詞 *Christina ovalis*、*Pinh, Er. of Sav.* (拉丁) *ヒメアザミ ナアザミ* (日本)

基本 係菊科苦芙屬入藥用苦芙之苗葉。

產地 山野原澤間。

形態 苦芙為澤草類之宿根草本莖高二三尺。葉長橢圓形。緣邊有銳鋸齒。秋時開花。帶淡紫色。其大者葉如地黃。味苦。初生有白毛。入夏抽莖。有毛。開白花。甚繁。結細實。其無花實者名地膽草。汁苦如膽也。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 面目通身漆瘡。燒灰傳之亦可生食。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論苦芙曰燒灰。療金瘡。極驗。【宋】大明諸家本草論苦芙曰治丹毒。【明】汪穎食性本草論苦芙曰煎湯洗痔甚驗。【明】李時珍本草綱目論苦芙曰下氣解熱。浙東人採其嫩苗食之。可以一年不生疥瘡。

【苦芥子】 產地 出秦州。

類之一種。苗高尺餘。莖青。葉如柳。開花似榆葉。其子黑色。可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 明目。治血風煩燥。

【苦花】即貝母之古籍別名。典見別錄詳「貝母」條。

【苦花子】 古醫別名 毛連子。小葉金雞舌。苦花椒。

(綱目拾遺)

基本 苦花子為雜草類之一種。其根葉可供藥用。

主治 疔瘡。瘰癧。蝨傷。熱腹痛。熱喉風。並效。搗汁搽水。夏冷服。冬溫服。

【苦花椒】即苦花子之古籍別名。典見綱目拾遺詳「苦花子」條。

【苦苣】即苦菜之古籍別名。典見

補註本草詳「苦菜」條。

【苦茄】 形態 苦茄為藤菜類之一種野生植物。小而

有刺。子與根可供藥用。

主治 醋磨。塗癰腫。根亦可作湯浴。又主瘴氣。

【苦茄根】 主治 瘰癧氣。癰腫。

並作湯浴。

【苦桔梗】即桔梗味苦者之處方用名詳「桔梗」條。

【苦消】即消石之古籍別名。典見甄權藥性本草詳「消石」條。

【苦耽】即酸漿之古籍別名。典見圖經本草詳「酸漿」條。

【苦茶】即茶葉之別稱。詳「茶葉」條。即草蘆之日本別名。詳「草蘆」條。

命名 本品味苦甚強。雖浸熱湯千次。其味猶苦。故名。

古醫別名 苦藥。苦蘆。干振。和漢藥考)

基本 係屬龍膽科之當藥。

產地 李時珍本草綱目曰苦草生湖澤中。長二三尺。狀如茅蒲之類。

形態 當藥爲山野自生之一
年生草。莖作方形。高自五六寸至
一尺。上部暗綠色。下部暗紫褐色。
葉爲披針形。互生無柄。長寸許。花
開於梢上。爲白色或紫色。合瓣花
冠。根爲黃褐色直根。形味俱類龍
膽。

採取 每年十月間。採刈陰乾。
性質 苦。溫。無毒。

成分 當藥之成分。含有結晶
性成分(苦味)流動苦味成分。黃
色素。苦味樹脂質等。又日本淺野
房太郎氏。試驗當藥化學的成分。
謂其苦味質爲帶黃褐色無晶形
之粉末。有強烈苦味。呈中性反應。
於一百廿四度熔解。且與健質亞
那根中所含「健質奧卓克林」
Gentioplerin之分解物。或同爲
一物云。又理學士堀越之丞。藥劑
師黑部島吉雨氏論當藥 (Op.
holia dituta, Led.) 所含苦味
素一文。大略謂在東京衛生試驗
所。試驗當藥之成分。結果得到純
白色結晶物。及苦味極烈之物質
云。又藥學士矢部靜雄氏干振草
(Svertia chinensis) 之成分

九畫 苦

一文。就市上所售干振草之全乾
者。稍帶綠色者。及綠色乾燥者三
種。研究其成分。報告其中含有「
愛里窩洛仙塔烏林」(E. Petro-
contaurin) 之結晶體。作糖漿狀
之「奧歇里阿」酸 (Ophelia
acido) 及吉拉丁 (Chitratein)
之混合物云。

效能 日本民間用治腹痛。又
用於殺蟲。第二版改正日本藥局
方。有以當藥代龍膽者。其健胃之
功效。已無可疑。

主治 婦人白帶。煎湯服。又主
好嗜乾茶不已。面黃無力。爲末和
炒脂麻。不時乾嚼之。氣味大苦寒。
殺諸蟲。或有代胡黃連用之者。不
可。今人用染兒衫爲黃色。云能避
蚤虱。

用量 一錢至三錢。
參攷資料 綱目水草類載苦
草云。生湖澤中。長二三尺。狀如茅
蒲之類。主治白帶。又主好嗜乾茶
面黃二種病。其氣味藥性。又矢載
今依張璐玉本經逢原補之苦溫
無毒。香薰入足厥陰肝經。理氣中
之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦

伐胃。氣厥傷。腰。青梁柔脆者服之。
減食作瀉。過服則晚年多患頭風。
昔人畏多產育。以苗子三錢。經行
後。熱淋酒服。則不受妊。傷血之性
可知。(趙學敏)

【苦酒】即醋之古籍別名。典見綱
目。詳「醋」條。

【苦骨】即苦參之古籍別名。典見
綱目。詳「苦參」條。

【苦飽】即苦瓠之別稱。詳「苦瓠」
條。

【苦參】 命名 苦以味名。參以
功名。槐以葉形名也。

古醫別名 苦瀉。水槐。騰槐。
(本經) 地槐。莢槐。(別錄) 苦竹。野
槐。(綱目) 白莖。地骨。麻白。拔麻。虎
麻。苦。辛。綠白。陵郎。茶莖。虎卷扇。虎
(和漢藥考)

學名 Sophora flavescens,
Ait. var. Galeoides, Hemsl.

外國名 Sophora angust-
ifolia (拉丁)

基本 屬豆科之多年生草。爲
Sophora flavescens 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
苦參產廣西賀縣。廣東北江。樂昌。

城口。連州等處。實則凡山谷及田
野溼地多生之。

形態 苦參爲宿根草。山野及
田畔溼地俱生之。春季生苗。高達
三四尺。莖帶紫色。葉互生。爲多數
小葉所成之羽狀複葉。夏季於莖
梢開淡黃色蝶形花冠。花作總狀
花序排列。穗長至七八寸。秋季結
莢。實長二寸許。中有類似小豆之
種子。其根長大。色黃白。狀類牛蒡
根。味甚苦。



參 苦

採取 十月採根曝乾。
製法 留數日。凡使苦參。採得
用糯米泔汁浸一宿。其腥穢氣
并浮在水面上。須重重淘過。即瀝
之。從已至申。取曬切用。

性質 苦寒。無毒。
效能 堅陰。瀉火。燥脾。用作儲
胃。驅蟲。又治神經性消化不良
症。習慣性便秘。

作用 入胃能刺激胃神經。增

九〇三

九靈 苦

加胃分泌。而促進消化力。入腸能
激腸之蠕動。使大便秘排出。一部
分由腸壁吸收而入血。能增加血
液循環之力。

主治 心腹結氣。癥瘕積聚。黃
疸。溺有餘瀝。逐水除癰。腫。補中明
目止淚。(本經)養肝膽氣。安五臟。
平胃氣。令人嗜食。輕身定志。益精
利九竅。除伏熱腸癖。止渴醒酒。小
便黃赤。療惡瘡下部匿。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶
弘景本草集註論苦參曰。漬酒飲
治疥殺蟲【唐】蘇恭新修本草論
苦參曰。治惡蟲。唐甄權藥
性本草論苦參曰。治熱毒風。皮肌
煩燥。生瘡赤癩。眉脫。除大熱。嗜睡
治腹中冷痛。中惡腹痛【明】李時
珍本草綱目論苦參曰。殺疔蟲。炒
存性。米飲服。治腸風瀉血。并熱痢
【明】繆希雍本草經疏論苦參曰。
苦參稟天地陰寒之氣而生。其味
正苦。其氣寒而沉。純陰無毒。足少
陰腎經之君藥也。苦以燥脾胃之
濕。兼洩氣分之熱。寒以除血分之
熱。熱則生風。風溼合則生蟲。故主
心腹結氣。癥瘕積聚。黃疸。溺有餘

瀝。逐水除癰腫。明目止淚。利九竅。
除伏熱。腸癖。止渴醒酒。小便黃赤。
療惡瘡下部匿瘡。胃家溼熱。盛則
口淡不思食。食亦不生肌肉。溼熱
散。則胃氣平和。而令人嗜食矣。其
曰補中。養肝膽氣。安五臟。定志益
精。輕身者。通指熱散溼除。則臟腑
氣血安和而致然也。味既至苦。性
復陰寒。善能殺蟲。故藥性論。治熱
毒風。皮肌煩燥。生瘡。赤癩。眉脫。主
除大熱嗜睡【清】黃宮樞本草求
真論苦參曰。苦參味苦至極。古書
有云。雖在五參之外。云參亦屬有
補。然究止屬除溼導熱之品。於補
其奚濟乎。凡味惟甘為正。惟溫為
補。苦參味等黃蘗。寒類大黃。陰似
朴硝。誠為極苦極寒。用此殺蟲除
風。治水去疽。掃疥治癩。開竅通道。
清劑解疲。或云有益。若謂於腎有
補。經書立有是說。亦不過從溼除
熱。祛之後而言。豈真補陰益腎之
謂哉。况有用此擦牙。而更見有腰
痛傷腎之症。其可謂之補腎者乎。

【清】汪朗庵本草備要論苦參曰。
苦參苦燥溼。寒勝熱。沉陰主腎。補
陰益精。養肝膽。安五臟。利九竅。生
津止渴。明目止淚。治溫病血痢。腸
風。溺赤。黃疸。酒毒。熱生風。溼生蟲。
又能祛風逐水殺蟲。治大腸疥癩。
然大苦大寒。肝腎虛而無熱者勿
服。糯米泔浸去腥氣。蒸川。玄參為
使。慈貝母。菟絲子。漏蘆。反藜蘆。【
清】黃元御長沙藥解論苦參曰。
苦參味苦性寒。入足厥陰肝。足太
陽膀胱經。清乙木而殺蟲。利壬水
而泄熱【清】張際菴本草崇原論
苦參曰。苦參氣味苦寒。根花黃白。
稟寒水之精。得中土之化。水精上
與君火相參。故主治心腹結氣。參
位於中土之中。故治癥瘕積聚。而
清黃疸。裏水精則能資腎。故治溺
有餘瀝。苦主下洩。故逐水。苦能清
熱。故除癰腫。得中土之化。故補中
水之精。上通於火之神。故明目止
淚【清】徐潤溪本草經百種錄論
苦參曰。此以味為治也。苦入心。寒
除火。故苦參專治心經之火。與黃
連功用相近。但黃連似去心臟之
火為多。苦參似去心附小腸之火
為多。則以黃連之氣味清。而苦參
之氣味濁也【清】吳儀洛本草從
新論苦參曰。苦參大苦燥溼。大寒

九〇四

時熱。沈降入腎。消癯解毒。明目止
淚。治夢遺精滑。熱痢血痢。腸風瀉
血。溺赤。黃疸。又能祛風殺蟲。治大
風疥癩。眉脫。又能解酒毒【清】楊
時泰本草述鈞元論苦參曰。苦參
味至苦。氣復寒。夫苦為火味。腎中
原有真陽。故味之苦者入之。况苦
味更乎寒水之氣化。其氣味固有
專至者。所謂純陰而氣降。止宜於
腎水弱而相火旺之人。皆論也。
其治熱毒風之義。更為可參。蓋風
者。陽之淫氣。即陽之鬱氣。氣鬱化
風。漸已化為熱矣。是後而病乎衛
者也。由衛及營。以病乎血。積久而
熱之癩者。更就血中而為毒。熱毒
之所化。遂病乎腎肝之真陰。而為
熱毒風。故風熱在衛。止散陽鬱之
邪。而清其氣。熱毒蝕陰。必直驅其
傷陰之邪。而用至陰以勝之。如苦
參輩是也。第潔古謂為純陰。而透
以氣沉二字。可悟苦參元參均之
入腎。而卻有迴殊之用存焉。使與
病證不相對。待將沉寒直入命門。
痼冷大傷元陽矣。其可慢投乎哉。
又生地苦參涼血。一則慮其寒滯
於中。一則慮其寒沉於下。若風之

新論苦參曰。苦參大苦燥溼。大寒

化熱。熱又鼓風。而未至爲熱毒風者。則本藥胡四物。而用丹梔翹甘。藥頗爲適宜。如苦參。猶可需次以授也。

國外學說 日本學說謂苦參帶苦味。以有健胃劑之稱。漢醫家所貴重也。日本明治二十二年長井博士。發見一新類鹽基。因苦參古名マトリクサ而名之曰マトリン。其記號爲 $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_2$ 。味甚苦。然生理的作用未詳。唯知其非劇毒而已。猪子氏以苦參之亞爾傑保兒。趁幾斯二。○至三。○注射於兔之胃中。但見食慾缺損。腹搏緩徐。此外無特殊之症狀。

配合應用 苦參於臘月米醋。滴入甕中。封固。治一切天行熱病。頭疼。口渴。身熱。甚者發狂。飲碗許。得吐則愈。汗亦如之。

治大瘧且苦參。胡麻。刺蒺藜。荊芥穗。甘菊花。粉萆。白芷。當歸。川芎。地黃。天門冬。何首烏。牛膝。漆葉。秦艽。龍腦草。

治童子胃熱。腹復疳。苦參。牡蠣粉。白朮。青黛。

九 苦

安。而發黃疸。由失饋大食。胃氣濕熱。衝熏所致。苦參。龍膽草。爲末。牛膽和丸。梧子大。生大麥湯。服五丸。日三。

治熱毒足腫。疼欲脫。酒煮苦參。以漬之。集驗方。

治熱病狂邪。不避水火。欲殺人。苦參末。蜜丸。梧子大。每服十丸。薄荷湯下。亦可爲末。二錢水煎服。千金方。

治傷寒結胸。天行病。四五日。胸滿痛。壯熱。苦參一兩。醋三升。煮取一升二合。飲之。取吐即愈。天行毒病。非苦參醋藥不解。及溫覆取汗良。外臺祕要方。

治小兒身熱。苦參煎湯浴之良。

治小腹痛。赤黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升。煎八合。分二服。張傑方。

中惡心痛。苦參三兩。苦酒一升。煮取八合。分二服。肘後方。

飲食中毒。魚肉菜等毒。即用肘後中惡心痛方。煎服。取吐即愈。梅師方。

水丸。梧子大。每服十五丸。米飲下。陳氏仁存堂方。

治大腸脫肛。苦參。五倍子。陳壁土等分。煎湯洗之。以木賊末傅之。醫方摘要。

治齒縫出血。苦參一兩。枯礬一錢。爲末。日三服。立驗。又方。鼻齋。膿臭有蟲也。苦參。枯礬。一兩。生地。汁三合。水二盞。煎三合。少少滴之。曾濟方。

治肺熱生疔。遍身皆是。苦參末。粟米飲丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。御藥院方。

治大風癩疾。用苦參五兩。切。再以好酒三斗。漬三十日。每飲一合。日三服。常服不絕。若覺痺即瘥。蘇頌方。

治腎臟風毒。及心肺積熱。皮膚生疥癩疹。痒時出黃水。及大風手足癢爛。一切風疾。苦參三十一兩。荊芥穗十六兩。爲末。水糊丸。梧子大。每服三十九丸。茶下。和劑藥局方。

治上下諸瘻。或在上。或在下。苦參五升。苦酒一斗。漬三四日。服之。以知爲度。肘後方。

治具癩惡瘡。苦參二斤。蜂房二兩。麩二斤。水二斗。漬二宿。去滓。入黍米二升。煎熱稍飲。日三次。肘後方。

治下部瘡漏。苦參煎湯。日日洗之。直指方。

治瘰癧結核。苦參四兩。牛膝汁。爲丸。綠豈大。每煖水下二十九丸。張文仲備急方。

治湯火灼傷。苦參末油調傅。衛生寶鑑方。

用費 錢半至三錢。

治用宜忌 脾胃虛而無溼者。肝腎虛而無熱者。禁用。惡貝母。菴絲子。補苧。反藜蘆。玄參。爲之使。伏承制。雄黃。煇硝。

九〇五

著名方劑 豬肚丸。治夢遺精。赤白帶濁。劉松石方。苦參二兩。牡蠣粉一兩。爲末。以雄豬肚一箇。水三盞。煮爛。搗泥和丸。梧子大。每服百丸。溫酒下。

參攷資料 有朝士苦腰重。久坐。拒十餘步。然後能行。有一將佐。謂朝士曰。見公日逐。以藥搯齒。得無用苦參否。曰。始以病齒用。苦參已數年。此病由苦參入齒。其

九畫 苦

氣味傷腎。故使人腰重。後有太常少卿舒昭亮。用苦參搯齒。歲久亦病。腰自後悉不用。腰疾皆愈。此皆方書舊不載者。有人病遍身風熱。細癢。痒痛不可任。連胸頭臍腹。及近隱處皆然。涎痰亦多。夜不得睡。以苦參末一兩。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀石器熬成膏。和苦參末為丸。如梧桐子大。食後溫水服二十至三十九。次日便愈。(寇宗奭) 子午乃少陰君火對化。故苦參黃蘗之苦寒。皆能補腎。蓋取其苦燥溼。寒除熱也。熱生風。溼生蟲。故又能治風殺蟲。惟腎水弱而相火勝者用之相宜。若火衰精冷。真元不足。及年高之人不可用也。素問云。五味入胃。各歸其所。喜攻久而增氣。物化之常也。氣增而久之由也。王冰註云。入肝為溫。入心為熱。入肺為清。入腎為寒。入脾為至陰。而兼四氣。皆為增其味而益其氣。各從本臟之氣。故久服黃連苦參而反熱者。此其類也。氣增不已。則臟氣有偏勝。偏勝則臟有偏絕。故有暴天。是以藥不具五味。不備四氣。而久服之。雖且獲勝。久

必暴天。但人疎忽不能精候。張爾從正亦云。凡藥皆毒也。雖甘草苦參。不可不謂之毒。久服則五味各歸其臟。必有偏勝氣增之患。諸藥皆然。學者當觸類而長之可也。至於飲食亦然。又按史記云。太倉公淳于意醫齊大夫病齲齒。灸左手陽明脈。以苦參湯日漱三升。出入其風。五六日愈。此亦取其去風氣溼熱殺蟲之義。(李時珍) 苦參生汝南山谷及田野。三月八月十月採。根暴乾。(別錄) 苦參近道處處有之。葉極似槐葉。花黃色。子作莢。根味至苦惡。(陶弘景) 苦參其根黃色。長五七寸許。兩指粗細。三五莖並生。苗高三四尺。以來葉殊青色。極似槐葉。春生冬凋。其花黃白色。七月結實如小豆子。河北生者無花。子五月六月十月採。根暴乾。(蘇頌) 苦參七八月結角如蘿蔔子。角內有子二三粒。如小豆而堅。(李時珍)

【苦參子】

原名 鴉膽子。
古籍別名 苦穰子。

(吉靈旅抄)

產地 閩、廣、雲南諸省。多有之。

形體 鴉膽為雜草類之一種。結子形如梧子。又似益智仁而小。外殼蒼褐。殼中有仁。大如米粒。肉白多油。可供藥用。

採取 十月採之。
製法 生食令人吐。作霜鎚去油。入藥佳。

性質 苦寒。無毒。
主治 痢疾痔疾。

近人學說 張山雷曰。苦參子。僅見於趙氏本草綱目拾遺。一名鴉膽子。其形如小豆。與綱目苦參條中所載甚合。其味極苦。專主諸痔及滯下。大有神效。其功用亦與苦參相類。其仁多油而氣味甚烈。入胃易致引嘔。故皆去油作丸。或囓圖吞之。雖古書所未載。而功用不可沒也。惟是大苦大寒。非可恒用。而在應用之時。所服無多。止見其利。未見其弊。爰為補之。鴉錫純曰。治痢之藥品。雖有多種。其治痢之偏熱者。當以鴉膽子為最要之藥。其痢之偏寒者。當以硫黃為最要之藥。以此二種藥。皆有消除痢中毒菌之力也。此二種藥。右所錄方案中。已歷言之。而又宜詳

九〇六

細論之。鴉膽子。一名鴨蛋子。苦參所結之子也。故又名苦參子。其味極苦。外有黑硬皮。若去皮時。其仁破者。即不宜服。因破者服後。易消其苦味。遠出。恒令人嘔吐。是以治痢成方。有用龍眼肉。包鴉膽子仁。吞下者。藥房中祕方。有將鴉膽子仁。外用益元散為衣。而名之為苦提丹者。是皆防其入胃即化也。若以西藥房中膠囊盛之。吞下。雖破者亦可服。其性善涼血止血。兼能化癥生新。凡痢之偏於熱者。用之皆有捷效。而以治下鮮血之痢。瀉血水之痢。則尤效。歲在壬寅。有滄州友人。諱玉可。殷敬於鄰村。其年過五旬。當中秋時。下赤痢甚劇。且多鮮血。服藥二十餘日無效。適感他出新歸。過訪之。求為診治。其脈象洪滑。知其純係熱痢。遂謂之曰。此易治。買苦參子百餘粒。去皮。每服五六十粒。服兩次。即愈矣。如法服兩次。果全愈。後玉可旋里。其族人自奉天病重來歸者。大便下血年餘。一身悉腫。百藥不效。玉可授以此方。如法服之。三次全愈。鴉膽子又善清胃腑之熱。胃脘有實

熱充塞。噤口不食者。服之即可進食。鄰村武生李佐廷。年五旬。素有嗜好。身形羸弱。當霍亂盛行之時。忽然腹中作疼。惡心嘔吐。下利膿血。其家人懼甚。以為必是霍亂暴證。診其脈。毫無閉塞之象。惟弦數無力。左關稍實。遂曉之曰。此非霍亂。乃下焦寒火交戰。故腹中作疼。下利膿血。上焦虛熱。遂迫。故惡心嘔吐。實係痢證之劇者。遂投以生杭芍六錢。竹茹。法半夏各三錢。甘草。生薑各二錢。一劑。嘔吐即愈。腹疼亦輕。而痢猶不愈。不思飲食。俾單用鴉膽子十五粒。一日連服兩次。病者失。審斯則鴉膽子不但善理下焦。即上焦有虛熱者。用之亦妙。此所以治噤口痢而有捷效也。硫黃原寒火之精氣。其挾有雜質者。有時有毒。若其色純黃。即純係硫質。分毫無毒。為補相火。燉下焦之主藥。痢證之下焦涼者。其上焦恒有虛熱。硫黃質重。其勢力直達下焦。而不至助上焦之虛熱。諸家本草。謂其能使大便潤。小便利。西人謂係輕瀉之品。是中西之說。原相退也。愚嘗品驗此藥。其因下焦

九畫 苦

有寒而瀉瀉者。服之確可止瀉。其下焦有寒而不瀉者。服之問有作瀉之時。蓋其作瀉。正所以逐寒外出。其性原補中有瀉也。痢證不可以純補。是以用硫黃以治痢證之偏寒者。洵為無上之妙品也。然宜生用。不宜製用。當切記。

配合應用
●治痢用鴉膽子。去殼。去油。一錢。文蛤醋炒。枯礬。川連炒各三分。糊丸。珠砂為衣。或鴉膽霜。黃丹各一錢。加木香二分。亦可。烏梅肉丸。珠砂為衣。二方俱丸。菴豆。大粥皮。或鹽梅皮。或圓眼乾肉。或芭蕉子肉。包吞。約十一二丸。立止。要急後重。何夢瑤鴉膽丸方。又吉靈旅抄。用鴉膽即苦。樣子。去殼。留肉。包龍眼內。每歲一粒。白滾水下。

●治冷痢久瀉。百方無驗者。一服即愈。凡痢之初起。實熱實積。易知而易治。惟虛人冷積致痢。醫多不以為意。蓋實熱之症。外候有身熱煩燥。唇焦口渴。肚疼窘迫。裏急後重。舌上黃胎。六脈洪數。證候既愈。治者亦急。輕則疎利之。重則寒下之。積去而和。其陰陽無不愈者。

至於虛人冷積致痢。外無煩燥。裏內無肚腹急痛。有赤白相兼。無裏急後重。大便流利。小便清長。此由陰性遲緩。所以外症不急。遇此不可姑息。但以藥成三仙丹下之。以去其積。倘不愈。下必致養禍貽患。其積日久。漸次下墜。竟至大腸下口直腸上口交界之處。有小曲摺。隱匿於此。為腸積最深之處。藥所不到之地。證則乍輕乍重。或愈或發。便則乍紅乍白。或硬或溏。總無一定。任是神丹。分毫無濟。蓋積不在腹內。而在大腸之下。諸藥至此。性力已過。盡成糝糠。安能去此沈匿之積。所以冷痢有至三五年十數年不愈者。由此故也。古方用巴豆為丸下之者。第恐久病人虛。未敢輕用。今以至捷至穩。鴉膽子一味治之。此物出閩省。豐實。雖諸家本草未收。而藥肆皆有。其形似益智子而小。外殼蒼褐色。內肉白有油。其味至苦。用小鐵錘敲碎。其殼破肉出。其大如米。敲碎者不用。專取全仁用之。三五歲兒二十餘粒。十餘歲者三十多粒。大人則四十九粒。取天圓肉包之。小兒一

包三粒。大人一包七粒。緊包。空腹吞下。以飯食壓之。使其下行。更藉此天圓包裹。可以直至大腸之下也。此藥並不峻厲。復不肚痛。俟大便行時。有白凍如魚腦者。即冷積也。如白凍未見。過一二日再進一服。或微加數粒。此後不須再服。服時忌葷酒三日。戒鴨肉一月。從此除根。永不再發矣。倘次日腹中虛痛。用白芍一枝。甘草一枝。各重三錢。紙包水濯。火內煨熟。取起。鋪煎湯服之。立止。此方不忍隱秘。筆之於書。以公世用。(至聖丹方)

●醫宗彙編。用白石樹煨灰一錢。真鴉片切片二錢。鴉膽子去殼。紙包壓去油。三兩人參三分。枯礬二分。海南沈香三分。共為細末。調粥為丸。重五六釐。曬乾。磁瓶收貯。紅痢用蜜一匙。滾水調下。紅白相兼。陰陽水送下。肚脹滾湯下。水瀉米湯開水送下。忌油膩腥酸一月。(痢疾神方)

【苦梗】即桔梗之古籍別名。典見綱目。詳「桔梗」條。
【苦瓠】 命名 本品為瓠之苦味者。故名。

九〇七

苦瓠瓜

【苦瓠瓜】苦瓠為菜類之一種。即瓠也。乃瓠之別種。味甚苦。瓠與子可供藥用。其莖莖花亦有功用。詳見各條。

採取 須以細理整淨。無殘留者佳。

性質 苦寒。有毒。

主治 大水。面目四肢浮腫。下水。令人吐。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論苦瓠瓜子曰。利石淋。吐

呀嗽。癢結。疰蟲。痰飲。又煮汁漬陰

瘡。小便不通。【唐】陳藏器本草拾

遺論苦瓠瓜子曰。煎汁滴鼻中。出

黃水。去傷冷鼻塞。黃道。【宋】大明

諸家本草論苦瓠瓜子曰。吐蛇蟲。

【明】李時珍本草綱目論苦瓠瓜

子曰。治癰疽惡瘡疥癬。鱗齒有蟲

匿者。又可制水。

參攷資料 苦瓠過分多食吐

利者。以黍稷灰汁解之。【李時珍】

【苦瓠花】 主治 一切癰瘡。霜

後收曬。研末傅之。

【苦瓠蔓】 主治 癰瘡煎湯浴

【苦茶】即茶葉之古籍別名。典見

郭璞註爾雅。詳「茶葉」條。

【苦夏】即桔梗之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「桔梗」條。

【苦魚】 產地 出浙江舊處州

府境龍泉縣劍溪水中。

形態 苦魚為鱗魚類之一種。

形細色斑。狀如吹沙魚。可供藥用。

性質 苦微辛。無毒。

主治 醒酒。解酒毒。除痛。

【苦蘭】即蘭水之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳「蘭水」條。

【苦瓠瓜】即苦瓠之古籍別名。典

見綱目。詳「苦瓠」條。

【苦棗】 古籍別名 厥泄。【爾

雅】

形態 苦棗為棗之一種。其實

色青而小。味苦。可供藥用。

性質 苦大寒。無毒。

主治 傷寒熱伏在臟腑。狂蕩

煩滿。大小便閉澀。取肉煮研。和蜜

丸服。

【苦菜】 古籍別名 菜。【本經】

貝母游冬。【別錄】苦苣。【日

香菜。【綱目】野芥子。黃瓜菜。芥子

薊。【日本】

外國名詞 Sonchus oleraceo

目。丁。【拉丁】ノゲシ ケシヤ

サ ミハルノノゲシ【日本】

基本 係菊科。苦菜屬。為苦菜

之菜。其花子根俱入藥用。

產地 山野道旁多有之。

形態 苦菜為菜類之一種。春

初生苗有赤莖白莖二色。其莖中

空而脆。折之有白汁。其葉似花蘿

菊菜。而色綠帶碧。上葉抱莖。棉

菜似鷓鴣。每葉分叉。攢挺如穿葉

狀。開黃花。如初綻野菊。一花結子

一莢。如商蒿子。及鷓鴣子。花罷則

收斂。子有白毛茸。隨風飄揚。

落處即生。其葉可供菜茹與藥用。



採取 三月三日採之。陰乾用。

性質 苦寒。無毒。

主治 五臟邪氣。厭殺。胃痺。久

服安心益氣。聰察。少臥。輕身耐老。

【本經】腸胃。渴熱。中疾。惡瘡。久服

耐饑。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】張禹錫

嘉祐本草論苦菜曰。調十二經脈。

霍亂後胃氣煩逆。久服強力。雖冷

甚益人。【唐】陳藏器本草拾遺論

苦菜曰。搗汁飲。除面目及舌下黃。

其白汁塗丁腫。拔根。滴癰上立潰。

【宋】寇宗奭本草衍義論苦菜曰。

點瘰子自落。【宋】大明諸家本草

論苦菜曰。傅蛇咬。【明】汪機本草

會編論苦菜曰。明目。主諸痢。【明】

李時珍本草綱目論苦菜曰。血淋

痔瘡。

【苦菜花子】 性質 甘。平。無

毒。

主治 去中熱。安心神。

歷代記述攷證 【明】汪穎食

物本草論苦菜花子曰。黃疸疾。連

花子研細二錢。水煎服。日二次。良

【苦菜根】 主治 赤白痢。及骨

蒸並煮服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論苦菜根曰。治血淋。利

小便。

【苦苣】即石龍芮之古籍別名。

與見爾雅。詳「石龍肉」條。○即旱芹菜之古籍別名。與見綱目。詳「旱芹菜」條。

【苦楝子】即金鈴子之古籍別名。與見圖經本草。詳「金鈴子」條。

【苦楝根皮】 性質 苦。微寒。微毒。

效能 消溼熱。殺蚊蟲。專作疥癬殺蟲藥。

主治 利大腸。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論苦楝根皮曰。苦酒和塗疥癬甚良。【宋】大明諸家本草論苦楝根皮曰。治遊風熱毒風癢。惡瘡疥癩。小兒壯熱。並煎湯洗。

配合應用 ●治消渴有蟲。苦楝根白皮一握。切焙。入麝香少許。水二盞。煎一盞。空心飲之。雖困頓不妨。下蟲如虻而紅色。其渴自止。消渴有蟲人所不知。【夷堅志方】

●治小兒疳蟲。楝木皮削去蒼皮。水煮汁。量大小飲之。又斗門方用爲末。米飲服二錢。又集簡方用楝皮同雞卵煮熟。空心食之。次日蟲下。又經驗方。搗聖散。用苦楝皮

九靈 苦

二兩。白蕪荑半兩爲末。每以一二錢水煎服之。又簡便方。用楝根白皮。去粗二斤。切水一斗。煮取汁三升。沙鍋成膏。五更初。溫酒服一匙。以蟲下爲度。

●治小兒諸瘡。惡瘡。禿瘡。蠅虻瘡。浸淫瘡。並宜楝樹皮或枝燒灰。傅之。乾者豬脂調。【千金方】

●治口中瘻瘡。東行楝根。細剉。水煮濃汁。日日含漱。即吐去勿嚥。【肘後方】

●治蜈蚣蜂傷。楝樹枝葉汁塗之。良。【楊起簡便方】

●治疥瘡風蟲。楝根皮。皂角去皮子等分。爲末。豬脂調塗。【奇效方】

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡屬虛寒者禁用。

【苦楝實】即金鈴子之原名。詳「金鈴子」條。

【苦楝葉】即黃芩之古籍別名。典見記事。詳「黃芩」條。

【苦蕒】即酸漿之古籍別名。典見圖經本草。詳「酸漿」條。

【苦葵】即龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳「龍葵」條。

【苦苣菜】即苣菜之苦者。詳「苣菜」條。

【苦蕒】即遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳「遠志」條。

【苦蕒把豆兒】即香木髓之古籍別名。典見綱目。詳「香木髓」條。

【苦楝子】即苦參子之古籍別名。典見吉靈旅抄。詳「苦參子」條。

【苦楝】即茶葉之古籍別名。典見唐本草。詳「茶葉」條。

【苦蜜】 命名 本品爲蜜之味苦者。

古籍別名 黃杜。【綱目拾遺】

產地 出浙江處州之山野間。

性質 苦。

主治 除積熱。祛煩渴。止熱痢。解暑積。驅風邪。並療老人腸燥和酒食之。

【苦樹皮】即秦皮之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「秦皮」條。

【苦澤】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳「甘遂」條。

【苦蕒】即草薺之古籍別名。典見綱目。詳「草薺」條。

【苦蕎麥】 命名 本品結實與枝葉一似蕎麥而味

苦。故名。

古籍別名 水磨芳。【植物學大辭典】

外國名詞 Polygonum thuborgianum (拉丁) ; ノンバ

基本 係蓼科蓼屬。爲苦蕎麥之子實。

產地 生原野溼地。

形態 苦蕎麥爲穀類雜草之一種。高二三尺。莖密生細刺。粗硬。或有平滑者。葉戟形。互生。托葉如鞘狀膜質。其上緣有綠色小鱗片。

花小白色。或帶淡紅色。其莖背而多枝。葉一似蕎麥。結實亦似之而稍尖。其子可供藥用。

性質 甘。苦。溫。有小毒。

主治 充饑救荒。

參攷資料 ●苦蕎麥多食傷胃。發風動氣。能發諸病。有黃病者。尤當禁之。【李時珍】 ●苦蕎麥屬



苦 蕎 麥

搗爲粉。蒸使氣縮。滴去黃汁。乃可作爲糕餌食之。(綱目)

【苦蕒】即苦菜之古籍別名。典見綱目。詳「苦菜」條。

【苦龍膽】即龍膽。詳「龍膽」條。

【苦瓠】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【苦瓠】即甘松之古籍別名。典見金光明經。詳「甘松」條。

【苦膽】即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍膽」條。

【苦慈】即野菊花之古籍別名。典見綱目。詳「野菊花」條。○即蓮慈之古籍別名。典見綱目。詳「蓮慈」條。

【苦蕒】即苦菜大者之古籍別名。典見造化指南。詳「苦蕒」條。

【苦藥子】即解毒子之古籍別名。典見圖經本草。詳「解毒子」條。

【苦楮子】即楮子大而木文粗赤者。功用詳「楮子」條。

【苦橙皮】即秦皮之古籍別名。典見綱目。詳「秦皮」條。

【苦蕒】即敗醬之古籍別名。典見綱目。詳「敗醬」條。○即酸漿之小者。功用與酸漿同。典見綱目。詳

「酸漿」條。

【苦蕒】即蟪蛄之古籍別名。典見綱目。詳「蟪蛄」條。

【苦蕒】即苦參之古籍別名。典見本經。詳「苦參」條。

【苦鹽】即鹽池中未經煎煉之類。其味鹹而且苦。功用詳「食鹽」條。

【苧根】即苧麻之處方用名。詳「苧麻」條。

【苧麻】命名 凡麻之細者曰。經粗者曰紵。本品麻絲可以作紵。故名。

處方用名 苧麻根。苧根。古籍別名 家苧。山苧。野苧。紫苧。白苧。(綱目)

外國名詞 Boehmerianlyce

BL(拉丁) カラムシ マラヒウシ(日本)

基本 保壽麻科、苧麻屬、藥用苧麻之根。

產地 粵、閩、鄂、江、浙多產之。

形態 麻爲多年生草本。莖高三四尺。略有木質。被有鱗毛。春日由宿根而生葉。卵圓而尖。葉柄長而互生。邊緣有鋸齒。葉面色青。

面有白色稜毛。夏秋間葉腋開細花。花單性。無花冠。雄雌同株。色淡黃綠。而花瓣有四。花後結子。茶褐色。其皮纖維堅韌柔滑。夏秋剝取。可供絲布之料。其根可充藥用。



麻 苧

採取 二月八月採。

性質 甘寒。無毒。

效能 瀉熱。散瘀。療丹毒。通諸淋。用作瘡瘍與利尿藥。

主治 安胎。貼熱丹毒。溫苧汁。止消渴。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論苧麻根曰。治心膈熱。漏胎。下血。產前後心煩。天行熱疾。大渴。大狂。服金石藥。人心熱。瘡毒。箭蛇蟲咬。【明】經希雍本草經疏論苧麻根曰。苧根得土之冲氣。而兼陰寒。故味甘氣寒。而無毒。別錄專主小兒赤丹。爲其寒能涼血也。漬苧汁。療渴者。除熱之功也。日華子用以治心膈熱。漏胎。下血。胎前產後心煩。天行熱疾。大渴發狂。及服金石藥。人心熱。瘡毒。箭蛇蟲咬。皆以其性寒。能解熱涼血故也。

近人學說 張山雷曰。苧根見於別錄。稱其氣寒。主小兒赤丹。又言漬苧汁。療渴。古本所引別錄之文。止此。惟瀨湖綱目引別錄。則有安胎一說。不知何據。按苧性寒。古方多言其主治小便不通。五淋熱結等證。則有泄熱通利之力。是以日華本草。謂其甘寒而滑。乃近人偏以爲妊娠安胎之用。蓋以苧麻之質堅韌。取其堅固胎元之意。實則既寒且滑。必非胎動者所宜。且根主下行。尤爲妊娠禁品。考古今醫藥諸書。惟梅師方。用以治胎動。忽下黃汁。此外殊不多見。丹溪且言其行滯血。則更與胎動大相刺謬。瀨湖所引。未見古本。恐不可訓。雖大明亦有治胎漏下血一條。則日華本草。本多不經之論。且與其所言作滑之文。自相矛盾。更不尼據。日華又謂治心膈熱。天行熱病。大渴發狂。解金石藥熱。心煩。則皆其涼降之力也。石頑謂治產後血暈腹痛。專行滯血。又謂黃麻香

溫。寡散陳久瘀血。則皆以破血逐瘀為義矣。蘇恭唐本草又謂商麻子。治赤白痢。又是消積導滯之用。皆足為滑泄一屏證佐。然則苧麻之根。又何可為安胎套藥耶。

配合應用 ①治痰哮喘嗽。苧麻煨存性為末。生豆腐蘸三五錢。食即效。未全。可以肥豬肉二三片。蘸食甚妙。(醫學正傳方)

②治小便不通。用麻根。蛤粉半兩。為末。每服二錢。空心新汲水下。(聖惠方) 又用苧麻根洗研。攤精上。貼小腹連陰際。須臾即通。(積玄方)

③治小便血淋。苧根煎湯。類服。大妙。亦治諸淋。(聖惠方)

④治五種淋疾。苧麻根兩莖。打碎。以水一盃半。煎半盃。頓服。即通。大妙。(斗門方)

⑤治妊娠胎動。忽下黃汁如膠。或如小豆汁。腹痛不可忍。者。苧根去黑皮切。二升。銀一斤。水九升。煮四升。每服以水一升。入酒半升。煎一升。分作二服。一方不用銀。(梅師方)

⑥治肛門腫痛。生苧麻根搗爛

坐之良。(瀨湖集簡方)

⑦治脫肛不收。苧根搗爛煎湯。煎洗之。(聖惠方)

⑧治癰疽發背。初起未成者。苧根搗爛。傳上。日夜數易。腫消則速。(圖經方)

⑨治五色丹毒。苧根煮濃汁。日三浴之。(外臺秘要方)

⑩治雞魚骨。用苧麻根搗汁。以匙挑灌之。立效。(談野翁試驗方) 又用野苧麻根搗汁。丸如龍眼大。魚骨用魚湯下。雞骨用雞湯下。(醫方大成方)

⑪同生地黃汁。能涼血安胎。用量 錢半至三錢

應用宜忌 凡非黃熟者。禁用。參攷資料 ①苧性破血。將苧麻與產婦枕之。止血。運產後腹痛。以苧安腹上。即止也。又蠶咬人。毒入肉。取苧汁飲之。(陳藏器) ②苧麻舊不著所出州土。今閩蜀江浙多有之。剝其皮。可以織布。苗高七八尺。葉如楮葉。而無文。面青背白。有短毛。夏秋間。着細穗。青花。其根黃白。而輕虛。二月八月採。按陰穢草木疏云。苧一。棵數十莖。宿根在

土中。至春自生。不須栽種。荆揚閩三州。諸園種之。歲再刈。便割取其皮。以竹刮其葉。厚處自脫。得葉如筋者。煮之。用糝布。今江浙閩中。尚復如此。(蘇頌) ③苧。家苧也。又有山苧。野苧也。有紫苧。葉面紫。白苧。葉面青。其背皆白。可刮洗。煮食。救荒味甘美。其子茶褐色。九月收之。二月可種。宿根亦自生。(李時珍) ④能散子宮內淫熱之火。(醫學大辭典)

【苧麻根】 卽苧麻之處方用名。詳『苧麻』條。

【苧麻葉】 性質 甘寒。無毒。主治 金瘡傷折。血出。瘡血。

參攷資料 苧麻葉善散血。五月五日收取。和石灰搗作團。曬乾收貯。遇有金瘡折損者。研末傅之。即時血止。且易癒也。按李仲南永類方云。凡諸傷瘡。血不散者。五六日收貯。苧葉蘇葉搗爛。傅金瘡上。如瘡血腹內。順流水絞汁。服卽通。血皆化水。以生豬血試之。可驗也。秋冬用乾葉亦可。(李時珍)

【英】 卽陸英之古籍別名。典見爾雅。詳『陸英』條。

【英生】 卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【英豆】 卽山櫻桃之古籍別名。典見別錄。詳『山櫻桃』條。

【英消】 卽馬牙消之古籍別名。典見綱目。詳『馬牙消』條。

【英草花】 別錄。 古醫別名 鹿英。(形體 英草花為雜草類之一種。莖生木間。其花可供藥用。採取 九月採。陰乾用。性質 辛平。無毒。主治 痺氣。強陰。療女勞。頭。癩。煩。堅筋骨。治頭風。煎湯沐之。【英華庫】 卽益智仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益智仁』條。【英實】 卽營實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『營實』條。

命名 本品狀似雞。而產於有石。英諸地。故名。形體 英雞為原禽類之一種。其狀如雞。而雉尾。體無毛。腹下毛赤。飛翔不遠。常食碎石。英。故腸中有石。英。其肉可供藥用。性質 甘溫。無毒。

九一一

九盡 苜蓿 苜蓿 范 茄

空治 益陽道。補虛損。令人肥健悅澤。能食。不患冷。常有寶氣而不發也。

參攷資料 英雞取石英之功。今人以石英末飼雞。取卵食。終不及也。(李時珍)

【苜蓿】即大麻之雌者。功用詳『大麻子』條。

【苜蓿】即白英之古籍別名。典見本草拾遺。詳『白英』條。

【苜蓿】即白芷之古籍別名。典見別錄。詳『白芷』條。

【苜蓿】即草薺之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草薺』條。

【苜蓿】即竹筍之古籍別名。典見自備贊寧。詳『竹筍』條。

【苜蓿】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。即蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【范志稿】即神效之處方用名。詳『神效』條。

【茄子】 古醫別名 酪酥。(五代) 胎子錄) 落蘇。(拾遺) 崑崙瓜。(御覽) 草薺甲。(養生) 青茄。紫茄。白茄。銀茄。(蘇頌)

渤海茄。番茄。水茄。嫁茄。(綱目) 荷包茄。(植物學大辭典) 崑崙紫瓜。(拾遺錄)

外國名詞 Solanum Melon. Gaol. I. (拉丁) ナスビ ナス (日本)



(一) 子茄

形態 茄子係菜類。為一年生之草本。莖高二三尺。葉大互生。作卵形。或橢圓形。自夏徂秋。開紫色花。花合瓣。花冠有五瓣。有五稜。其苞有刺。集於花柱之周圍。故蒂包其果。果為漿果。暗紫色。間有紫白青等色者。果實中間有穢。穢中有子如芝麻。但北產者多扁圓。南產者卵圓或長圓。其花實蒂根均可供藥用。



(二) 子茄

【黃茄】乃諸茄之黃熟者。青茄白茄。乃因色而命名。其白者又名銀茄。功勝青茄。物海茄乃色白而堅實者。香茄乃色白而扁。甘脆不澀。生熟可食者。紫茄。乃色紫蒂長而味甘者。水茄乃形長。味亦甘。可以止渴者。

探取 九十月間採之。
性質 甘寒。無毒。
效能 散血瘀。或用作消腫鎮痛藥。

主治 寒熱五臟勞。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論茄子曰。治溫疾傳尸勞氣。醋磨傳腫毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論茄子曰。老裂者。燒灰治乳裂。【明】李時珍本草綱目論茄子曰。散血止痛。消腫寬腸。【清】黃宮繡本草求真論茄子曰。茄子性寒地陰。外假陽火。皮赤肉白。腸包平陰。花實香紫。故香載治寒熱。腸癆。並或散血止痛。寬腸利氣。然味甘氣寒。質滑而利。服則多有動氣。生瘡損目。腹痛泄瀉之虞。孕婦食之。尤見有害。此瓜菜中無益之物也。【清】王士雄隨息居飲食譜

論茄子曰。茄甘涼。活血止痛。消癰殺蟲。已瘡。消腫寬腸。治傳屍勞瘵。疝諸病。便滑者忌之。種類不一。以細長深紫。煙而子少者勝。單素皆宜。亦可醃曬為脯。秋後者微毒。病人勿食。

配合應用 治婦人血黃。黃茄子。竹刀切。陰乾為末。每服二錢。溫酒調下。(摘玄方)

治腸風下血。經霜茄連蒂。燒存性為末。每日空心溫酒服二錢。匕。(煙苑方)

治久患下血。大茄種三枚。每用一枚。溼紙包煨熟。安瓶內。以無灰酒一升半沃之。蠟紙封閉三日。去茄暖飲。(普濟方)

治腹內癥瘕。用陳舊茄兒。燒存性。入麝香。輕粉少許。脂調貼之。(壽域方)

治大風熱痰。用黃老茄子大者。不計多少。以新瓶盛埋土中。經一年。鹽化為水。取出入苦參末。同丸。梧子大。食已及臥時酒下三十丸。甚效。此方出江南人傳。(蘇頌圖經本草方)

治腰脚拘攣。腰脚風血積冷。

筋急拘攣疼痛者。取茄子五十斤。切洗。以水五斗。煮取濃汁。濾去滓。更入小鍋中。煎至一升以來。即入生粟粉同煎。令稀稠得所。取出攪和。更入辟香朱砂末。同丸如梧子大。每日用菖米酒送下三十丸。近暮再服。一月乃痊。男子女人通用皆驗。(蘇頌圖經本草方)

① 治瘡撲青腫。老黃茄極大者。切片如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥時。溫酒調服二錢匕。一夜消盡。無痕迹也。(勝金方)

② 治墜損跌撲。散血止痛。重陽日。收老茄子百枚。去蒂四破切之。硝石十二兩。搗碎。以不津器。先鋪茄子一重。乃下硝石一重。如此同鋪令盡。以紙數層密封。安置淨處。上下以新磚承覆。勿犯地氣。至正。月後取出。去紙兩重。日中曝之。逐日如此。至二三月度。茄已爛。開瓶傾出。濾去滓。別入新器中。以薄綿蓋頭。又曝至成膏。乃可用。每以酒調半匙。空腹飲之。日再。惡血散則痛止而愈矣。若膏久乾硬。即以飯飲化動用之。(蘇頌圖經本草方)

③ 治發背惡瘡。用上。以酒服

九畫 茄

半匙。更以膏塗瘡口四圍。覺冷如水。瘡乾便癒。其有根本在膚際者。亦可內消。(蘇頌圖經本草方)

④ 治熱毒瘡腫。生茄子一枚。割去二分。去瓢二分。似罐子形。合於瘡上。即消也。如已出膿。再用取瘡。(聖濟總錄方)

⑤ 治牙齒腫痛。隔年糟茄燒灰。類類乾擦立效。(海上方)

⑥ 治蟲牙疼痛。黃茄種燒灰。擦之效。(摘玄方)

⑦ 治喉痺腫痛。糟茄或醬茄細嚼嚥汁。(德生方)

⑧ 治婦人乳裂。用秋月冷茄子。裂開者。陰乾。燒存性。研末水調塗。(補遺方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ① 段成式酉陽雜俎。言茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄之性滑。不厚腸胃也。(李時珍) ② 凡久冷人不可多食。損人動氣。發瘡及痢疾。(馬志) ③ 秋後食多損目。(李廷飛) ④ 按生編云。茄性寒利。多食必腹痛下利。女人能傷子宮也。(李時珍) ⑤ 陳藏器本草云。茄一名落蘇。名義未詳。按五

代貽子錄作酪酥。蓋以其味如酥。略也。於義似通。杜寶拾遺錄云。隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜。又王隱君養生主論。治瘡方用乾茄。諱名草。鼈甲。蓋以鼈甲能治寒熱。茄亦能治寒熱。故爾。(李時珍) ⑥ 茄種宜於九月黃熟時收取。洗淨曝乾。至二月下種移栽。株高二三尺。葉大如掌。自夏至秋。開紫花。五瓣相連。五稜如繖。黃蕊綠蒂。蒂包其茄。茄中有瓢。瓢中有子。子如脂麻。其茄有圓如栝樓者。長四五寸者。有背茄。紫茄。白茄。白茄亦名銀茄。更勝背者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫。其白者爲水茄。江西常茄皆皮白。其紫者爲水茄。亦一異也。劉昫嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不凋。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。(李時珍)

【茄子茸】即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【茄花】 主治 金瘡牙痛。

【茄根及枯莖葉】 古籍別名 牛蒡根。

(和漢藥考)

主治 凍瘡皸裂。黃湯漬之良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茄根及枯莖葉曰。散血消腫。治血淋下血。血刺。陰挺。齒。口。【清】汪詒庵本草備要論茄子曰。茄根散血消腫。黃汁黃凍瘡。

【茄連】 古籍別名 撤藍。(綱目拾遺) 形態 葉如藍草而肥厚。根圓大。類麥。露出土外。開黃花。京師謂之撤藍。

主治 解煤毒。

【茄精香】即伽楠香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

【茄蒂】 主治 燒灰。米飲服二錢。治腸風下血不止及血痔。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茄蒂曰。燒灰。治口齒瘡。生切擦癩風。

九一三

參攷資料 治癩風。用茄蒂曬硫附末。搽之。取其散血也。白癩用白茄蒂。紫癩用紫茄蒂。亦各從其類耳。(李時珍)

九 薑 茅 茆 芩

【茅瓜子】即仙茅之古籍別名。典見開寶本草。詳「仙茅」條。

【茅朮】即蒼朮之產於江蘇茅山者。詳「蒼朮」條。

【茅竹筍】 古籍別名 毛筍。貓兒頭。貓筍。(符譜)

基本 係禾本科竹屬。為茅竹之嫩筍。

產地 各省境內。均有產之。惟江浙兩省產者。肥嫩最佳。

形態 茅竹為竹之粗大者。其筍未出土時。大者竟重二十餘斤。內白如霜。質饒嫩如腐。墮地即碎。嗅之作蘭花香。為諸筍中之最佳者。以其箨有毛。故俗呼為毛筍。大者清明後。方可採掘。出於臘月及正月者。形短小。箨亦有毛。取之可供食與藥用。

性質 甘平無毒。

效能 利九竅。通血脈。化痰涎。消食積。

主治 肺痿。吐血。痰嗽。積滯。

參攷資料 ①方筍生盛茂之間。生氣上升。其筍皆豎。生氣既衰。根則橫生。盡其力可亘十餘丈。與植立於地面者。可以長短相稱。②

參攷資料 ①方筍生盛茂之間。生氣上升。其筍皆豎。生氣既衰。根則橫生。盡其力可亘十餘丈。與植立於地面者。可以長短相稱。②

茅筍消痰之力。勝於他筍。惟多食。令人心嗜易飢。

【茅君寶簾】即蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼朮」條。

【茅花】即茅草之花。詳「黃茅」及「白茅」各條。

【茅香】 古籍別名 嗶尸羅。(綱目)

外國名詞 Hieoohloe bor. oil, R. of S (拉丁)カウパウ (日本)

基本 係禾本科茅香屬。

產地 凡原野卑溼諸地。恒有生產。

形態 茅香為香草類之多年生草本。春生莖如大麥。葉短。四五個月間。葉間生細花。莖長七八寸。莖上成穗。穗左右生小穗。於其前端著短梗花。全體略呈三角狀。花有黃白及黃綠色。頗滑澤。根如茅長而明潔。採得可供藥用。

性質 苦溫無毒。

主治 中惡溫胃。止嘔吐。療心腹冷痛。

參攷資料 ①茅香生劍南道

諸州。其莖葉黑褐色。花白色。即非白茅香也。(馬志)②今陝西河東汴東州郡亦有之。遼澤州。寬。三月生苗。似大麥。五月開白花。亦有黃花者。有結實者。有無實者。並正月二月採根。五月採花。八月採苗。

【蘇頌】①茅香根如茅。但明潔而長。可作浴湯。同蘆本尤佳。仍入印香中。合香附子用。(寇宗奭)②茅香凡有二。此是一種香茅也。其白茅香別是南番一種香草。唐慎微本草不知此義。乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下。(李時珍)

【茅香根】即白茅香之處方用名。詳「白茅香」條。

【茅香莖葉】 主治 作湯浴。辟邪氣。令人身香。

【茅粟】即粟之古籍別名。典見綱目。詳「粟」條。

【茅翁菜】即牛芎子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牛芎子」條。

【茅膏菜】 產地 生茅山中。

【茅膏菜】 形態 茅膏菜為雜草類之一種。高一尺。有毛如油膩。

參攷資料 ①茅膏菜為雜草類之一種。高一尺。有毛如油膩。

黏人手。可供藥用。性質 甘平。有毒。

主治 赤白久痢。養服之。

【茅蒐】即茜草根之古籍別名。典見別錄。詳「茜草根」條。

【茅檉】即山查之古籍別名。典見日用本草。詳「山查」條。

【茅鉞】即茅花之未曾開出如鉞者。而力甚較。茅花為重。詳「茅花」條。

【茆】即葶之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「葶」條。②即女菀之古籍別名。典見綱目。詳「女菀」條。③即茶葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茶葉」條。

【茆蒜】即小蒜之古籍別名。典見綱目。詳「蒜」條。

【茆質汗】 形態 茆質汗為雜草類之一種。葉背花白。其根可供藥用。

採取 七月採之。

主治 風腫。行血。

【茆香】即薄荷之古籍別名。典見呂忱字林。詳「薄荷」條。

【茆華】即淺香花之古籍別名。典見本經。詳「淺香花」條。

參攷資料 ①淺香花之古籍別名。典見本經。詳「淺香花」條。

【花胡】即柴胡之原名。詳「柴胡」條。

【苳草】即紫草之古籍別名。典見爾雅。詳「紫草」條。

【苳菴】即紫菴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫菴」條。

【苳萎】即芎藭之古籍別名。典見廣雅。詳「芎藭」條。

【苳蓂】即紫草之古籍別名。典見廣雅。詳「紫草」條。

【茉莉花】命名。本品或作末利。蓋本胡語。其無正字。隨人意會而命名也。

古醫別名 遠客。狎客。奈花。(胡目)玉屑。冰梨。拍花。雅友。磨利。彫瓊。綬華。小南強。山榴花。(和漢藥考)末利。(草本狀)抹厲。(洛陽名園記)抹利。(佛經)沒利。(德齡集)末麗。(洪邁集)

外國名詞 Jasminum sam. bac. Alt. (拉丁)

基本 樹木科。

產地 茉莉原出波斯。移種南海。今各處俱栽蒔之。臺灣者佳。福州者次之。贛州者又次之。和漢藥

考曰。中國廣東省城各花園中。多栽種之。遠輸至香港。上海。芝罘。天津等處。已成一種貿易品矣。

形態 茉莉產於熱帶地方。最長寒冷。乃一種小灌木。葉作卵圓形。其色深綠。兩兩對生。當夏秋間。枝端開五瓣之花。聚。暮開。朝落花。係單瓣。色白。香甚。大可知。頗類梅花。後乃變黃。

採取 夏季採之。尤以白花者良。

九畫 苳 茉 虺 蛇 蛋

性質 辛。熱。無毒。

效驗 潤燥。香肌。

主治 蒸油取液。作面脂。頭澤長髮。潤燥。香肌。亦入茗湯。

歷代配伍 王士雄 隨息居飲食譜論茉莉花曰。茉莉花辛甘溫。和中下氣。辟穢濁。治下痢腹痛。蒸葉蒸露。入藥皆宜。珍珠蘭更勝。

近人學說 張山雷曰。茉莉始見於晉。含南方草木狀。作末利。蓋南蠻土語。本無正字。瀨湖綱目。謂原出波斯。移植南海。其性畏寒。其花辛熱。願按此物極喜烈日。炎天酷熱。終日暴之。開花最繁。其花之

性熱可知。今人多以和入茶者。取其芳香。功用殆與玫瑰花代花相似。然辛熱之品。不可恒用。

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡氣虛者禁用。忌鐵器。

參攷資料 末利原出波斯。移植南海。今漢廣人栽蒔之。其性畏寒。不宜中土。弱莖繁枝。綠葉圓尖。初夏開小白花。重瓣無蕊。秋盡乃止。不結實。有千葉者。紅色者。莖生者。其花皆夜開。芬芳可愛。女人穿為首飾。或合面脂。亦可煎茶。或蒸取液。以代薔薇水。又有似末利而瓣大。其香清絕者。謂之狗牙。亦名雪瓣。海南有之。素蒙指印。皆其類也。(李時珍)

【茉莉根】性質 熱。有毒。

主治 以酒磨一寸服。則昏迷一日乃醒。二寸二日。三寸三日。凡跌損骨節脫臼接骨者。用此則不知痛也。

【茉莉花露】性質 用茉莉花蒸取。故氣香味淡。

主治 解胸中一切陳腐之氣。

【虺】即虺之古籍別名。典見綱目。詳「虺」條。

【虺林】即蛇林子之古籍別名。典見爾雅。詳「蛇林子」條。

【蛇】即貝母之古籍別名。典見綱目。詳「貝母」條。

【盲蟲】原名 裴蟲。

命名 本品以翼而鳴。其聲盲。故名。

基本 係化生蟲類。有翅。屬之盲蟲。

產地 陳仁山藥物生產辨云。盲蟲各省均有出產。乃大隻之牛。也。

形態 盲蟲大於蜜蜂。腹凹而扁。黃綠色。口有棘刺。雄四。雌六。似牛馬血液為食。有翼能飛。

種類 木虱生木葉上。卷葉如筒子。初出如白蛆。漸化為蟲。形如蠅而較大。即裴蟲之未能飛者。

牛虱生牛體上。長五分許。色灰黑。有淡黃色。密細。毛翅褐色。因其產卵器刺入牛之皮膚。產卵其中。孵化幼蟲。形橢圓。復寄生於牛之皮膚。肌肉間。吸食血液。出而化蟲成盲者。裴蟲係盲之產生於鹿。

體者。

探取 五六月間捕取。腹有血者良。

製法 採得用沸湯泡洗晒乾。入丸散。並須去翅足炒用。對末和藥。

性質 苦。微寒。有毒。

效能 破瘀積。消癥結。專作破血通經藥。

主治 逐瘀血。破血積。墜痞癥。癥。寒熱。通利血脈及九竅。(本經) 女子月水不通。積聚。除賊血在胸腹。五臟者。及喉痺結塞。(別錄)

張仲景之發明 蠶蟲一味。經張仲景之實驗。認為『主治瘀血。少腹鞭滿。發狂。發熱。喜忘。及婦人經水不利』。茲考徵如下。抵當湯證曰。少腹鞭滿。又曰。有久瘀血。又曰。有瘀血。用蠶蟲三十枚。抵當丸證曰。少腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。用蠶蟲二十枚。據此二方。則蠶蟲治瘀血明矣。是與水蛭。互相為用。故二品等分。唯湯方用三十枚。丸方用念枚。夫湯之證。急也。丸之證。緩也。故分兩亦有多少也耳。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論蠶蟲曰。破癥結。消積。墮胎。【明】繆希雍本草經疏論蠶蟲曰。蠶蟲其用大略與虻蟲相似。而此則苦勝。苦能泄結。性善嚼牛馬諸畜血。味應有鹹。鹹能走血。元素云。蠶飲血而用以治血。故主積聚癥瘕。一切血結為病。如經所言也。苦寒又能泄三焦火邪。迫血上壅。閉塞咽喉。故主喉痺結塞也。今人以其有毒。多不用。然仲景抵當湯丸。大黃虻蟲丸中。咸入之。以其散臍腑宿血。結積有特效也。凡毒藥之治病。如刑罰之治盜賊。不如是則不足以祛邪反正。若藥不瞑眩。厥疾弗瘳。正此謂也。【明】李士材本草圖解論蠶蟲曰。蠶蟲凡血在臍腑經絡者。祛逐攻下。蓋食血而能治血。因其性而為用也。【清】張隱庵本草原論蠶蟲曰。蠶乃吮血之蟲。性又飛動。故主逐瘀血。積血。通利血脈。九竅。傷寒論太陽病表不解。隨經解熱。在裏。抵當湯主之。內用蠶蟲。水蛭。大黃。桃仁。近時見醫治痘不起發。每加牛蠶。此外未之用也。

配合應用 ●治蛇螫血出。九

竅皆有者。取蠶蟲初食牛馬血腹滿者。三七枚。燒研湯服。(肘後方)

●治病驚去胎。蠶蟲十枚。炙搗為末。酒服。胎即下。(產乳方)

●治撲墜瘀血。蠶蟲二十枚。牡丹皮一兩。為末。酒服。方寸匕。血化為水也。若久。宿血在骨節中者。二味等分。(備急方)

用蠶 八分至錢半。

施用宜忌 凡無瘀結實積者。禁用。畏麻黃。

參攷資料 ●蠶以翼鳴。其聲。蠶。故名。陸佃云。蠶害民。故曰蠶。蠶害。故曰蠶。亦通。(李時珍) ●蠶有數種。並能吮血。揚浙以南。江嶺間。大有木蠶。長大綠色。始如蠶。蟬。啞牛。馬。或至顛仆。蜚。狀如蜜。蜂。黃黑色。今俗多用之。又一種小者。名鹿蠶。亦名牛蠶。大如蠅。蟻。牛馬亦蠶。市人採賣之。三種同體。以療血為本。雖小有異。同用之。不為蠶。(蘇恭) ●金幼。攷北征錄云。北虜長樂鎮。草間有蠶。大者如蜻蛉。擲人面。噉。元稹長慶集云。巴蜀山谷間。春秋常雨。五六月至。八九

月則多。蠶。道路驚飛。噉牛馬血流。噉人。毒劇而毒不留肌。故無治術。又段成式云。南方溪澗中。多水蛆。長寸餘。色黑。夏末。變為蠶。螫人甚毒。觀此。則蠶之變化。有水有木。非一端也。(李時珍)

【衍草】即麻伯之古籍別名。典見別錄。詳『麻伯』條。

【貞女】即女貞之古籍別名。典見山海經。詳『女貞』條。

【貞木】即女貞之古籍別名。典見綱目。詳『女貞』條。

【貞蔚】即益母草之古籍別名。典見別錄。詳『益母草』條。

【貞金】即鷓鴣之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『鷓鴣』條。

【貞革筋】即豬項下膏之別名。典見本草集註。詳『豬脂』條。

【貞勞】即蜻蛉之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蛉』條。

【貞殺疑蝨】即蝸牛之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『蝸牛』條。

【貞盤】即行夜之古籍別名。典見別錄。詳『行夜』條。●即蜚蠊之古籍別名。典見唐本草。詳『蜚蠊』條。

條。

【負擔】即益母草之古籍別名。典見皆殷產寶方。詳「益母草」條。
 【負蟻】即鳳婦之古籍別名。典見爾雅。詳「鳳婦」條。
 【負變】即公蠶之古籍別名。典見綱目。詳「公蠶」條。
 【赴魚】即三葉之古籍別名。典見別錄。詳「三葉」條。
 【軍門】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。
 【迦布德迦】即鴉鴉之古籍別名。典見梵書。詳「鴉鴉」條。
 【迦拘勒】即肉豆蔻之古籍別名。典見本草拾遺。詳「肉豆蔻」條。
 【迦南香】即伽楠香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。
 【迦師錯】即小麥之古籍別名。典見梵書。詳「小麥」條。
 【迦算香】即靈香之古籍別名。典見涅槃經。詳「靈香」條。
 【迦羅婆劫】即木棉之古籍別名。典見梵書。詳「木棉」條。
 【述河】即精鷄之古籍別名。典見綱目。詳「精鷄」條。
 【鄒草】即丹參之古籍別名。典見本經。詳「丹參」條。

九盡 負 赴 軍 迦 迦 鄒 郁

【郁李】詳「郁李仁」條。
 【郁李仁】命名 郁。山海經作栝窠郁也。花實俱香。故以名之。

處方用名 郁李肉。
 古籍別名 爵李仁(本經)鬱李仁(車下李仁)別錄)白棗樹仁(爾雅)棗仁(詩疏)棠棣仁(爾雅)棗仁(山梅子)臨上座(千金)藤(國大李仁)和漢藥考)栝李仁(山海經)

外國名詞 *Cerasus Communis* (拉丁) (*Prunus Japonica*) (英)

基本 屬薔薇科。為郁李子之產地 黃勞逸新中藥云。郁李仁原產法國。今陝西亦產之。



郁 李 仁

形態 郁李為灌木。高四五尺。其枝叢生。葉互生。作廣披針形。邊緣有鋸齒。類似杏葉。春季。葉間開

白色五瓣花。邊緣帶紅色。大四分許。實作球形。生綠熟赤。子仁為白色尖卵圓形。狀類桃仁而小。被有褐色薄皮。味辛苦。稍甘。有香氣。製法 雷斅曰。凡使郁李仁。以湯浸去皮尖。用生蜜浸一宿。漉出陰乾。研如膏用之。

性實 酸。平。無毒。
 效能 破血潤燥。瀉氣結。通大便。用作利水消腫藥。故在胃腸中均不顯何等作用。入血後。專激腎臟。使促進其利尿機能。

主治 大腹水腫。面目四肢浮腫。利小便水道。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論郁李仁曰。腸中結氣。閉格不通。【唐】孟詵食療本草論郁李仁曰。破癖氣。下四肢水。酒服四十九粒。能瀉結氣。【宋】大明日華諸家本草論郁李仁曰。泄五臟膀胱急痛。宜腰膝冷。消宿食。下氣。【宋】寇宗奭本草衍義論郁李仁曰。研和龍腦。點赤眼。【金】張元素珍珠囊論郁李仁曰。破宿血。潤燥。【元】李東垣用藥法象論郁李仁曰。專治大腸氣滯。燥澀不通。【明】

櫻希雅本草經疏論郁李仁曰。郁李仁味酸。氣平。無毒。元素言辛苦性潤。而降下陰也。入足太陰手陽明大腸經。其主大腹水腫。面目四肢浮腫者。經曰。諸濕腫滿。皆屬脾土。又曰。諸腹脹大。皆屬於熱。脾虛而濕熱客之。則小腸不利。水氣泛溢於面目四肢。辛苦能潤熱。結降下善導。凝閉。小便利。則水氣悉從之而出矣。甄權主腸中結氣。閉格不通。日華子云。泄五臟膀胱結痛。宜腰膝冷。消宿食。下氣。元素云。破血潤燥。李杲云。專治大腸氣滯。燥澀不通。均得之矣。【清】黃宮繡本草求真論郁李仁曰。郁李世人多合胡麻同用。以為潤燥通便之需。然胡麻功止潤燥。煖中活血。非若郁仁性潤。其味甘苦。而能入脾。下氣。行水。破血之劑也。故凡水腫。癢急。便閉。閉格不通。得此體潤。則滑。味辛。則散。味苦。則降。與胡麻實異。而又可以相需為用者也。然此止屬治標之劑。多服恐滲液。而益燥結不解耳。去皮尖。蜜浸研。配合應用 治大便秘結不通。用郁李仁。當歸。地黃。麻仁。麥門

冬、栲仁、生薑、肉蓯蓉。甚者加大黃。

●治腫滿。氣急不得臥。用郁李仁一大合。搗和麵作餅。喫入口。即大便通。泄氣便愈。(楊氏產乳方)

●治小兒多熱。熱湯研郁李仁。如杏酪。一日服二合。(栲和衆至寶方)

●治小兒閉結。極祿小兒。大小便不通。并驚熱痰實。欲得漚動者。大黃酒浸炒。郁李仁去皮研。各一錢。滑石末一兩。搗和丸。黍米大二歲小兒服三丸。豈人加減。白湯下。(錢乙方)

●治脚氣浮腫。心腹滿。大小便不通。氣急喘息者。郁李仁十二分。搗爛水研。絞汁。葱豉搗如粟大三合。同煮粥食之。(章甫獨行方)

●治卒心痛刺。郁李仁三七枚。嚼爛。以新汲水或溫湯下。須臾痛止。却啣薄荷鹽湯。(栲和衆至寶方)

●治皮膚血汗。郁李仁去皮。研一錢。雞梨搗汁調下。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡陰虛液虧者禁

用。

●郁李仁甘苦而潤。其性降。故能下氣利水。按宋史錢乙傳云。一乳婦因怪而病。既愈而目張不得瞑。乙曰。煎郁李酒飲之。使醉即愈。所以然者。目系內連肝膽。恐則氣結。膽橫不下。郁李能去結。隨酒入膽。結去膽下。則目能瞑矣。此蓋得肯綮之妙者也。(李時珍)

●必效方。療癩取車下李仁。湯潤去皮。及並仁者。與乾麵相伴。搗如餅。若乾入水少許。作麪餅。大小一如病人掌。爲二餅。微炙。使黃。勿令致熱。空腹食一餅。當快利。如不利。更食一餅。或飲熱米湯。以利爲度。利不止。以醋飯止之。利後當虛。若病未盡。一二日量力更進一服。以病盡爲限。不得食酪及牛馬肉等。累試神驗。但須量病輕重。以意加減。小兒亦可用。(蘇頌)

●爾雅棠棣。陸璣詩疏作菓字。非也。爾雅棠棣。卽此。或以爲唐棣誤矣。唐棣乃扶移白楊之類也。(李時珍)

●樹高五六尺。葉花及樹並似大李。惟子小若櫻桃。甘酸而香。有少滋味也。(韓保昇)

●按郭璞云。棠棣生山中。子如櫻桃。可食。詩小雅云。棠棣之華。鄂不韡韡。陸璣注云。白棣樹也。如李而小。正白。今官園種之一名菓李。又有赤棣。樹亦似白棣。葉如刺榆葉。而微圓。子正赤。如郁李而小。五月始熟。關西天水隴西多有之。(章禹錫)

●郁李仁。卽郁李仁之處方用名。詳「郁李仁」條。

●郁李根。性質 酸。涼。無毒。主治 齒斷。腫。齒。堅齒。去白蟲。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論郁李根曰。宣結氣。破積聚。【宋】大明諸家本草論郁李根曰。治風蟲牙痛。澁煎含漱。治小兒身熱。作湯浴之。

【重皮】卽厚樸皮之古籍別名。典見廣雅。詳「厚樸皮」條。

【重石油】卽石油之加熱三百度至三百六十度者。功用較尋常石油爲良。參見「石油」條。

【重陽花】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【重塵】卽玄參之古籍別名。典見本經。詳「玄參」條。

【重樓】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【重樓金線】卽蚤休之古籍別名。典見唐本草。詳「蚤休」條。

【重箱】卽百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【重澤】卽甘遂之古籍別名。典見別錄。詳「甘遂」條。

【重邁】卽百合之古籍別名。典見吳普本草。詳「百合」條。

【降香】卽降真香之簡稱。詳「降真香」條。

【降香片】卽降真香切片者之處方用名。詳「降真香」條。

【降香末】卽降真香研成末者之處方用名。詳「降真香」條。

【降真香】 命名 本品氣頗顯。郁焚之能降諸真。故名。

處方用名 降香片。紫降香。降香末。

古醫別名 紫降香。鷄骨香。

香末。

古醫別名 紫降香。鷄骨香。

香末。

綱目)

基本 係香木類。為降香之幹木。

產地 陳仁山藥物生產辨云。降香產架喇吉打。醫學大辭典曰。產蘇門答臘及南方諸省。

形態 降香樹。長莖細葉。花白。子黑。根極堅實。重有皮。其木形似蘇枋木。色紫潤。初焚不香。以諸香和之。則氣味馥郁。

性質 辛溫無毒。

效能 辟惡氣。治金瘡。止血。生肌。用作芳香健胃藥。又為傷折止痛藥。

主治 燒之辟天行時氣。宅舍怪異。小兒帶之辟邪惡氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論降真香曰。療折傷金瘡。止血定痛。消腫生肌。【明】繆希雍本草經疏論降真香曰。降真香。香中之清烈者也。故能辟一切惡氣。不祥。入藥以香舶來者。色較紅。香氣甜而不辣。用之入藥。殊勝。色深紫者。不良。上部傷。瘀血停積。胸膈骨。按之痛。或并脇肋痛。此吐血候也。急以此藥刮末。入藥煎服之。

九盡 降 面 革 韭

良。治內傷或怒氣傷肝。吐血用此。以代鬱金神效。名醫錄云。周崇被海寇刃傷。血出不止。筋骨如斷。用花蕊石散不效。軍士李高用紫金散掩之。血止痛定。明日結痂如鐵。遂愈。且無痕痕。叩其方。則用紫藤香。葵瓦刮下研末。附云。即降真之最佳者。曾救萬人。

辨偽 鄭肖巖曰。降真香以舶上來者為香。降色紫而潤。最為真品。近市肆竟以蘇木煨半透。偽充蘇木。雖似降真。但降真氣味辛溫。能止血。蘇木氣味甘平。能破血。性既相反。功又懸殊。用者宜細辨之。曹炳章曰。按朱輔山云。真降本出南海山中。今溪峒僻處所出者。似是而非。勁瘦不甚香。真降記云。降香生叢林中。番人頗寶。砍斫之功。乃樹心也。其外白皮厚八九寸。或五六寸。焚之氣勁而遠。結含草木狀云。紫藤長莖細葉。梗極堅實。重重有皮。花白子黑。其截置烟釀中。經久成紫。香可降神。故名降香。按紀氏所說。與前說稍異。豈即朱氏所謂似是而非者乎。抑中國出者。與香降不同乎。鄭君所云。或

南降乎。惟蘇木混充。恐非事實。蓋降香色紫黑。堅緻。氣香有辛辣氣。蘇木色黃微紅。質脆。氣微香。如柏樹氣。形色氣味。皆有不同。且降香出貨亦多。價值低廉。恐不易混充耳。

配合應用 治金瘡出血。降真香。五倍子。銅花等分為末。傅之。

(醫林集要方)

治癰疽惡毒。番降末。楓乳香。等分為丸。裹之。去惡氣甚妙。(集簡方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛血熱便秘。火盛者禁用。畏火。

參攷資料 降香唐宋本草。失收。唐慎微始增入之。而不著其功用。今折傷金瘡家多用其節。云可代沒藥血竭。(李時珍) 俗呼舶上來者為香降。亦名雞骨。與沉香同名。(李時珍) 生南海山中。及大秦國。其香似蘇枋木。燒之初不甚香。得諸香和之。則特美。入藥以番降紫而潤者為良。(南均) 今廣東。廣西。雲南。安南。漢中。施州。永順。保靖。及占城。暹羅。渤泥。琉球。

諸番皆有之。(李時珍)

【面來刺】 產地 續州山坡有之。

形態 叢生。硬莖。緒色。葉似榆葉。三葉攢生。中大旁小。面有濃綠黑紋。背外緣內結。有刺如針。可供藥用。



面來刺

效能 退煩熱。通肢節。

【革沈香】 即沈香之有橫紋者。為沈香中之上品。功用詳「沈香」條。

【革蜂窠】 即露蜂房之古籍別名。與見綱目。詳「露蜂房」條。

【韭】 處方用名 韭白。韭根。韭葉。韭汁。

古詩別名 豐本(禮記)草鱸乳(拾遺)起陽草(侯氏藥譜)個人菜(長生韭)(和漢藥考)嬾人菜(俗名)


外國名詞 Top (英)

基本 屬百合科。為韭菜之莖葉與根。

九靈 韭

產地 凡浙江、江蘇、安徽諸省之田野間恒多生焉。

形態 韭為多年生宿根草。為莖菜之一。道旁亦有野生者。有似葱之莖。莖為鱗狀。生於地下。葉細長扁平。性質柔軟。一根發生。長可尺許。色綠可愛。夏月抽莖。頂端開六瓣小白花。連綴而為繖形花序。後結三稜之果。中藏黃色扁平之小種子。



韭

用法 生搗取汁用。

性質 辛微酸。溫。瀉。無毒。

成分 含揮發油。此油之主要成分為硫亞立耳。

效能 散瘀。活血。在腸內有消滯之作用。故治大腸炎之下痢。亦作諸種出血藥。與噎膈反胃藥。

主治 歸心。安五臟。除胃中熱利。病人可久食。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論韭曰。葉黃鱗魚

鮮食斷卒下痢。根可入生髮膏用。

【唐】陳藏器本草拾遺論韭曰。根葉羹食。溫中下氣。補虛益陽。調和臟腑。令人能食。止洩血。腹中冷痛。生搗汁服。主胸痺骨痛。不可觸者。又解藥毒。療狂狗咬人。數發者。亦塗諸蛇。虺。蠍。蠹。蟲。毒。【唐】孟

詵食療本草論韭曰。炒熱以鹽醋空心喫十頓。治胸膈噎氣。搗汁服治胸痺刺痛如錐。即吐出胸中惡血。甚驗。又灌初生小兒。吐去惡水。惡血。永無諸病。【宋】日華諸家本草論韭曰。養食充肺氣。除心腹痞冷。疝瘕。痔。瘡。汁服。治肥白人。中風失音。【元】朱丹溪本草衍義補遺論

韭曰。主吐血。唾血。衄血。尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損。及腸噎病。搗汁澄清。和童尿飲之。能消散胃脘瘀血。甚效。【明】李時珍本草綱目論韭曰。飲生汁。主上氣喘急。欲絕。解肉脯毒。養汁飲。止消渴。盜汗。熏

產婦血暈。洗腸痔脫肛。【清】寧原食醫本草論韭曰。養食歸腎壯陽。止洩精。暖腰膝。【清】黃宮繡本草求真論韭曰。韭菜味辛微酸。氣溫無毒。按辛則能散。溫則能行。滯氣

客於腸胃。則血因氣而益阻。胃氣不通於五臟。則腰膝冷而痿痺生。肝主疎泄。腎主閉藏。肝腎虛則閉非時。經曰。足厥陰病。則為遺尿。及為白淫。服此氣行血散。肝補腎固。而病安有不愈乎。故舊有云。韭味最利病人。凡一切血瘀氣滯等症。俱能使之立效。如犬蛇傷。搗爛如泥。加鹽少許。作厚餅。頓換。則安。被利杖。及打血凝。薄敷。運動即散。久病下痢不止。同鯽魚羹食。即止。但火甚陰虛。用之為最忌焉。

配合應用 治胸痺急痛。胸脾痛如錐刺。不得俛仰。白汗出。或微背上不治。或至死。可取生韭或根五斤。洗搗汁服之。【食療本草方】

治陰陽易病。男子陰腫。小腹絞痛。頭重眼花。宜取鼠屎湯煮之。用鼠屎十四枚。韭根一大把。水二盞。煮七分。去滓。再煎二沸。溫服。得汗愈。未汗再服。亦治傷寒勞傷。【南陽活人書方】

治卒然中惡。持韭汁。灌鼻中。便甦。【食醫心鏡方】

治臥忽不寤。勿以火照之。但

九二〇

痛醫指指甲際而唾其面。則活。取韭搗汁吹入鼻中。冬月則用韭根。【肘後方】

治風作邪。韭根一把。烏梅十四個。吳茱萸炒半升。水一斗。煮之。仍以病人。內入煮三沸。擘浮者。生。擘沉者。死。煮至三升。分三服。【金匱要略方】

治喘息欲絕。韭汁飲一升。效。

治夜出盜汗。韭根四十九根。水二升。煮一升。頓服。【千金方】

治消渴引飲。韭苗日用三五兩。或炒。或作羹。勿入鹽。入糖無妨。喫至十斤。即住。極效。過清切勿喫。有人病此。引飲無度。得此方而愈。【秦憲副方】

治喉腫難食。韭一把。搗熟。傅之。冷即易。【千金方】

治水穀痢疾。韭葉作羹。粥。炒。任食之。良。【食醫心鏡方】

治脫肛不收。生韭一斤。切。以酥拌炒熟。綿裹作二包。更互熨之。以入為度。【聖惠方】

治痔瘡作痛。用盆盛沸湯。以器蓋之。留一孔。用洗淨韭菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先熏後洗。數

次自然脫體也。(袖珍方)

①治小兒胎毒。初生時。以韭汁少許灌之。即吐出惡水惡血。永無諸疾。(四聲本草方)

②治小兒腹脹。韭根搗汁。和猪肋煎服。一合。間日一服。取愈。(子母秘錄方)

③治小兒患黃。韭根搗汁。日滴鼻中。取黃水取效。(子母秘錄方)

④治痘毒不發。韭根煎湯服之。(海上方)

⑤治產後嘔水。產後因怒哭傷肝。嘔青綠水。用韭葉一斤。取汁入煎汁少許。和飲送愈。(摘玄方)

⑥治產後血暈。韭菜切。安瓶中。沃以熱醋。令氣入鼻中。即省。(丹溪方)

⑦治赤白帶下。韭根搗汁。和童尿。露一夜。空心溫服。取效。(海上方)

⑧治鼻衄不止。韭根。葱根同搗。滾大塞入鼻中。類易。兩三度自止。(千金方)

⑨治五般瘡癬。韭根炒存性。搗末。以猪脂和塗之。數度愈。(經驗方)

⑩治金瘡出血。韭汁和風化石灰日乾。每用為末。傅之效。(瀕湖集驗方)

⑪治刺傷中水。腫痛。煮韭熱搗之。(千金方)

⑫治漆瘡作痒。韭葉桿傅。(斗門方)

⑬治獾狗咬傷。七日當一發。三日不發。乃脫也。急於無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一盞。隔七日又一盞。四十九日共服七盞。須百日忌食酸鹹。一年忌食魚腥。終身忌食狗肉。方得保全。否則十有九死。徐本齊云。此法出肘後方。有風犬一日咬三人。止一人用此得活。親見有效。(簡便方)

⑭治百蟲入耳。韭汁灌之。即出。(千金方)

⑮治聾耳出汁。韭汁日滴三次。(聖惠方)

⑯治牙齦蟲。韭菜連根洗搗。同人家地板上泥和傅痛處。膠上以紙蓋住。一時取下。有細蟲在泥上。可除根。又方。韭根十個。川椒二十粒。香油少許。以水桶上泥同搗。傅病牙頰上。良久。有蟲出。數次即愈也。

⑰治解肉腫毒。凡肉罈器蓋過夜者。為蠱肉。屋漏沾者。為漏肺。皆有毒。搗韭汁飲之。(張文仲備急方)

⑱治食物中毒。生韭汁服數升。良。(千金方)

愈也。

⑲治解肉腫毒。凡肉罈器蓋過夜者。為蠱肉。屋漏沾者。為漏肺。皆有毒。搗韭汁飲之。(張文仲備急方)

⑳治食物中毒。生韭汁服數升。良。(千金方)

㉑用量 錢半至三錢。㉒施用宜忌 凡陰虛有熱。及無滯者。禁用。不可與蜜及牛肉同食。

㉓參攷資料 ①此菜殊辛臭。雖煮食之。便出猶焦灼。不如葱。雖熱即無氣。最是養生所忌。(陶弘景)

②菜中此物最溫。而益人。宜常食之。昔人正月節食五辛。以辟瘴氣。謂韭葱薤蒜薑也。(蘇頌)

③心痛有食熱物及怒鬱致死。血留於胃。口作痛者。宜用韭汁。桔梗加入藥中。開提氣血。有腎氣上攻。以致心痛者。宜用韭汁和五苓散。為丸。空心茴香湯下。蓋韭性急。能散胃口。血滯也。又反胃。宜用韭汁二盞。入薑汁牛乳各一盞。細細溫服。蓋韭汁消血。薑汁下氣。消痰和胃。牛乳能解熱潤燥補虛也。一人願月飲

刮剝酒三盃。自後食必屈曲下。腰硬。瀉微痛。右脈甚濇。關脈沉。此滯血在胃。眩之口。氣因鬱而成痰。陰塞食道也。遂以韭汁半盞。細細冷呷。盡半斤而愈。(朱震亨)

④春食則香。夏食則臭。多食則能昏神。嗜目。酒後尤忌。(寇宗奭)

⑤案許慎說文。韭字象葉出地上形。一種而久生。故謂之韭。一歲三四割。其根不傷。至冬壅培之。先春復生。信乎久生者也。(蘇頌)

⑥韭之莖名韭白。根名韭黃。花名韭薹。禮記謂韭為豐本。言其美在根也。薹之美在白。韭之美在黃。黃乃未曾出土者。(李時珍)

⑦韭豷生豐本。長葉青翠。可以根分。可以子種。其性內生。不得外長。葉高三寸。便剪。剪忌日中。一歲不過五剪。收子者。只可一剪。八月開花成莖。收取曬藏供饌。謂之長生韭。官剪而復生。久而不乏也。九月收子。其子黑色而扁。須風處陰乾。勿令悞。北人至冬。移根於土窖中。培以馬屎。暖則即具。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。聚貴皆珍之。韭之為菜。可生可熟。可漬可久。乃菜中最有益。

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

九畫 韭

者也。羅願爾雅翼云。物久必變。故老韭為莧。(李時珍)

【韭子】 處方用名 韭菜子。 舊本 屬百合科。為韭之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。韭子各省均有。以江蘇鎮江府為多出。十一月新

形體 韭子為扁平狀。色黃黑。 採取 九月間收子。須在風處陰乾。

製法 大明曰。入藥揀淨蒸熟。曝乾。箴去黑皮。炒黃用。

性質 甘溫。無毒。

效能 補肝腎。煖腰膝。用治陰痿遺精帶濁藥。

主治 夢中洩精。溺血。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論韭子曰。暖腰膝。治鬼交甚效。【明】李時珍本草綱目論韭子曰。補肝及命門。治小便頻數。遺尿。女人白淫白帶。【明】繆希雍本草經疏論韭子曰。韭子。味辛甘溫無毒。主夢中洩精溺血。蓋韭乃入足厥陰少陰經。腎主閉藏。肝主疏洩。素問云。足厥陰病則遺尿。思想

無窮。入房太甚。發為筋痿。及為白淫。韭子入厥陰而甘溫補肝及命門之不足。故主洩精溺血。【清】黃宮繡本草求真論韭子曰。韭子功治略同。但治遺精白濁更勝。蒸曝炒研用。【清】汪訥庵本草備要論韭子曰。韭子辛甘而溫。補肝腎。助命門。暖腰膝。治筋痿遺尿。洩精溺血。白帶白淫。蒸曝炒研用。燒煙熏牙蟲。【清】黃元御玉楸葉解論韭子曰。韭子味辛。性溫。入足少陰腎。足厥陰肝經。秘精斂血。暖腰強腰。韭子溫補腎肝。治白淫赤帶。腰膝軟弱。宗筋下痿。精液常流。韭菜汁治吐衄便溺諸血。行打撲損傷諸瘡。療女子經脈逆行。止胸膈刺痛。如雞消散胃脘瘀血。【清】楊時泰本草述鈞元論韭子曰。夫韭葉辛矣。最後有微酸。生用稍無甘。若韭子則結於季秋。稟金氣之專。已無酸味。惟辛兼有甘。合於氣之溫。故不得尚執入肝以論。夫辛者肺味。味歸形。形歸氣。氣者肺所主也。是物得降收之氣。為肺氣專精。以至於胃。即其辛甘合而下行者。仍歸氣之所始。不歸於命門而何歸哉。

人身先天元氣。全藉後天以施化。是由此而升。即由此而降之元機。所以效下焦之用。不僅治溺數。且療遺精也。第元氣根於命門。而三焦為之使。經云。三焦者中瀆之府。水道出焉。肝固主溺。然已包舉於三焦之中。下焦衛氣能化水而出。即能約三焦以爲行水之節度。雖足厥陰原與命門通。而三焦之包舉上中下者。固以三焦爲本矣。

配合應用 ①治虛勞傷腎。夢中洩精。用韭子二兩。微炒爲末。食前溫酒服二錢匕。(聖惠方)

②治虛勞溺精。用新韭子二升。十月霜後採之。好酒八合。漬一宿。以晴明日童子向南擗一萬杵。平旦溫酒服方寸匕。日再服之。(外臺祕要方)

③治夢洩遺尿。韭子一升。稻米二斗。水一斗七升。煮粥。取汁六升。分三服。(千金方)

④治玉莖強中。玉莖強硬不痿。精流不住。時時如針刺。捏之則痛。其病名強中。乃腎滯漏疾也。用韭子破故紙各一兩。爲末。每服三錢。水一盞煎服。日三卽住。(經驗方)

九二二

⑤治腰脚無力。韭子一升。揀淨。蒸兩炊久。曝乾。箴去黑皮。炒黃。搗粉。安息香二大兩。水煮一二百沸。慢火炒赤色。和搗爲丸。梧子大。如乾。入少蜜。每日空腹酒下三十丸。以飯三五匙壓之。大佳。(海上方)

⑥治女人帶下。及男子腎虛冷。夢遺。用韭子七升。醋煮干。沸焙研末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。(千金方)

⑦烟熏蟲牙。用瓦片煨紅。安韭子數粒。清油數點。待烟起。以筒吸引至痛處。良久。以溫水漱口。吐有小蟲出。爲效。未盡再熏。(救急方)

用量 錢中至三錢。

施用宜忌 凡陰虛火旺者禁用。

參攷資料 ①韭子陽也。伏石鐘乳乳香。(李時珍) ②韭子每日空心生吞一二十粒。鹹湯下。能治夢遺溺白。(陳藏器) ③韭子得龍骨桑螵蛸。主漏精補中。葛洪孫思邈諸方多用之。(蘇頌) ④韭子入棘刺諸丸。主漏精。(陶弘景) ⑤棘刺丸。方見外臺祕要。治諸勞洩。小便數。藥多不錄。案梅師方治遺精。

用韭子五合。白龍骨一兩爲末。空心酒服方寸匕。千金方治夢遺小便數。用韭子二兩。桑螵蛸一兩。微炒研末。每日酒服二錢。三因方治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。有家韭子丸。蓋韭乃肝之菜。入足厥陰經。腎主閉藏。肝主疏洩。素問曰。足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。男隨洩而下。女子綿綿而下。韭子之治遺精瀉濁。小便頻數。女人帶下者。能入厥陰。補下焦肝及命門之不足。命門者。藏精之府。故同治云。(李時珍)

【韭汁】即韭用其汁者之處方用名。詳「韭」條。
【韭白】即韭之處方用名。詳「韭」條。
【韭根】即韭之處方用名。詳「韭」條。

【韭菜】即韭之處方用名。詳「韭」條。
【韭菜香】即韭菜香之葉似韭形者之別名。典見雲南志。詳「芸香草」條。
【風】爲雜木類之一種。係產於湖南桂陽縣者。其葉可療頭風。故名。詳「風葉」條。

【風化硝】製法 以芒硝於風輕飄白粉也。或以瓷瓶盛挂簷下。待硝滲出瓶外。刮下收之。別有甜瓜燈硝滲出刮收者。或黃牯牛膽收硝刮取。皆非甜硝也。(李時珍)
主治 主治上焦風熱。小兒驚熱。臨痰。清肺解暑。以人乳和塗。去眼臉赤腫。及頭面暴熱腫痛。煎黃連點赤目。

九畫 韭 風

【風母】即風狸之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。
【韭菜子】即韭子之處方用名。詳「韭子」條。
【韭菜粥】本品係用韭菜和米煮成之粥。

曹炳章曰。按風化硝乃皮硝所提煉而成。皮硝又名朴硝。產於江北通州山東。生於斥鹵之地。經冬令西北燥風冷氣凝結成硝。掃取即名皮硝。再以皮硝入水煎炸。去雜屑。經宿凝結。狀如鹽末。名曰朴硝。再以水煎。澄去渣滓。入蘿蔔數枚。同煮熱。傾入盆中。經宿則凝結成白硝如冰。其表面生有細芒如鋒者。爲芒硝。其生牙似圭角。作六角。縱橫玲瓏。名馬牙硝。又以其似白石英。故又謂之英硝。其再以蘿蔔汁煎煉。至去鹹味爲甜硝。置風日中吹去水氣。則輕白如粉。即風化硝是也。若同甘草汁煎過。則極昇燒。則爲元明粉也。


參攷資料 ●風化硝甘緩輕浮。故治上焦心肺痰熱。而不瀉利。(李時珍)
【風斗石斛】即石斛之處方用名。詳「石斛」條。
【風木藤】即楓上寄生之原名。詳「楓上寄生」條。
【風片】即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。
【風母】即風狸之古籍別名。典見

綱目。詳「風狸」條。
【風生獸】即風狸之古籍別名。典見綱目。詳「風狸」條。
【風石斛】即石斛之處方用名。詳「石斛」條。
【風延莓】產地 生山野間。形體 風延莓爲蔓草類之一種。蔓繞草木間。其葉細小。可供藥用。性質 苦寒。無毒。
主治 小兒發熱發強。驚癇等熱。熱淋。利小便。解煩明目。並煮服之。

九二三

【風車子】古籍別名 四角風。產地 生南安。形態 莖生長如藤。而直立。莖色。葉長如枇杷葉。而薄。中寬末尖。紋如格葉。深刻細密。面凹背凸。面色深綠。背淡青。結實如兩片榆莢。十字相穿。極似麝數風扇。四角平勻。生青熟黃。中有子一粒。如稍較形。長三四分。皮黃如槐米。可供藥

用。



子 車 風

效能 祛風散寒。

主治 療風痺。洗風足。

【風車草】即茜草之古籍別名。與見土宿本草。詳「茜草根」條。

即土茜草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「土茜草」條。

【風味園頭】即砂仁之古籍別名。與見和漢藥考。詳「砂仁」條。

【風流樹】即瑞香之古籍別名。與見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【風茄兒】即曼陀羅花之古籍別名。與見綱目。詳「曼陀羅」條。

【風草】命名 本品能治風疾。故名。

古籍別名 風菜。風藤草。風藥。

(綱目拾遺)

產地 廣東高要縣七里巖中。

形態 風草爲山草類之一種。叢生石縫間。葉圓厚如冬青。可供藥用。

藥用。

主治 祛風疾。頭疼。目昏眩。瘡疥疾。

【風鳥草】即白花菜之日本名。詳「白花菜」條。

【風菜】即風草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「風草」條。

【風梢蛇】係烏梢蛇之一種。狀類烏蛇。長大無劍脊。而尾梢短。性質效能。與尋常烏梢蛇同。詳「烏梢蛇」條。

【風蛤】產地 出福建邵武縣。及在峨嵋峯麓之數村多有之。

形態 風蛤爲溼生蟲類之一種。狀似蝦蟇。每值初春。東南風起。則滿牀蔚間。可供食與藥用。

性質 溫煖無毒。

主治 風痺。手足拘攣。折傷。

【風梭御史】即使君子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「使君子」條。

【風脚蛇】即蛇之產於于闐縣境。行疾如風。日行千里者。功用較尋常蛇爲良。詳「蛇」條。

【風葉】基本 風葉爲雜木類之一種。其葉可供藥用。性質 微溫無毒。

主治 追風活血。浸酒服。頭風。代茗飲。

【風菴】命名 本品爲菴之產於臺灣而能祛風者。故名。

主治 療風疾。

【風膏藥】基本 本品係用風草所蒸成之膏藥。古籍別名 山脊藥。(綱目拾遺)

主治 功用詳風草條。

【風狸】命名 本品能因風勝越。死則得風復生。而又治風疾。故名。

古籍別名 風母。風生獸。平猴。拮据。(綱目)

產地 出嶺南。及蜀西徼外山林中。

形態 風狸爲獸類之一種。其狀如猿猴而小。目赤。尾短如無色。青黃而黑文如豹。或謂一身皆無毛。惟自鼻至尾一道有青毛。廣一寸。長可三四分。尿如乳汁。喜食蜘蛛。噴蕭陸香。晝則隱伏不動。如蠅夜則因風騰躍甚捷。其腦可供藥用。

主治 療風疾。酒浸服。

【風狸尿】主治 諸風。大風。

【風磨銅】產地 生西番。置風露中。色燦如金。

主治 似之除一切風疾。

【風蹄】即火腿之古籍別名。與見東陽縣志。詳「火腿」條。

【風薑根】基本 係取生薑根之風乾者。

性質 辛熱無毒。

效能 溫中益肺。散寒祛風。

主治 寒嗽。嘔吐。嘔吐。腹痛。瀉。冷痢。血閉。

參攷資料 風薑根。性較乾薑溫和。不烈。比生薑則不溫。爲肺經氣分之藥。病人虛而冷者。宜使用之。

【風藤】即南藤之古籍別名。與見綱目。詳「南藤」條。

【風藤草】即風草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「風草」條。

【風藥】即澤蘭葉之古籍別名。與見綱目。詳「澤蘭葉」條。

【石南葉】即石南葉之古籍別名。與見綱目。詳「石南葉」條。

【石南葉】即石南葉之古籍別名。與見綱目。詳「石南葉」條。

見綱目拾遺。詳「風草」條。

【風藥菊】即金箭頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金箭頭」條。

【風露草】即槐牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「槐牛兒」條。

【風鼓】即殿之風乾者。詳「殿」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【飛天蜈蚣】即地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

九靈 風 飛

【飛沉香】 性質 辛。微溫。無毒。 主治 益血明目。活絡舒筋。

參攷資料 ●海南人採香。夜宿香林下。望某樹有光。即以斧斫之。記其處。曉乃伐取。必得美香。又見光從某樹飛交某樹。乃雌雄相感。亦斧痕記取之。得飛沉香。功用更大。(查浦輯聞) ●飛沉香能和陰陽二氣。可升可降。外達皮毛。內入骨髓。方輿志生黎居五指山。山在瓊州山中。所產有沉香。青桂香。雞骨香。馬蹄棧香。同是一本。其本頗類椿及檉柳。葉似橘。花白。子若檳榔。大如桑椹。交州人謂之密香。欲取者。先斷其積年老根。經歲皮幹朽爛。而木心與枝節不壞者。即香也。堅黑沉水者為沉香。細枝堅實不爛者為青桂。半沉半浮者為雞骨。形如馬蹄者為馬蹄。粗者為棧香。(趙學敏)

【飛沒藥】即沒藥經水漂過者之處方用名。詳「沒藥」條。

【飛辰砂】即辰砂經水漂過者之處方用名。詳「辰砂」條。

【飛來牡丹】即一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「一粒金丹」條。

【飛來鳳】即金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金雀花」條。

【飛松子】 命名 本品為飛松之子實。見人能飛去。成空株。故名。

古籍別名 狐實。梧實。山松子。(綱目拾遺)

產地 出滇中諸山野間。

形態 飛松為夷果類之一種。莖生松樹上。葉似柳。結實如梧桐子。而大倍之。殼長。薄殼。味美。氣香。可供食與藥用。

主治 下氣消痰。通和血脈。安神定驚。

參攷資料 凡有人魂神不安。及驚越失魂。神不守舍。一切等症。此為要藥。故靈璧趙氏天王補心丹。治任仲用之。張叢綺育。十季返魂丹。加飛松子殼更效。(綱目拾遺)

【飛青黛】即青黛經水漂過者之處方用名。詳「青黛」條。

【飛英】即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃精」條。

【飛風道者】即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「朴硝」條。

【飛絃蟲】即馬陸之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「馬陸」條。

【飛魚】即文鰩魚之古籍別名。典見綱目。詳「文鰩魚」條。

【飛廉】 處方用名 飛廉根。飛廉花。

古籍別名 淵盧。水禾。飛雉。飛輕。伏兔。伏硫。天葵。(別錄)木禾。(綱目)

外國名詞 Carduus Crispus (拉丁) ヒレアザシ ヤハズ アザミ オニノマユハキ (日本)

基本 係菊科飛廉屬。為飛廉之根與花。

產地 多在山野原澤間。

形態 飛廉為澤草類之宿根草。本形似薊。惟莖上有聚伏之薄葉。薄葉與莖皆有刺。密生其上。六月間開頭狀花。花形略小。淡紅色。其根直。肉白皮黑。曬乾則黑如元

參攷資料 正月採根。七八月採花。製法 凡用根。先刮去粗皮。梓

九靈飛食

細以苦酒拌一夜。漉出日乾。細杵用(雷敷)

性質 苦平無毒。

主治 骨節熱。歷重酸疼。久服令人身輕。(本經)頭眩。頂重。皮間邪風如蟻螿針刺。魚子細。起熱瘡。癰疽痔。溼痺。止風邪欬嗽。下乳汁。久服益氣明目不老。可煮。可乾用。(別錄)

(別錄)

歷代醫述攷證 【唐】蘇恭新修本草論飛廉曰。留血療疔蝕。殺蟲。【唐】齋炳四聲本草論飛廉曰。小兒疔瘡爲散。水漿服。大效。【明】李時珍本草綱目論飛廉曰。治頭風旋運。

配合宜忌 得烏頭良。忌麻黃。參攷資料 處處有之。極似苦菜。惟葉多刻缺。葉下附莖。莖有皮起似箭羽。其花紫色。俗方殆無用。而道家服其枝莖。可得長生。又入神枕方。今既別漏盧。則此漏盧。乃別名爾。(陶弘景) 此有兩種。一種生平澤中。是陶氏所說者。一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則肉白皮黑。中有黑

脈。日乾則黑如玄參。用莖葉及根。療疔蝕殺蟲。與平澤者俱有驗。今俗以馬薊似苦菜者爲漏盧。並非是也。(蘇恭) 凡使勿用赤脂莖。與飛廉形狀相似。只赤脂莖見酒。則色便如血。以此可表識之。(雷敷) 今秦州所闢漏盧。花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州所闢漏盧。花紫碧色。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸。委之。根黑色如蔓青而細。又類葱本。與陶蘇所說飛廉相近。然彼但謂之漏盧。今醫家罕有用飛廉者。不能的識。(蘇頌) 飛廉亦薺類也。蘇頌圖經疑海州所闢之漏盧是飛廉。沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而結頭。古方漏盧散下云。用有白茸者。則是有白茸者乃飛廉無疑矣。今考二物氣味功用。俱不相遠。似可通用。豈或一類有數種。而古今名稱各處不同乎。(李時珍)

【飛廉根】即飛廉之處方用名。詳【飛廉】條。

【飛廉花】即飛廉之處方用名。詳【飛廉】條。

【飛廉】條。即飛廉之處方用名。詳【飛廉】條。

【飛廉】條。即飛廉之處方用名。詳【飛廉】條。

九二六

天光。光中有此草。形似飛鸞。有翅。有三尾。雪中開五色花。花中抽一莖。直上著花。其葉狀如金絲。荷葉草。面綠背銀紅色。而光澤者。可供藥用。

採取 須雪中見花者爲真。根如老薑。葉可入藥。若有黑毛而不開花者。乃斷腸草。能殺人。不可誤採。

性質 苦寒。無毒。

主治 咽喉及口內諸病。滾水沖泡服之。

參攷資料 飛鸞草味雖苦寒。性反不下降而獨上升。見物即沾。實烈可知。以此草沖於水中。用指蘸之。則苦寒全在指上。其水即淡。若沾唇則味在唇上。水雖咽下。而味不入喉也。故治咽喉者。須以小管灌於喉中。或令病人張大口。用匙灌入。直達喉所。則味在患處矣。金鼓洞在近背陰地亦有之。(趙學敏)

【食火雞】即駝鳥之古籍別名。與見綱目。詳【駝鳥】條。

【食菜莢】原名 烏山椒。命名 本品形味似

處方用名。詳【滑石】條。
【飛蛾】即燈蛾之原名。詳【燈蛾】條。
【飛雉】即飛廉之古籍別名。典見別錄。詳【飛廉】條。
【飛鼠】即蝙蝠之古籍別名。典見宋本草。詳【蝙蝠】條。
【飛鼠屎】即夜明砂之古籍別名。典見藥物生產辨。詳【夜明砂】條。
【飛取鳥】即鷓鴣之古籍別名。典見本草集註。詳【鷓鴣】條。
【飛輕】即飛廉之古籍別名。典見別錄。詳【飛廉】條。
【飛蓬草】即蓬草子之古籍別名。典見綱目。詳【蓬草子】條。
【飛蠶】即白蠶之古籍別名。典見綱目。詳【白蠶】條。
【飛龍】即丹鐵之古籍別名。典見別錄。詳【丹鐵】條。
【飛藤】即骨路支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【骨路支】條。
【飛鸞草】 產地 出浙江杭州西湖葛嶺後山中。金鼓洞中。形態 飛鸞草爲雜草類之一種。生洞中。入洞中暗處。仰見一線

茶莢宜供食用。故名。又烏鴉最喜食之。送有烏山椒之名。

古稱別名 椒子。艾子。艾子。子(楚俗名)

經) 越椒(博雅) 儻子(拾遺) 辣子(楚俗名)

外國名詞 Zanthoxylum

ailanthoides. S. of N. (拉丁)

甚本 屬芸香科。為烏山椒之子實。

產地 凡暖地之山谷森林中恒多生焉。

形態 烏山椒為落葉喬木。高一二丈。老樹幹高四丈。周圍有三尺餘。枝柯密茂。樹皮作褐色。有粗刺。葉為奇數羽狀複葉。具長葉柄。小葉為披針形。末端尖銳。長一寸至四寸。闊二分至寸許。邊緣微有鋸齒。有四雙至十五雙。花開於初夏。小而作淡黃色。排列為圓錐花序。果實似山椒。熟則變為紅色。氣味亦極相似。

採取 八月採。

製法 去果梗。浸熱湯。取出。或剉或炒用。

性質 辛苦。大熱。無毒。

效能 暖胃。燥溼。與吳萸同用。

九薑食

治霍亂、中暑、食傷諸症。

主治 功同吳茱萸。力少劣。療水氣用之佳。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論食茱萸曰。心腹冷氣痛。中惡。除飲逆。去臟腑冷。溫中甚良。

【唐】陳藏器本草拾遺論食茱萸曰。療蠱毒飛尸。着喉口者。刺破。以子搗之。令血出。當下涎沫。黃汁服之。去暴冷腹痛。食不消化。殺腥物。

【明】李時珍本草綱目論食茱萸曰。治冷痢帶下。暖胃燥溼。

配合應用 ●治赤白帶下。搗子。石菖蒲等分為末。每日鹽酒溫服二錢。(經驗方)

●治久瀉虛痢。腹痛者。搗子丸。治之。蠟子。肉豆蔻各一兩。陳米一兩半。以米一分。同二味炒黃為末。一分生礬為末。粟米粥丸。梧子大。每陳飲下五十九丸。日三服。(普濟方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 食茱萸有小毒。動脾火。病目病者忌。凡無寒溼者禁用。畏紫石英。

參攷資料 ●爾雅云。椒。檉醜。

棟。陸璣詩疏云。椒。檉屬也。(蘇恭) ●此即蠟子也。蜀人呼為艾子。楚人呼為辣子。古人謂之蕢及檉子。因其辛辣。重口。使人有殺殺。熏然之狀。故有諸名。蘇恭謂茱萸之閉口者為食茱萸。孟詵謂茱萸之閉口者為蠟子。馬志謂粒大色黃黑者為食茱萸。粒緊小色青綠者為吳茱萸。藏器謂吳食二茱萸是一物。入藥以吳地者為良。不當重出此條。只可言漢與吳。不可言食與不食。時珍謂數說皆因茱萸二字相混。致誤耳。不知吳茱萸菜乃一類二種。茱萸取吳地者入藥。故名。菜黃蠟子。則形味似茱萸。惟可食用。故名食茱萸也。陳藏器不知食茱萸即蠟子。重出蠟子一條。正自誤耳。按曹憲博雅云。蠟子。越椒菜黃也。鄭樵通志云。蠟子一名食茱萸。以別吳茱萸。禮記三牲用穀。是食茱萸也。二說足正諸人之謬。(李時珍) ●蠟子出閩中。江東。其木高大似檉。莖間有刺。其子辛辣如椒。南人淹藏作果品。或以寄遠。吳越春秋云。越以甘蜜丸。蠟報吳增封之禮。則蠟之相贈尚矣。

(陳藏器) ●食茱萸南北皆有之。其木亦甚高大。有長及百尺者。枝莖皆黃。有小白點。葉類油麻。其花黃色。蜀人呼為艾子。禮記所謂蕢者是也。較艾擊相近也。宜入食藥中。能發辛香。(蘇頌) ●食茱萸。蠟子。辣子。一物也。高木長葉。黃花綠子。叢簇枝上。味辛而苦。土人八月採。搗取汁。入石灰攪成。名曰艾油。亦曰辣米油。始辛辣。蠟口。入食物中用。周處風土記。以椒檉薑為三香。則自古尚之矣。而今貴人罕用之。(李時珍)

【食茱萸】即辣茄之古籍別名。典見食物宜忌。詳「辣茄」條。

【食蛇鼠】形體 食蛇鼠為鼠類之一種。味尖尾赤。能食蛇。其尿可供藥用。

主治 蛇虺螫傷傳之。

【食蜜】即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【食膠】即鹿角膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿角膠」條。

【食鹽】原名 大鹽。命名 鹽成於海。鹽字象器中煎鹵之形而味鹹。故曰鹽。

此供食用要品。送名食鹽焉。

處方用名 鹽水。炒鹽。鹽湯。

古籍別名 大鹽(本經)。離池

類鹽。海砂。產戎地名。鈉鹽(綱目)

形鹽(周禮)海鹽(俗名)

外國名詞 Salt(英) Kocha-

巴(德)

基本 屬天然綠化物之一種。

為白色結晶形之粉末。

產地 和漢藥考曰。產於美、德、俄、英、法、西班牙等國。而中日兩國

為其主產地。

形態 鹽有精粗之別。故性狀亦從而各異。其形或為散子形結

晶體。或為結晶形之細末。其色則或純白。或灰白。味鹹。有時稍帶苦

味。在空氣中或不變化。或攝收水分。潮溼溶解。水亦易溶。惟雜有不

潔物者。則往往遺留器底。

種類 海鹽取海鹵煎鍊而成者。

成者。井鹽取井鹵煎鍊而成者。

池鹽係疏鹵地為畦隴而墾園之引清水注入。久則色赤。待夏秋

南風大起。一夜結成者。崖鹽係生於土崖間狀如白礬者。亦名生

鹽(蓋謂天然化生之鹽也)

製法 李時珍曰。凡鹽人多以礬硝灰石之類雜之入藥。須以水化澄去脚滓。煎鍊白色乃良。

用法 水化用。或火煨用。有以外傳有以和服。

性質 鹹寒。無毒。

成分 鹽之主成分。為綠化鈉 NaCl。此外尚含有加里、苦土、石灰等之鹽化物。及夾雜硫酸鹽類

等。其粗惡之品。更攪和沙土、蕪芥等物。凡純粹之鹽。其綠化鈉在百分之九十五以上。粗惡者。水分及他種異物。在百分之十一分半以上。

效能 瀉火。潤燥。清心。滋腎。又為瀉吐之藥。及作諸藥引經之品。

為慢性便秘之緩下藥。及咯血吐血時之止血收斂藥。又為近代用作虛脫間貧血時之覺醒藥。及為健胃鎮痛藥。又治胃酸缺乏之消化不良。習慣性便秘。創傷。

作用 內服少量。能促進胃液之分泌。而助消化之不足。入腸後能激腸之蠕動。又能令其黏膜之分泌增加。以迫大便之排出。且同時又能促進蛋白質之吸收。由胃

腸游離而入腎臟。能激腎臟之黏膜。使利尿之功用增加。外用微有凝固血液之能。

主治 腸胃結熱。喘逆。胸中病。令人吐(本經)傷寒寒熱。吐胸中痰癖。止心腹卒痛。殺鬼蠱邪。疰毒氣。下部匿瘡。堅肌骨(別錄)

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論食鹽曰。除風邪。吐下惡物。殺蟲。去皮膚風毒。調和臟腑。消宿物。令人壯健。【唐】甄權藥性本草論食鹽曰。空心措齒。吐水洗目。夜見小字。【宋】大明諸家本草論食鹽曰。助水瀉。及霍亂心痛。金瘡。明目。止風淚。邪氣。一切蟲傷。瘡腫。火灼。疥。長肉。補皮膚。通大小便。療疝氣。滋五味。【明】李時珍本草綱目論食鹽曰。解毒涼血。潤燥。定痛。止痒。吐一切時氣風熱。痰飲。闕格諸病。【明】繆希雍本草經疏論食鹽曰。鹽稟水氣。以生。洪範潤下作鹹。素問水生鹹。此鹽之根源也。本經味鹹。別錄鹹溫無毒。察其本具氣味。則是鹹寒而非溫也。氣薄味厚。入足少陰。亦入手少陰。足陽明。手太陰。陽明經。其主腸胃結熱。

喘逆。胸中病。及傷寒寒熱者。皆熱邪在陽明也。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。正此之謂也。五臟若欲補。云心欲酸。急食酸以軟之。以鹹補之心。虛則邪熱客之而卒痛。鹹寒能除熱補心。故主心腹卒痛也。凡溼熱在下焦。則為腫脹。留著經絡。則肌骨酸。鹹寒能除溼熱。故主之也。或以為鹹能軟堅。又何以堅肌骨。不知肌骨軟緩。皆溼熱所致。經曰。熱則骨消筋緩。又曰。體重。附腫。肉如泥。皆屬於溼。如夏月溼熱大盛。則肉食易於潰散。得鹽性之鹹寒。乃能堅久不腐也。鹹味涌泄。所以能吐胸中痰癖。及鬼蠱邪疰毒。氣悉皆吐出也。多食傷肺。喜咳者。肺主清。多食則鹹味漬入肺竅。故令咳也。日華子以之助水瀉。及霍亂心痛。金瘡。明目。止風淚。邪氣。一切蟲傷。瘡腫。火灼。通大小腸。療疝氣。諸治悉取其入腎入心。走血脈。堅除熱潤下之功耳。【清】黃宮繹本草求真論食鹽曰。鹽之品類甚多。有生海。生池。生井。生土。生階。生石。生樹。生草之各異。然寒氣味則一。鹽味鹹氣寒。加以皂角末同

煎。則味又兼微辛。五味惟鹹潤下。故凡大小便閉者。得此則通。五味惟鹹走血。故凡血熱血痛者。得此則入。五味惟鹹入骨。故補腎藥。必當鹽湯送下。而諸骨筋痛。藉此則堅。五味惟鹹潤燥。而辛又能泄肺。故凡痰飲喘逆。得此則降。五味惟鹹軟堅。故凡結核積聚。得此則消。五味惟鹹補心。故凡病因心起。而見喜笑不休。則當用此。沸飲過止。至於癰疽惡毒。眼目暴赤。酒醉顛狂。湯火急迫。凡其因熱而起者。無不藉此以寒勝熱。而使諸症其悉平矣。但鹹雖能走血。多食則血即凝。凝則下趨。過鹹則反水上吐。所以霍亂臭毒。頭疼腹痛等症。則可引涎上歸而吐之也。水腫如何。忌食。恐其以水助水之意也。橫生逆生。如何用鹽。即便縮入正產。以其力有上舒之意也。水蛭蚯蚓及蟲。如何得此耶。化。以其富有以水濟火之意也。多食如何口渴。以其滲去胃中津液也。清。鄒澍本經疏證論食鹽曰。蘇子瞻曰。江河泉澤之水。凡通者皆甘。惟入海則鹹。人身津液皆甘。惟溺則鹹。以是知鹹

雖水味。然水至鹹。必往而不反。非通流之水矣。往而不反之水。死水也。養鹽者。無論池井與海。並取往而不反者。令其先與土洽。繼以火燔。則遂成鹽。變水成金。易寒為溫。此其概耳。鹽不必盡以水也。凡斥鹵之處。地中之氣。即可成鹽。淮南取鹽。惟擇不毛之地。墾治成場。築而堅之。灑以海水。令其透溼。上蓋以灰。不一二日。運灰入池。沃之以水。南遂漫出矣。鹽不必盡以火也。淮北之成鹽。以日。河東之成鹽。以風。然日固火氣之宗。南風之烈。亦火氣之化。大抵鹽者。非他皆不能流通之水。不生草木之土。用火炙治以成。而其性溫。則於人亦治水與土之頑硬而已。然觀乎別錄所主。傷寒寒熱。胃中痰癖。心腹卒痛。皆以吐而奏功。鹽亦何自能令人吐哉。夫圖經之言可信也。曰。南盛之候。乘炬以照。炬為南氣所沖。鹽即熄滅。其氣上行。概可見矣。葛稚川曰。傷寒時氣溫病。頭痛壯熱。咳大。取鹽一升。以湯送之。腹中當絞而吐。更覆取汗便差。又曰。卒腹痛。用食鹽一大把。多飲水送之。忽當

吐即差。又曰。取上好鹽。先以大豆少許。含口中。勿咽。須臾水當滿口。至水近齒。更用方寸匕。抄鹽內口中。令與水一時咽。療暴得熱病。頭痛目眩。卒心腹痛。及欲霍亂。痰飲宿食。氣滿喘息。久下赤白。積聚吐逆。乏氣少力。顏色痿黃。瘡癩諸風。以是察之。鹽入人口。能令人津液升而發之。於是復多飲水以激之。乃能作吐。非鹽能令人吐也。其能耗精泣血。即在此矣。然則所謂下部醫瘡。堅肌骨者。亦當吐而獲效耶。則仲景之言。尤可信也。曰。頭風用大附子一枚。炮。鹽等分。為散。林後。以方寸匕。摩疾上。令藥力行。其為療治。亦概可見矣。藥性論曰。下部蝕瘡。炒鹽布裹坐。熨之。葛稚川曰。下利肛痛。不可忍。者。熬鹽包坐。熨之。千金翼曰。瘡癩初生者。嚼鹽頻擦之。外科精義曰。潰爛作瘻。以鹽厚其四圍。即止。由是察之。鹽摩人身。能令風火消除。肌肉堅固。不必其服之也。其能令人咳。肌肉腫。破。亦即此矣。陶隱居謂以鹽醃魚肉。則能經久不敗。以沾布帛。則易致朽爛。而未申明其所以然。陳劬

齋曰。是能使易朽爛者不敗。反使不敗者易朽爛也。夫鹽入口。則劫津液而聚之。聚之。即所以散之矣。血肉之物。能不敗者。取其散去津液。而受日暴火炙也。布帛之類。能致敗者。因其鹵氣溼過。縱日暴火炙。益易朽爛也。是可見其功。亦可見其過矣。

國外學說 英美學說謂食鹽從鹹水鹽成。或煮成。即尋常之食鹽。為食物中不可少之質。此質久為古人所知。動物植物內亦有此質。地產石鹽。含此質極多。鹽水泉者。即此質消化於水而成。其他如海洋之水。均含此質。可將其水煎而得之。水之化散。遲速不同。故其結成顆粒之形亦異。尋常出售之鹽。率多不淨。必先用法提淨之。其法以鹽消化於水。使之再成顆粒。鹽之淨者。雖久遇空氣而不變化。鹽之不淨者。雖暫遇空氣而亦變化。至於鹽之作用。食鹽為改血藥。吐藥。瀉藥。或用以治療癩瘡。痰。霍亂吐瀉。肺血吐出等。人之血內。不可無鹽。無鹽則身弱無精神。食之甚多。則為改血藥。於癩癩病有益。

九 鹽 食

九畫 食

如用鹽水洗浴。或暖或冷。皆能感
動皮膚。而於身弱或足癩之人。更
能得益。如以食鹽一大匙。清化於
溫水服之。則為便用之吐劑。其功
用又能作補劑。行氣驅蟲。外用能
治手足扭傷及跌打損傷。法用沸
水將食鹽浸至滿而不化。用布蘸
敷患處。甚效。用水節射鼻內。治鼻
滯變臭。又如咽喉久病。用此漱之
亦可。又如治感冒傷風。法用水化
食鹽少許。或漱口。或滋鼻孔。均
可。又如治蛇咬。則用刀刮去傷口
之毒。再以食鹽敷之。處方。食鹽七
斤半。溫水三十桶。化勻。浸洗。每三
日用一次。治身體無力。(鹽沐浴
水方)又食鹽一分。水五分至十
分。化勻。漱口。治咽喉類病。(鹽漱
水方)用量。作補劑。每服一分七
釐半。至一錢零五釐。作瀉劑。每服
二錢一分至四錢二分。作吐劑。每
服半兩至一兩。加水半斤沖服。改
血。每服一分至一錢。治暴吐血。每
服一錢零五釐至二錢一分。治瘧
疾。每服一兩至一兩半。分為數服。
趁病發過後服之。用榆皮麥水和
服。免嘔吐。日本和漢藥考曰。鹽廣

布於地球之上。天然凝結者曰岩
鹽。(岩鹽又名崖鹽。或曰山鹽。尋
常為骰子形之結晶體。然亦有八
面形。或為種種不整齊之小塊。有
如類粒者。有若挺子狀者。有具纖
維狀之紋理者。色白。或灰白。質半
透明。或不透明。有玻璃或脂肪之
光澤。破碎面作貝殼狀。味鹹。辛。風
空氣中。則潮溼而分解。比重二。
一至二。三。硬度二。○至二。
五。往往夾雜他物。來自西洋之食
鹽。皆本礦之精製品也。鹽溫石者。
乃煎熬海鹽之際。凝結於釜底而
成也。出售者為板片狀。長三寸。廣
二寸半。厚五分。前人治腹痛。以此
石炭臍上。取溫煖。然經一來復日。
亦即潮溼而分解。)人造者曰鹽。
製自海水者曰曬。又曰掘。礦開採
之岩鹽。純粹者祇須碎之。或以水
溶解一次。蒸發之後。再使結晶。便
可出賣。惟此種極少。往往夾雜石
膏。粘土。沙石等物質。必須先以水
溶解。濾去不潔之物。然後可蒸發。
使之結晶。至採收海水。湖水。泉水
中所含之鹽。則須視鹽之多少。與
地土之寒熱燥溼等。而各異其製

法。有藉太陽熱以蒸散其水分者。
有因寒冷。水結成冰而去之者。有
空氣乾燥之地。擴大鹽水之蒸散
面。為濃厚溶液。加熱而蒸發。使結
晶者。有在寒溼之地。潮水中之鹽
分。自然因水之蒸散而成。鹽於潮
底者。故未可執一而論也。又曰。日
本製海鹽法。先以粘土與砂。鞏固
田鹽之牀。乃布砂使勻。任海潮流
入。若在鹽田高於海面之地方。則
將海潮汲上。藉太陽之熱。使蒸散
其水分。如是數次。則鹽自黏附砂
粒。運以海水洗之。便得濃厚溶液。
乃入石鍋熱之。以蒸發其水分。鹽
分遂得析出。更令母液(即苦汁)
滴下。始製成鹽。聚集而裝包販賣。
又曰。食鹽中因多有異物。故凡供
醫家及食用者。概須精製。現今醫
藥用者。皆以製藥術製之。而成精
製食鹽。第四版改正日本藥局方
云。食鹽為骰子形之結晶。或結晶
性之粉末。色純白。味鹹。毫不帶苦
味。在空氣中不變化。入水三分。殆
能溶解。現中性之反應。酒精殆不
溶解。

近人學說 ●時逸人曰。食鹽

九三〇

一物。化學家名為氯化。乃人生家
庭日用所必需者也。故常人以爲
作食物中調味之補助品而已。忽
略而不重視。殊不知此物與人體
生理病理治療等。均有極大之關
係。與他種調味品不同。實有不可
忽略之道。在焉。爰特分爲三項述
之。(食鹽與生理之關係)人體中
之成分。據生理學家言。大別爲有
機性無機性之二種。無機性占無
機性化合物三分之一。考人體中
之鹽類。其大部分爲存於溶解。而
食鹽分則吸收於血中。綠血中所
含金質強弱。以食鹽爲最多。居
共百分六十至九十之間。故其味
鹹。鹽在血中。有激動血輪之力。有
助體質消長之功。其小部分。成爲
固形體。而含於骨內。爲人體中實
要之成分。與他種成分。同於體內。
新陳代謝。專由小便排泄。自營養
品中。攝取而補償之。吾國本草云。
鹽氣味甘。鹹寒無毒。歸入腎而堅
筋骨。治骨痛齒痛。又云。水主鹹。凝
結成鹽。在人則血脈應之。鹽之氣
味。鹹腥。人之血亦鹹腥。故鹽入血。
從其類也。由是推之。鹽之對於人

鹽之生理。中外學說。皆不謀而相符合。(食鹽與病理之關係)吾人每日於食物中。加少量之鹽。服之不但能調味。且能催動胃液之分泌。而助消化。兼能催進蛋白質之吸收。緣胃之所以能消化者。在有胃液。胃液所以有消化力者。輕緣酸之功。居其一。輕緣酸何以生。生於食鹽之故也。若人不食鹽。則身弱無精神。久之血液變質。發生瘰癧。癩瘡。疥癬等症。如食鹽過多。輕則口渴。胃部灼熱而發痛。重則嘔吐。下痢。牙肉腫出血。更服非常之劑量。則發瘧。瘧死。故鹽不可不食。亦不可多食。證之吾國本草亦然。其說曰。鹹走血。血病毋多食鹹。多食則血脈凝泣而變色。又曰。鹽能和臟腑。消宿食。令人壯健。又多食則傷腎損肺。觀以上之中外學說。如此。則鹽關係於人體病理也。明矣。(食鹽與治療之關係)食鹽對於治療上。應用頗廣。本經云。鹽主治胃腸結熱。喘逆。令人吐。西說謂其有改血行氣。驅蟲。及補益去毒。吐瀉之功。與吾國本草之說同。其主治方甚夥。今擇其中西簡要。就方

九 鹽 食

中。有曾經實驗。能奏特效者。分爲內服外治二類。錄之於下。餘如鹽水射注法。治霍亂。糖尿。失血。神傷。眩暈等症。食鹽吸入法。治呼吸器類病。因非常人所能用者。姑付闕如。(甲)內服方。(一)妊婦及常人。每日欲通大便一次者。空腹時以開水一碗。投入鹽少許服之。(二)補益。食鹽能生輕緣酸。助胃液消化之功用。每服二分至一錢。若服二錢以上。則爲下劑矣。(三)改血。每服三分至半錢。用以治療瘰癧等症。(四)暴吐血。以食鹽五分至一錢。和以開水冷飲之。(按常人有以童便服之。即止者。因尿中含有鹽質之故也。)(五)硝酸銀中毒。嚙下水蛭時。及誤服他種之毒物。用食鹽三錢至六七錢。服之。即能下毒物。溶解毒素。(六)瘧疾。以鹽一兩至一兩五錢。分爲數服。趁病發過後。服之。用榆皮煎水和之。免致嘔吐。(乙)外治方。(一)脚指臭穢。有痒者。用鹽一分。水十分。和勻洗之。(二)手足扭傷。及跌打交節痛等。用沸水將鹽浸滿。至滿而不化時。用布蘸敷患處。(

三)蛇咬。用刀刮去傷處毒。再用食鹽敷之。(四)咽喉類病。用食鹽一分。水十分。化勻。以之嗽口。(五)以十分之一食鹽水。用水節射入直腸內。能殺直腸之線蟲。若鼻涕變臭。則射入鼻內。(六)鹽水沐浴。方溫水一桶。約加食鹽四兩。化勻。浸洗。每三日用一次。能治身弱。足軟。並治腺病及子宮病。右列內服外治二類之方。皆確有效驗。毫無疑義者。但我國出售之食鹽。往往雜有他物及不潔之物。在內。食之。頗有礙於衛生。須擇其精品。淨潔者。方可用之。黎伯樞曰。(飲食物。在人體內。化學之反應)肉類。卵。魚類。牛油。豚脂。乾酪。穀粉。米麵。包。扁豆。胡桃。麥酒等類。以上食料。能使組織反應。偏於酸性作用。謂之酸性食料。血液。香湯。牛乳。各種野菜。菌類。藥物類。茶。咖啡。粗製糖等類。以上食料。能使組織液反應。偏於鹼基性作用。謂之鹼基性食料。人之發病。於飲食物。殊有關係。如多食酸性食物。反應則增加熱量。減少分泌。多食鹼基性食物。反應則增加分泌。減少熱量。蓋酸性反應

之食物。多蛋白質。脂肪質。粉質。酒精。多成形成質之成分。可使體量肥胖。其作用爲養化燃燒體溫。由是發生組織液中。賦有此質。細胞營養。交換新陳。繼續不斷。然其大要。須溶解於水。而後流通。尤藉鹽基。以爲劑劑。不使酸偏溫。而致發熱。乾燥。至若賦有鹼基性之物。多含天然之鹽質。是以動植二物。皆可資食料。二者不能偏廢。而日常烹膳調味。必用鹽。間亦用糖。究以用鹽爲多。爲人類普通之飲食。生理內自然之要求。不用鹽。遂覺無味。成爲必須之嗜好。是以人體上。鹼基。其互爲平衡。但平常偏於鹼基性方面。在組織液中。血液。中。皆見之。(酸與鹽在病機上之狀況)例如創傷。近年德人研究。瘰癧之食餌治療法。謂斷絕食鹽之供給。多用酸性食餌。可以痊愈。屢驗不虛。其故以鹽能漲大組織。創面潰瘍。增加分泌。不易治愈。然又謂瘰癧。乾燥。落屑者。不忌。是則鹽非一定忌物。茲以中醫規則言之。則虛證忌鹽。實症不忌。所謂乾燥落屑。卽爲實症。亦卽熱症。鹽爲溼潤之物。

自然不忌。且為排膿所必須。不有鹽質。不能分泌。膿液不易出。膿出而腐去。新組織再生。良好治愈。瘡即收口。鹽固不在禁忌之列。若體質虛弱。瘡口平塌。脈氣沉微。則為虛症。自須進以酸性食料。如蛋白質。肉類。脂肪。乾飯。以增加成形成質之材料。使腐去新生。添加體溫。振作生氣。若投以食鹽。潤下之性。使組織弛緩。分泌不暢。溫度低降。新組織不易再生。細胞軟弱。少氣。瘡即難以平復。考古方治狼瘡。有猪蹄湯洗瘡口法。猪蹄富有背腺。液液以之洗瘡。實扶助軟弱細胞。能起其新生組織。是為虛證治法。與德醫治狼瘡之多給酸性食物意同。中國古醫家。於鹽之性質。肉之性質。大段甚明白。而著書立說。獨無詳細以教人。今世歐醫所驚奇為新發明者。不知在中國古醫固已早有端倪。幾經實用。然其詳則須後學逐一為之疏通證明。古今不啻若合符節也。(鹽之排泄與存蓄證之於外分泌內分泌) 痰涎涕淚汗尿。無不具有鹽質。此外分泌也。胃中鹽酸及淋巴腺甲狀腺

攝護腺等。所有之液。亦無不有鹽質。此內分泌也。外分泌為排泄之物。內分泌為存蓄之物。內外分泌亦互為新陳交換。若鹽之多量。排泄。惟在於尿。尿之成分。大概為氣體物。固體物。液體物所併合。即所謂酸與鹽。亞摩尼亞水等。病體虛寒者。所下多鹽類。壯熱者。所下多酸類。(鹽性之變化與宜忌) 鹽性本易溶解。遇水多時。溶解之鹽。能使組織膨脹。作用弛廢。所以水腫病忌鹽。此種學說。中國古醫已言之。德醫學說亦同。(見前狼瘡食餌治療) 但酸性反應傷重時。例如質熱病。水分減少。血液所賦之鹽。亦不免乾燥變硬。則血液濃厚。不易循行。內經有鹹走血。血病毋多食鹹。多食鹹。則血凝泣而不行。諸語。是指用多量者言。鹽至凝泣。便不溶解。組織亦斷不膨脹。疎鬆。亟宜以清淡之水稀釋之。鹽得水則溶解。其性潤而易行。且足以制酸。反應之大過。如鹽量過少。酸量過多。亦足以致病。故鹽在藥用上。亦占重要位置。常有熱病如咽喉腫。氣管支乾燥。難於咯痰者。得相

當之鹽水。每每治愈。海水浴。亦利於血行。常有手足軟痛之病。浴海水而獲愈者。其例不少。此鹽因身質變化消長。而各有宜忌。不得併為一談也。(鹽之種類性別) 人所食之鹽。為鈉。專由食物調味上供給。若菓蔬中所含之鹽。多為鉀鈣鎂等。鈉與鉀鈣鎂種類質異。為性各別。鎂能使組織吸引水分。鉀等則能使組織排泄水分。德醫對於潰創療法。謂除去鈉鹽。而代以他種鹽類。可使減少水分。組織乾燥。易以治療云。茲考人體中血液。中多鈉鹽。組織液中多鉀鹽。鉀性透。宜利於排泄水分。鈉性鹹潤。易以吸引水分。血液與組織液交換新陳者。即此兩種鹽性。互為出入。此生理上天然之調節。遇宜避去鈉鹽之病。則使減少其注入。加增其排出。所以使創面乾燥。易療之理。即此(國醫所用之鹽劑意義) 素問熱淫於內。治以鹹寒。火淫於內。治以鹹冷。寒淫於內。以鹹溫之等。詞鹹性寒冷。為對待熱火之正治。以鹹溫寒。則又為從治。此皆屬象數名理之學。而鹹之為用在輒別

見少陰之復少陽之復條下。但素問用鹹。亦各有佐藥。合之各盡其妙。如甘緩酸收。辛散。苦堅。苦泄。苦下。常以鹹藥同用。道理則滿周至。此象數名理之精意。非科學醫所能及也。至考其屬何種鹽。則素問未有言。張仲景撰用素問。作傷寒論。所用大承氣。大陷胸等湯。治燥熱。治結胸。其中芒硝一物。當稟承素問。治火淫熱淫宗旨。而方亦為古所傳。可想。芒硝則為鉀鹽。鉀鹽在腸管能增加水分。分泌出。在腸管中。易於排泄。燥熱。而全體之細胞。則未有鉀鹽吸入使之膨脹也。仲景治少陰病之白通加猪膽汁人尿湯。人尿一物。中含食鹽。是即為鈉。而是方宗旨。則稟承素問寒淫所勝。平以辛熱。佐以甘苦。以鹹瀉之之意。膽汁為苦。人尿則鹹。乾薑附子則為辛熱。主藥在辛熱。而佐藥在鹹苦。意理精卓。以藥之味性治病。是為象數名理之所長。金匱中風篇有頭風摩散。大附子一枚。鹽等分為散。以方寸匕摩疾上。令藥力易行。此鹽即鈉鹽。其意義在輒堅。以佐附子之辛散。消渴小

便不利淋瀝有茯苓戎鹽湯以一彈丸大之戎鹽佐半斤之茯苓二兩之白朮戎鹽亦即鈉鹽出於西戎所產其意義爲潤下以佐茯苓白朮之輪運滲泄水曰潤下潤下作鹹爲書洪範所言本爲象數名理之學亦即在物理之中試驗之下仲景已宗其理以入藥方意簡括精當並不空泛黃疸篇有硝石礬石散以等分爲散和以大麥汁服方寸匕又有大黃硝石湯以四兩之硝石佐以四兩之大黃黃蘗十五枚之梔子硝石即煎芒硝之下層所結是爲鈣鹽鈣鹽鹹而苦澀與鈉鹽不同鈉鹽純鹹古人雖不諳科學未能分出鈣鈉然其性味攸殊則已早有分別異用於攻下者用鈣鹽於滋潤者用鈉鹽而其方不亂按之病理各皆適合後世醫家能用鹽治病者殊少遑問能察前哲用鹽劑之意理與鹽類之異性稍通科學者又多半捨人唾餘一味步拜西化於本國前哲遺書漫無考究循誦尙無何況解說心志不及安有審思精微深遠之國學不將湮沒而可惜乎

九鹽食

配合應用 ① 鍊鹽黑丸 崔中丞鍊鹽黑丸方鹽末一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以燻火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤微瀉如水汁即去火待凝破瓶取出豉一升熬煎桃仁一兩和麪炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻入蜜和丸梧子大每服三丸平且時服天行時氣鼓汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若多服黃連汁止之或過殺藥入藥久不動者更服一兩丸藥後忌口二三日其藥願月合之瓷瓶密封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落無藥可求但用此藥即敵大黃朴硝數兩曾用有效小兒女子不可服(劉禹錫傳信方)

② 治卒中尸逆其狀腹脹急中心或塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐(孫真人方)

③ 治尸疰鬼疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐裏之(藥性論方)

④ 治鬼擊中惡鹽一盞水二盞和服以冷水嚥之即甦(救急方)

⑤ 治中惡心痛或連腰膺鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服常吐惡物愈(藥性論方)

⑥ 治中風腹痛鹽半斤熬水乾着口中飲熱湯二斤得吐愈(用後方)

⑦ 治脫陽虛證四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽熨臍下氣海取燉(救急方)

⑧ 治心腹脹堅痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定不吐更服(梅師方)

⑨ 治腹脹氣滿暴脹酒服六銖(後魏書方)

⑩ 治酒肉過多脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下一二次即如湯沃雪也(簡便方)

⑪ 治霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令其氣透又以一包熨其背(救急方)

⑫ 治霍亂轉筋欲死氣絕腹有暖氣者以鹽燒脾中灸鹽上七壯即甦(救急方)

⑬ 治肝虛轉筋肝臟氣虛風冷

搏于筋這體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之(聖惠方)

⑭ 治一切脚氣鹽三升熬熱分裹近壁以脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸之尤良夜夜用之(食療本草方)

⑮ 治脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以熱湯泡洗有一人病此曾用驗(救急方)

⑯ 治胸中痰飲傷寒熱病瘧疾須吐者並以鹽湯吐之(外臺秘要方)

⑰ 治病後脇脹天行病後兩脇脹滿熬鹽熨之(外臺秘要方)

⑱ 妊娠心痛不可忍鹽燒赤酒服一撮(產寶方)

⑲ 治妊娠逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底仍急爪搔之(千金方)

⑳ 治婦人陰痛青布裹鹽熨之(藥性論方)

㉑ 治小兒疝氣井內用腎氣以葛袋盛鹽於戶口懸之父母用手擦料鹽即愈(日華方)

㉒ 治小兒不尿安鹽於臍中以艾灸之(藥性論方)

九靈食

①治小便不通。灑紙包白鹽。燒過。吹少許入尿孔中。立通。(普濟方)

②治氣淋。用鹽和醋服之。(廣利方)

③治二便不通。鹽和苦酒。傳臍中。乾即易。仍以鹽汁灌臍內。并內用紙裹鹽。投水中飲之。(家藏方)

④治渴。精白濁。雪白鹽一兩。并築緊固濟。煨一日。出火毒。白茯苓。山藥各一兩。為末。煮肉和蜜丸。梧子大。每漿湯下三十丸。蓋甘以濟。辟腎兩得也。(直指方)

⑤治下痢。肛痛。不可忍者。熬鹽包坐裏之。(肘後方)

⑥治血痢不止。白鹽紙包燒。研調粥。喫三四次。即止也。(救急方)

⑦治中蠱吐血。或下血如肝。鹽一升。苦酒一升。煎化。頓服。得吐即愈。乃支太醫方也。(小品方)

⑧治金瘡。血出甚多。若血冷。則殺人。宜炒鹽三撮。酒調服之。(梅師方)

⑨治金瘡。中風。煎鹽令熱。以匙抄灑。却水熱。滴瘡上。冷更著一日。勿住。取瘡大效。(肘後方)

⑩治小兒。撮口。鹽頭搗貼臍上。灸之。(子母秘錄方)

⑪治病笑不休。治鹽煨赤。研入河水。煎沸。吸之。探吐熱痰。數升。即愈。素問曰。神有餘。笑不休。神心火也。火得風。則煽笑之象也。一婦病此半年。張子和用此方。遂愈。(儒門事親方)

⑫治飲酒不醉。凡飲酒先食鹽一匕。則後飲必倍。(肘後方)

⑬治明目。堅齒。大利老眼。海鹽以百沸湯泡。散清汁於銀石器內。熬取雪白鹽花。新瓦器盛。每早指牙漱水。以大指甲點水洗目。閉坐良久。乃洗面。名洞視千里法。極神妙。(永類鈴方)

⑭治風熱牙痛。槐枝煎濃湯。二盞。入鹽一斤。煮乾。炒研。日用指牙以水洗目。(唐瑤經驗方)

⑮治齒齩。齒動。鹽半兩。皂莢兩挺。同燒赤。研。夜夜指齒。一月後。並瘥。其齒牢固。(食療本草方)

⑯治齒齩。宜露。每日嚼鹽。熱水含百遍。五日後。齒即平。(千金方)

⑰治齒疼。出血。每夜鹽末厚封。斷上有汗。盡盡。乃臥。其汁出時。叩齒勿住。不過十夜。疼血皆止。忌猪魚油。菜等極驗。(肘後方)

⑱治喉中生肉。綿裹筋頭。挂鹽指之日五六度。(孫真人方)

⑲治帝鐘。喉風。垂長半寸。煨食鹽。類點之。即消。(聖惠方)

⑳治風病。耳鳴。鹽五升。蒸熱。以耳枕之。冷復易之。亦治耳卒疼痛。(肘後方)

㉑治目中淚出。鹽點目中。冷水洗數次。瘥。(范汪方)

㉒治目中浮翳。遮睛。白鹽生研。少許。類點。瘥。小兒亦宜。(直指方)

㉓治小兒。目昏。或來或去。漸大。侵睛。雪白鹽。少許。燈心。蘸點。日三五次。不痛不礙。瘥。用有效。(活幼口議方)

㉔治塵物。眯目。以少鹽。并鼓置水中。視之。立出。(孫真人方)

㉕治酒。齩赤鼻。白鹽。常擦之。妙。(直指方)

九三四

綿搗。瘡上五六度。即瘥。(藥性論方)

①治體如。蟲行。風熱也。鹽一斗。水一石。煎湯。浴之。三四次。亦療一切風氣。(外臺祕要方)

②治瘡。癢痛。痒。初生者。嚼鹽。類擦之。妙。(千金方)

③治手足。心毒。風氣。毒腫。鹽末。椒末。等分。酢和。傅之。立瘥。(肘後方)

④治手足。疣目。鹽。傅上。以舌砥之。不過三度。瘥。(肘後方)

⑤治熱病。生。腫。下部有。瘡。熬鹽。熨之。不過三次。(外臺祕要方)

⑥治一切。漏瘡。故布。裹。燒。赤。為末。每服一錢。(梅師方)

⑦治瘡。疔。經年。鹽中。黑泥。晒。研。擦之。(永類鈴方)

⑧治瘡。敗。尿。瘡。鹽湯。浸。綿。搗。瘡上。(食療本草方)

⑨治蜈蚣。咬人。嚼鹽。塗之。或鹽湯。浸之。妙。(梅師方)

⑩治蛇。蝎。咬毒。形如。大風。眉。髮。皆落。惟。邊。煎。鹽。湯。浸。身。數。遍。即。愈。浙。西。將。軍。張。韶。病。此。每。夕。蛇。蝎。咬。於。體。一。用。用。此。方。而。安。蛇。蝎。長。鹽。也。

(經驗方)

①治蜂螫咬。將鹽塗之。(千金方)

②治解黃蠅毒。烏梁山峽多小黃蠅。生毒蛇蟻中。瘡人初無所覺。漸痒為瘡。勿搔。但以冷水沃之。擦鹽少許。即不為瘡。(方輿勝覽方)

③治毒蛇傷。將鹽塗之。(灸三壯。仍嚼鹽塗之。(徐伯玉方)

④治鼠出怪病。臨臥。淨身。鼠出。約至五升。隨至。血肉俱壞。每宿漸多。痛痒不可言狀。惟喫水臥牀。晝夜號哭。舌尖出血不止。身齒俱黑。尋動鼻。但飲鹽醋湯十數日。即安。(夏子谷奇疾方)

⑤解狼毒。鹽汁飲之。(千金方)

⑥治桑箭毒氣。鹽貼瘡上。灸三十壯。(集驗方)

⑦治救溺水死。以大椶臥之後。足放高。用鹽擦。瘡中待水自流出。切勿倒提出水。(救急方)

⑧治瘡癰作痒。以鹽摩其四圍。即止。(外科精義方)

⑨應用宜忌。凡血虛癰滯。及水腫溼滿者。禁用。漏蘆為之使。

九畫 食 香

卷致塗料 ●洪範水曰。潤下

作鹹。素問曰。水生鹹。此鹽之根源也。夫水周流於天地之間。潤下之性。無所不在。其味作鹹。凝結為鹽。亦無所不在。在人則血脈應之。鹽之氣味鹹。腥。人之血亦鹹。腥。鹹走血。血病無多食鹹。多食則脈凝。泣而變色。從其類也。煎鹽者。用皂角收之。故鹽之味微辛。辛走肺。鹹走腎。喘嗽水腫消渴者。鹽為大忌。或引痰吐。或泣血脈。或助水邪。故也。然鹽為百病之主。百病無不用之。故服補腎藥。用鹽湯者。鹹歸腎。引藥氣入本臟也。補心藥用炒鹽者。心苦虛以鹹補之也。補脾藥用炒鹽者。虛則補其母。脾乃心之子也。治積聚結核用之者。鹽能燥堅也。諸瘰癧眼目及血病用之者。鹹走血也。諸風熱病用之者。寒勝熱也。大小便病用之者。鹹能潤下也。骨病齒痛用之者。腎主骨。鹹入骨也。吐藥用之者。鹹引水聚也。能收豆腐。與此同義。諸蟲及蟲傷用之者。取其解毒也。(李時珍) ●鹽字象器中煎鹵之形。禮記鹽曰。鹹。爾雅云。天生曰鹵。人生曰鹽。許慎說

文云。鹽鹹也。東方謂之斥。西方謂

之鹹。河東謂之鹹。黃帝之臣宿沙氏。初煮海水為鹽。本經大鹽。即今解池。類鹽也。方士又呼鹽為海砂。(李時珍)

【香水蘭】即草蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳「草蘭」條。

【香牙蕉】即芭蕉之一種。葉有珠砂斑點。結實甘美。汁如乳露。食之甜美。寒氣沁心。為蕉中之最佳者。植時必以木夾之。否則結實時。易受風吹。吹後必折。性質效能。與芭蕉同。詳「芭蕉」條。

【香白芷】即白芷之處方用名。詳「白芷」條。

【香戎】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【香芋】產地 浙南諸境內多產之。

形態 香芋係莖草類之一種。引藤莖而生。葉極闊。小白花。花落地生實。速熟。牽引土中。莖葉不斷。冬盡掘取。煮食。香甜可口。種時以沙壓橫枝。則生。採其實。可供藥用。

性質 香甘。無毒。

主治 壯陽強腎。久服令人多

男。

【香芋】即落花生之古籍別名。典見兩葢翁食物便覽。詳「落花生」條。●即土芋之俗名。詳「土芋」條。

【香豆豉】即淡豆豉炒香者之處方用名。詳「淡豆豉」條。

【香果】即川芎之古籍別名。典見別錄。詳「川芎」條。

【香油】即胡麻油之原名。詳「胡麻油」條。

【香附子】原名 莎草根。附連而生。可以合香。故名。

處方用名 製香附。七香餅。水三稜。

古醫別名 莎草。夫須。(別錄)

雷公頭。(綱目)抱靈居士抱靈居士(記事珠)月萃吟(金光明經)

三稜草。雀頭香。(唐本草)草附子。水香枝。水巴戟。水莎。莎結。續根草。

(圖經)侯莎。(爾雅)地毛。(廣雅)地賴根。(綱目)腐。腐。爾雅)香枝。附米。貝莎。回頭青。雀腦香。(和漢藥考)

外國名詞 Cyprus longus

九靈香

(拉丁)

基本 屬莎草科為莎草之塊根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。香附產廣東以三水橫江為最清遠南沙大塘均有出下四府安南等亦有但貨味略次用薑汁燒酒釀童便製之則四製也但今之人所製多用鹽代童便本屬不合。

形態 莎草為一年自生之宿根草海濱尤多故一呼濱管春月從宿根生苗高一尺許葉似管而小三脊有光澤夏月於莖頂生花穗開紫黑色花地下莖匍匐繁殖其新根旁生鬚根數塊成爲一株外部黃赤色內部淺褐色頗堅實有芳香味辛。

採取 二月八月間採之。製法 雷斅曰凡使香附採得陰乾於石臼中搗之切忌鐵器李時珍曰凡採得連苗曝乾以火煨去苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透晒搗川或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方又稻草煮味不苦。

性質 甘微寒無毒。

成分 含有揮發油。

效能 調氣解鬱除諸痛理胎產專作通經藥又為祛痰健胃藥及作消散瘰癧疔瘡藥。

主治 除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論香附曰治心腹中客熱膀胱間連腸下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣【元】李東垣用藥法象論香附曰治一切氣逆亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣【明】李時珍本草綱目論香附曰散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰飲痞滿胸膈腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽疔瘡吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候不調胎前產後百病【清】黃宮繡本草求真論香附曰香附米辛苦香燥據書備極贊賞能入肝膽二經開鬱散滯活血通經參行諸經氣分凡霍亂吐逆泄瀉崩漏三焦不利等症治皆有效又云生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝腎外徹腠理炒黑則止血分補虛鹽水浸炒則入血分潤燥青鹽炒則

補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則補氣得歸地則補血得木香則疎滯和中得檀香則理氣腥脾得沉香則升降諸氣得川芎蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯苓則交濟心腎得茴香補骨脂則引氣歸元得三稜莪朮則消磨積塊得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得艾葉則煖子宮乃氣病之總司大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非云宜於婦人不宜於男子也按此專屬開鬱散氣與木香行氣親同實異木香氣味苦劣故通氣甚捷此則苦而不甚故解鬱居多且性和於木香故可加減出入以爲行氣通劑否則宜此而不宜彼耳但氣多香燥陰虛氣薄禁用或酒或童便或鹽水浸炒各隨本方製用。

補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則補氣得歸地則補血得木香則疎滯和中得檀香則理氣腥脾得沉香則升降諸氣得川芎蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯苓則交濟心腎得茴香補骨脂則引氣歸元得三稜莪朮則消磨積塊得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得艾葉則煖子宮乃氣病之總司大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非云宜於婦人不宜於男子也按此專屬開鬱散氣與木香行氣親同實異木香氣味苦劣故通氣甚捷此則苦而不甚故解鬱居多且性和於木香故可加減出入以爲行氣通劑否則宜此而不宜彼耳但氣多香燥陰虛氣薄禁用或酒或童便或鹽水浸炒各隨本方製用。

國外學說 和漢藥考曰香附以日本產者爲上藥用以石臼搗碎去皮其碎成粉末者謂之末香附子半碎者謂之砂香附子又分爲白砂赤砂二種前者爲嫩根爲

九三六

上品後者爲老根爲下品。

近人學說 張山雷曰香附辛味甚烈香氣頗濃皆以氣用事故專治氣結爲病而其色帶紫中心較黑質又堅實重墜則雖以氣勝而與輕舉升騰之辛溫諸藥不同故能直入血分下達腎肝王海藏所謂陽中之陰血中氣藥深得物理自然之妙又凡辛溫氣藥臆舉有餘最易耗散元氣引動肝腎之陽且多燥烈則又傷陰惟此物雖含溫和流動作用而物質既堅則雖善走而亦能守不燥不散皆其特殊之性故可類用而無流弊未嘗不外達皮毛而與風藥之解表絕異未嘗不疏泄解結又非上行之辛散可比好古謂本草不自治崩漏而能治崩漏是益氣而止血也頗謂雖不可直認爲益氣而確有舉陷之力丹溪謂須用童便浸過蓋據其辛味太濃以下行爲監制之義頗意調肝腎者此法最宜或有以醋炒以青鹽炒者其理蓋亦如此時珍謂其氣平而不寒香而能質其味多辛能散散善能降微甘能和爲足厥陰肝手少陽三

微甘能和爲足厥陰肝手少陽三

焦氣分主藥。而參通十二經氣分。頗謂氣結諸症。固肝膽橫逆肆虐。爲多。此藥最能調氣。故瀕湖謂之。專入足厥陰。其質胸脇痺結。腹脅脹。少腹結痛。以及諸疝。無非肝絡不疏。所謂三焦氣分者。合上中下而一以貫之。固無論其何經何絡也。李又謂生用則上行胸膈。外達皮膚。熱則下走肝腎。外徹腰足。蓋生者輕清。其氣上行。熱則重濁。其力下降。然此物在土。茸毛豐厚。且黏連草根。堅韌不解。故採藥者必以火燎之。而後粒粒可擇。蓋皆已煨而熟之矣。且藥肆中又皆製之色黑。尙何得有生者可用。然胸膈氣滯。亦皆投之。輒應。可知本性使然。固不在乎製藥之殿爲區別者也。韓氏醫道。或稱黃鶴丹。青囊丸。二方之妙。黃鶴丹用香附一斤。川連半斤。二味。煮治肝火熾盛之氣。結不通者。青囊丸用香附一斤。烏藥五兩。二味。則皆行氣之不失於溫燥者。自可以泛應一切氣痛而有餘。石頑謂氣病之總司。女科之主帥。惟經水先期而淡。及失氣無聲無臭者。非用。蓋血氣本虛。更

九盞香

與利氣。則血愈虛而氣愈耗矣。

配合應用 唐玄宗天寶單

方圖云。水香稜根。名莎結。亦名草附子。其味辛。微寒無毒。凡丈夫心中客熱。膀胱間連脇下氣。妨常日憂愁不樂。心忪少氣者。取根二大升。持熬令香。以生絹袋盛。貯於三大斗無灰清酒中。浸之。三月後。浸一日。卽堪服。十月後。卽七日。近暖處乃佳。每空服。溫飲一盞。日夜三四次。令酒氣相續。以知爲度。若不飲酒。卽取根十兩。加桂心五兩。蕪黃三兩。和搗爲散。以蜜和爲丸。持一千杵。丸如梧子大。每空服酒及煎蜜湯飲汁等。下二十九丸。日再服。漸加至二十九丸。以達爲度。

交感丹 凡人中年精耗神衰。蓋由心血少。火不下降。腎氣憊。水不上升。致心腎隔絕。營衛不和。上則多驚。中則塞痞。飲食不下。下則虛冷遺精。愚醫徒知峻補下田。非惟不能生水滋陰。而反見衰悴。但服此方半年。屏去一切暖藥。絕嗜欲。然後習祕固派流之術。其效不可殫述。俞通奉年五十一。遇錢璣城中先生。授此服之。老猶如少年。

至八十五乃終也。因善示羣生。同登壽域。香附子一斤。新水浸一宿。

石上擦去毛。炒黃。茯神去皮。木四兩。爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。侵早細嚼。以降氣湯下。降氣湯用香附子如上法。半兩。茯神二兩。炙甘草一兩。半爲末。點沸湯服。前藥（薩謙齋瑞竹堂經驗方）

一治氣熱上攻。頭目昏眩。及治偏正頭痛。大香附子去皮。水煮一時。搗晒。焙研爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。水一盞。煎八分。服。女人醋湯煎之（奇效良方）

升降諸氣。治一切氣病。痞脹。喘噎。噎酸。煩悶。虛痛。走注。常服開胃消痰。散壅思食。早行山行。尤宜服之。去邪辟瘴。香附子炒四百兩。沉香十八兩。樟砂仁四十八兩。炙甘草一百二十兩。爲末。每服一錢。入鹽少許。白湯點服（和劑局方）

治一切氣疾。心腹脹滿。噎塞。噎氣吞酸。痰逆。嘔惡。及宿酒不解。香附子一斤。縮砂仁八兩。甘草炙四兩。爲末。每白湯入鹽點服。爲粗末。煎服亦可。名快氣湯（和劑局方）

調中快氣。心腹刺痛。小烏沉湯。香附子擦去毛。焙二十兩。烏藥十兩。甘草炒一兩。爲末。每服二錢。鹽湯隨時點服（和劑局方）

治心脾氣痛。自飛霞方外奇方云。凡人胸膈頓處一點痛者。多因氣及突起。或致終身。或子母相傳。俗名心氣痛。非此。乃胃脘有滯。爾惟此獨步散治之。甚妙。香附米醋浸。略炒爲末。高良薑酒洗七次。略炒爲末。俱各封收。因寒者。薑二錢。附一錢。因氣者。附二錢。薑一錢。因氣與寒者。各等分。和勻。以熱米湯入。煎汁一匙。鹽一捻。調下。立止。不過七八次除根。又王璠百一選方云。內翰吳井夫。心痛欲死。服此卽愈。又類編云。梁混脾痛。心數年不愈。供事穢跡。佛夢傳此方。一服而愈。因名神投一七散。

治心腹諸痛。艾附丸。治男女心氣痛。腹痛。少腹痛。血氣痛。不可忍。香附子二兩。蕪艾葉半兩。以醋湯同煮。熟。去艾。炒爲末。米醋糊丸。梧子大。每白湯服五十九丸（集簡方）

治停痰宿飲。風氣上攻。胸膈

九三七

九畫 香

不利。香附、葛茨水浸。半夏各一兩。白礬末半兩。薑汁麪糊丸。梧子大。每服三四十九。薑湯隨時下。(仁存方)

◎治元氣腹冷及開胃。香附子炒研為末。每用二錢。薑鹽同煎服。(普濟方)

◎治酒腫。香附子、艾米醋。黃乾。焙研為末。米醋糊丸。服。久之。敗水從小便出。神效。(經驗方)

◎治氣虛浮腫。香附子一斤。童子小便浸三日。焙為末。糊丸。每米飲下四五十丸。日二。(丹溪方)

◎治老小疝瘕。往來疼痛。香附。南星等分為末。薑汁糊丸。梧子大。每食湯下二三十丸。(聖惠方)

◎治疝痛。腹痛及小腸氣。香附末二錢。以海藻一錢。煎酒空心調下。并食海藻。(瀕湖集簡方)

◎治腰痛。指牙。香附子五兩。生薑二兩。取自然汁浸一宿。炒黃為末。入青鹽二錢。擦牙數次。其痛即止。(乾坤生意方)

◎治血氣刺痛。香附子炒一兩。荔枝核燒存性五錢。為末。每服二錢。米飲調下。(婦人良方)

◎治女人諸病。四製香附丸。治婦人女子經候不調。兼諸病。大香附子。揀去毛一斤。分作四分。四兩。醇酒浸。四兩。醇醋浸。四兩。鹽水浸。四兩。童子小便浸。春三秋五。夏一冬七日。淘洗淨。晒乾。搗爛。微焙為末。醋煮麵糊丸。梧子大。每酒下七十丸。復人加澤蘭。赤茯苓末二兩。氣虛加四君子料。血虛加四物料。(瑞竹堂方)

又養附濟陰丸。治婦人月經不調。久成癥積。一切風氣。用香附子一斤。分作四分。以童洩鹽水酒醋各浸三日。艾葉一斤。漿水浸過。醋糊和餅。晒乾。晚釵砂半斤。炒。莪茂四兩。酒浸。當歸四兩。酒浸。各焙為末。醋糊丸。梧子大。每服七十九丸。米飲下。日二。(法生堂方)

又醋附丸。治婦人室女。一切經候不調。血氣刺痛。腹脹。膨脹。心怔。乏力。面色痿黃。頭暈。惡心。崩漏。帶下。便血。癥瘕。積聚。及婦人數墮胎。由氣不升降。服此尤妙。香附子米醋浸半日。砂鍋煮乾。搗焙石白。為末。醋糊為丸。醋湯下。又艾附丸。治同上。香附子一斤。熟艾四兩。醋煮。當歸酒浸二兩。為末。如上丸服。(濟

察方)

◎治婦人氣虛血衰。變生諸症。頭暈。腹滿。皆宜。抑氣散主之。用香附子四兩。炒。茯苓。甘草。炙。各一兩。橘紅二兩。為末。每服二錢。沸湯下。(濟生方)

◎治下血血崩。血如山崩。或五色漏帶。並宜常服。滋血調氣。乃婦人之仙藥也。香附子去毛。炒。焦。為末。極熱酒服二錢。立愈。昏迷甚者。三錢。米飲下。亦可加樓灰。(許學士本事方)

◎治赤白帶下。及血崩不止。香附子。赤芍藥。等分為末。鹽一抄。水二盞。煎一盞。食前溫服。(聖惠方)

◎治安胎。順氣。鐵單散。香附子炒。為末。淺煎。紫蘇湯服一二錢。一加砂仁。(中藏經方)

◎治妊娠。惡阻。胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。起坐不便。飲食不進。二香散。用香附子二兩。薑香葉。甘草各二錢。為末。每服二錢。沸湯入鹽調下。亦治頭風。疔痛。(聖惠方)

九三八

縮砂仁炒三兩。甘草炙一兩。為末。每服二錢。米飲下。(朱氏集驗方)

◎治產後。狂言。血暈。煩渴。不止。生薑。附子去毛。為末。每服二錢。薑水煎服。(朱氏集驗方)

◎治氣鬱。吐血。丹溪用童子小便。調香附末二錢。服。又治吐血不止。莎草根一兩。白茯苓半兩。為末。每服二錢。陳粟米飲下。(澗察方)

◎治肺。破咯血。香附末一錢。米飲下。日二服。(百一選方)

◎治小便。尿血。香附子。新地榆。等分。各煎湯。先服香附湯三五呷。後服地榆湯。至盡。未效。再服。(指迷方)

◎治小便。血淋。痛不可忍。香附子。陳皮。赤茯苓。等分。水煎服。(十便良方)

◎治諸般。下血。香附童子小便。浸一日。搗碎。米醋拌焙。為末。每服二錢。米飲下。又用香附以醋酒各半。煮熟。焙研為末。黃稔米糊丸。梧子大。每服四十九丸。米飲下。日二服。又戴原禮云。只以香附子末二錢。入百草霜。麝香各少許。同服。效尤速也。(直指方)

◎治老小脫肛。香附子、荊芥穗等分爲末。每服一匙。水一大盞。煎十數沸。淋洗。(三因方)

◎治偏正頭風。用香附子炒一斤。烏頭炒一兩。甘草二兩爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。葱茶嚼下。(本事方)

◎治氣鬱頭痛。用香附子炒四兩。川芎窮二兩。爲末。每服二錢。臘茶清調下。常服除根明目。(濟察方) 華陀中藏經加甘草一兩。石膏二錢半。

◎治女人頭痛。香附子末。茶服三錢。日三五服。(經驗方)

◎治肝虛頭痛。冷淚羞明。補肝散。用香附子一兩。夏枯草半兩。爲末。每服一錢。茶清下。(簡易方)

◎治耳卒聾閉。香附子瓦炒。研末。蘿蔔子煎湯。早夜各服二錢。忌鐵器。(衛生易簡方)

◎治時耳出汗。香附末。以棉杖送入。(經驗方)

◎治諸般牙痛。香附、艾葉煎湯漱之。仍以香附末擦之。去涎。(普濟方)

◎治牢牙去風。益氣烏髒。治牙

九盡 香

疼牙宜。乃鐵裏先生妙方也。香附子炒存性三兩。青鹽生薑各半兩爲末。日擦。(濟生方)

◎治消渴累年不愈。莎草根一兩。白茯苓半兩爲末。每陳粟米飲服三錢。日二。

◎治難疽疔毒。曾孚先云。凡癰疽疔毒。皆因氣滯血凝而致。宜服諸香藥。引氣通血。常器之云。凡氣血閉香。卽行。聞臭卽逆。疔毒皆由氣滯而血聚。最忌臭穢不潔。觸之毒必引致。陳正節公云。大凡疔疾。多因怒氣而得。但服香附子藥。進食寬氣大有效也。獨勝散。用香附子去毛。以生薑汁淹一宿。焙乾。碾爲細末。無時以白湯服二錢。如疔初作。以此代茶。瘡潰後亦宜服之。或只以局方小烏沉湯。少用甘草。愈後服至半年尤妙。(陳自明外科方)

◎治蜈蚣咬傷。嚼香附塗之立效。(袖珍方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛及血熱者禁用忌鐵。
參攷資料 香附之氣。平而

不寒。香而能竄。其味多辛能散。微苦能降。微甘能和。乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥。而兼通十二經氣分。生則上行胸膈。外達皮膚。熱則下走肝腎。外徹腰足。炒黑則止血。得童溲浸炒則入血分而補虛。鹽水浸炒則入血分而潤燥。青鹽炒則補腎氣。酒浸炒則行經絡。醋浸炒則消積聚。薑汁炒則化痰飲。得參朮則補氣。得歸芍則補血。得木香則流滯和中。得檀香則理氣。得沉香則升降諸氣。得芍藥若朮則總解諸鬱。得梔子黃連則能降火熱。得茯神則交濟心腎。得茴香。破故紙則引氣歸元。得厚朴。半夏則決壅消脹。得紫蘇。葱白則解散邪氣。得三稜。莪朮則消磨積塊。得艾葉則治血氣。暖子宮。乃氣病之總司。女科之主帥也。飛霞子韓忞云。香附能推陳致新。故諸香皆云益氣。而俗有耗氣之說。宜於女人不宜於男子者非矣。蓋婦人以血用事。氣行則無疾。老人精枯血閉。惟氣是資。小兒氣日充。則形乃日固。大凡病則氣滯而礙。故香附於氣分爲君藥。世所罕知。臣以

參芪。佐以甘草。治虛怯甚速也。忞游方外時懸壺輕齋。治百病黃鶴丹。治婦人青蘘丸。隨宜用引。輒有小效。人藥不已。用者當思法外意可也。黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方。故名。其方用香附一斤。黃連半斤。洗晒爲末。水糊丸。梧子大。假如外感葱薑湯下。內傷米飲下。氣病香湯下。血病酒下。痰病薑湯下。火病白湯下。餘可類推。青蘘丸。乃邵應節真人母病感方士所授者。方用香附略炒一斤。烏藥略炮五兩三錢。爲末。水醋發。麵糊爲丸。隨證用引。如頭痛茶下。痰氣薑湯下。血病酒下爲妙。(李時珍)

◎別錄止云。莎草。不言用苗用根。後世皆用其根。名香附子。而不知莎草之名也。其草可爲笠及雨衣。疎而不沾。故字從草從沙。亦作養字。因其爲衣垂縷如孝子衰衣之狀。故又從養也。爾雅云。瀟音浩。侯莎。其實提是也。又云。薑夫須也。薑乃笠名。賤夫所須也。其根相附連。續而生。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。按江表傳云。魏文帝遣使於吳求雀頭香。卽此。其

九三九

九盡 香

葉似三稜及巴戟。而生下溼地。故有水三稜、水巴戟之名。俗人呼爲雷公頭。金光明經謂之月萃。記專珠謂之抱野居士。(李時珍) 處處有之。苗葉如薤而瘦。根如筋頭大。譚按唐玄宗天寶單方圖。載水香稜功狀。與此相類。云水香稜原生博平郡池澤中。苗名香稜。根名莎結。亦名草附子。河南及淮南下溼地卽有。名水莎。隴西謂之地積根。蜀郡名續根草。亦名水巴戟。今洛都最饒。名三稜草。用莖作鞋履。所在皆有。採苗及花與根療病。(蘇頌) 香附子今人多用。雖生於莎草根。然根上或有或無。有薄皴皮紫黑色。非多毛也。刮去皮則色白。若便以根爲之則誤矣。(寇宗奭) 莎葉如老韭葉而硬。光澤。有劍脊稜。五六月中抽一莖。三稜中空。莖端復出數葉。開青色花。成穗如黍。中有細子。其根有鬚。鬚下結子一二枚。轉相延生。子上有細黑毛。大者如羊棗而兩頭尖。採得燎去毛。曝乾貨之。此乃近時日用要藥。(李時珍) 凡人病則氣滯而餒。故香附於氣分爲君藥。臣

以參香。佐以甘草。治虛怯甚速也。(萬全) 氣鬱多用香附。或氣弱而鬱者。必同補劑而用。固也。然有火傷元氣以致鬱者。又須降火之劑而以此佐之。(如黃鶴丹之同黃連並用) (劉清江) 香附是血中之氣藥也。蓋血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝滯。氣順則血亦隨之而和暢矣。(張石頑)

【香附苗及花】

主治 丈夫心肺中虛風。

及客熱膀胱連腸下時有氣。妨皮膚。搔痒癢癢。飲食不多。日漸瘦損。常有憂愁。心忪少氣等證。並收苗花二十餘斤。剉細。以水二石五斗。煮一石五斗。斛中浸浴。令汗出。五六度。其搔痒卽止。四時常用。癰瘡風永除。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論香附苗及花曰。煎飲散氣鬱。利胸膈。降痰熱。

【香附根酒】

原名 莎根酒。製法 用莎根一斤。切熟令香。袋盛浸酒。日夜飲之。常令酒氣相續。

主治 心中客熱。膀胱膈下。氣

鬱。常憂不樂。

【香珀】卽琥珀有香氣者之古籍別名。典見綱目。詳「琥珀」條。

【香砂仁】卽砂仁之處方用名。詳「砂仁」條。

【香茅】卽白茅之一種。生湖南及江淮間。葉有三脊。其氣香芬。性質功用與尋常白茅同。詳「白茅香」條。卽鼠麴草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鼠麴草」條。

【香娘子】卽蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蠊」條。

【香葍】卽香薷之古籍別名。典見食療本草。詳「香薷」條。

【香薷】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【香葍】卽香薷之處方用名。詳「香薷」條。

九四〇

葉可供藥用。

主治 焚之。辟瘟疫風毒。房屋穢氣。湯浴祛風寒。包佩解鬱。開水酒煎塗面部。能滅黑癩。滋顏。搽髮辟穢。醋煎乘熱擦牙。漱口。能止齒痛。動接口臭。水煎和醋服。去頭多風。生津。健忘。食不知味。

【香草】卽佩蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳「佩蘭」條。卽蘭草之古籍別名。典見綱目。詳「蘭草」條。

【香薷】卽都管草之古籍別名。典見圖經本草。詳「都管草」條。

【香薷】卽胡荽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「胡荽」條。

【香薷】卽芳香之古籍別名。典見綱目。詳「芳香」條。

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三

【香梨】 產地 生建昌。形態 綠莖大葉。作三



梨 香

又形。前尖。大過於掌。深齒半寸許。粗紋斜。面綠背淡青。可供藥用。

主治 擦傷。

【香葉】即香薷之古籍別名。典見千金食治。詳「香薷」條。即羅勒之古籍別名。典見綱目。詳「羅勒」條。

【香椿皮】即椿樹白皮之處方用名。詳「椿樹白皮」條。

【香楓】即楓香脂之俗名。詳「楓香脂」條。

【香稜】即香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香附子」條。

【香蕊】即香薷之古籍別名。典見食療本草。詳「香薷」條。

【香鼠】產地 出雲南諸地之山野中。

形態 香鼠爲獸類鼠屬之一種。體長寸許。形如鼠而較小。小者如指。穴於柱中。行地上。疾如激箭。插置箱篋中。經年氣香不散。蓋其多食香草。亦如薷之有香薷。故有異香。可供藥用。

主治 疝疾甚驗。

九疊香

【香蒲粉】即蒲黃之原名。詳「蒲黃」條。

【香薷】即香薷之古籍別名。典見本草行義。詳「香薷」條。

【香蓋】即香薷果之古籍別名。典見綱目。詳「香薷果」條。

【香狸香】即狸貓香之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「狸貓香」條。

【香墩草】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【香穀芽】即穀芽之處方用名。詳「穀芽」條。

【香薷】即薷之有香氣者。詳「薷」條。

命名 單字從單。單廷也。單味得永。有單廷之意。故名。


古籍別名 黃單。(陳仁玉菌譜) 白色者名肉單。(吳瑞) 推非。(日本) 蓋單。(菌譜)

外國名詞 Coriandula Sibirica, Honn. (拉丁) シヒタケ (日本)

基本 係擔子菌類帽菌族。爲香薷屬之寄生物。產地 有自寄生於諸枯木樹

上者。亦有用人工令適宜萌生者。各省咸有出產。

形態 香薷爲菜類之寄生菌物。其質外褐色。肌理玉潔。芳香雋永。但其菌絲體上。生笠與柄。卽爲子實體。笠之裏面。有許多裂褶。於此裂褶著生芽胞。採得有生乾焙乾二法。



種類 合單。又名台單。生台之草荒山。寒極雪收。春氣欲動。土鬆芽活。此菌候也。其質外褐色。肌理玉潔。芳香韻味。一發釜鬲。聞於百步。山人曝乾以售。香味減於生者。他山雖產。其柄高而香劣。不及矣。○稱香單。生孟溪諸山。秋中雨零露浸。釀山脊木。腴發爲菌。花生絕頂樹杪。初如蕊珠。則盤類輕酥。滴乳。淺黃白色。味尤甘。已乃張傘。大若掌。味頓涼矣。春時亦生。而香液少。食之之法。下冊似沸澆起。參和衆味。而特全於酒。切勿攪動則

涎腥不可食矣。亦可煮熟致遠。○松單。生松陰。採無時。凡物松出。無不可愛者。○麥單。生溪邊沙壤中。味殊美絕。類麝香。○玉單。初寒時生。潔竹可愛。作羹微朝。俗名寒蒲單。○黃單。叢生山中。黃色。俗名黃單。又名黃純。○紫單。結紫色。產山中。爲下品。○四季單。生林木中。味甘而肌理粗。○鷄香單。生高山中。狀類鷄子。久而微開。味殊甘滑。不澁稠香。然與杜單相亂。不可不慎。杜單。土菌也。性質 甘平無毒。

主治 益氣不飢。治風破血。

歷代記載攷證 【清】黃宮綉本草求真論香單曰。香單食中佳品。凡菽粟土熱毒。惟香單味甘性平。大能益味助食。及理小便不禁。蓋此本於桑楮諸木所出。得受桑楮餘澤而成也。然此性極滑濡。中虛服之有益。中寒與滯。食之不無滋害。取冬產肉厚。細如錢大者良。【造】王士雄隨息居飲食譜論香單曰。香單甘平開胃。治洩瀉不禁。包邊回轉者佳。俗名香菰。痧痘後產後病後忌之。性能動風故也。

【香蕉】即芭蕉實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「芭蕉」條。

【香薷】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【香蠟】即海蠟之屬。可製香料者。詳「海蠟」條。

【香薷】 命名 薷本作薷。薷菜蘇之類也。本品氣香葉柔。故名。

處方用名 陳香薷。香薷。

古醫別名 薷（土籍）香薷。香

非（食療）白香薷（圖經）香薷。千金）蜜蜂草（綱目）香戎香薷。

茂藥石解。山翁（何首烏亦一名山翁）醜菜。董萊。奴也只清涼種。

（和漢藥考）

外國名詞 Elaholtria patra-
ini Gardke. (拉丁)

基本 屬唇形科薷刀香薷之葉及花穗。

產地 山野道旁間。

形態 薷刀香薷為一年生草。

高二三尺。分枝多枝。香氣強烈。莖作方形。葉對生。作卵圓形。邊緣有

繸齒。類紫蘇葉。莖莖俱有毛茸。秋季於莖梢開小紫花。相續作穗狀。

花於一側相連。稍反張。作薷刀狀。故有此名。

採取 夏採莖葉。秋採花穗。陰

乾。

製法 雷斅曰。凡使香薷。採得去根留葉。剉曝乾。勿令犯火。服十

兩。一生不得食白山桃也。時珍曰。八九月開花。着穗時。採之。陰乾用。

性質 辛微溫。無毒。

效能 發汗散暑熱。利溼清水腫。

主治 霍亂腹痛吐下。散水腫。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論香薷曰。去熱風。卒轉筋

者。煮汁頓服。半升即止。為末水調服。止鼻衄。【宋】大明諸家本草論

香薷曰。下氣除煩熱。療嘔逆冷氣。【明】王類食物本草論香薷曰。夏

月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。【明】李時珍本

草綱目論香薷曰。主胸氣寒熱。【明】繆希雍本草經疏論香薷曰。

香薷味辛。其氣微溫。而無毒。入足陽明太陰。少陰經。辛散溫通。故

能解寒鬱之暑氣。霍亂腹痛吐下轉筋。多由暑月過食生冷。外邪與

內傷相并而作。辛溫通氣。則能和中解表。故主之也。散水腫者。除溼

利水之功也。孟詵謂其去熱風。卒轉筋者。煮汁頓服。半升即止。為末

水調服。止鼻衄。日華子謂其下氣除煩熱。療嘔逆冷氣。汪穎謂其夏

月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。【明】李士材本

草圖解論香薷曰。香薷辛溫入肺。發散暑邪。通利小便。定霍亂。散水

腫。世醫治暑。概用香薷。殊不知香薷為辛溫發散之劑。如納涼飲冷。

陽氣為陰邪所遏。以致惡寒發熱。頭痛煩渴。或霍亂吐瀉者。與之相

宜。若勞役傷暑。汗多煩喘。必用清暑益氣湯。如大熱大渴。人參白虎

湯。以瀉火益元。若用香薷。是重虛其表。反助其熱矣。今人不知暑傷

元氣。概用香薷代茶。不亦誤乎。忌火亦忌日。此草乃夏月解表之品。

無表邪者戒之。其性溫熱。陽暑症不可誤投。【清】黃宮繡本草求真

論香薷曰。香薷氣味香竄。似屬辛溫。並非沉寒。然香氣既除。涼氣即

生。所以菴蒸溼熱。得此則上下通達。而無鬱滯之患。擇結之陽邪。得

此則煩熱頓解。而無固結之弊矣。是以用為清熱利水要劑。然必審

屬陽證。其症果屬陽結。而無虧弱之症者。用此差為得宜。若使專賦

稟虧。飲食不節。其症有似燥渴。而見吐瀉不止者。用此等於代茶。寧

無誤乎。今人但知暑即是熱。熱即是暑。暑熱混為一氣。而不知暑屬

何形。熱屬何象。暑何因是而名。熱何因是而發。暑何因何體氣而至。

熱何因熱體氣而召。暑何用於香薷不宜。熱何用於香薷則效。其中

旨趣。在人領會。未可為粗心人道也。陳者良宜冷服。

配合應用

●治一切傷暑。香薷飲。治暑月臥溼當風。或生冷不節。真邪相干。便致吐利。或發熱頭

痛體痛。或心腹痛。或轉筋。或乾嘔。或四肢逆冷。或煩悶欲死。並主之。

用香薷一斤。厚朴。薑汁炙。白扁豆。微炒。各半斤。到散。每服五錢。水二

盞。酒半盞。煎一盞。水中沉冷。連進二服。立效。活人書。去扁豆入黃連

四兩。薑汁同炒黃色用。（和劑局方）

●治水病洪腫。胡洽居士香薷

煎。用乾香薷五十斤。剉入釜中。以水淹過三寸煮之。使氣力都盡。去滓澄之。微火煎至可丸。丸如梧桐子大。一段五丸。日三服。日漸增之。以小便利則愈。(蘇頌圖經本草方)

① 治通身水腫。深師齋丸。治暴水風水氣水。通身皆腫。服至小便利為效。用香薷葉一斤。水一斗。熬極爛。去滓再熬成膏。加白朮末七兩和丸。梧子大。每服十九丸。米飲下。日五夜一服。(外臺祕要方)

② 治四時傷寒不正之氣。用水香薷為末。熱酒調服一二錢。取汁。(衛生易簡方)

③ 治心煩胸膈痛。速胸欲死者。香薷搗汁一二升。服(肘後方)

④ 治鼻衄不止。香薷研末。水服一錢。(聖濟總錄方)

⑤ 治舌上出血。如銀孔者。香薷煎汁服一升。日三服(肘後方)

⑥ 治口中臭氣。香薷一把。煎汁含之。(千金方)

⑦ 治小兒髮遲。陳香薷二兩。水一盞。煎汁三分。入豬脂半兩。和勻。日日塗之。(永類鈴方)

九畫 香

⑧ 治白禿慘痛。即上方入胡粉和塗之。(子母祕錄方)

用量 八分至二錢。施用宜忌 凡無暑邪束表者禁用。忌火。

參攷資料 ① 霍亂者飲無不瘥者。作煎。除水腫尤良。(陶弘景)

② 霍亂轉筋者。單煮服之。若四肢煩冷。汗出而渴者。加薤子同煮服。

(蘇頌) ③ 世醫治暑病。以香薷飲為首藥。然暑有乘涼飲冷。致陽氣為陰邪所遏。遂病頭痛發熱惡寒。

煩燥口渴。或吐或瀉。或霍亂者。宜用此藥。以發越陽氣。散水和脾。若飲食不節。勞役作喪之人。傷暑大熱。大渴汗泄如雨。煩燥喘促。或瀉或吐者。乃勞倦內傷之證。必用東垣清暑益氣湯。人參白虎湯之類。

以瀉火益元可也。若用香薷之藥。是重虛其表。而又瀉之。以熱矣。蓋香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者尤不可多服。而今人不知。傷傷元氣。不均有病無病。概用代茶。謂能辟暑。真疑人說夢也。且其性溫。不可熱飲。反致吐逆。飲者惟宜冷服。則無拒格之患。其

治水之功。果有奇效。一人妻自腰以下附腫。面目亦腫。喘急欲死。不飽伏枕。大便瀉。小便短少。服藥罔效。時珍診其脈。沉而大。沉主水。大主虛。乃病後冒風所致。是名風水也。用千金神祕湯。加麻黃。一服喘定。十之五。再以胃苓湯吞深師齋丸。二日。小便長。腫消。十之七。調理數日全安。益見古人方皆有至理。但神而明之。存乎其人而已。(李時珍) ④ 所在皆種。但北土差少。似白蘇而葉更細。壽春及新安皆有之。彼間又有一種石香薷。生石上。莖葉更細。色黃而辛香。彌甚。用之尤佳。吳人以爲茵陳用之。(蘇頌) ⑤ 香薷有野生有家。蔕中州人三月種之。呼爲香菜。以充蔬品。丹溪朱氏。惟取大葉者爲良。而細葉者香烈更甚。今人多用之。方蕪尖葉有刻缺。頗似黃荊葉。而小九月開紫花。成穗有細子。細葉者僅高數寸。葉如落蒂葉。即石香薷也。(李時珍) ⑥ 幼科病暑熱。夾雜別病有諸。而時下不外發散消導。加入香薷一味。考本草香薷辛溫發散。能泄宿水。夏熱氣閉無汗。渴

飲停水。香薷必佐杏仁。以杏仁苦降泄氣。又曰。香薷辛溫氣升。熱服易吐。佐苦降如杏仁。黃連。黃芩。則不吐。(葉天士)

【香櫨】 原名 枸櫨。古籍別名 佛手柑。(綱目)

外國名詞 Citrus medica, L. (拉丁) マルブシユカン (日本)

基本 係橙櫨科柑屬。爲枸櫨之果實。其根葉實露詳各條。

產地 生於溫暖諸地。

形態 香櫨爲果類之常綠亞喬木。枝間有長刺。葉似橘。作倒卵形。葉柄無翼。葉邊微有鋸齒。精實橢圓形。兩端稍尖。長約四五寸。果皮似橙。而厚皺而光澤。色如瓜。生青熟黃。味不佳。而氣清香。其實可供藥用。

性質 辛。酸。無毒。

主治 下氣。除心頭痰水。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論香櫨曰。煮酒飲。治痰氣咳嗽。煎湯。治心氣下痛。

【香櫨根葉】 主治 功用同皮。

九靈 香

【香橡露】 性質 氣香味淡。用香橡蒸取。

主治 消痰逐滯。

【香蘇】 ①即爵牀之古籍別名。與見別錄。詳『爵牀』條。②即紫蘇之古籍別名。與見千金食治。詳『紫蘇』條。③即雞蘇之古籍別名。與見肘後方。詳『雞蘇』條。

【香壁香】 即麝香之古籍別名。與見綱目。詳『麝香』條。

【香欒】 即柚之古籍別名。與見綱目。詳『柚』條。

【香欒】 即柚之古籍別名。與見綱目。詳『柚』條。



R
414.504
377

十畫

【修胞】即山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【修胞】即薯蕷之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【俳蒲木】 陸地 生陵谷間。木類之一種。葉如柰。其實赤有三稜可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 療少氣止煩。

【俱兔骨】即虎骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎骨』條。

【倉庚】即爲之古籍別名。典見月令。詳『爲』條。

【個人菜】即韭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『韭』條。

【倍子】即五倍子之簡稱。詳『五倍子』條。

【倒甲果】即吊搭果之原名。詳『吊搭果』條。

【倒生樹】即榕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『榕』條。

【倒行狗子】即砂揆子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『砂揆子』條。

十畫 修 俳 偃 倉 個 倍 倒 倚 倭 保 兼 凌

【倒金鈞】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【倒流水】即澆水之古籍別名。典見本草衍義。詳『流水』條。

【倒捻子】 命名 本品食之必捻子。訛爲都念子也。蘇子瞻名爲海漆。非漆而曰漆。以其得一木之液凝而爲血。可補人之血。與漆同功。功逾青黏。故名。

古野別名 都念子。綱目海漆。蘇子瞻文。黏子。倒黏子。綱目拾遺。

陸地 所在多有。產羅浮者高丈許。

形態 檳榔叢生。開於暮春。似芍藥而小。有紅白二種。子如軟柿。外紫內赤。亦有四葉承之。汁可染若胭脂。

性質 甘美。

主治 痰嗽喉氣。暖腹。益肌肉。

參攷資料 東坡雜記。吾謫居南海。以五月出陸。至藤州。自藤至儋。野花夾道。如芍藥而小。紅鮮可愛。檳榔叢生。土人云。倒黏子花也。

至儋則巴結子。爛紫可食。味甘美。中有細核。嚼之瑟瑟有聲。亦頗香。兒童食之。使大便難。野人夏秋下劑。食葉。已子活。活血補血。研瀝爲膏。何之。又止腸滑。

【倒掛紫金鈞】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【倒掛塵】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳『梁上塵』條。

【倒掛藤】 陸地 生深山中。草類之一種。莖有逆刺。如懸鉤。倒掛於樹間。葉尖而長。可供藥用。

性質 苦無毒。

主治 一切老血。及產後諸疾。精痛。血上欲死。煮汁服。

【倒插刺】即黃察耶之古籍別名。典見綱目。詳『黃察耶』條。

【倒黏子】即倒捻子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『倒捻子』條。

【倚待草】 命名 本品逐病極速。故名。

陸地 生山谷中。

形態 倚待草爲雜草類之一種。高二三尺。葉圓形。可供藥用。

採取 八月採之。

性質 甘溫無毒。

主治 血氣虛勞。腰痠。麻痺。顏色枯槁。絕腸老血。浸酒服。

【倚商】即通草之古籍別名。典見山海經。詳『通草』條。即木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【倭木】即杉材之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杉材』條。

【倭硫】即石硫黃之產於日本琉球。呂宋等處者。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。



34095

九四五

【凌泉】即黃環之古籍別名。與見本經。詳【黃環】條。

【凌香】即凌香花之簡稱。詳【凌香花】條。

【凌香花】原名 紫葳花。命名 本品附木而蔓生。延上。高達數丈。故名。其花色赤紫。又有紫葳之稱。

古語別名 陵君。愛華（本經）陵時花（郭璞）女葳花（甄權）武威花。覆陵花。鬼目花（吳普）

基本 屬紫葳科紫葳之花。產地 陳仁山藥物生產辨云。凌香花各省均有產。但以江蘇鎮江為多出。



凌香花

形態 凌香花為自生山中或栽植庭園之蔓生木本。莖生氣根。植物根由莖之上部發生。不入於地內。而生於空中。取空氣中之水分以爲生活者。曰氣根。攀登他樹。其葉對生。爲羽狀複葉。小葉

作尖卵圓形。邊緣有粗鋸齒。七八月間。開黃赤色不整齊之大花。有五瓣花冠。花後結長三寸許之蒴果。

採取 六七月採之。

製法 採得陰乾入藥。

性質 酸。微寒。無毒。

效能 瀉血熱。破血瘀。專作通經藥。

主治 婦人產乳餘疾。崩中。癥瘕。血閉。寒熱。羸瘦。養胎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論凌香花曰。產後奔血不定。淋瀝。主熱風。風癩。大小便不利。腸中結實。【宋】大明諸家本草論凌香花曰。酒釀熱毒風。刺風。婦人血膈。遊風。崩中帶下。【明】經希雍本草經疏論凌香花曰。紫葳。即凌香花也。其味酸。氣微寒。無毒。花開於夏而色赤。味應帶苦。入肝行血之峻藥。故主婦人產乳餘疾。及崩中癥瘕。血閉寒熱。羸瘦諸證。至於養胎。決非其性之所宜。用者慎之。

【清】黃宮繡本草求真論凌香花曰。肝經血分藥也。味甘而酸。氣寒無毒。凡人火伏血中。而見腸結血閉。風癩崩帶。癥瘕。一切由於血瘀血熱而成者。所常用此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥。多有此爲君。姪娘用此克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎即安之意也。所云孕婦忌服者。恐其瘀血既無。妄用恐生他故也。此爲女科必用之藥。但當相症施治耳。藤生。花開五瓣。黃赤有。不可近鼻。聞傷腦。【清】張隱菴本草崇原論凌香花曰。紫葳。延引藤。蔓。主通經脈。氣味酸微寒。主清血熱。故本經主治如此。近時用此爲通經下胎之藥。仲景葶甲煎丸。亦用紫葳以消痰癥。必非安胎之品明矣。本經養胎二字。當是墮胎之譌耳。【清】楊時泰本草述鈞元論凌香花曰。氣寒。其味酸。先而勝。苦後而殺。知其入血而散熱。結無疑。第丹溪云。補陰甚捷。瀕湖又言。能去血中伏火。似其性不專於通行。且此味畏鹵鹹。以鹹多傷血之理推之。則知畏傷血者。必非峻於行血者也。又即其治熱毒風言之。夫血中所壅之熱化而爲毒風。治非行血而兼補陰不能取效。用此物治

之。是其即行爲補可知矣。丹溪言其有守而能獨行。所以爲崩漏要藥歟。

近人學說 張山雷曰。凌香之花。色黃而赤。正入血分。味微酸而氣微寒。吳普謂神農謂公岐伯皆作辛。扁鵲苦鹹。能消清血分之熱。故可以活血行滯。而亦可治帶下崩中。本經專主婦人產乳餘疾。正以初產乳子之時。陰血已虛。孤陽偏旺。最宜此酸鹹微寒。直入血分。藉以固護。既耗之元陰。而收攝浮游之陽。可見古人之治產後。皆以助陰抑陽爲主。正與晚近庸俗之見。產後妄用溫補。耗燥陰液者。兩得其反。又治崩中。則專以元陽妄行。不能自攝之崩中而言。非謂可以統治血虛不守之崩漏。癥瘕血閉。蓋亦爲血熱太甚。灼燥成癥者言之。亦非陰寒凝結之穢厥閉塞可知。又曰寒熱羸瘦。則又血虛內熱。形消體瘠者耳。其又能養胎者。以胎元既結之時。元陰凝聚於下。往往虛陽升浮於上。而此能養之。亦助陰補陽之要旨也。

配合應用 治壯實婦人經

閉用沒骨花、當歸、紅花、川芎、牛膝、地黃、延胡索、桃仁、蘇枋木、五靈脂。

①治婦人血崩。沒骨花爲末。每酒服二錢。後服四物湯。(丹溪方)

②治葉後下血。沒骨花浸酒。類飲之。(普濟方)

③治消渴飲水。沒骨花一兩。搗碎。水一盞。煎一盞。分二服。(聖濟方)

④治嬰兒不乳。百日內小兒無故口青。不飲乳。用沒骨花、大蘆葉、芒硝、大黃等分爲末。以羊脂和丸。梧子大。每服一丸。以乳送下。便可喫乳。熱者可服。寒者勿服。昔有人休官後。雲遊湖湘。修合此方。救危甚多。(普濟方)

⑤治久近風癩。沒骨花或根葉爲末。每服三錢。溫酒下。服畢。解髮。不住手梳。口噙冷水。溫則吐去。再噙再梳。至二十口乃止。如此四十九日。絕根。百無所忌。(方賢奇效方)

⑥治通身風痒。沒骨花爲末。酒服一錢。(醫學正傳方)

⑦治大風癩疾。沒骨花五錢。地龍焙。研爛炒。全蠍炒。各七箇爲末。

每服二錢。溫酒下。先以藥湯浴過。服此出臭汗爲效。儒門事親。加蟬蛻。五品各九箇。作一服。(潔古家藏方)

⑧治鼻上酒齋。用沒骨花、山梔子等分爲末。每茶服二錢。日二服。數日除根。臨川曾子仁用之有效。(百一選方) 又用沒骨花半兩。硫黃一兩。胡桃四箇。膩粉一錢。研膏生絹包掛。(楊氏家藏方)

⑨治走皮趨瘡。滿頰滿頂。浸淫溼爛。延及兩耳。痒而出水。發歇不定。用沒骨花并葉煎湯。日日洗之。(直指方)

⑩治婦人陰瘡。紫葳爲末。用鯉魚腦或膽調搽。(摘玄方)

⑪治耳卒聾閉。沒骨葉杵取自然汁滴之。(斗門方)

⑫治女經不行。沒骨花爲末。每服二錢。食前溫酒下。(徐氏胎產方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡血虛陰虧。又無瘀滯者禁用。畏鹵鹹。

參攷資料 ①花不可近鼻。開傷腦。花上露入目。令人昏瞭。(李時珍)

時珍) ①沒骨花連莖葉用。詩云。苕之華。云其黃矣。爾雅云。陵苕黃華。真白華菱。山中亦有白花者。(蘇頌) ②今處處皆有。多生山中。人家園圃亦或栽之。初作莖生。依大木久延至巔。其花黃赤。夏中乃盛。今醫家多採花乾之。入女科藥用。(蘇頌) ③沒骨野生。蔓纒數尺。得木而上。卽高數丈。年久者藤大如杯。春初生枝。一枝數葉。尖長有齒。深青色。自夏至秋開花。一枝十餘朵。大如牽牛花。而頭開五瓣。結黃色。有細點。秋深更赤。八月結莢。如豆莢。長三寸許。其子輕薄如榆仁。馬兜鈴仁。其根長亦如兜鈴根狀。秋後採之。陰乾。(李時珍)

性實 苦平。無毒。

【沒骨花莖葉】 性實 苦平。無毒。

主治 痿躄。益氣。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論沒骨花莖葉曰。熱風身痒。遊風風癩。瘀血帶下。花如根功同。【明】李時珍本草綱目論沒骨花莖葉曰。治喉痺熱痛。涼血生肌。【沒骨草】卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【凍青】卽冬青之古籍別名。典見綱目。詳『冬青』條。

【凍瓊脂】卽石花菜膠之古籍別名。詳『石花菜』條。

【剛子】卽巴豆之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『巴豆』條。

【剛前】卽淫羊藿之古籍別名。典見本草經。詳『淫羊藿』條。

【剛堅肉】卽豬肉之古籍別名。典見禮記。詳『豬肉』條。

【原寸香】卽麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【原生地】卽大生地之處方用名。詳『大生地』條。

【原油香】卽大茴香之處方用名。詳『大茴香』條。

【原金銀】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【原扁斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【原紅花】卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【原滑石】卽滑石之處方用名。詳『滑石』條。

【原麝香】卽麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【原蠶沙】 命名 本品一名晚蠶沙。蓋原也。晚也。再

養之義也。即藥用須以夏蠶之糞沙故名。

處方用名 二蠶沙。

古籍別名 晚蠶沙。晚蠶矢。(方書)蠶屎。(俗名)原蠶糞。別名

基本 屬昆蟲類中鱗翅族。為夏蠶排泄之糞。

產地 凡養蠶區域多有。

形態 蠶沙為鐵黑色之橢圓顆粒。入藥須用夏蠶之糞。

製法 蘇頌曰。凡使蠶沙蠶蛾皆用晚出者佳。李時珍曰。蠶沙須晒乾淘淨再晒。可久收不壞。

性質 甘辛。溫。無毒。

效驗 祛風溼。治目疾。化血瘕。療頑痺。用治眼眩糜爛藥。又或以治淋疾及為風痺藥。

主治 腸鳴熱中消渴。風痺癢癢。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論蠶沙曰。炒黃袋盛。浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹

內宿冷。冷血瘀血。腰脚冷疼。炒熱袋盛。熨偏風筋骨。癱緩。手足不遂。

腰脚軟。皮膚頑痺。【明】李時珍本

草綱目論蠶沙曰。治消渴癢結。及婦人血崩頭風。風赤眼。去風除溼。

【明】繆希雍本草經疏論蠶沙曰。原蠶沙即晚蠶所出屎也。其味辛

甘。氣溫無毒。腸鳴者。水火相觸也。辛甘以和之。消渴者。中氣燥熱也。辛

以潤之。蠶屬火。其性燥。燥能勝溼。去風。故其沙主療風溼之病。如陳

藏器以之炒黃袋盛。浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹內宿冷。瘀血。腰脚冷疼。炒熱熨偏風筋骨。癱緩。手足不遂等證。【清】黃宮繡本

草求真論蠶沙曰。蠶砂即晚蠶所出之屎也。玩書所著治功。多有祛風除溼之能。所述治症。多是肢節

不遂。皮膚頑痺。腰膝冷痛。冷血瘀血。腸鳴消渴。爛弦風眼。終蠶食而不飲。其食出則氣燥。燥則可以勝

溼去風。凡一切皮膚等症。因於風溼而至者。無不得此以為調治。且

味辛而兼甘。故凡水火相激。而見腸鳴。得此甘以和之。燥熱而見消渴。不止。得此辛以潤之。是以用此

炒黃袋盛。浸酒。以去風。緩不遂。皮膚頑痺。暨爛弦風眼。用此油浸塗

九四八

患即愈。昔史國公用此浸酒。以治風痺。義多根此。然惟晚者為良。早蠶者不堪入藥。以伺火烘。故有遲也。

配合應用 ①治半身不遂。蠶沙二頭。以二袋盛之。蒸熟。更互熨患處。仍以羊肚糗米煮粥。日食一枚。十日即止。

②治風瘙癢癩。作痒成疔。用蠶沙一升。水五斗。煮取一斗二升。去滓。洗浴避風。(聖惠方)

③治頭風白屑作癢。蠶沙燒灰。淋汁洗之。(聖惠方)

④治眼目不出。蠶沙揀淨。空心以新汲水香下十枚。勿嚼破。(聖惠方)

⑤治消渴飲水。用晚蠶沙焙乾為末。每用冷水下二錢。不過數服。(斗門方)

⑥治婦人血崩。蠶沙為末。酒服三五錢。(儒門事親方)

⑦治月經久閉。蠶沙四兩。砂礪炒。半黃色。入無灰酒一壺。煮沸。澄去沙。每溫服一盞。即通。

⑧治轉女為男。婦人始覺有孕。用原蠶屎一枚。井華水服之。日三

(千金方) ①治跌撲傷損。扭閃出骨。發等證。蠶沙四兩。炒黃。綠豆粉四兩。炒黃。枯礬二兩。四錢為末。醋調傅之。相包。移定。換三四次。即愈。忌產婦近之。(邵真人經驗方)

②治男婦心痛。不可忍者。晚蠶沙一兩。滾湯泡過。濾淨。取清水服。即止。(瑞竹堂方)

用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡無溼痺而有血燥者禁用。

參攷資料 ①蠶屎飼牛。可以代穀。用三升醇酒。拌蠶沙五斗。飯蒸於暖室中。鋪油單上。令患風冷氣痺。及近感癱風人。就以患處一邊臥沙上。厚蓋取汗。若虛人須防大熱昏悶。令露頭面。若未全愈。間日再作。(寇宗奭) ②陳氏經驗方

一抹膏。治爛弦風眼。以真麻油浸蠶沙二三宿。研細。以篦子塗患處。不問新舊。隔宿即愈。同桑柴灰淋汁。煮髓肉作丸。治腹中癢結。李九

華云。蠶沙煮酒。色味清美。又能療疾。(李時珍) ③蠶沙置酒罈上。泥好。色清味美。昔史國公用此浸酒。

以治風痺。相得益彰矣。(盧飛鵬)

【原蠶沙酒】

製法 用原蠶
糞炒黃。袋盛。浸
酒飲。

主治 風緩頑痺。諸節不遂。腹
內宿痛。

【原蠶蛾】

古籍別名 晚蠶蛾。
(日華)魏蠶蛾。(廣
志)熱蠶蛾。(綱目)

採取 以蠶者入煎。

製法 徐之才曰。凡使炒去翅
足用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 益精氣。強陰道。交接不
倦。亦止精。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論原蠶雄蛾曰。壯陽事。
止澀精。尿血。暖水臍。治暴風。金瘡。
凍瘡。湯火瘡。滅癩瘡。

參攷資料 ●蠶蛾用第二番。

取其敏於生育也。(寇宗奭) ●蠶
蛾性淫。出繭即媾。至於枯槁乃已。
故強陰益精用之。(李時珍)

【原蠶糞】即原蠶沙之別名。詳「
原蠶沙」條。

【員貨】即蠶寶之古籍別名。典見

別錄。詳「蠶寶」條。

【唐小豆】即相思子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「相思子」條。

【唐夷】

基本 唐夷為雜草類
之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 療瘰癧。

【唐青子】即萊菔子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「萊菔子」條。

【唐柿】即無花果之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「無花果」條。

【唐茶】即皋蘆之日本別名。詳「
皋蘆」條。

【唐婆鏡】即鬼臼之古籍別名。典
見綱目。詳「鬼臼」條。

【唐椽】即扶椽之古籍別名。典見
爾雅。詳「扶椽」條。

【唐梨】即檳榔之日本名。詳「檳
榔」條。

【唐菜】即白菜之日本名。詳「白
菜」條。

【唐楸子】即胡桃之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「胡桃」條。

【唐蒙】即菟絲子之古籍別名。典
見爾雅。詳「菟絲子」條。

【唐橋】即枸橋之古籍別名。詳「

枸橋」條。

【唐醬】即番醬之日本名。詳「番
醬」條。

【唐攝】即地膚子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【喇喇鳥】即鸚鵡之古籍別名。典
見廣雅。詳「鸚鵡」條。

【莖悉】即天名精之古籍別名。典
見別錄。詳「天名精」條。

【埋光烏藥】即高良薑之古籍別
名。典見和漢藥考。詳「高良薑」條。

【埋頭蛇】即蝮蛇之古籍別名。典
見綱目。詳「蝮蛇」條。

【城裏赤柱】即淮木之古籍別名。
典見綱目。詳「淮木」條。

【城頭菊】 產地 生浙江杭城
石牌間。

形態 城頭菊為菊類之一種。
枝葉極瘦。九月開花如豆。小於茶
菊。氣香而味甘。其花可供藥用。枝
葉詳見該條。

性質 甘寒。無毒。

主治 明目。祛頭風。喉痺。涼血
解毒。

【城頭菊枝葉】

主治 鮮者
生搗。瘡疔瘡。

井服其汁。兼治蛇咬。瘰癧。梅瘡。眼
瘡。煎洗。天泡瘡亦效。

【夏瓜】即西瓜。之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「西瓜」條。

【夏生】即萊菔之古籍別名。典見
王禎農書。詳「萊菔」條。

【夏石】即鐘乳石之古籍別名。典
見別錄。詳「鐘乳石」條。

【夏冰】 命名 本品為夏季所
製之冰。故名。但天然者
俱在邊荒之區。殊不易得耳。

古籍別名 凌。(綱目)

性質 甘冷。無毒。

主治 去煩熱。熨人乳石發熱
腫。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日

用本草論夏冰曰。解煩渴。消暑毒。
【明】李時珍本草綱目論夏冰曰。
傷寒陽毒。熱盛昏迷者。以冰一塊
置於臍中。良。亦解燒酒毒。

參攷資料 ●夏暑盛熱。食冰

應與氣候相反。便非宜人。誠恐入
腹。冷熱相激。卻致諸疾也。食譜云。
凡夏用冰。止可隱映飲食。令氣涼
爾。不可食之。豈當時暫快。久皆成
疾也。(陳穀器) ●宋徽宗食冰太

疾也。(陳穀器) ●宋徽宗食冰太

過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸。上曰。服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此可謂活機之士矣。(李時珍)

【夏芥】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【夏枯花】即夏枯草之處方用名。詳「夏枯草」條。

【夏枯草】 命名 本品夏至後即枯故名。

處方用名 夏枯花。

古籍別名 夕句。乃東。(本經)

燕面(別錄)鐵色草(綱目)血見愁。猪屎草。云鬻。鬻突。鬻筋骨草。四牛鬻草(和漢藥考)

外國名詞 Florba Brunell.

lae Herb. Brunell(拉丁)

基本 屬唇形科夏枯草之葉莖。

產地 凡山野原澤間。多有生焉。陳仁山藥物生產辨云。夏枯草產廣東北江。星子。樂昌。連州等。江浙各省均有出產。

形態 夏枯草為山野自生之宿根草。莖作方形。高五六寸。葉對

生。作長橢圓形。前端尖。邊緣有細鋸齒。葉腋多毛茸。於莖頂葉腋。發生淡紫色或白色唇形花。後結實。此草至夏枯死。故有夏枯草之名。尚有滁州夏枯草。為山野自生之唇形科植物。葉草 Brunellia Vulgaris, L. 莖方形。高一尺許。葉對生。類薄荷葉而稍尖。葉莖俱生毛茸。莖頂列生淡紫色或白色唇形花。作穗狀。如矢。故名。藥用混充夏枯草。



夏 枯 草

採取 四月間採之。

製法 採得陰乾。取葉莖用。亦有用其花者。

性質 苦。辛。寒。無毒。

效能 清肝火。散鬱結。消癰。明目。用治癰癤。凝滯。又為解除子宮及陰戶黏膜炎及眼病藥。

主治 寒熱瘧疾。且療頭痛。破癥散癥。結氣脚腫。溼痺。輕身。

歷代記述攷證 【明】經希雍

本草經疏論夏枯草曰。夏枯草味苦辛而性寒無毒。為治癰癤鼠瘻之要藥。入足厥陰少陽經。丹溪謂其補厥陰肝家之血。又辛能散結。苦寒能下泄除熱。故治一切寒熱及消癰癤鼠瘻破癥散結。氣頭瘡。皆由於熱。脚腫溼痺。無非溼熱所成。熱消結散。溼去。則三證自除。而身亦輕矣。【明】李士材本草圖解論夏枯草曰。夏枯草苦辛微寒。獨入厥陰。消癰癤。散結氣。止目珠痛。此草補養厥陰血脈。又能疎通結氣。目痛癰癤。皆係肝症。故建神功。然久用亦防傷胃。與參朮同用。方可久服無弊。【清】黃宮繡本草求真論夏枯草曰。夏枯草辛苦微寒。按書所論治功。多言散結解熱。能治一切癰癤溼痺。目珠夜痛等症。似得以寒清熱之義矣。若屬內火。治不宜用。又藥何以枯名。以其冬生而夏枯也。莖葉同用。

純陽之氣。得陰氣而即死。觀其主癰癤破癥散結。脚腫溼痺。皆以宜通泄化見長。必具有溫和之氣。方能消釋堅凝。疏通壅滯。不常有寒涼之作用。石頑遂原。改為苦辛溫。自有至理。苦能泄降。辛能疏化。溫能流通。善於宜泄肝木之火之體。而順利氣之血運行。凡凝痰結氣。風寒瘧者。皆其專職。丹溪謂治癰癤散結氣。大有補養厥陰血脈之功。樓全善謂治目珠痛夜甚。點以苦寒藥。尤甚。神效。蓋目珠係於厥陰。夜甚而遇寒藥反甚。是厥陰陰火。鬱窒不疏。自不宜直折以寒涼。反致遏抑愈劇。夏枯草能疏通肝胆之氣。木鬱達之。亦以稟純陽之氣。而散陰中結滯之熱耳。石頑謂本經言輕身者。能除脚腫溼痺。而無重着之患也。又能解內熱。緩肝火。治肝熱。目赤。皆疏通厥陰氣滯之功用。久服亦傷胃。以善於宜泄。反助厥陰肝木之氣也。

配合應用 ●明目補肝肝虛目睛痛。冷淚不止。血脈痛。羞明怕日。夏枯草半兩。香附子一兩。為末。每服一錢。煎茶湯調下。(簡要濟

衆方)

①治赤白帶下。夏枯草花開時採。陰乾爲末。每服二錢。米飲下。食前服。(徐氏家傳方)

②治血崩不止。夏枯草爲末。每服方寸匕。米飲調下。(聖惠方)

③治產後血暈。心氣欲絕者。夏枯草搗絞汁。服一盞。大妙。(徐氏家傳方)

④治撲傷金瘡。夏枯草口嚼爛。尋上即愈。(衛生易簡方)

⑤治汗斑白點。夏枯草煎濃汁。日日洗之。(乾坤生意方)

⑥治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。或日久成漏。用夏枯草六兩。水二

鍾。煎七分。食遠溫服。虛甚者則煎汁熬膏服。并塗患處。兼以十全大補湯。加香附。貝母。遠志。尤善。此物生血。乃治瘰癧之聖藥也。其草易得。其功甚多。(薛已外科經驗方)

用費 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛胃弱而無鬱結者。禁用。土瓜爲之使。

參攷資料 ①本草言夏枯草大治瘰癧。散結氣。有補發厥陰血脈之功。而不言及。觀其退寒熱。虛

者可使。若實者以行散之藥佐之。外以艾葉灸。亦漸取效。(朱震亨)

②黎居士易簡方。夏枯草治目疾。用沙糖水浸一夜。取其能解內熱。緩肝火。機全善云。夏枯草治目

珠疼。至夜甚者。神效。或用苦寒藥點之。反甚者。亦神效。蓋目珠連目本。屬厥陰之經。夜甚及點苦寒藥。反甚者。夜與寒亦陰故也。夏枯草純陽之氣。補厥陰血脈。故治此如神。以陽治陰也。(李時珍) ③生平

深。冬至後生葉。似旋覆。三月四月開花。作穗。紫白色。似丹參花。結子亦作穗。五月便枯。四月採之。(蘇恭) ④原野間甚多。苗高一二尺許。其莖微方。葉對節生。似旋覆葉而長大。有細齒。背白多。故莖端作穗。長一二寸。穗中開淡紫小花。一穗有細子四粒。丹溪云。無子亦失察矣。嫩苗淪過。浸去苦味。油鹽拌之可食。(李時珍) ⑤本經專治寒熱瘰癧。以辛能散結。苦能除熱。而凝結瘰癧氣散矣。曹輕身者。脚腫漣

痺愈。而無重著之患也。(張石頑)

⑥夏枯草本經以爲苦寒。而機全善。謂目珠夜痛。及點苦寒藥。更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

十靈 夏 奚 娑 宮 害 宵 家

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

者。夜與寒皆陰也。此物冬至至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附。甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛。溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱壅肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(盧鵬飛)

學大辭典) ①艾名。冰臺。此名夏臺。灸治百病。能回絕氣。治百病。濟絕氣。恐是一物重出也。(李時珍)

②夏橘。即金橘之古籍別名。典見廣州志。詳「金橘」條。

③夏薑。即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

④奚毒。即草烏頭之古籍別名。典見本經。詳「草烏頭」條。

⑤娑羅子。即天師栗之古籍別名。典見綱目。詳「天師栗」條。

⑥宮粉。即白粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。⑦即白粉之處方用名。詳「白粉」條。

⑧宮粉茶。即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

⑨害母草。即鬼臼之古籍別名。典見圖經本草。詳「鬼臼」條。

⑩宵燭。即益火之古籍別名。典見古今注。詳「益火」條。

⑪家母藤。即葛公藤之古籍別名。典見葛祖方。詳「葛公藤」條。

⑫家芥子。即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

⑬家芋。即芋麻之古籍別名。典見綱目。詳「芋麻」條。

【家茵陳】即茵陳蒿之古籍別名。與見和漢藥考。詳「茵陳蒿」條。

【家菊】即茶菊之古籍別名。與見葦芳譜。詳「茶菊」條。

【家雁】即鵝之古籍別名。與見綱目。詳「鵝」條。

【家鄉肉】即嘉香肉之別名。與見綱目拾遺。詳「嘉香肉」條。

【家兔】即兔之古籍別名。與見綱目。詳「兔」條。

【家瘦】即菱之古籍別名。與見綱目。詳「菱」條。

【家豬脂】即豬脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「豬脂」條。

【家豬】即豬之古籍別名。與見綱目。詳「豬」條。

【家孽】即草豆蔻之古籍別名。與見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【家蘇子】即紫蘇子之處方用名。詳「紫蘇子」條。

【射工】即溪鬼蟲之古籍別名。與見本草拾遺。詳「溪鬼蟲」條。

【射干】 命名 本品莖極疎長。正如射之長竿之形狀。故名。

古語別名 烏扇。烏蒲。(本經)

烏髮。烏吹。紫蝴蝶。(俗名)草豆。(別錄)鳳翼(拾遺)鬼扇。仙人掌。紫金牛(土宿)野萱花。扁竹。(綱目)黃蓮。(吳普)玉燕。夜干。野干。野乾。地扁竹。秋蝴蝶。扁筑。鬼前(和漢藥考)白花射干。(本草集註)

外國名詞 Pardenthus sin. Onis(拉丁)

基本 屬鳶尾科。為射干之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。射干原產浙江。



射干

形態 射干為多年自生之草。本其花堪供賞玩。然實係毒草。莖高約二三尺。葉似菖蒲。宛如廣闊之劍。而葉端極尖銳。葉脈平行。各藥兩行密排。狀若展大之葵扇。夏月葉間忽抽一莖。更分數枝。頂端開六瓣大片之花。色帶黃紅。被有深紫色之斑點。實為橢圓形之蒴果。後乃腹裂而散出黑色之種子。

根似良薑而瘠。其內色白。外則黃白。叢生聚根。味辛。

種類 莖極疎長。狀如射之長者。射干也。莖短葉側相比而如扇者。烏扇也。

採取 二三月或八九月間採根。去皮。日乾。

製法 雷斅曰。凡使射干。採根。先以米泔水浸一宿。漉出。然後以筴竹葉煮之。從午至亥。日乾用。

性質 苦。平。有毒。

效能 瀉火。解毒。散血。消痰。用治咽喉腫痛。及水腫吐酸。藥。

主治 欬逆上氣。喉痺。咽痛。不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。(本經)療老血在心脾間。欬唾。言語氣臭。散胸中熱氣。(別錄)

歷代紀述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論射干曰。苦酒摩塗毒腫。唐甄權藥性本草論射干曰。治疰氣。消瘀血。通女人月閉。

【宋】大明日華諸家本草論射干曰。消痰破癥結。胸膈滿腹。脹氣喘。痰癖。開胃下食。鎮肝明目。【宋】寇宗奭本草衍義論射干曰。治肺氣喉痺。為佳。【金】張元素珍珠囊論

射干曰。去胃中癰瘡。【元】朱震亨本草衍義補遺論射干曰。利積痰。消結核。【明】李時珍本草綱目論射干曰。降實火。利大腸。治癰母。【明】經希雍本草經疏論射干曰。射干辛而有毒。故本經謂其味苦。平。有毒。平。亦辛也。別錄微溫。保昇微寒。二說一義。並無異云。潔古云。味苦。入手少陽少陰厥陰經。若能下瀉。故善降。兼辛。故善散。故主欬逆上氣。喉痺。咽痛。不得消息。散結氣。胸中邪逆。既降且散。益以微寒。故主食飲大熱。別錄又主老血在心脾間。欬唾。言語氣臭。散胸中熱氣。甄權主疰氣。消瘀血。主女人月閉。日華主消痰。破癥結。胸膈滿腹。脹氣喘。痰癖。寇宗奭主肺氣喉痺。為佳。潔古主胃中癰瘡。皆此意也。丹溪主行太陰厥陰之積痰。使結核自消。甚捷。又治足厥陰濕氣下流。因疲勞而發。為便溺。悉取其洩熱散結之力耳。故古方治喉痺。咽痛。為要藥。【清】黃宮繡本草求真論射干曰。射干形如烏羽扇。又以烏羽扇為名。辛。苦。微寒。苦。散。瀉火。解毒。散血。消痰。然究毒

之所胎。血之所聚。痰之所積。又皆因火結聚而成。射干苦能降火。寒能勝熱。兼因味辛上散。俾火降熱除。而血與痰與毒無不因之而不平矣。是以喉痺咽痛結核。疝瘕便毒。瘰癧等症。因於老血結於心脾。痰涎積於太陰厥陰者。無不可以調治。如金匱之治欬氣之用射干。麻黃治瘰癧母繁甲煎丸。用烏扇燒過千金之治喉痺用烏骨膏。治便毒之用射干。同生煎煎服。皆取性善主降。功多於上服則必瀉之意。若脾胃虛寒切忌。泔浸煮熟炒用。

近人學說 張山雷曰。本經謂不得消息。當作不得息。言其喘逆氣急。不得呼吸之常度也。古醫書言喘逆不得息甚多。本草經此條。作不得消息。義不可解。恐係衍文。雖舊本皆有消字。甚覺無謂。又曰射干苦降。而能開泄頑痰瘀血。散結定逆。其功頗多。故別錄謂為微溫。石頭加以辛字。然熱痰寒飲喘逆上氣。皆能治之。則皆以苦降為主。固不必待其為溫。且射干之主治。雖似不一。實則降逆開痰。破結泄熱二語。足以概之。所以韓保昇

十靈射

謂之微寒。而瀨湖。岳岳又徑以為寒。究之下氣通滯。亦不係乎寒涼。本經善平。最是至當不易。其所列之主治。則開泄定逆而已。至名醫別錄。則增益破瘀一層。其主咳唾。言語氣臭。亦肺胃蘊熱之病也。甄權稱其消瘀血。通婦女月閉。日華謂其消痰。破癥結疝癰。胸膈滿腹。脹。張潔古謂其去胃中癰痞。丹溪謂其利積痰。疝毒。消結核。瀨湖稱其降實火。利大腸。治瘰癧。陶弘景謂苦酒醱塗。可消腫毒。石頭謂散結降氣。為咽喉腫痛要藥。能降相火。火息則血散。腫消。而痰結自解。實而言之。開通泄降四字盡之矣。

配合應用 ①入龍甲煎丸。治瘰癧。

②治咽喉腫痛。用生射干。豬脂各四兩。合煎令焦。去滓。每嚙棗許。即瘥。(袖珍方)

③治喉痺不通。用扁竹新根。搗汁。嗽之。大腸動即解。或醋研汁。噴引涎出亦妙。(醫方大成方)

④治喉痺不通。用紫蝴蝶根一錢。黃芩。生甘草。桔梗各五分。為末。水調頓服立愈。名奪命散。(便民

方)

⑤治乳癰初腫。用扁竹根如僵蠶者。同葶草根為末。蜜調敷之神效。(永類鈴方)

⑥治喉痺有烏髮膏。(孫真人千金方)

⑦治咽喉腫痛。射干花根。山豆根。陰乾為末。吹之如神。(袖珍方)

⑧治傷寒咽閉腫痛。用生射干。豬脂各四兩。合煎令膏。去滓。每嚙棗許。即瘥。(扁安常傷寒論方)

⑨治二便不通。諸藥不效。紫花扁竹根。生水邊者。佳。研汁一盞。服即通。(普濟方)

⑩治水蠱腹大。動搖水聲。皮膚黑。用鬼扇根。搗汁。服一盞。水即下。(肘後方)

⑪治陰疝腫刺。發時腫痛如刺。用生射干。搗汁。與服。取利亦可。丸服。(肘後方)

⑫治中射工毒生瘡者。烏髮。升麻各二兩。水三升。煎二升。溫服。以滓傅瘡上。(姚僧坦集驗方)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡虛而無實火者禁用。

著名方劑 射干麻黃湯。治欬而上氣。喉中作水雞聲。此湯主之。(金匱方)射干十三枚。一法三兩。麻黃。生薑各四兩。紫菀。款冬花各三兩。五味子半升。細辛三兩。半夏八枚。一法半升。大棗七枚。上九味。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

參攷資料 ①治便毒。此足厥陰溼氣。因疲勞而發。取射干三寸。與生薑同煎。食前服。利三兩行。甚效。(采實堂) ②射干能降火。故古方治喉痺咽痛為要藥。孫真人千金方。治喉痺有烏髮膏。張仲景金匱玉函方。治欬而上氣。喉中作水雞聲。有射干麻黃湯。又治瘰癧母繁甲煎丸。亦用烏扇燒過。皆取其降厥陰相火也。火降則血散腫消。而痰結自解。癥瘕自除矣。(李時珍) ③其葉叢生。橫鋪一面。如鳥翅及扇之狀。故有烏扇。鳥髮。鳳翼。鬼扇。仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而根如竹也。根葉又如鱗。故曰草鱗。(李時珍) ④射干。虎尾。二物相似。人多不分。射干即人間所種為花草名。鳳翼者。葉如鳥翅。秋

生紅花赤點。莖尾亦人間所種。苗低下於射干。狀如鳶尾。夏生紫碧花者是也。〔陳藏器〕射干根潤形似高良薑。大小赤黃色。淡硬。五六七八月採。〔大明〕今在處有之。人家種之。春生苗。高一二尺。葉大類燈籠。而狹長橫張。疎如翅羽狀。故名烏翼。葉中抽莖似葶草莖而強硬。六月開花。黃紅色。瓣上有細文。秋結實作房。中子黑色。一說射干多生山崖之間。其莖雖細小亦類木。故荀子云。西方有木。名曰射干。莖長四寸。生於高山之上。是也。〔蘇頌〕射干。即今扁竹也。今人所種。多是紫花者。呼為紫蜀蝶。其花三四月開。六出。大如荳花。結房。大如拇指。頗似泡桐子。一房四隔。一隔十餘子。子大如胡椒。而色紫極硬。咬之不破。七月始枯。陶弘景謂射干莖尾是一種。蘇恭、陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是射干。韓保昇謂黃花者是射干。蘇頌謂花紅黃者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者非。各執一說。何以憑依。謹按張揖廣雅云。鳶尾。射干也。易通卦

驗云。冬至射干生。土宿真君本草云。射干即扁竹。葉扁生如側手掌形。莖亦如之。青綠色。一種紫花。一種黃花。一種碧花。多生江南湖廣川。漸平陸間。八月取汁。煮雄黃。伏雌黃。制丹砂。能拒火。據此則鳶尾射干本是一類。但花色不同。正如牡丹芍藥與菊花之類。其色各異。皆是同屬也。大抵入藥。功不相遠。〔李時珍〕射干之名有三。佛經射干。紹嶽。此是惡獸。似青黃狗。食人能綠木。阮公云。射干。臨層城者。是樹。殊有高大者。本草射干。是草。即今人所種者也。〔陳藏器〕

【射父香】即麝香之古籍別名。典見爾雅。詳「麝香」條。

【射罔】 性質 苦。有大毒。主治 尸疰瘰癧。及頭中風痺。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論射罔曰。瘰癧瘡根結核。瘰癧瘰癧。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘰癧。習習逐病。至骨瘡有熱膿。及黃水塗之。若無膿。水有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。

參攷資料 ●人中射罔毒。以

甘草、藍汁、小豆葉、淨萍、冷水、薤苳皆可。一味製之。〔大明〕草烏頭射罔。乃至毒之藥。非若川烏頭。附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風頑急疾。不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭。附子補右腎命門之功哉。吾輩却知府。自負知醫。因病風癱。服草烏頭。木鱉子藥過多。甫入腹。而麻痺。送至不救。可不慎乎。權曰。烏喙形如鳥喙。其氣鋒銳。宜其通經絡。利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎為射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳。捷利。能如是乎。楊清叟曰。凡風寒溼痺。骨內冷痛。及損傷入骨。年久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭。南星等分。少加肉桂。為末。薑汁熱酒調塗。未破者。能內消。久潰者。能去黑爛。二藥性味辛烈。能破惡塊。逐寒熱。遇冷即消。遇熱即潰。〔李時珍〕

【射罔】即草烏頭煎汁之別名。典見本草拾遺。詳「草烏頭」條。

【射香】即麝香。詳「麝香」條。

【射香茶】即前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「前胡」條。

【射影】即溪兔龜之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「溪兔龜」條。

【峭粉】即輕粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「輕粉」條。

【峯子油】即駱駝脂之古籍別名。典見綱目。詳「駱駝脂」條。

【峯寶玉】即白朮之處方用名。詳「白朮」條。

【師系】 古醫別名 臣免。巨骨。基本 師系為雜草類之一種。可供藥用。

產地 生平澤中。

採取 八月採。

性質 甘無毒。

主治 癰腫瘰癧。瘻瘡。瘻之。

【師姑草】即玉瓜之古籍別名。典見土宿本草。詳「玉瓜」條。

【席草】即燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「燈心草」條。

【徐李】 古醫別名 無核李。〔本草綱目〕

聖地 生山之陰。

形態 徐李為雜木類之一種。

樹如李而小。其實青色。無核。乃無核李也。其實可供藥用。

採取 實熟時採之。
主治 益氣。輕身延年。

【徐長卿】 命名 徐長卿者。人邪病。遂以名之。

古籍別名 鬼督郵。(本經)石下徐長卿。(別錄)別仙蹤。(綱經)鈴柴胡。(日本)

外國名詞 Pyenostelma chinensis, Dgeol (拉丁)ヌズサ

イニ(日本) 基本 係蘿藦科徐長卿屬之根。

產地 在山谷川澤溼地。

形態 徐長卿為山草類之自生林野草本。莖高二三尺。細而剛。葉對生。作線狀披針形。無鋸齒。夏

月自梢端及葉腋抽枝開花。花形甚小。淡黃綠色。副冠為五鱗片所成。著於雄蕊之上。葯之各室有一花粉塊下垂。花後結子。其根橫生

如細辛。微粗。長色黃而有腥氣。可供藥用。

採取 三四月間採之。

製法 雷斅曰。凡採得粗杵。并少蜜令過。以磁器盛蒸三伏時日乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 鬼物百精。瘴毒。疫疾。邪惡氣。溫瘧。久服強悍。輕身。(本經)益氣延年。又曰。石下長卿。主鬼注

精物邪惡氣。殺百精。蠱毒。老魅。注易亡。走啼哭。悲傷恍惚。(別錄)

參攷資料 抱朴子。言上古辟瘟疫。有徐長卿散良效。今人不知用此。(李時珍) 鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁。爾氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者。取其強悍宜腰

脚。故知是徐長卿。而非鬼督郵也。(陶弘景) 徐長卿生泰山山谷及隴西。三月採。又曰。石下長卿

生隴西山谷池澤。亦三月採。(別錄) 所在川澤多有之。葉似柳。兩葉相當。有光澤。根如細辛。微粗

長。黃色。而有腥氣。今俗以代鬼督郵非也。(蘇恭) 生下溼川澤之間。苗似小桑。兩葉相對。三月苗青

七八月着子。似羅摩子而小。九月苗黃。十月凋。八月採根日乾。(韓

保昇) 鬼督郵及己之亂杜衡。其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵。其苗不同。其功同也。杜

衡之亂細辛。則根苗功用皆彷彿。乃彌近而大亂也。不可不審。(李時珍)

【徐黃】 產地 生水澤中。

形態 徐黃為芳草類之一種。莖大葉細。香如薔本。其莖可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 心腹積疴。治惡瘡。

【徑松】 即羅漢松之古籍別名。與見綱目拾遺。詳羅漢松條。

【息王藤】 產地 生山谷間。

形態 息王藤為蔓草類之一種。四時常青。凌冬不凋。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 產後腹痛。惡露不盡。濃

【拳參】 外國名詞 Rhizoma Biflori (拉丁)

基本 屬蓼科。為金線重樓之地下莖。

產地 凡山野陰溼之地恒多

生焉。

形態 拳參為多年生草本。莖高二尺。葉作廣披針形。下部之葉。極有長柄。夏月梢上開小花。六瓣

色淡紅或白。簇生為穗狀花序。葉與莖之嫩者。堪作食品。其地下莖。即謂之拳參。色黑褐。長七分至二

寸。肥大而扁平。粗如小指。下面稍凸隆。副根如鬚。或留殘痕。上面凹陷。有溝一條。隨葉痕而生橫

溝。一端彎曲。狀如海蝦。味有收斂性。

採取 五月採之。

成分 含有一種鞣酸。餘則澱粉等質也。

效能 專作收斂藥。

主治 為末。淋瀝。腫氣。

國外學說 日本學說謂拳參者。生於中國。日本之高山。為肥大之地下莖也。其形狀如海蝦。成分為單寧酸。澱粉等。有收斂之效。但



內服不可不注意。又為含漱藥。能固齒。於矢荷兒陪苦。口中諸病。用之有驗。於慢性痔疾。黏液瀉洩。及其他慢性咽喉炎及帶下等之局所用之。然現今能用者甚稀。又荷蘭藥鏡曰。拳參多採於山野間。藥肆呼為金線重樓。但陳久者不堪入藥。根之性質功效。與葛爾蘇室拉同。為最有效之收瀉藥。凡諸管

【拳黃雞子】 古籍別名 水 羅荀（綱目拾遺）

纖維因虛弱而弛緩之病。如久瀉。失血。稀液脫泄各症。俱治之。尿道滑液膜剝脫而小便淋痛及經久無毒之淋病。白帶下。亦治之。愚問

【扶劍豆】 卽刀豆之古籍別名。典見綱目。詳「刀豆」條。

致熱腐敗熱。以此藥加對症之劑。夙稱奇效。散劑用一錢至三錢。或加煎劑。或加苦味之越幾斯劑。製為丸藥。或徑用越幾斯劑。均各從其便。煎劑取根一兩。水煎。取用以

【扶火】 卽益火之古籍別名。典見吳普本草。詳「益火」條。

此根外敷。善治咽喉潰瘍。作含漱藥。功效卓著。

【致神】 卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳「桑螵蛸」條。

用量 七分至二錢。

【旁巨芋】 卽芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

參攷資料 生淄州田野。葉如羊蹄。根似海蝦。黑色。土人五月採之（蘇頌）

【旁其】 卽烏藥之古籍別名。典見本草拾遺。詳「烏藥」條。

【參攷資料】 卽紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫參」條。

【勞通】 卽刺蒺藜之古籍別名。典見本草經。詳「刺蒺藜」條。

【旃那】 卽番瀉葉之原名。詳「番瀉葉」條。

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見綱目。詳「檀香」條。

【旃檀娜】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【旃檀】 卽檀香之古籍別名。典見

【晏青】 卽斑蝥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「斑蝥」條。

【香梁】 卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【枸核】 基本 枸為雜木類之一種。其核可供藥用。

【栗】 命名 栗字說文作棗。從肉省。象其花實下垂之狀。故名。

處方用名 栗實。栗子。

古籍別名 萬迎（梵書）板栗。錐栗。茅栗。山栗。華栗。桐栗。石栗。（綱目）芋栗（莊子）

外國名詞 Castanea vul-Garis, I am var. japonica, DC.

（拉丁）

基本 係殼斗科栗屬。為栗之果實。

產地 各省之山野間咸有出。

形態 栗為落葉喬木。高四五

丈。大者七八丈。葉作披針形。有鋸齒。互生。與櫟之葉相酷似。夏日開花。花小。單性。雌花與雄花同株。雄花作長穗狀。花序。雌花常三花集生。包以總苞。果實為堅果。有二三枚。在殼之殼斗內。其殼斗全而帶刺。成熟後。則殼裂散出果實。其狀大小因種類而不一。



栗

【栗】 栗之最大者為板栗。栗之中心扁子者為榿栗。栗之稍大者為山栗。山栗之圓而未尖者為錐栗。栗之圓小如榛子者為華栗。栗之小如指頂者為茅栗。即桐栗。栗之出於蕪州山中者。一年方熟。圓如彈而皮厚。味如胡桃。為石栗。

採取 八九月採之。風乾用。

用法 風乾者味甘。可生嚼。或煮熟供食。或生杵攪研和藥。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 補腎氣。厚腸胃。用作滋

養劑。

主治 益氣。厚腸胃。補胃氣。令人耐飢。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論栗子曰。生食治腰脚不遂。【唐】蘇恭新修本草論栗子曰。療筋骨斷碎。腫痛瘀血。生嚼塗之有效。【清】黃宮璣本草求真論栗子曰。栗。腎之菜也。味鹹性溫。體重而實。故能入腎補氣。凡人胃氣虧損。而見腰脚軟弱。並胃氣不充。而見腸鳴泄瀉。服此治無不效。然須風乾。遠液吞咽為佳。作粉為食。勝於羹。次若使栗不風乾。或生水氣未除。食則助溼發氣。生急。蒸煮炒熱。食則壅氣滯腸。而於風水之人尤忌。小兒多食。令齒不生。【清】王士雄隨息居飲食譜論栗子曰。栗甘平補腎。益氣厚腸。止瀉耐飢。最利腰脚。解羊肉毒。辟穀濟荒。生熟皆佳。點看竝壞。未時嚼之作桂花香。老者風乾則甜而饒。同橄欖食風味尤美。以錢塘產者良。凡食均須細嚼。連液吞嚥則有益。若頓食至飽。反壅氣傷脾。其外感未去。痞滿疴積。瘧痢瘵瘵。產後小兒病人。

十畫 栗

不飢便感者。宜忌之。以生極難化。熱最滯氣也。【清】黃元御玉楸藥

解論栗子曰。栗子鹹甘入脾。補中助氣。充虛益餒。培土實脾。諸物莫逮。但多食則氣滯難消。少則則氣達易尅耳。生食治腰腿不遂。生嚼塗筋骨碎斷。又消腫痛。行瘀血。破瘰癧。去惡刺。出箭頭。止鼻衄。斂瀉利。風乾者佳。

配合應用 ●治小兒疳積。用生嚼栗子傅之。亦治荊刺入肉。外塗秘要方) ●治馬汗入肉成瘡者。方同上。

(勝金方) ●治馬咬成瘡。獨顆栗子燒研傅之。亦治熊虎爪傷。【醫說方】 ●治小兒口瘡。大栗煮熟。日日與食之。甚效。【普濟方】 ●治衄血不止。宜州大栗七枚。刺破。連皮燒存性。出火毒。入麝香少許。研勻。每服二錢。溫水下。(聖濟總錄方)

●治金刃斧傷。用獨殼大栗研傅。或倉卒嚼傅亦可。(集簡方) 施用宜忌 凡脾虛消化不足。及溼熱困中者禁用。

參攷資料 ●相傳有人患腰

脚弱。往栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然應生嚼。若服煎則宜蒸曝之。(陶弘景) ●栗於五果屬水。水潦之年。則栗不熟。類相應也。有人內寒。暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰脚無力。以袋盛生栗。懸乾。每日喫十餘顆。次喫猪腎粥。助之久。必強健。蓋風乾之栗。勝於日曝。而火煨油炒。勝於煮蒸。仍須細嚼。連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰脚病。山翁服栗舊傳方。客來為說長興晚。三咽徐收白玉漿。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦飢。應侯請發五苑栗。則本草栗厚腸胃。補腎氣。令人耐飢之說。殆非虛語矣。(李時珍) ●吳栗雖大。味短。不如北栗。凡栗日中曝乾。食即下氣補益。不爾。猶有木氣。不補益也。火煨去汗。亦殺水氣。生食則發氣。煮蒸炒熱。食則壅氣。凡患風水人。不宜食。味鹹生水也。(孟詵) ●小兒不可多食。生則難化。熟則滯

氣。臨食生蟲。往往致病。(寇宗奭)

●今會稽諸暨栗。形大皮厚不美。刻及始豐。栗皮薄而甜乃佳。(陶弘景) ●栗處處有之。而兗州宣州者最勝。木高二三丈。葉極類櫟。四月開花。青黃色。長條似胡桃花。實有房。葉大者若拳。中子三四小者若桃李。中子惟一。將熟則罅拆子出。栗類亦多。按陸璣詩疏云。栗五方皆有之。周秦吳揚特饒。惟濃陽及范陽栗甜美味長。他方者不及也。倭韓國諸島上。栗大如雞子。味短不美。桂陽有莖栗。殼生實大如杏仁。皮子形色與栗無異。但較小耳。又有奧栗。皆與栗同。子圓而細。惟江湖有之。或云即華也。華音榛。詩云。樹之榛栗是矣。(蘇頌) ●板栗。錐栗。二樹皆大。茅栗似板栗。而細如棗子。其樹雖小。葉亦不殊。但春生夏花。秋實冬枯。為異耳。(蘇恭) ●湖北一種旋栗。頂圓末尖。即榛栗。其子形也。栗欲乾收。莫如曝之。欲生收。莫如瀟沙藏之。至夏初尚如新也。(寇宗奭) ●栗但可種成。不可移栽。按事類彙編云。栗木高二三丈。苞生多刺。如蠟

藥用。

主治 辟寒邪。止心痛。胃痛。研

細酒下。

【桂心】即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【桂耳】命名 本品係多年老樹上蒸出之質。色紅狀如木耳。故名。

主治 一切血症。

【桂府滑石】即滑石產於山東蓬萊縣境之桂府村者。與見綱目。詳『滑石』條。

【桂林滑石】即滑石產於廣西蒼梧府境者。與見綱目。詳『滑石』條。

【桂枝】處方用名 川桂枝。隨枝。蜜炙桂枝。

古醫別名 牡桂枝。(本經) 外國名詞 Cortex Cinnamomi(拉丁)

基本 桂枝屬於樟科之桂。其新幹及枝之外皮剝下陰乾。即桂枝也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桂枝產廣東肇慶。六屬。羅定等處。泗輸出者為最幼。世界產額。以我

十畫 桂

國之廣西西川。及東印度安南諸地為最夥。

形態 桂為常綠喬木。自生於中國之南部及交趾。其他熱帶地方。則栽植之。樹幹高大。作灰色。外皮多而易剝。所謂桂皮是也。其皮香味甚烈。嫩枝作受壓狀。具有四稜。其莖柄與花穗之分枝。色均灰白。或帶黃。覆以軟毛。葉如皮革。作長卵圓形。有尖端。多係互生。至枝端則對生。長八仙米至十至八仙米。廣二仙米至六仙米。葉皆有柄。長八密米。生有脈紋三條。面色綠。有光澤。其網絡俱凹陷。背帶褐綠色。有極短之軟毛。香氣亦甚。花穗直立如軸。其末端之華穗。約有花三朵。花苞頗小。僅四密米。色帶黃白。覆以細毛。其底部形如圓板。為卵圓形之片。雄蕊附著於花苞之喉口。其數不定。多作三四螺旋線。在內者為有生殖性之粉囊。粉囊分四房。疊積為兩層。其生殖性雄蕊具有柄。或坐立。雌蕊較細。柱頭亦如圓板。果瓣在截片底部之邊緣。有彎裂六條。實為漿果。被以薄皮。照最近考驗所得。謂桂枝外

面現紅褐色之薄皮。闊五分許。質堅。作螺旋形。或兩邊向內卷縮。甚至卷轉如管。表面稍粗。有白色。縱紋皆隱隱隆起。裏面現褐色。亦不平滑。破折之處。淺盡平坦。不作纖維狀。味芳香。異常辛辣。味較烈。桂皮乃剝取桂樹莖幹之皮。曬乾而成。厚自一密米至三密米。外面灰褐色。或褐色。以顯微鏡檢視。其橫斷面則見其柔軟組織多含澱粉粒。其內面之石核細胞環層。在在中斷。外伴纖維束。而石核細胞之膜壁。其厚薄又每個不同。大都在內者厚。在外者薄。再觀皮部則處處有厚膜纖維。此纖維長皆○·七密米。粗○·○一五·至○·○三密米。並見有油細胞及黏液細胞。髓線概為二細胞列。含有澱粉粒。及細微之葑酸鹽結晶。皆為細長菱形。

種植 此樹不種苗。乃植其小樹。移種山腹。先灌糞水。後再堆肥。約經五六年。發育最為旺盛。十年後始可採取其皮。

採取 每年於二月八月時間。握取其根。浸於水中。薰束洗淨其泥。檫木作槌。擊樹幹。令可剝取外皮。以鐮刀切尺許長。凡剝取桂皮一片。即以竹片張於內面。攤曬上。置日中晒二三日。俟乾。則成暗褐單卷之根皮。長廣不等。稍枝則先去葉。亦斷為尺許。剝取外皮。即桂枝也。

製法 或以蜜炙。或以清炙。及白芍拌用。

性質 甘。微溫。無毒。

成分 中含揮發桂油(桂皮油)一·○至一·五%。餘則為樹脂。澱粉。黏液質。糖質。單寧酸等。

桂皮油 (Oleum Cinnamomi) 有桂皮固有之芳香。質澄明而稍濃稠。色帶黃。或黃褐。性善揮發。起酸性之反應。比重一·○四至一·○七。味如燒灼。酒精。伊打哥。噁仿姆。冰醋酸等能溶解之。其中含有桂亞爾台希度(C₆H₅-CH=CH-CH=O) 台爾品(C₆H₅)₂及桂皮酸等。

效能 發汗解肌。溫經通絡。用為治術逆之要藥。

作用 桂枝之醫治作用。以桂枝有發汗解熱及止汗作用。鎮靜

九五九

十靈 桂

鎮痙鎮痛作用。亢奮強心強壯作用。祛痰作用。健胃驅風作用。疏通瘀血通經催產。及下胎盤死胎之作用。利尿作用。矯味矯臭作用。則桂枝之主要成分。因含有桂枝油及揮發油。故藥物學所載揮發油之醫治作用。可謂即桂枝之醫治作用也。

主治 上氣欬逆。結氣喉痺。吐吸。利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。(本經)心痛。脇痛。脇風。溫筋通脈。止煩出汗。(別錄)

張仲景之發明 桂枝一味。經張仲景之實驗。認為主治衝逆。旁治奔豚頭痛。發熱惡風。汗出身痛等症。茲考徵如下。桂枝加桂湯證曰。氣自少腹上衝心。(以上一方。桂枝五兩) 桂枝甘草湯證曰。其人又手自冒心。心下悸。欲得按。桂枝甘草附子湯證。(此方於桂枝甘草湯而加附子。桂枝甘草湯條。有上衝證。然此湯亦常有上衝證) 苓桂甘草湯證曰。欲作奔豚。苓桂五味甘草湯證曰。氣從少腹下衝胸咽。桂枝附子湯證。桂枝附子湯。用桂枝多於桂枝

加附子湯。而無上衝證。蓋開文也。桂枝加附子湯條。猶有桂枝之證。現於此湯。而可無桂枝之證乎。(以上五方。桂枝皆四兩) 桂枝湯證曰。上衝。又曰。頭痛發熱。汗出惡風。苓桂朮甘湯證曰。氣上衝胸。(以上二方。桂枝皆三兩) 歷觀此諸方。桂枝主治衝逆也。明矣。頭痛發熱之證。其所旁治也。仲景之治疾。用桂枝者。居十之七八。今不枚舉焉。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論桂枝曰。去冷風疼痛。【金】張元素珍珠囊論桂枝曰。去傷風頭痛。開腠理。解表發汗。去皮膚風溼。【元】李東垣用藥法象論桂枝曰。橫行手臂。以其為枝也。氣薄則發洩。故桂枝上行而解表。氣厚則發熱。故肉桂下行而補腎也。【清】楊時泰本草述鈞元論桂枝曰。桂枝性輕揚。能行上焦頭目。通手臂肢節。調營血。和肌表。除傷風頭痛。肢節痛風。去皮膚風溼。散下焦蓄血。直行為奔豚之先導。(奔豚為腎氣。腎氣出膀胱) 橫行為手臂之引經。世醫不悟桂枝實表

之義。幾以此味為能補衛而密腠理。若然何以不用參耶。夫四時之風。因於四時之氣。冬月寒風。衛為所併。不能為營氣之固。而與之和。故汗出。惟桂枝辛甘能散肌表寒風。又通血脈。故合於白芍。由衛之固以達營。使其相和。而肌解汗止。又能去下焦蓄血。上焦蓄血。多因熱氣上逆。血不循經所致。非若下焦蓄血。則是寒氣冰凝。血不流行而蓄也。故散以桂枝辛熱之氣。仲景桃仁承氣湯中用之。【清】鄒澐本經疏證論桂枝曰。(上略)蓋其用之之道有六。曰和營。曰通陽。曰利水。曰下氣。曰行瘀。曰補中。其功之最大。施之最廣。無如桂枝湯。則和營其首功也。夫風傷於外。壅遏衛氣。衛中之陽。與奔逆相逐。不得不就近曳營氣為助。是以營氣弱。衛氣強。當此之時。又安能不調和營氣。使散陽氣之鬱遏。通邪氣之相併耶。【清】黃宮繡本草求真論桂枝曰。桂枝係肉桂枝梢。其體輕。其味辛。其色赤。有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣而利水。且能橫行於臂。調和營衛。治痛風

九六〇

脇風。止煩出汗。驅風散邪。為解肌第一要藥。故書皆言無汗能發。有汗能收。然其汗之能發。止是因其衛實於虛。陰被陽濤。故用桂枝以調其營。營調則衛氣自和。而風邪莫容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理以發其汗也。其汗之能收。止因衛受風傷。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而羸風。其用桂枝湯為治。取其內有芍藥。入營以收陰。外有桂枝。入衛以除邪。則汗自克見止。非云桂枝能閉其汗孔。味者不察。謂桂枝發汗止汗。是何意哉。徒以順口虛囑。其失遠矣。【清】葉天士本草經解論桂枝曰。桂氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方潤澤之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。肺為金臟。形寒飲冷。則傷肺。肺傷則氣不下降。而病上氣欬逆矣。桂性溫。溫肺。肺溫則氣下降。而欬逆止矣。結氣喉痺。吐吸者。痺者。閉也。氣結於喉。閉而不通。但吐而不能吸也。桂辛溫。散結行氣。則結者散。而閉者通。不吐而能吸也。辛則能潤。溫則筋脈和。而關

節利矣。中者。脾也。辛溫則暢達肝氣。而脾經受益。所以補中益氣者。肺主氣。肺溫則真氣流通而受益也。久服通神。輕身不老者。久服則辛溫助陽。陽氣常伸而靈明。陽盛而身輕不老也。【清】張隱菴本草崇原論桂枝曰。桂木凌冬不凋。氣味辛溫。其色紫赤。水中所生之木也。肺腎不交。則為上氣欬逆之證。桂啓水之生陽。上交於肺。則上氣平而欬逆除矣。結氣喉痺者。三焦之氣不行於肌腠。則結氣而為喉痺。桂菓少陽之木氣。通利三焦。則結氣通而喉痺可治矣。吐吸者。吸不歸根。即吐出也。桂能引下氣。與上氣相接。則吸入之氣。直至丹田而後出。故治吐吸也。關節者。兩肘兩腋兩髀兩關皆機關之室。周身三百六十五節。皆神氣之周行。桂助君火之氣。使心主之神。而出入於機關。游行於骨節。故利關節也。補中益氣者。補中焦而益上下之氣也。久服則陽氣盛而光明。故通神明。三焦通會元氣於肌腠。故輕身不老。【清】陳修園本草經說論桂枝曰。桂。牡桂也。牡。陽也。即今

十畫 桂

之桂枝。桂皮也。南。根也。南。桂。即今之內桂。厚桂也。然生發之機。在枝幹。故仲景方中所用。俱是桂枝。即牡桂也。時醫以桂枝發表。禁不敢用。而所用肉桂。又必刻意求備。皆是為施治不愈。卸罪巧法。

國外學說 依日本藥局方。為芳香性健胃藥。又為調味調香料。於慢性下痢。急性腸加答兒之末期。子宮弛緩。輕度之出血。(作用於子宮筋之力。比麥角遠弱。)可為散劑。一日數回。用〇・三至一・五。或以五・〇至一五・〇。為浸劑。一日中分服之。又集成藥物學曰。桂枝為產於中國南部及安南樟科之樹皮。其主要成分為桂皮油。旁含鞣酸。樹脂。橡膠等。桂枝之作用。在其揮發油與鞣酸。能亢進胃液及唾液之分泌。而奮起消化器。桂枝用於健胃驅風及子宮出血間。用為催產藥。桂枝屬於芳香性神經藥。芳香性神經藥之通性。屬於本類者。為因含有揮發油。而有效之植物及動物之一部分。與含有揮發油及其他香氣性不明物質一二之動物性產物。本類

之藥物。隨藥效的分類法。多屬於亢奮藥。及回蘇性藥。往往亦依其用量之差異。而有鎮痙之效。

近人學說 曹炳章曰。傷寒金匱用桂枝。考其用意。皆屬發散。肝脾而行營血。通達經絡。而開皮毛。至於調經閉。疏木止痛。通關逐痺。活絡舒筋。尤有專功。長沙藥解云。大抵雜症百出。非緣脾胃之逆。則因肝脾之陷。桂枝既宜於逆。又宜於陷。左之右之。無不宜之。凡潤肝養血之藥。一得桂枝。化陰滯而為陽和。非藥藥所能及。惟溼熱宜辛涼。則此物應忌耳。曹拙巢曰。寒溼凝滯於肌肉。陽氣不達於外。仲師因立桂枝湯方。以扶脾陽。而達營分之鬱。蓋孫絡滿佈。肢理寒鬱於肌。孫絡為之不通。非得陽氣以通之。營分中餘液。必不能蒸化而成汗。桂枝之開發脾陽。其本能也。但失此不治。溼邪內窺。關節則病。歷節。或竄入孫絡。而為痛。按之不知其處。俗名寒溼流筋。其鬱塞牽涉肝脾。二證皆宜桂枝。然猶為間接之治。若夫寒溼太甚。肝臟疎達之氣。為溼邪所壅。則為腹中急

痛。黃坤載以為溼盛肝鬱。太陽經云。陽脈瀉。陰脈弦。(右為陽。左為陰。)法當腹中急痛。先予小建中湯。不差。予小柴胡湯。金匱婦人雜病。婦人腹中痛。小建中湯主之。蓋婦人無外事。深閨伏處。動多肝鬱之證。仲師以小建中湯為主方。即可證桂枝之能達肝鬱也。章次公曰。自有清中葉。蘇派學說盛行以後。桂枝之價值。遂無人能解。病屬外感。既不敢用之解肌。病屬內傷。更不敢用之以補中。不免有藥材之嘆。予遇有麻黃湯證。懼病者疑麻黃之猛悍。輒以荊防代麻黃。而以桂枝佐之。亦效。蓋桂枝本質。原無汗之能力。以其辛香散。故可助發汗藥之作汗。蘇派醫生。所以不敢用桂枝。其理由之可得而言者。不外「南方無真傷寒」仲景之麻桂。僅可趨於北方人。非江南體質柔弱者所能勝。故若輩一遇熱病。無論傷寒溫病。一例以大豆卷。遠翹。桑。菊。應付之。於此而欲中醫之不式微。難言之矣。近世藥工。剖切桂枝。必先以水浸三五日。是桂枝芳香之性。已受損失。自後世有

十畫 桂

血家不宜桂枝之說。內傷病乃視桂枝如蛇蝎。其實桂枝辛溫。能使血液流行。亢進。不宜於血症之屬實熱者固也。至若虛勞羸弱。法當宗之。而蘇派醫生之較高明者。知桂枝治寒飲。然量僅二三分。寧不可笑。張山雷曰。桂枝輕用三五分至七八分。重用一錢至錢半。若營血素虛。而衛陽亦微。外有凜寒。則用一二分。與白芍合炒。其舌滑無苦者。且必桂芍同炒。而揀去桂枝芎用。僅取其氣。不食其味。此雖吳下近時新法。而不可謂其無深意者也。桂枝即肉桂之枝。柔嫩細條。芬芳馥郁。輕揚升散。味辛氣溫。結營衛之風寒。主太陽中風而頭痛。此中風為風寒新感之病。實即今之所謂傷風。凡漢唐以上。通稱中風。內經以及千金。外臺皆然。與金元以後之所謂中風大異。立中州之陽氣。痰脾胃虛緩而腹疼。枝幹橫行。故宜通經絡。上達肩背。溫辛勝水。則抑降腎氣。下定奔豚。開腎家之燥著。若是陽微腹短。斯為通瀉良材。維在燥咳氣升。妄用即致血溢。抑或陰虧液耗。誤投

必致病加。其效在皮。而仲景書反去其皮。可悟傳抄之謬。無皮為木。而晚近來或用其木。毋乃嗜好之偏。

配合應用 治風寒束表。用麻黃柴胡。荊芥。防風。生薑。葱白。

治骨節疼痛。用桑枝。附子。牛膝。威靈仙。茯苓。防己。

治上氣咳逆。用芥子。厚朴。杏仁。半夏。

用量 幾分至二三錢。施用宜忌 性能動血。陰虛火盛者忌之。忌生葱與火。

著名方劑 桂枝湯。治上衝頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝。芍藥。大棗。生薑各七分半。甘草五分。上五味。以水一盞四分。煎取六分。古

方藥品考桂枝湯條云。風邪受於表。必以先發表為順。故用桂枝以發散表邪。芍藥以順血固肌。生薑以開痰達藥力。大棗以溫保胃氣。甘草以調和諸藥。桂枝加桂湯。治本方證而上衝劇者。本方加桂五分。煎法同前。桂枝加芍藥湯。治本方證而肚腹拘攣甚者。桂枝。大棗各六分。芍藥一錢二分。甘草

四分。生薑六分。上煎法同前。桂枝去芍藥湯。治本方證不拘攣者。桂枝。大棗各九分。甘草六分。生薑九分。煎法同前。桂枝加葛根湯。治本方證而項背強急者。桂枝。芍藥各六分。甘草四分。葛根八分。大棗。生薑各六分。上六味以水二盞。煎取六分。桂枝加黃芪湯。治本

方證而黃汗。或自汗盜汗者。桂枝。芍藥。生薑。大棗各六分。甘草黃芪各四分。上六味以水一盞六分。煎

取六分。桂枝加厚朴杏仁湯。治本方證而胸滿微喘者。桂枝。芍藥。大棗。生薑各六分。甘草厚朴杏仁各四分。上七味以水一盞四分。煎

取六分。桂枝加附子湯。治本方證而惡寒或支節微痛者。桂枝。芍藥。大棗。生薑各七分半。甘草三分。附子三分。煎法同前。桂枝龍

骨牡蠣湯。治桂枝湯證而胸腹有動者。桂枝。芍藥。生薑。大棗。龍骨。牡蠣各六分。甘草四分。煎法同前。桂枝加芍藥生薑人參湯。治桂枝湯證而心下痞硬或拘攣及嘔者。桂枝。大棗。人參各六分。生薑。芍藥各八分。甘草四分。上六味以水二

盞四分煎取六分。桂枝二麻一湯。治桂枝湯證多麻黃湯少者。桂枝八分。芍藥。大棗。生薑各六分。甘草五分。杏仁三分。上七味以水一盞半煎取六分。桂枝二越婢一湯。治桂枝湯證多越婢湯證少者。桂枝。芍藥。甘草。麻黃各四分。大棗。石膏各六分。生薑七分。煎法同前。桂枝麻黃各半湯。治桂枝湯麻黃湯二方證相半者。桂枝五分。芍藥。生薑。甘草。麻黃。大棗各三分。杏仁三分。上七味以水一盞六分煎取六分。

九六二

參攷資料 桂。甘辛大熱。素問云。辛甘發散為陽。故漢張仲景桂枝湯。治傷寒表虛。皆須此藥。正合辛甘發散之意。本草三種之桂。不用牡桂。茵桂者。此二種性止於溫。不可以治風寒之病也。然本經止言桂。仲景又言桂枝者。取枝上皮也。靈樞示廣。桂能止煩出汗。而張仲景治傷寒有當發汗。凡數處皆用桂枝湯。又云。無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。汗多者用桂枝甘草湯。此又用桂枝附汗也。一藥二用。

湯。此又用桂枝附汗也。一藥二用。

與本草之義相通否乎。曰。本草言桂辛甘大熱。能宣導百藥。通血脈。止煩出汗。是調其血而汗自出也。仲景云。太陽中風陰弱者。汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。又云。太陽病發熱汗出者。此為營弱衛強。陰虛陽必濇之。故皆用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非桂枝能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。昧者不知出汗閉汗之意。遇傷寒無汗者。亦用桂枝。誤之甚矣。桂枝湯下發汗字。當認作出字。汗自然發出。非若麻黃能開腠理。發出其汗也。其治虛汗。亦當逆察其意可也。(王好古) ①桂枝本為解肌。若太陽中風。腠理致密。營衛邪實。津液凝固。其脈浮緊。發熱汗不出者。不可與此。必也皮膚疎泄。自汗。脈浮緩。風邪干於衛氣者。乃可投之。發散以辛甘為主。桂枝辛熱。故以為君。而以芍藥為臣。甘草為佐者。風淫所勝。平以辛苦。以甘緩之。以酸收之也。以薑黃為使者。辛甘能發散。

而又用其行脾胃之津液。而和營衛。不專於發散也。故麻黃湯不用薑黃。專於發汗。不待行其津液也。(成無己) ②麻黃遍徹皮毛。故專於發汗。而寒邪散。主皮毛。辛走肺也。桂枝透達營衛。故能解肌。而風邪去。脾主營。肺主衛。甘走脾。辛走肺也。肉桂下行導火之原。此東垣所謂腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通其氣者也。(李時珍) ③有人患赤眼腫痛。脾虛不能飲食。肝脈盛。脾脈弱。用涼藥治肝。則脾愈虛。用暖藥治脾。則肝愈盛。但於溫平藥中。倍加肉桂。殺肝而益脾。故一治兩得之。傳云。木得桂而枯是也。此皆與別錄桂利肝肺氣。牡桂治脇痛。脇風之義相符。人所不知者。今為拈出。又桂性辛散。能通子宮而破血。故別錄言其隨胎。靡安時。乃云炒過則不損胎也。(醫餘錄) ④桂枝亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗為主。而不獨調其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。(汪鞠菴) ⑤桂

枝辛甘而溫。氣薄升浮。入太陰肺。太陽膀胱經。溫經通脈。發汗解肌。治傷風頭痛。傷寒自汗。調和營衛。使邪從汗出。亦治手足痛。風脇風。桂枝偏陽。陰虛之人。一切血證。不可誤投。(吳儀洛)

【桂芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【桂花】即木犀花。詳「木犀花」條。

【桂花露】即木犀花露。詳「木犀花露」條。

【桂根皮】基本 本品即桂樹根上之皮。採取 取陳年之入土最深者為用。主治 貼牙痛。能斷根。

【桂桂】即紫蘇之古籍別名。典見爾雅。詳「紫蘇」條。

【桂葉】即大葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大葉」條。

【桂圓】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【桂圓肉】即龍眼之處方用名。詳「龍眼」條。

【桂蠶糞】主治 獸骨哽。煎醋飲。滋味。

【桂蠶蟲】形體 桂蠶蟲為化生蟲類之一種。即蠶蟲之生於桂樹者。大如指。色紫而香。蜜漬之可為珍味。可供藥用。性質 辛溫。無毒。主治 去冷氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桂蠶蟲曰。除寒痰。辟飲。冷痛。

【桃】命名 本品早花。易植而兆。其數多也。故名。又木兆。謂擊曰桃。

種類 以其種類而名者。有綠桃。緋桃。蘇州桃。千葉桃。西王母桃。碧桃。美人桃。人面桃。二色桃。日月桃。鴛鴦桃。瑞仙桃。壽星桃。巨核桃。十月桃。油桃。李桃。(綱目) 以其實之色而名者。有紅桃。細桃。白桃。烏桃。金桃。銀桃。胭脂桃。(綱目) 以其實之形而名者。有綿桃。御桃。方桃。圓桃。偏核桃。(綱目) 以其時而名者。有五月早桃。十月冬桃。秋桃。霜桃。(綱目) 小而多毛者。名毛桃。櫻桃。冬桃。一名卷桃。又名仙人桃。亦名崑崙桃。香名波淡樹。(綱目) 經

十畫 桂 桃

十靈桃

冬不落者名桃梟。桃奴。(綱目)汁液流出名桃膠。(綱目)

外國名詞 Prunus Persica. St. of N. var. vulgaris Maxim.

(拉丁) 毛桃 (日本)

基本 係薔薇科櫻桃屬。為桃之果實其仁毛梟。花葉膠枝及樹根皮詳見各條。

產地 山野平原。處處有出。

形體 桃為果類之落葉喬木。高丈餘葉披針形。長橢圓有鋸齒。互生。春月與李同時開花。花有紅紫、白等色。在單瓣者花冠自五瓣合成。重瓣者種亦多。實為核果。外面生毛。夏月成熟。亦有熟於秋冬者。熟則蒂帶紅色。結實五年後。宜以刀剝其樹皮。出其脂液。則可垂久。其實俗謂桃子。可供食與藥用。



桃

性質 辛。酸。甘。熱。微毒。
主治 作脯食。益顏色。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論桃實曰。肺之果。肺病宜食之。

參攷資料 ①桃子多食。令人有熱。(綱目) ②黃帝書云。食桃飽入水浴。令人成淋。及寒熱病。(孫思邈) ③生桃多食。令人膨脹。及生癰瘡。有損無益。五果列桃為下。以此(李時珍) ④桃與藍同食。患心痛。服尤人。忌食之。(吳瑞)

處方用名 桃仁泥。桃核仁。單桃仁。脫核仁。脫核嬰兒。(和漢藥考)

外國名詞 Prunus Persica

(拉丁) 基本 屬薔薇科。為桃之核仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桃仁各省均有出產。以湖南常德府。湖北襄樊。老河。山東河南產者為良。六七月出產。

形體 桃為各地所栽植之落葉樹。高達丈餘。葉互生。作披針形。邊緣有細鋸齒。花先葉而開。普通為淡紅色。五瓣。花時或開白。緋。紫等色。有單瓣重瓣之別。果實為肉果。作彈丸形。肉多汁柔軟。呈赤色。

或橙。色。核殼有許多短線溝。中有仁。仁為白色。扁平尖卵圓形。被有楊衣。且有縱紋。
採取 七月採實。取仁。陰乾。
製法 雷斅曰。凡使桃仁。須去皮。用白朮。烏豆二味。同於坩鍋中。煮二伏時。漉出。劈開心。黃如金色。乃用。李時珍曰。桃仁行血。宜速皮。尖生用。潤燥活血。宜湯浸。去皮。尖炒黃用。麥麸同炒。或燒存性。各隨本方。雙仁者有殼。不可食。
性質 苦。甘。平。無毒。
效能 破血行瘀。潤燥。通便。用治咳嗽。血病。風痛。
主治 瘀血血閉。癥瘕。邪氣。殺小蟲(本經) 止咳。逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。止心腹痛。(別錄)

九六四

利(上一方。桃仁三十枚) ①大龜鱉丸。證曰。腹滿。(上一方。桃仁一升) ②抵當丸。證曰。少腹滿(上一方。桃仁二十五枚) ③抵當湯。證曰。少腹當鞭滿。又曰。婦人經水不利(上一方。桃仁二十枚) ④桂枝茯苓丸。證不具。(上一方。桃仁諸藥等方) 據此諸方。則桃仁主治瘀血急結。少腹滿痛明矣。凡毒結於少腹。則小便不利。或如淋。其如此者。後必有膿自下。或洩血者。或婦人經水不利者。是又臍下久瘀血之所致也。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論桃仁曰。殺三蟲。又每夜嚼一枚。和蜜塗手。面良。【金】張元素珍珠囊論桃仁曰。治血結血祕血燥。通潤大便。破蓄血。【明】李時珍本草綱目論桃仁曰。主血滯風痺。骨蒸。肝癰。寒熱。鬼疰。疼痛。產後血病。【清】賈九如辨藥指南論桃仁曰。桃仁味苦。能瀉血熱。體潤能滋腸燥。若連皮研碎。多用。藉其赤色。以走肝經。主破蓄血。逐月水。及遍身疼痛。四肢木痺。左半身不遂。左足痛甚者。以其舒經。活血行血。

張仲景之發明 桃仁一味。經張仲景之實驗。認為主治瘀血。少腹滿痛。故兼治腸癰。及婦人經水不利。茲考徵如下。 ①桃仁承氣湯。證曰。少腹急結。 ②大黃牡丹皮湯。證曰。少腹腫痞。 ③葶藶湯。證不具。上三方(桃仁各五十枚) ④下瘀血湯。證曰。產婦腹痛。又曰。經水不

利。 ⑤桃仁三下散。 ⑥大龜鱉丸。證曰。腹滿。 ⑦桃仁一升。 ⑧抵當丸。證曰。少腹滿。 ⑨抵當湯。證曰。少腹當鞭滿。 ⑩婦人經水不利。 ⑪桃仁二十枚。 ⑫桂枝茯苓丸。證不具。 ⑬桃仁諸藥等方。 據此諸方。則桃仁主治瘀血急結。少腹滿痛明矣。凡毒結於少腹。則小便不利。或如淋。其如此者。後必有膿自下。或洩血者。或婦人經水不利者。是又臍下久瘀血之所致也。

有去瘀生新之功。若去皮搗爛少用。取其純白。以入大腸。治血枯便閉。血燥便難。以其澆潤涼血和血。有閉結通滯之力。

配合應用 治產後瘀血。結塊作痛。并治壯盛婦人。經閉不通。用桃仁。當歸。芍藥。澤蘭。延胡索。蘇木。五靈脂。紅花。牛膝。生地黄。益母草。

治大腸血燥。便結不通。用桃仁。當歸。麻仁。地黃。麥冬。芍藥。黃芩。肉蓯蓉。甘草。

治上部內傷。瘀血作痛。用桃仁。香降香。川通草。山查。穿山甲。乳香。沒藥。紅花。續斷。當歸。

延年去風。令人光潤。用桃仁五合。去皮。用糯米飯漿同研。絞汁令盡。溫酒洗齒。極妙。(千金方)

治偏風不送及癱疾。用桃仁二千七百枚。去皮尖。雙仁。以好酒一斗三升。浸二十一日。取出晒乾。杵細作丸。如梧子大。每服二十九。以原酒吞之。(外臺秘要方)

治風勞毒腫。腫痛。或牽引小腹及腰痛。桃仁一升。去皮尖。熬令黑。烟出。熱研如脂。芥。以酒三升。投

十畫 桃

和服。煖臥取汗。不過三度。瘥。(食醫心鏡方)

治瘧疾寒熱。桃仁一百枚。去皮尖。乳鉢內研成膏。不得犯生水。入黃丹三錢。丸梧子大。每服三丸。當發日。面北溫酒吞下。(唐慎微本草方)

治骨蒸作熱。桃仁一百二十枚。留尖。去皮及雙仁。杵為丸。平旦井花水類服之。令盡。量飲酒至醉。仍須任意喫水。隔日一劑。百日不得食肉。(外臺秘要方)

治上氣欬嗽。胸滿氣喘。桃仁三兩。去皮尖。以水一大升。研汁。和粳米二合。煮粥食。(食醫心鏡方)

治卒得欬嗽。桃仁三升。去皮。杵着器中密封。蒸熟日乾。絹袋盛。浸二斗酒中。七日可飲。日飲四五合。

治尸疰鬼疰。乃五尸之一。又挾鬼邪為祟。其病變動有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱淋瀝。沉沉默默。不知所苦。而無慮不。臨累年。積月。以至於死。死後復傳旁人。急以桃仁五十枚。研泥水。煮取四升。服之。取吐。吐不盡。三四日

再吐。(肘後方)

治傳尸鬼氣。咳喘瘴癘。注氣血氣不通。日漸消瘦。桃仁一兩。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁入米作粥。空心食之。

治鬼疰心痛。桃仁一合。爛研。煎湯服之。(急效方)

治卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖。研爛。水一合服之。(肘後方)

治人好覺癢。桃仁熬去皮尖。三七枚。以小便服之。(千金方)

治下部蟲匿。病人齒無色。舌上白。喜睡。憤憤不知痛痒處。或下痢。乃下部生蟲食肛也。桃仁十五枚。苦酒二升。鹽一合。煮六合服之。(肘後方)

治崩中漏下不止者。桃核燒存性。研細。酒服方寸匕。日三。(千金方)

治產後百病。千金桃仁煎。治婦人產後百病諸氣。取桃仁一千二百枚。去皮尖。雙仁。熬搗極細。以清酒一斗半。研如麥粥。納小瓶中。密封入湯中。煮一伏時。每服一匙。溫酒和服。日再。(圖經方)

治產後身熱如火。皮如粟粒

者。桃仁研泥。同臘豬脂。傅之。日易之。(千金方)

治產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。藕一塊。水煎服之。良。(唐孫經方)

治產後陰腫。桃仁燒研。傅之。

治婦人陰癢。桃仁杵爛。綿裹塞之。(肘後方)

治男子陰腫作痒。用桃仁炒香。為末。酒服方寸匕。日二。仍搗傅之。亦治小兒卵癩。(外臺秘要方)

治小兒爛疳初起。腫脹似火疔。桃仁研爛。傅之。(子母秘錄方)

治小兒聾耳。桃仁炒研。綿裹日日塞之。(千金方)

治風蟲牙痛。鍼刺桃仁。燈上燒烟出。吹波。安痛齒上。咬之。不過五六次愈。(衛生家寶方)

治唇乾裂痛。桃仁搗和豬脂。傅。(海上方)

治大便不快。裏急後重。用桃仁三兩。去皮。吳茱萸二兩。食鹽一兩。同炒熟。去鹽。茶每嚼桃仁五七粒。(金濟總錄方)

治急勞咳嗽煩熱。桃仁三兩。去皮尖。豬肝一枚。童子小便五升。

九六五

十畫 桃

同麥乾。於木臼內搗爛。入蒸餅和丸。梧子大。每溫水下三十九丸。(聖惠方)

◎治冷勞減食。漸至羸瘦。用桃仁五百顆。吳茱萸三兩。同入鐵鍋中。微火炒一炊久。將桃仁去皮。微黃色。即漸加火。待微烟出。即乘熱收入新瓶內。厚紙封住。勿令洩氣。每日空心取桃仁二十粒。去皮嚼之。以溫酒下。至重者服五百粒愈。(聖惠方)

◎預辟瘴癘。用桃仁一斤。吳茱萸黃。青鹽各四兩。同炒熱。以新瓶密封。一七取出。揀去茶鹽。將桃仁去皮尖。每嚼一二十枚。山居尤宜之。(全居士選奇方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無滯滯者禁用。香附爲之使。

著名方劑 桃核承氣湯。治傷寒太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。宜先與桂枝湯解外。外解已。但小腹急結。此主之。(傷寒方) 桃仁五十枚(去皮尖) 桂枝二兩(去皮) 大黃四兩 芒硝 甘草(炙)

各二兩。上五味。以水七升。煮取二升半。去滓。納芒硝。更上火。微沸下火。先令溫服五合。日三服。當微利。

參攷資料 桃仁苦重於甘。氣薄味厚。手足厥陰經血分藥也。苦以泄滯血。甘以生新血。故破凝血者用之。其功有四。治熱入血室一也。泄腹中滯血二也。除皮膚血熱燥痒三也。行皮膚凝滯之血四也。(李杲) 肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘以緩肝散血。故張仲景抵當湯用之。以治傷寒八九日內有蓄血發熱如狂。小腹滿痛。小便不利者。又有當汗失汗。熱毒深入。吐血及血結胸。煩躁。語者。亦以此湯主之。與蠶蟲。水蛭。大黃同用。(成無己) 血滯所宜者。桃仁。紅花。丹皮。蘇木。血竭之屬是也。第紅花。蘇木。血竭。色紅。丹皮。色紫。唯桃仁。屬血。而色乃白。固的知其爲肺果之類。曰。桃爲肺果。精專在仁。故司肺氣。爲營血之師帥。凡血之不行不濡。即氣之不決不運。氣如聚。箭血如波瀾。故也。所說可謂中肯。所以紅花。丹皮。蘇木。血竭。本赤紫

色而入血分。各有所入。唯桃仁本白色。而能和血。故上中下無不行也。又曰。桃爲肺果。而能奏功於血。猶杏爲心果。而能奏功於氣者也。其物理之妙有如此。(劉潛江)

◎桃仁性善破血。凡血結。血秘。血燥。瘀血。閉血。蓄血。血痛。血癥等證。用之立通。第散而不收。瀉而無補。過用之。及用之不得其當。能使血下不止。損傷真陰。爲害非細。故凡經閉不通。由於血枯。而不由於瘀滯。產後腹痛。由於血虛。而不由於血結塊。大便不通。由於津液不足。而不由於血燥。門結。法宜忌之。(經希雅)

九六六

【宋】大明諸家本草論桃毛曰。療崩中。破癖氣。
【桃奴】即桃囊之古籍別名。典見別錄。詳「桃囊」條。

【桃皮酒】製法 用桃皮煎汁。同糯米和麴釀酒飲。
主治 水腫。利小便。

【桃竹筴】古醫別名。黃芩。
主治 六畜疝中生蛆。搗碎納之。蛆盡出。

參攷資料 南人謂之黃筴。灰汁煮之。可食。不爾。載人喉。其竹殼生醜類。非一。(陳藏器) 桃竹。出川廣中。皮滑而黃。厚紋。瘦竹。四寸有節。可以爲席。(李時珍)

【桃竹筴殼】主治 楊梅瘡。煨灰酒服。

【桃核】即桃核之古籍別名。典見綱目。詳「桃核」條。

【桃枝及樹根皮】製法 辛。皮。根皮皆可用。根皮尤良。並取車行者。刮去粗皮。取白皮入藥。

性實 苦平無毒。
主治 除邪鬼中惡。腹痛。去胃

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論桃毛曰。能治惡鬼邪氣。

中熱。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桃枝及樹根皮曰。治疰忤。心腹痛。解蟲毒。辟疫癘。療黃瘻。身目如金。殺諸瘡蟲。

【桃花】

主治 詳見白桃花條。

【桃花石】

命名 本品即赤石脂之不黏舌。堅如石。而有花點者。故名。

性質 甘溫無毒。

主治 大腸中冷。膿血痢。久服令人肥悅能食。

參攷資料 桃花石即赤石脂。非別一物。故其氣味功用皆同。昔張仲景治痢用赤石脂。名桃花湯。和濟局方。治冷痢有桃花丸。皆即此物耳。(李時珍)

【桃花吐錢】即吐錢之古籍別名。典見會稽志。詳「吐錢」條。

【桃花鹽】

命名 桃花鹽產澤。旺每春深紅如桃花。至夏色漸淡。秋冬白。入春仍紅。故名。

性質 味鹹。

主治 胃痛人以鹽熨之。立止。

【桃金娘】

古籍別名 金絲桃。(花鏡)

產地 出粵省。叢生野間。

形態 桃金娘為常綠灌木之一種。葉橢圓質厚。對生。夏月葉腋抽細梗。開花色淡紅。似梅而末微尖。似桃而色倍。中華純紫。中綴黃鬚。露出花外。狀似金絲。八九月實熟青甜若牛乳狀。其實可供藥用。其花詳見該條。

性質 甘寒無毒。

主治 養血明目。

【桃金娘花】

主治 行血。

【桃柳藤】即何首烏之古籍別名。典見諸家本草。詳「何首烏」條。

【桃核仁】即桃仁之處方用名。詳「桃仁」條。

【桃寄生】

命名 本品為桃樹上之寄生。故名。

性質 苦辛無毒。

主治 小兒中蟲毒。腹內墜痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩為末。如茶點服。日四五服。

【桃鼻】

命名 本品係經冬不落之桃實。懸乾如鼻首。

殘木之狀。故名。

古籍別名 桃奴。桃景。鼻景。(別錄) 神桃。鬼鬻。鬻(綱目)

採取 正月採之。以中實者良。製法 雷斅曰。鬼鬻。十一月採得。以酒拌蒸之。從已至未。焙乾。以銅刀切。焙取肉用。

性質 苦微溫。有小毒。

主治 殺百鬼精物。(本經) 殺精魅五毒不祥。療中惡腹痛。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論桃鼻曰。治肺氣。腰痛。破血。療心痛。酒磨煖服之。【明】汪穎食物本草論桃鼻曰。主吐血。諸藥不效。燒存性研末。米湯調服。有驗。

【明】李時珍本草綱目論桃鼻曰。治小兒虛汗。婦人崩下。血破。伏梁。結氣。止邪。瘧。燒烟。瘡。痔。瘡。黑油。調傅小兒頭上。肥瘡。軟癩。

【桃景】即桃鼻之古籍別名。典見別錄。詳「桃鼻」條。

【桃絲竹】 產地 出兩廣。交趾等處。

形態 桃絲竹為苞木類竹屬之一種。本大如斗。而色黑。葉色亦

黑。形類棕竹。有大小之別。可為筆筒。酒注。茶瓊。及刀劍。擬等用。其茹可供藥用。符。符。殺。詳見各該條。

採取 於竹莖上刮取之。先刮去其外之青皮。再刮取其內層之二黃用。

主治 降痰火。煎服。功勝淡竹。解蛇咬及天蛇毒。諸癰。瘡。發背。疔。為末。傅之。或作餅貼之。血崩。炒末水服。

【桃絲竹殼】

基本 本品為桃絲竹上所生

之竹殼也。

主治 卷疔。瘡有效。

【桃葉】

古籍別名 嫩葉名桃心。(綱目)

採取 以嫩者入藥。尤勝。

性質 苦平無毒。

主治 除尸蟲。出瘡中小蟲。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論桃葉曰。治惡氣。小兒寒熱。客忤。【明】李時珍本草綱目論桃葉曰。療傷寒時氣。風痺。無汗。治頭風。通大小便。止霍亂腹痛。

參攷資料 ●桃葉煎汗法。張文仲備急方。治天行病。有支太醫

十靈 桃 桃

栲葉湯熏法。用水二石煮栲葉。取七斗。安牀簣下。厚被蓋臥牀上。乘熱熏之。少時當雨汗。汗過去湯。遠粉之。并灸大椎穴則愈。又陳廩且小品方有阮河南栲葉蒸法云。連發汗。汗不出者死。可蒸之。如中風法。燒地令熱。去火。以少水洒之。布乾栲葉於上。厚二三寸。安席葉上。臥之。溫覆得大汗。被中傳粉極燥。便瘥也。凡栲葉。麥麸。蠶沙。皆可如此法用。張苗言曾有人被極汗出。臥簣受冷。但苦寒倦四日。凡人發汗。汗不出。用此法而瘥也。(蘇頌)

按許叔微本事方云。傷寒病。醫者須顧表裏。循次第。昔范雲為梁武帝尉官。得時疫熱疾。召徐文伯診之。是時武帝有九錫之命。期在旦夕。雲恐不預。求速愈。文伯曰。此甚易效。恐二年後不坐起爾。雲曰。朝聞道。夕死可矣。况二年乎。文伯乃以火煨地。布栲相葉於上。令雲臥之。少頃汗出。粉之。翌日遂愈。後二年雲果卒。取汗先期。尚能促壽。况不顧表裏時日。便欲速愈者乎。夫栲葉發汗妙法也。猶有此戒。可不慎歟。(李時珍)

【桃膠】 採取 於栲茂盛時。以刀割樹皮。久則有膠溢。出。採收之。

製法 採得以桑灰湯浸過。曝乾用。

性質 苦。平。無毒。

主治 鍊服保中不飢。忍風寒。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草圖經論桃膠曰。下石淋。破血。治中惡。疰忤。【唐】孟詵食療本草論桃膠曰。主惡鬼邪氣。【明】李時珍本草綱目論桃膠曰。和血益氣。治下痢。止痛。

參攷資料 ●本草言栲膠鍊服。保中不飢。按仙方服膠法。取膠二十斤。粗袋盛於櫟木灰汁一石中。煮三五沸。取掛高處。候乾再煮。如此三度。曝乾研篩。蜜和丸。梧子大。每空腹酒服二十九丸。久服身輕不老。(蘇頌)

●按抱朴子云。栲膠以桑灰汁漬過。服之除百病。數月斷發。久則時有夜光如月。又列仙傳云。高丘公服栲膠得仙。古方以栲膠為仙藥。而後人不復用之。豈其功亦未必如是之殊耶。(李時珍)

【桃核】 古籍別名 桃杙。(綱目)

基本 本品即俗削桃木釘於地上。以鎮家宅者。

採取 以經三年者入藥良。

主治 卒心腹痛。鬼疰。破血辟邪惡氣。腹滿。黃汁服之。與桃符同功。

【桃蟲】 即巧婦鳥之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「巧婦鳥」條。

【桃蠶蟲】 命名 本品為蠶蟲之生於桃樹上者。故名。

性質 辛。溫。無毒。

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論桃蠶蟲曰。食之肥人。悅顏色。

【桃蠶蟲糞】 主治 辟瘴疫。為末水飲。

【桃椰子】 命名 本品木似板。椰而光利故名。

古籍別名 姑椰子。子。臨海異物志。煇木子。(伽藍記) 蕉樓子。(楊慎扈言) 鐵木子。(綱目) 砂糖椰子。(日本)

【桃榔】 外國名詞 Arong's saccharifera. Labill. (拉丁) ツクク ロツク(日本)

基本 係模欄科。為桃榔之干。

產地 生於南熱帶諸地。

形態 桃榔為喬木類之常綠木本。大者四五圍。高五六丈。葉作羽狀複葉。自許多小葉成。小葉細而長。葉下有鬚。如粗馬尾。可以織巾。花小單性。雌花與雄花同株。為肉穗花序。其汁液可製砂糖。結實如青珠。幹內有粉赤黃色。可作餅餌。名桃榔粉。其子可供藥用。



桃榔子

性質 苦。平。無毒。

主治 破宿血。

【桃榔麵】 命名 本品乃桃榔幹皮中之白粉。形似粉。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 作餅夾食。腴美令人不

續補益虛羸損乏腰脚無力久服輕身辟穀。

【桐】

古籍別名 白桐。梧桐。桐。桐(弘景)黃桐。(綱目)泡桐。紫花桐。(綱目)


外國名詞 Parlowia kom.

Onobos. H. Bu. (拉丁)キリ(日本)

基本 係玄參科桐屬。為桐之木材。其木皮葉花詳見各該條。

產地 山谷原野均有。

形態 桐為喬木類之落葉木。本高三丈。葉大對生。春夏間開花於枝梢。排列為圓錐。花序花冠呈紫色或白色。作唇形。萼五裂。實為兩房之蒴果。長寸餘。熟則兩裂。散出無數小扁種子。隨風飄揚。其木可供藥用。



桐

主治 腫從脚起。削片煮汁飲之。并飲少許。

【桐木皮】

主治 五痔。殺三蟲。(本經)療奔豚氣病。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桐木皮曰。五淋。沐髮去頭風。生髮滋潤。【明】李時珍綱目論桐木皮曰。治惡瘡。小兒丹毒。煎汁塗之。

【桐油傘紙】

基本 本品即兩傘上之桐油紙。

主治 蛙幹陰瘡。燒灰出火毒。一夜。傳之。便結痂。

【桐花】

主治 傳諸瘡。飼豬肥大三倍。

【桐蛙】

基本 桐油樹中之蠶蟲也。主治 惡腫毒。(取七根焙末。沖酒服。)

【桐麻】即商麻之日本名。詳『商麻』條。

【桐葉】

性質 苦寒。無毒。主治 惡蝕瘡陰瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桐葉曰。消腫毒。生髮。【桑上羊兒藤】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑上寄生】即桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

【桑耳】即桑耳之古籍別名。典見綱目。詳『桑耳』條。

【桑仁】即桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑椹』條。

【桑牛】即綠桑蠶之古籍別名。典見綱目。詳『綠桑蠶』條。

【桑生】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑白皮】原名 桑根白皮。桑嫩根之白色內皮。故名。

處方用名 生桑皮。炙桑皮。古籍別名 伏蛇皮。馬額皮。(吳淑事類賦) 嬰食蠶。延年卷雲。(和漢藥考)

基本 屬桑科。為鷄桑之嫩根白皮。

產地 凡養蠶區域恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。桑白皮以產廣東南海西樵三水。橫江為好。味以東沙島為好。肉粉口。清遠次之。其餘東莞等處亦有。

形態 桑之嫩根。外色青黃。內色白。皮內又有黏汁。色亦潔白。



桑白皮

採取 桑根採無時。但須採十年以上者之嫩根。剝取其內之白皮。焙乾。

製法 雷斅曰。凡使桑白皮。採十年以上向東。昨嫩根。銅刀刮去青黃薄皮一重。取裏白皮。切焙乾。用。其皮中涎勿去之。藥力俱在上也。忌鐵及鉛。有同醬炒者。

性質 甘寒。無毒。效能 潤肺。行水。用為水腫之利尿藥。又為喘咳之祛痰藥。

主治 傷中。五勞六極。羸瘦。崩中。絕脈。補虛益氣。(本經)去肺中水氣。唾血。熱渴。水腫。腹滿。臃脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑白皮曰。治肺氣喘滿。虛勞客熱。頭痛。內補不足。【唐】孟詵食療本草論桑白皮曰。煮汁飲。利五臟。入散用。下一切風氣水氣。

【宋】大明諸家本草論桑白皮曰。

謂中下氣。消痰止渴。開胃下食。殺腹蟲。止霍亂吐瀉。研汁。治小兒天疳。驚癇客忤。及傳鷄口瘡。大驗。【明】李時珍本草綱目論桑白皮曰。桑根白皮味甘氣寒而無毒。東垣海藏俱云。桑辛甘以固元氣而補不足。辛以瀉肺邪之有餘。故能止咳也。凡肺中有水氣。及肺火有餘者。宜之。傷中者。中氣傷也。五勞者。五臟勞傷也。六極者。六腑之中氣極也。羸瘦者。肌肉脫也。崩中者。血脫也。脈絕者。氣血兩虛之至。故脈不來也。之數者。皆由陰不足則陽有餘。陽有餘則火盛而內熱。火與元氣不兩立。火能消物。造化自然也。惟甘也可以補元氣。惟寒也可以除內熱。熱除矣。元氣生矣。則上來諸證自瘳。故本經終之以補虛益氣焉。別錄去肺中水氣者。即十劑中云。燥可去溼。桑白皮之屬是已。吐血熱渴者。熱傷肺。火炎迫血妄行。溢而上竅。而發熱作渴也。其主水腫腹滿。腹脹者。即利水道。除溼補虛之功也。溼熱盛則寸白生。

消除溼熱。則蟲自不能留也。縫金瘡者。甘寒補益。宜於傷損也。【明】李士材本草圖解論桑白皮曰。桑根白皮甘辛。瀉肺氣而痰水喘嗽皆除。古稱補氣者。非若參耆之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信為補劑。而肺虛者亦用之。大失桑皮之面目矣。刮去皮。蜜水炒。【清】黃宮繡本草求真論桑白皮曰。桑白皮辛甘性寒。善入肺中氣分。瀉火利水。除痰泄氣。綠氣與水與痰。止瀉病標。其氣逆不利。與水飲膠結。未有不因火結而成。久而不治。則痰積便祕。喘嗽胸滿。唾血口渴。水腫臃脹。腫不色。而見桑白皮辛甘而寒。能於肺中治火利水。俾火去而水自消。水去而火即滅。而氣因附而治。至書有云。能補元氣之不足。不過云其氣得自安。若以甘寒之味。可以補氣。則當置甘溫於何地乎。况本草十劑篇云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是也。故溼則為重。宜燥劑以除之。但此性寒而裂。雖有甘味。不能以制。故古人有戒勿多用之條。及肺虛火衰水稠風寒作嗽者。為切忌。焉為線可

縫金瘡。刮去皮取白。或恐瀉氣。密灸用。 配合應用 治嗽之要藥。桑白皮。天麥二冬。款冬花。百部。薄荷。甘草。沙參。貝母。枇杷葉。五味子。 治水腫之神劑。桑白皮。芍藥。 慈苡仁。木瓜。茯苓。橘皮。赤小豆。 治欬嗽吐血。甚者。煎鮮桑根白皮一斤。米泔浸三宿。刮去黃皮。剉細。入糯米四兩。焙乾為末。每服一錢。米飲下。【經驗方】 治消渴尿多。用入地三尺桑根。剉取白皮。炙黃黑。剉以水煮。濃汁。隨意飲之。亦可入少米。勿用鹽。【肘後方】 治產後下血。炙桑白皮。煮水飲之。【肘後方】 治血露不絕。鋸截桑根。取屑五指撮。以淳酒服之。日三服。【肘後方】 治墜馬拗損。桑根白皮五斤。為末一升。煎膏。俾之便止。已後亦無指血。終不發動。【經驗方】 治金刀瘡。傷新桑白皮燒灰。和馬糞塗。瘡上敷。易之。亦可煮汁服之。【廣利方】

治雜物眯眼。新桑根皮洗淨。搗爛。入眼。撥之自出。【聖惠方】 治髮脫墮落。桑白皮剉三升。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻頻洗。沐。白不落也。【聖惠方】 治髮禿不澤。桑根白皮。柏葉各一斤。煎汁。沐之。潤。【聖惠方】 治小兒重舌。桑根白皮。煮汁塗乳上飲之。【子母秘錄方】 治小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮。搗自然汁。塗之。甚效。乾者煎水。【聖惠方】 治小兒天疳。驚癇客忤。家桑東行根。取研汁服。【聖惠方】 治小兒火丹。桑根白皮。煮汁浴之。或為末。羊膏和塗之。【千金方】 治石癭堅硬。不作膿者。蜀桑白皮。陰乾為末。炸膠。和酒調。傅。以軟為度。【千金方】 用釐 錢半至三錢。 施用宜忌 凡肺虛無火及寒嗽者。禁用。忌鐵。鉛。續。桂。心。麻。子為之使。 著名方劑 瀉白散。治肺熱咳。嗽。【錢氏方】 桑皮炒。地骨皮各

一兩。甘草五錢。上爲末。每服一二錢。入粳米百粒水煎。

參攷資料 桑白皮長於利水。乃實則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火有餘者宜之。十劑云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙。治肺氣熱甚。欬嗽而後喘。面腫身熱。消白散用桑白皮炒一兩。地骨皮焙一兩。甘草炒半兩。每服一二錢。入粳米百粒。水煎食後溫服。桑白皮地骨皮皆能瀉火。從小便而去。甘草瀉火而緩中。粳米清肺而養血。此乃瀉肺諸方之準繩也。元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣。消邪所以補正也。若肺虛而小便利者。不宜用之。

(李時珍) 桑根白皮作線縫金瘡。腸出。更以熱雞血塗之。唐安金藏剖腹用此法而愈。(蘇頌) 古本草言桑根見地上者名馬額。有毒殺人。旁行出土者名伏蛇。亦有毒而治心痛。故吳淑事類賦云。伏蛇痛。馬額殺人。(李時珍)

【桑皮】即桑根白皮之簡稱。

【桑皮中白汁】 主治 小兒口瘡白漫拭

淨塗之便愈。又塗金刃所傷燥痛。須臾血止。仍以白皮裹之。甚良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桑皮中白汁曰。塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有效。取枝燒灑。治大風疥疥。生眉髮。

【桑耳】 命名 本品係生於桑上之菌耳故名。

古籍別名 桑橘(唐本草)桑蛾(宋本草)桑黃桑臣(藥性)桑雞(桑上寄生)(綱目)

外國名詞 Hirneola poly-
tricha, Fr. Scleroth (拉丁)キ
クラゲ(日本)

基本 係真正擔子菌類。爲桑樹上寄生之菌耳。

產地 多生在栽桑區域。

形態 詳見木耳條。

性質 甘平。有毒。

主治 黑者主女人漏下。赤白汁。血病。癥瘕積聚。陰痛。陰陽寒熱無子。(本經) 療月水不調。其黃熱陳白者。止久洩。益氣不飢。其金色者。治癆飲積聚。腹痛金瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑耳曰。治女子崩中帶下。月閉血凝。產後血凝。男子瘕癖。

【桑枝】 處方用名 嫩桑枝。藥性詳「桑耳」條。

外國名詞 Morus alba L.
(拉丁)クハ(日本)

基本 係桑科桑屬之嫩枝。

形態 桑枝。長者七八尺。短者三四尺。有粗有細。枝莖色青褐。略有彎形。梢端細。下端粗。皮內有白色黏汁。葉柄生於枝之左右側面。差錯而生。冬月葉落之後。其枝間有葉柄蒂痕。蒂痕之下有新葉苗芽。

採取 春夏採之。

製法 蘇頌曰。凡使桑枝。近效方。一法用花葉枝寸剉炒香。瓦器煮減一半。再入銀器重湯熬減一半。或入少蜜亦可。

性質 苦平無毒。

效能 祛風溼。利關節。專作風痺藥。

主治 骨體風痺。乾燥。水氣脚氣。風氣。四肢拘攣。上氣眼暈。肺氣欬嗽。消食。利小便。久服輕身。聰明耳目。令人光澤。療口乾。及癰疽後。渴用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風。

配合應用 治服食變白。久服通血氣。利五臟。雞桑嫩枝。陰乾爲末。蜜和作丸。每日酒服六十九丸。(聖惠方)

治水氣脚氣。桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服之。無忌。(聖濟總錄方)

治風熱臂痛。桑枝一小升。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病臂痛。諸藥不效。服此數劑自愈。觀本草切用。及圖經言其不冷不熱。可以常服。抱朴子言一切仙藥。不得桑枝煎不服。(本事方)

服五合。則吐。蟲毒出也。(肘後方)
⑤ 治刺傷手足。犯露水腫痛多。殺人以桑枝三條。焙火炮熱斷之。以頭熨指上。令熱冷即易之。盡二條。則指自爛。仍取韭白或菹白傅上。急以帛裹之。有腫更作。(千金方)

⑥ 治紫白癩風。桑枝十斤。益母草三斤。水五斗。浸煮至五斤。去滓。再煎成膏。每臥時。溫酒調服半合。以愈爲度。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 煎藥用桑者。取其能利關節。除風寒溼痺諸痛也。親錄經治寒痺內熱用桂酒法。以桑炭灰布巾拭痺處。治口僻。用馬膏法。以桑鈞鈎其口。及坐桑灰上。皆取此意也。又癰疽發背不起。發或癩肉不腐潰。及陰瘡癩癰。流注腫痞。頑瘡惡瘡。久不愈者。用桑木灸法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。亦取桑通關節。去風寒火性。暢達出毒之意。其法以乾桑木劈成細片。繫作小把。然火吹息。灸患處。每吹灸片時。以瘡肉腐動爲度。內服補托藥。誠良方也。又按

趙晉養病漫筆云。越州一學錄。少年苦嗽。百藥不效。或令用南向桑條一束。每條寸折。納鍋中。以水五盞。煎至一盞。盛瓦器中。湯即飲之。服一月而愈。此亦桑枝變煎法耳。(李時珍)

【桑油】

基本 本品即桑木之油。
採取 取鮮桑木種碎。裝入瓶內。用一瓶蓋口。倒埋土中。糠火煨之。油自滴下。貯罐聽用。
主治 小兒身面爛瘡。輕粉。雄黃各五錢。豬膽一個。滑石一兩。硫黃五錢。穿山甲十五片。炙。鳳凰退燒存性。五錢爲末。用桑油。豬膽汁調。細包擦之。

【桑花】

命名 本品乃桑樹上之花。
古醫別名 桑葎。桑錢。(綱目)
性質 苦。溫。無毒。
主治 健脾瀉腸。止鼻洪。吐血。腸風。崩中。帶下。

歷代記載攷證 【明】李時珍 本草綱目論桑花曰。治熱欬。
【桑柔枝】 即桑枝之處方用名。詳

【桑枝】條。

【桑柴火】

命名 本品係用桑木所燃之火。故名。
主治 癰疽發背不起。瘰癧肉不腐。及陰瘡癩癰。流注。腫痞。頑瘡。癩火吹滅。日灸二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸音。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。

參攷資料 ① 火以暢達。拔引蠱毒。此從治之法也。(朱丹溪) ② 桑木能利關節。養津液。得火則拔引毒氣。而祛逐風寒。所以能去腐生新。抱朴子云。一切仙藥。不得桑煎。不服藥。乃箕星之精。能助藥力。除風寒痺痛。久服。終身不患風疾。故也。葢器曰。桑柴火。灸蛇則足見。(李時珍)

【桑柴灰】

性質 辛。寒。有小毒。
主治 蒸淋。取汁爲煎。與冬灰等分。同減。瘰癧。黑子。蝕惡肉。煮小豆食。大下水腫。傅金瘡。止血生肌。

歷代記載攷證 【明】李時珍 本草綱目論桑柴灰曰。桑霜治噎食積塊。

【桑根白皮】 即桑白皮之原名。詳【桑白皮】條。

【桑根蛇】 即黃領蛇之古籍別名。與見綱目。詳【黃領蛇】條。

【桑脂】 即桑葉滋之原名。詳【桑葉滋】條。

【桑寄生】 命名 本品寓他木而生。如鳥立於上。稱曰寄生。以寓生桑上者入藥。故名。舊本俗呼爲寄生草。東方朔傳云。在樹爲寄生。在地爲之靈藏。

古醫別名 桑上寄生。寄層。寓木。宛童(本經)爲寄童。窠房。窠童。桑生。桑枯。混池。螟蛉。桑上羊兒。藤(和漢藥考)

基本 屬寄生科。爲桑上寄生木之枝葉。
產地 陳仁山藥物生產辨云。桑寄生。國內無論何省。有桑樹者。則有出。俗人多以廣東花地爲正。實不盡然。凡往花地。摘寄生。一到該園。必多方逢迎。又每元必有若干回頭。預備插雜。採得數十斤。即出頭門之闕。開茶烟點心。休息談話。此時園內之伴。即做插雜工夫。

真假混亂。如初一摘去寄生一百斤。初二則採取雜寄生百餘斤。回園安插回摘去寄生之類。或用牛屎禾稈糶之。加之尿水足淋。不十天其葉色暢茂。到十五日後。又從而摘之。有何好處。究不如廣西融縣之大桑樹。數十年生長。滿地皆是寄生之寄於樹者。亦滿目皆是。供多求少。左宜右有。價廉味高。隨即在梧州開略片蒸一息。其葉仍青。晒乾用之。與花地之寄生。有天淵之別。凡研究藥品者。必須親臨境地。方實而有據也。

形態 桑寄生生於桑樹枝間。根在枝節之內。高二三尺。其葉圓而微尖。質厚而柔。面青而光澤。背淡紫而有茸。自生枝葉。四月開白花。五月結實。實赤大如小豆。九月熟。汁黏稠者良。生桑樹者佳。

種類 大者曰葛。葉如石榴葉。小者曰女蘿。葉如麻黃葉。

採取 每年三月間。連桑枝採其莖葉陰乾。九月間。採其子實晒乾。

製法 雷啟曰。採得用銅刀和根枝莖葉細剉。陰乾用。勿見火。

十畫 桑

性質 苦。平。無毒。

效能 驅風溼。健筋骨。益營血。安胎元。專用為婦人藥。

主治 腰痛。小兒背強。癱腫。充肌。胎元不安。胎去。去女子崩中。內傷不足。產後餘疾。下乳汁。主金瘡去瘰。

歷代記述 攷證。【唐】甄權藥性本草論桑寄生曰。主懷妊漏血不止。令胎牢固。【宋】大明日華諸家本草論桑寄生曰。助筋骨。益血脈。【明】繆希雍本草經疏論桑寄生曰。桑寄生感桑之精氣而生。其味苦甘。其氣平和。不寒不熱。固應無毒。詳其主治。一本於桑。抽其精英。故功用比桑尤勝。腰痛及小兒背強。皆血不足之候。癱腫多由於營氣熱。肌膚不充。由於血虛。齒者骨之餘也。髮者血之餘也。益血則髮華。腎氣足則齒堅。而髮眉長。血盛則胎自安。女子崩中。及內傷不足。皆血虛內熱之故。產後餘疾。皆由血分。乳汁大下。亦由血虛。金瘡則全傷於血。上來種種疾病。莫不悉由血虛有熱所發。此藥性能益血。故竝主之也。兼能祛溼。故亦療

痺。【清】閻立陸本草選旨論桑寄生曰。桑寄生味苦平。無毒。感桑氣之精以生。故其功用一本於桑。而比桑尤勝。本經主腰痛。小兒背強。皆血不足之候。又主癱腫。充肌膚者。腫疽多由於營氣之熱。肌膚不充。由於血之虛也。齒者骨之餘。髮者血之餘。腎氣足則髮髮長。血盛則胎自安。女子崩中。及內傷不足。皆血虛內熱之故。產後餘疾。皆由於血分。乳汁不下。亦由於血虛。金瘡則金傷於血。故成種種疾病。莫不悉由血虛有熱所致。此藥性能益血。故竝主之也。就能祛溼。故亦主風溼痺。就古人於風溼作痛之症。每用獨活寄生湯。百發百中。今人服之。杳無奏功。詎非藥不得其真故耳。况川獨活。市人多以土當歸偽充。兩性俱燥。用之則耗衛敗營。無益有損。寧不爭劑耶。惟菱山吳氏。謂獨活原本羌活一種。以節密輕虛者為羌。節疎重實者為獨。川續斷與桑寄生。氣味略異。主治頗同。不得寄生。即加續斷。別立其名曰羌活續斷湯。使醫者不泥於舊名。病家勿誤於假藥。仁恩溥濟。

何其遠哉。【清】黃宮繡本草求真論桑寄生曰。桑寄生感桑精氣而生。味苦而甘。性平而和。不寒不熱。誠為補腎補血要藥。緣腎主骨。髮主血。苦入腎。得補則筋骨有力。不致痿痺。而不酸痛矣。甘補血。血得補則髮受其滋。而不枯脫落矣。故凡內而腰痛。筋骨為疾。胎墮外而金瘡。肌膚風溼。何一不藉此以為主治乎。第出桑樹生者。真和莖葉細剉陰乾。忌火服。則其效如神。若雜樹所出。性氣不同。恐反有害。【清】黃元御玉楸藥解論桑寄生曰。桑寄生通達經絡。驅逐溼痺。治腰痛。背強。筋痿。骨弱。血崩。乳閉。胎動。腹痛。疝疾。金瘡。癰疽。髮齒長眉鬚。【清】張隱庵本草崇原論桑寄生曰。寄生感桑氣而寄生枝節間。生長無時。不假土力。奪天地造化之神功。故能資養血脈於空虛之地。而取效倍於他藥也。主治腰痛者。腰乃腎之外候。男子以藏精。女子以繫胞。寄生得桑精之氣。虛聚而生。故治腰痛。小兒腎形未足。似無腰痛之證。應有背強癱腫之疾。寄生治腰痛。則小兒背強癱

腫之能治之充肌膚精氣外達也。堅髮商精氣內足也。精氣外達而充肌膚。則髮眉亦長。精氣內足而堅髮商。則胎亦安。蓋肌膚者皮肉之餘。齒者骨之餘。髮與鬚眉者血之餘。胎者身之餘。以餘氣寄生之物。而治餘氣之病。同類相感如此。【清】徐泗溪本草經百種錄論桑寄生曰。寄生乃桑之精氣所結。後生小樹於枝間。有子之象焉。故能安胎。其性與桑相近。故能驅風養血。其生不著土。資天氣而不資地氣。故能滋養血脈於空虛之地。而取效更神也。

國外學說 和漢藥考曰。屬於槲寄生科之宿木。一曰寄生。故寄生樹。或他種樹木之植物。謂之槲寄生。墜地不飼蠶之老桑樹。其枝間寄生一種宿木。自桑樹之皮部抽莖而出。宛似插枝於他木者。然其枯死之枝葉。俱現黃色。因採之以入藥。又大和本草曰。嫩桑樹無寄生。而養蠶之地。老桑亦少。故真者難得。惟日本隱岐及肥前五島有之。俗以爲中風要藥。頗貴重。又和漢三才圖會曰。他樹寄桑木

而生。曰桑寄生。又本草序例桑耳名桑寄生。是一名而二物矣。非一物而二名也。又手板發蒙曰。諸木皆有寄生。入藥須用桑上寄生。他木寄生者有毒。桑上寄生。作黃色。隱州產爲上。不飼蠶之墜地。桑無採斫之苦。故茂盛而寄生多。其寄生他木者黃色。非天然。乃偽染也。不可不辨。

配合應用 治血虛。手臂骨節疼痛。桑寄生。枸杞子。地黃。胡麻。川續斷。何首烏。當歸。牛膝。

獨活寄生湯 治一切風溼痺用桑寄生入獨活寄生湯。

療胎動腹痛。桑寄生一兩五錢。阿膠炒五錢。艾葉五錢。水一盞。半煎一盞。去滓溫服。或去艾葉。以其熱也。(聖惠方)

治腸氣。生桑寄生搗汁一盞。服之。(集簡方)

治毒痢膿血。六脈微小。並無寒熱。宜以桑寄生二兩。防風。大芎。二錢。炙甘草三錢。爲末。每服二錢。水一盞。煎八分。和滓服。(楊子建護命方)

治下血後虛。下血止後。但覺

丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力。桑寄生爲末。每服一錢。非時白湯點服。(楊子建護命方)

用量 三錢至五錢。施用宜忌 凡非桑上者禁用。忌火並忌鐵器。

著名方劑 獨活寄生湯。治風寒溼痺。偏枯脚氣。(千金方) 獨活三兩。桑寄生。秦九。細辛。歸身。生地。白芍。川芎。桂心。茯苓。杜仲。牛膝。人參。甘草各等分。爲粗末。每服四錢。煎服。一方有防風。

參攷資料 桑寄生新舊香云。今處處有之。從宜南北實。處處難得。豈歲歲窺斫。摘踐之苦。而不能生邪。抑方宜不同也。若以爲鳥食物子。落枝節間。感氣而生。則麥當生麥。穀當生穀。不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者。如何得子。落枝節間。由是言之。自是感造化之氣。別是一物。古人當日。惟取桑上者。實假其氣耳。又云。今醫家鮮用此。極誤矣。今醫家非不用也。第以難得真桑上者。得真桑寄生。下曠必驗如神。(寇宗奭)

寄生松上。楊上。楓上。皆有形類

一般。但根津所因。處爲異。則各隨其樹名之。生樹枝間。根在枝節之內。葉圓青赤。厚澤帶折。旁自生枝節。冬夏生。四月花白。五月實赤。大如小豆。處處皆有。以出彭城者爲勝。俗呼爲續斷用之。而本經續斷別在上品。主療不同。市人混雜無識者。(陶弘景) 此多生楓樹。柳水楊等樹上。葉無陰陽。如細柳葉而厚。莖粗短。子黃色。大如小豆。惟後州有桑上者。子汁甚黏。核大似小豆。九月始熟。黃色。陶言五月實赤。大如小豆。蓋未見也。江南人相承用。其莖爲續斷。殊不相關。(蘇恭) 諸樹多有寄生。莖葉並相似。云是烏鳥食一物子。糞落樹上。感氣而生。葉如橘而厚軟。莖如槐而肥。處處雖有。須桑上者佳。然非自探。卽難以別。可斷莖視之。色深黃者爲驗。又陶經云。葉似龍膽而厚。莖短似雞脚。作樹形。三月四月。花黃白色。六月七月。結子黃綠色。如小豆。以汁稠黏者良也。(韓保昇) 寄生高者二三尺。其葉圓而微尖。厚而柔。面青而光澤。背淡紫。而有茸。人曹川蜀桑多。時

有生者。他處鮮得。須自采或連桑采者。乃可用。世俗多以雜樹上者充之。氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。一種大者。葉如石榴葉。一種小者。葉如麻黃。其子皆相似。大者曰葛。小者曰女蘿。今觀蜀本韓氏所說。亦是兩種。與鄭說同。(李時珍)

【桑寄生實】

性實 甘平。無毒。
主治 明目。輕身通神。

【桑莖實】

古籍別名 草王。
別錄 多生園中。

形態 桑莖實為雜草類之一種。方莖大葉如荏。可供藥用。

採取 十月採之。
性質 酸溫無毒。

主治 婦人孕餘病。益氣輕身。

【桑格】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【桑黃】即桑耳之古籍別名。典見桑性。詳「桑耳」條。

【桑椹】

處方用名 黑桑椹。
古籍別名 葑人精。桑仁。桑實。文武實。(和漢藥考)

外國名詞 Mori Succina(拉)

基本 屬於桑科。為山桑所結之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。本品以中國地產者佳。尤以廣東、南海、順德、更好。桑椹原產波斯國。今我國養蠶各地。皆有之。

形態 桑椹初結色青黃。成熟色紫黑。形橢圓。表面凸凹不平。內含圓形小仁。種子懸其內。胚曲鈎。汁頗多。

種類 椹有烏白二種。而烏者良。

採取 每年四月間成熟時。採之日乾。

製法 寇宗奭曰。凡使桑椹。摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。置多少入蜜熬稠。貯藥器中。仙方日乾。為末。蜜和為丸。酒服亦良。李時珍曰。桑椹酒能理百種風熱。其法用椹汁三斗。重湯煮至一斗中。入白蜜二合。酥油一兩。生薑一合。煮令得所。瓶收。

用法 與他藥水煎。或剉末糊丸。其鮮者。搗汁用。

性質 甘寒。無毒。

成分 桑椹味初酸。繼轉甜。中含有機酸、糖分、黏液質、鹽類、色素等。效能 補腎。明目。養血。祛風。用作強壯藥。又治習慣性便秘。

作用 在胃中能補胃液之缺乏。以助消化之不足。入腸能激腸之黏膜。使腸之分泌增多。并能稍促腸之蠕動。

主治 利五臟。關節痛。血氣。久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾為末。蜜丸日服。

歷代記載致證 【唐】蘇恭新修本草論桑椹曰。單食止消渴。搗汁飲。解中酒毒。醴酒服。利水氣。消腫。【明】繆希雍本草經疏論桑椹曰。桑椹者。桑之精華所結也。其味甘。其氣寒。其色初丹後紫。味厚於氣。合而論之。甘寒益血而除熱。其為涼血補血益陰之藥無疑矣。消渴由於內熱。津液不足。生津故止渴。五臟皆屬陰。益陰故利五臟。陰不足則關節之血氣不通。血生津滿。陰氣長盛。則不飢而血氣自通矣。熱退陰生。則肝心無火。故魂

安而神自清寧。神清則聰明內發。陰復則變白不老。甘寒除熱。故解中酒毒。性寒而下利水。故利小氣而消腫。此皆自然之道也。【清】黃宮樞本草求真論桑椹曰。桑椹甘涼色黑。治能除熱。養陰止渴。烏鬚黑髮。【清】黃元御玉楸藥解論桑椹曰。桑椹滋木。利水清風。潤燥。治消渴。解淋。療瘰。充膚。烏鬚。黑髮。【清】王士雄隨息居飲食譜論桑椹曰。桑椹甘平。滋肝腎。充血液。止消渴。利關節。解酒毒。祛風濕。聰耳明目。安魂鎮魄。可生痰。(宜微鹽并食)可飲汁。或熬以成膏。或爆乾為末。設逢缺。可充糧食。久久服之。鬚髮不白。以小滿前熟透色黑而味純甘者良。熟桑椹以布濾取汁。發器熬成膏。收之。每日白湯或醇酒調服一匙。老年服之。長精神。健步履。息虛風。靖虛火。兼治水腫脹滿。瘰癧結核。

國外學說 英美學說謂桑椹汁俗名桑仁汁。用桑椹搗出之。中國西國均有之。樹高約二丈至三丈不等。從太古以來。無人不知有此樹。其原產地在波斯國等處。漸

十畫 桑

移植於歐羅巴之南。今英國則各處種植此樹。桑椹熟時其汁含水質甚多。

配合應用 ①四時月令云。四月宜飲桑椹酒。能理百種風熱。其法用桑椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑汁一合。麥令得所。瓶收。每服一合。和酒飲之。亦可以汁熬燒酒藏之。經年味愈佳。

②治瘰癧結核。文武君。用文武實印桑椹子二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每白湯調服一匙。日三服。(保命集方)

③治水腫脹滿。水不下則滿溢。水下則虛竭。還服十無一活。宜用桑椹酒治之。桑心皮切。以水二斗。煮汁一斗。入桑椹。再煮取五升。以糯飯五升。釀酒飲。(普濟方)

④治諸骨酸。喉。紅椹子細嚼。先嚥汁。後嚥滓。新水送下。乾者亦可。(聖惠方)

⑤治小兒白禿。桑椹取汁頻服。(千金方)

⑥治小兒白禿。黑椹入罌中。曝三七日。化爲水。洗之。三七日。神效。

(聖惠方)

①拔白髮。黑椹一斤。蝦蚪一斤。瓶密封。閉懸屋東頭一百日。盡化爲黑泥。以染白髮如漆。(本草拾遺方)

②髮白不生。黑熟桑椹。水浸日曬。搽塗。令黑而復生也。(千金方)

③治陰證腹痛。桑椹細包。風乾。過伏天爲末。每服三錢。熱酒下取汗。(集簡方)

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡大便溏瀉。腎虛無熱者禁用。

參攷資料 ①本經言桑其詳。然獨遺烏椹。桑之精英。盡在於此。採摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。量多少。入蜜。熬稠。貯瓷器中。每抄一二錢。飲後夜臥。以沸湯點服。治服金石發熱。口渴。生精神。及小腸熱。其性微涼。故也。仙方日乾爲末。蜜和爲丸。酒服亦良。(寇宗奭)

【桑椹酒】

製法 用桑椹搗汁。煎過。同麴米。釀酒飲。

【桑葉】

主治 補五臟。明目。治水腫。處方用名 冬桑葉。霜桑葉。黃桑葉。枯桑葉。

基本 屬桑科。爲山桑之葉。

產地 ①陳仁山藥物生產辨。云。桑葉產廣東以南海順德爲最。②凡江浙浙西區域恒多生焉。

形態 桑葉爲廣卵形。末端尖銳。底部作心臟形。近緣有鋸齒。有時分三裂五裂。葉面作淺綠色。

種類 葉無枝者。俗稱家桑。爲上品。葉有枝者。俗稱野桑。爲下品。

採取 九十月間採摘。曬乾。其經霜後枝上。積留者尤佳。

製法 蘇頌曰。凡使桑葉。以四月桑茂盛時採葉。又十月霜後三分二分已落時。一分在者。名神仙葉。即採取與前葉同陰乾用。

性質 苦。甘寒。有小毒。效能 祛風。清熱。涼血。明目。爲疏表解熱藥。用於傷風感冒。及白喉等症。又能輕微刺激肺黏膜。及喉頭黏膜。使分泌增加。爲祛痰鎮咳藥。

主治 除寒熱。出汗。(本經)汁解蜈蚣毒。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新修本草論桑葉曰。煎濃汁服。能除脚氣水腫。利大小腸。【唐】孟詵食

九七六

療本草論桑葉曰。炙熱煎飲。代茶止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論桑葉曰。研汁治金瘡。及小兒吻瘡。煎汁服。止霍亂腹痛吐下。亦可以乾葉煮之。雞桑葉煮汁。熱膏服。去老風。及畜血。(本)大明諸家本草論桑葉曰。煎飲。利五臟。通關節。下氣。

嫩葉煎酒服。治一切風。熱熱搏腎風痛出汗。并撲損瘀血。按爛塗蛇蟲傷。【明】李時珍本草綱目論桑葉曰。治勞熱咳嗽。明目長髮。【清】黃宮熾本草求真論桑葉曰。清肺瀉胃。涼血燥濕。去風明目。

近人學說 張山雷曰。以老而經霜者爲佳。欲其氣之全。力之厚也。故入藥用冬桑葉。亦曰霜桑葉。古稱桑爲箕星之精。箕主風。而通於肝。故以桑葉爲平肝之藥。頗謂此葉清芬。而經秋入冬。得嚴霜之令。故能泄降肝膽之鬱熱。非但木之折其剛暴之性。蓋桑樹確是肝家要藥。故桑枝宜通肝絡。疏利助助指。桑椹入血補營。滋養肝腎。陰液。而其葉脈絡最多。清疏明。則宜通肺絡。而疏達皮毛。清燥滋熱。皆以性情爲主治也。

配合應用 ①治青盲洗法。昔武勝軍宋仲孚。患此已二十年。用此法二年。目明如故。新研青桑葉。焙乾。逐月按日就地燒。存性。每以一合。於瓷器內煎減二分。傾出。澄清。溫熱洗目。至百度。常試有驗。(普濟方)

②治風眼。下淚。臘月不落桑葉煎湯。日日溫洗。或入芒硝。(集簡方)

③治赤眼。腫痛。桑葉為末。紙卷燒煙。熏鼻取效。海上方也。(普濟方)

④治頭髮不長。桑葉、麻葉。煮汁水沐之。七次。可長數尺。(千金方)

⑤治吐血不止。晚桑葉焙研。涼茶服三錢。只一服止。後用補肝肺藥。(聖濟總錄方)

⑥治小兒渴疾。桑葉不拘多少。逐片染生蠶。綿繫蒂上。曬陰乾。細切煎汁。日飲代茶。(勝人方)

⑦治發亂轉筋。入腹煩悶。桑葉一握。煎飲一二服。立定。(聖惠方)

⑧治大腸脫肛。黃皮桑樹葉三升。水煎過。用帶溫罨納之。(仁齋直指方)

⑨治肺毒風痞。狀如大風。綠雲散。用好桑葉洗淨。蒸熟。一宿日乾。為末。水調二錢。七服。(經驗方)

⑩治瘰癧口不斂。經霜黃桑葉為末。傅之。(直指方)

⑪治穿掌腫毒。新桑葉研爛。會之即愈。(通玄方)

⑫治湯火傷。瘡。經霜桑葉。燻存性。為末。油和傅之。三日愈。(醫學正傳方)

⑬治手足麻木。不知痛痒。霜降後桑葉煎湯。頻洗。(急救方)

用薑 錢半至三錢

著名方劑 桑菊飲。治太陰風溫。但咳。身不甚熱。微渴者。此方主之。(溫病條辨方)

桑葉二錢。牛蒡花一錢。杏仁一錢。連翹一錢。薄荷八分。苦梗二錢。甘草八分。茶根二錢。右以水二杯。煮取一杯。日二服。

●桑葉搗末丸散 任服。或煎水代茶飲之。又霜後葉煮湯。淋手足。去風痺。殊勝。又微炙。和桑衣煎服。治痢及金瘡。諸損傷。止血。(陶弘景)

●經霜桑葉研末。米飲服。止盜汗。(朱履亨)

有數種。有白桑。葉大如掌而厚。葉尖而長。以子種者。不若葉條而分者。桑生黃衣。謂之金桑。其木必將腐矣。種樹書云。桑以構接。則桑大。桑根下埋龜甲。則茂盛不蛀。(李時珍)

【桑葉滋】 原名 桑脂。桑葉筋中之白汁。基本 本品即新鮮性質 苦微寒。無毒。

主治 天絲入目點之。乳癰。癩癩及蜈蚣咬傷。

配合應用 ①治乳癰。用桑葉不拘頭二葉。摘去中段。取後半段。脂三分。黃柏八錢。水煎乾。止用三分。飯鍋蒸一次。夜露一宿。塗患處。雖爛見骨者。亦能收口不復。(集驗方)

②治小石瘰。採二蠶桑葉。滴下滋水。點上愈。小石瘰。今人呼為紫馬疔。(錢岐經驗方)

③消瘰癧。用胡鮑一錢。蛇脫泥球。包煨為末。三分。鬼饅頭。滋乾一錢。桑滋乾一錢。乳香。沒藥。各三分。麝香一分。共為細末。飯和搗為錠。

臨用時。再取鬼饅頭。化開。以雞翎搽患處。過宿即消。(秋泉秘方)

【桑葉露】 風清熱。主治 目疾紅筋。去宋本草。詳「桑耳」條。

【桑蛾】 即桑耳之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑楮」條。

【桑楮】 基本 本品即多年其枝頭長成如拳狀者。主治 臨症燒紅存性。為末酒服。

【桑屬】 古稱別名 竊脂。(爾雅) 青雀。(郭璞) 蠅嘴雀。(綱目)

外國名詞 Eopona (Cochintha) personata (拉丁)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科之桑屬。

產地 山林間。

形態 桑屬為林禽類之一種。大如鳩。其嘴圓錐形而粗。短。色黃。嘴根青黑。頭頂眼尖。眼緣及尾皆黑色。有銅光。腹背皆灰色。略帶褐。翼紫黑。有白條紋。脚淡黃色。性

喜食果實穀類。為農家之害鳥。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 肌肉虛羸。益皮膚。

【桑錢】即桑花之古籍別名。與見綱目。詳「桑花」條。

【桑蠶蛸】命名 本品輕飄如絹。而須採桑樹上者故名。

古籍別名 蠶娘窠。刀蠶窠。致神。綱目。拒斧窠。不過。附雅。蝕。賦。蟬蛸。蟬蛸。別錄。蠶蛸。遺尿。高。本草綱目。野狐鼻涕。和漢藥考。胃夷。揚雄方言。

基本 係屬昆蟲類中為直翅類。蠶蛸之卵。秋日築窠桑樹上。經日堅凝而成蠶蛸。

產地 陳仁山藥物生產辨云。以廣東各屬產者為最。尤以新安東莞為上。廣西八屬等亦有出。次之。又有產江蘇鎮江府者。又次之。均九月新。

形態 桑蠶蛸為形如舊紙之塊。性極輕。長寸許。色黑褐。或黃褐。破之則類似海蠶蛸。各房中俱藏卵。子。本草徵要曰。一生出九十。

九。

種類 蠶蛸卵。蓬樹便產。惟以桑樹上者是得。桑皮之津氣。良採取。每年於二三月間。連桑枝採收之。

製法 別錄曰。凡使桑蠶蛸。即桑枝上蠶蛸子也。採來蒸過。火炙。用。不爾令人洩。雷斅曰。凡使勿用。雜樹上生者。名蠶蛸。須覓桑樹東。畔枝上。採得去核子。用沸漿水浸。淘七次。鍋中熬乾。用。別修治無效也。韓保昇曰。採得以熱漿水浸。一伏時。焙乾。於柳木灰中炮炙。用。

性質 鹹甘平無毒。

效能 固腎益精氣。補虛治遺溺。用以治陰痿。遺精。及夜尿病。

主治 傷中。疝瘕。陰痿。益精。生子。女子血閉。腰痛。通五淋。利小便。小道。本經。療男子虛損。五臟氣。微。夢寐失精。遺溺。久服益氣養神。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑蠶蛸曰。炮熱。空心食。之。止小便。利。男子身衰。精自出。及虛。而小便利者。加而用之。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論桑蠶蛸曰。古。

方潤精。及風藥中多用之。【宋】寇宗奭本草衍義論桑蠶蛸曰。男女虛損。腎衰。陰痿。夢中失精。遺溺。白濁。疝瘕。不可開也。【明】李時珍本草綱目論桑蠶蛸曰。桑蠶蛸。肝腎命門藥也。古方盛用之。【明】經希雍本草經疏論桑蠶蛸曰。桑蠶蛸。桑樹上蠶娘子也。本經味鹹。氣平。別錄甘。無毒。氣薄。味厚。陰也。入足少陰。太陽經。人以腎為根本。男子腎經虛損。則五臟氣。

或陰痿。夢寐。失精。遺溺。蠶蛸味。屬水。內含於腎。腎得之而陰氣生。長。故能愈諸疾。及益精生子。腎與膀胱為表裏。腎得所養。則膀胱自固。氣化則能出。故利水道。通五淋也。女子疝瘕。血閉。腰痛。皆肝腎二經為病。故能入血。養氣。是以主之。甘能補中。故主傷中。益氣。腎足則水自上升。克與心交。故能養神也。至書既言功。尚收瀉。又言利便。養由是矣。產桑樹者佳。

配合應用 治虛勞盜汗。遺精白濁。桑蠶蛸炙白龍骨等分。為細末。每服二錢。空心鹽湯下。外。產桑樹者佳。

治婦人遺尿。桑蠶蛸酒炒。為末。白湯服二錢。兼治胎前產後遺尿不禁。千金翼方。

治小便不通。桑蠶蛸炙黃。三十枚。黃芩二兩。水煎分二服。聖惠方。

治婦人胞轉。小便不通。用桑蠶蛸炙為末。飲。服方寸匕。日用二。

治咽喉腫塞。桑上蠶娘窠一兩。燒灰。馬屁勃半兩。研勻。蜜丸。梧。

治咽喉腫塞。桑上蠶娘窠一兩。燒灰。馬屁勃半兩。研勻。蜜丸。梧。

子大煎犀角湯。每服三五丸。(總病論方)

④ 治咽喉骨硬。桑螵蛸醋煎呷之。(經驗良方)

⑤ 治底耳疼痛。桑螵蛸一箇燒存性。麝香一字研末。每用半字。搽入神效。有膿先微淨。(經驗方)

⑥ 治小兒軟癆。桑螵蛸燒存性。研末油調傅之。(危氏方)

用蠶 一錢至三錢。
施用宜忌 凡火盛者宜少用。
長旋覆花。蘇椹。

香名方劑 桑螵蛸散。治小便頻數。遺精白濁。心神恍惚健忘等症。(寇宗奭方) 桑螵蛸。(蒸過略炒) 遠志石菖蒲人參茯苓當歸龍骨(另研)龜甲(炙黃)甘草各一兩。右共研末。臨睡時。以人參湯調下二錢。

【桑槁】即桑耳之古籍別名。典見唐本草。詳「桑耳」條。

【桑蟲】即桑蠶蟲之簡稱。

【桑雞】即桑耳之古籍別名。典見綱目。詳「桑耳」條。

【桑蘇】即桑花之古籍別名。典見綱目。詳「桑花」條。

十 蠶 桑 桓 素 桔

【桑癭】 命名 本品生於老桑樹上之癭塊。狀如瘤形。故名。

採取 用刀斫下。陰乾用。

主治 療胃痛。去風痺。諸淫。浸酒用。

【桑蠶糞】 主治 腸風下血。婦人崩中。產痢。小兒驚風。胎毒。咽喉骨硬。

【桑蠶蟲】 命名 本品為蠶蟲。古籍別名 桑蠶(綱目)

形態 桑蠶蟲為化生蟲類之一種。乳白色。無脚。有黃褐色短毛。被覆全體。背有顆粒狀突起之物。能支其體。以覆行。蝕桑能入絲中。致桑枯死。其蟲可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 心暴痛。金瘡肉生不足。

歷代配述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論桑蠶蟲曰。治眼疾。【唐】陳藏器本草拾遺論桑蠶蟲曰。去風補不足。治小兒乳積。【宋】日華諸家本草論桑蠶蟲曰。脚下墜滿。障翳癢腫。治風癩。【明】李時珍本草綱目論桑蠶蟲曰。小兒驚風。口

瘡。風疖。婦人崩中。漏下赤白。墮胎下血。產後下痢。

【桓】即無患子之古籍別名。典見本草拾遺。詳「無患子」條。

【桑】即榛之別名。典見植物學大辭典。詳「榛」條。

【桑栗】即栗之叢生者。實大如杏仁。詳「栗」條。

【桔皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【桔柅子】即柅柅子之古籍別名。典見綱目。詳「柅柅子」條。

【桔梗】 命名 本品根莖結實。而梗直。故名。

處方用名 苦桔梗。白桔梗。蜜炙桔梗。玉桔梗。

古籍別名 濟危。(本經)白藥。梗草。(別錄)利如符。虛茹。房。方。陶。(吳氏本草)苦梗。(綱目)木便。苦梗。吉祥。柅。都。乙。羅。吐。道。乙。阿。叱。(和漢藥考)

學名 Platycodon grandiflorum A. D. C.

基本 屬桔梗科。為 Campanulaceae 植物。Platycodon grandiflorum 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桔梗產安徽滁州府。廣西各屬亦

有出產。每年春秋兩次收成。

形態 桔梗為多年生草本。自生於山野向陽之地。春日生苗。莖高二三尺。大者可四五尺。葉為長卵圓形。或披針形。邊緣有細鋸齒。多互生。夏秋之交。莖端開花。花色或白。或青紫。花冠五裂。如鐘。花後結倒卵圓形之蒴果。根類沙參而風曲。外現黃褐色。直下肥厚。

種類 味苦而根中有心者曰桔梗。即苦桔梗。味甜而根中無心者曰蜜桔。即甜桔梗。

採取 春採嫩苗。可以煮食。二月八月間採根曬乾。

九七九

九七九

九七九

九七九

九七九

九七九

九七九

九七九

九七九



(一) 梗 桔



(二) 梗 桔

十畫 桔

製法 雷斅曰。凡使桔梗。須去頭上尖硬。細剉用。生百合搗膏。水浸一伏時。火熬令乾。李時珍曰。今但刮去浮皮。米泔水浸一夜。切片微炒用。

性質 辛。微溫。有小毒。

效能 宣肺氣。散風寒。能載藥上行。用為祛痰鎮咳藥。治於感冒痰咳喘息。肺結核。肋膜炎等症。

主治 胸脇痛。如刀刺。腹滿腸鳴。胸膈驚悸。氣(本經)利五臟。腸胃補血氣。除寒熱。風痺。溫中消穀。療喉咽痛。下蟲毒。(別錄)

張仲景之發明 桔梗一味。經張仲景之實驗。認為主治濁唾腫脹也。勞治咽喉痛。茲考徵如下。○排膿湯證。○桔梗白散證。○出濁唾腥臭。久久吐膿。○桔梗湯證。○出濁唾腥臭。久久吐膿。○排膿散證。○以上四方。其用桔梗者。或三兩。或一兩。或三分。或二分。上方者。皆仲景之方也。而排膿湯。以桔梗為君藥也。不載其證。今乃歷觀其用桔梗諸方。或肺癰。或濁唾腥臭。或吐膿也。而以桔梗為君藥者。名為排膿。則其排膿也明矣。排

膿湯之證。雖闕。而桔梗湯觀之。則其主治明矣。桔梗湯證。曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。仲景曰。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯也。是乃甘草者。緩其毒之急迫也。而濁唾吐膿。非甘草之所主。故其不差者。乃加桔梗也。由是觀之。腫痛急迫。則桔梗湯。濁唾吐膿多。則排膿湯。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥

性本草論桔梗曰。主治下痢。破血積氣。消聚痰涎。去肺熱。氣促嗽逆。除腹中冷痛。主中惡。及小兒驚癇。【宋】大明諸家本草論桔梗曰。下一切氣。止霍亂。轉筋。心腹脹痛。補五勞。養氣。除邪辟溫。破癥瘕。肺癰。養血排膿。補內漏。及喉痺。【金】張元素珍珠囊論桔梗曰。利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽隘。胸膈滯氣。及痛。除鼻塞。【元】李東垣用藥法象論桔梗曰。治寒嘔。【明】李時珍本草綱目論桔梗曰。主口舌生瘡。赤目腫痛。【明】經希雍本草經疏論桔梗曰。桔梗本經味辛氣微溫。別錄加苦。云有小毒。神農醫和岐伯雷公咸曰無毒。而後加甘。觀其

所主諸病。應是辛苦甘平。微溫無毒。傷寒邪結胸脇。則痛如刀刺。邪在中焦。則腹滿及腸鳴。幽幽。辛散升發。苦澆甘和。則邪解而氣和。諸證自退矣。其主驚恐悸氣者。心脾氣血不足。則現此證。諸補心藥中。藉其升上之力。以為舟楫。勝載之用。此佐使之職也。別錄利五臟腸胃補血氣者。蓋指邪解則臟腑腸胃自和。和則血氣自生也。除寒熱風痺。溫中療喉咽痛。下蟲毒者。皆散邪解毒通利之功也。消穀者。以其升載陽氣。使居中焦而不下陷。則脾中陽氣長浮。而穀食自消矣。甄權用以治下痢。及去肺熱氣促者。升散熱邪之故也。日華子用以除邪辟溫。肺癰排膿。潔古用以利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽隘。胸膈滯氣。及痛。除鼻塞者。入肺開發和解之功也。【明】李士材本草圖解論桔梗曰。桔梗苦辛。氣輕味平。入肺經。載引諸藥入至高之分。為舟楫之劑。肺金稱職。則清肅下行。故能利膈下氣。散痞滿。治胸脇痛。破血結。消痰涎。理喘咳。療肺癰。排膿血。清上焦熱。凡頭目咽喉口鼻

九八〇

諸症。一切主之。按桔梗之用。惟其上入於肺。肺為主氣之臟。故能使諸氣下降。世俗泥為上升之劑。不能下行。失其用矣。凡用桔梗。去蘆及浮皮及尖。以百合搗爛。同浸一日。對碎微焙。【清】黃宮繡本草求真論桔梗曰。桔梗辛苦而不。按書而載能引諸藥上行。又載能以下氣。其義何居。蓋緣人之臟腑胸膈。本貫通利。一有寒邪阻塞。則氣血不通。其在於肺。則或為不利。而見痰壅氣促鼻塞。其在於陽明。則或風熱相搏。而見齒痛。其在於少陰。則因寒蔽火鬱。而見目赤喉痺咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡肺癰乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢腹痛。腹滿腹鳴。總皆寒入於肺。閉其竅道。則清不得上行。濁因不得下降耳。桔梗味苦氣平。質浮色白。係開提肺氣之聖藥。可為諸藥舟楫。載之上浮。能引苦澆峻下之劑。至於至高之分。成功。俾清氣既得上升。則濁氣自克下降。降氣之說。理根於是。是以好古加味甘桔。無不因虛加藥。如失音則加訶子。聲不出加半夏。上

氣加陳皮。涎嗽加知母貝母。咳滿加五味。酒毒加葛根。少氣加人參。嘔加半夏生薑。吐膿血加紫苑。肺痿加阿膠。胸膈不快加枳殼。痞滿加枳實。目赤加梔子大黃。面腫加茯苓。膚痛加黃耆。發斑加荊防。疫癘加牛蒡大黃。不得眠加梔子。總不離乎枳椇。以爲開提。奈世僅知此屬上升。而不知其下行。其失遠矣。但痘疹下部不起勿用。以其性升之故。久嗽不宜妄用。以其通陽泄氣之故。陰虛不宜妄用。以其拔火上乘之故。其蘆能吐膈上風熱痰實。生研末。水調服探吐。去浮皮泔浸。微炒用。清。鄒澍本經疏證論枳椇曰。海葳東垣丹溪皆謂枳椇入腎。豈不以仲景治少陰喉痛耶。殊不知枳椇主喉痛。仍是治肺非治腎也。夫足少陰直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。支者從肺注心中。腎家邪熱循經而上。肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盡。故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宜洩也。以枳椇開之。肺竅既通。氣遂宣洩。熱自透達矣。雖然。此舉其暫者言耳。

曰咳而胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。非氣停即飲停。飲停即熱生氣血爲之潰腐耶。亦主以枳椇湯。而注其效曰。再服則吐膿血。豈非火清則熱行。氣宣則腐去也。由此而推。謂腎家之熱爲肺所阻者。其一端也。肺家有熱。氣不宜洩。何獨不能阻腎之氣使熱復生於下哉。又曰。亦主血痹。血痹之脈。寸口關上微。尺中小緊。是病亦關於腎。蓋血痹由於氣滯。氣開則血開。上竅通下竅自通也。通經四逆湯。咽痛者。去芍藥。加枳椇。利止。不出者。去枳椇。加入人參。芍藥開陰結。止腹痛。下利。枳椇開陽結。亦止腹痛。下利。可知戴陽之候。有結於陽。有結於陰。枳椇芍藥之用。隱然相對待矣。利止必腹痛。先已腹痛已。則結已開。無所事芍藥。并無所事枳椇。况結既開。正嫌其虛。又烏可復用開洩。人參之補肺。枳椇之開肺。又隱然相對待矣。於此知枳椇之苦先於辛。苦歸於辛。苦者以開提腸胃。蓄積。辛者使從肺泄爲出路。諸家謂爲升提。謂爲舟楫。似矣。其實又

有故焉如此者。寒實結胸無熱證者。治以白散散中用枳椇爲疏通氣分之主。夫開導胸中之氣。仲景於大承氣湯。小承氣湯。梔子厚朴湯。莫不用枳椇。此偏不用何哉。蓋病有上下。治有操縱。結在上者。宿痰停飲也。故凡結胸無論熱實寒實。寧用甘遂。芫花。巴豆。不用枳椇。如大陷胸湯丸白散是也。結在中下。始熱與實。氣隨熱化。則於瀉滌邪穢中。疏利其與邪爲伍之氣。大小承氣等湯是也。况枳椇之用。使氣上越而不使氣下洩。今病在至高。固宜操上而縱下。不使中下無過之地。橫被侵凌。故曰病在膈上必吐。在膈下必利也。熱邪與停飲結。治以瓜蒌。而佐之者。反用半夏。黃連。寒邪與停飲結。治以巴豆。而佐之者。反用枳椇。貝母。於寒因熱用。熱因寒用之中。反佐以取之。可謂精義入神以致用者矣。排膿散即枳實芍藥論加枳椇。雞子黃也。排膿湯即枳椇湯加薑棗也。排膿何必取枳椇。蓋皮毛者肺之合。枳椇入肺。暢達皮毛。膿自當以出。皮毛爲順也。散之所至者深。湯之

所至者淺。枳實芍藥散。本治產後瘀血腹痛。加枳椇。雞子黃爲排膿。是知所排者。結於陰分血分之膿。枳椇湯本治肺癰吐膿喉痛。加薑棗爲排膿湯。是知所排者。陽分氣分之膿矣。二方除枳椇外。無一味同。皆以排膿名。可見排膿者。必以枳椇而隨病之淺深以定佐使。是枳椇者。排膿之君藥也。

國外學說 日本學說謂枳椇者可用爲強壯劑。漢醫則配列於祛痰劑。用量二・〇至六・〇。又本草綱目啓蒙曰。枳椇自生於山中向陽之地。形似沙參。無毛。帶白色。斷之則有白汁。莖圓。高三五尺。葉橢圓。有細鋸齒。皆互生。或二三葉相對。六月以後。莖端開花。茂盛者雖葉間亦開。尋常多單瓣。青紫色。亦有作雙層。千瓣。圓扁等形。與深藍。黃白相間諸色者。雙層者有紫二重。桔梗。白二重。桔梗。二重。仙莖。桔梗。牡丹。桔梗。等。千瓣者。亦有紫白二種。扁者名摺扇。桔梗。有深藍。淡藍二種。千瓣形。扁。莖亦帶扁。黃色者。名淺黃。桔梗。間色者。有白花紫點。桔梗。仙莖。桔梗。南京。桔梗。

十畫 桔

十畫 桔

更有單瓣不作筒狀者。名紋桔梗。此數種皆藝花家所重者。入藥以常品為良。市中所販。根潔白者是。曬乾也。藥舖稱三原桔梗。其根細長。末尤細。末不細者。稱竹原桔梗。氣味更薄。不堪用。味苦為桔梗之本性。故有苦梗、苦桔梗之名。又古方藥品考曰。桔梗有數種。形似沙參。屈曲不直。皮揚肉白。有滋味者為上品。潔白者與根粗色白者。俱不堪用。採根浸水。候腐爛而後曬乾。則氣味消失。亦不能入藥。別有名花壇者。是花園中老根。尤粗劣。勿用。又大和本草曰。山野多有之。春日宿根出新芽。秋開碧花。或放白花。其花瓣有多至八層者。殊美觀。入藥。以碧花之根。冬日及正月採者為良。小根性薄。大者合用。此草以雞糞壅之。則肥茂。實生長極速。二年即開花。根亦大。花堪賞玩。叢生者花愈多。莖不高。又用藥須知曰。日本產桔梗。可用。其花有厚瓣。重瓣。色有紫白之別。其根亦有細大之分。入藥以小者為貴。藥舖稱楊枝手是也。一種名雞桔梗。日醫富遠志用。非是。又物類品隨

曰。桔梗。日本所在多有。花作紺碧色。或白花。紫花。或二色相雜。花瓣亦有單瓣。重瓣之異。近世製藥者。多於六月土用中。採掘其根。浸河水數日。待外皮爛。然後洗淨。曬乾。色純白。然氣味薄甚。宜八九月掘取。又日用藥品考曰。日本藥舖所售。俱本國產。如三原桔梗。竹原桔梗。白桔梗。皆夏月浸於流水。曬乾收用者也。惟氣味俱薄。其他尚有呼為生乾及楊枝手者。嫩根亦通用。又手板發蒙曰。日本方書稱桔梗為佛吉草。出金剛山者。曰金桔梗。出奧州者。曰相馬桔梗。別一種曰生乾桔梗。桔梗與遠志根有相同之效。中含有沙波寧。藥劑師清水如水氏嘗將其提出之物質研究之。定名曰普刺企嫩。

辨偽 ●鄭育巖曰。苦桔梗之根。結實而梗直。故有是名。非木上之梗也。近道處處有之。其根外白中黃。有心。味苦而辛。本經主治胸脇痛。如刀刺。腹滿腸鳴。胸膈驚恐。悸氣。其一種無心味甜者。莖危也。一名杏葉沙參。又名甜桔梗。性味功用。與桔梗大不相同。近今藥肆

因苦桔梗價貴。多以甜梗偽充。又有一種水口梗。性味更劣。服之安能見功耶。曹炳章曰。按桔梗出安慶古城山。色白有蘆。內起菊花心。味甜帶苦者佳。寧國府涇縣出者。形味略同。亦佳。其他如鎮江。全椒。滁州。白陽山。常州。宜興。天長。定遠。樽渚。各縣皆出色。黃白味甜均不道地。此藥乃開提肺氣。為手太陰要藥。須擇色白性糯飽。味苦而有心者用之。若味甜者。即莖危也。效用不同。不可混用耳。

近人學說 ●袁淑範曰。桔梗一名苦梗。為屬桔梗科 (Campanulaceae) 植物 Platycodon grandiflorum 之根。中醫以為祛痰鎮靜等之要藥。用於呼吸器病及神經系病。或以之代人參。用之以為能補五勞養氣之強壯藥。故自神農本草經已收之於藥品中矣。

●張山雷曰。桔梗功用。諸家所述。皆溫通宜泄。無論上焦下焦結滯之病。一例通治。獨潔古謂其為諸藥之舟楫。載以上行。至胸中最高之分。諸藥中有此一物。則不能下沈云云。總仲醇和之。謂其性陽而

九八二

上升。凡病氣逆上升者。弗用。及下焦藥中。弗入此味。張景岳之本草上。又大揚其旨。謂專用降劑。此物不宜同用。願按此說。不知易考。從何處悟入。本經別錄。皆無此意。殆誤認仲景千金桔諸方。或治咽喉喉痛。或治肺癆喘咳。皆主上焦之病。而云然。然試觀本草經。主腹滿腸鳴。別錄下焦毒。豈無下行之用。張隱庵辨之。謂桔梗氣分之藥。上中下皆可治。斥潔古為杜撰。然潔古景岳之說。今尚盛行於時。遂令通達三焦。宣陽行氣之功。不復信用於世。易老誤人。正是不淺。丹溪之言曰。乾咳嗽乃痰火之邪。鬱在肺中。苦桔梗以開提之。願按桔梗辛宜以治火鬱。未能脫貼。但輕用之。以溫為嚮導。尚無大弊。石頑謂痘疹下部不能起發。大忌桔梗。陰虛久嗽。不宜用。皆以其疏泄陽氣也。仲景甘桔湯。本治少陰咽痛。而後人乃以此方統治一切風熱實火咽痛。多未見其效者。則抹却少陰一層之過也。且自易老獨創桔梗上升之議。仲醇景岳石頑諸子。靡然宗之。而猶認定其為咽痛

專藥。就使桔梗果屬升提。則凡風熱實火諸喉咽病。正是火勢壅上之候。更與辛升。寧不抱薪救火。而益張其燄。奈何庸俗之流。猶昧然盲從。而執定甘桔爲咽痛之普通藥劑耶。

配合應用 ①治胸滿不痛。桔梗根殼等分。水二鍾。煎至一鍾。溫服。(南陽活人書方)

②治傷寒腹脹。陰陽不和也。桔梗半夏湯主之。桔梗半夏陳皮各三錢。煮五片。水二鍾。煎一鍾。溫服。(南陽活人書方)

③治痰嗽喘急。桔梗一兩半。爲末。用童子小便半升。煎四合。去滓溫服。(簡要濟衆方)

④治肺癆咳嗽。胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如粳米粥者。桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升。分溫再服。及朝暮吐膿血則瘳。(金匱方)

⑤治喉痺毒氣。桔梗二兩。水三升。煎一升。頓服。(千金方)

⑥治齒齲腫痛。桔梗。慈苳仁等分爲末服。(永類鈴方)

十靈 桔

⑦治骨槽風痛。牙根腫痛。桔梗爲末。棗飴和丸。阜子大。綿裹咬之。仍以荊芥湯漱之。(經驗方)

⑧治牙疳臭爛。桔梗。茴香等分。燒研傅之。(衛生易簡方)

⑨治肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。桔梗丸主之。桔梗一升。黑牽牛頭末三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服四十九丸。溫水下。日二服。(保命集方)

⑩治鼻出衄血。桔梗爲末。水服方寸匕。日四服。一加生犀角屑。亦治吐血下血。(普濟方)

⑪治打擊瘀血在腸內。久不消。時發動者。桔梗爲末。米飲下一刀圭。(肘後方)

⑫治中蠱下血如雞肝。晝夜出血石餘。四臟皆損。惟心未毀。或鼻破將死者。苦桔梗爲末。以酒服方寸匕。日三服。不能下藥。以物均口灌之。心中當煩。須臾自定。七日止。當食豬肝肺以補之。神良。一方加犀角等分。(古今錄驗方)

⑬治妊娠中惡。心腹水痛。桔梗一兩。剉水一鍾。生薑三片。煎六分溫服。(聖惠方)

⑭治小兒客忤。死不能言。桔梗燒研三錢。米湯服之。仍吞麝香豆許。(張文仲備急方)

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡陰虛火逆。及無風寒痺肺者禁用。畏白芨。龍膽草。忌豬肉。節皮爲之使。

著名方劑 ①桔梗白散。治咳而胸滿振寒。脈數咽乾。不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。(外臺方) 桔梗。貝母各三分。巴豆一分。(去皮熬令如脂) 上三味爲散。強人飲服半錢。已羸者減之。病在上膈者吐膿血。膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

②桔梗湯。治少陰咽痛。先與甘草湯。不瘳。與桔梗湯。(傷寒方) 桔梗一兩。甘草二兩。右二味。水二升。煮減半。去滓溫服。日二服。

參攷資料 ①朱肱活人書。治胸中痞滿不痛。用桔梗。枳殼。取其通肺利膈下氣也。張仲景傷寒論。治寒竇結胸。用桔梗。貝母。巴豆。取其溫中消穀破積也。又治肺癰。腫膿。用桔梗。甘草。取其苦辛清肺。甘溫瀉火。又能排膿血補內漏也。其

治少陰證二三日咽痛。亦用桔梗。甘草。取其苦辛散寒。甘平除熱。合而用之。能調寒熱也。後人易名甘桔湯。通治咽喉口舌諸病。宋仁宗加荊芥防風。連翹。遂名如聖湯。極言其驗也。(李時珍) ②乾咳嗽乃痰火之邪鬱在肺中。宜苦梗以閉之。痢疾腹痛。乃肺金之氣鬱在大腸。亦宜苦梗開之。後用劑藥。此藥能開提氣血。故氣藥中宜用之。(朱震亨) ③此草之根結實而梗直。故名。吳普本草一名利如。一名符冠。一名房。圖方書並無是。蓋亦度詞爾。桔梗。薺。乃一類。有甜苦二種。故本經桔梗一名薺。而今俗呼薺。爲甜桔梗也。至別錄始出薺。條分爲二物。然其性味功用皆不同。當以別錄爲是。(李時珍) ④今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉而長。櫛四葉相對而生。嫩時亦可食。食。夏開小花。紫碧色。頗似牽牛。秋後結子。八月採根。其根有心。若無心者爲薺。關中所出桔梗。根黃皮似芡。莖根莖細青色。葉小青色。似菊葉也。(蘇頌) ⑤凡使如

十靈 桔 柏 般 氣 泰 浙

用木梗。真似桔梗。只是咬之腥澀不堪。凡用桔梗。須去頭上尖硬二三分已來。并兩畔附枝子槐。枯上細剉。用生百合搗碎。緩火熬令乾。用每桔梗四兩。用百合二兩五錢。(雷斅)

【桔梗蘆頭】 主治 吐上膈 風熱痰實。生研末。白湯調服一錢。探吐。

【柏油】 卽烏柏子油之原名。詳『烏柏子油』條。

【般孽】 命名 本品生於石上。隱然如木之孽也。故名。

古籍別名 豎石(綱目) 基本 般孽爲石類之一種。乃鐘乳之根。附石而生。可供藥用。

產地 出山谷中。

性質 辛溫無毒。 主治 爛傷瘰癧。洩痢。寒熱。鼠瘻。癩癧。結氣。脚冷疼弱。(本經) 煎筋骨弱。并痔瘡。及下乳汁。(別錄)

施用宜忌 惡防己畏朮。

【氣包魚】 卽河豚之古籍別名。典見綱目。詳『河豚』條。

【氣砂】 卽礪砂之古籍別名。典見圖經本草。詳『礪砂』條。卽礪

砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礪砂』條。

【氣酒】 卽燒酒之古籍別名。典見綱目。詳『燒酒』條。

【氣殺耶草】 卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【氣結】 產地 出交趾。真臘。占城。瓊海等處。

主治 噎膈。

參攷資料 此乃伽楠香樹中空腹內所結。藉伽楠芬烈之氣。得日月雨露之精華。凝結而成。故名。

氣結形亦同香塊。而酥潤鬆膩。不甚堅大。約伽楠得其質。此得其魂。亦如天生黃出湯泉。爲硫氣薰結而成者。然頗難得。世不見多者也。(單斗南)

【氣盤蟲】 卽行夜之古籍別名。典見本草集註。詳『行夜』條。

【氣攀】 卽行夜之古籍別名。典見綱目。詳『行夜』條。

【泰和老雞肉】 命名 本品爲雞之出於江西泰和。吉水諸縣。家家畜之。近則五六年。遠則一二十年者。故名。

性質 甘辛熱無毒。

九八四

主治 內托小兒痘瘡。參攷資料 泰和老雞。俗傳能發痘瘡。待痘瘡發時。以五味煮爛。與兒食。甚則加胡椒及桂附之屬。此亦陳文中治痘用木香異攻散之意。取其能助溼熱發膿也。風土有宜不宜。不可以爲法。(李時珍)

【浙朮】 卽白朮之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『白朮』條。

【浙貝母】 命名 本品爲產於浙江者。功用別於川貝。故名。

處方用名 象貝母。

產地 浙江省皆有出。其中尤以寧波象山出者爲最佳。

形態 皮糙。獨顆無瓣。頂圓心斜。

性質 苦寒無毒。

主治 化痰止咳。開宣肺氣。

配合應用 本經遠原云。貝母新產者。治疝瘕。喉痺。乳癰。金瘡。風溼。一切癰瘍。同苦參。當歸。治妊娠小便難。同青黛。治人面惡瘡。同遠志。治項上結核。皆取其閉鬱散結。化痰解毒之功也。

參攷資料 寧波象山所出

貝母亦分兩瓣。味苦而不甜。其頂平而不尖。不能如川貝之象。荷花蕊也。土人於象貝中揀出一二。與川貝形似者。以水浸去苦味。曬乾。充川貝賣。但川貝與象貝。性各不同。象貝苦寒。解毒利痰。開宣肺氣。凡肺家扶風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺矣。不若用象貝治風火痰嗽爲佳。若虛寒咳嗽。以川貝爲宜。(葉開齊) 象貝味大苦。性寒。陰也。時也。乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥。大治肺癰。肺痿。咳嗽。吐血。衄血。最降痰氣。善調鬱結。止疼痛。消脹滿。清肝火。明目。除時氣。煩熱。黃疸。淋閉。便血。瀉血。解熱毒。殺諸蟲。及療喉痺。瘰癧。乳癰。發背。一切癰瘍。腫毒。溼熱惡瘡。痔漏。金瘡。出血。火瘡。疼痛。爲末。可敷煎湯。可服。性味俱厚。較之川貝。母清降之功。不啻數倍。反烏頭。又解上焦脾胃之火。

【浙芩】 卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【浙烏頭】 古籍別名 附片。蒟。綱目拾遺。鸚哥菊。

(俗名)

鹽地 出於浙江錢塘寬橋。
主治 取根浸酒服。追風活血。
爲風痰要藥。

【浙茯苓】卽茯苓之處方用名。詳「茯苓」條。

【浙驢皮膠】 命名 本品係浙人所造之黑驢皮膠。故名。

製法 其造法一如造阿膠式。但用杭屬臨平鎮寶莊渡地方之泉水煎熬而成。赤黑色帶絲。頂有猪鬃紋。與東阿所造無二。入藥亦頗有效。

主治 內傷腰痛。強力伸筋。添精固腎。並補血潤燥。功同阿膠。

參攷資料 阿膠真者難得。有浙膠。則較勝於用雜膠也。寶莊在臨平湖西岸。有寶莊泉。土人名爲大力水。云食之多力。向聞虎跑泉水。注大缶中。平日投錢於中。能吞一百六十青錢。而水不溢。他水至八十已浸漫於外矣。而寶莊水。能吞二百青錢不溢。其力更勝可知。以此水作膠。自可敵伏流之濟水。蓋其含有特殊之礦質。故功亞阿膠（綱目拾遺）

【澆草】卽天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【浮小麥】 處方用名 浮麥。古籍別名 蘇麥（和漢藥考）

基本 係小麥水淘淨起者。鹽地 凡產麥區域恒有之。

形體 浮麥之形色與小麥同。惟浮麥中虛體輕。故能浮水也。

採取 夏四五月間。採取曬乾。

製法 淘淨焙用。

性質 甘。鹹。寒。無毒。

效能 清飲。止汗。用作解除虛熱藥。

主治 益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人勞熱。

配合應用 治虛汗盜汗。用浮小麥。文武火炒爲末。每服二錢半。麥熟切片。米飲下。日三服。或煎湯代茶飲。一方以猪鬃唇蘸食亦良。（衛生寶鑑方）

參攷資料 蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛。及瘡瘍腫爛。沾漬。或小兒暑月。出痘瘡潰爛。不能著席。睡臥者。並用夾襪蘸蘇蘇合。藉臥性涼而輒。誠妙法也。

【浮石】卽浮海石之原名。詳「浮海石」條。

【浮貝】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【浮根石】卽葵之古籍別名。典見綱目。詳「葵」條。

【浮海石】 原名 浮石。命名 本品體輕而多氣孔。入水則浮海中。故名。

古籍別名 水花（拾遺）羊肚石。海南石。玉脂芝（和漢藥考）

外國名詞 Bigstone（拉丁）

基本 火山噴出之花崗岩。消失中存之珪酸鐵等可溶性物質。而但遺石灰質及雲母質之物。其在海濱者。更爲海水溶解。失其成分。而似海綿。且被波浪磨擊。微呈圓形。入藥以得海濱者爲良。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海石產廣東新安。平海。水東等處。

形體 浮海石爲疎鬆極輕之塊。色有多種。或白。或灰白。或帶黃。或青黑。有類似玻璃或絹絲之光澤。質雖堅而甚脆。有無數大小之氣孔。破碎面作貝殼狀。硬度概爲四·五。比重二·一至二·五。投

水中。則上浮而不沈。以其多氣孔故也。因是又有輕石之名。

製法 洗淨煨過水飛用。

性質 咸。平。無毒。

成分 出於火山者。與海岸所產者。成分雖略有不同。大都含有珪酸。礬土。石灰。苦土。養化鐵。養化錳。鉀。鈉等。

效能 消老痰結核。清肺金降火。用治諸淋及咳痰藥。

主治 麥汁飲。止渴治淋。殺野獸毒。

歷代醫述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論浮海石曰。止咳。【宋】寇宗奭本草衍義論海石曰。去目昏。【元】朱丹溪本草衍義補遺論海石曰。清金降火。消積塊。化老痰。【明】李時珍本草綱目論海石曰。消癭癭。結核。疝氣。下氣。消瘻。腫。【明】李士材本草圖解論海石曰。海浮石乃水沫結成。色白體輕。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。故入肺除痰嗽。而輒擊。上源既清。故又治諸淋。咳逆由於虛氣上沖者。勿用。按飲由於脾胃元虛者。忌之。【清】黃宮繡本草求真論浮海

十畫 浮

石曰。海石即書所云浮石者是也。其石係水沫結成。浮於水上。故以浮名。色白體輕。味鹹氣寒。蓋既有升上之能。復有達下之力。其日能治止焦痰熱。目睛痘癰者。以其氣浮上達之謂也。能治諸淋積塊。癭瘤者。以其鹹潤軟堅之意也。至於實則宜投。虛則忌服者。以其忌有尅削之氣也。味鹹者良。煨過水飛用。

配合應用 治咳嗽不止。浮石末。湯服。或蜜丸服。(肘後方)

治消渴引飲。浮石。舶上青黛等分。磨香少許爲末。溫湯服一錢。又方。用白浮石。蛤粉。蟬殼等分爲末。鯽魚膽汁七個。調服三錢。神效。(本事方)

治血淋砂淋。小便澀痛。用黃烟浮石爲末。每服二錢。生甘草煎湯調服。(直指方)

治石淋破血。浮石滿一手爲末。以水三升。酢一升。和羹二升。澄清。每服一升。(傳信適用方)

治小腸疝氣。莖積囊腫者。直指方用浮石爲末。每服二錢。木通。赤茯苓。麥門冬煎湯調下。又用海

石。香附等分爲末。每服二錢。薑汁調下。(丹溪方)

治頭核腦瘰。頭枕後生核核。正者爲腦。側者爲痺。用輕虛白浮石燒存性爲末。入輕粉少許。麻油調掃塗。勿用手按。即濕。或加焙乾黃牛糞尤好。亦治頭瘻。(直指方)

治底耳有膿。海浮石一兩。沒藥一錢。麝香一字爲末。擦淨吹之。(普濟方)

治疳積不愈。海浮石燒紅。醋淬數次。二兩。金銀花一兩爲末。每服二錢。牛水煎服。病在上食後。在下食前。一年者半年愈。(儒門事親方)

治疔瘡發背。白浮石半兩。沒藥二錢。半爲末。醋糊丸。梧子大。每服六七丸。臨臥冷酒下。亦治諸般惡瘡。(普濟方)

用量 三錢至四錢。施用宜忌 凡氣血兩虛。及痰飲寒嗽者禁用。

參攷資料 遠行無水。止渴。和苦栝樓爲丸。每旦服三十九丸。永無渴也。(陳藏器) 浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久而結成者。

狀如水沫及饅乳石。有細孔如蛙窠。白色體虛而輕。今皮作家。用磨皮垢甚妙。海中者味鹹。入藥更良。(李時珍) 燒泥爲瓦。燻木爲炭。水沫爲浮石。此皆去其柔脆。變爲堅剛也。交州記云。海中有浮石。轉虛。如以磨脚。煮水飲之。止渴。即此也。(抱朴子)

浮蛆 卽酒醱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳酒醱條。

浮麥 卽浮小麥之處方用名。詳浮小麥條。

浮留 卽菹營之古籍別名。典見食療本草。詳菹營條。

浮留藤 卽菹營之古籍別名。詳菹營條。

浮萍 原名 水萍。類不同。蓋無根以入水底土中。而輕浮水面。隨風蕩漾。故名。

處方用名 浮萍草。紫背浮萍。古醫別名 荇。水花。水衣。水蘇。


水白。蛙食。魚食。池星。鴨。浮萍。水蠟。九子萍。水中萍。子草。(和漢藥考)

基本 屬浮萍科植物。爲水中

九八六

之浮萍。

產地 多在池澤溝渠深水間。形態 浮萍爲一年生草。三葉相集。浮於水面。葉爲扁平之倒卵圓形。大二三分。有光澤。面綠色。背紫紅色。葉下多鬚根。夏開淡綠色小花。此草浮遊不定。隨風所至。吸收溶解水中之養分。故生長旺盛。



萍 浮

種類 大者曰蘋。中者曰荇。小者曰萍。蘋荇葉大。雖生水而有根。直入水底土中。與小者浮萍迥然不同。浮萍有背面粉綠者。有面背皆紫赤者。血者。入藥以紫背爲良。古今要覽稱第四百六十五卷浮萍條云。本草綱目荇菜集解。庚辛玉冊云。燒葵花爲荇菜。白花爲白蘋。卽水鏡草之一。水鏡草。荇之別名也。詩召南。于以采蘋。古之所謂蘋。今之大萍也。俗呼水蠟。泡子。亦曰蘭山。此萍八月抽莖開花。早者五月卽開。七月結實。色綠。

小於蓮子。五六月間開花者。在莖之一寸四五分處。三瓣白色。能結實。其開花遲者。則開於莖下之一寸許。色綠。不結實。入藥用此種。水萍有青萍。品字藻。槐葉藻。滿江紅。種種。青萍及品字藻。俱屬浮萍科植物。槐葉藻及滿江紅。俱屬槐葉藻科植物。凡止水中。處處皆有之。青萍葉長。兩面皆綠。品字藻三葉相附。色較淡。槐葉藻。則如山椒。生四五葉。色深綠。根細長一二寸。色黃褐。性柔輭。以其葉形如槐葉。故名。滿江紅葉簇生。色紅紫。經冬不凋。別有一種紫背浮萍。俗呼爲家鴨之餌。生於三月。故禮月令云。春季萍始生。此草入冬。經霜即枯。沈於水底。明年三月。又復上浮。生葉繁茂。葉面色綠。葉背色紫。有細根入藥用。

主治 暴熱身癢。下水氣。勝酒。長髮。止消渴。久服輕身。(本經)下氣。以沐浴生毛髮。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論浮萍曰。搗汁服。主水腫。利小便。爲末。酒服。方寸匕。治人中毒。爲膏。傅面。點【宋】大明諸家本草論浮萍曰。治熱毒風熱。熱狂。癩腫。毒湯火傷。風癰。【明】李時珍本草綱目論浮萍曰。主風溼麻痺。脚氣。打撲傷損。目赤翳膜。口舌生瘡。吐血。衄血。癩風。丹毒。【明】繆希雍本草經疏論浮萍曰。水萍。專得水氣之清陰。故味辛。氣寒。別錄。兼酸無毒。蓋其體輕浮。其性清燥。能祛溼熱之藥也。熱氣鬱於皮膚。則作癢。味辛而氣清寒。故能散皮膚之溼熱也。寒能除熱。燥能除溼。故下水氣。酒性溼熱。而萍之質不沈於水。其氣味辛寒。輕清而散。故能勝酒。血熱則髮髮焦枯而易墮。涼血則營氣清而髮髮自長矣。別錄。主消渴者。以溼熱之邪去。則津液自生。而渴自止也。其曰下氣。以沐浴生毛髮者。亦以寒能除熱。涼血之驗也。熱邪不干。營氣清旺。則能

獲輕身矣。【清】黃宮繡本草求真論浮萍曰。浮萍於水上。體輕氣浮。辛寒。古人謂其發汗勝於麻黃。下水捷於通草。一語括盡浮萍治功。故凡風溼內淫。癢淡不舉。在外而見肌膚瘙癢。一身暴熱。在內而見水腫不消。小便不利。用此殊肌通散。俾風從外散。溼從下出。而癰與痰。其悉除矣。至本經載長髮。髮者。以毛竅利而血脈榮也。止消渴者。以經氣和而津液復也。勝酒者。以陽明通達而能去酒毒也。總皆因其體浮。故能散風。因其氣寒。故能勝熱。因其產於水上。故能以水利水耳。用浮萍其背紫色。爲末。蜜丸。彈子大。空心酒服。然必大質大熱。方可用此。若表虛自汗者。其切禁焉。燒酒辟蚊亦佳。但氣虛切勿近此。【清】黃元御玉楸藥解論浮萍曰。浮萍辛涼發表。治瘧疫斑疹。療肌肉麻痺。中風喎斜。癱瘓。醫難。疽熱腫。隱疹。瘙癢。楊梅粉刺。汗斑。皆驅。利小便。閉癰。消肌膚腫脹。止吐衄。長髮。髮。

外達皮毛。發汗溼熱。下通水道。皆其天然之性情作用。本經別錄。大明。謂家主治。無不在此範圍之內。然而色綠而背色紅紫。則又不僅專入氣分。而亦必兼清血熱。故聖濟以治吐血不止。聖惠方又治鼻衄。瀕湖以治目赤口瘡。既善清火。而又導熱下行。其效良捷。近人止以爲發汗之藥。而不知清熱正其專長。殊覺未盡其用。且其質最輕。氣味皆薄。雖曰發汗。性非溫熱。必無過汗之慮。而俗子畏之多不敢用。則綱目所引去風丹一方。有鐵鑊頭上也。出汗一句之故。張石頑因之。亦謂去風丹治大風。扇風等皆驗。且有發汗勝於麻黃之句。蓋皆未嘗於物理上體驗之耳。醫頤按瀕湖所引去風丹一詩。不知何本。據其所稱。東京石磧。梵書大篆人不能曉。真人林某逐字辨譯云。云。頤謂既梵字。斷無逐字譯之。卽成七言詩句之理。且大篆之與梵字。風馬牛不相及。何以梵字而有。大篆之名。其爲妄人僞造。不攻自破。據其所治有左癱右瘓。三十六種風等說。淺俗已極。明是無知方

十畫 浮

十畫 浮

士。櫻壁虛構。且更有胎孕有傷。服過百粒。即為全人云云。不成文理。可鄙孰甚。李氏不知抉擇。貪多務得。取盈篇幅。徒亂人意。殊可哂矣。

配合應用 治夾驚傷寒。紫背浮萍一錢。犀角屑半錢。鈞藤鈞三七個。為末。每服半錢。蜜水調下。連進三服。出汗為度。(聖濟總錄方)

治消渴飲水。日至一石者。浮萍搗汁服之。又方。用乾浮萍。栝樓根等分為末。人乳汁和丸。梧子大。空腹飲服二十九。三年者數日愈。(千金方)

治小便不利。膀胱水氣澆滯。浮萍日乾為末。飲服方寸匕。日二服。(千金方)

治水氣洪腫。小便不利。浮萍日乾為末。每服方寸匕。白湯下。日二服。(聖惠方)

治霍亂心煩。用蘆根炙一兩。水萍焙。人參。枇杷葉炙各一兩。每服五錢。入薤白四寸。酒煎溫服。(聖惠方)

痘水調下。(聖濟總錄方) 治鼻衄不止。用浮萍末吹之。(聖惠方) 治中水毒病。手足指冷至膝肘。即以浮萍日乾為末。飲服方寸匕。良。(姚僧坦集驗方) 治大腸脫肛。水聖散。用紫浮萍為末。乾點之。(危氏得效方) 治身上虛癢。用浮萍末一錢。以黃芩一錢。同四物湯煎湯調下。(丹溪纂要方) 治風熱癢癢。浮萍蒸過。焙乾。牛蒡子酒煮。曬乾。炒各一兩。為末。每薄荷湯服一二錢。日二次。(古今錄驗方) 治風熱丹毒。浮萍搗汁遍塗之。(子母秘錄方) 治汗斑癩風。端午日收紫背浮萍。曬乾。以四兩煎水浴。并以萍擦之。或入漢防己二錢亦可。(袖珍方) 治少年面皰。浮萍日投。密之。并飲汁少許。(外臺秘要方) 又用紫背萍四兩。防己一兩。煎濃汁洗之。仍以萍於斑對上熱擦。日三五次。物雖微末。其功甚大。不可小看。

治粉滓面黚。溝渠小萍為末。日傅之。(聖惠方) 治大風癩疾。浮萍草。三月採。淘三五次。密三五日。焙為末。不得見日。每服三錢。食前溫酒下。又方。七月七日。取紫背浮萍。日乾為末。半升。入好消風散五兩。每服五錢。水煎類飲。仍以煎湯洗浴之。(十便良方) 治癩瘡入目。浮萍陰乾為末。以生羊子肝半個。同水半盞。煮熟。搗爛絞汁。調末服。甚者不過一服。已傷者十服見效。(危氏得效方) 治腎內翳睛。青萍少許。研爛。入片腦少許。貼眼上效。(危氏得效方) 治毒腫初起。水中萍子草。搗傅之。(肘後方) 治發背初起。腫嫩赤熱。浮萍搗和雞子清貼之。(聖惠方) 治楊梅瘡。水萍煎汁。浸洗半日。數日一作。(集簡方) 治燒煙去蚊。五月取浮萍陰乾用之。(孫真人方) 用量 八分至錢中。

九八八

施用宜忌 凡非實熱實邪者禁用。

卷致益料 浮萍發汗。勝於麻黃。(朱震亨) 俗醫用治時行熱病。亦堪發汗。甚有功。方用浮萍一兩。四月十五日採之。麻黃去根。箭。桂心。附子。炮裂。去脾皮。各半兩。四物搗細篩。每服一錢。以水一中盞。生薑半分。煎至六分。和滓熱服。汗出乃瘳。又治惡疾癩瘡。遍身者。濃煮沐浴。平日多效。此方甚奇古也。(蘇頌) 浮萍其性輕浮。入肺經。達皮膚。所以能發揚邪汗也。世傳宋時東京開河。掘得石碑。梵書大篆一詩。無能曉者。真人林靈素逐字辨譯。乃是治中風方。名去風丹也。詩云。天生靈草無根幹。不在山間不在岸。始因飛絮逐東風。汎梗背青飄水面。神仙一味去沈疴。探時須在七月中。選其纏風與大風。些小微風都不算。豆淋酒化服三丸。鐵鑊頭上也出汗。其法以紫色浮萍。曬乾為細末。煉蜜和丸。彈子大。每服一粒。以豆淋酒化下。治左癱右瘓。三十六種風。偏正頭風。口眼喎斜。大風癩風。一切無名風。

及脚氣并打撲傷折及胎孕有傷

服過百粒即爲全人此方後人易

名紫萍一粒丹(李時珍)◎本草

所用水萍乃小浮萍非大蘋也陶

蘇俱以大蘋註之誤矣萍之與蘋

音雖相近字却不同形亦迥別浮

萍處處池澤止水中甚多季春始

生或云楊花所化一葉經宿即生

數葉葉下有微鬚即其根也一種

背面皆綠者一種面背皆紫赤若

血者謂之紫萍入藥爲良七月採

之淮南萬畢術云老血化爲紫萍

恐自有此種不盡然也小雅呦呦

鹿鳴食野之苹者乃蒿屬陸佃指

爲萍誤矣(李時珍)
【浮萍草】即浮萍之地方用名詳
【浮萍】條

【浮萍】即浮萍之古籍別名典見

和漢藥考詳【浮萍】條

【浮爛羅勒】 產地 生康國

形態 浮爛羅

勒爲喬木類之一種其皮似厚朴

可供藥用
性質 酸平無毒
主治 一切風氣開胃補心除
冷痺調臟腑

【浴香】◎即檀香之古籍別名典

見綱目詳【檀香】條◎即乳香之

古籍別名典見綱目詳【乳香】條

【海人草】即鵝鵝菜之古籍別名

典見和漢藥考詳【鵝鵝菜】條

【海山仙人】即荔枝之古籍別名

典見和漢藥考詳【荔枝】條

【海仁草】即鵝鵝菜之古籍別名

典見和漢藥考詳【鵝鵝菜】條

【海巴子】即貝子之古籍別名典

見和漢藥考詳【貝子】條

【海月】 命名 本品蛤類也形

似半月故名

古籍別名 玉瑠明瓦江瑠馬

類馬甲(綱目)
外國名詞 Eucosta Place-
na Linn. Window Shell
(拉丁) ヲドガヒ(日本)
基本 係軟體動物瓣鰓類無
管類單柱類海月科爲海月之殼
其肉詳見該條
產地 生閩粵海濱間
形態 海月爲介類之一種其
殼圓形而扁色澤似雲母而質透
明較合部在右殼有二齒與左殼
之二溝相對脚無足絲棲於海濱

砂土腹中有小蟹飢則蟹出覓食

飽則海月亦飽以火近之蟹出而

海月斃其殼透明可供遮窗與藥

用
性質 甘辛平無毒

主治 消渴下氣調中利五臟

止小便消腹中宿物令人易飢能

食生薑醬同食之
【海月肉】 性質 甘辛平無毒

主治 消溼熱療癰

腫風煎湯洗之
【海牛】 命名 本品有角如牛

故名

產地 出東海中

形態 海牛爲介類海螺之一

種頭有硬角尖銳有紋身蒼色有

龜背紋腹部黃白色有筋頂花點

魚尾可供藥用
性質 鹹溫無毒
主治 益腎固精與腸
【海石榴】即石榴高一二尺即結

【海男子】即海參之大而有刺者

詳【海參】條

【海芋】 命名 本品根形似芋

故名

古籍別名 羞天草(玉册)觀

音蓮天荷隔河仙(綱目)

外國名詞 Alouatta Macro-
rhiza, Schott. (拉丁) アンシ
ウイモ(日本)

基本 係天南星科海芋屬爲

海芋之根
產地 生山野間
形態 海芋爲蕁草類之野生

草本春月生苗高四五尺葉似芋

葉而有幹夏秋間抽莖開花如一

瓣蓮花碧色花中有蕊長作穗狀

其根可供藥用
性質 辛有大毒
主治 瘡癤毒腫風癩伏磁砂

【海松子】 命名 本品乃海松

樹之子實故名
地方用名 松子仁海松實
古籍別名 孔雀松(綱目)
一叢五葉者名五鬣松新羅松子
(綱目)朝鮮松(日本)栝子松

十畫 海

(西陽雜俎)松實(俗名)

外國名詞 Pinus Korean.

Pinus S. of N. (拉丁) テウセン

マツ テウセンゴエウ(日本)

基本 係松杉科松屬。為海松

之子仁。

產地 寒地恒有出。醫學大辭

典曰。產關東及直隸等處。

形態 海松子為栗果類之常

綠喬木。高至數丈。有三樹脂道。葉

作長針形。往往五葉相叢。生花單

性。雄花與雄花同株。果實甚大。為

毬果。呈長卵形。長約六七寸。各鱗

片間有二子。長五分許。有脂氣。甚

香美。大如巴豆。上有三稜。一端略

尖。



海松子

採取 七八月間採之。過時即

散落難收也。

製法 採得剝去殼。取仁用水

煎。或搗研和藥。

性質 甘。小溫。無毒。

效能 通虛秘。治風痺。用作潤

燥鎮咳藥。又為祛風頑痺藥。

主治 逐風痺寒氣。虛羸少氣。

補不足。潤皮膚。肥五臟。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論海松子曰。主諸風。溫腸

胃。久服輕身延年不老。【宋】開寶

重定新本草論海松子曰。骨節風

頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟

不饑。【宋】寇宗奭本草衍義論海

松子曰。同柏子仁治虛秘。【明】李

時珍本草綱目論海松子曰。潤肺

治燥結咳嗽。【明】繆希雍本草經

疏論海松子曰。海松子氣味香美

甘溫。甘溫助陽氣而通經。則骨節

中風水氣。及因風頭眩死肌自除

矣。氣溫屬陽。味甘補血。血氣充足

則五臟自潤。髮白不飢。所由來矣。

仙方服食。多餌此物。故能延年輕

身不老也。【清】王士雄隨息居飲

食諸論海松子曰。海松子甘平潤

燥。補氣充飢。養液息風。耐飢溫胃

通腸辟濁。下氣香身。最益老人。果

中仙品。宜看宜留。服食所珍。

配合應用 服松子法。七月

取松實。去木皮。搗如膏收之。每服

雞子大。酒調下。日三服。百日身輕。

三百日行五百里。絕穀。久服神仙。

渴即飲水亦可。以練過松脂同服

之。【聖惠方】

治肺燥咳嗽。蘇遊風發湯。用

松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏和

熱蜜牛兩收之。每服二錢。食後沸

湯點服。【外臺秘要方】

治小兒寒咳。或作壅喘。用松

子仁五個。百部炒。麻黃各三分。杏

仁四十個。去皮尖。以少水略煮三

五沸。化白砂糖丸。茨子大。每食後

含化十九大妙。【錢乙小兒方】

治大便虛秘。松子仁。柏子仁。

麻子仁等分。研泥。溶白蠟和丸。梧

子大。每服五十丸。黃芪湯下。【寇

氏方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃薄便瀉及有

溼滯痰飲者禁用。

參攷資料 服食家用松子。

皆海松子。曰中國松子。肌細力薄。

只可入藥耳。按列僊傳云。僊徒好

食松實。體毛數寸。走及奔馬。又僊

子少在黑山。食松子茯苓。壽數百

歲。又赤松子好食松實。天門冬。石

脂。齒落更生。髮落更出。莫知所終。

皆指此松子也。【李時珍】新羅

松子甘美大溫。去皮食之甚香。與

雲南松子不同。雲南松子似巴豆。

其味不及。與卑古國偏桃仁相似。

多食發熱毒。【李珣】按醫說云。

食胡羊肉。不可食松子。而物類相

感。志云。凡雜色羊肉。入松子則無

毒。其說不同何哉。【李時珍】海

松子出遼東及雲南。其樹與中國

松樹同。惟五葉一叢者。繆內結子

大如巴豆。而有三稜。一頭尖。爾久

收亦油。中國松子。大如柏子。亦可

入藥。不堪果食。按段成式西陽雜

俎云。子種五鬣松二株。根大如碗

結實與新羅南詔者無別。其三鬣

者。俗呼孔雀松。亦有七鬣者。或云

三鬣者為栝子松。五鬣者為松子

松。【李時珍】

【海松根】即長松根之古籍別名。

典見植物名彙。詳長松根條。

【海松實】即海松子之處方用名。

詳海松子條。

【海狗油】即腦髓油之原名。詳

腦髓油條。

【海狗腎】即腦髓之處方用名。

詳見肺脾條。

【海金沙】

命名 本品質細色黃故名謂之海者神異之也俗名竹園葵者象葉形也

古籍別名 竹園葵(俗名)

外國名詞 Lycodium jap. onium, Sw.(拉丁)

基本 屬海金沙科。為其葉背之孢子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海金沙以湖南四川等所產為上。乃升金沙所結之粉。體輕。色紅棕者為佳。廣東英德清遠亦有之。又有名土金沙。乃燈心花仁出產香禺大石。



海金沙

形態 海金沙為多年生羊齒類。春日從宿根生苗。及長則成莖莖質硬而有光澤。纏繞他物。長達數尺。葉為分裂之複葉。梢頭小葉類蕨葉背之邊緣。皆微作卷狀。中

十靈海

並列子莖。一端稍作帽狀。孢子為可動性輕粉末。呈黃褐色。逢火則燃燒如石松子。秋季取梢葉於紙上曬乾。則子莖落集其上。謂之海金沙。供藥用。

採取 秋七月間採葉收之。

性質 甘寒無毒。

效能 滲溼熱。適五淋。用作鎮靜及利水藥。

主治 通利小腸。得梔子。馬牙消。蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海金沙曰。治溼熱腫滿。小便熱淋。膏淋。血淋。石淋。莖痛。解熱毒。【明】繆希雍本草經疏論海金沙曰。海金沙味甘淡。氣寒。性無毒。甘寒淡滲之藥。故主通利小腸。得牙硝。梔子。皆鹹寒苦寒之極。又得蓬沙之辛。所以能治傷寒熱狂。大熱當利小便。此釜底抽薪之義也。淡能利竅。故治熱淋。血淋。膏淋等病。乃手太陽小腸經之藥也。

【清】黃宮繡本草求真論海金沙曰。海金沙味甘而淡。氣寒無毒。為主通利小腸血分要藥。凡小腸熱閉。而見五淋疼痛不止者。服之使

熱盡從小便而出。且於傷寒熱閉。而見腹滿狂燥。則當於此加梔子。朴硝。蓬沙。投治。俾熱亦從小便而出。此釜底抽薪之一義也。但腎臟真陽不足切忌。淘淨取浮者曬乾。燃之不沾指者真忌火。

配合應用 治熱淋急痛。海金沙草陰乾為末。煎生甘草湯。調服二錢。此陳總領方也。一加滑石(夷堅志方)

治小便不通。脾下滿悶。海金沙一兩。臘南茶半兩。搗碎。每服三錢。生薑甘草煎湯下。日二服。亦可米服(圖經本草方)

治膏淋如油。海金沙。滑石各一兩。甘草梢二錢半為末。每服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。(仁存方)

治血淋痛澀。但利水道。則清濁自分。海金沙末。新汲水。或沙糖水服一錢。(普濟方)

治脾溼腫滿。腹脹如鼓。喘不得臥。海金沙散。用海金沙三錢。白朮四兩。甘草半兩。黑牽牛頭末一兩半為末。每服一錢。煎倒流水調下。得利為妙。(東垣關室秘藏方)

治痘瘡變黑歸腎。用竹園葵草煎酒傳其身。即發起。(直指方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡虛而無溼熱者禁用忌火。

參攷資料 出黔中郡。湖南亦有生。作小株。高一二尺。七月收其全科。於日中曝之小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細砂落紙上。且擊且擊。以盡為度。(劉禹錫)

江浙湖。川。陝皆有之。生山林下。莖細如線。引於竹木上。高尺許。其葉細如圓莖葉。而其薄。背面皆青。上多皺文。皺處有砂子。狀如蒲黃粉。黃赤色。不開花。根極堅強。其砂及草皆可入藥。方士採其草。取汁煮砂縮汞。(李時珍)

海金沙生於葉上。小腸膀胱血分藥也。熱伏二經血分者宜之。故小便熱淋莖痛為要藥。(張石頑)

海金沙子結葉間。如膽附肝之象。三焦與膽通。惟膽中相火結。三焦之水乃結。此藥以結解結。(唐容川)

海金沙草上結砂。亦所含之精英也。氣輕上浮。宜入心肺。砂墜下墜。則入二腸。甘淡則能滲溼去熱。色黃赤則入

九九一

血分。故主治五淋毒痛。腫。下熱。除則上熱亦息。(汪雙池)

【海南石】即浮海石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮海石』條。

【海南楨】即楨榔之處方用名。詳『楨榔』條。

【海砂】即食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【海紅】 古籍別名 海棠梨。(綱目)

產地 出海外。

形態 海紅為山果類之一種。即海棠梨之果實。如木瓜而小。二月開紅花。八月實熟。採得可供藥用。

性質 酸。甘。平。無毒。

主治 止洩痢。

【海紅豆】 命名 本品大如紅豆故名。

產地 生南海諸地。

形態 海紅豆為喬木類之一種。樹高二三丈。葉似梨葉而剛。春開白花。花後枝間結莢。其子略扁。累累如線珠。皮紅肉白。可供藥用。

性質 微寒。有小毒。

主治 人黑皮。野醫花癩。頭面

遊風。宜入面藥及澡頭。

【海紅柑】即柑之樹小實大。皮厚色紅者。典見綱目。詳『柑』條。

【海胡桃】即甘劍子之古籍別名。典見綱目。詳『甘劍子』條。

【海苔】即乾苔之古籍別名。典見綱目。詳『乾苔』條。

【海若白事小吏】即烏鰂骨之古籍別名。典見醫經本草。詳『烏鰂骨』條。

【海孫】即王孫之齊地別名。詳『王孫』條。

【海扇】即車渠之古籍別名。典見綱目。詳『車渠』條。

【海根】 形態 海根為溼草類之一種。多生山谷中。莖色赤。葉似馬藜。其根形似菝葜。可供藥用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 霍亂中惡。心腹痛。鬼氣疰作。飛尸。喉痺。蠱毒。癰疽。惡腫。赤白遊癆。蛇咬大毒。酒及水磨服。并傳之。

【海桐皮】 命名 本品樹似桐而皮黃白有刺故名。

古籍別名 刺桐皮。(綱目)木

棉樹皮。(藥物生產辨)

基本 屬海桐花科。為海桐之木皮。海桐為落葉喬木。高數尺。木幹皆有刺。葉圓大。稍似梧桐。甚繁密。春暮色深紅。花附幹生。側數如掌形。若金鳳。其子實似楓。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海桐皮產廣東博羅。各省亦有出。

形態 似梓白皮而堅韌。

製法 與他藥水煎。或酒浸服。或到末和作丸散。

性質 苦。平。無毒。

效能 祛風。溼。利經絡。治頑痺。療脚氣。用治風溼痺痛藥。

主治 霍亂中惡。赤白久痢。除疝。疔疥。牙齒蟲痛。並煮服及含之水。浸洗。日除膚赤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論海桐皮曰。主治腰脚不遂。血脈頑痺。腿膝疼痛。赤白瀉痢。

【明】李時珍本草綱目論海桐皮曰。去風殺蟲。煎湯洗赤目。【清】黃宮繡本草求真論海桐皮曰。海桐皮辛苦而溫。能入肝經。血分。祛風除溼。及行經絡。以達病所。是以腰膝脚痛能療。赤白瀉痢能止。蟲牙

風痛。煎湯漱之。能愈。疝。癩。疥。瘡。磨汁塗之。能治。目赤。膚癢。浸水洗之。能退。一皆風祛溼散之力。用者須審病自外至則可。若風自內成。未可妄用。須隨症酌治可耳。

近人學說 張山雷曰。海桐皮唐人李珣海藥本草。謂此木生南海山谷中。似桐而皮黃白色有刺。故名海桐。亦名刺桐。蘇頌謂生南海及雷州近海諸郡。皮堅韌。可作繩索。入水不爛。游頤按物實如此。其力在皮。故入藥能外治皮膚之病。祛風逐溼而亦宜通絡脈。可療頑痺腿膝疼痛。蘇頌引劉禹錫傳信方。以此藥合牛膝。苧。羌活。地骨皮。五茄皮。甘草。葱。生。地。浸酒服。治腰膝痛不可忍。有驗。詢又謂治赤白痢。蓋味苦氣涼。能導濕熱積滯以下行也。大明以為性溫者非是。

配合應用 ●同真川樅皮。輕粉。蛇牀子。山大黃為末。傳癩瘡。

●治風濕有蟲。海桐皮。蛇牀子。等分為末。以臘豬脂調搽之。(艾元英如宜方)

●治風蟲牙痛。海桐皮煎水漱

元英如宜方)

●治風蟲牙痛。海桐皮煎水漱

元英如宜方)

元英如宜方)

元英如宜方)

元英如宜方)

元英如宜方)

元英如宜方)

元英如宜方)

之。(聖惠方)

①治中惡霍亂。海桐皮煮汁服之。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無風寒溼邪者禁用。

著名方劑 ①海桐皮散。治手足拘攣。(證治準繩方)海桐皮當歸(湯洗焙乾)牡丹皮熟地牛膝

(酒浸焙)各一兩。山茱萸補骨脂各五錢。上藥研為細末。每服一錢。清水八分。加葱白二寸。煎至五分。去淨食前溫服。②海桐皮湯。治跌打損傷。(金鑑方)海桐皮錢線透骨草乳香沒藥各二錢。當歸錢半

(酒洗)川椒三錢。川芎紅花各一錢。威靈仙白芷甘草防風各八分。右為粗末。裝白布袋內。紫口煎湯。煮洗患處。

參攷資料 ①古方多用浸酒。

治風濕。南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云。頃年予在姑孰。得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺。諸藥莫療。因覽劉禹錫傳信方。備有此驗。修服一劑。便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝芎藭羌活地

骨皮五加皮各一兩。甘草半錢。薏苡仁二兩。生地黃十兩。並淨洗。焙乾。剉以綿包裹。入無灰酒二斗。浸之。冬二十七。夏一七。空心飲一盞。每日早午晚各三次。長令醞醱。此方不得減。禁毒食。(蘇頌)②海桐皮能行筋絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。(李時珍)③海桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大

如手作三花尖。皮若梓白皮而堅。剉可作繩。入水不爛。不拘時月採之。又云。嶺南有刺桐。葉如梧桐。其花附幹而生。側數如掌形。若金鳳。枝幹有刺。花色深紅。江南有刺桐。紅花無質。(蘇頌)④海桐皮有巨刺。如龍甲之刺。或云。即刺桐皮也。按。榕舍南方草木狀云。九真有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色。照映三五方。則三五復發。陳翥桐譜云。刺桐生山谷中。文理細緊。而性喜折裂。體有巨刺。如檉樹。其實如楓。類桐身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花。成朵而繁。紅色如火。為夏秋榮觀。(李時珍)

【海桐花】 主治 止血瘡血。殊效。



海桐花

【海珠】即紅海粉之別名。詳「紅海粉」條。

【海珠藜】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【海珠叢】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【海粉】即紅海粉之別名。詳「紅海粉」條。

【海粉半夏麴】 原名 海粉 命名 本品為半夏麴之一種。係和海粉製成者。故名。

製法 用半夏為末。入海粉。雄黃二分之一。和熟蜜。草窠七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療積痰沉疴。

【海粉麴】即海粉半夏麴之原名。

【海花】即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳「水英」條。

【海蚌殼】即石決明之古籍別名。典見和藥漢考。詳「石決明」條。

【海馬】 命名 本品乃魚鱗類也。狀如馬形。故名。

古籍別名 水馬(綱目) 產地 生南海中。

形態 海馬為介類硬骨魚之一種。雌者色黃。雄者色青。長一二寸至三四寸。側面視之。頭略似馬體。或褐色。或作銀白色。有喙下垂。全體有硬皮。成環節狀。腹部稍粗。尾細長。可供藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 婦人難產。帶之於身。甚驗。臨時燒末飲服。并手握之。即易產。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論海馬曰。主產難及血氣痛。【明】李時珍本草綱目論海馬曰。暖水。壯陽道。消瘕塊。治疔瘡腫毒。

參攷資料 海馬雌雄成對。其性溫暖。頗有交感之義。故難產及陽虛。房中術多用之。如蛤蚧。即君子之功也。蝦亦壯陽。性應同之。(李時珍)

【海參】

命名 本品滋補之力不窮人參故名。

古籍別名 海鼠。沙鼠。(動物學大辭典)有刺者名刺參。無刺者名光參。大而有刺者名海男子。(綱目拾遺)

外國名詞 Stichopus japonicus Solenka (拉丁) (Seejung)

(英) ナマコ 或 イリコ (日本)

基本 係棘皮動物海參類有足類海參科之海參。

產地 生海灣中及外海礁岩間。

形態 海參為魚屬之一種。形圓長。體柔軟。呈蠕蟲狀。皮膚黏滑。內有小骨片。一端有口。一端有肛門。口緣列有觸角二十個。背面具大圓錐狀之突起。腹面有管狀之水管。足三列。水管足有吸盤。能伸縮自如。為運動器。口內有石灰管。下接於腸。腸迂曲初向後。又折於前。復向於後。終達肛門。當腸將達肛門處之稍偏前面。旁有一種分枝。如樹枝之管。乃是水肺。為呼吸器。體色青黃褐或赤。背腹異彩。腹面有三條縱帶紋。背面有二條。長

約一尺。日則潛伏。夜則以水管足及體內之筋肉扭動而匍行。觸手表面分泌一種黏液。時時卷曲。可以鈎取食物。產海灣泥底者。色多青黑而質軟。產外海岩礁者。色多黃褐而質硬。捕得晒乾。可供食品與藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 補腎經。益精髓。消痰涎。攝小便。壯陽道。殺瘡蟲。降火滋腎。通腸潤燥。除勞怯諸症。

配合應用 治虛火燥結。同木耳切爛。入豬大腸煮食之。

治休息痢。每日黃湯服之。

治一切潰瘍生蛆。焙末傅之。

參攷資料 臨安儒醫盛天然

云。曾往青山里視一婦人病。眼鼻口耳髮根出血。下部亦然。其人已昏不知人。詢其夫得症之由。數日前受驚而起。時天酷暑。大旱。又中燥烈之氣。致血溢奔騰。上下散出。即不救矣。諸醫皆束手無策。盛有叔曾於都中得一方。專治此症。幸尙記憶。遂急喚人取山泉一桶。燒酒一觔。挾婦起坐。裸其小腿。先以燒酒淋之。俾酒從踝下。即滴入水

功同海藻。

參攷資料 海帶可以束物。醫家用以下水。貯於海藻。昆布。(掌禹錫)

【海梧】

命名 本品形似梧桐故名。

產地 出安南及熱帶諸地。

形態 海梧為喬木類之一種。樹如桐而色白。結實肥大如小栗。而有三角。甘肥同松子。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 利大小腸。益智。開心胸。明耳目。疲怔健忘。夜多惡夢。空心日食十數枚。月餘自愈。疝氣。囊大如斗。燒灰服之。

海梧子 產地 生安南及熱帶諸地。

形態 海梧為喬木類之一種。樹似梧桐。色白。葉似青桐。結實肥大。如小栗。而有三角。味甘可食。同於松子。其子可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 明耳目。益智。開心胸。利大小腸。治怔健忘。疝氣。囊大如斗。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海帶曰。治水病。癭瘤。

桶內淋訖。然後將臚置水中。一飯頃。其上下血即止。結亦凝。面色如粉。急叫人覓壯年乳婦。以乳哺之。再用海參半觔。切片。焙為末。每次調服三錢。日三服。蓋海參能生百脈之血。若失血過多。必須以此補之。其生血之功。捷於歸芍也。(趙學敏)

【海犀皮】 功用 活血。治風。

【海犀骨】 即黃明膠之古籍別名。典見綱目。詳「黃明膠」條。

【海豚魚】 命名 本品因其形似豚。故名。

外國名詞 *Dolphinus longi-*

rostris Gray 或 *Prodelphinus longirostris* (拉丁) (*Dolphin*) (英)

古籍別名 海豨。生江中者名

江豚。拾遺。江豬。水豬。(異物志) 鯨魚。鯨魚。鯨魚。(綱目)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類游水類齒齒類海豚科。

產地 生江海中。

形態 海豚魚為無鱗魚類鯨屬之一種。體長八九尺。如枋錘狀。口吻尖。為嘴狀。上下顎皆有錐形之齒。各五十六枚。齒頭尖銳。耳小。善聽。鼻孔有瓣狀膜。背面及體旁皆黑藍色。腹白。有兩乳。背有高約七八寸之脊。鰭向後屈。前肢變為狹尖之鰭。無後肢。尾平擴。亦呈鰭狀。半月形。其背脂最多。可燃。燈骨。稔肉。可供藥用。



魚 豚 海

性質 鹹。腥。無毒。
主治 飛尸。蠱毒。瘡癩。作脯食之。

【海豚魚肪】

主治 摩惡瘡。疥癬。痔瘡。大馬

【海蛇】 即蛇婆之別名。詳「蛇婆」條。

【海鰐】 即貝子之古籍別名。典見綱目。詳「貝子」條。

【海鹿】 即鷓鴣菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鷓鴣菜」條。

【海湯草】 即海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「海藻」條。

【海藻】 即無漏子之古籍別名。典見草木狀。詳「無漏子」條。

【海棠梨】 即海紅之古籍別名。典見綱目。詳「海紅」條。

【海椒】 即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【海菜】 即海藻之古籍別名。典見綱目。詳「海藻」條。

【海蛤】 基本 本品乃海中諸蛤爛殼之總稱也。

形態 海蛤為介類之一種。種類甚多。大者如棋子。小者如油麻粒。其殼經海水瀰爛或漂至海邊。多集於沙土中。其色不一。或黃。或白。或赤。採得研末。可供藥用。

採取 四五月間淘沙取之。

製法 雷斅曰。凡使海蛤。勿用游波。蟲骨真相似。只是面上無光。誤餌之。令人狂走。欲投水。如鬼祟。惟醋解之。立愈。其海蛤用漿水煮一伏時。每一兩入地骨皮。栝葉各二兩。同煮一伏時。東流。水淘三次。搗粉用。韓保昇曰。取得。以中天河。煮五十刻。以枸杞汁拌勻。入篋竹筒內。蒸一伏時。搗用。

性質 苦。鹹。平。無毒。

主治 欬逆上氣。喘息煩滿。胸

痛寒熱。(本經) 療陰痿。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新

修本草論海蛤曰。主治十二水滿

急痛。利膀胱。大小腸。【唐】甄權藥

性本草論海蛤曰。治水氣浮腫。下

小便。治嗽逆上氣。項下瘰癧。【唐】

蕭炳四聲本草論海蛤曰。止消渴。

潤五臟。治服丹石人有瘡。【宋】日

華諸家本草論海蛤曰。療嘔逆。胸脇脹急。腰痛。五痔。婦人崩中。帶下。【明】李時珍本草綱目論海蛤曰。清熱利溼。化痰飲。消積聚。除血痢。婦人血結胸。傷寒反汗。搗擗。中風。癱瘓。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者。禁用。長狗膽。甘遂。芫花。蜀漆為之使。

參攷資料 海蛤是諸蛤爛殼。文蛤別是一種。但海中蛤蚌名色雖殊。性味相類。功用亦同。無甚分別也。(李時珍)

【海蛤粉】 即蛤粉之處方用名。詳「蛤粉」條。

【海蛇】 古籍別名 水母。樽蒲魚。(拾遺) 石鏡。(綱目)

海蜃。(俗名)

外國名詞 *Phoplumascuti-*

oie (拉丁) *ヒセンクラゲ* (日本)

基本 係腔腸動物。海蛸科魚類。為海蛇之內。其皮詳見該條。

形態 海蛇爲無鱗魚類之一種。種類甚多。大者徑尺餘。普通者上面高凸。狀如張嫩。平滑而軟。色淡藍。皮薄。下面有八腕。延長如柄。色淡紅。腕上觸手叢生。觸手之間有無數細口。內通胃腔。嫩之邊緣有耳目。常浮水面。羣蝦附之。其肉可供藥用。

製法 採得浸以石灰。礬水。去其血汁。其色遂白。其最厚者。謂之蛇頭。其味更勝。生熟皆可食。茄柴灰和鹽水醃之尤良。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 婦人勞損。積血。帶下。小兒風疾。丹毒。湯火傷。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海蛇曰。療河魚之疾。

【海蛇皮】 命名 本品即海蛇之外白皮。故名。

性質 鹹。清。溫。無毒。

主治 祛風。消痰。行積。治頭風。瘡塊。療無名腫毒。

【海蘊】 即海蘊之日本名。詳「海蘊」條。

【海棧】 即無漏子之木名。典見綱目。詳「無漏子」條。

【海櫻子】 古籍別名 千年果。 (綱目) 鳳尾蕉子。無漏子。無漏果。棗實。 (綱目拾遺)

形態 海櫻爲喬木類之一種。高三四丈。圍五六尺。春月開花。狀如蕉花。有兩瓣。漸漸開。中有十餘房子。長二寸。黃白色。形類棟子。有核。新秋實熟。色黑。味甘如飴。可供食與藥用。

製法 用刀剝去青皮。石灰湯治之。入冷熱蜜浸換四次。則澀味去。瓶封久藏不壞。

性質 甘。溫。無毒。

主治 消食寬中。除痰止咳。益氣潤顏。久食令人肥美。

【海腴】 即人參之古籍別名。典見廣雅。詳「人參」條。

【海蜃】 即海蛇之訛名。詳「海蛇」條。

【海蜃】 即淡菜之古籍別名。典見綱目。詳「淡菜」條。

【海鼠】 即海參之別名。詳「海參」條。

【海鼠藤】 即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【海漆】 即倒捻子之古籍別名。詳「倒捻子」條。

【倒捻子】 條。

【海瘋藤】 即蕃椒之古籍別名。典見花鏡。詳「蕃椒」條。

【海精木】 即水英之古籍別名。典見綱目。詳「水英」條。

【海蕒】 即山道年可之別名。詳「山道年可」條。

【海荔子】 即鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳「鳳仙子」條。

【海豬】 即海豚魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「海豚魚」條。

【海狸】 即狸之古籍別名。典見廣雅。詳「狸」條。

【海鳳絲】 古籍別名 草蓮。 產地 生廣信。

形態 叢生。橫根。綠莖細如小竹。初生葉如青蒿。漸長細如茴香。葉可供藥用。



海風絲

主治 頭風。利大小便。

【海髮】 即海藻之古籍別名。典見本草集註。詳「海藻」條。

【海榴茶】 即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【海燕】 外國名詞。Matsukawa 或 マキヒトテ (日本)

基本 係棘皮動物海盤車類之海燕。 產地 出海中礁岩間。

形態 海燕爲介類之一種。五腕甚短。體爲五角形。略似燕。色藍。有褐色斑點。口在體之下面。口緣分裂作深溝。直沿各腕之中央。達於其端。溝中有管。足二列。以司運動。可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 陰雨發損痛。黃汁服。取汗即解。亦入滋陽藥。

【海蠅】 性質 鹹。寒。 主治 療熱結核。能降鬱氣。

參攷資料 ●海蠅。杭俗立夏以爲應時之味。以花椒酒之麻油拌食。從新云。比蠅身細而長。殼有旋紋六七屈。頭上有鬚。春初蟻起。可海崖石壁。海人設網於下。一掠而取。治以鹽酒椒桂。按海蠅有

大如指，長一二寸許者，名釘頭螺。溫台沿海諸郡多有之。海螵蛸生海塗中，立夏後有人見其羣變為蛇，今人所稱豆娘是也。或云此螺能跳丈許，蓋還其處。此物又能食蛤，明州奉化多蛤田，皆取苗於海塗，種之，久則自大。時田者不時轉視，恐有海螵蛸，蓋蛤不畏他物，惟畏海螵蛸。蚌田中一有此物，蚌無遺種，皆被其吮食盡。玉環出者，大如指，名釘頭螺（杭州府志）。

【海龍】 命名 本品乃海馬之。大者其形似龍，故名。一種首尾如龍，而無牙爪，長四五寸至尺餘，身長而尾直不捲，體如玉色，雌者黃，雄者青，可供藥用。至治 益房精，催生尤有捷效。握之即產，功倍海馬。

參攷資料 海馬之屬有三，小者長不及寸，名海蛆，不入藥中，等者長一二寸，名海馬，尾盤旋作

十 蠶 海

罔。形扁如馬，其性溫，味甘，煖水臑。壯陽道，消瘕塊，治疔腫，產難，血氣痛。海龍乃海馬中絕大者，長四五寸至尺許不等，皆長身而尾直，不作圈，入藥功力尤倍。雖同一類，形狀微有不同。此物廣州南海亦有之，體方，周身如玉色，起竹節紋，密密相比，光瑩耀目，誠佳品也。（百草鏡）。

【海魚】 即蠔龜之別名。詳「蠔龜」條。

【海螵蛸】 即烏鰂骨之原名。詳「烏鰂骨」條。

【海螺】 原名 海蜆。古籍別名 流螺。（圖經）假豬螺。小者名釘頭螺。（綱目）

產地 生海濱間。

形態 海螺為介類螺蚌屬之一種，種類甚多，硬殼有旋線，身可宛轉伏藏。其大者殼可為酒厄及吹器，內面光潔美麗，亦可以鑲嵌漆器，肉可供食與藥用。

性質 甘冷無毒。

主治 目痛累年，或三四十生，取汁洗之，或入黃連末在內，取汁點之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金要論海螺肉曰：合菜煮食，治心痛。

古籍別名 甲香。（交州記）

製法 雷斅曰：凡使用生芽香，皂魚同煮半日，石臼搗篩用之。經驗方曰：凡使用黃泥同水煮一日，溫水浴過，再以米泔或灰汁煮一日，再浴過，以蜜酒煮一日，浴過，燻乾用。蘇頌曰：傳信方載其法云：每甲香一斤，以泔斗半，微火煮一伏時，換泔再煮。凡二換，漉出，衆手刮去香上涎物，以白米三合，水一斗，微火煮乾，又以蜜三合，水一斗，煮三伏時，乃以炭火燒地令熱，洒酒令潤，鋪香於上，以新瓦蓋上一伏時，待冷，硬石臼木杵搗爛，入沉香末三兩，磨一分，和搗即成，以瓶貯之，埋過經久，方燒。凡燒此香，須用大火爐，多着熱灰，剛炭猛燒，令盡去之，爐旁着火煖水，即香不散。此法出於劉克奉禮也。宗奭曰：甲香

善能管香烟，與沉、檀、龍、麝香用之尤佳。

性質 鹹平無毒。

主治 心腹滿痛，氣急，止痢，下淋。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論海螵蛸曰：和氣清神，主腸風痔瘻。【唐】陳藏器本草拾遺論海螵蛸曰：瘡疥，疥癬，頭疔，癢瘡，甲疽，蛇蟻，蜂螫。

【海螵白皮】 即白皮子之俗名。詳「白皮子」條。

【海腹石】 即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「血竭」條。

【海藤】 即藤黃樹之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「藤黃」條。

【海藥子】 本經。古籍別名 連木。（陸地 生山谷間。）

形態 海藥為莖草類之一種，其子實似黃藥子，苦藥子，可供藥用。

製法 凡使去皮取仁，研細用。

性質 辛溫無毒。

主治 邪氣諸痺，疼癢，續絕傷，補骨髓（本經）破血，止痢，消腫，除

蟲。解蛇毒。(別錄)

【海鏡】 古醫別名 鏡魚。環蚌。(郭璞賦) 宵乘盤。蠟鏡。

(綱目)

外國名詞 Amusium japo-

nious Gmel(拉丁)ツキヒガヒ

(日本)

基本 屬輻射動物瓣腮類無管類單柱類海扇科海鏡之肉

產地 福建、港、粵諸海濱。均有產之。

形態 海鏡形似海月。而殼形略圓。右殼平。左殼稍膨凸起。近殼頂之耳狀突起小。而前後同形。殼外面無隆線。但有細微之放射線。左殼面色褐。或淡紅。有多數之細紫輪紋。右殼色白或青白。殼長約四寸。土人多磨爛其右殼。使之透明。嵌之於天窗或窗櫺。亦可作明瓦。取其肉。可供食與藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

效能 利尿。祛溼。消積。療風。下氣。和中。

主治 消渴。祛腹中宿積。令人易饑。

參攷資料 產於南海。兩片相

合成形。殼圓如鏡。光瑩放射如雲。母內有肉形如蚌。胎腹有寄生蟲。大如豆。狀如蟹。蟻則出食。入則飽矣。(李時珍)

【海藻】 命名 藻乃水草之有

之曰藻。本品係生海中者。名之曰海藻。海藻者海中所產藻類之總稱也。但藥則用馬尾藻。

處方用名 淡海藻。馬尾藻。

古醫別名 莠。海蘿。(爾雅) 藻。

(別錄) 落首。(本經) 神馬草。海湯草。(和漢藥考) 海菜。(綱目) 海髮。

(本草集註)

基本 屬褐色海藻門之馬尾

藻 Sargassum Erecto, C. Ag.

產地 陳仁山藥物生產辨云。

海藻產廣東新安、平海、汕尾等鹹水海處。十二月出新。至五月止。

形態 海藻類中之馬尾藻。係

生於各地沿海暗礁之藻類。長自三四尺至五六尺。莖細而分歧。互生狹長葉。葉腋有大一分餘之黑色球圓形氣胞。壓之則破裂有聲。日本之筑前地方。呼此為捉風子。其莖莖生鮮時。呈黑色。入溫湯則

變綠。

採取 十二月至來年五月止。為採取時期。

製法 雷斅曰。凡使須用生烏豆。并紫背天葵三件。同煮伏時。日乾用。李時珍曰。近人但洗淨鹹味。焙乾用。

性質 苦。鹹。寒。無毒。

效能 海熱。散結。化痰涎。消癰。瘰。用作軟堅藥。又為利尿藥。

主治 癰瘰結氣。散頸下硬核。痛癢腫。癢癢堅氣。腹中上下雷鳴。下十二水腫。(本經) 瘰癧皮間積聚。暴癩。瘡氣。結熱。利小便。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論海藻曰。辟百邪鬼魅。治氣急。心下滿。疝氣。下墜。疼痛。卵腫。去腹中幽幽作聲。【唐】李珣海藥本草論海藻曰。治奔豚氣。脚氣。水氣。浮腫。宿食不消。五臟痰壅。【明】繆希雍本草經疏論海藻曰。海藻味苦。鹹寒。而無毒。氣味俱厚。苦能澀結。寒能除血熱。鹹能軟堅。潤下。故本經主癰瘰。氣。頸下核。破散結。氣。癰腫。瘰癧。堅氣。及腹中上下鳴。下十二水腫。瘰癧皮間積聚。暴癩。瘡

氣。結熱。利小便。潔古專消癰瘰。馬刀。瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云

有小毒。【清】黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻者。性反甘草。能治項頭一切瘰癧。癰疽。癩瘡。及痰飲

脚氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能澀結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其

水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。硬結不解者。用此堅軟結。泄。邪

退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸

藥。無不知是。海帶。有似海藻。而粗柔。朝而長。主治無異。昆布。亦同海

藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰瘰。如石者。非此不除。且其下氣最速。久

服多令人瘦。至云海島人。常食以其水土不同。故耳。皆反甘草。略洗

去鹽水用。

近人學說 張山雷曰。海藻生

長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。

癰瘰結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡

所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

凝聚之結核。非其治矣。難腫癢。多由血熱淤滯而生。腹鳴水腫。更多溼熱停頓之候。凡此諸症之屬於陽實有餘者。固可治之。而正氣不及。清陽不運諸症。不可概施。別錄特提結熱二字。最當注意。非謂陽虛血瘀之癢癢癢。及寒水泛溢等病。皆可以此統同論治也。十二水腫。蓋以十二經而言。諸經積水。固皆有溼熱不利之一候。此類寒滯泄水之藥。固可用之。又曰。甄權謂治心下滿。疝氣下墜疼痛。卵墮。李珣海藥本草。以治奔豚氣。脚氣。水氣浮腫。皆當以熱壅有餘一而而言。正與腎水泛溢之奔豚。及寒水凌心。寒疝結痛諸症。兩得其反。此皆讀古人書者。不可不辨之門徑。非謂凡此諸病。不問虛實寒熱。皆以此物一例通用也。

配合應用 ①海藻酒 治濕氣。用海藻一斤。絹袋盛之。以清酒二升。浸之。春夏二日。秋冬三日。每服兩合。日三酒。盡再作。其滓曝乾。爲末。每服方寸匕。日三服。不過兩劑。即瘥。(范汪方)

②治濕氣初起。海藻一兩。黃連

二兩。爲末。時時飲。先斷一切厚味。(丹溪方)

③治項下瘰癧如梅芋狀。宜連服前方海藻酒消之。(肘後方)

④蛇盤瘰癧。頭項交接者。海藻菜以蕎麥炒過。白僵蠶炒等分。爲末。以白梅泡湯和丸。梧子大。每服六十丸。米飲下。必泄出毒氣。(危氏得效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而有溼滯者禁用。反甘草。

參攷資料 ①海藻起男子陰消。男子瘡疾。宜常食之。南方人多食。北方人效之。倍生諸疾。更不宜矣。(孟詵) ②東垣李氏治瘰癧馬刀散。腫潰堅湯。海藻甘草兩用之。蓋以堅積之病。非平和之藥所能取捷。必令反奮以成其功也。(李時珍)

③此有二種。馬尾藻生淺水中。如短馬尾。細黑色。用之當浸去鹹味。大葉藻生深海中。新羅國葉如水藻。而大海人以繩繫。膜沒水取之。五月以後。有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正爲二藻也。(陳藏器)

此即水藻生於海中者。今登萊諸州有之。陶隱居引爾雅綸組註。昆布謂昆布似組。青苔紫菜似綸。而陳藏器以綸組爲二藻。陶隱居似近之。(蘇頌)

【海藻酒】 製法 用海藻一斤。洗淨。浸酒飲。

主治 癭瘤結氣。

【海蘇】 卽連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連錢草」條。

【海蘊】 命名 緇亂絲也。本品業似之故名。

古籍別名 海雲(日本)

外國名詞 Mesogonia Desimp.

Dions, Sur (拉丁)モシク(日本)

基本 係海藻科。爲海藻類之海蘊。

產地 出淺水岩石上寄生於馬尾藻類之藻。

形態 海蘊爲水草類之隱花植物。枝多細長而柔滑。葉細如絲。色蒼黏滑。浮於水面。長數尺。可生食與藥用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 癭瘤。結氣在喉間。下水。

歷代記述攷證 **【宋】蘇頌** 補圖經本草論海蘊曰。主水腫。

【海鮫】 卽鮫魚產於海中者之別名。詳「泥鯉」條。

【海鰈】 命名 本品爲鰈之產於海中者。故名。

古籍別名 紅鰈(綱目拾遺) 鰈(爾雅)

形態 海鰈爲魚類鰈屬之一種。長可二尺餘。皮殼嫩紅。鱗鬣鹹。鼻背有斷節。尾有硬鱗。前足有鉗。多足善躍。其肉作鮮。可供食與藥用。

性質 甘平。有小毒。

主治 飛尸。蛇蟲。口中甘。齒齒。頭瘡。去疥。瘡。風。身。痒。治山。蚊。子。入。人。肉。初。食。指。發。則。愈。

參攷資料 海鰈同猪肉食。令人多睡(李時珍)

【海鰈】 卽海鰈之原名。詳「海鰈」條。

【海鰈魚】 命名 本品形象海鰈。故名。

古籍別名 邵陽魚。少陽魚。荷魚。鮫魚。鰈魚。鰈魚。鰈魚。石鰈(綱目)

基本 係脊椎動物魚類板鰓類橫口類紅類之海鵝魚。

產地 常匍匐於海底沙土中。

形態 海鵝魚為無鱗類魚族之一種。體形扁平。大者圍七八尺。狀如盤及荷葉。頭部之下面有口鼻及五對之鰓孔。頭部之上面有兩眼及噴水孔。此孔可認為鰓孔所變化者。口有小齒。胸鰭甚擴張。故外觀似胸部。甚寬扁。多呈斜方形。或圓扇形。尾部狹小。背面具銳棘。腹鰭小。無臀鰭。尾鰭亦小。僅有上葉。無下葉。全體無鱗而骨軟。游泳甚拙。整人甚毒。其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 男子白濁。存淋。玉莖澀痛。

參攷資料 海鵝魚肉。氣味有小毒。(李時珍) 海鵝魚肉。不益人。(陶弘景)

【海鵝魚尾】

性質 有毒。

【海鵝魚齒】

性質 無毒。

主治 齒痛。

主治 療痔。燒黑研末。酒服二錢匕。

【海鰻鱺】

命名 本品出海中。形類鰻鱺而大故名。

古籍別名 慈鰻鱺。狗魚。(日華)


外國名詞 Murenosox

cincaus. (拉丁) Fork (英)

八毛(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鰻類海鰻鱺科。

產地 生海中岩礁裂隙間。



海 鰻 鱺

形態 海鰻鱺為無鱗魚類之一種。體圓長。至尾端漸側扁。形似鰻鱺。皮面無鱗。口大具銳齒。上顎微為鈎狀。下顎不突出。脊鰭始於鰓孔之上。臀鰭始於體之中段。連續於尾。背色淡灰黑。稍帶紫。腹面暗白。微帶青。脊鰭暗色黑。有闊緣。邊本體長三尺餘。大者六尺許。棲於海潮流緩慢處。晝伏。夜出覓食。

其肉可供藥用。

性質 甘。平。有毒。

主治 療皮膚惡瘡。疥癬。疥癩。痔瘡。

參攷資料 海鰻鱺功似鰻鱺。緩而不補。(李時珍)

【海羅】即海藻之古籍別名。典見爾雅。詳【海藻】條。

【海蠶】 產地 生南海山石間。形態 海蠶為蠶之一種。其狀似蠶。大如拇指。其沙甚白。如玉粉狀。可供藥用。

性質 鹹。大溫。無毒。

主治 虛勞。冷氣。諸風不遂。久服補虛羸。令人光澤。輕身。延年不老。

參攷資料 海蠶沙難得真者。彼人以水搗葛粉。石灰。以梳齒印成。偽充之。縱服無益。反能損人。宜慎之。(李時珍)

【海鹽】即鹽之以海水製成者。詳【食鹽】條。

【浸藍水】 基本 係取藍草浸漬之水。

製法 取藍草厚鋪木板上。漬之以水。使起酵發熱。待至乾燥。上

下攪和。再漬水發酵。如是多次。至醇全息。則成暗青黑色。

性質 辛苦寒。無毒。

效能 除熱解毒。殺蟲消積。

主治 治誤吞水蛭成積。眼痛黃瘦。

參攷資料 昔有人因醉飲田中水。誤吞水蛭。胸腹脹痛。面黃。以此水飲之。大瀉數行。頓愈。

【涅石】即礬石之古籍別名。典見綱目。詳【明礬】條。

【消石】 命名 本品力能消化諸石故名。

古籍別名 芒消(別錄)苦消(甄權)焰硝(土宿)火消(綱目)

(甄權)焰硝(土宿)火消(綱目)地霜(蜀本)生消(唐本)硝石鹽石化金石。河東野。北帝玄珠。(和漢藥考)

外國名詞 Salpetrae. Saltr Nitri. (拉丁) Niter. (英) Salpoker (德)

基本 為硝礦之一種。

產地 在山谷川澤及諸崗地。

形態 消石為六稜之冰柱狀結晶。無色。或白色。味微辛苦。冷而有刺戟性。置空氣中。不變化。水養

溶解。投入火中。則爆鳴。立即燃燒。而發鮮明之焰。

製法 大明曰。真消石。柳枝湯煎三周時。如湯少。即加熱者。伏火即止。齊敬曰。凡治消石。先研如粉。用雞腸菜。柏子仁。共二十五箇。和作一處。丸如小帝珠子。以瓷瓶子於五斤火中煨赤。投消石四兩於瓶內。連投藥丸入瓶。自然伏火也。抱樸子曰。能消柔五金。化七十二石。為水劑之。須用地蓮子。猪牙皂角。苦參。南星。巴豆。漢防己。晚蠶砂。李時珍曰。將化。投甘草入內。即伏火。

性質 苦寒。無毒。

成分 化學上謂之硝酸加溜誤。KNO₃。

效能 破堅積。消瘰癧。療瘡亂。通五淋。用作清涼利尿藥。又治水腫石淋。

作用 在胃中能激動胃腺。使分泌增加。入至腸。又能刺激腸黏膜。使腸之分泌亦增多。催促大糞之排出。由腸壁而吸入血中。能增血液中之鹼性。退緩悸逆之心臟。以減退原有之體溫。由血中游離

十畫 消

而至腎臟。能將腎臟充血。使全身之過量水分。迅速迫向腎臟排出。若服量過多。則易釀成腸胃炎。

主治 五臟積熱。胃腸便閉。瀉去著結飲食。推陳致新。除邪氣。煉之知膏。久服輕身。本經。療五臟十二經脈中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿消渴。利小便。及瘰癧瘡。天地至神之物。能化七十二種石。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論消石曰。破積散堅。治腹脹。破血。下瘰癧。得根出。宋。大明諸家本草論消石曰。含嗽。治喉閉。明。李時珍本草綱目論消石曰。治伏暑傷冷。霍亂吐利。五腫淋疾。女勞黑疸。心腸疝痛。赤眼。頭痛。牙痛。

國外學說 日本學說謂依日

本藥局方云。為消炎藥。於肺炎肋膜炎。心內外腹膜炎。急性關節炎。用之為利尿藥。於諸般之水腫。與實芰。答利斯。服用一日三回。自〇、三至一、五。為水散服之。腸胃炎及衰弱者。宜禁忌。又和漢藥考曰。消石熱帶地方。因含窒素有機物

之腐敗。窒素為空氣中之酸素所酸化。變為硝酸。更與地中之亞兒加里化合而生鹽。取而精製之。遂成消石。日本舊法。採取地板下。經過數年之土類。以水溶化。候土質類沈降器底。汲取其上面澄清者。蒸發而使結晶。又從而精製之。

配合應用 ①頭痛欲死。消石末吹鼻內即愈。炮炙論。

②治諸心腹痛。爛消。雄黃各一錢。研細末。每點少許入背內。名火龍丹。亦治腰腹諸痛。集玄方。

③治赤眼腫痛。消石末。臥時以銅筋點黍米大入目背。至旦以鹽水洗去之。聖惠方。

④治眼目障翳。男女內外障翳。或三五箇月不見效者。一點復明。好熔消一兩。銅器鎔化。入飛過黃丹二分。片鱗二分。銅匙急炒。入罐內收之。每點少許。其效如神。張三伴仙方。

⑤治風熱喉痺。及懸喉風病。玉輪匙。用熔消一兩半。白殭蠶一錢。礪砂半兩。鱗子一字。研細末。吹之。三因方。

⑥拾重舌。鷓口。竹槿同熔消點

之。普濟方。

⑦治伏暑瀉痢。及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者。不過三服。消石。舶上硫黃各一兩。白礬。滑石半兩。飛麩四兩。為末。滴水丸。梧子大。每新汲水下三五十九丸。名甘露丸。普濟方。

⑧治五種淋疾。勞淋。血淋。熱淋。氣淋。石淋。及小便不通。至甚者。透格散。用消石一兩。不夾泥土。雪白者。生研為末。每服二錢。各依湯使勞淋。勞倦虛損。小便不出。小腹急痛。瘳子末煎湯下。通後便須服補虛丸散。小便不出。時下血。疼痛滿急。熱淋。小便熱。赤色。膝下急痛。並用冷水調下。氣淋。小腹急滿。尿後常有餘瀝。木通煎湯下。石淋。莖肉痛。尿不能出。內引小腹膨脹急痛。尿下。砂石。令人悶絕。將藥末先入鉢內。隔紙炒至紙焦為度。再研。用溫水調下。小便不通。小麥湯下。卒熱諸淋。只以冷水下。並空心調藥。使消如水服之。沈存中雜苑方。

⑨治服石發瘡。疼不可忍。用紙團圍之。中心填消石令滿。以匙抄水淋之。覺不熱痛即止。兵部手

集方)

治發背初起。惡寒齒齩。或已生瘡腫。隱疹。消石三兩。暖水一升。泡化。青布摺三重。溫搗赤處。熱即換。類易取瘻。(外臺秘要方)

治女勞黑痘。仲景曰。黃家日嘔。發熱及惡寒。此為女勞得之。勝脫急。少腹滿。身盡黃。額上黑。尺下熱。因作黑痘。腹脹如水。大便黑時。渣非水也。腹滿者難治。消石。礬石。燒等分。為末。以大麥粥汁和服。方寸匕。日三。病隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。(金匱方)

治手足不遂。大風及丹石熱。風不遂。用消石一兩。生烏麻油二斤。置鑊中。以土壅蓋口。紙泥固濟。火煎。初時氣腥。熱則氣香。更以生麻油二升。合煎得所。收不津器中。服時。坐室中。重作小紙屋。然火於內。服一大合。發汗。力壯者日二服。三七日。頭面疱疹皆滅也。然必以火為使。(波羅門僧方)

用量 五分至三錢。
施用宜忌 凡無實邪者禁用。惡苦參。苦菜。畏女菴。杏仁。竹葉。火為之使。

參攷資料

朴消屬水。味鹹而氣寒。其性下走。不能上升。故惟蕩滌腸胃積滯。折治三焦邪火。消石屬火。味辛帶苦微鹹。而氣大溫。其性上升。故能破積散鬱。治諸熱病。升散三焦火鬱。調和臟腑虛寒。與硫黃同用。則配類。二氣均調。陰陽有升降水火之功。治冷熱緩急之病。既制礬石。則除積滯痰飲。蓋硫黃之性燠而利。其性下行。消石之性暖而散。其性上行。礬石之性寒而下。消石之性暖而上。一升一降。一陰一陽。此制方之妙也。今兵家造烽火銃機等物。用消石者。直入雲漢。其性升可知矣。雷公炮炙論序云。腦痛欲死。鼻投消末。是亦取其上升辛散。乃從治之義。本經言其寒。別錄言其大寒。正與龍腦性寒之誤相似。凡辛苦物。未有大寒者。况此物得火則招生。與樟腦火酒之性同。安有性寒大寒之理哉。史記倉公傳云。菑川王美人。懷子不乳。來召淳于意。意往。飲以葇葇藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。躁者有餘病。即飲以消石一劑。出血豆比五六枚。而安。此去

血結之驗也。李時珍。消石療病。與朴消相似。仙經用此消化諸石。今無真識。此者。或云與朴消同。所以朴消一名消石。朴也。又云一名芒消。今芒消乃是煉朴消作之。並未覈研其驗。有人得一種物。色與朴消大同小異。觸如握鹽。雪。以火燒之。紫青烟起。云是真消石也。今宕昌以北諸山。有鹹土處。皆有之。(陶弘景)神農本草無芒消。只有消石一名芒消。名醫別錄乃出芒消。療與消石同。疑即消石也。舊出寧州。黃白粒大。味極辛苦。今醫家多用。煮煉作色者。全白粒細而味不甚烈。皇甫士安言。無朴消。可用消石。消石生山之陰。鹽之澹也。取石脾與消石。以水煮之一斛。得三斗。正白如雪。以水投中。即消。故名消石。其味苦。無毒。主消渴熱。中止煩滿。三月采於赤山。朴消者。亦生山之陰。有鹽鹹苦之水。則朴消生於其陽。其味苦。無毒。其色黃白。主療熱。腹中飽脹。養胃消穀。去邪氣。亦得水而消。其療與消石小異。按如此說。是取芒消合煮。更成爲真消石。以朴消作芒消者。

用煨湯淋汁煮之。若木盆中經宿。即成矣。今益州人復鍊礬石作消石。絕柔白而味猶是礬。又曰。朴消。今出益州北部。汝山郡。四川。雙陵二縣界。生山崖上。色多青白。亦雜黑斑。土人擇取白軟者。以當消石用之。當燒令汁沸。出狀如礬石也。(陶弘景)朴消有縱理。綫理二種。用之無別。其白軟者。朴消苗也。虛軟少力。鍊爲消石。所得不多。以當消石。功力大劣也。又曰。消石。即是芒消。朴消一名消石。朴。今煉粗惡朴消。取汁煎作芒消。即是消石。別錄復出芒消。誤矣。晉宋占方多用消石。少用芒消。近代諸醫。但用芒消。豈言消石。理既明白。不合重出。(蘇頌)舊說。朴消。芒消。消石。三物同種。初采得苗。以水淋汁。煎成者爲朴消。一名消石。朴。又煉朴消。或地霜而成。堅白如石者爲消石。一名芒消。又取朴消淋汁。煉煎。結成有細芒者。爲芒消。雖一體異名。而修煉之法既殊。則主治之功亦別。然本經所載。疑是二種。今醫方所用。亦不能究。但以未煉成塊。微青色者爲朴消。煉成盆中有

塊。微青色者爲朴消。煉成盆中有

芒者爲芒消。亦謂之益消。芒消之底澄澱者爲消石。朴消力緊。芒消次之。消石更緩。未知孰是。蘇恭言晉宋古方多用消石。少用芒消。按張仲景傷寒論承氣陷胸。皆用芒消。葛洪肘後方。傷寒時氣亦多用芒消。惟治食積不化云。無朴消用芒消代之。是晉宋以前通用朴消芒消矣。胡洽方十葷湯用芒消。大五飲丸用消石。並云無消石用芒消。是梁隋間通用芒消消石矣。以此言之。朴消消石爲精。芒消爲粗。故陶氏引皇甫士安之言爲證。是消石當時已難得其真。故方書通以相代矣。又古方金石澆法。用朴消消石。芒消。馬牙消。四種相參。次第下之。方出唐世。不知當時如何分別也。又南方醫人著消說云。本草有朴消。消石。芒消。而無馬牙消。諸家所注三種。竟無斷決。或言芒消。消石是一物。不合重出。或言煎鍊朴消。經宿。盆中有細芒爲芒消。或言馬牙消自是一物。今諸消之體各異。理亦易明。而惑乃如此。朴消味苦而微鹹。出蜀郡者。瑩白如冰雪。內地者小黑。皆蘇隨易碎。風

十畫 消 涎 烈 烏

吹之則結霜。泯泯如粉。熬之烱沸。亦可鑄錢以水。合甘草豬膽。煮至減半。投大盆中。又下凝水石屑。同漬一宿。則凝結如白石。英者。芒消也。掃地霜煎鍊而成。試竹上如解鹽。而味辛苦。燒之成屑。都盡者。消石也。能消金石。又性畏火。而能制諸石使拒火。亦天地之神物也。牙消卽是芒消也。又有生消。不因煮鍊而成。亦出蜀道。類朴消而小堅也。其論雖辨。然與古人所說殊別。亦未可全信也。(蘇頌)諸消自晉唐以來。諸家皆執名而猜。都無定見。惟馬志開寶本草。以消石爲地霜煉成。而芒消。馬牙消。是朴消煉出者。一言足破諸家之惑矣。諸家蓋因消石一名芒消。朴消一名消石。朴之名相混。遂致實辨不決。而不知消有水火二種。形質雖同。性氣迥別也。惟神農本草經。朴消。消石二條爲正。其別錄芒消。嘉祐馬牙消。開寶生消。俱係多出。今並歸併之神農所列朴消。卽水消也。有二種。煎鍊結出細芒者爲芒消。結出馬牙者爲牙消。其凝底成塊者。通爲朴消。其氣味皆鹹而寒。神農

所列消石。卽火消也。亦有二種。煎鍊結出細芒者。亦名芒消。結出馬牙者。亦名牙消。又名生消。其凝底成塊者。通爲消石。其氣味皆辛苦。而大溫。二消皆有芒消。牙消之稱。故古方有相代之說。自唐宋以下。所用芒消。牙消。皆是水消也。南醫所辨雖明。而以凝水石豬膽煎成者。爲芒消。則誤矣。今通正其誤。其石脾一名消石者。乃造成假消也。(李時珍)

【消石朴】卽朴消之古籍別名。典見別錄。詳「朴消」條。

【涎衣草】卽地膚子之古籍別名。典見唐本草。詳「地膚子」條。

【烈節】 廢地 生林簣中。形態 烈節爲莖草類之一種。春生苗莖。葉似丁公藤而纖微。無花實。其莖可供藥用。採取 九月採之。曝乾用。性質 辛溫無毒。

主治 肢節風冷。筋脈急痛。作湯浴之。

參攷資料 楊傑家藏經驗方。有烈節酒。治歷節風痛。用烈節。松節。牛膝。熟地。黃芩。歸各一兩。爲粗

末。絲袋盛之。以無灰酒二百盞。浸三日。每服一盞。入生酒一盞。溫服。(李時珍)

【烈撲】卽厚樸之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「厚樸」條。

【烏丁】卽孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳「孩兒茶」條。

【烏丁泥】卽烏夢泥之別名。詳「孩兒茶」條。

【烏女】卽玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳「玉竹」條。○卽萎蕤之別名。詳「玉竹」條。

【烏山椒】卽食茱萸之原名。詳「食茱萸」條。

【烏元參】卽玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【烏文木】卽烏木之古籍別名。典見綱目。詳「烏木」條。

【烏木】 古籍別名 烏楠木。烏文木(綱目)

外國名詞 Diogyros Peer-
China, Chiko. (拉丁)

基本 係柿樹科柿樹屬。爲烏木之木材。

產地 出東印度及馬來半島。與熱帶諸地。

形態 烏木爲喬木類之常綠木本高二丈餘葉長橢圓形平滑互生花單性合瓣花冠淡黃色雌雄同株果實球形赤黃色其木材黑色體重堅實入水則沉老者色純黑可製器具與供藥用



烏木

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 解毒。又主霍亂吐利。取屑研末溫酒服。

【烏牛子】即經霜絲瓜子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『絲瓜』條。
【烏古瓦】即古瓦之原名。詳『古瓦』條。
【烏玉玦】即墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。
【烏尖】即鹽筍乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹽筍乾』條。
【烏羊婆羅】即沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『沙參』條。
【烏白木】即烏柏木。詳『烏柏木』條。

【烏吹】即射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。
【烏辛】即葶藶之原名。詳『葶藶』條。

【烏豆】即黑大豆之處方用名。詳『黑大豆』條。

【烏貝】即蚌之別名。詳『蚌』條。

【烏足】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【烏柿】命名 本品即柿用火薰乾而色黑者。故名。

性質 甘。溫。無毒。
主治 殺蟲。金瘡。火瘡。生肉止痛。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論烏柿曰。治狗齧齋斷下痢。【唐】陳藏器本草拾遺論烏柿曰。服藥口苦及嘔逆者。食少許即止。

【烏花蛇】即烏梢蛇之別名。詳『烏梢蛇』條。

【烏金】即墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。即鐵之古籍別名。典見綱目。詳『鐵』條。

【烏金石】即石炭之古籍別名。典見綱目。詳『石炭』條。

【烏金紙】產地 出浙江杭縣。主治 療下疳。

參攷資料 烏金紙之製法。先造烏金水刷紙。候黑如漆。再蒸過以繩石研光。性最堅韌。不中書畫。用以包裹珍寶。及藥物作襯紙。則溼氣不入。凡打金箔。則以此紙包金片。揮巨斧捶之。金成箔而紙不損。其紙價頗昂。蓋惟浙人善造也。 (醫學大辭典)

【烏金磚】基本 本品爲年久。衰窖中之瓦磚也。

主治 小兒痘不貫漿。虛弱無力者。大效。

【烏柿】即柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【烏韭】古籍別名 石髮。石苔。 (唐本草) 石衣。 (日華)

基本 係羊齒門羊齒類水龍骨科骨碎補屬。爲烏韭之莖根。 產地 生山陰石間。

形態 烏韭爲苔類瓦松屬之一種。常綠草本。根莖堅硬。橫臥地下。自此生葉。葉柄堅硬而滑澤。呈圓柱形。葉身稍帶革質。長於葉柄。

全體爲橢圓形披針形。裂片細。略呈四回羽狀。莖長四五寸。茸青翠。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 皮膚往來寒熱。利小腸。膀胱氣。 (本經) 療黃疸。金瘡內塞。補中益氣。 (別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論烏韭曰。燒灰沐頭。長髮令黑。

配合宜忌 垣衣爲之使。

【烏韭】即麥門冬之藥名。典見綱目。詳『麥門冬』條。即陸釐之古籍別名。典見綱目。詳『陸釐』條。

【烏食草】即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【烏扇】即射干之古籍別名。典見本經。詳『射干』條。

【烏相子油】原名 柏油。基本 本品乃榨烏相子實所得之脂肪油。

性質 甘淡。無毒。
主治 塗頭變白爲黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論柏油曰。塗一切腫毒瘡疥。

【烏柏木】命名 本品子實。烏喜食之。又木老則根

下黑爛成白。故名。

處方用名 烏柏根皮。

古籍別名 鴉白(綱目)鴉兒。

(和漢藥考)

外國名詞 Sapina Sebiferum Roxb(拉丁)

基本 屬大戟科。葉用烏白之

根皮。產地 凡南方平澤間恒多生焉。



烏 柏 木

形態 烏白為暖地所產之落葉喬木。高一丈至三丈餘。葉互生。作廣卵圓形。前端尖。夏月於梢上生花穗。接黃色單性小花。秋末結長三四寸黑褐色扁圓形之實。表面被有白粉。中藏三子。如豆大。皮

十 畫 烏

部含有多量脂肪。採其根皮供藥用。

製法 大明曰。慢火炙乾黃乃用。

性質 苦。微溫。有毒。

效能 瀉熱毒。消水腫。用作利水藥。

主治 暴水癥結積聚。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華詒家本草論烏柏根白皮曰。療

頭風。通大小便。【元】朱丹溪本草

衍義補遺論烏柏根白皮曰。解蛇

毒。【明】繆希雍本草經疏論烏柏

根白皮曰。烏柏木根皮味苦氣微

溫。日華子言涼。然詳其用。應是辛

苦溫之藥。而其性則有毒也。與巴

豆。牽牛大略相似。入手足陽明經。

其主暴水癥結積聚者。皆二經為

病。苦能瀉。辛能散。溫能通行腸胃。

則諸證無不除矣。

配合應用 ①治小便不通。烏

柏根皮煎湯飲之。(肘後方)

②治大便不通。烏柏木根方長

一寸。劈碎。水煎半盞。服之立通。不

用多喫。其功神聖。象能取水。(斗

門方)

③治二便關格二三日則殺人。烏

柏東南根白皮。乾為末。熱水服

二錢。先以芒硝二兩煎湯服吐甚

效。(肘後方)

④治水氣虛腫。小便澀。烏柏皮。

檳榔。木通一兩為末。每服二錢。米

飲下。(聖惠方)

⑤治脚氣濕瘡。極痒有蟲。烏柏

根為末。傅之。少時有涎出良。(摘

玄方)

⑥治尸注中蠱。心腹刺痛。沈默

錯亂。用烏柏根皮煎濃汁一合。調

硃砂末一錢服之。肘後方無硃砂。

(永類鈴方)

⑦治疔疔昏狂。疔頭凸。紅柏樹

根經行路者。取二尺許。去皮搗爛

并華水調一盞服。待瀉過。以三角

銀杏仁浸油搗會患處。(聖濟總

錄方)

⑧治嬰兒胎瘡滿頭。用水邊烏

柏樹根。晒研。入雄黃末少許。生油

調搽。(經驗良方)

⑨治鼠非砒毒。烏柏根半兩。搗

水服之。(醫方大成)

⑩治鹽鹵痰喘。柏樹皮去粗搗

汁。和飛鷄作餅烙熟。早晨與兒喫

三四箇。待吐下鹽涎乃佳。如不行。熱茶催之。(摘玄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者

禁用。

參攷資料 ①烏柏根性沉而

降。利水通腸。功勝大戟。一野人病

腫滿氣壯。令掘此根。搗爛。水煎服

一盞。連行數行而病平。氣虛人不

可用之。此方出太平聖惠方。言其

功神聖。但不可多服爾。誠然。(李

時珍) ②烏柏葉。如小杏葉。但微

薄而綠色。差淡。子八九月熟。初青

後黑。分為三瓣。取子出油。然燈及

焚髮。(寇宗奭) ③烏白。烏喜食其

子。因以名之。陸龜蒙詩云。行歌每

依鴉兒影。挑頻時見鼠姑心是矣。

鼠姑。牡丹也。或云其木老則根下

黑爛成白。故得此名。鄭樵通志言

烏白即拒柳者非也。(李時珍) ④

生山南平澤。樹高數仞。葉似梨杏。

五月開細花。黃白色。子黑。(蘇頌)

⑤南方平澤甚多。今江西人種植。

採子蒸食。取脂澆燭。食之子。上皮

脂勝於仁也。(李時珍) ⑥水腫多

屬脾虛。不能制水。以致水氣泛溢。

法當補脾實土為急。此藥必不可輕用。如果元氣壯實者。亦須暫施一二劑。病已即去之。(經希雅)

【烏柏根皮】即烏柏木之處方用名。詳「烏柏木」條。

【烏柏葉】性質 苦。微溫。有毒。主治 食牛馬六畜

肉。生疔腫欲死者。搗汁頓服。得大利。去毒即愈。未利再服。冬用根。

【烏參泥】即孩兒茶之原名。詳「孩兒茶」條。

【烏草】即鼠尾草之古籍別名。與見本草拾遺。詳「鼠尾草」條。

【烏骨雞】命名 本品乃鷄類之骨色烏者故名。

處方用名 烏鷄肉。基本 屬鷄類。為舌黑或骨

鳥之雞。形態 與鷄條同。惟其骨或羽毛之色為烏黑耳。

製法 孟詵曰。凡使烏鷄。治新產婦。須用烏鷄一隻。治淨。和五味末炒香。投二升酒中。封一宿。取飲。

令人肥白。又和烏油麻二升。熬香入酒中。極效。

性質 甘平。無毒。

效能 補虛羸。治勞損。用作滋養強壯藥。

主治 補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊。心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢禁口。煎煮食飲汁。亦可搗和丸藥。

歷代記述攷證 【明】經希雅本草經疏論烏骨鷄曰。烏骨鷄性屬陰。能走肝腎血分。補血益陰。則虛勞羸弱可除。陰回熱去。則津液

自生。渴自止矣。陰平陽秘。表裏固密。邪惡之氣不得入。心腹和而痛自止。鬼亦不能犯矣。益陰。則衝任帶三脈俱旺。故能除崩中帶下。一切虛損諸疾也。古方烏骨鷄丸。治婦人百病者。以其有補虛益陰入血分之功。

配合應用 治赤白帶下。白果。蓮肉。江米。各五錢。胡椒一錢。為末。烏骨鷄一隻。如常治淨。裝末入腹。煮熟。空心食之。

治遺精白濁。下元虛弱者。用前方食之良。

治脾虛滑泄。烏骨母雞一隻。治淨。用豆豉一兩。草果二枚。燒存

性。捺入雞腹內。紮定。煮熟。空心食之。

施用宜忌 凡非虛羸而有實邪者禁用。

參攷資料 雞屬木。而骨反鳥者。巽變坎也。受水木之精氣。故肝腎血分之病宜用之。男用雌。女用雄。婦人方科有烏雞丸。治婦人百病。養雞至爛。和藥。或并骨兼用之。鬼擊卒死。用其血塗心下亦效。(李時珍)

【烏兔】即鷓鴣之古籍別名。與見杜甫詩。詳「鷓鴣」條。

【烏菓子】即鼠李子之古籍別名。與見圖經本草。詳「鼠李子」條。

【烏梅】命名 本品係以未熟薰火煤煙中。薰乾者。色變烏黑。故名。

處方用名 烏梅乾。烏梅肉。

古籍別名 梅實(本經) 薰梅(綱目) 菓煙九助(和漢藥考)

基本 屬薔薇科梅樹未熟之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。烏梅各省均有出。

採取 三四月間採其中實者。以煙薰乾。

製法 陶弘景曰。凡使烏梅。須去核。微炒之。李時珍曰。造法取青梅。籃盛於突上。薰黑。若以稻灰淋汁。潤溼。蒸過。則肥澤不盡。

性質 酸。溫。平。無毒。

效能 斂肺。瀉腸。殺蟲。柔肝。有健胃固腸之效。用於下痢。又有發汗解熱之效。用於感冒。

主治 下氣。除熱。煩滿。安心。止肢體痛。偏枯不仁。死肌。去青黑痣。蝕惡肉(本經) 去痺。利筋脈。止下痢。好唾口乾(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論烏梅曰。水瀉汁飲。治傷寒煩熱。唐陳藏器本草拾遺論烏梅曰。止渴。調中去痰。治癆瘵。止吐逆。霍亂。除冷熱痢。宋大明諸家本草論烏梅曰。治虛勞骨蒸。消酒毒。令人得睡。和建茶。乾

真為丸服。止休息痢。大驗。【明】李時珍本草綱目論烏梅曰。斂肺。瀉腸。止久嗽。瀉痢。反胃。噎膈。就厥吐。利消腫。消痰。殺蟲。解魚毒。馬汗毒。硫黃毒。【明】經希雅本草經疏論

烏梅各省均有出。

烏梅曰。梅實。卽今之烏梅也。其味最酸。經曰。熱傷氣。邪客於胸中。則氣上逆而煩滿。心爲之不安。烏梅味酸。能斂浮熱。能吸氣歸元。故主下氣。除熱煩滿及安心也。下痢者。大腸虛脫也。好唾口乾者。虛火上炎。津液不足也。酸能斂虛火。化津液。固腸脫。所以主之也。其主肢體痛。偏枯不仁者。蓋因溼氣浸於經絡。則筋脈弛緩。或疼痛不仁。肝主筋。酸入肝而養筋。肝得所養。則骨正筋柔。機關通利而前證除矣。其主去死肌。青黑瘰癧肉者。白梅之功也。白梅味酸。鹹能軟堅。故又能消痰醒睡。止霍亂。解酒毒。弘景云。生梅烏梅。白梅。功用大約相似。第烏梅較良。實用更多。〔清〕黃宮繡本草求真論烏梅曰。烏梅酸澀而溫。似有類於木瓜。但此入肺則收。入腸則澀。入筋與骨則軟。入蟲則伏。入於死肌惡肉。惡瘰則除。刺入肉中則拔。故於久瀉久痢。氣逆煩滿。反胃骨蒸。無不因其收澀之性。而使下脫上逆皆治。且於癩毒可敷。中風牙關緊閉可開。虻蟲上攻眩仆可治。口渴可止。寧不爲酸

十畫 烏

澀收斂之一驗乎。不似木瓜功專疏泄脾胃。筋骨溼熱。收斂肺脾耗散之元。而於他症則不及也。但肝喜散惡收。久服酸味。亦伐生氣。且於諸症初起切忌。〔清〕王士雄隨息居飲食譜論烏梅曰。梅性酸溫。生時宜醃鹽食。溫膽生津。孕婦多嗜之。以小滿前肥肥而不帶苦者佳。食梅齒齲。嚼胡桃肉解之。多食損齒。生痰助熱。凡痰嗽疝膨痞積脹滿。外感未清。女子天癸未行。及婦女汛期前後。產後痧痘後並忌之。青者鹽醃。曬乾爲白梅。亦可蜜漬糖收。法製以充方物。牛黃者烟薰爲烏梅。入藥及染色用之。極熟者榨汁。曬收爲梅醬。古人用以調饌。故書曰。若作和羹。爾惟鹽梅也。辨偽 ●鄭肖巖曰。造烏梅法。係取青梅籃盛於竈突上。熏黑。若以稻灰淋汁。潤溼蒸過。則肥澤不盡。近有以小李偽造充售。則無益而有害矣。●曹炳章曰。按烏梅杭州出者。肉厚核小。色黑。性潮潤者佳。紹興楓橋出者。性燥核大。肉薄。色黑微黃者。略次。別處亦出。總要肉厚色黑。性糯爲佳。

配合應用 ●治渴消煩悶。烏梅肉二兩。微炒爲末。每服二錢。水二盞。煎一盞。去滓。入鼓二百粒。煎至半盞。溫服。〔簡要濟衆方〕 ●治泄痢口渴。烏梅煎湯。日飲代茶。〔扶壽精方〕 ●治產後痢瀉。烏梅肉二十箇。麥門冬十二分。每以一升。煮七合。細呷之。〔必效方〕 ●治赤痢腹痛。烏梅肉炒。黃連各四兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每米飲服二十九。日三服。〔聖惠方〕 ●治便痢膿血。烏梅一兩。去核。燒過爲末。每服二錢。米飲下。立止。〔聖濟總錄方〕 ●治久痢不止。腸垢已出。用烏梅肉二十箇。水一盞。煎六分。食前分二服。〔肘後方〕 又用烏梅肉。白梅肉。各七箇。搗爛。入乳香末少許。杵丸。梧子大。每服二三十丸。茶湯下。日三。〔袖珍方〕 ●治大便下血。及酒痢久痢不止。用烏梅三兩。燒存性爲末。醋煮。米糊和丸。梧子大。每空心米飲服二十九。日三。〔濟生方〕 ●治小便尿血。烏梅燒存性。研

末。醋糊丸。梧子大。每服四十九。酒下。 ●治血崩不止。烏梅肉七枚。燒存性。研末。米飲服之。日三。 ●治大便不通。氣奔欲死者。烏梅十顆。湯浸。去核。丸棗大。納入下部。少時即通。〔食療本草方〕 ●治霍亂吐利。鹽梅煎湯。細細飲之。〔如宜方〕 ●治蛇蟲上行。出於口鼻。烏梅煎湯。頻飲。并含之。卽安。〔食鑑本草方〕 ●治水氣滿急。烏梅。大棗各三枚。水四升。煮二升。納蜜和勻。含嚙之。〔聖濟總錄方〕 ●治梅核腦氣。取半青半黃梅子。每個用鹽一兩。淹一日。夜曬乾。又浸又曬。至水盡乃止。用青錢三個。夾二梅。麻線縛定。通裝磁罐內。封埋地下。百日取出。每用一枚。含之。唾汁。入喉卽消。收一年者。治一人。二年者。治二人。其妙絕倫。〔龔氏經驗方〕 ●治心腹脹痛。短氣欲絕者。烏梅二十七枚。水五升。煮一沸。納大錢二七枚。煮二升。頓服之。〔肘後

方)

- ①治勞瘵劣弱。烏梅十四枚。豆豉二合。桃柳枝各一虎口。甘草三寸。生薑一塊。以童子小便二升。煎一半。溫服即止。(圖經本草方)
- ②治久欬不已。烏梅肉微炒。罌粟殼去筋膜。蜜炒。等分爲末。每服二錢。睡時蜜湯調下。
- ③治痰厥頭痛如破者。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三升。煮一升。頓服。取吐即愈。(肘後方)
- ④治傷寒頭痛壯熱。胸中煩痛。四五日不解。烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。溫服取吐。吐後避風良。(梅師方)
- ⑤治折傷金瘡。乾梅燒存性。傅之一宿。瘡(千金方)
- ⑥治馬汗入瘡作痛。用烏梅連核搗爛。以頭醋和敷。仍先刺瘡。出去紫血。乃傅之。緊定。(經驗方)
- ⑦治獺犬傷毒。烏梅末酒服二錢。(千金方)
- ⑧治指頭腫毒。疔甚者。烏梅肉和魚鮮搗封之妙。(李樓奇方)
- ⑨治傷寒匿瘡。生下部者。烏梅肉三兩。炒爲末。煉蜜丸。梧子大。以

石榴根皮煎湯。食前下二三十丸。(聖惠方)

- ⑩治小兒頭疔。烏梅燒末生油調塗。(聖濟總錄方)
- ⑪治硫黃毒發。令人背膊疼痛。目暗漠漠。烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿水一大盞。煎七分。呷之。(聖濟總錄方)
- ⑫用量 八分至錢半。
- ⑬施用宜忌 凡病當發散者禁用。又忌豬肉。
- ⑭著名方劑 烏梅丸。治病者靜而時煩。因感寒。就上入其腸。爲就厥。當吐就。並治久痢。(仲景方) 烏梅三百個。黃連一斤。黃柏六兩。乾薑十兩。附子六枚。(池) 蜀椒四兩。(熬去汁) 桂枝六兩。細辛六兩。人參六兩。當歸四兩。右十味。異搗篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。蒸之。五升米下。飯熟搗成泥。和藥令相得。納臼中。與蜜二千下。如梧子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至二十丸。禁生冷滑物臭食。
- ⑮參攷資料 烏梅。自梅所主諸病。皆取其酸收之義。惟張仲景治就厥烏梅丸。及蟲匿方中用者。

取蟲得酸即止之義。稍有不同耳。醫說載曾魯公痢血。百餘日。醫不能療。陳應之用鹽水梅肉一枚。研爛。合臘茶入醋服之一。啜而安。大丞梁莊稱公亦痢血。應之用烏梅。胡黃連。蘆下土。等分爲末。茶調服亦效。蓋血得酸即斂。得寒則止。得苦則清。故也。其蝕惡瘡。肉雖是酸收。却有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性。研傅惡肉上。一夜立盡。聖惠用烏梅和蜜作餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。膿潰百日方愈。中有惡肉。突起如蠶豆大。月餘不消。醫治不效。因閱本草得此方。試之一日夜。去其大半。再上一日而平。(李時珍) 烏梅收酸。益津開胃。治休息痢。能斂肺瀉腸。血痢不止。以烏梅燒灰存性。米湯服之。漸止。中風僵仆。牙關緊閉者。取烏梅擦牙。銀即開。按烏梅之酸。固有酸收斂軟之兩義也。(張石頑) 梅古文作臬。象子在木上之形。梅乃杏類。故反杏爲臬。書家說爲甘木。後作梅。從每。諧聲也。或云梅者。媒也。媒合衆味。故書

云。若作和羹。爾惟鹽梅。而梅字亦從某也。陸佃埤雅言。梅入北方。變爲杏。郭璞註。爾雅以柗爲梅。皆誤矣。柗即柗木。荆人呼爲梅。見陸璣草木疏。(李時珍) 多食損齒。傷筋。蝕脾胃。令人發膈上痰熱。服黃精人忌食之。食梅齒齲者。嚼胡桃肉解之。物類相感志云。梅子同甜粉食。則不酸。不軟牙。(大明)

【烏梅肉】即烏梅之處方用名。詳【烏梅】條。

【烏梅乾】即烏梅之處方用名。詳【烏梅】條。

【烏梅】條。

【烏梢蛇】原名 烏蛇。古別名 劍脊烏梢蛇。黑花蛇。(綱目) 黑風蛇。烏花蛇。(和漢藥考)

基本 屬爬蟲類蛇類。爲烏蛇之內。

產地 陳仁山藥物生產辨云。烏蛇產江蘇鎮江府十月新。

形態 烏蛇棲息各地山野間。全體漆黑色。腹部灰黑色。頭圓尾尖。背有三稜。眼有赤光。雖枯死。眼不陷。如活者。其重一兩以下者。爲上。粗大而重者。爲下。以其藥力減

也。

種類 有劍脊而細尾者為烏梢蛇。無劍脊而粗尾者為鳳梢蛇。採取 夏秋間恒於蘆葦上捕得之。

製法 雷斅曰。凡使去頭及皮。到斷。苦酒浸一宿。漉出。柳木炭火炙乾。或以酥炙。於屋下已地上掘坑埋一夜。再炙乾。或以酒浸煮乾用。

用法 水煎服。或酒浸飲。或焙到為末。和作丸散。

性質 甘。平。無毒。

主治 祛風燥溼。治癩瘡。諸風頑痺。皮膚不仁。風瘙癢。疥癬。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論烏梢蛇曰。熱毒風。皮肌生癩。眉髭脫落。癢疥等瘡。【明】李時珍本草綱目論烏梢蛇曰。功與白花蛇同。而性善無毒。色黑如漆。尾細。【清】楊時泰本草述鈞元論烏梢蛇曰。烏梢蛇與白花蛇。味皆甘。皆入血。而白花蛇獨兼有鹹。則入血而祛風者。烏梢似難與白花同。故本草所列主治。有輕重之別也。

十靈 烏

配合應用 ●治例。治大風。用烏蛇三條。蒸熟取肉。焙研末。蒸餅丸。米粒大。以喂烏雞。待盡。殺雞。煮熟。取肉。焙研末。酒服一錢。或蒸餅丸。服。不過三五雞即愈。又用大烏蛇一條。打死。盛之。待爛。以水二碗。浸七日。去皮骨。入糙米一升。浸一日。曬乾。用白雞一隻。餓一日。以米飼之。待毛羽脫去。殺雞。煮熟。食。以酒下之。吃盡。以熱湯一盆。浸洗大牛日。其病自愈。【秘傳方】

●治紫白癩風。烏蛇肉酒炙六兩。枳殼炒。牛膝。天麻各二兩。熟地黃四兩。白茯苓炒。五加皮。防風。桂心各二兩。剉片。以絹袋盛於無灰酒二斗中。浸之。密封七日。每溫服一小盞。忌雞鵝魚肉發物。【聖惠方】

●治面瘡野飽。烏蛇肉二兩。燒灰。臘豬脂調傅。【聖惠方】

●治嬰兒撮口。不能乳者。烏梢蛇酒浸。去皮骨。炙半兩。麝香一分。為末。每用半分。荊芥煎湯調灌之。【聖惠方】

●治破傷中風。項強身直。定命散主之。用白花蛇。烏蛇。並取向後

二寸。酒洗。潤取肉。蜈蚣一條。全者。炙。右各為末。每服三錢。溫酒調服。【普濟方】

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料 ●商州有人患大風。家人惡之。山中為起茅屋。有烏蛇。墮酒罌中。病人不知。飲酒漸瘳。罌底見有蛇骨。始知其由。【朝野僉載】 ●烏蛇。生商洛山。背有三稜。色黑如漆。性善。不噬物。江東有黑梢蛇。能纏物至死。亦此類也。【馬志】 ●蕪州黃州山中有之。乾寧記云。此蛇不食生命。亦不害人。亦生蘆葦中。吸南風。及其花氣。最難採捕。多於蘆枝上得之。其身烏而光。頭圓尾尖。眼有赤光。至枯死。眼不陷。如活者。稱之重七錢。至一兩者為上。十兩至一鎰者為中。粗大者力漸減也。作偽者用他蛇。煎黑。亦能亂真。但眼不光耳。【蘇頌】 ●烏蛇脊高。世稱劍脊烏梢。尾細長。能穿小銅錢。一百文者佳。有身長丈餘者。其性畏鼠。蛇類中惟此入藥最多。【寇宗奭】

【烏梢蛇皮】 主治 風毒氣。眼生翳。唇緊。唇

煎燒灰。酥和傅之。【李時珍】

【烏梢蛇卵】 主治 大風癩疾。

參攷資料 聖濟總錄。治癩風。用烏蛇卵。和諸藥為丸服。云與蛇肉用功。【李時珍】

【烏梢蛇膏】 主治 耳聾。結。麥豆許。塞之神效。

【烏梢蛇膽】 主治 大風癩疾。木舌。眼塞。

【烏犀】 即烏莖之古籍別名。典見綱目。詳「皂莢」條。

【烏犀角】 即犀角之處方用名。詳「犀角」條。

【烏蛇草】 即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【烏魚】 即鱧魚之別名。詳「鱧魚」條。 ●即烏鰂魚之簡稱。詳「烏鰂魚」條。

【烏魚蛋】 古醫別名。雄白魚。【藥性考】

考本 本品係烏鰂魚腹中之

卵。

產地 登萊。

性質 鹹平無毒。

主治 開胃利水。

【烏麥】即蕎麥之古籍別名。典見日川本草。詳「蕎麥」條。

【烏麻】即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【烏喙】原名 草烏喙。古籍別名 兩頭尖。(綱目)

性質 辛微溫。有大毒。

主治 風溼丈夫腎溼。陰寒痺寒熱。歷節。引腰痛。不能行步。癰腫。結又墮胎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論草烏喙曰。男子腎氣衰弱。陰汗。瘰癧。歲月不消。【明】李時珍本草綱目論草烏喙曰。主大風頑痺。

【烏菴】即大菴黑者之處方用名。詳「大菴」條。

【烏椴】即椴木之古籍別名。典見開寶本草。詳「椴木」條。

【烏殺硬蟲】即蝓蟻之別名。詳「蝓蟻」條。

【烏絨樹皮】即合歡皮之別名。詳「合歡皮」條。

【烏絨子】即鼠李子之別名。詳「鼠李子」條。

【烏菱】即玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳「玉竹」條。

【烏雄雞肉】基本 係存性。動物鳥類鷄雞類。類雉科。

性質 甘微溫。無毒。

主治 補中止痛。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論烏雄雞曰。止肚痛。心腹惡氣。除風溼麻痺。諸虛羸。安胎。治折傷并癰疽。生搗塗竹木刺入肉。

參攷資料 按李廷飛云。黃雞

宜老人。烏雞宜產婦。暖血。馬益卿云。妊婦宜食牡雞肉。取陽精之全於天產者。此亦胎教宜見。虎豹之意耳。又唐崔行功纂要云。婦人產死。多是富貴家擾攘。致婦驚悸。氣亂故耳。惟宜屏除一切人。令其獨

產。更爛煮牡雞取汁。作粳米粥。與食。自然無恙。乃和氣之效也。蓋牡雞汁性滑而濡。不食其肉。恐難消

也。今俗產家。每產後即食雞啖卵。

氣壯者。幸而無恙。氣弱者。因而成疾。皆由不解此意也。(李時珍)

【烏圓】即鸚尾之古籍別名。典見本經。詳「鸚尾」條。

【烏滑石】即滑石色烏似璽。上有青白膩文者之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「滑石」條。

【烏莖】即南天燭之別名。詳「南天燭」條。

【烏賊甲】即烏賊骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏賊骨」條。

【烏賊骨】即烏賊魚骨之簡稱。詳「烏賊骨」條。

【烏飯】即青精乾石髓飯之古籍別名。典見綱目。詳「青精乾石髓飯」條。

【烏飯草】即南天燭之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「南天燭」條。

【烏椴子】即鼠李子之古籍別名。典見綱目。詳「鼠李子」條。

【烏爾格納】即山穀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「山穀」條。

【烏嬰】即射干之古籍別名。典見別錄。詳「射干」條。

【烏蒜】即石蒜之古籍別名。典見

救荒本草。詳「石蒜」條。

【烏菴】即射干之古籍別名。典見本經。詳「射干」條。

【烏銀】製法 烏銀。用硫黃。家製爲器。盛糖飲之。

主治 長年辟惡。

配合應用 治翻胃如神。用紋銀錢二分。硫黃一觔。將硫黃分作一百二十包。取大傾銀罐一個。將銀放入罐內。炭火上煨。將硫黃逐包投入罐內。黃盡爲度。取銀爲末。初次服三分。二次服二分。三次服一分。再加丁香。茴香。藿香。沉香各三分。麝香一分。分爲三服。每服用銀粉二分。水一鍾。煎藥至半鍾。將銀粉空心送下。作三日服完。即愈。

【烏菴】即鸚尾之古籍別名。典見別錄。詳「鸚尾」條。

【烏椴】原名 約椴。命名 本品根似烏藥。氣香。故名。


古稱別名 榆草。(本草集註)

枕。豫(綱目)

基本 屬椴科爲烏椴之根皮。產地 凡山谷間恒多產。爲和

漢藥考曰。產暖地山中。日本之四國。安房。伊豆等處。亦頗產此。

形態 烏樟爲落葉灌木。幹高自七八尺至一丈。葉爲長橢圓形。或披針形。前端尖。三五葉簇生。初夏於生新葉之前。枝梢先開黃色小花。作繖狀。實黑色圓形。大二三分。藥用其根皮。



烏樟

採取 八九月間。採根皮日乾。
用法 水煎或磨服。或對末外傳。

性質 辛溫無毒。

成分 根皮成分未詳。木部、葉、皮部。俱含有揮發油。採收之名爲烏樟油或釣樟油。

效能 傳金瘡。療疥癬。用作止血藥。

歷代記述攷證

【唐】蕭炳四

【宋】大明日華諸家本草論烏樟曰。治奔豚脚氣水腫煎湯服亦可。

十畫 烏

浴疥癢。疥癩。風瘰。併研末傳之。

參攷資料 ①樟有大小二種。

紫淡二色。此即樟之小者。按鄧樞通志云。釣樟亦樟之類。即耐雅所謂掄無疵是也。又相如賦云。椶楠豫章。顏師古注云。豫即枕木。章即樟木。二木生至七年。乃可分別。觀此。則豫即別錄所謂釣樟者也。根似烏藥香。故又名烏樟。(李時珍)

②生柳州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月採根皮日乾。(蘇恭)

烏樟莖葉

主治 置門上辟天行時氣。

烏楠木 卽烏木之古籍別名。與見綱目。詳「烏木」條。

烏菱 卽菱實老而發硬者。詳「菱」條。

烏膠 卽阿膠之古籍別名。與見和漢藥考。詳「阿膠」條。

烏參 卽參果根之古籍別名。與見別錄。詳「參果根」條。②卽藜蘆之古籍別名。與見和漢藥考。詳「藜蘆」條。

烏鴉

古籍別名 鴉鳥。(爾雅)老鴉。鶻鴉。鶻鴉。楚鳥。

(綱目)大鴉鳥。(禽經)

外國名詞 *Cervus macrorhynchus* Rp. (拉丁) *Oriental*

favon. (英) *Grow Krah* (德)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類烏鴉科。

產地 出山林間。浙東尤多。

形態 烏鴉爲林禽類之一種。其嘴強直。色黑而大。嘴根具剛毛。被覆鼻孔。體之上面黑色。翼之基部暗色。有綠光。喉部之羽呈披針形。其翼大有十手翼。脚較細。色黑。四趾踏地。前三後一。趾端有鈎爪。體長一尺八寸。翼長一尺四寸。嘴長六七分。食穀類。喜晨鳴。其肉可供藥用。

性質 酸。溫。平。無毒。

主治 瘦病咳嗽。骨蒸勞疾。臍月以瓦瓶泥固。燒存性爲末。每服飲一錢。又治小兒疳疾及鬼魅。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論烏鴉肉曰。治暗風癩疾。及五勞七傷。吐血咳嗽。殺蟲。

參攷資料 ①烏鴉肉。臭不可食。止可治病。(孟詵) ②烏鴉肉及卵食之。令人昏忘。其毛亦然。蓋

未必昏。爲其類臭耳。(陳啟聲)

烏鴉今人多用治急風。而本經不著。宜於臘月捕取。翅羽嘴足全者。泥固。煨過入藥。治諸風。烏犀丸中用之。見和劑局方。(蘇頌) ③聖濟總錄。治破傷中風。牙關緊急。四肢強直。有金烏散。煨過入藥。品多不錄。(李時珍)

烏鴉心 主治 卒然咳嗽。炙熟食之。

烏鴉目 主治 吞之令人見諸魅。或研汁注目中。夜能見鬼。

烏鴉翅羽 主治 從高墜。下瘀血。搶心。面青氣短者。取右翅七枚。燒研酒服。當吐血便愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論烏鴉翅羽曰。治針刺入肉。以三五枚炙焦。研末醋調。傳之數次。卽出。甚效。又治小兒痘瘡。不出復入。

烏鴉頭 主治 土蜂螫。燒灰傳之。

烏鴉膽 主治 點風眼紅爛。餘與燕鳥膽汁同。

【烏龍骨】即虎骨之古籍別名。典見肘後方。詳「虎骨」條。

【烏賴樹皮】即合歡皮之古籍別名。典見綱目。詳「合歡皮」條。

【烏頭】①即川烏之原名。詳「川烏」條。②即附子正根也。詳「附子根」條。

【烏頭尖】即川烏尖之處方用名。詳「川烏」條。

【烏頭附子尖】性質 辛溫。有毒。

主治 爲末茶服半錢。吐風痰癩痢。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求真論烏附尖曰。烏附尖能吐風痰。以治癩痢。取其直達病所也。

配合應用 ①治風厥癩痢。凡中風。痰厥。癩痢。驚風。痰涎上壅。牙關緊急。上視。搐搦。並宜碧霞丹主之。烏頭尖。附子尖。蠟棺各七十個。石綠研九度。飛過十兩爲末。麩糊丸。芥子大。每用一丸。薄荷汁半盞化下。更服溫酒半合。須更吐出痰涎爲妙。小兒驚痢。加白礬等分。(和劑局方)

②治脾風撮口。生川烏尖三個。全足蜈蚣半條。酒浸炙。麝香少許。爲末。以少許吹鼻得嚏。乃以薄荷湯灌一字。(永類鈴方)

③治木舌腫脹。川烏尖。巴豆研細。醋調塗刷。(集簡方)

④治牙痛難忍。附子尖。天雄尖。全蠍各七個。生研爲末。點之。(永類鈴方)

⑤治奔豚疝氣作痛。或陰囊腫痛。去鈴丸。用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油。爲末。糕糊丸。梧子大。朱砂。麝香爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。(濟療方)

⑥治割甲成瘡。連年不愈。川烏頭尖。黃蘗等分。爲末。洗淨貼之。以愈爲度。(古今錄驗方)

⑦治老幼口瘡。烏頭尖一個。天南星一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

參攷資料 ①烏附用尖。亦取其銳氣直達病所爾。無他義也。保幼大全云。小兒慢脾驚風。四肢厥逆。用附子尖一個。硫黃棗大一個。蠟棺七個。爲末。薑汁麵糊丸。黃米

大。每服十丸。米飲下。亦治久瀉。疝。凡用烏附。不可執爲性熱。審其手足冷者。輕則用湯。甚則用丸。重者用膏。候手足暖。陽氣回。即爲佳也。按此方乃和劑局方碧霞丹變法也。非真慢脾風。不可輒用。是故初虞世有金虎碧霞之戒。(李時珍)

②常山吐瀉疾積飲在於心下。瓜蒂吐熱痰在膈。木鱉子引吐熱毒從痰外出。萊菔子吐氣痰在膈。參蘆吐虛痰。烏附尖。藜蘆吐風痰。(黃宮繡)

③朱丹溪治許白雲。屢用瓜蒂。梔子。苦參。藜蘆等劑。吐之不透。後用附子尖和漿水與之。始得大吐。膠痰數碗。(汪昂)

【烏龍】即狗之俗名。詳「狗」條。

【烏龍草】即七葉黃荊之別名。詳「七葉黃荊」條。

【烏龍鬚】形態 烏龍鬚爲雜草類之一種。掛生於烏柏樹上。細長如燈芯草狀而下垂。採得曬乾。可供藥用。

主治 一切血症。癰腫。勞瘵。痲疾。

【烏擇】即虎骨之古籍別名。典見漢書。詳「虎骨」條。

命名 本品皆以畜毛織成。其黑乃本色。故名。

主治 火燒生瘡。令不着水。風止血。除賊風。燒灰酒服。治瘰癧。後血下不止。久臥吸人脂血。損顏色。上氣。

參攷資料 鼈屬甚多。出西北方。皆畜毛所作。其白或黑者。本色也。其青烏。黃赤者。染色也。其鼈。揭。鬚。鬚。鬚。等稱者。因物命名也。大抵入藥。不甚相遠。(李時珍)

【烏墨泥】即孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳「孩兒茶」條。

【烏蟻】即蟻蛇之黑色者。典見綱目拾遺。詳「蟻蛇」條。

【烏雞】即烏骨雞之簡稱。詳「烏骨雞」條。

【烏雞肉】即烏骨雞之處方用名。詳「烏骨雞」條。

【烏鯉魚】即鯉魚之別名。詳「鯉魚」條。

【烏藤菜】即劉寄奴草之古籍別名。典見綱目。詳「劉寄奴草」條。

誘賊。(綱目)矮樟。房花。莖麻。矮樟。矮脚樟。比目沈香。(和漢藥考)

外國名詞 Lindora Stryeh-nifolia, Vahl. (拉丁) (Daph-nium Strychnifolium, S. et Z.) (英)

基本 鳳樟科之天台烏藥及屬防己科之衡州烏藥之根。

產地 凡嶺南諸州及吳楚山谷中恒多產焉。尤以天台者佳。

形態 烏藥為常綠灌木。高八九尺。葉厚作圓形。或橢圓形。前緣尖。邊緣無鋸齒。縱有三條脈絡。春月於枝梢葉腋開淡黃綠色之小花。其根外部紫褐色。內部黃白色。根葉均有一種香氣。

種類 嶺南者黑褐色而堅硬。天台者其色白而虛軟。形如天冬。兩端尖。中肥大。成連珠狀。旁有鬚根。粗三四分。長四五寸許。以新者為良品。衡州者形如木根。不作連珠狀。實為下品。

採取 八月間採根。根如車轂紋。形如連珠者用。

製法 根採旁附狀如錫珠連者。直根不堪用。去皮心。略炒。或生

磨用。性質 辛。溫。無毒。

效能 溫中。順氣。用治中風。氣逆亂藥。

主治 中惡。心腹痛。蠱毒。疔疔。鬼氣。宿食不消。天行疫瘴。膀胱腎間冷氣。攻衝背脊。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論烏藥曰。除一切冷

霍亂反胃。吐食瀉痢。癰癤疥癩。并解冷熱。其功不可悉載。貓犬百病。竝可磨服。【元】王好古湯液本草論烏藥曰。理元氣。【明】李時珍本草綱目論烏藥曰。中氣脚氣。疝氣。氣厥。頭痛。腫脹喘急。止小便頻數。及白濁。【明】繆希雍本草經疏論烏藥曰。烏藥味辛氣溫。無毒。然嘗其味。亦帶微苦。氣亦微香。足陽明少陰經。其主中惡。心腹痛。疔疔。鬼氣。天行疫瘴者。皆足陽明受病。陽

明開竅於口鼻。凡邪惡忤鬼。與夫疫瘴之氣。侵入。悉從口鼻而入。此藥辛溫。煖胃。辟惡散邪。故能主諸證也。胃煖則宿食自消。辛散則蟲毒亦解。又腎與膀胱為表裏。虛則

寒客之。而冷氣攻衝背脊。辛溫能散寒邪。其性又善下走。則冷氣攻衝自止也。性溫走泄。故復能散婦人血凝氣滯。微苦而辛。故又能療小兒腹中諸蟲也。【清】黃宮繡本草求真論烏藥曰。烏藥辛溫香。竝書載。上入脾肺。下通腎經。如中風中氣。膀胱冷結。小便頻數。反胃吐食。泄瀉霍亂。女人血氣凝滯。小兒

之屬於氣逆。而見胸腹不快者。皆宜用此。功與木香香附同為一類。但木香苦溫。入脾。爽滯。宜於食積。則宜香附。辛苦入肝。膽二經。開鬱散結。每於憂鬱則妙。此則逆邪橫胸。無處不達。故用以為胸腹逆邪。要藥耳。氣行則風自散。若氣虛內熱。而見胸膈不快者。非其所宜。根有車轂紋形。而連珠者良。酒浸一宿。或煨研用。

配合應用 同沉香。木香。白豆蔻。香附。橘皮。檳榔。治婦人氣質暴氣壅脹。

治一切氣痛。不拘男女。冷氣血氣。肥氣。息賁氣。伏梁氣。奔豚氣。搶心切痛。冷汗喘息欲絕。天台烏

藥小者。酒浸一夜。炒。茴香炒。青橘皮。去白炒。良薑炒。等分為末。溫酒童便調下。(衛生家寶方)

治男婦諸病。香烏散。用香附。烏藥等分為末。每服一二錢。飲食不進。豈豈湯下。瘧疾乾嘔。白臘湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風。盧風。茶湯下。婦人冷氣。米飲下。產後血攻心脾痛。童便下。婦人血海痛。男子疝痛。茴香湯下。(乾坤秘製方)

治小腸疝氣。烏藥一兩。升麻八錢。水二鐘。煎一鐘。一宿。空心熱服。(孫天仁集效方)

治脚氣。擊痛。鄉村無藥。初發時。即取土烏藥。不犯鐵器。布指去上。豈瓦刮。好酒浸一宿。次早空心溫服。酒泄即愈。入爵少許。尤佳。痛入腹者。以烏藥同雞子。瓦罏中水煮一日。去雞子。切片。蘸食。以湯送下。甚效。(永類金方)

治血痢。瀉血。烏藥燒存性。研陳米飯丸。梧子大。每米飲下三十丸。(普濟方)

治小兒慢驚昏沈。或搐。烏藥磨水灌之。(濟急方)

治氣厥頭痛。不拘多少。及廣

後頭痛。天台烏藥、川芎、薄荷等分爲末。每服二錢。臘茶清調下。產後鐵錘燒紅。洋酒調下。(濟生方)

① 治咽喉閉痛。生烏藥即矮樟根。以酸醋二盞。煎一盞。先噙後嘔。吐出痰涎爲愈。(經驗方)

② 治孕中有癰。洪州烏藥。輭白香辣者五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分。溫服。(婦人良方)

③ 治心腹氣痛。烏藥水磨濃汁一盞。入橘皮一片。蘇葉一錢。煎服。(集簡方)

用錢 錢半至三錢。
施用宜忌 凡氣虛而有內熱者禁用。

奇名方劑 ① 烏沉湯。治一切氣。一切冷。補五臟。調中壯陽。暖膝。去邪氣。冷風麻痺。膀胱腎間冷。氣攻衝背脊。色仰不利。風水毒腫。吐瀉轉筋。痲痺刺痛。中惡。心腹痛。鬼氣。疰忤。天行瘧疾。婦人血氣痛。(局方) 天台烏藥百兩。沉香五十兩。人參三兩。甘草四兩。右共研末。每服半錢。煎鹽湯空心服。或水煎溫服。② 縮泉丸。治脬氣不足。小便頻數。(丹溪方) 烏藥、益智仁各等

分。右共研末。酒煮山藥糊丸。④ 四磨飲。治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨阻不食。(濟生方) 人參、烏藥、檳榔、沉香。右四味。各濃磨水。取七分。煎三五沸。空心溫服。

參攷資料 ① 烏藥性和來氣少。走泄多。但不甚剛猛。同沈香同磨。作湯點服。治胸腹冷氣甚穩當。(慈宗藥) ② 烏以色名。其葉狀似

鱗鯢。鱗魚。故俗呼爲鱗鯢樹。拾遺作旁。其方音訛也。南人亦呼爲矮樟。其氣似樟也。(李時珍) ③ 烏藥生嶺南邕州。容州及江南。樹生似茶。高丈餘。一葉三極。葉青陰白。根狀似山芍藥。及烏樟根。色黑褐。作車紋。橫生。八月採根。根直者不用。(陳藏器) ④ 今台州、雷州、衡州皆有之。以天台者爲勝。木似茶。根高五七尺。葉微圓而尖。面青背白。有紋。四五月開細花。黃白色。六月結實。根有極大者。又似釣樟根。然根有二種。嶺南者黑褐色而堅硬。天台者白而虛軟。並以八月採根。如車紋。形如連珠者佳。或云天台者香白可愛。而不及海南者力大。(蘇頌) ⑤ 吳楚山中極多人以

爲薪根。葉皆有香氣。但根不甚大。纔如芍藥爾。嫩者肉白。老者肉褐色。其子如冬青子。生青熟紫。核殼極薄。其仁亦香而苦。(李時珍)

【烏藥子】 主治 陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒起。黑烟。按水中煎三五沸。服一大盞。汗出陽回。卽瘥。

【烏藥茶】 產地 出東莞。製法 以芝麻醬油。雜茶。爲汁煎之。主治 去風溼。破食積。

【烏藥嫩葉】 主治 炙礬。煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。

參攷資料 烏藥下通少陰腎經。上理脾胃元氣。故丹溪朱氏。問陰丸藥中。往往加烏藥葉也。(李時珍)

【烏藥子】 卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【烏鯛骨】 原名 海螵蛸。命名 本品形象螵蛸。故名。

處方用名 烏賊骨。
古藉別名 墨魚骨(綱目) 鮫

魚骨。(日華) 海者自事小吏。(綱經) 白龍柔骨。烏賊甲。墨烏骨。烏魚。(和漢藥考)

基本 屬頭足科二類。爲軟體動物烏賊之骨。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海螵蛸以廣東北海。平海。汕尾。水東等處產者爲大隻。日本山東亦有出。

形態 烏賊體作壘狀。呈灰色。下部叢集八短脚。另有一對頗長之鬚狀觸脚。各脚具有吸盤四列。體囊側緣有扁平擴展作餅狀者。口生於體與脚之間。眼生於口上。體肉白色。囊中貯有墨汁。逢敵卽吐。而自晦其蹤跡。本品爲雪白。長橢圓形之骨質。表面作革質狀。一面稍凹。一面隆凸。由石灰鹽類之結晶針組成。質脆弱。逢酸類卽溶解。遺留膜狀物質。



烏 鱧

種類 烏賊種類頗多。日本產者有真烏賊 Sepia irrorata Es.

sect. 刺烏賊 *Sepia a ulota*. 槍
烏賊 *Loligo vulgaris*, Lar. 花
枝 *Spiofonta lessoniana*, For
of Orb. 耳烏賊 *Sepiola japon-*
ica For. of bOr. 鯉烏賊 *Omma-*
strophes pacificus, Appol. 六
種。採取骨質供藥用者。為真烏賊
及刺烏賊二種。其他質柔薄。不適
藥用。

製法 陶弘景曰。凡使烏鯉骨。
須炙黃用。雷斅曰。勿用沙魚骨。其
形真似。但以上文順者是假。以血
滴作水浸。并煮一伏時。漉出。搗一
坑。燒紅。入魚骨在內。經宿取出。入
藥。其效加倍也。

性質 鹹。溫。無毒。
成分 由磷酸鈣。炭酸鈣。膠質
等而成。

效能 通血脈。祛寒濕。溫經。止
帶。用作止血藥。及為女子血枯經
閉藥。或配合眼藥。及用作牙粉原
料。又治肺結核。咯血。痔出血。創傷
其作用與石決明同。惟凝固血液
之能。較石決明為強。

主治 女子赤白帶下。經汁血
閉。陰蝕腫痛。寒熱癢癢。無子。(本

經) 驚風入腹。腹痛環臍。丈夫陰
中腫痛。令人有子。又止瘡多膿汁
不燥。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
本草拾遺論海螵蛸曰。炙研飲服。
治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小
蟲。【唐】孟詵食療本草論海螵蛸
曰。治眼申熱淚。及一切浮翳。研末
和蜜點之。久服益精。【宋】大明日
華諸家本草論海螵蛸曰。療血崩。
殺蟲。【明】李時珍本草綱目論
海螵蛸曰。主女子血枯病。傷肝。唾
血下血。治癰消癥。研末傅小兒疳
疔。痘瘡臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷。跌
傷出血。燒存性酒服。治婦人小戶
燥痛。同雞子黃塗小兒重舌。口
同蒲黃末傅舌腫。血出如泉。同槐
花末吹鼻。治衄血。同銀硃吹鼻。治
喉痺。同白礬末吹鼻。治蠟螫疼痛。
同麝香吹耳。治聾耳。有膿及耳聾。
【明】繆希雍本草經疏論海螵蛸
曰。烏賊魚骨。味鹹。氣微溫。無毒。入
足厥陰少陰經。厥陰為藏血之臟。
女人以血為主。虛則漏下。赤白。或
經汁血閉。寒熱癢癢。少陰為藏精
之臟。主隱曲之地。虛而有溼。則陰

蝕腫痛。虛而寒客之。則陰中寒腫。
男子腎虛。則精竭無子。女子肝傷。
則血枯無孕。鹹溫入肝腎。通血脈
而祛寒溼。則諸證除。精血足。令人
有子也。其主驚氣入腹。腹痛環臍
者。蓋肝屬木。主驚。驚入肝膽。則營
氣不和。故腹痛環臍也。入肝膽。舒
營氣。故亦主之。溫能燥溼。故又主
瘡多膿汁也。按素問云。有病胸脇
支滿者。妨於食。病至則先開腥臊
臭。出清液。先睡血。四肢清。目眩。時
時前後血痛。名曰血枯。得之年少
時。有所大脫血。或醉入房中。氣竭
肝傷。故月事衰少不來。治之以四
烏鯉骨。一箇。茹為末。丸以雀卵。大
如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所
以利腸中及傷肝也。觀此則其入
厥陰血分。為女人崩漏下血之要
藥可知矣。【清】葉天士本草經解
論海螵蛸曰。烏賊魚骨。氣微溫。稟
天春和之木氣。入足厥陰肝經。味
鹹無毒。入足少陰腎經。氣味頗多
於倒陽也。女子以血為主。肝為藏
血之臟。肝血不藏。則赤白漏下。其
主之者。氣溫以達之也。肝藏血。血
枯則血閉。其主之者。味鹹以通之。

腎為藏精之臟。主陰戶隱曲之地。
肝為厥陰。其經絡陰器。其筋結陰
器。二經溼濁下注。則陰蝕腫痛。其
主之者。氣溫可以燥溼。味鹹可不
消腫也。寒熱癢癢者。癢癢而發寒
熱也。烏賊骨鹹可軟堅。溫可散寒
熱也。男子腎虛。則精竭無子。女子
肝傷。則血枯無子。鹹溫入肝腎。通
血益精。令人有子也。【清】黃元御
玉楸藥解論海螵蛸曰。烏鯉魚骨
善能斂新血。而破瘀血。素問治女
子血枯。先睡血。四肢青。目眩之前
便血。以烏鯉魚骨。茵茹為末。丸以
雀卵。血枯必由夫血脫。血脫之原
緣。瘀滯不流。經脈莫容。烏賊骨行
瘀固脫。兼擅其長。故能著奇功。其
諸治效。止吐衄崩帶。辟腎障癢癢。
癢跌打湯火。淚眼雀目。重舌。口
喉痺。耳聾。精癩消腫。拔疔敗毒。斂
瘡燥膿。化便止痢。收陰囊遺精。除
小便血淋。【清】楊時泰本草述鈞
元論海螵蛸曰。烏賊骨既治女子
赤白漏下。經汁及血崩。唾血下血
矣。而又主血閉。月事衰少不來。癢
癢無子。何以一物之用。能通能止。
迥殊哉。夫經閉有有餘不足二證。

有餘者多為氣與寒與積所逆。證發於暫。或痛或實。通劑乃可用之。不足者。衝任內竭。其證無形。其來也漸。不可用通劑。烏賊所主者。乃肝傷血閉不足之病也。即崩漏亦有有餘不足之分。其為熱所乘致傷衝任者。是謂有餘。可治以黃連解毒湯。其肝腎受傷。而衝任之氣不能約制。經血者。是謂不足。治以烏賊骨末。醋湯調下是也。然則用烏賊骨。或通或止。總為益肝腎之陰氣而已。血隨氣而行。亦因氣而固。方書概言中氣。而不言肝腎之氣。雖補益中氣。亦可以治肝腎。第由肝腎之虛。以傷中氣者。不本病因而投之可乎。且陰氣陽氣之治有殊。此味稟陰氣之專。以化血而血黑。故肝腎之陰氣有損者。投之適宜。不漫同他味之能益陰也。女子赤白帶下。方書多主溼熱。東垣云。此任脈之病。尺脈濡弱而滑。沉微無力。為白帶。為血虛。或澆數而實。為赤帶。為熱。然則烏賊所主者。任脈病。非中宮溼熱下溜之病也。其味鹹。宜歸水臟。血為水所化。一切主治。總由益腎之陰氣。非使肝

之藏血者。能司其運化出納之職而已。豈獨為女子要藥乎。凡屬血病。上面鼻舌。下面前後血。皆能療之。即不屬血病。上面目昏耳聾。下面溺失精遺痔患。亦能療之。

配合應用 治赤白目翳。傷寒熱毒攻眼。生赤白翳。用烏鯽魚骨一兩。去皮為末。入龍腦少許。點日三。又治諸目翳。用烏鯽骨。五靈脂等分為細末。熟豬肝切片。蘸食日二。(聖惠方)

治赤翳攀睛。照水丹。治眼翳。惟厚者尤效。及赤翳攀睛。貫瞳人。用海螵蛸一錢。辰砂半錢。乳細水飛。澄取。以黃蠟少許。化和成劑。收之。臨臥時。火上旋丸黍米大。揉入背。中睡至天明。溫水洗下。未退更用一次。即效。(海上方)

治雀目夜眼。烏賊骨半斤。為末。化黃蠟三兩。和捏作錢大餅子。每服一餅。以豬肝二兩。竹刀批開。搽藥。扎定。米泔水半碗。煮熟食之。以汁送下。(楊氏家藏方)

治疳眼流淚。烏賊魚骨。牡蠣等分為末。糊丸。卓子大。每用一丸。同豬肝一具。米泔煮食。(經驗方)

治底耳出膿。海螵蛸半錢。麝香一字為末。以綿杖蘸淨。吹入耳中。(濟察方)

治鼻瘡疳疔。烏賊魚骨。白及各一錢。輕粉二字為末。搽之。(錢乙小兒方)

治小兒臍瘡。出血及膿。海螵蛸。鱧脂。為末。油調搽之。(聖惠方)

治頭上生瘡。海螵蛸。白膠香。各二錢。輕粉五分為末。先以油潤淨。乃搽末二三次。即愈。(衛生易簡方)

治癩癧白駁。先以布拭赤。用烏賊骨磨三年醋塗之。(外臺秘要方)

治疔瘡惡腫。先刺出血。以海螵蛸末搽之。其疔即出。(普濟方)

治蚊螫痛楚。烏賊骨一錢。白礬二分。為末。啗鼻。在左壁者。啗左鼻。在右壁者。啗右鼻。(衛生寶鑑方)

治灸瘡不瘳。烏賊骨。白礬等分為末。日日塗之。(千金方)

治小兒痰射。多年海螵蛸末。米飲服一錢。(葉氏摘玄方)

治小便便血。海螵蛸末一錢。生地黃汁調服。又方。海螵蛸。生地黃。赤茯苓等分為末。每服一錢。柏葉車前湯下。(經驗方)

治大腸下血。不問大人小兒。臍毒腸風。及內痔下血。日久多食。易飢。先用海螵蛸炙黃。去皮研末。每服一錢。木賊湯下。三日後。服豬臟黃連丸。(直指方)

治卒然吐血。烏賊骨末米飲服二錢。(聖惠方)

治骨瘦在喉。烏賊魚骨。陳橘紅。焙等分為末。寒食麵和。餳丸。夾于大。每用一丸。含化嚙汁。(聖濟總錄方)

治舌腫出血如泉。用烏賊骨。蒲黃各等分。炒為細末。每用塗之。(簡便單方)

治跌破出血。烏賊魚骨末。傅之。(直指方)

治陰囊溼痒。烏賊骨。蒲黃。搽之。(醫宗三法方)

用量 錢中至三錢。

施用宜忌 凡陰虛多熱者禁。

用。惡白芨、白鐵、附子。

參攷資料

●海螵蛸亦治牛馬陸騎(蘇恭)●海螵蛸投於井水。蟲皆死。(陳敷器)●烏賊骨久服。絕嗣無子(張鼎)●按本經云。主瘕瘕無子。別錄云。令人有子。孟詵亦云。久服益精。而張鼎此說。獨相背。反必誤矣。若云血病無多。食鹹。烏賊亦主血閉。故有此說。然經閉有有餘不足二證。有餘者血滯。不足者肝傷。烏賊所主者。肝傷血閉不足之病。正與素問相合。豈有令人絕嗣之理。當以本經別錄為正。恐人承誤。故辨正之。(李時珍)●陶隱居言。此是鷄鳥所化。今其口腹具存。猶頗相似。腹中有墨。可用。故名烏賊。能吸波噴墨。令水濁。暴白衛。以防人害。又南越志云。其性嗜鳥。每自浮水上。飛鳥見之。以為死而啄之。乃卷取入水而食之。因名烏賊。言為鳥之賊害也。(蘇頌)●案羅願爾雅。云。九月寒鳥入水。化為此魚。有文墨。可為法。則故名烏賊。則者。則也。骨名螵蛸。象形也。(李時珍)●魚有兩鬚。遇風波。即以鬚下可。或黏石如纜。故

十畫 烏

名鱧魚(大明)●近海州郡皆有之。形若革。口在腹下。八足。聚生於口旁。其背上只有一骨。厚三四分。狀如小舟。形輕虛而白。又有兩鬚。如帶甚長。腹中血及膽。正如墨。可以書字。但逾年則迹滅。惟存空紙耳。世言烏賊。恆墨而知禮。故俗謂是海若。自事小吏也。(蘇頌)●烏賊無鱗有鬚。黑皮白肉。大者如蒲扇。燦熱。以薑醋食之。脆美。背骨名海螵蛸。形似楊蒲子而長。兩頭尖。色白。脆如通草。重重有紋。以指甲可刮。為末。人亦鑊之。為細飾。又相感志云。烏賊過小滿而形小也。(李時珍)

【烏鰂魚腹中卵】 性質 無毒。 鹹。

【烏鰂魚肉】

性質 酸。平。無毒。

主治 益氣強志。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論烏鰂肉曰。益人。通月經。

參攷資料 烏鰂肉味珍美。動風氣。(吳瑞)

【烏鰂魚血】

主治 耳聾。

【烏鰂魚腹中卵】

性質 無毒。 鹹。

主治 開胃利水。

【烏鰂腸中墨】

主治 血刺。心痛。醋磨服之。炒研。醋調服亦可。

【烏爛死蠶】

基本 本品為蠶在簇上爛死而黑臭者。

主治 蝕瘡有根者。及外野雞病。並傳之。白死者。主白遊癬。赤死者。主赤遊癬。

【烏蘇莓】

命名 本品五葉如白蘇。故名。

古醫別名 五葉莓。龍草。(陶弘景) 拔龍葛。(爾雅) 赤葛。五爪龍。(綱目) 赤澄藤。(綱目) 五葉葛。五澄藤。(和漢藥考) 五葉屯。(綱目) 五龍草。(綱目)

外國名詞 Cissus Japonica, Wild. (拉卜)

基本 屬葡萄科。為烏蘇莓之根。

產地 多在山野川谷及平澤園籬間。

形態 烏蘇莓為山野自生之多年生蔓草。其莖每節有卷鬚。纏繞他種草木。輒妨礙其生長。故日

本呼為「葇枯」。葉五生。為五個掌狀複葉。夏月於枝梢開黃綠色四瓣小花。作聚繖花序排列。後結圓實。略與南天燭實同大。初綠色。成熟則變黑色。根為黃白色。長一二尺。其粗如指。搗之有汁。



烏蘇莓

採取 四五月採之。

用法 根搗汁外搽。或內飲。葉揉熱外貼之。

性質 酸。苦。寒。無毒。

效能 清熱毒。消癰腫。用治癰毒。凡癰癤疔腫。蟲咬。搗根傳之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論烏蘇莓曰。風毒熱腫。游丹。搗傳并飲汁。【明】李時珍本草綱目論烏蘇莓曰。涼血解毒。利小便。根搗酒服。消癰腫神效。

配合應用 ●治小便尿血。五葉藤。陰乾為末。每服二錢。白湯下。(衛生易簡方)

●治喉痺腫痛。五爪龍草。車前

十畫 烏 烘 烙 烟

草。馬蘭菊。各一握。搗汁。徐嘔。祖傳方也。(醫藥正傳方)

⑤ 治項下熱腫。俗名蝦蟆瘰。五葉藤搗傳之。(丹溪真要方)

⑥ 治一切腫毒。發背乳癰。便毒。惡指初起者。並用五葉藤。或根一握。生薑一塊。搗爛。入好酒一盞。絞汁熱服。取汗。以渣傳之。即散。一用大蒜代薑亦可。(壽域神方)

⑦ 治跌撲損傷。五爪龍搗汁。和童尿熱酒服之。取汗。(簡便方)

參攷資料 ⑧ 五葉如白欖。故曰烏欖。俗名五爪龍。江東呼龍尾。亦曰虎葛。曰龍。曰葛。並取莖形。赤澀與赤葛及拔音相近。(李時珍)

⑨ 莖端五葉。開花青白色。所在有之。夏採苗用。(韓保昇) ⑩ 塗墮間甚多。其藤柔而有稜。一枝一鬚。凡五葉。葉長而光。有疎齒。面背背淡。

七八月結苞成簇。青白色。花大如粟。黃色。四出。結實大如龍葵子。生青熟紫。內有細子。其根白色。大者如指。長一二尺。搗之多涎。滑傳滋。

醫學集成謂即紫葛。楊起簡便方謂即老鳩眼睛草。斗門方謂即何首烏。並誤矣。(李時珍)

【烏欖】 性實功用與根同。詳【烏欖】條。

【烏欖】 即鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳【鱧魚】條。

【烏欖】 命名 本品即橄欖之烏色者故名。

產地 廣東番禺諸地。

形態 烏欖為橄欖屬之一種。樹高端正而多。獨幹至頂。乃布枝柯。有雌有雄。結子如棗大。長寸許。光澤無稜角。其瓣先生者向下。後生者向上。八九月成熟。皮青黑。肉自有文。層疊如海螵蛸狀。其仁肥大。與實俱可供藥用。

採取 以長竿擊之。或刻其幹東。納以紅鹽。則其幹東之子遂落。刻其幹之西。或南北亦然。

性質 甘。澀。溫。無毒。

主治 補血。

參攷資料 橄欖即今常食之青果。欖仁可治吻燥者。亦指青果核中仁而言。非指烏欖仁也。橄欖有青烏二種。閩人以白者名青果。粵中止名白欖。不曰青果也。白欖利微。人少種焉。烏欖下番禺諸鄉皆種之。種至二年。其狹長八九尺。

必并之乃結實。并至三年。而子小。收十年而大收矣。烏欖子。以溫水泡。候紫脂浮起。溢出。乃可食。水冷則生膠。熱則肌膚反實。總二欖論之。白欖雄而烏欖雌。白屬陽而烏屬陰。陽故色白而行氣。陰故色紅而補血。惟烏者陰。故有仁可食。白者陽。故仁小而不食。此其別也。(趙學敏)

【烏欖子仁】 性質 甘。淡。無毒。

主治 潤肺下氣。補血。殺諸魚毒。

【烏欖】 即菱稻之古籍別名。典見本草拾遺。詳【菱稻】條。

基本 本品非謂火烘。

【烘柿】 即青綠柿子收置器中。自然紅熟如快成。濕味盡去而甘如甜者。

性質 甘。澀。寒。無毒。

主治 通耳鼻氣。治腸胃不足。解酒毒。壓胃開熱。止口乾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論烘柿曰。續經脈氣。

參攷資料 ① 飲酒食紅柿。令人易醉。或心痛欲死。別錄言解酒。

毒。失之矣。(李時珍) ② 生柿性冷。鹿心柿尤不可食。令人腹痛。(陶弘景) ③ 凡柿皆涼。不至大寒。食之引痰。為其味甘也。日乾者食多。動風。凡柿同蟹食。令人腹痛。作瀉。二物俱寒也。(寇宗奭) ④ 按玉璫百一選方云。一人食蟹。多食紅柿。至夜大吐。繼之以血。皆不省人。一道者云。惟木香可解。乃臍汁灌之。即漸甦醒而愈也。(李時珍)

【烘柿】 即柿之古籍別名。典見綱目。詳【柿】條。

【烙鐵草】 即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【雷公藤】條。

基本 係烟具中所積。

【烟油】 滯之流質也。

古籍別名 五行丹(綱目)

性質 辛。微毒。

主治 毒蛇咬。蜈蚣咬。

參攷資料 ① 烟油入口。如小兒及好吃烟者。誤犯之。若將別種湯洗。愈洗愈疼。必至瞎而後已。須用亂頭髮或藤纏。緩緩揉之。即愈。(同書錄) ② 烟油乃五行之氣相合而生。近日外丹家用以點藥金。又可益金色。術士隱其名。呼為大。

極膏。又曰氣泥。曰五行丹。別以燃燈代油。則一切毒蟲皆不近。入水蚊龍亦畏之。入藥。舊竹桿劈取者良。凡梅條。藤條。紫檀。烏木。老鶴草。及純銅。純銀。桿中油。皆不及竹中者性良。惟象牙桿中烟油。可殺蠱毒。固有橄欖木烟桿。其中油可毒魚。至烟膏亦各隨所食烟質為高。下烟肆所市烟。俱以烟葉噴油。打成塊。用鐵錫披竹絲售之。此為純葉。不雜。為上品。更有打塊時。夾葉雜。難以辨紅錫成絲。再加蘆黃末。以和其色者。其氣燥烈。損人。烟膏亦淡而薄。不及上品力厚也。海鹽朱進士醒菴云。烟油解蛇毒。初不甚信。後見里人獲一赤練蛇。長八九尺。粗如臂。口吐毒烟。一人近之。蛇噴以氣。即腹裂死。一人酸以荷竹烟桿去頭嘴。以竹絲通出油。刺入蛇口。蛇噴之。即瞑目閉口。身捲縮。俄復伸長。如是數次。直如繩而斃。始知其解毒殺蟲之功。信不虛謬。諸城劉仲旭少府云。西北口外出一種毒蟲。名曰蠃蟻。狀如中土蠃蠅。人出遇之。即觸人面。不問何處。被其觸者。亦不甚痛。頃覺眼

十畫 烟

睛四圍出細蛆。攢食睛膏。痛不可忍。彼土人治法。惟取烟桿四五枝。折取烟油。塗目內。痛忍片時。其蛆皆死。然後再用溫水洗去烟油。即愈。(陳毅齋)

【烟花】即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【烟草】條。

【烟珠】即梁上塵之古籍別名。典見見綱目。詳【梁上塵】條。

【烟草】古籍別名。實菸草。烟花。長命草。淡肉菜。延命草。相思草。貧報草。南蠻草。返魂草。(和漢藥考)淡芭菰。(植物學大辭典)

外國名詞 *Nicotiana glauca* (拉丁) タバコ (日本) 基本 係茄科烟草屬。為煙草之葉。

產地 原產地在南美及西印度諸島。今則各國有之。我國向產於福建。現今種者尤夥。

形態 烟草為毒草類。一年生草本。種類甚多。栽者另闢煙園。種之莖圓。高五六尺。葉為闊大之橢圓形。末端帶尖。皆互生。葉柄短。若以葉面抱其莖者。故作水瀝式。長

尺許。面黃綠。背較淡。乾則變枯褐色。具有麻痺性。味苦。葉與莖俱有微細之茸毛。毛頭有黏液腺。花開於秋初。時則花梗抽出。放淡紅紫色之花。長寸許。為五裂漏斗狀。合瓣花。排列作短穗狀。果實為蒴果。形如球。又似卵。中藏無數淡褐色之細小種子。



草 烟

性質 辛。溫。微毒。

成分 主要成分一為植物鹽

基。名尼古丁 *Nicoid*。(煙草中尼古丁之含量。視產地。種類。種植法等。而有多少之別。有祇含百分之二者。有多至百分之九者。此尼古丁係于八百二十八年。漢攝爾托及伊衣滿爾人。最先發見。)一為煙草精。名尼可却丁 *Nicotin*。(又名煙草腦)其灰分中則含有加里石灰酸。化里胃誤等。主治 宣陽氣。行經絡。祛山嵐瘴氣。寒溼陰邪。辟穢殺蟲。

歷代記述攷證

【清】黃宮繡本草求真論烟草曰。下咽。即能醉人。且或醉倒。而復甦。其性力之猛。殆非他物所能比類者矣。景岳云。吸其味。則辛而鮮甘。審其氣。則溫而且熱。凡書所述烟草。皆言在表。則能散陰助陽。如山嵐瘴毒。瘴溼。而致膝理閉塞。筋骨疼痛。服此可以見效。在裏則能開胃和中。凡因風寒食滯。而致攪亂嘔吐。宿食難消。膨脹鬱結。下陷後墜。服此亦克有功。且其氣一入人口。不比常度。頃刻而周一身。令人通體俱快。醒能使人醉。醉能使人醒。饑能使人飽。飽能使人饑。以之代酒代茗。終身不厭。卒不能以妨人。其故何耶。蓋緣烟性猛。人不能勝。故下咽即醉。醉因氣耗。理固然也。然烟氣易散。而人氣留。陽性留中。旋亦生氣。雖散仍補。此惟陰滯者用之。如神。若陽盛氣越。多燥多火。及氣虛氣短多汗者。皆不宜用。國產者最佳。

配合應用

●治風寒溼氣。骨節疼痛。痺痿不仁。鶴膝風。歷節風。及偏頭風。漏肩風。有見明膏用鮮

烟葉搗汁。浸松香。曬乾入藥。亦取其氣味以透利筋絡也。(葉天士種福堂方)

治毒蛇咬傷。先避風。擠出惡血。用生煙葉或乾葉搗研傅之。或煙膏煙灰皆可。(慈航活人書方)

辟臭蟲。煙葉舖牀代褥。或燒熏之盡絕。

參攷資料 烟葉生者有毒。食之即中毒。難治。其莖更烈。凡溪塘中大魚難捕。用烟莖剉末。同青胡橘皮。搗爛。置水中。大魚輒如醉。浮水面。小魚皆死。雖鱖鯉鱉龜蟹蚌蛤之屬。無一活者。其毒之烈如此。但造烟吸之。則味淡迥不如葉之味厚耳。(綱目拾遺)

【烟桿】 基本 本品為吸旱烟用之竹管。以年久色黑毛竹。男子用者良。

主治 婦人血崩。

參攷資料 新昌張姓。茹竹烟管四十餘年。色如漆而光可鑑。珍同拱璧。雖感好不輕假也。母病無藥餌資。貧錢二緡。典主子患損病。諸藥罔效。或謂非多年竹烟管不可治。遂取取物識之數寸。煎湯

服之。愈後酬銀以巨萬金。(秋燈叢話) 烟桿雖受烟火熏漬之氣。然非藉人氣津液漸漬之。必不酥透。其桿經男子食者。光澤可鑑。一經婦人口。便色黯不鮮明。且多直裂紋。又最忌薰。凡多年好桿。持以上廁。能令光澤。若象牙桿。便裂開走油。不堪用。物性之相忌如此。

陳毅齋 殺蟲毒傳屍癆。塗惡瘡。劈取中心油。透而酥者。搗如糊。塗瘡即癒。或攤油紙上貼。治蟲隔。

陳毅齋 毒蛇咬傷。先取婦人舊油頭繩。紮住腫處。勿令腫上。再取耳垢封之。止痛。隨用多年油黑竹烟筒桿。紫色者亦可。毛竹最佳。一段約長三寸。咀嚼嚙汁。渣淡吐去。并取桿中之油。搽患處。烟桿味辣。服之反甜。蛇毒亦隨解。痛止自愈。試效多人。凡蛇咬有蛇齒留肉內者。烟油塗之即出。(百草鏡)

凡血崩諸藥不效者。用多年舊烟桿。紫色油透者佳。截一寸燒灰。黃酒調服。下喉即止。屢試屢效。(劉怡軒)

【烟筒頭中煤】 主治 蜈蚣咬傷。取烟筒

頭內硬煤擦之。立時止痛。

【烟葉】 主治 風寒濕熱。骨節疼痛。接痺不仁。鶴膝風。歷節風。偏頭風。漏肩風。毒蛇咬傷。辟臭蟲。兼治腦漏。

參攷資料 菸葉半筋。曬乾。研極細末。調花露四兩。曬乾。用玫瑰餅再研吹入。吃蘭花烟成腦漏者。以白鷺脊骨燒烟烟之。數日愈。蘭花乃江西買人帶來一種蘭子。即澤蘭子也。氣香烈。取其子研。拌入烟名曰蘭花烟。人食之作蘭花香。然其氣竄上。往往入頂傷腦。易成腦漏。(楊春涯驗方)

【烟膠】 命名 本品係蒸消牛黑土。由烟煤結如膠狀。故名。

主治 頭瘡白禿。疥癬風癩。癢痛流水。取牛皮癬岸為末。麻油調塗。或和輕粉少許。

【烟藥】 基本 烟藥為石類之一種。可供藥用。

性質 辛溫有毒。

主治 瘰癧痔瘻。疥根惡腫。

【鴉鐵石】 即慈石之古籍別名。典見本草衍義。詳慈石條。

【特生舉石】 命名 本品所附著於他石而生。故名。

古籍別名 蒼碧石。蒼石。(別錄) 泉海。梁州舉石。(綱目) 製法 徐之才曰。火煉之良。

性質 甘溫有毒。

主治 明目利耳。腹內絕寒。破堅積及鼠瘻。殺百蟲。惡獸。蒼石主寒熱。下氣。瘰癧。殺食獸。

參攷資料 別錄云。舉石久服。令人筋舉。特生舉石。久服能延年。丹書亦云。舉石化為水。能伏水銀。煉入長生藥。此皆方士謬說也。與服砒石永長生之義同。(李時珍)

舉石有數種。白舉石。蒼舉石。紫舉石。紅皮舉石。桃花舉石。金星舉石。銀星舉石。特生舉石。俱是一物。但以形色立名。其性皆熱毒。

並可毒鼠制汞。惟蒼白二色入藥用。諸舉生於山。則草木不生。霜露不積。生於水則水不冰凍。或有溫泉。其氣之溫可知已。庚辛玉冊云。

舉陽石也。生山谷水中。澗出似舉石。有文理橫截在其中。為佳。伏火制

有文理橫截在其中。為佳。伏火制

砂赤。其狀頗與方解石相似。但投水不冰者爲真。其出金穴中者。名握雪碧石。(李時珍)

【特迦香】

古籍別名 瘴瘴香。(綱目拾遺)

主治 辟邪去疫。安魂魄。定驚悸。

參攷資料 山翳水西。形如杏卵。色頗淡白。焚之辟邪去穢。鬼魅避之。博物志載。漢武帝焚西使香宮中。病者盡起。徐審得瘴瘴香焚之。一家獨不疫疾。卽此類歟。(五雜俎)

【狻猊】卽獅之古籍別名。典見綱目。詳「獅」條。

【狼】

古籍別名 毛狗。(綱目) 牡者名權。子名微。(爾雅)

外國名詞 Canis lupus L.

(拉丁)(Wolf)(英)オーカミ

或オホカミ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂脚類犬科。

形態 狼爲獸類犬屬之一種。形酷似犬。性猛惡。常食哺乳類鳥類動物。眼裂斜。有凶光。鼻長。口裂深。耳殼小而尖。頭上生剛毛。呈粗

頸之觀。體瘦。背略傾斜。肩高聳。四肢長。能涉水。毛剛硬。肩、頸、腎各部爲尤長。體黃或褐灰。口吻黑。頰及眼之上部淡黃。或灰褐。上唇與上顎白色。前肢之腕部有黑色條紋。尾下垂。常蓬鬆。全體常發一種惡臭。長約五六尺。高約三尺。性凶惡。食生物。其肉可供藥用。

性質 鹹熱無毒。

主治 補益五臟。厚腸胃。填骨髓。腹有冷積者。宜食之。

【狼牙】卽狼牙之古籍別名。典見別錄。詳「狼牙」條。

命名 本品根黑如獸之齒牙。故名。

處方用名 狼牙根。

古籍別名 牙子(本經)狼齒。

狼子(別錄)犬牙抱牙(吳普)支蘭(李當之)源草(日本)

外國名詞 Potentilla Cry-

phaenica, Maxim.(拉丁)ミ

ツモトサウ ミナモトサウ

ラウゲ ラフゲ(日本)

基本 係薔薇科。委陵菜屬。藥用狼牙之根與莖葉。產地 多在山野川谷間。

形態 狼牙爲毒草類之野生草本。莖頗長。質硬而直立。上部之葉。每葉皆有三小葉。花黃色。花序由數花而成。有萼樣之苞。雌蕊多數。各雌蕊含一腋珠。花後結乾果。色黑。

性質 苦寒。有毒。

主治 邪氣熱氣。疥癩。惡毒。瘡痔。去白蟲。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狼牙曰。治浮風。瘰癧。煎汁洗惡瘡。【宋】大明諸家本草論狼牙曰。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎服。【清】黃元御長沙藥解論狼牙曰。狼牙味苦性寒。入足厥陰肝經。清肝之鬱熱。療女子之陰疔。金匱狼牙湯(狼牙三兩。水四升。煮半升。以綿纏筋如齒。浸湯。瀝陰日四)治婦人少陰脈滑而數。陰中生瘡。蝕爛者。尺中候腎。尺脈滑數。是木鬱於水而生下熱。法當陰裏生瘡。溫熱蒸腐。故剝蝕而壞爛。狼牙清鬱熱而達肝。止蝕爛而消痛。瘡也。【清】張隱菴本草崇原論狼牙曰。狼性靈智。此草根如獸之牙齒。而專以狼名者。疑取其上下靈

通之義。寒水之氣上行。則能散在表之邪氣。熱氣以及皮膚之疥癩惡毒。苦寒之氣下洩。則能除在下之瘡痔。以及在內之白蟲。金匱要略曰。少陰脈滑而數者。陰中卽生瘡。陰中蝕瘡爛者。狼牙湯洗之。此草氣味苦寒。裏性純陰。故能治少陽之火熱瘡爛也。

配合宜忌 惡地榆。蕪肌。蕪炭爲之使。

參攷資料 ①狼牙生淮南川谷及宛旬。八月採根。暴乾。中溼腐爛。生衣者。殺人。(別錄) ②葉青。根黃赤。六七月華。八月實黑。正月八月採根。(吳普) ③所在有之。苗似蛇莓。而厚大。深綠色。根黑。若獸之牙。三月八月採根。日乾。(韓保昇) ④范子計然云。出建康及三輔。色白者善。(李時珍)

【狼牙根】卽狼牙之處方用名。詳「狼牙」條。

【狼牙莖及葉】 主治 金瘡。蝕小兒陰疔。

【狼皮】 主治 暖人。辟邪惡氣。

【狼尾】 主治 擊馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。

【狼尾草】 命名 本品穗狀似狼尾故名。

古籍別名 稷。藜藿。狼茅。孟（爾雅）宿田翁。守田（詩疏）

產地 生原野田澤及道旁間。

形態 狼尾草為穀類之多年生草本。其莖直立而堅。有小刺毛。葉細長而尖。有並行脈。秋日莖頂生黑褐色長刺毛。出穗五六寸。作圓柱形。如粟。花紫色。列為穗狀花序。密生長芒。其米可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 作飯食之令人不饑。

【狼把草】 原名 耶耶草。

命名 閩人呼為耶耶。狼把當作耶耶乃通。故本品即是耶耶草。

古籍別名 附草。虱草。田五加木。（和漢藥考）

外國名詞 Bidens tripartita (L.) (拉丁)

基本 屬菊科狼把草之葉莖。產地 凡山野道旁川澤水濱及田畦間皆有生焉。

形態 狼把草為一年生草。春季抽莖。高達二尺餘。其葉或裂為三。或裂為五。作卵圓披針形。邊緣有粗鋸齒。每節對生。惟梢上之葉則為作披針形之單葉。夏季於枝梢開黃色筒狀花冠頭狀花。總苞外。另有多數有柄之小葉。秋季結刺栗毬狀實。成熟立即脫落。附他物以達遠方。故日本俗呼此為附草虱草。



草把狼

採取 夏月三伏中。刈取陰乾。性質 苦平無毒。

成分 據東京衛生試驗所高橋增次郎氏之分析。言狼把草中含有樹脂（稍多量）揮發油（極少量）蠟（稍多量）鞣酸（多量）加鐵液則呈綠色。苦味質（極少量）黏液質（多量）無機鹽類（多量）硝石及綠化鉀。據氏言。未見有可治肺病之物質云。

效能 療血病。治癩瘡。用作健胃利尿藥。

主治 黑人髮。令人不老。又云耶耶草。主赤白久痢。小兒大腹痞滿。丹毒寒熱。取根煮黃汁服。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論狼把草曰。狼把草。主丈夫血痢。不瘕婦人。根治積年疝痢。取草二斤。搗絞取汁。一小升。納白麵半雞子許。和勻。空腹頓服。極重者不過三服。或收苗陰乾。搗末。蜜水半碗。服一方寸匕。【明】李時珍本草綱目論狼把草曰。可染髮。治積年癩。天陰即痒。搔出黃水者。搽末搽之。

國外學說 日本農學士原田東一郎氏著『藥用草木栽培法』之狼把草條下。載有類似草之識別法。摘錄於左。以供參考。（一）真正狼把草。多生於溼地。能受陽光之處。類似草則生於堤岸。竹園等乾燥之地。（二）真者粗大。節與節間互相接近。類似草則纖細。節與節間相距頗長。（三）真者枯時。即變黑褐色。類似草則變黃褐色。（四）真者葉對生。類似草之葉。則非對生。（五）真者有花被。枯後仍貼

附花萼。從不脫落。類似草則未有花被。貼附花萼者。上野藥學士。更分析狼把草。據云。其水製成幾斯。如仍溶化於水時。見有物質析出。聚集檢之。知該析出物。係由可溶於酒精之樹脂狀物。及可溶於熱湯之無機鹽類（硝石及綠化鉀）而成。其樹脂狀物質。根據試驗之反應。假定屬於糖原質。或苦味質。又和漢藥考曰。係民間藥。謂治肺病有特效云。（一）說此草雖無治肺功效。但煎湯飲之。能使胃強健。治咳利尿。醫學博士中西氏著有『狼把草藥談』一文。醫學博士遠山氏著有『迷信狼把草』一文。俱論該藥對於肺病並無何等功效云。

用盤 煎成茶狀。日服三合至五合。或錢半至三錢。參攷資料 ①方士官耶把草。即鼠尾草。功用亦近之。但無的據。（李時珍）②狼把草。生山道旁。與穗秋子並可染皂。又曰。耶耶草。生山澤間。高三四尺。葉作雁齒如鬼針苗。鬼針即鬼釵也。其葉有極如銀腳狀。（陳藏器）

【狼把草】即狼把草之說。見『狼把草』條。

【狼毒】命名 本品毒性猛烈。如狼。故觀其名。則知其毒矣。

古醫別名 狼青草（崇厚）續毒。（和漢藥考）

基本 爲狼毒草之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。狼毒即尖尾木李頭也。各屬皆有。三月新。

形態 狼毒葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。其根皮黃。肉白。以質重者良。輕者力劣。

採取 二月八月採根陰乾。製法 凡使以陳久者良。宜醋炒入藥用。

用法 恒以剉末和作丸散。性質 辛平有毒。

效能 止九種心痛。殺一切蟲。痛。用作鎮痛藥。又爲殺蟲藥。

主治 咳逆上氣。破積聚。飲食寒熱水氣。惡瘡鼠瘻。疽蝕。鬼精。蠱毒。殺飛鳥走獸（本經）除胸下積。餘（別錄）

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論狼毒曰。治痰飲癥瘕。亦殺鼠。【明】李士材本草圖解論狼毒曰。狼毒辛平有大毒。陳而沉水者良。主咳逆。治蟲疽瘰癧結核。驅心。痛。【清】張隱菴本草崇原論狼毒曰。狼青草有大毒。稟火氣也。氣味辛平。莖葉有毛。入水則沈。稟金氣也。稟金氣。故主治肺病之咳逆。上氣。金能攻利。故破積聚。破積聚。則飲食壅滯。而爲寒爲熱之病。亦可治矣。水氣水寒之氣也。水氣而濡。則有惡瘡鼠瘻疽蝕。并鬼精蠱毒之病。狼毒稟火氣而溫燥寒。故皆治之。又言其毒能殺飛鳥走獸。草以狼名。殆以此故。

國外學說 本草類編曰。狼毒。二月八月採根陰乾。四月開花。八月結實。本草綱目啓蒙曰。昔時有自漢傳來者。形如商陸。皮黃白色。有橫紋甚密。如眞正羌活。多疣瘡。肉白色。地錦抄曰。狼毒春自宿根生。葉多毛。花黃色。開於八九月。日俗呼「粟橋」。

配合應用 治腹中冷痛。水穀不化。心下停痰。兩脇痞滿。按之

鳴轉。逆害飲食。用狼毒三兩。附子一兩。旋覆花三兩。搗末。蜜丸。梧子大。每服三丸。食前白湯下。日三服。亦治兩脇氣痛。（肘後方）

治陰疝欲死。丸縮入腹。急痛。欲死。狼毒四兩。防風二兩。附子三兩。燒以蜜丸。梧子大。每服三丸。日夜三度。白湯下。（肘後方）

治一切蟲病。川狼毒杵末。每服一錢。用餵一皂子大。沙糖少許。以水化開。臥時空腹服之。次早即下蟲也。（集效方）

治乾溼蟲疥。狼毒不拘多少。搗爛。以猪油馬油調搽患處。方睡。勿以被蒙頭。恐藥氣傷面。此推揚潘氏所傳方（蘭氏經驗方）

治積年疥癩。狼毒一兩。一半生研。一半研炒。輕粉三合。水銀三錢。以茶末少許。於瓦器內。以津液擦化爲末。同以清油浸藥。高一寸。三日待藥沉油清。遇夜不見燈火。煎油塗瘡上。以口鼻於藥杯上。吸氣以取效。（永類鈴方）

治積年乾癬生瘡。搗之。黃水出。每逢陰雨即痒。用狼毒末塗之。（聖惠方）

治惡疾風癩。狼毒秦光等分。爲末。每服方寸匕。溫酒下。日二服。或一服。（千金方）

治心腹連痛作脹。用狼毒二兩。附子半兩。搗篩。蜜丸。梧子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸止。又從一丸起。至三丸止。以瘳爲度。（肘後方）

用量 三分至八分。施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。惡麥句意。畏占斯。蜜陀僧。大豆爲之使。

著名方劑 九痛丸。治九痛。一蟲二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣。又治連年積冷流注心胸。及落馬墮車。瘀血中惡等證。（局方）狼毒（炙香）吳茱萸（湯泡）巴豆（去心取霜）乾薑（炮）人參各一兩。附子（去皮）三兩。右各爲末。煉蜜丸。梧子大。每空腹溫酒下一丸。

參攷資料 狼毒合野葛。納耳中。治瘰癧（抱朴子）狼毒生秦亭山谷。及奉高。二月八月採根陰乾。陳而沉水者良。（別錄）秦亭在隴西。奉高是大山下。縣。陶云沉

十畫 狼

者是狼毒。浮者是防葵。此不足為信。假使防葵秋冬採者堅實。得水皆沉。狼毒春夏採者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃。橘皮。半夏。枳實。吳茱萸。為六陳也。《馬志》。根似玄參。惟虛浮者為劣也。《韓保昇》。狼毒出秦晉地。今人往往以草蘭菊為之。誤矣。《李時珍》。

【狼青草】即狼毒之古籍別名。典見本草崇原。詳「狼毒」條。

【狼尿】 主治 瘰癧。燒灰。油調封之。又治骨硬不下。燒灰。水服之。

【狼茅】即狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳「狼尾草」條。

【狼屎中骨】 主治 小兒夜啼。燒灰。水服二黍米大。即定。又能斷酒。

【狼脂膏】 採取 於臘月煉淨收之。

主治 補中益氣。潤燥深飲。塗諸惡瘡。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論狼脂膏曰。入風氣膏中。能去積久風痺。調酒服。散

逆結之氣。 參攷資料 小切狼腸膏。與稻米為餼。調以狼胸臆中膏。和米作粥糜也。古人多食狼肉。以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼。取其膏聚也。諸方亦時用狼之鬚牙皮鬣。而本草並不著其功用。祇有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據攷勝正要諸書補之云。《李時珍》。

【狼喉醬】 主治 噎病。日乾為末。每以半錢入飯內食之。妙。

【狼跋子】 原名 黃環子。命名 跋乃狼足。其葉似之。故名。 性質 苦寒。無毒。

主治 惡瘡。蝸疥。殺蟲魚。 歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論狼跋子曰。苦酒磨塗瘡疥效。

【狼嗉下皮】 主治 搓作條勒頭。能去風止痛。

【狼蕲】即真蕲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真蕲子」條。

【狼齒】即狼牙之古籍別名。典見別錄。詳「狼牙」條。

【珠子仁】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【珠子草】即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【珠友】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品即人參之產於閩地。形扁而圓。大如珠狀。故名。

產地 出閩中及雲南舊姚安府境。

採取 以閩產大而明透者佳。製法 須去皮。水泡過用。因苦劣之味。皆在皮耳。

性質 苦。微甘。寒。無毒。 主治 補肺。降火。下氣。止牙痛。 參攷資料 ①珠兒參味厚體重。肺熱者宜之。臟寒者服之。即作腹痛。鬱火服之。火不能透發。反生寒熱。其功與西洋參相同。非真能補也。珠兒參功能托裏。外症堪用。血症可代三七。《綱目拾遺》。②按

珠參本非參類。前未聞有。此近年始行。然南中川之絕少。或云來自粵西。是三七子。又云。草根大約以參名。其性必補。醫每慮其苦寒。友人朱秋亭。客山左。開貨珠參者。有製法。服之可代遠參。每五錢。索價五十金。秋亭罄千金。市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分研末。并勻。將雞蛋一個。去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雙筒。待小雞出時。取出。將雞蛋一箇。於蛋上作記。如此七次。共成七箇。其藥即成矣。每遇垂危大症。并產孽無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢為準。每次須多飲數兩。救人。《綱目拾遺》。③又接濟陰保元揚載在醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣。生血。為調經聖藥。演珠參三錢。以米仁四錢。并水蒸透。咀片。再入薑。加米仁汁。蒸曬乾。用懷生地一兩。砂仁。酒。薑。三味。并煎。九曬。收。再以瓦焙為炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒。川芎二錢。去淨油。米泔水。浸洗。收

乾。再入酒浸。丹參四錢酒洗透。充
蔚子四錢酒蒸透。香附三錢。以豉
土醋。鹽。童便。甘草水。乳汁。逐次製
過。用雲白朮五錢。陳土炒。女真子
三錢。以白芥。車前。水浸乾。用。如氣
血熱。加丹皮。生地。氣血寒。加肉桂
數分。不真確之寒熱。而先後至者。
照本方。如經閉無分婦女。本方加
牛膝。(綱目拾遺)

【珠兒參】即珠參之處方用名。詳
「珠參」條。

【珠粉】即真珠之處方用名。詳「
真珠」條。

【珠實】即蓮肉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【珠樹】即青琅玕之古籍別名。典
見山海經。詳「青琅玕」條。

【珠蠶】即蓮肉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【珠蘭】古籍別名。雞爪蘭花。
珍珠蘭。魚子蘭。(綱目
拾遺)芝蘭。

形態 珠蘭為蘭之一種。枝葉
似茉莉花。發長條細蕊。與建蘭同。
其香亦相似。而濃郁過之。其根可
供藥用。

主治 磨傅癰癤。

參攷資料 珠蘭性毒。止可取
其香氣。故不入藥。張篋壬云。中條
山有老道士。教人治狐魅。有一女
子。為雄狐所祟。教以用珠蘭根搗
爛。置牀頭。俟狐來。交時。塗其莖物
上。狐大啼。竄去。次日。野外得一死
狐。道士云。此根。狐肉沾之。即死。性
能養狐。尤捷效也。(綱目拾遺)

【珠髓】 產地 出海中。

形態 珠髓為介類髓
屬之一種。其狀如肺。有四目。六足。
皆有珠。蓋蚌珠在腹。而髓珠在足。
故以名之。可供藥用。

性質 甘酸。無毒。

主治 食之辟疫癘。

【班珠藤】 產地 生山谷中。

形態 班珠藤為莖
草類之一種。凌冬不凋。其子如珠
而有斑。可供藥用。

採取 冬月採之。

性質 甘溫。無毒。

主治 祛風活血。羸瘦婦人諸
疾。

【班】即珂之古籍別名。典見綱目。
詳「珂」條。

【病草】即艾葉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「艾葉」條。

【皋毘】即虎皮之古籍別名。典見
莊子。詳「虎皮」條。

【皋蘆】 古籍別名 瓜蘆。(陶
弘景) 苦薺。過羅。物羅
(綱目拾遺) 唐茶。苦茶。(日本)

外國名詞 Thea Dinensis,
L. var. macrophylla, Siob.
(拉丁) タウチヤ ニガチヤ

キツカフチヤ(日本)

基本 係山茶科山茶屬。

產地 生山野間。

形態 皋蘆為味果類茶之一
種。乃常落灌木。全體與茶樹相似。
惟莖較粗。葉亦肥大而厚。長三四
寸。秋末葉腋生花。比茶花亦稍大。
白色。其嫩葉不宜煎飲。可充紅茶
之料。老葉可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 貧飲。止渴明目。除煩。令
人不睡。消痰利水。

歷代記述攷證 【唐】李珣海
藥本草論皋蘆葉曰。通小腸治淋。
止頭痛煩熱。【明】李時珍本草綱
目論皋蘆葉曰。噉嗽。清上。臨。利咽

喉。

施用宜忌 凡胃寒脾冷者禁
用。

【益母草】 原名 芎藭。

子實皆莖處密貯。故名。

古籍別名 益明。火秋。(本經)

聖藥。(陳藏器) 真蔚。(別錄) 陳確。
(爾雅) 牛薺。(爾雅注) 野天麻。
(會編) 鬱臭草。真擔。(唐殷產寶

方) 苦低草。(圖經) 夏枯草。(外
臺秘要) 猪麻。土質汗。(綱目) 養
大札。小胡麻。干屠塔。天芝麻。反魂
丹。臭鬱草。透骨草。鬱臭苗。目比也
叱。(和漢藥考)

外國名詞 Leonurus japonicus, L. (拉丁)

基本 屬唇形科。為益母草之
莖葉。

產地 凡海濱及田野間恒多
生焉。陳仁山藥物生產辨云。益母
草產廣東各屬。以能度來者多。

形態 益母草乃雜草也。多生
原野間。春日抽莖。入夏莖高三四
尺。莖作方形。有縱溝。每節對生有
長柄之葉。葉作深裂三。各片更有

一〇二五

深缺刻似鳥頭葉其莖頂之葉則似艾葉裏面色綠夏中葉間輪生淡紫色之小唇形花一花常結四子是名芩藟子亦入藥用

種類 益母之白花者入氣分即敗器所謂莖葉爾雅所謂雅也益母之紅花者入血分即爾雅所謂葭也

採取 五月採刈莖莖九月採收子實

製法 凡使益母膏須三月採取連根葉莖花洗淨於箔上攤曝水乾以竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過二三寸煎煮候草爛水減三之二濾去草取汁約五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀餈狀磁瓶封收性質 辛微苦寒無毒效能 祛瘀生新活血調經用

聖治 瘧癘可作浴湯

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論益母草曰搗汁服主浮腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒併傳之又服汁主子死腹中及

產後血脹悶滿汁入耳中主聾耳

持傳蛇虺毒【唐】陳藏器本草拾遺論益母草曰入面藥令人光澤

治粉刺【明】李時珍本草綱目論益母草曰活血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血暈血風痛崩中漏下尿血瀉血痢疳痔疾打撲內損瘀血大便小便不通【清】

黃宮繡本草求真論益母草曰益母草一名芩藟辛微苦寒功能入胞心胞絡消水行血去瘀生新調經解毒為胎前胎後要劑是以無胎而見血淋血閉血崩帶血下痛既胎而見胎漏胎產而見難產已產而見血暈疔癰乳腫等症服此皆能去瘀生新蓋味辛則於風可散血可活味苦則於瘀可消結可除加以氣寒則於熱可療並可臨症酌施則於母自有益耳此外番沙腹痛嘔之用此濃煎飲亦取能散惡血然氣味辛散墮子散大者其切忌之益母子主治略同但行中有補非若益母草徒以消水

行血為事也小暑端午及或六月六日採取良忌錢子微妙【清】頁九如辨藥指南論益母草曰益

母草味苦略辛入肝清熱疏散專治胎前產後諸症故名益母凡胎前氣易滯故惡阻而胎不安產後血易凝故血暈而腹痛以此活血行氣而不推薄使血氣流通以除凝滯大有益於陰分故云有補陰之功此非濡潤之物體本枝葉僅可通散不可滋補惟用之疏滯氣即所以養真氣用之行瘀血即所以生新血耳

國外學說 荷爾藥鏡云益母草又名芩藟有稀釋攪選鎮痙強壯之效於子宮諸病心腹痛心下

牽脹心悸或黏液壅滯妨礙胃之消化運動致發緊急痛者或肢節牽引拘攣者以此作泡劑服飲俱有效洵良藥也

配合應用 濟陰返魂丹此方乃吉安文江高師禹儲禮求於名醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎前產後諸疾危證用野天麻又名益母又名火杖又名頁擔即芩藟子也葉似艾葉莖類

火麻方梗凹面四五月節節開花紅紫色如葵花南北野處皆有白花者不是於端午小暑或六月

六日花正開時連根收採陰乾用葉及花子用忌鐵器以石器碾為細末煉蜜丸如彈子隨證嚼服用湯使其根燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其藥不限丸數病愈為度或丸如梧子大每服五

七十九又可搗汁溼淨熬膏服之胎前產後腹痛或作聲者米飲下胎前產後脾胃刺痛胎動不安下血不止當歸湯下產後以童子小便化下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛發脈息調經絡並溫酒下胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹滿心

悶心痛並用炒鹽湯下產後血暈眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下產後結成血塊腹痛奔痛時發寒熱有冷汗或面垢頰赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下產後瀉血水以煎湯下產後痢疾米湯下產後血崩漏下糯米湯下產後赤白帶下煎膠艾湯下月水不調溫酒下產後中風牙關緊急中

身不遂。失音不語。童便酒下。產後氣喘咳嗽。胸膈不利。惡心吐酸水。面目浮腫。兩脇疼痛。舉動失力。溫酒下。產後月內咳嗽。自汗發熱。久則變爲骨蒸。童便酒下。產後鼻衄。舌黑口乾。童便酒下。產後兩太陽穴痛。呵欠心忪。氣短羸瘦。不思飲食。血風身熱。手足頑麻。百節疼痛。並米飲化下。產後大小便不通。煩躁口苦者。薄荷湯下。婦人久無子息。用溫酒下。(告嚴產寶方)

⑤治婦人難產。益母草搗汁七。大合煎減半。頓服立止。無新。以乾者一大握。水七合煎服。(韋宙獨行方)

④治胎死腹中。益母草搗熟。以暖水少許。和絞取汁。頓服之。(韋宙獨行方)

③治產後血暈。心氣欲絕。益母草研汁。服一盞絕妙。(子母祕錄方)

②治產後血閉不下者。益母草汁一小盞。入酒一合。溫服。(聖惠方)

①治帶下赤白。益母草花開時。採摛爲末。每服二錢。食前溫湯下。

十靈 益

(集驗方)

④治小便尿血。益母草搗汁。服一升。立痊。此蘇澄方也。(外臺祕要方)

③治赤白雜痢困重者。益母草日乾。陳鹽梅燒存性。等分爲末。每服三錢。白痢乾薑湯下。赤痢甘草湯下。名二靈散。(衛生家寶良方)

②治小兒疳痢垂死者。益母草嫩葉。同米煮粥食之。取足。以蓮爲度。甚佳。取汁飲亦可也。(廣利神效方)

①治痔疾下血。益母草葉搗汁飲之。(食醫心鏡方)

⑤治一切癰疽。婦人如乳。乳癰。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用天麻草切五升。以水一斗半。煮一半。分數次洗之。以殺痒。(千金方)

④治急慢疔疔。用益母草搗封之。仍絞五合。服卽消。(聖惠方)又用益母草。四月連花採之。燒存性。先以小尖刀十字割開疔根。令血出。次邊根開破。捻出血。拭乾。以稻草心蘸藥。燃入疔口。令到底良久。常有紫血出。捻令血淨。再燃藥入。

見紅血乃止。一日夜擦三五度。重者二日根爛出。輕者一日出。有瘡根脹起。卽是根出。以針挑之。出後仍傳藥生肌。易愈。忌風寒房室酒肉一切毒物。(醫方大成方)

③治癩毒已破。益母草搗傳甚妙。(斗門方)

②治勃乳成癰。益母爲末。水調塗乳上一宿。自痊。生痔亦得。(聖惠方)

①治喉閉腫痛。益母草搗爛。新汲水一盞。絞濃汁。頓飲。隨吐愈。冬月用根。(衛生易簡方)

⑤治粉刺黑斑。閉關事宜。五月五日。收帶根天麻。紫花者曬乾。燒灰。以商陸根搗自然汁。加酸醋。和攪灰作餅。炭火煨過。收之。中年方用。入面藥。甚能潤肌。又蘇頌曰。唐天后鍊益母草。澤面法。五月五日。採根苗具者。勿着火。曝乾。搗羅。以麵水和成團。如雞子大。再曝乾。仍作一爐。四旁開竅。上下置火。安藥中央。大火一炊久。卽去大火。留小火養之。勿令火絕。經一伏時出。

之。瓷器中研治。篩。再研。三日收用。如黑豆法。日用二方。每十兩加滑石一兩。胭脂一錢。

④治馬咬成瘡。若低草切細。和醋炒塗之。(孫真方)

③治馬咬成瘡。若低草切細。和醋炒塗之。(孫真方)

②治馬咬成瘡。若低草切細。和醋炒塗之。(孫真方)

①治馬咬成瘡。若低草切細。和醋炒塗之。(孫真方)

⑤單用和童便。服能下死胎。及治熱入血室。發熱。煩燥。類傷寒。

④君四物湯。杜仲。阿膠。真川續斷。爲丸。安胎止痛。

③得生地黃。白芍藥。麥門冬。枇杷葉。青蒿子。五味子。阿膠。治血熱。經行先期。及胎漏下血。

②同生甘菊。蒼耳草。金銀花。紫花地丁。各一握。貝母。鼠黏子。白芷。殭蠶。白及。白欬。生甘草。連翹。生地黃。各三錢。熬夏枯草汁。和藥同煎。濃頓飲之。消一切疔腫。發背。及無。

名腫毒。

益母膏。治產婦諸疾。及折傷內損有瘀血。每天陰則痛。神方也。三月採益母草。一名負擔。一名夏枯草。連根葉莖花洗。擇令淨。於箔上攤曝水乾。竹刀切長五寸。勿用鐵刀。置於大鍋中。以水浸過二三寸。煎煮候草爛。水減三之二。澆去草取汁。約五六斗。入盆中。澄半日。以綿濾去濁滓。以清汁入釜中。慢火煎。取一斗。如稀餈狀。密封收。每取梨大暖酒和服。日再服。或和羹粥亦可。如遠行即更煉之。可丸收之。服至七日。則疼痛漸平復也。產婦惡露不盡。及血暈。一二服。其藥無忌。又能治風益心力。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛無瘀者禁用。忌鐵。

參攷資料

益母草之根莖花葉實。並皆入藥。可同用。若治手足厥陰血分風熱。明目益精。調婦人經脈。則單用莖子為良。若治腫毒瘡癤。消水行血。婦人胎產諸病。則宜並用為良。蓋其根莖花葉專於行。而其子則行中有補故也。

(李時珍) 芎藭之功。宜於婦人及明目益精。故有益母之稱。其莖方類麻。故謂之野天麻。俗呼為豬麻。豬喜食之也。夏至後即枯。故亦有夏枯之名。近效方謂之土質汗。林億云。質汗出西番。乃熱血合諸藥煎成。治金瘡折傷。益母亦可作煎治折傷。故名為土質汗也。(李時珍) 爾雅注云。今芎藭也。又名益母。劉歆云。雅。臭穢也。臭穢即芎藭也。陸璣云。雅。益母也。故曾子見之。嘗為之感恩云。(掌禹錫) 芎藭初春生時。亦可浸洗。淘去苦水。煮作菜食。浸冬不凋。悴也。(寇宗奭) 芎藭近水溼處甚繁。春初生苗。如嫩蒿。入夏長三四尺。莖方如黃麻莖。其葉如艾葉。而背青。一梗三葉。葉有尖歧。寸許一節。節生穗叢。簇抱莖。四五月間。穗內開小花。紅紫色。亦有微白色。每穗內有細子四粒。粒大如同蒜子。有三稜。褐色。藥肆往往以作巨勝子貨之。其草生時有臭氣。夏至後即枯。其根白色。蘇頌圖經謂其葉似荏。其子黑色。似雞冠子。九月採實。寇宗奭行義謂其浸寒不凋者。

皆誤傳也。此草有白花紫花二種。然莖葉子穗皆一樣也。但白者能入氣分。紅者能入血分。別而用之可也。按開闢事宜云。白花者為益母。紫花者為野天麻。返魂丹註云。紫花者為益母。白花者不是。陳藏器本草云。芎藭生田野間。人呼為臭麻。天麻生平澤。似馬鞭草。節節生紫花。花中有子。如青葙子。孫思邈千金方云。天麻草。莖如火麻。冬生苗。夏着赤花。如鼠尾花。此皆似以芎藭天麻為二物。蓋不知其是一物二種。凡物花皆有赤白。如牡丹芍藥。菊花之類是矣。又按郭璞爾雅注云。雅音推。即芎藭。又名益母。葉似荏。白華。華生節間。又云。藜音推。方莖葉長而銳。有穗。穗間有花。綠色。可以為飲。江東呼為牛薺。據此則是雅藜名本相同。但以花色分別之。其為一物無疑矣。宋人重修本草。以天麻草誤註天麻。尤為謬矣。陳藏器本草。又有莖葉。云生江南陰地。似益母。方莖對節。白花。主產後血病。此即芎藭之白花者。故其功主血病亦相同。(李時珍)

【益母草子】 原名 芎藭子。基本 屬唇形科。為芎藭之子實。

採取 九月間採收子實曬乾。

製法 李時珍曰。凡使益母草丸用子微炒香。亦或蒸熟。烈日曝燥。容箴去殼取仁用。

性質 辛甘微溫無毒。

效能 活血調經。逐風明目。用作通經收斂藥。

主治 明目益精。除水氣。久服輕身。(本經)療血逆。大熱。頭痛心煩。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論芎藭子曰。治產後血脹。【元】吳瑞日用本草論芎藭子曰。春仁生食。補中益氣。通血脈。損精髓。止渴潤肺。【明】李時珍本草綱目論芎藭子曰。治風解熱。順氣活血。養肝益心。安魂。調女人經脈。崩中帶下。產後胎前諸疾。久服令人有子。【明】繆希雍本草經疏論芎藭子曰。芎藭子味辛甘微溫。微寒無毒。入手足厥陰經。為婦人胎產調經之要藥。此藥補而能行。辛散而能潤者也。目者。肝之竅也。

益肝行血。故明目益精。其氣純陽。辛走而不守。故除水氣。肝臟有火。則血逆。肝涼則降而順矣。大熱頭痛。心煩。皆血虛而熱之候也。清肝散熱和血。則頭疼心煩俱解。【清】葉天士本草經解論芫蔚子曰。芫蔚子氣微溫。稟天初春之木氣。入足厥陰肝經。味辛甘無毒。得地金土之味。入手太陰肺經。足太陰脾經。氣味俱升陽也。肝為藏血之臟。脾為統血之臟。辛甘益血。目得血則能視。所以明目。脾者陰氣之原也。肺者津液之原也。甘辛能潤。所以益精。脾者為胃行津液者也。肺者相傳之官。通調水道者也。辛甘益脾。則津液行而中道通。所以除水氣。久服益肝脾。脾主周身之氣。脾主周身之血。肝為生生之原。以生氣血。氣血生生長旺。自然身輕矣。【清】陳修園本草經讀論芫蔚子曰。本經芫蔚子主治。無一字言及婦人經產之病。其云微溫者。得春木之氣也。味辛者。得秋金之味也。木有利則其性和。性和則有輕身之效。經所謂風能生物是也。其云明目者。以肝開竅於目也。

十畫 益

其云益精者。以精生於飲食之菁華。先散於肝而後藏之於腎也。葉主髮疹痒者。以洗浴能去肌表之風也。凡產後微發熱。是外感微風。此物甚為對症。若重症則不足恃。况症重藥輕。病將日深。終至敗壞而莫挽。今人奉為女科聖藥。貽誤滋多。且其獨具之長反掩矣。近人學說 張山雷曰。芫蔚。古人止用其子。本經之明目益精。則溫和養血。而又沈重。直達下焦。故為補益腎陰之用。除水氣者。辛溫下降。故能通絡而逐水。其莖可浴癢。則活血疏風之功也。別錄加以微寒。則亦溫亦寒。大是不妥。蓋當時以治熱證。因而屢入此說。療血逆者。溫和行血。又子能重墜。下降。故能平逆。惟主大熱頭痛心煩。則與溫養之性不符。存而不論可也。又曰。芫蔚古用其子。今用莖葉。氣烈味濃。功專活血行血。今三吳之俗。以為產後唯一之要藥。無人不。服。又主經行不利。腹痛臍腹。皆有捷驗。其稟溫和之性。亦可概見。而又治癰腫瘡瘍。內飲其汁。外敷其滓。則頗似涼血解毒。不知生搗

取汁。其性已與煎服微有不同。而辛溫之氣。宜通血絡。自然散毒消腫。其子其莖。皆具溫通之性。但子則沈重下降。守而不走。故能補腎益精明目。莖葉則扶疏旁達。走而不守。故能活血流氣。通調經絡。凡草木之枝葉花實。性質各有不同。皆即此義。若白花紅花之異。則一類二種。形式臭味。皆無二致。其用亦同。或謂紅者主血分。白者主氣分。則皮相之見也。用量 錢半至三錢。應用宜忌 凡非血滯血熱及虛神散大者禁用。忌鐵。【益母草苗】 原名 聖菜。性實 辛平無毒。主治 破血。產後腹痛。煮汁服。參攷資料 ①莖葉生江南陰地。似益母。方莖對節。白花。〔陳藏器〕②此即益母之白花者。乃爾雅所謂葍是也。其紫花者。爾雅所謂葍是也。葍。皆同一音。乃一物二種。故此條亦主血病。與益母功同。郭璞獨指白花者為益母。皆殿謂白花者非益母。皆欠詳審。做苗

可食。故謂之菜。寇宗奭言芫蔚苗可養食。正合此也。〔李時珍〕【益志】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。【益志子】即益智仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益智仁』條。【益決草】 產地 生山陰間。形態 益決草為雜草類之一種。根如細辛。可供藥用。性質 辛溫無毒。主治 咳久肺傷。【益明】即益母草之古籍別名。典見本經。詳『益母草』條。②即地膚子之古籍別名。典見藥性。詳『地膚子』條。【益智】即龍眼之古籍別名。典見別錄。詳『龍眼』條。【益智仁】 命名 脾主智。此味古籍別名 英華庫。益志子。〔和漢藥考〕 基本 為屬於蓴荷科之植物。其子實即名益智。產地 ①陳藏器云。凡崑崙國及交趾。今嶺南州郡及馬刺拔爾地方。恒多產焉。②陳仁山藥物生

十畫 益

產辨云。產瓊崖十三屬。以陵水為上等。五六月新。

形態 益智葉似蕒荷。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。莖如竹筍。二月花連著實。五六月熟。其子如筆頭。而頭尖長七八分。但今益智子。形如棗核。而其皮及仁。皆似草豆蔻也。但係覆果。大於縮砂。形長圓。色暗黑。頂端有小嘴。其下則有果梗。中藏細小種子。色紅褐。作多角形。氣芳香。略似沒藥。

採取 每年六七月間。採實陰乾。
製法 米氏集驗方曰。凡使益智仁。去殼用鹽水炒。

性質 辛溫無毒。
成分 含有比重〇一九二至〇一九四之右旋性發揮油。自百分之三至百分之五。脂肪油百分之。澱粉百分之三。

效能 煨腎縮小便。溫脾止瀉。瀉。用作健胃消化藥。又用以治遺精。小便餘瀝。及夜中尿多諸症。藥氣安神。補不足。利三焦。調諸氣。夜多小便者。取二十四枚。碎入鹽同煎服。有奇驗。

煎服。有奇驗。
歷代記述攷證 【元】王好古湯液本草論益智曰。益脾胃。理元氣。補腎虛。滑澀。【元】李東垣用藥法象論益智曰。客寒犯胃。和中益氣。及人多睡。【明】李時珍本草綱目論益智曰。冷氣腹痛。及心氣不足。夢洩赤濁。熱傷心系。吐血血崩。諸證。【明】繆希雍本草經疏論益智曰。益智子。仁。味辛。其氣溫。其性無毒。入足太陰。足少陰經。惟辛故所以散結。惟溫故所以通行。其氣芳香。故主入脾。其稟火土與金。故燥而收斂。以其斂攝。故治遺精虛瀉。及小便餘瀝。此皆腎氣不固之證也。腎主納氣。虛則不能納矣。又主五液。延乃脾之所統。脾腎氣虛。二臟失職。是腎不能納。脾不能攝。故主氣逆上浮。涎穢泛溢。而上溢也。飲攝脾胃之氣。則逆氣歸元。涎穢下行。宜東垣用以治客寒犯胃。和中益氣。及人多睡。王好古謂益智本脾家藥。主君相二火。故用以益脾胃。理元氣。補腎虛。滑澀。劉河間又謂益智辛熱。能開發鬱結。使氣宣通。皆以其香可入脾開鬱。辛

能散結。復能潤下。於開通結滯之中。復有收斂之義。故也。【清】黃宮繡本草求真論益智曰。益智氣味辛熱。功尚燥脾溫胃。及斂脾胃氣逆。藏納歸源。故又號為補心補命之劑。是以胃冷而見涎唾。則用此以收斂。脾虛而見不食。則用此溫理。腎氣不溫。而見小便不縮。則用此鹽炒。與烏藥等分。為末。酒煮山藥粉。為丸。鹽湯下。名縮泉丸。以投與夫心腎不足。而見夢遺崩帶。則用此以為秘精固氣。若因熱成氣虛。而見崩漏夢遺等症者。則非所宜。此雖類於縮砂。同為溫胃。但縮砂蜜多有快滯之功。此則止有逐冷之力。不可不分別而審用耳。

出嶺南。形如棗核者。【清】閻立陞本草選旨論益智曰。益智味辛。微瀝無毒。入手足太陰經。治心腎脾肺。和中煨胃之藥也。故凡嘔吐自利。飲食少進。脾胃受寒之故也。遺精。淋瀝。赤白。胃氣虛冷之故也。三焦衰弱。涕唾稠黏。肺氣淹滯之故也。惟用益智之辛溫。開發以宣暢而通理焉。使寒者溫之。虛者補之。滑者澀之。滯者和之。則君相

一〇三〇

之火以調。脾肺之氣以健。是四經之藥也。然好古有言。益智本脾藥。在集香丸則入肺。在四君子湯則入脾。在風髓膏則入腎。三經互用。有子母相關之義。當於補中兼用之故。今人於進食劑中。用補心腎氣藥用。又方治應多小便者。取三十四枝。碎入鹽同煮。服。有奇驗。其必有道矣。亦勿多服。

國外學說 日本學說謂益智漢醫用為健胃消化藥。益智有一種芳香。是由揮發油而來者。此油在種子中。其成分含有一種「ステアロブテン」在藥局方上僅供製劑之用。如於複方丁幾類中。為芳香性附加物而已。（又扶氏藥物學）Carydium, 從前譯作益智。其入藥之仁。名曰 Cystaria cardamomum, Maton. 又名馬刺拔爾加他摩斯。此物產於馬刺拔爾之海岸。約在二千五百至五千尺高處。錫蘭亦有之。果實為三稜長圓形。呈淡褐色。長一二仙米。徑一仙米許。具有繃亂之種線與皺裂。囊殼中包藏種子。約二十枚。香味特異。酷似樟腦。

含有比重〇·九二至〇·九四之右旋性揮發油。自三%至五%。脂肪油一%。澱粉三%。三四兩次改正之。日本藥局方內。特收入此藥定名為小豆蔻 *Fructus Cardamomi* (*Elettaria cardamomum*, *White et Naron*)。大抵係採收稔熟之蒴果而乾燥之。顆粒作淡黃色。長一二仙米。粗約一仙米。有鈍稜三條。且有縱脈。頂端有小嚙。內分三房。各房俱藏縱列之種子約七粒。種子色褐。呈不整齊之有角性。且帶皺紋。而覆以無色菲薄之衣。種子在莢殼中時。含有極芳香之分泌物。至果殼則無甚氣味。又和漢藥考曰。益智原名 *Cardamomum*。為香味藥。多產於東印度地方。種類頗夥。益智。縮砂。草果等皆屬之。初版日本藥局方中收入縮砂 *Fructus Cardamomi*。皆記其基本植物名與其形狀。至第三四版。特更名為小豆蔻。亦記其基本形狀等。故此 *Cardamomum* 之譯名與其基本植物。當定名時。然費苦心也。又有譯作小益智。白豆蔻。草果等

十畫 益

名者。近人學說。張山雷曰。益智始見於藏器本草拾遺。謂之辛溫。不言其瀉。但諸家所述主治。無一非溫瀉功用。藏器謂主遺精虛瀉。小便餘瀝。夜多小便者。以二十四枚碎之。入鹽同煎服。有奇效。東垣謂治客寒犯胃。和中益氣。及人多睡。 (石頑謂胃虛多睡。蓋胃氣虛寒而廉泉不攝。涎唾自流。此藥溫胃而瀉。最有捷效。) 海藏謂益脾胃。理元氣。補腎虛。滑瀝。皆溫補脾胃。而尤以固瀉為主。瀨湖謂其大辛。行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。 (此氣弱以元陽之氣而言。) 李氏集驗方縮泉丸。 (益智子鹽炒烏藥等分。酒煮山藥粉為丸。) 治脾胃氣不足。小便頻數。及老年陽虛遺瀉皆效。楊仁齋直指方云。心者脾之母。進食不止於和脾。火能生土。當使心藥入脾胃藥中。庶幾相得。古人進食藥中。多用益智。土中益火也。顧案此為脾陽虛緩。而不思食者立法。脾土喜溫而惡寒。喜燥而惡溼。寒溼困之。則健運力乏。而不思納穀。且食亦無味。此惟溫煦

以助陽和。而斡旋大氣。則能進食。益智醒脾益胃。固亦與砂仁豆蔻等。一以貫之。仁齋說到益火生土上去。附會心經之藥。尙是舍近求遠。故意深言之。亦殊不必。瀨湖又謂治心氣不足。夢洩赤濁。則以腎陽無權。滑瀝不禁者立論。故可用此溫瀉一法。然遺瀉之虛寒症。絕少。石頑謂因於熱者。色黃乾結。不可誤用。極是。瀨湖又謂治熱傷心。系吐血崩漏諸證。則既是熱傷。而反用此大辛大熱之藥。何其背謬。一至於此。要知洪氏夷堅志所載。吐血不止。驚顛狂燥一條。用益智等藥而愈者。本是小說家言。何可徵信。按之病理。寧不矛盾。而乃採入綱目。且因之而創為專治熱傷之吐血。亦可謂好奇太過矣。

配合應用 ①佐人參、茯苓、半夏、橘皮、車前子。則攝涎積立效。

②同藜香、蘇子、橘皮、枇杷葉、木瓜。止逆氣上壅。

③同五味子、山茱萸、炒鹽、人參。治小便頻數淋瀝。

④同人參、乾薑、橘皮、藜香。治因寒犯胃作嘔吐。

⑤小便頻數。脾氣不足也。雷州益智子。鹽炒。去鹽。天合烏藥。等分為末。酒煮山藥粉糊為丸。如梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。名稱泉丸。 (朱氏集效方)

⑥心虛尿滑。及赤白二濁。益智子仁。白茯苓。白朮。等分為末。每服三錢。白湯調下。

⑦白濁腹痛。不拘男婦。用益智仁。鹽水浸炒。厚朴。薑汁炒。等分。薑三片。棗一枚。水煎服。 (永類鈴方)

⑧小便赤濁。益智子仁。茯苓。各二兩。遠志。甘草水煮。各半斤。為末。酒糊丸。梧子大。空心鹽湯下。五十丸。

⑨腹脹忽瀉。日夜不止。諸藥不效。此氣脫也。用益智子仁二兩。濃煎飲之立愈。 (危氏得效方)

⑩婦人崩中。益智子。炒碾細。米飲入鹽服一錢。 (產寶方)

⑪香口辟臭。益智子仁一兩。甘草二錢。碾粉紙之。 (經驗良方)

⑫潤胎下血。益智仁半兩。縮砂仁一兩。為末。每服三錢。空心白湯下。日二服。 (胡氏濟陰方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 益智芳香。性本溫熱。證屬燥熱。病人有火者。皆當忌之。故凡嘔吐由於熱而不因於寒者。氣逆由於怒而不由於虛者。小便餘瀝由於水瀉精虧者。內熱而不由於腎氣者。虛寒泄瀉。由於溼火暴注而不由於氣虛腸滑者。並禁用。

參攷資料 按洪邁夷堅志云。秀川進士陸迎。忽得吐血不止。氣厥驚顛。狂躁直視。至深夜。欲投戶而出。如是兩夕。徧用方藥。弗瘳。夜夢親音授一方。命但服一料。永除病根。夢覺記之。如方治藥。其病果愈。其方用益智子仁一兩。生硃砂二錢。青橘皮五錢。麝香一錢。碾爲細末。每服一錢。空心燈芯湯下。(李時珍) 脾主智。此物能益脾。胃故也。與龍眼名皆智義同。按蘇軾記云。海南產益智。花實皆長穗。而分爲三節。觀其上中下節。以候早中晚禾之豐凶。大豐則皆實。大凶皆不實。罕有三節並熟者。其爲藥。只治水而無益於智。其得此名。豈以其知歲耶。此亦一說也。終近穿鑿。(李時珍) 自願微廣州記云。

其葉似蕺荷。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。無華莖。莖如竹筍。子從心出。一枝有十子。叢生。大如小棗。其中核黑而皮白。核小者佳。含之攝涎。或四破去核。取外皮蜜。變爲粽食。味辛。晉盧循遺劉裕。益智粽是此也。(陳藏器) 益智子似連翹子頭。未開者苗葉花根與豆蔻無別。惟子小爾。(蘇恭) 按稽含南方草木狀云。益智二月花。連着實。五六月熟。其子如筆頭而兩頭尖。長七八分。雜五味中。飲酒芬芳。亦可鹽曝及作粽食。觀此則顯微言其無華者誤矣。今之益智子。形如棗核。而皮及仁皆似草豆蔻云。(李時珍)

【益媚草】 產地 出浙江永嘉縣。

形態 益媚草爲芳香草類之一種。葉如澤蘭。莖赤。高二三尺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 五痔脫肛。止血。炙香浸酒服。

【盞合子】 卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【眞川柏】 卽黃柏之處方用名。詳『黃柏』條。

【眞川連】 卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【眞水仙】 卽水仙之古籍別名。典見肇芳譜。詳『水仙』條。

【眞朱】 卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【眞芋】 卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【眞京麩】 卽天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【眞阿膠】 卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【眞青黛】 卽青黛之處方用名。詳『青黛』條。

【眞珍珠】 卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【眞風斗】 卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【眞桑瓜】 卽甜瓜之日本名。詳『甜瓜』條。

【眞海決】 卽石決明之處方用名。

詳『石決明』條。

【眞珠】 處方用名。眞珍珠。珠粉。湖瑠珠。瓊珠。粉。瓊珠。珠。牽瓊珠。細瓊珠。中瓊珠。珍珠母。

古藥別名 珍珠(開寶)蚌珠。(南方志)瑠珠(萬貫)走珠。明月南珠。神胎。麻尼。滑珠。鮫珠。蚌胎。髓珠。珊瑚珠。西洋珠。北海珠。南海珠。李殼珠。走盤珠。南蕃珠。惡思佛。(和漢藥考)馬價珠(格古論)

外國名詞 Magaciteae. (拉丁) Pearl (英) Poridohn. (德)

基本 係貝類之殼。內面生一種病之分泌物。就中以雙殼類中。屬於吳柱類之眞珠介所產。最爲著名。

產地 陳仁山藥物生靈辨云。珍珠產區衆廣。原日以廣東廉州。合浦產者正地道。奈近日少出。俱以南洋蘇錄爲上等。印度更多出。架喇吉打。嗒味兩埠爲聚處。由此運來。和漢藥考曰。眞珠產於印度。巴西。墨西哥。阿刺伯。澳洲。日本各處之海灣。中國亦有之。

形態 眞珠介。一名珠母。以其

殼之外面黏附於深二丈至六丈之海中岩礁上面產生。介殼似帆立貝。大自三寸至六七寸。形扁平。上緣直。如切下緣作半圓形。外現茶褐色。或帶紫色。如牡蠣殼。邊緣極薄。內面有真珠狀光澤。殊美。隨其肉可食。此貝雖有足而不能匍匐。故殼外叢生無數似絲之毛。以是半附岩石。其毛長一二寸至六七寸。色黑綠。有光澤。老介中偶產有極貴重之真珠。尚有雙殼類中。屬於同柱類之蚌。則潛生於湖沼池澤等淡水之底。介殼稍呈橢圓形。長二寸至四寸。廣三寸至七寸。許。外黑似漆。內面有真珠狀光澤。中產真珠。土人浮小舟。以繩網撈取之。檢視其殼內有無真珠。其內可充肥料。真珠介及蚌貝等物。當在水中生存之時。偶有微細之生物或砂粒等。竄入殼中。外套膜受其刺戟。殊覺不適。遂分泌真珠質。與殼內有光輝之物質相同。被覆而保護已體。因此真珠者。實一種病之物質也。試檢查真珠。其中必皆存有砂粒。砂粒之外。則係無數之薄層疊積而成。即知非虛

十畫 真

妄矣。現今東西各國。盛行飼養珠母之法。於其外套膜間。投入砂粒。放養數年。自然產生真珠。遂採收而貨賣之。蚌貝所產之真珠。較珠母略大。然用真珠養成術者。其光澤不及珠母之珠。惟介殼類之種族原因。位置種種不同。故產生之真珠。其形狀大小。色澤亦異。形狀有球圓。長圓之別。最小如芥子。最大若大豆。色澤有白。藍。黃。黑。褐。諸種。質堅。微透映。有如銀之光澤。放美麗之光。重者自一毫至三分餘。要之不論大小。概以正圓形者為上品。光澤以產於海水者為佳。淡水產次之。

採取 五月至九月間採之。
製法 李珣曰。凡使珍珠。須要新完未經鑽者。研如粉。方堪服食。不細則傷人臟腑。雷斅曰。凡用以新者。絹袋盛之。置牡蠣四兩於平底甕中。以物四向支穩。然後著珠於上。乃下地榆五花皮五方草各到四兩。籠住。以漿水不住火。住三日三夜取出。用甘草湯淘淨。於白中搗細重篩。更研二萬下方可服食。慎微曰。抱朴子云。真珠徑寸

以上服食。令人長生。以醋磨漬之。皆化如水銀。以浮石綠。粟。蛇。黃。等物合之。可引長三四尺。為丸服之。李時珍曰。凡入藥不用首飾。及見尸氣者。以人乳浸三日。煮過。如上搗研。一法以絹袋盛。入豆腐腹中。煮一柱香。云不傷珠也。

用法 恒以對末和作丸散。

性質 鹹。甘。寒。無毒。

成分 真珠主要之成分。為碳酸鈣 $CaCO_3$ 。東京化學會誌曾載有真珠之成分。錄之如左。真珠如不碎之為粉。醋酸便不溶解。其成分為碳酸鈣九一。七二。動物質植物質五。九四。水二。二三。與存在全母貝殼中之量不同。

效驗 消熱。潛陽。安神。定驚。磨目。或專作眼科藥。又作解熱解毒藥。

主治 鎮心。明目。去腐。障障。膜。塗面。令人潤澤。好顏色。塗手足。去皮膚。逆。腫。綿。囊。塞。耳。主。聖。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論真珠曰。磨腎。瑩。瑩。瑩。李珣海藥本草論真珠曰。除面。野。止。洩。合。知。母。瘵。煩。熱。消。渴。合。左。慈。

根治小兒。然豆。折。入。眼。【宋】寇宗奭本草衍義論真珠曰。除小兒。驚。熱。【明】李時珍本草綱目論真珠曰。安魂。魄。止。遺。精。白。濁。解。痘。疔。毒。主。難。產。下。死。胎。胞。衣。【明】繆希雍本草經疏論真珠曰。珠。藏。於。澤。則。川。自。照。况。塗。面。澤。不。令人。潤。澤。好。顏色。平。凡。小。兒。驚。熱。風。癩。為。必。須。之。藥。【清】黃宮繡本草求真論真珠曰。珍珠。即。蚌。所。生。之。珠。也。珠。稟。太。陰。精。氣。而。成。故。中。秋。無。月。則。蚌。即。無。珠。也。此。藥。馮。楚。賡。辯。論。最。詳。謂。其。功。用。多。入。陰。經。其。色。光。明。其。體。堅。硬。大。小。無。定。要。以。新。完。未。經。鑽。者。為。尚。味。甘。微。鹹。氣。寒。無。毒。入。手。少。陰。心。經。足。厥。陰。肝。經。蓋。心。虛。有。熱。則。神。氣。浮。遊。肝。虛。有。熱。則。目。生。翳。障。除。二。經。之。熱。故。能。鎮。心。明目。也。耳。聾。本。屬。腎。虛。有。熱。甘。寒。所以。主。之。逆。風。者。臟。脹。也。胸。腹。氣。逆。脹。滿。以。及。手。足。皮。膚。皆。腫。也。經。曰。諸。溼。腫。滿。皆。屬。脾。土。諸。滿。脹。大。皆。屬。於。熱。此。脾。虛。有。熱。兼。有。積。滯。所致。珍珠。味。甘。既。能。益。脾。寒。能。除。熱。體。堅。復。能。磨。積。消。滯。故。亦。生。之。至於。疔。毒。癰。腫。長。肉。生。肌。尤。臻。奇。

效。但體最堅硬。研如飛麵。方堪服食。否則傷人臟腑。外搽肌肉作疼。蚌蛤無陰陽化牡。須雀化成。故珠樹一於陰精也。

國外學說

日本和漢藥考曰。眞珠藥用者少。裝飾者爲多。其新光正圓且巨大者。世人莫不珍之。若小而不整或暗且帶色。則價值大有等差。必裝飾不適用者。方肯入藥。如大村眞珠。伊勢眞珠。志摩眞珠。尾張眞珠。水戶眞珠。蛤仔眞珠。石決明眞珠等。皆供藥料者也。又眞珠自來多爲造品。因除藥用外。且作裝飾品。故奇貨可居也。如法。意等國。俱以玻璃。蠟。魚眼等。仿造其原形。外以淡水產之魚鱗。研成粉末塗之。製作之巧。誠足驚人。驟視之。竟與眞珠無別也。又以眞珠製成細末。眞珠質堅。欲研粉末。必先加熱。然熱之過度。仍難成粉末。故相傳搗碎研粉。尙爲穩妥之舊法也。有種種之法。將眞珠入土器。加大豆四五粒。土器加蓋。爐上熱之。至大豆膨脹爲度。將珠取出。或入米泔水盪煮。至微鳴取出搗碎。

辨偽

鄭肯農曰。珍珠偽名。藥珠。每用上海假珠。或廣東料珠。偽充者。研爲粉。更難辨識。古方外症多用湯藥。罕用。近人湯劑。喜用蘇珠。又豈料爲假珠。所欺誑乎。用者慎之。曹炳章曰。按范成大蟲魚志云。珍珠出合浦海中。有珠池。蟹戶投水採蚌取之。相傳海底有處所如城郭。大蚌居其中。有怪物守之不可近。蚌之細碎。莖廷於外者。始得而採之。嶺表錄異云。珠池在廉州邊海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每年刺史親監珠戶入池採珠。以充貢賦。皆採老蚌取而剖珠。池在海上。其底與海通。其水乃淡。深不可測也。土人採小蚌肉作膳食。亦往往得細珠如粟。即今之廉珠也。乃知珠池之蚌。隨其大小。悉胎中皆有珠矣。而今之取珠蚌者。云得之海邊。不得於池中。也。其北海珠蚌種類小。土人取其肉。或有得珠者。色黃白不甚光瑩。或即今之藥珠也。蚌中又有一種江瑤者。腹亦有珠。皆不及南海者奇而且多。寇宗奭曰。河北海深中亦有珠。圓及寸者。色多

微紅。珠母與廉州者亦不相類。但清水急流處。其色光白。濁水及不流處。其色暗也。熊太古冀越集云。禹貢言淮夷珠璣。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。予嘗見瑤人入海。取得珠子樹數株。狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。瑤人鑿石得樹以求蚌。甚可異也。南越志云。珠有九品。以五分至一寸八九分者。爲大品。有光彩。一邊似鍍金者。名瑤珠。次則走珠。滑珠等品也。格古論云。南番珠色白。圓瑤者爲上。廣西者次之。北海珠。即藥珠。色微青者爲上。粉白油黃者下也。西番馬價珠爲上。色青如翠。其老色夾石粉背油稠者下也。凡蚌聞雷則瘞瘦。其孕珠如懷孕。故謂之珠胎。中秋無月。則蚌無胎。左思賦云。蚌蛤珠胎。與月盈虧是矣。陸佃云。蚌蛤無陰陽化牡。須雀始化成。故能生珠。專一於陰精也。龍珠在額。蛇珠在口。魚珠在眼。鮫珠在皮。鼈珠在足。蛛珠在腹。皆不及蚌珠也。據近時市上所通用。最上者爲濛珠。即廉州合浦縣珠池

所產。粒細如粟。如粟。色白光滑。有寶光。其次曰藥珠。種類甚多。即北海所產。色白黃。有神光者亦佳。惟色黑質鬆者爲最次。不入藥用。

配合應用

治小兒驚癇風熱。大人失志癲狂。用眞珠粉。丹砂。牛黃。犀角。天竺黃。茯神。遠志。鈎藤。鈎。琥珀。金箔。

治目生翳障。眞珠。煨甘石。龍腦香。白礬砂。空青。人爪。點目。

治廣疔結毒。及陰蝕瘡。眞珠粉。鍾乳石。象牙末。牛黃。冰片。白礬。蠶紅。鉛。天蠶。蠶。蚌。竹。屑。樟。皮。灰。沒藥。明礬。

治口疳。珠粉。人中白。黃粟。青黛。硼砂。和冰片。少許。治下疳。加入雞內金。膩粉。

安魂定魄。眞珠末。豆大一粒。蜜一規殼。和服。日三。於小兒尤宜。 (肘後方)

治卒忤不甯。眞珠末。用雞冠血和丸。小豆大。以三四粒納口中。 (肘後方)

治灰塵迷目。用大珠拭之。則明也。 (格古論方)

治婦人產後。眞珠末一兩。酒

服立出(千金方)

①治胞衣不下。真珠一兩。研末。苦酒服(千金方)

②治子死腹中。真珠末二兩。酒服立出(外臺秘要方)

③治癩瘡不效。珠子七枚爲末。新汲水調服(儒門事親方)

④治肝虛目暗。茫茫不見。真珠末一兩。白蜜二合。鯉魚膽二枚。和合銅器煎至一半。新綿濾過。瓶盛。類點取瘻。亦治青盲不見(聖惠方)

⑤治小兒中風。手足拘急。真珠末水飛一兩。石羔末一錢。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。日三(聖惠方)

⑥治目生翳。真珠一兩。地榆二兩。水二大盞。煮乾。取真珠。以醋浸五日。熱水淘去醋氣。研細末。用每點少許。以愈爲度

用量 五釐至一分。
炮用宜忌 凡無實火鬱熱者禁用。

參攷資料 ①河北滹深中亦有圓及寸者。色多微紅。珠母與廉州者不相類。但清水急流處。其色

光白。濁水及不流處。其色灰暗也。

(寇宗奭) ②按廉州志云。合浦縣海中有梅青嬰三池。蜃人每以長繩繫腰。攜籃入水。拾蚌入籃。卽振繩令舟人急取之。若有一線之血浮水。則蚌魚腹矣。又熊太古翼越集云。禹貢言淮夷珠璣。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。予嘗見蜃人入海。取得珠子。樹數擔。其樹狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。蜃人鑿石得樹以求蚌。甚可異也(李時珍)

【真珠】卽珠砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「珠砂」條。

【真珠母】卽蚌殼之處方用名。詳「蚌殼」條。

【真珠花】卽蒴藋之別名。詳「蒴藋」條。

【真珠草】 古籍別名 陰陽草。產地 生野道旁及牆垣間。形態 真珠草爲蘆葦類之一種。葉似槐而狹小。晝開夜閉。葉背生小珠如鳳仙子。葉端直綴。經霜輒紅。高三四寸。可供藥用。

主治 小兒百病。及諸疴瘦弱。眼欲盲。皆效。爲末。白湯下。或煎煮魚肉食。

【真珠菜】 性質 甘。潤。無毒。主治 利水。通淋。結消腹脹。下氣。癰閉。

參攷資料 六安有真珠菜。如真珠。又益部方物略記。真珠菜。戎瀘等州有之。生水中。石上。翠纒纒。莖首貫珠。蜀人以蜜熬食之。或以醃。可致千里不壞。又黃山志。真珠菜。藤本。莖生。暮春發芽。每芽端綴一二莖。圓白如珠。葉翠綠如茶。連莖腊之。香甘鮮滑。他蔬讓其美。(趙恕軒)

【真珠黃】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

十畫 真 斌 砥 砭 砭

【真菊】卽茶菊之古籍別名。典見藥芳譜。詳「茶菊」條。

【真菜】卽莖莖子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「莖莖子」條。

【真寧豆】 命名 本品卽豆之產於甘肅省舊慶陽府真寧地方者。故名。性質 甘。平。無毒。主治 解諸藥毒。

【真檀】卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

【真蟲草】日本名尊麻。爲真蟲草。詳「尊麻」條。

【真蘆薈】卽蘆薈之處方用名。詳「蘆薈」條。

【矮姑】卽矮葵之古籍別名。典見綱目。詳「矮葵」條。

【砥石】卽羊肝石之原名。詳「羊肝石」條。

【砭石】卽砭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「砭石」條。

【砭石】 命名 本品石錄。古以代針刺病之石。故名。古籍別名 鍼石(綱目) 主治 刺百病癰腫。

【砱砱石】即井泉石之別名。詳「井泉石」條。

【破布】匿地。出嶺東高要、陽江、陽春、恩平諸地。

【破布】破布爲雜木類之一種。其葉狀如掌而色綠。可供藥用。

【主治】解夢香毒。能醒迷。

參攷資料 嶺南險地。舟人多以胡荽草合香焚之。人即迷。聞名爲夢香。以此煎服。立解。故有身無破布葉。莫上夢香船之曲。(綱目拾遺)

【破地鍾】即萊蕪之古籍別名。與見王禎農書。詳「萊蕪」條。

【破門】即大黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「大黃」條。

【破故芷】即補骨脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「補骨脂」條。

【破故紙】即補骨脂之處方用名。詳「補骨脂」條。

【破軍殺】即大戟之古籍別名。與見和漢藥考。詳「大戟」條。

【破胸棗】即枳實之古籍別名。與見和漢藥考。詳「枳實」條。

【破雪】即黃芩子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「黃芩子」條。

【破管草】即雀麥之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「雀麥」條。

【破銅錢】即類之古籍別名。與見綱目。詳「類」條。

【破圍草】即雀麥之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「雀麥」條。

【破圍符】即蓬莪朮之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蓬莪朮」條。

【祕惡】古籍別名。杜逢。(別錄)

【祕惡】祕惡爲雜草類之一種。可供藥用。

【性質】酸。無毒。

【主治】肝經邪氣。

【祝鳩】即斑鳩之古籍別名。與見綱目。詳「斑鳩」條。

【神丹】基本。神丹爲石類之一種。可供藥用。

【神木】百病寒熱。

【神水】即茯苓木之簡稱。詳「茯苓木」條。

【神水】即口津之古籍別名。與見綱目。詳「口津」條。

【神火】製法。取神火法。用劈水冲之。面上有浮起細沫一層。用荊川紙拖水面。其沫即黏著紙上。將紙壓乾。掃下。即神火也。其砂澄清。去水再研。再冲。見有浮起之沫。依前法拖曬。如此六七次。直至無浮沫方止。每砂一斤。約可取神火八九。用烏金紙包收貯。

【神火】效。能拔毒收口。

【主治】凡癰疽疔瘡。難收口者。以神火少許。鷄翎掃膏藥上。貼毒水易乾。瘡口易斂。爲外科聖藥。

【神仙對坐草】古籍別名。蜈蚣草。地蜈蚣。(綱目拾遺)

【產地】生山野陰溼諸地。及道旁多有之。

【形態】神仙對坐草爲溼草類之一種。莖幹蔓生。兩葉相對。色青。形圓似佛耳草。夏開小黃花。每節間着二朶。清明時發苗。高尺許。亦似鵝腸草狀。對節而生。可供藥用。

【採取】二三月間採之。陰乾用。

【主治】黃疸初起。脫力虛黃。黃

白火丹。反胃噎膈。水腫臌脹。陰症。傷寒。及一切疝氣。

【神末砂】即硃砂之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳「硃砂」條。

【神守】即鼈甲之古籍別名。與見古今注。詳「鼈甲」條。

【神朴】即厚樸之處方用名。詳「厚樸」條。

【神芝】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【神屋】即龜版之古籍別名。與見本經。詳「龜版」條。

【神砂】即煨砂之古籍別名。與見本草求真。詳「煨砂」條。

【神砂】即硃砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【神胎】即眞珠之古籍別名。與見和漢藥考。詳「眞珠」條。

【神座砂】即硃砂之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳「硃砂」條。

【神桃】即桃泉之古籍別名。詳「桃泉」條。

【神草】即人參之古籍別名。與見別錄。詳「人參」條。

【神草】即天麻之古籍別名。與見吳普本草。詳「天

席條。

【神馬草】即海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「海藻」條。

【神符白雪】即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

【神符樹】即夜蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「夜蘭」條。

【神黃豆】產地 出雲南西南境地及四川。

形庭 神黃豆莢如槐角。形似細竹筒。長可三四寸。搖之有聲。中如竹節。片片相疊。剖之狀如棋子。而色白。內有豆粒。色黃光亮。較蠶豆略大。似五倍子。中者線紋。堅實而扁。其出四川者。莢如連翹而略短。內有豆粒。作微紅色。俱可供藥用。

主治 稀痘。解毒。

配合應用 凡痘自胸以上。自背以下俱有。而中間一截全無者。名兩頭痘。此氣血不能貫通。上下而腰臍之間為寒毒凝滯也。若不急治。七日之後。必變灰白之症矣。見點時。急用生薑。當歸。赤芍。枳椇。防風。荆芥。厚樸。續斷。白芷。山查。木通。神黃豆三十粒。服此。中間方

有痘可無虞。(張琰種痘新書方)

●神黃豆用筒瓦火焙。去其黑殼。碾末。白水下之。可永除小兒痘毒。服法以每月初二日。十六日為期。半歲每服半粒。一歲每服一粒。一歲半每服一粒半。週至三歲。服三粒。則終身不出矣。或曰按二十四氣服之。以二十四粒為度。或云水畢閉目服之。(綱目拾遺方)

●痘將發未發時。用神黃豆連殼焙炒。燥用豆研細水服。(珍異藥品方)

●痘將出時。用神黃豆。按一歲一粒。剝去外殼。并內皮。將瓦焙熟。一半留生。一半芫荽湯調服。毒重者稀。毒輕者更稀。十餘歲者亦不過七粒。倘未曾出痘者。亦如法以水調服之。竟不出痘。宜三月。五月。七月。七月。九月。九等日。(寶笈方)

【神麝香】即靈麝香之古籍別名。典見離騷註。詳「靈麝香」條。

【神箭】即衛矛之古籍別名。典見廣雅。詳「衛矛」條。

【神膠】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【神燈火】主治 一切腫毒。癰疽。疔發。背。能解毒活血。消腫散瘀。

參攷資料 外科有神燈照法。用硃砂。雄黃。俱研。水飛。血竭。沒藥。等。烘去汗。各二錢。麝香四分。為極細末。每用三分。以紅棉紙緊捲。燃條。約長七寸。麻油潤透。以火燃著。須令患者坐無風處。將藥條離瘡半寸。自外至內。週圍徐徐照入。火頭向上。藥氣乃入。毒即隨火解散。自不內侵臟腑。不可太過。恐傷好肉。其瘡微微覺熱。心神即爽。每日只熏一次。初用三條。每日加一條。加至四五條。勢即漸減。然後每日減去一條。直熏至紅腫消盡為度。然後用後藥。藥粉。鼓草。新鮮採得者。搗爛。入陳年小粉等分。初起者。再加白鹽。研細少許。打成稠糊。敷半寸厚。留頭。必須敷過瘡。半三分。方能鎮定毒根。瘡口之上。用大蔥葉滾水泡熱。扯開貼之。或膏蓋亦可。避風為妙。自能拔出膿毒。如無鮮草。以如意黃金散代之。集要云。神燈照法。勿用太早。如瘡四五日。開形未成。毒未聚。瘡用之。毒必內壅。

反難外出。須用在八九日後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。未成者自消。已成者自高。不起發者即發。不腐潰者即潰。若毒已潰。膿已泄者。不宜用。每日以猪蹄湯淋洗。或蔥頭煎湯洗亦佳。忌發物。(趙恕軒)

【神錦花】即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【神與草】即犍牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「犍牛兒」條。

【神麴】命名 昔人用麴。多以造酒。後醫乃造神麴。專供藥用。力更勝之。蓋取諸神聚會之日造之。故得神名。

處方用名 六神麴。范志麴。建神麴。神麴。六精。探芸神麴。焦六精。炒神麴。古醫別名 陳麴。(俗名)麥曲。六丁麴。(和漢藥考)

基本 神麴係用白麵和藥汁。如造醬黃法而製成者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。神麴原產福建。名曰建麴。但字號名目太多。真偽難辨。以左字探芸。居麴為通行。其次范志麴。其餘滿

地充麴。但正貨俱無香味。充貨切開必香。凡用此味。著在消滯解表。究竟用六神麴較穩當也。六神麴方。青蒿葉。蒼耳子。北杏。正小荳。生旱辣麥各等分。卷爛。用粗麥麴埋餅。即完全六神麴也。

製法 李時珍曰。五月五日。或六月六日。或三伏日。用白麵百斤。青蒿自然汁。赤小豆末。杏仁泥。各三升。蒼耳自然汁。野麥自然汁。各三升。以配白虎青龍朱雀玄武勾陳騰蛇六神。用汁和麵。豆杏仁作餅。麻葉或楮葉包。如造醬黃法。待生黃衣。曬收之。臨用炒令香入藥。

性質 甘。辛。溫。無毒。
效能 行氣。消食。治瀉痢。化痰涎。用為消化藥。
主治 化水穀。宿食。癥結。積滯。健脾暖胃。

歷代配述攷證 【金】張元素珍珠囊論神麴曰。養胃氣。治赤白痢。【明】李時珍本草綱目論神麴曰。消食下氣。除痰逆。霍亂。泄痢。脹滿諸疾。其功與麴同。因挫腰痛者。服過洋酒。溫服有效。婦人產後欲

回乳者。炒研酒服二錢。日二即止。甚驗。【清】黃宮繡本草求真論神麴曰。神麴辛甘氣溫。其物本於白麵。杏仁。赤小豆。青蒿。蒼耳。紅麥。六味。作餅蒸鬱而成。其性六味為一。故能散氣調中。溫胃化痰。逐水消滯。小兒補脾。輕平等藥。醫多用此。以為調治。蓋取辛不甚散。甘不甚壅。溫不見燥也。然必合以補脾等藥。並施則佳。若孕婦無積。及脾陰不足。胃火旺者。並勿用耳。義與麥芽同也。【清】陳修園本草經讀論神麴曰。凡麴藥皆主化穀食積。服此便消。或鼻中如聞酒香。藥性所生。主治亦不外此。痰結積聚者。水穀之積久而成也。健脾暖胃者。化他長。人人以之常服。且云祛百病。怪甚。考造麴之法。六月六日是六神聚會之日。用白麵百斤。青蒿茶葉。野麥各自然汁三升。杏仁研泥。赤小豆為末各三升。通化作餅。麻葉。或楮葉包。如造醬黃法。待生黃衣。曬乾收之。陳久者良。藥用六種。故名六神麴。今人除去六字。只名神麴。任意加至數十味。無非越

破之藥。大傷元氣。且有百草神麴。害人更甚。近日通行福建神麴。其方於六神本方中。去赤小豆。蕙其。易蛇。加五苓散。平胃散料。及麥芽。穀芽。使君子。樵子。大黃。黃芩。大腹皮。砂仁。白芷。丁香。木香。藿香。香附。良薑。芍藥。防風。秦艽。羌活。獨活。川芎。蘇葉。荊芥。防己。路黨。參。茯苓。萊菔子。苡仁。木通。茶葉。乾薑。乾葛。枳實。肉桂。檳榔。青皮。木瓜。薄荷。荷。蟬退。桃仁。紅花。三稜。莪朮。鬱金。茵陳。柴胡。菊花等為末。製為方塊。以草窰發黃衣。曬乾。此方雜亂無序。誤人匪淺。且以藥末合五穀。習造發黃而為麴。只取其速於釀化。除消導之外。並無他長。何以統治百病。且表散之品。因密發而失其辛香之氣。攻堅之品。以密發而失其雄入之權。補養之藥。氣味中和。以密發而變為臭腐穢濁之物。傷脾妨胃。更不待言。明者自知。如感冒病。宜審經以發散。若服神麴。則裏氣以攻伐而虛。表邪隨虛而入矣。傷食新病。宜助胃以化。傷食頗久。宜承氣以攻下。若服神麴。則釀成甜酸穢腐之味。滯於中。魚沒無出

路。則為惡心脹痛矣。吐瀉是陰陽不交。泄瀉是水穀不分。赤白痢是濕熱下注。噎膈是胃門乾槁。翻胃是命門火衰。痰餘是水氣泛溢。與神麴更無干涉。若誤服之。輕則致重。重則致死。可不慎哉。

配合應用 神麴開胃健脾。消食止瀉。同山查。麥藥。穀藥。縮砂。陳皮。草果。藿香。白朮。乾葛。蓮肉等用效。

療痞滿暑濕 麴朮丸 用神麴炒。蒼朮。泔製炒。等分為末。糊丸。梧子大。每米飲下五十丸。一百一還方。

健胃息食 治脾胃俱虛。不能消化水穀。胸膈痞悶。腹腸膨脹。連年累月。食滯嗜臥。口無味。神麴六兩。麥藥炒三兩。乾薑泡四兩。烏梅肉焙四兩。為末。蜜丸。梧子大。每米飲下五十丸。日三服。和劑局方。

食積心痛 陳神麴一塊。燒紅。滓酒二大碗服之。摘玄方。
胃虛不尅 神麴半斤。麥芽五升。杏仁一升。各炒為末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼化一丸。普濟方。
治暴泄不止 神麴炒二兩。茶

黃湯泡炒半兩爲末。醋糊丸。梧子大。每服五十九丸。米飲下。(百一選方)

⑤ 治產後暈絕。神麴炒爲末。水服方寸匕。(千金方)

用量 二錢至四錢。
施用宜忌 凡中虛無積。胎元不足者禁用。

參攷資料 ① 按倪維德啓徵集云。神麴治目病。生用能發其生氣。熟用能斂其暴氣也。買思鸛齊民要術。雖有造神麴古法。繁瑣不便。近時造法更簡易也。(李時珍) ② 金匱要略。用神麴治虛勞百病。以其調中而清滯也。(黃元御) ③ 六神者。白虎(白麴)青龍(青蒿)朱雀(赤小豆)玄武(杏仁)勾陳(蒼耳)騰蛇(野葛)各配六神也。此藥陳者爲良。故一名陳麴。(和漢藥考)

【神麴酒】 製法 用神麴燒赤。滓酒飲。

主治 因肺腰痛。
【神篇石】 卽石硫黃之古籍別名。與見本草集註。詳「石硫黃」條。
【神龜】 卽白芷之古籍別名。與見

和漢藥考。詳「白芷」條。
【秬】 卽黍之一稂二米者。與見爾雅。詳「黍」條。

【秦爪】 卽秦尤之古籍別名。典見四聲本草。詳「秦尤」條。

【秦王試劍草】 卽鹿蹄草之古籍別名。典見綱目。詳「鹿蹄草」條。

【秦仇】 卽秦尤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦尤」條。

【秦札】 卽秦尤之古籍別名。典見別錄。詳「秦尤」條。

【秦皮】 命名 一作檉皮。其木小而窄高。故名。或云本

出秦地。藥用其皮。遂名之秦皮。古籍別名 檉皮。榑木皮。石檀皮。(別錄) 樊桐皮。(陶弘景) 盆桂皮。(日華) 苦樹皮。(蘇恭) 苦樞皮。(綱目) 檉皮。白榑木皮。若裏木皮。細辛木皮。(和漢藥考)

外國名詞 Fraxinus Bung-gana, DC. var. pubinervis, W.C. (拉丁)

基本 屬木犀科爲秦樹之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。秦皮產奉天省。十月新。

形態 秦皮爲山野自生之落

形體 秦皮爲山野自生之落

葉喬木。多產於寒地。幹高二三丈。周圍可三尺。葉爲奇數羽狀複葉。小葉形長橢圓或長卵圓。皆對生。末端尖銳。三四月間。枝梢簇生淡紫色小花。有四萼片。而無花冠。果實爲扁平之翅果。樹皮平滑。色青綠。以水浸之。立變碧青。此液多用以洗患眼。煎樹絲皮。可製成一種越幾斯。謂之木膠。入藥用。此樹皮所生之白蠟。用以塗物。殊滑澤。



秦皮

採取 二月八月採之。採剝其皮陰乾用。尤以去骨取皮。漬水。色碧青者佳。

性質 苦微寒。無毒。

效能 瀉熱。明目。瀉腸。止痢。用作眼藥。又爲瀉痢藥。

主治 風寒溼痺。洗洗寒氣。除熱。目中青昏白膜。(本經) 療男子少精。婦人帶下。小兒漏身熱。可作洗日湯。久服皮膚光澤。厚大。有子。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論秦皮曰。明目。去目中久熱。兩目赤腫。疼痛。風淚不止。作湯浴小兒身熱。煎水澄清。洗赤目。極效。【唐】陳藏器本草拾遺論秦皮曰。同葉煮湯。洗蛇咬。并研末傅之。

【元】王好古湯液本草論秦皮曰。主熱痢下重。下焦虛。【清】黃宮繡

本草求真論秦皮曰。秦皮味苦氣寒。色青。性滑。功入肝以除熱。入

腎以清氣。是以因風而見溼痺。驚

癩。目障之症者。則常用此苦燥苦

降之味以除。因脫而見崩帶。腸癖

下痢之症者。則常用此取瀉。寒氣

以固。如仲景白頭翁之用秦皮。苦

瀉之類。老子云。天道貴清。惟清故

補。服此不惟泄瀉止脫。而且益腎

有子矣。至治赤眼腫痛。則合黃連

等分。煎點。並秦皮一味煎湯以洗。甚效。但此氣寒傷胃。總不宜於胃虛少食之人耳。出酉上。皮有白點。漬水碧色。書紙不脫者真。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。秦皮。其木大抵似檉。枝幹皆青綠色。葉約如匙頭。虛大而光。無花實。皮有白點而不粗錯。取皮

漬水。便成碧色。書紙看之。皆青色者。真也。根似槐根。又古方藥品考曰。秦木高一二丈。幹枝皆綠白色。春出葉。一條五六葉排生。夏月枝梢開花。後結實。薄似松子而長大。日本產秦皮有二種。其皮不厚。白綠色。裏面褐色。浸水即變碧色。此爲真品。今藥舖賣者可用。出丹州。若州等處。又有小葉者。高四五尺。枝葉相似。但瘦小。以其皮浸水。即變淡綠色。味略同。下品也。出城州。天臺山。又大和本草曰。葉似椿葉。又似槐葉而小。亦似薔薇葉。以皮與葉浸水。立成綠汁。此汁善治紅眼腫。花多作紫色。如女郎花。樹幹性直。堪作鑿刀之柄。樹皮現紫點色。又物類彙編曰。所在多有。大葉者形似吳茱萸。小葉者叢生。此藥用治眼病。其效最顯。取其浸汁入墨色。尤光潤。加入畫色中更妙。又荷蘭藥鏡載秦皮之效如左。樹之裏皮色白。乾則帶黃色。味苦。收漬能發汗。利小便。治瘧有特效。爲煎劑或散劑服之。木質性收澀。爲末敷之。可愈創止血。或謂煎劑能治瘧疾一說。此對瘧疾之汁。治瘧疾。

咬傷。取效如神。堪爲解毒藥。故以之內服。其葉則貼傷部。綠枝瓦上焙之。折斷處自有津液滴出。凡患傷冷毒之耳聾。以此津液滴入耳中。立愈。子實能利小便。治水腫。每晨以子半錢。和葡萄酒一盞飲服。即利小便。以治水腫。黃疸。累驗。
配合應用 治赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮取七合。澄清。日日溫洗。一方加滑石。黃連等分。(外臺祕要方)
治眼暴腫痛。秦皮、黃連各一兩。苦竹葉半升。水二升半。煮取八合。食後溫服。此乃謝道人所方也。(外臺祕要方)
治赤眼時痛。秦皮一兩。清水一升。白蠟中浸。春夏一食頃以上。看碧色出。即以筋頭纏。仰臥點令滿眼。微痛勿畏。良久。滌取熱汁。日點十度以上。不過兩日即瘥也。(外臺祕要方)
治眼弦挑。鉗乃肝脾積熱。到秦皮。夾沙糖水煎。調大黃末一錢。微利佳。(直指方)
治血痢連年。秦皮、具尾草、薔薇根等分。以水煎取汁。調器重釜煎成丸。如梧子大。每服五六丸。日二服。稍增。以知爲度。亦可煎飲。(千金方)
治天蛇毒瘡。似瀨非瀨。天蛇乃早間花蜘蛛也。人被其螫。爲露水所濡。乃成此疾。以秦皮煮汁一斗。飲之即瘥。(寇宗奭方)
用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。惡苦氣。防癸。臭菜。莢。忌火。大戟爲之使。
參攷資料 痢則下焦虛。故張仲景白頭翁湯以黃蘗、黃連、秦皮同用。皆苦以堅之也。秦皮浸水青藍色。與紫草同用。治目病以增光華尤佳。(王好古) 柝皮色青氣寒。味苦。性瀉。乃是厥陰肝少陽膽經藥也。故治目病翳癩。取其平木也。治下痢崩帶。取其收澀也。又能治男子少精益精有子。皆取其瀉而補也。故老子云。天道貴瀉。此藥乃服食及驚癩崩所宜。而人止知其治目一節。幾於廢棄。良爲可憐。淮南子云。柝皮色青。治目之要藥也。又萬華術云。柝皮止水。謂其能收淚也。高誘解作致水。言能

使水沸者。謬也。(李時珍) 樹葉似檜。故名石檜。俗因味苦。呼爲苦樹。(蘇恭) 秦皮生盧江川谷及宛旬水邊。二月八月採皮。陰乾。(別錄) 俗云是樊榭皮。而水漬以和墨書。色不脫。微青。(陶弘景) 此樹似檜。葉細皮有白點。而不粗錯。取皮漬水。便碧色。書紙看之。皆青色者。是真。(蘇恭) 今陝西川部及河陽亦有之。其木大部似檜。枝幹皆青綠色。葉如匙頭。虛大而不光。並無花實。根似槐根。俗呼爲白柝木。(蘇頌)
【秦尖】 卽刺蒺藜之古籍別名。與見和漢藥考。詳刺蒺藜條。
原名 秦乳。
【秦朮】 本品出秦中。而根作羅紋交錯者佳。故名。
處方用名 左秦朮。西秦朮。紋秦朮。
古籍別名 秦瓜。(四聲本草)
秦札。秦料。(別錄) 秦膠。(俗名) 秦仇。綱草。產家大器。(和漢藥考)
外國名詞 Zanthoxylum
Piperitum DC. (拉丁)
Instinctia condantia

其能收淚也。高誘解作致水。言能

基本 屬醫藥科。為秦艽之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。秦艽以陝西省漢中府產者為正。地道名曰西秦艽。其次雲南產者多。四川者少。總其名曰川秦艽。氣味不及西艽之佳也。

形態 秦艽莖高五六寸。葉婆娑。莖梗俱青色。如蒿苣葉。六月中間紫色花。似葛花。花後遂結子。其根色黃。而互相交糾。長一尺左右。粗細不等。

採取 二月八月間。採根曝乾。製法 雷斅曰。凡使秦艽。須於脚文處。認取左文列為秦。治疾。右文列為艽。即發脚氣。凡用秦。以布拭去黃白毛。乃用黃元湯浸一宿。日乾用。李時珍曰。秦艽但以左文者為良。分秦與艽為二。則謬矣。

性質 苦平無毒。效能 散風溼。治痺痛。用作風痺藥。主治 寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。(本經)療風。無問久新。通身掣急。(別錄) 現代記載 〔唐〕甄權藥

十靈 秦

性本草論秦艽曰。牛乳點服。利大小便。療酒黃疸。解酒毒。去頭風。〔宋〕大明諸家本草論秦艽曰。傳尸骨蒸。治疔。及時氣。〔金〕張元素珍珠囊論秦艽曰。除陽明風溼。及手足不遂。口噤。牙痛。口瘡。腦風。瀉血。養血。榮筋。〔元〕王好古湯液本草論秦艽曰。泄熱。益膽氣。〔明〕李時珍本草綱目論秦艽曰。治胃熱。虛勞發熱。〔明〕繆希雍本草經疏論秦艽曰。秦艽味苦平。別錄兼辛。微溫。而無毒。潔古氣微溫。味苦辛。亦可云微寒。苦能洩。辛能散。微溫能通利。故主寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。性能祛風除溼。故別錄療風。無問久新。及通身掣急。能燥溼散熱。故日華子治骨蒸及疔熱。甄權治酒疸。解酒毒。元素除陽明風溼。及手足不遂。腸風。瀉血。養血。榮筋。好古泄熱。益膽氣。咸以其除溼散結。清腸胃之功也。〔清〕黃宮繹本草求真論秦艽曰。秦艽苦多於辛。性平微溫。凡人感冒風寒與溼。則身體酸痛。肢節煩疼。拘攣不遂。如風勝則為行痺。寒勝則為痛痺。溼勝則為着痺。痺

在於骨則體重。痺在於脈則血滯。痺在於筋則拘攣。痺在於肉則不仁。痺在於皮則膚寒。至於手足酸疼。寒熱俱有。則為陽明之溼。潮溼骨蒸。則為陽明之熱。推而道黃便澀。腸風瀉血。口噤牙痛。亦何莫不由陽明溼熱與風所成。用此苦多於辛。以燥溼邪。辛兼以苦。以除肝膽風熱。實為驅風除溼之劑。然久痛虛羸。血氣失養。下體虛寒。痠疼枯瘦。小便利者。咸非所宜。形作羅紋相交。長大黃白。左紋者良。右紋勿用。

國外學說 日本和漢藥考曰。此藥純係中國產。其基本植物未詳。產於中國之河北河南諸省。一說。因產於陝西。故名秦艽。一說。屬於醫藥科。未得其證。不敢臆斷。日本向以鬮毛茸料之牛蒡充之。截然不同也。本草綱目啓蒙曰。中國產。根肥大。色黃白。左右分枝。又有上為分枝。而未端仍合為一者。根中空。外如網。因之如羅紋相交。享保年同。國人自高麗攜其秧來。始有此種。頃已漸多。葉似毛茸。葉而無毛。一根叢生。方莖直立。葉互生。

開淡黃花。形似烏頭花而小。根黃色。此草多產於城州之北山及信州。花亦有作淡紫色或黃白色者。種樹家稱為伶人草。其根極似中國米之乾根。色黑褐。去皮則內中空。羅紋相交。味苦。同時又有中國來者。偶有葉雜入。則見其葉似菱荷葉。非毛茸葉之形。據此則屬麗之種。殆又非秦艽矣。

辨偽 鄭省巖曰。假艽出秦中。今涇州鄜州岐州河陝諸郡皆有其根。土黃色。作羅紋交糾。左右旋轉。李時珍云。以左紋者良。今市肆偽品。即邊秦有毛。其枝尙小。匪特左右紋難辨。不知何物混充。又安能療病乎。曹炳章曰。按秦艽。陝西寧夏府出者。色黃肥。大蘆少。左旋者佳。山西五臺山亦出。皮色略黑。肉黃白色。亦佳。以上皆名西秦艽。湖北產者。條細質鬆。毛屑較多。名漢秦艽。為次。 近人學說 袁淑範曰。秦艽味苦辛。而氣平。性溫無毒。主治寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。本草證類亦曰。療風。不問新久。皆效。藥性論亦云。秦艽利大小

十靈 秦

便。差五種黃病。蕭炳曰。療酒黃黃。瘡大效。廣利方曰。秦尤療黃心煩。熱口乾。皮肉皆黃。有極效。此外如孫真人治黃疸亦用秦尤。以此等例觀之。秦尤似有鎮痛利水作用也。其主要成分供簡單的化學方法檢驗時。似為一種配糖體也。張山雷曰。秦尤之尤。本從草下牛取糾結之意。玉篇本作苧。孫氏問經堂所刻本草經從之。今作尤。或作苧者。皆苧之變體。非從草下九及几也。其根入土甚深。互相糾結。故以為名。而能通行經絡。流利骨節。名義功用。皆從此出。其氣味則本經謂之苦平。而別錄加以辛及微溫。以其主治風寒濕痺。必有溫通性質也。然其味本苦。其功用亦治風熱。而能通利二便。已非溫藥本色。後人且以治胃熱黃疸煩渴等症。其非溫性。更是彰明較著。考本經別錄主治。功在舒筋通絡。流利骨節。惟治痺痛燥結之證。蓋與防風羌獨同類之品。甄權之治頭風。即祛風也。惟又稱其利大小便。亦與本經下水利小便之旨相合。蓋秦尤之根。曲折通達。既能外行

於關節。亦能內達於下焦。故宜通諸府。引導溼熱。直走二陰。而出。昔人每謂秦尤為風家潤藥。其意指此。因之而并及腸風下血。張石頑且謂其治法皆以溼熱有餘。宜瀉積滯言之。非統治諸虛不攝之下血帶下也。又就其導溼去熱而引伸之。則治胃熱。泄內熱。而黃疸酒毒。牙痛口瘡。溫疫熱毒。及婦人懷胎蘊熱。小兒疳熱煩渴等症。皆胃家溼熱。而秦尤又能通治之矣。約而言之。外通經隧。內導二便。是其真宰。而通絡之功。又在理溫之上。要之皆是從溼阻熱結一面着想。而氣虛血弱之症。皆非其治。仍與防風羌獨等味。異曲同工耳。又曰。秦尤之根。以互相糾結為名。故陶弘景謂相交而長大者佳。無謂左右也。乃劉宋時之雷敫。妄為區別。竟謂左文為秦。右文為尤。鄙陋可笑。其謬已極。秦是地名。牛是物理。而可分以為二。不通孰甚。而後人能為應聲之蟲。皆以左者為佳。不知草之根。豈便互結。左右何關性質。亦猶藤本蔓生。未聞左旋右旋。顯分區別也。考雷敫所著之炮

炙論。詞多可鄙。本無足取。因其書竟稱為雷公炮炙論。而無識者流。甚至誤認為黃帝時之雷公。謬加推崇。轉相援引。因而沿訛襲謬。附和同聲。卒莫知其究竟。此亦談醫之一則笑話矣。秦尤治熱。本因其能通利二便。遂以胃家溼熱諸症。一概歸其主治。然皆治實熱。非虛熱也。自日華本草。插入主傳尸骨蒸一語。而俗醫又以為勞瘵發熱之聖藥。於是血虛身熱。率以秦尤柴胡。錯綜相同。自謂已握治勞之秘鑰。不知若輩能傷胃。寒能傷脾。寧不輕者致重。重者致死。而病者醫者。皆不覺悟。則日華殆其作俑者乎。李東璧謂黃疸煩渴之用秦尤。取其去陽明之溫熱也。陽明有溼。則身體痠疼而煩熱。陽明有熱。則日晡潮熱而骨蒸。其說甚是。清瀦蓋其能治潮熱骨蒸。亦皆胃有實熱之證。而謬者遂以移之於虛熱。其相去不太遠耶。若小兒疳熱。亦惟實證為宜。挾虛者審之。石頑亦謂肢體疼痛。或浮腫。挾有客邪者。用以祛風利溼。方為合劑。若久痛虛羸。血氣不能營養而痛。及下體

一〇四二

虛寒。痠疼枯瘦。而小便清利者。咸非所宜。
配合應用 治酒疸。秦尤。乾葛。茵陳。五味子。黃連。扁豆。木通。首帶。
治下部溼熱作疼。或生溼瘡。秦尤。苡仁。木瓜。五加皮。黃柏。蒼朮。牛膝。
治五種黃疸。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食風蠶亦作黃。因勞發黃。多痰滯。自有赤脈。益憔悴。或面赤惡心者是也。用秦尤一大兩。剉作兩帖。每帖用酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒人易治。屢用生力。又治黃病。內外皆黃。小便赤。心煩口乾者。以秦尤三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫再服。此方出於許仁。則又孫真人方加芒硝六錢。(貞元廣利方)
治暴瀉引飲。秦尤二兩。甘草炙半兩。每服三錢。水煎服。(聖惠方)
治傷寒煩渴。心神燥熱。用秦尤一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。亦治小兒骨蒸。(聖惠方)

④治小便艱難。或轉胞腹滿。悶不愈。療殺人。用秦朮一兩。水一盞。煎六分。分作二服。又方加冬葵子等分爲末。酒服一匕。(聖惠方)

⑤治胎動不安。秦朮、甘草、炙鹿角膠炒。各半兩爲末。每服三錢。水一大盞。糯米五十粒煎服。又方秦朮、阿膠炒、艾葉等分。如上煎服。(聖惠方)

⑥治發背初起。疑似者。便以秦朮、牛乳煎服。得快利三五行即愈。(海上方)

⑦治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑧治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑨治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑩治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑪治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑫治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

⑬治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

十畫 秦 快

經虛熱。及肺痿。骨蒸已成。或寒或熱。擊暖不出。體虛自汗。四肢怠惰。(直指方) 柴胡二錢。人參、龍甲、(醋炙) 秦朮、當歸、紫菀、半夏各一錢。地骨皮、錢半。甘草五分。右水二盞。薑三片。烏梅、大棗各一枚。煎七分。食後服。如熱甚者加青蒿。汗多者加黃芪。去半夏。生薑二味。

秦致資料 ①秦朮手足陽明經藥也。兼入肝膽。故手足不遂。黃疸煩渴之病。須之。取其去陽明之溼熱也。陽明有溼。則身體酸疼。煩熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。所以聖惠方治急勞煩熱。身體酸疼。用秦朮、柴胡一兩。甘草五錢爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦朮、炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。(李時珍) ②今河陝州郡多有之。其根土黃色。而相交糾。長一尺以來。粗細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑。連莖梗俱青色。如萹蒿。六月中開花。紫色似葛花。當月結子。每於春秋採根陰乾。(蘇頌) ③今庸師喜用秦朮。且不辨左紋右紋。凡遇痛症。動輒用之。失

其旨矣。(張石頑)

【秦朮】即秦朮之原名。詳【秦朮】條。

【秦朮】即秦朮之古籍別名。與見別錄。詳【秦朮】條。

【秦朮】古籍別名。藜藜。【秦朮】(山海經) 產地 生於低溼諸地。形態 秦朮藜爲菜類之一種。狀如藜。莖葉可供菜茹與藥用。性質 辛溫。無毒。主治 心腹冷脹。下氣消食。和齋。醋食之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論秦朮藜曰。破氣甚良。又末之和酒服。療心痛。恒塞滿氣。參攷資料 秦朮藜加入生菜中。最香美。(孟詵)

【秦朮藜子】 主治 腫毒。搗末和醋塗。

【秦椒】即秦椒之古籍別名。與見龍柏藥性考。詳【秦椒】條。②即花椒之原名。詳【花椒】條。

【秦菴】即秦菴之古籍別名。與見圖經本草。詳【秦菴】條。

【秦膏】即秦膏之處方用名。詳

【秦膠】即秦朮之俗名。詳【秦朮】條。

【秦燕毛】 命名 本品爲燕之名。由古秦地南來者。故名。 主治 解諸藥毒。取二七枚。燒灰水服。

【秦龜甲】即山龜甲之原名。詳【山龜】條。

【秦歸】頭圓尾多色紫。氣香肥潤者。即馬尾歸之古籍別名。與見綱目。詳【馬尾歸】條。

【秋雞】 古籍別名 水雞。 外國名詞 Rallus aquaticus indica. Blyth (拉丁) (Water rail 或 Eastern water-rail 或 Indian water-rail) (英)

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類。秋雞科。

產地 出田澤沼池水畔間。

形態 秋雞爲原禽類之一種。其狀似雞。嘴比頭長。略彎曲。嘴根赤而尖。淡黑。背面概作煤褐色。具白斑。混交赤褐。中脰黑。翼亦黑。頰

赤而尖。淡黑。背面概作煤褐色。具白斑。混交赤褐。中脰黑。翼亦黑。頰

赤而尖。淡黑。背面概作煤褐色。具白斑。混交赤褐。中脰黑。翼亦黑。頰

十畫 秬 秠 粉

黑褐。眼之上部巨類部灰赤色。有淡黑之橫斑。尾短色黑。脚帶赤褐色。趾無蹼。體長四寸餘。翼長三寸半。尾長一寸八分。能游泳。善步行。不能高飛。夏至後。夜鳴達旦。秋後即止。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。
主治 蠶瘻。

【秬】 命名 秬字篆文。象其禾體柔弱之形。故名。

古籍別名 衆。糯。糯粟。(唐本草) 黃糯。黃米。(綱目)

外國名詞 Panicum italicum L. Var. glutinosa. (拉丁)

モチアハ(日本)

基本 係禾本科稷屬。爲秬之米。其根詳見「秠根」條。

形態 秬米爲稷粟類之一種。乃粟米。粟米之有黏性者。有赤。白。黃三色。皆可釀酒熬糖。及作糝糕食。與供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 寒熱。利大腸。療漆瘡。

歷代配述攷證 【唐】孟詵食

療本草論秬米曰。治筋骨緊急。殺疥疥毒熱。生搗和雞子白。傅毒腫

良。【宋】日華諸家本草論秬米曰。主大咳。凍痛。嚼傳之。【明】李時珍本草綱目論秬米曰。治肺癆。及陽盛陰虛。夜不得眠。及食鷄鴨成癥。妊娠下黃汁。

參攷資料 ①秬米性平。不可常食。擁五臟氣。動風。悶人。(孟詵)

②秬米味酸。性熱。黏滯。易成黃積。病小兒不宜多食。(李時珍) ③秬米作酒。煮糖。肥。易消。方藥不正。用。惟嚼以塗漆。瘡。及釀諸藥。醱。爾。

(陶弘景) ④秬者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱。利大腸。大腸者。肺之舍。而肺病多作皮寒熱也。

千金治肺癆方用之。取此義也。糧。糧。經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得眠。中夏湯中用之。取其益陰氣。而利大腸也。大腸利。則腸不盛矣。方見

中夏條。又吳苑云。宋元嘉中。有人食鴨成癥。醫以秬米研粉。調水服之。須臾煩躁。吐出一鴨。雞而瘥也。千金方。治食鴨肉成病。胸滿面赤。不能食。以秬米泔一盞飲之。(李時珍)

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣。治脾胃

【秠米粥】

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣。治脾胃

虛寒。洩痢。吐逆。小兒痘瘡白色。

主治 煮湯洗。祛風。

【秠根】 ①即秠米之黑者。典見綱目。詳「秠米」條。②即黍之色黑者。與見爾雅。詳「黍」條。

【筍】 即竹筍之俗名。詳「竹筍」條。

【粉口兒茶】 即孩兒茶之別名。詳「孩兒茶」條。

【粉丹皮】 即牡丹皮之處方用名。詳「牡丹皮」條。

【粉甘草】 即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【粉沙參】 原名 土人參。

本品各地皆產。莖葉一似人參。故名。出江浙者。俗名粉沙參。

古籍別名 竹節人參。土參。節人參。佛掌參。竹鞭人參。(和漢藥考)

外國名詞 Panax Japonica (拉丁)

基本 屬五加科爲土參之根。產地 趙學敏本草綱目拾遺曰。土人參。各地皆產。尤於錢塘西湖南山尤多。

湖南山尤多。

形態 土人參爲多年生草。生於深山陰地。莖葉俱酷似人參。莖高二尺餘。葉爲掌狀複葉。由五小葉而成。類七葉樹葉。夏月於梢頭簇生。細小五瓣白花。作繖形。花序排列。實小如豆。初綠。熟紅。頂端有黑色。輪根初爲球根。次變直根。後復橫行。爲竹節狀。橫生。根如小指。大呈鉛黃色。有多數鬚根。本根味苦。鬚根則甘。

一〇四四

種類 ①粉沙參即土人參之出於江浙者。②紅黨參即土人參之去皮淨。煮極熟。陰乾而成者。③小人參即土人參之產於日本薩摩者。④魁人參即土人參之產於日本信濃下野日光者。

採取 夏秋之交。採根日乾。製法 趙學敏曰。凡使須蕪之極透。則寒去而氣香味淡。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 日本藥學士井上剛治氏。嘗研究竹節人參之成分。由化學試驗之結果。發見一種糖原質。又由動物試驗。確定其所含成分。應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

醫用竹節人參作祛痰藥。並非偶然云。

效能 癆肺。下氣。治咳嗽。平喘。送。爲人參之代用品。亦爲強壯藥。此外有健胃解熱祛痰之效。

醫治 慢性消化不良症。習慣性便秘。

作用 助胃酸分泌之不足。刺激胃之蠕動。使消化功能增大。至腸始吸收至血中。使心臟動力增加。

主治 氣香味淡。性善下降。能伸肺經治節。使清熱下行。補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升久瀉。淋瀝。難產。經閉。瀉痢由於肺熱者。反胃噎膈由於燥溼者。凡有升無降之症。每見奇效。以其根一直下行入土最深故也。

配合應用 ①治白帶初起。土人參切片三兩。用陳紹酒。飯上蒸熟。分作三服。服完即愈。(百草鏡方)

②補陰虛及楊梅結毒。對配茯苓蒸膏酒煎服。(王安採藥方)

用效 一錢至三錢。
應用宜忌 凡脾胃虛下陷滑精

夢遺者禁用。孕婦亦忌。以其下行而滑致也。

參攷資料 土參於春二三月。發苗如蒿艾而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。土人恒於夏月採根入藥。(綱目拾遺)

【粉兒茶】即粉口兒茶之簡稱。

【粉草】即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【粉草薺】即草薺之處方用名。詳「草薺」條。

【粉葛根】即葛根之處方用名。詳「葛根」條。

【粉團花】古籍別名。大者名玉粉團。小者名洋粉團。(綱目拾遺)

形態 粉團爲落葉灌木類之一種。葉略成圓形。有鋸齒。多皺紋。生細毛。夏初開白花。花瓣成簇。望之如粉團。大者初青後白。小者青色轉白。白後轉紅藍色。雄雌花叢集成球。直徑可達二寸許。其花可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 水煎洗腎囊風。同水龍竹。雷公藤。燒蕩除臭蟲。

【粉團花根】**主治** 喉爛。磨翎毛。爾掃。涎出即愈。

【粉節草】即蕩蕩之古籍別名。與見綱目。詳「蕩蕩」條。

【粉豬苓】即豬苓之處方用名。詳「豬苓」條。

【粉錫】即白粉之古籍別名。典見本經。詳「白粉」條。

【粉霜】**命名** 本品由水銀復轉升鍊而成。質輕如粉。色白如霜。故又命之曰水銀霜。

古籍別名 水銀霜。白雲。白蠶砂。(綱目)白霜砂。(新中藥)外國名詞 Corrosivo Sublimato。(拉丁)

基本 係汞化物之一種。

形態 粉霜爲白色半結晶性之塊粒或粉末。潔白而有光澤。

製法 李時珍曰。升鍊法。用真汞粉一兩。入瓦罐內。令勻。以燈盞仰蓋罐口。鹽泥塗縫。先以小炭火鋪罐底。四圍以水濕紙。不住手在燈盞內擦。勿令間斷。逐漸加火。至罐頭住火。冷定取出。即成霜如白蠟。按外臺秘製。裁古方崔氏造水

銀霜法。云用水銀十兩。石硫黃十兩。各以一錢熬之。良久。銀熱黃消。急傾入一罇。少緩。即不相入。仍急攪之。良久。成灰。銀不見。乃下伏龍肝末十兩。鹽末一兩。攪之。別以鹽末鋪罇底。一分入藥在上。又以鹽末蓋面。一分以瓦盆覆之。鹽土和泥塗縫。炭入煨一伏時。先文後武。開盆刷下。凡一轉後。分舊土爲四分。以一分和霜入鹽末二兩。如前法飛之。訖。又以土一分。鹽末二兩。和飛如前。凡四轉上盡。更用新土如此七轉。乃成霜用之。此法後人罕知。故附於此云。

用法 恒以和作丸散用。

性質 辛溫無毒。

效能 祛痰。消積。或用作驅蟲藥。

主治 下痰涎。消積滯。利水。與輕粉同功。

作用 有直接殺滅微菌之能。性甚強烈。可刺激患部之黏膜。使分泌腺增。若用時過久。反致局部結痂而腐蝕。

配合應用 ①治小兒急驚。搗搗盛粉霜二錢。白牽牛炒。輕粉

一〇四五

十靈 紋 納 純 紗 紙 素 索 缺 羔 殺 着 耕

一〇四六

各一錢爲末。每服一字。薄荷湯下。吐涎爲效。(全嬰方)

①治小兒暴瀉粉霜一字。小兒半錢。蓮花湯調下。冬月則用蓮肉。(保幼大全方)

②治風熱驚狂。神白丹。治傷寒積熱。及風生驚搐。或如狂病。諸藥不效。粉霜一兩。以白麵六錢。和作餅子。炙熟同研。輕粉半兩。磁白霜二錢半。爲末。滴水丸。梧子大。每服十九至十五丸。米飲下。(宣明方)

③治斑疹生臂。粉霜八分。硃砂一錢。爲末。水調少許。傾入耳內。(飛鴻集方)

④治腋下胡臭。粉霜。水銀等分。以面脂和塗之。(聖濟總錄方)

⑤治楊梅惡瘡。粉霜一味。搽之。(集簡方)

用釐 五分至一錢。

應用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏蕎麥稈。灰。硫黃。

參攷資料 ①以汞粉轉升成霜。故曰粉霜。抱朴子云。白雲粉霜也。以海齒爲質。蓋以土鼎勿洩精華。七日乃成。要足陽氣。勿爲陰侵。惟置藕地。丁河車。可以煉之。點化

在仙爲玄靈。在人爲精原。在丹爲木精。在造化爲白雪。在天爲甘露。(李時珍) ②粉霜。輕粉。亦能潔淨。府去膀胱中垢膩。既毒而損齒。宜少用之。(張元素)

【紋素尤】即秦尤之處方用名。詳『秦尤』條。

【紋銀】即銀箔之處方用名。詳『銀箔』條。

【納髓】古籍別名。納才。(醫經)

形態 納髓爲介類之一種。即髓之無裙。而頭足不縮者。其甲可供藥用。

性質 有小毒。

主治 傳尸勞。及女子經閉。

參攷資料 納髓肉有毒。食之令人昏塞。以黃耆。美藍。煎湯服之。立解。(蘇頌)

【純青蒿】即青蒿之處方用名。詳『青蒿』條。

【純鈎鈎】即鈎藤之處方用名。詳『鈎藤』條。

【純陽草】即金剛纂之古籍別名。典見丹房本草。詳『金剛纂』條。

【紗羊】即蜻蜓之古籍別名。典見

綱目。詳『蜻蜓』條。

【紗帽翅】形態 紗帽翅爲雜草類之一種。一莖間數十花。色黃。其葉可供藥用。

主治 癩疾。

【紙母】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【素火腿】即處算片之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『處算片』條。

【素心剛】即建蘭之別名。詳『建蘭』條。

【素芝】即白芝之古籍別名。典見綱目。詳『白芝』條。

【素奈】即蘋果色白者之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【素馨花】產地 以廣東南番爲最多。



素馨花

主治 解心氣鬱痛。下痢腹痛。

【素干】古籍別名 馬耳。(別錄)

基本 素干爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 易耳。

【索羅香】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【缺盆子】即覆盆子之古籍別名。典見爾雅。詳『覆盆子』條。

【缺盆草】即葶之古籍別名。典見綱目。詳『葶』條。

【羔羊肉】即幼羊之肉。其功用詳『羊肉』條。

【殺羊肉】即羊肉之處方用名。詳『羊肉』條。

【殺羊肉】即百里奚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『百里奚草』條。

【殺肉】即羊肉之古籍別名。典見綱目。詳『羊肉』條。

【香婆草】即曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【耕香】形態 耕香爲茅草類之一種。乃排草香之一類。其莖生細葉。可供藥用。

產地 出熱帶諸地。

性質 辛。溫。無毒。

主治 調中辟惡去臭。

【胭脂】即胭脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胭脂』條。

【耿子】即草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳『草烏頭』條。

【能消】即威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『威靈仙』條。

【能消草】即玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【能甍】(綱目) 古醫別名 三足甍。

產地 出吳興陽羨縣山池中。

形態 能甍爲介類甍屬之一種。形似甍而生三足。其肉可供藥用。

性質 大寒。有毒。

主治 折傷止痛。化血生滄。塗之。道家辟諸厭穢死氣。或畫像止之。

參攷資料 能甍食之殺人。

(蘇頌)按姚福庚已編云。太倉民家得三足甍。命婦亦食畢。入臥少頃。形化爲血水。止存髮耳。隣人疑其婦謀害。訟之官。時知縣黃廷宜鞫問不決。乃別取三足甍。令婦如前烹治。取死囚食之。入獄亦化。

如前人。遂辨其獄。竊謂能甍之有毒。不應如此。然理外之事。亦未可以臆斷也。而山海經云。從水多三足甍。食之無毒。近亦有人誤食而無恙者。何哉。蓋有毒害人。亦未必至於骨肉頓化也。(李時珍)

【脂麻】即胡麻之古籍別名。典見本草衍義。詳『胡麻』條。

【脂蛇】(綱目) 命名 本品體能脆斷。故名。

產地 出雲南、貴州、及崑崙山野間。

形態 脂蛇爲鱗類蛇屬之一種。長尺餘。圓如錢。嘴尖尾秀。背黑腹白。暗鱗點點。常伏莽草間。見人輒躍起數尺。跌爲十二段。人去復合爲一。兩端俱生頭。其色如白金。甚光亮。跌拾之。往往觸毒即斃。其肉可供藥用。

採取 置竹筒於其側。候其入筒中。急持之。方得完全。稍緩則碎。斷。或伺其斷時。錯取之。須各置異處。以免仍續成蛇。待風乾入煎用。

性質 有毒。

主治 熬膏搽瘡癰疽。及療風癩。

參攷資料 肥蛇治瘰癧。服以上用首。腰以下用尾。又治大麻風及痢疾。(綱目拾遺)

【肥蛇骨】 主治 醋磨固腫毒。

【臭牡丹】 形態 葉形與臭梧桐相同。但薄而糙。氣亦臭。五月開花成朵。一帶百花色粉紅。

主治 洗痔瘡。治耳。臭牡丹各一大握。搗爛。新汲水調服。瀉下黑水即愈。一切癰疽。臭牡丹枝葉。搗爛。罌之立消。

【臭牡丹葉】 功用詳『臭牡丹』條。

【臭芙蓉】 即臭梧桐之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『臭梧桐』條。

【臭花娘草】 即天名精草之別名。詳『天名精』條。

【臭屎茉莉頭】 產地 南海。採取 二三月。主治 理腳氣。

【臭柚】 即柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【臭草】 產地 出西域諸地。形態 臭草爲雜草類。

之一種。高尺許。開小黃花。結子成實。裂分四房。每房有子數粒。春秋二仲。皆可布種。或於春月折枝。插之。亦能活。不畏霜雪。又不喜肥。須澆以清水。則茂。若以手摻之。則臭氣拂拂。亦非穢汚腐臭之氣可比。其葉與花蕊可供藥用。

主治 瀉瀉及小便不通。解蛇蠍蜈蚣諸毒。生食或煮食。鼻衄。搗葉塞之。危急重病昏暈。醋蒸搗塞鼻孔。耳痛。搗汁置石榴皮內。煎過瀝之。目痛。置清水內。露二三夜。點之。功用與香草等。

參攷資料 臭草植樹下。能殺樹上蟲。植園中。能辟蛇蠍蜈蚣等諸毒。並治蠅蟲。以清油煎臭草葉。搗爛敷臍上。勝食使君子。遠矣。目力過勞。以臭草葉自然汁。加蜂蜜一滴。并略加小茴香。自然汁調和。點眼。久則光明。楊梅瘡。以自然汁略加好酒。并清水粉同煎治之。婦人心氣痛病。由於子宮上沖。用臭草葉。嗅之以愈爲度。大庚實上土。曾用此方。嘆其靈驗。小兒大便秘。出。以好酒煮臭草葉。搗爛。用布作膏貼之。(綱目拾遺)

【臭草】即靈實之古籍別名。典見
綱經本草。詳靈實條。

【臭梧桐】 古醫別名 秋葉。
採葉書。後庭花。學
圃餘疏。臭芙蓉。八角梧桐。綱
目拾遺。

產地 葦芳譜云。臭梧桐生南
海及雷州。近海之州郡亦有之。

形態 葦芳譜云。臭梧桐葉大
如手。作三花。尖長。青不彫。皮若梓
白而堅。剝可作繩。水入不爛。花細
白如丁香。而臭。味不甚美。遠觀可
也。人家園內多植之。皮堪入藥。採
取無時。敏按。臭梧桐有家野之別。
家生者。成樹而高大。野生者。木小
不成樹。不過三四尺。花色粉紅。赤
無大紅。純白者二種。俱可入藥。功
用亦相近。綱目拾遺云。臭梧桐生
人家。燻砌下甚多。一名芙蓉根。葉
深綠色。大畧後開花。紅而淡。似芙
蓉。外苞內蕊。花白五出。瓣尖蒂紅。
霜降後苞紅。中有實。作紫翠色。百
草鏡云。一名臭芙蓉。其葉圓尖。不
甚大。搯之氣臭。葉上有紅筋。夏開
花。外有紅苞。成簇。色白五瓣。結實
青圓如豆。十一月熟。藍色。花。葉皮

俱入藥。

主治 寬筋活血。化痞消癥。

配合應用 ①治獨脚楊梅瘡。

洗鷄掌風。一切瘡疥。煎湯洗汗斑。

溼火腿腫。久不愈者。同菴園子沒

酒服。并能治一切風濕。止痔腫。煎

酒服。貼臍疔。搗爛作餅。加桐油貼

神效。

②治半支風。取葉連根。掛於風

頭廊下。吹乾。將葉燒灰入瓶內。每

早服三錢。酒吞。百草鏡方。又用

臭梧桐葉。并梗。曬燥磨末。共二斤。

用白蜜一斤。為丸。早滾水下。晚酒

下。每服三錢。驗過神效。邱虎臣

驗方。

③治半邊頭痛。用川椒五錢。臭

梧桐葉二兩。先將桐葉炒黃。次入

椒再炒。以火酒灑在鍋內。拌和取

起。捲在絹內。紮在痛處。吃熱酒一

碗。取被蓋頭而睡。出汗即愈。

④治一切內外痔。用臭梧桐葉

七片。瓦松七枝。皮硝三錢。煎湯熏

洗。神效。急效方。

⑤治風氣頭風。集驗。凡頭風用

臭梧桐花。陰乾。燒灰存性。為末。每

服二錢。臨臥酒下。三服無不愈。

⑥止痛。用隔年臭梧桐花。煎湯

服即愈。必效方。

⑦消腫服煎。臭梧桐葉百片。煎

湯服三四次。救生苦海方。

⑧治內外一切乳毒。用臭梧桐

春夏取頭三個。秋冬取根。搗爛絞

汁。對陳酒熱服。取汗為度。神效。一

經驗廣集方。

⑨治挂心疝。臭梧桐葉。每歲用

一片。共歲若干。葉若干。清水洗葉

用無灰白酒煎服。華玉先試效

方。

⑩豬桐丸。此丸治男婦感受風

溼。或嗜飲冒風。內溼外邪。傳於四

肢。脈絡壅塞不舒。以致兩足輕痠

疼痛。不能步履。或兩手牽絆。不能

仰舉。凡辛勞之人。常患此症。狀似

風癱。服此丸立能全愈。用地梧桐

俗謂臭梧桐。不論花。葉。梗。子。曬乾

切碎。為末。一斤。豬鬃草炒。磨末。入

兩。二味和勻。蜜丸。如桐子大。早晚

以白滾湯送下。四錢。忌食豬肝。羊

血。番茹等物。或單用臭梧桐二兩

煎湯飲。以酒過之。連服十劑。其痛

即瘥。或煎湯洗手足亦可。濟世

養生集方。

參攷資料 周廷園云。臭梧桐。

一年三月十月兩次作花。若葉無

紅筋。搯之不臭者。疏。臭梧桐者。吳

地野生。花色淡。無植之者。淮揚間

成大樹。花微紅者。縉紳家植之中

庭。或云後庭花也。獨園中此花。鮮

紅異常。名百日紅。花作長鬚。亦與

吳地不同。園林中植之。灼灼出矮

牆上。至生深澗中。與清泉白石相

映。永嘉人謂之丁香花。

【臭葡萄】即臭藤之古籍別名。典

見汪氏藥錄。詳臭藤條。

【臭蒿】即黃花蒿之古籍別名。典

見綱目。詳黃花蒿條。

【臭榜皮】即榜榜白皮之處方用

名。詳榜榜白皮條。

【臭橋】即杓橋之古籍別名。典見

綱目。詳杓橋條。

【臭橙】即柚之古籍別名。典見食

性本草。詳柚條。

【臭蕪荑】即蕪荑之處方用名。詳

蕪荑條。

【臭蟲】即壁蝨之古籍別名。典見

綱目。詳壁蝨條。

【臭藤】 古醫別名 卻藤。綱

目拾遺。臭葡萄。汪

氏藥錄) 御節。(李氏草疏)

【形態】 臭藤爲蔓草類藤屬之一種。二月發苗。蔓生地上。葉對生。而氣臭。六七月開花粉紅色。結子似葡萄而氣亦臭。其根細小。二三年者。大如菜菔。可供藥用。

主治 腿脚諸風。寒溼痛拘攣。煎洗。腸癢。跌打損傷。流注風火。癩瘰癧毒。散鬱氣。理疝疾。合紫蘇煎湯洗。

【臭藤】 卽薺草之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『薺草』條。卽薺草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薺草』條。

【臭藤草】 卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【般若湯】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【慈可魚】 卽杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳『杜父魚』條。

【船虹】 產地 生川蜀諸地。形態 船虹爲雜草類之一種。其色黃。可供藥用。採取 立秋採之。性質 酸。無毒。主治 下氣止煩渴。可作浴湯。

十畫 臭 般 船 荖 荖 荖

藥。

【荖葱】 古籍別名 山葱。生沙地名水葱。(綱目)

外國名詞 Allium victorialis L. (拉丁) ギヤウシヤニニウ ヤマル センシヤウニンニク(日本)

基本 係百合科葱屬。爲荖葱之葉莖。

產地 山野平原。處處有之。

形態 荖葱爲葱類野生之一種。開白花。結子如小葱頭。莖葉可供藥用。

性質 辛。微溫。無毒。

主治 除瘴氣惡毒。久食強志益膽氣。

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新修本草論荖葱曰。主諸惡毒。狐尿刺毒。山溪中沙蟲。射工等毒。麥汁浸。或搗傳大效。

【荖葱】 卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【荖葱子】 性質 辛。微溫。無毒。主治 洩精。

【荖】 卽茶葉之原名。詳『茶葉』條。

【荖荷】 卽藎荷之日本名。詳『藎荷』條。

【荖支】 卽荖枝。詳『荖枝』條。

【荖支紅】 卽山牛膝之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山牛膝』條。

【荖奴】 卽龍眼之古籍別名。典見新修國經本草。詳『龍眼』條。

【荖枝】 原名 蔞枝。弱而帶牢不可摘。須以刀斧割取其枝。則與蔞同。故名。

處方用名 荖枝肉。

古籍別名 丹荔(綱目) 芮。大荔。山芝。天芝。火芝。丹芝。赤芝。金芝。火質。菌芝。桂芝。紫芝。紫靈。神芝。雷芝。離芝。甘液。獨生。朱柿。紅嫩。翻枝。櫻枝。瓊珠。殼皮。垣衣。福果。甜殼。荔。錦。十八娘。五德子。天垢子。玉晴子。甘露水。燕胎子。賴蛇珠。海山仙人。釘坐真人。蜂衣仙子。皺玉天漿。(和漢藥考)

外國名詞 Nephelium Lit-chi Camb. (拉丁)

基本 屬無患樹科荔枝之質。產地 陳仁山藥物生產辨云。荔枝核產廣東。以番禺。增城。東莞

爲多出。新安。惠州。汕尾亦有。

形態 荔枝爲高一丈五尺餘之常綠樹。葉爲羽狀複葉。頗爲滑澤。花似橘花。呈青白色。花後結實。色爲茶褐。形近球圓。狀酷似龍眼。外被有鱗形皺裂之殼皮。破之內部空虛。正中有核。稍附果肉。氣味俱類龍眼。



荔枝

採取 五六月間成熟時採之。用法 生食或者服。或生搗或煎用。

性質 甘。平。無毒。

效能 養血止煩渴。消腫發痘。瘡。用治瘰癧瘡及疔瘡惡腫藥。

主治 止渴。益人顏色。

歷代記載攷證 【唐】李珣海藥本草論荔枝曰。食之止煩渴。頭重。心燥。背膈勞悶。【唐】孟詵食療本草論荔枝曰。通神。益智。健氣。

【明】李時珍本草綱目論荔枝曰。治瘰癧瘡。赤腫疔腫。發小兒痘瘡。【明】程希聖本草經疏論荔枝

十 荔 荔

曰荔枝子。南方果也。本經雖云平。而其氣質溫也。鮮時味極甘美。多津液。故能止渴。甘溫益血。助榮氣。故能益人顏色也。多食令人發熱。或衄血齒痛者。以其生於炎方。熱於夏月。故性善助火發熱耳。【清】黃宮繡本草求真論荔枝曰。荔枝味甘而酸。氣溫故能入脾助氣。入肝益血養營。然於血虛火衰則宜。若使病非虛弱。及素火盛服之。反致助火發熱。而有衄血齒痛之病矣。痘瘡不起。用殼煎湯以服。蓋取殼性溫補內托之意。然要皆屬性燥。用當酌量所宜。非若龍眼性主溫和。而資益甚多也。出建產者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論荔枝曰。荔枝甘溫而香。通神益智。填精充液。辟臭止疼。滋心營。養肝血。果中上品。鮮者尤佳。以核小肉厚而純甜者勝。多食發熱。動血損齒。凡上焦有火者忌之。食之而醉者。即以其殼煎湯或蜜湯解之。

三箇。不用雙數。以狗糞中米淘淨為末。與糯米粥同研成膏。攤紙上貼之。留一孔出毒氣。【普濟方】用荔枝肉白梅各三箇。搗作餅子。貼於瘡上。根即出也。【濟生秘覽方】性。研末擦牙即止。乃治諸藥不效仙方也。【普濟方】用大荔枝一箇。別開。填鹽滿殼。煨研搽之即愈。【孫氏集效方】
② 呃逆不止。荔枝七箇。連皮核。燒存性為末。白湯調下立止。【楊拱馨方摘要】
用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛火旺者禁用。
參攷資料 ① 荔枝屬陽主散無形質之滯氣。故瘡贅赤腫者用之。苟不明此。雖用之無應。【朱震亨】② 多食不傷人。如少過度。飲蜜漿一盃便解也。【蘇頌】③ 荔枝氣味純陽。其性長熱。鮮者食多即脹腫口痛或衄血也。病齒腫及火病人尤忌之。開寶本草言其性平。蘇氏謂多食無傷。皆謬說也。按物類相感志云。食荔枝多則醉。以殼

浸水飲之即解。此即食物不消。還以本物消之之意。【李時珍】④ 司馬相如上林賦作離支。按白居易云。若離本枝。一日色變。三日味變。則離支之名。又或取此義也。【李時珍】⑤ 荔枝生嶺南及巴中。今閩之泉福漳州興化軍蜀之嘉蜀渝涪州。及二廣州郡皆有之。其品以閩中為第一。蜀州次之。嶺南為下。其本高二三丈。自徑尺至於合抱。類桂木冬青之屬。綠葉蓬蓬。然四時榮茂不彫。其木性至堅勁。土人取其根作阮成槽。及彈碁局。其花青白狀。若冠之蕊。其子喜雙實。狀如初生松毳。殼有皺紋。如雞初青。漸紅。肉色淡白如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。則子翁然俱赤。乃可食也。大樹下子至百斛。五六月盛熟時。彼方皆燕會。其下以賞之。極量取啖。雖多亦不傷人。少過則飲蜜漿便解。荔枝始傳於漢世。初惟出嶺南。後出蜀中。故左思蜀都賦云。旁挺龍目。側生荔枝。唐白居易闕序論之詳矣。今閩中四郡所出特奇。蔡襄譜其種類至三十餘品。肌肉甚厚。甘香瑩白。非廣蜀

之比也。福唐錢貢白曝荔枝。蜜煎荔枝。肉俱為上方珍果。白曝須嘉寶乃堪。其市貨者多用雜色荔枝。入鹽梅。曝成。皮色深紅。味亦少酸。殊失本真。經曝則可經歲。商販流布。遍及華夏。味猶不歇。百果之盛。皆不及此。又有焦核荔枝。核如雞舌。香味更甜美。或云是木生背陽。結實不完就者。又有綠色蠟色。皆其品之奇者。本上亦自難得。其蜀嶺荔枝。初生小酢。肉薄核大。不堪自曝。花及根亦入藥。【蘇頌】⑥ 顧微廣州記云。荔枝冬夏常青。其實大如雞卵。殼朱肉白。核黃黑色。似半熟蓮子。精者核如雞舌。香甘美。多汁。極益人也。【陳藏器】⑦ 荔枝炎方之果。性最長寒。易種而根淨。其木甚耐久。有經數百年猶結實者。其實生時肉白。乾時肉紅。日曬火烘。兩沒蜜煎。皆可致遠。成朵曬乾者。謂之荔枝。按白居易荔枝圖序云。荔枝生巴峽間。樹形團圓如帷蓋。葉如冬青。花如橘而春榮。實如丹而夏熟。采如蒲桃。核如枇杷。殼如紅綉。膜如紫綉。肉潔白如冰雪。漿液甘酸如醴酪。大略如彼。

其質過之。若酸木枝。一日而色變。二日而香變。三日而味變。四日而色香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出。早熟而肉薄。味甘酸。不及閩中下等者。閩中惟四郡有之。福州最多。興化最奇。泉漳次之。福州延亘原野。一家甚至萬株。與化上品。大徑寸餘。香氣清遠。色紫殼薄。厚膜紅。核如丁香。母剝之。如水精。食之如絳雪。荔枝以甘為味。雖百千樹。莫有同者。過甘與淡。皆失於中。若夫厚皮尖斜。肌理黃色。附核而赤。食之有渣。食已而澀。雖無酢味。亦自下等矣。最忌辟香。燭之花質盡落也。又洪邁夷堅志云。莆田荔枝名品。皆出天成。雖以其核種之。亦失本體。形狀百出。不可以理求也。沈括筆談。謂蕉核荔枝。乃土人去其大根。燻焦種成者。大不然也。(李時珍) 荔枝藥品。中今未見用。惟崔元亮方中收之。果實中為上品。多食亦令人發虛熱。此物喜變質。尤可愛。宋朝有蔡君謨荔枝譜。其說甚詳。唐杜牧詩云。一騎紅塵妃子笑。無人知是荔枝來。此是川蜀荔枝。亦可生置之。

十畫 荔

長安也。(寇宗奭) 所謂止渴者。亦陽虛而不能化陰。則津液不生。故能止之。猶止泄瀉。以白朮健胃生津也。若陽盛而渴者用之。則為倒施矣。(劉潛江)

【荔枝肉】即荔枝之處方用名。詳「荔枝」條。

【荔枝花及皮根】 主治 喉痺腫痛。用水煮汁。細細含嚥之。

【荔枝核】 基本 屬無患科。為荔枝之核。

形態 荔枝之核。橢圓而紫褐色。味甘。性溫。無毒。

效能 散寒滯結氣。消疝癰腫。專作疝痛藥。

主治 心痛。小腸氣痛。以一枚煨存性。研末。新酒調服。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論荔枝核曰。治疝疝氣痛。婦人血氣刺痛。【明】繆希雍本草經疏論荔枝核曰。核味甘溫。主心痛。小腸氣痛。疝疝。婦人血氣刺痛。以一枚煨存性。研末。酒調服。蓋其氣溫而通行。入肝腎。散滯氣。辟

寒邪。所以能療如上諸證也。【清】黃宮繡本草求真論荔枝核曰。荔枝核味甘氣溫。專入肝腎。散滯辟寒。雙核形似拳丸。尤治疝疝卵腫。以其形類相似。有感而通之義也。

配合應用 治疝疝痛不止。荔枝核煨為末。醋服二錢。數服即愈。(衛生易簡方)

治婦人血氣刺痛。用荔枝核。燒存性。半兩。香附子炒一兩。為末。每服二錢。鹽湯米飲任下。名獨痛散。(婦人良方)

治疝氣癰腫。荔枝核。炒黑色。大茴香炒。等分為末。每服一錢。溫酒下。(孫氏方) 玉環來笑丹。用荔枝核四十九箇。陳皮連白九錢。硫黃四錢。為末。鹽水打麵糊丸。綠豆大。過痛時。空心酒服九丸。良久再服。不過三服。其效如神。亦治諸氣痛。(皆效方)

治陰腎腫痛。荔枝核燒研酒服二錢。

治腎腫如斗。荔枝核。背橘皮。茴香等分。各炒研。酒服二錢。日三服用。錢半至三錢。

參攷資料 荔枝核入厥陰。行

散滯氣。其質變結而核背拳丸。故其治疝疝卵腫有效。類象形之義。(李時珍)

古醫別名 嫩皮葱。【荔枝草】 野裏青(綱目拾遺)

過冬青。天名精(經驗廣集) 鳳眼草。賴師草。隔冬青(草藥方)

形態 荔枝草為雜草類之一。種。冬盡發苗。經霜不枯。三月抽莖。高近尺許。開花細紫成穗。五月遂枯。莖方中空。葉尖長。面有麻點。邊有鋸齒。葉色深青。映日有光。背淡白色。有絲筋紋縱經。葉面麻點。凹凸分明。皆獨瓣。一叢數十葉。可供藥用。

性質 涼。無毒。

主治 涼血消癰腫。楊梅瘡。痔瘡。煎液咽味十八症。

配合應用 治急驚。荔枝草汁半錢。水飛過。珠砂半分。和勻服之立愈。

治小兒疳積。荔枝草汁入茶盃內。用不見水雞饅肝一個。將銀針鑽數孔。浸在汁內。汁浮於肝。放飯鍋上蒸熟。食之即愈。(集驗方)

治喉痛或生乳蛾。用荔枝草

搗爛。加米醋。絹包裹。縛筋頭上。點入喉中。數次愈。(救生苦海方)

②治壁單蛾。雪裏青一握。搗汁。中茶鍾。滾水沖服。有痰吐出。如無痰。將雞毛探吐。若口乾。以鹽湯醋湯止渴。切忌青菜。菜油。(集效方)

③治痔瘡。雪裏青汁。炒槐米。爲末。柿餅搗丸。如桐子大。每服三錢。雪裏青煎湯下。(活人書方)

④治白濁。雪裏青草。生白酒煎服。

⑤治無名腫毒。雪裏青一握。鮮者佳。加金剪刀同搗爛。入酒糟半鍾。共搗敷。不必留頭。輕者自散。重者雖出膿無效。(葉天士效方)

⑥治且盛。用過冬青。即荔枝草。又名天名精。五六枚。同鯽魚入鍋。煮熟。去草及魚。汁飲之。(經驗廣集方)

鳳眼草。即荔枝草。土人稱爲賴師草。醫家名隔冬青。涼血止崩漏。散一切癰毒。最效。(汪遠仕草藥方)

【荔枝殼】 主治 婦人血崩。燒研存性。空心酒服。小兒痘出無漿。煎湯飲。

參攷資料 荔枝殼功能理血。

透發分標。凡疹癩難透。及痘出模糊。非此不能解表成漿。

【荔枝奴】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【荔枝】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

塔草。四岳近陽草。四天王草。四補草。風車草。(土宿)過山龍。(補遺)牛芩。(綱目)地紅。地蘇。血藤。茹藤。過山紅。(和漢藥考)嘉草。西天王草。(土宿)真君本草)

外國名詞 Radix Rubiae.

(拉丁)

基本 屬茜草科。爲茜草之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茜草根產河南禹州。山西等處。秋季新。

形體 茜草爲多年生蔓草。或自生。或種植。春日自宿根抽莖。莖方中空。有刺。刺皆向下。葉形卵圓。或如心臟而長。邊緣有細刺。皆輪生。入秋梢頭。節間。俱簇生穗狀之花。大分許。色白。四瓣。果實形如球。色黑。類山椒子。其根形如圓柱。大若稍稈。或如羽莖。多帶殘莖。幹根有多數之節。外面色紅黃或紅褐。久置空氣中。則色變深。味稍甘。

乃變收斂性之苦味。有一種臭氣。嚼之則唾津染紅。

採取 二月三月間採之。尤須採取經過微寒。大之根爲佳。

製法 雷斅曰。凡使茜草。須用鋼刀於槐砧上。剉日乾。勿犯鉛鐵氣。勿用赤柳草根真相似。只是味酸澆。誤服令人患內障眼。遠服甘草水止之。即毒氣散。

性質 苦寒。無毒。

成分 茜根之主成分。爲阿里乍林(Alizarin, C₁₅H₁₀O₄)與勃兒富林(Purpurin, C₁₆H₁₀O₇)。阿里乍林與勃兒富林相合之糖原質。謂之魯培利台栗克酸(Ruberythric acid, C₂₈H₃₈O₁₁)。因受發酵作用而生阿里乍林。

效能 吐衄下血。祛瘀生新。用爲通經藥。又作利尿藥。用於心臟病。及爲發汗藥。用於風邪。

主治 寒濕風痺。黃疸補中。(本經)止血。內崩下血。膀胱不足。痿跌蟲毒。久服益精氣。輕身。可以染絳。又苗根主痺及熱中傷跌折。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

圖

根 草 茜

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

圖

性本草論茜草根曰。治六極傷。心
肺吐血。瀉血。宋大明諸家本草
論茜草根曰。止鼻洪。尿血。產後血
暈。月經不止。帶下。撲損瘀血。泄精
痔瘻。瘡癤。排膿。酒煎服。明李時
珍本草綱目論茜草根曰。通經脈。
治骨節風痛。活血行血。明繆希
雍本草經疏論茜草根曰。茜根味
苦寒。甄權云。甘。潔古微酸。鹹溫無
毒。蓋盡之矣。行血涼血之要藥。非
苦不足以洩熱。非甘不足以和血。
非鹹不足以入血。非溫少陽
之氣。不足以通行。故主瘰癧及疽。
瘰癧有五。此其爲治。蓋指蓄血發黃而
不專於溼熱者也。瘰者血病。行血
鞏堅。則瘰自愈。甘能益血而補中。
病去血和。補中可知矣。苦寒能下
洩熱氣。故止內崩。及下血除熱。故
益膀胱。踐跌則血瘀。血行則踐跌
自安。涼無病之血。行已傷之血。故
治蠱毒。藥性論味甘。主六極傷心
肺吐血瀉血。日華子味酸。止鼻洪
帶下。產後血暈。乳結。月經不止。腸
風痔瘻。排膿。治痔瘡。泄精尿血。撲
損瘀血。皆取其涼血行血。苦寒泄
熱之功耳。清黃宮補本草求真

十畫 茜

論茜草根曰。茜草味酸。鹹寒。色赤。
功用略有似於紫草。但紫草則止
入肝涼血。使血自爲通活。此則能
入肝與心。使血必爲走泄也。故
凡經閉風痺黃疸。因於瘀血內阻。
者服之。因能使瘀下行。如值吐崩
尿血。因於血滯。而見艱澀不快者。
服之。更能逐瘀血止。總皆除瘀去
血之品。與紫草血熱則涼之意。視
同而實異。不可混也。但血虛發熱
者。忌用。根可染絳。忌鐵。清陳修
園本草經疏論茜草根曰。氣味苦
寒者。得少陰之氣化也。風寒溼三
氣合而爲痺。而此能入手足少陰。
俾上下交通而旋轉。則痺自愈矣。
上下交通。則中土自和。斯有補中
之效矣。中土和。則溼熱之氣自化。
而黃疸自愈矣。又素問以蘆茹二
兩。烏劍骨四兩。丸以雀卵。飲以鮑
魚汁。治氣竭肝傷脫血。血枯經閉。
丈夫陰痿精傷。名曰四烏劍骨一
蘆茹丸。蘆茹卽茜草也。亦取其入
少陰以生血。補中宮以統血。汁可
染絳。以血而能行血。歟。後人以此
三味。入烏骨白絲毛雞腹內。以陳
酒煮便。煑燥乾爲丸。以百勞水

下五七十九。治婦人倒經。血溢於
上。男子咳嗽吐血。左手關脈弦。背
上畏寒。有瘀血者。清楊時泰本
草述鈞元論茜草根曰。茜根味甘
而微酸。鹹。色赤。氣溫。專於行血活
血。本經治寒溼風痺。固以其溫而
行之矣。乃亦以治黃疸者。蓋血挾
熱則毒內瘀而發黃。以寒涼行之。
不若以溫從治之。此義可通於血
證。凡滯血發熱者。其脈澀。外證必
象嗽水。及嘔惡痰涎。或兩脚厥冷。
或小腹結急。或唾血。或鼻衄。心煩
燥渴。皆其明驗。又熱毒瘀血。在小
便爲淋痛。在大便爲腸風。釋此則
茜根之療。唾血衄血及尿血瀉血。
非從治而導瘀之故歟。夫血以寒
泣。亦以熱熱。熱能使陰不守。致血
狂越而四溢。亦能瘀之使不循經。
而四溢。然則療血證者。可不知行
之活之。而徒守降火一法乎。甄氏
又言治六極傷心。肺吐血瀉血。夫
六極皆虛勞證。何以茜根亦治之。
親金匱以大黃蘆茹丸主乾血。則
知茜根之治六極所傷而爲吐血
瀉血者矣。夫血蓄於內。瘀則易治。
乾則難治。茜根非能治乾血也。特

有內傷者。卽能瘀血。不獨吐衄者
有之。且如女子血證。豈惟閉者爲
瘀。卽月經不止。或亦調養失節。內
傷元氣。致血墮隧道。不能歸經。而
錯出。是皆得以茜根行之者。不可
不知也。
國外學說 和漢藥考曰。西洋
茜草。亦多年生草本。從前南歐及
東歐。栽種甚多。莖高一二尺。葉爲
廣披針形。邊緣有細刺。六葉輪生。
花開於梢頭。與葉腋。爲黃綠色之
小花。攢簇如穗。果實爲漿果。然甚
小。荷開藥鏡曰。茜草以根入藥。又
爲紅色染料。性溫。味帶苦。有收澀
解凝。利尿之效。故能淨刷肝脾。腎
及子宮。而用於脾病。黃疸。水腫。諸
種腫病。爲一種疏解開達之良藥。
治肝脾腫。蓋諸症。以茜根水煎。或
爲泡劑服之。極驗。跌打損傷。及內
部創傷。用之。則散瘀血。止疼痛。俱
有速效。水煎。或葡萄酒。麥酒。浸服。
或燒酒。浸製。爲丁幾劑用。一脫。服
此根後。則小便及婦人之乳汁。俱
變紅色。終則骨亦變紅。以此用於
諸骨病。有奇效。或云。久服此藥。
則諸骨變軟。故於骨病有害。然

有人用於小兒佝僂病。試服此根四年。終奏殊效。誠經驗之良方也。方用茜根二錢。乾橙皮一分六釐。茴香搗碎二分半。右剉細。同入磁罐。以水六磅。煎至二磅。冷定。取上清。收貯玻璃瓶中。作一日之服量。名茜根煎。凡小兒諸骨。柔輭痿弱。難於舉動。或諸骨已切。屈者。祇須無他惡症。服此決能恢復。但此煎劑中。宜酌加綠蜜。令其適口。即乳母亦可服之。若別有大便秘結。或下利腹脹之患。則各加對症之藥。此劑苟非連服數月。必不見效。茜根於經閉為最有效之藥。而且性最平穩。不如他種通經藥有攻墮瀉之害。

近人學說 張山雷曰。茜根性寒。所主多血熱。失血之症。古今說解。都無異義。而本經主治。獨以寒溼二字為冠。最為不倫。雖各本無不盡同。然病情藥性。大相矛盾。此必古人傳寫之說。不可望文生義。曲為附和。風痺指血瘀血熱。焯著不行而言。茜草寒涼。又色赤入血。而能通瘀活絡。是以主之。古人論痺。本有熱痺一候。此必不可與上文寒溼。連屬讀之。而謂可治寒痺。溼痺也。黃疸本屬熱症。此則并能清熱逐瘀。總仲醇謂指蓄血發黃。而不專於溼熱。其說甚是。補中以清熱。言熱淫於裏。則中氣傷。惟去其熱。清其血。則中得其補。經文最簡。皆當觀其會通。並非泛泛言之。別錄止血。以血熱湧泄言之。一以清血中之熱。一以通瘀積之瘀。斯血循古道而不橫逆。崩中亦以龍雷大亢之時而言。如其所失太多。陽氣已餒。即非所宜。墜跌必有血瘀。瘀則蘊而生熱。故宜清熱行瘀。蠱毒皆南方熱淫之毒。清血熱者。必能解毒。陳藏器謂蘊荷與茜主蠱為最。惟膀胱不足一證。殊屬費解。姑且存而不論。以俟知者。又曰。瀕湖謂茜根赤色而氣溫。味微酸而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯。味酸入肝而鹹走血。專於行活血。血俗方治女子經水不通。以一兩煎酒服之甚效。

配合應用 治吐血衄血。諸血熱妄行。溢而上竅。茜草。地黃。麥門冬。當歸。身。阿膠。茅根。童便。治腸風下血。茜草。牛膝。地黃。黃香。地榆。芍藥。荊芥穗。佐地榆。治橫痃魚口有神。同藤蟲。乳香。沒藥。桂心。牛膝。地黃。主痿厥。治吐血不定。茜根一兩。搗末。每服二錢。水煎冷服。亦可水和二錢服。(周應簡要濟衆方) 治吐血。燥渴及解毒。用茜根。雄黑豆。去皮。甘草炙。等分為末。井水糊丸。彈子大。每服溫水化一丸。(聖濟總錄方) 治鼻血不止。茜根。艾葉各一兩。烏梅肉二錢。半為末。煉蜜丸。梧子大。每烏梅湯下五十九丸。(本事方) 治五旬行經。婦人五十後。經水不止者。作敗血論。用茜根一名。過山薑一兩。阿膠。側柏葉。炙黃芩。各五錢。生地黃一兩。小兒胎髮一枚。燒灰。分作六帖。每帖水一盞。半煎七分。入髮灰服之。(經驗方) 治心痺。心煩內熱。茜根。黃汁服。(傷寒類要方) 解中蠱毒。吐下血如猪肝。茜草根。製荷葉各三分。水四升。煮二升。服即愈。(陳延之小品方)

黑髮烏髮。茜草一斤。生地黃三斤。取汁。以水五大盤。煎茜草汁。持淨再煎三度。以汁同地黃汁。微火煎如膏。以瓶盛之。每日空心溫酒服半匙。一月髮髮如漆也。忌雞荀五辛。(聖濟總錄方) 治錢姑漏瘡。茜根。燒灰。千年石灰。等分為末。油調傅之。(儒門事親方) 治脫肛不收。茜根。石榴皮各一握。酒一盞。煎七分。溫服。(聖惠方) 預解瘡疹。時行瘡疹。正發。服此則可無患。茜根煎汁。入少酒飲之。(奇效良方) 用釵 錢半至二錢。配合宜忌 畏鼠姑汁。忌鐵。鉛。制雄黃。參攷資料 茜草主蠱毒。黃汁服。周禮庶民。掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草者。蘊荷與茜也。主蠱為最。(陳藏器) 俗人治痛風用草藥。取速效。如石絲為君。過山龍等佐之。皆熱性而燥。不能益陰。却能燥溼。病之淺者。溼痰得燥而開。癢血得熱而行。故亦暫效。若病深而

血少者。則愈規愈虛。而病愈深矣。
 (朱震亨) ① 苜蓿根赤色。而氣溫味
 酸。酸而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯
 味酸入肝。而鹹走血。手足厥陰血
 分之藥也。專於行活血。俗方治
 女子經水不通。以一兩煎酒服之。
 一日即通。甚效。名醫別錄。言其久
 服益精氣。輕身。日華子言其滋精
 殊不相合。恐未可憑。(李時珍) ②
 按陸佃云。許氏說文。苜蓿乃人血
 所化。則草鬼為苜。以此也。陶隱居
 本草言。東方有而少。不如西方多。
 則西草為苜。又以此也。陸機云。齊
 人謂之西。徐人謂之牛蓼。又草之
 盛者為苜。牽引為苜。覆為苜。則
 苜蓿之名。又取此義也。人血所
 化之說。恐亦俗傳耳。土宿真君本
 草云。四補草。其根苜蓿也。一名西
 天王草。一名四岳近陽草。一名錢
 塔草。風車兒草。(李時珍) ③ 苜蓿根
 生喬山山谷。二月三月採根。曝乾。
 又曰。苜蓿根生山陰谷中。莖延草木
 上。莖有刺。實如椒。(別錄) ④ 染絳
 草。葉似莖葉。頭尖下闊。莖葉俱滿
 四五葉對生。節間莖延草木上。根
 紫赤色。所在皆有。八月採。(韓保

十畫 苜蓿 苜蓿 莖 莖 莖 莖

昇) ⑤ 今國人亦作畦種。故史
 記云。千畝屈西。其人與千戶侯等
 言其利厚也。(蘇頌) ⑥ 苜蓿十二
 月生苗。莖延數尺。方莖中空。有筋
 外有細刺。數寸一節。每節五葉。葉
 如鳥藥葉而極澀。面青背綠。七八
 月開花。結實如小椒大。中有細子。
 (李時珍)

【苜蓿莖】 性質功用。詳「苜蓿根」
 條。

【苜蓿藤】 即苜蓿。詳「苜蓿根」
 條。

【苜蓿】 即天名精之古籍別名。典
 見爾雅。詳「天名精」條。

【苜蓿仁】 即大麻仁之古籍別名。
 典見本經。詳「大麻仁」條。

【莖子】 即覆盆子之古籍別名。典
 見爾雅。詳「覆盆子」條。

【莖】 即刺蒺藜之古籍別名。典見
 爾雅。詳「刺蒺藜」條。

【莖梧桐】 即鳥不宿之別名。詳「
 鳥不宿」條。

【莖】 即慈菇。詳「慈菇」條。

【莖】 即慈菇。詳「慈菇」條。

【莖】 即知母之古籍別名。典見
 和漢藥考。詳「知母」條。

【莖白】 原名 莖。
 命名 本名根交結而
 色白。故名。

古籍別名 莖草。(說文) 莖草。
 (綱目) 莖菜。(綱目) 莖筍。
 (日用) 莖菜。(綱目) 其苗有莖梗
 者。名莖蔞草。(綱目) 拾遺

外國名詞 Nisaria aquatica
 ⑧, ⑨ (拉丁) マユモ (日本)


基本 係禾本科莖屬。為莖之
 筍。其葉根米均詳見各條。

產地 生江湖池澤中。

形態 莖為水草類之多年生
 草本。高五六尺。春月生新芽如筍
 狀。即莖筍。亦即俗名莖白。生熟可
 啖。為蔬類植物之一種。其葉細長
 而尖。有平行脈。夏秋之間。梢上開
 花。花單性。列為圓錐花序。結實如
 米。可煮粥飯。其筍可供食與藥用。

性質 甘。冷。滑。無毒。

主治 利五臟。邪氣。酒。飲。面赤。



白 莖

白。煎。目赤。熱。毒。風。氣。卒。心。痛。
 可。鹽。醋。麥。食。之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
 本草拾遺論莖筍曰。去煩熱。止渴。
 除目黃。利大小便。止熱刺。雜鱗魚
 為羹食。開胃口。解酒毒。壓丹石毒
 發。

參攷資料 ① 莖筍寒滑。不可
 多食。(孟詵) ② 莖之種類皆極冷。
 不可過食。甚不益人。惟服金石人
 相宜耳。(蘇頌)

【莖米】 原名 莖米。
 命名 本品乃莖草之
 子實。故名。

古籍別名 莖蓬。(爾雅) 莖蓬。
 彭胡米。安胡。(綱目)

形態 莖米為六穀之一種。色
 白而滑膩。作飯香脆。可供藥用。

採取 霜後採之。

性質 甘。冷。無毒。

主治 止渴。

歷代記述攷證 【明】李時珍
 本草綱目論莖米曰。解煩熱。調腸
 胃。

【莖白根】 古籍別名 莖根。莖

十靈 芡 茯

性質 甘。大寒。無毒。
主治 腸胃痼熱。消渴。止小便利。搗汁飲之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論芡白根曰。燒灰和雞子白塗火燒瘡。

參攷資料 芡白根亦如蘆根。冷利更甚(蘇頌)

【芡把】

原名 菰手。
命名 本品為菰菜三年者。中心生白莖如藕狀。似兒臂。故有菰手之稱。即俗謂之芡把也。

古籍別名 菰首(蜀本草)烏鬱(拾遺)蓮藕(綱目)

性質 甘。冷。滑。無毒。
主治 心胸中浮熱。風氣。滋齒。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論芡把曰。煮食止渴。及小兒水痢。

參攷資料 芡把性滑。發冷氣。令人下焦寒。傷陽道。禁蜜食。發痲疾。服巴豆人不可食(孟詵)

【芡草】即芡白之古籍別名。典見說文。詳「芡白」條。

【芡蚤】即壁蝨。詳「壁蝨」條。

【芡荷】即芡白之古籍別名。典見

日用本草。詳「芡白」條。

【芡蟲】即壁蝨。詳「壁蝨」條。

【芡雞】即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【茯兔】即伏兔。詳「伏兔」條。

原名 伏兔。

【茯苓】

命名 本品乃松之神靈伏結而成。故名。俗作茯苓。乃傳寫之訛耳。

處方用名 白茯苓。白雲苓。白苓。浙茯苓。白苓塊。浙苓。雲茯苓。苓乳糕。雲苓。白苓糕。雲苓塊。白糕。製茯苓。

古籍別名 伏兔(本經)松腹。不死麪(記事珠)更生。雪腹。金翁。兔絲形絲。不死麪。萬岑精。絳農伏胎(和漢藥考)

外國名詞 Pachyma Cocos. (拉丁) Lycoperdon. (英)

基本 係生於截斷松樹根部下之一種茸類菌藥物。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茯苓以雲南產者為雲苓。最正地道。質結不能削片。產安徽者名安苓。選起最好者為排苓。又名天生苓。其次大棟苓。中棟苓。小棟苓。

之分。削片者俱用安徽苓。原樞來者名平片。餘碎作切片。原個到廣東削片名齊厚片。頂厚片。上厚片。中厚片。頂卷。齊頂卷。上卷。中卷。上散片。白茯苓之分。赤茯苓。單產日本。以橫濱為最。神戶次之。

形態 茯苓為大小不同之塊。大如兒頭。表皮極厚。擁腫如疣。乾則現黑褐色。而生細皺。內部為肉質粒狀。色白或淡紅。白者質堅實。名白茯苓。上品也。淡紅者質輕虛。名赤茯苓。品下矣。

採取 採收茯苓。自七月下旬。至來年三月止。山民用茯苓突。刺入截斷松樹近旁之土中。以探索茯苓。若覺有如芋塊之物。或出茯苓突嗅之。覺帶有茯苓之臭氣者。依之發掘。每得茯苓。百不失一。茯苓突者。乃比鐵火箸稍粗之鐵棒也。一端裝柄。作丁字式。茯苓掘出之後。先浸水中一宿。以小刀削去外皮。切成小片。陰乾。約六七日。包裝收貯。

製法 雷斅曰。凡使茯苓。用皮去心。搗細。於水盆中攪濁。浮者濾去之。此是茯苓赤筋。若難服。餌令

人。童子並黑睛點小。兼目盲。陶弘景曰。作丸散者。先煮一二沸。乃切曝乾。用。後人有用乳蒸者。性質 甘。平。無毒。

成分 未經細加試驗。但其主要成分。則為匹克型。

效能 益心脾。行水滲。用為利尿藥。以治水腫與淋病。又為強壯藥。用於衰弱者。

作用 與胃極無變化。由腸壁吸入血中。能增高血壓。使腎臟之分泌機能亢進。

主治 胸脇逆氣。憂恚驚邪。恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不饑延年(本經)止消渴。好睡。大腹淋瀝。腸中痰水。水腫淋結。開胸腑。調臟氣。伐腎邪。長陰。益氣力。保神氣(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茯苓曰。開胃。止嘔逆。善安心神。主肺痿痰壅。心腹脹滿。小兒驚癇。及女人熱淋。【宋】大明日華諸家本草論茯苓曰。補五勞。七傷。開心益志。止健忘。煖腰膝。安胎。

【金】甄元素珍珠囊論茯苓曰。止

渴。利小便。除溼益燥。和中益氣。利
腰。舒間血。【元】李東垣用藥法象
論茯苓曰。返水煖脾。生津導氣。平
火止泄。除虛熱。開陳理。【元】王好
古湯液本草論茯苓曰。瀉膀胱。益
脾胃。治腎積奔豚。【明】穆希雍本
草經疏論茯苓曰。茯苓生於古松
之下。味甘平。性則無毒。入手足少
陰。手太陽。足太陰。陽明經。胸脇逆
氣。邪在手少陰也。憂悲驚邪。皆心
氣不足也。恐悸者。腎志不足也。心
下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。
亦手少陰受邪也。甘能補中。淡而
利竅。補中則心脾實。利竅則邪熱
解。心脾實則憂悲驚邪自止。邪熱
解則心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口
焦舌乾自除。中焦受溼熱。則口發
渴。溼在脾。脾氣弱則好睡。大腹者
脾土虛不能利水。故腹脹大也。淋
溼者。脾受溼邪。則水道不利也。臨
中痰水水腫。皆緣脾虛所致。中焦
者。脾土之所治也。中焦不治。故見
斯病。利水實脾。則其證自退矣。開
胸膈。調臟氣。伐腎邪者。何莫非利
水除溼。解熱散結之功也。長陰益
氣力。保神守中。久服安魂養神。不

饒延年者。補心脾。伐腎邪。除溼利
竅之極功也。白者入氣分。赤者入
血分。補心益脾。白優於赤。通利小
腸。專除溼熱。赤亦勝白。【清】黃宮
繡本草求真論茯苓曰。茯苓色白
入肺。味甘入脾。味淡溼。故書皆
載上滲脾肺之溼。下伐肝腎之邪。
其氣先升後降。凡人病因水溼而
見氣逆煩滿。心下結痛。嘔逆嘔吐。
口苦舌乾。水腫淋結。憂悲驚恐。及
小便或澀或多者。服此皆能有效。
故入四君。則佐參朮以滲脾家之
溼。入六味。則使澤瀉以行腎邪之
餘。最為利水除溼要藥。書曰。健脾
即水去。而脾自健之謂也。又曰。定
魄即水去。而魄自安之意也。且水
既去。則小便自開。安有癃閉之慮
乎。水去。則內溼已消。安有小便多
見之謂乎。故水去。則胸膈自寬。而
結痛煩滿不作。水去。則津液自生。
而口苦舌乾悉去。惟水衰精滑。小
便不禁。非由水溼致者切恐。恐其
走表洩氣故耳。若有赤白之分。赤
入小腸。白入膀胱。白微有補。赤則
止瀉溼熱。一氣一血。自不容混。如
此。至皮專治水腫膚脹。以皮行皮

之義。以大塊堅白者良。【清】賈九
如辨藥指南論茯苓曰。茯苓。字
世俗說傳。史記及仙經。皆名茯苓。
假松之真液而生。受松之靈氣而
結。東坤陰最厚。味獨甘淡。甘則能
補。淡則能滲。甘淡屬土。用補脾陰。
土旺生金。兼益肺氣。主治脾胃不
和。泄瀉腹脹。胸脇逆氣。憂思煩滿。
胎氣不安。魂驚跳。腸間痰氣。蓋
甘補則脾臟受益。中氣既和。則津
液自生。口焦舌乾。煩渴亦解。又治
下部溼熱。淋瀝水腫。便溺黃赤。腰
膝不利。停蓄邪水。蓋淡滲則膀胱
得養。腎氣既旺。則腰膝間血自利。
津道流行。益肺於上源。補脾於中
部。令脾肺之氣。從上順下。通調水
道。以輸膀胱。故小便多而能止。澀
而能利。惟瘡瘡起。服時禁用。恐滲
泄不能貫漿。其赤茯苓。淡赤微黃。
但不堪入肺。若助脾行痰。與白者
功同。因松種不一。故分赤白。原無
白補赤瀉之分。

辨偽 ●鄭肯岩曰。茯苓當取
整個切片。照之微有筋膜者真。切
之其片自捲。以結白為上。近來有
一種鑄片。多以米粉和苔末假造
混充。聞又有以米粉包裹松根造
成整個者。亦宜細辨。曹炳章曰。
按寇宗奭曰。茯苓生於多年大松
之根。乃松之精氣盛而抑鬱。發泄
於外。結為茯苓。故不抱根。離其本
體有零之義也。精氣不盛。止能附
結本根。既不離本。故曰茯神。淮南
子云。千年之松。下有茯苓。上有菟
絲。寇宗奭曰。上有菟絲之說。甚為
可信。李時珍曰。下有茯苓。上有靈
氣如絲之狀。土人亦時見之。非菟
絲也。與術云。松脂入地。千年為茯
苓。望松樹赤者。下有茯苓。此皆冒
天然野生之茯苓。其生長在十年
或數百年不等。得松之精氣足。其
皮黑糊。其肉堅緻結白。不論何地
產。皆為佳品。惟雲南產。天然生者
為多。亦皮薄起細紋。肉帶玉色。體
樞實重為最佳。惜乎出貨不多。其
他產臨安六安於潛者。種者為多。
其法用本地天麻鮮茯苓搗碎如
泥。種於肥土山葉茂松根上。先將
松根傍離根二尺餘。掘去泥土。至
見松根。將茯苓層每株約一兩。以
竹箬裹附松之支根上。閉半年。施
肥料一次。至三年起掘。則成二三

十畫 茯

斤重量之茯苓。然其生結不在原種根上。隨氣息止而結。往往有種於西杖根而結。若在東杖根。則有種而不結者。且松根下結。若而葉必萎黃。或發紅色。此即松之精氣收聚凝結為苓也。故土人望而即知其謂有苓。種苓外皮鬆淨而厚。內肉鬆而不堅。結色白無神。即種苓也。為次。凡茯苓有筋者去之。雷斅云。茯苓有赤筋者。誤服令人目中有星。多服致目盲。服茯苓者注意之。

配合應用 ①白茯苓。得煉蜜。胡麻仁。何之。可以辟穀。延年。不饑。②入五苓散。利水除溼。氣勝。則去桂。

③得人參、白朮、橘皮、山藥、菴豆、芍藥、甘草。為補脾胃之上藥。④得二朮、澤瀉、車前、白芍藥、橘皮、木瓜、豬苓。為消水腫之要劑。⑤入六味地黃丸。能伐腎邪。⑥入補心丹。則補心安魂養神。⑦治血虛心汗。別處無汗。獨心孔有汗。思慮多則汗亦多。宜養心血。以艾湯調茯苓末服一錢。(證治要訣方)

①治心虛夢洩。或白濁。白茯苓末二錢。米湯調下。日二服。東坡方也。(直指方)

②治妊娠水腫。小便不利。惡寒。赤茯苓去皮。炙子各半兩。為末。每服二錢。新汲水下。(禹謩師方)

③治卒然耳聾。黃蠟不拘多少。和茯苓末細嚼。茶湯下。(普濟方)

④治血餘怪證。十指節斷壞。惟有筋連。無節肉。蟲出如燈心。長數寸。遍身綠毛。卷名曰血餘。以茯苓、胡黃連煎湯飲之。愈。(夏子益奇疾方)

⑤治水腫尿澀。茯苓皮、椒目等分。煎湯日飲。取效。(普濟方)

⑥治胸膈氣逆。脹滿。茯苓一兩。人參半兩。每服三錢。水煎服。日三。(聖濟總錄方)

⑦治小便頻多。白茯苓去皮。乾山藥去皮。以白礬水淪過。焙等分。為末。每米飲服二錢。(儒門事親方)

⑧治下虛消渴。土盛下虛。心火炎熾。腎水枯涸。不能交濟而成渴。白茯苓一斤。黃連一斤。為末。蒸天花粉作糊丸。梧桐子大。每溫湯

下五十丸。(德生堂經驗方)

⑨治下部諸疾。龍液膏。用堅實白茯苓。去皮焙研。取清溪流水。浸去筋膜。復焙。入瓷罐內。以好蜜和勻。入銅釜內。重湯蒸。柴灰煮一日。取出收之。每空心白湯下二三匙。解煩鬱躁渴。一切下部疾皆可除。(積善堂方)

⑩治痰涎泄滑。痢不止。白茯苓一兩。木香煨半兩。為末。紫蘇木瓜湯下二錢。即止。(百一選方)

⑪治面黥雀斑。白茯苓末。蜜和。夜夜傳之。二七日愈。(桃僧垣集驗方)

⑫治猪雞骨哽。五月五日。取猪子曬乾。白茯苓等分為末。每服二錢。乳香湯下。一方不用猪子。以所哽骨煎湯下。(經驗良方)

⑬治漏痔神方。赤白茯苓。去皮。沒藥各二兩。破故紙四兩。石白搗成一塊。春秋酒浸三日。夏二日。冬五日。取出。木籠蒸熟。曬乾。為末。酒糊丸。梧桐子大。每酒服二十九丸。漸加至五十丸。(華炳集驗方)

用益 三錢至四錢。

施用宜忌 凡陰虛而無溼熱

者禁用。惡白飯。畏牡蠣。地榆。雄黃。秦朮。鼈甲。忌米醋及酸物。馬問為之使。得甘草。防風。芍藥。紫石英。麥門冬。共療五臟。

著名方劑 ①朱雀丸。治心神不定。恍惚健忘。心火不降。腎水不升。時復振跳等症。(百一選方) 茯苓二兩(去皮) 沉香半兩 上共研末 煉蜜丸 小豆大 每服三十丸 食後人參湯下 ②威喜丸。治丈夫元陽虛。精氣不固。小便下濁。淋瀝常滿。夢寐多驚。頻頻遺泄。婦女白淫。白帶。並主之。(局方) 白茯苓四兩(去皮作臣) 豬苓四錢半(入內煮二十餘沸。取出日乾。去豬苓為末) 上藥以黃蠟搜和丸。彈子大。每嚼一丸。空心津下。以小便清為度。忌米醋。③茯苓丸。治心腎俱虛。神志不守。小便淋瀝。或夢遺白濁。(三因方) 白茯苓。赤茯苓。各等分。上藥為末。新汲水飛去沫。挖乾。以地黃汁同搗。酒熬作膏。和丸。彈子大。空心鹽湯嚼下一丸。④茯苓丸。治夢遺滑精。赤白便濁。以及強中消渴。(局方) 茯苓。石蓮子。各三兩。菟絲子。十兩。(酒浸) 五味子。八

兩上共研末。以山藥六兩。酒煮糊丸。漏精發湯下。赤濁燈心湯下。白濁茯苓湯下。消渴米飲下。

參攷資料 ①茯苓白色者補赤色者利。俗用甚多。仙方服食亦為至要。云其通神而致。和魂而鍊魄。利竅而益肌。厚腸而開心。調營而理衛。上品仙藥也。善能斷穀不飢。(陶弘景) ②茯苓赤白補。上古無此說。氣味俱薄。性浮而升。共用有五。利小便也。開腠理也。生津液也。除虛熱也。止瀉也。如小便利或數者。多服則損人目。汗多人服之。亦損元氣。天人為其淡而滲也。(張元素) ③小便多能止之。小便瀉能利之。與車前子相似。雖利小便而不走氣。酒浸與光明朱砂同用。能秘童元。味甘而平。如何是利小便耶。(王好古) ④茯苓茯神生大。山山谷大松下。二月八月採陰乾。(別錄) ⑤今出靈州。大者如三四升器。外皮黑而細皺。內堅白。形如鳥獸。龜鱉者良。虛赤者不佳。性無朽蛀。埋地中三十年。猶色理無異也。(陶弘景) ⑥今泰山亦有茯苓實。而理小不復採用。第一出

十 靈 茯

華山。形極粗大。雍州南山亦有。不如華山。(蘇恭) ⑦所在大松處皆有。惟華山最多。生枯松樹下。形塊無定。以似龜鳥形者為佳。(韓保昇) ⑧范子計然言。茯苓出嵩山及三輔。淮南子言千年之松。下有茯苓。上有兔絲。典術言松脂入地千歲為茯苓。望松樹赤者有之。廣志言茯苓乃松汁所作。勝於茯苓者。云即茯苓貫着松根者。生朱提漢陽縣。(羣芳錄) ⑨今大華嵩山皆有之。出大松下。附根而生。無苗葉花實。作塊如拳。在土底。大者至數斤。有赤白二種。或云松脂變成。或云假松氣而生。今東人見山中古松。欠為人斬伐。其枯折椹枿枝葉不復上生者。謂之茯苓。擗即於四面丈餘地內。以鐵頭錐刺地。如有茯苓。則錐固不可拔。乃掘取之。其撥大者。茯苓亦大。皆自作塊。不附着根。其包根面輕虛者為茯神。則假氣生者。其說勝矣。龜策傳云。茯苓在兔絲之下。狀如飛鳥之形。新雨已霽。天晴無風。以火夜燒兔絲去之。即籌燭此地。單之火滅。即記其處。明乃掘取。入地四尺或七

尺得矣。此類今不聞有之。(蘇頌) ⑩下有茯苓。則上有靈氣如絲之狀。山人亦時見之。非兔絲子之兔絲也。注淮南子者。以兔絲子及女羅為說誤矣。茯苓有大如斗者。有堅如石者。絕勝。其輕虛者不佳。蓋年淺未堅故爾。劉宋王微茯苓贊云。皓蒼下居。形絲上膏。中狀雞臆。其容龜蔡。神侔少司。保延幼艾。終志不移。柔紅可佩。觀此形絲。即兔絲之證矣。寇氏未解此義。(李時珍) ⑪茯苓乃松之精汁。流注於根而生。是則天之陽。以下返其宅者也。下有茯苓。其松嶺上有茯苓苗。名威喜芝。茯苓在土中。氣自能上應於苗。得松之精。則有木性。能疏土也。凝土之質。味淡色白。功主滲利。能行水也。其氣不相連接。自上應於苗。故能化氣上行而益氣。(唐容川) ⑫有謂茯苓善滲。凡下元不足者忌之。非也。夫茯苓為古松精華。凝結而成。入地最久。得氣最厚。其質重。其氣清。其味淡。重能培土。清能益金。淡能利水。惟其得土氣之厚。故能調三部之虛。虛熱虛火。脾虛痰溼。凡涉虛者皆宜之。

以其中和粹美。非他迅利剋伐者比也。又能為諸陰藥之佐而去其滯。為諸陽藥之使而宜其道。補不滯。瀉不峻。利精純之品。無以過之。乃治虛勞者。久已與澤瀉同聚。殊為良藥。惜矣。(理虛元鑑) ⑬茯苓一味。為治痰主藥。痰之本水也。茯苓可以行水。痰之動溼也。茯苓又可行溼。(世補齋) ⑭松之餘氣為茯苓。楓之餘氣為猪苓。竹之餘氣為雷丸。亦名竹苓。猪苓在本經為中品。雷丸在下品。茯苓在上品。方藥用之。獨多。以其得松之精英。久服可以安魂養神。不飢延年也。又有一種橘苓。生於橘樹。其形如粟。可治乳癰。見趙恕本草綱目拾遺。(冷廬醫話)

【茯苓皮】 外國名詞 Selenia sinensis (拉丁)

(Osten) (英) 主治 水腫。腹脹。利水道。開腠理。

參攷資料 茯苓皮行水而不耗氣。功勝大腹皮。其用法。去心搗末。漉過用。浮濁者為赤筋。能傷目。(醫學辭典)

【茯苓粉粥】

基本 本品以茯苓粉和米煮成之粥。

主治 清上實下。

【茯苓酒】

製法 用茯苓粉和麴米釀酒飲。

主治 頭風虛眩暖腰膝。療五勞七傷。

【茯神】

命名 本品由松根之津氣不盛。止能附結本根。不能發達於外。結為茯苓。既不離本。遂抱根而生者。故曰茯神。

處方用名 辰茯神。抱木茯神。殊茯神。雲茯神。茯神塊。茯神糕。

基本 屬芝栢科。為松根地下所結之菌塊。

形態 茯神為木類菌類之一種。與茯苓同生於松根。但茯苓滋結於根外。而茯神則抱根而生。無苗葉莖花。形大如拳。肉白質鬆。採取 二月八月採之陰乾。製法 凡使去木。先以茯神去皮。到細入羅篩內。置水盆中。薄篩去筋膜。澄清。取水底細末曬乾。復以人乳拌蒸三四次。或五六次更佳。每一兩蒸作二兩。

性質 甘平。無毒。效能 安神魄。養精。治驚悸失眠。用作鎮靜藥。

主治 辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多悲怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茯神曰。補虛乏。主心下急痛。墜滿。人虛而小腸不利者。加而用之。【明】繆希雍本草經疏論茯神曰。茯神抱木心而生。以此別於茯苓。別錄謂茯神平。總之其氣味與性應是茯苓一體。茯苓入脾胃之用多。茯神入心之用多。故主辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多悲怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。藥性論又云。茯神君味甘無毒。主驚癇。安神定志。補勞乏。主心下急痛。墜滿。人虛而小腸不利。加而用之。其心名黃松節。治偏風。口面喎斜。毒風筋攣。不語。心神驚擊。虛而健忘。其所主與茯苓大同小異耳。【清】黃宮繡本草求真論茯神曰。茯神功與茯苓無異。但神抱心以生。苓則不從心抱。故苓則能入脾與腎。而神則多入心耳。

書曰。服此開心益智。安魂定魄。無非入心導其痰滯。故能使心與腎交通之謂耳。心木書名黃松節。味苦性溫。能治諸筋攣。偏風喎斜。心制健忘。是入血滲淫之意。取苓有心者是。去皮及中木用。【清】張隱菴本草崇原論茯神曰。離松根而生者為茯苓。抱松根而生者為茯神。總以茯苓為勝。茯苓皮。茯神木。後人收用。各有主治。然皆栢柏之藥。並無精華之氣。不足為重也。

【清】賈九如辨藥指南論茯神曰。茯神生於枯松根下。因無枝葉上升。津氣向下。抱根附結。得松之神氣而成。不離於本。有依守之義。故名茯神。特取此鎮伏心神。能中守而不移。以其體沉重。重可去怯。其性溫補。補可去弱。賦人曰。心本熱。虛則寒。如心氣虛怯。神不守舍。驚悸怔忡。魂魄恍惚。勞怯健忘。俱宜溫養心神。非此不能也。

茯苓乃得松之氣。自作塊而大。不附着根。其包根而背虛者。茯神也。其餘鑑別法。詳前茯苓條下。

配合應用 養心安神。朱雀丸。治心神不定。恍惚健忘。不樂。火不下降。水不上升。時復振跳。常服消陰養火。全心氣。用茯神二兩。去皮沉香半兩。為末。煉蜜丸。小豆大。每服三十丸。食後人參湯下。(百一選方)

用量 三錢至四錢。著名方劑 茯神丸。治心腹風虛。驚悸心忪。健忘等症。(準繩方) 茯神(去木)人參(去蘆)麥冬(去心)熟地黃。黃芩。苡仁。梧子。仁厚。角屑。各一兩。龍齒。饅母。粉。各兩半。防風(去蘆)黃耆。各七錢。中。上藥共研細末。令勻。煉蜜和丸。梧子大。每服二十丸。不拘時溫粥飲送下。參攷資料 ①仙方止云。茯苓而無茯神。治療既同。用應無嫌。(陶弘景) ②神農本草止言茯苓。名醫別錄始添茯神。而主治皆同。後人治心病。必用茯神。故潔古張氏於風眩心虛。非茯神不能除。然茯苓未嘗不治心病也。(李時珍)

肝風內煽。發厥。不省人事者。余每重用茯神木治之。無不神效。蓋此症雖屬肝。而內煽則必上薄於心。心君爲之不寧。故致發厥。茯神本治心。而中抱之木。又屬肝。以木制木。木平則風定。風定則心寧。而厥自止也。(沈金整)

【茯神木】 命名 本品即茯神。心內木。故名。

原名 黃松節。

主治 偏風口面喎斜。毒風筋掣不語。心神驚悸。虛而健忘。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茯神木曰。治脚氣痺痛。諸筋牽縮。

【茯神塊】 即茯神切成塊之處方用名。詳「茯神」條。

【茯神糕】 即茯神製成之糕。詳「茯神」條。

【茯蘊】 即茯苓之本名。詳「茯苓」條。

【茯苓】 即積苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「積苓」條。

【茯苓粥】 基本 本品即以茯苓和米煮成之粥。

主治 治心腹疼痛。

【苳芒】 原名 苳芒決明。外國名詞 Lathyrus Davidii Hoo. (拉丁) イタチサ

サゲ エンドウサウ(日本) 基本 係豆科山蠶豆屬。爲苳芒之子實。

產地 山野道旁間。

形態 苳芒爲蔓草類之莖生。草本由卷鬚而上。葉爲羽狀複葉。小葉卵形。其數在二對以上。有托葉甚顯著。蝶形花冠。呈黃色。果實細長。與豌豆之莢相似。其子扁而色褐。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 調中除痰。止渴。令人不睡。

參攷資料 苳芒莖葉味甘而滑。可作酒麴。嫩時採以爲蔬。及點茶食。均甚香美。(醫學辭典)

【苳芒決明】 即苳芒之原名。詳「苳芒」條。

【苳芒】 即防風之古籍別名。典見吳普本草。詳「防風」條。

【苳香】 即大苳香。其子實莖葉。詳「大苳香」條。

【苳香八角珠】 即莽草之別名。詳「莽草」條。

【莽草】 條。

【苳香酒】 製法 用苳香浸酒。飲。卽卽尤妙。

主治 卒然腎氣痛。舉丸偏墜。牽連心腹痛。

【苳香粥】 基本 本品係苳香和米煮成之粥。

主治 和胃治疝。

【苳香蟲】 命名 本品係生於苳香枝葉中之蟲。故名。

形態 苳香蟲爲卵生蟲類之一種。狀如尺蠖。青色。可供藥用。

主治 小腸疝氣。

【苳草】 即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防風」條。

【苳芋】 (別錄) 苳芋。衛與。卑山竹。(和漢藥考)

基本 屬繖形科苳芋之莖莖。產地 凡深山幽谷之陰地間。恒有生焉。

形態 苳芋爲多年自生草本。莖高一二尺。或三四尺。春生苗葉。葉酷似檉葉。夏月開圓錐花。呈綠色。秋季結紅色肉。果味辛苦。有

芳香。

採取 三四月間採莖莖用。

製法 凡使莖莖陰乾。失用。

性質 苦溫有毒。

成分 含有苳芋精 Myrmanalshikmin C₁₅H₂₅N₃O₂ 毒質。

效能 祛風濕。療痺痛。用作治風藥。又治振顫。麻痺。痛風。

作用 入胃後略能刺激腺液。神經。使腺分泌增多。出幽門而至十二指腸及小腸內。次第被吸收。而入血。由末梢神經被刺激而傳達於大腦。大腦亦被激而麻醉。同時血液之循環。與細胞之新陳代謝。亦遲滯而緩慢。

主治 五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦如瘵狀。發作有時。諸關節風溼痺痛。(本經) 疾久風溼。走四肢神弱。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論苳芋曰。治男子女人脚脚痺風。拘急。攣痛。【宋】大明諸家本草論苳芋曰。一切冷風。筋骨怯弱。羸弱。入藥炙用。【清】黃宮繡本草求真論苳芋曰。苳芋本屬毒物。味辛而苦。氣溫有毒。據書所述。治

十畫 茯 苳 苳 苳

症。多是風溼爲用。如治風癩。則有茵芋丸。治風痺。則有茵芋酒。治產後風。則有茵芋膏。凡風溼痺症。多用茵芋。與石南蕒草。同爲一類。若云能療虛羸寒熱。悉莫及耳。出彭城海鹽。莖赤。葉如石榴而短厚者佳。取根葉陰乾炙用。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。茵芋係生於深山幽陰處之山木。高一二尺。更高者其本皆倒掛。祇末直立。今種樹家多栽之。高四五寸者。亦能開花結實。葉兩對。形似 *Yucca mollis* (日名) 葉厚而帶赤。經冬不凋。正二月枝頭著花。成穗二寸許。花大三分。五瓣。白色。萼稍帶褐色。後結圓實。熟作赤色。大如南天燭子。有一種綠萼者。蒂亦綠色。又大和本草曰。茵芋有毒。煎注菜蔬殺蟲。又本田重次郎氏從茵芋葉及各部分。發見一種植物鹽基。名茵芋精。加以化學的及藥物學的研究。知本品爲極微弱鹽基。雖能與磷酸共結成結晶性鹽。但一加。水。則仍返爲分離鹽基。其化學的集成爲 $C_{12}H_{19}NO_6$ 。對於筋之作用甚爲顯著。蛙筋接

觸其毒。卽陷於強直狀態。盡失運動能力。卽在 *Tobacco* 之稀薄液。此作用仍顯明現出。若比較筋對於本品之感受性。則赤蛙筋較金線蛙筋爲易。本品又能使反射興奮性亢進。惟此現象。在赤蛙不可得見。此外本品對於心臟之作用。亦頗顯著。試之於蛙。其心臟卽漸次衰弱。終至筋呈麻痺狀而靜止。於其他動物行大量靜脈內注射。輒致痙攣而斃。此時之直接死因。亦爲心臟麻痺。若僅用中等量。則對於心臟之作用小而且暫。祇使血壓沉降而已。今就其微弱鹽基對於筋之作用。亢進反射興奮性作用等以觀。則本品似甚類咖啡精。惟咖啡精之特殊作用。影響筋之動作。及尿之分泌作用。在本品則無。故終不能歸入咖啡精類也。

配合應用 ①茵芋酒。治賊風手足枯痺拘攣。用茵芋。附子。天雄。烏頭。秦艽。女萎。防風。防己。石南葉。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味。切以絹袋盛。清酒一斗。漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痺爲度。方出胡治居士百病方(圖經方) ②茵芋丸。治風氣積滯成脚氣。發則痛者。茵芋。葉妙。蘇以仁。各半兩。郁李仁一兩。牽牛子三兩。生研末。牛兩。上爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服二十九。五更遶環湯下。取利未利再服。取快。(本事方) ③治產後中風。茵芋五兩。木防已半斤。苦酒九升。漬一宿。猪脂四斤。煎三上三下。膏成。每服熱摩干遍。(千金方) 用量 三分至八分。 應用宜忌 凡陰虛而無風溼實邪者禁用。 參攷資料 ④千金外臺諸古方。治風癩有茵芋丸。治風痺有茵芋酒。治婦人產後中風有茵芋膏。風溼諸方多用之。茵芋。石南。蕒草。皆古人治風妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。(李時珍) ⑤茵芋生太山川谷三月三日採葉陰乾。(別錄) ⑥好者出彭城。今近道亦有莖葉狀似蕒草而細軟。連細莖採之。方用甚稀。惟合療風酒。(陶弘景) ⑦今雍州。絳州。華州。杭州。亦有之。春生苗。高三四尺。莖赤。葉

似石榴而短厚。又似石南葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月採莖葉日乾。(蘇頌) 【茵草】卽蕒草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕒草」條。 【茵陳】卽茵陳蒿之簡稱。詳「茵陳蒿」條。 【茵陳草】卽茵陳蒿之處方用名。詳「茵陳蒿」條。

【茵陳酒】 基本 本品係以茵陳釀成之酒。 製法 用茵陳蒿一斤。秫米一石。麴三斤。如常釀之。 主治 風痰。筋骨變急。

【茵陳蒿】 原名 山茵陳。 命名 本品雖屬蕒類。經冬不死。至春因舊苗枯。則由陳莖而再生。故名因陳。形似蓬蒿。後加諸字耳。

處方用名 綿茵陳。茵陳草。 古籍別名 因塵(張揖廣雅) 自註(圖經本草) 著蕒。家茵陳。(大明本草) 石茵陳。(和漢藥考) 外國名詞 *Herba Artemisino Copillaris Herb. Artem. Cap. (拉一)*

基本 屬菊科茵陳蒿之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

茵陳蒿產江西吉安府為最。名曰

土茵陳。產廣西柳州者氣味亦同。

有一種名綿茵陳。以產湖北省黃

州府。漢陽府兩屬毗連數縣所產

為佳。安徽亦有出。形狀披散。名為

鷄絲。不悅俗眼。春季出新。

形態 茵陳蒿為生於山野或

河岸沙礫之多年生草。春季叢生。

先密生白毛葉。類似胡蘿蔔葉。繼

拍莖二三尺。互生銀鼠色細葉。愈

上而愈細。作絲狀。夏秋之間。於梢

葉間。點綴白色穗狀小花。結實如

芥子。色褐黃。

種類 ① 山生者曰山茵陳。②

野生者曰野茵陳。③ 採集其細莖

葉者曰綿茵陳。

採取 每年五月間及立秋節。

採其莖葉陰乾。

製法 雷斅曰。凡使須用藥有

八角者。陰乾。去根。細剉。勿令犯火。

性質 苦。平。微寒。無毒。

效能 清溼熱。治黃疸。有解熱

發汗淨血三作用。為黃疸之特效

十 蠶 茵

主治 風溼寒熱。邪氣熱結。黃

疸。久服輕身益氣。耐老。面白悅。長

年。白兔食之。仙(本經)治通身發

黃。小便不利。除頭熱。去伏瘕。(別

錄)

張仲景之發明 茵陳一味。經

張仲景之實驗。認為主治溼熱發

黃也。茲考徵如下。① 茵陳五苓散

證曰。黃疸。② 茵陳蒿湯證曰。心胸

不安。久久發黃。以上二方。茵陳蒿

一方六兩。一方十分。觀此二方。茵

陳蒿治發黃也。明矣。或問曰。發黃

之證。治之之方。其不用茵陳蒿者。

間亦有之。如何。答曰。發黃。小便不

利。或渴無餘證者。茵陳五苓散主

之。發黃。大便不通者。茵陳蒿湯主

之。若乃一身盡黃。腹脹。小便必黑

時溼者。消導散主之。發黃。心中懊

憤。梔子大黃散湯。發黃。腹滿。小便

不利。大黃消石湯。發黃。頭痛惡風

自汗出。桂枝加黃耆湯。發黃。嘔逆

小半。夏湯主之。發黃。胸脇苦滿。小

柴胡湯主之。發黃。腹中拘急。小建

中湯主之。此皆隨證而異方也。仲

景氏之於茵陳蒿。特用之於發黃

無他病者而已。

歷代配伍攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論茵陳曰。通關節。去滯

熱。傷寒用之。【宋】大明日華諸家

本草論茵陳曰。石茵陳治天行時

疾。熱狂。頭痛。頭旋。風。眼。疼。瘵。瘵。女

人。癢。癢。并。因。損。乏。絕。【明】繆希雍

本草經疏論茵陳曰。茵陳蒿味苦

平。微寒。無毒。故主風溼寒熱。邪氣

熱結。黃疸。通身發黃。小便不利。及

頭熱。皆溼熱在陽明太陰所生病

也。苦寒能燥溼。除熱。溼熱去。則諸

證自退矣。去伏瘕。及久服輕身益

氣耐老。面白悅。長年。未有修事者。

日華子云。石茵陳味苦涼無毒。即

山茵陳也。入足陽明太陰足太陽

三經。除溼散熱結之要藥也。【明】

李士材本草圖解論茵陳曰。茵陳

蒿足太陽藥也。治發黃。驅溼熱。利

小便。通關節。按發黃有陰陽二種。

茵陳同梔子黃蘗以治陽黃。同附

子乾薑以治陰黃。總之茵陳為君

隨佐使之寒熱而理黃症之陰陽

也。古法以茵陳同生薑搗爛。於胸

前四肢。日日擦之。【清】黃宮繡本

草求真論茵陳曰。茵陳味苦微寒。

諸書皆言溼熱伏於陽明。用此以

入太陽膀胱。發汗利水。俾太陽陽

明溼熱之邪。盡得於藥而解矣。且

治傷寒時疾。狂熱瘵瘵。頭痛頭旋。

女人疝瘕。亦是溼熱為病。但黃原

有陰陽寒熱之分。陽黃者。由熱蘊

於脾土。如茵值於大旱。則茵必燥

而黃。是茵因燥而黃者也。太溼則

茵必溼而黃。是茵因溼而黃者也。

熱為陽。寒為陰。故黃亦以陰陽分

之。是以仲景立有茵陳蒿湯。梔子

蘗皮湯。麻黃連翹赤小豆湯。以治

陽黃之症。又立茵陳附子湯。以治

陰黃之症。茵陳治黃通劑。在人審

其所因而酌治耳。若蓄血發黃。則

治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣

分藥也。於血則不能治矣。茵陳本

有二種。葉細而青蒿者可用。若生

子如鈴。則為山茵陳矣。出於殺蟲

及治口瘡。【清】鄒樹本經疏證論

茵陳曰。風溼寒熱邪氣。新感者也。

熱素有者也。新感之邪為素有之

熱結成黃疸。此證已所謂茵陳矣。

故傷寒金匱二書。幾若無疸不茵

陳者。然梔子蘗皮湯證。有外熱而

無裏熱。麻黃連翹赤小豆湯證。有

裏熱而無外熱。小建中湯證。小便

自利。小柴胡湯證。腹痛而嘔。小半夏湯證。小便色不變而嘔。桂枝加黃芪湯證。脈浮。椰子大黃湯證。心中懊憹。消石礬石散證。額上黑。日晡發熱。則內外有熱。但頭汗出。齊頸而還。腹滿。小便不利。口渴。為茵陳蒿湯證矣。第腹滿之治在大黃。內熱之治在椰子。惟外復有熱。但頭汗出。小便不利。始為茵陳的治。其所以能治此者。豈不為新葉茵陳幹而生清芬。可以解鬱熱。苦寒可以洩停滯邪。蓋陳幹本能降熱利水。復加以葉之如絲如縷。挺然於暑溼蒸逼之時。先草木而生。後草木而彫。不必能發散。而清芳揚溢。氣暢不斂。則新感者遂不得不解。自是汗出不止於頭矣。故曰發熱汗出。此為熱越。不能發黃也。

不能斷為本藥之有效成分。又療黃疸有效之說。村井純之助云。殆因有物質。如洋藥亞爾鮮中所含苦味質之「アアシンチン」之故歟。茵陳蒿之用量。一日五・〇至一〇・〇為煎劑與之。
近人學說 黎伯樞曰。昔李時珍作本草綱目。於茵陳蒿謂有石茵陳。山茵陳。家茵陳。三種。豈知今日已無此等名目。別有所謂綠茵陳。綿茵陳二種。查綠茵陳之所以名為綠。不知何所取義。其來由為何。然其物莖葉俱有。莖為方莖。似是蕨類。然殊不見其綠。若綿茵陳一種。純是細小花瓣。其所謂綿。當是指其柔嫩。嗅之別有一種香氣。其性輕浮。實為走表之物。至為何種之花。不得而知。惟與綠茵陳形色性味。迥然各別。查茵陳蒿本治黃疸。即西醫所謂膽汁溢出之病。實以綠茵陳為合。今醫士處方。但書茵陳。據藥店人云。率以綠茵陳與之。然余曾實驗過。亦有與綠茵陳者。殊不一定。余意須以綠茵陳為正。但僅書茵陳。不能必藥店之定給以何種。是則處方時

須特別註明也。張山雷曰。茵陳味淡利水。乃治脾胃二家溼熱之專藥。溼熱酒疸。身黃瘦赤。如醫皆胃土蘊滯積熱之證。古今皆以此物為主。其效甚速。滯滯腸胃。外達皮毛。非此不可。蓋行水最捷。故凡下焦溼熱痒搔。及足脛腫脹。溼瘡流水。並皆治之。其陰黃一證。雖曰虛寒。然亦內有蘊熱。故能發見黃色。則以入於溫經隊中而掃蕩之。即仲景茵陳附子之法。惟女勞疸一症。則療滯痺者。非僅通利所可奏功。故必以硝石礬石之咸利者。為刮垢磨光之治。而無取於茵陳也。
配合應用 茵陳性苦寒。能除一切溼熱。五疸雖各有其因。然同為溼熱所成。故得黃連。乾葛。黃蘗。首習。五味子。治酒疸如神。
治發痘 茵陳二朮。茯苓。澤瀉。車前子。木通。橋皮。神麴。紅麴。麥門冬。
治痘因酒色而得。病名女勞疸。茵陳。生地。黃。仙人對坐。草。石斛。木瓜。牛膝。黃蘗。
治發痘。寒熱不食。食即頭眩。

心胸不安。茵陳六兩。椰子十四枚。大黃二兩。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便而去也。
(仲景茵陳湯)
又茵陳五苓散。總治諸疸。
茵陳蒿除大熱寒瘧。傷寒頭痛。風熱。瘧痢。利小便。以茵陳細切。煮羹食之。生食亦宜。(食醫心鏡方)
治週身風痒。生疥疥。用茵陳黃濃汁。洗之。立瘳。(千金方)
治癩癧風病。茵陳蒿兩握。水一斗五升。煮取七升。先以皂莢湯洗。次以此湯洗之。冷更作。隔日一洗。不然。恐痛也。(崔行功要方)
治風疾。變急。茵陳蒿一升。糯米一石。麴三斤。和勻。如常法釀酒服之。(聖濟總錄方)
治癩黃。如金。好眠吐涎。茵陳蒿。白鮮皮。等分。水二鍾。煎服。日服二(三十六黃方)
治週身黃疸。茵陳蒿一把。同生薑一塊。搗爛。於胸前四肢日日擦之。

①治男子酒疸。用茵陳蒿四根。梔子七箇。大田螺一箇。連殼煨燥。以百沸白酒一大盞。沖汁飲之。祕方也。

②治眼熱赤腫。山茵陳、車前子等分。煎湯。細茶調散服數服。(直指方)

用塩 二錢至四錢。

施用宜忌 凡無溼熱而發黃。由於蓄血者。禁用。忌火。

著名方劑 黃疸方。治身目皆黃。皮肉瘦出。(千金翼方)茵陳一把。梔子二十四枚。石膏一斤。上以水五升。煮二升。取二升半。去渣。以猛火燒石。存令赤。投湯中。沸定。服一升。覆取汗。周身以粉粉之。不汗更服。

參攷資料 ①張仲景治傷寒熱甚發黃。身面悉黃者。用之極效。一僧因傷寒後。發汗不盡。有留熱。面身皆黃。多熱。期年不愈。醫作食治。不對。而食不減。予與此藥。服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵陳。山梔子各三分。秦芫。升麻各四錢。爲散。每用三錢。水四合。煎二合。去滓。

十畫 茵 茶

食後溫服。以知爲度。此藥以山茵陳爲本。故書之。(冠宗爽)②張仲景曰。茵陳。梔子。大黃湯。治溼熱也。梔子。麩皮湯。治燥熱也。如苗溼則溼黃。苗旱則燥黃。溼則瀉之。燥則潤之可也。此二藥治陽黃也。韓祗和李思訓治陰黃。用茵陳。附子湯。大抵以茵陳爲君。而佐之以附子。大黃。各隨其寒熱也。(王好古)③近道皆有之。不及太山者佳。春初生苗。高三五寸。似蓬蒿而葉緊細。無花實。五月七月採莖葉。陰乾。今謂之山茵陳。江寧府一種。茵陳。葉大根粗。黃白色。至夏有花實。陪州一種。白莖。一似青蒿而青白。本土皆以爲茵陳。入藥。今南方醫人。用山茵陳。乃有數種。或著其說云。山茵陳。汴京及北地用者。如艾蒿。葉細。面背白。其氣亦如艾。味苦。乾則色黑。江南所用者。莖葉都似家茵陳。而大。高三四尺。氣極芳香。味甘辛。俗又名龍腦薄荷。吳中所用。乃石香薷也。葉至細。色黃。味辛。甚香烈。性溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。以本草論之。但有茵陳蒿。無山茵陳。注云。似蓬蒿而葉細。今汴

京北地所用山茵陳是也。大體世方用山茵陳。療體痛。解寒發汗。行肢節滯氣。化痰利濕。治勞倦最要。詳本草正經。惟療黃疸利小便。與世方都不應。今試取汴京所用山茵陳。爲解肌發汗藥。灼然少效。江南山茵陳。療傷寒。腦痛。絕勝。比見諸醫議論。謂家茵陳亦能解肌。下臆。去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本草所無。自出。俗方茵陳。蓋當別是一物。主療自異。不得爲山茵陳也。此說亦可據。但以功較之。則江南者爲勝。以經言之。則非本草所出。醫方所論。更當考論。爾(蘇頌)④茵陳。昔人多謬爲蔬。故入藥用山茵陳。所以別家茵陳也。洪舜俞老圃賦云。醴糟紫葢之草。沫醴青陳之絲是也。今淮揚人二月二日。猶採野茵陳。苗和粉麵作茵陳餅食之。後人各據方土所傳。遂致淆亂。今山茵陳。二月生苗。其莖如艾。其葉如淡色青蒿。而背白。葉歧繁細。而扁整。九月開細花。黃色。結實大如艾子。花實並與菴蘭花實相似。亦有無花實者。(李時珍)⑤茵陳有二種。一種葉細如

青蒿者。名結茵陳。專於利水。爲溼熱黃疸要藥。一種生子如鈴者。名山茵陳。又名角蒿。其味苦辛小毒。專於殺蟲。治口齒瘡。絕勝。本經主風溼寒熱。熱結黃疸。溼伏陽明所生之病。皆指結茵陳而言。茵陳專走氣分。而利溼熱。若蓄血發黃。非此能治也。(張石頑)

【茵陳】即茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵芋」條。

【茶子】性質 苦寒有毒。主治 喘急咳嗽。去痰垢。搗仁洗衣。除油膩。

【茶考】即土當歸之古籍別名。典見進賢。詳「土當歸」條。

【茶果】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳「紫金牛」條。

【茶油】原名 樟油。外國名 Oleum Carnolliae. (拉丁) (Tea Oil) (英)

基本 本品乃樟樹子實榨取之油。俗呼爲茶油。

性質 甘涼無毒。

主治 潤腸清胃。殺蟲解毒。燃燈益目。抹髮解腫。

十畫 茶

參攷資料 茶油不宜生食。及煎熱不熟食之令人作瀉。(趙學敏)

【茶腦】 產地 出遠東塞外諸地。

形態 茶腦爲山果類之一種。高三尺許。葉如樟樹。背有黃白點。開花碧色。有四出。有八出。形似手結子。大如拳。味甘如餡。樹皮浸水。可取油以燃燈。其子實可供食與藥用。

性質 甘。無毒。

參攷資料 遠塞無藥。土人有病者恒取啖之即愈。(趙學敏)

【茶根】 卽茶樹根之簡稱。

【茶矩摩】 卽鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳『鬱金香』條。

【茶婆蟲】 卽蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳『蜚蠊』條。

【茶蛙蟲】 基本 茶蛙蟲爲化生蟲類之一種。卽蠶蟲之生於茶葉籠中者。其蛙屑可供藥用。

主治 聾耳出汁。研末絞淨。搽。

【茶蛙蟲蛙屑】 功用 治聾耳出汁。(研)

末搽之)

【茶蛙蟲蒸】 卽茶蛙蟲蛙屑。

【茶菊】 古籍別名 黃色者名高脚黃。紫色者名紫帶。

盤桓。白色千葉者名玉玲瓏。(綱目拾遺) 眞菊。家菊。(羣芳譜)

產地 出浙江杭州之笕橋。及紹興之新昌。與安徽。江西。皆有之。

形態 茶菊爲溼草類菊屬之一種。其莖柔韌。嫩青老紫。葉色淡綠。似小金鈴而尖。氣似薄荷。花色有黃有白。小如指頭。實如葶藶而細種之亦生。其花可供藥用。

採取 以浙江江西者佳。入藥陰乾去蒂用。

性質 苦。微甘。平。無毒。

主治 諸風頭目眩暈。平咳逆。解肌熱。清鬱火。益肺腎。

配合宜忌 反河魀。無鱗魚。白朮。杞子。地骨皮爲使。

【茶菊枝葉】 主治 紅絲疔。

共搗爛。傅至絲盡處。跌打損傷。和童便無灰酒煎服。

【茶菊花露】 基本 本品卽以茶菊蒸取之

歸。

性質 苦。微甘。平。無毒。

主治 清心明目。除熱祛風。

【茶菊根】 主治 疔腫。紅絲疔。喉疔。喉癰。

【茶葉】 原名 茗。古籍別名 苦茶。(唐本草) 檟。(爾雅) 葶。葶。(綱目) 茆。苦茶。碧澗。雲霧。(郭璞註爾雅)

外國名詞 Thea(拉丁) Tea(英) Thee(德)

基本 屬山茶科茶樹之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茶各屬有出三四月新。普再茶產雲南。由蒙自配車經河口魯街出河內轉海防。付船來港。近日以同慶印同與印爲最好。原以姑娘茶爲最好。惜乎甚少。

形態 茶爲常綠小灌木。高達五六尺。葉作長橢圓形。長一寸許。



茶 葉

呈深綠色。有光澤。邊緣有細鋸齒。初夏生新葉。至秋季。開類似棉花之白色單瓣花。其實作褐色扁圓形。熟則有三子裂出。

種類 綠茶係採得焙去苦水。便可泡飲者。紅茶係蒸焙醱而製成者。紅綠兩種乃普通常用之飲料。其餘因產地製法培植採取而異其名種者頗多。

種植 茶有野生種。種者用子。二月下種。一次須數百顆。乃生一株。蓋其空殼者多之故耳。

採取 每年於立春後八十八日前後採之。置蒸籠中蒸熟。後即攤席上冷之。次乃以焙爐上揉搓。使充分乾燥。

製法 凡入藥用須以臘茶。研治作餅。日乾用。尤以陳細者良。

用法 沸水沖。或水煎。或剉末用。

性質 苦。甘。微寒。無毒。

成分 茶葉中含有咖啡鹼。二至三。四。揮發油。單寧等。

咖啡鹼 Caffeinum C₈H₁₀N₄O₂。

+ H₂O 爲柔韌白色針狀結晶。有絹絲狀光澤。味微苦。溶於八十分

。

之水。無色溶化。呈中性反應。溶於二分之沸湯。冷後凝結。成爲結晶性糜粥。又可溶於哥羅仿姆（C. J. Jorolorm）及約五十分之酒精。惟於伊打。則不甚溶解。置空氣中則風化。將本品徐徐燒熱。約在百度時。僅一部分揮散。至一百八百度。則完全昇華。又將本品○一瓦溶化於綠氣水十立方仙米內。於重湯煎上蒸發。所得殘留物。作黃赤色。和以安母尼亞水少許。則呈紫紅色。

效能 清熱。降火。消食。醒睡。用作興奮神經藥。又爲利尿藥。又治疲勞性精神衰弱症。

作用 入胃後。除所含之一部分單寧制止消化酵素之作用及凝固已消化之蛋白外。餘皆不起何等變化。惟精油（香精）有稍能激胃分泌增多之功。由幽門而達十二脂腸小腸等處。始次第將茶精吸入血中。由微血管而傳達中樞神經。使血液循環加速。腦部血量增多。精神遂被激而興奮。惟效力微甚。而時間亦短促。

主治 痰積。利小便。去痰熱。止

十畫 茶

渴。令人少睡有力悅志。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論茶葉曰。下氣消食。作飲加茶。莫葱薑良。【唐】陳藏器本草拾遺論茶葉曰。破熱氣。除瘴氣。利大小腸。【宋】陳承本草別說論茶葉曰。治傷暑。合醋服治泄痢。甚效。【元】王好古湯液本草論茶葉曰。清頭目。兼治中風昏憤。多睡不醒。【明】吳瑞日用本草論茶葉曰。炒煎飲。治熱毒赤白痢。同芎藭葱白煎飲。止頭痛。【明】李時珍本草綱目論茶葉曰。濃煎飲吐風熱痰涎。【明】繆希雍本草經疏論茶葉曰。茗本經味甘。氣微寒。無毒。藏器言苦。然亦有苦者。氣薄味厚。入手太陰少陰經。太陰爲清肅之臟。喜涼而惡熱。熱則生痰而津液竭。故作渴也。痰積者。大腸積熱也。小便不利者。小腸熱結也。甘寒入心肺而除熱。則津液生。痰熱解。厥氣既清。肺病不求其止而止矣。令人少睡者。蓋心臟神。神昏則多睡。清心經之熱。則神常自惺。寂故不寐也。下氣消食者。苦能下泄。故氣下火降。而兼滌除腸胃。則食自消化矣。

【明】李士材本草圖解論茶葉曰。茗苦甘微寒。下氣消食。清頭目。醒睡。解炙燥毒。酒毒。消暑。同濕治痢。按茗得天地清陽之氣。故善理頭風。肅清上膈。使中氣寬舒。神情爽快。此惟洞山上品。方獲斯效。至如俗用雜茶。性味不佳。久啜。羸雅必使中土蒙寒。元精暗耗。輕則黃瘦減食。甚則嘔泄痞腫。無病不集。害可勝數哉。茶序云。消停釋滯。一日之利暫佳。瘴氣侵精。終身之累。斯大東坡云。除煩去膩。不可無茶。然空心飲茶。直入腎經。且寒脾胃。乃引賊入室也。【清】黃宮繡本草求真論茶葉曰。茶茗大者爲茗。小者爲茶。茶稟天地至清之氣。得春露以培生意。克足纖芥。滓穢不受。味甘氣寒。故能入肺清痰利水。入心清熱解毒。是以垢膩能滌。炎燥能解。凡一切食積不化。頭目不清。痰涎不消。二便不利。消渴不止。及一切吐血便血。衄血血痢。火傷目疾等症。服之皆能有效。但熱服則宜。冷服聚痰。多服少睡。久服瘦人。至於空心飲茶。既使入腎削火。復於脾胃生寒。萬不宜服。茶之產處

甚多。有以陽羨名者。謂之真巖茶。治能降火以清頭目。有以臘茶名者。以其經冬過臘。佐劉寄奴治便血最效。有以松蘿名者。是生於徽。耑於化食。有以日鑄名者。生於浙。耑於清火。有以建茶名者。生於閩地。耑於辟瘴。有以苦丁名者。產於六合。耑於止痢。有以普洱名者。生於滇南。耑於消食辟瘴。止痢。至於蒙山。世所罕有。且有許多偽充。真偽莫辨。然大要總屬導痰宜滯之品。雖一日之利暫快。而終身之累斯大。損多益少。服宜慎矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論茶葉曰。茶微苦微甘而涼。清心神醒睡除煩。涼肝膽滌熱消痰。肅肺胃。明目解渴。不渴者勿飲。以春採色青。炒焙得法。收藏不泄氣者良。色紅者已經蒸審。失其清滲之性。不能解渴。易成停飲也。普洱產者味重力峻。善吐風痰。消肉食。凡暑穢痧氣。腹痛乾霍亂痢疾等證。初起。飲之輒愈。

國外學說 英美學說謂茶葉產中國。日本。英國。印度等處。內含一精。曰提年酸。茶共分爲二大類。

十畫 茶

其第一類謂之綠茶。綠茶能分數種。內有五種。如官茶圓珠。點春。兩前。屯溪等。此類茶樹均耐冷。故英國多種植此樹。能經冬不枯。中國有數種綠茶。其色係將醱類之物所染。曾有西人查考常出售之綠茶。有加色料與不加色料之別。其第二類謂之武夷茶。西國以為此樹出各種黑茶。即為白毫。臘生。小種。工夫。武夷等。第黑茶與綠茶。俱為綠茶樹之葉。在中國之南方北方等處。惟黑茶則大半在中國之南。如廣東省等處。而黑茶與綠茶之分別。因黑茶必先置於天若干時。待其少發酵而後加熱烘之。則能變為黑色。印度人種中國之茶子。以其所得茶樹之葉。依中國法烘之。而與中國安徽省之上等烏龍茶相比較。初無上下之分。考茶之功用。能收斂而稍行血氣。大半感動筋力。令人覺爽適。如辛勞力乏時飲之。能補精神。飲濃茶則能感動筋力。如飲更淡之茶。則能平火安心。其功用又能發汗。解鴉片毒。免其困迷。日本和漢藥考曰。種茶及製茶之起始。散見諸書。今將

「日本事物起原」所載者錄之。如左。種茶及製茶之起始。無從確知。惟徵之史乘。有聖武天皇太平年間。召百僧於禁庭賜茶云云。又嵯峨天皇弘仁年間。始立賞茶式云云。足見日本飲茶年代頗遠。至後鳥羽院文治年間。有建仁寺開基千光國師榮西。留學宋國。於建久年間歸日。由江南浮梁。攜回茶之種子。種於筑前國有振山。其所製茶謂之岩上茶。並著有喫茶養生錄一書。榮西實為日本種茶及製茶之始祖也。

近人學說 念曰。茶葉為我國特產。且為一般人所嗜之飲料。最近據大阪市立衛生試驗所山口博士研究所得。茶內實含有偉大的殺菌力。以之治却潑司虎列拉。赤痢諸症。甚見功效。博士曾以却潑司之細菌。置於濃冷之茶汁中。發見此種細菌。在紅茶中二十分鐘。在綠茶中三十分鐘。全告死亡。若於咖啡中。則不見效。因茶中含有多量的單寧酸。單咖啡則無細菌中之蛋白質。遇茶中之單寧酸。即被吸收結合而停止其生活。

此與石炭而做成普通消毒劑。完全不同。而自成為一種獨特新異的殺菌法。至於紅茶中所含之單寧酸。較綠茶中所含者約多二倍。故紅茶之功效較偉。又虎列拉與赤痢之細菌。比却潑司之細菌尤弱。博士以此種細菌。置於顯微鏡下。以茶汁一滴注之。不到七分鐘。即失其活動。博士並言。印人昔以茶治傷風。却潑司諸病。云甚靈效。今由實驗所得。可信其言不謬。故普通以茶作飲品。不但可以預防傳染。即以治療上述諸病。亦必經驗異常也。

配合應用 治氣虛頭痛。用上春茶末。調成膏。置瓦盞內覆轉。以巴豆四十粒。作二次燒烟。蒸之。曬乾。乳細。每服一字。別入好茶末。食後煎服。立效。(醫方大成方)

治熱毒下痢。以好茶一斤。炙搗末。濃煎一二盞。服。久患痢者。亦宜服之。又用臘茶。赤痢以鹽水煎服。白痢以連皮自然薑汁。同水煎服。二三服即愈。(孟詵方) 又用蠟茶二錢。湯點七分。入麻油一蜆殼和服。須臾腹痛大下即止。一少年

一〇六八

用之有效。(直指方) 一方蠟茶末。以白梅肉和丸。赤痢甘草湯下。白痢烏梅湯下。各百丸。一方建茶合醋煎熱服即止。(經驗方)

治大便下血。榮衛氣虛。或受風邪。或食生冷。或痰炙燥。或飲食過度。積熱腸間。使脾胃受傷。精粕不聚。大便下利。清血。臍腹作痛。裏急後重。及酒毒一切下血。並皆治之。用細茶半斤。碾末。川百藥煎五箇。燒存性。每服二錢。米飲下。日二服。(普濟方)

治產後祕塞。以葱涎調蠟茶末。丸百丸。茶服自通。不可用大黃利藥。利者百無一生。(郭稽中婦人方)

治久年心痛。十年五年者。煎湖茶。以頭醋和勻服之。良。(兵部手集方)

治腰痛。痛難轉。煎茶五合。投醋二合。頓服。(孟詵方)

治嗜茶成癖。一人病此。一方士令以新鞋盛茶。令滿。任意飲盡。再盛一鞋。飲如此二度。自不喫也。男用女鞋。女用男鞋。用之果愈也。(集簡方)

① 解諸中毒。芽茶白礬等分。調朱冷水調下。(簡便方)

② 治痘瘡作痒。房中宜燒茶烟。恒熨之。

③ 治陰囊生瘡。用蠟面茶爲末。先以甘草湯洗後貼之妙。(經驗方)

④ 治脚極濕爛。茶葉嚼爛傳之有效。(攝生方)

⑤ 治蠅螬尿瘡。初如糝粟。漸大如豆。更大如火烙。漿炮。疼痛至甚。者。速以草條并蠟茶。俱可以生油調傳。藥至痛乃止。(勝金方)

⑥ 治風痰頭疾。茶芽。梔子。各一兩。煎濃汁一。碗。服。良久探吐。(摘玄方)

⑦ 治蠶亂煩悶。茶末一錢。煎水調乾薑末一錢。服之即安。(聖濟總錄方)

⑧ 治月水不道。茶清一瓶。入沙糖少許。露一夜。服。雖三箇月胎亦適。不可輕視。(鈞氏方)

⑨ 治痰喘咳嗽。不能睡臥。好末茶一兩。白殭蠶一兩。爲末。放盆內。蓋定。傾沸湯一小盞。臨臥再添湯點服。(瑞竹堂方)

用量 錢半至二錢。
施用宜忌 凡脾虛胃寒及酒後與水腫痲疔者禁用。

參攷資料 ① 一人好燒鷄炙。博。日常不飲。人咸防其生癰疽。後卒不病。訪知其。人每夜必吸涼茶一碗。乃知茶能解炙博之毒也。(汪穎)

② 薑茶治痢。靈助陽。茶助陰。並能消暑解酒食毒。且一寒一熱。調平陰陽。不問赤白冷熱。用之皆良。生薑細切。與真茶等分。新水濃煎服之。蘇東坡以此治文潯公有效。(楊士瀛)

③ 茶苦而寒。最能降火。火爲百病。火降則上清矣。然火有五火。有虛實。若少壯胃健之人心肺脾胃之火多盛。故與茶相宜。溫飲則火因寒氣而下。降熱飲則茶借火氣而升散。又兼解酒食之毒。使人神思開爽。不昏不睡。此茶之功也。若虛寒及血弱之人。飲之既久。則脾胃惡寒。元氣暗損。土不制水。精血潛虛。成痰飲。成痞脹。成痿痺。成黃瘦。成嘔逆。成洩瀉。成腹痛。成疝瘕。種種內傷。此茶之害也。(李時珍)

④ 與糖同食。令人身重。(胡洽) ⑤ 大渴及酒後飲茶水。

入腎經。令人腰脚膀胱冷痛。兼患水腫癰瘡諸疾。大抵飲茶宜熱宜少。不飲尤佳。空腹最忌之。(李廷飛) ⑥ 凡服威靈仙土茯苓者。忌飲茶。(李時珍) ⑦ 郭璞云。早採爲茶。晚採爲茗。一名芽。蜀人謂之苦茶。陸羽云。其名有五。一茶。二檟。三叢。四茗。五芽。(蘇頌) ⑧ 今閩浙蜀江湖淮南山中。皆有之。通謂之茶。春中始生。嫩葉。蒸焙去苦水末之。乃可飲。與古所食。殊不同也。陸羽茶經云。茶者南方嘉木。自一尺二尺至數十尺。其巴川峽山有兩人合抱者。伐而掇之。木如瓜。蘆。葉如梔子。花如白薔薇。實如柝。欄。幸如丁香。根如胡桃。其上者生爛石中。者生礫裏。下者生黃土。藝法如種瓜。三歲可採。陽岸陰林。紫者上。綠者次。符者上。芽者次。葉卷者上。舒者次。在二月三月四月之間。茶之筍者生於爛石之間。長四五寸。若巖之始抽。淺露。採之。茶之芽者。發於叢薄之上。有三枝四枝五枝。於枝頭探之。採得蒸焙封乾。有千類萬狀也。略而言之。如胡人靴者。盛縮然如蟹牛。臍者。廉沾然。出山者。

輪困然。拂水者。潤澆然。皆茶之精好者也。如竹籜。如霜荷。皆茶之解老者也。其別者。有名南芽。枸杞芽。枇杷葉。皆治風疾。又有烏莢芽。槐芽。柳芽。乃上春摘其芽。和茶作之。故今南人。輪官茶。往往雜以菜葉。惟芽蘆竹符之類。不可入。自餘山中草木芽葉。皆可合和。椿柿尤奇。真茶性冷。惟雅州蒙山出者。溫而主疾。毛文錫茶譜云。蒙山有五頂。上有茶園。其中頂曰上清峯。昔有僧人病冷且久。過一老父。謂曰。蒙之中頂茶。當以春分之先後。多聚人力。俟雷發聲。併手採擇。三日而止。若獲一雨。以本處水煎服。即能祛宿疾。二雨當眼前無疾。三雨能固肌骨。四雨卽爲地仙矣。其僧如說。獲一雨餘。服之未盡。而疾纏。其四頂茶園。採摘不廢。惟中峯草木繁密。雲霧叢蔽。驚獸時出。故人跡不到矣。近歲稍貴。此品製作亦精於他處。(蘇頌) ⑨ 茶有野生種。生種者。用于其子。大如指。頂正圓點。色其仁入口。初甘後苦。最載人喉。而閩人以榨油食用。二月下種。一次須百顆。乃生一株。蓋空殼者多。

輪困然。拂水者。潤澆然。皆茶之精好者也。如竹籜。如霜荷。皆茶之解老者也。其別者。有名南芽。枸杞芽。枇杷葉。皆治風疾。又有烏莢芽。槐芽。柳芽。乃上春摘其芽。和茶作之。故今南人。輪官茶。往往雜以菜葉。惟芽蘆竹符之類。不可入。自餘山中草木芽葉。皆可合和。椿柿尤奇。真茶性冷。惟雅州蒙山出者。溫而主疾。毛文錫茶譜云。蒙山有五頂。上有茶園。其中頂曰上清峯。昔有僧人病冷且久。過一老父。謂曰。蒙之中頂茶。當以春分之先後。多聚人力。俟雷發聲。併手採擇。三日而止。若獲一雨。以本處水煎服。即能祛宿疾。二雨當眼前無疾。三雨能固肌骨。四雨卽爲地仙矣。其僧如說。獲一雨餘。服之未盡。而疾纏。其四頂茶園。採摘不廢。惟中峯草木繁密。雲霧叢蔽。驚獸時出。故人跡不到矣。近歲稍貴。此品製作亦精於他處。(蘇頌) ⑨ 茶有野生種。生種者。用于其子。大如指。頂正圓點。色其仁入口。初甘後苦。最載人喉。而閩人以榨油食用。二月下種。一次須百顆。乃生一株。蓋空殼者多。

十畫 茶

十畫 茶 茸 茹 茺 苧 荳 荅 荊

故也。畏水與日。最宜坡地陸處。清明前採者上。穀雨前者次之。此後皆老茗爾。採蒸揉焙。修造皆有法。詳見茶譜。昔賢所稱。大約謂唐人尚茶。茶品益衆。有雅州之蒙頂。石花。露芽。穀芽爲第一。建寧之北苑。龍鳳園爲上供。蜀之茶則有廣川之神泉。獸目。硤州之碧潤。明月。夔州之眞香。邛州之火井。思安。黔陽之都瀾。嘉定之峨眉。瀘州之納溪。玉壘之沙坪。楚之茶則有荊州之仙人掌。湖南之白鷺。長沙之鐵色。蕪州。蘇門之團面。壽州。霍山之黃芽。廬州之六安。英山。武昌之樊山。岳州之巴陵。辰州之淑浦。湖南之寶慶。茶陵。吳越之茶。則有湖州顧渚之紫筍。福州方山之生芽。洪州之白鷺。雙井之白毛。廬山之雲霧。常州之陽羨。池州之九華。丁山之陽坡。袁州之界橋。睦州之鳩坑。宣州之陽坑。金華之舉岩。會稽之日嶧。皆產茶有名者。其他猶多。而最雜更甚。按陶隱居註苦茶云。西陽。武昌。廬江。晉陵。皆有好茗。飲之宜人。凡所飲物。有茗及木葉。天門冬。苗。莠。莠葉皆益人。餘物並冷利。又

巴東縣有眞茶。火煬作卷結。爲飲亦令人不服。俗中多煮檀葉。及大皂李葉作茶飲。並冷利。南方有瓜。蘆木。亦似茗也。今人採構。山。礬。南燭。烏藥。諸葉。皆可爲飲。以亂眞茶云。(李時珍) ⑤徽之松蘿。茶化食。六合之苦丁。茶止痢。滇南之普洱茶。消食辟瘴。(盧明飛) ⑥產中國。日本。印度。日本除北海道外。各地皆產之。其中有名者。如山城之宇治。駿河之安倍。久保。近江之信樂。武藏之狹山等。(和漢藥考) ⑦貯茶用磁製或錫製壺最佳。陶製及玻璃器。不能貯茶。保存長久。(和漢藥考) ⑧蠶豆葉。枸杞葉。柳葉等。農家往往用以代茶。奸商則往往以之混入茶葉。使增加重量。(和漢藥考)

【茶腿】即火腿之別名。見「火腿」條。

【茶樹根】 性質 味苦。平。無毒。 主治 口爛。煎湯代茶飲之。立效。

【菲母】即鼠翅草之古籍別名。典見綱目。詳「鼠翅草」條。

【菲母草】即鼠翅草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「鼠翅草」條。

【菲花枝】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。

【茹根】即白茅根之古籍別名。典見本經。詳「白茅根」條。

【茹草】即柴胡之古籍別名。典見吳普本草。詳「柴胡」條。

【茹蘆】即茜草根之古籍別名。典見別錄。詳「茜草根」條。

【茹藤】即茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茜草根」條。

【芫蔚】即益母草之原名。詳「益母草」條。

【芫蔚子】即益母草子之原名。詳「益母草子」條。

【苧蒿】 古籍別名 蓬蒿。(綱目)

外國名詞 Chrysanthemum
Coronarium, L. (拉丁) シュンギク キクナ ムジンサウ (日本)

基本 係菊科。苧蒿屬。爲苧蒿之莖葉。

產地 生原野間。

形態 苧蒿爲菜類之一年生。或越年生草本。高二三尺。葉二回

羽狀深裂。互生。花黃色。或白色。頭狀花序。其花外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。每一花。結子近百。成穗如地荳。及苦蕒子。其莖葉可供食與藥用。

性質 甘。辛。平。無毒。

主治 安心氣。養脾胃。消痰飲。利腸胃。

參攷資料 苧蒿多食動風。氣薰人心。令人氣滿。(景萬錫)

【荳】即苧蒿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苧蒿」條。

【荳】即赤小豆之古籍別名。典見廣雅。詳「赤小豆」條。

【荳】即雞之古籍別名。典見綱目。詳「雞」條。

【荳三稜】即三稜之處方用名。詳「三稜」條。

原名 假蘇。

【荳荊芥】 原名 假蘇。 命名 本品莖葉辛香似蘇。故名。



苧蒿

處方用名 荊芥穗。荊芥炭。炒荊芥。黑荊芥。

古籍別名 鼠薷。(本經)荳荊。

(別錄)京芥。鄭芥。一捻金。再生丹。如聖散。獨行散。舉癩古拜散。(和漢藥考)胡荊芥。石荊芥。新羅荊。(綱目)

外國名詞 Salvia Plabera.

(拉丁) (Sage) (英)

基本 唇唇形科。為荊芥之花穗與莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。荊芥產江西。紅梗者為佳。其次浙江杭州府。再次湖北廣城。廣東產者名土荊芥。全無辛香。不適用。夏季出新。

形態 荊芥(此與土荊芥異)。為一年生草本。莖直立。高一二尺。葉作長披針形。其端尖銳。別有五小葉。成爲鱗狀。葉腋歧生分枝。梢端開淡紅色之唇形花。與紫蘇花相似。核成長穗。氣芳香。味如樟腦。

採取 五六月間並花實成穗者採之。曬乾。

製法 凡使以陳者良。去梗取穗。有微炒用以殺辛香者。若用以

十畫 荊

止血。須炒黑。性質 辛溫。無毒。與黃芩同而較弱。

成分 含有揮發油與樹脂。

效能 輕宣發表。祛風理血。爲鎮痛鎮痙藥。用於胃寒性痙攣及痛風發作。產後亦多用之。若用大

量則有疏表發汗之用。施於感冒及天痘癩疹。功效甚著。又治流行性感胃。

主治 寒熱。鼠瘻癰瘰。生瘡。破結聚氣。下瘀血。除溼。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論荊芥曰。去邪。除勞渴。冷風出汗。黃汁服之。搗爛。醋和傳

丁腫腫毒。【唐】甄權藥性本草論荊芥曰。單用治惡風賊風。口面喎

斜。遍身癢痺。心虛忘事。益力添精。辟邪毒氣。通利血脈。【唐】陳士良

食性本草論荊芥曰。主血分風氣。壅滯。背脊疼痛。虛汗。理丈夫脚氣。

筋骨煩疼。及陰陽毒傷寒頭痛。頭眩目眩。手足筋急。【唐】孟詵食療

本草論荊芥曰。產後中風。身強直。研末酒服。【宋】日華諸家本草論

荊芥曰。利五臟。消食。下氣。醒酒。作

菜生熟皆可食。并煎茶飲之。以鼓

汁煎服。治暴傷寒。能發汗。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論荊芥曰。治婦

人血風及瘡疥爲要藥。【明】李時珍本草綱目論荊芥曰。散風熱。清

頭目。利咽喉。消瘡腫。治項強。目中黑花。及生瘡陰癩。吐血衄血。下血

血痢。崩中。痔漏。【明】繆希雍本草經疏論荊芥曰。假蘇。荊芥也。其氣

溫。其味辛。其性無毒。入血分之風藥也。故能發汗。其主寒熱者。寒熱

必由邪盛而作。散邪解肌出汗。則寒熱自愈。鼠瘻由熱結於足少陽

陽明二經。火熱鬱結而成癰瘰爲病。亦屬二經故也。生瘡者。熱血有

溼也。涼血燥溼。瘡自脫矣。破結聚氣者。辛溫解散之力也。下瘀血入

血分。辛以散之。溫以行之之功用也。痺者。風寒溼三邪之所致也。祛

風燥溼散寒。則溼痺除矣。【清】黃宮繡本草求真論荊芥曰。荊芥辛

苦而溫。芳香而散。氣味輕揚。故能入肝經氣分。驅散風邪。凡風在於

皮裏膜外。而見肌膚灼熱。頭目昏眩。咽喉不利。身背疼痛者。用此治

無不效。不似防風氣不輕揚。驅風

之必入人骨肉也。是以宜散風邪。用以防風之必兼用荊芥者。以其

能入肌膚宜散故耳。且既入肝經風木之臟。則肝即屬於藏血之地。

故又能以通利血脈。俾止衄腸風崩痢。產後血暈。瘡毒癰腫。血熱等

症。靡不藉其輕揚。以爲宣滲之具。寧於風木之臟。既於其氣而理者。

復不於血而治乎。玩古方產後血暈風起。有用荊芥爲末。同酒。及或

童便調治。崩中不止。有用炒黑荊芥以治。於此可見其概矣。速應用。治血須炒黑。

國外學說 日本藥學士村山義溫嘗試驗中國產荊芥中之揮

發油。據稱揮發油中。含有薄荷精。與日本產薄荷油中所含者相似。

惟用光學試驗。則見平面相同。立體則異。蓋含於荊芥油中者爲右

旋性。含於薄荷油中者。乃左旋性也。

辨偽 鄭育慶曰。荊芥本經名假蘇。味辛性溫。臭香。處處有之。

本係野生。今多栽種。近有一種偽品。並無香味。又安能治寒熱。破結

聚。下瘀血而除溼疽乎。曹炳章

曰按荆芥三月出新。江南孟阿陸
宛產者莖細短。穗多色綠為最佳。
大倉出者穗多氣香亦佳。蕭山龜
山出者。梗粗葉綠。穗少氣香。略次。
江西山東產者。梗粗穗紅不香。南
京出性硬。皆極次。其他各處皆出。
總要梗紅穗多。葉綠氣香者為道
地。

近人學說 張山雷曰。荆芥味
微辛而帶芳香。其氣甚清。質又輕
揚。故治風熱在表在上諸症。能滲
肺熱而達皮毛。風熱咳嗽宜之。風
熱外感頭痛寒熱亦是主藥。又入
血分。清血熱。能治咽喉口舌發腫
大頭諸症。亦治瘡癤風疥癩癩。吐
衄下血崩漏。能散上散下。散結導
痰。厥功甚多。而亦甚捷。誠風熱血
熱之一大法王。不可以其微賤易
得而忽視之。然古法每謂產後中
風。口噤發瘧。角弓反張。血暈不醒。
有豆淋酒法。以防風羌活。荆芥等
藥。炒研為末。另以黑豆炒熱。酒
淋藥熱。調藥沖服。意謂此是產後
猝受外風。故宜風藥酒服。溫升疏
散之法。無論何書。往往稱為大效。
甚且託名於華元化。稱之為華陀

愈風散。不知產後瘳厥。角弓反張。
純是陰脫於下。陽浮於上。雖曰中
風。明是內動之風。上升沖腦。以致
知覺運動。頓失其常。鐵而碎之。猶
恐不濟。妄投風藥。加以熱酒。是為
教孫升木。火上添油。殺之尤速。安
有得效之理。此皆古人誤認內風
作外風之治法。一盲導盲。千篤一
律。最是黑暗地獄。惟荆芥炒黑。則
輕揚疏散之性已失。而黑能入血。
可以止血之妄行。若產後去血過
多。陰不涵陽。暈厥昏噴者。用童便
調灌。則又能立定其氣血沖腦之
變。是為一舉兩得。卻是佳方。此不
可與豆淋酒之法作一例觀也。

配合應用 治頭項風強。八
月後。取荆芥穗作枕。及鋪牀下。立
春日去之。(千金方)
治風熱頭痛。荆芥穗。石膏等
分為末。每服二錢。茶調下。(永類
鈴方)
治風熱牙痛。荆芥根。烏柏根。
葱根。等分煎湯。頻含漱之。
治小兒驚癇。一百二十種。用
荆芥穗二兩。白礬半生半枯一兩。
為末。糊丸。黍米大。硃砂為衣。每晝

湯下二十九。日二服。(醫學集成
方)

治一切傷風。口眼喎斜。用青
荆芥一斤。青薄荷一斤。同入砂盆
內研爛。生絹絞汁。於瓷器中煎成
膏。流去滓三分之一。將二分日乾
為末。以存和丸。梧子大。每服三十
丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。
(經驗方)

治中風口噤。荆芥穗為末。酒
服二錢。立愈。名荆芥散。買似道云。
此方出會公談錄。前後用之甚驗。
其子名順者。病此已革。服之立定。
真再生丹也。

華佗愈風散。治婦人產後中
風。口噤。手足攣。痙如角弓。或產後
血暈。不省人事。四肢強直。或心眼
倒築。吐瀉欲死。用荆芥穗子。微焙
為末。每服三錢。豆淋酒調。或童子
小便服之。口噤則挑齒。灌之。斷噤
則灌入鼻中。其效如神。大抵產後
大眩則汗出而廢。理疎則易於中
風也。時珍曰。此方諸書盛稱其妙。
(馬僧垣集驗方)以酒服。名如聖
散。云藥下可立待應效。(陳氏方)
名舉卿古拜散。(齊存散方)用古

老錢煎湯服。名一捻金。(王貺指
迷方)加當歸等分。水煎服。許叔
微本事方云。此藥委有奇效。神聖
之功。一婦人產後睡久。及醒則昏
昏如醉。不省人事。醫用此藥。及交
加散。云服後當醒。必以左手搔頭。
用之果然。醫股產寶方云。此病多
因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草
受風而成。急宜服此藥也。戴原禮
證治要訣。名獨行散。買似道悅生
隨抄。呼為再生丹。

治產後迷悶。因怒氣發熱。迷
悶者。獨行散。用荆芥穗。以新瓦半
炒。半生為末。童子小便服一二錢。
若角弓反張。以豆淋酒下。或到散
童尿煎服。極妙。蓋荆芥乃產後要
藥。而角弓反張。乃婦人急候。得此
證者。十存一二而已。(戴原禮要
訣方)

治產後血暈。築心。眼倒風。縮
欲死者。取乾荆芥穗。搗篩為末。每
用二錢。童子小便一酒盞。調勻
熱服。立效。口噤者。挑齒。口閉者。灌
鼻中。皆效。近世名醫用之。無不知
神也。(綱目本草方)
治產後血眩。風虛。精神昏冒。

荊芥穗一兩三錢。栲仁五錢。去皮尖炒爲末。水服三錢。若喘加杏仁。去皮尖炒。甘草炒各三錢。(保命集方)

⑤治產後下痢。大荊芥四五穗。於釜內燒存性。不得犯油火。入麝香少許。以沸湯些須調下。此藥雖愈。能愈大病。不可忽之。(深師方)

⑥治產後鼻衄。荊芥焙研末。童子小便服二錢。海上方也。(婦人良方)

⑦治九竅出血。荊芥煎酒。通口服之。(直指方)

⑧治口鼻出血如涌泉。因酒色太過者。荊芥燒研。陳皮湯服二錢。不過二服也。

⑨治吐血不止。用荊芥連根洗。搗汁半盞服。乾菴爲末亦可。(聖惠方) 又用荊芥穗爲末。生地黄汁調服二錢。(經驗方)

⑩治小便尿血。荊芥。磁砂。等分爲末。糯米飲下三錢。日三服。(集簡方)

⑪治崩中不止。荊芥穗於麻油燈上燒焦爲末。每服二錢。童子小便服。此夏太君煎娘方也。(婦人良方)

⑫治痔漏腫痛。荊芥煮湯。日日洗之。(簡便方)

⑬治大便下血。用荊芥炒爲末。每米飲服二錢。婦人用酒下。亦可拌麵作餅飽食之。(經驗方) 又用荊芥二兩。槐花一兩。用炒紫爲末。每服三錢。清茶送下。(簡便方)

⑭治小兒脫肛。荊芥。皂角等分。煎湯洗之。以鐵漿塗上。亦治子宮脫出。(經驗方)

⑮治陰癩腫痛。荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。即消。

⑯治小兒疳積。荊芥穗煎湯洗淨。以煨葱刮薄。出火毒。貼之即消。(海上方)

⑰治瘰癧潰爛。瘰癧牽至胸前。兩腋塊如茄子大。或牽至兩肩。上四五年不能療者。皆治之。其效如神。武進縣朱守仁傳云。其項不能回頭。用此數日。滅如瘡爛。破者用荊芥根下一段。剪碎。煎沸湯。溫洗良久。看爛破處紫黑。以鍼一刺去血。再洗三四次。用樟腦。雄黃等分爲末。麻油調搽。上出水。次日再洗再搽。以愈爲度。(活法機要方)

⑱治疔腫諸毒。荊芥一握。切以水五升。煮取一升。分二服。俟冷飲。(藥性論方)

⑲治一切疥疥。荊芥末。以地黃自然汁。蒸存和丸。梧子大。每服三十五丸。茶酒任下。(普濟方)

⑳治脚極濕爛。荊芥葉搗傅之。(簡便方)

㉑治經脚生瘡。荊芥燒灰。葱汁調傅。先以甘草湯洗之。(摘玄方)

㉒治小兒風寒。煩熱有痰。不省人事。荊芥穗半兩。焙。麝香片。腦各一字。爲末。每茶服半錢。大人亦治。(普濟方)

㉓治頭目諸疾。一切眼疾。血勞。風氣頭痛。頭眩目眩。荊芥穗爲末。每酒服三錢。(龍樹論方)

㉔治經閉不通。小腹急痛。無問久新。荊芥。大黃爲末。等分。每溫水服三錢。小便不通。大黃減半。大便不通。荊芥減半。名倒換散。(普濟方)

用蠶 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無外感風寒濕邪者禁用。忌火。反魚。蟹。河豚。豬肉。
參攷資料 ①荊芥反魚蟹河

豚之說。本草醫方並未言及。而神官小說往往載之。按李廷飛延壽書云。凡食一切無鱗魚。忌荊芥。食黃鱔魚後食之。令人吐血。惟地漿可解。與蟹同食動風。又蔡條鐵山叢話云。予居嶺嶺。見食黃鱔魚。犯寶芥者立死。甚於鈞吻。洪邁夷堅志云。吳人魏幾道。啖黃鱔魚。後探荊芥和茶飲。少頃。足痒。上激心。肺。狂走。足皮欲裂。急服藥。兩日乃解。陶九成輟耕錄云。凡食河豚。不可服荊芥。藥大相反。予在江陰。見一儒者。因此喪命。草航細談云。凡服荊芥。忌食魚。楊誠齋曾見一人立致於死也。時珍按荊芥乃日用之藥。其相反如此。故詳錄之。以爲警戒。又按物類相感志。言河豚用荊芥同煮三五次。換水則無毒。其說與諸書不同。何哉。大抵養生者。能守前說爲戒可也。(李時珍) ②按吳普本草云。假蘇一名荊芥。葉落而細。蜀中生。歐之。昔乃東漢末人。去別錄時未遠。其實當不謬。故唐人蘇恭祖其說。而陳士良蘇頌復啓爲兩物之疑。亦臆說爾。曰蘇曰蘇曰芥。皆因氣味辛

十畫 荊

十畫 荆 蒞 苈 苈

一〇七四

香如蘇如葶如芥也。(李時珍) 今處處有之。葉似落葵而細。初生香辛。可噉。人取作生菜。古方稀用。近世醫家爲要藥。並取花實成穗者。曝乾入藥。又有胡荽。俗呼新羅荽。又有石荽。生山石間。性相近。入藥亦同。(蘇頌) 荽荽原是野生。今爲世用。遂多栽。二月布子生苗。炒食辛香。方莖細葉。似獨帶葉而狹。小淡黃綠色。八月開小花。作穢成房。房如紫蘇。房內有細子。如葶藶子。狀黃赤色。遠糧收採用之。(李時珍) 今人但遇風證。概用荽防。不知唯風在皮裏膜外者宜之。若風入骨肉者。須防風。不得混用。(吳遵程)

【荽】 命名 本品係用牡荽根。根莖炙取之汁。如竹瀝然。故名。 基本 屬馬鞭草科。爲牡荽之根汁。 形態 牡荽爲落葉灌木。每植庭園中以供玩賞。高四五尺。大達丈餘。新枝色綠。其形方。有茸毛。舊枝色褐。其形圓。葉爲掌狀複葉。三小葉附之。其在梢頭者。則有五小葉。俱有長柄。小葉爲橢圓狀。或爲長披針形。葉尖有鋸齒與茸毛。花朵小。色青紫。夏日開於枝葉之間。爲圓錐花序。其瀝則清冽如水。與竹瀝相彷彿。

【荽荽】 卽荽荽之處方用名。詳【荽荽】條。

製法 時珍曰。取法用新採根莖。截尺五長。架於兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取用。又法截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外。以糠火煨燒。其汁瀝入下瓶中。亦妙。

【荽桃】 卽櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳【櫻桃】條。

用法 乘熱時飲服。或和入湯藥中。

【荽崗沙】 卽荽荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荽荽】條。

性質 甘。平。無毒。

【荽鳩】 卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳【斑鳩】條。

效能 通經絡。消痰涎。用爲祛痰藥。

【荽】 卽荽荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

【荽】 卽荽荽之俗名。詳【荽荽】條。

主治 飲之去心悶煩熱。頭風。旋暈目眩。心頭澹澀。欲吐。卒失音。小兒心熱驚癇。止消渴除痰。吐令人不睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論荽瀝曰。除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱利。【清】汪詒庵本草備要論荽瀝曰。荽瀝甘平。除風熱。化痰涎。開經絡。行血氣。治中風失音。驚癇痰迷。眩暈煩悶。治渴熱。爲去風化痰妙藥。氣虛食少者忌之。

配合應用 治中風口噤。荽瀝每服一升。(范汪方)

治頭風頭痛。荽瀝日日服之。(集驗方)

治喉痺瘡腫。荽瀝細細咽之。或以荽一握。水煎服之。(千金方)

治目中卒痛。燒荽木黃汁。點之。(肘後方)

治心虛驚悸。瘦羸者。荽瀝一升。火煎至一分。作四服。日三夜一。(小品方)

赤白下痢。五六年者。荽瀝每日服五合。(外臺祕要方)

選蔞膏。荽木燒取汁。日塗

之。(梅師方)

用量 八分至錢中。

參攷資料 荽瀝氣平味甘。化痰去風爲妙藥。故孫思邈千金翼云。凡患風人多熱。常宜於竹瀝。荽瀝。姜汁合五合和勻。熱服。以透爲度。陶弘景亦云。牡荽汁治心風。爲第一延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荽瀝。(李時珍) 二汁同功。並以姜汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荽瀝。(朱震亨) 牡荽本東印度所產。享保年間。始有人取漢種。栽種江戶藥圃。說見小野蘭山翁著本草紀聞。(和漢藥考)

【蒞草】 基本 蒞草爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 瘰癧瘡。

【苈】 卽苈菜之古籍別名。典見詩經。詳【苈菜】條。

【苈】 卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳【浮萍】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

【苈】 卽苈菜之俗名。詳【苈菜】條。

日。詳「茶葉」條。

【草八角】古醫別名。紅孩兒。孩兒捧傘。(綱目拾遺)

產地 出浙江於沿昌化之山野間。

形態 草八角為木八角之一種。高尺許。葉角上仰。色黃。獨莖一葉。夏秋間開花。兩葉相對。粉紅色。下垂。結子紅色。亦成對。其根圓而不長。可供藥用。

性質 溫。無毒。

主治 祛骨內風。療癰腫諸毒。

參攷資料 八角金盤。有草木

二種。木本者。其葉尖。角仰起如盤之狀。葉背色黃。故曰金盤。草本者。葉尖。角不仰。葉背不黃。微有分別。此藥性熱力猛。有毒。咀之味麻。雖壯實人亦宜少用。服藥後忌魚腥。豬。羊。牛。馬。等肉。犯之令人癩狂。惟自蒸煎可解。入藥用近根皮。酒煎服。取汗即愈。力弱者發咳作吐。病亦愈。(趙學敏)

【草三稜】即三稜之古籍別名。與見開寶本草。詳「三稜」條。

【草木之王】即南天燭之古籍別

名。與見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【草牛黃】即黃芩子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「黃芩子」條。

【草王】即桑莖實之古籍別名。與見別錄。詳「桑莖實」條。

【草古】即甘草之古籍通用簡名。詳「甘草」條。

【草甘送】即蚤休之古籍別名。與見唐本草。詳「蚤休」條。

【草石蠶】命名。本品根似石蠶。故名。

古醫別名 地蠶(日用)土蛹(餘冬錄)甘露子(食物)滴露地瓜兒(綱目)

外國名詞 Saechys Sieboldi (Miq.) (拉丁) チロギチロウ

口ギ(日本) 基本 係唇形科水蘇屬。為草

石蠶之根。產地 出山野間。

形態 草石蠶為山草類之多。年生草本。方莖。高二尺餘。葉與莖皆密生毛茸。葉對生。有鋸齒。下部之葉長心臟形。上部之葉長卵形。秋日花生於上部之葉腋。連綴如穗狀。唇形花冠呈淡紅紫色。其生

於地下根莖。尖端肥大。肉質呈連球狀白色。大如指。形如蠶。可資食。味如馬鈴薯。亦供藥用。



草石蠶

採取 冬月採之。性質 甘。平。無毒。

主治 浸酒除風破血。煮食治浮毒。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論草石蠶曰。焙乾。主走注風。散血止痛。其節亦可持末。酒服。

【清】趙學敏本草綱目拾遺論草石蠶曰。治風痺。羊毛癩。虎咬成瘡。口不斂。為末搽之。解硫黃毒。蛇毒。治發背。癰疽。結核等症。竹。木。魚。刺。黃疽。熱淋。洗眼疾。及陰溼瘡。

參攷資料 ①草石蠶和五臟。下氣清神。(飲膳正要) ②草石蠶不宜生食。及多食。生寸白蟲。與諸

魚同食。令人吐。(李時珍)

【草血場】即地錦草之古籍別名。與見綱目。詳「地錦草」條。

【草血場】即地錦草之古籍別名。與見綱目。詳「地錦草」條。

【草兵】即巴豆之古籍別名。與見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【草決明】即青葙子之原名。詳「青葙子」條。

【草豆仁】即草豆蔻之古籍別名。與見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【草豆蔻】原名 豆蔻。肉豆蔻而名也。

處方用名 煨草果。草果仁。

古醫別名 漏蔻(草物志)草果(鄭樵通志)豆叩。豆株。家嗽。寶蔻。草豆仁(和漢藥考)蘇迄米羅細(金光明經)

外國名詞 Cardamomum (拉丁) (Cardamoms) (英)

基本 屬於蘭荷科。為草豆蔻之子實。

產地 陳仁山藥物生虛辨云。草果產雲南百色。廣西龍州等處。有運東京海防而來。有運南寧而來。十一月新。

形態 草豆蔻苗似薑。其葉似山薑。杜若。根似高良薑。二月開花。作穗。房生莖下。嫩葉卷之初如芙蓉花。微紅。穗頭深色。其葉漸腐

芙蓉花。微紅。穗頭深色。其葉漸腐

花漸出。色漸淡。亦有黃白色者。結實者龍眼。皮無鱗甲。皮中子如石榴瓣。夏月熱時採之。曝乾。根苗微作樟木香。根莖子俱辛香也。

選類 建寧所產者名草豆。大如龍眼。而形微長。其皮黃白。薄而稜峭。其仁大如縮砂仁。而辛香氣和。滇廣所產者名草果。長大如訶子。其皮色黑。厚而稜密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。

製法 雷斅曰。凡使草豆。須用帚取向莖子及皮。用茶葉同於鐵上煨炒。待茶葉微黃黑。即去茶葉。取草豆莖皮及子。杵用之。李時珍曰。今人惟以麵裹燒火煨熟。去皮用之。

性質 辛。溫。瀉。無毒。效。能 燥。溼。祛。寒。除。痰。截。痢。用。為。健。胃。解。毒。藥。

主治 溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。
歷代記述攷證 【宋】開寶重定新本草論草豆曰。下氣。止霍亂。一切冷氣。消酒毒。【元】李東垣用藥法象論草豆曰。調中補胃健脾。

消食。去客寒。心與胃痛。【明】李時珍本草綱目論草豆。曰。治瘴癘。寒瀉。傷暑。吐下。洩痢。噎膈。反胃。痞滿。吐酸。痰飲。積聚。婦人惡阻。帶下。除寒。燥溼。開鬱。破氣。殺魚肉毒。制丹砂。【明】繆希雍本草經疏論草豆。曰。味辛。氣溫。而性無毒。海藏又云。大辛。熱。入足。太陰。陽明。經。蓋辛能破滯。香能入脾。溫熱能祛寒燥溼。故主溫中。及寒客中焦。心腹痛。中寒。嘔吐也。脾開竅於口。脾家有積滯。則痰而為熱。故發口臭。醒脾導滯。則口氣不臭矣。辛散溫行。故下氣。寒客中焦。飲食不消。氣因閉滯。則霍亂。又散一切冷氣。消酒毒者。亦燥溼破滯。行氣健脾。開胃之功也。產閩之建寧者。氣芳烈。類白豆蔻。善散冷氣。療胃脘痛。理中焦。產滇貴兩粵者。氣猛而濁。俗呼草果者是也。善破瘴癘。消穀食。及一切宿食停滯。作脹悶及痛。【清】黃宮繡本草求真論草豆曰。草豆。性熱。辛。香。散。功。與。肉。蔻。相。似。但。此。辛。熱。燥。溼。除。寒。性。兼。有。瀉。不。似。豆。蔻。性。居。多。能。止。大。腸。滑。脫。不。休。也。又。功。與。草。果。相。同。但。此。止。逐。風。

寒客在胃口之上。症見當心疼痛。不似草菓辛熱浮散。專治瘴癘寒瀉也。故凡溼鬱成病。而見胃脘作疼。服之最為有效。若使鬱熱內成。及陰虛血燥者。服之為大忌耳。閩產名草菓。如龍眼而微長。皮黃白。薄而稜峭。仁如砂仁。而辛香氣和。滇廣所產名草菓。如訶子。皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。雖是一物。微有不同。麵裹煨熟。取仁。忌用鐵器。【清】閩立陸本草選旨論草菓曰。草菓。味大辛。熱。氣溫而猛。升也。陽也。無毒。與草豆。莖並入足。太陰。陽明。經。辛能去滯。香能入脾。溫熱能祛寒燥溼。故主治消食除痰。祛寒破滯。但氣比草菓猛。而且濁。功力迅速。故凡胸腹脹滿。宿食不消。或感寒中寒。腹痛吐利。或生冷積聚。痰涎鬱結。或寒邪客胃。當心作疼。或感山嵐瘴氣。或病霍亂。瀉心。若審知其為寒溼所致。而不為暑熱所傷者。用之如鼓應桴。而且同縮砂能溫中焦。故寒中者用之。同常山能截疫癘。故時瘧者用之。皆取其氣之猛烈。功之大而效之速也。然其氣溫。積溫成熱。過多能助脾

熱。傷脾損目。至於老衰虛羸。元氣不足者。則全戒焉。以其氣專消導也。

國外學說 英美學說謂草豆。性溫。補。開胃。祛風。佐瀉劑。同服。能免肚疼。每服一分至三分。

配合應用 ①入人參養胃湯。能消一切宿食。開拓中焦滯氣。②藥性論云。草豆。莖。單。用。能。主一切冷氣。

③治心腹脹滿短氣。用草豆。莖。一兩。去皮。為末。以木瓜。生薑。湯。調服。半錢。千金方。

④治霍亂煩渴。草豆。莖。黃連。各一錢。半。烏豆。五十粒。生薑。三片。水煎服。聖濟總錄方。

⑤治脾胃不足。虛寒瀉瀉。草菓。仁。一兩。以船上茴香。一兩。炒香。去茴香不用。吳茱萸。一兩。湯泡。七次。同破故紙。一兩。炒香。去故紙不用。初盧巴。兩。同山茱萸。一兩。炒香。去茱萸不用。三味。為末。酒糊丸。每六七十丸。鹽湯下。百一選方。

⑥香口辟臭。草豆。莖。細。辛。為末。含之。直指方。

①治脾痛腹滿。草果仁二箇。酒煎服之。(肘後方)

②治胃弱嘔逆不食。用草豆蔻仁二枚。高良薑半兩。水一盞。煮取汁。入生薑汁半合。和白麵作餅。刀以羊肉脂汁煮熱。空心食之。(普濟方)

③治虛癆自汗不止。用草果一枚。麩髮煨熟。連麩研入平胃散。二錢。水煎服。(經效濟世方)

④治赤白帶下。速皮草果一枚。乳香一小塊。麩裏煨焦。黃同麩研細。每米飲服二錢。日二服。(衛生易簡方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡陰血不足而無寒溼實邪者禁用。

著名方劑 果附湯。治氣虛脾寒。瘧疾。熱少寒多。或單寒不熱。或大便泄而小便多。不能食。(濟生方) 草果仁。熟附子各二錢。半生薑七片。棗肉二枚。上以水三盞。煎取一盞。溫服。

參攷資料 ①草豆蔻氣味極辛。微香。性溫。而調散冷氣甚速。虛弱不能飲食者。宜此與木瓜。烏梅。

縮砂。益智仁。狗寶。甘草。生薑同用。(寇宗奭) ②風寒客邪在胃之上。當心作疼者。煨熟用之。(李杲) ③草豆蔻性溫。能散滯氣。消膈上痰。若明知身受寒邪。口食寒物。胃脘作疼。方可溫散用之。如鼓應桴。或溼痰鬱結成病者。亦效。若熱鬱者。不可用。恐積溫成熱也。必用梔子之劑。(朱熹亨) ④豆蔻治病。取其辛熱浮散。能入太陰陽明。除寒燥溼。開鬱化食之力而已。南地卑下。山嵐烟瘴。飲酸酸鹹。脾胃常多寒溼。鬱滯之病。故食料必用與之相宜。然過多亦能助脾熱。傷肺損目。或云與知母同用。治瘧瘧寒熱。取其一陰一陽。無偏勝之害。蓋草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之火也。(李時珍) ⑤按揚雄方言云。凡物盛多白蔻。豆蔻之名。或取此義。豆象形也。南方異物志作漏蔻。蓋南人字無正音也。今雖不專爲果。猶入茶食料用。尙有草果之稱焉。金光明經三十二品香藥。謂之蘇乞迷羅細。(李時珍) ⑥草豆蔻今嶺南皆有之。苗似蘆。其葉似山薑。杜若。根似高良薑。二月

開花作穗。房生於莖下。嫩葉卷之而生。初如芙蓉。花微紅。穗頭深色。其葉漸廣。花漸出而色漸淡。亦有黃白色者。南人多採花以當果。尤貴。其嫩者。并穗入鹽同淹。治瘧瘧作朶不散。又以木槿花同浸。欲其色紅爾。其結實者。龍眼子而銳。皮無鱗甲。皮中子如石榴瓣。夏月熟時採之。曝乾。根苗微作樟木香。根莖子並辛香。(蘇頌) ⑦豆蔻生交趾。其根似益智。皮殼小厚。核如石榴而辛香。葉如芫荽而小。三月採其葉。細破陰乾用。味近苦而有甘。(李珣) ⑧草豆蔻草果雖是一物。然微有不同。今建寧所產豆蔻。大如龍眼。而形微長。其皮黃白。薄而穠。其仁大如縮砂仁。而辛香氣和。滇廣所產草果。長大如訶子。其皮黑厚而穠密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。彼人皆用茗茶。及作食料。俱用之物。廣人取生草蔻入梅汁。鹽漬令紅。曝乾。煎酒。名紅鹽草果。其初結小者。名鷓鴣舌。元朝飲膳。皆以草果爲上供。南人復用一種。火楊梅。僞充草豆蔻。其形圓而粗。氣味辛猛。而不和。人亦多用之。或云卽山薑實也。不可不辨。(李時珍)

【草東床】卽大腹皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大腹皮』條。

【草果】卽草豆蔻之古籍別名。典見鄭樵通志。詳『草豆蔻』條。

【草果仁】卽草豆蔻之處方用名。詳『草豆蔻』條。

【草河車】卽草紫河車之簡稱。詳『黃休』條。

【草金丹】卽杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杏仁』條。

【草金鈴】卽牽牛子之古籍別名。典見炮炙論。詳『牽牛子』條。

【草附子】卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【草萬餘糧】卽土茯苓之古籍別名。典見本草拾遺。詳『土茯苓』條。

【草菴】卽蓬菴之日本名。詳『蓬菴』條。

【草烏】卽草烏頭之簡稱。詳『草烏頭』條。

【草烏喙】卽烏喙之原名。詳『烏喙』條。 ②卽草烏頭兩歧相合者之別名。詳『草烏頭』條。

十畫 草

【草烏頭】

原名 烏喙。土附子。本品形如川

烏。而又為野生者故名。

古籍別名 兩頭尖。奚毒。(本

經) 耿子。毒公。帝秋。(吳普本草)

金鵝。鴛鴦菊。(綱目) 苗名。莨。莖

獨白草。(綱目拾遺) 汁煎名射罔

(綱目拾遺) 僧鞋菊。(吳俗名) 雙

麝菊。(日名)

外國名詞 Aconitum (拉丁)

基本 屬毛茛科。為烏頭之球

根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

烏頭產四川龍安府。陝西漢中兩

處。近日所用川烏草烏。長身細個

者。俱由日本運來。萬國藥方卷三

四十七篇論產於歐洲印度大謬。

形態 烏頭為山野自生之宿

根草。莖高二三尺。葉有光澤。作掌

狀分裂。十月間於梢上開青紫色

或白色花。有兜狀不整齊萼。形如

伶人之烏冠。故日本呼此為烏兜

此草由產地而異其花形。莖葉亦

有硬軟之別。其球根即烏頭。作蘿

蔔狀。下部漸漸細小。末端或尖或

鈍。上部扁平。往往彎曲。頗多縱橫

皺裂。色帶褐黃。

採取 春二月間採根。陰乾。

製法 李時珍曰。凡使烏頭。或

生用。或炮用。或以烏大豆同煎熟。

去其毒用。

用法 恒用焙到為末。和作外

治藥。間有和作丸散用。

性質 辛溫。有大毒。

成分 主成分為耶普阿哥尼

丁 Japconitine, C₂₁H₃₃N₃O₉

效能 祛風溼。開頑痰。用作麻

醉與鎮痙藥。施於腹痛。胸膈痛。

足痛。關節痛。及諸風痛。癱瘓。腦腫

黑內障眼等症。又治疝痛。偏癱。腦

性痙攣性小兒麻痺。

作用 自腸壁吸入血中。即能

大減血液循環之速率。使血壓降

低。由末梢神經傳達入腦。腦神經

被激而麻痺。視覺聽覺亦均減其

敏銳。心臟之跳動先速而後緩。同

時全身肌肉弛緩。思想紊亂。汗出

尿增。若服過量。竟可由失覺而死。

主治 中風惡風。洗洗出汗。除

寒溼痺。咳逆上氣。破積聚寒熱。其

汁煎之名射罔。殺禽獸。(本經) 消

胸上痰冷。食不下。心腹冷痙。辟間

痛。不可俯仰。目中痛不可久視。又

墮胎。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論草烏曰。主惡風憎寒。冷

痰包心。腸腹疔痛。瘰癧氣塊。傷痛

益陽事。強志。【明】李時珍本草綱

目論草烏曰。治頭風喉痺。癰腫疔

毒。【清】黃宮繡本草求真論草烏

曰。草烏頭辛苦大熱。按書論此。惟

長洲張澐辨之。明斷。言此與射罔

乃至毒之物。非若川烏頭附子之

比。自非風頑急疾。不可輕投此藥。

止能搜風勝溼。開頑痰。治頑疔。以

毒攻毒而已。本經治惡風。洗汗出。

但能去惡風。而不能回陽散寒。可

知。昔人病風癱。服草烏頭木鱉子

藥過多。甫入腹。遂麻痺不救。烏附

五種。主治攷分。附子大壯元陽。雖

偏下焦。而周身內外無所不至。天

雄峻溫。不減於附。而無頃刻回陽

之功。川烏專搜風溼痛痺。却少溫

經之力。側子善行四支。不入臟腑。

草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同

類異性者。至於烏喙稟氣不純。服

食遠之可也。【清】張隱庵本草崇

乃土附子也。性劣有毒。但能搜風

勝溼。開頑痰。破堅積。治頑疔。以毒

攻毒。不能如附子益太陽之標陽。

助少陽之火熱。而使神機之環轉。

用者辨之。【清】楊時泰本草述鈞

元論草烏曰。草烏頭為至毒之藥。

如用以治病。必須沉寒痼冷。足以

相當。或寒溼合井。結聚癰塊。頑痰

死血。阻塞真陽。非是不可以開道

路。令流氣破積之藥。得以奏功。蓋

因於風虛則病溼。溼聚而不化。則

病於風毒。謂之頑風。是其所治者

溼風也。故明其為風虛。則知用此

以透陽之壘。豈得概謂治風而投

之風淫以取敗哉。【清】鄒澍本經

疏證論草烏曰。烏頭之用。大率亦

與附子略同。其有異者。亦無不可

條疏而伴比之也。夫附子曰。主風

寒咳逆邪氣。烏頭曰。中風惡風。洗

洗出汗。咳逆邪氣。明明一偏於寒。

一偏於風。一則沉著而回浮。越之

陽。一則輕疏而散已潰之陽。於此

見附子沉。烏頭浮矣。附子曰。除寒

溼墜臂拘攣。膝痛不能行步。烏頭

曰。除寒溼痺。一主治痿。一主治痺。

按雙拘攣。是筋因寒而收引。陽氣

柔則能養筋。又何患其不伸。寒濕
痺是氣因邪而阻閉。陽氣強則能
逐邪。又何患其不開。於此見附子
柔。烏頭剛矣。夫惟其沉方能柔。惟
其散則為剛。沉而柔者無處不可
到。無間不可入。散而剛者無處不
可開。無結不可解。故附子曰破癥
堅積聚血癥。烏頭曰破積聚寒熱。

於此可見其一彙入血。一則止及
氣分矣。大烏頭煎治寒疝。只用烏
頭一味。籍中論脈甚詳。尤在淫釋
之尤妙。曰弦緊或皆陰也。而弦之
陰從內生。緊之陰從外得。弦則衛
氣不行。惡寒者。陰出而痺其外之
陽也。緊則不欲食者。陰入而痺其
胃之陽也。衛陽與胃陽並衰。外寒
與內寒交感。由是陰反無畏而上
衝。陽反不治而下伏。所謂邪正相
搏。即為寒疝。此用烏頭之鹹也。曰
寒疝繞臍痛。自汗出。手足厥冷。曰
拘急不得轉側。發作有時。陰縮。此
用烏頭之證也。此外用烏頭之法。
猶有二證。一則曰病歷節不可屈
伸疼痛者。烏頭湯。一則曰寒疝腹
中痛逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸
刺諸藥不治者。抵當烏頭桂枝湯。

烏頭湯比於麻黃。抵當烏頭桂枝
湯比於桂枝。可知烏頭為治陽痺
陰逆之要劑矣。

國外學說

日本學說謂據猪
子氏之實驗云。烏頭究非如漢醫
所稱道之貴重藥品。若於病床用
之。則從來所謂適宜之症。宜有制
限者。不過用於神經痛（內服或
外用）而已。就二三藥物書。舉其
醫治效用。大略（一）為鎮痛藥。於
癱瘓質斯。神經痛。痛風等症用之。
（二）以鎮靜心動之亢進為目的。
於脚氣用之。但因熱發而亢進者。
反以不用為良。（三）為利尿藥。於
諸般之水腫用之。至其用量。根內
用一回〇・〇三（七毫八絲）一
日〇・三（七毫八毫）極量一回
〇・一（二毫六毫）一日〇・五
（二分三釐）又藥用烏頭。品種甚
多。藥學博士下山順一郎氏大別
之為草烏頭。白川附子。勝山附子。
（以上三種為日本產）川烏頭。大
附子（以上二種華產）五種。註明
草烏頭為烏頭種根。白川附子為
其老根。而川烏頭及大附子。則未
有註釋。又據有葦草木圖說曰。烏

頭有大毒。有二種。山中自生者。曰
草烏頭。毒性甚烈。春從宿根生苗。
高三四尺。莖弱不能直立。葉分枝
而互生。至秋。每葉間開花。作深碧
色。大抵二三朵相綴。狀似伶人烏
冠。又有濃紫色與白色者。後者日
本呼為 *Hanabishi* 人家園圃
所栽者。曰川烏頭。毒性較草烏頭
稍遜。莖強而直立。葉厚。有深綠色
光澤。花濃紫色。狀與草烏頭之花
無異。凡烏頭即為其母。附子即為
其子。側子生於附子之側。栽附子
不生子而長大者。則謂之天雄。此
皆根之名。本草綱目烏頭釋名曰。
李時珍曰。『草烏頭取汁和酒。為
毒藥。射禽獸。蝦夷地方。取附子
加蜘蛛毒椒同搗。將煎凝之毒汁。
塗於竹箭。以射禽獸。謂之 *Upu*
或 *Footstone*。足知其毒之深。
綱目謂之射罔。即此。英美學說謂
草烏頭產中國。歐羅巴。印度等處。
高約一尺六寸至五尺。根則頭大
而末削。及多橫強。長約三四寸。其
根與葉。均可為藥品。內含一精。即
厄哥匿爾。亞格尼質。野生
者。較家烏頭尤毒。本草綱目。謂其

為至毒之藥。况西土較中國高亢。
所產者其力自較中國愈大。用鮮
葉可配膏汁等。用乾根可配酒及
擦酒等第根之功力。比葉尤峻。故
凡釀作藥酒者。或用根或用葉。亦
須聲明。西國常用之草烏頭。在歐
羅巴。數處山上。養六畜之處。或冷
處得之。如英國內地。間亦有之。西
國古時。原入毒品。人所鮮服。其用
以作服劑。僅百有餘年耳。至其醫
治作用。為止痛。寧睡。平癩。平
脈。藥。又為解熱。藥。解炎。藥。第有最
烈之毒。能徑不知覺。隨筋。如欲用
減熱氣之藥。則此藥有大用。如以
根少許入口嚼之。則發口津必多。
口中覺熱而癢。唇舌間覺有針刺。
服後則能平癩。令週體筋。麻木
不寧。四肢如觸。針。肉筋亦隨減
力。若服稍多。則必眼。窺。收。縮。又令
人昏。交。癱。瘓。因。暈。絕。而。死。如。或。服
至。殺。人。之。分。兩。則。覺。喉。刺。熱。肚。疼。
作。渴。作。吐。作。瀉。週。體。麻。木。而。愈。形
軟。弱。惟。不。至。昏。蒙。抽。搐。又。如。腦。氣
筋。疼。風。溼。及。心。病。用。此。藥。均。有。益。
凡。腦。氣。筋。疼。或。服。飲。劑。或。以。擦。酒
頻。擦。其。驗。又。如。牙。部。筋。作。疼。宜

先用擦酒搽膠頰。俟數日不愈。方可內服。又如牙痛。以棉花蘸擦酒。塞入牙穴。其痛即止。又如初患風溼。每日宜服此藥三四次。連服數日可愈。若舊症骨衣生厚。亦宜每日服飲三四次。兼以擦酒搽之。又如跌打損傷。以擦酒搽之。有奇效。又如胃不消化。及舌有白苔。宜與發汗藥或瀉藥同服。此藥以火酒浸之。能提出功力。尋常用者。則以所浸之酒入藥。其功用又能治痛風。胃氣疼。毒癰。心體變大。梅核生炎。牙關緊閉。癆痰。第藥性酷烈。用宜慎。至解藥之解此毒。須先用吐劑。後用內外行氣劑。

近人學說 ●張山雷曰。本經亦有烏頭之名。李氏綱目謂此非川產之烏頭。而野生於他處者。故以草烏頭別之。壽頰按本經烏頭。但云生山谷。初無川產非川產之明文。但今之草烏。既非川產。則藥性當自有別。蓋川中烏附。據宋人楊天惠附子說。謂產於綿州之彰明縣。熟耕作壘。冬月播種。春月生苗。云云。可知川產皆為人力所培植。而他處所產。既野生。則毒烈

自當更甚。其汁煎之名曰射罔。能殺野獸。其毒可知。國語謂驪姬置葷於閭。葷昭注葷烏頭也。左傳載驪姬置葷事。謂公祭之地。地債與犬。犬斃。與小臣。小臣亦斃。烏頭大毒。乃至於此。誠非附子之可以同日語也。本經謂主中風惡風。洗洗。蓋仍以外感寒風而言。洗洗。讀作灑灑。仍是灑漸惡風之候。而後世乃謂可治惡風。以惡字作如字讀。豈古人之真旨。要知毒風厲風等症。皆是血熱成毒。似此大熱大毒之物。胡可妄投。此蓋誤讀古書之謬。疑人說夢。妄不可聽。惟果是寒溼寒痰。洩陰泄寒。堅凝結聚之症。始可用為佐使。引到病所。以開堅積耳。此藥雖經甘草湯浸。姜汁製透。然入口管之。喉舌即刺痛異常。少頃且麻木熱腫。猛烈莫與等倫。欲入煎劑。不過一二分而止。瀨湖謂吾蘇郡知府。自負知醫。因為風痺。服草烏頭木鱉子藥。入腹麻痺。遂至不救。後人亦當知所戒矣。●楊華亭曰。本草經烏頭。附子。天雄。雖分三名。而主治略同。惟烏頭條下有可為射罔殺禽獸等語。別錄

云。烏頭生郎陵。〔河南臨山縣〕李時珍以川產者為烏頭。他處為草烏頭。實大誤。近世烏頭。附子。天雄。側子。皆用四川人工產者。其形態與天產稍異。其根粗圓而短。其鮮質大者兩餘。乾者約七八錢。若天產鮮質。至大不過四錢。小者一二錢。乾質大者約一二錢。小者數分。西國入藥。統名烏頭。非西國烏頭。不生附子。亦非棄去附子。蓋烏頭。附子。天雄。側子。漏籃子。其性味皆同。實不能強為分別。獨恨雷斅云。『味。附烏。雄。側。中。吡。者。服之。令人喪目。』自欺欺世。誠醫藥界之罪人也。予曾以天生之烏頭。附子等為末。試服二哩。至一小時。覺腦中如開電機。顛動迅速。而動力輕浮微茫。如分劑再加。即至眩暈。因知此藥先至腦部。故漢書頗使醫淳于衍。以烏頭毒皇后。后曰。我頭岑岑也。或謂中西烏頭。附子等不類。但予曾管驗其功能。實係相同。其不同者。中西用法有異耳。中醫多用原質配藥煎服。西醫多用烏頭酒單服。而配劑較少。故其取較與主治常覺不類。非藥之本

質有懸殊也。別錄於烏頭等之修治云。『採根陰乾。』至雷斅與陶弘景云。『熱灰炮製。』由是炮製之法。日益加多。至宋乃有釀造之治。明李中梓以薑汁鹽水煮之。今四川人工產者。均以鹽水煮熟。色褐黑而光。形如煮熟甘藷。因此藥內含澱粉。如被煮熟。則澱質已變而黏。〔藥市以此為生附子。生烏頭。實誤。〕及至藥房。復用水浸。必達至咀嚼無味。切成薄片。美其名曰淡附片。俗醫往往用至兩許。皆此造作物也。陳修園云。『按製藥始於雷公。炮製竟謬。難以悉舉。要知此人名數。宋時人非黃帝時之雷公也。』日人和田啓十郎云。『後世修治之法甚煩。去酷烈之本味。棄偏性之毒氣。使純弱無能之物。而欲以除毒治病。是猶緣木求魚也。蓋藥之本性在毒。無毒則不成藥。豈能專司修治以滅藥之毒耶。』夫藥之大毒小毒。以病當之。以分劑計之。何毒之有。本草徑凡例云。『若用毒藥療病。先起如黍粟。病去即止。不去倍之。不去十之。取去為度。』西醫用藥多提取元素去

其精柏。如烏頭素以極淡之溶液。(如干分舍一)替之能令唇舌麻刺。今我中醫用藥。乃去其元素。取其精柏。反謂之去毒精製。誠大惑莫解也。蓋烏頭附子等雖極毒。而入藥主治之功能。則為諸藥所莫及。然單服者甚少。宜與他藥並用為妙。明其病理與分劑。即勿須畏其毒。惟能用毒藥。方為良醫。夫兵者凶器也。而仁人用之。可以救民。用藥通乎用兵也。故內經多稱毒藥。淮南子云。『天下之物。莫凶於奚毒。然而良醫藥而藏之。有用也。』李時珍云。『吾時知府自負知醫。因病瘡。服草烏頭。木鱉子。藥過多。甫入腹。而麻痺遂至不救。可不慎乎。』予謂郝氏之死。非死於毒。乃死於不善用毒耳。李氏又云。『李東垣治馮翰林姪陰盛格陽。傷寒。面赤煩渴引飲。脈來七八至。按之則散。用葶附湯加人參投半斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙也。』按以上所云。陰盛格陽。其脈七八至。面目赤而煩渴者。無一非烏頭之正治。用之而效。固其宜也。又何神奇之有。李氏不知。乃以不

奇為奇。非所謂皆非勝是者歟。惟云共投半斤。則幸為製造無力之物。如同嚼粥。噉飯。否則立時致命矣。金匱用烏頭約五方。用天雄一方。用附子約十八方。傷寒論用附子。約十九方。古用皆天產也。烏頭。附子。天雄。側子。俱用原質。此藥喜生深山向陰之地。採根於春日及花後莖枯之時。洗去泥土及根鬚。輕刮去外皮。陰乾。收藏勿洩氣。用時搗碎。採子於成熟之後。採葉於夏日陰乾用之。入藥用根與子。其莖葉亦可。惟力較遜耳。有大毒。微臭。鮮質管之味。先甜後苦。後則辛熱麻刺。(嘗時須謹慎)烏頭。附子。天雄。側子。性味俱同。行於皮膚。則生汗。若與桂枝並用。亦能止汗。傷寒論桂枝加附子湯用之。能令血管舒縮。中樞微阻。故能止其漏汗。若走於神經系統。能平腦止痛。醫風寒。選脾。頭痛。目痛。不能久視。項強。關節炎。肩臂痛。腰痛。四肢拘攣。寒氣腹痛。經痛。子宮寒。白帶等症。均有效。行於血循環。能令血壓減少。因秘走神經。中樞被激。致心肌受阻。則血管舒短。中樞亦受阻。

是以血壓為緩。故於脈波洪數。因血旺鼻衄。心跳等症。佐生地三七等藥服之。能令脈數為緩。但至脈沉微欲絕時。如四肢厥逆。霍亂吐瀉等症。與乾薑等藥相配。又能加增血壓。有回陽通絡溫經之功。故仲師四逆湯。通脈四逆湯用之。再走於腎經。能激刺小便。加多。故桂枝加附子湯內用之。主小便難。療學云。『此藥乃醫家為重要之劑。其效尤為他藥不能及。』但此藥功效雖多。其毒性亦烈。只醫士臨症變化。惟於虛弱症慎用。若於局部神經系痛。以烏頭素擦。擦之有效。惟於近目口處不可用。再此藥能惹胃。足分劑多服。令人眩暈嘔吐。金匱烏頭桂枝湯云。『加至五合。其知者如醉狀。得吐者為中病。』此係烏頭入腦惹胃之力。毒分劑則致呼吸中樞被癱。脈波弛緩。以至心舒停止而死。

是以以血脈為緩。故於脈波洪數。因血旺鼻衄。心跳等症。佐生地三七等藥服之。能令脈數為緩。但至脈沉微欲絕時。如四肢厥逆。霍亂吐瀉等症。與乾薑等藥相配。又能加增血壓。有回陽通絡溫經之功。故仲師四逆湯。通脈四逆湯用之。再走於腎經。能激刺小便。加多。故桂枝加附子湯內用之。主小便難。療學云。『此藥乃醫家為重要之劑。其效尤為他藥不能及。』但此藥功效雖多。其毒性亦烈。只醫士臨症變化。惟於虛弱症慎用。若於局部神經系痛。以烏頭素擦。擦之有效。惟於近目口處不可用。再此藥能惹胃。足分劑多服。令人眩暈嘔吐。金匱烏頭桂枝湯云。『加至五合。其知者如醉狀。得吐者為中病。』此係烏頭入腦惹胃之力。毒分劑則致呼吸中樞被癱。脈波弛緩。以至心舒停止而死。

是以以血脈為緩。故於脈波洪數。因血旺鼻衄。心跳等症。佐生地三七等藥服之。能令脈數為緩。但至脈沉微欲絕時。如四肢厥逆。霍亂吐瀉等症。與乾薑等藥相配。又能加增血壓。有回陽通絡溫經之功。故仲師四逆湯。通脈四逆湯用之。再走於腎經。能激刺小便。加多。故桂枝加附子湯內用之。主小便難。療學云。『此藥乃醫家為重要之劑。其效尤為他藥不能及。』但此藥功效雖多。其毒性亦烈。只醫士臨症變化。惟於虛弱症慎用。若於局部神經系痛。以烏頭素擦。擦之有效。惟於近目口處不可用。再此藥能惹胃。足分劑多服。令人眩暈嘔吐。金匱烏頭桂枝湯云。『加至五合。其知者如醉狀。得吐者為中病。』此係烏頭入腦惹胃之力。毒分劑則致呼吸中樞被癱。脈波弛緩。以至心舒停止而死。

川烏頭一枚。生附子一枚。並為末。葱一斤。豉一斤。搗如泥。和作餅子。以草鋪盤內。加楮葉於上。安餅於葉上。又鋪草葉蓋之。待出汗。只一日夜。乃曬之。為末。以生薑取汁。煮麵糊和丸。梧子大。初服三十丸。日二服。服後身痺。汗出即愈。惟須避風。(乾坤秘製方)

◎治發傷風病。用草烏頭為末。每以一二分。溫酒服之。出汗。(醫域方) 又用草烏尖。白芷。并生研末。每服半錢。冷酒一盞。入葱白一根。同煎服。少頃。以葱白熱粥投之。汗出即愈。(儒門事親方)

◎治年久麻痺。或歷節走氣。疼痛不仁。不拘男女。神授散。用草烏頭半斤。去皮為末。以袋一箇。盛豆腐半袋。入烏頭末在內。再將豆腐搗滿。壓乾。入鍋中煮一夜。其藥即堅如石。取出。曬乾為末。每服五分。冷風溼氣。以生薑湯下。麻木不仁。以葱白湯下之。(活人心統方)

◎治風溼痺木。黑神丸。草烏頭連皮生研。五蠶脂等分為末。六月六日。滴水丸。彈子大。四十歲以下分六服。病甚。一丸作二丸。薄荷湯

化下。覺微麻為度。(本事方)

◎治風溼走痛。黑膏煎丸。用兩頭尖。五蠶脂各一兩。乳香。沒藥。當歸三錢。為末。醋糊丸。梧子大。每服十九至三十丸。臨臥溫酒下。忌油膩。溼麵。孕婦勿服。(瑞竹堂方)

◎治腰脚冷痛。烏頭三箇。去皮臍。研末。醋調貼。須臾痛止。(十便良方)

◎治膝風作痛。草烏。細辛。防風。等分為末。搽靴襪中。及安護膝內。能除風溼健步。(扶壽方)

◎治遠行脚腫。草烏。細辛。防風。等分為末。搽鞋底內。如草鞋。則以水微溼。擦之。用之可行千里。甚妙。(經驗方)

◎治脚氣製痛。或膝間有核。生草烏頭。大黃。木鼈子。作末。豉汁煎茶調貼之。又法。草烏一味。為末。以豉汁或酒糟同搗貼之。(永類鈴方)

◎治溼滯足腫。早輕晚重。用草烏頭一兩。以生薑一兩同研。交感一宿。蒼朮一兩。以葱白一兩同研。交感一宿。各焙乾。為末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。酒下。

◎除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用草烏頭一斤。蒼朮二斤。以去白陳皮半斤。生甘草四兩。黑豆三升。水一石。同煮乾。只揀烏木。曬焙為末。酒糊丸。梧子大。焙乾收之。每空心溫酒下。二三十丸。覺麻即漸減之。名烏朮丸。(集簡方)

◎治偏正頭痛。草烏頭四兩。川芎。藜四兩。蒼朮半斤。生薑四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶。封固。埋土中。春五夏三。秋五冬七日。取出。曬乾。揀去葱薑。為末。醋糊和丸。梧子大。每服九丸。臨臥溫酒下。立效。(戴古渝經驗方)

◎治久患頭風。草烏頭尖。生用一分。赤小豆三十五粒。麝香一字。為末。每服半錢。薄荷湯冷服。更隨左右噴鼻。(指南方)

◎治風痰頭痛。體虛傷風。停聚痰飲。上厥頭痛。或偏或正。草烏頭炮去皮尖。半兩。川烏頭生去皮尖。一兩。麝香。乳香。三梟子。大為末。每服二錢。薄荷湯下。食後服。(陳胃三因湯方)

◎治女人頭痛。血風證。草烏頭。

桐子。等分為末。自然葱汁。隨左右調塗太陽及額上。勿過眼。須避風。(濟生方)

◎治腦洩鼻穢。草烏去皮半兩。蒼朮一兩。川芎二兩。並生研末。麴糊丸。綠豆大。每服十丸。茶下。忌一切熱物。(聖濟總錄方)

◎治耳鳴耳癢。如流水及風聲。不治成聾。用生烏頭。掘得。乘溼削如玳瑁大。塞之。日易二次。不三日愈。(千金方)

◎治喉痺口噤。不開欲死。草烏頭。皂莢。等分為末。入麝香少許。搽牙。并噴鼻內。牙關自開也。用草烏尖。石膽。等分為末。每用一錢。醋煮皂莢汁調稀。掃入腫上。流涎數次。其毒即破也。(濟生方)

◎治虛壅口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一大塊。為末。睡時以醋調塗手心。足心。或以草烏頭。吳茱萸。等分為末。密調塗足心。(本事方)

◎治疔蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。入麝香。等分為末。貼之。

◎治風蟲牙痛。草烏炒黑。一兩。細辛一錢。為末。搽之。吐出涎。一方

草烏食鹽同炒。黑慘之。(海上方)

⑤治寒氣心痛三十年者。射罔食茱萸等分爲末。蜜丸。麻子大。每酒下二丸。日三服。劉國英所祕之方。(范汪東陽方)

⑥治寒癩積瘰。巴豆一枚。去心皮。射罔去皮。如巴豆大。大棗去皮一枚。搗成丸。梧子大。清旦先發時。每服一丸。白湯下。(肘後方)

⑦治脾寒厥瘧。先寒後熱。名寒瘧。但寒不熱而色黑者。名厥瘧。寒多熱少。面黃腹痛。名脾瘧。三者並宜服此。買耆老用之二十年。累試有效。不蛀草烏頭。削去皮。沸湯泡二七度。以蓋蓋良久。切焙。研稀。糊丸。梧子大。每服三十丸。覆十片。覆三枚。葱三根。煎湯清早服。以聚壓之。如人行十里許。再一服。絕勿飲湯。便不發也。(東坡良方)

⑧治腹中癥結。雷妨飲食。羸瘦。射罔二兩。椒三百粒。搗末。雞子白和丸。麻子大。每服一丸。漸至三丸。以愈爲度。(肘後方)

⑨治水泄寒痢。大草烏一兩。以一半生研。一半燒灰。醋糊和丸。綠豆大。每服七丸。井華水下。忌生冷

魚肉。(十便良方)

⑩治泄痢注下。三神丸。治清濁不分。泄瀉注下。或赤或白。腹臍刺痛。裏急後重。用草烏頭三箇。去皮。尖。以一箇火炮。一箇醋煮。一箇燒灰爲末。醋糊丸。綠豆大。每服二十丸。水瀉流水下。赤痢甘草湯下。白痢薑湯下。忌魚腥生冷。(和劑局方)

⑪治結陰下血腹痛。草烏頭。蛤粉炒。去皮。臍切。一兩。茴香炒三兩。每用三錢。水一盞。入鹽少許。煎八分。去滓。露一夜。五更冷服。(聖濟總錄方)

⑫治老人遺尿。不知出者。草烏頭一兩。童便浸七日。去皮。同鹽炒爲末。酒糊丸。綠豆大。每服二十九。鹽湯下。(普濟方)

⑬治內痔不出。草烏爲末。津調點肛門內。痔即反出。乃用枯痔藥點之。(外科集驗方)

⑭治疔毒初起。草烏頭七箇。川烏頭三箇。杏仁九箇。飛羅麵一兩。爲末。無根水調。搽留口。以紙蓋之。乾則以水潤之。(唐瑤經驗方)

⑮治疔毒惡腫。生烏頭切片。醋

熬成膏。攤貼。次日根出。又方。兩頭尖一兩。巴豆四箇。搗貼。疔自拔出。(普濟方)

⑯治疔毒發背。草烏頭去皮爲末。用葱白連鬚和搗丸。豌豆大。以雄黃爲衣。每服一丸。先將葱一根細嚼。以熱酒送下。或有惡心。嘔三四口。用冷水一口止之。即臥。以被厚蓋。汗出爲度。亦治頭風。(乾坤祕鑑方)

⑰治惡毒諸瘡。及發背疔瘡。便毒等證。二烏膏。用草烏頭。川烏頭。於瓦上。以井華水磨汁塗之。如有口。即塗四邊。乾再上。亦可單用草烏膠醋塗之。(永類鈴方)

⑱治大風癩瘡。遍身黑色。肌體麻木。痺痛不常。草烏頭一斤。刮洗去皮。極淨。攤乾。以清油四兩。鹽四兩。同入鍋內。炒令深黃色。傾出。剩油。只留鹽并藥。再炒令黑。煙出爲度。取一枝。壁破。心內如米一點白者始好。白多再炒。乘熱。粹羅爲末。醋糊丸。梧子大。每服三十九。空心溫酒下。草烏性毒難制。五七日間。以黑豆煮粥食。解其毒。(濟察方)

⑲治通身生瘡。陰囊兩脚尤甚者。草烏一兩。鹽一兩。化水。浸一夜。炒赤爲末。猪腰子一具。去膜。煨熟。竹刀切。搗醋糊丸。綠豆大。每服三十丸。空心鹽湯下。(濟察方)

⑳治一切諸瘡未破者。草烏頭爲末。入輕粉少許。臘猪油調和。搽(普濟方)

㉑治瘰癧初作未破。作寒熱。草烏頭半兩。木鱉子二箇。以米醋磨細。入搗爛葱頭。蚯蚓糞少許。調勻。傅上。以紙條貼。令通氣孔妙。(醫林正宗方)

㉒治馬汗入瘡。腫痛急。燎之。遇則深。以生烏頭末。傅瘡口。良久。有黃水出。即愈。(靈苑方)

㉓治蛇蝎螫人。射罔傅之。類易血出。愈。(梅師方)

㉔治中沙風毒。用射罔傅之。佳。(千金方)

㉕用量 八分至一錢。施用宜忌 凡陰虛陽盛。及非真中寒者。禁用。反半夏。括蕪。貝母。白欬。白芨。惡藜蘆。

㉖著名方劑 ①烏頭湯。治歷節疼痛。不可屈伸。(金匱方) 麻黃芍

十畫 草

藥、黃耆、甘草(炙)各三兩。烏頭三枚(咬咀)以蜜二升煮取一升。即出烏頭。上五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。納蜜煎中。更煎之。服七合。不知。更服之。○大烏頭煎。腹滿。脈弦而緊。弦則衛氣不行。即惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。即為寒痼。遠勝痛者。發則自津出手。足厥冷。其脈沉緊者。此主之。(金匱方)烏頭。(大者五枚。熬去皮。不必咀)水二升。煮取一升。去滓。納蜜二升。煎令水氣盡。又一煎法。取二升。強入服七合。弱人服五合。不知。明日更服。不可一日再服。○烏頭赤石脂丸。心痛。激背。背痛。噉心。此主之。(金匱方)蜀椒一兩。烏頭一兩。(泡)附子半兩。乾姜一兩。赤脂一兩。上五味。末之。蜜丸。如梧子大。先食服一丸。日三服。不知。再加。○烏頭桂枝湯。治寒疝腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治者。(金匱方)烏頭大者五枚(熬去皮。不必咀)以水二升。煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。又一煎法。令將一升後。初服二合。不知。即服三合。又不知。深加至五

合。其知者。如醉狀。得吐者。為中病。參攷資料 ○草烏頭。今杭人多植於庭院。九月開花。淡紫嬌豔。與菊同時。謂之鸚鵡菊。又謂雙鸞菊。蕊若菊。瓣若菊。皆以花之形狀名之。根有大毒。與川中所出之烏頭迥別。古時烏頭烏喙。隨時所稱。非有異也。後人以形正者。有似烏烏之頭。其兩枝相合而生者。有似烏烏之喙。以此別之。然形狀雖殊。主治則一。(王塚崖)○草烏之毒。甚於川烏。蓋川烏由人力種。時時則探。草烏乃野生。地上多歷歲。月。故其氣力。尤為勇悍。猶之芋子。人植者無毒。可啖。野生者有毒。不可啖。其理一也。又川烏先經鹽淹。殺其烈性。寄至遠方。為日稍久。故其毒少減。草烏未經淹製。或係現取。其毒較甚。(王塚崖)○今人製造酒藥。凡川烏草烏。暨各種毒品。亦皆在內。名曰紹興酒藥。釀酒易熱。且多氣味香烈。杭俗甚行。而受其害者比比也。(仲氏)○凡風寒溼痺。骨內冷痛。及損傷入骨。年久發痛。或陰疽腫毒。並宜草烏頭。南星等分。少加肉桂為末。煮汁熱酒

調塗。未破者能內消。久潰者能去黑爛。二藥性味辛烈。能破惡塊。逐寒熱。遇冷即消。遇熱即潰。(楊清叟) 【草珠兒】即苡仁之古籍別名。典見救荒本草。詳「苡仁」條。 【草紙】 基本 本品係用稻草所製成之紙。用以包物者。 性質 甘。平。無毒。 主治 腸風下血。癰腫瘰癧。小兒臍疔。燒灰用。餘與楮紙同。 【草蕊】 即木蓮之古籍別名。典見山海經。詳「木蓮葉」條。 【草梢】 即甘草梢之處方簡名。詳「甘草」條。 【草犀】 命名 本品解毒之功。如犀角。故名。 處方用名 草犀根。 產地 在山野間。 形態 莖高二三尺。獨莖。根如細辛。 性質 辛。平。無毒。 主治 解一切毒氣。虎狼蟲虺所傷。溪毒野蠱惡刺等毒。並宜燒服之。臨死者亦得活。

一〇八四

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論草犀根曰。天行癘毒。寒熱咳嗽。痰壅。飛尸。喉痺。瘡腫。小兒寒熱。丹毒。中惡。注忤。利血等病。煮汁服之。嶺南及睦黎間。中毒者。以此及千金藤並解之。 參攷資料 ○草犀生衝繁洪。饑間。苗高二三尺。獨生根如細辛。生水中者名水犀。(陳藏器)○廣州記云。生嶺南及海中。獨莖對葉而生。如燈蕊。草根若細辛。(李珣) 【草犀根】 即草犀之處方用名。詳「草犀」條。 【草紫河車】 即蚤休之別名。詳「蚤休」條。 【草豉】 形態 草豉為葉類之花中。可供食與藥用。 性質 辛。平。無毒。 主治 辟惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。 【草雀】 即高雀之別名。詳「高雀」條。 【草魚】 即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱒魚」條。 【草魚目】 即苡仁之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【草麻繩索】

命名 小白索。大日繩。本品係

用草或麻所製成之繩索故名。

主治 大腹水病。取三十枚去皮研水三合。且服。日中當吐下水汁結囊。若不盡。三日後再作。未盡更作。遂後禁水飲鹹物。

【草雲母】即雲質之苗。見唐本草。詳「雲質」條。

【草當歸】即當歸色白而味薄者之古籍別名。典見本草集註。詳「當歸」條。

【草痴】即水蛭之古籍別名。典見綱目。詳「水蛭」條。

【草蜂窠】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳「露蜂房」條。

【草裏金銀】即玉銀草開黃花者之別名。詳「玉銀草」條。

外國名詞 Gossy-
pium herbaceum L.

產地 東印度及亞刺比亞原產。我國各地亦有栽培。

基本 錦葵科。草棉屬。

形態 草棉為一年生草本。高至二三尺。葉掌狀分裂有長葉柄。

互生。托葉二片。形狹而尖。秋月葉腋開花。花大有苞。基部連合。上部分裂。萼杯狀。花冠五瓣。黃色。單體。雄蕊包圍於雌蕊之外。雌蕊一枚。子房上位。果實為蒴果。熟則開裂。其種子被以長毛白色。俗名棉花。可為絮及藥用。



棉 草

性質 甘溫。

主治 禦寒却冷。燒灰止血。敷凍瘡。

【草裏銀銀】即玉銀草開白花者。見「玉銀草」條。

【草蒿】即青蒿之古籍別名。典見本草經。詳「青蒿」條。即黃花蒿之古籍別名。典見綱目。詳「黃花蒿」條。

【草蒿子】即青蒿子之古籍別名。典見本草經。詳「青蒿子」條。

【草蜘蛛】

原名 蜘蛛。產地 生原野草木稠密諸處。

形態 草蜘蛛為蜘蛛類之一種。其腹長。恒於草木枝葉間。張平網如棚。作穴於一隅。隱伏其身。以待蟲至。網而捕食。此物可供藥用。主治 出疔腫。根搗膏塗之。

【草蜘蛛絲】

主治 去瘡贅。疥子。除瘧疾。

【草蜜】即羊刺蜜之古籍別名。典見本草拾遺。詳「刺蜜」條。

【草節】即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【草節鉛】即鉛之產於四川犍為縣者。見「鉛」條。

【草蓮】即海鳳絲之別名。見「海鳳絲」條。

【草菴蓉】即列當之處方用名。詳「列當」條。

【草菌】即鹿豆之古籍別名。典見爾雅。詳「鹿菌」條。

古籍別名 草屨。屨。不借千里馬。(綱目)

採取 以破舊者入藥用。

主治 和人亂髮。燒灰。醋調。傅小兒熱毒遊腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論草鞋曰。僮生。治蠶亂。

【草鞋底】即葦筍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「葦筍」條。

【草鞋鼻】功用與草鞋同。詳該條。

【草頭】首習之別名。見「首習」條。

【草鷓頭】即貫衆之古籍別名。典見別錄。詳「貫衆」條。

【草龍珠】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【草龍芻】即龍鬚草之古籍別名。典見述異記。詳「龍鬚草」條。

【草龍膽】即龍膽之俗名。詳「龍膽」條。

【草屨】即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳「草鞋」條。

【草葷】即射干之古籍別名。典見別錄。詳「射干」條。

【草螺子】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【草鐘乳】即韭之古籍別名。典見本草拾遺。詳「韭」條。

【草菌茹】即通川菌茹。取其漆頭赤皮者。本品乃白菌茹之別名。典見綱目。功用與菌茹同。詳「菌茹」條。

【草麒麟】即蘇骨草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蘇骨草」條。

條。
【草楨斷】卽石龍芻之古籍別名。與見本經。詳『石龍芻』條。

【草蘭】原名 蘭草。本品葉似馬蘭。故名。

處方用名 省頭草。

古醫別名 前水香(本經)香

水蘭。燕尾香(開寶)煎澤草。(唐

本)蘭澤草(弘景)大澤蘭。(炮

炙)都梁香(李氏藥錄)女蘭。孤

兒菊(綱目)孩兒菊。千金草。九節

蘭(綱目拾遺)

基本 屬蘭科。爲草蘭之葉。



(一) 蘭草

形態 草蘭爲芳草類之多年常綠草本。山野及池澤恒有自生。高二三尺。有地下莖。葉細長而尖。或短而狹小。質平滑有光澤。邊緣有鋸齒甚細。長尺許。有平行脈。由根叢生。下部之葉三裂。上部尖長。花色淡紫。或淡黃綠色。瓣上有細

紫點。花冠爲管狀。列爲頭狀花序。一莖一花。幽香清遠。古人恒摘而佩之。故謂之都梁香。其花于根葉可供藥用。



(二) 蘭草

採取 四五月間採之。

性質 辛。平。無毒。

效能 辟惡。調氣。用作芳香健胃藥。

主治 利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣輕身。不老通神明。(本

經)除胸中痰癖。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】雷

斡雷公炮炙論蘭草曰。生血調氣

養營【唐】陳藏器本草拾遺論蘭

草曰。主惡氣香澤。并可作膏塗髮。

【宋】馬志開寶新詳定本草論蘭

草曰。養水浴風病。【元】李東垣用

藥法象論蘭草曰。其氣清香生津。

止渴潤肌肉。治消渴瘵。【明】李

時珍本草綱目論蘭草曰。消癰腫。

調月經。煎水解中牛馬毒。【明】經

希雅本草經疏論蘭草曰。蘭草稟天地清芬之氣以生。故其味辛。氣平無毒。入手太陰足陽明經。肺主氣。肺氣鬱結。則上竅閉而下竅不通。胃主納水穀。胃氣鬱滯。則水穀不以時化而爲痰癖。蟲毒不祥之氣。亦胃中受病。辛不能散結滯。芬芳能除穢惡。則上來諸證自癒。大都開胃除惡。清肺消痰散鬱結之聖藥也。久服等語。亦言其效之極功耳。

近人學說 張山雷曰。蘭草芳

香。故能解毒辟穢。而生於水中。則

能利水。功用亦與澤蘭無甚大別。

東垣謂其氣清香。生津止渴。治消

渴脾瘵。蓋消渴脾瘵。皆脾胃熱壅。

氣愈鬱則熱愈熾。清芳可以導濁。

則熱氣疏通。內經謂肥美所發。令

人口甘。治之以蘭。除陳氣也。石頑

逢原。亦謂嘔噎脾痺。口中時時溢

出甜水者。非此不除。芳辛溫。調

肝和脾。功倍馨香。善散積久陳鬱

之氣。

配合應用 同藿香。枇杷葉。

石斛。竹茹。橘紅。開胃氣之神品。

治噎膈之將成者。加入沈水

香。鬱金。白豆蔻。真蘇子。蘆根汁。下氣開鬱。

治消渴。同栝樓根。麥冬。黃連。竹葉。蘆根汁。

食牛馬毒殺人者。省頭草速

根葉煎水服卽消。(唐瑤經驗方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 蘭草浸油塗髮。

去風垢。令香潤。史記所謂羅襪

解。微聞香澤者是也。崔實四時月

令作香澤法。用清油浸蘭香。蠶香

雞舌香。苜蓿葉四種。以新綿裹浸。

胡麻油和豬脂納銅鑪中。沸定。下

少許青蒿。以綿幕瓶鑄嘴。滴出。瓶

收用之。(李時珍)香蘭乃香草。

能辟不祥。陸瓊詩疏。首鄭俗三月

男女乘間於水際。以自祝。蓋蘭

以蘭之藹以蘭之其義一也。淮南

子云。男子種蘭。美而不芳。則蘭須

女子種之。女蘭之名。或因乎此。其

葉似菊。女子小兒喜佩之。則女蘭

孩菊之名。又或以此也。唐瑤經驗

方。言江南人家種之。夏月採置髮

中。令頭不蝟。故名省頭草。其說正

合煎澤之義。古人蘭蕙皆稱香草。

如零陵香草。都梁香草。後人省之

通呼爲香草爾。近世但知蘭花。不知蘭草。惟虛谷方回考訂。極言古之蘭草。卽今之千金草。俗名孩兒菊者。其說可據。(李時珍) 蘭草澤蘭。一類二種也。俱生水旁下濕處。二月宿根生苗成叢。紫莖素枝。赤節綠葉。葉對節生。有細齒。但以莖圓節長而葉光有歧者爲蘭草。莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭。嫩時並可採而佩之。八九月後漸老。高者三四尺。開花成穗。如鷄蘇花紅白色。中有細子。雷敬炮灸論所謂大澤蘭。卽蘭草也。小澤蘭。卽澤蘭也。禮記佩蘭註。楚辭秋蘭以爲佩。西京雜記。栽漢時池苑種蘭。以辟神。或雜粉葢衣香中辟蠹者。皆此二蘭也。今吳人蒔之。呼爲香草。夏月刈取。以酒油瀝制。經作把子。貨爲頭澤佩帶。與別錄所出大吳之文。正相符合。或云家蒔者爲蘭草。野生者爲澤蘭。亦通。(李時珍) 蘭有數種。蘭草澤蘭。生水旁。山蘭卽蘭草之生山中者。蘭花亦生山中。與三蘭迥別。蘭花生近處者。葉如麥門冬而春花。生福建者。葉如菅茅而秋花。黃山谷

所謂一幹一花爲蘭。一幹數花爲蕙者。蓋因不識蘭草蕙草。遂以蘭花強生分別也。蘭草與澤蘭同類。故陸璣言蘭似澤蘭。但廣而長節。離離言其綠葉莖素枝。可綴可佩。可藉可膏可浴。鄭詩言士女秉蘭。禮記言諸侯贊薰。大夫贊蘭。漢書言蘭以香自燒也。若夫蘭花有葉無枝。可玩而不可綴。藉浴。乘程膏焚。故朱子離離辨證言古之香草。必花葉俱香。而燥溼不變。故可刈佩。今之蘭蕙。但花香而葉乃無氣。質弱易萎。不可刈佩。必非古人所指甚明。古之蘭似澤蘭而蕙。卽今之零陵香。今之似茅而花有二種者。不知何時誤也。熊大古莫越集。言世俗之蘭。生於深山窮谷。決非古時水澤之蘭也。陳遜齋閑覽言楚騷之蘭。或以爲都梁香。或以爲澤蘭。或以爲猗蘭。當以澤蘭爲正。今人所種如麥門冬者。名幽蘭。非真蘭也。故陳止齋著蘭盜說。以謂之方虛谷訂蘭說。言古之蘭草。卽金之千金草。俗名孩兒菊者。今之所謂蘭。其葉如茅而嫩者。

根名土續斷。因花覆郁。故得蘭名也。楊升菴云。世以如蒲葢者爲蘭。九畹之受詛久矣。又吳草廬有蘭甚詳云。蘭爲醫緩上品之藥。有枝有莖。草之植者也。今所謂蘭無枝無莖。因黃山谷稱之。世遂謬指爲離離之蘭。寇氏本草亦溺於俗。反疑舊說爲非。夫醫經爲實用。豈可誤哉。今之蘭。果可利水殺蟲而除痰癖乎。其種盛於閩。朱子乃閩人。豈不識其土產。而反辨析如此。世俗至今。猶以非蘭爲蘭。何其惑之難解也。(李時珍) 此非今蘭蕙建蘭之蘭。瀨湖綱目辨之極詳。說文謂之香草。陸璣草木疏。謂蘭爲王者之香。其莖葉皆似澤蘭。廣而長節。節中赤。高四五尺。藏之罍中。辟蠹。據此則蘭草澤蘭相似而非一物。故本經上品既有蘭草。而中品又有澤蘭。然別錄謂蘭草生太湖池澤。本經亦曰一名水香。水香零陵郡都梁縣西小山上。有浮水其中。悉生蘭草。則本是水產。實與澤蘭大同小異。故漢書司馬相如傳。衡蘭芷若。類注謂卽今之澤蘭。江賦褻以蘭紅。注亦以爲澤蘭。蓋

二物之相混久矣。瀨湖亦謂一物二種。(張山雷) 草蘭子治目。赤眼生膜。納皆內少頃。膜卽出。屬物入目。納三四枚於目中。子卽濕。與塵俱出。(醫學辭典) 草蘭花性質苦無毒。功用宜氣利水道。治滯下痢疾。養酒服辟不祥。按此物氣類木香。苦甚黃連。善能宣氣。四達。故治病效功甚捷。(醫學辭典)

【草麝香】卽鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳「鬱金香」條。

【草龍甲】卽茄子之古籍別名。典見養生主論。詳「茄子」條。

【菘】卽冬葵子之古籍別名。典見爾雅。詳「冬葵子」條。卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【菝麥】卽菝麥之古籍別名。典見日用本草。詳「菝麥」條。

【菝菝】卽五味子之古籍別名。典見爾雅。詳「五味子」條。

【荏桐】卽罌子桐之古籍別名。典見本草衍義。詳「罌子桐」條。

【荒夫草】卽無風獨搖草之古籍別名。典見郭璞賦。詳「無風獨搖

十畫 茵 菜 虺 蚊 蚌

【草】條。

【商草】即弄草之原名。詳「弄草」條。

【菜】即樣之古籍別名。典見綱目。詳「樣」條。

【虺】即獅之古籍別名。典見綱目。詳「獅」條。

【蚊烏蜩】即枸杞蟲之古籍別名。典見爾雅。詳「枸杞蟲」條。

【蚊蠶樹】即夜蘭之古籍別名。典見嶺南雜記。詳「夜蘭」條。

【蚌】古籍別名。烏貝。(動物學大辭典)


外國名詞 Anodonta chinensis (拉丁) Swam muschel (英) Flussmuschel (德) カラヌガヒ或下ブガヒ或タンガヒ (日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類同柱類蚌科。

產地 生江湖淡水中。

形態 蚌爲介類之一種。與蛤同類而異形。其殼長橢圓形而薄。殼內真珠。色帶微紅。老者殼頂之表皮剝脫。常露出真珠層。殼合部無齒。唯後方有一側齒。又有內外

軀廣而突出。肉色黃白。肉柱有二。脚大殼長。約達尺許。其肉可供食與藥用。



蚌

性質 甘。鹹。冷。無毒。
主治 止渴。除熱。解酒毒。去眼赤。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蚌肉曰。明目除溼。主婦人勞損下血。【宋】日華諸家本草論蚌肉曰。除煩解熱毒。血崩帶下。痔瘻。壓丹石藥毒。以黃連末納入。取汁點赤眼。眼暗。

參攷資料 ①蚌肉性微冷。多食發風。動冷氣。(寇宗奭) ②馬刀蚌蛤。蟬蛻大同小異。寇氏止盲冷。而不言溼。溼生熱。熱久則氣上升。而生痰生風。何冷之有。(朱震亨) 命名 本品係蚌殼中所含之水。故名。

性質 涼。無毒。

主治 清熱。消痰。除溼。治雀目。夜盲。婦人胎動。小兒嘔驚。塗湯火傷。解酒積丹石藥毒。

【蚌胎】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【蚌珠】即真珠之古籍別名。典見南方志。詳「真珠」條。

【蚌粉】即蚌殼粉之原名。詳「蚌殼粉」條。

【蚌淚】基本 即蚌中水也。性質 鹹。寒。
主治 清熱安胎。消痰除溼。解酒積丹石藥毒。初生小兒嘔驚。逢原云。用蚌水磨墨。滴入口中。少頃。下黑糞。而愈。湯火傷。用生蚌水塗之。

參攷資料 蚌生淡水中。色蒼入肝。故有清熱行溼。治雀目夜盲之力。綱目載蚌肉及蚌粉。功用獨遺。其殼內所含之水。不知此水乃真陰天一之精。入藥最廣。特爲補其缺。(趙恕軒)

【蚌殼】處方用名 真珠母。製法 凡使蚌殼。去淨外層黑殼。擇其內層光潔如真珠

一〇八八

色者用。故俗有真珠母之稱。以真珠生於蚌殼中故也。

性質 甘。鹹。冷。無毒。
主治 滋肝陰。清肝火。治癲狂。驚癩。眩暈。耳鳴。心跳。血熱崩中。吐

參攷資料 蚌殼入心肝二經。與石決明僅入肝經者不同。故涉神志病者。非此不可。(醫學辭典)

【蚌殼灰】即蚌殼粉之處方用名。詳「蚌殼粉」條。

【蚌殼粉】原名 蚌粉。製成之粉。故名。本品係蚌殼

處方用名 蚌殼灰。性質 鹹。寒。無毒。
主治 煇殼粉治反胃。心膈痰飲。用米飲服。

歷代記載攷證 【宋】日華諸家本草論蚌殼粉曰。諸疝。止痢。并嘔逆。醋調塗癰腫。【明】李時珍本草綱目論蚌殼粉曰。解熱燥溼。化痰消積。止白濁。帶下。痢疾。除溼。水嗽。明目。擦陰瘡。溼疥。癬痒。參攷資料 蚌粉與海蛤粉同功。皆水產也。治病之要。只在清熱

行滯而已。日華言其治疳。近有一兒病疳。專食此粉。不復他食。亦一異也。(李時珍)

【蛇蟥酒草】即鼠麴草之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳「鼠麴草」條。

【蚊】即水蛙之古籍別名。典見別錄。詳「水蛙」條。

【蚓蟻】即蚯蚓泥之古籍別名。典見綱目。詳「蚯蚓泥」條。即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蚯蚓」條。

【蟻母】即知母。見「知母」條。

【蛇】古籍別名。虺。(綱目)狗。虺(俗名)。

基本 係脊椎動物爬蟲類蛇類管牙類。蛇科管蛇亞科。為蛇類之幼蛇。

形態 蛇為蛇類之一種。全體比蠍為小。土色無文。蟄時不圓。屈如狗。糞亦有劇毒。其肉可供藥用。

製法 凡使去頭、尾、腸、皮、骨、醋。夾研末用。

主治 療瘰癧內漏。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蛇曰。治破傷中風。大

風。惡瘡疾。

【蛇青】即地膽之古籍別名。典見本經。詳「地膽」條。

【蛇】即蛇蟲之簡稱。詳該條。

【蛇蟲】(綱目) 古籍別名。蝮。蝮人龍。

形態 蛇為九蟲之一種。乃蠕形動物。狀如蚯蚓。而無環節。色白兩端甚尖。寄生於人腹小腸間。雌者長至尺餘。雄者亦長七八寸。可供藥用。

性質 大寒。

主治 目中府赤熱痛。取大者洗淨。斷之。令汁滴目中。三十年膚赤亦瘥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蛇蟲曰。治一切眼疾。及生疔。翳赤白膜。小兒胎赤風。赤眼。燒末傅之。或以小兒吐出者。陰乾為末。入米粉少許。唾津調塗之。又治一切冷瘡。

參攷資料 蛇人腹中長蟲也。按巢元方病源云。人腹有九蟲。伏蟲長四分。蠱蟲之主也。蛇蟲長五六寸至一尺。發則心腹作痛。上下口喜吐涎及清水。實上心則死。白

蟲長一寸。色白頭小。生育轉多。令人精氣損弱。腰脚疼。長一尺。亦能殺人。肉蟲狀如爛杏。令人煩悶。肺蟲狀如蠶。令人咳嗽成勞。殺人。胃蟲狀如蝦蟆。令人嘔逆存嘔。弱蟲又名疥蟲。狀如瓜瓣。令人多睡。赤蟲狀如生肉。動作腹鳴。蝨蟲至微。形如菜蟲。居腸胃中。令人生癰疽。疥癬。癩瘡。痔瘡。疔。疔。諸病。諸蟲皆依腸胃之間。若入臟腑。氣實則不為害。虛則浸蝕變生諸病也。又有尸蟲與人俱生。為人大害。其狀如犬馬尾。或如薄筋。依脾而居。三寸許。有頭尾。凡服補藥。必須先去此蟲。否則不得藥力。凡一切瘡。瘰。久皆成蟲。紫庭真人云。九蟲之中。六蟲傳變為勞瘵。而蝮。蛇。寸白。三蟲不傳。其蟲傳變。或如嬰兒。如鬼形。如蝦蟆。如守宮。如蜈蚣。如蠱。如蛇。如蠶。如蠅。如鼠。如蝠。如蝦。如猪。如血。如髮。如亂絲等狀。凡蟲在腹。上旬頭向上。中旬向中。下旬向下。服藥須於月初四五日。五更時。則易效也。張子和云。巢氏之衍九蟲詳矣。然蟲之變。不可勝窮。要之皆以溼熱為生。蟲得木氣

乃生。得雨氣乃化。豈非風水主熱。雨澤主溼耶。故五行之中。皆有蟲。諸木有蠶。諸果有蠶。諸殺有妨。五穀有螟。腹。蠶。麥。朽。蠶。栗。被。蟲。出。草。腐。益。化。皆。木。之。蟲。也。烈。火。有。鼠。爛。灰。生。蠅。皆。火。之。蟲。也。穴。蟻。蟻。蝸。田。蟻。石。蟻。皆。土。之。蟲。也。蟬。馬。蛭。魚。魃。蛟。龍。皆。水。之。蟲。也。昔。有。冶。工。破。一。釜。見。其。斷。處。白。中。有。一。蟲。如。米。蟲。色。正。赤。此。則。金。中。亦。有。蟲。也。(李時珍)

【蝮蟲窠】即蝮窠之古籍別名。典見本經。詳「蝮窠」條。

【蚤休】 命名 本品能療蟲蛇之毒。得此治之。即能早休。故名。

處方用名 蚤休根。

古籍別名 蚤休(別錄)重寶。重樓金線草甘遂(唐本草)整休(日華)紫河車(圖經)七葉一枝花(蒙筌)三層草白甘遂(綱目)草紫河車(圖經)

基本 屬毒草類。為蚤休之根。產地 陳仁山藥物生煎辨云。蚤休以廣西南寧屬多出。形態 蚤休為野生深山之多

十蠶 蚘 蛟 蚓 蟻 蛇 蟻 蝮 蚤

十靈 蚤

年生草本。一莖獨上。高尺餘。莖當葉心。葉為長卵形。成層輪生。凡二三層。或五七層。每一層有七葉。色綠。似芍藥。夏月莖端開赤黃色花。一花七瓣。有金絲蕊下垂。長三四寸。秋結紅子。根大如鬼臼。或如蒼朮狀。又似尺二蜈蚣。肥紫蒼蒲。外紫中白。

採取 五月採之。

製法 採根。洗淨切片。日乾用。

用法 與他藥水煎。或剉末服。

或磨汁外塗。

性質 苦。微寒。有毒。

效能 殺三蟲。治癩瘡。專作解毒藥。

主治 爲癩瘡頭弄舌。熱氣在腹中。本經。癩疾癰瘡。除蝕。下三蟲。去蛇毒。別錄。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蚤休曰。生食一升。利水。

【宋】大明諸家本草論蚤休曰。治胎風手足搖。能吐泄瘰癧。【明】李時珍本草綱目論蚤休曰。去瘧疾寒熱。

近人學說 張山雷曰。蚤休乃苦泄解毒之品。瀉潤謂足厥陰。

經之藥。蓋清解肝膽之鬱熱。息風降氣。亦能退腫消痰。利水去溼。本經治驚癇搖頭弄舌。皆肝陽肆虐。木火生風之症。又謂之瘧疾者。瘧即巔頂之巔。字亦作顛。謂是肝風上凌。直上頂巔之病。今西學家所謂血沖陽經者。頗似吾國舊學向所未聞。然氣上不下。頭痛巔疾。見於素問五常政大論。字皆作巔。豈非明言其病在巔頂。聲類謂瘧爲風病。豈非風動上凌。直犯巔頂。則其病在巔。亦可於言外得之。可證此種肝風猝動之變。吾國舊籍早已明知其爲氣血上沖。正不待西學家自矜創獲。蚤休能治此症。正以苦寒泄降。能息風陽而清氣火。則氣血不沖。腦經不擾。而瘧疾驚癇。搖頭弄舌。諸病可已。本經之旨。直與龍素諸條。息息相通。以皆古醫經之無上精義。惜乎漢魏六朝以降。誤以巔頂之巔。認作顛狂之顛。而驚癇昏仆等症之真旨遂晦。是病乃不復可治。此是後世醫學之陋。固不可與素問本草經。同日而語。然即此可知本經素問。論病探源。竟有非漢魏以下醫家所能

悟到者。則信乎古書之真非易讀矣。若其專治癰腫。則苦寒清熱。亦能解毒。治陰蝕。下三蟲。亦苦寒勝溼。自能殺蟲。其用淺顯易知。不煩多贅。溯湖引諺語。有七葉一枝花。深山是我家。癰疽如過者。一似手拈拿云云。知此草專治癰腸。古今無不推重。然此類寒涼諸品。惟陽發紅腫大痛者爲宜。而堅塊頑木之陰症大忌。非謂凡是外科。無不統治也。

配合應用 治小兒胎風。手足搖。用蚤休即紫河車爲末。每服半錢。冷水下。衛生易簡方。

治慢驚發搐。帶有陽證者。白甘遂末。即蚤休一錢。栝樓根末二錢。同於慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。煎蘇香薄荷湯調下。錢乙小兒方。

治中風毒。金線重樓根。麝水服即愈。集簡方。

治咽喉殺賊。腫痛用重蠶。赤色者。川大黃炒。木鼈子仁。馬牙消。半兩。半夏泡一分爲末。蜜丸。炙子大。舍之。聖惠方。

用蠶 錢半至三錢。

一〇九〇

施用宜忌 凡無實火熱毒者禁用。

參攷資料 冷。無毒。伏雄黃丹砂。蓬砂。及鹽。大明。蟲蛇之毒。得此治之。即休。故有蚤休蠶休諸名。重蠶三層。因其葉狀也。金線重樓。因其花狀也。甘遂。因其根狀也。紫河車。因其功用也。李時珍。

今謂重樓金線者是也。一名重蠶。南人名爲甘遂。一莖六七葉。似王孫。鬼臼。莖麻。葉有二三層。根如肥大菖蒲。細肌脆白。蘇恭。蚤休無旁枝。止一莖。挺生。高尺餘。頗有四五葉。葉有歧。似苦杖。中心又起莖。亦如是生葉。惟根入藥用。冠宗爽。重樓金線。處處有之。生於深山陰溼之地。一莖獨上。莖當葉心。葉綠色。似芍藥。凡二三層。每一層七葉。莖頭夏月開花。一花七瓣。有金絲蕊。長三四寸。王屋山產者至五七層。根如鬼臼蒼朮狀。外紫中白。有黏糯二種。外丹家採制三黃砂。承入藥。洗切焙用。李時珍。蚤休入足厥陰經爲散。結導熱之品。以治外證。殊有功效。但其性苦寒。不宜多服。元氣虛者

忌之。(醫學大辭典)

【蚤休根】即蚤休之處方用名。詳「蚤休」條。

【胡蛇】

命名 本品身大而行更紆徐。冉冉然也。故名。

處方用名 胡蛇膽。

古籍別名 南蛇。埋頭蛇。(綱目)巴蛇(綱目)

外國名詞 Python molurus

L. (拉丁) (Indian python 或 Black-tailed python) (英)

基本 係爬蟲類蛇屬。藥用胡蛇之膽。

產地 在嶺南諸地之山野間。



胡蛇

形態

胡蛇大者五六丈。圍四五尺。小者不下三四丈。身有斑紋如錦形。如鱗。頭似鼠。尾圓。無鱗。其首不舉。故有埋頭蛇之稱。其膽狹長。通黑。皮膜極薄。祇之甜苦。刮末

着水中。浮游盤旋行走者。其偽者旋行但遲耳。

製法 採得曝乾用。

用法 俱以外傳。剉末和藥。

性質 甘苦寒。有小毒。

效能 瀉熱明目。治疳。用作殺蟲。醫瘡。又為去翳明目藥。及傷科要藥。

主治 目腫痛。心腹脹痛。下部

瘡。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論胡蛇膽曰。治小兒八癩。

【唐】孟詵食療本草論胡蛇膽曰。疳。水化灌鼻中。除小兒腦熱。疳瘡。腹瀉。瀉下部。治小兒疳痢。同麝香。傳齒疳宜露。【唐】陳藏器本草拾遺論胡蛇膽曰。破血。止血。痢。蟲。下血。【明】李時珍本草綱目論胡蛇膽曰。明目。去翳。膜。療大風。【明】繆希雍本草經疏論胡蛇膽曰。胡蛇膽味苦。中有甘氣。寒。有小毒。入手少陰。足厥陰。陽明經。心腹腫痛者。蟲在內攻。嚼也。下部腫痛者。蟲在外侵蝕也。溼熱則生蟲。苦寒能燥。溼殺蟲。故內外施之皆得也。肝開竅於目。肝熱則目腫痛。入肝泄

熱。則腫痛除矣。今人受杖時用此。噙化。可得不死。其功能護心止痛。使止血不上。薄心有神。力也。

配合應用 ①治小兒急疳疔。水調胡蛇膽傳之。(聖惠方)

②治小兒疳痢。羸瘦多睡。坐則閉目。食不下。用胡蛇膽豆許二枚。煮通草汁研化。隨意飲之。并塗五心下部。(楊氏產乳方)

③治齒齙宜露。出膿血。用胡蛇膽三錢。枯白礬一錢。杏仁四十九枚。研勻。以布指銀。閉令血盡。日三搽之。愈乃止。(聖惠方)

④治痔瘡腫痛。胡蛇膽研。香油調塗。立效。(醫方摘要)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡無風熱實火者禁用。

參攷資料 嶺表錄云。雷州有養蛇戶。每歲五月五日。即昇蛇入官取膽。曝乾。以充土貢。每蛇以軟草藉於籃中。盤屈之。將取則出於地上。用板柵十數。翻轉蛇腹。按定約分寸。於腹間剖出肝膽。膽狀如鴨子大。取訖。內肝於腹。以線縫合。昇歸放之。或言蛇被取膽者。他

日捕之。則遠避歸腹。以明無膽。又言取後尚能活三年。未之知否。(蘇頌) ①真膽狹長。通黑。皮膜極薄。祇之甜苦。煎以注水。即沉而不散。(陶弘景) ②試法。別取粟許。着淨水中。浮游水一回。旋行走者。為真。其徑沉者。皆膽血也。勿多着。亦沉散也。陶未得法耳。(蘇恭) ③人多以猪膽虎膽偽之。雖水中走。但遲耳。(孟詵) ④其膽着醋。能卷人筋。終不可脫。惟以芒草作筋。乃可段成式。酉陽雜俎云。胡蛇長十丈。管吞鹿。鹿消盡。乃遠樹。則腹中之骨。穿露而出。養疔時。肪膜甚美。或以婦人衣投之。則蠕而不起。(陳藏器) ⑤按劉珣錄異記云。胡蛇大者五六丈。圍四五尺。小者不下三四丈。身有斑紋。如故錦。顯。秋夏於山林中。同鹿吞之。蛇遂羸瘦。待鹿消乃肥壯也。或言一年食一鹿也。又顧玠海槎錄云。胡蛇吞鹿及山馬。從後脚入毒氣。呵及角。自解脫。其膽以小者為佳。王濟手記云。橫州山中多胡蛇。大者十餘丈。食麋鹿。骨角隨腐。土人採葛藤。塞入穴中。蛇嗅之。即躡。乃發穴取之。肉

極腹美。皮可冒鼓及飾刀劍樂器。范成大廣輿記云。築兵捕蚌蛇。滿頭插花。蛇即注視不動。乃逼而斷其首。待其騰擲。力竭乃斃。昇歸食之。又按山海經云。巴蛇食象。三年而出其骨。君子服之。無心腹之疾。郭璞注云。今蚌蛇即其類也。南齊志。蚌蛇贊曰。蚌惟大蛇。既洪且長。採色駁映。其文錦章。食灰香鹿。腴成養瘡。資養嘉食。是豆是蠶。(李時珍)

【蚌蛇牙】 採取 以長六七寸者用。

【蚌蛇肉】 性質 甘溫。有小毒。主治 佩之辟不祥。利遠行。中小物。吞吐不出。飛尸游蠱。喉。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論蚌蛇肉曰。除疔瘡。辟瘴疫瘴氣。【明】李時珍本草綱目論蚌蛇肉曰。除手足風痛。殺三蟲。去死肌。皮膚風毒。癩風。疥癬。惡瘡。參攷資料 ●蚌蛇肉。四月勿食之。(綱目) ●度嶺南。食蚌蛇。瘴毒不侵。(甄植) ●按柳子厚捕蛇說云。永州之野產異蛇。黑質白草。

燭草木盡死。無察之者。然得而脂之以為餌。可已大風墜院癩瘡。去死肌。殺三蟲。又張鷟朝野僉載云。泉州盧元欽。患瘡風。惟鼻未倒。五月五日。取蚌蛇進貢。或言肉可治風。遂取食之。三五日頓可。百日平復。(李時珍)

【蚌蛇酒】 製法 用蚌蛇肉一斤。羌活一兩。袋盛。同麴置缸底。糯米飯蓋之。釀酒。待熟取酒。以蛇肉焙乾。研末和藥。或袋盛。浸酒亦可。

主治 諸風痛痺。殺蟲辟瘴。治癩風。疥癬。惡瘡。性質 甘平。有小毒。主治 耳聾及皮膚風毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蚌蛇膏曰。治癩疾。【明】李時珍本草綱目論蚌蛇膏曰。綿裹塞耳聾。

辨偽 真膏。鼻如梨。豆子相着。他蛇膏皆大如梅李子也。(陶弘景) 【蛭蝶】 即蛭蝶之俗名。詳「蛭蝶」條。

【蛭蝶】 即青缺之古籍別名。典見綱目。詳「青缺」條。

【蛭休】 即蛭休之古籍別名。典見別錄。詳「蛭休」條。

【訓狐】 即鴉之古籍別名。典見拾遺。詳「鴉」條。

【豇豆】 命名 本品色多紅綠。故名。

古語別名 豇豆。(綱目) 大角豆。(日本) 長豆。(俗名)

外國名詞 Vigna sinensis, Phaseolus (拉丁) ササゲ (日本)

基本 係豇科豇豆屬。為豇豆之子實。

形態 豇豆為殼類之一。一年生草本。莖有蔓性。能纏繞於他物上。葉為羽狀複葉。自三小葉成。夏日開花。作蝶形花冠。色淡青。帶紫。果實為長莢。莢內有種子數粒。既可供食。亦可充藥用。



豇豆

採取 秋月採之。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 理中益氣。補腎健胃。和五臟。調營衛。生精髓。止消渴。吐逆。泄痢。小便數。解鼠莽毒。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求真論豇豆曰。豇豆味甘而鹹。性平無毒。考之時珍云。豇豆可菜可穀。備用最多。乃豆中之上品。又曰。豇豆開花結莢。必兩兩並垂。有習坎之義。豆象微曲。有似人腎。所謂豆為腎穀者。宜此當之。是以腎氣虛損。必賴此為主治。且此味甘而平。入腎而更入胃。故凡胃津不生。胃渴不止。吐逆泄痢。小便頻數。草莽毒中。皆得甘以調劑。而使諸症悉平也。香載諸疾無腫。惟水腫忌補腎氣。不宜多食耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論豇豆曰。豇豆甘平。輒時採莢為蔬。可菜可素。老則收子充食。宜韶宜饒。頗肖腎形。或有微補。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

參攷資料 ●豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

宜多食耳。又柏珍方云。中鼠莽毒者。以豇豆羹汁飲即解。欲試者。先刈鼠莽苗。以汁澆之。使根爛不生。此則物理然也。(李時珍) ①此豆紅色居多。莢必雙生。故有豇豆雙之名。廣雅指為胡豆誤矣。(李時珍) ②豇豆處處三四月種之一種。莢長丈餘。一種莢短。其葉俱本大末尖。嫩時可茹。其花有紅白二色。莢有白紅紫赤斑駁數色。長者至二尺。嫩時充菜。老則收子。此豆可菜可果可穀。備用最。乃豆中之上品。而本草失收何哉。(李時珍)

【豹】 古籍別名 程(列子)失刺孫(綱目)

外國名詞 Fols leopardus

L.(拉丁)(Leopard或Panther

(英)ヒョウ或(ウ)(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有

胎盤類食肉類裂腳類貓科

產地 出西南亞洲及非洲諸


地。

形態 豹為獸類之一種動物。

其形似虎。面圓耳短。比虎耳尖。瞳

孔能隨光而收放。齒具門犬臼三

種。毛短密生。色蒼褐。至赤褐有光輝。具暗褐色或黑色之斑點。在背與體旁之斑點。如薔薇花形。或環形。大且明。在肢者則減少。且稍黑。腹部白色。身長四尺許。四肢大尾長。能攀樹木。性殘忍。捕食動物。其肉可供藥用。



豹

性質 酸。平。無毒。

主治 安五臟。補經傷。輕身益氣。冬食利人。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金製論豹肉曰。辟鬼魅神邪。宜

腎。【宋】日華諸家本草論豹肉曰。

壯筋骨。強志氣。耐寒暑。令人猛健。

參攷資料 ①豹肉氣味溫微

毒。正月勿食。傷神損壽。(千金) ②

豹肉令人志性粗豪。食之便覺少

頃消化乃定。久食亦然。(孟詵) ③

此獸敏捷過虎。故能安五臟。補經

傷。輕身壯筋骨也。(寇宗奭)

【豹皮】

參攷資料 ①豹皮。不可藉睡。令人神驚。其毛

入人瘡中有毒。(陳藏器) ②廣西

南界有嗜獵蟲。食死人尸。不可驅

逐。惟以豹皮覆之。則畏懼而不來。

(李時珍)

【豹足】即卷柏之古籍別名。典見

吳普本草。詳「卷柏」條。

【豹脂】

基本 本品係用豹肉所熬成之脂膏。

主治 生髮。亦入面脂。

【豹鼻】

主治 鬼交狐魅。同狐鼻水煎服。

【豹頭骨】

主治 燒灰淋汁。去頭風白屑。(孟詵)

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論豹頭骨曰。作枕辟邪。

古籍別名 豺狗(綱目)

基本 係脊椎動物哺乳

類有胎盤類食肉類裂腳類犬科

形態 豹為獸類之一種。形瘦

如犬。略似狼。口吻狹長。口裂深。幾

至耳下。鼻與鼻根處不凹。耳殼直

立。眼銳有光。牙銳利。軀幹長。四肢

前長後短。各肢具鈎爪。有小蹠。便

游水。尾垂後方。稍蓬鬆。毛色茶褐

帶微紅。或灰黃而帶薄黑色。頗有

小白點。全體長四尺餘。有腺臭氣。

鳴聲如犬吠。性凶暴。喜食羊。其皮

可供藥用。

性質 熱。

主治 冷痺。軟脚氣。熱之以輕

裹病上。即瘥。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論豹皮曰。療諸疔痢。腹中

諸瘡。煮汁飲。或燒灰。酒服之。亦可

傳露齒疔。(明)李時珍本草綱目

論豹皮曰。治小兒夜啼。百法不效。

同狼屎中骨。燒灰等分。水服少許。

即定。

參攷資料 ①豹皮燒灰。和酒

灌解槽牛馬。便馴良。②豹肉酸熱

有毒。食之損人精神。消人脂肉。令

人瘦。(孟詵)

【豹漆】即豹節。

【豹節】即五加皮之別名。見「五

加皮」條。

【買尖】六安茶之最佳者。功用見

「六安茶」條。

【買沉香】即沉香之處方用名。詳

「沉香」條。

【貢桂】即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

外國名曰 Rosm. arinus officinalis,

ト(拉丁) マンロネ ンウマ ンルサウ(日本)

萆本 係唇形科迷迭香屬。葉用迷迭香之子實。

產地 原產南部歐羅巴。

形態 迷迭香爲芳草類之常綠小灌木。葉作線形。革質。花淡黃色。生於莖上部之葉腋。結實。嚴霜不凋。芳香甚烈。



迷迭香

性質 辛溫。無毒。

主治 惡氣。令人衣香。燒之去臭。合羌活爲丸。燒之。可以辟除蚊蚋。

參攷資料 廣志云。出西海。魏略云。出大秦國。(陳藏器)魏文帝時。自西域移植庭中。同曹植等各有賦。大意其草修幹柔莖細

枝弱。根繁。花結實。嚴霜弗凋。收採幽殺。摘去枝葉。入袋佩之。芳香甚烈。與今之排香同氣。(李時珍)迷迭香用爲通經藥。又將其枝葉蒸溜之。採取迷迭油。以之供外用。亦間有內用者。此油有毒。故用時若其量過多。足以致死。(植物學大辭典)

【起蛟水】主治 壯筋骨。健腰膝。已虛勞。除驚悸。殺蟲。尸疰。鬼疰。遁尸邪氣。浴疥疥。虛弱者。以代水煎。滋補藥良。性升。能直透巖頂。

參攷資料 嶺州多山。每春夏之交。久雨。有起蛟之患。村人習見。勿異也。蛟初起。一二月間。地中先有聲。隱隱如雷鳴。或如牛吼。至期。土中輒陷出一小穴。如豆大。水從穴出。直上一二尺。如箭。已而漸升。漸長。長至簷隙與溜合。則水勢乃大。下穴亦漸大如碗孔。蛟如銀鱗形。從穴出。乘水而上。過簷。則形變大。乃飛越奔騰而去。屋宇亦無害。惟相隔一二里許。田禾間有傷損者。爲山水冲刷而然。此水初起。一二尺時。山人以瓶盞之屬。接取

食之力大無窮。蓋出蛟口中。含吮精力。貫注直逼而上。其全身之力。蓋在此水。故人亦不能多食。壯健者。三盞。即腹脹。不能再飲。土人以釀酒。更壯精力。可已虛勞。(張宇南)蛟初起時。水如箭。清如泉。脈漸湧而高。必合天雨水。則勢大。而能飛騰。蛟出穴口。始泛出水。名曰發洪。若初起時。用河水一杓。灌入其穴。則蛟水自回。便不能出穴。或取婦人月經穢布塞之。亦止。若人服蛟水作脹。用千里長流河水煎服之。亦可解也。(單杜可)

【起目】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【起貧草】即紫葢之古籍別名。典見寶藏論。詳『紫葢』條。

【起陽草】即韭之古籍別名。典見侯氏藥譜。詳『韭』條。

【軒子】即菴草之古籍別名。典見綱目。詳『菴草』條。

【追風使】即五加皮之古籍別名。典見圖經本草。詳『五加皮』條。

【追魂使者】即鉛之古籍別名。典見土宿真言本草。詳『鉛』條。

【逆石】即石牀之古籍別名。典見

綱目。詳『石牀』條。

【逆流水】命名 本品即倒瀉之水。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 中風卒厥。頭風。瘧疾。咽喉諸病。其性逆而倒上。故宜吐痰飲之。藥宜用之。

【郎君子】產地 生海中。

形態 郎君子爲介類之一種。狀如螺。中實如石。大如豆。藏箱篋中。積年不壞。若置醋中。即盤旋不已。可供藥用。

主治 婦人難產。手握之便生。極驗。

【郎郎草】即狼把草之原名。詳『狼把草』條。

【郎舉】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【郢城薄】即菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【酒母】即小麥麴之古籍別名。典見綱目。詳『小麥麴』條。

【酒杯藤】產地 出自西域諸地。

形態 酒杯藤爲果類之一種。藤大如臂。葉堅硬。結實大如指。味

似豆蔻。其子可供藥用。
性質 甘辛平。無毒。

主治 消食下氣。消酒止渴。辟邪瘴。消癰腫。殺蚊蟲。治尸疰勞瘵。蟲蠱。瘰癧。癰疽。結核。癰疽。潰爛。食屎成積。用酒杯藤子燒灰。糖拌服。下五七錢。自效。飲酒過量。成病。用酒杯藤子煎服。極驗。

【酒泥草】 命名 本品係酒罈頭泥中之草。故名。

主治 剪刀風。

【酒炒】 卽米酒之處方用名。詳「米酒」條。

【酒芥】 卽黃芥用酒製成者之處方用名。詳「黃芥」條。

【酒浸】 卽米酒之處方用名。詳「米酒」條。

【酒窩】 卽酒醱之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「酒醱」條。

【酒製軍】 卽大黃以酒製成者之處方用名。詳「大黃」條。

【酒葶】 命名 本品爲年久酒罈中所生之菌。故名。

主治 一切酒傷。酒勞。酒疽。因酒成病諸症。服之立效。

參攷資料 酒製生酒罈中不

十靈酒

恒有。凡藏酒之家。千百罈酒間。有一罈。啓之中空無酒。下有絮結於中。其罈初結之時。酒上薄凝如衣膜。久則漸厚。一二寸。便能滲酒。將酒中精華。醇醱之氣。盡攝於膜內。膜乃漸厚。酒亦漸少。久久則酒乾。所存十不餘一。其膜如鮮海鮑。瀟瀟而軟。嗅之作酒香。微帶微蒸氣。識者取之焙乾。乾者如瓜皮。面青黑。背作肉紅色。溼軟如棉。可入藥。蓋酒能生單。必罈係新出。未脫火氣。而置酒之地。又爲溼熱所蒸。致中變而成此。故造釀家用罈。貴舊而不貴新也。(趙學敏)

【酒精】 原名 酒精。古籍別名 柏。

基本 本品爲糯稈黍麥之屬。蒸釀酒後所餘之糟粕。

採取 以臘月。清明。重陽。造酒者良。

製法 漚乾。入鹽少許。收藏。若榨乾者則無味。不適用。

性質 甘辛無毒。

主治 溫中消食。除冷氣。殺腥。去草萊毒。潤皮膚。調臟腑。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論酒精曰。撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮毒。

參攷資料 酒精有麴蘖之性。能活血行經。止痛。故治傷損有功。

按許叔微本事方云。治踰折傷筋骨痛不可忍者。用生地黃一斤。藏瓜瓞糟一斤。生薑四兩。都炒熱。布裹傷處。冷卽易之。又類編所載。

只用藏瓜瓞糟一物。入赤小豆末和勻。罈於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日卽痊也。(李時珍)

【酒罈上紙】 基本 本品卽封蓋酒罈口上之紙。

採取 陳久者良。

主治 療皮膚間忽然血出。撕破貼之。

【酒藥】 卽小麥麴之俗名。詳「小麥麴」條。

基本 本品乃未榨出酒之米醱。

古籍別名 酒窩。浮蛆。(綱目拾遺)

性質 甘辛。溫。無毒。

主治 行血氣。發痘漿。益髓脈。

生津液。

配合應用 ●治赤眼淹纏。杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔各一錢。取雄雞肝一個。忌見水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯蒸熱。去渣。以湯肝食下。隔二日。再服一次。全愈。(祝氏效方)

●治小兒鼻風。吹乳腫痛。用酒醱和菊花葉數上。立愈。無葉用根。甘菊葉尤佳。搗汁沖和服。更效。(劉起堂經驗方)

●治吹乳方。用葶藶根嫩者炒。和白酒醱少許。共搗爛。敷患處。一日夜卽消。忌食發物。(周氏家寶方)

●治頭風。用蒼耳子。白芷。藜精。草各五錢。川芎三錢。甜酒醱四兩。老酒二碗。煎一碗服。(妙淨方)

●治夢遺白濁。酸梅草二錢。孩兒菊二錢。搗取汁。加不見水酒醱。空心煎服。(救世青囊方)

●治雞產。用酒醱。麻油。蜂蜜。章便。雞子白各半盞。煎溫服。卽下。

●治痘出不起。用狗蠅七枚。冬日取。在狗耳內。搗爛。和酒醱服。卽日發起。紅潤可觀。(不藥良方)

十畫 釘 釜 針 陝 陟 除 隻 隼 馬

一〇九六

① 治痘瘡不起。萃毒搗汁。和白酒釀。頓溫服之。但不可頓大熱。大熱則反不妙。慎之。(良方集要)

② 保元丹。黃精一觔。甘枸杞四兩。酒浸五觔。好黃酒五觔。入礬煮一柱香。每食一茶杯。藥渣搗為丸。加胡桃肉八兩。大黑棗八兩。青州柿餅一觔。(千金不易方)

參攷資料 酒釀味濃厚。多飲腹滿。而性善升透。凡火上行者忌之。(積學散)

【釘頭石】即代諸石之處方用名。詳「代諸石」條。

【釘頭螺】即海螺小者之別名。典見綱目。詳「海螺」條。

【釜月下土】即伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「伏龍肝」條。

【釜月中墨】即釜臍墨之古籍別名。典見四聲本草。詳「釜臍墨」條。

【釜炭】即釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳「釜臍墨」條。

【釜煤】即釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳「釜臍墨」條。

【釜臍墨】命名 本品即釜臍。下之黑灰。故名。

古別名 釜月中墨(四聲)

【釜臍墨】(開竅)釜煤。釜炭。鍋底墨。(綱目)

性質 辛。溫。無毒。

主治 中惡蠱毒。吐血。血暈。以酒或水溫服二錢。亦塗金瘡。止血生肌。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論釜臍墨曰。消食積。舌腫。喉痺。口瘡。陽毒發狂。

參攷資料 古方治傷寒。黑奴丸用釜臍墨。瘧突。梁上塵。三物同合。諸藥。為其功用相近耳。(李時珍)

【針辰砂】即辰砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辰砂」條。

【針砂】即砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「砂」條。

【針魚】即鱖魚之俗名。詳「鱖魚」條。

【陝州豉汁】命名 本品乃用陝州大豆和鹽。椒。生姜所製之豉汁。故名。

主治 除煩熱。

【陟釐】古別名 側梨。(蘇恭)水苔。石髮。(開寶)石衣。(廣雅)水衣。(說文)水綿。澤。

【陟釐】(蘇恭)水苔。石髮。(開寶)石衣。(廣雅)水衣。(說文)水綿。澤。

【馬】(鳥非。綱目)

產地 生淡水中及水石間。

形態 陟釐為苔類之一種。其形有多數之細胞。成爲一列。綠色。或紫。非如髮。或纏繞如絲。以顯微鏡視之。葉體成螺旋形。構造甚精。可爲肥料。并可供藥用。

性質 甘。大溫。無毒。

主治 心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論陟釐曰。搗汁服。治天行痢心悶。(宋)寇宗奭本草衍義論陟釐曰。作脯食。能止渴疾。禁食鹽。

【明】李時珍本草綱目論陟釐曰。搗塗丹毒赤遊。

【除辛】即鈎吻之古籍別名。典見吳普本草。見「鈎吻」條。

【隻刺】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼耳子」條。

【隼】即鷂之古籍別名。典見綱目。詳「鷂」條。

外國名稱 Equus cab. alius Jinn. (拉丁)

【馬】(Horse 或 Mare 或 Stallion) (英)

【馬】(Horse 或 Mare 或 Stallion) (英)

【馬】 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。有蹄類。奇蹄類。馬科。

產地 出新誠。蒙古。青海。川邊一帶。

形態 馬爲獸類家畜類之一種。即野馬之變種也。面部長耳殼直立。能動。頸背有鬃。上下顎各有門牙三對。犬牙一對。牝者無之。白牙六對。四肢強健。肢各一趾。着地趾有蹄。尾具長毛。體毛或褐或白。或黃不一。體長五六尺。至七八尺。性溫順。堪力役。其肉可供藥用。

採取 以純白牡者良。

性質 辛。苦。冷。有毒。

主治 傷中。除熱。下氣。長筋骨。強腰脊。壯健強志。輕身不飢。作臍。治寒熱痿痺。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬肉曰。黃汁洗頭。瘡白禿。

參攷資料 ① 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ② 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

③ 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ④ 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

⑤ 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ⑥ 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

⑦ 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ⑧ 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

⑨ 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ⑩ 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

⑪ 馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華) ⑫ 馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下。

肉色黑。及馬自死者。並不可食。殺人。馬黑脊而斑聲者。不可食。(張鼎) 患痢生疥人勿食。食必加劇。妊婦食之。令子過月。乳母食之。令子疳積。(蕭炳) 同倉米。芥耳食。必得惡病。十有九死。同置食。生氣嗽。同豬肉食。成雀亂。食馬肉。毒發心悶者。飲清酒則解。飲濁酒則加。(孟詵) 食馬中毒者。飲葷煎汁。食杏仁可解。(李時珍)

【馬刀】

命名 俗稱大為馬。本品大而形如刀。故名。

古醫別名 馬蛤(別錄)齊蛤(吳普)哇(爾雅)處(周禮)蜉蝣(吳普)蜉岸(綱目)

產地 生江湖池澤及海中。

製法 凡使馬刀殺。煉粉用。

形態 馬刀為介類動物之一種。棲水泥中。其形似蚌而小。形狹而長。其類甚多。又與螺相類。殼成長方形。大者長三四寸。外色蒼黃。內色淡黃。其肉可供食。殼可供藥用。

性質 辛。微寒。有毒。

主治 婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸賊鼠。(本經)能除五

臟同熱。肌中鼠。止煩滿。補中氣。去厥痺。利機關。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬刀殺曰。消水。蠱氣。瘰癧。飲。

參攷資料 馬刀殺得水火良。(蘇恭) 馬刀殺得水爛人腸。(綱目)

古醫別名 馬勒口鐵。

基本 本品為馬口中所含之鐵嚼環也。

性質 辛。

主治 小兒驚風。

【馬子鐵】 即人中黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人中黃」條。

【馬天乙茸】 即馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬勃」條。

【馬心】 參攷資料 馬心患痢人食之。則痞悶加甚。(孟詵) 以白馬者良。

【馬牙半支】 命名 本品即虎牙半支之葉。

古醫別名 醫辨半支。鐵梗半支。山半支。(綱目拾遺) 旱半支。(百草鏡) 醫辨豆草。(家寶方) 醫辨草。

產地 生石壁間。及燥土平澤諸處。

形態 馬牙半支為半支類之一種。引蔓而生。二月發苗。其莖微方。作水紅色。有細紅點子。經霜不凋。四月開黃花。如瓦松。葉大叢生。圓如薺。中豆瓣。莖葉可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 利水化濕熱。和血消癰腫。療腸癰痔漏。並蛇咬。疔疽。便毒。風痺。跌撲。黃疽。擦汗斑。尤妙。搗汁陳酒和服。

配合應用 搗板豆草。六月六日。雞鳴時。採略洗。蒸熟。一日曬乾。不乾焙之。每一筋。配老薑一筋。磨細收貯。一日者一錢。二日者二錢。三日者三錢。酒調服。服後飲酒至醉為妙。合時忌雞犬婦人見之。神效。(家寶方)

治狗咬。以酒洗淨。瘡口血。搗板半支。搗上。一二日。即斂而愈。

治瘰癧。馬牙半支。作茶常服。多年瘰癧皆消。屢試屢驗。

治急癆。用醫辨草。陰乾。每服三錢。水煎服。

治淋疾。芝麻一把。核桃一個。石上馬牙半支。共搗。滾生酒沖服。(奇方類編)

治水腫。取醫辨草。搗合。麝香貼。膠眼。如人行五里。其水即下。

參攷資料 馬牙半支有二種。有紅梗青梗之別。治婦人赤白帶第一妙藥。赤帶用赤梗者。白帶用白梗者。採得搗汁。半酒。盡酸。迷迷草亦有赤白二種。赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁。半酒。盡和。勻。加紹酒中。煮。煮熟。一服。即止。永不復發。(綱目拾遺)

【馬牙砂】 即珠砂之古籍別名。典見新修本草。綱目。詳「珠砂」條。

【馬牙消】 古醫別名 牙消。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牙消。各國各省均有出。乃用舊坭。頃而得之。近日由外洋來者。多屬田料用之。

製法 用芒硝再煎。化。澄。去脚。入蘿蔔數枚。同煮。熱。傾。盆中。經宿。結於上面。生牙如圭角。作六稜。縱

十靈 馬

橫玲瓏。潤嫩可愛者。即馬牙消也。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 除五臟積熱伏氣。末歸

點眼赤。去赤腫障。清淚痛。亦入

點眼藥中用。功同芒硝。

【馬牙消】即朴硝之處方用名。

詳「朴硝」條。即馬牙消。

【馬牙齒】性質 甘。平。有小毒。

主治 小兒馬齒。水

摩服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論馬齒曰。燒灰唾和。塗

瘰癧疔腫。出根效。

【馬包】即馬勃之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「馬勃」條。

【馬叱同仇大乃】即蟻蝮之古籍

別名。典見和漢藥考。詳「蟻蝮」條。

【馬尼齒】即馬勃之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「馬勃」條。

【馬甲】即海月之古籍別名。典見

綱目。詳「海月」條。

【馬甲子】產地 江西處處有

之。

形態 如莖莢。莖莖。大葉如柿

葉亦硬。面綠。背淡。有緒紋。開小白

花。如蓮花。結實形似鯪魚。圓小如

錢。生青熟緒。有扁核。青時味如琪

而淡。其根可供藥用。



馬甲子

主治 喉痛。

【馬皮】主治 婦人臨產。赤馬

皮。催生良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬皮曰。治小兒赤禿。

以赤馬皮。白馬蹄燒灰。和臘豬脂

傅之良。

【馬目毒公】即鬼臼之古籍別名。

典見本經。詳「鬼臼」條。

【馬目奪公】即八角連之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「八角連」條。

【馬矢藟】即馬先蒿之古籍別名。

典見本經。詳「馬先蒿」條。

【馬先蒿】命名 本品氣如馬

矢。先為矢字之誤。故

名。

古醫別名 馬矢藟。(本經)練

石草。爛石草。(別錄)馬新蒿。(唐

本草)虎麻。(綱目)鹽齋菊。鹽齋

草。(日本)

外國名詞 Podicularia renu-

Pinase, L. (拉丁) シホガマキ

ク シホガマサウ(日本)

基本 係玄參科馬先蒿屬。藥

用馬先之莖葉。

形態 馬先蒿為溼草類。屬

之一種。多年生草本。高二三尺。葉

長卵形。互生或對生。秋月開花。作

唇形。花冠紅紫色。生於莖之上部。

或有帶黃白色者。八月結角。似小

豆。銳而長。其莖葉可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 寒熱鬼疰。中風溼痺。女

子帶下病。無子。(本經)練石草。治

五癰。破石淋。膀胱中結氣。利水便

小便。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論馬先蒿曰。治惡

疔。

參攷資料 葉大如莖蔚。花紅

白色。三月八月採莖葉。陰乾。用。八

月九月實熟。俗謂之虎麻是也。一

名馬新蒿。所在有之。莖蔚苗短小。

其子夏中熟。二物初生極相似也。

(蘇恭)

一〇九八

【馬耳】即索干之古籍別名。典見

別錄。詳「索干」條。

【馬行】即紫參之古籍別名。典見

別錄。詳「紫參」條。

【馬尾】主治 女人崩中。小兒

客忤。

參攷資料 馬尾。濟生方治崩

中。十灰丸中用之。又延壽齋云。刷

牙用馬尾。令齒疎損。近人多用燒

灰揩拭。最腐齒。不可不知。(李

時珍)

【馬尾】即商陸之古籍別名。典見

廣雅。詳「商陸」條。

【馬尾香】即乳香之古籍別名。典

見海藥。詳「乳香」條。

【馬尾連】產地 出雲南省。

上有小根頭。土人盤曲之以市。

性質 性寒。味苦。

效能 能去皮莖膜外及筋絡

之邪熱。

主治 小兒傷風及痘疹難透。

【馬尾絲】命名 本品形如馬

尾。故名。

產地 出產海島間。

形態 馬尾絲為雜草類之一

種。葉細而長。花紅而小。根似菟子。核色黃且多細絲如髮。不拘鮮乾。俱可供藥用。

主治 蛇蜂諸毒。

【馬尾歸】即當歸之產於陝西。頭圓多尾。色紫。氣香而肥者。詳『當歸』條。

【馬尾藻】即海藻之處方用名。詳『海藻』條。

【馬尾勃】即馬勃之處方用名。詳『馬勃』條。

【馬折】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【馬朮】即馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【馬肝】 古籍別名 懸燧。 性質 有大毒。

主治 經水不通。

參攷資料 ①馬肝及鞍下肉。殺人(陶弘景)②按漢武帝云。食肉毋食馬肝。又云。文成食馬肝而死。草莊云。食馬留肝。則其毒可知矣。方家以豉汁。鼠矢解之。(李時珍)

【馬肝石】 外國名詞 Polys. onum multiflor.

十畫 馬

mm. (拉丁)

命名 本品爲石之青黑如馬肝者故名。

製法 須盛以金函。養以水銀。

主治 烏髮拭之。止癢。和九轉丹服。

【馬肝石】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳『何首烏』條。

【馬豆】即雲實之古籍別名。典見綱目。詳『雲實』條。

【馬辛】即荏菥之古籍別名。典見綱目。詳『荏菥』條。

【馬乳】 性質 甘。冷。無毒。 主治 止渴。治熱。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論馬乳曰。作酪性溫。飲之消肉。

參攷資料 馬乳性冷利。同魚胎食作癩。(孫思邈)

【馬乳葡萄】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【馬夜眼】 古籍別名 附蟬尸。 基本 本品在馬膝上。有此目。能夜行。

主治 卒死尸厥。觸齒痛。

【馬鬃子】即馬鬃子之古籍別名。

典見爾雅。詳『馬鬃子』條。

【馬明退】即蠶脫之古籍別名。典見補註本草。詳『蠶脫』條。

【馬牀】即蛇牀子之古籍別名。典見廣雅。詳『蛇牀子』條。

【馬肺】 主治 寒熱。陰痿。

【馬金南】即馬檳榔之古籍別名。典見記事珠。詳『馬檳榔』條。

【馬金鑿】即馬檳榔之古籍別名。典見雲志。詳『馬檳榔』條。

【馬前子】即車前子之別名。詳『車前子』條。

【馬勃】 處方用名 輕馬勃。馬尻勃。

古籍別名 馬朮。馬窠。灰菰。牛屎菰。(綱目)灰包。馬包。馬胞。馬尼菌。馬天乙。茸。(和漢藥考)狗頭灰。(俗名)

外國名詞 Tyopordonbo. Pithall (英)

基本 係夏季生於山林陰地之馬勃。爲菌類之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬勃以廣東南順之桑基產者爲佳。質鬆浮。其次廣西產者。再次則

產於河南省開封府。質結而重。均十月新。

形態 初生作白色球狀。如馬糞。及長大。外面作暗褐色。質輕如棉。中含無數孢子。其熟者。觸之發塵煙。

採取 夏秋間採曝乾。

製法 李時珍曰。凡用以生布張開。將馬勃於上。摩擦。下以盤承取末用。

性質 辛。平。無毒。

效能 清肺火。療喉痛。閉音。止血。

主治 惡瘡馬疥。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論馬勃曰。傳諸瘡疥甚良。【宋】寇宗奭本草衍義論馬勃曰。去膜。以蜜拌揉。少以水調。治喉痺咽疼。【明】李時珍本草綱目論馬勃曰。清肺。散血熱。解毒。

【明】經希雍本草經疏論馬勃曰。馬勃味辛。氣平。而無毒。宜其主惡瘡。馬疥。及止凍瘡也。衍義曰。去膜。以蜜拌。少以水調。治喉痺。痛則辛散之功也。【清】汪飴庵本草備要論馬勃曰。馬勃。辛。平。輕。虛。清。

十畫 馬

肺解熱散血止咳。治喉痺咽痛。鼻
衄失音。外用敷諸瘡良。生溼地朽
木上。狀如肝。紫色。虛煖。彈之粉
出。取粉用。

近人學說 張山雷曰。馬勃生
於陰溼之處。色紫成團。輕鬆多粉。
乾而撲之。粉輕四散。有如烟霧。雖
非苔類。而稟陰溼之氣以生。蓋亦
與苔相似。故李氏綱目。附於苔類
之末。唯輕虛能散。與苔類之專於
滑降者不同。其氣味。則名醫別錄
以為辛平。其主治。則別錄雖止治
惡瘡馬疥。蓋既能散毒。又能燥溼。
以療溼瘡。固得其宜。故弘景亦謂
傳諸瘡甚良。今人用以為金瘡止
血。亦效。寇宗奭謂以蜜拌抹。以水
調。治喉痺咽疼。蓋既散鬱熱。亦
清肺胃。確是喉症良藥。東垣普濟
消毒飲用之。亦是此意。瀕澗謂清
肺散血熱解毒。內服外敷。均有捷
驗。誠不可以微賤之品而忽之。

配合應用 ①治咽喉腫痛。噤
物不得。馬勃一分。蛇退皮一條。燒
末。綿裹一錢。含嚙立瘥。(聖惠方)
②治走馬喉痺。馬屁勃。即灰。搗
爛。消一兩。為末。每吹一字。吐涎血

即愈。(經驗良方)
③治聲失不出。馬騾勃。馬牙消
等分。研末。沙糖和丸。夾于大噲之
(摘玄方)
④治久嗽不止。馬勃為末。蜜丸。
梧子大。每服二十丸。白湯下。即愈。
(普濟方)
⑤治魚骨哽咽。馬勃末。蜜丸。彈
子大。噲嚙。(聖濟總錄方)
⑥治積熱吐血。馬屁勃為末。沙
糖丸。如彈子大。每服半丸。冷水化
下。(袖珍方)
⑦治妊娠吐衄不止。馬勃末。滾
米飲服半錢。(聖惠方)
⑧治斑瘡入眼。馬屁勃。蛇皮各
五錢。皂角子十四箇。為末。入罐內。
鹽泥固濟。燒存性。研。每溫酒服一
錢。(開孝忠集驗方)
⑨治睡瘡不斂。葱鹽湯洗淨。拭
乾。以馬屁勃末傅之。即愈。(仇遠
稗史方)
用量 八分至錢半。
參攷資料 ①馬勃。即唐韓退
之所謂牛溲馬勃。俱收並蓄者也。
有大如斗者。小亦如升杓。去膜。以
蜜揉拌。少以水調。治喉閉咽痛。

生溼地及腐木上。夏秋採之。(寇
宗奭) ⑤每見用寒涼藥數劑者。
雖愈而熱毒內攻。變生他病。為害
不小。惟馬勃辛平而散。甚為穩妥。
(吳遵程)
【馬屎】即馬適之俗名。詳「馬適」
條。

【馬屎中粟】 主治 金創。小
兒寒熱。客忤。不
能食。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論馬屎中粟曰。治小兒
脇痛。
【馬思哥油】即酥之古籍別名。典
見綱目。詳「酥」條。
【馬思答吉】 產地 出西域
諸地。
形態 馬思答吉為菜類植物
之一種。形如椒。而香氣酷烈。可供
藥用。
性質 苦。溫。無毒。

主治 去邪。順氣。溫中。利腸。止
痛。生津。解渴。令人口香。
【馬珂螺】即珂之古籍別名。典見
綱目。詳「珂」條。
【馬駒】即白棘之古籍別名。典見

一一〇〇

綱目。詳「白棘」條。
【馬胞】即馬勃之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「馬勃」條。
【馬胞衣】 主治 婦人天癸不
三錢。入麝香少許。空腹新汲水下。
不過三服。良。
【馬革】即黍之古籍別名。典見郭
義恭廣志。詳「黍」條。
【馬韭】即麥門冬之楚名。典見綱
目。詳「麥門冬」條。
【馬唐】即蒼草之古籍別名。典見
別錄。詳「蒼草」條。
【馬廔瓜】即王瓜之古籍別名。典
見本草衍義。詳「王瓜」條。
【馬料豆】即稽豆之俗名。詳「稽
豆」條。
【馬草】即敗醬之古籍別名。典見
別錄。詳「敗醬」條。

【馬骨】 性質 有毒。
主治 燒灰和醋。傅小
兒頭瘡及身上瘡。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論馬骨曰。止邪。癩。燒灰
和油。傅小兒耳瘡。頭瘡。陰瘡。瘰癧。
有漿。如火灼。敷乳頭。飲兒。止夜啼。

【馬骨】 性質 有毒。
主治 燒灰和醋。傅小
兒頭瘡及身上瘡。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論馬骨曰。止邪。癩。燒灰
和油。傅小兒耳瘡。頭瘡。陰瘡。瘰癧。
有漿。如火灼。敷乳頭。飲兒。止夜啼。

【馬兜鈴】 命名 本品莖附木
上秋間葉落其質懸
垂狀如馬項之鈴故名

處方用名 杜兜鈴 蜜炙兜鈴

古籍別名 王黃瓜 王室瓜 玉

寶瓜 兜鈴苗 兩金藤 (和漢藥考)

雲南根 (綱目) 都淋藤 (肘後方)

外國名詞 Aristolochia

dobilis, S. et Z. (拉丁)

基本 屬馬兜鈴科 藥用馬兜

鈴之子實

產地 陳仁山藥物生產辨云

馬兜鈴產安徽亳州河南山東直

隸山西平古縣等



馬兜鈴

形態 馬兜鈴為生於原野路

旁之多年生蔓草 春季自宿根生

苗 經格樹木而上 葉似薯蕷葉而

厚 背呈白色 有毛茸 葉莖俱有一

種惡臭 夏季於葉腋開黃紫色不

整筒狀花 後結實 即名馬兜鈴 根

名青木香 此草至秋季而枯死 實

十畫 馬

為褐色卵圓形 長一寸 闊六七分
被有薄皮 中有多數白色扁平種
子 類似榆實

採取 七八月採實陰乾

製法 雷斅曰 凡用馬兜鈴 採

得實 去葉及莖 以生絹袋盛於東

屋角畔 待乾勢開去革膜 取淨子

焙用

性質 苦寒 無毒

效能 開肺下氣 消熱化痰 治

肺熱喘咳症

主治 痰結喘促 血痔瘰癧

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論馬兜鈴曰 肺氣上急坐

息不得 咳逆連連不止 【金】張元

素珍珠囊論馬兜鈴曰 清肺氣 補

肺 去肺中溼熱 【明】繆希雍本草

經疏論馬兜鈴曰 馬兜鈴味苦氣

寒而無毒 亦應有辛 入手太陰經

苦善下洩 辛則善散 寒能除熱 其

性輕揚 厥狀類肺 故能入肺除熱

而使氣下降 咳嗽者 氣升之病也

氣降熱除 嗽自平矣 痰結喘促 亦

肺熱病也 宜并主之 血痔瘰癧 無

非血熱 况痔病屬大腸 大腸與肺

為表裏 清肺熱則腸熱亦清矣 故

亦主之 甄權用以治肺氣上急 坐

息不得 咳逆連連不止 潔古用以

清肺氣 補肺 去肺中溼熱者 皆除

熱降氣散結之力也 【清】黃宮繡

本草求真論馬兜鈴曰 馬兜鈴辛

性苦寒 體輕而虛 熱則四開象肺

因苦則能入肺降氣 因寒則能瀉

熱除痰 因辛則於寒中帶散 故肺

熱痰喘 聲音不清者 服此最宜 且

其體輕則性上涌 故竊要治蛇蟲

毒 一味濃煎 服之探吐 其毒即解

至有云服馬兜鈴能補肺陰者 取

其熱清氣降 而肺自安之意 錢氏

用此同阿膠糯米補肺 其功原在

糯米阿膠耳 豈馬兜鈴之謂哉 又

云可治腸風痔瘻 以肺與大腸為

表裏 腸胃之熱 本於肺臟所移 肺

清而腸之熱與之俱清耳 若肺寒

喘嗽失音者 切忌 去筋膜 取子用

【清】汪劭庵本草備要論馬兜鈴

曰 馬兜鈴體輕而虛 熱則四開象

肺 故入肺 寒能清肺熱 苦辛能降

肺氣 治痰喘喘促 血痔瘰癧 大腸

經熱 亦可吐蟲 蔓生實如鈴 去筋

膜 取子用 【清】黃元御玉楸藥解

論馬兜鈴曰 馬兜鈴味苦氣寒 入

手太陰肺經 清肺降逆 定喘止咳

治痔瘻腫病 能解蛇蟲之毒 多用

則吐 【清】楊時泰本草述鈞元論

馬兜鈴曰 馬兜鈴所治 專主咳嗽

之因於肺熱而痰結喘促者 第肺

熱痰結 須分虛實 經曰 太陽獨至

脈喘虛氣逆 是陰不足 陽有餘也

又有虛勞少血 津液內耗 心火自

焚 使燥熱乘肺 咯喘膿血 上氣澀

潮 其嗽連續而不可已者 用兜鈴於

補瀉中 得不從所主劑 以為別乎

且就痰結而論 亦不能以熱盡之

有咳因寒溼 久而痰滯 氣道壅塞

亦竟喘促不得臥 是乾澀理中之

治也 較病於肺熱為陽之有餘者

符壤懸殊 而患證相類 就是推之

則六淫所感 寒熱而外 更如風暑

燥溼 有乘於各氣之偏 累及陰陽

合和之宗氣 遂極於主氣肺臟 以

為咳嗽氣逆者 更舉七情受病 有

因各臟之戾氣 以累及宗氣 而極

於主氣者 種種可止就肺熱而實

之歟 况六淫七情 每每因鬱化火

治火之法 必先治鬱 而火乃散 又

不謂清肺熱 下逆氣 便可一了百

當也 知此則可以善用兜鈴矣

近人學說 賈九如曰馬兜鈴體質輕。氣味俱清。凡輕清者上浮。單入肺部。主治肺熱久嗽。痰結喘促。肺氣上急。坐臥不安。蓋嗽久則肺虛。肺虛則氣熱。氣逆則喘促。上急以此苦味者涼之降之。使肺熱去而嗽自止也。後湖云。肺熱久嗽。喘促連聲不絕者。非此不能除。因其體輕升上。直入膈。主治臍滿。張山雷曰。馬兜鈴開寶本草稱其苦寒。甄權則謂之平。瀕湖則曰微苦辛。蓋甄按味固稍苦而氣甚清。雖能清熱。却非大苦大寒之品。東垣謂味厚氣薄。陰中微陽。瀕湖加一辛字。蓋亦以其輕而能散。固亦隱隱有辛開之作用者也。開寶謂主肺熱咳嗽。痰結喘促。正以形質空虛。中雖有質。而亦片片如紙。宛若木蠲。之隨風飛揚。故同為宣通肺氣。化痰開閉之藥。其能治喘促者。以肺有痰濁鬱結。則呼吸不暢。而喘促隨之。此能通其結。塞斯氣道。利而喘促自寧。此與虛喘家濁陰上逆。宜於攝納鎮墜之治者。一輕一重。用藥相反。而同為定喘之兩大法門。甄權謂主肺

氣上急。咳逆連連。潔古謂去肺中溼熱。固皆肺實氣壅之正治也。開寶又謂治血痔瘻瘡。則清利宜通。固為瘡家血熱壅結之良劑。且血痔腸漏。皆屬大腸燥金溼熱之壅滯。此能清金開溼。是以主之。若潔古以為清肺。而又以為補肺。則殆誤解錢仲陽補肺阿膠散之真旨。要之仲陽意中。祇為肺受燥火之陵。熱壅不宜。故用牛蒡杏仁兜鈴。皆屬開宣清熱主治。特以熱傷肺陰。乃主阿膠。非諸藥皆是補肺正將。瀕湖已謂錢氏此方。非以兜鈴補肺。乃取其清熱降氣。使邪去而肺安。蓋頭案宣肺之藥。紫苑微溫。兜鈴微清。皆能疏通壅滯。止咳化痰。似此二者。有一溫一清之分。宜辨寒嗽熱嗽。寒喘熱喘主治。究竟紫苑本非大溫。兜鈴亦非大寒。而能快壅疎通。皆有捷效。洵乎同為肺金壅塞之良藥矣。

味更清。力量更薄。究其功用。不如杜兜鈴為佳。而價值則較賤。尙不知究是何物。如謂果即兜鈴之別種。則其外囊又何以棄而不用。且此藥之所以開肺者。性情專在於亮。瀕湖所謂體輕而虛。然則懸而四開。有肺之象者是也。今乃偏去其外殼。則未免有買椟還珠之憾矣。

配合應用 治水腫腹大。喘急。馬兜鈴煎湯日服之。(千金方)

治肺氣喘急。馬兜鈴二兩。去殼。及膜。酥半兩。入盤內。拌勻。慢火炒乾。甘草炙一兩。為末。每服一錢。水一盞。煎六分。溫呷或噉之。(簡要濟衆方)

治一切心痛。不拘大小男女。大馬兜鈴一個。燈上燒存性。為末。溫酒服立效。(摘玄方)

解蛇蟲毒。飲食中得之。咽中如有物。噤不下。吐不出。心下熱悶。兜鈴一兩。煎水服。即吐出。(崔行功纂要方)

治痔瘻腫痛。以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良。(日華本草方) 用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡屬寒嗽及脾弱便泄者禁用。

參攷資料 馬兜鈴體輕而虛。然則懸而四開。有肺之象。故能入肺。氣寒味苦。微辛寒。能清熱。苦辛能降肺氣。錢乙補肺阿膠散用之。非取其補肺。乃取其清熱降氣。邪去則肺安矣。其中所用阿膠糯米。則正補肺之藥也。湯劑中用多。亦作吐。故崔氏方用以吐蟲。其不能補肺。又可推矣。(李時珍) 其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蟲。隱其名為三百兩銀藥。肘後方作都淋蓋誤傳也。(李時珍) 獨行根。生古堤城旁。所在平澤叢林中。皆有之。山南名為土青木香。一名兜鈴。根莖生葉似蘿藦。而則且澀。花青白色。其子大如桃李。而長。十月以後枯。則頭開四系若囊。其中實薄扁似榆莢。其根扁而長尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月採根。(馬志) 馬兜鈴今關中河東河北淮壘浙州郡皆有之。春生苗作莖。總樹而生。葉如山羅葉而厚大。背自六月開黃紫花。頗類枸杞花。七

月結實如大瓠。狀似鈴。作四五瓣。其根名雲南根。微似木香。大如小指。赤黃色。七八月採實曝乾。(蘇頌) 肺熱咳嗽。為絕少之症。今人惑於錢乙補肺阿膠一方。取以治虛嗽。百服百死。按單以馬兜鈴治虛嗽固不可。若配以阿膠糯米。有何不可。此則一偏之言也。(陳修園)

【馬兜鈴根】即青木香之原名。詳【青木香】條。

【馬勒口錢】即馬口錢之別名。見【馬口錢】條。

【馬眼】採取。以白馬生殺者。取之良。

性質 平。無毒。
主治 疔癩。腹滿。瘧疾。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論馬眼曰。小兒疔病。與母帶之。

【馬絆繩】命名 本品乃繫馬之繩。故名。

主治 煎水治小兒疔疾。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬絆繩曰。燒灰搽鼻瘡。

【馬脛骨】性質 甘寒。無毒。
主治 煨存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩。黃連。

【馬莧】即馬齒莧之古籍別名。與見別錄。詳【馬齒莧】條。

【馬蝮】即馬陸大者之別名。詳【馬陸】條。

【馬蚊】即馬陸之古籍別名。典見郭璞賦。詳【馬陸】條。

【馬通】命名 本品即馬之糞。凡糞必達洞腸而出。故名。

處方用名 白馬通。白馬屎。
古籍別名 馬屎。馬糞。(俗名)

製法 新瓦上焙乾用。
性質 微溫。無毒。

效能 清血熱。止吐衄。用作解熱止血藥。

主治 止渴。止吐血。下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論馬通曰。數頂止衄。

【唐】陳藏器本草拾遺論馬通曰。絞汁服。治產後諸血氣。傷寒時疾。當吐下者。【唐】孟詵食療本草

論馬通曰。治時行病起合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜各二服。又治杖瘡。打損傷。瘡中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。【明】李時珍本草綱目論馬通曰。絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱悶脹。燒

灰水服。治久痢赤白。和豬脂治馬咬人瘡。及馬汗入瘡。刺死馬骨。刺傷人。毒攻欲死者。【明】經希雍本草經疏論馬通曰。白馬通本經雖云微溫。然必是苦而涼者也。惟其苦涼。所以能療諸血熱。證止渴。及

孟詵主陰陽易垂死者。絞汁服也。【明】李士材本草圖解論馬通曰。白馬通即馬屎。微溫。主婦人崩中

止渴。及吐血。下血。鼻衄。金瘡止血。治陰陽易垂死者。絞汁服。白馬通味辛微寒。主消渴。破癥。墜積。聚。男子伏梁。積疝。婦人瘕疾。銅器盛飲之。【清】搨樹本經疏證論馬通曰。史記大宛多善馬。馬汗血。其先天馬子也。是知馬之氣最盛者。能使

血隨汗出。即劣亦不能使血停於中。散之以行脈絡矣。然獨用其通何也。蓋馬通之治。治血之因寒而停。遇隨以溢者。何以知之。則以別

錄謂其微溫。仲景用於柏葉湯。知之。夫血緣火迫而溢。必不用性溫者為治。且不使與乾薑艾葉為伍矣。馬一身之物。非性寒即有毒。均非能釀生氣於人身者。惟通則性溫。而為養馬一身之餘。縱使一切性寒有毒之骨肉臟腑。皆賴此以生長。則人之身其因寒因傷而血

停。因血停而吐衄崩漏者。均能行以散之。不容其再停矣。然謂其止渴何也。夫惟止渴一語。獨隸於婦人崩中之下。亦可知其崩中。則一身津液隨血而流。遂不足以上滋。固無與於吐衄金創。小小下血者矣。

配合應用 治吐血不止。燒白馬通。以水研絞汁一升服。(梅師方)

治衄血不止。用綿裹白馬屎塞之。(錄驗方) 又用赤馬糞絞汁。飲一二升。並滴鼻內。乾者沒水亦可。(千金方)

治口鼻出血。用赤馬糞燒灰。溫酒服一錢。(永類鈴方)

治久痢赤白。馬糞一丸。燒灰水服。(肘後方)

十 驢 馬

十靈馬

- ① 治卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞丸。絞汁灌之。乾者水煮汁亦可。此烏鶴法也。(肘後方)
- ② 治提腸痔痛欲死者。用馬糞研汁飲之。立愈。(經驗方)
- ③ 治小兒卒作。馬屎三升。燒末。以酒三斗。煮二沸。取汁。浴兒。避風。(千金方)
- ④ 治小兒羸瘠。面青腹強。是作客氣。新馬糞一團。絞汁灌之。(聖濟總錄方)
- ⑤ 治傷寒勞復。馬屎燒末。冷酒服方寸匕。便發。(聖惠方)
- ⑥ 治熱毒攻肢。手足腫痛欲脫。以水煮馬屎汁灌之。(外臺秘要方)
- ⑦ 治風蟲牙痛。白馬屎汁。隨左右含之。不過三口。愈。(聖惠方)
- ⑧ 治鼻翳不聞。新馬屎汁含滿口。灌入即通。(聖惠方)
- ⑨ 治筋骨傷破。以熱白馬屎傳之無效。(千金方)
- ⑩ 治疔腫傷風作腫。以馬屎炒炭。上五十遍。極效。(聖惠方)
- ⑪ 治多年惡疔。或痛痒生瘻。用

- 馬糞并齒。同研爛。傳上不過數次。武丞相在蜀時。歷有瘡痒不可忍。用此而瘥。(兵部手集方)
- ⑫ 治諸瘡傷水。或傷風寒痛劇。用馬屎燒烟熏。令汗出。愈。(千金方)
- ⑬ 治凍指欲墮。馬糞煮水。漬半日即愈。(千金方)
- ⑭ 治積聚脹滿。白馬糞同蒜搗存。傅患處。效。(活人心鏡方)
- ⑮ 治一切漏疾。白馬通汁。每服一升。良。(千金方)
- ⑯ 用蠶 三錢至四錢。
- ⑰ 施用宜忌 凡無實熱者禁用。
- ⑱ 參攷資料 ① 馬屎曰通。牛屎曰洞。豬屎曰零。諱其名也。凡屎必達腸胃乃出。故曰通。曰洞。謂廣腸也。(李時珍) ② 別錄以雲中馬為良。雲中今大同府也。大抵馬以西北方者為勝。東南者劣。弱不及。馬應月。故十二月而生。其年以齒別之。在畜屬火。在辰屬午。或云在卦屬乾。屬金。馬之眼光照人全身者。其齒最少。光愈近。齒愈大。馬食杜衡善走。食稻則足重。食鼠屎則腹脹。食鷄糞則生骨眼。以儼為烏梅

- 拭牙則不食。得桑葉乃解。掛鼠狼皮於槽。亦不食。遇海馬骨則不行。以豬槽飼馬。石灰泥馬槽。馬汗着門。並令馬落駒。繫鬃於麻。辟馬病。皆物理當然耳。(李時珍)
- 【馬蓬】 基本 馬蓬為雜草類之一種。可供藥用。
- 性質 辛。無毒。
- 主治 殺蟲。
- 【馬陰莖】 製法 陳藏器曰。白馬。春月游牝時。力勢正強者。生取陰乾。百日用。雷斅曰。用時以鋼刀破作七片。將生羊血并蒸半日。曬乾。以粗布去皮及乾血。搗碎用。
- 性質 甘。鹹。平。無毒。
- 主治 傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健生子。(本經) 小兒驚癇。(別錄)
- 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬陰莖曰。益丈夫陰氣。
- 參攷資料 ① 陰乾。同肉菴蓉。等分。為末。蜜丸。梧子大。每空心酒下四十九丸。日再。百日見效。(孟詵)

一一〇四

- ① 主男子陰痿。故房中術備用之。(甄權)
- 【馬陸】 古籍別名 百足。(本經) 馬軸。(別錄) 飛蚊。(李氏藥錄) 刀環蟲。(蘇恭) 百節。(衍義) 千足。(炮炙論) 馬蚊。馬蠅。馬蠅。(郭璞) 馬蠅。(爾雅) 蠶(綱目) 馬蠅。
- 外國名詞 Julius Julius
- Thousand-legs (拉丁) ヤステ (日本)
- 基本 係節肢動物多足類馬陸類馬陸科。
- 產地 陰溼諸地。處處有之。
- 形態 馬陸為溼生蟲類之一種。其體則長。約三十箇同形之環節合成。每環節具脚二對。頭部扁平。有短觸鬚一對。及單眼數個。口有上下顎各一對。無毒鉤。背而有黃黑相間之環紋。晝伏夜出。食草根及腐敗物。常有一種惡臭。觸之則彎曲如蠶狀而不動。其在山而大者。謂山蠶蟲。採得可供藥用。
- 製法 雷斅曰。凡收得馬陸。以糠頭炒至燥焦黑。取出。去糠。竹刀刮去頭足。研末用。

性實 辛溫有毒。

主治 腹中大聚癥。破積聚。息肉。惡瘡。白禿。(本經)療寒熱痞結。脇下滿。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬陸曰。辟邪瘡。

參攷資料 馬陸係神農藥。雷

氏備載炮炙之法。而古方鮮見用者。惟聖惠逐邪丸用之。其方治久瘡發軟無時。用百節蟲四十九枚。淫生蟲四十九枚。砒霜三錢。粽子角七枚。五月五日。日未出時。於東南上尋取兩般蟲。至午時向南研勻。丸小豆大。每發日早。男左女右手。把一丸嗅之七遍。立效。修時忌孝子。婦人。師尼。獐犬見之。亦合別錄。療寒熱之說。大抵毒物止可外用。不敢輕入丸散中。(李時珍)

【馬留】即獼猴之古籍別名。典見倭遊錄。詳「獼猴」條。

【馬寫】即車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【馬蛤】即馬刀之古籍別名。典見別錄。詳「馬刀」條。

【馬蛭】即水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳「水蛭」條。

【馬軸】即馬陸之古籍別名。典見別錄。詳「馬陸」條。

【馬軻螺】即珂之古籍別名。典見綱目。詳「珂」條。

【馬新藹】即馬先蒿之古籍別名。典見唐本草。詳「馬先蒿」條。

【馬棟子】即馬蘭子之處方用名。詳「馬蘭子」條。

【馬溺】採取 以白馬者良。性實 辛微寒。有毒。

主治 消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人瘦積。銅器承飲之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論馬溺曰。洗頭瘡白禿。漬惡刺。瘡日十次。愈乃止。【明】李時珍本草綱目論馬溺曰。熱飲治反胃殺蟲。

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛病。奴死剖之。得一白髓。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿隨髓而流。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

【馬腦】性實 有毒。主治 斷酒。臘月者溫酒服。

參攷資料 馬腦食之。令人癡。(孟詵)

【馬腸】產地 生泰州。形態 馬腸為雜木類之一種。其葉似桑。其根葉可供藥用。

採取 三月採葉。六月採根。性實 苦辛寒。有毒。

主治 根療蟲除風。其葉療疥疥。

【馬莖】即鬱金之原名。詳「鬱金」條。

【馬蜂】即土蜂之古籍別名。典見綱目。詳「土蜂」條。

【馬飯】即薺草之古籍別名。典見別錄。詳「薺草」條。

【馬瘍木】產地 生山谷間。形態 為雜木類之一種。樹形似櫻。其根皮可供藥用。性實 有小毒。

主治 惡瘡疥癬。生蟲作痒。為末和油塗之。

【馬精香】即返魂香之古籍別名。

典見海藥本草。詳「返魂香」條。

【馬蟻】即水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳「水蛭」條。

【馬蠟】即蟬之古籍別名。典見爾雅。詳「蟬」條。

【馬蠟】即馬陸之古籍別名。典見爾雅。詳「馬陸」條。

【馬銜苒苒】即芍藥節大莖細。狀如馬銜者之古籍別名。典見綱目。詳「川芎」條。

【馬鳴退】即蟬蛻之別名。見「蟬蛻」條。

【馬鞭草】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬鞭草」條。

【馬價珠】即真珠產於西番者之古籍別名。典見格古論。詳「真珠」條。

【馬竅】即馬勃之古籍別名。典見綱目。詳「馬勃」條。

【馬箭】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【馬蓼】古籍別名 大蓼。龍藏水紅花。墨記草。(綱目)

外國名詞 Polygonum Polsumbu, Eain. Var. Blumei, Matsuna. (拉丁)イヌタバ(日

本) 基本 係蓼科蓼屬。為馬藜之莖葉。

產地 原野溼地均有出。
形態 馬藜為溼類之野生雜草。莖高一二尺。葉長橢圓形而尖。互生。其鞘狀托葉之邊緣。有細長之剛毛甚多。初夏開花。花淡紅色。密生於花軸之上部。穗狀花序。其莖葉可供藥用。



馬藜

性質 辛溫。無毒。
主治 去腸中蛭蟲。輕身。

參攷資料 ①馬藜伏丹砂、睡黃(李時珍) ②凡物大者。皆以馬藜之俗呼大藜是也。高四五尺。有大小二種。但每葉中間有黑跡如蟲點記。故方士呼為墨記草。(李時珍) ③馬藜。生下溼地。莖斑葉大有黑點。亦有兩三種。其最大者名龍藜。即水荏花也。(陶弘景)

【馬醉木】 命名 本品牛馬食其葉即有醉狀。故名馬醉木。

古籍別名 投木(拾遺)
基本 屬石南科馬醉木之葉。
產地 凡山野川谷間皆有之。
形態 馬醉木為山野自生之常綠樹。庭園亦栽植之。以供玩賞。高五六尺。但生於深山者。有時高至二丈。葉互生。為革質。作長卵圓形而稍尖。邊緣有細鋸齒。春季於枝梢垂穗三寸許。簇生白色蜜狀小花。花後結小實。



馬醉木

用法 水煎薰洗。或焙剉外搽。
性質 苦平。有毒。
效能 殺蟲蟲。洗疥癬。用作殺蟲藥。

主治 破產後血。黃汁服之。其葉煎汁洗疥癬。搗碎封蛇傷。
用量 八分至一錢。
國外學說 本草綱目啓蒙曰。

投木生山中者。多係五六尺小木。年久者始至丈餘。葉互生。形細長。有鋸齒。似拾葉而薄。經冬不凋。春日枝梢開花。呈白色。如新木花。穗長三寸許。叢集下垂。後結小子。亦如緞木子。牛馬若食此葉。即作醉狀。故名馬醉木。鹿食之。則不時角解。菜園生小長黑蟲時。用此葉煎湯。放冷灌之。可殺蟲。又和漢藥考曰。將葉之生汁點舌上。舌立麻痺。若誤咽下。時致喪命云。

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡內服藥中禁用。

參攷資料 ①投木生江東林箕間。樹如石榴。葉細。高丈餘。四月開花。白如雪。(陳藏器) ②此木今無識者。其狀頗近山礬。恐古今稱謂不同耳。(李時珍)


【馬駒】 即薪葉之古籍別名。典見吳普本草。詳「薪葉」條。
【馬齒砂】 即砂砂之古籍別名。典見本草集註。詳「砂砂」條。

【馬齒莧】 命名 本品葉序比竝如馬齒。而性滑利。
古籍別名 馬莧。(別錄) 五行

草。(圖經) 五方草。長命菜。馬齒龍芽草。九頭獅子草。豬耳草。(綱目) 五色莧。鼠齒莧。(和漢藥考)

外國名詞 Portulaca oleracea L.(拉丁)

基本 屬馬齒莧科。馬齒莧之葉莖。
產地 凡原野間恒多生焉。
形態 馬齒莧為一年之自生草。本春季生苗。平臥地上。分枝成長。莖圓。帶微赤色。葉厚而對生。作長橢圓形。葉莖俱係多汁肉質。表面滑澤。夏季於葉腋開大二分許之黃色五瓣花。後結實。實橫裂。中藏小黑色種子。



馬齒莧

採取 六七月間採之。

製法 雷斅曰。凡使勿用大葉者。韓保昇曰。葉小者至難燥。當以槐木槌碎。向日東作架曬之三兩日。即乾如隔年矣。入藥須去莖。用其莖無效。

性質 酸寒無毒。

效能 治熱毒瘡。解毒散血。用治毒蟲及毒蛇刺傷藥。

主治 諸腫癢疔目。搗搯之。破痰。止消渴。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇

對本草論馬齒莧曰。治白尸脚陰

腫。【唐】蘇恭新修本草論馬齒莧

曰。飲汁。治反胃諸淋。金瘡流血。破

血。癩癧。小兒尤良。用汁治緊唇

面皴。解馬汁射工毒。塗之。瘰。【唐】

孟詵食療本草論馬齒莧曰。作膏

塗溼癩。白禿。杖痞。又主三十六種

風。麥粥止痢及疔痢。治腸痛。【宋】

蘇頌嘉祐圖經本草論馬齒莧曰。

能肥腸。令人不思食。治女人赤白

帶下。【宋】開寶重定新本草論馬

齒莧曰。服之。長年不白。治癰瘡。殺

諸蟲。生搗汁服。當利下惡物。去白

蟲。利梳垢。封丁腫。又燒灰和陳醋

滓。先灸後封之。即根出。【明】李時

珍本草綱目論馬齒莧曰。散血消

腫。利腸滑胎。解毒通淋。治產後虛

汗。【明】繆希雍本草經疏論馬齒

莧曰。馬齒莧味辛苦。氣寒無毒。經

云。替氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。

十畫 馬

原病式云。諸痛瘡疔。皆屬心火。

辛寒能涼血散熱。故主癰結。癰瘡

疔腫。白禿。及三十六種風結瘡。搗

敷。則腫散疔根拔。絞汁服。則惡物

當下。內外施之。皆得也。辛寒通利。

故寒熱去。大小便利也。苦能殺蟲。

寒能除熱。故主殺諸蟲。去寸白。止

渴。辛寒能散肺家之熱。故主目盲

白翳也。長年不白。總言其涼血益

血。病去身輕之功耳。方士多採取

用。以其亦有代砂結汞之能也。

近人學說 張山雷曰。此草葉

似首畜而肥厚如錢。其莖亦最肥

碩。曬於烈日之中。不易乾燥。其稟

性陰寒。已可概見。故最善解癰腫

熱者。亦可作敷藥。對本草稱其酸

寒。寇宗奭謂其寒滑。陳藏器謂治

諸腫。破痰癧。止消渴。皆寒涼解熱

之正治。蘇恭亦謂飲汁。治反胃。金

瘡流血。諸淋。破血癧癧。則不獨

治癰腫。兼能消痞。蓋此草之莖。面

青而背紫。莖亦作紫色。故入血分

而破血滯諸症。蘇頌謂治女人赤

白帶下。則此症多由溼熱凝滯。寒

滑以利導之。而溼熱可泄。又兼能

入血破癧。故亦治赤帶。瀨湖謂散

血消腫。利腸滑胎。解毒通淋。又無

一非寒滑二字之成績也。

配合應用 ①治三十六風結

瘡。馬齒莧一碩。水一碩。煮取汁。入

蜜蠟三兩。重煎成膏。塗之。【食療

本草方】

②治諸氣不調。馬齒莧麥粥食

之。【食醫心鏡方】

③治穢解毒氣。六月六日。採馬

齒莧曬乾。元且煮熟。同鹽醋食之。

可解疫癘氣。【唐寶經方】

④治筋骨疼痛。不拘風溼氣。楊

梅瘡。及女人月經病。先用此藥止

疼。然後調理。乾馬齒莧一斤。溼馬

齒莧二斤。五加皮半斤。蒼朮四兩。

春碎。以水煎湯洗滌。急用葱攪搗

爛。沖熱湯三碗服之。暖處取汗。立

時痛止也。【海上名方】

⑤治脚氣浮腫。心腹脹滿。小便

澀少。馬齒莧和少糯米醬汁煮食

之。【食醫心鏡方】

⑥治男女瘡疾。馬齒莧搗扎手

寸口。男左女右。

⑦治產後虛汗。馬齒莧研汁三

合服。如無以乾者煮汁。【婦人良

方】

⑧治產後血痢。小便不通。臍腹

痛。生馬齒莧菜汁三合。煎沸。入

蜜一合和服。亦治小兒血痢。【產

寶方】

⑨治肛門腫痛。馬齒莧葉。三葉

酸草等分。煎湯煎洗。一日二次。有

效。【瀨湖方】

⑩治痔瘡初起。馬齒莧不拘鮮

乾。煮熟食之。以湯煎洗。一月內

外。其孔閉即愈矣。【楊氏經驗方】

⑪治赤白帶下。不問老稚孕婦。

悉可服。取馬齒莧搗絞汁三大合。

和雞子白二枚。先溫令熱。乃下莧

汁。微溫頓飲之。不過再作即愈。【

崔元亮海上方】

⑫治小便熱淋。馬齒莧汁服之。

【聖惠方】

⑬治陰腫痛極。馬齒莧搗傅之

良。【永類鈴方】

⑭治中蟲欲死。馬齒莧搗汁一

升飲。并傅之。日四五次。【壽域方】

⑮治腹中白蟲。馬齒莧水煮一

碗。和鹽醋空腹食之。少頃。白蟲盡

出。【孟詵方】

⑯治緊唇面皴。馬齒莧煎湯日

洗之。【聖惠方】

①治目中息肉淫膚赤白膜。馬齒莧一大握。洗淨和芒硝末少許。綿裹安上。類易之。(龍木論方)

②治風竇腫痛。馬齒莧一把握。汁漬之。即日腫消。(本事方)

③治漏耳諸瘡。治耳內外惡瘡。及頭瘡肥瘡。瘡瘡黃馬散。黃藥牛兩。乾馬齒莧一兩。爲末。傳之。(聖惠方)

④治項上癰瘡。用馬齒莧陰乾。燒研。臘豬脂和。以暖泔洗拭。傳之。(外臺秘要方)又治癰癧未破。馬齒莧同旋花搗。日三次。(簡便方)

⑤治腋下胡臭。馬齒莧杵。以蜜和作團。紙裹。泥固。半寸厚。日乾。燒過研末。每以少許和蜜作餅。先以生布揩之。以藥夾脇下。令極痛。久忍。然後以手巾勒兩臂。日用一次。以瘻爲度。(千金方)

⑥治小兒火丹。熱如火。邊際卽損人。馬齒莧搗塗。(廣利方)

⑦治小兒疥瘡。久不瘥者。馬齒莧燒研傳之。(千金方)

⑧治豌豆斑瘡。馬齒莧燒研傳之。須臾。根逐葉出。不出則更傳之。

(肘後方)

①治疔瘡腫毒。馬齒莧二分。石灰三分。爲末。雞子白和傳之。

②治反花惡瘡。馬齒莧一斤。燒研。豬脂和傳。

③治蛙脚腫瘡。用乾馬齒莧研末。蜜調傳上一宿。其蟲自出。神效。(海上方)

④治足趾甲疽腫爛者。屋上馬齒莧。崑崙青木香。印城鹽等分。和勻。燒存性。入光明砂少許。傳之。(外臺秘要方)

⑤治瘡久不瘥。積年者。馬齒莧搗爛封之。取汁煎稠傳亦可。(千金方)

⑥治馬咬人瘡入心者。馬齒莧煮食之。(聖惠方)

⑦治射工溪毒。馬齒莧搗汁一升。服。以淨傳之。日四五次。良。(海上方)

⑧治毛蟲螫人。赤痛不止。馬齒莧搗熟封之。妙。(靈苑方)亦治蜂螫人。(張文仲方)

⑨治蜈蚣咬傷。馬齒莧汁塗之。(肘後方)

⑩治小兒白禿。馬齒莧煎膏塗。

之。或燒灰。豬脂和塗。(聖惠方)

①治身面癩痕。馬齒莧湯日洗二次。(聖惠方)

②治雜物眯目不出。用東牆上馬齒莧。燒灰研細。點少許於昏頭。卽出也。(聖惠方)

③用錢。錢半至三錢。施用宜忌。凡脾虛便泄及孕婦。禁用。忌煎甲。

參攷資料 ④馬齒莧所主諸病。皆只取其散血消腫之功也。(李時珍)

⑤多年惡瘡。百方不瘥。或痛癢不已者。煎搗爛。馬齒莧傳上。不過三兩遍。此方出於武元衡。

相國。武在西川。自苦。歷瘡。燥痒不堪。百醫無效。及到京。有驛吏上此方。用之。便瘥也。李絳記其事於兵部手集。(蘇頌)

⑥馬齒莧。雖名莧。類。而苗葉與莧都。不相似。一名五行草。以其葉青。梗赤。花黃。根白。子黑也。(蘇頌)

⑦馬齒莧。處處園野生之。柔莖布地。細細對生。六七月開細花。結小尖實。實中細子如葶。

糜子狀。人多採苗。煮曬爲蔬。方士採取伏砒。結承。煮丹砂。伏硫黃。死雄制。雌。別有法度。一種水馬齒生。

水中。形狀相類。亦可均食。見玉西樓藥譜。(李時珍)

【馬齒莧子】

主治 明目。歷代記述攷

【唐】孟詵食療本草論馬齒莧子曰。延年益壽。【明】常效先食醫心鏡論馬齒莧子曰。青盲白翳。除邪氣。利大小便。去寒熱。以一升搗末。每以一匙。用葱豉煮粥食。或著米。粳五味作羹食之。

【馬齒莧粥】

基本 本品係以馬齒莧和米

煮成之粥。

主治 治瘰。消腫。

【馬齒龍芽草】卽馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。【馬齒攀】卽攀石色青白生者之古籍別名。典見本草集註。詳『明琴』條。

【馬瓊】卽水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳『水蛭』條。

【馬穰子】卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【馬蠶草】卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【馬蹄】卽馬懸蹄之簡稱。詳『馬

【馬蹄】條。

【馬蹄決明】即決明子之古籍別名。典見本草集註。詳「決明子」條。

【馬蹄香】即杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「杜若」條。

【馬蹄草】即杜衡之處方用名。詳「杜衡」條。

【馬蹄草】即尊之古籍別名。典見綱目。詳「尊」條。即決明子之古籍別名。典見本草集註。詳「決明子」條。

【馬蹄草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【馬錢子】即番木鱉之古籍別名。典見綱目。詳「番木鱉」條。

【馬頭骨】性質 甘。微寒。有小毒。

主治 喜眠。令人不睡。燒灰水服方寸七日。三夜一作枕亦良。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論馬頭骨曰。治齒痛。燒灰傳頭耳。【明】李時珍本草綱目論馬頭骨曰。療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傳之。白汗出良。

【馬類】即海月之古籍別名。典見綱目。詳「海月」條。

【馬糞】即馬通之俗名。詳「馬通」條。

【馬糞石】即鮮苔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鮮苔」條。

【馬薊】即白朮之古籍別名。典見綱目。詳「白朮」條。即大薊之古籍別名。典見范汪。詳「大薊」條。即蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼朮」條。

【馬薊根】即續斷之古籍別名。典見初虞氏古今錄驗方。詳「續斷」條。

【馬薊子】即馬薊子之古籍別名。典見禮記注。詳「馬薊子」條。

【馬檳榔】古籍別名 馬金盞。事珠。紫板榔。綱目。

形態 檳榔為檳榔之一種。其莖莖生。結實大如葡萄。紫色。核頗大。似大楓子。而殼稍薄。圓長斜扁。其中仁可供藥用。

性質 苦。甘。寒。無毒。

主治 產難。臨時細嚼數枚。并華水送下。須臾立產。再以五枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下也。欲斷產者。常嚼二枚。水下久則子宮冷。自不孕矣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬檳榔仁曰。傷寒熱病。食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。即無所傷。

參攷資料 馬檳榔仁。凡嚼之者。以冷水一口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。汪機。

【馬薊】即玉竹之古籍別名。典見別錄。詳「玉竹」條。

【馬藍】命名 本品為藍之一種。其葉如苦蕒者。故名。

古籍別名 板藍。俗名大葉冬藍。山海經。琉球藍。和漢藥考。外國名詞 Strobilanthes flaccidifolia, Nees (拉丁)

主治 婦人敗血。遠根焙搗下。節。酒服一錢七。

【馬蠶】即水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳「水蛭」條。

【馬鞭草】命名 本品節生紫類鞭草。故名。

古籍別名 龍牙草。國經。鳳頭草。綱目。馬折。馬鞭草。杜牛夕。

鐵掃帚。鐵筍草。和漢藥考。鐵筍符。

外國名詞 Verbena officinalis, L. (拉丁) Vervain (英)

基本 屬馬鞭草科。馬鞭草之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬鞭草有兩種。產廣西南寧。百色。安南東京等處。單枝形如馬鞭。又名黃草。洗淨偽充金釵斛用。廣東生草藥店所沽者。其形若傘。開花結子時有筋。經過草邊。褲脚每多被筋所刺。以此種為正。

形態 馬鞭草為原野自生之多年生草。亦有栽植以供玩賞者。春季自宿根生苗。莖作方形。高二三尺。葉對生。初似菊葉。後作三尖。更分裂為羽狀。邊緣有細鋸齒。夏日。梢上開穗狀小花。作淡紫色。花冠作唇形。根白色。類貝母。

【馬藍】命名 本品為藍之一種。其葉如苦蕒者。故名。

古籍別名 板藍。俗名大葉冬藍。山海經。琉球藍。和漢藥考。外國名詞 Strobilanthes flaccidifolia, Nees (拉丁)

主治 婦人敗血。遠根焙搗下。節。酒服一錢七。

【馬蠶】即水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳「水蛭」條。

【馬鞭草】命名 本品節生紫類鞭草。故名。

古籍別名 龍牙草。國經。鳳頭草。綱目。馬折。馬鞭草。杜牛夕。

鐵掃帚。鐵筍草。和漢藥考。鐵筍符。



草 鞭 馬

十畫 馬

採取 七八月間採之。

製法 採得莖葉曬乾用。

性質 苦微寒無毒。

效能 破血通經殺蟲消腫用。

作清血藥。

主治 下部腫瘡。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論馬鞭草曰。療癩血瘕。久瘡。破血殺蟲。搗爛煎取汁。熬如飴。每空心酒服一匕。【宋】大明諸家本草論馬鞭草曰。治婦人血氣。肚脹。月候不勻。通月經。【元】朱丹

溪本草衍義補遺論馬鞭草曰。治金瘡。行血活血。【明】李時珍本草綱目論馬鞭草曰。搗塗癰腫。及蠅螻尿管。男子陰腫。【明】繆希雍本草經疏論馬鞭草曰。馬鞭草。圖經謂之龍牙。別錄味苦氣寒無毒。保昇日華子咸謂辛涼。本是涼血破血之藥。下部腫瘡者。血熱之極。兼之溼熱。故血汚濁而成瘡。且有蟲也。血涼熱解。汚濁者破而行之。靡不瘳矣。陳藏器謂其破血殺蟲。亦此意耳。

配合應用 ●治瘧疾寒熱。用馬鞭草搗汁五合。酒二合。分二服。

(千金方)

●治鼓脹煩渴。身乾黑瘦。馬鞭草細剉。曝乾。勿見火。以酒或水同煮。至味出。去滓溫服。以六月中旬

雷鳴時採者有效。(衛生易簡方)

●治大腹水腫。馬鞭草。鼠尾草各十斤。水一石。煮取五斗。去滓再煎。令稠。以粉和丸。大豆大。每服二三丸。加至四五丸。神效。(肘後方)

●治男子陰腫。大如升。核痛。人所不能治者。馬鞭草搗塗之。(集驗方)

●治婦人疝痛。名小腸氣。馬鞭草一兩。酒煎服。以湯浴身。取汗甚妙。(醫要奇方)

●治婦人經閉。結成癥塊。助脹大欲死者。馬鞭草根苗五斤。剉細水五斗。煎至一斗。去滓。熬成膏。每服半匙。熱酒化下。日三服。(聖惠方)

●治酒積下血。馬鞭草灰四錢。白芷灰一錢。蒸餅丸。梧子大。每米飲下五十丸。(摘玄方)

●治魚肉癢癢。凡食魚鱸及生肉在胸膈不化。成癢癢。馬鞭草搗汁飲一升。即消。(千金方)

●治乳癰腫痛。馬鞭草一握。酒一碗。生薑一塊。搗汁服。渣敷患處。(衛生易簡方)

●治白癩風瘡。馬鞭草為末。每服一錢。食前荆芥薄荷湯下。日三服。忌鐵器。(聖惠方)

●治人疥馬疥。馬鞭草不犯鐵器。搗自然汁半盞。飲盡。十日內愈。神效。

●治赤白下痢。龍牙草五錢。陳茶一撮。用水煎服。神效。(醫方摘要方)

●治發背癰毒。痛不可忍。龍牙草搗汁飲之。以滓敷患處。(集簡方)

●治楊梅惡瘡。馬鞭草煎湯。先煎後洗。氣到便爽。瘡腫隨滅。(本草蒙筌方)

●治馬喉痺風。腫頰吐血。馬鞭草一握。避風。去兩頭。搗汁飲之。良用。錢半至三錢。

●施用宜忌 凡無滯滯。及元虛而無溼熱瘡毒者。禁用。忌火。

●參攷資料 ●葉似狼牙及菟蔚。抽三四穗。紫花。似車前。穗類鞭韜。部不似蓬蒿也。(蘇恭) ●今銜

山廬山江淮州郡皆有之。苗類益母而莖圓。高二三尺。又曰龍牙草。生施州高二尺以來。春夏有苗。葉至秋冬而枯。採根洗淨用。(蘇頌)

●馬鞭下地甚多。卷月生苗。方華葉似益母。對生。夏秋開細紫花。作穗。如車前穗。其子如蓬蒿子而細。根白而小。(李時珍) ●馬鞭氣味苦有毒。伏丹砂硫磺。(甄權)

【馬鞭草根】 性質 辛。溫。無毒。

主治 赤白下痢初起。焙搗羅末。每米飲服一錢。無所忌。

【馬額皮】 卽生於土上之桑根之皮。與桑白皮性味完全不同。不可採用。有毒。食之殺人。

【馬蟻草】 卽地錦之別名。詳「地錦」條。

【馬顛】 基本 馬顛爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘有毒。

主治 療浮腫。不可多食。

【馬駿毛】 卽馬駿毛之簡稱。詳「馬駿毛」條。

原名 鬻毛。

古籍別名 鬻。(綱

目)

性質 有毒。

主治 小兒驚癇。女子崩中。赤白帶。赤用赤馬。白用白馬。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論馬鬣毛曰。燒灰服止血塗惡瘡。

塗惡瘡。

【馬寶】即鮮苔之生於馬腹中者。用治癩癩。其性味詳「鮮苔」條。

【馬懸蹄】良。採取 以赤白馬者。

性質 甘平。無毒。

主治 驚邪癩癩。乳難。辟惡氣。鬼毒。蠱疰不祥。(本經)止衄。內漏。齒齒。赤馬者。治婦人崩。白馬者。治白帶。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】韓保昇

蜀本草論馬懸蹄曰。主癩癩齒痛。

【唐】孟詵食療本草論馬懸蹄曰。赤馬者辟溫瘧。【明】李時珍本草綱目論馬懸蹄曰。療腸癰。下瘀血。帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。搽走馬疔蝕甚良。

【馬蘭子】原名 蕪蕪。

古籍別名 劇草子。豕首子。

十畫 馬

(本經)蕪蕪。(別錄)馬薤子。(禮記注)馬薤子(爾雅)鐵掃帚子。(救荒本草)旱蒲子(禮記)三堅子(綱目)莽子(爾雅)

外國名詞 Iris onata, Th.

umb var. chinensis, Maxim.

基本 屬薔尾科。馬蘭之種子。

形態 馬蘭為自生之宿根草。春末自宿根叢生數十葉。高二三尺。葉細厚旋捲。類溪蓀葉。故有捲溪蓀之名。四五月間抽莖。梢上開紫碧色類似溪蓀之六瓣花。後結莢實。中有帶赤色小扁子。謂之馬蘭子。供藥用。



子 蘭 馬

採取 五月間採實。陰乾。

製法 時珍曰。凡入藥炒過用。

治疔則以醋拌炒之。

性質 甘平。無毒。

效能 消溼熱。解諸毒。用治小

腹疔痛藥。

主治 皮膚寒熱。胃中熱氣。風

寒溼痺。堅筋骨。令人嗜食。久服輕身。(本經)止心煩滿。利大小便。長肌膚。肥大。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論馬蘭子曰。療金瘡。血內流。癰腫有效。【宋】大明日華諸家

本草論馬蘭子曰。婦人血氣煩悶。產後血暈。并經脈不止。崩中帶下。

消一切疥癬。止鼻衄吐血。通小腸。消酒毒。治黃病。殺蠱毒。傳蛇蟲咬。

【明】李時珍本草綱目論馬蘭子曰。治小腹痛。腹內冷積。水痢諸

病。

配合應用 治諸冷極病。醫

所不治者。馬蘭子九升。洗淨。空腹

服一合。酒下。日三服。(千金方)

治寒疝諸疾。寒疝不能食。及

腹內一切諸疾。消食肥肌。馬蘭子

一升。每日取一把。以麴拌煮香之。

服盡愈。(姚僧坦集驗方)

治喉痺腫痛。用蕪蕪一合。升

麻五分。水一升。煎三合。入少蜜攪

勻。細呷大驗。(聖惠方)用馬蘭子

二升。升麻一兩。蜜丸。水服一錢。又

方。馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。研為

細末。空心用溫酒服方寸匕。(衛

生易簡方)

治水疔百病。用馬蘭子以六

月六日。麴蒸各等分。為末。空心米

飲服六寸匕。如無六月六日。常

麵亦可。或牛骨灰亦可。又方。馬蘭

子。乾薑。黃連各等分。為散。熱湯服

二方寸匕。入腹即斷也。冷熱皆治。

常用神效。不得輕之。忌豬肉冷水。

(張文仲備急方)

治腸風下血。有瘡瘡瘡破者

不治。馬蘭子一斤。研破。酒浸。夏三

冬七日。曝乾。何首烏半斤。雄黃雌

黃各四兩。為末。以浸藥酒打糊丸。

梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三

服見效。(普濟方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 月令仲冬。荔挺

出。鄭玄注云。荔馬薤也。通俗文云。

一名馬蘭。本草謂之蕪蕪。(蘇恭)

馬蘭子。北人訛為馬棟子。廣雅

云。馬薤。荔也。高誘云。荔挺出。荔草

挺出也。講禮者不識。呼為荔挺。又

作馬薤。並誤矣。馬薤亦名豚耳。即

馬蘭也。(蘇頌)爾雅云。莽音瓶。

馬薤也。此即荔草。謂其可為馬刷。

故名。今河南北人呼為鐵掃帚。是

十蠶馬

矣。(李時珍)今陝西諸郡及鼎澧州亦有之。近汴尤多。葉似蘆而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角子如麻。大而赤色。有稜根。細長通黃色。人取以為刷。三月開花。五月採實。並陰乾。用許慎說文云。荔似蒲而小。根可為刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多。種於階庭。呼為旱蒲。不知即馬薺也。(蘇頌) ③ 蠶草生荒野中。就地叢生。一本二三十莖。苗高三四尺。葉中抽莖開花。又能結實也。(李時珍)

【馬蘭花及根葉】

主治 去白蟲。(本草)

經)療喉痺。多服令人溼洩。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬蘭花及根葉曰主癰疽惡瘡。

配合應用 ① 治睡死不寤。蠶實根一握。搗爛。以水絞汁。稍稍瀝之。(外臺秘要方)

② 喉痺口噤。馬蘭花一兩。荑荊子一兩。為末。溫水服一錢。

③ 喉痺腫痛。喘息欲死者。外臺秘要用馬蘭根葉二兩。水一升。半

煮一盞。細飲之。立瘳。用根搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。(聖惠方)

④ 治沙石熱淋。馬蘭花七枚。燒故筆頭二七枚。燒粟米一合。炒為末。每服二錢。酒下。日二服。名通神散。

⑤ 治小便不通。馬蘭花炒。茴香炒。厚糜炒為末。每酒服二錢。(十便良方)

⑥ 治一切癰疽。發背惡瘡。用錢掃帚。同松毛。牛膝。以水煎服。(乾坤生意方)

⑦ 治面上癢。取錢掃帚。地上自落葉。并子。煎湯。頻洗。數次。自消。(醫域神方)

⑧ 治面腫鼻齇。馬蘭子花。杵傅之佳。(肘後方)

參攷資料 ① 蠶草花實皆入藥。列仙傳云。寇先生采人。好種蠶食其葩。實是矣。(蘇頌) ② 按葉水東日記云。北方田野人患胸腹飽脹者。取馬棟花。搗涼水服。即泄。數行而愈。按此則多服令人泄之說有驗。而蠶實謂之馬蘭。更無可以疑矣。(李時珍)

【馬藻】即水藻之古籍別名。典見綱目。詳「水藻」條。

【馬薺】 命名 凡物大者。多以馬名。本品似芹而大。故名。

古籍別名 牛薺。(爾雅)胡芹。(通志)野茴香。(綱目)

產地 生水澤間及卑溼諸地。形態 馬薺為菜類之一種。與芹同類。三四月生苗。一本叢生。如蒿。白毛蒙茸。似水芹而微小。似芎藭葉而色深。五六月開碎花。攢簇如蛇牀。及薺花。青白花。結實亦如薺。而色黑且重。根白色。長尺許。氣亦香。硬堅不堪食。莖苗可供食與藥用。

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 益脾胃。利胸膈。去冷氣。作菜茹食。

【馬薺子】 性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 心腹脹滿。開胃。下氣消食。調味用之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論馬薺子曰。炒研醋服。治卒心痛。令人得睡。【明】李時珍本草綱目論馬薺子曰。溫中暖脾。治

一一二

反胃。

【馬鬣膏】 命名 鬣項上也。即馬項上之脂膏。故名。

性質 甘。平。有小毒。

主治 生髮。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬鬣膏曰。治面黧。手足皴粗。入脂澤用。療偏風口喎。僻

參攷資料 ① 馬鬣脂膏。柔五金。(溫源) ② 按靈樞經云。卒口僻急者。頰筋有寒。則急引頰移。頰筋骨熱。則緩不收。以桑鈞鈞之。以生桑灰置坎中坐之。以馬鬣其急頰。以白酒和桂末塗其緩頰。且飲美酒。噉炙肉。為之三拊而已。靈

樞無註本。世多不知此方之妙。竊謂口頰喎僻。乃風中血脈也。手足陽明之筋。絡於口。會太陽之筋。絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而

縱。故左中寒。則逼熱於右。右中寒。則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑癢。營衛凝滯。治法。急者緩之。緩者急之。故用馬鬣之甘平。柔緩以療其急。以酒其痺。以通其血脈。用桂酒之辛熱。急束以達其緩。以和其營衛。以通其經絡。榮

其緩。以和其營衛。以通其經絡。榮

能治風痺。通節竅也。病在上者。酒以行之。甘以助之。故飲美酒。噉炙肉云。(李時珍)

【馬蘭】 命名 本品葉形似蘭。且大而俗稱物之大者為馬。故名。

處方用名 馬蘭根。馬蘭葉。

古籍別名 紫菊(綱目)紺菊。

(日本)嫩尖名馬蘭頭(俗名)

外國名詞 Astor trinervius,

Roxb. var. adustus Maxim.

(拉丁)コンギク(日本)

基本 係菊科紫菀屬。為馬蘭

之根莖。

產地 多生於山野田澤間。



馬蘭

形態 馬蘭為芳草類之多年生草本。高二三尺。葉長作卵形而尖。粗糙。有三大脈。其鋸齒甚深。互生。秋月莖頭枝梢開花。花深紫色。與雞兒腸相類。惟有許多冠毛。故相差異。其嫩苗可作蔬茹。而根莖

等均可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 破宿血。養新血。止鼻衄。吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸。及諸

菌毒。蠱毒。生搗塗蛇咬。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬蘭曰。主諸瘧及腹中急痛。痔瘡。

近人學說 祝天一曰。吳地町

畦有草。葉似澤蘭。青而滋。花似野菊。瓣紫蕊黃。莖圓而赤。嫩時野人

摘而充饌。味頗美。因值錢。亦不甚借。鄉人名之曰馬藍。言此草係藍

屬。繁植而賤。可供馬食。故稱焉。根名為馬藍根。亦賤名也。味辛涼。能

解毒。東垣普濟解毒飲用治時行大頭。有奇效。搗汁敷瘡毒。滴喉痺

應響甚疾。誠良藥也。綱目有馬蘭釋名紫菊。註云。葉似澤蘭。花似菊

抑。即馬藍歟。蘭與藍音同。故出此綱目藍條中。另有馬藍。蓋指菸藍

而言也。或曰。蘭與藍既音同。不妨名之為蘭。何必名之為藍。余曰。蘭

芳草也。此草不香。不可稱蘭。蘭貴名也。此草託身田坂。安可自稱尊

而僭亂其名乎。

參攷資料 ●馬蘭辛平。能入

陽明血分。故治血與澤蘭同功。近

人用治痔漏云有效。春夏取生。秋

冬取乾者。不用鹽醋。白水煮食。并

飲其汁。或以酒煮。焙研糊丸。米飲

日服之。仍用煎水。入鹽少許。日

日煎洗之。醫學集成云。治痔用馬

蘭根搗傅片時。看肉平即去之。稍

遲恐肉反出也。(李時珍) ●馬蘭

生澤旁。如澤蘭而氣臭。楚辭以惡

草喻惡人。北人見其花呼為紫菊。

以其似單瓣菊花而紫也。又有山

蘭。生山側。似劉寄奴葉。無極。不

對。生花心微黃赤。亦大破血。皆可用。

赤遊風丹毒。並治大人丹毒。或滯

熱伏於經絡。腿面不紅不腫。疼痛

異常。病者祇覺熱。他人按之極冷

者。方用馬蘭。不拘多少。無葉取根。

清水洗去泥。搗絞取汁。以雞毛蘸

汁。搽之。乾則再換。或調飛浮六一

散。搽之亦可。(醫學大辭典)

【馬蘭根】即馬蘭之處方用名。詳

【馬蘭】條。

【馬蘭葉】即馬蘭之處方用名。詳

【馬蘭】條。

【馬蘭頭】即馬蘭嫩尖之俗名。詳

【馬蘭】條。

【馬蘭樹皮】即合歡皮之古籍別

名。典見和漢藥考。詳【合歡皮】條。

【馬蘭】即馬陸之古籍別名。典見

郭璞賦。詳【馬陸】條。

【馬藍】即水蛭之古籍別名。典見

本草衍義。詳【水蛭】條。

【骨片】即鹿茸之花名。詳【鹿茸】

條。

【骨皮露】基本 本品為地骨

皮所蒸之露。

主治 解肌熱骨蒸。一切虛火。

【骨托禽】即駝鳥之古籍別名。典見綱目。詳「駝鳥」條。

【骨咄犀】即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳「蛇角」條。

【骨美】即白薇之古籍別名。典見綱目。詳「白薇」條。

【骨訥】即風肺臍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「風肺臍」條。

【骨納】即風肺臍之古籍別名。典見綱目。詳「風肺臍」條。

【骨脾草】即辟瘟草之俗名。詳「辟瘟草」條。

【骨蝕】即風肺臍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「風肺臍」條。

【骨碎補】原名 猴薑。本品能治折傷而補骨碎故名。根如猴形。狀似真境。遂有猴薑之稱。

處方用名 鮮毛薑。申薑。

古籍別名 胡蘇薑(拾遺)石毛薑(日華)石菴薑(綱目)毛薑(俗名)

基本 隱花植物。石草類。為骨碎補之根。

產地 多在山野川谷石樹間。陳仁山藥物生產辨云。骨碎補產

廣東北江、清遠、三坑等處。

形態 骨碎補為石草類多年自生之隱花植物。莖細長。延繞於巖石或樹木上。其枝幹密生。春生葉為三出羽狀複葉。葉面青綠。背面色白。夏日生多數子囊莖。有包如穀斗。其根扁長似薑。入藥用。



補 碎 骨

採取 春秋季採之。

製法 數日。凡採得用銅刀刮去黃赤毛。細切。蜜拌潤。飯蒸一日。曬乾用。急用只焙乾不蒸。亦得也。

性質 苦。溫。無毒。

效能 補腎治骨傷。破血療風痛。用作緩和滋養藥。又為殺蟲鎮痛藥。

主治 破血止血。補傷折。

歷代記載 甄權【唐】甄權藥性本草論骨碎補曰。主骨中濕氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。【宋】大明諸家本草論骨碎補曰。惡疾。微爛肉。殺蟲。【明】李

時珍本草綱目論骨碎補曰。研末。豬腎夾煨。空心食。治耳鳴及腎虛久泄。牙疼。【清】黃宮燾本草求真論骨碎補曰。骨碎補味苦而溫。功崗入腎補骨。且能入心破血。是以腎虛耳鳴。久瀉。跌仆損傷。骨痛牙痛。血出。無不用此調治。俾其腎補骨堅。破瘀生新。而病即除。至論其名曰骨碎補。以其骨碎能補骨故耳。雖與補骨脂相似。然總不如補骨脂性溫固腎通心。而無逐瘀破血之治也。去毛。蜜拌蒸用。【清】鄒澍本經疏證論骨碎補曰。折之不死。插之輒生。剪枝移續。則根重栽。皆草木恒性。詎足為異。未可以療傷折也。然則倒插亦生。橫埋亦生。雖切之成塊。暴之至枯。摘其一葉。分其一瓣。無不可生者。遂可以療傷折乎。此不過水與土正相媾。草木偶得之。遂乘此生發耳。又烏足以療傷折。且傷之為傷。豈無差別。在皮肉曰傷破。在筋脈曰傷斷。惟在骨乃曰傷折。傷既在骨。而遠望水土之滋凝。草木之聯屬。其傷處敗壞久矣。惟骨碎補者。寸寸折之。寸寸皆生。處處折之。處處有汁。無

藉根株之係。不致血液之漏。故曰主破血。止血。補傷折。言能。不使凝結者。留滯。不使流動者。妄行。而補其傷折。如未嘗傷折也。所以然者。苦本堅塞。而內含水。自應腎之體。溫本生發。而能運水。自應腎之用。此後人所以察其幾微。而謂為補腎。以除耳鳴齒痛。皆可以是以義推之矣。

近人學說 張山雷曰。骨碎補寄生石樹之間。有根有葉。黏着不落。亦猶桑上寄生之屬。性溫而通。故入血和血。通調脈絡。開竅本草。謂氣味苦溫。主破血止血。補傷折。又入藥用根。溫而達下。則入肝腎。故甄權謂主骨中濕氣。風血疼痛。上熱下冷。蓋溫養下元。能引升浮之熱。藏於下焦窟宅。是以可治上熱下冷。李瀕湖謂研末同豬腎煨食。可治耳鳴。及腎虛久泄。牙痛。皆以此意。非可通治胃家實火之齒痛。壽頤先業師岡仙朱先生。嘗用以治寒痰凝滯。牙關不利。頻車隱痛之骨槽症。甚有捷驗。又凡陰虛於下。而肝膽浮陽。挾痰上凝之齒痛。牙槽不利。及陰寒逼陽上浮之

喉痛喉癢諸症。用此亦頗有效。皆即瀕湖用治牙痛之意。而陽邪實感者。類皆不可妄試。昔人每謂此藥入腎。治骨。并能治骨傷碎。因得此名者。皆當識得此意。非陰虛有熱之骨痛骨痿。果可以一概主治也。戴元禮症治要訣。謂病後下虛。不善調養。或遠行。或房勞致兩足痿軟。或痛或痺。遂成痲風。宜用獨活寄生湯。加虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一。同研酒服。則以腎之虛寒而言。此藥溫腎。能起骨萎宜矣。惟病後風之脚腫膝腫。亦有陰虛生內熱者。則宜魏玉璣之一貫煎。戴氏此法。非可概投。所謂萬痛有正面皆有反面。症論治。最當明辨。設或因吞棗。希圖弋獲。未有不敗者矣。此藥之根。有似於竈。且生茸茸之毛。故又有毛竈之名。一名猴竈。或謂即以有毛其形似猴得名。壽頤則謂寄生木石之上。等於猴之升木。字之以猴。其義易知。非象形也。又名申竈。則以申年之即猴兒年耳。

配合應用 ●治虛氣攻牙。齒痛血出。或疼痛。骨碎補二兩。銅刀細剉。瓦鍋慢火炒黑爲末。如常搗齒。良久吐之。嚥下亦可。劉松石云。此法出靈苑方。不獨治牙痛。極能堅骨固牙。益精髓。去骨中穢氣。疼痛牙動將落者。敷擦立住。再不復動。經用有神。

●治風蟲牙痛。用骨碎補。乳香等分爲末。糊丸塞孔中。名金針丸。(聖濟總錄方)

●治耳鳴耳閉。骨碎補。削作細條。火炮熱塞之。(圖經方)

●治病後髮落。胡孫竈。野薺薇嫩枝。煎汁刷之。

●治腸風失血。胡孫竈燒存性五錢。酒或米飲服。(仁存方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡精虧血虛。及無療滯者禁用。

參攷資料 ●骨碎補入婦人血氣藥。蜀人治因折筋骨傷損。取根搗篩。煮黃米粥和裹傷處有效。(蘇頌) ●骨碎補足少陰藥也。故能入骨治牙。及久泄痢。昔有魏刺史子久泄。諸醫不效。垂殆。用此藥末入猪腎中煨熟與食。頓住。蓋腎主大小便。久泄屬腎虛。不可專

十鬘 骨 高

從脾胃也。雷公炮炙論。用此方治耳鳴耳亦腎之竅也。按戴原禮症治要訣云。病後下虛。不善調養。或遠行。或房勞。或外感。致兩足痿軟。或痛或痺。遂成痲風。宜用獨活寄生湯。吞虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一。同研。取汁。酒解服之外。用杜牛膝。杉木節。萹薢。白芷。南星。煎湯。頻頻薰洗。此亦從腎虛骨痿而治也。(李時珍) ●骨碎補本名猴竈。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故命此名。或作骨碎布說矣。江西人呼爲胡孫竈。象形也。(陳藏器) ●菴蘭主折傷破血。此物功同。故有菴蘭之名。(李時珍) ●今淮浙陝西。變路州。郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾黃無花實。採根入藥。(蘇頌)

【骨路支】

古鑿別名 飛藤。(綱目拾遺)

產地 生山野間。

形態 骨路支爲蔓草類藤屬之一種。莖葉似淺苔藤。根如青木

香。可供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 上氣浮腫。水氣喘逆。婦人崩中。餘血癥瘕。殺三蟲。

【骨蓬】即蓬蓬草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓬蓬草」條。

【骨篤】即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳「蛇角」條。

【骨篤犀】即骨咄犀。詳「蛇角」條。

【高山源黑魚】即鮫魚之別名。典見和漢藥考。詳「鮫魚」條。

【高良薑】**命名** 本品始出高良郡。即今高州。故名。其山高而稍涼。則名高涼也。

處方用名 高良薑。

古鑿別名 蠻薑。(綱目) 埋光烏藥。比目連理花。(和漢藥考)

外國名 Galanga (拉丁) Galangal (英) Galgant (德)

基本 係屬薑荷科良薑之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。良薑產廣東瓊州各屬爲多。

形態 良薑爲多年生草。莖圓而直立。高六七尺。葉作披針形。有短柄。稍似肉質。花呈綠白色。不整

質實作濃橙黃色卵圓形。其鬚根頗多。長約二寸。粗約四五分。外部時或生有許多節環。並被有細皺紋之薄皮。呈赤褐色。惟內部則為白色。充實而呈纖維狀。質輕而作木質狀。氣味芳香。味如胡椒。



高良薑

種類 良薑出嶺南者。形大虛。生江左者。稠緊。亦不甚辛。其實一也。今人呼細者為杜若。大者為良薑者。亦非也。

採取 二三月間根採。

製法 李時珍曰。凡使良薑紅。宜炒過入藥。亦有以薑同。吳茱萸。東壁土炒過入藥者。朱氏集驗方。脾虛寒痛。高良薑。麻油炒。永類鈴方。治婦人妊娠瘧疾。豬膽汁浸一宿。東壁土炒。

性質 辛。大溫。無毒。

成分 為揮發油。辛味性樹脂。越幾斯。澱粉。膠質等。凡高良薑中。含有三種結晶體。即一。幹草質里。

質。Kamferid. 「格蘭仁」

Galangin. 「阿魯卑特」 Alpin-

H. 是也。甲為黃色扁平結晶體。

(C₁₅H₁₂O₆·H₂O) 不溶於水。熱之

則於二百二十一度至二百二十

二度溶化。乙為淡黃色柱狀結

晶體。丙為粒狀結晶體。

效能 暖胃散寒。止痛。消食。用

作芳香性健胃藥。能治初期虎列

拉。橫隔膜。驚厥。急性腸加答兒。

作用 能刺激胃壁神經。使消

化機能亢進。亦能刺激腸壁血管。

使之收縮。傷寒霍亂等菌遇之。即

感強烈之刺激而死。

主治 暴冷。胃中冷逆。霍亂腹

痛。

歷代紀述攷證 【唐】甄權藥

性本草論良薑曰。治風破氣。腹內

久冷氣痛。去風冷痺弱。【唐】陳藏

器本草拾遺論良薑曰。下氣。益聲

好顏色。煮飯服之。止痢。【宋】大明

日華諸家本草論良薑曰。轉筋瀉

痢。反胃。解酒毒。消宿食。【宋】蘇頌

嘉祐圖經本草論良薑曰。含塊。嚙

津。治忽然惡心。嘔清水。遠邇即瘥。

若口臭者。同草豆蔻為末水煎飲。

【明】李時珍本草綱目論良薑曰。

健脾胃。寬噎膈。破冷癖。除瘴瘧。效

【明】穆希雅本草經疏論良薑曰。

高良薑。本經大溫。藏器辛溫。元素

辛熱。純陽浮也。入足陽明。太陰經。

二經。為客寒所犯。則逆冷。霍亂腹

痛。諸病生焉。辛溫暖脾胃。而逐寒

邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自

愈矣。甄權治腹內久冷氣痛。去風

冷痺弱。大明主轉筋瀉痢。反胃解

酒毒。消宿食。蘇頌治惡心嘔清水。

皆取其煖胃溫中。散寒祛冷之功

也。【清】黃宮繡本草求真論良薑

曰。良薑氣味辛熱。治無他屬。凡因

客寒積於胃脘。而見食積不消。絞

痛殆甚。暨霍亂瀉痢。吐惡噎膈。瘵

瘵冷癖。皆能溫胃却病。故同薑附

則能入胃散寒。同香附則能除寒

祛鬱。若傷暑泄瀉。實熱腹痛切忌

此。雖與乾薑性同。但薑乾經炮經

制。則能以去內寒。此則辛散之極

故能以辟外寒之氣也。

辨偽 鄧肯巖曰。陶隱居言

高良薑始出高良郡。故得此名。別

錄云。氣味辛。大溫。無毒。主治暴冷

胃中冷逆。霍亂腹痛。近有偽品色

黑而暗不黃。根瘦無味。非高良所

產。不可用。用之反有害矣。曹炳

章曰。高良薑。廣東海南出者。皮紅

有橫節紋。肉紅黃色。味辛辣。為道

地。出貨多用。途少。偽者鮮見。南越

筆記云。高良薑出於高涼。故名。根

為高良。薑子即紅豆蔻。子未拆含

胎。與薑經冬味。辛香入饌。又云。凡

物盛多謂之寇。是子如紅豆而叢

生。故名紅豆蔻。今驗此花深紅如

灼。與圖經花紅紫色相類。合花。能

結實。大如白果。有稜。嫩時色紅綠

如細如楊梅。所謂含胎也。老則色

紅。印草木狀之生。薑。楚辭之杜若

也。

近人學說 良薑大辛大溫。潔

古謂辛熱純陽。故專主中宮真寒

重症。別錄獨以治胃冷氣逆。霍亂

腹痛者。正以霍亂皆中宮大寒。忽

然暴仆。俄頃之間。胸腹絞痛。上吐

下瀉。即四肢冰冷。面唇舌色淡白

如紙。脈伏不見。冷汗如油。大肉陡

削。良由盛暑之時。乘涼飲冷。洎沒

真陽。致中氣暴絕。見症如是之劇

甚者。一二時即已皆斃。此非大劑

溫燥。萬不能挽回垂絕之元陽。三

十年來。時疫頻行。每年不有。所見無不如是。蓋附癸黃。良薑蕪荑之屬。均爲此症必須要藥。惟近賢王孟英陸九芝兩家。所論霍亂。皆主溼熱而言。且謂肢冷脈伏。卽是熱深厥深之候。萬萬不可誤用四逆法者。此則當時見症之不同。蓋亦天時人事之變遷。固自有不可一概論者。此當以舌苔之白與黃。膩辨之。而所瀉所吐之物。一則清。一則濁。一則穢氣惡濁。亦必確乎有憑。固不患臨症時之無所適從也。又曰。藪器謂止痢者。當以虛寒滑利言之。必非溼熱積滯之腸。則可知。甄權謂治腹內久冷氣痛。大明治反胃。則胃中無火。食入反出之朝食暮吐。完穀清瀉者也。蘇頌謂含塊噁津。治忽熱惡心嘔清水。亦胃寒之症。瀕湖謂健脾胃。寬嘔。破冷痺。除瘴瘴。皆以陰霜填塞者言。而胃燥津枯之噎膈。溼熱穢濁之瘴瘴。非可一概論矣。石頑謂脾胃爲客寒所犯。則逆冷霍亂。辛溫暖脾胃而逐寒邪。故能治之。甄權大明之主治。皆暖胃溫中散寒之功。如寒疝小腹痛。須同茴香治

十薑高

之。產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。亦用之。若胃火作嘔。傷暑霍亂。禁用。

配合應用 ①治霍亂吐利。高良薑。炙令香。每用五兩。以酒一升。煮三四沸。頓服。亦治腹痛中惡。(外臺祕要方)

②治霍亂嘔甚不止。用高良薑生剉二錢。大棗一枚。水煎冷服。立定。名冰蠶湯。(普濟方)

③治心脾冷痛。用高良薑三錢。五靈脂六錢。爲末。每服三錢。醋湯調下。(永類鈴方)

④治霍亂腹痛。高良薑一兩。剉以水三大盞。煎二盞。去滓。入粳米一合。煮粥食之。便止。(聖惠方)

⑤養脾溫胃。去冷消痰。寬胸下氣。大治心脾痛。及一切物傷。用高良薑。乾薑。等分。泡研末。麴糊丸。梧子大。每食後橘皮湯下十五丸。妊娠勿服。(和劑局方)

⑥治脾虛寒。瘧寒多熱少。飲食不思。用高良薑。麻油炒。乾薑炮。各一兩。爲末。每服五錢。用豬膽汁調成膏子。隨發時。熱酒調服。或以膽汁和丸。每服四十九丸。酒下亦佳。此

丸屢施皆效。救人以百計。大抵寒發於陰。用豬膽引二薑入膽去寒。而燥脾胃。一寒一熱。陰陽相制。所以作效也。一方只用二薑。牛生半炮。各半兩。穿山甲炮。三錢。爲末。每服二錢。醋腎酒下。(朱氏集驗方)

⑦治妊婦腫疾。先因傷寒變成者。用高良薑三錢。剉以豬膽汁浸一夜。東壁土炒黑。去土。以肥瘦肉十五枚。同焙爲末。每用三錢。水一盞。煎熱。將發時服。神妙。(永類鈴方)

⑧治暴赤眼痛。以管吹良薑末入鼻取嚏。或彈出鼻血卽散。(試驗方)

⑨治風牙腫痛。良薑二寸。全蠍焙一錢。爲末。搽之。吐涎。以鹽湯嗽口。此乃樂清巧者所傳。(百一選方)

⑩治頭痛。用良薑生研。類噀鼻。(普濟方)

用鹽 八分至錢半。施用宜忌 凡胃火作嘔。傷暑霍亂。火熱注瀉。心虛作痛等症。禁用。

著名方劑 ①良附丸。治胃脘寒痛。屢發屢止。(心口痛方)高良薑(酒洗)七次。二錢。香附(醋洗)七次。一錢。有。二味。對爲末。加薑汁一匙。鹽少許。爲丸。每服一錢。米飲下。②高良薑丸。治心脾冷痛。(永類鈴方)高良薑(切片)四兩。分作四份。一兩用陳陳米半合炒黃去米。一兩用陳壁土炒黃去土。一兩用巴豆三十四粒炒黃去豆。一兩用斑蝥炒黃去蝥。更以吳茱萸一兩。酒浸一夜。同良薑再炒爲末。以浸吳萸之酒。打糊爲丸。梧子大。每服五十九丸。空心酒湯下。

參攷資料 ①噎逆胃寒者。高良薑爲要藥。人參。茯苓。佐之。爲其溫胃。解散胃中風邪也。(楊士瀛) ②孫思邈千金方。言心脾冷痛。用高良薑細剉。微炒爲末。米飲服一錢。立止。(李時珍) ③凡男女心口一點痛者。乃胃脘有滯。或有蟲也。多因怒及受寒而起。遂致終身。俗言心氣痛者。非也。用高良薑以酒洗七次。焙研。香附子以醋洗七次。焙研。各記收之。病因寒得用薑末二錢。附末一錢。因怒得用附末二

錢。葶末一錢。寒怒兼有各一錢半。以米飲加入生薑汁一匙。鹽一捻。服之立止。韓飛醫通書亦稱其功云。(心口痛方) ⑤良葶形氣與杜若相似。而葉如山葶。(李時珍)

⑥良葶內郡雖有。而不堪入藥。春生莖葉。如葶苗而大。高一二尺許。花紅紫色。如山葶花。(蘇頌) ⑦良葶不可單用。多用。恐犯沖和之氣。虛人須與參朮同行。(吳儀洛) ⑧凡患脚氣人。每且飽食。午後少食。晚則不食。若飢可食。或粥。若不消。而欲致霍亂者。即以高良葶一兩。水三升。煮一升。頓服。盡即消。若倉卒無者。以母葶一兩代之。清酒煎服。雖不及高良葶。亦甚效也。(蘇恭)

【高良葶子】 原名 紅豆蔻。 產地 生南海諸山谷中。

形態 紅豆蔻。花叢生。葉瘦如碧蘆。春末始發。初開花。抽一幹。有大籜包之。籜拆花見。一穗數十葶。淡紅鮮妍。如桃杏花色。萎重則下垂。如蘿蔔。又如火劑環瑤。及剪彩樹枝之狀。每莖有心兩枚。人比之

連理也。子似豆蔻。故名紅豆蔻。

性質 辛。溫。無毒。

主治 腸虛水瀉。心腹絞痛。霍亂嘔吐。酸水。解酒毒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紅豆蔻曰。冷氣腹痛。消瘴毒氣。去宿食。溫腹腸。吐瀉痢疾。【明】李時珍本草綱目論紅豆蔻曰。治噎膈反胃。虛癆寒脹。燥溼散寒。【清】黃宮繡本草求真論紅豆蔻曰。氣味辛甘而溫。炒過入藥。亦是散寒燥溼。補火醒脾之味。且善解酒。并治風寒牙痛。

配合應用 治風寒牙痛。用紅豆蔻為末。隨左右以少許搽鼻中。并搽牙取涎。或加麝香。(衛生家寶方)

參攷資料 ①紅豆蔻苦辛。多食令人舌粗。不思飲食。(甄權) ②紅豆蔻最能動火。傷目致衄。食料不宜用之。(生生編) ③紅豆蔻。李東垣脾胃藥中常用之。亦取其辛熱芳香。能醒脾溫肺。散寒燥溼。消食之功爾。若脾肺素有伏火者。切不宜用。(李時珍) ④紅豆蔻之禁忌炮製。一如良葶。(吳儀洛) ⑤紅

豆蔻苗如蘆。葉如薔。花作穗。嫩葉卷之而生。微帶紅色。嫩者入醃。累累作菜。不散落。須以朱槿花染令色深。善醒醉。解酒毒。無他要使也。(李珣)

【高柴子】即胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡荽」條。

【高飛】即白楊之古籍別名。典見綱目。詳「白楊」條。即扶移之古籍別名。典見崔豹。詳「扶移」條。

【高魚】即石斑魚之古籍別名。典見綱目。詳「石斑魚」條。

【高粱】即稷米之俗名。詳「稷米」條。

【高脚黃】即茶菊之黃色者。典見綱目拾遺。詳「茶菊」條。

【高麗胡椒】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【高麗參】命名 本品為人參產於朝鮮者。即古之百濟。新羅諸地。故名。

古籍別名 白條參。(別錄)朝鮮參。韓國參。百濟參。新羅參。紅參。白參。別直參。(綱目)

外國名詞 Cora-Cinenseng (拉丁)

產地 朝鮮江原道之太白山。小白山。為古來有名產地。其次咸鏡道之麒麟山。白雲山。狼林山。白頭山等。為八道中有名產地。其中除小白山外。以狼林山所產為最粗。性質亦佳。

種植 高麗常於園圃培植。人參。自時後須閱七年。方可採取。

採取 產生於山野者。恒集山中。搜採。採取之法。由時而異。其最簡者。於積雪未消盡時。入山。有參之處。其地較暖。則雪先融。消約二尺。大四方地者。即知有參。而採之。

性質 甘微溫。無毒。

主治 腸胃中冷。心腹鼓痛。胸膈逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。破堅積。令人不忘。

近人學說 張山雷曰。朝鮮地當東海之濱。東東方發生之氣。故其氣味濃厚。色亦重濁。具有溫養生發之性。今用之於脾胃虛寒。真陽衰弱。及中氣不振。陰寒用事。諸證。功效甚捷。較之遼參。偏於養陰。含有清涼氣味者。性質迥異。蓋遼參稟性醇正。絕無剛烈氣象。是以滋陰除津。尤其獨步。而高麗參則

已有剛健姿態。溫升之性。時時流
露。所以兼能振作陽氣。戰勝陰氣。
二者所主之病。雖同陰枯血耗之
候。惟陰虛之體。相火易升。則宜於
遠參而不宜於高麗參。若陰液既
耗。而真陽亦衰。則宜用高麗參而
不宜用遠參。一則養陰而兼理虛
熱。一則補陰而即以扶陽。各有專
主。不容或紊。若治虛熱而誤用高
麗參。無異抱薪救火。則欲蘇潤輻
之。而灼其垂竭之脂膏。若治虛
寒而誤投遠參。幾於落阱下石。則
欲回黍谷之春。而適以陽絕於冰
窖。同是虛也。同是參也。在常用之
時。而一字之爭。已如水火冰炭之
各異。彼夫風寒溼邪。痰飲食積。氣
血鬱結之不得妄投是味者。更無
庸言矣。

十靈 高 爾 鬼

日抄參精參二種。乃人參之種。參
前人參條下已辨明。與別直不同。
別直產韓國。即古之高麗。其產參
之地。如京畿道之松都龍仁。平安
道之江界。全羅道之錦山。忠清道
之忠州。其間以松都產者為最勝。
紅參製造官廠在焉。其地在韓京
之北二十餘里。四面皆山。居北緯
三十八度。寒暑之差殊甚。如松都
產者。以金剛山出者曰金剛參。為
最上品。即今正官別直也。而拳頭
參次之。且有官私之別。紅白之分。
官參。松都所產。由義州出關。加以
重稅。私參。別處所出。多偷漏出口。
故曰私也。廣報云。白參雖不行於
內地。而實則紅參鮮時亦是白參
製成。不過加附子水以醱其色。價
且較白參為昂。及考其性。紅參又
遠不逮白參之和平。故土人無食
紅參者。蓋別直雖為種品。如歷年
餘久。質味愈良。古時每栽七年而
採。後則五年而採。近世韓國割讓
日本。日人多精農學。教以人工栽
培速成之法。三年即能採買。故其
受氣逐年薄弱。而性味效能。亦年
不如年也。凡辨真偽。若真正官別

體態則方形而直。蘆頭大。與身混
直而上。皮面近蘆有細橫皺紋。中
身細直紋。紋緊則無紋。味若兼微
甘。鮮潔而有清香氣。煎淘多次。汁
清而參仍不腐爛。此為最上之品。
近時射利之徒。多以廠參偽充。即
俗所為扁剛。石渠子是也。考廠參
中身大。蘆頭小。頭細。杖下亦粗圓
而大。皮紋直而粗。味苦而兼澀。煎
淘汁混。參亦腐化。以此可辨為贗
品。若廠參以鑽灰同貯。幾年餘。參
性受灰炕燥過度。形質因此堅緻。
煎之亦汁清不燥。其味仍苦兼澀。
總不若真別直質味之清香鮮潔
也。

參攷資料 ● 韓國人參之起
原。去今數百年前。一韓人於巨濟
(釜山與馬山浦之間)之幽谷。發
見一奇草。採掘之。擲至釜山。以示
中國商人。詢其名。不能答。即出高
價購之。且願促再往探索。採取。此
事喧傳遐邇。人爭趨之。深山幽谷
一時採掘殆盡。該韓人乃試行栽
植。終不能如天然產。其後思得一
法。將栽植者蒸熟曬乾。再示之中
國商賈。云此亦可。韓囚之人參殆
即起原於此。蓋始識之者為韓人。
而今則成爲韓國國產之一云。●
韓國之輸出人參於中國。以宣德
年間廢除歲幣金銀。改齎紅參。為
其濫觴。自是高麗人參之名。見稱
於中國。歷年貢使赴北京時。許隨
員各帶紅參八十斤。准其出。售。謂
之包定數。明亡清興。運帶紅參。其
數大增。貢使隨員書狀。官以下三
十五六名人員。共得攜帶至一萬
二百斤。此外義州商賈之隨員。攜
密運者。年達一二萬斤云。隨員攜
帶紅參。應豫先在松都購得定數。
每斤納錢文二十五兩(二貫五
百文)之稅。於松都留守處取得
類似今之印花者。貼箱上。准許攜
帶。及一行渡鴨綠江時。義州府使
再加查驗。復納每斤二兩(一云
銀四兩半)渡江稅。始准通行云。
【高麗牽牛花】即曼陀羅花之古
籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀
羅」條。
【附子】即附子之根。左右附而偶
生者之古籍別名。典見綱目。詳「
附子」條。
【鬼丹】即蘆薈之古籍別名。典見

利漢藥考。詳『百毒』條。

【鬼仙木】即杜仲之古籍別名。與見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【鬼仙橋】即山馬蘭之古籍別名。與見百草鏡。詳『山馬蘭』條。

【鬼目】即羊蹄之古籍別名。與見本經。詳『羊蹄』條。即『鬼目』之古籍別名。與見綱目。詳『鬼目』條。

即白英子之古籍別名。與見綱目。詳『白英』條。

【鬼日花】即凌霄花之古籍別名。與見吳普本草。詳『凌霄花』條。

【鬼考子】即蛇牀子之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳『蛇牀子』條。

【鬼白】故名。本品根形似白。

處方用名 鬼白根。

古籍別名 九白。借犀。馬目毒公。(本經)天白。九老。(本草崇原)解毒。(別錄)毒母草。瑤田草。(圖經)獨脚蓮。獨荷草。(土宿)鬼藥。

羞天子。羞天花。戒律草。山荷葉。旱荷葉。羞寒花。旱荷。八角盤。八角鏡。


唐婆鏡。(綱目)

外國名詞 Podophyllum venosipollo, Hec. (拉丁)

本 係小蘗科。鬼白屬為鬼白之根。

產地 多生山野川谷間。

形態 鬼白為毒草類之多年生山草本。年生一莖。既枯則生一葉六出。或五出。形如雁掌。莖端一葉如徽。隨日傾向。且東夕西。花紅紫色。如荔枝。為葉所蔽。不常外現。其根成白形而似天南星。採得可供藥用。



白 鬼

採取 二月八月採之。

製法 採得根焙乾或陰乾用。

性質 辛溫有毒。

效能 殺蟲辟惡。專作解毒藥。

主治 殺蟲毒。鬼疔。精神。辟惡。氣不祥。逐邪。解百毒。(本經)殺大毒。療咳嗽喉結。風邪煩惑。失魄妄見。去目中障翳。不入湯。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鬼白曰。主尸疔。癰瘡。勞

疾。傳尸痰疾。【明】李時珍本草綱目論鬼白曰。下死胎。治邪癩。癰疽。蛇毒。射工毒。【明】繆希雍本草經疏論鬼白曰。鬼白辛溫有毒。乃陰草中之散結辟邪者也。故能入陰分以辟不祥。及諸蟲毒。鬼疔。精神。尸疔。傳尸。煩惑。失魂。妄見。然此諸病。何莫非陰邪。尸鬼之所為。凡物以類相從。故惟陰草之異品。乃能治乎陰鬼之賊害也。其去目中障翳。及咳嗽喉結。風邪。則辛散之功。耳。其藥有二種。味甘者勝。苦者稍劣。

配合應用 ●治子死腹中。胞破不生。此方累效。救人。歲萬數也。鬼白不拘多少。黃色者。去毛為細末。不用篩羅。只燃之。如粉為度。每服一錢。無灰酒一盞。同煎八分。通口服。立生如神。名一字神散。(婦人良方)

●治射工中人。寒熱發瘡。鬼白藥一把。苦酒漬。取汁。服一升。日二次。(千金方)

●治黑黃急病。面黑黃。身如土色。不妨食。脈沉。若青脈入口者。死。宜烙口中黑脈。耳會。玉泉。章門。心

命。用生鬼白搗汁。一小盞。服。乾者為末。水服。(三十六黃方)

用蠶 八分至錢半。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏垣衣。

參攷資料 ●古方治五尸鬼。疔百毒。惡氣。多用之。又曰。今福州人三月採瑤田草根葉。焙乾。搗木。蜜丸服。治風疾。(蘇頌) ●鬼白根。如射干。白而味甘。九日相連。有毛者良。故名。(陶弘景) ●此物有毒。而曰如馬眼。故名馬目毒公。殺蟲解毒。故有厚名。其藥如鏡。如盤。如荷。而新苗生。則舊苗死。故有鏡。盤。荷。蓮。寄母諸名。蘇東坡詩集云。瑤田草。俗號唐婆鏡。即本草鬼白也。蟲生一白。如黃精根。而堅瘦。可以辟穀。宋祁劍南方物贊云。羞天花。蜀地處處有之。依莖發花。蔽葉自隱。俗名羞天子。改為羞寒花。即本草鬼白也。贊云。胃寒而茂。莖修葉廣。附莖作花。葉蔽其上。以其自蔽。若有羞狀。別有羞天草。與此不同。即海芋也。(李時珍) ●鬼白生深山巖石之陰。葉如蕪麻。重樓。生一莖。莖端一葉。亦有兩歧者。年長

一莖。莖枯則爲一白。假令生來二十年。則有二十白。豈惟九白耶。根肉皮鬚。並似射干。今俗用多是射干。而江南別送一物。非眞者。今荊州當陽縣。陝州遠安縣。襄州荊山縣山中。並貢之。亦極難得。蘇恭《鬼白根》。如天南星相疊之狀。故市人道謂小者爲南星。大者爲鬼白。殊爲謬誤。按黃山谷集云。唐婆謁葉底開花。俗名羞天花。卽鬼白也。歲生一白。滿十二歲。則可爲藥。今方家乃以鬼燈藥爲鬼白誤矣。又鄭樵通志云。鬼白葉如小荷。形如鳥掌。年長一莖。莖枯則根爲一白。亦名八角盤。以其葉似之也。據此二說。則似是今人所謂獨脚蓮者也。又名山荷葉。獨荷草。旱荷葉。八角鏡。南方處處深山陰密處有之。北方惟龍門山玉屋山有之一莖。獨上莖生葉心而中空。一莖七葉。卽如初生小荷葉。面青背紫。揉其葉作瓜李香。開花在葉下。亦有無花者。其根全似蒼朮。紫河車。丹爐家採根制三黃砂汞。或云其葉八角者更驗。或云其根與紫河車一樣。但以白色者爲河車。赤色者

爲鬼白。恐亦不然。而庚辛玉冊謂蚤休。獨草。旱荷。陰草。亦有分別。陶弘景以馬目毒公與鬼白爲二物。殊不知正是一物。而有二種也。又唐獨孤酒丹房鏡源云。朮律草有二種。根皆似南星。赤莖直上。莖端生葉。一種葉凡七瓣。一種葉作數層。葉似蓖麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴鐸。倒垂青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自搖。可制砂汞。按此卽鬼白之二種也。其說形狀甚明。(李時珍)《鬼白性最猛悍。故能以毒攻毒。顧名思義。故能殺鬼辟邪》(醫學大辭典)

【鬼白根】卽鬼白之處方用名。詳「鬼白」條。

【鬼皂莢】產地 生江南澤畔。形態 鬼皂莢爲雜草類之一種。狀如皂莢。高一二尺。其葉可供藥用。

主治 作湯浴。去風瘡。疥癬。按葉去衣垢。沐髮令長。

【鬼芋】 古籍別名 蒟蒻。(圖經本草)

產地 生山野深谷間。

形態 鬼芋爲芋之一種。狀如葶藶。可供藥用。

製法 採得剖作四片。入砂盆磨作膠漿。鍋裏成膏。待冷則凝結如餅塊。一復剖爲四片。添水再煮成膏。膏成照前三煮四煮。乃可食。

主治 療癩。

【鬼見愁】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳「無患子」條。

【鬼油麻】卽漏蘆之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「漏蘆」條。

【鬼芭】卽師系之古籍別名。典見別錄。詳「師系」條。

【鬼前】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳「射干」條。

【鬼屋】卽鬼蓋之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鬼蓋」條。

【鬼柳】卽柳之古籍別名。典見綱目。詳「柳」條。

命名 本品搗汁。其味如香油。故名。

【鬼香油】 基本 鬼香油爲葶藶類之一種。苗葉如香薷。可供藥用。

主治 諸瘡腫毒。敗瘡毒。潤肌膚。滋顏色。

配合應用 冬瓜瘻。附骨疽。用

鬼香油加甘草一錢。入醬板鹽花。搗罽有效。(草藥方)

【鬼香油根】功用與葉同。詳「鬼香油」條。

【鬼扇】卽射干之古籍別名。典見土宿本草。詳「射干」條。

產地 生石壁間。

【鬼扇草】 形態 鬼扇草爲石草類之一種。葉面青。有直紋。如白葉狀。枝枝生如扇骨形。可供藥用。

主治 打傷昏死。搗汁灌入。卽醒。

【鬼桃】卽羊桃之古籍別名。典見本經。詳「羊桃」條。

【鬼神】卽紫木之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫木」條。

【鬼針草】 古籍別名 鬼鍼。鬼(日本)

(日本) 外國名詞 *Bisaona japonica* (拉丁) センダングサ キツ子パン(日本)

基本 係菊科鬼針草屬。藥用鬼針之根苗。

產地 原野池畔均有出。

形態 鬼針草爲溼草類之野

生草本。莖高二三尺。葉爲三出之
二回羽狀複葉。對生。秋末各枝梢
着頭狀花。黃色。花後結實。長五六
分。頂上有刺毛四五本。能藉是附
着人物。散布他處。

性實 苦平無毒。

主治 蜘蛛蛇咬。杆汁服。併敷。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論鬼針草曰。塗嫩葉傷
參攷資料 ●生池畔。方壑。葉

有極子作銀脚。着人衣如針。北人
謂之鬼針。南人謂之鬼釵。(陳藏
器) ●割甲傷肉不愈。鬼針草齒
鼠黏子根搗汁。和臘猪脂塗。(千
金)

【鬼釵】即葛本之古籍別名。典見
本經。詳「葛本」條。

【鬼眼】即龍眼最小者之別名。詳
「龍眼」條。

【鬼眼睛】即蟹螯殼之古籍別名。
典見綱目。詳「蟹螯殼」條。

【鬼釵】即鬼針草之古籍別名。典
見綱目。詳「鬼針草」條。

【鬼畫符】即夜闌葉上之白篆文
者之古籍別名。典見嶺南雜記。詳
「夜闌」條。

【鬼都郵】即鬼督郵之古籍別名。
典見唐本草。詳「鬼督郵」條。

【鬼新】即蕪本之古籍別名。典見
本經。詳「蕪本」條。

【鬼督郵】 命名 本品專治鬼
郵。故名。

古籍別名 鬼都郵。鬼獨搖草。
(唐本草)

學名 *Macrocneidum rig-*
idulum, Mark. (植名後編植辭

B. E. R.) *Pertya sigdula*,
Nikaido, (圖鑑) *Pertya Mac-*
rocneidum, Mark. (圖鑑) *M.*
robustum, Max. (植物名彙)

基本 係菊科。爲鬼督郵之根
產地 在山野間。

形態 鬼督郵爲山草類之野
生草本。叢生。而苗惟一莖。莖端生
葉。若繖狀花。生於葉心。黃白色。其
根橫生而細黑無鬚。可供藥用。



鬼 督 郵

採取 二月八月間採之。
製法 雷敏曰。凡採得細到。用
生甘草水煮一伏時。日乾用。

性實 辛苦平無毒。
主治 鬼疰。卒中惡。心腹邪
氣。百精毒。溫瘧疫疾。強腰脚。益脊
力。

參攷資料 ●按東晉深師方
治上氣咳嗽邪嗽。燥嗽。冷嗽。四滿
丸。用鬼督郵同蜈蚣。荒花。膠。諸
毒藥爲丸。則其有毒可知矣。非毒
藥不能治鬼疰。邪惡之病。唐本云。
無毒。蓋不然。(李時珍) ●此草獨
莖而葉攢其端。無風自動。故曰鬼
獨搖草。後人誤爲鬼督郵。因其
專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者
傳舍有督郵之官。主之。徐長卿。赤
箭。皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。
名同而物異。(李時珍) ●莖似細
箭。高二尺以下。葉生莖端。狀如
傘花。生葉心。黃白色。根橫生而無
鬚。二月八月採根。徐長卿。赤箭。並
有鬼督郵之名。而主治不同。宜審
用之。(韓保昇) ●鬼督郵與己
同類。根苗皆相似。但以根如細辛
而色黑者爲及。根如細辛而色

黃白者爲鬼督郵。(李時珍)

【鬼督郵】 ●即天麻之古籍別名。
典見本經。詳「天麻」條。 ●即徐長
卿之古籍別名。典見本經。詳「徐
長卿」條。

【鬼膊藤】 產地 生林野潤邊。
形態 鬼膊藤爲莖
草類之一種。葉如梨葉。子如棧子。
其藤葉可供藥用。

性實 苦溫無毒。
主治 浸酒服。祛風氣。

【鬼膊藤葉】 性實 苦溫。無
毒。

主治 搗傅癰腫。

【鬼蒜】即百合之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「百合」條。

【鬼鈞藟】即天南星之古籍別名。
典見諸家本草。詳「天南星」條。

【鬼蓋】 古籍別名 朝生。鬼嫩。
(弘景) 鬼屋。(藏器)

產地 生陰溼諸地。及墻垣之
下。

形態 鬼蓋爲土菌之一種。朝
生夕死。狀如菌而莖赤。可供藥用。
性實 甘平無毒。
主治 和醋傅腫。瘰癧瘡。

【鬼蓋】即人參之古籍別名。與見本經。詳「人參」條。

【鬼箬】即箬葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「箬葉」條。

【鬼箭】即衛矛之古籍別名。與見別錄。詳「衛矛」條。

【鬼箭羽】即衛矛之處方用名。詳「衛矛」條。

【鬼骷髏】基本 本品乃殘老之向日葵。其子可供藥用。

主治 通氣透膜。合麝香。急性子搗爛為膏。貼臍能落胎。

參攷資料 冬日桃園中有樹上乾枯殘桃。亦名鬼骷髏。與此名同物異。

【鬼齒】基本 本品為腐敗竹根之先入地者。

古籍別名 鬼銀（綱目）

性質 苦平無毒。

主治 中惡注忤。心腹痛。麥汁服之。

十畫 鬼

【鬼燈檠】即山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳「山慈姑」條。

【鬼獨搖草】即鬼督郵之古籍別名。典見唐本草。詳「鬼督郵」條。

【鬼頭】即菟藟之古籍別名。典見綱目。詳「菟藟」條。

【鬼蠟燭】即石上蠟燭之俗名。詳「石上蠟燭」條。

【鬼醜】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳「甘遂」條。

【鬼鍼】即鬼針草之古籍別名。典見綱目。詳「鬼針草」條。

【鬼齒】即鬼蓋之古籍別名。與見本草集註。詳「鬼蓋」條。

【鬼藏】即玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳「玄參」條。

【鬼繫腰】即格石之古籍別名。典見外科精要。詳「格石」條。

【鬼藥】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

【鬼藤】即烏韭之古籍別名。典見綱目。詳「烏韭」條。

【鬼饅頭】即木蓮子之俗名。詳「木蓮子」條。

十一畫 乾

【鬼蠟燭】即蒲包草實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蒲包草」條。

【鬼獨搖】即桃梟之古籍別名。典見綱目。詳「桃梟」條。

【鬼鱉】即鱉魚之小者。典見綱目。詳「鱉魚」條。

十一畫

【乾冬菜】命名 本品即冬菜之曝乾者。故名。

古籍別名 曬乾菜（綱目拾遺）

性質 甘平無毒。

主治 利膈下氣。開胃益血。生津液。補虛勞。並療久年咳嗽。聲音不出。泡湯飲。湯火傷。和酒搗傅。白火丹煎服及洗浴之。

參攷資料 冬菜乃白菜。杭俗小年前後。居人率市白菜。以鹽醃之。作臘藏。為禦冬及春時所食。名曰冬菜。其滷汁。煮豆及豆腐食。能清火益肺。誠食中佳品。至春分後。天漸暖。菜亦漸變黑色。味苦不堪食。以之曬作乾。飯鍋上蒸黑。再曬再蒸。如此數次。乃曝之極乾。貯缶中。可久藏不壞。名曰曬乾菜。即

乾冬菜也。年久者出之。香氣頗烈。功能開胃。噤口痢及產後以之下粥。大有補益。蓋白菜本能和中下氣。利三焦。通二便。含土德之精。有生金之用。乾之則苦返其初。而從母化也。久蒸久曬。則味反甘。全其德。故有中和之運功。與參耆等。借乎世多忽而不知。余故特為表之。

瀨湖綱目。悉下無乾菜之用。殊為缺略。近日筴橋人所市者。乃蘿蔔英所乾。與芥菜乾。蒸曬成者。皆不入藥。須人家冬白菜。醃作蒸曬。年久者為佳。葶芳譜有遺黑醃法。用白菜如法醃透。取出掛於桁上。曬極乾。上飯蒸熱。再曬乾。收之。極耐久藏。夏月以此醃和肉炒。可以久留不臭。即今乾冬菜也。（趙學

按）

【乾地黃】即大生地之原名。詳「大生地」條。

【乾地龍】即蚯蚓之處方用名。詳「蚯蚓」條。

【乾陀木皮】命名 本品褐。色。可染僧褐。故名。

產地 生西域諸地。安南亦有。

出。

形態 乾陀木爲雜木類之一種。樹大皮厚。葉似櫻桃葉。其木皮可供藥用。

性質 溫平無毒。

主治 瘧瘵氣塊。溫腹煨胃。止嘔逆。破宿血。婦人經閉。腹內血塊。酒煎服之。

【乾柿】 卽柿餅之別名。性質功能詳『柿餅』條。

【乾苔】 基本 本品爲海苔之乾燥者。

古籍別名 苔菜。(本草蒙言) 海苔。(綱目) 青苔。(日本) 紅藻。(本草綱目)

外國名詞 Entomorpha Linza, J. G. Ag. (拉丁) ノラノン(日本)

基本 係真正綠藻類絲藻族石蓴科乾苔屬之乾苔。

產地 出淺海中。

形態 乾苔爲苔類之一種。卽苔之產海中者。葉爲細長之管狀。體似絲綿。又似韭。可供食與藥用。採取 冬春間採長數寸者。日乾用。

性質 鹹寒無毒。

主治 瘰癧。結氣。

歷代記述攷證 『唐』孟詵食療本草論乾苔曰。治痔殺蟲。及蜜亂嘔吐不止。麥汁服。『唐』陳藏器本草拾遺論乾苔曰。心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之卽止。『宋』日華諸家本草論乾苔曰。下一切丹石諸藥毒。納木孔中。殺蠶。『明』吳瑞日用本草論乾苔曰。消茶積。『明』李時珍本草綱目論乾苔曰。燒末吹鼻。止衄血。湯浸搗。傳手背腫痛。

參攷資料 ●洪氏夷堅志云。河南一寺僧。盡患瘰癧。有洛陽僧共寮。每食取苔脯同餐。經數月。僧項贅皆消。乃知海物皆能除是疾也。(李時珍) ●柔苔寒。乾苔熱。(陶弘景) ●苔脯食多發瘡疥。令人痿黃。少血色。(孟詵) ●有咳嗽人不可食之。(吳瑞)

【乾苔】 卽獨脚一枝蓮之古籍別名。典見百草鏡。詳『獨脚一枝蓮』條。

【乾皋】 卽鸚鵡之古籍別名。典見綱目。詳『鸚鵡』條。

【乾魚】 卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

綱目 詳『鮑魚』條。

【乾莖】 卽大莖藤乾者之古籍別名。典見別錄。詳『大莖』條。

【乾葛】 卽葛根之處方用名。詳『葛根』條。

【乾菜煎】 卽地骷體之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『地骷體』條。

【乾苜蓿】 卽苜蓿之處方用名。詳『苜蓿』條。

命名 漆本作漆。水汁可以髹物。其字象水滴而下之形也。故名。藥用其乾涸者。送命之曰乾漆。

古籍別名 續命筒。(和漢藥考) 黑漆(俗名)

基本 乾漆爲漆樹之液汁。貯置器內。漸次乾涸。凝成堅固之塊粒。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乾漆乃油漆店之漆盆底。乾而不能再用之漆。取出沽之。

形態 漆樹科之漆樹(Rhus Vernicifera, D. C.) 其樹幹鋸下後。鋸痕有液汁流出。卽爲漆液。其散去水氣。成爲暗褐色濃稠液者。謂之黑目漆。其乾涸成爲黑色。

蜂窩狀輕塊 謂之龍目乾漆。可供藥用。

製法 大明曰。凡使乾漆入藥。須搗碎炒熟。不爾損人腸胃。若是溼漆煎乾更好。亦有燒存性。

用法 恒以剉末和作丸散用。

性質 辛溫無毒。

成分 生漆之成分爲水、漆酸、(C₁₅H₁₀O₂) 膠質、蛋白質等。漆液在空氣中之硬化。係由其主成分氧化所致。但須有溼氣存在。方能硬化。

效能 破血。消積。燥溼。殺蟲。用作通經藥。又有燒烟吸之。用治勞瘵喉痺等。

主治 絕傷。補中。續筋骨。填髓。安五臟。五緩六急。風寒溼痺。生漆去長蟲。久服輕身耐老。(本經)

乾漆療咳嗽。消瘀血。痔結。腰痛。女子疝瘕。利小腸。去蛇蟲。(別錄)

歷代記述攷證 『唐』甄權藥性本草論乾漆曰。殺三蟲。主女人經脈不通。『宋』大明諸家本草論乾漆曰。治傳尸勞。除風。『金』張元素珍珠囊論乾漆曰。削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。『明』

一二四

經希羅本草經疏論乾漆曰。乾漆味辛氣溫。甄權加鹹。宗奭加苦。氣味俱厚。通行腸胃。入肝行血之藥也。凡風寒溼邪之中人。留而不去。則腸胃鬱而生蟲。久則五臟六腑皆受病。或為癰瘕。或為拘攣。所自來矣。此藥能殺蟲消散。逐腸胃一切有形之積滯。腸胃既清。則五臟自安。痿緩痺結自調矣。又損傷一證。專從血論。蓋血者有形者也。形質受病。惟辛溫散結而兼鹹味者。可入血分而消之。瘀血消則絕傷。自和筋骨自續。而髓腦自足矣。其主瘡結腰痛。女子疝瘕者。亦指下焦血分受寒血凝所致。利小腸者。取其通行經脈之功耳。至於瘵咳嗽。雖非正治。然亦有瘀血停積。發為骨蒸勞瘵。以致咳嗽者。得其消散瘀血之力。則骨蒸退而咳嗽亦除也。誤中漆毒者。多食蟹及甘豆湯解之。【明】李士材本草圖解論乾漆曰。乾漆辛溫。降而行血毒。而殺蟲。二者已罄其功能。若祛風止痛。除瘵理傳尸。正行血殺蟲之效也。性急多毒。弗得過用。凡畏漆者。嚼椒塗口鼻。免生漆瘡。如杉木如

紫蘇。如蟹。患漆瘡者。皆可煎湯浴之。煎乾。妙令烟盡。存性。【清】黃宮繡本草求真論乾漆曰。乾漆味辛氣溫。有毒。有降無升。專破日久凝結之血。及削年深堅結之積。緣人感受風寒溼滯。鬱而為病。則中外不舒。胃中有物。留滯不消。久而生蟲。血積不化。結而為瘵。由是陽氣竭。津液枯槁。癰瘕風痺。因之不免。用此辛溫毒烈之性。鏟除瘀積。中氣得復。絕陽皆積。而緩急和矣。按血見漆花水。故能化蟲破血。千金三蠱方。皆賴以之。為君。本經言能輕身者。以其蠱去而身自輕之謂也。所謂中氣可復。絕陽可續者。亦因瘀去而中自復。與陽自續之謂也。但無積血者。切忌。以其傷營血。損胃氣耳。炒令烟盡為度。

配合應用 ①治腹中瘀血作痛。乾漆、麝香、桃仁、當歸、紅花、蘇木、牡丹皮、五靈脂、延胡索、牛膝。或產後感寒。惡露未盡。結成痞塊。作痛者。加入乾薑、澤蘭。

②殺腸胃一切諸蟲。乾漆、棟根、鶴虱、檳榔、錫灰、慈苳根、烏梅、龍膽草。

③治女子月閉。乾漆、牛膝、牡丹皮、續斷、赤芍藥、桃仁、乳香、沒藥、紅花、延胡索、鼈甲。若瘀血。臍腹作痛。畏寒。及不發熱。不口渴者。可加桂枝。

④治紫雲風。乾漆、掃蕪葉、生地、黃牛、枝蓮、胡麻、荊芥、何首烏、天門冬、苦參。

⑤治小兒蟲病。胃寒危惡。證與癩相似者。用乾漆、掃蕪、白蕪、黃等分為末。米飲服一字至一錢。

(杜仁方)

⑥治九種心痛。及腹脇積聚滯氣。筒內乾漆一兩。搗炒烟盡。研末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服五丸至九丸。熱酒下。(簡要濟衆方)

⑦治婦人不會生長。血氣疼痛。不可忍。及治丈夫疝氣。小腸氣。撮痛者。並宜服二聖丸。溼漆一兩。熬一食頃。入乾漆末一兩。和丸。梧子大。每服三四丸。溫酒下。怕漆人不可服。(經驗方)

⑧治產後背腫疼痛。及血氣水疾。乾漆、大麥芽等分為末。新瓦燒相間鋪滿。鹽泥固濟。煨赤。放冷。研散。每服一二錢。熱酒下。但是產後諸病皆可服。(婦人良方)

⑨治五勞七傷。補益方。用乾漆、柏子仁、山茱萸、酸棗仁各等分為末。蜜丸。梧子大。每服二七丸。溫酒下。日二服。(千金方)

⑩治喉痺欲絕。不可針藥者。乾漆燒烟。以筒吸之。(聖濟總錄方)

⑪解中蠱毒。平胃散末。以生漆和丸。梧子大。每空心溫酒下。七十丸至百丸。(直指方)

⑫下部生瘡。生漆塗之良。(肘後方)

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。畏雞子。忌油脂。惡川椒。紫蘇。及蠶。半夏為之使。

參攷資料 ①仙方用蟹消漆。為水。鍊服長生。抱朴子云。淳漆不黏者。服之通神長生。或以大蟹投其中。或以蠶母水。或以玉水合之。服。九蟲悉下。惡血從鼻出。服至一年。六甲行廚至也。(陶弘景) ②漆性毒而殺蟲。降而行血。所主諸證。雖繁。其功只在二者而已。(李時珍) ③今人貨漆多雜桐油。故多毒。淮南子云。蟹見漆而不乾。相感也。漆得蟹而成水。蓋物性相制

也。凡人畏漆者。嚼胡椒塗口鼻則可免。生漆瘡者。杉木湯紫蘇湯。漆姑草湯。蟹湯浴之皆良。(李時珍)

◎梁州漆最甚。益州亦有。廣州漆性急易燥。其諸處漆桶中自然乾者。狀如蜂房。孔孔隔者為佳。(陶弘景)

◎漆樹高二三丈餘。皮白。葉似椿。花似槐。其子似牛李子。木心黃。六月七月刻取滋汁。金州者最善。漆性並急。凡取時須在油解破。故淳者難得。可重重別制拭之。上等清漆。色黑如墨。若銀石者好。黃嫩者蜂窩者不佳。(韓保昇)

◎溼漆藥中未見。用者皆乾漆。其溼者在燥熱及未冷時則難乾。得陰溼。雖寒月亦易乾。亦物之性也。若露漬人。以油治之。凡驗漆惟稀者。以物蘸起。細而不斷。斷而急收。更有塗於乾竹上。陸之速乾者。並佳。(寇宗奭)

◎漆樹人多種。之分前移栽。易成有利。其身如柿。其葉如楮。以金州者為佳。故世稱金漆。人多以物亂之。試訣有云。微扇光如鏡。懸絲急似鈎。懸成琥珀色。打着有浮溫。今廣浙中出一種漆樹。似小椶而大。六月取汁漆物。黃

澤如金。即唐書所謂黃漆者也。入藥仍當用黑漆。廣南漆作餉糖氣。沾沾無力。(李時珍)

【乾餅藥】即石鹼之古籍別名。與見瘰癧科書。詳「石鹼」條。

【乾蝦】 命名 蝦之曬乾者也。主治 能解蟲毒。并治水土不服。

參攷資料 蝦生淡水者。色青。生鹹水者。色白。溪瀾中出者。殼厚氣腥。以其得土氣薄也。湖澤池沼中者。殼薄肉滿。氣不腥。味佳。海中之者。色白。肉粗味殊劣。(趙恕軒)

【乾醋】 即醋之古籍別名。與見新本草詳「醋」條。

【乾菘蓉】 即肉菘蓉之處方用名。詳「肉菘蓉」條。

【乾錫糟】 命名 本品係製造餉餉所餘之糟粕。故名。

性質 甘。溫。無毒。

主治 反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。

參攷資料 錫以藥成。暖而消導。故其精能化滯。緩中。養脾。止吐也。按續洪濟察方云。甘露湯。治反

胃嘔吐不止。服此利胸膈。養脾胃。進飲食。用乾錫糟六兩。生薑四兩。二味同搗作餅。或焙或晒。入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熱一宮人。病反胃。往京口甘露寺。殿水陸。泊舟岸下。夢一僧持湯一杯。與之飲。罷便覺胸膈快。次早入寺。供湯者。乃夢中所見僧。常以此湯待賓。故易名曰甘露湯。予在臨汀。療小吏旋愈。切勿忽之。(李時珍)

置。均連之名。外面黃褐色。有皺紋。製法 陶弘景曰。凡作乾薑。水淹三日。去皮。置流水中六日。更剝去皮。然後晒乾。置磁缸中。釀三日。乃成。蘇頌曰。造法採根於長流水中。洗過。日晒為乾薑。以漢溫池州者為良。陶說乃漢州乾薑也。李時珍曰。乾薑以母薑造之。今江西藥均皆造。以白淨結實者為良。故今人呼為白薑。又曰均薑。凡入藥並宜炮用。

性質 辛溫。無毒。

成分 含有揮發油及纖維等。

效能 溫中祛寒。燥溼。消痰。用作驅風消化痰。

主治 胸滿咳逆上氣。溫中止血。出汗。逐風溼痺。腸澼下痢。生者尤良。(本經) 寒冷腹痛。中惡霍亂。脹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。止唾血。(別錄)

張仲景之發明 乾薑一味。經張仲景之實驗。認為「主治結滯水毒也。勞治嘔吐。咳。下利厥冷。煩躁腹痛。胸膈腰痛。」茲考徵如下。

◎大建中湯證曰。心胸中大寒痛。嘔不能飲食。◎苓姜朮甘湯證曰。

外國名詞 Zingiber. (Cin. Ger.)

基本 屬薑科。為 Zingiber officinale 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乾薑以四川為最。白肉。廣東六步。次之。黃肉。欽廉。北海。廣西均有。出。又次之。均黃肉。安南東京產者。亦次之。白肉。

形態 乾薑肉色淨白。故有白

乾薑。以四川為最。白肉。廣東六步。次之。黃肉。欽廉。北海。廣西均有。出。又次之。均黃肉。安南東京產者。亦次之。白肉。

身體重。腰中冷。又云。腰以下冷痛。
 ①半夏乾薑散證曰。乾嘔吐逆。吐涎沫。(以上三方。乾薑或四兩。或諸藥等分) ②人參湯證曰。喜睡。又曰。心中痞。③通脈四逆湯證曰。下利清穀。又曰。手足厥逆。又云。乾嘔。④小青龍湯證曰。心下有水氣。乾嘔。又云。咳。⑤半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。⑥柴胡姜桂湯證曰。胸脇滿。又云。心煩。⑦黃連湯證曰。腹中痛欲嘔吐。⑧苓甘五味姜辛湯證曰。咳胸滿。⑨乾薑黃連黃芩人參湯證曰。吐下。⑩六物黃芩湯證曰。乾嘔下利。(以上九方。乾薑皆三兩) ⑪梔子乾薑湯證曰。微煩。⑫甘草乾薑湯證曰。既咽中乾。煩躁吐逆。⑬乾薑附子湯證曰。煩躁不得眠。(以上三方。乾薑二兩。一兩而四兩之例) ⑭四逆湯證曰。下利清穀。又曰。手足厥冷。(以上一方。乾薑一兩半而三兩之例) ⑮桃花湯證曰。下利。⑯乾薑人參半夏丸證曰。嘔吐不止。(以上二方。乾薑一兩而三兩之例) 歷觀此諸方。其嘔吐者。咳者。痛者。下利者。之等。豈是皆水毒之結滯者也。

十一 薑 乾

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論乾薑曰。治腰腎間疼冷。冷氣。破血去風。通四肢關節。開五臟六腑。宣諸絡脉。去風毒冷痺。夜多小便。【宋】大明日華諸家本草論乾薑曰。消痰下氣。治轉筋吐瀉。腹脹反胃。乾嘔。療血撲損。止鼻衄。解冷熱毒。開胃消宿食。【元】王好古湯液本草論乾薑曰。主心下寒痞。目睛久赤。【明】李時珍本草綱目論乾薑曰。乾薑能引血藥入血分。氣藥入氣分。又能去惡養新。有陽生陰長之意。故血虛者用之。凡人吐血。衄血。下血。有陰無陽者。亦宜用之。乃熱因熱用。從治之法也。【明】繆希雍本草經疏論乾薑曰。乾薑稟天地之陽氣。故味辛而氣溫。雖熱而無毒。辛可散邪。理結。溫可除寒。通氣。故主胸滿。咳逆。上氣。溫中出汗。逐風溼痺。下痢。因於寒冷。止腹痛。其言止血者。蓋血虛則發熱。熱則血妄行。乾薑炒黑。能引諸補血藥入陰分。血得補。則陰生而熱退。血不妄行矣。治腸癖。亦其義也。生薑能通神明。辟惡氣。故主中惡。霍亂。脹滿。風邪。諸毒。皮府間

結氣。惟唾血。定非寒證。則錄載之誤矣。【清】陳修園本草經讀論乾薑曰。乾薑氣溫。稟厥陰風木之氣。若溫而不烈。則得沖和之氣。而屬土也。味辛得陽明燥金之味。苦辛而不偏。則金能生水。而轉潤矣。故乾薑為燥寒之要藥也。胸中者。肺之分也。肺寒則金失下降之性。氣壅於胸中而滿也。滿則氣上。所以咳逆。上氣之症生焉。其主之者。辛散溫行也。中者。土也。土虛則寒。而此能溫之。止血者。以陽虛陰必走。得煖則血自歸經也。出汗者。辛溫能發散也。逐風溼痺者。治寒邪之留於筋骨也。治腸癖下痢者。除寒邪之陷於腸胃也。以上諸治。皆取其雄烈之用。如孟子所謂剛大浩然之氣。塞乎天地之間也。生則辛味渾全。故又申言曰。生者尤良。即金匱治肺痿。用甘草乾薑湯。自註炮用。以肺虛不能受過辛之味。炮之使辛味稍減。亦一時之權宜。非若後世炮黑炮灰。全失薑之本性也。葉天士亦謂炮黑入腎。何其陋歟。【清】黃元御長沙藥解論乾薑曰。乾薑燥溼溫中。行鬱降濁。補

益火土。消納飲食。暖脾胃而溫手足。調陰陽而定嘔吐。下衝逆而平咳嗽。提脫陷而止滑泄。【清】黃宮繡本草求真論乾薑曰。乾薑其味本辛。炮制則苦。大熱無毒。守而不走。凡胃中虛冷。元陽欲絕。合以附子同投。則能回陽立效。故耆則有附子無薑不熱之句。與仲景四逆白通姜附湯皆用之。且同五味。則能通肺氣而治寒嗽。同白朮。則能燥溼而補脾。同歸芍。則能入氣而生血。故凡因寒內入。而見臟腑痛。蔽。關節不通。經絡阻塞。冷痺寒痢。反胃隔絕者。無不藉此以爲拯救。除寒炒黑。其性更純。味變苦鹹。力主下走。黑又止血。辛熱之性雖無。而辛涼之性尙在。故能去血中之鬱熱而不寒。止吐血之妄行而不滯。較之別藥。徒以黑能止血爲事者。功勝十倍矣。血寒者。可多用。血熱者。不過三四分。爲導而已。白淨結實者。良。母煎曬乾者。爲乾薑。【清】賈九如辨藥指南論乾薑曰。乾薑乾久。體質收束。氣則走瀝。味則含蓄。比生薑辛熱過之。所以止而不行。專散寒。如腹痛身涼作

十一畫 乾

薄。完穀不化。混以甘草。取辛甘合化。為陽之義。入五積散。助散標寒。治小腹痛。入理中湯。定寒微亂。止大便溏瀉。助附子以通經寒。大有回陽之力。君參朮以溫中氣。更有反本之功。生薑主散。乾薑主守。一物大相迥別。孕婦勿用。

國外學說 英美學說謂乾薑產中國。印度及西印度羣島等地。根可入藥。第須刮去外皮。令乾。如不刮去外皮。則謂之黑薑。刮去外皮。則謂之白薑。古時羅馬人疑薑為胡椒之根。因其味與胡椒略同。西國常出售之黑薑。係從東印度運來。此薑多種植於印度平原與山上各處。白薑則從西印度運來。白薑黑薑。俱有香辛之味。如以水或濃酒浸之。則其藥性之質。自能消化而出。其醫治作用。為安胃暖性之香藥。能為引痰取嚏生津藥。又能為行氣補胃藥。祛風藥。如傷食。胃中發氣或胃難消化。宜服之。兼能療治血滯身冷等症。入鼻。則能作嚏。入口。則能令喉熱生津液。入胃。則能令內皮發暖行血。第此藥除壯氣臟外。獨用之處甚少。

大抵多借別藥而作補劑。與瀉劑同服。能止瀉藥之烈。而瀉時之肚疼。可免。外用能作漱水。治喉鬆。處方。乾薑四錢。搗爛。沸水十二兩。四錢四分。浸半點鐘。濾淨。宜乘熱服。治肚疼氣厥。或輕痢症。服此亦效。每服一兩至二兩。(乾薑泡水平方)

辨偽 鄭肖巖曰。土北薑溫州所產。質鬆不結。味淡不辛。又有一種洋北薑。氣味尤劣。更不可用。按北乾薑氣味辛溫。其色黃白。兼見乃手足太陰之溫藥也。凡製乾薑炮製。當以三衝開化產者為佳。用母薑水浸晒乾。以肉厚而白淨。結實明亮如天麻者良。故又名白薑。近今藥肆。且有以傷水變味之生薑。晒乾炮用。未免有名無實。誤人匪淺。曹炳章曰。按乾薑湖南均州出。小雙頭內白色。為均薑最佳。浙江台州出者。為台薑。個小肉黃黑色者。次。其他江西南寧國。四川皆出。總要個大堅實。內肉色白為佳。

配合應用 治血脫色白面天不澤。脈瀉者。此大寒也。宜乾薑之辛溫。以益血。大熱以溫經。須炒黑用。 治脾胃虛弱。飲食減少。易傷難化。無力。肌瘦。用乾薑類研四兩。以白錫切塊。水浴過。入鐵銹溶化。和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。 治頭暈吐逆胃冷生痰。用炮薑二錢。炙草一錢二分。水一鍾。半煎。減半服。 治中寒水瀉。炮薑研末。粥飲服二錢。 治寒痢青色。乾薑切如豆大。每米飲服六七枚。日三夜一。累用得效。 治血痢不止。乾薑燒黑存性。放冷為末。每服一錢。米飲下。神效。 治脾寒痼疾。乾薑炒黑。為末。臨發時。以溫酒服三錢。 治胸滿咳逆上氣。乾薑生用。同橘皮。烏藥。白豆蔻。 乾薑。紫蘇。桂枝。能溫中出汗。加朮。則能逐風溼痺。 治下利。寒冷腹痛。用乾薑。朮。茯苓。人參。甘草。 治產後惡露不盡。血虛發熱。用乾薑炒黑。同生地。黃白芍藥。當

一二二八

歸。牛膝。 治腸辟下血。用乾薑。生地。黃。白芍藥。麥門冬。人參。黃耆。甘草。升麻。 治中惡。用乾薑。薑香。縮砂。橘皮。紫蘇。木香。去木香。加木瓜。則治霍亂腹滿。加桂枝。并治風邪諸毒。皮膚間結氣。 治胃虛嘔逆。乾薑。橘皮。人參。 治痰喘久不愈。用乾薑。橘皮。朮。貝母。茯苓。 治寒瘧。用乾薑。人參。朮。桂枝。 治虛寒泄瀉。中寒作泄。用乾

薑。人參。朮。甘草。 用薑 三分至一錢。 施用宜忌 乾薑大辛。辛能散氣。走血。久服損陰傷目。陰虛內熱。陰虛咳嗽。吐血。表虛有熱。汗出。自汗。盜汗。膿毒下血。因熱嘔惡。火熱腹痛等症。禁用。惡黃芩。黃連。夜明砂。秦椒。為之使。 奇名方例 大順散。治胃暑伏熱。引飲過多。脾胃受溼。水穀不分。霍亂吐瀉。臟腑不調。(局方) 乾薑四斤。甘草三十斤。(劉守真) 杏

仁(去皮尖)肉桂(去粗皮)各四斤。先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟。次入乾薑同炒。令裂。次入杏仁又同炒。候不作聲爲度。篩淨。後入肉桂一處搗爲散。每服二錢。水煎溫服。如煩燥。并花水調下。不拘時。沸湯調亦得。⑤乾薑人參半夏湯。治妊娠嘔吐不止(金匱方)乾薑人參各一兩。半夏二兩。上三味末之。生薑汁和丸。梧子大。每服十九。

參攷資料 ④乾薑。大辛大熱。陽中之陽。其用有四。通心助陽一也。去臟腑沉寒痼冷二也。發諸經之寒氣三也。治感寒腹痛四也。腎中無陽。脈氣欲絕。黑附子爲引。水煎服之名薑附湯。亦治中焦寒邪。寒淫所勝。以辛散之也。又能補下焦。故四逆湯用之。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。所以能治寒寒。非者附子行而不止也。理中湯用之者。以其回陽也。(張元素)⑤乾薑。生辛。炮苦。陽也。生則逐寒邪而發表。炮則除胃冷而守中。多用則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣。故也。須以生甘草緩之。辛熱以散

寒寒。同五味子用以溫肺。同人參用以溫胃也。(李杲)⑥乾薑。心脾二經氣分藥也。故補心氣不足。或言乾薑辛熱而言補脾。今理中湯用之。言泄不言補何也。蓋辛熱燥溼。泄脾中寒溼邪氣。非泄正氣也。又云服乾薑以治中者。必僭上。不可不知(王好古)⑦乾薑入肺中。利肺氣。入腎中。燥下溼。入肝經。引血藥生血。同補陰藥。亦能引血藥入氣分。生血。故血虛發熱。產後大熱者。用之。止唾血。痢血。須炒黑用之。有血脫色白而天不澤。脈濡者。此大寒也。宜乾薑之辛溫。以益血。大熱以溫經。(朱震亨)⑧乾薑孕婦不可食。令胎內消。蓋其性熱而辛散故也。(李時珍)⑨乾薑如懼性散炒黃用。或炒微焦。市醫將其泡淡用之。殊屬可笑。(吳遵程)⑩薑留皮則冷。去皮則熱。非皮性本冷也。薑留皮則行表而熱去。去皮則守中而熱存耳。(朱丹溪)⑪造乾薑法。選取母薑無筋者。水瀝三日。用藥索刮去皮。洗淨。風日透乾。以堅爲度。除夕製此最良。惟天陰雨雪。難免凍壞耳。他時製者力

遜。用時。水洗剉細。藥舖製法。與此不同。不分母薑。子薑。投滾水中。煮片刻。即取出。晒乾。石灰粉之。收貯販賣。以此要利。慎勿用之。又有寒製乾生薑。亦不分其母子。但切作錢片。晒乾收貯。於小寒大寒三十日中製之。故云。此種質軟。輕虛。氣味俱減。然勝於湯灰乾薑遠矣。缺時可倍用之。本草綱目引張元素語曰。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。李杲曰。乾薑生辛。炮苦。朱震亨曰。止唾血。痢血。須炒黑用之。三說皆非。蓋乾薑之味本辛。何來苦味。所以苦者。即炮炒焦黑之變。非本味也。物經焦黑。無不變苦。豈獨乾薑哉。故用炒焦乾薑者。與不用同。(和漢藥考)⑫整塊晒乾者。日本藥舖呼爲麻留乾薑。切片晒乾者。呼爲乾生薑。俱佳。色白。味甚辛。上品也。又三河乾薑。形瘦小。外白。肉赤如錫。辛味較薄。不及前二種。製法。秋冬之交。取老薑肥大者。水浸洗過。候天晴。刮去皮。或切片。晒乾。若一時難乾。入磁器烘之。亦可。或云。寒中製者。不堪用。以其極不易乾。袋易凍壞。其氣味俱損故也。

(古方藥品考)⑬乾薑以白淨結實者爲佳。來自外國者無此貨。日本參州。遠州出者。名三河乾薑。其色白。以石灰收貯故也。用時宜洗去石灰。黑薑一名炮薑。乾生薑。藥舖亦多。或誤作乾薑用之。非生薑。方書以嫩根爲子薑。或稱紫薑。其老根爲母薑。(日用藥品考)⑭養老新書曰。老人和脾胃氣。進飲食。止痰逆。療腹痛。調中氣。莫如用木香人參散。方用木香半兩。人參去蘆頭半兩。藿香葉一分。甘草半兩。炒。乾薑半兩。炒。陳皮半兩。去穢。茯苓去黑皮一分。白朮半兩。微炒。枳椇葉去毛一分。厚朴去粗皮。用生薑汁製丁香半兩。凡十二味。秤準分兩。搗羅爲末。每服二錢。水一盞。入生薑一片。薑二枚。同煎至六分。去滓溫服。此男子婦女通用之方也。方中厚朴無分量。大約與丁香相等耳。(錄續昆陽漫錄)【乾歸】即當歸之古籍別名。典見本經。詳「當歸」條。【乾雞筋】即淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「淫羊藿」條。

十一畫 乾 偃 假 偏 做 側

【乾藕節】即藕節陰乾者之別名。詳「藕節」條。

【乾蟾】即蟾蜍晒乾者之別名。詳「蟾蜍」條。

【乾蟾腹】即蟾蜍之處方用名。詳「蟾蜍」條。

【乾鵲】即鵲之新語名。詳「鵲」條。

【乾蟻】即全蟻晒乾者之別名。詳「全蟻」條。

【偃鼠】即隱鼠之古籍別名。典見綱目。詳「隱鼠」條。

【假君子】即牽牛子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牽牛子」條。

【假油柑】即真珠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「真珠草」條。

【假建】即煙草之葉絲非福建產者。性質功能。詳「煙草」條。

【假素馨】原名 青藤仔。產地 出粵中。

形態 假素馨為藤屬之一種。葉長三四寸。多芒刺。莖大如指。而堅韌似柳條。其花可供藥用。

主治 煎湯洗疥瘡。

【假蘇】即荊芥之原名。詳「荊芥」條。

【假豬鬃】即海鬃之古籍別名。典見綱目。詳「海鬃」條。

見綱目。詳「海鬃」條。

【偏桃核】即桃實之肉薄而尖。頭偏。狀如月牙形。仁似新羅桃實者。性質功能。與尋常桃實同。詳「桃」條。

【偏精】即黃精葉偏生不對節者之別名。性質功能。詳「黃精」條。

【做打馬】即香打馬之別名。性質功能。詳「香打馬」條。

【側子】命名 本品生於附子之側。故名。

處方用名 製側子。

古籍別名 煎子（許慎）

基本 屬毛茛科。為附子根旁之塊根。

採取 八月間須在附子邊側間削取之。

用法 水煮薰洗。或剉末用。

性質 辛大熱。有毒。

效能 療脚氣治頑痺。用作麻酔性之驅風燥濕藥。

主治 癱腫。風痺。歷節。腰脚疼。冷寒熱。風痰。又墮胎。

歷代記述攷證 【南北朝】雷斅雷公藥對論側子曰。冷酒調服。治遍身風癱。神妙。【唐】甄權藥性

本草論側子曰。療脚氣。冷風濕痺。大風。筋骨掣急。【清】黃宮繡本草求真論側子曰。側子連生附側。宜於發散四肢。故治手足風濕諸痺。其功皆與附子補散差殊。【清】汪

劬庵本草備要論側子曰。側子散側旁生。宜於發散四肢。充達皮毛。治手足風濕諸痺。

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無風寒濕邪者禁用。

參攷資料 ●唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯。見外臺秘要。【李時珍】此附子邊角之大者。削取之。昔時不用。比來醫家以療脚氣多驗。【陶弘景】側子附子皆是烏頭下旁出者。以小者為側子。大者為附子。今以附子角為側子。理必不然。若當陽以下。江左山

南嵩高齊魯閭。附子時復有角。如大豆許。瓠州以上。劍南所出者。附子之角。但如黍粟。豈可充用。比來都下皆用細附子。有效。未嘗取角也。【蘇恭】

【側生】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【側金盞花】即黃蜀葵之古籍別名。典見綱目。詳「黃蜀葵」條。

【側柏子仁】原名 柏實。命名 葉扁而側生。故曰側柏。

古籍別名 柏仁。柏子仁。（和漢藥考）

基本 係屬松杉科側柏之核仁。

產地 陳仁山藥物生齒辨云。產山東兗州府。九月新。

形態 本品作倒卵圓形。大四五分許。內有黃白之仁。如麥粒大。



側柏子仁

採取 每年九月採。晒乾。

製法 雷斅曰。凡使先以酒浸一宿。至明。漉出。晒乾。用黃精自然

汁。於日中煎之。緩火煮成膏。為度。每煎柏子仁三兩。用酒五兩。浸。李

時珍曰。此法是服食家者用。尋常用。只蒸熟。曝烈日。春。簸取仁。炒研入藥。

桂質 甘平無毒。

效能 補心脾。潤血脈。用作滋養強壯藥。

主治 療恍惚。虛損。吸吸。歷節。腹中重痛。益血止汗。驚悸。益氣。除風溼。安五臟。久服令人潤澤。美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論柏實曰。治頭風。腰腎中冷。膀胱冷。澀宿水。與陽道。益壽。去百邪鬼魅。小兒驚癇。【元】王好古湯液本草論柏實曰。潤肝。【明】李時珍本草綱目論柏實曰。養心氣。潤腎燥。安魂定魄。益智寧神。燒溼澤頭髮。治疥癬。【明】穆希雍本草經疏論柏實曰。柏感秋令。得金氣。其質堅。而氣極芬芳。故其質味甘平無毒。甄權加辛。亦應有之。其主驚悸者。心藏神。腎藏精。與志。心腎兩虛。則病驚悸。入心故養神。入腎故定志。神志得所。養而寧定。則其證自除矣。芬芳則脾胃所喜。潤澤則肝腎所宜。故能安五臟。五臟皆安。則氣自益矣。心主五色。耳為腎竅。目為肝竅。加以久服。氣專其力。自倍。豈不令人潤澤美色。耳目聰

十一畫 側

明。不饑不老。輕身延年。惟除風溼痺之功。非潤藥所能當。是藥之能事耳。別錄療恍惚。即驚悸之漸也。虛損。吸吸。精氣微也。歷節。腰中重痛。肝腎不足也。汗乃心液。心主血。益陰血。則諸證悉差矣。【清】黃宮繡本草求真論柏實曰。柏子仁辛甘平潤。考書俱言四臟皆補。究

之止屬心藥耳。蓋香雖能補脾。而實可以通竅而入心。潤雖可以補肝而益腎。而實可以寧神而定志。甘雖足以和胃而固中。而實足以益血而神守。是以風溼可除。驚癇可療。邪魅可辟。皮膚可澤。惟見神恬氣適。耳聰目明。而無枯槁燥塞之患矣。然性多潤滑。陰寒泄瀉者。切忌。氣多香洩。體虛火盛者。亦忌。若云不飢不老。延年輕身。雖出經典。仍當活視。毋為書執。蒸熟暴乾。自製入藥炒。【清】黃元御玉楸葉解論柏實曰。柏子仁辛香甘滑。乘燥金斂肅之氣。而體質則極滋潤。能收攝神魂。寧安驚悸。滑腸開秘。榮肝。起痿。明目。聰耳。健膝。強腰。澤潤。舒筋。斂血。止汗。燥可泄溼。潤亦清風。至善之品。蒸曬香斂。取仁炒

研。燒溼取油。光澤髮。塗抹癬疥。搽黃水瘡溼最效。

配合應用 服柏實法。九月

速房取實暴收去殼。研為細末。每服二錢。溫酒下。一日三服。渴即飲水。令人悅澤。一方加松子仁等分。以松脂和丸。一方加菊花等分。蜜丸服。

治老人虛閉。柏子仁、松子仁、大麻仁等分同研。鎔蜜蠟丸。梧子大。以少黃丹湯。食前服二三十丸。日二服。【寇宗奭方】

治小兒輕啼驚癇。腹滿。大便青苔色。用柏子仁末。溫水調服一錢。【聖惠方】

陸氏積德堂方。治黃水溼瘡。真柏油二兩。熬稠。搽之如神。【聖惠方】

治腸風下血。柏子仁十四粒。搥碎。養貯。浸好酒三盞。煎八分服。立止。【普濟方】

用量 一錢至三錢。施用宜忌 凡便溼多痰者。禁用。畏菊花。羊蹄草。

著名方劑 柏子仁丸。治經行復止。血少神衰。用柏子仁（去油）

牛膝（酒浸）各五錢。澤蘭。續斷各二兩。熱地黃一兩。蜜丸。米飲下。

參攷資料 柏取滿以療馬

痛疥。今未見用。松滋者。老人虛弱。柏子仁、大麻子仁、松子仁等分同研。溶白蠟丸。桐子大。以少黃丹湯。服二三十丸。食前。舊官陝西。每登高望之。雖千萬株。皆一一西指。蓋此水為至堅之木。不畏霜雪。得木之正氣。他木不逮也。所以受金之正氣所制。故一向之。【寇宗奭】

柏子仁性平。而不寒不燥。味甘而補。辛而能潤。其氣清香。能透心腎。益脾胃。蓋仙家上品藥也。宜乎滋養之劑用之。列仙傳云。赤松子食柏實。齒落更生。行及奔馬。諫非虛語也。【李時珍】

金匱竹皮大丸。治乳婦中虛煩亂。嘔逆煩喘者。加柏實一分。以其清金降逆而止煩嘔也。徐忠可云。神哉。喘加柏實。柏每西向。得西方之氣最清。故能益金。潤肝木而養心。則肺不受燥。喘自平也。按酸棗仁。本經主治心腹寒熱。邪結氣聚。四肢痠痛。溼痺。而柏子仁則主除風溼痺。安五臟。

均是仁也。而所治大略相同如此。方書安心之藥。每用棗仁。補心之丹。不遺柏仁。一方之中。往往連類而及。想有同等功效之故歟。(黃元御)

【側柏子殼】 主治 解砒霜如神。用三錢。炒紅土三錢。同研為末。用雞子清調服。服後作一寒。頃即愈。重者不過兩服。

【側柏油】 著本 係屬松杉科之側柏。為該樹所榨取之油脂。

產地 側柏油各省境內均有產。惟產於山西者最佳。
形態 本品受熱極易成溶液。冷則成結晶狀之塊粒。並鑄烏黑色之螢光。氣若松香。取之可供塗敷。與藥用。

主治 諸癩。癩毒。赤遊丹。禿瘡。頭面耳部黃水瘡。

參攷資料 ①身面疥目。同松脂研勻塗之。數夕自失。(聖惠) ②本品殺蟲力最強。如壁蝨。匿藏板壁之空隙處。祇須滴少許於板壁縫內。蟲即盡死。③此物以竹箬挑

之。懸絲不斷者。為真。

【側柏炭】 即側柏葉焙炒成炭者之處方用名。詳「側柏葉」條。

【側柏枝節】 主治 煮汁釀酒。去風痺。歷節。

風。燒取豬油。療疥疥。及蟲癩。良。

配合應用 ①治霍亂轉筋。以燉物裹脚。後以柏木片煮湯。淋之。(經驗方)

②治齒齦腫痛。取柏枝燒熱。拄孔中。須臾蟲綠枝出。(聖惠方)

③治惡瘡有蟲。久不愈者。以柏枝節燒溼。取油敷之。三五次無不愈。亦治牛馬疥。(陳永本草方)

【側柏根白皮】 性質 苦平。無毒。

效能 涼血液。生毛髮。

主治 火灼爛瘡。

配合應用 熱油灼傷。柏白皮以臘豬脂煎油。塗敷瘡上。(肘后方)

【側柏葉】 原名 扁柏葉。

命名 柏有多種。入藥宜用葉扁而側生者。故名。

處方用名 側柏炭。扁柏葉。柏葉汁。

古籍別名 柏葉(綱目) 叢柏(和漢藥考)

外國名詞 Leaf of Arborvitae. (英)

基本 為松杉科側柏樹之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。扁柏中國各省有出。廣東各屬均有。但以清遠為多。功用行氣祛風。利小便。行瘀血。

形態 側柏為山野之常綠樹。本品作小鱗狀。酷類檜葉。

製法 雷斅曰。凡用。揆去兩叶并心枝子。用糯泔浸七日。以酒拌蒸一伏時。每一斤。用黃精自然汁十二兩。浸焙。又浸又焙。待汁乾用之。李時珍曰。此服食治法也。常用或生或炒。各從本方。

性質 苦微溫。無毒。

成分 主要素為 pinipicrin, sturbin, 餘為揮發油。樹脂。單寧酸。

效能 涼血。止血。去風。理溼。用作婦人崩漏及吐衄之止血藥。亦為淋疾之利尿藥。

作用 入胃後。略能促進胃分泌。同時又能防止其過量之發酵。

入腸能增加腸之斂性。至血中稍。有收縮血管。凝固血球之功。

主治 吐血衄血。崩血。崩中赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。去溼痺生肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論側柏葉曰。治冷風。歷節。疼痛。止尿血。【宋】大明日華諸家本草論側柏葉曰。灸器凍瘡。燒取汁塗頭。黑潤髮髮。【宋】蘇頌嘉祐

綱經本草論側柏葉曰。傳湯火傷。止痛滅癢。服之療蟲疔。作湯常服。殺五臟蟲。益人。【明】釋希雍本草經疏論側柏葉曰。側柏葉味苦而微溫。義應並於微寒。故得主諸血崩。中赤白。若夫輕身益氣。令人耐寒暑。則略同於柏實之性矣。惟生肌去溼痺。乃其獨擅之長也。【清】

黃宮繡本草求真論側柏葉曰。側柏葉苦瀉微寒。膏肓養陰滋肺燥。土然稟受西金。堅勁不凋。服此大能伐胃。雖有止血涼血之功。而氣味與血分無涉。不過仗金氣以制木。借炒黑以止血耳。別錄稱為補益。似屬未是。但塗湯火傷。損生肌殺蟲。灸器凍瘡。汁染髮髮。最佳。酒

殺蟲。灸器凍瘡。汁染髮髮。最佳。酒

浸或炒或生用。

國外學說 英美學說謂側柏產中國、西國等處。取該樹之葉與子。可為藥品。然惟葉扁而側生者始可入藥用。其子之功用。能利小便。行氣祛風。主治白淋。鼓症。作泡。水或服油酒等。處方以側柏子一兩。或用葉亦可。水十六兩。泡一刻鐘。濾渣為度。分三次服。能利小便。治老人小便閉甚效。(側柏泡水方) 又側柏子四錢。麥糠八兩。甘菊二錢。煮稠乘熱數之。凡毒瘡初腫未潰者。以側柏子搗爛和別藥塗之最良。(側柏子糊方)

配合應用 ●服松柏法。孫真人枕中記云。嘗以三月四月採新生松葉。長三四寸許。并花蔭陰乾。又於深山巖谷中。採當年新生柏葉。長二三寸者。陰乾為末。白蜜丸。如小豆。大常以日未出時。手持八十一丸。以酒下。服一年。延十年命。服二年。延二十年命。欲得長肌肉。加大麻。巨勝。欲心力壯健者。加茯苓。人參。此藥除百病。益元氣。滋五臟。六腑。清明耳目。強壯不衰。老年益壽。神驗。用七月七日露水丸。

十一 蠶 側

之更佳。

●神仙服餌。五月五日。採五方側柏葉三斤。遠志去心二斤。白茯苓去皮一斤。為末。煉蜜和丸。梧子大。每以仙靈脾酒下三十丸。日再服。並無所忌。勿示非人。

●治中風不省。涎潮口禁。語言不出。手足蟬曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。用柏藥一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不飲酒。分作四五服。方進他藥。(楊氏家藏方)

●治時氣瘴疫。社中西南柏樹。東南枝。取暴乾研末。每服一錢。新水調下。日三四服。(聖惠方)

●治霍亂轉筋。柏葉搗爛。裹脚。及煎汁淋之。(聖惠方)

●治吐血不止。用柏葉米飲。服二錢。或蜜丸。或水煎服並良。(聖惠方)

●治憂悲嘔血。煩滿少氣。胃中疼痛。柏葉為散。米飲調服。二方寸匕。(聖惠方)

●治衄血不止。柏葉。榴花研末吹之。(普濟方)

●治小便尿血。柏葉。黃連焙研。酒服三錢。(濟急方)

●治大腸下血。隨四時方向。採側柏葉燒研。每米飲服二錢。王洙之舒州病。此陳宜父大夫傳方。二服愈。(百一選方)

●治酒毒下血。或下痢。嫩柏葉九蒸九晒。二兩。陳槐花炒焦一兩。為末。蜜丸。梧子大。每空心溫酒下四十丸。(普濟方)

●治蠱痢下血。男子婦人。小兒大腹下黑血。茶脚色。或膿血如淀色。柏葉焙乾為末。與黃連同煎為汁服之。(圖經方)

●治小兒洞痢。柏葉煮汁。代茶飲之。(經方)

●治月水不斷。側柏葉炙。芍藥等分。每用三錢。水酒各半煎服。室女用側柏葉。木賊炒微焦。等分為末。每服二錢。米飲下。(聖濟方)

●治湯火燒灼。柏葉生搗塗之。繫定。二三日。止痛滅癢。(圖經方)

●治風癢核痛。未成膿。以柏葉搗塗。熬鹽煎之。氣下即消。(姚僧坦集驗方)

●治大風癩疾。眉髮不生。側柏

葉九蒸九晒為末。煉蜜丸。梧子大。每服五丸至十丸。日三夜一。服百日即生。(聖惠方)

●治頭髮不生。側柏葉陰乾作末。和麻油塗之。(梅師方)

●治頭髮黃赤。生柏葉末一升。猪膏一斤。和丸彈子大。每以布裹一丸。納汁中。化開。沐之。一月色黑而潤矣。(聖惠方)

●治頭暈。錢半至三錢。施用宜忌。凡無溼熱者。禁用。畏菊花。羊蹄。諸石。及麴。瓜子。牡蠣。桂為之使。

●著名方劑。柏葉湯。治吐血不止。(金匱方) 柏葉乾薑各三兩。艾三把。上三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮。取一升。分溫再服。

●參攷資料。●柏性後凋而耐久。稟堅凝之質。乃多壽之木。所以可入服食。道家以之點湯常飲。元且以之浸酒辟邪。皆有取於此。麝食之而體香。毛女食之而體輕。亦其證驗矣。毛女者。秦王宮人。關東賊至。竊走入山。飢無所食。有一老公。攷喫松柏葉。初時苦澀。久乃相宜。遂不復飢。冬不寒。夏不熱。至漢

十一畫 側兜剪勒

成帝時。獵者於終南山見一人。無衣服。身生黑毛。跳坑越澗如飛。乃密圍殺之。去秦時二百餘載矣。事出葛洪抱朴子書中。(李時珍)

史記言松柏為百木之長。其樹聳直。其皮薄。其肌膩。其花細瑣。其實成球狀。如小鈴。籍後四裂。中有數子。大如麥粒。芬香可愛。柏葉松身者。檜也。其葉尖硬。亦謂之栝。今人名圓柏。以別側柏。松葉柏身者。樅也。松檜相半者。檜柏也。峨嵋山中一種。竹葉柏身者。謂之竹柏。(李時珍)

【側柏】即柏樹之別名。詳「柏樹」條。

【側梨】即陸釐之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「陸釐」條。

【兜木香】即返魂香之別名。性質功能詳「返魂香」條。

【兜納香】性質 辛平無毒。主治 溫中除暴冷。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論兜納香曰。惡瘡腫瘰。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香柳枝煎湯浴小兒。易長。

參攷資料 兜納香氣味甘溫。(陳藏器)

【兜婁婆香】即樹香之古籍別名。典見綱目。詳「尚香」條。即樹香之古籍別名。典見楞嚴經。詳「樹香」條。

【兜鈴苗】即馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬兜鈴」條。

【剪刀草】產地 生建昌。形態 獨莖。高尺許。對葉尖長。微似鳳仙花葉。而無齒。面綠背青。白。梢端抽長條。結黃實。如忍仁而小。層綴如穗而疏。可供藥用。



剪刀草

主治 洗眼瘡。

【剪刀草】即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【剪金子】即玉不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉不留行」條。

【剪金花】即玉不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳「玉不留行」條。

【剪紅羅】即刺春羅之古籍別名。典見綱目。詳「刺春羅」條。

【剪草】產地 生山深間。形態 剪草。為莖草類之一種。其葉似茗而細。狀如茜草。又如細辛。或謂即茜草。其根可供藥用。

採取 二月三月。採根曝乾用。

性質 苦涼無毒。

主治 諸惡瘡。疥癬風癢。瘰癧。有蟲浸酒服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論剪草曰。主一切失血。

參攷資料 上部血。須用剪草。牡丹皮。天門冬。麥門冬。(張元素)

許學士本草方云。剪草治勞瘵。吐血損肺。及血妄行。名曰神傳膏。其法每用一斤。淨洗晒為末。

入生蜜二斤。和為膏。以器盛之。不得犯鐵器。一日一蒸。九蒸九曝。乃止。病人五更起。面東坐。不得語。言以匙抄藥四匙食之。良久以稀粟米飲壓之。藥只冷服。米飲亦勿太熱。或吐或否。不妨。如久病肺損略

血。只一服愈。尋常嗽血妄行。每服一匙可也。有一貨婦病瘵。得此方九日藥成。前一夕病者。夢人戒令翌日勿亂服藥。次日將服藥。屋上土墜器中。不可用。再合成。將服為籍。裂器。又不得食。再合未就。而夫人卒矣。此藥之異。有如此。若小小血妄行。只一服而愈也。此藥絕妙。若此。而世失傳。惜哉。(李時珍)

一一三四

【勒法】即紫鑛之古籍別名。典見綱目。詳「紫鑛」條。

【勒母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【勒草】即葎草之古籍別名。典見別錄。詳「葎草」條。

【勒馬宜】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大戟」條。

【勒魚】命名 本品魚腹。有硬刺。刺人故名。古籍別名 鮓(動物辭典)乾者名勒然(綱目)

基本 係脊椎動物魚類喉嚨類。類鮓科。為勒魚之肉。

產地 出東南海中。

形態 勒魚為鱗類之一種。其形似鮓。亦似鱒。鱗呈櫛狀。眼大下

形似鮓。亦似鱒。鱗呈櫛狀。眼大下

頸比上頸長。口略向上。殆無齒。吞
蝕小胸腎。亦小尾分叉。肉可供
食與藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 開胃暖中。作藥尤良。

【勒魚鰓及脊骨】 主治 瘧疾。以一寸
入七寶飲酒水中各半煎。露一夜服。

【勒魚】 即勒魚之乾者。與見綱目。
詳「勒魚」條。

【瓠瓜】 即瓠瓜實之無柄而圓大
形扁者。性質功能詳「瓠瓜」條。

【區余】 基本 區余爲雜草類
之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。
主治 心腹熱癰。

【參三七】 即三七之處方用名。詳
「三七」條。

【參貝陳皮】 即橘皮用參貝製成
者。詳「橘皮」條。

【參果根】 古醫別名 百連。烏
參。鼠莖。鹿蒲。(別錄)

形態 參果爲雜草類之一種。
根生百餘。根根有衣莖莖。可供藥
用。

採取 三月三日採根。

性質 苦。有毒。

主治 鼠瘻。
【參軍肉】 即豬肉之古醫別名。與
見崔豹古今注。詳「豬肉」條。

【嗜叭香】 即藏香之別名。性質功
能詳「藏香」條。

【啄木鳥】 命名 本品鑿裂樹
木取其蠹食。故名。

古醫別名 斲木鳥(爾雅)。鴛
(綱目)青鴛(動物辭典)赤色者
名山啄木鳥(圖經本草)

外國名詞 Pionia p. (拉丁)
Wood-pecker (英) Specht (德)
キツツキ 或 アテゲラ (日本)

基本 屬脊椎動物鳥類。攀食
類啄木鳥科。

產地 出山林間。及原野之樹
洞中。

形態 啄木鳥。爲林禽類之一
種。其嘴尖直而堅。嘴根有剛毛。接
於額而開鼻孔。舌細長。尖端具逆
鉤。伸縮自如。體之上。概青色。雄
之頭部紅色。雌者灰色。眼下有紅
斑。覆翼羽。稍帶黃。手翼暗褐。而外
羽有多數白斑。腰部有鮮黃斑。體
下淡綠。有暗色橫斑。尾羽軸剛直。

上暗綠。下灰色。脚短。二趾前。二趾
後。皆具尖銳之鉤爪。便於攀木。常
叩樹幹。覓蠹食之。其肉可供食與
藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 痔瘡。及牙齒疳。蟲牙。
燒存性研末。納孔子中。不過三次。
屢代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論啄木鳥肉曰。追勞蟲。
治風癩。

參攷資料 ●淮南子云。啄木
愈。以類相攝也。荆楚歲時記云。
野人以五月五日。取啄木主齒痛。
(劉禹錫) ●追勞治痢治瘡。皆取
制蟲義也。(李時珍)

【啄木鳥舌】 主治 齒齦作
痛。以綿裹尖。咬
之。

【啄木鳥血】 主治 庚日向
西熱飲。令人面
色如朱。光彩射人。

原名 蓬莖。
【商陸】 命名 本品能逐毒水
氣。故曰逐毒。祇爲商陸。又說爲當
陸。北音說爲章柳。或云枝枝相值。
葉葉相當。故曰當陸。或云多當陸

路而生也。
處方用名 商陸根。
古醫別名 夜呼(本經)當陸。
白昌(開寶)章柳根(圖經)馬尾
(廣雅)莧陸(易經)昌陸。章陸。鹿
神。文章柳。牛舌根。杜大黃。樟柳根。
(和漢考索)

外國名詞 Radix Phytolae-
coco. (拉丁)

基本 屬商陸科。爲山牛蒡之
根。

產地 凡山野川谷間之陰地。
恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。
商陸產廣東清遠。

形態 商陸爲多年宿根草。莖
高三四尺。葉互生。爲長卵圓或長
橢圓形。似菸葉而小。且有光澤。夏
日莖梢葉腋間。開有極無尊之小
白花。作總狀花序排列。果實爲漿
果。色紫黑。其根形似蘿蔔根。外面
淡褐色。內部灰白色。出售者多截
作三寸許。再切成片。日本藥局方
載入商陸。略謂商陸係採其根莖
乾而用之。根頗彎曲。縱斷面有污
白色之條紋。紋皆隆起。似行行排
列。其左右兩面。被以似紅似白之

一一三五

外皮。橫切片有屈曲凹凸之輪層。性柔韌。不易破折。內色白。帶粉性。無甚臭味云。但第四版改正。已刪去。(和漢藥考)



商 陸

採取 二月八月。採根日乾。

製法 雷斅曰。取花白者。根。銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。流出架飯。蒸以黑豆葉一重。商陸一重。如此蒸之。從午至亥。取出。去豆葉。曬乾。用。無豆葉以豆代之。

性質 辛平。有毒。

成分 商陸根中有毒成分。名曰質脫拉克託克辛 (Phytolacca-cosolida, C₁₁H₁₆O₈)。為無結晶之華爾斯。水不能溶解。遇酒精即全溶解。然加水沖淡。則再起沈澱。此有毒成分。在商陸根中。約含有四%至五%。析出之後。以水製成越幾斯。行生理之試驗。毫無效果。復試以酒製越幾斯。則功效顯著。致能 大瀉膿膽水。飲專作利

尿藥。主治 水腫。疝瘕。瘰癧。除癰腫。殺鬼精物。(本經)療胸中邪氣。水腫。痿痺。腹滿。洪直。疏五臟。散水氣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論商陸曰。薄十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外良。【宋】大明日華諸家本草論商陸曰。通大小腸。瀉蟲毒。墮胎。婦腫毒。傳惡瘡。【明】李士材本草圖解論商陸曰。商陸酸辛有毒。通大小腸。疎澀水腫。攻消痰癖。搗爛傳腫毒。喉痺小兒痘毒。同葱白煨臍。白者可入湯散。赤者但堪外貼。古贊云。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。與大戟甘遂異性同功。虛者不可用。止用貼臍。小便利即腫消也。腫脹因脾虛者多。若誤用之一時。雖效。未幾再作。決不能救。【清】黃宮繡本草求真論商陸曰。商陸辛酸苦寒。有毒。功專入脾行水。其性下行最峻。有排山倒海之勢。功與大戟。芫花。甘遂相同。故凡水腫水脹。疝瘕。癰腫。喉痺不通。溼熱。蠱毒。惡瘡等症。服此即能見效。如仲景

牡蠣澤瀉散之用商陸。以治大病。後腹以下腫。用此急迫以散之也。若脾虛水腫。因服輕劑未愈。遂用苦劣有毒純陰之藥。迅迫效雖稍見。未幾即發。決不可救。取花白者良。赤者只堪貼臍。黑豆湯浸蒸用。得蒜良。【清】黃元御長沙藥解論商陸曰。商陸根酸苦湧泄。專於利水。功力迅急。與芫遂大戟相同。得水更烈。善治水氣腫脹之病。神效非常。兼療癰腫。痰癖。諸證。赤者大毒。用白者鮮根搗汁。服後勿飲水。【清】鄒澍本經疏證論商陸曰。吳哉。李瀨湖謂商陸沈降而陰。其性下行。專於治水。與大戟甘遂異性同功也。夫所費於治本經者。為能審名辨物。知其各有所宜耳。若商陸之功。不過與大戟甘遂埒。則用大戟甘遂已耳。又何取於商陸哉。夫大戟甘遂味苦。商陸味辛。苦者取其降。辛者取其通。降者能行逆。折橫流之水。通者能行壅滯停蓄之水。取義既殊。功用遂別。豈得以此混彼也。仲景書中十棗湯用大戟甘遂。大陷胃湯。甘遂半夏湯。大黃甘遂湯。均用甘遂。不用大戟。則

甘遂之與大戟。固自有異矣。獨於大病差後。腹已下水。氣者。牡蠣澤瀉散中。偏取商陸。謂非商陸有異於大戟甘遂乎。商陸不用赤花。赤根。獨有取於白花白根者。蓋以其色之白。恰配其味之辛。以為攻堅破頑之用。下病者上取。上病者下取。牡蠣澤瀉散治腹以下水氣不行。必先使商陸葶藶。從肺及腎。開其來源之壅。而後牡蠣海藻之輕堅。蜀漆澤瀉之開洩。方能得力。用括樓根者。恐行水之氣過融。有傷上焦之陰。仍使之從脾吸陰。還歸於上。與常山之蛇。擊其首則尾應。擊其尾則首應者不殊也。是故商陸之功。在決壅導塞。不在行水。疏利。明乎此。則不與他行水之物。同稱混指矣。

國外學說 日本學說謂商陸者。自昔為有名之利尿劑。本草綱目云。療水。其效如神。櫻村清德氏。確定其酒精越幾斯。於諸般水腫。有顯效。又長井氏。摘出一種華爾斯樣之化合物。命名曰「フ井トラツコトキシソ」。然依動物試驗之結果。即以為商陸之利尿

成分似大糖率。其利尿之理由。今尙不明。日本和漢藥考曰。世俗每以山牛蒡爲商陸。實則同名而異物也。山牛蒡爲屬於菊科之宿根草。根似牛蒡。故名山牛蒡。莖高二三尺。上葉葉柄短。葉形卵圓或橢圓。邊緣有鋸齒。下葉葉柄長。似牛蒡之葉。莖與葉俱有灰白色之茸毛。至秋生蕾。形圓如球而有刺。旋開深紫色之喇叭花。作頭狀花序排列。其嫩葉如商陸。可供食用。老葉用以引火。山牛蒡之嫩葉。浸以鼓汁。可供食用。其乾根煎服。不見有害。生根之絞汁。則性猛烈。服之往往致死。島根土人。秋分掘山野。自生之山牛蒡根。以小刀剝去外皮。浸鼓汁。或作蜜餞食之。以治風毒水腫。脚氣諸症。頗有效。牛蒡根爲菊科植物之宿根草。歐洲各國多產之。莖與花俱似牛蒡。入藥以野生者爲佳。故有山牛蒡根之名。近人譯作商陸。其實與真正之商陸相混。此根外作灰褐或灰白色。有皺裂。形如紡錘。內部類白色。橫斷面爲線狀。味甘。性微黏。其生根有一種烈臭。爲發汗利尿藥。

十一畫 商

以治慢性皮膚病。發毒。痛風等症。用此藥一〇・〇至二〇・〇。製成煎劑服之。成分爲伊努寧 (Inulin) 糖質。鞣酸等。山牛蒡根。爲商陸科植物之宿根草。產於北美及非洲之北部。與歐洲之南部。爲商陸之一種。此可充真正之商陸。服〇・〇六至〇・三。已有利尿變質之效。若服至〇・五或二・〇。必起吐瀉。商陸之基本植物。同名異種者頗多。一說中國產之商陸。與日本產爲異種云。

辨偽 ● 鄭肖巖曰。偽名次商陸。卽俗所稱豬卜卜者。其性無從稽考。萬不可服。按商陸氣味辛平有毒。主治水腫。癰腫。殺鬼精物。近道所在有之。春生苗高二三尺。莖青赤。極柔脆。葉如牛舌而長。夏秋開花作朶。根如蘿蔔。似人形者有神。有赤白二種。白根者花白。赤根者花赤。白者入藥。赤者毒更甚。俗名章柳。不可服。服之見鬼神。嗟嗟。同是一種。根色赤者。尙不可用。豬卜卜之異種乎。● 曹炳章曰。按商陸八九月出新。各處皆出。晉江浙市上通用白商陸。赤者不入藥。服

之有消燥。解腎之毒。故勿創。鄭君所云豬卜卜。不知其形狀若何。因未曾見過。不敢妄評。

配合應用 ● 治溼氣脚軟。章柳根切小豆大。煮熟。更以綠豆同煮爲飯。每日食之。以遠爲度。甚效。(斗門方)

● 治水腫氣滿。用白商陸根去皮。切如豆大。一大盞。以水二升。煮一升。更以粒米一大盞。同煮成粥。每日空心服之。取微利。不得雜食。(外臺祕要方) 用白商陸六兩。取汁半合。和酒半升。看人與服。當利下水。取效。(千金方) 用白商陸一升。羊肉六兩。水一斗。煮取六升。去滓和葱鼓作醴食之。有效。(梅師方)

● 治腹中暴癢。有物如石。痛刺啼呼。不治。百日死。多取商陸根。搗汁。或蒸之以布藉腹上。安藥勿覆。冷卽易。晝夜勿息。(千金方)

● 治瘰癧如石。在脇下。堅硬。生商陸根汁一升。杏仁一兩。浸去皮。搗如泥。以商陸汁絞杏泥。火煎如餠。每服黃許。空腹熱酒服。以利下惡物爲度。(聖惠方)

● 治產後腹大。堅滿。喘不能臥。白聖散用章柳根三兩。大戟一兩。半。甘遂炒一兩。爲末。每服二三錢。熱湯調下。大便宜利爲度。此乃去水聖藥也。(潔古保命集方)

● 治五尸注痛。腹痛。脹急。不得喘息。上攻心胸。旁攻兩脇。痛或塊。涌起。用商陸根熬以蠶殼。更互熨之。取效。(肘後方)

● 治小兒痘毒。小兒將痘發熱。失表。忽作腹痛。及膨脹。唇氣。乾。亂由毒氣與胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傅臍上。斑止。痘出。方免無虞。(摘玄方)

● 治耳卒熱腫。以生商陸。削尖。納入耳再易。(聖濟方)

● 治喉卒攻痛。商陸切根。炙熱。隔布熨之。冷卽易。立愈。(圖經本草方)

● 治瘰癧喉痺。攻痛。生商陸根。搗作餅。置瘰癧上。以艾炷於上。灸三四壯。良。(外臺祕要方)

● 治一切腫毒。商陸根和鹽少許。搗傅。日再易之。(千金方)

● 治石癭如石。堅硬。不作膿者。生商陸根。搗之。燥卽易。取軟爲

度亦治溼漏諸病。(張文仲備急方)

◎治瘡傷水毒。商陸根搗炙。布裏熨之。冷即易之。(千金方)

用鹽 五分至一錢。

施用宜忌 凡脾虛而非邪實者禁用。

參攷資料 ①方家不甚用。惟療水腫。切生根。雜鯉魚。煮作湯服。道家乃散用之。及煎服。皆能去尸蟲。見鬼神。其質子亦入神藥。花名蒟花。尤良。(陶弘景) ②商陸苦寒。其性下行。專於行水。方家治腫滿。小便不利者。以赤根搗爛。入麝香三分。貼於臍心。以帛束之。得小便利。即腫消。又治溼水。以指畫肉上。隨散不成文者。用白商陸。香附子炒乾。出火毒。以酒浸一夜。日乾為末。每服三錢。米飲下。或以大蒜同商陸煮汁服亦可。其莖葉作蔬食亦可治腫疾。(李時珍) ③赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不止。殺人。令人見鬼神。(蘇恭) ④俗名葦柳根。多生於人家園圃中。春生苗高三四尺。背葉如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作桑根。

如蘿蔔而長。八九月採之。爾雅謂之蒟。廣雅謂之馬尾。易經謂之葦。雷斅曰。一種赤莖。苗葉絕相類。不可服之。有傷筋骨。消腎之毒。惟花白年多者。仙人採之作脯。可下酒也。(蘇頌) ⑤商陸昔人亦種之為蔬。取白根及紫色者。擊破作畦栽之。亦可種子。根苗莖並可洗蒸食。或用灰汁煮過亦良。服丹砂乳石食之尤利。其赤與黃色者有毒。不可食。按周憲王救荒本草云。章柳幹粗似雞冠。花幹微有線楞。色微紫赤。極易生植。(李時珍)

【商草】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【商棘】即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天門冬」條。

【商殺】即枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳殼」條。

【問荊】即接續草之別名。性質功能詳「接續草」條。

【國大李仁】即郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【國木皮】即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【國丹】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。

【國老】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【國豆】即豌豆之古籍別名。典見綱目。詳「豌豆」條。

【執火】即蟹之古籍別名。典見綱目。詳「蟹」條。

【聖石】即石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石灰」條。

【聖灰】即石灰之古籍別名。典見本經。詳「石灰」條。

【聖蠶】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳「蚯蚓」條。

【董】即旱芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「旱芹菜」條。

◎即草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳「草烏頭」條。

【董草】即新羅之古籍別名。典見別錄。詳「新羅」條。

【董蕘菜】即紫花地丁之古籍別名。典見植物圖考。詳「紫花地丁」條。

【董葵】即石龍肉之古籍別名。典見山海經。詳「石龍肉」條。

◎即旱芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「旱芹菜」條。

【董葉】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【婆子】即水眼之別名。詳「水眼」條。

【婆木香】即散香之別名。詳「散香」條。

【婆那婆】即波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳「波羅蜜」條。

【婆固脂】即補骨脂之原名。詳「補骨脂」條。

【婆固紙】即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「補骨脂」條。

【婆律香】即冰片之古籍別名。

【商陸花】原名 蒟花。主治 人心昏塞。多忘喜臥。取花陰乾。百日搗末。日暮水服方寸匕。乃臥。思念所欲事。即於眠中醒悟也。

【商陸根】即商陸之處方用名。詳「商陸」條。

【商陸葉】性質 辛。平。有毒。效能 行水利便。通腸消腫。主治 腫瘰。

【商庚】即蠶之古籍別名。典見爾雅。詳「蠶」條。

與見新修本草圖經。詳「冰片」條。
①即百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百部」條。

【婆律香膏】 原名 龍腦香膏。

命名 本品即冰片製成之膏。故名。

主治 耳聾。摩一切風。

【婆娑石】 (綱目)

產地 生南海。

形態 婆娑石爲石類之一種。其色綠無斑點。或謂海南有山。五色雜峙。其下水流如箭。舟過其下。人以刀斧擊取。其石有光焰。燒之作硫黃氣。可供藥用。

採取 以有金星而能磨成乳汁者佳。以手磨點鷄冠血。當化爲水者真。

性質 甘淡寒。無毒。

主治 解一切藥毒。療疫。熱閉。頭痛。

參攷資料 婆娑石。能匿五金。伏三黃。制鉛汞。(李時珍)

【婆娑奶】即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【婆娑酸】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【婆娑鐵線包】即羅摩之俗名。詳「羅摩」條。

【婆娑】即百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百部」條。

【婆娑草】即百部之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「百部」條。

【婆羅得】 (綱目)

產地 生於波斯。

形態 婆羅得爲喬木類之一種。樹似柳。實如蓖麻子。以指甲抓之。即有汁出。其子可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 冷氣塊。溫中補腰腎。破痰癖。可染髮髮令黑。

【婆羅門皂莢】即阿勃勒之古籍別名。典見本草拾遺。詳「阿勃勒」條。

【婆羅門參】即仙茅之古籍別名。典見阿經本草。詳「仙茅」條。

【婆羅勒】即婆羅得之古籍別名。典見綱目。詳「婆羅得」條。

【婆羅樹】即天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【婢尾魚】即比目魚之別名。典見臨海志。詳「比目魚」條。

【婢尾魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【婢尾春】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【宿田翁】即狼尾草之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「狼尾草」條。

【宿芥】即黃芥之古籍別名。典見本草集註。詳「黃芥」條。

【寄生】即鐵指甲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵指甲」條。

【寄生草】即桑上寄生之別名。性質功能。詳「桑寄生」條。

【寄生蟲】即寄居蟲之古籍別名。典見綱目。詳「寄居蟲」條。

【寄居】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【寄居蟲】 基本 本品爲蟲之寄居於螺殼中者。

古籍別名 寄居蟲(綱目) 巢蟻(動物辭典)


外國名詞 Pagurus 或 Pagurus Horns Crab Einar. olerkos (拉丁) ヤトカ

(日本)

基本 係節肢動物甲殼類。胸甲類十屬。長尾類。寄居蟲科之寄居蟲。

產地 生海涯及湖澤間。

形態 寄居蟲爲蟲類之一種。其頭胸部堅硬。被剛毛。有肢腹部。柔軟觸角。稍長。第一對腳。形大爲鉗狀。全體赤色。或蒼黑。大者長四寸。恒寄居螺類之遺殼。可供藥用。



寄居蟲

主治 益顏色。美心志。

參攷資料 ①海南一種似蜘蛛。入螺殼中。負殼而走。觸之即縮。如螺火矣。乃出一名。特無別功用。(陳藏器) ②案孫愷云。寄居在螺殼中者名曰螺。則寄居亦非一種也。(李時珍)

【寄居】即桑寄生之古籍別名。典見本經。詳「桑寄生」條。

十一畫 婆 婢 焚 宿 寄

【寄童】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【密陀僧】

梵語也。命名 密陀沒多。皆

古籍別名 沒多僧(唐本)爐底(綱目)灰坯陀僧。理文石。甜陀淳子。甜面淳子(和漢藥考)丹鏡(西藥名)銀池。淡銀(藥物生產)拼)

外國名詞 Lithargyrum.

(拉丁) Lithargo. (英) Bihis. latho. (德)

產地 陳仁山藥物生產辨云。密陀僧各屬有出此乃傾銀爐之爐底也。又名銀池。又名淡銀。西藥名丹鏡。

形態 密陀僧為粉末或鱗片狀之塊。色黃或紅黃。無臭無味。水不能溶解。稀硝酸能溶解之。又浸於稀硝酸中。則夾雜其間之鋼鐵均可除去。

種類 帶灰色者謂之銀密陀僧。現黃色者謂之金密陀僧。品質相同。惟因色彩而區別耳。

製法 雷敦曰。凡使搗細。安瓷鍋中。重紙袋盛。柳蛙末焙之。次下

東流水。浸滿。火煮一伏時。去柳末。紙袋取用。又精鍊銀鐵之際。熱鐵石末。加入鐵屑。除去硫黃。加鉛熔合。再使鉛酸化。令吸收於木灰中。依精鍊之灰吹法。而造出副產物。是為密陀僧。或祇將鉛銻化。使燻空氣酸化而製之。

性質 鹹。辛。平。有小毒。

成分 在化學上謂之酸化鉛(PbO)

效能 刮痰。鎮驚。配合膏藥。用為治瘡藥。溼疹。水疱疹。

作用 能收縮黏膜。及潰瘍處之血管。使分泌減少。同時又與白血球化合而成蛋白化鉛。令患處與空氣隔離。故可免除腐爛。

主治 久痢。五痔。金瘡。面上癩。面膏藥用之。

歷代記載攷證 【宋】大明日華諸家本草論密陀僧曰。鎮心。補五臟。治驚癇。咳嗽。嘔逆。吐痰。【明】李時珍本草綱目論密陀僧曰。療反胃。消渴。瘡疾。下痢。止血殺蟲。消積。治諸瘡。消腫毒。除胡臭。染髮髮。

【明】繆希雍本草經疏論密陀僧曰。密陀僧感銀銅之氣而結。故其

味鹹。辛。氣平。有小毒。久痢。五痔。大腸溼熱積滯也。辛主散結滯。鹹主潤下。除熱。大腸清寧。則久痢五痔自瘳矣。體重能消唇堅積。味鹹能入血涼血。故又主金瘡。及滅面上癩點也。【清】黃宮繡本草求真論

密陀僧曰。密陀僧係出銀坑之中。真者難得。今用多屬傾銀爐底。味辛而鹹。氣平。小毒。大率多屬祛溼除熱。消積滯。安驚定魄。止血散腫。能絕癩除疥。安驚定魄。止血散腫。消積殺蟲。及療腫毒。敷凍瘡。解狐臭。染髮。非其祛熱清溼。除重鎮。鎮擊。則病曷克去乎。但此出於銷銀爐裏。則有銅氣雜入。不堪入藥。且只可以外敷。不可以作服餌也。若入藥須煮一伏時。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。灰吹之滓也。有金密陀僧。銀密陀僧二種。以黃白色別之。用煎湯藥者。少膏藥或桐油漆中始用之。英美學說謂密陀僧化名鉛養。係從鉛礦製出。其結冰如鱗片。在古人早已知有此質。為提金提銀工內所常用。至鉛中分銀之工內亦用之。尋常出售之密陀僧。常含

較少許。又含銅鎂。炭養(二)玻養(三)與土質等。其性質與鉛之別質相同。匠之以鉛為藥者。每易受其害。如與流質油相和。成密陀僧膏藥。可為數種膏藥內之要質。不可內服。外用能作貼膏類。至解藥之解此毒者。須先服土朴硝或洋朴硝。後服吐劑。消劑。解毒之後服鴉片止痛。又服牛奶與雞蛋清。等用密陀僧貼膏四分。黃蠟一分。杏仁油三分。或香油亦可。共化勻。攤布條上。以裏患處。治溼癬甚效。

(密陀僧油膏方) 又密陀僧膏二十四兩。松香三兩二錢。洋肥皂一兩六錢。先將密陀僧膏煨熱。另以一鎰將松香洋肥皂煨熔。然後加入密陀僧膏。和勻。此膏宜以布開調。凡割症用以合口甚妙。(密陀僧合口膏方) 又密陀僧膏二十

七兩。洋肥皂四兩八錢。松香八錢。照合口膏方製之。製成後。用布開紙開調。均可。凡瘡科及皮膚等症不能收口者。以此膏貼之。(密陀僧收口膏方)

配合應用 治痰結胸中不散。密陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾

散。密陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾

爲末。每服二錢。以酒水各一小盞煎一盞。溫服。少頃當吐出痰涎爲妙。(聖惠方)

①治消渴飲水。神效方用密陀僧二兩研末湯浸。蒸餅丸。梧子大。濃煎鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸。日增五丸。至三十九止。不可多服。五六服後。以見水惡心爲度。惡心時。以乾物壓之。日後自定。甚奇。(選奇方)

②治赤白下痢。密陀僧三兩。燒黃色。研粉。每服一錢。醋茶下。日三服。(聖惠方)

③治腸風痔瘻。用銅青。密陀僧各一錢。麝香少許爲末。津和塗之。(濟急方)

④治小兒初生。遍身如魚卵。又如水晶。破則成水流。滲又生者。用密陀僧生研。搽之。仍服蘇合香丸。(救急方)

⑤治腋下胡臭。漿水洗淨。油調密陀僧塗之。以一錢用熱蒸餅一箇。切開。搽末夾之。(集簡方)

⑥治口臭。密陀僧一錢。醋調漱口。(普濟方)

⑦治大人口瘡。密陀僧研搽。

之。(聖濟方)

①治小兒口瘡。不能吮乳。密陀僧末。醋調塗足心。瘡愈。洗去。蔡醫博方也。(黎居士簡易方)

②治鼻內生瘡。密陀僧。香白芷等分爲末。蠟燭油調搽之。(簡便方)

③治鼻齇赤腫。密陀僧二兩。細研。入乳調。夜塗。且洗。譚氏亦治瘡。癩。又外壅治野雞斑點。(聖惠方)

④治夏月汗斑如疹。用密陀僧八錢。雄黃四錢。先以鹽片擦熱。仍以鹽片蘸末。搽之。次日即愈。(活人心統方)

⑤治骨疽出骨。一名多骨疽。不時出細骨。乃母受胎。未及一月。與六親骨肉交合。感其精氣。故有多骨之名。以密陀僧末。桐油調勻。攤貼之。即愈。(濟域方)

⑥治血風腫痛。密陀僧香油入粗罈內。磨化。油紙攤膏。反覆貼之。(孫氏集效方)

⑦陰汗溼痒。密陀僧末。傅之。戴氏加蛇牀子末。

施用宜忌 凡中寒無實邪者

禁用。

參攷資料 ①密陀僧感錯銀之氣。其性重墜。下流。直走下焦。故能墜痰止吐。消積定驚。治癩痢。止消渴。療瘡腫。洪邁夷堅志云。驚氣入心。精痞不能言語者。用密陀僧末一匕。茶調服。即愈。昔有人伐薪。爲狼所逐。而得是疾。或授此方。而愈。又一軍校探藤。逢惡蛇。病此。亦用之而愈。此乃驚則氣亂。密陀僧之重。以去怯而平肝也。其功力與鉛丹同。故膏藥中用代鉛丹云。(李時珍) ②密陀僧墜重。推破如金色者佳。(慈宗爽) ③今嶺南閩中。銀銅冶處。亦有之。是銀錯。其初探破時。銀銅相雜。先以錯同煎鍊。銀隨錯出。又採山木葉。燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀錯於灰上。更加火煨。錯滲灰下。銀住灰上。罷火候冷。出銀。其灰池感金銀氣。積久成此物。(蘇頌) ④密陀僧。原取銀治者。今既難得。乃取煎銷銀鋪爐底用之。造黃丹者。以腳滓鍊成。密陀僧。其似瓶形者。似也。(李時珍) ⑤密陀僧惟治野雞

傅面外。今人無復用以服食者。大

都可外敷。不可內服。此藥難得。其者。銷銀爐底。乃硝銅之氣所結。能爛一切物。故益不宜輕用。(繆希雍) ⑥密陀僧製法。先以鉛入鍋。煮鎔。用鏟再燭。令與天空。養氣相合。變作黃粉。即黃丹。隨將該粉。攪出。復用烈火。透。俟冷凝。結。即成爲密陀僧。不入服劑。製膏。或和入別藥。作收口膏。凡瘡科皮膚等症。不能收口者。以此膏貼之。(西藥略釋)

【密香】即沈香之古籍別名。典見綱目。詳「沈香」條。

【密蒙花】命名 本品花序繁密。蒙茸如錦簇。故名。

古籍別名 水錦花(炮炙論) 寒不凋(和漢藥考)

外國名詞 *Brouhaia officinalis* (拉丁)

基本 屬馬錢科。爲密蒙之花。產地 陝仁山藥物生產辦云。密蒙花產陝西興安府。漢中府。湖北宜昌府。均有出。又有一種俗稱明花球。實屬益草仁。產湖南湖北兩省。

形態 密蒙花樹高丈餘。葉經

形態 密蒙花樹高丈餘。葉經

十一畫 密寇將尉屏崑崖

冬不凋。似冬青葉而厚。背白。有細毛。又云。不似冬青。柔而不尖。色深綠。其花細碎。數十房成一朶。冬生春開。微紫色。

採取 二三月間採花曝乾。

製法 雷斅曰。凡使揀淨。酒浸一宿。漉出候乾。并蜜令潤。蒸之。從卯至酉。日乾。再拌蒸。如此三度。日乾。每一兩用酒八兩。蜜半兩。

性質 甘平。微寒。無毒。

效能 祛腎障。明眼目。專作眼科藥。

主治 青盲。疔瘡。赤腫。多眵。淚。消目中赤脉。小兒。疝豆。及疔氣攻眼。

歷代記述攷證 【元】王好古湯液本草論密蒙花曰。入肝經氣血。分潤肝燥。【明】繆希雍本草經疏論密蒙花曰。密蒙花其莖萌於冬而開於春。氣平微寒。味甘而無毒。爲厥陰肝家正藥。親本經所主。無非肝虛有熱所致。蓋肝開竅於目。目得血而能視。肝血虛則爲青盲。疔瘡。肝熱甚則爲赤腫。眵淚。赤脈。及小兒。疝瘕。餘毒。疔氣。攻眼。此藥甘以補血。寒以除熱。肝血足而

諸證無不愈矣。好古謂其潤肝燥。守真以之治畏日羞明。誠謂此也。形與羌花相似。但羌花狹小而密。蒙花差大爲異。用者宜詳辨之。

辨名 鄭肖巖曰。蒙花一名

蒙山茶。一名雲芝茶。性寒能清肺胃之熱。故疹病用之尤宜。近今多以近道礪花僞充。則性味懸殊矣。曹炳章曰。按蒙花三月出。新湖北當歸山出者。其花白綠色。白茸毛淨而無梗者佳。各處出。花碎小。色白黃。梗多者次。

配合應用 治青盲疔瘡。密蒙花。空青。木賊。生地黃。蟬蛻。白蔞。殺精草。決明子。羚羊角。

治肝腎虛。目不能遠視。密蒙花。甘菊花。枸杞子。生地黃。白蔞。殺精草。

治風熱溼熱。眼赤痛。密蒙花。黃連。赤芍藥。防風。荊芥穗。黃蘗。甘菊花。甘草。龍膽草。

治小兒疳積。眼目不明。密蒙花。胡黃連。白蘗。使君子。蟬蛻。木賊。蘆薈。

治目中障翳。密蒙花。黃蘗。根。各一兩。爲末。水丸。梧子大。每臥時

湯服十九至十五丸。(聖濟總錄方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 密蒙花蜀中州郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背白。有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月採花曝乾用。(蘇頌) 利州甚多。其葉冬不凋。亦不似冬青。柔而不光潔。不深綠。其花細碎。數十房成一朶。冬生春開。(寇宗奭)

寇脫 卽通草之古籍別名。典見山海經。詳「通草」條。

將軍 卽大黃之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「大黃」條。卽石硫黃之古籍別名。典見綱目。詳「石硫黃」條。

將軍乾 卽蟋蟀之處方用名。詳「蟋蟀」條。

將軍 卽白芍之古籍別名。典見綱目。詳「白芍」條。

尉佗生 卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

尉佗桂 卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

尉魚 卽鱒魚之古籍別名。典見

一一四二

毛詩疏義。詳「鱒魚」條。

屏風 卽防風之古籍別名。典見別錄。詳「防風」條。卽芥菜之古籍別名。典見楚詞。詳「芥菜」條。

崑崙 卽白斂之古籍別名。典見別錄。詳「白斂」條。

崑崙瓜 卽茄子之古籍別名。典見御覽。詳「茄子」條。

崑崙桃 卽冬桃之古籍別名。典見綱目。詳「冬桃」條。

崑崙草 卽青箱子之古籍別名。典見唐本草。詳「青箱子」條。

崑崙紫瓜 卽茄子之古籍別名。典見杜寶拾遺錄。詳「茄子」條。

崑崙黃 卽雌黃之古籍別名。典見綱目。詳「雌黃」條。卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳「石硫黃」條。

崑崙藍 卽甘藍之古籍別名。典見綱目。詳「甘藍」條。

崖香 卽海南沈香之產於崖州者。性質功能與尋常之沈香同。詳「沈香」條。

崖椒 古籍別名 野椒。(綱目)

Schinus molle, S. et Z. (拉丁)

基本 屬芸香科山椒類。為野
椒之果實。椒紅。

產地 多野生於山崖間。
形態 崖椒為蜀椒之一種。葉
大於蜀椒。其子灰色。不黑無光。亦
不甚香。其紅可供藥用。



崖 椒

採取 四季採皮實。熟時採椒
紅用。

性質 辛。熱。無毒。

主治 肺氣上喘。兼咳嗽。并野
薑為末。酒服一錢匕。

施用宜忌 忌鹽。

【崖櫻】

命名 本品形似櫻。而
生山崖間。故名。

形態 崖櫻為石草類之一種。
莖高尺餘。四時有葉無花。其根可
供藥用。

製法 採根去粗皮。入藥用。

十一畫 崖 巢 帶 常

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 婦人血氣。并五勞七傷。
以根同半。天回。雞翁藤。野蘭根。四
味洗焙為末。每服二錢。溫酒下。丈
夫無所忌。婦人忌雞魚。溼麵。

【崖蜜】 即櫻桃之實最大而甘
者之古籍別名。典見孫炎註解。詳

【櫻桃】條。即石蜜之古籍別名。
典見綱目。詳「石蜜」條。

【崖鹽】 即光明鹽之古籍別名。典
見綱目。詳「光明鹽」條。

【巢帶子】 即鈎梁之古籍別名。典
見本草拾遺。詳「鈎梁」條。

【巢煙九助】 即烏梅之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「烏梅」條。

【巢蟹】 即寄居蟲之古籍別名。典
見動物辭典。詳「寄居蟲」條。

【帶心連翅】 即連翅之處方用名。
詳「連翅」條。

【帶柳】 即帶魚之小者。典見綱目
拾遺。詳「帶魚」條。

外國名詞 Trichurus
chinensis (拉丁)

帶魚 chinensis (拉丁)

古醫別名 裙帶魚。小者名帶
柳。(綱目拾遺)

產地 出海中。

形態 帶魚為無鱗類。魚屬之
一種。頭尖尾細。身扁眼大。口有強
齒。脊背連續甚長者。至五六尺。大
小不等。體有滑涎。背淡青。腹白色。
乾者作銀光色。周身無細骨。止中
有一脊骨。狀如透箕。兩面皆肉。肉
細而肥。橫洋海中。來則千百成羣。
脚尾而行。不受網羅。惟以鈎釣。斯
可得其一。而連續不絕。出以八月。
盛於十月。而移重則多。移少亦少。
捕得可供食與藥用。

【帶魚】 即練鰻之古籍別名。典見
禽經。詳「練鰻」條。

【帶島】 即練鰻之古籍別名。典見
禽經。詳「練鰻」條。

性質 甘。平。無毒。

主治 和中開胃。去風殺蟲。

參攷資料 帶魚胎醃風乾。久
藏不敗。煎烹味美。多食發疥。(綱
目拾遺)



魚 帶

【帶殼葱】 即白豆蔻之處方用名。
詳「白豆蔻」條。

【帶葉蘇梗】 即紫蘇之處方用名。
詳「紫蘇」條。

原名 蜀漆。

【常山】 命名 本名苗名蜀漆。

根名常山。 四方用名 炒常山。製蜀漆。

古醫別名 五草。(本經)恒山。
(吳普)雞屎草。鴉屎草。(日華)巨
草。翻胃木。(和漢藥考)

外國名詞 Oriza Japonica,
Pinus. (拉丁)

基本 屬芸香科。為常山之根
與葉。

產地 陝仁山藥物生產辨云。
常山。產四川萬縣。重慶及湖南為
正。又有土常山。產廣東清遠。其功
雖亦能吐。惟不及四川。湖南之佳。
常山。產四川。湖南。湖北。江西各
省。廣東產自清遠。

常山。產四川。湖南。湖北。江西各
省。廣東產自清遠。

常山。產四川。湖南。湖北。江西各
省。廣東產自清遠。

常山。產四川。湖南。湖北。江西各
省。廣東產自清遠。



(一) 山 常

形似。常山為落葉小灌木。莖高五六尺。長者可丈許。葉為廣橢圓或倒卵圓形。有短柄。面有光澤。彼此互生。葉面且有透明之小點。臭氣甚烈。四五月間。開淡黃色四瓣小花。雌雄異株而生。雌花有短梗。撥葉腋而生。雄花有長梗。排列為穗狀。果實為蒴果。熟則縱裂。種子飛散遠處。根細長。屈曲。色黃。內部充實。有苦味。最細者稱雞骨常山。本草以常山入毒草類。農家以之煎汁。為牛馬之殺虱藥。又有海州常山。為屬於馬鞭草科臭桐之根。藥舖往往以之染黃。偽充常山。土常山為屬於虎耳草科之甘茶。亦落葉灌木。四月八日佛會用之。



(二) 山 常

採取 五月採葉。(即採蜀漆) 八月採根。(即採常山) 製法 雷斅曰。凡使常山。採時連根苗收。如用莖葉。臨時去根。以

甘草細剉。同水拌溼蒸之。臨時去甘草。取蜀漆細剉。又拌甘草水。勻再蒸。日乾。用其常山。凡用以酒浸一宿。漉出。日乾。蒸搗。用。李時珍曰。近時有酒洗蒸熟。或瓦炒熟者。亦不甚吐人。又有醋制者。吐人。性質 苦寒。有毒。

成分 常山之成分。亦為礆魯培林。與黃連同。

效能 行水。吐痰。除寒熱。用為截瘧之要藥。

作用 在胃中後。有激胃神經。使胃黏膜之分泌增加。至腸中。略能激腸之蠕動。使積滯緩緩排出。入血中。即刺激中樞神經。使體溫下降。又能減少血管之排洩。以阻止體溫之升高。且可使固有溫度次第消失之。

主治 傷寒寒熱。發溫瘧鬼毒。胸中痰結。吐逆。(本經)瘰癧。鬼蠱。往來水脹。酒酒惡寒。鼠疫。(別錄)

歷代配伍攷證 【唐】甄權藥性本草論常山曰。治諸瘧。吐痰涎。治項下瘰癧。【明】釋希雅本草經疏論常山曰。常山味苦寒。別錄桐君益之以辛。宜其有毒也。苦泄辛

散。故善透飲。陰寒祛熱。故善破瘵。瘵入口即吐。其性暴悍。又可知已。木經主傷寒寒熱。宜作主山嵐瘴氣寒熱。發為溫瘧鬼毒。胸中痰結。古方治瘧多用。蓋以嶺南西粵。鬼方。咸多山嵐瘴癘之氣。所感邪氣。充於榮衛皮膚之間。欲去皮膚毛孔中瘴氣。根本非常山不可。以其性能祛逐老痰積飲。善散山嵐瘴癘之邪故也。【明】李士材本草圖解論常山曰。常山苦寒。有小毒。瘵至捷。截瘧如神。常山劫痰瘵瘵。無他藥可比。須在發散表邪之後。用之得宜。立建神功。世俗聞雷斅有老人久病之戒。遂視常山為峻劑。殊不知常山發吐。惟生用與多用為然。與甘草同行。則亦必吐。若酒浸炒透。但用錢許。余每用必見奇功。未有見其或吐者也。不一表

明將使良藥見疑。沉疴難起。抑何其愚耶。酒浸一宿。切薄片。慢火久炒。形如雞骨者。性猛烈。施之瘵食者多效。若肉食之人。稍稍揆虛。不可輕入。【清】黃宮繡本草求真論常山曰。常山辛苦而寒。有毒。功專引吐行水。為除瘵老痰積飲

要藥。蓋瘵無不挾痰挾熱而成。然亦有風痰寒熱食氣之分。治須分其陰陽虛實表裏以定。如瘵果因傷寒寒熱。及時氣溫疫。而致黃涎聚於胸中心下。牢固不解。則常用此引吐。然亦須在發散表邪。及提出陽分之後而用之。其用又當審其所見部位。又藥佐使以治。如常山得甘草則吐。水在上者宜之。得烏梅山甲則入肝。水在腸下者宜之。得大黃則利水。邪熱交結而成內實者宜之。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草果板椒則入脾。然此陰毒之草。其性悍暴。雖有破瘵逐飲之能。而亦終損真氣。所以仲景治瘵方中。從無及此。而夏傷於暑。秋必瘵瘵。及瘵在三陰。元氣寒入則常山等藥皆為戈戟。或問吐藥甚多。何以瘵疾必用常山蜀漆。蓋以常山性兼逐疫。瘵本於濕疫。故於常山蜀漆則宜。猶之瓜蒂烏附尖。萊菔子。藜蘆。皆為吐劑。而瓜蒂則止宜於熱瘵。烏附尖則止宜於溼瘵。萊菔子則止宜於氣瘵。藜蘆則止宜於風瘵也。酒浸炒用。

根即對漆。功用略同。但苗性輕揚。其於上焦邪結。治之更宜。

國外學說 日本學說謂常山者。用於間歇熱(即瘧病)其成分如黃連。內有「ベルベリン」。古方藥品考曰。蜀漆(即若葉常山苗)木高五六尺。葉似茗葉。而闊大光滑。觸之。臭氣染手。春發細黃花。根屈曲。色淡黃(即常山)。

辨偽 鄭育巖曰。常山假者色極淡。真者色帶黃。按常山又名恒山。產益州及漢中。今汴西淮浙湖南諸州郡皆有。生山谷間。常山者根之名也。狀似荊根。細實而黃者。謂之雞骨常山。用之最勝。今市肆所賣假常山。不知何物。偽充。良可慨已。曹炳章曰。按常山十月出新。湖南常陽山出者。色黃無蘆。形如雞骨者良。俗稱雞骨常山為最佳。如外黃內白粗大者皆偽。是別種樹根。偽充。不可不辨也。小士曰。常山之治瘧發明。可謂甚古。本經別錄甄權不云乎。考之歷代之治瘧藥物。非參用本品。不為功。此則一勘古書之治案。即可得也。蓋以瘧有日日瘧。間日瘧。三日

十一 瘧 常

瘧之分。其病原係由瘧拉利亞原蟲侵入人體血液中之赤血球。其傳染之媒介為蚊。蚊名曰安俄斐雷斯(Anopheles)。此瘧拉利亞原蟲之侵入赤血球後也。乃在此赤血球內。營其增殖繁殖之作用。及至成為多數之幼蟲。赤血球即為其所破壞。當此之時。此種瘧拉利亞原蟲。乃遊走血液中。而產生一種毒素。人體因其毒素之刺激。遂發寒熱。故名為瘧。脾為無管腺之一。其實蓋一較大之淋巴腺耳。有製造白血球及淋巴球之功能。據一般醫學家之研究。凡人體感傳染病時。而脾臟常腫大。所以然者。因脾細胞有吞噬細菌之作用。淋巴腺則在人體中有吸收水分及雜質之特能。其次。凡有害於身體之細菌。亦多為淋巴球所困。使不致有蔓延作祟之虞。綜上所述之生理病理。及證之余個人臨牀之經驗。確知常山之有治瘧效能者。第一。即能中和瘧拉利亞原蟲在血液中所分泌之毒素。并有撲殺瘧原蟲之可能性。第二。當有刺激淋巴腺。致吸收毒素及排除毒素

等抗毒作用。故凡患者。服用常山後。血液中之瘧拉利亞毒素。被其中和。精神不受刺激。其寒熱當不發。故瘧愈。瘧愈則淋巴已無毒素之遺留。故脾腫亦消。其有患久瘧之緩性脾腫者。則常山服之無效。因此時脾臟內之血管。以發生栓塞。故必須用去瘀藥。攻之。常山無蕩滌瘀血之功能。故服之不效也。晚近治瘧之藥物。莫不知有規寧(金雞納霜)其藥者。然瘧症服規寧後。往往有復發之記錄。服本品則否。故余謂本品有撲殺瘧原蟲者。蓋亦絕對可信者也。據植物辭典。謂本品之汁液。外用可殺牛馬之蟲。可知內服當亦有殺病原蟲之作用。以此而證明本品治瘧之特效。愈覺先民之發明藥理。真確可靠。予我人研究之興趣。此其功德。至可欽佩者也。雖然。本品不僅治瘧而已。別錄之治鼠瘻。甄權之治項下瘰癧。鼠瘻瘰癧之病狀。部位。非項下之淋巴腺腫脹乎。所以然之謂。因淋巴有吸收毒素之抗毒作用。今淋巴因吸收某種毒素太多。腺之間隙。被其梗阻。以致淋

巴液不能流通。故其處腫大或發炎也。故我為常山有刺激淋巴。吸收瘧毒及排除瘧毒等抗毒作用者。若用以治此淋巴腺之腫脹。而促進其循環。其奏效亦何疑焉。至謂其治胸中痰涎。及方書之所謂無痰不成瘧者。我人若深明淋巴之生理。及此所謂無痰不成瘧之語意。則此所謂無痰不成瘧之痰字。乃為瘧時之一種輕胃間之滲出物之證狀。所以然者。因淋巴原為吸收人體中之水分及雜質之機能。今因本身吸收毒素太多之故。而瘧原蟲之分泌毒素。復源源而來。如是因循。則其原有之抗毒作用。以感不平衡。遂致肺胃間之雜質水分。難以盡量吸收。故滯留而為痰。為涎矣。故瘧愈。則淋巴之機能以恢復原狀。而營其原有之生理工作。於是之所謂痰涎之來源。遂可不治而愈。俗醫不知此理。因治瘧時。見其多痰多涎。即疑瘧為痰涎所作。彼又安知此所謂痰涎云者。蓋即淋巴失其功用乎。

配合應用 截瘧諸湯。川常山三兩。漿水三升。沒一宿。煎取一

升。欲發前服取吐。(外臺祕要方)用常山一兩。棗米一百粒。水六升。煮三升。分三服。先夜未發時發時服。發時(肘後方)予用此四十年。奇效。不能盡述。切勿加減。萬一無吐者。當山酒麥曬乾。知母貝母。草果各一錢。半水一鐘。半煎。半熟。五更熱服。渣以酒浸。發前服。(養生主論王隱者羅漢湯方)

升。截瘧諸酒用常山一兩。酒一升。漬二三日。分作三服。平旦一服。少頃再服。臨發又服。或加甘草黃服之。(肘後方)醉醱湯。治間日瘧。支大醫云。乃桂州方也。甚驗。恒山一錢二分。大黃二錢。炙甘草一錢二分。水一盞。煎減半。發日五更溫服。再以水一盞。煎減半。日。未發時溫服。(宋依經心錄方)治久瘧不止。常山一錢。半。核膠一錢。丁香五分。烏梅一個。酒一盞。浸一宿。五更飲之一服。便止。永不再發。如神。(虞搏醫正傳方)

每服二十九。竹葉湯下。五更一服。天明一服。發前一服。或吐或否。即止。(千金方)恒山搗末。三兩。真丹一兩。研白蜜和。杵百下。丸。梧子大。先發時三丸。少頃再服三丸。臨時服三丸。酒下。無不顯者。(肘後方)炒丸方。黃丹丸。治大小久瘧。恒山二兩。黃丹半兩。烏梅連核。瓦焙一兩。為末。糯米粉糊丸。梧子大。每服三五丸。涼酒下。隔一夜一服。平旦一服。午後方食。(活幼心書方)用恒山三兩。知母一兩。甘草半兩。搗末。蜜丸。梧子大。先發時服十九丸。次服七丸。後服五六丸。以瘧為度。葛洪(肘後方)噉仰丸。治一切瘧。常山四兩。炒存性。草果二兩。炒存性。為末。薄糊丸。梧子大。每臥時。冷酒服五十九丸。五更再服。忌鷄羊熱物。(和劑局方)又勝金丹。治一切瘧。胸膈停痰。發不愈者。常山八兩。酒浸。蒸焙。檳榔二兩。生研末。糊丸。梧子大。如上法服。(和劑局方)二聖丸。治諸瘧不拘遠近。大小。用雞骨恒山雞心。檳榔各一兩。生研。鯉甲煨焦。一兩。半。為末。糯米粉糊丸。葉豆大。黃丹為衣。每服三

五十丸。如上法服。(集簡方) ②治厥陰肝瘧。寒多熱少。喘息如死狀。或小腹痛。小便如膿。不同久近。不吐不泄。如神。恒山一兩。醋浸一夜。瓦器煮乾。每用二錢。水一盞。煎半盞。五更冷服之。(趙真人濟急方) ③治太陰肺瘧。痰聚胸中。病至令人心寒。寒甚乃熱。熱間善驚。如有所見。恒山三錢。甘草半錢。糯米三十五粒。水二鐘。煎一鐘。發日早分三次服。(千金方) ④治少陰腎瘧。溼漉然。寒手足寒。腰脊痛。大便難。目眴。陶然。恒山二錢。半。豉半兩。烏梅一錢。竹葉一錢。半。葱白三根。水一升。半。煎一升。發前分三服。(千金方) ⑤治牡蠣獨熱不冷者。蜀漆一錢。半。甘草一錢。麻黃二錢。牡蠣粉二錢。水二鐘。先煎麻黃。蜀漆去沫。入藥再煎。至一鐘。未發前溫服。得吐則止。(外臺祕要方) ⑥治溫瘧熱多。恒山一錢。小麥三錢。淡竹葉二錢。水煎五更服。甚良。(藥性論方) ⑦治三十年老瘧。及積年久瘧。

常山。黃連各一兩。漬三升。漬一宿。以瓦釜煮取一升。半。發日早服五合。隨時再服。熱當吐。冷當利。無不瘳者。(肘後方)用恒山一兩。半。龍骨五錢。附子炮二錢。半。大黃一兩。為末。雞子黃和丸。梧子大。未發時五丸。將發時五丸。白湯下。支大醫云。此方神驗。無不顯者。(張文仲備急方) ⑧治瘧瘧寒熱。常山一寸。草果一枚。熱酒一碗。浸一夜。五更望東服之。蓋臥。酒醒即愈。(劉長春經驗方)用常山。檳榔。甘草各二錢。黑豆一百粒。水煎服之。乃彭司寇所傳。(談藝錄試驗方)用常山。黃連。香豉各一兩。附子炮七錢。搗末。蜜丸。梧子大。空腹飲服。四九欲發時三丸。至午後乃食。(葛稚川肘後方) ⑨治妊娠瘧疾。酒蒸常山。石膏煨各一錢。烏梅炒五分。甘草四分。水一盞。酒一盞。浸一夜。平旦溫服。(姚和衆經驗方) ⑩治小兒驚悸。暴驚卒死中惡。用蜀漆炒二錢。左顧牡蠣一錢。二分。漿水煎服。當吐痰而愈。名千金

良。治三十年老瘧。及積年久瘧。

湯(阮氏方)

①治胸中痰飲。恒山、甘草各一兩。水五升。煮取一升。去滓。入蜜二合。溫服七合。取吐。不吐更服。(千金方)

用蠶 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。長玉札。忌葱菜及菘菜。伏磁石。得甘草吐痰痰。

著名方劑

①常山飲。治痰癰。

(局方)常山(火酒炒)知母貝母

草果檳榔各一錢。烏梅三枚。加姜

煎。未發時。面東溫服。②蜀漆

散。瘧多寒者。名曰牝瘧。此湯主之。

(金匱方)蜀漆(洗去腥)雲母

(燒二日夜)龍骨各等分。杵為散。

未發時。以漿水服半錢匕。溫瘧加

蜀漆半分。臨發時服一錢匕。

參攷資料

①蜀漆春夏用莖

葉。秋冬用根。老人久病。切忌服之。

(雷斅)②常山蜀漆。有卻痰截癩

之功。須在發散去邪。及提出陽分

之後。用之得宜。神效立見。用失其

法。真氣必傷。夫瘧有六經五臟。癰

瘰。溼食積。瘴疫。鬼邪。諸瘧。須分陰

陽虛實。不可一概論也。常山蜀漆

十一畫 常

生用則上行必吐。酒蒸炒熟用則

氣稍緩。少用亦不致吐也。得甘草

則吐。得大黃則利。得烏梅鯁鯉甲

則入肝。得小麥竹葉則入心。得秫

米麻黃則入肺。得龍骨附子則入

腎。得草果檳榔則入脾。蓋無痰不

作瘧。二物之功。亦在驅逐痰水而

已。楊士瀛直指方云。常山治瘧。人

皆薄之。瘧家多蓄痰涎。黃水。或停

滯心下。或結滯腸間。乃生寒熱。法

當吐痰逐水。常山豈容不用。水在

上焦則常山能吐之。水在膈下則

常山能破其癖。而下其水。須行血

藥品佐助之。必收十全之功。其有

純陽發瘧。或蘊熱內實之證。授以

常山。大便點滴而下。似泄不泄者。

復用北大黃為佐。泄利數行。然後

獲愈也。又待制李煎云。嶺南瘴氣

寒熱所感。邪氣多在營衛肉皮之

間。欲去皮膚毛孔中瘴。根本非常

山不可。但性吐人。惟以七寶散冷

服之。即不吐。且驗也。(李時珍)③

恒亦常也。恒山乃北岳名。在今定

州。常山乃郡名。亦今真定。豈此藥

始產於此得名歟。蜀漆乃常山苗

功用相同。今併為一。(李時珍)④

常山生山谷間。莖圓有節。高者不

過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相

當。二月生白花。青萼。五月結實。青

圓。三子為房。其葉暴燥。色青白。堪

用。若陰乾。便黑爛。變壞矣。(蘇恭)

⑤今汴西淮浙湖南州郡亦有之。

海州出者。葉似椒葉。八月中有花。

紅白色。子碧色。似山棟子而小。今

天台山出一種草。名土常山。苗葉

極甘。人用為飲。甘味如蜜。又名蜜

香草。性涼益人。非此常山。(蘇頌)

⑥瘧疾必有黃涎聚于胸中。故曰

無痰不成瘧。弦脈主痰飲。故曰瘧

脈自弦。常山去老痰積食。故為諸

瘧要藥。又曰。常山吐瘧痰。瓜蒂吐

熱痰。烏附尖吐溼痰。萊菔子吐氣

痰。藜蘆吐風痰。(吳遵程)

【常山苗】即蜀漆之別名。典見綱

目。詳「常山」條。

【常吏之生】

古籍別名 常吏之生。(蜀本草)

形態 常吏之生為雜草類之

一種。結實有刺。大如稻梁。可供藥

用。

性質 苦。平。無毒。

主治 明目。

【常吏之生】即常吏之生之譌寫

者。典見蜀本草。詳「常吏之生」條。

【常思子】即蒼耳子之古籍別名。

典見本草集註。詳「蒼耳子」條。

【常春藤】 命名 本品小兒取

有土鼓之名。後改為常春藤。

古籍別名 土鼓藤(拾遺)龍

麟薔荔(日華)木為(日本)

外國名詞 Hedera Helix

L. var. colchica, C. Koch (拉

丁) キツタフユツタ(日本)

基本 係五加科常春藤屬。為

常春藤之莖葉。其子實詳見該條。

產地 生山野間。



常春藤

形態 常春藤為蔓草類藤屬

之常綠灌木。莖蔓生。常以氣根

攀緣於他木。其大者幹徑約二三

寸。葉卵形。全邊或狀狀分裂。冬開

小花。黃綠色。花瓣五。為繖形花序。

結實形圓色黑。莖與葉俱供藥用。

性質 苦無毒。

主治 凡一切癩疽腫毒初起。

取莖葉一握。研汁和酒溫服。利下惡物。去其根本。

【常春藤實】

性質 甘溫無毒。

主治 風血。羸老。腹內諸冷。血閉。強腰脚。變白。煮服。浸酒皆宜。

【常葉子】即蒼耳子之古籍別名。典見廣雅。詳「蒼耳子」條。

【康于石】即松化石產於康于河者之別名。典見唐書。詳「松化石」條。

【康伯鼓】即蒲州鼓之別名。性質功能詳「豆鼓」條。

【張天剛】

產地 生南安。形態 叢生。硬莖有節。紅黃色。葉似水蘓葉。實如小嬰。楊色。莖葉實俱有小刺如毛。根淡紅色。有鬚。可供藥用。



張天剛

性質 甘溫。效能 補陰分不足。

主治 下部虛軟。

【強仇】即百合之古籍別名。典見本草圖註。詳「百合」條。

【強狸】即百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【強骨】即狗脊之古籍別名。典見別錄。詳「狗脊」條。

【彫胡米】即菘米之古籍別名。典見綱目。詳「菘米」條。

【彫莖】即菘米之古籍別名。典見綱目。詳「菘米」條。

【彫莖】即菘米之古籍別名。典見別雅。詳「菘米」條。

【彫瓊】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【御戈】即鬼桃之古籍別名。典見綱目。詳「羊桃」條。

【御米】即粟粟子之處方用名。詳「粟粟子」條。

【御米粥】基本 本品即以御米煮成之粥。

主治 反胃。利大腸。

【御米殼】即粟粟殼之處方用名。詳「粟粟殼」條。

【御李子】即李子之古籍別名。典見綱目。詳「李子」條。

【御風草】即天麻之古籍別名。典見藥性。詳「天麻」條。

【御柳】即檉柳之日本名。詳「檉柳」條。

【御麥】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。

【御菜】即落葵之古籍別名。典見綱目。詳「落葵」條。

【御黃李子】即李子之北方產者。典見綱目。詳「李子」條。

【御溝金水】

性質 性平。味微鹹。帶甘。

主治 男婦骨蒸。乾血勞。童子勞。晝夜發熱。至緊不肯服藥。此水不比尋常。大有功效。

參攷資料 製御溝金水法。用

瘦雞八隻。高二尺。取山上淨土。裝

入籠內。用磁鉢八個。盛之。取童便

八桶。傾入七羅土內。淋下。上以井

花水推之。共傾入一羅土內。如淋

少。再用清水推前七羅土。又加

上一羅土。待他一夜淨。淋下水三

五碗。以磁罐收貯。外用井水養之。但遇此症。待口中要茶吃。將此水

半杯。溫服。即安。至重不過三七次。立愈。(集驗方)

【御藥園木香】即土木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土木香」條。

【惟那木】即南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【威施】即蟾蜍之古籍別名。典見韓詩註。詳「蟾蜍」條。

【悉蘭脂】即錫怪脂之古籍別名。典見綱目。詳「錫怪脂」條。

【慎華】

基本 慎華為樞草類之一種。可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 上氣解煩。堅筋骨。

【扈子】即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。

【捨子花】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【捨頭】即寒具之古籍別名。典見錢乙。詳「寒具」條。

【掃帚菜】即地膚子之古籍別名。典見本草集註。詳「地膚子」條。

【掃帚菜】即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【排風】即白英之古籍別名。典見

本草拾遺。詳「白英」條。

【排風藤】即「葳蕤」之古籍別名。與見植物學大辭典。詳「葳蕤」條。

【排草香】命名。本品根莖芬芳。亦可供合諸香。故名。

處方用名 排草根。排草香根。外國名詞 *Lysimachia silystris*。

oliana, Miq. (拉丁) モロニン サウ(日本)。

基本 係樞草科珍珠菜屬。為排草之香根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。排草產廣東番禺石排。

形態 排草為芳草類之多年生草本。獨莖。長葉長根。其葉參差而生。色淡綠。與莖同。偏反下垂。微似鳳仙花葉。而光澤無鋸齒。夏間開細柄黃花。五瓣尖長。有淡黃蕊。一簇花羅結細角長二寸許。枯時可以浸油刷髮。其根狀如白茅。亦如細柳根。色白而氣甚香。如麝香。為熱帶諸香所不及。

採取 秋間採之。
製法 採得根。陰乾用。
用法 恒以水煎洗。或

燒煙薰之。

效能 辟穢濁。驅時氣。用作祛惡辟臭藥。

主治 辟臭。去邪惡氣。歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論排草香曰。排草氣味芳香。據書載能祛惡辟臭除魅。與天時行。並宜燒之。水腫浮氣風癩。可用生薑芥子煎湯浴洗。玩此氣味芳香。僅可以辟邪魅。惡使之氣不克勝。至於水腫浮氣。亦須香以通達。使之氣伸浮散。故止可入外用。若使作湯以服。則經絡遍布。雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又因香而斂敗矣。故古人制方。有宜於外者。則即以外為主。而內不投。有宜於內者。則即以為內為要。而外不行。即云諸香有類於斯。內亦見用。然此補少。澁多。古人獨於此味。別為外治。而不內入。未必不有意義於其中也。

參攷資料 ●排草香出交趾。今嶺南亦或蒔之。草根也。白色。狀如細柳根。人多僞雜之。案范成大桂海志云。排草香狀如白茅香。芬烈如麝香。人亦用以合香。諸香無

及之者。又有麝香木。出占城。乃老朽樹心節。氣頗類麝。李時珍。

排草根芳香之氣。皆可辟臭。去邪惡氣。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水腫浮氣。與生薑芥子煎湯浴風癩效。張石頑。此味亦止可入外用。若使作湯以服。則經絡遍布。雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又因香而斂敗矣。(盧飛鵬)

【排草香根】即排草香之處方用名。詳「排草香」條。

【排草根】即排草香之處方用名。詳「排草香」條。

【搗搗】即搗搗之古籍別名。與見綱目。詳「搗搗」條。

【掛金燈】即桂花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「旋花」條。

【掛金藤】即金錢鈞蝦蟆之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「金錢鈞蝦蟆」條。

【掛綠】即荔枝實之最佳者。產廣東增城縣。性質功能。參詳「荔枝」條。

【採芸神精】即神麩之處方用名。詳「神麩」條。

【接余】即香柔之古籍別名。與見

爾雅。詳「香柔」條。

【接骨】即續斷之古籍別名。與見別錄。詳「續斷」條。即攀倒甌之古籍別名。與見綱目。詳「攀倒甌」條。

【接骨木】命名。本品功能接骨故名。古籍別名 續骨木。木煎鹽。(綱目) 木英。并打活。野黃楊。京漆木。(和漢藥考)

外國名詞 *Caesalpinia leco-*

Boar. H. (拉丁)

基本 屬忍冬科。為接骨木之

枝葉。形態 接骨木為落葉灌木。或自生山野。或種於人家之牆角。樹幹拗掇。然枝條繁茂。高可丈餘。早春即發芽。葉為奇數羽狀複葉。皆對生。小葉為長卵圓形。邊緣有鋸齒。葉面平滑。夏日。梢頭開五瓣之花。色白而帶綠黃。相綴而為圓錐形花序。果實為小核果。至秋成熟。現紫黑色。

性質 甘。苦。平。無毒。

效能 除用為發汗藥外。打傷。挫傷等。並可服用。又用為患部之

十一畫 排

掘掛採接

番法料。主治 折傷。續筋骨。除風痺。齒。齒可作浴湯。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論接骨木曰。根皮主痰飲。下水腫。及痰癆。黃汁服之。當刺下及吐出。不可多服。葉主痰癆。大人七葉。小兒三葉。生搗汁服。取吐。【明】李時珍本草綱目論接骨木曰。千金方。打傷瘀血。及產婦惡血。一切血不行。或不止。並黃汁服。

國外學說 日本和漢藥考曰。

西洋產接骨木。其花可作緩劑之與。發汗劑及發汗藥。又為蒸湯劑及敷藥。用於風濕痛及潰瘍疼痛等症。花辦乾則變黃。日本產之花。乾則作黃褐色。且香氣不佳。故不入藥用。又西洋產者。不惟花可入藥用。即其果實。葉。嫩芽。皮等。均可作藥用。並利尿藥也。

配合應用 ●治折傷筋骨。接

骨木半兩。乳香半錢。芍藥當歸。芎藭。自然銅各一兩。為末。化黃蠟四兩。投藥攪勻。漿手丸如芥子大。若止傷損。酒化一丸。若碎折筋骨。先用此敷貼。乃服。(衛生易簡方)

●治產後血暈。五心煩熱。氣力欲絕。及寒熱不禁。以接骨木破如算子一握。用水一升。煎取半升。分服。或小便頻數。惡血不止。服之即瘥。此木煮之三次。其力一般。乃起死妙方。(產書方)

用靈 錢半至三錢。

參攷資料 ●接骨以功而名。花葉都類薔薇。陸英。水芹。故一名木薔薇。(蘇頌) ●所在皆有之。葉如陸英。花亦相似。但作樹。高一二丈許。木體輕虛無心。(蘇恭)

【接骨仙桃】

古籍別名 八卦仙桃(集驗)

奪命丹。活血丹。(本草拾遺) 蟠桃草(綱目拾遺) 產地 田野近水處之田墾。多有產生。

形態 接骨仙桃。係桃類之一種。形似蟠桃。穀雨後生苗。葉光如石榴葉。形長類早蓮。高可尺許。莖空。搗斷不暈。亦不香。立夏後開細白花。而成穗。結實如豆。形似桃子。細小。中空。內有小蟲者。真入藥實。速蟲用。採取 芒種前後。須俟實紅而

採。以空內小蟲。未生翅翼。不能穿穴。而出時。收用。則藥力方全。蓋此藥之用。全在乎蟲。若過夏至去採。則蟲穴孔而出。化為小蚊。苞空無用矣。

製法 採後即須曬焙。令內蟲死。若懸挂風乾。恐內蟲生翅。越出。則藥亦無用矣。

性質 甘淡。溫。無毒。

主治 消癰腫。

配合應用 ●專治肝氣。胃氣。小腸疝症。用仙桃草有蟲者。金橘核。福橘核。菓澄茄各等分。為末。砂糖調丸。菘豆大。每晚服一錢許。至重者。二服斷根。(和肝胃氣方)

●百草鏡云。取有蟲仙桃草用童便製透。入補藥用。(勞損虛怯方)

●百草鏡云。用新鮮接骨仙桃草。搗汁。加入乳和服。按吐血諸方。皆用涼血之劑。惟此藥性熱。加入乳能引血歸經。故妙。(治吐血方)

●專治跌撲損傷。用蘇木五錢。八角金盤根一錢。接骨仙桃草五錢。臭梧桐花三錢。煎酒服。(救生苦海方)

【接骨草】 古籍別名 四季花。(華芳譜)

外國名詞 Diolipera japonica, Makino. (拉卜)

產地 出廣西園林中多有之。形態 接骨草為蕁草類之一種。高二三尺而叢生。葉大如柳而厚。莖有節。綠色而圓。三月開花。白色。至九月不絕。其枝葉可供藥用。




接骨草

性質 平。

主治 跌折傷。續斷骨。搗爛之。

【接骨草】即蕁草之古籍別名。典見綱目。詳「蕁草」條。

【接續草】 形態 接續草為蕁草類之一種。莖如木



接續草

賦。每寸許結節。節節相接。採之可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 治上氣。氣急。結氣。癆瘵。瘡痛。

【推丸】即錢銀之古籍別名。典見本草集註。詳『錢銀』條。

【推石】即綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳『綠膚青』條。

【推車客】即錢銀之古籍別名。典見綱目。詳『錢銀』條。

【推車蟲】即推車客之古籍別名。典見綱目。詳『錢銀』條。

【推青】即綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳『綠膚青』條。

【推屎蟲】即錢銀之古籍別名。典見孫氏集效方。詳『錢銀』條。

【推蕪】即干蕪之古籍別名。典見陸機草木疏。詳『干蕪』條。

【搗天皮】即地衣草之古籍別名。典見綱目。詳『地衣草』條。

【救火】即景天之古籍別名。典見別錄。詳『景天』條。○即登火之古籍別名。典見吳普本草。詳『登火』條。

【救命王】古籍別名。死裏逃生。綱目拾遺。

基本 救命王為雜草類之一種。可供藥用。

主治 小兒感冒。風寒咳嗽。大人傷力。損傷吐血。及諸風疼痛。無名腫毒。

【救命王】即金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【救救人者】基本 救救人者為雜草類之一種。可供藥用。

產地 生庭院中。

採取 五月十月採。曝乾用。

性質 甘有毒。

主治 通氣痛痺。諸不足。

【救荒草】即黃精之古籍別名。典見本草拾遺。詳『黃精』條。

【救窮草】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【敗石】基本 敗石為雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦無毒。

主治 瘰癧瘰。壞者故名。

十一畫 推搗救敗

醫不盡。月閉止。好血。下惡血。去鬼氣。疰疔。癥結。酒煮服之。亦燒末酒下。爾久着煙者佳。

基本 本品乃石龍芎之莖所織成。入藥須用其破舊者。

【敗席草】基本 本品乃石龍芎之莖所織成。入藥須用其破舊者。

主治 淋病。及小便不通。煮汁服。

【敗席草】即石龍芎之處方用名。詳『石龍芎』條。

【敗澤菜】即羊蹄之古籍別名。典見綱目。詳『羊蹄』條。

【敗荷葉】即荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【敗將】即龜版之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『龜版』條。

【敗船茹】命名 本品即大獨。檢竹茹以補漏者故名。

主治 平療婦人崩中。吐血。痢血不止。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌圖經本草論敗船茹曰。治金瘡。刮敗船茹灰傳之功。同牛膽石灰。

參攷資料 敗船茹。古人以於茹。今人只以麻筋和油石灰為之。

【敗筆頭灰】基本 本品係破舊之筆毛。燒灰以供藥用。

採取 莖者為最佳。

性質 微寒。無毒。

主治 水腫。治小便不通。小便數難。淋瀝。陰腫。脫肛。中惡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治男子交婚之夕。莖萎。【明】李時珍本草綱目論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治難產。漿飲服二錢。治咽喉痛。不下飲食。

【敗鼓皮】命名 本品係舊鼓。上兩面之破皮。故名。

採取 以黃牛皮者良。

性質 平無毒。

主治 中蠱毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論敗鼓皮曰。治小便淋瀝。塗月蝕耳瘡。並燒灰用。

【敗龜版】即龜版之處方用名。詳『龜版』條。

一一五一

十一畫 敗

【敗瓢】

命名 本品乃匏瓠破開爲之者故名。

採取 以苦匏者佳。年久者尤良。

性質 苦。平。無毒。

主治 消脹。殺蟲。治痔漏下血。崩中。帶下。赤白。

【敗醬】

命名 本品根作陳敗。豆醬氣味。故名。

古鑿別名 鹿腸。(本經)澤敗。鹿首馬草。(別錄)苦菜。苦蕒。(綱目)

外國名詞 Patrinia scabio-

safolia, Link. (拉丁)

基本 屬敗醬科。爲 Patrinia Scabiosafolia, Link. 之根。



(一) 醬敗

形態 敗醬爲多年自生之宿根草。本莖高三四尺。葉對生。下部者爲類菊葉之羽狀複葉。或羽狀裂葉。上部者爲細長單葉。或三裂

秋季於梢上簇生黃色小花。狀如蕪粟。根作紫白色。狀類柴胡。



(二) 醬敗

採取 八月採根曬乾。

製法 雷斅曰。凡收得便粗杵入甘草葉相拌。對蒸。從巳至未。去甘草葉。焙乾用。

性質 苦。平。無毒。

效能 破瘀滯。活血。消腫。腫排膿。磨障膜。消弩肉。用作疔瘍藥。又爲目疾藥。

主治 暴熱。火瘡。赤氣。疥癩。疽痔。馬鞍熱氣。(本經)除癰腫浮腫。結熱。風痺不足。產後痛。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論敗醬曰。治毒風癰瘡。破多年凝血。能化膿爲水。產後諸病。止腹痛。餘疹。煩渴。【宋】大明諸家本草論敗醬曰。治血氣。心腹痛。破癥結。催生落胞。血運鼻衄。吐血。赤白帶下。赤眼障膜。疔肉。疔耳。瘡癩。疥癬。丹毒。排膿補瘻。

近人學說 張山雷曰。敗醬有

敗醬氣。故以敗醬得名。能清熱。泄結。利水。消腫。破瘀排膿。惟宜於實熱之體。本經稱其味苦平。主暴熱。

火創。赤氣。疥癩。疔毒。馬鞍熱氣等。【創今作瘡。搔今作瘻。馬鞍熱氣四字。頗不經見。蓋陰勝間熱氣蒸騰。亦陰分之溼熱也。】別錄稱其味鹹微寒。除癰腫浮腫。結熱。風痺。

產後痛。甄權稱其辛苦微寒。治毒風。癰瘡。破凝血。能化膿爲水。止煩渴。療腹痛。產後諸病。日華治血氣。心腹痛。破癥結。催生落胞。定血運。吐血。衄血。赤白帶下。赤眼障膜。疔肉。疔耳。疔瘡。疥癬。丹毒。無一非實熱滯滯之症。惟產後諸痛。當以瘀露作痛者爲宜。而瀕湖所引別錄。竟作產後疾痛。大明本草又以產後諸病。渾言之。則流弊良多。不可不知所辨別者也。

配合應用 ①治腹癰有膿。惡莖仁附子敗醬湯。用惡莖仁十分。附子二分。敗醬五分。搗爲末。每以方寸匕。水二升。煎一升。頓服。小便當下即愈。(金匱方)

②治產後惡露。七八日不止。敗

一一五二

醬。當歸各六分。續斷。芍藥各八分。芍藥。竹茹各四分。生地黃炒十二分。水二升。煮取八合。空心服。(外臺祕要方)

③治產後腰痛。乃血氣流水。腰痛不可轉者。敗醬當歸各八分。芍藥。芍藥。桂心各六分。水二升。煮八合。分二服。惡露。(廣濟方)

④治產後腹痛如錐刺者。敗醬草五兩。水四升。煮二升。每服二合。日三服。良。(衛生易簡方)

⑤治蠅鼠屎遺膿者。敗醬煎汁塗之。良。(楊氏產乳方)

用畏 錢牛至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯實熱者禁用。

參攷資料 ①敗醬乃手足陽明厥陰藥也。善排膿破血。故仲景治癰。及古方婦人科皆用之。乃易得之物。而後人不知用。蓋未遇識者耳。(李時珍) ②南人採嫩者暴蒸作菜食。味微苦。而有陳醬氣。故又名苦菜。與苦蕒龍葵同名。亦名苦蕒。與酸醬同名。苗形則不同也。(李時珍) ③處處原野有之。俗名苦菜。野人食之。江東人每採收醬

壽。春初生苗。深冬始凋。初時葉布地生。似松葉而狹長。有鋸齒。綠色。而深背淺。夏秋莖高二三尺。而柔弱。數寸一節。節間生葉。四散如扇。頂開白花成簇。如芹花蛇狀。子花狀。結小實成簇。其根白紫。頗似柴胡。(李時珍)

【鼓肺候】即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。

【旋栗】即榛栗之別名。性質功能。參詳「榛栗」條。

【旋復花】即旋覆花之處方用名。詳「旋覆花」條。

【旋菑】即旋花之古籍別名。與見新修本草圖經。詳「旋花」條。

【旋花】古稱別名。筋根。(本經)美草。(別錄)旋菑。(蘇恭)續筋根。鼓子花。宛腸草。(圖經)天劍草。經枝牡丹。(綱目)打碗花。狗兒釋。地腸草。掛金燈。牽枝牡丹。(和漢藥考)

外國名詞 Calystogon sp. pinn. Fr. Br. var. japonica, (拉丁)

基本 屬旋花科。為旋花之莖葉花根。

十一 益 救 旋

陸地 凡川澤田野間恒多生焉。

形態 旋花為多年生蔓性草。本多自生於原野道旁。莖細長。左旋纏繞他物而成。葉為箭狀。又似較長二三寸。中片特長。末端稍凸而尖。其側片則極短。具長葉柄。皆互生。盛夏葉腋開合瓣花。色淡紅。狀似喇叭。類牽牛花而小。朝開暮謝。果實為扁平之蒴果。內分三室。室藏種子數粒。根色白。細如筋。雖寸寸切斷。仍能生長為一體。其繁殖力頗強也。



旋 花

採取 五月採花陰乾。二月八月採根日乾。

性質 花甘。根辛。溫。無毒。

效能 補陰。續筋。用為利尿藥。

主治 面黃。黑。色。媚。好。益。氣。根。主。腹。中。寒。熱。邪。氣。(本經)利。小。便。久。服。不。飢。輕。身。續。筋。骨。合。金。瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論旋花曰。搗汁服。主丹毒熱。【明】李時珍本草綱目論旋花曰。補勞損。益精氣。

配合應用 治破折斷筋。旋菑根搗汁。瀝渣中。仍以淨傅之日。三易。半月即斷筋。處便續。(外臺秘要方)

太乙金鎖丹。秘精益髓。用五色龍骨五兩。覆盆子五兩。蓮花蕊四兩。未開者。陰乾。鼓子花三兩。五月五日採之。雞頭子仁一百顆。並為末。以金櫻子二百枚。去毛。木白搗爛。水七升。煎濃汁一升。去渣。和藥杵二千下。丸梧子大。每空心溫鹽湯下三十九丸。服之至百日。永不止。如要瀉。以冷水調車前末半合服之。忌葵菜。(瑞竹堂方)

用益 錢半至三錢。

參攷資料 凡藤葛之屬。象人之筋。所以多治筋病。旋花根細如筋。可壞。故別錄言其久服不飢。時珍自京師還。見北上車夫每歲之云。暮歸煎湯飲。可補損傷。則益氣續筋之說。尤可徵矣。(李時珍)

旋花蔓生。今之河北京西關陝

田野中甚多。最難鑷拔。治之又生。世又謂之鼓子花。言其形肖也。四月五月開花。亦有多葉者。其根寸截。置之土下。頗滋潤。方涉旬。苗已生。(寇宗奭)

旋花即平澤旋菑也。其根似筋。故一名筋根。(蘇恭)

其花不作瓣狀。如軍中所吹鼓子。故有旋花鼓子之名。一種千葉者。色似粉紅牡丹。俗呼為輕枝牡丹。(李時珍)

旋花田野隨地皆生。逐節蔓延。葉如波菜葉而小。至秋開花。如白牽牛之花。粉紅色。亦有千葉者。其根白色。大如筋。不結子。(李時珍)

形態 旋菑為介類龜屬之一種。鳥首龜尾。聲如破木。可供藥用。

主治 耳聾佩之。

旋覆花 命名 本品花綠繁茂。因而覆下。故名。

四方用名 旋復花。金佛花。全福花。金佛草。全福梗。

古醫別名 金沸草。(本經)戴椹。(別錄)金錢花。滴滴金。夏菊。(綱目)盜庚。(爾雅)曼菊。滴滴盛。六月菊。野金錢。野油菊。(續攷

〔論〕飛天蕊。疊羅黃。〔和漢藥考〕吡尸沙。〔酉陽雜俎〕

基本 扇菊科。爲旋覆之花蕾。產地 凡川谷平澤間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。旋覆花產廣西賀縣鍾山。八步。廣東下四府惠州。陽江等處均有出。

形態 旋覆花爲多年生草本。多自生於原野之溼地。春日生苗。莖長一二尺多。一株一莖。有時出二莖。葉無柄。形若披針。邊緣有粗鋸齒。微有毛。皆互生。至夏。梢端開黃花。大如錢。其形若菊。排列爲頭狀花序。其周圍之花。爲舌狀花冠。中心之花。爲筒狀花冠。有單瓣。雙瓣二種。根作白色。鬚莖。殊茂盛。



旋覆花

採取 七八月間採花日乾。製法 雷斅曰。採得花。去莖。并殺皮及蒂子。蒸之。從巳至午。陰乾用。

用法 恒入煎劑。須用紗包。或

以絹袋盛。蓋有細毛。恐射入肺。令人咳逆。間有烙到爲末。和作丸散。

性質 鹹。溫。有小毒。效能 下氣。消痰。除噎。噎。軟堅。結。用作健胃祛痰藥。

主治 結氣。脇下滿。驚悸。除水。去五臟間寒熱。補中下氣。〔本經〕消胸上痰結。睡如膠漆。心膈痰水。膀胱留飲。風氣溼痺。皮間死肉。目中眇。利大腸。通血脈。及益色澤。〔別錄〕

歷代記述攷證

〔唐〕甄權藥性本草論旋覆花曰。主水腫。逐大腹。開胃。止嘔逆。不下食。〔宋〕寇宗奭本草衍義論旋覆花曰。行痰水。去頭目風。〔元〕王好古湯液本草論旋覆花曰。消堅軟痞。治噎氣。〔明〕繆希雍本草經疏論旋覆花曰。旋覆花別錄。甄權。日華子。寇宗奭。皆無毒。宗奭又加苦辛。而曰。冷利。其寒冬之氣而生者乎。故其味。首係之以鹹。潤下作鹹。鹹能軟堅。別錄加甘。甘能緩中。微溫。溫能道行。故主結氣。脇下滿。心膈伏飲。則病爲瘳。飲消則復常矣。除水去五

臟間寒熱。及消胸上痰結。睡如膠漆。心膈痰水。膀胱留飲。風氣溼痺。皮間死肉。目中眇。利大腸者。皆軟堅。冷利潤下。消痰飲。除水之功也。其曰補中下氣者。以甘能緩中。鹹能潤下故也。通血脈。益色澤者。蓋指飲消則脾健。健則能運行。脾裏血。又統血故也。〔造〕黃宮繡本

草求真論旋覆花曰。旋覆花即本經所名金沸草者是也。其性雖兼辛溫。凡陰虛勞嗽。風熱燥欬。不可誤用。用之其嗽必甚。究之味苦而鹹。性主下降。凡心脾伏飲。脇下脹滿。胸上痰結。睡如膠漆。風氣溼痺。皮間死肉。服之即能有效。更能續筋。數傷。是以仲景之治傷寒。汗下後。心下痞堅。噎氣不除。有旋覆代

緒石湯。並金匱半產漏下。有旋覆花湯。胡洽治痰飲在兩脇。脹滿。有旋覆花湯。皆取苦能下氣故耳。惟其性寒主下。故善治載病衰弱。大腸虛。寒暑切忌。以其不禁。再下故也。五月五日。採花曬乾。去皮。蒸蕊殺用。〔清〕葉天士本草經解論旋覆花曰。旋覆氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味鹹有小毒。得

地北方陰慘之水味。入足少陰腎經。氣味降多於升陰也。溫能散結。鹹能軟堅。故主結氣。脇下滿也。水氣乘心則驚悸。鹹溫下水。所以并主驚悸也。去五臟間寒熱者。五臟藏陰臟也。痰蓄五臟。則臟陰不藏。而寒熱矣。鹹溫可以祛痰。所以去寒熱也。補中者。中爲脾胃。水行痰消。則中宮脾胃受補也。下氣者。鹹性潤下也。因有小毒。所以服之必煩也。〔清〕陳修園本草經讀論旋覆花曰。旋覆花氣溫。稟風氣而主散。味鹹。得水味潤下而軟堅。味勝於氣。故以味爲主。唯其軟堅。故結氣。脇下滿等證。皆能已之。唯其潤下。故停水驚悸。及五臟鬱滯。而生寒熱等證。皆能已之。藉鹹降之力。上者下之。水氣行。痰氣消。而中氣自然受補矣。

近人學說

●張山雷曰。旋覆花體質甚輕。飛揚疏散。其主治。當以泄散風寒。疏通脈絡爲專。主別錄治風氣溼痺。皮間死肉。通血脈。宗奭去頭目風。皆其輕疏泄散之功也。以治風寒喘嗽。突飲漬肺。最是正法。或謂旋覆降氣。寒邪在肺

者。不宜早用。則止知疏泄之力。足以下降。而不知其飛揚之性。本能上升。且本經明謂其溫。寇宗奭又以爲辛。則疏散寒邪。正其專職。若其開結泄水。下氣降逆等治。則類皆沈重下達之義。頗嫌其與輕揚之本性。不甚符合。按本經。旋覆花一名金沸草。局方有金沸草散一方。疑古人本有用其莖葉。而未必皆用其花者。考草木花葉之功用。不同者甚多。或升或降。各有取義。亦其稟賦使然。不容混合。且莖則質重。花則質輕。亦物理自然之性。况旋覆花之尤爲輕而上揚者乎。乃今人恒用其花。而並不用莖葉。竟以重墜之功。資之輕揚之質。恐亦非古人辨別物性之真旨也。且其花專主溫散。疏泄之力亦猛。宜於寒飲。而不宜於熱痰。石頑已謂陰虛勞嗽。風熱燥欬。誤用之嗽必愈甚。是亦以其輕揚。升泄太過。正與降氣之理相反。惜其輕揚之性。流動不滯。自能流通氣化。而宣壅塞。固非專以升散見長。若但以逐水導滯爲治。似不如兼用其莖葉。較爲近理。別錄稱其根專主風溼。

十一 蠶 旋

斜

其意可曉然也。黎伯樞曰。今日之旋覆花。大概有二種。一稱廣旋覆。一稱漳旋覆。當爲廣漳二州所出。不然。不冠以廣漳二字。然二種性質不同。廣旋覆花堅小而色深黃。花瓣並不開展。所謂旋覆。實言其象。與本草綱目所云形似菊。又稱金錢花。狀況不殊。惟漳旋覆不然。花瓣輕飄。色白。與本草所說大相徑庭。此味木治胸結痰飲。降氣不行。本草稱其氣味鹹溫。張仲景旋覆代赭石湯。治水飲噎氣。轉嘔。實相吻合。此惟廣旋覆合用。若漳旋覆。氣味未必鹹溫。色白。質輕。性揚。與病理實不相投。此種花究竟不知何花。而亦被以旋覆之名。可謂名不副實。核其形態。絕不相類。處方者若準書旋覆花。則爲廣旋。任由藥店支配。而醫士未必盡知。是則此物亦須特別註明方可也。

配合應用 ●治中風壅滯。用旋覆花洗淨焙研。煉蜜丸。梧子大。夜臥以茶湯下五丸至七丸十九。 (經驗方)

●治半產漏下。虛寒相搏。其脈

弦。其旋覆花湯。用旋覆花三兩。葱十四莖。新絳少許。水三升。煮一升頓服。(金匱方)

●治月蝕耳瘡。旋覆花燒研。羊脂和塗之。(集簡方)

●治小兒眉癬。小兒眉毛眼眦。因癬退不生。用野油化。即旋覆花。赤箭。即天麻。苗。防風。等分爲末。洗淨。以油調塗之。(總微論方)

●胡洽治痰飲在兩脇。服瀉。有旋覆花丸。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡真元虛衰而無實邪者禁用。

著名方劑 七物旋覆代赭湯。治傷寒汗吐下後。心下痞硬。噎氣不除。此主之。(仲景方) 旋覆花三兩。人參二兩。生薑五兩。(切) 半夏半升。(洗) 赭石一兩。大棗十二枚。炙甘草三兩。上七味以水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

參攷資料 ●寇宗奭言其行痰水。去頭目風。亦走散之藥。病人滲虛者不宜多服。冷利大腸。宜戒也。(朱饒亨) ●諸名皆以花狀命。

也。爾雅云。流盜庚也。庚者金也。謂其夏開黃花。盜竊金氣也。西陽雜俎云。金錢花。一名毗尸沙。自梁武帝時。送入中國。(李時珍) ●今所在皆有。二月以後。生苗。多近水旁。大似紅藍。而無刺。長一二尺以來。葉似柳。莖細。六月開花。如菊花。小銅錢大。深黃色。上黨野人呼爲金錢花。七八月採花。今近道人家。園圃所種。金錢花。花葉並同。極易繁盛。恐即旋覆也。(蘇頌) ●旋覆葉如大菊。又如艾蒿。秋開花。如梧桐子。花淡黃色。其香過於菊。別有旋花。乃鼓子花。非此花也。(寇宗奭) ●花狀如金錢菊。水澤邊生者。花小。瓣單。人家栽者。花大。莖葉。薺稊。瘠使然。其根細白。俗傳露水。滴下即生。故易繁。亦不然。(李時珍)

【旋覆根】 主治 療風溼。續筋。除搗傳之。

【旋覆葉】 主治 傳金疝。止血。

【明】 李時珍本草綱目論旋覆葉。曰。治疔瘡腫。

【斜枝大士】 卽龍膽之古籍別名。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚粟棒】即鳥不宿之古籍別名。與見綱目。詳『鳥不宿』條。

子。曼陀羅葉。

古籍別名 風茄兒。山茄子。(綱目)惡客(姚伯聲花品)佛花。雜色。類茄。香婆草。醉仙桃。閩陀羅。華。天茄。彌陀花。高麗牽牛花。(和漢藥考)佛茄兒。東莨菪子。(新本草)

外國名詞 Stramonium (Datura Alba.) (Thornapple Jamestown Wood.)

基本 屬茄科。藥用曼陀羅之花。子與葉。

產地 凡山野路旁。恒多生焉。

形態 曼陀羅為一年生草本。自生於山野路旁。或種植園圃。春日抽莖。至夏可高三四尺。分枝稀疏。葉為巨大之卵圓形。彼此互生。似茄子葉。有不整之尖。晚夏開放白花。狀如喇叭。花冠頗長。有突起五。朝開夕萎。實為裂果。大可寸許。其形橢圓。外生多刺。中藏種子無數。扁平色黑。此為毒草。故花。莖。實皆毒。子毒尤甚。人誤食之。立即狂亂。洋產曼陀羅(Datura Tat. f. L.)莖高一尺至五尺。紫色。

葉形卵圓。有不整之缺裂。其柄頗長。彼此互生。夏日葉腋開紫花。作喇叭狀。又似漏斗。但不全開耳。花冠之邊緣。俱作五裂。果實為蒴果。外生棘刺。中藏無數扁平之黑色種子。其葉為尖卵圓形。其邊緣有三五不整之尖。葉柄頗長。面深綠。背淡綠。有一種不快之麻痺性。臭乾則無之。味苦辛。種子色褐黑。有光澤。扁平。形如雞心。有小窩點。中藏多白汁之胚乳與鉤狀之子蕊。

採取 八月採花及葉。九月採實。

用法 剉末和入麻藥中。

性質 辛。溫。有毒。

成分 曼陀羅華之有效成分。據下山藥學博士所實驗。知其為非沃新卻明(Hyosyamine C₁₇H₂₇N₃O₂)。又藥學士兒島高里。依下山博士之指導。將日本產曼陀羅華子行化學檢查。結果與洋種



曼陀羅

相同。效能 為麻醉藥。用於喘息及痙攣性咳嗽。他如神經痛。梅毒。痲瘋。痛風等症。俱可治之。尤能治老年哮喘。

主治 諸風。及寒濕脚氣。煎湯洗之。又主驚癇及脫肛。并入麻藥。

作用 入胃後略能激胃壁神經。使麻醉之。至腸被吸收而至血中。與血液極不起變化。其功效最著者。即由末梢神經受激而傳達腦神經。使腦部受激。而將全身血管收縮。心跳增速。全身分泌減少。瞳孔亦隨而縮小。同時腸蠕動亦被激而增加。若服大量。則心跳弛緩。血壓減低而死。

國外學說 日本學說謂曼陀羅葉 Folia Stramonii (Datura Stramonium, L. D. Tatura L.)。本兩種植物之葉。花時採取陰乾。葉柄長而圓。上有細溝。葉色深綠。不甚長。作廣卵圓形。或長卵圓形。又或作針形。上端尖銳。基部如楔。邊緣生不同之鋸齒。或重鋸齒。且帶茸毛。主脈之兩旁。有極粗之枝脈三五條。穆酸鹽細胞。

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

羅華子行化學檢查。結果與洋種

包藏於精品。味微苦而鹹。此藥須特別貯藏。一次極量〇・二(〇・〇)一日極量〇・六(〇・〇)和漢藥考曰。前人行外科手術時。每以曼陀羅華。配和為麻醉藥。從前外科大家華岡清洲。秘製麻藥方劑。曾配合曼陀羅華。醫事啓源載之。茲摘錄如下。曼陀羅花八分(陳舊者佳。新者發嘔)草烏頭二分。白芷二分。當歸二分。川芎二分。上五味。為粗末。一渝。空心服之。須臾。心氣昏暈。手足麻痺。或沈眠不覺。或悶亂發狂。乘時治之。既而飲以濃茶。又與黃連解毒加石膏湯。二。三時乃醒。如目眩。咽乾。神氣不復者。用黑豆湯即解。倘其不醉者。更飲溫酒。或乘輦動搖必醉。其醉有遲速者。由天資有躁靜爾。英美學說謂此藥產中國。印度。歐羅巴。及北亞美利加等處。葉與花及子。均可入藥。內含一精。即打都仁精。如用其子。須用其成熟者。如用其葉。則新乾均可。如用其花。則用其新乾者。功力勝於其葉。而遜於其子。此藥在印度。古時即用為藥品。而阿刺伯人。則從印度得之。此草

全體有大臭。能從遠處分辨之。其全體均有藥性。其作用為止痛藥。又為治轉筋藥。又因其能止痛。則能助睡。如腦筋疼或風濕。無論作內外科之用。均能減痛。又如發狂之人服之。亦能平心。然用葉而服至三四枚。則必厥略。數頭略昏。遍體發煖。而面與手亦旋發汗。倘服葉而至八九枚。則能令人醉。身略發熱。語多含糊。甚至噎人散火。作渴作悶。小便數多。大便亦不禁。若服過多。則語言顛倒。恍如沈醉。有患氣喘病者。將其葉作煙。葉燃吸。以一分至半錢為一次。能頃刻見效。然作煙吸時。亦不可過多。其功用能治咳嗽。胃氣疼。若外用能止痛。可作貼膏油膏用。至解藥之解此毒。與顏菊同。

配合應用 ●治面上生瘡。曼陀羅花。晒乾研末。少許貼之。(衛生易簡方)

●治小兒慢驚。曼陀羅花七朵。重一字。天麻二錢半。全蝎炒十枚。天南星炮。丹砂。乳香各二錢半。為末。每服半錢。薄荷湯調下。(御藥院方)

●治大腸脫肛。曼陀羅子連殼一對。橡斗十六箇。同剉。水煎三五沸。入朴硝少許洗之。(儒門事親方)

參攷資料 ●相傳此花笑采釀酒飲。令人笑。舞。釀酒飲。令人舞。予曾試之。飲須半酣。更令一人或笑或舞。引之乃驗也。八月採此花。七月採大麻子花。陰乾。等分為末。熱酒調服三錢。少頃昏昏如醉。割瘡灸火。宜先服此。則不覺其苦也。(李時珍) ●法華經言。佛說法時。天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。梵音雜色也。茄乃因葉形爾。姚伯榮花品呼為惡客。(李時珍) ●曼陀羅生北土。人家亦栽之。春生夏長。獨莖直上。高四五尺。生不旁引。葉莖碧。葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣。狀如牽牛花而大。撒花中折。餅葉外包。而朝開夜合。結實圓而有丁。拐。中有小子。八月採花。九月採實。(李時珍)

●日本近代世談云。朝鮮牽牛花。來自貞享年中。八月開白花。頗似朝顏。一名曼陀羅花。乃蔓草也。

(和漢藥考)

【曼陀羅花】即曼陀羅之處方用名。詳「曼陀羅」條。

【曼陀羅葉】即曼陀羅之處方用名。詳「曼陀羅」條。

【曼陀羅樹】即山茶花之古籍別名。與見朝日。詳「山茶花」條。

【曼珠沙華】即石蒜之古籍別名。與見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【曼遊藤】古籍別名。沉瀉。瘧地。生山谷中。

形態 曼遊藤為蔓草類之一種。莖纏木上。狀如寄生。葉似柳。眷月開紫色花。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 久嗽。癆疾。久服長生延年。

【望日砂】即兔屎之古籍別名。與見朝日。詳「兔屎」條。

【望月砂】即兔屎之處方用名。詳「兔屎」條。

【望江青】古籍別名。還精草。玉星草。銀腳鸞鷲。血見慈。天芝麻。(綱目拾遺)九節金。翻草(秋泉家秘)

十一畫 望 梁 梅

產地 多生澤旁湖岸間。

形態 望江青為澤草類之一種。穀雨後始發苗。莖方中空。葉狹長而尖有鋸齒。對節生。小滿後抽莖。開花成穗。細紫。層層直上。寒露時則枯。根多鬚。節間方面色白。極長中亦空明。絕類水芹。可供藥用。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 止吐血。生精力。除溼熱。去星障。療肺癆。勞傷。脫力。及小兒驚風。同金器煎服。

配合應用 治打傷撲傷。最活血。搗汁沖酒服。渣器傷處。同牛膝。芍藥。當歸。獨活。玉叉草。活血丹。七葉草。五爪龍。放棒行。金雀腦。覆絲藤。還草等。和勻搗汁。加酒服之。損傷垂死。但得入咽可生。並治諸爛痛瘡。癩吐血亦效。

去目中星翳障。望江青一兩。羊肝一具。同豆腐煮食。(百草鏡方)

治吐血。白蜜二兩。隔湯頓熱。望江青一兩煎汁。沖蜜服。不論遠年新起一切血症。二服除根。但服此藥後。每服須吃桂圓五粒。二服吃十粒。方無後患。此藥服後。人如

醉。惺惺然欲睡。一週時自息。再得燕窩粥培元更妙。

治乳癰。乳核。秋泉家秘祖傳天下第一奇方。治乳癰。乳核。腫硬大者服之。即內消。用九龍川。即龍見怕一兩。細葉冬青。即山黃楊。五錢。龍爪紫金。即馬鞭草。又名龍爪草。一兩。金剪刀三錢。九節金絲草。即望江青。五錢。遍地金。龍草。即地五爪。三錢。用無灰酒二碗。加香粉。或橋葉十餘片。煎半。饑時隨量二三次服之。渣再煎服。

絕癰。望江青乾者五錢。煎酒服。

【望江南】 古籍別名 飯匙倩草。蛇滅門草。(和漢藥考) 大吳風草。(植物辭典)

基本 係屬豇科。望江南。Oryza Occidentalis L. 之子實。

產地 生山野陰地。

形態 望江南為草本。高二三尺。葉橢圓。對翼葉。各小葉作卵圓或長橢圓形。前端尖。於莖之上部葉腋抽莖。開黃花。莖之下部葉腋亦著花。花後結長三寸許之莢。果中有作嘴狀之多數扁卵圓形

種子。

成分 望江南所含之成分。大約與大黃及「弗蘭格拉」皮中所含「愛莫琴」(Cathosin)相同。

採取 十月間採實去莢用。主治 腹痛。下痢。食傷。自湯下。十二三粒。

【望江南葉】 主治 蛇蟲咬傷。採葉貼之。

【望見消】 即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【望春】 即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【望果】 即蜜望子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「望望」條。

【望魚】 即鱗魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱗魚」條。

【梁上塵】 古籍別名 倒掛塵。烏龍尾。烟珠。(綱目)

基本 本品即屋上倒挂之塵。

製法 雷敫曰。凡梁上塵。須去烟火。大遠高堂殿上者。拂下篩淨。未用。李時珍曰。凡用倒掛塵。燒令烟盡。篩取末入藥。雷氏所說。似是梁上灰塵。今人不見用。

一二五八

性質 辛苦。微寒。無毒。主治 腹痛。時關。中惡。鼻衄。小兒癩疥。

歷代配伍攷證 【明】李時珍本草綱目論梁上塵曰。食積。止血。瘡血出。斷斷出血。

【梁州礬石】 即特生礬石之古籍別名。典見綱目。詳「特生礬石」條。

【梅子水】 性質 酸鹹。無毒。主治 諸毒。惡瘡。

參攷資料 造梅子水法。用大梅子三五十個。搗碎。入有嘴瓶內。加鹽三兩。入河水浸。過二指日。取凝。抽投入多多益善。經年更佳。凡毒將水搽之。即消。(秋泉秘錄)

【梅仁】 即梅核仁之簡稱。詳「梅核仁」條。

【梅片】 即冰片之處方用名。詳「冰片」條。

【梅冰】 即冰片之別名。詳「冰片」條。

【梅杏】 即杏之實黃而味酸者。性質功能。與尋常杏同。參詳「杏」條。

【梅花】 處方用名 綠萼梅。紅梅花。綠梅花。古籍別名 杲。(綱目)

基本 屬薔薇科。為梅樹(Cerasus Mume, S. of N.)之花萼。

形態 梅為落葉喬木之一種。樹幹高達二三丈。葉互生。作長卵圓形。邊緣有鋸齒。在早春未長葉前。先榮樹而開單瓣或重瓣之圓形花。有香氣。色有紅白淡紅等。初開時。微帶嫩綠色。凡花露。實仁。實水。葉。梗。根均能療病。另詳各該條。

種類 梅之種類頗多。其主要者。有鶴頂梅。重葉梅。野梅。鴛鴦梅。早梅。綠萼梅。六瓣梅。水梅。紅梅等。採取 以單葉綠萼者入藥良。含苞者力較勝。採取時。不犯人手者更佳。

性質 微酸。澁。無毒。

效能 開胃散鬱。生津止渴。解暑除煩。安神定魄。滌痰熱。清頭目。利氣平肝。

主治 痰熱壅滯。唇瘡癩癧。癰瘡結核。先天胎毒。痘毒。一切中毒。配合應用 治瘰癧方。以雞蛋白一孔。入綠萼梅花將開者七朵。封口飯上蒸熟。去梅花食蛋。每日一枚。七日全愈。

治臂上生瘡。白梅樹貼之神

效。如開裂出血者即止。(赤水玄珠方)

宜端午日製合。飛珠砂紅芽大戟。處州山芙蓉。千金霜。川文蛤。淨粉。草河車。以上六味各二兩。珍珠。琥珀。明雄黃。冰片。陳金。各五錢。梅花。西牛黃。各一兩。川麝香。四錢。上各藥為末。乳篩極細。以糯米粉糊杵為丸。研用。(紫金錠方)

白梅花。三錢。採飽綻者。須預備曬乾。生地黃。三錢。當歸。三錢。生甘草。一錢。臍帶。小兒自己落下時。去灰。或用礬新瓦。夾存性。研極細末。同煎濃汁。濃清熱膏。作一日吃。完可使小兒永不出痘。萬病回春。(稀痘神方)

九仙奪命丹。集驗云。又名十聖丹。治七十二般無名腫毒。惡瘡。流注。火瘃等症。磁砂。三錢。雄黃。乳香。沒藥。冰片。血竭。各二錢。石膽。礬。銅青。麝香。枯礬。熊膽。飛過黃。丹各一錢五分。蜈蚣。蚯蚓。殭蠶。各二條。微炒。黃色。去嘴。梅花。一升。寒水石。牛黃。蟾酥。白蜜粉。磁砂。各一錢。全蝎。九個。蝸牛。七條。以上廿三味。為末。研極細。以磁砂。一錢五分。為衣。

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

香水。飛。熊膽。各六分。沒藥。去油。京牛黃。苦。亭。磁。砂。礬。砂。蟾酥。人乳。泡。血。竭。雄。黃。水。飛。各。二。錢。片。腦。一。錢。另。研。沈。香。一。錢。白。梅。花。陰。乾。一。錢。二。分。共。為。細。末。用。人。乳。汁。化。糖。酥。丸。黍。米。大。金。箔。為。衣。(集驗方)

三花丹。將出痘之時。用此能稀痘。梅花。桃花。梨花。取已開未開者。陰乾。為末。等分。兔腦。為丸。雄黃。為衣。用赤小豆。煮。豆。黑。大。豆。湯。送。下。(赤水玄珠方)

預稀痘疹。每年臘月。清晨。搗。帶。露。綠。萼。梅。花。一。百。朵。加。上。白。糖。搗。成。小。餅。令。食。之。(不藥良方)

張瑛種痘新書。治痘氣血兩虛。灰。白。水。泡。癩。塌。等。症。黃。芪。二。兩。人。參。一。兩。甘。草。五。錢。紫。河。車。一。兩。梅。花。一。兩。五。錢。鹿。茸。一。兩。共。為。末。每。服。八。九。分。用。內。托。散。煎。湯。下。氣。實。者。加。山。查。陳。皮。各。五。錢。(七仙丹方)

用生青果。核七個。碎去仁。曬乾。研極細末。不宜火焙。又不宜沾生水。再用玉蝶。梅花。二十一朵。去蒂。共。白。蜜。兩。茶。匙。搗。濃。恰。交。春。分。時。與。小。兒。服。可。永。不。出。痘。即。出。亦

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共為丸。如丸不起。略加麪糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手心上。裏藥。用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫運。毒走攻心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手摸。摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花中開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後。即可服。(稀痘方)

新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶。曰坎氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行痘毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆腐。煮過。磨

十一畫 梅

不過數粒。此方傳自江寧王培德家。已九世無痘癘之兒。真異方也。

【青梅散方】

① 青梅丹。治痘已出未出。不起不發。隱在皮膚。並治麻痘斑症。用梅花一兩。桃仁辰砂甘草各二錢。絲瓜五錢。為末。每服五分。參蘇湯下。痘不問前後。凡黑陷咬牙寒戰。用梅花六錢。穿山甲一兩。仙靈脾五分。麝香一錢。為末。每服三五分。咬牙。加人牙二三粒。內托散送下。(赤水玄珠方)

② 種痘新書云。能起五陷。黃蠟梅花素心者尤良。陰乾不拘多少。去毛殼。曬透。用桃花陰乾。山查去核炒為末。小絲瓜陰乾為末。陳皮去白。人參黃芪炙甘草炙礞砂。紫河車酒洗去筋。蒸焙乾。鹿茸酒酥炙穿山甲。取首尾四足者。炒。仙靈脾去四。剉。酒焙。人牙火燬。韭汁焯七次。各為末。用。按綱目。梅花條下。並無主治。而於臘梅花下。亦僅言解暑生津而已。不知臘梅亦並非梅種。其主治亦廣。不僅治痘也。(二花散方)

③ 紹痘。用南方綠萼梅。未放

探。風乾。逢四時八節。節前一日。用雞蛋一個。打孔入。蒸紙糊好。飯上蒸熟。吃數次。永不出痘。即出亦不過數粒。(楊春涯驗方)

④ 解毒毒。立春前後三日。採紅梅。含半開者。一鍾去蒂。仍安鐘內。磁碟蓋住。一週。時足。氣汁升。上用新搗盆。未經五辛者。搗研如泥。嵌成餅。加明礞砂水飛一錢。勻。摻於上。緩緩研勻。再加白蜜少許。丸如彈子。蠟半乾。金箔為衣。每服一丸。甘草湯下。忌鐵器。單服。過一丸後。當日晚間。微發熱。次日。遍身發出細粟。是其驗也。朱禹功仙傳稀痘方。赤豆黑豆各一兩。研末。入新竹筒中。削皮留節。整孔入藥。杉木塞緊。用蠟封固。臘月。浸劇中。一月。取出。風乾。每藥配梅花片三錢。每服一錢。以經霜絲瓜。煎湯下。神效。(劉氏得效方)

⑤ 龍腦骨。治痘出未透。心狂見鬼。陷伏等症。用梅花不拘多少。曬乾。為末。加冰片少許。共研為末。以猪心血和勻。為丸。狂譫者。燈心湯引。紫陷者。以紫草煎湯調之。加酒

飲。茶。點。化。下。(種痘新書方)

⑥ 千里梅花丸。途中備用。用枇杷葉乾葛末。百藥煎。烏梅肉。臘梅花。甘草各等分。為末。用蠟化開。投蜜。每蠟一兩。加白蜜二錢。和藥末。搗二三百下。丸如雞豆。夏月。長途。含化。一丸。津液頓生。寒香滿腹。妙不可言。(醫學指南方)

⑦ 白梅花。古方未見用者。近時有梅花湯。用半開花。溶蠟封花口。投蜜。中。過時。以一兩。來。同蜜一匙。點沸湯服。又有蜜漬梅花法。用白梅肉少許。浸雪水。潤花。一宿。蜜浸。酒。又梅花粥。法。用落英入熟米粥。再煮食之。故楊誠齋有蜜點梅花帶露餐。及脫蕊。收將熟粥。喫之。句。皆取其助雅。致清神思而已。(李時珍) ⑧ 梅花冬蕊。春開。其花不畏霜雪。花後發葉。得先天氣最足。故能解先天胎毒。(百草鏡)

⑨ 梅花冰片。即冰片之處方用名。詳【冰片】條。

⑩ 梅花鹿。即鹿之毛。褐色。而有白星。斑點者。以之入藥。最良。性質功能。參詳【鹿】條。

【梅花鹿】即龍腦香之狀。如梅花者。為最上品。性質功能。參詳【冰片】條。

【梅柏砂】即珠砂之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳【珠砂】條。

【梅桃】即山櫻桃之古籍別名。與見綱目。詳【山櫻桃】條。

【梅核仁】基本 本品即梅實中之核仁。性質 酸。平。無毒。主治 明目。益氣。不饑。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論梅核仁曰。除煩熱。【明】李時珍本草綱目論梅核仁曰。治代指。忽然腫痛。搗爛。和醋浸之。

【梅梗】採取 以綠萼者入藥。良。並宜帶葉成枝者用。主治 通上下膈氣。並治婦人小產。

參攷資料 ① 凡梅有氣條。青翠色。此條無葉。止光。梗出枝。嫩。薛微君生白。曾言。用以通上下膈氣。有效。此氣條而非梗也。(趙學敏)

② 保產神效方。凡婦人妊娠三月。久。慣小產。百藥不效者。以梅梗三五條。煎湯飲之。復飲龍眼湯。無

效。

有不保者。(道藏集)

【梅葉】 性質 酸平。無毒。
主治 休息痢及霍亂。

煮濃汁飲。

參攷資料

①嵩陽子言。清水採梅葉洗蕉葛衣。經夏不脆有驗。

(陳藏器) ②夏衣生黴點。梅葉煎湯洗之。即去甚妙。(李時珍)

【梅精】 即冰片之別名。詳「冰片」條。

【梅實】 古籍別名 生青梅。黃熟梅。

產地 河南、湖北、川、蜀、江浙諸省境內均有產之。

基本 屬薔薇科。為梅樹之果實。

形態 梅實作球形。小如彈丸。大如杏實。表皮作絨毛樣之光芒。於夏日梅雨時節結實。在未熟期內。色為翠綠。成熟後。色呈杏黃。稍開紅色。內實鬆脆。多液無滓。含之香口。嚼之頗酸。取之可供食與藥用。

【梅實水】 即梅子水之別名。詳「梅子水」條。

製法 採用半青半黃之梅實。每箇用鹽一兩(鹽少不效)。淹沒一日一夜。取出晒乾。又淹又晒。漬

十一 蠶 梅

梓

至鹽水盡為度。每用青銅錢三枚。夾鹽梅兩箇。麻線紮住。裝貯瓷罐內。封固埋藏地中。約經百日許。取出可用。埋藏一年者佳。以愈陳愈良。又有用糟漬鹽浸者。為白梅。薰黑者。名烏梅。各有效能。另詳各該條。

性質 酸平。無毒。

主治 痰涎壅塞。喉如有物。膈間作痛。吐之不出。噎之不下。梅核隔氣。用此含口。嚼汁入喉。即消。

參攷資料 ①梅花開於冬而實。然於夏。得春之全氣。味最酸。性能收斂。食之生津。糖藏可充果餌。榨汁可以製梅醬。(李時珍) ②梅實多食損齒傷筋。蝕脾胃。令人發臨上痰熱。齒隨者。嚼胡桃肉。即解。曾服黃精者。忌食。(大明) ③梅實如同留粉拌食。則不酸。且無壞牙之患。(物類相感志)

【梅實仁】 即梅核仁之別名。詳「梅核仁」條。

【梅實水】 即梅子水之別名。詳「梅子水」條。

【梅樹根】 採取 以不出土者

主治 風痺。

歷代記述攷證 **【宋】**大明諸家本草論梅樹根曰。煎湯飲。治霍亂。止休息痢。

參攷資料 ①梅樹根。出土者。不可用。用之殺人。(綱目) ②初生小兒。取梅樹根。同桃李根。煮湯浴之。無瘡熱之患。(崔氏寶嬰)

【梅蠟】 即吐鐵之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「吐鐵」條。

性質 酸斂。

主治 生津解渴。

參攷資料 ①鮮綠萼初放。花採取蒸露。能解先天胎毒。六月未出痘。小兒和金銀露食之極佳。②國小記海澄人。蒸梅及薔薇露。取如燒酒法。酒一壺。滴少許。便芳香。(周傑園)

【梅邊】 即鞭笞之感。梅雨溼氣而早生者。味淡肉硬。不及秋生者佳。性質功能。參詳「鞭笞」條。

【梓】 古籍別名 木玉(綱目)

外國名詞 Catalpa Ka-empferi, S. et Z. (拉丁) キサ

サゲ アソサ カハラヒサギ カミナリササゲ ハブテコ

アラ(日本)

基本 係紫葳科梓屬之梓。產地 生山野間。

形態 梓為喬木類之落葉木。高二丈餘。葉略呈卵形。掌狀。淺裂。與桐葉相類。惟較小。葉柄長。夏日開花。唇形。花冠淡黃色。帶有紫色之斑紋。萼亦唇形。有二深裂。結實細長。略似豇豆之莢。其根白皮可供藥用。

酒類 ①木理白者。為梓。梓之有美文者。為椅。②木理赤者。為楸。梓之小者。為椴。

採取 以堅實不腐者良。

製法 凡使去外層黑皮。取裏白入藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 熱毒。去三蟲。(本經) 瘧疾。主吐逆。胃反。及小兒熱瘧。身熱熱煩。蝕痔。煎湯浴之。非搗碎



梓

十一畫 梓 梗 條 梟 枹 梧 椈 枹 椈 椈 椈

【別錄】

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論梓根白皮曰煎湯洗小兒壯熱一切疥疥皮膚瘙癢【明】李時珍本草綱目論梓根白皮曰治溫病復感寒邪變為胃嘔黃汁飲之。

【梓葉】 主治 搗傅結疔。飼豬肥大三倍。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論梓葉曰擦手足火爛疔。

【梓葉】 即父陸根之古籍別名。與見別錄。詳「父陸根」條。

【梟子】 即山梟子之原名。詳「山梟子」條。

【梟子仁】 即山梟子仁之別名。詳「山梟子仁」條。

【梟子皮】 即山梟子皮之別名。詳「山梟子皮」條。

【梟花】 即山梟子花之別名。詳「山梟子花」條。

【梟草】 即桔梗之古籍別名。典見別錄。詳「桔梗」條。

【梟通草】 即通草之處方用名。詳「通草」條。

【梗雞】

基本 梗雞為溼生蟲類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 瘰癧。

【條】 即柚之古籍別名。典見爾雅。詳「柚」條。

【條芥】 即黃芥之處方用名。詳「黃芥」條。

【梟】 即鴉之古籍別名。與見本草綱目。詳「鴉」條。

【梟羊】 即鴉之古籍別名。典見山海經。詳「鴉」條。

【梟景】 即鴉之古籍別名。典見別錄。詳「鴉」條。

【梟鴉】 即鴉之古籍別名。典見爾雅。詳「鴉」條。

【梟皮】 即秦皮之古籍別名。典見別錄。詳「秦皮」條。

【梟油】 即茶油之原名。詳「茶油」條。

【梟桐皮】 即秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦皮」條。

【梟桐】 古語別名。梟(綱目) 外國名詞 Sterculia planifolia, L. (拉丁)アラギ

リ(日本)

基本 係梧桐科梧桐屬。為梧桐之木皮。其花。子。葉詳見各條條。

產地 原野間處處有之。

形態 梧桐為落葉喬木類。桐之一種有綠色之枝幹。葉大分裂。為掌狀。基腳呈心臟形。葉之裏面有毛茸。葉脈之分歧點。有褐色之斑紋。是謂蜜腺。葉柄長。互生。夏開小花。圓錐形。花序帶黃色。雌雄同株。結實為蒴果。熟則裂如葉狀。種子附於其緣邊。大如胡椒。味如菱。其木白皮纖維有黏汁。可供藥用。



梧桐

性質 苦。寒。無毒。

主治 燒研和乳汁塗。烏髮髮。祛黃赤。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論梧桐木白皮曰治腸痔。

【梧桐子】 性質 甘。平。無毒。主治 搗汁塗拔去白髮根。下必黑者。又治小兒口

瘡和雞子燒存性研搗。

【梧桐花】 主治 癩頭。牡丹。湯火傷。

【梧桐葉】 性質 苦。寒。無毒。主治 發背。灸煎末。蜜調得乾即易。

【梧鼠】 即蟻姑之古籍別名。典見荀子。詳「蟻姑」條。

【梧實】 即飛松子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「飛松子」條。

【椈】 即肉桂之古籍別名。典見爾雅。詳「肉桂」條。

【椈木】 即馬醉木之古籍別名。典見本草遺拾。詳「馬醉木」條。

【椈瑛】 即君遷子之古籍別名。典見廣志。詳「君遷子」條。

【椈子香】 即沉香之形似椈子者。詳「沉香」條。

【梳篦】 命名 梳者。其齒疏通也。篦者。其齒細密相比也。兩者其齒連節也。乃用以梳髮之具。故名。

古語別名 櫛(綱目)

採取 以黃楊木及石楠木所製者良。

主治 虱病黃汁服之。及活虱

入腹爲病。成癩瘡者。

歷代記述攷證。【明】李時珍

本草綱目論梳篋曰。主小便淋瀝。乳汁不通。霍亂轉筋。噎塞。

【視砂】即石鹼之古籍別名。典見醫科書。詳『石鹼』條。

【款冬菜】即款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【款凍】即款冬花之古籍別名。典見郭璞賦。詳『款冬花』條。

【殼菜】即淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【滑石】即滑石之古籍別名。典見別錄。詳『滑石』條。

【涼木】即松楊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『松楊』條。

【涼粉草】即仙人凍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『仙人凍』條。

【涼徽遮金珠】即紫金牛之西俗名。詳『紫金牛』條。

【浙二泔】即梗米泔水之原名。詳『梗米泔水』條。

【淘河】即鴉鷂之別名。典見動物學大辭典。詳『鴉鷂』條。

【淘鷄】即鷄鷄之古籍別名。典見綱目。詳『鷄鷄』條。

【淡子芥】即黃芥之處方用名。詳『黃芥』條。

【淡天冬】即天門冬之處方用名。詳『天門冬』條。

【淡竹花】即小青草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小青草』條。

【淡竹茹】即竹茹之原名。詳『竹茹』條。

【淡竹殼】原名 淡竹籜。命名 本品即淡竹嫩時所苞之籜殼。故名。

主治 去目翳。功同熊膽。拭淨毛。燒存性。同麝香。搗細點之。

原名 鴨跖草。命名 本品莖葉似竹。故名。

古籍別名 鴨跖草。(喜祐)根名碎骨子。水竹。(時珍)

外國名詞 Lophatherum gracile, Brongn. var. elatum, Hack.

基本 屬禾本科淡竹(Lophatherum elatum, Zoll.)之葉。

產地 凡山野道旁。以及卑濕處。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。淡竹葉廣東各屬均有產。以花

縣從化下四府爲多出。

形態 淡竹爲生於山野路旁之草本植物。春月從宿根生苗。初時類竹。莖高達二三尺。葉互生。似竹葉。作廣披針形。前端尖。闊一寸許。長六七寸。花爲粗大穗狀花。開於梢上。根爲纖維狀。附生如麥門冬之堅球根。



淡竹葉

性質 甘寒。無毒。

效能 滲溼。清熱。專作利尿藥。主治 葉去煩熱。利小便。清心。根能隨胎催生。

近人學說 張山雷曰。此非竹類也。生下溼地。細莖綠葉。有似於竹。故有此名。四五月間。開花如蛾。兩瓣舒展作翅。栩栩欲飛。深碧可玩。古書謂之鴨跖草。陳藏器謂味苦大寒。治寒熱。瘧疾。飲丁腫。小兒丹毒。發熱狂痢。大腹痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬。癰腫等毒。日華謂治溼痺。利小便。瀕湖以消喉痺。

亦清熱解暑。泄水利水之良品也。用益 三錢。

施用宜忌 凡無溼熱及孕婦禁用。

參攷資料 ①古方書所載之淡竹葉。係 *Phyllostachys* 之葉。和漢藥考) ②竹葉象形。碎骨冒其下胎也。(李時珍) ③淡竹葉處處原野有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。儼如竹米落地所生細竹之莖。葉。其根一窠數十鬚。鬚上結子。與麥門冬一揆。但堅硬。爾。隨時採之。八九月抽莖。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米。用作酒麪。甚芳烈。(李時珍)

【淡竹葉】即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【淡竹溼】即竹溼之處方用名。詳『竹溼』條。

【淡竹籜】即淡竹殼之原名。詳『淡竹殼』條。

【淡肉果】即烟草之別名。詳『烟草』條。

【淡伯】即厚樸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『厚樸』條。

【淡附子】即附子之處方用名。詳『附子』條。

十一畫 梘

欸 殼 液 涼 浙 淘 淡

【附子】條。

【淡豆豉】

命名 豉者嗜也。功能調和五味。可甘嗜也。故名。

也。故名。

【地方用名】

製豆豉。炒香豉。香豆豉。

豆豉。

【古醫別名】 大豆豉。(別錄)

基本 係黑大豆製成之淡味

豆豉。

產地 陶弘景曰。豉出襄陽錢

唐者。香美而濃。入藥取中心者佳。

形態 豉色褐而灰。質柔輭而

潤。其味淡。顆粒則較生豆爲小而

扁也。

製法 造淡豉法。用黑大豆

二。三斗。六月內淘淨。水浸一宿。瀝

乾。蒸熟。取出攤席上。候微溫。蒸覆

每三日一看。候黃衣上遍。不可太

過。取曬。絞淨。以水拌乾。溼得所。以

汁出指間爲準。安甕中。築實。桑葉

蓋厚三寸。密封泥。於日中曬七日。

取出曝一時。又以水拌入甕。如此

七次。再蒸過。攪去火。安甕收。築封

卽成矣。造鹹豉法。用大豆一斗。

水浸三日。淘蒸。攤甕。候上黃。取出

絞淨。水淘漉乾。每四斤入甕一斤。

鹽絲半斤。椒。蒜。茴。杏仁。并勻入

甕。上面水浸過一寸。以箬蓋封口。

曬一月。乃成也。造豉汁法。十月

至正月。用好豉三斗。清麻油熬令

烟斷。以一升并豉蒸過。攤冷。曬乾。

并再蒸。凡三遍。以白鹽一斗。搗和

以湯淋汁三四斗。入淨釜。下椒豉

葱。橘絲同煎。三分減一。貯於不津

器中。香美絕勝也。有豉豉。瓜豉。豉

豉諸品。皆可爲之。但充食品。不入

藥用也。

性質 苦寒。無毒。

效能 解肌。除煩。熱。有發汗

作用。用於感冒及急性傳染病。症

疹未透而惡寒者。又本品能刺激

胃之知覺神經。間接反射於延髓

之嘔吐中樞。而引起嘔吐。爲催吐

藥。須用大量。凡胃不消化。異物積

滯。食道內。或病後胃之機能薄弱。

以致積滯而引起苦悶欲吐者。均

宜之。並能吐去痰涎及黏液。故兼

有祛痰作用。

主治 傷寒頭痛。寒熱。瘧氣。惡

毒。煩躁滿悶。虛勞喘吸。兩腳疼冷。

殺六畜胎子諸毒。

歷代名醫論 香豉一味。經

張仲景之實驗。認爲『主治心中

懊憹也。勞治心中結痛。及心中滿

而煩也』。茲考徵如下。枳實梔

子豉湯。證不具也。(枳實梔子豉

湯條。無心中懊憹證。爲則按梔子

大黃豉湯。此枳實梔子豉湯而加

大黃者。而其條有心中懊憹之證。

心中懊憹。固非大黃所主治也。然

則枳實梔子豉湯條。其脫心中懊

憹之證也。明矣。梔子大黃豉

湯證曰。心中懊憹。(以上二方。香

豉皆一升)梔子豉湯證曰。心

中懊憹。又曰胸中窒。又曰心中結

痛。梔子甘草豉湯證。不具也。梔

子甘草豉湯。梔子生薑豉湯。是梔子

豉湯加味之方也。故每章之首。冠

以若字焉。心中懊憹而少氣者。梔

子甘草豉湯。心中懊憹而嘔者。梔

子生薑豉湯。斯可以知已。(以上

三方。香豉皆四合)瓜蒂散證

曰。心中滿而煩。(以上一方。香豉

一合)歷觀此諸方。其主治心中

懊憹也。明矣。

歷代名醫論 香豉曰。治時疾熱病。發

性本草論 香豉曰。治時疾熱病。發

汗。然未能止盜汗。除煩。生搗爲丸

服。治寒熱。胸中生瘡。發服治血

痢腹痛。研塗陰莖生瘡。宋大明

諸家本草論香豉曰。治瘧疾骨蒸

中。毒藥蠱氣。犬咬。明李時珍本

草綱目論香豉曰。下氣調中。治傷

寒。溫毒發癩。嘔逆。明繆希雍本

草經疏論香豉曰。豉諸豆皆可爲

之。惟黑豆者入藥。有鹹淡二種。惟

江有淡者治病。經云。味苦寒。無毒

然詳其用。氣應微溫。蓋黑豆性本

寒。得澆曬之氣。必溫。非苦溫則不

能發汗。開腠理。治傷寒頭痛寒熱

及瘧氣惡毒也。苦以湧吐。故能治

煩躁滿悶。以熱鬱胸中。非宜劑無

以除之。如傷寒短氣煩躁。胸中懊

憹。飢不欲食。虛煩不得眠者。用梔

子豉湯吐之是也。又能下氣調中。

辟寒。故主虛勞喘吸。及兩腳疼冷。

【造】黃宮繡本草求真論香豉曰。

淡豆豉本於黑豆蒸罨而成。按其

味苦氣寒。似屬苦降下行之味。而

無升引上行之力也。然經火熬罨。

味雖苦而氣則馨。氣雖寒而質則

浮。能升能散。故得葱則發汗。得鹽

則引吐。得酒則治風。得韭則治痢

得春則止。而炒熱又能止汗。是以邪在上。而見煩躁。頭痛滿悶。懊憤不眠。發斑嘔逆者。合於梔子。則能引邪上吐。使不致陷入。而成內結之症也。然必江右製者。方堪入藥。【清】鄭樹本經疏證論香豉曰。張隱庵謂豆爲腎穀。色黑性沈。豉熟而成。輕浮主啓陰臟之精上資。故其治煩躁滿悶也。非特由於傷寒頭痛寒熱者可用。卽由於瘴氣惡毒者亦可用也。蓋煩者陽盛躁者陰逆。陽盛而不得下交。陰逆而不能上濟。是以神不安於內。形不安於外。最是仲景形容之妙。曰反覆顛倒。心中懊憤。惟其反覆顛倒。心中懊憤。正可以見上以熱盛不受陰之滋下。因陰逆不受陽之降。治之不以他藥。止以豉梔子成湯。以梔子能泄熱下行。卽可知豉能散陰上逆矣。曰仲景用豉多於汗吐下後何也。曰豉之功在除煩躁滿悶煩燥滿悶。非汗吐下後不多見也。雖然汗吐下後。兼煩躁兼滿悶者不少矣。於何定其爲梔鼓湯證。夫汗後有亡陽證。則煩燥而不滿悶。有內熱證。有內實證。

則煩而不躁。下後有結胸證。有痞證。則滿悶而不煩燥。吐後有煩滿而無燥。蓋煩燥則非實。滿悶則非虛。惟其虛實之間。斯爲發越洩降所宜用。於此猶不可定。豉爲開發上焦鬱抑。宣導陰濁。迥迥耶。然則葛稚川取葱豉湯治傷寒初起非歟。夫稚川固言之矣。曰凡初覺頭痛身熱。脈洪。一二日便以葱豉湯治之。則其爲熱邪非寒邪。在陽明不在太陽明甚。何則。寒邪應惡風惡寒。此但言身熱。寒邪當脈數脈緊。此則言脈洪。證之以仲景所謂傷寒三日。陽明脈大者。詎非若合符節。且梔子與葱白。一係洩熱。一係通陽。洩熱者縱通陽者衡。縱則能通上下之道。此所以宜於汗吐下後。表邪已滅之時。衡則能達外內之情。此所以宜於病初起卒難辨識之際。是在先在後。關梔子葱白。不關豉。又可明矣。曰梔子煎湯證。亦未見必有滿悶也。此則論中所載多矣。曰胸中窒。曰心中結痛。非滿悶之謂耶。特按之心下濡。句切宜著眼。恐恐煩滿爲實熱證也。若論煩燥則在陰者多。在陽

者少。如少陰有吐利。燥煩四逆者。有自利。燥煩不得臥者。有吐利。手足逆冷。煩燥欲死者。厥陰有熱少厥。微指頭寒。默默不欲食。煩燥者。有脈微。手足厥冷。煩燥者。皆以有脈微四逆。而無滿悶。知其非陽經證。不得治以豉。矣。然陽經之煩燥。陰經之煩燥。其因究有別也。應如何而審之。夫煩未有非陽盛者。燥無有非陰逆者。特陽經之煩燥。是陰陽相搏。陰經之煩燥。是陰陽相逐。相搏者其力足相敵。而兩不相下。相逐則陽既敗。北陰復迫之也。是故陽經之煩燥。雖輕揚之豆。散其陰逆有餘。陰經之煩燥。卽沉重之豉。附輔其陽弱不足也。雖然。豉味苦氣寒。本屬陰。以之治陰逆。則寒因熱用。熱因寒用。非歟。夫氣寒氣涼。治以寒涼。行水瀆之。此五常政大論文也。注家謂熱湯浸漬。則寒涼之物。能治寒涼。試檢傷寒論。諸用豉湯。皆不以生水。煮甚者。枳實梔子湯。先空煮清漿水。更入枳實梔子。再下豉。僅須五六沸。卽已成湯。如金匱要略。梔子大黃湯。以治陽而非治陰。遂入

藥不分先後。是其秉經訓。何如耶。又如瓜蒂散證。在太陽曰胸有寒。在少陰曰手足寒。脈弦遲。在厥陰曰手足厥冷。脈緊。更明明爲寒。非如諸梔子鼓湯證之並未言寒也。而瓜蒂苦寒。豉又苦寒。亦以熱湯下。豉煮汁和瓜蒂赤小豆末。服正與以寒治寒之旨相符。其證爲邪與痰飲。因陰陽相搏而結於胸中。斷可證矣。於此見陰翳之所。在卽陽氣之所阻。驅散其陰翳。陽氣自伸。此豉之功。陽氣既伸。其實者隨卽引而越之。使不經無病之所。虛者隨卽抑而下之。使不傷未敗之氣。此瓜蒂與梔子之力。夫故曰胸中實。曰虛煩。而用豉。可並行不背也。說者謂仲景之六經。是區分地面。所該者廣。雖以脈爲經紀。凡風寒濕熱。內傷外感。自表及裏。寒熱虛實。無乎不包。素問皮部論曰。皮有分部。脈有經紀。其生病各異。別其部分。左右上下。陰陽所在。諸經始終。此其立說之源也。觀於廣濟療骨蒸肺氣。每至日晚。卽惡寒壯熱。顏色微赤。不能下食。日漸羸瘦。方用豉。葱白。生地黃。

甘草、童子小便。張文仲療虛損慘
額不食。四體勞強。時翁翁熱。無氣
力。作骨蒸。方用豆豉、梔子、杏仁、童
子小便。服後四體益熱。即服豆豉、
葱白、生薑、生地、黃、童子小便。仍不
離陽明葱豉法。調繁療臍臍實熱。
精神不守。瀉熱梔子煎。方用豆豉、
梔子、甘竹、大青、橘皮、赤蜜、千金
療心實熱。或欲吐不出。悶喘急。頭
痛。瀉心湯。方用豆豉、梔子、小麥、石
脊、地骨皮、茯苓、淡竹葉。仍不離太
陽陽明梔豉法。信然。以是類推。則
刷繁之以理中。茯苓湯治脈實熱
極。血氣傷心。使心好生。赫怒口為
變赤。言語不快。消熱。止血氣。調脈
以蠶甲湯治勞熱。四肢腫急。少腹
滿痛。顏色黑黃。關格不通者。並用
豆豉。甚者千金以豆豉地黃二味。
搗散酒服。治虛勞冷。骨節痛。無力。
崔氏枸杞酒。取豆豉。以枸杞湯淋。
秋麻子粉糞汁。取半沒雞。取半沒
米。和地黃蒸飯。釀成酒。治五內邪
氣。消渴。風溼。下胸脇間氣。頭痛。堅
筋骨。強陰。利大小腸。填骨髓。長肌
肉。破除結氣。五勞七傷。去胃中宿
食。利耳目。鼻衄吐血。內溼風疰。補

中逐水。破積癥。惡血。石淋。長髮
傷寒。瘵氣。煩躁。滿悶。虛勞。喘吸。逐
熱。破血。及胸臍腫。亦悟別錄。虛
勞。喘吸。兩脚疼冷之旨矣。〔清〕閱
立。陸本草。選旨論香豉曰。淡豆豉
味苦。氣寒。陰中之陰。無毒。原夫黑
豆性平。作豉則溫。既經蒸。又
升能降。本草主治傷風頭痛。寒熱
瘵氣。惡毒。煩躁。滿悶。虛勞。呼吸。兩
脚疼冷。殺六畜胎子諸毒。故時珍
以之下氣。調中。治傷寒溫毒發斑
瘡之症。今人佐以葱白。散寒熱頭
痛。助以梔子。除虛煩懊。醇酒浸
管。治足冷痛甚。薤白煮服。止血痢
多疼。而且佐鹽使之能吐。佐蒜使
之止血。炒熟使之止汗。江南人凡
得時氣。既先用葱豉湯取汗。往往
便差。皆竊取於李氏之意。而推廣
之也。若其未經造豉。則又有異焉。
夫豆有五色。各治五臟。惟黑豆屬
水性寒。為腎之穀。入腎居多。且走
血分而壯氣。充元。與青白豆動氣
之物不同。故以逐水脹。消癰腫。除
風熱。下結氣。散瘀血。所謂同氣相
求。昔陶華嘗以黑豆入鹽煮食。云
能補腎。蓋豆乃腎之穀。其形類腎。

黑色通腎。又引之以鹽。所以妙也。
若其生用。生毒之人。食生豇而不
噦。服毒之人。食豆查而自吐。此為
解毒之物。又曰豆腐。可以發毒。何
也。蓋生毒之人。以實脾為要。豆腐
凡瀉肝之物。恐脾處有傷元氣。而
瘡毒難收。故爾云然。豆腐乾之實
脾而健胃。因其豆之熟也。豆腐漿
之止咳而治噦。因其豆之液也。豆
腐皮之實脾虛。豆腐焦之開胃氣。
因解表故而又熱則補也。又曰炒
食則熱。煮食則寒。牛食之溫。馬食
之涼。一體之中。功效各殊。
近人學說。張山雷曰。大豆本
是堅實補腎之品。惟用以製豉。則
悉而發。變堅實而為空鬆。當其
罨時。外必生霉。豆中實液。確已外
散。故有表散外邪之性情。葛洪肘
後方葱豉湯。謂傷寒有數種。〔此
所謂傷寒有數種。蓋即難經所謂
傷寒有五之例。凡春溫夏熱。溼溫
冬溫等候。古人俱以傷寒二字總
稱之。〕庸人卒不能分別者。今取
一藥兼療之。〔此所謂一藥言一
方也。〕即葱豉湯。藥止葱白豆豉二
物。洵不誣也。但古之豆豉當汗

解肌。散膚表之熱。止取其蒸。醫實
鬆。輕而能散。而今之江浙市肆中。
又以麻黃湯浸過。則發汗之力。乃
陡加倍。發熱。病本不重。惟時雖
新涼。微寒發熱。病本不重。惟時雖
已習醫。不致自信。乃延同邑之世
醫某君定方。用淡豆豉三錢。初服
一二劑。無甚變動。迨服至三劑。則
烘熱蒸。汗出如浴。歷三日後。不
論痲。淋漓不息。幾致神志迷惑。
如在霧中。初時舌有白膩之苔。而
大汗之後。頓至光紅如鏡。嗣即繼
以大劑清養益津。而一臥三月。久
不恢復。當時亦歸咎於醫之胃味。
謂陰液素薄之體。不當速用發散
之藥。實則此藥中雖有麻黃。分量
甚少。何致速有此變。此必市肆中
之製法不善。誤用過量之麻黃所
致。然亦可知今之豆豉。已非古書
中之豆豉。所可等置。齊觀者已。古
法仲景梔子豉湯。治吐下後心中
懊。及大下後身熱不去。心中痛。
皆取其質之輕鬆。能宣通胸中鬱
窒之義。今則藥質已異。性情不侔。
恐亦無此效用。又古以治血痢刺
痛。赤白後重。亦皆以宜通結塞為

功今既製入煎黃。則必有不可同年而語者。

配合應用 ①治傷寒發汗。云

傷寒有數種。唐人卒不能分別者。今取一葉兼療之。凡初覺頭痛身熱。脈洪一二日。便以葱鼓湯治之。用葱白一虎口。鼓一升。綿裹水三升。煮一升。頓服取汗。更作加葛根三兩。再不汗。加麻黃三兩。又法。用葱湯煮米粥。入鹽鼓食之。取汗。又法。用鼓一升。小男溺三升。煎一升。分服取汗。(肘後方)

②治傷寒不解。已三四日。胸中悶惡者。用鼓一升。鹽一合。水四升。煮取一升半。分服取吐。此秘方也。(梅師方)

③辟除溫疫。鼓和白朮。浸酒常服之。(梅師方)

④治傷寒懊憹。吐下後。心中懊憹。天下後。身熱不去。心中痛者。並用梔子鼓湯吐之。梔子十四枚。水二盞。煮一盞。入鼓半兩。同煮至七分。去滓服。得吐。止後服。(傷寒論方)

⑤治傷寒餘毒。傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫。用鼓五合。微炒。

以酒一升半。同煎五七沸。任性飲之。(簡要濟眾方)

⑥治傷寒目翳。燒鼓二七枚。研末吹之。(肘後方)

⑦治傷寒暴痢。以鼓一升。薤白一握。水三升。煮薤熟。納鼓更煮。色黑去鼓。分爲二服。(藥性方)

⑧治血痢不止。用鼓。大蒜等分。杵丸。梧子大。每服三十九丸。鹽湯下。(王氏博濟方)

⑨治血痢如刺。以鼓一升。水漬相淹。煎兩沸。絞汁頓服。不遑再作。(藥性方)

⑩治赤白重下。葛氏用豆豉熬小焦。搗服一合。日三。或炒魚以水浸汁服。亦驗。外臺用鼓心炒爲末。一升。分四服。酒下。入口即斷也。

⑪治臟毒下血。烏犀散。用淡鼓十文。大蒜二枚。煨同搗丸。梧子大。煎香菜湯服二十九日。二服。安乃止。永緒根本。無所忌。(究原方)

⑫治小便血條。淡豆豉一握。煎湯。空腹飲。或入酒服。(危氏得效方)

⑬治瘧疾寒熱。煮鼓湯飲數升。得大吐即愈。(肘後方)

⑭治小兒寒熱。惡氣中人。以溼鼓研丸。鷄子大。以摩臍上。及手足心六七遍。又摩心臍上。旋旋呪之。上破鼓丸。看有相毛。瘳道中。即便寤也。(食醫心鏡方)

⑮治盜汗不止。以鼓一升。微炒香。清酒三升。漬三日。取汁。冷暖任服。不瘳。更作三兩劑。即止。(孟詵方)

⑯治胸喘痰積。凡天雨便發。坐臥不得。飲食不進。乃肺竅久積冷痰。遇陰氣觸動則發也。用此一服。即愈。服至七八次。即出惡痰數升。藥性亦隨而出。即斷根矣。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入磁甃末一錢。枯白礬三錢。丸綠豆大。每用冷茶冷水送下七丸。甚者九丸。小兒五丸。即高枕仰臥。忌食熱物等皆效。

⑰治風毒膝癢。骨節痛。用鼓三五升。九蒸九暴。以酒一斗。浸經宿。空心隨性溫飲。(食醫心鏡方)

⑱治手足不隨。鼓三升。水九升。煮三分。分三服。又法。鼓一升。微熬。糞貯。漬三升酒中。三宿。溫服。常令微醉爲佳。(肘後方)

⑲治頭風疼痛。鼓湯洗頭。避風取瘳。(孫真人方)

⑳治卒不得語。煮鼓汁。加入羹酒服之。(肘後方)

㉑治喉痺不語。煮鼓汁一升。服。覆令取汗。仍着桂末於舌下。嚥之。(千金方)

㉒治咽生瘻肉。鹽鼓和搗塗之。先刺破出血。乃用神效。(聖濟總錄方)

㉓治口舌生瘡。胸膈疼痛者。用焦鼓末。含一宿。即瘳。(聖惠方)

㉔治舌上血出如針孔者。用鼓三升。水三升。煮沸。服一升。日三服。(葛氏方)

㉕治墮胎血下。煩滿。用鼓一升。水三升。煮三沸。調鹿角末方寸匕。(子母秘錄方)

㉖治妊婦動胎。鼓汁服。(子母秘錄方)

㉗治婦人難產。乃兒枕破。與敗血裹其子也。以勝金散逐其敗血。即順矣。用鹽鼓一兩。以苜蓿布裹了。燒赤。乳細。入麝香一錢爲末。取秤鍾燒紅。滓酒調服一大盞。(郭稽中方)

①治小兒胎毒。淡鼓煎濃汁與三五口。其毒自下。又能助脾氣。消乳食。(聖惠方)

②治小兒現乳。用鹹鼓七箇。去皮。膩粉一錢。同研丸。黍米大。每服三五丸。薑香湯下。(全幼心鑑方)

③治小兒丹毒。作瘡出水。鼓炒烟盡爲末。油調傅之。(姚和衆方)

④治小兒頭瘡。以黃泥裹。煨熟取研。以蔥菜油調傅之。(勝金方)

⑤治發背癰腫。已潰未潰。用香鼓三升。入少水。搗成泥。爛腫處。大小作餅。厚三分。瘡有孔。勿覆孔上。鋪餅。以艾列於上。灸之。但使溫濕。勿令破肉。如熱痛。卽急易之。患當減快。一日二次。灸之如先。有孔以汁出爲妙。(千金方)

⑥治一切惡瘡。熬鼓爲末。傅之。不過三四次。(產乳方)

⑦治陰莖生瘡。爛者。以鼓一分。蚯蚓溼泥二分。水研和。塗上。乾卽易之。禁熱食酒蒜芥菜。(藥性論方)

⑧治蠟螫皮膚。作鼓傅之甚良。(千金方)

⑨治蟲刺人。鼓心嚼敷。少頃

見鼓中有毛。卽瘰。若不見。再傅。晝夜勿絕。見毛爲度。(外臺祕要方)

⑩治跌跌破傷筋骨。用鼓三升。水三升。漬濃汁飲之。止心悶。(千金方)

⑪治殿傷瘀聚。腹中悶滿。鼓一升。水三升。煮三沸。分服。不瘥。再作。(千金方)

⑫解蜀椒毒。鼓汁飲之。(千金方)

⑬治中牛馬毒。鼓汁和人乳類服之。效。(衛生易簡方)

⑭小蝦蟇有毒。食之令人小便秘澀。膝下悶痛。有至死者。以生鼓一合。投新汲水半碗。浸濃汁。頓飲之。卽愈。(萌芽客語方)

⑮治中酒成病。鼓葱白各半升。水二升。煎一升。頓服。(千金方)

⑯治服藥過劑。悶亂者。鼓汁飲之。(千金方)

⑰治雜物眯目不出。用鼓三七枚。浸水洗目。視之。卽出。(聖濟總錄方)

⑱治刺在肉中。嚼鼓塗之。(千金方)

⑲治腫從脚起。鼓汁飲之。以滓

傅之。(肘後方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 無外感風寒者禁用。

參攷資料 ①古今方書用鼓治病最多。江南人善作鼓。凡得時氣。卽先用葱鼓湯服之。取汗。往往便瘥也。(蘇頌) ②蒲州鼓味鹹。作法與諸鼓不同。其味烈。陝州有鼓汁。經十年不敗。入藥。並不如今之鼓心。爲其無鹽故也。(陳藏器) ③陝府鼓汁。甚勝常鼓。其法以大豆爲黃。蒸每一斗。加鹽四升。椒四兩。春三日。夏二日。卽成。半熟。加生薑五兩。既潔淨且精也。(孟詵) ④鼓諸大豆皆可爲之。以黑豆者。入藥有淡鼓鹹鼓。治病多用淡鼓。汁及鹹者。當隨方法。其鼓心乃合鼓時取其中心者。非剝皮取心也。此說見外臺祕要(李時珍)

⑤淡芭菰 卽烟草之別名。典見植物學大辭典。詳「烟草」條。

⑥淡葵莢 卽葵菜莢之處方用名。詳「葵菜莢」條。

⑦淡昆布 卽昆布之處方用名。詳「昆布」條。

【淡秋石】卽秋石之處方用名。詳「秋石」條。

【淡秋冰】卽秋石之處方用名。詳「秋石」條。

【淡海藻】卽海藻之處方用名。詳「海藻」條。

【淡乾薑】卽乾薑之處方用名。詳「乾薑」條。

【淡菜】 命名 本品曬乾時。不加鹽卽可食故名。古籍別名 殼菜(本草綱目) 海菜。東海夫人(綱目) 貽貝。(動物學大辭典)

外國名詞 Mytilus Cuvier. postea Lischke Muschel. Mieschbacher (拉丁) イガヒ或イノカヒ或シウリ或セトガヒ(日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類異柱類殼菜科爲殼菜之肉

產地 生海水中。

形態 淡菜爲介類之一種。其殼呈三角形。稍膨大。表皮厚。有輪層。殼頂之鈹合部。外面有韌帶。自殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

殼外黑色。背面有白褐色斑紋。殼內真珠色。肉殼有前肉柱。小後肉柱大。腳長有溝。多具筋肉。腳之根部。有分泌黏液之腺。黏液由腳溝流下。凝為絲狀物。即為足絲。為固着於外物之用。殼長二寸。高四寸。其肉紅紫色。味佳。可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 虛勞。傷風。精血衰少。及吐血。久痢。腸鳴。腹痛。疝瘕。婦人帶下。產後瘦瘠。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論淡菜曰。產後血結。腹內冷痛。治瘕瘕。潤毛髮。治崩中帶下。燒食一頓。令飽。【宋】日華諸家本草論淡菜曰。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰脚氣。能消宿食。除腹中冷氣。疰疰。亦可燒汁。沸出食之。【明】李時珍本草綱目論淡菜曰。清濕氣。

參攷資料 ●淡菜常時燒食。即苦不宜人。與少米先煮熟後。除去毛。再入蘿蔔。或紫蘇。或冬瓜同煮。即更妙。【孟詵】●淡菜生海藻上。故治瀉與海藻同功。【李時珍】●淡菜不宜多食。多食令人頭目

十一畫 淡

淨 淫

閉關。得微利即止。【日華】●淡菜多食發丹石。令人腸結。久食脫人髮。【陳藏器】

【淡黃芥】即黃芥之處方用名。詳「黃芥」條。

【淡銀】即蜜陀僧之古籍別名。與見藥物生產辨。詳「蜜陀僧」條。

【淡菴菴】即內菴菴之處方用名。詳「肉菴菴」條。

【淡鼈甲】即鼈甲之處方用名。詳「鼈甲」條。

【淨毛燕】即燕窩之處方用名。詳「燕窩」條。

【淨牛膽汁】即牛膽之處方用名。詳「牛膽」條。

【淨皮硝】即朴硝之古籍別名。與見和漢藥考。詳「朴硝」條。

【淨粉】即番薯粉之依法製成者。詳「甘薯」條。

【淨柴胡】即柴胡之處方用名。詳「柴胡」條。

【淨骨皮】即地骨皮之處方用名。詳「地骨皮」條。

【淨連翹】即連翹之處方用名。詳「連翹」條。

【淨黃連】即黃連之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「黃連」條。

【淨銀花】即金銀花之處方用名。詳「金銀花」條。

【淨蓮鬚】即蓮鬚之處方用名。詳「蓮鬚」條。

【淨雙鈎】即鈎藤之處方用名。詳「鈎藤」條。

【淫羊藿】命名 西川北部有食此藿所致。故名。古籍別名 剛前。【本經】仙靈脾。【唐本】三枝九葉草。【綱經】放杖草。【藥考】千兩金。乾鷄筋。黃連祖。【日華】仙靈吐。【柳子厚文】蕪枝草。黃德祖。靈籙尊師。靈草。【和漢藥考】

外國名詞 Barron wort. (英)

基本 係小蘗科葶草 (Epi-medium macranthum, Morr. et Deane) 之葉。

產地 蘇頌圖經本草云。淫羊藿江東。陝西。秦山。漢中。湖湘間皆有之。陳仁山藥物生產辨云。產廣東北江連州屬。


形態 淫羊藿一名葶草。為宿

根草。自舊根叢生。數細莖。春日生葉及穗。高一二尺。一柄有三枝。九葉。葉為卵圓形。大二三寸。類香葉。邊緣有細鋸齒。夏月。莖上開或白或黃白。或淡紅。或淡紫色之四瓣花。倒垂。其狀如蛇。故名葶草。

採取 每年五月間採根葉陰乾。

製法 雷斅曰。凡使用淫羊藿。時呼靈仙脾。以夾刀夾去葉四昨花枝。每一筋用羊脂四兩拌炒。待脂盡為度。

性質 辛寒。無毒。效能 補命門。興陽事。治陰痿。強腰膝。專作強壯藥。主治 陰痿。絕傷。墮中痛。利小便。益氣力。強志。【本經】堅筋骨。消瘰癧。赤癰。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人有子。【別錄】



淫 羊 藿

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論淫羊藿曰。丈夫絕

陽無子。女人絕陰無子。老人昏痿。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨羸急。四肢不仁。補腰膝。強心力。【明】李時珍本草綱目論淫羊蠶曰。淫羊蠶味甘氣香。性溫不寒。能益精氣。乃手足陽明三焦命門藥也。真陽不足者宜之。【明】繆希雍本草經疏論淫羊蠶曰。淫羊蠶味辛甘。其氣溫而無毒。本經言寒者誤也。入手厥陰。為補命門之要藥。亦入足少陰厥陰。可升可降。陽也。辛以潤腎。甘溫益陽氣。故主陰痿絕陽。益氣力。強志。莖中痛者。肝腎虛也。補益二經。痛自止矣。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。辛以潤其燥。甘溫益陽氣以助其化。故利小便也。肝主筋。腎主骨。益腎肝則筋骨自堅矣。辛能散結。甘能緩中。溫能通氣。行血。故主癩癧赤瘰。及下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服令人無子者。因陽旺則陽道數舉。氣仰女而精耗散。故無子也。一名仙蠶。柳文作毗。毗者。人臍也。臍為命蒂。故主入命門。修事如雷公法。【明】李士材本草圖解論淫羊蠶曰。淫羊蠶辛溫無毒。主陰痿絕

陽。莖中痛。利小便。益氣力。強志。堅筋骨。消癩癧。赤瘰。下部有瘡。洗出蟲。虛陽易舉。夢遺不止。便赤口乾。強陽不痿。并忌之。【清】黃宮繡本草求真論淫羊蠶曰。淫羊蠶辛香甘溫。諸書皆載能治男子絕陽不與。女子絕陰不產。且能治冷風勞氣。四肢麻木不仁。腰膝無力。蓋因氣味甘溫。則能補火助陽。兼有辛香。則冷可除而風可散耳。至云久服無子。恐陽旺多慾。精氣耗散。無他故也。去枝。羊脂拌炒。近人學說。張山雷曰。淫羊蠶稟性辛溫。專壯腎陽。故主陰痿。曰絕傷者。即陽事之絕傷也。莖中痛亦腎臟之虛寒。利小便者。指老人及虛寒人之陽事不振。小便滴瀝者言之。得其補助。助腎陽而小便自利。非溼熱蘊結。水道赤澀者可比。讀書慎勿誤會。益氣力。強志。堅筋骨。皆元陽振作之功。然虛寒者固其所宜。而陰精不充。真陽不固者。萬不可為。擬苗之助長者也。消癩癧。赤瘰。蓋亦因其溫通氣血。故能消化凝結。然癩瘡之病。由於陰血不充。肝陽燥灼。而煎熱津液。凝結

痰濁者為多。幸勿誤讀古書。反以助其烈。陷人於炮烙之酷刑。洗下部之瘡。則辛燥能除溼熱。亦猶蛇牀子之洗瘡殺蟲耳。又曰。日華主丈夫絕陽。女子絕陰。一切冷風勞氣。筋骨羸結。四肢不仁。補腰膝。則辛溫之品。固不獨益腎壯陽。并能通行經絡。祛除風寒溼痺。但日華又謂治老人昏痿。中年健忘。則未免譽之太過。而景岳且謂男子陽衰。女子陰衰之難於子嗣者。皆宜服之。則偏信溫補。其弊滋多。更非中正之道矣。石頑謂一味仙蠶脾酒。為偏風不送要藥。頭按不送之病有二。一為氣血俱虛。不能榮養經絡。或風寒溼邪痺着之病。古之所謂痺症是也。其來也緩。一為氣血上沖。擾亂腦神經而忽失其運動之病。今之所謂中風。西醫之所謂腦經病是也。其病也暴。仙蠶脾酒。止可以治風寒溼痺之不送。并不能治氣血兩虛之不送。而血冲腦經之不送。更萬萬不可誤用。配合應用。淫羊蠶。陽草也。甘溫益陽。氣辛則走而能補。宜與

白朮、甘枸杞、肉蓯蓉、五味子、牛膝、山茱萸同用。為補陽之妙劑。清醇酒飲。益丈夫。興陽道。理腰膝冷。亦治偏風不送。大約每蠶一斤。流酒十斤。如常法。勿令過醉。修事時忌雞犬婦人見。治三焦欬嗽。腹滿不飲食。氣不順。淫羊蠶、五味子等分。為末。煉蜜丸。如梧子大。每三十九丸。蓮茶湯下。治目昏生翳。用仙蠶脾、生王瓜。即小栝樓紅色者。等分為末。每服一錢。茶下。日三服。聖濟總錄方。治病後青盲目。日近者可治。仙蠶脾一兩。淡豆豉一百粒。水一碗半。煎一碗。頓服即愈。百一選方。治小兒雀盲。仙蠶脾、晚蠶蛾各半兩。炙甘草、射干各二錢。半為末。羊肝一枚。切開。摻藥末二錢。粘定。以黑豆一合。米泔一盞。同煮熟。分二次食。以汁送之。普濟方。治痘疹入目。用仙蠶脾、葶藶仙等分。為末。每服五分。米湯下。用蠶 一錢至三錢。

極用宜忌 相火易動，陽強易
擊，夢遺便赤，口乾等症。禁用。葷類
紫芝之爲之使，得酒良。

參攷資料 ⑤淫羊藿。後人因

別錄羊食而淫之說，遂改爲性熱
助陽誤矣。夫羊性喜淫，乃其天賦
不必食此藿也。即謂食之益淫，故
以命名。然人非羊也，食之何必淫。
蓋體賦既殊，不能以一例論也。余
謂羊爲火畜，蓄其水氣，羊果食藿
而益淫，亦內經陰平陽秘之旨耳。
(王秉衡) ⑥豆葉日靈。此葉似之，
故亦名靈。仙靈脾，千兩金，放杖草，
附前，皆言其功用也。鷄筋，黃連，祖
皆因其根形也。柳子厚文作仙靈
毗，入辟曰毗。此物補下，於理尤通。
(李時珍) ⑦淫羊藿。江東，陝西，秦
山，漢中，湖湘間皆有之。莖如粟稈，
葉青如杏葉，上有刺，根紫色，有鬚。
四月開白花，亦有紫花者。碎小獨
頭。五月採葉曬乾。湖湘出者，葉如
小豆，枝莖緊細，經冬不凋。根如黃
連。關中呼爲三枝九葉草。苗高一
二尺許。根葉俱堪用。蜀本草言生
處不聞水聲者良。(蘇頌) ⑧淫羊
藿生大山中，一根數莖，莖粗如線。

十一畫 淫

淮 深 混 清

高一二尺，一莖三椹，一椹三葉，葉
長二三寸，如杏葉及豆莢，面光背
淡，甚薄而細，齒有微刺。(李時珍)

【淫羊藿】即天門冬之古籍別名。

【淫小麥】即小麥之處方用名。詳

【小麥】條。

【淮山】即山藥之處方用名。詳

【山藥】條。

【淮山藥】即山藥之處方用名。詳

【山藥】條。

【淮牛膝】即牛膝之處方用名。詳

【牛膝】條。

【淮木】 古醫別名 百歲城中

木。(本經)城裏赤柱。(

綱目)

【淮木】 淮木爲雜木類之一種。

可供藥用。

產地 出山西平陽及河東諸

地。或謂即古城中之木材。

性質 苦平無毒。

主治 主久欬上氣，傷中虛羸。

(本經)女子陰蝕漏下，赤白沃。城

裏赤柱，療婦人漏血，白沃，陰蝕，淫

溼邪氣，補中益氣。(別錄)

參攷資料 淮木煮湯服。主難

產。(杜正誥)

【淮豆】即豌豆之古籍別名。與見

綱目。詳「豌豆」條。

【淮東子】 古醫別名 跳蝦蟲。

跳蟲。(綱目拾遺)

產地 多生水旁溼土中。

形態 淮東子爲溼生蟲類，彈

尾類昆蟲之一種。形如跳蚤而大

逾倍。色如蝦，灰黑色，有灰色斑紋。

身有細毛，觸角粗短，分四節。頭側

各有單眼八，腹部多足如蝦。尾部

有附屬物，如劍狀，善跳躍，可供藥

用。

採取 以器置水中，候其跳入。

則不能出而取之。

主治 療風痺，去溼腫。

參攷資料 淮東子秋時鬪蟻

蟻家多畜之。凡蛋遇鬪傷及虛羸，

必每日以此飼之。云能益體力也。

其性最敏捷，能透透經絡，皮裏膜

外，無不行到。(趙學敏)

【淮烏頭】即草烏頭之生於淮城

者。詳「草烏頭」條。

【淮鹽】即戎鹽之古籍別名。與見

藥物生產辨。詳「戎鹽」條。

【深深奶】即大生地之古籍別名。

與見和漢藥考。詳「大生地」條。

【深黃】即鬱金之古籍別名。與見

和漢藥考。詳「鬱金」條。

【混元母】即人胞之古籍別名。典

見本草蒙筌。詳「人胞」條。

【混池】即雞卵殼之名。詳「雞卵」

條。

【混池衣】即人胞之古籍別名。典

見綱目。詳「人胞」條。

【混池池】即雞抱出卵殼之別名。

與見綱目拾遺。詳「雞抱出卵殼」

條。

【混池蟻蛉】即桑寄生之古籍別

名。與見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【清水豆卷】即大豆卷之處方用

名。詳「大豆卷」條。

【清阿膠】即阿膠之處方用名。詳

「阿膠」條。

【清炙草】即甘草之處方用名。詳

「甘草」條。

【清炙青】即黃耆清炙者之處方

用名。詳「黃耆」條。

【清風藤】 古醫別名 青藤。尋

風藤。(綱目)

外國名詞 Sapia japonica,
Mitsum. (拉丁)アラカツラ

十一畫 清 淺 牽

(日本)

基本 係清風藤科清風藤屬。爲清風藤之莖。

產地 生山野間。浙江天台山有山。

形態 清風藤爲蔓草類之纏繞灌木。嫩莖綠色。葉卵形。尖端革質。滑澤深綠色。秋季脫落。葉柄仍留。爲針狀。三月間花生葉腋。花五瓣。黃色。結實球形。熟則呈深碧色。其莖可供藥用。



清風藤

主治 風痰。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論清風藤曰。治風溼流注。歷節鶴膝。麻痺痿痺。損傷瘡腫。入酒藥中用。

【清涼種】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【清油】即胡麻油之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡麻油」條。

【蔓瓜】即蔓瓜之日本名。詳「蔓瓜」條。

瓜」條。

【牽】即牛之牝者。見「牛」條。

【牽牛酥】基本 係取存椎動汁。製煉爲酥。

性質 甘微寒。無毒。

效能 和氣活血。通腸利水。潤肌膚。澤毛髮。

主治 心熱肺痿。胸中客熱。渴漱。吐血。虛勞。急痛。瘰癧。口瘡。及諸瘡毒。

命名 本品始出田野人牽牛謝藥。故以

名之。後人隱其爲黑丑白丑者。蓋丑屬牛也。

處方用名 丑牛。黑丑。白丑。白牽牛。

古籍別名 益飯草。天茄。(綱目)狗耳草。(救荒)草金鈴。(炮炙)假君子。三白草。(和漢藥考)

外國名詞 Pharostia hede. arcea L. (拉丁)

基本 屬旋花科喇叭花牽牛之種子。

產地 陳仁山藥物生產。辨云。牽牛子產陝西漢中府。安徽亳州。

縣。

形態 喇叭花爲一年生之纏繞草本。葉皆互生。每葉片各有三裂。葉面微生細毛。夏日葉腋開合瓣花。形如喇叭。頗大。朝開夕萎。故又名朝顏花。果爲蒴果。形圓如球。中分三室。藏種子兩粒。此花有紅。白。紫。藍。雜色等。而花與葉之形狀。亦殊多變化。種子作三角形。外面色黑褐。內面色白。



牽牛子

種類 ①凡開青藍色之花。則子黑。名黑丑。力速。②凡開白色之花。則子白。名白丑。力遲。

採取 八月與九月間採實曬乾。

製法 雷斅曰。凡採得子。曬乾。水淘去浮者。再曬。并酒蒸。從巳至未。曬乾收之。隨用。審去黑皮。李時珍曰。今多只碾取頭末。去皮。缺不用。亦有半生半熟用者。

性質 苦寒。有毒。

一一七二

成分 含有主要之昆謨胡林

(Convovulin C₁₅H₂₁O₉)與藥刺巴根相同。

效能 瀉溼熱。利二便。用作和緩下劑。爲便秘與腳氣藥。

主治 下氣。療腳滿水腫。除風毒。利小便。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論牽牛子曰。治痰癰氣塊。利大小便。除虛腫。落胎。【唐】孟詵食療本草論牽牛子曰。和山茱萸。服去水病。【宋】大明日華諸家本草論牽牛子曰。取腰痛。下冷膿。瀉蟲毒藥。并一切氣壅滯。【元】李東垣用藥法象論牽牛子曰。除氣分溼熱。三焦痰結。【明】李時珍本草綱目論牽牛子曰。逐痰消飲。通大腸氣。秘風。殺蟲。達命門。【明】羅

希雍本草經疏論牽牛子曰。牽牛子本經不載。乃名醫續註。本草謂爲苦寒有毒。其主下氣者。乃損削真氣之謂也。療腳滿水腫。除風毒。利小便。皆相似語。况前病多屬脾胃氣虛。此是瀉藥。今反用之。爲害滋大。【明】李士材本草圖解論牽牛子曰。牽牛子辛溫入肺及大小

醫。利小便。通大便。治水腫。逐痰飲。除氣分溼熱。疏三焦。壅結。牽牛子主脾家水氣。喘滿腫脹。下焦鬱滯。腰背脹重。及大腸風秘氣。祕。卓有殊功。但病在血分及脾虛痞滿者。不可服也。碾取頭末。去皮。去其用。亦有半生半熟用者。皮能滯氣。勿得誤用。【清】黃宮樞本草求真論牽牛子曰。牽牛有白有黑。白者其性入肺。尚於上焦氣分。除其溼熱。故氣逆壅滯。及大腸風秘者。得此以治。黑者其性兼入右腎。能於下焦通其遺滯。故腫滿。氣及大小便祕。俱得以治。但下焦血分溼熱。溼自下受。宜用苦寒。以折牽牛氣味辛辣。久嚼雄烈。服之最能泄肺。若以下焦血病。而於氣分有損之藥。以爲投治。是以血病瀉氣。不使氣血俱損乎。惟是水氣在肺。喘滿腫脹等症。暫用以爲開泄。俾氣自上達下。而使二便傾開。以快一時。若果下焦虛腫。還當佐以沉香補骨脂等味。以爲調補。俾補瀉兼施。而無偏破損泄之害矣。取子肉去浮者。春去皮。得木香乾薑良。【清】陳修園本草經讀論牽牛子曰。牽牛子

大毒大破之藥。不堪以療內疾。惟楊梅瘡或毒發周身。或結於一處。其則陰氣。鼻柱壞。顛瀆不合。其病多從陰氣而入。亦必使之從陰器而出也。法用牽牛研取頭末。以土茯苓自然汁泛丸。又以燒秘散爲衣。每服一錢。生槐蓋四錢。以土茯苓湯送下。一日三服。服半月效。【清】楊時泰本草述鈞元論牽牛子曰。牽牛子感熱火之化所生。稟性雄烈。色黑者。先甘後苦。甘少苦多。其力速。色白者。先甘後辛。甘少辛多。其效遲。二者均瀉氣分之溼。故下水積類用之。夫溼屬血病。又有所謂氣分之溼者。此即血中之氣也。人身元氣。不能化溼。積久而蘊隆之氣。滯着填壅。以致喘滿腫脹。或變遏下焦。二便不得施化。斯時將從血治乎。將必於血中之氣而資之。用此爲斬關奪門之將。乃有人處。而畏以其泄元氣。遂束手待斃。可乎。如邪不至於蘊隆。患不極於填壅。則正氣未併於溼邪。但處其弱而已。弱而投之。能復有存者。寡矣。故臨證投劑。惟審溼邪之盛否。以爲用舍耳。凡人三焦氣壅。

有升無降。津液皆化爲痰飲。不能下滋腸腑。而病腸結。服硝黃徒入血分。必若罔聞。更有必用大黃之證。無牽牛則竟不能入胃口以下者。可知此味爲血中開導之先驅。即漫然謂其泄氣不可也。大抵牽牛屬陽中之陰。稟性辛烈。故多就陰溼之氣以爲開。非治熱也。不論寒溼。溼熱。但其壅結處。即其奏功處。若寒溼溼熱之痰。上壅下祕。尤其的對。如下焦病於氣壅而實。以致腹痛者。用此能達命門。走精髓。以此病亦本於溼所化也。惟水氣爲患。正當益脾健運。以資氣化。焉用此不能化氣。而徒瀉氣之味。以致氣化愈窮哉。

製法甚簡易。而效用頗確實故也。猪子氏於數多患便祕者。投與此劑。頗得良效。用法。大約以〇、五至〇、七爲丸。一回內服之。服後經數時。發下痢。其際雖有腹痛。然通常不劇。牽牛子華爾斯之製法。以牽牛子加亞爾爾保爾。蒸餾或蒸散後。於殘渣內加溫蒸餾水。類類洗滌。至水無色爲度。終以全量於水浴上屢次攪拌之。使乾變爲度。英美學說謂牽牛子又名二丑。產中國各處。有黑白二種。黑者於野處滋生。尤爲繁多。至白者則多有人種植之。然此草雖分黑白二種。如用爲藥品。其功力無稍異。

近人學說 張山雷曰。牽牛善泄溼熱。通利水道。亦走大便。故別錄謂其苦寒。至李氏東垣。以其兼有辛散氣味。遂謂是辛熱雄烈。竊願按此物甚滑。通泄是其專長。試細嚼之。惟其皮稍有辛味。古今主治。皆用之於溼熱氣滯。實腫脹滿。二便不通。則東垣以爲辛熱。張石頑和之。亦謂辛溫。皆屬不確。當以別錄之苦寒爲正。又氣載人喉舌。細味之亦在皮中。所謂有毒。蓋

十一畫 牽

卽在此。古方中凡用末子。均稱止用頭末。正以其皮黏韌。不易細碎。祇用頭末。則棄其皮。而可無辛散之毒。頗有意味。可思。觀別錄主治。專破氣分之壅滯。泄水溼之腫滿。除風利便。固皆以實病言之。此藥功用。固已包舉無遺。甄權申之。則曰。治痲痺氣塊。利大小便。東垣謂除氣分溼熱。三焦壅結。瀨湖謂逐痰飲。通大腸氣。秘風殺蟲。亦皆主結滯壅塞各論。而甄權乃又謂除虛腫。則誤矣。日華本草謂治腰痛。蓋亦指溼熱阻塞。腰脊不利之症。惟言之殊不分明。究屬非是。

配合應用 ④黑牽牛得白木香。檳榔。使君子。能追蟲取積。

⑤牛耶丸。治氣築奔衝不可忍。用黑牽牛半兩。檳榔二錢半爲末。每服一錢。紫蘇湯下。追蟲取積亦可用。(普濟方)

⑥治面上風刺。黑牽牛酒浸三日。宿爲末。先以薑汁擦面。後用藥塗之。(摘玄方)

⑦治面上粉刺。搗子如米粉。黑牽牛末。對入面粉藥中。日日洗之。(聖惠方)

⑧搜風通滯。風氣所攻。臟腑積滯。用牽牛子以童尿浸一宿。長流水上洗半日。生絹袋盛。掛風處令乾。每日鹽湯下三十粒。極能搜風。亦消虛腫。久服令人體清瘦。(斗門方)

⑨利膈丸。治三焦壅塞。胸膈不快。頭昏目眩。涕唾痰涎。精神不爽。用牽牛子四兩。半生半炒。不蛀皂莢。酥炙二兩爲末。生薑自然汁。煮糊丸。梧子大。每服二十九。荊芥湯下。(王褒博濟方)

⑩治一切積氣。宿食不消。黑牽牛頭四兩爲末。用蘿蔔剉空。安末蓋定。紙封。蒸熱取出。入白薑麩末一錢。搗丸。梧子大。每服一二十九。白湯下。名順氣丸。(普濟方)

⑪治男婦五積。五般積氣成聚。用黑牽牛一斤。生搗末八兩。餘滓以新瓦炒香。再搗取四兩。煉蜜丸。梧子大。至重者三十五丸。陳橘皮。生薑煎湯臥時服。半夜未動。再服三十九。當下積聚之物。尋常行氣。每服十九。甚妙。(博濟方)

⑫治胸膈食積。牽牛末一兩。巴豆霜三個。研末。水丸。梧子大。每服

二三十丸。食後隨所傷湯下。(儒門事親方)

⑬治腎氣作痛。黑白牽牛等分炒爲末。每服三錢。用豬腰子切。縫入茴香百粒。川椒五十粒。搽牽牛末入內。扎定紙包。煨熟。空心食之。酒下。取出。靈物效。(直指方)

⑭治傷寒結胸。心腹硬痛。用牽牛頭末一錢。白糖化湯調下。(鄒氏家藏方)

⑮治大便不通。用牽牛子半生半熟爲末。每服二錢。薑湯下。未通再以茶服。一方加大黃等分。一方加生檳榔等分。(簡要方)

⑯治大腸風秘結滯。牽牛子微炒。搗頭末一兩。桃仁去皮尖。麸炒半兩。爲末。熟蜜丸。梧子大。每湯服三十丸。(衍義方)

⑰治水蠱脹滿。白牽牛、黑牽牛各取頭末二錢。大麩麥四兩。和作燒餅。臥時烙熟食之。以茶下。降氣爲驗。(宣明方)

⑱治諸水飲病。張子和云。病水之人。如長川泛溢。非孟杓可取。必以神禹決水之法治之。故名禹功散。用黑牽牛頭末四兩。茴香一兩。

炒爲末。每服一二錢。以生薑自然汁調下。當轉下氣也。(儒門事親方)

⑲治陰水陽水。黑牽牛頭末三兩。大黃末三兩。陳米飯餅糕一兩。爲末。糊丸。梧子大。每服五十九。薑湯下。欲利服百丸。(醫方捷徑方)

⑳治水腫尿瀉。牽牛末。每服方寸匕。以小便利爲度。(千金方)

㉑治溼氣中滿。足脛微腫。小便不利。氣急欬嗽。用黑牽牛末一兩。厚朴製半兩。爲末。每服二錢。薑湯下。或臨時水丸。每煮湯下三十丸。(普濟方)

㉒治水氣浮腫。氣促。坐臥不得。用牽牛子二兩。微炒搗末。以烏牛尿浸一宿。平旦入葱白一握。煎十餘沸。空心分二服。水從小便中出。(聖惠方)

㉓治風毒脚氣。捻之沒指者。牽牛子搗末。蜜丸。小豆大。每服七丸。生薑湯下。取小便利乃止。亦可吞之。其子黑色。正如桃小核。(肘後方)

㉔治小兒腫病。大小便不利。黑牽牛、白牽牛各二兩。炒取頭末。并

等水和丸。綠豆大。每服十二丸。雞
荷子煎湯下。(聖濟總錄方)

●治小兒腹脹。水氣流腫。膀胱
實熱。小便赤澀。牽牛生研一錢。青
皮湯空心下。一加木香。減半丸服。
(鄭氏小兒方)

●治疝氣浮腫。常服自消。黑牽
牛。白牽牛各半生半炒取末。陳皮
青皮等分爲末。糊丸。綠豆大。每服
三歲兒服二十九丸。米湯下。(鄭氏
小兒方)

●治疝氣耳聾。疝氣攻腎。耳聾
陰腫。牽牛末一錢。豬腰子半個。去
膜淨切。摻入內。加少鹽。溼紙包煨
空心食。(鄭氏小兒方)

●治小兒雀目。牽牛子末。每以
一錢。用羊肝一片。同麪作角子二
個。炙熱。食米飲下。(普濟方)

●治風熱赤眼。白牽牛末。以葱
白。煎丸。綠豆大。每服五丸。葱湯
下。服訖。睡半時。(衛生家寶方)

●治馬脾風病。小兒急驚。脾風
喘滿。胸高氣急。脇縮鼻張。閉亂欬
嗽。煩渴痰瀾。聲啞。俗名馬脾風。不
急治。死在旦夕。用白牽牛半生半
炒。黑牽牛半生半炒。大黃煨。棗穉

各取末一錢。每用五分。蜜湯調下。
痰盛加輕粉一錢。名牛黃奪命散。
(全幼心經方)

●治小兒夜啼。黑牽牛末一錢。
水調傳臍上。即止。(生生編方)

●治臨月滑胎。牽牛子一兩。赤
土少許。研末。覺胎轉痛時。白榆皮
煎湯下一錢。(王養博濟方)

●治小便血淋。牽牛子二兩。半
生半炒爲末。每服二錢。薑湯下。良
久。熱茶服之。(經驗方)

●治腸風瀉血。牽牛五兩。牙皂
三兩。水浸三日。去皂。以酒一升。煮
乾。焙研末。蜜丸。梧子大。每服七丸。
空心酒下。日三服。下出黃物。不妨
病後。日服五丸。米飲下。(本事
方)

●治痔漏有蟲。黑白牽牛各一
兩。炒爲末。以豬肉四兩。切碎。炒熟
蘇末。食盡。以白米飯三匙。壓之。取
下白蟲爲效。又方。白牽牛頭末四
兩。沒藥一錢。爲細末。欲服藥時。先
日勿夜飲。次早空心將豬肉四兩。
炙切片。蘸末。細細嚼食。取下膿血
爲效。晝人加減用。忌酒色油膩三
日。(儒門事親方)

●治淋瀝水溢。乃腎虛也。牽牛
末二錢。半入切。開豬腎中。竹葉包
定。煨熟。空心食。溫酒送下。借腎入
腎。一經一橫。兩得其便。惡水既澀。
不復淋瀝。(直指方)

●治一切癰疽發背。無名腫毒。
年少氣壯者。用黑白牽牛各一合。
布包。越碎。以好醋一盃。熬至八分。
露一夜。次日五更溫服。以大便出
膿血爲妙。名濟世散。(張三丰仙
方)

●治濕熱頭痛。黑牽牛七粒。砂
仁一粒。研末。并華水調汁。仰灌鼻
中。待涎出即愈。(聖濟總錄方)

●治氣滯腰痛。牽牛不拘多少。
以新瓦燒赤。安於上。自然一半生
一半熟。不得攪動。取末一兩。入硫
黃末二錢。半。同研勻。分作三分。每
分用白麪三匙。水和。捍開。切作菴
子。五更初。以水一盞。煮熟。連湯溫
下。痛即已。未住。隔日再作。予曾有
此疾。每發。一服痛即止。(本事方)

用盡 八分至錢半。
應用宜忌 凡氣虛及溼熱在
血分者禁用。
著名方劑 舟車神佑丸。治水

腫水脹形氣俱實者。(河間方)黑
牽牛四兩。大黃二兩。(酒浸)甘遂
一兩。(麪裏煨)橘紅。大戟。(麪裏
煨)芫花。(醋炒)青皮。(炒)各一
兩。木香五錢。檳榔五錢。輕粉一錢。
上爲末。水丸。每服五分。五更滾水
下。大便利三次爲度。量虛實用之。
並忌鹽醬百日。

參攷資料 ●牽牛以氣藥引
則入氣。以大黃引則入血。利大腸。
下水積。色白者瀉氣分溼熱。上攻
喘滿。破血中之氣。(王好古)●牽
牛治水氣在脾。喘滿腫脹。下焦鬱
滯。腰背脹重。及大腸風。秘氣。卓
有殊功。但病在血分。及胃脾虛弱
而痞滿者。則不可取。快一時。及常
服。暗傷元氣也。一宗室大人。年幾
六十。平生苦腸結病。旬日一行。甚
於生產。服養血潤燥藥。則泥膈不
快。服消黃瀉利藥。則若罔知。如此
三十餘年矣。時珍診其人。體肥膏
梁。而多瘰癧。日吐酸痰。碗許。乃寬
又多火病。此乃三焦之氣壅滯。有
升無降。津液皆化爲痰飲。不能下
滋腸腑。非血燥比也。潤劑留滯。消
黃徒入血分。不能通氣。俱爲痰阻。

十一 羴 羴

故無效也。乃用羴牛末。皂莢膏丸與服。即便通利。自是但覺腸結。一服就順。亦不妨食。且復精爽。蓋羴牛能走氣分。通三焦。氣順則痰逐飲消。上下通快矣。外甥柳翁。素多酒色。病下極腹痛。二便不通。不能坐臥。立哭呻吟者七晝夜。醫用通利藥不效。道人叩予。予思此乃滯熱之邪。在精道。壅脹隘路。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在大腸膀胱也。乃用棟實。茴香。穿山甲諸藥。入羴牛加倍。水煎服。一服而減。三服而平。羴牛能達右腎命門。走精隧。人所不知。惟東垣李明之知之。故明之治下焦陽虛。天真丹用羴牛以鹽水炒黑。入佐沈香。杜仲。破故紙。官桂諸藥。深得補瀉兼施之妙。方見醫學發明。又東垣治脾溼太過。通身浮腫。喘不得臥。腹如鼓。海金沙散。亦以羴牛為君。(李時珍)

【牽枝牡丹】即旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【犀牛皮】基本 此是海犀。其皮可供藥用。

主治 治風活血最效。

效能 祛風溼。解熱毒。

參攷資料 犀皮多創入藥。一斤兌二元餘。為祛溫解毒之要劑。正剛皮一斤值洋廿元。余在生藥行時。殊罕見。實買。特向巴貨商詢問。始知本品為服食上品。如燕窩魚翅然。不常入煎藥也。(程登瀛)

【犀角】

本品即犀牛之角。

處方用名 犀角尖。犀角片。烏犀角。黑犀角。磨犀尖。

古籍別名 兕角。(綱目)低密。(番名)奴角。兕角。毗沙擊。(和漢藥考)竭伽角。(番書)斑角。(唐本草)

外國名詞

Rhinoceros-horn (英)

基本 屬哺乳動物中之奇蹄類。為犀之鼻角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。犀角產安南金邊龍巖為最好。近日少出。以暹羅為上。但其庄頭略劣。反以石叻內埠檳嶼內埠山打根等處莊頭略好。人多悅之。仰光亦有出。次之。和漢藥考曰。產於中國暹羅。安南。蘇門答臘及非洲等處。

形體 犀為牛類。巨獸也。好棲息於池沼湖澤等陰溼之地。其出也。必數頭為一羣。體亞於象。尾大而稍黑。皮膚幾於無毛。若裸體然。皮厚而堅。頸肩腰部諸具極深之皺紋。俾體之運動可以自如。其足三趾。末端有蹄。頭稍帶三角形。上唇突出。下唇之外。無大齒。鼻上之皮膚。變而為尖銳上挺之物。或一或二。謂之犀角。然不如他獸之用以格鬪。僅恃以傷樹木。掘泥土。與投石而已。性愚鈍。然野而難馴。見人即奔竄。若迫之過急。則亦反身抗拒。勢不可當。其聽覺嗅覺均極銳敏。惟目力多弱。常以木葉為食。飼從前歐洲寒地。犀之孽生殊繁。今則已絕其種。僅亞非兩洲之熱帶地方。猶見有棲息者。在亞洲者。為印度犀。體長一丈二尺。高六七尺。鼻上有尖物一。故名一角犀。皮多皺裂。全身有粟瘡。具粟眼。因此所得犀角。又有粟紋角。粟眼角等別名。在非洲者。體長丈餘。高五尺許。鼻上之尖物有二。前一後。但較短。故名二角犀。皮膚之皺裂似

一一七六

甲。其性兇暴。甚於印度犀。其角為角質狀之一種尖物。微彎曲。有剛毛。大抵壯者為短。老者為長。最長者。可二三尺。尋常多七八寸。或尺許。底部闊五六寸。其色不一。或外面淡褐綠色。內作黃色。中央黑色。或為黑白二種。或黑色相和。角尖為盼。入藥以用黑色者為佳品。故烏犀角之名最著。試以鋸縱解之。見為粗糙之纖維狀。然稍滑澤。其性質與毛爪相同。

製造 蘇頌曰。凡使犀角。捕得殺死。為上。銳角者次之。寇宗奭曰。應取茸。犀取尖。其精緻之力。盡在是也。以西番生犀。磨服為佳。入湯散。犀之雷斂曰。凡使物用奴犀。犀病水犀。犀子犀。無潤犀。惟取烏犀。肌皺折裂。光潤者。錯屑入臼。杵細萬匝。乃用。李珣曰。凡犀角。錯成。當以薄紙裹於懷中。蒸燥。乘熱搗之。應手如粉。故歸田錄云。翡翠犀。金人氣粉犀。

用法 古法多到末。或作片用。近則多磨服。

性質 苦。酸。寒。無毒。

成分 含炭酸石灰。磷酸石所。

膠質等。其有效成分為硫化乳酸。效能。清心胃熱。療傷寒時疫。解溫毒。止吐衄。用作強壯解熱解毒諸藥。

作用 在胃不起作用。至胃略。有激腸蠕動之效。入血中能使中樞神經興奮。心跳強盛。血壓增高。同時又能減少白血球。使體溫下降。

主治 百毒鬼疰。邪鬼瘴氣。殺。鈎吻灼羽蛇毒。除邪。不迷惑。寢。久服輕身。(本草)又治傷寒溫疫。頭痛寒熱諸毒氣。令人駿健。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論犀角曰。辟中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背。癰疽。瘡腫。化膿。作水。療時疾。熱如火。煩毒。入心。狂言妄語。【唐】李珣海藥本草論犀角曰。主風毒攻心。既耗熱。則赤痢。小兒疝豆。及風熱疔。刺。【唐】孟詵食療本草論犀角曰。燒灰水服。治卒中惡。心痛。飲食中毒。藥毒。熱毒。筋骨中風。心風。煩悶。中風。失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀。功用相同。【宋】日華

十一 靈犀

諸家本草論犀角曰。治心煩。止驚。鎮肝。明目。安五臟。補虛勞。退熱。消痰。解山瘴。溪毒。【明】李時珍本草綱目論犀角曰。磨汁。治吐血。衄血。下血。及傷寒。蓄血。發狂。譫語。發黃。發斑。痘瘡。稠密。內熱。黑陷。或不結痂。瀉肝。涼心。清胃。解渴。【清】黃宮繡本草求真論犀角曰。犀角苦鹹。大寒。功歸入胃。清熱。及入心。涼血。蓋胃為水穀之海。無物不受。口鼻為陽明之竅。凡毒邪必先由於口鼻。而入。以及於陽明胃腑。犀角為神靈之獸。食百草之毒。及衆木之棘。角尖。精力盡聚。用此苦寒之性。使之歸入陽明。以清諸熱。百毒也。熱邪既去。心經自明。所以狂言妄語。熱毒癰腫。驚煩。目赤。吐血。衄血。蓄血。時疫。斑黃。直瘡。黑陷等症。無不由於入胃入心。散邪。清熱。涼血。解毒之功也。然痘瘡。心火。初用不無冰伏之虞。後用不無引毒入心之患。故必慎用。始無礙耳。至於熱毒之癰。遇有飲食。以犀筋攪之。有毒則生白沫。無毒則無。若云可以發表取汗。則必礙熱閉表。合以升發等味同投。則見魄汗淋漓。若

微毒。單用則不及矣。銛成以熱。掌摸之。香者真。不香者假。成器多被蒸。煮無力。入湯劑。磨汁。八九劑。對細納懷中。待熱搗之立碎。【清】楊時泰本草述鈎元論犀角曰。犀茹百毒。食衆棘。凡毒入此獸之胃而悉化。其角屬陽性。走散。潔古謂為陽中之陰。大抵入胃而效。心之用者。心為火主。風逐火。焰。火散而風自平。且肝脾之系。俱連繫於心。是以風毒風熱。驚癩。斑黃。遇之而悉。穆。至於瘡腫化膿。特療血分熱毒之餘事耳。【清】賈九如辨藥指南論犀角曰。犀角氣香。屬陽。主走散。性涼。屬陰。主湧泄。妙在陰陽並用。善清虛火上炎。致吐衄。妄行。肺胃中蓄血凝滯。又取其味苦酸鹹。恰合心神之性。蓋心惡熱。以苦涼之心。苦緩。以酸收之心。欲軟。以鹹軟之。且清香透心。以此益心神。即能鎮肝氣。一切心經肝膽之熱。必不可缺。若小兒驚癩。疔熱。痘瘡。血熱。尤為聖藥。

許。根部扁闊。徑五六寸。皮極粗糙。色灰白。中心作深黑色者。名烏犀。角為上品。其白色者為下品。凡劈之。經理。撫之。滑澤者真。其高二三寸。色黑。形如盆山者。呼倍多利。亦堪用。其形似牛角。長一尺六七寸。根粗三四寸。不扁闊。劈之。縱理密者為水犀。不真。又和漢藥考曰。中國人以犀角製為酒杯。花瓶等。視為珍品。酒杯曰兕觥。酒中如有焯毒。一入此杯。立即沸騰。泛溢。人知此酒有毒。得免於害。試之。百不爽一。又犀皮異常堅厚。即鋼刃亦難割。刻。統丸亦不易貫徹。故印度及非洲土人。均以其革製鏡柄。頗重。視之。其肉味極美。印度人嗜食之。辨偽 犀角用黑兕角及水牛角。雕琢形似。假造混雜。鑿便之粉。或錯便之屑。更難辨別。按李時珍云。犀出西番。南番。瀾南。交趾等處。有山犀。水犀二種。水犀出入水中。尤難得。陶宏景云。入藥。惟取雄犀。生者為佳。若犀片及見成器物。已被蒸煮。不堪用。寇宗奭云。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力。盡在是也。用者當選角質烏黑。肌皺折裂。光

潤者。錯屑入白。杵細研末。或當面
鍍粉。或取頂尖犀水取汁尤佳。再
李珣有云。凡犀角鑄成。當以薄紙
裹於懷中。蒸燥乘熱。磨之。應手如
粉。此法今人鮮知。故罕用耳。曹
炳章曰。按嶺表錄異云。犀牛似牛
形而豬頭。腳似象。蹄有三甲。首有
兩角。一在額上為兕犀。一在鼻上
較小為胡帽犀。鼻上者皆蒼東而
花點小。多有奇紋。粘犀亦有兩角。
皆謂毛犀。俱有粟紋。堪為腰帶。干
里犀中或有通者。花點大小奇異。
固無常定。有獨花路道。有頂花大
而根花小者。謂之倒插通。此二種
亦五色無常矣。若通處白黑分明。
花點差池。計價巨萬。希世之寶也。
海島逸志云。犀牛大過於牛皮如
荔殼。而紋大如錢。背皮如馬鞍。以
覆其項。頭似鼠。嘴似兔。足蹠腫如
象。好行荆棘中。喜食藤刺。頭一角
在鼻梁。世所繪其角在額者非也。
此余所目親。其行林中。觸樹多折。
此頭一角。或即特犀也。沈萍如云。
犀角本草載出西番南番滇南交
廣諸處。有山水兕三種。山犀易得。
水犀難見。並有兩角。鼻角長而額

角短。水犀皮有珠甲。山犀則無。兕
即碎犀。止一角在頂。紋理細膩。斑
白分明。不可合藥。蓋粘角紋大。而
粘角紋細也。其紋如魚子形。謂之
粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有
黃花者為正透。黃中有黑花者為
倒透。花中復有花者名重透。並名
通犀。乃上品也。花如椒豆斑者次
之。烏犀純黑。無花者為下品。其通
天夜視有光者。名夜光犀。能通神。
又有角上有紋直上至端。夜露不
濡者。名通天犀。羌海雜誌云。犀角
皮厚而無毛。鼻上生前後兩角。後
之所產。祇有一角。為解熱之特效
藥。且亦自能解角。角藏於巖穴中。
獵人以如其形木角易之。則次年
解角仍藏原處。否則更易他處。不
復再見矣。今就市上所通行者。惟
暹羅角為最佳品。其外有瘤。根盤
內有蜂巢形。中凸出如墩。兩畔陷
紋粗。削片自多黑少。為上品。交趾
產者。外無瘤。內無墩。紋較細者次
之。又有一種天麻角。性硬。更次。雲
南產者。角尖長。其氣臭。最次。凡犀
角為熱症中之退熱特效藥。關係
人命生死。非尋常藥可比。必須採

辦的真。暹羅角為要。須看色黑。劈
開處直紋粗者為妙。尖上頭圓
更佳。試法以真犀角置為酒器。則
清香為異耳。沈萍如云。犀角以有
花紋而粗者為貴。今市人多以雲
貴山中野牛野羊角偽之。其角黑
而無花紋。且氣短耳。此等偽角。害
人生命。不可不慎。
近人學說 程登瀛曰。犀兕
之遺產者。其形狀最曾為文在叻
坡醫藥月刊發表。並預備拍攝犀
照。以證歷來角生鼻端說之說誤。
惟此項照片不易得。查辭典所收
圖說。皆係角生鼻端。即洋人所畫
之獵獸圖。亦係一角生於鼻尖。以
是疑是各地產物。變形。蓋暹地出
產頗多。獵人每割頭角出市場。犀
之形狀。固人人知曉也。茲特將選
產特徵及近日市價。摘錄如下。犀
之形態似水牛。而體較長大。頭尖
眼細。頭短。不善轉側。腳成筒狀。
三個蹄趾甚擴張。其皮角分正
副二種。價值相差甚鉅。犀一角。生
額中。兕二角。縱列。長角在頭額
中。照角在鼻端。形如枳壳。重兩許。
高不過一寸。亦稱角解。蓋薄如

薄餅故也。犀角成斜圓錐體。角頭
徑達四寸。重至二磅者。長僅六七
寸。平常多隆凸如山峯。兕角甚至
尺許。微身斜。又犀角表面灰黑而
角質白。角盤部顆突粗糙。盤緣週
圍有凹痕。稍隆底部有均勻小溝
紋。自角壁外透入內壁成凸凹紋。
世稱千支紋。兕角灰黑色。角盤部
逐漸擴大成平坡狀。無凹溝。表面
粗裂如松皮狀。與正犀之數十
條角絡成粗顆突者不同。犀角
端鈍圓。角空淺。兕角端微尖。角空
較深。角空底皆有蜂窩孔。犀皮嫩
髮成不規則圓形。大半呈六角形。
大如網錢。俗稱鳳梨皮。即婆羅
蜜皮樣。兕皮嫩髮多直紋。亦有
交錯成小井字形部位。犀毛生嫩
裝中。粗硬而疏短。尾短無拂毛。兕
尾似牛尾。毛細密。犀腳趾甚擴張。
蹄甲面圓滿。兕趾不甚擴張。蹄甲
面稍隆。據近日兌價。犀角一斤莊
每斤值七百餘銖。兕角值六百銖。
十二兩以上。作斤莊計算。小角較
廉。在往時兕角常比犀便宜一半。
嘗發見以小兕角刻造混充正犀
之糾紛。犀皮每擔值二千銖。兕皮

約一百五十餘而已。此種皮角。概由香港轉運至上海。犀之種類名稱不一。今分析之。犀較小於象。角生鼻端。其皮較厚。極堅厚。印度犀一角。非洲犀二角。縱列。一前一後。角質堅緻。可以製器。可以入藥。見辭源。犀（本經中品）奇蹄動物。體較河馬爲重。四肢短。有三蹄。頭上有一角或二角者。前角在鼻骨處。後角在頭骨。一角者只有前角。產亞非兩大洲。水陸均有之。見中國醫學大辭典。按辭源。醫典所附犀圖相同。均係一角位於鼻尖端與耳對立成三角柱形。卽一角者只有前角是也。大概兩辭書係取材歐美動物學書。不知該圖採自何地。其兩耳長而聳。角甚細長。與耳埒。殊不類遺產的活犀。辭源復謂印度犀一角。其圖殆爲印度產歟。暹與印度接壤。所產亦只有一角。（照角不算）其角却生額額正中。此距離幾百里。產物之異形歟。抑辭書之訛誤耶。犀爲食草反芻獸。高如大水牛。體較長大。尾短無絨毛。頭肥大。自肩至頭尖突如梭。全頭短硬。不善轉側。耳向兩旁

斜翹。頭尖眼細。角位於耳目之中。中央角生鼻骨端。爲硬革包軟骨質的隆凸形。老兕特高寸許。如女乳峯。雌者較低平。正火犀則消滅無形。肢肥短成圓筒狀。蹄擴展。辨其皮角分正副二種。價值相差甚鉅。正金剛犀。眼晴黃赤如瑪瑙色。俗稱火犀。皮突起顆疣狀。毛極疎。小生裂痕中。其皺裂成不規則之圓形紋。曰鳳梨皮（卽鱗鱗樣）。厚五六分以至七八分。以年齡之老幼爲差別。其胎孕十二個月。壽命較長於象。前年每擔皮值千未。現市價報千五六。最近有售得二千餘未者。兕犀（商人簡作庶。名其皮角爲副莊）尾毛似牛。皮略有粗橫紋。或橫直交錯粗裂如象皮。厚四五分。一擔值百五六未。正銅角大十三四兩者。長僅五六寸。由角纖維組織而成。附著於頭皮。無角套。基部甚擴大。如竹筍形。層層粗細。或顆粒如珠釘。角尖椎鈍。微呈彎斜。向前或向後無定。小角僅隆凸三四寸。如山峯。角基緣伸展四五分。插入皮裏。曰角盤。週圍皺裂成網線紋。曰干支紋。內緣

壁有柏皮狀的細毛管。角空甚淺。反側頭視之。恰成小髻。樣樣的窩凹。底部呈海棉狀。鬆疏的枯骨孔。固著於頭額特形凸突之硬筋膜。爲血管神經所出入。兕副莊角較細長。外表平。端尖細。略彎曲。角盤無甚擴展。角空成半球圓。干支紋。毛管粒。比較皆稠塗不能如正莊之顯著。刻下市價較前年漲三分之一。一筋莊。正角售九百未。副五六百未。十二兩以上作筋莊計。算小者較廉。舊說謂牝犀曰兕。無角。但兕實牝皆有角。牝角恒較小耳。上述兩種皆有其雌雄。據獵人言。兕謂犀之生。殖力甚衰弱。自和中國交通以來。視爲山林間之活寶。百計謀殺之。故現時森林中之剛犀頗稀。而山牛却很多。剛犀起羣。尋不過雌性交媾時。卽與山牛交而生變種的兕。雌兕與犀交生犀。與牛交生牛。雄者交犀交牛皆生兕。變種從雌性化也。此說雖未有憑證。可以證實。我們也無比較真確的證據。可以駁他。只能說犀兕是同類異種。但觀察家作旁證。駱馬與鴉鵂能變種。人類亦

能變種。犀之形態似牛。通稱爲犀牛。特頭尾皮毛蹄角與牛異。兕之皮尾毛類牛。短椎角變爲較細長。而有彎曲。假定爲犀與牛交之變種。其推測却有相當之理由可備。（按商場別稱爲庶。副兕字是我借加的。此種副莊犀。是否古人稱虎兕之兕。余不敢斷定。）獵人三五成組。帶米與火種入深山。隨地斫竹爲炊器。以藤蘆葉實爲加味。獵取禽獸佐餐。常生活於森林中。犀喜居山坡。掘土窟積水爲住所。常以泥漿塗其身。髮見足跡。則隱伏其常行路旁。截橫身射擊之中。彈則一直前走。因其習性罕回頭。傷人可從尾後追趕無危險。垂死時卽出尿。獵人備竹筒承之。並割取其珍貴部分。備淺山距市場較近。及正剛犀則盡取其皮肉。尖頭弄宜。兩府常年獲二三十頭。全西勢當有百幾十頭。其皮角概運銷我國及日本。犀食草蔬。肉細膩。如雞。經過三日尙未腐敗可食。味亦甘美適口。除骨內外各部分。大多收入藥。於治療上有特效者。如角皮齒蹄甲勢尿尿血等。犀稟性

清潔。喝必擇流水。先以右前足攪之。使沉澱之樹葉雜草。隨水流淨。至澄清見沙石才飲。故有前蹄較光赤為最佳。一腳三個甲。中甲兜肚狀。外甲略成三角形。甲空之裂痕。蜂窠孔。略如角空一樣。故真蹄角是無物可以混充的。其清熱解毒。治失血發癩諸症。功用與角同。雖效力稍遜。但重用之仍較廉宜。故能暢銷於本地各市場。勢為剛犀之生殖器。短大似扇。副細長如牛。末端分叉。每具值百末。味鹹微甘。溫熱善發汗。取三錢和生薑煎服。治傷寒感冒初起惡寒症。有特效。借常人無病理常服。過伏暑溫熱亦作服。服必淋汗。因之灼燥津液。增加濕熱。病至不起者甚多。尿青綠色。味極臭惡。治黃腫下消。小便渾濁症頗有效。純淨者難得。多是獵人割時注尿洗滌其尿胞而已。屎(肚草)有毒能殺蟲。燃燒薰疥癬疾。煨研搽腫瘍。無名腫毒。其消腫解毒之功甚偉。血療跌打傷。沖溫酒服。其破瘀行血之效。勝山羊血。殺時收血入竹筒內。以草管貫其中。架炭火上燻炙。隨吹乾結。

後劈竹成片。故有發酵樣的惡孔。齒與蹄甲。磨水服清涼。修治成膏。或以醋磨。搽熱毒瘡。腫瘍疼痛最有效。男皮多割入藥。一斤兌二元餘。為祛溼解毒之要劑。正剛皮一斤值二十元。余在生藥行時。殊罕見買。特向巴貨商詢問。始知本品為服食上品。如燕窩魚翅。不常入煎劑也。舊以嶺表錄異所載。犀之種類最多。但沈萍如劉恂辨釋種類。都有五通五色花樣。在今日但覺光怪陸離。無從核對。惟通天犀一名。邇地亦有傳說。謂某地有火犀一頭。夜行森林中。火光照耀如電。異通神。獵人伺捕皆不能鏡中云。李時珍云。犀出西南。番禺南。交廣諸地。有山水兕三種。避水犀尤難得。地方繁盛。大野獸逐漸滅種。今世殆無避水犀。則上述兩種。在邇地亦已罕見。減少矣。抱朴子云。犀食百草之毒。故能解百毒。凡蟲毒之解。於飲食時以角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱。羌海雜誌載皮厚無毛。鼻上生前後兩角。為退熱解毒之特效藥。自能解角脫。

角藏於巖穴中。獵人以如其形之木角易之。則次年解角仍存原處。否則更易他處。不復再見矣。陶宏景云。入藥惟取雄犀生者為良。自脫者次之。苦角片及見成器物。已被蒸煮不堪用。李珣有云。當以薄紙裹於懷中。蒸燥。乘熱搗之。應手如粉云。此皆理想之言。一一試之。並未盡然。據獵人說。不曾捕獲無角或新生小角者。從可推知其角之牢固。沒有解換。縱有自脫之死角。亦非偶然所能拾得。故知市肆必無自脫之角。亦無已被煮之現成器。陶氏之言。無須顧慮。只要提防假角耳。在邇地一角值百元至千元。以此為貨當交易。亦常發生假角騙案。但正角有直破痕者。最無價值。或竟無人承買。不知何故。俗稱破裂角是死運衰兆。殆因質無錢。故為是言耳。袁淑範曰。今將依化學的試驗所得之成績。簡略陳之。則如左。一。犀角五瓦之熱湯浸出液中。含有○、○二五瓦之乾燥物質。二。犀角一瓦中含有一○、○三瓦之灰分。三。犀角一瓦中有○、○五瓦。即含有五

%之硫黃。四。犀角浸出液不呈任何 Alkaloid 反應。五。犀角之加水分解產物中。得證明約有二%之奇羅進(Tyrosin)及若干之硫化乳質(Thiomilchsäure)奇士素(Nyctin)等。六。犀角之水蒸汽蒸餾液中。含有與水性浸出液呈同樣硫黃臭之揮發成分。由是知犀角之有效成分。吾人不得不先注目於 Nyctin 及 Thiomilchsäure。前者據漢氏(Buchta)之法。以人類之頭髮。用化學的方法處理之。而得 Nyctin 之結晶。後者又依雷鳴氏(Levin)之法。從製 Brenzkamphorsäure 着手。用人工的集成法。可得 Thionitrosäure 之純品。然後再以之與犀角浸出液行比較的動物實驗。其結果可證明 Thiomilchsäure 為薄溶液之作用。完全與犀角浸出液之作用相同。Thionitrosäure 存在於角質之加水分解產物中。早經史氏(Schiff)證明確定之事實。今又將犀角水蒸汽蒸餾液用依的兒(Aether)振盪之。再試驗其依的兒殘渣時。

Thiomilchsaure之反應。確為陽性。依此犀角之一種有效成分為硫化乳酸 Thiomilchsaure。於此益可知矣。概括以上實驗之成績而得結論如左。(一)犀角對於由溫刺或由副腎素腦內注射所發之熱。不呈解熱作用。(二)犀角於正常之心臟。不呈作用。然對於能力減弱之心臟。有使心動強盛之效。(三)犀角對於或種毒物。有解毒作用。(四)犀角浸出液靜脈內注射。能使白血球減少。(五)犀角之加水分解產物中。證明有 Tyrosin, Zystin und Thiomilchsaure等。(六)犀角之浸出之水蒸汽。蒸餾液生理的作用。與硫化乳酸 (Thiomilchsaure) 之作用完全相同。依以上諸種實驗之成績。使吾人得知犀角之一有效成分。確為硫化乳酸無疑。

配合應用 犀角、鬼臼、麝香、龍齒、茯神、蘇合香、沉水香、天靈蓋、丹砂、雄黃、能辟鬼疰邪氣。

① 治大人小兒風熱驚癇。用犀角、丹砂、琥珀、金箔、天竺黃、牛黃、鈎藤、鈎羚羊角、真珠、麝香。

十一畫 犀

② 治痘瘡血熱。初見點。紅腫。壯熱。口渴。煩燥。狂語。犀角磨汁。同生地黃、紅花子、麥門冬、紫草、白芍藥、鼠黏子。多服。可保無虞。

③ 治吐血衄血。犀角磨汁。同鬱金、童便、生地黃、麥門冬、炙甘草、白芍藥、紫蘇子、蔚草、丹參、白藥子。

④ 犀角地黃湯。治傷寒蓄血發黃。或熱盛吐血。

⑤ 入紫雪丸。治大人小兒顛狂。溫疫癘毒邪魅。一切煩熱為病。

⑥ 入抱龍丸。治小兒恍惚驚悸。痰涎壅塞。

⑦ 入至寶丹。治中風不語。中惡氣絕。一切神魂恍惚。癡狂擾亂等證。

⑧ 治中忤中惡鬼氣。其證或暮夜登廁。或出郊外。忽然倒地。厥冷握拳。口鼻出清血。須臾不救。似尸厥。但腹不鳴。心腹暖耳。勿移動。令人圍繞燒火打鼓。或燒蘇合香安息香麝香之類。候醒乃移動。用犀角五錢。麝香、砂砂各二錢五分。為末。每水調二錢服即效。(華陀方)

⑨ 治臥忽不寤。若以火照之則

殺人。但唾其面。痛癢其腫。及大趾甲際。即活。以犀角為枕。即令不覺。

⑩ 治痘瘡稠密。不拘大人小兒。生犀於澀器中。新汲水磨濃汁。冷飲服之。(錢氏小兒方)

⑪ 治消毒解熱。生犀角尖磨濃汁。頻飲之。(錢氏小兒方)

⑫ 治蠟螻尿瘡。狀如茶葉。中央白膿。惡寒壯熱。可磨犀角汁塗之。(千金方)

⑬ 治癩疽毒瘡。喜着十指。狀如代指。根深至肌。能壞筋骨。毒氣入臟。殺人。宜燒鐵烙之。或灸百壯。日飲犀角汁取瘥。(千金方)

⑭ 治山嵐瘴氣。犀角磨水服之。良。(集簡方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非大熱及無溫毒者。與孕婦禁用。惡雷丸、烏頭、烏喙、慈石、忌鹽、松脂、升麻為之使。

著名方劑 犀角地黃湯。治傷寒及溫病。應發汗而不汗。內蓄血者。及鼻血吐血不盡。內餘瘀血。大便黑。面黃。消瘀血。(千金方) 犀角一兩。生地黃八兩。芍藥三兩。丹皮二兩。上四味。咀。以水九升。煮取

三升。分三服。

參攷資料 ① 犀角犀之精靈所聚。尼陽明藥也。胃為水穀之海。飲食藥物必先受之。故犀角能解一切諸毒。五臟六腑皆稟氣於胃。風邪熱毒。必先干之。故犀角能涼諸血。及驚狂斑痘之證。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之熱。所以能解毒。凡蟲毒之癩。有飲食以此角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱也。北戶錄云。凡中毒箭。以犀角刺瘡中。立愈。由犀食百毒。棘刺也。昔溫嶠過武昌。牛渚磯下。多怪物。嶠然犀角照之。而水族見形。淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。則犀之精靈辟邪不惑。於此益可見矣。(李時珍) ② 犀角妊婦勿服。能消胎氣。(雷斅) ③ 犀字篆文象形。其特名兒。亦曰沙犀。爾雅翼云。兕與犀字音相近。猶殺之為犛也。大抵犀兕是一物。古人多言兕。今人多言犀。北音多言兕。南音多言犀。為不同耳。梵書謂犀曰揭伽。(李時珍) ④ 犀出永昌山谷。及益州。永昌即今滇南也。(別錄) ⑤ 今出武陵。交州。寧州諸

遠山犀有二角。以額上者為勝。又有通天犀。角上有一白縷。直上至端。夜露不濡。入藥至神驗。或云此是水犀。角出水中。漢書所謂羶犀者。置米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有怪犀。角甚長。文理似犀。不堪入藥。(陶弘景) 怪犀是羶犀。文理細膩。斑白分明。俗謂斑犀。服用為上。入藥不如雄犀。(蘇頌) 犀出西番南番。滇南交州諸處。有山犀。水犀。兕犀三種。又有毛犀。似之。山犀諸山林人多得之。水犀出入水中。最為難得。並有二角。鼻角長而頰角短。水犀皮有珠甲。而山犀無之。兕犀即犀之特者。亦曰沙犀。止有一角在頂。文理細膩。斑白分明。不可入藥。蓋牯角文大而特角文細也。洪武初。九真曾貢之。謂之獨角犀是矣。陳藏器謂犀無水陸。郭璞謂犀有三角。蘇頌謂毛犀為牯犀。皆其說傳。毛犀即牯牛也。犀角紋如魚子形。謂之粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有黃花者為正透。黃中有黑花者為倒透。花中復有花者為重透。並名通犀。乃上品也。花如椒豆斑者

次之。烏犀純黑。無花者為下品。其通天夜視有光者。名夜明犀。故能通神開水。飛禽走獸見之皆驚。又山海經有白犀。色白。開元遺事有辟寒犀。其色如金。交趾所貢。冬月暖氣襲人。白孔六帖有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能清暑氣。嶺表錄異有辟塵犀。為簪梳帶勝。塵不近身。杜陽編有獨忿犀。云為帶。令人獨去忿怒。此皆希世之珍。故附見之。(李時珍)

【犀角片】即犀角之處方用名。詳【犀角】條。

【犀角尖】即犀角之處方用名。詳【犀角】條。

【犀角】條。古籍別名 星洛。泥洛。

【犀洛】(別錄) 犀洛為雜草類之一種。基本 犀洛為雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 癰疾。

【犀角】即羶犀之原名。詳【羶犀】條。【猛火油】即石腦油之古籍別名。典見康輿之昨夢錄。詳【石腦油】條。

【猪心花】即辛亥之古籍別名。典見和漢藥考。詳【辛亥】條。

【猪牙草】即蕭蕭之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蕭蕭】條。

【猪耳菜】即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳【羊蹄】條。

【猪屎草】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【夏枯草】條。

【裸慄】即果然之古籍別名。典見綱目。詳【果然】條。

【理石】命名 本品即石膏之順理而微硬有肌者。故名。

古籍別名 立制石。(本經) 肌石。(別錄) 精理黃石。

外國名詞 Marmor

形態 理石為石類之一種。即石灰岩之變性。有白色雜色兩種。白者為火成石灰岩。由粒狀之結晶質。集合而成。可供造像碑坊。其雜色者。為水成石岩。質極緻密。含鐵及黏土等不純物。有黑黃青諸彩色。具山川雲物之形狀。可供屏風及嵌桌椅窗壁。但有由人工造成者。其狀頗似其天然生成者。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 身熱。利胃。解煩。益精明目。破積聚。去三蟲。(本經) 除發衛中去來大熱。結熱。解煩毒。止消渴。及中風痿痺。(別錄)

歷代紀述攷證 【唐】蘇恭新修本草論理石曰。漬酒服。療癰。令人肥悅。

配合宜忌 惡麻黃。滑石為之使。

【理文石】即密陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳【密陀僧】條。

【琉球石】即番薯之日本名。詳【番薯】條。

【琉球藍】即馬藍之古籍別名。典見和漢藥考。詳【馬藍】條。

【琉璃】即琉璃石之原名。詳【琉璃石】條。

【琉璃石】原名 琉璃。命名 本品漢書作流離。蓋謂其流光陸離也。故名。

古籍別名 火齊。(綱目)

產地 出高麗諸地。

形態 琉璃石為石類之一種。色白而堅。厚半寸許。可製為燈罩。映光較明。採得可供藥用。

主治 身熱目赤。以水浸冷熨之。

【琉璃草】

產地 出廣東始興縣玲瓏岩。

形態 琉璃草爲雜草類之一種。莖如芹梗。可供藥用。

主治 風疾。功類風藥。

【瓠瓜】 卽蜜蘆之實首尾如一者。詳「蜜蘆」條。

【瓠蘆】 卽蜜蘆之別名。詳「胡蘆」條。

【甜勾根】 卽覆盆根之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆根」條。

【甜瓜】

命名 本品味甜於諸瓜故名。

古籍別名 甘瓜(唐本)果瓜(綱目)真桑瓜(日本)

外國名詞 Cucumis Melo, (拉丁)マクハウリ(日本)

基本 係葫蘆科胡瓜屬。爲甜瓜之瓜類。

產地 原產亞細亞及亞非利加之熱帶地方。現我國各省均有出。

形態 甜瓜爲果類之一種。莖生本草。莖細長。有卷鬚。纏繞他物。

之上。葉圓作心臟形。掌狀分裂。夏日開花。花單性。雌花與雄花同株。合瓣花冠色黃。結實爲瓠果。至盛夏成熟。概呈橢圓形。長四寸許。色亦黃。有縱條紋而無刺。味甘甜。



甜瓜

性質 甘寒。滑。有小毒。

主治 止渴。除煩熱。利小便。通三焦。開壅塞。氣治口鼻瘡。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論甜瓜曰。暑月食之。永不中暑。清黃宮。補本草求真論

甜瓜曰。甜瓜。暑月解止渴之品也。味甘性寒。有毒。凡人因於暑月內

伏。症見膿血惡痢。痛不可忍。須以水浸甜瓜數枚。食之即愈。若瓜經

日曝。其寒尤甚。故書有言瓜寒於曝。油冷於煎。卽是此意。但此陽氣

素盛。亦宜少食。若使脾胃素冷。服之則有瘧痢。痘黃。動氣反胃。陰下

生癢。生瘡。發熱作脹之變。須用鹽花少許。麝香與酒則解。脚氣痿痺

食之。惡永不除。瓜蒂甜主涌吐。但有兩鼻兩蒂者。殺人。皮可取收作

藥。或蜜收晒爲菓。【清】王士雄隨息居飲食譜論甜瓜曰。甜瓜甘寒

滌熱。利便除煩。解渴療飢。亦治暑痢。種類匪一。以清香甘脆者勝。多

食每患瘧痢。凡虛寒多溼。便滑腹脹。脚氣及產後病後皆忌之。其子亦可食。

參攷資料 ①瓜性最寒。曝而食之尤冷。故嵇聖蘭云。瓜寒於曝。油冷於煎。此物性之異也。王翼洛

都賦云。瓜則消暑。消解渴療飢。又奇效良方云。昔有男子病膿血

惡痢。痛不可忍。以水浸甜瓜。食數枚即愈。此亦消暑之驗也。(李時珍) ②多食發黃疸。令人虛羸多

忘。解藥力。病後食多。或反胃脚氣。人食之。惡永不除也。(孫思邈) ③

多食令人陰下溼。痒生瘡。動宿令穢。癢病。破腹。發虛熱。令人假假氣

弱。脚手無力。少食則可。龍魚河圖云。凡瓜有兩鼻兩蒂者。殺人。五月

瓜沉水者。食之得冷病。終身不癒。九月被霜者。食之。冬病寒熱。與油餅同食。發病。多食瓜作脹者。食鹽

花卽化。(孟詵) ④張華博物志。言人以冷水漬至膝。可頓啖瓜至數十枚。漬至項。其味轉多。水皆作瓜

氣也。則水浸消瓜。亦物性也。瓜最忌醇香與酒。凡食瓜過多。但飲酒

及水服辟香丸。勝於食鹽漬水也。(李時珍) ⑤瓜字篆文。象瓜在鬚

蔓間之形。甜瓜之味。甜於諸瓜。故獨得甘甜之稱。舊列菜部誤矣。按

王禎云。瓜類不同。其用有二。供果者爲果瓜。甜瓜。西瓜是也。供菜者

爲菜瓜。胡瓜。越瓜是也。在木曰果。在地曰蔬。大曰瓜。小曰瓠。其肉曰

瓠。其堆曰瓠。謂脫花處也。其蒂曰瓠。謂繫蔓處也。禮記爲天子削瓜

及瓜祭。皆指果瓜也。本草瓜蒂。亦此瓜之蒂也。(李時珍) ⑥甜瓜

北土中州種時甚多。二三月種下。廷莖而生。葉大數寸。五六月花開

黃色。六七月瓜熟。其類最繁。有圍有長。有尖有扁。大或徑尺。小或一

捻。其稜或有或無。其色或青或綠。或黃斑。或白路黃路。其瓢或

白或紅。其子或黃或赤。或白或黑。按王禎農書云。瓜品甚多。不可枚

舉。以狀得名。則有龍肝虎掌。兔頭

狸首。羊髓蜜筒之稱。以色得名。則有烏瓜白圓。黃瓜白圓。小青大斑之別。然其味不出乎甘香而已。廣志惟以遠東。嶺南。廣江之瓜為勝。然瓜州之大瓜。陽城之御瓜。西蜀之溫瓜。永嘉之寒瓜。未可以優劣論也。甘肅甜瓜。皮氣皆甘。勝糖蜜。其皮暴甘猶美。浙中一種陰瓜。種於陰處。熟則色黃如金。膚皮稍厚。藏之至春。食之如新。此皆種藝之功。不必均以土地也。甜瓜子曝裂取仁。可充果食。北瓜最長。麝氣。觸之。甚至一帶不收也。(李時珍)

【甜瓜子仁】

製法 雷斅曰。凡收得曝乾。杵細。馬尾篩過成粉。以紙三重裹。壓去油用。不去油。其力短也。西瓜子仁同。

性質 甘寒。無毒。

主治 腹內納聚。破潰膿血。最為腸胃脾內壅要藥。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論甜瓜子仁曰。止月經太過。研末。去油水調服。【唐】孟暉食療本草論甜瓜子仁曰。炒食補中宜人。【明】李時珍本草綱目論

甜瓜子仁曰。清肺潤腸。和中止渴。

【甜瓜花】

主治 心痛欬逆。

【甜瓜蒂】 ①即瓜蒂之處方用名。詳【瓜蒂】條。②即瓜蒂之原名。詳【瓜蒂】條。

【甜瓜蒂】

原名 瓜蒂。命名 本品係甜瓜之蒂。故名。

古籍別名 瓜丁(千金)苦丁香(象形)瓜蒂(和漢藥考)

基本 屬葫蘆科。甜瓜未熟之蒂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。甜瓜蒂產山東登州府蓬萊縣。八月新。

形態 甜瓜為栽植園圃之一

年生蔓草。莖有長粗毛。以卷鬚纏他物而成。葉作心臟圓形。有淺掌狀分裂。葉柄頗長。花為單性。

為黃色合瓣花冠。深作五裂。雌花及雄花生於同株。果實為漿果。有

甘味。形狀不一。但多數為橢圓形。長四五寸。徑二寸餘。成熟則呈有

光澤黃色。有綠色縱線。其蒂之熟者苦味少而效力薄。故入藥宜以

未熟瓜之蒂。

採取 六七月間採其背瓜蒂。

陰乾用。製法 雷斅曰。凡使勿用白瓜蒂。要取青綠色瓜。氣足時。其蒂自然落在莖上。採得擊屋東有風處。吹乾用。寇宗奭曰。此甜瓜蒂也。去瓜皮用蒂約半寸許。曝極乾。臨時

研用。李時珍曰。按唐璠云。甜瓜蒂以團而短。瓜團者良。若香甜瓜及長如瓠子者。皆供菜之瓜。其蒂不可用也。

性質 苦寒。無毒。

成分 日本醫學博士猪子吉人氏。對於其有效成分。名之為甜瓜毒素(Melocortin)。其後醫學

博士高橋順太郎氏。繼續研究。證明所謂甜瓜毒素者。實與瑪瑪琪加(Momoridica)果實中所含

愛拉鐵林(Elaterrin C₁₈H₂₅O₅)為同一物云。(見東京醫學新誌第八百五十七號)

效能 吐熱痰。治風癩。用作催吐藥。

主治 大水身面四肢浮腫。下水殺蟲毒。欬逆上氣。及食諸果病

在胸腹中。皆吐下之。(本經)去鼻中肉。療黃疸(別錄)

張仲景之醫明 瓜蒂一味。經張仲景之實驗。認為主治胸中有毒。欲吐而不吐。茲考徵如下。瓜蒂散證曰。胸中痞硬。氣上冲咽喉。不得息者。又曰。必中滿而煩。饑而不能食者。病在胸中。上方用瓜蒂一分。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論瓜蒂曰。治胸寒熱。眼昏吐痰。【元】王好古湯液本草論

瓜蒂曰。得辟香細辛。治鼻不聞香臭。【明】李時珍本草綱目論瓜蒂曰。吐風熱痰涎。治風眩頭痛。癩癩

喉痺。頭目有濕氣。【明】程希雍本草經疏論瓜蒂曰。瓜蒂感時令之火熱。稟地中之伏陰。故其味苦氣寒。有小毒。入手太陰。足陽明。足太

陰經。其主大水身面四肢浮腫黃疸者。皆脾胃虛。水氣濕熱。乘虛而客之也。若以湧瀉。使水溼之氣外

散。故能主之。經曰。在高者因而越之。病在胸中。則氣不得歸元。而為

欬逆上氣。吐出胸中之邪。則氣自順。欬逆止矣。殺蟲毒者。亦取吐

出

之義。去鼻中肉者。以其苦寒能除肺家之熱也。日華子治腦熱。眼昏吐痰。好古得野香細辛。治鼻不聞香臭。及吐風熱痰涎。風眩頭痛。癩癩喉痺。頭面有溼氣。傷寒客水胸中。傷食脹滿。下部無脈等證。皆借其宜發洩引涎。迫淚之功耳。【清】黃宮繙本草求真論。瓜蒂曰。甜瓜蒂即俗名苦丁香是也。味苦氣寒有毒。蓋此氣味純陰。功尚清泄。凡因熱痰聚。而見面目浮腫。致逆上氣。皮膚水氣。黃疸溼熱諸症。則當用此調治。或兼他藥同入清吐。如仲景合赤小豆之酸甘。以吐胸中寒邪。金匱瓜蒂湯。以治中噦無汗之類。若不因其高而越。則為喘為嗽。勢所必至。但非實熱實症。不可輕用。

國外學說 日本學說謂昔時用為催吐藥。然自吐酒石吐根等輸入後。已相形見絀矣。藥用者。當甜瓜未熟之時。採其蒂。乾燥之。有催吐之效。尤以新而味苦辛者為良。經年而失氣味者為劣。依猪子氏之實驗云。本品之有效成分。為難溶於水而易溶於亞爾個保爾

及依的兒之物質。而非糖原質。或亞爾加魯乙度之類。其作用也。或直達。或間接。刺戟嘔吐中樞。以誘起嘔吐。本藥以日本越前產者。尤有峻劇之性。故病牀上甚宜注意。因曾舉動物試驗之成績。而詳論之。【和漢藥論】漢醫吐劑之用量。凡〇・四。又和藥漢考曰。蒂之熟者少苦味。效力薄。日藥舖所售者。為越前福井所產。瓜瓜。為甜瓜之一種。之蒂。呼越前瓜蒂。為良品。據猪子博士言。瓜蒂注意服用。則祇刺戟胃腸而已。并不起吸收作用。即起呼吸障礙等。故毫無危險。惟服大量。則致急性胃腸炎。故須審慎云。

配合應用 ①治太陽中噦。身熱頭痛而脈微弱。此夏月傷冷水。水行皮中所致。瓜蒂二七箇。水一升。煮五合。頓服。取吐。【金匱方】
②治風涎暴作。氣塞倒仆。用瓜蒂為末。每用一二錢。膩粉一錢。匕以水半合調。良久涎自出。不出。含沙糖一塊。下咽即涎出也。【衍義方】
③治諸風諸癩。諸風癩痰。諸癩

涎涌。用瓜蒂炒黃為末。量人以醃薑水一盞調下。取吐。風癩加蠟。楸半錢。溼氣腫滿。加赤小豆末一錢。有蟲加狗油五七點。雄黃一錢。甚則加芫花半錢。立吐蟲出。【活法機要方】

④治風癩喉風。欬嗽及遍身風癩。急中涎潮等證。不拘大人小兒。此藥不大吐逆。只出涎水。瓜蒂為末。壯年服一字。老少半字。早晨井華水下。一食須含沙糖一塊。良久涎如水出。年深者出墨涎。有塊布水上也。涎盡。食粥一兩日。如吐多人。困甚。急以麝香泡湯一盞。飲之即止。【經驗後方】

⑤治急黃喘息。心上堅硬。欲得水喫者。瓜蒂二小合。赤小豆一合。研末。暖漿水五合。服方寸匕。一炊久。當吐。不吐再服。吹鼻取水亦可。【傷寒類要方】

⑥治遍身如金。瓜蒂四十九枚。丁香四十九枚。甘鍋內燒存性。為末。每用一字吹鼻。取出黃水。亦可揩牙追涎。【經驗方】

⑦治熱病發黃。瓜蒂為末。以大豆許吹鼻。中輕則半日。重則一日。

流取黃水乃愈。【千金方】

⑧治黃疸癆黃。並取瓜蒂。丁香。赤小豆各七枚。為末。吹豆許入鼻。少時黃水流。隔日一用。涎乃止。亦治身面浮腫。【孟詵方】

⑨治十種蠱氣。苦丁香為末。棗肉和丸。梧子大。每服十三丸。煎湯下。甚效。【瑞竹堂方】

⑩治溼家頭痛。用瓜蒂末一字。嚙入鼻中。口含冷水。取出黃水。愈。【活人書方】

⑪治瘧疾寒熱。瓜蒂二枚。水半盞。沒一宿。頓服。取吐愈。【千金方】
⑫治發狂欲走。瓜蒂末井水服一錢。取吐即愈。【聖惠方】

⑬治大便不通。瓜蒂七枚。研末。綿裹塞入下部。即通。【必效方】

⑭治鼻中寒肉。陳瓜蒂末吹之。日三次。瘻乃已。又方。瓜蒂末。白蠟末各半錢。綿裹塞之。或以猪脂和槌子塞之。日一換。又方。青甜瓜蒂二枚。雄黃。麝香。半分為末。先抓破後貼之。日三次。【聖惠方】又用瓜蒂十四枚。丁香一枚。黍米四十九粒。研末。口中含水。嚙鼻。取下乃止。【湯液方】

●治風熱牙痛。用瓜蒂七枚。炒研。辟香少許和之。綿裹。咬定。流涎。止。

(聖濟總錄方)

●治癩尿自禿。甜瓜蔓連蒂。不拘多少。以水浸一夜。炒熱。取苦汁。去性再熬。如儲。盛收。每刺去癩。洗淨。以膏一盞。加半夏末二錢。煎汁一匙。狗膽汁一枚。和勻塗之。不過三上。忌食動風之物。(儒門事親方)

●治胸喘痰氣。苦丁香三箇。爲末。水調服。吐痰即止。(朱氏經驗方)

用盤 八分至錢半。
施用宜忌 凡非氣壯邪實者
禁用

著名方劑 瓜蒂散。治太陽病胸中痞硬。氣上沖胸。不得息。此胸中有寒也。或手足厥冷。脈乍緊。心中煩滿。不能食。病在胸中。並當吐之。瓜蒂(熬)赤小豆各一分。上二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取汁。和散溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡直嘔家不可與之。

參攷資料 ●瓜蒂乃陽明經除濕熱之藥。故能引去胸膈痰涎。頭目溼氣。皮膚水氣。黃疸溼熱諸證。凡胃弱人及病後產後用吐藥。皆宜加慎。何獨瓜蒂爲然。(李時珍) ●瓜象實在鬚蔓間也。蒂瓜之綴蔓處也。性偏蔓延。未繁於本。故少延羶腐。爾雅曰。其紹庭。疏云。繼本曰紹。形小曰庭。故近本之瓜常小。近末之瓜轉大也。凡實之吮抽津液。惟瓜稱最。而吮抽津液之櫃惟蒂。是以瓜蒂具微下炎上之用。乃蒂味苦而瓜味甘。以見中櫃之所以別於上下內外。誠湧泄之宜劑通劑也。(盧子由)

甜瓜葉

主治 搗汁塗頭生髮

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論甜瓜葉曰。補中。治小兒疳及打傷損折。爲末酒服。去瘀血。

製法 採得後乾用

甜瓜蔓藤

主治 女人月經斷絕。同使君子各半兩。甘草六錢。爲末。每酒服二錢。

甜瓜類 卽甜瓜之別名。詳【甜瓜】條。

瓜條

【甜貝母】卽川貝母之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【川貝母】條。

【甜杏仁】原名 巴旦杏。本品卽杏仁之甜味者。故名。

處方用名 哀杏仁。

古籍別名 八撈杏。忽鹿麻。(綱目)把漢杏。

外國名圖 Prunus Amygdalus, Stokes.

產地 出回回舊地。今關西諸處亦有之。

形態 甜杏爲果類之一種。樹如杏而葉差小。實亦尖小而肉薄。核如梅核。殼薄而仁較杏爲大。其味甘美。如榛子。可供茶點與藥用。



甜杏仁

性質 甘。平。溫。無毒。

主治 止咳下氣。消心腹逆悶。

【甜陀淳子】卽蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蜜陀僧】條。

【甜柑】卽柑實之先霜而黃。每顆八瓣者。性質功能。詳【柑】條。

【甜桔槎】卽桔槎之甜者別名。典見綱目。詳【桔槎】條。卽繁危之處方用名。典見綱目。詳【繁危】條。

【甜消】卽芒硝之用蘿蔔同煮。煉去鹹味者。性質功能。參詳【芒硝】條。卽英治製煉之別名。詳【英治】條。

【甜梅】卽杏仁之古籍別名。典見綱目。詳【杏仁】條。

【甜染子】卽枸杞子之古籍別名。典見圖經本草。詳【枸杞子】條。

【甜菊花】卽菊花之處方用名。詳【菊花】條。

【甜葡萄酒】主治 令病人精神速復。

【甜橘紅】卽橘紅用糖汁製煉者之別名。詳【橘紅】條。

【甜厚糜】卽厚糜之處方用名。詳【厚糜】條。

【甜廣皮】卽橘皮之處方用名。詳【橘皮】條。

【甜蔞】卽蔞麥之古籍別名。典見綱目。詳【蔞麥】條。

【甜麥】即甜麥之處方用名。詳「甜麥」條。

【甜藤】 鹽地 生山野林下。形態 甜藤為蔓草類之一種。莖莖如葛。葉尖長氣辛臭。莖可供藥用。其葉詳見該條。

性質 甘寒無毒。
主治 熱煩解毒。調中氣。令人屬健。止洩。又治刺馬血毒入肉。及狂犬牛馬黃病。蛇咬傷。

【甜藤】 即甘藤之古籍別名。與見補註本草。詳「甘藤」條。即忍冬藤之古籍別名。與見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【甜藤葉】 性質 辛。臭。空治 搗傳。小兒腹中因癖。痞滿。

【甜藤】 即糖之木紋細白而質小者。性質功能。詳「糖」條。

【甜藤子】 即鈎粟之古籍別名。與見吳瑞本草。詳「鈎粟」條。

【產家大器】 即秦尤之古籍別名。與見和漢藥考。詳「秦尤」條。

【畢豆】 即豌豆之古籍別名。與見本經。詳「豌豆」條。

廣史。詳「豌豆」條。

【畢勃】 即華菱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「華菱」條。

【畢茄煙】 即煙草之一種。性質功能。與煙草同。詳「煙草」條。

【畢榜伽子】 即覆盆子之古籍別名。典見圖經本草。詳「覆盆子」條。

【畢澄茄】 古籍別名 毗陵茄。子。畢澄茄(綱目) 外國名詞 Piper cubeba, (可拉丁) ヒツチヨウカ(日本)

基本 係胡椒科胡椒屬。為畢澄茄之果實。

產地 出東印度。及爪哇等處。

形態 畢澄茄為喬木類之蔓生植物。葉長卵形而尖。開白花。穗狀花序。至夏結實。為漿果。如豌豆大。呈黑褐色。與胡椒一類。二種。其實可供藥用。

採取 八月九月採之。

性質 辛溫無毒。

製法 雷敏曰。凡採得。去柄及破皮。用酒浸蒸之。從已至酉。杵細晒乾。入藥用。

主治 下氣消食。去皮膚風。心腹間氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮。及香身。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論畢澄茄曰。治一切冷氣痰癖。并霍亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。明李時珍本草綱目論畢澄茄曰。暖脾胃。止嘔吐。噎逆。

【畢菱】 即華菱之古籍別名。典見大明會典。詳「華菱」條。

【吳翹】 即連翹之古籍別名。典見爾雅。詳「連翹」條。

【略石】 即略石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「略石」條。

【略本草子】 即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【盜庚】 即旋覆花之古籍別名。典見爾雅。詳「旋覆花」條。

【盒子草】 即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【盒兒藤】 即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【粟】 即秫之古籍別名。典見唐本草。詳「秫」條。

【粟口芝】 即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【粟戎】 即紫參之古籍別名。典見別錄。詳「紫參」條。

【話子】 即蛸蚪之古籍別名。典見綱目。詳「蛸蚪」條。

【硃砂】 原名 丹砂。命名 丹乃石名。其字從井中一點。象丹在井中之形。義後人以丹為朱色。遂呼為朱砂。其出辰州者為上。故有辰砂之稱也。

處方用名 辰砂。飛辰砂。塊辰砂。洋尖砂。劈砂。豈砂。鏡面砂。古籍別名 朱砂。脚砂。土坑砂。新坑砂。海坑砂。(綱目) 梅柏砂。金星砂。神末砂。平面砂。箭鏃砂。白庭砂。神座砂。妙疏砂。金座砂。玉座砂。白金砂。澄水砂。陰成砂。辰錦砂。芙蓉砂。曹末砂。(醫公炮炙論) 巴砂。越砂。雲母砂。馬齒砂。豆砂。末砂。(本草集註) 光明砂。馬牙砂。無量砂。(新修本草) 日精。真珠。仙砂。赤砂。赤帝。太陽。朱鳥。絳陵。朱兒。絳宮。朱兒。赤帝。精。赤帝。髓。朱雀。(石藥爾雅) 塊砂。階砂。針砂。神砂。溪砂。宜砂。真朱。半面砂。(和漢藥考) 類塊。鹿蘇。(圖經本草)

外國名詞 Hydrargyri Sulphidum Fabrum(拉丁) China Bante. (英) Zinnober. (德)

一一八七

基本 係金岩屬。為汞礦類之丹砂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。硃砂產貴州。以漢口為上。銅仁次之。大豆砂、鏡砂。均由此歸出。大粒者呼名鏡砂。為好。豆砂次之。和漢藥考曰。產於西班牙。奧大利亞。匈牙利。意大利。秘魯。墨西哥。諸國。中國以產於宜州。辰州者為上。錦州次之。日本則產於阿波。大和。伊勢。尾後。陸前等地。

形態 辰砂之形狀。如板。如絲。如粒。如塊。色紅。或褐紅。或褐黑。有金剛光澤。條痕作緋紅色。硬度二。○至三。五。比重八。○至八。二。熱則發生亞硫酸瓦斯。而蒸升水銀。諸酸類不溶解。惟濃硝酸能溶解之。

種類 丹砂品類頗多。以辰州。錦州出者為良。如馬牙。光明者為上品。白光如雲母者為中品。石片。稜角。生青光者為下品。其最佳者名箭簇砂。結而不實者名肺砂。細者名末砂。色紫不染紙者名舊坑砂。色鮮染紙者名新坑砂。

採取 採無時。土人採之。穴地

數十丈。始見其苗。乃白石也。謂之朱砂林。砂生於石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。十二枚為一座。其色如未開蓮花。光明耀目。亦有九枚為一座者。及有七枚五枚者。次之。每座中大者為主。四圍小者為臣。朝護四面。雜砂一二斗抱之中。有芙蓉頭成顆者。乃入上品之丹砂也。

製法 雷敏曰。凡修事朱砂。靜室焚香。齊沐後。取砂以香水浴過。拭乾。碎搗之。鉢中更研三伏時。取一瓷鍋子。每朱砂一兩。同甘草二兩。紫背天葵一錢。五方草一錢。着砂上。以東流水養三伏時。勿令水闕去藥。以東流水淘淨乾。熬又研如粉。用小瓷瓶入青芝草。山鬚草。半兩。蓋之。下十斤火煨。從巳至午。方歇。候冷取出。細研用。如要服。則以熬蜜丸。細麻子大。空腹服一丸。李時珍曰。今法惟取好砂研末。以流水飛三次。用其末。砂多雜石末。鐵屑。不堪入藥。又法以絹袋盛砂。用蕎麥灰淋汁。煮三伏時。取出。流水浸洗過。研粉飛晒用。又丹砂以石磨。消石和埋土中。可化為水。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 百分中含水銀八十六。硫黃十四。化學上謂之硫化水銀。

功效 安魂魄。定驚。明目。解毒。用作鎮瘧藥。又治初期梅毒。

作用 有直接殺滅微菌之能。惟功效遠不及水銀。

主治 身體五臟百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅。邪惡鬼。久服通神明。不老。能化為汞。一本經。通血脈。止煩滿。消渴。益精神。悅澤人面。除中惡。腹痛。毒氣。疥癩。諸瘡。輕身神仙。別錄。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論硃砂曰。鎮心。主尸疰。抽風。【宋】大明諸家本草論硃砂曰。潤心肺。治瘡。疔。息肉。并塗之。【明】李時珍本草綱目論硃砂曰。治驚癇。解胎毒。痘毒。驅邪。瘧。發汗。【明】繆希雍本草經疏論硃砂曰。丹砂味甘。微寒。而無毒。蓋指生砂而言也。藥性論云。丹砂君。為清鎮。少陰君火之上藥。辟除鬼魅。百邪之神物。安定神明。則精氣自固。火不妄炎。則金木得平。而魂魄自定。氣力

自倍。五臟皆安。則精華上發。故明目。心主血脈。心火寧謐。則陰分無熱。而血脈自通。煩滿自止。消渴自除矣。殺精魅。邪惡鬼。除中惡。腹痛者。陽明神物。故應辟除不祥。消散陰惡。殺腐之氣也。久服通神明。不老。古之真人。飛丹煉石。引納清和。配以金鉛。按之法象。自能合丹道而成變化也。【清】黃宮繡本草求真論硃砂曰。辰砂即書所云丹砂。朱砂者是也。因砂出於辰州。故以辰名。體陽性陰。外顯丹色。內含真汞。不熱而寒。雖中有坎也。不苦而甘。火中有土也。嬰兒媿女。交會於中。故能入心解熱。而神安魄定。是以同滑石。甘草。則清暑。同遠志。龍骨。則養心氣。同丹參。則養心血。同地黃。枸杞。則養腎。同厚朴。川椒。則養脾。同南星。川烏。之類。則祛風。且以人參。茯苓。神濃煎。調入丹。則治離魂病。以丹砂末一錢。和生雞子黃三枚。攪勻。頓服。則妊娠胎動。即安。胎死。即出。慎勿經火。及一切煎煉。則毒等於砒礪。况此純陰重滯。即未烹煉。久服。寐悶。以其虛靈之氣。被其鎮墜也。辰砂如明箭簇者。

良。

國外學說 英美學說謂硃砂產中國之廣東、貴州、四川、湖南等處。係自然生成。其配成者。係從汞與硫磺粉製煉。硃砂為希臘國人所知之藥。在古時埃及國人用之為顏料。中國與印度國。自古以來。即用為藥品。而中國所產之硃砂。在西國久已著名。又日本古方藥品考曰。朱真。即今辰砂也。以出辰州者為勝。故名。從前運至日本之辰砂。有馬牙砂、箭鏃砂、雲母砂、米粒砂數種。現今運來者。皆如豆粒大。體重。朱色鮮豔。此為上品。亦有細砂作黃赤色者。須水飛去黃。取丹砂用。日本產不入藥。方書中單稱朱。或單稱丹者。皆指辰砂言。日本呼作丹者。即鉛丹。呼作朱者。即銀朱。以水銀製之。故有毒。與朱砂不同。辰砂生用無毒。若煨煉過。則生水銀。有毒。故忌火。

辨偽 鄧肯巖曰。丹砂始出涪州山谷。今辰州、錦州及雲南、波斯、巒寮洞中。石穴內皆有。而以辰州為勝。故又名辰砂。大者如芙蓉。花小者如箭鏃。研之明淨鮮紅。斯

十一 蠶 硃

為上品。近今市肆有以鉛丹摻入硃砂。又用代赭摻入辰砂。貽害多矣。曹炳章曰。按硃砂體質極重。鮮紅。硃紅色至褐紅色之粒塊。亦有成細小透明之斜方之結晶體者。或為紅色粉末。有時含為有機物。則顏色殆黑。不明亮。俗為陰沙。實內含有銻質或鐵質。銅及各種硫化物。礦相伴。不堪入藥。周去非云。據本草金石部。以湖南辰州所產為佳。雖今世亦貴之。今辰砂乃出沅州。其色與廣西宜州所產相類。色鮮紅微紫。與邕州砂之深紫微黑者大異。功效亦相懸絕。蓋宜山即辰山之陽故也。雖然。宜辰硃砂雖良。要非仙藥。嘗聞邕州石江溪。歸德州大秀墟。有金縷砂。大如箭鏃。而上有金線縷文。乃真仙藥。得其道者。可用以變化形質。試取以煉水銀。乃見其異。乃邕州燒水銀。當硃砂十二三斤。可燒成十斤。其良者十斤。真得十斤。惟金縷砂八斤可得十斤。不知此砂一經火力。形質乃重。何也是砂也。取毫末而齒之。色如鮮血。誠非長宜可及。惜乎出產不豐。不能分銷全國耳。

今所通行者。皆湖南辰州及雲南貴州出者。苟能片大而薄。如鏡面光亮。色紫紅鮮豔。明透者。為鏡面砂。亦佳。如整粒者。為豆砂。能起鏡面光。豔亦佳。細如粉屑者。為米砂。略次。如呆色紫暗。不明亮者。即陰砂。內含銻質或鐵質。為更次。不宜入藥用。

配合應用 服食丹砂。三皇真人練丹方。丹砂一斤。研末重篩。以醇酒沃之。如泥狀。盛以銅盤。置高閣上。燥則復以酒沃。令如泥。陰雨疾風。則藏之。盡酒三斗。乃暴之。三百日。當紫色。靜室飯丸。麻子大。常以平旦向日吞三丸。一月三蟲出。半年諸病瘳。一年鬚髮黑。三年神人至。(太上玄變經方)

小神丹方。真丹末三斤。白蜜六斤。攪合日曝。至可丸。丸麻子大。每且服十丸。一年白髮反黑。齒落更生。身體潤澤。老翁成少。(抱朴子內編方)

明目輕身。去三尸。除疔。美酒五升。浸朱砂五兩。五宿日乾。研末。蜜丸小豆大。每服二十丸。白湯下。久服見效。(衛生易簡方)

神注丹方。白茯苓四兩。糯米酒。軟竹刀切片。陰乾。為末。入朱砂末二錢。以乳香水打糊。丸梧子大。朱砂末二錢。為衣。陽日二丸。陰日一丸。要秘精。新汲水下。要逆氣。過精。溫酒下。並空心。(醫壘元戎方)

烏髭髮白。小雌雞二隻。只與烏油麻一件。同水飼之。放卵時。收取先放者。打殺。以朱砂末填入。糊定。同柴卵。抱出雞。取出其藥。自然結實。研粉。蒸餅和丸。如綠豆大。每酒下五七丸。不惟髮白。亦且愈疾。(張路方)

小兒初生六日。解胎毒。溫臘胃。壯氣血。朱砂豆大。細研。蜜丸一粟大。調與吮之一日。令盡。(姚和衆至寶方)

預解痘毒。初發時。或未出時。以朱砂末半錢。蜜水調服。多者可少。少者可無。重者可輕也。(丹溪方)

治初生兒。月內驚風欲死。朱砂磨新汲水。塗五心最驗。(斗門方)

治小兒驚熱。夜臥多啼。朱砂

牛兩。牛黃一分爲末。每服一字。犀角屑水調下。(普濟方)

◎治急驚搐搦。用丹砂半兩。天南星一個一兩。重者炮裂酒浸。火煨三個爲末。每服一字。薄荷湯下。(聖濟總錄方)

◎治驚悸不語。打撲驚悸。血入心竅。不能言語。朱砂爲末。以雄豬心血和丸。麻子大。每煮湯下七丸。(直指方)

◎治客忤卒死。真丹方寸匕。蜜三合和灌之。(肘後方)

◎治癩癩狂亂。歸神丹。治一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足。癩癩狂亂。積痞心二個。切入大朱砂二兩。燈心三兩在內。麻扎石器煮一伏時。取砂爲末。以伏神末二兩。酒打薄荷丸。梧子大。每服九丸。至十五丸。至二十五丸。麥門冬湯下。甚者乳香人參湯下。(百一選方)

◎治產後癩狂。敗血及邪氣入心。如見祟物。狂。用汁三四茶匙調。以紫項地龍一條。入藥滾三滾。刮淨。大辰砂一二錢。研細飛過。用飲兒乳去地龍不用。入無灰酒

一盞。分作三四次服。(何氏方)

◎治心虛遺精。豬心一個。批片相連。以飛過朱砂末摻入。線縛。白水煮熟食之。(唐瑤經驗方)

◎治男婦心痛。朱砂。明礬。枯等分爲末。沸湯調服。(摘玄方)

◎治心腹宿癥。及卒得癥。用朱砂研細搜飯。以雄雞一隻。餓二日。以飯飼之。收糞。曝燥爲末。溫酒服方寸匕。日三服。服盡更作。愈乃止。(外臺祕要方)

◎治霍亂轉筋。身冷心下微溫者。朱砂研二兩。蠟三兩。和丸。著火籠中。煎之。周圍厚覆。勿令烟洩。兼牀下著火。令腹微暖。良久當汗出而甦。(外臺祕要方)

◎辟瘴正陽。丹砂三兩。水飛。每服半錢。溫蜜湯下。(普濟方)

◎治傷寒發汗。傷寒時氣。溫疫。頭痛。壯熱脈盛。始得一二日者。取真丹一兩。水一斗。煮一升。頓服。覆被取汗。忌生血物。(外臺祕要方)

用真丹末。酒調。遍身塗之。向火坐得汗愈。(肘後方)

◎辟穢溫疫。上品朱砂一兩。細研。蜜和丸。麻子大。常以大棗日平

且。一家大小勿食諸物。向東各吞三七丸。勿令近齒。永無溫疫。(外臺祕要方)

◎治諸般吐血。朱砂。蛤粉等分爲末。酒服二錢。又方。丹砂半兩。金箔四片。蚯蚓三條。同研丸。小豆大。每冷酒下二丸。(聖濟總錄方)

◎治妊婦胎動。朱砂末一錢。和雞子白三枚。攪勻頓服。胎死即出。未死即安。(普濟方)

◎治子死腹中不出。朱砂一兩。水煮熟沸爲末。酒服立出。(十全博救方)

◎治目生障翳。生辰砂一塊。日擦之。自退。王居靈病此。用之如故。(普濟方)

◎治目膜息肉。丹砂一兩。五月五日研勻。銅器中以水漿一盞。顯水一盞。浸七日。暴乾。銅刀刮下。再研。瓶收。每點少許。皆上。(聖濟總錄方)

◎治目生弩肉及珠。管真丹。貝母等分爲末。點注。日三四度。(肘後方)

◎治面上疔癩。雞子一枚。去黃。朱砂末一兩。入雞子內封固。入白

伏蟬下抱。至離出。取塗面即去。不過五度。面自如玉。此乃陳朝張貴妃常用。方出西王母枕中方。(外臺祕要方)

◎治沙蜂叮螫。朱砂末水塗之。(摘玄方)

◎治木蛭疥癬。南方多雨。有物曰木蛭。大類鼻涕。生於古木之上。聞人氣則閃閃而動。人過其下。墮人體間。即立成瘡。久則遍體。惟以朱砂。麝香塗之即愈。(張杲醫說方)

◎治產後舌出不收。丹砂傅之。暗搗益益作塵地。聲驚之。即自收。(集簡方)

用鼠 三分至八分。

施用宜忌 凡無實熱者禁用。惡惡石長鹹水忌一切血。

參攷資料 同遠志龍骨之類則養心氣。同當歸丹參之類則養心血。同枸杞地黃之類則養腎。

同厚朴川椒之類則養脾。同南星川烏之類則祛風。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以發汗。隨佐使而見功。無所往而不可。夏子益奇疾方云。凡人自覺本形作兩人。並

行並臥。不辨真假者。離魂病也。用長砂人參。茯苓。濃煎日飲。真者氣爽。假者化也。類編云。錢不少。卿夜多惡夢。通宵不寐。自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰。昔常如此。有道士教戴辰砂如箭鏃者。漆旬即驗。四五年不復有夢。因解髻中一絳囊遺之。即夕無夢。神魂安靜。道書謂丹砂辟惡安魂。觀此二事可徵矣。(李時珍) 臨沅縣廖氏家。世世壽考。後徙去。子孫多夭折。他人居其故宅。復多壽考。疑其井水赤。乃掘之。得古人埋丹砂數十斛也。飲此水而得壽。况鍊服者乎。(抱朴子) 鄭康成註。周禮以丹砂石髓。雄黃。礬石。慈石爲五毒。古人惟以攻疔毒。而本經以丹砂爲無毒。故多鍊治服食。鮮有不爲藥患者。豈五毒之說特乎。宜當以爲戒。(蘇頌) 朱砂鎮養心神。但宜生使。若鍊服少有不作疾者。一醫疾服伏火者。數粒。一旦大熱。數夕而斃。沈存中云。表兄李勝鍊朱砂爲丹。歲餘沐浴。再入鼎。誤遺一塊。其徒丸服之。遂發憎冒。一夕而斃。夫生珠砂初生小兒便可服。因火力

所變。遂能殺人。不可不誣。(寇宗奭) 葉石林避毒錄載林彥振謝任伯皆服伏火丹砂。俱病腦疽死。張果醫說。載張愨服食丹砂。病中消數年。發覺疽而死。皆可爲服丹之戒。而周密野語。載臨川周推官平生孱弱。多服丹砂。烏附藥。晚年發背疽。醫悉歸罪丹砂。服解毒藥不效。醫醫老祝診脈曰。此乃極陰證。正當多服伏火丹砂及三建湯。乃用小劑試之。復作大劑。三日後用膏敷貼。半月而瘡平。凡服三建湯一百五十服。此又與前諸說異。蓋人之臟腑。稟受萬殊。在智者辨其陰陽脈證。不以先入爲主。非妙入精微者不能企此。(李時珍) 丹砂卽今朱砂。俗醫別取武都仇池。雄黃夾雌黃者名爲丹砂。用之謬矣。符陵是涪州接巴郡南。今無復采者。乃出武陵西川諸蠻夷中。皆通屬巴地。故謂之巴砂。仙經亦用越砂。卽出廣州臨漳者。此二處並好。惟須光明。鑿爲佳。如雲母片者。謂之雲母砂。如櫻砂子。紫石英形者。謂之馬齒砂。亦好。如大小豆及大塊圓滑者。謂之豆砂。細

末碎者。謂之末砂。此二種粗不入藥用。但可盡用爾。朱砂皆擊坎入數丈許。雖同出一郡縣。亦有好惡。地有水井。勝火井也。仙方煉餌。最爲長生之寶。(陶弘景) 丹砂大略二種。有土砂石砂。其土砂復有塊砂末砂。體並重而色黃黑。不任畫用。療瘡疥亦好。但不入心腹之藥。然可燒之出水銀乃多也。其石砂有十數品。最上者爲光明砂云。一顆別生一石。內大者如雞卵。小者如棗栗。形似芙蓉。破之如雲母。光明照徹。在龜中石臺上生。得此者帶之辟惡爲上。其次或出石中。或出水內。形塊大者如拇指。小者如杏仁。光明無雜名馬牙砂。一名無重砂。入藥及畫俱善。俗間亦少有之。其磨鍊新井別井。冰井火井。芙蓉石末石堆豆末等砂。形類頗相似。入藥及畫。當擇去其雜土。石便可用矣。別有越砂。大者如拳。小者如雞鴨卵。形雖大其雜土石。不如細而明淨者。經言末之名。眞朱者謬矣。豈有一物以全末殊名乎。(蘇恭) 砂凡百等。不可一一論。有妙砂。如拳許大。或重一鎰。

有十四面。面如鏡。若遇陰沉天雨。卽鏡面上有紅漿汁出。有梅拍砂。如梅子許大。夜有光生。照見一室。有白庭砂。如帝珠子許大。面上有小星。現有神座砂。金座砂。玉座砂。不經丹爐服之。而自延壽命。次有白金砂。澄水砂。陰成砂。辰歸砂。芙蓉砂。鏡面砂。箭鏃砂。曹末砂。土砂。金星砂。平面砂。神末砂等。不可一一細述也。(雷斅) 今出辰州。宜州。階州。而辰砂爲最。生深山石巖間。土人采之。穴地數十丈。始見其苗。乃白石。謂之朱砂林。砂生石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。狀若芙蓉頭。箭鏃。連林者紫黯若鐵色。而光明鑿徹。碎之巒岩作牆壁。又似雲母片。可折者眞辰砂也。無石者爾佳。過此皆陶土石中得之。非生於石林者。宜砂。縞有大塊者。碎之亦作牆壁。但罕有類物狀。而色亦深赤。爲用不及辰砂。蓋出土石間。非白石林所生也。然近宜州隣地。春州。融州。皆有砂。故其水盡赤。每烟霧蕭蕭之氣。亦赤黃色。士人謂之朱砂氣。尤能作瘴癘爲人患也。階砂又次之。不堪入藥。惟

可靈色爾。凡砂之精好者。為光明砂。其次謂之顯塊。其次謂之鹿麩。其下謂之末砂。惟光明砂入藥。餘並不用。(蘇頌)曰。丹砂以辰錦者為最。蔚陽即古錦州地。佳者為箭鐵砂。結不實者為肺砂。細者為末砂。色紫不染紙者為舊坑砂。為上品。色鮮染紙者為新坑砂。次之。蘇頌陳承所謂隋州金商州砂者。乃陶弘景所謂武都雄黃。非丹砂也。范成大桂海志云。本草以辰砂為上。宜砂次之。然宜州出砂。處與湖北大牙山相連。北為辰砂。南為宜砂。地脈不殊。無甚分別。老者亦出白石牀上。蘇頌乃云宜砂出土石間。非石牀所生。是未識此也。別有一種色紅質嫩者。名土坑砂。乃土石間者。不甚耐火。邕州亦有砂。大者數十百兩作塊。黑暗少精。鑿不堪入藥。惟以燒取水銀。蘇頌云。融州亦有。今融州無砂。乃邕州之說也。隴仙庚辛玉冊云。丹砂石以五溪山嶺中產者。得正南之氣。為上。麻陽諸山與五溪相接者。次之。雲南波斯西胡砂。並光潔可用。柳州一種砂。全似辰砂。惟塊圓如皂角

子。不入藥用。商州黔州土丹砂。宜信州砂。皆內含毒氣。及金銀銅鉛氣。不可服。張杲丹砂要訣云。丹砂者。萬靈之主。居之南方。或赤龍以建號。或朱鳥以為名。上品生於辰錦二州石穴。中品生於夾桂。下品生於衡邵。名有數種。清濁體異。真偽不同。辰錦上品砂。生白石牀之上。十二枚為一座。色如未開蓮花。光明耀日。亦有九枚為一座。七枚五枚者。次之。每座中有大者為主。四圍小者為臣。朝護四面。雜砂一斗。抱之中。有芙蓉頭成類者。亦入上品。又有如馬牙光明者。為上品。白光若雲母為中品。又有紫靈砂。圓長似筍。而紅紫為上品。石片稜角生青光為下品。交桂所出。但是座上及打石得。形似芙蓉。頭面光明者。亦入上品。顆粒而透明者。為中品。片段不明徹者。為下品。衡邵所出。雖是紫砂。得之砂石中者。亦下品也。有溪砂。生溪州砂石之中。土砂。生土穴之中。土石相雜。故不入上品。不可服餌。唐李德裕黃治論云。光明砂者。天地自然之寶。在石室之間。生雪牀之上。如初生

芙蓉。紅色未拆。細者環拱。大者處中有辰居之象。有君臣之位。光明外散。采之者。尋石脈而求。此造化之所歸也。

【硃砂根】 古醫別名。平地木。火龍珠。水龍珠。山豆根。(植物名彙) 萬兩(日本)

外國名詞 Artisia Crenata, Sims. (A. Craspa, A. De.) (拉

丁) マンリヤウ(日本)

基本 係紫金牛科紫金牛屬。為珠砂(Myrsinaceae)之根。

產地 凡山野陰地恒多有出。



(一) 根 砂 硃

形態 硃砂根為山草類之常綠亞灌木。莖高二三尺。在暖地則至七八尺。葉互生。長橢圓形。有尖端。革質厚而光澤。緣邊有鈍鋸齒。夏月莖梢抽出花梗。花小。作繖形花序。花冠帶白色。有暗色之小點。五裂。雄蕊與花冠之裂片對生。果

實色赤如球形。大如豌豆。經久不落。果色有白有黃。其根色赤。大如筋。可供藥用。



(二) 根 砂 硃

性質 苦。涼。無毒。

主治 咽喉腫痛。腫水或醋曬之。甚良。

參攷資料 硃砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青葉。背蒼赤。夏月長茂。根大如筋。赤色。此與百兩金彷彿。(李時珍)

【硃砂魚】即金魚之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「金魚」條。

【硃砂銀】基本 本品乃方士用諸藥。合硃砂鍊製而成者。

性質 冷。無毒。

主治 延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡。蠱毒。心熱。煎煩。憂忘。虛勞。

配合宜忌 畏石亭脂、惡石、鐵、忌一切血。

【珠茯神】即茯神用珠砂拌成者之處方用名。詳「茯神」條。

【珠連翹】即連翹之處方用名。詳「連翹」條。

【礞砂】即礞砂之原名。詳「礞砂」條。

【礞砂霜】即礞砂之處方用名。詳「礞砂」條。

【研星草】即小將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「小將軍」條。

【研茶】製法 東莞人以芝蔴油炒雜茶葉。煮煎而成。主治 去風溼。解除食積。痰飢。

【研藥】古醫別名 研藥根。基本 屬樟科烏藥類之研藥根。

產地 粵南諸州及浙之台州均有產之。

形態 研藥為常綠灌木。樹較烏藥稍小。葉形如椒。根則全類烏藥而圓細。取之可供藥用。

性質 苦澀。無毒。

主治 霍亂中惡。蠱毒。腹內不調。痢下赤白。

【移角】即車螯角不正者之古籍別名。典見臨海水土記。詳「車螯」條。

【移柳】即水楊之古籍別名。典見古今注。詳「水楊」條。

【章】即烏樟之古籍別名。典見綱目。詳「烏樟」條。即胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡椒」條。

【章柳根】即商陸之古籍別名。典見圖經本草。詳「商陸」條。

【章魚】古醫別名 章舉。(韓文) 信鳥魚。臨海志) 外國名詞 Octopus octopus。dia. l. (拉) Poulpo. 或 Devil-dog. (英) タニ或タニ(日本)

基本 係軟體動物頭足類二綱類章魚科。為章魚之內。

產地 生海中。

形態 章魚為鱗類之一種。其體分頭及軀軀兩部。全係肌肉。而無骨骼。皮膚粗滑。皮內有含色之小胞。故能時時變換體色。頭部兩旁有眼。口旁有觸脚八條。比烏鰂少二條。體長。逾腹數倍。頗強壯。大

者能攝羊豕入水。因脚端各有吸盤二行。及唇狀之膜。互相連綴。腹短小而圓。無內殼。捕魚介為食。其肉可供食與藥用。

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 養血益氣。

【章陸】即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

【章漆木】即接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳「接骨木」條。

【章舉】即章魚之古籍別名。典見韓文。詳「章魚」條。

【笛師】即竹蜂之古籍別名。典見山海經。詳「竹蜂」條。

【符窻】即桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳「桔梗」條。

【笹龍膽】即龍膽之日本名。詳「龍膽」條。

【拍】即酒糟之古籍別名。典見綱目。詳「酒糟」條。

【粒紅花】即紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【精刺】即雲實之古籍別名。典見綱目。詳「雲實」條。即枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳實」條。

【粘桐葉】即粘桐葉之古籍別名。典見救荒本草。詳「粘桐葉」條。

【粗草紙】產地 出於富陽。桐而皮。基本 為稻草與石灰質所澆而成。

性質 淡。溫。平。

主治 發散。燥溼。

配合應用 發疹。折角草紙半張。南貨店包物厚者是也。煎服較檀柳尤透發。(百草詩方)

治小兒疳積。急用大草紙燒灰。敷之。則不致變癰。或加枯礬。或再加龍骨。燒灰等分。入麝香少許。撒之。(不藥良方)

治腸風下血。粗草紙燒灰。砂糖拌勻。開水服。(不藥良方)

貝母。圍。經驗廣集。治羊兒痘。百發百中。用川貝母去心一兩。研粉。用羅篩過。鋪大草紙一百張。一層草紙。鋪一下。一百張草紙。鋪一百下。然後用線縫之。入四碗水。煮乾。每清早取一張紙。成團。煨過。滾湯。泡汁飲之。服盡全愈。神妙無比。(趙恕軒)

【紫丁香】即瑞香之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【紫丹】即紫草之古籍別名。與見別錄。詳「紫草」條。

【紫丹參】即丹參之處方用名。詳「丹參」條。

【紫玉環】基本 本品即荔枝之產四川瀘縣者。

產地 產於四川瀘縣。

主治 除瘰癧。辟瘴。

參攷資料 紫玉環晒乾。啖一枚。早行大務中。則風不致侵受。

(趙學敏)

【紫玉簪】即玉簪花之開紫色花蕾者。詳「玉簪花」條。

【紫石英】命名 英。亦作瑛。玉光也。五種石英。皆似玉之有光瑩。故名。

外國名詞 Amethyst. (英)

(德) 基本 屬巖石。為石英類之一種。

產地 別錄。紫石英生太山山谷。李時珍曰。自大規至太山皆有之。烏程縣北龍山。亦有出。東莞縣嶺山。又有出。

形態 紫石英屬於六角系稜

柱狀結晶之鑽石色。紫或青紫。或略帶灰色。惟色之深淺。頗不一定。質透明。有玻璃光澤。硬度七。比重二·五至二·八。諸酸類俱不能溶解之。

製法 李時珍曰。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末。水飛過。曬乾入藥。

性質 甘。溫。無毒。

效能 溫營。鎮心。補肝。又可用為妊娠藥。

主治 心腹咳逆邪氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。療上氣。心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣。不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。久服溫中。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫石英曰。養神氣。治驚癇。蝕膿。【明】繆希雍本草經疏論紫石英曰。紫石英。本經味甘氣溫無毒。別錄加辛。雷公言大溫。獨李當之。言大寒者。是味其性矣。味厚於氣。入手少陰。手厥陰。足厥陰。經少陰。主心。屬陽。而本熱。虛則陽氣衰。而寒邪得以乘之。或為上氣咳

逆。或為氣結寒熱。心腹痛。此藥溫性除寒。甘能補中。中氣足。心得補。諸證無不遷矣。驚悸。心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎮壓諸經。茲得鎮壓之力。而心君有以鎮攝。即重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之。而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫能散風寒邪氣。故為女子煖子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎮墜。虛火使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末。水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡本草求真論紫石英曰。紫石英。即係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫即能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治瘵。凡婦人子戶。因於風寒內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸。夢魂不安。服此則能鎮魂安神。為心肝經溫血要藥。

配合應用 ●治女人子宮虛寒。絕孕無子。用紫石英、白薇、艾葉、白膠、黃芩、山茱萸、川芎、香附。

●治虛勞驚悸。補虛止瀉。令人能食。紫石英五兩。打如豆大。水淘一遍。以水一斗。煮取三升。細細服。

(張文仲備急方)

●療心中結氣。用紫石英、茯苓、人參。

●療霍亂。用紫石英、天雄、茵陳。

●治癰腫毒氣。紫石英火燒醋淬。為末。生薑米醋煎敷之。醱亦得。

(日華本草方)

用爐 一錢至四錢。

應用宜忌 止可暫用。不宜久服。及婦人絕孕。凡由於陰虛火旺。不能攝受精氣者。禁用。畏附子、犀角、磁石、甲、黃連、麥句薑。長石為之使。

著名方劑 風引湯。治風熱癲癩及驚癇。巢氏云。脚氣宜用此湯。

(金匱方) 紫白石、石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石各等分。以水一升。煎去三分。食後溫呷。無不效者。一方有桂枝、赤石脂。

參攷資料 ①紫石英明微如
水精。但其色紫而不勻。(寇宗奭)
②紫石英凡虛而悸不安者。宜
加用之。婦人服之有子。(甄權) ③
乳石論。無單服紫石英者。惟五石
散中用之。張文仲備急方有鎮心
單服紫石英水法。胡演及千金方
則多雜諸藥同用。今方治婦人及
心病時有使者。(蘇頌) ④紫石英
手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮
心。重以去怯也。下能益肝。溼以去
枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。
故心神不安。肝血不足。及女子血
薄。慮遠不孕者。宜之。別錄言其補
心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽
血陰營衛之別。惟本經所言諸症。
甚得此理。(李時珍) ⑤紫石英今
第一用太山。石色重。下有根。次
出冠零山。亦好。又有南成石。無根。
又有青綿石。色亦重。黑明。又有
林邑石。腹裏必有一物如眼。吳興
石四面。緣有紫色。無光澤。會稽諸
暨石。形色如石榴子。先時並雜用。
今惟采太山最勝。仙經不用。而
俗方重之。(陶弘景) ⑥紫石英按
嶺表錄云。嵩州山中。多紫石英。其

十一 靈 紫

色淡紫。其實登。隨其大小。皆有
五稜。兩頭如箭鏃。煮水飲之。暖而
無毒。比之北中白石英。其力倍矣。
(劉禹錫) ⑦按太平御覽云。自大
觀至太山。皆有紫石英。太山所出
甚瑣瑋。平氏陽山縣所出。色深特
好。烏程縣北壘山所出。甚光明。但
小黑。東莞縣爆山所出。舊以貢獻。
江夏礬山亦有出。永嘉固陶村小
山所出。芒角甚好。但小薄爾。(李
時珍)

【紫石華】 古籍別名 堯石華。
(別錄)

基本 紫石華為石類之一種。
可供藥用。

產地 生河南山中。

採取 採無時。

性質 甘。平。無毒。

主治 止渴。去小腸熱。

【紫耳】 卽舊籍之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「青蒲」條。

【紫朱】 卽代赭石之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「代赭石」條。

【紫地丁】 卽紫花地丁之處方用
名。詳「紫花地丁」條。

【紫草茸】 卽紫草之處方用名。詳

「紫草」條。

【紫衣】 產地 石瓦間皆有之。
基本 紫衣為苔類之
一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 黃疸暴熱。目黃下水。熱
痢。煮服。長髮作灰。淋汁沐之。并可
染褐色。

【紫李】 係李之一種。實甘美堪食。
功能性質。與尋常李同。參見「李」
條。惟核仁不入藥用。

【紫沙糖】 卽赤沙糖之別名。功能
性質。詳「赤沙糖」條。

【紫的】 卽蓮肉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【紫芋】 卽芋子之古籍別名。典見
新修本草圖經。詳「芋子」條。

【紫貝】 命名 本品大而質白。
文紫無姿。自然不假外
飾。而光彩煥爛。故名。

古籍別名 文貝。好螺。紫貝齒。
紫貝螺。(綱目)

產地 出東南海中。

形態 紫貝為貝類之一種。形
亦相似。而大二三寸。背上深紫有
斑點。光潔可愛。大者至尺餘。殼質

色白如玉。古人作貨幣。畫家以研
物。其殼可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 明目。去熱毒。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論紫貝曰。治小兒眼疾。
目昏。

【紫貝齒】 卽紫貝之古籍別名。典
見綱目。詳「紫貝」條。

【紫貝螺】 卽紫貝之古籍別名。典
見綱目。詳「紫貝」條。

【紫河車】 卽蛋休之古籍別名。
典見圖經本草。詳「蛋休」條。卽
人胞之處方用名。詳「人胞」條。

【紫芙】 卽紫草之古籍別名。典見
廣雅。詳「紫草」條。

【紫芙】 卽紫草之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「紫草」條。

【紫芥子】 卽芥子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「芥子」條。


【紫芝】 命名 本品卽芝草之
紫色者。故名。

古籍別名 木芝。(本經)荔枝。
(和漢藥考)

性質 甘。溫。無毒。

主治 耳聾。利關節。保神。益精

氣。堅筋骨。好顏色。久服輕身。不老延年。



芝 紫

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫芝曰。療虛勞。治痔。

【紫花地丁】

處方用名 地丁草。紫地丁。


古籍別名 羊角子(秘經)箭頭草。獨行虎。米布袋(綱目)董董菜(植物圖考)

外國名詞 Viola Patrinii, DC. var. chinensis, Ging (拉丁)スミレ スモトリバナ(日本)

藥用其莖葉。

產地 凡山野原澤間。恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。地丁廣東各省有出。以北江爲多。廣西各屬亦有出。以南寧爲多。但上海來者。與廣東正天葵。有八成相像。形態 紫花地丁爲溼草類之

多年生草本。生平地者起莖。生溝壑者起莖。莖高三四寸。葉作長卵形。或長橢圓形。葉柄長而叢生。春夏間花莖自葉叢間抽出。端著一花。有五瓣。其瓣大小不齊。中有一瓣有長距。花白者莖紫。花紫者莖白。夏日結角。其實爲蒴果。有銳頭。常裂開而散種子。其根如大枝人參。巨者如萊菔。色白可烹食。其變種之花。有淡紫帶紅。白。雪白等色。莖葉可供藥用。



紫花地丁

採取 夏季採之。採得陰乾用。

性質 苦。辛。寒。無毒。

效能 消熱解毒。專作外科瘡瘍藥。

主治 一切癰疽發背。疔腫癰瘰。無名腫毒惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李士材本草圖解論紫地丁曰。紫花地丁。稟地之陰氣。入肝胃經。爲癰證散結。消熱解毒之要藥。癰疽已潰。及

陰證平塌忌之。【清】黃元御玉楸藥解論紫地丁曰。地丁味苦辛微寒。消腫。療瘡疥。行經。瀉火。散腫消毒。治癰疽瘰癧。疔毒惡瘡。敷食皆佳。紫花地丁更勝。

近人學說 張山雷曰。地丁專爲癰腫疔毒通用之藥。瀕湖綱目稱其苦辛寒。治一切癰疽發背。疔腫瘰癧。無名腫毒。惡瘡。然辛涼散腫。長於退熱。惟血熱壅滯。紅腫焮發之外。爲宜之。若謂通治陰疽發背。寒凝之證。殊是不妥。蓋癰疽發背。古人多作火毒治者。以六朝隋唐之世。人多好服金石燥烈之藥。故病源千金外莖。皆有金石丹毒發一門。古之癰疽發背。皆是丹藥熱毒。治宜寒涼。亦固其所。而自宋金以降。金丹一派。漸以銷沈。蓋亦久無丹石發之一症。而凡患有癰背之疽者。純是太陽經寒水爲病。雖外形亦有紅腫焮熱。頗似實火。然項背必拘急不仁。舌苔必白潤。垢膩。誤投涼劑。內陷隨之。卽平塌頑木。不可復救。此其病情與古時熱毒。正相對峙。而外癰諸書。猶沿用大寒大涼之法。皆是此症之戈。

戟。石頭已謂地丁性寒。不利陰症。浸腫無頭。不赤不高者。禁用。地丁之名。以花莖一莖直上。有似於丁。故蒲公英亦有黃花地丁之稱。而此草又有紫花白花二種。向來用者。以紫花爲主。蓋取其色紫。能入血分。以療血熱。然花雖有二色。而花紫者莖白。花白者莖紫。則固皆入血分。亦無所用其區別。又有以治黃疽者。亦清熱利溼之功用也。

配合應用 治黃疽內熱。地丁末。酒服三錢。又稱芒黏咽不得出者。箭頭草嚼嚙下。又癰瘰疔瘡。發背諸腫。紫花地丁根。去粗皮。同白茯苓爲末。油和塗。神效。(乾坤祕製方)

治癰疽惡瘡。紫花地丁連根。同蒼耳葉等分。搗爛。酒一鐘。澆汁服。(楊誠經驗方)

治癰疽發背。無名諸腫。貼之如神。紫花地丁草。三伏時收。以白麩和成。鹽醋浸一夜。貼之。(孫天仁集效方)

治一切惡瘡。紫花地丁根。日乾。以蠟燭燒煙。對瘡熏之。出黃水。取盡愈。(衛生易簡方)

①治丁瘡腫毒用紫花地丁草搗汁服。雖極者亦效。(千金方)又用紫花地丁草、葱頭、生薑共搗貼之。若瘡加新黑牛屎。(楊氏方) ②治喉痺腫痛。箭頭草葉入醬少許。研膏點入取吐。(普濟方)

用蠶 錢半至三錢

施用宜忌 凡屬虛寒者禁用。

參攷資料 處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花結角。平地生者起莖。溝壑邊生者起莖。普濟方云。鄉村雜落生者。夏秋開小白花。如鈴兒倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花者相反。恐是別一種也。(李時珍)

【紫花地丁】①即列當之古籍別名。真見和漢藥考。詳「列當」條。②即肉蓯蓉之古籍別名。真見和漢藥考。詳「肉蓯蓉」條。

【紫花菘】即萊菘之古籍別名。真見爾雅。詳「萊菘」條。

【紫花菘子】即萊菘子之古籍別名。真見和漢藥考。詳「萊菘子」條。

【紫花桐】即紫桐之古籍別名。真見綱目。詳「桐」條。

【紫花梨】係梨之一種。性質功能。

十一畫 紫

與尋常梨同。參見「梨」條。

【紫果】即紫草之古籍別名。真見和漢藥考。詳「紫草」條。

【紫油朴】即厚樸有紫色油光者之處方用名。詳「厚樸」條。

【紫風柳】即瑞香之古籍別名。真見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【紫金牛】古籍別名。平地木。(圖經)石青子。(植物圖考)涼鐵速金珠。(西俚名)藪柑子(日本)茶果。小青。矮茶。金牛草。植物名彙)

外國名詞 *Ardisia japonica*, (拉丁) *ヤブカウジ* *ヤマタチバナ* *ヤブタチバナ* *カダモノキ*(日本)

基本 係紫金牛科。為紫金牛屬(*Myrsine*)之根皮。

形態 紫金牛為山草類之常綠小灌木。狀如多年草木。高四五寸或八九寸。葉互生。長卵形。有鋸齒。夏月莖梢開花。花小有花梗。作合瓣花冠。帶青白色。着以赤色之小點。常二花聚集而生。其果實小如珠形。熟則呈紅色或白色。鮮美可愛。而經久不落。其根與皮可

採供藥用。



紫 金 牛

性質 辛。平。無毒。

主治 時疾。腸氣。去風痰。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫金牛曰。解毒。破血。

配合應用 紫牛皮散。治打撲。

金瘡。傷處浮腫。方用紫牛皮。南星。

草烏。川烏。半夏。川當歸。黃柏。杜當。

歸。川芎。烏藥。破故紙。白芷。劉寄奴。

川牛膝。桑白皮。各等分。研為細末。

生煎薄荷汁調敷。皮熱者加黃柏。

生地各五錢。有瘡口者勿封。即於

四邊敷之。(證治準繩方)

參攷資料 紫金牛生福州。葉

如茶葉。上綠下紫。結實圓紅色。如

丹朱。根微紫色。八月採根。去心暴

乾。頗似巴戟。(蘇頌)

【紫金牛】即射干之古籍別名。真見土宿本草。詳「射干」條。

【紫牛皮】①即野蘿蔔之古籍別名。真見綱目拾遺。詳「野蘿蔔」條。

②即紅木香之古籍別名。真見綱目拾遺。詳「紅木香」條。③即地骨皮之古籍別名。真見和漢藥考。詳「地骨皮」條。

【紫金沙】即露蜂房之古籍別名。真見綱目。詳「露蜂房」條。

【紫金藤】古籍別名。山甘草。

產地 生山野間。

形態 紫金藤為莖草類藤屬之一種。春生苗葉。色青。至冬凋落。莖如枯條。藤皮可供藥用。

採取 採皮曬乾用。

主治 療丈夫腎氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫金藤皮曰。滑損傷

瘀血。搗傅惡瘡腫毒。

【紫佳石】古籍別名 赤英石。血(別錄)紫賀石。

(陶弘景)

產地 出直隸、邯鄲縣諸地。

形態 紫佳石為石類之一種。

採取 二月採之。

性質 酸。無毒。

主治 除瘰。活氣血。

【紫素】即素之花青核紫。實大如升。其汁如漆者。性質功能。與尋常素同。詳「素」條。②即菟葵之古籍別名。與見《山海經》。詳「菟葵」條。

【紫背仙橋】即毛葉仙橋素之有紫背者。詳「毛葉仙橋」條。

【紫背浮萍】即浮萍之有紫背者。詳「浮萍」條。

【紫背金盤】 產地 生水石間。

形態 紫背金盤爲石草類之一種。莖高尺許。莖如黃絲。搓之即斷。葉背紫色無花。其根可供藥用。性質 辛。澀。熱。無毒。

主治 婦人血氣痛。洗焙研末酒服。

應用宜忌 能消胎氣。孕婦禁用。忌雞魚。羊血。溼麩。

【紫背草】 產地 南贛山坡爲多。



草 背 紫

形態 似蒲公英而紫莖。近根葉又發稀。背俱紫。梢端秋深開紫花。似禿女頭花。不全放。老亦飛絮。其功用與蒲公英同。

【紫背稀奇】 產地 多生陰山間。

形態 紫背稀奇爲莖草類之一種。着地而生。苗葉有兩。大兩小。葉面灰色有直紋。背面微紫。若起心。長一二尺。葉尖對生。可供藥用。

主治 痘毒。取鮮者酒煎服。已成速愈。未成立消。

【紫背龍牙】即蛇舍之古籍別名。典見《圖經》。詳「蛇舍」條。

【紫背帶】係首帶之一種。產於原野。北方多有種者。莖高尺餘。葉爲複葉。似豌豆而小。開紫花。莢宛轉彎曲。性質功能與首帶同。參詳「首帶」條。

【紫芋】即芋麻之古籍別名。典見《綱目》。詳「芋麻」條。

【紫茄】即茄子之古籍別名。典見《圖經本草》。詳「茄子」條。

【紫英】即紫草之古籍別名。典見《本草》。詳「紫草」條。

新本草。詳「紫草」條。

【紫茉莉】 古傳別名 騰脂花。 (草花譜) 狀元紅。

(花鏡) 夜繁花。(綱目)

外國名詞 Mirabilis jalapa, (拉丁) オシロイバナ(日本)

基本 係紫茉莉科紫茉莉屬。爲紫茉莉之根。其子詳見該條。

產地 原產西印度。

形態 紫茉莉爲茉莉類之一種。多年生或一年生草本。莖高二三尺。葉卵圓形。或心臟形而尖。葉柄長對生。夏月每月夕開花。一夜凋落。花有合瓣。萼如漏斗狀。有白紅黃等色。亦有一本五色兼備者。甚美麗。有香氣。結實外有苞。形圓有皺紋。苞內青子成簇。大如豌豆。久乃黑。子內白色。有粉狀之胚乳。可作化粧品。而花可浸酒。其根三年不取。大如牛蒡。味甘如山藥。去其外皮。鹽漬可佐饌食與藥用。



莉 茉 紫

性質 微甘。無毒。

主治 婦人乳癰。男子淋濁。及去風活血。

配合宜忌 忌鐵。

參攷資料 紫茉莉根。性寒純陰。柔中帶剛。久食恐骨軟。故陽虛人尤宜忌之。(綱目拾遺)

【紫茉莉子】 古傳別名 土山奈。(綱目拾遺)

性質 寒。

主治 去面上斑痣。粉刺。取粉用。

【紫逸香】即鬱金香之古籍別名。典見《綱目》。詳「鬱金香」條。

【紫桐】即桐之花紫而葉上密生點毛。實可煮蠟者。性質功能與桐同。參見「桐」條。

【紫珠】即紫荊之古籍別名。典見《本草拾遺》。詳「紫荊」條。

【紫荊】 命名 本品木似黃荊。而色紫。故名。

處方用名 紫荊木。紫荊皮。紫荊花。紫荊枝。

古傳別名 紫珠。(陳藏器) 皮名肉紅。內消。(綱目) 滿條紅。(羣芳譜) 花條芳。蘇芳花(日本)

芳譜) 花條芳。蘇芳花(日本)

外國名詞 *Cercis chinensis*,

ハウバナ (拉丁) ハナズハウ ス
ウバナ (日本)

基本 係豆科。爲蒴果紫蒴之
木梗與花皮。

形態 凡山野林深間均有出
形。紫蒴爲落葉灌木。高十
尺有餘。枝節叢生。春月先葉節節
撥簇生花。花爲蝶形花冠。紅紫色。
數朵一簇。細碎可愛。或生木身之
上。或附根上。枝下無花梗。花罷葉
漸出。葉圓作心臟形而尖。有光澤
而互生。其果實爲莢。扁平。長二寸
餘。闊四五分。



紫 蒴

採取 春月採花。餘時採皮梗。
其皮以色紫味苦如膽者佳。

性質 苦平無毒。
效能 解熱毒。消癰腫。破癰。活
血。用作外科瘡毒要藥。
主治 破宿血。下五淋。澁黃汁

十一 藍 紫

服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
本草拾遺論紫蒴曰。解諸毒物。癰
疽。喉痹。飛尸。蟲毒。蛇蝎。蜈蚣。狂犬
毒。並煮汁服。亦可以之洗瘡。【宋】
大明諸家本草論紫蒴曰。通小腸。

【明】李時珍本草綱目論紫蒴曰。
活血行氣。消腫解毒。治婦人血氣
疼痛。經水凝滯。

配合應用 ●治婦人血氣。紫
蒴皮爲末。醋糊丸。櫻桃大。每酒化
服一丸。【熊氏補遺方】

●治鶴膝風痺。紫蒴皮三錢。老
酒煎服。日二次。【直指方】

●治傷眼青腫。紫蒴皮。小便浸
七日。曬研。用生地黄汁。薑汁調得
不腫。用葱汁。【永類鈴方】

●治爛犬咬傷。紫蒴皮末。沙糖
調塗。留口退腫。口中嚼麻杏仁去
毒。【仙傳外科方】

●治鼻中疳瘻。紫蒴花陰乾爲
末。貼之。【衛生易簡方】

●治發背初生。一切癰疽皆治。
單用紫蒴皮爲末。酒調。籠住。自然
撮小。不開。內服柞木飲。此乃救貧
良劑也。【仙傳外科方】

●治癰疽未成。用白芷。紫蒴皮
等分爲末。酒調服。外用紫蒴皮。木
蠟。赤芍藥等分爲末。酒調作藥。
【仙傳外科方】

●治痔瘡腫痛。紫蒴皮五錢。新
水食煎服。【直指方】

●治產後諸淋。紫蒴皮五錢。牛
酒半水煎服。【熊氏補遺方】

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無癰毒及癢滯
者禁用。

參攷資料 ●楊清叟仙傳方。
有仲和膏。以紫蒴爲君。其方治一
切癰疽。發背。流注。諸腫毒。冷熱不
明者。紫蒴皮炒三兩。獨活去節炒
三兩。赤芍藥炒二兩。生白芷一兩。
木蠟炒一兩。爲末。用葱湯調熱敷。
血得熱則行。葱能散氣。痞不甚熱
者。酒調之。痛甚者。筋不伸者。加乳
香。大抵癰疽流注。皆氣血凝滯所
成。過溫則散。過涼則凝。此方溫平。
紫蒴皮破血消腫。獨活止風動血。
引拔骨中毒。去溼瀝氣。芍藥生血
止痛。木蠟消腫散血。同獨活能破
石腫堅硬。白芷去風生肌止痛。蓋
血生則不死。血動則流。通。肌生則

不爛。痛止則不癢。風去則血自散。
氣破則硬可消。毒自去。【李時珍】

●皮梗及花。氣味功用並同。【大
明】●其皮色紅而消腫。故揚科
呼爲肉紅。又曰內消。與何首烏同
名。【李時珍】●紫蒴處處有之。人
多種於庭院間。木似黃荊。葉小無
極。花深紫可愛。【蘇頌】●即田氏
之蒴也。至秋子熟。正紫。圓如小珠。
名紫珠。江東林深間尤多。【陳藏
器】

【紫蒴木】即紫蒴之處方用名。詳
【紫蒴】條。

【紫蒴皮】即紫蒴之處方用名。詳
【紫蒴】條。

【紫蒴花】即紫蒴之處方用名。詳
【紫蒴】條。

【紫蒴】條。

【紫蒴桂】係桂之一種。性質功能
與桃桂同。參見【肉桂】條。

【紫蒴梗】即紫蒴之處方用名。詳
【紫蒴】條。

【紫蒴】條。

命名 本品花紫梗紫。
【紫草】可以染紫故名。其根顯
有白毛如茸。又名紫草茸。

處方用名 紫草茸。紫草根。
古經別名 紫丹。【別錄】紫莢。

十一畫 紫

花散(廣雅)花草。觀(爾雅)地血。鴉街草(吳普)紫果。紫莢。紫列。瑤芽(和漢藥考)紫莢。芝草。(新本草)

學名 Lithospermum officinale, L. var. Erythrorizon, Clarke.

基本 屬紫草科。為 Boraginaceae 之根。

產地 雲南、貴州、山東、陝西、廣西等省之山谷原野間。恒有生長。



紫草

形態 紫草為山野自生之宿根草。園圃亦栽種之。莖高一二尺。葉無柄。為廣披針形或長卵圓形。皆互生。莖與葉面皆粗糙。至夏枝梢開如筒五裂之小白花。底部有似葉之物苞之。果實為小堅果。形圓如球。質平滑。色淡褐。其根頗直。生者作牛蒡臭。皮肉俱有酸味。乾則根屈曲似小指。外作暗紫色。有縱紋。內面為黃白色。質輕脆。

浸以熱水。即成紅色之液。

採取 三月間。採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡使每一斤。用蠟二兩。溶水拌蒸之。待水乾。取去頭并兩碎。細到用。

性質 苦。寒。無毒。

成分 日本理學博士久原窮

氏。曾從其中提煉出一種色素。

曰紫草紅 (Lithospermin-702)。

證其化學式為 $C_{21}H_{28}O_8$ 。

其後理學士黑田氏。又從其中提煉出一種色素曰紫根仁 (Shikonin)。

證其化學式為 $C_{24}H_{32}O_8$ 。

並聲明謂其係一醋基化合物。生

根有特殊之臭氣。皮肉皆具酸味。

粗若小指。外面呈暗紫色。有縱紋。

裏面呈黃白色。質則疎鬆。用溫湯

浸時。可得紅色之液。昔時在人工

染料發明以前。曾用其為紫色染料。

綜觀各種書籍。似乎有瀉利作用也。

效能 發痘疹。塗瘡。用治惡瘡。

主治 心腹邪氣。五疳。補中益氣。利九竅。(本經)通水道。療腫脹。

滿痛。用以合膏。療小兒疳及面皴。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫草曰。治惡瘡癩癬等。

【明】李時珍本草綱目論紫草曰。治斑疹。痘毒。活血涼血。及利大腸。

【明】繆希雍本草經疏論紫草曰。紫草味苦氣寒而無毒。為涼血之聖藥。故主心腹邪熱之氣。五疳者。溼熱在脾胃所成。去溼除熱利竅。其痘自愈。邪熱在內。能損中氣。邪熱散即能補中益氣矣。苦寒性滑。故利九竅而通利水道也。腹腫脹滿痛者。溼熱滯於脾胃。則中焦受邪而為是病。溼熱解而從小便出。則前證自除也。合膏療小兒痘瘡及面皴。皆涼血之效也。【明】李士材本草圖解論紫草曰。紫草之用。當以涼血為功。疹痘毒盛則血熱。血熱則乾枯而毒不得越。得紫草涼之。則血行而毒出。世俗未明此旨。誤認為宣發之劑。非矣。其性涼潤。便閉者乃為相宜。若大便利者。不敢多用。微而紫色染手者。佳。【清】黃宮繡本草求真論紫草曰。紫草甘鹹氣寒。色紫質滑。入厥陰血分。涼血。血涼則九竅通。二

1100

便利。故凡血熱毒閉。而見心腹急痛。水腫不消。五疳癩癬。惡瘡。及痘瘡。血熱毒盛。二便閉澀者。治當用此。俾血得寒而涼。得鹹而降。得滑而通。得紫而入。血涼毒清。而二便因以解矣。奈世誤以為宣發之藥。不論毒閉與否。輒用。殊失用藥意義矣。瀉者忌服。茸得陽氣之早。用宜取其為正。酒洗用。

國外學說 和漢藥考曰。紫根之良否。關於產地之寒暖。以寒地產者為良。又紫根有山根。里根之別。山根乃野生之種。推為佳品。里根為栽種品。採收之期。多於莖將枯時。掘取。不用水洗。徑曬乾收藏。勿令受溼。別有藥用稱紫草茸者。乃其嫩苗之葉也。依醫學得藥士澤田玄弘氏(東北醫學會報第二九號)之實驗云。紫根者。紫草之根。古來為膏藥。於皮膚病等外用之。華岡膏方便覽中。有紫雲膏者。其製法如左。紫根二兩。當歸二兩。萬真鹿四錢。黃蠟八兩。胡麻油四合。上五味。先煮香油。次煮當歸。萬真鹿。後入紫根。見泡沫消時。去火。且煖時。濾之。此膏藥。氏於火傷。

凍傷、溫疹、水泡疹、及淺在性潰瘍、
(下腿潰瘍等)試用之曾收偉效。
今概括氏之實驗如左。(一)紫苳
(氏改稱)者於火傷、凍傷、溫疹、表
在性潰瘍及水泡疹等病的分泌
過多之症、用之有卓效。(二)爲紫
苳主劑之紫根中、殆含收斂性物
質、卽某種鞣酸。(三)該鞣酸爲色
素、或爲別物、尙未明瞭。

近人學說 祝天一曰。草之
初生曰苳。紫草苳者。言紫草初生
茸亂之嫩苗也。今市上所謂之紫
草苳。形如蝗螂蟬蛸。色紫。斷之透
明。燒之煇作黏液。可黏破損玻璃
器。是膠質也。非紫草之嫩苗也。明
矣。然不知其爲何物也。遍搜本草。
類似蟲部中之紫蠟。今人痘科方。
多用紫草苳。藥肆卽以此物與之。
醫家藥家病家皆不知察。人云是
我亦云是。余惑之。故拈出與博雅
者研幾之。王治華曰。紫草之嫩
苗。卽紫草苳也。今市肆所售色紫
狀似鑽石。乃係一種細蟲。如蟻虱
緣於樹枝。聚其脂液而成。此物本
名紫蠟。今人用以治痘疹。有活血
起脹之功。無礙寒作瀉之患。其功

十一 紫

倍於紫草。故亦以紫草苳呼之。實
非紫草同類也。紫草以產於廣西
色深紫而脆者爲上。嫩苗尤良。出
貴州。色紫性輭者亦佳。山東出者
次之。按紫草入肝經。兼入心包絡。
爲涼血宣竅。澀熱解毒之品。目醫
石原保秀用以涼血。活血。利大小
腸。故於痘疹欲出未出。血熱毒盛。
大便閉滯者宜之。已出而紫黑便
閉亦宜之。第已出而紅活。及白陷
大便利者。是當慎用者耳。曾育溪
謂紫草性寒。小兒脾氣實者猶可
用。脾氣虛者。反能作瀉。古方惟用
苳。取其初得陽氣。以發痘疹。今人
不達此理。一概用之。則誤矣。張
山雷曰。紫草氣味苦寒。而色紫入
血。故清理血分之熱。古以治臟腑
之熱結。後人則專治痘傷。而兼療
斑疹。皆涼血清熱之正旨。楊仁齋
以治癰毒之便閉。則凡外傷家血
分實熱者。皆可用之。且一切血熱
妄行之實火病。及血痢血痔。瘦血
淋血之氣壯邪實者。皆在應用之
列。而今人僅以爲痘家專藥。治熱
病者。治外傷者。皆不知有此疏矣。

配合應用 治痘疹深紅色。

或紫或黑陷。乾枯便閉。紫草。紅花
子。生地黃。甘草。貝母。牡丹皮。濃煎。
加生犀角汁。壯兒大小。以四十九
匙至半匙爲度。神效。若在一朝及
二朝內。稍有元氣。雖危可生。痘疔
痘毒成治之。惟痘毒須加黃耆。金
銀花。鼠黏子。痘瘡火斑癩者。加硬
石膏。麥冬。知母。竹葉。一二劑卽去
之。

治解痘毒。紫草一錢。陳皮五
分。葱白三寸。新汲水煎服。(直指
方)

治嬰童痘疹。三四日隱隱將
出未出。色赤便閉者。紫草二兩。剉
以百沸湯一盞。泡封。勿泄氣。待溫
時服半合。其瘡雖出亦輕。大便利
者勿用。煎服亦可。(經驗良方)

治痘毒黑疔。紫草三錢。雄黃
一錢爲末。以胭脂汁調銀簪挑破。
點之極妙。(集簡方)

治癰疽便閉。紫草。栝樓實等
分。新水煎服。(直指方)

治小兒白禿。紫草煎汁塗之。
(聖惠方)

治小便卒淋。紫草一兩爲末。
每食前用井華水服二錢。(千金

方) 亦治產後淋瀝。(產寶方)

治惡蟲咬人。紫草煎油塗之。
(聖惠方)

治火黃身熱。午後卻涼。身有
赤點或黑點者不可治。宜烙手足
心。背心。百會。下廉。內服紫草湯。紫
草。吳藍一兩。木香。川黃連一兩。水
煎服。(三十六黃方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡胃寒脾弱。大便
滑泄者禁用。

參攷資料 紫草古方稀用。
今醫家多用治傷寒時疾。發疹疹
不出者。以此作藥。使其發出。章甫
獨行方。治豌豆瘡。煮紫草湯飲。後
人相承用之。其效尤速。(蘇頌) 紫
草味甘鹹而氣寒。入心包絡及
肝經血分。其功長於涼血活血。利
大小腸。故痘疹欲出未出。血熱毒
盛。大便閉滯者宜用之。已出而紫
黑便閉者亦可用。若已出而紅活。
及白陷大便利者。切宜忌之。故楊
士瀛直指方云。紫草治痘。能導大
便。使發出亦輕。得木香。白朮佐之。
尤爲有益。又曾世榮活幼新書云。
紫草性寒。小兒脾氣實者猶可用。

脾氣虛者反能作瀉。古方惟用非取其初得陽氣。以類屬類。所以用發痘瘡。今人不達此理。一概用之非矣。(李時珍) ①出襄陽。多從南陽新野來。彼人種之。即是今染紫者。方藥都不復用。博物志云。平氏陽山。紫草特好。魏國者。紫色殊黑。比年東山亦種之。色小淺於北者。

(陶弘景) ②所在皆有。人家或種之。苗似蘭香。莖赤節青。二月開花。紫白色。結實白色。秋月熟。(蘇恭) ③種紫草。三月逐墾下子。九月子熟時刈草。春社前後採根陰乾。其根頭有白毛如茸。未花時採。則根色鮮明。花過時採。則根色黯惡。採時以石壓扁。曝乾。收時忌人溺及鷄馬糞。并烟氣。皆令草黃色。(李時珍)

【紫草貝母】即貝母之產於四川東境者。形較川貝稍大。而力稍遜。參見「貝母」條。
【紫草根】即紫草之處方用名。詳「紫草」條。

【紫草茸】命名 本品形似紫草。而根柔茸。兼色紫。故名。

康藏。西番。形態 本品鮮時。色淡紅而透明。如琥珀。陳久成塊形。如指形。大色呈深紫。質堅似木。卷形如桂皮。可供藥用。

性質 辛涼。
效能 涼血解毒。散熱催生。
主治 痘疹諸腫。一切瘡毒。

參攷資料 ①痘學真傳云。紫草茸。古本不見。近刻但在紫草項下註明。紫草茸。染手者為佳。竟不知別有一種。予幼時見世叔華私卿家有紫草茸。為發痘神丹。乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者。予取而藏之。每遇血熱毒癩。失血煩悶。頂陷不起。痘疔腫脹。於清解藥中。研加四五分。無不神效。惜乎方書不載。不敢擅增本草。近見神應心書。獨標紫草茸。色潯紅。出鳥思藏。着大樹枝上。如白蠟。其價如千金。不特發痘如神。用酒調服一二錢。能治諸腫毒惡瘡。又云。順手搗一錢酒下。力能催生。此效水禱應夢。屢獲其效。併請正西番貢價之語。至近時亦知茸。非紫草之嫩苗。復誤認胭脂。即是紫草茸。此

說更謬。(葉大椿) ②按紫草。本草諸方皆用根。韋宙獨行方。治豌豆瘡。不發。煮紫草湯飲。後人相承用之。則以之治痘。涼血解毒。自此始也。曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者。猶可用。脾氣虛者。反能作瀉。古惟用茸。取其初得陽氣。以類屬類。所以用發痘瘡。則用茸亦見於此。而亦未聞有鳥思藏所出一種。據葉所云。又似紫草。亦無的解。以其親試歷效。故存其說。以俟後之博訪。③痘科釋義云。痘科用紫草。古方惟用其茸。取氣輕味薄。而有清涼發散之功。凡下紫草。必用糯米五十粒。以制其冷性。庶不損胃氣。而致泄瀉。惟大熱便秘者。不必加(羅良)

【紫苑】即紫苑之處方用名。詳「紫苑」條。

【紫菊】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫草」條。

【紫酒】命名 本品以其色紫。故名。

製法 用雞屎白炒焦投酒中。待變紫色。即去滓飲之。

主治 卒然中風。口偏不語。角

弓反張。煩亂欲死。及臟腹不消。

【紫真香】即降真香之處方用名。詳「降真香」條。

【紫粉霜】即銀朱之古籍別名。典見綱目。詳「銀朱」條。

【紫參】命名 本品根形似參。而色紫。故名。

外國名詞 Tzu Shen
學名 Polygonum bistorta,
Bt.

基本 屬蓼科。紫參屬。藥用紫參之根莖。

產地 凡山野巖谷及溪澗旁。俱有生焉。

形態 紫參為多年生草本。自生於深山之陰地。葉形卵圓。大小不一。末端帶尖。生於地下莖之頭端。具長葉柄。葉皆簇生。莖高三四寸。葉叢間抽出輪狀有托葉之花莖。而於其頂端。卷開帶紅白色之六瓣小花。連續而為穗狀。根為形似地黃之地下莖。但稍長。延長約尺餘。根有節。每節約寸餘。即有細條連續之。作連珠狀。外面色黑褐。收藏多年者。長約尺許。被以褐色之粉衣。

採取 三月採之。

製法 採得曬乾。或火炙使色

紫用。

性質 苦寒。無毒。

效能 破血。消癥。治痢。或用作

通經藥。

主治 心腹積聚。寒熱邪氣。通

九竅。利大小便。(本經)療腸胃大

熱。唾血。衄血。腸中聚血。癰腫諸瘡。

止渴益精。(別錄)

歷代記述攷證 (唐)甄權藥

性本草論紫參曰。治心腹羸脹。散

癥血。治婦人血閉不通。(唐)蘇恭

新修本草論紫參曰。牡蒙治金瘡

破血。生肌肉。止痛。赤白痢。補虛益

氣。除脚腫。發陰陽。(元)王好古湯

液本草論紫參曰。主狂癩。溫瘧。飢

血。汗出。治血痢。(明)繆希雍本草

經疏論紫參曰。紫參味苦辛。氣寒

而無毒。專入血分。為除熱散結。逐

血之要藥。故主心腹積聚。寒熱邪

氣。通九竅。利大小便。略同紫草也。

苦以燥溼洩熱。辛以散結。寒以除

邪氣。故療腸胃大熱。唾血。衄血。腸

中聚血。亦主癰腫諸瘡者。熱氣熱

則留滯而成癰腫。血涼而活則自

散也。能散瘀血。故主婦人血閉不

通。癰有血蓄則狂。陽明熱則衄血。

溼熱在腸胃。則血凝滯而成血痢。

除熱活血。故亦主金瘡。(清)黃宮

繡本草求真論紫參曰。紫參味苦

而辛。氣寒無毒。功帶入肝。逐瘀破

血。兼入胃腑。使血自為通利。

故凡寒熱血痢癰腫積塊。心腹積

聚。因於血凝滯而成者。無不可

以調治。以其味苦則澀。味辛入肝

寒則勝熱。而使血從二便出矣。仲

景治下痢腹痛。而用紫參湯以除

亦取散其積血之意。但世人罕識

其真。用以紫菀為代。雖其寒熱不

同。而其疎利則一。(清)張隱庵本

草崇原論紫參曰。金匱澤漆湯。方

用紫參。本論云。咳而脉沉者。澤漆

湯主之。綱目集解云。古方所用牡

蒙。皆為紫參。而陶氏又以王孫為

牡蒙。今用亦希。因金匱方有紫參

故存於此。

近人學說 張山雷曰。紫參味

苦性寒。色紫。故清熱而入血分。主

心腹積聚。寒熱邪氣者。蓋血熱而

凝結之積聚。與玄參之主腹中寒

熱積聚同意。非能治氣滯寒凝之

積聚也。別錄主腸中聚血。亦即此

意。通九竅利二便者。清熱涼血。則

九竅自通。二便自利。別錄療腸胃

大熱。吐血衄血。癰腫諸瘡。皆苦寒

能清血熱之功用。止渴者。熱清而

渴自止。益精者。則因其清火而甚

胃之邪熱既去。而真陰斯充。究竟

陰寒之質。非補益之品也。又曰。紫

參苦寒。故專主血熱。而味又微辛

則能散瘀。故又能破逐血積。凡血

中鬱熱而成癥結。如痞塊癥瘕之

屬。皆可治之。惟氣滯寒凝之瘀血

必非其治也。

配合應用 紫參湯治痢下。

紫參半斤。水五升。煎二升。入甘草

二兩。煎取半升。分三服。(金匱方)

治吐血不止。紫參。人參。阿膠

炒等分為末。烏梅湯服一錢。一方

去人參。加甘草。以糯米湯服。(聖

惠方)

治面上酒刺。五參丸用紫參。

丹參。人參。苦參。沙參各一兩。為末。

胡桃仁。杵和丸。梧子大。每服三十

丸。茶下。(救濟方)

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡無瘀滯及脾胃

虛寒者禁用。畏辛夷。

參攷資料

紫參色紫黑。肝

臟血分藥也。故治諸血病。及寒熱

癰痢。癰腫積塊之屬。厥陰者。古方

治婦人腸胃病。烏喙丸所用牡蒙。

即此物也。唐蘇恭註王孫引陳延

之小品方。牡蒙所主之證。正是紫

參。若王孫則止治風溼痺證。不治

血病。(李時珍)紫參。王孫並有

牡蒙之名。古方所用牡蒙。多是紫

參也。按錢起詩集云。紫參幽芳也。

五德連芎。狀如飛禽羽。故俗名

五鳥花。(李時珍)紫參一名牡

蒙。生河西或高山。圓聚生根。黃赤

有文。皮黑中紫。五月花紫赤。實黑

大如豆。(吳普)今河中習解齊

及淮蜀州郡皆有之。苗長一二尺。

莖青而細。其葉青。似槐葉。亦有似

羊蹄者。五月開花。白色。似蕙花。亦

有紅紫而似水葳者。根淡紫黑色。

如地黃狀。肉紅白色。肉淺而皮深

三月採根。火炙紫色。又云。六月採

曬乾用。(蘇頌)紫參根。乾紫黑

色。肉帶紅白。狀如小紫草。范子計

然云。紫參出三輔。有三色。以青赤

色為善。(李時珍)

【紫接骨】 萆本。本品即接骨草之紫色者。

古籍別名 金寶相。嫩皮。金鉢孟。(綱目拾遺)

產地 多生山土間。

形態 紫接骨為接骨草之一種。與衣接骨相似。而莖葉俱紫色。葉似蝴蝶花。根形如商陸。可供藥用。

主治 跌打勞損。瘀血。散風透風。為金瘡之聖藥。

【紫梗】 即紫鑽之古籍別名。與見綱目。詳「紫鑽」條。

【紫莧】 萆本。屬克科莧類之紫色植物。

性質 甘。無毒。

主治 治氣痢。殺蟲毒。療諸蛇螫傷。搗汁飲。並以渣敷傷處。

【紫蚌】 即石蠅之古籍別名。與見綱目。詳「石蠅」條。

【紫頂龍芽】 即龍芽草之開紫花者之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「龍芽草」條。

【紫梢花】 原名 弔精。性質 甘。溫。無毒。

主治 益陽補精。療真元虛弱。

陰接遺精。餘溼白濁如脂。小便不禁。瘰癧下溼。瘰癧。女人陰寒冷帶。入丸散及煎湯用。

參攷資料 和劑玉霜丸注云。如無紫梢花。以木賊代之。(綱目)

【紫梢花】 即弔精之精。與見北夢瑣言。詳「弔精」條。參考資料二三四項。

【紫檳榔】 即馬檳榔之古籍別名。與見綱目。詳「馬檳榔」條。

【紫賀石】 即紫佳石之古籍別名。與見本草集註。詳「紫佳石」條。

【紫荷】 即茶之產於浙江吳興縣境者。性質功能。參見「茶」條。

【紫給】 古籍別名 野葵。(別錄)

產地 生高陵諸地。

形態 紫給為雜草類之一種。野生郊外。其根如烏頭。可供藥用。

採取 三月三日採之。

性質 鹹。

主治 毒風。洩注頭部。

【紫菀】 命名 本品根色紫而柔宛。故名。

處方用名 紫菀。炙紫菀。古籍別名 青菀。紫荷。(別錄)

返魂草。(綱目)夜牽牛。(斗門方) 菹菀。紫菀。萬金。白羊鬚草。(和漢藥考)

外國名藥 Astor tataricus. F. (拉丁)

萆本 屬菊科。為紫菀之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。紫菀產安徽亳州。河南禹州。秋季出新。

形態 紫菀為多年生草本。春苗萌芽。莖互生。直立不倚。高可六七尺。葉大而為長橢圓形。有鋸齒。面粗糙。中秋莖端及枝梢開花。排列為頭狀花序。在其周圍之花。為淡紫色之舌狀花冠。中央之花。為黃色筒狀花冠。其色美麗。堪供玩賞。其根為一株叢生細長之根。狀似細辛。外面色紅紫。質柔韌。折之不易斷。



紫菀

採取 二三月間採根。陰乾。製法 雷斅曰。凡使紫菀。須去

頭及土。用東流水洗淨。以蜜浸一宿。至明於火上焙乾。用一兩用蜜二分。

性質 苦。溫。無毒。

效能 溫肺。下氣。化痰。止咳。用治咳逆藥。

主治 咳逆上氣。胸中寒熱結氣。去蟲毒。瘰癧。安五臟。(本經)療咳唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚風。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫菀曰。治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。(宋)大明諸家本草論紫菀曰。調中消痰。止渴。潤肌膚。添骨髓。【元】王好古湯液本草論紫菀曰。益肺氣。主息賁。

【明】繆希雍本草經疏論紫菀曰。紫菀味苦溫。別錄兼辛無毒。苦以泄之。辛以散之。溫以行之。辛先入肺。肺主諸氣。故主咳逆上氣。胸中寒熱結氣。去蟲毒。亦辛之力也。瘰癧者。陽明之溼熱。熏蒸於肺。則肺熱而津液不能下滴。傷其氣化。以困水之上源。故為瘰癧也。肺為五臟之華蓋。而主諸氣。肺安則能朝百脈。散精布液於各臟。故云安五

酸也。療咳逆。吐膿血。止喘悸者。散肺家之邪也。能安五臟。故治五勞及虛不足。小兒驚癇。亦虛而有熱故也。熱散則驚癇自止矣。得蜜蒸焙良。【明】李士材本草圖解論紫菀曰。紫菀辛甘微溫。肺家藥也。益肺調中。消痰定喘。止血療咳。解渴潤肌。補虛辟鬼。辛而不燥。潤而不寒。補而不滯。誠哉金玉君子。然非稍用多用。不能速效也。小便及滑血者。服一兩立效。去鬚洗淨。微火焙之。【清】黃宮繡本草求真論紫菀曰。紫菀辛苦而溫。色赤。雖入至高之臟。仍兼下降。故書載入肺金血分。能治虛勞咳嗽。驚悸吐衄諸血。又能通調水道。以治滑瀉便血。用此上下皆宜。且此辛而不燥。潤而不滯。於肺實為有益。然疎泄性多。培養力少。與桑白皮杏仁同為一類。但桑白皮杏仁則瀉肺經氣分。此則專瀉血經氣分也。故肺虛乾咳。禁用。紫色潤燥者良。其藥雖分上中與下。然下疎泄尤甚。蜜炒用。款冬為使。白者為女菀。入氣分。大瀉肺氣。肘後方用此三分。鉛丹一分。並酸漿服。一刀圭。日進三

服。至二十一日。能令面黑轉白。過服不宜。去頭鬚蜜水炒用。【清】賈九如辨藥指南論紫菀曰。紫菀味甘而帶苦。性涼而體潤。恰合肺部血分。主治肺焦葉舉。久嗽痰中帶血。及肺痿。痰喘。消渴。使肺竅有清涼潤澤之功。因其色紫類肝。用入肝經。凡勞熱不足。肝之衰病也。蓄熱結氣。肝之衰病也。吐血衄血。肝之逆上也。便血溺血。肝之妄下也。無不奏效。因其體潤。善能滋腎。蓋腎主二便。以此潤大便燥結。利小便短赤。開發陰陽。宣通壅滯。大有神功。同生地。麥冬。入心。寧神養血。同丹皮。赤芍。入胃。清熱涼血。其桑皮色白。為肺中氣藥。紫菀色紫。為肺中血藥。宜分別用。

辨偽 ●鄭肯巖曰。偽名紫菀。又名硬蕪紫菀。服之往往愈見咳逆氣結。其害無窮。按紫菀近道處處雖有出產。然色紫味苦。質極柔宛。若此種硬蕪。形質既殊。性味自劣。聞又有以車前及旋覆根。赤土染過混充者。更奚堪入藥乎。●醫炳章曰。按紫菀鳳陽府壽州龍王廟四鄰出者。鬚根粗。根色紫紅。硬梗少者佳。河南淮慶府出。枝略細。軟糯亦可用。湖北出者。性硬根細。泥屑重者。次。偽者浙江尚少。因價賤。出貨亦多故耳。

近人學說 張山雷曰。紫菀柔潤有餘。雖曰苦辛而溫。非燥烈可比。專能開泄肺鬱。定咳降逆。宣通窒滯。其味微辛。則入氣分。其色殷紫。則入血分。故能兼疏肺家氣血。凡風寒外束。肺氣壅塞。咳喘不爽。喘促哮喘。及氣火燔灼。鬱為肺癰。咳吐膿血。痰臭腥穢。諸證。無不治之。而寒飲蟄踞。濁涎膠固。喉中如水雞聲者。尤為相宜。惟其溫而不熱。潤而不燥。所以寒熱皆宜。無所避忌。景岳謂水虧金燥。咳嗽失血者。非其所宜。石頑謂陰虛肺熱乾咳者。忌之。蓋恐開泄太過。重傷肺金。又恐辛溫之性。或至助火。要之虛勞作嗽。亦必有濁痰阻塞肺竅。故類類作咳。以求其通。不為開之。咳亦不止。以此溫潤之品。泄化垢膩。順調氣機。而不傷於正。不偏於燥。又不犯寒涼遏抑。滋膩戀邪等弊。豈非正治。且柔潤之質。必不偏熱較之二冬二母。名為滋陰。而實陰風滯。阻寒隱道者。相去猶遠。惟實火作咳。及肺癰成膿者。則紫菀雖能泄降。微嫌其近於辛溫。不可重任。然藉為嚮導。以揭穴犁庭。亦無不可。總之肺金壅塞。無論為寒為火。皆有非此不開之勢。而俗子多不知之。但以從事於蘇子之辛溫。桑皮之抑降。此肺勞之人。所以項背相望。而不可救藥也。經氏經疏反謂其辛散之功甚烈。且謂咳逆喘嗽。皆是陰虛肺熱之證。欲用紫菀須與二冬桑皮同用。則不獨沒煞肺寒喘嗽一層。且紫菀之功。力惟在開泄。乃以二冬膩之。且以桑皮之大寒苦降者。遏抑之。是惟恐其肺家痰涎濁膩。或有透泄之路。而必欲閉之塞之。乃至於絕也。如此談醫。直以殺人為能事。然則今之治嗽。而只知有二冬桑皮者。皆繆仲醇作俑之孽矣。立言不慎。貽禍無窮。不可不辨。又凡小便不利之候。多有由於氣化不宜者。古人謂之氣癃。不調其氣。但與滲利。亦必不效。惟紫菀疏泄肺氣。則上竅開而下竅亦泄。石頑謂其通調小道。其用在是。非僅以其溫潤也。

配合應用 ①治肺傷咳嗽。紫菀五錢。水一盃。煎七分溫服。日三次。(衛生易簡方)

②治久嗽不癒。紫菀、款冬花各一兩。百部半兩。搗羅爲末。每服三錢。薑三片。烏梅一個。煎湯調下。日二其佳。(國經本草方)

③治小兒咳嗽聲不出者。紫菀末、杏仁等分。入蜜同研丸。芥子大。每服一丸。五味子湯化下。(全幼心鑑方)

④治吐血咳嗽。吐血後咳者。紫菀、五味炒爲末。蜜丸芥子大。每含化一丸。(指南方)

⑤治產後下血。紫菀末。水服五撮。(聖惠方)

⑥治纏喉風痺不通欲死者。用返魂草根一莖。洗淨。納入喉中。待取惡涎出。卽瘥。神效。更以馬牙滑津嚥之。卽絕根本。一名紫菀。南人呼爲夜牽牛。(斗門方)

⑦治婦人小便卒不得出者。紫菀爲末。并華水服三撮。卽通。小便者服五撮立止。(千金方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛肺燥。及有

實熱者禁用。惡天雄、羅麥、蘇木、雷丸、遠志、畏茵陳。款冬爲之使。

著名方劑 紫菀湯治肺傷氣極。勞熱咳嗽。吐痰吐血。肺痿肺癰。(玉海藏方) 紫菀知母貝母阿膠各二錢。人參甘草桔梗茯苓各五分。五味子十二粒。上藥水煎服。日二服。一方加蓮肉。

參攷資料 ①形似重葯。根作節。紫色。潤軟者佳。(大明) ②紫菀遠根葉採之。醋浸。入少鹽收曬。作菜。辛香。號名仙菜。不宜多。多則腐也。(玉類) ③按陳自明云。紫菀以半山所出。根如北細辛者爲良。沂兗以東皆有之。今人多以車前旋覆根赤土藥過僞之。紫菀肺病要藥。肺本自亡津液。又服走津液藥。爲害滋甚。不可不慎。(李時珍)

④辛溫暫用之品。陰虛肺熱者。不宜專用。多用。須與二冬之桑皮共之。白者名女菀。入氣分。大泄肺氣。(顧松園)

【紫菀非】卽紫菀之根最柔輭者。典見綱目。詳【紫菀】條。
【紫菀】卽馬蘭之古籍別名。典見綱目。詳【馬蘭】條。

古稱別名 紫莢。(綱目) 甘海苔。(日本)

外國名詞 Porphyrus tonos, Kijohi, (拉丁)アサクサノリ アマノリ(日本)

基本 係紅藻類紫菜屬之紫菜。
產地 多出閩越諸地之海濱岩石間。

形態 紫菜爲水藻類藻屬之一種。全體扁平。呈廣披針形。或橢圓形。稍分枝。有紅紫綠紫黑紫等色。長一二寸。闊五六分。採而乾之。可供食與藥用。



紫菜

採取 冬春間採之。

性質 甘寒。無毒。

主治 熱氣煩。塞咽喉。黃汁飲之。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論紫菜曰。病懷癆脚氣者。宜食之。

參攷資料 ①紫菜多食令人腹脹。發氣吐白沫。飲熱醋少許卽消。(陳藏器) ②凡癆結積塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能軟堅之義也。(朱丹溪)

古稱別名 蜀芹。楚葵。苔菜。(國經) 赤芦。水菴菜。(綱目) 起食菜。(寶藏論)

外國名詞 Corydalis incisa, Poda (拉丁)ムラサキケマン ヤブケマン(日本)

基本 係罂粟科紫堇屬。爲紫堇之苗葉。
產地 生山野間。



紫堇

形態 紫堇爲堇類之多年生雜草。本莖高一二尺。葉二三回分裂。缺刻。銳頭。稍似胡蘿蔔。又似水菴之葉。有長柄而互生。春夏間開花。總狀花序。花軸上之苞有缺刻。紫紅色。一瓣有距。雄蕊凡六。果實爲蒴。呈線狀。其蒴葉可作蔬。

果實爲蒴。呈線狀。其蒴葉可作蔬。

食與藥用。

採取 三四月間採之。

性質 苦澀。

參攷資料 取汁煮。雌黃。制赤。伏砂砂。擒三黃(綱目)

【紫華花】(綱目本草) 古籍別名 水菊菜。

性質 酸。微溫。無毒。

主治 曝乾研末。塗脫肛。

【紫璣】即大璣之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大璣』條。

【紫栴蛇】即栴精之原名。詳『栴精』條。

【紫萍】即浮萍之葉體較大。面青背紫。而多下垂之鬚根者之別名。詳『浮萍』條。

【紫雲英】即刺搖之別名。典見植物學大辭典。詳『刺搖』條。

【紫雲瑪瑙】即瑪瑙之產於安徽和縣者之別名。性質功能。與尋常瑪瑙同。詳『瑪瑙』條。

【紫葛】 外國名詞 Vitis Co-ignotia, Pull (拉丁) ヤマブドウ ガネブ(日本)

基本 係葡萄科葡萄屬。爲紫

十一畫 紫

葛之根皮。

產地 生山中及田野間。

形態 紫葛爲藤類之莖。生灌木。葉大而圓。基脚作心臟形。掌狀分裂。裂痕淺。呈稜角狀。緣邊有不等之齒牙。上面平滑。下面密生褐色之毛。如綿狀。夏末莖梢著花。圓錐花序。基部有卷鬚。花冠五瓣。黃綠色。結實漿果。熟則紫黑色。味酸多甘少。可食。其根皮肉紫色。大者徑二三寸。可供藥用。

採取 三月八月間。採根皮曬乾用。

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 癰腫惡瘡。搗末醋和封之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論紫葛根皮曰。主癰瘕。緩急。并熱痛風。通小腸。燒灰制消石。【明】李時珍本草綱目論紫葛根皮曰。生肌散血。

【紫葡萄】即葡萄之紫色者。功能最良。典見綱目。詳『葡萄』條。

【紫葳】即凌霄花之原名。詳『凌霄花』條。

【紫葵】即紫菜之古籍別名。典見

綱目。詳『紫菜』條。

【紫葉蘇枝】即紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【紫蒂盤桓】即茶菊之紫色者。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。

【紫鑽】即紫鑽之原名。詳『紫鑽』條。

射干之俗名。詳『射干』條。

【紫葷】即香葷之作。結紫色者。爲葷中之下品。性質功能與尋常香葷無異。惟力較遜。參詳『香葷』條。

【紫慈根】即白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芨』條。

【紫鷲蕒】即鷲鷲之古籍別名。典見綱目。詳『鷲鷲』條。

【紫龍鬚】即龍鬚藤之紫色者。詳『龍鬚藤』條。

【紫葳】即魚腥草之處方用名。詳『魚腥草』條。

【紫舊】即紫葳之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫葳』條。

【紫檀】命名 檀善木。故從重。宜善也。其色紫者。名紫檀。

處方用名 紫檀香。紫檀木。紫檀片。

古籍別名 赤檀。綱目)

外國名詞 Pterocarpus sam- balius, L.f. (拉丁) シアン(日本)

基本 係豆科紫檀屬之木質。

產地 東印度爲原產地。今廣東廣南諸省均有出。

東廣南諸省均有出。

形態 紫植爲常綠木本。莖高五六丈。葉爲奇數羽狀複葉。有三小葉。花序總狀。萼有毛。花冠蝶形。呈黃色。果實有翼。其木質新者色紅。舊者色紫甚堅。重入水沉。既可用作器具及染料。又可充藥用。



紫 植

製法 採得紙封收。藏則不泄氣。削片或到末。或磨汁用。

性質 微寒。無毒。

效能 消腫毒。辟惡氣。用作瘡毒藥。

主治 磨塗惡毒風毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論紫植曰。刮末。傳金。指止血。止痛。療淋。【宋】大明諸家本草論紫植曰。醋磨。傳一切卒腫。【明】繆希雍本草經疏論紫植曰。紫真植。味鹹。氣微寒。性應無毒。其主惡毒風毒者。凡毒必因熱而發。熱甚則生風。而營血受傷。毒乃生焉。此藥誠能入血。寒能除熱。則

毒自消矣。弘景以之傳金。瘡止血止痛者。亦取此意耳。宜與番降真香同爲極細末。傳金。瘡良。【清】張石頑張氏醫通論紫植曰。白檀辛溫。氣分藥也。故能理衛氣而調脾。肺。利胸膈。紫植鹹平。血分藥也。力能和營氣而消腫毒。治金瘡。用量 五分至一錢。

施用宜忌 紫植能動火耗氣。若癰腫潰後。諸瘡多膿。及陰虛火亢者均忌之。

【紫植片】即紫植之處方用名。詳【紫植】條。

【紫植木】即紫植之處方用名。詳【紫植】條。

【紫植香】即紫植之處方用名。詳【紫植】條。

【紫植】條。

【紫藍】即生藍根之初生嫩芽。尖而微紫者。性質功能與尋常藍同。詳【生藍】條。

【紫檳榔】即馬檳榔之別名。而馬檳榔。係大腹子之一種。詳【檳榔】條。

【紫藍】 基本 紫藍爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 鹹無毒。

主治 解諸內毒。

【紫葳】即葳香之紫色者。性質功能與葳香同。詳【葳香】條。

【紫碧石】即碧石紫色者之別名。詳【碧石】條。

【紫羅毯】即石將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【石將軍】條。

【紫羅蘭】即紫羅蘭之別名。詳【紫羅蘭】條。

【紫羅網】即爲尾之古籍別名。典見花鏡。詳【蒼尾】條。

【紫羅蘭】 產地 生溪澗中或原野間。

形態 紫羅蘭爲山草類之一種。葉如箭鏃。質厚密生。白色。硬毛高二三尺。下部形類灌木本。春開紫紅花。其根可供藥用。

採取 以溪澗而白花者爲佳。

主治 虛脹腫滿。清利水道。其土產者。瘕跌打損傷。搗和酒服。

參攷資料 紫羅蘭根。不可多服。令人吐瀉。傷胃氣。【趙學敏】

【紫藤】 古籍別名 招豆藤。【綱目拾遺】

外國名詞 Krauhia Flor. ibunda, Taub. (拉丁)ノチ

ムラサキフチ(日本)

基本 係豆科。紫藤屬之紫藤。產地 生山野間。

形態 紫藤爲蔓生落葉木本。莖卷絡於他物。葉互生。作奇數羽狀複葉。小葉長卵形。春末隨葉出花。軸下垂。開花蝶形。花冠紫色或白色。長總狀花序。結實爲長莢。有短毛密生。其皮之纖維可供織物。嫩葉與種子可供食與藥用。



紫 藤

性質 甘。微溫。有小毒。

主治 作煎和糖服。下水。癩病。參攷資料 藤皮着樹從心。置有皮。四月生紫花可愛。長安人亦種飾庭也。江東呼爲招豆藤。其子作角。角中仁。熬香着酒中。令酒不敗。敗酒中用之亦正。【陳藏器】

【紫藤】即省藤之古籍別名。典見植物學大辭典。詳【省藤】條。

【紫藤香】即降真香之古籍別名。典見綱目。詳【降真香】條。

植物學大辭典詳【省藤】條。

【紫葳】即葳蕤之未解葉者。功能生肉滅瘰。爲治金瘡聖藥。其餘性質。與葳蕤同。參見「葳蕤」條。

【紫蘇】

原名 蘇。蘇從穌。舒暢之謂。本品性能舒暢。功能行血和血。故名。但莖葉色紫者。遂名紫蘇也。

處方用名 蘇葉。蘇梗。帶葉蘇梗。

古籍別名 赤蘇。(肘後)桂荏。(爾雅)香蘇。(千金方)水蘇。山魚蘇。白魚蘇。水狀元。(和漢藥考)

外國名詞 Perilla nankinensis, Deane. (拉丁)

基本 屬唇形科。爲紫蘇之葉。其子葉詳見各該條。

產地 凡山野平原間。恒多生長。陳仁山藥物生產辨云。蘇葉產廣東。以連州。清遠爲多出。

形態 紫蘇爲一年生草本。多種於園圃。春下種子。莖高三尺許。其形方。分莖有稜。具外逆之稀毛。葉作卵圓或廣橢圓形。末端帶尖。長二寸內外。邊緣有鋸齒。多皺。葉有柄。皆對生。背面多紫紅色。通體發一種之芳香。八九月間。莖端

葉腋。俱出三四寸長之穗。開或白或淡紫之唇形花。小花較爲總狀花序。萼五裂。果實爲屬於閉果之瘦果。亦有芳香性。種子黃褐色。如芥子大。其葉可供藥用。



紫蘇

種類 ①其葉面背皆紫色者。紫蘇也。②其葉面背皆白色者。白蘇也。③其葉色不紫而氣不香似荏者。野蘇。即荏也。④其葉細齒密。如剪成之狀。香色。莖子一無稍異於紫蘇。惟其莖葉子實較爲俱細者。即花紫蘇也。亦即所稱回回蘇也。

種植 圓圃間恒有栽植。有於二三月間下種者。有由宿子在地。屆春而自生者。茲述其栽培之要點於下。①氣候及土質。氣候以溫和者爲最佳。寒冷地方。於其生長有所不適。土地不論黏土。壤土。砂土。園土。及石灰土等。栽培之皆能生長。惟其品質上稍有差異。最適

者爲砂土。栽培之可使生長完全而無缺也。次之則園土。栽培之則其品質略有不良。石灰土尙能生長。其品質已劣而不可比。至於黏土。壤土。栽培之能生長者甚少。雖有生長。品質亦劣。且其生產大減。故栽培者。往往有虧資之苦也。②產地及種類。產於南省者。如福建。廣東。廣西等是也。產於中省者。如四川。湖北。江西。浙江等是也。產於北省者。如山西。甘肅等是也。南省產出。品質雖爲最佳。其中亦有優劣之分。廣東之產出者。較福建。廣西產出者爲佳。是其證也。中省產出者。品質雖較南省爲劣。其中有時亦不無反較南省爲優者。如四川有時產出之品質。實優於廣西。福建產出之品質也。北省則不及也。故藥中所用者。皆廣東所產出之品質。而用北省者甚少。其種類亦有早中晚之別。中種最佳。早種次之。晚種不及。惟收量較多。是其長也。③治地。先擇適宜之砂土。砂土不得。則以園土代之。於冬季耕鬆土地。或於春季一二月間耕起之。(冬耕宜深。春耕宜淺)耕起之

後。將肥打碎土塊。乃可作畦。畦闊約二尺五寸至三尺爲度。高約五六寸。栽中種者。其畦稍可狹小。約闊二尺至二尺五寸。高約三四寸。已足。畦上土面。須肥不爲要。④時期。栽早種者。於二月下旬至三月上旬。可以栽種於已作畦上也。栽中種者。稍遲二十餘日。於三月中旬至四月上旬。亦可栽種於畦間也。栽晚種者。於四月中旬至四月下旬。即當栽種。不可再遲也。⑤播種。治地既完。時期又擇。於是。可以從而播種也。播種分有二式。一點播。二條播。點播者。用器點穴於畦上。限定若干距離。不可有廣狹之差。而後將種子投入於畦上之穴間也。條播者。於畦上掘小溝。溝不可斜。當如直線。而後將種子排放其中也。條播與點播。其利益相差無幾。所差者。點播之用種子較少。於條播之種子也。⑥施肥。自播至刈。施二三次之稀薄人糞尿已足。第一次當於播種後施之。第二次宜在中耕後施之。第三次於除草後。當即施與。或稍遲十餘日後施之。亦無不可。⑦中耕。播種後待二

月之久。即行中耕一次。可毋庸多行也。除草宜時。動除之。爲要。不可怠忽。又不拘定時期。限定次數也。收穫。早種於七八月間。可以刈取。中種於八月下旬。亦可刈取。晚種刈取之期。則在九月中旬也。刈取之法。用銳鎌刈之。或者先用小耙掘鬆土地。而後手捏莖葉中帶根枝拔起之。拔起之後。曝日中二三日。始可乾燥無溼。而後再貯藏於高燥之地上可也。計算每畝收穫量。約可得七八百斤。而二三百斤者爲最劣。每畝播種之量。點播約需一升四合。條播約需二升六七合。若過少則不能數一畝之用。過多則徒耗其種子也。

採取 七月至九月間。採其莖葉日乾。

製法 凡使蘇葉。須用兩面俱紫者。去蛛網蟲子。切到用。

性質 辛溫。無毒。

效能 發肌表。散風寒。用作下氣藥。又爲殺一切魚肉毒之要藥。

主治 下氣。除寒中。其子尤良。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論紫蘇曰。以葉生食作藥。

殺一切魚肉毒。【唐】孟詵食療本草論紫蘇曰。除寒熱。治一切冷氣。【宋】日華諸家本草論紫蘇曰。補中益氣。治心腹脹滿。止嘔亂轉筋。開胃下食。止脚氣。通大小腸。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論紫蘇曰。通心經。益脾胃。煮飲尤勝。與橘皮相宜。【明】李時珍本草綱目論紫蘇曰。解肌發表。散風寒。行氣寬中。消痰利肺。和血溫中。止痛定喘。安胎解魚蟹毒。治蛇犬傷。【明】李士材本草圖解論紫蘇曰。紫蘇辛溫。肺家藥也。葉可發散風寒。梗能行氣安胎。子可消痰定喘。解魚蟹毒。治蛇犬傷。按紫蘇以辛散爲功。久服泄人真氣。世俗喜其芳香。愛其遠氣。或爲小蔬。或作蜜餞。朝暮用之。甚無益也。古人謂芳草致衰貴之疾。蓋指此耳。【清】黃宮繡本草求真論紫蘇曰。紫蘇背面俱紫。辛溫香竄。五月端午採用。凡風寒偶傷。氣閉不利。心膨氣脹。並暑溼泄瀉。熱閉血脈。崩漏淋瀝。喉腥口臭。俱可用此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可暖中。使其一身舒暢。故命其名曰蘇。是以時珍謂其

同橘皮砂仁。則能行氣安胎。同薑香烏藥。則能快氣止痛。同麻黃葛根。則能發汗解肌。同芍藥當歸。則能和營散血。同木瓜厚朴。則能散溼解鬱。同桔梗枳殼。則能利膈寬中。同杏子。煎子。則能消痰定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺薄。難以奏效。但久服亦能泄人真氣。虛寒泄瀉尤忌。即安胎和胃藥中。用之。不過取其辛香。暫調胃寒氣滯之症。豈可概用久用。以陷虛虛之禍耶。梗下氣稍緩。子降氣最速。【清】賈九如辨藥指南論紫蘇曰。蘇葉爲發生之物。辛溫能散。氣薄能通。味薄發泄。專解肌發表。療傷風傷寒。及瘧疾初起。外感霍亂。溼熱脚氣。凡屬表症。放邪氣出路之要藥也。丹溪治春分後濕熱病。頭痛身熱。脊強目痛。鼻乾口渴。每以此同葛根白芷。入六神通解散。助其感風。發汗解肌。其病如掃。取其辛香。以治抑鬱之氣。停滯胸膈。入心氣飲。開心胸鬱熱神妙。如寒滯腹痛。火滯痢疾。溼滯泄瀉。少佐三分從內略爲疏解。最爲妥當。參蘇飲治虛人感冒風寒。方中一補

一散。古人良有深意。如不遵其義。減去人參。或服之不應。或邪氣未散。而正氣先虛。須知用藥得法。全在君臣佐使之間。此獨制魚蝦蝮蟹之毒。如過傷其味者解之。

國外學說 古方藥品考曰。紫蘇面背皆紫。其氣芳香者可用。所謂花紫蘇是也。凡用葉者。須去蛛網蟲子。藥舖出售者甚粗劣。或香氣散失者。亦不可用。面背皆紫者。名片面紫蘇。面背俱不紫者。名野蘇。此二種均不堪入藥。蘇子之功。專在芳香氣遠。然今用其子而去殼。則淡薄而無香氣。故須連子殼用之。乃最有效。又大和本草曰。紫蘇須用紫色者。於近六月。葉不乾時採之。最佳。時珍云。有一種花紫蘇。其葉細齒密紐。如繭成之狀。香色莖子一般。無二人稱回回蘇。按此山野有之。形狀氣味。與紫蘇不異。惟葉莖子俱細耳。若香氣則烈於尋常紫蘇。日本呼爲高麗紫蘇。生葉加入魚膾食之。去魚毒。有香氣。填和以梅醬。麥食亦可。能開胃進食。

近人學說 張山雷曰。紫蘇芳

香氣烈。莖幹中空。故能徹上徹下。外開皮毛。泄肺氣而通腠理。上則通鼻竅。清頭目。爲風寒外感。靈藥中則開胸膈。醒脾胃。宣化痰飲。解鬱結而利氣滯。方言云。舒蘇也。楚通語也。是蘇字有舒散之義。氣疎以達。蘇之得名以此。今人恒以莖葉子三者分主各症。蓋此物產地不同。形狀亦別。多莖者其莖亦細而莖幹大者。則葉又少。故分析辨治。尤爲精切。葉本輕揚。則風寒外感用之。疏散肺閉。宣通肌表。泄風化邪。最爲敏捷。莖則質堅。雖亦中空。而近根處偉大豐厚。巨者徑寸。則固澀氣用之。解結止痛。降逆定喘。開胃醒脾。固其開泄外感之旨不同。而子則滑利直下。降氣消痰。止咳潤肺。又是別有意味。此今人選葉之密。已與宋金元明不同。不可謂非藥物學之進境者。惟其子多油。能泄眞氣。石頑謂氣虛久嗽。陰虛喘逆。脾虛滑泄者。皆不可用。

配合應用 ①治感寒上氣。蘇葉三兩。橘皮四兩。酒四升。煮一升。半分再服。(肘後方)

十一 薑 紫

①治傷寒氣喘不止。用赤蘇一把。水三升。煮一升。稍稍飲之。(肘後方)

②治勞復食復欲死者。蘇葉煮汁二升飲之。亦可入生薑。豆豉。同煮飲。(肘後方)

③治卒嘔不止。香蘇濃煮。頓服三升良。(千金方)

④治霍亂腹滿。未得吐下。生蘇搗汁飲之。佳。乾蘇煮汁亦可。(肘後方)

⑤治諸失血病。紫蘇不限多少。入大鍋內水煎令乾。去滓熬膏。以炒熟赤豆爲末。和丸。梧子大。每酒下三五十丸。常服之。(斗門方)

⑥治金瘡出血不止。以嫩紫蘇葉。疊葉同搗貼之。(永類鈴方)

⑦治癩撲傷損。紫蘇搗傅之。瘡口自合。(談楚翁試驗方)

⑧治傷損血出不止。以陳紫蘇葉。曬所出血。按爛傅之。血不作。臍且愈後無癢甚妙也。(永類鈴方)

⑨治風狗咬傷。紫蘇葉嚼傅之。(千金方)

⑩治蛇虺傷人。紫蘇葉搗飲之。(千金方)

⑪治食蟹中毒。紫蘇煮汁飲二升。(金匱方)

⑫治飛絲入目。令人舌上生泡。用紫蘇葉嚼爛。白湯嚥之。(危氏得效方)

⑬治乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封之。(海上仙方)

⑭治咳逆短氣。紫蘇莖葉二錢。人參一錢。水一鍾煎服。(普濟方)

⑮用薑 錢半至三錢 施用宜忌 凡氣弱表虛。而無外感風寒者。禁用。忌火。不可與鯉魚食。食之生毒瘡。

著名方劑 紫蘇飲。治妊娠胎氣不利。懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。象治臨產。驚恐氣結。連日不安。或二便不利。(嚴氏方) 大腹皮。人參。川芎。橘皮。芍藥各五錢。紫蘇一兩。當歸三分。甘草一分。上生薑四片。葱白七寸。水煎服。一方無人參。有香附。名紫蘇和氣飲。

參攷資料 ①紫蘇近世要藥也。其味辛。入氣分。其色紫。入血分。故同橘皮。砂仁。則行氣安胎。同蜜香。烏藥。則溫中止痛。同香附。麻黃。則發汗解肌。同芍藥。當歸。則和血

散血。同木瓜。厚朴。則散滯解鬱。治霍亂脚氣。同桔梗。枳殼。則利膈寬腸。同杏仁。萊菔子。則消痰定喘也。

(李時珍) ②紫蘇白蘇。皆以二三月下種。或宿子在地自生。其莖方其葉圓而有尖。四圍有鉅齒。肥地者面背皆紫。瘠地者面背皆紫。其面背皆白者。卽白蘇。乃荏也。紫蘇嫩時。採葉和蔬茹之。或鹽及梅漬作菹食。甚香。夏月作熱湯飲之。五

六月速根採收。以火煨其根。陰乾。則經久葉不落。八月開細紫花。成穗作房。如荊芥穗。九月半枯時收。子細如芥子而色黃赤。亦可取油。如荏油。務本新書云。凡地畔近道可種蘇。以遮六畜。收子打油。燃燈甚明。或熬之以油器物。丹房鏡源云。蘇子油能柔五金。八石。沙州記云。乞弗房之地。不種五穀。惟食蘇子。故王禎云。蘇有遮護之功。又有燈油之用。不可闕也。今有一種花紫蘇。其葉細齒密紐如繭成之狀。香色莖子並無異者。人稱回回蘇云。(李時珍) ③薄荷根莖。真似紫蘇。但葉不同爾。薄荷莖燥。紫蘇莖和入藥。須以刀刮去青薄皮。則

之(雷敷)◎蘇色紫赤。枝莖空通。其氣朝出暮入。有如經脉之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以蘇葉能發表。汗者血液之汗也。易思問常用蘇莖通十二經之調氣。治明眼飽悶。通大小便。止下利赤白。予亦常用治吐血下血。多奏奇功。夫茵草芎藭之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇畫出夜入之行速耳。(張隱菴)◎長沙藥解。金匱半夏厚朴湯。用蘇葉治婦人胸中如有炙鬱。以其降濁而散滯也。(黃元御)

【紫蘇子】 處方用名。炒蘇子。炙蘇子。家蘇子。杜蘇子。蘇子霜。

基本 屬唇形科。為紫蘇之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蘇子各省均有出。廣東以番禺為正。清遠。大石等處亦多生焉。

形態 蘇子大似芥子。色黃褐。

採取 九月間。莖葉枯時收之。

製法 凡使蘇子。以自收者真。市售者多偽。或焙炒或蜜炙用。

性質 辛溫無毒。

效能 開鬱下逆氣。消痰定喘。

咳。用作祛痰鎮咳藥。

主治 下氣。除寒。溫中。

歷代記載攷圖 【唐】甄權藥性本草論蘇子曰。治上氣咳逆。冷氣。腰脚中溼氣。風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白身香。【宋】日華諸家本草論蘇子曰。調中。益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止咳。潤心肺。【宋】寇宗奭本草衍義論蘇子曰。治肺氣喘急。【明】李時珍本草綱目論蘇子曰。治風順氣。利隔寬腸。解魚蟹毒。【清】汪訥庵本草備要論蘇子曰。蘇子與葉同功。潤心肺。尤能下氣定喘。止咳消痰。利隔寬腸。溫中開胃。

配合應用 ◎順氣利腸。紫蘇子。麻子仁等分研爛。水瀝取汁。同米煎粥食之。(濟生方)

◎治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升。微炒。以生絹袋盛於三斗清酒中。浸宿炒飲之。(聖惠方)

◎治一切冷氣。紫蘇子。高良薑。橘皮等分。蜜丸。梧子大。每服十九丸。空心酒下。亦治風濕脚氣。(藥性論方)

◎治風寒溼痺。四肢掣急。脚腫不可踐地。用紫蘇子二兩。杵碎。以水三升。研取汁。煮粳米二合。作粥和葱椒薑豉食之。(聖惠方)

◎治消渴變水。服此令水從小便出。用紫蘇子炒三兩。蘿蔔子炒三兩。為末。每服二錢。桑根白皮煎湯服。日二次。(聖濟方)

◎治夢中失精。蘇子一升。熬杵研末。酒服方寸匕。日再服。(外臺祕要方)

◎治食蟹中毒。紫蘇子煮汁飲之。(金匱方)

◎治上氣咳逆。紫蘇子入水研瀝汁。同粳米煮粥食。(簡便方)

用錢 錢半至三錢。

施用宜忌 凡腸滑氣虛者禁用。

著名方劑 蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞等症。(局方)蘇子半夏各二錢。前胡。炙草。厚朴。陳皮各八分。當歸二錢。沉香七分。豈三片。上藥水煎。不拘時服。若虛冷人加肉桂五分。黃耆一錢。

參攷資料 ◎蘇子下氣。與橘

皮相宜。(陶弘景)◎蘇子與葉同功。發散風氣。宜用葉。清利上下。則宜用子。(李時珍)◎氣虛表虛者。禁用葉。腸潤肺虛者。禁用子。(李士材)◎火升作嘔者。不宜用葉。惟可用子。(經希雍)

【紫蘭】 卽白芨之古籍別名。典見羣芳譜。詳「白芨」條。

【紫蘭根】 卽白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芨」條。

【紫蘘】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【紫樹】 卽櫻桃之實。紫色。皮裏有細黃點者。功能與尋常櫻桃同。參見「櫻桃」條。

【紫蠶】 卽石蠅之俗名。典見綱目。詳「石蠅」條。

【紫蠶】 卽石蠅之古籍別名。典見綱目。詳「石蠅」條。

【紫蠶】 原名 紫蠶。本品色赤。狀似鑽石。破開乃紅。故名。

古籍別名 赤膠。(蘇恭)紫梗。勒佞。(綱目)

產地 出南番諸地。

形態 紫蠶為一種細蟲如蠅。

風絲樹枝聚其脂液而成。其猶冬
膏樹上之小蟲。能造白蠟者。然明
透如琥珀。可以染色與藥用。

性質 甘。鹹。平。有小毒。

主治 五臟邪氣。金瘡。帶下。破
積血。生肌止痛。與麒麟竭大同小
異。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫鏡曰。溼痒疥疥。宜
入膏用。益陽精。去陰滯氣。

參攷資料 紫鏡治痘瘡。有活
血起膜之功。無鹹寒作瀉之患。功
用倍於紫草。(醫學大辭典)

【絲道草】即通草之處方用名。詳

【通草】條。

【細子】即羊桃之古籍別名。與見
綱目。詳「羊桃」條。

【細木通】即木通之處方用名。詳
【木通】條。

【細石】即石苻之古籍別名。與見
和漢藥考。詳「石苻」條。

【細辛】 命名 本品根細而味
極辛故名。

處方用名 北細辛。炙細辛。

古醫別名 小辛。少辛。(本經)
玉苻絲。綠鬚真。(和漢藥考)山人

參。(俗名)


學名 Asarum Sieboldi,

Miq.

基本 屬馬兜鈴科。為細辛之
鬚根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
細辛產自遼寧。吉林兩省。五月新
朝鮮亦有出。

形態 細辛為多年生草本。生
於山野陰地。春日自地下莖發生
新葉。具長葉柄。葉為心臟形。末端
尖銳。底部凹陷。似杜衡而薄。無光
澤。亦無紋理。花開於新葉之間。緊
接地上。大棗三四分。三瓣。色紫黑。
形似壺。花朶極小。開則下垂。入秋
則苗葉俱枯。其地下莖之副根。長
三五寸。粗二三分。外淡褐色。內白
色。氣味峻烈。辛若山椒。



辛

採取 二月八月採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡使細辛。切去
頭子。以瓜水浸一宿。曝乾。用須揀

去雙葉者。服之害人。

性質 辛。溫。無毒。

效能 通竅。搜風。散寒。行水。用
作面部風痛藥。又為頭痛咳嗽藥。

主治 咳逆上氣。頭痛。腦動。百
節拘攣。風溼痺痛。死肌。久服明目。

利九竅。輕身。長年。(本經)溫中下
氣。破痰。利水道。開胸中滯結。除喉
痺。總鼻不閉。香臭。風癩癩疾。下乳
結汗。不出。血不行。安五臟。益肝膽。

通精氣。(別錄)

張仲景之發明 細辛一味。經

張仲景之實驗。認為主治宿飲停
水。故治水氣在心下而咳滿。或上
逆。或脇痛。茲考徵如下。小背湯證
曰。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。苔
甘五味。搗辛湯證曰。咳胸滿。(以
上二方。細辛皆三兩)麻黃附子
細辛湯證。(麻黃附子細辛湯條
特云。少陰病。反發熱而不舉。餘證
為則按。六經也者。是後人之攙入。
而非仲景之古也。所謂少陰病者。
陰臥。小便清利也。陰臥者。惡寒甚
也。惡寒者。水病也。仲景氏之治瀉
寒也。其用附子者居多。又其言曰。
尤附並走皮中。逐水氣也。由是觀

之。惡寒之為水氣也明矣。其喘而
惡寒。有痰飲之變者。此方主之。)

大黃附子湯證曰。脇下偏痛。桂枝
草黃辛附湯證曰。心下堅大如
盤。邊如旋杯。(以上三方。細辛皆
二兩)

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論細辛曰。含之去
口臭。【唐】甄權藥性本草論細辛
曰。添膽氣。治嗽。去皮風溼痺。風眼
淚下。除齒痛。血閉。婦人血澀腰痛。

【元】王好古湯液本草論細辛曰。
潤肝燥。並治腎脈為病。脊強而厥。

【明】李時珍本草綱目論細辛曰。
治口舌生瘡。大便燥結。起目中倒
睫。【明】繆希雍本草經疏論細辛
曰。細辛味辛。溫而無毒。入手少陰
太陽經。風藥也。風性升。升則上行。
辛則橫走。溫則發散。故主咳逆。頭
痛。腦動。百節拘攣。風溼痺痛。死肌。
蓋痺及死肌。皆是感地之溼氣。或
兼風寒所成。風能除溼。溫能散寒。
辛能開竅。故療如上諸風寒溼疾
也。別錄又謂溫中下氣。破痰開胸。
除喉痺。總鼻。下乳。結汗。不出。血不
行。益肝膽。通精氣。皆升發辛散。開

通諸竅之功也。其曰久服明目。利九竅。輕身。長年者。必無是理。蓋辛散升發之藥。豈可久服哉。【清】黃宮繡本草求真論細辛曰。細辛味辛而厚。氣溫而烈。為足少陰腎溫經主藥。凡風寒邪入至陰。而見本經頭痛。腰脊俱強。口瘡喉痺。鼻淵齒齲。水停心下。口吐涎沫。耳聾鼻癢。倒睫便瀆者。並宜用此調治。或用獨活為使。俾在表之陽邪可表。而在裏之伏邪可除。故書載能通閉利竅。破痰下乳。行血發汗。且走腎者。必斂肝與腐。腐虛癆癯。及風眼淚下者。得此辛散宣通。而令淚收竅除。至書所云。服能入腎潤燥。非是火盛水衰。陰被陽涸而成。實因陰盛陽衰。火屈於水而致也。遇此辛以除寒。溫以燥溼。則陰得解而不凝矣。豈剛燥不撓之謂也乎。世之論藥性者。每鮮如此體會。但知就燥論燥。而致固執不通。獨不思經有云。腎苦燥。急食辛以潤之。乎。然味厚性烈。所用止宜數分。過則氣萎命傾。若血虛頭痛者。尤宜戒焉。產華陰者。真去莖葉者。用之。【清】葉天士本草經解論細辛曰。

細辛氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升陽也。肺屬金而主皮毛。形寒飲冷則傷肺。肺傷則氣不降。而咳逆上氣之症生矣。細辛入肺。溫能散寒。所以主之。風為陽邪而傷於上。風氣入腦則頭痛腦動。風性動也。其主之者。風氣通肝入肝。辛散也。地之溼氣。感則害人皮肉筋骨。百節拘攣。溼傷筋骨也。風溼痺痛。溼傷肉也。死肌。溼傷皮也。細辛辛溫散溼活血。則皮肉筋骨之邪散而愈也。久服辛溫暢肝。肝開竅於目。五臟津液上奉。故明目。辛溫開發。故利九竅。肝木條暢以生氣血。所以輕身長年也。【清】徐洵溪本草經百種錄論細辛曰。此以氣為治也。凡藥香者。皆能疎散風邪。細辛氣盛而味烈。其疎散之力更大。且風必挾寒以來。而又木熱而標寒。細辛性溫。又能驅逐寒氣。故其疎散上下之風邪。能無微不至。無處不到也。【清】黃元御長沙藥解論細辛曰。細辛味辛。氣溫。入手太陰肺足少陰腎經。降衝逆而止咳。驅寒溼

而薄濁。最清氣道。兼通水源。【清】楊時泰本草述鉤元論細辛曰。細辛香味俱細。少陰本藥也。其辛熱能溫足少陰之寒。究溫寒之用。所以致於內外周身。而上行為最者。非肝不能也。別錄所云。益肝散通精氣。最為扼要。其在至陰之分。雖不倫於補陽諸味。却能就陰分而散寒邪。即至陽之分。雖難比於行氣諸劑。却能就陽分而散陰結。陰中陽通。則能資營氣而使暢矣。陽中陰通。則能助風燥而使行矣。總以辛溫達腎肝之氣。而暢陽於下。導陰於上。紓腎陰而升肝陽。最為有裨於人。而非益氣血之藥也。此味因潔古言諸風通用。而承襲者往往不察所宜。不知風從陽氣言之。有虛有實。如陽壅於下而為風。自以達陽為主。若陽壅於上而為風。即宜以和陰為主。反加辛溫升散。則陽愈壅而風愈甚矣。細辛治陽壅之風。不治陽壅之風。投之若誤。為害滋甚。有中氣虛而時患傷風。竟從補中氣而愈者。不可參此義。以用細辛乎哉。至其能治風溼痺痛。亦由陽虛化風。因之化溼者

也。凡陽虛鬱風者。多化溼。不可不知。【清】鄒澍本經疏證論細辛曰。細辛色紫。紫者赤黑相兼也。赤為心色。黑為腎色。心與腎皆屬少陰。兩少陰經皆短而直。細辛一枝直上。體細柔勁似之。少陰者。又皆水火相依。細辛體雖細。味極烈似之。故凡風氣寒氣。依於精血津液。便溺涕唾。以為患者。並能曳而出之。使相離而不相附。則精血津液。便溺涕唾。各復其常。風氣寒氣。自無所容。如本經所載。主治咳逆者。風寒依於胸中之飲。頭痛腦動者。風寒依於腦中之髓。百節拘攣者。風寒依於骨節屈伸洩澤之液。風溼痺痛死肌者。風寒依於肌肉中之津。推而廣之。隨地皆有津液。有津液。風寒皆能依附焉。故在胸為痰。為滯結。在喉為痺。在乳為結。在鼻為癰。在心為癰。在小腸為水。在氣分為汗不出。在血分為血不行。此別錄之與本經一貫不異者也。然須審定風寒果否零亂細碎。倚著於津液者。宜之。若風寒偏被一身。及與營衛相搏者。自有他味為治。與細辛無預也。細辛能提出

依附津液之風寒。不能使津液復
共常。且不能使津液中氣不隨提
曳以出。故其治咳。每與五味子乾
薑爲耦。如小青龍湯。真武湯。厚樸
麻黃湯是也。若射干麻黃湯。則不
用乾薑用生薑。四逆散。小柴胡湯
則但用乾薑五味子不用細辛。蓋
水氣與風寒相搏。有飲有溼有水。
隨人異亦隨證異。則兼嘔者有之。
兼滿者有之。兼喘者有之。不可但
因其咳。混同治也。特風寒將化。
則細辛不可用。小柴胡湯證。半化
半未化者且然。何況全化者耶。四
逆散證。雖以四逆係之少陰。然終
外寒內熱。故其治咳。乾薑五味可
用。細辛不可用矣。細辛惟治寒乃
爲恰合。惡寒者。寒之方。口渴者。
寒之已化。觸動者。寒與在上之陽
駁。而陽欲負。下有陳寒。則必惡寒
可見矣。曰脇下偏痛發熱。其經弦
緊。此寒也。當以溫藥下之。宜大黃
附子湯。曰寒氣厥逆。赤丸主之。二
者一溫以附子。下以大黃。一溫以
烏頭。利以茯苓半夏。一使其從大
便解。一使從小便解。皆以細辛聯
絡其間。不然則溫自溫。下自下。利

十一畫 細

自利。終不能使寒氣徹底。澀清耳。
於金匱求大便通利者。有大黃附
子湯。於傷寒論求利止者。有烏梅
丸。可知細辛能已後陰諸疾矣。至
千金治鼻塞耳聾齒痛諸方。用細
辛者甚多。至口鼻目病。則幾乎無
方不用。豈本經所謂明目利九竅
者。誠不必別擇。盡可用之耶。然即
此亦可窺其嚴於去取之意矣。觀
於目病由勞者。息肉生者。有障翳
者。有赤白膜膚者。生珠管者。皆不
用。眼暗者。淚出者。皆赤者。多用之。
則目病用細辛。有去取矣。鼻病生
息肉者。衄血者。皆不用。鼻塞者。鼻
癢者。多用之。則鼻病用細辛。有去
取矣。口病惟口臭齒痛多用之。耳
病惟外治多用之。惟前陰病則絕
無用者。曾謂九竅不利於細辛。毫
無別擇哉。素問曰。六經爲川。腸胃
爲海。九竅爲水注之氣。細辛雖善
治著水之寒。然著於小者能治之。
著於川著於海。則非所長矣。前陰
者。汪洋大水之出路。故非細辛所
能與也。清閱立陞本草選旨論
細辛曰。細辛味大辛。氣溫。氣厚於
味。陽也。升也。無毒。惡黃芪。獐。海。山

茱萸。忌生。桑。狸。肉。長。滑。石。硝。石。反
黎。蘆。稟。天。地。陽。升。之。氣。以。生。入。手
少。陰。太。陰。經。風。藥。也。風。性。升。升。則
上。行。辛。則。橫。走。溫。則。發。散。有。開。通
諸。竅。之。功。有。除。溫。散。寒。之。理。故。本
經。主。咳。逆。上。氣。頭。痛。腦。動。百。節。拘
攣。風。溫。痺。痛。死。肌。別。主。溫。中。下。氣。
破。痰。利。水。道。開。胸。中。滯。結。除。喉。痺。
塞。鼻。不。聞。香。臭。風。癩。癩。疾。下。乳。結。
汗。不。出。血。不。行。安。五。臟。益。膽。通。精
氣。且。甄。權。之。除。齒。痛。血。閉。弘。景。以
之。去。口。臭。而。詳。求。厥。志。其。所。以。治
諸。風。溼。寒。風。頭。痛。痰。飲。胃。中。滯。氣。
驚。癩。取。其。辛。溫。能。散。也。其。治。口。瘡
口。臭。喉。痺。齩。齒。腫。痛。者。取。其。能。散
浮。熱。也。亦。火。鬱。發。之。之。義。其。治。風
寒。咳。嗽。上。氣。者。辛。能。泄。肺。也。其。治
膽。氣。不。足。驚。癩。眼。目。諸。疾。者。辛。能
補。肺。也。其。通。少。陰。及。耳。竅。便。溺。者。
辛。能。潤。燥。也。故。管。佐。以。獨。活。治。少
陰。頭。痛。佐。以。魯。晉。根。治。諸。濕。痺。
得。歸。巧。牡。本。苳。苳。甘。草。療。婦。人。血
閉。得。決。明。鯉。魚。膽。羊。肝。止。風。淚。目
疼。得。麻。附。煎。湯。發。寒。邪。自。裏。之。表。
每。多。得。效。耳。然。其。性。辛。燥。發。散。故
凡。病。內。熱。火。盛。及。氣。虛。血。虛。陰。虛

等症。法並忌之。入風藥亦不可過
五分。若過五分。直有氣塞而死之
患。非必有毒。特不識多寡耳。清
買九如辨藥指南論細辛曰。細辛
味辛性溫。若寒邪入裏。而在陰經
者。以此從內托出。佐九味羌活湯
發散寒邪快捷。因其氣味辛香。故
能上升。入芎辛湯。療目痛後羞明
畏日。糧。澁。難。開。合。通。竅。湯。散。肺。氣
而通鼻竅。佐清胃湯。祛胃熱而止
牙疼。此熱藥入寒劑。蓋反以佐取
之之義也。但少用助火。多用則氣
閉不通。每劑止三四分耳。
國外學說 日本和漢三才圖
會曰。細辛山谷間處處有之。皆不
及華陰。高麗者。葉似小葵。柔莖。根
細而直。色紫。味極辛。嚼之習習如
椒。而更甚於椒。大抵能亂細辛者
甚多。皆當以根苗色味細辨之。杜
衡。鬼督郵。徐長卿。白薇。白前。皆能
亂細辛。按細辛中日俱用之。與州
津。輕。及。江。州。之。產。良。阿。波。及。豐。前。
小倉之產次之。其葉似小葵。而青
有小白點。夏月開小紫花。朵短根
直。外黃內白。其氣略如椒。雖辛。不
甚用。細辛藏人參。則人參不蛀云。

又和語本草綱目曰。日本所謂細辛。類杜衡也。杜衡莖葉氣味俱似細辛。時珍曰。杜衡亂細辛。則根苗功用皆彷彿。不可不審。今家園多植之。謂可免雷筴之災。此細辛也。凡類似細辛者。本草多載。審用之可也。又大和本草曰。一說加茂莖為細辛。其根甚辛。實乃杜衡也。又山野有一種。根味似細辛。俗即謂之細辛。此白薇也。又物類品隱曰。種類頗多。中國產上品。葉圓而厚。日本產上品。葉稍長。南部。佐渡。產大抵相似。伊豆之天城山產亦上品。讀岐之大川產葉薄。至冬即枯。又用藥須知曰。細辛中日俱有之。形細味辛。習習如蜀椒者為真。日本產細辛。尚有優劣。加茂莖味薄。佐渡。秋田為上。葉皆圓。色青。無白斑。視南部所產為佳。關東及北地產葉有香氣。又日用藥品考曰。細辛以中國產者為真。惟攪雜杜衡。宜選別淨盡。日本產者。藥舖每呼為真細辛。其有呼土細辛。近江細辛。伊吹細辛。並杜衡也。杜衡較細辛根粗。辛味少。有臊氣。又藥學士朝比奈泰彥。嘗將杜衡及細辛之

原植物。互相研究。記述其關係與區別。又析出杜衡之揮發油。並將油分蒸餾。而析出揮發油之生成分。著有記事一篇。錄入明治四十年藥學雜誌第三百〇二號。題曰杜衡之研究及與細辛之關係。摘錄如下。細辛與杜衡。每易混淆。且杜衡之出產。視細辛為多。故藥舖往往以杜衡代之。本草辨別之法。僅云細辛根細。味初不辛。須與大辛烈。杜衡根粗。辛味少。有臊氣。頗屬簡陋。難臻完備。余按細辛之葉較薄。形似腎臟而銳尖。花筒內部有類似縱線之突起。杜衡葉厚如革。作卵狀心形。又似戟狀心形。多有白斑。花筒內部有縱橫似網之突起。又細辛為一年生葉。杜衡則為常綠葉。依此區別。庶不致混亂矣。往年在東京藥舖。購得生細辛約三四十斤。皆杜衡也。可知吾國從前在盛行中藥時代。細辛與杜衡常混用矣。此余所以利用此機。即以研究杜衡。為研究細辛之資也。

溫。遼東產者名北細辛。可以入藥。南方產者名杜衡。其莖稍粗。辛味稍減。一莖有五七葉。俗名馬蹄香。不堪入藥。北產者其莖極細。其味極辛。若此種粗而無味。先失命名之義。又奚有治病之功乎。曹炳章曰。按細辛六月出新。關東出者為北細辛。根莖細清白。氣辛。葉少。梗多為最佳。江南甯國。涇縣出亦佳。江甯句容。滁州。白陽山等處出。皆次。亳州出者為馬細辛。山東出為東細辛。均次。不堪藥用。

配合應用 治陽明火熱上攻。以致齒痛。用細辛。石膏。 治治婦人子宮冷不受孕。用細辛。當歸。芍藥。芎藭。牡丹。黨參。甘草。白薇。 治目痛。用細辛。鯉魚膽。青羊肝。甘菊花。決明子。 療傷寒少陰咽痛。用細辛。甘草。 治風頭痛。用細辛。藁本。芎藭。白芷。荊芥。防風。 解利傷風寒鼻塞。用細辛。紫蘇。防風。甘草。桔梗。杏仁。薄荷。桑白皮。

治暗風卒倒。不省人事。細辛末吹入鼻中。(危氏得效方) 治虛寒嘔噦。飲食不下。細辛去葉中兩丁香二錢半為末。每服一錢。柿蒂湯下。 治小兒客忤。口不能言。細辛桂心末等分。以少許含口中。(外臺祕要方) 治小兒口瘡。細辛末醋調。貼臍上。(衛生家寶方) 治口舌生瘡。細辛。黃連等分為末。搽之。滋潤甚效。名兼金散。一方用細辛。黃蘗。(三因方) 治口瘡。腫痛。細辛。黃蘗。汁。熱含。冷吐。取瘡。(聖惠方) 治鼻中息肉。細辛末。時時吹之。(聖惠方) 治諸般耳聾。細辛末。溶黃蠟丸。鼠屎大。綿裹。一丸塞之。一二次即愈。須戒怒氣。名聰耳丸。(嬰氏經驗方) 用量 三分至八分。 施用宜忌 凡陰虛陽旺。及無風寒實邪者。禁用。惡黃耆。狼毒。萊菔。惡生菜。狸肉。畏消石。滑石。反藜蘆。骨青。滋根為之使。

參攷資料 ①治頭面風痛。不

可缺此。(寇宗奭) ②水停心下不行。則腎氣燥。宜以辛潤之。細辛之

辛。以行水氣而潤燥。(成無己) ③細辛非華陰者不得為真。若單用

末不可過一錢。多則氣閉塞不通者死。雖死無傷。近年開平獄中嘗

治此不可不記。非本有毒。但不識多寡耳。(陳承) ④小辛少辛。皆細

小之義也。按山海經云。浮戲之山多少辛。管子云。五沃之土。藟藥生

少辛。是矣。(李時珍)

【細辛木皮】即秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦皮」條。

【細亞錫飯】 產地 生大庚
形態 硬莖。叢生。葉如柳葉。附莖叢結。長梗。小實。鱗葉下垂。可供藥用。



細亞錫飯

主治 洗疥毒。

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

【青皮】條。

【細昆布】即海帶之日本名。詳「海帶」條。

【細草】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

【細茶】即兩前茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「兩前茶」條。

【細荔】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【細理石】即石膏之古籍別名。典見別錄。詳「石膏」條。

【細莧】即野莧之古籍別名。典見別錄。詳「莧」條。

【細連枝】即六安茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「六安茶」條。

【細黑豆】即稽豆之古籍別名。典見逢原。詳「稽豆」條。

【細腰蜂】即螞蟥之古籍別名。典見莊子。詳「螞蟥」條。

【細葉冬青】即冬青之葉細而木皮可製糖者。詳「冬青」條。

【細葉菖蒲】即石菖蒲葉較細者之別名。詳「石菖蒲」條。

【細瓊珠】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【細礪石】即砥石之古籍別名。典

見綱目。詳「砥石」條。

【紵麻】即苧麻。以其皮可績紵。故名。性質功能。參見「苧麻」條。

【紺菊】即馬蘭之日本名。詳「馬蘭」條。

【紺著】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎杖」條。

【紺殼】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【紺髮】即蜻蛉之大而色玄紺者。性質功能。詳「蜻蛉」條。

【終石】 基本 爲石類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。
主治 瘕瘕瘰癧。益精氣。小便澀。

【袋角】即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【羚羊片】即羚羊角之處方用名。詳「羚羊角」條。

【羚羊肉】 性質 甘。平。無毒。
主治 惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論羚羊肉曰。和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急強。中風。北人恒食。南人食之。免蛇蟲傷。

【羚羊角】 命名 本品獨標。顯也。其字從鹿。從羴。省文。故名。顯。後人簡寫爲羚。藥用其角。遂名之曰羚羊角。

處方用名 鈔羚羊。羚羊片。屬羚羊。

古籍別名 屬羊角。鹿角。九尾羊角。(綱目) 羴角。(山海經) 羴角。羴羊角。(和漢藥考)

外國名詞 Nemoriaedus
crispus Tomm. (拉丁) Antelope-horn. (英) Hirschhauehorn (德)

基本 屬羴草類羚羊之角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。羚羊產中俄交界各地。如西北利亞。及安南等處。採辦者以張家口。牛莊爲聚處。

形態 羚羊體長四尺餘。高半之類。山羊。毛呈黃褐色。腹部則爲白色。日本所產倭羚羊(羴鹿) A. Chima 亦爲羚羊之一種。其有名產地爲日本奧州南部地方。體高二尺餘。毛青灰色。其尖端呈黑褐色。其角爲細長角。長尺許。徑寸餘。

呈黃褐色。稍有光澤。末端稍彎曲。有螺旋狀關節。日本產者。帶黑色。長五寸餘。基部有橫紋。謂之倭羚。羊角。羚羊產於中國西北者。為正道。值昂而藥效甚著。產於暹羅。安南者。為南羚。其形態與北羚無異。棲息於多巖石之深山。鳥白赤。各色俱有。角之烏白。隨其毛色為轉移。有曲輪狀。亦有斜直者。此種南羚。有效用與否。尙有待於證驗。唯其價值甚賤。而形質足以正地道者。相混。則亟須辨別也。茲舉其相違特徵於下。①正羚。角基部橫剖面。幾成正規則。南羚。角空擴大。剖面呈橢圓形。②正羚。環節勁。凸突。節目上。球結成索結狀。南羚。節目斜。光滑。③正羚。角長一尺者。角尖常有三四寸。南羚。角尖約二寸左右。但有個共通點。凡角直者。其尖長。曲輪角之角尖。常較短。南羚亦有角基細圓者。唯產量不多。其環節亦斜。不能如正羚之凸突。故節目乃固定之特徵。可資鑑別者也。至角質白。尖端有血色。跡均與正羊相同。在出產地土人。每對售二三元。基圓白雅者。至市

場值十餘元。皆有人帶回國。竟以正角價售於市肆。其相似之形狀。概可想見矣。

製法 凡使不可單用。須要不折。元對繩線。錢銼銼細。重重密裹。避風。以旋旋取用。搗篩極細。更研萬匝入藥。免刮人腸。不用時密封貯存。臨用則磨末吞服。

用法 水磨服。又與他藥水煎。或剉末和作丸散。

性質 鹹。寒。無毒。

效能 平肝。熄風。清熱。安神。用作鎮痙藥。又為通經藥。

主治 明目。益氣。起陰。去惡。血注下。辟蠱毒。惡鬼不祥。常不覺寐。傷寒時氣。寒熱。熱在肌膚。溼風注毒。伏在骨間。及食噎不通。久服強筋骨。起陰益氣。利丈夫。(別錄)

歷代記述效驗

【唐】陳藏器本草拾遺論羚羊角曰。治驚悸。煩悶。心胸惡氣。癩癧惡瘡。溪毒。【唐】孟詵食療本草論羚羊角曰。治中風。筋掣。附骨疼痛。作末蜜服。治卒熱。悶。及熱毒痢血。疝氣。磨水塗腫毒。【唐】甄權藥性本草論羚羊角

曰。治一切熱毒。風攻。疰。中惡。毒風。卒死。昏亂。不識人。散產後惡血。衝心。煩悶。燒末酒服之。治小兒驚癇。治山瘴及噎塞。【元】朱丹溪本草衍義補遺論羚羊角曰。羚羊角味苦。鹹。性寒。無毒。入肝經。主傷寒熱。在肌膚。溫風注伏在骨間。邪氣不祥。驚夢狂越。心神不寧。小兒卒熱。驚搐。產後敗血。沖心。清心解毒。明目。益氣。燒灰。又主食噎不通。其角多倒掛。痕深入者。為真。羚羊屬木。宜入厥陰。木得其平。而風火諸症。無能乘矣。【明】李時珍本草綱目論羚羊角曰。平肝舒筋。定風安魂。散血下氣。辟惡解毒。治子癰瘰癧。

【清】黃宮繡本草求真論羚羊角曰。羚羊角苦。鹹。大寒。功備入肝。清火。兼入心肺二經。考書所論。主治多屬冗統。惟李時珍剖晰甚明。言羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰。肝經。甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障翳。而羚羊角能平之。肝主風。在合為筋。其發病也。小兒驚癇。婦人子癰。大人中氣。搖擗。及筋脈掣急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝

之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。癡癩卒死。而羚羊角能安之。血者肝之脈也。發病則瘀滯下注。疝痛。痔痢。疥癩。癰疽。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣為怒。則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性。蠱。而筋骨之精在角。故又能辟惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒煙走蛇。虺也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肺及肝。若使過用。久用。則更有伐生之氣耳。多兩角。一角者。勝。剉研極細。或磨用。【清】張石頑張氏醫通論羚羊角曰。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗昏障。而羚羊角能平之。痘瘡正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癰。大人中風。搖擗及筋寒。歷節痛。而羚羊能舒之。驚駭不寧。狂越僻謬。而羚羊能安之。惡鬼不祥。而羚羊能辟之。惡血注下。癰毒疝腫。疥癩癰疽。產後血氣。而羚羊能散之。溼熱留滯。腸氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩懣氣逆。噎塞不通。鬱為寒熱。而羚羊

之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。癡癩卒死。而羚羊角能安之。血者肝之脈也。發病則瘀滯下注。疝痛。痔痢。疥癩。癰疽。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣為怒。則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性。蠱。而筋骨之精在角。故又能辟惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒煙走蛇。虺也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肺及肝。若使過用。久用。則更有伐生之氣耳。多兩角。一角者。勝。剉研極細。或磨用。【清】張石頑張氏醫通論羚羊角曰。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗昏障。而羚羊角能平之。痘瘡正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癰。大人中風。搖擗及筋寒。歷節痛。而羚羊能舒之。驚駭不寧。狂越僻謬。而羚羊能安之。惡鬼不祥。而羚羊能辟之。惡血注下。癰毒疝腫。疥癩癰疽。產後血氣。而羚羊能散之。溼熱留滯。腸氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩懣氣逆。噎塞不通。鬱為寒熱。而羚羊

之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。癡癩卒死。而羚羊角能安之。血者肝之脈也。發病則瘀滯下注。疝痛。痔痢。疥癩。癰疽。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣為怒。則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性。蠱。而筋骨之精在角。故又能辟惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒煙走蛇。虺也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肺及肝。若使過用。久用。則更有伐生之氣耳。多兩角。一角者。勝。剉研極細。或磨用。【清】張石頑張氏醫通論羚羊角曰。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗昏障。而羚羊角能平之。痘瘡正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癰。大人中風。搖擗及筋寒。歷節痛。而羚羊能舒之。驚駭不寧。狂越僻謬。而羚羊能安之。惡鬼不祥。而羚羊能辟之。惡血注下。癰毒疝腫。疥癩癰疽。產後血氣。而羚羊能散之。溼熱留滯。腸氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩懣氣逆。噎塞不通。鬱為寒熱。而羚羊

羊角能降之。詳本經所主。皆取散厥陰血結耳。愚按諸角。皆能入肝散血解毒。而犀角爲之首推。以其出食百草之毒。兼走陽明。力能祛之外出也。故痘瘡之血熱毒盛者。爲之必需。若痘瘡之毒。并在氣分。而正面稠密。不能起發者。又須羚羊角。以分解其勢。使惡血流於他處。此非犀角之所能及也。人但知羚羊角能消目翳。定驚癇。而散痘瘡。惡血之功。人所共味。羯羊角治青盲。目暗與羚羊角不殊。而辟除邪魅。毒亦相彷彿。惜乎從未之聞。惟消乳癖。丹方用之。白羯羊角亦能消乳癖。而方家每用琉璃角。燈磁片。刮取薄屑。置胸中候脆。杵細酒服。方寸匙。應效。當取宿腐之味。以消陳積之殆也。其鹿角刮屑。善消虛人乳腫。未潰卽治。已潰卽斂。卽本經主漏下惡血之治。龍角神效不寧。功用與龍齒略同。千金方中有齒角并用者。牛角膠。尚主閉血血崩。牛之一身。惟此無用。而本經特爲採錄。千金尤爲崩漏要藥。可見天地間無棄物也。

辨偽 ①鄭省農曰。羚羊偽者。

十一畫 羚

用白兕角。及白牛蹄。瑤瑤。僞充。其現切之羚羊絲。尤難辨。按羚羊產梁州。真州各處。商洛諸巖山中。及秦隴西域。皆有角長尺餘。有節特起。環繞如人手。指握。得二十四節者。尤有神力。今多用尖。取其精銳堅剛之力也。宜揀選地道頂尖。磨水取汁。用之尤靈。②曹炳章曰。羚羊有黑白二種。黑者清腎肝熱。白者清肺熱。熄風。近年以白者爲重。故市上僅有白羚羊。黑者多無。詎知近年藥用漸繁。捕獵殆盡。因而價值日昂。且羚羊質性堅硬。刀切不入。我藥習俗。以形式相競。鈔片入藥。以求雅觀。查其鈔片之法。先將羚羊水浸七八日。再用滾水泡透。經此手續。化堅爲軟。則鈔之片。毀闊大。形式雖雅觀。然經水浸泡。汁液盡出。性味已失。反增腥臭。氣味。治病功能。已大半消失。昔考古人。修治羚羊之法。先用鐵絲。細細。再搗極細。更研萬匝。入藥。免刮黏胃腸。使原質不失。效力完固。法良意美。但一經研末。眞僞莫辨。難免以僞亂眞。則害人更甚。

配合應用 ①治驚邪驚寐。及

頭目狂亂等疾。羚羊角。犀角。丹砂。牛黃。琥珀。天竺黃。金箔。茯神。遠志。鈎藤。鈎。竹瀝。

②治肝腎虛而有熱。以致目昏生翳。羚羊角。枸杞子。甘菊花。決明子。穀精草。生地黃。五味子。黃連。蠶。蒙花。木賊草。女貞實。

③治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。(外臺秘要方)

④治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。(千金方)

用量 三分至一錢五分。

應用宜忌 凡非溫疫熱毒。及肝經無熱者。禁用。

著名方劑 ①紫雪丹。治煩熱發狂。(局方)犀角。羚羊。磁石。朴硝。硝石。磁石。寒水石。滑石。石膏。丁香。沉香。木香。麝香。升麻。甘草。如法合成。每服三四分。至一錢。冷開水調。

②羚羊角散。治子癇。(本事方)用羚羊角屑一錢。杏仁。薏仁。防風。獨活。川芎。當歸。茯神。棗仁。各五分。(妙)木香。甘草。各二分。加姜煎服。

③羚羊角丸。治中風手顛。頭昏。舌艱澀。(錢乙方)羚羊角(屑)一

兩。犀角三錢。羌活。防風。各一兩。薏苡仁(炒)秦朮。各一兩。上爲末。煉蜜丸。

參攷資料 ①在肝之病。必用羚羊角。亦猶入心之病。必用犀角也。(陸九芝)②羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障翳。而羚羊角能平之。肝主風。在合爲筋。其發也。小兒驚瀾。婦人子瀾。大人中風。搐攣。及經脈緊急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝之神也。發病則驚。不寧。狂越。僻謬。疑寐。卒死。而羚羊能安之。血者肝之臟也。發病則癩。滯下注。疝痛。毒痢。瘡腫。癩。產後血氣。而羚羊能散之。相火寄於肝膽。在氣爲怒。病則煩瀆。氣逆。噎塞。不通。寒熱。及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性。靈而筋骨之精。在角。故又能辟邪惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒烟。走蛇。也。本經別錄。其著其功。而近俗。罕能發揚。惜哉。(李時珍)③羚羊出於西地。似羊而大。角有節。最堅勁。能碎金。剛石。與鱗骨。夜宿防患。以角掛樹。而棲。多

兩角。一角者勝。到研極細。或磨用。
(虞飛鵬)按王安石字說云。鹿則比類而環角外。向以自防。臨則獨棲懸角木上。以遠害。可謂羸也。故字從鹿從羸。省文。後人作羚。許慎說文云。羸山羊也。大面細角。山海經作羸云。狀如羊而馬尾。賈信星槎勝覽云。阿丹國羚羊自胸中至尾垂九塊。名九尾羊。(李時珍)今出建平宣都諸嶺山中。及西域。多兩角。一角者為勝。角多節。感盛圓繞。別有山羊。角極長。惟二邊有節。節亦疎大。不入藥用。乃爾雅云。羸羊者。羌夷以為為羚羊。能涉峻坂。(陶弘景)羚羊南山商洛間大有。今出梁州。真州。洋州亦實。其角細如人指。長四五寸。而文盛細。山羊或名野羊。大者如牛角。可為鞍橋。又有山羸。大如鹿。皮可作鞞。有兩角。大小如山羊角。俗人亦用之。陶氏所謂一邊有粗文者。是即山羊也。(蘇頌)今秦隴龍蜀金商州山中皆有。戎人捕得來貨。其形似羊。青色而大。其角長一二尺。有節。如人手指。握痕。又最堅勁。郭璞註爾雅云。羸似羊而大。其角細

而圓銳。好在山崖間。類似羸羊。其角大而墮。出西方。本草諸註各異。觀今所市者。與爾雅之羚羊。陶註之山羊。蘇註之山羸。大都相似。今人相承用之。以為羸羊。細角長四五寸者。往往羸中有磨角成痕處。詳諸說。此乃真羸羊角。而世多不用何也。又閩廣中山出一種野羊。彼人亦謂之羚羊也。羚羊似羊而色青毛粗。兩角短小。羸羊似羸。兩角長大。山羸乃羸之身。而羚羊之角。但稍大而節疎慢耳。陶氏言羚羊有一角。而陳氏非之。按寰宇志云。安南高石山出羚羊。一角極堅。能碎金剛石。則羚羊固有一角者矣。金剛石出西域。狀如紫石英。百鍊不消。物莫能擊。惟羚羊角扣之。則自然冰泮也。又犢骨僞充佛牙。物亦不能破。用此角擊之。即碎。皆相畏耳。羚羊皮西人以作座褥。(李時珍)羚羊角以有掛痕者為真。今磨用之。角不見掛痕。已難確定其真僞。若羚羊角片。則多以山羊角鑄成。且久煎無味。絕無效力。(孫鳳翔)羚羊一物。惟溫疫邪毒可以解散。若傷寒表症而誤

用之。則邪反陷矣。(仲氏)

【羚羊肺】 性質 甘平無毒。 主治 水腫臃脹。小便不利。

參攷資料 羚羊肺。本草不收。千金翼載大醫山羸。治章司業水腫。養若丸用之。蓋取其引藥入肺。以通小便之上源也。其方用羚羊肺一具。沸湯微燻過。曝乾為末。養若子一升。用三年醋沒一伏時。蒸熟搗爛和丸。梧子大。每用四十九。麥門冬湯。食後服。候口中乾。妄語為驗。數日小便大利。即逐。無羚羊以青羊膽代之亦可。(李時珍)

【羚羊鼻】 主治 灸研服。療五尸遁尸。邪氣。

【羚羊膽】 性質 苦寒無毒。 主治 面下疔。如雀卵色。以二升同煮三沸。塗四五次。

【羝肉】 即羊肉之古籍別名。典見綱目。詳「羊肉」條。

【羝天子】 即鬼白之古籍別名。典見綱目。詳「鬼白」條。

【羝天花】 即鬼白之古籍別名。典見綱目。詳「鬼白」條。

【羝天草】 即海芋之古籍別名。典見皮辛玉冊。詳「海芋」條。

【羝寒花】 即鬼白之古籍別名。典見綱目。詳「鬼白」條。

【脫毛】 即白辛之古籍別名。典見別錄。詳「白辛」條。

【脫石】 即滑石之古籍別名。典見本草集註。詳「滑石」條。

【脫紅換棉】 即石蕊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蕊」條。

【脫核仁】 即桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桃仁」條。

【脫核嬰兒】 即桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桃仁」條。

【春杵頭細糠】 採取 以糠糶取。 性質 辛甘熱。 主治 卒啞。刮取含之。亦可煎湯呷之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論春杵頭細糠曰。燒研水服。令婦人易產。

參攷資料 春杵頭細糠。治噎病。亦是春搗義爾(陶弘景)。

【春搗】 即春搗之古籍別名。典見綱目。詳「春搗」條。

【舵菜】 命名 本品係海船舵上所生之蔬菜故名。

性質 味甘寒無毒。

主治 瘰癧結氣痰飲。

【船茴香】 即大茴香之處方用名詳「大茴香」條。即莽草之古籍別名。與見和漢藥考詳「莽草」條。

【船底苔】 基本 本品爲苔之生於船底者。

性質 甘冷無毒。

主治 鼻洪吐血。淋疾。同炙甘草煎汁濃煎湯呷之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論船底苔曰。解天行熱病。伏熱。頭目不清。神志昏塞。及諸大毒。以五兩和酥餅末一兩半。麵糊丸。梧子大。每溫酒下五十丸。

參攷資料 按方賢奇效方云。

水之精氣。漬船板木中。累見風日。久則變爲青色。蓋因太陽晒之中。感陰陽之氣。故服之。能分陰陽。去邪熱。調臟腑。蓋物之氣味所宜也。

(李時珍)

【荷包茄】 即茄子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「茄子」條。

【荷包牡丹】 形態 荷包牡丹爲一年生草。庭院多栽植之。莖高二尺許。葉羽狀細裂。春月開紅花。成總狀下垂。取根可供藥用。

效能 搗汁和酒沖服。能令人沈醉不醒。

主治 專治金瘡止痛。

【荷包草】 命名 本品葉大。中缺。形如荷包。故名。

古藥別名 肉餛飩草。金鎖匙。

(綱目拾遺)

產地 多生寺院牆砌石間。或亂石縫中。

亂石縫中。

形態 荷包草爲石草類之一種。形似地錢。十月發苗。莖細葉似芡實。並有皺紋如腰包。延蔓布地。逐節生根。極易繁衍。至六七月間。上面生二子。青翠可愛。採得可供藥用。



荷包草

採取 須於四月十月採之。

性質 微寒。

主治 黃白火丹。去溼火。同神仙對坐草用。清五臟。點熱眼。止吐血。洗痔瘡。調婦人經期。

配合應用 ①治水腫初起。活鯽魚大者一尾。用磁片割開。去鱗及腸血。以紙拭淨。勿見水。以荷包草填腹。令滿。甜白酒蒸熟。去草食。魚利溼熱。治黃白痘。皸眼。白濁。經閉。搗汁點熱眼。煎湯洗痔瘡腫痛。

(百草鏡方)

②治疝氣。用荷包草研爛汁。酒送服。此草形似荷包。上面有二子。初生時有葉無子。須至六七月方生。(周氏家寶方)

③治黃痘。荷包草。螺螄三合。同搗汁。澄清。煨熱服。(家寶方)

④治眼中生疔。用肉餛飩草。連根葉和酒漿板搗汁。飲二三次。即愈。(酒漿板。即酒醴糟也。眼科要覽方)

⑤治蛇咬。鶴頂紅。即灰蠶。肉餛飩。野甜菜。三味共搗敷之。(家寶方)

施用宜忌 忌鹽。

【荷花瓣】 即蓮花之處方用名。詳

「蓮花」條。

【荷魚】 即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰻魚」條。

原名 荷錢。

【荷葉】 命名 藕生水中。其葉曰荷。嫩葉形似錢。故名。

處方用名 青荷葉。鮮荷葉。敗荷葉。

古藥別名 藕荷葉。芰荷葉。(綱目)

外國名詞 Leaves of Lotus

(英)

基本 屬睡蓮科。爲蓮之葉。

產地 多生池沼中。

形態 蓮爲多年生草。春季從宿根生新葉。初小。謂之錢葉。(荷錢)稍大。浮水上。謂之水葉。地下莖肥大。有節。內有作縱行管狀之多數空竅。此即藕也。可供食用。葉初爲卷葉。後舒張作圓形。柄狀。高抽水。表面滑澤。下面中央有葉柄。初夏開美麗白色或淡紅色大花。子實包藏於倒圓錐形之花托(蓮房)中。狀類椎實。

採取 六七月採。

製法 大明曰。荷葉荷鼻。入藥

一二二二

十一畫 荷

並多用。

用法 水煎或生搗或炙到。

性質 苦平無毒。

效能 升清散熱。消暑。化熱。用

爲止血及解毒藥。

主治 血脈腹痛產後。胎衣不

下。酒煮服之。

歷代記載攷證 【宋】大明日

華諸家本草論荷葉曰。止渴。落胞。

破血。治產後口乾。心脾燥煩。【明】

李時珍本草綱目論荷葉曰。生發

元氣。裨助脾胃。澀精液。散瘀血。消

水腫。癰腫。發痘瘡。治吐血。咯血。衄

血。下血。溺血。血淋。崩中。產後惡血

損傷敗血。【明】李士材本草綱解

論荷葉曰。主開胃消食。止血固精。

【清】黃宮橋本草求真論荷葉曰。

荷葉其味雖苦。其氣雖平。然生水

土之下。污穢之中。挺然獨立。實有

長養生發之氣。故昔人謂其色青

主屬木。其形仰主上行。其中空主

上發。其象震主入腑。爲東方膽木

必用之藥。故潔古枳朮丸方。用荷

葉燒飯爲丸。取其以能升發脾胃

之氣。東垣清震湯用此以治頭面

風痛等症。取其以爲升發風寒之

具。聞人規用此以治痘瘡風寒外

發。惡黑倒靨。取其以爲溫肌散邪

之具。證治要訣。用此一味。燒灰單

服。以治湯水浮腫。取其溫以行水

之意。至入脾胃。須用其蒂。謂之荷

鼻。取其味厚。獨勝他處。但服荷葉

過多。令人瘦劣。非可常用。試觀丹

士縮銀。用荷葉同煨。而銀質頓輕。

於此可知其概矣。【清】王士雄隨

息居飲食譜論荷葉曰。葉功用與

房略同。其色青。其象寬。故能升發

膽中清氣。以達脾氣。凡脾虛氣陷

而爲便溺不運者。可佐入培中之

劑。如荷米煎之類是也。古方荷葉

燒飯。卽是此義。蓋燒飯卽煎飯。後

人拘泥字面。不解方言。入火燒焦。

全失清芬氣味矣。凡上焦邪盛。治

宜清降者。切不可用。東垣清震湯

之謬。章杏雲已力辨其非。試察其

能治痘瘡倒靨。則章氏之言益信。

痘疹論云。痘瘡倒靨。若由風寒外

襲。致閉血凝。漸變黑色。身痛肢厥

者。溫肌散邪。則氣行而痘自起也。

用霜後荷葉。貼水紫背者。炙乾。自

直。酥炒去絲。等分爲末。每服五

分。溫酒或茯苓湯調下。蓋荷葉能

升發陽氣。散瘀血。留好血。使毒能

解結滯之氣。故也。此藥平和。易得

而活人甚多。勝於人牙龍腦多矣。

名南金散。

配合應用 ①治陽水浮腫。敗

荷葉燒存性。研末。每服二錢。米飲

調下。日三服。證治要訣方。

②治脚膝浮腫。荷葉心。薊木等

煎湯淋洗之。永類鉉方。

③治痘瘡倒靨。紫背荷葉散。又

名南金散。治風寒外感。倒靨勢危

者。萬無一失。用霜後荷葉。貼水紫

背者。炙乾。白氈敷直者。炒去絲。等

分爲末。每服半錢。用胡荽湯或溫

酒調下。聞人規痘疹論方。

④治諸般癰腫。拔毒止痛。用荷

葉中心蒂。如錢者。不拘多少。煎湯

淋洗。拭乾。以飛過寒水石。同臙脂

脂塗之。又治癰腫。榨水飲方中用。

(本事方)

⑤治打撲損傷。惡血攻心。悶亂

疼痛者。以乾荷葉五斤。燒存性。爲

末。每服二錢。童子熱尿一盞。食前

調下。日三服。利下惡物爲度。(聖

惠方)

⑥治產後心痛。惡血不盡也。荷

一二二二

葉炒香爲末。每服方寸匕。沸湯或

童子小便調下。或燒灰或煎汁皆

可。亦治胎衣不下。(救急方)

⑦治傷寒產後。血暈欲死。用荷

葉。紅花。豨黃等分。炒研末。童子小

便。調服二錢。(麗安堂傷寒論方)

⑧治孕婦傷寒。大熱煩渴。恐傷

胎氣。用椒卷荷葉。焙半兩。蚌粉二

錢。牛爲末。每服三錢。新汲水入蜜

調服。并塗腹上。名單胎散。(鄭氏

方)

⑨治妊娠胎動。已見黃水者。乾

荷蒂一枚。炙研爲末。糯米淘汁一

鍾。調服卽安。(唐氏經驗方)

⑩治吐血不止。嫩荷葉七箇。搗

水服之。甚佳。又方。乾荷葉。生蒲黃

等分。爲末。每服三錢。桑白皮煎湯

調下。用輕霜敗荷。燒存性。研末。新

水服二錢。(肘後方)

⑪治吐血略血。荷葉焙乾爲末。

米湯調服二錢。一日二服。以止爲

度。用敗荷葉。蒲黃各一兩。爲末。每

服二錢。麥門冬湯下。(聖濟總錄

方)

⑫治吐血衄血。陽乘於陰。血熱

妄行。宜服四生丸。陳日華曰。屢用

得效。用生荷葉、生艾葉、生柏葉、生地黃等分搗爛。丸雞子大。每服一丸。水三杯。煎一杯。去渣服。(濟生方)

⑤治崩中下血。荷葉燒研半兩。蒲黃、黃芩各一兩爲末。每空心酒服三錢。

⑥治血痢不止。荷葉蒂水煮汁服之。(活濟方)

⑦治下痢赤白。荷葉燒研。每服二錢。紅痢蜜、白痢沙糖湯下。

⑧治脫肛不收。用貼水荷葉。焙研。酒服三錢。仍以荷葉盛末坐之。(經驗良方)

⑨治牙齒疼痛。青荷葉剪取錢蒂七箇。以濃米醋一杯。煎半杯。去滓。熬成膏。時時抹之妙。(唐氏經驗方)

⑩治赤遊火丹。新生荷葉。搗爛。入鹽塗之。(精玄方)

⑪治漆瘡作痒。乾荷葉煎湯洗之良。(集驗方)

⑫治偏身風癢。荷葉三十枚。石炭一斗。淋汁。合煮漬之。半日乃出。數日一作。甚良。(聖惠方)

⑬治偏頭風痛。升麻、蒼朮各一

兩。荷葉一個。水二鍾。煎一鍾。食後溫服。或燒荷葉一個爲末。以煎汁調服。(簡便方)

⑭治刀斧傷。荷葉燒研。搽之。(集簡方)

⑮治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。(醫聖元戎方)

⑯治雷頭風。雷頭風證。頭面疔瘡。腫痛。憎寒。發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑。誅伐無過。一人病此。諸藥不效。余處清震湯。治之而愈。用荷葉一個。升麻、蒼朮各五錢。水煎。溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象。震。其色又青。乃涉類象形之義也。又按開人規痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外感。則數閉血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛。四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑白出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散

瘀血。留好血。俱能解結滯之氣也。此藥易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云。荷葉服之。令人瘦劣。單服可以消陽水浮腫之氣。(李時珍) 荷葉伏白銀。伏硫黃。(李時珍)

⑰治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。(醫聖元戎方)

⑱治雷頭風。雷頭風證。頭面疔瘡。腫痛。憎寒。發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑。誅伐無過。一人病此。諸藥不效。余處清震湯。治之而愈。用荷葉一個。升麻、蒼朮各五錢。水煎。溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象。震。其色又青。乃涉類象形之義也。又按開人規痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外感。則數閉血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛。四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑白出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散

瘀血。留好血。俱能解結滯之氣也。此藥易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云。荷葉服之。令人瘦劣。單服可以消陽水浮腫之氣。(李時珍) 荷葉伏白銀。伏硫黃。(李時珍)

⑲治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。(醫聖元戎方)

⑳治雷頭風。雷頭風證。頭面疔瘡。腫痛。憎寒。發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑。誅伐無過。一人病此。諸藥不效。余處清震湯。治之而愈。用荷葉一個。升麻、蒼朮各五錢。水煎。溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象。震。其色又青。乃涉類象形之義也。又按開人規痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外感。則數閉血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛。四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑白出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散

瘀血。留好血。俱能解結滯之氣也。此藥易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云。荷葉服之。令人瘦劣。單服可以消陽水浮腫之氣。(李時珍) 荷葉伏白銀。伏硫黃。(李時珍)

㉑治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。(醫聖元戎方)

㉒治雷頭風。雷頭風證。頭面疔瘡。腫痛。憎寒。發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑。誅伐無過。一人病此。諸藥不效。余處清震湯。治之而愈。用荷葉一個。升麻、蒼朮各五錢。水煎。溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象。震。其色又青。乃涉類象形之義也。又按開人規痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外感。則數閉血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛。四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑白出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散

【荷葉上露】 性平。甘。無毒。 主治 治一切虛損勞症。

參攷資料 夏日黎明。日將出時。將長杓坐碗於首。向荷池葉上傾瀉之。以伏露爲佳。秋露太寒。花上者性散。有小毒。勿用。(趙恕軒)

【荷葉燒飯】 基本 本品爲荷葉和梗米燒成之飯。

主治 厚脾胃。通三焦。資助生發之氣。

參攷資料 ①易水張潔古根朮丸。用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物。色青中空。爲生化萬物之根。蒂用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀氣。今胃厚不致再傷。其利廣矣。大矣。(李杲) ②東南人不識北方炊飯無飯。類乎爲燒如燒

菜之意。遂說以荷葉包飯。入灰火燒。雖丹溪亦未之辯。但以新荷葉煮湯。入梗米造飯。氣味亦全也。凡梗米造飯。用荷葉湯者。寬中芥葉湯者。舒痰。紫蘇湯者。行氣解肌。薄荷湯者。去熱。淡竹葉湯者。辟暑。皆可類推也。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

十一畫 葶

古籍別名 烏葶。烏葶。蕪。葶。行義。黑三稜。(博濟方)芍。地。栗。(鄭樵通志)


外國名詞 Holcocharis

Plantagine, R. Dr. (拉丁)

基本 係莎草科植物蕪之根。

產地 多生水田沃地間。

形態 葶為多年生草。春季生葉。形似燈心草而粗。長三四尺。質軟而內空。夏時於莖頂生寸許類管之穗。黑色有白蕊。根類似慈姑。大六七分。外部有紅有黑。內部則皆白色。



種植 恒以栽植於肥田中。三月下種。待霜後苗枯。冬月掘取。

採取 冬春之間。為掘取時期。

製法 凡入藥有製成澱粉者。

法取葶蕪自然汁曬乾成粉用。

用法 入藥恒用粉末。或搗汁用。同有整個加入煎劑。

性質 甘。微寒。滑。無毒。效能 清熱。明目。化痰。消積。用作消解藥。

主治 消渴。瘧熱。濕中。益氣。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草論葶蕪曰。下丹石。消風毒。除胸中實熱氣。可作粉食。明耳目。

消黃疸【宋】日華諸家本草論葶蕪曰。開胃下食【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論葶蕪曰。作粉食。厚人腸胃。不飢。又能解毒。服金石人宜之。

【明】汪機本草會編論葶蕪曰。療五種腸氣。消宿食。飯後宜食之。治誤吞銅物【明】李時珍本草綱目論葶蕪曰。主血痢。下血。血崩。辟蠱毒【清】黃宮繡本草求真論葶蕪曰。烏葶止一水藥。何書皆言力能毀銅。破積攻堅。止血。治痢。住崩。擦疥。解毒。發痘。清聲醒酒。其效若是之多。蓋以味甘性寒。則於在胸實熱可除。而諸實脹滿可消。體黑則以力善下行。而諸血痢血毒可祛。是以冷氣勿食。食則令人每患腳氣。熱嗽勿用。用則於人有集火氣之為害耳【清】王士雄隨息居飲食譜論葶蕪曰。甘平明目。養胃和

肝。治痢。辟蠱。病人可食。

配合應用 ①治腹滿脹大。烏葶去皮。填入雄豬肚內。線縫。砂器煮糜食之。勿入鹽。

②善毀銅。銅器中煮之。即炸。

③誤吞銅物。以烏葶合胡桃食一二斤許。即消。

④一味曬乾。為末。服。能辟蠱毒。

⑤大便下血。葶蕪搗汁。大半鍾入酒少許。溫服。三日見效。(神祕方)

⑥治下痢赤白。午日午時。取完好葶蕪。洗淨。拭乾。勿令損破。於瓶內入好燒酒浸之。黃泥密封收貯。遇有患者。取二枚細嚼。空心用原酒送下。(經驗方)

⑦治婦人血崩。烏葶一歲一個。燒存性。研末。酒服之。(李氏方)

⑧治小兒口疳。用葶蕪燒存性。研末。搽之。(簡便方)

用量 二枚至四枚。粉用五分至一錢。

施用宜忌 凡脾腎虛寒而無熱者禁用。

參攷資料 ①按王氏博濟方。治五積冷氣攻心。變為五隔諸病。

一二三四

金鎖丸中用黑三稜。註云。即烏葶。乾者。則汪氏所謂消堅之散。蓋本於此。又董炳集驗方云。地栗曬乾。為末。白湯每服二錢。能辟蠱毒。傳聞下蠱之家。知有此物。便不敢下。此亦前人所未知者也。(李時珍)

①烏葶生淺水田中。其苗三四月出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。肥田栽者。粗近葱蒲。高二三尺。其根白。莖秋後結顆。大如山查。栗子而臍有聚毛。累累下生入泥底。野生者黑而小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬月掘收。為果。生食。煮食皆良。(李時珍)

【葶蕪三七】即昭參之別名。詳「昭參」條。

【葶蕪山漆】即昭參之別名。詳「昭參」條。

【葶蕪粉】古籍別名。烏葶粉。黑三稜粉。(綱目拾遺)

製法 與藕粉同。

性質 甘寒。無毒。

主治 毀銅。銷堅。除腹中痞積。丹石蠱毒。清心去翳。除肺胃經滯。

熱。過飲傷風失聲。痔毒乾紫。可以起發。

【荻皮】

產地 生江南諸地。形體 荻皮爲雜木類之一種。形如松葉。有針刺。結實黃赤。其皮可供藥用。



皮 荻

採取 十月採之。性質 苦。

主治 止消渴。益氣。殺白蟲。

【荻梁】即蜀黍之古籍別名。典見廣雅。詳『蜀黍』條。

【荻葵】即蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【荻蔗】即甘蔗之節疎而細者之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【荻】即苦菜之古籍別名。典見本草。詳『苦菜』條。

【荻苦蒿】即白菊之別名。詳『白菊』條。

【荻蕒】即蕒蕒之原名。詳『蕒蕒』條。

【荻】即菟葵之古籍別名。典見外國名醫。詳『菟葵』條。

【荻蕒】即穉蕒之別名。詳『穉蕒』條。

【荻蕒】即雞頭菜之古籍別名。典見綱目。詳『雞頭菜』條。

【荻木麩】即西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【荻根酒】即香附根酒之原名。詳『香附根酒』條。

【荻草】即香附子之古籍別名。典見別錄。詳『香附子』條。

【荻草根】即香附子之原名。詳『香附子』條。

【荻婆子】即婆娑子之古籍別名。典見本草綱目。詳『婆娑子』條。

【荻結】即香附子之古籍別名。典見綱目。詳『香附子』條。

【荻蕒】即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【荻】即貝母之古籍別名。典見爾雅。詳『貝母』條。

【荻勒母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【荻麻】處方用名 商麻實。古醫別名 白麻。瓊蘇。

十一 荻 荻

茶 荻 荻 荻 荻 荻 荻 荻

商麻 (綱目) 桐麻 (日本)

外國名醫 Aburion avicenna, Gaerth (拉丁) イチビ

キリアサ (日本) 基本 係錦葵科商麻屬之子實。

產地 原產於熱帶地方。凡原野間處處有出。

形態 商麻爲澤草類之一年生草本。春日下種。生苗莖高五六尺。葉圓心臟形。葉柄長。夏月葉梢之葉腋開花。花小黃色。萼片五。花瓣五。雄蕊多。比花瓣短。雌蕊之柱頭二裂至五裂。果實至成熟後。則乾燥而裂開。現出有毛之種子。其莖皮可採纖維。色白光澤。供布與繩料。其實與根可供藥用。



麻 商

性質 苦。平。無毒。

主治 赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。癰腫無頭者。吞一

枝。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論商麻曰。生眼醫癩肉。起倒睫。除毛。

參攷資料 ①商一作藟。又作縵。種必連項。故謂之項也。(李時珍) ②商。即漬麻也。今人取皮作布及索者。實似大麻子。九月十月採陰乾。(蘇恭) ③商麻今之白麻也。多生卑溼處。人亦種之。葉大如桐葉。圓而有尖。六七月開黃花。結實如半磨形。有齒。嫩青。老黑。中子扁黑。狀如黃葵子。其莖輕虛。潔白。北人取皮作麻。以莖曬曬黃。作燂燈。引火甚速也。其嫩子見。小兒亦食之。(李時珍)

【商麻根】主治 止痢。古方用之。

【商麻實】即商麻之處方用名。詳『商麻』條。

【商公藟】即藟菜之俗名。詳『藟菜』條。

【藟菜】命名 本品葉頗似杏。故名。古醫別名 堯葵 (唐本) 水葵 (馬融傳) 水鏡草 (土宿) 鬍子菜。

十一畫 莖 莘 蓐 筱 莞 莠 莢 莧

(野菜譜) 苳(詩經)接余(爾雅) 葍金蓮子(說文)苳絲菜。苳公藜 (俗名)屏風(楚辭)

外國名詞 Limnanthum

nymphoides, Link var. japonicum, Miq. (拉丁)アサザ

ハナジユンサイ(日本)

基本 係龍膽科苳菜屬。爲苳菜之莖葉。

產地 生池沼水澤間。

形態 苳菜爲水草類之多年生草本。其葉爲圓心臟形。周緣稍呈波狀。表面綠色。裏面帶紫色。浮水面與莖相似。惟近葉柄處。有缺刻爲異耳。夏日葉腋抽花。梗出水面。花冠五裂。色深黃。亦有白者。緣邊有多數之突起。如毛狀。結實大如棠梨。中有細子。其莖葉可供藥用。

性質 甘。冷。無毒。

主治 消渴去熱利小便。

歷代記載攷證 【宋】開寶重定新本草論苳菜曰。搗汁服。療寒熱。【明】李時珍本草綱目論苳菜曰。持傳諸腫毒。火丹遊腫。【莖菹】○卽白苳之古籍別名。與

見別錄。詳「白苳」條。○卽苳蒲之古籍別名。與見和漢藥考。詳「苳蒲」條。

【苳菜】卽莖之古籍別名。與見綱目。詳「莖」條。

【苳菜】 產地 生山澤間。

形態 苳菜類。爲雜草類之一種。形似蒲黃。葉如芥。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 痺腫。跌撲損傷。

【苳牛藻】卽聚藻之別名。性質功能詳「聚藻」條。

【苳菹菜】卽萎菜之古籍別名。與見植物學大辭典。詳「萎菜」條。

【苳子】卽菹之古籍別名。與見綱目。詳「菹」條。

【苳】卽白苳之古籍別名。與見綱目。詳「白苳」條。

【苳草】卽苳芋之古籍別名。與見別錄。詳「苳芋」條。

【苳菹子】卽胡菹之古籍別名。與見和漢藥考。詳「胡菹」條。

【莠】卽狗尾草之古籍別名。與見綱目。詳「狗尾草」條。

【莢莠】卽藟虛之古籍別名。與見

新修本草圖經。詳「藟虛」條。

【莢榆】卽榆之古籍別名。與見綱目。詳「榆」條。

【莢蓬】 古醫別名 繫蓬。弄先。

外國名詞 Viburnum dilatatum, Thunb. (拉丁)ガマズ

ミソソミ ヨツツミ ヨツドソメ(日本)

基本 係忍冬科。莢蓬屬。爲莢蓬之枝葉。

產地 生山野間。

形態 莢蓬爲灌木類之落葉。木本莖高一二丈。葉廣橢圓形。或略似圓形。有短尖。頂緣。邊有鋸齒。葉面甚粗糙。對生。初夏開花。聚繖花序。花小。白色。微帶粉。結實小。爲漿果。赤色。味甘。可食。其枝葉可供藥用。



莢 蓬

性質 甘。苦。平。無毒。
主治 殺三蟲。下氣消穀。煮汁

一二二六

和米作粥。飼小兒甚美。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論莢蓬枝葉曰。作粥灌六畜。搭中生蛆立出。

【莢蓬菜】卽莢蓬之枝葉。性質功能。參詳「莢蓬」條。

【莢菜】 命名 本品莖葉高大

而易見。故字從見。而名曰莢。

古醫別名 莢實。莢實(別錄) 莢莢(嘉祐圖經本草)

外國名詞 Amaranthus maritimus, L. (拉丁)ヒコ

アヒコ ヒヤウナ(日本)

基本 係莢科。爲莢之莖葉。

產地 各地皆有出。

形態 莢爲莢類之一年生草本。莖三四尺。葉互生。卵圓形。葉柄長。夏秋之際。花穗自莖梢抽出。花細小。呈黃綠色。苞與果實同長。或稍長於果實。春夏間採其嫩莖與葉。可供食與藥用。

性質 甘。冷。利。無毒。

主治 六莢并利大小腸。治初

別滑胎。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食

別滑胎。

別滑胎。

別滑胎。

別滑胎。

別滑胎。

療本草論苧菜曰。白苧補氣。除熱通九竅。【唐】蘇恭新修本草論苧菜曰。赤苧主赤痢。射工沙虱。【唐】陳藏器本草拾遺論苧菜曰。紫苧殺蟲毒。治氣痢。【清】黃宮繡本草求真論苧菜曰。苧菜味甘氣寒。性滑。按據諸書。無不皆言其性冷利。能治熱結。血痢。蟲毒之症。即人服之者。亦無不謂其通利便。是亦菜中最利最滑之味也。且又戒其多食。則令人動氣煩悶。又曰不可與蔥同食。生蟹。試取蟹肉。切如豆大。以苧菜封裹。置土坑內。用土掩蓋一宿。盡變成蟹。按此事即未有而其氣味之寒冷。與魚龜蟹同為一類。故有如此箴規之詞矣。豈止尋常冷利之味哉。然果陽不陰。及於暑時。挾有真正熱候。亦又何忌。惟在食之者之能審其所用可耳。中治肝經風熱。上攻眼目赤痛。生翳。遮障不明。青盲赤眼。並宜服之。為末每服方寸匙。【清】王士雄隨息居飲食譜論苧菜曰。苧甘涼。補氣。清熱。明目。滑胎。利大小腸。種類不一。以肥而柔。饒者良。務服滑瀉者忌之。尤忌與蔥同食。

十一畫 苧

苧

參攷資料 ①人苧細苧并冷利。赤苧療赤下而不堪食。方用苧菜甚稀。斷穀方中時用之。【陶弘景】②赤苧微寒。故主血痢。紫苧不寒。比諸苧無毒。故主氣痢。【蘇頌】③五月五日。收苧菜和馬齒苧。為細末等分。與妊娠人常服。令易產也。【孟詵】④紅苧入血分善走。故與馬苧同服。能下胎。或煮食之。令人易產。【朱震亨】⑤苧凡六種。赤苧。白苧。人苧。紫苧。五色苧。馬苧也。惟人白二苧實可入藥用。赤苧味辛。別有功用。【韓保昇】⑥苧並三月撒種。六月以後。不堪食。老則抽莖如人長。開細花成穗。穗中細子扁而光黑。與青苧子。雞冠子無別。九月收之。細苧即野苧也。北人呼為糖苧。柔莖細葉。生即結子。味比家苧更勝。俗呼青苧苗為雞冠苧。亦可食。【李時珍】

【苧菜根】 主治 陰下冷痛。入腹則腫滿殺人。搗爛傳之。

【苧菜實】 命名 本品乃苧所結之子實。故名。性質 甘寒無毒。

主治 青盲明目。除邪。利大小便。去寒熱。久服益氣力。不饑。輕身。【本經】治白昏。殺就蟲。【別錄】

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論苧菜實曰。益精氣。【明】李時珍本草綱目論苧菜實曰。治肝風客熱。醫目黑花。

參攷資料 苧實與青苧子同類異種。故其治目之功。亦彷彿也。【李時珍】

【苧實】 即苧菜之古籍別名。典見別錄。詳「苧菜」條。

【苧陸】 即商陸之古籍別名。典見易經。詳「商陸」條。

【苧】 即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烟草」條。

【苧子】 即苧子之古籍別名。典見本經。詳「苧子」條。

【苧若子】 命名 本品一作蘭。蕩放宕。故名。處方用名 天仙子。古籍別名 橫唐子。【本經】行唐子。【綱目】行蕩子。虎茄。發狂草。狂奔。狼藉子。牙疼子。破雪。草牛黃。【和漢藥考】顯茄。【新本草】

外國名詞 Scopolia, (拉丁) (英)(德)

基本 屬茄科苧若之葉。莖。根。種子。

產地 陳仁山藥物生證辨云。天仙子產自安南。西貢。石叻。亦有出。但不如安南出者之佳。六七月新。

形態 苧若為自生深山幽谷之多年生草。早春雪未融前即行萌芽。故或呼破雪。苗初呈紫黑色。漸長。則葉莖俱變淡綠色。莖高尺餘。葉互生。為長橢圓形。惟稍帶尖。邊緣有淺鈍鋸齒。枝梢連生大小二葉。花開於葉腋而下垂。為有梗。淡紫色鐘狀之合瓣花冠。上邊五裂。果實為覆果。熟則上部之周圍作盒狀綻破。中有茶褐色類黑粟子之種子。根為球莖。稍有彎曲。外面呈灰黃色。嫩縮作結節狀。內部類白色。全形類薯蕷。人若誤食。則



苧子

狂亂奔走。故或呼發狂草、狂奔藥。

採取 六月七月採于日乾。

製法 雷欒曰。凡使蕒子十兩。以頭醋一銖。煮乾為度。却用黃牛乳汁浸一宿。至明日乳汁黑。即是真者。曬乾搗篩用。

用法 恒到末和入外施瘡科藥中。同有和作內服丸散。

性質 苦寒。無毒。

效能 蕒蛙牙齒痛。瘰癧癩癧。狂用作鎮癩。鎮痛藥。治癩癧發狂。及其他神經諸病。亦用於膝腫及癩癧等。又治鴉片中毒。胃潰瘍。肺結核。盜汗。

作用 入胃後。因胃之作用。各質皆行分解。惟以蕒替精之量為最大。故服後刻許。胃分泌神經液。激而減少分泌。口鼻及鼻咽喉之分泌同減少。此品不特能制止胃液之分泌。又能制止唾液之分泌。至少亦能阻止其 secretion 及他種藥物而來之腺液增多。但不能阻礙 Secretin 之作用。又能廢止膽囊及迷走神經管轄下之部份之分泌。至腸能令腸之蠕動弛緩。及制止腸之分泌。由腸壁入

血中。即促進血液之循環。使心跳之速率增加。迷走神經亦受激而麻痺。全身血管收縮。汗液及尿亦同時減少。如服過量。則脈搏速弱。瞳孔縮小而死。

主治 齒痛。出蟲。肉痺拘急。久服輕身。使人健行走及奔馬。並強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。(本經)瘰癧狂風癩。顛倒拘攣。(別錄)

歷代記述攷覽 【唐】陳藏器本草拾遺論蕒替子曰。安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疔癩。取子洗曬。隔日空腹水下一指捻。亦可小便浸。令泣盡暴乾。如上服。勿令子破。破則令人發狂。【唐】甄權藥性本草論蕒替子曰。炒魚研末。能治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。【宋】大明諸家本草論蕒替子曰。燒蕒蟲牙。及洗陰汗。【明】李士材本草圖解論蕒替子曰。蕒替子苦辛有毒。一名天仙子。主止癩癧風。甘草升麻。可解其毒。 國外學說 日本學說謂本品之效分。由理學博士長井義義氏及テシユミト氏。檢明其中含

有亞窩羅必涅及「ヒヨスチアミン」等。與歐洲所產之別刺敦那。同其生理的作用。故可為別刺敦那之代用品。或供製造亞窩羅必涅及「ヒヨスチアミン」之用。又為越幾斯。於鎮癩及鎮痛藥用之。我國之蕒替。實為貴重之藥品。現今日本藥局方亦收載之。其主要效能。為鎮靜鎮痛藥。用於劇甚之咳嗽刺戟。(略痰甚少。而咳嗽須發者)例如慢性喉頭及氣管枝加答兒。肺癆。喘息。痰咳。胃痛。三又神經痛。坐骨神經痛。及痙攣性狹窄。因肛門裂傷之筋收縮。子宮頸收縮。嘔吐。慢性便秘。及癩癧。舞蹈病等。均有效。一日二三回。○三至○二。(自七毫八絲至五釐二毫)為浸劑。散劑。或丸劑。外用則為細粉。為輕膏。一回之極量。○二至○六。(五釐二毫至一分五釐六毫)但此為蕒替草之量。其根及越幾斯。主治亦同。而根之量為○。○一五至○。○七。(三毫九絲至一釐八毫二絲)一日二三回。為浸劑。散劑。丸劑。外用則為粉末。為輕劑。極量一

回。○。○七。(一釐八毫三絲)一日極量。○。○三。(七釐八毫)越幾斯一回之極量。○。○五。(一釐三毫)一日之極量。○。○二。(五釐二毫) (日本藥局方)英美學說謂蕒替產中國。日本。歐羅巴。及美國等處。與佛茄兒。蘭羊花。同類。高約三尺。結實狀如李子。內有多核。此樹全身皆具功力。其花及子。可入藥。而藥品中多用其莖與根。內含一精。即丫刀邊精。(亞窩魯必涅)其功力最峻烈。如用其葉。無論鮮乾。皆可配酒等。如用其根。則可配助存酒。擦酒等。蕒替為提神寧睡藥。不宜過服。過服則喉渴。目眩。頭昏。如沉醉而易傷命。然如始利類及散劑。能敗此藥功力。不可同服。其功用又能止痛發表。解轉筋。利小便。補陽。主治風癩。腦氣筋疼。哮喘。癩風。癩病。類便。遺尿。陽痿。遺精。風溼。至解藥之解此毒。須先用膽礬一分七釐半。以水和服。待吐後。繼服鴉片膏。(第鴉片性毒。可按蕒替多少酌用。慎勿妄加)或服綠養冰等。 配合應用 ●治卒發顛狂。蕒

荳三升爲末。以酒一升。漬數日。絞去滓。煎令可丸。如小豆。三丸。日三服。當見面急。頭中如有蟲行。額及手足有赤豆。處如此。並是運候也。未知再服。取盡神良。(陳延之小品方)

① 治風痺厥痛。天仙子三錢。炒大草烏頭。甘草半兩。五靈脂一兩。爲末。糊丸。梧子大。以黑膏爲衣。每服十九丸。男子菖蒲酒下。女子芫花湯下。(聖濟總錄方)

② 治久嗽不止。有濃血。荳荇子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。眞酥一雞子大。大棗七枚。同煎。令酥盡。取菀日食三枚。又方。荳荇子三撮。吞之日五六度。(孟詵方)

③ 治年久呷嗽。至三十年者。荳荇子。木香。蘇黃。等分爲末。以羊脂塗青紙上。撒末於上。卷作筒。燒烟熏吸之。(崔行功纂要方)

④ 治積冷瘕癖。不思飲食。羸困者。荳荇子三分。水淘去浮者。大棗四十九個。水三升。煮乾。只取棗。去皮核。每空心食一個。米飲下。覺熱即止。(聖濟總錄方)

⑤ 治水瀉日久。青州乾棗十個。

去核。入荳荇子。填滿扎定。燒存性。每粟米飲服一錢。(聖惠方)

⑥ 治冷疝痢下。荳荇子爲末。臘豬脂和丸。綿裹。導下部。可因痢出。更納新者。不過三度。遂。(孟詵方)

⑦ 治赤白下痢。腹痛。腸滑後重。大黃煨半兩。荳荇子炒黑一撮。爲末。每服一錢。米飲下。(普濟方)

⑧ 治久痢不止。變種種痢。象脫肛。荳荇丸。用荳荇子一升。淘去浮者。煮令芽出。曬乾。炒黃黑色。青州棗一升。去皮核。醋醃二升。同煮。搗膏丸。梧子大。每服二十丸。食前米飲下。(聖惠方)

⑨ 治腸風下血。荳荇煎。用荳荇實一升。曝乾。搗篩。生薑半斤。取汁。銀鍋中。更以無灰酒二升。浸之。上火煎如稠粥。卽旋投酒。度用酒可及五升。卽止。慢火煎。令可丸。大如梧子。每日取酒。適下三九。增至五七丸止。若丸時黏手。則以菟絲粉襯隔之。火候忌緊。藥焦則失力也。初服微熱。勿怪。疾甚者。服過三日。當下利。疾去利亦止。絕有效。(醫中方)

⑩ 治脫肛不收。荳荇子炒研。傅之。(聖惠方)

⑪ 治風牙蟲牙。用天仙子一撮。入小口瓶內。烟燒。竹筒引烟入蟲孔內。熏之。卽死。永不再發。(瑞竹堂方)

⑫ 又用荳荇子入瓶內。以熱湯淋下。口含瓶口。令氣熏之。冷更作。盡三合。乃止。有涎津。可去甚效。(普濟方)

⑬ 又用荳荇子數個。納孔中。以蠟封之。亦效。(備急方)

⑭ 治牙齒宜落。風痛。荳荇子末。綿裹咬之。有汁勿嚥。(必效方)

⑮ 治風毒咽腫。嚥水不下。及癰癧。咽腫。水服荳荇子末兩錢。七神效。(外臺祕要方)

⑯ 治乳癰堅硬。新荳荇子半匙。清水一盞。服之。不得嚼破。(外臺祕要方)

⑰ 治石癰堅硬。不作膿者。用荳荇子爲末。醋和傅瘡頭。根卽拔出。(千金方)

⑱ 治惡瘡似癩。十年不愈者。荳荇子燒研。傅之。(千金方)

⑲ 治打撲折傷。羊脂調荳荇子末。傅之。(千金方)

⑳ 治蠶犬咬傷。荳荇子七枚。吞之。日三服。(千金方)

㉑ 用量 三分至八分。施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

著名方劑 荳荇子散。治五癰。(外臺方) 猪卵一具。陰乾。一百日。荳荇子三斤。牛黃八分。鱧魚膽五分。桂心一兩。(研) 上五味。以清酒一升。漬荳荇子。曝令乾。盡酒止。搗合下篩。酒服五分。日再服。不知稍增。

參攷資料 ① 以石灰清煮。一伏時。搗出去芽。曝乾。以附子乾。薑陳橘皮。桂心。厚朴。爲丸。服。去一切冷氣。積年氣痢。甚溫。暖。也不可生服。傷人。(甄權) ② 荳荇之功。卻未見如上所說。而其澤則有甚焉。荳一二日而芽方生。其爲物可知矣。荳荇。雲實。防葵。赤商陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發其義者。蓋此類皆有毒。能使痰迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽。故耳。唐安祿山誘契丹。飲以荳荇酒。醉而坑之。又嘉靖四十三年二月。有陝西游僧武如香。挾妖術。至昌黎縣。民環柱家。見其妻美。設飯間。呼其全家。

十一 蕺 莪 莫 莖 惹 蒨 拊 荳 處 蚯

一一三〇

同坐。將紅散入飯內食之。少頃舉家昏迷。任其奸污。復將魔法吹入柱耳中。柱發狂惑。見舉家皆是妖鬼。盡行殺死。凡一十六人。並無血迹。官司執柱囚之。十餘日。柱吐痰二碗許。問其故。乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊妹也。柱與如香皆論死。世宗廟皇帝命榜示天下。觀此妖藥。亦是莪莖之類耳。方其迷惑之時。視人皆鬼矣。解之之法。可不知乎。(李時珍) ⑤莪莖性溫。有毒。服之熱發。以綠豆汁、甘草、升麻、犀角並解之。(大明) ⑥所在皆有之。葉似菘藍。莖葉皆有細毛。花白色。子殼作鬚狀。結實扁細。若粟米大。其色青黃。六月七月採。子日乾。(韓保昇) ⑦處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃。王不留行、紅藍等。而闊如三指。四月開花。紫色。莖莢有白毛。五月結實。有殼。作鬚子狀。如小石榴。房中子至細。青白色。如粟米粒。(蘇頌) ⑧食莪莖中。其微候初如醉酒。咽喉燥渴。終而瞳孔散大。不能見物。舌亦痿澀。不能言語。精神狂亂疾奔。(和漢藥考)

【莪莖根】 性質 苦。辛。有毒。主治 邪瘧。疥癬。殺蟲。
配合應用 ①治痢疾不止。莪莖根燒灰。水服一合。量人強弱用。(千金方)
②治惡瘧有蟲。莪莖根搗爛。蜜和傅之。(千金方)
③治疔肉刺。莪莖根搗汁塗之。雷公炮炙論序云。脚生肉刺。搗莪莖。謂繫於棍帶上也。

肚繫了。當便出也。(儒門事親方)
【莪朮】 卽蓬莪朮之處方用名。詳蓬莪朮條。
【莪朮】 卽蓬莪朮之古籍別名。與見和漢藥考。詳蓬莪朮條。
【莪朮】 卽蓬莪朮之古籍別名。與見附推。詳蓬莪朮條。②卽王不留行之古籍別名。與見和漢藥考。詳王不留行條。

見別錄。詳莪石條。②卽玄石之古籍別名。與見綱目。詳玄石條。
【處拊片】 基本 本品係以茅竹符片。微施湯煮。蒸乾者。
古籍別名 素火腿。(綱目拾遺)
性質 甘。微鹹。平。無毒。
主治 利血消痰。

④治狂大咬人。莪莖根和鹽搗傅之。日三上。(外臺祕要方)
⑤治惡刺傷人。莪莖根水煮汁浸之。冷卽易神方也。(千金方)
⑥萬聖神應丹。治箭頭不出。端午前一日。不語。尋見莪莖科根本。枝葉花實全好者。道云。先生爾却在這裏。道罷。用柴灰自東南起圍了。以木棒子掘取根下。周圍土。次日未出時。依前不語。用鐵頭取出。洗淨。勿令雞犬婦人見。於淨室中以石臼搗如泥。丸彈子大。黃丹爲衣。以紙袋封懸高處陰乾。遇有箭頭不出者。先以象牙末貼瘡口。後用緋帛袋盛此藥。放罅中。綿兜


【莫阿婆伽】 卽辟香之古籍別名。典見和漢藥考。詳辟香條。
【莫貨】 卽莧菜之古籍別名。典見別錄。詳莧菜條。
【莧】 卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳白芷條。
【莧香】 卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳白芷條。
【惹】 卽芒之古籍別名。典見附推。詳芒條。
【蒨】 卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳地榆條。
【蒨葉】 卽白棘之古籍別名。典見別錄。詳白棘條。
【荳砂】 卽砂砂之處方用名。詳砂砂條。
【處石】 卽惹石之古籍別名。與

【處速】 卽南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳南連條。
【蚯蚓】 命名 蚓之行也。引而後申。其壤如丘。故名。
處方用名 地龍。乾地龍。白頭蚯蚓。
古籍別名 土龍。(別錄) 地龍子。(藥性) 寒蟻。寒蚓。附蚓。(吳普) 蟻蟻。胸肥。千人踏。(大明) 華諸家本草) 聖蠶。蟻蟻。曲蟻。土蟻。歌女。(綱目) 蚓蟻。蟻蟻。鳴蟻。却行。寒欣。(和漢藥考)

外國名詞 Perichaeta sicboldii Forsk 或 Lumbucus terrestris (拉一) Earth-worm (英)
基本 屬環節蟲類之蚯蚓。

產地 各處皆有之。

形態 蚯蚓為棲息溼地之棲皮狀及圓筒狀蟲類。頭尖。無耳目。鼻。有多數環節。腹面有細小短刺。以助前進而防後退。在地中時。肛門向地面。食土壤。攝收滋養料。排泄細土於體外。



蚯蚓

採取 二三月採之。曝乾。須取白頭。是其老者。或路上踏殺者。名千人踏。更良。

製法 陶弘景曰。凡使蚯蚓。若取乾。須熬作屑。雷斅曰。凡收來用糯米泔浸一夜。漉出。以無灰酒浸一日。焙乾切。每一兩以蜀椒糯米各二錢。中同熬。至米熟。揀出。用。李時珍曰。入藥。有為末。或化水。或燒灰者。各隨方法。

用法 水煎。或生搗。或剉末。和作丸散。
性質 鹹。寒。無毒。
效能 瀉熱。行水。用作解熱及

十一 蠶 蚯

利尿藥。 主治 蛇癩。去三蟲。伏尸。鬼疰。蠱毒。長蟲。(本經)化爲水。療傷寒。伏熱。狂。大腹黃疸。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蚯蚓曰。溫病大熱狂言。飲汁皆瘥。炒作屑。去虵蟲。去泥。鹽化爲水。主天行諸熱。小兒熱病。癩癩。塗丹毒。傅漆瘡。【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓曰。殺化爲汁。療耳聾。【唐】韓保昇蜀本草論蚯蚓曰。解射同毒。【唐】甄權藥性本草論蚯蚓曰。炒爲末。主蛇傷毒。【宋】日華諸家本草論蚯蚓曰。治中風癱疾。喉痺。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蚯蚓曰。治脚風。【明】李時珍本草綱目論蚯蚓曰。主傷寒癩疾。大熱狂煩。及大人小兒小便不通。急慢驚風。歷節風痛。腎臟風注。頭風齒痛。風熱赤眼。木舌喉痺。鼻衄痔耳。禿瘡癩瘻。卵腫脫肛。解蜘蛛毒。療蝨蟻入耳。【明】繆希雍本草經疏論蚯蚓曰。蚯蚓味鹹寒。無毒。大寒能祛熱邪。除大熱。故主伏尸。鬼疰。及療傷寒伏熱狂。繆主下走。利小便。故治大腹黃疸。諸蟲癩成。

歸溼熱所成。得鹹寒之氣。則微自消。蟲自去。而蠱毒之熱亦解矣。昔一道人治熱病發狂。用白頭蚯蚓十數條。同荊芥穗搗汁與飲之。得臭汗而解。其爲治傷寒伏熱狂。繆之明驗也。【明】李士材本草圖解論蚯蚓曰。蚯蚓氣大寒。能除有餘邪熱。傷寒非陽明實熱狂躁者。不宜用。溫病無壯熱。及脾胃素弱者。不宜服。黃疸綠大勞腹脹。屬脾胃虛。尸疰因陰虛成勞瘵者。咸不宜服。【清】黃宮繇本草求真論蚯蚓曰。蚯蚓最屬寒味。觀書所載甚明。其言味寒無毒。性鹹。其論所治。則云能主伏屍鬼疰。傷寒伏熱。狂繆熱病發狂。血熱。痘瘡斑多紫黑。癩瘡。黃疸損傷。垂危。瘰癧潰爛。流串。順風脚氣。備極濕熱形症。皆能調治。則其氣味之寒。不待言矣。究其所以致治。則因此物伏處窪處。鑽土飲泉。是其本性。故能除其鬼疰。解其伏熱。且味鹹主下。處溼而以入溼爲功。故於溼熱之病。溼熱之物。遇之則化。停滯蓄水。觸着即消。而使靈從小便而出。蚯蚓本有鑽土之能。化血之力。而凡跌仆受傷。

血滯經絡。又安有任其停蓄。而不爲之消化乎。但溼認不確。妄爲投用。良非所宜。取老蚯蚓白頭者。良搗汁并水調下。入藥。或曬乾爲末。【清】張石頑馮氏醫通論蚯蚓曰。蚯蚓雖卑。伏性善穴竅。專解溼熱。療黃疸。利小便。通經絡。故活絡丸以之爲君。溫病大熱狂妄。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而出也。

國外學說 遠西名物考曰。蚯蚓油。用蚯蚓洗淨者半磅。阿利讓油三磅。入玻璃瓶中。置燒處。淹二十一日。絞油貯之。又法。取蚯蚓若干。置磁器中三日。使吐淨泥土。用溫湯洗淨。布巾拭乾。置磁壺中。加阿利讓油至三指橫徑上。又加葡萄酒少許。密封。置燒處三日。乃置入磁鍋內。用火煮去水氣。布巾包絞。再行濾過。靜置片時。去沉下之渣。入玻璃瓶封固貯之。用以敷數。能緩弛肢節。拘強。神經變愈。療風痛。打撲傷。神經創。火傷。甚有效。配合應用 ●治傷寒熱結六七日。狂亂見鬼欲走。以大蚓半斤。去泥。用人溺煮汁。飲或生絞汁。亦可。(肘後方)

十一畫 蚯

① 治腸毒結胸。按之極痛。或通而復結。喘促大躁狂亂。取生地龍一條。洗淨。研如泥。入生薑汁少許。蜜一匙。薄荷汁少許。新汲水調服。若熱熾者。加片腦少許。即與揉心下片時。自然汗出而解。不效再服一次。神效。(傷寒蘊要方)

② 治諸癩煩熱大躁。用上方服之甚效。亦治瘰癧。(直指方)

③ 治小便不通。蚯蚓搗爛。浸水。濾取濃汁半碗。服立通。(斗門方)

④ 治老人尿閉。白頭蚯蚓。茴香等分。杵汁飲之。即愈。(朱氏集驗方)

⑤ 治小兒尿閉。乃熱結也。用大地龍數條。去泥。入蜜少許。研碎。莖卵。仍燒蠶紙。朱砂。龍腦。麝香。同研少許。以麥門冬。燈心煎湯調服。(全幼心鑑方)

⑥ 五福丸。治小兒急驚。用生蚯蚓一條。研爛。入五福化毒丹一丸。同研。以薄荷湯少許化下。

⑦ 乳香丸。治驚風。小兒慢驚風。心神。煩燥。筋脈拘急。胃虛。蟲動。反折。啼叫。用乳香。牛錢。胡椒二錢。研勻。以白頭蚯蚓生捏去

土。搗爛。和丸。麻子大。每服七丸。至十五丸。微白煎湯下。(普濟方)

⑧ 治慢驚。用平正附子。去皮。臍。生研為末。以白頭蚯蚓於末內滾之。候定。刮上附末。丸黃米大。每服十九丸。米飲下。(百一選方)

⑨ 治急慢驚風。五月五日。取蚯蚓竹刀。截作兩段。急跳者作一處。慢跳者作一處。各研爛。入硃砂末。和作丸。記明急驚。用急跳者。慢驚。用慢跳者。每服五七丸。薄荷湯下。(應驗方)

⑩ 治小兒卵腫。用地龍連土。為末。津調傳之。(錢氏方)

⑪ 治勞復。卵。或縮入腹中。絞痛。身體重。頭不能舉。小腹急熱。拘急欲死。用蚯蚓二十四枚。水一斗。煮取三升。頓服。取汗。或以蚯蚓數升。絞汁服之。並良。(肘後方)

⑫ 治手足腫痛。欲斷。取蚓三升。以水五升。絞汁一升。半服之。(肘後方)

⑬ 治代指疼痛。用蚯蚓杵傳之。(聖惠方)

⑭ 治風熱頭痛。地龍炒研。薑汁。半夏餅。赤茯苓等分。為末。一字至

半錢。生薑煎湯下。(普濟方)

⑮ 龍珠丸。治頭風疼痛。用五月五日。取蚯蚓。和麝香。杵丸。梧子大。每以一九。納鼻中。隨左右先塗。薑汁在鼻立愈。(聖濟總錄方)

⑯ 聖惠龍香散。治偏正頭痛。不可忍。用地龍。去土。焙。乳香等分。為末。每以一字。作紙捲。燈上燒烟。以鼻嗅之。(濟察方) 又方。加人指甲。等分。云(滑察方) 又一方。每服一捻。香爐上。慢火燒之。以紙筒引烟。入鼻。薰之。口噴冷水。有涎吐去。仍以好茶一盞。點。即愈。(徐介翁方)

⑰ 治風赤眼痛。地龍十條。炙為末。茶服三錢。(聖惠方)

⑱ 治風蟲牙痛。鹽化地龍水。和麵。納齒上。又以皂莢。去皮。研末。塗上。蟲即出。又同玄胡索。蕞。末。塞耳。(普濟方)

⑲ 治牙齒裂痛。死曲蟻為末。傅之。即止。(千金方)

⑳ 治齒縫出血不止。用地龍末。枯礬各一錢。麝香少許。研勻。擦之。(聖惠方)

㉑ 治牙齒動搖。及外物傷動。欲

落。謂藥不效者。乾地龍炒。五倍子炒等分。共為末。先以生薑揩牙。後傅擦之。(御藥院方)

㉒ 治木舌腫滿。不治殺人。用蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久漸消。(聖惠方)

㉓ 治咽喉卒腫。不下食。地龍十條。搗塗喉外。又以一條。著鹽化水。入蜜少許。服之。(聖惠方)

㉔ 治喉痺。塞口。用韭地紅。小蚯蚓數條。醋搗。取食之。即吐出痰血。二三碗。神效。(普濟方) 又用地龍一條。研爛。以雞子白攪和。灌入。即通。(聖惠方)

㉕ 治鼻中瘻肉。地龍炒一分。牙皂一挺。為末。蜜調塗之。清水滴盡。即除。(聖惠方)

㉖ 治耳卒聾閉。蚯蚓入。安。內。化水點之。立效。(勝金方)

㉗ 治耳出膿。生地龍。釜上。燻生豬脂等分。研勻。葱汁和。搽。作。子。綿。裹。塞。之。或用地龍為末。吹之。(聖惠方)

㉘ 治耳中打聆。乾結不出。用白蚯蚓入。葱葉中。化為水。滴耳。令滿。不過數度。即易挑出。

①治蝨入耳。用地龍爲末。入葱內。化水點入。則蝨亦化爲水。
(聖惠方)

②治白禿頭瘡。乾地龍爲末。入輕粉。麻油調搽。(普濟方)

③治癩癧潰爛流串者。用荊芥根下段煎湯。溫洗良久。着瘡破紫黑處。以針刺去血。再洗三四次。用韭菜地上蚯蚓一把。五更時收取。炭火上燒紅爲末。每一匙入乳香。沒藥。輕粉各半錢。穿山甲九片。炙爲末。油調傅之。如神。此武進朱守仁所傳有驗方。(保命集方)

④治龍纏瘡毒。水缸底蚯蚓一條。連泥搗傅即愈。

⑤治蛛蝎咬瘡。遍身皆有。以葱一枚。去尖頭。將蚯蚓入葉中。緊捏兩頭。勿令洩氣。頻搖動。即化爲水。以點咬處。甚效。(譚氏小兒方)

⑥治陽證脫肛。以荊芥。生薑煎湯洗之。地龍蟠如錢樣者。去土一兩。朴硝二錢爲末。油調傅之。(全幼心鑑方)

⑦治中蠱下血如爛瓜者。以蚯蚓十四枚。苦酒三升。漬至蚯蚓死。服水。已死者皆可活。(肘後方)

⑧治癩風痛痒。白頭蚯蚓去土。以葷肉同搗丸。梧子大。每美酒下六十丸。忌葷蒜。(活人心統方)

⑨治對口毒瘡。已潰出膿。取韭菜蚯蚓。搗細。涼水調傅。日換三四次。(扶壽方)

⑩治耳聾氣閉。蚯蚓。川芎。薊各兩半爲末。每服二錢。麥門冬湯下。服後低頭伏睡。一夜一服。三夜立效。(聖濟總錄方)

⑪治口瘡瘰癧。地龍。吳茱萸。研末。醋調。生麵和塗。足心立效。(摘玄方)

用遺 一錢半至三錢。
施用宜忌 凡虛寒而無實熱者禁用。畏葱鹽。

參攷資料 ①乾蚓熬作屑。去就甚有效。(陶弘景) ②腐風藥必須此藥爲使。然亦有毒。昔有人因脚病。藥中用此。果得奇效。病愈服之不輟。至二十餘日。覺燥憤。但欲飲水不已。遂致委頓。大抵攻病用毒藥。中病即當止也。(蘇頌)

③蚯蚓。爾雅謂之蠃蟻。巴人謂之胸。皆方音之轉也。蝮。曲。蝮。象其狀也。東方虬賦云。乍逶迤而蝮曲。

或宛轉而蛇行。任性行止。擊物便曲是矣。術家言蚓可與雲。又知陰晴。故有土龍。地龍子之名。其鳴長吟。故曰歌女。(李時珍) ④入藥用白頭。是其老者。取得去土。鹽之日曝。須臾成水。道術多用其屎。呼爲蚓坑。亦曰六一泥。以其飲細泥。無沙石。入合丹泥釜用。(陶弘景)

⑤今處處平澤膏壤地中有之。孟夏始出。仲冬蟄結。雨則先出。晴則夜鳴。或云結時能化爲百合也。與蟲蠢同穴爲雌雄。故郭璞贊云。蚯蚓土精。無心之蟲。交不以分。睡於蟲蠢是矣。今小兒陰腫。多以爲此物所吹。經驗方云。蚯蚓咬人。形如大風。眉鬚皆落。惟以石灰水浸之。良昔浙江將軍張韶病此。每夕蚯蚓鳴於體中。有僧教以鹽湯浸之。數遍遂痊。(李時珍)

【蚯蚓泥】 古籍別名 蚓壤。六性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 赤白久熱痢。取一升炒爛。沃汁半升。濾淨飲之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓泥曰。傳狂犬傷。出

犬毛。神效。【宋】日華諸家本草論蚯蚓泥曰。小兒陰囊。忽虛熱腫痛。以生甘草汁入輕粉末調塗之。以鹽研傅。去熱毒。及蛇犬傷。【蚯蚓糞】 卽蚯蚓泥之別名。詳「蚯蚓泥」條。

【炸蟬】 卽蟬之古籍別名。典見本經。詳「蟬」條。

【炸蝻】 卽蝻之古籍別名。典見綱目。詳「蝻」條。

【蚶蚊】 卽蚊之古籍別名。典見綱目。詳「蚊」條。

【蚶蚊草】 卽蚊之古籍別名。典見綱目。詳「蚊」條。

【蚶】 卽瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳「瓦楞子」條。

【蚶子壳】 卽瓦楞子之處方用名。詳「瓦楞子」條。

【蚶蝸】 卽蝸之古籍別名。典見別錄。詳「蝸」條。

【蝸蟻】 卽蝸牛之古籍別名。典見爾雅。詳「蝸牛」條。

十一畫 蚯

炸 蚶 蝻 蝮

十一畫 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺 蚺

【蚺蛭】即蟻之古籍別名。典見楊雄方言。詳「蟻」條。

【蚺蟻】即蟻之古籍別名。典見綱目。詳「蟻」條。

【蚺蟻】即蟻之古籍別名。典見綱目。詳「蟻」條。

【蚺蟻】即蟻之古籍別名。典見莊子。詳「馬陸」條。

【蚺蟻】即木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

【蚺蟻】即金龜子之別名。詳「金龜子」條。

【蚺魚】即衣魚之古籍別名。典見綱目。詳「衣魚」條。

【蚺蟻房】即雀蟻之古籍別名。典見蜀本草。詳「雀蟻」條。

【蚺蟻】即五穀蟲之原名。詳「五穀蟲」條。

【蚺蟻】即馬陸之古籍別名。典見綱目。詳「馬陸」條。

【蛇口半枝蓮】即蛇草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蛇草」條。

【蛇皮】即蛇蛻之古籍別名。典見藥性本草。詳「蛇蛻」條。

【蛇休草】即川芎之古籍別名。典見

見和漢藥考。詳「川芎」條。

【蛇石】 基本 係蟻蛇腦中所生之石。

產地 多在南粵桂西。以及南洋羣島東印度等處。

形態 蛇石形類圍棋子。大如扁豆。有黑白二色。亦有以蛇肉和土舂成者。或謂即大蛇之角及蛇銜土之類。以置蛇頭上。蛇不敢走。動者為真。取之可供藥用。

性質 有毒。

主治 治癰疽惡瘡。一切無名腫毒。及蜈蚣毒蟲等傷。

參攷資料 蛇石善於拔除各種毒氣。置患處。能緊黏不脫。毒盡則自落。惟用後必須以乳汁(人乳或牛羊乳均可)或溫水浸。至乳汁略變綠色。或黃黑色。再以清水洗淨。抹乾收貯。否則石必粉裂。不堪再用。

古醫別名 蛇銜。(本經) 紫背龍牙。(綱目)

威蛇。(大明) 小龍牙。(綱目)

外國名詞 Potentilla Indiana W. of A. (拉丁) ラクニ イチゴ オヘイイチゴ(日本)

一二三四

基本 係薔薇科委陵菜屬。為蛇含之葉。

產地 山野原澤間。

形態 蛇含為溼草類之多年生草本。莖長而質軟。常伏臥於地上。葉為掌狀複葉。呈淡綠色。葉柄長在莖之下部者有五小葉。上部者有三小葉。春夏間梢上分枝多數之花梗。著以黃色之小瓣花。雄蕊及雌蕊甚多。其根葉俱可供藥用。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 驚癇。寒熱。邪氣。除熱。療金瘡。疔疔。鼠瘻。瘡。頭痛。(本經) 治心腹邪氣。腹痛。溼痺。養胎。利小兒。



蛇含

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論蛇含曰。治小兒寒熱。丹毒。【宋】大明諸家本草論蛇含曰。止血。協風毒。癰腫。赤眼。汁傳蛇虺蜂毒。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論

蛇含曰。紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚼之便效。

參攷資料 蛇含治蛇咬。今以草柄蛇口中。經傷人亦不能有毒也。種之亦令無蛇。(陳藏器) 按葛洪抱朴子云。蛇銜膏。連已斷之指。今考葛洪肘後方。載蛇銜膏云。治癰腫。療血。產後積血。耳目諸病。牛領馬鞭。用蛇銜。大黃。附子。芍藥。大戟。細辛。獨活。黃芩。當歸。莽草。蜀椒。各一兩。雞白十四枚。上為末。以苦酒淹一宿。以猪膏二斤。七星火上煎沸成膏。收之。每溫酒服一彈丸。日再服。病在外。摩之。傳之。在耳。綿裹塞之。在目。點之。若入龍銜。藤一兩。則名龍銜膏也。所謂連斷指者。不知即此否否。(李時珍)

按劉敬叔異苑云。有田父見一蛇被傷。一蛇銜一草着瘡上。經日傷蛇乃去。田父因取草治蛇瘡。皆驗。遂名曰蛇銜草也。其葉似龍牙而小。背紫色。故俗名小龍牙。又名紫背龍牙。(李時珍) 蛇銜處處有之。有兩種。並生石上。亦生黃土地。當用細葉有黃花者。(陶弘景) 出興州。今近處亦有。生土石上。

或下溼地。蜀中人家亦種之。辟蛇一莖五葉。或七葉。有兩種。八月採根陰乾。日華子云。莖葉俱用。五月採之。又曰。紫背龍牙。生蜀中。春夏生葉。採無時。(蘇頌)蛇銜。只用葉曬乾。勿犯火。根莖不用。勿誤用。有葉尖葉者。號竟命草。其味酸澀。誤服令人吐血不止。速服知時子解。(雷斅)蛇含根。治產後瀉痢。

產地 出西域諸地。
形態 蛇角色淡如碧玉。稍有黃色。其文理如角。又似象牙。叩之聲清脆。亦如玉。磨刮嗅之有香。燒之不臭。可供藥用。
性質 有毒。
主治 腫毒。解諸毒蟲毒。以毒攻毒也。

【蛇含石】即蛇之於冬蟄時。口中所含之土。至春始吐出。其堅如石。故以為名。其性質效能。與蛇黃略同。而力遜之。或誤以蛇含石為蛇黃。不知蛇黃乃蛇腹中多年之結精。此不過蛇口中一季所含之土。故其精氣之厚薄。大有分別。不可同作一物也。

【蛇抱勒】產地 粵南大滬等處多有產之。
性質 清酸。
效能 除滋殺蟲。
主治 洗疥痔。治瘰癧。及吐血牙痛。

【蛇米】即蛇牀子之古籍別名。與見本經。詳「蛇牀子」條。
【蛇衣】即蛇蛻之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。
【蛇角】基本 本品乃大蛇之角。
古籍別名 骨咄犀。骨葛。碧犀。(綱目)

命名 蛇喜臥於下。食其子。故有蛇牀。
【蛇牀子】下食其子。故有蛇牀。其葉似薔薇。故曰薔薇。
古籍別名 蛇粟。蛇米。(本經) 虺牀。野(爾雅)馬牀(廣雅) 薔薇。(別錄)老鬼子(雷公炮炙論) 繩毒。菴棘。思益(本經)蛇常。赤木草。赤目草。連陽八座(和漢藥考)
基本 邇來醫家。多以屬鞮形科。渣芹之子。實當之。藥舖所售者。別一種植物之子也。(和名鈔云。

前人誤以為屬眼子菜科之眼子菜。而即以其子充之。
產地 陳仁山藥物生產辨云。蛇牀子廣東廣西各屬均有出。以江蘇鎮江為多。各省所產味同。
形態 東三省所產之蛇牀子。高約四十至七十仙米。莖中空。有縱溝數條。並有稍稍膨出之關節。嫩莖之下部。帶紫色。其近根處。粗

○。三至○。七仙米。間有至一仙米者。根與莖粗細略同。色白。長約六至十仙米。花為繖形。作複繖形。花序排列。有大花梗。大花梗上斜生無數之小花梗。向上放射。小花梗上之小葉有毛。繖形花長短略同。花極少。白色。五瓣。各瓣為倒卵圓形。末端尖銳。向內卷曲。其正中有凹溝。以顯微鏡檢之。即見有繁密之斑點。雄蕊凡五。其粉囊如袋。雌蕊凡二。其尖端交互向外。分裂果二。附於簪柱。即供藥用之蛇牀子也。各果長約三至三。五密米。外面黃褐色。帶茸毛。其新收採者。頂端尚附有雌蕊之餘基。又有廣皮膜狀(但非翅狀)之肋線五條。果殼現黑褐色。每殼皆有油腺。

其兩分果之接合面。亦有兩油腺。六七月開花。秋間結實。花時點綴原野。甚美觀也。
種植 野生者多。間有生長於園圃者。
採取 五月採實。陰乾。
製法 雷斅曰。凡使須用濃薑汁。并百部草根自然汁。同浸一伏時。瀉出日乾。却用生地黃汁。相拌蒸之。從已至亥。取出日乾。用大明日。凡服食。即揆去皮殼。取仁微炒。殺毒。即不辣也。作湯洗浴。則生用之。

用法 內服須炒研水煎。外治則生用湯洗。
性質 苦平無毒。
成分 蛇牀子揮發油中。有左旋性皮嫩。左旋性加藤芬。及異性顯草酸。薄爾尼愛斯推兒。
效能 溫子臟。逐寒溼。療陰瘡。腫癢。為陰痿藥。及婦人陰腫藥。
主治 男子陰痿。溼癢。婦人陰中腫痛。除毒氣。利關節。癩癧。惡瘡。久服輕身。好顏色。(本經)又能溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服令人有子。(別錄)

歷代記述攷證【唐】甄權藥

性本草論蛇牀子曰治男子女人虛濕痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大谷陽事【宋】大明日華諸家本草論蛇牀子曰暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢【明】經希雅本草經疏論蛇牀子曰蛇牀子味苦平別錄辛甘無毒今詳其氣味當必兼溫燥陽也故主婦人陰中腫痛男子陰痿淫癢除痺氣利關節惡瘡別錄溫中下氣令婦人子腹熱男子陰強久服輕身令人有子蓋以苦能除濕溫能散寒辛能潤腎甘能益脾故能除婦人男子一切虛寒濕所生病寒溼既除則病去身輕性能益陽故能已疾而又

性溫熱得少陰君火之氣主治男子陰痿淫癢婦人陰中腫痛稟火氣而下濟其陰寒也除痺氣利關節稟火氣而外通其經脈也心氣虛而寒邪盛則癩癩心氣虛而熱邪盛則生惡瘡蛇牀味苦性溫能助心氣故治癩癬惡瘡久服則火土相生故輕身心氣充盛故好顏色【清】徐洄溪本草經百種錄論

蛇牀子曰蛇牀生於陰溼卑下之地而芬芳燥烈不受陰溼之氣故入於人身亦能於下焦陰溼所歸之處逐其邪而補其正也【清】黃宮繙本草求真論蛇牀子曰蛇牀子辛苦性溫功能入腎補命祛風燥濕故凡命門火衰而致風溼內淫病見陰痿囊溼及女子陰戶蟲蝕子臟虛寒產門不開雙腰酸澀痺帶下脫肛與夫一切風溼痞疥等症服之則陽莖舉關節利腰背強手足遂瘡疥掃至於大瘰癧癧難當作湯洗浴產後陰脫不收用此類袋熨收【清】鄒樹本草疏證論蛇牀子曰六氣惟溼最滯滯惟風最迅疾蛇牀子生陰溼地而得芬芳燥烈之性味是為於溼中鐵

風化能於溼中行風化則向所謂溼者已隨風氣鼓透而化津化液矣男子之陰痿溼癢婦人之陰中腫痛何能不已耶至於肌肉中溼化而痺氣除骨節中溼化而關節利膈中溼化而惡瘡已皆一以貫之無事更求他義也惟治癩癬一節則似正病乎風而更助以風藥者殊不知風因痰生人因風病若變因痰而生之風如溼中所鍾風化能鼓透溼氣化津化液則此痰此風早將變為氣風流行之生氣尚何癩癬之足虞以是知化病氣為生氣原非臆說也【清】吳儀

洛本草從新論蛇牀子曰辛苦而溫強陽補腎散寒祛風燥溼殺蟲治陰痿囊溼女子陰瘡陰癢子臟虛寒產門不閉腎門之病腰痠澀痺帶下脫肛及頑癬惡瘡風溼諸病煎湯浴止風癢

慈濟臥其下食其子蓋產卑溼汗下之地本係溫熱之氣所鍾其含養實可知親雷製法以濃薑汁同浸再以生地黃汁并煎無非監制其燥烈之性其反能治溼熱病者同氣相求以從其類也故近今醫籍絕少用為內服之藥况市肆中以偽賤品皆不炮製而可妄用以入煎劑乎本經又謂除痺氣利關節癩癬則燥烈之性本能通行經絡疏通關節然非寒溫及未經法製者慎弗輕投本經又主惡瘡則外治之藥也別錄又謂辛甘能

溫中下氣令婦人子腹熱男子陰強令人有子則其專溫腎陽更屬彰明較著甄權謂治虛寒溼痺風癢痛起瘰癧去風冷發陽事日華謂治腰膝痠痛四肢頑痺縮小便去陰汗溼癬赤白帶下景岳謂逐寒疝起陽痿主陽衰無子皆是強陽主治石頑謂辛香性溫助男子壯火腎火易動陽強不固者弗服甚是正論李瀾湖竟泛泛然謂其補助男子有益婦人則以本經列於上品而過於推崇遂有左道旁門專於與陽而戕人生命者皆

此類補陽助慾。不顧其本之說。有以誤之。是不可以不慎也。惟治外痔溼熱痛癢。沒淫諸瘡。可作湯洗。可爲末敷。收效甚捷。不得以賤品而忽之。

配合應用 ①治男子陰痿溼瘕。用蛇牀子。巴戟。天。遠志。牛膝。何首烏。陽起石。

②治婦人陰中腫痛。用蛇牀子。巴戟。天。牛膝。杜仲。續斷。地黃。黃蘗。白膠。

③治一切帶下。用蛇牀子。黃蘗。山藥。萸肉。五味子。茯苓。車前子。香附。川續斷。補骨脂。赤者加白膠。阿膠。

④治陽事不起。蛇牀子。五味子。菟絲子。等分爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。(千金方)

⑤治赤白帶下。月水不來。用蛇牀子。枯白礬。等分爲末。醋麪糊丸。彈子大。日脂爲衣。綿裹納入陰戶。如熱極。再換。日一次。(儒門事親方)

⑥蛇牀子散。治子宮寒冷。溫中坐藥。取蛇牀子仁爲末。入白粉少

許。和勻。如粟大。綿裹納之。自然溫也。(金匱玉函方)

⑦治婦人陰癢。蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯類洗。(集簡方)

⑧治產後陰脫。絹盛蛇牀子。蒸熱熨之。又法。蛇牀子五兩。烏梅十箇。煎水。日洗五六次。亦治婦人陰痛。(千金方)

⑨治男子陰腫脹痛。蛇牀子末。雞子黃調傅之。(永類鈴方)

⑩治大腸脫肛。蛇牀子。甘草各一兩。爲末。每服一錢。白湯下。日三服。并以蛇牀末傅之。(經驗方)

⑪治痔瘡腫痛不可忍。蛇牀子煎湯熏洗。(簡便方)

⑫治小兒疳積。蛇牀子杵末。和猪脂塗之。(千金方)

⑬治小兒甜疔。頭面耳邊。連引流水。極癢。久久不愈者。用蛇牀子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調搽之。(普濟方)

⑭治耳內溼瘡。蛇牀子。黃連各一錢。輕粉一字。爲末吹之。(全効心鑑方)

⑮治風蟲牙痛。蛇牀子。燭燭同研塗之。(千金方) 又用蛇牀子煎

湯。乘熱漱數次。立止。(集簡方) ⑯治冬月喉痺。腫痛不可下藥者。蛇牀子燒煙於瓶中。口含瓶嘴。吸煙。其痰自出。(聖惠方)

用鹽 一錢至三錢 施用宜忌 腎中有火。及下部有熱者禁用。惡牡丹。貝母。巴豆。伏硫黃。

參攷資料 ①蛇牀子。生於海濱。一根簇生數莖。莖初貼地。後漸昂起。高尺許。有線條。葉似鱗。底部重覆。至末則單。色淡綠。面滑澤。開重瓣五瓣之小白花。尖向內卷。子室橢圓。有縱溝。頭有白色二柱。雄蕊五。作淡紫色。大小繖俱有尖細之萼。果實略圓。縱脊大。無毛。長約分許。(增訂草木圖說) ②葉似小葉。莖對花。白。子如黍粒。黃。白花。生下溼地。所在皆有。以揚州。蘇州者爲良。(韓保昇) ③三月生苗。高三二尺。葉青碎。作叢似荔枝。每枝上有花頭百餘。結同一窠。似馬芹類。四五月乃開白色。又似繖狀。子黃褐色。如黍米。至輕虛。(蘇頌) ④其花如碎米攢簇。其子兩片成合。似薔蘿子而細。亦有細稜。凡花實似

蛇牀者。當歸。芎藭。水芹。諸本。胡蘿蔔是也。(李時珍)

【蛇莓】 古籍別名。蛇頭。地莓。殘莓。(日用) 疔瘡藥。(南安) 蛇蛋果。(淮南) 地錦。(江漢)

外國名詞 Duchesnea, in. dig, Fock (拉丁) ヲロイチ, クチナハイチヨ(日本)

基本 係薔薇科。爲蛇莓屬蛇莓之汁。蛇莓屬爲薔薇科之一屬。其特徵與薔子屬相類。似花有萼。樣之苞。雌蕊甚多。子房內含一胚珠。果實爲閉果。而其差異如下。雌子屬。果實無肉質之花托。苞比萼小。而蛇莓屬則果實有肉質之花托。苞比萼大。

產地 多在山野或陰暗卑溼地方。

形態 蛇莓爲多年生草本。莖匍臥地。長二三尺。莖有微毛。而不滑。葉以三小葉合成。而互生。有長柄。葉邊綠。各生粗鋸齒。夏初於葉腋間各生一花。有長花梗。萼外有苞。花有五瓣。黃色。雄蕊約二十枚。雄蕊甚多。其果實細小。熟時。花

十一畫 蛇

托膨大呈赤色。外形略與和蘭毒之果實相類。



根。採取 四五月採子及莖葉與

製法 採得陰乾或日乾。

用法 恒以生搗取汁。亦有水

煎及到末用。

性質 甘酸。大寒。有毒。

效能 瀉熱解毒。

主治 胸腹大熱不止。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論蛇莓曰。治傷寒

大熱。及溪毒射工毒。甚良。【唐】孟

詵食療本草論蛇莓曰。主孩子口

糜。以汁灌之。【宋】大明諸家本草

論蛇莓曰。通月經。瘡疥腫。傅蛇傷

【明】李時珍本草綱目論蛇莓曰。

傅湯火傷。痛即止。

配合應用 治口中生瘡。天

行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍

噉之。【傷寒類要方】

治傷寒下腹生瘡。以蛇莓汁服二合。日三服。仍水漬烏梅令濕入。崖蜜飲之。【肘後方】

治水中毒病。蛇莓根搗末服之。并導下部。亦可飲汁一二升。夏

月飲入水。先以少末投中流。更無

所畏。又辟射工。家中以器貯水浴

身。亦宜投少許。【肘後方】

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無熱毒者禁用。

參攷資料 蠶老時熱紅於

地。其中空者為蠶莓。中實極紅者

為蛇殘莓。人不啖之。恐有蛇殘也。

【吳瑞】所在有之。生下溼地。莖

頭三葉。花黃子赤。儼若覆盆子。根

似敗醬。四月五月採子。二月八月

採根。【韓保昇】蛇莓莖長不盈

尺。莖端惟結實二顆。小而光潔。誤

食腹人。非若覆盆苗長大。而結實

數顆。微有黑毛也。【汪機】此物

就地引細蔓。節節生根。每枝三葉。

葉有齒刻。四五月開小黃花。五出

結實鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則

不同也。其根甚細。本草用汁。當是

取其莖葉并根也。仇遠釋史記作

蛇櫻草。言有五葉七葉者。又言俗

傳食之能殺人亦不然。止發冷涎耳。【李時珍】

【蛇草】 古籍別名 蛇口半枝

運落得咬。【綱目拾遺】

產地 生陰溼諸地及古井間。

與蘆葦水澤旁。

形態 蛇草為雜草類之一種。

形似淡竹葉。葉背有紅點。如蛇眼。

可供藥用。

主治 一切蛇傷。疔腫痔瘡。速

根搗碎。並煎酒服。

【蛇草】即蛇眼草之原名。詳【蛇

眼草】條。

【蛇齒】即赤地利之古籍別名。與

見【綱目拾遺】詳【赤地利】條。

【蛇退】即蛇蛻之地方用名。詳【

蛇蛻】條。

【蛇退皮】即蛇蛻之古籍別名。與

見和漢藥考。詳【蛇蛻】條。

【蛇常】即蛇林子之古籍別名。與

見和漢藥考。詳【蛇林子】條。

【蛇婆】 古籍別名 海蛇。【動

物學大辭典】

外國名詞 Platyrus (Hy-

drophis) fasciatus Dind. 或 P.

schisto hynchus Soa Snake

一二三八

(拉丁)カイシヤ或エラアウナ

ギ或ウミヘビ(日本)

基本 係脊椎動物爬蟲類蛇

類海牙類蛇。藥科為蛇婆蛇之內

產地 出南海及南洋諸島中。

形態 蛇婆為蛇屬之一種。與

魚類中之海蛇不同。其體長。下中

部及尾皆側扁。左右擊水而游泳。

頭及眼皆小。鼻孔在頭端。被一種

膜。口有毒牙。牙上有溝。鱗呈六

角形相並列。背青綠。腹黃。有白色

與黑色環紋。肺甚大。足以減輕體

重。以便浮游。長有三四尺。大者六

七尺。其肉可供藥用。



蛇 婆

性質 鹹。平。無毒。

主治 赤白痢。蟲毒下血。五

野雞病。瘰癧。炙食或燒末。米飲服

二錢。

【蛇眼草】 原名 蛇草。

產地 生古井及年

久陰溼諸地及蕙葦水澤旁。

形態 蛇草為雜草類之一種。形如淡竹葉。背後皆是紅圈。如蛇眼狀。可供藥用。

主治 疔腫痔瘡及一切蛇咬傷。

【蛇符】即蛇蛻之古籍別名。典見別錄。詳『蛇蛻』條。

【蛇脫】即蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【蛇脫皮】即蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇蛻』條。

【蛇蛋果】即蛇莓之古籍別名。典見淮南子。詳『蛇莓』條。

【蛇苗藤】產地 出福建舊福寧府境。

形態 蛇苗藤為蔓草類藤屬之一種。莖細葉如猴耳。可供藥用。

主治 喉痛百病。

【蛇魚】即蝮蛇之古籍別名。典見綱目。詳『蝮蛇』條。

【蛇魚草】基本 蛇魚草為雜草類之一種。可供藥用。

主治 金瘡血出不止。搗傳之。

【蛇蛻】即蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

蛇蛻』條。

【蛇筋】即蛇蛻之古籍別名。典見吳普本草。詳『蛇蛻』條。

【蛇粟】即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【蛇殘毒】即蛇莓之古籍別名。典見日用本草。詳『蛇莓』條。

【蛇黃】命名 本品生蛇腹中。正如牛黃之意。故名。

產地 出嶺南諸地之蛇腹中。

形態 蛇黃圓重如錫。有黃黑青雜色。或謂大者如鷄子。小者如彈丸。其色紫。可供藥用。

採取 九月間。掘土下七八尺。尋採之。

製法 大明曰。入藥燒赤。醋淬三四次。研末水飛用。

性質 冷無毒。

主治 心痛。疰杵。石淋。小兒驚癇。婦人產難。以水黃研服汁。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論蛇黃曰。靈心。【明】李時珍本草綱目論蛇黃曰。磨汁塗腫毒。

【蛇蛻】命名 蛇字古文象其宛轉盤曲之形。蛻字音

脫音退。有退脫之義。故名。處方用名 蛇蛻。蛇退。龍衣。蛇殼。古籍別名 龍子衣。弓皮。【本經】龍子皮。蛇符。【別錄】蛇筋。【吳普】蛇皮。【甄權】龍退。【綱目】蛇退皮。局皮。蛇衣。石龍衣。蛇脫皮。【和漢藥考】外國名詞 〇Pipera 〇Pipera (英) 基本 屬爬蟲類之蛇族。為其鱗上退脫之皮膜。產地 陳仁山藥物生處辨云。龍衣各省均有出。但以江蘇省蘇州府最多。又云。南蛇皮產安南。南洋羣島。暹羅亦有出。但不如安南者佳。二三月出新。形態 蛇蛻為如管之皮膜。面有鱗形。色銀灰。有光澤。首尾全長數尺。稍帶革質狀。其味鹹。入藥。以不暴於雨露者為良。採取 五月五日或十五日取之。良。尤以石上完全者佳。製法 雷斅曰。凡使勿用青黃蒼色者。只用白色如銀者。先於地下掘坑深一尺二寸。安蛻於中。一宿取出。醋浸炙乾。用李時珍曰。今

人用蛇蛻。先以皂莢水洗淨。懸竹上。或酒或醋或蜜浸炙黃。用。或燒存性。或鹽泥固煨。各隨方法而不同。

用法 但以剉末和入丸散用。

性質 鹹。甘。平。無毒。

效能 驅風。解毒。辟惡。殺蟲。用作諸瘡解毒藥。

主治 小兒百二十種癩。蛇癩。癩疾。癩瘡。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。【本經】大人五邪。首語。僻越。止嘔。逆。明目。燒之療諸惡瘡。【別錄】

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論蛇蛻曰。療喉痺。百鬼魅。胎。【唐】孟詵食療本草論蛇蛻曰。安胎。【唐】陳藏器本草拾遺論蛇蛻曰。止痛。【宋】日華諸家本草論蛇蛻曰。灸用辟惡。止小兒驚悸。客熱。蠱日。灸用辟惡。止小兒驚悸。客熱。煎汁傳癩瘡。白癩風。催生。【明】李時珍本草綱目論蛇蛻曰。辟惡去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹奶。大人喉風。退目昏。消木舌。傅小兒重舌。重翻。唇緊解頰。面瘡。月蝕。天泡瘡。大人疔腫。消瘡。腫毒。黃湯洗諸惡蟲傷。【明】穆希雍本草經疏論蛇

一二三九

十一 蠶 蛇

蛇曰蛇。蛇之餘性猶存。不以氣味爲用者。故蛇之性上竄而主風。蛇之入肝而辟惡。其性一也。小兒驚風。痲瘋。痲疾。寒熱。蛇癩。弄舌。接頭。大人五邪。言語僻越。皆肝經爲病。邪惡侵犯也。蛇走竄。能引諸藥入肝散邪。故主如上等證。善能殺蟲。故主腸痔。蟲毒。惡瘡。邪去木平。故止嘔咳。明目。今人亦用以催生去翳膜者。取其善脫之義也。【清】黃宮繡本草求真論蛇蛇曰。蛇退味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚風。瘧疾等症。無不用此爲主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅毒者不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癩癩仆偏正頭風。喉舌諸疾者皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡瘡痔漏疥癬。無不用之即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而凡眼目翳膜。胎衣不下。得此即爲解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。

- ① 治小兒驚風。並用蛇蛇灰。醋調傳之。(聖惠方)
- ② 治小兒口緊不能開口。飲食不語。即死。用蛇蛇燒灰。拭淨傳之。(千金方)
- ③ 治小兒解頰。蛇蛇熬末。以豬頰車髓和塗之。日三四易。(千金方)
- ④ 治小兒頭疔。小兒面疔。小兒月蝕。並用蛇蛇燒灰。臘豬脂和傳之。(肘後方)
- ⑤ 治小兒吐血。蛇蛇灰。乳汁調服半錢。(子母秘錄方)
- ⑥ 治痘後目昏。小兒痘後障翳。

- ⑦ 治橫生逆生。胞衣不下。蛇蛇炒焦爲末。向東酒服。一刀圭。即順。(千金方) 又用鹽泥固煨。研二錢。榆白湯服。(十全轉救方) 治逆生須臾不救。用蛇蛇一具。蠟燭十四個。頭髮一握。並燒存性。分二服。酒下。仍以小針刺兒足心三七下。擦鹽少許。即生。(濟生秘覽方)
- ⑧ 治婦人產難。蛇蛇泡水。浴產門自易。(寶鑑方)
- ⑨ 治婦人吹乳。蛇皮一尺七寸。燒末。溫酒一盞服。(產乳方)
- ⑩ 治腫毒無頭。蛇蛇灰豬脂和

- ⑪ 治石癭無膿。堅硬如石。用蛇蛇灰貼之。經宿便愈。(聖濟總錄方)
- ⑫ 治諸漏有膿。蛇蛇灰。水和傳上。即蟲出。(千金方)
- ⑬ 治疔腫魚脰。蛇蛇雞子大。水四升。煮三四沸。服汁立瘳。(外臺秘要方) 又治魚臍瘡出水。四畔浮漿。用蛇蛇燒存性。研雞子清和傳。(直指方)
- ⑭ 治惡瘡似癩。十年不癒者。全蛇一條。燒灰。豬脂和傳。仍燒一條。溫酒服。(千金方)
- ⑮ 治瘰癧風白駁。蛇皮灰醋調塗。(聖惠方) 又用蛇蛇數百遍。令熱藥草中。勿回顧。(外臺秘要方)
- ⑯ 治陷甲入肉痛苦。用蛇皮一具。燒灰。雄黃一彈丸。同研末。先以溫漿洗疔。針破貼之。(初虞世方)
- ⑰ 治耳忽大痛。如有蟲在內。奔走。或血水流。或乾痛。不可忍。者。蛇蛇皮燒存性。研。鷄翎吹之。立愈。經驗秘方也。(楊拱醫方摘要)

用蠶 八分至錢半。 施用宜忌 凡無風毒者及孕

婦藥用。畏磁石及酒。

參攷資料 ④蛇脫從口退出。

眼暗亦退。今眼藥及去翳膜用之。

取此義也。(寇宗奭) ⑤入藥有四

義。一能辟惡。取其變化性靈也。故

治邪僻鬼魅。蠱毒諸疾。二能去風

取其屬異性靈也。故治驚癇癩駁

喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘡痔

漏疥癬諸疾。用其毒也。四有煨義

故治窮膜胎產皮膚諸疾。會意從

類也。(李時珍) ⑥蛇蛻止癩。正發

日。取塞兩耳。又以手持少許。并服

鹽醋汁令吐。(陳藏器)

【蛇滅門草】即望江南之古籍別

名。典見和漢藥考。詳『望江南』條。

【蛇銜】即蛇舍之古籍別名。典見

本經。詳『蛇舍』條。

【蛇齒】即赤地利之古籍別名。典

見本草拾遺。詳『赤地利』條。

【蛇頭抓草】即蛇草之別名。詳『

蛇草』條。

【蛇頭草根】即天南星之古籍別

名。典見和漢藥考。詳『天南星』條。

【蛇遶草】即川芎之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『川芎』條。

【蛇藍】即曲節草之古籍別名。典

見綱目。詳『曲節草』條。

【蛇藍】即六月霜之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳『六月霜』條。

【蛇蘭草】 基本 屬淫草類。爲

蛇蘭草之莖葉。

主治 蛇虺毒蟲等螫。取根葉

搗傳咬處。當下黃水。

參攷資料 ①生平地。葉似苦

枝而小。節赤。可高一二尺。種之辟

蛇。又一種草。莖則似芋。亦傳蛇毒。

(陳藏器) ②按百一方云。關東有

草。狀如芋。莖方節赤。按傳蛇毒如

摘却。然名蛇蘭草。又有鼠蘭草。即

後非。(唐慎微)

【蛇蕪】即蛇毒之古籍別名。典見

本草會編。詳『蛇毒』條。

【蛇母】即蟻蟻之古籍別名。典見

綱目。詳『蟻蟻』條。

【妖蟻】即蟻蟻之古籍別名。典見

爾雅。詳『蟻蟻』條。

【妖蟻】即蟻蟻之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳『蟻蟻』條。

【蛭蚤】即蛭蚤之別名。詳『蛭蚤』

條。

【蛭蟻】即蛭蟻之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『蛭蟻』條。

【蚌】即蚌之別名。典見動物學

大辭典。詳『蚌』條。

【蚌母】即知母之原名。詳『知母』

條。

【蛭蟻】即蛭蟻之古籍別名。典見

綱目。詳『蛭蟻』條。

【蚌蛇膽】即蚌蛇之處方用名。詳

『蚌蛇』條。

【蛋結】即大黃之處方用名。詳『

大黃』條。

【蛋清】即蛋白之別名。詳『雞子

白』條。

【蛋精】即雞子白之別名。典見新

中藥。詳『雞子白』條。

【訥會】即蘆薈之古籍別名。典見

本草拾遺。詳『蘆薈』條。

【鼓蟲】 命名 本品形狀顏色

略似大豆。故名。

古籍別名 鼓母蟲(綱目)

外國名詞 Grynus Outus,

Motach. (拉丁) ミツスマシ

(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類鞘

翅類鼓蟲科之鼓蟲。

產地 生水澤間。

形態 鼓蟲爲隱生蟲類之一

種。其體形扁圓。色黑或黃。有光澤。

頭頂及前胸背皆光滑。上唇多直

較。複眼分離計四枚。其中間出觸

角。觸角短形不正。分九節。色黑褐

兩鬚及足。皆赤褐。翅鞘有刻點。所

成之直列。尾端突出。翅端外前肢

長。中後兩肢皆扁而短。附節有五。

常集水中。善游泳。食小蟲。夜則飛

於空中。捕得可供藥用。

性質 有毒。

主治 殺禽獸。蝕息肉。傳惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鼓蟲曰。白梅裏含之

除射工毒。

【鼓母蟲】即鼓蟲之古籍別名。典

見綱目。詳『鼓蟲』條。

【豚肉】即豬肉之古籍別名。典見

本經。詳『豬肉』條。

【豚脂】即豬脂之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『豬脂』條。

【豚榆係】即地榆之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『地榆』條。

【豚頭】即豬卵之古籍別名。典見

本經。詳『豬卵』條。

【貧報草】即烟草之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『烟草』條。

十一畫 貨

【貨母】即知母之古籍別名。典見本經。詳「知母」條。

【貨中】即貨衆之古籍別名。典見吳普本草。詳「貨衆」條。

【貨仲】即貨衆之處方用名。詳「貨衆」條。

【貨首】即貨衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貨衆」條。

【貨筋】即貨衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貨衆」條。

【貨衆】原名 鳳尾草。命名 本品莖葉如鳳尾。其根本而柔枝貨之故名。

處方用名 貨仲。貨衆根。管仲。古籍別名 貨節。貨渠。百頭。虎卷。肩脊。本經。泊萍。藥藻。草頭。頭。

（別錄）黑狗脊。（綱目）鳳尾草。（爾雅）貨中。（吳氏本草）牛高非。澤石頭。貨首。貨筋。（和漢藥考）

學名 Aspidium Falcatum Br. Ch.

基本 屬水龍骨科貨衆之根。產地 凡山野溪谷間之陰溼處。恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。貨衆產廣東各屬均有出。

形態 貨衆爲自生山中溪畔

貨

或深林陰處之羊齒類植物。葉叢生於一根。作羽狀。稍彎曲。長一二尺。小葉作楔狀。冬日不凋。根稍類烏頭。呈黑褐色。

採取 二月八月間採之。製法 採得洗去土氣。陰乾用。

性質 苦。微寒。有毒。效驗 清溼熱。止崩帶。解毒。殺蟲。用作婦科藥。又作殺蟲藥。

作用 在胃中能激胃液之分泌。至腸中與蟲遇即驅殺而混入糞中排出。如服量過多或過久。則惹激中樞神經而呈中毒現象。

主治 腹中邪熱氣。諸毒。殺三蟲。（本經）去寸白。破癥瘕。除頭風。止金瘡。（別錄）

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論貨衆曰。爲末水服一錢。止鼻血有效。【明】李時珍本草綱目論貨衆曰。治下血崩中帶下。產後血氣脹痛。斑疹毒。痔瘡。骨

痺。解諸病。【明】繆希雍本草經疏論貨衆曰。貨衆味苦而又微寒。止應云有小毒。以其苦寒。故主腹中邪熱氣諸毒。三蟲皆由溼熱所生。苦寒除溼熱。則三蟲自死矣。若以

鴻之。亦兼有散之之義。故破癥瘕。苦寒能除風熱。故止頭風。金瘡出血後。必發熱。洩熱散結。則金瘡自止。【清】黃宮繡本草求真論貨衆曰。貨衆即俗稱爲管仲者是也。味苦微寒無毒。世遇天時行不正之氣。人多用此置之水缸。使人食之不潔。且不能力能解毒。凡遇崩中帶下。並癥瘕斑痘。蟲蟲骨哽。皆可用之。蓋以苦能殺熱。寒能散熱。故也。昔王璆百一選方言食鯉魚羹煎澆汁。速進一啜而出。可見輭堅之功。其殆若是之神矣。形似狗脊而大。汁能制三黃。化五金。伏鐘乳。結沙制汞。解毒轉堅。

近人學說 張山雷曰。貨衆苦寒。沈降之質。故主邪熱而能止血。并治血痢下血。甚有捷效。皆苦以燥溼。寒以泄熱之功也。然氣亦滯。厚故能解時邪熱結之毒。別錄除頭風。專指風熱言之。凡大頭疫腫連耳目。用泄散而不速應者。但加入貨衆一味。即邪勢透泄。而熱解神清。不獨苦寒泄降。亦氣之足以散邪也。故時疫流行。宜浸入水缸

中。常飲則不傳染。而井中沉一枚。不犯百毒。則解毒之功。尤其顯著。不得以輕賤而忽之。

配合應用 治鼻衄不止。貨衆根末。水服一錢。（普濟方）

治諸般下血。腸風。酒痢。血痔。肉赤色者。即本草貨衆也。去皮毛。剉焙爲末。每服二錢。空心米飲下。或醋糊丸。梧子大。每米飲下三四十九丸。或燒存性。出火毒爲末。入麝香少許。米飲服二錢。（普濟方）

治女人血崩。貨衆半兩。煎酒服之。立止。（集簡方）

治產後亡血過多。心腹微痛者。用貨衆狀如刺蝟者一個。全用不到。只揉去毛及花萼。以好醋蘸溼。慢火炙令香熟。候冷爲末。米飲空心每服三錢。甚效。（婦人良方）

治赤白帶下。年深諸藥不能療者。用上方治之亦驗。名獨聖湯（婦人良方）

治年深欬嗽。出膿血。用貨衆蘇方木等分。每服三錢。水一盞。生薑三片煎服。日二服。又久欬漸成勞瘵。鳳尾草爲末。用魚肝油食之。

(聖惠方)

① 快斑散。治痘瘡不快。用貫衆、赤芍藥各一錢。升麻、甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服。(王海藏方)

② 治頭瘡白禿。貫衆、白芷爲末。油調塗之。又方貫衆燒末。油調塗。(聖惠方)

③ 治漆瘡作瘡。油調貫衆末塗之。(千金方)

④ 治雞魚骨哽。貫衆、棉砂、甘草等分爲粗末。棉包少許。含之。嚥汁。久則隨痰自出。(普濟方)

⑤ 解輕粉毒。齒縫出而臭。腫。貫衆、黃連各半兩。煎水。入冰片少許。時時漱之。(陸氏積德堂方)

⑥ 治血痢不止。鳳尾草根。即貫衆五錢。煎酒服。(集簡方)

⑦ 治便毒腫痛。貫衆酒服二錢良。(多能鄙事方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾虛胃寒而無實熱者禁用。蘆薈、赤小豆爲之使。

參攷資料 ① 貫衆大治婦人血氣。王海藏治夏月痘出不快。快斑散用之云。貫衆有毒而能解腹

十一畫 貫

軟 透

中邪熱之毒。病因內感而發之於外者多效。非古法之分經也。又黃山谷黃豆帖。言荒年以黑豆一升。投淨。入貫衆一斤。剉如骰子大。同以水煮。文火斟酌至豆熟。取出。日乾。覆令展盡餘汁。候去貫衆。每日空心。燻豆五七粒。能食百草木枝。葉有味。可飽。又王粲百一選方。言

滁州蔣教授。因食鯉魚玉鱗羹。爲肋肉所哽。凡藥皆不效。或令以貫衆煎汁一盞。分三服。連進至夜。一略而出。亦可爲末。水服一錢。觀此可知其輕堅之功。不但治血治瘡而已也。(李時珍)

① 苗似狗脊。狀如雉尾。根直多枝。皮黑肉赤。曲者名草鷓頭。所在山谷陰處均有之。(韓保昇)

② 今陝西河東州郡。及荆襄間多有之。而少有花者。春生苗。赤葉。大如蕨。莖幹三稜。葉綠色。似雞翎。又名鳳尾草。其根紫黑色。形如大瓜。下有一黑鬚毛。又似老鷓。郭璞注爾雅云。葉負銳。莖毛黑。布地。冬不死。廣雅謂之貫節。是矣。(蘇頌)

③ 多生山陰近水處。數根叢生。一根數莖。莖大如筋。其涎滑。其葉兩兩對生。如狗脊之葉而

無錫齒。青黃色。面深背淺。其根曲屈而有尖峭。黑鬚叢簇。亦似狗脊根而大。狀如伏鷓。(李時珍)

④ 貫衆有止血驅蟲解毒作用者。明矣。古方解輕粉毒。或承毒性口腔炎。時多用貫衆黃連各半兩煎水。入冰片少許。時時漱之。謂有特效也。(袁淑範)

主治 惡瘡。令人洩。

【貫衆根】即貫衆之處方用名。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見本經。詳【貫衆】條。

【透骨消】 產地 粵南大瀝諸地均有出之。

【透骨消】 性質 酸。清香。平。效能 散風除溼。

【透骨消】 主治 專治骨痛。理跌打傷。

【透骨消】 古籍別名 鐵線透骨草(綱目拾遺)

【透骨消】 形態 透骨草爲雜草類之一種。形如牛膝草及馬鞭草。可供藥用。

【透骨消】 全治 痰熱毒。輕堅。合金箔。入骨補髓。兼治難產。

【透骨消】 配合應用 治瘋氣疼痛。不拘遠年近日。透骨草二兩。穿山甲二兩。防風二兩。當歸三兩。白茯苓四兩。白芍三兩。歸身四兩。去莖用葉。九蒸九曬。海風藤二兩。生地四兩。廣皮一兩。甘草一兩。已上爲末。

【透骨消】 見千金食治。詳【君選子】條。

【透骨消】 和漢藥考。詳【鉛糖】條。

十一 蠶 透 逐 通

用猪板油一斤。煉蜜爲丸。梧子大。早晚各五錢酒下。懸痔難忍。(周氏家方實) 又核棗肉四個。酸葡萄七個。瘻瘻一個。錢線透骨草三錢。水煎熱服。出汗愈。不問風濕皆效。(醫學指南方)

①治痔。透骨草一味。貼患處。一柱香或半柱香時。即揭去。皮上起泡即愈。(醫學指南方)

②洗瘻瘻秘方。蛤蚧一個。麻黃。川椒。透骨草。防風。大鹽各四兩。白花蛇二錢。艾一把。槐枝一條。川烏草烏各二兩。紫花地丁一斤。用水二桶煎。大缸半埋在地。入水。溫時。坐上洗。再用水二桶煎。候冷時。再入熱水。或一日或一夜。臨出時。用水澆頂心數次。再用芥末粉貼患處。紙絹裹熱。坑上睡。汗出盡爲度。(醫學指南方)

參攷資料 透骨草大能蠶壁。取汁浸透板能化爲水。專主燥骨。丹按鳳仙白花者亦名透骨白。追風散氣。紅花者名透骨紅。破血腫胎。亦有透骨之名。非一物也。
【透骨草】即益母草之古籍別名。與見和漢藥考詳益母草條。

【透骨將軍】即積砂之古籍別名。與見土宿本草詳積砂條。

【逐折】即厚樸子之原名。詳厚樸子條。

【逐馬】即玄參之古籍別名。與見藥性詳玄參條。

【逐馬】即丹參之古籍別名。與見本草集註詳丹參條。

【通石】即孔公孽之古籍別名。與見綱目詳孔公孽條。

【通仙草】即石長生之古籍別名。與見和漢藥考詳石長生條。

【通竹】即竹之空心直上而無節者。性質功能。與尋常竹同。參詳竹條。

【通血香】 產地 出自西洋及陝西諸地。

形態 通血香爲芳草類之一種。色如乾荷可供藥用。

主治 血症及肝經血氣諸症。入藥最良。

配合應用 ①治腹脹。通血香一錢。取亞腰葫蘆一個。不去子膜。入香於內。再入酒煮。仍以所開之蓋。合縫封固。以陳酒安鍋內。懸葫蘆於酒中。揆定勿令傾倒。將葫蘆

煮三柱線香爲度。煮時其香透屋。醬之外。煮完取出。煎煮內子膜并藥。焚乾爲末。每服一錢。空心時酒下。間五日再服一錢。服盡葫蘆內藥。服五六錢即愈。此方出廣華記。云治脾虛有滯者。(救急黃海方)

②治瘡癤內消方。紫背天葵一兩五錢。海藻洋帶昆布各一兩。海螵蛸五錢。貝母桔梗各一兩。通血香三錢。右藥爲細末。酒糊爲丸。桐子大。每服七十九。食後溫黃酒送下。(良劑集方)

③治痔漏通腸。胡連追毒方。專治痔漏。不拘遠年近日。有漏或通腸。及汚混孔出者。先用此方。追毒膿血。後服黃連閉管丸。取效最穩。用胡黃連八錢。切片。煎汁。并炒。刺蝟皮一個。切片。炒黃爲末。通血香八分。須用真者研末。辟香二分。共和勻。饅飯爲丸。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水反多。乃藥之功。勿懼可也。(海藥秘錄方)

④黃連閉管丸。胡黃連淨末八錢。甲片麻油內煨黃五錢。石決明煨過五錢。真通血香六分。不可少。槐花五錢。共爲細末。蜜丸。每服一錢。每服一錢。空心清米湯下。早晚二服。重者二十一日收功。此方不用針刀挂線之苦。誠起廢疾之良方也。如漏邊有硬肉突起者。加紫蘭二十一個。炒末。和入此方。及通身諸漏並治。屢試屢效。

一二四四

⑤驅毒丸。治痔漏無論新久。但舉發便下血作痛。肛門墜重者。膿血不止。腫痛難坐者。並治胡黃連淨末八兩。通血香錢半。用雄猪大腸頭一段。長一尺二寸。溫湯洗淨。將連末及通血香灌入腸內。兩頭以白絲線扎緊者。酒二斤中。新砂鍋內。煮酒將乾爲度。取起腸藥。各搗如泥。倘藥爛曬一時。復搗爲丸。桐子大。每服七十九。空心溫酒送下。久服除根。又名白銀定子。治漏有孔者。只須半月。見功神效。

⑥三品一條槍。白礬淨末一兩。白礬淨末二兩。明雄黃二錢。四分。通血香八分。乳香一錢二分。先將批藥研極細末。錢杓秤成餅。入炭火煨淨。取出。去火毒。爲末。和入雄黃血香乳香細末。作饅子成條。插入漏內。直透裏痛處爲止。每日上三次。至七日爲止。半月瘻瘻而

每服一錢。空心清米湯下。早晚二服。重者二十一日收功。此方不用針刀挂線之苦。誠起廢疾之良方也。如漏邊有硬肉突起者。加紫蘭二十一個。炒末。和入此方。及通身諸漏並治。屢試屢效。

愈如痛未痊。用生肌散收口可也。生肌散。治諸痔諸瘡腫毒。收口神效。乳香沒藥海螵蛸。用三黃湯煮過。寒水石煨過。輕粉龍骨煨赤。石脂煨。冰片各等分。共研細末。搽患處。外貼膏藥。

【通香水】 產地 出塞外及內蒙古諸地。

形態 通香水為灌木類之一種。木長數尺。氣甚芬芳。可供藥用。主治 焚之辟瘴。穢氣。邪祟。並治各種奇疾。

參攷資料 通香水以沸湯沃之。取其汁洗衣服。及瀆一切花卉。覆屋宇壁。經年香氣不減。燒之香氣能達數百里。契丹珍之。(趙學敏)

【通泉草】 即紅茂草之古籍別名。與見庚辛玉册。詳「紅茂草」條。

【通草】 原名 通脫木。 命名 本品功尚通利。故名。

處方用名 方通草。白通草。絲通草。槿通草。條通草。花方通。紅通草。

古籍別名 活竟。陸南。(爾雅)

寇脫。倚商。(山海經)

外國名詞 Aralia papy-

nifera Hook. (拉丁) ツウダツ

ボク(日本)

基本 係五加科樹木屬。為通脫木之木髓。

產地 凡暖地山側。及原野間。

恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。

通草產廣西南寧。百色。



(一) 草通



(二) 草通

形態 通脫木為落葉灌木。本高丈餘。莖質不堅。含有白色之木髓。髓如紙。厚薄不勻。葉為掌狀。分裂。有長葉柄。集生於莖之上部。花與土當歸之花相似。其莖髓切作薄片。可代紙用。及供製裝飾品。

之料。入藥用者。即謂之通草。

採取 秋季採之。

製法 採得切片。日乾。用時有以辰砂拌赤。亦有紅花汁染赤者。

用法 恒以和入他藥水煎服。

性質 淡。甘。平。無毒。

效能 利水道。清溼熱。催生下乳。通利五淋。專作利尿藥。

主治 利陰竅。治五淋。除水腫。癰疽。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論通草曰。解諸毒。止痛。【明】汪機本草會編論通草曰。明目退熱。下乳催生。【清】黃宮繡本草求真論通草曰。通草氣味甘淡。體輕色白。有類燈心。功同入肺。引熱下降。及利小便。通淋治腫。然燈心質小氣寒。則兼降心火。此則兼入胃。通氣上達。而下乳汁之為異耳。况此體大氣輕。滲淡殆甚。能升能降。既可入肺而清熱。復能上行而通胃。東垣用此。以治五腫水腫。腫閉。非取氣寒能降味淡能升之意乎。仲景用此。合當歸芍藥桂枝。細辛。大棗。甘草。名為當歸四逆湯。以治傷寒邪入厥陰。非取通草

以通替術之意乎。但孕婦勿服。

近人學說 張山雷曰。通脫木

即今之所謂白通草也。陳藏器本草云。通脫木生山側。葉似蕁麻。其莖空心。中有髓。白可愛。女工取以飾物。俗亦名通草。爾雅所謂離南活脫也。(陳藏器。唐開元時人。為三原縣尉。著本草拾遺。活脫。今爾雅作活莖。陸氏釋文。莖或作該。郭注。草生江南。高丈許。大葉。莖中有髓。正白。爾雅又有倚商活脫。郭注。即陸南也。陳氏本草引爾雅作離南活脫。蓋以莖字罕見。乃合爾雅前後兩條。而非有之耳。山海經中山經。其草多莖脫。郭注。寇脫草。生南方。高丈許。似荷葉。莖中有髓。正白。零桂人植。而日灌之。以為樹。即此。一書頌案。陳氏說與郭景純合。則唐人所謂通脫木者。即今之通草無疑。而確非本經之通草。陶注本經。通草繞樹藤生。而此則是草類。但高大似樹。惟瀨湖綱目亦列於莖草類中。且釋之曰。莖生山中。大者圍數寸。殊與郭氏陳氏所說不合。豈瀨湖曾見其確是莖生乎。抑以其性情效力。有似木通。而

十一畫 通 速 遂 逢 連

連類及之。遂亦姑妄言之乎。茲姑依綱目並錄於木通之後。亦以其功用之相類耳。其氣味則李東垣用藥法象謂甘淡寒無毒。皆頗案此甘字。非大甜之謂。實即淡字。如泉水食米皆謂味甘之例。此物無氣無味。以淡用事。故能通行經絡。清熱利水。性與木通相似。但無其苦。則泄降之力緩。而無燥厲之弊。難能通利。不甚傷陰。溼熱之不甚者。宜之。而壅遏閉結之症。必不能及。木通之捷效。東垣謂利陰竅。治五淋。除水腫。癰。亦惟輕症。乃能有功耳。又謂瀉肺利小便。與燈草同功。蓋皆色白而氣味輕清。所以亦能上行。瀉肺之熱。閉。宜其上竅。則下竅自利。說亦可取。乃又謂宜生用之。則輕清之藥。豈有炒用之策。伯耶。汪石山謂明目退熱。亦輕清上行之效。又謂下乳。催生。則清淡者能滑利通竅耳。瀨湖謂色白。氣寒。味淡。體輕。氣寒降也。味淡升也。又曰。白梗通吾臭。藥肆有之。不知是何草之梗。其大過於拇指。外皮微黑。中心純白。輕虛之甚。切薄片用之。其色澤頗與白通草相似。但

不如白通草之柔潤。味淡氣清。功用與白通草等。而古今本草皆無此物。姑并錄之。以備藥鏡所藉。且近時白通草之價漸貴。而梗通尚廉。入藥功力殊無軒輊。是可取也。

配合應用 治上部內傷。通草。香降。香。紅。麩。鱧。甲。山。查。沒。藥。

洗頭風痛。新通草瓦上燒存性。研末二錢。熱酒下。牙關緊者。幹口澀之。(百一選方)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡氣虛及孕婦並無溼熱者禁用。

參攷資料 通草瀉肺利小便。甘平以陰緩血也。與燈草同功。宜生用之。李杲。通脫木生山側。葉似薏麻。其莖空心。少有白鬚。輕白可愛。女人取以飾物。俗名通草。(陳藏器) 郭璞。育生江南。高丈許。大葉似荷。而肥莖中。鹹正白。今園圃亦有種。莖者。或作蟹煎充果。食之甘美。(蘇頌)

通草 即木通之原名。典見本經。惟近世。木通。與。通草。係列為二物。各見本條。

通草子 即木通實之別名。典見

綱目。詳。木通。條。

通草酒 製法 用通草子煎汁。同麴米釀酒飲。

主治 續五臟氣。通十二經脈。利三焦。

通脫木 即通草之原名。詳。通草。條。

通脫木花上粉 宋。治。諸。毒。瘡。癩。瘡。痔。疾。納。之。

歷代醫家論 宋。蘇頌。經本草論通脫木花上粉曰。療瘰癧。及胸中伏氣。攻胃咽。

通漆 即節華之古籍別名。典見別錄。詳。節華。條。

通蠶草 即忍冬藤之古籍別名。典見土宿本草。詳。忍冬藤。條。

速香 即伽楠香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳。伽楠香。條。

速腦 即冰片之古籍別名。典見綱目。詳。冰片。條。

遂巡酒 製法 三月三日。收。五月。收。馬。蘭。花。五。兩。五。錢。六。月。六。日。收。脂。麻。花。六。兩。六。錢。九。月。九。日。收。黃。甘。菊。花。九。兩。九。錢。陰。乾。十。二。

月八日。取。臘。水。三。斗。待。春。分。取。桃。仁。四。十。九。枚。好。者。去。皮。尖。白。麵。十。斤。正。同。前。花。和。作。麴。紙。包。四。十。九。日。用。時。白。水。一。瓶。麴。一。丸。麴。一。塊。封。良。久。成。矣。如。淡。再。加。一。丸。

主治 補虛益氣。去一切風痺。澤氣。久服益壽。耐老好顏色。

遂東根 即知母之古籍別名。典見別錄。詳。知母。條。

遂 即連翹之古籍別名。典見爾雅。詳。連翹。條。

遂及根 即白芨之古籍別名。典見本經。詳。白芨。條。

遂母 即知母之古籍別名。典見本經。詳。知母。條。

遂本 即海藥子之古籍別名。典見本經。詳。海藥子。條。

遂及檳 即檳榔之處方用名。詳。檳榔。條。

遂蟲陸 即羊蹄之古籍別名。典見本經。詳。羊蹄。條。

遂枝草 即首習之古籍別名。典見郭璞賦。詳。首習。條。

遂桂 即肉桂之古籍別名。典見和藥漢考。詳。肉桂。條。

遂珠 即山丹之古籍別名。典見

日華諸家本草詳「山丹」條。

【連珠巴戟】即巴戟天之處方用名詳「巴戟天」條。

【連草】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【連異】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【連異翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【連陽八座】即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇牀子」條。

【連荷】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【連錢草】原名 穿牆草。蓋謂

苟有開隙。此草即能穿過。故名。

連。故名連錢草。

古醫別名 積雪草。(本經)胡

薄荷(天寶)地錢草(唐本草)海

蘇。錢葛。新羅薄荷(和漢藥考)

外國名詞 Hedeoma pteridifolium (拉丁)

基本 係扇形科連錢草之

十一畫 連

葉莖。

產地 中國南方。如荆、楚、江淮、浙等地多出之。



(一) 草錢連

形態 連錢草為原野自生之多年生草。莖方形。帶紫色。蔓延地上。花時直立。高五六寸。花後再偃臥地上。長及丈餘。葉作紫綠色心臟形。或腎臟形。以長葉柄對生。邊緣有粗鋸齒。葉莖俱生粗毛。茸。葉腋開淡紫色斑點之唇形花。此草氣香而味苦。



(二) 草錢連

類類 蘇恭注薄荷云。有一種莖生功用相似。圖經云。胡薄荷與薄荷相類。但味少甘。土人恒作茶飲。俗呼為新羅薄荷。即天寶方所

用之連錢草也。據二說。則積雪草即胡薄荷。乃薄荷之莖生者附。

採取 每年八九月。採取莖葉。

製法 曬乾。或陰乾。

用法 焙燥研末用。或生搗取汁用。

性質 苦。寒。無毒。

成分 連錢草含有揮發油及單寧等。

效能 搗敷疥毒。消腫止痛。用作強壯藥。民間用治小兒痢。故名所切草。

主治 大熱惡瘡。癰疽。浸淫。赤瘰。皮膚赤身熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論連錢草曰。單用治瘰癧鼠漏。寒熱時節來往。【唐】陳藏器本草拾遺論連錢草曰。主暴熱。小兒寒熱。腹內熱結。搗汁服之。【唐】蘇恭新修本草論連錢草曰。搗敷熱腫。丹毒。【宋】日華諸家本草論連錢草曰。以鹽按貼腫毒。并風癩疥癬。【明】李時珍本草綱目論連錢草曰。研汁點暴赤眼良。

著名方劑 九仙腦紅散。主治男女嘔吐諸血。及便血。瀉血。婦人

崩漏。(黃炳集驗方)積雪草五錢。當歸(酒炒)黑山桐。蒲黃炭。黃連。黃芩。生地黃。槐花炭各一錢。上部加藕節一錢。下部加地榆一錢。水煎服。

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡陰疽諸毒。以及脾胃便溼者。切勿搗服。忌麻子。蕎麥。

配合應用 ①疏解內臟癰塞。祛肺腎等污液。 ②治胃寒欬嗽。痰欬。溼喘等肺病。 ③用於分欬之胸病。治欬嗽肺傷勞欬。有殊效。用於肺癆。能除敗液。愈創瘍。加於和胸藥草。或為泡劑。或為煎劑。或為細末用之。或一味為泡劑。和砂糖或白蜜。使甘美易服。 ④乾欬勞嗽。用此藥浸葡萄酒。長服有效。加薑。失刺。養及洞。麩。尤佳。 ⑤熱病及勞瘵。血中有醋。腐毒。侵刺肺部。欬嗽。在奪不止。或肺癆。欬嗽。呼吸不利等。用後方為佳。此有同於香青 (Sage) 之功效。

能愈創瘡。涼解內熱。祛除汚液。且利大小便。奏殊效。

參攷資料 連錢草葉圓如錢。荊楚人謂之地錢草。徐僑藥草圖名曰連錢草。

【連錢草】即薄荷之古籍別名。與見天寶單方。詳「薄荷」條。即積雪草之古籍別名。與見本經。詳「積雪草」條。

【連輝辛】即辛子之古籍別名。與見新修本草圖經。詳「辛子」條。


【連翹】命名 本品實似蓮房。翹出衆草。故名。

【處方用名】淨連翹。殊連翹。連翹殼。連翹心。帶心連翹。團圓連翹。古醫別名 連。異翹。爾雅。旱蓮子。藥性。爾雅。吳普。三廉。竹根。別錄。根名連翹。傷寒論。折根。黃君。韋。連。大翹。連。草。爾雅。卑。蓮。度。厄。錢。連。異。翹。和漢藥考。

外國名詞 Forsythia viridissima, Vahl. (拉一)

基本 屬木犀科爲連翹之實。產地 陳仁山藥物生產辨云。連翹產河南恒慶府。湖北紫荊關。

臨陽府。山東。山西等處均有出產。八月初。



(一) 翹 連

形態 連翹爲落葉灌木。枝條作蔓狀。葉爲卵圓形複葉。由三葉而成。邊緣有鋸齒。花爲鮮黃色。四裂合瓣花冠。春月先葉而開。六七月間結黃褐色實。本品爲表面暗褐色短小之實。類玉椿實。有稍突起之黃赤色斑點。其成熟者。裂爲二房。中含大如粟粒之種子。有香氣。



(二) 翹 連

種類 大翹生下溼地。葉狹長如水蘇。花黃。結子似椿。實之未開者。作房翹出衆草也。小翹生原岡上。花實皆如大翹。而細小色黑耳。

採取 八月採之。

製法 凡使宜以黑而閉口者良。去蒂根用。

性質 苦。平。無毒。

效能 散諸經客熱。治癰腫疔毒。

主治 寒熱。鼠疫癘瘧。癰腫惡瘡。瘰癧。結熱。蠱毒。(本經)去白蟲。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論連翹曰。通利五淋。小便不通。除心家客熱。【宋】大明諸家本草論連翹曰。通小腸。排膿。治疔毒。止痛。通月經。【元】李東垣用藥法象論連翹曰。散諸經血結氣聚。消腫。【元】朱丹溪本草衍義補遺論連翹曰。瀉心火。除脾胃溼熱。治中部血證。以爲使。【元】王好古湯液本草論連翹曰。治耳聾。耳痛。耳癢。【明】樞希雍本草經疏論連翹曰。連翹本經雖云味苦平無毒。平應作辛。乃爲得之。潔古謂其性涼味苦。氣味俱薄。入手足少陽。手陽明經。亦入手少陰。心經。其主寒熱。鼠疫癘瘧。瘰癧。結熱者。以上來諸證。皆從足少陽。膽經氣證。有熱而

成。此藥正清膽經之熱。其輕揚芬芳之氣。又足以解足少陽之鬱氣。清其熱。散其鬱。不膠矣。癰腫惡瘡。無非營氣壅遏。衛氣鬱滯而成。夫清涼以除熱。芬芳輕揚以散鬱。則營衛通和。而癰腫消矣。蠱毒非熱非辛。則不成。熱解則蠱自消。溼熱盛則生蟲。清其熱。而苦能澀。蟲得苦即伏。故去白蟲。甄權用以通利五淋。小便不通。除心家客熱。日華子用以通小腸。排膿。治疔毒。止痛。通月經。東垣用以散諸經血結氣聚。消腫。丹溪用以瀉心火。除脾胃溼熱。及治中部血證。以爲使。海藏用以治氣秘。火炎之耳聾。一皆清熱散結。下氣燥溼之功也。【明】李士材本草圖解論連翹曰。連翹苦寒入心。瀉心火。破血結。散氣聚。消腫毒。利小便。諸瘡癰瘻。皆屬心火。連翹清心。遂爲瘡家要藥。治癰癤瘡瘍。有神。然久服有寒中之患。【清】黃宮繡本草求真論連翹曰。連翹味苦微寒。質輕而浮。香雖載瀉。六經鬱火。然其輕清氣浮。實爲瀉心要劑。心爲火主。心清則諸臟與之皆清矣。然溼熱不除。病

症百出。是以癰毒五淋。寒熱鼠瘻。瘰癧惡疔。熱結蟲毒等症。書載皆能以治。且經有言諸瘡疔毒。皆屬心火。連翹實為疔家聖藥也。然多用胃虛食少。脾胃不足者慎之。况清而無補。癰疽潰後勿服。火熱由於虛者忌投。〔清〕鄒樹本經疏證論連翹曰。虛子繇曰。本經所列連翹主治。合陰陽內外而言。誠開闔之樞鍵也。故主熱結在中為寒熱鼠瘻。瘰癧。其本在臟。其末在頰腋間也。若蟲毒則但沈於臟。癰疽癰腫則但浮於腑。成屬寒熱為病。因熱結為形證者也。其功力與夏枯草相等。但夏枯草偏於從本。寒水化令。故上微顛頂下及跌踵。連翹偏於從末。寒容平氣味。故外翹膚腠。內翹五中。至解邪熱結於心。理則一矣。連翹亦莖獨上。秋來結莖莖端。花後分瓣作房。中含黑子。乾則振之。皆落而不著莖。其房剖之即解。片片相比。氣甚清。富夫海暑之候。諸氣懈弛。血脈值消。懈弛者多顛頭。值消者易癰。疥。疔。鼠瘻。最善顛頭之所也。故鼠瘻癰瘰。氣多於血之候。恒生於頸腋平

十一 蠶 連

原曠蕩。尤善癰瘰之地也。故癰腫惡疔。血多於氣之候。恒生於背腹。及夫結為癰。漫為疔。又何莫非氣道炎。而顛頭癰。迨至涼。既動。萬象清明。庶類遂剝落粉紆。傾然改舊。故草凋於土。葉辭於樹。水涸於澗。與連翹之治寒熱鬱結。何以異哉。〔清〕賈九如辨藥指南論連翹曰。連翹氣味輕清。體浮性涼。浮可去實。涼可勝熱。總治三焦諸經之火。心肺居上。脾居中州。肝膽居下。一切血結氣聚。無不調達而通暢也。但連翹治血分功多。柴胡治氣分功多。同牛蒡子善療癰瘰。解毒尤不可缺。

近人學說 張山雷曰。連翹味苦。苦能清熱。形圓而尖。中空有房。狀似心。故專清心家之熱。此物理自然之性。非勉強附會之言也。又凡質輕而空鬆者。必有開泄宣通之作用。故亦能散結而泄化格脈之熱。本經治癰瘰癧腫。疔毒癰瘰。結熱蟲毒。固以諸痛痒瘡。皆屬於熱。而疏通之質。非特清熱。亦以散其結滯也。又心與小腸為表裏。故清心之品。皆通小腸。又能泄

膀胱。利小水。導下焦之溼熱。甄權謂其通利五淋小便不通。除心家客熱。日華謂其治瘡癰。排膿止痛。東垣謂其散諸經血結氣聚。消腫丹溪謂其清心火。除脾胃濕熱。石頑謂其輕清而浮。主治諸疔。為結者散之之義。繆仲醇謂經主癰瘰。癰瘰皆足少陽膽經氣鬱有熱。此藥輕揚清芳之氣。足以散其鬱而清其熱。海藏以主耳聾。亦氣火土壅之症也。又曰。近人有專用連翹心者。即其房中之質也。細而質輕。故任浮而專清上焦心肺之熱。較之其殼在外。亦能通行經絡。共用固自有別。然雖是心而亦不堅實。若是竟謂能清心家實火。亦殊未必。

配合應用 ①連翹得貝母。白芷。甘草。金銀花。玄參。薄荷。夏枯草。白芨。能消癰瘰。加牡蠣。人瓜。山豆根。蒲公英。消乳癰。乳癰。

②治癰瘰結核。連翹。脂麻等分為末。時時食之。(簡便方)

③治項邊馬刀。屬少陽經。用連翹二斤。粟麥一斤。大黃三兩。甘草半兩。每用一兩。以水一盞。煎七

分。食後熱服。十餘日後。灸隔泣穴二七壯。六十日決效。(張潔古活法機要方)

④治痔瘡腫痛。連翹煎湯薰洗。後以刀上飛過綠礬入麝香貼之。(集驗方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡陰虛內熱及癰毒已潰者禁用。

參攷資料 ①連翹之用有三。消心經客熱一也。去上焦諸熱二也。為疔家聖藥三也。(張元素) ②十二經濟藥中不可無此。乃結者散之之義。(李杲) ③手足少陽之藥。治瘡瘍癰瘰結核有神。與柴胡同功。但分氣血之異爾。與鼠黏子同用。治瘡瘍別有神功。(王好古) ④按爾雅云。連異翹則是本名。連又名異翹。人因合稱。為連翹矣。連翹亦作連君。即本經下品翹根是也。唐蘇恭新修本草。退入有名未用中。今并為一。連乃小翹。人以為體勝者。故同名。(李時珍) ⑤今近汴京及河中。江寧。潤。澤。兗。州。岳。利。諸州。南康軍皆有之。有大小二種。大翹生下溼地或山岡上。膏

一二四九

十一畫 連 途 郭 都 野

一二五〇

葉狹長如榆葉水蘇莖。莖赤色。高三四尺。獨莖梢間開花。黃色。秋結實似蓮。內作房瓣。根黃如蒿根。八月採房。其小翅生岡原之上。花葉實皆似大翅而細。南方生者。葉狹而小。莖短。纒高一二尺。花亦黃。實房黃黑。內含黑子如粟粒。亦名旱蓮。南人用花葉。今南方醫家說云。連翅有兩種。一種似椿實之未開者。發小星而外完。無茸。莖之則中解。氣甚芳烈。其實纒乾。振之皆落。不著莖也。一種乃如蒿莖。發柔。外有茸。莖抱之而無解脈。亦無香氣。乾之雖久。著莖不脫。此甚相異。此種江南下澤間極多。如椿實者。乃自蜀中來。入用勝似江南者。據本草則亦以蜀中為勝。然未見其莖葉也。(蘇頌) 治瘡熱。氣分用。連翅血分用柴胡。(劉潛江)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論連翅根曰。治傷寒熱。欲發黃。參攷資料 ①翅根氣味。神農雷公甘有毒。李當之苦。吳普。翅根氣味苦寒。(王好古) ②翅根生嵩高平澤。二月八月採。(本經) ③方藥不用。人無識者。(陶弘景) ④此即連翅根也。能下熱氣。故張仲景治傷寒發熱在裏。麻黃連翹赤小豆湯用之。注云。即連翅根也。(王好古)

主治 哮喘。對水煎服。即止。 郭公刺葉 主治 博天泡。瘡。搗細。油調搽之。 【郭公刺葉】 即蟹之古籍別名。典見揚雄方言。詳【蟹】條。 【都乙羅叱】 即桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳【桔梗】條。 【都念子】 即倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳【倒捻子】條。 【都草】 即百脈根之日本名。詳【百脈根】條。 【都梁香】 即草爾之古籍別名。典見李氏藥錄。詳【草爾】條。 【都淋藤】 即青木香之古籍別名。典見肘後方。詳【青木香】條。 【都羅木】 即天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳【天麻】條。 【野人】 即狒狒之古籍別名。典見綱目。詳【狒狒】條。

【連翅心】 即連翅中心之處方用名。詳【連翅】條。

【連翅莖根】 主治 心脾積熱。 【連翅莖葉】 主治 心脾積熱。 【連翅殼】 即連翅之處方用名。詳【連翅】條。

【野丈人】 形態 野丈人為雜草。花似木槿。有白毛。長寸餘。披下如白頭翁。可供藥用。 野丈人 即白頭翁之古籍別名。

【連翅根】 性質 甘寒。平。有小毒。 主治 下熱氣。益陰精。令人面悅。好明目。久服輕身耐老。(本經) 以作燕飲酒病人(別錄)

【郭公刺】 古籍別名 光骨刺。 基本 郭公刺為雜草之一種。其根可供藥用。葉詳見該條。

【野天冬】 即百部之處方用名。詳【百部】條。 【野天門冬】 即百部之古籍別名。典見綱目。詳【百部】條。 【野天麻】 即赤箭天麻之一種別名。詳【天麻】條。 ①益母草之古籍別名。典見本草會編。詳【益母草】條。



野山菊

【野山菊】 產地 南嶺山中多有之。 形態 叢生。花葉抱莖如苦蕒。而歧齒不尖。莖瘦無汁。梢端發枝。秋開花如寒菊。其根葉可供藥用。

【野天冬】 即百部之處方用名。詳【百部】條。 【野天門冬】 即百部之古籍別名。典見綱目。詳【百部】條。 【野天麻】 即赤箭天麻之一種別名。詳【天麻】條。 ①益母草之古籍別名。典見本草會編。詳【益母草】條。

【野毛豆】 古稱別名 勞豆。產地 生田陰園園同。

形態 野毛豆。爲菜類豆屬之一種。其莖葉與莢。較家種者爲細小。引蔓而生。枝細弱。葉細尖。兩兩排枝對生。初生苗時。絕似金鳳花之葉狀。清明後。開灰紫細花。結莢實如毛豆。又似角蕩。中有二子。圓小若菘豆。至小滿前後。則老黑枯落。採得可供藥用。

採取 立夏後採之。

性質 微寒。無毒。

主治 平肝火。能發汗。療目疾。小兒疳疾。黃白瀉。及肝疳初起。取鮮者同雞肝煮食。解痘毒。煨存性麻油調傳。

【野朮】 卽朮之野生而非由人工栽種者。入藥最良。參詳『白朮』條。

【野生薑】 卽黃精之古籍別名。典見本草蒙筌。詳『黃精』條。

見本草蒙筌。詳『黃精』條。

【野羊】 卽山羊之古籍別名。典見圖經本草。詳『山羊』條。

【野百合】 卽百合之處方用名。詳『百合』條。

【野老】 卽草薺之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『草薺』條。

【野延胡】 卽一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『一粒金丹』條。

【野赤豆】 卽赤小豆之處方用名。詳『赤小豆』條。


【野李】 卽李實之味苦者。性質功能較尋常李爲遜。參詳『李實』條。

【野杉】 卽榧實之古籍別名。典見綱目。詳『榧實』條。

【野芝麻】 卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【野芋】 卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【野芋芳】 基本 本品卽芋之野生者。或謂種芋三年不收。卽成野芋。



野芋

性質 滑。有大毒。

主治 跌打損傷。痔漏麻風。合麻藥用。消腫毒。止痛。療瘡癬。蛇傷。搗傳。婦人乳癰。和香糟搗傳。

參攷資料 野芋性滑。下石滯。服食皆忌。祇可外用。中共毒者。令人戰喉音啞。煩悶垂死。以大豆漿澆汁解之。澆汁亦可。(趙學敏)

【野芋頭】 形態 野芋頭爲野芋之一種。葉較小而略似茨菇。葉有尖端與草木形如鞋底者不同。亦可供藥用。

主治 諸物食積。已成痞塊。磨爛和糯米粉煮粥淡食之。

【野芍草】 基本 野芍草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 治痞滿用五斤。以一半安烏盆內。置雞子十箇在草上。以草一半蓋之。米醋浸二宿。雞子殼。乃取於飯上蒸熟。頓食之。塊漸消也。

【野豆】 卽野毛豆之簡稱。詳『野毛豆』條。

【野油花】 卽旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳『旋覆花』條。

【野油菊】 卽旋覆花之古籍別名。典見總微論。詳『旋覆花』條。

【野芥子】 卽苦菜之日本名。詳『苦菜』條。

【野金錢】 卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【野於朮】 卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【野狐絲】 卽菟絲子之古籍別名。典見綱目。詳『菟絲子』條。

【野狐鼻涕】 卽螻蛄之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『螻蛄』條。

【野孤鼻涕】 卽桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑螵蛸』條。

【野紅花】 卽大薊之古籍別名。典見綱目。詳『大薊』條。

【野胡蘿蔔】 係胡蘿蔔之一種。其莖葉花實。皆與胡蘿蔔同。惟根細小。味甘。生食熟食皆宜。性質功能。與胡蘿蔔無異。參見『胡蘿蔔』條。

【野首蓓】 卽首蓓之野生者。詳『首蓓』條。

【野苗】 卽何首烏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『何首烏』條。

【野茄】 卽蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳子』條。

【野芋】 卽芋麻之古籍別名。典見綱目。詳『芋麻』條。

【野芋麻】 古籍別名 天青地白。草川綿葱。銀葶。天

名精(綱目拾遺)

產地 山麓溪澗河壑岸旁土
隙間多有產之。

形態 野苧麻爲蕨類之一種。
形狀頗似地菘。立春後生苗。長約
尺許。葉圓而尖如卵形。結子細碎。
根肥白無筋。搗之有滑涎。可供藥
用。

性質 甘涼無毒。

效能 發散風毒。活血。止血。消
渴。安胎。

主治 小兒丹毒。蠱脹崩淋。哮喘
白濁。疥瘡發背。跌撲折傷。蟲螫
蛇傷。

配合應用 ①教師白字亮傳。

大鯽魚一尾。獨核肥皂一個。胡椒
七粒。黃梔子九個。老薑一片。蔥頭
三個。野苧麻根一段。乾麵一搥。香
糟一團。紹酒隨數用。同前藥合搗
如泥。炒熱熨敷患處。外用布包紮。
緊次日青出即愈(跌打閃挫方)。
②徐若寧云。看咬傷處。有竅是
雄蛇。無竅是雌蛇。以針挑破傷處
成竅。然後取野苧麻嫩頭搗汁。和
酒服三盞。絞刺渣數傷口。能令毒
從竅中出。立愈。將渣焚去。永不復

發(趙想軒蛇蝎咬傷方)

③治癩疽發背對口一切無名
腫毒。野苧麻搗汁用無灰酒沖下。
渣敷患處。錢頭蓋被出汗。即出膿
水全愈(一切腫毒方)。

④日取野苧葉陰乾。曬燥搗熟。
取白絨收。夏月遇有金刃傷者。
敷之即止血。且不作膿。(救生苦
海方)

古籍別名 龍鬚草。

產地 多生山澤水旁間。

形態 野苧草爲澤草類之一
種。較苧草稍細而短。清明後生苗。
小滿時開花細小。其根類似竹根
而黑色。可供藥用。

主治 利溼熱。治纏淋精濁。崩
中溼痺。鼻衄疔腫。明目。疥瘡。口咽
諸毒。火症。鶴膝風。齒牙疼痛。欲脫
者煎飲之。

野烏頭 卽草烏頭野生者之別
名。典見綱目。詳草烏頭條。

野脂麻 卽玄參之古籍別名。典
見綱目。詳玄參條。

野茴香 卽馬薺之古籍別名。典
見綱目。詳馬薺條。

產地 出甘肅及遼東
山野中。

形態 野馬爲獸類野馬類之
一種。其形似馬而小。皮可爲裘。肉
可供藥用。其陰莖詳見該條。

性質 甘平無毒。

主治 人病馬癩。筋脈不能自
收。周痺。肌肉不仁。用肉一斤。豉汁
煮熟。入五味葱白。作醃臘及羹粥
類食之。白煮亦可。

野馬陰莖 性質 酸。鹹。溫。
無毒。

主治 男子陰痿。少精。

野馬蘭 命名 本品功同馬
蘭。因其野生。故名。

形態 野馬蘭係蘭之一種。形
似馬蘭。惟馬蘭氣味芳香。可佐蔬
食。此則氣臭味劣。不堪供食。三月
發苗。莖赤而粗。秋開白花。成簇細
碎。莖葉俱入藥用。

採取 三四月採。陰乾。

性質 寒涼。

效能 清血。
主治 溼熱蛇咬。小兒瘡疔。

野甜瓜 卽王瓜之古籍別名。典
見綱目。詳王瓜條。

野甜菜 卽車前草之古籍別名。
典見和漢藥考。詳車前草條。

野苧薺 產地 生山野土中。

形態 野苧薺爲葎
薺之一種。春日生苗。葉三出似韭
而細。葉上有光。根如豆。大。年久則
愈大。性喜燥。其生必在高原。若移
植園圃。一經汗溼。根即朽爛。而其
生亦不易長。雖至百年。猶如錢大。
其根可供藥用。

製法 採得勝粉。水中濾過。曬
乾用。

主治 去目星。怒肉。面黧。斑痣。
消痞。

配合應用 ①磨光散。點眼神
藥。用野苧薺粉洗淨。去皮。石臼搗
爛。密絹絞汁。如做藕粉法。再用清
井水飛。曬乾。煅。甘石用黃連。黃柏。
黃芩。甘菊。薄荷。煎水。煨。更用童便
煨一次。將藥水飛。曬乾。珍珠入豆
腐內。煨過。研細水飛。每葎薺乾粉
一兩。配製過。甘石五錢。珠末三錢。
各將磁瓶收貯。臨用。漸漸配和。加
冰片少許點之。(種福堂方)

②錦紋大黃一兩。北細辛四兩。
將二味用上高泉水一百二十兩。

將藥入砂鍋煎至二十兩。以細絹濾去渣。用大銀碗一個。盛藥碗下。以磚三塊。放定碗底。將燈注注麻油。用燈草七根。燃燈煮碗底。內煎藥成膏。滴水成珠。每膏一兩。用野苧粉五錢。多些亦不妨。冰片三分。和勻作錠。如多年厚腎。每兩加水飛過。蠟退末五分。須要去頭。足泥沙。水洗曬乾。爲末。水飛三次。用(明目去翳秘方)又方。野苧粉。猪屎各等分。搗和。用雞子殼半個。放藥在內。臨臥合印堂上。俟水流入目中。腎隨淚出。二十日即愈。并治田螺頭眼。

配合宜忌 忌鐵器。

參攷資料 野苧蕪較產池澤者力尤峻利。故點眼。去翳障如神。(趙學敏)

【野苧】係苧之野生者。柔莖細葉。生卽結子。作菜食。味比家苧更勝。性質功能。與苧菜同。參詳「苧」條。【野麥】卽雀麥之古籍別名。與見綱目。詳「雀麥」條。

【野梨】●卽棠梨之古籍別名。與見綱目。詳「棠梨」條。●卽鹿梨之古籍別名。與見綱目。詳「鹿梨」條。

【野椒】卽崖椒之古籍別名。與見綱目。詳「崖椒」條。

【野苧】卽苧茅之別名。苧茅係白茅之一種。性質功能。參詳「白茅」條。

【野菊】卽野菊花之處方用名。詳「野菊花」條。

【野菊花】 命名 本品自生於原野。而形似菊。故名。 處方用名 野菊。野黃菊。黃菊。

古醫別名 苦苾。(綱目)油菊。(日本)

外國名詞 Chrysanthemum. indicum, L. (拉丁)アブラキク(日本)

產地 多在山野平原間。



(一) 花 菊 野

形態 野菊爲溫草類之多年生草本。莖多分枝。高三四尺。葉與

菊相似。但花較小。其葉有深缺刻。及細鋸齒等。則與菊不同。晚秋。枝梢開花。作頭狀花序。花黃色。外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。其舌狀花冠。較花柱長數倍。果實無冠毛。其花莖莖根。俱可供藥用。



(二) 花 菊 野

性質 苦。辛。溫。有小毒。

主治 調中止洩。破血。婦人腹內宿血宜之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論野菊花曰。治癰腫疔毒。癩瘰眼。【清】黃宮繡本草求真論野菊花曰。野菊花一名苦苾。爲外科癰腫藥也。其味辛而且苦。大能散火散氣。故凡癰毒疔腫癩瘰。眼目熱痛。婦人瘀血等症。無不得此則治。以辛能散氣。苦能散火者是也。但胃氣虛弱。切勿妄投。

近人學說 祝天一曰。菊種衆多。種類顏色各殊。多瓣者供人玩賞。單瓣者俗名滿天星。雖列爲菊之點綴。人多賤之。又有九月間挺秀於籬邊水溪之間。開黃花大如鵝眼者。名野菊。野者謂其生於原野。不受人工之栽培。而榮枯於自然也。古之菊本無家野。花部黃色。晉陶潛傷時世之不淑。棄官歸隱。見籬畔黃菊。芳香孤立。不畏嚴霜。不伍衆草。慨然自比。爲之移植三徑。後人有慕逸士之風。爲蒔之於園圃。加以剪移灌漑。接植諸法。於是菊之變種百出。各呈其秀。以媚主人。菊性亦遷矣。維單瓣黃菊。猶存其舊。故入藥取單瓣菊良。李時珍本草綱目。混苦苾爲野菊。殊矣。苦苾生澤畔間。花葉莖一如萵苣。故鄉人呼爲野萵苣。四五月至八九月。開黃花。形似單瓣菊。氣味辛香。揉之作蒿氣。不若菊之沁芳悅人也。味辛苦而澀。咀之令人作嘔。不若菊之辛芳快胃也。苦苾蒿屬也。非菊類也。前人誤指爲野菊。果非。而時珍竟混其名者。更不當也。

參攷資料 ●野菊花生於山野間者。味苦莖青。服之大傷胃氣。

【朱熹亨】◎慈乃蓮子之心。此物味苦似之。故與之同名。(李時珍)
◎苦慈生於澤畔。莖如馬蘭。花如菊。菊甘而慈苦。語曰。苦如慈是也。(陳藏器)◎苦慈原野極多。與菊無異。但葉薄小而多尖。花小而莖多如蓬窠狀。氣味苦辛慘烈。(李時珍)

【野菊根】 主治 善利水。通癰。閉。搗汁和酒服。癰。癰未破。搗爛酒煎服。白消白漬。

【野菊根葉】 主治 癰腫疔毒。為外科要藥。

【配合應用】 治療癰未破。用野菊花根煎酒熱服。以渣敷貼自消。(經驗方)

◎治癰腫疔毒。用野菊花連根帶葉搗爛。煎酒熱服取汗。以渣敷貼。或用蒼耳同入。(孫氏治毒方)

【野葵】 即野蘿蔔之原名。詳『野蘿蔔』條。

【野葵】 即鴉之別名。典見動物學大辭典。詳『鴉』條。
【野圓莖】 即石胡荽之古籍別名。典見綱目。詳『石胡荽』條。
【野黃菊】 即野菊花之處方用名。

詳『野菊花』條。

【野黃楊】 即接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【野荳花】 即射干之古籍別名。典見綱目。詳『射干』條。

【野葛】 即鈎吻之古籍別名。典見本經。詳『鈎吻』條。

【野葡萄】 即菓頁之俗名。詳『菓頁』條。

【野葱】 即沙葱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙葱』條。

【野葵】 即紫給之古籍別名。典見別錄。詳『紫給』條。

【野落蘇】 即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【野慈姑】 即澤瀉之古籍別名。典見綱目。詳『澤瀉』條。

【野槐】 即苦參之古籍別名。典見綱目。詳『苦參』條。

【野蒜】 即山蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山蒜』條。

【野管根】 即白茅根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白茅根』條。

【野綠豆】 即鹿藿之古籍別名。典見綱目。詳『鹿藿』條。

【野麥】 即知母之古籍別名。典見綱目。詳『知母』條。

別錄。詳『知母』條。

【野澄】 即蕩之結實最小角形極鉅者。性質功能較尋常蕩為遜。詳『蕩』條。

【野蘆】 即蘆之俗名。詳『蘆』條。

【野豌豆】 即蕒之古籍別名。典見綱目。詳『蕒』條。

【野蕎麥】 即金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草秘。詳『金鎖銀開』條。

【野豬】 命名 本品即豬之野生者故名。

外國名詞 Sus Ionomiyataki Tomm. (Wild boar) (拉丁) イノシシ 或 井ノシシ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類不反芻偶蹄類野豬科。

產地 出山林中。原野亦有之。

形態 野豬為獸類家畜豬之原種。其體肥大而強壯。前部尤健。頭部為楔狀。頸部不顯。不能回頭。面部長吻。端有鼻孔。耳短小直立。能動齒有門犬臼三種。大牙甚發達。在上顎者向下鈎曲。在下顎者更長為圓錐形。皆突出於外。全體

被黑色粗毛。堅硬如針。四肢短。各有四趾。尾短小。生叢毛。體長四五尺。晝伏。夜出覓食。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 癩癩。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論野豬肉曰。炙食治腸風。瀉血。不過十頓。

參攷資料 野豬肉微動風。(寇宗奭) 野豬肉不發病。即減藥力。與家豬肉不同。但青蹄者不可食。微動風。(孟詵) 野豬處深山中有之。惟關西者。時或有黃。其形似豬而大。牙出口外。如象牙。其肉有至二三百斤者。能與虎鬪。或云能掠松脂。曳沙泥。塗身以禦矢也。最害田稼。亦啖蛇虺。凡服巴豆藥者。忌之。(李時珍)

【野豬皮】 主治 燒灰。塗鼠瘻。惡瘡。

【野豬外腎】 原名 野豬陰卵。主治 連皮燒存性。研米飲服。治腸中帶下。及腸風瀉血血痢。

【野豬尾】 產地 生山野間。形態 野豬尾爲蔓草類。蔓之一種。莖纏木上。四時不凋。有葉無花。莖根可供藥用。性質 苦。清涼。無毒。

主治 心氣痛。解熱毒。同百藥頭等分焙研爲末。每酒服二錢。

【野豬脂】 採取 臘月採煉。服之。

主治 鍊淨和酒日三服。令婦人多乳。十日後。可供三四兒。素無乳者亦下。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論野豬脂曰。悅色。除風腫毒。治疥癬。

【野豬陰卵】 卽野豬外腎之原名。詳【野豬外腎】條。

【野豬黃】 性質 甘。平。無毒。主治 金瘡止血。生肉。滋癩瘡。水研如棗核許。服之日二服效。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論野豬黃曰。研水服。治血痢。注病。【宋】日華諸家本草論野豬黃曰。治惡毒。鼠。小兒肝氣。容竹天甲。

【野豬齒】 主治 燒灰水服。治蛇咬毒。

【野豬頭骨】 主治 邪瘧。及積年下血。

【野豬膽】 主治 惡熱。毒氣。歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論野豬膽曰。治鬼注。癩癩。小兒諸疳。水研棗裹服。

【野靛青】 古籍別名 靛青。形態 如菟菜。葉尖中心有青點。

主治 結熱黃疸。定瘡毒疼痛。生肌長肉。

【野貓】 卽貓程之古籍別名。典見綱目。詳【貓程】條。


【野鴨】 卽鳧之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳【鳧】條。

【野樸】 卽厚樸之處方用名。詳【厚樸】條。


【野薔薇】 命名 本品爲薔薇之野生者。故名。古籍別名 石珊瑚。

產地 山野及溪落間有之。形態 野薔薇爲薔薇類之一種。其葉細而花小。莖本蔓生多刺。

花有粉紅純白純紅等色。皆單瓣。氣香而甜。似玫瑰。其花可供藥用。根。枝。子。花。露。詳見各該條。



(一) 野薔薇



(二) 野薔薇

主治 瘧疾以白色含蕊者持茶煎服。又治婦人經結吐血。

參攷資料 薔薇花香烈。大耗真氣。虛人忌之。(綱目拾遺)

【野薔薇子】 主治 產後輟癩。

【野薔薇枝】 主治 婦人禿髮。以嫩枝同猴煎汁刷之。

【野薔薇花露】 基本 本品卽用野薔薇花蒸取之露。

主治 散風熱。利溼濁。醒胃悅脾。療口疳口糜。止消渴牙痛。並治腫毒疥癬。

【野薔薇根】 主治 肺癆吐痰。煎酒煎服。口瘡煎湯漱之。

【野蠔蛎】 卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蝸牛】條。

【野鴿】 形態 係鴿之原種。全體毛色較尋常家鴿稍爲暗褐。惟背之中央爲灰白。頸及胸有紫綠色之光澤。築巢於山野森林之中。出食用禾。爲農家之害鳥。

效能 性質功能較家鴿略遜。參詳【鴿】條。

【野雞斑】 卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳【杉材】條。

【野雞】 卽雉之古籍別名。典見綱目。詳【雉】條。

【野雞冠子】 卽青箱子之古籍別名。典見綱目。詳【青箱子】條。

【野雞頭子】 卽青箱子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【青箱子】條。

【野薔】 卽鳧之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳【鳧】條。

十一畫 野 釣 欵 陰

【野蕨蕒】即蕨參之古籍別名。與見蕨參新研究。詳「蕨參」條。

【野蘭】即蘭蕒之古籍別名。與見本經。詳「蘭蕒」條。

【野蘭根】形態 野蘭爲石草類之一種。高二尺有餘。四時有葉無花。其根可供藥用。

性質 微苦。溫。無毒。
主治 功同崖櫻根。

【野蘿藦】原命 野萊菔。古籍別名 紫金皮。巴壁虎。山蘿藦(綱目拾遺)。

形態 野蘿藦爲萊菔之一種。苗葉根形與家種者無異。惟肉雖白。而皮則帶黃爲不同。其根可供藥用。



野 蘿 藦

性質 寒。無毒。
主治 肺癆搗汁服。並療癰疽。渣傳亦可。

【野蠶豆】即翅搖之古籍別名。與見綱目。詳「翅搖」條。

【釣樟】即烏樟之原名。詳「烏樟」條。

【釣蕪】即王瓜之古籍別名。與見和漢藥考。詳「王瓜」條。

【釣藤鈎】即鈎藤之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鈎藤」條。

【欵子股】命名 石斛名金欵。花本品狀似之。故名。古籍別名 金欵股。棒蘭。(海藥)三十根(綱目)。

外國名詞 *Lulnia toosa* (拉丁) *ボウラン マツラ* (日本)

基本 係蘭科欵子股屬。爲 *Ophidocera* 之根。產地 凡熱帶地方川粵諸省之山野均有出。

形態 欵子股爲山草類之寄生老樹上常綠草本。莖高至尺餘。葉形如箭。夏月葉腋開花。淡黃綠色。有暗紅色之斑點。其根每莖有三四十根。形如細辛。採得可供藥用。

性質 苦。平。無毒。
主治 解毒癰疽神驗。以水煎服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論欵子股曰。解諸藥毒。煮汁服。亦生研。更烈。必大吐下。如無毒。亦吐去熱痰。瘡癤。天行瘟疫。喉痺。

參攷資料 ①忠州。萬州者亦佳。草莖功力相似。綠嶺南多毒。家家貯之。(李珣) ②按嶺表錄云。嶺中多蠶毒。彼人以草藥金欵股治之。十救七八。其狀如石斛也。又忍冬藤解毒。亦號金欵股。與此同名云。(李時珍)

【陰土鹽】即戎鹽之古籍別名。與見綱目。詳「戎鹽」條。

【陰地蕨】古籍別名 花蕨。(植物學大辭典) 外國名詞 *Botrychium bot* (Latin, Sw. (拉丁) *ハナワラ* *ヒフコノハナワラビ* *フコワ* *ラビ* *ヒカゲワラビ* *トコワ* *ラビ* (日本)

基本 係瓶附小草科。爲陰地蕨屬之根苗。產地 多產山野間。

形態 陰地蕨爲溼草類之多。年宿根草本。高五六寸。葉數回羽

一二五六

狀分裂。呈黃綠色。每一葉則抽一穗。着生多數之子囊。根如細辛。苗與葉俱可供藥用。

性質 甘。苦。微寒。無毒。
主治 腫毒風熱。

參攷資料 ①生鄂州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。莖青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月採根用。(蘇頌) ②江浙亦有之。外家採制丹砂硫黃。(李時珍) ③男女吐血後。胸膈虛熱。陰地蕨。紫荷車。貫衆。甘草各半兩。水煎服。每服三錢。(聖濟總錄方)

【陰成】即菊花之古籍別名。與見別錄。詳「菊花」條。

【陰成砂】即砂砂之古籍別名。與見雷公炮炙論。詳「砂砂」條。

【陰浴】即雞溼之古籍別名。與見別錄。詳「雞溼」條。

【陰飛】即姑獲鳥之古籍別名。與見玄中記。詳「姑獲鳥」條。

【陰陽水】即生熱水之古籍別名。與見綱目。詳「生熱水」條。

【陰陽草】即真珠草之古籍別名。與見綱目遺拾。詳「真珠草」條。

【陰精石】即玄精石之古籍別

名。典見綱目。詳『玄精石』條。①即

苦蔭石之古籍別名。典見綱目。詳

『苦蔭石』條。

【陰諧】即雄鳩之別名。典見綱目。

詳『鳩』條。

【陰龍膏】即豬脂之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『豬脂』條。

【陰獸當門】即牛膽之古籍別名。

典見和漢別考。詳『牛膽』條。

【陰蕪】即蓬蘽之古籍別名。典見

別錄。詳『蓬蘽』條。

【陳小麥】即小麥之處方用名。詳

『小麥』條。

【陳火腿骨】

性質 鹹寒。

效能 祛熱蕩

積。

主治 諸痢。腸辟。霍亂。宿積。

配合應用 ①治食積及痢。取

本品煨黑研用。(百草鏡方)

②治諸痢。用陳火腿骨二根。炭

火煨灰。篩過。加上白糖一兩。米湯

飲。或滾水或酒調服。無不效。(救

生苦海方)

③治赤白痢。用陳火腿骨灰。陳

皮。炙草各一兩。爲末。蜜丸。如菉豆

大空心服一錢。白痢用煎。赤痢用

白湯送下。

④又用生火腿骨。焙燥研極細

末。無灰酒送下。即止。(神錦方)

⑤用陳火腿骨煨灰六兩。飯鍋

巴煨灰五兩。砂仁炒三兩。南山查

炒五兩。共爲末。每服三錢。久痢人

參湯下。紅痢紅糖湯下。白痢白糖

湯下。黃痢炒焦白朮三錢。煎湯服。

霍亂吐瀉。養香湯下。(集驗方)

⑥治噤口痢。火腿骨煨一兩。蓮

肉二兩。木香七錢。烏梅三錢。醋糊

爲丸。桐子大。每服七丸。蠶絲湯下。

(筆珠萃方)

⑦陳年火腿骨。煨黑色。研末三

錢。用火肉一斤煮熟。去汁上肥油。

取清湯一碗。又將此末送下。(不

藥良方)

典見新中藥。詳『橙皮』條。

【陳平珍果】即胡桃之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【陳米】即陳粟米之處方用名。詳

『陳粟米』條。

【陳艾絨】即艾葉之處方用名。詳

『艾葉』條。

【陳阿膠】即阿膠陳久者之處方

用名。詳『阿膠』條。

【陳芫花】即芫花之處方用名。詳

『芫花』條。

【陳知白】即何首烏之古籍別名。

典見開寶本草。詳『何首烏』條。

【陳青黛】即青黛之處方用名。詳

『青黛』條。

【陳思炭】

古藥別名 石黃香。

藥本草論陳思炭曰。祛風。補益。輕

身。酒浸服。

【陳家白藥】

形體 陳家白

藥爲莖草類之

一種。相傳謂蒼梧。爲陳家所植。莖

似土瓜。葉如錢。其根似防己。可供

藥用。

採取 以緊小者良。

性質 苦寒。無毒。

主治 解諸藥毒。水研服必吐。

未盡再服。並去心胸煩熱。天行痘

瘰。

參攷資料 ①陳家白藥。與婆

羅門白藥。及赤藥功用相似。(陳

藏器) ②陳家白藥。善解毒。爲諸

藥所不及。(李時珍)

【陳香薷】即香薷之處方用名。詳

『香薷』條。

【陳枳殼】即枳殼之處方用名。詳

『枳殼』條。

【陳枳實】即枳實之處方用名。詳

『枳實』條。

【陳倉米】即陳粟米之原名。詳『

陳粟米』條。

【陳黃肉】即山茱萸之處方用名。

詳『山茱萸』條。

【陳皮】即橘皮之處方用名。詳『

橘皮』條。②即橙皮之古籍別名。

陳

十一畫 陰

陳

一二五七

【陳棗核仁】

性實 燥之。苦平無毒。

主治 腹痛邪氣。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食

療本草論陳棗核仁曰。惡氣。卒疰。作。【明】李時珍本草綱目論陳棗核仁曰。核燒研。搽。瘰癧。良。

參攷資料 按劉根別傳云。道

士陳孜如狗人。江夏袁仲陽敬事

之。故曰。今春當有疾。可服棗核申

仁二十七枚。後果大病。服之而愈。

又云。常服棗核。百邪不復干也。仲

陽服之有效。則棗果有治邪之說

矣。又道書云。常含棗核治氣。令口

行津液。嚙之佳。謝承後漢書亦云。

孟節能含棗核不食。可至十年也。

此皆藉棗以生津受氣而嚙之。又

能達黃宮以交離坎之義耳。（李

時珍）

【陳黃殼】即蠶盧之處方用名。詳

【蠶盧】條。

【陳蠶】即蠶之處方用名。詳【蠶】

條。

【陳麻皮】即榜皮之處方用名。詳

【榜皮】條。

【陳榜皮】即榜皮之處方用名。詳

【榜皮】條。

【陳原米】

原名 陳倉米。本品係梗米

久入倉中而又陳赤者。故名。

處方用名 陳米。

古籍別名 老米。火米。紅粟。（

綱目）

外國名詞 Old rice. (英)

基本 係貯藏倉中十年以上

之梗米。

形態 陳倉米為入倉之梗米。

北人有用粟者。陳久則氣味變而

色亦不潔澤。與新米大相懸殊。

製法 生研或微炒用。

性質 酸。溫。無毒。

效能 補脾胃。止洩痢。

主治 下氣。除煩渴。調胃止洩。

歷代記載攷證 【唐】陳士良

食性本草論陳倉米曰。暖脾胃。去

氣。宜作湯食。【唐】孟詵食療本草

論陳倉米曰。炊飯食。止痢。補中。益

氣。堅筋骨。適血脈。起腸道。以飯和

酢。搗封毒腫。惡瘡立瘥。北人以飯

置甕中。水浸令酸食之。暖五臟。六

腑之氣。研米服。去卒心瘡。【宋】大

明日華諸家本草論陳倉米曰。補

五臟。潤腸胃。【明】李時珍本草綱

目論陳倉米曰。調腸胃。利小便。止

渴除熱。【清】黃宮繡本草求真論

陳倉米曰。陳倉米即米多年陳積

於倉而未用者也。凡米存積未久。

則性仍在。未革。煮汁則膠黏不爽。

食亦滯滯不消。至於熱病將愈。胃

氣未復。猶忌食物。熱與食。選

而煩以生。必得沖淡甘平。以為調

劑。則胃乃通。陳米津液既枯。氣味

亦變。服之。正能養胃。除熱祛煩。是

以古人裁此。既有煮汁養胃之功。

復有祛滯除煩之力。一切惡瘡。百

藥不效者。用此作飯成團。火煨存

性。麻油膩粉調敷。可知沖淡和平。

力雖稍遜。而功則大。未可忽也。若

無病之時用此。日為飽飯。則又未

見其克合也。【清】學原食鑑本草

論陳倉米曰。寬中消食。多食易饑。

【清】楊時泰本草述鈞元論陳倉

米曰。陳粟米氣味俱盡。遠歸於淡。

淡能滲滯。為五味主。可以養胃氣。

且化滯熱。又可以裕脾陰。方書主

治瀉利居多。以下多則亡陰。而茲

味不越於養脾胃之陰而已。如治

吐利後大渴不止。因於脾胃之陰

氣發稔矣。至如倉粟湯主療痢下

噤口。此因胃氣虛而熱乘之。故用

麥。乃以羌獨柴胡升遠其胃氣。

并散其毒氣。必入陳倉米以養脾

陰。使不為熱毒所并也。又如滑瀉

豆蔻飲。用陳米為君。而肉蔻五味

赤脂止中。之。又如脾胃氣弱。受寒

注瀉。水穀不分。或冷熱不調。下利

膿血。更如魚腦。腸滑下數。腹痛脹

滿。方用木香。肉蔻。粟殼。薑。甘補脾

胃正氣而固滑。卻必入陳米過倍。

以大養陰氣。始能奏功。至於桃花

湯。治霍亂後熱結下焦。下利膿血。

既用赤脂烏梅。化血分之邪。而收

脫。仍以白朮炮薑。升陽正脾胃之

氣。亦必佐以陳米。合於桐仁養脾

胃之陰。而散其留熱。不令其下結

也。合觀數證之用。豈得泛然止言

其養胃哉。

國外學說 日本明治二十五

年東京衛生試驗所。以村井純之

助氏為主任。試驗陳米。公表其成

績。陳久之米。除香味。色澤發生變

化外。並稍減少脂肪。但其他成分

則與新米似無大差。陳米米質之

變化。甚為顯著。脂肪之減少亦甚。

黃成之飯。少黏力。味淡白。易消化。恐非由糊精增加所致云。又和漢藥考曰。將寒製餅貯藏水中。(時時換水)謂之水餅。患痢疾時。食之有奇效云。又東京市淺草區須賀町之須賀神社。每年大祭。製有小團子。置竹篾。供神前。後分配於市民。夏日有吐瀉者。麥晒乾之。笠園子食之則愈云。此等物之功效。或與陳粟米相同云。

配合應用 治霍亂大渴能殺人。以黃倉米三升。水一斗。煮汁澄清飲良。(永類鈴方)

治反胃腸氣不下食者。大倉用倉米或白米。日西時以水微拌溼。自想日氣如在米中。次日晒乾。袋盛掛風處。每以一撮。水煎和汁飲之。即時便下。又方。陳倉米炊飯。磨研。每五兩入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。(普濟方)

治諸積聚。太倉丸。治脾胃虛飽。不時生病。及諸般積聚。百物所傷。陳倉米四兩。以巴豆二十一粒。去皮同炒。至米香豆黑。勿令米焦。擇去豆不用。入去白橘皮四兩。爲末。糊丸。梧子大。每飯湯服五丸。日

二服。(百一選方)

治暑月吐瀉。陳倉米二升。麥芽四兩。黃連四兩。切同蒸熟。焙研爲末。水丸。梧子大。每服百丸。白湯送下。

用量 三錢至五錢。

參攷資料 具原益軒翁有用新米變陳米法。法將粳米浸水一日取出。晒一日。如是七八次。則成陳米云。陳倉米煮汁不淨。初時氣味俱盡。故沖淡可以養胃。古人多以煮汁煎藥。亦取其調腸胃利小便去溼熱之功也。千金方治洞注下利。炒此米研末飲服者。亦取此義。日華子謂其潤腸胃。寇氏謂其冷利。皆非中論(李時珍)有屋曰。陳倉米。皆官積也。方曰倉。圓曰困。皆私積也。老亦陳也。火米有三。有火蒸治成者。有火燒治成者。又有畚田火米。與此不同。(李時珍)

陳廩米即粳米久入倉陳赤者。以廩草人故曰廩爾。方中多用之。人以作醋。勝於新粳米也。(陶弘景) 陳米北人多用粟。南人多用粳及稻。並水浸蒸晒爲之。亦有火燒過治成者。入倉陳久

皆氣過色變。故古人謂之紅粟。紅廩。陳陳相因也。(李時珍) 朱公

米。南中紀開。靖州南二十里飛山碧。相傳爲元末朱都督屯兵之所。精礫時有米粒色微黑而不腐。云是朱公所遺兵糧。游客謁神祠取輒得之。至今尙存。療脾疾。(趙學敏)

陳麩 即神麩之俗名。詳「神麩」條。

陳磨星 即天南星之處方用名。詳「天南星」條。

陵石 基本 陵石爲石類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 益氣耐寒。久服輕身長年。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論陵石曰。治汗後耳聾。取有竅如銀眼者。爲末冷水服。

【陵石】即路石之古籍別名。典見別錄。詳「路石」條。

【陵石花】即凌霄花之古籍別名。典見本經。詳「凌霄花」條。

【陵耶】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【陵時花】即凌霄花之古籍別名。典見山海經。詳「凌霄花」條。

【陵馬】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

【陵湯】即赤舉之古籍別名。典見別錄。詳「赤舉」條。

【陵游】即龍磨之古籍別名。典見本經。詳「龍磨」條。

【陵澤】即甘遂之古籍別名。典見別錄。詳「甘遂」條。

【陵龜】即鱉龜之古籍別名。典見郭璞賦。詳「鱉龜」條。

【陵蕪】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳「甘遂」條。

【陵鯉甲】即穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「穿山甲」條。

【陵蝮】即蝮蛇之古籍別名。典見本經。詳「蝮蛇」條。

【陵蕪】即蓬蕪之古籍別名。典見別錄。詳「蓬蕪」條。即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【陸荊子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【陸續丸】即蔓荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蔓荊子」條。

十一畫 陸 雀

【陸虎遺生】即龍骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍骨」條。

【陸英】古籍別名。華草。(別錄)榮(不榮而實者)秀榮(榮而不實者)英(爾雅)

基本 係忍冬科接骨木屬。為陸英之根葉。陸地 熊耳川谷。及宛句諸田野間均有出之。

形態 陸英為鼠草類之一種。春生莖有節節間生枝。葉大似水芹。花形如葫蘆。園中植者。莖高大而色赤。立秋前後採其枝葉。可供藥用。

性質 苦寒。無毒。效能 除煩解悶。降濁開鬱。利尿消腫。祛溼療風。

主治 骨間諸痺。四肢拘攣。膝寒酸痛。陰痿脚腫。短氣不足。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論陸英曰。陸英能解風毒。及脚氣上衝。心煩悶絕。水氣虛腫。風瘙皮肌。惡痒等症。煎湯入少酒浴之妙。

參攷資料 陸英即蒟蒻也。古方無誤。謹惟昔陸英後人不諳。

一二六〇

頂及頸。都為胡橘色兼褐色。頭之兩旁白色。中央有大黑斑。背面概褐色。多黑褐斑。下面除喉部黑色。外。概灰色。翼茶綠有黑斑。每足四趾。前三後一。能跳行地上。體長二三寸。性狡猾。所產之卵有花斑。其肉可供藥用。

命名 雀字從小從隹。隹音錐。短尾也。蓋謂短尾小鳥。故名。


古籍別名 瓦雀。賓雀。老而有斑紋者名麻雀。小而黃口者名黃雀。嘉賓(綱目)

外國名稱 Passer mon-tanus Linn(拉丁) Sparrow 或 Tree-sparrow (英) Sperring (德)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。

產地 穴居樹洞。及屋簷瓦隙間。處處有之。

形態 雀為原禽類鳥屬之一種。頭圓尾短。嘴為圓錐狀。色黑。頭



雀

頂及頸。都為胡橘色兼褐色。頭之兩旁白色。中央有大黑斑。背面概褐色。多黑褐斑。下面除喉部黑色。外。概灰色。翼茶綠有黑斑。每足四趾。前三後一。能跳行地上。體長二三寸。性狡猾。所產之卵有花斑。其肉可供藥用。

今人取雀肉。和蛇牀子熬膏。和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起於唐世。云明皇常服之有驗。(蘇頌) 聖濟總錄治虛寒雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏。亦祖此意也。(李時珍) 雀肉不可合李食。及與諸肝食。妊婦食雀肉飲酒。令子多淫。食雀肉豆醬。令子面黧。凡服白朮人忌之。(陶弘景)

採取 五月採之。性質 酸溫。無毒。主治 下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雀卵曰。和天雄菟絲子末。為丸。空心酒下。五丸。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。除疝瘕。

參攷資料 雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰。(陶弘景) 按素問云。胸脇支滿者。妨於食。病至則先開腠理。出清液。先唾血。四肢清。目眩時時前後血病。名血枯。得之年少時。有所大脫血者。醉入房中。氣竭肝傷。

性質 甘溫。無毒。主治 冬三月食之。起陽道。令人有子。歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雀肉曰。益精髓。縮五臟。氣不足。宜常食之。不可停輟。(宋) 日華諸家本草論雀肉曰。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。

參攷資料 正月以前。十月以後。宜食之。取其陰陽靜定未泄也。故卵亦取第一番者。(寇宗奭)

故月事衰少不來。治之以烏鰂魚骨、爾茹二物。并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸爲後飯飲鮑魚汁。以利腸中。及傷肝也。飯後藥先爲後飯。本草三藥。並不治血枯。而經法用之。是攻其所生所起耳。(蘇頌) 自今人知雀卵。能益男子陽虛。不知能治女子血枯。蓋雀卵益精血耳。(李時珍)

【雀肝】

主治 腎虛。陽弱。

【雀角花】 卽雀麥之古籍別名。典見綱目。詳「雀麥」條。

【雀兒臥單】 卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳「地錦草」條。

【雀兒酥】 卽胡頹子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「胡頹子」條。

【雀兒飯蕪】 卽雀蕪之古籍別名。典見蜀本草。詳「雀蕪」條。

【雀兒酸】 卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳「酢漿草」條。

【雀林草】 卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳「酢漿草」條。

【雀梅】 命名 本品實形如梅。故名。

古醫別名 千雀。(別錄) 爵梅。

十一畫 雀

(綱目拾遺)

產地 生海中石間。

形態 雀梅爲雜草類之一種。葉似薔薇。實如梅而小。共有樹生者。枝不蔓曲。高大而不結。名山雀梅。其葉均可供藥用。

性質 酸。寒。有毒。

主治 蝕惡瘡。治癰腫。瀉熱解毒。療便毒。乳癰。

【雀梅子】 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【雀梅仁】 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【雀麥】 命名 本品乃野麥爲燕雀所食。故名。

古醫別名 燕麥(唐本草) 苜蓿草(外臺祕要) 牛星草。雀角花(綱目)

外國名詞 Bromus japonicus, Thunb. (拉丁) スズメノ

チヤヒキ(日本)

基本 係禾本科雀麥屬。爲雀麥之子實。其苗詳見該條。

產地 生原野間。

形態 雀麥爲穀類之一年生平滑草本。作小穗狀花序。往往自

二三花成。有長芒。其葉細長而尖。有平行脈。葉柄作輪狀。結實亦成穗。細長而疏。其子實可供藥用。



雀麥

性質 甘。平。無毒。

主治 充饑。滑腸。

【雀麥】 古醫別名 破關草。破管草。(綱目拾遺)

形態 雀麥爲雜草類之一種。其花象雀脚。相傳謂花能令人饑。恐可供藥用。

性質 熱。有毒。

主治 點痔漏。

參攷資料 雀麥獵人採蒸藥箭。故呼破關草。又能爛痔漏。又有破管之名。性熱氣烈。傷人肌膚。立能潰腫。須以米醋炒用。並能腐腸之品。不入湯劑。惟外症用之。(綱目拾遺)

【雀喙及脚脛骨】 主治 小兒乳癰。每

用一具。資汁服。或燒灰米飲調服。

【雀麥苗】 性質 甘。平。無毒。主治 難產胎死腹中。胞衣不下。煮汁飲之。

【雀粟】 卽九熟草之古籍別名。典見別錄。詳「九熟草」條。

【雀脾射】 卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。

【雀腦】 主治 綿裹塞耳。治聾。燒灰。油塗凍瘡。

【雀腦香】 卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香附子」條。

【雀鼠】 卽鼯鼠之古籍別名。典見埤雅。詳「鼯鼠」條。

【雀煤】 卽郁李仁之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「郁李仁」條。

【雀瓢】 卽羅漢果之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「羅漢果」條。

【雀背】 古醫之古籍別名。典見本經。詳「女背」條。

【雀頭血】 主治 雀首。以血點之。

【雀頭香】 卽香附子之古籍別名。典見唐本草。詳「香附子」條。

【雀蕪】 命名 本品卽毛蟲所作之繭。形如團而雀首

作之繭。形如團而雀首

十一畫 雀 鴉 雪

食其莢中子故名。

古籍別名 蛭蟲窠。燥舍。(本草經) 姑婦房。雀兒飯。窠(蜀本草) 天漿子(綱目) 棘剛子(衍義) 紅姑娘窠(綱目)

產地 凡樹枝間處處有之。

形態 雀窠大如巴豆。形如桑蠶。上有蓋。

採取 八月採蒸之。尤宜採榴棘上者。內有蠅。正如蠶繭之宜採桑上者用。

性質 甘。平。無毒。

主治 寒熱結氣。瘰癧。鬼疔。小兒疳積。

近人學說 尤學周曰。治熱瘰。肺閉。氣急。目定。有驚風。傾向者。用天漿壳及麻黃等品。師徒相傳。天漿壳旁必註一包字。而藥店所用天漿壳為研合子。俗名婆婆針線包。此物雖內如飛絮。煎時。無包之必要。且此種平淡之品。有何功能。敢與麻黃同伍。其必為本品之壳。無異。醫不識藥。藥肆妄作主張。以羊易牛。而復以訛傳訛。不加更正。良尼愧嘆。

參攷資料 今醫家治小兒

慢驚。用天漿子有蟲者。曰雀窠。乾

綠。三物各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服。加減大有效也。(蘇頌) 雀窠打破。取汁與小兒飲。令無疾。小兒病後口者。漸漸口撮。不得飲乳。但先搗口傍見血。以藥研汁塗之。或同鼠婦生搗塗之。(陳藏器)

【雀翅】 (別錄) **古籍別名** 去母。更生。

產地 生蘆中。

形態 雀翅為蘆草類之一種。葉細黃蘆亦有刺。四月結實。銳黃中黑。可供藥用。

採取 五月採。陰乾用。

性質 鹹。無毒。

主治 益氣明目。

【雀醫草】 (別錄) **古籍別名** 白氣。

形態 雀醫草為雜草類之一種。春生莖葉。秋開白花。冬結黑實。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 流爛瘡。療風水。益氣。輕身。

【雀鴉】即甘露之古籍別名。與見

杜鎬。詳「甘露」條。

【雀髀射】即石射莖。如雀髀。葉生莖端者。詳「石射」條。

【雀蘇】即白丁香之古籍別名。與見炮炙論。詳「白丁香」條。

【雀癩】即雀癩之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「雀癩」條。

【雀鸞】即鸞之古籍別名。與見陸機詩疏。詳「鸞」條。

【雀牛兒】古籍別名。鬥牛兒。

風露草。神與草。(和漢藥考)

外國名詞 *Horba Cerani* Herb. Goran. (拉)

基本 屬牻牛兒科。為牻牛兒之莖葉。

形態 牻牛兒莖生地上。莖帶茸毛。經冬不枯。初年莖細軟。至二年則粗硬。葉對生。大寸許。作掌狀。分裂。邊緣有鋸齒。葉面生有紫黑



雀牛兒

斑點。夏日於葉間開略似梅花之花。色有白紅及淡紅等。花後結莢。實熟則縱裂為五。散布種子。其狀如神與之狀。故一名神與草。

採取 七八月間。採莖葉陰乾用。

成分 此草含有多種治菌加埕

休酸。及普通質加埕質。

效驗 為民間藥。濃煎。用治痢

【雪朮】即玉朮之別名。為朮種之

最上品。性質功能。較尋常之朮尤

勝。參見「白朮」條。

【雪如來】即白芨之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「白芨」條。

【雪芝】基本 本品芝之為冰

雪所結。歲久蒸積而成

者。

產地 多生陰崖絕壁間。及衡

岳諸地。

形態 雪芝為芝類之一種。晶

瑩如玉。懸掛峻坂。非藥劑級不

可擷取。取得可供藥用。

主治 療肺疾。降火清心。

【雪花】即瑞雪花之古籍別名。與

見綱目拾遺。詳「瑞雪花」條。

【雪花石羔】即石膏之細粒相集

色潔白如雪珠者。參見『石竹』條。

【雪花菜】即豆腐渣之古籍別名。

與見慈航活人書。詳『豆腐渣』條。

【雪客】即野薺之古籍別名。與見綱目。詳『薺』條。

即野薺之古籍別名。與見綱目。詳『薺』條。

之古籍別名。與見花鏡。詳『野薺』條。

【雪眉同氣】即白扁豆之古籍別名。與見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【雪茶】命名 以其產地臨近高山積雪之處。入夏不消。而形似茶。其色又白。故名。

古籍別名 白茶(大觀)白葉茶(東溪)

產地 出滇南騰江府屬山中

形體 色白。久則微黃。形似蓮心。

性質 甘。苦。溫。

主治 祛寒。治胃氣積痛。及痢疾。

參攷資料 此茶本非茶類。乃天生一種草芽。土人採得炒焙。

已亥臘。過餘杭。往訪劉摶清少府。吸雪茶。云帶自雲南。茶片皆作筒子。如紫筒菊。蕊瓣樣。詢所主治。

因言此茶大能暖胃。凡晨寒冰凍時。啜一盞。滿腹如火。若患癆損及失血過多之人。腹胃必寒。最忌食茶。惟此茶不忌。乃相與烹瀹食之。果入腹溫暖。味亦苦冽香美。較他茶更厚。

大觀茶論。白茶自爲一種。與常茶不同。其條數闊。其葉瑩薄。崖林之間。偶然生出。非人力所可致。有者四五家。生者不過一二株。所造止於二三鎊而已。芽英不多。尤難蒸焙。湯火一失。則已變而爲常品。須製造精微。溫度得宜。則表裏昭著。如玉之在璞。他無與論也。

東溪試茶錄。白葉茶於近歲園培時有之。地不以山川遠近。發不以社之先。芽葉如紙。民間以爲茶瑞。(趙恕軒)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

成穗。如夏枯草有毛者。其根可供藥用。葉詳見該條。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 咽喉卒閉。搗汁瀉之。咳血同豬肉煮食。散風火。消腫毒。結滯。肺痿。疔癰。疳疔。瘡疾。搗汁服。

【雪裏青】即荔枝草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『荔枝草』條。

【雪裏青葉】命名 本品性堅與蓮搗汁。米醋液過。沖和含漱之。

【雪裏花】命名 本品性堅與冬冰雪之中開花。故名。

產地 浙之鎮海。蘇之招寶山。龍潭。旁。均有出之。

形體 雪裏花係雜草類之一種。苗短小。狀如六月雪。高不過二寸。每於嚴寒冰雪之際。開白色鮮花。大如豆形。採得曬乾。可供藥用。

性質 辛涼。無毒。

主治 痔疾。以本品爲末。溼者乾。乾者麻油調搽。一二度。痔即消縮。

【雪裏開】命名 本品隆冬嚴寒。雪中開花。故名。

參攷資料 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形體 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷疾。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據其地有天山。冬夏雪。雪中。有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。濕陽銷夏。鑊。蓋外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。伏苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

原名 雪蓮。

十一畫 雪 頂 釘 魚

產地 出深谷中。

形態 雪蕤開為雜草類之一種。苗甚短小。如六月雪狀。高僅二寸許。每雪時開白花如豆大。其花可供藥用。根詳見該條。

主治 痔瘡。為未傳之乾者。麻油調搽。

【雪股】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【雪蓮】即雪荷之原名。詳「雪荷」條。

【雪蓮花】 產地 本品生於溫帶之地。如雲南邊陲諸境。

效能 性極熱。浸酒為補劑。多血熱妄行。或用合煎藥。其禍尤烈。

【雪蝦蟆】 產地 巴里坤之雪山中。

形態 雪蝦蟆為溼生蟲類之一種。通身有金線紋。其形絕似可供藥用。

性質 大熱。微辛。

主治 補命門。益丹田。壯陽卻冷。陰痿能與。

配合應用 內造伏虎丹。與陽種子。強腎助神。用真川貝母四兩。

須四製。第一次用大附子一個。童便一湯碗。蒸乾切細。燒酒三湯碗。

非菜汁三湯碗。同入砂鍋。將貝母煮乾。去附子不用。第二次用雪蝦蟆一兩。無則以大蛤蚧一對代之。

用石敲碎。亦用燒酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去蛤蚧不用。第三次用吳茱萸一兩。亦用酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去茱萸不用。第四次用公丁香五錢。亦用酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去丁香不用。製完。其貝母爛如泥。置石臼中舂。再入真阿芙蓉一錢。乳製蟾酥三錢。麝香五分。拌勻作條。焙乾收貯。用時唾津磨搽。

施用宜忌 凡火盛者。禁用。

參攷資料 雪蝦蟆能回已絕之陽。功兼參附。故為性命根源之藥。(趙學敏)

【雪蛤】 命名 本品屆冬而肥。故名。

產地 廣東諸地之池澤間多有之。

形態 雪蛤為魚類之一種。形似鱧而稍短。性喜游泳。波上得濟。流則跳躍等。其味美。作膾尤佳。

可供藥用。

主治 益氣力。健筋骨。活血行氣。送水利溼。

參攷資料 雪蛤粵中池塘多蓄之。以魚秧長成。與鮑性相反。即屬土。其性沈。常潛水中。蛤屬水。其性浮。常躍水上。鮑食之。可以實腸。蛤食之。可以行氣。鮑守而蛤行。性各不同如此。(趙學敏)

【雪壓珊瑚】即枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枸杞子」條。

【雪雞】 產地 出西陲諸地。

形態 雪雞為原禽類。雞屬之一種。千百成羣。棲止雪中。可供食與藥用。

採取 以雄者入藥良。

主治 暖丹田。壯元陽。除一切積冷陰寒。癩癧諸疾。較雪蓮尤效。

參攷資料 雪鷄肥美。可以為食。惟性燥耳。(綱目拾遺)

【雪蠶】 命名 本品生積雪中。而狀似蠶。故名。

古籍別名 雪蛆。(綱目)

產地 出北方高山諸地。

形態 雪蠶為卵生蟲類之一種。大如蠶。味極甘美。可供藥用。

一二六四

性質 甘寒。無毒。

主治 解內熱。渴疾。

參攷資料 王子年拾遺記云。貝嶠之山有冰蠶。長六七寸。黑色有鱗角。以霜雪覆之。則作兩長一尺。拍五色絲。織為文錦。入水不濡。投火不燥。堯時海人獻之。其質輕煖。柔滑。按此亦雪蠶之類也。(李時珍)

【頂生地】即大生地之處方用名。詳「大生地」條。

【頂黃王】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【頂坐真人】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【魚丁】即魚鮓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「魚鮓」條。

【魚子】 命名 本品即魚腹中之子。故名。

古籍別名 魚鱗。(綱目)

形態 凡魚皆於冬月孕子。至春末夏初。則於滯水草間生子。有牡魚隨之。洩白。越數日則化生。魚子可供藥用。

採取 以青魚鯉鮪之屬者用。

主治 目中翳障。

【魚子蘭】即珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『珠蘭』條。

【魚父】即青蚨之古籍別名。典見綱目。詳『青蚨』條。

【魚生】即魚鱸之古籍別名。典見綱目。詳『魚鱸』條。

【魚目青】即白青之古籍別名。典見綱目。詳『白青』條。

【魚伯】即青蚨之古籍別名。典見綱目。詳『青蚨』條。

【魚尾花】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【魚尾草】即醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳『醉魚草』條。

【魚油】即魚脂之古籍別名。典見綱目。詳『魚脂』條。

【魚狗】命名。本品能在水面捕食小魚。如獵狗然。故名。

古醫別名。蝦。天狗。水狗。(爾雅)魚虎。魚師。(食經)翠碧鳥。(綱目)

外國名詞 Alcedo bengalensis Gm Kingfisher Eisvogel (拉丁)カワセミ或シロウビン 或カハセビ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類魚狗科。

產地 在水涯巖穴間。

形態 魚狗為水禽類鳥族之一種。大如燕。形似杜鵑。嘴長而強直。有角稜。末端尖銳。體之下面。青綠色。頭部濃橄欖色。有青綠色斑紋。眼下亦有一青綠紋。眼後具強光澤之橙褐色。頤及喉部。黃白色。胸腹橙褐色。尾短足亦短小。色赤褐。常在水畔掘穴營巢而居。其肉可供藥用。

性質 鹹平。無毒。

主治 魚哽及魚骨入肉不出。痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲亦佳。

參攷資料 今人治魚骨哽。取得去腸。用陰陽瓦泥固煨存性。入藥用蓋。取其相制之意。(李時珍)

【魚狗舌】原名 翠鳥舌。

製法 用魚狗舌。以桐油浸晒乾。再浸再晒。使硬如三稜錢用。

主治 頭風。於頭上鍼之即愈。

【魚食】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【魚虎】即魚狗之古籍別名。典見

食經。詳『魚狗』條。

【魚津草】即水英之古籍別名。典見綱目。詳『水英』條。

【魚師】即魚狗之古籍別名。典見食經。詳『魚狗』條。

【魚草】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【魚脂】命名。本品即魚之脂肪。脂者旨也。其味甘旨。故名。

古醫別名 魚油。(綱目)

性質 甘溫。有小毒。

主治 瘰癧。用和石灰泥船。魚脂腥臭者。二斤。安銅器內。燃火柱令暖。隔紙熨瘰上。晝夜勿息火。又塗牛狗疥。立愈。

參攷資料 魚脂點燈治盲人目。

【魚腥草】命名。本品莖葉紫赤。有魚腥臭氣。故名。

處方用名 蕺菜。魚腥草。紫蕺。古醫別名 蕺。(別錄)菹菜。(蘇恭)蕺菜。十葉。岑菜。蕺草。孟娘菜。筆管菜。龍鬚菜。(和漢藥考)

基本 屬三白草科。為紫蕺之葉與莖根。

產地 多在山谷原野之陰溼地方。

形態 蕺為多年生草本。高自七八寸至尺餘。莖細長。色紅紫。葉為心臟形。末端尖銳。似甘藷葉及蕎麥葉。葉與莖俱有一種不快之惡臭。初夏梢上歧生分枝。而於其頂端開淡黃色之小花。花皆裸出。無花被。遠綴而為穗狀花序。花序之下。具有類似花瓣之苞四瓣。色白。果實為蒴果。小而作球圓形。戴三花柱。中藏多數種子。

採取 夏秋間採之。

製法 採得葉及莖根陰乾用。

用法 水煎或生搗。


性質 辛。微溫。有小毒。

效能 消熱。解毒。用作疥癬藥。

主治 蚊咬尿瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論魚腥草曰。淡竹筒內煨



魚 腥 草

熱。持傳惡疥白禿。【明】李時珍本草綱目論魚腥草曰散熱毒癰腫疥痔脫肛疝疔疾解諸毒。【明】程希雍本草經疏論魚腥草曰莖生於下濕之地味辛氣溫能治痰熱癰腫發為肺癆吐膿血之要藥辛溫主散故能治蠟蝦疥瘡肺主氣辛溫能散氣故多食令人氣喘肺與大腸為表裏大腸溼熱盛則為痔瘡得辛溫之氣則大腸清寧故又為痔瘡必須之藥。

配合應用 ①單用搗汁入年久芥菜瀉飲之治疔癰有神。

②治背疽熱腫莖菜搗汁塗之留孔以洩熱毒冷即易之。【經驗方】

③治痔瘡腫痛魚腥草一握煎湯煎洗仍以草搗痔即愈。一方洗後以枯礬入片腦少許傳之。【救急方】

④治疔瘡作痛魚腥草搗爛傳之痛一二時不可去草痛後一二日即愈。【陸氏積德堂方】

⑤治小兒脫肛魚腥草搗如泥先以朴硝水洗過用芭蕉葉托住藥坐之自愈。【永類鈴方】

⑥治蟲牙作痛魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲為效。【簡便方】

⑦斷截癰疾紫莖一握搗爛細包周身摩擦得睡有汗即愈。【醫前一時作之救急易方】

⑧治惡蛇蟲傷魚腥草皺面草槐樹葉草決明一處杵爛傳之甚效。【救急易方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無溼熱疥毒者禁用。

參攷資料 ①莖字。段公路北戶錄作莖音莖。秦人謂之莖子。莖莖音相近也。其葉腥氣故俗呼為魚腥草。【李時珍】

今小兒食之便覺胸膈。【陶弘景】

⑨小兒食之三歲不行久食發虛弱損陽氣消精髓。【五說】

⑩莖菜又名十藥氣甚臭村民每取其根飯上蒸熟食之據云味甚甘本草以此列入柔滑菜類然實不可食且有小毒日俗馬醫用以飼馬稍有十種藥之功能故號稱十藥云。【大和本草】

【魚膏】即鱈膠之古籍別名。典見綱目。詳鱈魚條。

【魚魷】 命名 本品即諸魚之腦脊猶枕也故名。 主治 能消毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論魚魷骨曰解蟲毒作器盛飲食過蟲輒裂破也。

本草綱目論魚鮓曰治痔耳痔癰諸疥有蟲瘰白殿代指痢主下痢膿血。

參攷資料 ①凡鮓皆發瘡疥鮓內有髮害人。【陳藏器】

②鮓不熟者損人脾胃反至疾也。【吳瑞】

③諸鮓皆不可合生胡荽發菜豆發麥醬蜂蜜而食令人消渴及驚亂。凡諸無鱗魚鮓食之尤不益人。【李時珍】

【魚鱈草】即魚腥草之處方用名。詳魚腥草條。

【魚鱗】即絲瓜之古籍別名。典見綱目。詳絲瓜條。

【魚鱗】 命名 鱗者類也魚鱗於水其鱗似剛故名。 主治 諸魚鱗燒灰主魚骨氣。 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論魚鱗曰食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢。

參攷資料 魚鱗係魚身保護之具為透明之角質由真皮變化而成排列如瓦狀魚之產於淡水或海邊者因易觸傷故鱗片厚大其產於遠洋者則反是其細微者隱於皮中視之如裸體其全無

鱗者。則其稀。今所謂無鱗魚者。實鱗之細微者居多爾。(醫學辭典)
【魚鱗】即鱗之古籍別名。典見食經。詳「鱗」條。

【魚鱗】命名。本品以魚剖切。成故名。凡諸魚之鮮活者。薄切洗淨血。以蒜薑薑醋五味食之。皆謂之鱗。

古籍別名 魚生(綱目)

性質 甘。溫。無毒。

主治 去冷氣溼痺。除膀胱水。腹內伏梁。氣塊冷痰。結癖疝氣。喉中氣結。心下酸水。開胃口。利大小便。補腰脚。起陽道。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論魚鱗曰。宜脚氣風氣人。治上氣喘咳。【唐】孟誥食療本草論魚鱗曰。即鱗。主久痢腸痔痔疾。大人小兒丹毒風眩。

參攷資料 魚鱗辛辣。有劫病之功。予在蒼梧。見一婦人病吞酸。諸藥不效。偶食魚鱗。其疾遂愈。蓋此意也。(汪穎) ①近夜勿食。不消成積。勿飲冷水。生蟲時行。病後食之。胃弱。勿同乳酪食。令人霍亂。不可同瓜食。(陳藏器) ②按食治

云。凡殺物命既虧仁愛。且肉未停冷。動性猶存。旋烹不熟。食猶害人。况魚鱗肉生。損人尤甚。為癩癧。為癩疾。為奇病。不可不知。昔有食魚生而生病者。用藥下出。已變蟲形。鱗鱗尚存。有食鱗肉而成積者。用藥下出。已成動物。而能行。皆可驗也。(李時珍)

【魚鱗金星】

命名 以其葉橢圓如魚鱗。而

葉面又起金點如星。故名。產地 浙江西子湖飛來峯之絕頂。以及其他背陰山石間。

形態 魚鱗金星為植物雜草類之一種。立夏後發苗。根細如蠟線。蔓延石上。葉不對節。一長一圓。長者為魚。圓者為鱗。葉經霜則老。背起金星。惟鱗葉無。葉可供藥用。性質 涼。

主治 治膨脹。癩癧。火毒症。

【鳥不宿】即鳥不宿之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳「鳥不宿」條。

【鳥不宿】

命名 本品枝梗有刺。鳥不能棲宿。故名。

古籍別名 晚娘棒(綱目)老

戊草。昏樹晚娘棒。鳥不踏。刺根白皮。石米刺(綱目拾遺)鳥不宿刺。(汪連仕採藥書)茨梧桐。

產地 多生山場間。

形態 鳥不宿為灌木類之一種。枝赤色。長三四尺。皮色如桑。細者如大指。老者如甘蔗。葉如杏葉。開黃花成穗。其根白皮可供藥用。性質 溫。

主治 透骨追風。行血定痛。癩風毒流注。跌打損傷。催生下胎。雙單喉蛾。紫雲風。大麻風。筋骨疼痛。並治虛勞如神。

【鳥不宿根下蟲】 主治 風毒流注。神效。

【鳥不宿莖葉】

主治 雜產。同甘草和酒水煎服。

【鳥不踏】即鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳥不宿」條。

【鳥木羊】即拂拂之古籍別名。典見山海經。詳「拂拂」條。

【鳥栗】即九熟草之古籍別名。典見別錄。詳「九熟草」條。

【鳥岡子】即鼠李子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「鼠李子」條。【鳥葵】即相鳥之古籍別名。典見綱目。詳「相鳥」條。

【鳥龍尾】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳「梁上塵」條。

【鹵水】

古籍別名 苦鹵。(綱目拾遺)

性質 苦鹹。無毒。主治 治大熱消渴。去煩除邪。下蠱毒。柔肌膚。去溼熱。消痰癆。積塊。洗垢膩。多服損人。

參攷資料 有鹽鹵水。乃已燒成鹽。復澆下之。苦鹵一名鹵水。此乃取於鹵地。澆以燒鹽之用。與鹽鹵水不同。(趙恕軒)

【鹵鹵】

原名 鹵鹵。命名 本品乃土中所含一種質料。性滑而味鹹。可用以浣衣去垢者。就土性而曰鹵。取而用之。則曰鹵。故名。

古籍別名 鹵鹽。寒石。(吳普)石鹵(補遺)鹵鹵。凝結如石者。名石鹵(綱目)

產地 出山西諸縣平野。及大谷榆次等高亢地。

形態 鹵鹵為鹵石類之一種。

秋間皆生。南望之如水。近之如積雪。刮而熬之。遂成爲鹹。微有蒼黃者。卽鹵鹹也。爾雅所謂天生曰鹵。人生曰鹹者是。可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 大熱消渴。狂煩除邪。及下蠱毒。柔肌膚(本經)去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆。噦滿。明目目痛(別錄)

參攷資料 鹵鹹制四黃。作碎藥用。礪砂礮。一時卽軟。(獨孤酒) 凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦水卽鹵水也。鹵水之下澄鹽。凝結如石者。卽鹵鹹也。丹溪所謂石鹵者。乃灰鹵也。見土類。矣。昔本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽。非鹵地之鹽也。不妨同名。(李時珍)

【鹵鹹】卽鹵鹹之古籍別名。典見綱目。詳「鹵鹹」條。
【鹵鹹】卽鹵鹹之原名。詳「鹵鹹」條。
【鹵鹽】卽鹵鹹之古籍別名。典見吳普本草。詳「鹵鹹」條。

【鹿皮】 主治 一切濕瘡。燒灰和醋。脂搗之。日五六易。

愈乃止。

【鹿白】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【鹿列】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

【鹿竹】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【鹿肉】 性質 甘溫。無毒。主治 補中益氣力。強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鹿肉曰。補虛瘦弱。調血脈。【明】李時珍本草綱目論鹿肉曰。養血生容。治產後風虛邪僻。

參攷資料 九月後。正月前。可以食。他月不可食。發冷痛。白臍者。豹文者。並不可食。鹿肉脯炙之。不動。及見水而動。或曝之不燥者。並能殺人。不可與雉肉。蒲白。鮫魚。蝦同食。發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。

【孟詵】中風口偏者。以生肉同生椒搗貼。正卽除之。【華陀】鹿居士言。鹿性多野。烈能別良草。止食葛花。葛葉。鹿葱。鹿藥。白蒿。水芹。甘草。薺。芻。頭。蒿。山。蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。養神

用其肉者。以其性烈清淨也。凡藥餌之人。久食鹿肉。藥必不得力。服爲其食解毒之草。制諸藥也。(孫思邈)

【鹿血】 主治 陰痿。補虛。止腰。痛。鼻衄。折傷。狂犬傷。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鹿血曰。和酒服。治肺痿吐血。及崩中帶下。【明】汪穎食物本草論鹿血曰。諸氣痛欲危者。飲之立愈。【明】李時珍本草綱目論鹿血曰。大補虛損。益精血。解痘毒。藥毒。

參攷資料 近世有服鹿血酒者。云得於射生者。因採捕入山。失道數日。飢渴將委頓。惟獲一鹿。刺血數升。飲之。飢渴頓除。及歸。遂覺血氣充盛。過人。有效而服之者。刺鹿頭角間血。酒和飲之。更佳。

【蘇頌】近世韓飛霞補益方。有斑龍晏法。孫氏解毒毒。有陰陽二血丸。皆古所未知者。而沈存中又以刺血代茸爲非。亦一說也。(李時珍)

【鹿沙】卽沙魚之背。有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能。參詳時珍。

【蛟】條。

【鹿良】 基本 鹿良爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月採之。性質 鹹。臭。

主治 小兒驚癇。黃豚瘰癧。大人瘰癧。

【鹿角】 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。

古醫別名 鎮山威。斑龍角。(和漢藥考)

外國名詞 Cornu Cervi(拉丁) Barts horn(英) Hirschhorn(德)

基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。往花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲。海洋洲。均不產此。產於其他三大洲。形體 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

惟牡有白毛斑點。牝則雜有白毛。牝無角。牡有角。由年數而增加。枝數。夏季觸樹水而脫落。此角謂之鹿角。供藥用。其角係作枝狀。分岐之堅實角質。長有達三尺者。外面呈白色或淡褐色。處處突起。下部斷面有無數鬆孔。是乃血脈穿過角質中之癩痕。

種類 鹿角有頭骨皮毛毗連者為生角。鹿角無頭骨皮毛毗連者為解角。

採取 每年七月間採截其老角。須以鹿年久者佳。煮以爲膠。入藥更佳。尤要黃色緊重尖者之角。以此鹿食靈草。故美於衆鹿也。

製法 孟詵曰。凡用鹿角。麋角。並截段錯屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛爲丹。服之至妙。以角寸截。泥裹於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按崔行功要藥方。鹿角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煨。再和如此五度。以牛乳和。再燒過。研用。**用法** 與他藥水煎。或酒浸。或對末和作丸劑。

十一畫 鹿

性質 鹹。溫。無毒。
成分 爲磷酸鈣。碳酸鈣。膠質。軟骨等。

效能 散瘀活血。治瘡癩腫毒。益氣補虛。治五勞七傷。用作溫補強壯藥。又治遺精。腎孟炎。

主治 惡瘡癩腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰痛。折傷。惡血。益氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論鹿角曰。貓鬼中惡。心腹疼痛。【唐】孟詵食療本草論鹿角曰。蜜炙研末。酒服。輕身強骨。補陽道絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一撮。卽出鬼精。燒灰治婦人胞中餘血不盡欲死。以酒服方寸匕。日三甚妙。【宋】日華諸家本草論鹿角曰。水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡癩癰腫熱毒。火炙熱熨小兒重舌。口瘡。【明】繆希雍本草經疏論鹿角曰。藥非補陰。鹿茸補陽。角亦如之。凡角初生。軟嫩者爲茸。稟壯健之性。故能峻補腎家真陽之氣。熬成白膠。則氣味甘緩。能通周身之血脈。生角則味鹹氣溫。惟散熱。行血。消

腫。辟惡氣而已。鹹能入血。軟堅。溫能通行散邪。故主惡瘡癩腫。逐邪惡氣。及留血在陰中。少腹血急痛。

折傷惡血等證也。肝腎虛。則爲腰痛。鹹溫入腎。補肝。故主腰痛。脊痛。氣屬陽。補陽。故又能益氣也。【清】張隱庵本草崇原論鹿角曰。鹿角功力與茸角相等。而攻毒破洩。行

療逐邪之功居多。較茸膠又稍銳焉。【清】徐洵溪本草經百種錄論鹿角曰。鹿之精氣全在於角。角本

下連督脈。鹿之角於諸獸爲最大。則鹿之督脈最盛可知。故能補人身之督脈。督脈爲周身骨節之主。腎主骨。故又能補腎角之中皆貫以血。衝爲血海。故能補衝脈。衝督盛而腎氣強。則諸效自臻矣。【清】閻立陞本草選旨論鹿角曰。鹿角有生用熟用兩法。生能散熱。行血消腫。辟邪。熱能益腎。補虛。強精。活血。故本草治惡瘡癩疽。逐邪惡氣。夜夢鬼交。留血在陰中。除少腹血痛。折傷。惡血等症。服用水磨。塗用醋磨。所謂生用也。又強骨髓。補陽道。絕傷脫精。尿血腰痛。又婦人夢與鬼交。及婦人胞中餘血不盡

欲死。蜜炙酒服。或燒灰研服。所謂熟用也。

國外學說 英美學說謂鹿角

係牡鹿之角。並其磅下之角。在古人常用之爲藥品。鹿角至春時則解。自第一年至第五年。逐年加大。過五年則漸減小。如將鹿角燒之所成之灰。可以作炭養燐養(五)之用。所以鹿角之功用。如取鹿角磅下之花。合於水沸之。則成無色膠類質。有養身之性。可代魚肚等膠類形質。又有鹿角精與鹿角油。鹿角鹽。皆有祛痰。發汗。興奮之效。而鹿角膠則爲補藥。又日本和漢藥考曰。鹿畏人。惟日本大和國奈良及安藝國宮島之馴鹿。則爲人狎。生後一年之牡鹿無角。二年乃生角。但無枝。三年生一枝。四年生二枝。六年生四枝。六年以上。增加未有一定。昔時歐洲亦有以鹿角供藥用。並有鹿角所製之鹿角油。(Oleum animal raspatum) 鹿角炭(Cornu cervi nigrum) 鹿角膠(Sol. volatile cornu cervi) 鹿角灰(Cornu cervi album) 等製劑。

十一畫 鹿

近人學說 曹炳章曰鹿常棲於西北山林中善別良草常食蒼葉鹿葱白蒿水芹甘草蒼耳薺芫柏樺槲栗之芽蘗及樹皮果實等植物夏期入深山至冬出遊於山麓性溫順常驚駭善走啼聲悲慘喜羣居分背而食食則相呼行則同旅居則環角向外以防患臥則口朝尾闕以通督脈常以一牡多牝而成羣交尾期在秋季一牡常交百數牝謂之聚應至春初羣散入夏得苜蓿食之而肥孕於仲秋生於仲春六月而生每胎一子初生鼻邊有缺者為雄雄者毛黃色有白斑有角雌者無角毛雜黃白色無斑鹿至六十歲必傾頽於角下有斑痕紫色行則流涎不復急走故曰鹿戴玉而角斑鵝龜云鹿千歲色蒼一千五百歲色白二千歲色元隨蜀餘開云明正統十五年洋縣橫溪獲一白鹿項有銅牌上有鐫刻皆浸滅惟唐字可辨其在千年以上者無疑鹿之嗅覺甚敏銳有上風有獵犬及人能嗅得之又難辨微聲故不易獵獲今之獵者每當秋季吹鹿笛誘出而鎗

殺之鹿體羸弱四肢細長前二趾踏地有蹄尾短眼耳皆大耳壳能轉動牡者有枝形角一對牝者無之毛色至夏赤褐有淡色白斑是謂鹿斑至冬概灰褐體長四尺餘角不空由皮膚下層(即真皮)所變化而發達者初為瘤狀呈紫褐色蔽褐色密毛是為鹿茸富有血管附之甚濕迨鹿茸漸長乃磨於樹幹脫去皮毛此時其營養盛而血管破裂流血乃見真角鹿角原質與尋常各獸角不同因牛羊等角有心其原料與結成之阿勒約門質相類鹿角至春日則脫自第一年則漸減少當年初生者無角五年則漸減少當年初生者無角頭上祇有兩凸處至第二年則生出無枝之角第三年則生叉形之角第四年則生兩叉之角第五年則生四叉之角第六年則生五叉之角第七年則生四叉之角以後各年之形無大變化惟逐年減少其原質與骨大同小異鹿茸乃鹿解角後新生含血之芽角漸長則成毛角再大則謂鹿角故云宜知茹之小者分枝員大而不取此舉

非生初久形分大小而言未可指為鹿之大小解也凡具氣者幼則弱老則衰惟壯健者則強是藥鹿之茸皆當取於壯大之為貴乃今以小而毛黃為鹿大而毛青為麋致購茸之競爭小者其惑甚矣不知鹿之種類甚夥古書誤解亦甚多茲再詳細辨正之鹿有同類異種同種異形其各種形態習性分條辨列如下(甲)鹿類異種當分為二十二種列舉於后(一)麋鹿體小而輕健肩高約二尺體重約三十斤毛角亦黃褐色頗美麗角小而形簡由前頭骨所生之長骨軸支之角上有毛牡者角長三寸至四寸餘眼下有斜走之隆起二上顎之犬牙甚發達為防敵之用叫聲如狐性能怯弱善馳產於中國日本蘇門答臘爪哇菲律賓等處(二)麂鹿為鹿類中之巨大者長成之牡鹿高達五尺半以上體重約千磅角又分十二至十四時達二十又長達五尺多棲於美洲落磯山脈附近能沐水亦善馳北美洲土人祭之使曳橈或荷物肉味頗美(三)赤鹿疑申記云南山

一二七〇

有赤鹿足短而身大如牛肉千斤毛皮冬夏異色夏毛帶赤褐色冬毛帶灰色角如枝狀長成者之角長約三尺有二十餘尖有時達四十餘尖當年之稚鹿無角產子期在六月間每產不過二子稚鹿之背部及體旁有白斑產於歐亞之北方(四)麝鹿體比赤鹿大而強壯相等毛色煤褐眼上具黃褐斑紋角有三叉枝株向前彎而超過頭頂尖端為筒式之分又沿其曲線而直計之長達四尺(五)黠鹿形似赤鹿而略小成長之牡肩高約三尺體重約二百磅毛色概黃褐或帶赤褐有明顯之白斑紋又有多數白線紋至冬季毛色增灰至夏則常帶黑褐色角之上部邊平或為掌狀無枝略向前尾略長性溫順經三年而長成可飼養之為園中玩賞品亞歐兩洲皆產之(六)麝鹿體小形美肩高二尺三寸許體長三尺三寸許角小長約七寸至一吋七分分三枝全體色暗赤褐毛粗臀部近旁有白斑無尾眼之內皆無回窩常獨居產於歐洲之暖地及亞洲等各處(七)

豈鹿。體形似鹿有斑點。產於豈得。
(八)鳥鹿。形性似豈鹿。產馬來。非律賓。(九)馴鹿。產於亞歐美三洲之北極地。體軀之大小。隨產地而異。大概棲地愈北者則較大。頸短。頭下有長毛。四肢強健。第二第五趾。與第三第四趾踏地。蹄廣而分裂。踏雪而行。不致陷入。產於美洲者體最大。長大之牡。肩高達四尺許。重約四百磅。夏季毛色概暗褐。頸鼻腹及後肢皆白。至冬季毛捲縮。色淡帶灰。牝牡皆有角。出胎數月間即生。牡角大。長達五尺許。角基圓長。角頂擴大生枝。枝端扁平如劍。牝角較小。而分枝亦少。馴鹿原係野生。夏季出山林遊於山地。入秋再返舊地。其去森林為避蚊輩之刺螫故也。至冬日積雪滿地。善用其吻端角蹄。掘食雪下之地衣類。(十)長頸鹿。形略似鹿。頸甚長。故名。頭頂至趾高一丈八尺。為動物中之最高者。頭小眼大。鼻孔能閉閉。耳殼小。唇長而薄。上顎無門牙及犬齒。但上下顎之血齒強。大舌細長。具鈎曲之刀。牝牡皆有短角一對。牡者雖長。不似鹿角之

年交脫。角形如截木。外被皮膚。尖端簇生短毛。頸盛長。頸骨祇有七節。與他獸同。頸上具短鬚。胸部小。四肢長。前肢尤長。肩高九尺。尾細長。尖端有護毛。全體毛色橙赤。散列暗黑色之圓斑。腹及腋下色較淡。體長丈六乃至丈九。牝者較短。多產於非洲。性溫順。食草木之嫩芽。以四肢及頸俱長。亦適於食喬木之葉。步行甚速。(十一)馬鹿。雅翼云。晉楚有鹿似馬。當解角時。與馬無異。故名馬鹿。(十二)駝鹿。埤雅云。北狄有駝鹿。極大。而色蒼黃。無斑。角大而有紋。堅瑩如玉。茸亦可用。(十三)天鹿。瑞應圖云。天鹿神獸也。狀如牛。身披五色。而肉甲方旭。蟲蒼云。天鹿或作天祿。孟康西域傳注云。符拔一角為天祿。兩角為辟邪。伏似虎。正黃色。有鬣。而尾有茸毛。大如牛。鬚範云。天鹿野馬也。一角如茸。青色。其肉落地不沾泥沙。謂之靈獸。(十四)靈鹿。粵述云。梧州火山。靈鹿三足。(十五)兩頭鹿。南中志云。兩頭鹿。產雲南。一身兩頭。食毒草。又名食毒鹿。張華博物志。名荼首。嶺出永昌郡。是

兩頭鹿名也。似鹿兩頭。其胎中尿。以四月取之。段成式酉陽雜俎云。雙頭鹿。矢名耶希。夷人謂鹿為耶。謂尿為希。按唐韻。尿字音郤。即此義也。陳藏器以胎中尿敷惡瘡。乃疔。唐范曄後漢書云。雲陽縣有神鹿兩頭。能食毒草。華陽國志云。此鹿出雲陽南郡熊舍山。荊州記云。武陵郡。雲陽山。點蒼山。產兩頭鹿。似鹿前後有頭。一頭食。一頭行。山人時或見之。(十六)猿鹿。澤史紀餘云。猿鹿南海猿魚所化。其色較鹿稍赤。本草明辨云。外洋淡水處出猿鹿。乃猿魚所變。其角曰魚角。其色枯白。枝最多。不能取茸。(十七)飛孩獸。洞冥記。禽韓國獻飛孩獸。似鹿青色。帝以寒青之絲為繩繫之。及死掛於苑門。皮毛皆朽。而骨猶毒。人知其靈異。更以他繩繫其足。明日往視。唯繫處存。餘皆飛去。(十八)把雜爾。坤輿外紀云。渤泥產把雜爾。狀似鹿。腹生一石。可療百病。國王甚重之。方旭云。把雜爾。八絃澤史作把雜爾。出西南大海中。渤泥國。(十九)狸如。西山經云。皋塗山有獸曰狸如。狀

如鹿。而有四角。白尾。其前足如人手。而後足如馬蹄。(二十)夫諸。中山經云。敖岸山有獸曰夫諸。狀如白鹿而四角。(廿一)無損。騏雅云。豕頭而牙為無損。訓實云。南方有獸。似鹿而豕頭有牙。善依人求五穀食之名。無損。(廿二)角端。廣輿紀云。角端產樵粗。角可為弓。隴蜀餘聞云。角端產瓦屋山。能食虎豹。不傷人。談蒼云。角端鹿形。馬尾。獨角生鼻上。日行萬八千里。能曉四夷之語。張尚瑗石里石識云。國朝崇德二年。蒙古貢齊希特。能解人語。蓋角端之屬。然則元時所見。或亦齊希達乎。元史元太祖至西印度。見角端能言。(乙)麋類異種。當分爲四種。條舉列后。(一)麋。形體甚大。重一千四百磅。高約七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬚。胸部及喉下。密生長毛。向下垂。牡體生後。九月而生角。逐年增枝。枝短而粗。角之全部成鋸形。從左右兩旁向內部彎曲。其中夾略成凹形。角之大者。重達七百兩以上。每行深林中。必將其角向後橫臥。故能不與樹枝相抵觸。而

十一畫 鹿

十一畫 鹿

來去自如。此角極堅強。力能撲狼。頭極短。體又甚高。故不便俯首食地面雜草。常至叢林中。食樹皮樹葉及嫩芽等。性怯弱。喜孤立。不成羣。馳走迅速。亦能游泳。夏日為防繩類刺螫。則沒入池中。僅露頭面。其蹄較大。故行軟泥地及雪上。無傾陷之患。化者每次產二千肉可食。產中國西北各山林中。及俄國那威瑞典及北美洲之北方。博物志云。麋生南方。恒千百為羣。食澤草。其踐處成泥。名曰麋。種稻可收百倍。方旭云。狀與鹿無異。但目下有兩孔。能夜視。其毛帶青黑色。牡者亦有兩角。夏至解角。二。熊北山經云。倫山有獸曰羆。狀似麋而竅在尾上。此與熊屬之熊不同者。三。羆。胡東山經云。尸胡山有獸曰羆。狀如麋而魚目。嗚自呼。四。麋。西域記云。麋似麋而大。前昂後低。毛多而長。為裘甚暖。角扁而厚。為篋甚良。丙。鹿。形異。當分為四種。分列於后。一。麋。係一種奇異之鹿類。頭似鹿。脚似牛。尾似驢。背似駱駝。從全體觀之。無一所似。故此人俗呼曰不象。體大如

小牛。毛淡褐。背稍濃。腹漸淡。角質堅。表面有凸凹。角甚甚厚。從幹分二。又一向後。一向向外。後者有並行之類。小犄直伸而出。向外者甚彎曲。末端復分枝。足頗大。蹄較小。體長(除尾)七尺三寸。肩出約四尺。性似鹿。食植物。常慢走。馳驅時比馬尤速。每年五月間產子。孕期八箇月。稚獸毛濃黃。體褐色。有白色大斑。生後三箇月。斑即消失。牡者生後二年。角始分。又角至冬至時則脫落。或謂此獸為我國固有之動物也。地學雜誌云。額爾古納河右岸。鄂倫春所使者。彼名曰沃利恩。吾國名曰麋。俗名四不象。角有數歧。似鹿。蹄分兩歧。似牛。身長色灰似驢。其頭則似鹿。非鹿。似牛。非牛。寬額而長喙。毛甚豐。能負重百餘斤。鄂倫春俄人馴畜之用。時以木擊樹。或吹木器。聞聲即來。飼以苔。用畢則縱之去。即遊行山中。廣輿記云。鹿產陝西終南山。六書故云。鹿似鹿而大。長尾可為撈塵。解角於長至節。名苑云。鹿之大者曰麋。羣鹿隨之。視其尾為準。其尾能辟塵。拂塵則不蛀。置苜蓿中能

歲久紅色不退云。二。麋。正字通云。鹿狀似麋。但角不歧。毛不斑耳。爾雅謂牛尾一角。誤。三。麋。說文麋。鹿也。六書故云。麋之脂黃。亦謂黃羊。談薈云。麋無脂。掉雅云。麋性怯。飲水見影即奔。本草綱目云。麋秋冬居山。春夏居澤。其狀似鹿而小。無角。毛黃黑色。牡者口外有兩牙。甚長。俗呼牙。白者曰銀。孟詵曰。麋肉八月至十一月可食。餘日動氣。四。方。格致鏡原云。弦超入泰山。見一物似麋而頭似婦人髮。髻簪珥。悉具。歸告瓊。瓊智曰。此方輝也。五百年一見。見者必壽。後弦超果二百餘歲。綜觀以上鹿類二十二種。麋類四種。鹿形異獸四種。計三十種。其間有同種異形者。有同形異種者。其角可入選取非者。不及六七種。錄之以備鑑別參考耳。

配合應用 鹿角法。鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮。臍為末。每服二錢。空心溫酒下。令人少睡。益氣力。通神明。(彭祖方) 治腎消尿數。鹿角一具。炙。搗篩。溫酒每服方寸匕。日二。(外臺 祕要方) 治骨虛勞。極。面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰。髮落齒枯。甚則喜睡。用尾角二兩。牛膝酒浸。焙一兩。牛。為末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒下。(濟生方) 治腎虛腰痛。如錐刺。不能動搖。鹿角屑三兩。炒黃研末。空心溫酒服方寸匕。日三。(肘後方) 治卒腰痛。不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投二升酒中。浸一宿。飲。(梅師方) 治婦人腰痛。鹿角屑。炒黃。研酒服方寸匕。日五六服。(楊氏產乳方) 治妊娠腰痛。鹿角截五寸。長燒赤。投一升酒中。又燒。又沒。如此數次。細研。空心酒服方寸匕。(產寶方) 治產後腹痛。血不盡者。產後燒研。豉汁服方寸匕。日二。(子母祕錄方) 治妊娠下血不止。鹿角屑。當歸各二兩。水三盞。煎減半。頓服。不過二服。(普濟方) 治胎死腹中。鹿角屑三寸匕。

養葱鼓湯和服。立出。(百一選方)

①治墮胎血崩不下。狂悶寒熱。用鹿角屑一兩爲末。鼓湯服一錢。三日須臾血下。(聖惠方)

②治胞衣不下。鹿角屑三分爲末。煮湯調下。(產乳方)

③治產後血暈。用鹿角一段。燒存性。出火毒爲末。酒調。溫下即醒。(楊供醫方摘要方)

④治婦人白濁。滑數虛冷者。鹿角屑炒黃爲末。酒服二錢。(婦人良方)

⑤治筋骨疼痛。鹿角燒存性爲末。酒服一錢。日二。

⑥治食後喜嘔。鹿角燒末二兩。人參一兩爲末。煮湯服方寸匕。日三。(肘後方)

⑦治小兒疳疾。鹿角粉。大豆末等分相和。乳調塗乳上飲之。(古今錄驗方)

⑧治小兒瘧疾。鹿角生研爲末。先發時。以乳調一字服。(千金方)

⑨治小兒滯下赤白者。用鹿角灰。髮灰等分。水服三錢。日二。(千金方)

⑩治小兒重舌。鹿角末塗舌下。

日三。(姚和衆方)

⑪治小兒流涎。脾熱也。鹿角屑末。米飲服一字。(普濟方)

⑫治面上疥癩。鹿角尖磨濃汁厚塗之。(神效方)

⑬治面上風瘡。鹿角尖磨酒塗之。(聖惠方)

⑭治咽喉骨鯁。鹿角爲末含之。嚥津。(斗門方)

⑮治跌跌損傷。血瘀骨痛。鹿角末酒服方寸匕。日三。(千金方)

⑯治竹木入肉不出者。鹿角燒末。水和塗上立出。久者不過一夕。(千金方)

⑰治蠅瘻尿瘻。鹿角燒末。苦酒調服。(外臺祕要方)

⑱治五色丹毒。鹿角燒末。猪脂和敷。(肘後方)

⑲治發背初起。鹿角燒灰。醋和塗之。日五六易。(千金方)

⑳治乳發初起。不治殺人。鹿角磨濃汁塗之。并令人嚙去黃水。隨手即散。(梅師方)

㉑治吹奶掀痛。鹿角屑爲末。炒黃。酒服二錢。仍以梳梳之。(唐氏經驗方)

①治下注脚瘡。鹿角燒存性。入輕粉同研。油調塗之。(集要方)

②治瘰癧腫毒。鹿角尖磨濃汁塗之。甚妙。(瀕湖方)

③治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

④治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑤治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑥治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑦治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑧治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑨治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑩治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑪治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑫治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

⑬治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

古語別名 土肉石華。(郭璞海賦)龍鬚菜。(盛京志)猴葵。(綱目)麒麟菜。石花菜。細如牛毛者名牛毛石花菜。(綱目拾遺)

外國名詞 Chondrus ocosima (日本)

基本 係紅藻類杉海苔族鹿角菜屬之鹿角菜。

產地 生海濱沙石間。

形態 鹿角菜爲水菜類之一種。有紅白二色。紅者長四寸。分枝如又本細而未開。末端純圓。作紫黃色。全形略似鹿角。及珊瑚白者。根叢生長約尺餘。狀如柳而色白。質皆酥脆。可供藥用。

性質 甘。大寒。滑。無毒。

主治 下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論鹿角菜曰。消痰如神。治一切瘡積痔毒。

參攷資料 鹿角菜微毒。丈夫不可久食。久食發癩疾。損腰腎。經絡。血氣。能令人脚冷痺。少顏色。(孟詵) 鹿角菜土人採曝。貨爲

一二七三

十一畫 鹿

海鏡。以水洗醋并。則脹起。如新味極滑美。若久沒則化如膠狀。女人用以梳髮。粘而不亂。石花菜生海中。沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二種。洗去沙土。煮化凝成膏。精膏俱佳。又有細如牛毛者。呼牛毛石花。味稍劣。郭璞海賦。所謂土肉石華是也。(朱排山柑園小識) 龍鬚菜生於東南海邊。石上叢生。狀如柳根。長者至尺餘。白色。以醋浸食。亦佳蔬也。土人呼為麒麟菜。出金州海邊。鹿角菜生東南海中。大如錢線。分丫如鹿角。紫黃色。乾之為海鏡。水洗醋并。則如新味。今金州海邊有之。據志則似一類二種也。(盛京志) 石花膏。毛世洪養生集。治辛苦勞碌之人。或嗜酒多慾。忽生外痔。發作疼痛。步履難移。服此或大便通一週。或不消亦即止痛。可以行走。再用探洗等藥。自能斷根。用麒麟菜洗去灰。一兩。用天泉水煮炸。和白糖五錢食之。此方乃李治還臬司傳靈隱寺僧。杭人蕭成子患此症。僧往候。授以此方。服之隨愈。予記之後。治數人多效。

【鹿角膏】即麥飯石膏之別名。係石膏之一種。功能較通尋常石膏。參詳「石膏」條。

【鹿角膠】 命名 本品係用鹿角熬成之膠。故名。

古籍別名 白膠(本經)食膠。(和漢藥考)

外國名詞 Gelatina cornu oervi (拉丁) Gelatin of Hartshorn (英) Gelatin von Hirsch horn (德)

基本 屬單蹄類為牡鹿頭角所製成之膠。

形態 鹿角膠為無色透明或半透明無氣味之薄片。劣品有腥臭。逢冷水則吸收而膨脹。入熱湯中易溶化。冷之則凝固。再熱之則融化。次分解發惡臭。

採取 七月間採裁。

製法 蘇頌曰。凡使鹿角膠。七月採角。以鹿年久者。其角更好。煮以為膠。入藥彌佳。別錄曰。白鹿生雲中。黃鹿角作之。陶弘景曰。今人少復煮作。惟合角弓用之。其法先以米瀉汁漬七日。令軟。煮煎如作阿膠法耳。又法對角令紙入乾牛

皮一片。即易消爛。不耐雖百年無一熟也。蘇恭曰。鹿角藥角。但煮濃汁煎。即為膠矣。何必使爛。欲求爛亦不難。陶未見耳。孟詵曰。作膠法。須細破寸截。以河水浸七日。令軟。方煮之。雷斅曰。採全角。開。並長三寸。以物盛於急水中。浸一百日。取出。刀刮去黃皮。拭淨。以鹼醋煮七日。旋旋添醋。勿令少軟。成時不用着火。只從子至戌。一日足。角軟如粉。搗爛。每一兩入無灰酒一盞。煮成膠。陰乾研篩用。李時珍曰。今人呼煮爛成粉者為鹿角霜。取粉熬成膠。或以濃汁熬成膏者。為鹿角膠。按胡瑗衛生方云。以米泔浸鹿角七日。令軟。入急流水中。浸七日。去麋皮。以東流水。桑柴火。煮七日。旋旋添水。入醋少許。搗成霜用。其汁加無灰酒。熬成膠用。又韓愈醫通云。用新角寸截。置於長流水中。浸七日。以瓦甎入水。桑柴火煮。每一斤入黃醋半斤。以壺掩住。水少旋添。其角軟。以竹刀刮淨。搗為霜用。孟詵曰。凡用鹿角藥角。並殺段錯屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曬乾搗篩為末。或燒飛

一二七四

為丹服之至妙。以角寸截。混糞於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按推衍功。要藥方。鹿角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煨。再和如此五度。以牛乳和。再燒過。研用。

用法 水化或酒化。或和他藥水煎。或溶化和作丸劑。

性質 甘。平。無毒。

成分 為膠素(Gluein)、軟骨素(Chondrin)等。

效能 滋補肝腎。滋養精血。用作滋補神經衰弱之強壯藥。又治貧血略血。

作用 入胃即與胃酸化合。而凝固。至腸復分解。而被腸壁吸入血中。頗有增加血液之凝固力。

主治 傷中。勞絕。腰痛。羸瘦。補中益氣。婦人血閉。無子。止痛安胎。療吐血。下血。崩中。不止。四肢作痛。多汗。淋瀝。折跌。傷損。久服。輕身延年。

歷代記載 唐甄權藥性本草論鹿角膠曰。男子損氣。氣弱分損。吐血。婦人服之。令有子。

安胎去冷。治渴下赤白。【明】李時珍本草綱目論鹿角膠曰。炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健。悅顏色。又治勞嗽。尿精尿血。瘡癩腫毒。【明】穆希雍本草經疏論鹿角膠曰。白膠是熬鹿角而成。故其味甘氣平。別錄謂溫無毒。氣薄味厚。入足厥陰少陰手少陰厥陰經。經曰。勞則喘且汗出。內外皆越。中氣耗矣。故凡作勞之人。中氣傷絕。四肢作痛。多汗。或吐血下血。皆肝心受病。此藥味甘氣溫。入二經而能補益中氣。則絕傷和。四肢利。血自止。汗自斂也。折跌傷損。則血凝而成病。甘溫入血。通行又兼補益。故折跌傷損自愈。婦人血閉無子。及崩中淋露胎痛不安。腰痛羸瘦者。皆血虛肝腎不足之候。溫肝補腎。益血。則諸證自退。而胎自得所養也。血氣生。真陽足。故久服能輕身延年耳。更治尿血滑精。瘡癩腫毒。及漏下赤白。婦人久服能令有子。【清】黃宮繡本草求真論鹿角膠曰。鹿膠由角煎熬。書載補陽益陰。強精活血。總不出通脈補命門之用。但其性力緩味甘。不能如茸之

力甚峻。蓋茸有通交陽維之功。膠有緣合衝脈之任。膠非藉桂同用。以通其陽。則不能除寒熱驚癇。膠非假龜膠同用。不能達任而治羸瘦腰痛。膠非假地黃當歸同投。不得引入衝脈。而治婦人血閉胎漏。至若膠治傷中絕勞。即茸所謂能主瀾下惡下也。膠之能以補中益氣。即茸所謂能益氣強志也。膠之能以輕身延年。即茸所謂能以生齒不老也。然惟平臟服之得宜。若使純陰無陽。服此反能泥膈。先不免有腹脹飽滿之弊矣。生角味鹹氣溫。生能散熱行血。消腫辟惡。熱能益腎補虛。強精活血。角霜連汁煎乾。書載能治脾胃虛寒便泄。取其溫而不滯。若以煎過膠者代充。其膠既去。服之奚益。鹿胎鹿肉鹿筋。力能補陽。若藥胎藥筋藥肉。則反損陽而傷陰矣。不可不慎。鹿胎須以色淡形瘦者為是。若色深形肥。則為藥胎矣。若色皎白。其胎下唇不若鹿之長於上。則為藥胎。其他獸胎。總與鹿胎不侔。鹿筋亦須辨骨細者為是。粗即是藥筋。不可妄用。【清】張隱庵本草崇原論鹿

角膠曰。鹿茸形如萌芽。有初陽方生之意。鹿角形如劍戟。具陽剛堅銳之體。水熬成膠。故氣味甘平。不若鹿茸之甘溫也。主治傷中勞絕者。中氣因七情而傷。經脈因勞頓而絕。鹿膠甘平滋潤。故能治也。治腰痛羸瘦者。鹿運督脈。則腰痛可治矣。膠能益髓。則羸瘦可治矣。補中者補中焦。益氣者益腎氣也。治婦人血閉無子者。鹿性純陽。角具堅剛。膠質潤下。故能啓生陽。行瘀積。和經脈而孕子也。止痛安胎者。更和經脈而生子也。久服則益陰助陽。故輕身延年。【清】陳修園本草經疏論鹿角膠曰。白膠。即鹿角煎熬成膠。何以本經白膠列為上品。鹿茸列為中品乎。蓋鹿茸溫補過峻。不知白膠之甘平足資也。功用略同。不必再釋。其主婦人血閉止痛安胎者。皆補衝脈血海之功也。輕身延年者。精足血滿之效也。【清】賈九如辨藥指南論鹿角膠曰。鹿角膠性氣與味具厚濁。入腎肝兩經。鹿乃純陽之物。其頭常向尾。善通督脈。其精華在角。以此煎膠。氣味濃厚。精血有力。莫過於此。

非尋常草類所比。故能補精氣。助火衰。與陽道。健腰膝。為壯腎扶肝。捷勝之神物也。蓋阿膠補陰。鹿角膠補陽。功效各奏。 國外學說 日本和漢藥考曰。鹿角膠之製法。將鹿角屑入鐵鍋。加清水燒熱。至角質柔軟。從火撤下。濾過。將其濾液。移於別器。用微火煎熬。至已成餉狀。乃放冷。待其凝固。切斷曬乾。又慮為兒藥性。曰鹿角膠性易消化。有滋養功效。尤以患熱病者。胃腸感動。致疾。嘔吐。下痢。腹痛等症。最有神效。為暴瀉。或失血太過。致精力虛損者之要藥。又醫方名物考曰。鹿角膠滋養潤補。易消化。治熱病類之胃腸感觸。特甚。不勝飲食等症。或兼有嘔吐。下痢。腹痛等症。或失血過多。所致之虛脫症。或加砂糖。梅核汁。列甲殼酒等。使味美。 辨偽 偽藥條辨云。鹿角膠原名白膠。以鹿角寸截米泔浸七日。令軟。再入急流中浸七日。刮去粗皮。以東流水桑柴火煮七日。頻頻添水。取汁澀淨。加無灰酒熬成膏。冷則膠成矣。氣味甘平。主治傷

十一畫 鹿

中勞絕。股痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。市肆有以牛皮黃為膠偽充。一層白色。俗名白頭。氣味類臭黏濁。服之有害。曹炳章曰。按鹿之種類有三。陸佃云。鹿之大者名曰麀。羣鹿以其尾為趨向。其尾可作拂塵。今北人呼為大尾鹿者是也。李潑湖以麀似鹿而色青黑。大如小牛。肉蹄。其目下有二竅為夜眼之說。證之似略有據。然未曾實指其角解於冬也。清高宗帝有鹿角記。言之詳矣。因二物俱解角於夏。乾隆丁亥。長至。齋宿南郊。命侍臣詣南苑。聚木闌之鹿。吉林之麀。大尾之麀。監視之。及五時而麀之角解。麀鹿皆不解。隨傳旨欽天監。改月令之麀角解為鹿角解。此經頒示天下。而人民所共知者也。是麀之尾與麀鹿殊。而角解於長至。地學雜誌云。麀俗稱為四不像。蓋其形似鹿。而牛身馬尾羊蹄。特其首類鹿耳。故得此名稱。清聖祖嘗在壇園中。實驗此物。而改夏小正鹿角解之說。若麀與鹿。則李潑湖所言麀肉蹄四眼之說。亦猶牛黃之於水牛。形稍殊而

其實一物也。且朱子之註孟子。亦曰麀鹿之大者。未嘗分為二也。李春芝云。麀鹿俗名梅花鹿。尤有馬鹿之分。亦屬同類異種耳。新羅雜記云。麀鹿北疆極產之。每冬季多狩獵者。其角於小滿節後。角根發癢。以頭相觸。角即脫落。堆於一處。獵者於深山中。有一獲數百對者。脫角後。越五六日。新茸即生。此時最為貴重。產於拜城之額什克巴什山。漢騰格星山。若焉耆之納刺達嶺。俗稱之曰鹿瀾。言其產鹿之多也。即品質言。尤以產於伊犁之果子溝者為最佳。行銷於內地各藥行。大抵關東出者。其角外皮黃黑色。內白色。有神光。為最佳。湖廣樞縣出亦佳。福建陝西出有雙角單角之分。雙角老者亦佳。單角為次。海南丹山出者。無杈枝亦次。又外洋淡水中出魚角。又名沙角。為鯨魚所變。其色枯白而大。杈枝甚多。為最次。其他煎膠之法。用正鹿角鋸斷。每段約二寸。零通淨。角內灰質洗淨。煎七晝夜。停火。取出骨渣。候冷濾淨。再熬至滴水成珠。取起入方錫盤中。候凝結成塊。取出

以刀切塊。貯藏三年發售。名鹿角膠是也。
近人學說 徐究仁曰。今之談軟骨病者。鮮不以維他命D為治療之要素。且為最新之聖劑。而孰知吾華夏天然之產物。其成效率實有遠超於此者乎。即鹿角膠是。請假一事以徵之。余同鄉有許視者。忽得脚軟不能行。乞余往診。余診其脈。沉濡而細。周身肥白。飲食如常。惟下肢軟弱。跬步不能。毛竅豎起。冷汗時出。按之肌肉。且失溫度。余斷為腎陽虛衰。氣化失周。即唐韓昌黎所謂軟脚病也。為疏金匱腎氣湯十劑。并囑續服鹿角膠。當自效。許依法施治。月餘。果獲全痊。迨十七年春。而舊恙復發。兩足軟冷如故。憶余前次為其治愈之方。雖已忘卻。尚記有鹿角膠一物。遂購服試之。詎服未一月。竟日臻痊愈。按鹿角膠鹹溫無毒。神農本草經名曰膠。李時珍謂其純陽。能通督脈。別錄主腰痛折傷。日華主脚膝無力。孟詵主強骨髓。益陽道。蓋腎主骨。骨為幹。腎藏精。精生髓。以其有強壯腎命之功。故皆主之也。

一二七六

又嘗考其成分。內含磷質。石灰質。膠質。軟骨素等。夫磷質為人身之要素。尤為骨質中選用之靈魂。鹿角膠有增進磷質之功能。又能使石灰質之運化健全。故於軟骨症有特效也。且據近年西人之研究。謂軟骨症之發生。除食料偏乏。維他命外。而因居幽暗之處。亦為一大原因。嘗實驗之於動物。如將該動物飼於暗處。雖食料如常。亦能使生軟骨之病。再次如用充足光線。施於動物之身。則雖常飼以完全不含維他命之食物。該動物亦不至生軟骨之病。其尤奇者。但須特飼養該動物之食料。暴於日光中。即該動物不受日光。亦不至發生軟骨病云云。由此言之。益信軟骨病為陽虛之症。而日光非陽氣之精英乎。鹿角膠非補陽精之藥乎。
配合應用 治勞傷吐血。鹿角膠。牛膝。牡丹皮。麥門冬。地黃。真蘇子。鬱金。白芍藥。當歸。童便。續斷。 治腎虛陽痿。精寒無子。鹿角膠。山茱萸。枸杞子。鹿茸。地黃。麥冬。杜仲。補骨脂。懷山藥。車前子。五味

子、巴戟天、蓮鬚。加入當歸、紫石英、治婦人血閉子宮冷服之受孕。

①治虛勞尿精。白膠二兩。炙為末。酒二升。和溫服。(外臺祕要方)

②治虛損尿血。白膠三兩。炙。水二升。煮一升。四合。分服。(外臺祕要方)

③治湯火灼瘡。白膠水煎令稠。待冷塗之。(斗門方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛陽盛。及有實火者禁用。畏大黃。得火良。

著名方劑 斑龍二至百補丸。大補虛損。壯陽治痿。(青囊方)鹿角、黃精、杞子、熟地、菟絲子、金櫻子、天冬、麥冬、牛膝、椿實子、龍眼肉。共熬成膏。加入煉蜜。調入後藥末。杵合為丸。鹿角霜、人參、黃耆、芡實、茯苓、山藥、知母、熟地、黃肉、五味子。十味共研細末。和前置膏為丸。

【鹿角膠入粥】

主治 助元陽。治諸虛。

【鹿角藤】

古籍別名 白毛刺。不薪木。(綱目拾遺)

形態 鹿角藤為鹿屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人

皮肉。腫痛不休。其根可供藥用。子葉詳見各該條。

性質 大熱。主治 和香糟搗爛。卷風氣。消痞積。

【鹿角藤子】

主治 食之大能醉人。

【鹿角藤葉】

主治 蒸酒服。鑽筋透骨。

【鹿豆】 即鹿蠶之古籍別名。典見郭璞賦。詳「鹿蠶」條。②即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

【鹿豆忠】 即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

【鹿乳餅】

基本 本品係幼鹿腹中之乳餅。

形態 鹿乳餅為母鹿飼子之乳汁。在幼鹿腹內結成餅塊。大如雲南棋子。色微黃。乾者老黃色。其氣甚腥。可供藥用。

採取 候鹿產子時。輒於夜半伺其洞側。鹿乳子必五更。乳畢出洞。至暮方歸。每日祇乳小鹿一次。食乳於腹。結十二小餅。每一時即消一餅。土人候母鹿出洞。即將乳

鹿抱歸剖腹取之。

主治 益命門。強陰氣。理怯弱。虛損。發痘漿。治女子乾血勞。

【鹿胎】

基本 本品為牝鹿之胎。

製法 入藥以真者。酥炙。黃用。性質 甘溫。無毒。

主治 補養下元。虛寒不足。辨偽 張鷟曰。胎中鹿。其嘴、尾、蹄。與生鹿無異者為真。其色淡形瘦者。為鹿胎。若色深形肥者。為藥胎。慎勿誤用。能損真陽。又獐胎與鹿胎相類。但色皎白。且其下唇不若鹿之長於上唇也。其他雜獸之胎。與鹿胎總不相似也。

參攷資料 鹿性補陽益精。男子真元不足者宜之。不特茸角並胎入藥。而全鹿丸合大劑。參耆歸附。大壯元陽。其胎純陽未散。宜為補養。天真。滋益少火之良劑。然須參耆河車。羣佐之。又為得力。如平素虛寒。下元不足者。入六味丸中。為溫補精之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患。但慎勿誤用藥胎。反傷天元陽氣也。(趙學敏)

【鹿胎】 即葱白之古籍別名。典見

綱目。詳「葱白」條。

主治 解諸毒。參攷資料 鹿食藥草。其胎中甕蘗。可療毒也。(時珍)

【鹿虻】 即虻蟲之古籍別名。典見綱目。詳「虻蟲」條。

【鹿神】 即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

【鹿英】 即英草花之古籍別名。典見別錄。詳「英草花」條。

【鹿韭皮】 即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳「牡丹皮」條。

【鹿首】 即敗醬之古籍別名。典見別錄。詳「敗醬」條。

主治 癰腫死肌。溫中。四肢不隨。頭風。通腠理。不可近陰。

【鹿茸】

命名 本品即鹿角之初生者。含血未成骨時。如草之嫩芽故名。

處方用名 關鹿茸。血蠟鹿茸。關茸。毛角。

古籍別名 斑龍。(綱目)鹿蟲。袋角。囊角。茄子茸。九女春。冲天室。嫩鹿茸。(和漢藥考)北查及花名。血包。屬子。叉子。

十一畫 鹿

(北音) 鹿片。血片。風片。骨片。(花名)

外國名詞 Young harts horn (英)

基本 爲單蹄類牡鹿於夏至脫去舊角初生之新角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿茸產中國邊境。以長白山爲最好。關東亦佳。俄屬海參威等處次之。六月見新。

形態 鹿茸爲蒙有毛皮之初生嫩角。柔嫩作茄子狀。類蕈菌。故名鹿茸。外面呈紫褐色。有光澤。中有血管。其在春末解角生茸之際。初起如銀杏狀。漸成梨形及核桃形。北人名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸如茄子形。或如較子形。北人名曰冠子。至較子形。再養數日。急宜取用。此爲第二期。惟此指家畜者而言。如山野者則隨獲取茸。效力更偉。若逾此期。即爲叉子。或曰毛角。而爲第三期。血液枯竭。功力亦薄。

中者。名曰血片。再次層片有峰高。色紫黑。透孔者。名曰風片。最次層與骨毗連。同角相仿者。名曰骨片。
採取 每年於四五月間解角後。採陰乾。
製法 雷斅曰。凡使鹿茸。用黃精自然汁浸兩日夜。漉出切焙。搗用。免湯人也。又法。以鹿茸鋸作片。每五兩用羊脂三兩。拌天靈蓋末塗之。慢火炙。令內外黃脆。以鹿皮裹之。安室中一宿。則藥魂歸矣。乃慢火焙乾。搗末用。日華曰。只用酥炙炒研。寇宗奭曰。茸上毛。先以酥薄塗勻。於烈焰中灼之。候毛盡。效矣。不如此。則火燥傷茸矣。李時珍曰。潛察濟生諸方。有用酥炙酒炙。及酒蒸焙用者。當各隨本方。
用法 與他藥水煎或酒浸。或剉末和作丸劑。
性質 甘溫。無毒。
效能 補元陽。治虛勞。填精血。療接骨。用滋補強壯藥。
主治 漏下。遺血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。(本經)療虛勞。酒酒如瘡。羸瘦。四支酸疼。腰脊痛。

小便數利。洩精。濁血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫。骨中熱直癢。安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。不可近丈夫陰。令痿。(別錄)
歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鹿茸曰。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。炎末。空心酒服。方寸匕。壯筋骨。【明】李時珍本草綱目論鹿茸曰。生精補髓。養血益陽。強筋健骨。治一切虛損。耳聾目暗。眩暈虛痢。【明】經希雍本草經疏論鹿茸曰。鹿茸稟純陽之質。含生發之氣。故其味甘氣溫。別錄言酸微溫。氣薄味厚。陰中之陽也。入手厥陰少陰。足少陰厥陰。經絡人衝任脈虛。則爲漏下。遺血。或瘀血在腹。或爲石淋。男子肝腎不足。則爲寒熱驚癇。或虛勞。酒酒如瘡。或羸瘦。四肢酸疼。腰脊痛。或小便數利。洩精。濁血。此藥走命門。心包絡。及腎肝之陰分。補下元真陽。故能主如上諸證。及益氣強志。生齒不老也。癰腫疽瘡。皆營氣不從所致。甘溫能通血脈。和機理。故亦主之。【明】李士材本草圖解論

一二七八

鹿茸曰。鹿茸鹹溫。腎經藥也。補火助陽。生精益髓。強筋健骨。暖腰壯膝。固精攝便。安胎殺鬼。鹿稟天地純陽之氣。氣化濃密。其角自生。至聖。無兩月之久。大者至二十餘筋。凡物之生。無速於此。故能強陽補骨。非他藥可比也。長大爲角。與茸同功。力少遜耳。【清】黃宮繡本草求真論鹿茸曰。鹿茸甘鹹氣溫。稟純陽之質。含發生之氣。號爲山獸。性淫而遊山。夏至得陰氣而角解。陰生陽退之象也。至於大於鹿者。爲麋。麋是深獸。居陰。性淫而遊澤。冬至得陽氣而角解。陽生陰退之象也。陰陽相反如斯。故鹿氣味純陽。其茸故於右腎。補其精氣不足。大爲補精煖血之劑。是以齊載能補髓養血。強筋健骨。凡腰腎虛冷。遺精崩帶等症。服皆有效。雖離屬陰。而茸又屬陰中之陽。故能入於左腎。補其血液不足。且諸茸皆發督脈之背。若爲腎臟外垣。外垣既固。腎氣內充。命門相火。不致妄動。血氣精津。得以凝聚。故鹿茸又云能補督脈之真陽。藥茸能補腎賦陰中之陽。不可不細爲明辨耳。但

鹿茸與藥茸。世罕能辨。大抵其質粗壯。腦骨堅厚。毛色蒼鷲。而雜白毛者。則爲藥茸。形質差瘦。腦骨差薄。毛色黃澤。而雜白毛者。則爲鹿茸。藥茸雖分有二。然總不外填精補髓。堅強筋骨。長養氣血。而爲補肝滋腎之要藥也。鹿角初生。長二三寸。分岐如戟。紅如瑪瑙。破之如朽木者。良。酥塗微炙。用茸有小白蟲。視之不見。鼻嗅恐蟲入鼻。【清】陳修園本草經讀論鹿茸曰。鹿爲仙獸而多壽。其臥則口鼻對尾間。以通督脈。督脈爲通身骨節之主。腎主骨。故又能補腎。腎得其補。則志強而齒固。以志藏於腎。齒爲骨餘也。督得其補。則大氣升舉。惡血不滯。以督脈爲陽氣之總督也。然角中皆血所貫。衝爲血海。其大補衝脈可知也。凡虧損之病。皆挾衝脈而作。陰氣虛。不能寧謐於內。則附陽而上升。故上熱而下寒。陽氣虛。不能周衛於身。則隨陰而下陷。故下熱而上寒。鹿茸入衝脈而大補其血。所以能治寒熱驚癇也。至於長而爲角。別錄謂其主惡瘡。逐惡氣。以一點胚血。發洩已盡。只有

拓毒消散之功也。【清】徐泗溪本草經百種錄論鹿茸曰。鹿茸之中。惟一點胚血。不數日而即成角。此血中有真陽一點。通督脈貫腎水。乃至靈至旺之物也。故入於人身。爲峻補陽血之要藥。又其物流動生發。故又能逐瘀通血也。鹿茸氣體全而未發洩。故補陽益血之功多。鹿角則透發已盡。故拓毒消散之功勝。先後遲速之間。功效輒異。非明乎造化之機者。不能測度也。【清】閻立陞本草選旨論鹿茸曰。鹿茸味甘鹹。又云苦辛。氣溫無毒。麻勃爲使。合鹿之精髓骨血而成。故能治精髓骨血之病。本草主瀉下惡血。洩精滯血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。能健骨。能生齒。能益氣。強志。及一切虛損耳聾。目暗眩暈。虛利。功用雖多。總不出此意耳。

辨偽 ●鄭育巖曰。鹿茸頂尖帶血者。謂之血柿茸。價值甚昂。聞射利之徒。或用豬尾。或用小腸。和以豬血。搗以雜藥。假造偽充。外形與真無二。及煎熬之後。則糜爛臭穢。可驗而知之。若研末入丸藥。甚難辨識。按鹿茸氣味甘溫無毒。主治漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。爲補骨血益精髓之要藥。藥茸尙不可用。又安用此假柿茸耶。若遇危險重症。服之則貽誤必多矣。●曹炳章曰。按茸者。如草芽初生之狀。麋鹿雌者無角。雄者之角。年解年生。乘其初生含血未成骨時。取以爲補精血藥。因其狀命名也。惟採茸之法。貴乎始生含血者。漸長則成角。不適用。故云宜如茄之小者。分岐則大而不取。此舉茸生初久。形分大小而取。非可指爲鹿之大小解也。凡其氣血者。幼則弱。老則衰。惟壯大者則強。是藥鹿之茸。正當取於壯大之麋鹿。爲貴。當取其頭骨大而茸豐肥。如馬鞍形。稱形者爲最。至茄茸則太嫩而小。寇宗奭已論之矣。再論採取之法。羌海雜誌云。茸鹿一種。天下盛稱關東。其質製法。以西產爲良。品質亦不及西產之厚也。然西產製法。亦未嘗不佳。最上者亦曰旋茸。其法得一生鹿。閉於柵。聚圍

之而呼喚。鹿性燥驚。距奮躑足無停。其體純陽。兩角更甚。約數小時。其熱度達於極點。有力者。猝入以利刃斷其首。長杆丈餘。上穿鐵環。綴八尺之鐵鏈。而以鹿角繫其端。極力搖而旋轉之。甲疫乙易。乙疲丙易。不知其數千萬轉。其精血靈活和勻。無孔不入。無竅不通。稍停則精血凝聚之處。易生微蟲。精血不到之處。元氣不足。非全材矣。此青海採製鹿茸之法也。此指家畜而言。如遇野山之鹿。即隨時又獲取茸。功效尤偉。李春芝云。麋鹿俗呼梅鹿。尤有馬鹿之分。二鹿均能生茸。皆有蠟血片。大抵藥鹿解角後。其新茸芽生之際。初起如銀杏狀。漸成梨形及核桃形。名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸。如茄子形。或如鞍子形。名曰冠子。鞍子稍養數日。急宜取用。此爲第二期。倘逾此期。卽爲叉子。此爲第三期。卽毛角也。血液枯燥。功效已薄。上述藥鹿生茸。關於時際之遲早。以區別其形狀之良窳。再別其每架鹿茸切片時。復有蠟片。血片。風片。骨片之分。如茸之頂尖。最首層

之白如蠟。油潤如脂。名之曰鱗片。次層白中兼黃。純係血液液注其。中故名曰血片。再次層片有蜂巢。色紫黑透孔。名曰風片。俗云木通。片如木通之空通也。最次則與骨。毗連。同角相彷彿。名曰骨片。效力更。薄矣。凡辨原架鹿茸之法。須顏色。紫紅明潤有神。頂圓如饅頭式者。佳。如色帶黃黑。頂上凹陷者。次。東。三省及青海新疆產均佳。浙江衢。州金華出亦佳。偽者以鹿茸架。用。豬血麵粉做成。

近人學說 ●丁福保曰。鹿茸。為峻補之藥。因其中有阿摩尼亞。峻補之功力。不在鹿茸。而在阿摩。尼亞。阿摩尼亞得火則飛。故服鹿。茸之法。應切片浸服。若不知此理。以火煎煮。阿摩尼亞得火飛去。則。無功力。且鹿茸價甚昂貴。真者難。得。西國近年不用鹿茸。專用阿摩。尼亞。以其功力同而價甚賤。平人。不難常食。●曹炳章曰。鹿茸補精。填髓之功效。雖甚偉。服食不善。往。往發生吐血。衄血。尿血。目赤。頭暈。中風昏厥等症。考其原因。其人平。時多陽旺液燥。貧血。虧精。氣血乏。

運。荷服食參茸能用份少。服日多。則助氣養血。有益無損。雖有餘熱。亦不為害。若陽虛陰燥之人。再驟。服大劑。以致有助燥燄陰之弊。蓋。茸為骨血之精。通督脈而上衝於。腦。其上升之性。故如上述之病生。焉。余每遇當用鹿茸之症。有一釐。漸增至數分數錢。每獲安效。此即。大虛緩補之義也。近有富室大老。日以煙霞為友。更有嬌妻美妾為。樂。不知煙色消精燄鬱。氣血亦隨。之枯竭。陽越陰涸。百骸亦因而空。虛。再妄服鹿茸。欲藉其補髓添精。以助慾。不知茸為腦之精華。專注。於上。而週身敗血。亦皆上迫於頭。以致頭痛昏暈諸症生焉。即西醫。所謂腦溢血。實即內經所謂氣血。併走於上。則為大厥是也。總之煙。色虧敗之身。精血枯竭之體。再妄。煖鹿茸行血上竄之峻補。是無異。抱薪救火。安有不戕生傷命者耶。

鹿茸東三省皆產。要色紫紅明潤。頂圓如饅頭形者佳。色帶黃黑。頂。凹陷者略次。新疆雜記云。藥鹿北。疆皆產之。其角於小滿後。馬蘭花。開時。角根發癢。以頭相觸。角即脫。

落。堆於一處。獵者於深山中。有一。獲數百對者。脫角後。越五六日。新。茸即生。此時最為貴重。產於拜城。之額什克巴什山。漢騰格里山。若。焉耆之納喇特嶺。俗稱之曰鹿圍。言其產鹿之多也。即品質言。尤以。產於伊犁之果子溝者為最佳。行。銷於內地各藥行。羌海雜誌云。鹿。茸一種。天下盛稱關東。其實製法。以北產為良。品質實不及西產之。厚也。其他如湖廣涇縣出亦略次。海南丹山出。無杈枝亦次。外洋淡。水處出一種沙鹿。乃鯨魚所變。其。色枯白而大。杈枝多。不能取茸。為。最次。他如福建陝西衢州皆出。皆。能取茸。亦稱道地。日本產者曰洋。茸。為最次。不入藥用。鹿為仙獸。其。足甚捷。行走如飛。故獵者多苦之。每逐一鹿。須費數日之辛勞。倘遇。之則道人四週堵擊。而以首領之。人迎頭猛擊。預伏數人於叢草中。以俟擊倒時。急持其角。否則鹿仆。而茸角自毀矣。必須先取其茸。然。後斃鹿。使鹿茸之血不散。蓋其力。盡在血中也。故茸最難得不破。及。不出血。以如紫茄者為上。名茄子。

茸。大嫩則血氣未具。其實力少。太。老則血液乾枯。亦力薄。惟長四五。寸形如分枝馬鞍。茸端如珊瑚紅。玉。破之。以如朽木者最善。此關東。野鹿。獵獲時取茸之法也。孟詵又。云。鹿茸不可以鼻嗅之。其中有小。白蟲。肉眼視之不見。入人鼻中。必。為蟲類。藥不及救也。據西醫化學。試驗之結果。亦云內含微生菌。實。不宜於肉體。亦無若何功效云。按。鹿茸補精填髓。確有實據。其性質。亦與西醫以肉補肉以血補血之。功同。即內經精不足者補之以味。是也。大抵鹿茸之發生。小白蟲微。生菌者。率多洋茸及陳久次貨。其。中含有多數雜質。不無微菌夾雜。其內。間或有之。可指普通鹿茸皆。如是也。沈存中筆談補云。今人以。藥鹿茸作一種者。誤矣。或刺藥鹿。以代茸用。云茸亦血。更大誤矣。藥。鹿利補陰。鹿茸利補陽。須以他藥。佐之。則有功。凡含血氣之動物。肉。差易長。筋次之。骨最難長。故人自。胚胎至成人。至二十歲。骨髓方堅。惟藥鹿二角。自生至堅。無二月之。久。大者至二十餘觔。一日夜須生。

數兩。凡骨之生。無遠於此。韋草木
易生長。亦不及之。此骨之至強者。
所以能補骨血。堅陽道。益精血也。
頭者諸陽之會。上鐘於茸角。豈可
與凡血爲比哉。李時珍曰。鹿之茸
角補陽。右腎精氣不足者宜之。藥
之茸角補陰。左腎血液不足者宜
之。此乃千古之微祕。前人方法雖
具。而義理未盡闡發。故論者紛紜。
如楊氏家藏方治虛損有二至丸。
兩角並用。其藥性過溫。止宜於陽
虛寒溼血痺諸症。於左腎無與焉。
孫思邈千金方。言藥角丸一百一
十方。惟容成子羔所服者。特出衆
方之外。子羔服之羽化。今觀其方。
比二至丸似可常服。何心得曰。
茸爲國藥。重要補品。習用已久。一
至冬令。天序告藏。宜以服食。補益
精血。行銷頗廣。價值低昂。以種類
異。本國產物。大抵以北地爲上。而
山門亦多。非精於其業者。不能辨
辨。有藥有鹿。性狀各別。藥鹿皆山
獸。凡大山多有此物。滇蜀閩廣。及
國外之暹羅安南南洋英荷各屬
島。俱有出產。顧不能與國產比。緯
度四十以上。氣候最重。其茸壯而

十一 鹿

有力。南洋熱帶。多在緯線三五度
之地。氣候宜發。其茸力薄。惟市上
出售之茸。各產皆有。不可不辨。茲
以素所考驗者。彙而記之。得其大
略。服茸者。若得吾說。而參考之。亦
不爲無益云爾。(一)北鹿茸。身圓
毛黃。身分二又。亦有三四又者。每
年夏至一陰生。則脫換一次。其又
之多者。因年而增。既老則止。盤以
上至少二寸分。又若僅寸外者。則
非正北鹿。皮淡黃帶白。淡黑者亦
有之。頂圓而豐滿。左右相朝對。盤
上珠點分明。門角窄。頂骨薄。肉如
蕪花色。功用則取紫潤圓短肥嫩
者爲佳。否則鹿老而力遜。(二)北
藥茸。身壯。毛帶紫黑色。身分三又。
一寸外便開。又每年冬至一陽生。
則脫換一次。年增一枝。其末分簇。
則與鹿同。頂圓而豐滿。皮淺黑色。
多茸毛。其肉色似桃花。其頂色則
似柿葉。其色如朱。故北人名爲血
柿茸。(三)閩東之鹿茸。身比北鹿
壯些。皮黃有光。毛白如蘆花。身有
紋透頂。深而且現。少血頂。無脚珠。
肉紫青色。通身至合頂處。有小孔
如木通狀。(四)三姓所產之茸。甚

難分辨。似鹿非鹿。似藥非藥。身肥
瘦皆同。北鹿皮紫黑色。毛薄黃色。
肉白而淡青。少血頂。角門闊。頂骨
厚。老嫩亦審其珠點之深淺。(五)
關西之茸。身壯。皮紫黑帶黃。紋淺。
毛粗而白。且皺。珠點凸起。多帶黑
色。頭骨肥壯。不長。附枝亞於正身
之壯。頂尖有血。皮薄。而肉切開。其
色則赤而帶黑。性鬆不黏。(六)家
園茸。禿頂光頭。皮黑帶黃。珠盤極
其分明。其紋淺而不現。少血頂。肉
色淡如枯骨。性硬。毛茸中帶粗。身
瘦不壯。(七)雲南所產之茸。身長
瘦弱。皮黑紋深。皮面如漆之光。少
毛。珠盤下方有粗毛。土黃色。味鹹。
皮肉不相黏。肉鬆而不結。其色如
老糠。食之無益。(八)閩地所產之
茸。身如蕪乾。炊之輒如棉絮。皮色
黑。肉多血色。切片有弦稜。方而不
圓。如金狗脊之形。味香。食之亦稍
有功力。利男子。少婦恐妨礙胎。老
媼合宜。出在建寧台灣等處。所產
不多。故此少見。(九)海南瓊州內
山所產之茸。其身壯大。形體甚異。
附枝多至四五枝。毛片細幼如棉。
其形不潔。毛色紫黑。如艾絨帶黑。

頂上豐滿。少血。皮黑。有些淡黃。其
肉切開。色如死灰。性如烘火。味微
鹹。食之有損無益。(十)安南所產
之茸。嫩則身壯。骨硬。皮紫紅。間帶
黑色。頂嫩小。身材直而不曲。老則
身瘦。皮轉黑色。性溫味辛。肉色白
中有帶黑處。皮薄。珠盤高。甚少毛。
有之亦盤面上些小而已。其色淡
黃。其骨色如碧玉。(十一)暹羅所
產之茸。毛片皮肉。其色皆同安南
之茸。惟安南之茸。身材老而且粗。
暹產則身壯幼。其中亦有血頂者。
切片之時。難分南北。其色皆紅。惟
收貯三五日。其色即退如蜡。北茸
之色不變。其中質賤。即此便可見。
(十二)仰光之茸。身瘦長。毛黃粗。
皮烏黃色。頂少尖者。多結血頂。盤
下大過盤面三分之一。肉色淡黃。
皮薄。味微鹹。切開皮肉脫而不相
連者亦有。(十三)西川所產之茸。
毛幼而黃。身瘦。附枝甚長。頂角帶
青。盤面即開。又多連頂角。肉色同
北藥。味淡。皮色微黃帶烏。(十五)
坤甸之茸。皮黑而薄。毛烏黃而少。
身直。肉色土白。味鹹。紋深且長。血
者亦有。少而不多。實勝越山口洋。

十一 鹿

漫里洞等處所產。身皮毛色。皆不
相上下。所差無幾。總之南洋各地
所產之茸。身直無彎。皮色老而有
光。紋深盤大。珠點凸起。身光少毛。
身小短。重至斤者。絕少。即有亦老
不堪用矣。(十五)高低吧實。宋卡
大年。六坤。萬那老。那老。勿各。卑
檳。深水地所產之茸。身長者。尺五
六。至二尺者。亦百無二。皮色如烏
。獠。毛鳥中帶些白黃。盡皆連盤漸
落。並無單取茸尾者。身材同坤甸
等處所產。相彷彿。認此道者。甚
難分別。惟深水地之茸。味淡而氣
香。因此多蛙。不能貯久。其血頂如
蓮茸。所有南洋之茸。血頂皆同。鹿
茸之功。全在其血中之燐質。硫質。
故能補陽。以前製此藥。往往用火
烘酥。或隔水蒸脆。而後為末。不知
此質一經見火。即行飛散。功力已
去八九。此皆不明化學之故。若以
之錫成寸段。而劈碎之。置於石灰
缸中。收燥後。生藥為末。則原質全
在其功力。必大不同。(但茸不得
留過三年)惟此品。以關東產者
為最。即家畜者。價已不賤。若得野
庄者。更為可寶。否則用川雲所產

者。名曰蔭茸。照此製法。亦有功力。
而價較廉也。

配合應用 ①治腎虛腰痛。及
陰痿不起。鹿茸。牛膝。杜仲。地黃。山
藥。補骨脂。巴戟天。山藥。肉蓯蓉。
菟絲子。

②斑龍丸。治諸虛。用鹿茸。酥炙。
或酒炙亦可。鹿角。膠炒成珠。鹿角
霜。陽起石。煨紅酒。肉蓯蓉。酒浸。
酸棗仁。柏子仁。黃芪。蜜炙。各一兩。
當歸。黑附子。泡。地黃。九蒸。九焙。各
八錢。辰砂。砂半錢。各為末。酒糊丸。
如梧子大。每空心溫酒下五十丸。

(濟安方)

③鹿茸酒。治陽事虛痿。小便頻
數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛
切片。山藥末一兩。絹袋裝。置酒罈
中。七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作
丸服。(普濟方)

④治陰虛腰痛。不能反側。鹿茸
。菟絲子。各一兩。柏苗。香半兩。為
末。以羊腎兩對。去酒。煮爛。搗泥。和
丸。梧子大。陰乾。每服三十五丸。溫
酒下。日三服。(本事方)

⑤治精血耗弱。耳聾口渴。腰痛
白濁。上燥下寒。不受峻補者。鹿茸

酒蒸。當歸。浸酒。各一兩。焙為末。烏
梅肉。黃芩。搗丸。梧子大。每米飲服
五十丸。(濟生方)

⑥治腰膝疼痛。傷敗者。鹿茸。塗
酥。炙。紫為末。每服酒服一錢。(續
千金方)

⑦治小便頻數。用鹿茸一對。酥
炙。為末。每服二錢。溫酒下。日三服。
(鄭氏家傳方)

⑧治虛弱危困。因血氣衰弱者。
鹿茸。酥炙。一兩。為末。入麝香五分。
以燈心。黃芩。肉和丸。梧子大。每空
心米飲下三五十丸。(濟生方)

⑨治飲酒成濕。骨立不能食。但
飲酒即泄。用嫩鹿茸。酥炙。肉蓯蓉
。煨。一兩。生薑。香五分。為末。陳白米
飯丸。梧子大。每米飲下五十丸。名
香茸丸。(普濟方)

⑩治室女白帶。因衝任虛寒者。
鹿茸。酒蒸。焙。二兩。金毛狗脊。白斂
。各一兩。為末。用艾葉。醋打糯米糊
丸。梧子大。每溫酒下五十丸。日二
服。(濟生方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非虛寒者禁用。
鹿茸為之使。

一一八二一

著名方劑 鹿茸丸。治腎臟真
陽久虛。下體痿弱。疼痛。喘嗽。水泛
。為痰。(濟生方)鹿茸。(酒炙)牛膝。
(鹽酒炒)五味子。各二兩。川棟肉。
(酒蒸)山藥。肉桂。杜仲。(鹽酒炒)
澤瀉。(鹽水炒)各一兩。沉香(研)
五錢。上研末。酒和丸。梧子大。每服
七十九。清晨溫酒下。

參攷資料

按濟安方云。昔
西蜀市中。嘗有一道人。貨斑龍丸。
一名茸珠丹。每大醉。高歌曰。尾闕
不禁。滄海竭。九轉靈丹。都慢說。惟
有斑龍頂上珠。能補玉堂閣下穴。
朝野遐傳之。其方。蓋用鹿茸。鹿角
膠。鹿角霜也。又戴原禮。證治要訣。
治頭眩暈。甚則屋轉。眼黑。或如物
飛。或見一為二。用茸珠丹。甚效。或
用鹿茸。甚效。無灰酒。三蒸。煎一盞。
入麝香少許。溫服亦效。云茸生於
頭。類之相從也。(李時珍)鹿茸
夏收之。陰乾。百不收。一旦易臭。惟
破之火乾大好。(蘇恭)南山多
鹿。每一雄遊。化百數。至春羸瘦。入
夏。惟食。百蒲。即肥。當角解之時。其
茸甚痛。獵人得之。以索繫住。取茸。
然後斃。鹿茸之血未散也。(抱朴

子) ①茸最難得不破及不出却血者。蓋其力盡在血中故也。此以如紫茹者為上。名茄子茸。取其難得耳。然此大嫩。血氣未具。其實少力堅者又大老。惟長四五寸。形如分岐馬鞍。茸端如瑪瑙紅玉。破之肌如朽木者最善。人亦將麋角偽為之。不可不察。(寇宗奭) ②鹿字篆文象其頭角身足之形。爾雅云。鹿牡曰麋。音加。牝曰麀。音攸。其子曰麇。音遂。絕有力曰麇。音堅。斑龍名出澗察方。按乾寧記云。鹿與斑龍相戲必生異角。則鹿得稱龍。或以此與梵書謂之密利迦羅。(李時珍) ③鹿處處山林中有之。馬身羊尾。頭側而長。脚高而行速。牡者有角。夏至則解。大如小馬。黃質白斑。俗稱馬鹿。牝者無角。小而無斑。毛雜黃白色。俗稱鹿。鹿孕十月而生子。鹿性淫。一牡常交數牝。謂之聚鹿。性喜食。能別良莠。食則相呼。行則同旅。居則環角外向。以防害。臥則口朝尾間。以通督脈。殷仲堪云。鹿以白色為正。述異記云。鹿千歲為若。又五百歲為白。又五百歲為玄。玄鹿骨亦黑。為脯食之。

可長生也。埤雅云。鹿乃仙獸。自能樂性。六十年必懷瑤於角下。斑痕紫色。行則有涎。不復急走。故曰鹿戴玉而角斑。魚懷珠而鱗紫。沈存中筆談云。北狄有駝鹿。極大而色蒼黃。無斑。角大而文。堅瑩如玉。茸亦可用。名苑云。鹿之大者曰麀。羣鹿隨之。視其尾為準。其尾能辟塵。拂拭則不蠹。置茵席中。歲久紅色不黯也。(李時珍)

鹿茸酒

製法 用鹿茸。山藥。浸酒服。
主治 陽虛痿弱。小便頻數。勞損諸虛。

鹿骨

性質 甘。微熱。無毒。
主治 安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論鹿骨曰。作酒主內虛。續絕傷。補骨除風。【明】李時珍本草綱目論鹿骨曰。燒灰水服。治小兒洞疳下痢。

鹿啣草

產地 九江建昌山中。有之。
形態 綠葉紫背。鋪地而生。面有白縷。略似葦葉。而較長。根亦紫。

可供藥用。

性質 溫。無毒。

效能 入肝腎二經。強筋健骨。補腰腎。生精液。

主治 浸酒治吐血。通經。

鹿脛骨

製法 取脛骨。濯紙包裹。灰火煨之。以黃脆可研為度。若焦黑者。為過性勿用。

主治 生肌收口。為未瘳之。

鹿御草

命名 本品鹿銜之。則病癒。故名。
古籍別名 薇御草。糜御草。(本經) 承蒼草。(別錄) 吳風草。(唐本) 無心草。無願草。承麟草。(吳普)

基本 為鹿御草之莖葉。

產地 凡原野川澤均有出。

形態 鹿御草為溼草類之野。生草本。莖赤色。有風不偃。無風獨搖。葉大如芫蕪。叢生。面綠背青。有毛。花黃色。花後結子。根如黃連。盤屈而生。赤黑色。其子與莖葉。俱可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 風溼癱。歷節痛。驚瀉吐。

舌。悻氣賊風。鼠癩癰腫。(本經) 暴癩。逐水。痲痿。躄。久服輕身明目。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論鹿御草曰。婦人服之。絕產無子。【明】李時珍本草綱目論鹿御草曰。煎水洗瘰癧。疔疽。惡瘡。

參攷資料

糜銜乃素問所用。治風病自汗藥。而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病身熱。懈惰汗出。如浴。惡風少氣。此為何病。岐伯曰。病名酒風。治之以澤瀉。朮各三五分。糜銜五分。合以三指撮。為後飯。後飯者。先服藥也。(李時珍) ④南人謂之吳風草。一名鹿銜草。首鹿有疾。銜此草即癒也。(蘇恭) ⑤據蘇說則薇銜。糜銜。當作鹿銜也。鹿藥一類。按麟道元水經注云。魏興錫山。多生糜銜草。有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當作無風。乃通。(李時珍) ⑥一名無心草。非草之無心者。方藥少用。(陳藏器) ⑦薇銜生漢中川澤。及宛句郢鄢。七月採莖葉。陰乾。(別錄) ⑧此草叢生似芫蕪。及白頭

十一 鹿

豹。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。(蘇恭)

【鹿麻】即五母麻之古籍別名。典見別錄。詳「五母麻」條。

【鹿梨】 古籍別名 貝梨。(詩疏) 山梨(毛詩) 陽糕(爾雅) 羅樹梨 赤羅野梨(綱目) 大梨(日本)

外國名詞 *Pirus calleryana*, Dono. (拉丁) イスナシ ヤナシ(日本)

基本 係薔薇科梨屬。為鹿梨之果實。其根皮詳見該條。

產地 生山野間。
形態 鹿梨為果類之落葉喬木。乃梨之原種。高二三丈。木有紋如羅。赤者紋急。白者紋緩。枝有針葉。大橢圓形。或卵形。邊緣有微細鋸齒。葉柄及葉背。密生軟毛。春日枝梢葉腋。撥簇白色之花。與梨花相似。結實呈球狀如杏。其實可供藥用。

採取 八月採之。
性質 酸。溫寒。無毒。
主治 瘰癧食治痢。

【鹿梨根皮】 性質 酸。溫寒。無毒。
主治 瘰癧疥。煎汁洗之。

【鹿陽生】即玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玄參」條。

【鹿筋】 主治 勞損續絕。
歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論鹿筋曰。塵沙目昧者。嚼爛。投入目中。則粘出。

【鹿腎】 性質 甘平。無毒。
主治 補腎氣。

歷代記載攷證 【宋】日華諸家本草論鹿腎曰。補中安五臟。壯陽氣。作酒及煮粥食之。
【鹿腎粥】 主治 補腎虛諸疾。

【鹿腎膠】 基本 係鹿腎所熬之膠。
性質 甘平。無毒。
主治 婦人血淋帶下。腰膝痠痛。不能受孕。與阿膠摻入服之。餘與鹿腎同。

【鹿胎草】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。
即鹿銜草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹿銜草」條。

【鹿腦】 主治 刺入肉。不出。傳之自出。並入面脂。令肌膚悅澤。

【鹿腸】即敗醬之古籍別名。典見本草。詳「敗醬」條。即玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳「玄參」條。

【鹿葱】即葶草之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳「葶草」條。即藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳「藜蘆」條。

【鹿精】 古籍別名 峻。(韓悉醫通)

主治 補虛羸勞損。
參攷資料 王師授子鹿峻丸方云。鹿稟純陽而峻者。天地初分之氣。牝牡相感之精也。醫書稱鹿茸角血髓有大補益。而此峻則入神矣。其法用初生牡鹿三五隻。苑圃馴養。每日以人參煎湯。同一切草藥。任其飲食。久之。以硫黃細末和入。從少至多。燥則漸減。周而復始。大約三年之內。一旦毛脫筋露。氣盛陽極。却以牝鹿隔苑誘之。欲交不得。則精洩於外。或令其一交。即設法取其精。瓦器收之。香黏如

一二八四

錫。是為峻也。用和鹿角霜一味為丸。空心酒下。大起胎羸虛癆危疾。凡服滋補丸藥。用此入煉蜜和劑。結妙。(韓悉)

【鹿銜】即薇銜之古籍別名。典見綱目。詳「薇銜」條。

【鹿蒨】即參果根之古籍別名。典見別錄。詳「參果根」條。

【鹿劍】即葶草之古籍別名。典見土宿本草。詳「葶草」條。

【鹿虱】即虱產於鹿體者。性質功能。與牛虱同。參見「牛虱」條。

【鹿齒草】即鹿蹄草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿蹄草」條。

【鹿齒】 主治 鼠瘻留血。心腹痛。不可近丈夫陰。

【鹿蹄肉】 主治 諸風脚膝骨中疼痛。不能踐地。同豉汁五味煮食。

【鹿蹄草】 命名 本品葉象鹿蹄。故名。能合金瘡。又名試劍草。
古籍別名 小秦王草。山慈姑。藥王試劍草(綱目) 鹿蹄草(和漢藥考)

外國名詞 *Pirola elliptica*.

Nutt.

基本 屬鹿蹄草科。一藥草之葉莖。

產地 凡山野平原及寺院荒處恒多生焉。

形態 一藥草為多年生常綠草。自生於山野。葉有長葉柄。自地上叢生。作深綠色之橢圓形。大四寸許。脈絡頗深。經冬不凋。夏月抽長七八寸之花莖於上部開白色或紫色之六瓣繖狀花。多下向。



草蹄鹿

用法 搗塗。或抹生葉外貼。

效能 用作止血收斂藥。

主治 金瘡出血。搗塗即止。又塗一切蛇蟲大咬毒。

國外學說 和漢藥考曰。其屬

鹿蹄草科之冬青 (Chinaphila umbellata, Nutt.) 有譯作鹿

蹄草者。但與一藥草實非同物。冬青英名為 Winter green。或

十一畫 鹿

Pipissowa 為常綠草。葉作尖卵

圓形。大二寸許。邊緣有鋸齒。表面作深綠色。裏面稍作青白色。揉碎

新葉有一種臭氣。中含苦味。越幾斯 (Chinaphila) 單寧等。此物

在歐美。用作強壯收斂藥。治腺病。使腐質斯等。由此葉採取之揮發

油。謂之冬青油。無色。或帶紅色。有芳香。味甘。觸舌有溫感。比重為一

·一七至一·一八。沸點為百度。專用於香料。

參攷資料 按軒轅述寶藏

論云。鹿蹄多生江廣平陸。及寺院荒處。淮北絕少。川陝亦有。苗似董

菜。而葉頗大。背紫色。春生紫花。結青實。如天茄子。可用制雌黃丹砂

(李時珍) 揉生葉貼創口。可止血。或毒蟲咬傷。毒蛇咬傷痛甚者。貼之即止痛。(和漢藥考)

【鹿頭肉】 主治 消渴。夜夢鬼

參攷資料 鹿頭可醱酒。須於

作藥時稍益葱椒。(寇宗奭)

【鹿頭酒】 製法 用鹿頭煮爛。搗成泥。連汁和麴米。釀酒飲。少入葱椒。

主治 虛勞不足。消渴。夜夢鬼物。補益精氣。

【鹿糞】 主治 經日不產。乾溼各三錢。研末。煎湯服立效。

【鹿膽】 性質 苦寒。無毒。主治 消腫散毒。

【鹿鼻】 即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【鹿藥】 命名 本品根莖。鹿好食之。故名。產地 出甘肅武陵縣。

形態 鹿藥為山草類之一種。其苗與根皆似黃精。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。主治 療風血。去諸冷。益老起陽。酒浸服。

參攷資料 鹿食九種解毒之草。此其一也。(李時珍)

【鹿菴】 命名 豆葉為菴。鹿喜食之。故名。古籍別名 草菴(爾雅)鹿豆

(郭璞) 登豆。野綠豆。綱目(餓馬黃(俗名) 痰切豆。金雀豆。狐豆。日本)

外國名詞 Rhynchosia vol-

ubilis, Lour. (拉丁) クンキリ

イメ キンチヤクイメ(日本) 基本 係豆科鹿藿屬。為鹿藿之苗葉。

產地 生山野及田澤間。

形態 鹿藿為菜類之多年生莖草本。其莖細長。常卷絡於他物之上。葉有三小葉。葉柄甚長。夏月葉腋着以數花。短總狀花序。蝶形花冠。淡紫色。實為莢果。長五六分。開三分。常含二扁圓種子。色黑。可磨粉熬食。



藿鹿

採取 五月六月採苗。日乾用。

性質 苦平。無毒。

主治 蠱毒。女子腰腹痛不樂。腸癰。瘰癧。癆瘵。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鹿藿曰。止頭痛。

【鹿藿】即葛根之古籍別名。與見別錄。詳「葛根」條。

十一畫 鹿 麥

【鹿類】即砂砂之古籍別名。典見
綱經本草。詳「砂砂」條。

【鹿藿】即木藿藿之古籍別名。典
見綱目。詳「木藿藿」條。

【鹿髓】 製法 煉淨入藥用。
性質 甘溫無毒。

主治 丈夫女子傷中絕脈。筋
急痛。咳逆。以酒和服之良。

歷代記述攷證 【明】日華諸
家本草論鹿髓曰。同蜜煮服。壯陽
道。令有子。同地黃汁煎膏服。填骨
髓。壯筋骨。治嘔吐。【明】李時珍本
草綱目論鹿髓曰。補陰強陽。生精
益髓。潤燥澤肌。

參攷資料 ●鹿髓可作酒。唐
方多有其法。【蘇頌】●鹿髓近方
稀用者。劇繁方。治肺虛毛悴。酥髓
湯用之。御藥院方。滋補藥用。其脊
髓和酒熬膏丸藥。甚為有理。白飛
段醫通云。取鹿腦及豬骨髓。煉成
膏。每一兩。加煉蜜二兩。鍊勻。瓷器
密收用。和滋補丸藥。妙。凡腰痛
屬腎虛寒者。以和古方。摩腰脊。還
汁化一粒。擦腎堂。則暖氣透入。丹
田如火。大補元陽。此法甚佳。人鮮
知之。【李時珍】

知之。【李時珍】

【鹿腎】 主治 氣虛。以酒漬炙
乾。再浸酒中。含麝汁。味
盡更易。十具乃愈。

【鹿尾根】即漏蘆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「漏蘆」條。

【麥文】即麥門冬之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【麥冬】即麥門冬之古方用名。詳
「麥門冬」條。

【麥句豆】即天名精之古籍別名。
典見本經。詳「天名精」條。

【麥曲】即神麴之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「神麴」條。

【麥李子】即李實之與麥同熟。上
有凹痕者。惟核仁性劣。不入藥用。
功能參詳「李子」條。

原名 穠麥蘗。

【麥芽】 命名 本品乃麥子製
令萌出嫩芽。曬乾者。故名。

處方用名 生麥芽。炒麥芽。

古籍別名 麥蘗(和漢藥考)
麴麥芽(新本草)

外國名詞 Malt (英) Malt
(德)

基本 係禾本科植物大麥之
實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
麥芽各省均有出。

製法 麥芽用大麥浸水。至已
柔。先去水。復乾其水氣。乃堆置
五六日。則漸鬱蒸。而生幼根及芽。
此謂之麥蘗。曬乾。炒之。抹去其皮。
以供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 消食。下氣。溫中。除滿。為
助消化之滋養藥。

主治 消食和中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論麥芽曰。破冷氣。去心腹
脹滿。【宋】日華諸家本草論麥芽
曰。溫中下氣。開胃。止霍亂。除煩悶。
消痰飲。破癥結。能催生落胎。【金】
張元素珍珠囊論麥芽曰。補脾胃。
虛。寬腸下氣。腹鳴者用之。【明】李
時珍本草綱目論麥芽曰。消化一
切米麵諸果食積。【明】經希雍本
草經疏論麥芽曰。麥蘗以水漬大
麥而成。其味鹹。氣溫無毒。功用與
米蘗相同。而此消化之力更緊。鹹
能驟。溫主通行。其發生之氣。又
能助胃氣上升。行腸道而資健運。
故主開胃補脾。消化水穀。及一切

故主開胃補脾。消化水穀。及一切

結積冷氣脹滿。如上所言等證也。
好古曰。麥芽神麴二藥。胃氣虛人
宜服。【清】買九如辨藥指南論麥
芽曰。大麥為五穀之長。甘溫入脾。
以此發芽。取其體輕性銳。輕可去
實。銳能消散。炒香開胃。以除煩悶。
生用力猛。主消麥麵食積。癥瘕氣
結。胸膈脹滿。體結痰涎。小兒傷乳。
又能行上焦滯血。若女人氣血壯
盛。或產後無兒。飲乳。乳房脹痛。丹
溪用此二兩。炒香搗去皮。為末。分
作四服立消。其性氣之銳。散血行
氣。迅速如此。勿輕視之。凡痰火哮喘
及孕婦。切不可用。

國外學說 英美學說謂大麥
芽即萌芽之大麥。烤乾而成。其功
用能作潤劑。養生。配麥芽膏用之。
處方。以大麥芽百分粗末。水酌用。
先用涼水一百分。浸六點鐘。再用
熱至八十六度之熱水。四百分。漸
加熱。不過一百三十一度。浸一點
鐘。濾渣。扭汁。入攪鍋。復加熱。不過
一百三十一度。散氣成膏。如蜜形
為度。每服一錢至四錢。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

配合應用 ●消食積。用麥蘗
同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

蒼朮。

快膈進食。麥芽四兩。神翅二兩。白朮。橋皮各一兩。爲末。蒸餅丸。梧子大。每人參湯下三五十丸。

治產後腹脹不通。轉氣急。坐臥不安。以麥蘖一合爲末。和酒服。良久通轉。神驗。(李絳兵部手集方)

治產後青腫。乃血水漬也。乾漆。大麥蘖等分爲末。新瓦中鋪漆。一層。藥一層。重實令滿。鹽泥固濟。煨赤研末。熱酒調服二錢。產後諸疾並宜。(婦人經驗方)

治產後回乳。產婦無子。食乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘖二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下。甚良。(丹溪方)

治穀勞嗜臥。飽食便臥。得穀分病。令人四肢煩重。嘔噦欲臥。食畢輒甚。用大麥蘖一升。椒一兩。並炒乾。薑三兩。持末。每服方寸匕。白湯下。日三。(肘後方)

治腹中虛冷。食輒不消。羸瘦弱。因生百疾。大麥蘖五升。小麥麩半斤。鼓五合。杏仁二升。皆熬黃。香搗篩。糊丸。彈子大。每服一丸。白

湯下。(肘後方)

治產後秘塞。五七日不通。不宜妄服藥丸。宜用大麥芽。炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥間服。(婦人良方)

治妊娠欲去胎。麥蘖一升。蜜一升。服之。卽下。又小品用大麥芽一升。水三升。煮二升。分三服。神效。(外臺秘要方)

用宜忌 凡脾胃虛而無積者禁用。參攷資料 麥蘖、穀芽、粟蘖皆能消導米麵諸果食積。觀造餉者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣也。不可不知。若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。(李時珍)

麥門 卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

麥芽橋餅 卽橋餅之出於國中。漳泉者。典見綱目拾遺。詳「橋餅」條。

【麥門冬】

原名 麥蘖冬。 命名 麥蘖曰蘖。本品根似麥而有鬚。葉如韭而凌冬

不凋。故名。後人簡寫爲麥門冬。 處方用名 麥冬。寸麥冬。寬冬。大麥冬。辰麥冬。

古籍別名 蘖冬。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。禹餘糧。(別錄) 禹韭。忍冬。忍凌。隨脂。僕。 疊不死草。(吳普) 麥文。麥門。門冬。 山管。麥門。東。雄骨木。階前草。(本草綱目) 香嫩草。不死葉。雉鳥老。草。沙草。秀根。冬兒。沙里。安神除枝。(和漢藥考) 瓜黃。蘇冬。(俗名)

外國名詞 Ophiopogon Japonicus.

基本 屬百合科。小葉麥門冬(沿階草)及大葉麥門冬之根。 產地 陳仁山藥物生產辨云。麥門冬產四川錦州者。俗名瓜黃。產浙江杭州者。名蘇冬。清明出新。兩相比較。以蘇冬味爲濃厚。

形態 小葉麥門冬爲山野自生之常綠草。人家階前亦多植之。故有沿階草之稱。形如小蘭。葉作細長形。長尺許。初夏於葉間抽出高四五寸之花軸。開淡紫色六片穗狀花。果實作球形。呈鮮紫色。大葉麥門冬。生於陰溼之地。其形酷

似前者。葉長一二尺。花軸至一尺以上。開淡紫色粗大穗狀花。果實作紫黑色。其根爲黃白色。有鬚根。作連珠形。中貯滋養質。柔潤而有橫紋。

種植 園圃田野恒有栽之。其法四月初採根於黑壤肥沙地栽植。每年六月九月十一月中施用肥料一次。及澆澆之。或種其子亦可。但生成較爲遲慢耳。

採取 二月八月十月間。採根陰乾。

製法 陶弘景曰。凡使麥門冬。須用肥大者。揚澤。抽去心。不爾令人煩。李時珍曰。凡入湯液。以滾水潤溼。少頃。拍去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。卽於風中吹冷。如此三四次。卽易燥。且損藥力。或以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥以酒浸搗之。

性質 甘平無毒。 效能 補肺。養胃。瀉火。生津。用作祛痰藥。及爲和緩滋養藥。 主治 心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身。不老不饑。(本經) 療身重目黃。心下支

十一畫 麥

滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈瘵。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健。美顏色。子(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論麥冬曰。斷穀爲要藥。【唐】陳藏器本草拾遺論麥冬曰。去心熱。止煩熱寒熱。體勞下痰飲。久服輕身明目。和車前地黃丸服。去溼痺。變白。夜視有光。【唐】甄權藥性本草論麥冬曰。治熱毒。大水面目肢節浮腫。下水。主泄精。【宋】大明諸家本草論麥冬曰。治五勞七傷。安魂定魄。止嗽。定肺痿。吐膿。時疾熱狂。頭痛。【金】張元素珍珠囊論麥冬曰。治肺中伏火。補心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳汁不下。【明】繆希雍本草經疏論麥冬曰。麥門冬本經甘平。平者冲和而淡也。別錄微寒。入足陽明。衆入手少陰。太陰。實陽明之正藥。主心腹結氣者。邪熱之氣。結於心腹間也。以其清和微寒而平緩。故能散熱結而下逆氣也。傷中傷飽。以致胃絡脈絕者。脾主肌肉。五臟之氣皆稟於胃。胃病則脾無所稟。故

羸瘦而短氣也。身重目黃者。脾胃溼熱也。心下支滿者。脾虛而滯滯中焦也。虛勞客熱。口乾燥渴者。因虛勞而熱客中焦。故口乾而燥渴。陽明之熱上衝。則象嘔吐也。痿厥者。陽明溼熱病也。陽明溼熱盛。則上熏蒸於肺而爲痿厥。治痿獨取陽明。治本之道也。陰精生於五味。五味先入脾胃。脾胃得所養。則能散精於各臟。而陰精充滿。故能強陰益精也。中焦者。脾胃之所治也。脾胃安則中焦治。故能消穀而調中也。保神定肺氣。則兼潤乎心肺矣。胃氣盛則五臟之氣皆有所稟而安。脾胃俱實。則能食而肥健。脾統血。心主血。五臟之精華。皆見於面。血充臟安。則華彩外發。而顏色美矣。脾胃強則後天之元氣日盛。下氣則陽交於陰。交則虛勞愈而內熱不生。內熱去則陰精日盛。故有子。斷穀固著於仙經。卻乃已疾之良藥。故久服延年。輕身不老。不飢也。【明】李士材本草圖解論麥冬曰。麥門冬甘而微寒。肺經藥也。清肺中伏火。定心竅。煩。理勞瘵。骨蒸。止血熱。妄行。理經枯。乳用。療

肺痿吐膿。潤燥乾煩渴。主用殊多。要不越清肺之功。夏令溼熱。人病困倦無力。身重氣短。孫真人立生脈散。補天元真氣。人參甘溫。瀉熱火而益元氣。麥冬甘寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。瀉丙丁而補庚金。殊有妙用。然胃寒者不敢餌也。去心用。若入丸劑。湯潤搗膏。畏其寒者。酒浸搗。【清】黃宮繡本草求真論麥冬曰。麥冬有類天冬。然麥冬甘味甚多。寒性差少。天冬所主在肺。而麥冬所主。則更在肺而在心。是以書載功能。消痰止咳。解熱除煩。去痿除痺。而又載同人參。則能復脈生津。非合心肺而皆治乎。蓋肺朝於百脈。脈屬心。心燥則肺失養而脈絕。心清則氣即充而脈復。麥冬氣稟清肅。能於心中除煩。譬如人當盛暑。則煩灼不寧。若值秋風一至。則炎熱頓解。而無燥鬱不堪之候矣。至於乳汁不開。用此則能通活。熱血妄行。用此則能即止。他如膈上之稠痰。得此則消。心下之支滿。得此則除。脾有積熱。則化。胃有火嘔。則止。色因血枯。即潤。嗽久不止。即愈。誠保肺之津

梁。清心之指南也。但氣寒而虛人禁用。肥大者良。去心用。入滋補藥酒浸。【清】楊時泰本草述鈞元論麥冬曰。虛勞以二冬爲治肺要藥。他如黃連清心。黃芩清肺。尤不得與麥冬之治虛勞等功。凡病惟上焦陽盛之熱。以芩連直折之。而陰自復。若本至陰之虛。以致陽亢。而復投芩連。則不能和其陽之無依。而反絕其陰之化原。惟此味以清和之性。潤賦之質。回陰燥而透脈。枯。使元陽得以依於陰而不僭。乃爲中的也。雖然。溼潤者。第與燥氣對。柔膩者。第與元氣對。若有胃熱而兼溼滯。抑或陽氣居於卑弱。亦不可施。【清】賈九如辨藥指南論麥冬曰。麥冬色白體濡。主潤肺。味甘性涼。主清肺。蓋肺苦氣上逆。潤之清之。肺氣得保。若咳嗽連聲。若客熱虛勞。若煩渴。若促接。皆屬肺熱。無不悉愈。同生地令心脾清。則氣順。結氣自釋。治虛人元氣不運。胸腹虛氣痞滿。及女人經水枯。乳不下。皆宜用之。同黃芩扶金制木。治虛脹浮腫。同山梔清金利水。治支滿黃疸。又取其四時葉青。凌冬

不潤。長生之物。同小荷錢。清養。以佐少陽生氣。入固本丸。以滋陰血。使心火下降。腎水上升。成坎離既濟。心腎相交之義。

國外學說 日本學說謂為肺臟各病之解熱藥。和漢藥考曰。宇田川椽齋翁譯荷爾藥鏡第十五卷。沙列布條。載有麥門冬之性質。效能略似沙列布。可以代用云。英美學說謂麥門冬產中國之兩江等處。以其根似積麥。故名麥門冬。其根可為藥品。其功用能化痰止咳。與天門冬同。

辨偽 鄭肯巖曰。偽名洋麥冬。色極白。味苦不甜。按麥冬古時野生。凌冬青翠。宛如麥粒。故名麥冬。今江浙多蒔植之。根色黃白。氣味甘平。質性滋潤。稟少陰冬水之精。上與陽明胃土相合。為上品服食要藥。奚容偽物混充。而誤人不少乎。曹炳章曰。按麥門冬。出杭州笕橋者。色白有神。體輕性稀。細長皮光潔。心細味甜為最佳。安撫寧國七寶浙江餘姚出者。名花園子。形短體重。心粗色白帶黃。略次。近時市用以此種最多。四川出者。

十一 麥

色白短實。質重性燥。亦次。湖南衡州耒陽縣等處亦出。名探陽子。中勻。形似川子。亦不道地。大者曰提青。中者曰青提。小者曰蘇大。曰紹大等名目。以枝頭分大小耳。

近人學說 張山雷曰。麥冬產於西北土脈深厚之地。入土深遠。其味大甘。得坤土之正。而膏脂濃郁。故專補胃陰。滋津液。本是甘藥。補益之上品。凡胃火偏盛。陰液漸枯。及熱病傷陰。病後虛羸。津液未復。或炎暑燥津。短氣倦怠。秋燥逼人。肺胃液耗等證。麥冬寒潤。補陰解渴。皆為必用之藥。但稟西北嚴霜之氣。偏於陰寒。則惟熱燥液枯者。最為恰當。而脾胃虛寒。滯陽不振者。亦非陰柔之品。所能助其發育生長。況復膏澤厚膩。荷脾運不旺。反以礙其轉輸而有餘。由滯阻痰凝。寒飲停滯者。固無論矣。本經別錄主治。多就養胃一層立論。必當識得此旨。方能洞達此中利弊。不然者。拘執傷飽支滿。身重目黃等說。一概亂投。自謂此亦古人精義所在。豈不益增其困。別錄又以麥冬主痿厥者。正是內經治痿。獨

取陽明之意。胃主肌肉。而陽明之經。又是足而上。陽明經熱。則經脈弛緩而不收。胃液乾枯。則絡脈失潤。而不利。補胃之津。而養陽明之液。是為治痿起廢之本。但亦有溼流關節。而足廢不用者。則宜先理其溼。又與滋潤一法。迥迥相對。不知辨別。其誤尤大。別錄又謂其定肺氣。而後人遂以麥冬為補肺主藥。蓋以肺家有火。則滋胃之陰。以生肺金。亦是正法。參麥散一方。固為養胃保肺。無上妙品。然肺為貯痰之器。乾燥者少。溼潤者多。設使痰氣未清。而即投黏膩。其害已不可勝言。而麥冬又滋膩隊中之上將。或更以沙參玉竹二母等柔潤甘寒之物。輔之。則盤踞不行。闕為窟宅。而清肅之肺金。遂為痰飲之淵藪矣。麥冬本為補益胃津之專品。乃今人多以為補肺之藥。雖曰補土生金。無甚悖謬。究之。其所以專主者。固在胃而不在肺。寇宗奭謂治肺熱。亦就肺家有火者言之。柔潤滋液。以療肺熱。葉焦亦無不可。日華謂主肺痿。固亦以肺火熾盛者言之也。然又繼之曰吐酸。則

係肺痿矣。究之肺痿肺癰。一虛一實。虛者乾痰。實者痰火。麥冬潤而且膩。可以治火燥之痿。不可治痰塞之癰。最平和之。遂以肺癰肺痿。併作一氣。則虛實之不分。豈非大謬。且肺癰為痰濁與氣火交結。咯吐臭穢。或多膿血。宜清宜降。萬無投以滋膩之理。即使如法清理。火息痰清。咳吐大減。肺氣已呈虛弱之象。猶必以清潤為治。誤與膩補。痰咳即盛。餘屑復張。又臨證以來。之歷歷可據者。而肺痿為肺熱葉焦之病。若但言理法。自必以補肺為先務。然氣虛必咳。咳必迫火上。升而胃中水穀之液。即因而亦化為痰濁。故肺雖痿矣。亦必痰咳頻仍。略吐不已。惟所吐者。多涎沫而非痰。潤之。痰是亦止。宜清養肺氣。漸理其燥金之火。使但知為虛。而即與黏膩滋補。則虛者未必得其補益。而痰火即得所憑依。反致愈咳愈盛。必至碎金不鳴。而不復可救。此沙參玉竹。麥冬。知母等味。固不獨肺痿肺癰所大忌。即稀痰之肺痿。亦必有不可誤與者。皆俗醫之所不知者也。又麥冬本非治

咳嗽之藥。本經別錄。鑿鑿可據。自日華有止咳一說。而景岳亦謂其治肺乾咳嗽。推其用意。亦謂乾咳無痰。則為氣火利金。麥冬滋潤退熱。夫豈不可特咳嗽一證。雖有虛實寒熱之分。而挾痰挾溼者。十恒八九。乾咳無痰者。十不一二。即使本是無痰。而誤投滋膩。則氣火交結。痰濁遂滋。適以助其黏膩。而邪無從泄。凡屬咳病。必肺氣鬱密。不能宣通。因而作聲。以求開泄。止宜順其機以導之。用輕揚疏達之品。如桑葉。葉。葉。兜鈴。木蝴蝶之類。助其開展。則咳聲得達。痰吐滑利。其勢即解。誤與滋膩。則痰邪為其閉塞。昔賢比之如油入麵。不可復出。最是確論。石頑亦謂陰虛為咳。喘嗽上氣。失音失血。及風寒暴嗽。大非所宜。正是此旨。蓋痰濁得其滋。燥則無論為風為寒。為外來之邪。為內蘊之熱。皆膠黏固結。牢不可破。永永閉網於肺中。後雖欲開泄之。而不可得。遂致成癆。結之根。時時寬鬆。試問肺葉嬌嫩。而能堪此日常之激動乎。勞瘵之由。強半在此。石頑又謂癆疹咳嗽。亦不

可用此。因性寒助陰。適以固斂。陽邪不能發越。尤為剝切。且咳病有服麥冬。必致音啞。是其陰寒斂邪入肺之明證。所以凡有咳證。麥冬等味。真是燒毒。徐靈胎嘗大聲疾呼。而人多不覺。近世名醫如葉天士。費伯雄。皆犯此禁。未始不誤於日華止咳之一說。而陳藏器且以此物為下痰飲。景岳亦更有消痰一說。則尤為殺人之利刃。今之俗醫。又誤於葉氏指南。費氏醫醇等書。恒以製造勞瘵為事。所見治咳一方。隨此弊者。比比而是。甚矣醫學之不昌。雖曰自昔已然。未免於今為烈。曷禁感慨係之。日華又謂麥冬治五勞七傷。蓋亦本經主傷中之意。養胃滋陰。生津益血。夫執非調和五臟之正治。然以為服食之品。調養於未病之先。則可。若曰勞傷已成。而以陰柔之藥治之。又非陽生陰長之旨。且勞損之病。雖曰內熱。然亦是陰虛而陽無所附。補脾之氣。助其健運。尚能擊其中堅。而首尾皆應。往事滋潤養陰。則陰寒用事。而脾陽必敗。不食泄瀉等證。必不可操券以俟。越人所謂

適中不治之病。又皆陰柔之藥。有以釀成之矣。

配合應用 ①麥冬、人參、五味子為生脈散。能復脈通心。夏月暑傷氣服之。良。酒後飲之。解酒毒。肺熱者。去人參。加甘枸杞子作飲。治一切虛勞客熱。

②麥冬、五味子、枸杞、地黃、牛膝、鱉甲、酸棗仁、天冬。治五勞七傷。胃強者可加當歸。火盛者可入黃蘗、砂仁、甘草三物。俱選減。

③治陽明瘧大渴引飲。煩燥或嘔吐。麥門冬、石膏、知母、竹葉各數兩。病人虛者。加人參兩許。痰多者。加貝母、橘紅各兩許。

④藥性論云。麥門冬。止煩渴。主大水。面目肢節浮腫。下水。治肺痿吐膿。宜同天門冬、慈苳仁、黃蘗、芍藥、茯苓、石斛、桑根白皮、五味子、牛膝、黃芩、續命。止泄精。宜兼覆盆、黃連、石斛、磁石、澤瀉。療心腹結氣。身重目黃。

⑤日華子治五勞七傷。安魂定魄。止渴肥人。時疾熱狂。頭痛止嗽。故同石苻、知母、竹葉、粳米。專療時

氣頭痛。大渴煩燥及發狂。甚者須各數兩。濃煎飲。乃佳。虛羸人因作勞內傷而發者。可量加人參。名人參白虎湯。有肺熱者。勿入人參。⑥麥冬黃連治消渴。〔指元亮海上方〕

⑦治心肺虛熱。虛勞客熱。入沙參、五味子、同青蒿、鱉甲、牛膝、地黃、芍藥、天門冬、枸杞子、五味子、胡黃連、山藥、茯苓、山茱萸、蜜丸。治骨蒸勞熱。〔衍義方〕

⑧治勞氣欲絕。用麥門冬一兩。甘草炙二兩。粳米半合。煎二枚。竹葉十五片。水二升。煎一升。分三服。〔南陽活人方〕

⑨治吐血衄血。諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取自然汁。入蜜二合。分作二服。即止。〔活人心鏡方〕

⑩治衄血不止。麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服立止。〔保命集方〕

⑪治齒縫出血。麥門冬煎湯漱之。〔蘭室寶鑑方〕

⑫治咽喉生瘡。脾肺虛熱上攻也。麥門冬一兩。黃連半兩。為末。煉

蜜丸梧子大。每服二十丸。麥門冬湯下。(普濟方)

①治乳汁不下。麥門冬去心。焙為末。每用三錢。酒磨厚角約一錢許。溫熱調下。不過二服便下。(熊氏補遺方)

②治下痢口渴。引飲無度。用麥門冬去心三兩。烏梅肉二十個。細剉。以水一升。煮取七合。細細呷之。(必效方)

③治金石藥發。用麥門冬六兩。人參四兩。甘草炙二兩。為末。蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。(本草圖經方)

④治男女血虛。麥門冬三斤。取汁熬成膏。生地黃三斤。取汁熬成膏。等分。一處瀉過。入蜜四之一。再熬成瓶收。每日白湯點服。忌鐵器。(醫方摘要方)

用蜜 錢半至三錢。

⑤用宜忌 凡脾胃虛寒而大便溏薄者禁用。惡款冬、苦茗、苦菜、青蘗、木耳、伏石、鐘乳、地黃、車前為之使。

⑥著名方劑 麥門冬湯。治上焦傷風。開其腠理。上焦之氣。慄悍滑

十一 壹 麥

疾。遇閉即出。經氣失道。邪氣內著。故成瀉氣之症。瀉氣即瀉風。俗名熱髓頭。(三因方)麥冬、生蘆根、竹茹、白朮各五兩。炙草、茯苓各二兩。人參、陳皮、葶藶各三兩。上九味。每服四錢。薑五片。陳米一撮。煎熱服。⑦麥冬湯。治火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。此湯主之。(金匱方)麥冬一升。半夏七升。人參、甘草各二兩。粳米三合。大棗十二枚。上六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

麥門冬治肺熱之功為多。其味苦但專泄而不專收。寒多人禁服。治心脾虛熱及虛勞。與地黃、阿膠、麻仁。同為潤經益血。復脈通心之劑。與五味子、枸杞子。同為生脈之劑。(冠宗爽)⑧六月間溼熱方旺。人病骨乏無力。身重氣短。頭眩眼黑。甚則痿痺。故孫真人以生脈散。補其天元真氣。脈者人之元氣也。人參之甘寒。潤熱火而益元氣。麥門冬之苦寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。瀉丙火而補庚金。兼益五臟之氣也。(李杲)⑨按趙繼宗儒醫精要云。

麥門冬以地黃為使。服之令人頭不自。補髓通腎氣。定喘促。令人肌體滑澤。除身上一切惡氣不潔之疾。蓋有君而有使也。若有君無使。是獨行無功矣。此方惟火盛氣壯之人服之相宜。若氣弱胃寒者。必不可餌也。(李時珍)⑩麥門冬葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及隄坂。肥土石間久廢處。二月八月十月採根陰乾。(別錄)⑪出江寧者小潤。出新安者大白。其苗大者如鹿葱。小者如韭葉。大小有三四種。功用相似。其子圓碧。(陳藏器)⑫所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。四季不凋。根黃白色。有鬚在根。如連珠形。四月開淡紅花。如紅蓼花。實碧而圓如珠。江南出者葉大。或云吳地者尤勝。(蘇頌)⑬潤肺除熱清心。為心肺虛熱之神品。以甘先入脾胃。故又為陽明之正藥。本經謂其主羸弱者。胃病則脾無所稟。而肌肉不生。別錄謂其療身腫目黃。心下支滿。能消殺調中者。蓋脾胃之熱去。則溼除而諸症愈。脾胃安而能食肥健矣。(顧松園)

【麥門冬】即麥門冬之古籍別名。與見和漢藥考。詳「麥門冬」條。【麥斛】即石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。【白茅根】即白茅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白茅根」條。【麥黃】即黃蘗之古籍別名。典見綱目。詳「黃蘗」條。【麥藜藤】產地 麥地間。多有之。形態 麥藜藤。為蔓草類之一種。形似神仙對坐草。莖蔓麥上。葉對生而尖。微有毛。葉有大小兩種。以莖細節微紫而葉小者。可供藥用。採取 四月採之。主治 跌撲損傷。乾者酒煎服。命名 本品狀如握麥。故名。外國名詞 Maianathih 產地 生溪中麻石間。形態 麥飯石為石類之一種。其形大小不等。或如拳。或如雞卵。或如盞。或如餅。有粒點如豆。如米色黃白。採取可供藥用。性質 甘。溫。無毒。主治 一切癰疽。發背。

十一畫 麥 麻

一二九二

參攷資料 大凡石類。多主癰疽。世傳麥飯石膏。治發背瘡甚效。乃中岳山人呂子華秘方。裴員外嗜之。以名第河南尹。脅之以重刑。呂寧絕榮望。守死不傳其方。取此石碎如碁子。炭火燒赤。投米醋中。浸之。如此十次。研末篩細。入乳鉢內。用數人更碾五七日。要細膩如麵。四兩。鹿角一具。要生取連腦骨者。其自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令烟盡即止。為末研細二兩。白斂生研末二兩。用三年米醋入銀石器內煎。令魚目沸旋。旋入藥在內。竹杖子不住攪熬。一二時久。稠稠得所。傾在盆內。待冷。以紙蓋收。勿令塵入。用時以鷄翎拂膏於腫上。四圍赤處盡塗之。中留錢大洩氣。如未有膿即內消。已作頭即撮小。已潰即排膿如湯水。若病久肌肉爛落。見出筋骨者。即塗細布上貼之。乾即易。逐日瘡口收斂。但中隔不穴者。即無不差。已潰者。用時先以豬蹄湯洗去膿血。故帛搥乾。乃用藥。其瘡切忌手觸。動嫩肉。仍不可以口氣吹風。及腋氣。月經有孕人見之。合藥亦忌此等。

初時一日一洗一換。十日後可二日一換。此藥要研極細方有效。若不細塗之。即極痛也。此方孫真人千金月令已有之。但不及此詳悉耳。又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡。取粗黃石如鷄卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。常有屑落。醋中再燒再淬。俟石至盡。取屑日乾。搗篩極細末。和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之煉石法。用敷瘡腫。無不應驗。(蘇頌)

【麥炒】原名 麩。本品係麥炒成者故名。

古籍別名 糗。(綱目) 性質 甘。苦。微寒。無毒。主治 和水服。解煩熱。止洩。實大腸。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論麥麩曰。治寒中除熱渴。消石氣。 【麥麩】即錐雞之古籍別名。典見綱目。詳「錐雞」條。 【麥藍子】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【麥穗】即山嬰桃之古籍別名。典見吳普本草。詳「山嬰桃」條。 【麥蘗】即麥芽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥芽」條。 【麥門冬】即麥門冬之原名。詳「麥門冬」條。

【麥糗】即小麥麩之古籍別名。典見綱目。詳「麥麩」條。

【麥豐】係香豐之一種。多生溪邊沙壤中。味鮮美適口。形狀頗類蕨。性質功能。亦與香豐同。參見「香豐」條。

【麥饌】即吐鐵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「吐鐵」條。

【麥類】即茶之最嫩者。性質功能。與尋常茶同。參見「茶」條。 【麻】即大麻之原名。詳「大麻仁」條。

【麻子仁】即大麻仁之處方用名。詳「大麻仁」條。

【麻尼】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【麻衣接骨】產地 多生山背陰地及山麓山溪間。

形態 麻衣接骨為接骨草類

之一種。形似土牛膝。較雨後發苗。葉似芋麻而青不白。對節生。節下則粗如鶴膝。作紫黯色。甚脆。折之從粗節處視之。紫透中心。可供藥用。

性質 溫。

主治 行血。跌打損傷。

參攷資料 接骨草數種。俱產深山洞隙旁。近地罕得。人家間有種之者。然麻衣接骨。每不易得。玉節骨性涼味甘。而補能和中調血。生髓益津。其功不僅專治折損。麻衣接骨。性溫而行血。惟專治折損。故人多不傳其種。(趙學敏)

【麻伯】古籍別名 君苣。衍草。道止自死。(別錄)

產地 出陝西諸地。

形態 麻伯為芳草類之一種。狀如剛。其葉厚而黑。內白。莖實皆赤黑色。其根可供藥用。

採取 九月採之。

性質 酸。無毒。

主治 益氣止汗。 【麻沸湯】即熱湯之古籍別名。典見仲景全書。詳「熱湯」條。 【麻油】即胡麻子油之簡稱。詳「

胡麻子油」條。

【麻油半夏麴】 原名·麻油麴。本品爲半夏麴之一種。

製法 用半夏入麻油。浸三五日。炒乾爲末。和麴草宜七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 虛咳內熱。勞嗽之痰。

【麻油麴】即麻油半夏麴之原名。詳「麻油半夏麴」條。

【麻勃】即大麻花之原名。詳「大麻花」條。

【麻枯餅】即胡麻之古籍別名。與見類目。詳「胡麻」條。

【麻紙】即胡麻枯餅之古籍別名。與見類目。詳「胡麻枯餅」條。

【麻紙】 命名 本品係用麻製成之紙。故名。

主治 止諸血。燒灰用。餘與楮紙同。

【麻茶澤】即無其子之古籍別名。與見類目。詳「無食子」條。

【麻葉】即豌豆之古籍別名。與見類目。詳「豌豆」條。

十一 壹 麻

【麻雀】即雀之老而斑者。與見類目。詳「雀」條。

【麻黃】 命名 本品味麻色黃。故名。

處方用名 炙麻黃。

古醫別名 龍沙(本經)卑相。卑鹽(別錄)赤根。狗骨。中央節。土中黃節。土(和漢藥考)豆福草(日本)

外國名詞 Ephedra vulgata, Rich. var. helvetica, H. et T. (拉丁)

基本 屬麻黃科。爲麻黃之莖。產地 隴仁山藥物生產辨云。

麻黃產北口八達嶺一帶。山上野生。三伏時採掘。和漢藥考曰。產中國。印度。西伯利亞。南非洲等處。



形態 麻黃狀如木賊。莖高二三尺。莖間有節。有細小之鱗白枝分出。夏日莖梢開黃色之單性花。結實如百合。類似皂莢。子味甜。外

皮紅。裏仁黑。其根作紫赤色。長者近尺。似木質。粗約如指。其莖似木賊而細。其色淡綠。內部空虛。亦有稍充實者。味有收斂性。令舌稍麻。

採取 立秋或三伏中採莖陰乾。令青。

製法 陶弘景曰。凡用麻黃。折去節根。水黃十餘沸。以竹片掠去上沫。令人煩。根節能止汗故也。

性質 苦溫。無毒。

成分 藥理學博士長井長義曾見麻黃中含有一種植物鹽。基名之曰愛泛特林 (Ephedrine, C₉H₁₇NO)。

效能 開腠理發汗。利小便。行水。用爲止痢之收斂藥。近時用爲麻醉性之鎮咳祛痰藥。又治急性氣枝管炎。

作用 在胃腸中能收縮胃腸之血管。以阻止其蠕動。入血中能致血壓增高。心跳加速。內臟之血管均被激而收縮。惟以腎臟之血管收縮爲最甚。而外部皮下之微血管。因強心增其鼓出之力。使血液自然轉運於外。故外部皮下之微血管。反被激而放大。而汗腺之

分泌遂此增多。氣枝管之抽搐。亦被激而鬆弛。故能平喘治咳。

主治 中風傷寒頭痛。溫病發表出汗。去邪熱氣。止咳逆。止氣除寒熱。破癥堅積聚(本經)五臟邪氣。緩急風。脇痛。字乳餘疾。止好睡。通腠理。解肌瀉邪惡氣。消赤黑斑毒。不可多服。令人虛(別錄)

張仲景之發明 麻黃一味。經張仲景之實驗。認爲主治喘咳水氣也。旁治惡風。惡寒。無汗。身疼。骨節痛。一身黃腫。茲考徵如下。

麻黃湯證曰。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。甘草麻黃湯證曰。裏水。麻黃醇酒湯證曰。黃疸。以上三方。麻黃四兩。或三兩。而爲君藥。

大青龍湯證曰。惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁。越婢湯證曰。惡風。一身悉腫。越婢加朮湯證曰。一身面目黃腫。越婢加半夏湯證曰。其人喘。目如脫狀。(以上四方。麻黃皆六兩)。

麻黃杏仁甘草石膏湯證曰。汗出而喘。壯熱湯證。(牡蠣)即甘草麻黃湯。而加牡蠣。湯方也。牡蠣治動氣。蜀漆主逐水。然則世所謂瘧疾。動

氣在上而喘者。此湯主之也。外證
稔要特云吐痞而不舉其證。茫乎
如舟行無津涯矣。(以上二方。麻
黃皆用一兩) ⑤葛根湯證曰。無
汗惡風。⑥小背龍湯證曰。心下有
水氣咳而微喘。⑦烏頭湯證曰。歷
節疼痛。(以上三方。麻黃皆三兩)
⑧麻黃附子甘草湯證。⑨麻黃附
子細辛湯證。(麻黃附子甘草湯
麻黃附子細辛湯二方。其條所謂
少陰病者。惡寒甚也。而有無汗之
證。故用麻黃也。)(上二方麻黃皆
用二兩) 歷觀此數方。麻黃主治
喘咳水氣也明矣。故其證而惡風
惡寒。無汗身疼。骨節痛。一身黃腫
者。用麻黃皆治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論麻黃曰。治身上毒風。癢
痺。皮肉不仁。主壯熱溫疫。山嵐瘴
氣。【宋】大明諸家本草論麻黃曰。
通九竅。調血脈。開毛孔。皮膚。【金】
現元素珍珠囊論麻黃曰。去營中
寒邪。洩衛中風熱。【明】李時珍本
草綱目論麻黃曰。散赤目腫痛。水
腫風腫。產後血滯。【明】羅希雅本
草經疏論麻黃曰。麻黃療傷寒。為

解肌第一。專主中風傷寒。頭痛溫
病。發表出汗。去邪熱氣者。蓋以風
寒溼之外邪。客於陽分皮毛之間。
則腠理閉拒。榮衛氣血不能運行。
故謂之實。此藥輕清成象。故能去
其壅實。使邪從表散也。咳逆上氣
者。風寒鬱於手太陰也。寒熱者。邪
在表也。五臟邪氣緩急者。五緩六
急也。風脇痛者。風邪客於脇下也。
斯皆衛實之病也。衛中風寒之邪
既散。則上來諸證自除矣。其曰消
赤黑斑毒者。若在春夏非所宜也。
破癥堅積聚。亦非發表所能。潔古
云。去營中寒邪。洩衛中風熱。乃確
論也。多服令人虛。走散真元之氣
故也。【明】李士材本草圖解論麻
黃曰。麻黃辛甘而溫。氣味俱薄。輕
清上浮。入手太陰。足太陽二經。去
營中寒邪。泄衛中風熱。通利九竅。
宣達皮毛。消癥毒。破癥結。止咳逆。
散腫脹。按麻黃輕可去實。為發表
第一藥。惟當冬令在表。真有寒邪
者。始為相宜。雖發熱惡寒。苟不顯
疼身痛拘急。脈不浮緊者。不可用
也。雖可汗之症。亦當察病之重輕。
人之虛實。不待多服。蓋汗乃心之

液。若不可汗而誤汗。雖可汗而過
汗。則心血為之動搖。或亡陽。或血
溢。而成壞症。不可不慎。致致。服
麻黃而汗不止者。以水浸髮。仍用
撲法即止。凡服麻黃。須避風寒。
不爾復發難療。去根節。煮數沸。掠
去上沫。沫令人煩。節能止汗。故
也。【清】黃宮繡本草求真論麻黃
曰。麻黃辛溫微苦。中空而浮。入足
太陽膀胱。兼入手太陰肺。仲景用
此。以治寒入太陽無汗。其意甚深。
蓋緣津液為汗。汗即血也。在營則
為血。在衛則為汗。寒傷營。營血內
澀。不能外通於衛。衛氣固密。津液
不行。故無汗。發熱而惡寒。方用麻
黃甘草同桂枝。引出營分之邪。達
之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。是
麻黃雖太陽發汗重劑。實散肺經
火鬱之邪。其在十劑。有曰輕可去
實。葛根麻黃之屬是也。但桂枝則
解太陽風邪。傷衛。葛根則解陽明
肌熱口渴。柴胡則發少陽陽邪。寒
熱往來。此則能發太陽陰邪。傷營。
不可不細辨也。發汗用莖去節。止
汗須用莖節。並給粉粟米等分為
末。袋裏撲之。【清】賈九如辨藥指

南論麻黃曰。麻黃枝條繁細。雖主
性較。形體中空。空通腠理。性味辛
溫。辛能發散。溫可去寒。故發汗解
表。莫過於此。屬足太陽膀胱經藥。
治傷寒初起。皮毛腠理寒邪。壅遏
營衛。不得宣行。惡寒拘急。身熱躁
盛。及頭腦巔頂。頭項脊中。腰背遍
體。無不疼痛。開通腠理。為發表散
邪之主藥。但元氣虛弱。及勞力感
寒。或表虛者。斷不可用。倘誤用之。
自汗不止。筋傷肉爛。為亡陽症。難
以救治。至若春分前後。玄府易開。
如患足太陽經症。彼時寒變為溫
病。甚為減用。入六神通解散。通解
表裏之邪。則營衛和暢。若夏至前
後。陽氣浮於外。膚腠開泄。人皆氣
虛。如患足太陽經症。寒又變熱。病
不可大發汗。使真氣先泄。故少用
四五分。入雙解散。微解肌表。大清
其裏。此二者。乃劉河間玄機之法。
卓越千古。若四時暴感風寒。閉塞
肺氣。為咳嗽聲啞。或鼻塞胸滿。或
喘急痰多。用入三拗湯。以發散肺
邪。奏功甚捷。若小兒疹子。常解散
熱邪。以此同杏仁發表清肺。大有
神效。

國藥學說 日本學說謂麻黃
從來爲發汗劑。所常用之藥品也。
明治十八年之頃。長井博士用析
之。發見一種類鹽基名曰「エド
ロリン」。化學的記號爲 $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{NO}$ 。
以濃厚鹽酸處理之。則分
解而生「ベンヂールメチール
ケトン」及「メチールアマン」
夫「エドロリン」之主作用。
在散大瞳孔。此爲高橋三浦兩氏
所確定。緒子氏亦參預其實驗者
也。其作用因刺戟瞳孔散大神經
(頸部交感神經)之末梢。或瞳孔
開大筋。緒子氏與高橋氏共施行
之於動物試驗云。投小量之「エ
ドロリン」則散大瞳孔之外。
不見特殊之作用。然與大量。則發
全身之痙攣。此時血壓大高。但「
エドロリン」與「アトロピ
ン」等相反。其毒性極少。故點眼
之際。無中毒之虞。因「エド
ロリン」而瞳孔散大。不能長久。故
可以之檢查眼底。通常以二%至
四%之鹽酸「エドロリン」溶
液。爲點眼用。至「エドロリン」
與汗液分泌之關係。緒子氏曾與

高橋氏共施行試驗一二次。然未
能詳悉。麻黃中。殆更有促發汗之
成分歟。(和漢藥論)麻黃越幾
斯者。中外醫學新報第三百五十
二號有西尾重氏所記述。今摘記
其要云。麻黃爲古方葛根湯中之
主藥。其發汗之效。全歸麻黃。此世
人所共知也。長井氏云。自麻黃中
發見一種類鹽基。其成分爲「エ
ドロリン」(中略)故余發一
思想。自麻黃製出麻黃越幾斯。以
供藥用。即於麻黃二三〇・〇加
水。凡三時許。用強火煮沸之。至其
水止之中。而濾過之。又於其殘渣
加水。煮沸而濾過之。混和此濾液
於前液。在文火上。使之蒸發。至得
適宜之稠度而止。則可得有第二
稠度之越幾斯凡五〇・〇。此越
幾斯。極富於黏稠性。其色爲黑褐
色。味苦。有顯著之麻黃香味。其性
爲弱酸性。服用時。爲丸藥用之尤
便。凡疾病要發汗者。如因感冒而
發之急性鼻加答兒。急性咽喉加
答兒。急性氣管支加答兒。慢性質
斯。急性腎臟炎等。最宜用之。服用
此藥之一定量。就發汗後。被發汗。則

始覺全身溫暖。顏面及耳之邊緣。
尤覺溫暖。次即發汗。其發汗所需
之時間。與服他種發汗劑時。無大
差異。同時唾液之分泌。亦若稍過
於平時。但不甚顯著。又尿之分泌。
亦大增加。尿有麻黃臭。此尿至少
至二十四時許。尚有特別之臭氣。
又汗中亦有麻黃之臭氣。發汗之
多少。關係於服用麻黃越幾斯之
多少。固已。然有極確實之結果者。
服之覺全身溫暖。此時心臟之機
能。尤進。脈搏之數增加。至發汗既
終。則復如故。其副作用之可記者。
如高橋三浦兩氏所研究。若稍侵
害眼之調節作用。發汗後。凡二十
四時許。閉覽細字書籍。覺眼之疲
勞。殊甚。然檢眼之瞳孔。不見特別
散大。此外別無副作用。試執些少
麻黃越幾斯。插入貓之眼結膜內。
自眼瞼上按摸之。經過數十分時。
則顯見瞳孔散大。此當爲麻黃越
幾斯中之「エドロリン」作用
於瞳孔者。而麻黃越幾斯發汗之
效。與別種發汗劑。如水楊酸。達
「ピロカルピン」。「ヤボランジ」
藥。互相比較。其發汗之多量。確與

「ピロカルピン」及「ヤボラン
ジ」藥相勞。然「ピロカルピ
ン」及「ヤボランジ」藥之副作
用。能令人嘔吐。及唾液之分泌過
多。尿道痙攣等。致覺不快。又水楊
酸。其發汗不及「ピロカル
ピン」之確實。且發汗後致耳鳴。
故對於副作用。以麻黃越幾斯爲
佳。然其作用於心臟機能。若用大
量。則比「ピロカルピン」危險之
度爲幾何。非更研究與實驗。不易
列明。用通常量。不致有他危險。而
發汗之效甚確實。古方之用麻黃。
已數千年。良有以也。故余勸人自
麻黃製出麻黃越幾斯。而供藥
用。並望日本藥局方中。後來宜將
此藥加入之。余製出之麻黃越幾
斯。通常量一回一・〇至二・〇。
比麻黃原品。爲與五・〇至一〇
・〇相當。若與更大量。則發汗過
多。非體格強壯偉大者。不可使用
也。又和漢藥考曰。日本不產此物。
皆自外國輸送。武藏國豐島郡之
水邊沙地。產有一種類似麻黃之
物。根似細筋。具有黑色紋理。莖似
木賊。自來代麻黃用之。實則恐係

十一畫 麻

十一 罌 麻


罌木賊科之節節菜 (Equisetum longatum, Willd.) 也。又古方藥品考曰。麻黃來自外國者祇一種。其莖堅。色淡綠。氣味澆。咀之。舌上覺麻痺者為上品。又有和麻黃者。似麻黃而輕虛。味淡薄。非真品也。松玄達云。麻黃日本亦有之。然功能不同。當價貴時。藥商每對和麻黃及燈心草。摻和雜賣。甚難辨認。

辨偽 鄭育巖曰。麻黃始出晉地。今榮陽。汴州。彭城諸處皆有之。氣味苦溫無毒。春生苗纖勁直。外黃內赤。中空有節。如竹形。宛似毛孔。故為發表出汗聖藥。市肆有以蘆草偽充。氣味既別。力甚毫無重症用之。不免貽誤。曹炳章曰。按麻黃九十月出新。山西大同府。代州邊城出者。龐大。外青黃而內赤。色為道地。太原陵壠縣。及五台山出者。次之。陝西出者。較細。四川滑州出者。黃嫩。皆略次。山東河南出者。亦次。惟關東出者。細硬。蘆多不入藥。若蘆草偽充。更為害人矣。近人學說 袁淑範曰。麻黃亦名龍沙。又名卓相。卓鹽狗骨。亦


根。產自歐洲。印度。及我國為特多。野生於蒙古地方。屬麻黃科植物 Ephedra Urig. Aris Rich. Far. Holboellia Hook. et Thoms 之莖。形甚細。小呈鱗狀。有收斂性之味。與一種麻痺性之香氣。麻黃古來在吾皇漢醫界為用作發汗之要藥。張仲景治傷寒有麻黃湯。葛根湯及大小青龍湯皆用麻黃。治肺痿上氣有射干麻黃湯。厚朴麻黃湯皆重方也。麻黃湯。麻黃二錢。桂枝一錢三分。甘草六分。杏仁十個。葛根湯。葛根一錢半。桂皮。甘草。芍藥各七分半。麻黃一錢。小青龍湯。麻黃。芍藥。細辛。乾薑。甘草。皮各一錢半。五味子。半夏各二錢。大青龍湯。麻黃五錢。桂皮。甘草。杏仁。石膏三錢。近年來在新醫界中。皆用含有麻黃之製劑為鎮咳。祛痰。及喘息治療藥。其聲價愈增高。茲者余以關於麻黃從來之實驗。藥物學的研究為基礎。少述麻黃之醫治效用及其藥理。幸而為臨床醫家用藥上之參考資料。抑或得為關於麻黃治驗知識之交換。並吾國已得有數千年來之經驗。

而有大效之漢藥研究上。苟有所裨益。則我國之古文。明藉此可以發揚。國粹因之而得保存。此著者之初望也。麻黃藥用之起源。雖遠在四五千年前之神農本經。然其科學的研究。則為近來之發見。即距今三十餘年前。日本長井義博。士。先梅氏及史氏等。自麻黃中分離一種植物鹼。名曰 Ephedrin。此即今日所謂麻黃之有效成分也。其化學的性狀。亦依長井博士及泰西諸大家等研究證明矣。即其藥物學的作用。亦由高橋三浦兩博士。廣瀨。大津。久保田。杜氏等研究闡明無遺矣。(一) 麻黃之有效成分。麻黃中約含有 31.0% 之 Ephedrin。其製法。先將麻黃用鹽酸性水浸出之。後濃縮其浸出液。再加石灰使之乾燥成粉末。用酒精浸出時。Ephedrin 即移行於此。浸出液中矣。再依普通之植物鹽分離法處置之。其鹽基。顯現為無水透映針狀之結晶形。依長博士之研究。謂 Ephedrin 之藥學的構造。類似副腎素 (Adrenalin)

1196



Adrenalin



Ephedrin

其藥物學的作用二者亦甚相似。據久保田。大津等之研究。謂其注 Ephedrin 於靜脈內時。因末梢血管之收縮。起血壓之上升。其作用雖不及 Adrenalin 之強。然富於持久性。又作用 Ephedrin 於氣管支筋。腸管等時。由交感神經末梢之刺激及肌肉之麻痺。起弛緩散大。又以此點。眼時。刺戟。眼交感神經。使瞳孔放大。此外對於骨骼筋及心臟等。亦有相當之使用。而其對於金線蛙及家兔之致死量。為對體重一毫 0.400.5 瓦。(二) 麻黃與發汗作用。麻黃古來即用作發汗之主藥。神農本草經謂麻黃苦無毒。主治傷風。傷寒。頭痛。溫病。發表發汗。去熱邪氣。止咳逆。上氣。除寒熱。又大明謂麻黃通九竅。調血脈。開毛孔。皮膚。古方藥品考謂麻黃解寒逐溼除疼。臨

認有能排多量之水分於體外。然同書後段謂麻黃氣藥之驗達也。然前人單爲發汗之藥。余蓋考之。非有發汗之能矣。張仲景曰。發汗後不可更行桂皮湯。汗出而喘無大熱者。麻黃甘石湯主之。可以徵也。不認麻黃有發汗作用。麻黃古來吾漢方醫家常用做發汗劑。而近年日本西尾重研究麻黃醇之發汗作用。似有所得。今試介紹於下。在就寢前用麻黃之一定量。後將全身少溫覆之。則初覺全身溫暖。次則發汗所要之時間。與服其他之發汗劑無甚大差。其發汗量關係於麻黃醇服用量之多寡。然其發汗量多而且凝實等。則勢歸於 Pilocarpin 及 Sabolandi 葉等。當服麻黃醇感全身溫暖之時。有心悸亢進脈搏增加等症候。至發汗終時則復舊態。其副作用似少有侵害眼之調節機能。此在發汗後二十四時間覺困細字書籍時。每覺多疲勞感。然此時不認有瞳孔散大作用。由此西尾氏常用麻黃醇於急性鼻炎。急性咽喉炎。急性氣管支炎。俱麻質斯。急性

十一畫 麻


腎臟炎等認有確實之發汗作用。藉此可證數千年來經驗古醫方之不謬矣。如上述多數之漢醫家。雖認麻黃在臨牀上有發汗作用。然在近代之實驗藥物學上。果有發汗作用與否。未聞有一定之研究成績報告。最近早川氏曾在南滿醫學會雜誌第十一卷第七號上就麻黃及其有效成分 Ephedrin 與發汗作用之關係有所報告。同時多依歐哥民氏將貓足部密閉於硝子筒內。流通乾燥空氣於此筒內。將皮膚放散之水分悉導之於鹽酸鈣內。再稱量之。與適用試驗液前之水分放散量比較測定之。而檢其成績時。注鹽酸 Ephedrin 〇・〇五以下於靜脈內時。全不起發汗作用。用〇・〇七瓦以上時。每回雖能證明發汗。然依詳細之實驗觀察時。此亦是大量之 Ephedrin 刺戟中樞神經之一徵候。麻黃或 Ephedrin 似無有令汗腺或汗腺神經使之起發汗作用。從來關於汗腺之分泌。有種種之異說。蘭氏主張汗腺分泌神經只存於交感

神經內。武藤氏謂依滿氏等則主張交感神經與副交感神經之二重分布說。然在實驗藥物學上。汗腺分泌神經對於毒藥之關係。全與一般交感神經之關係相異。對於副腎素 (Adrenalin) 不起何等之刺戟徵候。而對於副交感神經毒之 Pilocarpin atropin 等則起作用。在多數報告例中。因 Adrenalin 之注射。勿論動物或是人類皆有發汗之例。特別吾人感有興味的爲武藤氏之實驗。氏謂注射 Adrenalin 於羊馬等時。皆起甚劇烈之發汗。而 Ephedrin 之化學構造及藥物學上的作用均近似於 Adrenalin。故如早川氏之所說。謂麻黃與 Ephedrin 雖難認有特發性的發汗作用。然在一定之病的條件之下。特先將麻黃製爲浸劑或煎劑。與多量之液體一同服用時。始得認其發汗現象。亦非難想事也。如此以麻黃爲優秀發汗劑之諸醫家。之貴重經驗與麻黃及 Ephedrin 雖認有特發的發汗作用。二者之孰是孰非。尙待今後之研究。

本草有麻黃根氣味甘平無害。止汗。夏月雜粉撲之。又曰。麻黃根節甘不能止汗。效如影響。望發汗氣。既不能禦。物理之妙。不可測度。如此。由是麻黃根應用於盜汗及虛汗等。其作用正與麻黃相反。麻黃自根而生。其作用相反。亦屬有興味之事也。關於麻黃根尙未有詳細之藥物學的研究報告。今試製麻黃根之浸液。注於動物血管內。時。能使血壓下降。其作用正與麻黃相反。再依麻黃根浸所行之試驗。成績列斷時。麻黃根對於血壓之作用外。大多數皆與麻黃相等。無此根中含有之血壓下降物質比較。依簡單之藥物的操作。即可變爲血壓上升性質。故其有效成分。亦屬與 Ephedrin 相近似之 Alkaloid 歟。暫記於此。以待後之研究。(三) 麻黃與利尿作用。麻黃於發汗作用之外。古書多記載其有利尿作用。服用時能增尿之排泄。有治水腫及浮腫之效。西尾氏言尿之分泌。依麻黃確實能增加。排泄有麻黃臭之尿。佐藤也博士報告。以麻黃之煎劑

(一〇一一〇〇)用於慢性腎
臟炎時有著明之利尿作用。麻黃
有利尿作用否。果若有利尿作用
是依如何之藥理而起。至今日尙
未有實驗的研究報告。按麻黃有
血壓上升作用。在一定之時間內
流通腎臟血管內之血液量亦當
增加。故謂有利尿作用。非不可能
之事也。然依大津及久保田氏之
實驗。麻黃有效成分 Ephedrin
之血壓上升作用。由收縮末梢血
管而起。然在犬之腎臟血管通流
試驗時。Ephedrin 反收縮腎臟
血管。果如上述。則其有利尿作用
不得不旁求解說。麻黃中含有之
Ephodrin 及其他以外之物質。
有能刺戟腎臟血管之作用歟。但
以麻黃製成藥劑或其他之藥形
服用時。多攝取液體能增各腺之
分泌及利尿與其他一般藥劑相
同。(四)麻黃之與瞳孔散大作用
麻黃之有效成分 Ephodrin 有
散瞳作用。夙為三浦博士所報告
據博士之研究。謂 Ephodrin 散
瞳作用於短時間內即能消散。決
不似 Atropin 類點眼時時長數

日。且在此時決無侵犯眼圍筋
之害。故用於眼底檢查時。定優於
Homatropin 而其散瞳作用。又
非動眼神經及瞳孔收縮之刺戟。
專基於眼交感神經末梢之刺戟。
長井博士在人工的合成 Epho-
drin 之時。得一種比 Ephodrin
少一 Methyl 基之一新 Alkaloid
因命其硫酸鹽謂 Mydrinatin



Ephodrin



Mydrinatin

而此物據三浦博士之研究。謂比
Ephodrin 之瞳孔散大作用強
大。今以其一〇%液點眼時。二十
分後起瞳孔散大作用。五十分其
作用達至極點。至五時間則漸次
恢復。二十—三十時間後則可完
全復舊。如新 Mydrinatin 之散
瞳作用。其恢復容易與 Himo-
tropin 異。不起眼圍筋之麻

痺作用。故在點眼後亦不起不快
感及羞明等徵候。又水居博士亦
推獎 Mydrinatin 為卓越之瞳
孔散大藥。然 Mydrinatin 在現
今眼科界中。有不歡迎者何故。非
其在臨牀上。有劣於其他之散瞳
藥者乎。(五)麻黃之鎮咳祛痰作
用。麻黃主治肺氣喘。咳嗽。痰喘
胸滿等。皆為古醫聖所傳之學說
也。古醫家多記麻黃湯。青龍湯。麻
黃甘石湯等。以麻黃為主藥之藥
劑。皆有祛痰鎮咳之效。近年日本
石野寬吉氏應用左記處方之麻
黃劑於喘息症。常得佳良之結果。
處方。麻黃(一〇〇〇)一〇〇〇。
〇。稀鹽酸五液。單含利別六〇。
上一日量。四回分服。然麻黃非有
根治喘息之效。麻黃之主要成分
Ephedrin 與 Adrenalin 相
同。對喘患恐係屬對症的作用。溯
Adrenalin 有治氣管支喘息之
特效。初依卡氏及汲氏等之提倡。
此後東西多數之學者。臨牀家多
確認其作用雖屬一過性。然有著
效。而關於藥理雖有多數之實驗。
要之皆由 Adrenalin 作用於

氣管枝筋使之弛緩。故其體積亦
開大。在氣管支筋弛緩時。微數之
Epinephrin 亦容易奏效。此顯然
之理也。又 Epinephrin 能對抗
肺循環之阻血。即左心房內腫之
增加。又氣管支點膜中血管收縮
等。亦屬不可爭之事實也。而麻黃
中含有構造及作用皆與 Epine-
phrin 相類似之 Ephedrin。故
麻黃即 Ephedrin 應如 Adre-
nalin 對於氣管支喘息有效力。
此極顯著之理也。義依大津及久
保田氏之動物實驗。得有極富興
味之成績。即先將家兔用實雷斯
方法測定其呼吸量。再注如 Ma-
karia, Elixoerpin, Winkapo-
dion 等種藥毒於家兔。使起氣
管支痙攣。後再注麻黃之生成分
Ephedrin 於家兔時。雖在注射
痙攣毒途中亦能除去痙攣。使呼
吸漸次恢復。又將牛之氣管支筋
抽出。養於 Ringer's Solution
中。作用 Epinephrin 常見現地痙
攣作用。然在先用痙攣毒使之起痙
攣。後再作用 Epinephrin 於該筋
其痙攣作用愈顯著。又檢 Epine-

之強烈。然其直歷上昇作用。富於持久性。故其效力能少持久。亦不難推想之理也。喘息之原因。雖有種種。然不論其原因如何。主症候終不外乎氣管支節之痙攣。故能作用於其末梢使之弛緩之物質。即使其作用屬一時的。對治療上亦應有著干之效果。喘息症。如因肺循環變。氣管枝黏膜充血等之血行障礙時。則不但使氣管支節弛緩。即因其血壓作用。亦能除去其血行障礙。此是吾國數千與經驗之療實。為喘息症要藥之實驗的根據。亦屬實驗藥物學上有與麻之事實也。○張澤霖曰。考麻黃一物。本草均謂主治傷寒喘咳等症。功能發汗。並未有利熱之說。然則古人豈不知此。而讓西人來發明哉。蓋亦有意焉。夫汗者。液也。小便亦液也。麻黃能發汗。其作用為持液液體於外。使炭氣不致逗留。體溫適其常度。故我國醫以之為肺病要藥。實其利尿之作用。亦如此也。設若單就小便癱閉。則麻黃非但不能治。且可以增

十一畫 麻

病。何則。小便不利。其原因多端。大都由於溼熱下注膀胱所致。若不知而治以辛溫之麻黃。其不慎事者。幾希。必也審詳其誘因。參合其脈症。知其小便不利。確由汗孔閉塞。肺之治節不行。斯時與麻黃治之。則效如桴鼓矣。西人謂有刺戟腎臟血管之功用。增加尿量之排泄。實則知其然而不知所以然之說也。○張山雷曰。麻黃質輕而空疏。氣味俱薄。雖曰性溫。然淡洎殊甚。故輕浮上升。專走氣分。凡風寒溫熱之邪。自外感而來。初在氣分者。無不治之。雖古今皆以為發表之藥。仲景列之於太陽篇中。然表即皮毛之部。而皮毛即合於肺。總之外來之邪。皆自外入。傷於皮毛。則曰表病。觸於口鼻。則曰氣病。而皮毛合於肺。口鼻通於肺。肺又專主氣之出納。故外感之第一步。皆氣分先受其病。無論風寒溫熱之邪。肺家首當其衝。表病即氣病。氣病即肺病。寒邪則鼻塞身重。瀉寒發熱。溫邪則鼻燥氣濁。肌膚灼熱。且必多兼咳嗽。寒邪則咳聲不揚。溫邪則咳痰不滑。又皆感邪犯肺

傷氣之明證。是以治外感之病。第一要著。即在輕瀉肺邪。疏達氣分。無不立解。惟麻黃輕瀉上浮。專疏肺鬱。宣洩氣機。是為治感第一要藥。雖曰解表。實為開肺。雖曰散寒。實為泄邪。風寒固得之而外散。即溫熱亦無不賴之以宣通。觀於本草經主中風傷寒。去邪熱氣。除寒熱之說。及後人并治風熱斑疹。熱痺不仁。溫瘧嵐瘴。其旨可見。而俗人猶以為專主表寒之猛劑者。誤矣。且仲景麻黃湯之專主太陽病寒傷營者。以麻黃與桂枝並行。乃為散寒之用。若不與桂枝同行。即不專主散寒發汗矣。抑麻黃之瀉肺。亦不獨疏散外來之邪也。苟為肺氣鬱窒。治節無權。即當藉其輕揚。以開痺者。如仲景甘草麻黃湯之治寒水黃腫。千金麻黃醇酒湯之表熱黃疸。後人以麻黃治水腫氣喘。小便不利諸法。雖曰皆取解表。然以開在內之閉塞。非以逐在外之感邪也。又凡寒邪鬱肺。而鼻塞音啞。熱邪壅肺。而為濁涕鼻淵。水飲液肺。而為面浮喘促。火氣灼肺。而為熱熱息粗。以及燥火內

燥。新涼外束。乾咳聲啞等證。無不恃以為疏達肺金。保全清肅之要務。較之香貝苦降。桑皮杷葉等之過抑閉塞者。功罪大是不侔。而庸俗畏之。幾如蛇蝎。豈真古今人之不相及耶。蓋昔耳食之談。而未嘗體驗之耳。李涵湖本草綱目。麻黃發明一條。極言其為肺金專劑。申明仲景麻黃湯之功用。本不專為散寒發汗而設。謂傷寒無汗之用。麻黃湯。雖治太陽。實即治肺。蓋汗為津液所化。汗即血也。其在營則為血。在衛則為汗。寒邪傷營。則營血內滯。而氣不能外通於衛。衛氣閉塞。津液不行。故無汗發熱而憎寒。風邪傷衛。則衛氣外泄。而不能內護其營。營氣虛射。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮毛者。肺之合也。肺主衛氣。包羅一身。是其證雖屬太陽。而肺實受其病。其症必兼面赤。拂鬱咳嗽。有痰喘而胸滿。非皆肺病之明驗乎。蓋皮毛外閉。而邪熱內攻。則肺氣鬱窒。故以麻黃甘草同桂枝引出鬱分之邪。達之肌表。佐以杏仁。滋肺而利其氣。汗後

十一畫 麻

大熱而喘者。則加石膏。朱肱活人書有云。夏至後加以石膏。知母。是皆泄肺火之藥。則麻黃湯雖曰太陽發汗重劑。而實為發散肺金火鬱之藥。其說極是。於此可見麻黃湯之發汗。更重在桂枝。而麻黃之治。則其主在肺。而不在表。尤彰彰明矣。又曰。麻黃性質最輕。氣味又淡。本草雖曰苦溫。亦因其功用而懸疑之。不過言其溫和升發之義耳。乃流俗畏之。幾以為大溫大熱之藥。則李瀕湖綱目性熱一言誤之也。甚且謂其出產之地。冬不積雪。而魏氏經疏。更為過甚之詞。竟有氣味大辛大熱之說。又謂自春深以至初秋。法所同禁。今試取麻黃而細嚼之。辛味何在。考古今各案本草別錄。謂微溫。則輕浮證實。必稟春升溫和之氣。最為有據。惟張潔古稱其性溫味苦甘辛。然亦謂其氣味俱薄。不知魏氏何忽一變而為大辛。且加以大熱二字。似此危詞。聽最是駭人。實屬荒謬。已極。而俗人聞聲却步。大率為此

汗。此則治驗以來。鑿鑿可據者。且亦惟寒邪在表。乃宜少少取汗。以解表邪之寒熱。若用以泄肺閉。亦且無取乎得汗。而奏效甚捷。何況輕揚之性。一過無餘。亦必不能大汗頻仍。留戀藥力。釀為巨患。景岳已謂今人長為毒藥。而不敢用。又有謂夏月不宜用麻黃者。皆可晒也。瀕湖又謂凡服麻黃藥。須避風一日。不則病恐復作。亦是臆說。不足徵也。

配合應用 治天行熱病。初起一二日者。麻黃一大兩。去節。以水四升。煮去沫。取二升。去滓。若米一匙。及鼓。為稀粥。先以湯浴後。乃食粥。厚覆取汗。即愈。(必用方) 治傷寒。麻黃十斤。(去節) 杏仁四升。(去皮熬) 大黃一斤十二兩。先以雪水五石四斗。漬麻黃於東向窻釜中。三宿。後納大黃。攪勻。桑薪煮至二石。去滓。納杏仁同煮。至六七斗。絞去其滓。置銅器中。更以雪水三斗合煎。令得二斗四升。藥成丸。如彈子大。有病者

(千金方)

治傷寒。黃疸。表熱者。麻黃醇酒湯。主之。麻黃一把。去節。綿裹。美酒五升。煮取半升。頓服。取小汗。春月用水煮。(千金方)

治寒水黃腫。張仲景云。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。甘草麻黃湯。主之。麻黃四兩。水五斗。煮去沫。入甘草二兩。煮取三升。每服一升。重覆汗出。不汗。再服。慎風寒。有患氣急。久不瘥。變成水病。從腰以上腫者。是宜以此發汗。(千金方)

治水腫。脈沉。屬少陰。其脈浮者。為氣虛。脈者。為氣。非水者也。麻黃附子湯。汗之。麻黃三兩。水七升。煮去沫。入甘草二兩。附子炮一枚。煮取二升。每服八分。日三服。汗。(金匱方)

治風痺。冷痛。麻黃去根。五兩。桂心二兩。為末。酒二升。慢火熬。如饑。每服一匙。熱酒調下。至汗出。為度。避風。(聖惠方) 治小兒慢脾風。因吐瀉後而

三〇〇

煨為末。二歲以下一錢。三歲以上半錢。薄荷湯下。(聖惠方)

治尸咽痛。麻黃。語聲不出。麻黃以青布裹之。燒烟筒中。熏之。(聖惠方)

治產後腹痛。血下不盡。麻黃去節。為末。酒服。方寸匕。一日二三服。血下盡。即止。(子母秘錄方)

治心下悸。病。半夏麻黃丸。用半夏。麻黃。等分。末之。煉蜜丸。小豆大。每飲服三丸。日三服。(金匱方)

治痘瘡。倒靨。寇宗奭曰。鄭州麻黃。去節。中兩。以蜜一匙。同炒。良久。以水半升。煎數沸。去沫。再煎。去三分之一。去滓。乘熱服之。避風。其瘡復出也。一法。用無灰酒煎。其效更速。仙源縣。筆工。李用之。子。病斑。瘡。風寒。倒靨。已困。用此。一服。便出如神。

治中風。諸病。麻黃。一升。去根。以東流水。三石。三斗。以淨。鑊。盛。五斗。先煮。五沸。掠去沫。逐漸。添水。盡。至。三五斗。漉去。麻黃。渣。定。澀。去。滓。取。清。再。熬。至。一斗。再。澄。再。濾。取。

取汗熱時要勤擾。勿令着底。恐魚
(宣明方)

用量 五分至錢半。
施用宜忌 凡氣虛自汗。肺熱
喘嗽等症禁用。惡辛夷。石菴。忌鐵
厚朴。白薇爲之使。

著名方劑 麻黃湯。治太陽中
寒。頭身俱痛。發熱無汗。惡風而喘。
(傷寒論)麻黃三兩(去節)桂枝
二兩(去皮)炙草一兩。杏仁七十
個(去皮尖)上四味。以水九升。先
煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮
取二升。去滓。溫服。合覆取微汗。
不須啜粥。餘如桂枝法。將息。

參攷資料 ●張仲景治傷寒
有麻黃湯。及葛根湯。大小青龍湯。
皆用麻黃。治肺痿。上氣。有射干麻
黃。厚朴麻黃湯。皆大方也。(孫頌)
●麻黃乃肺經專藥。故治肺病多
用之。張仲景治傷寒。無汗用麻黃。
有汗用桂枝。歷代明醫解釋。皆隨
文傳會。未有究其精微者。時珍常
釋思之。似有一得。與昔人所解不
同。云津液爲汗。汗卽血也。在營則
爲血。在衛則爲汗。夫傷寒傷營。血
內滯。不能外通於衛。衛氣閉固。津

十一畫 麻

液不行。故無汗發熱而憎寒。風傷
衛。衛氣外泄。不能內護於營。營氣
虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡
風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮
毛者。肺之合也。肺主衛氣。包羅一
身天象也。是證時睡屬乎太陽。而
肺實受邪氣。其證兼面赤。佛鬱。咳
嗽。有痰。喘而胸滿。諸證者。非肺病
乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻。而肺
氣贖鬱。故用麻黃甘草同桂枝。引
出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁
泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。
加以石膏。朱肱活人書。夏至後加
石膏知母。皆是泄肺火之藥。是麻
黃湯雖太陽發汗重劑。實爲發散
肺經火鬱之藥也。痰理不密。則津
液外泄。而肺氣自虛。虛則補其母。
故用桂枝同甘草。外散風邪。以救
表。內伐肝木。以防脾。佐以芍藥。泄
水而固脾。泄東所以補西也。使以
薑棗行脾之津液。而和營衛也。下
後微喘者。加厚朴杏仁。以利肺氣
也。汗後脈沉遲者。加人參。以益肺
氣也。朱肱加黃芩爲陽旦湯。以瀉
肺熱也。皆是脾肺之藥。是則桂枝
雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺

之藥也。此千古未發之秘旨。愚因
表而出之。又少陰病發熱脈沉。有
麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草
湯。少陰與太陽爲表裏。乃趙嗣其
所謂熱附配麻黃。補中有發也。一
錦衣夏月飲酒達旦。病水泄。數日
不止。水穀直出。服分利消導升提
諸藥。則反劇。時珍診之。脈浮而緩。
大腸下弩。復發痔血。此因肉食生
冷茶水過雜。抑遏陽氣在下。木盛
土衰。素問所謂久風成痼泄也。法
當升之。揚之。遂以小續命湯投之。
一服而愈。昔仲景治傷寒六七日
大下後。脈沉遲。手足厥逆。咽喉不
利。唾膿血。泄利不止者。用麻黃湯
平其肝肺。兼升發之。卽斯理也。如
能神而明之。則此類是者也。(李
時珍) ●麻黃微苦而辛。性熱而
輕。楊僧繼洪云。中牟有麻黃之地。
冬不積雪。爲泄內陽也。故過用則
洩真氣。觀此則性熱可知矣。服麻
黃自汗不止者。以冷水浸頭髮。仍
用撲法卽止。凡服麻黃藥。須避風
一日。不爾病恐復作也。凡用須佐
以黃芩。則無赤眼之患。(李時珍)
●今青州。彭城。榮陽。中牟者爲勝。

色背而多沫。到中亦有不好。(陶
弘景) ●鄭州鹿臺。及閩中沙苑。
河旁沙洲上最多。同州沙苑亦多。
其背徐者。亦不復用。(蘇恭) ●按
段成式酉陽雜俎云。麻黃莖頭開
花。花小而黃。叢生子如覆盆子。可
食。(掌禹錫) ●今近汴京多有之。
以榮陽中牟者爲勝。春生苗。至夏
五月則長及一尺以來。梢上有黃
花。結實如百合瓣而小。又似烏菘
子。味甜。微有麻黃氣。外皮紅。裏仁
子黑。根紫赤色。俗說有雌雄二種。
雌者於三月四月之內開花。六月
內結子。雄者無花。不結子。至立秋
以後。收採莖陰乾。(孫頌) ●麻黃
出鄭州者佳。剪去節半兩。以蜜一
匙。同炒良久。以水半升。煎俟沸。
去上沫。再煎去三分之一。不用滓。
病瘡抱倒醫黑者。乘熱盪服之。避
風。何共瘡復出一法。用無灰酒煎。
但小兒不能飲酒者。難服。然其效
更速。以此知此藥入表也。(寇宗
奭) ●本經治中風。是主緩風痺
痺。而首云溫痺。係溼痺。乃傳寫之
誤。(張石頑) ●今人多有長之爲
藥。而不敢用。又有謂夏月不宜

十一畫 麻

用麻黃者。皆不達可晒也。凡用散者。惟斯為最。然柴胡。麻黃。俱為散邪要藥。但陽邪宜柴胡。陰邪宜麻黃。不可不察也。(張景岳)

【麻黃根】 性質 甘平無毒。主治 止汗。夏月糲粉撲之。

配合應用 治盜汗陰汗。麻黃根。牡蠣粉。為末撲之。

治盜汗不止。麻黃根。椒目等分為末。每末一錢。無灰酒下。外以麻黃根。故蒲扇。為末撲之。(奇效良方)

治小兒盜汗。麻黃根三分。故蒲扇灰一分為末。以乳服三分。日服三次。仍以乾薑三分。同為末。三分撲之。(古今錄驗方)

治諸虛自汗。夜臥即甚。久則枯復黃。麻黃根各一兩。牡蠣米泔浸洗。煨過為散。每服五錢。水二盞。小麥百粒煎服。(和濟局方)

治虛汗無度。麻黃根。黃芩等分為末。飛麩糊作丸。梧子大。每用浮麥湯下百丸。以止為度。(談藝翁驗方)

治產後虛汗。黃芩。當歸各一

十二畫 傅 傘 備

兩。麻黃根二兩。每服一兩。煎湯下。治陰囊溼癢。骨有勞熱。麻黃根。石硫黃各一兩。再用米粉一合為末。傅之。(千金方)

治內外障翳。麻黃根一兩。當歸身一錢。同炒黑色。入麝香少許為末。噴鼻頻用。此南京相國寺東黑孩兒方也。(普濟方)

參攷資料 麻黃根節止汗。以故竹扇并末同撲之。又牡蠣粉。粟粉。并麻黃根等分為末。生胡袋盛貯。盜汗出。即撲。手摩之。(甄權)

麻黃發汗之氣。駭不能察。而根節止汗。效如影響。物理之妙。不可測度。如此。自汗有風溼。傷風。風溫。氣虛。血虛。脾虛。陰虛。胃熱。痰飲。中暑。亡陽。柔痙諸證。皆可隨證加而用之。當歸六黃湯加麻黃根。治盜汗尤捷。蓋其性能行周身肌表。故能引諸藥外至衛分。而固膜理也。本草但知撲之之法。而不知服餌之功尤良也。(李時珍)

麻黃發汗。而其根專於止汗。昔人每謂為物理之奇異。不知麻黃輕揚。故走表而發汗。其根則深入土中。自不能同其升發之性。況苗則輕揚。根

則重墜。一升一降。理有固然。然正惟其同是一本。則輕揚走表之性。猶存。所以能從表分而收其散越。斂其輕浮。以遂歸於裏。是固根莖收束之本性。則不特不能發汗。而并能使外發之汗。斂而不出。此則麻黃根所以有止汗之功力。投之

輒效者也。凡止汗如糯稻根。粳米。乾。小麥。棗仁之類。皆取其堅凝定靜之意。以收散失之氣。其旨皆同。夫豈麻黃與根。同出一本。而其性。願乃背道相馳耶。防風發汗。其根止汗。亦是此義。(張山雷)

三〇一

【麻黃】即大麻花之原名。綱目謂為麻子者非也。詳「大麻花」條。【麻蕪萍】即蜈蚣萍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜈蚣萍」條。

【麻蕪】即黃麻梗蟲之古籍別名。典見綱目。詳「黃麻梗蟲」條。【即蒼耳發蟲之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳發蟲」條。

【麻蕪】即大麻子之古籍別名。典見綱目。詳「大麻仁」條。【麻蕪】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百合」條。

【麻蕪春】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百合」條。【麻蕪】即胡麻蕪之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻蕪」條。

【麻蕪接骨】即紫接骨之古籍別名。典見綱目。詳「紫接骨」條。【麻蕪】即胡麻蕪之原名。詳「胡麻蕪」條。

【麻蕪】即胡麻蕪之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻蕪」條。【麻蕪豆粉】即胡麻子粉之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻蕪」條。

【麻蕪香】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「乳香」條。

【傅延年】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳「菊花」條。

【傅致膠】即阿膠之原名。詳「阿膠」條。

【傘子鹽】即井鹽之古籍別名。典見綱目。詳「食鹽」條。

【備身粉】即芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芫花」條。

十一畫

【割田蕪】即蓬蕪之古籍別名。與見綱目。詳「蓬蕪」條。

【割蕪露澤】即胡黃連之古籍別名。與見和漢藥考。詳「胡黃連」條。

【勝光子】即雞脚草之子。與見綱目拾遺。詳「雞脚草」條。

【勝志】即龍窩石之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「龍窩石」條。

【勝春】即月季花之古籍別名。與見綱目。詳「月季花」條。

【勝馬】即車前草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「車前草」條。

【勝宮】即車前草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「車前草」條。

【勞水】①即流水之古籍別名。與見綱目。詳「流水」條。②即甘澗水之古籍別名。與見綱目。詳「流水」條。

【勞豆】即野毛豆之古籍別名。詳「野毛豆」條。

【勞鐵】基本 本品為銅鐵之一種。可供藥用。

【博邪】即屈遊之古籍別名。與見綱目。詳「屈遊」條。

【博登】即蟻蟹之古籍別名。與見

綱目。詳「蟹」條。

【博勞】即伯勞之古籍別名。與見陸機詩疏。詳「伯勞」條。

【博落迴】 古籍別名 落迴。勃勒回。號倚草。拾遺。

外國名詞 Maclova cordata, 列比(拉丁)チヤンバギク タケニクサ(日本)

基本 係罌粟科博落迴屬。產地 生山谷原野間。

形態 博落迴為毒草類之多年生草本。形如蕪麻。莖中空。吹之作聲。折斷莖中有綠汁。帶黃褐色。高五六尺。葉大而卵圓。基脚作心臟形。邊緣多缺刻。葉背有白粉。葉柄長。互生。秋月莖頭分枝着花。圓錐花序。花小白色。萼二片。無花瓣。花後結小莢。採得可供藥用。



博落迴

性質 大毒。

主治 殺精魅。治溪毒。蟲毒。消

癰疽疔瘡。疔肉。療白蟻風。及諸惡

毒。參攷資料 博落迴祇可外用。不可內服。內服致人立死。故勿輕以入口。(綱目)

【厥藪】即藪之古籍別名。與見爾雅。詳「藪」條。

【善朮】即獅子朮之古籍別名。與見清異錄。詳「於朮」條。

【嗜提求】即孩兒茶之西藥名。詳「孩兒茶」條。

【喜鷓】即鷓之古籍別名。與見食療本草。詳「鷓」條。

【鳴起草子】即蒼耳子之古籍別名。與見綱目。詳「蒼耳子」條。

【單母】即馬刀之古籍別名。與見綱目。詳「馬刀」條。

【單桃仁】即桃仁之處方用名。詳「桃仁」條。

【堯韭】即蒼蒲之古籍別名。與見吳普本草。詳「蒼蒲」條。

【報春花】即辛夷之古籍別名。與見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【報喜蘭】即催生蘭之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「催生蘭」條。

【壺柑】即柚之古籍別名。與見唐

本草。詳「柑」條。

【壺蜂】即大黃蜂之古籍別名。與見綱目。詳「大黃蜂」條。

【壺蘆】 命名 壺酒器也。蘆。飲器也。本品各象其形。又可為酒飯之器。故名。

處方用名 陳蒲假。葫蘆殼。古籍別名 瓠瓜(說文)瓠瓜。葫蘆。蒲蘆(綱目)懸瓠(莊子)

形態 壺蘆為菜類之一。一年生草本。圓多植之。莖細長。以卷鬚絡於他物。葉圓心臟形。有軟毛。夏初開白花。夕開朝萎。至秋實熟。如大小二種。重疊狀。可供藥用。其莖與花葉實中子。詳見各該條。



(一) 蘆壺



(二) 蘆壺

性質 甘。平。滑。無毒。

主治 利水道。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論壹蘆曰。消渴。惡瘡。鼻口中肉爛痛。【唐】孟詵食療本草論壹蘆曰。消熱。服丹石人宜之。【宋】大明諸家本草論壹蘆曰。除煩。治心熱。利小腸。潤心肺。治石淋。

參攷資料 名醫錄云。浙人食匏瓜。多吐瀉。謂之發暴。蓋此物以暑月墜成故也。惟與香菜同食。則可免。【李時珍】

【壹蘆子】 主治 齒斷。或腫。或露齒搖疼痛。用八兩。同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。

【壹蘆葉】 性質 甘。平。無毒。 主治 耐飢作菜茹。

【壹蘆蔓鬚及花】 主治 解毒。 【寒不凋】 卽密蒙花之古籍別名。 典見和漢藥考。詳「密蒙花」條。 【寒水石】 卽石膏之古籍別名。 典見綱目。詳「石膏」條。

【寒水石】 原名 凝水石。 命名 本品折片投水。水能凝動。故名寒水。亦本其義。

也。

古籍別名 白水石。【本經】凌水石。【別錄】鹽精石。泥精。鹽枕。鹽根。【綱目】白水石。冷油石。冷石。【和漢藥考】

外國名詞 Calcareous Spar. 基本 屬方解石。或微石類中之一種礦石。 產地 凡內地積鹽之下。恒有生焉。

形態 寒水石爲鹽之精液。滲出土中。年久結成清瑩有稜之石塊。其狀爲白色。或透明堅硬之固塊。或爲粗糙細粒。種類甚多。

製法 雷斅曰。凡使須用生薑自然汁。煮乾研粉用。每十兩用生薑一盞。

性質 辛。寒。無毒。 成分 由結晶性碳酸鈣而成。 效能 瀉熱。降火。利水。明目。用作解熱配合眼藥。又昔時亦用作牙粉原料。

主治 身熱。腹中積聚邪氣。皮中如火燒。煩滿。水飲之。久服不飢。【本經】又除時氣熱盛。五臟伏熱。胃中熱。止渴。水腫。小腹痛。【別錄】

【本經】又除時氣熱盛。五臟伏熱。胃中熱。止渴。水腫。小腹痛。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論寒水石曰。歷丹石毒風。解傷寒勞復。【明】李時珍本草綱目論寒水石曰。治小便白。內痺。涼血降火。止牙疼。堅牙明目。【明】經

希羅本草經疏論寒水石曰。凝水石生於內地。稟積陰之氣而成。本經味辛氣寒。別錄加甘。大寒無毒。經曰。小熱之氣。涼以和之。大熱之氣。寒以取之。又曰。熱淫於內。治以

鹹寒。大寒微燥之性。故主身熱邪氣。皮中如火燒。煩滿。及時氣熱盛。五臟伏熱。胃中熱也。易飢作渴。亦胃中伏火也。甘寒除陽明之邪熱。故能止渴不飢。水腫者。溼熱也。小便多不利。以致水氣上溢於腹。而成腹痺。辛鹹走散之性。故能除熱利竅消腫也。療腹中積聚者。亦取其辛散鹹緩之功耳。【唐】黃宮繡

本草求真論寒水石曰。寒水石又名凝水石。又名白水石。生於內地。因鹽精滲入土中。年久積聚。清瑩有稜而成也。味辛而鹹。氣寒無毒。書載能治時行大熱。口渴水腫。益以性稟純陰故也。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。又曰。小熱之氣。涼以和

之。大熱之氣。寒以收之。服此治熱利水。適相宜耳。然此止可暫治。有餘之邪。及數湯火水傷。若虛人熱浮。其切忌焉。望自含之。卽化者。真否卽是偽。但真者絕少。

配合應用 治男女轉脬。不得小便。寒水石二兩。滑石一兩。炙子一合。爲末。水一斗。煮五升。時服一升。卽利。【永類鈴方】

治牙眼出血有竅。寒水石粉三兩。朱砂二錢。甘草。膩子一字。爲末。乾搗。【普濟方】

治湯火傷灼。寒水石燒研。傅之。【衛生易簡方】

治小兒丹毒。皮膚熱赤。寒水石半兩。白土一分。爲末。米醋調塗之。【經驗方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。長地榆。制丹砂。伏元精。

參攷資料 凝水石稟積陰之氣而成。其氣大寒。其味辛鹹。入腎走血。除熱之功。同於諸鹽。古方所用寒水石是此石。唐宋諸方寒水石是石膏。近方寒水石則是長

之。大熱之氣。寒以收之。服此治熱利水。適相宜耳。然此止可暫治。有餘之邪。及數湯火水傷。若虛人熱浮。其切忌焉。望自含之。卽化者。真否卽是偽。但真者絕少。

配合應用 治男女轉脬。不得小便。寒水石二兩。滑石一兩。炙子一合。爲末。水一斗。煮五升。時服一升。卽利。【永類鈴方】

治牙眼出血有竅。寒水石粉三兩。朱砂二錢。甘草。膩子一字。爲末。乾搗。【普濟方】

石方解石(李時珍)①凝水石色如雲母可折者鹽之精也。生常山山谷中水懸及郡(別錄)②常山即恒山屬井川中水屬河間郡。郭屬趙郡。此處地皆鹹鹵。故云鹽精。而碎之亦似朴硝。此石末置水中。夏月能為冰者佳。(陶弘景)③別錄言凝水鹽之精也。陶氏亦云鹵地所生。碎之似朴硝。范子計然云。出河東。河東鹵地也。獨孤酒丹房鑿源云。鹽精出鹽池。狀如水晶。據此諸說。則凝水即鹽精石也。一名泥精。昔人謂之鹽枕。今人謂之鹽根。生於鹵地積鹽之下。精液滲入土中。年久至泉結而成石。大塊有齒稜如馬牙消。清瑩如水精。亦有帶青黑色者。皆至暑月回潤。入水浸久亦化。蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石。味更鹹苦。乃玄精之類。又注食鹽。謂鹽枕作精塊。有孔竅者蜂窠。可封為禮贊者。皆此物也。唐宋諸醫不識此石。而以石方解石為注。誤矣。(李時珍)④

【寒瓜】即西瓜。瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「西瓜」條。

【寒石】即鹵鹼之古籍別名。典見

十二畫 寒

寓富尋就屠帽

吳普本草。詳「白鹼」條。

【寒具】命名。本品冬春可留數月。及供寒食禁烟之用。故名。

古籍別名 捻頭。(錢乙)環餅。(要術)櫛。(綱目)

製法 用糯粉和麴。搗成細繩。盤曲如環形。入油煎之。而成。可經久藏。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 利大小便。潤腸。溫中益氣。

【寒欣】即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蚯蚓」條。

【寒花】即露花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「露花」條。

【寒蔞】即蓬蔞之古籍別名。典見本草會編。詳「蓬蔞」條。

【寒食粥】命名。本品於寒食成之。粥。故名。

主治 咳嗽。下血氣。調中。

【寒皋】即鸚鵡之古籍別名。典見萬畢術。詳「鸚鵡」條。

【寒蚓】即蚯蚓之古籍別名。典見吳普本草。詳「蚯蚓」條。

【寒菜】即葶藶子之古籍別名。典見胡居士百病方。詳「葶藶子」條。

【寒蠶蟲】即五蠶脂之原名。詳「五蠶脂」條。

【寒蕪】即玉蕪之古籍別名。典見綱目。詳「香蕪」條。

【寒鴉】即慈烏之古籍別名。典見綱目。詳「慈烏」條。

【寒粟】即粟米之古籍別名。典見綱目。詳「粟米」條。

【寒蟻】即蟻之古籍別名。典見吳普本草。詳「蟻」條。

【寓木】即桑寄生之古籍別名。典見本經。詳「桑寄生」條。

【富水】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【尋風藤】即清風藤之古籍別名。典見綱目。詳「清風藤」條。

【就葛】即黃環之古籍別名。典見唐本草。詳「黃環」條。

【屠蘇酒】製法 用赤木桂心七錢五分。防風一兩。我藥五錢。蜀椒。桔梗。大黃五錢七分。烏頭二錢五分。赤小豆十四枚。以三角棒蘘盛之。除夕夜。懸井底。元旦取出。置酒中。煎數沸。舉家東

寓彭復閱惠

向。從少至長。次第飲之。藥滓還投井中。歲飲此水。一世無病。

主治 辟疫癘。一切不正之氣。

【帽子花】即鴨跖草之日本別名。詳「鴨跖草」條。

【豕肉】即豬肉之古籍別名。典見綱目。詳「豬肉」條。

【莢椒】即荳蔻之古籍別名。典見別錄。詳「荳蔻」條。

【莢頤】即天名精之古籍別名。典見別錄。詳「天名精」條。

【彭侯】形態 彭侯為獸類之一種。狀如黑狗。無尾。可烹食。味如狗。其肉可供藥用。

性質 甘。酸。溫。無毒。

主治 辟邪氣。令志壯。

【彭根】即石龍芮之古籍別名。典見吳普本草。詳「石龍芮」條。

【復累】即魁蛤之古籍別名。典見綱目。詳「魁蛤」條。

【四石】即明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「明礬」條。

【問陀羅華】即曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【惠貝】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【惡士婆勝】即菊醬苗之古籍別名。典見綱目。詳『菊醬』條。

【惡客】即曼陀羅之古籍別名。典見姚伯聲花品。詳『曼陀羅』條。

【惡思佛】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『真珠』條。

【惡疾】即牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【惡草羅】即葳蕤之古籍別名。典見莊漫錄。詳『葳蕤』條。

【惡實】即牛蒡子之原名。詳『牛蒡子』條。

【惡實子】即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【提天冬】即天門冬之處方用名。詳『天門冬』條。

【揭田藟子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【揭泛水】即甘瀾水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【揚搖】產地 閩粵及熱帶諸地有之。

形態 揚搖爲夷果類之一種。其子生皮中長四五寸。有七脊。色黃無核。可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 通百脈。強筋骨。和中益氣。潤肌膚。好顏色。

【握雪礬石】基本 本品爲礬石之出於金穴者。

古籍別名 公石(唐本草)化公石(國經本草)

性質 甘溫無毒。

主治 痢冷積聚。輕身延年。多食令人熱。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論握雪礬石曰。療大風瘡。

【揭拉婆】即車渠之古籍別名。典見梵書。詳『車渠』條。

【揭羅閣】即鷓鴣之古籍別名。典見梵書。詳『鷓鴣』條。

【散血丹】即小將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小將軍』條。

【散紅花】即紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【散鹽】即末鹽之古籍別名。典見周禮。詳『食鹽』條。

【斑石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【斑尾】即斑貓之古籍別名。典見綱目。詳『斑貓』條。

【斑希】即玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【斑杖】即虎杖之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『虎杖』條。

即攀倒甌之古籍別名。典見綱目。詳『攀倒甌』條。

【斑枝花】即木棉之古籍別名。典見綱目。詳『木棉』條。

【斑佳】即斑鳩之古籍別名。典見范汪方。詳『斑鳩』條。

【斑耗】即斑貓之古籍別名。典見綱目。詳『斑貓』條。

【斑犀】即兕犀之古籍別名。典見唐本草。詳『兕犀』條。

【斑菌】即斑貓之古籍別名。典見吳普本草。詳『斑貓』條。

【斑鳩】命名 鳩。鴉也。言其聲。斑。錦也。言其色。故名。

古籍別名 錦鳩。斑佳。(范汪方) 鴉鳩。(左傳) 祝鳩。鴉。荆鳩。楚鳩。後鳩。棘鳩。郎鳥。辟。卑。小而無斑者。名佳。其子名鴉鳩。(綱目)

外國名詞 Turtur. Turanus. L. (Indandono) (拉丁) シラ

コバト或シユズカケバト(日

本)


基本 係脊椎動物鳥類鳩類。類鳩科之斑鳩。

產地 在山林原野間。

形態 斑鳩爲原禽類鳩之一種。體比鳩略小。頭頸及下面概

灰白色。稍帶赤色。脊背至尾色近黑。腹風羽黑。外側之尾羽根

黑。端白。頸部之背面有黑色之半環形輪。餘呈淡白色。其肉可供食與藥用。



斑 鳩

性質 甘。平。無毒。

主治 明目多食。益氣。助陰陽。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論斑鳩肉曰。久病虛損人食之補氣。【明】李時珍本草綱目論斑鳩肉曰。食之令人不噎。

攷資料 范汪方治目有斑鳩丸。總錄治目有鴉鳩丸。倪惟賢

丸。總錄治目有鴉鳩丸。倪惟賢

氏謂在補腎。故能明目。竊謂鳩能益氣則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩以養國老。仲秋授年老者以鳩杖。云鳩性不噉食之且復助氣也。(李時珍)

【斑鳩血】 主治 熱飲及解毒

【斑鳩屎】 主治 治時耳出膿 疼痛及耳中生疔瘰

同夜明沙末等分吹之。

【斑殼】 卽格實子之古籍別名。與見唐本草。詳「格實子」條。

【斑節相思】 形態 斑節相思爲雜草類之一種。枝葉類似薄荷而大。其味如艾。可供藥用。

主治 解毒。

【斑蝥】 卽斑蝥之原名。詳「斑蝥」條。

【斑龍】 卽鹿茸之古籍別名。與見綱目。詳「鹿茸」條。

【斑龍角】 卽鹿角之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鹿角」條。

【斑貓】 原名 斑蝥。其毒如矛刺。故名。後俗訛爲斑貓。

十二畫 斑

也。

古籍別名 蟹螯蟲(拾遺)龍虵。斑尾(綱目)斑虵。晏青。赤頭。龍蛇。(和漢藥考)斑菌(吳普)騰髮。豆斑貓(新本草)

外國名詞 Cicindela chinensis, Dog (拉卜) Blister-fly (英)

基本 斑蝥爲屬甲殼類之昆蟲。

產地 陳仁山藥物生產辨云。斑蝥各省均有出。廣東以清遠石角北江。惠州均有出。

形態 斑蝥爲大豆葉上之甲蟲。長五五分。黃黑斑紋。烏腹尖喙。其體有一種臭氣。

採取 八九月間。就莖葉上捕捉。陰乾。

製法 雷斅曰。凡斑蝥。芫青。亭長。地膽。修事並漬糯米。小麻子相拌。炒至米黃黑色。取出。去頭足兩翅。以血餘裏懸東轆角上。一夜。用之則毒去也。大明曰。入藥須去翅足。糯米炒熟。不可生用。卽吐瀉人。李時珍曰。一法用麸炒過。醋煮用之也。

用法 體以封末。和入外傳藥。同有和作丸散。

性質 辛寒。有毒。

成分 斑蝥之主成分爲羯答利斯。此外含有芳香性揮發油及脂肪質。惟其含量由種類產地等而異。

效能 治疥癬。消瘰癧。用作發泡藥。及生毛藥。間有作爲利尿藥者。

主治 寒熱鬼疰。蠱毒。鼠瘻。疔疽。蝕死肌。破石癭(本經)血積傷人肌。治疥癬。墮胎(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論斑蝥曰。治瘰癧。通利水道。【宋】大明日華諸家本草論斑蝥曰。療淋疾。傳惡疥癬。【明】李時珍本草綱目論斑蝥曰。治疔癩。解疔毒。刺大毒。沙蟲毒。蠱毒。輕粉毒。【明】繆希雍本草經疏論斑蝥曰。斑蝥味辛氣寒。肩鸛云。有大毒。近人肌肉則潰爛。毒可知矣。入手陽明手太陽經。性能傷肌肉。蝕死肌。故主鼠瘻。疔瘡。疥癬。辛寒能走散。下泄。故主破石癭。血積。及墮胎也。至於鬼疰。蠱毒。必非極辛大毒

之藥所能療。此本經之說。甄權主療瘰癧。通利水道。以其能通逐腸胃垢膩。復能破結。走下竅也。【明】李士材本草圖解論斑蝥曰。斑蝥攻血積。利水道。治疔癩。解疔毒。刺大毒。蠱毒。輕粉毒。治墮胎。按斑蝥專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。但痛不可當。虛者大禁。甄炒醋炙。【清】黃宮繡本草求真論斑蝥曰。斑蝥最屬惡物。聞人捕捉。卽於尾尾射出惡氣。令人臭不可聞。近人肌肉則潰。入胎則墮。其毒極可知矣。其味辛。其氣寒。其性下走而不上。故書言外用。止可以蝕死肌。數疥癬惡瘡。內治止可以破石癭。淋。拔瘰癧。疔腫。下大腸惡毒而已。取其以毒攻毒也。然惟賢者可用。其拔瘰癧毒。則以斑蝥法製。使令毒根從便出。如粉片血塊。爛肉之形。次以木通。滑石。燈心草。壅道之。但下大毒之初。先於患人頭上。拔去血凝二三莖。以斑蝥七枚。去翅足。炙黃。用蟬蟪搗汁服之。瘡口於無風處。搗去血。灑小便洗淨。髮灸敷之。服後小便當有瘀毒。泄去。三四日當有狗肉三四枚爲盡。如

數少。再服七枚。若愈後忌聞鐘聲。復發則不可治矣。去頭足糯米炒熟。生用則吐瀉。人亦有用來取氣不取質者。

國外學說 日本學說謂日本之斑貓。醫者亦夙知其有藥效。謂能治蠱毒。爛惡肉。腐瘡毒。利水道。蓋含一種刺戟性之物質明甚。其刺戟性物質為何。猪子氏以為即係羯答利斯。故我國之豆斑貓。與泰西之芫菁。有相同之效分。製造合羯答利斯劑。及羯答利斯用之。最為適宜。依丹波鈴木成島諸氏之實驗云。羯答利斯之含量為百分之三。優勝於芫菁者。幾至三倍。(藥學雜誌第百三號)又謂羯答利斯酸鹽。於治療上大得聲譽。療喉頭結核尤稱有效。其結節能褪色。縮小。壞瘍漸見治愈。亦有全治愈者。其用量。以羯答利斯〇・一至〇・二密瓦。隔日注射之。副作用中。最當注意者。為刺戟腎臟。即患蛋白尿及腎炎是也。故投藥時。常宜檢查病者之尿。斑貓之種類。有如下述。①豆斑貓(葛上亭長)日本各地產此。上總地方尤多。為

甲翼蟲 (Epicauta gothardi, Mats.) 七八月間最多。豈科植物及馬鈴薯葉等。均受巨害。人若觸葉。立即伴死墜地。外觀類蚤。長五分許。作圓筒狀。頭部作赤褐色。心臟形。觸角頗長。甲翼作黑色。其兩側中央。有類黃色之線。腹部作黑色。有黃色輪四五條。俱為黃色毛所成。有一種特異臭氣。味如灼。②青斑貓 (芫菁) (Lytta varicosa, Fab.) 產歐洲南部。尤以西班牙。意大利。法國南部等為最多。有西班牙蠅。發泡蠅等別名。食白楊。接骨木。槐木等葉而生。長。捕此之法。可於早晨敷布樹下。蒙面罩。御手套。用棒擊樹即紛紛墮下。集之置入薄醋中。或用煮醋蒸氣燻殺之。使充分乾燥。其形態類豆斑貓而稍大。長六七分。全體有金綠色。光澤。具六脚。有觸角。頭部作心臟形。呈赤色。甲翼作四角形。翅為淡褐色。氣味俱與豆斑貓同。③日本斑貓 (路致) (Mylabris cichorii, Fabric.) 棲息於日本各處沙地。長七八分。全身黑色。有黃紅斑點。頗為美麗。即頗長。時天盛暑

之日。止於道旁。路人行近。則急起飛行。數十步而復止。其狀恰如教人路徑。故日本有路致之稱。其意猶言引路也。④漢產斑貓 (Clypea ochotri, m. Puschata, m. rubipennis) 產中國山西。山東。湖南。湖北。安徽諸省。全身黑色。長寸許。甲翅有黑褐色線一條。至三條。秋季捕集曬乾。供藥用。⑤土斑貓 (地隱) (Meloe corvinus) 棲息於山野土石之間。長寸許。闊三四分。全身碧黑色。前翅短。無後翅。故祇能匍匐地上。採集之。亦供藥用。⑥羯答利味 (Cantharidin, C₁₂H₁₄O₄) 為光耀。無色。無氣味。稜柱狀或葉狀之結晶體。於二百十八度融解。不溶於冷水及溫湯。對於各種溶解劑。則善能溶解。有酸類之性。與鹽基化合。構成鹽類。羯答利斯之製劑有酒。軟膏。硬膏。油劑。鈣劑等。羯答利斯之一回服量。為〇・〇一至〇・〇五瓦。英美學說謂斑蝥又名發泡斑蝥。又名發泡甲蟲。產中國。西班牙。法國。俄羅斯等處。係豆莢上飛蟲。生暖處。並日光多處為最堅壯。中國所

產之斑蝥。其形狀雖與西國有別。而其功力則同。內含一精。即甘道殿。取以研末。作藥珠多功效。其作用為解性毒藥。又為引炎。惹皮膚藥。又為行氣藥。利小便藥。治久癩病類。久白濁。便澀。陽痿。間能令生溺器具生炎。如久涎流白帶白濁等症。用之最有益。但此藥之尋常用處。為引炎。令皮膚成泡。約六點鐘至十二點鐘即成。然間能成淋。務宜慎用。又如起水泡。能引病外出。治肺體生炎。心胞絡生炎。肺胞膜生炎。照胸前部位擦之。至解藥之解此毒。須先服吐劑。或用抽水節。後服蓖麻油與鴉片。其處方以斑蝥一分粗末。淡酒八十分。共入有蓋器內。浸七天。同時搖動。濾渣。用絞盤絞之。過淋紙。再加酒。仍足八十分為度。治下痿。小便淋瀝。每服八釐七毫半。至三分中。(斑蝥酒方)又斑蝥一錢。芥末四錢。胡椒四錢。樟腦四錢。蒜頭一顆。白醋四兩八錢。火酒十兩零八分。和勻。同浸七天。濾淨。搽風溼症甚效。(同上)又斑蝥一斤末。黃蠟八兩。松香八兩。猪油八兩。先將黃蠟松

香豬油煎好。將斑末加入。以攪至凝結爲度。此膏用布開調。或用紙亦可。貼此膏約三四點鐘。或五六點鐘。令其略起水泡。宜隨即撤去。再敷以麥精甘菊。或敷以爛飯。但貼此膏。其症之輕重。亦須分辨。其在重症。則刺破其水泡後。並須將其皮揭去。而復貼以松香黃膏。令其膿盡發。庶易獲效。其在輕症。則俟其起水泡後。隨即刺穿。另用白藥膏以潤之。至小兒貼此膏。須將白藥膏加入。令勿過烈。如膿腐發炎。須俟其稍退。貼此膏令引炎外出。又如頭腦積血伏熱等症。須先用藥以清其熱。次以此膏貼頭後及小腿裏。又如眼內久患熱症。以此膏貼太陽穴。及貼頭後耳後等處。其翳膜自可免生。又如肺內熱症已退。仍覺痛而未愈。以此膏貼胸前。又如腦筋作疼。以此膏貼患處。若骨絞發腫。以此膏貼數次。自能獲效。此膏有三妙用。其一能引炎外出。其二能令熱消散。而免生翳膜。其三能行氣血。(斑蝥甲膏方) 又斑蝥十二分極細末。黃蠟七分半。煉羊油七分半。洋

松香三分。煉豬油六分。除斑蝥。餘共入攪鍋鎔化。再加斑蝥調勻。至涼爲度。能引炎外出。起水泡用。(臨時用攤布上。以樟腦細末撒膏面上。可免小便熱疼。外蒙亮紗一層。貼患處。俟起水泡。即行揭去。)(斑蝥貼膏方) 附錄。斑蝥生八日至九日即死。活時發一大臭。最爲可憎。捕取斑蝥之法。必在早起時。以布蓋護其手與面。後將其樹搖動。令斑蝥落下。或置醋內。或置篩內。令過醋務。則斑蝥已死。或在日光內曬之。或在暖房內晾乾。置瓶內。恐有他蟲蝕之。務宜密塞爲要。近人學說。楊贊民曰。斑蝥一名斑蝥。有作盤蝥。身紫綠色。兼金屬之光澤。因有斑文。(本草作有黃黑色斑文) 故曰斑蝥。長約五六分。以至寸許。多生在葉上。捕生蟲做食料。很有功於農人。但性辛寒。有大毒。在醫藥上本無足取。世人偏用之入藥。甚爲不解。茲將主治證候列下。以證明其不該入藥之原因。於下。斑蝥最重要之主治。(一) 瘰癧。(二) 獬犬傷。瘰癧名號甚多。凡十餘種。然究其病理原因。

不外痰濕風熱氣毒結聚而成。有急性慢性二種分別。急性者暴然而發。但容易潰破。所以治法不難。至於慢性瘰癧。來勢很緩。漸漸發作。結核腫痛。堅硬難消。經了一年半載。漸化膿潰爛。或竟變成危險證候。所以不容易治療。普通治法不外消痰解鬱。清毒行氣。去結散核。和血活絡。用藥如海藻丸。消核散。屏黃丸。控涎丹。消風化痰湯。內消瘰癧丸。紫霞膏。皆可隨證選用。原不必專倚賴斑蝥一物。自楊登甫創立瘰癧之毒。以斑蝥地膽爲主。製治如法。能使其從小便出。如粉片血塊爛肉。此其驗也。於是法製瘰癧雞蛋。與楊氏家藏治瘰癧方。此等方藥。竟爲瘰癧證之主治。真是萬分荒謬。須知瘰癧證之發生。雖有許多原因。但無非是身體血液。中缺乏碘質。不能爲此。所以療治瘰癧方法。必須含有碘質者。方能奏效。自然界中含碘最富者。首推生在海中之動物植物。(晉醫廉說頭處。險而癭。便是離海太遠。缺乏碘質之故。) 海藻。海帶。昆布。何

以爲瘰癧之重要藥。即爲含有碘量之故。牡蠣何以有消擊軟核之功用。亦爲含碘甚富之故。試問斑蝥有甚關係。有甚能力。可以療治瘰癧。就使誤食蟲蟻。氣殘陳水宿茶等。發生瘰癧。當然毒氣是聚在發生之部位。但斑蝥入腸。便肆其攻竄之性。直達下部精溺之處。如須使之轉上行。以攻去病根。斷無此事。有人問患瘰癧者。一吃斑蝥以後。確能尿出如粉片血塊爛肉等物。豈非明驗。不知服斑蝥者。所以尿出之粉片血塊爛肉。完全由斑蝥造成。因其性質非常毒厲。將其汁染在肌肉上。可以使肌肉即時潰爛。可知服後所經過之地點。焉得不起潰爛作用。所以服斑蝥者。一定腹中便溺之處。痛不可當。求生不能。求死不得。十分苦慘。豈非內臟破損之特徵耶。斑蝥第二項主治。是獬犬傷。古人有言。國狗之癩。無不噬也。可見是甚厲害。但因無妥當之治法。至民國十一年。方有人提倡用仲景傷寒論中之抵當湯加減治。(原方係用生川軍二錢。桃仁七粒。去皮尖。地龍五七隻。炒去足。加白蜜三錢。酒一

杯煎。速渣服之。不拘帖數。至大小便不見惡物爲度。幾經醫人試用。功效非常。昭著。據發明者經過。係就被瘋犬嚼死之耕牛。剖腹察視。見腹中有斗大紫黑色血塊。極之嬌嬌欲動。因悟出傷寒論中太陽病。其人發狂者。爲熱在下焦蓄血之證。其人如狂者。血證證也。下血乃愈。於是師着仲景之意。立此治法。真是探本窮原。勝過古人萬倍。古人對於此證內容。皆不能十分明瞭。但從毒氣與平常犬畜之性質上着想。所以外治法用砂酒壺吸毒。及追風如聖散。內治法用救生散。扶危散。木鼈。杏仁。此類藥物。皆非適當。救生扶危二散。皆以斑蝥爲主藥。雖能逐惡物。血塊由小便出。但內臟也難免並受損傷。腹中血塊。既然斗大。欲從很小之溺孔中盡逐去。病根決不可能。因爲斑蝥用量。雖極強壯之人。亦不能耐過三劑以上。而痢大毒。至少亦須十餘劑。方能見效。我恐如服斑蝥三四次。已早將小腸膜和泌尿管蝕化。豈尚有生命存留。所有受瘋犬傷者。與患瘋癩之人。甚不

相宜。總之斑蝥除外治爲迫蝕惡肉與生髮以外。決無一毫價值可言。

配合應用 ●內消癰癧。不拘大人小兒。用斑蝥一個。去翅足。以粟一升同炒米焦。去米不用。入薄荷四兩爲末。烏雞子清丸。如菘豆大。空心臘茶下三丸。加至五丸。却每日減一丸。減至一丸後。每日五

丸。以消爲度。(經驗方)又癰癧經久不癒。用斑蝥一枚。去翅足。微炙。以漿水一盞。空腹吞之。用蜜水亦可。重者不過七枚。痊也。(廣利方)

●治癩瘡有蟲。八月中多取斑蝥。以苦酒浸半日。曬乾。每用五個。銅器炒熟爲末。巴豆一粒。黃犬背上毛二七根。炒研。硃砂五分。同和苦酒頓服。其蟲當盡出也。

●治癰疽拔膿。癰疽不破。或破而腫硬無膿。斑蝥爲末。以蒜搗膏。和水一豆許。貼之。少頃膿出。即去藥。(直指方)

●治疔腫拔根。斑蝥一枚。捻破。以錢割瘡上。作米字形。樣封之。即出根也。(外臺秘要方)

●治血疔便毒。不拘已成未成。

隨卽消散。斑蝥三個。去翅足。炒。滑石三錢。同研。分作三服。空心白湯下。日一服。毒從小便出。如痛。以車前木通。澤瀉。猪苓煎飲。名破毒散。甚效。(東垣方)

●治積年癰疽。用斑蝥半兩。微炒爲末。蜜調傅之。(外臺秘要方)又用斑蝥七個。醋浸。露一夜。搽之。(永類鈴方)

●治面上瘡。腫大風。面上有紫瘡。癰未消。用乾斑蝥末。以生油調傅。約半日。瘡腐脹起。以軟帛拭去。藥以棘鍼挑破。近下冷水出乾。不得刺其瘡皮。及不可以藥近口眼。若是尖瘡。癰子。卽勿用此。別用臙攀末合藥以治之。(聖濟總錄方)

●治疣痣黑子。斑蝥三個人。首少許。以糯米五錢。炒黃。去米。入蒜一個。搗爛點之。

●治瘋狗咬傷。此乃九死一生之病。急用斑蝥七枚。以糯米炒黃。去米爲末。酒一盞。煎半盞。空心溫服。取下小肉狗三四十枚。爲盡。如數少。數日再服。七次無狗形。永不再發也。累試累驗。(衛生易簡方)又用大斑蝥三七枚。去翅翅足。用

糯米一勺。略炒過。去斑蝥。別以七枚。如前炒。色變復去之。別以七枚。如前至青烟爲度。去蝥。只以米爲粉。用冷水入清油少許。空心調服。須臾再進一服。以小便利下。瘡物爲度。如不利。再進。利後肚疼。急用冷水調青酸服之。以解其毒。否則有傷。黃連水亦可解之。但不宜服一切熱物也。(醫方大成方)

●治中沙虱毒。斑蝥二枚。一枚末服。一枚燒至烟盡。研末。傅瘡中立瘻。(肘後方)

●治塞耳治聾。斑蝥炒二枚。生巴豆去皮心二枚。杵丸。棗核大。綿裹。差之。(聖惠方)

●治妊娠胎死。斑蝥一枚。燒研。水服卽下。(廣利方)

用鼠 三只至七只。施用宜忌 凡非氣壯毒盛者。禁用。畏巴豆。丹參。空青。蘆薈。青。甘草。豆。花。

毒致資料 ●斑蝥人獲得之。尾後惡氣射出。臭不可聞。故其入藥。亦專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。痛不可當。葛氏云。凡用斑蝥。取其利小便。引藥行氣。以毒

尾後惡氣射出。臭不可聞。故其入藥。亦專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。痛不可當。葛氏云。凡用斑蝥。取其利小便。引藥行氣。以毒

攻毒是矣。碧登甫云。瘰癧之毒。莫不有根。大抵以斑蝥地膽爲主。制度如法。能使其根從小便中出。或如粉片。或如血塊。或如爛肉。皆其驗也。但毒之行。小便必澀痛。不可當以木通滑石燈心葶藶道之。又葛洪肘後方云。席辯刺史傳云。凡中蠱毒。用斑蝥蟲四枚。去翅足。炙熟。桃皮五月初五日採取。去黑皮。陰乾。大戟去骨。各爲末。知斑蝥一分。二味各用二分。合和葶藶大。以米清服之。必吐出蟲。一服不達。十日更服。(李時珍) 斑蝥。芫青。亭長。地膽之毒。酸汁。黃連。黑豆。葱茶。皆能解之。(李時珍)

【普陀茶】 產地 定海之普陀山。

主治 血痢。肺癆。

【普洱茶】 卽普洱茶之古籍別名。真見物理小識。詳「普洱茶」條。

古籍別名 普洱茶。

產地 雲南普洱府。

性質 苦澀。

參攷資料 按普洱茶大者一

十二畫 普

團五餅。如人頭式。名人頭茶。每年入貢。民間不易得也。有僞作者。名川茶。乃川省與滇南交界處。土人所造。其餅不堅。色亦黃。不如普洱清香。獨絕也。普洱茶膏。黑如漆。醴酒第一。綠色者更佳。消食化痰。清胃生津。功力尤大也。物理小識。普洱茶蒸之成團。西番市之最。能化。物與六安同。普洱茶膏。能治百病。如肚腹受寒。用薑湯發散。出汗即愈。口破喉癢。受熱疼痛。用五分噙口。過夜即愈。受暑擦破皮血者。研敷之。

【普賢線】 古籍別名 仙人語。羅漢條(綱目拾遺)

產地 出四川峨嵋山。及湖南衡山。

形態 普賢線爲蔓草類之一種。種有二。其出峨嵋山者。乃樹上苔鬚。蔓引而生。長達數尺。或謂在深谷中有尋丈。其出衡山者。生石上。與苔同種。色多鮮翠。長二三尺。叢垂若綫。無根蒂。狀如同心帶。三股。色綠。俱可供藥用。

景

主治 胃脘心氣疼痛。煎服之。

古籍別名 慎火。戒火。火母。(別錄) 護火。辟火。(綱目) 瓦花。龍鱗草。辨慶草。(和漢藥考)

外國名詞 Sedum Purpureum, Link. (拉丁)

基本 屬景天科。爲景天之葉。產地 多在山野川谷之石間。或有栽生於庭園中。亦有盆種於屋上者。謂能辟火之災云。



景天

形態 景天爲多年生草本。自生於高山之上。圓圓種種者亦多。莖圓。高一二尺。葉色白綠。作長卵圓或長橢圓形。略如匙頭。無柄。厚而帶肉質。且含漿液。邊緣有細鋸齒。彼此互生。夏秋枝生分枝。梢端開五瓣之花。色白而有紅暈。簇生如繖。間有開黃花或綠色花者。子黑似粟粒。此草性極強健。試折取一莖。棄置數日後。再插入地上。仍

能發生細根。由漸成長。

採取 四月七月間採葉陰乾。用法 恒以和入外治藥劑。或煎水蒸浴。或生搗驗敷。

性質 苦平。無毒。

效能 解熱毒。治丹瘡。用治毒。隨解毒藥。

主治 大熱火瘡。身熱煩邪。惡氣。諸蟲毒。疥疔。寒熱。風痺。諸不足。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論景天曰。療金瘡。止血。煎水浴小兒。去煩熱。驚氣。

【唐】甄權藥性本草論景天曰。風疹。惡痒。小兒丹毒。及發熱。【宋】大明諸家本草論景天曰。熱狂赤眼。頭痛寒熱。遊風。女人帶下。【明】經

系雅本草經疏論景天曰。景天卽似火草也。味苦平。別錄酸無毒。性能涼血解毒。故主大熱火瘡。身熱煩邪。惡氣。諸蟲毒。疥疔。寒熱。風痺。諸不足。熱解則毒散。血液。血涼則陰生。故也。【清】吳儀洛本草從新

論景天曰。景天一名慎火草。瀉熱解毒。苦酸而寒。乃純陰之品。獨入離宮。專清熱毒。療諸種火丹。一切遊風。搗傳蛇鼠。中寒者服之。有大

效。

效。

效。

效。

效。

十二畫 景 曾 朝 梨

害。

配合應用 ●治驚風煩熱 火草煎水浴之。(普濟方)

●治小兒中風汗出中風一日頭頂腰熱二日手足不用用慎火草乾者半兩。麻黃丹參白朮三錢半爲末。每服半錢。藥水調服。三四歲服一錢。(聖濟總錄方)

●治臭穢風疹。在皮膚不出及疥癬。取慎火苗葉五大兩。和鹽三大兩。同研絞汁。以熱手摩塗。日再上之。(圖經方)

●治熱毒丹瘡。慎火草搗汁拭之。日夜拭一二十遍。一方。苦酒搗泥塗之。(千金方) 治烟火丹毒。從兩股兩脇起。赤如火。景天草。真珠末一兩。搗如泥塗之。乾則易。(楊氏產乳方)

●治漆瘡作痒。按慎火草塗之。(外臺祕要方)

●治眼生花腎。澀痛難開。景天搗汁。日點三五次。(聖惠方)

●治產後陰脫。慎火草一斤。陰乾。酒五升。煮汁一升。分四服。(子母祕錄方)

用益 八分至錢半。

施用宜忌 凡病屬於虛寒者禁用。

參攷資料 ●景天氣味寒。有小毒。可煨砂。(大明) ●今南北皆有之。人家種於中庭。或盆置屋上。春生苗葉似馬齒莧而大。作層而上。莖極脆弱。夏中開紅紫碎花。秋後枯死。亦有宿根者。苗葉花並可用。(蘇頌) ●景天人多栽於石山上。二三月生苗。脆莖。微帶赤黃色。高一二尺。折之有汁。葉淡綠色。光澤柔厚。狀似長匙頭。及胡豆葉而不尖。夏開小白花。結實如連翹而小。中有黑子如粟粒。其葉味微甘苦。煉熱水淘可食。(李時珍) ●景天似佛甲草而大。折取之。倒懸簷下。經日不凋。復栽於地。仍能生活。勝馬齒莧。(和漢藥考) ●日俗多以之治腫瘍。取新鮮葉。火炙。剝去葉皮。貼敷患處。膿自吸出。腫瘍遂愈。(和漢藥考)

●景天即螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳「螢火」條。

會青 命名 本品層層而生。其生從實至空。從空至實。故名。

產地 生銅礦中。

形體 會青爲石類之一種。其色青。年久形如黃連相綴。或似蚯蚓屎。方稜式。擊之如金聲。者爲真。以之塗鐵。色赤如銅。可供藥用。

製法 雷斅曰。凡使勿用夾石及銅青。每一兩要紫背天葵。甘草。青芝草三件。乾溼各一盞。細到。放瓷鍋內。安青於中。東流水二盞。緩緩煮之。五晝夜。勿令水火失時。取出。以東流水浴過。研乳如粉用。

性質 酸。小寒。無毒。

主治 目痛。止淚。出風。痺。利關節。通九竅。破癥。堅積聚。(本經) 養肝。除寒熱。殺白蟲。療頭風。腦中寒。止煩渴。補不足。盛陰氣。(別錄)

施用宜忌 畏菟絲子。

參攷資料 ●會青住火成。可結采。制丹砂。蓋含金氣所生也。須酒醋漬煮用。(獨孤酒) ●會青治目。義同空青。古方辟邪。太乙神精丹。用之。扁鵲治積聚。留飲。有會青丸。並見古今錄驗方。(李時珍)

對節生枝。長葉如柳。可供藥用。



柱一天朝

效能 升氣。補虛。

主治 無名腫毒。蛇咬。

●朝木蓮花 即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

●朝天蓮 即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

●朝生 即鬼蓋之古籍別名。典見本草集註。詳「鬼蓋」條。

●朝開暮落花 即木槿之古籍別名。典見綱目。詳「木槿」條。

●朝腦 即樟腦之古籍別名。典見和漢藥考。詳「樟腦」條。

●朝鮮松 即海松子之日本名。詳「海松子」條。

●朝鮮參 即高麗參之別名。詳「高麗參」條。

梨 命名 本品性善下行而流利。故名。

處方用名 雅梨。梨汁。梨子皮。古稱別名 快果。果宗。玉乳。蜜。

父。察兒梨。(綱目) 綿梨。(綱目) 乳梨。鵝梨。(嘉祐圖經本草)

外國名詞 Pirus sinensis,

Lindl (拉丁) ナシ アリノミ

(日本)

基本 係薔薇科梨屬。為梨之

果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

產山東平原縣等處。醫學辭典曰。

以產直隸之河間。山東之萊陽者

為佳。

形態 梨為山果類之落葉喬

木高二三丈。惟為採果之便。常剪

其枝。或剪除之。變為灌木形。葉

作卵圓形。有尖端。邊緣生細微之

鋸齒。如毛狀。葉柄長。互生。卷月隨

新葉而開花。花五瓣。白色。雄蕊甚

多。葯黑褐色。雌蕊五。秋結果為漿

果。表皮有小斑點。中有子十餘粒。

呈黑色。其花實葉等。俱可供藥用。



(一) 梨

十二畫 梨



(二) 梨

種植 山野園圃間有栽植者。

以梨子十餘粒下種。惟一二子生

梨。餘皆生杜。須以棠梨或桑樹接

過。則結實早而佳。

採取 秋月成熟時採之。

製法 梨與蘿蔔相間收藏。或

削梨蒂。種於蘿蔔上藏之。皆可經

年不爛不壞。

用法 恒以去皮生食。入藥速

皮水煎。或搗汁和用。

性質 甘微酸。寒。無毒。

效能 瀉熱。養陰。用作清涼劑。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論梨曰。熱嗽。止渴。切片貼

湯火傷。止痛。不爛。【唐】孟詵食療

本草論梨曰。卒暗風。不語者。生搗

汁。頓服。胸中痞塞。熱結者。宜多食

之。【宋】開寶重定新本草論梨曰。

治客熱中風。不語。治傷寒熱發。解

丹石熱氣。驚邪。利大小便。【宋】大

明諸家本草論梨曰。除賊風。止心

煩氣。喘。熱狂。作漿吐風痰。【明】李

時珍本草綱目論梨曰。潤肺涼心。

消痰降火。解疳毒酒毒。【明】繆希

雍本草經疏論梨曰。梨味甘微酸。

氣寒無毒。入手太陰。兼入足陽明

經。別錄著梨。止胃其害。不殺其功。

陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病。

多主於風寒外邪。以溫熱為補藥。

多桂附。凡冷利之物。輟而不用也。

不知時運。迭降。稟受。遇殊。今時之

人。火病熱病痰病。往往皆是。梨能

潤肺消痰。降火除熱。故蘇恭主熱

嗽。止渴。貼湯火傷。治客熱。中風。不

語。傷寒。寒熱。解丹石熱氣。驚邪。利

大小便。大明主賊風心煩。氣喘熱

狂。孟詵主胸中痞塞。熱結等。誠不

可闕者也。本經言多食令人寒中

者。以其過於冷利也。乳婦金指不

可食者。以血得寒則凝。而成癥為

病也。凡人有痛處。脈數無力。或發

渴。此癥疽將成之候。惟晝夜食梨。

可轉重為輕。膏梁之家。厚味醃酒。

縱恣無節。必多痰火。卒中癥疽之

病。數食梨。可變危為安。功難盡述

【明】李士材本草圖解論梨曰。梨

味甘寒。潤肺涼心。消痰降火。止嗽

除濕。生者清六腑之熱。熟者滋五

臟之陰。【清】黃宮繡本草求真論

梨曰。梨成於秋。花皆白。得西方金

氣之最。味苦微酸。氣寒無毒。功尚

入肺與胃。凡胸中熱結熱嗽。痰咳

便秘。狂煩明乾。喉痛中風。因濕反

胃不食。並湯火傷。疔癰疽。目障。丹

石熱氣。一切屬於熱成者。惟食梨

數枚。即能轉重為輕。消弭於無事。

然必元氣素實。大便素堅。方可與

之。若使元氣虛弱。誤啖多致寒中。

蓋梨是冷利之物。服之中益寒冷。

金指乳婦。亦忌投服。恐血得寒益

凝。豈可概謂能食。而不審而別之

乎。搗汁熬膏。良。煮汁蜜製。清痰止

嗽。用菜蔬與梨相間收藏。則不爛

【清】黃元御玉楸藥解論梨曰。梨

甘寒清利。涼心肺煩熱。滋臟腑燥

渴。洗滌痰核。疏通鬱塞。滋木清風。

泄火敗毒。治風淫熱。欲作癰瘰

癥疽之病。陰旺土溼者。忌之。泄胃

滑腸。不可恣食。上熱者。取汁溫服。

點眼病。赤腫。肉。【清】王士雄隨

息居飲食譜論梨曰。梨甘涼潤肺

清胃涼心。滌熱息風。化痰已嗽。養

陰瀉燥。散結通腸。消癰疽。止煩渴。解丹石烟煤炎。燻脊梁。癩瘰諸毒。治中風不語。痰熱驚狂。溫器等病。煎絞汁服。名天生甘露飲。以皮薄心小肉細無渣。略酸味者良。北產尤佳。切片貼湯火傷。止痛不爛。中虛寒瀉。乳婦金瘡。忌之。新產及病後須蒸熱食之。與蘆根相同。收藏則不爛。可搗汁熬膏。亦可醫食。

配合應用 ●治消渴飲水。用香水梨。或鴨梨。或江南雪梨。皆可。取汁。以蜜湯熬成膏。用瓶收。以熱水或冷水調服。愈乃止。(普濟方)

●治卒得咳嗽。用好梨。去核。搗汁一碗。入椒四十粒。煎一沸。去滓。納黑錫一大兩。消訖。細細含嚥。立定。(海上方) 又用梨一顆。刺五十孔。每孔納椒一粒。麩麥。灰。火煨熟。停冷。去椒食之。又方。去核。納酥蜜。麵。裹燒熟。冷食。又方。切片。酥煎食之。又方。搗汁一升。入酥。蜜各一兩。地黃汁一升。煎成合。凡治嗽。須喘急定時。冷食之。若熱食。反傷肺。令嗽更劇。不可救也。若反。可作羊肉湯餅飽食之。即佳。(孟曉方)

●治痰喘氣急。梨剉空。納小蟲。

豆令滿。留蓋合住。繫定。糠火煨熟。搗作餅。每日食之。至效。(摘玄方)

●治暗風失音。生梨搗汁一盞。飲之。日再服。(食療本草方)

●治小兒風熱。昏憒。不能食。用消梨三枚。切破。以水二升。煮取汁一升。入粳米一合。煮粥食之。(聖惠方)

●治赤目。野肉。日夜痛者。取好梨一顆。搗絞汁。以酥。麥黃。連片一錢。浸汁。仰臥點之。(國經方)

●治赤眼腫痛。鵝梨一枚。搗汁。黃連末半兩。膩粉一字。和勻。絲。浸梨汁中。日點之。(聖惠方)

●治反胃轉食。藥物不下。用大雪梨一箇。以丁香十五粒。刺入梨內。溼紙包。四五重。煨熟食之。(聖濟總錄方)

用量 錢半至四錢。

施用宜忌 凡胃寒便滑。及無熱邪者。禁用。

參攷資料 ●梨多食動脾。少則不及。病用梨者。當斟酌之。惟病酒煩渴。人食之。甚佳。終不能卻疾。(慈宗輿) ●孫光憲北夢瑣言云。有一朝士。見奉御梁新診之。曰。風

疾已深。請速歸去。復見鄆州馬醫趙鄂診之。言與梁同。但請多喫消梨。咀齧不及。絞汁而飲。到家旬日。惟喫消梨。頓爽也。(唐慎微) ●按類編云。一士人。狀若有疾。厭厭無聊。往楊吉老診之。楊曰。君熱證已極。氣血消。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。聞茅山有道士。醫術通神。而不欲自鳴。乃衣僕衣。詣山拜之。願執薪水之役。道士留置弟子中。久之。以貨告道士。道士診之。笑曰。汝便下山。但日日喫好梨一顆。如生梨已盡。則取乾者。泡湯食。津飲汁。疾自當平。士人如其戒。經一歲。復見吉老。見其顏貌。腴澤脈息和平。驚曰。君必遇異人。不然豈有痊理。士人備告吉老。吉老具衣冠。望茅山設拜。自告其學之未至。此與瑣言之說。彷彿。觀夫二條。則梨之功。豈小補哉。然惟乳梨。鵝梨。消梨。可食。餘梨。則亦不能去病也。李時珍云。梨。處處皆有。而種類殊別。醫方。相承。用乳梨。鵝梨。梨。出宣城。皮厚而肉實。其味極長。鵝梨。河之南北州郡。皆有之。皮薄而漿多。味差短。其香。則過之。其餘

水梨。消梨。紫糜梨。赤梨。青梨。茅梨。甘棠梨。梨兒梨之類。甚多。俱不入藥也。一種。藥梨。惟堪。蜜。養食之。止口乾。生食。不益人。冷中。又有紫花梨。療心熱。唐武宗。有此疾。百藥不效。青城山。邢道人。以此梨。絞汁。進之。帝疾。遂愈。復求之。不可得。常山郡。忽有一株。因緘封。以進。帝多食之。解煩燥。殊效。歲久。木枯。不復有種。今人。不得。而用之矣。(蘇頌) ●梨樹。高二三丈。尖葉。光膩。有細齒。二月。開白花。如雪。六出。上已。無風。則結實。必嘉。故古語云。上已有風。梨有聲。中秋。無月。蚌無胎。買思。言梨核。每類。有十餘子。種之。惟一。二子。生梨。餘皆。生杜。此亦一異也。杜。即棠梨也。梨品。甚多。必須。棠梨。桑樹。接過者。則結子。早而佳。梨有青黃。紅紫。四色。乳梨。即雪梨。鵝梨。即錦梨。消梨。即香水梨也。俱。為上品。可以治病。梨兒梨。即玉乳梨之。說。或云。梨兒。一作。語兒。地名也。在蘇州。嘉興。縣。見。漢書。注。其他。青皮。早穀。半斤。沙。糜。諸梨。皆。粗。澆。不堪。止。可。蒸。煮。及。切。煑。為。脯。爾。一種。醋。梨。另。水。煮。熟。則。甜。美。不。損。人。也。音。

人言梨皆以常山、真定、山陽、鉅野、梁國、睢陽、齊國、臨淄、鉅鹿、弘農、京兆、鄴都、洛陽爲稱。蓋好梨多產於北土。南方惟宣城者爲勝。故司馬遷史記云：「淮北榮南河濟之間，千株梨。其人與千戶侯等也。」又魏文帝詔云：「真定御梨，大如拳，甘如蜜，唐如菱，可以解煩釋憤。」辛氏三秦記云：「合消梨，大如五升器，墜地則破，須以囊承取之。漢武帝常種於上苑。此又梨之奇品也。物類相感，志言梨與蘿蔔相間收藏，或削梨蒂種於蘿蔔上，藏之，皆可經年不爛。今北人每於樹上包裹，過冬乃摘，亦妙。」李時珍云：「梨不論形色，總以心小肉細，嚼之無渣，而味純甘者爲佳。凡丹石煙火、煤火酒毒、一切熱藥爲患者，咳之立解。溫熱虛病及陰虛火燥、津液虧損者，搗汁飲之，立效。此果中之甘露子，藥中之聖醍醐也。」(王乘齊)云：「凡人有病處，口渴脈數，此癰疽將成之候。惟晝夜食梨，可轉重爲輕。膏粱之家，厚味醇酒，縱恣無節，必多痰火，芥中癰疽之病，能常食梨，可免。」(顧松園)

十二畫 梨 藥 榆 棉

【梨子皮】即梨之處方用名。詳「梨」條。

【梨木皮】 主治 解傷寒時氣。

【梨汁】即梨之處方用名。詳「梨」條。

【梨尖草】即牛蒡之別名。詳「牛蒡」條。

【梨花】 主治 去面黑粉滓。

【梨花春】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【梨食】即白芍之古籍別名。典見別錄。詳「白芍」條。

【梨葉樹】即根椶子之古籍別名。典見綱目。詳「根椶子」條。

【梨葉】 主治 霍亂吐利不止。 灸汁服。作煎治風。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌 圖經本草論梨葉曰：治小兒寒疝。

【明】吳瑞日用本草論梨葉曰：搗汁服，解中菌毒。

【梨葉】即芥之古籍別名。典見別錄。詳「芥」條。

【梨蓋】即防葵之古籍別名。典見本經。詳「防葵」條。

【梨鬆】 產地 出臺灣海島中。 形態 梨鬆爲雜草類之一種。其果實如肥皂，可供藥用。

主治 磨塗疥瘡。

【梨鱗】即鱗鱗之古籍別名。典見綱目。詳「鱗鱗」條。

【藥杖草】即淫羊藿之古籍別名。典見諸家本草。詳「淫羊藿」條。

【藥枝草】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「淫羊藿」條。

【榆】即鈞樟之古籍別名。典見本草集註。詳「烏樟」條。

【榆草】即烏樟之古籍別名。典見綱目。詳「烏樟」條。

【棉子】 基本 本品係草棉之子實。

性質 辛熱。

主治 補虛煖腰。治損。油毒。骨目。塗疥等。

配合應用 ①治痰火後牛身不遂，筋骨疼痛，核桃仁、棉花子仁、杜仲炒、巴戟砂仁、骨碎補、枸杞子、續斷、牛膝各二兩，大蝦米四兩，菟絲餅四兩，用燒酒二十觔煮服。如

年高者加附子、肉桂各一兩。酒服完，將渣曬乾爲細末，煉蜜爲丸。每

服二錢。酒送下。

②長春丸治腎虛精冷之症。魚膠一觔，蛤粉炒成珠，極焦。棉花子取淨仁一觔，去油，淨酒蒸，白蓮鬚

八兩，金櫻子去仁毛淨一觔，金釵石斛八兩，炒藥麩四兩，枸杞子四

兩，五味子四兩，炒鹿角五觔，鱈魚片，河水煮三晝夜，去角，取汁熬膏

和藥末爲丸。梧桐子大，每服三錢。

(集驗良方)

③健步方。棉花子仁一觔，淨肉用燒酒三觔炒乾。枸杞子四兩，酒

浸。杜仲四兩，鹽酒煮炒。菟絲子四兩，酒炒。歸身二兩，破故紙四兩，酒

洗炒。胡桃仁四兩，共爲末，煉蜜爲丸。桐子大，每服三錢。空心滾湯下。

(漫錄集方)

④仙傳蟠桃丸。大有補益。治諸虛百損。棉花子取淨仁乾，燒酒拌

透。下用黃酒水平對蒸一炷香。缸

裏用黃酒煮熟。取淨肉各一觔。歸身、牛膝、枸杞，俱用酒浸。肉苁蓉酒

洗去泥甲。山茶葉酒潤去核。菟絲子酒蒸成餅。白魚膠熬炒成泡。白

茯苓、人乳并蒸。紙鹽水炒。熱地酒

煮如餡。以上藥各四兩。淨巴戟酒

十二畫 棉棋探棒 棕 棗

洗去心五兩。共爲細末。煉蜜爲丸。三錢。早晚酒水任意送下。(臥盤山人傳方)

⑤種子方。棉子仁淨肉四兩。燒酒拌曬三次。熟地二兩。枸杞一兩。菟絲子破故紙茯苓。山藥。陳皮。五味子。連翹。何首烏。各一兩。蜜丸。鹽湯空心服四錢。(集驗方)

⑥治痔漏管。棉花子仁炒。急性子炒。草麩子仁炒。各等分爲末。每服三錢。空心好酒下。輕者半月。重者一月。管自退。(周氏家寶方)

⑦治出血不止。棉花子燒灰存性。爲末數之。(家寶方)

⑧治崩帶。陳蓮蓬燒灰存性。五錢。棉花子肉燒灰存性。三錢。共一服。無灰酒調下。(家寶方)

⑨治腸風下血。生柿子二個。竹刀切去蒂核。以棉花子塞入柿內。仍盪好。瓦上煨存性。研細末。米飲熱調服。重者三服全愈。(不藥良方)

⑩治穀道生瘡。俗呼偷糞老鼠。用棉花子炒去殼。磨粉。每早中晚三次。打糊服一碗。半月全愈。(不藥良方)

⑪治腎子大小偏墜。回生集。用棉子煮湯入藥。將腎囊坐入藥口。俟湯冷止。一二次。散其冷氣自愈。(不藥良方)

⑫治陽痿不起。棉花子水浸曬乾。燒酒拌炒去殼。用仁半觔。破故紙鹽水炒。韭菜子炒。各二兩。爲末。葱汁爲丸。梧子大。每服二錢。空心酒下。(祝氏效方)

⑬治痢疾。棉花子仁。新瓦炒去油。焦研細。每服二錢。紅用燈心湯下。白用好陳酒下。(救生苦海方)

⑭治癰腫。棉花子。用棉花子一斗。燒酒拌和炒燥去灰。再拌再炒。以黑爲度。去殼再炒。搗爲末。用砂糖調和。每服三錢。服過一升許。即愈。(集驗方)

【棉花】即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜仲」條。⑮即草棉花之俗名。詳「草棉」條。【棉花葵】即黃蜀葵之古籍別名。典見植物圖考。詳「黃蜀葵」條。

【棋】即棋棍子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「棋棍子」條。【棗子】 產地 生山野間。形態 棗爲果類之一

種。三月開花。結實如梨。七八月成熟。色黃。味甘。而核甚堅。可供藥用。性質 甘。平。無毒。主治 生食之。止水痢。熱和蜜食之。去嗽。

【棒槌草】即龍鬚草之別名。詳「龍鬚草」條。【棒雞草】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【棒蘭】即釵子股之古籍別名。典見海藥。詳「釵子股」條。【棕心草】即龍常草之古籍別名。典見綱目。詳「龍常草」條。

【棕栢】即棧欄之俗名。詳「棧欄」條。【棕欄】即棧欄之俗名。詳「棧欄」條。

【棕欄皮】即棧欄之處方用名。詳「棧欄」條。【棧欄炭】即棧欄炒黑者之處方用名。詳「棧欄」條。

【棕欄草】即棧欄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「棧欄」條。【棧】即大棗之原名。詳「大棗」條。

一三一六

【棗木心】 性質 甘。溫。有小毒。主治 中藥腹痛。面目青黃。淋露骨立。到取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清煎五升。且服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。

【棗杞】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。【棗兒核】即棧欄之處方用名。詳「棧欄」條。

【棗油】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗核仁】 原名 陳棗核仁。性質 燥。苦。平。無毒。主治 腹痛邪氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論棗核仁曰。惡氣。卒疰。忤。【明】李時珍本草綱目論棗核仁曰。核燒研。搗膠。瘡良。參攷資料 按劉根別傳云。道士陳孜如。疑人。江夏袁仲陽。敬事之。孜曰。今春當有疾。可服棗核仁。仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治邪之說。

矣。又道書云。常含棗核。治氣令口
行津液。嚼之佳。謝承後漢書亦云。
孟節能含棗核不食。可至十年也。
此皆藉棗以生津受氣而嚼之。又
能達黃宮以交陰坎之義耳。(李
時珍)

【棗脯】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗棘】即蛇牀子之古籍別名。典
見本經。詳「蛇牀子」條。

【棗葉】性質 甘。溫。微毒。
主治 覆府黃。能令出
汗。(本經)和葛粉搗熱瘡瘡良
(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸
家本草論棗葉曰。治小兒壯熱。煎
湯浴之。

參攷資料 棗葉作散服之。使
人復。久則嘔吐。(別錄)

【棗實】即海椶子之古籍別名。典
見綱目拾遺。詳「海椶子」條。

【棗膏】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗樹皮】主治 同老桑樹皮
並取北向者。等分燒
研。每用一合。井水煎澄取清。洗目。

一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。

【棗樹根】主治 小兒赤丹。從
脚跌起。煎湯頻浴之。

【棗貓】產地 生棗樹間。
形體 棗貓為卵生蟲
類之一種。即棗樹上之飛蟲。大如
棗子。色青灰。有兩角。採得陰乾。可
供藥用。

參攷資料 按方廣云。小兒初
生。以綿裹臍帶。離臍五六寸。扎定
咬斷。以鴉翎筒送藥一二分。入臍
大孔。輕輕揉散。以艾柱灸臍頭三
壯。結住。勿打動。候其自落。永無臍
風之患。萬不失一。臍硬者用之。軟
者無病。不必用也。其法用陰乾棗
貓兒研末三箇。真珠珀研四十九
粒。炒黃丹五分。白枯礬。給粉。血竭。
各五分。研勻如上法用。臍有三孔。
一大二小也。

【棗蠶屎】基本 本品即棗樹
上之蠶蟲屎。

主治 辟耳出膿水。研末。同麝
香少許吹之。

【棘竹】即竹之別名。詳「竹」條。

【棘刺】即白棘之古籍別名。典見

別錄。詳「白棘」條。

【棘狗】即枳椇子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【棘梅子】即枳椇子之古籍別名。
典見綱目。詳「枳椇子」條。

【棘剛子】即雀巢之古籍別名。典
見本草衍義。詳「雀巢」條。

【棘蕪】即遠志之古籍別名。典見
本經。詳「遠志」條。

【棘實】即酸棗之小者。典見新修
本草圖經。詳「酸棗」條。

【棘棘】即白棘之古籍別名。典見
別錄。詳「白棘」條。

【楨桂】即肉桂之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「肉桂」條。

【棠棣子】即山查之古籍別名。典
見圖經本草。詳「山查」條。

【棠梨】古語別名 野梨。(綱
目)

基本 係薔薇科棠梨屬。為棠
梨之子實。其枝。葉。花。詳見各該條。

產地 在山林間。

形態 棠梨為梨之一種。落葉
亞喬木。枝幹如梨。葉作卵形。有鋸
齒。黯白色。春初開小白花。結實如
小棗子。霜後可食。與供藥用。

性質 酸。甘。溫。寒。無毒。

主治 燒食止滑痢 性實 酸。甘。溫。

【棠梨枝葉】無毒。

主治 霍亂吐瀉不止。轉筋腹
痛。取一握。同木瓜二兩。煎汁細呷
之。

【棠梨花】主治 濟飢。煤食或
噉乾磨粉食。

【棠棗】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棠棣仁】即郁李仁之古籍別名。
典見爾雅。詳「郁李仁」條。

【棧香】即佛佛香之別名。典見乘
雅。詳「佛佛香」條。

【棧蘆李】即麥李之別名。典見郭
璞註爾雅。詳「李子」條。

【棧仁】即郁李仁之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【棧仁】即棗仁之古籍別名。典見
爾雅。詳「棗仁」條。

【棧桐】即桐之古籍別名。典見本
草集註。詳「桐」條。

【枳椇】即椶櫚之古籍別名。典見
綱目。詳「椶櫚」條。

【枳仁】即枳子仁之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「柏子仁」條。

【栝葉】即栝葉之古籍別名。與見綱目。詳「栝葉」條。

【栝子木】即栝樹之古籍別名。與見綱目。詳「栝樹」條。

【栝豆】即綠豆之古籍別名。與見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【栝耳】即香耳之日本名。詳「香耳」條。

【栝實】即綠桑葚之別名。與見動物學大辭典。詳「綠桑葚」條。

【椴】即椴木之古籍別名。與見綱目。詳「椴木」條。

【椴】即李子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「李子」條。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

【椴】命名 椴乃椴之小而卑者。

椴至熟黃赤。此則雖熟亦青黑色。可生啖。不可為乾。可供藥用。

性質 甘寒。瀉。無毒。

主治 歷丹石藥發熱。利水解毒。去胃中熱。久食令人寒中。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論椴椴曰。止煩渴。潤心肺。除腹臟冷熱。

參攷資料 椴柿生啖性冷。服石家宜之。久食令人中寒。不可與蟹同食。(附弘景)

【椴柏酒】製法 除夕日。用椴七枝。浸酒一瓶。元旦飲之。

主治 辟一切疫癘不正之氣。

製法 用鮮椴藤取。

主治 明目開胃。運食健脾。

【椴花】即山欒之古籍別名。與見綱目。詳「山欒」條。

【椴】即杉材之古籍別名。與見植物學大辭典。詳「杉材」條。

【椴皮】即土骨皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【椴】即水仙之古籍別名。與見百陽雜俎。詳「水仙」條。

【款冬花】命名 款者至也。本品至冬而花。故名。

處方用名 蜜炙款冬。冬花。

古籍別名 紫吾。虎鬚。(本經)

氏冬。(別錄)款凍。(郭璞)類凍。菹。

奚。(爾雅)預冬。(衍義)款花。冬花。

葛款冬。款冬。(和漢藥考)

外國名詞 Dioscorea

基本 屬菊科款冬之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產排云。款冬花產陝西盩厔為最。漢中亦可。山西次之。四川又次之。冬季出新。



(一) 款冬花

形態 款冬為山野自生之多。年生草。春抽花莖。葉互生。初作長卵圓形。葉前端尖。花為帶白色筒狀花冠。其數頗多。作頭狀花序排列。花後葉莖發育。高達二尺餘。葉則作心臟圓形。而具長葉柄。根為蔓延之地下莖。呈灰白色。質脆。味苦。謂之款冬根。亦供藥用。其

花為帶青褐色。大如指頭之花蕾。作梨荷荷狀。味苦。



(二) 款冬花

採取 十一月十二月間。採花蕊陰乾。

製法 晉駁曰。凡採得。須去向莖。花蕊殼。并向裏實。如梨殼者。并枝葉。以甘草水浸一夜。曬乾。去葉用。

性質 辛溫。無毒。

效能 溫肺。下氣。化痰。止咳。用作祛痰鎮咳藥。治痰咳喘息。及妊婦之咳嗽。感冒亦有者。

主治 咳逆上氣。善喘。喉痺。諸驚。寒熱邪氣。(本經)消渴。喘息呼吸。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論款冬花曰。療肺氣心促。急熱勞咳。速逆不絕。涕唾稠黏。肺痿。肺癰。咳吐膿血。【宋】大明諸家本草論款冬花曰。潤心肺。益五臟。除煩消痰。法肝明目。及中風等疾。

【明】李士材本草圖解論款冬花曰：款冬花辛而微溫。肺經藥也。潤肺消痰。止咳定喘。清喉痺。理肺痿。肺癆。古人治久款冬花一兩。蜂蜜并酒入茶壺中。以麪固其蓋。勿令洩氣。壺下着炭火。待烟從壺口出口。含吸。烟盡乃止。數日必效。按傳成款冬花賦有云。冰浸盈谷。雪積破崖。顧見款冬。煒然華豔。則其純陽之性可知。雖具新溫。却不燥熱。故能輕揚。上達至高之府。贊相傳而奏功動也。蜜水并微火炒。【清】黃宮繡本草求真論款冬花曰：款冬花按書既載辛溫純陽。又載海熱消痰除煩定驚。明目治咳。逆上氣喘。渴聲喉痺。肺痿肺癆。咳吐血等症。其藥似屬兩歧。詎知所謂純陽者。因其氣味上達。入陽而不入陰。且經當雪而秀。故謂其氣純陽。所謂能治咳逆者。因其咳因寒入。得此溫煖。以爲疏滯。則寒自順而下矣。所謂能除熱痰而嗽者。亦是熱因寒入。痰因熱成。除寒而熱可清。除熱而寒自解。所謂能治肺痿肺癆。咳吐血者。亦是肺虛。得此以爲溫潤。故能服之即止。

十一畫 款

若使自因實致。則此屬屬難按。况此雖云純陽。於火更不克助。故辛溫之內。仍有和煖之意。是以書載可爲寒熱虛實通用。生河北關中者。良。揀淨花。甘草水浸。用【清】鄭樹本經疏證論款冬曰：千金外臺。凡治咳逆久咳。並用紫菀款冬者。十方而九。然二物者。一則閉結。使中焦之陰化血。一則吸陰下歸。先之功力略同。而其異在千金外臺亦約略可見。蓋凡睡腹血失音者。及風寒水氣盛者。多不甚用款冬。但用紫菀。款冬則每同溫劑補劑用者爲多。是不可得其大旨哉。【清】賈九如辨藥指南論款冬花曰：冬花用蓋。蓋乃發生之品。含蓄未放。生於冬而耐寒。得一陽初動之氣。開發生機。且喜其味苦主降。氣香主散。一物而兩用兼備。故用入肺部。順肺中之氣。又清肺中之血。專治咳逆上氣。煩熱喘促。痰涎稠黏。涕唾腥臭。爲諸證之要藥。如久嗽肺虛。尤不可缺。

純陽之品。故一名款凍。生河北關中。微見花未舒。故者良。近今市肆多以枇杷花蓋。充。雖無大害。然性不同。則功自異耳。【清】曾炳章曰：按冬花九月出新。山西大原者。色紫紅無核。爲手辦冬花。最佳。有梗者。曰上冬花。次之。梗多色黑紫者。曰中冬花。亦次。亳州出者。更次。考冬花花瓣。色紅紫光潔。枇杷花色。色黃紫有茸毛。形態不同。最易鑒別。【清】張山雷曰：款冬嚴寒着花。其性微辛。是以性溫而花本輕揚。故主肺病。能開泄鬱結。定逆止咳。專主咳嗽。性質功用。皆與紫菀絕似。所以本經主治。亦復多同。於寒束肺金之飲邪。喘嗽最宜。然氣味雖溫。而生於水中。亦潤而不燥。則溫熱之邪。鬱於肺經。而不得疏泄者。亦能治之。又如紫菀開肺。寒熱皆宜之例。特比之紫菀。究是辛溫一籌。則火邪鬱結。如肺癰成膿。痰紅臭穢之候。自當有所顧忌。甄權竟謂其主肺痿肺癰。而最岳石頑從而和之。殊是未妥。且石亦謂陰虛勞嗽忌之。以其性溫也。何獨於肺癰而不畏其溫。是知

有二五而不知有一十矣。要之其功用大綱。多似紫菀。上文紫菀條中論之已詳。茲亦不贅。試參考之。亦可觸類而旁通也。穆氏經疏。有一方用款冬花合貝母桑根白皮紫菀枇杷葉天花粉百部天冬麥冬杏仁。謂治喘逆咳嗽。則喘逆咳嗽四字之中。有寒有熱。有實有虛。證情病態。萬有不齊。豈有羅列幾味治肺之藥。而謂可以通治寒熱虛實之理。且所集諸藥。寒者溫者。開者膩者。疏道者閉塞者。渾雜於一爐之中。縱有幾味對證。亦已多所牽制。何由奏效。此類成方。視視之。頗似親切。病情無甚悖謬。實則庸雜已極。必無偶爾倖中之理。且開泄與遏抑並用。則紫菀款冬百部之最能疏化肺鬱者。已爲二冬之黏滯。束縛不靈。况再加以桑皮苦寒抑降。閉而塞之。更是落阱下石之手段。惟恐其肺家鬱塞。稍得疏通。而必感之塞之。以速其斃。製方之意。不知是何居心。又穆氏更有一方。以款冬麻黃杏仁桑白皮甘草。治風寒鬱實作喘。則寒邪外來。開肺宜也。但桑白皮遏抑肺氣。

十二畫 款

殘 穀 渠 渡 泐 渴 游 漾 滿 湖

豎曰濟肺。而寒能抑寒。惟肺家燥烈為宜。斷非外有寒邪者所可妄試。若去桑皮而易以紫菀。則幾矣。

配合應用

款冬花。雖畏貝母。然得貝母。桑根白皮。紫菀。枇杷葉。栝樓根。百部。天麥門冬。杏仁。治喘逆及咳嗽反良。物有相制故也。如半夏畏生薑。得之則制其毒。而愈能奏效也。

款冬得麻黃。杏仁。桑根白皮。甘草。治風寒鬱實熱於上焦肺分作喘。其效甚速。

款冬一味燒烟吸之。治喘嗽。具如本草注中所載。

治痰嗽帶血。款冬花。百合蒸焙。等分為末。蜜丸。飽服。大每臥時嚼一丸。薄荷湯下。(濟生方)

治口中疳瘡。款冬。黃連等分為細末。用唾津調成餅子。先以蛇牀子煎湯漱口。乃以餅子傅之。少頃確住。其瘡立消也。(楊誠經驗方)

用益 錢半至三錢。

應用宜忌 凡火熱利金。肺陰不足者禁用。惡皂莢。消石。玄參。長貝。牛黃。鹿茸。黃耆。黃芩。不運。通。青

杏仁為之使。得紫菀良。參攷資料 本經主咳逆。古方用為溫肺治嗽之最。崔知悌療久咳煎法。每旦取款冬花如雞子許。少蜜并花使潤。納一升。錢鑄中。又用一瓦。盤鑽一孔。孔內安一小筆管。以麵泥封。勿令漏氣。鑄下着炭火。少時烟從筒出。以口含吸。噓之。如胸中少悶。須舉頭。即將指頭按住筒口。勿使漏。至烟盡乃止。如是五日一為之。待至六日。飽食羊內餽。餛一頓。永遼矣。(蘇頌)

按述征記云。洛水至歲末凝。屆時款冬生於草水之中。則顆凍之名。以此而得。後人誤為款冬。即款凍附。(李時珍) 百草中惟此不顯冰。雪。最先春也。故世謂之鑽凍。雖在冰雪之下。至時亦生芽。春時人採以代蔬。入藥須殺見花者良。如已芬芳。則都無氣力。今人多使如筋頭者。恐未有花也。(寇宗奭) 第一出河北。其形如宿尊。未舒者佳。其腹裏有絲。次出高麗。百濟。其花乃似大菊花。次亦出蜀。北部皆昌。而並不如。其冬月在冰下生。十二月正月且取之。(陶弘景) 今出

雍州南山溪水及華州山谷潤間。葉似葵而大。叢生。花出根下。(蘇恭) 今關中亦有之。根紫色。葉似草薺。十二月開花。黃青紫。去土一二寸。初出如菊花。萼通直而肥實。無子。則陶氏所謂出高麗百濟者。近此類也。又有紅花者。葉如荷而斗直。大者容一升。小者容數合。俗呼為蜂斗葉。又名水斗葉。則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也。傳成款冬賦序云。予曾逐禽登於北山。於時仲冬之月。冰凌盈谷。積雪被屋。願見款冬。煒然始數華。豈是也。(蘇頌)

款冬 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘花 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘草 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘葉 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘根 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘莖 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘葉 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘根 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。
殘莖 即款冬花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「款冬花」條。

游海茹 即茄子之古籍別名。與見綱目。詳「茄子」條。
渴旦 即寒蟬蟲之古籍別名。與見唐詩。詳「寒蟬蟲」條。
渴砂 即全蠍之古籍別名。與見和漢藥考。詳「全蠍」條。
渴粟 即血竭之古籍別名。與見和漢藥考。詳「血竭」條。
游冬 即苦菜之古籍別名。與見別錄。詳「苦菜」條。
游冬蘇母 即貝母之古籍別名。與見和漢藥考。詳「貝母」條。
游波 即燕之古籍別名。與見炮炙論。詳「燕」條。
游龍 即葶草之古籍別名。與見詩經。詳「葶草」條。

漢阪魚 命名 本品為魚之產於陝西省郿縣之漢阪地方。故名。主治 痔疾。
蒲胡 即前胡之原名。詳「前胡」條。
湖丹皮 即牡丹皮之處方用名。詳「牡丹皮」條。
湖目 即選肉之古籍別名。與見和漢藥考。詳「選肉」條。

和漢藥考。詳「選肉」條。

【消廣虎】即白虎之處方用名。詳
【白虎】條。

【消珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

【消珠珠】即真珠之處方用名。詳
【真珠】條。

補虛損。潤顏色。療痔洩腹痛。

參攷資料 鹿銜一名無心草。

此草功用與之相近。其圖形亦相
近。恐即一物也。見耳草亦名無心
草。與此不同。(李時珍)

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

【無心草】即鼠麴草之古籍別
名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。即
鹿御草之古籍別名。典見吳普本
草。詳『鹿御草』條。

主治 陰腎萎弱。囊下溼癢。並
煎汁小浴。極妙。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名印】即地榆之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地榆』條。

補國經本草論無名異曰。消腫毒
佳。難症。醋摩傳之。明李時珍本
草綱目論無名異曰。收溼氣。明

經希雅本草經疏論無名異曰。無
名異。東地中。陰水之氣。以生。本經

味甘。氣平。無毒。蘇頌。鹹寒。鹹能入
血。甘能補血。寒能除熱。故主金瘡

折傷內損。及止痛生肌肉也。蘇頌
醋摩傳腫毒。難症。亦取其活血

涼血之功耳。明李士材本草圖
解論無名異曰。無名異。甘平。無毒。

主金瘡折傷。內損。止痛生肌肉。收
溼氣。除折傷腫毒外。無他用。清

黃宮繡本草求真論無名異曰。無
名異。即俗所名乾子者是也。味甘

而鹹。微寒。無毒。諸書皆言能治癰
腫。損傷接骨。金瘡合口。其義何居

以其鹹有入血之能。甘有補血之
力。寒能勝熱之義者故耳。是以人

於受杖時。每服三五錢。其於傷處
不其覺痛。用醋磨塗。腹處即消。要

皆外治之品。而非內服之味也。生
川廣小。黑石子也。一包約數百枚。

【世】黃元御玉楸藥解論無名異
曰。無名異。燥溼行瘀。消腫止痛。治

金瘡打損。筋斷骨折。癰疽梅毒。痔

瘰癧。即氣瘰瘡之類。此物善收溼氣。調漆煉油。其乾甚速。至燥之品。

配合應用 ①治打傷腫痛。無名異為末。酒服。起下。四肢之末血皆散矣。(集驗方)

②治損傷接骨。無名異甜瓜子各一兩。乳香。沒藥。各一錢。為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。擦左顧牡蠣末。裹之。竹篾夾住。(多能醫事方)

③治臨杖預報。無名異末。臨時溫服三五錢。則杖不甚痛。亦不甚傷。(談楚翁試效方)

④治赤痢丹毒。無名異末。葱汁調塗立消。(簡便方)

⑤治痔漏腫痛。無名異炭火煨紅。米醋洋七次。為細末。以溫水洗痔。鴉麥筋頭。填末入瘡口。數次愈。(簡便方)

⑥治天泡濕瘡。無名異末。井華水調服之。(普濟方)

⑦治腫瘡潰爛。無名異。鏡丹。細研。清油調。擦。溼則乾。擦之。(濟急方)

⑧治脫陰瘡。無名異二錢。磨

香一字。研。酒半碗。午後空腹服。立效。(多能醫事方)

⑨治拳毛倒睫。無名異末。紙卷作捲。點燈吹殺。點之。睫自起。(保命集方)

⑩治消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸。綠豆大。每服百丸。以茄根煎茵蕪湯送下。(聖濟總錄方)

⑪治脚氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頗換。(衛生簡易方)

用置 八分至錢半。

參攷資料 ①崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石。摩其損處。遂愈而去。乃取其石。理傷折大效。人因傳之。李時珍 ②無名異。氣味鹹寒。伏硫黃(蘇頌) ③無名異。出大食國。生於石上。狀如黑石。灰。香人以油煉如磁石。嚼之如錫也。(馬志) ④今廣州山石中。及宜州八星。龍濟山中。亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。(蘇頌) ⑤生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃。而色黑。近處山中。亦時有之。

用以煮蟹。殺腥氣。煎煉桐油。收水氣。塗剪剪。則燈自斷也。(李時珍) ⑥無名異。產中國河南。陝西。廣東諸省。日本。遠江。石見。隱岐。伊豆。土佐等處。亦產之。(和漢藥考)

【無灰木】即不灰木之古籍別名。與見綱目。詳「不灰木」條。

【無耳聞雪】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【無姑仁】即蕪荑之古籍別名。與見本經。詳「蕪荑」條。


【無花果】 命名 和漢藥考云。本品一名一熟。蓋謂其果一月而成。熟時誤為無花而結果。遂命之曰無花果。

古籍別名 映日果。(便民圖纂) 優曇鉢(廣州志) 阿羅(綱目) 底珍(酉陽雜俎) 唐榜。蜜果。映日紅。王孫皮。枝。仙桃。青桃。(和漢藥考)

外國名圖 Flora Carica, F(拉丁)

基本 屬桑科無花果之實。產地 陳仁山藥物生產辨云。無花果各國均有。出廣東。廣西各屬均有。土耳其產者。均同一體。

形態 無花果種類甚多。為人工栽植之喬木。高達丈餘。葉形大。為單葉。有裂三至五。邊緣有鋸齒。有毛茸。質粗糙。切傷之。有白汁流出。花生於花托。花托作鐘狀。其上面生雄花。下面生雌花。花後。花托漸次膨脹。變成倒卵圓形之果肉。氣候寒冷。則其表面被有白色粉霜。有特異氣味。及良佳甘味。長約二寸。闊三寸許。作倒卵圓形之果實。外部生時作綠色。熟則變紫褐色。或黃褐色。內部為紫色。或紅色。此果實在未熟時。滲出辛味乳液。及漸成熟。則漸減少。增加甘味。藥用採此乾燥之。



採取 六七月間。實熟時採之。用法 水煎。或生搗用。性質 甘。平。無毒。成分 含有葡萄糖。膠質。脂肪。效能 清熱。潤腸。用作緩和。滋養。又治痔疾。及消化不良症。

作用 入胃後與胃液混和。協助消化之不足。一部分至腸而後吸入血中。一部分仍向大便排出。入血後能促進血液之氣化。使細胞之新陳代謝增力。

主治 開胃止瀉痢。

歷代記述 醫【明】李時珍本草綱目論無花果曰。治五痔。咽喉痛。【清】王士雄隨息居飲食譜論無花果曰。無花果甘寒清熱。療痔潤腸。上利咽喉。中寒者忌食。

國外學說 荷爾藥鏡曰。乾實(蒸熟而曬乾者)含有甘味黏液。頗有緩和功效。故能解胃寒傷冷。毒腐腐液。凡咳嗽、聲啞、咽喉刺痛、喉痛、肺喉痛、胸膈痛、或疝痛、淋疾、癩瘡等。一切適用。緩和劑諸症。水煎用之。有殊效。咽喉口中癢痛等。加入漱劑。爲甘和止痛良藥。肺癆、胸膈痛諸症。乾咳、久咳、勞咳等劇病。多服下方。有奇效。(一)酒解和胸飲。無花果(剉)乾葡萄(剉)各二益斯。甘草(剉)四錢。大麥煎(次出)二斤。蒸溜水一斤。上用文火煮至二斤。飲服。(二)大麥煎。精大麥二益斯。湯湯五斤。上先用冷

水。細將大麥洗淨。加水半斤。煮一二沸。去其汚色湯。取大麥。加沸湯五斤。煮減中。應用。(初煮一二沸。去汚色湯。則無臭味。患者易服。)用此作嫩衝熱等飲料。有止渴潤燥之效。或加橙汁少許。尤佳。將乾實置熱灰煨。貼腫毒。善能化膿。貼痔痛。疼痛速消。用作舊布貼之。尤佳。潰爛貼之。有排膿之效。生實煮渣。含有酪腐乳狀汁。故用以摩擦疣贅。魚目等。屢能消散。或用其汁和豚脂擦之。或用其樹葉摩擦之。亦皆有效。痔血閉止。用此樹葉。類擦肛門。則潰破。瘀血通泄。英美學說謂無花果英俗名非格。各國皆產。其產土耳其者最爲上品。自古以來。即用爲食物與藥品。此樹原產於亞細亞。後移植於歐羅巴各處。其樹身與枝。多含香味。而如乳之汁。其未熟時。亦生此汁。比將熟時。則漸生膠質與糖質。此樹而如得合宜之水土與地氣。則所產之無花果。必多汁而軟。有最佳之味。須於將熟時。滴下乾之。今歐羅巴南邊。所產甚多。而亞細亞各處所產亦復不少。有數處以無花果爲

最大貿易之物。如阿富汗與波斯國之所產者。多運至印度國出售。而英國出售之無花果。則從土麥拿運來。可作食物之藥。未食慣者。食之。有微利性。其功用能作潤劑。養生。治便秘。藥品中用之。大半爲潤皮藥。將熟者加熱劈開。則能作輾布膏之用。治癬子疼。

用量 八分至錢半。

參攷資料 ①無花果凡數種。此乃映日果也。即廣中所謂優鉢鉢。及波斯所謂阿羅也。(李時珍) ②無花果出揚州及雲南。今吳楚閩越人家。亦或折枝插成。枝柯如枇杷樹。三月發葉如花。葉五月內不花而實。實出枝間。狀如木饅頭。其內虛。採以鹽漬。壓實令扁。日乾。克果食。熟則紫色。輾爛。甘味如柿。而無核也。按方輿志云。廣西優鉢鉢。不花而實。狀如枇杷。又段成式酉陽雜俎云。阿羅出波斯拂林。人呼爲底珍。樹長丈餘。枝葉繁茂。有子如薤。無花而實。色赤。類棗。榜一月而熟。味亦如柿。二書所說。皆即此果也。又有文光果。天仙果。古度子。皆無花之果。(李時珍)

【無花果葉】

性質 甘。微辛。平。有小毒。

主治 五痔腫痛。煎湯類薰洗之效。

【無重砂】 卽珠砂之古籍別名。與見新修本草圖經。詳「珠砂」條。

【無風獨搖草】

命名 本品人自動。故名。

古稱別名 荒夫草。(郭璞)

產地 生山野間。

形態 無風獨搖草爲雜草類之一種。頭若彈子。尾若鳥尾。開花黃色。結實如菟絲子。可供藥用。

採取 五月五日採之。

性質 溫。平。無毒。

主治 頭骨遊風。遍體搔痒。黃汁淋洗。

參攷資料 ①羌活、天麻、鬼臼、醜御四者。皆名無風獨搖草。而物異不同。(李時珍) ②無風獨搖草。帶之令夫婦相愛。(陳藏器)

【無食子】

命名 本品波斯人無不食。以代果。故名。

處方用名 沒食子。沒石子。古稱別名 黑石子。(炮炙)麻

十二畫 無

茶澤。諸虛子(綱目)摩澤樹。拔壓子(百陽雜俎)

基本 係喬木類。為無食樹之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產自印度波斯屬。來自暹羅。

形態 無食樹高六七丈。葉似桃葉而長。間歲互生一根。春開白花。花心微紅。其子實圓如彈丸。生青熟黃。可供食。蟲蛇有孔者。並可充藥用。

採取 秋月採之。

製法 雷敏曰。凡使勿犯銅鐵。非被火驚。用顆小無秋米者妙。用漿水於砂盆中。研令盡。焙乾再研。如烏犀色。入藥。

性質 苦溫。無毒。

效能 清精。飲腸。專作收攝藥。

主治 赤白痢。腸滑。生肌肉。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論無食子曰。腸虛冷痢。益血生精。和氣安神。烏髭髮。治陰毒。燒灰用【宋】馬志新詳定本草論無食子曰。溫中。治陰瘡。陰汗。小兒疳積。冷滑不禁【清】黃宮繡本草綱目論無食子曰。沒石子味苦

性溫色黑。功歸入腎固氣。凡夢遺精滑。陰虛齒痛。腹冷泄瀉。瘡口不收。陰汗不止。一切虛火上浮。腎氣不固者。取其苦以堅腎。溫以煖胃。

健脾。黑以入腎益氣。補精神氣。按納丹田。不為走泄。則諸病自能克愈矣。至書所云安神定魄。亦是神氣既收。不為外浮之患。他如燒黑灰煎湯。以治陰毒。合他藥以染髮。為末以擦牙齒。皆是賴其收瀉之力。以為保護。無他道也。但味苦性降。多用恐氣過下。不可不慎。出外番。顆小紋細者佳。炒研用。蟲蝕成孔者。揀去。忌銅鐵。

配合應用 治血痢不止。沒石子一兩為末。飯丸小豆大。每食前來飲下五十丸(普濟方)

治小兒久痢。沒石子二箇。熬黃研末。作餅餵食之。(宮氣方)

治產後下痢。沒石子一箇。燒存性。研末。清煎。熱即飲下。日二次(子母秘錄方)

治牙齒疼痛。綿紗無食子末一錢。咬之。涎出吐去。(濟聖錄方)

治鼻面酒皰。用南方沒石子

有孔者。水磨成膏。夜夜塗之。甚妙。(危氏得效方)

治口鼻急疔。沒石子末吹下部即透(千金方)

治大小口瘡。沒石子泡三分。甘草一分。研末。搽之。月內小兒生者。少許置乳上吮之。入口即啼。不過三次(聖惠方)

治足趾肉刺。無食子三枚。肥皂夾一挺。燒存性。為末。醋和傅之。立效(奇效方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡有實邪者禁用。參攷資料 沒石子合他藥染髮。造墨家亦用之。(冠宗爽) 波斯人每食以代果。故番胡呼為沒石子。梵書無與沒同音。今人呼為墨石。沒石。轉傳說矣。張仲景用治陰汗。燒灰。先以湯浴了。布裹灰撲之。甚良(李珣) 無食子生西戎沙磧間。樹似檉。劉禹錫曰。按段成式西陽雜俎云。無食子生波斯國。呼為摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。三月開花。白色。心微紅。子圓如彈丸。初青。熟乃黃白。蟲蝕成孔者入藥用。其樹一年生

一三三四

無食子。一年生。拔糜子。大如指。長三寸。上有殷中仁。如粟黃。亦可噉。

【蘇恭】按方輿志云。大食國有樹。一年生。如梨子而長。名曰蒲盧子。可食。次年則生麻茶澤。即沒石子也。間歲互生。一根異產。如此。一統志云。沒石子出大食諸番。樹如樟。實如中國茅栗。(李時珍) 此樹中國印度俱有。用是果入藥。能收斂止血。咳血。瀉血。大小腸血。痔瘡。白帶俱宜之。法用沒石子一兩。搗爛。水一斤。煎至一斤。每服一兩。日服二三次。或研細作散。每服一分。半至三分。日服二次。喉嚨弱者。用沒石子水漱之。外用能止肛門痔瘡痛。法用沒石子一錢。研極細末。鴉片膏半錢。豬油八錢。攪和作膏。每用半錢。搽患處。脚指有血。亦可。用此油搽。(內科新說)

【無核李】即徐李之古籍別名。典見綱目。詳李條。

【無根金絲草】即無根草之古籍別名。典見百草鏡。詳無根草條。

【無根草】古籍別名。無根金

鏡) 豆馬黃(李氏草錄)

形態 無根草爲莖草類藤屬之一種。莖細色赤。無根無葉。祇有青色細葉。附於莖際。莖極長。繞於草木而生。有花有子。其苗可供藥用。子詳見該條。

採取 三月四月間採之。尤以色黃而細如線者爲真。

性質 苦。微甘。寒。無毒。

主治 利水去溼熱。涼血。消癰疽。上吐衄。下血。解諸藥毒。及辟瘴。搗傅疔腫惡瘡。淋濁帶下。黃疸。並小便不通。狐臭。腫氣。和非根煎湯洗。

【無根草子】

主治 活血。解毒。療難產。酒煎服。

煎服。

【無根藤】 卽菟絲子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【無骨苧麻】

古籍別名 玉接骨。血見愁。金不換。玉錢草。玉槓。草麒麟。玉連環。玉盤龍。玉槓半枝蓮。(綱目拾遺)

產地 多生陰溼諸地。

形態 無骨苧麻爲接骨草類之一種。立夏時發苗。莖節則粗。高尺許。葉尖而長。形似苧麻而薄小。

背不白。莖如筋。色明透。至九月間莖白明如水晶。上有細紅點子。其花白色。結子青色。至十月草枯而子紅熟。每顆有一二百子。其根莖延白色多粗節。類竹根。中有黏液。種於鬆土。極易繁殖。其根可供藥用。

採取 九月採之。

性質 甘。涼。無毒。

主治 續筋骨。療折傷。理氣開胃。止吐衄。腸紅下血。

參攷資料 無骨苧麻能入肺經。血分行肺經。惡血。引良血歸經。大有功效。(綱目拾遺)

【無患子】

古籍別名 恒。燦。貴。子。油珠子。菩提子。鬼見愁。(綱目)

外國名詞 Sepindus Malt.

Hwai Gaerth. (拉丁) ムクロ

シツフ(日本)

基本 係無患子科無患子屬。

爲無患子之核外肉。

產地 生山野間。

形態 無患子爲落葉喬木類。高二丈餘。葉互生。作偶數羽狀複葉。小葉長卵形。夏月開小花。帶黃

色。雄花八蕊。雌花子房三室。則能花序。結實略似球形。徑六七分。果深堅硬。熟時黃茶色。殼變甚多。內含一種子。形圓色黑。質亦堅。可作念珠。其核外肉可供藥用。



子 患 無

採取 十月間採之。

性質 微苦。平。有小毒。

主治 瘡疔去面黥。喉痺研納喉中立開。又主飛尸。

【無患子仁】

性質 辛。平。無毒。

主治 燒之辟邪惡氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論無患子仁曰。煨食辟惡。去口臭。

【無情子】 卽礪砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「礪砂」條。

【無殼月拔伊】 卽蛤蚧之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛤蚧」條。

【無殼蛤蚧】 卽蛤蚧之古籍別名。

典見附註。詳「蛤蚧」條。

【無義草】 卽山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳「山慈姑」條。

【無腸公子】 卽蟹之古籍別名。典見抱朴子。詳「蟹」條。

【無實子】 卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠李子」條。

【無漏子】 命名 和漢藥考一

名蘇鐵。謂其將枯死時。打入鐵釘則復蘇。故名。無漏子。殆係香音。

處方用名 千年琪。

古籍別名 波斯琪(拾遺) 千年琪(爾雅) 萬歲琪(一統志) 海琪(草木狀) 番琪(對表錄異) 金琪(輟耕錄) 木名海琪。鳳尾蕉。(綱目) 火蕉。番蕉。鳳尾松。蘇鐵。(和漢藥考) 窟莽樹(西陽雜俎)

基本 屬蘇鐵科蘇鐵之子實。

產地 原產波斯國。彼人呼爲窟莽樹。和漢藥考曰。爲暖國植物。琉球薩摩日向等產。此。台灣亦有產。

形態 蘇鐵爲自生之常綠樹。高達一丈餘。莖多直立。全面爲鱗片狀。葉痕所掩。葉叢生於莖頂。爲

十二畫 無

焦 焰 爲 犁

一三三六

其大之羽狀複葉。質硬而有光澤。其小葉作細長形。在暖地則開花。爲單性花。雌雄異株。雌花叢生。狀如火焰。全面有淡褐色長毛。雄花作松毬狀。子實至秋季成熟。其子實爲類桃實而稍扁平之。子實外圍有赤色薄皮。殼而有光澤。內部有白色厚皮。內有白仁。

採取 七八月間採之。

用法 生食或煮汁。

性質 甘。溫。無毒。

效能 消痰止咳。用作通經收斂藥。

主治

補中益氣。除痰嗽。補虛損。好顏色。令人肥健。

歷代記述攷證

【唐】李珣海藥本草論無漏子曰。消食止咳。治虛羸。悅人久服無損。

配合應用

蘇鐵澱粉。有治痢疾功效。又治呃逆。（和漢藥考方）

治刀傷用蘇鐵葉燒焦豚脂煉合塗之。（和漢藥考方）

用量 一錢至三錢。

參攷資料 無漏名義未詳。千年萬歲。言其樹性耐久也。曰海

粟。曰波斯。曰番煎。言其種自外國來也。金粟。貴之也。曰樓。曰蕉。象其幹葉之形也。番人名其木曰煎。其名其實曰苦魯麻。苦魯麻。皆音相近也。（李時珍）樹若栗木。其實若榛子。有三角。（李珣）按劉恂嶺表錄云。廣州有一種波斯粟木。無旁枝。直幹三四丈。至歲四向。共生十餘枝。葉如樓欄。彼土人呼爲海棧木。三五年一着子。每架約三二十顆。都類北方青棗。但小爾。頗商亦有摺本國者。至中國色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蕉。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礮。種之不生。蓋蒸熟者也。（蘇頌）千年棗雖有棗名。別是一物。南番諸國皆有之。即杜甫所賦海棧也。按段成式酉陽雜俎云。波斯東生波斯國。彼人呼爲煎。樹長三四丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生花。狀如蕉花。有兩脚。漸漸開。中有十餘核。六七月熟。則子黑。狀類乾栗。食之味甘如飴也。又陶九成輟耕錄云。四川成都。有金果樹六株。相傳

漢時物也。高五六十丈。圍三四尋。挺直如矢。木無枝柯。頂上有葉如樓欄。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗而大。每歲仲冬。有司具祭。收採。令醫工以刀割去青皮。石灰湯滷。過入冷熱蜜。浸換四次。瓶封。進獻。不如此法。則生澀不可食。番人名爲苦魯麻。蓋鳳尾焦也。一名萬歲棗。泉州有萬年棗。即此物也。又替含草木狀云。海棧大如杯碗。以比安期海上如瓜之棗。似未得其詳也。巴旦杏亦名忽鹿麻。另是一物也。（李時珍）

【無漏子】即海棧實之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「海棧子」條。
【無漏果】即海棧子之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「海棧子」條。
【無節竹】即通竹之古籍別名。與見綱目詳「竹」條。
【無憂扇】即枇杷葉之古籍別名。與見和漢藥考。詳「枇杷葉」條。
【無聲虎】即大黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「大黃」條。
【無顛】即薇衍之古籍別名。與見吳普本草。詳「薇衍」條。
【無顛草】即鹿御草之古籍別名。

與見吳普本草。詳「鹿御草」條。
【魚山查】即山查焙炒成者之處方用名。詳「山查」條。
【焦山樞】即山樞子焙炒成者之處方用名。詳「山樞子」條。
【魚六粒】即神麴焙成魚色者之處方用名。詳「神麴」條。
【魚朮】即白朮炒魚者之處方用名。詳「白朮」條。
【魚冬朮】即白朮炒魚者之處方用名。詳「白朮」條。
【魚白芍】即白芍炒魚者之處方用名。詳「白芍」條。
【焦石】即石炭之古籍別名。與見綱目詳「石炭」條。
【煇石】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「石硫黃」條。
【煇消】即消石之古籍別名。與見土宿本草。詳「消石」條。
【爲猴】即獼猴之古籍別名。與見說文。詳「獼猴」條。
【犂尖草】即雷公藤之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。
【犂食】即芍藥之古籍別名。與見別錄。詳「芍藥」條。
【犂頭刺皮】即雷公藤之古籍別

名。具見物理小識。詳『雷公藥』條。
【犂頭草】 瘴地。在閩粵諸縣境內。
 形態 本品爲雜草類之一種。係一年生草本。形似犂頭。三四月出新。採之可供藥用。

效能 去腐生新。活血止痛。
 主治 治火疔惡毒。魚口便毒。

【獨藤頭草】 卽鱧魚之古籍別名。與見本草必用。詳『鱧魚』條。
【獨藤頭草】 卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。
【獨藤頭草】 卽水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【猩猩】 外國名詞 Simia Satyrus 或 Pithecius Satyrus (拉丁) (Orangoutang) (英)
 基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。體長類。猿類。狢鼻類。人猿類之猩猩。

產地 出蘇門答臘及婆羅洲諸地海岸沼澤之森林中。亦出非洲。有大猩猩黑猩猩等種。

十一畫 犂

獠 猿 狒 狒 狒 狒 狒

形態 猩猩爲獸類之一種。面部裸出。呈顴黑色。額略圓而高。眼大口突出。唇薄。頰部之皮弛緩。忿怒或悅樂時。則生皺紋。無煩味。門犬白三種齒俱備。牡者頰下生長鬚。軀幹肥大。四肢較短。無尾。臀毛逆立。無腎疣。毛長。色赤褐。前肢長。可達跟。拇指短。趾皆長。筋骨十二對。體長四尺餘。不善行立。其肉可供藥用。



猩猩

性質 甘。鹹。溫。無毒。
 主治 食之不味不飢。令人善走。窮年無厭。可以辟穀。

參攷資料 逸書言猩猩肉食之令人不味。其猩猩可知矣。古人以爲珍味。故荀子言猩猩能言笑。二足無毛。而人賤其羹。食其肉。呂氏春秋云。肉之美者猩猩之唇。擯擯之矣。是矣。(李時珍)

【狒皮】 卽刺蝟皮之古籍別名。典見本經。詳『刺蝟皮』條。

【狒】 卽狒之古籍別名。典見綱目。詳『狒』條。

【猴子棗】 卽猴棗之別名。典見藥物生產辨。詳『猴棗』條。

【猴丹】 卽猴棗之別名。詳『猴棗』條。

【猴佛】 卽辛亥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛亥』條。

【猴梨】 卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【猴棗】 古稱別名 狒子棗。羊棗。猴丹。(藥商隱名)

產地 多在南洋星加坡諸海島及西藏印度等處。

形態 猴棗係屬質物。爲石種類。形如鵝卵。大小不一。似石而鬆脆。擊之易碎。色黯黃而微白。其理層層疊疊而生。內有核仁。性極堅硬。印產者。大如雞卵。色純青。藏產者。顆粒甚小。色青黑。光瑩耀目。類如寶石。質地尤爲堅實。效力差勝。

性質 微鹹兼苦。寒。平。無毒。
 效能 平虛喘。鎮肝魂。定瘧厥。止瘧疾。開痰閉。清痰熱。

主治 爲癩。痰厥。癩疽。癩癧。痰核。橫痃。

配合應用 治痰熱癰毒。喘逆。癩癧。猴棗。竹瀝。遠志。天竺黃。蒲貝母。膽星。半夏。

治癩疽痰核。猴棗醋膠塗。用蠟 輕則一分。重則二三分。

參攷資料 猴棗生於老猿猴之胃及肝膽間。綠猿猴常食各種山菓。積年累月。其精液所結成爲石者。形如棗。猶如牛之生黃。狗之生寶。馬之生黑。鹿之生玉。諸獸之生酢。皆此皆物之爲病。而人得之以爲寶。故功能有如此。甚捷。而治效亦相類也。猴棗爲治熱痰最靈捷之聖藥。較之西黃八寶散。暨諸祛熱痰藥。不啻功勝百倍。

猴棗以產於沙喇滑者爲正道地。坤甸產者。亦入上品。近日多出南洋羣島。由板嶼。石叻運來者多。該地土人呼之爲羊腸棗。未必無因。好格物者。其細思之。(藥物生產辨)

【猴殺草】 卽南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳『南天燭』條。
【猴葵】 卽鹿角菜之古籍別名。典

見綱目。詳『鹿角菜』條。

【猴蒜】即毛其之古籍別名。與見綱目。詳『毛其』條。

【猴摑】即山查之古籍別名。典見危氏得效方。詳『山查』條。

【猴瘰】即骨碎補之原名。詳『骨碎補』條。

【猴藥】即南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳『南天燭』條。

【猴園子】古籍別名 仙茅果。
(綱目拾遺)

產地 出臨海深山中。
形態 猴園為夷果類之一種。秋生冬實。大如指頭。其子可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。
主治 暖丹田。益五臟。健脾增氣力。

參攷資料 猴園子樵人採食。并可磨粉。其性溫補。然城市亦無食之者。綱目有猴園子。形與此別。又臨海出猴總子。一名土柿。每年九十月同生。形與红柿同。皆非一物。(綱目拾遺)
【瀉】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【琥珀】命名 虎死則精魄入地。化為石。本品形狀似之。故謂虎魄。俗文從玉。以其類玉也。

處方用名 血珀。毛珀。光珀。西血珀。紅琥珀。琥珀屑。西雲珀。

古籍別名 明珀。蠟珀。香珀。江珠。(綱目)阿溼摩揭婆(梵書)丹珀。南珀。紅珠。虎魄。大蟲珀。(和漢藥考)紅松脂。璽珀。花珀。水珀。石珀。物象珀(炮炙論)

外國名詞 Succinum. (拉丁) Bornston. (德) Succinits. Amber. (英)

基本 屬松柏科植物之樹脂。埋沒地中。歷久而化為石。即琥珀。

產地 和漢藥考曰。琥珀產於東洋之海岸各地。及俄德波蘭瑞典丹麥等國之沙中。或海水中。日本不產真琥珀。僅陸前。陸中能登。石狩等處。產類似之物。

形態 琥珀為扁平或不正圓形之塊。色淡黃或淡白。質透明。有類似松脂之光澤。但頗脆弱。破碎面作貝殼狀。有時含有無血蟲或水泡等物。比重一。〇至一。一。

八。硬度二。五。熱至二百十五度則變軟。熱至二百八十七度則融解。遇酒精。伊打。松節油等。俱稍溶解。摩擦之則發生電氣。燃以火則膨脹而發白煙。氣芳香。乾留之則可得琥珀油。

種類 ①璽珀即紫珀之長者。②蠟珀即色黃而明瑩者。③香珀即有香氣者。④水珀即色淡黃無紅而多皺紋者。⑤石珀即重如石而色黃者。(不堪用)⑥花珀即文如新馬尾松中心文。色紅黃相間者。⑦物象珀即中含有昆蟲等物者。⑧黃白者曰明珀。⑨淡白者曰金珀。又曰香珀。⑩日本與州所產之琥珀者。乃木脂之別名。非琥珀也。⑪紅松脂者似琥珀。但濁而且脆。其文橫為別耳。

採取 採掘無時。
製法 雷斅曰。凡使琥珀入藥用水調。則柏子末。安磁鍋中。置琥珀於內。煮之。從已至申。常有異光。搗粉篩用。今人有用乳製者。

用法 到末和作丸散。或水煎或沖服。
性質 甘。平。無毒。

成分 為樹脂。揮發油。琥珀酸。斯可金。及硫黃等。

效能 利水。散瘀。通淋。安神。用作利尿及通經藥。

主治 安五臟。定魂魄。殺精魅。邪鬼。消瘀血。通五淋。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論琥珀曰。止血生肌。合金瘡。【宋】大明日華諸家本草論琥珀曰。壯心明目。磨腎。止心驚。邪。療瘰癧。破結瘕。治產後血枕痛。

【金】張元素珍珠囊論琥珀曰。清肺。利小腸。【清】黃宮繡本草求真論琥珀曰。琥珀甘淡性平。按書雖曰脂入土而成。實合以鎮壓等藥。則能安魂定魄。色赤能入心肝。二經血分。合以辛溫等藥。則能消瘀破積。生肌合口。其味甘淡上行。合以滲利等藥。則能治淋通便。燥脾補土。且能明目退翳。逐鬼殺魅。謂是水去熱除安鎮之意。但此性屬滑。則於真氣無補。氣屬滲利。則於本源有耗。此惟水盛火衰者。用之得宜。若其火盛水涸。用之不能無慮。松脂入土。年久結成。或楓脂結成。以厚熱拾芥者。真。用柏子仁。

【金】張元素珍珠囊論琥珀曰。清肺。利小腸。【清】黃宮繡本草求真論琥珀曰。琥珀甘淡性平。按書雖曰脂入土而成。實合以鎮壓等藥。則能安魂定魄。色赤能入心肝。二經血分。合以辛溫等藥。則能消瘀破積。生肌合口。其味甘淡上行。合以滲利等藥。則能治淋通便。燥脾補土。且能明目退翳。逐鬼殺魅。謂是水去熱除安鎮之意。但此性屬滑。則於真氣無補。氣屬滲利。則於本源有耗。此惟水盛火衰者。用之得宜。若其火盛水涸。用之不能無慮。松脂入土。年久結成。或楓脂結成。以厚熱拾芥者。真。用柏子仁。

未入瓦鍋同煮半日。搗末用。

國外學說 日本學說曰。琥珀

者。漢醫用爲利尿通經藥。用量一

・二至四。○琥珀之成分爲「

スクシニン」或名爲琥珀酸

土之黃色。華爾斯。琥珀酸及少量

之揮發油。據扶氏之藥物書云。琥

珀者。專供薰烟之用。其薰烟之目

的。在得爽快之氣。又於復原質斯

應用之。（此目的祇在導其蒸氣

於患部。或以木棉飽和之。貼於患

部。或如「コロフォニウム」用

爲撒布末。然依和漢藥考。亦用爲

通經及利尿藥。又和漢藥考曰。日

本進口之琥珀。皆透明作深紅色。

國人稱爲白透。亦名金珀。此爲上

品。其色稍淡者名銀珀。次之淡黃

色者名蠟珀。又次之帶黑者爲下

品。凡日本產。皆重濁不透明。不堪

入藥。又遠西醫方名物考曰。以琥

珀末加香質之蒸溜油。如迷迭香

油。刺賢堉兒油等。入玻璃瓶中。時

時搖盪之。則逐漸溶化。或以此末

加松節油。或骨非波拔爾撒誤一

倍。入玻璃瓶中。密封。文火煮八日

許。其末亦盡溶化而成紅色。於此

依前法加杏仁油煮之。則變紫紅

色。加橄欖油或胡桃油煮之。則變

美麗之紅色。加罌粟子油煮之。則

變紅黃色。加扁桃油或亞麻油煮

之。則變黃色。又東京獸醫新報曰。

琥珀油爲殺鼠藥。最有功效。其有

效成分。即在琥珀酸。法以琥珀酸

與牛膽。并鼠喜食之蕎麥粉。三者

相和製成丸子。鼠食之。立即逼身

毛戴。煩渴欲死。得水則飲。愈飲愈

渴。漸漸動作遲鈍。自食後三時半

至二十七時內。無不倒斃。平均十

一時即死。此雖係牛膽之苦味酸。

刺戟其胃而然。而其主要之作用。

實由於琥珀酸也。所用琥珀酸之

量。每一丸含○。一用○。三至

○。五。已足殺一鼠。又遠西醫方

名物考曰。琥珀中所含之油氣。鹽

氣。能利小便。通經水。又患指搦。瘧

瘵諸症。或昏睡眩暈。癩症。子宮病。

脾病。用此俱有效。此因琥珀中所

含質。透揮發之油鹽。有開達腦神

經之效也。此外更能治下利。尿多。

遺精淋病。白帶。吐血等症。蓋性

能收斂耳。琥珀爲末。服其煎汁。或

和雞子黃。或製爲丸。或作藥均

可。服量。自一分至一錢。爲末。搽皮

膚破裂及小瘡。乾即愈。其製法。以

乾溜琥珀而得之。餾液。分爲二層。

上層爲油。即琥珀油也。下層爲水。

中含琥珀酸。故可從此中製出琥

珀酸。琥珀油爲褐色油狀之液體。

臭味俱似拔爾撒誤。比重○。九

二至○。九七。濃酒精能溶解之。

遇碘則立即爆發。成分爲一種炭

化水素。○。四。是名琥珀酸。入

藥須用其精製者。謂之精製琥珀

油。是爲無色或微黃之液體。有拔

爾撒誤之臭氣。溶解於十分至十

二分之酒精。此精製琥珀油。有衝

動。鎮痙。發汗。利尿之效。每服五滴

至十五滴。一日數次。或製爲丸劑。

乳劑。酒精溶液等。皆可用於風濕

痛。癩癩。舞蹈病。百日咳。小兒瘧

諸症。又齒痛。風溼痛。麻痺等。多配

合他種刺戟藥。以之外用。又補珍

藥。說述其性能曰。衝動。鎮痙。利尿。

外用引赤。專治患歇斯里的。癩癩。

月經不足者。均宜用之。外用。治局

部麻痺。及慢性關節風溼痛。俱極

著效。此外尚可治面部神經痛。法

以琥珀油一分。阿片酒半份。攪和

時時塗擦痛處。即愈。用法。內用。每

服五滴至十五滴。和護膜藥用之。

又補珍藥說曰。製法以琥珀油一

盎斯。入玻璃器。取硝酸三盎斯半。

徐徐滴入。用玻璃棒攪拌。靜置三

十六小時。分取上面之樹脂狀物。

乃先洗以冷水。再洗以熱水。大約

數次。至其水毫不帶酸味而止。主

治性質極似麝香。可代用之。英美

學說曰。琥珀係松香入地年久變

成。內含數種松香類質。在古時希

臘人。知以琥珀擦之。即能吸輕體

殆。因其生電氣之故。尋常所得之

琥珀。則係海邊礫石內。隨海水飄

至岸邊者。至英國所用之琥珀。其

大半得之於波羅的海邊。或印度

海邊。地學家謂琥珀爲松樹類所

產之松香。常有人在地內。挖起變

成石形之松木。又如木煤層內所

遇見之琥珀。常見有微蟲。或植物

微蟲。雜於其內。其常見者。爲參差

形。隨塊。其色黃或黃紅。似松香。能

透光。無臭亦無味。其功用能行氣

解轉筋。生津液。利小便。治經脈不

調。羊癲風。牙關緊閉。哮喘。抽風。

配酒油用之。今內服者少。

十二靈 琥

十二畫 琥

辨偽 鄭育巖曰。琥珀出西
香南。香及松樹。楓木。津波。墜地。多
年所化。色黃而明。瑩者名。琥珀。色
若松香。紅而且黃者名。明珀。有香
者名。香珀。出高麗。日本。者色深紅。
凡中有蜂蟻松枝。形色如生者尤
好。當以手心摩熱。拾芥為真。氣味
甘平無毒。能安五臟。定魂魄。消痰
血。通五淋。近有以松脂偽造。混售。
松脂氣味苦澀。性不同。則功自別。
◎首楞章曰。按南蠻記云。寧州有
折腰峯。岸崩則蜂出。土人燒治。以
為琥珀。常見琥珀中有物如蜂形。
此說亦難憑信。列仙傳云。松柏脂
入地。千年成爲茯苓。茯苓化為琥
珀。今泰山出茯苓。而無琥珀。益州
永昌出琥珀。而無茯苓。亦無實據。
或言龍血入地為琥珀。或言虎死
時目光滲入地生琥珀。故又名虎
魄。此屬無稽神話。更無價值可言。
元中記言。松脂入地為琥珀。廣志
云。哀牢縣生有琥珀。生地中。其土
及旁不草。深者八九尺。大者如斛。
削去外皮。中成琥珀。初如桃膠凝
結成也。滇志云。雲南麗江出者。其
產地旁不生草木。深八九尺。大者

如斗。削去外皮。中成琥珀。紅大明
透者為血珀。最佳。黃嫩者。力薄。為
金珀。次之。今蠻地莫對江。猛拱地
產此。夷民皆鑿山而得。與開礦無
異。滇南雜誌云。琥珀產緬甸。諸西
夷地。以火珀及杏紅血珀為上。金
珀次之。蠟珀最下。供藥餌而已。又
云。琥珀根有黑有白。有如雀腦。據諸
家所說。是屬礦物質無疑。化學易
知云。琥珀為地內變化之松香。內
含致種松香之質。史廷麟說琥珀
云。琥珀為松柏等脂液。埋置土內。
日久遂成化石。雖云礦物。仍胚胎
於植物者也。其成分純屬有機化
合。平均百分中。含炭素七八。九
四。水素一〇。五三。酸素一〇。
五三。又往往有小蟲肢體混合其
內。是必當時蟲類飛行。適觸流動
狀之脂液。中。陷入不復得脫。(南
蠻記所說。或此類歟。)送併而為
一焉。色黃而赤。又有呈褐色者。豔
紅與黑。殆所罕見。則體為不規則
狀。多小顆。德國柏林博物館所藏
重量達十八磅。洵世界最大之產
物也。性脆為半透明體。重量極低。
與水相若。倘置於一等五一零九

之海水中。則浮而不沉。硬度二乃
至二五。較石膏猶過之。以銅片擦
之。則易損傷。以布摩之。生強電氣。
能引紙片毛髮等。但傳熱極鈍。如
熱至攝氏百五十度而始柔軟。二
百度至三百度而始溶解。若投於
火。最易燃燒。放黃燄與香氣。其殘
餘之灰燼。適如海綿狀之炭物質。
亦一奇觀也。其生產地。在北德之
波羅的海濱。就中摩麥且澤間。產
額最多。其狀態可分為二。其一屬
第三紀之下部漸新統。與揚炭層
俱現。為母床。其二過海波之衝擊
及風雨冰雪之作用。離母床。釋海
沙而源積。其產於海濱者。稱海琥
珀。質純而均。歷久不變色。比之山
產。實遠過之。一千八百六十年頃。
撒謨爾島發見琥珀母床後。其坑
道近傍。常有天然露出者。與前紀
之海濱產。同為北德之特色。此係
德國產之琥珀。科學之研究也。更
據中國產之琥珀。以藥用者之鑑
別。以深紅明透質鬆脆者為血珀。
最佳。廣西產者。色紅明亮。為西珀。
亦佳。黃嫩者。次之。金珀。更次。廈門
產者。色淡黃。有松香氣。為洋珀。更

次。他如雲貴邊者。人死以松香燻
填材。底。伏土深久。松香由黃轉黑。
土人名曰老材香。以充琥珀。年久
古墓中。往往發見之。然神色黑。無
神光。仍含松香氣。為最次。不入藥
用。欲辨真偽。試將琥珀摩擦之。能
發電氣。拾芥者。真偽者。不發電氣。
放樟腦臭。置酒精中。最易浸入。以
刀削之。不能粉末。而為小片。其硬
度比天然產為高。皆為偽品。真者
刀刮鬆脆成粉。凡安心神。定魂魄。
宜生用。與燈芯同研。去燈芯。眼科
宜入豆腐內。煮用。◎柯等和曰。琥
珀以產自雲貴者為佳。其色紫紅。
明亮名雲珀。陝西產者名西珀。以
能吸芥者為真。所謂磁石引針。琥
珀拾芥者也。微光者名光珀。但充
器皿。不入藥用。產於廈門及東洋
者。皆不可用。作偽者。以松香煎煉
而成。形色與真者無異。然以火燒
之。有松香氣。不可用。
配合應用 ①用琥珀。浸藥。乳
香。延胡索。乾漆。隨甲為散。治產後
血暈有神。佐以人參。益母草。澤蘭。
生地。牛膝。當歸。蘇木作湯。送前藥。
則治兒枕痛。惡露下不盡。腹痛。少

腹痛寒熱等證。極效。

① 琥珀和大黃、鼈甲作散子。酒下方寸七。下婦人腹內惡血。

② 琥珀同鼈甲、京三稜各一兩。沒藥、延胡索各半兩。大黃六銖。熬搗為散。空心酒服三錢。治婦人癥瘕氣塊。及產後血暈。悶絕。兒枕痛。甚虛極者。減大黃。

③ 琥珀同丹砂、滑石、竹葉、麥冬、木通。治心家有熱。小腸受之。因之小便不利。立效。

④ 琥珀同人瓜、珍珠、瑪瑙、珊瑚。除目翳赤障。

⑤ 琥珀得丹砂、犀角、羚羊角、天竺黃、遠志、茯神、鎮驚。主諸癩。

⑥ 治小兒胎毒。琥珀防風各一錢。丹砂半錢。為末。研乳調一字入口中。最妙。(直指方)

⑦ 治小兒胎爛。琥珀、丹砂各少許。全蠍一枚。為末。麥門冬湯調一字服。(直指方)

⑧ 治小兒轉胞。真琥珀一兩。為末。用水四升。葱白十莖。麥汁三升。入琥珀末二錢。溫服。砂石諸淋。三服皆效。(聖惠方)

⑨ 治小便淋瀝。琥珀為末二錢。

辟香少許。白湯服之。或葶草煎湯服。老人虛人。以人參湯下。亦可蜜丸。以赤茯苓湯下。(普濟方)

⑩ 治從高墜下。有瘀血在內。刮琥珀屑。酒服方寸七。或入蒲黃二匙。日服四五次。(外臺祕要方)

⑪ 治金瘡。閉絕不識人。琥珀研粉。童子小便調一錢。三服。瘥。(鬼遺方)

⑫ 治小便尿血。琥珀為末。每服二錢。燈芯湯下。(直指方)

⑬ 治魚骨哽咽。六七日不出。用塊琥珀珠一串。插入咽所。牽引之。即出其骨。(外臺祕要方)

⑭ 用量 三分至八分。

⑮ 施用宜忌 凡陰虛內熱。水虧火旺者禁用。

⑯ 著名方劑 ① 琥珀散。止血生肌。鎮心明目。破癥瘕氣塊。產後血暈。閉絕。兒枕痛。並主之。(海藥本草方)

② 琥珀、鼈甲、京三稜各一兩。延胡索半兩。沒藥半兩。大黃六銖。共研末。為散。空心酒服三錢。七日再服。神驗。莫及。產後減大黃。③ 神效琥珀散。治石淋水道澀痛。頻下沙石。(醫宗必讀方)

琥珀、桂心。

(去皮)滑石(水飛)大黃、葵子、膩粉、木通、木香、磁石(煨酒淬七次研)各等分。共研細末。每服二錢。

燈芯葱白煎湯調服。

參攷資料 ① 古方用為利小便。以燥脾土有功。脾能運化。脾氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥急之苦。(朱震亨) ② 俗中多帶之辟惡。甜削服療瘵。血至驗。仙經無正用。(陶弘景) ③ 和大黃、鼈甲作散。酒下方寸七。惡血。婦人腹內血盡。即止。宋高祖時。寧州買琥珀枕。碎以賜軍士。用傅金瘡。

(陳藏器) ④ 舊說松脂滄入地。千年所化。今燒之。亦作松氣。亦有中有一蜂形色如生者。博物志乃云。燒蜂窠所作。恐非實也。此或蜂為松脂所沾。因墜地滄沒。爾亦有煮蠟。雞子及青魚。飲作者。並非真。惟以手心摩熱。拾芥為真。今並從外國來。而出茯苓處。並無。不知出琥珀處。復有茯苓否也。(陶弘景)

⑤ 琥珀是海松木中津液。初若桃膠。後乃凝結。復有南珀。不及舶上來者。(李珣) ⑥ 諸家所說茯苓琥珀。雖有小異。同皆云松脂所化。但茯苓、茯神乃大松摧折。或斫伐而根。癯不朽。津液下流而結成。故治心腎通津液也。若琥珀乃是松樹枝節。榮盛時。為炎日所灼。流脂出樹身外。日漸厚大。因墜土中。津潤歲久。為土所滲。而光瑩之體。獨存。今可拾芥。尚有黏性。故其蟲蟻之類。乃木入土時所黏者。二物皆自松出。而所製各異。茯苓生於陰。而成於陽。琥珀生於陽。而成於陰。故皆治營安心而利水也。(陳承)

⑦ 凡用須分紅松脂、石珀、水珀、花珀、物象珀、墜珀、琥珀。其紅松脂如琥珀。只是潤大脆文橫。水珀多無紅色。如淺黃。多皺文。石珀如石重。色黃。不堪用。花珀文如新馬尾。松心文一路赤。一路黃。物象珀其內自有物命。入用神妙。墜珀是象珀之長。琥珀如血色。以布拭熱。吸得芥子者真也。(雷斅) ⑧ 琥珀拾芥。乃草芥。即禾草也。雷氏言拾芥子。誤矣。唐書載西域康干河松木。入水一二年。化為石。正與松楓諸木。滲入土化。珀同一理也。今金商麗江亦有之。其茯苓千年化琥珀之說。亦誤傳也。按曹昭格古論云。琥珀

一三三

十一畫 琥

出西番南番。乃楓木津液多年所化。色黃而明瑩者名蠟珀。色若松香。紅而且黃者名明珀。有香者名香珀。出高麗倭國者。色深紅。有蜂蟻松枝香尤好。(李時珍)

【琥珀】即松脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「松脂」條。

【琥珀屑】即琥珀之處方用名。詳「琥珀」條。


【琪瑯香】即伽楠香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

【番木鱧】古籍別名。馬錢子。苦實把豆。火失刻扣部。(綱目)

外國名詞 Soman Strychni

基本 屬馬錢科之常綠樹。為番木鱧之種子。

產地 原產印度。今西藏亦有產焉。



番木鱧

形態 番木鱧形扁。圓者略曲。色灰黃。直徑二十耗。厚四耗。表面

生毛茸。胚堅硬如角質。藏於七耗長之芽苞內。但核小於木鱧。而色白味苦。

採取 八九月採實取仁用。

用法 恒以搗和。和作外治藥。

性質 苦寒。無毒。

成分 主要素為 Strychnine (C₂₁H₃₃N₃O₂) Brucine (C₂₇H₄₅N₃O₂) Igeurine Loganin

作用 入胃時。無任何變化。至腸能刺激腸壁神經。使腸之蠕動增劇。而令大便便秘。一部分仍由大便排出。一部分由腸壁吸入而達血中。略能阻止血球氯化。及排出二氯化炭之功。然最顯著之作

用。即由神經而達腦部。使腦神經特別興奮。且能延長數日之久。若服大量則腦神經反被麻醉。全身血液因氣分而停止流動。甚至呼吸弛緩。四肢痙攣而死。

主治 傷寒熱病。咽喉痺痛。消痞塊。並含之唾汁。或磨水噴喉。及治神經衰弱症。腦貧血。

配合應用 治喉痺作痛。番木鱧。青木香。山豆根等分。為末。吹之。(楊琪醫方摘要方)

◎治經喉風腫。番木鱧仁一個。木香三分。同鹽水調。能膽三分。膽礬五分。以雞毛掃患處取效。(唐瑤經驗方)

◎治斑瘡入目。苦實把豆兒。即馬錢子半個。輕粉。水花。銀珠。各五分。片腦。麝香。枯礬。少許。為末。左目吹右耳。右目吹左耳。日二次。(田日華飛鴻集方)

◎治病欲去胎。苦實把豆兒。研膏。納入化戶三四寸。(集簡方)

參攷資料 番木鱧狀似馬之連錢。故名馬錢。李時珍。番木鱧生回回國。今西土印州諸處皆有之。莖生。夏開黃花。七八月結實。如栝樓。生青熟赤。亦如木鱧。其核小於木鱧。而色白。彼人曾治一百二十種病。每證各有湯引。或云以豆腐製過用之。良。或云能毒狗至死。(李時珍)

◎番木鱧主治風癩。膀胱疝。膀胱口瘻。或小便不利。或不能忍溺。自遺。均效。惟腦部有炎者。須去渣方可服。以子作散。每服宜用三釐。每日三服。要之此藥高下不一。品質參差。故西醫多捨是而用土的年。即番木鱧之精也。

(西藥略釋)

【番石】即滑石之古籍別名。典見別錄。詳「滑石」條。

【番豆】即落花生之古籍別名。典見物理小識。詳「落花生」條。

【番南瓜】即南瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「南瓜」條。

【番姜】即蕃椒之古籍別名。典見范成台府志。詳「蕃椒」條。

【番紅花】命名 本品為紅藍花之出於番地者。故名。

古籍別名 泊夫藍。撒法郎。(綱目)

外國名詞 Crocus Sativus

〔拉丁〕サフラン(日本)

基本 係鳶尾科番紅花屬。為番紅花之花。

產地 生西番回回國諸地。

形態 番紅花為澤草類之多。年生草本。高四五寸。地下莖與水仙之鱗莖相似。葉較水仙細長。亦叢生。有並行脈。夏秋間花自莖叢中出。花蓋六片。青綠色。或白色。或淡紫色。有香氣。雄蕊三。雌蕊一。其花可供藥用。



花紅番

性實 甘。平。無毒。

主治 心憂鬱積氣悶不散。活血。久服令人心喜。又治驚悸。

參攷資料 ①番紅花元時以入食饌用。(李時珍) ②番紅花西醫視為開胃行經之品。又可為著色之用。(醫原大辭典)

【番苦荬】即番慈茹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番慈茹」條。

【番茹】即茄子之古籍別名。典見綱目。詳「茄子」條。

【番茹】即番茹之俗名。詳「番茹」條。

【番國米】即西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳「西國米」條。

【番荷】即薄荷之古籍別名。典見千金方。詳「薄荷」條。

【番菱】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。

【番瓠】即無漏子之古籍別名。典見嶺表異錄。詳「無漏子」條。

【番椒】即辣茄。參見「蕃椒」條。

【番蒜】 產地 出臺灣番地。 形態 番蒜為蒜類之一種。其外形似木瓜。中形似柿。可供藥用。

主治 消癥瘕。解食毒水毒。

參攷資料 昔有浮山張氏。宿於閩。一婢食鼈肉後。誤食莧。遂病面黃腹脹。碗破欲死者數矣。半載後。有饋番蒜者。婢偶食之。遂大洩。有物如小髓者數十。頃刻爽然。其疾若失。方知番蒜可治鼈毒也。(植學啟)

【番蕉】 即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳「無漏子」條。 ②即鳳尾蕉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳳尾蕉」條。

【番荳蔻】 古籍別名 番苦荬。 產地 種出荷蘭。

形態 番荳蔻為雜草類之一種。其葉秀嫩如雲板。曬乾則香。結子青紅色。可供藥用。

主治 一切心氣痛。

【番莖】 即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蕃椒」條。

【番瀉葉】 原名 旃那。 處方用名 洋瀉葉。

古鑿別名 新拿。辛拿。辛那。辛拿。(藥物大成)

外國名詞 Cassia acutifolia, La Dal. (拉丁) ヤナ (日本)

基本 係豆科決明屬 (Cassia alpinaceae) (亦作山扁豆屬)

為亞歷山旃那 (Cassia acutifolia Dohle) 支內威黎旃那 (Cassia anyathifolia Vahl)

等樹葉之乾燥者。

產地 為熱帶地方亞非利加之埃及。印度之替納勿里。暨中國南部。



葉瀉番

形態 旃那為灌木狀之植物。樹幹高約二三尺。葉偶數羽狀複葉。葉小長卵形而銳尖。似小刀狀。葉體扁平。而不反曲。質堅強而薄。帶黃綠色。葉柄甚短。邊緣平坦。全

無毛茸。或僅於葉脈上少許有之。花番五瓣。稍不整齊。花色嫩黃。果實反莢。形狀扁平。厚而灰黯。密敷硬毛。採其葉用於下劑。最著效果。

性質 甘苦。大寒。兼有惡臭。

成分 旃那葉之主要成分為加答爾精酸 (Katharic acid)。

為無品形黑褐色之物質。此外另含有加答爾精滿尼萬 (Katharicomanic 精質) 佩利沙列精 (Chrysoresin 黃色素) 旃那必

佩林 (Sonnepikrin 苦味質) 及植物鹽酸。加答爾精酸。被吸收於血液。後由諸分泌而排泄。故婦人內服本品後之乳汁。小兒飲之。亦能起同樣性之下利。而旃那中之黃色素。於十五分時。已現於尿中。尿亦被染為黃褐色。

效能 旃那葉之瀉下效力。頗為確實。故於一時性之便秘服之。即可以促進腸之排泄。如服小量 (二分六釐) 並可消化積食。增加食慾。如服適量 (五分至一錢) 功能緩下。欲其大瀉。則服二錢至三錢之浸劑。不問數小時。即起效用。而瀉瀉也。

作用 旂那葉之作用。較諸大黃少強。內服小量(二分六釐至五分)約間五六小時。則始呈其作用。起初放矢。以後不腹痛而起排泄。形似粥糜狀之硬便。內服大量(一錢至一錢三分)約間三小時後。則發嘔氣嘔吐。雷鳴腹痛。利下澀滯。且損食氣。增加痔瘡及子宮之出血。甚之有致死產者。故於妊婦不宜服此。但能亢進大腸之蠕動。刺戟腸之管壁。較諸他種瀉下藥。則一時雖為微弱。而於腸管有炎之症。則頗增劇。極易誘起腸黏膜發炎。故有此症時最宜忌之。

主治 心腹脹滿。便秘積滯。并治膨脹水腫。屢試輒驗。多服令人肚疼反胃。宜佐香味藥同服。辨偽 旂那葉銳尖形。質薄。黃綠色者。堪稱道地。如葉尖圓而厚。味獨苦而不甘者。則屬質品。不入藥用。

用法 泡服或作散末服。或為丸劑沒劑均可。
用量 小量二分半至五分。中量一錢至一錢半。大量二錢至三四錢。

參攷資料 服大量之旂那葉後。有惹起惡心嘔吐等症狀。此為含有樹脂樣之物質也。預以酒精浸製。除去其樹脂樣之物質。毫無逗留。使無揮發性之油脂存在。則仍不減瀉下之效。而可免惡心嘔吐之不快。(華實字)

【番諸】

原名 甘藷。
古稱別名 朱藷。(綱目拾遺) 紅藷。(植物學大辭典) 薩摩藷。琉球藷。唐藷。(日本) 山芋。番薯。番薯。番茹。(俗名) 金第。金薯。外國名詞 Ipomoea batatas, Yam. (拉丁)

基本 係旋花科牽牛子屬甘藷類。
產地 產自南洋羣島。及暖地原野多有出。



(一) 甘藷

形態 甘藷為菜類之多年生草本。莖細長。匍匐地上。葉卵形。或心臟形。有長葉柄互生。花作合瓣

花冠紫色。如漏斗狀。二三月及七八月間均可下種。大抵春種者塊根大。秋種者塊根小。其皮色有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。要之紅皮者心黃而味甜。白皮者心白而味淡。其實理膩潤如脂。可供食與藥用。



(二) 甘藷

性質 甘平。無毒。
主治 補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰。功同薯蕷。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論番藷曰。補中和血暖胃。肥五臟。白皮白肉者。益肺氣生津。中滿者不宜多食。能壅氣。黃時如生薑一片。調中與薑同功。紅花黃食。可理脾血。使不外洩也。

配合應用 治痢疾下血。痢疾之起。多因脾胃先虛而後積滯成痢。其有脾氣虛甚。欲健中焦者。必宜甘溫之藥。其有命門不暖。欲

實下焦者。必宜純熱之藥。至若濕熱所致。煩熱日燥。腹痛純紅。小水黃赤。以及下血者。用此薯蕷熟。以芍藥湯類類嚼服。或薯粉調冬蜜服亦愈。(傳習錄方)

治酒積熱瀉。泄瀉之症不一。或水土相亂。併歸大腸而瀉。或土不制水。清瀉不分而瀉。或小腸受傷。氣化無權而瀉。或真陰虧損。元陽枯涸而瀉者。此皆各從其類治之。若酒溼入脾。因而發泄者。用此薯蕷熟食。(傳習錄方)

治濕熱黃瘡。黃疸之症有四。一曰陰黃。由氣血敗也。一曰表邪發黃。即傷寒症也。一曰臌黃。驚恐所致也。更有陽黃一症。或風溼外感。或酒食內傷。因溼成熱。因熱成黃者。用此薯蕷食。其黃自退。

治遺精淋濁。遺精與淋濁症不同。故治亦不同。然大要實在心脾腎。故凡遇此症。無論有夢無夢。有火無火。或氣淋。血淋。膏淋。勞淋。總宜調養心脾。每早晚用此粉調服。大有奇功。

治血虛經亂。婦人血虛。或遲或早。經多不定。故陽虛補其陽。陰

虛損其陰。氣滯順其氣。其有不宣辛燥寒涼。而宜於清和者。用此薯藥。煖服。調養其脾。使脾健生化。程期自定。

⑤ 治小兒疳疾。疳者乾也。在小兒爲五疳。在成人爲五勞。其病由於嗜食乾燥之品。嗜啖肥厚之物。妄服峻利之藥。以致津液乾涸。延而成疳。此薯最能潤燥生津。安神養胃。使常服之。則積化而疳愈矣。

參攷資料 按陳祈暢異物志云。甘藷出交廣。南方民家。以二月種。十月收之。其根似芋。亦有巨魁。大者如雞卵。小者如雞鴨卵。剝去紫皮。凡肉正白如肌。南人用當米穀果實。蒸炙。皆香美。初時甚甜。經久得風稍淡也。又按番合草木狀云。甘藷薯類之類。或云芋類也。根葉亦如芋根。大如拳。厥。蒸煮食之。味同薯類。性不甚冷。殊匪之不一。業耕者。惟種此。蒸切曬收。以充糧。名薯糧。海中之人多壽。亦由不食五穀而食甘藷故也。(李時珍) 甘藷即薯類之屬。見於陳祈暢異物志。番合南方草木狀。中土之

十二畫 番

有此物。其來舊矣。第不甚貴重。栽植者少。明季有閩人陳經綸。復自呂宋移其種歸。巡撫金公學曾勸民樹藝。閩人德之。號爲金薯。然自是長樂謝舉。浙黃州李時珍。新城王象晉各有論述。皆不及經綸事。而其裔孫世元父子。復爲金薯傳習錄。盛修其先世傳自呂宋之功。一似中國素非所產者。此考證之疎也。夫以一物之微。足以備荒療疾。不費功力。其爲功於民食。實不淺矣。前任布政使李公渭。嘗舉以敦山東之民。其性又喜沙土高地。於山海之區尤屬相宜。五雜俎百穀之外。有可以當穀者。芋也。薯類也。而閩中有薯薯似山藥而肥白過之。種沙地易生。而極蕃衍。饑饉之民。多賴全活。此物北方亦可種也。羣芳譜朱薯一名番薯。大者名玉枕薯。形圓而長。本末皆銳。皮紫肉白。質理膩潤。與芋及薯類自是各種。氣香。生時似桂花。熟者似薔薇。露撲地。纏生。一莖莖數十百莖。節節生根。一畝種數十石。勝種穀二十倍。閩廣人以當米穀。有謂性冷者。非二三月及七八月俱可

種。但卵有大小耳。卵八九月始生。冬至乃止。生便可食。若未大者勿頓掘。令居土中。日漸大。到冬至須盡掘出。否則敗爛。金氏學曾曰。薯傳外番。因名番薯。形如王瓜。藕臂如拳。如指。如卵。如瓶。大小不一。實同種別。皮有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。蒸熟勻膩如脂。甘平益胃。性同薯類。海隅人以供饗。茹莖極速。節節有根。入地即結。每畝可得數千斤。勝種五穀幾倍。徐氏元魁曰。昔人謂薯蒂有六利。市有七絕。予謂甘薯有十二勝。收入多。一也。白色味甘。諸土種中特爲寶絕。二也。益人與薯類同功。三也。爾地傳生。剪莖作種。今歲一莖。次年便可種數十畝。四也。枝葉附地。隨節生根。風雨不能侵損。五也。可當米。凶歲不能災。六也。可充饌。實。七也。可釀酒。八也。乾久收藏。層之。旋作餅餌。勝用錫蜜。九也。生熟皆可食。十也。用地少。易於灌溉。十一也。春夏下種。初冬收入。植葉極盛。草穢不容。但須墾培。不用鋤耘。不妨農。十二也。陸公薯錄有澆種。澆製諸法。雖無關於藥病。而有

濟於備荒。故併錄之。種薯宜高地沙地。起脊尺餘。種在脊上。遇旱可汲井澆灌。即遇涝年。若水退。在七月中氣候。既不及藝五穀。即可剪藤種薯。至於蝗蝻爲害。草禾蕩盡。惟薯根在地。藹食不及。縱令蕪葉皆盡。尙能發生。若蝗信到時。急令人發土。徧塗。蝗去之後。滋生更易。是天災物害。皆不能爲之損。人家凡有隙地。但只數尺。仰見天日。便可種得石計。此救荒第一義也。歲前深耕。以大糞壅之。春分後下種。若地非沙土。先用柴灰或牛馬糞和土中。便土脈散緩。與沙土同可。行根。重耕起要極深。將薯根每段截三四寸長。覆土深半寸許。每株相去縱七八尺。橫二三尺。俟薯生既盛。苗長一丈。留二尺。作老根。餘剪三葉爲一段。插入土中。每栽苗相去一尺。大約二分入土。一分在外。即又生薯。隨長隨剪。隨種隨生。薯莖與原種者不異。凡栽薯須順栽。若倒栽則不生。節在土上則生。枝在土下則生。卵約各節生根。節從其連綴處斷之。令各成根苗。每節可得卵三五枚。凡藤薯已遍地。

不能容者。即為游藤。宜剪去之。及
 掘根時。捲去藤。但可飼牛羊豕。
 或曬乾。冬月。皆能令肥。脂。二三
 月種者。每株用地方二步有半。而
 卵。每宜飲約用薯三十六株。
 四五月種者。地方二步而卵。每
 畝約六十株。六月種者。地方一步
 有半。而卵。每畝約一百六株。有奇。
 七月種者。地方三尺以內。得卵。細
 小矣。畝約九百六十株。種種疎密。
 略以此準之。九月畦種。生卵如薯。
 如。擬作種。此松江法也。金氏曰。
 薯苗入地。即活。東西南北。無地不
 宜。得沙土。高地。結尤多。天時旱澇。
 但能有秋。養苗地。宜鬆。耕過。須起
 町。高四五寸。春分後。取薯種。科。置
 町內。發土。薄蓋。縱橫。相去尺許。半
 月。即發芽。日漸。莖長一丈。或五六
 尺。割七八寸。為一莖。勿割盡。留半
 寸許。當割處。復發。生生不息。若養
 莖作苗。須用稍長尺許。密密栽。豎
 如養葱蒜法。栽莖。使牛耕町。寬二
 丈許。高五六寸。將莖斜插町心。約
 以七分在町內。三分在町外。町內
 者。結實。町外者。滋莖。每莖相去一
 尺餘。十餘日。町兩旁。使牛耕開。令

畦。又七八日。以糞壟之。仍使牛培
 上。每町可得薯三四劬。若雨多。須
 將莖撥町上。毋令浮根。匝地。然實
 結地內。蟲不能災。菜如食。莖亦能
 復發。早栽宜稀。晚栽宜密。三四月
 栽者。實粗大。七八月栽者。實細小。
 秋末。實始加大。冬至前。當掘盡。不
 掘盡。亦不能大。熟時。須先割莖。置
 町下。俟乾。捲起。冬月。到。饑。牲。畜。若
 北地。早寒。則遲一個月栽。早一個
 月掘。宜遲宜早。亦看天氣。冷。暖。耳。
 甘薯。疏云。江南。田。下者。不宜。薯。
 若高仰之地。平時。種。薯。種。豆者。易
 以種。薯。有數倍之穫。大江以北。土
 更高。地更廣。即其利。百倍。不啻矣。
 倘虛。天旱。則此種。畝。收。十石。數口
 之家。止種一畝。縱。旱。甚。而。汲。井。灌
 澆。一至成。熟。終。歲。足。食。又何。不可
 取種之法。葦。芳。譜。云。九月。十月。間
 掘。薯。卵。近。根。先生者。勿。令。損。傷。用
 輾。草。包裹。掛。通。風。處。陰。乾。一。法。於
 八月中。揀。近。根。老。藤。剪。七。八。寸。長。
 每。七。八。根。作。一。小。束。耕。地。作。畦。將
 藤。束。栽。如。栽。韭。法。過。月。餘。每。條。下
 生。小。卵。如。蒜。頭。狀。冬。月。畏。寒。稍。用
 草。蓋。壟。至。來。春。分。種。一。法。霜。降。前

取近根卵稍堅實者。陰乾。以輾草
 作覆。另以輾草裹之。既無風和暖
 不近霜雪。不受冰凍。處。一法。霜降
 前。收取根。藤。壟。令。乾。於。壟。下。掘。窖。
 約。深。一。尺。五。六。寸。先。用。稍。藤。三。四
 寸。次。置。種。其。上。更。加。稍。藤。三。四。寸。
 以。土。蓋。之。一。法。七。八。月。取。老。藤。種
 入。木。桶。或。磁。瓦。器。中。至。霜。降。前。置
 草。簾。中。以。稍。藤。覆。置。向。陽。近。火。處。
 至。春。分。後。依。前。法。種。金。氏。曰。存。薯
 之。法。不。一。在。人。變。通。或。存。木。斛。車
 陶。磁。瓦。竹。籠。中。俱。可。但。性。畏。寒。又
 畏。熱。置。避。風。和。暖。處。用。草。浮。蓋。俾
 通。氣。若。封。固。則。發。熱。壞。爛。故。前。在
 東。厥。玉。環。見。其。島。民。少。穀。食。多。以
 薯。為。糧。彼。土。有。地。率。多。種。薯。土。人
 云。其。利。十。倍。於。穀。以。薯。糧。多。者。為
 富。其。收。薯。之。法。多。曝。乾。切。條。以。竹
 席。圍。如。陶。器。之。久。亦。不。蛀。用。則。以
 水。煮。代。飯。云。食。之。多。力。鮮。病。蓋。其
 味。甘。能。補。脾。土。故。也。金。氏。曰。薯。初
 結。即。可。食。味。淡。多。汁。及。時。則。甜。根
 食。煮。食。燻。食。蒸。食。亦。可。生。食。切。片
 曝。乾。碾。作。餅。粥。磨。作。粉。餅。滾。水。灼
 可。作。丸。并。麵。可。作。酒。春。細。水。濾。去
 渣。澄。曬。成。粉。其。葉。可。作。蔬。范。成。壺

樽府志。長而色白者是苜蓿。圓而
 黃赤者。出自文來國。金姓者。掘回
 故名。金寧。諸羅縣志。他物。下。種。必
 用。子。用。仁。或。原。物。根。芽。獨。尊。不。然
 取。一。條。片。切。之。只。留。皮。一。兩。種
 之。發。根。〔科目拾遺〕甘薯。俗。傳
 能。發。諸。病。患。痔。漏。者。愈。後。食。之。復
 發。以。任。能。下。行。而。滯。氣。故。也。〔越
 學。敏〕
 【番薯荷子】即胡盧巴之古籍別
 名。典見和漢藥考。詳「胡盧巴」條。
 【畫石】即滑石之古籍別名。典見
 本草衍義。詳「滑石」條。
 【畫眉石】即黑石脂之古籍別名。
 典見綱目。詳「黑石脂」條。
 【畫粉】即白粟之古籍別名。典見
 綱目。詳「白粟」條。
 【異草】 陸地 生籬木間。
 形態 異草為雜草類
 之一種。附木而生。葉如葵。莖旁有
 角。折斷有白汁。可供藥用。
 性質 甘。無毒。
 主治 痿痺寒熱。去濕。瘰。
 【異翅】即遠翅之古籍別名。典見
 爾雅。詳「遠翅」條。
 【南公乳】即鐘乳石之古籍別名。

【與見別錄】詳『鐘乳石』條。

【留行子】即王不留行之處方用名。詳『王不留行』條。

【留求子】即使君子之古籍別名。與見綱目。詳『使君子』條。

【留軍待】陸地 生山谷中。形態 留軍待爲雜木類之一種。其葉似楸而細長。可供藥用。

性質 辛溫無毒。
主治 肢節風痛。折傷瘀血。瘰癧。

【留師】即竹蜂之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【留師蜜】即竹蜂蜜之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【留黃】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【疏趾】即雉之古籍別名。與見綱目。詳『雉』條。

【痛痛草】即葎草之日本別名。詳『葎草』條。

【登相子】即東磨之古籍別名。與見保德州志。詳『東磨』條。

【登粟】即登相子之別名。詳『東磨』條。

【登相子】即登相子之別名。詳『東磨』條。

【登菴子】即菴葷子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『菴葷子』條。

【發狂草】即真君子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『真君子』條。

【發里里安】即甘松之西名。詳『甘松』條。

【菝皮】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【盛樞】即旋覆花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【盜庚】即旋覆花之古籍別名。與見爾雅。詳『旋覆花』條。

【短狐】即溪鬼蟲之古籍別名。與見廣雅。詳『溪鬼蟲』條。

【短青】即羅漢松之短者。與見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【短脚三郎】陸地 生南安。形態 高五六寸。橫根橘色。發發。莖葉生梢頭。秋結圓實。下垂。生青熟紅。與小青相類。可供藥用。



短脚三郎

性質 熱。
主治 跌打損傷。風痛。

【硝石】即消石之古籍別名。與見和漢藥考。詳『消石』條。

【硝石朴】即朴硝之原名。詳『朴硝』條。

【硝黃半夏麴】原名 硝黃。採取 以陳久者良。

製法 用半夏入芒硝三分之一。煮透。與大黃膏和成。草盡七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治 中風卒厥。傷寒熱狂。由於痰濁者。

【硝黃麴】即硝黃半夏麴之原名。詳『硝黃半夏麴』條。

【硝硝】即硝砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『硝砂』條。

【硝整】即車整之別名。詳『車整』條。

【車渠】即車渠之別名。詳『車渠』條。

【硫黃】即石硫黃之古籍別名。與見吳普本草。詳『石硫黃』條。

【硫黃油】即石鵬油之古籍別名。與見綱目。詳『石鵬油』條。

【硫黃益】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫黃香】命名 本品形如硫黃而氣香故名。性質 辛溫無毒。

主治 去惡氣殺蟲。

【硫黃香】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫磺】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【程】即豹之古籍別名。與見列子。詳『豹』條。

【程】即糯米之古籍別名。與見綱目。詳『糯米』條。

【稍瓜】即越瓜之古籍別名。與見食物本草。詳『越瓜』條。

【硬石膏】即長石之古籍別名。與見綱目。詳『長石』條。

【硬飯】即土茯苓之古籍別名。與見綱目。詳『土茯苓』條。

【硬穢】即土茯苓之古籍別名。與見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【稷米】即稷米之古籍別名。與見綱目。詳『稷米』條。

【稷米】即稷米之古籍別名。與見綱目。詳『稷米』條。

【童便】 原名 人尿。 命名 本品係取十二歲以下之男童小便故名。

古醫別名 溲。小便。素問。輸

瀉酒。還元湯。綱目。還魂酒。和漢藥考。

基本 係取十二歲以下無病童男不茹葷辛者之小便。

形態 清微如水者入藥用。

採取 取時去其頭尾以中間一段清微者佳。

用法 取得乘熱飲。冬則隔湯燉溫服。或和湯藥下。

性質 鹹寒無毒。

效能 滋陰降火。用為止血消癥藥。

主治 寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新

修本草論人尿曰。主久嗽。上氣。失聲。及痰積滿腹。唐陳藏器本草拾遺論人尿曰。明目。益聲。潤肌膚。利大腸。推陳致新。去咳嗽。肺癆。鬼氣。瘧病。停久者服之佳。恐冷則和熱湯服。宋大明日華諸家本草論人尿曰。止勞渴。潤心。療血閉。

熱狂。撲損瘀血在內。壅絕。止吐血。鼻衄。皮膚皴裂。難產。胎衣不下。蛇犬咬。元朱丹溪本草衍義補遺論人尿曰。滋陰降火甚速。明李時珍本草綱目論人尿曰。殺蟲解毒。療瘧中喝。明繆希雍本草經疏論人尿曰。人溺乃津液之濁者。滲入膀胱而出。其味鹹氣寒無毒。為除勞熱骨蒸咳嗽吐血及婦人產後血暈悶絕之聖藥。晉褚澄勞極論云。降火甚速。降血甚神。飲溲溺百不一死。服涼藥百不一生。言其功力之優勝也。經云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故人尿小便入胃。亦隨脾之氣上歸於肺。下通水道。而入膀胱。乃循其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣清者為氣。濁者為血。濁之清者為津液。清之濁者為小便。與血同類也。故其味鹹而走血。鹹寒能伏虛熱。使火不上炎。而血不妄溢。是以能療諸血症也。蘇恭主久嗽。上氣失聲。及日華子止勞渴。潤心。肺癆。血閉。熱狂。撲損瘀血在內。壅絕。止吐血。鼻衄。皮膚皴裂。難產。胎

衣不下諸證。悉由此故。本經主寒熱頭疼。溫氣者。鹹寒能除邪熱。故耳。法當熱飲。熱則於中尚有真氣存在。其行自速。冷則惟存鹹味寒性矣。明李士材本草圖解論人尿曰。小便鹹寒。滋陰降火。止血和經。去瘀養新。定嗽消痰。童便尤良。清黃宮繡本草求真論人尿曰。童便係孩童津液濁氣。滲入膀胱而出。味鹹氣寒無毒。為除勞熱骨蒸咳嗽吐血。婦人產後血暈悶絕之聖藥。褚澄遺書云。降火甚速。降血甚神。飲溲溺百不一死。非真不死。甚言功力之優也。經云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故人尿小便入胃。亦隨脾之氣上歸於肺。下通水道。而入膀胱。乃尋其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣清者為氣。濁者為血。濁之清者為津液。清之濁者為小便。與血同類也。故味鹹而走血。鹹寒能伏虛熱。使火不上炎。血不妄溢。是以能療諸血症也。凡人久嗽失音。勞渴煩燥。吐衄損傷。皮膚皴裂。人咬火燒。絞腸痧痛。難產。胎衣不

下。法當乘熱飲之。蓋熱則尚存真氣。其行自速。冷則惟有鹹味寒性矣。若救陰却癆。必以童便為優。蓋取混元之氣。清純而不滑雜耳。今人類用秋石。雖亦能入腎除熱。但經水澀火燥。真元之氣。全失其功。不及童便多矣。現多服久服。則鹹能走血。令血凝氣滯。為病。矧有陽氣素虛。食少腸滑者。其可用之為治乎。取童子十歲以下。相火未動。不食葷腥酸鹹者。去頭尾。取中間一節。清微如水者。用。痰用薑汁。療用薑汁。冬月用湯溫之。

近人學說 剛立陞曰。童便味鹹。氣寒。無毒。純陽之物也。為降相火之要藥。消瘀血之神品。本草治勞渴。潤心。肺。療陰虛。火動。熱。熱。如燎。久嗽失聲。及治虛中渴。洗鼻。發赤眼。潤口。舌生瘡。是降火之用也。療血閉。熱狂。撲損。瘀血在內。壅絕。止吐血。鼻衄。難產。胎衣不下。血凝頭痛。蛇犬咬。是散血之用也。故婦人臨產之時。血上搶心。惡心煩悶者。已產之後。去血過多。陰無所附者。產內血閉。惡露不行者。或呵欠頓悶。或嘔逆不止。或自汗多來。皆

陰虛之症。必以此至陽之物助之。使衛逆於上者。得鹹寒之味而順下。妄行於下者。亦得純陽之氣以相依。其在男子陰虛不足者。與之便以滋陰。陽虛不足者。與之便以壯陽。即嘔吐咯衄之症。亦用便以止之。血虛勞熱之症。亦用便以和之。是皆即降火散血之理。而神明其用者也。而究其能散之故。其何道以致此哉。夫飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。膀胱乃便之菑路也。故能治肺病。引火下行。此其病降火之道也。凡人精氣清者。為氣濁者。為血濁之清者。為津液清之濁者。為小便。小便與血同類也。故其味鹹而走血。治諸血病。此其為散血之道也。昔褚澄書論咳血症云。惟飲復瀉。百不一死。若服寒涼。百不一生。見道之言。真百試而百驗者歟。人中白。即便之下凝乾久者。故降火消血之用。大略相同。本草以治傳屍。勞熱。止肺癰。吐血。瀉肝火。三焦火。并膀胱火。從小便而出。其義亦不甚遠也。特其既經火煨。則稍除寒氣。而乾久則效

亦稍緩。故熱則用便。緩則用白。秋石即便之依法。以秋露斬其滓。秘經陰陽二煉而成者也。得日精火焫之氣。已變寒而為溫。况其物本出心腎水火二臟。而流於小腸。而又假天地之水火。凝而為體。又名還元丹。能滋腎水。反本還元。養丹田。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰咳。退骨蒸。轉堅塊。明目。清心。延年益壽。其法空心服。陽煉。日午服。陰煉。久服去百病。強骨髓。補神血。開心益智。補煖下元。悅色進食。則脾下管如火暖。諸般冷疾。久年冷勞。虛憊者皆愈。所以人部中稱人乳汁。紫河車。併斯三者均為接命之至寶。良不誣也。而瓊碎錄乃云。秋石味鹹走血。使水不勝火。久服令人成渴疾者。必是淫慾之人。藉此放肆。甚或加以陽藥。助其邪火。所主耳。若謂秋石本有此害。豈知秋石哉。

配合應用 治陰虛咳嗽聲啞。喉間血腥氣。用童便。枇杷葉。天門冬。麥門冬。蘇子。桑白皮。沙參。五味子。生地黃。款冬花。百部。

治內傷吐血。或瘀血停留作痛。用童便。蘇木。香降香。續斷。牛膝。牡丹皮。蒲黃。

治產後血暈。童便。澤蘭。荊芥。白芷。續斷。延胡索。牛膝。蘇木。黑豆。虛者加人參。凡產後溫飲一盃。可免血暈。至三日後止之。

治中暈昏倒。以熱小便灌之即活。

治頭痛至極。童便一盞。鼓心半合。同煎至五分溫服。(聖濟總錄方)

治熱病咽痛。童便三合。含之即止。(聖惠方)

治骨蒸發熱。三錢童便五升。煎取一升。以蜜三匙和之。每服二碗半。日更服。此後常取自己小便服之。輕者二十日。重者五十日。連服二十日後。當有蟲如蚰蜒。在身常出。十步內聞病人小便臭者。遂也。(孟詵必效方)

治男婦怯證。男用童女便。女用童男便。斬頭去尾。日進二次。乾燒餅壓之。月餘全愈矣。(聖惠方)

治久嗽涕唾。肺癆。時時寒熱。頰赤氣急。用童便去頭尾少許。五合。取大粉甘草一寸。四破浸之。露

一夜。去甘草。平旦頓服。或入甘草末一錢。同服亦可。一日一劑。童子忌食五辛熱物。(姚僧垣集驗方)

治肺癆咳嗽。鬼氣疰病。停久臭濁。日日溫服之。(集驗方)

治吐血鼻衄。人溺。雞汁和勻服一升。(日華本草方)

治齒縫衄血。童便溫熱。含之立止。(聖惠方)

治消渴重者。衆人溺坑中水。取一盞服之。勿令病人知。三度遂。(聖惠方)

治瘰癧滿腹。諸藥不痊者。人溺一服。一升。下血片塊。二十日即出也。(蘇恭本草方)

治絞腸痧痛。童子小便。服之即止。(聖惠方)

治卒然腹痛。令人騎其腹。溺臍中。(肘後方)

治下痢休息。杏仁去皮。麴炒研。以猪肝一具。切片。水洗血淨。置淨鍋中。一重肝。一重杏仁。鋪盡。以童便二升。同煎乾。放冷。任意食之。(聖惠方)

治痢疾湯甚。童便和蜜煎沸頓服。(簡便方)

① 治瘰癧諸瘡。無論新久。童便一升入白蜜三匙。攪去白沫。頓服。取吐碧綠痰出為妙。若不然。終不除也。(聖惠方)

② 治中喝昏悶。夏月人在途中。熱死。急移陰處。就掘道上熱土。攤臍上作窩。令人溺滿。暖氣透臍。即醒。乃服地漿蒜水等藥。(仲景方)

③ 治中惡不醒。令人尿其面上。即甦。此扁鵲法也。(肘後方)

④ 治三十年癩。一切氣塊。宿冷惡病。苦參二斤。童子小便一斗二升。煎取六升。和糯米及麴如常法作酒服。但腹中諸疾皆治。酒放二三年不壞。多作救人神效。(聖惠方)

⑤ 治金瘡中風。自己小便。日洗二三次。不妨入水。(聖惠方)

⑥ 治金瘡血出不止。飲人尿五升。(千金方)

⑦ 治打傷瘀血攻心者。人尿煎服一升。日一服。(蘇恭本草方)

⑧ 治折傷跌撲。童便入少酒飲之。推陳致新。其功甚大。薛己云。余在居庸。見覆車被傷七人。仆地呻吟。俱令灌此。皆得無事。凡一切傷

損。不問壯弱。及有無瘀血。俱宜服此。若腸腹或作痛。或發熱煩躁。口渴。惟服此一。勝似他藥。他藥雖效。恐無瘀血。反致誤人。童便不動臟腑。不傷氣血。萬無一失。軍中多用。此屢試有驗。(外科發揮方)

⑨ 治杖瘡腫毒。服童便良。(千金方)

⑩ 治火燒悶絕。不省人事者。新尿頓服二三升良。(千金方)

⑪ 治刺在肉中。用溫小便漬之。(千金方)

⑫ 治人咬手指。瓶盛熱尿浸一夜即愈。(通變要法方)

⑬ 治蛇犬咬傷。以熱尿淋患處。(日華子) 治蜈蚣傷人。令婦人尿於瘡上。最妙法。(千金方)

⑭ 治蛇經人足。就令尿之便解。(肘後方)

⑮ 治蜂螫螫毒。人尿洗之。(肘後方)

⑯ 治蜘蛛咬毒。久臭人溺。於大窠中坐浸。仍取烏雞屎炒沒酒服之。不爾。恐毒殺人。(陳藏器本草方)

⑰ 治百蟲入耳。小便少少滴入。

(聖惠方)
⑱ 治勞瘵已久。童子小便。乘熱少少頻滴之。(聖惠方)

⑲ 治赤目腫痛。自己小便。乘熱抹洗。即閉目少頃。此以真氣退去邪熱也。(普濟方)

⑳ 治腋下狐臭。用自己小便乘熱洗兩腋下。日洗數次。久則自愈。(集簡方)

㉑ 治傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日服二升良。(楊氏產乳方)

㉒ 治子死腹中。以夫尿二升。煮沸飲之。(千金方)

㉓ 治中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。(肘後方)

㉔ 解諸菜毒。小兒尿和乳汁服二升。(海上方)

㉕ 治僮生下胞。用人溺一升。入葱豉各一分。煎二三沸。熱飲便下。(日華本草方)

㉖ 治痔瘡腫毒。用熱童尿入礬三分。洗之一日二三效。(救急方)

用量 一錢或一杯。
施用宜忌 凡脾胃虛寒而無火者禁用。

著名方劑 自通加人尿猪膽汁湯。治傷寒少陰下痢。服自通湯後。利不止。汗出而厥逆。無脈。乾嘔而煩者。此方主之。服後脈暴出者。死。微續者生。(傷寒論) 葱白四莖。乾姜一兩。附子一枚。(生用去皮。破八片) 上三味。以水三升。煮取一升。去滓。納入人尿五合。猪膽汁一合。分溫再服。

【童桑葉】 即嫩桑葉之處方用名。詳「桑葉」條。

【童腸】 即紫參之古籍別名。與見別錄。詳「紫參」條。

【筆竹茹】 主治 勞熱。

【筆管菜】 即黃精之俗名。詳「黃精」條。即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「魚腥草」條。

【筋子】 古籍別名 根子。(陳藏器)

產地 生山野間。

形態 筋子為雜草類之一種。莖高尺餘。葉圓厚光潤。凌冬不凋。其根大如指。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。
主治 心腹痛。不問冷熱遠近。

惡臭氣注刺痛。霍亂蠱毒。暴下血。酒磨服。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論筋子根曰。主心中結塊。久積氣。攻臍下痛。

【筋根】即旋花之古籍別名。典見本經。詳「旋花」條。

【筋骨草】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【筋退】即人爪甲之古籍別名。典見綱目。詳「人爪甲」條。

【筒桂】即筒桂之古籍別名。典見唐本草。詳「肉桂」條。

【筒切】即水楊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水楊」條。

【答刺不花】即土撥鼠之古籍別名。典見飲膳正要。詳「土撥鼠」條。

【答逐果】即倒吊果之古籍別名。典見張揖廣雅。詳「倒吊果」條。

【粟奴】命名 本品即粟穗成熱時所生之黑微故名。

主治 利小腸。除煩懣。

【粟米】原名 粟。命名 粟者。積也。謂積於穀故名。

古語別名 中熟者名八月黃。

小米。寒露粟。(綱目)程麥黃。袖粟。(別錄)

基本 係禾本科粟屬。為粟之子實。

形態 粟為穀類之一年生草本。高四五尺。葉長與玉蜀黍之葉相類而較狹。花小而密集。作圓錐花序。果實為穎果。小粒狀。帶有黃色。



米 粟

採取 孟秋及初冬採之。

製法 採得曝乾。杵去殼用。用法 水煮。或磨粉和藥。

性質 鹹。微寒。無毒。效能 清熱。解渴。補脾胃。和腸胃。用作滋養藥。

主治 養腎氣。去脾胃中熱。益氣。陳者苦寒。治胃熱。消渴。利小便。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論粟米曰。止痢。墜丹石熱。

【唐】陳藏器本草拾遺論粟米曰。水煮服。治熱腹痛。及鼻衄。為粉和

水瀝汁。解諸毒。治霍亂及轉筋入腹。又治卒得鬼打。【唐】陳士良食性本草論粟米曰。解小麥毒發熱。

【明】李時珍本草綱目論粟米曰。治反胃熱痢。煮粥食。益丹田。補虛損。開腸胃。【清】王士雄隨息居飲食譜論粟米曰。粟米功用與秬秠二米略同。而性較涼。病人食之為宜。稷者亦名秠。汪謝城曰。粟之黏者固可稱秠。而實非治不寐之秠。

近人學說 丁福保曰。粟於穀類中養分最富。為人生所必需。其成分含有蛋白質。澱粉。糖分。脂肪等。就中植物纖維。鹽分尤多。其他含幾分之水。其味微鹹而為無毒性之食品。

配合應用 治胃熱消渴。以陳粟米炊飯乾食之良。(醫方心鏡方)

治反胃吐食。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟半升。杵粉。水丸。梧子大七枚。煮熟。入少鹽。空心和汁吞下。或云納醋中吞之。得下便已。(醫方心鏡方)

治鼻衄不止。粟米粉水煮服之。(普濟方)

治嬰孩初生七日。助穀神以導達腸胃。研粟米煮粥如飴。每日哺少許。(姚和衆方)

治孩子赤丹。嚼粟米以傅之。(兵部手集方)

治小兒重舌。嚼粟米以哺之。(子母秘錄方)

治雜物眯目不出。用生粟米七粒。嚼爛。取汁洗之。即出。(聖濟總錄方)

治湯火灼傷。粟米炒焦。投水澄取汁。煎稠如糖。類傅之。能止痛滅癢。痕一方。生半炒。研末酒調傅之。(崔行功纂要方)

治熊虎爪傷。嚼粟米以塗之。(葛氏方)

用量 三錢至四錢。施用宜忌 凡胃寒者禁用。參攷資料 陳粟及三五年尤解煩悶。服食家亦將食之。(陶弘景) 粟米利小便。故能益脾胃。(寇宗奭) 粟之味鹹。淡氣寒。下滲。腎之穀也。腎病宜食之。虛熱消渴。洩瀉。皆腎病也。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火而脾胃之病宜食之。(李時珍) 生者難化。熱

十二畫 筋

筒 筐 答 粟

十二畫 粟 粟 結 絡

者滯氣。隔食生蟲。(寇宗奭) ①與杏仁同食。令人吐瀉。雁食粟。足重不能飛。(吳瑞) ②粟古文作粟。象稂在禾上之形。而春秋題辭云。粟乃金所立。米爲陽之精。故西字合米爲粟。此鑿說也。許慎云。粟之爲言續也。續於穀也。古者以粟爲黍稷。粟之總稱。而今之粟在古但呼爲粟。後人乃專以粟之細者名粟。故唐孟詵本草言人不識粟。而近世皆不識粟也。大抵黏者爲秠。不黏者爲粟。故呼此爲秠粟。以別秠而秠秠。北人謂之小米也。(李時珍) ③粟。即粟也。穗大而毛長。粒粗者爲粟。穗小而毛短。粒細者爲粟。苗俱似芽。種類凡數十。有青赤黃白黑諸色。或因姓氏地名。或因形似時令。隨義賦名。故早則有趕麥黃。百日糧之類。中則有八月黃。老軍頭之類。晚則有雁頭青。寒露粟之類。按買思鷄齊民要術云。粟之成熟有早晚。苗稈有高低。收實有息耗。質性有強弱。米味有美惡。山澤有異宜。順天時。量地利。則用力少而成功多。任性返道。勞而無獲。大抵早粟皮薄米實。晚粟皮

厚米小。(李時珍)

【粟米粥】

性質 甘。溫。平。無毒。
主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

【粟泔汁】

基本 本品即淘洗粟米之泔水。
主治 霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立癒。臭泔止消渴尤良。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論粟泔汁曰。酸泔及澱洗皮膚。疥癬。殺蟲。飲之。主五痔。和臭糞皮煎服。治小兒疳痢。

【粟芽】

原名 粟米。
古籍別名 粟粟。(綱目)

性質 苦。溫。無毒。

主治 寒中。下氣。除熱。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論粟芽曰。爲末。和脂傅面。令皮膚悅澤。【宋】日華諸家本草論粟芽曰。除煩。消宿食。開胃。

參攷資料 ①粟黍穀麥豆諸粟。皆以水浸脹。候生芽。曝乾用。其功皆主消導。(李時珍) ②粟芽穀神散中用之。性溫於麥粟。(寇宗

奭)

【粟殼】 卽粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粟殼」條。

【粟糠】

基本 本品即粟米之糠皮。

主治 痔漏脫肛。和諸藥煎之。

【粟粟】 卽粟芽之古籍別名。典見綱目。詳「粟芽」條。

【粟】 卽稷米之古籍別名。典見綱目。詳「稷米」條。

【結瓜子】 卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬瓜子」條。

【結紅花】 卽紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【結殺】 產地 出西域諸地。基本 結殺爲香木類之一種。花極馨香。熬之成膏。可供藥用。

主治 去頭風白屑。同胡桃仁和香油塗之。

【結留子】 卽根椶子之古籍別名。典見綱目。詳「根椶子」條。

【絡石】 命名 本品耐冬而包絡石木而生。故名。

處方用名 絡石藤。

古籍別名 石椶。饒石。雲花。雲

一三四二

英。雲丹。(吳普) 石龍藤。明石。石椶。懸石。(別錄) 石血。耐冬。(蘇恭) 略石。領石。雲球。(和漢藥考) 鬼駝。駝。(外科精要)

外國名詞 Trachelospermum-jasminoides, Lemaire.

基本 係屬夾竹桃科。爲絡石之莖葉。

產地 絡石生山谷間之巖石上。或陰溼處之樹木上。

形態 絡石爲山野自生之常綠蔓草。莖作木質狀。葉對生。作長橢圓形。質強韌。有光澤。入冬變紅紫色。花爲乳白色。合瓣花冠。上緣五裂。各片作回旋狀。以聚繖花序排列。實爲細長莢果。長五、六寸。



絡石

種類 ①絡石與薛荔極相似。但薛荔附木而生。且其狀亦大於絡石。②絡石莖於石上者。葉細厚而圓短。纏於樹上者。葉大而薄。但

在石上者良。石血葉尖。一頭赤色。絡石葉圓正青。有謂石血。卽絡石之小者云。絡石帖石而生。其莖折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木強。面背背淡。清而不光。然有尖葉圓葉兩種。惟功用相同耳。

採取 每年六七月間。採其莖葉日乾。

製法 雷斅曰。凡採得用粗布揩去毛子。以熱甘草水浸一伏時。切曬用。

性質 苦溫無毒。

效能 通經絡。利關節。治痺痛。療癰毒。用作強壯藥。

主治 風熱死肌。癰傷。口乾。舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下。等(本經)大驚入腹。除邪氣。養腎主腰酸痛。堅筋利關節。久服輕身。明目潤澤好顏色。不老延年。通神。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論絡石曰。主一切風癰。白宜老。【唐】蘇恭新修本草論絡石曰。與蛇瘡毒。心開服汁。并洗之。刀斧傷。瘡傳之立瘳。【明】繆希雍本草經疏論絡石曰。絡石草少陽

十二畫 絡

之令。兼得地之陰氣。其味苦。其氣溫。微寒而無毒。入足陽明。手足少陰。足厥陰。少陽經。故主風熱死肌。癰傷。口乾。舌焦。癰腫不消。喉舌腫。水漿不下。皆苦溫通氣血。血屬陰。陰寒入血。而除熱之效也。又能除邪氣。養腎。主腰酸痛。堅筋骨。利關節。療蛇毒。心開刀斧傷。瘡傳立瘳。皆涼血除熱之功也。本經久服。輕身。明目。潤澤好顏色。不老延年。陳藏器以爲能變白。亦指益陰涼血而言也。生石上者良。

近人學說 張山雷曰。絡石氣味。本經謂之苦溫。蓋以隆冬不凋。而功能通經絡活血言之。故以爲溫。然本經主治。純是熱症。則非溫熱可知。故別錄改作微寒。而御覽引李當之說。且以爲大寒也。此物莖生而甚堅。節節生根。故善走經脈。通達肢節。本經主風熱死肌。別錄養腎。主腰酸痛。堅筋利關節。皆卽此義。其治癰腫喉舌腫。口乾。舌焦。皆苦寒泄降之功用也。別錄謂其除邪氣。則以邪熱而言。凡本經別錄邪氣二字。所賅最廣。其質各有所主。並非泛辭。讀者當以意

逆之。自能悟到。不可混作一例看。惟大驚入腹四字。則不甚可解。當付闕疑。又曰。蘇恭謂瘳瘳後血結大良。蓋以瘳瘳不通而言。苦泄破瘀。且普通絡石是以主之。又謂主蝮蛇瘡毒。心開。則清熱泄降。固解毒之良藥。又謂刀斧傷瘡。瘳之立瘳。則又外治活血之神丹矣。藏器謂主一切風。卽本經治風熱死肌。別錄利關節之義。今用以舒筋活絡。宜通痺痛。甚驗。

配合應用 治小便白濁。緣心腎不濟。或由酒色。送至已甚。謂之上淫。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥水濁。冬則土堅水清。卽此理也。醫者往往較補。其痰反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清矣。用絡石人參。茯苓各二兩。龍骨煨一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

(仁存堂方)

治發背癰疽。用絡石搗汁。入諸解毒藥。神效。

治喉痺喘息不通。須臾欲絕。以絡石一兩。水一升。煎取一大盞。去滓細細喫。須臾卽通。(外臺祕

要方)

治癰疽瘰癧。止痛蠟寶散。用鬼繫膜。生竹籬陰溼石岸間。絡石而生者好。絡石木者無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。阜茨刺一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁炒香。乳香沒藥各三錢。每服二錢。水一盞。酒中盞。慢火煎至一盞。溫服。(外科精要方)

用量 一錢至四錢。

施用宜忌 陽虛畏寒。及脾虛易泄者。禁用。惡鐵落。畏貝母。苜蓿。殺股藥毒。杜仲。丹皮爲之使。

著名方劑 博金散。治心腎不濟。或酒色過度。腎不足而有虛熱。小便不清。遺精白濁等症。(仁存堂方) 絡石人參。茯苓各二兩。煨龍骨一兩。共研末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

參攷資料 絡石在木者。隨木性。功與葶藶相似。更有石血。地錦等。十餘種。並是其類。大略皆主風血。暖腰膝。變白不老。(陳藏器) 絡石生木石間。凌冬不凋。葉似細橘葉。莖節着地卽生根。發

十二畫 絡 給 統 絲

包絡石旁花白子黑。(韓保昇) ① 絡石性實耐冬。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨。關節。風熱。癰腫。變白耐老。即醫家少知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒耳。(李時珍) ② 所在有之。生木石間。淺冬不凋。葉似細栝。莖節著處即生根。包絡石旁花白子黑。六七月採莖葉。日乾。(韓保昇) ③ 絡石貼石而生。其莖折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木強。面青背淡。澆而不光。有尖葉圓葉兩種。功用相同。蓋不一物也。(李時珍)

【絡石藤】 卽絡石之處方用名。詳【絡石】條。

【絡石橙】 卽金橘之古籍別名。典見花木志。詳【金橘】條。

【給敦羅】 卽羊刺蜜之古籍別名。典見綱目。詳【羊刺蜜】條。

【統草】 卽甘草之細者之別名。詳【甘草】條。

【統青蒿】 卽青蒿之處方用名。詳【青蒿】條。

【絲瓜】 命名 本品老則筋絲羅織。象人經絡。故名。



瓜 絲

處方用名 絲瓜絡。

古醫別名 魚鱗。(綱目) 天絲瓜。蠻瓜。(本草) 天羅布瓜。(事類合璧) 天羅勒。洗錫羅瓜。(和漢藥考) 烏牛子。(綱目拾遺)

基本 屬葫蘆科瓠果類。爲絲瓜之筋膜。其藤根葉詳見各條。

產地 陳仁山藥物生產辨云。絲瓜絡產廣東各屬。有出各省均有。出但江浙來者。去淨外衣。作洗身用。此種俱水瓜絡。公司有沽。

形態 絲瓜爲圓筒狀。種之一年生蔓草。莖有細長之刺毛。自葉間生出卷鬚。分枝而纏繞他物。攀登而上。可及丈餘。葉爲心臟形。有五裂至七裂。狀如掌。周圍有鋸齒。葉間有刺毛。夏日開五瓣黃花。其狀如鐘。皆單性。雌雄同株而生。果實爲細長之瓜。長可二尺餘。迨成熟已久。遂生強韌如網之纖維。嫩時多取供食用。熟而生出之纖維。

推。謂之絲瓜絡。可以代海綿。入藥取老絲瓜燒焦。謂之絲瓜霜。

採取 九十月經霜乃枯採之。

製法 凡入藥用者。去外皮。取筋膜用。尤以潔白者佳。

用法 與他藥水煎。或燉魚到末用。

性質 甘。平。無毒。

效能 涼血解毒。通經絡。行血脈。用爲瘡疔之要藥。又作祛痰瀉痛通乳藥。

主治 痘疔不快。枯者燒存性。入硃砂研末。蜜水調服。甚妙。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論絲瓜絡曰。絲瓜食除熱利腸。老者燒存性。服去風化痰。涼血解毒。殺蟲通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便。下血痔漏。崩中。黃積。疝痛。卵腫。血氣作痛。癰疽疔腫。齒齙疔毒。胎毒。【明】李士材本草綱目論絲瓜絡曰。絲瓜性冷解毒。多食敗陽。【清】黃宮繡本草求真論絲瓜絡曰。絲瓜性屬寒物。味甘體滑。其瓜經絡貫穿。風隔連屬。凡人風痰溼熱。癰毒血積。留滯經絡。發爲癰疽疔毒。崩漏腸風。水腫。

等症者。服之立能有效。以其通經達絡。無處不至。小兒痘出不快。用此近蒂三寸。連皮燒灰存性。爲末。沙糖水調服。並可以敷脚腫。鼻淵時流濁水。用此瓜藤近根三寸。燒灰存性。爲末。酒服。方寸匕。亦效。小兒預防出痘。於立冬後。用小絲瓜煨入硃砂服之。亦應。皆以借其寒滑通達之性耳。但過服亦能滑腸作泄。故書有言。此屬菜中。不足食之。當視臟氣以爲可否也。藥搗汁生服。可解一切蛇傷之毒。淳敷患處亦佳。【清】王士雄隨息居飲食譜論絲瓜絡曰。絲瓜(一名天羅)甘涼清熱。解毒安胎。行乳調經。補陽通絡。殺蟲理疔。消腫化痰。痰癭者爲者。宜單宜菜。老者入藥。能補能通。化溼除黃。息風止血。

國外學說 日本一本堂藥選曰。選絲瓜。須以全熟者爲佳。勿用未熟者。臨採時。卽到細曬乾。收貯隨用。久懸風處。則輕虛枯瘦。性味俱脫。不堪用。子燒焦存性。不如生用。近得異種。呼長絲瓜。始自琉球來。其長三倍於尋常絲瓜。此品入藥。故覺有力。俗呼盤嶺末。又大和。

本草曰。絲瓜功用極多。本草附方可見。葉與藤根皆有效用。無道屏棄者。又草木育種曰。四月初下種。蔞竹便纏繞。以人糞魚腥汁河泥等。培壅其根。大絲瓜切段入水煎汁。作祛痰藥。甚有效。

配合應用 ①治痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近蒂三寸。連皮燒存性。研末。砂糖水服。(直指方)

②治瘰癧不斂。瘡口太深。用絲瓜搗汁。頻抹之。(直指方)

③治風熱膠腫。絲瓜燒存性。研末。水調搽之。(殿月軒方)

④治肺熱面瘡。苦絲瓜。牙皂。莢並燒灰等分。油調搽。(摘玄方)

⑤治玉莖瘡潰。絲瓜連子搗汁。和五倍子末。頻搽之。(丹溪方)

⑥治坐板瘡疥。絲瓜皮焙乾。爲末。燒酒調搽之。(攝生紫妙方)

⑦治天泡溼瘡。絲瓜汁調辰粉。頻搽之。

⑧治手足凍瘡。老絲瓜燒存性。和臘豬脂塗之。(海上方)

⑨治肛門酒痔。絲瓜燒存性。研末。酒服二錢。(殿月軒方)

⑩治痔漏脫肛。絲瓜燒灰。多年石灰雄黃各五錢。爲末。以豬膽雞子清及香油和調貼之。收上乃止。(孫氏集效力)

⑪治腸風下血。經霜後乾絲瓜。燒存性。爲末。空心酒服二錢。一名蠻瓜。一名天羅。一名天絲瓜。是矣。(許叔微本事方)

⑫治下血危篤不可救者。絲瓜。即天羅一個。燒存性。槐花減半。爲末。每空心米飲服二錢。(普濟方)

⑬治酒痢便血腹痛。或如魚腦五色者。乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。一方煨食之。俗名魚鱗是也。(經驗良方)

⑭治血崩不止。老絲瓜燒灰。棕櫚燒灰等分。鹽酒或鹽湯服。(奇效良方)

⑮治經脈不通。乾絲瓜一個。爲末。用白鶴血調成餅。日乾研末。每服二錢。空心酒下。先服四物湯三服。(海上名方)

⑯治乳汁不通。絲瓜連子燒存性。研。酒服一二錢。被覆取汗。即通。(簡便單方)

⑰治乾血氣痛。婦人血氣不行。

上衝心膈。變爲乾血氣者。用絲瓜一枚。燒存性。空心溫酒服。(壽域神方)

⑱治小腸氣痛。繞臍衝心。連蒂老絲瓜。燒存性。研末。每服三錢。熱酒調下。甚者不過二三服。即消。

⑲治卵腫偏墜。絲瓜架上初結者。留下。待瓜結盡。藥落取下。燒存性。爲末。煉蜜調成膏。每晚好酒服一匙。如在左左睡。在右右睡。(劉松石保壽堂方)

⑳治喉閉腫痛。天羅瓜研汁。灌之。(普濟方)

㉑治化痰止咳。天羅即絲瓜。燒存性。爲末。東肉和丸。彈子大。每服一丸。溫酒化下。(攝生妙用方)

㉒治風蟲牙痛。經霜乾絲瓜。燒存性。爲末。搽之。(直指方)

㉓治風氣牙痛百藥不效者。用此大能去風。惟蛀牙不效。天羅即生絲瓜一個。擦鹽火燒存性。研末。頻擦。涎盡即愈。膠腫以水調貼之。

㉔治食積黃疸。絲瓜連子燒存性。爲末。每服二錢。因麵得病。麵湯下。因酒得病。溫酒下。連進數服。愈。(衛生易簡方)

⑳治小兒浮腫。天羅。燈草。葱白等分。煎濃汁。服。非洗之。(普濟方)

㉕治水腫腹脹。老絲瓜去皮一枚。剪碎。巴豆十四粒。同炒。豆黃。去豆。以瓜同陳倉米再炒。熟。去瓜。研米爲末。糊丸。梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃氣。巴豆逐水。絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。此乃元時杭州名醫宋會之方。(鮮于樞釣玄方)

㉖用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡血虛液涸而絡不利者。禁用。

參攷資料 ①絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及脚癬方中。燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。(玉類) ②絲瓜老者。筋絡貫串。房隔聯屬。故能通人脈絡。膠腫而去風解毒。消腫化痰。祛痛殺蟲。及治諸血病也。(李時珍) ③絲瓜唐宋以前無聞。今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引莖。延樹竹或作棚架。其葉大如蜀葵。而多子。尖有細毛。刺取汁。可染絲。其莖有稜。六七月開黃花。五出。微似胡瓜。花萼瓣俱黃。其瓜大寸許。長一二尺。甚則三四

十二畫 絲 絳 脾 脛 臍 胰 腎 舒 舜 莽

一三四六

尺。深綠色。有皺點。瓜頭如鬚首。嫩時去皮。可烹可爆。點茶充蔬。老則大如杵。筋絡纏紐如織成。經霜乃枯。惟可藉糖履漆器。故村人呼為洗錫雞瓜。內有隔。子在隔中。狀如苦蕒子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚皆可食也。(李時珍)

多用鷩鷩水煮沒。剝去蛹而採其綿。曬乾用。尤為便利。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

種類 未經用者為新綿。已經用者為故綿。其燒灰者為綿灰。參攷資料 古之綿絮。乃繭絲繅延不可紡織者。今之綿絮。則多木綿也。入藥仍用絲綿。(李時珍)

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

【絲瓜】 絲。 網目。詳『白茅』條。

【絲草】 即葶藶之舒長者。典見綱目。詳『葶藶』條。

典見和漢藥考。詳『蕒麻子』條。

【脛】 腫地 生山谷中。 形腫 脛為雜草類之一。 種。色白理順。可供藥用。 性質 甘。無毒。 主治 益氣延年。

【臍】 即斑蝥之古籍別名。典見吳普本草。詳『斑蝥』條。

【胰】 腫地 出嶺南。 形腫 胰類蟲為化生蟲類之一種。身扁。褐色。狀如氣盤。可供藥用。 主治 功同吉丁蟲。

【腎】 即胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【腎】 即胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【舒雁】 即鵝之古籍別名。典見綱目。詳『鵝』條。

【舒鵝】 即鴨之古籍別名。典見附雅。詳『鴨』條。

【舜英】 即朱槿之別名。詳『扶桑』條。

【莽果】 即蜜望子之古籍別名。典見廣慶志。詳『蜜望子』條。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。

【莽草】 原名 陶草。 命名 本品有毒。食之令人迷罔。故名。 古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石桂。茵草。縮苗香。(和漢藥考)茴香八角珠。 基本 屬木蘭科樹之葉。 腫地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。 形腫 樹為陸地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每裂果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。子皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甜味。



草 莽

採取 五月至七月間。採葉陰乾。

製法 雷斅曰。凡使葉勿用尖及學生者。取葉細剉。以生甘草水。煮二味。同盛入生稀絹袋中。微中蒸一日。去二件。熬乾用。

用法 恒作外治藥用。或煎湯以含漱及薰洗。或剉末以塗傳及摩擦。

性質 辛。溫。有毒。

成分 爲揮發油、脂肪油、樹脂、單寧、糖質等。

效能 消癰腫。理疔瘡。用爲消散疥癬疥癬藥及爲殺蟲藥。

主治 風頭。癩腫。乳癰。疔瘡。除結氣。疥癬。殺蟲魚。(本經)療喉痺不通。乳癰。頭風。癢。可用沐。勿令入段。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論非草曰。治風疽疔氣。腫。瘰癧。治瘰癧。除濕風。不入湯服。主頭瘡。白禿。殺蟲。與白飲。赤小豆。爲末。雞子白調如糊。燒毒腫。乾。更。易上。【宋】大明諸家本草論非草曰。治皮膚癩痺。煎湯湯。淋風蟲牙痛。

十二畫 莽

國外學說 日本和漢藥考曰。日本或書作構。蓋因日俗用其枝葉供佛前或墓前之故。葉曬乾爲抹香。或爲製造線香原料。子實中含有一種揮發油。香氣類薰澄茄。歐美諸國用以製造香油。日本每年輸出額達五十萬斤云。又查東京大學教師愛斐曼氏。嘗從非草實中。發見一種毒性結晶物。名之爲西基民 (Sibelin)。又云。子實含有揮發油一%。其中又含有名「沙夫洛爾」(Safrol)之芳香性化合物云。又相川藥學士。蒸溜非草油之實驗云。將非草葉與水蒸氣一同蒸溜。初得較水爲輕。氣味類似線香而極毒之油質。吸收此油之蒸氣。則致發嘔。極感不快。惟此極易揮發。置空氣中。其臭氣須臾即行消失。此物殆即愛斐曼氏所言非草實中之毒物歟。繼上述有毒性揮發油而來者。爲一種較水爲重之揮發油。不易逸散。此物殆即愛斐曼氏所言之沙夫洛爾歟。又關於莽草實之效能。已故理學博士伊藤圭介翁所著小石川植物園草木圖說。述之頗爲

詳盡。今摘錄於左。中國買人近亦於崎陽多購此實去。或云用以溜製香水。和方書之記莽草實藥效者頗多。如狐臭。用此葉濃煎。時時洗之。金創打撲。用此葉與大黃小麥粉和飯研和貼之。鼠咬。將此花燒爲霜貼之。或將葉陰乾。爲末。摻之。婦人乳腫。用此葉末與蕎麥粉調水貼之。瘰癧。用此葉末調紫纈汁貼之。丹毒。用此葉煎服。齒齲腫。用抹香貼之。又洗眼水。方於爐甘石加莽草實煎。用之有效云。又述搗之功用。曰搗之香氣清淨。可供神佛。除不淨。墓上插搗則厭懼。近山田園。恐園中物爲猪獠所竊。多植搗以懼之。掘出之芋。折搗枝覆之。則獸不敢取。此外尚多功用。去眼病熱。取落於墓上水中腐爛之。搗露點之。立愈。煎搗葉用之亦佳。搗有去眼熱功用。爲眼科良醫。齊藤祐仙所經驗。確係有效。人之往。藉於本法寺境內熊谷氏之墓。取其墓水治眼病。即霍然愈者。蓋亦由搗之功用耳。本法寺在本願寺前寺町。有熊谷稻荷社。犬咬名灸。爲病犬所咬。立於創口置搗葉。從

其上灸之。則有水自創口出。灸至水出而後已。甚爲奇妙。此法用於鼠咬亦佳。

配合應用 治賊風腫痺。風入五臟。恍惚。宜非草膏主之。莽草一斤。烏頭。附子。鄧獨各二兩。切以水和醋一升。漬一宿。猪脂一斤。煎三上三下。紋如滓。向火以手摩病上三百度。應手即痊。若耳鼻疾。可以綿裹塞之。疥癬雜瘡。並宜摩之。(肘後方)

治小兒風癩。製縱戴眼。極者日數十發。又治大人賊風。莽草。雷丸各一雞子黃。大化猪脂一斤。煎七沸。去滓。厚痛處。勿近日及陰。日凡三四次。(外臺秘要方)

治頭風久痛。莽草煎湯沐之。勿令入目。(聖惠方)

治風蟲牙痛。用非草煎湯。熱漱冷吐。一加山椒皮。一加獨活。一加郁李仁。一加芫花。一加川椒。細辛各等分。煎湯熱漱冷吐。(肘後方)

又用非草中兩。皂角三挺。去皮子。漢椒七粒。爲末。棗肉爲丸。芥子大。每以一九塞孔中。吐涎取效。(聖惠方)

十一畫 葍 菁 菅 菘 菧 菨 菊

① 治瘰癧結核。用葍草一兩爲末。雞子白調塗帛上貼之。日二易。取效止。亦治癰瘡未潰。得痛爲良。

② 治乳腫不消。葍草、小豆等分爲末。苦酒和傅之。(衛生易簡方)

③ 治狗咬昏悶。浸椒水。調葍草末傅之。(便民國藥方)

用益 錢半至三錢。

施用宜忌 凡癰瘍已潰者禁用。

參攷資料 ① 古方治風毒瘰癧。諸酒皆用葍草。今醫家取葉煎湯熱含。少頃吐之。治牙齒風蟲及喉痺甚效。(蘇頌) ② 濃煎湯淋滲皮膚癩痺。周禮煎氏掌除蠹物。以葍草熏之則死。(寇宗奭) ③ 古方治小兒傷寒。有葍草湯。又瓊碎錄云。思村王氏之子。生七日而兩腎縮入。二醫云。此受寒氣而然也。以硫黃、萊萸、大蒜研塗其腹。以葍草、蛇床子燒烟熏其下部而愈也。(李時珍) ④ 葍草制鱉黃雄黃而有毒。誤食害人。惟紫河車磨水服。及黑豆麥汁服。可解豆汁澆其根。卽爛。性相制也。(李時珍)

【葍草子油】卽八角油之別名。詳「八角油」條。

【葍】卽蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳「蓮肉」條。

【菘菘】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【菁茅】卽香茅之古籍別名。典見別錄。詳「香茅」條。

【菅松】卽天門冬之古籍別名。典見貝抱朴子。詳「天門冬」條。

【菅茅】卽白茅之一種。葉細長而尖。有並行脈。如白茅。秋開青白花。成穗。殼有長芒。實尖而黑。長分許。常黏人衣。根短硬如細竹。無節。味微甘。效能與白茅同。參見「白茅」條。

【菅根】卽地筋之古籍別名。典見別錄。詳「地筋」條。

【菘菘】卽萊萸之古籍別名。典見廣韻。詳「萊萸」條。

【菦竹】卽葍草之古籍別名。典見詩經小雅篇。詳「葍草」條。

【菦豆】卽綠豆之古方用名。詳「綠豆」條。

【菦筍】 基本 本品係用茅竹符淡煮曬乾者。

古籍別名 草鞋底。蝴蝶尖。玉版。闊綠。泥裏黃。(綱目拾遺)

產地 浙、閩、江西諸省多有之。

性質 甘平無毒。

主治 利水消水腫。發痰。平實喘。尋塵丸用之。

【菦草】卽葍草之古籍別名。典見唐本草。詳「葍草」條。

【菊】卽菊花。詳「菊花」條。

【菊米】 命名 本品卽野菊之蕊如米狀者故名。

產地 出浙江遂昌縣石練山中。

形態 菊米爲野生之菊蕊。乾之大如半粒綠豆。輕圓黃亮而有香氣。可供藥用。

主治 去風。清火。明目。敗毒。散疔。

命名 菊本作鞠。鞠弱華事至此而窮。故名。

處方用名 杭菊花。白菊花。白菊瓣。野菊花。滁菊花。甘菊花。甜菊花。黃菊花。池菊花。

古籍別名 節華。(本經) 女節。女華。女莖。日精。更生。傳延年。陰成。

基本 屬菊科。爲甘菊之花。

產地 陳仁山藥物生產辨云。菊花有黃白之分。白者以產安徽亳州爲最。其次河南懷慶府。又其次則產廣東潮州。色黑味苦。又有一種白杭菊。產浙江杭州府。合藥用少。茶用居多。又有一種黃杭菊。亦產浙江杭州府。又有一種大朶者名黃菊王。亦產浙江杭州府。黃菊。近日廣東小欖有種。花瓣略大。色黃而帶紅。味不香。杭州產者。色黃而帶青。味溫香。大有可別。白菊。再有一種名綠蒂菊。產安徽滁州。又名滁州菊。味最清涼。不甜不苦。白菊之中。以此味合藥爲適當。

外國名詞 Chrysanthemum Sinesis, Seb.

周盈(別錄)治瘡。(爾雅)金菘。牡菊。(綱目)女花。(和漢藥考)

形態 菊花爲多年生草本。品類不一。形色不同。茲以甘菊而實



(一) 花 菊

冬日生苗。葉如艾葉。色綠。夏秋漸高至二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。味微苦者真。



(二) 花菊

採取 正月採根。三月採葉。五月採莖。九月採花。十一月採實。俱陰乾用。

製法 採摘花瓣曬乾。或陰乾。其新鮮者尤良。

性質 苦平無毒。

效能 疏風熱。清頭目。用作驅風解熱藥。又為眼科藥。

主治 諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老。延年(本經)療腰痛去來。陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五臟。調四肢。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論甘菊曰。治頭目風熱。風旋倒地。膈骨疼痛。身上一切游風。令消散。利血脈。並無所忌。【宋】大明諸家本草論甘菊曰。作枕明目。

十二畫 菊

葉亦明目。生熟並可食。【金】張元素珍珠養論甘菊曰。養目血。去翳膜。【元】王好古湯液本草論甘菊曰。主肝氣不足。【明】經希雍本草經疏論甘菊曰。菊花為去風之要藥。苦可泄熱。甘能益血。甘可解毒。平則兼辛。故亦散結。苦入心小腸。甘入脾胃。平辛走肝。膽兼入肺與大腸。其主風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺者。諸風掉眩。皆屬肝木。風藥先入肝。肝開竅於目。風為陽邪。勢必走上。血虛則熱。熱則生風。風火相搏。故也。腰痛去來。陶陶者。乃血虛氣滯之候。苦以泄滯結。甘以益血脈。辛平以散虛熱也。其餘胸中煩熱者。心主血。虛則病煩。陰虛則熱。收於內。故熱在胸中。血益則陰生。陰生則煩止。苦辛能泄熱。故煩熱並解。安腸胃。利五臟。調四肢。利血氣者。即除熱祛風。益血入心入脾入肝之驗也。久服輕身耐老延年者。物久則力專。力專則氣化。化則變常。其釀酒延齡和藥變白。皆服餌專氣之功。故亦為仙經所錄矣。【明】李士材本草圖解論甘菊曰。甘菊花味甘。

性平。入肺腎兩經。清頭目風熱。定風虛眩。利血脈。安腸胃。悅皮膚。止痛。翳膜速晴。冷淚流溢。珍為要品。鍾會贊菊有五美云。圓花高懸。準天極也。純黃不雜。合土色也。早植晚發。君子德也。冒霜吐英。象貞質也。味和體輕。神仙食也。甘者功用弘多。苦者但可理。白者入氣。赤者行血。神而明之。存乎其人耳。忌火。去蒂。漿過曬乾。乘燥入磨。【清】黃宮繡本草求真論甘菊曰。甘菊生於春。長於夏。秀於秋。得天地之清芳。稟金精之正氣。其味辛。故能祛風而明目。其味甘。故能保肺以滋水。其味苦。故能解熱以除燥。凡風熱內熾。而致眼目失養。翳膜遮睛。與頭眩暈。風浮溼痺等症。服此甘和輕劑。以平木制火。養肺滋腎。俾木平則風熄。火除則熱除。而病無不愈矣。是以除目翳膜。有同枸杞相對蜜丸。久服永無目疾。以單瓣味甘者入藥。黃入陰分。白入陽分。紫入血分。【清】徐澗溪本草經百種錄論甘菊曰。凡芳香之物。皆治頭目肌表之疾。但香則無不辛燥者。惟菊花不甚燥烈。故於

頭目風火之疾尤相宜焉。【清】黃元御玉楸藥解論甘菊曰。甘菊花清利頭目。治疼痛眩暈之證。庸工凡治頭目無不用之。今古相承。不見其效。不知頭目眩暈。由溼盛上逆。濁氣充塞。相火失根。升浮旋轉而成。愚妄以為頭風。而用發散之藥。此千試不靈之方也。【清】王士雄隨息居飲食譜論甘菊曰。甜菊花甘涼。清利頭目。養血息風。消疔腫。點茶蒸露。醱酒皆佳。苦者勿用。餘如野薔薇。金銀花功用略同。可類推也。【清】夏九如辨藥指南論甘菊曰。甘菊得秋氣之深。應候而開。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕。味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治溫以清。凡病熱退。其氣尚溫。以此同桑皮理頭痛。除餘邪。佐黃芪治眼昏。去翳障。助沙參療腸紅。止下血。領石斛扁豆。明目聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暈。鼻塞熱壅。肌膚溼痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆歸肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又治暴赤眼腫。目

十二畫 菊

痛淚出。是以清肺熱須用黃甘菊。古來未悉此義。予姑訂之。以俟同志辨正。

國外學說 古方藥品考曰。菊有數百種。唯稱甘菊者堪入藥。其花黃色。長瓣味微苦者。宜自製。市中販者多偽品。須選用。又陳久者亦不堪用。更有野菊一名苦。花亦作黃色。惟瓣短小。且味苦。氣香。此與甘菊功用不同。甘菊冬日生苗。葉如艾葉。色綠。夏秋漸高二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。採之曬乾。又用藥須知曰。菊花有白。紅。黃三種。俱入藥。而以色黃味甘者為上。若辣者不用。一種干瓣小朵。味甚甘。尤稱佳品。蓋珠子菊之類也。單瓣味苦者。乃野菊之屬。厥名苦。實雜菊也。更有冒菊之名。而實非菊者。或則以野菊充菊花。此皆市販貪得以欺人也。又本草辨疑曰。菊有數種。藥舖所出售者。形雖極似。實是野菊。味苦不堪入藥。山中自出之菊。小而味甘者。真有黃。白二種。俱可用。又本草綱目。啓蒙曰。菊花種類極多。大率可分為二。一入藥用者。一供賞玩者。

藥用之菊。祇甘菊一種。本草所說。蓋專指此。甘菊不論黃白。味甘者皆可用。但現今所種者。均係黃色。九月開花。大寸許。或寸半。瓣如常。菊作細筒子。其末五出。瓣多重心。變為闊瓣。則黃色略淡。中有小心。此種花與葉均無苦味。故可作藥料。今藥肆所賣。乃臬州仙臺出產之尋常黃菊。味苦。入藥非宜。至供賞玩之菊。則有春夏秋冬之分。皆以花開時為名。冬菊。即寒菊。漏虛條內。有單葉寒菊之名。秋後花葉澆酒。再一經霜。則盡變紅紫色。鮮豔奪目。餘詳見范成大。劉蒙泉。史正志等之菊譜。及花史。佐編。羣芳譜。祕傳花鏡。及日本之菊經。又從前日本醫家。每製為菊酒。或菊油。用之。菊酒。昔人謂有養脾胃之效。製法有數種。茲記其一。法以乾菊花四兩。熱地黃二兩。人參末一錢。冰精屑四兩。入燒酒一斤中。密封瓶口。經七十日。漉去渣。即成菊油。出日本之薩摩。遐邇馳名。製造此油。乃不用家菊。而用野菊。立冬前後。入山採摘野菊。曬乾。用水蒸氣。蒸留之。使成揮發油。質透映。帶綠

色。為有野菊香之液體。味微苦。比重約〇・九三三。酒精。伊打等。不拘多少。能溶解之。有衝動。鎮痙之效。世稱薩摩菊油。醫治功用極多。頭痛。塗擦頭部。仍服用。眩暈。塗擦頭部及胸膛。仍服用。齒痛。塗布頰部痛處。腹痛。下瀉。塗擦腹部。仍服用。眼病。和水傳之。金瘡。湯火傷。整傷等。各塗擦傷口。淋痛。尿道閉塞。塗布尿道孔。仍服用。陰虱。塗毛上。虱盡死。用蠶內服。大人每次三滴。至五滴。入開水中。攪和服。又一本堂藥選菊花。有辨論藥用甘菊之謬曰。菊花之味本苦。神農本草已言之。自名醫別錄出。始曰味甘。陶弘景且以甘者為真。菊苦者為苦。按菊之專尚甘者。乃道家勸誘之故技。以其帶甘。易餌。故爾。方士炫人。醫家亦為所惑。遂有輕身。耐老。延年。好顏色。服之成仙。疑白變黑。齒落再生等語。放誕不經。殊為可笑。醫人又主張甘補脾胃。苦寒瀉泄之說。皆以甘者為良。其誤益甚。殊不知菊花之苦。此其本味。其帶甘者。乃肥養之所。非天性也。豈入藥用哉。

一三五〇

辨偽 鄭肯巖曰。黃菊即黃色之茶菊。較家菊朵小。心多。而色紫。杭州錢塘所屬各鄉。多種菊為業。九十月取花。挑入城市。以售。有高脚黃等名色。味苦微甘。性平。而香。去風除熱。明目疎肝。能清眩暈。頭風。其浙省城頭一帶。所產名城頭菊。皆野生。絨上石縫中。至秋開花。花小如茶菊。香氣沁脾。點茶更佳。聞有以本地園中所種之陶愛。一名滿天星。偽充。形雖似。而性不同。且少香味。又安能療病乎。曹炳章曰。按菊花種類甚雜。惟黃菊。產杭州海寧等處。味苦。兼甜。香氣甚雅。有蒸曬二種。蒸菊。將鮮菊入蒸籠內。先蒸。再曬。烘燥至燥。其色老黃。收斂。柔瓣不散。曬菊。以鮮花烈日曬乾。其色嫩黃。柔瓣花。瓣易散。皆道地。城頭菊。野生。城牆陰處。色黃。朵較少。浙名野菊花。亦蒸曬為善。味苦。性涼。香氣亦佳。以散風清火。解毒消腫。凡生危險。疔毒。用野菊搗汁。一大碗飲之。可免毒氣攻心。以燥花作枕。永免頭風。疔毒。其他如滁菊。白菊。真贗關係。較黃菊猶重。自滁菊出。安徽滁州

者。其採法先剪枝連花帶葉倒掛
下。陰乾後。再摘花。故氣味更足。
其花瓣細軟。干層花蕊小嫩黃色。
花蒂綠尖小而平。氣芬芳。味先微
苦後微甘。口含後香氣甚久不散。
為最佳。出浙江德清縣者。花瓣闊
而糙。蕊心微黃。蒂大柄臍凹陷。氣
味香不濃。為略次。白菊河南出者
為菊菊。蒂綠干瓣細軟無心。蕊氣
清香。味苦微甘為最佳。蘇州濟暨
關出。為杜菊。色白味甘。又出單瓣
亦佳。海寧出者。名白茶菊。色白瓣
粗。心蕊黃。味甜。多茶葉店買。亦佳。
江西南昌府出名。淮菊。朵小色白
帶紅。味苦。氣濁。梗多。亦次。廈門出
者曰洋菊。朵大而扁。心亦大。氣濁
味甘。更次。

近人學說 張山雷曰。菊在古
時。似止有黃華一種。而近則園林
之蒔。千紅萬紫。色相最多。可謂
百卉中絕無僅有之奇品。蓋自經
騷人韻士。矜賞孤芳。而扞接之法
最多。遂覺變化離奇。不可方物。其
實則花色雖殊。而氣味性情亦尚
無甚大別。(吾嘉戰菊。自明季以
來。頗有研究。流風遺韻。至今猶存。

十二畫 菊

其以極大花朵。養之極老。經冬不
凋。聽其自乾。明年即以此枯花播
種。亦舊新芽。是為子種。兩三年後
方能着花。則形色必與老花不同。
以此知菊之花色最多。殆古人即
以此法造成也。(惟正名定分。仍
當屬之黃華。而近今藥物恒用之
品。則以杭產之黃色小花為正。而
杭產色白之小花。其氣醇靜。味最
甘緩。清香幽韻。尤為過之。若白色
大花之產於古者。氣味殊覺辛
烈。則功力亦未免不純。是在用之
者。量能器使。必不可作一例觀也。
此外更有野菊一種。花尤小而氣
尤烈。味尤苦。葉瘦而老。僅可作瘡
科敷藥。自檜以下。殊不足道。雖亦
是晚節之附庸。然韓學夫人。終不
脫小家伎倆者也。又曰。菊之花色
最多。種以百計。然古稱鞠有黃華。
則黃者其正色也。今之雜色奇花。
蓋皆後人扞接所變化。入藥亦有
數種。黃者味甘。白者味苦。惟滁菊
花白。茶菊味甘。而清芬撲鼻。沁人
心脾。尤為上品。其他雜色。味俱苦
烈。不入藥用。野菊尤苦。古名苦蕒。
祇可裝入枕囊。功能清腦明目。經

久則佳。黃甘菊。白茶菊。滁菊三種。
以滁菊為尤良。凡清芬之藥。氣輕
而升。多能治頭目之疾。但香氣勝
者。無不幸燥。惟菊花。稟秋金剛降
之氣。清芬不濁。絕無燥烈之弊。故
治頭目。疏風清泄。抑降肝膽木火
炎上之病。尤為馴良。

配合應用 ① 甘菊花為祛風
要藥。風木通肝。肝開竅於目。故為
明目之主。同地黃。黃蘗。枸杞子。白
蒺藜。五味子。山茱萸。當歸。羚羊角。
羊肝。治肝腎俱虛。目痛。加決明子。
木賊草。穀精草。柴胡。可以去外翳。

② 治風熱目痛。菊花。黃連。玄參。
甘草。生地。黃荊。芥穗。決明子。連翹。
桔梗。柴胡。川芎。羌活。童便。
③ 治血虛頭痛。菊花。川芎。細辛。
藜蘆。當歸。生地。熱地。黃。天麥門冬。白
芍藥。甘草。童便。亦主頭眩。因痰
結而作者。無痰藥不效。
④ 與枸杞子相對蜜丸。久服則
終身無目疾。兼不中風及生疔疽。
⑤ 治疔瘡。菊花。遠根。生用。紫花
地丁。益母草。金銀花。半枝蓮。貝母。
連翹。生地。黃。桔樓根。白芷。白及。蒼
耳子。夏枯草。甚者以蟾酥丸發汗。

大便閉者。汗後以玉樞丹下之。如
無玉樞丹。以大戟加薑休。桑肉丸
服三錢必下矣。忌甘草。犯之則死。
為有大戟故也。

⑥ 服食甘菊。王子喬變白增年
方。用甘菊。三月上寅日採苗。名曰
玉英。六月上寅日採葉。名曰容成。
九月上寅日採花。名曰金精。十二
月上寅日採根。名曰長生。四物
並陰乾。五日。取等分。以成日合搗
杵為末。每酒服一錢匕。或以蜜丸
梧子大。酒服七丸。一日三服。百日
輕酒。一年髮白變黑。服之二年。齒
落再生。五年八十歲老翁變為兒
童也。孟詵云。正月採葉。五月五日
採莖。九月九日採花。(玉函方)

⑦ 服食白菊。引九月九日白菊
花二斤。茯苓一斤。並搗羅為末。每
服二錢。溫酒調下。日三服。或以凍
過松脂和丸。雞子大。每服一丸。主
頭眩。久服令人好顏色。不老。(太
清寶方)

一三五

七壯。并服此酒及散永。其法春末夏初。收白菊。曬苗陰乾。搗末。空腹取一方寸匕。和無灰酒服之。日再服。漸加三方寸匕。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月。合花收。曝乾。初取三大斤。以生絹袋盛。貯三大斗酒中。經七日。服之日。三次。常令酒氣相續為佳。〔圖經方〕

①治風熱頭痛。菊花白朮。川芎各三錢。為末。每服一錢半。茶調下。〔簡便方〕

②治膝風疼痛。菊花。陳艾葉。作護膝。久則自除也。〔吳曼扶壽方〕

③治癩瘡入目生翳障。用白菊花。穀精草。綠豆皮等。分為末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮。候泔盡。食柿。日食三枚。淺者五七日。遠者半月見效。〔仁齋直指方〕

④治病後生翳。白菊花。蟬脫等。分為散。每用二三錢。入蜜少許。水煎服。大人小兒皆宜。屢驗。〔急救方〕

⑤治疔腫垂死。菊花一握。搗汁一升。入口即活。此神驗方也。冬月採根。〔肘後方〕

⑥治女人陰腫。甘菊苗。搗爛煎湯。先熏後洗。〔危氏得效方〕

⑦治酒醉不醒。九月九日。真菊花。為末。飲服方寸匕。〔外臺秘要方〕

⑧治眼目昏花。雙美丸。用甘菊花一斤。紅椒去目。六兩。為末。用新地黃汁和丸。梧子大。每服五十丸。臨臥茶清下。〔瑞竹堂方〕

用鹽 錢半至三錢。 施用宜忌 忌火。朮及枸杞根。 桑根白皮為之使。

參攷資料 ①菊苗可蔬。葉可啜。花可餌。根實可藥。藁之可枕。醱之可飲。自本至末。罔不有功。宜乎前賢比之君子。神農列之上品。隱士探入酒罈。騷人發其落英。費長房言。九日飲菊酒。可以辟不祥。神仙傳言。康風子朱孺子。皆以服菊花成仙。荊州記言。湖廣久病風。羸飲菊潭水。多壽。菊之貴重如此。是豈葦芳可伍哉。西京雜記言。採菊花莖葉。雜秫米。釀酒。至次年九月。始熟用之。〔李時珍〕 ②菊有兩種。一種莖紫氣香而味甘。葉可作羹。食者為真菊。一種青莖而大。作蒿

艾氣。味苦不堪食者。名苦菊。非真菊也。葉正相似。惟以甘苦別之。南陽縣最多。今近道處處有之。取種便得。又有白菊。莖葉都相似。惟花自五月取之。仙經以菊為妙用。但難多得。宜常服之。〔陶弘景〕 ③菊之品凡百種。宿根自生莖葉。花色品不同。宋人劉蒙泉。范至能。史正志。皆有菊譜。亦不能盡收也。其莖有株莖紫赤青綠之殊。其葉有大小厚薄尖禿之異。其花有千葉單葉。有心無心。有子無子。黃白紅紫間色。深淺大小之別。其味有甘苦辛之辨。又有夏菊。秋菊。冬菊之別。大抵惟以單葉者。味甘入藥。菊譜所載。甘菊。鄧州黃。鄧州白者。是矣。甘菊始生於山野。今則人皆栽植之。其花細碎。品不甚高。蕊如蜂窠者。中有細子。亦可採種。嫩葉及花皆可採食。白菊花稍大。味不甚甘。亦秋月採之。菊之無子者。謂之牡菊。燒灰。撒地中。能死。謂之說。固出自周禮也。〔李時珍〕 ④本經言菊花味苦。別錄言菊花味甘。諸家以甘者為菊。苦者為苦菊。惟取甘者入藥。謹按。張華博物志言。菊

有兩種。苗花如一。惟味小異。苦者不中食。范至能譜序言。惟甘菊一種可食。仍入藥餌。其餘黃白二花。皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風。則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊。名苦者。爾。故景煥牧豎閑談云。真菊延齡。野菊灌人。正如黃精。益壽。鈞陶殺人之意。〔李時珍〕 ⑤菊葉。濕風。祛熱。與花略同。而苦降有餘。清芬不及。肝膽火旺者。可入煎劑。泄降內蘊之風火。力量尤勝於花。輕用一錢。重用亦可至二三錢。不拘何種菊葉。功用大略相似。而滁州白菊之葉尤良。惟野菊葉其苦尤甚。則止可搗敷熱毒癰腫。丁瘡。不入煎劑。〔張山雷〕

【菊花酒】 製造 用菊花煎汁。同麴米。釀酒飲。或加地黃。當歸。枸杞諸藥。亦佳。 主治 頭風。明目。去瘰癧。消百病。

【菊花參】 命名 因其葉似菊。花故名。 產地 雲南東川府巧家。汎江

雲南東川府巧家汎江

邊。

主治 功同人參。力較遜。

【菊花露】即甘菊花露之屬。方用名。詳「甘菊花露」條。

【菊婢子】即鳳仙子之古籍別名。詳「鳳仙子」條。

【茵芝】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【菖蒲】 命名 本品乃蒲類之水劍草者。因葉形也。

處方用名 石菖蒲。鮮菖蒲。乾菖蒲。九節菖蒲。百蒲根。

古別名 昌陽（別錄）菖韭。

（吳普）水劍草。（隱名）荃。白菖。昌本。昌羊。宅。泥。清。莖。落。紫。耳。溪。孫。菖。石。上。草。松。衣。介。望。見。消。陽。春。雪。南。菖。菖。綠。劍。真人（和漢藥考）


外國名詞 Calamus

基本 屬天南星科之宿根草木。為 *Acorus calamus* 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。菖蒲以產四川者為最。節密身結而清香。又廣東產者。清遠。三坑。石潭等處多。出。近水者名水菖蒲。大條。身鬆浮。節疎。味香帶悶。近山上

出者。名石菖蒲。質結節密細條。氣味清香。與川菖蒲不差上下。西藥名劍草。又有一種名外菖蒲者。即九節小菖蒲。味略辛而不甚香。嚼之有辛辣味。產陝西漢中河南禹州。

形態 石菖蒲。屬天南星科。入藥用地下莖。為多年生草本。自生於溪澗之濱。葉為劍狀。雖有並行脈。無中肋線。長約尺許。至夏。葉間抽出花梗。開綠褐色細花。排列而為圓柱狀之肉穗花序。後結綠果。往往益種。用作玩品。以變種矮小者為貴。其根莖匍匐。似蜈蚣背者。入藥用。從前以一寸九節者為良品。又水菖蒲。溪孫。乃生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。



菖蒲

種類 ①石菖蒲乃生水石之間。葉有劍形。瘦根。密節。高尺餘者。②泥菖蒲。白菖乃生於池澤。葉肥。根高二三尺者。③水菖蒲。溪孫乃

生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。種類 恒用瓦石器以砂土移栽於盆中。至春剪洗。愈剪愈細。高四五寸。葉如韭。根如匙柄粗者。甚則根長二三寸。葉長寸許。謂之錢蒲。亦堪服食入藥。

採取 五月十二月採取陰乾。用鮮者。隨時採。

製法 雷斅曰。凡使菖蒲。勿用泥。夏菖二件如竹根。鞭形。黑氣穢味腥。惟石上生者。根條嫩黃。緊硬節稠。一寸九節者是。真也。採得。以銅刀刮去黃黑硬節皮。一重。以嫩藥枝條相拌。蒸熟。曬乾。刮用。

性質 辛溫無毒。

成分 西洋產菖蒲之根中。除含多量之澱粉外。尚有揮發油。樹脂。及一種苦味之亞哥寧（Acorin）。

（三）日本產菖蒲。含有揮發油。澱粉。苛烈芳香性之樹脂。極微之鞣酸。鐵性物質。亞哥寧。及一種亞爾加羅伊特。即加拉明（Calamin）。

惟石菖蒲之成分。尚未詳悉。

效能 辟穢。開竅。宣氣。逐痰。又治神經衰弱之消化不良症。

作用 入胃即能刺激胃神經。

使其分泌增加。消化力加大。且一部由腸壁吸入血中。微有興奮精神之能。

主治 風寒溼痺。咳逆上氣。開心孔。稍五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾。癱瘓。濕腸胃。止小便利。久服輕身。不忘。不迷惑。延年。益心智。高志。不老（本經）四肢溼痺。不得屈伸。小兒濕癩。身積熱不解。可作浴湯（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論菖蒲曰。治耳鳴。頭風。淚下。鬼氣。殺諸蟲。惡疥。疥癩等。【宋】大明日華諸家本草論菖蒲曰。除風下氣。丈夫水腫。女人血海冷敗。多忘。除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。及耳痛者。作末炒。乘熱。髮甚。驗。

【元】王好古湯液本草論菖蒲曰。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論菖蒲曰。治中惡。卒死。客忤。癰疽。下血崩中。安胎。瀉。散。癰。腫。搗汁。服。解巴豆。大戟毒。【明】釋希雅本草經疏論菖蒲曰。菖蒲味苦辛。其氣大溫。陽精芳草。故無毒。陽氣開發。外充百骸。辛能四達。以散邪結。此通利心脾二經之要藥也。蓋苦可

一二五三

燥溼。溫能辟寒。辛可散結。風寒溼三者合而成痺。去此三邪。痺自愈矣。陽氣開發。芬芳輕揚。氣重於味。辛象橫走。故能下氣開心。咳逆者氣逆之候也。下氣則咳逆上氣可去。五臟之壅遏既微。則九竅應之而通。故聰明耳目。出音聲。主耳聾。辛以散之。故治癰瘡。氣味辛溫。氣厚發熱。故溫腸胃。膀胱虛寒。則小便不禁。腸胃既溫。則膀胱與焉。故止小便。脾主四肢。脾溼既祛。則四肢溼痺之得屈伸自利。山嵐瘴氣。最能使小兒發瘧。寒溼之甚。莫過山嵐。既散其邪。則病本已拔。瘧焉得而不已焉。作浴湯。及久服輕身者。除溼之驗也。不迷惑。益心智高。志者心竅開利也。其曰補五臟延年者。單指巖棲修煉之士。辟穀服餌之用。以其助發陽氣。辟除陰風。彙可參合養性諸藥。如黃精。青黏。地黃。天門冬之屬。實其宜導。臻乎太和。故亦為仙經要藥。至於世俗之人。五慾熾然。六淫迭至。詎可窮年卒歲。久餌偏燥之物乎。【明】李士材本草圖解論苜蒲曰。苜蒲辛溫。心肝藥也。開心竅。消伏梁。除痰

嗽。通九竅。明耳目。出音聲。散風溼。止心痛。殺諸蟲。辟鬼邪。理惡瘡。按仙經歷稱苜蒲為水草之精英。神仙之靈藥。然石硫水。生莖細節密。不沾土者。方為上種。銅刀刮去粗皮。米泔浸之。飯上蒸之。藉穀氣而臻於中和。真有殊常之效。【清】黃宮繡本草求真論苜蒲曰。石苜蒲辛苦而溫。香芳而散。諸書尙論未透。惟張發發揮本經最明。指此實為心氣不足要劑。其言能補五臟。以心為君主。五臟係焉。首言治寒溼痺。是取其辛溫開發脚氣之力。治咳逆上氣者。痰溼壅滯之喘咳。故宜搜痰。若肺胃虛燥之喘咳。非苜蒲可治也。其開心孔。利九竅。明耳目。出音聲。總取辛溫利竅之力。心孔開。九竅利。則癰瘡之毒可解。腸胃喜溫惡寒。腸胃既溫。則膀胱之虛寒。小便不禁。自止。久服輕身者。除溼之驗也。不忘不惑。延年益智。高壽不老。皆補五臟。通九竅氣之力也。其釋本經如此。又言能主肝虛心腹痛。霍亂轉筋。消伏梁。癰。喜通心脾痰溼。可知千金治胎動不安。半產漏下。或搶心下血。及

產後崩中不止。並以苜蒲一味煎服。皆取辛能開竅。血氣安養之意。觀此苜蒲實為宜氣通竅之劑。故在楊士瀛亦謂噤口下痢。可用石苜蒲。加於參苓白朮散內。以開其胸。則其義亦著。但陽亢陰虛。驚寐失合者。禁用。以其能動心胞之火耳。取一寸九節。紫花根瘦者佳。去皮微炒用。
國外學說 日本學說謂苜蒲之有效成分名曰「アコリン」之一種苦味質。及獨逸局方收載之一種揮發油。即苜蒲油是也。シロチーテルマン氏之說云。「アコリン」及苜蒲油之外。尙含有安息香酸澱粉。苜蒲根殊無殺菌其服用者。小兒亦然。對於弛緩性之消化不良。及胃加答兒。最有效驗。故用為清涼健胃藥。殊有驅風之效。用量以苜蒲根〇・五至二・〇（一回）為內用粉劑。或以之為浸劑。二分與十分之比例。又酒精製或精藏苜蒲根。亦為消化藥。苜蒲丁幾一回十五滴至五〇。英美學說謂水苜蒲又名白苜。產中國。印度。歐羅巴及北亞美利

加等處。該草每滋生水溼之處。其根本可藥。其根頭大約五分。長約數尺。形狀似分數截。而實則相連。由根頭發生直立之葉。該葉闊約八分。長約二三尺。英國昔時亦以此草之根作藥品。近已廢棄。而不用。水苜蒲頗為通行之藥。恒以別藥相合而作補劑。其功用能補胃。開胃暖胃。止肚疼。治氣喘。兼治飯不消化。作存酒等服之。用量每服一分半至三分。研末服之。
近人學說 張山雷曰。本經之苜蒲。即今之石苜蒲根也。御覽引經有生石上及一寸九節云云。是其明證。且本經上品別有香蒲。云生池澤。是石苜蒲與池沼之香蒲。載然不同。則吾吳土語。亦名池沼中之香蒲為苜蒲者。非是。苜蒲芳香清冽。以氣用事。故能振動清陽。而辟除四時穢濁不正之氣。但香蒲者之氣味情性。殊與苜蒲相近。故本經必以生石上及一寸九節別之。味辛氣溫。故主風寒溼邪之痺著。治咳逆上氣者。以寒飲溼痰之壅塞。隔上。氣密不通者。胃之辛能開泄。溫勝溼寒。凡停痰積飲。溼

濁蒙蔽。胸痺氣滯。舌苔白膩垢穢。或黃厚者。非此芬芳利竅。不能疏通。非肺胃燥咳。及腎虛之咳。逆上氣可比。開心孔。補五臟者。亦以痰濁壅塞而音。蕩滌邪穢。則九竅通靈。而臟氣自得其補益。非溫燥之物。能補五臟真陰也。而俗人謬謂菖蒲能開心竅。及反以導引痰涎。直入心包。比之閭門迎賊者。過矣。且清芬之氣。能助人振刷精神。故使耳目聰明。九竅通利。凡寒飲閉塞。肺氣不宣。則令人音瘖。菖蒲能逐飲宣竅。而聲自開。以視虛勞金破之不鳴。顯然有別。圭耳聾以下十二字。其義殊與上文不類。大觀本不在白之例。恐是後人臆入。姑存而不論。其止小便利一說。蓋指清氣下陷。收攝無權之症。辛溫能升舉下陷之氣。或可治之。別錄主肢痺痺不得屈伸。則即本經之主風寒濕痺。復疊無別。殊是蛇足。溫酒亦時行之良氣。而兼有溼痰家。菖蒲滌痰辟穢。裨助正氣。故能治之。然病之虛實寒熱。各各不同。傷舉小兒。似嫌泛濫。且作浴湯外治。其效亦鈇。別錄此條。皆非精要。

十一畫 菖

大是可疑。或後人有所點竄。又曰。甄權治耳鳴。則溼痰蒙其清氣。而甲木少陽之氣。鬱而不伸者。即開通九竅之功效也。若肝腎陰虛。浮陽上擾之耳鳴。則非辛溫所宜矣。甄權又治頭風淚下。亦惟寒風外束者為宜。若肝陽自擾之頭風。又不可一例論治。甄氏又謂治鬼氣。瀕湖謂治中惡卒死。客忤。則皆陰霾不正之氣。固芳香辟穢之正治也。大明謂除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。皆指寒溼交互。汨沒真陽者。菖蒲乘芳冽之正氣。自能勝邪。而行氣定痛。後人鑿香正氣等方。以及臍疝等疫諸丸散。皆即此例。然菖蒲雖溫。辟惡可言。而溫中尚嫌不足。其直中三陰之大痛吐瀉。轉筋冷汗。脈伏色青等症。亦非此所能獨當大任。

配合應用 ①菖蒲同熟地黃。黃蘗作丸。治腎虛耳聾。若中年預服。可使老而聰聰。 ②菖蒲同二朮。木瓜。懸仁。石斛。葶藶。黃蘗。為除溼強步之要藥。兼治下部膿瘻溼瘡如神。 ③菖蒲佐人參。麥門冬。酸棗仁。茯神。遠志。生熟地黃。為補心之劑。如心氣鬱結者。加沈香。能益火以開心。

④菖蒲可辟蚤蟲。 ⑤功能聰耳明目。益智不忘。於甲子日取菖蒲一寸九節者。陰乾百日為末。每酒服方寸匕。日三服。 (千金方服食法) ⑥七月七日取菖蒲為末。酒服方寸匕。飲酒不醉。好事者服而驗之。久服聰明。 (千金方) ⑦治三十六風。有不治者。服之悉效。菖蒲薄切三斤。盛於絹袋。玄水一斛。即清酒也。懸浸之。密封百日。視之如菜綠色。以一斗熱黍米納其中。封十四日。取出日飲。 (夏禹神仙經方) ⑧治癩癩風疾。以九節菖蒲不開鷄犬聲者。去毛。水白搗末。以黑紙豬心一個批開。砂礮炙湯。調服三錢。日一服。 (醫學正傳方) ⑨凡尸厥之病。卒死脈猶動。聽其耳目中如微語聲。肢間煖者是也。醫死之病。臥忽不藉。勿以火照。但痛醫其腫。及足撐趾甲際。睡其面即甦。仍以菖蒲末吹鼻中。桂末納舌下。并以菖蒲汁灌之。 (肘後方) ⑩治卒中客忤。用菖蒲根搗汁。舍之立止。 (肘後方) ⑪除一切惡。用端午日切菖蒲。漬酒飲之。或加雄黃少許。 (洞天保生錄方) ⑫治喉痺腫痛。用菖蒲根嚼汁。燒鐵秤錘。滓酒一盃飲之。 (聖濟總錄方) ⑬治霍亂腹痛。生菖蒲剉四兩。和搗汁。分溫四服。 (聖惠方) ⑭治諸積蠱脹。如食積。氣積。血積之類。石菖蒲八兩。剉。斑蝥四兩。去翅足。同炒黃去蠶。以布袋盛。攪去蜜屑。為末。醋和丸。梧子大。每服三五丸。溫白湯下。治腫脹尤妙。或入香附二錢。 (奇效方) ⑮治肺損吐血。九節菖蒲末。白麵等分。每服三錢。新汲水下。日一服。 (聖濟總錄方) ⑯解一切毒。石菖蒲。白礬等分。為末。新汲水下。 (事林廣記方) ⑰治赤白帶下。石菖蒲。破故紙等分。炒為末。每服二錢。更以菖蒲浸酒調服。日一服。 (婦人良方)

十二畫 苳

①治胎動半產。卒動不安。或腰痛胎轉。搶心。下血不止。或日月未足。而欲產。並以苳蒲根搗一二升服之。(千金方)

②治產後崩中。下血不止。苳蒲一兩。酒二盞。煎取一盞。去滓。分三服。食前溫下。(千金方)

③治耳卒聾閉。苳蒲根一寸。巴豆一粒。去心同搗。作七丸。綿裹一丸塞耳。日一換。一方不用巴豆用蓖麻仁。(肘後方)

④治病後耳聾。生苳蒲汁滴之。(聖惠方)

⑤治蚤虱入耳。苳蒲末炒熱。袋枕之。即愈。(聖濟總錄方)

⑥治諸般赤眼。攀睛雲翳。用苳蒲自然汁。文武火熬作膏。日點之。(聖濟總錄方)

⑦治眼險挑鉞。獨生苳蒲根。同鹽研敷。(醫城聖方)

⑧治癰疽發背。生苳蒲搗貼之。瘡乾者。爲末水調塗之。(孫用和秘寶方)

⑨治熱毒淫疥。有人遺體生瘡。痛而不痒。手足尤甚。黏着衣被。曉夕不得睡。有人教以苳蒲三斗。日

乾爲末。撒布席上臥之。仍以衣被覆之。既不黏衣。又復得睡。不五七日。其瘡如失。後以治人。應手如驗。(衍義本草方)

⑩治風癩有蟲。苳蒲末五斤。酒浸釜中。蒸之使味出。先經酒一日。每服一升。或半升。(千金方)

⑪治陰汗溼痒。石苳蒲。蛇床子等分爲末。日搽二三次。(濟急仙方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡陰血不足。精滑汗多者。禁用。惡麻黃地膽。忌羊肉。餒糖。勿犯鐵器。犯之令人吐逆。秦皮。秦朮爲之使。

香名方劑 ①枕中方。治好忘。(千金)苳蒲。龜甲。遠志。(去心)龍骨等分。上四味。治下飾。酒服方寸匕。日三常服。令人大聰。②鎮心會睡益智方。(千金翼)苳蒲。益智子各八兩。遠志(去心)五十兩。三味爲末。以淳糯米酒服方寸匕。百日有效。秘不令人知。
參攷資料 ①苳蒲世又謂之蘭蕙。生水次。失水則枯。根節密者。氣味足。石苳蒲根。格石而生者。節

一三五六

乃密。入藥須用此等。(慈宗爽)②古方有單服苳蒲法。蜀人治心腹冷氣。搗苳蒲者。取一二寸。槌碎同吳茱萸煎湯飲之。亦將隨行卒患心痛。嚼一二寸。熱湯或酒送下亦效。(蘇頌)③苳蒲氣溫味辛。乃手少陰足厥陰之藥。心氣不足者。用之。虛則補其母也。肝苦急。以辛補之。是矣。道藏經有苳蒲傳一卷。其語粗陋。今略節其要云。苳蒲者。水草之精英。神仙之續藥也。其法採緊小似魚鱗者一斤。以水及米泔浸各一宿。刮去皮。切曝乾。搗篩以糯米粥和勻。更入熟蜜搜和丸。如梧子大。稀葛袋盛置。當風處令乾。每日酒飲任下三十丸。隨臥更服三十丸。服至一月。消食。二月痰除。服至五年。骨體充。顏色澤。白髮黑。落齒更生。其藥以五德配五行。葉青。花赤。節白。心黃。根黑。能治一切諸風。手足頑痺。癢緩不遂。五勞七傷。填血補腦。堅骨髓。長精神。潤五臟。神六腑。開胃口。和血脈。益口齒。明目。澤皮膚。去寒熱。除三尸九蟲。天行時疾。瘴疫瘦病。瀉痢痔漏。婦人帶下。產後血暈。並以酒服河內

葉。敬母中風。服之一年而百病愈。寇天師服之得道。至今廟前猶生苳蒲。鄭魚曾原等。皆以服此得道也。又按葛洪抱朴子云。韓衆服苳蒲十三年。身上生毛。冬不寒。日記萬言。商丘子不娶。惟食苳蒲根。不饑不老。不知所終。神仙傳云。咸陽王典。食苳蒲得長生。安期生採一寸九節苳蒲。服仙去。又按羅仙神隱書云。石苳蒲。置一盆於几上。夜間觀書。則收烟無害目之患。或置星露之下。至旦取葉尖露水洗目。大能明視。久則白晝見星。端午日以酒酒尤妙。蘇東坡云。凡草生石上。必須微土以附其根。惟石苳蒲。濯去泥土。漬以清水。置盆中。可數十年不枯。節葉堅瘦。根鬚連絡。蒼然於几案間。久更可喜。其延年終身之力。既非昌陽可比。至於忍寒淡泊。不待泥土而生。又豈昌陽所能彷彿哉。(李時珍)④下痢禁口。雖是脾虛。亦熱氣閉。隔心胸所致。俗用木香失之。溫用山藥失之。閉。惟參苓白朮散。加石苳蒲。粳米飲。調下。或用參苓石蓮肉少入。苳蒲服。胸次一開。自然思食。(楊士

蕒) 石菖蒲舒心氣暢心神。怡心。益心志。妙藥也。而世俗有散心之說。不知創自何人。審是則文王嗜此。何以多男而壽考耶。故清解藥用之。賴以祛痰穢之濁而衛宮城。滋養藥用之。藉以宣心思之結而通神明。(王秉衡) 菖蒲主耳聾。瘴瘴溫胃。止小便利。十二字。瀨湖綱目以爲出於本經。而問經堂輯本無之。徐澗溪本經百種亦不錄。御覽引本經。有生石上一寸九節者。久服輕身。云云。大觀本則無生石上三字。有一寸九節者。良六字。作黑字。則大觀本以此六字爲出於名醫別錄者也。昌今本作考。左氏傳享有昌歎。杜注。昌歎。昌蒲也。周禮。醴人。朝事之豆。其實有昌本。鄭注。昌本。昌蒲根。切之。四寸爲菹。說文。菹。菖蒲也。廣雅。耶。昌陽。菖蒲也。呂氏春秋。冬至後五旬七日。昌始生。淮南說山訓。昌羊。去蚤蠱而來。蛤窮。字皆作昌。則從草之菖。學生後矣。(張山雷) 上洛郡。對梁州。嚴道縣。在蜀郡。今乃處。處有生。石積上。概節爲好。在下澤地。大根者。名昌陽。不堪服食。真

十二畫 菖

菘 菜

菖蒲葉有脊。一如劍刃。四月五月亦作小燈花也。東開溪澤。又有名溪菘者。根形氣色極似石上菖蒲。而葉正如蒲。無脊。俗人多呼此爲石上菖蒲者。謬矣。此止主咳逆斷蚤虱。不入服食用。詩詠多云。蘭蓀芷謂此也。(陶弘景) 菖蒲處處有之。而池州戎州者佳。春生青葉。長一二尺許。其葉中心有脊。狀如劍。無花實。今以五月五日收之。其根盤屈有節。狀如馬鞭。大。一根旁引三四根。旁根節尤密。亦有一寸十二節者。探之初虛。輒曬乾。方堅實。折之。中心色微赤。嚼之。辛香少。淳。人多植於乾燥沙石土中。臘月移之。尤易活。黔蜀蠻人。常將隨行。以治卒患心痛。其生蠻谷中者。尤佳。人家移種者。亦堪用。但乾後辛香堅實。不及蠻人持來者。此皆醫方所用石菖蒲也。又有水菖蒲。生溪澗水澤中。不堪入藥。今藥肆所貨。多以二種相雜。尤難辨也。(蘇頌) 菖蒲今陽溪山中。生水石間者。其葉逆水而生。根鬚絡石。略無少泥土。根葉極緊細。一寸不啻九節。入藥極佳。兩浙人家。以瓦石

器種之。日暮易水則茂。水濁及有泥滓。則萎。近方多用石菖蒲。必此類也。其池澤所生。肥大節疏。粗慢。恐不可入藥。唯可作果盤。氣味不烈。而和淡爾。(馬志) 菖蒲新舊相代。四時常青。羅浮山記。言山中菖蒲。一寸二十節。抱朴子言。服食以一寸九節。紫花者尤善。蘇頌言。無花實。然今菖蒲。二三月間。抽莖開細黃花。成穗。而昔人言菖蒲。難得見花。非謂無花也。應劭風俗通云。菖蒲。放花。人得食之。長年是矣。(李時珍) 石菖根多節者。良。一寸九節者。名石上菖蒲。今單稱曰菖蒲。卽石上菖蒲也。名白菖者。乃端陽菖蒲也。(手板發蒙) 石菖多栽水盆。常灌水。則能繁茂。眼病人。見其蒼色。爲快。春抽莖。開細黃花。成穗。凡石菖。菖蒲之類。葉有劍脊。氣甚芳香。白菖。燕之花之類。葉無劍脊。輒而韌。色亦較淡。無香氣。謂之錢蒲。又一種。髹石菖。一名高麗石菖。葉長一二寸。甚細小。爲貴品。(和漢三才圖會)

【菖蒲酒】 基本 本品係用菖蒲煎汁。和麴米釀。或浸成之酒。
 主治 三十六風。一十二痺。通血脈。治骨痿。久服耳目聰明。
 【菘】 卽白菜之原名。詳「白菜」條。
 【菘子】 卽白菜子之原名。詳「白菜子」條。
 【菘藍】 爲藍之一種。其葉色白。如菘。故名。卽大青之古籍別名。典見綱目。詳「大青」條。
 【菜瓜】 卽越瓜之古籍別名。典見綱目。詳「越瓜」條。
 【菜伯】 卽葱白之古籍別名。典見綱目。詳「葱白」條。
 【菜油】 卽菜子之油之古籍別名。典見綱目。詳「菜子」條。
 【菜芝】 卽蕪之古籍別名。典見別錄。詳「蕪」條。
 【菜花魚】 卽杜父魚之俗名。詳「杜父魚」條。
 【菜花銅】 基本 此乃天生黃赤銅。合爐甘石煉成。
 性實 味辛。
 主治 斂金瘡。傷口。強脾益肺。

十二畫 菜 菝

除一切風痺。

【菜藍】

產地 廣信多出。
形態 黑根有鬚。叢生。綠莖。嫩有疏節。葉似大葉柴胡。粗紋疏齒。可供藥用。



菜藍

主治 治跌打損傷。

【菝菝】

原名 菝菝。
命名 菝菝猶疑。疑結者。短也。本品莖莖堅強。但短而小。故名。江浙人遂謂之菝菝。

古籍別名 金剛根。王瓜草。(日華)鐵菱角。(綱目)拔殼。金剛刺。金剛骨。金剛抽。荆崗沙。老君鬚。鬚兒擔。(和漢藥考)焮結。(綱目)基本。屬百合科菝菝之地下莖。

產地 多在山野間。

形態 菝菝為山野自生之上昇莖草。莖莖細而堅。每節垂。有光澤。高自二三尺至六尺。有曲刺。葉互生。作卵圓形或橢圓形。惟托葉

一三五八

變為卷鬚。恒纏繞他物。夏季於葉腋發黃綠色六瓣小花。作繖形。雌雄異株。花後結紅色漿果。如豆大。其根為木質狀或粉狀之地下莖。有節塊。稍有鬚根。長六七寸。粗一二寸。外面褐色。內部淡紅色。稍有不快苦味。市上用以混充土茯苓。



菝菝

採取 二月八月間。採根曝乾。
製法 凡使以米泔浸。削去皮。

性質 甘。酸。平。溫。無毒。

成分 含有斯密拉辛。樹脂。色素。單寧。澱粉等。斯密拉辛。為白色無臭之結晶體。有苦味。稍溶於水。善溶於酒精。伊打等。逢強硫酸。初變紅色。次變紫色。終變黃色。

效能 止瀉。治痢。用作發汗劑。
主治 腰背疼痛。風痺。益血氣。止小便利。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論菝菝曰。治時疾。疽疔。【元】王好古湯液本草論菝菝曰。補肝經風虛。【明】李時珍本草綱目論菝菝曰。治消渴。月崩。下利。
配合應用 治小便滑數。金剛骨為末。每服三錢。溫酒下。睡時。(儒門事親方)

治沙石淋疾。重者取去根本。用菝菝二兩為末。每米飲服二錢。後以地椒煎湯浴腰腹。須臾即通也。(聖濟總錄方)

治消渴不止。拔殼即菝菝。吹咀半兩。水三盞。烏梅一個。煎一盞。溫服。(普濟方)

治下痢赤白。金剛根。蠟茶等分。為末。白梅肉。搗丸。芥子大。每服五七丸。小兒三丸。白荆甘草湯下。赤痢烏梅湯下。(衛生易簡方)

治風毒脚羽。痺滿上氣。田舍貧家。用此最良。用菝菝洗到一斛。以水三斛。煮取九斗。漬麩去滓。取一斛。漬飲如常。釀酒任意日飲之。(肘後方)

用量 三錢至四錢。
參攷資料 取根浸赤汁。煮粉食。辟瘴。(蘇頌) 今近道及江

浙州郡多有之。苗莖成莖。長二三尺。有刺。其葉如冬青。烏藥葉而差大。秋生黃花。結黑子。如櫻桃大。其根作塊。人呼金剛根。(蘇頌) 菝菝山野中甚多。其莖似莖而堅。強直生有刺。其葉圓大。狀如馬蹄。光澤似柿葉。不類冬青。秋開黃花。結紅子。其根甚硬。有硬鬚。如刺。其葉煎飲酸澆。野人採其根。葉入藥。家用名鐵菱角。吳普本草以菝菝為狗脊非矣。(李時珍) 歲時記曰。昔有道士。每年除夜。至閭里。各贈藥一劑。將此納入紅袋。浸置井中。元且自水中取出。和酒飲之。則不染瘴疫。名曰屠蘇酒。蓋即屠去邪氣而蘇之意。其藥用赤朮。桂心。各七錢半。防風一兩。菝菝。蜀椒。桔梗。大黃各五錢七分。烏頭二錢半。赤小豆十四枚。配合而成。

菝菝 即薄荷之古籍別名。典見揚雄甘泉賦。詳『薄荷』條。

菝菝 即菝菝之原名。詳『菝菝』條。

菝菝 即薄荷之原名。詳『薄荷』條。

菝菝 即薄荷之古籍別名。典見揚雄甘泉賦。詳『薄荷』條。

菝菝 即薄荷之古籍別名。典見揚雄甘泉賦。詳『薄荷』條。

和漢藥考詳『薄荷』條。

【菟丘】即菟絲子之古籍別名。與

見廣雅。詳『菟絲子』條。

【菟竹】即黃精之古籍別名。典見

別錄。詳『黃精』條。

【菟奚】即款冬花之古籍別名。與

見爾雅。詳『款冬花』條。

【菟絲子】命名 菟絲之根。其

形似兔故名。

處方用名 菟絲子。兔絲餅。

古籍別名 菟蘆(本經)菟縷。

菟藟(赤綱)(別錄)菟丘(廣雅)玉

女唐蒙(爾雅)火獸草野狐絲

(綱目)烏麻金菟。狐絲。老禿鷲。迎

陽子。雞火。閉。無根。廢。金線。廢。金線

草。金錢草。天碧草(和漢藥考)

外國名詞 Guscute japon-

ica, chois. var. thyrsoidea

Engelm. (拉丁) Dodder. (英)

基本 屬旋花科。為菟絲之子

實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

以遼陽。蓋平出產為多。山東。河南。

安徽。湖北均有產。冬季新。

形態 菟絲為山野自生之莖

草。春季於地上伸莖如絲。得他植

物而纏繞之。自絕其根。而由被纏
之植物吸取滋養料以生長。莖細
初白色。後呈黃白色。不含葉綠素。
莖之分枝。纏掛植物之梢。狀如掛
麵。葉細小作鱗狀。駭視之若無葉。
晚夏開花。大二三寸。帶赤白色。後
結實。大一分餘。熟則呈黑褐色。內
有種子二三粒。形似蘿蔔子。



(一) 子絲菟



(二) 子絲菟

採取 每年九月採實曬乾。

製法 雷斅曰。凡使勿用天碧

草子。真相似。只是味酸澆并黏也。

菟絲採得去殼。用苦酒浸一二日。

漉出。以黃精自然汁相對。浸一宿。

至明。用微火煎至乾。入臼中燒熱。

鐵杵杵去三千餘杵。成粉用之。李

時珍曰。凡用以溫水。淘去沙泥。酒

浸一宿。曝乾搗之。不盡者。再浸曝
搗。須臾悉細。又法酒浸四五日。蒸
曝四五次。研作餅。焙乾。再研末。或
云曝乾時入紙條數枚。同搗。即刻
成粉。且省力也。

性質 辛甘平。無毒。

效能 補肝腎。生精髓。用作強

壯收斂藥。

主治 續絕傷。補不足。益氣力。

肥健人(本經)養肌強陰。堅筋骨。

主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦

燥渴。寒血為積。久服明目。輕身延

年(別錄)

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論菟絲子曰。治男女虛冷。

添精益髓。去腰疼膝冷。治消渴熱

中。久服去面黧。悅顏色。【宋】大明

日華諸家本草論菟絲子曰。補五

勞七傷。治鬼交泄精。尿血。潤心肺。

【元】王好古湯液本草論菟絲子

曰。補肝臟風虛。【明】繆希雍本草

經疏論菟絲子曰。菟絲子本經言

其味辛平。別錄益之以甘者。正雷

公所謂稟中和。凝正陽之氣。而結

者也。其為無毒。明矣。五味之中。惟

辛通四氣。復兼四味。經曰。腎苦燥。

急食辛以潤之。菟絲子之屬是也。

與辛香燥熱之辛。適乎不同矣。學

者不以辭害義。可也。為補脾腎肝

三經要藥。主續絕傷。補不足。益氣

力。肥健者。三經俱實。則絕傷續而

不足補矣。脾統血。合肌肉。而主四

肢。足陽明太陰之氣盛。則力長。而

肥健。補脾故養肌。益肝腎故強陰。

堅筋骨。煖而能補腎中陽氣。故主

莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥

渴者。脾腎虛而生內熱。津液因之

不足也。二臟得補。則二病自愈。寒

血為積者。勞傷則血凝。陽氣乏絕

則內寒。血隨氣行。氣弱不能統血

以行。久而為積矣。凡勞傷。皆脾腎

肝三臟主之。肝脾氣旺。則瘀血自

行也。久服明目。輕身延年者。目得

血而能視。肝開竅於目。瞳子神光

屬腎。肝腎實。則目自明。臟實精滿

則身自輕。延年可必矣。【清】黃宮

繩本草求真論菟絲子曰。菟絲辛

甘。溫不質黏。濕而不燥。補而不滯。

得天地中和之氣。故齊稱為補髓

添精。強筋健骨。止遺固泄。暖腰溫

膝。明目祛風。為補肝腎脾氣要劑。

合補骨脂。杜仲用之。最為得宜。但

十二畫 菟

杜仲、補骨脂氣味辛溫。性溫。下。不似菟絲氣味甘平。而不重降耳。若服之而見陽強不痿。其便燥結。小水赤澀者。以性主補故也。但菟絲子最難得真。實者有以水犀草子種出。形像絕似。藥肆所賣。多屬此物。然服之亦有微功。沒酒煮爛。作餅曬乾。買九如辨藥指南。論菟絲子曰。菟絲子蔓延草上。無根假氣而生。滋仲春正陽之氣。方始結實。稟氣中和。性味甘平。取子主於降。用之入腎。善補而不峻。益陰而固陽。凡滑精便濁。尿血餘瀝。虛損勞傷。腰膝積冷。頭眩無力。皆係腎虛所致。以此調養。無不奏效。又因味甘。甘能助脾。療脾虛久瀉。飲食不化。四肢困倦。脾氣漸旺。則衝氣自沖。肌肉得養矣。

配合應用 菟絲子、蓮實、山藥、人參。能實脾止瀉。嗜食加五味子、肉豆蔻、砂仁。能治腎瀉。

① 治小使赤濁。心腎不足。精少血燥。口乾煩熱。頭暈怔忡。菟絲子、麥冬、冬等分。為末。蜜丸。梧子大。鹽湯。每下七十九。
② 治腰膝疼痛。或頑麻無力。菟絲子洗一兩。牛膝二兩。同入銀器內。酒浸一寸五分。曝為末。將原酒煮。糊丸。梧子大。每空心酒服三二十丸。(經驗方)
③ 治肝傷目暗。菟絲子三兩。酒浸三日。曝乾為末。雞子白和丸。梧子大。空心酒下二十九。(聖惠方)
④ 治身面卒腫。洪大。用菟絲子一升。酒五升。漬二三宿。每飲一升。日三服。不消再造。(肘後方)
⑤ 治婦人橫生。菟絲子末。酒服二錢。一加車前子等分。(聖惠方)
⑥ 治眉鍊瘰癧。菟絲子炒研油。調傳之。(山居四要方)
⑦ 治穀道赤痛。菟絲子熬黃。黑為末。雞子白和塗之。亦治痔如蟲咬。(肘後方)

⑧ 治小便便溼。菟絲子煮汁飲。(范汪方)
⑨ 治小使溼。菟絲子煮汁飲。(范汪方)

一三六〇

菟。馨。類。松。枝。為。使。得。酒。良。
著名方劑 菟丸。治強中。消渴。(局方) 菟絲子(酒浸)十兩。茯苓三兩。石蓮子三兩。五味子八兩。山藥六兩。上以酒煮。山藥。搗和。藥末為丸。大菟絲子丸。治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠疼。面目黧黑。目眩耳鳴。心衝氣短。時有盜汗。小便數滑。(局方) 菟絲子。鹿茸。(酥炙去毛)。澤瀉。石龍芮。桂枝。附子各一兩。石斛。熟地。茯苓。牛膝。(酒浸焙)山黃肉。續斷。防風。杜仲。菴蓉。(酒浸焙)補骨脂。(酒炒)蕪澄茄。巴戟。沉香。茴香各七錢半。五味子。川芎。桑螵蛸。覆盆子各五錢。上為細末。麩糊為丸。
參攷資料 抱朴子仙方單服法。取實一斗。酒一斗。浸曝乾。再浸。又曝。令酒盡。乃止。搗篩。每酒服二錢。日二服。此藥治腰膝。去風。兼能明目。久服令人光澤。老變為少。十日外。飲。如湯沃雪也。(蘇頌)
菟絲莖生。莖於草上。柔細且長。而極堅韌。子又多。故為養陰通絡上品。其味微辛。則陰中有陽。守而能走。與其它滋陰諸藥之偏於

風溼者絕異。經仲醇謂五味之中。辛通四氣。經言辛以潤之。菟絲子之屬是也。與辛香燥熱之辛。迥乎不同。所解極爲剴切。本經續絕傷。補不足。益氣力。肥健人於滋補之中。皆有宣通百脈。溫運陽和之意。不僅以物質主治。而含天然之氣味性情。此吾國藥物之學。不言理化。而實得理化學之最上乘者。汁去面疔。亦柔潤肌膚之功用。久服則陰液足而目自明。陽氣長而身自輕。皆有至理。弗疑爲仙佛家欺人之語。別錄所謂養陰強肌。堅筋骨。亦陰陽兩調之義。莖寒精滑。則元陽不運而至陰不攝也。滑有餘溼。則腎陽不布而大氣不舉也。若夫口苦燥渴。明爲陰液之枯涸。寒血成積。亦爲陽氣之不宣。惟此善滋陰液。而又敷布陽和。流通百脈。所以治之。以視地黃輩之專於補陰。守而不走者。固有間矣。(張山雷)

【菟絲子苗】

性質 甘。平。無毒。
主治 研汁塗面。去面疔。
歷代記載攷證 【南北朝】陶

十二畫 菟

弘景本草集註論菟絲子苗曰。接碎煎湯。浴小兒。療熱癩。
參攷資料 菟絲子苗汁。伏三黃。硫。汞。結草砂。(綱目)

【菟葵】

古籍別名 天葵。(圖經) 蒼雷丸草。(外丹本草) 節分草。(植物學大辭典) 外國名詞 Eranthis pinnatifida, Maxima (拉丁) セツア ンサウ(日本) 基本 係毛茛科菟葵屬。藥用其苗莖。
產地 凡山野樹陰平原澤田間有出。

形態 菟葵爲溼草類之多年野生草本。莖高三寸或五寸。葉爲掌狀深裂。有長葉柄。三四月間在葉之總苞間抽出一梗。開白色五瓣花於莖頂。其莖紫黑。堪供藥用。採取 六七月間採莖莖。日乾用。

性質 甘。寒。無毒。
主治 下諸石五淋。止虎蛇毒。諸折損汁飲之。塗瘡能解毒止痛。
參攷資料 菟葵苗如石龍芮而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。

菟葵極滑。所在下澤田間皆有。人多識之。六月七月。採莖葉曬乾入藥。(蘇恭) 郭璞注爾雅云。菟葵似葵而小。葉狀如梨。有毛。灼之可食。而滑。(羣芳譜) 菟葵綠葉如黃蜀葵。其花似拒霜甚雅。其形至小。如初開單葉蜀葵。有檀心。色如牡丹。姚黃。其葉則蜀葵也。唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也。(冠宗爽) 按鄭樵通志云。菟葵。天葵也。狀如葵菜。葉大如錢而厚。面青背微紫。生於崖石。凡丹石之類。得此而後能神。所以雷公炮炙論云。如要形堅。豈忘紫背。謂其能堅鉛也。此說得於天台一僧。又按南宮從响轉神書云。紫背天葵。出蜀中。蠶草也。生於水際。取自然汁。煮承則堅。亦能煮入石拒火也。又按初虞世古今錄驗云。五月五日前。將成。看桑下有菟葵者。至五日中午時。至桑下。見曰。繫黎乎。俱當蘇。溲訶。咒畢。乃以手摩桑陰一遍。口齧菟葵及五葉草嚼熱。以唾塗手。熱摺令偏。再將七日。不得洗手。後有蛇蟲蜂蟻咬傷者。以此手摩之。即愈也。李時珍竊謂古有祝由一

菠

科。此亦其類。但不知必用菟葵。取何義也。若謂其相制。則治毒蟲之草亦多矣。(李時珍)

【菟葵】 卽苦參之古籍別名。典見別錄。詳「苦參」條。

【菟葵】 卽菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳「菟絲子」條。

【菟葵】 卽菟絲子之古籍別名。典見本經。詳「菟絲子」條。

【菟葵】 卽菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳「菟絲子」條。

【菠菜】 原名 菠薐。
古籍別名 波斯草。波斯菜。赤根菜。(綱目) 洋菜。紅菜。(綱目拾遺)

外國名詞 Spinacea oleracea, Mill (拉丁) ハウレンサウ (日本)

基本 係藜科菠薐屬。爲菠菜之莖葉。

形態 菠薐爲藜類之一年生或越年生草本。高二尺許。葉互生。作卵圓形而尖。如三角狀。其基部之兩側有尖部。花小黃綠色。花單性。雄花與雌花異株。其根色赤而味甜。實有刺。狀如蒺藜。

十二畫 菠 菘 茵 菘 耕 蔬 菩



菠 菘

性實 甘。冷。滑。無毒。
主治 利五臟。通腸胃熱。解酒毒。服丹石人食之佳。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論菠菜曰。通血脈。開胸膈。下氣調中。止渴潤燥。菜根尤良。【清】黃宮繡本草求真論菠菜曰。菠菜出自西域。何書皆言能利腸胃。蓋因滑則通竅。菠菜質滑而利。凡人久病。大便不通。及痔漏閉塞之人。宜咸用之。又言能解熱毒酒毒。蓋因寒則療熱。菠菜氣味既冷。凡因癰腫毒發。並因酒溼成毒者。須宜用此以服。且湯與熱。未有不先由胃而始及腸。故藥多從甘入。菠菜既滑且冷。而味甘。故能入胃清解。而使其熱與毒。盡從腸胃而出矣。然此服之過多。為害不淺。張鷟云。凡蔬菜皆能疎利腸胃。而菠菜冷滑尤甚。又曰。多食令人脚弱。發腰痛。動冷氣。與鮭魚同食。發

霍亂。則知此即可以供蔬。而用又當斟酌於其中也。【清】王士雄隨息居飲食譜論菠菜曰。菠菜甘辛。溫開胸膈。通腸胃。潤燥活血。大便滯滯及患痔人宜食之。根味尤美。秋種者良。驚熱後不宜食。病人忌之。【清】趙學敏本草綱目拾遺論菠菜曰。止血。治利杖瘀血。攻心。搗汁沖酒服。即散。可理跌打。

參攷資料 ●北人食肉麵。食

之即平。南人食魚鱸水米。食之即冷。故多食必冷大小腸也。【孟詵】按張從正儒門事親云。凡人久病大便滯滯不通。及痔漏之人。宜常食菠菜菜之類。滑以養竅。自然通利。【李時珍】按李時珍醫話錄云。菠菜種出自西國。有僧將其子來云。本是顯陵國之種。語說為菠菘耳。【唐慎微】按唐會要云。太宗時。尼波羅國獻菠菘菜。類紅藍。實如蒺藜。火熱之能益食味。即是此也。方士隱名為波斯草云。【李時珍】菠菜八月九月種者。可備冬食。正月二月種者。可備春蔬。其莖柔脆中空。其葉綠膩柔厚。直出一尖。旁出兩尖。似鼓子花葉

狀而長大。其根長數寸。大如指。梗而色赤。味更甘美。四月起莖尺許。有雄雌。就莖閉碎。紅花散。顯不顯。雌者。結實有刺。狀如蒺藜子。種時須舒開。易發。必過月朔乃生。亦一異也。【李時珍】菠菜粥。乃以菠菜和米煮成之粥。功用和中潤燥。【醫心方大辭典】

【菠菘】即菠菜之原名。詳菠菜條。

【菘子】即馬蘭子之處方用名。詳馬蘭子條。

【菘菘】即蓮花之古籍別名。與見綱目。詳蓮花條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【菘】即青菘之古籍別名。與見綱目。詳青菘條。

【別錄】

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論菘菘子曰。治肝家積聚。眼目赤腫。

配合寶島 以乾菘。苦菘。或謂苦菘為之。使得益利。子細辛良。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

【菘菘】即菘菜之單梗有毛者。與見綱目。詳菘菜條。

並未傳之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論菩薩石曰。明目去翳。【菩薩豆】即續隨子之古籍別名。【續隨子】與見日華諸家本草。詳「續隨子」條。

【菩薩草】 產地 生江浙諸省之山野間。

形態 菩薩草為毒草類之一種。四時不開。秋冬有花。結赤子如蒜頭。其根可供藥用。

採取 冬月採之。

性質 苦。無毒。

主治 中諸食毒。酒研服。諸毒傷。搗汁飲。并傳急處。妊娠咳嗽。搗篩蜜丸服。

【華木】即芙蓉之古籍別名。與見綱目。詳「芙蓉」條。

【華草】即陸英之古籍別名。與見別錄。詳「陸英」條。

【華蕒】即黃丹之古籍別名。與見和漢藥考。詳「黃丹」條。

【華蠶】即雄之古籍別名。與見綱目。詳「雄」條。

十一畫 苦

食物本草。詳「土菌」條。

【菰手】即菱粳之原名。詳「菱粳」條。

【菰米】即菱米之原名。詳「菱米」條。

【菰苳】即菱粳之古籍別名。與見蜀本草。詳「菱粳」條。

【菰根】即菱白根之別名。詳「菱白根」條。

【菰筍】即菱白之芽。與見綱目。詳「菱白」條。

【菰菜】即菱白之古籍別名。與見圖經本草。詳「菱白」條。

【菰苳】即菱白根之古籍別名。與見綱目。詳「菱白根」條。

【菰蔞草】即菱白之苗有莖梗者。與見本草拾遺。詳「菱白」條。

【菱】 原名 菱實。 命名 本品苗葉支散。故字從支。其角核峭。故謂之菱。

處方用名 菱角。菱肉。

古醫別名 菱。(別錄) 水粟。(風俗通) 厥櫛。藤蓆。(爾雅) 沙角。陸野菱。家菱。折腰菱。郢城菱。浮根菱。青水菱。(綱目) 烏菱。(俗名)

外國名詞 Trapa natans.

華 菰 菱

L (Trapa chinensis, Lour.)

(拉丁) ヒシ ヒシノミ (日本) 慈本 係菱科菱屬。藥用其角實。

產地 多在池潭陂塘中。

形態 菱為水草類之一年生草本。根生土中。其莖自水中達水面。及細裂之根狀葉。漂於水中。葉略作三角形。有鋸齒。葉柄長。浮水。中部膨大為浮囊。夏月開花。花白。有四瓣。雄蕊四枚。單生於葉腋。果實為兩角形。有青紅二色。與花殼。粉皆可療疾。詳各該條。



菱

採取 夏秋採之。

用法 生食或熬煮。或搗爛澄粉用。

性質 甘。平。無毒。

效能 消暑。泄熱。用作解熱解毒藥。又為滋補劑。

主治 安中。補五臟。不飢。輕身。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論菱曰。藤蓆和蜜餅之可斷穀。長生。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論菱曰。解丹石毒。【明】李時珍本草綱目論菱曰。解暑。解傷寒積熱。止消渴。解酒毒。射菌毒。【清】黃宮樞本草求真論菱曰。菱角種類雖多。氣滯則一。即青有胃安中。消水。止渴。解酒。療瘧。治痢。及有紅。瀉白。補生。熱降。升之。既。然亦止供食品。而於治瘵。則無。且於過食。則有腹滿。填脹。損陽。後。墮之虞。必取辟香。生薑。吳茱萸。黃作湯。及或沉香。磨汁。以搗。是亦味甘。性寒。助濕。增滯。之一。證也。平。性。不。之。說。似不足信。【清】王士雄隨息居飲食譜論菱曰。菱。菱。鮮者。甘。涼。析。醒。清。熱。多。食。損。陽。助。濕。胃。寒。脾。弱。人。感。之。者。者。風。乾。肉。反。轉。燥。熱。者。甘。平。充。飢。代。穀。亦。可。澄。粉。補。氣。厚。腸。多。食。滯。氣。胸。腹。痞。脹。者。忌。之。茨。花。向。日。菱。花。向。月。故。交。燬。而。淺。寒。饑。饉。菱。花。謂。女。人。容。貌。如。月。也。

參攷資料 ①搗爛澄粉。食。補中。延年。(履仙) ②生食。性。冷。利。多。食。傷。人。腹。脹。損。陽。氣。痿。蕪。生。癭。瘰。

十二靈 菱 菲 蔎 菴

水族中此物最不治病。若過食腹脹者可燒葱酒服之即消。亦可含吳茱萸咽津。(孟詵) ①仇池筆記言菱花開背日。茨花開向日。故菱寒而茨暖。別錄言菱實性平。豈生者性冷而乾者則性平歟。(李時珍) ②其葉支散。故字從支。其角梭峭。故謂之菱。而俗呼為菱角也。昔人多不分別。淮安晉武陵記以三角四角者為菱。兩角者為茨。左傳屈到嗜菱。即此物也。爾雅謂之厥。音肩。又許慎說文云。菱。楚謂之菱。秦謂之薺。楊氏丹鉛錄。以菱為雞頭。引離騷。菱荷以為衣。言菱葉不可緝衣。皆誤矣。按爾雅薺。乃決明之名。非厥也。又爾雅菱荷。乃藕。上出水生花之莖。非雞頭也。與菱同名異物。(李時珍) ③菱。凌有湖澤處則有之。落泥中最易生。發有野蔎。家蔎。皆三月生。菱莖引葉浮水上。扁而有尖。光而如鏡。葉下之莖。有股如蝦。股一莖一葉。兩兩相差。如蝶翅狀。五六月開小白花。背日而生。晝合宵航。隨月輕移。其實有數種。或三角四角。或兩角無角。野菱自生湖

中。葉實俱小。其角硬直。刺人。其色嫩青。老黑。嫩時剝食。甘美。老則蒸食之。野人曝乾。剝米為飯。為粥。為糕。為果。皆可代糧。其莖亦可曝收。和米作餅。以度荒歉。蓋澤農有利之物也。家蔎種於陂塘。葉實俱大。角硬而脆。亦有兩角彎卷如弓形者。其色有青有紅。有紫。嫩時剝食。皮脆肉美。蓋佳果也。老則殼黑而硬。墜入江中。謂之烏菱。冬月取之。風乾為果。生熟皆佳。夏月以蠶水澆其葉。則實更肥美。按段成式酉陽雜俎云。蘇州折要。菱多兩角。荊州郢城。菱三角無刺。可以按莎。漢武帝昆明池有浮根菱。亦曰青水菱。葉沒水下。露出水上。或云玄都有雞翎菱。碧色。狀如雞飛。仙人堯伯子常食之。(李時珍)

【菱粉】 基本 本品係用菱實搗浸澄出之粉。

【菱莖】 即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【菱角】 即菱之處方用名。詳「菱」條。

製法 同藕粉條。

【菱殼】 採取 以老而堅黑者入藥良。

性質 瀉無毒。

主治 頭面黃水瘡。無名腫毒。指頭天蛇。燒灰香油調敷。脫肛。先以麻潤溼腸頭塗。再以菱殼水洗之。藥髮。

【菱莖】 主治 去疣子。取鮮者搽之。

【菱實粉粥】 基本 本品係用菱實粉和米煮成之粥。

主治 益腸胃。解內熱。

【菲根】 即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羊蹄」條。

【蔎草】 即蔎草之古籍別名。典見許慎說文。詳「蔎草」條。

【菴摩勒】 古籍別名 餘甘子。(唐本) 菴摩落迦果。(梵書)

基本 係大戟科種子木屬。為

一三六四

菴摩勒之實與仁。

產地 生山谷中。

形態 菴摩勒為喬木類之落葉木本。葉長五六分。為線狀橢圓形。葉端鈍。對生於枝上。並列而如羽狀複葉。雄花雌花生於同株。花細小。黃色。雄花叢生。有花梗。雌花少數無梗。花被五六片。為卵長形。結實為肉質。形圓而帶六稜。大如梅子。色青白。連核作五六瓣。乾則並核皆裂。至冬成熟。其實與仁俱可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 風虛熱氣。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論菴摩勒實與仁曰。補益強氣。合鐵粉一斤用。變白不老。取子壓汁。和油塗頭。生髮。去風癩。令髮生如漆黑。【唐】李珣海藥本草論菴摩勒實與仁曰。主丹石傷。肺上氣。咳嗽。久服輕身延年長生。服乳石人宜常食之。【宋】寇宗奭本草衍義論菴摩勒實與仁曰。為末點湯服。解金石毒。【明】李時珍本草綱目論菴摩勒實與仁曰。解硫黃毒。

【卷摩落迦果】即卷摩勒之古籍別名。與見梵書。詳「卷摩勒」條。
【卷摩遜迦果】即卷摩果之古籍別名。與見佛書。詳「卷摩果」條。

【卷羅果】古籍別名。卷摩羅迦果。(佛書)香蓋。

(綱目) 基本 出西域諸地。安南諸番地亦有之。

形態 卷羅果爲果類。柰屬之一種。葉似茶葉。實似北梨。夏月乃成熟。可供食與藥用。其葉詳見該條。

採取 五月六月採之。
性質 甘溫無毒。

主治 食之止渴。

歷代記述攷證 【唐】陸士良食性本草論卷羅果曰。主婦人經脈不通。丈夫營衛中血脈不行。久食令人不飢。

參攷資料 卷羅果動風。凡天行病及食飽後。俱不可食。同大蒜辛物食之。令人患黃病。(馬志)

【卷羅葉】基本 本品即卷羅果之葉也。
主治 渴疾煎湯飲。

【卷蘭子】命名 卷。草堂也。閩里門也。本品老莖可。以蓋覆卷間。故名。

處方用名 卷蘭實。蘭蔕子。卷蘭莖。

古籍別名 裂蘭。(綱目)大莖。(日本)

基本 係菊科艾屬。爲卷蘭之子實。

產地 凡山野川澤及平原溼地。恒有生長。

形態 卷蘭爲溼草類之多年生草本。高數尺。莖白如艾而粗。葉如菊而缺刻不深。質厚。稍葉較細。通常有三尖。夏秋間自葉腋出細莖。開小頭狀花。排列作穗狀。色淡黃。或淡褐色。似牡蒿而微大。其實小如艾。中有細子。極易繁衍。採得子實供藥用。

採取 九十月間採之。
製法 採得陰乾用。

性質 苦微寒。無毒。
效能 散瘀血止痛。逐水邪。消腫。用作利尿藥。又爲活血鎮痛藥。

主治 五臟瘀血。腹中水氣。臌脹。留熱。風寒溼痺。身體諸痛。久服。

輕身延年不老。(本經)又療心下堅。隔中寒熱。周痺。婦人月水不通。消食明目。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論卷蘭子曰。益氣。主男子陰痿不起。治心腹脹滿。宋大明諸家本草論卷蘭子曰。腰脚重痛。膀胱痛。及骨節煩痛。不下食。明李時珍本草綱目論卷蘭子曰。插酒飲。治因挫腰痛。及婦人產後血氣痛。明李士材本草圖解論卷蘭子曰。卷蘭子味苦微寒無毒。主風寒溼痺水腫。

配合應用 卷蘭子同牛膝。茜草。白芨。消腹癥。去留血。又主療血腹脹。俗呼爲單腹脹。四肢不腫者。是其候也。

善辟蛇。蛇著之即爛。

治瘵血不散。變成癰腫。生卷蘭莖搗汁一升服之。(廣利方)

治月水不通。婦人宿有風冷。留血積聚。月水不通。卷蘭子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒二升。浸封五日。後每飲三合。日三服。(聖惠方)

治瘵後血痛。卷蘭子一兩。水

一升。童子小便二盃。煎服。(瀨湖集簡方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無瘀滯溼阻者禁用。煎實意苜爲之使。

參攷資料 本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡治治驚邪。狸骨丸之類。大方中用之。孫思邈千金翼。草雷獨行方。主腕折瘀血。並單用卷蘭莖汁服。亦可未服。今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速。(蘇頌)

貞元廣利方謂之卷蘭莖云。又史注云。卷蘭軍行宿室也。則簡似當作盧。(李時珍) 卷蘭子生雍州川谷。亦生上黨及道邊。十月採實陰乾。(別錄) 今江淮亦有之。春生苗葉如艾蒿。高二三尺。七月開花。八月結實。九月採實。(蘇頌)

狀如蒿艾之類。近道處處有之。仙經亦時用之。人家種此。時蛇也。(陶弘景) 卷蘭葉不似艾。似菊葉而薄。多細丫。面背皆青。高者四五尺。其莖白色。如艾實。中有細子。極易繁衍。莖花者以之接菊。(李時珍)

十二益 卷

十二畫 菘 菸 蔚 菘 菘 菘

【菘藔實】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

【菘藔子】即菘藔子之處方用名。詳「菘藔子」條。

花小黃綠色。萼五裂。雄蕊五。雌蕊一。有苞作穗狀花序。結實。內有細子。其莖葉可供食與藥用。

性質 甘。苦。大寒。滑。無毒。

主治 時行壯熱。解風熱毒。搗汁飲之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論菘藔曰。夏月以菜作粥

食。解熱止熱毒痢。搗爛傳灸瘡。止

痛易瘥。【唐】陳藏器本草拾遺論

菘藔曰。搗汁服。主寒熱痢。止血生

肌。及諸禽獸傷。傅之立愈。【宋】大

明諸家本草論菘藔曰。煎湯飲。開

胃通心隔。宜婦人。【明】李時珍本

草綱目論菘藔曰。補中下氣。理脾

氣。去頭風。利五臟。

參攷資料 菘藔性平。微毒。冷

氣人不可多食。動氣。患腹冷者食

之必破腹作瀉。【掌禹錫】

主治 煮牛生持汁

服治小兒熱。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論菘藔子曰。醋浸搗面

去粉滓。潤澤有光。

性質 甘。平。無毒。

主治 通經脈。下氣。

開胸膈。

【菘藔根】

本品係用菘

和米煮成之粥。

性質 健胃益脾。

主治 健胃益脾。

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

【菘藔子】即菘藔子之古籍別名。與見

東之土太。

形態 菘藔為莖生草本。莖葉

俱青。葉作三叉。似山薯。又似綠豆

莢。花有黃紅白數色。亦有無花而

結白子者。其根為黃白色。多節之

根。粗四五分。狀如山藥。

採取 二月八月採根。曬乾。

製法 凡使須以其根。細長。洗

白而虛。曬者佳。酒浸一宿。焙乾。或

鹽水炒用。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉血分。溼熱。療淋濁。水

瀉。用為治風利。瀉。及諸瘡藥。

主治 腰脊痛。強骨節。風寒濕

痺。惡瘡不瘳。熱氣。【本經】傷中

悲怒。陰痿。失調。老人五緩。關節老

血。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論菘藔曰。冷風痺。痺。腰脚

癱。緩不遂。手足驚。男子腎腰痛

久冷。腎間有膀胱宿水。【宋】大明

諸家本草論菘藔曰。頭旋。痼疾。補

水。腰。聖筋骨。益精。中風。失音。【元】

王好古湯液本草論菘藔曰。補肝

虛。【明】李時珍本草綱目論菘藔

曰。治白濁。莖中痛。痔瘡。瘰癧。【明】

綠希雍本草經疏論草薺曰。草薺味苦甘平。無毒。為祛風除溼補益下元之要藥。故主腰背痛。強骨節。風寒溼痺。惡瘡不瘳。熱氣傷中。惡怒。陰痿失溺。關節。老血。老人五緩。正以苦能燥溼。甘入脾而益血。故悉主之。甄權又主冷風癢。膝脚癢。不送。手足。男子腰痛。久冷。腎間有溼。膀胱宿水。日華子主頭旋癱疾。補水。堅筋骨。益精明目。中風失音。海藏主肝虛。李氏治白濁。莖中痛。痔漏。瘰癧。已上諸證。無非陽明溼熱流入下焦。客於肝腎所致。此藥祛陽明之溼熱。以固下焦。故能去濁分清。而療下元虛冷。溼邪為病也。【明】李士材本草圖經論草薺曰。草薺苦平。胃與肝藥也。搜風去溼。補腎強筋。主白濁。莖中痛。陰痿失溺。惡瘡。入肝搜風。故能理風與筋之病。入胃祛溼。故能理濁與瘡之病。古人或稱其攝瀉之功。或稱其逐水之效。何兩說相懸耶。不知腎為閉藏封藏之本。腎氣強旺。則自能收攝。而妄水亦無容藏之地。且善清胃家溼熱。故能去濁分清也。楊氏草薺分清

十二畫 草

飲。正得此意。【清】黃宮繡本草求真論草薺曰。草薺味苦氣平。功祛風除溼固腎。凡人大便燥結。小便頻數。每於便時。痛不可忍。者此必大便熱閉。積熱腐瘵等物。同液乘虛流入小腸。故於便時。即作痛也。且水道不清。則溼熱不除。而肝火愈熾。筋骨愈癢。草薺氣味苦平。既能入肝祛風。復能引水歸入大腸。以通穀道。俾水液澄清。而無痛苦之患矣。又安有痺痛腰痛。膀胱宿水。與陰痿失溺。痔漏。惡瘡之累乎。昔人云。既有逐水之功。復有攝精之力。洵不誣耳。我輩土茯苓與草薺。雖不相類。而功用不遠。白虛。【清】賈九如辨藥指南論草薺曰。草薺性味淡溼。長於溼。溼帶苦亦能降下。主治風寒溼痺。男子白濁。莖中作痛。女人白帶。病後胃中濁氣下流所致。以此入胃。驅溼。其症自愈。又治瘡疥。惡風。溼鬱肌。脈管。不得宣行。致經脈拘攣。手足不便。以此溼去。脾溼能令血脈調和也。

藥用根。則沈墜下降。故主治下焦。雖微苦能泄。而質輕氣清。色味皆淡。則清熱理溼。多入氣分。少入血分。本經主腰背痛。乃腎有溼熱。濁氣不去。而腰脊為之疼痛。非腎虛無溼之腰痛。所可彈同。施治。強骨節者。宜通百脈。溼濁去而正氣自強。非能補益。以助其強固。此藥理之至易辨者。楊氏有草薺分清飲。專治溼熱淋濁。正是此意。惟方中有益智仁。溫而且澀。性正相反。不能並列。殊有誤會。瀨湖綱目謂草薺能治陽明之溼。而固下焦。故能去濁分清。立說甚允。然又謂楊氏此方。治真元不足。下焦虛寒。小便頻數云云。則與草薺性情。兩相背謬。殆為智仁一物。而展轉誤認。甚非藥理之真。讀古人書。慎勿為其所眩。本經又主風寒溼痺。頤謂惟溼熱痺著。最為合宜。若曰風寒。必非此苦澀淡溼者。所能倖效。又治惡瘡。不瘳。熱氣者。豈非為溼與熱。蒸之主藥乎。別錄謂主傷中。亦惟脾為溼困者。宜之。決非補中之藥。又治惡怒。頗不可解。又謂陰萎失溺。則溼熱閉結者。亦有萎墜不

仁。沒溺不利之症。必非可以起虛痿。又謂治老人五緩。關節老血。則語大浮泛。且與草薺真性。不相符合。何可輕信。不謂仲淳因此二語。竟謂此物為補益。下元之要藥。又謂甘入脾而益血。以溼泄利溼之效用。而說到補陰上去。可謂顛預已極。不如石頭達原。謂古人或稱攝精。或稱利水。何其兩說相懸。不知溼濁去而腎無邪熱之擾。腎氣藥能收攝。頗能窺見玄奧也。甄權謂主冷氣癢痺。腰脚癢緩不遂。男子腎腰痛久冷。【醫公對切音憤。玉篇謂腰忽痛也。】蔚頤按此。即周痺陰萎之症。然惟溼熱為患。乃宜此藥。甄氏冷氣久冷之說。大誤。甄又謂治腎間有溼。膀胱宿水。是也。而今本瀨湖綱目引此二句。脫一溼字。乃作腎間有膀胱宿水。送令人無從索解。俗本誤人。真是不小。甄氏經疏引此不誤。王好古謂補肝虛。亦不可訓。尤奇者。莫如日華本草。竟謂補水。堅筋骨。益精明目。頭旋癱疾。中風失音云云。庸雜之極。最為蕪穢。願每謂唐宋人藥物之學。固多有未可盡信者。

十二畫 葦 蕪 菜

而必以大明氏爲荒謬之尤。不知瀕湖何所取裁。亦爲之作抄書者而不加芟穉耶。

配合應用 ①葦蕪得牛膝、木瓜、慈苳仁、黃蘗、骨碎補、續斷、杜仲、石斛、生地、黃狗脊。治腰脊痛、強骨節、加朮、蒼朮、茯苓。治周痺。

②葦蕪同黃耆、生地、黃金銀花、皂角刺、皂莢子、牛膝、木瓜、石斛、慈苳仁、海風藤、白僵蠶、胡麻。治惡瘡久不瘳。

③葦蕪同蓮子、茯苓、車前子、木通、澤瀉、牛膝、黃蘗、甘草。可分清除溼。

④治腰脚車轉。行履不穩者。葦蕪二十四分。杜仲八分。搗篩。每旦溫酒服三錢匕。禁牛肉。(唐德宗貞元廣利方)

⑤治小便頻數。川葦蕪一斤爲末。酒糊丸。梧子大。每鹽酒下七十丸。(集玄方)

⑥治白濁頻數。澄面如油。澄下如膏。乃真元不足。下焦虛寒。葦蕪分清飲。用葦蕪、石菖蒲、益智仁、烏藥等分。每服四錢。水一盞。入鹽一抄。煎七分。食前溫服。日一服。效乃

止。

⑦治腸風痔漏。如聖散。用葦蕪、貫衆去土等分爲末。每服三錢。溫酒空心服之。(孫尚藥傳家祕寶方)

⑧治頭痛發汗。葦蕪、旋覆花、虎頭骨、酥炙。等分爲散。欲發時。以溫酒服二錢。暖臥取汗。立瘳。(聖濟總錄方)

用炭 錢半至三錢。
施用宜忌 凡陰虛而無溼熱者禁用。長莖根、大黃、柴胡、前胡、忌茗醋。慈苳爲之使。

參攷資料 ①葦蕪、菝葜、土茯苓。三物形雖不同。而主治之功不相遠。豈亦一類數種乎。雷斅炮炙論序云。菝葜多。夜煎竹木。竹木葦蕪也。浸多白濁。皆是溼氣下流。

葦蕪能治陽明之溼。而固下焦。故能去濁分清。楊倓家藏方。治真元不足。下焦虛寒。小便頻數。白濁如膏。有葦蕪分清飲。正此意也。又楊子建萬全護命方云。凡人小便頻數。不計度數。便莖內痛。不可忍。此疾必先大勝熱。不通水液。只就小腸大腑。愈加乾竭。其則渾身

熱。心躁思涼水。如此卽重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。將物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛也。不飲酒者。必不生過食辛熱煎膩之物。又因色傷而然。此乃

小便頻數而痛。與淋澀澀而痛者不同也。宜用葦蕪一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自滅也。(李時珍)

②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輾者爲勝。莖生。葉似粟莢。(蘇恭) ③葦蕪莖生。葉似莢。莖而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲葦蕪誤矣。莖葉根苗皆不同。

(李時珍) ④土茯苓與葦蕪。形雖不同。功用相似。亦善祛風除溼。去濁分清。均治濕積化毒。東山經育食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷服之。無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃止瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顯松園)

【葦蕪】卽羊桃之古籍別名。與見

熱。心躁思涼水。如此卽重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。將物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛也。不飲酒者。必不生過食辛熱煎膩之物。又因色傷而然。此乃小便頻數而痛。與淋澀澀而痛者不同也。宜用葦蕪一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自滅也。(李時珍) ②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輾者爲勝。莖生。葉似粟莢。(蘇恭) ③葦蕪莖生。葉似莢。莖而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲葦蕪誤矣。莖葉根苗皆不同。(李時珍) ④土茯苓與葦蕪。形雖不同。功用相似。亦善祛風除溼。去濁分清。均治濕積化毒。東山經育食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷服之。無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃止瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顯松園)

爾雅。詳羊桃條。
【蕪麻子】卽蕪麻子。詳蕪麻子條。
【菜】卽菜之古籍別名。與見陸璣詩疏。詳蕪麻條。

【菜蕪】 命名 本品在上古謂之蕪。中古轉爲菜蕪。後世遂說爲蘿蔔。蘿蔔乃俗名也。古籍別名 蕪蕪、蘿蔔、芫突、紫花蕪、沙羅菊。(綱目) 溫慈、土酥、爾雅、蕪蕪。(廣韻) 楚蕪、秦蕪。(國經) 破地維、夏生。(王禎農書)

外國名曰 Raphanus Sativus, L. (拉丁) Radishwood (英)

基本 屬十字花科。爲蘿蔔之根。 產地 菜蕪各省均有。江蘇以宜興者爲佳。

形態 蘿蔔爲一年或越年生草本。莖高達三四尺。葉作羽狀分



(一) 蕪菜

莖。剛硬而有毛茸。梢上分歧。開淡紫或白色四瓣十字花。作總狀花序排列。後結莢形閉果。根長大白色多肉。



(二) 蕺菜

種植 田園恒以栽植。乃供菜茹食用。每年五六月或八九月下種。約經百日採食。

採取 秋採苗。冬採根。夏採子。

用法 搗汁用。

性質 辛甘無毒。

效能 破氣。化痰。清熱。消食。

主治 散服及炮炙服食。大下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人。生持汁服。止消渴。試大有驗。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四

穿本草論蕺菜。曰。利關節。理顏色。練五臟。惡氣制麪毒。行風氣。去除邪熱氣。【唐】孟詵食療本草論蕺菜。曰。利五臟。輕身。令人白淨。肌細。【宋】日華諸家本草論蕺菜。曰。消痰止咳。兼治肺痿吐血。溫中。補不

十二畫 菜

足。同羊肉銀魚煮食。治勞瘦咳嗽。

【元】吳瑞日用本草論蕺菜。曰。搗汁服。治吐血衄血。【明】汪穎食物

本草論蕺菜。曰。同猪肉食。益人生

擄服。治禁口痢。【明】寧原食鑑本

草論蕺菜。曰。寬胸膈。利大小便。生

食止渴。寬中。養食化痰消導。【明】

汪機本草會編論蕺菜。曰。殺魚腥

氣。治豆腐積。【明】李時珍本草綱

目論蕺菜。曰。主吞酸。化積滯。解酒

毒。散瘀血。甚效。未服治五淋。丸服

治白濁。煎湯洗脚。氣飲汁治下痢

及失音。并烟蕪欲死。生搗塗打撲

湯火傷。【明】繆希雍本草經疏論

蕺菜。曰。蕺菜根味辛甘。氣溫。無毒。

孟詵云。性冷。大明云。詳其功用

應是生者味辛。性冷。熟者味甘。溫

平。故本經下氣消穀。去痰癖。肥健

人。及溫中補不足。寬胸膈。利大小

便。化痰消導者。蕺菜之用也。止消

渴。制麪毒。行風氣。去邪熱。氣治肺

痿吐血。肺熱痰嗽。下痢者。生食之

用也。大抵入手足太陰。手足陽明

經。故所主皆脾肺腸胃之病。【明】

李士材本草圖解論蕺菜。曰。蕺菜

辛甘。下氣消食。和中化痰。解醒散

血。大治吞酸。搗汁服。治吐血衄血。消

渴。塗跌打湯火傷。解麪毒。楊億云。

種芋三十畝。省米三十斛。種苜三

十畝。益米三十斛。則蘿蔔果能消

食也。服地黃何首烏。忌食蘿蔔。令

人髭髮白。有人被賊。火薰垂死。以

蘿蔔葉生嚼汁噴。卽甦。子能定喘

消痰。消食除脹。利大小便。消癰腫

毒。生用能升熱。用能降。

配合應用 ①治年遠脾泄。百

藥不效。單煮白菜蕪。終日啖之。不

輟必差。

②治食物作酸。蘿蔔生嚼數片。

或生菜嚼之。亦佳。絕妙。乾者熟者。

鹽醃者。及人胃冷者。皆不效。(集

簡方)

③治反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸。細

細嚼嚥良。(普濟方)

④治消渴飲水。獨勝散。用出了

子。蘿蔔三枚。淨洗切片。日乾爲末。

每服二錢。煎猪肉湯。澄清調下。日

三服。漸增至三錢。生者搗汁亦可。

或以汁煮粥食之。(國經方)

⑤治肺痿咳血。蘿蔔和羊肉。或

鯽魚煮熟。食之。(普濟方)

⑥治鼻衄不止。蘿蔔搗汁。半盞。

入酒少許。熱服。并以汁注鼻中。皆

良。或以酒煎。湯入蘿蔔。再煎飲之。

(易簡方)

⑦治下痢禁口。蘿蔔搗汁。一小

盞。蜜一盞。水一盞。同煎。早一服。午

一服。日啖米飲。吞阿膠丸。百粒。如

無蘿蔔。以子搗汁亦可。一方加枯

礬七分。同煎。一方只用蘿蔔菜煎

湯。日日飲之。又用蘿蔔片。不拘新

舊。藥蜜噴之。嚼汁。味淡。再換。覺思

食。以肉煮粥。與食。不可過多。亦治

痢後腸痛。(普濟方)

⑧治大腸便血。大蘿蔔皮。燒存

性。荷葉燒存性。蒲黃生用。等分爲

末。每服一錢。米飲下。(普濟方)

⑨治腸風下血。蜜炙蘿蔔。任意

食之。昔一婦人。服此有效。(百一

選方)

⑩治酒疾下血。連旬不止。用大

蘿蔔二十枚。留青葉寸餘。以井水

入罐中。煮十分爛。入淡醋。空心任

食。(醫親養老方)

⑪治大腸脫肛。生菜蕪搗。實脾

中。束之。覺有痔。卽除。(摘玄方)

⑫治小便白濁。生蘿蔔剝空。留

蓋。入吳茱萸。填滿。蓋定。煎任。糯米

十二畫 菜

飯上蒸熟。取去菜莖。以蘿蔔焙研末。糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。(普濟方)

⑤治沙石諸淋。疼不可忍。用蘿蔔切片。蜜浸少時。炙乾數次。不可過焦。細嚼。鹽湯下。日三服。名喚眩脊。(普濟方)

⑥治遍身浮腫。出了子蘿蔔。浮麥等分。浸湯飲之。(聖濟總錄方)

⑦治脚氣走痛。蘿蔔煎湯洗之。仍以蘿蔔曬乾爲末。鋪積內。(聖濟總錄方)

⑧治偏正頭痛。生蘿蔔汁一瓊殼。仰臥。隨左右注鼻中。神效。王荊公病頭痛。有道人傳此方。移時遂愈也。以此治人。不可勝數。(如宜方)

⑨治失音不語。蘿蔔生搗汁。入豈汁同服。(普濟方)

⑩治喉痺腫痛。蘿蔔汁和皂莢漿服取吐。(普濟方)

⑪治滿口爛瘡。蘿蔔自然汁類漱去涎妙。(集簡方)

⑫治湯火傷灼。生蘿蔔搗塗之。子亦可。亦治花火傷肌。烟熏欲死。(聖濟總錄方)

⑬治打撲血聚。皮不破者。用蘿蔔或葉搗封之。(邵氏方)

用鹽 錢半至三錢

施用宜忌 凡氣虛血虧諸症。禁用。服首烏地黃者忌之。

參攷資料 ①萊菔功同蕪菁。然力猛。更出其右。斷下方亦用其根。燒熟入藥。尤能制麪毒。昔有婆羅門僧東來。見食麥麵者。驚云。此大熱。何以食之。又見食中有蕪菔。乃云。積有此以解其性。自此相傳。食麵必啖蕪菔。(蘇頌) ②萊菔搗爛制麪。作饅飪食之最佳。飽食亦不發熱。酥煎食之下氣。凡人飲食過度。生嚼嚙之便消。(蕭炳) ③洞微志云。齊州有人病狂。云夢中見紅裳女子。引入宮殿中。小姑令歌。每日遂歌云。五嶽樓閣曉玲瓏。天府由來是此中。惆悵闕懷言不盡。一丸蘿蔔火吾宮。有一道士云。此犯大麥毒也。少女心神。小姑脾神。醫經言蘿蔔制麪毒。故曰火吾宮。火者毀也。遂以藥并蘿蔔治之。果愈。又按張杲醫說云。饒民李七病鼻衄甚危。醫以蘿蔔自然汁和無灰酒飲之。卽止。蓋血隨氣運。氣滯

一三七〇

故血妄行。蘿蔔下氣而酒導之。故也。又云。有人好食豆腐中毒。醫治不效。忽見買豆腐人。言其妻誤以蘿蔔湯入鍋中。遂致不成。其人心悟。乃以蘿蔔湯飲之。而移物理之妙如此。又延壽書載李師逃難入石窟中。賊以烟熏之。垂死。摸得蘿蔔菜一束。嚼汁嚙下。此法備急。不可不知。(李時珍) ④萊菔俗名蘿蔔。按爾雅云。突蕪。庖孫炎註云。紫花菘也。俗呼溫菘。似蕪菁大。根俗名菘突。一名蕪菔是也。(韓保昇) ⑤紫花菘。溫菘。皆南人所呼。吳人呼楚菘。廣南人呼秦菘。(蘇頌) ⑥萊菔南北通。有北土尤多。有大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者白而脆。宜生啖。河朔極有大者。而江南安州洪州。信陽者甚大。重至五六斤。或近一秤。亦一時種時之力也。(蘇頌) ⑦萊菔今天下通有之。昔人以蕪菁萊菔二物混註。闔人種萊菔。六月下種。秋採苗。冬掘根。春末抽高莖。開小花。紫碧色。夏初結角。其子大如大藤子。圓長不等。黃赤色。五月亦可再種。其葉有大者如蕪菁。細者如花芥。皆有

細柔毛。其根有紅白二色。其狀有長圓二類。大抵生沙壤者脆而甘。生瘠地者堅而辣。根葉皆可生可熟。可菹可醬。可豉可醃。可糖可醋。可飯。乃蔬中之最有益者。而古人不深詳之。豈因其賤而忽之耶。抑未諳其利耶。(李時珍)

【萊菔子】 古醫別名 溫菘子。土酥子。(爾雅) 唐薯子。羌稽子。登菘子。楚菘子。菘菘子。蘿白子。蘿肥子。蕪菔子。蕪菘子。紫花菘子。(和漢藥考)

形態 萊菔子爲蘿蔔之扁平長圓形種子。大如麻子。表面呈黃赤色。

性質 辛。甘。平。無毒。

效能 用作健胃祛痰藥。及爲消化藥。又治惡臭性枝氣管炎。慢性消化不良症。

作用 入胃能助胃液消化。澱粉。使造成多量之糖素。至腸始漸次吸入腸壁而達血中。令血液氣化增進。全身熱量增高。肺臟之呼吸作用。亦同進行。痰質遂被迫而

主治 研汁服。吐風痰。同醋研。

消腫毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論萊菔子曰。下氣定喘。治痰消食。除脹。利大小便。止氣痛。下痢後重。發瘡疹。【清】黃宮繡本草求真論萊菔子曰。萊菔子氣味甚辛。生用研注。能吐風痰。有倒牆推壁之功。迅利莫禦。若醋研敷。則癰腫立消。炒熟則下氣定喘。消食寬膨。一生一熟。性氣懸殊。

參攷資料 ●萊菔子治痰。有

推將倒壁之功。(朱丹溪) ●萊菔子之功。長於利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風寒。發瘡疹。降則定痰喘咳嗽。調下痢後重。止內痛。皆是利氣之效。予曾用果有殊績。(李時珍)

【萊菔花】

主治 用榨下酒釀。食之甚美。明目。基本 本品係萊菔和米煮成之粥。

【萊菔粥】

主治 消食利膈。

【萊菔】即青箱子之古籍別名。典見本經。詳「青箱子」條。

【萌】即竹筍之古籍別名。典見僂贊。詳「竹筍」條。

【萌葛皮】即合歡皮之古籍別名。典見綱目。詳「合歡皮」條。

【萍蓬草】原名 水粟。本品結子如粟。如蓬子。故名。

處方用名 水粟根。

古籍別名 水粟子。水粟包。水笠。(綱目) 堯葵。骨蓬。川骨。(和漢藥考)

外國名詞 Nuphar japonicum, DC (拉丁)


基本 屬睡蓮科。為萍蓬草之根。

產地 凡池澤河流之淺水間。恒有生長。

形態 萍蓬草為多年生草本。春日根間叢生多葉。葉分二種。出水上之葉。作箭形。似里芋葉而長。質稍厚。在水中之葉。則大而柔軟。色亦較淡。且大小不同。大者可尺許。小者纔二三寸。夏秋之交。水面

自抽出花梗。開五瓣之黃花。大寸許。形似梅花。根為多節之長根。頗似腐骨。外面粗糙。色帶褐。處處有黑斑。內部帶白色。質輕如粉。藥舖所售者。多截作二三寸長。更縱破

為二。



萍蓬草

採取 冬十月間採之。

製法 採得去粗皮曬乾。性質 甘寒。無毒。

效能 和血行瘀。用為清血藥。主治 養食補虛。益氣力。久食不饑。厚腸胃。

國外學說 日本一本堂藥選曰。萍蓬根在水中如骨狀。故謂之川骨。亦有栽植池中。以賞玩者。與荷花同。故日本所在多有。藥舖所售皆真。用時去粗皮。水洗。剉細。破

瘀血。導新血。治跌打損傷。微毒。痲結。產後瘀血諸症。又和漢三才圖會曰。根甘寒。如藕。內年人亦食之。香味如藕。煮食如栗。補虛益氣力。厚腸胃。按萍蓬草根如腐骨。(味鹹。大冷。) 花黃色。莖頭著葉。夏月採根切片。曝於暑熱石上。如值陰雨。則色變黑。不堪用。略似腐骨。故俗呼川骨。葉似款冬葉而稍軟。日

本方多用之。入金瘡。跌傷及胎前產後藥中。為破血止血之要藥。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ●萍蓬草生南方

池澤。葉大如荷。花亦黃。未開時狀如筍袋。其根如藕。飢年可以當穀。(陳藏器) ●水粟三月出水。莖大如指。葉似荷葉而大。徑四五寸。初生如荷葉。六七月開黃花。結實狀如角黍。長二寸許。內有細子一包。如墨粟。澤農採之。洗擦去皮。蒸曝。容取米。作粥飯食之。其根大如栗。亦如雞頭子根。飲年人亦食之。作藕香味。如栗子。昔楚王渡江。得萍實。大如斗。赤如日。食之甜如蜜者。蓋此類也。若水萍安得有實耶。三四月採莖。取汁。煮成膏。能拒火。又段公路北戶錄有睡蓮。亦此類也。其葉如荷而大。其花布葉數重。當夏盡開花。夜縮入水。晝復出。(李時珍)

【萍蓬草子】

性質 甘。澀。平。無毒。

主治 助脾厚腸。令人不饑。

【葵香】即玉竹之古籍別名。典見綱目。詳「玉竹」條。

十二畫 萎 落 葛 荊 虛 蝸 蝓 蛙 蚱 蟻 蛭

【萎陵菜】即柴胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『柴胡』條。

【菴藹】即白蒿之古籍別名。典見中國醫學大辭典。詳『白蒿』條。

【萎移】即玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【萎蕤】即玉竹之原名。詳『玉竹』條。

【葶】即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【落】即蒜之生於水中者。典見呂忱字林。詳『山蒜』條。

【苒花】即商陸花之原名。詳『商陸花』條。

【菴草】即葶麻之日本別名。詳『葶麻』條。

【虛中】即鑽乳石之古籍別名。典見吳普本草。詳『鑽乳石』條。

【虛飯】即冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【蝸】即蝸蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蝸蟲』條。

【蝓】即蝓蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蝓蟲』條。

【蝓蟻】即蝓蟻之別名。詳『蝓蟻』條。

【蛙食】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【蚱蟻】即全蠍之古籍別名。典見開寶本草。詳『全蠍』條。

【蚱蟻】即鼠婦之古籍別名。典見本經。詳『鼠婦』條。

【蚱蟻】即全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【蚱蟻】即雄蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。


【蚱蟻】即蚱蟻之古籍別名。典見綱目。詳『蚱蟻』條。

【蛭蟻】古籍別名。陸蠡（本經）附蝸蝓蠶土蝸。別錄）托胎蟲。蔡條鐵圍叢語。鼻涕蟲（俗名）蛭蝓（綱目）附蝸蝓。窮。糞。石。夾子。無殼。月。拔。伊（和漢藥考）無殼。蝸。蠶（爾雅）外國名詞。Bryozoa（英）

【蛭蟻】凡池澤間及牆壁石垣之陰溼地方。恒多生焉。

【蛭蟻】形體。蛭蟻為溼生之軟體動物。體闊三四分。長二寸餘。背面有網羅狀黑線。呈褐灰。褐色。或赤褐色。觸角為黑色。分泌多量黏液。

其所經之處。留下銀色線。此蟲晝伏暮出。食前類為生。冬季潛伏地下。若用食鹽。砂糖等撒於其體。則分泌黏液甚多。終致瘰癧而斃。



蝓 蟻

其所經之處。留下銀色線。此蟲晝伏暮出。食前類為生。冬季潛伏地下。若用食鹽。砂糖等撒於其體。則分泌黏液甚多。終致瘰癧而斃。

【蛭蟻】為蝸類。其液者為蝸牛。無液者用法。生搗塗敷。或焙研調傅。性質。鹹寒。無毒。效能。塗瘡癩。消腫痛。用作解蜈蚣毒之要藥。

主治。賊風。喘。僻。軟筋。及脫肛。驚癇。瘰癧。

歷代記述。攷證。【宋】寇宗奭本草衍義論蛭蟻曰。解蜈蚣蠍毒。

【明】李時珍本草綱目論蛭蟻曰。腫毒。熱。熱。瘡。腫。痛。【明】穆希雍本草經疏論蛭蟻曰。蛭蟻蝸牛。稟陰溼之氣而生。故味鹹氣寒。無毒。

經曰。清靜則肉腠閉拒。雖大風毒。毒弗能害也。如陰血虧竭。陽氣驟。授。則腠理不密。賊風乘虛而入。風。主。搖動。中於經絡。故鳴。僻。攣。軟。筋。筋。急。所。自。來。矣。又。風。為。陽。邪。筋。脈。得。之。皆。燥。急。鹹。寒。能。行。陰。潤。燥。軟。堅。則。筋。脈。舒。緩。經。絡。通。達。而。諸。證。除。矣。驚。癇。者。風。熱。也。脫。肛。者。大。腸。熱。也。曉。跌。者。血。脈。傷。必。發。熱。也。鹹。寒。除。諸。熱。所。以。主。之。蜈。蚣。性。畏。二。物。不。致。過。其。所。行。之。路。觸。其。身。即。死。故。人。取。以。治。蜈。蚣。毒。【清】張隱菴本草原論蛭蟻曰。蜈。蚣。感。雨。溼。之。氣。而。生。故。氣。味。鹹。寒。主。定。驚。清。熱。解。毒。輪。筋。寇。宗。奭。曰。蛭。蟻。能。解。蜈。蚣。毒。近。時。治。咽。喉。腫。痛。風。熱。喉。痛。用。管。脚。檢。之。內。入。喉。中。冷。吞。下。即。愈。

近人學說。馬叔循曰。驗方新編治瘰癧。條下有蛭蟻和搗銅錢合。罌之方。予初欲試其方。而難碎其。錢。一。日。捉。蛭。蟻。數。十。條。選。青。錢。五。六。枚。於。小。日。中。搗。之。頃。刻。而。塵。抹。之。錢。如。粉。而。亮。如。金。惟。治。瘰。癧。不。見。大。效。因。念。物。性。相。制。誠。不。堪。理。測。而。其。毀。銅。之。功。當。遠。勝。於。胡。桃。華。

齊也。

配合應用 ①治脚腫爛疥。臭穢不可近。用煨蚶十條。瓦焙研末。油調傅之。立效。(救急方)

②治痔熱腫痛。用大蛤蚶一箇。研泥。入片脣一字。燕脂。坯子半錢。同傅之。(大全良方)

施用宜忌 凡無實火熱毒者禁用。

參攷資料 按秦樵鏡園證語云。嶺南地多蜈蚣。大者二三尺。蝮人寃死。惟見托胎蟲則踴躍不行。蟲乃登其首。陷其腦而死。故以此蟲生痔塗蜈蚣傷。立時疼痛止也。又大全方云。痔熱腫痛。用大蛤蚶一箇。研泥。入龍腦一字。燕脂。坯子半錢。同傅之。先以石薺煮水。濕洗尤妙。五羊大帥趙尚書夫人病此。止以蛤蚶京墨研塗亦妙。大抵與蛤牛同功。(李時珍)

【蛤蜊】即蜆蝦之古籍別名。典見本草集註。詳「蜆蝦」條。

【蜆蝦】即木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

【蛤粉】原名 蛤蚶粉。命名 蛤類之有利於

十一 蠶 蛤

人者。故名蛤蚶。蛤粉。即用蛤蚶殼煨末所成之粉。

古籍別名 蛤蚶粉。海蛤粉。(綱目)

基本 係水族動物介類蚌蛤屬。用海蛤蚶殼煨成之粉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海蛤粉產廣東鹹水海。新安平海一帶多出。

形體 蛤蚶大者二三寸。其殼幾為正圓形。外面黃褐色。輪紋稍高。內面白色。煨研之。成爲極細之白粉末。

採取 春夏間採之。

製法 朱震亨曰。蛤粉用蛤蚶燒煨成粉。不入煎劑。李時珍曰。按吳球云。凡用蛤粉。取紫口蛤蚶殼。炭火煨成。以熟糯棧速于同搗和成團。風乾用。最妙。

用法 恒以剉末和藥。

性質 鹹寒。無毒。

效能 清熱。利濕。化痰。散結。用作收斂劑。又爲軟堅藥。

主治 熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣。白濁帶下。同香附末。薑汁調服。主心疝。

蛤

歷代記載攷證 【明】李時珍

本草綱目論蛤粉曰。清熱利溼。化痰。定喘嗽。止嘔逆。消浮腫。利小便。止遺精白濁。心脾疼痛。化積塊。解結氣。消癥核。散腫毒。治婦人血病。油調塗湯火傷。【清】黃宮楠本

草求真論蛤粉曰。蛤蚶粉即海內水蚌殼。煨而爲粉也。與黃海淡水蚌殼不同。功與牡蠣相似。但此止有斂滯化堅解熱之力。故能消痰

止咳。治腫。昔宋徽宗寵妃患此。李防禦覓得市人海蚌蛤蚶粉。少加青黛。以淡鹽水加麻油敷。調服而愈。亦是斂肺清熱之意。無他治也。內鹹。解酒熱。文蛤背有紫斑

紋。比較蛤蚶殼稍厚。性味。主治頗近。但此性發利水。止渴除煩。並治血熱崩中。帶下。總取其寒鹹滲飲之義耳。海蛤係海內爛壳。混雜沙

泥。火煨爲粉。亦屬利水消腫。止咳之品。然總不類牡蠣。功專收滯固脫。解熱爲事也。

配合應用 ①治氣虛水腫。昔滁州酒庫撤司陳通。患水腫垂死。諸醫不治。一僮令以大蒜十個。搗如泥。入蛤粉丸。梧子大。每食前白

湯下二十九丸。服盡小便下數桶而愈。(醫濟方)

②治心氣疼痛。真蛤粉炒過。白。佐以香附末等分。白湯洋服。(聖惠方)

③治白濁遺精。潔古云。陽盛陰虛。故精泄也。真珠粉丸主之。用蛤粉煨一斤。黃柏新瓦炒過一斤。爲細末。白水丸。如梧子大。每服一百丸。空心用溫酒下。日二次。蛤粉味鹹。而且能補腎陰。黃柏苦而降心火也。

④治雀目夜盲。真蛤粉炒黃爲末。以油鹽化和丸。梟子大。內於豬腰子中。應紫定蒸食之一日。一服。(儒門事親方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 ①蛤粉能降能消。能奠能燥。(朱震亨) ②寒制火而鹹潤下。故能降。寒散熱而鹹走血。故能消。爲。堅者奠之以鹹。取其屬水而性潤也。溼者燥之以滲。取其經火化而利小便也。(李時珍)

③海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別

用。

用。

用。

用。

江湖之蛤粉蚌粉也。今人指稱曰海粉。蛤粉。寇氏所謂紫蛤之灰是矣。近世獨取蛤蚧粉入藥。然貨者亦多紫蛤也。大抵海中蚌蛤蚧。性味鹹寒。不甚相遠。功能軟散。小異大同。非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬。但能清熱利溼而已。今藥肆有一種狀如線粉者。謂之海粉。得水則易爛。蓋後人因名售物也。然出海中沙石間。故功亦能化痰。與

【蛤粉炒阿膠】即阿膠以蛤粉拌炒成者之方用名。詳『阿膠』條。其肉充海錯。亦作為膏鹽。其殼火煨作粉。名曰蛤蚧粉也。汪機

【蛤蚧】命名 本品雄者為蛤。雌者為蚧。夜聞其鳴聲。一曰蛤。一曰蚧。遂因其聲而命其名也。

處方用名 蛤蚧尾。對蛤蚧。古籍別名 蛤蚧(日華)僂蛤(綱目)

基本 係爬蟲類脊椎動物蜥蜴屬之蛤蚧。產地 陳仁山藥物生產辨云。

蛤蚧產廣西。以龍州為多。其次瀘壩。貴縣。南寧。百色等。均有出。梧州乃聚處。實非梧州所產。

形體 蛤蚧為蜥蜴同類異種。長四五寸。首如蝦蟆。背綠色。有白點。或鮮紅斑紋。其鱗如米粟。為十二行。居梁棟破壁間。夜出食蟲。雄者皮粗口大。身小尾短。雌者皮細口尖。身大尾小。雌雄相呼。累日相交。兩兩互抱。捕者壁之。雖死不開。故入藥其尾功效尤著。

製法 雷敏曰。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙。焙令乾。以瓷器盛。懸屋東角上一夜。用之。力可十倍。勿傷尾也。日華曰。凡用頭足。洗去殼內不淨。以酥炙用。或用蜜炙。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘。息者為真也。宜丸散中用。

性質 鹹。平。有小毒。效能 補肺腎。定喘嗽。用作滋養強壯藥。

主治 久咳嗽。肺勞傳尸。殺鬼物邪氣。下淋瀝。通水道。歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論蛤蚧曰。肺痿咯血。咳嗽上氣。治折傷。【宋】日華諸家本草論蛤蚧曰。下石淋。通月經。治肺氣。療咳血。【明】李時珍本草綱目論蛤蚧曰。肺氣。益精血。定喘止咳。療肺癆。消渴。助陽道。【明】樞希雍本草經疏論蛤蚧曰。蛤蚧味鹹。氣平。有小毒。其主久肺勞。傳尸。鬼物邪氣。咳嗽。淋瀝者。皆肺腎為病。勞極則肺腎虛而生熱。故外邪易侵。內

證兼發也。蛤蚧屬陰。能補水之上源。則肺腎皆得所養。而勞熱咳嗽自除。邪物鬼氣自去矣。肺朝百脈。通調水道。下輸膀胱。肺氣清。故淋瀝水道自通也。又顧珩海槎錄云。廣西橫州甚多蛤蚧。牝牡上下相呼。累日情洽。乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不閉。乃用熟稿草細纏。蒸過。暴乾。售之。煉為房中之藥。甚效。尋常捕者。不論雌雄。但可為雜藥用。【清】黃宮繙本草求真論蛤蚧曰。蛤蚧絕與蛤蚧不類。生於廣南。身長七八寸。首如蝦蟆。背綠色。斑頭圓肉滿。鱗小而厚。鳴則上下相呼。雌雄相應。情洽乃交。兩相抱負。

自墮於地。往捕劈之。至死不閉。大助命門相火。故普載為房術要藥。且色白入肺。功兼人參羊肉之用。故用能治虛損痿弱。消渴喘嗽。肺痿吐沫等症。專取交合肺腎諸氣。入藥去頭留尾。酥炙口含少許。雖疾走而氣不喘。則知益之功為莫大焉。但市多以龍子混冒。舉世亦不深辨。如龍子則剖開而身多赤。症皮。搗助陽火。雖治陽痿。性少止瀉。蛤蚧則纏束多對。通身白鱗。兼溫肺氣。故補氣喘之最宜。其藥不論牝牡皆可。即非相抱時捕之。功用亦同。但其藥力在尾。尾不全者不效。去頭足。

辨偽 鄒育巖曰。蛤蚧生嶺南山谷。及城牆或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。自惜其尾。見人取之。多自嚼斷其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。北戶錄云。其首如蝦蟆。背綠色。上有黃斑點。如古錦紋。其聲最大。蘇頌云。入藥肆須雌雄兩用最。或云陽人用雄。陰人用雌。雷敏曰。雄為蛤。身小尾粗。雌為蚧。皮細口尖。身大尾小。氣味鹹平。有小毒。治虛勞嗽。

一三七四

嗜。助陽益精。大有奇功。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘。息者為真也。今市肆有一種紅點蛤蚧者。有大毒。萬不可服用。用者須揀尾全者。細驗皮色。有無紅點。方可入藥。曹炳章曰。按唐暎日記云。蛤蚧蛇身而四足。形如鸚鵡。身有瘡。五色俱備。其疥處又似蝦蟆。最臭惡。余初入鎮安。路旁見之。疑為四足蛇。甚惡之。問土人。乃知為蛤蚧也。郡衙傍山。處處有之。夜輒聞其鳴。一聲曰。蛤。一聲曰。蚧。能叫至十三聲。方止者。乃佳。其物每年一擊。十三聲。則年久而有力也。能潤肺納氣。壯陽益氣。口咬物。則至死不釋。故捕者。輒以小竹片。縛之。使咬。即携之來。雖已入石縫中。亦可乘其咬而擊出也。遇其雌雄相接時。取之。則有用於房中術。然不易遇也。藥肆中所售。兩兩成對者。乃取其兩身。聯屬之耳。其力在尾。而頭足有毒。故用之者。必尾全而去其頭足。鄭君云。紅點。或指活時言。其活時。身上五色俱備。在市上通行者。色皆青綠。色有鱗。而無紅點也。

十二畫 蛤

近人學說。程登瀛云。蛤蚧入爬蟲類。與蜥蜴同類。異種。英文名作 *Lacerta*。謂有烏紅二種。體細長。作圓筒狀。四肢短小。無蹠趾。爪銳利。趾間有鱗片。善附着他物。首似蝦蟆。兩頰有細齒。頭旁有發音膜。膜後各有一小竅。若雞耳。此發音器之橋。成與蝦蟆異。意其發聲不從口出也。背被以細鱗。青綠色。有黃紅點。或黃褐灰暗色。上有鮮紅斑點。居樑棟破壁間。舊謂產於廣西。余見自安南至暹羅。宋卡。處處有之。宋卡以下。英屬馬來各地。則無此物。惟中國地產者。色暗。而暹地產者。色較淺淡。為稍異耳。余初至暹境。一夜忽聞吭厲之鳴聲。審視之。一爬蟲。長可五六寸。遊行於牆隅。為前所不曾見者。詢問同僑。或云壁虎。或云本頭公雞。一本頭公。即叻坡之大伯公。察其形態。絕似蛤蚧。佛寺路亭。每座必有一對。多則三四對。鳴一聲。轉兩音。若『獨架』。『獨架』聲。隆而響。厲。非雌雄互叫也。暹人擬呼為 *Tokah*。譯音即獨架。華僑亦多從之。傳說。此物棲於屋內。主興旺。又謂暹國

十三省。能聞其連鳴十三聲。『常叫七八聲即止』。方止者。為將來富冠全國之徵兆。暹為佛教國。此物神秘意思。故擾人清夢。而人不堪。甚惡之。有惡之者。則以紅烟和紅灰。為餌。誘捕之。年來在暹地見詩歌筆記之誌。志此物者。名人人殊。余欲知其載籍。作何名。乃從書本上抄錄。蜥蜴類。如大守宮。壁虎。鱧虎。草龍。石龍。蛇。四脚蛇等。凡三年積二十七條。錯綜互見。形態習性。皆與此不符。惟名之曰『蛤蚧』。最為恰當。但未聞有人稱為蛤蚧。捉之入藥。故不敢告人。但以蛤蚧示暹人。皆隨口答曰。獨架。其相像之點。亦可想見矣。嗣後捉兩隻。曬乾。與蛤蚧比勘。色帶灰褐。紅綠斑點。亦較鮮明。惟辨物須從固形之特徵。區劃。色彩小異。不足為區別標準。譬如人固一望而知其為人。若細察其色相。蓋無一不相肖者。近見暹醫探入藥。就詢之。據云。入酒浸劑。功能去風溼。益氣力。翻查英暹文動物學書。暹名獨架。英文名作 *Lacerta*。與蛤蚧英名 *Lacerta*。有烏紅二種之說。全相吻

合。至是我以為 *Lacerta*。即蛤蚧之疑。想可得證實矣。鄭君云。市上有紅點蛤蚧。殆即此物。但謂有大毒。萬不可服。則尚須研究。方書載。蛤蚧有小毒。紅蛤蚧。當然亦有毒。用時。祇須修淨。酒製。便可穩當。遺毒之大小。頗難分別。要在用量。與炮製。為異耳。毒蛇至毒也。去頭皮。骨髓。同玉桂。明矾。黃食。閩人視為清補妙品。潮人竟成條。焙魚入酒。以治瘡。暹人取毒蛇。頭散服。以治癰腫。初見之。莫不駭怪。詎知毒。毒素正。所以治病也。况蜥蜴類。大多無毒。不傷人。南洋華僑。勞動界。常採用四脚蛇。野蛇。浸酒者。亦以此類物。體中含有特種阿磷液。利去風溼。可以從化驗證實之。故余以為。潤公河以南所產之紅蛤蚧。亦可以入藥也。暹人用之。亟稱其功效。甚著。可為左證。按南洋所謂四脚蛇者。長二尺以上。重至六七斤。皮堅韌。可製錢袋。卵大如鵝蛋。拾獲。將出殼之蛇。胎一窠。四五粒者。值三四元。為主治風痺之要藥。與辭書所載。『蜥蜴。胎生長六七寸。尾易斷。斷後復生。常棲於石

壁之類。又名石龍。俗稱四脚蛇。之說。頗不相符。遙地平原尚多原野。草木茂密。熱帶產之爬蟲。處處有之。蜥蜴類尤為蕃盛。此類多無毒。不咬人。嘗經目睹者有十餘種。昨天還童捉一物到寓。頭身形態似蛤蚧。長六七寸。尾長尺許。作三稜狀。身上被以無色透明之薄鱗。(能自脫換。若蛇退不成條)背赤褐。有淺黃色星點。肢短。五趾長而屈曲。爪勾利(頗似圖畫之龍爪)蛇舌不能鳴。棲於山野石壁間。遇名蟻甲入窠。我疑此即石龍蜥也。唯其舌分歧。常自伸縮如蛇。與載籍微有不同耳。

配合應用 ●治久嗽肺癆。寇宗奭曰。久嗽不愈。肺積虛熱成癆。咳出膿血。晝夕不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。用蛤蚧。阿膠。鹿角膠。生犀角。羚羊角各二錢。半。用河水三升。銀石器內。文火熬至半升。濾汁。時仰臥臥呷。日一服。

●治喘嗽面浮。并四肢浮者。蛤蚧一雌。一雄。頭尾全者。法酒和蜜塗之。炙熟。蒸固。人參。似人形者。半兩。為末。化蠟四兩。和作六餅。每食

糯米薄粥一盞。投入一餅。攪化。細熱呷之。(普濟方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非關脾胃兩虛。而有風寒實邪者。禁用。

參攷資料 ●昔人言補虛弱。人參羊肉之屬。蛤蚧補肺氣。定喘止咳。功同人參。益陰血。助精扶羸。功同羊肉。近世治勞損弱。許叔微治消渴皆用之。俱取其滋補也。劉純云。氣液衰陰血竭者。宜用之。何大英云。定喘止咳。莫佳於此。(李時珍) ●蛤蚧生嶺南山谷。及城隍或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。最惜其尾。見人取之多。自嚼斷其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。揚雄方言云。桂林之中。守宮能鳴者。俗謂之蛤蚧。蓋相似也。(馬志) ●生廣南水中。夜即居於榕樹上。雌雄相隨。投一獲。二。近日西路亦有之。其狀雖小。滋力一般。俚人採之。割腹以竹張開。曝乾醫之。(李珣) ●人欲得首尾全者。以兩股長柄鐵叉。如黏蠶等狀。伺於榕木間。以叉刺之一股中。腦一股着尾。故不能嚼也。入藥須


雌雄兩用。或云陽人用雄。陰人用雌。(蘇頌) ●蛤蚧一物。確是生息於牆隅屋角者。試審察其足。短趾薄爪。利便知是為遊絲之用。若生於山地池塘。即為兩棲類。必須具備善走善躍之足。兼有潛水習性。乃能適應生存。此物類之公例也。據說。曾於叻坡京菓舖酒樓前。看過生活者。以小竹籠拘禁。放於水桶。裝插標發售。曰。梧州生蛤蚧。以是可知其為水產物云。我亦曾見過。那似乎是鬼蛤而非蛤蚧。其形相似而實不同也。(程登瀛)

●鬼蛤。一作桂蛤。亦以廣西蒼梧產為最著。閩南嶺東亦有之。俗名烏鬼魚。學名疑即鱗鱗。山淵池中常見之。形色似蝦蟆。身滑無鱗。色黑。腹赤。自有黑斑。四足短小。不適於步行。尾長而扁。為便於游泳之用。此屬兩棲類。大蛙之有尾者。與蛤蚧之屬。蜥蜴類。科屬亦不相同也。想不僅足下一人有此懷疑。故公問答。辯向望助坡同志。往粵人京菓舖審視之。放水桶中者。果為蛤蚧乎。抑如上述之桂蛤乎。(程登瀛)

【蛤蚧尾】即蛤蚧之處方用名。詳「蛤蚧」條。

【蛤魚】即田雞之古籍別名。真見綱目。詳「田雞」條。

【蛤蜊肉】 性質 鹹。冷。無毒。
主治 養食醒酒。



蛤 蜊 肉

歷代記述攷證 【宋】寧禹錫嘉祐補註本草論蛤蜊肉曰。潤五臟。止消渴。開胃。治老癯為寒熱。婦人血塊。宜煮食之。

參攷資料 ●高武痘疹正宗云。俗言蛤蜊海鏡。能發疹。多致傷損脾胃。生痰作嘔。作瀉。此皆嘲笑作罪也。又言痘毒入目者。以蛤蜊汁點之。可代空青。夫空青得銅之精氣。而生性寒。可治赤目。若痘毒是臟腑毒氣上衝。非空青可治。蛤蜊雖寒。而溼中有火。亦不可不知矣。(李時珍) ●蛤蜊肉性雖冷。乃與丹石人相反。食之令腹結痛。(陳藏器)

【蛤蚧粉】即蛤蚧之原名。詳『蛤蚧』條。

【蛤蕒】即蕒蕒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕒蕒』條。

【蛤蚧】即蛤蚧之古籍別名。典見諸家本草。詳『蛤蚧』條。

【蟹】即馬陸之古籍別名。典見綱目。詳『馬陸』條。

【蟻】即蟻之古籍別名。典見綱目。詳『蟻』條。

【訶子】原名 訶梨勒。命名 訶梨勒。梵音。天主持來也。

【方用名】訶子炭。訶子肉。古醫別名 苛子。阿子。柯子。推實亦一名柯子。漉翁。(和漢藥考) 隨風子。(圖經)

外國名詞 Terminalia chebula, Potz (拉丁) Myrobalan. (英)

基本 屬使君子科。為訶梨勒之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。訶子來自架喇吉打。九月新。向日中國有出。味質更佳。和漢藥考曰。係產印度地方。

形態 為褐色卵圓形之石質。類槌實。縱有六稜。皮厚而有皺紋。及光澤。內部堅實。帶黃色。味苦。採取 七八月間。採六路者。製法 雷斅曰。凡使訶子。須以酒浸後蒸一伏時。以刀削去路。取細到焙用。用肉則去核。性質 苦溫。無毒。

成分 主要素含有沒食子酸 $(C_{15}H_{14}O_6)$ 。單寧酸 $(C_{12}H_{10}O_5)$ 。及沒食子糖 $(H_{10}O_4 \cdot 2H_2O \cdot 5\%)$ 。及沒食子糖酸。故印度地方。用於染色及鞣皮術等。

效能 斂肺。瀉腸。用為瀉痢藥。及作收斂藥。又治赤痢。腸黏膜炎。作用 入胃後。令胃內之 PO_4 及蛋白質皆凝固。而消化力被阻。且能將胃黏膜收縮。使分泌減退。至腸能收縮腸壁之微血管。減輕下痢。且微有殺菌之功。由腸壁吸入血中。能使血液流動之血管收縮。阻止血液及白血球之滲出。故有間接止血之功。又能使腸收縮而減下痢。

主治 冷氣。心腹脹滿。下食。歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論訶子曰。破胸膈結氣。通利津液。止水道。黑髮。【唐】蘇炳四聲本草論訶子曰。下宿物。止腸辟久洩。赤白痢。【唐】蘇恭新修本草論訶子曰。治痰嗽。咽喉不利。含三數枚。殊勝。【宋】大明日華諸家本草論訶子曰。消痰下氣。化食開胃。除煩治水。調中止嘔吐。霍亂。心腹虛痛。奔豚腎氣。肺氣喘急。五膈氣。腸風瀉血。崩中帶下。懷孕瀉胎。及胎動欲生。脹悶。氣喘。并患痢人。肛門急痛。產婦陰痛。和蠟燒烟熏之。及煎湯薰洗。【元】朱丹溪本草衍義補遺論訶子曰。實大腸。斂肺降火。【明】經希雍本草經疏論訶子曰。訶梨勒其味苦澆。其氣溫而無毒。苦所以洩。澆所以收。溫所以通。惟斂故能主冷氣。心腹脹滿。惟溫故能下食。甄權用以止水道。蘇炳用以止腸辟久洩。蘇頌用以療腸風瀉血。帶下。朱登亨用以實大腸。無非苦澆收斂。皆治標之功也。

【明】李士材本草圖解論訶子曰。訶梨勒即訶子。酸苦澆溫。肺與大腸藥也。酸澆能固腸止瀉。苦溫可下氣寬中。止嗽化痰。亦下氣之功。

腸風止血。亦固腸之力。生用則能清金行氣。煨熟則能溫胃固腸。波斯國大魚放涎。水中凝滑。船不能通。投訶子湯。尋化為水。則其化痰可知。甄權煨去核。【清】黃宮繡本草求真論訶子曰。訶子味苦澆溫。氣溫無毒。雖有收斂止瀉之功。然味苦居多。服之反使氣下泄。故舊載能消痰降火。止喘定逆。且於虛人不宜獨用。至於嗽痢初起。用最切忌。以其止有劫截之功耳。服此能平胃和中。亦能消膨去脹。使中自和。用非脾胃虛弱。於中實有補也。波斯國人行舟。遇大魚涎。滑數里。舟不能行。投以訶子。其滑即化。則其化涎消痰。概可見矣。第性兼收澆。外邪未除。其切禁焉。出番船及嶺南。色黑肉厚者良。酒蒸去核用肉。生清肺氣。熱溫胃固腸。【清】楊時泰本草述鈞元論訶子曰。方書於訶子有止用皮者。有止用肉者。其肉先澆次苦。而澆不敵苦。又次酸及甘。乃其微。是肉之為用。降瀉居多。而澆中猶有收斂。更合於中土之氣。而不盡瀉也。其皮澆與苦等。次止有甘亦甚微。是皮之瀉

十二畫 蛤 蚧 訶

能散苦。瀉猶未極。又止帶。甘則瀉中尤有緩也。二者須索其肉之有異以施治。乃為得之。再按訶子下逆氣。瀉結氣。通積聚。利咽喉。歷考成方。如息賁之枳實散。伏梁之半夏散。奔豚之木香檳榔散。便閉之七宣丸。又聲痞之訶子湯。核核氣之清咽屑。或止同於降瀉。從邪之寶者論治。或更同於寒涼之降瀉。從實邪之有熱者論治也。又如胸痞氣滯。脇肋刺痛之沉香升降散。胸痺喘息之利膈散。息賁之半夏湯。喘證之蘇杏散。或兼補劑。從虛中有實者論治。或更兼溫補。從虛中有寒者論治也。是其降瀉為功。豈得畏氣虛而不用乎。至又有用其酸與瀉者。義固非與降瀉相反也。人身肺氣猶天。其職司降。而有降即有收。自飛門至於魄門。皆一氣之所貫。經故曰。魄門亦為五臟使。言臟腑精粕。固由其瀉。而臟氣升降。亦藉以調。訶子入手太陰陽明。其味始於清苦。終於酸甘。降與收隨所合而為用。是以丹溪治久嗽。叔劑。則同於百藥煎。荆芥穗。河間治失音發聲。則同於桔槔。木通。

童便。東垣以止久痢。則同於御米殼。乾薑。陳皮。寶鑑則合於椿白皮。母丁香。其通便閉也。合杏仁。麻仁。枳殼為二仁丸。協柴胡。枳實。桃仁。大黃。木香為七宣丸。釋此不可以識訶子之長技。亦惟我所使歟。總之用以降瀉。宜於氣實。實者邪氣實。用以收瀉。則宜於氣虛。虛者正氣虛。此中後先主輔。惟當適事為故耳。至繆氏致慎於火嗽。溼熱痢立論。良是。第丹溪治火嗽。久病有同杏仁。青黛。海粉。皂角。膽星。而用者。又治溼熱久痢。有同地榆。當歸。木香。黃連。阿膠。烏梅。而用者。正可推此類以盡變也。又如滑瀉之治。有訶子散以治熱。更有訶子丸以治寒。舉寒熱而皆宜。其故可思矣。再河間治熱滑。訶子散用訶子。木香。黃連。甘草。其云腹脹痛漸止。瀉下漸少。宜此藥止之。如止之不已。宜因其歸而送之。加厚樸一兩。竭其邪氣也。玩此則主輔應有合宜之味。而火嗽溼熱痢。又何不宜於訶子耶。清。賈九如辨藥指南論訶子曰。訶子味苦而帶酸澀。能降能收。兼得其善。蓋令空則鳴。肺氣為

火邪鬱遏。以致吼喘咳嗽。或至聲啞。用此降火斂肺。則肺竅無壅塞。聲音清啞矣。取其澀可去脫。若久瀉久痢。則實邪去而元氣脫。用此同健脾之藥。固澀大腸。瀉痢自止。但若能泄氣。真氣太虛者。宜少用之。

配合應用 治肺虛受寒喘嗽。用訶子人參。

訶子得橘皮。砂仁。主冷氣入內。心腹脹滿。及因寒食不下。

訶子得益智。止氣虛寒。小水不禁。

訶子佐枳椇根白皮。止腸瀉瀉血。

訶子佐白朮。蓮實。止久洩因於虛寒。

訶子同蛇牀子。五味子。山茱萸。杜仲。續斷。止虛寒帶下。

訶子同人參。肉苳蓉。則實大腸。

治下氣消食。訶黎一枚為末。瓦器中水一大升。煎三兩沸。下藥更煎三五沸。如麴塵色。入少鹽飲之。(食醫心鏡方)

治一切氣疾。宿食不消。訶黎

一枚。入夜含之。至明嚼嚙。又訶黎三枚。溼紙包煨熟。取核細嚼。以牛乳下。(千金方)

治氣嗽日久。生訶黎一枚。含之。唾汁。後口爽。不知食味。却煎檳榔湯一饌服。立便有味。此知連州成密方也。(經驗方)

治嘔逆不食。訶黎勒皮二兩。炒研粉。丸梧子大。空心湯服二十丸。日三服。(廣濟方)

治風痰雀亂。食不消。大便瀉。訶黎三枚。取皮為末。和酒頓服。三五次。妙。(外臺秘要方)

治小兒雀亂。訶黎一枚為末。沸湯服一半。未止再服。(子母秘錄方)

治小兒風痰。癰閉。語音不出。氣促喘悶。手足搖動。訶子半生。半炮。去核。大腹皮等分。水煎服。名二聖散。(全幼心鑑方)

治風熱街頂熱閉。訶黎二枚。為末。芒硝一錢。同入醋中。攪令消。

治氣弱水瀉。訶黎勒十枚。麴。煨火煨熟。去核研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。又長服方

治風熱街頂熱閉。訶黎二枚。為末。芒硝一錢。同入醋中。攪令消。

治氣弱水瀉。訶黎勒十枚。麴。煨火煨熟。去核研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。又長服方

治一切氣疾。宿食不消。訶黎

訶黎勒、陳橘皮、厚朴各三兩。搗篩蜜丸。大如梧子。每服二三十丸。白湯下即愈。(陶經本草方)

⑤ 治水瀉下痢。訶黎勒炮二分。肉豆蔻一分爲末。米飲每服二錢。(聖惠方)

⑥ 治下痢轉白。訶子三箇。二炮。一生爲末。沸湯調服。水痢加甘草末一錢。(普濟方)

⑦ 治赤白下痢。訶子十二箇。六生六煨。去核焙爲末。赤痢生甘草湯下。白痢炙甘草湯下。不過再服。(趙原陽濟急方)

⑧ 治妬精下疳。大訶子燒灰。入麝香少許。先以米泔水洗後揉之。或以荊芥、黃蘗、甘草、馬鞭草、葱白煎湯洗亦可。昔方士周守眞醫唐精爛莖一二寸。用此取效也。(洪邁夷堅志方)

⑨ 用蠶 八分至錢半。

⑩ 應用宜忌 凡肺脾有實火與實邪者禁用。

⑪ 著名方劑 ① 訶黎勒散。治氣痢。(金匱方) 訶黎勒十枚。(煨) 作爲散。粥飲和頓服。② 訶黎勒丸。治腸胃積寒。久痢純白。或有青黑。日

十二畫 訶

象

夜無度。(局方) 肉豆蔻(去皮) 木香、乾姜(泡)各二十兩。縮砂仁、訶黎勒皮、川烏頭(泡去皮臍) 白礬(煨)各十分。龍骨(洗) 赤石脂各八十兩。爲末。用粟米飯爲丸。如梧子大。每服二十九至三十九丸。溫粟米飲下。食前服。甚者加倍。② 訶黎勒丸。治大腸虛冷。瀉瀉不止。腹痛引痛。飲食不化。(濟生方) 訶黎勒(麵包煨) 附子(泡) 肉豆蔻(麵包煨) 木香、吳茱萸(炒) 龍骨(生用) 茯苓、藜蘆等分爲末。生姜汁煮麵糊丸。如梧子大。每服七十丸。空心米飲下。

參攷資料 ① 訶黎勒氣虛人亦宜。緩緩煨熟少服。此物雖瀉腸而又泄氣。其味苦澀故爾。(寇宗奭) ② 肺苦氣上逆。急食苦以泄之。以酸補之。訶子苦重瀉氣。酸輕不能補肺。故嗽藥中不用。(李杲) ③ 訶子同烏梅五倍子用則收斂。同橘皮、厚朴用則下氣。同人參用則能補肺治咳嗽。東垣云。嗽藥不用者非矣。但咳嗽未久者不可驟用爾。替合草木狀言作飲久服。令鬚髮白者變黑。亦取其澀也。(李

時珍) ④ 訶黎皮主嗽。肉主眼瀉。痛。波斯人將訶黎勒大腹等在船上用防不虞。或遇大魚放涎滑水中數里。船不能通。乃煮此洗其涎。滑。尋化爲水。則其治氣消痰功力可知矣。(李杲) ⑤ 金光明經言。流水長者除病品云。熱病下藥服訶黎勒。又廣異記云。高仙芝在大食國得訶黎勒長三寸。置抹肚下。便覺腹中痛。因大痢十餘行。疑訶黎勒爲祟。後問火食長老云。此物人帶一切病消。利者乃出。靈物爾。仙芝寶之後被誅。失所在。(唐慎微) ⑥ 今嶺南皆有。而廣州最盛。樹似木槿。花白。子形似稻子。椹黃。青黃色。皮肉相着。七八月實熟時。採六路者佳。嶺南異物志云。廣川法性寺有四十五株。子極小而味不澀。皆是六路。每歲州貢。只以此寺者。寺有古井。木根蘸水。水味不鹹。每子熟時。有佳客至。則院僧煎湯以延之。其法用新摘訶子五枚。甘草一寸。破之。汲井水同煎。色若新茶。今其寺謂之乾明古寺。尚在。舊木猶有六七株。南海風俗尙貴此湯。然煎之不必盡如昔時之法也。訶

子未熟時。風飄墮者。謂之隨風子。曝乾收之。益小者佳。彼人尤珍貴之。(蘇頌) ⑦ 凡使勿用毗黎勒。個个毗頭也。若訶黎勒文。只有六路。或多或少。並是雜路。皆圓而露文。或八路至十三路。號曰椰精。勒。渣不堪用。(雷敫) ⑧ 訶子炭。即訶子炒黑者之處方用名。詳訶子條。 ⑨ 訶子核。主治 磨白蜜。注目。去風赤痛。神良。 歷代記述攷證 ① 明李時珍本草綱目論訶子核曰。止咳及洩痢。 ② 訶子葉。主治 下氣消痰。止渴及洩痢。煎飲服。功同訶黎。 ③ 訶梨子。即檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳檳榔條。 ④ 訶梨勒。即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳訶子條。 ⑤ 訶黎勒。即訶子之原名。詳訶子條。 ⑥ 象毛。即金鎖銀關之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳金鎖銀關條。

【象牙】 處方用名 象牙屑。象牙絲。

古籍別名 伽耶牙。(戶北錄) 基本 爲嗜乳動物類象之牙齒。

產地 陳仁山藥物生產辨云。象牙產自暹羅安南。其屑廣東象牙店有沽。

形態 象爲獸類。乃陸生動物中之最大者。體長丈餘。被毛極精。鼻長八尺許。爲圓筒狀。屈伸自然。食物賴鼻送口。先端有小塊突起。如人指。能拾纖介之物。頗覺銳利。眼細小。上顎之門齒有二。延長而挺出口外者。象牙也。下顎無門齒。四肢皆大。各有五趾。趾端有蹄。其尾稍小。先端爲總狀。其皮牙等俱可供藥用。

製造 剉末用。

性質 甘寒。無毒。

效能 止血斂瘡。拔毒生肌。用作收斂藥及清熱藥。

主治 諸錢及雜物入肉。刮牙屑和水敷之。立出。治癩病。刮齒屑炒黃。研末飲服。

歷代記述攷圖 【宋】蘇頌

祐圖經本草論象牙曰。諸物刺咽中。磨水服之亦出。若舊梳屑尤佳。

【明】李時珍本草綱目論象牙曰。主風癩癢。一切邪魅精物。熱疾骨蒸。及諸瘡。並宜生屑入藥。【清】黃宮繡本草求真論象牙曰。象牙味甘性寒。按象性主剛猛。而牙則善脫。故凡皮肉間有形滯物。及邪魅癢。瘡風癩。並惡瘡。內有毒未拔者。服之立能有効。以其具有脫性。故能以脫引脫耳。是以癰腫不解。用牙磨水服之。并挫末蜜塗之。即效。諸錢竹木刺入肉。刮削煎湯。溫服即愈。諸骨鯁入於喉。刮下薄片。類服即吐。不吐再服。以吐出爲度。

【清】張石頑張氏醫通曰。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨爛之末。生蜜調塗。治諸錢雜物入肉。荷梳刮薄片屑。溫湯類服。治竹木刺。及諸魚骨鯁。即時吐出。不吐再服。以吐出爲度。非刮下薄片。不能應手也。【清】張景岳景岳全書曰。味甘氣涼。能清心腎之火。可療驚悸風狂。骨蒸痰熱。鬼精邪氣。

配合應用 治小便不通服急者。象牙生煎服之。(救急方)

治小便過多。象牙燒灰飲服之。(聖濟總錄方)

治痘疹不收。象牙屑。銅銚炒黃紅色爲末。每服七八分或一錢。白水下。(王氏痘疹方)

治諸獸骨鯁。象牙磨水香之。(永類鈴方)

治竹刺入肉。象牙刮末。以水煮白梅肉。調塗自軟。(簡要濟衆方)

治錢箭入肉。象牙刮末。水和敷之。即出也。

用量 五分至八分。

參攷資料 眞臘風土記云。象牙殺取者上也。自死者次之。覓於山中多年者下矣。或謂一歲一換牙者。非也。(蘇頌) 西域重象牙。用飾牀座。中國貴之以爲笏。象牙。用飾牀座。中國貴之以爲笏。象牙。每脫牙。自埋藏之。崑崙諸國。人以木牙。潛易取焉。(甄權) 象牙取口兩邊各出一牙。下垂夾鼻者。非口內食齒。齒別入藥。今爲象笏者。是牙也。(寇宗奭)

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙絲】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙】條

【象皮】 主治 下疳燒灰和油敷之。又治金瘡不合。

參攷資料 象肉癰腫。人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。(李時珍)

【象肉】 性質 甘淡。平。無毒。 主治 燒灰和油塗禿瘡。

歷代記述攷圖 【宋】日華諸家本草論象肉曰。生煮汁服。治小便不利。燒灰飲服。治小便多。

參攷資料 象肉多食令人體重。(開寶) 象肉肥脆。少類豬肉。味淡而含滑。則其通小便者。亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化。故又能縮小便也。(李時珍)

【象尾毛】 參攷資料 象尾毛可去火。並可作剔牙篋。(趙學敏)

【象豆】即植糜子之古籍別名。典見開寶本草。詳【植糜子】條。

【象貝母】即浙貝母之處方用名。詳【浙貝母】條。

【象馬】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳【當歸】條。

【象骨】 主治 解毒。參攷資料 胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能淨(開寶)

【象睛】 主治 目疾和人乳滴之。

【象鼻草】 基本 象鼻草為雜草類之一種。可供藥用。產地 出舊雲南府境。主治 丹毒。跌撲損傷。

【象穀】 即粟子之古籍別名。典見綱目。詳「粟子」條。

【象頭花】 即由歐之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「由歐」條。

【象膽】 製法 雷斅曰。凡使勿用雜脂。其象膽乾後。上有青竹文斑。光膩。其味微帶甘。入藥勿便和案案。須先搗成粉。乃和案案。性質 苦。寒。微毒。主治 明目。治疳。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論象膽曰。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許。貼齒根。不且漱去數度。即瘥。參攷資料 象膽明目。能去塵。

膜也。與熊膽同功。雷斅炮炙論云。象膽揮黏是矣。李時珍

【象膽】 即蘆薈之俗名。詳「蘆薈」條。

【象糞】 採取 以野象者良。主治 燒焦雞掌風。和升麻水煎服。發瘋疹痘疔。

【貂鼠】 即貂鼠之古籍別名。典見綱目。詳「貂鼠」條。

【貂尾】 基本 貂出西北塞外。食松栗。即南中松狗之類。其行捷穿樹枝如飛。蓋以尾為用者。故其力在尾。主治 凍瘡。用貂尾燒存性為末。搽爛處。自愈。未破者。用舊貂皮毛。煨研。香油和搽。

【貂鼠】 古籍別名 栗鼠。(爾雅) 松狗貂。銀貂。(綱目)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂腳類。鼬鼠科。為貂鼠之肉。其毛皮詳見該條。產地 出北寒帶諸地。如東三省。三姓。琿春。寧古塔等處之山林中多有之。形態 貂鼠為鼠類之一種。大

如鼠。尾粗。毛長寸許。體狹長約二尺。形如鼬。口吻尖銳。有黑點。耳殼短而圓。四肢短。前比後更短。趾有鈎爪。毛色黃。或紫黑。可作裘服。甚貴。其肉可供藥用。

種類 毛色帶黃者名黃貂。毛色帶白者名銀貂。性質 甘。平。無毒。主治 功用同鼠肉。

【貂鼠毛皮】 主治 塵沙眯目。以裘袖拭之。即出。凍瘡未潰。以舊者煨研和塗。【鼬鼠】 即鼬鼠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼬鼠」條。

【貴老】 即橋皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橋皮」條。

【買子木】 即買子木之古籍別名。典見綱目。詳「買子木」條。

【買麻藤】 命名 本品堅韌如麻。故名。麻言買其藤。猶得麻也。故名。產地 出廣東高要縣一帶。

形態 買麻藤為蔓草類之一種。綠樹而生。莖多汁液。折斷飲之。可以止渴。結子味苦。可食。其藤又可製履與供藥用。

主治 蛇咬。鮮乾俱效。【貽貝】 即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【貽貝】 即淡菜之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「淡菜」條。

【貴龜】 古籍別名 三足龜。(爾雅) 基本 貴龜為龜類之一種。身有三足。其肉可供藥用。主治 消脹。辟時疾。

【越王蛇】 即兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳「兩頭蛇」條。

【越王約髮】 即兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳「兩頭蛇」條。

【越王鳥】 即鸞之古籍別名。典見綱目。詳「鸞」條。

【越王頭】 即椰子之古籍別名。典見綱目。詳「椰子」條。

【越王餘算】 命名 相傳本品為晉安越王渡南海。將黑角白骨作算籌。其有餘者。棄水中。而生此物。故名。古籍別名 白珊瑚。產地 生海中。形態 越王餘算為水草類之一種。其質堅緻似珊瑚。惟色白幹

十二畫 象

貂 貓 貴 買 貽 賁 越

直。無枝。可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 水腫浮氣結聚。宿滯不消。腹中虛鳴。並煮服之。

【越瓜】

命名 本品出於越地。故名。

古籍別名 稍瓜(食物)菜瓜(綱目)長者名羊角瓜。醬瓜(俗名)白瓜。淺瓜(日本)

外國名詞 Cucumis Conomon, Thunb. (拉丁)シロウリ

アサウリ(日本)

基本 係葫蘆科胡瓜屬。為越瓜之果實。

產地 原產越中。今南北皆有之。

形態 越瓜為菜類之一年生蔓草本。就地蔓生。全體與甜瓜相似。花期花色亦相同。夏秋間結瓜實。橢圓形。長自七八寸至尺許。外皮淡綠色。越產者則白色。子如胡瓜子。大如麥粒。其果實可供食與藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 利腸胃。止煩渴。

歷代記述攷證 【明】常效先

心鏡篇論越瓜曰。和飯作餅。久食益腸胃。

參攷資料 ①越瓜生食多冷中動氣。令人心痛。臍下癥結。發諸瘡。又令人虛弱。不能行。不益小兒。天行病後不可食。又不得與牛乳酪及鮓同食。(孟詵) ②越瓜生食可充果蔬。醬醃糖醋浸皆宜。亦可作菹。按齋子真云。菜瓜能暗人耳目。親驗馬食之即眼爛。可知矣。(李時珍)

【越砂】即硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳「硃砂」條。

【越桃】即山梔子之古籍別名。典見別錄。詳「山梔子」條。

【越桐】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【越砥】即羊肝石之古籍別名。典見別錄。詳「羊肝石」條。

【越鳥】即孔雀之古籍別名。典見綱目。詳「孔雀」條。

【越椒】即食茱萸之古籍別名。典見博雅。詳「食茱萸」條。

【越雉】即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【跗蟪】即蛞蝓之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蛞蝓」條。

【軸脂】即車脂之古籍別名。典見綱目。詳「車脂」條。

【軹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【進賢菜子】即蒼耳子之古籍別名。典見記事珠。詳「蒼耳子」條。

【都勾樹】即莎木麵之古籍別名。典見綱目。詳「莎木麵」條。

【都念子】古籍別名。倒捻子。出粵省諸地。

形態 都念子為灌木類之一種。樹高丈餘。樸嫩叢生。枝柯細長似蜀葵。小而深紫。中心黃色。葉如白楊。花如芍藥。而小。春月開花。有紅白兩色。色鮮可愛。結實如柿。有四葉承之外。紫內赤。小而無核。味甚甘美。或謂有細核。嚼之瑟瑟有聲。味帶苦沁。子實可供食與藥用。

性質 甘。酸。小溫。無毒。

主治 痰嗽噎氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論都念子曰。暖腹腸益肌肉。

參攷資料 都念子為補血良

品。小兒食之則大便難暢。其產羅浮者尤佳。其皮漬之得膠。可以代柿。名海漆。與漆同功。功逾青黏。汁若臙脂。可作染料。其花可以釀酒。(醫學大辭典)

【都念子】即倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳「倒捻子」條。

【都念葉】 主治 夏秋暑濕下痢。亦可為麴用。

【都咸子】 產地 出嶺南山谷

形態 都咸子為喬木類之一種。樹如半。三月開花。結實大如指。長三寸。秋月成熟。色正黑。其子及木皮與葉俱可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論都咸子及木皮與葉曰。去傷寒清涕。嗽逆上氣。宜煎服之。

【都馬蛇】即蝮牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝮牛」條。

【都梔子】 古籍別名 梔子。(綱目)

產地 生嶺南山谷中。

形態 都枏爲喬木類之一種。樹高丈餘。二月開花。赤色。結實似木瓜。大如鵝卵。狀若青梅。秋月成熟。釀蜜餞。可供食與藥用。



都枏子

性質 酸。澀。平。無毒。
主治 久食益氣止洩。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論都枏子曰安神溫腸。治痔久服無損。【明】李時珍本草綱目論都枏子曰解酒止煩渴。

【都梁香葉】即澤蘭葉之古籍別名。與見本草集註。詳澤蘭葉條。【都淋蔞】即馬兜鈴之古籍別名。與見肘後方。詳馬兜鈴條。

【都管草】 古籍別名 香薷。(圖釋)

學名 *Angelica kusiana*, Max.

基本 係繖形科。爲都管草之根。

十二畫 都

產地 多在山谷田野間。

形態 都管草爲山草類之多。年生草本。高尺許。其葉一似土當歸。其根似羌活。亦有莖作莖生者。採得可供藥用。

性質 苦。辛。無毒。
主治 風腫癰毒赤疔。以醋磨塗之。亦治咽喉腫痛。切片含之立愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論都管草曰解蜈蚣蛇毒。

近人學說 袁淑範曰。都管草依魏美氏謂其有效成分。恐係一種油類 (*Angelicosol*)。或係一種苦味質 (*Angelikabitter*)。

參攷資料 都管草生宜州田野。根似羌活。頭長一節。苗高一尺許。葉似土當歸。有莖莖。二月八月採根。陰乾。施州生者作莖。又名香薷。莖長丈餘。赤色。秋結紅實。四時皆有。採其根枝。淋洗風毒。腫。蘇頌。按范成大桂海志云。廣西出之一莖六葉。李時珍。

【都管草】即天麻之古籍別名。與見和漢藥考。詳天麻條。

都 酈 酢 酥

【酢】即醋之古籍別名。與見綱目。詳醋條。

【酢桶】即醃釀子之古籍別名。與見本草拾遺。詳醃釀子條。

【酢漿】即地榆之古籍別名。與見綱目。詳地榆條。


【酢漿草】 命名 本品莖葉皆有酸味。故名。
古籍別名 酸漿。赤孫施。(圖經) 醋母。小酸芽。鳩酸。(蘇恭) 酸箕。(李當之) 三葉酸。三角酸。酸母。雀兒酸。雀林草。(綱目)

外國名詞 *Oxalis corniculata*, (拉丁) *カタバミ*, *イモノクサ* (日本)

基本 係酢漿草科酢漿草屬。爲酢漿草之莖葉。
產地 生原野道旁及田澤之陰溼諸地。

形態 酢漿草爲石草類之多。年生草本。莖傾臥地上。嫩者匍匐。長三四寸。葉爲掌狀複葉。小葉三片。倒心臟形。葉柄頗長。互生。夜則小葉閉合下垂。翌朝復展。秋抽花軸。着一花或數花。花小五瓣。黃色。結實爲蒴果。熟則裂。能散其種子。

其莖葉可供藥用。



酢漿草

採取 四月五月採陰乾。
性質 酸。寒。無毒。
主治 殺諸小蟲。惡疥癩瘡。搗傅之食之解熱湯。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論酢漿草曰。赤孫施。治婦人血結。用一搗洗。燉酒服之。【明】李時珍本草綱目論酢漿草曰。主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍。治沙石淋。煎湯洗痔。脫肛甚效。搗塗湯火蛇咬傷。

參攷資料 酢漿草嫩時用搗石器。令白如銀。(蘇頌) 酢漿草能制砂疔。疔疔。砒石。(李時珍)

命名 本品尋常多用牛乳合熬煉取之油。故名。

古籍別名 酥油。馬思哥油。(綱目)

一三三三

羊酥。①以羊牛乳製成者名羊牛酥。②以犛牛乳製成者名犛牛酥。

探取。用牛羊之乳汁入鍋煮二三沸。傾入盆內。冷定。待其上面結皮。取皮再煎油出。去渣。入鍋即成酥油。或以桶盛乳。以木棍搗半日。俟焦沫出。撥取。煎去焦皮。亦成酥油。

製法。凡入藥以微火溶化。適淨用之良。

主治。療眼目。隨左右納鼻中。垂頭少頃。令流入。則目中物與淚俱出。塗蜂蟻咬。

參攷資料。①酥乃酪作。其性與酪異。然牛酥功勝羊酥。犛牛酥復勝家牛酥。(蘇恭)②酥以犛牛犛牛乳者爲上。白羊者次之。(孫思邈)③牛乳冷。羊牛溫。牛酥不難寒。病之兼熱者宜之。羊酥不難溫。病之兼寒者宜之。蓋各有所長。惟犛酥功雖勝於羊而難得。(汪機)④酥乃酪之浮而所成。今人多以白羊脂雜之。不可不辨。(李時珍)

【酥蜜粥】基本 本品即以酥蜜和米煮成之粥。

主治 養心肺。
【鈔粉】即白粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。

【鈔華】即白粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。①即黃丹之古籍別名。典見綱目。詳「黃丹」條。

【釧】即金之古籍別名。典見爾雅。詳「金」條。

【釧】即錫之古籍別名。典見綱目。詳「錫」條。

【開口川椒】即川椒之處方用名。詳「川椒」條。

【開口吳萸】即吳茱萸之處方用名。詳「吳茱萸」條。

【開口花椒】即花椒之處方用名。詳「花椒」條。

【開水】即熱湯之俗名。詳「熱湯」條。

【開元錢】基本 唐開元時所鑄之古錢。印有開元通寶四字者是。

主治 禁口痢。折傷接骨。兼療驚風。

【開金鎖】產地 出江浙兩省。形態 爲山草類之一種。高三四尺。葉如草薺。根如首烏而無稜。肉白色而無紋。略似菝葜。無刺。可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 祛風溼。療手足不遂。筋骨疼痛。同蒼朮當歸用。

【開屏鳳尾】即翠雲草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【開鬱半夏麴】原名 開鬱麴。製法 用半夏末。合香附、蒼朮、撫芎各等分。熬煎成膏。草盡七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療鬱痰。

【開鬱麴】即開鬱半夏麴之原名。詳「開鬱半夏麴」條。

【閩月椶皮】命名 本品即椶桐值閩月增生之皮。故名。

採取 以陳久者入藥良。

主治 血症。煨研服。

【開客】即白鷗之古籍別名。典見綱目。詳「白鷗」條。

【陽古米】即粳粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粳粟子」條。

【陽明子】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

【陽侯】即石硫黃之古籍別名。典見外家。詳「石硫黃」條。

【陽春雪】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【陽桃】即五斂子之古籍別名。典見綱目。詳「五斂子」條。①即獼猴桃之古籍別名。典見日用本草。詳「獼猴桃」條。

【陽鳥】古籍別名 陽鳥。(拾遺)

產地 出建州諸地。

形態 陽鳥爲水禽類之一種。形似鶴而小。身黑。頸長。面白。其嘴可供藥用。

主治 療惡蟲咬成瘡。燒灰酒服。

【陽起石】命名 本品能起陽之不能起者。故名。

古籍別名 羊起石(別錄)白石(本經)石生五精金五精陰華五色芙蓉(和漢藥考)

外國名詞 Asbestos tremo-

Hio (拉丁) Promolite. (英)

基本 屬磷石類。爲似針狀之石塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東山西。

形態 陽起石爲束針狀之塊。色白或灰。或淡綠。發石膏之光澤。質柔軟。易破碎。作細絲狀。胎生於寒水石及苦灰石中間有透明者。入藥以白色者爲上。

製法 大明曰。凡使陽起石入藥。燒後水煨用之。凝白者佳。李時珍曰。凡用火中煨赤。酒泮七次。研細水飛過。日乾。亦有用燒酒浸過。同樟腦入罐升煉取粉用者。

用法 與他藥末糊丸。不入湯劑。

性質 微溫。無毒。

成分 昔人以陽起石爲雲母之根。主要之成分。爲無水珪酸及苦土。此外尙含有加爾皂甙及鐵等。

效能 強陽事。療陰痿。消癥瘕。治崩漏。用作陰痿藥。

主治 崩中漏下。破子。腹中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不

十二畫 陽

起。補不足。(本經)療男子莖頭寒。陰下溼痒。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論陽起石曰。補腎氣。精之。腰痛。膝寒。溼痺。子宮久冷。冷微寒。瘕。止月水不定。【宋】大明日華諸家本草論陽起石曰。治帶下。溫。冷。氣。補五勞七傷。【元】王好古湯液本草論陽起石曰。補命門不足。

【明】李時珍本草綱目論陽起石曰。散諸熱腫。【明】程希雍本草經疏論陽起石曰。陽起石稟純陽之氣。以生。本經味鹹。氣微溫。無毒。觀閱經所載齊州陽起山。其山常有煖氣。雖盛冬大雪徧境。獨此山無少積。蓋石氣熏蒸也。其爲氣之溫煖。當不甚微矣。味鹹而氣溫。入右腎命門。補助陽氣。并除積寒。宿血留滯。下焦之聖藥。故能主崩中漏下。及破子。腹中血。癥瘕。結氣。寒熱腹痛。及男子莖頭寒。陰痿不起。陰下溼痒。令人有子也。真陽足。則五臟之氣充溢。邪溼之氣外散。故久服不飢。并去臭汗也。別錄又主消水腫者。蓋指真火歸元。則能煖下

焦。熏蒸精粕。化精微。助脾土以制水也。【明】李士材本草圖解論陽起石曰。陽起石。鹹溫。主下部虛寒。助陽種子。火煖水飛。陰虛火旺者。忌之。陽痿屬於失志。以致火氣閉塞。不得發越而然。及崩中漏下。由於火盛而非虛寒者。並不宜服也。【清】黃宮繡本草求真論陽起石曰。陽起石。即雲母根也。雖大雪迴境。此山獨無。稟純陽之氣。以生。味鹹。氣溫。無毒。能補命門相火。凡因火衰。寒氣內停。宿血留滯。而見陰痿。精滑。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫。瘕瘕。服此。即能有效。以其性稟純陽。故耳。是以育龜丸用此。以爲嗣續宗祧之基。不可以房術論也。功雖類於硫黃。但硫黃大熱。號爲火精。此則其力稍遜。而於陽之不能起者。克起。陽起之號。於是而名。出齊州。雲頭雨脚。鷲鷲毛。色白。滋潤者。良。火煨醋泮七次。研粉。水飛用。【清】張隱庵本草崇原論陽起石曰。主治崩中漏下者。崩漏爲陰。今隨陽氣而上升也。破子。腹中血。及癥瘕結氣者。陽長陰消。陽氣透發。則癥結破散矣。婦人月事不以時

下。則寒熱腹痛。而無子。陽起石真下啓元。陰中有陽。陰陽和而寒熱除。月事調而生息繁矣。男子精虛。則陰痿不起。陽起石助陰中之陽。故治陰痿不起。而補腎精之不足。【清】黃元御玉楸藥解論陽起石曰。陽起石。溫。暖。肝。腎。強。健。宗。筋。治寒疝。冷瘕。崩漏。帶下。陰下溼痒。腰膝酸疼。腹痛。無子。經期不定。

國外學說 英美學說謂陽起石內含鎂銨銻銻酸等質。別無功用。不可作藥品云。

辨僞 李時珍曰。陽起石。真者。頗少。以雲頭雨脚。輕懸如狼牙者。爲佳。其鋪茸苗角者。不佳。王建平與術乃云。黃白而赤重厚者。佳。母之根也。庚辛玉册云。陽起石也。齊州揀金山出者。時。其尖似箭。簇者。力強。如狗牙者。力微。做大雪中。煖然沒者。爲真。

配合應用 陽起石同破故紙。鹿茸。鳳附。鹿。菟絲子。狗陰。鹽。肉。菴容。巴戟。天。治命門虛寒。陰痿不起。精寒無嗣。服之。能令陽道豐隆。使人有子。總治男子九種之疾。

十二畫 陽 隈 隊 階

汲水調塗。(僑問事親方)

①治元氣虛寒。精滑不禁。大腑清瀉。手足厥冷。陽起石煨研。鍾乳粉各等分。酒煮附子末。同麵糊丸。梧子大。每空心米飲下五十丸。以愈爲度。(濟生方)

②治陰痿陰汗。陽起石煨爲末。每服二錢鹽酒下。(普濟方)

用量 一錢至錢半。

施用宜忌 陰虛火旺者。以及陽痿屬於失志者。崩漏由於火盛而非虛寒者。禁用。惡澤瀉。茵桂。雷丸。石葵。蛇蛻。畏菟絲子。忌羊血。桑螵蛸爲之使。

參攷資料 ①陽起石如狼牙者佳。其外色不白如蘆石。其大塊者亦內白。治男子婦人下部虛冷。腎氣乏絕。子嗣久寒者。須水飛研用。凡石藥冷熱皆有。正宜斟酌。(寇宗奭) ②陽起石右腎命門氣分藥也。下焦虛寒者宜用之。然亦非久服之物。張子和儒門事親云。喉痺相火急速之病也。相火龍火也。宜以火逐之。一男子病經喉風腫。表裏皆藥不能下。以涼藥灌入鼻中。下十餘行。外以陽起石燒赤。

伏龍肝等分。研極細末。日以新汲水調。掃百遍。三日熱始退。腫始消。此亦從合之道也。(李時珍) ③陽起石所出與雲母同。而甚似雲母。但厚異耳。今用乃出益州。與礬石同處。色小黃黑。但礬石雲母根未知孰是。俗用乃稀。仙經服之。(陶弘景) ④陽起石以白色肌理似殷。乃夾帶雲母滋潤者爲良。故本經一名白石。今用純黑如炭者誤矣。雲母之黑者名雲。服之損人。則黑陽起石亦必惡矣。今齊山在齊州西北。無陽起石。石乃在齊山西北六七里。蘆山出之。本經雲山或蘆字說也。太山沂州惟有黑者。其白者獨出於齊州。(蘇恭) ⑤陽起石今惟出齊州。他處不復有。齊州惟一土山。石出其中。彼人謂之陽起山。其山常有溫暖氣。雖盛冬大雪。獨此山無積白。蓋石氣薰蒸使然也。山惟一穴。官中常禁閉。至初冬則州發丁夫。遣人監取。歲月積久。其穴益深。饒鑿他石得之甚難。以白色明瑩若狼牙者爲上。亦有挾他石作塊者。不堪。每歲採擇上供。剩餘州中貨之。不爾。

無由得也。貨者雖多。而精好者亦難得。舊說是雲母根。其中猶帶雲母。今不復見此矣。古方服食不見用者。今補下藥多用之。(蘇頌) ⑥陽荷 卽麗荷之古籍別名。典見黔志。詳「麗荷」條。 ⑦陽雀 卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳「杜鵑」條。 ⑧陽精 卽大生地之古籍別名。典見見和漢藥考。詳「大生地」條。 ⑨陽鴉 卽陽鳥之古籍別名。典見本草拾遺。詳「陽鳥」條。 ⑩陽椴 卽鹿梨之古籍別名。典見爾雅。詳「鹿梨」條。 ⑪陽鱗 卽白魚之別名。詳「白魚」條。

【陽燧錠】 製法 趙氏集要古有烙法。今罕用之。不粗工不知用法。抑且患者見之駭然。故以此代之。法用乾蟾酥到薄片。焙研。砂水飛。川烏。草烏各五分。研置一條。各研細。將硫黃一兩五錢置杓內。微火鎔化。入藥末攪勻。急攪爲要。遲則凝矣。傾入磁盆內。速攪成片。待冷收用。 主治 治溼痰流注。附骨陰疽。

寒溼瘡毒。經久不消。內潰不痛者。能使未成卽消。已成卽潰。已潰卽斂。如若風痺。用竹筴點之。有酸痛處。筆蘸蠟記之。照墨上灸。若腫膝疼痛。灸兔眼穴。諸瘡初起。灸三五壯卽痊。 ⑫陽蓋 卽麗荷之別名。典見植物圖考。詳「麗荷」條。 ⑬隈支 產地 出江蘇邳縣。及四川邛縣。 形態 隈支爲灌木類之一種。樹高丈餘。枝修而弱。開白花。結實大如雀卵。狀似荔枝。其肉黃色。可供藥用。 性質 甘。無毒。 主治 七種疝氣。一切瘡瘍疥癬。

【隊隊】 產地 出雲南緬甸諸地。 形態 隊隊爲溼生蟲類之一種。狀如壁蝨。生有定偶。出必雌雄相隨。可供藥用。 主治 夫婦不和。入婿藥用。 ⑭階砂 卽珠砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「珠砂」條。 ⑮階前草 卽麥門冬之古籍別名。


與見綱目。詳「麥門冬」條。

【雁】古籍別名。鴻（綱目）借

（楚書）江鵝（俗名）

產地 出江湖池澤間。

形態 雁為水禽類之一種。其狀如鵝。體長二尺許。嘴長微黃。背部褐色。翼帶青灰色。胸腹有黑斑。爪白。脚橙黃色。首長而尾羽短。鳴聲嘹亮。飛時自成行列。為春去秋來之候鳥。其肉可供食與藥用。



雁

性質 甘。平。無毒。

主治 祛風。療麻痺。壯筋骨。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論雁肉曰。食之治諸風。【明】李時珍本草綱目論雁肉曰。

利臟腑。解丹石毒。

參攷資料 雁肉七月勿食。食之傷人神。禮云。食雁去腎。不利人。（孫思邈）

十二畫 雁

【雁毛】

主治 喉下白毛。療小兒疳有效。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論雁毛曰。自落翎毛。小兒佩之辟驚癩。

參攷資料 按西陽雜俎云。臨邑人春夏雜取鴻雁毛以禦暑。又淮南萬畢術云。鴻毛作氈。可以渡江。此亦中流一壺之意。水行者不可不知。（李時珍）

【雁來紅】

古籍別名 老少年。（綱目拾遺）

形態 老少年苗初出似莧。莖葉穗子與雞冠無異。至深秋本高六七尺。則脚葉深紫而頂葉大。鮮紅可愛。愈久愈妍。此花秋色之最佳者。



雁來紅

主治 鼻淵。

參攷資料 雁來紅一名老少年。無有用入藥者。惟急救方有治鼻淵法。用老少年煎湯。熱薰鼻

雄

內。然後將湯服二三口。大妙。冬間用根。瀕湖綱目青葙下附雁來

紅。無主治。土宿真君本草雁來紅制赤。眼科要覽。老少年。銀杏部殼為君。宜渣根。大藥者佳。千里光。雄楊梅樹根皮為臣。煎成濃膏。置

加製甘石。冰片。又方加茶樹根皮。為脊子眼藥。去遠年障翳。有一種少年老。頂黃紅而脚葉綠。為別一種。枝頭亂葉叢生。有紅紫黃綠相兼雜出者。名十樣錦。一種根下葉綠。頂上葉純黃者。名雁來黃。

【雁肪】

古籍別名 鴛肪。（綱目）

性質 甘。平。無毒。

主治 風擊拘急。傷枯。血氣不通。利久服益氣。不飢。輕身耐老。（本經）長毛髮鬚眉（別錄）

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論雁肪曰。殺諸石藥毒。【宋】日華諸家本草論雁肪曰。治耳聾。和

豆黃作丸。補勞瘦。肥白人。【明】李時珍本草綱目論雁肪曰。塗癰腫耳疳。又治結熱。胸痞。嘔吐。

【雁屎白】

主治 灸瘡腫痛。塗之。

【雁音草】即慈草之日本別名。詳「慈草」條。

【雁骨】

主治 燒灰。和米泔淋頭長髮。

【雁喙】即灰質之古籍別名。與見古今注。詳「灰質」條。

【雁喙實】即灰質之古籍別名。與見和漢藥考。詳「灰質」條。

【雁鳴】即灰質之古籍別名。與見和漢藥考。詳「灰質」條。

【雁寶】即灰質之古籍別名。與見和漢藥考。詳「灰質」條。

【雁脂】即灰質之古籍別名。與見和漢藥考。詳「灰質」條。

【雁頭】即灰質之古籍別名。與見古今注。詳「灰質」條。

【雄狐屎】即狐屎之原名。詳「狐屎」條。

【雄雀屎】即白丁香之原名。詳「白丁香」條。

【雄魚白】即烏魚蛋之古籍別名。與見藥性考。詳「烏魚蛋」條。

【雄豬眼梢肉】主治 能拔

對口瘡用雄豬眼梢肉三錢。剉爛如泥。加滑石末四錢。和勻敷患處

一三八七

頂上。以膏藥蓋之。拔去瘰肉。放出黃水即愈。

【雄黃】 命名 本品生山之陽。是丹之雄。故名。

處方用名 雄精。

古籍別名 黃金石。(本經)石黃。(唐本)蒸黃。(綱目)白陵。丹山。

地精。夜金。男精。男生。黃奴。朱雀金。

天陽石。帝男血。帝男精。迨利加柔。

黃雄。丹山月魂。太甸首中石。雞冠石。(和漢藥考)

外國名詞 Peolgar, Orpi-mout. (英)

基本 屬碲礦斜方系。為紅黃色之不透明固體。

產地 陳仁山藥物生產辨云。雄黃產湖南邵市。以蘇片紅熟為好。和漢藥考曰。日本之石狩。陸奧。陸前岩代。下野等地產此。

形態 雄黃係產於黏土或噴火口附近之美黃色或橙黃色小板狀結晶礦石。時或作粒狀。又有葡萄狀。鐘乳狀等者。其面有線痕。有真珠光。半透明。硬度一。五。溶於硝酸。苛性亞爾加里。安母尼亞等。

製法 雷斅曰。凡使雄黃。須以三兩為率。用甘草。紫背天葵。地膽。碧稜花各五兩細剉。取東流水入井鍋中。煮三伏時。漉出。搗如粉。水飛澄去黑者。曬乾再研用。其內有劫鐵石。又號赴矢黃。能劫於鐵。并不入藥用。孫思邈曰。凡服食用武都雄黃。須以油煎九日九夜。乃可入藥。不然有毒。李時珍曰。又有用醋入蘿蔔汁。煮乾用妙。抱朴子曰。或以豬脂裹蒸之。於赤土下。或以松脂和之。或以三物煉之。或布帛如衣服之。令人長生。除百病。殺三蟲。伏火者可點銅成金。變銀成金。

用法 恒以剉末和作丸散用。

性質 苦。平。寒。有毒。

成分 為三硫化砷 (As₂S₃)。

效能 燥溼殺蟲。療疥癬。劫痰解毒。治驚癇。用作腐蝕藥。脫毛藥。又治鼠瘻。痔疾。惡瘡。及毒蛇毒蟲。整傷之解毒藥。

作用 與砒石同。但內服較砒石之刺激性為少。外用之效。則較勝於砒石。

主治 寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。殺精物。惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五

兵。鍊食之。輕身神仙。(本經)療疥蟲。醫疔。目痛。鼻中息肉。及絕筋破骨。百節中大風積聚。瘴氣。中惡。腹痛。鬼疰。殺諸蛇虺毒。解藥蘆毒。悅澤人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論雄黃曰。主疥癬。風邪。癩癧。風痺。一切蟲獸傷。【元】王好古湯液本草論雄黃曰。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。【明】李時珍本草綱目論雄黃曰。治瘡疾。寒熱。伏暑泄痢。酒飲成癖。驚癇。頭風眩暈。化腹中瘕。血殺勞蟲疳蟲。【明】繆希雍本草經疏論雄黃曰。雄黃味苦平。氣寒有毒。別錄加甘大溫。甄權言辛大毒。察其功用。應是辛苦溫之藥。而甘寒則非也。氣味俱厚。升也。陽也。入足陽明經。其主殺精物。惡鬼邪氣。及中惡腹痛鬼疰者。蓋以陽明虛則邪惡易侵。陰氣勝則精鬼易惡。得陽氣之正者。能破幽暗。所以殺一切鬼邪。勝五兵也。寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。疥蟲。醫疔。諸證。皆溼熱留滯肌肉所致。久則浸淫

而生蟲。此藥苦辛能燥溼殺蟲。故為瘡家要藥。其去鼻中息肉者。肺氣結也。瘴氣者。大腸積滯也。筋骨斷絕者。氣血不續也。辛能散結滯。溫能通行氣血。辛溫相合而殺蟲。故能搜剔百節中大風積聚也。虺蛇陰物。藥蘆陰草。雄黃裏純陽之氣。所以善殺百蟲。蛇虺毒。及解藥蘆毒也。別錄復有目痛及悅澤人面之語。悉非正治鍊餌之法。出自仙經。以銅為金。亦黃白術中事耳。【明】李士材本草圖解論雄黃曰。雄黃辛溫有毒。肝家藥也。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。解百毒。辟百邪。殺百蟲。截邪毒。理蛇傷。然能化血為水。血虛大急用之。當歸。白芷。藤黃。地黃。紫河車。均能制其毒。【清】黃宮繡本草求真論雄黃曰。雄黃生山之陽。得氣之正。味辛而苦。氣溫有毒。凡人陽氣虛則邪易侵。陰氣勝則鬼易惡。真二氣之精者。能破瘴妖。受陽氣之正者。能辟幽暗。故能治寒熱鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。疥蟲。醫疔。諸症。皆由溼熱侵於肌肉而成。服此辛以散結。溫以行氣。辛溫相合而蟲殺。故能搜剔百節中

風寒積聚也。是以聖惠方之治狐感。肘後方之治陰腫如斗。案祕方之治瘧母。急救方之治風狗咬傷。聖濟之治白禿頭瘡。何一不用雄黃以爲調治。至云能解蛇虺蠱蘆等毒。以其蛇屬陰物。藥屬陰草也。瘰癧肉癖氣能治者。以其一屬氣結。一屬積滯也。目痛能愈者。以其肝得辛散之意也。明徹不臭者。良醅醋浸。入菜菔汁煮乾用。生山陰者名雄黃。功用略同。劣者名蘆黃。燒之則臭。止可薰疥疥。殺蟲鼠。

配合應用 ①治卒中邪。雄黃末吹鼻中。(集驗方)

②治鬼擊成病。腹中煩滿欲絕。雄黃粉酒服一刀圭。日三服。化血爲水也。(千金方)

③治辟穢。可用雄黃帶頭上。或以黃許繫左腋下。終身不覺。(張文仲方)

④治家有邪氣。用真雄黃三錢。水一碗。以東南桃枝呪酒滿。屆則絕迹。(集簡方)

⑤治女人病邪。女人與邪物交通。獨言獨笑。悲思恍惚者。雄黃一兩。松脂二兩。溶化。以虎爪提之。丸

十一 蠶 雄

如彈子。夜燒於篋中。令女坐其上。以被蒙之。錢頭在外。不過三劑。自斷。仍以雄黃入參。防風。五味子等分爲末。每日井水服方寸匕。取愈。(肘後方)

⑥小丹服法。雄黃。柏子仁各二斤。松脂煉過十斤。合搗爲丸。每旦北向服五丸。百日後拘魂制魄。與神人交見。(太上變玄經方)

⑦轉女爲男。婦人覺有妊。以雄黃一兩。絳蠶盛之。養胎。轉女成男。取陽精之全於地產也。(千金方)

⑧治小兒諸癩。雄黃。硃砂等分爲末。每服一錢。豬心血入盪水調下。(直指方)

⑨治骨蒸發熱。雄黃末一兩。入小便一升。研如粉。乃取黃理石一枚。方圓一尺者。炭火燒之。三食頃。濃淋汁於石上。置薄氈於上。患人脫衣坐之。衣被圍住。勿令洩氣。三五度。瘥。(外臺祕要方)

⑩治傷寒咳逆。服藥無效。雄黃二錢。酒一盞。煎七分。乘熱嗅其氣。即止。(活人方)

⑪治傷寒狐惑。蟲蝕下部。痛痒不止。雄黃半兩。燒於瓶中。熏其下

部。(聖惠方)

⑫治偏頭風病。至巽散。用雄黃。細辛等分爲末。每以一字吹鼻。左痛吹右。右痛吹左。(博濟方)

⑬治五尸注病。發則痛楚無常。昏光沉重。纏結臍腹。上衝心脇。卽身中尸鬼接引爲害也。雄黃。大蒜各一兩。杵丸。彈子大。每熱酒服一丸。(肘後方)

⑭治腹脇痞塊。雄黃一兩。白礬一兩。爲末。麵糊調膏攤貼。卽見功效。未效再貼。(集玄方)

⑮治脇下疝癰。及傷飲食。煮黃丸。用雄黃一兩。巴豆五錢。同研。入白麵二兩。滴水爲丸。梧子大。每服二十四丸。漿水煮三十沸。入冷漿水。沉冷吞下。以利爲度。如神。(保命集方)

⑯治飲酒成癖。酒癩丸。治飲酒過度。頭旋。惡心。嘔吐。及酒停積於胃間。遇飲卽吐。久而成癖。雄黃。皂角子。大六個。巴豆。連皮。油十五個。蠟。梢十五個。同研。入白麵五兩。半滴水。丸。豌豆大。將乾入鉢內。炒香。將一粒放水試之。浮則取。起收之。每服二丸。溫酒下。(和濟局方)

⑰治髮癢飲油。有飲油五升。以來方快者。不爾則病。此是髮入於胃。氣血衰之化爲蟲也。雄黃。半兩。爲末。水調服之。蟲自出。(夏子益奇疾方)

⑱治癩癧積聚。去三尸。益氣。延年。卻老。雄黃二兩。爲末。水飛九度。入新竹筒內。以蒸餅一塊。塞口。蒸七度。用好粉脂一兩。和丸。綠豆大。每服七丸。酒下。日三服。(千金方)

⑲治小腹痛滿。不得小便。雄黃末。蜜丸。塞陰孔中。(傷寒類要方)

⑳治陰腫如斗。痛不可忍。雄黃。礬石各二兩。甘草一尺。水五升。煮二升。浸之。(肘後方)

㉑治中飲食。雄黃。青礬等分。爲末。每服二錢。新汲水下。(鄒華舉方)

㉒治蟲毒。雄黃。生礬等分。端午日。研化。蠅丸。梧子大。每服七丸。(蘇東坡方)

㉓治結陰。便血。雄黃不拘多少。入漿內。練繫定。煎湯。用饒一兩。化汁。傾入湯內。同煮。自早至晚。不住添湯。取出。爲末。共煎。杵和丸。梧子大。每服三十九丸。煎熱湯。空心

下。只三服止。(普濟方)

①治中成舌強。正舌散。用雄黃、荊芥穗等分爲末。豆淋酒煎服二錢。(衛生寶鑑方)

②治破傷中風。雄黃、白芷等分爲末。酒煎瀝之即甦。(邵真人經驗方)

③治瘋狗咬傷。雄黃五錢。麝香二錢爲末。酒下。作二服。(救急良方)

④治百蟲入耳。雄黃燒燃。熏之自出。(十便良方)

⑤治馬汗入瘡。雄黃、白礬各一錢。烏梅三個。巴豆一個。合研。以油調半錢傳之良。(經驗方)

⑥治蜘蛛傷人。用雄黃末傳之。(朝野僉載方)

⑦治金瘡內漏。雄黃半豆大。納之。仍以小便服五錢。白竹化爲水。(肘後方)

⑧治杖瘡腫痛。雄黃二分。蜜陀僧一分。研末。水調傳之極妙。(救急方)

⑨治中藥箭毒。雄黃末傳之。沸汁出愈。(外臺秘要方)

⑩解毒瘡毒。水服雄黃末一錢。

(外臺秘要方)

①治小兒痘疔。雄黃一錢。紫草三錢爲末。胭脂汁調。先以銀簪挑破。搽之極妙。(痘疹證治方)

②治白禿頭瘡。雄黃、豬膽汁和傳之。(聖濟總錄方)

③治眉毛脫落。雄黃末一兩。醋和塗之。(聖濟總錄方)

④治肌肉化蟲。有蟲如蟹。走於皮下。作聲如小兒啼。爲肌肉之化。雄黃、雷丸各一兩爲末。搽豬肉上。炙熱。喫盡自安。(夏氏奇疾方)

⑤治風痒如蟲。成煉雄黃、松脂等分研末。蜜丸。梧桐子大。每飲下十九丸。日三服。百日愈。忌酒肉鹽豉。(千金方)

⑥治疔瘡惡毒。刺四邊及中心。以雄黃末傳之。神效。(千金方)又用雄黃、麝香各五分爲末。蜜搗搗丸。小米大。以針刺破瘡頂。插入甚妙。(積德堂方)

⑦治廣東惡瘡。雄黃一錢半。杏仁三十粒去皮。輕粉一錢爲末。洗淨。以雄豬膽汁調上。二三日即愈。百發百中。天下第一方。(積德堂方)

⑧治蛇蟻咬瘡。雄黃末醋調傳之。(普濟方)

⑨治喉喉風燥。雄黃磨新汲水一盞服。取吐下愈。(千金方)

⑩治風熱痛。用雄黃、乾薑各等分爲末。嚼鼻。左痛嚼右。右痛嚼左。

⑪治牙齒蟲痛。雄黃末和棗肉丸。塞孔中。(傷寒類要方)

⑫治走馬牙疳。臭爛出血。雄黃豆大七粒。每粒以淮棗去核。包之。鐵線串於燈上。燒化爲末。每以少許搽之。去涎以愈爲度。(全幼心鑑方)

⑬治小兒牙疳。雄黃一錢。銅綠二錢。爲末貼之。(陳氏小兒方)

⑭治疔蟲蝕鼻。雄黃、麝香等分研末。蠟磁膠和。用槐枝點之。(金匱方)

⑮治耳出臭膿。雄黃、雌黃、硫黃等分爲末。吹之。(聖濟總錄方)

⑯治膿瘡日久。雄黃二錢。陳皮五錢。青布捲作大捲。燒烟熏之。熱水流數次愈。(鄧筆案方)

⑰治鼻準赤色。雄黃、硫黃各五錢。水粉二錢。用頭生乳汁調傳。不過三五次愈。(攝生妙用方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虧血虛者禁用。忌錢及火。

參攷資料 ①帶雄黃入山林。卽不畏蛇。若蛇中人。以少許傳之。登時愈。吳楚之地。暑溼鬱熱。多毒蟲及射工沙虱之類。但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之。或已中者。塗之亦良。(抱朴子) ②雄黃治瘡。瘡尙矣。周禮醫醫瘡。以五毒攻之。鄭康成注云。今醫方有五毒之藥。作之合黃。置石膽、丹砂、雄黃、礬石。慈石其中。燒之。三日三夜。其烟上着。雞羽掃取。以注瘡。惡肉破。骨則盡出也。楊億筆記。載楊嗣少時。有瘡生於頰。連齒輪車外。腫若覆碗。內潰出膿。痛楚難忍。百療彌年不瘳。人令依鄭法燒藥。注之。少頃。朽骨連牙潰出。遂愈。信古方攻病之速也。黃奎音武。卽今有蓋瓦合也。(蘇頌) ③五毒藥。范注東陽方。變爲飛黃散。治緩疽惡瘡。蝕惡肉。其法取瓦盆一個。安雌黃於中。丹砂居南。慈石居北。青居東。白石英居西。礬石居上。石膏次之。鐘乳居下。雄黃裂之。雲母布於下。

各二兩末。以一盞蓋之。羊毛泥固濟。作三隔窳。以陳葦燒一日。取其飛黃用之。大雄黃乃治疥殺毒要藥也。而入肝經氣分。故肝風肝氣。疔癩。痰涎。頭痛眩暈。暑瀉泄痢。積聚諸病。用之有殊功。又能化血爲水。而方士乃鍊治服餌。神異其說。被其毒者多矣。按洪邁夷堅志云。虞雍公尤文感暑疔。遠月不瘥。忽夢至一處。見一人如仙。宜延之坐。壁間有藥方。其辭云。暑毒在脾。溼氣遠脚。不泄則痢。不痢則癩。獨鍊雄黃。蒸餅和藥。別作治療。醫者大錯。公依方用雄黃水飛九度。竹筒盛。蒸七次。研末。蒸餅和丸。梧子大。每甘草湯下七丸。日三服。果愈。太平廣記載成都劉無名。服雄黃長生之說。方士言爾。不可信。(李時珍) ⑤今人敲取石黃中精明者爲雄黃。外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之則臭。以此分別也。(陳藏器) ⑥今階州卽古武都山。中有之。形塊如丹砂。明徹不夾石。其色如雞冠者。眞有青黑色而堅者。名爲黃。有形色似眞而氣臭者。名爲臭黃。並不入服食。只可療疥疥。

十一畫 雄

雅 雲

其臭以醋洗之便去。足以亂眞。尤宜辨。又階州接西戎界。出一種水窟雄黃。生於山岩中有水流處。其石名青煙石。白鮮石。雄黃出其中。其塊大者如胡桃。小者如粟豆。上有孔竅。其色深紅而微紫。體極輕虛。而功用更勝。丹竈家尤貴重之。(蘇頌) ⑦武都水窟雄黃。北人以充丹砂。但研細色帶黃爾。(李時珍)

【雄黃油】卽石膽油之古籍別名。典見綱目。詳「石腦油」條。

【雄黃蟲】基本 雄黃蟲爲卵。生蟲類之一種。狀如蠟蟻。可供藥用。

主治 明目。益氣力。

【雄精】卽雄黃之處方用名。詳「雄黃」條。

【雄膽】性質 詳雄黃條。

主治 殺三蟲毒。除癩疾。駐容延年。

參攷資料 王存恩太僕貴陽人云。其土多山。出雄黃。有大至數百觔者。中有浮沙成團如鷄卵。曰雄膽。破之有清水。澆許。急飲之。沉疴俱消。壽二百歲。特以山民頑礦。

遇之不謹。卽散漫不得飲耳。有一人飲之。至今猶在。健如三十許人。自言百五十餘歲矣。(六研齋筆記)

【雄雞冠血】卽雞冠血之處方用名。詳「雞冠血」條。

【雅友】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【雅客】卽水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水仙」條。

【雅梨】卽梨之處方用名。詳「梨」條。

【雅連】卽黃連之處方用名。詳「黃連」條。

【雅蒜】卽水仙之古籍別名。典見本草會編。詳「水仙」條。

【雲丹】卽格石之古籍別名。典見吳普本草。詳「格石」條。

【雲母】命名 荆南志云。華容

雲以出之處。於下掘取。無不大獲。有長五六尺。可爲屏風者。但掘時。忌作聲也。據此則此石乃雲之根。故得雲母之名。

處方用名 雲母石。古籍別名 雲華。雲珠。雲英。雲

液。雲砂。(本經。礬石(綱目)地。雲貝石。雲膽。千層紙。金星石。(和漢藥考))

外國名詞 Chinner

基本 層巖石類。爲雲母之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。雲母石產自雲南省。和漢藥考曰。日本之三河。若狹。甲斐。近江。美濃。磐城諸處產此。

形態 雲母爲斜方柱狀礦石。常有銳角。劈開完全。沿其薄面剝離之。則作有彈力性薄片狀。又有作板狀。鱗皮狀者。色有白。淡黃。綠。褐。黑等。硬度二至三。略有眞珠光。

種類 抱朴子云。向日視之色。青白多黑者。名雲母。宜冬服。色黃白多青者。名雲英。宜春服。色青白多赤者。名雲珠。宜夏服。色如冰露。乍黃乍白者。名雲砂。宜季夏服。色黃白晶者。名雲液。宜秋服。較然純白明澈者。名雲石。四時可服。其黝黯純黑有文斑斑鐵色者。名雲膽。其色雜黑而強肥者。名地。以上二種不可服食。又和漢藥考曰。雲母種類頗多。大別之爲加里雲。

母(白雲母)及錢雲母(黑雲母)二種。又由形態、色彩、成分等區分之。其主要者為羽狀雲母、柱狀雲母、綠雲母、錢雲母等。

製法 雷歐曰。凡使雲母。須用黃黑者厚。而頑赤色者輕。婦人手持者。致不中用。須要光瑩如水色者為上。每一片用小地膽草、紫背天葵、生甘草、地黃汁各一盞。乾者細剉。溼者取汁。放入瓊鍋中。安置。取天池水三盞。著水煮七日七夜。水火勿令失度。雲母自然成碧玉漿。在鍋底。却以天池水猛投其中。攪之。浮如蠅涎者即去之。如此三度。淘淨。取沉香一兩搗作末。以天池水煎沉香湯二升。以末分為三次。再淘雲母漿。盡日曬。任用。抱朴子曰。服五雲之法。或以桂葱水玉化之為水。或以膠於鐵器中。以原水熬之為水。或以消石合於筒中。埋之為水。或以蜜澆為醪。或以秋露漬之百日。韋葦挺以為粉。或以無顏草粉血合何之。服至一年。百病俱除。至三年返老成童。五年可以役使鬼神。胡演曰。鍊粉法。八九月間。取雲母以礬石拌勻。入瓦竈

內封口。三伏日則自柔輾。去滓。次日取百草頭上露水漬之百日。用韋葦挺以為粉。李時珍曰。道書言鹽湯煮雲母。亦可為粉。又云。雲母一觔。鹽一斗。漬之。銅器中蒸一日。白中搗成粉。又云。雲母一觔。白鹽一升。同搗細。入布袋揅之。沃令鹽味盡。懸高處風吹。自然成粉。

用法 恒以剉末和作丸散用。

性質 甘平無毒。

成分 為珪酸礬土、鉀、鈉、鈣、釷、少量)水氣等。

效驗 補中理勞傷。補腎治癆。痢。用作緩和強壯藥。又為瘡瘍癰疽藥。內服治肺結核。動脈硬化症。外用瘰癧癬。

作用 入胃後有中和酸液之能。使胃內過多之鹽酸。化為有用之消化酵素。一部分至小腸。始被吸收而入血。血液中此硅質。白血球之繁殖。即行增加。血液之凝固力亦同時加大。能使被結核菌侵腐之周圍包圍。滅殺其蔓延之能力。而於動脈硬化。尤有防止之功效。

主治 身皮死肌。中風寒熱。如

在車船上。除邪氣。安五臟。益子精。明目(本經)下氣。聖肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。止痢。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙(別錄)。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論雲母曰。主下痢。腸辟。補腎冷。【明】繆希雍本草經疏論雲母曰。雲母本經載其味甘氣平。詳其主治。亦應有溫。韓保昇曰。雲母色白而主肺。此石藥中溫良之品也。以其法金。故主身皮死肌。及中風寒熱。如在車船上。甘能緩。溫能和。故除邪氣。石性鎮。能使火下。火下則水上。是既濟之象也。故安五臟。益子精。明目。久服輕身。延年別錄。主下氣。聖肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。皆此意也。其曰止痢者。久痢則腸胃俱虛。甘溫足以回其虛。下墜足以去其積。故亦主之也。【清】黃宮繡本草求真論雲母曰。雲母生於泰山山谷。氣味甘平而溫。諸書皆言達肌溫肉。安臟定魄。補中經續。故凡死肌敗肉。惡毒陰症。及車船眩暈。痰飲頭痛。

皆常用此劑治。以其溫有陽和之力。重有鎮攝之能。故能使之辟邪而鎮怯也。但書有言。久服真輕。解。不過極為贊揚。且因是物。經時不焦。入土不腐。故云服可長生。其說即出本經。豈真事哉。但此性屬助陽。陰虛火炎者勿服。以色白光益者良。

配合應用 雲母得鉛丹熬成膏。可貼一切癰疽瘡毒。和以昇丹細末。更奇效。

服食雲母。上白雲母二十斤。薄壁。以露水八斗作湯。分半淘洗一次。又作二斗。作湯。納芒硝十斤。木器中漬二十日。取出。絹袋盛。懸屋上。勿見風日。令燥。以鹿皮為囊。揉之。從旦至午。篩淨。復揉得好粉。五斗。餘者。塞之。以粉一斗。納屋簷。二升。攪糊。入竹筒內。薄削封口。漆固。埋北垣南屋下。入地六尺。覆土。春夏四十日。秋冬三十日。出之。當成水。若潤澗不消。更埋三十日。此水能治萬病。及勞氣風疼。每以溫水一合和服之。日三服。十日小便當變黃。二十日腹中寒。辟治。三十日鬚齒更生。四十日不畏風寒。五

十日諸病皆愈。顏色日少。長生神仙。(千金方)

①治痰飲頭痛。往來寒熱。用雲母粉二兩。鍊過。桓山一兩。爲末。每服方寸匕。湯服。取吐。忌生葱生菜。(深師方)

②治牝瘡多寒。雲母燒二日夜。龍骨。蜀漆。燒去腥。等分爲散。未發前。漿水服半錢。(金匱方)

③治小兒下痢赤白。及水痢。雲母粉半兩。煮白粥調食之。(食醫心鏡方)

④治赤白久痢。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。服二服。立見神效。(千金方)

⑤治婦人帶下。水和雲母粉方寸匕。服立見神效。(千金方)

⑥治小便淋疾。溫水和雲母粉服三錢。(千金方)

⑦治婦人難產。經日不生。雲母粉半兩。溫酒調服。入口卽產。不順者卽順。萬不失一。陸氏云。此是何德揚方也。已救三五十人。(積德堂方)

⑧治粉滓面黧。雲母粉。杏仁等分爲末。黃牛乳拌。略蒸。夜塗。旦洗。

十二畫 雲

(聖濟總錄方)

①治風癩遍身。百治不愈。煨雲母粉。清水調服二錢。良。(千金方)

②治一切惡瘡。用雲母粉傅之。(千金方)

③治火瘡敗壞。雲母粉和生羊髓塗之。(聖惠方)

④治金瘡出血。雲母粉傅之。絕妙。(事林廣記方)

⑤治風熱汗出。水和雲母粉服三錢。不過再服。立愈。(千金方)

⑥治風熱汗出。水和雲母粉服用量。三錢至四錢。

⑦應用宜忌。凡非實症者禁用。惡徐長卿。忌羊肉粉。長蛇甲及流水。澤瀉爲之使。

⑧參攷資料。古雖有服鍊法。今人服者至少。謹之至也。惟合雲母膏。治一切癰毒瘡等。方見和劑局方(寇宗奭)。

⑨明皇雜錄云。開元中名醫紀昀。觀人顏色談笑。知病淺深。不待診脈。帝召入掖庭。看一宮人。每日展則笑。啼號若狂。疾而足不能履地。昀視之曰。此必因食飽而大促力。頓仆於地。而然。

乃飲雲母湯。熱寐而失所苦。問之。乃言太華公主。載誕。某當主。臚懼。

聲不能清。長因喫泥。稀糞飽而歌。大曲。唱罷。覺胸中甚熱。獻於初。因墜下。久而方甦。遂病此也。又經效方云。青城山大人。觀主。康道豐。治百病。雲母粉。方用雲母一斤。折開。揉入大瓶內。築實。上澆水銀一兩。封固。以十斤頂火。煨赤。取出。卻并香葱。紫連。麴草。二件。合搗如泥。後以交絹袋。盛於大水盆內。搗取粉。餘滓未盡。再添草藥。重搗取粉。以木盤一面。於灰上。印一淺坑。鋪紙。傾粉在內。候乾。焙之。以麴糊丸。梧子大。遇有病者。服之。無不效。知成都府辛謙。曾患大風。衆醫不愈。道豐進此。服之神驗。(唐慎微)

⑩他物埋之卽朽。着火卽焦。而五雲入猛火中。經時不焦。埋之不腐。故服之者。長生。入水不濡。入火不燒。踐棘不害。抱朴子。昔人言雲母壙尸。亡人不朽。盜發。馮貴人家。形貌如生。因共葬之。發。齋幽公塚。百戶縱橫。及衣服。皆如生人。中並有雲母壙之故也。(李時珍)

⑪雲母生太山山谷。齊山。廬山。及琅琊。北定山石間。二月採之。雲華五色。具雲英。色多青。雲珠。色多赤。雲

液色多白。雲砂。色青黃。礪石。色正白。(別錄)

【雲母石】卽雲母之處方用名。詳【雲母】條。

【雲母砂】卽礪砂之古籍別名。與見本草集註。詳【礪砂】條。

【雲母礬】卽明礬之古籍別名。與見綱目。詳【礬石】條。

【雲芝茶】基本。本品名茶。而實非茶。乃山石所生。石衣。如苔蘚之屬。

產地。山東蒙山。在蒙陰縣城南三十里。高二三十里許。周圍約三百餘里。產茶曰雲芝茶。土人售於市曰蒙山茶。

性質。寒冷。

主治。胃熱消積。

【雲花】卽礪石之古籍別名。與見吳普本草。詳【礪石】條。

【雲花草】原名。雲花子。形態。雲花草爲雜草類之一種。狀如麻黃。而中堅。實可供藥用。

主治。瘰癧。疥。

【雲南根】卽馬兜鈴根之古籍別名。與見綱目。詳【馬兜鈴】條。

即青木香之古籍別名。典見綱目。詳「青木香」條。

【雲砂】即雲母之古籍別名。典見本經。詳「雲母」條。

【雲膽】即雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雲母」條。

【雲苔】即茯苓之處方用名。詳「茯苓」條。

【雲苔塊】即茯苓之處方用名。詳「茯苓」條。

【雲英】即雲母之古籍別名。典見本經。詳「雲母」條。即格石之古籍別名。典見吳普本草。詳「格石」條。即雲寶之古籍別名。典見別錄。詳「雲寶」條。

【雲香】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楓香脂」條。

【雲核】產地 羅浮山中。形態 色黃白如雲母。性質 平。

主治 却疾延年。餘同雲母。

【雲珠】即雲母之古籍別名。典見本經。詳「雲母」條。即格石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「格石」條。

【雲茯苓】即茯苓之處方用名。詳

【茯苓】條。

【雲伏神】即伏神之處方用名。詳「伏神」條。

【雲茶】即石蕊之古籍別名。典見綱目。詳「石蕊」條。

【雲液】即雲母之古籍別名。典見本經。詳「雲母」條。

【雲華】即雲母之古籍別名。典見本經。詳「雲母」條。

【雲實】古籍別名 貝實。雲英。豆。羊石子。臭草。《圖經》：樹刺。粘刺。《綱目》：苗名草雲母。《唐本》

基本 係屬荳科雲實之種子。產地 別錄曰：雲實生河間川谷。凡山野間恒多生焉。



雲實

形態 雲實係落葉灌木。直立或橫伸。長達丈餘。葉為多數小葉所成之羽狀複葉。莖葉俱有刺。夏月於梢上抽花莖。長達尺餘。開黃色花。類藤花。相綴作總狀。花後結

莢果。類藤豆。大二寸許。中有褐色種子。大如豆。似莢。藤子。

採取 三四月採苗。九十月採實。曝乾。

製法 雷斅曰：凡採得粗搗。相對并淨。類椽實。蒸一日。揀出曝乾。

性質 辛溫。無毒。

效能 治痢。療瘡。

主治 泄痢。腸澼。殺蟲。蠱毒。去邪。惡結氣。止痛。除寒熱。《本經》：消渴。《別錄》

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論雲實曰：治瘧多用。【明】李時珍本草綱目論雲實曰：主下膿膿血。

配合應用 治瀉下不止。雲實。女萎各一兩。桂半兩。川烏頭二兩。為末。蜜丸。梧子大。每服五丸。水下。日三服。《肘後方》

用量 一錢至錢半。

參攷資料 貝亦音雲。其義未詳。豆以子形名。羊石當作羊矢。其子肖之故也。《李時珍》：處處有之子。細如荳。藤子而小。黑。其實亦類荳。燻之致鬼。未見其法。術。《陶弘景》：雲實大如黍及麻子。

黃黑似豆。故名天豆。叢生澤旁。高五六尺。葉如細槐。亦如苜蓿。枝間微刺。俗謂苗為草雲母。陶云似事。靡者非也。《蘇恭》：葉如槐而狹。長。枝上有刺。苗名臭草。又名羊石子。草實名馬豆。三月四月採苗。十月採實。過時即枯落也。《蘇頌》

此草山原甚多。俗名枯刺。赤莖。中空。有刺。高者如蔓。其葉如槐。三月開黃花。燦然滿枝。莢長三寸許。狀如肥皂莢。內有子五六粒。正如鶴豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼白仁。咬之極堅。重有腥氣。《李時珍》

【雲實花】主治 見鬼精。多食精物。下水。燒之致鬼。《別錄》

【雲實根】主治 骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。

【雲霧】即茶葉之別名。詳「茶葉」條。

【順流水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳「流水」條。

【須丸】即代赭石之古籍別名。典見本經。詳「代赭石」條。

【須蔭折羅婆香】即楓香脂之古籍別名。典見金光明經。詳「楓香

脂」條。

【須臾】即鸚鵡之古籍別名。典見爾雅。詳「鸚鵡」條。

【靴履】即履之古籍別名。典見綱目。詳「履」條。

【覓】即螻蛄之古籍別名。典見揚雄方言。詳「螻蛄」條。

【黃土】命名 本品即土之黃色者故名。

製法 陳藏器曰。凡使黃土。當去土上惡物用。

性質 甘平無毒。

主治 洩痢冷熱赤白。腹內熱毒絞結痛。下血。取乾土水煮三五沸。絞去滓。暖服一二升。又解諸藥毒。中肉毒。合口椒毒。野菌毒。

參攷資料 按劉昫錢乙傳云。元豐中。皇子儀國公病痘瘰。國醫未能治。長公主舉乙入進黃土湯而愈。神宗召見。問黃土愈疾之狀。乙對曰。以土勝水。水得其平。則風自退。爾上悅。攝太醫丞。又夷堅志云。吳少師得疾。數月消瘦。每日飲食入咽。知萬蟲攢攻。且痒且痛。皆以為勞瘵。迎明醫張銳診之。銳令明且勿食。遣卒詣十里外取行路

十二蠶 須

匙 髮 黃

黃土至。以溫酒二升攪之。投藥百粒飲之。覺痛。幾不堪。及登瀛。下馬。蟬千餘。宛轉。其半已困死。吳亦憊甚。調理三日乃安。因言。夏月出師。燥渴。飲澗水一盃。似有物入咽。遂得此病。銳曰。蟲入人腹。勢必羣生。饑則聚。唾精血。飽則散。虛臟。苟知殺之。而不能掃取。終無益也。是以請公榜腹。以誘之。因蟲久不得土味。又喜酒。故乘饑畢集。一洗而空之。公大喜。厚賂謝之。以禮送歸。(李時珍)

【黃土】即落花生出於福建興化。實粒滿而味甜者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「落花生」條。

【黃大豆】命名 本品乃大豆之色黃者故名。

古籍別名 黃豆(寧原)

外國名詞 Glycine hispida, Mame (拉丁) グイヅ マメ

ミソマメ オホマメ (日本)

基本 係豇科大豆屬。為黃大豆之子實。

形態 黃大豆為穀類之一。年生草本。高二尺餘。莖葉皆有毛。葉互生。複葉。自三小葉成小葉。邊緣

無齒牙。夏秋開小花。作蝶形花冠。色白或帶紫。雄蕊二。雌蕊一。果實為莢。有毛。其子實形如大豆。而色淡黃。供食用。亦可充藥用。



大豆黃

採取 夏秋採之。
用法 恒以水煮。調味供食。入藥水煎。或到末用。
性質 甘溫無毒。

效能 消水腫。塗瘡毒。用作緩和滋養藥。

主治 寬中下氣。利大腸。消水腫。腫毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃大豆曰。研末。熱水和塗。痘後癰。【清】黃宮繡本草求真論黃大豆曰。黃大豆按書。既言味甘。服多壅氣。生痰動嗽。又曰。寬中下氣。利大腸。消水腫。腫毒。其理似屬兩歧。詎知書言甘。適如滯。是即炒熟而氣不洩之意也。書言寬中下氣。利腸。是即生冷未炒之意。

也。凡物生則疎泄。熟則壅滯。大豆其味雖甘。其性雖溫。然生則水氣未泄。服之多有疎泄之害。故豆須分生熟而治。則有補瀉之為別耳。是以書載誤食毒物。須生搗研水塗之。諸菌毒不得吐者。濃煎汁飲。試內癰及臭毒腹痛。並與生黃豆嚼。甜而不惡心者。是即上部結有癰膜。及中具毒發移之真候。惟有痘後餘毒發癰。並痘後風癰。痘後生瘡。腫瘍。背瘡等症。則或煎湯炒黑。為末以治。用補則須假以炒熟。然必少食則宜。若使多服不節。則必見有生痰壅氣動嗽之弊矣。豆油辛甘而熱。與豆氣味稍別。能塗瘡疥。解髮疽。蒿燒灰。點惡瘡。去惡肉。【清】王士雄隨息居飲食譜論黃大豆曰。黃大豆甘平。補中解毒。宜煮食。炒食則壅氣。浸髮芽。摘根為蔬。味最鮮美。肺癰。痧氣。生嚼不腥。疑似之間。試之甚驗。痘後癰毒。嚼生黃豆塗之。即潰。浸腫搗塗。諸癰瘡亦妙。

【黃大豆油】基本 本品係用黃大豆所榨取之油。

十二畫 黃

性質 辛甘熱。微毒。
主治 塗瘡疥。解髮疔。

【黃大豆稽】

主治 燒灰入。點患去惡肉藥。

【黃大戟】即芫花之根。有毒。功能消腫。詳「芫花」條。

【黃子】即女麴之古籍別名。典見「綱目」。詳「女麴」條。

【黃丹】

原名 鉛丹。
命名 本品係用黑鉛和硝黃、鹽礬煅煉而成黃色之丹藥。故名。

處方用名 丹粉。

古醫別名 朱粉。鉛華。(綱目) 丹。赤丹。金柳。軍門。國丹。華蓋。龍汁。鏡丹。鉛黃華。(和漢藥考)

外國名詞 Minium。(拉丁) Red Lead。(英) Monnige。(德)

基本 係金屬礦石類。為黑鉛煉成之丹。

產地 產鉛諸地。均有法製出。沽。

形態 黃丹為黃赤色重粉末。煅熱之。放出養氣一部分。變為養化鉛。置於普通溶解劑。不能溶解。

逢硝酸。則溶解一部分。成爲硝酸鉛。餘則留下褐色之過養化鉛。

採取 採無時。

製法 李時珍曰。按獨孤酒丹房經源云。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃十兩。消石一兩。鎔鉛成汁。下醋點之。滾沸時。下硫一塊。少頓下消黃。待沸定。再點醋。依前下少許消黃。待爲末。則成丹矣。今人以作鉛粉。不盡者。用消石礬石炒成丹。若轉丹爲鉛。只用速鬚葱白汁。并丹慢煎。煨成金汁。傾出。即還鉛矣。貨者多以鹽消砂石雜之。凡用以水漂去消鹽。飛去砂石。澄乾。微火炒紫色。地上去火毒。入藥會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤。五錢三分也。

用法 恒對末。和作丸散。或和入外治傳藥。

性質 辛。微寒。無毒。

效能 內服墜痰鎮心。外傳拔毒生肌。用作解熱解毒藥。又爲專供外科製造膏藥之要品。

主治 吐逆胃反。驚癩癩疾。除熱下氣。鎮化濕成丸。久服通神明。(本經) 止小便。除毒熱。脾單。金瘡。血溢。(別錄)

一三九六

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃丹曰。驚悸狂走。消濕煎膏。用止痛生肌。【宋】大明諸家本草論黃丹曰。鎮心安神。止吐血及嗽。傳瘡長肉。及湯火瘡。染鬚。

【宋】寇宗奭本草衍義論黃丹曰。治瘡及久積。【明】李時珍本草綱目論黃丹曰。墜痰殺蟲。去怯。除忤。惡。止痢。明目。【清】黃宮繡本草求真論黃丹曰。鉛丹即名黃丹。係用黑鉛。硝黃。鹽礬煅煉而成。故味兼鹹而走血。其性亦能殺蟲解熱。墜痰祛積。且更拔毒去癢。長肉生肌。膏藥每取爲用。目暴赤痛。鉛丹調貼太陽立效。

配合應用 ①治消渴煩亂。黃丹新汲水服一錢。以蕎麥粥壓之。(聖惠方)

②治吐逆不止。碧霞丹。用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就銚內煨紅。冷定爲末。粟米飯丸。梧子大。每服七丸。醋湯下。(集驗方)

③治小兒吐逆不止。宜此清氣。燒針丸。用黃丹研末。小棗肉和丸。次子大。每以一九針。簪於燈上。燒

過研細。乳汁調下。一加硃砂。枯礬等分。(謝氏小兒方)

④治反胃氣逆。胃虛。鉛丹二兩。白礬二兩。生石亭脂半兩。以丹礬研勻。入坩鍋內。以炭中碎煨赤。更養一夜。出坩鍋。日入亭脂同研。粟米飯和丸。綠豆大。每日米飲下十五丸。(聖濟總錄方)

⑤治瀉瀉下利赤白。用藥肉搗爛。入黃丹。白礬各皂子大。糗米飯一團。和丸。彈子大。鐵線穿於燈上。燒過爲末。米飲服之。(摘玄方)

⑥治赤白痢下。黃丹炒紫。黃連炒等分爲末。以糊丸。麻子大。每服五十丸。生薑甘草湯下。(普濟方)

⑦治妊娠下利疼痛。可用烏雞卵一箇。開孔。去白留黃。入鉛丹五錢。攪勻。泥裹煨乾。研末。每服二錢。米飲下。一服愈。是男。二服愈。是女。(三因方)

⑧治吐血。咯血。咳血。黃丹新汲水服一錢。(經驗方)

⑨治寒熱瘧疾。體虛汗多者。黃丹。百草霜等分。爲末。發日空心米飲服三錢。不過二服愈。或糊丸。或蒜丸皆效。又用飛炒黃丹一兩。恒

山末三兩。蜜丸。梧子大。每服五十丸。溫酒下。平日及未發將發時各一服。無不效。(肘後方) 端午日用黃丹炒二兩。獨蒜一百箇。搗丸。梧子大。每服九丸。空心長流水面東下二三發後乃用。神效。亦治痢疾。(普濟方) 又用黃丹炒。建茶等分爲末。溫酒服二錢。又黃丹飛焙。麩糊丸。茨子大。每棗子一枚。去核。包一丸。紙裹煨熟食之。(三因方)

●治溫瘧不止。黃丹炒半兩。青蒿草尿浸二兩。爲末。每服二錢。寒多酒服。熱多茶服。(仁存堂方)

●治小兒痘瘡。壯熱不寒。黃丹二錢。蜜水和服。冷者酒服。名鬼哭丹。(劉涓子遺方)

●治風癩發止。驅風散。用鉛丹二兩。白礬二兩。爲末。用三角磚相固。以七層紙鋪磚上。鋪丹於紙上。繫箱丹上。以十斤柳木柴燒過爲度。取研。每服二錢。溫酒下。(王氏傳濟方)

●治客忤中惡。道間門外得之。令人心腹刺痛。氣衝心胸。脹滿。不治害人。真丹方寸七。蜜三合。和灌之。(肘後方)

十二畫 黃

●治赤眼痛。黃丹、蜂蜜調貼太陽穴。立效。(明目經驗方)

●治赤目及腎。鈔丹、白礬等分爲末。點之。又方。鈔丹、烏賊骨等分合研。白蜜蒸點之。(千金方)

●治眼生珠管。鈔丹半兩。鯉魚膽汁和如膏。日點三五次。(聖惠方)

●治痘疹生。黃丹、輕粉等分爲末。吹少許入耳內。左患吹右。右患吹左。(參痘方)

●治小兒重舌。黃丹一豆大。安舌下。(子母秘錄方)

●治小兒口瘡糜爛。黃丹一錢。生蜜一兩。相和蒸黑。每以雞毛蘸擦甚效。(普濟方)

●治腋下胡臭。黃丹入輕粉唾調類。搽之。(普濟方)

●治婦人逆產。真丹塗兒足下。(集驗方)

●治癩蝨入耳。黃丹、酥蜜、杏仁等分。熬膏。綿裹包塞之。聞香即出。抽取。(聖惠方)

●治蚊蠶螫人。醋調黃丹塗之。(肘後方)

●治金瘡出血。不可以藥速合。

則內潰傷肉。只以黃丹、滑石等分爲末。傳之。(集元方)

●治外痔腫痛。黃丹、滑石等分爲末。新汲水調。日五上之。(聖童百問方)

●治血風癩瘡。黃丹一兩。黃蠟一兩。香油五錢。熬膏。先以葱椒湯洗貼之。(陸氏積德堂方)

●治遠近腫瘡。黃丹飛炒。黃蘗酒浸七日。焙。各二兩。輕粉半兩。研細。以苦茶洗淨。輕粉填滿。次用黃丹護之外。以藥末摻膏貼之。勿揭動。一七見效。(孫氏集效方)

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡屬虛寒及無實熱者禁用。

參攷資料 ●仲景龍骨牡蠣湯。中用鈔丹。乃收斂神氣以鎮驚也。(成無己) ●丹係用鉛養化所製。法詳理化集談第三十二號。(明治十二年三月刊行) 茲述其梗概如下。於鐵皿中。投入鉛及明礬少許。熱之用棒攪拌。經八小時至十小時。使之冷定。即得養化之鉛塊。乃置入石臼。搗爲粉末。更用淘汰法。而得細粉。曬乾之。再入鐵

鍋。徐徐燒熱。二十四小時後。復入石臼搗碎。用篩篩過。即納入鐵皿中。加蓋熱四日。以成鮮紅色爲度。(和漢藥考) ●日藥舖所售之丹。向由泉州堺及大阪出產。上品者。謂之長吉丹。用作丸藥之衣。或用於膏藥等。下品者。由製白粉鉛法製出。今摘錄手板發家所載品類如下。丹燒成黃色。俗謂之黃丹。再燒成丹。則有上、中、普通三種。單呼丹者。係指辰砂。呼光明丹者。爲中品。呼菊丹者。爲下品。皆係泉州堺及大阪所燒。有丹屋長吉丹。屋市兵衛。鉛屋市兵衛。越後屋丹藏。粹屋九郎。石衛門等。乘久爲極上品。長吉。上品。光明丹。中品。勝久。中品。市兵衛。下品。此有丹屋及鉛屋二名。即普道丹。亦呼菊丹。第四版改正日本藥局方曰。鉛丹爲赤色重粉末。不溶於水。於本品加鹽酸熱之。則發出綠氣。生白色結晶性物質。(和漢藥考)

【黃心】即木蘭之古籍別名。典見綱目。詳木蘭條。

【黃文】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳黃芩條。

【黃斤】即葛根之古籍別名。與見別錄。詳「葛根」條。

【黃牙】①即石硫黃之古籍別名。與見綱目。詳「石硫黃」條。②即金之古籍別名。與見錢源。詳「金」條。

【黃牙石】即金牙石之古籍別名。與見綱目。詳「金牙石」條。

【黃牛肉】即牛肉之處方用名。詳「牛肉」條。

【黃牛根】即土茯苓之古籍別名。與見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【黃占】即黃蠟之古籍別名。與見和漢藥考。詳「黃蠟」條。

【黃奴】即雄黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【黃瓜】原名 胡瓜。命名 本品來自西域。故曰胡瓜。後因避諱。遂改爲黃瓜。

外國名詞 Cucumis sativus. (拉丁) キウリ (日本)

基本 係葫蘆科胡瓜屬之果實。

形態 黃瓜爲菜類之一年生草本。由卷鬚而上昇。葉爲心臟形。淺裂如掌狀。有葉柄互生。夏日開花。花單性。合瓣。花冠黃色。雄花與

雌花同株。雄蕊三。雌花于房下位。有三側膜胎座。果實細長爲瓠果。有刺甚多。恒供食用。亦可充藥用。



瓜 黃

性質 甘寒。有小毒。

主治 清熱解渴。利水道。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論黃瓜曰。胡瓜氣味甘寒。服此止能清熱利水。別無裨益。故南人坐坑。用此以爲席珍。南人值暑。用此以爲供蔬。井或咽喉腫痛。用此入藥。以爲吹消。杖瘡火眼。用此納稍刮粉。以爲點茶。湯火傷。用此搗碎入瓶。取水以爲刷。敷水病肚脹。用此連子醋煮。空心以爲投服。小兒熱痢。用此投蜜。以爲投治。皆以取其甘寒解毒之意。然使瀉寒氣陰。復則能以動氣。發熱作瘡。且發脚氣生瘡。小兒過服。尤易作瀉。生疳。不可不慎。葉則苦平。小毒。能治小兒閃癖。【清】王士雄隨息居飲食譜論黃瓜曰。黃瓜生

食甘寒。清熱利水。可茹可饌。兼瀉蔬之用。而發風動熱。天行病後。瘡癩。脚氣。疥癩。產後痧痘。皆忌之。

參攷資料 ①北人避石勒諱。改呼黃瓜。至今因之。【陳】陳蕃。張壽使西域得種。故名胡瓜。按杜寶拾遺錄云。隋大業四年。避諱。改胡瓜爲黃瓜。與陳氏之說微異。今俗以月令王瓜生。即此誤矣。王瓜。土瓜也。【李時珍】②胡瓜處處有之。正二月下種。三月生苗。引蔓。葉如冬瓜葉。亦有毛。四五月開黃花。結瓜。圍二三寸。長者至尺許。青色。皮上有瘡癩如疣子。至老則黃赤。色。其子與菜瓜子同一種。五月種者。霜時結瓜。白色而短。並生熟可食。兼蔬醃之用。糟醬不及菜瓜也。【李時珍】③黃瓜善解火毒。北方坐臥坑床。用此或爲珍品。南人以之供蔬。不甚有益。惟值暑時。用此爲蔬。亦可稍清暑熱。生食者不可多用。醋和鹽同食。可治小兒熱痢。【陸龜父】

【黃瓜仁】即瓜蒞仁之古籍別名。與見別錄。詳「瓜蒞仁」條。

【黃瓜根】主治 搗傅狐刺毒腫。

【黃瓜菜】命名 本品花黃。其氣如瓜。故又名黃瓜菜。

古籍別名 黃花菜。【食療】黃鵪菜。【救荒】苦菜。【日本】

外國名詞 Lactuca Thunbergiana, Maxim (拉丁) ヲガナ (日本)

基本 係菊科高苣屬。黃瓜菜之莖葉。

產地 生山野田澤間。

形態 黃瓜菜爲雜草類之一種。高一二尺。葉形不一。大抵細長披針形。有缺刻。不整齊。根葉有長柄。莖葉則無柄。基脚抱莖上。初夏分枝開花。舌狀花冠。黃色。結實小而平滑。有冠毛。其莖葉可供藥用。

性質 甘微苦。微寒。無毒。

主治 通結氣。利腸胃。

【黃瓜葉】性質 苦。平。有小毒。主治 小兒閃癖。一歲用一葉。生投攪汁服。得吐下良。

【黃皮果】古籍別名 黃彈子。【綱目拾遺】

【黃皮果】古籍別名 黃彈子。【綱目拾遺】

產地 廣東、廣西及熱帶諸地多有之。

形態 黃皮為夷果類之一種。其果大如龍眼。皮色黃白。有微毛。鱗目如肋。有青核數枚。或似棟子及小棗狀。可供食與藥用。

性質 酸。平。無毒。

主治 消食順氣。除昏。止嘔逆。痰水。胸膈滿痛。蚊蟲上攻。心下作痛。

參攷資料 廣東瑣語。載果中有白蠟子。與黃皮果絕相似。而味尤勝。諺有云。黃皮白蠟。甜酸相雜。想功亦不甚遠也。食荔枝太多。用黃皮果解之。(趙學敏)

【黃皮核】 產地 以廣府屬為最多。

主治 塗小兒頭上瘡癬。疔氣。

【黃石】 即人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人參」條。即方解石之原名。詳「方解石」條。

【黃石脂】 命名 本品為石脂之黃色者。故名。

性質 苦。平。無毒。

主治 養脾氣。安五臟。調中。大小兒洩瀉。腸辟下膿血。去白蟲。

十二畫 黃

除黃痘瘰癧蟲。久服輕身延年。

施用宜忌 惡細辛。畏蠶蠟。黃連。甘草。曾青為之使。

【黃石華】 產地 生山東牛島山中。

形態 黃石華為石類之一種。其色黃。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 陰癢。消渴。腦中熱。解百毒。

【黃安】 即雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雌黃」條。

【黃米】 即秣之古籍別名。典見綱目。詳「秣」條。即稷米之俗名。詳「稷米」條。

【黃羊】 命名 本品腹帶黃色。而幼稚肥小者。故名。

古籍別名 爾耳羊。(綱目)

產地 出關西。西番及桂林諸地。

形態 黃羊為獸類羊屬之一種。其狀與羊同。但低小。細肋。腹下黃色。羊如羖羊。數十成羣。喜臥沙漠地及野草中。其出桂林者。則深褐色。黑脊白斑。與鹿相近。皮可為裘。肉可食。與藥用。其詳詳見該條。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補中益氣。並治勞傷虛寒。

參攷資料 黃羊肉煮汁無味。其膈不可食。(綱目)

【黃羊髓】 主治 補益。功同羊髓。

【黃衣】 即黃蒸麴之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「黃蒸麴」條。即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃精」條。

【黃伯勞】 即鶯之古籍別名。典見綱目。詳「鶯」條。

【黃杜】 即苦蜜之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「苦蜜」條。

【黃杜鵑】 即羊躑躅之古籍別名。典見本草蒙筌。詳「羊躑躅」條。

【黃沈香】 即沈香之別名。詳「沈香」條。

【黃沙石】 即鐘乳石之古籍別名。典見藥性。詳「鐘乳石」條。

【黃栴】 即香躑躅之一種。典見綱目。詳「香躑躅」條。

【黃良】 即大黃之古籍別名。典見本經。詳「大黃」條。

【黃豆】 即黃大豆之古籍別名。典見寧原。詳「黃大豆」條。

【黃防風】 即防風之處方用名。詳「防風」條。

【黃卷皮】 即大豆卷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大豆卷」條。

【黃姑魚】 即黃鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「黃鰻魚」條。

【黃明膠】 命名 本品即用牛草水膠。(外臺秘要) 海原膏(綱目) 青膠。

性質 甘。平。無毒。

主治 吐血。衄血。下血。血淋。下痢。妊婦胎動。血下。風溼走注。疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛。潤燥。利大小腸。

參攷資料 本經白膠。一名鹿角膠。黃鹿角作之。阿膠一名傳致膠。黃牛皮作之。其說甚明。黃明膠即今水膠。乃牛皮所作。其色黃明。非白膠也。但非阿膠水所作耳。但其功用亦與阿膠彷彿。苟阿膠難得。則真牛皮膠亦可權用。其性味

皆平補。宜於虛熱。若鹿角膠則性味熱補。非虛熱者所宜。不可不致辨也。(李時珍)

【黃昏】即王孫之古籍別名。典見別錄。詳「王孫」條。

【黃香影子】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【黃松節】即伏神木之原名。詳「伏神木」條。

【黃果】即黃葛樹之古籍別名。典見居易錄。詳「黃葛樹」條。

【黃泥螺】即吐鐵之古籍別名。典見海味索隱。詳「吐鐵」條。

【黃物】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「金」條。

【黃芝】命名。本品為芝之黃色者故名。

古醫別名。金芝。(本經) 性質。甘平。無毒。

主治。心腹五邪。益脾氣。安神。忠信和樂。久食輕身延年。

【黃芝】即黃精之古籍別名。典見瑞草經。詳「黃精」條。即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉竹」條。

呈深黃色。長約五六寸。大者達尺

【黃芩】命名。芩說文作蒼。謂其色黃也。又芩者黔也。黔乃黃黑之色也。故名。

處方用名。條芩。子芩。淡子芩。淡黃芩。酒芩。東芩。

古醫別名。腐腸。(本經)空腸。內虛。經芩。黃文。(別錄)宿芩。(陶弘景)妬婦。印頭。(吳普本草)苦督郵。(記事)純尾芩。鼠尾芩。(唐本草)條芩。(綱目)枯芩。北芩。片芩。枯腸。裏腐草。裏朽草。杠谷樹。裏朽斤草。(和漢藥考)

學名。Scutellaria baicalea, baicalin, baicalin

基本。屬玄參科。為黃芩之根。產地。陳仁山藥物生產辨云。黃芩山西。直隸。熱河一帶。均有出。俱野生。春以清明節前收成。秋以立秋後收成。

形態。黃芩為多年自生之宿根草。春季自宿根抽出方莖。高二三尺。葉對生。作披針形。類柳葉。有毛茸。無葉柄。夏月於莖上及枝梢開紫色或白色唇形花。花後結乾果。中有球形黑色種子。根長大

餘。外面暗灰色。內部暗褐色。木部粗糙。呈淡黃色。其髓稍致密。呈褐黃色。皮部與木部。易於剝離。概無香氣。稍有苦味。

【子芩乃新根也。中多堅實而細。即今所謂條芩。鼠尾芩。採取。二月九月間採根陰乾。製法。李時珍曰。凡使黃芩。得酒上行。得醋磨汁。除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮清肺火。得白朮安胎。

性質。苦平。無毒。

成分。高橋醫學博士。試驗黃芩根。發見有作黃色針狀或板狀結晶體之一種植物鹽基。名為司克胎拉林 (Scutellarin C₁₅H₁₆O₇)。

效能。清火。清溼熱。治泄痢。療瘡瘍。用作清涼解熱藥。又治流行性感冒。破傷風。

作用。在胃內能增胃酸之不足。以助長消化之功能。至腸中略有激腸蠕動之效。入血內能減退組織細胞之氯化機能。以阻止體

溫之增高。主治。諸熱。黃疸。腸胃洩痢。逐水。下血閉。惡瘡。痘蝕。火瘍。(本經)療痰熱。胃中熱。小腹痛。消穀。利小腸。女子血閉。淋露。下血。小兒腹痛。(別錄)

歷代記述攷證。【唐】甄權藥性本草論黃芩曰。治熱毒骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破癰氣。治五淋。令人宜暢。去關節煩悶。解熱渴。

【宋】大明諸家本草論黃芩曰。下氣。主天行熱疾。疔瘡。排膿。治乳癰發背。【金】張元素珍珠囊論黃芩曰。涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱。目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎。養陰退陽。

【明】李時珍本草綱目論黃芩曰。治風熱溼熱。頭疼。奔豚。熱痛。火咳。肺痿。喉腥。諸失血。【明】繆希雍本草經疏論黃芩曰。黃芩味苦平無毒。別錄益之以大寒。味厚氣薄。入手太陰。少陰。太陽。陽明。亦入足少陽。其性清瀉。所以除邪。味苦所以燥溼。陰寒所以勝熱。故主諸熱。諸熱者邪熱與溼熱也。黃疸腸胃洩痢。皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病皆溼熱勝之病也。折其本則諸

病自瘳矣。苦寒能除淫熱。所以小腸利而水自逐。源清則流潔也。血閉者實熱在血分。即熱入血室。令人經閉不通。淫熱解則榮氣清而自行也。惡瘡疽蝕者。血熱則留結而爲癰腫潰爛也。火瘍者。火氣傷血也。涼血除熱則自愈也。別錄治疫熱者。熱在胸中則生痰火。在少腹則絞痛。小兒內熱則腹痛。胃中淫熱去則胃安而消穀也。淋瀝下血是熱在陰分也。其治往來寒熱者。邪在少陽也。五淋者。淫熱勝所致也。苦寒清瀝之氣勝。則邪氣自解。是伐其本也。【明】李士材本草因解論黃芩曰。黃芩苦寒輕瀉者入肺。堅實者入大腸。主風熱淫熱痰熱骨蒸。火咳下利。喉間腥氣。上部積血。寒熱往來。失血瘰癧。安胎療淋。養陰退陽。得酒上行。得醋勝除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下利。得桑皮瀉肺火。得白朮安胎。稍扶虛者。切勿輕用。【清】黃宮繡本草求真論黃芩曰。黃芩香載味苦入心。又載入肺。瀉火入脾。除溼入大腸。以治腸澀腹痛入小腸膀胱。以治淋閉。且治中焦實火。及

邪在少陽膽經。得此以爲清理。三藥而上下表裏皆治。其功力之泛涉。殆有難爲備主者耳。不知內火衝激。外邪傳入。皆能恣害。上如胸膈咽喉。下如肚腹二便。中如表裏之所。陰陽之界。無不病症悉形。以故腹痛腸解。寒熱往來。黃疸淋閉。胸高氣喘。癰疔疔毒。火嗽喉腥。經閉胎漏。口渴津枯。一皆淫之所淫。熱之所燙。火之所勝。黃芩味苦性寒。枯而大者。輕飄上升以清肺。肺清則痰自理矣。實而細者。沉重下降以利便。便利則腸澀自去。酒炒則隔熱可除。而肝膽火熄。生用則實熱堪投。而腹痛斯愈。且得白朮砂仁以安胎。得厚朴黃連以除腹痛。得芍藥以治痢。得柴胡以治寒熱往來。此雖合上與下。表裏皆治。而究止爲上中二焦。瀉火除熱與溼之味矣。但肺虛腹痛屬寒者。切忌。黃明者良。中虛者爲枯芩。即片芩。內實者爲條芩。即子芩。上行酒炒。瀉肝膽火。【清】張隱庵本草崇原論黃芩曰。黃芩色黃內空。能清腸胃之熱。外肌皮而性寒。能清肌表之熱。乃手足陽明兼手太陰之

藥也。主治諸熱黃疸腸澀洩痢者。主諸經之熱。歸於胃土。而爲黃疸歸於大腸。而爲洩痢。黃芩中空。主清腸胃之熱。故能治之。腸胃受濁。得肺氣通調。則水津四布。血氣運行。逐水下血閉者。黃芩外肌皮而清肌表。清則肺氣和。而留水可逐。血閉自下矣。火熱之氣留於肌肉皮膚。則爲惡瘡疽蝕。惡瘡疽蝕。名曰火瘍。黃芩治之。清肌表也。【清】葉天士本草經解論黃芩曰。黃芩氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。其味無毒。得南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降陰也。心者火臟也。十二官之君。諸熱之主也。苦平清心。故主諸熱。黃疸者。溼熱乘脾之症也。脾爲太陰溼土。土溼熱則本色現而發黃疸。黃芩苦平清肺。脾亦太陰。太陰溼熱退。而脾疸亦平也。肺與大腸相表裏。大腸溼熱。則腸澀洩痢。黃芩清肺。肺清則通調水道。而溼熱下逐。腸肺復其燥金之性。而洩痢愈矣。肺司水道。熱則肺失清肅之令。而水道不通。水因而蓄。爲黃芩清肺則氣化。下及膀胱。而水下逐矣。血閉者。實

熱在血分。而經閉不通也。心主血。味苦清心。則能下洩。所以主之。惡瘡疽蝕者。係瘡疽肢壞潰腐而不收口也。火傷火傷瘡也。皆心火有餘。而腐壞肺之皮毛也。苦平清心。所以主諸痛痒瘡毒也。【清】陳修園本草經讀論黃芩曰。黃芩與黃連黃蘗。皆氣寒味苦而色黃。主治大略相似。大抵氣寒皆能除熱。味苦皆能燥溼。色黃者皆屬於土。黃而明亮者則屬於金。金借土之色以爲色。故五金以黃金爲貴也。但黃芩中空似腸胃。腸爲手陽明胃爲足陽明。其主諸熱者。指腸胃諸熱病而言也。黃疸爲大腸經中之鬱熱。逐水者。逐腸中之水也。下血閉者。攻腸中之蓄血。惡瘡疽蝕火瘍者。爲肌肉之熱毒。陽明主肌肉。瀉陽明之火。即所以解毒也。本經主治之旨如此。仲景於少陽經用之。於心下悸易茯苓。於腹痛易芍藥。又於本經首外別有會悟也。【清】鄒澍本經疏證論黃芩曰。仲景用黃芩有三。爲芍藥分熱結者。與柴胡爲耦。一。小柴胡湯。大柴胡湯。柴胡桂枝乾薑湯。柴胡桂枝湯。

一血分熱結者與芍藥為耦。(桂枝柴胡湯。黃芩湯。大柴胡湯。黃連阿膠湯。鼈甲煎丸。大黃蠶蟲丸。奔瀉湯。王不留行散。當歸散。)溼熱阻中者與黃連為耦。(半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。生薑瀉心湯。葛根黃芩黃連湯。乾薑黃芩黃連人蔘湯。)以柴胡能開氣分之結。不能洩氣分之熱。芍藥能開血分之結。不能清迫血之熱。黃連能治溼生之熱。不能治熱生之溼。醫之解。但去其耦者。未平其致。因之。怒。終未已也。故黃芩協柴胡能清氣分之熱。協芍藥能洩迫血之熱。協黃連能解熱生之溼也。小柴胡證腹中痛者去黃芩。加芍藥。心下悸小便不利者去黃芩。加茯苓。夫腹中痛。未必非氣血之結。而心下悸。小便不利。亦何以決知其非氣熱而生之水。且本經明言黃芩能逐水。別錄明言黃芩能除小腹絞痛。利小腸。而逐去之何耶。殊不知治腹滿痛。腹痛繞臍痛。少腹疝痛。有可用寒藥者。惟腹中痛者必無中熱之理。仲景是以於厥陰篇。特標其旨曰。腹中痛。若轉氣下。則少腹

者。此欲自利也。其他如真武湯之腹痛。小便不利。小建中湯之腹中急痛。附子粳米湯之腹中寒氣。雷鳴切痛。當歸生薑羊肉湯之腹中痛。及脇痛裏急。抵當烏頭桂枝湯之腹中痛。逆冷。手足不仁。致痛雖殊。治痛亦異。用溫藥則同。以是知腹痛下一中字。則與凡痛有別。用黃芩諸方必無此矣。彼小腹絞痛者。乃熱氣迫血。血結少腹而痛。與鼈甲煎丸。大黃蠶蟲丸。王不留行散之用黃芩不殊也。小便不利。原不必忌黃芩。小便不利而心下悸。則不容更用黃芩。何則。仲景云。太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。彼雖論血結。此亦可借以喻氣結。曰。飲水多而心下悸。則非熱阻所化之水矣。熱阻所化之水。可以黃芩逐之。飲水而停蓄者。其可以黃芩逐之耶。蓋水氣凌心為悸。必寒水乃然。若熱化之水氣。則脾家上升。濁濛之氣。中焦變化取赤之汁。終日周流於腹中。而稟命於心君。若均能致悸。則無病人有不悸時耶。李瀕湖言有人素多酒慾。少腹絞痛。不可

忍。小便如淋。諸藥不效。偶用黃芩。木通。甘草。三味煎服。遂止。王海藏言有人因虛服附子藥多。病小便閉。服芩連藥而愈。大抵黃芩之用。凡氣分有餘。挾熱攻衝他所者。乃為的對。若他所自病。不係熱氣攻衝者。則不可服。服之必益虛其氣。他病之病。反足以攻衝於氣矣。或問黃芩湯治何等證。其證腹痛與否。若腹痛何以用黃芩。若腹不痛何以用芍藥。曰。其證身熱。不惡風。亦不惡熱。或下利。或嘔。腹則不痛。蓋芍藥甘草大棗。桂枝湯裏藥也。以不惡風。故不用薑桂。黃芩甘草大棗。小柴胡湯裏藥也。以不往來寒熱。故不用柴胡。以其常熱。故不用人蔘。若不嘔。則井不用半夏。生薑。至芍藥則並不因腹痛而用。以桂枝湯證原無腹痛也。亦不心下痞。以不去大棗也。夫芍藥甘草湯。治傷寒汗出。誤服桂枝湯後。足脛拘急。已見其能破陽邪於陰分矣。加以黃芩。不益可見陽分之熱甚盛。攻於陰分。為利。非陰中自有慾陽之結耶。仲景於厥陰篇云。傷寒脈遲。與黃芩湯除其熱。腹中則

冷不能食。可知黃芩湯證之厥必數。黃芩所治之熱。必自裏達外。不治但在表分之熱矣。黃芩治自裏達外之熱。千金歷有明文。芍藥湯治產後虛熱頭痛。若通身發熱者。加黃芩。慎火草散。治崩中漏下。赤白青黑。腐臭不可近。熱多者加知母。黃芩。道人深師增損腎瀝湯。治風虛勞損挾毒。脚弱疼痛。下焦虛冷。胸中有熱。其熱多者。加黃芩。又可知陰虛氣盛。熱自內出者。黃芩亦能治之。而不但治感觸所化。輿中達外之熱矣。李瀕湖自緣感冒咳嗽既久。且犯戒。遂病骨蒸。發熱。府如火燎。每日吐痰盈碗。暑月煩渴。寢食幾廢。脈浮洪。徧服柴胡。麥冬。荊瀝諸藥。月餘。益劇。皆以為必死。其尊人以謂李東垣治肺熱如火燎。煩躁引飲。甚甚者。宜一味黃芩。以瀉肺經氣分之火。遂按方用黃芩一兩煎服。次日身熱盡退。痰嗽皆愈。於此益可知黃芩所治。必肺經氣分之熱。肺經氣分之熱。必晝甚於夜也。黃芩本經主黃疸。腸辟洩利。金匱要略及傷寒論發黃證皆不用。洩利證兩書除諸瀉

心湯外。亦絕不用。今以千金方參合而考之。亦頗有意義可尋也。千金治黃方。凡有黃芩者。多云一身面目悉黃。金匱要略中所載有身體黃者。有額上黑者。有面青目黑者。可知痘證非一身面目悉黃者。不可用矣。千金治熱利。冷利。疳瀉。小兒利。用黃芩方多有壯熱一語。可知洩利無熱者。不可用矣。大抵氣主充周。無處不到。凡病有彼此不相伴者。必非氣分之病。黃芩主氣分之熱。於此不可以相證乎。千金治小兒核腫壯熱。有實方。及治小兒熱毒入膀胱中。忽忽小便不通。欲小便則澀痛不出。出少如血。須臾復出。地膚子湯。治小兒落胎墮地。如有瘀血。腹中陰陰寒熱。不肯乳哺。但啼哭叫喚。蒲黃湯。皆有黃芩。考茲數證。均為氣熱攻血。亦微其病本之治。別錄所謂黃芩治小兒腹痛者。於此可明其旨矣。即其治小腹痛。亦當與此不異。蓋傷寒金匱兩書。僅有腹痛去黃芩之文。大率黃芩所治之小腹痛。必煩熱。必口渴。必小便有異。於常。於此則非所宜矣。〔清〕賈九

十一 黃

如辨藥指南論黃芩曰。黃芩中枯者名枯芩。條細者名條芩。一品宜分兩用。蓋枯芩體輕主浮。專瀉肺胃上焦之火。主治胸中逆氣。膈上熱痰。咳嗽喘急。目赤齒痛。吐衄失血。發斑發黃。痘疹瘡毒。以其大能涼隔也。其餘芩體重主降。專瀉大腸下焦之火。主治大便閉結。小便淋瀝。小腹急脹。腸紅痢疾。血熱崩中。胎漏下血。挾熱腹痛。諸語狂言。以其大能清腸也。同枳實。紫朴。能消穀食。因邪熱不殺穀。以此清胃。則穀易消。同柴胡。退熱。為柴胡散火之標。以此折火之本。同白朮。安胎。蓋白朮健脾。但胎坐中宮。氣不運行。易生鬱熱。以此清氣。胎動自安。用豬膽汁拌製。入厥陰肝經。以清抑鬱之火。止胎前瘧寒。戰振動。不使墮胎。

國外學說 日本學說謂黃芩漢醫頗珍重之。稱為有清涼解熱利尿之效。緒子氏因漢醫珍重黃芩。苦於不明其理由。高橋學士發見一種結晶性物質。附以「スクテラリン」之名。然於治療上。無特殊之作用。黃芩果為有效與否。暫時尚為一疑問而已。〔中外醫事新報和漢藥論〕又和漢藥考用為清涼解熱藥。用量二、〇至六、〇。又曰。藥肆所售黃芩。有漢朝鮮和三種。漢種呈黃黑色。有苦味。為上品。其中老根。色頗黑。內部空虛。味苦。日本呼真鍮手。其嫩根形細長。內部充實。日本呼軸手。朝鮮種呈鮮黃色。苦味薄。為中品。日本種。根細長。而有縱紋。往往分歧。外面灰黃色。內部鮮黃色。味稍苦。含樹脂質。為下品。

近人學說 賈汝範曰。按黃芩為屬唇形科宿根植物。美國藥制中早已揭載。有一種黃芩。其有效成分。據日人高橋順太郎氏之研究。則為一種呈黃色針狀或板狀。無臭無味之結晶體也。因其原植物之名為 *Scutellaria baicaensis*。故雖命名為「Scutella-ria」〔黃芩精〕將切碎之黃芩。用以太冷浸。蒸餾其浸出液。則析去黃色之結晶塊。再將此結晶塊溶解於沸騰酒精中。放置數時間後。即能析出黃色針狀或板狀之黃芩精結晶也。

配合應用 ①治濕熱作瀉腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、車前子、防風、升麻。
②治滯下腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、滑石、升麻。
③三黃丸。孫思邈千金方云。巴郡太守。癸加減三黃丸。療男子五勞七傷。消渴。不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱。瀉五臟火。春三月。黃芩四兩。大黃三兩。黃連四兩。夏三月。黃芩六兩。大黃一兩。黃連七兩。秋三月。黃芩六兩。大黃三兩。黃連三兩。冬三月。黃芩三兩。大黃五兩。黃連二兩。三物隨時合搗。下篩。蜜丸。烏豆大米飲下。每服五丸。日三。不知增至七丸。服一月。病愈。久服走及奔馬。人用有驗。禁食豬肉。〔圖經本草方〕

④三補丸。治上焦積熱。瀉五臟。大黃連。黃蘗等分為末。蒸餅丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。〔丹溪方〕
⑤治肺中有火。清金丸。用片芩炒為末。水丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。〔丹溪方〕
⑥治小兒驚啼。黃芩、人參等分

爲末。每服一字。水飲下。(普濟方)

① 治肝熱生疔。不拘大人小兒。黃芩一兩。淡豉三兩爲末。每服三錢。以熟豬肝裹。吹溫湯送下。日二服。忌酒麵。(衛生家寶方)

② 治少陽頭痛。亦治太陽頭痛。不拘偏正。小清空齋。用片黃芩酒浸透。曬乾爲末。每服一錢。茶酒任下。(東垣方)

③ 治眉厓作痛。風熱有淚。黃芩酒浸。白芷等分爲末。每服二錢。茶下。(潔古方)

④ 治吐血衄血。或發或止。積熱所致。黃芩一兩。去中心黑朽者爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。和滓溫服。(聖惠方)

⑤ 治吐衄下血。黃芩三兩。水三升。煎一升半。每溫服一錢。亦治婦人漏下血。(廣安時卒病論方)

⑥ 治血淋熱痛。黃芩一兩。水煎熱服。(千金方)

⑦ 治經水不斷。赤心丸。治婦人四十九歲已後。天癸當住。每月却行。或過多不止。用條芩心二兩。米醋浸七日。炙乾。又浸。如此七次。爲末。陸樹丸。梧子大。每服七十九空。

心溫酒下。日二次。(瑞竹堂方)

⑧ 治崩中下血。黃芩爲細末。每服一錢。露蘆酒下。以秤錘燒赤。淬酒中也。許學士云。崩中多用止血及補血藥。此方乃治陽乘於陰。所謂天醫地熱。經水沸溢者也。(本草方)

⑨ 安胎清熱。條芩、白朮等分炒爲末。米飲和丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。或加神麴。凡妊娠調理。以四物去地黃。加白朮。黃芩爲末。常服甚良。(丹溪方)

⑩ 治產後血渴。飲水不止。黃芩、麥門冬等分。水煎。溫服。無時。(楊氏家藏方)

⑪ 治炎瘡血出。一人灸火至五壯。血出不止。如尿。手冷欲絕。以酒炒黃芩二錢爲末。酒服即止。(李樓怪證奇方)

⑫ 治老小火丹。黃芩末水調塗之。(梅師方)

⑬ 用薑 錢半至二錢。施用宜忌 凡脾胃虛寒及無溼熱實火者禁用。惡葱實。畏丹砂。牡丹。藜蘆。山茱萸。龍骨爲之使。著名方劑 黃芩湯。太陽與少

陽合病。自下利者。此主之。(傷寒論) 黃芩三兩。甘草芍藥各二兩。大棗十二枚。上四味。水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

⑭ 黃芩之中枯而

⑮ 黃芩之功效 黃芩之中枯而顯者。瀉肺火。利氣消痰。除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。養陰退陽。補膀胱寒水。滋其化源。高下之分。與枳實枳殼同例。(李杲)

⑯ 黃芩之用有九。瀉肺熱一也。上焦皮膚風熱風溼二也。去諸熱三也。利胸中氣四也。消痰膈五也。除脾經諸溼六也。夏月須用七也。婦人產後養陰退陽八也。安胎九也。酒炒上行。主上部積血。非此不能除。下痢膿血。腹痛後重。身熱久不能止者。與芍藥甘草同用之。凡諸痛瘡不可忍。宜芩速苦寒之藥。詳上下分。稍及引經藥用之。(張元素)

⑰ 黃芩降痰。假其降火也。凡去上焦溼熱。須以酒洗過。用片芩瀉肺火。須用桑白皮佐之。若肺虛者。多用則傷肺。必先用天門冬保定肺氣。而後用之。黃芩白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。

⑱ 黃芩降痰。假其降火也。凡去上焦溼熱。須以酒洗過。用片芩瀉肺火。須用桑白皮佐之。若肺虛者。多用則傷肺。必先用天門冬保定肺氣。而後用之。黃芩白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。

⑲ 黃芩降痰。假其降火也。凡去上焦溼熱。須以酒洗過。用片芩瀉肺火。須用桑白皮佐之。若肺虛者。多用則傷肺。必先用天門冬保定肺氣。而後用之。黃芩白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。

血不妄行。乃能養胎。黃芩乃上中二焦藥。能降火下行。白朮能補脾也。(朱震亨)

⑳ 張仲景治傷寒心下痞滿。瀉心湯凡四方。皆用黃芩。以其主諸熱。利小腸故也。又太陽病下之利不止。喘而汗出者。有葛根黃芩黃連湯。及主妊娠安胎散。亦多用之。(蘇頌)

㉑ 得厚朴黃連止腹痛。得五味子。牡蠣。令人有子。得黃芪。白飲。赤小豆。療鼠瘻。(徐之才)

㉒ 得酒上行。得豬膽汁。除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。(李時珍)

㉓ 圓者名于芩。破者名宿芩。其腹中皆爛。故名腐爛。(陶弘景)

㉔ 宿芩乃舊根。多中空。外黃內黑。即今所謂片芩。乃又有腐腸類。婦諸名。如婦心點。故以此之子芩。乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云西芩。多中空而色黯。比芩多內實而深黃。(李時珍)

㉕ 今出宜州。郪川。涇州者佳。兗州大實亦好。名狹尾芩。(蘇恭)

㉖ 今川蜀河東陝西近鄜皆有之。苗長尺餘。莖幹粗如筋葉。從地四面作叢生。類紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉

細長青色。兩兩相對。六月開紫花。根如知母粗細。長四五寸。二月八月採根曝乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四面相植。其莖空中。或方圓。高三四尺。四月花紫紅赤。六月花實黑。根黃。二月至九月採。與今所說有小異也。(蘇頌)

【黃芩子】

主治 腸胃腹血。

【黃芪】即黃耆之處方用名。詳『黃芪』條。

【黃芫花】即蕪花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蕪花』條。即芫花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『芫花』條。

【黃花了】形體 黃花了爲雜草類之一種。春生青葉。開花似辣椒花。黃色。秋日結實。可供藥用。

主治 咽喉齒痛諸病。

【黃花子草】即綿絮頭草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『綿絮頭草』條。

【黃花母】即山柳菊之別名。詳『山柳菊』條。

【黃花地丁】即蒲公英之原名。詳『蒲公英』條。

十二畫 黃

【蒲公英】條。

【黃花苗】即蒲公英之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花草】即千里光之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花郎草】即蒲公英之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花魚】即石首魚之古籍別名。與見臨海志。詳『石首魚』條。

【黃花菜】即葦草之古籍別名。與見綱目。詳『葦草』條。即黃瓜菜之古籍別名。與見食療本草。詳『黃瓜菜』條。即白花菜之黃花者。詳『白花菜』條。

【黃花演】即千里光之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花蒿】命名 本品形似青蒿而色淡黃。故名。

古種別名 臭蒿。草蒿(綱目)。

外國名詞 Artemisia annua, L. (拉丁) クリニンジン (日本)

基本 係菊科艾屬。爲黃花蒿之葉。

產地 在原野田澤間。

形態 黃花蒿爲溼草類之一

年生草本。高三四尺。覆葉細裂。花小筒狀。花冠帶黃色。頭狀花序。甚圓。其葉擦碎之。則發辛惡臭氣。其葉與子。俱可供藥用。



黃花蒿

性質 辛苦。涼。無毒。

主治 小兒風寒驚熱。

參攷資料 黃花蒿一名臭蒿。臭蒿一名草蒿(大明) 香蒿。臭蒿通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭不可食。人家採以釀醬黃酒。麴者是也。(李時珍)

【黃花蒿子】性質 辛苦。涼。無毒。

主治 治勞下氣。開胃。止盜汗。及邪氣鬼毒。

【黃芽菜】即白菜之古籍別名。與見植物學大辭典。詳『白菜』條。

【黃矮菜】即黃矮菜之原名。詳『黃矮菜』條。

【黃金石】即雄黃之古籍別名。與

見本經。詳『雄黃』條。

【黃金花】即百脈根之日本名。詳『百脈根』條。

【黃金粉】即錫絲之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『錫魚』條。

【黃柏】原名 藥木。藥皮。處方用名 黃蘗。黃柏炭。川黃柏。真川柏。古種別名 山層(和漢藥考) 根名樓租(綱目)

外國名詞 Evodia Glauca 基本 屬芸香科之落葉喬木。爲 Phellodendron amurense 之樹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。黃柏以北江。星子。連州爲最。廣西桂林亦可。身結色青黃。可惜薄殼。產日本者。以其身鬆色黃。而無蠟青。橫濱好些。神戶次之。又有鹿錦州者。由烟台牛莊運來。與日本產者同類。更薄而劣。

形態 黃蘗爲深山自生之落葉喬木。寒地最多。高達三四丈。葉對生。爲羽狀複葉。其小葉作橢圓

十二畫 黃

形。前端尖。長二三寸。表面綠色。背帶白色。夏月開黃綠色五瓣聚繖花。花爲單性。雌雄異株。果實爲漿果。作球形。大二三分。熟則呈黑色。有苦味。其皮表面黃褐色。有深裂。裏面作黃色而光滑。



黃柏

採取 二月五月採皮。日乾。製法 雷斅曰。凡使黃藥皮。削中粗皮。用生蜜水浸半日。漉出曬乾。用蜜塗。文武火炙令蜜盡爲度。每五兩用蜜三兩。張元素曰。二製治上焦。單製治中焦。不製治下焦也。李時珍曰。黃柏性寒而沉。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒製則治上。鹽製則治下。蜜製則治中。

性質 苦寒。無毒。

成分 黃柏之有效成分。亦爲祕魯培林 (Borberin)。與黃連同。效能 瀉相火。清溼熱。用作變質。強壯健胃藥。及用以增進食慾。又可外用爲眼科藥。與皮膚病藥。

又治糖尿病。腎臟炎。

作用 有增進胃液。促進消化之能。至屬有刺激腸壁神經。使腸吸收增加。入血後。能使血液循環有標準之次數。而神經亦同時振興。

主治 五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰陽蝕瘡 (本經) 療驚氣。在皮間肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。 (別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論黃柏曰。熱瘡。起蟲瘡。血痢。止消渴。殺疰蟲。 【唐】甄權藥性本草論黃柏曰。男子陰痿。及傳莖上瘡。治下血。如鷄鴨肝片。 【宋】大明日華諸家本草論黃柏曰。安心除勞。治骨蒸。洗肝明目。多淚。口乾心熱。殺疰蟲。治疥。心痛。鼻衄。腸風。下血。後急。熱腫痛。 【金】張元素珍珠囊論黃柏曰。瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。療下焦虛。諸痿癱瘓。利下。竅除熱。 【元】李東垣用藥法象論黃柏曰。瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛不可忍。 【元】朱丹

一四〇六

瀉。亦皆溼熱傷血所致。洩痢者。滯下也。亦溼熱干犯腸胃之病。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。皆溼熱乘陰虛。流客下部而成。膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。皆陰虛血熱所生病也。以至陰之氣。補至陰之不足。虛則補之。以類相從。故陰回熱解。溼燥而諸證自除矣。乃足少陰腎經之要藥。專治陰虛生內熱諸證。功烈甚偉。非常藥可比也。潔古用以瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。療下焦虛。諸痿癱瘓。利下。救除熱。東垣用以瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛不可忍。丹溪謂得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。 【清】黃宮繡本草求真論黃柏曰。黃藥昔人同知。母用於六味丸中。名爲知藥八味丸。又同知藥各一兩。酒洗焙研入桂。名爲滋腎丸。謂其可滋真陰。此說一出。而天下翕然宗之。以至於今。牢不可破。詎知黃藥性稟至陰。味苦性寒。行隆冬肅殺之令。故獨入少陰瀉火。入膀胱瀉熱。凡人病因火亢。而見骨蒸勞熱。

自去。耳鳴消渴便閉。及溼熱爲病。而見諸痿癱。淡。水瀉熱利。黃疸水腫。痔血腸風。瀉下赤白。與夫諸痛瘡。癢。蚊蟲內攻。診其尺果洪大。按之而有力。可炒黑暫用。使其溼熱順流而下。陰火因而潛伏。則陰不受煎熬。而陰乃得長矣。非謂真陰虛損。服此卽有滋潤之力也。故於實熱實火則宜。而於虛熱虛火。則徒有損而無益。奈今天下人不問虛實。竟有爲去熱治勞之妙藥。而不知陰寒之性。能損人氣。滅人食命。門真元之火。一見而消亡。脾胃運行之機。一見而阻喪。元氣既虛。又用苦寒。退絕生機。莫此爲甚。川產肉厚色深者良。生用降黃火。蜜炙則不傷胃。炒黑能止崩帶。酒製治上。蜜製治中。鹽製治下。〔清〕買九如辨藥指南論黃柏曰。黃柏樹高數丈。其皮從上直下。味苦入骨。是以降火能自頂至踵。浴膚微癢。無不週到。專瀉腎與膀胱之火。蓋腎屬寒水。水少則漸消。涸竭則變熱。若氣從下起者。陰火也。內經曰。腎欲堅以苦堅之。堅卽爲補。丹溪以此一味名大補丸。用鹽水製。

十二畫 黃

使鹽以入腎。主降陰火。以救腎水。用蜜湯拌炒。取其燻隔而不驟下。治五心煩熱。目痛口瘡諸症。單炒褐色。治腸紅痔漏。遺精白濁。溼熱黃疸。及膀胱熱。臍腹內痛。凡屬相火。用此抑之。腎自堅固。而無狂蕩之患。因味苦能走骨。能沉下。用酒拌炒。四物湯調服。領入血分。治四肢骨節走痛。足膝酸疼無力。遍身惡瘡。及腳氣攻冲。嘔逆惡心。陰虛血熱。火氣於足者。蓋此一味。名潛行散。能瀉陰中之火。亦能安蛔蟲。以苦降之之義也。

國外學說 日本學說謂黃柏與黃連同含有「ベルベリン」然其含量。比黃連爲劣。故治療上之價值。亦因之而少。諸子氏就二三古書。調查關於黃柏之事項。知凡供外用時。多爲火傷皮膚之炎。症等。廣益本草大成第十二卷第四藥曰。小兒疳生疔不合者。黃藥末塗之。〔子母秘傳〕人冬月向火。火氣內入兩股。瘡生汁出不止者。黃藥末塗。立癒。〔醫說〕藥性能毒大成第二卷第三十五頁曰。除下部之溼瘡。毒腫。蜜炒爲末塗於口瘡。

甚佳。諸子氏欲探其原因。試取黃柏之一定量。澆水而浸出之。則浸液呈膠狀。通過濾紙甚難。〔於濾液中加入亞爾個兒亦不沈降。是與護談相反〕又嘗其少量。但覺辛味。〔因含有「ベルベリン」之外。尙有黏液之味。氏因察所謂植物性黏液之存在否。製出而定其量。則黃柏中約含七至八%之植物性黏液。故以黃柏供外用者。唯因其含有植物性黏液也。然則如亞爾答。亞麻仁。錦葵等。於表皮剝脫。皮膚炎等。殆可供藉布。溼溫療法之用。又依此理由。於急心腸胃炎。咽喉炎等。當可內服。氏又試驗植物性黏液之外。並無護談類之存在。蓋黃藥之主成分。爲秘魯培林。其試驗成績。有已故醫學博士諸子吉人氏之報告。詳載東京醫學會雜誌第二卷第十二號。又日本市上有售所謂陀羅尼助者。爲有光澤之黑色板狀塊。係煎熬黃藥而成之一種水製越幾斯。用代熊膽。昔海云。昔有僧誦陀羅尼時。製此用爲防睡之助云。其味極苦。製於吉野大峯之洞川。爲稱係大峯

所燒香煙煤。加百草製成。或用胡黃連（千振）根製者云。又藥學雜誌第二百十四號載有藥學得業士平井方澄氏之「爲取縣產煉熊之試驗報告」一文。詳述煉熊之功效。形態。及其成分等。其言曰。煉熊在東國地方。呼陀羅尼助。內服治腹痛。腹痛等。外用點充血目。爛目等。或用以貼於打傷。刀傷等。農家則用作牛馬脾藥。試驗其成分。可證明其中含有秘魯培林。古來使用煉熊。其主效亦卽在此秘魯培林。加之含有多量樹膠類。與秘魯培林相並。故於內服外用。能奏上述功效。而民間用此。亦確實有效。故煉熊實爲不可輕視之民間藥。以余觀之。本品之製法。能加以改良。將可得有力之製品云。詳細請再參閱該雜誌。

辨偽 鄭肖巖曰。黃柏本出漢中山谷。今以蜀中產者皮厚色深爲佳。樹高數丈。葉似紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。入藥用其根。結塊如松下茯苓。氣味苦寒無毒。近有一種偽品。色黃而黑。味充不苦。不知何物假充。用之得無害。

十二盡 黃

平。●暫炳章曰按黃柏。四川順慶府南充縣出者為川柏。色老黃。內外皮黃黑。塊片小者佳。可作染料。用。湖南及閩東出者。為關柏。塊片甚大而薄。色淡黃者次。東洋出者。為洋柏。色亦淡黃。質鬆。更不入藥。

配合應用 ●黃藥為足少陰

腎經藥。然以柴胡引之則入膽。以黃連、葛根、升麻引之則入腸胃。及大陰脾經。治溼熱滯下。佐牛膝、枸杞、地黃、五味子、鱉甲、青蒿。則益陰除熱。佐甘菊、枸杞、地黃、葵藜、女貞實。則益精明目。得猪膽汁、水銀粉。則主諸熱瘡有蟲。久不合口。得鉛丹。則生肌止痛。得木瓜、茯苓、二朮、石斛、地黃。則除溼健步。佐白芍藥、甘草。則主火熱腹痛。

●治口中及舌上生瘡。到黃藥含之。(外臺祕要方)

●治小兒重舌。以黃藥、苦竹瀝浸點舌上。(千金方)

●治咽喉卒腫。食飲不進。黃藥搗末。苦酒和敷腫上。佳。(肘後方)

●治傷寒時氣。溫病毒攻手足。腫痛欲斷。亦治毒攻陰腫。細到黃藥五斤。以水三斗。煮漬之。(傷寒

類要方)

●治食自死六畜肉中毒。黃藥末。服方寸匕。未解再服之。(葛氏方)

●治嘔血。黃藥蜜塗炙乾。杵為末。麥冬湯調下二錢匕。立癒。(經驗方)

●治癰疽疔毒。或發乳房。初起微赤。不急治之。即殺人。搗黃藥末和雞子白塗之。(梅師方)

●治吐血熱極。用黃藥二兩。蜜炙搗末。每服二錢。溫糯米飲調下。(簡要濟衆方)

●治小兒熱瀉。黃藥削皮。焙為末。用薄米飲。丸如粟大。每服十九米飲下。(十全博救方)

●治傷寒熱病。口瘡。黃藥削去。麝皮。蜜漬一宿。唯欲令濃。含其汁。良久吐更含。若胸中熱。有瘡時。飲三五合尤佳。(深師方)

●衍義云。藥木今用皮。以蜜炙。與青黛各一分同為末。入生龍腦一字。研勻。治心脾熱。舌煩生瘡。當擦瘡上。有涎即吐。又張仲景藥皮湯。無不驗。傷寒論中已著。

●治妊娠下痢白色。晝夜三五

十行。根黃厚者。蜜炒令焦為末。大蒜煨熟。去皮。搗爛如泥。和丸。梧子大。每空心米飲下三五十九丸。日三服。神妙不可述。(婦人良方)

●治赤白濁淫。及夢洩精滑。真珠粉丸。黃藥炒真蛤粉各一斤。為末。煉蜜丸。菘豆大。每服一百丸。空心溫酒下。黃藥苦而降火。蛤粉鹹而補腎也。又方加知母炒牡蠣。煨山藥炒等分為末。糊丸。梧子大。每服八十九丸。鹽湯下。(潔古家珍方)

●治積熱夢遺。心忪恍惚。隔中有熱。宜清心丸主之。黃藥末一兩。片腦一錢。煉蜜丸。梧子大。每服十五丸。麥冬湯下。此大智禪師方也。(許學士本事方)

●治口疳臭爛。綠雲散。用黃藥五錢。鋼絲二錢。為末。搽之。漱去涎。(三因方)

●治鼻疳有蟲。黃藥二兩。冷水浸一宿。絞汁。溫服。(聖惠方)

●治鬚毛毒瘡。生頭中。初生如蒲桃。痛甚。黃藥一兩。乳香二錢。半為末。槐花煎水調作餅。貼於瘡上。(普濟方)

●治小兒脾疳不合者。黃藥末

一四〇八

塗之。又方。治疔瘡。熱瘡。黃藥末一兩。輕粉三錢。豬膽汁調搽之。或用蜜炙黃藥末一味。(子母秘錄方)

●治火毒生瘡。凡人冬月向火。火氣入內。兩股生瘡。其汁淋漓。用黃藥末搽之。立愈。一婦生此。人無識者。用此而愈。(張景岳說方)

●斂瘡生肌。黃藥末。麴糊調塗。效。(宣明方)

●用量 錢半至三錢。●應用宜忌 凡非實火諸症。及脾虛多瀉。胃薄少食者。禁用。惡乾漆。

●著名方劑 ●滋腎丸。治肺痿。聲嘶。喉痺。咳血。煩燥。及溼熱下注。小便澀滯等症。(東垣方) 黃柏(酒炒)二兩。知母(酒浸炒)二兩。肉桂一錢。為末。熱水丸。梧子大。每服五十九丸。空心下。●二妙散。治溼熱下注。足軟脚腫。及筋骨疼痛。(丹溪方) 黃柏(炒)若朮(炒去皮)各等分。為末。生薑研。沸湯調服。

●參攷資料 ●黃藥之用有六。瀉膀胱心火一也。利小便結二也。

瀉膀胱心火一也。利小便結二也。

除下焦溼腫三也。痢疾先見血四也。臍中痛五也。補腎不足壯骨體六也。凡腎水膀胱不足。諸痿厥腰無力。於黃芪湯中加用之。使兩足膝中氣力涌出。痿軟即便去也。乃瘕瘕必用之藥。蜜炒研末。治口瘡如神。故雷公炮炙論云。口瘡舌折立愈。黃酥謂以酥炙根黃含之也。
(張元素) 黃蘗 蒼朮 乃治痿要藥。凡去下焦溼熱作腫及痛。并膀胱有火邪。并小便不利。及黃蘗者。並用酒洗黃蘗。知母為君。茯苓澤瀉為佐。凡小便不通。而口渴者。邪熱在氣分。肺中伏熱。不能生水。是經小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。豬苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通者。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚。陰中之陰藥治之。黃蘗知母是也。長安王善夫病小便不通。漸成中滿。腹堅如石。脚腿裂破出水。變睛凸出。飲食不下。痛苦不可名狀。治滿利小便。滲洩之藥。服遍

十二畫 黃

矣。予診之曰。此乃奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致膀胱久而乾涸。小便不化。火又逆上。而為嘔噦。雖經所謂開則不得小便。格則吐逆者。潔古老人言熱在下焦。但治下焦。其病必愈。遂處以北方寒水所化大苦寒之藥。黃蘗知母各一兩。酒洗焙燥。入桂一錢。為引。熱水丸。如灰子大。每服二百丸。沸湯下。少時如刀刺。前陰火燒之狀。溺如瀑泉。湧出。淋下成流。顧盼之間。腫脹消散。內經云。熱者寒之。腎惡燥。急食辛以潤之。以黃蘗之苦寒。蕩熱補水。潤燥為君。知母之苦寒。瀉腎火為佐。肉桂甘熱。為使。寒因熱引也。(李杲) 古書言知母佐黃蘗。滋陰降火。有金水相生之義。黃蘗無知母。猶水母之無蝦也。蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火。知母能清肺金滋腎水之化源。故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥。上古所未言也。蓋氣為陽。血為陰。邪火煎熬。則陰血漸涸。故陰虛火動之病。須之。然必少壯氣盛能食者。用之相宜。若中氣不足。而邪火熾盛者。久服則有寒中之變。近時虛

損及縱慾求嗣之人。用補陰藥。往往以此二味為君。日日服餌。降令太過。脾胃受傷。真陽暗損。積氣不暖。致生他病。蓋不知此物苦寒而滑滲。且苦味久服。有反從火化之害。故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷胃。不能生陰之戒。
(李時珍) 黃蘗本經言藥木及根。不言蘗皮。豈古時木與皮通用乎。(李時珍) 藥木今出邵陵者。輕薄色深為勝。出東山者。厚而色淺。其根於道家入木芝品。今人不知取服。(陶弘景) 子蘗亦名山石榴。子似女貞。皮白不黃。亦名小蘗。所在有之。今云皮黃謬矣。按今俗用子蘗。皆多刺小樹。名刺蘗。非小蘗也。(蘇恭) 黃蘗樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如棠棣。經冬不凋。皮外白裏深黃色。其根結塊。如松下茯苓。今所在有之。出房商合等州山谷中。皮厚二三分。鮮黃者上。二月五月採皮日乾。(蘇頌) 黃蘗處處有之。以蜀中出肉厚色深者為佳。(蘇頌) 黃芩樹子入肺。黃連入心。黃蘗入腎。燥溼所歸。各從其類也。故活人書四味解

毒湯。乃上下內外通治之藥。(王好古)

【黃柏炭】即黃柏炒過者之處方用名。詳「黃柏」條。

【黃柏根】原命 檀桓。性質 苦寒無毒。主治 心腹百病。安魂魄。耐饑渴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論黃柏根曰。去萬病為散飲服。

【黃芩】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【黃英】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【黃英香】即檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

【黃屑】形體 黃屑為雜木類之一種。其樹如檉。可供藥用。

性質 苦寒無毒。

主治 心腹痛。霍亂。破血。酒煎服。酒煎目黃。及野雞病。熱痢下血水者服。

【黃茄水】製法 秋天黃老茄 子不計多少以新瓶 盛埋地中。年化為水。取出應用。

主治 大風熱痰。能消痰成水。

【黃芽根】即白芽根之一種。參 詳「白芽根」條。即地筋之處方 用名。詳「地筋」條。

【黃香】即松脂之古籍別名。與見 和漢藥考。詳「松脂」條。

【黃孫】即王孫之古籍別名。與 見別錄。詳「王孫」條。即黃精之 古籍別名。與見和漢藥考。詳「黃 精」條。

【黃桐】即桐之古籍別名。與見圖 經本草。詳「桐」條。

【黃秫】形態 黃秫為雜草類 之一種。形如桐根。可供 藥用。

性質 苦。無毒。

主治 除心煩。止汗出。

【黃耆】命名 耆長也。本品色 黃。為補藥之長。故名。

處方用名 黃芪。生黃耆。炙黃 耆。清炙耆。蜜炙耆。大有耆。綿黃芪。

古籍別名 戴椹（本經）戴椹 芎藭。百本。艾草。芟草。獨椹（別錄）

王孫。（藥性）羊肉。（日華）黃嗜。綿 耆。戴粉。（綱目）妬婦。甘板麻。百藥 綿。（和漢藥考）

外國名詞 Astragalus, hir- oshimansu, Mak（拉丁）

藥商隱名 上有芪。西上芪。芪 面。又有因產地而名者。如白水黃 芪。赤水黃芪。木黃芪。土黃芪。岩黃 芪。

基本 黃耆屬莖科。中國產者。 用黃耆之地下莖。日本產者。用岩 黃耆之地下莖。黃耆葉似槐葉。而 微尖小。又似蒺藜葉。而微闊。大青 白色。開黃紫花。大如槐花。結小尖 角。長寸許。根長二三尺。以緊實如 箭筈者為良。嫩苗亦可燻食。其子 收之。十月下種。如種菜法。

產地 黃耆之產地。在昔日 中國醫籍。多謂出自隴西。如秦州 記曰。隴西襄武縣出黃耆。又唐慎 微證類本草及李時珍本草綱目。 皆引證陶宏景之言曰。第一出隴 西洮陽。李氏在綱目集解中。又引 陳承言曰。黃耆本出綿上。為良。而 陶經檢憲州黃耆者。實為地與綿 上相鄰故也。元王好古曰。綿上即

山西沁州。而白水在陝西同州。明 陳嘉謨亦謂綿上沁州鄉名。白水 赤水二鄉。俱屬隴西。如是黃芪在 昔時似皆謂出自陝西及山西。即 赤水鄉。白水鄉。與綿上。故有赤水 耆。白水耆。與綿耆之稱也。今吾東 耆亦出。如奉天之法庫縣。及東蒙 古臨西一帶。黃耆皆上品。和漢 藥考云。白水赤水耆。俱陝西之鄉 名。綿耆。出於山西沁州綿上。故名。

或云用其皮折之。柔韌如綿者為 良。乃謂之綿黃芪。木黃芪者。短而 理橫。今人多以首溜根假之。俗呼 為土黃芪。但堅而脆。味苦。令人瘦 黃。芪柔而味甘。令人肥。大異。用者 宜審。木黃芪亦勿用。碧黃耆產加 賀國白山。和泉國金剛山。及安藝 廣島等。為宿根草。春季抽莖。高三 四尺。葉為多數小葉所成之複葉。 有毛茸。秋季開類小豆花之淡黃 色花。後結莢實。中有小子。一種呼 富士黃耆者。產駿河國富士山。莖 如莖。花淺黃色。結莢角。又有一種 紫色者。根莖俱小而硬。謂之本黃 耆。陳仁山藥物生產辨云。正芪 產區分三處。一關東。二蒙古塔。三

卜奎。產東三省伊黎。吉林。三姓地 方。清明後收成。入山採掘。至六七 月間。乃上市。沖口芪。產區亦廣。產 於山西省渾源州近陽高縣一帶。 收穫在秋後冬前。擇出勻滑直強 者。先製粉芪。綿芪。專治三江一帶 次下者。乃製沖口芪。染成黑皮。而 渾源芪。牛莊芪。即此芪。製剝原來 生芪而來。是以不黑皮。又有一種 名管芪。實為川芪。原產四川碧江 汶縣。灌縣。江油縣等處。又有一種 名禹州芪。乃由口外運至禹州。扎 把而來。原色白皮。亦是生芪。非產 禹州。粉芪原出陝西岷州。大同。宣 化等處。

形態 黃耆為莖科植物 (L? guminoso) 中蝴蝶花形科植物 (Papilionaceae) 宿根草 Astragalus Honryi Oliv. 之根。同種 類之植物有數種。即因其產地亦 別其形狀及種類。如陶弘景謂。出 隴西洮陽者。色黃白。味甜美。出黑 水宕昌者。色白。肌理粗新者。亦甘 又蘇頌曰。黃耆之出綿上者。其皮 折之。柔韌如綿。故謂之綿黃耆。本 草綱目謂今市場販者。多切成六

七寸許之短棒狀。外面呈淡褐色。有螺旋狀之隆起線。內部爲黃白色。折之柔韌如綿。破折面爲纖維狀。其味微甘稍帶芳香性。世多採首習根充實。假黃者俗呼爲土黃。不知首習根堅而脆。肉色黃味亦苦。黃者軟而綿。肉白味甘。此爲異耳。又按本草圖譜引草木圖說謂開淡黃花者。名曰木黃者。學名則爲 *Asparagus retrofractus*。則爲 *Asparagus retrofractus*。學名 *Asparagus retrofractus*。產自日本安藝廣島地方。綱目記木香短而理橫。又爲開紫花者。產自駿州富士名之曰富士黃者。學名則爲 *Astragalus Adairgensis* Pall. 莖如芟。根亦白。二者皆屬下品。

採取 二月十月間採之。
製法 雷斅曰。凡使勿用木香草。真相似。只是生時葉短并根橫也。須去頭上殼皮。蒸半日。擘細於槐帖上剉用。李時珍曰。今人但粗屑以蜜水塗炙數次。以熟爲度。亦有以鹽湯潤透。器盛於湯瓶蒸熱切用者。
性實 甘。微溫。無毒。
效能 益氣。固衛。托疔。生肌。用。

十二 薑 黃

作和緩強壯藥。及利尿止痛排膿劑。又爲瘡瘍癰疽。以及痘證不起之要藥。

作用 入胃後。能助胃之消化力。而能與胃酸化合。至小腸被其吸入血中。促進血液之進行。故能托瘡排膿。振興精神。增高體力。
主治 癰疽久敗疔。排膿止痛。大風癩疾。五痔。鼠瘻。補虛。小兒百病。(本經)婦人子腹風邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛。洩痢。益氣。利陰氣。(別錄)

張仲景之發明 黃耆一藥。經張仲景氏之實驗。認爲能治肌表之水。故能治黃汗盜汗皮水。又勞治身體重及麻木不仁者。考證如下。①香芍桂枝苦酒湯證曰。身體腫。發熱汗出而渴。又云。汗沾衣。色正黃如藥汁。②防己黃耆湯證曰。身重汗出惡風。(以上二方。黃耆皆五兩)③防己茯苓湯證曰。四肢腫。水氣在皮膚中。④黃耆桂枝五物湯證曰。身體不仁。(以上二方。黃耆皆三兩)⑤桂枝加黃耆湯證曰。身常暮盜汗出者。又云。從

腰以上必汗出。下無汗。腰腹弛痛。如有物在皮中狀。(以上一方。黃耆二兩)⑥黃耆建中湯證。不具也。(以上一方。黃耆一兩半)歷觀上諸方。黃耆主治肌表之水也。故能治黃汗盜汗皮水。又能治身體腫或不仁者。是腫與不仁。亦皆肌表之水也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃耆曰。主虛喘。腎衰。耳聾。瘰癧熱。治發背內補。【宋】日華諸家本草論黃耆曰。黃耆助氣壯筋骨。長肉補血。破癥瘕。瘰癧。癭。腸風血崩。帶下赤白痢。產前後一切病。月候不勻。咳嗽頭風。熱毒赤目。【金】張元素珍珠囊論黃耆曰。治虛勞。自汗。補肺氣。消肺火。心火。實皮毛。益胃氣。去肌熱。及諸經之痛。【元】王好古湯液本草論黃耆曰。主大陰瘧疾。陽痿爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣裏急。又曰。黃耆治盜汗。并自汗。及膚痛。是表皮之藥。治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。【元】李東垣用藥法象論黃耆曰。黃耆

補三焦實衛氣。與桂同功。特比桂甘平。不辛熱。爲異耳。蓋桂則通血脈。能破血。而實衛氣。黃則益氣也。【明】陳嘉謨本草蒙筌論黃耆曰。參芪俱益虛損。但人參惟補元氣。調中。黃芪兼補衛氣實表。如共劑而用。須別主輔。凡內傷脾胃。發熱惡寒。怠惰嗜臥。嘔吐洩瀉。及脹滿痞塞。形羸力乏。脈微神短。參爲君。若表虛而自汗盜汗。漸至亡陽。諸潰瘍多耗膿血。嬰兒痘疹未灌全漿。一切陰毒不起之疾。治之。又須實衛護營。當以芪爲君。參爲臣。【清】楊時泰本草述鈞元論黃耆曰。黃耆味甘。氣微溫。氣厚於味。可升可降。陰中之陽也。入手足太陰氣分。甘溫純陽。主益肺氣。溫分肉。實皮毛。固腠理。大補表之元氣。虛弱。通和陽氣。利陰氣。泄火邪。能活血脈。生血助胃氣。(治脾胃虛弱。脈弦血脈不行。羸瘦腹痛)益三焦元陽。補五臟諸虛不足。火夫虛損羸瘦。短氣虛喘。腎衰耳聾。瀉久腸風。老人氣虛腸悶。更治虛煩肌熱。遺勞自汗盜汗。若表虛有邪。發汗不出服之。自汗并內托陰

補三焦實衛氣。與桂同功。特比桂甘平。不辛熱。爲異耳。蓋桂則通血脈。能破血。而實衛氣。黃則益氣也。【明】陳嘉謨本草蒙筌論黃耆曰。參芪俱益虛損。但人參惟補元氣。調中。黃芪兼補衛氣實表。如共劑而用。須別主輔。凡內傷脾胃。發熱惡寒。怠惰嗜臥。嘔吐洩瀉。及脹滿痞塞。形羸力乏。脈微神短。參爲君。若表虛而自汗盜汗。漸至亡陽。諸潰瘍多耗膿血。嬰兒痘疹未灌全漿。一切陰毒不起之疾。治之。又須實衛護營。當以芪爲君。參爲臣。【清】楊時泰本草述鈞元論黃耆曰。黃耆味甘。氣微溫。氣厚於味。可升可降。陰中之陽也。入手足太陰氣分。甘溫純陽。主益肺氣。溫分肉。實皮毛。固腠理。大補表之元氣。虛弱。通和陽氣。利陰氣。泄火邪。能活血脈。生血助胃氣。(治脾胃虛弱。脈弦血脈不行。羸瘦腹痛)益三焦元陽。補五臟諸虛不足。火夫虛損羸瘦。短氣虛喘。腎衰耳聾。瀉久腸風。老人氣虛腸悶。更治虛煩肌熱。遺勞自汗盜汗。若表虛有邪。發汗不出服之。自汗并內托陰

疽排膿止痛。長肉生肌。為瘡家聖藥。又治女子月候不勻。血崩帶下。胎前產後氣耗血虛。並療小兒百病。【清】張隱菴本草崇原論黃者曰。黃者色黃。味甘微溫。稟火土相生之氣。化土主肌肉。火主經脈。故主治肌肉之癢。經脈之疽也。癢疽日久。正氣衰微。至三焦之氣不溫。肌肉則為久敗瘡。黃者助三焦出氣以溫肌肉。故可治也。癢疽未潰。化血為膿。痛不可忍。黃者補氣助陽。陽氣化血而排膿。膿排則痛止。火風癩疾。謂之癩瘍。乃風寒客於脈而不去。鼻柱壞而色敗。皮膚潰爛者是也。今夫五痔者。牡痔。牝痔。腸痔。脈痔。血痔。是熱邪淫於下也。鼠瘻者。腎臟水毒。上淫於脈。致項項潰腫。或空或凸。是寒邪客於上也。夫癩疾五痔鼠瘻。乃邪在經脈。而證見於肌肉皮膚。黃者內資經脈。外資肌肉。是以三證咸宜。又曰補虛者。乃補正氣之虛。而經脈調和。肌肉充足也。小兒經脈未盛。肌肉未盈。血氣皆微。故治小兒百病。【清】鄒樹本經疏證論黃者曰。黃者根莖。皆旁無歧互。獨上獨下。其

根中央黃。次層白。外層褐。顯然三層。界畫分明。又其味甘。其氣微溫。直入中土。而行三焦。故能內補中氣。則本經所謂補虛。別錄所謂補丈夫虛損。五勞羸瘦益氣也。能中行營氣。則本經所謂主癢疽。久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。別錄所謂逐五臟間惡血也。能下行衛氣。則本經所謂五痔鼠瘻。別錄所謂婦人子臟風。邪氣腹痛。洩利也。癢疽。寒邪客於經絡之中。則血泣不通。衛氣歸之。不得復反。故癢腫寒氣化為熱。熱勝則肉腐為膿。素問風論。風氣與太陽俱入。行諸脈。散於分肉。與衛氣相干。其道不利。故使肌肉憤癢。有癢。衛氣有所凝。故肉有不仁。營氣熱附不清。故使鼻柱壞。而色敗。名曰癩風。生氣通天論。營氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。歷歷明微。莫非營衛之病。而營衛所以屬三焦。三焦所以屬中土者。靈樞營衛生會篇。上焦出於胃上口。貫膈。竝咽。布胸中。以發呼吸。而行營衛。是為中氣。中焦亦竝胃中。出上焦之後。此所受氣。泌糟粕。蒸津液。上注於肺。乃化為血。是為

營氣。下焦別迴腸。泌別汁。注於膀胱。是為衛氣。三者皆本於水穀。是三焦為營衛之本。脾胃之蒸腐變化。又為三焦之本。黃者一源三派。滋三焦之根。利營衛之氣。故凡營衛間阻滯。無不靈通。所謂源清流自潔者也。【清】黃宮繡本草求真論黃者曰。黃者味甘性溫質輕。皮黃肉白。故能入脾補氣。入表實衛。為補氣諸藥之最。是以有耆之稱。且著其功曰。生用則能固表。無汗能發。有汗能收。是明指其表實則邪可逐。故無汗能發。表固則氣不外洩。故有汗能止耳。又著其功曰。熱則生血。生肌。排膿。內托。是蓋指其氣足。則血與肉皆生。毒化成膿。而為瘡瘍聖藥矣。至於豆瘡不起。陽虛無熱。書言於耆最宜。皆是取其質輕達表。功專實衛。而能升氣於表。又言力能補腎。以治崩帶淋濁。是蓋取其補中升氣。則腎受陰。而崩帶淋濁自止。然與人參比較。則參氣味甘平。陽兼有陰。耆則乘性純陽。而陰氣絕少。蓋一宜於中虛。而泄瀉痞滿。倦怠可除。一更宜於表虛。而自汗亡陽。潰瘍不起。

可治。且一宜於水虧。而氣不得宣發。一更宜於火衰。而氣不得上達。之為異耳。書言黃者性畏防風。其功益大。蓋謂能以助者達表。相畏而更相依。是以如斯。若使陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒。肝氣不和。肺脈洪大者。則並戒其勿用矣。出山西黎民。大而肥潤。節直良。瘦小色黑。堅硬不軟者。服之令人胸滿。血虛肺燥。趙福蜜炙。發表生用。氣虛肺寒。酒炒。腎虛氣薄。鹽湯蒸潤。切片用。【清】賈九如辨藥指南論黃者曰。黃芪皮黃入脾。肉白走肺。性溫能升陽。味甘淡。用蜜炒。又能溫中。主健脾。故內傷氣虛少用。以佐人參。使補中益氣。治脾虛瀉。痔痢日久。吐衄腸紅。諸久失血。後及痘瘡。慘白。主補肺。故表疎衛虛多用。以君人參。作飲汗固表。治自汗盜汗。諸毒潰後。收口生肌。及痘瘡貫膿。癰疽久不愈者。從骨托毒而出。必須鹽炒。痘科虛不發者。在表助氣為先。又宜生用。若氣有餘。表邪旺。醃理實。三焦餘熱未淨。萬不可加。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。黃者

治痢疾。及梅毒。頗有效。其拉丁名爲『阿斯葛拉格留斯。愛基斯加卑斯』。用根及子。味微甘。收澀。水煎服。治下痢赤痢。利小便。又作淋藥。能剝淨斷頭腐爛使之治愈。又爲末。摻經久潰瘍及瘡。傷使排膿而愈。或用治梅毒諸症。左方多有效。

辨偽 ●鄭育巖曰。黃芪偽名介芪。介或作蓋。條硬無味。色白不黃。按黃芪以山西綿上出者爲佳。故一名綿芪。色黃帶白。緊實如箭。故又名北箭芪。折之柔韌如綿。故能入肌腠而補氣。若介芪之呆劣。又安可用乎。聞蓋芪性極發散。有人誤服。汗流不止。其性與綿芪大相反。用者當明辨之。●曹炳章曰。按黃芪冬季出新。山西太原府里陵地方出者。名上芪。其貨直長。稍軟而無細枝。細皮皺紋。切斷有菊花紋。兼有金井玉欄杆之紋。色自黃。味甜鮮潔。帶有葶豆氣。爲最道地。又大同府五台山出。粗皮細硬。枝短味淡。作小把。爲台芪。俗稱小把芪。略次。亳州出者。性硬筋多。韌而肉色黃。爲毫芪。俗稱奎芪。亦

十二畫 黃

次。陝西出者。爲西芪。性更硬。味極甜。更次。蛟城出者。爲蛟芪。枝短皮粗。無枝。極次。四川出者。爲川芪。小把皮紅黑色。性硬筋軟如麻。味青草氣。爲最下品。服之致腹滿。最能害人。凡外症瘡瘍用黃芪。如陽癰。托毒化膿。及虛體瘡疔。皆用生。陰疽補托。轉陽用炙。皆須太原產之上芪。立能見效。若以側路雜芪充用。則爲害甚烈。不可不辨矣。

近人學說 徐錫年曰。黃芪味甘性溫。氣升質降。爲溫養脾胃。益氣固表之品。本經論其功用。有治癰疽久敗。排膿止痛。大風癩疾。五疔風癩。補虛。小兒百病等文。後人用之。如補中益氣湯。當歸補血湯。黃芪建中湯諸方。皆以黃芪爲補中溫裏。益氣實表之品。誠足以發明黃芪之功用矣。迨夫後賢繼起。議論紛紜。以致本經意旨。愈說愈晦。愈趨愈下。如金元大家張潔古者。以本經主治癰疽久敗。排膿止痛二語。遂倡出黃芪爲瘡家聖藥之說。味者不察。一律沿襲。於是治瘡諸家。不問症情。不辨虛實。竟以黃芪一味。視同神聖。無往不用。以

致補住邪火。增長毒炎者。比比皆然也。瘡症暴發。毒勢方張。或爲痰火互結。或爲溼毒蘊熱。始則嫩腫。堅大。繼則潰爛膿膿。滲透攻化。化毒清火。此其治也。乃一用黃芪。甘溫升發。實表固裏。助其蘊釀之資。增其養癰之患。甚至於燎原而莫可救。是素稱爲瘡家之聖藥者。今爲瘡症之砒鴆矣。雖然。此非黃芪之咎也。乃用之者不識其時耳。然則黃芪果何時而可用乎。曰。潰瘍久敗。肌肉難生。膿水不淨。此久病元虛。脾陽衰弱。瘡口潰塌。不能興其生發之機。能黃芪甘溫。補益元氣。且走肌腠。投於此際。可謂有利無弊。誠爲聖品矣。是故本經以治癰疽久敗。排膿止痛者。卽此意也。張隱庵曰。癰疽日久。正氣衰微。故曰久敗。不意高明如潔古者。竟抹煞本經久敗兩字。倡此籠統之說。致後人有濫用之弊。殆亦其本意所不及料者。敢貢一得。用者審之。

●張山雷曰。黃芪具春令升發之性。味甘氣溫。色黃。皆得中和之正。故能補益中土。溫養脾胃。凡中氣不振。脾土虛弱。清氣下陷者。最宜

其皮味濃質厚。力壯皆在皮中。故能直達人之膚表肌肉。固護衛陽。充實表分。是其專長。所以表虛諸病。最爲神劑。但升舉有餘。偏於陽分。氣虛陽虛者。宜升宜提。而陰虛火擾者。宜禁。若肝腎不足。不可誤與升陽。伐其根本。故凡飢餓勞役。脾陽下陷。氣怯神疲者。及瘡久脾虛。清氣不升。寒熱不止者。投以東垣之補中益氣湯。無不捷效。正以黃芪爲參朮之佐。而又得升柴以升舉之。則脾陽復辟。而中州之大氣。幹旋矣。(正語)黃芪爲固表主藥。甘溫之性。專走肌肉皮膚。本草經之癰疽久敗。瘡疔排膿止痛。明謂其專治癰疽之久敗者。則排膿止痛。蓋久敗之潰瘍。肌肉久壞。膿水頗仍。表氣大虛。黃芪益氣固表。以療其虛。斯能排膿止痛耳。張隱庵亦謂癰疽日久。正氣衰微。故爲久敗。乃後人習焉不察。誤認其通治癰疽。置久敗二字於不問。張潔古則稱其內托陰疽。爲瘡家聖藥。饒仲醇則稱其治小兒胎毒瘡癩。張景岳則稱其生者可治癰疽。張石頑則稱其托已潰瘡。餘子礫礫。

無不節取本經排膿止痛四字。泛指為瘡家必用之藥。所以庸俗之書。治瘡各方。類皆不問虛實。插入黃芪一味。自謂能讀本草。而富貴家亦喜其堂皇冠冕。信之不疑。不知瘡勢方張。而用質表之藥。為虎傅翼。適以愈張其毒。則腫瘍難消。潰瘍毒熾。排膿適以生膿。止痛乃以增痛。皆誤讀本經之咎矣。潔古所謂內托阻陰疽。注重陰證。猶可說也。然望腫而質其表。亦以助邪終屬非法。且瘡家聖藥四字。即為後人沿說製謬之根。而穆氏經疏。竟謂其治小兒胎毒瘡癩。則皆熱毒滲火之病。而投甘溫固表。直是抱薪救火。誤讀古書。抑何至於此極。景岳石頑。皆高明之士。所謂藥物。皆有經驗。而猶仍斯謬。又何怪庸耳俗目之人云亦云。蒞蘆依樣耶。壽頤於瘡科一門。具有師承。凡在腫瘍及潰瘍之毒勢未清者。概不浪投補劑。以取悅富貴之家。惟漬久元虛。或虛寒之體。始以四君六君保元歸脾等方。隨宜擇用。非矯異於庸俗也。亦澄清之不容不爾者也。敢揭而出之。為世俗之

治瘡者告。俾知本草經固未嘗不可信。特不可為誤讀古書者所惑。庶幾令病人少受痛苦。亦治醫者之陰德也。白朮條中。昔人曾有潰瘍禁用之說。以其能生膿作痛也。張石頑亦信之。試問同是補益肌肉之品。何以一忌一宜。大相刺謬。如此。豈有朮之補脾。必生膿作痛。而芪之固表。反有消膿止痛之理。則後先虛實。不加辨別。而混為一例之過也。須知藥之治病。全在用之得當。同此一病。而前後之虛實不同。斯攻補即當異治。若但執一病名。而不問虛實。不問寒熱。泛泛然號於眾曰。某藥為宜。某藥為忌。豈理也哉。甄權治虛喘腎衰。蓋誤認其補氣之過也。要知升舉之品。正與喘證之氣逆上壅相反。且腎衰作喘。本是氣虛不攝。陰火上衝。攝納歸元。猶恐不及。乃復舉而升之。則根本既搖。而速之厥矣。此東垣之補中益氣湯。所以最不宜於肝腎之虛也。張潔古謂其瀉肺火。蓋亦指氣虛發熱言之。虛火不藏。面赤發熱。有似肺家之火。則芪以補脾益氣。能退大熱。若火熱利金。

而妄投補益。則謬矣。東垣謂防風能制黃芪。而芪得防風。則功愈大。云云。願謂既以制之。而反能大其功。自盾自矛。最為可笑。蓋既惑於前人相制之謬說。而又無解於許胤宗之以黃芪防風湯。薰愈柳太后中風口噤之病。乃欲申一說以解其紛而不悟。適以造成怪誕支離之弊。蓋防風黃芪。均是行表之藥。道合志同。何云相制。胤宗之法。自有巧思。不意東垣倡此奇談。殊為可駭。要知徒逞隨見。毫不足徵。後學萬弗泥此。庶不汨沒性靈。窒智巧。中風口噤。不語最多。氣升痰升。內因之病。風藥表藥。直是鳩毒。古人多作外風治療。皆是誤認。所以古之治案。多難盡信。許氏此案。見舊唐書本傳。治法新穎。獨闢蹊徑。如謂果能取效。恐亦未必。蓋史乘中所載醫家治驗。大都意想之辭。試為細嚴醫藥理法。多難符合。良由乘筆者傳聞得之。而文人又皆不知醫學。則人云亦云。但知其新奇可喜。又安能辨得醫理病理之確當與否。子長孟堅之有公等傳。尚多不可索解。更何論乎范

疇陳齋以下。如華陀傳等。皆是。况乎中風一證。卒仆昏迷。本非外受之風。素問謂是血菀於上。名以薄厥。又謂氣血交并於上。名以大厥。今西醫謂之血冲腦經。皆不可妄用風藥。壽頤編有中風對論三卷。專論此病。以質驗為主。一說古書專散溫藥之誤。胤宗此案。果是外風。則不服而落。已覺有意矜奇。效否亦殊難必。若是內因。則為害必甚。雖入正史。願終不敢深信。而東垣黃芪之說。更是匪夷所思。出乎情理之外。潔古有黃芪無汗發之有汗止之一說。而後人之編本草者。多循例照錄。無汗能發。有汗能止。二句。幾以此物為發汗止汗之專藥。亦知二者之功用。一散一收。正如冰炭之相反。而不相合。天下安有一物而具有水火二性之理。乃黃芪之效力如此。寧非絕大怪異。抑知黃芪能達表。而補益衛陽。明係固表之藥。何以能發汗。蓋惟衛分充盈。而陽氣流通。固亦有時而微汗津津者。潔古意中。固自有說。然約而稱之。則非立言之體矣。○袁淑範曰。黃芪學名之商楮。

依余個人所閱之參考書。皆謂產自我國及日本。從未有記自歐洲亦產者。其學名因此亦紛紛不一。西人則多譯自日本。如 Chinese Materia Medica 及 Botanical Chemical and Pharmacological reference list to Chinese Materia Medica 等。則記其學名為 Astragalus Hoangtchy 察 "Hoangtchy" 是日人讀黃芪之音。又如稱為 Astragalus hiroshimanus Mak 者。因黃芪在日本多產自安藝。即今之廣島之地方。因命名謂廣島黃芪。日人讀廣島之音為 "Hiroshima"。故西人即譯為 Astragalus hiroshimanus。如是吾人如稱為 Astragalus huang-chi。似亦未嘗不可。且黃芪本產地而異其功效。如李時珍在本草綱目發明中。引陶弘景之言曰。出關西者溫補。出自水者冷補。如是吾人何能以日本產之 Astragalus hiroshimanus 表示中國黃芪。此節意以爲如果稱爲 Astragalus hiroshimanus。何如稱之謂 Astragalus huang-chi 爲妥。又據稱精通湖北產植物名之英人 Henry 氏在彼所著之 Alphabetical list of Chinese names of plants 中。記黃芪之學名爲 Astragalus Henry Oliv. 故日人多以之爲中國黃芪之學名。如 Chimoyama Pharmacognosio 及 Pharmaceutische Botanik 等書多記爲 Astragalus Henry Oliv. 又和漢藥考則記中國產者爲 Astragalus Henry Oliv. 日本產者爲 Hodyarsium esculentum, Ledeb. 而國人又有以 Astragalus hiroshimanus Mak 或 Hoangtchy 爲中國黃芪之學名者。其屬背謬錯誤者。不言可喻矣。今姑就余個人之意見。議定學名及其種類於次。黃芪 Huang-chi. (中) 黃芪 Hoangtchy. (日) (一) Astragalus Huang-chi 產自中國 (Astragalus Hoangtchy) (Astragalus Henry Oliv) (甲) Astragalus Chih-shui-Huangchi. 陝西同州赤水鄉。(乙) Astragalus

Poshui-Huangchi. 陝西同州白水鄉。(丙) Astragalus Nion-Huang-chi 山西沁州綿上。(丁) Astragalus Man-chou-Huangchi. 產自滿洲。(戊) Astragalus Nu-Huang-chi (一) Astragalus hiroshimanus Mak. 產自日本廣島。(二) Astragalus flexistipulus Miq. 產自日本。(四) Astragalus adsurgens pall. 產自日本富士。(五) Hodyarsium esculentum, Ledeb. 產自日本。總之吾人研究國藥。固應先擇其功效卓著。富有興味者研究之。然如甘草黃耆人參等。中醫常用之藥。似亦不可屏棄。不道。因研究最終之目的。爲解決實地之問題。故也。至黃耆之種類及學名。皆因產地而異。吾人不應以日本產之 Astragalus hiroshimanus Mak 表示國產黃耆。况我國黃耆。又有赤水、白水、綿耆等之區別也。昔日醫籍。雖記黃耆爲補虛延長氣息之聖藥。然依余之不完備之試驗成績。判斷時。黃耆至少亦不能能有強壯之功效。其有效之主要

成分。雖不敢斷言。然屬 Alkaloid 爲不可少疑之事實也。

配合應用 ①黃耆在補中益氣湯。甘溫能除大熱。爲治勞倦發熱之要劑。

②黃耆同生熟地黃、黃蘗、黃芩、黃連、當歸。加酸棗仁。炒熟研。爲治陰虛盜汗之正法。本方法三黃加人參、五味子、酸棗仁。治表虛自汗。

③黃耆同桂枝、芍藥。防風、炙甘草。能實表。治表虛長風。傷風自汗。

④黃耆與茅山朮、生地黃等分。牛膝、黃芩。減半作丸。治積年溼毒。癩瘡。百藥不效。

⑤主甲疽疔腫爛。生脚指甲邊。赤肉出。黃耆二兩。蘭茹三兩。苦酒漬一宿。豬脂五合。微火上煎。取三合。絞去滓。以封瘡上。日三度易。其肉即消。(外臺祕要方)

⑥黃耆同白芷、白及、甘草、金銀花、皂角刺。排膿止痛。

⑦黃耆同人參、甘草。治天行痘瘡。陽虛無熱證。

⑧治小便不通。綿黃耆二錢。水二盞。煎一盞。溫服。小兒減半。(綿

十二畫 黃

徵論方

① 治酒疸黃疾。心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤。黑黃。斑由大醉當風入水所致。用黃香二兩。木蘭一兩。為末。酒服。方寸匕。日三服。(肘後方)

② 治氣虛白濁。黃芪鹽炒半兩。茯苓一兩。為末。每服一錢。白湯下。(經驗良方)

③ 治渴補虛。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃香箭箴者去蘆。六兩。一半生焙。一半以鹽水潤溼。飯上蒸三次。焙到粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃為末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃香六一湯。(外科精要方)

④ 治老人悶塞。綿黃香。陳皮。去白各半兩。為末。每服三錢。用大麻子一合。研爛。以水濃漿。煎至乳起。入白蜜一匙。再煎沸。調藥空心服。甚者不過二服。此藥不冷不熱。常服無祕塞之患。其效如神。(和劑

局方

① 治腸風瀉血。黃香。黃連等分。為末。麵糊丸。綠豆大。每服三十丸。米飲下。(孫用和祕寶方)

② 治尿血沙淋。痛不可忍。黃香。人參等分。為末。以大蘿蔔一個。切一指厚。大四五片。蜜二兩。淹炙。令盡。不令焦。點末食。無時。以鹽湯下。(永類鈴方)

③ 治吐血不止。黃香二錢。牛。紫背浮萍五錢。為末。每服一錢。薑蜜水下。(聖濟總錄方)

④ 治咳嗽膿血。咽乾。乃因虛中有熱。不可服涼藥。以好黃香四兩。甘草一兩。為末。每服二錢。點湯服。(席延賞方)

⑤ 治肺癰得吐。黃香二兩。為末。每服二錢。水一盞。煎至六分。溫服。日三四服。(聖惠方)

⑥ 治胎動不安。腹痛下黃汁。黃香。川芎。各一兩。糯米一合。水一升。煎半升。分服。(婦人良方)

⑦ 治陰汗溼痒。綿黃香酒炒。為末。以熱豬心點喫。妙。(濟急方)

⑧ 治瘵疔內固。黃香。人參。各一兩。為末。入真龍腦一錢。用生藕汁

和丸。綠豆大。每服二十九。溫水下。日服。(本事方)

⑨ 用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡非氣虛而表裏有實邪者。禁用。惡龜甲。白鮮皮。畏防風。茯苓為之使。

著名方劑 ① 玉屏風散。治自汗不止。氣虛表弱。易感風寒。(潔古方) 黃芪(炙)防風各一兩。白朮(炒)三兩。共研末服。② 保元湯。治小兒慢驚痘證。險惡不起。以及虛寒雜病。(東垣方) 黃芪三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。肉桂(春夏二三分。秋冬六七分)水煎服。

參攷資料 ① 黃香治氣虛。盜汗。并自汗。及膚痛。是皮表之藥。治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。(王好古) ② 黃香補元氣。肥白而多汗者。為宜。若面黑形實而瘦者。服之令人胸滿。宜以三拗湯治之。(朱震亨) ③ 黃香。防風。世多相須。而用。唐許胤宗。為新蔡王外兵參軍。王太后病風。不能言。脈沉。難對醫

告衛窮。胤宗曰。餌液不可進。即以黃香。防風。煮湯。數十斛。置床下。氣如霧。熏。薄之。是夕語。(本草衍義) ④ 黃香出隴西者。溫補。出白水者。冷補。又有赤色者。可作膏用。消癰腫。(陶弘景) ⑤ 凡虛而有客熱者。用白水黃香。虛而有客冷者。用隴西黃香。(陳藏器) ⑥ 黃香藥中補益。呼為羊肉。(一) 白水黃香。無薄。排膿活血。及治煩悶熱毒。骨蒸。(二) 赤水黃香。涼無毒。治血退熱毒。(三) 木者。涼無毒。治煩排膿之力較遜。(大明日華本草) ⑦ 黃香甘溫。純陽。其用有五。補諸虛不足。一也。益元氣。二也。壯脾胃。三也。去肌熱。四也。排膿止痛。活血生血。內托癰疽。為瘡家聖藥。五也。又補五臟諸虛。治脈弦自汗。瀉陰火。去虛風。無汗則發之。有汗則止之。(張元素) ⑧ 防風能制黃香。黃香得防風。其功愈大。乃相畏而相使也。(李東垣) ⑨ 凡氣實內塞。胸膈閉悶。腸胃有積滯。及多怒。肝氣不和者。勿服。其陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒者。忌之。痘瘡血分熱甚者。禁用。(經仲淳) ⑩ 黃香。獨壅。叢生。

作葉扶疏。百本戴在首。如衛氣出目行頭。(衛出下焦其行始睛明穴)自上而下。從外而內。百骸百脈。咸衛外而固矣。其行可久可速。能知衛氣出入之道路。便了知黃芪之功用矣。(盧不遠)

【黃茶菊】 命名 本品即茶菊之黃花者故名。

採取 以紫蒂者為佳。性質 苦微甘。平無毒。

主治 去風明目。搜肝氣。益肺腎。治頭暈目眩。補血潤容。入血分。

【黃荊】 即荊子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『荊子』條。

【黃荊實】 即荊實之古籍別名。與見國經本草。詳『荊實』條。

【黃草】 即葶草之古籍別名。與見吳普本草。詳『葶草』條。②即艾葉之古籍別名。與見增雅。詳『艾葉』條。

【黃背魚】 即黃鱔魚之古籍別名。與見綱目。詳『黃鱔魚』條。

【黃婆羅】 即胡頹子之古籍別名。與見綱目。詳『胡頹子』條。

【黃梅】 即迎春花之日本名。詳『迎春花』條。

【黃梅】 即迎春花之日本名。詳『迎春花』條。

十二畫 黃

【黃梅花】 即蠟梅花之古籍別名。與見綱目。詳『蠟梅花』條。

【黃梔子】 即山梔子之古籍別名。與見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【黃硫砂】 即石硫黃之古籍別名。與見藥性。詳『石硫黃』條。

【黃腹雀】 即巧婦鳥之古籍別名。與見綱目。詳『巧婦鳥』條。

【黃袍】 即鶯之古籍別名。與見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【黃連】 命名 本品根如連珠而色黃故名。

處方用名 川黃連。小川連。川雅連。川連。上川連。雅連。古勇連。真川連。

古籍別名 王連。(本經)支連。(藥性)水連。(名彙)宜連。上草。棟連。淨黃連。滴膽芝。(和漢藥考)

學名 *Coptis boots*, Wall.

外國名詞 *Radix coptidis*, (拉丁) *Coptis-root*, (英) *Kop-pis wurzel*, (德)

基本 黃連屬毛茛科。此係採掘其曾經七八年之根莖。去鬚根曬乾而用之者。

產地 黃連為治療上之要藥。

隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者為最佳。故名川連。茲將其產別形態。詳別於下。四川峨嵋山產者曰峨嵋連。蘆藎而綠。刺硬皮黃。切開空心有菊花紋。金黃色者為最上品。瀘州野生者曰瀘州連。蘆頭中空而圓。有硬刺色黃帶青。頭尾均勻。切開亦有菊花紋。亦佳。馬湖所出者亦蘆藎硬刺。皮色青帶黑。首尾一樣。有節。均為佳。紫岩溝。瓦屋山出者。瘦小有蜂腰。皮毛柔。輭蘆硬刺。亦佳。以上皆野山出品。打箭爐出者。亦曰水連。皮黑刺少。無蘆頭。有枝。色黃略灰。重慶種出者。曰母珠連。硬蘆而扁。頭粗尾細。色黃。更次。喇山種出者。曰喇連。蘆扁硬刺。略軟。色黃。切開空鬆者。亦次。四川石柱種出者。曰味連。形似鷄爪連。亦次。嘉定管高廟所出者。曰嘉定連。俗名母連。種後五年出土。皮如鱗甲。肉色黃而帶紅。亦次。南川金佛山產者。曰金山連。蘆長連少。亦次。岡山種出者。曰岡連。皆次。以上皆四川產也。雲南野出者。曰雲景連。體鬆蘆軟。形似鴨腳爪。皮黑肉色黃。亦次。種者

隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者為最佳。故名川連。茲將其產別形態。詳別於下。四川峨嵋山產者曰峨嵋連。蘆藎而綠。刺硬皮黃。切開空心有菊花紋。金黃色者為最上品。瀘州野生者曰瀘州連。蘆頭中空而圓。有硬刺色黃帶青。頭尾均勻。切開亦有菊花紋。亦佳。馬湖所出者亦蘆藎硬刺。皮色青帶黑。首尾一樣。有節。均為佳。紫岩溝。瓦屋山出者。瘦小有蜂腰。皮毛柔。輭蘆硬刺。亦佳。以上皆野山出品。打箭爐出者。亦曰水連。皮黑刺少。無蘆頭。有枝。色黃略灰。重慶種出者。曰母珠連。硬蘆而扁。頭粗尾細。色黃。更次。喇山種出者。曰喇連。蘆扁硬刺。略軟。色黃。切開空鬆者。亦次。四川石柱種出者。曰味連。形似鷄爪連。亦次。嘉定管高廟所出者。曰嘉定連。俗名母連。種後五年出土。皮如鱗甲。肉色黃而帶紅。亦次。南川金佛山產者。曰金山連。蘆長連少。亦次。岡山種出者。曰岡連。皆次。以上皆四川產也。雲南野出者。曰雲景連。體鬆蘆軟。形似鴨腳爪。皮黑肉色黃。亦次。種者

蘆硬刺軟。更次。廣西產者曰新山連。皮光色黃。質重。斷則淡黃色。其次。處州出產曰土連。皮色黃肉質心淡。色味雖苦兼甜。亦極次劣。奇會工出者。曰會連。形似母連。皮略黑。肉空鬆。乃馬所食。不入藥用。鷄屎連。色黑細小。斷則綠色而淡。亦極次劣。不入藥。近有日本產者。曰洋連。形色與川連相同。皮光而毛刺。肉黃。取汁可為染色。故又曰色連。性更次劣。不堪入藥。自雲連至洋連。終俱屬偽品。服之甚為害人。望藥界注意為幸。

形態 黃連為生長山野宿根草。其種類甚多。莖高自二三寸至尺餘。四時不凋。春季於莖葉旁抽花莖。其上部簇生白色花。葉由種類而異。而其載於日本藥局方以 *Coptis anomala* f. *folia* *S. & N.* 及其他 *Coptis* 屬根莖充之。其形態以丹波黃連規定之。載於日本藥局方者如次。黃連粗約一至五密米。長約至四仙米。多彎曲。有細小多數副根。處處有疣狀隆起。外面呈黃灰色。破折面尖銳粗糙。橫斷面則現出厚暗橙黃色

之皮部及淡黃色之木部。木部中有大髓心。或髓心空洞。本品無臭而味極苦。



黃連

種類

①菊葉黃連 (Coptis anomonifolia S. et Z.) 葉類菊葉。早春抽莖。長四寸至一尺許。分出數梗。皆互生。每梢開白花。花後生新葉。②芹葉黃連一名長葉黃連 (Coptis brachyptala S. et Z.) 爲二回羽狀複葉。類芹菜。③細葉黃連 (Coptis brachyptala S. et Z. Var. pygmaea. Miq.) 爲數回羽狀複葉。爲前者之變種。④大葉黃連一名摩摩黃連 (Coptis orientalis, Maxim.) 葉類菊葉而粗大。⑤五加葉黃連一名梅花黃連 (Coptis quinquefolia, Miq.) 葉爲五楔狀小葉。似五加葉而小。⑥三葉黃連一名醋漿草黃連 (Coptis trifolia, Salisb.) 莖高二三寸。葉爲

倒卵圓形三小葉。邊緣有銳齒。

種植 栽培黃連。有分根栽培。與下種栽培二種之別。分根栽培者。以其株下根部。分其根而植之也。下種栽培者。以其種子播下於地。而後漸漸生長者也。總之分根與下種。無甚差異。不過分根取其生長速。下種取其種實多而已。欲栽培者。皆可取其法而行之。①氣候及適地。栽培黃連。氣候以溫和少寒冷者爲最適。若寒冷過甚。地方及熱帶地方。均不適其生長。土質則溼潤之砂質土爲最佳。次之則腐植質土。尙能生育。餘若黏土。重黏土。石灰土等。皆不能生長也。故氣候土質。爲栽培黃連者。應究之事項。否則不察氣候。不辨土質。而妄栽於不適之土地。不宜之氣候。則徒耗多量之資本。費多時之勞力。恐難得其良果也。②產地及種類。黃連產地甚少。吾國僅揚子江一帶。如湖北。安徽。四川等地方。略有產出。然其品質。不無優劣。產於四川者爲最佳。產於湖北者。次之。產於安徽者爲最劣。故藥品上所用黃連。以四川爲最多。爲其品

質優佳。凡黃連所需要之氣候土質。正適其當也。至於種類。以產出地名之。③治地。耕起砂質地之土塊。使之細碎。而後可以作畦。若不作畦。則排水須易。不使停滯積水。若排水不易。積水停滯。則土中之空氣。難以流通。有礙黃連之生長。以致結果不良。以上所述。乃分根栽培之治地也。下種栽培則否。先作冷床。而後播種於其中。迨其稍長。再移植於他土。④栽種。欲以分根栽培黃連者。於秋時分其根。而栽培於砂質土中可也。種子栽培者。治地作床。既畢之後。下種於冷床中。疎整之。以待春期之假植也。假植之後。苗生長至二三年。然後於秋時。八九月之交。乃作畦以移植之。畦幅三尺五寸至四尺五寸。株與株相隔約一尺。⑤管理。黃連爲木本植物。其管理較草本植物爲易。故除草等項。可毋庸十分注意。惟有暇時。除之則更佳。⑥施肥。黃連所需肥料。以堆肥油粕二種爲主。餘若壘素。燐酸。加里等肥料。皆不適於黃連之生長。故可不施。每黃連一畝地。積當需堆肥二百

斤左右。用油粕約五十斤左右。且未施。以先堆肥與油粕二肥。互相混和堆積之。以待其腐熟。而後施之。時期分三次。第一次在下種後施之。第二次在假植後施之。第三次在移植後施之可也。⑦收穫。調製。收穫之期。在定植後四五年。於秋季八九月之間。採收之。既刈後。去其毛根。不可洗滌。即曝於日中。待乾燥之後。藏於木製之箱中。而置於高燥處。以待市價可也。⑧計算。因栽培之巧拙。亦有優劣之分。優者每畝之收量。約百餘斤。劣者亦可得七八十斤。其價以品質之優劣而定。且其市價。又不一律。故不贅述。

採取 七八月間根緊。乃堪採製法 雷斅曰。凡使黃連。以布拭去肉毛。用漿浸二伏時。漉出。於柳木火上焙乾。用李時珍曰。五臟六腑皆有火。平則治。動則病。故有君火相火之說。其實一氣而已。黃連入手少陰經。爲治火主藥。本臟火則生用。治肝膽實火。則以豬膽汁浸炒。治肝膽虛火。則以醋浸炒。

治上焦火。則以酒炒。治中焦火。則以薑汁炒。治下焦火。則以鹽水炒。或朴硝炒。治氣分溼熱火。則以茱萸湯浸炒。治血分塊中伏火。則以乾漆水炒。治食積火。則以黃土炒。諸法不獨爲之引導。蓋辛熱能製其苦寒。酸寒能制其燥性。在用者詳酌之。

性質 苦寒。無毒。

成分 黃連含有「祕魯培林」

(Barberin C₂₁H₂₇NO₇) 與格倫

僕根中所含主成分相同。故其效用亦與格倫僕根同。祕魯培林爲美麗。微細。黃色星狀結晶體之植物鹽基。無臭而味極苦。對於試驗紙呈中性反應。冷水及冷酒精難溶。但用溫湯及酒精。則易溶而成黃色液。將其熱至百度。初變赤色。終復返爲黃色。若再加高熱。則分解發出黃色蒸氣。

效能 清心火。燥脾溼。涼血。消癆。厚腸。止瀉。用作瀉火燥溼之健胃藥。又治胃酸缺乏之消化不良。症。初期赤痢。慢性腸炎。瀉膿眼等。作用 加增胃液之不足。使消化機能亢進。又能刺激脈管運動。

十二畫 黃

之中樞神經。而使腸壁之脈管收縮。如與痢病菌相遇。有制其繁殖力。并能阻止其本身之活動力。

主治 熱氣目痛。背傷泣出。明目。腸瀉。腸痛。下痢。婦人陰腫。痛。久服令人不忘。(本經)又主五臟冷。熱。久下洩。瀉。膿血。止消渴。大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽。並療口瘡。(別錄)

張仲景之發明 黃連一味。經

張仲景之實驗。認爲主治中心煩悸。旁治心下痞。吐下。腹中痛。茲考徵如下。①黃連阿膠湯證曰。心中煩。不得臥。(以上黃連四兩)②黃連湯證曰。胸中有熱。腹中痛。欲嘔吐。③乾薑黃連黃芩人參湯證曰。吐下。④葛根黃連黃芩湯證曰。利遂不吐。⑤白頭翁湯證曰。下利欲飲水。(以上黃連皆三兩)⑥大黃黃連瀉心湯證曰。心下痞。按之濡。瀉心湯證曰。心下痞。(以上黃連皆一兩。而亦三兩之例。)歷觀上諸方。黃連治心中煩悸也明矣。故心中煩悸。而痞者。吐者。利者。腹痛者。用此皆治也。此外用黃連一兩

方多。其比餘藥分量差少。但舉心胸之微疾。不足取而徵焉。故不枚舉也。

歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論黃連曰。治羸瘦氣急。【宋】大明日華諸家本草論黃連曰。治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸。煩燥。潤心肺。長肉。止血。天行熱疾。止盜汗。并瘡疥。豬肚蒸爲丸。治小兒疳氣。殺蟲。【金】張元素珍珠囊論黃連曰。治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。【元】王好古湯液本草論黃連曰。主心病逆而盛。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論黃連曰。去心竅惡血。解服藥過劑煩悶。及巴豆輕粉毒。【明】李士材本草圖解論黃連曰。黃連苦寒入心。爲治火之主藥。瀉心火而除痞滿。療痢疾。而止腹痛。清肝膽而明耳目。祛溼熱而理痞瘍。利水道而厚腸胃。去心竅之惡血。消心積之伏梁。愚謂黃連大苦大寒。行隆冬肅殺之令。譬如聖世不廢刑威。惟不得已而後敢用。若概施之。則暴虐甚而德意窮。民不堪命矣。喜用寒涼者。尙其戒諸。黃連止

入心家。言清肝膽者。實則瀉子之法也。清心火者。生用。清肝膽火者。炙茶黃并炒。上焦之火宜酒炒。下焦之火宜鹹水炒。中焦之火宜薑汁炒。蓋辛熱能制其苦寒。鹽潤能制其燥耳。【明】繆希雍本草經疏論黃連曰。黃連氣味苦寒。而無毒。味厚於氣。味苦而厚陰也。宜其下洩。欲使上行。須加引導。入手少陰陽明。足少陽厥陰。足陽明太陰。爲病酒之仙藥。滯下之神草。六經所至。各有殊功。其主熱氣目痛。背傷淚出。明目。大驚。益膽者。涼心清肝。膽也。腸瀉腹痛下劑。別錄兼主泄瀉。泄者。瀉利也。瀉者。大腸下血也。俗呼爲瀉毒。除水利骨。厚腸胃。療口瘡者。滌除腸胃脾三家之溼熱也。久服令人不忘者。心家無火。則清。清則明。故不忘。禪家習定多飲苦者。亦此義附。【清】黃宮繡本草求真論黃連曰。黃連大苦大寒。據書所載治功。信極表著。且以別錄中有厚腸胃一語。互爲傳播。以至於今。謬尤莫闕。貽害無窮。詎知黃連止瀉瀉心之品。除溼之味。卽云腸瀉能止。口乾能除。痞滿腹痛能

十一畫 黃

消。癰疽疔瘡能愈。肝虛能鎮。與婦人陰蝕。小兒疳積。並火眼赤痛。吐血衄血。諸痔等症。亦無不由此調治。亦何莫不因溼熱火退而言。豈於溼除火退之外。尙有治效之著哉。况此性稟純陰。在人腸胃素厚。挾有燥溼火熱。服之過多。尙有偏性爲害。而致胃腸頓絕。生氣漸滅。矧有脾胃素弱。因此一言流播。而可恃爲常服者乎。今人一見火熾。不論其寒是熱。是虛是實。輒以取投。以致偏勝貽害。暗受天折。殊堪嘆惜。出四川瘦小狀類。葱爪。連珠者。良。煎汁炒。清。鄭樹本經疏證論黃連曰。徐洵溪曰。苦屬火。性皆熱者。常理也。黃連至苦。而反至寒。則得火之味。與水之性。故能除水火相亂之病。水火相亂者。溼熱是也。是故熱氣目痛。背傷。淚出。目不明。乃溼熱在上。腸澀腹痛。下利。乃溼熱在中。婦人陰中腫痛。乃溼熱在下者。悉能除之矣。凡藥能去溼者。必增熱。能除熱者。必不能去溼。惟黃連能以苦燥溼。以寒除熱。一舉而兩得焉。黃連根株叢延。莖引相屬。有數百株共一莖者。故

名遠。其治亦多。蔓延淹久之證。如浸淫疥。黃連粉主之是矣。夫名浸淫。則非初起暴得之疾。亦非一治可瘳之候。故傷寒論金匱要略兩書。從未有新得之病用黃連者。黃連根黃花黃實黃。皆具土色。四月開花。六月結實。七月根緊。適逢太陰溼土陽明燥金主令時。宜乎爲入脾胃之藥矣。乃仲景諸瀉心湯。以之爲關鍵。何歟。夫仲景瀉諸瀉心證之源。曰病發於陽。而反下之。熱入因作結胸。病發於陰。而反下之。因作痞。結胸稱熱。入痞不稱熱。入可見所入之邪。非陽邪矣。陰邪結於陽位。心下痞硬。非心病而何。心病不能燥土。土遂不運。而乾噫食臭。乾嘔心煩。下利矣。腹中雷鳴者。心氣被遏。不能上行。下走腸間也。夫心之爲體。於卦象離。今被邪逼。則外陽內伐。內陰騰沸。故半夏甘草生薑三瀉心湯。治陰邪之未化者也。大黃黃連附子二瀉心湯。治陰邪之已化者也。陰邪已化。不逼心陽。則在內之沸亂略定。惟在外之邪氣尙阻。則取二黃之瀉熱。蕩去其邪。邪去正自安矣。惡寒

汗出者。在上之陰邪。機化。在下之陰氣復逆。故輕取二黃之氣。以蕩熱除穢。重任附子之威。以迫逐逆陰。使之異趨。同歸相成。而不相背也。其未化者。陽餒於陽位。而恣肆於陰分。邪盤踞於清道。而潰泄於下焦。非乾薑半夏生薑之振散陰霾。不足以廓清心之外郭。非人蔘黃連之養陰泄熱。不足以安擾心之內竅。然則直謂之補心可也。而曰瀉心何哉。夫稱謂當循其實。補者益其虛。瀉者泄其實。今者明因邪氣入伐。致心臟內竅。若曰補則嫌於無邪矣。顧可乎。本經所謂腸澀腹痛下利者。與此正同。蓋腸澀腹痛下利。多發於夏秋溼熱之交。盛暑之時。心氣發舒。其驗在汗。所謂汗爲心液也。當此之時。或由口食寒膩。阻遏其發舒之氣。或由乘風取涼。使汗不得暢。於是火鬱於中。陰凝於外。因遂生溼。溼復生熱。寒熱與溼。輾轉膠固。故後世所製香連薑連等法。均仿此意爲之。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。少陰病二三日已上。心中煩。不得臥。黃連

阿膠湯主之。二方皆以黃連爲君。二證皆發於心。可見黃連爲瀉心火之劑矣。成無己曰。陰不得升。獨治於下。爲腹中痛。陽不得降。獨治於上。爲胸中熱。欲嘔吐。夫陰之升。其體由腎。其用由肝。陽之降。其源由肺。其貴由心。然脾胃爲升降之樞。脾提腎肝之氣以升。胃曳心肺之氣而降。故治陰之必升。必兼治脾胃。治陽之必降。必兼治胃。是於黃連湯。又可參黃連爲心胃之劑。嘔吐爲胃病。故後世治嘔用黃連。其效最捷。蓋上升皆火之變。見人身之火。惟欲其降。升則爲病。卽所謂諸嘔吐酸。諸逆沖上。皆屬於火者也。尤在溼曰。陽經之寒變爲熱。則歸於氣。陰經之寒變爲熱。則歸於血。陽經之熱。或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱結證。不用調胃承氣小承氣。而獨用大承氣。諸下利證。不已。必便膿血。是其驗也。心中煩。不得臥。熱證也。至二三日已上。乃心中煩。不得臥。則非始卽熱矣。始卽熱。熱心中煩。不得臥者。爲陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日已上始見。

則爲陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛。亦必其陰本虛。故阿膠芍藥雞子黃。無非救陰之品。瀉火則惟待苓連。而苓止一兩。連乃四兩。此黃連之任獨冠一方。無可議矣。迨二方面觀。又可悟黃連一味。在黃連湯。爲溫劑中寒藥。在黃連阿膠湯。爲補劑中瀉藥矣。【清】賈九如辨藥指南論黃連曰。黃連味苦。苦能燥溼而去垢。性寒。寒能勝熱而不滯。善理心脾之火。凡口瘡牙疼。耳鳴目痛。煩燥惡心。中焦鬱熱。嘔吐痞悶。腸澀下痢。小兒疳積。傷寒吐瀉。諸痛痞積。皆不可缺。入香連丸。祛腸中積滯。有厚腸之功。入吳茱丸。除香吐酸水。有清胃之力。此皆一寒一熱。陰陽相濟。最得制方之妙。若薑製以和其寒。少變其性。引至熱所。不至抵牾。則能止嘔。瀉引上焦清頭目。豬膽拌炒。瀉肝膽火。單炒黑用。脾虛熱瀉。獨爲妙劑。生用癰腫解毒。尤其所宜。但胃中停食。及胃虛作嘔。傷寒下早致痞。皆宜禁用。

國外學說 日本藥學博士猪子吉人氏言其根中含有總管培

十二畫 黃

林 (Berberin, $C_{20}H_{17}NO_4$) 與格倫僕根中所含主成分相同。故其效用。亦與格倫僕根同。總管培林爲美麗微細黃色星狀結晶體。之植物鹼基。無臭而味極苦。並言其根中平均含有一五%。又用普通煎法。其湯中含有九%。其醫治之用。試驗於動物。見有收縮子宮之作用。因其有制酵及收斂作用。故對目膜腸胃之炎證。確能奏效。據臨床經驗。以諸般消化器病。及腸加答兒。最爲奏效。貝爾貝林爲一種亞爾加魯兒度。廣存於植物界中。在一八三五年始經普西納爾氏自 *Berberis vulgaris*, L. 中發現。依原植物之名始命名爲貝爾貝林 (Berberin)。溫度至攝氏百二十度時。則熔融變爲赤褐色之樹脂樣物。而依須密都氏及西路巴哈氏 (Arch. d. pharm., 1887, Heft. 4.) 之研究。謂貝爾貝林之鹹性液中加過錳酸加里酸化時。則能發生。可令人注目之一種分解產物即 Hemip-berberin 而在 Gmelin; Handb. d. Organ. Chem. IV, anft. 4.

p. 336 中則載有雜片鹽基納爾科琴 (Narcotin)。酸化時亦發生 Hemipberberin。如此則 Pol-berin 與 Narcotin 在化學上既有如斯之關係。而在生理作用似亦應有相當之關係也。依佛爾古氏 (Falk: 1854) 就家兔之研究曰。投以致死量。○五乃至一。○五時。則呼吸起障礙。後肢痺麻。終陷於搖弱而死。然後再與 Gmelin 等就犬重複試驗。則雖用至二。七五亦不能致死。故 Gmelin 氏在其有機化學第四卷中則記 Berberin 爲無毒之物質。貝爾貝林對人體之毒亦甚輕微。不足介意。况且依貝爾古路及普西納爾兩氏謂其○。二至○。六具有亢進食慾之功效。依基電路氏研究曰。貝爾貝林雖有制止酸酵作用。而毫無防腐作用。黃連中雖無鞣酸而有收斂作用。概屬貝爾貝林之功也。普西納爾曾用黃連爲健胃藥。特別是對於熱性病之恢復期有效。其外如消化不良。胃病。各種下痢加答兒性黃疸等皆有功效。一回常用其一

。二至一。八製成煎劑九○。○用之。由是觀之。我國古時治目。治痢。用黃連之所以有效者明矣。即因黃連之有效成分貝爾貝林有收斂作用。故對於眼目之炎性疾患有效。因其有制酵及收斂作用。故能奏止泄之功。况且依包路氏 (Poir) 謂一般苦味質藥皆能刺戟腸黏膜。及其附近之淋巴裝置。使淋巴球即白血球增殖。進入體之防禦力。而黃連即屬一種苦味藥。當然亦能使白血球增殖。元進其止痢之功效也。而黃連因其刺戟腸黏膜及其附近之淋巴裝置之作用。故亦能增進食慾。能亢進其吸收作用。此黃連在今日醫界。猶能保存其地位。在歐美藥劑中之所以收爲苦味健胃。止瀉劑也。

辨偽 鄭育巖曰。黃連偽名廣連。即洋川連。色不黃。中有花點。皮黑面有毛。按黃連以四川雅州出者爲佳。故名雅連。形如雞距。故又名雞爪連。氣味苦寒。色極黃。易於辨識。近有辦峨眉山所產者。價值甚昂。涼泉人最喜購之。若此種

廣遠。色不黃則名不稱。性味既殊。功用自劣。誤服之則貽害多矣。曹炳章曰。按黃連背陰草根也。苗似茶叢。經冬不凋。生於深山窮谷。幽僻無日照之處。必得凝寒之氣者為上。八九月出新種類甚多。隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者多佳品。為治療上之要藥。

近人學說 ①顧子靜曰。黃連為毛茛科植物黃連之根莖。秋日採集。除去鬚根。而乾燥用之。色黃無臭氣。味頗苦。日本猪子氏施精密試驗。得下之結論。(一)黃連之有效成分。為備利備林。(二)備利備林。於諸種之消化器病最有功效。(三)黃連之療治器病。功效甚著。片山寬助氏謂虎列拉(即霍亂)之初期。用黃連三分至五分。以一杯水煎出。一次服食。一日五六次。有特效。高橋正純氏謂腸炎。用黃連一錢。煎一杯水。分四次。一日服。下痢頓止。二三日全治。數多之患者試用。均有良效。豐村讓氏謂黃連之功效有四。(一)大人及小兒之急性腸炎。用黃連四分。煎

一杯水。分三次。一日服。有大效。(但此為成人量。小兒宜按年齡酌減)小兒並無中毒之恐。(二)赤痢。最初一二月間。投下劑。後與黃連有效。(三)腸瘵扶斯(即傷寒)之下痢。亦由黃連而治。(四)腸結核(亦稱腸癆)之下痢。用黃連亦得美滿之結果。黃連之用量。一日量。約為一分五釐至四分五釐。②張山雷曰。黃連苦寒。所主皆溼積熱鬱之證。目痛皆傷泣出。溼熱之鬱於上者也。目為肝之竅。肝家鬱熱。目為之病。苦寒清肝。則目自明。腸泄腹痛。乃膿血交黏之滯下病。辭古止作辟。即帷裳變積之變。故辟字有積聚之義。腸辟者。謂腸間積聚之溼熱也。燥溼清熱。故黃連為治療滯下之主藥。下痢。則泄瀉也。惟泄瀉之病。有因於暑熱。亦有因於脾虛。暑熱者。宜苦以堅之。而脾虛則非其治矣。婦人陰中腫痛。亦溼滯熱鬱證也。別錄主五臟冷熱。久下洩瀉膿血。即本經之腸辟也。消渴為胃腸之熱證。大驚為心月之熱證。苦寒清熱。是以主之。除水者。以熱結之水道不通言

之。非通治脾胃虛寒之水病也。利骨者。苦以堅之耳。調胃厚腸。謂消化溼熱。而腸胃調和。益腸者。清肝熱。即所以祛膽邪。即上文主大驚之意。療口瘡者。亦清脾胃之熱邪也。又曰。黃連大苦大寒。苦燥溼寒勝熱。能泄降一切有餘之溼火。而心脾肝腎之熱。膽胃大小腸之火。無不治之。上以清風火之目病。中以平肝胃之嘔吐。下以通腹痛之滯下。皆燥溼清熱之效也。又苦先入心。清滲血熱。故血家諸病。如吐衄。便血。淋瀝。痔漏。崩帶等證。及癰瘍。疔疹。丹毒。並皆仰給於此。但目疾。須合瀉風行血。滯下。須兼行氣導滯。嘔吐。須兼鎮墜化痰。方有捷效。僅恃苦寒。亦不能操必勝之券。且連之苦寒。尤以苦勝。故燥溼之功。獨顯。凡諸證之必需於連者。類皆溼熱鬱滯。恃以為苦燥泄降之資。不僅以清熱見長。凡非舌厚苔黃。膩濁滿布者。亦不任此大苦大燥之品。即瘡瘍一科。世人幾視為陽證通用之藥。實則惟疔毒一證。發於實火。需連最多。餘惟溼熱交結。亦所恒用。此外血熱血毒

之不挾溼邪者。自有清血解毒之劑。亦非專恃黃連。可以通治也。

配合應用 ①治癆瘵已透而煩躁不止者。用黃連同赤樗木葉入三黃石膏湯。

②治盜汗有神。用黃連入當歸六黃湯。加薤仁。龍眼。

③治風熱上攻。目赤痛。用黃連同地黃。甘菊。荊芥。穗。甘草。梔。芎。藭。柴胡。蟬。木。通。

④黃連末一兩。同雄羊肝一具。生搗白。衆手丸。如桐子。每服以滾漿水吞廿一丸。諸眼目疾及障翳青盲皆主之。禁食豬肉。雞油。汁。亦勿入口。作六劑必效矣。

⑤黃連同當歸。甘菊花。人乳。浸煎。入明礬。銅綠。各少許。洗目甚效。

⑥治一切滯下膿血。用黃連同芍藥。蓮子。薤豆。升麻。甘草。滑石。紅芎。

⑦治滯下純血。腹痛。用黃連同槐花。枳殼。乳香。沒藥。

⑧治小兒一切疳熱。用黃連同五穀蟲。蘆薈。白蘚。黃青。紫白。樺花。白芙蓉。花。如神。

⑨黃連同赤小豆為細末。傳痔

瘡妙。

①治痧後後瀉瀉。用黃連同乾葛、甘草、升麻、芍藥。

②治酒病酒傷。用黃連同五味子、麥門冬、乾葛神效。

③治口糜口瘡。用黃連同五味子、甘草煮濃汁漱口良。

④治卒消渴。小便多用黃連同麥門冬、五味子。

⑤治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑥治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑦治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑧治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑨治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑩治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑪治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑫治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

⑬治虛人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

十一畫 黃

於鼻衄血。得寒則凝滯結聚。得熱則流散妄行。黃連、黃芩、柏葉、甘草各等分。為末。煎去滓。溫服。

①香連丸。治一切痢疾。黃連五兩。甘草三兩。上以蜜水略拌溼。置鍋中。重湯蒸良久。取出晒乾。如此者九次。

②小陷胸湯。治病在心下。按之則痛。脈浮滑者。傷寒論。黃連一兩。半夏（洗）半升。栝實一個。三味。水六升。先煮栝實。取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

③三黃湯。治三焦實熱。一切有餘火症。及大便秘結者。本方。黃連、黃芩、大黃各等分。水煎服。

④黃連性寒。味苦。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六。瀉心臟火一也。去中焦溼熱二也。諸瘡必用三也。去風溼四也。赤眼暴發五也。止中部見血六也。張仲景治九種心下痞。五等瀉心湯。皆用之。

⑤張元素。黃連苦燥。苦入心。火就燥。瀉心者。其質瀉脾也。實則瀉其子也。王好古。黃連去中焦溼熱。而瀉心火。若脾胃氣虛。不能轉運。

者。則以茯苓、黃芩代之。以豬膽汁拌炒。佐以龍膽草。則大瀉肝膽之火。下痢胃口熱。禁口者。用黃連人參煎湯。終日啣之。如吐再強飲。但得一啣。下咽便好。

⑥朱震亨。古方以黃連為治痢之最。蓋治痢之宜辛苦寒藥。辛能發散。開道鬱結。苦能燥溼。寒能勝熱。使氣宜平。而已。諸苦寒藥多泄。惟黃連黃蘗性冷而燥。能降火去溼。而止瀉痢。故治痢以之為君。

⑦張元素。今人多用黃連治痢。蓋執以苦燥之義。下俚。但見腸虛溼泄。微似有血。便即用之。又不顧寒熱多少。惟欲盡劑。由是多致危困。若氣實。初病熱多血痢。服之。便止。不必盡劑。虛而冷者。慎勿輕用。

⑧寇宗奭。諸痛痒瘡。皆屬心火。凡諸瘡。宜以黃連當歸為君。甘草黃芩為佐。凡服暴發赤腫痛。不可忍。宜黃連當歸以酒浸煎之。宿食不消。心下痞滿者。須用連枳。

⑨李杲。黃連治目方多。而羊肝丸尤奇異。今醫家流以黃連當歸芍藥等分。用雪水或甜水煎湯。熱洗之。冷即再溫。甚益眼目。但是風毒赤目花翳用之。無不神效。蓋眼目之病。皆是血脈凝滯使然。故以行血藥。合黃連治之。血得熱則行。故乘熱洗也。

⑩蘇頌。火分之病。黃連為主。不但瀉心火。而與苓朮諸苦藥列稱者。此也。比目疾人。以人乳浸蒸。或點或服之。生用為君。佐以官桂少許。煎百沸。入蜜空心服之。能使心腎交於頃刻。入五苓滑石。大治夢遺。以黃土蘆汁酒蜜四炒為君。以使君子為臣。白芍藥酒煮為佐。廣木香為使。治小兒五疳。以萊菔炒。加水香等分。生大黃倍之。水丸。治五痢。此皆得制方之法也。

⑪韓愈。黃連治目及痢。為要藥。古方治痢香連丸。用黃連木香。蘇連散。用乾黃連。連通丸。用黃連。麥煎黃散。用黃連。生薑。治消渴。用酒蒸黃連。治伏暑。用酒煮黃連。治下血。用黃連。大蒜。治肝火。用黃連。萊菔。治口瘡。用黃連。細辛。皆是一冷一熱。一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。君臣相佐。陰陽相濟。最得制方之妙。所以有成功。而無偏勝之害也。

⑫李時珍。本經別錄。並無黃連久服長生之說。惟陶弘景言。道方

久服長生。神仙傳載。封君達黑穴公。並服黃連五十年。得仙。竊謂黃連大苦大寒之藥。用之降火燥溼。中病即當止。豈可久服。使煎殺之。令常行。而伐其生發沖和之氣乎。案問載岐伯言。五味入胃。各歸所喜。攻久而增氣物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。酸入肝為溫。苦入心為熱。辛入肺為清。鹹入腎為寒。甘入脾為至陰。而四氣兼之。皆增其味。而益其氣。故各從本臟之氣為用。所以久服黃連苦參。反熱從火化也。餘味皆然。久則臟氣偏勝。即有偏絕。則有暴夭之道。是以絕粒服餌之人。不暴亡者。無五味偏助也。又秦觀與喬希聖論黃連書云。開公以眼疾。餌黃連至十數兩。猶不已。殆不可也。醫經有久服黃連苦參。反熱之說。此雖大寒。其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心火偏勝。則熱乃其理也。况眼疾本於肝熱。肝與心為子母。心火也。肝亦火也。腎益臟也。人患一水不勝二火。豈可久服苦藥。使心有所偏勝。是以火救火。其可乎。秦公此書。蓋因王公之說。而推

詳之也。我明荆端王素多火病。醫令服金花丸。乃苳連梔蘂四味。餌至數年。其火愈熾。遂至內障。喪明。觀此則寒苦之藥。不但使人不能長生。久則氣增偏勝。速天由矣。當以素問之言為法。陶氏道書。久服長生之說。皆謬談也。誤人最甚。醫宜知之。楊士瀛云。黃連能去心竅惡血。(李時珍)

【黃連祖】即淫羊菴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『淫羊菴』條。

【黃連頭】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃練藤芽』條。

【黃雀】即雀之小而黃口者。典見綱目。詳『雀』條。

【黃雀花】即金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金雀花』條。

【黃魚】即石首魚之處方用名。詳『石首魚』條。

【黃魚】即鱸魚之古籍別名。典見食療本草。詳『鱸魚』條。



黃 麻

【黃鳥】即鶯之古籍別名。典見詩經。詳『鶯』條。

【黃麻】 古醫別名。牛泥茨。三珠草。天紫蘇。(綱目拾遺)

外國名詞 Corchorus capsicifolius (拉丁) ツナソ カナヒキラ(日本)

基本 係田麻科黃麻屬。為黃麻之皮。

產地 出東印度及北省諸地。

形態 黃麻為麻之一種。一年生草本。高二三尺。三月生苗。葉為長卵形。端尖。互生。有微毛。大葉旁有兩小葉。如杏葉。夏秋開葉腋開小花。黃色。五瓣。至秋每葉生子三粒。如粟米子。內有一粒如菜子。嫩青老黑。其莖皮之纖維。可製繩袋等物。並可供藥用。其根。子。葉。詳見各該條。

性質 苦。溫。無毒。

主治 專破血。通小便。陳者燒研酒服。

【黃麻子】 性質 熱。

主治 行血。治咳傷肺。

參攷資料 黃麻子功能行血。同風茄可製麻藥。(醫學大辭典)

【黃麻仁】即大麻仁之俗名。詳『大麻仁』條。

【黃麻根】 基本 本品即大麻之根與葉。

主治 搗汁或煮汁服。主療血石淋。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論麻根曰。治產難衣不出。破血墮胎。帶下崩中不止者。以水煮服之。效。【唐】甄權藥性本草論麻根曰。治熱淋下血不止。取三九枚。洗淨。水五升。煮三升。分服。血止。神驗。【宋】蘇頌圖經本草論麻根曰。根及葉搗汁服。治瘡打擦血。心腹滿氣短及腕折骨痛不可忍者。皆效。無則以麻黃汁代之。

【黃麻葉】 性質 苦。微辛。無毒。

主治 婦人血崩。連

根搗爛。酒煎。露一宿。次早服之。氣鬱。心疼。肚疼。痢疾。痞結。並一切血症。同虎杖龍芽用。爲治諸血之聖藥。

【黃麻蟲】 基本 本品係生於黃麻梗內之一種幼蟲。

採取 秋時收取。以葱管藏之。

性質 溫。

主治 疔毒。

配合應用 ①用黃麻梗內蟲。

以葱葉包貯。掛風頭令乾。將疔瘡搗破。以麻蟲少許。入於所挑之處。瘡卽化爲水而愈。(程林卽得方)

②治疔。蟻螂膏。用蟻螂三個。肚

白者佳。黃麻蟲十個。二味搗勻。撥

破患處貼之。如患在手。足有紅絲。上臂絲盡處。將針挑斷。出血。仍用

前藥。毒重者。更服敗毒藥。(陶節

卷方)

③用黃麻梗中蟲一條。焙乾爲末。酒調服下。疔化爲水。(葉氏方)

參攷資料 百草鏡。麻蟲生麻

梗近根上一節中。二月化爲飛蟲。穿穴去。山左人每於刈麻時。將蟲

連麻梗寸斷。布袋裝盛。帶至南方。

十二畫 黃

質與養禽鳥家。飼畫眉百靈之用。云其蟲性暖。去風行血。鳥食之。可以禦寒。蟲形如小蠶。細長明淨。入藥須連麻梗蒸焙用。如用生者。須以葱藏。

【黃喉蛇】卽黃領蛇之古籍別名。

典見綱目。詳「黃領蛇」條。

【黃筍】卽桃竹筍之別名。詳「桃竹筍」條。

【黃粘】卽山豆根之古籍別名。典

見綱目。詳「山豆根」條。

【黃菊花】卽菊花之處方用名。詳

「菊花」條。

【黃菊花】卽野菊花之處方用名。

詳「野菊花」條。

【黃雅菜】卽黃矮菜之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「黃矮菜」條。

【黃丸】卽黃頰魚之古籍別名。典

見綱目。詳「黃頰魚」條。

【黃黍】卽黍之古籍別名。典見郭

義恭農志。詳「黍」條。

【黃嗜】卽黃耆之古籍別名。典見

綱目。詳「黃耆」條。

【黃楊木】 基本 係黃楊科。黃

楊屬。

產地 生山野間。

形態 黃楊木爲灌木類之常

綠木。枝條繁茂。高二尺許。不易

長大。俗謂歲長一寸。葉如初生槐

芽。卵形對生而青厚。四時不凋。春

開小花。淡黃色。其木材堅膩。可作

梳。剉印等最良。非可供藥用。

採取 凡取木。於陰晦夜無星

時。伐之則裂者良。

性質 苦。平。無毒。

主治 婦人難產。入達生散中

用。又主暑月生癩。搗爛塗之。

【黃矮菜】 原名 黃芽菜。

網無滓。故名。 命名 本品鮮莖質

古籍別名 黃雅菜。花交菜。(

綱目拾遺) 膠菜。(俗名)

形態 黃矮菜爲菜類莖之變

種。莖葉皆扁。層層圍裹。全體成圓

柱形。頂成圓形。葉色淡黑。柔艱。甘

美。可供蔬茹與藥用。

性質 甘。溫。滑。無毒。

主治 利腸胃。除胸煩。解酒渴。

補虛羸。和中止嘔。滑竅降氣。

施用宜忌 凡患洩痢者禁用。

參攷資料 黃短矮菜有南北

二種。南產者惟杭城太平門外沙

地產者爲最。他處悉高大粗鬆。絕

無捲心。密葉。味亦較甜。北產者

帶來者。味更美。質更細。且無粗筋。

有重至十餘斤一棵者。南中亦不

易得也。陳瓊碧云。食之潤肌膚。利

五臟。且能降氣清音聲。(趙學敏)

【黃稞】爲青稞之一種。功用詳「

青稞」條。

【黃梁米】 命名 本品卽梁米

之黃色者。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 益氣和中止洩。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論黃梁米曰。去客風頑痺。

【明】李時珍本草綱目論黃梁米

曰。止霍亂。下痢。利小便。除煩熱。

參攷資料 ①青梁白梁。性皆

微涼。獨黃梁性味甘平。豈非得土

之中。和氣多耶。(寇宗奭) ②諸梁

比之他穀。最益脾胃。(蘇頌)

【黃葛樹】 古籍別名 嘉樹。(

綱目拾遺) 黃果。(居

易錄)

形態 黃葛樹爲喬木類之一

種。種有三。其出羅目縣者。兩樹對

植。圍各二三尺。上引橫枝。亘二丈。

相接連理。陰庇百夫。其出雲南者。似海棠。稍大。香似佛手。甘脆如梨。多津液。其出蜀中者。樹而不結實。皮類川槿。葉似桂葉而稍大。形圍四時不凋。幹則擁腫。根皆蟠露土上。至於石崖之側。全不藉土氣而生。於某月種植。每歲必於某月始芽。其根、皮可供藥用。

主治 疥癬。煎湯浴之。

【黃葵子】即黃蜀葵子之簡稱。詳「黃蜀葵」條。

【黃蜀葵】古醫別名 側金盞花（綱目）棉花葵

（植物圖考）

外國名詞 Hibiscus Mani-


hot.I. (拉丁) トロアノヒネ

基本 係錦葵科木槿屬。為黃蜀葵之花蕾。

產地 在原野間。

形態 黃蜀葵為溼草類之越年或一年生草本。春月下種生苗。莖高三四尺。其矮者高不及尺。根長而肥。大葉互生。掌狀深裂。花大。瓣有五。黃色。下部帶有紅色。總苞四片至七片。其根肥大有黏液。供

製紙之糊料。結角大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則色黑。其稜自裂。中有六房如芝蔴房。房內有子如苘麻子。色亦黑。花子及根俱可供藥用。



黃蜀葵

性質 甘。寒。滑。無毒。

主治 小便淋。及催生。治諸疔。瘡。膿水久不瘳者。作末傅之。即愈。為疥家要藥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃蜀葵花曰。消癰腫。浸油塗湯火傷。

近人學說 張山雷曰。此又別是一種。非即蜀葵之黃花者。葉似鴉爪。秋深開花。今之所謂秋葵花也。性亦寒涼潤利。因之亦以葵名。嘉祐本草謂其花主小便淋。催生。治惡瘡。膿水不差。作末敷之。瀕湖謂其花消癰腫。其子亦消癰腫。治五淋水腫。通乳汁。為催生利小便要藥。瀕湖引經驗方。黃蜀葵花。麻

油浸蜜收。治湯火灼傷。今有預製以備緩急者。頗能止痛定腐。甚有效也。

參攷資料 ①冬葵、黃葵、蜀葵。

形狀雖各不同。而性俱寒滑。故所主療不甚相遠。蘇頌②黃葵子古方少用。今為催生及利小便要藥。或用或入湯散皆宜。蓋其性滑與冬葵子同功故也。花子與根性功相同。可以互用。無花用子。無子用根。李時珍③黃蜀葵花近道處處有之。春生苗葉。頗似蜀葵而葉尖狹。多刻缺。夏末開花。淺黃色。六月採陰乾之。禹錫④黃蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫橙色。摘下別散。日乾之不爾。即過爛也。寇宗奭⑤黃葵二月下種。或宿子在土自生。至夏始長。葉大如莧麻葉。深綠色。開歧丫有五尖。如人爪形。旁有小尖。六月開花。大如碗。鴉黃色。紫心。六瓣而側。且開午收。暮落。人亦呼為側金盞花。隨即結角。大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則黑色。其稜自裂。內有六房如芝蔴房。其子累累在房內。狀如苘麻子。

色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。李時珍

【黃蜀葵子及根】性質 甘。寒。滑。無毒。

主治 癰腫。利小便。五淋水腫。產難。通乳汁。

【黃蜂】即大黃蜂之簡稱。詳「黃蜂」條。

【黃蜂蠟】即黃蠟之處方用名。詳「黃蠟」條。

【黃雌雞肉】性質 甘。酸。鹹。平。無毒。

主治 傷中。消渴。小便數而不禁。腸澀洩利。補益五臟。絕傷。療五勞。益氣力。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論黃雌雞肉曰。補丈夫陽氣。治冷氣疾。著牀者。漸漸食之。良以光粉。諸石末和飯。飼雞。煮食。其補益。宋日華謂家本草論黃雌雞肉曰。治勞劣。添髓補精。助陽氣。暖小腸。止洩精。補水氣。明李時珍本草綱目論黃雌雞肉曰。治產後虛羸。煮汁煎藥服佳。

【黃零草】即佩蘭之古籍別名。典見庚辛玉冊。詳「佩蘭」條。

【黃鼠】 古籍別名 禮鼠 拱鼠。
(韓文) 鼯鼠 銀鼠 青鼠。
總釋(綱目)

產地 出山西、陝西、沙漠諸地。
形態 黃鼠爲獸類鼠屬之一種。體如大鼠。尾足俱短。毛黃色。見人則交其前足於頸。拱而如揖。乃宜入穴。穴於沙漠土中。皮可爲裘。領肉味美。可供食與藥用。

性質 甘平無毒。
主治 潤肺生津。煎膏貼疔腫。解毒止痛。

參攷資料 黃鼠肉多食發瘡。(正要) 黃鼠北方所食之物。而方書無載。按經驗良方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退熱。用大黃鼠一箇。清油一斤。慢火煎焦。水上試油不散。乃濾淨澄清。再煎。次入炒紫黃丹五兩。柳枝不住攪勻。漢水成珠。下黃蠟一兩。熬黑乃成。去火毒三日。如常攤貼。(李時珍)

【黃鼠狼】 卽鼯鼠之古籍別名。與見綱目。詳「鼯鼠」條。

【黃精】 命名 昔人以本品得坤土之氣。獲天地之精。故名。


十二畫 黃

處方用名 製黃精。

古籍別名 黃芝(瑞草經) 戊己芝(五符經) 菟竹 鹿竹 救窮草 重樓 鷄格 垂珠 馬箭 白及 苟格 蔽蕪 以上別錄 仙人餘糧 (陶弘景) 米舖 野生還(蒙筌) 龍衝(廣雅) 救荒草(綱目拾遺) 黃孫 黃衣 黃獨 飛英 卑菜 玉芝草 太陽草 竹大根 沙田隨(和漢藥考) 筆管菜(俗名)

學名 Polygonatum Chin.aliculatum

基本 屬百合科黃精之根莖。
產地 陳仁山藥物生產辨云。黃精以湖南產者爲正。形象菱角。肉色黑。其餘遠州、樂昌、西江、八屬、廣西南寧。均有出產。但種類不同。形如玉竹頭。長身瓜藤樣。而味略有辛辣。湖南產之正黃精。一片純甜。切開肉紋亦有別。



形態 黃精爲山野自生之宿

(一) 精 黃

根草。種類頗多。莖高自一二尺至四五尺。葉由種類而異。五月間。於莖頂及葉腋。開青白色花。下垂如懸鳴子。鳴子乃日本農家用以驅逐田園鳥畜之物。於板面懸細竹。以繩引之。則鳴。故名鳴子百合。(因葉狀如百合葉) 其根爲黑褐色。地下莖。有節。年久者肥大。販賣品中。混有萎蕤。別之之法。以有節者爲生薑手黃精(眞黃精) 無節者爲地黃手黃精(萎蕤)



(二) 精 黃

採取 二月八月採之。陰乾。
製法 雷斅曰。凡採得以溪水。洗淨蒸之。從巳至子。薄切曝乾。用蘇頌曰。羊公服黃精法。二月三月。採根。入地八九寸爲上。細切一石。以水二石五斗。煮去苦味。漉出。囊中壓取汁。澄清。再煎如膏。乃止。以炒黑黃豆末相和得所。捏作餅子。如錢大。初服二枚。日益之。亦可焙乾。篩末水服。孟詵曰。餌黃精法。取

莖子去底。釜內安置得所。入黃精。令滿。密蓋。蒸至氣溜。卽曝之。如此九蒸九曝。若生則刺人咽喉。
用法 與他藥水煎。或酒浸。或蒸搗和作丸散。
性質 甘平無毒。

成分 黃精之化學成分的研。究。日本中尾博士曾於南滿洲藥學會發表之。今介紹於左。取五〇乃至一〇〇瓦之黃精粉末。用邵哥雷氏浸出器。以脫浸出之。至無移行於以脫之物時爲止。蒸餾其以脫液。稱其殘渣。爲以脫殘渣。斯次乃蒸散殘留於試料中之以脫。使之乾燥。後更以強酒精浸出之。至無浸出物爲止。蒸發其酒精溶液。稱其殘渣。爲酒精殘渣。同樣更乾燥其殘留試料。後用熱湯浸出之。作成水性越幾斯。後乃用鹽酸性水溶解其以脫殘渣。新濾過。以脫振盪之。棄其溶於以脫之部分。取其透明之鹽酸性液。(以下單稱之爲酸性液) 次更溶其鹽酸性水抽出後之殘渣於炭酸鹼性水。濾過。更用以脫振盪之。同樣取其透明之溶液。(以

下筒稱之爲鹹性液。以下更檢此兩樣浸出液。對於各種試藥之反應如次。酸性液依鹽化白金水素酸現淡褐色絮狀晶。單寧酸現白色。馬耶路氏試藥初現白色。繼則急變爲褐色之沈澱。沃度錒現赤褐色絮狀沈澱。昇乖現帶褐色絮狀沈澱。磷毛利浦澱酸初現白色。後乃變灰色絮狀沈澱。鹽化金水素酸初現白色。後變褐色之沈澱。沃度若鉛現帶褐色絮狀沈澱。依皮若林酸初現淡黃色。繼則急變爲褐色之絮狀沈澱。武奧佛耶酸現初白後褐之沈澱。磷武奧佛耶酸初現白色。後乃急變爲褐色之絮狀沈澱。沃度卡特米現帶帶褐色絮狀沈澱。毛利浦澱酸亦現帶褐色之絮狀沈澱也。鹹性液依鹽化白金水素酸。磷毛利浦澱酸。毛利浦澱酸。磷武奧佛耶酸。武奧佛耶酸等具現與上同樣之沈澱。

效能 潤肺生津。治勞傷。填精髓。用作滋養緩和藥。

主治 補中益氣。除風溼。安五臟。久服輕身延年不饑。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論黃精曰。補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心肺。單服九蒸九曝。食之駐顏斷穀。【明】李時珍本草綱目論黃精曰。補諸虛。止寒熱。填精髓。下三尸蟲。【清】黃宮繡本草求真論黃精曰。黃精書極稱羨。謂其氣平味甘。治能補中益五臟。補脾胃。潤心肺。填精補助筋骨。除風溼。下三蟲。且得坤土之精粹。久服不飢。其言極是。但究其氣味。止能入脾補陰。若使挾有痰溼。則食之反更助痰。根紫花黃。葉如竹葉者是。俗名山薑。九蒸九曬用。

國外學說 日本和漢藥考曰。黃精種類頗多。分述於下。●黃精生山中陰地。有數種。春皆自宿根生苗。初出土時。有籜包之。狀如小筍。惟不直立。葉圓嫩綠。有光澤。似百合葉。細瘦而互生。●竹葉黃精。葉形狹長如竹葉。又似百合葉。柔薄光滑。有細縱理。長三五寸。四五片於葉間開花。作筒狀。未分五瓣。形如沙參花。無蒂色白。瓣嫩綠。皆下垂。後結圓實。較雨天燭子爲大。熟則成黑色。中有細子。其根白色。

橫生而有節。歲增一節。積年漸長。本草原始言生刺人喉。是爲玉竹黃精。●大葉黃精。葉長大。苗粗高四五尺。根節圓扁。大一寸餘。相連橫生。形如白及根。山農煮熟食之。味如薯蕷。是爲白及黃精。●圓葉黃精。苗高二三尺。莖較竹葉黃精爲細。葉較萎蕤葉爲短。堅硬有光。其花亦小。根與竹葉黃精無異。●唐種黃精。享保年中傳入日本。其狀與玉竹黃精無異。惟其葉或互生。或兩葉相對。或五七葉相對。雜生一莖。如紹興本草所繪爲異耳。是爲正精。藏器說云。『偏精功用不如正精』。據此當以唐種爲上品。日產皆偏精也。此外品類尚多。日本藥舖所售。皆本國產。以澳洲南部所出者爲上品。其形最肥大。又出燕黃精。黑色。味如熟地黃。用供果食。本草原始云。『熟味甘堪食。深黑色。象地黃。有二三枝者。有一二枝者』。卽此。熟指九蒸九曝也。

近人學說 ●袁淑範曰。黃精之學名。極不一致。蓋因產地不一。其形狀亦遂之而異之故也。例如

Polygonatum macropodium,
Polygonatum elegantum,
Polygonatum multiflorum,
Polygonatum chinense, 及
Polygonatum latifolium,
Polygonatum falcatum, 等皆爲其學名。今姑以 *Polygonatum sibiricum* 爲其學名。●張山雷曰。黃精不載於本經。今產於嶽州。嶽人常以爲饋贈之品。蒸之極熟。隨時可食。味甘而厚。賦頗類熟地黃。古今醫方。極少用此。蓋平居服食之品。非去病之藥物也。按其功用。亦大類熟地。補血補陰。而養脾胃。是其專長。但膩滯之物。有溼痰者。弗服。而胃納不旺者。亦必避之。

配合應用 ●補肝明目。黃精二斤。蔓菁一升。淘同和。九蒸九曬。爲末。空心每米飲下二錢。日二服。延年益壽。【聖惠方】

●治大風癩瘡。營氣不清。久風入脈。因而成癩。鼻壞色敗。用黃精根去皮。潔淨。淡水洗二斤。曝。納粟米飯中。蒸至米熟。時時食之。【聖濟總錄方】

●補虛精氣。黃精、枸杞子等分。搗作餅。日乾爲末。煉蜜丸。梧子大。每湯下五十九丸(奇效良方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。大便滑瀉者禁用。忌梅實。花。菓子並同。

參攷資料 ●神仙芝草經云。

黃精寬中益氣。使五臟調。良。肌肉充盛。骨髓堅強。其力增倍。多年不老。顏色鮮明。髮白更黑。齒落更生。又能先下三尸蟲。上尸名彭矯。好寶物。百廿日下。中尸名彭居。好五色。六十日下。下尸名彭居。好五色。三十日下。皆爛出也。根爲精氣。花實爲飛英。皆可服食。又按雷氏炮炙論序云。駐色延年。精煎神錦。註云。以黃精自然汁并研細神錦。於柳木中蒸七日。以木蜜丸服之。木蜜。枳椇也。神錦。不知是何物。或云。珠砂也。(李時珍)●按抱朴子云。黃精服其花。勝其實。服其實。勝其根。但花難得。得其生花十斛。乾之。棧可得五六斗。非大有力者不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其斷殺不及朮。朮。何令人肥健。可以負重涉險。但不及黃精。

十二畫 黃

之甘美易食。凶年可與老少代糧。謂之米輔也。(禹錫)●徐鉉精神錄云。臨川士家一婢。逃入深山中。久之。見野草枝葉可愛。取根食之。久久不饑。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫。上樹避之。及曉下地。其身款然。空而去。若飛鳥焉。數歲。家人探薪。見之。捕之不得。臨絕壁下。網圍之。俄而騰上山頂。或云。此婢安有仙骨。不過靈藥服食爾。遂以酒餌。置往來之路。果來。食訖。遂不能去。擒之。具述其故。指所食之草。卽是黃精也。(唐慎微)●黃精爲服食要藥。故別錄列於草部之首。仙家以爲芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。五符經云。黃精獲天地之淳精。故名。爲戊己芝。是此義也。餘糧。救窮。以功名也。鹿竹。菟竹。因葉似竹。而鹿兔食之也。垂珠。以子形也。陳氏拾遺。救荒草卽此也。(李時珍)●根似嫩薑。俗名野生薑。九蒸九曝。可以代糧。又名米輔。(陳嘉謨)●今處處有之。二月始生。一枝多葉。葉狀似竹。而短。根似萎蕤。萎蕤根如荻根。及菹蒲。概節而平直。黃精根如鬼臼。

黃連。大節而不平。雖燥並柔。有脂潤。俗方無用此。而爲仙經所貴。根葉花實皆可餌服。酒散隨宜。具在斷殺方中。其葉乃與鈎吻相似。惟莖不紫。花不黃。爲異。而人多惑之。其類乃殊。遂致死生之反。亦爲奇事。(陶弘景)●鈎吻。眞似黃精。只是葉頭尖。有毛鈎子一箇。若誤服之。害人。黃精葉似竹也。(雷斅)●黃精。肥地生者。卽大如拳。薄地生者。猶如拇指。萎蕤。肥根。頗同小者。肌理形色。大都相似。今以鬼臼黃連爲比。殊無彷彿。黃精葉似柳。及龍膽。徐長卿。壘而堅。其鈎吻。蔓生。葉如柿葉。殊非比類。(蘇恭)●黃精。南北皆有。以嵩山。茅山者爲佳。三月生苗。高一二尺。以葉如竹。葉而短。兩兩相對。莖梗柔脆。頗似桃枝。本黃末赤。四月開青白花。狀如小豆花。結子白如黍粒。亦有無子者。根如嫩生薑。而黃色。二月採。根。蒸過曝乾。用。今遇八月採。山中。人九蒸九曝。作果賣。黃黑色。而甚甘美。其苗初生時。人多採爲菜茹。謂之畢菜。味極美。江南人說黃精苗。葉稍類鈎吻。但鈎吻葉頭極尖。

而根細。而蘇恭言鈎吻蔓生。恐南。北所產之異耳。(蘇頌)●黃精。野。生山中。亦可剪。根長二寸。稀種之。一年後極稠。子亦可種。其葉似竹。而不尖。或兩葉三葉四五葉。俱對節而生。其根橫行。狀如萎蕤。俗採。其苗。燻熟。肉去。苦味食之。名筆管菜。

【黃精】卽人參之古籍別名。典見。桑梓本草。詳「人參」條。

【黃精酒】製法 用黃精、蒼朮各五斤。天門冬三斤。麥汁一石。同。麴十斤。糯米一石。如常釀酒。飲。至治 壯筋骨。益精髓。變白髮。治百病。

【黃蔞】卽酸漿之古籍別名。典見。爾雅。詳「酸漿」條。

【黃蕪】卽黃蕪。之原名。詳「黃蕪」條。

【黃蒸麴】原名 黃蒸。命名 本品係以米。麥粉和。待其蒸熟成黃者。故名。古籍別名 黃衣。(蘇恭)麥黃。(綱目) 採取 於六七月作而生。綠。一四二九

者佳。

製法 用米麥合磨成粉。和水成餅。麻葉裹之。待生黃衣。取出曬乾用。

性質 甘溫。無毒。

主治 功同女麴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論黃蒸麴曰。溫補。能消諸生物。【宋】日華諸家本草論黃蒸麴曰。溫中下氣。消食除煩。【明】李時珍本草綱目論黃蒸麴曰。治食黃。黃汗。

【黃蒿】即鼠麴草之古籍別名。典見本草會編。詳『鼠麴草』條。

【黃蜜】即蜂蜜之黃色者。詳『蜂蜜』條。

【黃蠶蠟】即黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃蟾】即黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃遠】即射干之古籍別名。典見吳普本草。詳『射干』條。

【黃蠶】即香蠶之一種。詳『香蠶』條。

【黃寮郎】 古醫別名 倒摘刺。

(綱目)

產地 生山野間。

形態 黃寮郎為雜草類之一種。冬夏常青。其根可供藥用。

主治 風疾。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論黃寮郎根曰。治咽喉痛。搗汁入酒酒之。牙痛刀上燒取煙煤。綿裹塞痛處。

【黃彈子】即黃皮果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃皮果』條。

【黃德祖】 產地 本品生現上。草類之一種。葉如尖刀。獨梗如芋。花紅色。白頭。如何首烏。可供藥用。

主治 瘡癬。

【黃德祖】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【黃練藤皮】 主治 霍亂痢疾。合諸香丸服。

命名 本品芽味苦澆如黃連。

似槐葉。尖長柔滑。肥厚光澤。二三月間。枯枝生芽。淡紅色。如椿芽。生食之。苦中帶甘。清香可口。醃以為菜。與芹芽。椿芽。蘆芽並重。揉乾代茶。又勝於茗。可供藥用。其藤皮詳見該條。

性質 苦。澆。寒。無毒。

主治 解暑。止渴。利便。生津。明目。清熱。解毒。治喉痛咽哽。醒酒。舌爛。口糜。嚼汁可解。

【黃蓬草】即番草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓬草』條。

【黃楊侯】即青鶴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『青鶴』條。

【黃橘皮】即橘皮之原名。詳『橘皮』條。

【黃獨】即土芋之古籍別名。典見綱目。詳『土芋』條。

【黃獨】即土芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃頷魚】即綠魚之古籍別名。典見綱目。詳『綠魚』條。

【黃頷魚】即金頂龍芽草之古籍別名。典見滇南本草。詳『仙鶴草』條。

【黃頷蛇】 命名 頷。喉下也。本品喉下色黃。故名。

古醫別名 黃喉蛇。色赤者名赤棟蛇。桑根蛇。(綱目) 青大蛇。(動物學大辭典)

外國名詞 Elaphe clima, ophora Schleg 或 Elaphevira Gata (拉丁) アオガイシヨイ (日本)

基本 係脊椎動物爬蟲類蛇類。闊口類黃頷蛇科。為黃頷蛇之肉。其頭骨所吞鼠。所吞蛙。詳見各該條。

產地 在原野間。

形態 黃頷蛇為蛇類之一種。頭部較小。舌分歧。無毒牙。吻端頗闊。鼻間鱗小。額鱗前方頗闊。後方尖狹。鼻孔四大。上唇鱗八枚。鱗鱗

似槐葉。尖長柔滑。肥厚光澤。二三月間。枯枝生芽。淡紅色。如椿芽。生食之。苦中帶甘。清香可口。醃以為菜。與芹芽。椿芽。蘆芽並重。揉乾代茶。又勝於茗。可供藥用。其藤皮詳見該條。

性質 苦。澆。寒。無毒。

主治 解暑。止渴。利便。生津。明目。清熱。解毒。治喉痛咽哽。醒酒。舌爛。口糜。嚼汁可解。

【黃蓬草】即番草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓬草』條。

【黃楊侯】即青鶴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『青鶴』條。

【黃橘皮】即橘皮之原名。詳『橘皮』條。

【黃獨】即土芋之古籍別名。典見綱目。詳『土芋』條。

【黃獨】即土芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蠶】即香蠶生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蠶』條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃獨石】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

四枚。體鱗二十列。腹鱗二百二十八枚。肛門鱗分裂。尾下鱗一百一十對。體暗綠色。背有淡黑色條紋。長四尺七寸。其行緩遲。常入人家捕食鼠類。丐兒養爲玩物。其肉可供食與藥用。



黃領蛇

性質 甘。溫。有小毒。
主治 醴酒或入丸散。主風癩頑癬惡瘡。自死蛇黃汁塗大疥。黃汁浸臂腕作痛。燒灰同豬脂塗風癬漏瘡。婦人妬乳。狗犬咬傷。

【黃領蛇吞鼠】 基本 黃領蛇吞入腹中

之鼠。尙未消化者。
主治 鼠瘻蟻瘻有網孔如鍼者。以臘月豬脂煎焦。去滓塗之。

【黃領蛇吞鼈】 基本 黃領蛇吞入腹中

之鼈。尙未消盡者。
主治 噎膈。勞嗽。蛇瘻。

【黃領蛇骨】 主治 久癆勞瘵。入丸散用。

【黃領蛇頭】 主治 燒灰。主久瘡。及小腸癰。

入丸散用。

【黃鯁】 卽黃頰魚之古籍別名。典見綱目。詳「黃頰魚」條。

【黃鰲魚】 卽杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳「杜父魚」條。

【黃鰲】 卽鰲魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰲魚」條。

【黃鴨】 卽鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳「鴛鴦」條。

【黃龍湯】 卽金汁之古籍別名。典見本草集註。詳「金汁」條。

【黃環】 命名 本品葉黃而圓。故名。

古籍別名 凌泉。大就。(本經) 實名狼跋子。(別錄) 就葛。度毅。(唐本) 生芻。根韭。(吳普)

產地 生山野平原間。

形態 黃環爲蔓草類之一種。莖長二尺許。葉圓色黃。花紫色。結實有子。其根形似葛。可供藥用。其子詳見「狼跋子」條。

採取 三月間採根用。

性質 苦。平。無毒。

主治 蠱毒鬼疰。鬼魅。邪氣在臟中。除咳逆寒熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃環根曰。治上氣急及百邪。【明】李時珍本草綱目論黃環根曰。治痰嗽。消水腫。利小便。施用宜忌 惡茯苓。防己。乾薑。惡尾爲之使。

【黃環子】 卽狼跋子之原名。詳「狼跋子」條。

【黃環】 卽黃環之處方用名。詳「黃環」條。

【黃藍】 卽紅藍之古籍別名。典見開寶本草。詳「紅藍花」條。

【黃藍花】 卽紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紅花」條。

【黃蟲】 產地 生溼地間。

形態 黃蟲爲溼生蟲類之一種。赤頭長尾。有角。羣集而居。可供藥用。

採取 七月七日採之。

性質 苦。

主治 瘵寒熱。

【黃離】 卽黃色鯉魚。典見圖經本草。詳「鯉魚」條。

【黃鵠】 卽鵠之古籍別名。典見綱目。詳「鵠」條。

【黃犢子臍屎】 基本 本品卽黃色小牛

之臍中屎。

採取 以新生未食草者收乾之。

主治 九竅四肢指肢間血出。乃暴怒所爲。燒此末。水服方寸匕。日四五服良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃犢子臍屎曰。主中惡蠱亂及鬼擊吐血。以一升和酒三升煮汁服。

【黃蘗】 卽木藜蘗之古籍別名。典見綱目。詳「木藜蘗」條。

【黃藤】 性質 甘。苦。平。無毒。

主治 飲食中毒。利小便。煮汁類服卽解。

參攷資料 黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云甚有效。(李時珍)

【黃藤】 卽鈎吻之古籍別名。典見綱目。詳「鈎吻」條。

之鼠。尙未消盡者。
主治 噎膈。勞嗽。蛇瘻。

【黃藥子】 古籍別名 赤藥。(圖經) 木藥子。大苦。

紅藥子(綱目)

產地 在山野間。

形態 黃藥子為莖草類之一種。莖高二三尺。柔而有節。形似藤。實非藤。葉大作掌狀。長三寸許。開細白花。其根長尺許。大者圍二三寸。外褐。內黃赤。可供藥用。

採取 十月間採根用。

性質 苦平無毒。

主治 諸惡腫瘡。喉痺。蛇犬咬毒。研水服之。亦含亦塗。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論黃藥子曰。涼血降火。消溼解毒。

參攷資料 孫思邈千金月令方。療忽生瘰疾一二年者。以萬州黃藥子半斤。須緊重者為上。如輕虛即是他州者。力慢。須用加倍。取無灰酒一斗。投藥入中固濟瓶。以煉火燒一伏時。待酒冷。乃開。時時飲一杯。不令絕酒氣。經三五日後。常把鏡自照。覺消即停飲。不爾便令人項細也。劉禹錫傳信方亦著其效。云得之邕州從事張君。君目

擊有效。復試其驗如神。其方並同。惟小有異處。是燒酒俟香出外。瓶頭有津出。即止。不待一宿。火不可得。猛耳(蘇頌)

【黃藥酒】 命名 本品係用黃藥子製成之酒。故名。

製法 用萬縣緊重者之黃藥子三斤。無灰酒一斗。以藥納入。固封瓶口。以糠火緩燒一伏時。至酒氣香出。瓶頭有津即止。俟冷。取酒服。或將藥切片。袋盛。浸酒煮服。

主治 諸瘰癧結氣。

古籍別名 黃鱔魚。黃鱔。黃缺。(綱目)

外國名詞 Pseudohagrus nuntianus Tomm and schlegel (拉丁) キギ 或 キバチ (日本)

基本 係脊椎動物魚類喉嚨類。粘魚科之黃鱔魚。

產地 生江湖淡水水中。

形態 黃鱔魚為無鱗類魚屬之一種。體長。形略似鮎。尾甚闊扁。頭闊扁。口吻短。眼小。分生。為上位。而被薄皮。上下兩頰皆有毛狀之

闊齒列一帶。口蓋亦有齒。鼻旁有觸鬚一對。上下頰亦有一對。兩眼間廣闊而隆起。全體甚粘滑。脊背皆有鱗刺。其棘甚強。力能飛躍。背青黃色。腹色黃。其肉可供食與藥用。

性質 甘平。微毒。

主治 醒酒。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日

用本草論黃鱔魚肉曰。祛風【明】李時珍本草綱目論黃鱔魚肉曰。黃食治水腫。利小便。燒灰。治瘰癧。久漬不收斂。及諸惡瘡。

應用宜忌 反荊芥。同食害人。

參攷資料 黃鱔魚為無鱗魚類。無鱗之魚不益人。發瘡疥。(孟詵)

採取 翅下取

參攷資料 凡消渴飲水無度。以黃鱔魚涎和青蛤粉。滑石等分。和丸服。粟米湯下三十丸(綱目)

【黃鱔魚類骨】 主治 喉痺 腫痛。燒研茶服三錢。

【黃鱔魚】 命名 魚腸肥曰鱔。本品腸腹多脂。故名。古籍別名 黃骨魚。黃鮎魚。(綱目)

產地 生江湖中。

形態 黃鱔魚為鱗類魚屬之一種。狀如白鰻。而頭尾不昂。身扁。鱗細。色白。闊不逾寸。長不盈尺。腸腹多脂。味美。肉可供藥用。其油詳見該條。

性質 甘溫無毒。

主治 自黃汁飲。止胃寒洩瀉。

參攷資料 黃鱔魚油。燃燈。令人目昏。(李時珍)

外國名詞 Rhinus colu (拉丁) ワウ

基本 係漆樹科漆樹屬之黃

櫨。出豫蜀諸省。

形態 黃櫨為喬木類之落葉木。本高一二丈。葉作羽狀複葉。小者為長卵形。有光澤。春夏間開小花。花為圓錐形。花序結實圓扁而

花為圓錐形。花序結實圓扁而

小。可採蠟。其木材黃色。可作染料與藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 除煩熱。解酒疸。目黃。水煎服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目。論黃檗木曰。洗赤眼。及湯火漆瘡。

【黃礬】 命名 本品即礬石之黃色者。故名。

性質 酸澆。鹹有毒。

主治 療瘡生肉。

歷代記述攷證 【唐】李杲海藥本草論黃礬曰。野雞瘰癧。惡瘡疥癬。【元】李東垣用藥法象論黃礬曰。治陽明風熱牙疼。

參攷資料 ①黃礬丹。趙家所須。亦入染皮用。(蘇恭) ②黃礬出陝西瓜州沙州。及舶上來者。為上黃色。狀如胡桐淚。入於綠礬中。揀出黃色者充之。非真也。波斯出者。打破中有金絲文。謂之金線礬。唐刀劍。額花文。丹房鑑源云。五色山脂。吳黃礬也。(李時珍)

【黃檗】即檉之古籍別名。與見綱目詳。【檉】條。

十二 蠶 黃

【黃蠶蜂窠】即露蜂房之古籍別名。與見和漢藥考。詳「露蜂房」條。

【黃蘗】即黃柏之處方用名。詳「黃柏」條。

【黃蠟】 原名 蠶蠟。

命名 本品生於蜜中。故曰蠶蠟。乃蜂窠之底。其色黃。故又名之曰黃蠟。

處方用名 黃蜡。黃蜂蠟。蜂蠟。黃蜜蠟。

古籍別名 黃占。(和漢藥考) 外國名詞 Corn Thuya (拉丁) Yellow Wax, Bees Wax (英) Gold Wacla (德)

基本 黃蠟由蜜蜂腹部輪節狀處分泌。燻空氣而凝結。係用以造成蜂巢及蜜槽者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。黃蠟產湖北涇陽為最。沙市次之。雲南又次之。廣東瓊州。欽州。北海均有出。但去蜜糖不清。味香。易生蟲。又有一種洋蠟。由喇喇吉打運來。蠟質略硬。其餘日本出之魚油蠟。又有用火水渣而製成者。非有閱歷。不易辨別。

形態 黃蠟為有甘味狀氣味。

之黃色或褐色。蠟狀固塊。破折面作細粒狀。於四十九度至五十五度。柔軟。於六十度至六十四度融解。比重〇·九六二至〇·九六七。不溶於水及冷酒精。溶於煮沸酒精及伊打。

種類 ①黃蠟乃取蜜後。將殘蜂房煉過。滲入水中。候其凝結。色黃者。②白蠟係用黃蠟更用水煮溶化。以好紙摺作數層。入冷水。

中。有蠟凝紙上。一吸即起。仍投冷水中。再製。以蠟為度。鋪於竹器中。曬之。乾則傾酒以水。久之凝結。色白者。③白蠟係小蟲所作。其蟲食冬青樹汁。吐涎黏嫩枝上。至秋刮取。以水煮溶。置冷水中。則凝聚成塊。色白。此即所謂蠟白蠟。與蜜蠟之白者不同。

用法 水煎或剉末。或水化。和作丸散用。

性質 甘。溫。無毒。

成分 黃蠟成分。由產地而異。但其主要者為密里辛 (Myricin $C_{15}H_{14}O_2$)。塞林 (Corin $C_{15}H_{16}O_2$)。及塞洛列因 (Carolein) 此

三物。用煮沸酒精處理之。可使分離。即甲不溶於煮沸酒精。乙則溶化。冷即析出。丙則溶存而不析出。效能 續絕傷金瘡。治下痢膿血。用作賦形藥。又為生肌定痛之。瘡傷止血藥。專治創傷。腸出血。毒。

作用 有直接凝固血液之功。且有制腐滅菌之效。

主治 瘡癤。主下痢膿血。補中。續絕傷。金瘡。血氣不饑耐老。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃蠟曰。孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升。服。立瘳。又主白髮。搗去。消蠟點孔中。即生黑者。【明】李士材本草圖解論黃蠟曰。蠟主下痢。貼疳。生肌止痛。【清】黃元御玉楸藥解論黃蠟曰。黃蠟凝聚。收澆。治泄痢。便膿。胎動下血。跌打金刃傷。火蛇咬。凍裂。一切諸瘡。愈破風。

國外學說 英美學說謂黃蠟各處產之。乃取蜜後。煉渣。濾水中。候凝取之。以其色黃。故名黃蠟。有數種植物能生蠟質。如棕櫚樹及數種楊梅樹之類。中國與日本國。

十二畫 黃

亦有產蠟之樹。如烏柏樹等。在西國多未知之。昔人以爲蜂從花中取蜜。迺帶至窩內作蜂房。今時始知蜂腹內之鱗形處有核。能結成此質。用此質造成蜂房。而其蠟必爲所食之物變成。又製法。將蜂房切碎。壓出蜂蜜。將其餘質。在沸水中融化之。加熱若干時。則其異質或能消化。或能分開。待冷。則其蠟結成定質。再融化之。漚之。待冷則成塊。成餅形。色暗黃。其臭則奇而有。涼水不化。濃酒微化。熱松香油全化。加熱至一百四十六度則自化。其作用。爲潤皮藥。合於他質成膏。則能在腐蝕或刺戟之處。作一蓋護之。令不遇空氣。或他質。如舊風。或久延赤白痢。用此最佳。外科之用處。在作蠟膏。硬膏。油膏。用時以黃蠟一分。煉豬油四分。先將黃蠟鎔化。再加豬油調勻。至涼爲度。配油膏類用。此方較白油膏易存。故美國常用之。(黃油膏方)日本和漢藥考曰。從蜂窠採取蜂蜜。而以殘窠製黃蠟。法將殘窠放入釜中。和水於火上煎沸。盛囊中壓榨。如此則蠟質浮於水上。此時再

和水煎數次。後祇熔化蠟質。移於他器。使之成塊。更注沸湯數次。使脫去黃色。漸次成爲白色堅塊。初製者謂之黃蠟。再製者謂之曬蠟。(日本和歌山縣之製法)又第四版改正日本藥局方曰。黃蠟係蜂巢採取蜂蜜後。注意焙成者。本品爲淡黃色或黃色塊。於六十三度至六十四度熔融。成爲帶有蜂蜜香氣之澄明液。比重〇・九六二至〇・九七二。又遠西名物考曰。黃蠟外敷。能使堅硬者化軟。解凝結。緩和急迫。消散膿腫。或腫痛。乳頭嫩熱腫痛。及疥裂等塗之。極有效。多用作膏藥。自蠟之性狀功用。大抵與黃蠟相同。但須清涼症。多用自蠟。較黃蠟少緩和急迫功效。赤痢用下方。多見效。現蠟昆設爾弗方。玫瑰昆設爾弗二益斯。黃蠟四錢。甘扁桃油一盞。斯牛。將蠟及油。置文火上細煇。和玫瑰昆設爾弗服之。或視其症。加阿芙蓉少許。有殊效。勞瘵之症。或體質薄弱。肺之運於罷勞。患咳嗽。喘急。吐血。聲啞等症。或傷冷毒之痰。咳甚者。用左方多效。蒸蠟方。於黃蠟加松香

或乳香。沒藥等分。或加香膏(註)。(註)適宜。入小鍋。置文火上。漸次融解之。則生佳香。患者常以口受其蒸氣吸入之。

配合應用 治赤白痢。小腹痛不可忍。下重。或面青。手足俱變者。用黃蠟三錢。阿膠三錢。同溶化。入黃連末五錢。攪勻。分三次熱服。神效。(仲景調氣方)

治熱痢。及婦人產後下痢。用葱二葶子。大阿膠二錢。當歸二錢。半。黃連三錢。黃蘗一錢。陳原米半升。水三鍾。煮米至一升。去米入藥。煎至一鍾。溫服神效。(千金膠蠟湯)

治急心疼痛。用黃蠟燈上燒化。丸炙子大。百草霜爲衣。井水下三丸。

立效丸。治肺虛。喘熱。咳嗽。氣急。煩滿。咽乾。燥渴。欲飲冷水。體倦肌瘦。發熱。減食。喉音嘶不出。黃蠟溶淨。令淨。漿水煮過八兩。再化作一百二十九丸。以蛤粉四兩爲衣。養藥每服一丸。胡桃半箇細嚼。溫水下。即臥。閉口不語。日二。(普濟方)

治肝虛雀目。黃蠟不拘多少。

一四三四

滑汁取出。入蛤粉相和得所。每用刀子切下二錢。以豬肝二兩。批開。搽藥在內。麻繩扎定。水一椀。同入饒子內。煮熟。取出。乘熱蒸眼。至濕。并肝食之。日二。以平安爲度。其效如神。(集驗方)

治頭風髮疼。湖南押衙顧思退傳方。用蠟二斤。鹽半斤。相和於蠟羅中。溶令相入。捏作一兜。豎勢。可合腦大小。空頭至額。其痛立止也。(經驗方)

治脚上腫筋。劉禹錫續傳信方。用蠟半斤。銷之。塗黃絹帛上。隨患大小。開熱。乘熱纏脚。須當脚心。便者。瘻裂之冷。即易。仍貼兩手心。(因經方)

治暴風身冷。暴風。通身水冷。如癱緩者。用上方法。隨所患大小。圍攔。攤貼。并委手足心。亦治風毒驚悸。

治破傷風。澀如瘰者。以黃蠟一塊。熱酒化開。服立效。與玉真散對用尤妙。(瑞竹堂方)

治代指疼痛。以蠟松膠相和。火炙。隨指印。搽。(千金方)

治脚上凍瘡。濃煎黃蠟塗之。

(燒和齊藥方)

①治狐尿刺人腫痛。用熱蠟着瘡。并烟薰之。令汗出即愈。(肘後方)

②治犬咬瘡發。以蠟炙溶灌入瘡中。(葛氏方)

③治蛇毒螫傷。以竹筒合瘡上。溶蠟灌之效。(徐玉方)

④治湯火傷。瘡嫩赤疼痛。薄肉成膿。用此拔熱毒。止疼痛。飲瘡口。用麻油四兩。當歸一兩。煎焦去滓。入黃蠟一兩。攪化放冷。攤高貼之。神效。(醫林集要方)

⑤治癩癧爛瘡。用桃柳槐椿棟五枝。同荆芥煎湯。洗拭淨。以生黃蠟攤油紙上。隨瘡大小貼十疔。以帛拴定。三日一洗。除去一層。不用一月痊愈。(醫林集要方)

⑥治妊娠胎漏。黃蠟一兩。老酒一盃。二物在慢火上溶化熱。服頃刻即止。

⑦治呃逆不止。黃蠟燒烟。蒸二次即止。(醫方摘要方)

⑧治霍亂吐利。蠟一彈丸。熱酒一升。化服即止。(肘後方)

⑨治諸般瘡毒。瘡瘡金瘡湯火

等瘡。用黃蠟一兩。香油二兩。黃丹半兩。同化開。頓冷瓶收。攤貼。(王仲勉經驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡有溼滯痰鬱者。禁用。惡花。齊蛤。

參攷資料 ①蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。故養脾。蠟之氣味俱薄。故養胃。厚者味甘。而性緩質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性尚質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老小下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒。髮灰。黃連末各半。雞子殼。先煎蜜蠟苦酒。雞子四味。令勻。乃納連髮熬。至可丸乃止。二日服。靈神效無比也。此方用之。屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之方。深當膺服也。李時珍②和松脂。杏仁。棗肉。茯苓等分合成。食後服五十丸。便不飢。(甄權)③古人荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼。即易爛也。(蘇頌)

【黃護草】 基本 黃護草為雜草類之一種。可供藥用。

產地 生隴西諸地。

性質 無毒。

主治 除痺益氣。令人嗜食。

【黃辯】 古醫別名 經辯。(別錄) 基本 黃辯為雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 主心腹痛。疝瘕。口瘡。臍傷。

【黃膠鬮】 即羊膠鬮之古籍別名。典見綱目。詳「羊膠鬮」條。

【黃鱉】 即鱉魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱉魚」條。

【黃鱉菜】 即黃瓜菜之古籍別名。典見救荒本草。詳「黃瓜菜」條。

【黃蠟】 即黃蠟之俗名。詳「黃蠟」條。

【黃鱈魚】 即黃鱈魚之古籍別名。典見詩注。詳「黃鱈魚」條。

【黃鱈】 即白色鯉魚。典見爾雅本草。詳「鯉魚」條。

【黃鸚】 即鸚之古籍別名。典見說

文。詳「鸚」條。

【黃鸚】 即鸚之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「鸚」條。

【黍】 命名 黍從禾從示。象細粒散珠之形。而黍者。粳也。待暑而生。暑後而成。故名。

古醫別名 赤黍名。粟。白。粟名。黑。黍名。一稈二米名。秬(爾雅) 黃黍。大黑黍。牛黍。燕頰。馬草。驢皮。稻尾(郭義恭廣志) 餅黍。

(日本)

外國名詞 Panicum milia-cum L. (拉丁)モチキヒ(日本)

基本 係禾本科稷屬。為黍之子實。莖根詳見該條。

產地 溫帶熱帶諸地皆有之。

形態 黍為數類之一。年生草本。高四五尺。葉細長而尖。有並行脈及粗毛。花有三雄蕊。單花。為穗狀花序。實有赤白黃黑紫等色。粒勻無參差。佳結。可供食與釀酒及藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣補中。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

十二畫 黍 黑

按本草論黍米曰。燒灰和油塗杖。瘡止痛。不作癢。【明】李時珍本草綱目論黍米曰。嚼濃汁。塗小兒鵝口瘡有效。

參攷資料 黍米。即之穀也。肺病宜食之。主益氣。【孫思邈】

黍者暑也。以其象火。為南方之穀。蓋黍最黏滯。與糯米同性。其氣溫。暖。故功能補肺。而多食作煩熱。緩筋骨也。孟氏謂其性寒。非矣。【李時珍】 黍米性寒。有小毒。發故疾。久食昏五臟。令人好睡。緩人筋骨。絕血脈。小兒多食。令久不能行。小兒大食之。其脚腫。風合。發寒食成痼疾。合牛肉白酒食。則生寸白蟲。【孟詵】 稷之黏者為黍。粟之黏者為稷。稷之黏者為糯。別錄本文著黍稷糯稻之性味功用甚明。【李時珍】

【黍石】即文石之古籍別名。與見別錄。詳「文石」條。

【黍米粥】 性質 甘。溫。無毒。 主治 益氣。治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。

【黍莖根】 性質 辛。熱。有小毒。 主治 煮汁飲之。解

苦氣。毒。浴身。去浮腫。和小豆黃汁服。下小便。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黍莖根曰。燒灰酒服。方寸匕。治妊娠尿血。丹黍根。煎黃汁服。利小便。止上喘。

參攷資料 醉臥黍穰。令人生厲。人家取其莖穰。作提拂掃地。用以煮汁入藥更佳。【孟詵】

【黍喇菘】即沙米之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「沙米」條。

【黍粘子】即牛蒡子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「牛蒡子」條。

【黍麴草】即鼠麴草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鼠麴草」條。

【黑三稜】即三稜之古籍別名。與見國經本草。詳「三稜」條。即華毒之古籍別名。與見博濟方。詳「華毒」條。

【黑三稜粉】即華毒粉之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「華毒粉」條。

【黑大豆】 原名 大豆。 命名 本品有黑白二種。入藥用其色黑者。故名。 處方用名 黑豆。烏豆。

古籍別名 大豆。【本經】菽。

(俗名) 米。(綱目)

外國名曰 Black Soyabean (英)

基本 屬豆科。為黑大豆之種子。

產地 凡江浙。湘。鄂諸地之原野間。恒多產焉。

形態 黑大豆為一年生草本。廣種於亞洲之東部。莖高二三尺。葉為三片複葉。其小葉作卵圓形。頂端尖。莖與葉俱密生茸毛。花開於夏日。色白。或帶紫。形似蝶。果實為莢果。亦生茸毛。中藏種子四五粒。其種類極多。以其成熟有早晚。種子有大小。色又各不相同。故名稱遂異也。

種植 每年夏至前後下種。凡田野園圃間恒多栽植。

採取 九月間採之。

製法 採得去莢殼。曬乾。炒用。或生用。

性質 甘。平。無毒。

成分 黑大豆中含有植物性蛋白質極多。故食料必需之。於其營養上分析之。得各成分如下。水分一六。〇。九。蛋白質四〇。二。

一四三六

五。脂肪。八。二。六。無磷。磷。二。一。九。七。概。概。三。八。六。灰。分。四。五。四。

效能 祛風。解諸毒。兼有滋養之效。

主治 生研。治諸腫。煮汁飲。脫毒。止痛。米。炒。研。水。服。除胃中熱。傷。中。淋。瀉。下。癩。血。散。五。臟。積。內。寒。為。烏。豆。毒。炒。碎。用。生。胃。中。熱。除。毒。去。腫。止。腹。脹。消。飲。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草。治。黑。大。豆。曰。煮。食。治。風。毒。水。腫。【唐】陳。藏。器。本。草。拾。遺。論。風。大。豆。曰。炒。黑。熱。投。酒。中。飲。之。治。風。痺。癱。瘓。口。噤。產。後。頭。風。食。飽。生。吞。中。用。去。心。胸。煩。熱。風。性。慙。明目。縱。心。酒。補。久。厚。好。顏色。變。白。不。老。者。食。性。寒。下。熱。氣。腫。脹。丹。石。煩。熱。消。腫。【唐】孟。詵。食。療。本。草。論。黑。大。豆。曰。主。中。風。脚。弱。產。後。諸。疾。同。甘。草。煮。湯。飲。去。一。切。熱。毒。氣。治。風。毒。脚。氣。者。食。治。心。疝。筋。攣。腰。痛。腫。脹。同。桑。葉。灰。煮。食。下。水。鼓。腹。脹。和。飯。搗。碎。一。切。苦。腹。癢。男。女。人。陰。腫。以。鷄。多。糲。之。【宋】日。華。諸。家。本。草。論。黑。大。豆。曰。謂。中。下。氣。通。關。解。制。金。

石藥毒。牛馬溫毒。【明】李時珍本草綱目論黑大豆曰。煮汁解暑石。砒石。甘遂。天雄。附子。射罔。巴豆。羌。青。斑蝥。百藥之毒。及蠱毒。入藥治。下痢。腹痛。衝酒。治風。瘰及陰毒。腹。痛。牛磨貯之。止消渴。治腎病。利水。下氣。制諸風熱。活血。解諸毒。

配合應用 ①服食大豆。令人長肌膚。益顏色。填骨髓。加氣力。補虛能食。不過兩劑。用大豆五升。如作醬法。取黃芩末。以豬肪煉膏。和丸。梧子大。每服五十丸。至百丸。溫酒下。神驗。秘方也。肥人不可服之。
(延年秘錄方)

②救荒濟饑。博物志云。左慈荒年法。用大豆粒細調勻者。生熟按令光。取微豆內。先日不食。以冷水頓服。訖。一切魚肉菜蔬。不得復經口。渴即飲冷水。初小困。十數日後。體力壯健。不復思食也。黃山谷救荒法。黑豆。買菜各一升。煮熟。去菜。曬乾。每日空心。噉五七粒。食百木。枝葉皆有。味。可飽也。王氏農書云。昔晉惠帝永寧二年。黃門侍郎劉景先。奏。臣遇太白山隱氏。傳濟饑辟穀仙方。臣家大小七十餘口。

更不食別物。若不如斯。臣一家甘受刑戮。其方用大豆五斗。淘淨。蒸三遍。去皮。用大麻子三斗。浸一宿。亦蒸三遍。今日開取仁。各搗爲末。和搗。作團如拳大。入飯內。蒸。從戊至子時止。寅時出飯。午時曬乾。爲末。乾服之。以飽爲度。不得食一切物。第一頓得七日不饑。第二頓得四十九日不饑。第三頓得三百日不饑。第四頓得二千四百日不饑。更不必慮。永。不饑也。不同老少。但依法服食。令人強壯。容貌紅白。永不憔悴。口渴即研大麻子湯飲之。轉更滋潤。辟。若要重喫物。用葵子三合。研末。煎湯冷服。取下藥如金色。任喫諸物。並無所損。前知隨州朱頌。教民用之。有驗。序其首尾。勒石於漢陽大別山。太平興國寺。又方。用黑豆五斗。淘淨。蒸三遍。曬乾。去皮。爲末。秋麻子三升。浸去皮。曬研。糯米三斗。做粥。和搗。爲劑。如拳大。入飯中。蒸一宿。取曬。爲末。用紅小囊五斗。煮去皮核。和爲劑。如拳大。再蒸一夜。服之。至飽爲度。如渴飲麻子水。便滋潤。辟。也。脂麻亦可。但不得食一切之物。

③炒豆紫湯。蘇頌曰。古方有紫湯。破血去風。除氣。防熱。產後兩日。尤宜服之。用烏豆五升。清酒一斗。炒令烟絕。投酒中。待酒紫赤色。去豆。量性服之。可日。夜三。遂。神驗。中風口噤。加雞屎白二升。和炒。投之。
④豆淋酒法。寇宗奭曰。治產後百病。或血熱。覺有餘血。水氣。或中風。困篤。或背強。口噤。或但煩熱。癢。瘰。口。或身。頭。背。腰。或身。痒。喉。逆。直。視。或手。足。頑。癬。頭。旋。眼。眩。此皆虛熱。中風也。用大豆三升。熬熟。至微烟出。入瓶。中。以酒五升。沃之。經一日以上。服酒一升。溫覆。令少汗。出身。潤。即愈。口。噤。者。加。獨。活。半。斤。微。散。破。同。沃。之。產。後。宜。常。服。以。防。風。氣。又。消。結。血。
⑤治中風口噤。即上方日服一升。(千金方)
⑥治頭風頭痛。即上方密封七日。溫服。(千金方)
⑦治破傷中風口噤。用大豆一升。蒸去腥氣。勿使太熟。杵末。蒸令氣。通。取。下。飯。以。酒。一。升。淋。之。溫。服。一。升。取。汗。博。背。脊。上。即。愈。(千金方) 又用黑豆四十枚。硃砂二十

文。同研末。以酒半盞調服之。(經方)
⑧治頭項強硬。不得顧視。大豆一升。蒸。髮。色。發。髮。枕。之。(千金方)
⑨治暴得風疾。四肢。攣。縮。不能行動。取大豆三升。淘淨。漂。蒸。以。酒。二。升。傾。入。瓶。中。鋪。於。地。上。殺。腐。豆。上。令。別。人。臥。之。仍。重。蓋。五。六。層。衣。豆。冷。漸。漸。却。衣。仍。令。一。人。於。被。內。引。挽。線。急。曳。更。蒸。豆。再。作。併。飲。刺。溼。湯。如。此。三。日。三。夜。即。休。(宿氏醫要方)
⑩風入。腹。中。治。新。久。腹。風。入。腹。中。以。大。豆。一。斗。水。五。斗。煮。取。一。斗。二。升。去。滓。入。美。酒。斗。中。煎。取。九。升。且。服。取。汗。神。驗。(千金方)
⑪治風毒攻心。煩。躁。怵。惚。大。豆。半。升。淘。淨。以。水。二。升。煮。取。七。合。食。後。服。之。(心經方)
⑫治卒風不語。大豆。黃。汁。煎。稠。如。餠。舍。之。并。飲。汁。(肘。後。方) 又。治。喉。痺。不。語。(千金方)
⑬治卒然失音。用大生豆一升。青竹筴子四十九枚。長四寸。闕一分。水。煮。熟。日。夜。二。服。連。(孟。詵。方)
⑭治熱毒攻眼。赤。痛。眩。浮。用。黑

十一 蠶 黑

豆一升。分作十袋。沸湯中煮過。更互熨之。三遍則愈。(普濟方)

⑤治卒然中惡。大豆二七枚。雞子黃一箇。酒半升。和勻頓服。(千金方)

⑥治陰毒傷寒危篤者。用黑豆炒乾。投酒熱飲。或灌之。吐則復飲。汗出爲度。(居家必用方)

⑦治腸痛如打。大豆半升。熬焦入酒一升。煮沸飲。取醉。(肘後方)

⑧治腸脇卒痛。大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓服。(肘後方)

⑨治卒然腰痛。大豆六升。水拌溼。炒熱。布裏熨之。冷即易。乃張文仲所處方也。(延年秘錄方)

⑩治脚氣衝心。煩悶不識人。以大豆一升。水三升。煮取汁。服未定。再服。(廣利方)

⑪治身面浮腫。烏豆一升。水五升。煮汁三升。入酒五升。更煮三升。分溫三服。不達再合。(千金方)又用烏豆。煮至皮乾爲末。每服二錢。米飲下。(百一選方)

⑫治新久水腫。大豆一斗。清水一斗。煮取八升。去豆入薄酒八升。再煎取八升服之。再三服。水當從

小便中出。(范汪方)

⑬治腹中痞硬。夏秋之交。臥坐夜久。腹中痞。如礫石在腹。用大豆半升。生薑八分。水三升。煎一升。已來。頓服。(經驗方)

⑭治霍亂腹痛。大豆生研。水服方寸匕。(普濟方)

⑮治水痢不止。用大豆一升。炒白朮半兩爲末。每服三錢。米飲下。(指南方)

⑯治赤痢腹痛。黑豆、茱萸子二件。搗碎。吞嚥之。良。(經驗方)

⑰治男子便血。用黑豆一升。炒焦研末。熱酒淋之。去豆飲酒。神效。(活人心鏡方)

⑱治一切下血。雄黑豆緊小者。以皂角湯徹浸炒熟。去皮爲末。煉豬脂和丸。梧子大。每服三十九。陳米飲下。(中藏經方)

⑲治小兒沙淋。黑豆一百二十箇。生甘草一寸。新水煮熟。入滑石末。乘熱飲之。良。(全幼心鑑方)

⑳治腎虛消渴。難治者。黑大豆炒。天花粉等分爲末。糊丸。梧子大。每黑豆湯下七十九丸。日二名。救活丸。(普濟方)

㉑治消渴飲水。烏豆置牛腹中陰乾。百日吞盡。即瘳。(肘後方)

㉒治晝夜不眠。以新布火炙熨目。并蒸大豆。更番熨枕之。冷即易。終夜常枕之。即愈。(肘後方)

㉓治疫癘發腫。大黑豆二合。炒熟。炙甘草一錢。水一盞。煎汁。時時飲之。夷堅志云。靖康二年。春。京師大疫。有異人書此方於壁間。用之立驗也。

㉔治乳石發熱。烏豆二升。水九升。銅器煮五升。汁熬稠一升。飲之。(外臺秘要方)

㉕解毒砒毒。大豆煮汁飲之。良。(肘後方)

㉖治酒食諸毒。大豆一升。煮汁服。得吐即愈。(廣記方)

㉗解諸魚毒。用大豆煮汁飲之。(衛生方)

㉘解巴豆毒。下利不止。大豆煮汁一升。飲之。(肘後方)

㉙治惡刺瘡痛。大豆煮汁飲之。即瘳。(千金方)

㉚治湯火灼瘡。大豆煮汁飲之。易愈無斑。(毒祕錄方)

(千金方)

㉛治折傷墮墜。瘀血在腹。氣短。大豆五升。水一斗。煮汁二升。頓服。劇者不過三作。(千金方)

㉜治臨瘡煩燥。大豆煮汁飲之。佳。(子母秘錄方)

㉝治痘瘡溼爛。黑大豆研末。傅水調傅之。(普濟方)

㉞治小兒頭瘡。黑豆炒存性。研水調傅之。(普濟方)

㉟治染髮令烏。醋煮黑大豆。去豆煎稠。染之。(千金方)

㊱治牙齒不生。不拘大人小兒。年多者。用黑豆三十粒。牛糞火內燒令烟盡。研入麝香少許。先以針挑破血出。以少許搽之。不得見風。忌酸鹹物。(經驗方)

㊲治牙齒疼痛。黑豆煮酒。類類漱之。良。(周密治然齊抄方)

㊳治妊娠腰痛。大豆一升。酒三升。煮七合。空心飲之。(心鏡方)

㊴治子死腹中。月數未足。母欲悶絕者。用大豆三升。以醋煮。濃汁頓服。立出。(產乳方)

㊵治胞衣不下。大豆半升。醇酒三升。煮一升。分三服。(產書方)

● 辟穢時氣。以新布盛大豆一斗。納井中一宿取出。每服七粒佳。
(領要方)

● 治菜中蛇蠱。蛇毒入菜果中食之。令人得病。名蛇蠱。又豆爲末。酒漬絞汁服半升。

● 治身如蟲行。用大豆水漬絞漿。旦日洗之。或加少麴。沐髮亦良。
(千金方)

● 治小兒丹毒。濃煮大豆汁。塗之甚良。
(千金方)

● 治風疽疥疥。凡脚腫及腫厥中痒。搗則黃汁出者是也。以青竹筒三尺。着大豆一升在內。以馬屎糝火燒薰。以器兩頭取汁搽之。先以滑清和鹽洗之。不過三度極效。
(千金方)

● 治肝虛目暗。迎風下淚。用臘月牯牛膽盪黑豆。懸風處取出。每夜吞三七粒。久久自明。
(龍木論方)

● 治小兒胎熱。黑豆二錢。甘草一錢。入燈心七寸。淡竹葉一片。水煎。
(全幼心鑑方)

● 治天蛇頭指。痛臭甚者。黑豆生研末。入罌內。籠之。
(濟急方)

十二畫 黑

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無熱毒者禁用。長五參。龍膽。忌豬肉。厚朴。革麻子。得前胡。烏味。杏仁。牡蠣。及諸膾汁良。

參攷資料 ● 仙方修治末服之。可以辟穀度饑。然多食令人體重。久則如故也。
(蘇頌) ● 按養老書云。李守愚每晨水吞黑豆二七枚。謂之五臟穀。到老不衰。大豆有五色。各治五臟。惟黑豆屬水性寒。爲腎之穀。入腎功多。故能治水。消脹下氣。制風熱而活血解毒。所謂同氣相求也。又按古方稱大豆解百藥毒。予每試之。大不然。又加甘草。其驗乃奇。如此之事。不可不知。
(李時珍) ● 大豆性平。炒食極熱。煮食甚寒。作豉極冷。造醬及生黃卷。則平。牛食之。濕馬食之。冷。一體之中。用之數變。
(陳藏器) ● 服革麻子者。忌炒豆。犯之。脹滿致死。服厚朴者。亦忌之。動氣也。
(李時珍) ● 豆亦皆莢穀之總稱也。篆文未象莢生附莖下垂之形。豆象子在莢中之形。廣雅云。大豆菽也。小豆荅也。
(李時珍) ● 大豆有黑白黃

褐青斑數色。黑者名烏豆。可入藥。及充食作豉。黃者可作腐。榨油造醬。餘但可作腐及炒食而已。皆以夏至前後下種。苗高三四尺。葉團有尖。秋開小白花。成叢。結莢長寸餘。經霜乃枯。按呂氏春秋云。得時之豆長莖短足。其莢二七爲族。多枝數節。大菽則圓。小菽則圓。先時者必長莖。浮葉。莢節小。莢不實。後時者必短莖。莢節本虛不實。又范勝之種植書云。夏至種豆。不用深耕。豆花憎見日。則黃爛而根焦矣。知歲所宜。以養盛豆子。平量埋陰地。冬至後十五日發。取量之最多者種焉。蓋大豆保歲易得。可以備凶年。小豆不保歲而難得也。
(李時珍)

參攷資料 按抱朴子內篇云。相國張文蔚莊內有鼠狼穴。養四子。爲蛇所吞。鼠狼雌雄情切。乃於穴外。坩土壅穴。俟蛇出頭。度其回轉不便。當腰咬斷。而劈腹啣出。四子尚有氣。置於穴外。啣豆葉嚼而傳之。皆活。後人以豆葉治蛇咬。蓋本於此。
(李時珍)

【黑大豆皮】 主治 生用療痘瘡。目翳。嚼爛。

【黑大豆花】 主治 目盲翳膜。

【黑大豆苗】 效能 止渴。

【黑大豆葉】 主治 搗傅蛇咬。類易取。按。

【黑小豆】 即稽豆之古籍別名。典見綱目。詳「稽豆」條。

【黑山梔】 即山梔子焙炒成者之處方用名。詳「山梔子」條。

【黑丑】 即牽牛子之古籍別名。典見綱目。詳「牽牛子」條。

【黑元參】 即玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【黑升麻】 即升麻之日本名。詳「升麻」條。

【黑火柴頭魚】 即鱧魚之古籍別名。典見醫林集要。詳「鱧魚」條。

【黑牛兒】 即蠅蝦之古籍別名。典見綱目。詳「蠅蝦」條。

【黑玉】即玉之色黑如漆者。功用詳「玉」條。

【黑石】即脂礬之古籍別名。典見本經詳「脂礬」條。

【黑石子】即無名異之俗名。詳「無名異」條。

【黑石脂】命名 本品即石脂之黑色者故名。

古籍別名 石墨石涅。畫眉石。

（綱目）

性質 鹹。平。無毒。
主治 養腎氣。強陰。主陰蝕瘡。止腸辟瀉痢。瘰癧口瘡。咽痛。久服益氣。不燥延年。

參攷資料 黑石脂亦可為墨。其性黏舌。與石灰不同。南人謂之畫眉石。即許氏說文所謂黛。畫眉石也。（李時珍）

【黑石華】基本 黑石華為石類之一種。可供藥用。
產地 生山東半島山中陰石間。

性質 甘。無毒。
主治 陰痿消渴。去熱。療婦人月水不調。

【黑羊石】產地 出山東舊兗州府宮山中。

形態 黑羊石為石類之一種。以色黑有燦壁光瑩者。可供藥用。採取 春月掘地採之。

性質 淡。生涼。熱熱無毒。

主治 解藥毒。

【黑老虎】產地 廣東北江。英德清遠等處。

主治 產後半身不遂。

【黑豆】即黑大豆之處方用名。詳「黑大豆」條。

【黑辛夷】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【黑林檎】即林檎實之紫黑色者。詳「林檎」條。

【黑狗脊】即狗脊根之黑色者。功用詳「狗脊」條。即貫衆之古籍別名。典見綱目。詳「貫衆」條。

【黑芝】命名 本品即芝草之黑色者故名。

古籍別名 玄芝（本經）

性質 鹹。平。無毒。
主治 養利水道。益腎氣。通九竅。聰察。久服輕身不老。延年神仙。

【黑花蛇】即烏梢蛇之古籍別名。

典見綱目。詳「烏梢蛇」條。

【黑虎】即黑蝦蟆之原名。詳「黑蝦蟆」條。

【黑金】即錢之古籍別名。典見綱目。詳「錢」條。

【黑附子】命名 本品係用附子炮黑者故名。

性質 辛。甘。大熱。有毒。

主治 溫通元陽。峻補虛寒。但非若生用者功能發散耳。

【黑附子】即附子之古籍別名。典見綱目。詳「附子」條。

【黑胡椒】即胡椒實之乾而色黑者。詳「胡椒」條。

【黑砂星】即夜明砂之古籍別名。典見綱目。詳「夜明砂」條。

【黑風蛇】即烏梢蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏梢蛇」條。

【黑料豆】即種豆之古籍別名。典見綱目。詳「種豆」條。

【黑桑椹】即桑椹之處方用名。詳「桑椹」條。

【黑荊芥】即荊芥黑色者之處方用名。詳「荊芥」條。

【黑兜蟲】即九香蟲之古籍別名。典見綱目。詳「九香蟲」條。

【黑參】即玄參之古籍別名。典見綱目。詳「玄參」條。

【黑梢蛇】即烏梢蛇之產於江東者。能經物至死。性質效能。與烏梢蛇同。詳「烏梢蛇」條。

【黑殺星】即夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夜明砂」條。

【黑細豆】即種豆之古籍別名。典見綱目。詳「種豆」條。

【黑蛇根】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「升麻」條。

【黑魚】即鯢魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鯢魚」條。即鱧魚之俗名。詳「鱧魚」條。

【黑犀角】即犀角之處方用名。詳「犀角」條。

【黑草】即大連黑者之處方用名。詳「大連」條。

【黑塌香】即乳香之色黑者。為乳香中之下品。效能詳「乳香」條。

【黑蜂】即竹蜂之古籍別名。典見揚雄方言。詳「竹蜂」條。

【黑鉛】即鉛之古籍別名。典見新集藥錄。詳「鉛」條。

【黑雞肉】基本 本品即黑色毛羽雞。

之內。

性質 甘。酸。溫。平。無毒。

主治 作藥食。治風寒溼痺。五緩六急。安胎。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論黑雌雞肉曰。治反胃及腹痛。腰折骨痛。乳癰。又新產婦以一隻治淨。和五味炒香。投二升酒中。封一宿取飲。又和烏油麻二升。熬香入酒中極效。【宋】日華諸家本草論黑雌雞肉曰。安心定志。除邪辟惡氣。治血邪。破心中宿血。治癰疽。排膿。補新血。及產後虛羸。益色助氣。

【黑漆】即乾漆之別名。詳「乾漆」條。

【黑為耨】即為耨香之色黑者。詳「為耨香」條。

【黑錫】即鉛之處方用名。詳「鉛」條。

【黑錫灰】即鉛灰之古籍別名。與見綱目。詳「鉛」條。即鉛灰之原名。詳「鉛灰」條。

【黑頭草】即蝮腸之古籍別名。與見綱目。詳「蝮腸」條。

【黑龍衣】即鼈甲之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「鼈甲」條。

【黑薑】即炮薑之原名。詳「炮薑」條。

【黑穉豆】即小豆之色黑者。功效詳「穉豆」條。

【黑鮪】即鱈魚之古籍別名。與見綱目。詳「鱈魚」條。

【黑鱧】即鱧魚之古籍別名。與見圖經本草。詳「鱧魚」條。

十三畫

【亂銀絲】即杜仲之古籍別名。與見和漢藥考。詳「杜仲」條。

【亂髮灰】即血餘炭之原名。詳「血餘炭」條。

【催生草】即雙頭蓬之古籍別名。與見綱目。詳「雙頭蓬」條。

【催生蘭】古籍別名 報喜蘭。 (綱目拾遺)

形態 催生蘭為蘭之一種。懸生樹間。勿侵地氣。種法以空為根。以露為命。形與蘭相似。每莖作七八枝。開花似蠟梅。紅紫色。香味亦同。相傳謂其花遇有吉事則開。可供藥用。

主治 催生寤生者。以花懸戶

上即生。

【催風使】產地 生山地間。基本 催風使為雜草類之一種。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治 療風疾。

【催歸】即杜鵑之古籍別名。與見綱目。詳「杜鵑」條。

【催歸】即蛤蚧之古籍別名。與見綱目。詳「蛤蚧」條。

【勤母】即貝母之古籍別名。與見別錄。詳「貝母」條。

【噎尸羅】即茅香之古籍別名。與見金光明經。詳「茅香」條。

【噴魚】即河豚之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「河豚」條。

【嗎提口】古籍別名 瑪替哥。 (譯音)

產地 此藥產於南亞美利加之祕魯國。

基本 屬芳香類。藥用根。效能 活血行氣。壯陽強腎。

主治 腎虛。白濁。白帶。白淋。

【圓三七】即三七圓形者之別名。詳「三七」條。

【圓眼】即龍眼之俗名。詳「龍眼」

條。

【圓筍】即冬筍之已出土者。長尺許。以其穉圓。故名。性質功能。與冬筍同。詳「筍」條。

【圓蛤】即蛤蜊圓者之別名。詳「蛤蜊」條。

【圓黃】即牛黃成塊形者之別名。詳「牛黃」條。

【圓藥】即落葉松茸之古籍別名。與見和漢藥考。詳「落葉松茸」條。

【圓萎子】即胡萎之古籍別名。與見和漢藥考。詳「胡萎」條。

【塊砂】即硃砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【塊長砂】即硃砂之處方用名。詳「硃砂」條。

【塊沉香】即沉香之處方用名。詳「沉香」條。

【塊滑石】即滑石之處方用名。詳「滑石」條。

【塌香】即乳香溶化在地者之別名。詳「乳香」條。

【塌橘】即橘實之外皮綠色。內瓤紅色。瓣巨多。或者之別名。性質效能。與尋常橘同。詳「橘實」條。

【塔頂石灰】即天龍骨之原名。詳

十三畫 嫁 婆 鳳 盧 廉 棠 微 愛 感 慎 搖 搜 搥 搬 新

一四四二

【天龍骨】條。

【嫁茄】即茄子之古籍別名。典見綱目。詳「茄子」條。

【鑿鑿酸】即石蒜之古籍別名。典見綱目。詳「石蒜」條。

【扇盤蟲】即行夜之古籍別名。典見本草集註。詳「行夜」條。

【盧藥】基本。盧藥為雜草類之一種。莖如乾茅。色帶黃赤。可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 折傷內損瘀血。生膚止痛。治五臟。除邪氣。補虛損。產後血病。水煎服。亦可搗傅。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論盧藥曰。治墜馬內損。取末一兩。牛乳一錢煎服。

【廉葦】古籍別名。葦。藜。藜。葦。

性質 辛。熱。無毒。

主治 胃中冷。吐水。不下食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論廉葦曰。溫中下氣。消食益智。

參攷資料 ①廉葦似葦。生嶺南。劍南人多食之。②陳藏器。按

異物志云。生沙石中。似蓬。大如蕪。氣猛。近於臭。南人以爲蠱。其法。陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也。又鄭樵云。廉葦似山薑而根大。③李時珍。

【葉皮】即刺蝟皮之古籍別名。典見爾雅。詳「刺蝟皮」條。

【微莖】即藟本之古籍別名。典見別錄。詳「藟本」條。

【愛老】即佛桑花重葢者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「佛桑花」條。

【愛垂】即麥門冬之齊名。典見綱目。詳「麥門冬」條。

【感米】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【感藤】即甘藤之古籍別名。典見綱目。詳「甘藤」條。

【慎火】即景天之古籍別名。典見本經。詳「景天」條。

【搖車】即翅接之古籍別名。典見爾雅。詳「翅接」條。

【搜山虎】即羊躑躅根之古籍別名。典見綱目。詳「羊躑躅」條。

【搜夾子】即蠟蛟之古籍別名。詳「蠟蛟」條。

【搜筮】即吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「吳茱萸」條。

【搥胡根】性質 甘。寒。無毒。主治 潤五臟。止痛。湯。除煩去熱。明目。功用與麥門冬相等。

參攷資料 生江南川谷陸地。苗如葦草。其根似天門冬。凡用抽去心。②陳藏器。

【搬藍】即茄連之古籍別名。詳「茄連」條。

【新坑砂】即硃砂之古籍別名。典見綱目。詳「硃砂」條。

【新汲水】命名 本品即井中新汲之水。故名。主治 消渴反胃。熱痢熱淋。小便赤澀。卻邪調中。下熱氣。並宜飲之。射雞腫令散。洗漆瘡。治墜損。出冷頂。其身面則賜自入也。又解閉口。椒毒。下魚骨哽。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論新汲水曰。解砒石。烏味。燒酒。煤炭。馬刀毒。治熱悶昏。煩渴。

參攷資料 凡飲水痲疾。皆取新汲清泉。不用停污濁。暖。非直無

效。亦且損人。與榨曰。新汲井華水。取天一真氣。浮於水面。用以煎補陰之劑。及鍊丹。黃者。性味同於露水也。②蒙禹錫。

【新葦】即蕭那之別名。典見藥物大成。詳「香蒿葉」條。

【新麻布】命名 本品係麻質所織之新布。故名。主治 能逐瘀血。婦人血閉。腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。煨研。酒服之。

【新會皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【新會橙】即橙之產於廣東新會縣者。在橙類中爲最佳。詳「橙」條。

【新絲綿】主治 五野鷄病。燒灰。每服二錢。

【新雉木】形態 新雉木爲雜木之一種。結實如桃。可供藥用。

採取 七月採。陰乾用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 風眩頭痛。煎湯沐之。

【新羅白肉】即白附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白附子」條。

【新羅松子】即海松子之古籍別

名。與見綱目。詳「海松子」條。
 【新羅芥】即荊芥之古籍別名。與見綱目。詳「荊芥」條。

【新羅參】即高麗參產於朝鮮新羅地方者。詳「高麗參」條。

【新羅葛】即王瓜之古籍別名。與見和漢藥考。詳「王瓜」條。

【新羅薄荷】即連錢草之古籍別名。與見和漢藥考。詳「連錢草」條。

【晶石】
 產地 生海底。
 形態 晶石為石類之一種。狀如石。紫褐色。乃海中鹹水所結成。自然生量。可供藥用。

性質 鹹。無毒。
 主治 石淋。煎汁飲之。或燒赤投酒中飲。

【會及】即五味子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「五味子」條。

【會州白藥】
 形態 會州白藥為莖草類之一種。葉如白紙。可供藥用。

主治 療金瘡。止血生肌。碎末傅之。

【椰子】
 古籍別名 越王頭。符餘(綱目)南洋椰子。錫蘭椰子。西貢椰子。鳳凰椰子。帝王

椰子。皆耶。(植物學大辭典)
 外國名詞 Cocos nucifera.
 (拉丁)ヤシ ボンヤシ ヤシホ ヤギ(日本)

基本 係棕櫚科椰子屬。為椰子之子。其子皮。子殼。子葉。油。膏。肉。根皮。詳見各該條。
 產地 亞非利加洲與東印度為原產地。凡熱帶諸處皆有之。



椰子

形態 椰子為喬木類之常綠木本。幹高五丈。或十丈。圍三尺許。葉大羽狀分裂。叢生於樹幹頂上。花單性。雌雄同株。果實每年生數十枚。長形。有三稜。長八九寸。徑四五寸。大如斗。狀似瓠。房房相連。一房二十八實。或三十實不等。有黃毛。韌皮。甚粗厚。包之。即椰衣。中有殼。類似檳榔。殼上有二穴。殼中似蘆。肉極甘脆。瓢白如雪。核圓黑堅潤。長三寸。與肉皆緊着於皮。中空有清液。甘美而有酒氣。

可製酒。木材堅核。可供建築。其殼可入藥用。

採取 六七月間實熟時採之。
 性質 甘平。無毒。
 主治 益氣。

歷代記述攷證 【明】汪穎食物本草論椰子。曰。治風。【明】李時珍本草綱目論椰子。曰。令人面澤不皺。

【椰子皮】
 製法 蘇頌曰。不拘時月。採其根皮。入藥。用。一云其實皮亦可用。
 性質 苦平。無毒。
 主治 止血。療鼻衄。吐逆。霍亂。煮汁飲之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論椰子皮。曰。治卒心痛。燒存性。研。以新汲水服一錢。極驗。

【椰子油】
 基本 本品係用椰子果核榨取之油。
 外國名詞 Oleum Cocos.
 (拉丁) Coconut Oil Corps
 Oil (英) Kokosnuöl (德)

形態 椰子油為類似豚脂之脂肪。色白。或微帶黃。帶一種臭氣。比重 〇・八一至 〇・八三。凝

固點十六至十八度。融解點二十四至二十八度。酒精難於溶解。置空氣中。易於變性。

製法 壓榨果核。絞出其油。或與水同煮。俟沸。將浮於液面之油。放冷。收取。是為粗製油。若更將粗製油。融解。加熱。通以蒸氣。除淨揮散之分。再加白土。細細攪拌。更用熱水洗滌。收取其油。即成精製油。
 成分 椰子油中含加布洛酸 (Caproic Acid) 加布勃克酸 (Caprylic Acid) 老勃克酸 (Lauric Acid) 迷利歐克酸 (Myristic Acid) 薄荷密知克酸 (Palmitic Acid) 諸成分。因以構成。倘利失林與伊打。

主治 塗擦皮膚。腫脹。變硬。及疥疥癬疾。

【椰子肉】
 主治 益氣生風。筋骨疼痛。楊梅下疳。

【椰子殼】
 主治 楊梅瘡。筋骨痛。燒存性。隨時炒熱。以滾酒泡。服二三錢。暖覆取汗。其痛即止。神驗。

【椰子漿】
 古籍別名 椰中酒。(俗名)樹頭酒。

十三畫 椰

樓 樓

性質 甘。溫。無毒。

主治 止消渴。塗頭益髮令黑。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論椰子漿曰。治吐血水腫去風熱。

參攷資料

●椰子漿性熱。故飲之者多昏如醉狀。異物志云。食其肉則不饑。飲其漿則增渴。(李時珍) ●椰子生海南極熱之地。土人賴此解夏月毒渴。天之生物各因其材也。(朱丹溪)

【椰子膏】

基本 本品係以椰子殼熬成黑色之膏。

主治 塗鮮疾。

【椰中酒】即椰子漿之俗名。詳「椰子漿」條。

【椰根皮】

製法 質皮亦可入藥。俱宜灸用。

性質 苦。平。無毒。

主治 煮汁飲。止吐衄霍亂。燒研。新汲水服。止卒心痛。

【椰樹油】

基本 本品即椰樹以火炙出之油。

主治 祛暑止渴。療齒痛。烏髮。髮塗凍瘡。

【叢】●即木槿之古籍別名。與見

爾雅。詳「木槿」條。●即柚之古籍別名。與見綱目。詳「柚」條。

【樓魚】即樓桐子之古籍別名。與見綱目。詳「樓桐子」條。

【樓荷】●即樓桐子之古籍別名。與見綱目。詳「樓桐子」條。●即樓桐子之嫩者。詳「樓桐子及花」條。

【樓蟲】

主治 赤白帶。腸紅血。痢。其行血而又能補血。功同當歸。

參攷資料

滇南各甸土司記。樓蟲產越州外各土司中。穴居樓桐木中。食其根脂汁。狀如海參。粗如臂。色黑。土人以爲珍饈。土司饋賓客。必向各甸丁索取此蟲作供。連樓木數尺解送。剖木取之。作羹。味絕鮮美。肉亦堅韌而脆。絕似遠東海參。云食之增髓益血。尤治帶下。彼土婦人無患帶者。以食此蟲也。(趙恕軒)

【樓桐】

命名 本品皮中毛織如馬之樓。故名。

處方用名 棕桐皮。棕桐炭。古籍別名 柝桐。(綱目)樓。樓。

棕桐。棕桐(俗名)子名樓荷或樓魚。(醫學大辭典)

外國名詞 Troadycarpus excolsa, Wendl. (拉丁)シキロ(日本)

基本 係樓桐科。爲樓桐之樹皮。

產地 凡暖地山野及川廣諸地均有出。

皮。



樓 桐

形態 樓桐爲常綠喬木。幹直立。似圓柱。高二三丈。無枝條。幹之周圍全面。留有舊葉柄之基脚部。徑四寸至八寸。葉甚大。作掌狀。分裂。有長柄。裂生。幹端外向。四面花。小色淡黃。集生於分枝之花輪上。由苞以包被之。其苞大。色亦淡黃。雄花形如粟粒。雌花結實。呈核果狀。大似豌豆。其在葉之基部。而包幹之皮中。有絲毛。頗強韌。稱爲樓毛。可供器具繩帶等之材料。其皮月生一瓣。歲生十二瓣。如窗閤。月多生一瓣。惟此瓣較小。中間有

一四四四

界紋。且其質完成者。與常瓣有別。稱爲閉月樓桐皮。

採取 九月十月間。採皮陰乾。製法 大明曰。凡使樓桐皮。宜燒存性用。

性質 苦。清。平。無毒。

效能 清腸潤脫。消熱止血。專作收斂藥。

主治 止鼻衄吐血。破癥。治風。風赤白痢。崩中帶下。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論樓桐皮曰。主金瘡疥癬。

生肌止血。【明】穆希雅本草經疏論樓桐皮曰。樓桐皮。味苦。澀。氣平。無毒。本經主諸病皆燒灰用者。凡血得熱則行。得燥灰則止。故主鼻衄吐血。若能消熱。澀可去脫。故主崩中帶下。及腸風赤白痢也。止血固脫之性。而能消瘀血。故能破癥也。凡失血過多。內無瘀滯者。用之。切當。與亂髮灰同入更良。如暴得吐血。瘀滯方動。暴得崩中。瘀滯未竭。淨熱下痢。初發腸風。帶下方熾。悉不宜速用。即用亦無效。入藥須年久敗者良。

配合應用 ●治鼻血不止。樓

櫻灰。隨左右吹之。(琴居士方)

●治血崩不止。櫻櫚皮。燒存性。空心淡酒服三錢。一方加煨白礬等分。(婦人良方)

●治血淋不止。櫻櫚皮半燒半炒。為末。每服二錢。甚效。(衛生家寶方)

●治下血不止。櫻櫚皮半斤。枯櫻一箇。燒灰。每服二錢。米飲調下。(百一選方)

●治水穀痢下。櫻櫚皮。燒研水服方寸匕。(近效方)

●治小便不通。櫻皮毛燒存性。以水酒服二錢。即通利。累試甚驗。(攝生方)

用量 錢半至二錢。
應用宜忌 凡無滯滯及有實邪者禁用。

參攷資料 ●櫻皮燒黑。治婦人血露。及婦人吐血。須佐以他藥。(慈宗爽) ●櫻灰性澀。若失血過多。滯滯已盡者。用之切當。所謂澀可去脫也。與亂髮同用。更良。年久敗櫻入藥尤妙。(李時珍) ●櫻櫚川廣甚多。今江南亦種之。最難長。初生葉如白及。葉高二三尺。則木

十三畫 櫻

楸 椿

楸數葉。大如扇。上聳四散。歧裂。其莖三稜。四時不凋。其幹正直。無枝。近葉有皮囊之。每長一層。即為一節。幹身赤黑。皆筋絡。宜為鑿杵。亦可旋為器。其皮有絲毛。錯縱如織。刺取。可織衣。相稱。楸之屬。大為時利。每歲必兩三割之。否則樹死。或不長也。三月於木端。墜中出數黃苞。苞中有細子成列。乃花之孕也。狀如魚腹。孕子。謂之櫻魚。亦曰櫻筍。漸長出苞。則成花穗。黃白色。結實。藥。大如豆。生黃熟黑。甚堅實。或云南方此木有兩種。一種有皮絲。可作繩。一種小而無絲。惟葉可作帚。鄭樵通志。以為王楸者非也。王楸乃落帚之名。即地膚子。別有落莖。葉與此相似。而柔薄。可為扇笠。許慎說文。以為櫻櫚亦誤矣。(李時珍)

【櫻櫚子及花】

古籍別名 子嫩者名櫻筍。(綱目)

性質 苦。澁。平。無毒。

主治 澀腸。止瀉痢。腸風。崩中帶下。及養血。

參攷資料 ●櫻櫚子有小毒。

載人喉。未可輕服。(陳藏器) ●櫻櫚子。澀。有大毒。不堪食。(李珣) ●櫻魚。皆有毒。不可食。而廣蜀人。蜜養。醃。以供佛。寄遠。蘇東坡。亦有食櫻筍詩。乃制去其毒爾。(李時珍)

【櫻櫚】即櫻櫚之俗名。詳「櫻櫚」條。

【櫻桑】即楸之古籍別名。典見瓊詩疏。詳「楸」條。

【楸聖】即華楸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「華楸」條。

【楸】即楸樹白皮之簡稱。詳「楸樹白皮」條。

【楸根白皮】即楸樹白皮之處方用名。詳「楸樹白皮」條。

【楸樹白皮】原名 香者名 楸名。香。臭者名。楸。山。處方用名 楸根白皮。臭。楸皮。香。楸皮。

古籍別名 大眼桐。(綱目) 虎目樹。山楸。虎眼。(綱目拾遺)

外國名詞 Alnus glandulosa, Desf.

基本 屬棟科香楸之根皮。

產地 陳仁山藥物生處辨云。楸白皮。產直隸西山齊寧地方。收成限於五月初一至十五日為止。過此時期。則難以剝削也。

形態 香楸為落葉喬木。高達三四丈。葉為羽狀複葉。小葉作平滑長橢圓形。前端尖。嫩時呈紅色。與枝俱有氣味。五六月間。開五瓣小白花。後結黃褐色鐘狀實。根皮厚。作淡褐色。內面有布紋。藥舖往往有以山茶花根皮混充者。



楸 樹 白 皮

採取 五月間。剝採木皮及根皮。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使楸根皮。須用不近西頭者。為上。採出。以生葱并蒸半日。剝細。以袋盛。掛屋南畔。陰乾。用。李時珍曰。楸樹木皮根。並刮去粗皮。陰乾。臨用時。切焙入用更佳。

性質 苦。澁。無毒。

十三畫 椿

效能 燥溼。清熱。瀉腸。固下。專作收斂藥。

主治 疝瘕。椿根尤良。

歷代記載攷證 【南北朝】雷

斅雷公炮炙論椿根白皮曰。利溺

溼。【唐】陳藏器本草拾遺論椿根

白皮曰。去口鼻疝蟲。殺蚊蟲疥瘻。

鬼疰傳尸。醫毒下血。及赤白久痢。

【唐】甄權四聲本草論椿根白皮

曰。得地檢。止疝痢。【宋】大明日華

諸家本草論椿根白皮曰。止女子

血崩。產後血不止。赤帶腸風。瀉血

不住。腸滑瀉。縮小便。蜜炙用。【元】

朱丹溪本草衍義補遺論椿根白

皮曰。治赤白濁。赤白帶。溼氣下痢。

精滑夢遺。燥下溼。去肺胃陳積痰。

【明】穆希雍本草經疏論椿根白

皮曰。椿味苦有毒。甄權言微熱。甄

享言涼而燥。然考其用。必是微寒

苦燥之藥。入手足陽明經。本經主

甘瀉及洗疥瘡風疽。藏器去口鼻

疝蟲疥瘻者。因腸胃有溼熱。故現

是證。苦涼而燥。所以外治皆得也。

藏器又主殺蚊蟲毒下血。及赤

白久痢。日華子主腸風瀉血。蕭炳

云得地檢主疝痢。孟詵云止女子

血崩及產後血不止。赤帶。皆取其苦能燥溼。寒能除熱。瀉能收斂之功耳。採得去粗皮蜜炙用。【明】李士材本草圖解論椿根白皮曰。椿

白皮苦而微溫。專以固攝為用。故瀉痢腸風。遺濁崩帶者。並主之。然必病久而滑。始為相宜。若新病蛋

服。強勉固澀。必變他症而成癘疾矣。凡用刮去粗皮。生用則能通利。酸醋炙即能固澀。

國外學說 英美學說謂臭椿產中國印度國。取該樹根皮。可為藥品。第藥肆中所出售者。則係此樹皮而非純根皮。其功用。能開胃收斂。驅蟲。處方以臭椿根皮一分。沸水二十分。泡兩點鐘。濾渣為度。每服一兩至二兩。【臭椿泡水方】

又臭椿鮮根皮汁三分。濃酒一分。和勻。候七天過淋紙為度。宜存陰涼處。每服二錢一分至三錢一分。【臭椿汁方】

配合應用 治下血經年。椿根白皮三錢。水一盞。煎七分。入酒半盞服。【存仁方】

治小兒疝痢困重者。用椿根白皮搗粉。以水和藥。作大饅餡子。

日曬少時。又搗如此三遍。以水煮熟。空腹吞七枚。重者不過七服。愈。【外臺秘要方】

治小兒疝疾。椿根白皮日乾二兩。為末。以粟米淘淨。研濃汁和丸。梧子大。十歲兒二四丸。米飲下。量大小加減。仍以一丸納竹筒中。吹入鼻內。二度良。【子母秘錄方】

治下利清血。腹中刺痛。椿根皮洗刮曬研。醋糊丸。梧子大。空心米飲下三四丸。【經驗方】

治產後腸脫不能收拾者。椿根取皮。焙乾一握。水五升。連根煎五莖。漢椒一撮。同煎至三升。去渣傾盆內。乘熱熏洗。冷則再煎。一服可作五次用。洗後睡少時。忌鹽酢醬麵發風毒物。及用心勞力等事。【婦人良方】

治女人白帶。椿根白皮。滑石等分為末。粥丸。梧子大。空腹白湯下一百丸。【丹溪方】

寇宗奭云。洛陽一女子。年四十六七。耽飲無度。多食魚蟹。音毒在臍。日夜二三十瀉。大便與膿血雜下。大腸連肛門痛不堪忍。醫以止血痢藥不效。又以腸風藥則益

一四四六

甚。蓋腸風則有血無膿。如此半年。氣血漸弱。食減肌瘦。服熱藥則腹愈痛。血愈下。服冷藥則注瀉食減。服溫平藥則病不知。如此半年。垂命待盡。或人教服人參散。一服知二服減。三服膿血皆定。遂常服之。而愈。其方治大腸風。遺飲酒過度。挾熱下痢。膿血痛甚。多日不瘳。用

椿根白皮一兩。人參一兩。為末。每服二錢。空心米飲調服。忌油膩。瀉麵。青菜。菓子。甜物。雞。豬。魚。羊。蒜。蕪等。

治休息痢疾。日夜無度。腥臭不可近。臍腹攪痛。東垣脾胃論用椿根白皮。訶黎勒各半兩。母丁香三十箇。為末。醋和丸。梧子大。每服五十九丸。米飲下。又用椿根白皮。東南行者。長流水內漂三日。去黃皮。稍為末。每一兩加木香二錢。粳米飯為丸。每服一錢二分。空腹米飲下。【唐瑤經驗方】

治水數下痢。及每至立秋前後。即患痢。兼腰痛。取椿根一大兩。搗篩。以好麴。炒作饅餡。如菓子大水煮熟。每日空心服十枚。並無禁忌。神良。【劉禹錫傳信方】

⑤治下利清血。腹中刺痛。梔根白皮洗刮。醋研。醋和丸。梧子大。每空心米飲下三四十九。一加蒼朮根。殺滅牛。(經驗方)

⑥治腸毒下痢赤白。用香椿洗刮取皮。日乾為末。飲下一錢立效。(經驗方)

⑦治濕毒下血。溫白丸。用椿根白皮去粗皮。酒浸。曬研。棗肉和丸。梧子大。每淡酒服五十九。或酒糊丸亦可。(儒門事親方)

⑧治血痢下血。臘月日未出時。取背陰地北引椿根皮。東流水洗淨掛風處。陰乾為末。每二兩入寒食麩一兩。新汲水丸。梧子大。陰乾。每服三十丸。水煮滾。傾出。溫水送下。忌見日則無效。名如神丸。(普濟方)

⑨治脾毒腸風。因營衛虛弱。風氣襲之。熱氣乘之。血滲腸間。故大便下血。用臭椿根。刮去粗皮。焙乾四兩。蒼朮米泔浸焙。枳殼麸炒各一兩。為末。醋糊丸。如梧子大。每服五十丸。米飲下。日三服。(本事方) 用量 錢半至三錢。 施用宜忌 凡陰虛而積滯未

盡者禁用。

參攷資料 ①椿根白皮性涼而能瀉血。凡溼熱為病。瀉痢濁帶。精滑夢遺諸證。無不用之。有燥下瀉及去肺胃陳痰之功。治泄瀉有除溼實腸之力。但痢疾滯氣未盡者。不可濫用。宜入丸散。亦可煎服。不見有害。予每用炒研糊丸。看病作湯使。名固腸丸也。(朱震亨) ②椿皮色赤而香。椿皮色白而臭。多服微利人。蓋椿皮入血分而性瀉。椿皮入氣分而性利。不可不辨。其主治之功。雖同。而瀉利之效。則異。正如茯苓芍藥。亦白頗殊也。凡血分受病不足者。宜用椿皮。氣分受病有鬱者。宜用椿皮。此心得之微也。乾坤生意治瘡腫下藥。用椿皮以無根水研汁。服二三碗。取利數行。是其驗矣。故陳藏器言。椿皮有小毒。蓋有所試也。(李時珍) ③椿梔易長而多壽考。故有椿栲之稱。莊子言大椿以八千歲為春秋。是矣。椿香而梔臭。故椿字又作櫛。其氣薰也。櫛字從康。其氣臭。人呵噓之也。櫛亦椿音之轉爾。藏器曰。俗呼椿為櫛。椿。北人呼櫛為山椿。江

東呼為虎目樹。亦名虎眼。謂葉脫處有痕如虎之眼目。又如櫛蒲子。故得此名。(李時珍) ④二木南北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香。可噉。櫛木疏而氣臭。膳夫亦能熬去氣。並採無時。櫛木最為無用。莊子所謂吾有大木。人謂之櫛。其木擁腫。不中繩墨。小枝曲拳。不中規矩者。爾雅云。櫛山櫛。郭璞註云。櫛似櫛。色小白。生山中。因名。亦類漆樹。俗語云。櫛櫛漆。相似如一。陸機詩疏云。山櫛與田櫛無異。葉狹爾。吳人以葉為茗。(蘇頌) ⑤櫛之有花者無莢。有莢者無花。其莢夏月常生。吳櫛上。未見椿上有莢者。然世俗不辨椿櫛之異。故呼櫛莢為椿莢爾。(掌禹錫) ⑥椿櫛乃一木三種也。椿木皮細肌實而赤嫩。葉香甘。可茹。櫛木皮粗肌虛而白。其葉臭惡。嫩年人或採食。櫛木即櫛之生山中者。木亦虛大。梓人亦或用之。然爪之如腐朽。故古人以為不材之木。不似椿木堅實。可入棟樑也。(李時珍) 【椿櫛莢子】 古籍別名 鳳眼草(綱目)

主治 腸風便血。小便下血。療骨鯁。

【椿櫛葉】 性質 苦。溫。有小毒。風疝。椿木根葉尤良。 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論椿櫛葉曰。白禿不生髮。取椿桃楸葉心。搗汁。頻塗之。

參攷資料 ①椿葉無毒。椿葉有小毒。(李時珍) ②椿櫛之嫩芽。淪食。消風祛毒。(生生編) ③椿芽多食動風。煎十二經脈。五臟六腑。令人神昏。血氣微。若和豬肉熱麵類食。則中滿。蓋纏絡也。(孟詵)

【楊氏子】 即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【楊妃垢】 即古鏡鑄之古籍別名。典見綱目。詳「古鏡鑄」條。

【楊妃粉】 產地 出陝西西安府馬嵬坡上。去淨土三尺。再下有此粉。膩滑光潔。 主治 拭面去黧點。雀斑。美顏色。

【楊果】 即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【楊栢】 即白朮之古籍別名。典見

綱目詳「白朮」條。

【楊柳】即柳之古籍別名。與見綱目。詳「柳」條。

【楊桐】即南天燭之古籍別名。與見綱目。詳「南天燭」條。

【楊家果】即楊梅之古籍別名。與見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【楊梅】 命名 本品形如水楊子而味酸似梅故名。

古籍別名 杭子(綱目)火寶。火齊。金丸。楊果。龍睛。楊氏子。楊家果。鶴頭紅。鶴頂紅。日精。曹公。(和漢藥考)

外國名詞 Myrica rubra, Son (拉丁)

基本 屬楊梅科。為楊梅之果實。

產地 凡山野川谷間恒有產焉。

形態 楊梅為常綠樹。產暖地。寒冷處鮮有之。樹高二丈餘。葉作倒卵圓形。或長橢圓形。彼此互生。初夏開褐色小花。雄雌異株。而生。入秋則結核果。球形。色帶白。或紅紫。大三四分許。外有無數之乳頭突起。厥狀頗似蛇莓。味酸甘。樹

皮頗厚。外現黃灰黑色。有縱裂之淺溝。內作暗褐色。味具收斂之性。入水煎之。則得紅褐色之液汁。其中含有鞣酸及黃色素等。



楊梅

採取 五月採實。

性質 酸。甘。溫。無毒。

效能 用為收斂藥。及調氣和胃藥。

主治 鹽藏食。去痰。止嘔。噦。消食。下酒。乾作屑。隨飲酒時服方寸匕。止吐酒。

歷代記載攷證 【宋】孟詵食療本草論楊梅曰。止渴和五臟。能

滌腸胃。除煩。積。惡氣。燒灰。服。斷下痢。甚。驗。鹽者。常含一枚。咽汁。利五臟。下氣。【清】王士雄。隨息居。飲食譜。論楊梅曰。楊梅。甘。酸。溫。宜。齋。鹽。少。許。食。析。醒。止。渴。活。血。消。痰。滌。腸。胃。除。煩。積。惡。氣。鹽。藏。蜜。漬。酒。浸。糖。飯。為。膳。為。乾。消。食。止。痢。大。而。純。甜。者。勝。多。食。動。血。酸。者。尤。甚。諸。病。快

熱者忌之。

國外學說 本草食醫曰。楊梅實。氣。味。酸。甘。溫。無。毒。主。治。消。食。止

嘔。及。渴。滌。腸。胃。除。積。氣。又。大。和。本。草。曰。楊。梅。五。月。實。熟。實。大。色。紫。黑。

味甘。美。本。草。云。鹽。藏。食。之。能。去。痰。止。嘔。噦。消。食。下。酒。常。含。鹹。楊。梅。一

枚。利。咽。汁。五。臟。下。氣。人。家。多。儲。之。配。合。應。用 治。下。痢。不。止。用

楊。梅。燒。研。每。米。飲。服。二。錢。日。二。服。(普濟方)

治。頭。痛。不。止。楊。梅。為。末。以。少。許。啜。鼻。取。曉。妙。

治。頭。風。作。痛。楊。梅。為。末。每。食。後。薄。荷。茶。服。二。錢。或。以。酒。風。散。同

煎。服。或。同。搗。末。以。白。梅。肉。和。丸。彈。子。大。每。食。後。葱。茶。嚼。下。一。丸。(朱

氏。集。驗。方)

治。一。切。損。傷。止。血。生。肌。令。無。瘰。癧。用。鹽。藏。楊。梅。和。核。搗。如。泥。做

成。錠。子。以。竹。筒。收。之。凡。遇。破。傷。研。末。傳。之。神。聖。絕。妙。(經驗方)

參攷資料 楊梅生江南。廣

南山。谷。樹。若。荔。枝。樹。而。葉。細。陰。青。子。形。似。水。楊。子。而。生。青。熟。紅。肉。在。核。上。無。皮。壳。四。月。五。月。採。之。南。人

醃。藏。為。果。寄。至。北。方。(馬。志) 楊

梅。樹。葉。如。龍。眼。及。紫。葉。香。冬。月。不。凋。二。月。開。花。結。實。形。如。楮。實。子。五

月。熟。有。紅。白。紫。三。種。紅。勝。於。白。紫。勝。於。紅。類。大。而。核。細。鹽。藏。蜜。漬。糖

收。皆。佳。東。方。朔。林。邑。記。云。邑。有。楊。梅。其。大。如。盃。盤。青。時。極。酸。熟。則。如

蜜。用。以。釀。酒。致。為。梅。香。耐。甚。珍。重。之。寶。寶。物。類。相。感。志。云。葉。上。接。楊

梅。則。不。酸。楊。梅。樹。生。刺。以。甘。草。釘。釘。之。則。無。害。物。理。之。妙。也。(李。時

珍) 熱。毒。久。食。令。人。發。熱。根。齒。及。筋。冠。生。葱。同。食。(法。救)

【楊梅青】即空青之古籍別名。與見綱目。詳「空青」條。

【楊梅核仁】 採取 以枋漆自製。取仁用。

主治 即氣。

【楊梅樹皮及根】 主治 煎湯洗疥癬。

歷代記載攷證 【明】李時珍

本草綱目。論。楊。梅。樹。皮。及。根。曰。煎。水。漱。牙。痛。厚。之。解。破。毒。燒。灰。油。調。塗。湯。火。傷。

【楊梅樹皮及根皮】

主治 煎湯

洗瘡疥癬。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論楊梅樹皮及根皮曰。煎水漱牙痛。服之解瘡毒。燒灰油。塗湯火傷。

配合應用 ①治中痰毒。心腹

絞痛。欲吐不吐。百背肢冷。用楊梅樹皮煎湯二三盞。服之即愈。(王頌馬簡方)

②治風毒牙痛。用楊梅根皮厚

者焙一兩。川芎五錢。麝香少許。研末。每用半錢。鼻內暗之。口中含水。滄出痛止。(普濟方)又用楊梅

根皮。韭菜根。研末。上油泥等分。搗勻。貼於兩眼上半時辰。其毒從眼角出也。屢用有效之方。(摘要方)

【楊溪瓜】即西瓜之秋生冬熟者。

功效較尋常西瓜良。詳『西瓜』條。

【楊槿】

古籍別名 空疏。(唐本草)

外國名詞 Diorville japonica, DC. (拉丁)タニウツギ

ベニウツギ(日本) 基本 係忍冬科楊槿屬。爲楊

槿

十三畫 楊槿

槿之葉。

產地 生山野及籬垣間。

形態 楊槿爲灌木類之落葉木。高六七尺餘。葉大。對生。卵形而尖。有鋸齒。下面生毛。六月間開

花。合瓣花序。甚長。帶赤色。花冠之筒上部膨大。花柱亦長。而略短於花冠。雄蕊五。雌蕊一。常以數花攢簇而生。結實爲蒴果。其葉可供藥用。



楊槿

性質 苦寒。有毒。

主治 疽瘰。惡瘡。水煎汁洗之。

立瘥。

【楊槿耳】

基本 本品係楊槿木上所生之木耳。

性質 平。無毒。

主治 老血結塊。破血止血。煮服之。

服之。

【楓人】即楓香脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓子鬼】即楓香脂之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓上寄生】

原名 風木藤。古籍別名 吊

殺。樹藤。上樹。樹藤。鐵角藤兒。(綱目拾遺)

基本 係屬漆樹科。爲楓樹枝

節處附着之寄生植物。

形態 楓上寄生。即楓樹間之

蔓藤。年遠結成連珠如傀儡者。可供藥用。

主治 追風。蒸酒服。爲治癱瘓

勾急之要藥。同金雀根。土當歸。石

牀花根。石蠶蒸酒服。

【楓木上絲】即楓果之別名。與見

綱目。詳『楓果』條。

【楓木皮】

性質 辛。平。有小毒。

主治 止水。煎飲。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論楓木皮曰。止水。煎飲。冷風。煎湯浴之。

參攷資料 楓皮性澀。能止水

痢。蘇恭云。下水腫。水腫非溼。藥所

療也。(陳藏器)

【楓皮】即楓香脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓乳】即楓香脂之古籍別名。與

見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓果】

原名 楓實。本品即楓樹所

結之果實。故名。古籍別名 槲子。路路通。(綱目拾遺)

九空子(俗名)

形態 楓果外有刺球如栗殼。內有核。多孔隙。如蜂巢。可供藥用。

採取 以產浙江臨安及安樂

山者良。入藥尤以無蟲。陳久者用。

主治 辟瘴。御瘴。明目。除濕。舒

經絡。拘攣。周身痺痛。手足及腰痛

焚之。嗅其烟氣。皆愈。薰衣被。可除

五。

配合應用 ①治癩。楓木上絲

十個。燒灰存性。白朮五錢。共末。香

油。擦上即愈。(德勝堂方)

②治酸毒。路路通一個。煨存性。

研末。酒煎服。(古今良方)

參攷資料 楓果俗名路路通。

村。經管於髮。云可明目。宜老焚之。

香。郁可燻衣。辟邪。出雲南者。焚之

殺鬼。去邪。辟瘴。而其性大能通

十二經穴。故治水腫。眼用之。以其

能逐伏水也。(綱目拾遺)

【楓香果】即楓果之別名。詳『楓

果」條。

【楓柳皮】

產地 寄生楓樹間。形態 楓柳為寓木

類之一種。其葉似槐。莖赤根黃。結實六月成熟。色綠而細。其莖皮剝取可供藥用。

性質 辛。大熱。有毒。

主治 風濕齒痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論楓柳皮曰。積年痛風不可忍。久治無效者。細剝焙。不限多少。入麝膠浸酒常服。以醉為度。

【楓香脂】

命名 本品乃楓樹之脂。色白氣香。其狀如膠。故又謂之白膠香。

古籍別名 白膠香(綱目)須

蔭折羅婆香(金光明經)楓脂。楓乳。楓人。楓皮。楓子。鬼。雲香。(和漢

藥考)攝攝(爾雅)香楓(俗名)

外國名詞 Musick (拉丁)

(德) Masticha. (英)

基本 屬漆樹科。為楓樹枝幹

損傷處其脂滲出凝結之塊。

產地 凡中國南方及南歐北

非等處之山野岩谷間。恒有生焉。

形態 楓為灌木。產於中國

及南歐。北非等處。高一丈至丈五。葉為羽狀複葉。小葉形如披針。或為長卵圓形。葉腋開極小之花。形狀似房。後結小果。其成熟者作紅褐色。其香脂作顆粒。小者如芝麻。大者若小豆。形橢圓或卵圓。色黃似枸橼。微透明。有時亦作灰褐等色。比重約一。〇七四。質脆弱。破碎之面。光澤若玻璃。遇熱則發臭。頗似拔爾撒謨。咀嚼之。覺似蠟。其味苦。

採取 五月斫樹為坎。十一月探之。

製法 李時珍曰。凡用以醫水黃二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

用法 恒以剉末和作丸散。

性質 辛苦。平。無毒。

成分 含有瑪斯知克酸約九十分。及瑪斯知涅約十分。前者酒精能溶解。後者酒精不能溶解。

效能 調氣血。消癰疽。止吐衄。

治瘡疥。用作收斂藥。為外科要藥。

主治 癩癧。風痒。浮腫。燙水浴之。又生齒痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論楓香脂曰。一切癰疽瘡疥。金瘡。吐衄。咯血。活血。生肌。止痛。解毒。燒過措牙。永無牙疾。【明】穆希雍本草經疏論楓香脂曰。楓香脂味辛苦。氣平無毒。為活血涼血之藥。凡熱則生風。又血熱則壅而發癰。癰風為木化。風火相搏。則為浮腫。苦平能涼血熱。兼辛又能散風。故主血熱生風之證。風火既散。則肌肉和而浮腫自消。齒痛亦因風熱上攻。風熱既散。則痛自止矣。【清】黃宮繡本草求真論楓香脂曰。楓香係楓存脂所成。結而為香。故曰楓香。又曰白膠香。按楓性最疎通。故木易蛀。外科用以透毒。金瘡末敷即效。筋斷即續。齒頰腫痛。燒灰措牙甚工。咳唾膿血。同藥服之即止。皆取透發病氣之意。故能見其皆治也。以藥水煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

化為樹脂。惟此藥並無凝固。蛋白質及膠質之性。又手板發數日。日本之有楓樹。始自享保間。乃中國種也。葉大。可四五寸。有三尖。夏末結實。名楓林。楓香脂其樹脂也。名白膠香。或單稱白膠。亦曰鹿角膠。

配合應用 治吐血不止。白膠香為散。每服二錢。新汲水調下。

(簡要治家方)

治吐血衄血。白膠香。蛤粉等分。為末。姜汁調服。(王璠百一選方)

治吐血咯血。用白膠香。銅青各一錢。為末。入乾柿內。紙包。煨熟。食之。(濟安方)又用白膠香。切片。炙黃一兩。新綿一兩。燒灰。為末。每服一錢。米飲下。(聖惠方)

治金瘡。筋斷。用楓香末。傅之。(危氏得效方)

治便癰。膿血。白膠香一兩。為末。入麝香。輕粉。少許。摻之。(袖珍方)

治小兒奶痘。生面上。用楓香為膏。攤貼之。(活幼全書方)

治瘰癧。瘰癧。白膠香一兩。化開。以蓖麻子六十四粒。研入。待成

效。在於樹脂酸類。與其揮發油之

膏攤貼之(儒門事親方)

①治諸瘡不合白膠香、輕粉、各二錢。豬脂和塗。(直指方)

②治一切惡瘡。水沉金絲膏。用白膠香、瀝青各一兩。以麻油、黃蠟各二錢半。同溶化。入冷水中。扯干。攤貼之。(儒門事親方)

③治惡瘡疼痛。楓香、膩粉等分。為末。漿水洗淨貼之。(壽親養老書方)

④治久近癰疽。白膠香為末。以酒瓶上第葉夾末貼之。(袖珍方)

⑤治小兒疥癬。白膠香、黃蘗、輕粉等分。為末。羊骨髓和傅之。(儒門事親方)

⑥治大便不通。白膠香、牛黃、大鼠糞二枚。研勻。水和作挺。納入肛門。良久自通。(普濟方)

⑦治年久牙疼。楓香脂為末。以香爐內灰和勻。每日搽擦。(危氏得效方)

⑧治魚骨哽咽。白膠香細細香之。(聖惠方)

用量 八分至一錢半。
應用宜忌 凡無瘡滯者禁用。
參攷資料 ①楓香松脂皆可

十三畫 楓

槲 楔 楸 楸 楚 楮

亂乳香。但楓香微白黃色。燒之可見真偽。(寇宗奭) ①楓香松脂皆可亂乳香。其功雖次於乳香。而亦彷彿不遠。(李時珍) ②今南方及閩陝甚多。樹甚高大。似白楊。葉圓而作歧。有三角而香。二月有花白色。乃連着。實大如鴨卵。八月九月熟時。曝乾可燒。南方草木狀云。楓實惟九真有用之。有神。乃難得之物。其脂為白膠香。五月斫為坎。十一月採之。說文解字云。楓木厚葉弱枝善搖。漢宮殿中多植之。至霜後。葉丹可愛。故稱楓宸。任昉述異記云。南中有楓子鬼。木之老者為人形。亦呼為蠟楓。蓋瘡癩也。至今越巫有得之者。以醮刺鬼神。可致蠟異。(蘇頌) ③王瓊軒輯本紀云。黃帝殺蚩尤於黎山之邱。釋其械於大荒之中。化為楓木之林。爾雅注云。其脂入地。千年為琥珀。(韓保昇) ④楓木枝幹修幹。大者連數圍。其木甚堅。有赤有白。白者細膩。其實成穗。有柔刺。穢含言楓。實惟出九真者。不知即此楓否。孫炎爾雅正義云。楓子鬼。乃攝木上寄生。枝高三四尺。天旱以泥塗之。



樹 楓

即雨也。荀伯子臨川記云。嶺南楓木。歲久生瘡。如人形。遇暴雷大雨。則暗長三五尺。謂之楓人。宋齊丘化書云。老楓化為羽人。數說不同。大抵癭瘤之說。猶有理也。(李時珍)

【楓寄生】即楓上寄生之簡稱。詳【楓上寄生】條。

【楓脂】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳【楓香脂】條。

【楓脂香】即蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蘇合香】條。

【楓菌】 性質 有毒。
參攷資料 楓菌食之。令人笑不止。地漿解之。(陶弘景)

【楓實】即楓果之原名。詳【楓果】條。

【楓樹根及葉】 主治 癰疽
已成。搗酒飲。并以淨貼之。

【槲棗】即君遷子之古籍別名。典見千金食治。詳【君遷子】條。

【楸】即櫻桃之別名。典見爾雅。詳【櫻桃】條。

【楸】即木瓜之古籍別名。典見綱目。詳【木瓜】條。

【楚烏】即烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳【烏鴉】條。

【楚雀】即鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳【鶯】條。

【楚菴】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳【萊菔】條。

【楚菴子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【萊菔子】條。

【楚葵】即水芹菜之古籍別名。典見爾雅。詳【水芹菜】條。

【紫菀】即紫菀之古籍別名。典見爾雅。詳【紫菀】條。

【楚鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳【斑鳩】條。

【楚衡】即杜若之古籍別名。典見廣雅。詳【杜若】條。

【楚實】即杜若實之古籍別名。典見綱目。詳【杜若實】條。

【楮】即杜荊實之古籍別名。典見綱目。詳【杜荊實】條。

【楝實】即烏梅之古籍別名。典見本經。詳『烏梅』條。

【棟子】即金鈴子之古籍別名。典見本經。詳『金鈴子』條。

【棟參】即人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。

【棟連】即黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃連』條。

【楞葱】即沙葱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙葱』條。

【楠木】命名。本品乃南方之木故名。

古醫別名 楠(綱目)交讓木。(植物學大辭典)假柏南(俗名)

外國名詞 Machilus Nan-nu, Honml. (拉丁)ナンボク

(日本) 係樟科大樟屬。藥用楠之枝葉。

產地 生於蜀諸地之山中。

形態 楠木為香木類之常綠喬木。幹直立。高者十餘丈。童叢如蓋。葉長橢圓形。新舊迭生。花開淡綠色。或赤黃色。結實紫黑。如丁香木色。赤者堅。白者脆。密發芳香。可供棟梁器具之用。枝葉可供藥用。



木 楝

性質 辛。微溫。無毒。

主治 霍亂吐下不止。煮汁服。

歷代配伍攷證 【宋】大明諸家本草論楠木材與枝葉曰。煎湯洗轉筋及足腫。枝下同功。

【楠木皮】性質 苦。溫。無毒。主治 霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。并宜煎服。

【榆仁醬】古醫別名 營醢。(綱目)

採取 以陳久者入藥用。

製法 李時珍曰。造法。取榆仁水浸一伏時。袋盛。揉洗去泥。以麥汁拌晒。如此七次。同發過麵麴如造醬法。下鹽晒之。每一升麴四斤。鹽一斤。水五斤。

性質 辛。溫。無毒。

主治 利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。

【榆白皮】古醫別名 零榆皮。(本經)白者名粉山

採取 二月採皮。取白。曝乾。製法 去粗皮。取白。剉焙用。性質 甘。平。滑。利。無毒。

榆。(綱目)刺榆。(爾雅)

外國名詞 Dini Corsok (Yeha Bark)

基本 屬榆科。為春榆之枝皮。形態 春榆為落葉喬木。多生於寒溼之地。老樹幹高十丈。周圍可一丈五尺。小樹之分枝向上。大樹則下垂。葉互生。作橢圓或倒卵圓形。末端尖。底部狹窄如楔。邊緣有重鋸齒。大葉長三寸半。闊二寸。半面深綠。背淡綠。脈上有細軟毛。花先新葉而開。大約三四月間。已簇生暗紫綠色之小花。花冠作鐘形。邊緣有四裂至八裂。單性花及兩性花俱有之。果實扁圓。大三四分。有似膜之翅。中藏扁平之種子。本品為榆樹之內皮。色白。作扁平之長片。味帶收斂性。

採取 二月採皮。取白。曝乾。製法 去粗皮。取白。剉焙用。性質 甘。平。滑。利。無毒。



皮 白 榆

效能 淨溼熱。通二便。用作利水及祛痰藥。

主治 大小便不通。利水道。除邪氣。久服斷穀。輕身不饑。其實尤良。(本經)療腸胃邪熱氣。消腫。治小兒頭疔疔疔。(別錄)

歷代配伍攷證 【唐】甄權藥性本草論榆白皮曰。滑胎。利五淋。治胸喘。痰不眠。【唐】孟詵食療本草論榆白皮曰。生皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉

劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

國外學說 英美學說謂榆皮。產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可為藥品。能作瀉劑。其味甘。平。滑。利。無毒。能治小兒頭疔疔疔。及一切瘡毒。其皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚。傳瀉痞。【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利國竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿。及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤榆皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損真耳。

類。利小便。作漿及煮水服之。治水蠟類。外用能作潤皮劑。解炎。鬼方。以榆皮一分切片。沸汽水十六分。共入有蓋器內。浸二點鐘。濾渣。外用能治大頭瘡。火眼。每服二兩至四兩。(榆皮漿方)又荷蘭藥鏡云。春日採榆樹細枝。去外面之粗皮。用裏面之白皮。惟過於細嫩之梢。枝無效。藥舖清雅云。進口貨之榆白皮。非純白皮。乃連外皮售之。其功效。皮性收澀。為愈瘡。發汗之良藥。凡疥癬。乾癬等不甚經久之症。並一切皮膚病。用之極有特效。或異常頑惡險重之疥癬。雖用水銀劑及吐瀉法而不治者。用此則愈。方用榆皮八查斯水四磅。煎至減半。去滓。每日早晚服八查斯。連服數日。煎時須侵火久熬。令不甚稠。黏名榆皮排毒煎。某醫云。患乾癬。頑癬。禿瘡。惡毒頭瘡。雁瘡等經久之頑固皮膚病。用對症之藥劑不效。煎水銀吐瀉法不治者。改用此藥。無不有效。已治愈者。難僕指算。予用此方。略有加減。方用榆白皮四查斯水四磅。煎至減半。令服。但服後往往大便結。故時時兼用

十三畫 榆

緩下劑。又此藥煎濃。則藥汁稠黏。味惡難服。須如前述。則稍帶收斂之味。已耳。若製成越幾斯劑。收斂極甚。服此藥而奏效者。初時瘡反加甚。須久服乃逐漸乾愈。世人每求速效。故旋服旋輟。果能持之以恆。耐心守候。則無不應驗。如神。惟受毒已深者。即幸而治愈。終恐復發。防過之法。宜每逢春秋。連服前方數日。庶其毒可除淨也。

配合應用 ①斷殺不爛。榆皮、榆皮為末。日服數合。(救荒本草方)

①治胸喘不止。榆白皮。陰乾。焙為末。每日旦夜用水五合。末二錢。煎如膠服。(食療本草方)

②治久嗽欲死。許明則有效方。用厚榆皮。削如指大。長尺餘。納喉中。頻出入。畜吐膿血而愈。(古今錄驗方)

③治虛勞白濁。榆白皮二升。水用三斗。煮取五升。分之五服。(千金方)

④治小便氣淋。榆枝、石燕子。煎水日服。(普濟方)

⑤治五淋澀痛。榆白皮。陰乾。焙

研。每以二錢。水五合。煎如膠。日二服。(普濟方)

⑥治渴而尿多。非淋也。用榆皮二片。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服之。甚效。(外臺祕要方)

⑦治身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥食之。小便良。(備急方)

⑧治臨月易產。榆皮焙為末。隨月日三服。方寸匕。令產極易。(陳承本草別說方)

⑨治墮胎下血不止。用榆白皮。當歸焙各半兩。入生薑水煎服之。(普濟方)

⑩治胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮黃汁服二升。(子母祕錄方)

⑪治身首生瘡。榆白皮末。油和塗之。蟲當出。(子母祕錄方)

⑫治火灼爛瘡。榆白皮嚼塗之。(千金方)

⑬治五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可輕視。以榆白皮末。鷄子白和塗之。(千金方)

⑭治小兒蟲瘡。榆皮末。和豬脂塗綿上覆之。蟲出立瘥。(千金方)

⑮治難疽發背。榆皮白皮切。清水洗搗極爛。和香油傳之。留頭出氣。燥則以苦茶類。不黏更換。新者。將愈以桑葉嚼爛。隨大小貼之。口合乃止。神效。(救急方)

⑯治小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封之。頗易。(必效方)

⑰治小兒禿瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

⑱治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

⑲治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

⑳治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉑治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉒治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉓治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉔治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉕治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

㉖治小兒瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

十三畫 榆 榔 楮

云。榆。澆命柔故謂之榆。其粉則有分之。故謂之粉。其莢。飄零。故曰零榆。(李時珍)此即今之榆。樹取皮刮去上赤皮。亦可臨時用之。性至滑利。初生莢仁。以作糜羹。令人多睡。嵇康所謂榆令人眠也。(陶弘景)榆三月實熟。尋即落矣。今云八月採實。恐誤也。(蘇恭)江東無大榆。有刺榆。秋實。故經云。八月採者誤也。刺榆皮不滑利。(陳藏器)榆三月生莢。古人採仁以糜羹。今無復食者。惟用陳老實作醬耳。按爾雅疏云。榆類有數十種。葉皆相似。但皮及木理有異耳。刺榆有針刺如栝。其葉如榆。淪為蔬羹。滑於白榆。即爾雅所謂楸莖。詩經所謂山有樞是也。白榆先生葉。却着莢。皮白色。二月剝皮。刮去粗殼。中極滑白。即爾雅所謂榆白粉是也。荒歲。農人取皮為粉食之。當糧。不損人。四月採實。(蘇頌)那昂爾雅疏云。榆有數十種。今人不能盡別。惟知莢榆。白刺榆。榔榆。數者而已。莢榆。白榆。皆大榆也。有赤白二種。白者名粉。其木甚高大。未生葉時。枝條間先生榆莢。

形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茶。莢葉而長尖。艸潤澤。嫩葉。燒浸。淘過。可食。故內則云。董宣粉榆。免蕪。滲瀉。以滑之。三月採榆錢。可作羹。亦可收至冬。釀酒。淪過。晒乾。可為醬。即榆仁醬也。崔實月令。謂之醬榆。昔牟侑者是也。山榆之莢。名蕪莢。與此相近。但味稍苦耳。諸榆性皆屬地。故其下五穀不植。古人春取榆火。今人採其白皮為榆麵。水調和香劑。黏滑勝於膠漆。承曰。榆皮。溼搗如糊。用黏瓦石。極有力。汴洛人。以石為確。用此膠之。(李時珍)

【榆耳】 基本 本品即係榆樹上之木耳。
採取 八月採之。
主治 令人不飢。
參攷資料 八月榆樞。以美酒漬曝。同青梁米。紫菀。煎。蒸熟。為末。每服三撮。酒下。令人辟穀不飢。(淮南萬畢)

【榆花】 主治 小兒癩疾。小便不利。傷熱。
性質 微辛。平。無毒。

【榆莢仁】 主治 作糜羹。食令

人多睡。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論榆仁曰。主婦人帶下。和牛肉作羹食。唐孟詵食療本草論榆仁曰。子齊似蕪莢。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹間惡氣。卒心痛。塗諸瘡。癬。以陳者良。

【榆葉】 性質 甘平。滑利。無毒。主治 嫩葉作羹。及燻食。消水腫。利小便。下石淋。歷丹石。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論榆葉曰。煎汁洗酒。皸鼻。同酸漿仁等分。蜜丸。日服。治癩熱。虛勞不眠。
參攷資料 榆葉。曝乾。為末。淡鹽水。拌。或炙。或曬乾。拌菜食之。亦辛滑下水氣。(李時珍)

【榔木】 古籍別名 吻頭。(拾遺) 鴿不踏。(綱目)
外國名詞 Aralia sinensis, (拉丁) タラノキ(日本)

基本 係五加科榔木屬。藥用榔木之白皮。
產地 生山野間。
形態 榔木為灌木類之落葉木本。幹高丈餘。莖與葉有銳刺。葉

木本。幹高丈餘。莖與葉有銳刺。葉

一四五四

為二回羽狀複葉。小葉甚多。卵形。花小。白色。花五瓣。雄蕊與花瓣同數。互生。圓錐花序。嫩枝。嫩葉。有芳香。



木 楮

性質 辛。平。有小毒。
主治 水瘡。黃汁服。

參攷資料 榔木白皮。能爛齒牙。有蟲者。取片許。內牙中。當自爛落。(陳藏器)

【榔】 即蕪莢之木幹。生於山中。狀似榆葉。圓而厚。皮有細刺。性質效能。與其子實無異。詳「蕪莢」條。
【楮耳】 基本 本品即係榔樹上之木耳。
主治 功同木耳。

【楮李】 即鼠李子之古籍別名。與見錢氏。詳「鼠李子」條。
【楮桃】 即楮實子之古籍別名。與見集簡方。詳「楮實子」條。

【楮紙】 命名 本品係用楮皮製成之紙。故名。

性質 甘平無毒。

主治 止吐衄血痢。婦人血崩。月經不絕。產後血暈。金瘡出血。

【楮葉】

性質 甘涼無毒。主治 小兒身熱。食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論楮葉曰。治鼻衄。數升不。斷者。搗汁三升。再三服之。良久即止。嫩茹之。去四肢風痺。及赤白下痢。【唐】甄權藥性本草論楮葉曰。炒研搜麵。作為餛飩食之。主水痢。

【宋】大明諸家本草論楮葉曰。治刺風身癢。【明】李時珍本草綱目論楮葉曰。利小便。去風溼。腫脹。白濁。疝氣。瘡瘡。

【楮實子】 原名 穀實。命名 楮。本作杓。其皮可積為紵故也。又楚人呼乳為穀。因木中白汁如乳故者。

古籍別名 穀實(別錄)穀桑(陸機詩疏)楮桃(綱目)穀(圖經本草)斑殼(唐本草)

學名 Broussonetia Kesi-noki Sieb. 基本 係屬桑科楮樹之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。楮實子產江蘇蘇州之山野間。七月新。

形態 楮為落葉灌木。高五六尺。葉類桑而面粗糙。長四五寸。邊緣有細鋸齒。花為單性。雌雄異株。雄花長寸許。花穗下垂。呈黃白色。雌花相聚作球狀。呈紫色。實大寸許。類蛇莓(Indianstrawberry)熟則作紅色。樹皮為製紙原料。



楮實子

採取 構樹花。數歲人採食。以充饑。楮實牛熟時。採取蜜煎。可作果食。楮樹嫩芽。採之。可當菜茹。楮實子成熟時。色深紅。每年八九月採之。

製法 雷斅曰。採得後。水浸三日。攪旋投水。浮者去之。曬乾。以酒浸一伏時。了蒸之。從巳至亥。焙乾。用。又經驗方。煎法。六月六日。取穀子五升。以水一斗。煮取五升。去滓。

微火煎如錫用。性質 甘寒無毒。效能 消水腫。壯筋骨。明目。輭堅。用作強壯藥。

聖治 陰接水腫。益氣充肌。明目。久服不飢。不老輕身。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論楮實子曰。壯筋骨。助陽氣。補虛勞。又健腰膝。益顏色。【明】繆希雍本草經疏論楮實子曰。楮實味甘氣寒無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入足太陰經。其主水腫。益氣充肌膚者。脾為土臟。而主肌肉。脾虛則肌肉不充。土虛則水溼泛溢。甘為土化。能入脾堅土。則水腫消。肌肉充氣自益矣。明目者。目得血而能視。脾旺自能生血也。陰痿者。精氣竭也。脾實則能生精。而瀆注於腎。故陰自強也。補脾益氣。則五臟皆實。不饑耐老。輕身。是其驗矣。【明】李士材本草圖解論楮實子曰。楮實甘平。益腎助陽。療腫去水。能軟骨治痺。【清】黃宮繡本草求真論楮實子曰。楮實香育味甘氣寒。雖於諸臟。陰血有補。得此顏色。潤筋骨。壯腰膝。健肌肉。充水。

腫消。以致陰痿起。陽氣助。是明指其陽旺陰弱。得此陰血有補。故能使陽不勝而助之。非云陽痿由於陽衰。得此可以助陽也。若以純陰之品。可以補陽。則於理甚不合矣。况書又云。骨硬可用楮實煎湯。以服。及紙燒灰存性。調服。以治血崩血暈。並用衙門牌紙燒香。以斷婦人生育。與脾胃虛人禁用。久服令人骨痿。豈非性屬陰寒。虛則受其益。過則增其害之意乎。曠骨之說。未嘗不是。取浸水中不浮者。酒蒸用。

配合應用 治水氣蠱脹。楮實子丸。以潔淨府。用楮實一斗。水三升。熬成膏。茯苓三兩。白丁香一兩。半為末。以膏和丸。梧子大。從少至多。至小便清利。服減為度。後服治中湯。養之。忌甘苦酸補及發動之物。(活法機要方)

治女子月經不絕。來無時者。取案紙三十張。燒灰。以清酒半升。和調服之。頓定。膠中血暈服之。立驗。已斃者。去板齒。灌之。經一日亦活。(劉禹錫傳信方)

治鮮溼癢。用楮葉搗爛。傅上。

十三 蠶 楮

(聖惠方)

① 治天行病後兩脇脹滿。臍下如水腫。以穀枝汁。隨意服愈。(外臺祕要方)

② 治鼻衄。小分輒出。楮葉取汁飲三升良。(肘後方)

③ 治小兒下痢赤白。作渴。得水又嘔逆者。搗葉炙香。以飲漿半升。浸至水綠。去葉。以木瓜一箇。切內汁中。煮二三沸。去木瓜。細細飲之。(子母祕錄方)

④ 治通身水腫。楮枝葉煎如飴。空腹服一匕。日三服。(聖惠方)

⑤ 治肝熱生翳。楮實研細。食後蜜湯服一錢。日再服。(直指方)

⑥ 治金瘡出血。用穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑦ 治喉痺喉風。五月五日。或六月六日。七月七日。採楮桃陰乾。每用一個。爲末。井華水服之。重者兩個。(集簡方)

⑧ 治身面石疽。狀如瘰癧。而皮厚。穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑨ 治金瘡出血。用穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑩ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。(衛生易簡方)

用薑一錢至四錢。施用宜忌。凡脾胃虛寒者禁用。

著名方劑。還少丹。大補心腎。治發熱盜汗。遺精白濁。及真氣虧損。肌體羸瘦。枝節倦怠等症。(楊氏方) 山藥。牛膝。遠志。萸肉。茯苓。五味子。楮實子。巴戟。(酒浸去心) 菴蓉。(酒浸一宿) 菖蒲。杜仲。(姜汁酒同炒拌) 茴香。各一兩。枸杞。熟地。各二兩。共爲末。煉蜜同棗肉糊丸。梧子大。每服三十丸。溫酒或淡鹽湯下。日三服。

參攷資料 ① 仙方單服。其實

正赤時。收子陰乾。篩末。水服二錢。七。乃佳。抱朴子云。梓木實赤者。服之。老者成少。令人徹視。見鬼神。道士梁須年七十。服之。更少壯。到百四十歲。能行及走馬。(蘇頌) ② 別錄載。楮實功用。大補益。而修眞。祕旨。嘗言。久服。令人成骨。軀之。瘳。濟生。祕覽。治骨。哽。用。楮。實。煎。湯。服。之。豈。非。軀。骨。之。徵。乎。按。南。唐。書。云。烈

祖食。餒。喉。中。啞。國。醫。莫。能。愈。吳。廷。紹。獨。請。進。楮。實。湯。一。服。疾。失。去。羣。醫。他。日。取。用。皆。不。驗。吳。廷。紹。答。云。啞。因。甘。起。故。以。此。治。之。愚。謂。此。乃。治。骨。哽。堅。軀。之。義。爾。羣。醫。用。治。他。噎。故。不。驗。也。(李時珍) ③ 楮。楮。兩。樹。易。生。葉。多。澀。毛。南。人。剝。皮。持。煮。造。紙。亦。緝。練。爲。布。不。堅。易。朽。裴。淵。廣州。記。言。蠻。夷。取。穀。皮。熟。醃。爲。褐。裏。厨。布。以。擬。毡。甚。煖。也。其。木。腐。後。生。菌。耳。味。甚。佳。好。(許慎) ④ 陸。璣。詩。疏。云。楮。幽。州。謂。之。穀。桑。或。曰。楮。桑。荆。揚。交。廣。謂。之。穀。蘇。頌。⑤ 陸。佃。埤。雅。作。穀。米。之。穀。訓。爲。善。者。誤。矣。或。以。楮。構。別。爲。二。物。者。亦。誤。矣。(李時珍) ⑥ 此。有。二。種。一。種。皮。有。斑。花。文。謂。之。斑。穀。今。人。用。皮。爲。冠。者。一。種。皮。白。無。花。枝。葉。大。相。類。但。取。其。葉。似。葡。萄。葉。作。餅。而。有。子。者。爲。佳。其。實。初。夏。生。大。如。彈。丸。青。綠。色。至。六。七。月。漸。深。紅。色。乃。成。熟。八。九。月。採。水。浸。去。皮。穢。取。中。子。段。成。式。西。陽。雜。俎。云。穀。田。久。廢。必。生。構。葉。有。瓣。曰。楮。無。曰。構。陸。璣。詩。疏。云。江。南。人。積。其。皮。以。爲。布。又。搗。以。爲。紙。長。數。丈。光。澤。甚。好。又。食。其。嫩。芽。

一四五六

以。當。菜。茹。今。楮。紙。用。之。最。博。楮。布。不。見。有。之。醫。方。但。資。楮。實。餘。亦。稀。用。(蘇恭) ⑦ 按。許。慎。說。文。言。楮。穀。乃。一。種。也。不。必。分。別。惟。辨。雌。雄。耳。雄。者。皮。斑。而。葉。無。極。又。三。月。開。花。成。長。穗。如。柳。花。狀。不。結。實。數。年。人。採。花。食。之。雌。者。皮。白。而。葉。有。極。又。亦。開。碎。花。結。實。如。楊。梅。半。熟。時。水。漂。去。子。蜜。煎。作。果。食。二。種。樹。並。易。生。葉。多。澀。毛。南。人。剝。皮。搗。煮。造。紙。亦。緝。練。爲。布。不。堅。易。朽。裴。淵。廣州。記。言。蠻。夷。取。穀。皮。熟。醃。爲。褐。裏。厨。布。以。擬。毡。甚。煖。也。其。木。腐。後。生。菌。耳。味。甚。佳。好。(李時珍)

【楮樹白皮】

性。質。甘。平。無。毒。

主治 逐水。利。小。便。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論楮樹皮曰。治喉痺。【唐】甄權藥性本草論楮樹皮曰。治水腫氣滿。【明】李時珍本草綱目論楮樹皮曰。煮汁釀酒飲。治水腫入腹。短氣咳嗽。爲散服。治下血血崩。

【楮樹皮中白汁】

古。藥。別。名。構。膠。五。金。膠。漆。(綱目)

性質 甘平無毒。
主治 療癬。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楮樹皮白汁曰傳蛇蟲蜂蟻犬咬。

參攷資料 楮皮中白汁能合珠砂爲團故名五金膠漆。(大明) 楮汁最黏今人用黏金薄古法黏經書以楮樹汁和白芨飛麵調糊接紙永不脫解過於膠漆。(李時珍)

【楮樹枝莖】 主治 癰瘡癩。 灸湯洗浴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論楮樹枝莖曰搗濃汁服治小便不通。

【楸】 命名 本品葉大而早脫。 至秋已呈凋狀故名。

古籍別名 刺楸角楸。

外國名詞 Mallothus japonicus, Muel. Arg. (拉丁)アカメガシハ(日本)

基本 係大戟科楸屬。爲楸樹之木皮。其子枝葉詳見各該條。 形態 楸爲喬木類之落葉木。本高七八丈。葉大約三四寸。圓形。

十三畫 楮

或廣卵形。有尖端。掌狀淺裂。嫩葉及葉柄帶赤色。夏月枝梢開細小黃綠色花。穗狀花序。有萼。無花瓣。單性。雌雄異株。結實外面多刺。熟則開裂。吐出種子。色紅黃黑如櫻桃。味甚清香可食。



楸

性質 苦。小寒。無毒。

主治 吐逆。殺三蟲。及皮膚蟲。煎膏黏傅惡瘡。疽癩。癰腫。疔痔。除膿血。生肌膚。長筋骨。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論楸木皮曰。消食瀝腸。下氣。治上氣咳嗽。亦入面藥。【明】李時珍本草綱目論楸木皮曰。口吻生瘡貼之。類易取效。

【楸子】 製法 凡使須去盡子。仁用否則食之。令人心煩。

性質 甘。酸。無毒。

主治 多食瀆氣。令人好睡。

楸 核 殿 溫

【楸枝】 主治 煎湯。治瘧疾。

【楸葉】 性質 苦。小寒。無毒。 主治 搗碎。瘡腫。煮湯洗膿血。冬取乾葉用之。諸癰腫潰。及內有刺不出者。取葉十重貼之。

參攷資料 楸乃外科要藥。而近人少知。葛常之韻語陽秋云。有人患發背潰壞。腸胃可窺。百方不癒。一醫用於秋日太陽未升時。採楸樹葉熬之爲膏。傅其外。內以雲母存作小丸服。盡四兩。不累日而愈也。東晉范汪名醫也。亦稱楸葉治瘡腫之功。則楸有拔毒排膿之力可知。(李時珍)

【楸核】 卽枳椇之古籍別名。典見廣記。詳「枳椇」條。

【殿春客】 卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【溫泉】 原名 溫湯。 命名 以其泉水比其他岩泉溫度較高故名。

古籍別名 沸泉(陳藏器)滾泉。聚溫泉。湯泉(綱目)

基本 係泉水中含有各種礦物質之泉流。

產地 溫泉世界各國之凡歐近火山熱地者。多有之。中國陝西臨潼縣之驪山溫泉。北平之湯山。閩侯之福州。雲南元江之溫玉泉。均爲有名之湯泉。

形態 溫泉爲地層岩之空隙處。噴裂之岩泉。以其毗連火山熱地。故泉流溫。泉源自山腹石中流出。傾瀉下流。其色清澈且碧。熱如沸湯。甚之有攝氏寒暑表七八十度之高。故必和以冷水。然後可浴。惟湯池開鑿較久者。則其溫度亦漸漸減低。尋常患皮膚病者。以硫黃泉入浴爲最佳。

用法 溫泉水可供飲料。煮茗入浴均可。

性質 辛溫。微毒。

成分 溫泉所含礦物之成分。以地質之異。所以有種種不同之泉流。發見。有含鐵性鹽類者。有含硫黃者。有含食鹽。或炭酸者。尚有含其他物質者。細析甚多。大略不過如此。

作用 浴後能使皮膚之上皮細胞。膨脹。軟化。而表皮外之老廢物。亦同時容易剝離。卽皮脂與汗

液之附着物。亦隨皮垢以俱除。且以其高溫作用。調節皮膚之體溫。同時刺戟皮膚之神經。以促進其生理之機能。使血液循環。皆形旺盛。並能促進新陳代謝。如頭部鬱血等。皆得導之以下行。尤於女子之月經不調等症。可作未發之預防。此外更能增進食慾。舒暢精神。如於硫黃泉浴後。尤能驅除皮膚病之微生物。故於各種慢性皮膚病。尤奏功效。

主治 諸風。筋骨攣縮。肌膚頑痺。手足不遂。肩髮脫落。楊梅瘡疥。風癩諸瘡。

國外學說 日本藤瀨剛一云。溫泉混有種種之藥物。保有溫度。含有稀少之瓦斯。為今日理學的醫治唯一療法。茲將各溫泉質之作用效果。述之如次。●炭酸泉。可供飲料。若入此泉水於口中。則有一種特殊之氣味。同時入口。則刺戟胃之黏膜神經筋層。以助鹽酸之分泌。促進食慾。強健胃之運動。促進乳糜之流通。又腸之移動。亦同樣強健而助消化。胃之黏膜。因充血之結果。使泉水與含於其內

之成分。容易吸收。遂至顯利尿之效。腓液之分泌亦增多。但此為間接之影響也。又對於呼吸器黏膜之卡他亦有效。而使呼吸為愉快。將炭酸泉混於溫牛乳而飲之。最佳。又適宜於消化不良。但一時飲以大量。或持續的飲用時。則反有害於消化。●鹼泉。胃酸過多時。若鹼酸則能中和之。且有抑止酸醉之異常。促進腸之運動。又鼻腔咽喉頭等。可除去其附着之黏膜。本泉是有溶解尿酸及舊酸結石。及利尿之效。於腎臟結石。膀胱結石。膽石症。膽囊炎之治療。亦有同樣之效。又有抑止糖尿病之糖量。但患肺結核。惡性腫瘍者。則此泉宜忌避之。因鹼炭酸泉。若長使用。則有害於營養。易陷於消化不良。故虛弱及元氣虧乏者。宜忌飲之。當飲本泉時。以擇空腹時為佳。尿之發現。驗質者亦早。一日之飲用。量為二百瓦。分為二回或六回飲之。若食事之間飲之。則胃酸之中和為強。故須避之。慢性胃潰瘍。亦以早晨空腹時飲用為宜。至炭酸泉。或鹼炭酸泉。若含有多量炭酸

瓦酸時。則作為炭酸湯而利用之。入浴於此種炭酸湯時。忽然在皮膚表面。有無數微點之小空泡密着之。但經數分間。則皮膚潮紅而至感有溫暖。本泉於心臟瓣膜不全。閉鎖心臟之過緊張。動脈硬化症。狹心症之心臟病。每多奏效。故在西洋方面。著名之心臟病專門。溫泉池甚夥。其由各國而往訪之。不絕於道。其他如病後之恢復衰弱。神經痛。知覺過敏。痙攣。末梢神經麻痺。陰痿症。不妊症。及有流產之習慣者。均宜適用。入浴於少含炭酸瓦斯之鹼泉。則因溶解皮膚之分泌物而刺戟。故對於皮膚為有效。●鐵泉。鐵泉為活動於血液者。即赤血球增殖。血色素增多。體重增加。體溫亦昇高。半度至一度。脈搏充實。而有力。使搏數亦多。一般血液病。物質代謝病。雖可使用此鐵泉。但亦有宜禁者。鐵泉之增加血液者。若為高山之溫泉。則其受土地氣候之影響。而更為顯效。若選擇五百米之高山。則比之低地之效力強有二三倍。因氣壓之低者。對於造血作用最佳也。其他

如貧血萎黃病。病後。腎臟炎。精神過勞。又重病後之衰弱。慢性神經疾患。性慾之疾患。及有流產習慣之婦女等。則以本泉為宜。飲用鐵泉時。以每朝用四百至六百瓦。如在食時飲之。則鐵質易吸收。但鐵泉有使消化不良之傾向。故消化不良。宜注意用之。因飲用後。每有使胃停滯之感。全身異和。易起便秘。又牙齒每至染黑色。糞便亦為黑色。又如肺結核。或咯血時。心臟病。小循環之鬱積。胃腸之潰瘍等。則本泉為禁忌。施行入浴法。則刺戟末梢神經。促進溫感。與亢奮。而皮膚潮紅。知覺銳敏。脈搏充實。而強壯。故適應於麻痺。神經衰弱。小兒之飲量。比大人少。通常用西洋湯匙三四杯。一日三四回。飲之更佳。●硫黃泉。硫黃泉是可行飲用。入浴。吸入之三法。飲用法。可單飲其泉水。或混於牛乳。及其他之清涼水飲之。通常一日。由一百五十至三百五十瓦。每朝空腹時飲之。本泉成分中之硫化水素。是由胃腸吸收。入浴時。溫度愈高。皮膚充血。而其機能愈增高。硫黃之

由皮膚吸收。亦易能取。資痛風。藥疹。皮膚病。瘡後之餘病。腺病。梅毒等疾患者。則以浴此泉為佳。吸入法。是由呼吸器黏膜之吸收。而作用於上氣道以奏效。古來所稱為痰之湯之理由。即因吸入此溫泉所含之硫水素。刺戟粘膜。使祛痰容易。嗜痰為多。故以此而得名也。

④食鹽泉。食鹽泉之效。則基因於鈉。鈉與其他之固形成分及瓦斯也。飲用則因刺戟口腔及胃黏膜之神經。結果。唾液胃液之分泌。為反射作用的增加。以助消化。及強壯胃之運動。在腸管則促進其蠕動及分泌。故食慾旺盛。其作用於血液。則赤血球及血色素增多。物質代謝。尤以氮素(Nitrogen)之代謝為良好。胃之運動及分泌。有障礙時。慢性胃炎。十二指腸炎。膽囊炎。腸蠕動障礙等症。及肝之充血。腺病。脾腫。用之均奏效果。若入浴則食鹽刺戟皮膚。促進皮脂腺汗腺之分泌。但他方面又因食鹽之細結晶。附着於皮膚表面。皮膚為器械之刺戟。防止體溫放散。故浴後覺溫暖。

十三 鹽 溫 溪

近人學說。視振綱云。人體皮膚。如無糜爛創傷。則湯火難。以侵入。因之行溫泉浴時。其泉中之成分。皮膚亦未必吸收於體內。即能透入。其量亦微。世人以為溫泉中所含之藥物。能被吸收於皮內。此其觀念錯誤。但溫泉之於皮膚病。卻能直接奏效。然濫用溫泉浴法。亦不無流弊。故所患之皮膚病。是否適宜溫泉。於俗輩仍在捉摸之中。漫無準則。蓋皮膚病中。往往有因溼潤之刺戟。以致病勢增劇者。况溫度較高。而含有藥物之溫泉。其更富於刺戟性。而能使病增劇。不尤可慮乎。彼因入浴治療。以致病勢增劇之患者。屢見不鮮。凡此皆因不明浴治之理。濫用高溫度之溫泉浴所致也。蓋溫泉種類甚多。其中對於皮膚病認為最有效力者。厥惟硫黃泉。因其溫度有高低。所含硫黃有多寡。而其效力亦未必一定。要之。急性皮膚病患者。對於任何溫泉。均不宜浴。為是慢性皮膚病。卻不妨用硫黃泉。或鈉泉浴治。但高溫亦非所宜耳。

參攷資料 ①雲南會澤縣城

西北二十里。四季之中。泉水滾熱。近之者無不流汗。燻鷄犬之屬。毛無不脫落者。是以人不敢入其中沐浴。(稜屋) ②溫泉下有硫黃。即令水熱。猶有硫黃臭。硫黃主治諸瘡。故水亦宜然。當其熱處。可燻鷄羊熟鷄子也。(陳藏器) ③溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則鼓人肌膚。惟新安黃山。是朱砂泉。春時水即微紅。可煮茗。長安驪山。是礬石泉。不甚作氣也。礬石雖紅不熱。當是雄黃。爾有礬石處亦有湯泉。浴之有毒。(李時珍) ④廬山有溫泉。方士往往教患疥癬風癩楊梅瘡者。飽食入池。久浴得汗。乃止。旬日自愈也。(汪穎)

【溫湯】即溫泉之原名。詳「溫泉」條。

【溫菴】即萊菴之古籍別名。典見爾雅。詳「萊菴」條。

【溫藤】 產地 生山谷間。形態 溫藤為蔓草類之一種。蔓纏樹木。四時不凋。其莖葉可供藥用。性質 甘溫無毒。

主治 氣血積冷。漫酒服。

【溪狗】 產地 生南方溪澗中。形態 溪狗為溼生蟲。類之一種。狀如蝦蟆。尾長三四寸。可供藥用。性質 有小毒。

主治 溪澗及遊蠱。燒末水服。

【溪砂】即硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【溪鬼蟲】 古籍別名 射工。(綱目)抱槍。(雜俎)含沙。(詩註)短狐。(廣雅)水狐。(玄記)。

產地 生南方溪澗中。形態 溪鬼蟲為溼生蟲。類甲蟲屬之一種。體長二三寸。廣一寸。形扁。前闊後狹。似蟬。腹軟背硬。如蠶。頁殼黑色。下有翅能飛。作蜂窠聲。頭闊喉尖。有二骨眼。頭目醜黑。如狐。如鬼。喙頭有尖角如爪。長一分。六足如蟹。二足在喙下者。大而一爪四足。在腹下者小而歧。爪時或雙。屈前足。抱拱其喙。正如積弩上矢之狀。或含沙射人形影。冬日伏蟄谷間。所居之處。大霧不積。氣起如蒸。揭下一尺可得之。其角

十三畫 溪 洩 溶 溺 溼 滂 滋 滑

一四六〇

可供藥用。

主治 帶之。辟溪毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論溪鬼蟲角曰陰乾爲末佩之亦辟射工毒。

參攷資料 ●溪鬼蟲。蟾蜍。爲毒能食之。胡鴨亦辟之。(李時珍)

●溪毒中人。一名中水。一名中溪。一名水病。似射工而無物。春月多病之頭痛惡寒。狀如傷寒。二三日則腹中生蟲。食人下部。漸斂五臟。注下不禁。雖良醫不能療也。初得則下部若有瘡。正赤如截肉。爲陽毒。最急若瘡如蟲。爲陰毒。少緩皆殺人。不過二十日。方家用藥與傷寒溫病相似。或以小蒜煮湯浴之。及諸藥方。又云江南射工毒。蟲在山間。水中心行。或浴。則此蟲含沙射人形影。則病有四种。初得皆如傷寒。或似中惡。一種。身上有黑點。四邊悉赤。犯之如刺。一種。作瘡。久即穿陷。一種。突起如石。一種。如火灼燥瘡也。瘡之並無方法。王充論衡云。短狐含太陽毒氣而生。故有弓矢射人中人如火灼也。(李時珍)

【溪孫】即白蒿之古籍別名。典見本草拾遺。詳「白蒿」條。

【溪楓】即水楊柳之古籍別名。詳「水楊柳」條。

【溪蓀】係蓀之生於溪澗。根瘦而赤。節稍密者。性質效能同蓀。詳「蓀」條。

【溪鴨】即鴻鵠之古籍別名。典見異物志。詳「鴻鵠」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。


【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。

【洩】即重便之古籍別名。典見素問。詳「重便」條。



洩 疏

性質 生田野間。

形態 洩疏爲灌木類之一種。高丈餘。與枸杞相類。有刺。皮白中空。結實亦似杞子。兩兩相對。秋月熟則色赤。可供藥用。

採取 八月九月間採之。

性質 辛寒無毒。

主治 皮膚中熱。除邪氣。止遺。

溺。利水道。(本經)除胃中熱。下氣。可作浴湯。(別錄)

參攷資料 ●洩疏以瀉蘆爲之使。千金方。治婦人下焦三十六疾之承澤丸中用之。(李時珍)

【溶魚】即鱸魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱸魚」條。

【溺白堊】即人中白之原名。詳「人中白」條。

【溼生蟲】即鼠婦之古籍別名。典見綱目。詳「鼠婦」條。

【滂藤】即扶芳藤之古籍別名。典見綱目。詳「扶芳藤」條。

【滋草】即繁縷之古籍別名。典見千金食治。詳「繁縷」條。

【滑石】 命名 本品性滑利。故質又滑膩。故名。

處方用名 原滑石。飛滑石。塊滑石。滑石粉。

古醫別名 液石。番石。(別錄)

桂林滑石。桂府滑石。(綱目) 磨石。脫石。冷石。(陶弘景) 盡石。(本草衍義) 久冷。白滑石。液石。稜。利。竅。共石。活石。斑石。磧石。白玉粉。白仲寧。立制石。雷河督子。(和漢藥考) 烏滑石。(炮炙論)

外國名詞 Talcum (拉丁)

Talc. (英) Talc. (德)

基本 爲單斜形之礦石。

產地 陳仁山藥物生產辨云。滑石又名畫石。原產四川雲南。廣東亦有出。和漢藥考曰。日本之石。見越前。越中。阿波。備前。伯耆。上野。等處產此。

形態 滑石多數爲纖維狀。塊狀。粒狀。或葉狀。間有爲斜方柱狀。結晶體者。無色者少。多爲青白。黃白。灰綠。或銀灰諸色。有脂肪狀。或真珠狀光澤。質柔。硬度一。〇。爲岩石中硬度之最低者。比重爲二。六至二。八。其面光滑如油。故名。

製法 雷斅曰。凡使滑石。須用白滑石。以刀刮淨。研粉。以牡丹皮同煮一伏時。去牡丹皮。取滑石。以東流水淘過。曬乾。用。

性質 甘寒無毒。

成分 主成分爲含水矽酸鎂。此外含有少許雜物。

效能 滑利竅。逐溼熱。治淋病。通淋閉。用作淋病藥。及黃疸水腫藥。其精製者。有滑澤皮膚。防其糜。

爛之效。

主治 身熱洩瀉。女子乳難。經閉。利小便。薄胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身耐饑。長年(本經)通九竅。六腑津液。去留結。止渴。令人利中(別錄)

張仲景之發明 滑石一味。經張仲景之實驗。認為『主治小便不利。勞治渴。』茲考徵如下。猪苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。(以上一方。滑石一兩)此一方。可見滑石所主治也。滑石白魚散證曰。小便不利。蒲灰散證曰。小便不利。余未試二方。是以不取徵焉。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論滑石曰。燥溼分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐凝血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋為要藥。【明】李時珍本草綱目論滑石曰。療黃疸水腫脚氣。吐血衄血。金瘡血出。諸瘡腫毒。【明】繆希雍本草經疏論滑石曰。滑石石中之得冲氣者也。故味甘淡氣寒而無毒。滑以利諸竅。通壅滯。下垢膩。甘以和胃氣。寒以散積熱。甘寒滑利。以合共用。是為祛暑散熱。利

十三畫 滑

水除溼。消積滯。利下竅之要藥。本經用以主身熱。洩瀉。女子乳難。薄胃中積聚寒熱者。解足陽明胃家之熱也。利小便。經閉者。通膀胱利陰竅也。其曰益精氣。久服輕身耐飢。長年。此則必無是理矣。別錄通九竅。津液。去留結。止渴。令人利中者。溼熱解則胃氣和而津液自生。下竅通則諸壅自洩也。丹溪用以燥溼。分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐瘀血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋。皆此意耳。【清】黃宮繡本草求真論滑石曰。滑石何以滑名。因其性滑而名之也。滑石味甘。氣寒色白。服則能以清熱降火。通竅利便。生津止渴。為足太陽膀胱經藥。故凡中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。脚氣淋閉。水溼瀉利。吐血衄血。諸症。腫毒。乳汁不通。胎產難下。服此皆能蕩熱除溼。通汁滑胎。然其開竅利溼。不獨蓋由小便而下。蓋能上開腠理而發表。是除上中之溼熱。下利便溼而行。是除中之溼熱。溼去則三焦寧而表裏安。溼去則闕門通而陰陽利矣。河間益元散。用此通治上下表裏諸

病。其意在此。滑石既屬滲利。如何又言止渴。因其溼熱既溼。則脾胃中和。而渴自止耳。故書又載能理脾胃。義亦由此。白而潤者良。

國外學說 日本和漢藥考曰。滑石種類頗多。由其色澤。形狀。及品質等。而別為蠟石。溫石。凍石。石鹼石等。又日本藥局方曰。滑石為微細粉碎之珪酸。鑲於指間。捻之。覺如脂肪。不溶於水及酒精。漢醫以為淋病之主藥。扶氏藥物學云。於「インテルトリ」用為撒布粉劑。或為丸劑之衣。用甚四。○至一六。○又英美學說謂滑石中西國均產。內含鎂。鎂。或銻。銻。等。其功用。惟腹具酸者服之。則能合酸作瀉。又能作撲粉用。本草綱目謂其能療治石淋。黃疸。水腫。脚氣。吐血。鼻血。諸瘡腫痛。且去身熱。補脾胃。能通九竅。六腑津液。未知其何所據而云然。

近人學說 黎伯樞曰。滑石有三種。二種是真。一種是假。真者一種是川滑石。出四川。一種是漳滑石。出漳州。質皆甚滑。名實相負。細驗之。漳滑石質輕鬆。色微紅。川滑

石質堅緻。色微青。在藥性為瀉利。小便。消解血液與淋巴液中之炎熱。從小便而解。正是利用其滑性。滑石在化學上之元質為矽。為輕金屬之鹽類。能中和酸性液。熱病即酸性液發炎。滑石收其酸性液。排泄於尿。非常靈敏。常用真滑石。漳產質鬆而輕。易通達腸膜之液。川產質緻而密。下行通利之力尤銳。二者比較實以川產為勝。惟一種偽滑石。質粗鈍滑。並不見滑。實另一種土石。其元質不必為矽。究不知出產何處。查其來源已研成粉。而用紙包裹。以其不滑而瀉。則不惟無益。而反有害。醫家處方。但書滑石。藥店率以此物應之。余問之藥店。俱云若要真滑石。須加書川漳字樣。即得真物。余復驗藥店所製之六一散。亦多用滑石者。而用真滑石者亦有之。並不一致。以手捻之一。滑一滑。即可立辨。

配合應用 滑石和甘草為益元散。又名天水散。六一散。太白散。解中暑傷寒疫癘。并汗後遺熱。勞復諸疾。兼解兩感傷寒。百藥酒食邪熱。煩滿短氣。腹脹悶痛。淋

十三 蠶 滑

關濕痛。痰身熱嘔吐。洩瀉腸辟。下痢赤白。除煩熱。胸中積聚寒熱。止消渴。善水。婦人催生下乳。治吹乳乳癰。牙疳齒疳。此藥大養脾胃之氣。道九竅六腑。去留結。通經脈。消水穀。安魂定魄。乃神驗之仙藥也。劉河間傷寒直格本方。白滑石水飛過六兩。粉甘草一兩。為末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。實熱則用新汲水下。解利則葱鼓湯下。道乳用猪肉麵湯調下。催生用香油漿水調下。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥澀。結滯堅斂。不能舒緩故也。此藥力至則結滯頓開而產矣。如用以治痢。照雷公炮製用牡丹皮同煮過。加丹砂水飛細末。每兩一錢。名辰砂六一散。治心經伏暑。下痢純血。煩躁口渴。神昏不爽。

①治乳石發動。煩熱煩渴。滑石粉半兩。水一盞。絞白汁頓服。(聖惠方)
②治氣壅關格不通。小便淋結。躄下妨悶。兼痛。滑石粉水調服一兩。(廣利方)
③治小便不通。滑石末一升。車前汁和塗躄之。四畔方四寸。乾即易之。冬月水和。(楊氏產乳方)
④治婦人轉胞。因過忍小便而致。滑石末葱湯服二錢。(聖惠方)
⑤伏暑水泄。白龍丸。滑石火煨過一兩。硫黃四錢。為末。麵糊丸。菜豆大。每用淡薑湯。隨大小服。又方。治伏暑。或吐或瀉或瘧。小便赤。煩渴。玉液散。用桂府滑石燒四兩。發香一錢。丁香一錢。為末。米湯服二錢。亦治霍亂。(普濟方)
⑥治痘瘡狂亂。循衣摸牀。大湯引飲。用益元散一兩。加朱砂飛過二錢。冰片三分。麝香一分。用燈心湯調二三錢服。(王氏痘疹方)
⑦治風毒熱瘡。遍身出黃水。用桂府滑石末。傅之。次日愈。先以虎杖。豌豆。甘草等分煎湯。洗後乃搽。(普濟方)

⑧治脚指縫爛。滑石一兩。石膏煨半兩。枯礬少許。研搗之。亦治陰下濕汗。(集簡方)
⑨治傷寒衄血。滑石末。飯丸。梧子大。每服十丸。微嚼破。新水嚥下。立止。湯晦叔云。鼻衄乃當汗不汗所致。其血紫黑。時不以多少。不可止之。且服溫藥。調其營衛。待血鮮時。急服此藥止之也。(本事方)
⑩治暴得吐逆。不下食。生滑石末二錢。七。溫水服。仍以和麵半盞押定。(本草衍義方)
⑪治妊娠子淋。不得小便。滑石末水和泥。躄下二寸。(外臺秘要方)
⑫治杖瘡腫痛。滑石。赤石脂。大黃等分。為末。茶湯洗淨貼。(賴氏經驗方)
⑬治熱毒怪病。目赤鼻脹。大喘。渾身出斑。毛髮如錢。乃因中熱毒氣結於下焦。用滑石白礬各一兩。為末。作一服。水三盞煎減半。不住飲之。(夏子益奇疾方)
用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡陰虛而無濕熱者。禁用。惡甘青。制雄黃。以石葦為

一四六二

之使。
著名方劑 ①滑石代豬湯。治百合病下之後者。主之。(金匱)百合七枚。(擘)滑石三兩。(碎綿裹)代豬石如彈丸大一枚。(碎綿裹)以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代豬取一升。去滓。合和煎。取一升。五合。分溫服。②滑石白魚散。主小便不利。(金匱)滑石二分。亂髮二分。(燒)白魚二分。上三味。杵為散。飲服半錢。日三服。
參攷資料 ①古方治淋瀝。多單使滑石。又與石葦同搗末。飲服刀圭更驗。又主石淋。取十二分。研粉。分作兩服。水調下。煩熱定。即停後服。(蘇頌)②入足太陽經。滑能利竅。以通水道。為至燥之劑。豬苓湯用滑石。阿膠。同為滑劑。以利水道。葱豉生薑。同煎去滓。澄清。以解利。淡味滲洩。為陽。故解表利小便也。若小便自利者。不宜用。(王好古)③始安按縣所出。二石。形質既異。所用又殊。始安者。輭滑而白。宜入藥。東萊者。硬澀而青。乃作器

石也。(陳藏器)凡使有多般。其白滑石如方解石。色似冰白。畫石上有白膩文者真也。烏滑石似鹽。畫石上有青白膩文。入用亦妙。綠滑石性寒有毒。不入藥用。黃滑石似金。類類則畫石上有青黑色者勿用。殺人。冷滑石青蒼色。畫石上作白膩文。亦勿用之。(雷斅)今道永萊濠州皆有之。凡二種。道永州出者白滑如凝脂。南城志云。濠成縣出滑石。即滑石也。土人以爲燒器。烹魚食是也。萊濠州出者理粗質膏。有黑點。亦謂之斑石。二種皆可作器。甚精好。初出輒柔。彼人就穴中制作。用力殊少也。本草所載土地皆是北方。而今醫家所用白色者。自南方來。或云沂州所出。其自佳。與本草所云太山之陰相合。而彼土不取爲藥。今濠州所供青滑石。云性寒無毒。主心氣滯滯。與本經大同小異。又張勃吳錄地理志。及大康地記云。靈林州布山縣。馬湖馬嶺山皆有。甚毒。殺人。有冷石可以解之。石色赤黑。味苦。屑之著指中。并以切齒立蘇。一名切齒石。今人多用冷石作粉。治癆

十三畫 滑

源 溜 滌 煎 煙 煤 煨 煉 黏 照 煇

瘡。或云即滑石也。但味之甘苦不同爾。(蘇頌)滑石廣之桂林各邑及嶺中皆出。即古之始安也。白黑二種。功皆相似。山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳。故醫方有桂府滑石。與桂林者同稱也。今人亦以刻圖書。不甚堅牢。滑石之根爲不灰木。滑石中有光明黃子爲石麴芝。(李時珍)

【滑石粉】即滑石之處方用名。詳「滑石」條。

【滑胡麻】即亞麻之日本名。詳「亞麻」條。

【滑珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【滑菜】即冬葵子之俗名。詳「冬葵子」條。

【滑葵子】即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬葵子」條。

【滑蟲】即蛭蟻之古籍別名。典見唐本草。詳「蛭蟻」條。

【源草】即狼牙之日本名。詳「狼牙」條。

【溜魚】即鮫魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮫魚」條。

【滌菊花】即菊花之處方用名。詳

【菊花】條。

【煎香】即沈香之肌理有黑脈紋。入水中浮半沈者。爲沈香中之次品。詳「沈香」條。

【煎澤草】即蘭草之古籍別名。典見本草集註。詳「蘭草」條。

【煙】即烟草之簡稱。詳「烟草」條。

【煤油】即石油之別名。詳「石油」條。

【煤炭】即石炭之別名。典見綱目。詳「石炭」條。

【煤參】命名。形如參。皮心俱青黑。故名。產地 出陝西西安等處。性質 味微苦甘。主治 功力同人參。但較薄耳。參攷資料 煤參出陝西華山。食之多吐。其性亦劣。(施柳南)

【煤結】即土壘之別名。詳「土壘」條。

【煨人牙】即人牙煨成者之處方用名。詳「人牙」條。

【煨牙齒】即人牙煨成者之處方用名。詳「人牙」條。

【煨石決明】即石決明煨成者之處方用名。詳「石決明」條。

【煨石燕】即石燕煨成者之處方用名。詳「石燕」條。

【煨牡蠣】即牡蠣之處方用名。詳「牡蠣」條。

【煨赭石】即代赭石煨成者之處方用名。詳「代赭石」條。

【煨龍骨】即龍骨煨成者之處方用名。詳「龍骨」條。

【煨磁石】即磁石煨過者之處方用名。詳「磁石」條。

【煨礞石】即礞石煨成者之處方用名。詳「礞石」條。

【煨礞石】即礞石煨成者之處方用名。詳「礞石」條。

【煨牛膽汁】即牛膽煉成汁者之處方用名。詳「牛膽」條。

【煉牛膽汁】即牛膽煉成汁者之處方用名。詳「牛膽」條。

【煉蜜】即蜂蜜之已煉過者。詳「蜂蜜」條。

【煉豬油】即豬脂之處方用名。詳「豬脂」條。

【黏】即杉材之古籍別名。典見綱目。詳「杉材」條。

【照子】即古銅鏡之古籍別名。典見綱目。詳「古銅鏡」條。

【煇岸】即馬刀之古籍別名。典見綱目。詳「馬刀」條。

十三疊 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨 煨

【煨天麻】即天麻用火煨成者之處方用名。詳「天麻」條。

【煨木香】即木香煨成者之處方用名。詳「木香」條。

【煨石膏】即石膏煨成者之處方用名。詳「石膏」條。

【煨肉果】即肉豆蔻煨成者之處方用名。詳「肉豆蔻」條。

【煨草果】即草豆蔻以火煨成者之處方用名。詳「草豆蔻」條。

【煨葛根】即葛根之處方用名。如治泄利將葛根煨熟用之。詳「葛根」條。

【煨薑】製法 以盞洗淨。外裹漚紙。入炭火煨。令紙焦。及窻外皮微焦。中心呈深黃色則透矣。

主治 和中止嘔。及與大棗並用。能行脾胃津液而和營衛。(吳遵程)

【煨牛】即犍牛之古籍別名。典見綱目。詳「犍牛」條。

【煨桂】即肉桂之處方用名。詳「肉桂」條。

【煨苴】即藟苴之古籍別名。典見說文。詳「藟苴」條。

【猿柿】即君選子之日本名。詳「君選子」條。


【獅】 古籍別名 狻猊。 (綱目)

外國名詞 獅 (獅) (拉丁) Lion (英) シシ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類貓科之獅。

產地 出非洲及南美之巴西國諸地。

形態 獅為獸類之一種。形略似貓。頭部圓。肩部最壯大。至後方漸狹小。四肢強健。有鈎爪。掌有肉塊。行走無聲。尾細長。末端具叢毛。雄者頸間有長鬚毛。毛色淡黃帶褐。體長丈許。雌者較小。而尤淨。棲山林。食諸獸。吼聲可達數里。稱為百獸之王。其尿可供藥用。



獅

主治 燒之。殺百蟲。辟鬼氣。塗一切惡瘡。即結痂而愈。

參攷資料 獅屎堅如鐵石。磨之作紅色。燒之有臭氣。須用鐵匣盛之。周圍護以鐵屑。否則易於朽爛。(醫學大辭典)

【獅子乳】即於乳之盤結而生。醜怪。淨淨如獸形者。典見萬歷杭州府志。詳「於乳」條。

【獅子草】即九龍草之古籍別名。典見百草鏡。詳「九龍草」條。

【獅子盤頭蓋】即黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳「黨參」條。

【獅子耳】即耳草葉之別名。詳「耳草葉」條。

【獅血】 主治 燒之。殺百蟲。去鬼氣。

【獅油】 命名 本品係以獅脂熬取之油。故名。

形態 獅油冷凝時。則堅硬如石。熔熱時。則可挑絲一二尺長。不斷。可供藥用。

辨偽 以微黑色者及塗指甲上。涼透指甲者真。又方以黍許入沸湯。湯即不沸。

性質 辛。溫。有毒。

主治 消熱結。療腸塞。通二便。不利。酒服二三釐自效。

參攷資料 獅為百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹。熊太古言其乳入牛羊馬乳中。皆化為水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許。隔紙裝之。即脫。予嘗試用。垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎隔病。蓋噎隔皆鬱疾。癥積所致。用取滋痰之意。試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性最猛烈。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢。滋痰。但不能去墨跡耳。(淺原) 獅子油白膩。如猪肪。氣味俱薄。利小便。凡人小便不通。雖腹脹莖痛。病在危急者。以酒或白湯送下三四釐。或半分即通。管有一丐。因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日後。莖痛如割。至不可忍。屢投續祈死。人或以獅油少許投之。片刻即通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用何哉。豈當時未知用歟。第虛謬者似宜酌而用之。

（朱排山柑園小議）○獅油性最猛烈。服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友邵某得獅油少許。因病欲服之。未果。爲一鄉人轉乞去。市於人。獲重價。其人市得。服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審慎。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻削耳。善透經絡。凡用勿多。（趙學敏）

【獅頭參】即防風黨參之別名。典見翁有良辨誤。詳『黨參』條。

【瑞珺】即玳瑁之原名。詳『玳瑁』條。

【瑞香】原名 睡香。相傳廬山一比丘僧。晝寢岩下。夢中但聞異香。酷烈。覺而尋之。因得此。故名。後有好事者聞而奇之。以爲祥瑞之徵。迺改名瑞香。


古籍別名 世英。佳客。花賊。珠友。奪皮香。風流樹。紫丁香。紫風流。鷓鴣堆。蓬萊花。七里香。沈丁香。歸甲。蓬萊紫。（和漢藥考）

基本 屬瑞香科。爲瑞香之根皮。



(一) 香瑞

形態 瑞香爲常綠小灌木。人家庭固常種之。莖高四五尺。極枝有兩叉至三叉。外皮平滑。色灰褐。枝葉繁茂。葉形長橢圓。或廣披針形。全緣長二三寸。末端帶尖。基部部次第狹小。遂成葉柄。皆互生。質厚而軟。面深綠色。有光澤。背淡綠色。冬月。葉腋發生花蕾。春分前後。開類似堯花之四瓣合瓣花。相綴而爲頭狀花序。一簇約有十朵至十六朵。花被內面粉紅色。外面紫紅色。有皺裂。香氣極甚。其開白花者。謂之白瑞香。果實每不能結成。



(二) 香瑞

製法 採得洗淨日乾。

性質 甘。鹹。無毒。

效能 治骨痛。療喉痺。用作驅除穢毒藥。

主治 急喉風。用白花者。研水灌之。

用量 八分至一錢中。

參攷資料 南土處廬山中有之。枝幹婆娑。柔條厚葉。四時不凋。冬春之交。開花成簇。長三四分。如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。繇子者。欒枝者。惟欒枝者花紫香烈。枇杷葉者。結子。其始出於廬山。宋時人家栽之。始著名。欒枝者其節彎曲如斷折之狀也。其根綿纒而香。（李時珍）

【瑞香花】古籍別名 奪香花。雪花。（綱目拾遺）

性質 甘。無毒。

主治 含之清頭目。止齒痛。及稀痘瘰乳岩初起。

【瑞草】即四方如意草之別名。詳『如意草』條。

【如意草】即栝樓根之別名。典見綱目。

【瑞雪】即栝樓根之別名。典見綱目。

目。詳『天花粉』條。

【瑞蓮】即睡蓮之別名。詳『睡蓮』條。

【瑞聖奴】即柑之古籍別名。典見綱目。詳『柑』條。

【瑞蓮花】即睡蓮之古籍別名。典見綱目。詳『睡蓮』條。

【瑞龍腦】即龍腦香之別名。典見天寶本草。詳『龍腦香』條。

【瑞鷗】即鳳凰之別名。典見禽經。詳『鳳凰』條。

【瑟瑟】即靛子之別名。典見山海經。詳『寶石』條。

【瓶香】性質 微寒。無毒。

主治 天行時毒。水腫浮氣。水煎洗風癩。

參攷資料 瓶香係芳香味排草香之一種。爲熱帶地之產品也。即乳香之以瓶收者。性質功效較尋常乳香力過。詳『乳香』條。

【當石】即三葉之古籍別名。典見別錄。詳『三葉』條。

【當門子】即麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【當耶】即螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【當耶】即螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【當陸】即商陸之古籍別名。真見開寶本草。詳「商陸」條。

【當道】即車前草之古籍別名。真見本經。詳「車前草」條。

【當歸】命名 本品功能調氣養血。使氣血各有所歸。故名。

處方用名 全當歸。白當歸。西箱歸。川當歸。大當歸。秦當歸。白歸身。當歸鬚。歸尾。油當歸。

古籍別名 乾歸。(本經)山藟。白藟。(爾雅)文無。秦歸。(綱目)草頭歸。(陶弘景)馬尾歸。大芹。名薛。象馬。粉。稀。女。二。天。地。仙。圓。夷。靈。芝。僧。庵。草。(和漢藥考)

外國名詞 Aralia Edulis. (Aralia Cordata)

基本 屬繖形科當歸之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。當歸以陝西漢中府興安縣西固等為最。其次則四川階州龍安大寧廠甘肅等。近日雲南有來。味帶苦辣。與西歸之香甜純味有別。四川甘肅河南產者。亦可用之。但雲南產者。不適用。

形態 當歸為一年生之草本。

春月生苗。莖高三四尺。葉為由多數分裂小葉而成之羽狀複葉。深綠色。有光澤。夏月於梢頭開小白花。作繖繖形花序排列。秋季結淡綠色漿果。其根有分枝。天然生根。小而香氣強。栽植者反之。根粗而氣味異。藥用以天然根為佳。販賣品有生乾。蒸乾二種。但多為蒸乾品。長概四五寸。外部黃褐色。內部類白色。中有黃色木心。常溼潤。味辛甘。

種類 秦產者。力柔而善補。川產者。力剛而善攻。秦歸狀似大葉芎藭。頭圓尾多。色紫氣香。肥潤者即所謂馬尾歸。其餘如川產者。狀似細葉芎藭。頭大尾粗。色白堅枯。即所謂鏡頭歸。

採取 二月八月間。採根陰乾。製法 雷斅曰。凡使當歸。須去頭蘆。以酒浸一宿入藥。張元素曰。先以酒洗淨土。治上酒浸。治外酒洗過。或火乾日乾入藥。李時珍曰。凡曬乾。乘熱紙封裝。收之不蛀。聖濟總錄。防胎下血不止。當歸焙用。

用法 與他藥水煎。或酒浸。或熬膏。或剉末和作丸散。

性質 苦。溫。無毒。

成分 其中含有多量蔗糖。效能 補血。活血。潤燥。滑腸。用作調血通經。為女科要藥。

作用 在胃中僅能促進胃液之分泌增多。至腸始漸被吸入血中。同時又能激腸之黏膜。使腸壁吸收力強大。本品入血中。其作用專在刺激血液中之氫化酵素。令血液之氫化迅速。細胞之新陳作用亦隨之而增進。血壓亦較為增高。同時卵巢亦能誘起充血之作用。

主治 欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗在皮膚中。婦人漏下。絕子。溫中止痛。除客血內寒。中風。瘧。汗不出。溼痺。中惡客氣。虛冷。補五臟。生肌肉。諸惡瘡。癩。瘡。黃。汁。飲之。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論當歸曰。止嘔逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人瀝血腰痛。崩中。補諸不足。【宋】大明諸家本草論當歸曰。治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癢癬。腸胃冷。【元】王好古湯液本草論當歸曰。主痿癱嗜臥。足下熱而痛。衝

脈為病。氣逆。寒急。帶脈為病。腹痛。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論當歸曰。治頭痛。心腹諸痛。潤腸胃。筋骨皮膚。治癰疽。排膿止痛。和血補血。【明】繆希雍本草經疏論當歸曰。當歸辛大溫無毒。甘以緩之。辛以散之。潤之。溫以通之。暢之。入手少陰足厥陰。亦入足太陰。活血補血之要藥。故主欬逆上氣也。溫瘧寒熱。洗在皮膚中者。邪在厥陰也。行血則厥陰之邪自解。故寒熱洗隨愈也。婦人以血為主。漏下絕子。血枯故也。諸癩瘡瘍。其已潰者。溫補內寒。則補血而生肌肉也。金瘡以活血補血為要。破傷風亦然。並黃飲之。內虛則中寒。甘溫益血。故能溫中。血凝則痛。活血故痛自止。血溢出膜外。或在腸胃。曰客血。得溫得辛。則客血自散也。內寒者。甘溫益血之效也。中風。瘧。瘧。即角弓反張也。汗不出者。風邪乘虛客血分也。得辛溫則血行而和。故瘧自柔而汗自出也。痺者。血分為邪所客。故拘攣而痛也。風寒溼三者。合而成痺。血行則邪不能客。故痺自除也。中惡者。內

處。故粹中於邪也。客氣者。外來之寒氣也。溫中則寒氣自散矣。虛冷者。內虛血不營於肉分。故冷也。補五臟生肌肉者。臟皆屬陰。陰者血也。陰氣足則營血旺而肌肉長也。愚人虛冷。加而用之。【明】李士材本草圖解論當歸曰。當歸甘辛微溫。入心肝脾三經。主一切風。一切氣。一切血。溫中。止頭目心腹諸痛。破惡血。養心血。潤腸胃。養筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿止痛。生肌。氣血昏亂。服之而定。能領諸血各歸其所當之經。故名當歸。脾胃瀉者忌之。去蘆。酒洗微焙。【清】黃宮繡本草求真論當歸曰。當歸辛甘溫潤。諸書載為入心生血上品。緣脈為血府。諸脈皆屬於心。心無血養。則脈不運。血無氣附。則血滯而不行。當歸氣味辛甘。既不虛其過散。復不慮其過緩。得其溫中之潤。陰中之陽。故能通心而血生。存為血中氣藥。故凡一切血症。陰陽無所附。而見血枯血燥。血脫血閉等症。則當用此主治。按當歸頭則止血。上行。身則養血中守。尾則破血下流。全則活血不走。古方合白芍芍

十三 薑 當

芎。地黃同用。名為四物湯總劑。蓋謂得芍以為長養生發之機。地黃以為滋補化源之自。白芍以為救陰效陽之本。則血始能以生。若血虛而氣不固。則當佐以人參黃芪。血熱佐以條芩相連。血積佐以大黃牽牛。與夫營虛而表不解。則當佐以柴葛升麻桂。衛熱而表不斂。則當佐以大黃。隨其病之所向。以為出入加減。要使血滯能通。血虛能補。血枯能潤。血亂能撫。俾血與氣附。氣與血固。而不致散亂。而無所歸耳。書命其名曰歸。即是此意。是以氣逆而見欬逆上閉者。則當用此以和血。血和而氣則降矣。寒鬱而見瘧痢腹脹頭痛者。則當用此以散寒。寒散而血則和矣。血虛而見風痲無汗者。則當用此以養血。血養而風則散矣。他如瘡癩癰疽。而見痛者。異常肌肉失養。而見皮膚不潤。並衝脈為病。而見氣逆裏急。帶脈為病。而見腹痛。腰如坐水。亦何莫不因血虛氣無所附之意。得此則排膿止痛。癰消毒去。膚澤皮潤。而無枯槁不榮之患矣。然此味辛則散。氣虛火盛者切忌。味

甘則壅。脾胃虛寒者則忌。體潤性滑。大腸瀉瀉者則忌。不可不熟晰而明辨耳。至書既言當歸入心。而又曰入肝入脾。無非因其血補。而肝與脾皆有統脈之意。秦產頭圓尾多。色紫氣香肥潤。名馬尾當歸。其性力柔善補。川產尾粗堅枯。名饒頭當歸。其性力剛善攻。只宜發散。收貯曬乾。乘熱紙封囊內。宜用酒洗。【清】張隱庵本草崇原論當歸曰。當歸花紅根黑者。氣味苦溫。稟少陰水火之氣。上下相交。各有所歸。則欬逆上氣自平矣。治溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中者。助心主之血液。從經脈而外充於皮膚。則溫瘧之寒熱洗然。而在皮膚中者。可治也。治婦人漏下絕子者。助腎臟之精氣。從下而上交於心包。則婦人漏下無時。而絕子可治也。治諸癰瘡瘍者。養血解毒也。治金瘡。養血生肌也。凡藥皆可煮飲。獨當歸言煮汁飲者。以中焦取汁。變化而赤。則為血。當歸滋中焦之汁。以養血。故曰煮汁。謂煮汁飲之。得其專精矣。【清】徐洵溪本草經百種錄論當歸曰。當歸辛香而潤。香則

走脾。潤則補血。故能透入中焦。營氣之分。而為補營之聖藥。又曰。當歸為血家必用之藥。而本經無一字及於補血養血者何也。蓋氣無形可驟生。血有形難速長。凡通閉順氣和陰清火降逆生津去風利竅。一切滋潤通利之品。皆能令陰氣流通。不使亢陽致害。即所以生血也。當歸辛芳溫潤。兼比數長。實為養血之要品。惟苦其血充之效。則血之得所養。不待言而可知。此等當參全經。而悟其理。【清】夏九如辨藥指南論當歸曰。當歸性溫能散。帶甘能緩。經曰。肝欲散。以辛散之。肝苦急。以甘緩之。緩之散之。肝性所喜。即所為補。故專入肝以助血海。使血流行。凡藥體性分根升梢降。中守。此獨一物而全備。頭補血上行。身養血中守。梢破血下行。全活血運行周身。治血虛不足。縱耗精陰虛勞。去血過多。癰毒潰後。此皆血脫。用歸頭以補血也。治精神困倦。腰痛腿酸。女人血滯。目痛牙疼。遠久虛證。純血痢疾。此皆血少。用歸身以養血也。治諸腫毒。跌撲金瘡。皮膚瘙癢。溼痺癩

一四六七

鮮。經閉瘀蓄。此皆血聚。用歸尾以破血也。若全用治血虛昏亂者。服之即安。有各歸氣血於經絡之功。故名當歸。取其氣香體潤。同參朮用滋脾陰。如脾虛者米拌炒用。使無便滑之虞。凡痰涎者恐其黏膩。滑瀉者恐其滑腸。嘔吐者恐其泥膈。氣喘聲啞者恐其辛溫。心性喜煎。肺氣欲收。切宜忌之。

國外學說 日本學說謂當歸者。以中國產為最良。在日本則產於兵庫。福島縣等。漢醫用之。為通經清涼藥。能領諸血。各歸其所當歸之經。故名。即補血之聖藥也。然其作用甚可疑。毫無確實之根據。其成分亦尚未明瞭。用最大約六〇至一六〇。又日本大和國宇陀郡栽植當歸。於十一月採掘。其經二年之根。曬乾之。浸置熱湯中。片時。懸於下。乾曬二個月。將其乾定者約一斤為一束。收藏至清明。再曬二三日。每百斤用樟腦半斤。密封櫃中。至九月。乃開櫃取出。售之。英美學說謂當歸產中國之四川。陝西及江寧府。滁州等處。其根可入藥。其功用能開胃暖胃。處

方。以當歸一分。濃酒八分。先用酒六分。浸二天。間時搖動。裝滿蒲淋乾。再加餘酒。漂淋。仍足八分為度。每服一錢。零五釐。以至二錢一分。(當歸酒方)

近人學說 荆武黎曰。抽荆戴英。生來健康。向無經病。民國十四年春。曾舉一子。臨盆非常困難。經施種種注射手術。母子得慶俱全。然已衰憊不勝矣。嗣後竭力調護。母體漸臻健康。小兒亦強壯活潑。越六個月。而經再行。覺下腹部發牽引性疼痛。下紫黑色錠狀血塊。經淨痛止。展轉不愈。已兩越寒暑矣。婦人畏羞。祕而不言。嗣經覺察。堅詢所苦。答如上稱。井謂心身康泰時。痛少趨。憊倦時。則增劇。且趨前移後。甚不規則云云。當投以強壯劑。及治經痛最新製劑。如「佛里爾珠」Valy。安濟室則「Andyamon」。凡拉蒙「Votamon」等等。或則收效一時。或則效力毫無。訴之新醫藥。伎已窮焉。病者謂余曰。子曷不以中藥療我乎。余唯唯。因思當歸一物。中國古醫籍上。盛稱能調經種子。有補

血補氣之功。婦科產科方上。鮮有不用當歸者。乃不雜他藥。於舊藥舖中。單購當歸若干。每日煎煮五錢。數次分服。約十餘日。紅潮旋至。痛苦大減。因更持續煎服一星期。其後準期經至。痛苦若失。纏綿痼疾。一旦而除。驚喜莫名。詎料第三月經又停止。心滋疑焉。以為藥性已失。越數星期。而現全身疲乏。暈眩。嘔惡之象。知又撤下孽根矣。去年春。欣然復舉一男。因更嘆當歸之真有調經種子之偉功也。按當歸一物。中醫固奉為補劑佳品。最近據外人報告。亦謂婦人月經失常。當歸能統治之。可知當歸確有調經之主要功能。種子則為偶然之結果耳。凡因經病而患嗣續艱難者。殆有試服之價值矣。聞德國怡默克「G. Lohde」大藥廠。將當歸運諸中國。經精良化學的操作。去其渣滓。存其精華。製成藥劑。名之曰當歸精。想其效力偉大。當更倍蓰矣。張山雷曰。當歸是血家氣藥。以辛升運行為用。以溫和煥然為功。氣血虛寒者。得之。則血隨氣行。而歸其所歸。此當歸命名之

正義也。昔人每謂身能補血。頭能止血。尾能行血。全能和血。微上微下。可補可攻。頭尾之性。性不同。斯攻守之取效。自別。吾國藥物學之精細。所以異乎西人之專論物質。而無投不利者。其神髓在是。頃謂歸身主守。補固有功。歸尾主通。逐瘀自驗。而歸頭乘上行之性。便血。溺血。崩中淋帶等之陰。隨陽陷者。升之固宜。若吐血。衄血。之氣火升浮者。助以溫升。豈不為虎傅翼。是止血二字之所當因症而施。固不可拘守其止之一字。而誤謂其無所不可也。且凡失血之症。氣火沖激。擾動血格。而循行不守。故道者。實居多數。歸之氣味俱厚。行則有餘。守則不足。亦不可過信歸所當歸一語。而有循名失實之咎。即如局方四物一湯。舉國醫家。孰不知其是血家聖藥。且自海藏種種加味。而六合諸方。可謂五花八門。無美不備。極盡醫林能事。究竟即以四物首之。已是走者大走。守者太守。各有專主。未必水乳交融。更何論信手拈來者之合宜與否。此則泥於迹象。太嫌呆板。去神化二字。

障乎後矣。

配合應用

治婦人產後百病。當歸、川芎、芍藥、地黃。名四物湯。

主婦人血分百病。加炒黑乾薑、炒黑豆、澤蘭、牛膝、益母草、蒲黃。

當歸、桂枝、朮、菊花、牛膝、主痺。

治瘧在陰分久不止。當歸、牛膝、監甲、橘皮、生薑。

治心血虛。不得眠。當歸、酸棗仁、遠志、人參、茯神。

治盜汗。當歸、黃耆、生熟地黃、黃芩、黃連、黃蘗。

治破傷風。當歸、荊芥、白芷、芍藥、地黃。

治一切折傷。跌。挫。因。作。疼。當歸、續斷、牛膝、杜仲、地黃、鹿角屑、桂。

治難產及倒生。當歸、川芎、人參。

治產後血上。薄心。當歸、益母草、紅藍花、酒黃、牛膝。

治婦人血閉。無子。當歸、白膠、黃芩、芍藥、續斷、杜仲。

治滯下。純血。裏急後重。當歸、地榆、金銀花、滑石、紅麴。

治血虛發熱。當歸補血湯。治

肌熱燥熱。因渴引飲。目赤面紅。晝夜不息。其脈洪大而虛。重按全無力。此血虛之候也。得於肌困勞役。證象白虎。但脈不長實。為異耳。若誤服白虎湯。即死。宜此主之。當歸身酒洗二錢。綿黃芪蜜炙一兩。作一服。水二鍾。煎一鍾。空心溫服。日再服。(東垣蘭室秘藏方)

治失血眩暈。凡傷胎去血。產後去血。崩中去血。金瘡去血。拔牙去血。一切去血過多。心煩眩暈。悶絕。不省人事。當歸二兩。芍藥一兩。每用五錢。水七分。酒三分。煎七分。熱服。日二。(婦人良方)

治頭血不止。當歸焙研末。每服一錢。米飲調下。(聖濟總錄方)

治小便出血。當歸四兩。對酒三升。煮取一升。頓服。(肘後方)

治頭痛欲裂。當歸二兩。酒一升。煮取六合。飲之日再服。(外臺秘要方)

治內虛目暗。補氣養血。用當歸生曬六兩。附子火炮一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每服三十九丸。溫酒下。名六一丸。(聖濟總錄方)

治心下痛刺。當歸為末。酒服

方寸匕。(必效方)

治手臂疼痛。當歸三兩。切。酒浸三日。溫飲之。飲盡。別以三兩再浸。以瘳為度。(事林廣記方)

治溫瘧不止。當歸一兩。水煎飲。日一服。(聖濟總錄方)

治久痢不止。當歸二兩。吳茱萸一兩。同炒香。去茱萸不用。為末。蜜丸。桐子大。每服三十九丸。米飲下。名勝金丸。(普濟方)

治大便不通。當歸、白芷等分為末。每服二錢。米湯下。(聖濟總錄方)

治婦人百病。諸虛不足者。當歸四兩。地黃二兩。為末。蜜丸。梧子大。每食前米飲下十五丸。(太醫支法存方)

治月經逆行。從口鼻出。先以京墨磨汁服止之。次用當歸尾、紅花各三錢。水一鍾半。煎八分。溫服。其經即通。(簡便方)

治室女經閉。當歸尾、沒藥各一錢。為末。紅花浸酒。面北飲之一日一服。(普濟方)

治婦人血氣。膝下氣脹。月經不利。血氣上攻。欲暈。不得睡。用當

歸四錢。乾漆燒存性二錢。為末。煉蜜丸。梧子大。每服十五丸。溫酒下。(永類鈴方)

治墮胎下血不止。當歸焙一兩。葱白一握。每服五錢。酒一盞。半煎八分。溫服。(聖濟總錄方)

治妊娠胎動。神妙佛手散。治婦人妊娠傷動。或子死腹中。血下疼痛。口噤欲死。服此探之。不損則痛止。已損便立下。此乃徐玉神驗方也。當歸二兩。芍藥一兩。為粗末。每服三錢。水一盞。煎令泣泣欲乾。投酒一盞。再煎一沸。溫服。或瀝之。如人行五里。再服。不過三五服便效。(備急方)

治產難胎死。橫生倒生。用當歸三兩。芍藥一兩。為末。先以大黑豆炒焦。入流水一盞。童便一盞。煎至一盞。分為二服。未效再服。(婦人良方)

治倒產子死不出。當歸末。酒服方寸匕。(子母秘錄方)

治產後白膜。腹痛引脇。當歸二錢。乾薑炮五分。為末。每服三錢。水一盞。煎八分。入鹽許熱服。(婦人良方)

十三畫 當

①治產後腹痛如絞。當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分爲二服。未效再服。(婦人良方)

②治產後自汗。壯熱氣短。腰脚痛不可轉。當歸三錢。黃芪白芍藥酒炒各二錢。生薑五片。水一盞。半煎七分。溫服。(和劑局方)

③治產後中風。不省人事。口吐涎沫。手足瘳癱。當歸。荆芥穗等分爲末。每服二錢。水一盞。酒少許。童尿少許。煎七分。灌之。下咽即有生。意神效。(聖惠方)

④治小兒胎寒好啼。晝夜不止。因此成癩。當歸末一小豆大。以乳汁灌之。日夜三四度。(肘後方)

⑤治小兒脾溼。不早治。成脾風。或腫赤。或出水。用當歸末傳之一方。入麝香少許。一方用胡粉等分。試之最驗。若愈後因尿入復作。再傳即愈。(聖惠方)

⑥治湯火傷。疥。嫩赤潰爛。用此生肌拔熱止痛。當歸黃蠟各一兩。麻油四兩。以油煎當歸焦黃。去滓。納蠟攪成膏。出火毒攤貼之。(和劑局方)

⑦治白黃色枯。舌縮恍惚。若語

亂者死。當歸。白朮二兩。水煎。入生薑汁。蜜和服。(三十六黃方)

⑧治產後腹中疔痛。並腹中寒病。虛勞不足。(金匱方)當歸三兩。生薑五兩。羊肉一斤。上以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。⑨當歸補血湯。治男婦血虛似白虎症。肌熱面赤。煩渴引飲。脈來洪大而虛。重按則微。此方主之。(寶鑑方)當歸二錢。黃耆一兩。上二味水煎服。

⑩當歸六黃湯。治陰虛有火。盜汗發熱。(古方)當歸。生地。熟地。黃芩。黃連。黃柏各等分。黃耆加倍。上藥以水煎服。⑪當歸龍薈丸。治肝經實火。大便秘結。小便澀滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹。凡屬肝經實火。皆宜服之。(宣明方)當歸。龍膽草。黃連。黃芩。山梔各一兩。大黃。蘆薈。青黛各五錢。木香二錢。麝香五分。(另研)上爲末。炒。神麴糊丸。每服二十九。姜湯下。⑫當歸四逆湯。治

手足厥冷。脈細欲絕。脈浮革。因而腸鳴者。(傷寒方)當歸。桂枝。白芍各三兩。細辛二兩。大棗。杏仁。甘草。通草各二兩。上七味以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

⑬當歸芍藥散。治婦人懷妊。腹中疔痛。(金匱方)當歸三兩。芍藥一斤。茯苓四兩。白朮四兩。澤瀉半斤。芎藭三兩。右杵爲散。取方寸匕。酒和。日三服。⑭當歸貝母苦參丸。治妊娠小便難。飲食如故者。(金匱方)當歸。貝母。苦參各等分。上三味末之。蜜丸。如小豆大。飲服三丸。加至十丸。⑮當歸散。婦人妊娠宜常服。(金匱方)當歸。黃芩。芍藥。芎藭各一斤。白朮半斤。上五味杵爲散。酒服方寸匕。日再服。妊娠常服。即易產。胎無苦疾。產後百病悉主之。

參攷資料 ⑯世俗多謂惟能治血而金匱外臺千金諸方。皆爲人補不足。決取立效之藥。古方用治婦人產後惡血上衝取效。無急於此。凡氣血昏亂者。服之即定。可以補虛備產後要藥也。(陳承)⑰其用有三。一。心經本藥。二。和血。

治諸病夜甚。凡血受病。必須用之。血凝而不流。則痛。當歸之甘溫。能補和血。辛溫。能散內寒。苦溫。能助心散寒。使氣血各有所歸。(張元素)⑱入手少陰。以其心生血也。入足太陰。以其脾運血也。入足厥陰。以其肝藏血也。頭能破血。身能養血。尾能行血。全用同人參黃芪。則補氣而生血。同牽牛大黃。則行氣而破血。從桂附藥。則熱從大黃芒硝。則寒。佐使分定。用者當知。酒蒸治頭痛。諸痛皆屬火。故以血藥主之。(王好古)⑳按附雅。薛山。嶺。又云。薛白。嶺。薛音百。嶺即古芹字。郭璞註云。當歸也。似芹而粗大。許慎說文云。生山中者名薛。一名山嶺。然則當歸芹類也。在不地者名芹。生山中粗大者名當歸也。(蘇頌)㉑當歸本非芹類。特以花葉似芹。故得芹名。古人娶妻爲嗣。續也。當歸調血。爲女人要藥。有思夫之意。故有當歸之名。正與唐詩胡麻好種無人種。正是歸時又不歸之旨相同。崔豹古今注云。古人相贈以芍藥。相招以文無。文無一名當歸。芍藥一名將離。故也。(李時珍)㉒

今隴西四陽黑水當歸多肉少枝。

氣香。名馬尾當歸。西川北部當歸多根枝而細。歷陽所出者色白而氣味薄。不相似。呼為草當歸。缺少時亦用之。(陶弘景)今出當州

宕州。翼州。松州。以宕州者最勝。有二種。一種似大葉芎藭者。名馬尾當歸。今人多用。一種似細葉芎藭者。名蠶頭當歸。即陶稱歷陽者。不堪用。葉葉並卑。下於芎藭。(蘇恭)

今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之。以蜀中者為勝。春生苗。綠葉有三斑。七八月開花似薔薇。淺紫色。根黑黃色。以肉厚而不枯者為勝。(蘇頌)今陝西秦州。汶州諸處。人多栽種為貨。以秦歸頭。則尾多色淡氣香。肥潤者。名馬尾歸。最勝他處。頭大尾粗。色白。堅枯者為饒。頭歸。止宜入發散藥。爾韓悉言川產者力。剛而善攻。秦產者力柔而善補是矣。(李時珍)

【當歸酒】基本 本品係用當歸煎汁。或浸酒。

主治 和血脈。堅筋骨。止諸痛。

【當歸散】即當歸之處方用名。詳

十三畫 當

「當歸」條。

【當藥】即酸模之古籍別名。典見綱目。詳「酸模」條。

【當藥】即苦草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦草」條。

【痰切豆】即鹿藿之日本名。詳「鹿藿」條。

【痰宮劈歷】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「半夏」條。

【睡香】即瑞香之原名。詳「瑞香」條。

【睡菜】

命名 本品土人採根為鹽菹。食之好睡。故名。

古籍別名 眠菜。綽菜。醉草。爛婦。蔴(綱目)水柏(日本)

外國名詞 Menianthes trifoliata, L. (拉丁) ミツガシ

ハミツハンゲ(日本) 基本 係龍膽科睡菜屬。為睡菜之根。

產地 生池沼間。

形態 睡菜為水菜類之一種。葉類慈姑。由三小葉成。小葉有鈍鋸齒。夏月自根間抽莖。長尺餘。梢上著二寸許之疎穗。而開花。花冠呈白色。內面密生白色。其根可供

痰 睡 睡 矮 碗 碗 碗 碗

藥用。

性質 甘。微苦。寒。無毒。主治 心腸邪熱。不得眠。


【睡蓮】命名 本品花形似蓮。晝開夜閉。而清香氣爽。令人思睡。故名。

古籍別名 眠菜。睡蓮菜。瑞蓮花(綱目拾遺)

外國名詞 Nymphaea foliata, Georg. var. angustata, Cassp.

產地 專中之池沼間多有之。

形態 睡蓮為水草類之多年生草本。幹如銀股。心似雞頭。以水之深淺為長短。一根似藕條。葉布數重。如荇而大。類似芙蓉。葉脚有深缺刻。秋月開重瓣之五色花。或有外紫內白。其花晝放夜合。自未刻以後。即縮入水底。至晝復出。採得可供藥用。



睡 蓮

採取 須於雞鳴時採之。

主治 消暑解醒。佩之好眠。

【睡蓮菜】即睡蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「睡蓮」條。

【睡蟲】即砂投子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「砂投子」條。

【睡鴉】即鴉之古籍別名。典見周詩。詳「鴉」條。

【矮茶】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳「紫金牛」條。

【矮脚樟】即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

【葉底紅】條。

【矮脚鳳尾】即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【矮樟】即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

【碗草】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「淫羊藿」條。

【碗兒胭脂】即油胭脂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「油胭脂」條。

【碗礮石】即礮石之古籍別名。典見綱目。詳「礮石」條。

【碗砂】即蓬砂之處方用名。詳「蓬砂」條。

十三畫 碎禁稗 稠稗 稔窟 窠窠 竭 筧 筧 梁 粳

〔Boric Acid〕即蓬砂製煉者之化學名稱。功能勝尋常蓬砂。見『蓬砂』條。

【碎米柴】基本 碎米柴爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 瘰癧發背。入傳藥用。

【碎骨子】即淡竹根之古籍別名。典見綱目。詳『淡竹葉』條。

【禁生】即石斛之古籍別名。典見本經。詳『石斛』條。

【禁宮花】即王不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳『王不留行』條。

【稗】命名 稗乃卑賤之義。本品爲禾之卑賤者。故名。古籍別名 水稗。旱稗。紫黑色者名烏木(綱目)。

外國名詞 Panicum Crus
Call. L. (拉丁)ノヤヒ イ ×
ビエ(日本)

基本 係禾本科稗屬。
產地 田野處處有之。
形態 稗爲穀類之一年生草本。水生者莖扁。上青下紫。旱生者則綠色。高一二尺。或三四尺。葉細

長而尖。有平行脈。葉柄爲鞘狀而抱莖。初秋小花。圓錐花序。殼上有芒。與稗相似而較小。色紫黑。或淡綠色。子茶褐色。其米可供食與藥用。

性質 辛。甘。苦。微寒。無毒。
主治 煮食。益氣宣脾。

【稗苗根】主治 金瘡及傷損。末搽之。即止。甚驗。

【稠梨】即櫻類之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『櫻類』條。

【稠青蕈】係香蕈之一種。生於山間絕頂樹杪。初如蕊珠圓瑩。淺黃白色。味尤甘美。老則味減。烹時參和菜味。加以酒。勿攪動。動則涎腥不可食。性質效能與香蕈同。參見『香蕈』條。

【稚蕈】即蕈之嫩莖。典見綱目。詳『蕈』條。

【稔蕈】即大蕈之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大蕈』條。

【窟蕈樹】即無漏子之樹名。典見西陽雜俎。詳『無漏子』條。
【窠屑】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【窠童】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【摺】即魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳『魚狗』條。

【寬冬】即麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【筧門冬】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【粟】即粟米之原名。詳『粟米』條。

【梁米粥】性質 甘。溫。平。無毒。
主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

【粳米】命名 梗者硬也。本品性則少黏。故名。

處方用名 粳稻米。粳米粉。
古籍別名 秬米。粳米(綱目)
外國名詞 Orza sativa,
〔拉丁〕イネ ウルチ コメ
ウルゴン ウルシネ(日本)

基本 係禾本科稻屬。爲粳稻之子實。

產地 各省皆有出。原產於東印度。
形態 粳稻爲栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。作圓柱狀。直立而中空。有節。葉狹長。有尖

端。葉脈平行。葉柄包圍於莖外如鞘狀。互生。秋月莖梢抽穗而着小花。無萼及花冠。有內外兩殼。雄蕊六枚。雌蕊一枚。柱頭呈羽狀。果實爲穎果。有早中晚三收。其米供食。又充藥用。



米 梗

採取 八九月刈收之。
製法 收得曬乾。除去殼。杵去糠。

性質 甘。苦。平。無毒。
效能 補肺脾。益腸胃。專作滋養強壯藥。

主治 益氣。止煩。止渴。止洩。
歷代記述攷證 〔唐〕韓保昇蜀本草論粳米曰。溫中和胃氣。長肌肉。〔唐〕孟詵食療本草論粳米曰。煮汁。主心痛。止渴。斷熱。下痢。〔唐〕孫思邈千金翼論粳米曰。常食乾粳飯。令人不噎。〔宋〕日華諸家本草論粳米曰。補中。壯筋骨。益腸胃。〔元〕王好古湯液本草論粳

米曰。合夾實作粥食。益精強志。聰耳明目。【明】李時珍本草綱目論。粳米曰。能通血脈。和五臟。好顏色。【明】繆希雍本草經疏論粳米曰。粳米即人所常食米。感天地冲和之氣。同造化生育之功。爲五穀之長。人相賴以爲命者也。經曰。安穀則昌。絕穀則亡。仲景曰。人受氣於水穀以養神。水穀盡而神去。自上古聖人樹藝至今。不可一日無此也。稟土德之正。其味甘而淡。其性平而無毒。雖專主脾胃。而五臟生氣血脈精髓。因之以充溢。周身筋骨肌肉皮膚。因之而強健。本經益氣止煩止洩。特其餘事耳。【明】李士材本草圖解論粳米曰。粳米味甘苦平無毒。主益氣。止煩止泄。溫中和胃氣。長肌肉。穀芽即大米穀水浸生芽者。啓脾進食。寬中消穀。【清】黃宮繡本草求真論粳米曰。粳米即人常食之米也。稟天地中和之氣。味甘性平。人非此物不能養生。故性端主脾胃。而兼及他臟。凡五臟血脈。靡不因此而灌溉。五臟積液。靡不因此而充溢。他如周身筋骨肌肉皮膚。靡不因此而強

十三盡 粳

健。故凡白虎桃花竹葉石膏等湯。靡不因此以爲固中清熱。然米既有早晚之不同。復有地土出處之各異。早米受氣既早。性雖溫而質多黏。食之反能戀腸。晚米受氣既遲。其性稍涼。服之不無稍清。而白晚性滯。尤覺滋害。出於高地。則米硬而質潔。出於窪處。則米潤而性陰。然總於中是固。諸方用此佐助。蓋恐藥性苦寒。得此甘緩同入。俾胃氣不致頓損。而熱與煩亦得與之俱安矣。此雖常食之物。不甚有益。而一參以藥投。則其力甚巨。未可等爲泛常而忽視也。【清】王士雄隨息居飲食譜論粳米曰。秬米（亦作粳）甘平宜煮粥。食功與秬同。秬亦可粥。而秬較稠。秬亦可飯。而秬耐飢。粥飯爲世間第一補人之物。強食亦能致病。我生。易云節飲食。論語云食無求飽。尊者能釋其義。不必別求他法也。惟患停飲者不宜啜粥。榜腹雀亂雖米湯不可入口。以其性補。能閉塞腸絡也。故貧人患虛證。以濃米飲代參湯。每收奇績。若人衆之家。大鍋煮粥時。俟粥鍋滾起沫圓。醱滑如膏

者。名曰米油。亦曰粥油。撇取淡服。或加煉過食鹽少許服亦可。大能補液填精。有裨羸老。至病人產婦。粥養最宜。以其較純爲柔。而較稜不黏也。亦可磨粉作糕。而嘉興人不善藏穀。收米入甕。蒸罨變紅。名曰冬春米。精華盡去。糟粕徒存。暴殄天物。莫此爲甚。炒米雖香。性燥助火。非中寒便瀉者。忌之。又有一種香秬米。自然有香。亦名香珠米。煮粥時稍加入之。香美異常。尤能醒胃。凡煮粥宜用井泉水。則味更佳也。

近人學說 丁福保曰。米粒之中。蛋白質七。八。脂肪二。一。灰分一。二。水分一。三。二。除去水分之時。則其成分蛋白質爲第一。脂肪次之。灰分又次之。蛋白質與鷄卵之白相同。爲第一滋養人體之物。其他二成分。亦不可缺少。多數食物中。米爲最要。吾人以米爲常食。由於習慣。而適於人體。近時肉食盛行以來。有謂食獸肉爲肉。較米食爲優者。然但食肉類。而廢食米。斷不能保其健康。以米中之蛋白質與鷄卵及肉類中所含者。爲同一之成分。縱令不食肉類。鷄卵。亦有同一之效能。米中之脂肪。實有強壯身體。使之肥滿之效。而其消化大抵於食後一時間。已竟其功。

配合應用 ●治霍亂吐瀉。煩渴欲絕。用粳米二合。研粉。入水二盞。研汁。和淡竹瀝一合。頓服。（普濟方）

●治赤痢熱燥。粳米半升。水研取汁。入油瓷瓶中。蠟紙封口。沉井底一夜。平旦服之。吳內翰家乳母病此。服之有效。（普濟方）

●治自汗不止。粳米粉絹包。頻頻撲之。

●治五種尸病。粳米二升。水六升。煮一沸。服。日三。（肘後方）

●治卒心氣痛。粳米一升。水六升。煮六七沸。服。（肘後方）

●治米糲嗜米。有入好啞米。久則成瘕。不得米則吐出清水。得米即止。米不消化。久亦斃人。用白米五合。雞屎一升。同炒。焦爲末。水一升。頓服。少時吐出瘕。如研米汁。或白沫。淡水乃愈也。（千金方）

●治小兒初生三日。應開腸胃。

十三畫 粳

粳

一四七四

助穀神者。碎米澆作汁飲如乳酪。類以豆許與兒飲之。二七日可與哺。慎不得與雜藥也。(肘後方)

①治初生無皮。色赤。但有紅筋。乃受胎未足也。用早白米粉撲之。肌膚自生。(聖濟總錄方)

②治小兒甜積。生於面耳。令母類嚼白米。臥時塗之。不過三五次即愈。

③荒年辟穀。粳米一升。酒三升。漬之。曝乾。又漬酒浸取出。稍食之。可辟三十日。足一斗三升。辟穀一年。(肘後方)

④治胎動腹痛。急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。水七升。煎二升。分四服。(聖惠方)

⑤治赤根丁腫。白粉熬黑和蜜傅之。(千金方)

參攷資料 粳米赤者粒大而香。水漬之有味甘。益人大抵新熟者動氣。經年者亦發病。惟江南人多收火稻貯倉。燒去毛。至春春米食之。即不發病。宜人。溫中益氣。補下元也。(孟詵) 粳有早中晚三種。以晚白米為第一。各處所產。種類甚多。氣味不能無少異。而亦不

大相遠也。粳稻六七月收者為早粳。止可充食。八九月收者為遲粳。十月收者為晚粳。北方氣寒。粳性多涼。八九月收者即可入藥。南方氣熱。粳性多溫。惟十月晚稻氣涼。乃可入藥。(李時珍) 北粳涼。南粳溫。赤粳熱。白粳涼。晚白粳寒。新粳熱。陳粳涼。凡人嗜生米。久成米瘵者。治之以雞屎白。(李時珍) 常食乾粳飯。令人熱中。唇口乾。不可同馬肉食。發痼疾。不可和蒼耳食。令人卒心痛。急燒倉米灰。和蜜漿服之。不爾即死。(孟詵) 粳有水旱二稻。南方土下塗泥多宜水稻。北方地平惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地為畝田。種旱稻者。謂之火米。古者惟下種成畦。故祭祀謂稻為嘉蔬。今人皆拔秧栽插矣。其種近百。各各不同。俱隨土地所宜也。其穀之光芒。長短大細百不同也。其米之赤白紫烏。堅鬆香否不同也。其性之溫涼寒熱。亦因土產形色而異也。真贗有水稻。高丈許。隨水而長。南方有一歲再熟之稻。蘇頌之香粳。長白如玉。可充御貢。皆粳之稍異者也。(李時

珍)

【粳米禾稈】

主治 解砒毒。燒灰。新汲水淋。汁濾清。冷服一椀。毒當下出。

【粳米泔水】

原名 浙二泔。命名 浙泔米也。泔。泔汁也。蓋謂泔水宜取第二次者。清而可用。故名。古籍別名 米泔。(綱目)

性質 甘寒。無毒。主治 清熱。止煩渴。利小便。涼血。

參攷資料 風熱赤眼。以浙二泔。睡時冷調洗肝散。菊花散之類。服之。(戴原禮)

【粳米粉】

即粳米之處方用名。詳「粳米條」。

【粳米殼奴】

善本 本品即穀穗煤黑者。主治 走馬喉痺。燒研。酒服方寸匕。立效。

【粳米湯】

原名 炒米湯。善本 本品係用炒粳米煮成之湯。主治 益胃除溼。不去火毒。令人作渴。

【粳米粥】

性質 甘溫。平。無毒。主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

參攷資料 按羅天益寶鑑云。粳米粥。氣味淡。腸中之陰也。所以淡滲下行。能利小便。韓愈醫通云。一人痢淋。素不服藥。予令專啖粟米粥。絕去他味。旬餘減。月餘痊。此五穀治病之理也。又張耒粥記云。每日起食粥一大椀。空腹。虛致氣便作。所補不細。又極柔膩。與腸胃相得。最為飲食之妙訣。齊和尚說山中僧。每將且一粥。甚緊利害。如不食。則終日覺臟腑燥澀。蓋粥能暢胃氣生津液也。大抵養生求安樂。亦無深遠難知之事。不過寢食之間。故作此勸人。每日食粥。勿大笑也。又蘇軾帖云。夜饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利腸益胃。粥既快美。粥後一覺。妙不可言也。此皆著粥之有益如此。(李時珍)

【粳稻米】

即粳米之處方用名。詳「粳米條」。

【絹】

善本 本品乃素帛也。生曰絹。熟曰練。用蠶之黃絲。

所織成者。非染色也。

【古籍別名】練。(綱目)

採取 以黃絲絹入藥用。

主治 黃絲絹煮汁服。止消渴。

產婦浮腫。洗痘潰爛。燒灰止血痢下血。吐血血崩。

【經赤】即臙脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『臙脂』條。

【經芥】即黃芥之古籍別名。與見別錄。詳『黃芥』條。

【經粉】即臙脂之古籍別名。與見和漢藥考。詳『臙脂』條。

【經霜老茶葉】參攷資料。患羊癩瘋者。用一兩爲末。同生明礬五錢爲細末。水法丸。硃砂作衣。每服三錢。白滾湯送下。三服全愈。又好吃茶葉者。即以茶葉入肉汁湯內。飯鍋上蒸吃二三次。即不喜吃。(家寶方)

【經辯】即黃辯之古籍別名。與見別錄。詳『黃辯』條。

【絡橋】即當歸之古籍別名。與見和漢藥考。詳『當歸』條。

【義竹】即慈竹之古籍別名。與見綱目。詳『慈竹』條。

【聖石】即光明鹽之古籍別名。與見

見蜀本草。詳『光明鹽』條。

【聖先子】即預知子之古籍別名。與見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。與見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【聖僧】即楊梅子實色白者之別名。與見綱目。詳『楊梅』條。

【聖鐵】即天鐵蓋之古籍別名。與見和漢藥考。詳『天鐵蓋』條。

【聖蓮草子】即聖麥之古籍別名。與見和漢藥考。詳『聖麥』條。

【腦子】即冰片之古籍別名。與見和漢藥考。詳『冰片』條。

【腦荷】即龍腦薄荷之簡稱。詳『龍腦薄荷』條。

【腦膏】即人耳垢之古籍別名。與見日華諸家本草。詳『人耳垢』條。

【腦蓋竹】即天鐵蓋之古籍別名。與見綱目。詳『天鐵蓋』條。

【腦黃】即雄黃之別名。詳『雄黃』條。

【腹皮】即大腹皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳『大腹皮』條。

【腹蟻】即蟬蛻之古籍別名。與見

別錄。詳『蟬蛻』條。

【萬一藤】(綱目拾遺) 古籍別名 萬吉。

產地 生嶺南諸地。

基本 萬一藤爲莖草類之一種。蔓如小豆。可供藥用。

主治 蛇咬。杵末。水和傳之。

【萬吉】即萬一藤之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『萬一藤』條。

【萬年灰】即石灰之陳者。效能詳『石灰』條。

【萬年松】即卷柏之俗名。詳『卷柏』條。○即玉柏之古籍別名。與見綱目。詳『玉柏』條。

【萬年枝】即女青之別名。詳『女青』條。

【萬年青】古籍別名 千年莖。冬不凋草。(綱目拾遺)

形態 萬年青爲澤草類多年生之常綠草本。葉厚闊大而叢有平行脈。每枝獨瓣。無歧梗。葉頗青厚。花莖生於葉叢之中央。長四五寸。夏月生莖如玉黍狀。開小花。色淡綠。叢叢蕊上作穗狀花序。入冬結子。形圓。色黃或紅。惟喜山土。人

多栽種。其根可供藥用。子花葉詳見各條。



萬年青

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 咽喉急閉。搗汁和醋灌之。吐痰而愈。並療火丹。收溼熱洗脚氣。湯火傷。天泡瘡。白蛇纏。解中滿。魚眼。黃疽。心疼。哮喘。咳嗽。打傷。臨泣。

配合應用 ○白火丹。萬年青搗汁服。(祝氏效方)

○辟瘟丹。治頭風如神。用萬年青根削尖。蘸硃砂塞鼻孔內。左塞右。右塞左。兩邊痛者齊塞。神效。取清水鼻湧下。須一週時妙。(嵩崖雜記方)

○治老幼脫肛。萬年青連根煎湯洗。用五椀子末敷上立效。(活人書方)

○蛇毒。用萬年青磨塗渣。卷皆妙。(德勝堂方)

○治陰囊大。用萬年青根搗汁。

十三畫 萬 萱

熱沖陳酒服三次即愈。

治痔瘡腫痛難行。豬腿骨去兩頭。同萬年青入砂鍋內。水煮一炷香。乘熱熏。溫洗。日三次。數日愈。永不發。(活人書方)

治經喉風。用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下。吐出痰涎即好。倘口閉用牙刷挖開灌下。不吐再用髮梢送喉間探之。(經驗方)

參攷資料 萬年青以葉短尾即者為真。多作草蕪氣入腹。令人嘔吐。(趙學敏)

【萬年青子】 主治 催生。用乳香湯下一粒。

【萬年青花】 主治 一切跌打損傷。同山芝麻。樣實樹花。威靈仙汁。和丸酒下。採取 以嫩者陰乾用。

【萬年青葉】 性質 苦。微甘。無毒。 主治 解毒。清胃降火。止吐血。同紅棗七枚煎飲。坐板瘡。四月八日採之。煎洗痔瘡。取汁搽之。能制承。

【萬年青】 卽法製青皮之古籍別名。典見易簡方。詳「青皮」條。

【萬年霜】 卽人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人中白」條。

【萬年藤】 卽木通之古籍別名。典見藥性本草。詳「木通」條。

【萬兩】 卽硃砂根之日本名。詳「硃砂根」條。

【萬岑精】 卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【萬貞鹿】 卽豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「豬脂」條。

【萬金茸】 卽紫苑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫苑」條。

【萬歷龍鳳錢】 基本 明萬曆年所鑄之錢。上鑄龍鳳之形者。 主治 婦人臨產。置錢一文手掌內。可催生。

【萬歲】 卽卷柏之古籍別名。典見別錄。詳「卷柏」條。

【萬歲棗】 卽無漏子之古籍別名。典見一統志。詳「無漏子」條。

【萬歲藤】 卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天門冬」條。

【萬歲藤】 卽天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【萬壽果】 卽枳椇子之古籍別名。

典見藥物生產辨。詳「枳椇子」條。 【萱】 卽芒之日本名。詳「芒」條。 【萱花】 卽萱草之處方用名。詳「萱草」條。

【萱草】 處方用名 隨草。(詩經)

古籍別名 忘憂。(說文)丹棘。(古今注)應葱。(嘉祐本草)踐草。(毛詩)鹿劍。(土宿)妓女。(吳普)療愁。宜男。(綱目)忘草。(日本)黃花菜。金針菜。(隨息居飲食譜) 外國名詞 Homopolis (Lava, T) (拉丁) ワスレグサ ヒルナ(日本)

基本 係百合科萱草屬。爲萱草之苗花。 產地 凡山野平原之溼地恒有生長。

形態 萱草爲溼草類之多年生草本。葉如蒲葦而柔弱。新舊相代。四時青翠。夏月抽莖。高二三尺。莖端著以數花。花瓣六出。四垂。朝開暮萎。花有紅黃紫等色。亦有單瓣重瓣之別。至秋深。花乃盡。結果細似三角形。內有子。大如梧子。色黑而光澤。其嫩芽及花。柔輭而味

一四七六

甘。皆可供食。並可充藥用。 採取 五月採花。八月採根。採得後曬乾用。

用法 恒以黃熟調味供食。入藥水煎或對末用。

性質 甘。淡。無毒。 效能 祛溼熱。利胸膈。用作利尿藥。

主治 作益利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。輕身明目。 歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論萱草曰。養食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。【明】李時珍本草綱目論萱草曰。消食。利溼熱。

【明】李士材本草圖解論萱草曰。萱草一名鹿葱。性涼無毒。處處有之。孕婦佩帶其花。卽生男子。故又名宜男草。【清】黃宮繡本草求真論萱草曰。萱草何以萱名。以其草屬蔚茂。植之可以解憂。苗如葱葉。蒸食可以適口。味甘而氣微涼。能去溼利水。除熱通淋。止渴消煩。開胸寬膈。令人心平氣和。無有憂鬱。是以命名。但氣味清淡。服之未卽臻。不似氣猛烈。藥一入口。而卽見其有效也。【清】王士雄隨息居

飲食諸論。葦草曰。葦草甘平利膈。清熱養心。解憂釋忿。醒酒除黃。葦草宜之。與病無忌。

近人學說 張山雷曰。葦草為

涼降之品。專於清熱利水。陳穉器稱其根主沙淋。下水氣。酒疸。傷身黃者。搗汁服。寇宗奭稱其主大熱。衄血。研搗和生薑汁細呷之。景岳稱其并治帶濁。丹溪謂其善於下走。皆導熱利溼之用也。其花今為恒食之品。亦稟涼降之性。日華謂治小便赤澀。身體煩熱。蘇頌謂利胸膈。安五臟。瀕澗謂消食。利溼熱。其旨皆同。又今人恒以治氣火上。升夜少安寐。其效頗著。蓋其花亦朝開夜合。能順陰陽。噓吸之宜。而又能涼降泄火。以療陰火上浮。暮不歸合之證。固其宜也。

配合應用 ①治通身水腫。鹿葱根。曬乾為末。每服二錢。入席下。磨半錢。食前米飲服。(聖惠方) ②治小便不通。葦草根煎水類飲。(杏林摘要方) ③治大便後血。葦草根和生薑油炒酒衝服。(聖濟總錄方) ④治食丹藥毒。葦草根研汁服

十三畫 葦 助 蒿 蒿

之。(事林廣記方)

用薑 錢半至三錢。

參攷資料 ①葦本作葦。說也。詩云。焉得葦草。言樹之背。謂葦不能自遺。故欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。葦子云。欲忘人之憂。則贈之。丹棘一名忘憂。故也。其苗食。氣味如葱。而鹿食九種解毒之草。葦乃其一。故又名鹿葱。周處風土記云。懷妊婦人佩其花。則生男。故名宜男。李九華延壽書云。嫩苗為蔬。食之動風。令人昏然如醉。因名忘憂。此亦一說也。番康養生論。神農經言中藥。養性。故合歡。獨忿。葦草忘憂。亦謂食之也。鄭樵通志。乃言葦草。一名合歡者。誤矣。(李時珍) ②葦草。處處田野有之。俗名鹿葱。五月採花。八月採根。今人多採其嫩苗。及花附作蔬食。(蘇頌)

【葦草根】 主治 沙淋。下水氣。酒疸。黃色。遍身者。搗汁服。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論葦草根曰。大熱。衄血。研汁一大盃。和生薑汁半盃。細呷

之。【明】李時珍本草綱目論葦草。根曰吹乳。乳癰腫痛。搗酒服。以淨封之。

【蕒子】 卽側子之古籍別名。典見說文。詳「側子」條。

【蒿苳】 命名 本品來自高國。故名。

古籍別名 高菜。千金菜。(綱目) 嫩根名高苳。(俗名)

外國名詞 *Lactuca Scariola*, *Wigol* (拉丁) *チシヤ* *チサ* (日本)

基本 係菊科高苳屬。為高苳之根葉。其子詳見該條。

產地 生原野園圃間。

形態 高苳為菜類之一。年或越年生。草本。高三尺餘。上部之葉。無柄而尖。抱於莖上。下部之葉。廣而長。折之有白色黏汁。春末。梢頭分枝開花。舌狀花冠。黃色。



苳 高

性質 苦。冷。微毒。 主治 利五臟。通經脈。開胸膈。 功同白苳。

歷代記述攷證 【明】寧原食鑑本草論高苳根葉曰。利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。【明】李時珍本草綱目論高苳根葉曰。通乳汁。利小便。殺蟲蛇毒。

參攷資料 ①高苳有白者。紫者。其紫者入燒煉藥用。(陳藏器) ②久食昏人目。患冷人不宜食也。(李廷飛) ③按彭乘云。高苳有毒。百蟲不敢近。蛇蝎觸之。則目瞑不見物。人中其毒。以薑汁解之。(李時珍) ④紫高苳有毒。入燒煉用。丹房鑿源曰。高苳用硫黃種結砂子。制砂。又曰。紫色高苳。和土作器。火假如銅也。(陳藏器)

【高苳子】 製法 入藥宜炒用。 主治 下乳汁。通小便。治陰腫痔漏。下血。傷損作痛。

【高苳】 卽高苳之嫩根。詳「高苳」條。

【高菜】 卽高苳之古籍別名。典見綱目。詳「高苳」條。

【蕒苳】 卽蕒苳之古籍別名。典見

和漢藥考詳「蕒蕒」條。

【蕒蕒】

蕒蕒草。地處方用名。蕒蕒草。地

古籍別名 蕒竹(陶弘景)蕒
辨。蕒蕒(吳普本草)粉節草。道生
草(綱目)蕒蕒。王芻。百節。百節
草。猪牙草。鐵綿草(和漢藥考)殘
竹草(藥物生產辨)

外國名詞 Knob, Grass.

(英)

基本 蕒蕒科庭柳類。為蕒蕒
之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
蕒蕒產廣東龍門。從化。新安。惠州
等處。各省亦有。產南順地方。俗稱
其為殘竹草。牛最喜啖之。其頭即
蕒蕒也。

形態 蕒蕒為草本植物。多繁
殖。株旁高達一尺。全體類莖。葉厚
互生。夏季於葉腋開淡紅色。或
帶青色之小花。花後結黑色三角
形小實。根強潤。深入土中。吸收肥
料。

採取 五月間採之。
製法 採得陰乾用。
用法 水煎。或生搗飲。

性質 苦。平。無毒。
效能 殺蟲治蚊痛。通淋利小
便。

主治 浸淫疥癩。疽痔。殺三蟲。
(本經)療女子陰蝕(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論蕒蕒曰。煮汁飲。小兒療
蚊蟲有驗。【明】李時珍本草綱目
論蕒蕒曰。治霍亂黃痘。利小便。小
兒疳積。【明】李士材本草圖解論
蕒蕒曰。蕒蕒苦寒。利小便。驅濕熱。
殺諸蟲。【清】黃宮繙本草求真論
蕒蕒曰。蕒蕒味苦氣平。功尚利水
清熱。除濕殺蟲。是以小兒疳積。女
子陰蝕。浸淫疥癩。疽痔諸病。無不
藉此以為主治耳。以其味苦則熱
濕。味苦則蟲伏。但此止屬標治。不
能益人。勿常用也。葉細如竹。蕒莖
莖引。促節有粉。三月開細紅花。

近人學說 張山雷曰。蕒蕒味
辛。為燥溼殺蟲之品。今本皆作苦。
惟孫本作辛。據今本作痿。本經別
錄。皆以卻除溼熱為治。浸淫疥癩
疽痔。陰蝕。三蟲。皆溼熱為病也。後
人以其漚化溼熱。故并治溼瀉。淋
濁。瀕瀕以治黃痘霍亂。皆即清熱

利溼之功用。然亦惟溼阻熱結為
宜。而氣虛之病。皆非其治。若溼熱
疥癩。浸淫痛癢。紅腫四溢。膿水淋
瀉等證。尤其專職。

配合應用 ①治熱淋瀉痛。蕒
竹煎湯類飲。(生生編方)

②治熱黃痘疾。蕒竹搗汁頓服
一升。多年者日再服之。(藥性論
方)

③治霍亂吐利。蕒竹入豉汁中。
下五味煮羹食。(食醫心鏡方)

④治丹石銜眼。服丹石人毒發。
銜眼腫痛。蕒竹根一握洗搗汁服
之。(食療本草方)

⑤治蚊咬心痛。治小兒蚊咬心
痛。面背口中沫出。隨死者。取蕒竹
十斤。到以水一石。煎至一斗。去滓
煎如餒。隔宿勿食。空服一升。蟲即
下也。仍常煮汁作飯食。海上歌云。
下也。仍常煮汁作飯食。海上歌云。
心頭急痛不能當。我有仙人海上
方。蕒蕒醋煎適口。管教時刻便
安康。(食療本草方)

⑥治蟲食下部。蟲狀如蝸牛。食
下部作痒。取蕒竹一把。水二升。煮
熱。五歲兒空腹服三五合。(楊氏
產乳方)

⑦治痔發腫痛。蕒竹搗汁。服一
升。一二服未瘳。再服。亦取汁和麩
作餅。食。日三次。(藥性論方)

⑧治疔瘡疔毒。蕒竹搗封
佈落即瘳。(肘後方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無蟲積及中虛
洩便不利者禁用。

參攷科按 ①許慎說文作蕒
筑。與竹同音。節間有粉。多生道旁。
故方士呼為粉節草。道生草。(李
時珍) ②處處有之。布地而生。花
節間白。葉細。人呼為蕒竹。(陶
弘景) ③春中布地生道旁。苗似
蘆荻。葉細。綠如竹。赤莖如銀。股節
間花出。甚細。微青黃色。根如蒿根。
四五月採苗陰乾。蜀圖經云。二月
日乾。郭璞注爾雅云。似小麥。赤莖
節。好生道旁。可食。殺蟲是也。或云。
爾雅王芻即此也。(蘇頌) ④其葉
似落葉。而不尖。刺。莖引。莖節。
三月開細紅花。如薔薇花。結細子。
爐火家燒灰。煉霜。用一種水。蕒蕒
名。音督。出脫文(李時珍)

【落地生】即落花生之古籍別名。
與見綱目拾遺。詳「落花生」條。

【落蒂】即地膚子之古籍別名。與見諸家本草。詳「地膚子」條。
 【落蒂蒂】即地膚子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【落花生】 命名 花謝落地。其結實。故名。
 古稱別名 香豆。(物理小識)
 落地生。土露子。長生果。土豆。香芋。(食物便覽)

外國名 Arachis hypogaea, L. (拉丁) Peanant; Earthnut; Groundnut. (英)

產地 落花生原係南美洲熱帶地方之產物。我國閩省產者。出與化爲第一。味甘而粒滿。名黃土。出臺灣者。味澁而粒細。名白土。江浙亦有出。日本以紀伊地方最多。

形態 落花生爲一年生草本。莖高一二尺。其枝蔓延地上。葉爲由四小葉而成之羽狀複葉。於夏秋間開黃色小蝶形花。受精後。花托伸長向地。終伸入地下一二寸處。子房成熟。結成莢實。莢狀莢實。

故名落花生。莢實長一寸餘。作灰白色。外有紋理。中藏種子一粒。至四粒。種子爲白色。被有淡紅色薄膜。



落花生

採取 每年冬初掘土挖取。洗淨曝乾。

用法 炒食。或煮食。

性質 甘辛。無毒。

效能 悅脾和胃。潤肺化痰。有滋養功效。

主治 潤肺。解毒。化痰。炒食甘溫。養胃。調氣。耐飢。入饌。頗佳。榨油甚劣。以肥白香甜者良。有火者。但宜煮食。

歷代記述攷證 【清】汪詒庵

本草備要論花生曰。辛能潤肺。香能舒脾。果中佳品。【清】吳儀洛本草從新論花生曰。潤肺。補脾。和平。可貴。【清】黃宮繡本草求真論花生曰。花生味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此。香可舒脾。辛可

潤肺。藥中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熱。復不類烏芋。菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最爲得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實。則可。施於體寒溼滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾胃。腸之弊乎。仍當從其體氣。以爲辨別。則得之矣。

配合應用 ●止用花生淨肉。炒極細。研極細。燃鬚一二日後。色黑如漆。(俞友梁烏髮簡便方)

●安定臣云。昔曾患四日兩頭痛。諸方莫效。有人喜食炒花生。每日食三兩。不半月而愈。

施用宜忌 性能動火生痰。不宜多食。切勿與黃熟瓜同食。食之必死。被馬踢傷者。忌服。服之。疔更增痛。

參攷資料 ●落花生本草未

收。本無當醫藥之用。然能益脾潤肺。實佳果也。因世人謗之者多。故附見於此。明其有利無害也。(汪詒庵) ●花生本有滌痰之功。予家凡患咳嗽。止用花生。去殼膜。取淨肉。沖湯服。痰嗽自安。豈非化痰之功。善於瓜蒌貝母。世俗以火炒食。反能生痰矣。(童鹿壽) ●生研用下痰。炒熟用開胃。醒脾。滑腸。乾嗽者宜餐。滋燥。潤火。按花生乃花謝落地。感土氣而成實。故有入脾和胃之功。又能通肺氣。(藥性考) ●長生果。產閩地。花落土中。即生。從古無此。近始有之。味甘氣香。能健脾胃。飲食難消者宜之。或云與王瓜相反。子曾二者同食。未蒙其害。因表出之。(蓬原) ●花生殼焙研極細末。著人身體。沾肉。即生奇瘡。(韓柳生) ●花生不可與黃熟瓜同吃。吃則立死。所謂黃熟瓜。即香瓜。非長而白色。可以醃吃之。黃瓜也。始知俗傳之誤。(劉啓堂經驗方) ●花生昔年無之。自清康熙初年。耐應元往扶桑。覓種寄回。始有此品。(趙學敏)

【落花生油】

原名 果油。基本 本品即以落花生果實。榨取白色之脂肪油。

形態 落花生油。係將落花生種子。用冷壓榨出者。爲白色或淡黃色液。比重○·九一二。氣味俱

不甚烈。在空氣中亦不變化。逢攝氏零度之冷氣則凝結。如橄欖油。至零下二十六度。則全冰結。

性質 甘平。氣腥。無毒。

成分 爲脂肪油。蛋白質。炭水化合物。纖維。灰質等。其脂肪油。爲落花生主成分。含有四十二至五十二%。由阿拉吉琪克酸 (Arachidic acid $C_{22}H_{44}O_2$) 及里克諾里克酸 (Lignonic acid $C_{24}H_{48}O_2$) 之不飽和性油酸類而成。

主治 滑腸下積。功同橄欖油。

【落通】即博落通之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「博落通」條。

【落首】即海藻之古籍別名。典見本經。詳「海藻」條。

【落得打】古籍別名。土木香。山雄黃。五香草。珍珠。

倒捲簾。(綱目拾遺)

形態 落得打爲山草類之一種。苗長二三尺。葉細碎如蒿艾。又如薄荷。有清香。秋開小花。白色。結子亦白色。成穗。葉如水和紅花狀。其根似玉竹而無節。搗爛有黏性。可供藥用。花莖詳見各該條。

性質 甘平。無毒。

主治 跌打損傷。及金瘡出血。煎服。拍傳之。

參攷資料

●落得打行血立酒炒。止血宜醋炒。(醫學大辭典)

●落得打治跌打損傷神效。曾記辛巳年小婢失足。從樓梯墜下。瘀血積滯。因採此搗汁沖酒服。以渣罨傷處。一飯頃。疼痛即散。內瘀亦洩出。藥有清香者是。此藥以家種隔二三年者入藥用良。野產者入藥有草氣。胃弱者服之多吐。(趙學敏)

【落得打】即七葉草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉草」條。

【落得打花】主治 擦牙疼。治頭風風氣。

【落得咬】即蛇草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蛇草」條。

【落得打莖枝】採取 五月。問採嫩枝用。

性質 甘平。溫。無毒。

主治 去風調氣活血。療跌打損傷。無名腫毒。去瘡瘍。療血死肉。令人不痛。

【落葵】命名 本品葉冷滑如葵。故名。

古籍別名 天葵。紫葍。(別錄)

落葵。(爾雅) 落葵。(食經) 落葵。御菜。燕脂菜。胡燕脂。承露。(綱目) 落葵。(日本)

外國名詞 Basella alba, L (拉丁) ツルムラサキ(日本)

基本 係落葵科落葵屬。爲落葵之葉。其子詳見該條。

產地 生原野園圃間。

形態 落葵爲菜之一年生草。本莖葉俱柔。葉互生。卵形。夏秋葉腋抽出長梗。開花。初白繼紅。內外二瓣中。綴以雌雄蕊。花後結小圓實。熟則深紫色。或黑色。

性質 酸寒。滑。無毒。

主治 滑中散熱。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論落葵葉曰。利大小腸。

參攷資料 ●落葵甘微酸。冷滑。脾冷人不可食。(李時珍) ●曾爲狗留者。食之終身不瘻。(陶弘景)

【落葵子】製法 取子蒸過。烈日中曝乾。按去皮。取仁細研。和白蜜調勻。作面脂用。

主治 悅澤人面。

古籍別名 圖

【落葉松茸】藥。白木茸。落葉松菌。落葉松寄生。(和漢藥考)

外國名詞 Fungus laricina, (拉丁) Agaric of larch (英) Tarchonschwamm (德)

基本 係寄生於一種落葉松之菌。

產地 和漢藥考曰。落葉松茸。產日本寒地。尤以北海道爲最多。土人珍之爲靈藥。

形態 落葉松茸形類木耳。作中圈狀。大小不一。上面平滑。有白色或黃褐色之輪紋。下面則有橙黃色或褐色之無數鬚孔。上品者裏面白色。質堅而輕。味苦辛。次者使人作嘔。或爲粉末吸之。使人發噁。

用法 去外膜。曬乾爲粉末用。(欲爲粉末。可加糊漿。搗爲泥。乾後研末)

成分 爲苦味性樹脂。有機酸。膠質。蛋白質等。

效能 用作制汗藥。日本北海道。人用治腹痛。積痛等。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。性收

道。人用治腹痛。積痛等。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。性收

道。人用治腹痛。積痛等。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。性收

道。人用治腹痛。積痛等。

瀉。能下黏液。磨液。利小便。通經閉。治痛風。傷冷毒痛。及胃寒傷冷毒。黏液塞頭。胸諸症。疏滯神思。憂病脾病。黃疸汚液。散劑用半錢。至一錢。泡劑。浸劑。或作越幾斯。用至二錢。但不能迅速下瀉。而使人惡心腹痛。故宜加桂。丁香。乾薑。益智等香竄藥用之。或云此藥止瀉。汗有殊效。亦能止勞瘵狀消耗汗。又東京醫事新誌第六百六十號。載有猪子。本田兩氏之北海道藥。藥託波西一文。對於落葉松茸。有詳細報告。轉錄於下。託波西一名愛布里古。為一種菌類。寄生於落葉松。形稍圓。表面帶黃白或黃褐色。凸凹不平。切斷之。內部充實。毫無空虛。其色潔白。質如陶土。試取一小片。嘗之。初無特異之味。後則漸苦。北海道人頗珍重之。用之於諸種疾病云。分析託波西。可得二種物質。一為有機酸。一為華爾斯狀化合物。有機酸為無色結晶物。冷水難溶。逢熱湯則漸漸發生泡沫而溶化。但冷則復行析出。逢酒精最易溶化。但其鹼鹽溶而重金屬鹽(即銀鹽。銀鹽等)不溶。此性

質與阿格里克斯酸。大抵相同。華爾斯狀物質。可從上述酒精溶液製造之。服下大量託波西。則發吐瀉。試以三。〇與犬服下。經半小時即行嘔吐。著者猪子博士。皆試服〇。二。半日後即瀉下。便氏又皆試驗託波西之刺戟消化器。究係何種成分。即用分析而得之。有機酸〇。五。製成乳劑。使一大服之。又將華爾斯狀物質一。〇。亦製成乳劑。使另一犬服之。甲犬經二十分鐘即發嘔吐。乙犬無異狀。因知有刺戟性者。實為有機酸也。又用此酸就赤蛙試驗。確定其有壓抑汗腺分泌之作用。即於赤蛙注入此酸〇。〇三。經二十分鐘後。見其皮膚初漸減少黏滑性。次漸乾燥。在觸診上。尤易感知。此性質與阿格里克斯酸。完全相同。由以上試驗。知託波西確有制汗作用。因試用於盜汗。頗有效果。皆有一三十五歲之梅毒患者。每夜盜汗。使服託波西〇。〇六。盜汗如故。次日再服同量。盜汗稍減。第三日服〇。〇八。盜汗全止。又有一三十四歲之脚氣患者。衰弱盜

汗。服託波西〇。〇六。稍減。次日服同量。盜汗全止。患者服此。概未現出不快副作用。用量一回〇。〇六至〇。一。處方如下。託波西末〇。〇六至〇。一。白糖〇。三。臨臥頓服。一次不效。可連服數日。但服多量。往往有下痢之虞。宜加阿片用之。

【落葉松菌】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落葉松寄生】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落鴈木】命名 本品藤高丈餘。雁過皆越其中。故名。或謂鴈脚至代州鴈門而生。遂有是稱。

產地 生南海山野中。

形態 落鴈木為莖草類之一種。莖四邊如刀削。纏繞木上。葉如茶。無花實。其莖葉可供藥用。

採取 四月採之。

性質 甘平。溫。無毒。

主治 風痛。傷折。脚氣腫。腹滿。虛脹。以粉木皮同煮汁洗之。立效。

又婦人陰瘡。浮泡。以椿木皮同煮汁洗之。

歷代記載攷證 【宋】蘇頌圖經本草論落鴈木曰。產後血氣痛。并折傷內損諸疾。煮汁服。

【落蘇】即茄子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『茄子』條。①即金絲草之古籍別名。典見救急方。詳『金絲草』條。

【菹】即白菹之古籍別名。典見綱目。詳『白菹』條。

【菹菜】即魚腥草之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『魚腥草』條。

【葉下紅】即葉底紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『葉底紅』條。

【葉子金】即金之產於蜀中者之別名。典見寶貨辨疑。詳『金』條。

【葉子香】即沈香之一種。性質效能。詳『沈香』條。

【葉子雌黃】與雄黃同類。出於山之陰者。為雌黃。葉子者。文理層疊也。典見素問刺法論。詳『雌黃』條。

【葉牡丹】即甘藍之日本別名。詳『甘藍』條。

【葉底紅】古醫別名。平地木。(李氏草部)矮脚樟。

十三畫 落 菹 葉

葉下紅(綱目拾遺)

形態 乃小木也。生山土。長不過一二尺。葉如石楠。四月生蕊。五六朵成簇。垂如芝麻鈴樣。花作青白色。六七月結小子。如天竺子。稍後色紅。微如天竺子而大。俗呼矮脚樟。以其樹樟葉而木短也。山人每樹之入市。售作盆玩。又名葉下紅。

主治 吐血疝氣。

配合應用 治吐血。葉底紅。即矮脚樟。用二兩洗淨。木槌搗爛。豬肺一個。洗血淨。將葉入肺管內。河井水各三碗煮爛。至五更去葉。速湯食之一二次。愈。多食耗後息。(楊春注釋方)

某撫軍得宮傳秘方。治吐血。勞傷怯症垂危。久嗽成勞。無不立愈。曾經試驗多人。用平地木葉乾者三錢。豬肺連心一具。水洗淨。血用白湯焯過。以瓦片挑開肺管。將葉包裹麻線縛好。再入水煮熟。先吃肺湯。然後去葉食肺。若嫌味淡。以清漿糖食。一肺後。病勢自減。食三肺無不愈者。但所用乃平地木。與葉下紅有別。或一類相同。其

性本通耶(陶殿元方)

治偏墜疝氣。平地木搗汁沖酒服。半碗屢效。(李氏草秘方)

葉底紅 即兔耳一枝箭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「兔耳一枝箭」條。

葉金草 即金莖之古籍別名。典見別錄。詳「金莖」條。

葉柳草 即巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴戟天」條。

菴葎 即蜘蛛香之日本名。詳「蜘蛛香」條。

菴葎 即蘘荷之古籍別名。典見說文。詳「蘘荷」條。

菴葎子 即菴葎子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菴葎子」條。

葎草 古醫別名。勒草。來葎草。(別錄)葛勒蔓。(蜀圖經)

基本 係屬桑科葎草之莢。

產地 凡故墟道旁與山野間恒多生焉。

形態 葎草為山野自生之多。年生草。春月生苗。纏絡他物。莖略帶四角形。有毛刺。葉對生。作掌狀分裂。類大麻葉。有剛毛及長葉柄。

邊緣有鋸齒。花無花冠。且係單性。雌雄異株。雄者作圓錐花序排列。長五六寸。萼片及雄蕊各五。雌者數個集合作粗穗狀。皮質則為卵圓形或橢圓形之漿果。呈淡綠色。有香氣及苦味。種子黑色如大麻子。



葎草

性質 苦寒。無毒。

成分 為揮發油、單寧、樹脂質等。

效能 用作苦味健胃藥。主治 主癩血。止精。益盛氣。

歷代配述攷證 【唐】蘇恭新修本草論葎草曰。葎草主五淋。利小便。止水痢。除瘧。虛熱。湯。黃汁。或生搗汁服。【宋】寇宗奭本草衍義論葎草曰。生汁一合服。治傷寒汗後虛熱。【宋】蘇頌圖經本草論葎草曰。療背淋。久痢。疥癩。【明】李時珍本草綱目論葎草曰。潤三焦。消

五數。益五臟。除九蟲。辟瘴。傳蛇蝥傷。

配合應用 治小便淋瀝。葎草搗生汁三升。酢二合。合和頓服。當尿下白汁。亦治尿血淋瀝。及產婦汗血。汚衣赤色。(范汪方)

治久痢成疝。葛勒蔓末。以管吹入肛門中。不過數次如神。

治新久瘧疾。用葛葎草一握。一名勒蔓。去兩頭。秋冬用乾者。但山末等分。以淡漿水二大盞。浸藥。星月下露一宿。五更煎一盞。分二服。以吐痰愈。

治遺精癩瘡。葎草一握。以水二石。煮取一石。漬之。不過三作愈。(章甫獨行方)

治烏癩風瘡。葛葎草三秤。切洗。益母草一秤。切。以水二石五斗。煮取一石五斗。去滓。入甕中。浸浴一時。方出。坐密室中。又暖湯浴一時。乃出。暗臥取汗。勿令見風。明日又浴。如浴時瘙癢不可忍。切勿搔。

動。少頃漸定。後隔三日一作。以愈為度。(聖濟總錄方)

用量 三分至五分。

參攷資料 ●葎草生故墟道旁。葉似薺麻而小且薄。莖生有細刺。亦名葛葎。古方亦時有用之。(蘇恭) ●葎草二月生苗。莖有細刺。葉對節生。一葉五尖。微似薺麻。而有細齒。八九月開細紫花成簇。結子狀如黃麻子。(李時珍) ●葎草莖有細刺。善勒入膚。故名勒草。說為葎草。又說為來葎。皆方音也。別錄勒草即此草也。(李時珍) ●葎草。綱目。詳「葎詩」條。

【葎】即桑椹之古籍別名。與見和漢藥考。詳「桑椹」條。

【葎草】 古醫別名 鴻藹。龍古。龍鼓。游龍。(詩經) 石龍。

天麥。(別錄) 大麥。(綱目) 大毛麥。(日本) 葱涕。(千金方)

外國名詞 Polygonum orientale, L. var. pilosum, Moisin. (拉丁) オホケタテ ホタルタテ (日本) 葎本 係葎科葎屬。為葎草之

十三畫 葎

子實。

產地 原產東印度。凡田野水深間恒有生育。

形態 葎草為溼草類之一。生草本。高五六尺。莖與葉密生毛茸。葉大卵形而尖。葉柄長。秋月莖頭與枝梢開花。花帶紅色。密生成穗狀。其子扁如酸漿仁而小。色赤黑而肉白。與花莖葉俱可供藥用。



葎草

性質 鹹。微寒。無毒。

主治 消渴。去熱。明目。益氣。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論葎草曰。治瘰癧。

參攷資料 ●此葎甚大。而花亦繁紅。故曰葎。曰鴻藹亦大也。別錄有名未用。草部中有天麥云。一名石龍。生水中。陳藏器解云。天麥即水葎。一名游龍。一名大麥。據此則二條乃一指其實。一指莖葉而言也。(李時珍) ●葎生水旁。如馬葎而大。五月採實。(別錄) ●今生

葎 葎葛

下溼地甚多。極似馬葎而甚長大。詩釋隕有游龍。郭璞云。即龍古也。

(陶弘景) ●葎。即水葎也。似薺而葉大。赤白色。高丈餘。爾雅云。葎。龍古。其大者曰龍。音詭。陸璣云。游龍一名馬葎。然馬葎自是一種也。(蘇頌) ●葎草莖粗如拇指。有毛。其葉大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸漿仁而小。其色赤黑而肉白。不甚辛。炊爛可食。(李時珍)

【葎草花】 主治 散血。消積。止痛。 性質 辛。有毒。

【葎草莖根葉】 主治 惡瘡。去瘴氣。 性質 辛。有毒。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論天麥曰。根莖除惡瘡。腫水氣。脚氣。黃濃汁漬之。

【葛上亭長】 命名 本品黑身赤頭。如亭長之着玄衣赤帽。故名。

古醫別名 豆豉。(動物辭典) 外國名詞 Epicauta gon-hami, Marz. (拉丁) マメハンメウ (日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。翅類地膽科之葛上亭長蟲。 產地 生葛上。處處有之。 形態 葛上亭長為卵生昆蟲類。甲蟲屬之一種。其體黑色。額頰及後頭赤褐。被黃短毛。眼呈腎臟形。觸角側扁。雄之觸角。中央膨大。前胸比頭狹。前方為頸狀而細小。中央有直列黃毛。翅輪細長。稍呈圓柱形。兩翅之周圍。密被短黃毛。中央各有黃毛之直列。翅面密被黑色短毛。腹下各節。有黃毛直紋。腳長。各被黃毛。體長六七分。葛上亭長汁及豆葉等為食。捕得可供藥用。 採取 七月間在葛上採之。曬乾用。

一四八三

製法 與斑蝥同。 性質 辛。微溫。有毒。 主治 蟲毒。鬼疰。破淋。結。積聚。墮胎。 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛上亭長曰。通血閉。療塊。鬼胎。餘功同斑蝥。 施用宜忌 惡畏同斑蝥。 參攷資料 深師療淋用亭長之說最詳。云取葛上亭長。折斷腹。

腹中有白子如小米。三二分。安白板上。陰二三日收之。若有人患十年淋。服三枚。八九年以還。服二枚。煎時以水如盃許。著小盃中。爪用研之。當扇於水中。仰面吞之。勿令近牙齒間。藥雖微小。下喉自覺至下焦淋所。有頃藥作。大煩急不可堪者。飲乾麥飯汁。則藥熱止也。若無乾麥飯。但水亦可耳。老小服三分之一。當下淋疾如膿血。連連爾去者。或如指頭。或背或黃。不拘男女。皆愈。若藥不快。淋不下。以意節度。更增服之。此蟲五六月為亭長。頭赤身黑。七月為斑蝥。九月為地膽。隨時變耳。(蘇頌)

【葛公藤】

古籍別名 家母藤。(葛祖方)

形態 葉似蛇卵草。又似吉慶子。面背有蒙。背白色。三葉分枝。極似薔薇。有刺。四月間結子。

配合應用 血症將葛公根一兩。忌鐵器。用木擊碎。以水二大盃。煎作一盃。加好酒一盃。再煎至茶杯八分。臥時服。服後蓋暖周身。以手磨胸膈。數週。明晚如前。再服一兩。後日亦如前服一兩。連

服三日愈。(傳信方)

葛公草一名家母藤。治脚氣腫疼。沙木腿搗汁。熬成膏。鷄翎掃患處。乾即潤之。(葛祖方)

【葛仙米】

命名 本品昔為葛米而食。故名。洪隱居乏食。採充根

古籍別名 鮮者名天仙菜。乾者名天仙米。(綱目拾遺)

產地 多生南省諸山之山陰石間。

形態 葛仙米為菜類。石耳屬之一種。狀似木耳。其色紫綠。探而乾之。粒圓如黍。揉麵釀酒。氣極芳香。煮熟為羹。饜如青螺。可供菜茹與藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 利臟胃。胸膈。解熱清神。去痰火。久服延年。

【葛豆】即刀豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刀豆」條。

【葛乳】

古籍別名 葛花菜。葛(綱目拾遺)

性質 甘。苦。涼。無毒。用法 解肌熱。散風火。主治 風熱癩疹。醒酒。解酒積。

參攷資料 一名葛花菜。名山皆有。亦產高州。粵志高州多種葛。

雷州人市之為縹緗。秋霜時有葛乳。涌生地上。如芝如菌。赤色。味甘脆。微苦。乃葛之精華也。亦曰葛單。李瀨湖僅據太和山志。載其醒酒與酒積成疾。他皆未及。故特補之。(趙恕軒)

【葛花】

性質 甘。平。無毒。主治 消酒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛花曰。腸風下血。參攷資料 葛花同小豆花。乾末酒服。飲酒不醉也。(陶弘景)

【葛花菜】即葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳「葛乳」條。

【葛根】

原名 乾葛。命名 葛從葛。諧聲也。入藥用根。故名。

處方用名 煨葛根。粉葛根。葛根炭。

古籍別名 雞齊。(本經)鹿藿。黃斤。(別錄)鹿豆。鹿豆忠。葛藤根。鐵葛藤。雞齊根。(和漢藥考)

外國名詞 Paezythiza angulatus

基本 屬豆科為葛之根。

產地 各省均有出。江浙尤多。形態 葛為多年之自生蔓草。長達二三丈。恒纏繞木石。葉互生。為大形複葉。由三小葉而成。表面綠色。內面帶白色。與莖莖俱有褐色毛茸。初秋於葉腋生五六寸穗狀梗。開赤紫色蝶形花。作總狀花序排列。花後。結扁形之莢實。其種子嚼之有腥氣。根外面淡紫色。內部白色。根為類似薯蕷之紡錘狀。最大者直徑七八寸。長達一丈。販賣品有曬乾及生乾二種。前者白色帶白粉。後者呈黃褐色。



葛 根

採取 五六月間採根曬乾。

製法 凡使須揀雪白多粉者佳。去皮用。陳仁山云。廣東現所沽葛。由喃康庄寄將葛切開。用一池約可容葛七八擔者。葛放池中。用綠殼灰生鹽兩味開水浸之。所有

葛內精汁盡行漂出。浸兩晝夜。取出用山坑水泡之。泡後略為曬乾。即入硫磺極細之粉。使其色白。不計其合用與否。造起開片食之。酥且鹹。清甜之味全無。想葛根乃表散清涼之品。其味既鹹且酸。不飲已幸矣。尙望其能解表乎。此等乾葛。應在淘汰之列。正當造法。將葛去皮。用水洗淨。用大盆滿貯清水。將葛切片如骨牌形。放落清水盆。略浸五分鐘。取起曬乾。用。服時覺煎成之水。有甘涼之味。實無上之珍品也。何必多端弄巧。食其好色。貽害多人。故須從速改良。爲要。兩湖、安徽、江浙。均有到過港沽。原枝開直片煎水飲之。猶有原葛清甜之味。惟開片不好看。故無人買之。可知乾葛一味。各省均合製法。獨廣東弄巧取色。至爲不合衛生。至製葛粉之法。於春日發芽時。用長鐵探剝葛根。洗去土氣。於石盤上用木槌或鐵錘。細加打爛。盛水於桶。於其中揉出粉漿。乃入布袋絞去粗屑。復用水綿袋濾。靜置一日。去上面之水。曬乾。凝固物。用刀切。並削去底面黑粉。再置入桶中。

十三畫 葛

加多量之水。攪之。待其沈降。乃使流出上面之水。如此數次。待其已乾。用鐵匙鑷取。攤於鋪灰及布之曬盒中。曬乾之。謂之灰葛。若欲使潔白。可再將灰葛置入桶中。注水攪和。用細袋濾過。放置一日。再換水使之沈降。如此七八次。乃去水氣。移於鋪有乾白紙之曬盒。數日曬乾。則成潔白塊。是即葛粉。其形態爲純白色。無氣味之粉末。於顯微鏡下檢之。見有大小不等之顆粒。直徑自〇・〇〇二至〇・〇一八密米。

性質 甘。辛。平。無毒。

成分 葛根中含有多量澱粉。謂之葛粉。(一呼水粉)供藥用。同天花粉。

效能 升陽。解肌。生津。止渴。用作清涼發汗解熱藥。

主治 消渴。身大熱。嘔吐諸痺。起陰氣。解諸毒。(本經)療傷寒中風頭痛。解肌發表。出汗。開腠理。療金瘡。止脇風痛。(別錄)

張仲景之發明 葛根一味。經張仲景之實驗。認爲「主治項背強。勞治喘而汗出」。茲考徵如下。

葛根黃連黃芩湯證曰。喘而汗出。(以上一方。葛根半斤)葛根湯證曰。項背強。葛根加半夏湯證曰。葛根加半夏湯條曰。太陽與陽明合病。此須疾醫之。言也不取焉。葛根湯證而嘔者。此方即主之也。桂枝加葛根湯證曰。項背強。(以上三方。葛根皆四兩)爲則曰。葛根主治。項背強急也。葛根湯及桂枝加葛根湯。皆足以徵焉。

歷代記載攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論葛根曰。殺野葛巴豆百藥毒。【唐】甄權藥性本草論葛根曰。治天行上氣。嘔逆。閉胃下食。解酒毒。【唐】陳藏器本草拾遺論葛根曰。生者隨胎。煮食消酒毒。可斷穀不饑。作粉尤妙。【唐】蘇恭新修本草論葛根曰。獼狗傷。搗汁飲。并未傳之。【宋】大明諸家本草論葛根曰。治胸膈煩熱。發狂。止血。利通小腸。排膿破血。傳蛇蟲。嬰毒箭傷。【宋】開寶重定新本草論葛根曰。作粉止渴。利大小便。解酒去煩熱。歷丹石。傳小兒熱瘡。搗汁飲。治小兒熱瘡。【明】李時珍本草綱目論葛根曰。散鬱火。【明】李

士材本草圖解論葛根曰。葛根辛甘。陽明藥也。主頭額痛。解肌止渴。宜斑發痘。消毒解醜。【清】黃宮繡本草求真論葛根曰。葛根辛苦性平。輕揚升發。能入足陽明胃經。鼓其胃氣上行。生津止渴。兼入脾經。開腠發汗。解肌退熱。緣傷寒太陽病罷。傳入陽明。則頭循經而痛。胃被寒蔽。而氣不得上升。入肺則渴。胃主肌肉。氣不宜通則熱。故當用此以治。俾其氣升津生。肌解熱退。而無復傳之勢矣。但葛根一味。必其於頭額狹之處。痛如刀劈。方謂邪傳陽明。其藥可用。若使未入陽明。又是引邪入內。不可用也。即邪在於太陽。而略見於陽明。則以方來之陽明爲重。故必用葛根以絕其路。若使陽明症備。而止兼有太陽。則又以未罷之太陽爲重。故又不用葛根。且陽明主肌肉者也。而用乾葛。大開肌肉。則津液盡從外潰。恐胃愈燥而陰立亡。至於疹瘡未發。則可用此升提。酒醉則可用此解醒。火鬱則可用此升散。但亦須審中病輒止。不可過用。以致胃氣有傷也。【清】賈九如辨藥指南

論葛根曰。葛根根主上升。甘主散表。若多用二三錢。能理肌內之邪。開發陰理而出汗。屬足陽明胃經藥。治傷寒發熱。鼻乾口燥。目痛不眠。瘧疾熱重。蓋麻黃紫蘇專能攻表。而葛根獨能解肌耳。因其性味甘涼。能鼓舞胃氣。若少用五六分。治胃虛熱渴。酒毒嘔吐。胃中鬱火。牙疼口臭。或佐健脾胃藥。有醒脾之力。且脾主肌肉。又主四肢。如陽氣鬱遏於脾胃之中。狀非表症。飲食如常。但肌表及四肢發熱如火。以此同升麻柴胡防風羌活升陽散火清肌退熱。薛立齋常用神劑也。若金瘡。若中風。若瘧病。以致口噤者。搗生葛根汁。同竹瀝瀉下即醒。乾者為末。酒調服亦可。痘瘡難出。以此發之甚捷。

近人學說 張山雷曰。葛根氣味皆薄。質輕且鬆。養生之時。發育極速。最能升發脾胃清陽之氣。傷寒論以為陽明主藥。正惟表寒過鬱於外。胃家陽氣不能散布。故以此輕揚升舉之藥。捷動清陽。捍禦外寒。斯表邪解而胃陽舒展。所以葛根湯中仍有麻黃。明為陽明表

寒之主藥。非陽明裏熱之專司。若已內傳而為陽明熱症。則仲景自有白虎諸法。非葛根湯之所宜用。其葛根黃芩黃連湯方。則主陽明協熱下利。觀視之。頗似專為裏有實熱而設。故任用芩連之苦寒。則葛根似亦為清裏之品。抑知本條為太陽病桂枝證。醫反下之之變。邪熱因誤下而入裏。裏雖宜清。而利送不止。即以脾胃清陽下陷之候。葛根祇以升舉陷下之氣。並非為清裏而設。此皆仲師選用葛根之真旨。由此推之。而知本經之主消渴者。亦以燥令太過。降氣迅速。故飲雖多而渴不解。此藥治之。非特潤燥。亦以升清。又主嘔吐者。亦以胃氣不能敷布。致令食不得入。非可概治胃火上逆之嘔吐。而漫者視之。僅知為清胃生津。甘潤退熱之普通藥劑。則似是實非。寧獨毫釐之差。直是千里之謬矣。宋人之用葛根柴胡。往往認作解散表熱通套之藥。可謂不辨菽麥。此其精義。惟東垣氏知之最詳。蓋李氏於脾胃氣弱一症。研究獨深。是其生平唯一無二之精大經驗。闡明

此藥真詮。誠非朱奉議劉河間輩所可幾及。李之旨曰。葛根其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。以生津液。又解肌熱。為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。配合應用 ①葛根湯治陽明胃經溫病。邪熱頭疼發渴。煩悶。鼻乾。不得眠。如渴甚。嘔甚。則加石膏。麥門冬。知母。竹葉。葛根升麻湯。治斑痧初發。點粒未形。 ②同一切補腎益精藥作丸餌。則起陰。令人有子。 ③同升麻入升陽散火。升陽除濕。升陽益胃清暑益氣。補中益氣等湯用。 ④治數種傷寒。唐人不能分別。今取一藥。兼治天行時氣。初覺頭痛內熱。脈洪者。葛根四兩。水二升。入豉一升。煮取半升。服。生薑汁尤佳。(傷寒類要方)

汗。(梅師方) ①治妊娠發熱。葛根汁二升。分三服。(傷寒類要方) ②預防熱病。急黃賊風。葛粉二升。生地黃一升。香豉半升。為散。每食後米飲服方寸匕。日三服。有病五服。(廣安常傷寒論方) ③治辟瘴不染。生葛搗汁一小盞。服。去熱毒氣也。(聖惠方) ④治煩燥熱渴。葛粉四兩。先以水浸粟米半升。一夜漉出。拌勻。煮熱。以糜飲和食。(食醫心鏡方) ⑤治小兒熱渴。久不止。葛根半兩。水煎服。(聖惠方) ⑥治乾嘔不息。葛根搗汁。服一升。 ⑦治小兒羸瘦。壯熱食癩。葛粉二兩。水二合。調勻。傾入錫鍋中。重湯浸熟。以糜飲和食。(食醫心鏡方) ⑧治心熱吐血不止。生葛搗汁半升。頓服立瘳。(廣利方) ⑨治衄血不止。生葛搗汁服。三服即止。(聖惠方) ⑩治熱毒下血。因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁一升。入藕一升

和服(梅師方)

①治傷筋出血。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍熬屑傳之。(外臺祕要方)

②治臥膜疼痛。生葛根嚼之。嚙汁。取效乃止。(肘後方)

③治金創中風。瘳強欲死。生葛根四大兩。以水三升。煮取一升。去滓分服。口噤者灌之。若乾者搗末。調三指搗。仍以此及竹瀝多服。取效。(廣利方)

④治服藥過劑。苦煩。生葛汁飲之。乾者煎汁服。(肘後方)

⑤治酒醉不醒。生葛汁飲二升。便愈。(千金方)

⑥治諸藥中毒。發狂煩悶。吐下欲死。葛根煮汁服。(肘後方)

⑦解中灼毒。氣欲絕者。葛粉三合。水三盞調服。口噤者灌之。(聖惠方)

⑧治虎傷人。生葛煮濃汁洗之。仍搗末。水服方七。日夜五六服。(梅師方)

用甕 一錢至二錢。
施用宜忌 凡陰虛火炎與上盛下虛者禁用。

十三畫 葛

勤

著名方劑 葛根湯。治太陽病項背強。無汗惡風者。又治太陽陽明合病。自下利者。(傷寒論方)葛根四兩。麻黃三兩。(去節)桂枝二兩。芍藥二兩。炙甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。上七味。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升。去沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息及禁忌。

參攷資料 ①生葛搗汁飲。解溫病發熱。五月五日中午時。取根為屑。療金瘡。斷血為要藥。亦療瘡及瘡至良。(陶弘景) ②凡癰疽已見紅點。不可用葛根升麻湯。恐表虛反增癰爛也。(朱震亨) ③乾葛其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱。泄瀉聖藥也。(李杲) ④葛根氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出四也。(徐用誠) ⑤本草十劑云。輕可去實。麻黃葛根之屬。蓋麻黃乃太陽經藥。兼入肺經。肺主皮毛。葛根乃陽明經藥。兼入脾經。脾主肌肉。所以二味藥皆

輕揚發散。而所入迥然不同。(李時珍) ⑥葛雖除毒。其根入土五寸。已上者。名葛脰。脰者脛也。服之令人吐。以有微毒也。本經葛穀。即是其實也。(蘇恭) ⑦今處處有之。江浙尤多。春生苗。引藤蔓長一丈。紫色。葉頗似楸葉。而小。色青。七月着花粉。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日中午時採根。曬乾。以入土深者為佳。今人多作粉食。(蘇頌) ⑧漫冊之間。冬月取生葛搗爛。入水中揉出粉。澄成塊。入沸湯中。良久。色如膠。其體甚韌。以蜜拌食。捺入生薑少許。尤妙。又切入茶中。待蜜。雖甘而無益。又將生葛根煮熟。作果實賣。吉州南安亦然。(寇宗奭) ⑨葛有野生有家種。其莖延長。取治可作繒綌。其根外紫內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉。而長。面青背淡。其花成穗。藥相綴。紅紫色。其莢如小黃豆。莢亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子。核生嚼腥氣。八月採之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言葛穀是實。而宋蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花曬乾亦可

煨食(李時珍)

【葛根炭】即煨葛根。詳「葛根」條。

【葛根葉】 主治 金瘡止血。按傳之。

【葛根蔓】 主治 卒然喉痺。燒研水服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛根。曰。消癰腫。

【葛乳】即葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳「葛乳」條。

【葛勒蔓】即藤草之古籍別名。典見蜀圖經。詳「藤草」條。

【葛殼】 性質 甘平無毒。 主治 下痢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛殼。曰。解酒毒。

【葛藤】 效能 消癰腫。療瘡癰。 主治 治喉痺。痔。婦女吹乳。小兒口噤。

【葛藤根】即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

【葛藤】即蜀羊泉之日本名。詳「蜀羊泉」條。

【葛藤】即干葛之古籍別名。典見毛詩。詳「干葛」條。

【葛】即風葛草之古籍別名。典見

吳普本草詳鼠尾草條。

【葡】即白薇之古籍別名。典見桐目。詳「白薇」條。

【葡萄】命名本品可以造酒。人隨飲之則醇然而醉。故名。

處方用名 葡萄實。葡萄汁。葡萄乾。葡萄酒。

古籍別名 蒲桃。草龍珠。蒲萄。蒲陶。賜紫櫻桃。馬乳葡萄。水晶葡萄。紫葡萄。綱目。綠葡萄。

外國名詞 Vitis vinifera, L. (拉丁) Uva (Graepes) (英) ヲタウ (日本)

基本 係葡萄科葡萄屬結成之子實。

產地 葡萄原產西域。現在各省各屬均有出。陳仁山藥物生產辨云。葡萄乾產自廣東石龍東莞。形態 葡萄為蔓生之落葉植物。莖有卷鬚。藉以攀登於他物。其粗者周圍有數寸。葉互生。作掌狀分裂。嫩時有毛。如綿樣。至老則似平滑。初夏新枝之葉腋抽出花穗。花小。淡綠色。而作圓錐形花序。花瓣五片。在頂上略結合。不開而脫。

落。雄蕊與花瓣同數。雌蕊一至秋結實為漿果。多肉味美。至成熟則一朵之數凡六七十粒以上。一果之大約六七分。呈橢圓形。或圓形。或長橢圓形。外皮綠色。生紫暈。別有紫黑白諸色。可供食藥兩用。



葡 萄

採取 秋季採之。

製法 採得搗取自然汁用。

性質 甘平。瀉無毒。

效能 利筋骨。治痿痺。用作滋養藥。

主治 筋骨痠痺。益氣。倍力。強志。令人肥健。耐饑。忍風寒。逐水利小便。久食輕身不老延年。可作酒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論葡萄曰。除腸間水。調中治淋。【宋】蘇頌嘉祐補經本草論葡萄曰。時氣。痘瘡不出。食之。或研酒飲。甚效。【清】黃宮繡本草求真論葡萄曰。葡萄種類不一。此以真貨名者。因其形似葡萄。瑣細不大。

故以真貨名也。張璐論之甚詳。然此生於漠北。南方亦間有之。其幹類木。而係藤木。其子生青熟赤。乾則紫黑。氣味甘鹹而溫。能攝精氣。歸宿腎臟。與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味為然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀豆。各有攸宜。強腎方用真貨葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。清晨塗手心。摩擦腰脊。能助筋力強壯。若臥時摩擦腰脊。力助陽事堅強。服之尤為得力。稀痘方用真貨葡萄一錢。神黃豆一錢。一粒。杵為細末。一晝夜蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北方物。尚助東南生氣之不足也。然乘質素弱者宜服。反是則不免有助火之害矣。

國外學說 英美學說謂葡萄產中國西南等處。種種不一。其汁可釀酒。其樹之產處極多。古之埃及猶太希臘等國。俱種植此樹。有人疑此樹為波斯國之原產。近則英海南岸等處有野生之葡萄樹。而其種植於田園中者亦甚多。至樹身之大小與果之美劣。各處不同。間有生長甚大。能蔓延至最高之頂。如意大利國與印度國常有葡萄樹。能活多年。間亦有存至三四百年者。其性涼。能微利。利小便。於其熟時作水果食之。則能得其酒內皮之益。又為養身適口之食物。第食時宜去其皮。因皮難消化。井可用為藥品。如身熱發熱病。食之即能解渴。又可作葡萄酒乾。葡萄酒之用。作葡萄酒乾之法。或將葡萄酒在日光內曬之。或置爐中烘之。或將其曬燒成灰。將灰浸於水中。得鹼性之水。加熱令沸。將葡萄浸於此水內數秒時。取出。曬十四五日。即成。或將葡萄串之莖。乘其將熟時。割至將斷。則葡萄在樹上自乾。如西班牙國等處。與地中海東邊士麥拿等處。作葡萄乾均依此法。又阿富汗國作葡萄乾亦依此法。運往印度國出售。有一種葡萄乾。大而肉多。其色紫棕。玉葡萄乾之作用能養身體。虛弱人食之最宜。第乾者遠皮。多食恐腸胃發氣。似不及新者之佳。其功用能作潤劑。

配造他藥。則取其味美。

配合同用 除煩止渴。生葡萄搗取汁。以瓦器熬稠。入熱蜜少許。同取點湯飲其良。(居家必用方)

治熱淋瀝痛。葡萄搗取自然汁。生藕搗取自然汁。生地黃搗取自然汁。白沙蜜各五合。每服一匙。石器溫服。(聖惠方)

治胎中衝心。葡萄煎湯飲之。卽下。(聖惠方)

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡有風熱實邪者禁用。

參攷資料 按魏文帝詔羣臣曰。蒲桃當夏未涉秋。尙有餘暑。醉酒宿食。掩露而食。甘而不餽。酸而不酢。冷而不寒。味長汁多。除煩解渴。又釀以爲酒。甘於麴蘖。善醉而易醒。他方之果。甯有匹之者乎。(蘇頌) 甘酸溫。多食令人卒煩。則眼暗。(孟詵) 今河東及近汴州郡皆有之。苗作藤莖而極長大。盛者一二本。綿被山谷。開花極細而黃白色。其實有紫白二色。有圓如珠者。有長似馬乳者。有無核者。

十三畫 葡

董 箭 葦 葫 葯 葭 葱

皆七月八月熟。取汁可釀酒。按史記云。大宛以葡萄酒。富人藏酒萬餘石。久者十數年不敗。張蹇使西域。得其種。還中國始有。蓋北果之最珍者。今太原尙作此酒。寄遠也。其根莖中空相通。暮漚其根。而晨朝水浸于中矣。故俗呼其苗爲木通。以利小腸。江東出一種。質細而酸者名蔞菓子。(蘇頌) 葡萄折藤壓之最易生。春月萌苞生葉。頗似栝樓葉。而有五尖。生鬚延蔓。引數十丈。三月開小花。成穗。黃白色。仍連着實。星編珠聚。七八月熟。有紫白二色。西人及太原平陽皆作葡萄酒。貨之四方。蜀中有綠葡萄。熟時色綠。雲南所出者。大如瓊。味尤長。西邊有瓊瑣葡萄。大如五味子。而無核。按物類相感志云。甘草作釘針。葡萄立死。以麴香入葡萄皮內。則葡萄盡作香氣。其愛憎異於他草如此。又言其藤穿過聚樹。則實味更美也。三元延壽書言。葡萄架下不可飲酒。恐蟲屎傷人也。(李時珍)

【葡萄酒】卽葡萄之處方用名。詳【葡萄】條。

【葡萄酒】 性實。甘。平。瀉。無毒。主治 黃濃汁飲。止嘔噦。及霍亂後惡心。孕婦子上衝心。飲之卽下胎安。(孟詵)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葡萄酒及藤葉曰。治腰脚肢腿痛。煎湯淋洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。

【葡萄酒】 基本 本品係用葡萄實。或以藤汁和麴如常法釀成之酒。性質 甘。辛。熱。微毒。主治 暖腰腎。駐顏色。耐寒。參攷資料 葡萄酒。有熱疾。及齒疾。疥疹人。不可飲之。(李時珍)

【葡萄酒】 卽葡萄之處方用名。詳【葡萄】條。

【葡萄酒】 製法 以葡萄以器承其滴露。卽爲葡萄酒。性質 辛。甘。大熱。大毒。主治 益氣調中。耐飢。強志。消痰破癖。

參攷資料 葡萄酒。性熱甚

於燒酒。切忌多飲。(醫學大辭典)

【葡萄酒】 卽葡萄之處方用名。詳【葡萄】條。

【葡萄酒】 卽苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳【苡仁】條。

【黃稜子】 卽檳榔子之古籍別名。典見楊慎居言。詳【檳榔子】條。

【箭子】 卽懸鈞子之古籍別名。典見爾雅。詳【懸鈞子】條。

【葦子草根】 卽蘆根之古籍別名。典見和漢藥考。詳【蘆根】條。

【葦根】 卽蘆根之古籍別名。典見毛萇詩疏。詳【蘆根】條。

【葦莖】 係汀洲間蘆荻之粗種。性質效能。詳【蘆】條。

【葫】 卽大蒜之原名。詳【大蒜】條。

【葫蘆】 卽壺盧之古籍別名。詳【壺盧】條。

【葍】 卽白芷之古籍別名。典見綱目。詳【白芷】條。

【葭根】 卽蘆根之古籍別名。典見毛萇詩疏。詳【蘆根】條。

【葱子】 性質 辛。大溫。無毒。主治 明目。補中氣。不足。(本經)

歷代記述攷證 【宋】日華諸

十三 薑 葱

家本草論葱子曰。溫中益精。

性質 辛溫滑無毒。

【葱汁】 主治 瀉血飲之。解毒

蘆及桂毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論葱汁曰。能消玉

珍本草綱目論葱汁曰。散瘀血。止

藥毒。

配合應用 ①治金瘡出血不

止。取葱炙熱。按汁塗之即止。(梅

師方)

②治火疔丹毒。從頭起者。生葱

汁塗之。

③治痔瘻作痛。葱涎白蜜和塗

之。先以木絮子煎湯薰洗。其冷如

水即效。一人苦此。早間用之。午刻

即安也。(唐仲舉方)

④治解鈎吻毒。面青口噤欲死。

以葱涕啖之即解。(千金方)

參攷資料 ①葱汁即葱涕。功

同葱白。古方多用葱涎丸藥。亦取

其通散上焦風氣也。勝金方取汁

入酒少許。滴鼻中。治衄血不止。云

方。以葱汁和蜜少許服之。亦佳。云

鄒媪用此甚效。老僕試之亦驗。二

物同食害人。向以能治此疾。恐人

脾胃不同。非甚急則不可輕試也。

(李時珍) ③三洞要錄云。葱者。菜

之伯也。能消金錫玉石。神仙消金

玉漿法。於冬至日以重盧盛葱汁

及根。埋庭中。次年夏至發出。盡化

爲水。以法漬金玉銀青石各三分。

自消矣。曝乾如飴。食之可休糧。亦

曰金漿也。(唐慎微)

【葱白】 命名 葱從忽。外直中

空有忽通之象。故名。而

藥用其葉底之白色根莖。遂稱爲

葱白也。

脈。然無中筋。色青綠可愛。高一二

尺。葉底因在土中。不受日光。遂爲

白色。莖短縮。沒入土中。花自葉上

抽出。頂端生如蕓之苞。初現綠色。

旋成無數之小花。三瓣雙層。帶白

色。相綴而爲一團。



類種 ①冬葱即凍葱。葱或

名大宜葱。夏衰冬盛。其莖柔細而

香。②淡葱即木葱。冬則葉枯。其莖

硬粗。故有木名。③胡葱即麥葱。亦

名絲葱。或稱紫葱。莖葉粗硬而根

若金燈。④蒼葱即山葱。乃生於山

谷者。不入藥用。⑤樓葱亦冬葱之

類。即龍角葱。亦即龍爪葱。亦名羊

蔥。莖上生根。可以移下蒔之。

用法 水煎或生搗。

性質 辛平無毒。

效能 發表和表。通陽活血。用

爲發汗利尿藥。齒痛殺蟲藥。又爲

與香祛痰藥。發作疥癬痛風諸症

之包攝創面藥。

作用 入胃後。能刺激胃黏膜。

使胃液分泌增加。至腸能激腸黏

膜。令其吸收作用強大。同時又能

減少腸液之分泌。使大便燥結。并

可殺死小部分之赤痢菌。入血中

驟使血行增進。血壓如高。腎臟之

血管充血。而利尿作用十分增進。

令全身積蓄之過量水分。迅速向

腎臟迫出。同時氣枝管黏膜之分

主治 作湯治傷寒熱中風。

面目浮腫。能出汗。又治傷寒骨肉

碎痛。喉痺不道。安胎。歸日。益目睛。

除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥

毒。根治傷寒頭痛。

歷代記述攷證 【唐】陳士良

食性本草論葱白曰。殺一切魚肉

毒。【唐】孟詵食療本草論葱白曰。

通關節。止衄血。利大小便。【宋】大

醫

藥

考

原

方

集

明諸家本草論葱白曰。主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣。脚氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。元李東垣用藥法象論葱白曰。治陽明下痢下血。明寧原食鑑本草論葱白曰。達表和裏。止血。明李時珍本草綱目論葱白曰。除風溼身痛麻痺。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內釣。婦人妊娠瀉血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗爛大傷。制蚯蚓毒。明經希雍本草經疏論葱白曰。葱味辛平。平即涼也。而性無毒。辛能發散。能解肌。能通上下陽氣。故外來佛鬱諸證。悉皆主之。傷寒寒熱。邪氣并也。中風面目腫。風熱鬱也。傷寒骨肉痛。邪始中也。喉痺不通。君相二火上乘於肺也。辛涼發散。得汗則火自散。而喉痺通也。肝開竅於目。散肝中邪熱。故云歸目。除肝邪氣。邪氣散則正氣通。血自和調。而有安胎安中利五臟之功矣。其曰益目睛殺百藥毒者。則是辛潤利竅。而兼解散通氣之力也。明李士材本草圖解論葱白曰。葱白辛溫。入手大陰足陽明經。專主發散。以通上

下陽氣。故傷寒頭痛用之。少陰下利清穀。裏寒外熱。厥逆脈微。白通湯主之。亦有葱白。而赤者。四逆湯加葱白。成註云。腎惡燥。急食辛以潤之。葱白辛溫。以通陽氣也。陰症厥逆昏青。用葱一束。去根及青。留白二寸。烘熱安臍上。以熨斗熨之。葱壞則易熱氣透入。服四逆湯即遂。葱同蜜食能殺人。清黃宮燿本草求真論葱白曰。葱葉生辛而散。熱甘而溫。外實中空。能入肺經。發汗解肌。以通上下之陽。故書號為肺菜。其力則能明目利耳通便。及治傷寒頭痛。時疫熱狂。陰毒腹痛之謂。又氣通則血活。故書又載能止諸般血出不調。且氣通則毒解。故書又言。能治諸般惡毒。卽是以思。則和氣血之凝聚。是卽寒氣之未散。寒氣之既散。是血氣之既理。又安有毒氣不解。而云是藥之莫治乎。陽春一回。草木甲坼。其勢誠然也。故葱號為葱伯。又曰和事草。其意在斯。取白連髮用。亦有用青者。但過食亦損髮髮。及有虛氣上沖。汗出不止之弊。同蜜食。如何殺人。以蜜性最服。葱性最發。同葱

則脹益發。而不可解矣。不死何待。同棗食。亦令人病。其義可以例推。因并記之。清王士雄隨息居飲食譜論葱白曰。辛甘平。利肺通陽。散癰腫。祛風達表。安胎止痛。通乳和營。主霍亂轉筋。奔豚脚氣。調二便。殺諸蟲。理跌撲金瘡。制魚肉諸毒。四季不凋。味辛帶甘。而不臭者。良氣虛易汗者。不可單食。又忌同蜜食。清賈九如辨藥指南論葱白曰。葱頭去青。止用白頭。辛溫通竅。專主發散。凡一切表邪之症。大能發汗逐邪。疏通關節。蓋風寒濕之氣。感於皮膚經絡之間。而未深入臟腑之內。宜速去之。開發毛竅。放邪氣出路。則營衛通暢。但發表之意。用法不同。須知溫熱寒涼。皆能通表解散。若外感風寒。邪止在表。加入麻黃羌活紫蘇白芷辛溫之劑。專主發散。若內蓄鬱熱。邪遏在表。加入寒涼與辛溫並用之劑。一則清腸胃而祛積熱。一則開玄府而逐鬱邪。故有雙解通解之義。若邪在半表半裏。加入柴胡葛根苦涼之劑。以和解之。如用之無法。留邪於內。則費力不易治矣。

國外學說 日本大和本草曰。日本葱有四種。大葱。小葱。冬葱。朝葱是也。大葱五月結實。八九月栽苗。冬春可食。深種肥地。自根長大。味佳美。葱中佳品也。煮熟去臭氣。再者可食。溫補。多食能塞氣。因太甘也。二月後莖葉老枯。刈其莖。新葉常生。但不如冬春之美。小葱有二種。分取其根。謂之冬葱。性味勝於夏葱。三月後。老不堪食。本草所謂凍葱夏枯是也。夏月則食刈葱。本草所謂漢葱冬枯是也。一名夏葱。又稱五月葱。六月後不堪食。味不如冬葱。凡葱煮熟。去臭氣。再煮可食。不如此則惡臭難食。生葱不可食。傷神損性。本草云。葱殺一切魚肉毒。但不可與蜜同食。又服地黃人不可食。若頓死之人。以葱莖刺入鼻七八寸。血出立甦。男左女右。又刺入耳中五寸。鼻血出。卽活。不出血。死。小兒則以葱白入肛門。并兩鼻孔。此扁鵲秘方也。又圖典。葱宜培以雞糞。又曰。葱忌稻稈。葱根不可用。葉包之。包則立枯。不生。試之果然。中國農書所不載也。蔥搗去後。一夜便生萌芽。成長極速。

十三畫 葱

十三畫 葱

病人以垂。大葱、小葱鹽淹數日食之。味良佳。小葱乃葱之最細者也。形味俱似夏葱。祇大小異爾。五月收採。八月下種。一如冬葱。朝葱。即胡葱也。似食葱而根莖皆細且白。李時珍曰。根似蒜。又如薤。不甚臭。又和漢三才圖會曰。葱葉圓長無枝。故呼一文字。冬葱、漢葱。均十月中下種。初生葉細如針。正月刈葉和醋醃食之。因再三刈。故俗有刈葱之名。夏月葉硬不可食。所謂漢葱是也。刈葱稍長者。八月可移植。灌水培糞則茂盛。莖根長。白色。俗呼根葱。又名根深。經霜則柔。輒堪煮食。味甚甘美。性溫能除寒氣。所謂冬葱是也。四月葉端圓脹。青頭子。七月熱時取之。十月種之。成刈葱。一物而如二種。日本下野州梅澤。濃州。宮代之葱。自其白處。近尺長於葉也。上野。鹿沼產亦良。近來畿內夏根葱。肥大無異冬葱。此蓋春時不刈而移栽於他處。灌水培糞作之。葉貴人嘗不時之美菜。故然爾。但其味究不如經霜者。又念懷食錄曰。葱主發散。多食令人

神昏。葱宜冬月。不可多食。能損鬚髮。發人虛氣。五臟悶絕。正月食生葱。令人面上起遊風。燒葱同蜜食。壅氣殺人。生葱和棗食。令人病。合犬雉肉食。多令人血病。服地黃常山人須忌之。生葱不可與鯉合食。能成病。

近人學說 張山雷曰。鮮葱白輕用二三枚。重至五枚。以柔細者為佳。吾吳謂之綿葱。其粗壯者則曰胡葱。氣濁力薄。不如柔細之佳。去青用白。取其輕清。或連鬚用。欲其兼通百脈。若單用青葱莖。則以疏通肝絡之靈藥。與葱白專主發散不同。

配合應用 治感冒風寒。初起即用葱白一握。滾豆豉半合。泡湯服之。取汗。(溯湖集簡方)
治傷寒頭痛如破者。連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。(活人書方)

治時疾頭痛發熱者。以連根葱白二十根。和米煮粥。入醋少許。熱食取汗即解。(濟生秘覽方)
治數種傷寒。初起一二日不能分別者。用上法取汗。

治傷寒勞復。因交接者。腹痛卵腫。用葱白搗爛。苦酒一盞。和服之。(千金方)

治風濕身痛。生葱搗爛。入香油數點。水煎調川芎。藜蘆。金末一錢。服取吐。(丹溪心法方)

治妊娠傷寒。赤斑變為黑斑。尿血者。以葱白一把。水三升。煮熱服汁。食葱令盡取汁。(傷寒類要方)

治六月孕動。困篤難救者。葱白一大握。水三升。煎一升。去滓頓服。(楊氏產乳方)

治胎動下血。痛極。心用葱白煮濃汁飲之。未死即安。已死即出。未效再服一方。加川芎。一方用銀器同米煮粥及羹食。(案師方)

治卒中惡死。或先病。或不居。寢臥奄忽而死。皆是中惡。急取葱心黃刺入鼻孔中。男左女右。入七八寸。鼻自血出即甦。又法用葱刺入耳中五寸。以鼻中血出即活也。如無血出。即不可治矣。相傳此屬偽秘方也。(崔氏纂要方)

治小兒卒死無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通或曉

一四九二

即活。(陳氏經驗方)

治小兒急腹。內約腹痛。用葱湯洗兒腹。仍以葱熨貼臍上。良久尿出痛止。(湯氏秘傳醫方)

治陰毒腹痛。厥逆。唇青。臍痛。六脈欲絕者。用葱一束。去根及附留白二寸。烘熱安臍上。以熨斗火熨之。葱壞則易。良久熱氣透入。手足溫。有汗即痊。乃服四逆湯。若熨而手足不溫。不可治。(活人書方)

治脫陽危症。凡人大吐大瀉之後。四肢厥冷。不省人事。或與女子交後。小腹胃痛。外腎抽縮。冷汗出。脈逆。須臾不救。先以葱白炒熱熨臍。後以葱白三七葉搗爛。用酒者瀉之。陽氣即回。此輩作救卒病方也。(華佗方)

治卒心急痛。牙關緊閉。欲絕。以老葱白五莖。去皮鬚。搗碎。以匙送入口中。灌以麻油四兩。但得下。明即甦。少頃。盡積皆化。黃水而下。永不再發。累得數人。(瑞竹堂方)

治霍亂煩躁。坐臥不安。葱白二十莖。大棗二十枚。水三升。煎二分服。(深方)

治枕心心痛。用葱莖白二寸。

鉛粉二錢。持丸服之即止。葱能通氣。粉能殺蟲也。(楊氏經驗方)

治腹皮麻痺不仁者。多煮葱白食之。即自愈。(危氏方)

治小便閉脹。不治殺人。葱白三斤。剉炒。帕盛二個。更互熨小腹。氣透即通也。(許學士本事方)

治大小便閉。持葱白和酢。封小腹上。仍灸七壯。(外臺秘要方)

治大腸虛閉。勻氣散。用連鬚葱一根。煮一塊。豈一錢。淡鼓三七粒。持作餅。烘掉脾中。紫定。良久氣即通。不通再作。(楊氏直指方)

治小兒虛閉。葱白三根。煎湯。調生薑阿膠末服。仍以葱頭染蜜。插入肛門。少頃即通。(全幼心鑑方)

治急淋陰腫。泥葱半斤。煨熟。杵爛。貼臍上。(外臺秘要方)

治小便淋瀝。或有白者。以赤根樓葱。近根截一寸許。安臍中。以艾灸七壯。(經驗方)

治小兒不尿。乃胎熱也。用大蔥白切四片。用乳汁半盞。同煎片時。分作四服。即通。不飲乳者。服之即飲乳。若路四旁有青黑色及口

撮者。不可救也。(全幼心鑑方)

治腫毒尿閉。因腫毒未潰。小便不通。用葱切入麻油煎至黑色。去葱。取油時塗腫處。即通。(普濟方)

治水竅病腫。葱根白皮。煮汁服一盞。當下水出。病已困者。取根持爛。坐之。取氣。水自下。(聖濟總錄方)

治陰囊腫痛。葱白。乳香。搗塗。即時痛止。腫消。又方用煨葱。入鹽杵如泥。塗之。

治小便閉。葱白一握。鹽金一兩。水一升。煎二合。溫服。一日三次。(普濟方)

治腸痔有血。葱白三斤。煮湯薰洗立效。(外臺秘要方)

治赤白下痢。葱白一握。細切。和米煮粥。日日食之。(食醫心鏡方)

治便秘初起。葱白炒熱。布包熨數次。乃用傳藥。即消。又用葱根和蜜。搗傳。以紙密護之。外服通氣藥。即愈。(永類鈴方)

治癰疽腫硬。烏金散。治癰節腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱

白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消為度。(外科精義方)

治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。(千金方)

治乳癰初起。葱汁一升。頓服即散。(千金方)

治疔瘡。蒜腫刺破。以老葱。生蜜。并貼兩時。疔出。以醋湯洗之。神效。(聖濟總錄方)

治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱。搗泥。入蜜和塗之。神效。(楊氏方)

治刺瘡。金瘡。百治不效。葱煎濃汁。漬之。其良。(千金方)

治金瘡。瘡血在腹者。大葱白二十枚。麻子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血。而愈。未盡再服。(千金方)

治血壅怪病。人獨身忽然肉出如錐。既痒且痛。不能飲食。名血壅。不速治。必潰膿。血以赤皮。葱燒灰。淋洗。飲鼓湯。數盡。自安。(夏子益怪病方)

解金銀毒。用葱白煮汁飲之。(外臺秘要方)

治腦破骨折。蜜和葱白。搗勻

厚封立效。(肘後方)

治自縊垂死。葱心刺耳鼻中。有血出。即甦。

用量 八分至錢半。或二枚至四枚。

施用宜忌 凡無感冒及表虛多汗者。禁用。

著名方劑 白通湯。治少陰下痢。(傷寒方) 葱白四莖。乾薑一兩。附子一枚。(生用。去皮。破八片) 上三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

參攷資料 葱乃釋家五葷之一。生辛散。熟甘溫。外實中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其合陽明。故所治之症。多屬太陰陽明。皆取其發散通氣之功。通氣故能解毒。及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡。破損。折傷。血出。疼痛不止者。王隱。百一方。用葱白。砂糖。等分。研封之。云。痛立止。更無復癒也。葱葉亦可用。又葱管吹入玉莖內。治小便不通。及轉瞬危急者。極有捷效。余常用。治數人得驗。(李時珍) 葱主發散。多食昏人神。(寇宗奭) 正月

十三畫 葱

十三畫 葱 薺 葵 葶 葶

食生葱。令人面上起遊風。生葱同蜜食。作下利。燒葱同蜜食。壅氣殺人。(孫思邈) ⑤生葱合漿食。令人病。今大堆肉食。多令人病血。(張仲景) ⑥服地黃薯山人。忌食葱。(李時珍)

【葱花】 主治 心脾痛如錐刀刺腹。服一升。同吳茱萸一升。水八合。煎七合。去滓。分三服。立效。

【葱薺】 卽薺蘆之古籍別名。與見別錄。詳『薺蘆』條。

【葱涕】 卽葱汁之古籍別名。與見千金食治。詳『葱汁』條。

【葱鼓酒】 基本 本品係用葱根白與豆鼓浸成之酒。

主治 解煩熱。補虛勞。又治傷寒頭痛寒熱。解肌發汗。及冷痢腸瀉。

【葱鼓粥】 基本 本品卽用葱之粥。

主治 發汗。解肌。
【葱蒺】 卽薺蘆之古籍別名。與見吳普本草。詳『薺蘆』條。

【葱葉】 性質 微溫。無毒。 主治 利五臟。益目精。發黃疸。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論葱葉曰。主療水病足腫。

【宋】日華諸家本草論葱葉曰。煨研。傳金瘡。水入。敷腫。鹽研。傳蛇蟲傷。及中射工。溪毒。

配合應用 ①治水病足痛。葱葉煮湯漬之。日三五次妙。(章甫獨行方)

②治小便不通。葱白連葉搗爛。入密合外腎上卽通。(永類鈴方)

③治瘡傷風水腫毒。取葱青葉和乾薑黃蘗等分。煮湯浸洗。立愈。(食療本草方)

④治蜘蛛咬瘡。傷身生瘡。青葱葉一莖。去尖。入蚯蚓一條在內。待化成水。取點咬處。卽愈。(李絳兵部手集方)

⑤治代指毒痛。取萎黃葱葉煮汁熱漬之。(千金方)

參攷資料 ①煨葱治打撲損。見劉禹錫傳信方。云得於崔給事。取葱新拆者。燻火煨熱。剝皮。其間有涕。便將毒損處。仍多煨。續續易

熟者。崔云。頃在澤潯與李抱眞作列官。李相方以毯杖按毯子。其軍將以杖相格。因傷李相母指。并爪甲劈裂。遺索金創藥。裝之。強索酒飲。而面色愈青。忍痛不止。有軍吏言此方。遂用之。三易面色卽赤。斯須云已不痛。凡十數度。用熱葱并涕。纏裹其指。遂畢。庶笑語。(蘇頌)

②按張氏經驗方云。金創折傷血出。用葱白連葉煨熱。或鍋烘炒熱。搗爛。傅之。冷卽再易。石城尉戴堯

臣。試馬損大指。血出淋漓。余用此方。再易而痛止。翌日洗面。不見痕跡。宋推官鮑縣尹。皆得此方。每有殺傷氣未絕者。亟食用此。活人甚衆。又凡人頭目重悶疼痛。李時珍

每用葱葉插入鼻內二三寸。并耳內。氣通卽便清爽也。(李時珍)

【葱葵】 卽薺蘆之古籍別名。與見吳普本草。詳『薺蘆』條。

【葱莖白】 卽葱白之處方用名。詳『葱白』條。

【葱頭】 卽葱白之處方用名。詳『葱白』條。

【葱白】 條。

【葱鬚】 主治 通氣。

歷代記述攷證 【明】

一四九四

李時珍本草綱目論葱曰。療飽食房勞。血滲入大腸。便血腸痔。成痔。口乾。研末。每服二錢。溫酒下。

【薺蘆】 卽黃精之古籍別名。與見別錄。詳『黃精』條。

③卽玉竹之古籍別名。與見吳普本草。詳『玉竹』條。

【葵子】 卽冬葵子之原名。詳『冬葵子』條。

【葵菜粥】 主治 潤燥寬腸。

【葵蓴】 卽蓴之秋老者。與見綱目。詳『蓴』條。

【葶蘆】 處方用名 甜葶蘆。古籍別名 葶藶。大室。大適。(本經) 丁歷。狗薺。(別錄) 丁樂。公。帝力。苦草。良醫。七首。(和漢藥考)

外國名詞 Draba nemorosa, L. Var. hobocarpa, Ledeb. (拉丁)

基本 屬十字花科。爲葶藶之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。葶藶產河南禹州。安徽江蘇等處。山東兗州亦有產。

形態 葶藶爲二年生草本。莖高六七寸至尺許。葉皆互生。作卵圓或長橢圓形。無葉柄。莖與葉俱生茸毛。花在莖間。分枝爲二三枝。色黃四瓣。綴於梢頭。莢果而爲總狀花序。果實爲莢果。作長橢圓形。類似米粒。中藏無數小種子。色茶褐。似粟子。



葶藶

種類 葶藶有甜苦二種。甜葶藶。粒極細。色紅黃。味淡甘。而性緩。滯肺不傷胃。苦葶藶。粒似粟。形不圓。味微苦。而性峻。泄肺又傷胃。

採取 二三月間採實陰乾。
製法 雷斅曰。凡使以葶藶。糯米相合。置於甑上。微焙。待米熟。去米搗用。

性質 辛寒。無毒。
效能 瀉肺。行水。下氣。定喘。用爲利尿及祛痰藥。
主治 癥瘕積聚。結氣飲食。寒熱。破屋逐邪。通利水道。(本經)下

勝脫水。伏留熱氣。皮間邪水上出。面目浮腫。身腹中風熱。癰癤。利小腹。久服令人虛。(別錄)

張仲景之發明 葶藶一味。經張仲景之實驗。認爲「主治水病。旁治肺癰結胸」。茲考徵如下。●葶藶大棗湯證曰。肺癰。胸滿。腹一身面目浮腫。(以上一方葶藶搗丸如彈丸大)●大陷胸丸證曰。結胸(以上一方葶藶半升)●己椒藶黃丸證曰。腸間有水氣。(以上一方葶藶一兩)歷觀上諸方。一皆是主治水病也。而二方云水病。一方特云結胸。其所謂結胸者。用大陷胸丸。則水利而疾愈。然則葶藶之治水也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論葶藶曰。療肺壅上氣。欬嗽。及止喘促。除胸中痰飲。【明】李時珍本草綱目論葶藶曰。通月經。【明】李士材本草圖解論葶藶曰。葶藶子辛寒。入肺瀉氣。主肺壅上氣。欬嗽喘促。痰氣結聚。通身水氣。按本草十劑云。洩可去閉。葶藶大黃之屬。此二味皆大苦大寒。大黃洩血閉。葶藶洩氣閉。夫葶藶之峻

利。不減大黃。惟急逐水。殊動真氣。稍涉虛者。宜痛戒之。有甜苦二種。苦者專洩。甜者少緩。然肺家水氣急滿。非此莫能療。但不敢多用耳。酒炒或糯米拌炒。待米熟。去米用。

【清】黃宮繡本草求真論葶藶曰。葶藶辛苦大寒。性急不減硝黃。大瀉肺中水氣。腹急下行膀胱。故凡積聚癥結。伏留熱氣。水腫痰壅。嗽喘經閉。便塞至極等症。無不常用。此謂昔本草十劑篇云。洩可去閉。葶藶大黃之屬。但大黃則瀉脾胃。陰分血閉。葶藶則瀉肺經陽分氣閉。葶藶有苦有甜。甜者性緩。雖瀉而不傷。苦者性急。既瀉肺而復傷胃。故必用以大棗。補土以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云。用葶藶以治頭瘡。藥氣入腦。殺人。其意大可知矣。子如黍米。微長。色黃。糯米微炒用。

國外學說 日本古方藥品考曰。衍義云。經既言味辛苦。則苦者自不復入藥也。大抵治體皆以行水走瀆爲用。蓋取苦泄之義耳。惟苦葶藶自來絕跡。不論進口貨與本國產皆無之。今藥舖稱甜葶藶

者。粒極細。色紅黃。味淡甘。此薺子。或薺子也。其稱苦葶藶者。粒似薺子。不圓。味微苦。此救荒遺藜子也。皆非真品。全自芥子代用之。最有效。又甜葶藶苗有大小二種。甜葶藶自冬生苗。葉似薺而小。有微毛。至夏抽莖三五寸。開小黃花。漸次結綠莢。扁如胡瓜子形。其子極細。如海金沙。又用藥須知曰。葶藶。正二月著花。子宜早收。遲則脫落。形狀似薺。葉有茸毛。但苦味少。其來自中國之種。味極苦。此真苦葶藶也。本草所謂苦葶藶者是。然其難得。日本所產。殆甜葶藶之類歟。又日用藥品考曰。有甜苦二種。方書單稱葶藶。皆苦葶藶也。藥肆所列。不論中日產。皆以薺子。或薺子混充。卽所謂甜葶藶也。苦葶藶。味至苦。其子苦尤甚。日本竟不見此物。又手板發蒙曰。葶藶子。今稱苦葶藶者。乃過薺子之子。非真品也。蓋甜葶藶有來自中國者。苦葶藶則無之。又和漢三才圖會曰。葶藶俗稱狗薺。出於日本之攝州者。良。播州產次之。市中所售。多非真葶藶子。係採薺子充之。又大和

者。粒極細。色紅黃。味淡甘。此薺子。或薺子也。其稱苦葶藶者。粒似薺子。不圓。味微苦。此救荒遺藜子也。皆非真品。全自芥子代用之。最有效。又甜葶藶苗有大小二種。甜葶藶自冬生苗。葉似薺而小。有微毛。至夏抽莖三五寸。開小黃花。漸次結綠莢。扁如胡瓜子形。其子極細。如海金沙。又用藥須知曰。葶藶。正二月著花。子宜早收。遲則脫落。形狀似薺。葉有茸毛。但苦味少。其來自中國之種。味極苦。此真苦葶藶也。本草所謂苦葶藶者是。然其難得。日本所產。殆甜葶藶之類歟。又日用藥品考曰。有甜苦二種。方書單稱葶藶。皆苦葶藶也。藥肆所列。不論中日產。皆以薺子。或薺子混充。卽所謂甜葶藶也。苦葶藶。味至苦。其子苦尤甚。日本竟不見此物。又手板發蒙曰。葶藶子。今稱苦葶藶者。乃過薺子之子。非真品也。蓋甜葶藶有來自中國者。苦葶藶則無之。又和漢三才圖會曰。葶藶俗稱狗薺。出於日本之攝州者。良。播州產次之。市中所售。多非真葶藶子。係採薺子充之。又大和

者。粒極細。色紅黃。味淡甘。此薺子。或薺子也。其稱苦葶藶者。粒似薺子。不圓。味微苦。此救荒遺藜子也。皆非真品。全自芥子代用之。最有效。又甜葶藶苗有大小二種。甜葶藶自冬生苗。葉似薺而小。有微毛。至夏抽莖三五寸。開小黃花。漸次結綠莢。扁如胡瓜子形。其子極細。如海金沙。又用藥須知曰。葶藶。正二月著花。子宜早收。遲則脫落。形狀似薺。葉有茸毛。但苦味少。其來自中國之種。味極苦。此真苦葶藶也。本草所謂苦葶藶者是。然其難得。日本所產。殆甜葶藶之類歟。又日用藥品考曰。有甜苦二種。方書單稱葶藶。皆苦葶藶也。藥肆所列。不論中日產。皆以薺子。或薺子混充。卽所謂甜葶藶也。苦葶藶。味至苦。其子苦尤甚。日本竟不見此物。又手板發蒙曰。葶藶子。今稱苦葶藶者。乃過薺子之子。非真品也。蓋甜葶藶有來自中國者。苦葶藶則無之。又和漢三才圖會曰。葶藶俗稱狗薺。出於日本之攝州者。良。播州產次之。市中所售。多非真葶藶子。係採薺子充之。又大和

本草曰葶藶大於薺。葉似之。三四
月開細黃花。有甜苦二種。甜者可
食。且柔輭。實圓。又本草綱目啓蒙
曰。葶藶乃一種小草。生原野向陽
之地。葉似雞兒腸而厚。色淺有毛。
就地叢生。入春漸次抽莖。長四五
寸。亦或近尺。面綠背紫。莖與葉皆
互生。莖端生長穗。開細花。四瓣。類
薺花。惟此作黃色。且花後結莢。形
似米粒而扁。不作三角形。為不同
耳。初夏子熟。自然從莢中散落。苗
根亦與之俱枯。其子視薺粟為小。
色茶褐。味微辛。又古今要覽稿曰。
岡村尚謙云。採葶藶子。頗有遲早。
隨土地而異。大約至二月杪以迄
三月。最為相宜。過遲則莢開。子落
地上。不可得矣。(和漢三才圖會
正字通) 一種有紅花。葉似薺花。
極細。莖高至尺餘。柔輭而難於特
立。仲夏開細白花。六月結實。形圓
扁。小而味辛。入秋莖葉俱枯。(本
草應斯) 大和本草指此種即葶
藶之類。四月柔輭不老。實平而圓。
郭璞注爾雅云。葶藶似薺。葉細。俗
呼老薺。與紅毛薺同種。凡葶藶入
夏便枯。此薺至秋尚存。故有老薺

之稱。一種名過藍菜。秋始生苗。至
春蕃盛。葉小而互生。莖高至二尺
許。梢頭有穗。花後結莢。花白。莢正
圓。大如指頭。大田證元曰。葶藶有
甜苦二種。甜者多在近郊。苦者不
詳。或曰。來自西國。未知孰是。春秋
繁露云。葶藶枯於仲夏。款冬華於
嚴霜。由此考之。苦者即款冬。本草
所稱之過藍菜。俗呼軍配。至四月
必枯。形狀較甜者更大。春開白花。
實圓扁。似紅毛薺。而大中藏細子
如蘇子。味苦辛。然有可疑者。過藍
菜之果莢。含有臭氣。甚於葱蒜。又
其脚葉似發莖葉而小。其即古之
惡薺歟。若謂即係葶藶。殆未免附
會也。
近人學說 張山雷曰。葶藶子
苦降辛散。而性寒涼。故能破滯開
結。定逆止喘。利水消腫。本經主治
皆以破滯為義。至別錄則專通水
道矣。甄權謂療肺壅上氣咳嗽。止
喘促。除胸中痰飲。瀕湖謂通月經。
景岳謂泄氣閉善逐水。乃氣行而
水自行也。故肺中水氣。臍滿脹急
者。非此不除。石頑謂其專泄肺氣。
而能通膀胱之氣化。蓋惟上竅閉

塞。下竅不通。因而積水泛溢。為喘
滿。為腫脹。為積聚。辛以散之。苦以
泄之。大寒以沈降之。則下行逐水。
既泄肺氣。即通膀胱。為其體輕而
性降也。惟寒泄之品。能通利邪氣
之有餘。不能補益正氣之不足。苟
非實熱鬱塞。自當知所顧忌。別錄
久服令人虛。本是至理。然肺家痰
火壅塞。及寒飲瀰漫。喘急氣促。或
為腫脹等證。亦必賴此披堅執銳
之才。以成搗穴犁庭之績。自徐氏
之才。論十劑之泄。以去閉。偶以大
黃葶藶二物並舉。而東垣遂謂葶
藶氣味俱厚。不減大黃。景岳從而
和之。石頑且謂苦寒不減硝黃。丹
溪亦有葶藶性急。病涉虛者。殺人
甚捷之說。遂令俗人不辨是否。畏
如蛇蝎。即尋常肺氣喘滿。痰飲壅
塞之證。亦幾有不敢輕試之意。其
亦知實在性質。不過開泄二字。且
體質本輕。故能上行入肺。而味又
甚淡。何至猛烈乃爾。臨症以來。所
用甚夥。開肺之效。久已共見。而傷
肺之弊。尚是無聞。抑且通調水道。
固有其功。而傷肺作瀉。未見其罪。
乃古書多與大黃並論者。則皆因

徐氏偽舉之例。而聽者不察。和而
唱之。競為惡聲之蟲。無識盲從。可
為浩歎。盍亦試以二物分煮而嘗
之。當可恍然於其氣味厚薄之何
似矣。

配合應用 治肺癆喘急不
得臥。葶藶大棗湯。肺湯主之。葶藶
炒黃。搗末。蜜丸。彈子大。每用大棗
二十枚。水三升。煎取二升。入葶藶
一丸。更煎取一升。頓服。亦主支飲
不得息(金匱方)

治通身腫滿。苦葶藶炒四兩
為末。棗肉和丸。梧子大。每服十五
丸。桑白皮湯下。日三。大效。(外臺
祕要方)

治腹脹積聚。葶藶子一升。熬
以酒五升。浸七日。日服三合。(千
金方)

治痰飲咳嗽。含奇丸。用葶藶
子一兩。紙襯炒令黑。知母。貝母各
一兩。粟肉半兩。砂糖一兩半。和丸。
彈子大。每以新綿裹一丸。含之。嚥
津。甚者不過三丸。(饌中方)

治陽水暴腫。面赤煩渴喘急。
小便澀。其效如神。甜葶藶一兩半。
炒研末。漢防己末二兩。以綠頭鴨

血及頭合搗萬杵。丸梧子大。甚者空腹白湯下十九丸。輕者五丸。日三四服。五日止。小便利為驗。一加猪苓末二兩。(外臺祕要方)

①治通身腫滿。苦葶麻炒四兩。為末。猪肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三服。此方人不甚信。試之自驗。

②治水腫尿澀。用甜葶麻二兩。炒為末。以大棗二十枚。水一大升。煎一升。去棗入葶麻末。煎至可丸。如梧子大。每飲服六十九丸。漸加以微利為度。(梅師方)又方用葶麻三兩。絹包。飯上蒸熟。搗萬杵。丸梧子大。不須蜜和。每服五丸。漸加至七丸。以微利為佳。不可多服。令人不堪。若氣發服之。得利氣下即止。水氣無比。蕭騎馬水腫。服此得瘥。(崔氏方)又治男女大小頭面手足腫。用苦葶麻炒研。猪肉和丸。小豆大。每服十丸。煎麻子湯下。日三服。五七日小便多。則消腫也。忌鹹酸生冷。(外科精義方)

③治大腹水腫。用苦葶麻二升。炒為末。對鷓鴣雄雞血及頭合搗丸。梧子大。每小豆湯下十九丸。日三服。

又方。葶麻二升。春酒五升。漬一夜。稍服一合。小便當利。又方。葶麻一兩。杏仁二十枚。並熬黃色。搗分十服。小便去當瘥。(肘後方)

④治肺溼痰喘。甜葶麻炒為末。猪肉丸服。(續玄方)

⑤治欬嗽上氣不得臥。或偏體氣腫。或單面腫。鼓足腫。並主之。葶麻子三升。微火熬研。以絹袋盛。浸清酒五升。中冬七日。夏三日。初服如桃許大。日三夜。一冬月。日二夜。一量其氣力。取微利下為度。如患急者。不待日滿。亦可絞服。(崔知悌方)

⑥治月水不通。葶麻一升。為末。蜜丸。彈子大。綿裹。納陰中二寸。一宿易之。有汗出止。(千金方)

⑦治卒發顛狂。葶麻一升。搗三千杵。取白犬血和丸。麻子大。酒服二丸。三服即瘥。(肘後方)

⑧治頭風疼痛。葶麻子為末。以湯淋汁淋頭。三四度即愈。(肘後方)

⑨治疔蟲蝕齒。葶麻。雄黃等分。為末。臘月猪脂和成。以綿裹槐枝蘸點。(金匱方)

⑩治自禿頭瘡。用葶麻末塗之。(聖惠方)

⑪治瘰癧已潰。葶麻二合。鼓一升。搗作餅子。如錢大。厚二分。安瘡孔上。艾作炷灸之。令溫熱。不可破肉。數易之而灸。但不可灸初起之瘡。恐葶麻氣入腦傷人也。(永類鈴方)

⑫治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研。水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

用蠶 一錢至三錢。施用宜忌 凡肺脾氣虛而無實邪者。禁用。惡白殭蠶。石龍肉。得酒良。榆皮為之使。

著名方劑 葶麻丸。治水腫及脚並虛腫。(外臺祕要方)葶麻子半兩。牽牛子半兩。(生熟各半)澤漆葉。海藻。(洗去鹽炙)昆布。(洗去鹽炙)桑白皮。甘遂。(熬)椒目。郁李仁。各三分。桂心一分。上為末。蜜丸。桐子大。一服十五丸。日再加至二十丸。

參攷資料 ①苦甜二味。主治不同。仲景瀉肺湯用苦。餘方或有用甜者。或有不苦甜者。大抵苦

則下泄。甜則少緩。實病人虛實用之。不可不審。本草雖云治同。而甜苦之味。安得不異。(王好古)②甘苦二種。正如牽牛黑白二色。愈緩不同。又如葫蘆甘苦二味。良毒亦異。大抵甜者下泄之性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者下泄之性急。既肺泄而易傷胃。故以大棗輔之。然肺中水氣。腫滿急者。非此不能除。但水去則止。不可過劑。既不久服。何至殺人。淮南子云。大戟去水。葶麻愈服。用之不節。乃反成病。亦在用之有節。(李時珍)

【葶】即大蒜之古籍別名。典見綱目。詳「大蒜」條。

【葶菜】即小蒜之古籍別名。典見綱目。詳「小蒜」條。

【葶子】即葶耳子之古籍別名。典見本草集註。詳「葶耳子」條。

【葶】即遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳「遠志」條。

【葶食蠶】即桑白皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑白皮」條。

【葶糖】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

【葶糖】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

十三畫 葶

葶 葶 葶

之一種。形如雀齒而有刺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 寒熱瘧疾癰腫。女子帶下。

【蜀葵】 ①即芫花之古籍別名。典見別錄。詳「芫花」條。②即芫花之根。詳「黃大戟」條。

【蜀葵】 即蜀葵之俗名。詳「蜀葵」條。

【蜀脂】 即黃香之古籍別名。典見別錄。詳「黃香」條。

【蜀椒】 即川椒之原名。詳「川椒」條。

【蜀黍】 命名 本品種始自蜀。故名。

古籍別名 蘆粟(食物)木稷。荻粟(廣雅)蜀秫。蘆粟(俗名)

外國名詞 Andropogon

Sorghum, Brot. Var. vulgaris, Hack. (拉丁) モロシ タウ

キヒ(日本)

基本 係禾本科蜀黍屬。爲蜀黍之米。其根詳見該條。

產地 生田澤中。北省多有之。

形態 蜀黍爲穀類黍屬之一

年生草本。與蘆粟相似。稈粗而高達丈許。葉大闊二寸。長二尺餘。與莖俱稍帶赤褐色。春日下種。夏月莖梢抽出大穗圓錐花序。花後結實。色亦赤褐。秋日收穫。其米可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 溫中。瀉腸胃。止霍亂。黏者與黍功同。

【蜀黍根】 命名 本品自蜀戎吳諸處所來。而形如葵。故名。惟吳者乃胡之說也。

古籍別名 荊戎葵(爾雅)吳葵(別錄)胡葵(爾雅翼)杖。杖石。杖紅。杖葵。荻葵。衛足。一文紅。衛足葵(和漢藥考)

外國名詞 Althaea rosea, cav. (拉丁)

基本 屬錦葵科。爲蜀葵之苗根莖與花子。

產地 李時珍曰。蜀葵處處有之。凡郊野間恒多生焉。

形態 蜀葵爲二年生草本。莖

高五尺至七尺。莖直立。有茸毛。葉稍呈心臟形。具有五裂至七裂。皆互生。六月開花。葉腋間。大似木槿花。或五瓣。或重瓣。色有紅紫白數種。頗美觀。頂上之花。狀如穗。但葉形卵圓。或作心臟形。邊緣有不整之鋸齒。具有葉柄。色綠。兩面密生茸毛。乾者色暗。或爲黃綠色。易破折。根入藥用。尋常多採用剝去外皮之副根。色帶白。無臭味。帶黏滑性。



蜀葵

採取 取四時紅色單葉者陰乾。

性質 甘。微寒。滑。無毒。

成分 亞爾答亞根之成分。爲植物黏液(約百分之三十五)澱粉。亞斯拍拉根(約百分之二)等。

蜀葵根所含之成分。與此相同。惟黏液質不多耳。至葉中之成分。亦與根無異。

效驗 根葉爲治疝氣淋病劑

疾藥。

主治 根莖除客熱。利小便。散膿血惡汁。

歷代記述致圖 【唐】孫思邈千金翼論蜀葵苗曰。除客熱。利腸胃。【唐】陳藏器本草拾遺論蜀葵苗曰。煮食治丹石發熱。大人小兒熱毒下痢。【宋】大明日華諸家本草論蜀葵苗曰。搗爛塗火瘡。燒研傅金瘡。【明】李時珍本草綱目論蜀葵苗曰。作葷食滑嫩。治淋濁。煖易產。

國外學說 亞爾答亞根。爲屬於錦葵科植物之宿根。產於歐洲中部。地中海沿岸地方及亞洲。前人譯爲蜀葵。實則同名異種。日本藥局方曾採用蜀葵根。旋因該植物黏液不多。改用亞爾答亞根。第四版改正日本藥局方記載如下。亞爾答亞根者。乃採其副根。剝去袍層。乾而用之。色帶白。附有似黃疣之痕痕。與細微之纖維。其木質及皮。均多澱粉粒。具有排列之纖維束。並蘗酸鹽細胞。黏液細胞。黏液堆積於細胞膜之內面。其橫斷面。除新生組織帶褐色外。其餘均

帶白色。以此根一分。加水十分。即成帶黃色之黏漿。黏漿味淡。無酸性。及安母尼亞性之臭氣。若現穢白色。或已變木質者。俱不堪用。蓋亞爾答亞根之供藥用。以其黏液質極多故也。葵類中雖亦含黏液質。然終不及亞爾答亞根之多。因此日本產之葵根。不能入藥。一說蜀葵開白花者。其根頗多黏液質。此層尚須研究。又藥學博士石津利作。曾將黃蜀葵根試驗。據稱確可代亞爾答亞根用。錄其說如下。亞爾答亞根。係取屬錦葵科二年生植物之主根及副根。剝去外部之袍層。乾而製之。此根含有極多之澱粉。黏液質及亞斯拍拉根約二%。能緩解腸胃之刺戟。故用為黏滑性之佐使藥。前藥局方本以蜀葵根定為藥用品。尋以其根質頗堅韌。含粘液質尚少。不適醫家之用。故改正藥局方。改用亞爾答亞根。惟現今盛行之亞爾答亞根。仍非該植物之根。依然習用從前之蜀葵根。初不計藥局方之准與否也。所以然者。因亞爾答亞根。在日本甚不易得。曾取黃蜀葵根為

藥學之實習。以時日匆促。研究尚有缺漏之處。惟所得成。祇有足述者。黃蜀葵屬錦葵科植物。含有黏液質極多。水浸其根片時。便成黏漿。從前日本美濃。駿河等處。向用為製紙之原料。考黃蜀葵初生葉。祇有三尖。漸長始有五尖。至梢缺刻極深。似大麻葉。柄底有如針之托葉。至秋。每梢頭之葉腋。必開花一朵。萼重復如蜀葵。花五瓣淡黃。爪呈深紫色。似草棉花而大。被覆柱筒狀子室之上。頭為暗紅之五珠。雄蕊滿布其體。莖與葉柄俱帶毛。後結角果。如桐子。長寸許。為鈍五稜。亦有毛。中分五室。藏多數種子。形似商麻子。色褐。頗有蘇頭。此草有大小二種。小者高二三尺。大者六七尺。形狀相似。惟大者葉之缺刻更深。儼如五指中分。小者根之黏液較多。製紙專用此種。大者僅賞其花而已。又黃蜀葵根為長圓錐形。旁生細小之分枝。乾則外面現污灰色。有縱紋。質柔韌。不易破折。曾將其根行解剖學之檢查。與亞爾答亞根相較。先取此根浸六十%之稀酒精。經兩星期後。視

其橫斷面。則見其構造。與亞爾答亞根大略相同。全面幾皆呈白色。僅新生組織褐色。皮部約占長徑五分之一。至十分之一。有纖細之白色髓線。於木質部。為放線狀。而質微。後以顯微鏡檢視皮部。則見其纖維束。排列若輪圈。內皮纖維。為長袍束。至木質部之髓線。則顯然可見也。再以顯微鏡檢視其橫斷面。見其皮部。與木質部之構造。亦與亞爾答亞根無異。處處有黏液細胞。以水溼之。立即膨脹。分外顯明。此黏液細胞中。實含有代表生藥功用之黏液。又曾取此黏液。檢查其化學之本性。法先以黃蜀葵根洗淨。俟乾。搗碎。入廣闊之玻璃瓶。約加蒸餾水十倍。未幾即見膨脹。漸將黏液質分泌而成黏漿。一宿後。再視之。全液變為濃稠。即用力搖之。亦不易動。乃用粗布絞榨。除淨污物。遂得透明帶白色之黏液。於此欲分取純粹之黏液。須多加酒精。而取其沈澱之黏液。分。再反覆加濃酒精。搓捏洗淨。置生石灰上乾之。則得灰白色之黏液。此灰白色之黏液。加硝酸而

濕之。假即發生紅褐色之氣體。約三四時。幾全溶解。止餘灰白色之絮狀物質而已。這紅褐色之氣體。發生終止。仍黃沸片刻。濾過。放置俟冷。便可析出巨大之針狀結晶。與細小之白色結晶性粉末。於此一面分取。一面使再三結晶。最後檢視該結晶之本質。大都不外醋酸。其隨醋酸而發生之白粉物質。檢其熔點等。純然為黏液酸。據此性質考之。是該黏液乃真正黏液。與亞爾答亞根所含者無異。亞爾答亞根之功效。在於黏液。則黃蜀葵根可以代用。決然無疑。且黃蜀葵日本隨在皆有。其黏液既多。是功效益可信其確實也。

近人學說 張山雷曰。蜀葵雖大於葵。而氣味甘寒。性亦滑利。與葵不異。其苗則孫思邈稱其除客熱。利腸胃。殺諸疔。治丹石發熱。熱毒下痢。日華謂搗塗火傷。瀕瀕謂滑痰治淋。潤燥易產。其花。則別錄謂理心氣不足。瀕古謂治帶下。赤者主赤帶。白者主白帶。赤治血燥。白治氣燥。皆取其寒滑潤利也。瀕瀕謂和血潤燥。利大小腸。其子。則

日華謂主淋瀝。通小腸。催生墮胎。療水腫。治疥疥。皆以寒滑見長。惟宜於燥熱之證。而慮者忌之。

配合應用 ①治小便淋痛。葵花根洗到水煎五七沸。服之如神。
(衛生寶鑑方)

②治小便血淋。葵花根二錢。車前子一錢。水煮。日服之。(簡便單方)

③治小便尿血。葵莖。無灰酒服。方寸匕。日三。(千金方)

④治腸胃生癥。懷忠丹。治內癥。有敗血。腥穢甚。臍腹冷痛。用此排膿下血。單葉紅蜀葵根白芷各一兩。白枯礬。白芍藥各五錢。為末。黃蠟溶化和丸。梧子大。每空心米飲下二十九。待膿血出盡。服十宣散。補之。(坦仙皆效方)

⑤治諸瘡腫痛。不可忍者。葵花根去黑皮搗爛。入井華水調糊貼之。(普濟方)

⑥治小兒吻瘡。經年欲腐。葵根燒研傅之。(聖惠方)

⑦治小兒口瘡。赤葵莖炙乾為末。蜜和含之。(聖惠方)
用量 一錢至三錢。

十三畫 蜀

參攷資料 ①蜀葵四時紅色。單葉者。根陰乾。治帶下。排膿血。惡物極驗也。(寇宗奭) ②蜀葵苗不可久食。鈍人志性。若被狗留者。食之永不瘥也。(孫思邈) ③蜀葵苗合猪肉食。令人無顏色。(李廷飛)

④爾雅云。音堅。戎葵也。郭璞注云。今蜀葵也。葉似葵。花如木槿。花戎蜀其所自來。因以名之。(陳敷器) ⑤蜀葵處處人家植之。春初種子。冬月宿根亦自生。苗嫩時亦可茹食。葉似葵葉而大。亦似絲瓜。有歧。又過小。滿後長莖高五六尺。花似木槿而大。有深紅淺紅紫黑白色。單葉千葉之異。昔人謂其疎莖密葉。翠萼豔花。金粉植心者。頗善狀之。惟紅白二色入藥。其實大如指頭。皮薄而扁。內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁。輕虛易種。其階剝皮可緝布作繩。一種小者名錦葵。即荊葵也。爾雅謂之戎。音喬。其花大如五銖錢。粉紅色。有紫縷文。掌禹錫補注本草。謂此即戎葵非矣。然功用亦相似。(李時珍) ⑥五月花開。莖高數尺。花有淡紅。鮮紅。黑白各色。又有單瓣。千瓣之別。堪供

玩賞。鮮紅者最佳。皆自宿根發生。蔕子者二年開花。以其莖。水浸二日。剝離其皮。可製為繩。亦可織布。枯莖作薪。耐火力。雖成灰。久不熄。見酉陽雜俎。(大和本草) ⑦日本藥局方所收之亞爾答亞根。即係採用日本產之蜀葵製之。蜀葵根一名亞爾答亞根。為大如手指之長根。其帶灰黃色之粗層已剝去之外。面帶粉白色。內皮層為長纖維性。其橫斷面之皮部。白色稍厚。木心部作放線狀。味淡泊而黏滑。(和漢藥考)

【蜀葵子】 性質 甘。冷。無毒。
主治 淋瀝。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并瘰癧赤瘻。

配合應用 ①治大小便閉不通者。用白花胡葵子為末。麥濃汁服之。(千金方)

②治石淋破血。五月五日收葵子。炒研食前溫酒下一錢。當下石出。(聖惠方)

③治癰腫無頭。蜀葵子為末。水調傅之。(經驗後方)

參攷資料 按楊士瀛直指方

云。蜀葵子炒入宣毒藥中最驗。又催生方用子二錢。滑石三錢。為末。順流水服五錢。即下。(李時珍)

【蜀葵花】 原名 葵。葵華。
性質 鹹寒。無毒。
主治 理心氣不足。

歷代記載攷證 〔宋〕嘉祐圖經本草。蜀葵。蜀葵。小兒風癩。瘡。〔明〕李時珍本草綱目。蜀葵。花曰。治帶下。目中。火。和血。潤燥。通竅。利大小便。

【蜀葵根】 外國名詞 蜀葵根
採取 以紅花單葉者。陰乾用。
主治 利小便。治淋痛。祛客熱。酒服。止尿血。婦人帶下。惡物。排膿血。

【蜀葵莖】 性質 甘。微寒。無毒。
主治 作蔬。茹。潤燥。消痰。養食。除客熱。利腸胃。治丹石發熱。酒服。止熱毒。下痢。淋疾。尿血。搗塗。口瘡。火瘡。

參攷資料 蜀葵莖能鈍人性。志。不可久食。狗咬者。食之。永不瘥。合猪肉食。令人無顏色。(綱目)

【蜀葵】 即常山之原名。今以蜀葵

之根名常山。而處方多用常山。少用蜀漆。其功力效能。蓋相同也。詳【常山】條。

【蜀酸漿】即山茶黃之古籍別名。與見本經。詳【山茶黃】條。

【蜀隨子】即續隨子之古籍別名。與見和漢藥考。詳【續隨子】條。

【蜂白蠟】即白蠟之處方用名。詳【白蠟】條。

【蜂衣仙子】即荔枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳【荔枝】條。

【蜂房】即露蜂房之處方用名。詳【露蜂房】條。

【蜂虎】 古醫別名 蜜虎。古路產地 山東多有之。

形態 蜂虎為卵生類之一種。似蜂而大。首尖身圓。狀如橄欖形。有兩翼。亦如蜂翅。遍身生毛。花斑色。尾有短毫。綉張如鵝尾。鼻上有鬚二根。喜入花心中。以鬚釣取花蕊。而出其鬚能伸縮屈曲。如象鼻。然以捲物。而喜入鳳仙花叢中。散子於葉背。日久生小灰色蟲。如青蟻。體上有黑白斑。食其花葉。長大及老。則下根底。變為蛹。頭粗尾

尖。如海蠅狀。作者黃色。久則轉出為蛾。即成蜜虎。如此循環。生生不已。可供藥用。

採取 以雄者入藥用。

製法 捕得裝入布袋。掛於下陰乾。瓦上火焙。去其周身絨毛。煎去頭足翅尾。再以火焙為末。喉症加冰片少許合研用。

主治 咽喉腫痛。單雙喉蛾吹之心腹痛。酒服一二枚即止。

參攷資料 蜂虎有雌雄。雄者身瘦小。雌者腹大。入藥用雄者。以線穿陰乾。可合房術藥用。山東極多。能食蜂。養蜂家最忌之。其蟲口中。有黑絲。常捲。若入蜂窩。即吐直其絲。以刺蜂。蜂即斃。然後食之。蓋蜂針在尾。而此蟲之針在首。想亦有毒。故蜂為所刺。無不立斃。其蟲於初秋散子在豆莢中。則為豆蟲。如青蠅狀。食豆。在黍稷上。則為朝天猴。如刺蝟狀。後乘葉自下食而上。最為莊田之患。然可食。莊人候日未出時。此蟲著體。體重翅輕。不能飛。易於撲取。人捕得。去其翅。置瓦罐內。令其自相撲。其體上細毛自落。然後以油鹽椒薑炒食。

之味。勝蠶蛹。但其體上毛不可着人眼。若眼即目損。【綱目拾遺】

【蜂勑】即露蜂房之古籍別名。與見別錄。詳【露蜂房】條。

【蜂家】即露蜂房之古籍別名。與見和漢藥考。詳【露蜂房】條。

【蜂腸】即露蜂房之古籍別名。與見本經。詳【露蜂房】條。

【蜂巢】即露蜂房之處方用名。詳【露蜂房】條。

【蜂蜜】 原名 石蜜。命名 蜜以密成。故名。本經名石蜜。蓋謂生於巖石者良也。

處方用名 蜜糖。黃蜜。白蜜。生蜜。煉蜜。

古醫別名 石飴。【本經】巖蜜。赤蜜。崖蜂。【綱目】蜂糖。并醜。食蜜。百花露。百花精。菜口芝。【和漢藥考】

外國名詞 Mal(拉) Honey (英) Honig (德)

基本 屬膜翅類。蜜蜂之勞動。由一種嘔吐作用。釀貯於蜜巢者。一種嘔吐作用。釀貯於蜜巢者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

蜜糖。以產於東坡城為第一。瓊州嘉積為第二。俱運往江門沽。東莞新安。惠州為第三。南寧百色為第四。其次則廣西桂林。江口。廣東北江。連州。樂昌。西山下。四府。瓊州海口等。均有出。南寧。百色。蜜。前二三十年來者甚佳。但前十五年至今所到者。無一不混雜。有其名。無其實。

形態 蜜之純良品。為淡黃色。濃稠液體。經時稍久。則成顆粒狀。有清香及甘味。比重一·四二五至一·四三四。溶於水及稀酒精。

種類 ①生蜜。即白蜜。乃刺取蜂房。受爐火。或日光之熱。自然溶解。滴下之蜜液。②熟蜜。即黃蜜。乃雜取新舊之房。同碎入鍋。加水。溫煮。盛袋榨出之蜜液。③採自高山大樹之自然空穴。或大石間。曾經數年之蜂巢者。謂之山蜜。石蜜。岩蜜。為上。④採於人家。或野外。置箱或桶。等養蜂。釀成者。謂之飼蜜。或家蜜。為次。

採取 春夏秋三季。間採之。尤以春季為佳。以春時適其去舊營。造新巢之際。貯蜜較他時為多。故

造新巢之際。貯蜜較他時為多。故

也。其在毒草近側之蜂房。不宜採取。恐其含有毒質耳。

製法 雷斅曰。凡煉蜜一觔。只得十二兩半。是數若太少太過。並用不得。李時珍曰。凡煉砂蜜。每兩入水四兩。銀石器內以桑柴火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠不散。乃用謂之水。火煉法。又法以器盛置重湯中。煮一日。候滴水不散。取用亦佳。且不傷火也。

用法 水煎或水化。或浸藥外傳。或和藥為丸。

性質 甘平。無毒。

成分 蜂蜜之主成分為糖類。

其他有含澱物。花粉及水氣等。

效能 補中益氣。潤燥滑腸。有鎮咳通便之效。用於泌尿器病。喘息。慢性氣管枝加答兒等。其他用作丸劑。佐藥及調味藥。

主治 心腹邪氣。諸癘瘧。安五臟。諸不足。益氣補中。養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸辟。肌中疼痛。口瘡。明耳目。止痛解毒。除痰病。和百藥。久服強志。輕身。不饑。不老。延年神仙。

張仲景之發明 石蜜一味。經

十三 蜂

張仲景之實驗。認為「主治結毒。急痛。兼助諸藥之毒」。茲考徵如下。①大烏頭煎證曰。寒疝繞臍痛。②烏頭湯證曰。歷節不可屈伸。疼痛。又曰。脚氣疼痛。不可屈伸。又曰。寒疝。腹中絞痛。③烏頭桂枝湯證曰。寒疝腹中痛。以上三方。蜜各二升。④大陷胸丸證曰。結胸項亦強。上方白蜜二合。⑤大半夏湯證曰。嘔吐。心下痞。上方白蜜一升。⑥甘草粉蜜湯證曰。心痛。上方蜜四兩。⑦下瘀血湯證曰。產婦腹痛。上方蜜和為丸。酒煎。又與諸藥等分。⑧甘遂半夏湯證。不具。上方蜜半升。據上諸方。則蜜能治諸結毒。急迫疼痛。明矣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論。蜂蜜曰。牙齒疳。口瘡。目睛赤障。殺蟲。【唐】甄權藥性本草論。蜂蜜曰。治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一椀。止。或以蜜汁同蜜各一合。水和頓服。常服。面如紅花。【唐】孟詵食療本草論。蜂蜜曰。治心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙。服即下。【宋】

寇宗奭本草衍義論。蜂蜜曰。同症白拍塗湯火傷。即時痛止。【明】李時珍本草綱目論。蜂蜜曰。和替衛。潤臟腑。通三焦。調脾胃。【明】穆希雍本草經疏論。蜂蜜曰。石蜜。蜂採百花釀成。故本經味甘氣平。別錄

微溫無毒。得草木羣英之精華。合露氣以釀成。故其氣清和其味純。甘。施之精神氣血。虛實寒熱。陰陽內外諸病。罔不相宜。經曰。衰不足者。以甘補之。石蜜具天地間至甘之味。故能安五臟。諸不足。及益氣

補中除衆病也。心經有熱。則為諸驚癇。得甘緩之氣。則心火降。煩熱除。諸驚癇瘧平矣。諸痛癢疥癬。皆屬心火。故又能止肌中疼痛。及口瘡也。甘主解毒。故能和百藥。甘主入脾。故能養脾氣。脾氣得所。養而飲食自下。腸辟止矣。五臟足。氣血充。則耳目聰明。不飢不老。輕身強志。延年神仙所自來矣。【明】李

士材本草圖解論。蜂蜜曰。蜂蜜甘平和替衛。潤臟腑。通三焦。理脾胃。解諸毒。和百藥。導便結。生能清熱。熱則補中。凡煉蜜一觔。入水四兩。銀石器內慢火煎。掠去浮沫。至滴

水不散為度。【清】黃宮繡本草求真論。蜂蜜曰。蜜本花木精英。春生露氣。曬得醱而成。生則性涼。清熱。熟則性溫。補中。為至純粹之味。凡人五臟不足。燥結不解。替衛不調。三焦失職。心腹急痛。肌肉瘡瘍。咳嗽熱痢。眼目眩花。形色枯槁。無不

借其潤色。以投如仲景治陽明燥結。大便不解。用蜜煎導。取其能通結燥。而不傷脾胃也。滋補藥俱用白蜜為丸。取其和胃潤肺也。至於赤蜜。食之使人心煩。以其味酸。故惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼質潤。若脾氣不實。腎氣虛滑。及溼熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。白如膏者。良。用銀石器。每蜜一斤。入水四兩。桑火慢熬。掠去浮沫。至滴水成珠。用。忌葱蒜。高荳。同食。

國外學說 英美學說謂。蜂蜜產中國。西國等處。係蜜蜂在其窩內所釀之糖質。此糖質先成於花心內。蜜蜂食之。入其膈內。則改變其形性。吐出於蜂房之內。蜂房內自行流出之蜜。則為極細之蜂窩。如其蜜蜂窩中。尚未分釀。則所得之蜂蜜。謂之清蜜。上等之蜂蜜。食

之令人喉中不安。似覺少有雜味。存若干時。則蜂蜜變濃而成白色顆粒。至下等之蜂蜜。其內有顆粒與雜質。尋常之取蜜法。則由壓蜂房而得之。故蜂蜜以自房中取出者為佳。中國藥肆中所出售之蜂蜜。蜜中恒見有死蜂。甚汚。不可入藥用。蜂蜜之上等者。為黏性透明之流質。其嗅香而奇。味甜而美。下等則係棕紅色。其作用為潤內皮。殺利藥。如小兒便秘。服之最宜。多食令人肚疼。宜佐他藥和服。治咳嗽藥亦有效。外用能敷惡瘡。喉咽等處。方以蜂蜜四錢。研砂五分。調勻。搽小兒口疳。(研砂蜜方) 又用蜂蜜與甘草末。微火煎凝。捻作銳端長圓丸藥。納入肛門。導引屎出尤佳。(蜂蜜甘草方) 又日本和漢藥考曰。日本香川。德島。鹿兒島。宮崎。和歌山。沖繩等諸縣。產此。養蜂在日本為農家副業。法尚幼稚。故所獲蜂蜜不多。品質亦劣。養蜂者及藥業者。欲加以研究。可參閱日農商務省農事試驗所出版第五次內國勸業博覽會出品說明書。蜜蜂及藥學雜誌第二

百六十九號佐藤捨次郎氏之蜂蜜及黃蠟談。對於養蜂法。蜂蜜收集法等。可閱東京博物館出版版教草第二十四號。養蜂改良說等。又曰。學博士所著養蜂改良說等。又曰。取蜂蜜宜於春夏及秋季。春季蜂力最旺。為去舊巢營新巢之時。貯蜜尤多。故收取以此季最佳。日本採收蜂蜜法。即切取蜂房三分之二。入篩或籠。置桶上。於燻透或日光下熱之。則蜜液滴下。日本謂之「一番」。即漢名生蜜。(白蜜) 次將巢房盛於布囊。榨之。謂之「二番」。雖有蜂仔等。其質甚劣。又有不論蜂房新陳。同碎入鍋。加水少許。溫之。入布袋。擠出。漢名熟蜜。(黃蜜) 擠出後之精滓。可製黃蠟。又精製蜂蜜法。將蜂蜜入磁皿。蓋之。靜置寒暖適中。處三四日間。將表面所生泡沫。抹出數次。至已完全不發泡沫而後已。又法於蜂蜜加水四分之一至六分之一。入雞子白攪拌。用火熱之。擲去上面發出泡沫。投下雞卵。至上浮稠度。乃用毛篩濾過。即成精品。又曰。蜂蜜用於火傷有效例。有六歲小孩。嘗誤將其兩

手置燈火中。其老祖母向壯健。立抱之奔下。擬將兩手傷處。置水中。時適他室有盛新製蜂蜜之甕。因小孩痛楚異常。無法可施。即將其兩手。插置甕中。痛楚頓解。翌日復插置甕中。及第三日。已告全愈。創處並無損傷。亦全不起水泡。(日本安政七年刊行宇田川與齋譯萬寶新書) 又第三版改正日本藥局方云。精製蜂蜜。係取蜂蜜二分。加蒸餾水三分。於重湯煎上。溫一時間。俟其冷至約五十度。用緻密絨布濾過。復急於重湯煎上。蒸發。使成比重一。二三而止。(第四版改正日本藥局方云。加白陶土精製) 本品有良快香氣。又第四版改正日本藥局方曰。蜂蜜概無色。或作淡黃色。或帶楊黃色。新鮮時。為透映黏稠液。味甘。經久漸析出顆粒。本品微呈酸性。反應於顯微鏡下。檢視可見精晶。及花粉等質。又東洞益吉曰。仲景甘草粉蜜湯。證曰。毒藥不止。千金翼方。毒藥作藥毒。為是。此方本主緩結毒急痛。故兼治一切藥毒。不止煩悶者。路世見之。以為蜜能解

百藥毒。蜜若解百藥毒。則仲景之方。何其用蜜之多乎。夫蜜之於藥。能助其毒。又於其病毒。也能緩其急。猶粳米與小麥。甘草及粉。亦其功大抵相似。故知此方。則為緩其急用之。凡蜜之為物。同諸藥用之。則能助其毒。今同甘草及粉用之。則又能緩其急痛也。煩悶豈非藥毒之急乎。又所以兼治蠅蟲心痛也。梳又按所謂藥毒者。非攻病毒藥之藥毒。而必是害人毒藥之藥毒矣。故曰藥毒不止。煩悶者。所謂煩悶者。非攻病毒藥之煩悶。而害人藥毒之煩悶也。有止攻病毒藥之煩悶者。非疾醫之義矣。煩悶。是毒藥之既眩也。豈其止之可乎。余故曰。此藥毒者。非攻病毒藥之藥毒矣。由此觀之。則蜜之功。可以知矣。(害人毒藥者。蓋非醫人誤治之毒藥) 配合應用 ●治大便不通。腸明病自汗。小便反利。大便硬者。津液內竭也。蜜煎導之用。蜜二合。銅器中微火煎之。候凝如飴狀。至可丸。乘熱捻作挺。令頭銳。大如指。長寸半許。候冷即硬。納便道中。少頃

即通也。一法加皂角細辛爲末少許。尤速。(傷寒論方)

⑤治噎不下食。取崖蜜含。微微嚥下。(廣利方)

⑥治產後口渴。用煉過蜜不計多少。熱水調服即止。(產書方)

⑦治難產橫生。蜂窠。真麻油各半。煎滾半服立下。(海上方)

⑧治天行瘡。比歲有病天行瘡。頭面及身。須臾周匝。狀如火。皆戴白漿。隨決隨生。不即擦數日必死。差後瘡。瘡色一歲方滅。此惡毒之氣。世人云。建武中南陽。擊瘡所得。仍呼爲瘡。諸醫參詳。取好蜜通厚。煎上。以蜜煎升麻數。數拭之。(肘後方)

⑨治痘疹作癢難忍。搗成膏。及痘欲落不落。百花膏。用上等石蜜。不拘多少。湯和。時時以翎刷之。其瘡易落。自無癢痕。(全幼心鑑方)

⑩治癩癬。癢痒。白蜜不拘多少。好酒調下有效。

⑪治五色丹毒。蜜和乾薑末。傅之。(肘後方)

⑫治口中生瘡。蜜浸大青葉合之。(藥性論方)

⑬治陰頭生瘡。以蜜煎甘草塗之。痿。(外臺秘要方)

⑭治肛門生瘡。肛門主肺。肺熱即肛塞腫。縮生瘡。白蜜一斤。豬膽汁一枚。相和。微火煎。令可丸。丸三寸。長作挺。塗油。納下部臥。令後重。須臾通泄。(梅師方)

⑮熱油燒痛。以白蜜塗之。(梅師方)

⑯治疔腫惡毒。用生蜜與隔年葱研膏。先刺破塗之。如人行五里許。則疔出。後以熱醋湯洗去。(濟愈仙方)

⑰治面上野點。取白蜜和茯苓末。塗之。七日便瘥也。(孫真人食忌方)

⑱治目生珠管。以生蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。(肘後方)

⑲治誤吞銅錢。煉蜜服二升。可出矣。(葛氏方)

⑳治諸魚骨鯁。以好蜜稍稍服之。令下。(葛氏方)

㉑治年少髮白。拔去白髮。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不生。取梧椰子搗汁塗上。必生黑者。(梅師方)

【蜂糖】即蜂窠之處方用名。詳和漢藥考。詳馬蜂窠條。

【黃蠟】條。

【蠶】即車螯肉之古籍別名。典見綱目。詳「車螯肉」條。

【蝮】命名。蝮。蝮也。本品效內。光緒如日初出。故名。

古籍別名。扁蝮(綱目)金口蝮。

外國名詞 Corbicula leana Primo 或 Cyclina orientalis (拉丁) シジミ 或 マシシ (日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類有管類全緣類蝸科之蝸。

產地 出溪湖中淡水間。



蝸

形態 蝸爲介類蚌蛤屬之一種。殼形略似心臟。右左兩殼同形。殼外有同心之輪紋。約三十層。表皮暗褐。稍帶黃。殼內肉紫白色。頂膨起。色黑。但多脫去。表皮露出石灰質。殼合部有主齒三。外韌帶堅強。殼緣呈鋸齒狀。外套膜厚。其

十三 蠶 蜂

蜃 蜆

十三蠱 蜆

痕稍樹曲。大者一寸。殼高六七分。其肉可供食與藥用。

性質 甘。酸。冷。無毒。

主治 治時氣。開胃。墜丹石藥毒。及疔瘡。下溼氣。通乳。積食。食良。生浸取汁。洗疔瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論蜆肉曰。去暴熱。明目。利小便。下熱氣。脚氣。溼毒。解酒毒。目黃。浸汁服。治消渴。【明】李時珍本草綱目論蜆肉曰。生蜆浸水。洗痘瘰。無療痕。

參攷資料 蜆肉微毒。多食發嗽。及冷氣。治腎。【陳藏器】

【蜆殼】

命名 本品為蜆肉之乾者。故名。

主治 解蟲毒。療水土不服。

【蜆爛殼】

性質 鹹。溫。無毒。 主治 止痢。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論蜆爛殼曰。治陰疽。【唐】陳藏器本草拾遺論蜆爛殼曰。燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。【宋】日華諸家本草論蜆爛殼曰。療失精反胃。【明】李時珍本草綱目論蜆爛殼曰。化痰止咳。治吞酸。

蜈

心痛。及暴嗽。燒灰塗一切溼疥。與蚌粉同功。

古稱別名 痿癭。蟬蛆。

足蟲。百脚。 (俗名)

外國名詞 Scolopendra (拉

丁) Centipede (英)

基本 屬節足動物多足類中之蜈蚣。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蜈蚣產湖北武昌。洪山。宜昌等處。春季出新。傳聞將鷄毛溼透。於地上掘一大穴。放鷄毛於穴中。溼蕩蓋之。久而久之。則產生此種蜈蚣矣。

形態 蜈蚣為外觀厭惡之蟲類。春日徘徊各處。覓食動物性之食物。冬則蟄伏。軀體扁平細長。全長五六寸。頭及下面為黃褐色。背作暗綠色。全身有多數環節。每一環節生脚一對。末端如鉤。脚凡十五至二十對。呼吸口開於環節之兩旁。與氣管相通。此蟲卵生。幼時與母蟲異。初孵化時。繞六環節。後每蜕化一次。其環節與脚皆增多。一次。頭部具單眼數個。并棘狀觸

角一對。口有上顎。下顎。頭脚。頭脚乃第一環節脚之變形物。其尖端具毒腺。便於咬刺。人若被其螫傷。即起劇甚之疼痛。



蜈 蚣

採取 七月八月間採捕。黑頭赤足者良。

製法 雷斅曰。凡使蜈蚣。勿用干足。蟲真相似。只是頭上有白肉。面并嘴尖。若誤用併把著腥臭氣。入頂。能致死也。凡治蜈蚣。先以蜈蚣本末。或柳蛙末於土器中炒令木末焦黑。去木末。以竹刀刮去足甲。用李時珍曰。蜈蚣本不知是何物也。今人惟以火炙去頭足用。或去尾足。以薄荷葉火煨用之。

用法 恒以焙制和作外治藥。間有和入內服藥。

性質 辛。溫。有毒。

效能 祛風治驚癇。解毒療瘡。 用治小兒撮口驚風藥。 主治 鬼疰蟲毒。噉諸蛇蟲魚

一五〇六

毒。殺鬼物老精。溫瘧。去三蟲。 (本經) 療心腹寒熱積聚。墮胎。去惡血。 (別錄)

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論蜈蚣曰。治癩疥。【明】李時珍本草綱目論蜈蚣曰。小兒驚癇。風指。疔風。口噴。丹毒。疥癩。癩。便毒。痔漏。蛇瘻。蛇傷。【明】釋希雍本草經疏論蜈蚣曰。蜈蚣味辛。氣溫。有毒。乃屬陽之毒蟲。足厥陰經藥也。善能制蛇。見大蛇便緣上。咬其鬚。淮南子云。騰蛇游而殆於蜈蚣。正指此也。故本經主噉諸蛇。魚毒。及去三蟲。蟲毒也。性復走竄。所以能療鬼疰。溫瘧。殺鬼物老精。辛主散結。溫主通行。故又治心腹寒熱。結聚。墮胎。去惡血也。今世又以之治小兒驚癇。風指。疔風。口噴。與夫癩癧。便毒。痔漏。等證。皆用之。【清】黃宮繡本草求真論蜈蚣曰。蜈蚣本屬毒物。性善噉蛇。故治蛇瘻。毒者。無越是物。且其性善走竄。故瘧疫鬼怪。得此則瘳。又其味辛。辛則能以散風。故凡小兒驚癇。風指。疔風。口噴。得此入肝。則治。又其性溫。溫則能以療精。

故凡瘵血隨胎。心腹寒熱結聚。得此則祛。至於瘰癧便毒等症。書載能以調治。亦是以毒攻毒之意耳。赤足黑頭者佳。火燬用。畏蜘蛛蜈蚣。

辨偽 鄭省巖曰。蜈蚣以蘇州產者為良。開蘇人採取生草堆積腐爛。日久便生。燥乾外貨。背光脊棘。足赤腹黃。此易辨物也。舍蘇

蚣均不可用。市肆有以本地所產混售。間有一種千足蟲。一名馬陸。形最相似。若誤用之。并把着腥臭氣入頂。皆能毒發致死。不可不慎。 ① 曹炳章曰。按蜈蚣江蘇蘇州洞庭山出者多。頭紅身黑有光。大者最佳。常州吳江縣錫山出者少。頭紅身黃色。略次。四川出者。頭黃褐色。身黑褐色。小多力薄亦次。浙江餘姚縣出者。頭亦紅。身黑褐色。略次。大抵用者須擇長大頭尾全。全身黑而有光者為道地。項元麟曰。近時有一種千足蟲。其形相似。惟頭上有白肉。嘴尖者最毒。不宜作蜈蚣用。

近人學說 張山雷曰。蜈蚣亦是毒蟲。而能治幼科癩癧。疔風抽

十三畫 蜈

搐者。瀕湖謂善行而迅疾者。惟風與蛇。而蜈蚣乃能制蛇。則亦能定風。足厥陰經藥也。入煎藥不過一二分而止。究是毒物。不可率用。亦作外治末藥。則炒炙研之。皆無頭足。即其毒之所在處也。

配合應用 ① 金頭蜈蚣。得牛角。象牙末。猪懸蹄。刺蝟皮。蛀竹屑。能去通腸瀉管。

② 治瘰癧。一名蛇瘻。蟹爛瘻。雨之鄉。多毒。蛇氣。人有不伏水土。風氣而感觸之者。數月以還。必發蛇瘻。惟赤足蜈蚣。最能伏蛇為上藥。白芷次之。(直指方)

③ 治嶺南外蛇瘻。一名項喉瘻。項大腫痛。速喉。用赤足蜈蚣一二節。研細水下即愈。(聖濟總錄方)

④ 治初生小兒口噤不開。不能乳者。用赤足蜈蚣。去足炙研末。以猪乳二合。調半錢。分三四服。溫灌之效。(圖經方)

⑤ 治小兒撮口。但看舌上有瘡。如粟米大是也。以蜈蚣汁。刮破指甲。研傅兩頭肉即愈。如無生者。乾者亦可。(子母秘錄方)

⑥ 萬金散。治小兒急驚。蜈蚣一

條。全者去足。炙為末。丹砂。輕粉。等分。研勻。陰陽乳汁和丸。煮豆大。每歲一丸。乳汁下。(聖惠方)

⑦ 治天弔驚風。月久不下。眼見自睛。及角弓反張。聲不出者。雙金散。主之。用大蜈蚣一條。去頭足。酥炙。用竹刀批開。記定左右。又以射香一錢。亦分左右。各記明。研末包定。每用左邊者吹左鼻。右邊者吹右鼻。各少許。不可過多。若眼未下。再吹些。須眼下乃止。(直指方)

⑧ 治破傷中風欲死。用蜈蚣研末。擦牙。迫去積沫。立甦。(聖惠方)

⑨ 又用蜈蚣頭。烏頭尖。附子底。絹消等分。為末。每用一字。或半字。熱酒灌之。仍貼瘡上。取汗愈。(儒門事親方)

⑩ 治口眼喎斜。口內麻木者。用蜈蚣三條。一蜜炙。一酒浸。一紙裹。煨。並去頭足。天南星一箇。切作四片。一蜜炙。一酒浸。一紙裹。煨。一生用半夏。白芷各五錢。通為末。入麝香少許。每服一錢。熱調下。日一服。(通變要法方)

⑪ 治腹內蛇瘻。誤食菜中蛇精。成蛇瘻。或食蛇肉成瘻。腹內常饑。食物即吐。以赤足蜈蚣一條。炙研末。酒服。(衛生易簡方)

⑫ 治蜈蚣螫傷。蜈蚣燒末。傅之。

⑬ 治射工毒瘡。大蜈蚣一枚。炙研和酢傳之。(千金方)

⑭ 治天蛇頭瘡。生手指頭上。用蜈蚣一條。燒烟熏一二次即愈。或為末。猪膽汁調塗之。(奇效方)

⑮ 治丹毒瘡腫。用蜈蚣一條。白礬一皂子大。搗丸一箇。百部二錢。研末。調醋傳之。(本草衍義方)

⑯ 治瘰癧潰瘡。茶蜈蚣二味。炙至香熟。搗篩為末。先以甘草湯洗淨。傅之。(枕中方)

⑰ 治聾耳出膿。用蜈蚣末吹之。(鮑方氏)

⑱ 治小兒禿瘡。大蜈蚣一條。鹽一分。入油內。浸七日。取油。搽之。極效。(海上方)

⑲ 治便毒初起。黃脚蜈蚣一條。瓦焙存性。為末。酒調服。取汗即散。(濟生秘要方)

⑳ 治痔瘡疼痛。用赤足蜈蚣焙為末。入片腦少許。唾調傳之。(直指方) 又用蜈蚣三四條。香油煮一二沸。浸之。再入五倍子末二三

十三畫 蜈 蚣 娘 蛭 蛇 蝮

錢。餅收密封。如遇痛不可忍。點上油。即時痛止。大效。(孫氏集效方)

◎治腹大如箕。用蜈蚣三五條。酒炙研末。每服一錢。以雞子二箇打開。入末在內。攪勻。紙糊湯湯。煮熱食之。日一服。連進三服。移。(活人心統方)

◎治脚肚轉筋。蜈蚣燒猪脂和傅。(肘後方)

◎治女人建瘡。甲內隱肉突出。不愈。蜈蚣一條。焙研傅之。外以南星末醋和傅。四圍。(醫方摘要)

用蠶 一條至三條。或五分至一錢半。

施用宜忌 凡無風瘡。實邪及孕婦病者。禁用。長蝮。蝮。蠅。雞屎。桑皮。白蠟。

製法 以活蜈蚣浸胡麻油中。二十日後收用。通稱蜈蚣油。相傳有治愈創傷之效。故凡一切毒蟲。毒獸咬傷。痛者。取塗之。立能止痛消腫。火傷亦可用之。

參攷資料 蜈蚣背光黑綠。色。足赤腹黃。有被毒者。以烏雞屎。或大蒜塗之。效性長蝮。不取過所行之路。觸其身即死。故蝮能

治蜈蚣毒。(寇宗奭) 蜈蚣西南處。處有之。春出冬蟄。節節有足。雙鬚。尾。性畏蜘蛛。以溺射之。即斷。爛也。南方有極大者。而本草失載。按段成式酉陽雜俎云。綬定縣蜈蚣大者。能以氣吸蝮。相去三四尺。骨肉自消。沈懷遠南越志云。南方晉安有山。出蜈蚣大者。長丈餘。能啖牛。俚人燃炬。遂得以皮。斃肉。曝為脯。美於牛肉。葛洪遐觀賦云。南方蜈蚣大者。長百步。頭如車箱。肉白如瓠。越人爭買為羹炙。張采明道雜志云。黃州岐亭有拘羅山。出大蜈蚣。表丈尺。土人捕得。薰乾。商人販入北方。貨之。有致富者。蔡條叢話云。嶠南蜈蚣大者。二三尺。人至死。惟見託胎蟲。則局縮不敢行。蟲乃登首。嚼其腦而食之。故被蜈蚣傷者。搗蠶塗之。痛立止也。珍按託胎蟲。即蝮也。蜈蚣能制龍蛇。蝮而畏蜈蚣。蝮蝮蝮蝮。亦莊子所謂物畏其天。陰符經所謂禽之制在氣也。(李時珍)

【蜈蚣草】即神仙對坐草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「神仙對坐草」條。

【蜈蚣毒】命。本品葉狀。似蜈蚣。故名。古籍別名。邊箕。萍。麻。蕪。萍。網目拾遺。

【蜈蚣】多生溪澗。田港。止水間。一種。形如蕪。一莖細葉。兩房。擢對而生。葉頗粗。澁。不似萍之光澤。點點輕清。採得可供藥用。主治。辟一切跳蚤。蟲。晒乾。燒烟薰之。

【蜈蚣】係蜈蚣之一種。惟略似蜈蚣而小。大如指頭。身狹而長。有角黃黑色。甲下有翅能飛。夏月雨後叢生。黃土中。朝生暮死。性質效能。詳「蜈蚣」條。

【蜈蚣】係蟬之具五色者。性質效能。與尋常蟬同。詳「蟬」條。

【蜈蚣】即馬刀之古籍別名。典見爾雅。詳「馬刀」條。

【蜈蚣】即蝮之古籍別名。典見綱目。詳「蝮」條。

【蜈蚣】即蝮牛之俗名。詳「蝮牛」條。

【蜈蚣石】外國名詞。Ouzli。canorum, Lapi-

des canorum (拉丁) Crabs-bone (英)

基本 屬胸甲類之蜈蚣。胃之兩側。每歲新生二粒石灰質。即取以入藥。

一五〇八

產地 和漢藥考曰。蜈蚣日本東北地方溪流中產之。北海道尤多。

形態 蜈蚣為蟹類之一種。大一寸至三寸許。體形似蟹。八足兩膝。向後退。其味似蟹。或呼蜈蚣。胃之內面。兩側有用以咀嚼之。炭酸石灰質之突起物。謂之蜈蚣石。(一說此石灰質。係每歲新生皮殼之原料云。) 捕時或用手。或用繩穿。哇捕之。剥去其甲。而取其體中小石。為白色。淡青色。或微赤色之扁圓形物。大三四分。一面稍扁。平粗糙。一面突起作輪狀。硬固滑澤。無氣味。不溶於水。逢酸類則沸騰溶化。遺留軟膏狀物質。

成分 為磷酸鈣。磷酸鎂。碳酸鈣。鈉鹽類。膠質等。

效能 專作利水劑。

國外學說 遠西名物考曰。性收瀉乾燥。土質而含有鹼性鹽。為

收瀉乾燥。土質而含有鹼性鹽。為

專消剋酷厲酸敗液之良藥。其質多含黏液。而夾石灰質土。鹼性不烈。不刺戟胃。故較他土質制酸藥為佳。亦如他土質藥能閉大便。故宜兼用大黃或適宜瀉劑使之通利。是為至要。此藥含黏液有軟化性。故用於兼有疼痛諸症。尤有效。其功效不下於錐過爾拔。故一切酸敗液所起之症。即吞酸嗜噯。胸脇心腹刺痛。或小兒痼疾諸症。諸骨軟弱。佝僂病等。用之皆有奇效。利小便。發汗。止下痢。稀釋黏稠。疏解凝結。服甚。為末用至一錢。日服數次。如瓦老別里鹽用之。能驅諸病毒惡液。從汗與小便泄出。加入橙汁或蒸餾醋。待其沸動已止用之。善能發汗。江馬天江轉譯青囊珍珠（日本安政四年刊行）所載配合蛭石之處方如下。治小兒遠擊喘急。金硫黃（自半克冷至一克冷）非沃斯越幾斯（自一克冷至二克冷）蛭石。砂糖各半克冷。上研和分十二包。每四分鐘或半小時服一包。肺勞有熱者。宜此方。硝石等劑。以促衰弱。有害蛭石。二打蘭。枸橼汁加蛭石。

飽和為度。菩提樹花水六盎斯。甘草舍別利一盎斯。上調和。每一時服二食匕。

用量 一分至四分。

參攷資料 ①蛭石為荷蘭藥。拉丁語謂之 *Onnia Canoe*。

②遠西名物考曰。日本長門之赤間關及豐前中津附近河中。所產之蟹。有小石。狀如瑟苡仁。上凸下凹。此種蟹於七八月間脫殼。生新殼。於其已脫殼時捕之。其兩眼之間。必有二白石。惟須窺其脫殼而體仍軟。未能行走時速取之。否則其石頃刻溶化如米泔汁。使殼硬固。此為蛭石之一種。其性質功效亦同云。③捕得蛭石。即時剝去甲殼。取出之石。帶青色。為上品。裝過後取出者。色白。為下品云。【峻】即鹿精之古籍別名。典見韓悉醫通。詳「鹿精」條。【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。【裏朽斤草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。【裏腐草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃芩」條。

【補骨脂】即帶魚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「帶魚」條。

原名 胡人呼為婆。固脂。俗訛為破故紙。

命名 補骨脂。言其功也。胡非子。因其子之狀相似。非胡地之非子也。

處方用名 破故紙。

古籍別名 破故紙（固實）婆。

固脂（藥性）胡非子。（日華）天豆。反古紙。破故紙。婆固紙。補骨脂。（和漢藥考）

基本 係屬豆科。為補骨脂之種子。

產地 補骨脂生於南諸州及波斯國。陳仁山藥物生產辨云。產四川為最。河南。安徽次之。架喇吉打來者又次。名洋故紙。五月新。

形態 補骨脂為高達三四尺之草本植物。葉作橢圓形。夏秋間於葉間生穗一寸許。開淡紫色花。後結球形圓形大一分許之實。成熟則外皮變為黑色。中有黑褐色扁圓形類似麻子之種子。香氣而腥。採取 每年九月間採。製法 雷斅曰。凡使補骨脂。此

性燥毒。須用酒浸一宿。漉出。以東流水浸三日。夜蒸之。從巳至申。日乾。用一法以鹽同炒過曝用。

性質 辛。大溫。無毒。

效能 補命門。納腎氣。用作強壯藥。

主治 五勞七傷。風虛冷。骨體傷敗。腎冷精流。及婦人血氣墮胎。

歷代配述攷證 【唐】甄權藥性本草論補骨脂曰。男子腰疼膝冷。囊溼。逐諸冷痺。頑止小便。腹中冷。【宋】大明日華諸家本草論補骨脂曰。與陽事。明耳目。【明】繆希雍本草經疏論補骨脂曰。補骨脂味辛。其氣大溫。性則無毒。陽中微陰。降多升少。入手厥陰心包絡。命門。足太陽脾經。能煖水臟。陰中生陽。壯火益土之要藥也。其主五勞七傷者。蓋緣勞傷之病。多起於脾腎兩虛。以其能煖水臟。補火以生土。則腎中真陽之氣得補而上升。則能煖熱水穀。蒸糟粕而化精微。脾氣散精上歸於肺。以榮養乎五臟。故主五臟之勞。七情之傷。所生病。風虛冷者。因陽氣衰敗。則風冷乘虛而客之。以致骨體傷敗。腎冷

十三畫 補

精流。腎主骨而藏精。髓乃精之本。真陽之氣不固。即前證見矣。固其本而陽氣生。則前證自除。男子以精為主。婦人以血為主。婦人血氣者。亦猶男子陽衰腎冷而為血脫。氣陷之病。同乎男子之腎冷精流也。大溫而辛。火能消物。故能墮胎。【明】李時珍本草綱目論補骨脂曰。治腎虛。通命門。煖丹田。斂精神。【清】黃元御玉楸藥解論補骨脂曰。補骨脂味辛苦。氣溫。入足太陽脾。足少陰腎。手陽明大腸經。溫脾暖腎。消水化食。治膝冷腰疼。癱瘓滑腎。能安胎墜。善止遺精。收小兒遺溺。與丈夫痿陽。除陰囊之溼。愈關節之涼。溫暖水土。消化飲食。升達肝脾。收斂滑泄。遺精帶下。溺多。便滑諸證。甚有功效。方書稱其延年益壽。雖未必信。然要亦佳善之品也。【清】黃宮璣本草求真論補骨脂曰。補骨脂辛苦大溫。色黑。何書皆載能斂神明。使心胞之火。與命門之火相通。因而元陽堅固。骨髓充實。以其氣味溫苦。瀉以止脫。故也。凡五勞七傷。因於火衰。而見腰膝冷痛。腎冷流精。腎虛泄瀉。

及婦人腎虛胎滑。用此最為得宜。若認症不真。或因氣陷氣短。而見胎墮。水衰火勝。而見精流泄瀉。妄用補骨脂。則殺人慘於利器矣。

配合應用 ●治精氣不固。用破故紙、青鹽等分。同炒為末。每服二錢。米飲下。(三因方)

●治小便無度。腎氣虛寒。用破故紙十兩。酒蒸。茴香十兩。鹽炒。為末。酒糊丸。梧子大。每服百丸。鹽酒下。或以末擦豬腎煨食之。(普濟方)

●治小兒遺尿。膀胱冷也。夜屬陰。故學便不禁。用破故紙炒為末。每夜熱湯服五分。(嬰童百問方)

●補骨脂丸。治下元虛敗。脚手沈重。夜多盜汗。縱慾所致。此藥壯筋骨。益元氣。補骨脂四兩。炒香。菟絲子四兩。酒蒸。胡桃肉一兩。去皮。沈香研細。一錢半。煉蜜丸。如梧子大。每服二三十丸。空心鹽湯溫酒任下。自夏至起。冬至止。日一服。此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方於南番。人有詩云。三年時節向邊隅。人信方知藥力殊。奪得春光

來在手。青裙休笑白髭鬚。(和劑局方)

●治虛勞。男子女人。五勞七傷。下元虛冷。一切風病。四肢疼痛。駐顏壯氣。烏髭鬚。用補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。卻用烏油麻一升。和炒。令麻子聲絕。錢去。只用補骨脂為末。醋煮麪糊丸。如梧子大。每服二三十丸。空心溫酒鹽湯任下。又方。治腎虛腰痛。用破故紙一兩。炒為末。溫酒服三錢。神效。或加水香一錢。(經驗方)

●育娥丸。治腎氣虛弱。風冷乘之。或血氣相搏。腰痛如折。俛仰不利。或因勞役傷腎。或溼痺傷腰。或墮跌損傷。或風寒客掉。或氣滯不散。皆令腰痛。或腰間如物重墜。用破故紙酒浸炒一斤。杜仲去皮切片。薑汁炒一斤。胡桃肉去皮二十箇。為末。以蒜搗背一兩。和丸。梧子大。每空心溫酒服二十九。婦人淡醋湯下。常服壯筋骨。活血脈。烏髭鬚。益顏色。(和劑局方)

一五一〇

水二盞。煎六分服。日三次。愈則止。(夏子益奇疾方)

●二神丸。治脾胃虛弱。用破故紙炒半斤。肉豆蔻生用四兩。為末。肥瓠研存和丸。梧子大。每服五七十丸。空心米飲下。如木香二兩。名三神丸。(本事方)

●治打撲腰痛。瘀血凝滯。用破故紙炒。茴香炒。辣桂等分。為末。每熱酒服二錢。(直指方)

●唐鄭相國自敘云。予為南海節度。年七十五。粵地卑濕。傷於內外。衆疾俱作。陽氣衰絕。服乳石補藥百端不應。元和七年。有詞陵國舶主李摩訶。知予病狀。遂傳此方。并藥。予初疑而未服。摩訶稽首固請。遂服之。經七八日。而覺應驗。自爾常服。其功神效。十年二月。罷郡歸京。錄方傳之。用破故紙十兩。淨去皮。洗過。曝乾。酒浸。蒸。再曝。搗碎。令細。胡桃二十兩。湯浸。去皮。細研如泥。更以好蜜和。令如餡。瓷器盛之。且日以煖酒二合。調下。十匙服之。便以飯壓。如不欲酒。人。以煖熱水調之。餌久。則延年。益氣悅心。明目。補添筋骨。但禁蠶羊。羊肉。

心明目。補添筋骨。但禁蠶羊。羊肉。

餘無所忌。此物本自外番。隨海舶而來。非中華所有。番人呼爲補骨脂。語譯傳爲破故紙也。王紹顏續傳信方載其事頗詳。故錄之。

⑤治疝娠腰痛。通氣散。用破故紙二兩。炒香爲末。先嚼胡桃肉半箇。空心溫酒調下二錢。此藥神效。(婦人良方)

⑥養血返精丸。定心補腎。破故紙炒二兩。白茯苓一兩。爲末。沒藥五錢。以無灰酒浸高一指。煮化和末。丸梧子大。每服三十九。白湯下。昔有人服此。至老不衰。蓋故紙補腎。茯苓補心。沒藥養血。三者既壯。自然身安。(朱氏集驗方)

⑦治水瀉久痢。破故紙炒一兩。粟殼炙四兩。爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。薑棗同水煎服。(百一還方)

⑧牙痛日久。腎虛也。補骨脂二兩。青鹽半兩。炒研擦之。(御藥院方)

⑨風蟲牙痛。上連頭。腦補骨脂炒半兩。乳香二錢半。爲末。擦之。或爲丸塞孔內。日用有效。(傳信適用方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡病陰虛火動。腸道妄舉。夢遺尿血。小便短澀。及目赤口苦。舌乾大便燥結。內熱作渴。火升目赤。易飢嗜雜。溼熱成痿。以致骨之無力者。禁用。忌蠶豆及羊血。語血。得胡桃。胡麻良。

參攷資料 ①補骨脂生嶺南諸州及波斯國。(馬志) ②今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有。皆不及番舶者佳。莖高三四尺。葉小似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月採。(蘇頌)

【補骨脂】即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「補骨脂」條。
【解毒】即即鬼臼之古籍別名。典見別錄。詳「鬼臼」條。②即山豆根之古籍別名。典見綱目。詳「山豆根」條。

【解毒子】 古籍別名。地不容。 (唐本)苦藥子。(圖經)

產地 出川蜀山野間。
形態 解毒子爲蔓草類之野生草本。葉青似香葉而厚硬。作卵形而尖。凌冬不凋。無花實。其根黃

白色。外皮微粗。累累相連。而圓大。可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。
主治 解蠱毒。止煩熱。辟瘴瘧。利喉閉及痰毒。

歷代記載攷證 ①宋蘇頌圖經本草論解毒子根曰。治五臟邪氣。清肺歷熱。②明李時珍本草綱目論解毒子根曰。消痰降火。利咽喉。退目赤。

【解毒草】即吉祥草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「吉祥草」條。
【解錫】即白粉之古籍別名。典見本經。詳「白粉」條。

【解毒】即防己之古籍別名。典見本經。詳「防己」條。
【解毒】即苡仁之古籍別名。典見本經。詳「苡仁」條。

【麝香】即必栗香之古籍別名。典見綱目。詳「必栗香」條。
【麝香】即麝香之古籍別名。典見說文。詳「麝香」條。

【麝糖香】 命名 麝言其黏。糖故名。 產地 出閩粵諸省。

形態 麝糖爲香水類之一種。花香如茉莉。樹幹如橘。其枝葉熱之成香。似沙糖而黑色。可供藥用。採取 以淳而軟者良。

性質 苦。微溫。無毒。
主治 風水毒腫。去惡氣。伏尸。歷代記載攷證 ①南北朝陶弘景本草集註論麝糖香曰。治惡核惡瘡。②明李時珍本草綱目論麝糖香曰。和胡桃。青皮搗塗髮。令黑如漆。

參攷資料 麝糖香與淳者難得。多以其皮及糞尿雜之。爲合香家要用。(陶弘景)

【降麝】即紅豆之古籍別名。典見綱目。詳「紅豆」條。②即白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白扁豆」條。

【麝】即麝之古籍別名。典見綱目。詳「麝」條。
【麝香】即麝香之古籍別名。典見綱目。詳「麝香」條。

【麝】 命名 本品與麝同穴。各處故字從各而命。 產地 生山野中。
形態 麝爲獸類之一種。狀如

十三 蠶 補

解 詹 露 貉 類 貉

狸頭銳鼻尖。有斑色。而毛黃褐。又似小狐。日伏夜出。捕食蟲物。出則窺隨之。其性好睡。毛深厚。溫滑。可為裘服。肉可食。與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 元氣虛勞。及女子虛癯。

【賊參】即齊芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳「齊芎」條。

【路石】

古別名 陵石。(別錄)

產地 寄生石間。

形態 路石為雜草類之一種。天雨獨乾。日出獨濡。花黃莖赤。三歲一實。赤如麻子。其莖葉可供藥用。

採取 五月十月間採之。

性質 甘酸無毒。

主治 心腹病。實骨痛。止汗生肌。益氣耐寒。

【路路通】即楓果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「楓果」條。

【路頭花】即露花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「露花」條。

【跳蝦蟲】即淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「淮東子」條。

【跳蟲】即淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「淮東子」條。

見綱目拾遺。詳「淮東子」條。【跳鐵】即銅鐵之原名。詳「銅鐵」條。

【載】

基本 載為雜草類之一種。可供藥用。

性質 酸無毒。

主治 辟諸惡氣。

【載丹】即丹雄雞之古籍別名。典見吳普本草。詳「丹雄雞」條。

【載君行】即防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防己」條。

【辟火】即景天之古籍別名。典見綱目。詳「景天」條。

【辟邪】即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。

【辟邪翁】即吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「吳茱萸」條。

【辟風胡麻】即牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牛蒡子」條。

【辟虺雷】命名 本品辟蛇虺有威。故以雷名。

古籍別名 辟蛇雷。(綱目)

基本 係山草類。為辟虺雷之根。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 解百毒。消痰。祛大熱。頭

痛。辟瘟疫。

歷代紀遠效驗 【明】李時珍本草綱目論辟虺雷曰。治咽喉痛。解蛇虺毒。

參攷資料 ①辟虺雷狀如粗塊。蒼朮節中有眼。(蘇恭) ②今川中峨眉鶴鳴諸山皆有之。根狀如蒼朮。大者若拳。(李時珍)

【辟蛇雷】即辟虺雷之古籍別名。典見綱目。詳「辟虺雷」條。

【辟毒】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳「斑鳩」條。

【辟瘟草】古別名 獨脚金星。七星草。骨牌草。(綱目拾遺)

性質 性平。味苦。氣香。

主治 傷寒。瘧疾。風氣。腫毒。時氣。惡氣。散邪風。乳癰。熱瘡。小兒痘眼。瘡。喉閉。生蛾。同金鎖匙。汁醋漱。癆瘵。香煎。疎經絡。治疳。

參攷資料 ①百草鏡治癆瘵。用鴨脚金星草。曬乾。為末。取少許。噉鼻中。或煎服。亦可。小泉驗方。疔腫。用鴨脚金星草煎酒。一服。即消。

②一名獨脚金星雞。又名鴨脚金星。佩帶之。可辟疫氣。近見市者。有小

葉而短狹。大葉而長狹者。皆非辟瘟草也。小者名七星草。俗呼骨牌草。惟無五六蓋。五六乃天地之中。不易結寄。生石樹間。大者名劍脊金星。長一二尺。生山溪澗旁。老則葉背皆起星。此二種。東醫綱目已收載。辟瘟草葉如鴨脚。有三歧。一莖一葉。氣味清香。老則有星。香氣亦減。(趙恕軒) ③鴨脚金星。即辟瘟草。葉如鴨脚。大而薄。背生星點。至八九月間。星老乃黃乾之。其氣香冽不變。若葉太老及經水者。便不香。端午採嫩者。陰乾。用。勿見火。(百草鏡)

【辟驚石】古別名 避驚風

產地 西巴尼亞國

主治 治急慢驚風。一切天鈞尸疰。

參攷資料 西巴尼亞國有一處土中產石。色黑而光。取而琢之。或大或小。佩孩童胸前。遇邪風而起。慢驚急驚。此石代受。其患邪氣。盡收於石。自然裂破。孩童無恙。必須常佩。永遠。方可無虞。真可寶之物也。(本草補)

【遂石】 基本 遂石爲石類之一種。可供藥用。

產地 生太山。
性質 甘無毒。
主治 消渴傷中。益氣。

【遂陽木】 產地 生山中。
形態 遂陽木爲雜木類之一種。葉如白楊葉。三月結實。十月成熟。色赤。可食與供藥用。

性質 甘無毒。
主治 益氣。

【遂葛】 卽商陸之原名。詳「商陸」條。

【遊撥】 卽蕁撥之古籍別名。典見扶南傳。詳「蕁撥」條。

【遊蟲珠】 基本 係昆蟲類夜行蟲之屎也。

產地 粵西福建諸省境內。均有產之。
效能 解宿滯。落垢積。

主治 上焦血滯。腹內脹滿。癥瘕等症。

【遊龍】 卽葑草之古籍別名。典見毛詩。詳「葑草」條。
【運日】 卽雄鳩之古籍別名。典見和目。詳「鳩」條。

【運屎蟲】 卽蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳「蜈蚣」條。

【遍地金】 基本 本品卽乳藤之細莖者。
古籍別名 雞盲草。(綱目拾遺)

性質 寒。涼。無毒。
主治 小兒一切疳眼。

【遍地金錢】 卽金錢草之俗名。詳「金錢草」條。

【遍地香】 卽金錢草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金錢草」條。

【過山紅】 卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茜草根」條。

【過山龍】 卽茜草之古籍別名。典見本草衍義補遺。詳「茜草根」條。

【過冬青】 卽荔枝草之古籍別名。典見經驗廣集。詳「荔枝草」條。

【過東藤】 卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【過阿龍】 卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【過崗龍】 產地 粵東珠江兩岸。沼澤田野間。常有出之。

性質 甘。辛。微溫。
效能 理氣活血。祛風散滯。解鬱積。壯筋骨。

主治 除疔疔。理跌打。內傷痰火。痔漏管瘡。

【過街】 卽蠶蟲之古籍別名。典見綱目。詳「蠶蟲」條。

【過路蜈蚣】 卽地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣草」條。

【過羅】 卽草蓆之古籍別名。典見綱目。詳「草蓆」條。

【道乙阿吐】 卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桔梗」條。

【道人頭】 卽蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道生草】 卽葑草之古籍別名。典見綱目。詳「葑草」條。

【達節】 卽節華之古籍別名。典見別錄。詳「節華」條。

【酪】 古籍別名 漚。(綱目)
製法 先以牛馬羊駝之乳汁。半杓鍋內炒過。再入餘乳。熬數十沸。熱時常以杓縱橫攪之。乃傾出。燻盛。待冷。掠取浮皮。以爲酥。入齋酪少許。紙封放之。是謂選酪。再以酪晒結。掠取浮皮。再晒至皮盡。置釜中。炒少時。以器盛之。曝令作塊。是謂乾酪。俱可供藥用。其酥詳見該條。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 熱毒。止渴。解發熱。除胸中虛熱。身面上熱。疥。肌瘡。

歷代鉅述攷證 【宋】日華諸家本草論酪曰。止煩渴。熱。心。膈熱。痛。【明】李時珍本草綱目論酪曰。潤燥利腸。摩腹。生精血。補虛損。壯顏色。

參攷資料 按戴原禮云。乳酪血液之屬。血燥所宜也。酪。濃。北人多造之。水牛。犛牛。羴牛。馬。駝之乳。皆可作之。入藥。以牛酪爲勝。水牛。馬。駝之酪。冷。犛牛。羊。乳。酪。溫。(李時珍) 患冷患病人勿食羊

一五一三

十三畫 酪 鉛 銻 鉛

【酪】合酢食。成上。酸。(五賦)

【酪酥】即茄子之古籍別名。典見五代貽子錄。詳「茄子」條。

【鈴兒草】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳「沙參」條。

【鈴菜胡】即徐長卿之日本名。詳「徐長卿」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【鈴兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

用法 恒以焙和藥。亦有水煎。

性質 甘寒。無毒。

效能 降氣逆。墜痰涎。用作鎮靜藥。

主治 鎮心安神。治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。灸熨之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鉛曰。療癩瘡。鬼氣疰件。錯爲末。和青木香。傅瘡腫。惡毒。

【明】李時珍本草綱目論鉛曰。消瘰癧。癰腫。明目。固牙。烏髮。髮。治實女。殺蟲。墜痰。治噎膈。消渴。風癩。解金石藥毒。

配合應用 ●烏髮明目。黑鉛半斤。鍋內銼汁。旋入桑條灰。柳木擬成沙。篩末。每早搽牙。以水漱口。洗目。能固牙。明目。黑髮。髮。(勝金方)

●搽牙烏髮。黑鉛消化。以不蛀皂莢。寸切。投入炒成炭。入鹽少許。研勻。日用搽牙。搽去白髭。黑者更不白也。又方。黑錫一斤。炒灰埋地。中五日。入升麻。細辛。調子同炒。黑。日用搽牙。百日效。亦治牙齒動搖。(普濟方)

●烏髮鉛。鉛十兩。錫三兩。麥羅得三箇。針砂。熟地黃。半兩。茜根。胡桃皮。一兩。沒石子。阿膠。勒皮。硫黃。石榴皮。慈石。皂礬。烏麻油。各二錢。半爲末。先化鉛。錫。入末。一半。柳木攪勻。傾入梳模子。印成筒齒。餘末。同水煮。梳三日。水耗加之。取出。故帛重包五日。每以熱皮襯手梳一百下。須先以皂莢水洗淨。拭乾。(普濟方)

●治腎臟氣。發攻心。面黑欲死。及諸氣奔豚。喘急。鉛二兩。石亭脂二兩。木香一兩。麝香一錢。先化鉛。炒乾。入亭脂。急炒。起。以醋噴之。傾入地坑內。覆住。待冷。取研。粟飯丸。芥子大。每用二丸。熱酒化服。取汗。或下。或通氣。自愈。如大便不通。再用一丸。入元明粉五分。服。亦治婦人血氣。冷痛。攻心。(聖濟總錄方)

●治風癩。吐沫。反目。抽掣。久患者。黑鉛水。銀結砂。南星。炮各一兩。爲末。糯米飯丸。菉豆大。一歲一丸。乳汁下。(普濟方)

●反胃噎噎。黑鉛化汁。以柳木槌研成粉。一兩。入米醋一升。砂鍋熬。入蕪餅末。少許。搗丸。小豆大。每服一丸。薑湯下。(聖濟方)

●治多年反胃不止。紫背鉛二兩。石亭脂二兩。鹽鹵汁五兩。燒鉛以鹵汁淬盡。與亭脂同炒。起。挑於水上。焙止。研勻。蒸餅和丸。梧子大。每服二十九。煎石蓮乾柿湯下。(聖濟方)

●治消渴煩悶。黑鉛。水銀等分。結如泥。常含豆許。吞津。(聖惠方)

●治寸白蟲病。先食豬肉一斤。乃以沙。鋪水調。黑鉛灰四錢。五更服之。蟲盡下。食白粥一日。(本事方)

●治水腫浮滿。烏錫五兩。皂莢一挺。炙酒二斗。煮大沸。頻服。至小便出二三升。卽消。(千金方)

●治小便不通。黑鉛。末一兩。生薑半兩。燈心一握。井水煎服。先以炒葱貼臍。(聖惠方)

●治卒然咳嗽。爐中鉛屑。柱心。皂莢等分。爲末。蜜丸。如梧子大。每飲下十五丸。忌葱。(備急方)

●治瘰癧結核。鉛三兩。鐵器炒。取黑灰。醋和塗上。故帛貼之。頻換。去惡汁。如此。半月。不痛。不破。內消。

爲水而愈。(劉禹錫傳信方)

⑤治癰疽發背。黑鉛一斤。甘草三兩。微炙。瓶盛。酒一斗。浸甘草。乃鑄鉛投酒中。如此九度。去滓。飲酒醉臥即愈。(經驗方)

⑥治金石藥毒。黑鉛一斤。鑄化。投酒一升。如此十餘次。待酒至半升頓飲。(勝金方)

⑦取輕粉毒。出山黑鉛五斤。打壺一把。盛燒酒十五斤。納土茯苓半斤。乳香三錢。封固。重湯煮一日。埋土中。出火毒。每日早晚任性飲數杯。後用瓦盆接小便。自有粉出。爲驗。服至筋骨不痛乃止。(醫方摘要)

⑧解砒霜毒。煩燥如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾。黑鉛四兩。磨水一盞。灌之。(華陀危病方)

⑨解硫黃毒。黑錫煎湯服即解。(集同方)

用量 三錢至四錢。

應用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ①鉛變化爲胡粉。黃丹密陀僧。鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。密陀僧鎮墜下行。鉛白霜專治上焦

胸膈。此爲異耳。方士又錯爲梳。梳鬚髮可令光黑。或用藥煮之尤佳。(李時珍) ②鉛生山穴石間。人挾油燈尋至數里。隨礦脈上下曲折。斫取之。其氣毒人。若連月不出。則皮所癢黃。腹脹不能食。多致疾而死。地鏡圖云。草青莖赤。其下多鉛。鉛錫之精爲老婦。(李時珍) ③嘉州利州出草節鉛。生鉛未煨者也。打破肥燒之。氣如硫黃。業背鉛。即熟鉛。鉛之精華也。有變化。能碎金。剛鑽。雅州出鈞脚鉛。形如皂子。大又如蝦斗子。黑色。生山澗沙中。可乾承。盧氏鉛粗惡力劣。信州鉛雜銅氣。陰平鉛出劍州。是銅鐵之苗。並不可用。寶藏論云。鉛有數種。波斯鉛堅白。爲天下第一。草節鉛出健爲。銀之精也。銜銀鉛銀坑中之鉛也。內含五色並妙。上饒樂平鉛。次於波斯草節。頁版鉛。鐵苗。不可用。倭鉛。可勾金。土宿真言本草云。鉛乃五金之祖。故有五金雜并。追魂使者之稱。育其能伏五金而。死入石也。雌黃乃金之苗。而中有鉛氣。是黃金之祖矣。銀坑有鉛。是白金之祖矣。信鉛雜銅。是赤金之

十三畫 鉛

祖矣。與錫同氣。是青金之祖矣。砂伏於鉛而。死於硫。硫戀於鉛而。伏於硫。鐵戀於磁而。死於鉛。雄戀於鉛而。死於五。知故金公變化最多。一變而成胡粉。再變而成黃丹。三變而成密陀僧。四變而爲白霜。雷氏炮炙論云。令鉛住火。須仗脩天。如要形堅。豈忘紫背。註云。脩天。補天石也。紫背。天葵也。(獨孤酒)

【鉛丹】即黃丹之原名。詳「黃丹」條。

【鉛白】即鉛粉之別名。詳「白粉」條。

【鉛白霜】即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

【鉛光石】基本 鉛光石爲石類之一種。可供藥用。

主治 骨痛。

【鉛灰】原名 黑錫灰。

製法 用未經煨治之新鉛。研淨去渣。再銻成液。同硫黃。煨。談起。以醋酒之。候成黑灰。研之。以不黏滯爲度。用。

性質 甘寒。無毒。

主治 積聚殺蟲。同檳榔末等分。五更米飲服。

【鉛粉】即白粉之原名。詳「白粉」條。

【鉛條】即鉛之虛方用名。詳「鉛」條。

【鉛華】即鉛粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

【鉛黃華】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。

【鉛霜】命名 本品係以鉛雜水銀合煉而成之粉末。故名。

古籍別名 鉛白霜。神符白雲。(綱目)

製法 蘇頌曰。鉛霜用鉛雜水銀十五分之一。合鍊作片。置醋壺中。密封經久成霜。李時珍曰。以鉛打成錢穿成串。瓦盆盛生醋。以串橫盆中。離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處。候生霜。刷下。仍合住。

性質 甘酸。冷無毒。

主治 消痰止咳。解酒毒。去胸膈煩悶。中風痰實。止瀉。

歷代記載攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論鉛霜曰。去臘熱涎塞。【明】李時珍本草綱目論鉛霜曰。

十三畫 鉛 鈔 鈔

治吐逆。銀箔去怯。黑髮髮。

參攷資料 ①鉛霜性極冷。治

風痰及嬰穉驚滯。今醫家用之尤多。(蘇頌) ②鉛霜乃鉛汞之氣

交感英華所結。道家謂之神符白雪。其墜痰去熱定驚止瀉。蓋有奇效。但非久服常用之物。爾病在上

焦者。宜此清鎮。(李時珍)

【鉛精】即水銀之古籍別名。與見和漢藥考。詳「水銀」條。

【鉛養】即白粉之化學別名。詳「白粉」條。

【鉛礬】即黑礬之古籍別名。與見嘉祐阿膠本草。詳「礬石」條。

【鈔恒羅香】即發香之古籍別名。與見金光明經。詳「發香」條。

【鈔擺婆福羅】即珊瑚之古籍別名。與見梵書。詳「珊瑚」條。

【鈔吻】命名。本品入口則鈔人喉吻故名。

古籍別名 野葛(本經)毒根除辛(本草吳普)胡蔓草(圖經本草)斷腸草(黃履)火把花(治葛折之有青烟出者名固活(綱目)烟馬草(水莽草(俗名))

外國名詞 *Rhus toxicodendron*

Arum, L. var. radicans, Miq.

(拉丁) ッタウルシ (日本)

基本 係漆樹科漆樹屬。為鈔吻之根。

產地 生山野中。

形態 鈔吻為毒草類之一種。有草本木本兩種。草本者蔓生。葉為長卵形。端尖花黃而小。木本者高四五尺。葉似黃精。但有毛鈔子二個。初夏開單性花。黃綠色。雌雄異株。結實紅色。其根可供藥用。



鈔 吻

採取 二月八月採之。

性質 辛。溫。有大毒。

主治 金瘡乳疔。中惡風。咳逆上氣。水腫。殺鬼疰。蠱毒(本經)破

瘕積。除脚膝痺痛。四肢拘攣。惡瘡疥蟲。殺鳥獸。搗汁入存中。不入湯飲。(別錄)

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論鈔吻曰。主喉痺咽塞。聲音變

使。 應用宜忌 惡黃芩。牛夏為之

參攷資料 ①鈔吻食素。飲冷水即死。冷水發其毒也。彼土毒死人懸尸樹上。汁滴地上。生菌子。收之名菌藥。烈於野葛也。藥搗汁。解野葛毒。取汁滴野葛苗。即萎死。南人先食瓊菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。魏武帝敵野葛至尺。先食此菜也。(陳藏器) ②按李石續博物志云。胡蔓草出二廣。廣人負負急。每食此草而死。以誣人以急水吞即死。急水吞死稍緩。或取毒蛇殺之。覆以此草。澆水生菌。為毒藥害人。葛洪肘後方云。凡中野葛毒。口不可開者。取大竹筒。筒以頭柱其兩脇及腋中。澆冷水入筒中。數易水。須臾口開。乃可下藥解之。惟多飲甘草汁。人尿汁。白鴨或白鵝頭。灌入口中。或羊血灌之。嶺南衛生方云。即時取雞卵。抱未成雛者。研爛和麻油。灌之。吐出毒物。乃生。稍遲即死也。(李時珍)

【鈔笑】即苦笑之古籍別名。與見爾雅。詳「苦笑」條。

【鈔栗】古籍別名。果鈔子。(拾遺)甜橘子(吳璣)

產地 生山野間。

形態 鈔栗為喬木類之一種。木大數圍。凌冬不凋。實如栗而圓小。亦有如雀子圓卵者。其實中仁可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 食之不飢。厚腸胃。令人肥健。

【鈔鈔】即鈔藤之處方用名。詳「鈔藤」條。

【鈔藤】即王瓜之古籍別名。與見郭瓊賦。詳「王瓜」條。

【鈔鳩】即鴟鵂之古籍別名。與見綱目。詳「鴟鵂」條。

【鈔藤】命名。本品刺尚如鈔。處方用名。鈔鈔。純鈔鈔。椒鈔。淨雙鈔。雙鈔鈔。

古籍別名 鈔藤鈔。市藤鈔。(和漢藥考)

外國名詞 *Uncaria flynni*

chophylla, Miq. (拉一)

基本 屬茜草科。爲釣藤之鈎

產地 陳仁山藥物生產辨云。鈎藤以產廣西桂林者爲最好。廣東北江、星子亦佳。其次則連州、清遠、三坑、牙江、廣西賀縣等亦有出。形態 鈎藤爲自生之蔓性草。本葉腋生兩鈎棘。以攀緣於他物。高達丈許。葉對生。作卵圓形。頭端尖。夏間開淡黃褐色之小花。相綴若球。其嫩莖略方。老則變圓而成木質。鈎棘對生於葉腋之間。向下彎曲。初時色綠。至秋則變紅褐色。質堅強。狀似魚鈎。味爲收斂性。



鈎 藤

採取 三月採之。
用法 凡入煎劑。須俟他藥煎就。投入一二沸。頗得效力。否則無力。去極。純用嫩鈎。其功十倍。
性質 甘。微寒。無毒。
效能 熄風。清熱。定痛。止眩。專作鎮瘧藥。

十三畫 鈎

隔

主治 小兒寒熱。十二驚癇。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鈎藤曰。小兒驚啼痲癇。熱癇。客忤胎風。【明】李時珍本草綱目論鈎藤曰。大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。小兒鈎腹痛。發斑疹。【清】黃宮繡本草求真論鈎藤曰。鈎藤味甘微苦。氣平微寒。爲手少陰心厥陰肝經要藥。緣肝主風。心主火。風火相煽。則風因火而愈盛。火亦因風而益熾。其在小兒。則病必在驚癇痲癇。眼翳抽掣。大人則病必見頭旋目眩。婦人則病必見赤白帶下。故必用此輕平宜泄。以爲下降。則風靜火熄。而驚風熱自爾克除矣。此爲小兒風熱初熱。病未見甚者。用之得宜。若使風火至極。勢難驟遏。則此輕平疎泄。效難克奏。又當細審所因。用以重劑。以爲投服。則藥始與病當。而無病重藥輕之弊矣。取藤細多鈎者良。但久煎則無力。
近人學說 張山雷曰。鈎藤其質甚輕。氣味俱薄。自別錄卽以爲專治小兒寒熱。弘景且謂療小兒不入餘方。蓋氣本輕清。而性甘寒。

最合於幼見稱陰未充。稚陽易旺之體質。能治驚癇者。痲癇皆肝動生風。氣火上煽。沖激腦神經之病。此物輕清而涼。能泄火而能定風。甄權謂主小兒驚啼。痲癇熱癇。客忤胎風。潮瀉謂治大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。皆一以貫之。惟潮瀉又謂其發斑疹。則本於錢仲陽之紫草散。方用鈎藤鈎子。紫草茸等分爲末。溫酒調服。壽頤按仲陽之所謂斑疹。卽是痘瘡及瘡子。非今人時病中之所謂發斑。鈎藤輕能透發。清能解熱。而佐以紫草涼血活血。助其流動。又以酒輔之。能發亦能清。洵是不亢不卑穩妥之法。
配合應用 ①治小兒驚癇痲癇。用鈎藤。遠志。茯神。琥珀。棗仁。丹砂。牛黃。天竺。黃犀。角。層。生地。黃。龍齒。麥門冬。金箔。有痰加竹瀝。南星。橘紅。
②治小兒驚熱。鈎藤一兩。滑石半兩。炙甘草二錢五分爲散。每服半錢。溫水服。日三服。【聖濟錄方】
③治卒得癩疾。鈎藤炙甘草各二錢。水五合。煎二合。每服漿許。日

五夜三。【聖惠方】

④治斑疹不快。鈎藤鈎子。紫草茸等分爲末。每服一字。或中錢。溫酒服。【錢氏方】
用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡無風熱及實火者禁用。

參攷資料 ①鈎藤出梁州。葉細長。其莖間有刺。若鈎。【蘇恭】
②湖南湖北江南江北山中皆有之。藤長八九尺。或一二丈。大如拇指。其中空。小人用致酒。攪中。盜取酒。以氣吸之。消消不斷。【寇宗奭】
③狀如葡萄藤。而有鈎。紫色。古方多用皮。後世多用鈎。蓋取其力銳。【李時珍】
④祛肝風而不燥。幼科珍之。用治寒熱驚癇。痲癇諸疾。【顧松園】

【隔山消】 產地 生山地。
基本 隔山消爲雜草類之一種。白色。可供藥用。
主治 腹脹積聚。氣隔噎食。
【隔冬青】卽荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳「荔枝草」條。
【隔河仙】卽海芋之古籍別名。典見綱目。詳「海芋」條。

十三畫 隔 雉 雌

【隔刺虎】即伏牛花之古籍別名。典見綱目。詳「伏牛花」條。

【隔虎刺花】即伏牛花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「伏牛花」條。

【雉】 命名 雉飛若矢。一往而隨。故字從矢。而名曰雉。

古籍別名 野雞。疏趾。華蟲。(綱目)


外國名詞 Phasianus torquatus Cm (拉丁) Chineso King-necked pheasant Phasianus (英) Fasan (德) カウラーギン(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鴉類。類雉科。為雉之肉。其腦、嘴、尾、屎、黃。詳見各該條。

產地 山林原野間。

形態 雉為原禽類之一種。雌雄異色。雄者羽美。頭頸黑紺色。有綠光。面部赤色。頭頂青綠色。眉斑白。頸之一部。周圍有白色頸輪。嘴黃白色。胸腹銅赤色。有光澤。腹部中央黑色。肩黃色。混有黑斑。背之上部銅赤色。有白斑。彩色頗複雜。翼長約八寸。尾長約一尺六。雌之羽毛地色淡黃褐。胸腹部有黑色

之大斑。或有微細之暗色小斑。棲山野。食穀類及昆蟲。其肉可供食與藥用。



雉

性質 酸。微寒。無毒。
主治 補中益氣。力止洩痢。除瘰癧。

參攷資料 ①雉肉諸家言其發痔下痢人不可食。而別錄用治痢疾何邪。蓋雉在禽上。應胃土。故能補中。而又食蟲蟻。故能治瘰癧。取其制伏耳。若久食及食非其時。則生蟲有毒。故不宜也。(李時珍) ②周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有小毒。不可常食。損多益少。(蘇頌) ③雉肉久服令人瘦。九月至十一月稍有補。他月則發五痔諸瘡疥。不與胡桃同食。發頭風眩運。及心痛。與菌蕈木耳同

食。發五痔。立下血。同蕎麥食生肥蟲卵。同煮食生寸白蟲。自死爪甲不伸者殺人。(孟詵)

【雉毛奴邑】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「半夏」條。

【雉毛邑】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「半夏」條。

【雉骨木】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【雉鳥老草】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【雉麻】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「升麻」條。

【雉脚】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「升麻」條。

【雉黃】 基本 本品為雉巢中所生之黃。猶鷄窠中之

也。 採取 採掘時。先以弱繩穿三匝。從而掘之。尤以明透而質重一兩者佳。

主治 療一切毒蛇咬傷。辟邪魅。解產厄。

【雉雞尾】 主治 天火丹毒。燒灰和麻油調傳。

一五一八

【雉雞屎】 主治 久癩。

【雉雞腦】 主治 塗凍瘡。

【雉雞嘴】 主治 療蟻瘻。

【雌黃】 命名 本品生山之隴。故曰雌黃。

古籍別名 昆崙黃。(綱目) 石黃。玉雄。黃安。黃砥。砒黃。帝女血。(和漢藥考)

外國名詞 Auripigmentum. (拉丁) Opiment. (英) Auripigment. Opiment. (德)

基本 係砒礦之斜方系屬。為紅黃色之不透明固體。

產地 同雄黃。但以黃亮者為好。各國俱有出。

形態 雌黃為黏土質。或產於噴火口之近旁。狀似鐘乳。或如葡萄。或如粒。或若板片。色鮮黃或橙黃。有珠光。深質半透明。或透明。

硬度一。五至二。〇。比重三。四至三。五。水不溶解。亞兒加里及硝酸。俱善溶解。又熱於炭火上。則分解為亞硫酸與砒酸而蒸昇。

製法 雷斅曰。凡使雌黃。勿令婦人。雞犬犯之。一切穢惡之鬼。亦不宜近。否則雌黃即變如黑鐵色。不堪用也。反以損人。或以四兩用天碧枝和陽草粟。送子草各五兩。入瓠中。細煮三伏時。其色如金汁。一搥在鍋底下。用東流水。猛投於中。如此淘三度。去水拭乾。臼中容碎。篩研如塵。用方好。又曰。雌得芹花。立刻便成庚。芹花一名立起草。形如芍藥。煮雌能住火也。

用途 恒以對末和作丸散。或以和入外治藥中。
性質 辛平無毒。

成分 百分中含砷素六十一分。硫黃三十九分。化學上謂之三硫化砷素(As₂S₃)。三硫化砷素為人工品。以亞砷酸溶液。亞砷酸鹽溶液。砷酸溶液。通硫化水素而製之。為鮮豔之枸橼黃色粉末。水不溶解。亞兒如里能溶解之。實工用為黃色顏料。然有毒。一名王黃。又名中國黃。
效能 殺蟲。解毒。燥溼。療瘡。用為殺蟲藥。又治惡瘡。
主治 蝕鼻內息肉。下部惡瘡。

身面白駁。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。惡瘡頭禿。疥疥。殺毒蟲。身痒。邪氣諸毒。鍊之久服。令人騰滿。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雌黃曰。治冷痰勞嗽。血氣蟲積。心腹痛。癩癩解毒。

國外學說 日本和漢藥考曰。雌黃。雌黃。俱天產硫化砷素化合物之名稱。近今學者皆以 Orpiment 為雌黃。以 Realgar 為雄冠石。或以 Orpiment 為雌黃。而以 Realgar 為雄黃。或以 Orpiment 為石黃。以 Realgar 為雞冠石。畫工所用之黃色顏料有兩種。一為雌黃。二為雄黃。販賣者遂呼雌黃為雌黃。而呼雄黃為石黃。言海云。石黃即生雌黃之意。又按古書。雄黃。雌黃。為同種類之物。唯硫化砷素化合物之種類相異。故名稱各別耳。本草綱目云。雄黃生武都山谷者良。凡生山之陽者。其形如丹砂塊。明徹不夾石。色如雞冠石。此為上品。其青黑色而堅者名黑黃。形色似真而氣臭者名臭黃。以上二品。均不堪服食。只可

療瘡疥。其臭。以醋洗之。便去。足以亂真。尤宜辨。一云。驗之。可以燒蟲死者為真。雌黃生武都山。與雄黃同。生山之陰。又云。陽石氣未定者為雌。已足者為雄。相距五百年而結為石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。其雌黃試法。但於甲上磨之。土色者好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。和漢三才圖會云。雌黃今絕不出。從前以東京產者為佳。外色黝帶黃。破之內如鐵釘折口。微黑有光。雌黃以金色而薄片者良。凡水解解物。入鹽少許。則水不散。染。又與青黛合。則成綠青色。物類品。隨云。雌黃。雌黃。一類二種。目俗以用作顏料之雌黃。呼為雌黃。非真雌黃也。此編參考諸書。以 Orpiment 為雌黃。以 Realgar 為雄黃。以上品之雌黃為雞冠石。辨析既明。庶免謬誤。

配合應用 治反胃吐食。雌黃一分。甘草生半。分為末。飯丸。梧子大。以五葉草糯米煎湯。每服四丸。(聖濟總錄方)

治停痰在胃。喘息不通。呼吸欲絕。雌黃一兩。雄黃一錢。為末。化

蠟丸。彈子大。每服一丸。半夜時。換熱糯米粥中食之。(濟生方)

治心痛吐水。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾葛餅和丸。梧子大。每服七丸。薑湯下。(聖惠方)

治婦人久冷。血氣攻心。痛不止。以葉子。雌黃二兩。細研。醋一升。煎濃。和丸。小豆大。每服十五丸。醋湯下。(聖惠方)

治小腹痛滿。天行病。小腹痛。不得小便。雌黃末。蠶丸。納尿孔中。入半寸。(肘後方)

治癩癩癩。眼暗。嚼舌。雌黃。黃丹炒各一兩。為末。入麝香少許。以牛乳汁半升。熬成膏。和杵子下。丸。麻子大。每溫水服三五丸。(直指方)

治肺勞咳嗽。用雌黃一兩。入瓦合內。不固濟。坐地上。以火焙之。厚二寸。以炭一斤。簾定。頂火。煨三分去一。退火。出毒。為末。糖酥和丸。粟米大。每日空心杏仁湯下三丸。(斗門方)

治久嗽暴嗽。金粟丸。用葉子。雌黃一兩。研。以紙筒泥固濟。小合

十三蠶 雌 零雷

子一個。令乾。盛藥。水調赤石脂封口。更以泥封待乾。架在地上。炭火十斤。候火消三分之一。去火。候冷取出。當如鏡面光明紅色。鉢內細研。蒸餅丸。粟米大。每服三丸。五丸。甘草水服。服後睡良久。(勝金方)

①治腎消尿酸。乾蓮半兩。以鹽四錢。炒黃成類。雌黃一兩半。為末。蒸餅和丸。綠豆大。每服十九至三十丸。空心鹽湯下。(聖濟總錄方)

②治小便不禁。用類塊雌黃一兩半。研乾。真半兩。鹽四錢。同炒。盡色黃。為末。水和蒸餅丸。綠豆大。每服十九至二十九丸。空心鹽湯下之。(經驗方)

③治烏頭蟲瘡。雌黃粉醋和雞子黃調塗之。(聖惠方)

④治牛皮頑癬。雌黃末入輕粉和猪膏傅之。(直指方)

用蠶 八分至錢半。

施用宜忌 凡血虛者禁用。
參攷資料 ①雌黃氣味大寒。不入湯用。(別錄) ②葶藶地黃。獨帶益母。羊不食草。地榆。五加皮。瓦松。冬瓜汁。皆可制伏。又雌見餘及

胡粉則黑。(土宿真君) ③今雌黃出武都仇池者。謂之武都仇池黃。色小赤。出扶南林邑者。謂之崑崙黃。色如金。而似雲母甲錯。畫家所重。既有雌雄之名。又同山之陰陽合藥。便當以武都為勝。仙經無單服法。惟以合丹砂雄黃飛鍊為丹。爾金精是雌黃。銅精是空青。而服空青反勝於雌黃。其義難了。(陶弘景) ④雌黃一塊重四兩。拆開得千重。軟如爛金者佳。其夾石及黑如鐵色者不可用。(雷斅)

【雌檳榔】即大腹子之別名。詳「大腹子」條。

【零烏豆】即梅豆之細而扁者。與見綱目拾遺。詳「梅豆」條。

【零陵】即代諸石之古籍別名。與見和漢藥考。詳「代諸石」條。

【零陵香】即佩蘭之古籍別名。與見開寶本草。詳「佩蘭」條。

【零榆皮】即榆白皮之古籍別名。與見本經。詳「榆白皮」條。

【零餘子】基本 本品係結於萼。預葉腋之小球。性質 甘溫。無毒。

主治 補虛損。強腰脚。益腎。食

之不饑。

參攷資料 ①零餘子大者如雞子。小者如彈丸。在葉下。生曬乾。功用強於萼預。萼預有數種。此其一也。(陳藏器) ②此即山藥藤上所結子也。長圓不一。皮黃肉白。煮熱去皮食之。勝於山藥。美於芋子。霜後收之。墜落在地者。亦易生根。(李時珍) ③按獨孤酒丹房怪源云。背陰者雌黃也。消成者即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。硬而無衣。試法。但於甲上磨之。上色者好。又燒熨斗底。以雌對之。如赤黃線一道者好。舶上來。如噴血者。上湖南者次之。青者尤佳。藥子者。為上造化黃金。非此不成。亦能柔五金。乾承。轉硫黃。伏粉籍。又云。雌黃變鐵。雌黃變錫。(李時珍)

【雷丸】 命名 本品乃竹之餘氣所結。由雷震而成。無葉無莖。形圓色黑。猶雷之丸也。故名。狀如諸苓。又名之曰竹苓。

處方用名 白雷丸。

古籍別名 雷質。雷矢。(別錄)

竹苓。(綱目)

外國名詞 Myrtle Lapidos.

基本 係菌類。為概生於竹林土中之一種菌類。

CONR

鹽地 陳仁山藥物生產辨云。雷丸產四川湖南貴州等處。秋季新。

形體 雷丸似諸苓而小。其大者如粟。小者如零餘子。外皮黑褐色。或赤褐色。內部白色。質堅硬。採取 八月採根。曝乾。

製法 雷斅曰。凡使用甘草水。浸一夜。鋼刀刮去黑皮。破作四五片。以甘草水再浸一宿。蒸之。從已至未。日乾。酒并。再蒸。日乾。用大明。日入藥炮用。

性質 苦寒。有小毒。效能 殺蟲。消積。用作小兒解熱。療疳積。又治癩癧狂走等。

主治 殺三蟲。逐毒氣。胃中熱。利丈夫不利女子。(本經) 作摩摩。除小兒百病。逐邪氣。惡風汗出。除皮中熱結。殺蟲毒。白蟲。寸白。自出不止。久服令人陰痿。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論雷丸曰。逐風。主癩癧狂走。【明】繆希雍本草經疏論雷丸

走。【明】繆希雍本草經疏論雷丸

曰雷丸。味苦氣寒。別錄加鹹。有小毒。黃帝岐伯桐君扁鵲云甘。詳其所主。應是苦鹹爲勝。氣薄味厚。入手足陽明經。其主殺三蟲。白蟲。寸白。自出者。腸胃溼熱甚也。逐毒氣。胃中熱邪氣。惡風汗出。皮中熱結積者。腸胃邪熱甚也。苦寒能除二經溼熱邪氣。則上來諸證自除。作糜膏治小兒百病者。以小兒好食甘肥。腸胃類多溼熱蟲積。苦能殺蟲除溼。鹹寒能清熱消積。故主之也。凡蟲毒必熱必辛。苦寒能除辛熱。故又主解蟲毒也。別錄又云。久服令人陰痿。正見其過於苦寒偏至之氣。能令陽道痿也。〔清〕黃宮繡本草求真論雷丸曰。雷丸味苦而鹹。性寒小毒。本竹餘氣所結得辟塵而生。故有雷丸之號。功端入胃。除熱消積化蟲。故凡溼熱內鬱。癩癩狂走。汗出惡風。蟲積殆甚。腹大氣脹。蟲作人聲者。服之即能有效。以其性純陰。兼味至苦。感其辟塵。故能去其邪魅也。所云惟利男子不利婦人。亦以婦人屬陰。故於陰物不宜耳。究之果屬腎熱。亦又何礙。但無蟲積。不得妄用。皮黑

十三畫 雷

肉白者良。若肉紫黑者殺人。甘草水浸一宿。酒拌蒸或炮用。
 配合應用 ①治小兒疳疔。雷丸。蘇莢。使君子。蘆薈。五穀蟲。胡黃連。齊煎。

②殺腸胃一切蟲。雷丸。檳榔。鷓鴣。棟根。貫衆。牽牛。錫灰。惡莩根。

③小兒出汗。有熱。雷丸四兩。粉牛斤。爲末。撲之。〔千金方〕

④下寸白蟲。雷丸水浸。去皮切焙爲末。五更初食。炙肉少許。以稀粥飲服一錢匕。須上半月。服蟲乃下。〔經驗良方〕

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無蟲積者禁用。惡葛根。忌火。荔實。厚朴。蒼根。羌花爲之使。

參攷資料 ①按陳正敏選齊

開覽云。楊嗣中年得異疾。每發語腹中有小聲。應之。久漸聲大。有道士見之曰。此應聲蟲也。但讀本草。取不應者治之。讀至雷丸。不應。遂頓服數粒而愈。〔李時珍〕

②雷丸氣味鹹微寒。有小毒。赤者殺人。白者善。〔別錄〕

③雷丸生石城山谷。及漢中土中。八月採根曝乾。〔別錄〕

④雷丸竹之芽也。無有苗。其皆零而無相連者。今出房州金州。〔蘇恭〕

⑤雷丸大小如栗。狀如碯。芥而圓。皮黑肉白。堅實。〔李時珍〕

⑥大楓子油亦名雷丸油。但以雷丸充大楓子則不可。〔和漢藥考〕

⑦雷丸草。即菟葵之古籍別名。典見外丹本草。詳「菟葵」條。

⑧雷公墨。即雷墨之古籍別名。典見綱目。詳「雷墨」條。

⑨雷公頭。即香附子之古籍別名。典見綱目。詳「香附子」條。

古籍別名 板扛歸。蒸龍草。震龍根。霹靂。

木方勝板。倒金鉤。烙鐵草。倒挂紫金鉤。河白草。犁尖草。括把草。龍仙草。魚尾花。三木棉。〔綱目拾遺〕

犁頭刺藤。〔物理小識〕

產地 多生山麓陰處及離落

形體 雷公藤爲蔓草類之一種。獨莖蔓生。莖穿葉心上。又發葉葉上圓下尖。三尖形。如犁把。又似三角風。色青。枝梗有刺。每年四五

月間生苗。至九月經霜而枯。結實圓如珠。生時青色。熟則黑而味酸。

其莖葉可供藥用。

主治 瘧脹水腫。痞積。黃白疽。瘡疾。魚口便毒。癰疽。跌打。除壁蝨。瘰癧。疥癩。一切毒蛇傷。翻胃。噎膈。吐血。便血。喉痺。食積。心疼。虛飽。腹脹。陰囊腫大。發背疔瘡。乳癰。產後

遍身浮腫。

配合應用 ①白火丹。用雷公藤五錢。平地木三錢。車前四錢。天

青地白葉。三白草各三錢。煎服。又洗方。雷公藤。河白草煎浴。〔救生苦海方〕

②治水腫脹。平地木三錢。雷公藤五錢。車前草四錢。天青地白草三錢。路路通五個。打碎煎服。重者十服愈。〔救生苦海方〕

③治坐板瘡。烏賊骨五錢。雷公藤三錢。共爲細末。搽之。乾則以菜油調敷。〔秋泉家秘方〕

參攷資料 雷公藤出江西者。力大。土人採之。毒魚。凡蚌鱉之屬亦死。其性最烈。以其草烟熏蠶子。則不生。養蠶家忌之。用酒熱服。治風氣。合巴山虎爲龍虎丹。入水藥。魚人多服即昏。〔綱目拾遺〕

〔雷矢〕即雷丸之古籍別名。典見

一五二一

別錄。詳「雷丸」條。

【雷芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【雷河督子】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【雷楔】即霹靂礎之古籍別名。典見綱目。詳「霹靂礎」條。

【雷菌】係雞楳之一種。遇雷過即生。須疾採之。稍遲則腐。以之作藥。味甚美。性質效能。與雞楳同。參見「雞楳」條。

【雷寶】即雷丸之古籍別名。典見別錄。詳「雷丸」條。

【雷墨】古籍別名。雷公墨。 (綱目)

【雷地】出廣東海康縣境。形態 雷墨爲石類之一種。每當雷雨大作之際。飛下如沙石。大者如塊。小者如指。堅硬如石。黑色光豔。體重。叩之鏗然。可供藥用。

主治 小兒驚癇邪癎諸病。磨服即安。

【雷燒松】即松化石之古籍別名。典見輿地紀詳「松化石」條。

【雹】形態 雹爲冰類之一種。當雷雨時。雲氣爲電所衝。

激而入高空。凝爲冰點。雪片。復旋轉圓結而成冰塊。與雨雜下。小者如豆。大者如拳。

性質 鹹冷有毒。 主治 解溫熱狂甚。

【雹突】即菜菔之古籍別名。典見爾雅。詳「菜菔」條。

【靴筒朴】即厚朴捲作靴筒形者之處方用名。詳「厚樸」條。

【斬刺】即石刺木之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「石刺木」條。

【預知子】命名 本品相傳取子二枚。或雙仁者。綴衣領上。遇有蟲毒。則聞其發聲。當預知之。故名。

古籍別名 聖知子。聖先子。盍合子。仙沼子。 (日華) 八月扎。 (俗名)

形態 預知爲蔓草類之野生草本。引蔓木上。葉爲三角形。色綠而深。背淡。七八月結實。作房。生青熱深紅。每房有子五六枚。如皂莢。子色斑褐而光潤。可供藥用。其根詳見該條。

性質 苦寒無毒。 主治 殺蟲療癩。治諸毒。去皮。

研服有效。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論預知子曰。治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治法鮮氣塊。消宿食。止煩悶。利小便。假生中惡。失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三十粒。永遶。

【預知子根】採取 冬月採性質 苦冷無毒。 主治 解毒。搗細。溫水服。

【頑荊】即頑荊之古籍別名。典見圖經本草。詳「頑荊」條。

【飯豆】即白豆之古籍別名。典見綱目。詳「白豆」條。

【飯匙倩草】即望江南之古籍別名。典見和漢藥考。詳「望江南」條。

【飯頭】即草薺之古籍別名。典見和漢藥考。詳「草薺」條。

【飯鍋粳】即鍋焦之古籍別名。典見不藥良方。詳「鍋焦」條。

【飯鍋焦】即鍋焦之原名。詳「鍋焦」條。

【駝駝】係牡驢交牛而生者之別名。典見綱目。性質效能。與驢同。參

見「駝駝」條。

【劬魚】即鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱖魚」條。

【鳧】古籍別名。野鴨。野鶩。 (詩疏) 鴈。沉鴈。 (綱目)

外國名詞 Anas boschas I. (拉丁) Duck 或 wild duck Mallard (英) Ente (德) カモ 或 マカモ 或 アラクビ (日本)

基本 係存椎動物鳥類游禽類鴨科之鳥。

產地 江海湖泊中皆有之。

形態 爲水禽類之一種。狀如鴨而小。在夏季雄之頭頸皆紫綠。黑。肩胸皆赤。腹淡白。略帶紫。有黑點。背灰白。亦有黑斑。翼黃黑。雜以綠。黑白等色。嘴黃而扁。脚短。位於後端。趾有蹼。雌者多淡黑色。有黑斑。至冬。雄之頭部似雌。肩胸赤色。亦消滅。常數百爲羣。飛翔蔽天。亦如雁之排列成行。又爲候鳥之一。但後雁而來。亦後雁而去。棲水邊。食小魚。蟲。飽多脂。其肉可供食與藥用。

採取 冬月採之。

性質 甘涼無毒。

主治 補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之即瘳。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論兔肉曰。治熱毒風。及惡瘡。殺腹臟一切蟲。治水腫。

委攷資料 兔於九月以後。立春以前。即中食。大益病人。全勝家者。孟詵。兔肉不可合胡桃。木耳。豆豉同食。日華。

【兔公英】即蒲公英之古籍別名。典見千金食治。詳「蒲公英」條。

【兔血】 主治 解排生蟲毒。熱飲探吐。

【兔苳】即苳薺之古籍別名。典見本草衍義。詳「苳薺」條。

【兔葵】即苳薺之古籍別名。典見本草衍義。詳「苳薺」條。

【兔葵】即苳薺之古籍別名。典見唐本草。詳「苳薺」條。即苳薺草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苳薺草」條。

【兔頭】即兔頭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「兔頭」條。

【兔頭】即醉漿草之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳「醉漿草」條。

十三靈 兔

【麋】 命名 山中有虎。則麋必鳴以告。其聲凡几然。故名。

古籍別名 麋(爾雅)大者名麋。山海經。

外國名詞 Moschus chinensis (拉丁)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類鹿科之鹿。

產地 生山野林間。形體 鹿為獸類之一種。其形略似鹿。頭似鹿。又似狗。口有長牙。壯者有短角。脚細而力勁。善跳越。性好鬥。毛黃黑色。皮極細。其肉可供藥用。

性質 甘。平。無毒。主治 五痔病。燥熱。以薑醋進之。大有效。

【麋皮】 主治 除溼氣脚痺。作靴。麋者之。

【麋目】 命名 本品狀如麋之目。故名。古籍別名 鬼目(綱目) 產地 出嶺南諸地。

形體 麋目為果類之一種。樹幹高大如棠梨。葉似楮而皮白。春

鳩 鹿 鼓 鼠

開花。結實大如木瓜。小者如梅李。而不圓。正七八月成熟。色黃味酸。以蜜浸之。可供食用。

性質 酸。甘。小冷。無毒。委攷資料 鹿目多食。發冷痰。(陳藏器)

【鹿頭骨】 性質 辛。平。無毒。主治 飛尸。燒灰服。

【鼓子花】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳「旋花」條。

【鼓釘】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【鼓翅草】即鼓翅草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼓翅草」條。

【鼠】 外國名詞 Mus (Apo-demus) decumanus Ball. 或 Mus norvegicus Erxl Brownrot 或 Grey rat (拉丁)子

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類啮齒類。為鼠科之鼠。

形體 鼠為獸類鼠屬之一種。其體小頭圓。口吻突出。軀幹圓長。四肢短。尾長。骨有鬚。眼圓。耳殼小。門牙上下各二枚。其前而被黃色。珞瑯質。犬牙缺失。但留空隙。白齒

之嘴面有橫紋。前肢比後肢短。有五趾。各趾具鈎爪。其毛軟。背暗褐。腹灰白。腹旁略帶黃。尾闊被鱗。狀物環生粗毛。日匿穴中。夜出竊食。生殖力甚大。生百日。即能產子。每年可四產。一產有五頭至十頭。其肉。骨。血。糞等。均可供藥用。



鼠

採取 凡入煎須取雄者用。性質 甘。微溫。無毒。主治 療腰折。續筋骨。生痔傳之。三日一易。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論鼠曰。煎膏治諸瘡。瘻。臘月燒之。辟惡氣。唐孟詵食療本草論鼠曰。豬脂煎膏。治打撲折傷。凍瘡。湯火傷。臘月以油煎。枯。去滓。熬膏。收用。宋蘇頌圖經本草論鼠曰。油煎入蠟。傳湯火傷。

減其極良。【宋】日華諸家本草論鼠曰煎油治小兒疳癪。【明】李時珍本草綱目論鼠曰五月五日同石灰搗收傳金瘡神效。

【鼠王】即隱鼠之古籍別名。典見本草集註。詳「隱鼠」條。

【鼠矢】即山茶萸之古籍別名。典見吳普本草。詳「山茶萸」條。

【鼠母】即隱鼠之古籍別名。典見綱目。詳「隱鼠」條。

【鼠甲】即鼠外腎之原名。詳「鼠外腎」條。

【鼠外腎】原名 鼠甲。鼠卵之舉丸故名。本品乃雄鼠

採取 以雄鼠外腎之上。有文似印。兩腎相對。有符篆朱文九道者尤佳。以十一月或五月五日

七月七日正月朔旦子時。面北向子位。刮取陰乾。如篆刻。下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之無不欽悅。所求如心也。

主治 令人媚悅。

【鼠牙半支】 產地 多生窩山石壁間。

形態 鼠牙半支爲半支類之

一種。立夏後發苗葉。細如米粒。三瓣一聚。蔓延石間。根入石罅中。色白如鼠牙。四月開花。黃色。如瓦松。花後即枯。可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 消癰腫。溼鬱水腫。解諸毒。及湯烙傷。蟲蛇螫咬。並一切發背。對口。冬瓜。騎馬等症。搗汁酒服。渣傳之。

參攷資料 鼠牙半支能治一切癰毒。蛇傷。故有稱蛇傷之仙草。

（綱目拾遺）

【鼠肉】 採取 以牡鼠者良。性質 甘熱。無毒。

主治 小兒疳露。大腹。炙食之。歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鼠肉曰。小兒疳疾。腹大。食食者。黃泥。裹燒熟。去骨取肉。和五味。鼓汁。作羹食之。勿食骨。甚瘦人。【宋】蘇頌圖經本草論鼠肉曰。主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲。及小兒疳瘕。酒熬入藥。【明】李時珍本草綱目論鼠肉曰。炙食治小兒寒熱諸疳。

採取 以牡者良。

主治 療牙宜。爾青鹽

【鼠血】

採取 以牡者良。

主治 療牙宜。爾青鹽

擦之。

【鼠耳】即鼠麴草之古籍別名。典見別錄。詳「鼠麴草」條。

【鼠卵】即鼠外腎之原名。詳「鼠外腎」條。

【鼠尾芥】即黃芥之古籍別名。典見唐本草。詳「黃芥」條。

【鼠尾草】 命名 本品穗狀如鼠尾。故名。古籍別名 勳山陵剋。（吳普）烏草。水香。水青。（拾遺）鼠菊。（救荒）

外國名詞 *Salvia japonica*, *Thunb. var. dipinnata*, Fr. or Sav. (拉丁) アキノタムラサウ (日本)

基本 係唇形科鼠尾草屬。藥用其花葉。

產地 山野田澤恒多有出。

鼠尾草

形態 鼠尾草爲溼草類之多。年生草本。高二三尺。莖方形。葉爲



鼠尾草

羽狀複葉。對生。小葉五片或七片。初秋開花。穗狀花序。花小。唇形。花冠呈淡紫色。雄蕊二枚。雌蕊一枚。其莖可作染料。花葉與根俱可供藥用。

種類 鼠尾草種類頗多。春季開花者。謂之春鼠尾草。夏季開花者。謂之夏鼠尾草。和方書以千屈菜 (*Lythrum salicaria*, L.) 作鼠尾草。現時服用者仍不少。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 鼠疫寒熱。下痢。膿血不止。白花者主白下。赤花者主赤下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼠尾草曰。主瘧疾。水

用量 八分至錢半。

參攷資料 古方療痢多用之。當濃煎令可丸服之。或煎如飴服之。今人亦用作飲。或末服。亦得日三服。（陶弘景）鼠尾以穗形命名。爾雅云。勳鼠尾也。可以染皂。故名烏草。又曰水青。蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者。乃陵剋之誤也。（李時珍）鼠尾生平澤中。四月採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

採葉。七月採花陰乾。（別錄）所

在下濕地有之。惟黔中人採爲藥。葉如蕩。莖端夏生四五穗。穗若車前。花有赤白種。(韓保昇)鼠尾草根主治反花惡瘡。(總錄)

【鼠李子】

古醫別名 鼠梓。牛李。(別錄)山李子。烏菓子。(圖經)鼠李。趙李。(蘇恭)牛菓子。烏槎子。(綱目)楮李。(錢氏)梓。牛筋子。牛蒡子。烏岡子。無實子。錄子。爾子。(和漢藥考)綠子。烏綠子。

外國名詞 Rhamnus japonica, Maxim. var. genuina, Maxim (拉丁) Black-thorn (英)

甚本 係屬鼠李科。爲鼠李之果實。

產地 別錄曰。鼠李生田野間。蘇頌曰。今蜀川多有之。寇宗奭曰。今關陝湖南甚多。

形態 鼠李爲山野自生之落葉樹。高六尺至一丈。枝有刺。葉作橢圓形或卵圓形。前端尖。頂端之葉對生。花爲淡黃綠色。小花生於葉腋。果實黑色。如小豆大。其子爲有光澤之褐黑色漿果。作球形。形

有皺紋。往往留有圓形萼。果肉由二房而成。房各有直立之種子。一作褐色。果肉質鬆粗。味辛苦。



鼠李子

採取 八九月間採其熟實。日乾。其皮採無時。

用法 嫩者取汁。用以染色。熟者或生杵用。或剉末。或水煎服。

性質 苦。涼。微毒。

成分 含有拉姆諾加答里溼 (Rhamno catharine.)

效能 用作瀉劑。爲慢性便秘藥。

作用 在胃中僅能略助胃液之作用。至腸內能激腸之黏膜。使分泌增多。蠕動加速。其功尤顯著於大腸。

主治 寒熱。瘰癧瘡。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論鼠李子曰。下血及碎肉。除疝瘕積冷。九蒸酒漬。服三合。日再服。又搗傅牛馬六畜瘡中生蟲。

【宋】大明日華諸家本草論鼠李子曰。水腫腹脹滿。【明】李時珍本草綱目論鼠李子曰。痘瘡黑陷。及疥癬有蟲。

配合應用 治諸瘡寒熱。毒瘰及六畜瘡。用鼠李生搗傅之。

(聖惠方) 齒齲腫痛。牛李黃汁。空腹飲一盞。仍類含漱。(聖濟總錄方)

用量 五分至一錢。

施用宜忌 忌鐵。

參攷資料 牛李治痘瘡黑陷及出不快。或觸穢氣黑陷。古昔無知之者。惟錢乙小兒直訣必勝膏用之云。牛李子即鼠李子。九月後採黑熟者。入砂盆種爛。生相混。汁用銀石器熬成膏。瓷瓶收貯。常令透風。每服一皂子大。煎桃膠湯化下。如人行二十里。再進一服。其痛自然紅活。入麝香少許尤妙。如無生者。以乾者爲末。水熬成膏。又九齋衛生方亦云。痘瘡黑陷者用牛李子一兩。炒研。挑膠半兩。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。(李時珍) 即烏菓子也。今蜀川多有之。枝葉如李。其實若五味子。色黧

黑。其汁紫色。熟時採。日乾用。皮採無時。(蘇頌) 即牛李也。木高七八尺。葉如李。但狹而不澤。子於條上四邊生。生時青。熟則紫黑色。至秋葉落。子尚在枝。隨處皆有。今關陝及湖南江南北甚多。(寇宗奭)

【鼠李皮】

性質 苦。微寒。無毒。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鼠李皮曰。口疳。齲。及疳蟲蝕人脊骨者。麥濃汁灌之。神良。【唐】蘇恭新修本草論鼠李皮曰。治諸瘡寒熱。【宋】大明諸家本草論鼠李皮曰。祛風痺。

參攷資料 劉禹錫傳信方。治大人。口中疳瘡發背。萬不失一。用山李子根一名牛李子。薺薇根。野外者。各細切。五升水。五大斗。煎半日。汁濃。即於銀銅器中。盛之。重湯煎至一二升。待稠。瓷瓶收貯。每少少含嚥。必瘥。忌醬醋。油膩。熱麵。及肉。如發背。以帛塗貼之。神效。襄州軍事柳崖妻賈氏。患口疳十五年。齒盡落。斷不可近。用此而愈。(蘇頌)

【鼠肝】 主治 筋絡不出。搗塗之。痔耳出汁。每用漿核。

大藥熱毒之能引蟲也。

【鼠肝】 即灌草之古籍別名。典見別錄。詳「灌草」條。

【鼠豆】 即黎豆之滇南別名。詳「黎豆」條。

【鼠姑】 古籍別名 獸生丹水。 (別錄)

基本 鼠姑為芳草類之一種。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。 主治 欬逆上氣。寒熱邪氣。鼠瘻。瘰癧。

【鼠姑】 即鼠姑之古籍別名。典見本草集註。詳「鼠姑」條。

【鼠姑皮】 即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳「牡丹皮」條。

【鼠怕草】 即十大功勞之別名。詳「栲栳」條。

【鼠毒】 即特生磨石之古籍別名。典見綱目。詳「特生磨石」條。

【鼠法】 即夜明砂之古籍別名。典見本經。詳「夜明砂」條。

【鼠直】 即鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠麴草」條。

【鼠負】 即鼠婦之古籍別名。典見本草集註。詳「鼠婦」條。

【鼠垂】 即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳「垣衣」條。

【鼠脂】 主治 湯火傷。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼠脂曰。治耳聾。

【鼠婦】 命名 本品一作鼠負。蓋言鼠多在坎中背黏頁之故名。

古籍別名 炒蟻。(本經)蟻蟻。(別錄)鼠負。鼠姑。(弘景)鼠黏。(蜀本)頁蟻。(爾雅)溼生蟲。(圖經)地蟻。地鼠。(綱目)

外國名詞 Saw-dug wood. Louso. (英)

基本 係將彈尾類之鼠婦焙殺者。

產地 凡卑溼地。墜器下。及土坎中恒多生焉。

形態 鼠婦為棲息溼地土壆中。或墜底等之昆蟲。全體呈灰綠色。長二三分。卷縮作球圓形。下腹扁平。多足。尾端有棒狀具。能彈地跳行。

採取 五月間採之。

製法 凡採得焙乾。用法 恒以剉末用。

性質 酸。溫。無毒。

成分 或云含有蟻酸。效能 破血散。消癰癢。用作引赤發泡藥。

主治 氣經不得小便。婦人月閉。血凝癰瘕。寒熱。利水道墮胎。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼠婦曰。治久積寒熱。鼠鼻牙齦疼痛。小兒撮口疳風。口疳。疔瘡。倒靨。解射工毒。蜘蛛毒。蟻蝨入耳。【明】李士材本草圖解論鼠婦曰。鼠婦酸溫無毒。生人家地上。適月閉。利便。瘕。仲景用以醫久積。【清】黃元御長沙藥解論鼠婦曰。善通經脈。能化癥瘕。金匱龍甲煎丸用之。治病瘕日久。結為癥瘕。以其破血而消堅也。炒枯存性研細用。

配合應用 ●治產婦尿砂。鼠婦七枚。熬研末酒服。(千金方)

●治撮口疳風。用鼠負蟲杵絞汁少許。灌之。陳氏生杵鼠負及雀糞汁服之。(聖惠方)

●治口白瘡。地雞研水塗之即愈。(野城方)

●治風鼻牙痛。溼生蟲一枚。縛裹咬之。勿令人知。(聖惠方)

●治風牙疼痛。溼生蟲。巴豆仁。胡椒各一枚。研勻。飯丸。蠶豆大。綿裹。一丸咬之。良久涎出。吐去。效不可言。(經效濟世方)

●治痘瘡倒靨。溼生蟲為末。酒服一字即起。(痘疹論方)

●治蟻蝨入耳。溼生蟲研爛。後耳邊自出。或攤紙上作餅。安入耳中亦出。(衛生寶鑑方)

●治射工溪毒。鼠婦。豆豉。巴豆各三枚。脂和塗之。(肘後方)

附錄 三分至八分。

應用宜忌 凡無瘕瘕者禁用。

參攷資料 ●古方治驚癇血病多用之。蓋既陰經藥也。太平御覽載葛洪方。用鼠負蟲十四枚。各以糟釀之。丸十四丸。發時水吞下。便愈。而葛洪方治瘕疾等。熱。用鼠負四枚。蠶裹為丸。水下便斷。又用鼠負。豆豉各十四枚。搗丸。灰子大。未發前日湯服二丸。將發時再服二丸。便止。又蜘蛛毒人戒。

瘡。取此蟲食其絲。即愈。(李時珍)

按陸佃埤雅云。鼠負食之令人善淫。故有婦名。又名鼠姑。猶鼠婦也。鼠黏猶鼠負也。然則婦負二義俱通矣。因溼化生。故俗名溼生蟲。曰地雞地鼠者。象形。(李時珍)

今處處有之。多在下溼處。裝器底及土坎中。詩云。蚰蟻在室。鄭玄官家無人則生故也。(蘇頌)

溼生蟲多足。大者長三四分。其色如蚰。背有橫紋。起用處稀少。(寇宗奭)

形似衣魚。稍大。灰色。(李時珍)

【鼠黏】即鼠婦之古籍別名。與見蜀本草。詳「鼠婦」條。

【鼠黏子】即牛蒡子之處方用名。詳「牛蒡子」條。

【鼠眞】即夜明砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳「夜明砂」條。

【鼠梓】即鼠李子之古籍別名。與見別錄。詳「鼠李子」條。

【鼠梓木】即女貞之古籍別名。與見和漢藥考。詳「女貞」條。

【鼠菊】即鼠尾草之古籍別名。與見救荒本草。詳「鼠尾草」條。

【鼠尾】即礬石之古籍別名。與見

吳普本草。詳「礬石」條。

【鼠糞】即荊芥之古籍別名。與見本經。詳「荊芥」條。

【鼠糞】即山查之古籍別名。與見唐本草。詳「山查」條。

【鼠齒莧】即馬齒莧之古籍別名。與見和漢藥考。詳「馬齒莧」條。

【鼠梨】即鹿梨之古籍別名。與見陸機詩疏。詳「鹿梨」條。

【鼠莖】即龍常草之古籍別名。與見爾雅。詳「龍常草」條。

【鼠莖】即莽草之古籍別名。與見綱目。詳「莽草」條。

【鼠莖】即香附子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「香附子」條。

【鼠莖】即參果根之古籍別名。與見別錄。詳「參果根」條。

【鼠頭】即參果根之古籍別名。與見別錄。詳「參果根」條。

【鼠腦】在內中不出。擣爛厚塗之。即出。箭鏃針刃在咽喉胸膈諸處者。同肝搗塗之。又塗小兒解頭。以棉裹塞耳。治聾。

【鼠膽】

採取 捕得活鼠縛住。以熱湯泡死。破喉取之。其色眞紅者是也。

主治 目暗。

歷代記載攷證 【明】李時珍

本草綱目論鼠膽曰。點目。治青盲。雀目。不見物。滴耳治聾。

參攷資料 諸家本草不首鼠膽。治聾。而葛洪肘後方甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。有人側臥。溼膽入耳。盡膽一個。須臾汁從下耳出。初時更聾。十日乃瘳矣。後世輩方祖此。亦多用之。(李時珍)

【鼠糞】 處方用名 兩頭尖。限鼠矢。牡鼠尿。

【鼠糞】 古籍別名 定心草。

【鼠糞】 基本 係獸類齧齒動物鼠屬。鼠之屎。

【鼠糞】 產地 陳仁山藥物生產辨云。兩頭尖產自陝西省。各省各屬咸有出。

【鼠糞】 形態 作橢圓形。兩頭較尖。故有兩頭尖之名。較米粒稍大。色黑。

【鼠糞】 製法 採得陰乾用。性質 甘。微寒。無毒。

效能 治傷寒勞復。消乳癰瘡。瘡。用作解熱解毒藥。

主治 小兒疳疾。大腹。瘧疾。煎服。治時行勞復。

歷代記載攷證 【宋】日華諸家本草論牡鼠糞曰。治癰疾。明目。

【明】李時珍本草綱目論牡鼠糞曰。煮服。治傷寒勞復。發熱。男子陰。易腹痛。通女子月經。下死胎。研末。服。治吹奶。乳癰。解馬肝毒。塗鼠糞。瘡。燒存性。傅折傷。行腫。諸瘡。貓犬。傷。【明】櫻希雅本草經疏論牡鼠糞曰。牡鼠糞。本經諸家不首味。但云微寒。無毒。然詳其所自。應是苦鹹之物。蓋鼠屬水。而凡糞必苦者。也。入足陽明足厥陰經。其主小兒。癰疾。大腹。及時行勞復者。皆熱邪。在陽明也。苦寒能除是經之熱。所以主之。古方治男子陰。易腹痛。婦人吹乳。乳癰。皆取其除熱。燥。堅。泄。結。走肝入胃之功耳。

配合應用 治傷寒勞復。用雌鼠屎二十枚。鼓五合。水二升。煮一升。頓服。(外臺秘要方)又鼠屎。鼓湯。治勞復發熱。用雌鼠屎二十七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。爲粗末。

水一盞。葱白二寸。豉三十粒。煎一盞。分三服。(活人書方)

男子陰易及勞復。取鼠屎湯。用鼠屎兩頭尖者十四枚。豕根一大把。水二盞。煎一盞。溫服。得汗為效。未汗再服。(南陽活人方)

治大小便秘。雄鼠屎末。傅臍中立效。(普濟方)

治室女經閉。牡鼠屎一兩。炒研。空心溫酒服二錢。(千金方)

治子死腹中。雄鼠屎二七枚。水三升。煮一升。取汁。作粥食。胎即下。

治產後陰脫。以溫水洗。輾用雄鼠屎燒烟熏之。即入(熊氏方)

治婦人吹奶。鼠屎七粒。紅棗七枚。去核包尿。燒存性。入麝香少許。溫酒調服。(集要方)

治乳癰初起。雄鼠屎七枚。研末。溫酒服。取汗即散。(壽域方)

治乳癰已成。用新溼鼠屎。黃連。大黃。各等分。為末。以黍米粥清和塗四邊。即散。(病僧垣方)

治鼠瘻潰壞。新鼠屎一百粒。收密器中。五六十日。杵碎。即傳之效。(千金方)

治疔瘡惡腫。鼠屎。亂髮等分。燒灰。針瘡頭。納入。大良。(普濟方)

治鬼擊吐血。胸腹刺痛。用鼠屎。燒末。水服。方寸匕。不省者。灌之。(肘後方)

治折傷瘀血。傷損筋骨疼痛。鼠屎。燒末。豬脂和。傅急處。不過半日。痛止。(梅師方)

治中馬肝毒。雄鼠屎三七枚。和水研飲之。(梅師方)

治馬咬踏瘡。腫痛作熱。鼠屎二七枚。故馬糞五寸。和燒研末。豬脂調敷之。(梅師方)

治狂犬咬傷。鼠屎二升。燒末。傅之。(梅師方)

治貓咬成瘡。雄鼠屎。燒灰。油和傅之。曾經效驗。(壽域方)

治兒齒不生。雌鼠屎兩頭。圓者三七枚。一日一枚。拭其齒。勿食鹹酸。或入麝香少許。尤妙。(小品方)

治小兒白禿。鼠屎。瓦煨存性。同輕粉。麻油塗之。(百一選方)

治小兒鹽齩。鼠屎。燒研。水酒空心服之一錢。

治小兒燕窩生瘡。鼠屎。研末。

香油調搽。

治毒蛇傷。野鼠屎。水調塗之。(邵真人經驗方)

用蠶 錢半至二錢。

參攷資料 有小毒。食中誤食。令人目黃成疽。(李時珍)

即人家常鼠也。以其尖。膝。善穴。故南陽人謂之鼯鼠。其窟最長。故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諫之。謂為家鹿。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。(李時珍)

【鼠藤】 命名 本品鼠喜食之。故名。

產地 生山野間。

形態 鼠藤為蔓草類之一種。其莖繞他木莖。葉滑淨似枸杞。花白有節。苗頭有毛。其藤莖可供藥用。

採取 以鼠所咬處之莖。採入藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 丈夫五勞七傷。陰痿。益腸道。小便數白。腰脚痛冷。除風氣。壯筋骨。補衰老。好顏色。濃煎服之。取微汗。亦浸酒服。性溫。稍令人悶。


無苦也。

【鼠麴草】 命名 本品葉形似鼠。且可和米粉食之。故名。

古醫別名 鼠耳。無心草。(別錄) 香茅。(拾遺) 佛耳草。(法象) 黃蒿。(會通) 米麴。毛耳。朵。茸。母。(綱目) 鼠直。茸。母。草。黍。麴。草。毛。女。兒。菜。(和漢藥考) 蚰。蟬。酒。草。(酉陽雜俎)

基本 屬菊科為鼠麴草之莖。產地 凡山野間及陰溼地恒多生焉。

形態 鼠麴草莖高尺餘。莖葉俱柔輭。葉稍作倒披針形。長寸餘。有毛茸。花為翅黃色。小筒狀。花冠作頭狀花序排列。



鼠 麴 草

採取 二三月間。採取莖葉。性質 甘。平。無毒。效能 用作祛痰藥。

主治 鼠耳。主痺寒。寒熱止。款。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論鼠麴草曰。鼠麴調中益

氣。止洩除痰。歷時氣。去熱嗽。雜米

粉作糧食。甜美。【元】李東垣用藥

法象論佛耳草曰。佛耳治寒嗽及

痰。除肺中寒。大升肺氣。

用量 八分至錢半。

施用宜忌 款冬花爲之使。

參攷資料 ①治寒痰嗽。宜用

佛耳草。熱痰嗽。宜用燈籠草。【朱

貫亨】②別錄云。治寒熱止。款。東

垣云。治寒嗽。言其標也。日華云。治

熱嗽。言其本也。大抵重嗽多是火

鬱於內。而寒覆於外也。按陳氏經

驗方云。三奇散治一切款嗽。不問

久近晝夜無時。用佛耳草五十文。

款冬花二百文。熟地黃二兩。焙研

末。每用二錢。於爐中燒之。以筒吸

烟。嚥下。有涎吐去。予家一獲久病

此。醫治不效。偶在沅州得一婢。用

此法兩服而愈也。【李時珍】③麴

言其花黃如麴色。又可和米粉食

也。鼠耳言其葉形如鼠耳。又有白

毛。鼠耳似之。故北人呼爲茸母。佛

耳則鼠耳之說也。今淮人呼爲毛

十三畫 鼠

耳。則香茅之芽。似當作毛。按段

成式雜俎云。此野酒草。鼠耳也。一

名無心草。豈此野食此。故有是名

者耶。【李時珍】④鼠麴草生平開

熱地。高尺餘。葉有白毛。黃花。荆楚

歲時記云。三月三日。取鼠麴汁。蜜

和爲粉。謂之龍舌粉。以歷時氣。幹

音板。米餅也。山南人呼爲香茅。取

花雜糝皮。染褐。至破猶鮮。江西人

呼爲鼠耳草也。【陳藏器】⑤佛耳

草。撮人謂之黃蒿。二三月苗長尺

許。葉似馬齒莧而細。有微白毛。花

黃。土人採莖葉和米粉。搗作粬果

食。【汪機】⑥日華本草鼠麴。卽別

錄鼠耳也。唐宋諸家不知。乃退鼠

耳入有名未用中。李杲藥類法象

用佛耳草。亦不知其卽鼠耳也。原

野間甚多。二月生苗。莖葉柔輭。葉

長寸許。白茸如鼠耳之毛。開小黃

花成穗。結細子。楚人呼爲米麴。北

人呼爲茸母。故邵桂子遺天語云。

北方寒食採茸母草和粉食。宋徽

宗詩云。茸母初生認禁煙者是也。

【李時珍】

【鼠壤土】 基本 本品爲土之

十四畫 僕 僧 嗽 嘉

主治 中風。筋骨不隨。冷痺。骨

節疼。手足拘急。風擊痛偏枯。死肌

多收燥乾。蒸熱袋盛。更互熨之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論鼠壤土曰。小兒尿和塗

疔腫。

十四畫

【僕公嬰】 卽蒲公英之古籍別名。

與見圖經本草。詳「蒲公英」條。

【僕壘】 卽麥門冬之古籍別名。與

見吳普本草。詳「麥門冬」條。

【僧法實】 卽蔓荊子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳「蔓荊子」條。

【僧婆】 卽雁之古籍別名。典見梵

書。詳「雁」條。

【僧庵草】 卽當歸之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「當歸」條。

【僧鞋菊】 卽浙烏頭之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「浙烏頭」條。

【卽草烏頭之吳俗名。詳「草烏

頭」條。

【嗽神】 卽五味子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「五味子」條。

【嗽藥】 卽白前之古籍別名。典

見唐本草。詳「白前」條。②卽百部

之古籍別名。典見和漢藥考。詳「

百部」條。

【嘉香肉】 古籍別名 家鄉肉。

性質 味鹹。甘。性平。

主治 補虛開胃。

參攷資料 ①家鄉肉。金華屬

邑俱有之。秋卽醃。給客販入省城

市賣。其肉皮白肉紅。鮮氣香美。不

似他處醃豬肉。色少鮮澤也。但一

入杭城店。便加硝瀆。投缸中浸透。

然後出售。蓋不爾則肉味淡。反不

美。而秋時尙暖。不漬透硝瀆。又易

腐臭也。肉爲硝瀆。食之恐乏補益。

不似火腿冬醃。疎久者爲佳。然今

店中所售火腿。均以家鄉肉。臘風

乾。至次年度上起綠衣。充陳火腿

賣。人多不察。若療病作食。須真

金華腿方有效也。【藥鑑】②未經

枕肆瀆漬之內。故能補虛。若經瀆

漬。透便能燥肺。凡肺痿陰虛咳嗽

者。恐非所宜。產婦虛勞。須補者亦

忌。其肥肉得硝瀆入腹。卽成痰。轉

肥作痰者。亦不宜多食。倘食之作

痰。杏仁研食可解。附治爾條。不出

方如下。用陳年醃肉。去皮取紅活

美好者。同其屬細切到濃。將象牙末。及人所退爪甲爲末。共爲研細末。并入所剉肉內。再爲勻剉。令其合一。厚數箭。燒周圍。約一飯頃。其糕卽自送脫。竟有進至二三尺遠者。(趙恕軒)

【嘉草】●卽寶荷之古籍別名。典見綱目。詳『寶荷』條。●卽西草之別名。詳『西草』條。

【嘉魚】 命名 嘉者美也。言魚味美。故名。

古籍別名 鮓魚。拙魚。丙穴魚。

(綱目)

外國名詞 Salvolinus plur.

Ingr. S. kundacha pallua. (拉丁) イワナ或アマス(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉類鮭科。爲嘉魚之內。

產地 出四川雅安縣及廣西蒼梧縣江湖間。

形態 嘉魚爲鱗類魚屬之一種。形如鱈。頭鈍。鱗細小而圓滑。皮面富有黏液。體長一尺三寸。脊骨有十四五刺。後方又有一脂鱗。背骨亦有十二刺。背及體旁灰青。多淡黑斑。惟背面略帶煤黑色。腹

部灰白。微帶橙色。春則隨水出穴。秋則逆水入穴。其肉白如玉脂。多味美。可供食與藥用。



嘉魚

性質 甘。溫。無毒。

主治 養食。療腎虛。消渴。勞瘵。虛損。

歷代記述攷證 【宋】開寶重定新本草論嘉魚肉曰。食之令人肥健悅澤。

參攷資料 ●嘉魚食乳水。功用同乳。能久食之。力強於乳。(馬志) ●嘉魚常於崖下孔中。食乳石沫。故補益也。(孟詵)

【嘉寶】卽雀之古籍別名。典見綱目。詳『雀』條。

【嘉慶子】卽李子之別名。詳『李子』條。

【嘉樹】卽黃葛樹之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳『黃葛樹』條。

【嚼嚼哥】卽蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜂虎』條。

【團魚】卽鼈甲之俗名。詳『鼈甲』條。

【團慈姑】卽山慈姑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山慈姑』條。

【墓頭回】 基本 墓頭回爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 婦人崩中赤白帶下。同紅花入酒。水。童便煎服。

【壽星桃】卽桃之古籍別名。典見綱目。詳『桃』條。

【壽星草】●卽刺虎之古籍別名。典見綱目。詳『刺虎』條。●卽伏牛之別名。詳『伏牛花』條。

【壽祖】卽威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『威靈仙』條。

【奪命丹】卽接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『接骨仙桃』條。

【奪香花】卽瑞香花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『瑞香花』條。

【奪皮香】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【嫩柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【嫩桑枝】卽桑枝之處方用名。詳『桑枝』條。

【嫩前胡】卽前胡之處方用名。詳『前胡』條。

【嫩鹿茸】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【嫩釣藤】卽釣藤之處方用名。詳『釣藤』條。

【夢神】卽胡麻之苗。典見別錄。詳『胡麻』條。

【寶樹兒樹】卽山茶葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山茶葉』條。

【寶除雙牙】卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【對蛤蚧】卽蛤蚧之處方用名。詳『蛤蚧』條。

【對節菜】卽牛膝之古籍別名。典見綱目。詳『牛膝』條。

【對廬】 基本 對廬爲溼草類之一種。形如菴藷。可供藥用。

採取 八月採之。

性質 苦。寒。無毒。

主治 除大熱。療疥瘡。煮汁洗

之。

【對蝦】

命名 本品即蝦之成對者故名。

產地 出鹹水中。

形態 對蝦大者長五六寸肉肥色白兩兩乾之勾結如環或謂經雄蝦之成對者須於懷子時別之子散後無從辨其出於正月望後至三月大盛端節後即香不可得其肉可供食與藥用。

主治 補腎與陽。燒酒浸服。並療痰火後半身不遂筋骨疼痛。

【慈母枝葉】

產地 生山林間。

形態 慈母為雜木類之一種樹高丈餘。葉如櫻桃而小其枝葉可供藥用。

主治 下氣止渴。令人不睡。小兒痰痞。灸香作飯食。

【慈石】

命名 慈石取鐵。如慈母之招子故名。後人加石。遂稱為磁石。

處方用名 羅磁石。活磁石。煨磁石。呆磁石。

古醫別名 玄石。(本經) 皮石。(別錄) 煨鐵石。(本草衍義) 吸鐵石。

十四畫 對

石。(直指方)指南石。(和漢藥考)攝石。藥物生產辨)

外國名詞 Magnetite (英)

Magnetstein (德)

基本 礬石類。為色黑成粒之石塊。

產地 蘇頌云。凡今慈州。徐州及南海。嶺山中皆有之。陳仁山藥物生產辨云。慈石。廣東花縣多出。西北江均有出。和漢藥考曰。日本則產於陸中。羽後。越中。越後。飛彈。美濃等處。

形態 或如粒。或成塊。其成晶形者。為八面體。或斜方十二面體。黑鐵色。不透明。有金屬光澤。質緻密而脆。條痕現黑色。硬度五。五至六。五。比重四。九至五。二。具吸鐵之特性。諸酸類俱能溶解之。

種類 ①玄石。乃慈石之不能吸鐵者。亦即慈石之黑色者。②慈石。乃慈石中有孔。孔中有黃赤色。其上之細毛。功用更勝。其毛輕紫。石上頗滑。可吸速鐵。俗謂之煨鐵石也。③玄中石。中麻石。俱似慈石。惟不能吸鐵。况中麻石心有赤

慈

皮。粗如鐵。乃山石也。勿誤服。令人生惡瘡。不可食。④真磁石。一片。四面吸鐵。一斤者。名延年沙。四面只吸鐵八兩者。名攝探石。四面吸五兩者。名慈石。

製法 雷斅曰。凡使慈石。或一斤用五花皮一盤。地榆一盤。取綿十五兩。二件并對於石上。鎚碎作二三十塊。將石入鹽飯中。下草藥。以東流水煮三日。三夜。漉出。拭乾。布裹。再鎚細。乃礬入塵水。飛過。再礬用。寇宗奭曰。入藥須用火燒醋淬研為末。水飛。或醋煮三日。夜

用法 與他藥水煎服。或對末糊丸。又用以酒。浸於丸散。

性質 辛寒。無毒。

成分 慈石之成分。百分中含六十九分之第一酸化鐵。與三十分之一之第一酸化鐵。化學上謂之酸化亞酸化鐵 (Fe₂O₃)。磁石名磁鐵礦。

效能 補腎。潛陽。納衝氣。平喘。逆。用作強壯藥。

主治 周痺風濕。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消。除大熱煩滿及耳聾。(本經) 養腎。強骨。氣。益精。

除煩。通關節。消癰腫。鼠瘻。頭核。喉痛。小兒驚癇。鍊水飲之。亦令人有子。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論磁石曰。補男子腎虛風虛。身強。腹中不利。加而用之。【宋】大明日華諸家本草論磁石曰。治筋骨羸弱。補五分七傷。眼昏。除煩燥。小兒驚。吞針鐵等。即研細末。以筋肉。莫令斷。與末同吞下之。【明】李時珍本草綱目論磁石曰。明目。聰耳。止金瘡血。【明】經希雍本草經疏論磁石曰。磁石生於有鐵處。得金水之氣。以生。本經味辛。氣寒。無毒。別錄甄權。鹹。有小毒。大明甘。澀。平。甄權。鹹。溫。今詳其用。應是辛。鹹。微溫之藥。而甘寒非也。氣味俱厚。沈而降。陽中陰也。入足少陰。兼入足厥陰經。其主周痺風濕。肢節中痛。不可持物。洗洗酸者。皆風寒濕三氣所致。而風氣尤勝也。風淫末疾。發於四肢。故肢節痛。不能持物。風溼相搏。久則從火化。而骨節皮膚中。洗洗酸也。辛能散風寒。濕能通關節。故主之也。鹹為水化。能潤下。鍊堅。辛能散毒。微溫能運行

除熱。故主大熱煩滿。及消癰腫。風痰頭核。喉痛者。足少陽少陰虛火上攻所致。鹹以入腎。其性鎮墜而下吸。則火歸元。而痛自止也。夫腎為水臟。磁石色黑而法水。故能入腎。養腎。腎主骨。故能強骨。腎藏精。故能益精。腎開竅於耳。故能療耳聾。腎主趨瀉。久秘固而精氣盈益。故能令人有子。小兒驚癇。心氣怯。痰熱盛也。鹹能潤下。重可去怯。是以主之。甄權云。補男子腎虛風虛。身強腰中不利。加而用之。【明】李士材本草圖解論磁石曰。慈石辛鹹。色黑入腎。養腎益精。明目聰耳。諸藥石皆有毒。且不宜久服。獨磁石性稟沖和。無猛悍之氣。有補腎益精之功。大部漬酒。優於丸散。石性體重。故爾。【清】黃宮繡本草求真論磁石曰。磁石即俗燭石。磁為鐵母。故見鐵即能以引。是以有磁之說也。磁石味辛而鹹。微寒無毒。得中和之氣。能入腎鎮陰。使陰氣龍火不得上升。故千金磁珠丸用此以治耳鳴。嗜嗜。腎虛。神散。大謂有磁以鎮養精神。使真水不得外移。磁砂入心。鎮養心血。使邪

火不得上侵耳目。腎受陰矣。且磁入腎。腎主骨。磁味辛。辛主散。磁味鹹。鹹鎮堅。磁質重。重鎮怯。故凡周痺風溼。而見肢體酸痛。癆瘵腫核。誤吞針鐵。金瘡血出者。何一不用此以為調治。昔徐之才十劑論云。重可去怯。磁石鐵粉之屬是也。故法則氣浮。宜重劑以鎮之。然亦不可與鐵同用。色黑能吸鐵者。真火燬醋并。磁末水飛用。【清】楊時泰本草述鈎元論磁石曰。慈石孕二百年而成。則其生化之氣所萃。萃者。金也。腎水之母。氣所獨鍾。而感召特異。故能益腎之氣。以療虛。即其上通耳目之竅。而益聰明。固可思矣。夫腎氣陰中之陽也。腎氣足。是以更療風虛。蓋腎乃肝之化厚。腎氣虛。而肝亦因之。風屬陽也。肝之氣虛。故曰風虛。張鷟家有云。臂細無力。不能任重者。此乃肝腎氣虛。風邪客於營衛之間。使氣血不能周養故也。肝主項背與臂膊。腎主腰膝與腳膝。此證乃肝氣偏虛。宜專補肝補腎。雞峯此說。不正。與本經所指周痺風溼。肢節中痛。不可持物。泔洗醱消者。相發明歟。

別錄消癰腫。風痰頭核。此皆通關節之所及。而其本由於補腎虛。風虛如止。補腎虛。而不補風虛。則亦不能通關節。以療諸證矣。蓋肝以腎為體。腎又以肝為用也。據之慈石主治。所以於腎氣為切者。由其腎中母氣。確有感召之精。能通於氣血之中耳。如止云。重可去怯。不泛然而同諸石之用哉。又按獨孤酒云。慈石乃堅頑之物。無融化之氣。止可假其氣。不可服食。是以經氏云。用之漬酒。優於丸散。觀慈石丸。治精氣虛極。乃以酒煮碎。磁良久管之。酒有石味。將石并諸藥。曬乾。再并再曬。如此數次。務令石味入諸藥中。和透。更以此酒搜和諸藥。為丸。庶幾得之。

辨偽 湖南祁陽呂震和曰。查磁石祁陽亦產。並無若何真偽分別。但有頑與活者之辨。活者。確有吸鐵引針能力。試盛鐵砂於銅質薄盤內。盤下以磁石引之。則盤內之砂。可豎直如毛。或用瓷碗盛水。水面浮一小薄紙。再置針於紙上。外以磁石隔誘。而碗內之針。即隨其顛逆轉動。然初探之於山中。未能全活。須用磁砂苦養。若燬之於枕畔。使其得沾人體熱度。尤為真佳。

近人學說 張銘德曰。磁石一味。有死活之分。根尖之別。活磁石試驗之法。取磁石一塊。再用銅盤秤之。銅盤上面。攪勻針砂。銅盤下面。再用磁石靠盤底亂動。磁石到何處。則上面針砂即豎立。但磁石年深日久。亦就不靈。即為死磁石。因在藥店內。年久不能吸受天地之精氣。故無吸鐵之能。但磁石根。無論新取年久之貨。均無吸鐵之能。體質本堅結。與諸石不同。精石體鬆。打碎有層層凸頂色赤。磁石如用火煨。亦非用醋製不可。但磁石研粉。又非用醋製不可。張山雷曰。西人謂磁石琥珀。內有電氣。其能吸引者。皆是電氣發力。能吸引之也。琥珀能拾芥。而不能吸鐵。磁石能吸鐵。而不能拾芥。以所含之電氣不同也。然單以氣論。不如兼以質論。磁石之質類鐵。故以類相從而吸鐵。琥珀之質能黏。故以質為用而拾芥。辨藥性者。所貴體用兼論也。

配合應用 ①治耳卒聾閉。吸

鐵石半錢。入病耳內。鐵砂末入不病耳內。自然通透。(直指方)

②治陽事不起。磁石五斤。研清酒。漬二七日。每服三合。日二夜一。(千金方)

③磁珠丸。治眼昏內障。神光寬大漸散。昏如霧露中行。漸睹空花。物成二體。久則光不收。及內障。真磁石火煨醋滓七次。二兩。磁砂一兩。神麴生用三兩。為末。更以神麴末一兩。煮糊加蜜丸。梧子大。每服二十九。空心飯湯下。(倪微德原撰啓微集方)

④治金瘡血出。磁石末傅之。止痛斷血。(千金方)

⑤治腎虛耳聾。真慈石一豆大。穿山甲燒存性。研一字。新棉塞耳內。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲。即通。(濟生方)

⑥治老人耳聾。慈石一斤。搗末。水淘去赤汁。綿裹之。豬腎一具。於露地。每日取水作粥食。經年氣力強盛。顏如童子。(養老書方)

⑦治小兒驚癇。用慈石鍊水飲。(聖惠方)

⑧慈石丸。治子宮不收。名瘕疾。痛不可忍。用慈石酒浸煨研末。米糊丸。梧子大。每臥時滑石湯下。四十九丸。次早用慈石散。米湯服二錢。散用慈石酒浸半兩。鐵粉二錢。半當歸五錢。為末。

⑨治大腸脫肛。慈石半兩。火煨醋滓七次。為末。每空心米飲服一錢。(直指方) 又用慈石末。麴糊調塗。臍上。入後洗去。(簡便方)

⑩治金瘡腸出。納入。以慈石滑石各三兩。為末。米飲服方寸匕。日再。(劉涓子鬼遺方)

⑪治誤吞針鐵。真慈石。棗核大。鑽孔線穿吞。拽之立出。(錢相公篋中方)

⑫治疔腫熱毒。慈石末。酢和封之。拔根立出。(外臺祕要方)

⑬治諸般腫毒。吸鐵石三錢。金銀藤四兩。黃丹八兩。香油一斤。如常熬膏貼之。(乾坤祕轡方)

⑭用慈石三錢至一兩。施用宜忌 重鎮之品。類多傷氣。故可暫用。而不可久服。慈丹皮。莽草。長黃石脂。殺鐵毒。消金。柴胡。為之使。

著名方劑 ①磁石豬腎羹。治老人久患耳聾。養腎臟。強骨氣。(養老書方)

②磁石一斤。(杵碎水淘去赤汁綿裹) 豬腎一對。(去脂膜細切) 上以水五升。煮磁石取二升。去磁石。投腎調和。以葱。姜。椒。作羹。空腹食之。或作粥。及入酒並佳。③磁珠丸。治神水寬大漸散。昏如霧露中行。漸覩空中有黑花。視物成二。及內障。神光淡綠。淡白色。及治耳鳴耳聾。(倪微德原撰啓微集方)

④磁石二兩。辰砂一兩。神麴三兩。(生) 上三味。更以一兩水。和作餅。煮淨入煎。藥。煉蜜丸。每服十九。加至三十九。空心米飲下。

⑤慈石養腎氣。填精髓。腎虛耳聾目昏者。皆用之。(寇宗奭) ⑥慈石重可去怯。與鐵粉之類是也。(陳藏器) ⑦慈石法水色黑而入腎。故治腎家諸病。而通耳明目。一士子。類病目。漸覺昏暗。生翳。時珍用東垣羌活。勝風。湯加減法。與服。而以磁珠丸佐之。兩月。遂如故。蓋磁石入腎。鎮養真精。使神光不外移。磁砂入心。鎮養心

血。使邪火不上侵。而佐以神靈。消化滯氣。生熱並用。溫養脾胃。發生之氣。乃道家黃婆媒。合嬰始之理。制方者。宜窺造化之奧乎。方見孫真人千金石神麴丸。但云明目。百歲可讀細書。而未發出藥微義也。孰謂古方不可治今病耶。獨孤澗云。慈石乃堅頑之物。無融化之氣。止可假其氣服食。不可久服。渣滓必有大患。夫藥以治病。中病則止。此猶猶可餌服。何獨慈石不可服耶。慈石既煉末。亦非堅頑之物。惟在用者。能得病情而中的爾。淮南萬畢術云。慈石懸井。亡人自歸。註云。以亡人衣裹慈石。懸於井中。逃人自反也。(李時珍) ⑧今慈州。徐州及南海。傍山中皆有之。慈州者。歲貢最佳。能吸鐵。速數十錢。或一二斤刀器。同傳不落者。尤良。採無時。其石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更勝。按南川異物志云。滎海時頭水淺。而多慈石。微外大舟。以鐵葉固之者。至此皆不得過。以此言之。海南所出尤多也。(蘇頌) ⑨慈石其毛輕紫。石上頗瀉。可吸連鐵。俗謂之吸鐵石。其

十四畫 慈

玄石即慈石之黑色者。慈磨鐵鋒。則能指南。然常偏東不全南也。其法取新鑽中獨縷。以半芥子許。蠟綴於鐵腰無風處垂之。則針常指南。以針橫貫燈心。浮水上。亦指南。然常偏丙位。土宿真君曰。鐵受太陽之氣。始生之初。石產焉。一百五十年而成慈石。又二百年孕而成鐵。(寇宗奭)

【慈石毛】

性質 鹹。溫。無毒。
主治 補絕傷。益腸道。止小便白數。治腰脚。去疥癩。長肌膚。令人有子。宜入酒。

參攷資料 本經言石不言毛。毛石功狀殊也。(陳藏器)

【慈石酒】

製法 用慈石。木通。菖蒲等分。袋盛。浸酒飲。

【慈竹瀝】

主治 腎虛。耳聾。
主治 療熱風。和粥飲服。

【慈竹籜】

主治 小兒頭身惡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。

【慈姑】

命名 本品一根。歲生十二子。如慈姑之乳諸

子故名。

古種別名 蕪姑。水萍。別錄。槎了草。(蘇恭)燕尾草。(大明)河堯苳。白地菜。(圖經)箭搭草。(救荒)

外國名詞 Sagittaria Sagittifolia, L. (拉丁)

產地 生水田間。
形態 慈姑為水草類之一種。高三四尺。青莖中空。葉如燕尾。前尖後歧。秋開白花。為圓錐花序。霜後葉枯。根乃練結作橢圓形。色白而瑩滑。可供藥用。花葉詳各該條。



慈 姑

採取 冬春採之。
性質 苦。甘。微寒。無毒。

主治 百毒。產後血悶。攻心欲死。產雞胞衣不出。搗汁服一升。又下石淋。

參攷資料 慈姑冷有毒。多食發虛熱。及腸風。痔漏。崩中帶下。瘡癩。以生姜同煮佳。懷孕人不可

食。(大明) 吳人常食之。令人發脚氣。癢風。損齒。失顏色。皮肉乾燥。卒食之。使人乾嘔也。(孟詵)

【慈姑花】

主治 明目去溼。治一切疔腫。痔漏。

【慈姑葉】

採取 夏秋間採之。
主治 諸惡瘡腫。小兒遊疔丹毒。搗爛塗之。即便消退。甚佳。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論慈姑葉曰。治蛇蟲咬。搗爛封之。【明】李時珍本草綱目論慈姑葉曰。調蚌粉塗瘡。

【慈鳥】

命名 鳥字篆文象其形也。而其初生母哺。長則反哺。不忘慈母。故名。

古種別名 慈鴉(嘉祐)孝鳥。(說文)寒鴉。(綱目)

外國名詞 Corvus hogloos. or Soli. (拉丁) タウガラス (日本)

基本 係存性動物鳥類鳴禽類鳥鴉科。藥用慈鳥之內。

產地 北方山林中尤多。
形態 慈鳥為林禽類之一種。乃鳥之別稱。似鴉而稍小。嘴之尖

端較細。體黑色。而有紫綠色之光澤。多鳴於早晨。好食田園農作物。害鳥之屬。肉可供藥用。

性質 酸。鹹。平。無毒。
主治 補勞。治瘦。助氣。止咳。嗽。竹瀝羸弱者。和五味淹炙食之。良。

【慈鳥膽汁】

採取 伺慈鳥斷其頭。急剖其腹。則膽汁全飽。並無漏溢。然後以線穿陰乾。入藥用。若取之不得法。或被驚覺。縱殺得其膽。亦空皮無汁矣。
主治 明目。開腎。治青盲。醫障。眼弦風爛。並點之。解癰黃毒。

【慈菇】

即慈姑。詳該條。

【慈菇花】

即雨韭之原名。詳「雨韭」條。

【慈鴉】

即慈鳥之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳「慈鳥」條。

【慈謀勒】

即小茴香之古籍別名。典見開寶本草。詳「小茴香」條。

【慈餒餒】

即海鏡。之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「海鏡」條。

【戩子瑠瑠】

即瑠瑠。黑白相間者之古籍別名。典見綱目。詳「瑠瑠」條。

條。

【摘花】即紅花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「紅花」條。

【摘綠】即綠豆皮厚而粉少者之古籍別名。與見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【新木鳥】即刺木鳥。詳該條。

【旗鎗】即雨前茶之別名。與見綱目拾遺。詳「雨前茶」條。

【瑪伽角】即犀角之古籍別名。與見香書。詳「犀角」條。

【榕】古稱別名。倒生樹。不死樹。(綱目拾遺)赤榕。(泉州志)

產地 出回廣熱帶諸地。



榕

形態 榕為喬木類之常綠木。本其色有紅白。及葉有大小諸種。高四五丈。葉橢圓。平滑。狀似大麻。葉頗繁茂。木本稜凹。枝幹拳曲。大者廣達十餘畝。枝條節節如藤。垂下枝上生根連綿。拂地根又生枝。

十四畫 摘

斲 旗 錫 榕 榛

枝幹互相連屬。上下皆成連理。可以倒插。能生枝根。開花淡紅色。結實細圓。狀似無花果。子如冬青子。其根鬚可供藥用。

主治 一固齒。止牙痛。摘取入竹筒。將鹽蒸滿。泥封火煨存性。去竹筒研末搽之。

參攷資料 榕葉似大麻。干如冬青。枝幹拳曲。木本稜凹。不成材器。而結奇香。其脂與漆相似。可以貼金膠物。勝於楮脂。(藥性考)

榕樹國廣最多。他省則無。故紅梅驛以北無榕。大者隆十餘畝。離奇古怪。備木之異。然體曲不中梁柱。理斜不中材用。質虛不中薪鑪。莊子所謂以不材而壽者也。漳浦黃石齋先生有榕頌。其木年久者。常結伽南香。焚之致鶴。植於水際。其子可以肥魚。細枝曝乾束為炬。風雨不滅。其脂乳可以貼金接物。與漆同。其鬚可入藥用。(嶺南雜記) 說文以櫟為古松字。六書故以古松字為櫟。而櫟為南方之榕。通雅云。櫟當別出。狀木始於穢。含分字始於戴。桐。柳宗元詩。榕葉滿庭驚亂啼。後山叢談言蔡州靈

公殿。有大木四垂。傍出人莫能識。張幾間人管至蔡。為余言乃榕木。

此木無用。惟枝上垂根。曝之可作火繩。以發炮。又可染黑。贊寧志所云。倒生木不死樹。橫枝生根下地。如柱。即榕無疑。專志榕之怪在根。自上生下。語曰榕木倒生根。(趙學敏)

榕樹可以倒插。以枝為根。復以根為枝。故一名倒生樹。多中空不堅。無所用。離之木也。其象如離之大腹。其中空處。常產香木。炎精所結。往往有伽南。為粵人以其香可來。鷄子。可肥魚。多植於水際。其樹脂可以貼金接物。與漆相似。性畏寒。嶺梅嶺則不生。故紅梅嶺有數榕。為炎寒之界。有紅白大葉小葉數種。(專志) 按泉州府志。榕有二種。一種矮而盤桓。其鬚著地。復生為樹。一種名赤榕。上幹廣大。二種皆最寬。廣入藥用。有鬚者。(趙學敏)

命名 本品產閩中泰地。故名。

古稱別名 菜。(綱目)菜。(植物學大辭典)

外國名詞 Corylus hetero-

公殿。有大木四垂。傍出人莫能識。張幾間人管至蔡。為余言乃榕木。此木無用。惟枝上垂根。曝之可作火繩。以發炮。又可染黑。贊寧志所云。倒生木不死樹。橫枝生根下地。如柱。即榕無疑。專志榕之怪在根。自上生下。語曰榕木倒生根。(趙學敏) 榕樹可以倒插。以枝為根。復以根為枝。故一名倒生樹。多中空不堅。無所用。離之木也。其象如離之大腹。其中空處。常產香木。炎精所結。往往有伽南。為粵人以其香可來。鷄子。可肥魚。多植於水際。其樹脂可以貼金接物。與漆相似。性畏寒。嶺梅嶺則不生。故紅梅嶺有數榕。為炎寒之界。有紅白大葉小葉數種。(專志) 按泉州府志。榕有二種。一種矮而盤桓。其鬚著地。復生為樹。一種名赤榕。上幹廣大。二種皆最寬。廣入藥用。有鬚者。(趙學敏)

phylla, Ficus. (拉丁) ハシバ

シ キンチャクハシバミ (日本) 榛本 係樟木科榛屬。為榛之實中仁。

產地 生山野間。

形態 榛為灌木類之落葉木。本高七八尺至二三丈。葉互生。葉身甚闊。呈圓心臟形。有尖端。邊緣有重鋸齒。早春開花。花小單性。雌雄同株。雄花長穗狀花序。雌花少數相聚。常構成頭狀花叢。結實為堅果。至秋成熟。大五六分。外殼厚。形圓而狹。下有殼斗。包被其果。實中仁可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 益氣力。實腸胃。令人不飢。健行。



榛

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論榛實仁曰。止飢。調中。開胃。

十四畫 榧

【榧植】

古籍別名 榧植。(通志) 榧植(綱目拾遺)

木李(詩經)木梨(埤雅)唐梨(紅林檎)(日本)

外國名詞 Cydonia sinensis, Thoun. (拉丁)クワリン

カラナシ ベニリンゴ(日本)

基本 係薔薇科棠梨屬。爲榧植之實。

形態 榧植爲喬木類之落葉木本。高二三丈樹皮。每年常自剝落。痕如雲紋。又如鱗狀。葉卵形而尖。互生。春末隨葉開花。生於枝之頂端。萼之外面平滑。花冠五瓣。紅花。結實橢圓。頭尖。色黃。狀如木瓜。而大。蒂平滑。可供藥用。



榧

性質 酸平。無毒。至治 解酒去痰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論科榧實曰。食之去惡

榧 榧

心。止心中酸水。【宋】大明諸家本草論榧實曰。煨食止痢。浸油梳頭。治髮白髮赤。【明】吳瑞日用本草論榧實曰。羹汁服。治霍亂轉筋。

參攷資料 榧植氣辛香。致衣箱中殺蠹蟲。(孟詵) 榧植乃木瓜之大而黃色無重蒂者也。榧子乃木瓜之短小而味酢澆者也。榧椹則榧類之生於北土者也。三物與木瓜皆是一類各種。故其形狀功用不甚相遠。但木瓜得木之正氣。爲可貴耳。(李時珍)

【榧木】 古籍別名 水松。水杉。(綱目拾遺) 產地 出粵中潮州。多植於水旁。平堤曲岸間。 形態 榧爲喬木類之一種。其幹得杉十之六。枝葉得松十之四。故以幹名。爲水杉。枝葉爲水松。其皮質頗堅韌。可製履與藥用。 至治 溼脚氣。辟邪風。作履著之。

【榧子】 卽榧實之處方用名。詳【榧實】條。 【榧花】 卽榧華。詳該條。

【榧華】

基本 本品卽榧子之華也。

採取 春月採之。 性質 苦。

至治 療水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。

【榧實】

處方用名 榧子。 古籍別名 榧子。(本經) 赤果。玉榧。(日用) 玉山果。野杉。(綱目)

外國名詞 Torrey's nucifera, S. & N. (拉丁) カヤカハ(日本) 基本 係松柏科榧屬。爲榧之果實。

產地 凡山野平原恒有生焉。



榧

形態 榧爲果類之常綠喬木。高數丈。葉濃綠色。作線形而扁平。前端甚尖銳。硬如針。互生。成二縱列。春夏間開花。花單性。雄花與雌花異株。種子如核果狀。秋未成熟。

一五三六

作橢圓形。長八九分。淡褐色。外部有多脂之內。內有尖長之核。亦有橢圓之核。供食外亦可充藥用。

用法 生食炒食或和藥水煎服。

性質 甘平。澆。無毒。 效能 殺蟲。療痔。

至治 常食治五痔。去三蟲。蠱毒。鬼疰。惡毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論榧實曰。食之。療寸白蟲。【唐】孟詵食療本草論榧實曰。消穀。助筋骨。行營衛。明目。輕身。令人能食。多食一二升。亦不發病。【宋】寇宗奭本草衍義論榧實曰。多食滑腸。五痔人宜之。【明】李士材本草圖解論榧實曰。榧子消穀。進食。殺蟲。化積。止嗽。助腸。療痔。止瀉。【清】黃宮繡本草求真論榧實曰。榧實甘澆微苦。體潤而滑。性平無毒。按據諸書有言氣味苦寒。能消溼熱。爲肺家之果。又云性溫。散氣。能去腹中邪氣。及殺諸蟲。皆無定論。余按榧實甘澆。是其本質。凡肺不潤而燥者。得此則宜。故有

解燥除熱之功。非書所云能除濕熱之意乎。又其燥熱內擾。則蟲自附見蝕。而五痔腹脹等症。自爾悉形。服此燥氣悉除。腸胃頓清。其氣自附不結。非書所謂溫能散氣之意乎。又書所載有毒無毒。在人食既無病。又能以此療病。毒何由見。非書所云無毒之說乎。又其苦澆發儲。既能清燥潤肺。復於蟲蝕性味不合。令其即水化水。非書所云有毒之說乎。究之止屬潤肺解心殺蟲之品。其言有毒。止是毒蟲之毒。而非毒人之毒也。其言無毒。因非毒人之毒。而為毒蟲之毒也。故凡一切肺燥而見咳嗽不寧。腹中不和。五痔惡毒。並小兒黃瘦。便閉不解等症。服之無不奏效。昔東坡詩云。驅除三彭蟲。愈我心腹疾。義正是矣。但多食則有滑腸之慮。炒食味即香酥甘美。更有引火入肺。大腸受傷之慮。不可不細察耳。

配合應用 ①治寸白蟲。日食榧子七顆。滿七日。蟲皆化為水也。(孟詵方) ②又用榧子一百枚。去皮。火燃燉之。經宿。蟲消下也。胃弱者。喫五十枚。(外臺祕要方)

◎治好食茶葉。面黃者。每日食榧子七枚。以愈為度。(楊起簡便方)

◎令髮不落。榧子三箇。胡桃二箇。側柏葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮。永不落且潤也。(聖惠方)

◎治卒吐血。先食蒸餅兩三箇。以榧子為末。白湯服三錢。日三服。(聖濟總錄方)

◎治尸咽痛痒。語言不出。榧實牛兩。蕪荑二兩。杏仁。桂各半兩。為末。蜜丸。彈子大。含嚥。(聖濟總錄方)

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 ①榧實治咳嗽白濁。助陽道。(生生編) ②榧子肺家果也。火炒食之。香酥甘美。但多食則引火入肺。大腸受傷爾。(朱震亨) ③榧子殺腹間大小蟲。小兒黃瘦有蟲積者宜食之。(寧原) ④榧實榧子治療相同。當為一物無疑。但本經榧子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲。汪穎以粗榧為榧子。終是一類。不甚相遠也。(李時珍) ⑤性熱。同鷄肉食。生斷節風。又上癩人忌火氣。(吳瑞)

按物類相感志云。榧實素羹。味更甜美。豬脂炒榧。黑皮自脫。同甘蔗食。其渣自轉。又云。榧子皮反蕪豆。能殺人。(李時珍) ⑥榧亦作排。其木名文木。斐然章采。故謂之榧。信州玉山縣者為佳。故蘇東坡詩云。彼美玉山果。傑為金盤實。(李時珍) ⑦榧實大如橄欖。殼色紫褐而脆。其中子有一重黑粗衣。其仁黃白色。嚼久漸甘美也。(寇宗奭) ⑧榧有一種粗榧。其木與榧相似。但理粗色赤耳。其子稍肥大。僅圓不尖。神農本草榧子即粗榧也。(汪穎) ⑨榧生深山中。人呼為野杉。按羅願爾雅翼云。桮似杉而異於杉。彼有美實。而木有文采。其木似桐而葉似杉。絕難長。木有牝牡。牡者華而牝者實。冬月開黃圓花。結實大小如棗。其核長如橄欖核。有尖者不尖者。無稜而殼薄。黃白色。其仁可生喫。亦可焙收。以小而心實者為佳。一樹不下數十斛。陶氏不識榧子。惟蘇恭能辨為一物也。(李時珍)

【榮花樹皮】即合歡皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳合歡皮條。

【榮桐】即桐之古籍別名。與見桐目。詳桐條。

【榮莫】即土茯苓之古籍別名。與見和漢藥考。詳土茯苓條。

【榧梓】 命名 本品性溫而氣味。酢香。故名。

形態 榧梓為喬木類之一種。樹如林檎。花白綠色。結實如榧子。而小。氣甚香。肉鬆而多毛。可供藥用。其木皮詳該條。

性質 酸。甘。微寒。無毒。

主治 主水洩。腸虛。煩熱。散酒氣。並宜生食。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論榧梓實曰。去胸膈積食。止渴除煩。將臥時噉一兩枚。生熟皆宜。【宋】開寶重定新本草論榧梓實曰。溫中下氣。消食。除心間酸水。去臭辟衣魚。

參攷資料 ①榧梓實臥時噉之太多。亦痞塞胃脘也。(寇宗奭) ②榧梓實發熱。祕大小腸。聚胸中痰。壅澀血脈。不宜多食。(陳士良) ③榧梓實同車螯食。發疝氣。

十四畫 榧

榮 榧

(吳瑞)

【棍梓木皮】

主治 搗末。傳瘡瘍。

【槲桃】即桃之古籍別名。與見綱目。詳「桃」條。

【槲子】即槲藤子之古籍別名。與見日華諸家本草。詳「槲藤子」條。

【槲藤子】

命名 本品子象槲形故名。

古醫別名 合子(綱目拾遺)

象豆(開寶本草) 槲子(日華)

外國名詞 Prunotha scann-dons, L. (拉丁) モダマ (日本)

基本 係豆科槲藤子屬。為槲藤之子仁。

產地 野生山林間。

形態 槲藤為蔓草類之多年生草本。藤知通草。繞樹木。結實三年方熟。形如弓袋。其子仁圓扁。長一二寸。色紫黑微光。可供藥用。

製法 凡使其子中仁入藥。

性質 瀉。甘。平。無毒。

主治 五痔蟲毒。飛尸喉痺。以仁為粉。微熱水服一二匕。亦和大豆。深面去野蠶。

歷代記述攷證 【宋】開寶重

定新本草論槲藤子仁曰。治小兒脫肛。血痢瀉血。並燒灰服。或以一枚割瓢熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服必效。【明】李時珍本草綱目論槲藤子仁曰。解諸藥毒。

【藥香】即冰片之古籍別名。與見和漢藥考。詳「冰片」條。

【槲子】即部槲子之別名。詳「部槲子」條。

【構膠】即楮樹皮中白汁之古籍別名。與見綱目。詳「楮樹皮中白汁」條。

【積胸露】即枳實之古籍別名。與見和漢藥考。詳「枳實」條。

【槲了草】即慈姑之古籍別名。與見新修本草圖經。詳「慈姑」條。

【槲子】即槲實之處方用名。詳「槲實」條。

【槐木皮根皮】

性質 苦。平。無毒。

主治 爛瘡。喉痺。寒熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論槐木皮根皮曰。煮汁淋陰囊墜腫。氣痛。煮漿水漱口。齒風。疥。腫。血。【宋】大明諸家本草論槐

木皮根皮曰。治中風。皮膚不仁。浴

男子陰疝。卵腫。浸洗五痔。一切惡瘡。婦人產門疼痛。及湯火瘡。煎膏止痛。長肉。消癰腫。【宋】蘇頌圖經本草論槐木皮根皮曰。煮汁服治下血。

【槐生】即續斷之古籍別名。與見和漢藥考。詳「續斷」條。

【槐米】即槐花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「槐花」條。

【槐米炭】即槐花炒黑者之處方用名。詳「槐花」條。

【槐耳】

古醫別名 槐槐。槐菌。

赤雞。槐蛾。(綱目)

性質 苦。辛。平。無毒。

主治 五痔。脫肛。下血。心痛。婦人陰中瘡痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論槐耳曰。治風破血。益力。參攷資料 ①槐耳。槐樹上菌也。當取堅如桑耳者。②以煮漿粥。安槐木上。草覆之。即生。置耳。(甄權)

【槐角】即槐實之處方用名。詳「槐實」條。

【槐角子】即槐實之處方用名。詳「槐實」條。

【槐豆】即決明子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「決明子」條。

【槐枝】

採取 以東行者良。性質 苦。平。無毒。

主治 洗瘡。及陰囊下溼。瘰癧。月斷大枝。候生嫩藥。煮汁釀酒。療大風。痿痺甚效。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論槐枝曰。炮熱可熨蚊毒。【唐】陳藏器本草拾遺論槐枝曰。燒灰沐頭。長髮。【宋】蘇頌圖經本草論槐枝曰。背枝燒。澀塗。解。蝦。黑。指。牙。去。蟲。煎。湯。洗。痔。核。【明】李時珍本草綱目論槐枝曰。治赤目。崩漏。

參攷資料 劉禹錫傳信方。著

硤州王及郎中槐湯灸痔法甚詳。以槐枝澀煎湯。先洗痔。便以艾灸其上。七壯。以知為度。王及素有痔疾。充西川安撫使。判官。乘驛入。騎。谷。其痔大作。狀如胡瓜。熱氣如火。至驛。僱。仆。郵。吏。用。此。法。灸。至。三。五。壯。忽覺熱氣一道入腸中。因大轉。瀉。先血後穢。其痛甚楚。瀉後遂失。

胡瓜所在。登驥而馳矣。(蘇頌)

【槐枝酒】 命名 本品係用槐樹枝煎汁和麴如常釀成之酒。故名。

主治 大麻、瘰癧。

【槐花】 處方用名 槐花炭、槐米炭。

古籍別名 槐米、槐花米、槐座米。(和漢藥考)

外國名詞 Cassia Pulpa. (Cassia, Sophora or Torr.) (Cassia Pulp.)

基本 屬豆科槐樹之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

槐花以廣西桂林產者為最。廣東、遼州、東陵、樂昌出者為佳。染料必須用之。山東青州更多出產。但其質色不及兩廣之好。九月新。



(一) 花槐

形態 槐為落葉喬木。高二三丈。葉作羽狀複葉。小葉作長尖卵圓形。夏季於葉腋間開黃白色蝶

十四畫 槐

形花。作圓錐花序排列。後結類豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。即是槐實。



(二) 花槐

採取 四五月採花曝乾。製法 寇宗奭曰。凡使槐花。須未開時採收。陳久者良。入藥炒用。染家以水煮一沸出之。其稠滓為餅。染色更鮮。

性質 苦、平。無毒。效能 瀉熱、涼血。用治五痔及作一切下血藥。

主治 五痔、心痛、眼赤、殺腹臟蟲、及皮膚風熱、腸風瀉血、赤白痢、並炒研服。

歷代記載 攷證 【金】張元素珍珠囊論槐花曰。涼大腸。【明】李時珍本草綱目論槐花曰。炒香。頗嚼治失音及喉痺。又療吐血。衄中漏下。【清】賈九如辨藥指南論槐花曰。槐花體輕。色淡黃。氣和。味苦。性寒。能沈。力涼血。性氣薄而味

厚。入肺大腸二經。二三月萌蘆。四月五月開放。從木令生。而成於火。月火性味苦。苦能直下。且味厚。能沈。主清腸紅下血。痔瘡腫痛。膿毒淋瀝。此涼血之功。獨在大腸也。大腸與肺為表裏。能疏皮膚風熱。是泄肺金之氣也。

配合應用 ①治衄血不止。槐花、烏賊魚骨等分。半生半炒為末。吹之。(普濟方)

②治舌咽不止。槐花末傳之。即止。(朱氏集驗方)

③治吐血不止。用槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。(普濟方)

④治咯血唾血。用槐花炒研。每服三錢。糯米飲下。仰臥一時取效。(朱氏方)

⑤治小便尿血。槐花炒。鬱金煨各一兩為末。每服二錢。淡豉湯下立效。(錢中祕密方)

⑥治大腸下血。用槐花、荊芥穗等分為末。酒服一錢匕。(經驗方)

用柏葉三錢。槐花六錢。煎湯日服。(集簡方) 又槐花根殼等分炒存性為末。新汲水服二錢。(袖珍方)

⑦治暴熱下血。用生豬鬃一條。洗淨控乾。以炒槐花末填滿扎定。米醋沙鍋內煮爛。搗丸。彈子大。日乾。每服一丸。空心當歸煎酒化下。(水類鈴方)

⑧治酒毒下血。槐花半生半炒一兩。山梔子五錢為末。新汲水服二服。(經驗良方)

⑨治賊毒下血。新槐花炒研。酒服三錢。日三服。或用槐白皮煎湯服。(普濟方)

⑩治婦人漏血不止。用槐花燒存性研。每服二三錢。食前溫酒下。(聖惠方)

⑪治血崩不止。槐花三兩。黃芩二兩為末。每服半兩。酒一盞。銅秤鍾一枚。桑柴火燒紅。浸入酒內。調服。忌口。(乾坤祕傳方)

⑫治中風失音。炒槐花三更後仰臥嚼咽。(危氏得效方)

⑬治癰疽發背。凡人中熱毒。眠花頭。口乾舌苦。心驚背熱。四肢麻木。覺有紅暈在背後者。即取槐花子一大抄。鐵杓炒褐色。以好酒一盞。漬之。乘熱飲酒。一汗即愈。如未退再炒。一服極效。縱成膿者亦

十四畫 槐

無不愈。彭辛菴云。此方三十年屢效者。(劉松石保壽堂方)

⑤ 治楊梅毒瘡。乃陽明積熱所生。槐花四兩。略炒。入酒二盞。煎十餘沸。熱服。胃虛寒者勿用。(集簡方)

⑥ 治外痔長寸。用槐花煎湯類洗。并服之。數日自縮。(集簡方)

⑦ 治疔瘡腫毒。一切癰疽。發背。不論已成未成。但嫩痛者。皆治。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鍾。煎十餘沸。熱服。未成者二三服。已成者一二服見效。(醫方摘要方)

⑧ 治發背散。槐花。黑豆粉。各一升。同炒。象牙色。研末。用細茶一兩。煎一盞。露一夜。調末三錢。傅之。留頭。(攝生妙用方)

⑨ 治下血血崩。用槐花一兩。棧灰二錢。鹽一錢。水三鍾。煎減半服。(摘玄方)

⑩ 治白帶不止。槐花炒。牡蠣煨。等分。為末。每酒服三錢。取效。(摘玄方)

用煎 錢半至三錢。

槐用宜忌 凡無實火實熱者

禁用忌食

禁

禁

著名方劑 槐花散。治腸風。下血。(古方)槐花(炒)側柏葉(杵)枳殼(炒)各等分。為末。米飲下。

參攷資料 槐花今染家亦用。收時折其未開花。煮一沸。出之。釜中有所澄下稠黃滓。滲濾為餅。染色更鮮明。治腸風熱瀉。血甚佳。不可過劑。(寇宗奭)

【槐花米】即槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「槐花」條。

【槐花炭】即槐花炒黑者之處方用名。詳「槐花」條。

【槐苗】即槐耳之古籍別名。典見唐本草。詳「槐耳」條。

【槐葉】 性質 苦平。無毒。主治 邪氣。產難。絕傷。及癰疹。牙齒諸風。採嫩葉食。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論槐葉曰。煎湯治小兒驚癇。壯熱疥癬。及丁腫。皮莖同用。

【槐蛾】即槐耳之古籍別名。典見綱目。詳「槐耳」條。

【槐塵米】即槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「槐花」條。

【槐實】 處方用名 槐角。槐子。槐角子。

古籍別名 蠟子。(藥考譜)

外國名詞 Sophora japonica. (拉丁)エンジュ エンジュ(日本)

基本 屬豆科。為槐之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。槐角產廣東北江。樂昌。八步等處。植物學大辭典曰。產於東部亞細亞。

形態 槐為落葉喬木。高二三丈。葉為羽狀複葉。而互生。小葉數奇。而作長尖卵圓形。下面帶白色。夏季於葉腋開黃白色蝶形花。作圓錐花序。排列雄蕊十枚。各自離生。雌蕊一枚。秋結類角豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。

採取 七月採嫩實。十月採老實。

製法 雷斅曰。凡採得去單子。并五子者。只取兩子。三子者。以銅錘破。用烏牛乳浸一宿。蒸過。用。用法 與他藥水煎。或到末。和作丸散。其嫩實可生搗用。

一五四〇

性質 苦寒。無毒。效能 治腸風。便血。療內外五痔。用作祛風解熱藥。

主治 療五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷。火瘡。婦人乳癰。子臟急痛。(本經)久服明目。益氣。頭不白。延年。治五痔瘡。以七月七日取之。搗汁。銅器盛之。日煎。令可丸。如鼠屎。大納竅中。日三易。乃愈。又墮胎。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論槐實曰。治大熱。及難產。

【唐】陳藏器本草拾遺論槐實曰。殺蟲。去風。合房陰乾。煮飲。明目。除熱。淚。頭腦。心。胸。間。熱。風。煩。悶。風。眩。欲。倒。心。頭。吐。涎。如。醉。淺。淺。如。紅。車。上。者。【宋】大明諸家本草論槐實曰。治丈夫女人陰瘡。濕。癩。催。生。吞。七。粒。【宋】寇宗奭本草衍義論槐實曰。疎導風熱。【元】李東垣用藥法象論槐實曰。治口齒風。涼大腸。潤肝燥。【明】繆希雍本草經疏論槐實曰。槐實味苦。氣寒。而無毒。別錄益以酸鹹宜矣。入手足陽明。象入足厥陰經。其主五內邪氣熱者。乃熱邪實也。涎唾多者。脾胃有熱。

也。傷緒之病。其血必熱。五痔由於大腸火熱。火瘡乃血爲火傷。婦人乳癭。肝家氣結血熱所成。子臟急痛。由於血熱燥火。槐爲苦寒純陰之藥。爲涼血要品。故能除一切熱。散一切結。清一切火。如上諸病。莫不由斯三者而成。故悉主之。久服明目益氣。頭不白。延年者。血分無熱。則目自明矣。熱能傷氣。除火熱則氣自益矣。涼血則髮不白。熱去則陰精不損。故延年也。其花味以苦勝。故除手足陽明足厥陰諸熱。證尤長耳。【清】黃宮繡本草求真論槐實曰。槐角卽槐實。味苦酸鹹。氣寒無毒。入手足陽明大腸胃。及入足厥陰肝。凡因肝經熱鬱。而致風眩煩悶。痔血腸風。並陰瘡溼癢。目淚不止者。服此治無不效。以其氣皆純陰。爲涼血要藥。故能除一切熱。散一切結。清一切火也。至書所云能疏肝經風熱者。非是。具有表性。得此則疎實。因熱除而風自息之意。凡書所著治功。多有如此立說。不可不細體會而詳究耳。去單子及五子者。飼槌搗碎。牛乳拌煎。槐花味苦稠勝。其涼大腸血分

十四畫 槐

更甚。凡大小便血。及目赤腫痛舌。衄。並皆用之。

配合應用 ●治大腸脫肛。槐角。槐花各等分炒爲末。用羊血蘸藥。炙熟食之。以酒送下。豬腰子去皮蘸炙亦可。(百一選方)

●治內痔外痔。許仁則方。用槐角子一斗。搗汁酒稠。取地膽爲末。同煎丸。梧子大。每飲服十丸。兼作挺子。納下部。或以苦參末代地膽亦可。(外臺秘要方)

●治目熱昏暗。槐子。黃連二兩爲末。蜜丸。梧子大。每漿水下二十丸。日二服。(聖濟總錄方)

●治大熱心悶。槐子燒末酒服方寸匕。(千金方)

用飲 錢半至三錢。
施用宜忌 凡脾胃虛寒及無溼熱者禁用。忌鐵。景天爲之使。
著名方劑 槐角丸。治五極腸風瀉血。瀉前下血名外痔。糞後有血名內痔。大腸不收名脫肛。穀道四面努肉如爛名舉痔。痔頭有孔名瘻瘡。內有蟲爲蟲痔。並皆治之。(和劑局方) 槐角去梗炒(一兩)地榆當歸(酒焙)防風黃芩枳壳

(欬炒)上藥各半兩爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。

參攷資料 ●槐子以十月已日採相連多者。新益盛。合泥。百日皮爛爲水。核如大豆。服之令腦滿。髮不白而長生。(陶弘景) ●折嫩房角作湯代茗。主頭風明目補腦。水吞黑子以變白髮。扁鵲明目使髮不落法。十月上巳日。取槐子去皮。納新瓶中。封口。二七月初服一枚。再服二枚。日加一枚。至十日又從一枚起。週而復始。令人可夜讀。書。延年益氣力大良。(蘇頌) ●按大清草木方云。槐者虛星之精。十月上巳日採子服之。去百病。長生通神。梁書言庾肩吾常服槐實。年七十餘。髮鬢皆黑。目看細字。此其驗也。古方以子入冬月牛髓中漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云久服明目通神。白髮還黑。有痔及下血者尤宜服之。(李時珍) ●按周禮外朝之法。面三槐。三公位焉。吳澄注云。槐之言懷也。懷來人於此也。王安石釋云。槐黃中懷其美。故三公位之。春秋元命苞云。槐之言歸也。古者樹槐聽訟於下。使情歸

實也。(李時珍) ●槐實生河南平澤。可作神燭。(別錄) ●今處處有之。其木有極高大者。按爾雅槐有數種。葉大而黑者名檉槐。蓋合夜開者名守宮槐。葉細而青綠者。但謂之槐。其功用不言有別。四月五月開黃花。六月七月結實。七月七日採嫩實。搗汁作煎。十月採老實入藥。皮根採無時。醫家用之最多。(蘇頌) ●槐之生也。季春五日而

兔目。十日而鼠耳。更旬而始規。二旬而葉成。初生嫩芽。可煉熟。水淘過食。亦可作飲代茶。或採槐子種畦中。採苗食之亦良。其木材堅重。有青黃白黑色。其花未開時狀如米粒。炒過煎水。染黃甚鮮。其實作莢連珠。中有黑子。以子連多者爲好。周禮秋取槐檀之火。淮南子考槐生火。天玄主物簿云。老槐生丹。槐之神異如此。(李時珍)

【槐槐生】卽續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳續斷條。

槐膠 性質 苦寒無毒。
主治 一切風化凝。肝厥風。筋脈抽掣。及急風口噤。或四肢不收。頑痺。或海風周身如蟲行。

十四畫 槐 榔 歌 滴 滾 滿 漂 漆

一五四二

或破傷風口眼偏斜。腰背強硬。任作湯散丸煎。雜諸藥用之。亦可水煮和藥爲丸。

歷代記述攷證【明】李時珍本草綱目論槐膠曰。煨熱綿裹塞耳。治風熱聾閉。

【槐樞】即槐耳之古籍別名。典見唐本草。詳「槐耳」條。

【槐榧】即槐耳之古籍別名。典見蜀本草。詳「槐耳」條。

【槐膠】即决明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「决明子」條。

【榔桐】產地 多生山谷間。形態 狀似青桐。葉有極。皮可供藥用。其葉亦可療疾。詳該條。

性質 甘溫。無毒。

主治 療蠶咬毒氣入腹。研末服。

【榔桐葉】性質 甘溫。無毒。主治 療蛇蟲蜘蛛咬毒。搗敷。

【歌女】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳「蚯蚓」條。

【滴乳石】即鐘乳石之別名。詳「鐘乳石」條。

【滴乳香】即乳香之處方用名。詳「乳香」條。

【滴金卵】即延胡索之古籍別名。典見和漢藥考。詳「延胡索」條。

【滴滴金】即旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳「旋覆花」條。

【滴滴】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「旋覆花」條。

【滴膽芝】即黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃連」條。

【滴露】即草石蠶之古籍別名。典見綱目。詳「草石蠶」條。

【滾水】即熱湯之俗名。詳「熱湯」條。

【滿山香】產地 西江爲最多。性質 辛溫。



效能 止痛。消腫毒。通竅。止瘡癢。去風。殺疥疥。

主治 跌打傷。

【滿地金錢】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【滿江紅】基本 滿江紅爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 療癰疽。入膏用。

【滿條紅】即紫荊花之古籍別名。典見聖芳譜。詳「紫荊花」條。

【滿陰實】產地 生山野或園中。

形態 滿陰實爲雜草類之一種。莖如芥。或如瓜藤。葉小。七月結實。如櫻桃。可供藥用。

性質 酸平。無毒。

主治 益氣。延年。除熱。止渴。利小便。

【漂接草】即翹搖之古籍別名。典見陸放翁詩序。詳「翹搖」條。

【漂青黛】即青黛之處方用名。詳「青黛」條。

【漆子】主治 下血。

【漆姑草】即蜀羊泉之古籍別名。典見綱目。詳「蜀羊泉」條。

【漆花】主治 小兒解頰腹脹。交脛不行。

【漆柿】即梓柿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「梓柿」條。

【漆莖】即澤漆之古籍別名。典見本經。詳「澤漆」條。

【漆葉】基本 係漆樹科漆樹。樹爲漆樹之葉。其花。干詳各該條。



主治 五尸勞疾。殺蟲。曝乾研末。日用酒服一錢匕。

參攷資料 ●華佗傳載彭城樊阿少師事佗。佗授以漆葉青黏散。方云服之去三蟲。利五臟。輕身益氣。使人頭不白。阿從其言。年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏生豐沛彭城及朝歌。一名地節。一名黃芝。主理五臟。益精氣。本出於迷入山。見仙人服之。以告佗。佗以爲佳語。阿祕之。近者人見阿之壽。而氣力強盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復人識。青黏或云即黃精之正葉者也。(蘇頌)●按葛洪抱朴子云。漆葉青黏。凡蔽之草也。樊阿服之。得壽二百歲。而耳目聰

明猶能持鍼治病。此近代之實事。良史所記注者也。洪說猶近於理。前言可年五百歲者誤也。或云青黏卽歲稔。(李時珍)

【漆樹斗】卽乾漆。詳該條。

【漆頭】卽蘭茹之古籍別名。典見本草集註。詳「蘭茹」條。

【漏天機】卽龜版之古籍別名。典見圖經本草。詳「龜版」條。

【漏菴】卽草豆蔻之古籍別名。典見藥物志。詳「草豆蔻」條。

【漏蘆】命名。屋之西北黑處謂之虛。本品秋後卽黑而異於衆草。故有漏蘆之稱。

處方用名 漏蘆。

古籍別名 野閉。(本經)菴蒿。(蘇恭)兔油麻。(日華)北漏。老翁花。伐曲。大席。麝根。(和漢藥考)

基本 屬玄參科漏蘆之根。

產地 凡山谷間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。漏蘆產江蘇鎮江。

形態 漏蘆生於向陽之地。爲草本植物。高二三尺。葉似艾葉。惟小且薄。夏秋間。梢葉間開黃色似

十四畫 漆

赤小豆之脣形花。花後結實。子較墨粟子爲小。此草秋後則枯而變黑。異乎他草。

採取 八月採根陰乾。

製法 雷敷曰。凡採得漏蘆細到。以生甘草相對拌。蒸之。從已至申。揀出晒乾用。

性質 鹹寒。無毒。

效能 解熱毒。通乳汁。有去溼痺之功效。用治諸惡瘡痔漏藥。

主治 皮膚熱毒。惡瘡疽痔。溼痺。下乳汁。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。(本經)止遺溺。熱氣瘡。痒如麻豆。可作浴湯。(別錄)

歷代紀述 甄權【宋】大明日華諸家本草論漏蘆曰。通小腸。泄精。尿血。腸風。風赤眼。小兒壯熱。撲損。續筋骨。乳癰。瘰癧。金瘡。止血。排膿。補血。長肉。通經脈。【明】繆希雍本草經疏論漏蘆曰。漏蘆苦鹹無毒。苦能下洩。鹹能軟堅。寒能除熱。入足陽明。少陽。太陽。手太陰。陽明。寒而通利之藥也。故主皮膚熱惡瘡。疔痔。溼痺。下乳汁。別錄又主止遺溺。熱氣。瘡。痒如麻豆。可作浴湯。又本經久服輕身益氣。耳目聰明。

漏

不老延年者。蓋亦通指熱散病除。則臟腑自安。精神自倍。而臻乎壽考也。【清】黃宮繡本草求真論漏蘆曰。漏蘆味苦而鹹。氣寒有毒。凡苦則下泄。鹹則軟堅。寒則勝熱。漏蘆氣味俱備。其性專入陽明胃經。故凡癰疽發背。乳汁不通。及預解時行痘毒者。咸須服此。以解毒邪。俾邪盡從便出而解矣。然書又云。遺精尿血能止。亦因毒解熱除。自止之意。非因漏蘆實有收澀之功也。但氣虛瘡瘍不起。及孕婦有病者。切忌。出閩中。莖如油麻。枯黑如漆者。眞甘草拌。速翹爲使。

近人學說 張山雷曰。漏蘆滑利。泄熱。與王不留行功用最近。而寒苦直泄。尤其過之。苟非實熱。不可輕用。不獨耗陰。尤損正氣。日華謂通小腸。治泄精。溺血。腸風。乳癰。排膿。止痛。通經脈。皆惟實熱之症。可以暫用。石頑謂苦寒解毒。利竅殺蟲。排膿消腫。古治癰癤。以漏蘆湯爲主藥。蓋鹹能軟堅。苦寒清熱。解毒之功。然服之必瀉。則熱從下出。故氣虛者非其所宜。而妊婦尤爲切禁。附漏蘆湯方。漏蘆。速翹。生

草。大黃。生芪。治癰疽熱證。願按此湯。惟實熱癰結者宜之。其用黃芪。蓋欲以監制其迅利。然補氣之藥。以治癰腫。究屬非宜。若曰彼此牽制。欲其虛實二家。無投不利。則模稜兩可。必無桴應之理。此成方之所以不可混用也。惟在臨證時。審其虛實寒熱。而知所損益。然後可以恰當病機耳。

配合應用 ①治乳癰。乳癰。漏蘆。貝母。連翹。甘草。金銀花。橘葉。鼠糞。白芷。山豆根。山茨菇。夏枯草。

②治發背。瘰癧。排膿。止痛。漏蘆。連翹。生甘草。紫花地丁。貝母。金銀花。甘草。夏枯草。

③漏蘆同黃耆。人參。排膿。長肉。加狗蹄。磁蹄。汁。能下乳。

④治腹中蛇蟲。漏蘆爲末。以餅壓和。方寸匕服之。(外臺祕要方)

⑤治小兒無辜。疳病。肚脹。或時泄痢。冷熱不調。以漏蘆一兩。杵爲散。每服一錢。以豬肝一兩。入鹽少許。日煮熱。空心頓食之。(聖惠方)

⑥治冷勞泄痢。漏蘆一兩。艾葉炒四兩。爲末。米醋三升。入藥末。一半。同熬成膏。入後末和丸。梧子大。

十四畫 漏

每溫水下三十丸。亦治產後帶下。
(聖濟總錄方)

①治乳汁不下。乃氣脈壅塞也。又治輕格凝滯。乳內脹痛。邪毒成瘰。服之自然內消。漏蘆二兩。牛蛇退十條。炙焦瓜蒌十個。燒灰存性。為細末。每服二錢。用溫酒調下。良久。再以熱藥湯投之。總之以通為度。(和劑局方)

②治歷節風痛。筋脈拘攣。古聖散。用漏蘆炒半兩。地龍去土炒半兩。為末。生薑二兩。取汁入蜜三兩。同煎三五沸。入好酒五合。盛之。每以二盃調水一錢。溫服。(聖濟總錄方)

③治一切癰疽。發背初發二日。但有熱證。便宜服漏蘆湯。退毒下膿。乃是宜熱拔毒之劑。熱退即住服。漏蘆用有白非者。連翹生黃芪沉香各一兩。生粉草半兩。大黃微炒一兩。為細末。每服二錢。用薤菜湯調飲下。(集驗方)

④治白禿頭瘡。五月收漏蘆草。燒灰。豬膏和塗之。(聖濟總錄方)
用錢半至三錢。
應用宜忌 凡瘡瘍之屬於陰

症而氣虛不起及孕婦禁用。連翹為之使。

參攷資料 ①此藥久服甚益人。而服食方罕見用之。近道出者。惟療瘰癧耳。市人皆取苗用。(陶弘景) ②漏蘆下乳汁。消熱毒。排膿止血。生肌殺蟲。故東垣以為手足陽明藥。而古方治癰疽發背。以漏蘆湯為首稱也。願安常傷寒論。治癰疽及預解時行痘疹熱。用漏蘆葉云。無則以山梔子代之。亦取其寒能解熱。蓋不知其能入陽明之故也。(李時珍) ③漏蘆生香山山谷。八月採根陰乾。(別錄) ④香山應是黃帝所葬處。乃在上郡。及出近道。市人取苗用之。俗中取根名鹿麗根。苦酒摩。以療瘡疥。(陶弘景) ⑤此藥俗名莢蒿。莖葉似白蒿。花黃。生莖長似細麻之莖。大如筋許。有四五瓣。七八月後皆黑。異於衆草蒿之類也。常用其莖葉及子。未見用根。其鹿麗山南謂之本黎蘆。有毒。非漏蘆也。今人以馬薊似苦莢者為漏蘆。亦非也。(蘇恭) ⑥別本言漏蘆莖大如筋。高四五尺。子房似油麻房而小。江東

人取其苗用。勝於根。江寧及上黨者佳。陶云鹿麗。蘇云木黎蘆。亦非也。漏蘆自別。(馬志) ⑦南人用苗。北土用根。乃樹生如茱萸樹。高二三尺。有毒。殺蟲。山人用以洗瘡疥。(陳藏器) ⑧葉似角蒿。今曹兌州下溼處最多。六月七月採莖日乾。黑於衆草。(韓保昇) ⑨今汴東州郡及奉海州皆有之。舊說莖葉似白蒿。花黃白。莖莖若筋。大房類油麻而小。今諸郡所闕上。惟單州者差相類。沂州者花葉頗似牡丹。秦州者花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州者花紫碧。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸。莖之根如莖背而細。又類葱本。黑色。淮南人呼為老翁花。三州所生。花雖別而葉頗相類。但秦海州者葉更作鉅齒狀。一物而殊類。如此醫家何所適從。當依舊說似單州出者為勝。又本草飛廉名漏蘆。云與苦莢相類。其根生則肉白皮黑。乾則黑如玄參。七八月採花陰乾用。所說與秦州海州所闕漏蘆花葉及根頗相近。然彼人但名漏蘆。不曰飛廉也。(蘇頌) ⑩按沈存中筆談云。

一五四四

今方家所用漏蘆。乃真飛廉也。飛廉一名漏蘆。苗似苦莢。根如牛蒡。綿頭者是也。採時用根。今閩中所謂漏蘆。莖如油麻。高六七尺。秋深枯黑如漆。採時用苗。乃真漏蘆者也。(李時珍)

【漏蘆】即飛廉之古籍別名。與見別錄。詳「飛廉」條。

【漏蘆子】 命名 本品乃附子之項細未成者。小而漏蘆故名。
古籍別名 木鼈子。(炮炙論) 虎掌。(日華)

基本 屬毛茛科。為附子之未成者。
採取 八月間採。

用法 恒以剉研和入外治藥用。

性質 苦。辛。有毒。
效能 祛風。療瘡。用作麻醉性之瘡瘍藥。

主治 惡痢。冷漏瘡。惡瘡。瘋風。
配合應用 百歲丸治一切羸弱。雜下及休息痢。用漏蘆子一個。

大者。阿膠。木香。黃連。罌粟殼各半兩。俱炒焦存性。入乳香少許為末。

樹丸。梧子大。每一歲一丸。米飲下。

(羅天益衛生寶鑑方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非實症者禁用。

參攷資料 ①南星之最小者

名虎掌。此物類之。故亦同名。大明

會典載四川成都府歲貢天雄二

十對。附子五十對。烏頭五十對。漏

藍二十斤。不知何用。(李時珍) ②

服之令人喪目。(雷斅) ③按楊士

濱直指方云。凡漏瘡年久者。復其

元陽。當用漏藍子。葷加減用之。知

不當用而輕用之。又恐熱氣乘虛

變移結核。而為害尤甚也。又按類

編云。一人兩足生瘡。臭漬難近。夜

宿五夫人祠下。夢神授方。用漏藍

子一枚。生研為末。入膩粉少許。井

水調塗。依法治之。果愈。蓋此物不

堪服餌。止宜入瘡科也。(李時珍)

【漏藍子】即木鼈子之古籍別名。

與見和漢藥考。詳『木鼈子』條。

【漏蘆】即漏蘆之處方用名。詳『

漏蘆』條。

【漏蘆苗】即漏蘆之苗。性質功用

與根同。詳『漏蘆』條。

【漏蘆根】即漏蘆之根。詳『漏蘆』

條。

【瀉麻汁】

基本 本品即久瀉
黃麻之水。

主治 止消渴。治瘧血。

【漢防己】即防己之處方用名。詳

【防己】條。

【漢麻仁】即大麻仁之古籍別名。

與見爾雅。詳『大麻仁』條。

【漢椒】即川椒之古籍別名。與見

日華諸家本草。詳『川椒』條。

【漫黎】即酸棗之古籍別名。與見

綱目。詳『酸棗』條。

【榮】係陸英不榮而實者之別名。

與見爾雅。詳『陸英』條。

【漬菜】即白菜之日本名。詳『白

菜』條。

【煇鐵石】即煇鐵石。詳『慈石』條。

【熊】 命名 熊字篆文象形。故

外國名詞 Ursus torquatus

tus Schinz. (拉丁) Bear 或

Black bear (英) クマ 或 クロ

グマ (日本)

基本 脊椎動物哺乳類有胎

盤類食肉類裂腳類熊科。

產地 生深山巖谷間。

形體 熊為獸類之一種。其體

肥滿頭大。額闊耳殼短圓。鼻端略

鈍。眼露凶光。嘴突出上唇。中央有

分裂。四肢短。後比前長。能直立。以

蹠踏地。各五趾。具鈎爪。爪不能伸

縮。尾短小。毛深密而剛硬。色黑光

澤。咽喉部有白色月形紋。體長四

五尺。穴居樹洞土窖中。冬熱春出。

晝隱夜出。覓食果實芋薯等物。其

肉可供食與藥用。



熊

性質 甘。平。無毒。

主治 風痺。筋骨不仁。功與脂

同。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食

療本草論熊肉曰。補虛羸。

參攷資料 ①有病疾。不可食

熊肉。令終身不除。(陶弘景) ②若

腹中有積聚寒熱者。食之永不除

也。十月勿食之。傷神。(張鼎) ③按

劉河間云。熊肉振羸。兔目明。因

其氣有餘。以補不足也。(李時珍)

【熊白】即熊脂之古籍別名。與見

綱目。詳『熊脂』條。

主治 小兒客忤。

【熊血】 古稱別名 熊白。(綱

目)

製法 凡取得每一斤。入生椒

十四粒。同煉。器盛收之用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 風痺不仁。筋急五臟。腹

中積聚。寒熱羸瘦。頭傷白禿。面上

疥癬。久服強志。不飢。輕身延年。(

本經) 飲食嘔吐。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】甄權藥

性本草論熊脂曰。治面上黧黯。及

疥。【唐】蘇恭新修本草論熊脂曰。

長髮令黑。悅澤人面。【宋】日華諸

家本草論熊脂曰。治風。補虛損。殺

勞蟲。酒鍊服之。

參攷資料 ①熊白乃背上肪。

色白如玉。味甚美。寒月則有。夏月

則無。其脫其肪。及身中脂。煎煉過。

亦可作藥。而不中噉。(陶弘景) ②

熊脂涼。其脂燧燈。烟損人眼。令失光明。(日華)

【熊骨】

主治 煎湯浴。歷節風。及小兒客忤。

【熊掌】

製法 以酒醋、水、同煮。即大如皮球取用。

主治 禦風寒。益氣力。作肴食之。

【熊腦髓】

主治 諸耳聾。歷代記述攷證

【宋】日華諸家本草論熊腦髓曰。療頭旋摩頂。去白禿。風屑。生髮。

【熊膽】

外國名詞 Boar-gall (英) Baresall (德)

基本 係食肉類獸熊之膽囊。產地 陳仁山藥物生產辨云。熊膽產雲南爲正地道。近日來者。以印度西藏爲多。

形體 其形如茄。外面作淡赭色。如皮革。膽口附着纖維質。內部附有金黃之細粒。若松香之粉末。蓋即膽液風乾後。留剩之體質也。

採取 冬夏兩季同採之。製法 採得以細竹片挾持膽囊。用火炙五六日。懸高處十日許。風乾。俟膽汁漸凝。乃以小板撥壓。

令扁。然後出售。

用法 恒以剉研。和作丸散用。性質 苦寒。無毒。

效能 去翳明目。殺蟲治疳。用作健胃。殺蟲。鎮瘧。與畜藥。又爲膽汁補償藥。

主治 時氣熱盛。變爲黃疸。暑月久痢。疳瘕。心痛。疝忤。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論熊膽曰。小兒驚癇瘵。癢。以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎。

甚良。【宋】大明日華諸家本草論熊膽曰。治諸疳。耳鼻瘡。惡瘡。殺蟲。【明】李時珍本草綱目論熊膽曰。退熱清心。平肝明目。去翳。殺瘧。蠲蟲。【清】黃宮櫺本草求真論熊膽曰。熊膽味苦性寒無毒。功端涼心平肝。惟其涼心。故能治心。澀疰忤。

熱邪等症。惟其平肝。所以能治目赤翳障。惡瘡痔漏等症。且能入脾而治黃疸。溼邪入大腸。而治久痢。疝瘕溼熱。并治小兒風痰壅塞。發作驚癇。要皆除熱涼血。而病自愈耳。凡此只可作丸。勿煎湯。通明者佳。性善辟瘴。撲水上投。膽少許。則塵紛然而閉。又取少許。研滴水中。

掛如線。直至水底而不散者。真。

國外學說 日本產之熊膽。有岡膽。烏膽二種。岡膽爲產於深山之熊膽。上品也。烏膽爲北海道海濱所產。熊膽有一種腥臭。品不佳。又因採製時期而有夏膽。冬膽之別。夏膽作紅黃色。能透映。蠶皮厚。膽汁少。謂之琥珀手。推爲佳品。冬膽黑色。有光澤。蠶皮薄。膽汁滿。謂之黑膽。此非佳品。又有現綠褐色者。謂之青茶手。大抵琥珀手多採於秋間。黑膽多採於春間。又夏採之琥珀手。至秋每變爲茶褐色。秋採之琥珀手。至春每變爲黑色。又一本堂藥選曰。熊膽療癉癉疔疔疔。癉癉心胸痛。腹痛。傷食腹痛。不吐。不瀉。諸癉。癉狂。瘧疾。痢疾。殺蟲。止嘔。發痘瘡。治疳疾。驚癇。疳疔。腹痛。產後腹痛。催生點眼。去翳。塗痔。止痛。一切卒患。急病。用以鼓舞元氣。開通蔽塞。前人以熊膽爲小兒藥。並救急藥。出產無多。價值殊昂。從而僞藥亦夥。往往以磁膽。猴膽。牛膽等混充。甚者竟有以植物性苦味藥。煉製越幾斯。爲魚目混珠之計。茲將僞製法並試驗法摘錄如

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽僞製法。以黃柏。山梔子。毛黃連。三味。同研粉末。先炙山梔子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用。

水仙花根汁搽過。令變色。然後用。包妥之後。揆入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。

日本僞製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。眼仆。目定。齒嚙舌。人事不知。若發瘋癲。然是名子。煽急。以真熊膽。溫水化開。灌入口中。頓頓用之。旋見蘇甦。效驗確實如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者。乃效。世稱琥珀手。爲斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗中。如一線引散者。真。其入水即旋碎。如飛者。尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用 熊膽丸。治赤目障翳。每以膽少許化開。入冰片一二片。鋼器點之。絕奇。或淚堪加生。

糧粉些須。(齊東野語方)

④ 治初生目閉。由胎中受熱也。以熊膽少許。蒸水洗之一日七八次。如三日不開。服四物加甘草。天花粉。(全幼心鑑方)

⑤ 治小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化抹之。(聖惠方)

⑥ 治十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切方不及也。(外臺秘要方)

⑦ 治腸風痔瘡。熊膽半兩。入片鱗少許。研和。豬膽汁塗之。(壽域方)

⑧ 治心腹痛。熊膽一大豆。和水服之大效。(外臺秘要方)

⑨ 治風蟲牙痛。熊膽三錢。片鱗四分。每以豬膽汁和。調少許。搽之。(攝生方)

⑩ 治水弩射人。熊膽塗之。更以雄黃同酒磨服。即愈。(斗門方)

⑪ 治諸疔毒。熊膽使君子末等分。研勻。瓷器蒸。沸餅丸。麻子大。每米飲下二十九丸。(保幼大全方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡無實熱。火者禁用。惡防已。忌地黃。

【熏黃】

蘇本 本品係雄黃之青黑色而堅者。

性質 苦。平。寒。有毒。
主治 惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥煎嗽。

【熏黃】即雄黃之古籍別名。與見綱目。詳「雄黃」條。

【燐】即玉竹之古籍別名。與見綱目。詳「玉竹」條。

【燐牛】即牛生於北方者之別名。體頗大。有黃黑赤白駁雜數色。肉之性質功用。與尋常牛肉同。詳「牛肉」條。

【瘦牛】即牛最小者之別名。產廣南內之性質功用。與尋常牛肉同。詳「牛肉」條。

【瘦子薑】即杜若之古籍別名。與見藥性。詳「杜若」條。

【瘦耳草】即竹葉細辛之別名。與見綱目。拾遺。詳「竹葉細辛」條。

【瘦耳細辛】即及己之古籍別名。與見綱目。詳「及己」條。

【瘦頭】即土菌之古籍別名。與見綱目。詳「土菌」條。

【瘦耳】即藜荷之古籍別名。與見說文。詳「藜荷」條。

【瓊瑯葡萄】

古醫別名 公領孫(拾遺)

形態 回疆志葡萄一根數本。藤甚牽長。花極細而黃白色。其實有紫白青黑數種。形有圓長大小。味有酸甜不同。一種色綠而無核。較黃豆微大。味甘美。一種色紫而小。如胡椒。即瓊瑯葡萄。一種色黑。形長寸許。一種色白而大。皆七八月熟。涼乾可致遠。

性質 甘。酸。溫。平。無毒。
主治 筋骨痠痛。能利小便。

配合應用 ① 強腎。瓊瑯葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助腎力。強壯。若臥時。磨擦腰脊。力助陽事。堅強。尤為得力。

② 稀痘。瓊瑯葡萄一錢。一錢。神黃豆一錢。一粒。杵為細末。蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北方地方物。專助東南生氣之不足也。然惟稟質素弱者。用之有益。若氣壯偏陽者。勿服。恐其助長淫火之毒也。

參攷資料 ① 本經逢原云。瓊瑯葡萄。似葡萄而瓊瑯。故名。生漠

北。南方間亦有之。其幹類木而係藤。本其子生青熟赤。乾則紫黑。能攝精氣。歸腎臟。與五味功用相近。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味為然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。

近時北人以之強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。② 五雜俎西域白葡萄生者不可見。其乾者味殊奇。甘有豉眼葡萄。無核。又有瓊瑯葡萄。形似菜菔。小兒食之。能解毒。于文定筆塵云。瓊瑯即駁之訛。③ 黎魏曾仁恕堂筆記。瓊瑯葡萄。于文定引西京羽獵賦。謂瓊瑯當為駁。駁固屬附會。而以爲別有一種。亦非河西葡萄。雖引根牽蔓。不異中土。而結實大長如馬乳。色深紫。味亦殊甘。一枝千百顆。大者在上。細者下垂。取而乾之。大者爲白葡萄。細者名瓊瑯。非兩種也。故俗呼爲公領孫。惟綠葡萄則來自西域。非中土所有。④ 按紫桃軒雜綴。瓊瑯葡萄。神農九草之一。中土久有不俟博望從西域帶來也。吾里東塔朱買臣墓有之。戊子余曾歷平

湖。尋畧有一枝。莖莖滿架。夏開

花。

果。

十四 蠶 熊 燐 燐 瘦 獐 瘡

十四畫 瑤 瑪 瑰 數 佩 碧

碎花。結實如菉豆。望不可見。吾杭
縣。山汪姓家亦有此。然食之味
薄。不若甘肅者味厚也。入藥自宜
以西北者為優。(趙恕軒)

【瑤池沙】 主治 稀痘。取沙與
小兒常食之。永不出
痘。

參攷資料 柑園雜誌。喇嗎管
進瑤池水。水香蓮。色白而重。以琉
璃器貯之。數百年不涸不變。人飲
之能療百病。康熙五十三年。遣理
藩院員外盛柱取之。自京出西寧
口。望西北行凡七千里。至星宿海。
卽世所稱火敦驪兒也。更西北行
三千里。達崑崙山。山形如桃。皆積
雪。人不能上。測影高三百餘丈。山
前名孔雀門。後名馬門。左名獅門。
右名象門。山四隅各有一山。皆低
於崑崙。孔雀門內有池。名麻蓬達
噶。華言天河也。四山之水合流於
天河。河水伏流至星宿海。復流出
入中國。去崑崙西北四五里。卽瑤
池。池匝百八十里。岸傍皆雪。水中
有五色細砂。滑膩可食。取水一瓶。
并闡山川風土而歸。往返凡二年
零六月。

【瑤桂】 卽瑤桂之說。詳「肉桂」條。

【瑪瑙】 外國名詞 Achat (德)
Agate (英)

命名 本品色頗烟紅。文理交
錯。一似馬之鬚狀。故名。

古籍別名 文石。摩羅迦錄。(綱目) 夾胎瑪瑙。(衍義)

形態 瑪瑙為石英類石類礦
物之一種。與玉髓同質。時有赤白
灰各色相間成平行層。多圓形。中
心常空洞。水晶簇生其中。品類甚
多。以研木不熟者為真。可供藥用。

性質 辛寒。無毒。
主治 辟惡。熨目赤爛。

歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論瑪瑙曰。目生瘰疔。為
末點之。

【瑰尊】 卽尊之別名。典見綱目。詳
「尊」條。

【段】 卽青玉之古籍別名。典見綱
目。詳「青玉」條。

【佩鳳蜂】 卽大黃蜂之古籍別名。
典見綱目。詳「大黃蜂」條。

【碧水龍】 卽肉蓯蓉之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「肉蓯蓉」條。

【碧玉草】 卽燈心草之古籍別名。

典見綱目。詳「燈心草」條。

【碧石青】 基本 碧石青為石
類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。
主治 益精明目。去白癢。久服
延年。

【碧竹子】 卽鴨跖草之古籍別名。
典見綱目拾遺。詳「鴨跖草」條。

【碧貝】 卽貝子之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「貝子」條。

【碧青】 卽白青之古籍別名。典見
唐本草。詳「白青」條。

【碧飛】 古籍別名 方勝板。土
錦。灰地。區。(綱目拾遺)

形態 碧飛為爬蟲類蝮蛇屬
之一種。大者粗如圍。小者粗亦
如杯。斧頭突目。鋸齒。紋方而綫色。
雄者赤紫。雌者青黑。光暉。如蠶
甲。目亦如之。夏春布絲草。人觸
之。激射。迅於矢。忽然不見。已攪
肉而去。殺人至死。霜降。絲脆。高升
樹杪。施吐。白涎。烏鴉。下啄。則吞之。
性畏鹿。豬。冬。熱地中。其肉可供藥
用。

性質 大熱。有毒。
主治 惡風。頑痺。蝮蛇傷。

一五四八

參攷資料 碧飛惟鹿以為膳。
獵獲之前。左足扼其腹中。首尾盤
繞。右足。又趾寸解。噴無餘者。人得
而腊之。可入藥。野豬亦能食之。土
人嘗冬日。蛇於地中。野豕嗅其氣。
輒翻石掘土。出而啖之。蛇性大熱。
野豬惡風。頑痺。非此猛烈積熱之
性。驅之。則肢廢者不能復舉。殆以
毒攻毒之義。而被其嚼者。還食其
肉。則生。(趙學敏)

【碧桃】 卽桃之碧色者之古籍別
名。典見綱目。詳「桃」條。

【碧海水】 命名 係海水之作
碧色者。故名。

性質 鹹。微溫。有小毒。
主治 腫脹。下宿食。

【碧犀】 卽蛇角之古籍別名。典見
綱目。詳「蛇角」條。

【碧魚】 卽鱒魚之古籍別名。典見
綱目。詳「鱒魚」條。

【碧潤】 卽茶之產於四川者之別
名。詳「茶葉」條。

【碧霞石】 基本 碧霞石為石
類之一種。可供藥用。

主治 明目去翳障。
【碧輝兒花】 卽耳環草之古籍別

名。典見綱目。詳『耳環草』條。

【碧輝花】即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【碩鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見周易。詳『鼯鼠』條。

【福果】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【福桑花】即佛桑花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【福參】即建參之別名。典見綱目拾遺。詳『建參』條。

【福橋皮】即橋皮之處方用名。詳『橋皮』條。

【福澤瀉】即澤瀉之處方用名。詳『澤瀉』條。

【種蕉薑】即薑參之古籍別名。典見蕉參新研究。詳『薑參』條。

【端】即玄參之古籍別名。典見別錄。詳『玄參』條。

【筵】即蒲扇之古籍別名。典見綱目。詳『蒲扇』條。

【箇桂皮】性質 辛溫。無毒。效驗 養精神和顏。

色。輕身延年。參攷資料 箇桂皮辛而不熱。薄而能宣。善走胸脇。不能直達下。

十四畫 碧

焦。爲諸藥之先導。故能治百病。

【割耳草】基本 割耳草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 氣壅。

【管仲】即貫衆之處方用名。詳『貫衆』條。

【管貝齒】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【管松】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【精理黃石】即理石之別名。詳『理石』條。

【緜木】命名 本品木文側戾。故名。基本 緜木爲喬木類之一種。可供藥用。

產地 生山野林澤間。性質 甘溫。無毒。

主治 風血羸瘦。補腰脚。益陽道。宜浸酒飲。

【綠子】即鼠李子之別名。詳『鼠李子』條。

命名 本品即升麻之綠色者。故名。

主治 痢疾。下傷。

碩 福 種 端 筵 箇

參攷資料 本草從新謂綠升麻。乃升麻之別一種。拾遺則云升麻色綠者佳。非另一種也。繆仲醇用治下痢。每有驗。(趙學敏)

【綠毛龜】古醫別名 綠衣使者(綱目)

產地 出南海。

形態 綠毛龜爲介類龜之一種。大者如五銖錢。背生綠色絲狀之海藻。以中有金線者爲眞。脊骨有三稜。底甲如象牙。小者徑寸。雜以金色。璀璨可玩。可供藥用。

製法 李時珍曰。劉氏先天丸用龜九枚。以活鯉二尾。安釜中。入水覆以米篩。安龜在篩上。蒸熟。取肉曬乾。其甲仍以酥炙黃。入藥用。

又有遠甲肉。頭頸俱用者。

性質 甘鹹。平。無毒。

主治 通任脈。動陽道。補陰血。益精氣。治瘵弱。

歷代記述攷證 【明】陳嘉謨本草蒙筌論綠毛龜曰。縛置額端。能禁邪滲。收藏書笥。可辟蠹蟲。

【綠白】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【綠衣使者】即綠毛龜之古籍別名。

參攷資料 本草從新謂綠升麻。乃升麻之別一種。拾遺則云升麻色綠者佳。非另一種也。繆仲醇用治下痢。每有驗。(趙學敏)

命名 本品爲豆類而色綠。故名。俗作菘豆。

割 管 精 緜 綠

名。典見綱目。詳『綠毛龜』條。

【綠李】即李之古籍別名。典見唐本草。詳『李子』條。

命名 本品爲豆類而色綠。故名。俗作菘豆。

處方用名 菘豆。

古醫別名 文豆。拔綠。摘綠。植豆。青小豆。(和漢藥考)

外國名詞 Green Bean(英)

基本 屬豆科。爲綠豆之種子。產地 凡原野間處處生焉。

形態 綠豆莖高尺餘。莢葉花莢俱類赤小豆。自夏季至冬季不絕結實。將其早熟者再種之。至秋季已復結實。故日本有八重生之別名。八重即重疊意。其實爲外面綠色。或褐綠色之種子。似赤小豆而小。

種類 莢粒粗而色鮮綠者爲官綠。其皮薄而粉多。莢粒小而色褐綠者爲油綠。其皮厚而粉少。早種者爲摘綠。蓋謂可摘摘也。遲種者爲拔綠。蓋謂一拔而已也。

種植 三四月下種。田園間恆多栽植。

參攷資料 本草從新謂綠升麻。乃升麻之別一種。拾遺則云升麻色綠者佳。非另一種也。繆仲醇用治下痢。每有驗。(趙學敏)

命名 本品爲豆類而色綠。故名。俗作菘豆。

處方用名 菘豆。

一五四九

採取 夏秋兩季採之。

製法 馬志曰。凡使綠豆。以四

小者佳。粉作餌。食之良。大者名

積豆。苗子相似。亦能下氣。治霍亂

除穢器。用之宜速。皮去。皮則令

人少瘧氣。蓋皮寒而肉平也。

用法 水煮或搗到用。

性質 甘寒。無毒。

效能 消積熱。解百毒。

主治 養食消腫。下氣。壓解熱

毒。生研絞汁服。治丹毒。煩熱。風痧

藥石發動。熱氣奔豚。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論綠豆曰。補益元氣。和調

五臟。安精神。行十二經脈。去浮風

潤皮膚。宜常食之。煮汁能止消渴。

【唐】孫思邈千金翼論綠豆曰。治

寒熱。熱中。止泄痢。卒辟利。小便脹

滿。【宋】日華諸家本草論綠豆曰。

厚腸胃。作枕能明目。治頭風頭痛。

除吐逆。【明】寧原食鑑本草論綠

豆曰。解一切藥草牛馬金石諸毒。

【明】李時珍本草綱目論綠豆曰。

治痘毒。利腫脹。【明】繆希雍本草

經疏論綠豆曰。菘豆味甘氣寒無

毒。入足陽明經。夫丹石之藥。氣悍

而性熱。多服則火動。上升為煩熱。

甚則口鼻出血。狂悶躁擾。甘寒能

除熱下氣。解毒。故主服丹石藥人

毒發煩熱也。陽明客熱。則發出風

痧。以胃主肌肉。熱極生風。故也。解

陽明之熱。則風痧自除。脹滿者。溼

熱侵於脾胃也。熱氣奔豚者。溼熱

客於胃經也。除溼則腫消。壓熱則

氣下。益脾胃而腎邪亦自平也。孫

思邈主寒熱熱中。止泄痢。卒辟利

小便脹滿。日華子主厚腸胃。作枕

明目。治頭風頭痛。益氣除熱。毒風

孟詵主去浮風。益氣力。治消渴。和

五臟。安精神。可常食之。功效不可

備述。【清】黃宮繡本草求真論綠

豆曰。菘豆味甘性寒。據書備極稱

善。有言能厚腸胃。潤皮膚。和五臟

及資脾胃。按此雖用參芪歸朮。不

是過也。第書所言。能厚能潤。能和

能資者。緣因毒邪內熾。凡臟腑經

絡皮膚脾胃。無一不受毒擾。服此

性善解毒。故凡一切癰腫等症。無

不用此奏效。煮汁則止消渴。磨粉

合以乳香丹砂。則能護心使毒不

入。築枕夜臥。則能明目疎風。杖瘡

疼痛。則用雞子白調敷。即愈。皮尤

涼於菘豆。退翳明目如神。粉撲痘

潰尤妙。有除熱解毒之功。而無補

益資助之力。且與樛子相反。同食

則殺人。【清】王士雄隨息居飲食

譜論綠豆曰。綠豆甘涼。養食清肺

養胃。解暑止渴。瀉皮膚。消浮腫。利

小便。已瀉痢。析醒疳疫。浸髮發芽

摘根為蔬。味極清美。生研絞汁服

解一切草木金石諸藥牛馬肉毒。

或急火煎清湯冷飲。亦可。

配合應用 扁鵲三豆飲。治

天行痘瘡。預服此飲。疎解熱毒。縱

出亦少。用綠豆。赤小豆。黑豆一

升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。

任意食。豆飲汁七日乃止。一方加

黃大豆。白大豆。名五豆飲。

治痘後癰毒。初起以三豆苻

治之神效。綠豆赤小豆黑豆等

分爲末。醋調。時時掃塗。即消。【醫

學正傳方】

治防痘入眼。用綠豆七粒。令

兒自投井中。頻視七遍乃還。【全

幼心鑑方】

治小兒丹腫。綠豆五錢。大黃

二錢爲末。用生薄荷汁入蜜調塗。

（全幼心鑑方）

治赤痢不止。以大麻子水研

濾汁。煮綠豆食之。極效。粥食亦可

（必效方）

治老人淋痛。青豆二升。橘皮

二兩。煮豆粥。下麻子汁一升。空心

漸食之。併飲其汁甚驗。【養老書

方】

治消渴飲水。綠豆煮汁。並作

粥食。【普濟方】

治心氣疼痛。綠豆廿一粒。胡

椒十四粒。同研。白湯調服。即止。

治多食易餓。綠豆黃麥糯米

各一升。炒熟磨粉。每以白湯服一

盃。三五日見效。

十種水氣。用綠豆二合。半。大

附子一匳。去皮。切作兩片。水三

碗。煮熟。空心臥時食。次日將附

子兩片作四片。再以綠豆二合。半

如前煮食。第三日別以綠豆附子

如前煮食。第四日如第二日法。煮

食。水從小便下。腫自消。未消再服。

忌生冷毒物。鹽酒六十日。無不效

者。【朱氏集驗方】

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無熱毒者禁用。

反樛子。忌鯉魚。

參攷資料

●綠豆肉平。皮寒。解金石砒霜草木一切諸毒。宜連皮生研。水服。按夷堅志云。有人服附子酒多。頭腫如斗。唇裂血流。急求綠豆。黑豆各數合。嚼食。并煎湯飲之。乃解也。(李時珍) ●綠豆處處種之。三四月下種。苗高尺許。葉小而毛。至秋開小花。莢如赤豆。莢粒粗而色鮮者為官綠。皮薄而粉多。粒小而色深者為油綠。皮厚而粉少。早種者呼為摘綠。可類病也。遲種呼為拔綠。一拔而已。北人用之甚廣。可作豆粥。豆飯。豆酒。燒食。製食。磨而為麪。澄濾取粉。可以作餌。饋邊皮。搓索。為食中要物。以水浸溼。生白芽。又為菜中佳品。牛馬之食。亦多賴之。真濟世之良穀也。(李時珍)

【綠豆皮】

性質 甘寒。無毒。
主治 解熱毒。退目

【綠豆花】

主治 解酒毒。

【綠豆芽】

性質 甘平。無毒。
主治 解酒毒。熱毒。

利三焦。

參攷資料

諸豆生芽。皆腥羶不堪。惟此豆之芽。白美獨異。今人視為尋常。而古人未知者也。但受溼熱鬱遏之氣。故頗發疔動氣。與綠豆之性。稍有不同。(李時珍) ●綠豆青。即曲節草之古籍別名。典見圖經本草。詳曲節草條。 ●綠豆粉。性質 甘涼。平。無毒。解酒食諸毒。治發背。癰疽。瘡腫。及湯火灼傷。

歷代記述攷證

【明】寧原食鑑本草論綠豆粉曰。痘瘡溼爛。不結痂疔者。乾撲之良。【明】汪穎食物本草論綠豆粉曰。解孤菌。砒毒。【明】李時珍本草綱目論綠豆粉曰。新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒死。心頭尚溫者。【明】繆希雍本草經疏論綠豆粉曰。蒸豆粉所稟氣味。與蒸豆同。故能解諸熱及酒食毒。湯火傷灼也。發背。癰疽。瘡腫。皆熱毒所致。甘寒解陽明之熱。則毒氣不至犯胃。而嘔惡。腸胃清涼。而諸腫散矣。熱傷氣。除熱故能益氣也。

施用宜忌 蒸豆粉性涼。脾胃

參攷資料

●勿近杏仁。則爛不能作索。(吳瑞) ●綠豆色綠。小豆之屬木者也。通於厥陰。陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同赤豆。而壓熱解毒之力過之。且益氣厚腸胃。通經脈。無久服枯人之忌。但以此作涼粉。造豆酒。或偏於冷。或偏於熱。能致人病。皆人所為。非豆之咎也。豆粉須以綠色黏膩者為真。外科治癰疽。有內托護心散。極言其神效。丹溪朱氏有論發揮。(李時珍) ●外科精要謂內托散。一日至三日。進十數服。可免毒氣內攻。臟腑。切詳綠豆解毒。治石毒。味甘入陽明。性寒。能補。為君。以乳香去惡腫。入少陰。性溫。善竄。為佐。甘草性緩。解五金八石百藥毒。為使。想北方專為服丹石發疽者。設也。若夫年老者。病深者。證備者。體虛者。綠豆雖補。將有不勝其任之患。五香速翹湯。亦非必用之劑。必當助氣壯胃。使根本堅固。而行經活血。為佐。參以經絡時令。使毒氣外發。此則內托之本意。治施之早。可以內消也。(朱實亨)

【綠豆莢】

主治 赤痢。經年不愈。蒸熟隨意食之。

【綠豆粥】

基本 本品係綠豆和米煮成之粥。

主治 解熱毒。止煩渴。

【綠豆葉】

主治 霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。

【綠青】

命名 本品乃山之陰。石生銅坑中。其色綠青。或黑綠。故名。

處方用名 石綠。

古醫別名 大綠泥綠。(綱目)

國外學說 *Chlorite* (英)

基本 係金屬礦石類。為銅礦中綠色之塊粒或粉末。

產地 凡山谷之銅礦中恒有

生焉。

形態 綠青為淡綠色之塊粒

或粉末。不溶於水。溶於酸液中。則

成青綠色之溶液。

種類 ●質堅硬如石塊者。名

石綠。為上品。●質脆爛如碎土者。

名泥綠。為下品。

製法 採得淘取淨綠用。

用法 研細為末。和作丸散。或

入水或化。和作外傳藥。

十四畫 綠

性質 苦。酸。有小毒。

成分 主要成分爲鹽基性醋酸銅及亞砷酸之毒物等。

效能 吐風痰。治疥癬。專作皮膚病之殺蟲藥。又治黃癬。

作用 能使微血管收縮。減少黏膜之分泌。過疥癬等菌。皆能殺死之。

主治 益氣。止洩痢。療鼠鼻。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論綠青曰。吐風痰甚效。

配合應用 治急驚昏迷。不省人事。石綠四兩。輕粉一錢。爲末。薄荷汁入酒調一字服。取吐。(全嬰方)

治風痰迷悶。碧霞丹。用石綠十兩。烏頭尖。附子尖。蠟梅各七十箇。爲末。糊丸。芥子大。每服一九。薄荷汁入酒半合化下。吐出痰涎。甚效驗。(和劑局方)

治小兒疳積。腎疳。鼻疳。頭疳。耳疳。久不差者。石綠。白芷等分。爲末。先以甘草水洗瘡。拭淨。傅之一日。愈。(集玄方)

治腋下胡臭。石綠三錢。輕粉

一錢。濃醋調塗五次。斷根。(集玄方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料 今醫家多用吐風痰。其法揀上色精好者。研篩水飛。再研如風痰眩悶。取二三錢。同生龍腦三四豆許。研勻。以生薄荷汁。合酒溫調服之。偃臥須臾。涎自口角流出。乃愈。不嘔吐。其功速於他藥。今人用之。比比皆效。故著之。

(蘇頌) 痰在上宜吐之。在下宜利之。亦須觀人之虛實強弱而察其脈。乃可投之。初虞世有金虎碧霞之戒。正此意也。金虎丹。治風痰。用天雄。膩粉諸藥者。(李時珍) 按此味善吐風痰。以其爲銅之祖氣。取金氣之精。能使水平者。莫是過也。合龍腦名碧霞散。不可以治溼痰。惟同附子尖。烏頭尖。蠟梅用者。名碧霞丹。乃可治之。中風之痰。風溼有異。此陽中陰中之分也。世人憤憤者多。(楊時泰) 舊不著所出州土。但云生山之陰穴中。次空青條上云。生益州山谷。及越雋

一五五二

兩兩相對。大如木瓜。綠色。春生夏熟。其子實可供藥用。

性質 大毒。

主治 腐骨碎齒。外科方術家用之。

參攷資料 綠益子人不可食。誤食之入口。卽齒落如屑。舌黑如漆。滿口裂碎。血出如水。終日不能食。經旬方止。又能碎骨如泥。彼處藥師初生。取以潤其蹄。則千里可行。否則不能行。其性剛利如錐。舉而刺之。利如刀鋸。凡作角器必用此。(趙學敏)

【綠茶】卽茶葉之一種。詳「茶葉」條。

【綠袍草】卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【綠梅花】卽梅花之處方用名。詳「梅花」條。

【綠結】卽伽楠香色如鴨頭綠者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

【綠葉綠花草】卽澤漆之古籍別名。典見綱目。詳「澤漆」條。

【綠葡萄】卽葡萄之實綠色者之別名。詳「葡萄」條。

山有銅處。此物當是生其山之陰。爾今出韶州信州。其色青白。重工用爲綠色者。極有大塊。其中青白。花文可愛。信州人琢爲腰帶器物。及婦人服飾。其入藥當用顆塊。如乳香者最佳。(蘇頌) 石綠。陰石也。生銅坑中。乃銅之祖氣也。銅得紫陽之氣而生綠。綠久則成石。謂之石綠。而銅生於中。與空青。曾青同一根源也。今人呼爲大綠。范成大桂海志云。石綠。銅之苗也。出廣西古江有銅處。生石中。質如石者。名石綠。一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠石。鑄淘淨綠一十一兩四錢。暗色綠。每礦一斤。淘淨綠一十兩八錢。砂砂一斤。燒造硝砂綠一十五兩五錢。(李時珍)

【綠枋】卽梓枋之古籍別名。典見日用本草。詳「梓枋」條。

【綠奈】卽蘋果色青者之古籍別名。典見綱目。詳「蘋果」條。

【綠益子】 產地 出遼東諸地。形態 綠益爲喬木類之一種。樹高丈餘。其葉兩兩相對。開花大如盞。色黃。花落結實。亦

【綠鳩】即青鷓之古籍別名。典見動物學大辭典詳「青鷓」條。

【綠劍真人】即青蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青蒲」條。

【綠膚青】古籍別名。推青。推石(別錄)。

基本 綠膚青為雜草類之一種。可供藥用。

產地 生山谷間。

性質 辛。鹹。平。無毒。

主治 蟲毒瘡。及解蛇菜肉諸毒。

參攷資料 綠膚青不可久服。令人痿。別錄。

【綠萼梅】即梅花之處方用名。詳「梅花」條。

命名 本品可以染皂色。故又謂之皂礬。

古籍別名 青礬。綠礬。(唐本)。

紫紅皂礬(綱目)青明礬。皂莢礬。(和漢藥考)。

外國名詞 Green Vitriol (英) Eisen-vitriol (德)。

基本 係鐵礦類結晶。為鐘乳形或繡形之塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

十四畫 綠

青礬又名煉綠礬。西藥名磺鐵。化學名鐵礦。輕養。鐵養。硫養。黃鐵。東各屬。均有此礬。用鐵質與黃鐵水製成者。又有用黑礬煉出者。結冰色。淡綠。而遇光露空氣略化。和漢藥考曰。日本備中及長門都產此。

形態 綠礬為淡綠色稜柱狀結晶體。放置空氣中則養化。於表面生黃褐色銹。入水善溶。入酒精不溶。熱之則分解生鐵丹。味酸。澀。微甘。刺戟舌。

製法 注水於天產黃鐵礦。放置空氣中。使之養化。將所化生者。再溶於水中。過濾。將濾液蒸發。使成結晶。即為本品。現時乃金銀精煉處之副產物。將其精製即可。

性質 酸。涼。無毒。

成分 綠礬為粗製硫酸鐵(Fe₂SO₄H₂O)。其黃褐色銹。為第二硫酸鐵(Fe₂(SO₄)₃。綠礬中時含有硫酸銅(Cu₂SO₄H₂O)。

作青綠色結晶體。

效能 燥溼。化痰。功瀉白礬。用作蝕腐及止血藥。又為強壯藥。但易起消化障礙。又治貧血。創口出

血。

作用 入胃後與胃內之鹽酸化合。而成氯化鐵。或與蛋白化合。而成蛋白質。至小腸首段。鐵即化成為酸鐵。而次第被腸壁吸收。收時又能阻止腸黏膜之分泌。故久服有釀成大便燥結之弊。在血中能增進赤血球之數。使全身熱量增高。精神健康。體力強壯。若服量過多。則反惹起腸胃炎。與血液相遇。有直接凝固血液之功效。亦甚迅速。

主治 疝及諸瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論綠礬曰。喉痺。牙疳。疔瘡。疥癬。魚鱗。魚燒。灰。瘰。瘰。風。瀉。血。【明】李時珍本草綱目論綠礬曰。消積滯。燥脾溼。化痰。除脹。滿。黃腫。癰。利。風。眼。口。齒。諸。病。【明】經。希。雅。本。草。經。疏。論。綠。礬。曰。綠。礬。氣。味。所。稟。與。白。礬。同。其。酸。溼。收。燥。溼。解。毒。化。涎。之。功。亦。與。白。礬。相。似。而。力。差。緩。本。經。主。喉。痺。者。酸。溼。化。涎。之。功。也。疔。牙。口。瘡。惡。瘡。疥。癬。者。燥。溼。除。熱。解。毒。之。功。也。腸。風。瀉。血。者。消。散。溼。熱。之。後。復。有。收。澀。之。功。也。然。而。諸。治。之。外。又。善。消。積。滯。不。能。化。者。以。紅。礬。同。健。脾。消。食。藥。為。丸。投。之。輒。消。胃。弱。人。不。宜。多。用。服。此。者。終。身。忌。食。蕎。麥。犯。之。立。斃。

國外學說 日本學說謂綠礬為消毒作用極強之鐵劑。亦可為腐蝕藥。止血藥。其稀薄液用為收斂藥。作軟膏用於丹毒。癩。癬。膿。疹。梅毒潰瘍。作注射料用於淋病。白帶。又可用為浴料。若內服過久。則害消化。若用大量則發腸胃炎。

通常用爲收斂藥。治慢性腸加答兒腸出血。尿道出血。肺出血等。用綠以五・〇一〇・〇溶於一〇〇・〇水內。可爲藥法料。以〇・五一二・〇溶於一〇〇・〇水內。可作注射料。以一・〇與五・〇獸脂相和。可作軟膏。以三〇・〇一五〇・〇可爲全身浴料。內服每次〇・〇五一〇・二五。又英美學說謂青礬有從鐵質與碳強水製成。更有從黑礬煉成。露空氣則略化。印度國人俱用此質造墨水。古時羅馬人亦言此質能造墨。其天生者亦有之。俗名皂礬。其作用爲惹胃而兼收斂之鐵劑。又可爲行經藥。其補斂於鐵劑中爲上品。如血弱身虛者宜服。第不宜過服多服。以過服則肚疼作嘔。或至壞身。又如血少面白者宜合龍膽草膏。及蘆薈硫磺等藥作丸服之。其驗或以青礬水化。並加礦強水少許同服均妙。此藥雖與他類鐵劑。功用相同。然能惹腸胃。單服者甚少。處方以青礬一分二釐。啞磁一分二釐。肉桂末三分二釐。以水和勻。作丸八粒。每日飯後服二

粒。治身弱血少心跳。及婦人月經不行等症。(青礬丸方)又青礬五釐二毫半。水一兩。化勻爲度。洗火眼。或作射水亦可。并治白帶。白濁。(青礬洗水方)又青礬一分。黃油存三十分。以調勻爲度。治金錢癬。(青礬油膏方)每服一釐七毫半。至八釐七毫半。

近人學說 鄒爾凱曰。綠礬產天然之礦物。或溶鐵於硫酸之中。或燒黃鐵礦後。使爆於空中製之。呈綠色之結晶。故名綠礬。又名皂礬。或稱青礬。化學記號爲 Fe_2O_3 。故又名硫酸鐵。味酸鹹而帶澀。古書謂能收痰。除溼。殺蟲。破血。分積垢。近代西醫則多用爲補血劑。工業上常用爲製墨水之顏料。易溶於水。不溶於酒精。其主要成分。既爲鐵質。則爲補血劑無疑。惟含鐵質之藥品甚多。綠礬乃其劣等。故醫藥上不見常用。(市上售者不良。西藥房有精製者)又綠礬之用。不能過多。通常以二釐至五釐爲止。如服過量。則起嘔吐。與腹痛等。及古人所謂除痰破血者。也。大凡服鐵質之藥。入胃後

即共胃酸發生變化。然後破入血中。惟患熱病者。消化不良者。則不宜用之。又綠礬與五倍子混和。可得良好之顏料。綠礬之配合和適應症。(一)綠礬二釐。大黃末一分。肉桂五釐。作一次服。日服三次。凡身弱。血少。心跳。及因血虛而致月經不調者宜之。(二)綠礬三分。金雞納霜三分。黃連末五分。研和合。成丸。藥十五粒。每日早晚午各服一粒。爲血虛之補劑。(三)綠礬五釐。冷開水一兩。化勻。患火眼者。每日用此水洗滌二次。因綠礬有收斂及防腐之功也。(四)綠礬石灰木炭末各一斤。混和之。夏秋之間。隨意撒於便所。痰孟。陰溝等處。能使臭氣消滅。可爲臭藥水之代替品。

配合應用 ①治重舌木舌。皂礬二錢。鐵上燒紅研搽之。(陸氏積德堂方) ②治喉風腫閉。皂礬一斤。米醋三斤。拌曬乾末吹之。痰涎出盡。用良薑末少許。入茶內。漱口。嚥之。即愈。(孫氏集效方) ③治眼暴赤爛。紅棗五箇。入綠礬在內。火煨熟。以河水井水各一盞。桃柳心各七個。煎。每點少許入背上。(精玄方) ④治爛弦風眼。青礬火煨出毒。細研。泡湯。澄清點洗。亦治倒睫。翳毛。(永類鈴方) ⑤治瘧疾寒熱。礬紅。獨蒜頭煨等分。搗丸。次子大。每白湯嚼下一丸。端午日合之。(普濟方) ⑥治少陰瘧疾。嘔吐。綠礬一錢。乾薑炮。半夏夏。製半兩。爲末。每服半錢。發日早。以醋湯下。(聖濟總錄方) ⑦治翻胃吐食。白麴二斤。牛。蒸作大饅頭一個。頭上開口。剗孔。將皂礬填滿。以新瓦圍注。鹽泥封固。空土窩。安放。文武火燒一日。夜取出。研末。取肉爲丸。梧子大。每服二十九。空心酒湯任下。忌酒色。(醫方摘要方) ⑧治大便不通。皂礬一錢。巴霜二個。同研。入雞子內。攪勻。封頭。濕紙裹。煨熟食之。酒下。即通。(集玄方) ⑨治腸風下血。積年不止。盧弱菴者。一服取效。綠礬四兩。入砂鍋

內。新瓦蓋定。鹽泥固濟。煨赤。取出。入青鹽。生硫黃各一兩。研勻。再入鍋中。固濟煨赤。取出。去火毒。研入熟附子末一兩。粟米粥糊丸。梧子大。每空心米飲。溫酒任下。三十丸。
(永類鈴方)

⑤治婦人血崩。青礬二兩。輕粉一錢。爲末。水丸。梧子大。每服三十丸。新汲水下。(摘玄方)

⑥治血證黃腫。綠礬四兩。百草霜一升。炒麴半升。爲末。沙糖和丸。梧子大。每服三四丸。食後。下。鄭時舉所傳。又方。小麥淘淨一升。皂礬半斤。同炒黃爲末。黑斑肉半斤。搗勻。米醋打糊丸。梧子大。每煎湯下八九十九丸。日三服。(簡便方)

⑦治脾病黃腫。青礬四兩。煨成赤珠子。當歸四兩。酒醉浸七日。焙百草霜三兩。爲末。以浸藥酒打糊丸。梧子大。每服五丸。至七丸。溫水下。一月後。黃去正效。又方。綠礬四兩。百草霜五倍子各一兩。木香一錢。爲末。酒煎飛麩丸。梧子大。每空心酒下五丸。又方。平胃散。青礬二兩。爲末。醋糊丸。米飲下。或加烏沉

湯四兩。酒糊丸亦可。(潔古方)

⑧治酒黃水腫。黃腫積痛。用青礬半斤。醋一大盞。和勻。瓦盆內煨乾。爲度。平胃散。烏藥順氣散各半兩。爲末。醋煮糊丸。梧子大。每酒或煎湯下二三十丸。不忌口。加鍋灰。

(趙原楊真人濟急方)

⑨治食勞黃病。身目俱黃。青礬鍋內安炭煨赤。米醋拌爲末。棗肉和丸。梧子大。每服二三十丸。食後煎湯下。(救急方)

⑩治腹中食積。綠礬二兩。研末。醋一大盞。瓷器煎之。柳條攪成膏。入赤脚烏一兩。研丸。綠豆大。每空心溫酒下五丸。(聖惠方)

⑪治疳蟲食土及生物。研綠礬末。豬膽汁丸。綠豆大。每米飲下五七丸。(保幼大千方)

⑫治小兒疳氣。不可療者。綠礬煨赤。醋淬三次。爲末。棗肉和丸。綠豆大。每服十九丸。溫水下。日三。(集驗方)

⑬治走馬疳疔。綠礬放入鍋內。炭火煨紅。以醋拌勻。如此三次。爲末。入麝香少許。溫漿水漱淨。搽之。(談野翁試效方)

⑭治白禿頭瘡。皂礬。棟樹子燒研。探之。(普濟方)

⑮治小兒頭瘡。綠礬一兩。淡鼓一兩。炒黑。膩粉二錢。研勻。以桑灰湯洗淨。搽之良。

⑯治小兒甜疔。大棗去核。填入綠礬。燒存性。研貼之。(拔毒方)

⑰治耳生爛瘡。瓊子去核。包青礬。研香油調傅之。(摘玄方)

⑱治蠅蚩入耳。水調綠礬灌之。(普濟方)

⑲治蛆入耳中。綠礬搽之。卽化爲水。(摘玄方)

⑳治瘡中生蛆。綠礬末。搽貼卽化爲水。(摘玄方)

㉑治湯火傷灼。皂礬和涼水澆之。其疼卽止。腫亦消。(楊誠經驗方)

㉒治癬瘡作痒。螺螄十四個。槓樹皮末一兩。入盤內。蒸熟。入礬紅三錢。搗勻。搽之。(孫氏集效方)

㉓治甲疽疔。延爛。崔氏方。治甲疽或因割甲傷肌。或因甲長侵肉。遂成癰腫。黃水浸淫。相染。五指俱爛。漸上脚。趾。泡葉四邊。起如火燒。瘡日夜怪。醫不能療。綠礬石五兩。

燒至汁盡。研末。色如黃丹。收之。每以鹽湯洗拭。用末厚傅之。以軟帛煨裹。當日卽汁斷。瘡乾。每日一週。鹽湯洗滌。有膿。處使淨。傅。其疔乾。處不須近。但有急痛。處。塗。少許。令潤。五日。卽覺上疔起。依前洗。傅。十日。疔漸剝。盡。軟。處。或更生。白膿。泡。卽擦。破。傅。之。自然。癒。也。張。侍。郎。病。此。臥。經。六。十。日。京。醫。並。處。方。無。效。得。此。法。如。神。(外。臺。秘。要。方)

㉔治婦人甲疽。婦人趾甲內生瘡。惡肉突出。久不愈。名臭田。用皂礬。日。晒。夜。露。每。以。一。兩。煎。湯。洗。仍。以。礬。末。一。兩。加。雄。黃。二。錢。硫。黃。一。錢。乳。香。沒。藥。各。一。錢。研。勻。搽。之。(醫。方。摘。要。方)

㉕治塗染白髮。綠礬。薄荷。烏頭。等分。爲末。以鐵漿水浸。日。日。染。之。(相感志方)

㉖治腋下胡氣。綠礬。半。生。半。煨。爲末。入少。輕粉。以半。錢。浴。後。薑。汁。調。搽。候。十。分。熱。痛。乃。止。(直。指。方)

㉗用。量。五。分。至。錢。半。
㉘施。用。宜。忌。凡。脾。胃。虛。寒。及。無。積。滯。者。禁。用。

㉙參。攷。資。料。①綠。礬。酸。滴。滴。收。

十四鹽 綠 綢 綸 綻 綽 綿 緊

燥溼解毒。化涎之功。與白礬同而力差緩。按張三丰仙傳方載伐木丸云。此方乃上清金蓮頭祖師所傳。治脾土衰弱。肝木氣盛。木來尅土。病心腹中滿。或黃腫如土色。服此能助土益元。用蒼朮二斤。米泔水浸二宿。同黃酒麩麩四兩。炒赤色皂礬一斤。醋拌晒乾。入瓶火煨為末。醋糊丸。梧子大。每服三四十丸。好酒米湯任下。日二三服。李時珍常以此方加平胃散。治一晝夜中滿腹脹。果有效驗。蓋此礬色綠味酸。燒之則赤。既能入血分。伐木又能燥溼。化涎。利小便。消食積。故脹滿黃腫。瘧痢疴疾。往往用之。其源則自張仲景用礬石消石。治女勞黃疸方中變化而來。頌曰。劉禹錫傳信方治喉痺。用皂莢礬入好米醋同研。含之。噦汁立瘥。此方出於李時珍。甚奇妙。皂莢礬即綠礬也。(李時珍) 綠礬可以染皂色。故謂之皂礬。又黑礬亦名皂礬。不堪服食。惟瘡家用之。赤者俗名礬紅。以別朱紅。(李時珍) 綠礬出隰州溫泉縣。池州銅陵縣。並煎礬處。生焉。初生皆石也。煎煉乃成。其

形似朴硝而綠色。取置鐵板上。聚炭燒之。礬沸流出。色赤如金汁者。是真也。沸定時汁盡。則色如黃丹。又有皂莢礬。或云即綠礬也。(蘇頌) 綠礬新出窟未見風者。正如琉璃色。人以爲石膽。燒之赤色。故名綠礬。出瓜州者良。(蘇恭) 綠礬晉地。河內。西安。沙州。皆出之。狀如煨消。其中揀出深青鑿淨者。即爲青礬。煨過變赤。則爲綠礬。入坊塲及漆匠家多用之。然質者亦雜以沙土爲塊。昔人往往以青礬爲石膽誤矣。(李時珍) 綠礬。即細辛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「細辛」條。

【綠礬】即礬。綠色者之古籍別名。典見綱目。詳「礬」條。
【綢】即昆布之古籍別名。典見爾雅。詳「昆布」條。
【綸】即昆布之古籍別名。典見爾雅。詳「昆布」條。
【綻】即昆布之古籍別名。典見吳普本草。詳「昆布」條。
【綽】即穀芽之處方用名。詳「穀芽」條。
【綿菜】即睡菜之古籍別名。典見綱目。詳「睡菜」條。
【綿】即絲綿之原名。詳「絲綿」條。
【綿大戟】即大戟之處方用名。詳「大戟」條。
【綿灰】主治 吐血衄血。下血崩中。赤白帶下。疔瘡。臍疔。瘰癧耳。
【綿羊】即羊之一種。肉之功用。詳「羊肉」條。
【綿杜仲】即杜仲之處方用名。詳「杜仲」條。
【綿香】即黃香之古籍別名。典見綱目。詳「黃香」條。
【綿桃】即桃之古籍別名。典見綱目。詳「桃」條。

【綿菌陳】即茵陳蒿之處方用名。詳「茵陳蒿」條。
【綿梨】即梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。
【綿絮頭草】 古籍別名 金 子草。(綱目拾遺) 產地 生山野間。形態 綿絮頭草爲山草類之一種。立春後發苗。布地生葉。葉似慣火而薄。有白毛。並有白絲。色青白。質堅韌。氣清香。立夏後開黃花成簇。一莖直上。本小如剪刀草。其莖葉可供藥用。性質 酸寒。有小毒。
主治 囊風溼痺。梅毒下疳。同甘草煎洗。並療小兒疳疾。搽粉作餵食。
參攷資料 綿絮頭草多食損目。(趙學敏)
【綿黃香】即黃香之處方用名。詳「黃香」條。
【綿橘】即橘子微小而軟美可愛者之古籍別名。典見橘譜。詳「橘子」條。
【緊骨香】即紅木香之古籍別名。

與見綱目拾遺。詳「紅木香」條。

【緋帛】

命名 本品係用染絲造成之帛。即紅色之絹也。故名。

主治 燒研傅初生兒臍未落時腫痛。又癩惡瘡疔腫諸瘡。有根者入膏用爲上。仍以掌大一片。用露蜂房。棘刺鉤。烟草節。亂髮等分。燒研。空腹服方寸匕。

歷代記述攷證 【元】王好古湯液本草論緋帛曰。主墜馬。及一切筋骨損。【明】李時珍本草綱目論緋帛曰。燒研。療血崩。金瘡出血。白駁風。

【緋桃】

即桃之古籍別名。典見綱目。詳「桃」條。

主治 燒灰服。療瘡疾。

【翠羽草】

命名 本品葉細。攪簇如羽狀。而有翠斑。故名。

古籍別名 翠雲草。孔雀花。神錦花。鸚鵡草。鳳尾草。矮脚鳳尾。翠翎草。金雞獨立草。綱目拾遺。開屏鳳尾。綱目拾遺。

產地 生山野陰溼諸地。

形態 翠羽草爲溼草類之多。年生隱花植物。獨莖成叢。無直梗。其莖細長。倒懸或平鋪於地。其根遇土即生。見日即萎。故生陰溼之地。採得可供藥用。

主治 止吐血。散喉風。辟暑邪。解火毒。同胡桃葉煎。洗痔漏。

參攷資料 翠羽草爲散喉癰之聖藥。採藥志。嘉慶癸亥。予寓西溪。吳氏家次子。年十五。忽腹背患起紅癩。蔓延及腰。如帶。或云蛇纏。或云丹毒。乃風火所結。血凝滯而成。予疑其入山樵。採藥毒。乃以蟾酥。犀黃。銕塗之。不效。二三日。瘰愈大。作膿。復與以如意金黃散。敷之。亦不效。次日。瘡旁復起紅暈。更爲闊大。有老嫗。教以用開屏鳳毛。即翠雲草也。搗汁塗上。一夕立消。此草解火毒如此。又不特治血神效也。綱目拾遺。

翠梅草 即毛葉仙橋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「毛葉仙橋」條。

翠翎草 即金鳳毛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金鳳毛」條。

即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【翠蛇】

形態 翠蛇爲爬蟲類。蛇屬之一種。長達五六寸。形如曲蟻。蟻旋作圈。可供藥用。

主治 癰疽。疔毒。

翠鳥舌 即魚狗舌之原名。詳「魚狗舌」條。

翠雲草 即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

翠碧鳥 即魚狗之古籍別名。典見綱目。詳「魚狗」條。

翠穎 即檄檄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檄檄」條。

【翡翠】

產地 出越南等處。

形態 翡翠爲水禽類之一種。形如魚狗。稍大。常在水畔作穴而居。亦巢於木。前身翡翠。後身翠。如鸚鵡。翠雁。翠之狀。或謂雄爲翡翠。雌爲翠。色多青。可供藥用。

主治 功用同魚狗肉。

聚藻 水藻之一種。產於淡水中。多年生草本。葉又狀分裂。或二回。或三回。其裂片細長而尖。有小鋸齒。形花小。單性。生於葉腋。金魚好生卵於此。性質功用與水藻同。詳

水藻 條。

腐 即豆腐之簡稱。詳「豆腐」條。

腐巴 即腐肥。

腐皮 即豆腐皮之簡稱。詳「豆腐皮」條。

腐乳 即豆腐乳之簡稱。詳「豆腐乳」條。

腐沫 即豆腐沫之簡稱。詳「豆腐沫」條。

腐泔 即豆腐泔水之簡稱。詳「豆腐泔水」條。

腐把 即豆腐把之簡稱。詳「豆腐把」條。

腐婢 即赤豆花之原名。詳「赤豆花」條。

腐渣 即豆腐渣之簡稱。詳「豆腐渣」條。

腐腸 即黃芩之古籍別名。典見本經。詳「黃芩」條。

腐漿 即豆腐漿之簡稱。詳「豆腐漿」條。

腦脂 原名 海狗油。形態 腦脂。色綠。狀如乾糊。可供藥用。

性質 熱。無毒。

主治 善降三焦瀉逆之氣。能

十四卷 緋 翠 翡 聚 腐 腦

十四畫 臘

清水。積寒停飲。塗皮膚。疥癩。

參攷資料 ● 蓬萊李金什言

其地登州海口出海狗。皮可作裘帽。俗美其稱曰海龍。即此。其腎乃藥中臘。土人取海狗名曰打狗。此物晝夜潛海底。惟孳乳時登島。產子稍大。即相率入水。人不可得。須冬月極凍時。海中水口結冰。天晴海狗羣出。處冰上曝日。必候其入水時。驟入水以木棍擊其腰。方可得之。若冰裂或步履有聲。非其睡時。皆不可得。然每年打狗。墮水溺死。亦多因利重。人亦不惜驅命以往。(趙學敏) ● 親近海人取鮫魚海參者。用其油滴海面。海水即清見底。砂石畢見。可知其性之分利也。(趙學敏)

【臘 臍】 命名 本品乃臘臍之臍。故名。實則與腎

同用者。

處方用名 海狗腎。

古醫別名 骨納。海狗腎。(綱目) 阿惹勃他。(陳藏器) 骨納。骨納。鐵獸。(和漢藥考)

外國名詞 Castoreum (拉丁) (Castor) (英) カストロウ

△(日本)

基本 係將鱗脚類臘臍之陰莖丸及鱗連同切取者。

產地 ● 甄權謂臘臍是新疆國海內狗。臨海志謂臘臍出東海水中。寇宗奭謂臘臍今出登萊州。李時珍謂臘臍出遼西營州及結骨國與三佛國等處。● 陳仁山藥物生產辨云。臘臍產美國大呂宋為最。中國北邊近俄國等處亦有出。

形態 臘臍為棲息海上之獸類。形如狗。有吻鬣。四肢悉作蹄狀。尾短小。適於游泳。牡者體長五六尺。牝者祇及其半。幼時毛色黑。漸長則變茶褐色。有青黑色斑點。腹部生白毛。動作活潑。感覺銳敏。

製法 海狗之陰莖與舉丸。用酒浸一日。紙裹炙香。剉搗。或置銀器中。以酒煎熟。炙脆。李時珍曰。以漢椒。樟腦同收。則不壞。用法 細剉搗用。合藥為丸服。性質 鹹。大熱。無毒。效能 固精。強陽。煖腎。補肝。有溫補滋養之效。而功近菴蓉。鎖陽。主治 治男子宿癢氣塊。積冷

勞氣。腎精衰損。多色成勞。瘦悴。

歷代述記攷圖 【唐】陳藏器

本草拾遺論海狗腎曰。治鬼氣尸疰。夢與鬼交。鬼魅。狐魅。心腹痛。中惡邪氣。宿血結塊。痲瘋。羸瘦。【唐】李珣海藥本草論海狗腎曰。治五勞七傷。陰痿少力。腎虛。背膊勞悶。面黑精冷。【宋】食華子諸家本草論海狗腎曰。補中益腎氣。暖腰膝。助陽氣。破癥結。療狂癲疾。【清】黃宮繡本草求真論臘臍曰。海狗腎即臘臍。係西番獸物。足似狗而魚尾。今東海亦有。味甘而鹹。其腎即臘之臍。投於睡熟犬邊。犬即驚跳。臘月浸置水內不凍。其性之熱。殆可見矣。故書載治宿血症。癱疝。羸症者。取其鹹能入血。軟堅。溫能通行消散也。用其佐房術者。取鹹溫入腎。補虛固精。壯陽道也。此藥雖置器中。長年溫潤。然能入水不凍。大不同於他藥。若云功近菴蓉。鎖陽。潤燥相若。氣質不同。不無重視菴蓉。鎖陽。而輕視此物也。但脾胃挾有寒溼者。亦忌。以溼過溼。故耳。恐相礙也。酒浸紙裹。炙香。剉搗。或於銀器中以酒煎熟。合藥

一五五八

用。

國外學說 英美學說謂臘臍

產中國之北方。北亞美利加。俄羅斯國等處。係海狗。眼前之小囊。與其內所結成之質。海狗之腎。與麝香有相似處。古時即以此入藥品。其產北亞美利加者。能以泥與木成窩。便於居住。最靈巧。其產歐羅巴之北者。則不以泥木造窩。而惟挖地作洞。西國尋常出售之海狗腎。有二種。一為北亞美利加運來。一為俄羅斯國所產。如欲分辨之。可將其一分在純酒十六分內浸之。如變黃色者。即知為俄羅斯所產。如係深棕色者。即知為北亞美利加所產。臘臍頗有行氣治轉筋之性。能治數種腦筋病。與肉筋跳痛等病。過服令人脈數發熱。少服能平脈。治鬱病。羊癲風。熱症類。瘰癧病。可配酒用。日本日用藥品考曰。此由蝦夷松前津輕等處。出產。惟真品甚少。多用海狗充。凡用臘臍。係用舉丸。綱目諸說。皆然。獨日本則向來沿用陰莖。謂之臘臍。腰 (Edage) 真者赤色。長二三寸。根有毛。今藥舖所售

者長七八寸至尺餘。有名百尋鞭。一名筋鞭(Shinobu)者。俱非真品。又有以鹽醃者亦然。又日本山海名產圖繪曰。書臘豚獸作臘豚。係指外腎。即舉丸也。藥用頗少。肉。其以陰莖售買者。當係此。外腎之誤。由津輕南部出產。種類頗多。真偽難辨。或云海獺海豹。即其總稱。其曰海豹者。皮有黑斑點。似臘豚。當係羣鹿同種。海獺形狀全與臘豚相似。其前齒二重者。為真臘豚。一說燕上齒為二重齒。頭上有吹水之孔。隱毛間不易見肉。或百尋鞭投水中而水溫不凍者。為真品。陰莖亦有偽者。以百尋鞭成。故無毛。號百尋鞭。真者長三寸許。赤色。根有毛。全身灰黑。似水獺而較長。形似貓而小。口之吻鬚甚大。腮次左右有足似大鰭。後足在尾前。俱長一尺。其端有五爪。尾頗細。居海底最深處。或於海邊石上結伴舂陸。惟其中必有一隻不睡。見有船來。立發聲醒睡者。匪入水中。性善游泳。越潮甚疾。此種為真。臘豚。但海獺亦一切與之相同。故

十四畫 臘

今所謂臘豚者。多為海獺。真者甚難得。本草集解。言此出東海水中。可見中華亦甚少此物。係運自日本者也。蝦夷呼其大者為涅資夫(Wanpa)。中者為招基(Choki)。小者為烏涅烏(Duan)。是為真臘豚。呼鱗為鐵資熙(Feshi)。呼一隻為一羽。津輕取此鐵資熙為肴。呼其中之大者為托(To)。或今女孩呼魚為托托(To)。或本於此。亦未可知。中華亦有此語云。又夫木集雜十八。有建長八年百首歌合衣笠內大臣所詠詩云。我之戀愛。有若海驢(托托)睡流未醒之夢云云。此所謂海驢者。為海馬之一種。非臘豚之類也。又海驢。日本紀神代卷龍宮章。下訓作三千皮。蝦夷人之捕此。乘用繩纏絡之。船見有羣睡漂流者。則揮狐尾以嚇不睡之一隻。使不敢聲而遁去。乃用矢或魚叉射捕睡者。其技至精。頗不易及。船概不用棹。而於前後搖之。或曰臘豚。當係指豚。何為指外腎。某書載有欲得其蹄者。托松前部之南人。覓之終難得。詢之土人。乃云。臘與陰莖甚

濕。取陰莖必損蹄。故無有全者云。或云此當是雄者。若雌必有蹄。辨偽 臘豚。以臍置於臘月。衝風處。水中浸之不凍者。真也。蓋本品多偽者。因海中有獸。號曰水烏龍。土人取其腎以充臘豚。臍也。然真偽有別。不難分辨。真者有一對。則兩重。薄皮裹丸核。其皮上自有肉。黃毛。一穴三莖。收之器。中年溼潤如新。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳若狂者。真也。配合應用 同陽起石、肉蓯蓉、巴戟天、菟絲子、山茱萸、鹿茸、能壯陽道益精。有臘豚臍丸。治諸虛勞損。鬼疰邪惡。夢與鬼交。精氣之絕等證。(和劑局方) 用蠶 每服八釐七毫半至一分七釐半。應用宜忌 凡陽事易舉。以及骨蒸勞嗽者忌服。參攷資料 臘豚臍。鹹熱之品。本入命門補火。脾家所快者。臍熱也。故亦入之。助陽之功。獨甲藥劑。今出登萊州。即海狗腎也。其狀頭似豕。尾似魚。止生兩足。價殊貴。

類多偽者。須細辨之。(李士材) 臘豚。或謂連蹄取下。故名。或謂臘豚獸之蹄也。按兩名不類。恐一。是海魚之腎。一。是山獸之蹄也。綱目以此條入獸部。(汪詒庵) 臘豚。臍。今出登萊州。藥性論以謂。是海內狗外腎。日華子又謂之。獸。今觀其狀。非狗。非獸。亦非魚也。但前似似獸。尾似魚。其身有短密淡青白毛。腹脇下全白。仍相間於淡青白毛。上有深青黑點。久則色復淡。皮厚且韌。如牛皮。邊將多取以飾鞍轡。其臍。治臍積冷積寒。脾腎勞極有功。不待別試也。似狐長尾之說。蓋今人多不識。曉曉之屬。又小於獐。但口兩邊有長牙。好鬪。則用其牙皮為第一。無出其右者。然多牙傷痕。四方皆有。山深處。則頗多。其聲如擊破錢。(寇宗奭) 骨納獸。生西番突厥國。胡人呼為阿慈勃他。其狀似狐而大。長尾。臍似麝香。黃赤色。有如爛骨。(陳藏器) 按臨海志云。出東海水。中狀若鹿形。頭似狗。長尾。每日出。即浮在水面。昆裔家以弓矢射之。取其外腎。陰乾百日。味甘香美也。

一五五九

十四畫 膈管脆膏臺船蒨蒨蒙蒨蒨蒨蒨

【李拘】今出登萊州。其狀非狗非獸。亦非魚。但前脚似獸。而尾即魚。身有短密淡青白毛。毛上有深青黑點。久則亦淡。腹脇下全白色。皮厚韌如牛皮。邊將多取以飾鞍鞞。其膈治膈腹積冷精衰。脾腎勞極有功。不待別試也。似狐長尾之說。今人多不識之。(寇宗奭)按唐書云。骨獸出遼西營州及結骨國。一統志云。膈管出女真及三佛齊國。狀似狐脚。高如犬。走如飛。取其腎漬油。名膈管。觀此則似狐之說非無也。蓋似狐似鹿者。其毛色爾。似狗者其足形也。似魚者其尾形也。入藥用外腎而曰膈者。連膈取之也。又異物志。納獸出朝鮮。似狸。若黑色。無前兩足。能捕鼠。郭璞云。晉時召陵扶夷縣獲一獸。似狗。豹文。有角。兩脚。據此則納有水陸二種。而藏器所謂似狐長尾者。其此類與。(李時珍)

【膈管】即膈管之原名。詳「膈管」條。

【脆膏】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【脆膏】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【臺七里】原名 七里香。草類之一種。可供藥用。產地 出臺灣島中。主治 辟烟瘴。參攷資料 臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰。則化蚊蚋為水。(趙學敏)

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【蒨蒨】金瘡。跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡。止血殺蟲。古籍別名 自然殼。(海米(方孝孺集))

【膈管】

用膈管煎酒

浸。播爛。和麴米如常釀成之酒。

主治 助陽氣。益精髓。破癥結。冷氣。大補益人。

【船油石灰】

原名 水龍

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

參攷資料 船油石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏藥」條。

(綱目)

外國名詞 Hydrosmo Riv

icri, Engl. (拉丁) ノンニヤク

モイ(日本)

基本 係天南星科。藥用莖蕒之根。

產地 在原野川澤間。

形態 莖蕒爲毒草類之多年生草本。高至二尺餘。葉爲掌狀複葉。由羽狀之裂片而成。葉脈呈網狀。葉柄長。夏日開單性花穗狀花序。肉質甚長。有苞頗大。其地下肥大之球狀部。味最苦。製爲搗腐。可供食用。或用球狀部所採之粉末。供輕氣球及空氣枕之塗料。以防氣體之漏泄。其根圓如珠。亦可供藥用。



莖 蕒

性質 辛。寒。有毒。

主治 癰腫風毒。瘰癧腫上。搗碎。以灰汁煮成餅。五味調食。主消渴。

十四畫 莖

參攷資料 ●按三元延壽書

云。有人患瘰。百物不忌。見隣家修莖蕒。求食之美。遂多食而瘰愈。又有病癰難者。數人多食之。亦皆愈。(汪機) ●性冷甚。不益人。冷氣人少食之。生則載入喉出血。(李廷飛) ●莖頭出吳蜀。葉似由跋半。夏根大如碗。生陰地。雨滴葉下生子。又有斑杖。苗相似。至秋有花直出。生赤子根如莖頭。毒猛不堪食。虎杖亦名斑杖。與此不同。(馬志) ●江南吳中。出白莖蕒。亦曰鬼芋。生不澤極多。人採以爲天南星。了不可辨。市中所收。往往是此。但南星肌細膩。而莖蕒莖斑花紫。南星莖無斑。花黃爲異爾。(蘇頌) ●莖蕒出蜀中。施州亦有之。呼爲鬼頭。閩中人亦種之。宜樹陰下。掘坑積糞。春時生苗。至五月移之。長一二尺。與南星苗相似。但多斑點。宿根亦自生苗。其滴露之說。蓋不然。經二年者。根大如碗。及芋魁。其外理白。味亦麻人。秋後採根。頭淨。擦或搗。或片。段。以鹽灰汁煮十餘沸。以水淘洗。換水更煮五六遍。卽成凍子。切片。以苦酒五味淹食。不以灰

汁。則不成也。切作細絲。沸湯汆過。

五味調食。狀如水母絲。馬志言其苗似半夏。楊慎丹鉛錄言莖蕒卽此者。皆誤也。王楙農書云。救荒之法。山有粉葛。莖蕒。棗之利。則此物亦有益於民者也。其斑杖卽天南星之類。有斑者。(李時珍)

【莖蕒】

命名 本品可以調味。故謂之醬。

處方用名 莖蕒子。莖蕒葉。莖蕒根。

古籍別名 莖子。(廣志) 土蕒。扶留藤。扶留。浮留。(孟詵) 其苗名惡土蕒。莖蕒。(綱目) 浮留藤。(植物學大辭典)

外國名詞 Piper Bofle, L. (拉丁) キンマ(日本)

基本 係胡椒科土蕒藤屬。藥用莖蕒之根。葉與子。

產地 凡兩廣滇南及川南等處恒多有出。

形態 莖蕒爲芳草類之莖生草本。葉似玉瓜而厚大。有光澤。質似桑椹。皮黑肉白。其根葉子。採得可供藥用。

採取 春夏採之。

製法 雷斅曰。凡採得後。以刀刮上粗皮。撈細。每五錢。用生薑自然汁五兩。拌之。蒸一日。曬乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 下氣。溫中。破痰。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論莖蕒曰。咳逆上氣。心腹蟲痛。胃弱虛瀉。霍亂吐逆。解酒食味。【唐】孟詵食療本草論莖蕒曰。散結氣。心腹冷痛。消穀。【明】李時珍本草綱目論莖蕒曰。解毒。去胸中惡邪氣。濕脾燥熱。

參攷資料 ●按晉含云。莖子可以調食。故謂之醬。乃蕒變之類也。故孟詵食療謂之土蕒。其蕒葉名扶留藤。一作扶留。一作浮留。莫解其義。蕒則留字之訛也。(李時珍) ●今製川椒南皆有之。昔漢武帝使唐蒙曉諭南越。越王食蕒以莖蕒曰。此出番禺城下。武帝感之。遂開牂牁越。蜀。劉淵林注蜀都賦云。莖蕒綠木而生。其子如桑椹。熟時正青。長二三寸。以蜜及鹽藏而食之。辛香。與蘇蕒所說大同小異。蓋淵林所云。乃蜀產。蘇蕒所云。乃海南者耳。今惟貴葛變而

十四畫 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟 蒟

不食蒟蒻。故鮮有用者。(蘇頌) 廣州記云。出波斯國。實狀若菜。根紫褐色者為尚。黑者是老根不堪。然近多黑色。少見褐色。黔中亦有。形狀滋味一般。(李珣) 蒟蒻今兩廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之。其苗謂之蒟蒻。莖生依樹。根大如筋。彼人食椶櫚者。以此葉及蚌灰少許同嚼食之。云辟瘴癘。去胸中惡氣。故註曰。椶櫚浮留。可以忘憂。其花實即蒟子也。按俗舍草木狀云。蒟蒻即藟莪也。生於著國者。大而紫。謂之藟莪。生於番禺者。小而青。謂之蒟子。本草以蒟易蒟子非矣。蒟子一名扶留。其草形全不相同。李時珍稱謂蒟子莪生。藟莪草生。雖同類而非一物。然其花實氣味功用則一也。特氏以二物為一物。謂蒟子非扶留。蓋不知扶留非一種也。劉啟期交州記云。扶留有三種。一名獲留。其根香美。一名扶留。其藤味亦辛。一名南扶留。其葉青味辛是矣。今蜀人惟取莖葉作酒麪。云香美。(李時珍) 蒟蒻子。即蒟蒻之處方用名。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻根】即蒟蒻之處方用名。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻葉】即蒟蒻之處方用名。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻菜】即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。

【蒟蒻】即蒟蒻之古籍別名。典見別錄。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻實】即蒟蒻之原名。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻】即蒟蒻之簡稱。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻丁】即蒟蒻之俗名。詳「蒟蒻」條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。


【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。

【蒟蒻】條。



(一) 英公蒲

形隱 蒲公英為生於原野路傍之多年生草。葉作倒披針形。邊緣有下向大鋸齒。叢生地上。作車輪狀。春末抽莖高五六寸。於頂上開黃色花。類菊花。花後萼成白色冠毛。結實如球。作放射狀裂開。種子乘風飛散。莖葉根俱有苦味。白汁根部尤多。藥用以未乾燥生鮮者為佳。

學名 Taraxacum officinale, Vigg. var. glaucescens, Koch.
外國名詞 Taraxaci (拉丁) Dandelion (英) Löwenzahn (德)

基本 屬菊科為蒲公英之葉莖及根。
產地 陳仁山藥物生產辨云。蒲公英各省均有。但以江蘇省之鎮江來者為正。廣東土貨店所沽之公英。實係地胆頭。切要分別。



(二) 英公蒲

種類 黃花者名黃花地丁。紫花者名紫花地丁。又名大丁草。無花者名地胆草。白花者名白鼓釘。探取 四五月間採之。製法 凡採得洗淨陰乾。性質 甘平無毒。
成分 為泰拉基沙丁 (Thapsigargin) 苦味質 膠質糖質加里鈣鹽等。
效能 解熱毒滯氣。消乳癰核。有健胃強壯及清血之效。用於胆汁過多之腸炎及胃弱症。乳房腫痛。乳汁分泌之不足症。又為變質利尿之緩和劑。
作用 加增胃液之不足。促進消化功能。并能激腸之蠕動。使大便容易排出。
主治 婦人乳癰。水腫。麥汁飲及封之立消。
歷代記載攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蒲公英曰。白汁驗

惡刺狐尿刺瘡。卽愈。元朱丹溪本草衍義補遺論蒲公英曰。解毒散滯氣。化熱毒。消惡腫。結核。疔腫。明李時珍本草綱目論蒲公英曰。搽牙烏髮髮。壯筋骨。明經希雍本草經疏論蒲公英曰。蒲公英味甘平。其性無毒。當是入肝入胃。解熱涼血之要藥。乳癰屬肝經。婦人經行後。肝經主事。故主婦人乳癰腫乳毒。宜生嫩之良。清黃宮樞本草求真論蒲公英曰。蒲公英卽黃花地丁草也。味甘性平。能入陽明胃厥陰肝。涼血解熱。故乳癰乳毒爲首重焉。且能通淋。擦牙染髮塗刺。及解食毒疔毒。綠乳頭屬肝。乳房屬胃。乳癰乳毒。多因熱瘀血滯。用此直入二經。外敷散腫。臻效。內消須同夏枯。貝母。連翹。白芷等藥同治。况此屬土。花黃。故於食滯可解。毒氣可散。又能入腎涼血。故於髮髮可染。獨莖一花者。是有極者非。清王士雄隨息居飲食譜論蒲公英曰。蒲公英甘平清肺。利膈化痰。散結消癰。養陰涼血舒筋。固齒通乳益精。煨可爲蔬。老則入藥。洵爲上品。今人但以治

十四畫 蒲

乳患。抑何陋耶。別有紫花地丁。一名如意草。甘涼清熱補虛。消癰涼血耐飢益氣。爲救荒仙草。以生嚼無草氣。故可同諸草木葉咀食充飢也。

國外學說 日本學說謂漢醫於黃道皮膚消化不良。用蒲公英根。而西醫亦有用者。日本藥局方之主效。爲苦味健胃緩下等。卽爲苦味健胃藥。於消化不良。與他藥配用。自五。〇至一〇。〇。又製爲越幾斯。每一回自〇。五至一。五。亦爲苦味健胃藥。又日本藥局方曰。蒲公英係將蒲公英草全部。於春季開花前採取晒乾者。此草之葉。作大鋸齒狀。缺裂。根長一至二特西米突。粗〇。五至二。五仙米。呈褐色。帶縱溝。其橫截面現非放線狀之黃色木心。皮部厚。有同心性並列之多數乳脈管。英美學說謂蒲公英西國名獅牙草。產中國歐羅巴美國等處。其根無論鮮乾。均可入藥。酒水均能提出功力。根長約六寸至一尺餘。橫約四分至八分。內汁甚多。宜在中秋節後取之。此草於歐羅巴爲野生

之草。其用爲藥物。亦已多年。有植物學家曾查常出售之蒲公英根內。含有人參根。龍膽草根。苦菜根等質。用此根最合宜之法。將其汁熬成膏。有人將其根炒之。代咖啡之用。又有人將其乾粉與咖啡相雜。其作用爲輕瀉藥。收血藥。散炎化癰藥。又爲利小便藥。如肝與內腎之病。並皮膚久病等。均可用之。然性最輕。其平和之性。略與土茯苓相同。其功用又能動膽汁。作水膏等服之。均效。治胃不消化。大便結。肝積血。肝羸生瘕症。(須佐瀉藥同服)瘧疾。(須發過後服之)處方蒲公英乾根八錢切片搗爛。清水十六兩八錢。煮沸至一刻鐘之久。隔淨。隔時再加沸水。收足十六兩八錢爲度。每服一兩二錢六分至二兩五錢二分。治胃不消化等患極效。(蒲公英煮水方)又蒲公英鮮根四斤。搗爛。搗汁候澄清。將上面淨者拌出入鍋。熬十分鐘。熱不過二百一十二度。濾渣。再入攪鍋散氣。熱不過一百六十度。成膏爲度。每服八釐至二分六釐。(蒲公英膏方)又蒲公英乾

根四十分粗末。淡酒八十分。汽水酌用。先用酒浸蒲公英二天。扭出二十分另存。再用水四十分浸二天。用絞盤絞渣。過布入攪鍋散氣。餘十八分爲止。加前留之二十分調勻。再加汽水仍足四十分爲度。每服五分至二錢。(蒲公英洗膏方)按本草綱目謂其甘平無毒。主治婦人乳癰。黃汁飲及封之立消。解毒散滯氣。消惡腫結核。丁腫蛇螫腫痛。恐未必能有此功力。

近人學說 顧子靜曰。蒲公英爲菊科植物。蒲公英之宿根草。於春季開花前。採其根及全草。乾燥而用之。含苦味質及鉀鹽鈣鹽。其新鮮植物中流出之乳汁。則含樹脂質。春季含鹽類多。苦味質少。秋季則反之。蒲公英之作用。苦味質可健胃。鹽類有緩下之效。製爲稠厚之膏用之。膏之用量。每服一分三釐至四分。一日服三次。張山雷曰。蒲公英莖葉皆似蒿苣。吾鄉甚多。折其莖葉。有白汁溢出。如乳汁。故俗呼爲羊奶草。瀕湖謂關中謂之狗乳草。亦此意也。其性清涼。治一切疔瘡癰疽紅腫熱毒。

諸證。可服可敷。頗有應驗。而治乳癰。乳癰。紅腫堅塊。尤為捷效。鮮者鳩汁。溫服。乾黃煎服。一味亦可治之。而煎藥方中。必不可缺此。蘇恭唐本草。謂甘平無毒。治婦人乳癰。水腫。煮汁飲。及封之立消。洵不誣也。丹溪亦謂解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫。結核。丁腫。石頑。謂治乳癰。必鮮者。取汁和酒服。服後欲睡。是其功驗。微汗而愈。頃按乳癰。乳核單方。古法多用酒服。蓋欲其迅行。及於患處。然此惟堅塊初起。其形未大。未變色時。間或可施。而乳症多兼肝胆湯多。酒能助火。未可概投。若形勢漸巨。本欲醱膿者。適以速成其潰耶。自來著內科書者。多不習瘡科。所以不知其弊。實則內外二科。理本相同。且內外病之聯屬者。尤非少數。不知內科固萬不能治瘡。即不知瘡科。則治內亦時有養癰貽害之弊。無如長於治內者。輒謂吾是大方專家。彼汚穢腥臭之瘡瘍。又豈肯降格從事。然遇一內外相象之症。勢必束手無措。敷衍了事。捫心清夜。能無遺憾。須知治瘡。雖似小伎。要知非精於

治內者。亦不可與辨此中神化也。配合應用 治一切乳癰毒腫痛及乳癰。用蒲公英。夏枯草。貝母。連翹。白芷。栝樓根。橘葉。甘草。頭垢。牡鼠糞。山豆根。山慈菇等。

治惡刺及狐尿刺。摘取根莖白汁塗之。惟多塗立差。此方出孫思邈千金方。其序云。余以貞觀五年七月十五日。夜以左手中指背觸着庭木。至曉。遂患痛不可忍。經十日。痛日深。瘡日高大。色如熟小豆色。皆聞長者之論。有此方。遂依治之。手下即愈。痛亦除。瘡亦即癒。未十日而平復如故。楊炎南行方亦著其效云。(醫經方)

治產後不自乳兒。畜積乳汁。結作癰。取蒲公英搗傅腫上。日三四度易之。(梅師方)

還少丹。昔日越王曾遇異人。得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及八十者。服之。髮返黑。齒落更生。年少服之。至老不衰。得遇此者。宿有仙緣。當珍重之。不可輕泄。用蒲公英一斤。一名構轉草。又名蒲公英。生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有放花者。連根帶

葉取一斤。洗淨。勿令見天日。曬乾。入斗子解。鹽一兩。香附子五錢。二味為細末。入蒲公英內。淹一宿。分為二十團。用皮紙三四層裹扎定。用六一泥。即蚯蚓泥。如法固濟。入焙內焙乾。乃以武火煨。通紅為度。冷定取出。去泥為末。早晚擦牙。漱之。吐痰任便。久久方效。(瑞竹堂方)

治乳癰紅腫。蒲公英一兩。忍冬藤二兩。搗爛。水二鍾。煎一鍾。食前服。睡覺病即去矣。(積德堂方)

治疔瘡疔毒。蒲公英搗爛。裂之。即黃花地丁也。別夏搗汁和酒煎服取汗。(唐氏方)

治多年惡瘡。蒲公英搗爛貼。亦治蛇螫腫痛(救急方)

用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡無溼熱癰毒者禁用。

參攷資料 此草開黃花。味甘。解毒。散滯氣。可入陽明太陰經。化熱毒。消腫核。有奇功。同忍冬藤煎湯。入少酒佐服。治乳癰。服罷欲睡。是其功也。睡覺微汗。病即安矣。(朱世亨) 孫思邈千金方作

兔公英。蘇頌圖經作僕公。庚辛玉册作鴉。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。淮人謂之白鼓釘。蜀人謂之耳癩草。關中謂之狗乳草。案土宿本草云。金簪草一名地丁花。如金簪頭獨脚如丁。故以丁名之。(李時珍) 蒲公英。草生平澤田園中。莖葉似苦苣。斷之有白汁。堪生嫩。花如單菊而大。四五月採之。(韓保昇) 蒲公英。春初生。苗葉如苦苣。有細刺。中心抽一莖。莖端出一花。色黃如金錢。俗說為僕公。是也。(蘇頌) 地丁。江之南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無。小科布地。四散而生。莖葉花聚。似苦苣。但小耳。嫩苗可食。庚辛玉册云。地丁。葉似小莖。花似大旋。莖一莖。上三四寸。斷之有白汁。二月採花。三月採根。可制承伏三黃。有紫花者。名大丁草。出太行。王屋。諸山。陳州亦有。名燒金草。能煨珠砂。一種相類。而無花者。名地膽草。亦可伏三黃。砒霜。(李時珍) 詳「蒲公英」條。 蒲公昂。即蒲公英之古籍別名。

與見綱目。詳「蒲公英」條。

【蒲包草】 古籍別名 水蠟燭

草。綱目拾遺。貨名 鬼蠟燭。蒲莖。板枝。(汪蓮仕採藥書)

【蒲包草】 多生野塘間及蘆葦叢中。

形態 蒲包草為水草類之一種。秋杪結實。紅色宛如蠟燭。其根可供藥用。子詳見該條。

主治 療瘰癧。洗淨寸段。砂鍋煎湯飲。

參攷資料 蒲包草根。婦人服之終不受孕。須服北京真益母丸四五兩可解之。(趙學敏)

【蒲包草實】 主治 療金瘡。刃傷止血用。

【蒲州豆豉】 命名 本品為豆豉之出於山西舊蒲州府境者。故名。

製法 先以酒醋浸透。蒸之曝乾。入麻油再蒸晒如是三次。再加荳椒末。拌貯藏之用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 解煩熱。熱毒。寒熱。虛勞。詞中發汗。通關節。殺腥氣。傷寒鼻

十四畫 蒲

塞。

【蒲兒根】 卽蒲蕁之古籍別名。典見野菜譜。詳「蒲蕁」條。

【蒲柳】 卽水楊之古籍別名。典見爾雅。詳「水楊」條。

【蒲英】 卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【蒲丘】 卽青秧之古籍別名。典見綱目。詳「青秧」條。

【蒲席】 命名 本品係用蓆蒲所編之席。故名。

古籍別名 蓆(綱目)

採取 以年久陳敗者用之。良。性質 平。無毒。

主治 筋澁。惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蒲席曰。單用破血。治墜損。瘀血在腹刺痛。取久臥者。燒灰

酒服。【唐】陳藏器本草拾遺論蒲席曰。治霍亂轉筋入腹。取編席之索。燒研酒服。

參攷資料 蓆席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用。皆是菅草(陶弘景)蓆皆以蒲及稻藁為之。有精粗之異。吳人有以龍鬚草為蓆(李時珍)

【蒲扇】 命名 上古以羽為扇。故扇字從羽。後世有以蓆蒲所編者。故名。

古籍別名 筵(綱目)

採取 以年久而陳敗者用之。良。

主治 止汗。燒灰和粉撲身。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蒲扇曰。止盜汗。及婦人血崩。經水不斷。燒灰酒服。

【蒲移】 卽水楊之古籍別名。典見古今注。詳「水楊」條。

【蒲根白】 卽水楊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水楊」條。

【蒲桃】 卽蒲萄之古籍別名。典見綱目。詳「蒲萄」條。

【蒲桃殼】 主治 止嘔。或如神。

【蒲草】 卽蒲包草之簡稱。詳「蒲包草」條。

【蒲陶】 卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【蒲荷】 卽蒲蕁之古籍別名。典見食物本草。詳「蒲蕁」條。

【蒲荷】 卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【蒲黃】 命名 本品係香蒲花蕊之粉。色淡黃。故名。

處方用名 生蒲黃。炒蒲黃。蒲黃炭。

外國名詞 Typha

基本 屬香蒲科。為蒲草之花粉。

產地 凡池澤間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。蒲黃產湖北山東兩省。

形態 蒲為生於池沼之宿根草。葉叢生。長四尺至五尺。闊九分許。厚而柔軟。有平行脈。秋季取之。為蒲席。夏季抽圓莖。於頂上開花。成長穗狀。如蠟燭。謂之蒲穗。花粉作黃褐色。

採取 四月採日乾。

製法 雷斅曰。凡使勿用松黃。并黃蒿。其二件全似。只是味阻及吐人。真蒲黃須隔三重紙焙令色黃。蒸半日。却再焙乾用之。妙。大明曰。破血消腫者。生用之。補血止血者。須炒用。

性質 甘。平。無毒。

效能 行血祛瘀。止血和營。用作止血藥。

十四畫 蒲

聖治 心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。久服輕身益氣力。延年神仙。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蒲黃曰。治痢血鼻衄吐血。尿血。瀉血。利水道。通經絡。止女子崩中。【宋】大明日華諸家本草論蒲黃曰。婦人帶下。月候不勻。血氣。心腹痛。妊婦下血墜胎。血暈血。瘵。兒枕氣痛。頭撲血。閉。排膿。痔瘡。遊風。腫毒。下乳汁。止洩精。【明】李時珍本草綱目論蒲黃曰。涼血活血。止心腹諸痛。【清】鄒澍本經疏證論蒲黃曰。金匱要略用蒲灰散。利小便。治厥而皮水解者。或以爲香蒲。或以爲蒲席燒灰。香蒲但能清上熱。不云能利水。敗蒲席別錄。主筋澀。惡瘡。亦非利水之物。蒲黃本經主利小便。且本事方芝隱方。皆述其治舌脹神驗。予亦曾治多人。委銖無爽。不正有合治水之腫。於皮乎。夫皮水爲膚間病。不應有厥。厥者下焦病也。膀胱與腎爲表裏。膀胱以水氣歸皮。致小便不利。氣阻而成寒熱。則腎亦承其弊。爲之陰壅而陽不得達。遂成厥焉。

病本在外。非可用溫。又屬皮水。無從發散。計惟解心腹膀胱之寒熱。使小便得利。又何厥逆之有。以是知其爲蒲黃無疑也。曰蒲灰者。蒲黃之質。固有似於灰也。趙以德金匱衍義亦云。

近人學說 ①賈九如曰。蒲黃色黃氣香。專入脾經。若諸失血久者。炒用之可以助補脾之藥。攝血歸源。使不妄行。又取體輕行滯。味甘和血。上治吐衄咯血。下治腸紅崩漏。但爲收功之藥。在失血之初。用之無益。若生用亦能涼血消腫。②陳中權曰。中醫學術之退步。在因循苟且。不求真理。其於藥物亦然。不究其所以能治病之理。反穿鑿附會。從色形上着想。卒至病愈而不知所以愈。不愈亦不知所以不愈。此可爲嘆息痛恨者也。如蒲黃各本草言其生用行血。炒用止血。考蒲黃性味甘涼帶滑。生用涼血散血固矣。失笑散是也。然炒黑能止血。以紅見黑則止。爲水勝火。此真荒謬之談。須知失血之症。在上多由脾胃之傷。下則多由脾胃之傷。血管破裂。血不行其經。遂致失血。止血之藥。但當取其有膠黏之質。或乾澀之性。能收斂血液者。則血自凝聚而可止。於色之紅黑固無有也。如阿膠補血。亦能治一切失血。濃墨亦止血。箬葉炙研服亦止血。甚至外症出血。以灰塵膏粉塗之亦能止。且亦不限黑色。如明礬和白糖同服。止血亦效。此數物者。色黑白不齊。而紅見之亦止者。何也。亦惟各有其膠黏之質性。故主治亦同耳。如必謂紅見黑止。則諸失血症。皆可以煤炭屑或黑水止之矣。此又不通之論也。吾謂凡膠黏乾澀之品。均可止血。按之事實。自有可通者。炒蒲黃止血。確有特效。曾見有人外症出血不止。以蒲黃炭研細傳之即止者。然局方黑神散。主治行血下胎。〔見醫方集解〕方中用炒蒲黃。不知何故。疑是生蒲黃之誤。③張山雷曰。蒲黃專入血分。以清香之氣。兼行氣分。故能導瘀結而治氣血凝滯之痛。東璧李氏雖謂其涼活血。亦以水產之品。因謂之涼。頃謂蒲本清香。亦有辛味。以本經舊蒲辛溫例之。必不可以爲寒涼。蒲黃又

一五六六

爲蒲之精華所聚。既能逐瘀。則辛散之力可知。況心腹結滯之痛。新產瘀積之凝。失笑一投。捷於影響。雖曰蠶脂導濁。是其專職。然使蒲黃有瘀可用。若舌瘡口瘡。皮膚癬。痒諸病。傳以生蒲黃細粉可愈。則以細膩黏凝。自有生肌之力。非僅涼也。取其清涼也。

辨偽 ①鄧肯巖曰。蒲水草也。蒲黃乃香蒲花中之蕊。屑細若金粉。始出河東澤中。今處處有之。以藥州出者爲良。近今藥肆中。或以松花偽充。按松花氣味辛溫。蒲黃氣味甘平。松花能除風。蒲黃能消痰。性既不同。功亦各異。胡得偽充以害人乎。况失笑散中。有用蒲黃爲治產後瘀血攻心之妙方。若用松花偽充。則貽誤不少矣。②曹炳章曰。按蒲黃乃蒲草之花蕊。色淡黃。是花葶花蕊相合。名草蒲黃。爲佳。又有一種蘇州來者。曰蒲黃。面色老黃。屑細滑若粉。入罐煎之。知糊膠一般。服之令人作嘔。且不能入喉。吾初到時。人人以此爲道地。各大藥舖爭先置備。後因病人不能服。向醫生責問。始識受蒲黃

面之害。乃通告各藥舖。禁其沿用。今仍用草蒲黃。鄭君所云屑細若金粉。或亦是此物。不識以何物爲作。亦非松花粉。蓋松花粉色淡黃質輕。蒲黃面質重色老黃。然總是害人質品。應當革除之。

配合應用 ①治產後諸血病。蒲黃炒黑乾薑炒黑豆澤蘭當歸川芎牛膝生地黃。

②治瀉血。蒲黃車前子牛膝生地黃麥門冬。

③治血崩血淋。蒲黃阿膠白膠人參麥門冬赤茯苓車前子杜仲川續斷。

④生蒲黃納舌下。數數易之。能消重舌。

⑤治一切跌撲傷損。瘀血停滯腹中。生蒲黃麥澆和童便飲之。良。

⑥蒲黃能破血。故治癥結。五勞七傷。停積瘀血。胸前痛。卽發吐衄。悉和涼血行血藥主之。

⑦治肺熱衄血。蒲黃青黛各一錢。新汲水服之。或去青黛入油髮灰等分。生地黃汁調下。(簡便單方)

⑧治吐血唾血。蒲黃末二兩。每

日溫酒或冷水服三錢妙。(簡要濟衆方)

⑨治老幼吐血。蒲黃末每服半錢。生地黃汁調下。量人加減。或入髮灰等分。亦治小便出血。(聖濟總錄方)

⑩治小便轉胞。以布包蒲黃。裹腰腎。令頭致地。數次取通。(肘後方)

⑪治金瘡出血。悶絕。蒲黃牛兩熱酒灌下。(危氏得效方)

⑫治瘀血內漏。蒲黃末二兩。每服方寸匕。水調下。服盡止。(肘後方)

⑬治腸痔出血。蒲黃末方寸匕。水服之。日三服。(肘后方)

⑭治脫肛不收。蒲黃和豬脂傅。日三五度。(子母秘錄方)

⑮治胎動欲產。日月未足者。蒲黃二錢。井華水服。(集一方)

⑯治產婦催生。蒲黃地龍洗焙。陳橘皮等分爲末。另收。臨時各炒一錢。新汲水調服。立產。此常親用甚妙。(唐慎微方)

⑰治胞衣不下。蒲黃二錢。井水服之。(集驗方)

⑱治產後下血。羸瘦逾死。蒲黃二兩。水二升。煎八合頓服。(產寶方)

⑲治產後血瘀。蒲黃三兩。水三升。煎一升頓服。(梅師方)

⑳治兒枕血殺。蒲黃三錢。米飲服。(產寶方)

㉑治產後煩悶。蒲黃方寸匕。東流水服極良。(產寶方)

㉒治墜傷撲損。瘀血在內煩悶者。蒲黃末空心溫酒服三錢。(塞上方)

㉓治關節疼痛。蒲黃八兩。熱附子一兩爲末。每服一錢。涼水下。日一。(肘后方)

㉔治陰下溼癢。蒲黃末傅三四度。瘰(千金方)

㉕治聾耳出膿。用蒲黃末摻之。(聖惠方)

㉖治口耳大衄。蒲黃阿膠炙各半兩。每用二錢。水一盞。生地黃汁一合。煎至六分。溫服。急以帛繫兩乳。止乃已。(聖惠方)

㉗治耳中出血。蒲黃炒黑。研末摻入。(簡便方)

施用宜忌 凡陰虛及無熱者禁用。

參攷資料 ①香蒲生南海池澤。蒲黃生河東池澤。四五月採之。(別錄) ②蒲黃卽蒲葦花上黃粉也。甚療血。仙經亦用之。(陶弘景)

③汴人初得。糴去滓。以水調爲膏。擘爲塊。人多食之。以解心臍虛熱。小兒尤嗜之。過月則燥。色味皆淡。須蜜水和。不可多食。令人自利。極能虛人。(寇宗奭) ④蒲黃手足厥陰血分藥也。故能治血治痛。生則能行。熟則能止。與五靈脂同用。能治一切心腹諸痛。按許叔微本事方云。有士人妻舌忽脹滿口。不能出聲。一老叟教以蒲黃。頻摻。比曉乃愈。又芝隱方云。宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃乾葦末等分乾搗而愈。據此二說。則蒲黃之涼血活血可證矣。蓋舌乃心之外候。而手厥陰相火乃心之臣使。得乾葦是陰陽能相濟也。

(李時珍) ⑤香蒲卽甘蒲。可作薦者。春初生。取白爲菹。亦堪蒸食。山南人謂之香蒲。以昌蒲爲臭蒲也。蒲黃卽此蒲之花也。(蘇恭) ⑥香

十四畫 蒲 蒨 蒨

蒲。蒲黃苗也。處處有之。以秦州者為良。春初生嫩葉。出水時紅白色。茸茸然。取其中心。入地白。蒨。大如匕柄者。生喫之。甘脆。又以醋浸。如食筍。大美。周禮謂之蒲葍。今人罕有食之者。至夏抽梗於葍葉中。花抱梗端。如武士棒杵。故俚俗謂之蒲葍。亦曰蒲葍花。其蒲黃即花中葍層也。細若金粉。當欲開時。便取之。市廛以蜜搜作果食貨。質(蘇頌)。

蒲葍。生水際。似莞而稠有脊而柔。二三月苗。採其嫩根。瀹過作餅。一宿可食。亦可煨食。蒸食。及晒乾磨粉作飲食。詩云。其藪伊何。惟筍及蒲是矣。八九月收。葉以為席。亦可作扇。軟滑而溫。(李時珍)

蒲黃。本品乃蒲葍中篩出之赤滓。故名。

古籍別名 蒲葍(綱目)

主治 炒用。瀉腸。止瀉血。血痢。

蒲黃炒阿膠。即阿膠用蒲黃拌炒成者之方。用名。詳「阿膠」條。

蒲黃炭。即蒲黃炒成炭者之方。用名。詳「蒲黃」條。

蒲楊。即水楊之古籍別名。典見古今注。詳「水楊」條。

蒲葍。即蒲葍淨之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葍」條。即蒲葍之古籍別名。典見汪蓮仕採藥書。詳「蒲葍」條。

蒲葍殼。性質 淡。效能 下水。消腫。

蒲葍。原名 香蒲。甘蒲。醜石。嫩莖。故名。本品乃香蒲之嫩莖。故名。

古籍別名 蒲葍(食物) 蒲兒根。(野榮譜)

產地 生地澤中。

形態 香蒲為水草類之一種。高五六尺。莖圓。葉細長三四尺。有平行脈。其嫩莖謂之蒲葍。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 五臟心下邪氣。口中爛臭。聖齒明目聰耳。久服輕身耐老。

歷代記述攷證 【明】寧原食鑑本草論蒲葍曰。去熱燥。利小便。【明】汪穎食物本草論蒲葍曰。生啖止消渴。【明】李時珍本草綱目論蒲葍曰。搗汁服。治妊婦勞熱煩躁。胎動下血。

蒲葍。即蒲葍。詳「青葍」條。

蒲葍。即蒲葍之古籍別名。典見爾雅。詳「蒲葍」條。

蒲葍子。即無食子之古籍別名。典見綱目。詳「無食子」條。

蒲葍子。即胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳「胡頹子」條。

蒲葍。即蒲葍之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葍」條。

蒲葍根。即蒲葍之古籍別名。典見見和漢藥考。詳「蒲葍」條。

蒲葍。即蒲葍之古籍別名。典見本草集註。詳「蒲葍」條。

蒲葍。古籍別名 烏頭苗。(郭璞) 陸英。(綱目) 葍葍(爾雅) 葍葍(別錄) 蒲葍接骨草。(綱目) 眞珠花。珊瑚花。排風色。鐵籬篋。(植物名實圖考)

外國名詞 Sambucus javana. Bl. (拉丁) ソクシ(日本)

一五六八

夏日開花。繖房花序。花小白色。雄蕊五枚。與花冠之裂片同數。互生。雌蕊一枚。花間雜以黃色小體。如杯狀。果實為小粒形。十月熟則色紅。其莖葉花子。俱可供藥用。



蒲葍

性質 酸。溫。有毒。

主治 風痿癱瘓。身痒溼痺。可作浴湯。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論蒲葍曰。浴癩癬瘡。風痺。

【清】黃元御長沙藥解論蒲葍曰。味酸微涼。入足厥陰肝經。行血通經。消痰化凝。金匱王不留行散。用之治病。金瘡。以其行血而消痰也。

配合應用 治手足偏風。風溼冷痺。寒溼腰痛。取蒲葍葉。火燎厚鋪床上。熱眠於中。冷復易之。冬月取根。春碎熬熟用。(外臺秘要方)

治脚氣腫痛。取蒲葍根

研碎。酒醋共三分。根下合蒸熟。封裹。歷上一二日。即消。並治肌膚不仁。(千金方)

⑤治渾身水腫。坐臥不得。取薊根。去皮搗汁一合。和酒一合。煨服。當微吐利以後即愈。(梅師方)

⑥治頭風旋暈。起倒無定。薊根活白石屑各一兩。枳實炒七錢。半。每服三錢。酒一盞。煎六分。溫服。(聖惠方)

⑦治產後血暈。心悶煩熱。用薊根。破如算子一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之亦速。(衛生易簡方)

⑧治寒熱往來。瘧疾不止。取薊根一大握。炙令赤色。以水煎濃汁一盞。欲發前服。服後即愈。(斗門方)

⑨治卒暴癱塊。堅硬如石。作痛欲死者。取薊根一小束。洗淨細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲速用於熱灰中。溫出藥味服之。此方無毒。已愈多人矣。(古今驗方)

⑩瘰癧惡肉。頑固不消者。取薊根。石灰各淋取汁。合煎如膏。傅

之能蝕惡肉。亦去瘰癧。此藥過十日。即無效也。(千金方)

【蒸餅】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳雷公藤條。

餅故名。 命名 本品係用小麥麵加醋糟。蒸成食品之餅故名。

採取 以臘月及寒食日。蒸之至皮裂。去皮懸之風乾。臨時以水浸服。播爛濾過。用其以果菜油膩諸物為餡者。不堪入藥。

性質 甘平無毒。

主治 消食養脾胃。溫中化滯。益氣和血。止汗和三焦。通水道。

參攷資料 ①蒸餅和脾胃及三焦藥。甚易消化。且麪已過性。不助溼熱。(李時珍) ②按愛竹談藪云。宋寧宗為郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用蒸餅。大蒜。淡豆豉。三物搗丸。令以溫水下。三十九日。今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利。故爾。若琳者。其可與語醫矣。(李時珍)

蒸 蒺 藜 蕪

十四畫 薊

【蒺藜】即刺蒺藜之原名。詳刺蒺藜條。

【蒺藜】即刺蒺藜之簡稱。詳刺蒺藜條。 ①即蜈蚣之古籍別名。典見爾雅。詳蜈蚣條。

【蕪麻子】命名 本品葉似大蕪麻。亦作蠶。蠅牛虱也。子有麻點。曰蕪麻子。

處方用名 蕪麻仁。蕪麻子。古籍別名 遠近子。脾麻子。葶麻子。(和漢藥考)

學名 Ricinus communis, H.

外國名詞 Semen Ricini (拉丁) Ricinus Leaves (英) Ricini Folia. (德)

基本 屬大戟科。為蕪麻之種子。 產地 陳仁山藥物生產辨云。草麻子產區甚廣。以安南東京內埠為多。廣東北江。清遠。下四府各省均有出。

形態 蕪麻為一年生草本。莖

高六七尺。甚者長丈餘。莖圓而中空。如竹葉巨大。其狀如橘。而深裂似掌。邊緣有粗鋸齒。具長葉柄。皆互生。葉與莖俱帶白粉。傷之則滲出白汁。梢端或葉腋。抽出花梗。長五六寸至尺許。於此開單性之花。相殺而為總狀花序。雌花之花柱在上。色淡紅。雄花在下。色淡黃。果實為有刺之蒴果。中分三房。房藏三子。子形扁平。橢圓。色黑褐。而雜以白。有光澤。長三分至五六分。上半有灰白色之小嘴。底部有臍。胚乳色白如油。味辛烈。



蕪麻子

採取 夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾。 製法 雷斅曰。凡使蕪麻子。勿用黑天赤利子。終在地裏上。是顯兩頭尖有毒。其蕪麻子。節節有黃黑斑。凡使以鹽湯煮半日。去皮取子。研用。李時珍曰。取蕪麻油法。用蕪麻子仁五升。搗爛。以水一斗。煮

之有沫。起。俟沫盡乃止。去水以沫煎至點燈不炸。滴水不散。方美。

性質 甘辛平。有小毒。

成分 主要之成分為脂肪油。

即謂之蕪麻子油。

效能 通竅道。消積滯。用作瀉下藥。又為外傳藥。治老年及虛人便秘。

作用 在胃不起作用。至小腸首段。被腺液化合而成蕪麻油酸。

能激腸之黏膜。使腸液分泌增加。能將胃內未消化之食物。及腸中之積糞。瀉下。既少刺激性。而性又和平。誠極安全之緩下劑也。若服不純潔者。或服量過多。則亦能惹起胃黏膜炎。

主治 水瀉。以水研二十枚服之。吐惡沫。加至三十枚。三日一服。達則止。又主風虛寒熱。身體疥痒。浮腫。尸注惡氣。榨取油塗之。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論蕪麻子曰。研傳瘡癩疥癩。塗手足心。催生。【宋】寇宗奭本草衍義論蕪麻子曰。治瘰癧。取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十枚。枚有效。【明】李時

珍本草綱目論蕪麻子曰。主偏風不遂。口眼喎斜。失音。口頰。頭風耳聾。舌脹喉痺。齩喘。脚氣毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅。經絡。能止諸痛。消腫。追膿。拔毒。【明】穆希雍本

草經疏論蕪麻子曰。蕪麻甘辛而其氣則平。性有小毒。其力長於收吸。故能拔病氣出外。其性善收。故能追膿取毒。能出有形之滯物。又能通利關竅。故主水瀉。又主風虛寒熱。身體疥痒。浮腫。尸注惡氣。榨取油塗之。研塗手足心。催生。寇氏

主瘰癧。李氏主偏風。半身不遂。口眼喎斜。頭風。脚氣。毒腫。丹瘤。火傷。鍼刺入肉。女人胞衣不下。及子腸挺出。皆從外治。不經內服。良有見也。子無刺者。良。子有刺者。毒。【明】李士材本草圖解論蕪麻子曰。蕪麻子辛熱有毒。服者一生勿食。炒豆。犯即脹死。且有毒損人。故不可輕服。但取外治。其用甚多。研傳瘡癩癩癧。塗足心。催生。口眼歪邪。右

歪貼左。左歪貼右。塞鼻治癩。塞耳治聾。小便不通。三粒研細入紙捻。插莖即通。子宮脫下。塗頂即收。丹

溪曰。追膿拔毒。為外科要藥。鷓鴣油能引藥氣入內。蕪麻油能拔病氣出外。偏風手足不舉。同羊脂膠香。穿山甲煎作膏。日摩數次。手臂腫痛。蕪麻搗膏貼之。一日愈。偏頭

風同乳香搗塗即止。取油法。研爛入水煮之。有沫撇起。沫盡乃止。取沫煎至滴水不散為度。善收善走。氣味頗類巴豆。外用頗奏奇功。內服不可輕率。【清】黃宮繡本草求真論蕪麻子曰。蕪麻子甘辛有熱。性味頗類巴豆。既有收引拔毒之能。復有開竅通利之力。觀書所言

搗膏以貼手臂腫痛。一夜即效。子宮脫下。用此研膏以塗頂心。即入胞衣不出。用此研膏以塗脚心。即入下中風。口眼喎斜。偏左貼右。手心偏右貼左。手心即止。至於口鼻塞。耳聾喉痺。舌脹。用油烟薰即開。水癢浮腫。用仁研服一枚。即消。針刺好肉。用仁搗敷患處。即拔。癩癧惡瘡。用仁外敷立愈。凡此皆屬外用。以奏奇功。但不宜於服耳。昔人有以汁點舌。舌根下。即不能食。點

蓄肛門內。即下血死。并云服蕪麻者。一生不得服豆。犯即脹死。其毒

可知。鹽水煮取皮研取油用。忌鐵。國外學說 日本猪子氏之和漢藥論云。蕪麻子者。原產於印度。有下泄之效。其有效成分。為蕪麻子油。及一種醱酵素。即コーベル

ト氏所謂「リチン」是也。「リチン」有劇毒。亦與他醱酵素同。加百度之溫。則全無毒。漢醫擊之。處本藥也。先以鹽湯煮半日。而葉皮用之。和語本草卷之九。故「リチン」已化為無毒。經驗與理論相符合。可謂奇矣。而蕪麻子之成分。為一種有機酸。所謂「リチール」酸是也。

近人學說 張山雷曰。蕪麻子氣味甘平。澗湖以為甘辛平。其實全無辛味。石頑以為溫。頃且恒用以消散外痔。紅腫嫩熱各症。則可證其性必曾清涼。石頑之說亦非是。其性善走善散。丹溪以為能追膿取毒。拔邪外出。甚是不確。竊願業師朱氏。世以兼治外瘡名。凡拔毒提膿藥中。從不用此。惟退消屬毒。紅腫。及發頭癩。癩癧等症。有

家製千槌膏一方。專用蕪麻子仁。杵細和乳香膠香銀珠麝香成膏。

即有紅赤嫩高勢且醜臙者亦可十消八九。則明是消散之功。何可誤認提毒外出。瀨湖以治偏風。不舉口目喝斜。蓋亦用其走竄入絡。可以通痺。非能拔出血絡經脈之風邪。且偏風喝斜等證。本是腦經爲病。何嘗有外風入絡。認症本錯。而用藥又是隔膜。一誤再誤。頭謂此法亦必無效。據綱目所載一人偏風。手足不舉。瀨湖以此油同麝香。鯉甲等作膏。摩之而愈。則真是風寒溫三氣雜至之痺着關節者。所以有驗。此辨症之不可模糊。隱約者也。丹溪又以爲能出有形之滯物。故取胎產胞衣。剝骨膿血者用之。則亦因其善走而速之使動耳。瀨湖又謂一人病手臂一塊腫痛。以此搗膏貼之一夜而愈。則即走竄消散之功耳。又謂一婦產後。子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上。頭謂此藥性情。止能流動而使之行。不能收攝而使之斂。古書謂產後腸出。子宮不上。用蓖麻仁搗塗頂心百會穴。立刻收上云云。卻已陳陳相因。數見不一。均是空中樓閣。瀨湖此說。亦是依託古

書。欺人之語。蓋蓖麻散腫之功。極驗。如果子宮子腸不收而亦用之。豈不使其正氣愈散。理當益復下墜。萬無可愈之道。此微之實驗。而擊鑿有據者。何得比附古人之空談。而陷害病家於寶禍。吾國醫籍。最多此等荒唐之說。苟非確有至理。已覺不可輕信。况似此走散之品。而反謂之能收。正是大相矛盾者耶。石頭謂研塗煉癩瘡毒癰腫。即消。則是實驗。此散之力而非收之功也。且瀨湖綱目於主治正文中。連綴治女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅。經絡三句。則不下者。必使之下。挺出者。必使之收。此物既能下胎衣。而開通關竅。經絡。又何以能收子腸。一行之中。出爾反爾。更是可駭。似此信手拈來。實是誤人不小。又主治中以消腫追膿。拔毒六字。并作一氣。則消者欲其內消。追者拔者欲其外出。凡能內消之藥。必不能拔毒。而拔毒之藥。以敷未潰之瘍。適以提之成膿。必不能消腫。亦是兩相矛盾。萬不可通。蓋瀨湖本不諳治癰之原理。以致措辭乖謬。如是。究竟蓖麻治癰。

內消最有奇功。拔毒實無能力。此頭所以謂內外分科之不足恃也。又古書皆謂蓖麻有毒。不可內服。瀨湖且謂服蓖麻者。一生不得食炒豆。犯之必腹死。一似此物必是大毒之品。所以綱目列於毒草門中。然頃幼時。家圃中種此數年。當時并不知其即是蓖麻子。但見人家炒熱食之。如落花生者。然頃全家亦炒食屢矣。約計其數。實是不少。而全家未蒙其害。至今已將四十年。亦未嘗不食炒豆。乃知宋元以後醫書。苟非親驗。多是空談。嗚呼。安得更有神農氏作。而再一親嘗之耶。

配合應用 ①蓖麻子去殼。同紫背天葵等分。清水入砂器中煮。半日。空腹時與病人嚼下。自十五枚至廿一枚。癩癧久。久自消。

②李氏云。一人病偏風。手足不舉。用此油同羊脂。麝香。鯉甲等藥。煎作摩膏。日摩數次。一月餘漸復。兼服搜風養血化痰之劑。三月而愈。又一人病手臂一塊腫痛。亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈。又一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗。搗太陽穴。一夜痛止。又一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上。此藥外用。累奏奇功。但內服不可輕率耳。或言搗膏。以筋點於鷄馬六畜舌根下。即不能食。或點肚內。即下血死。其毒可知矣。

③治口眼喝斜。蓖麻子仁搗膏。左貼右。右貼左。即正。

④又用蓖麻子仁七七粒。研作餅。有喝安在左手心。左喝安在右手心。即以銅盂盛熱水坐藥上。冷即換。五六次即正也。(婦人良方)

⑤治風氣頭痛不可忍者。乳香。蓖麻仁等分搗餅。隨左右貼太陽穴。解髮出氣甚驗。

⑥又方。蓖麻仁半兩。鹿肉十五枚。搗塗紙上。捲筒插入鼻中。下清水涕。頭痛即止。

⑦治鼻塞不通。用蓖麻仁三十粒。大棗去皮一枚。搗勻。綿裹塞之。一日一易。三十日聞香臭也。(聖濟總錄方)

⑧治舌上出血。用蓖麻子油紙擦燒煙薰鼻中自止。(摘玄方)

⑨治舌脹塞口。用蓖麻仁四十粒。去殼研油。塗紙上作燒煙霧。

之。未退再煎。以愈為度。有人舌腫出口外。一村人用此法而愈。(經驗良方)

◎治急喉痺。牙關緊急不通。用此即破。以苧麻子仁研爛紙卷作筒。燒煙熏吸即通。或只取油作擦尤妙。名聖煙筒。

◎治催生下胞。用苧麻子七粒。去殼研膏。塗脚心。若胎及衣下。便速洗去。不爾。則子腸出。即以此膏塗頂。胎自入也。(崔元亮海上集驗方)

◎治產難。取苧麻子十四枚。每手各把七枚。須臾立下也。(肘后方)

◎治子宮脫下。用苧麻仁。枯礬等分為末。安紙上托入。仍以苧麻仁十四枚研膏塗頂心即入。(摘玄方)

◎又治盤腸生產。塗頂。方同上。(摘玄方)

◎治一切腫毒。痛不可忍。用苧麻子搗敷即止也。(肘后方)

◎治半身不遂。失音不語。取苧麻子油一升。陳酒一斗。銅鍋盛油。香酒中一日。煮之令熟。細細服之。

(外臺祕要方)

◎治八種頭風。苧麻子。剛子各四十九粒去殼。雀腦芎一大塊。搗如泥。糊丸梧子大。線穿掛風處。陰乾。用時先將好末茶調成膏。子塗盃內。後將灰火燒前藥烟起。以盃覆之。待烟盡。以百沸葱湯點盃內茶。藥服之後。以綿被裹頭。臥汗出避風。(袖珍方)

◎治天柱骨倒。小兒疳疾。及諸病後。天柱骨倒。乃體虛所致。宜生筋散貼之。木鼈子六箇。去殼。苧麻子六十粒。去殼。研勻。先包頭。擦頂上令熱。以津調藥貼之。(鄧氏小兒方)

◎治五種風癩。不問年月遠近。用苧麻子仁二兩。黃連一兩。石膏水一碗。文武火煮之。乾即添水。三日兩夜。取出黃連。只用苧麻。風乾。勿令見日。以竹刀每個切作四段。每服二十段。食後荊芥湯下。日二服。終身忌食豆。犯之必腹脹而死。(衛生寶鑑方)

◎治喉中瘡腫。用苧麻子仁一枚。朴硝一錢。同研。新汲水服之。速進二三服效。(杜任方)又用苧麻

仁。荊芥穗等分為末。蜜丸綿包。噴嚔之。(三因方)

◎治水氣脹滿。苧麻子仁研水。解得三合。清且一頓服。日中當下青黃水也。或云壯人止可服五粒。(外臺祕要方)

◎治脚氣作痛。苧麻子七粒。去殼研爛。同蘇合香丸貼足心。痛即止也。(外臺祕要方)

◎治小便不通。苧麻仁三粒。研細。入紙捻內。插入莖中即通。(摘玄方)

◎治喘咳嗽。苧麻子去殼。炒熟。揀甜者食之。須多服見效。終身不可食炒豆。(衛生易簡方)

◎治催生下胎。不拘生胎死胎。苧麻二個。巴豆二個。麝香一分。研貼臍中。并足心。又下生胎。一月一粒。溫酒吞下。(集簡方)

◎治癩風鼻塌。手指攣曲。節間痛不可忍。漸至斷落。用苧麻子一兩。去皮。黃連一兩。剉豆大。以小瓶子入水一升。同浸。春夏二日。秋冬五日。後取苧麻子一枚。劈破。面東。以浸藥水吞之。漸加至四五枚。若有微利。不妨。瓶中水盡更添。兩月

後。喫大蒜猪肉試之。如不發是效也。若發動再服。直候至不發乃止。(杜任方)

◎治小兒丹瘤。用苧麻子五個。去皮研。入麪一匙。水調塗之。甚效。(修真祕旨方)

◎治瘰癧結核。苧麻炒去皮。每睡時服二三枚。取效。一生不可喫炒豆。(經驗方)

◎治瘰癧惡瘡及軟癬。用白膠香一兩。瓦器溶化。去滓。以苧麻子六十四個。去殼研碎。溶膠投之。攪勻。入油半匙。頭至點水中。試軟硬。添減膠油得所。以緋帛量瘡大小。攤貼。一膏可治三五疔也。(備門事親方)

◎肺風面瘡。起白屑。或微有赤瘡。用苧麻子仁四十九粒。白果膠。搗各三粒。瓦松三錢。肥皂一個。搗為丸。洗面用之。良。(扶壽方)

◎治面上雀斑。苧麻子仁。蜜陀僧。硫黃各一錢。為末。用羊脂和勻。夜夜傅之。(摘玄方)

◎耳卒聾閉。苧麻子一百個。去殼。與大棗十五枚搗爛。入乳小兒乳汁。和丸作餅。每以綿裹一枚。塞

之。覺中熱爲度。每一日一易。大約二十日可痊。(千金方)

⑤ 治髮黃不黑。蓖麻子仁香油煎焦。去滓。三日後類刷之。(摘玄方)

⑥ 治湯火灼傷。蓖麻子仁。蛤粉等分研膏。湯傷以油調。火灼以水調塗之。(古今錄驗方)

⑦ 治鍼刺入肉。蓖麻子去殼一箇。先以帛蓋傷處。俾之類看。若見刺出。卽拔去。恐藥緊。移上好肉。或加白梅肉同研尤好。(衛生易簡方)

⑧ 治竹木骨哽。蓖麻子仁一兩。澀水石二兩。研勻。每以一捻置舌根。嚙嚙之。自然不見。又方。蓖麻油紅麴等分。研細。沙糖丸。皂子大。綿裹含喉。痰出大良。

⑨ 治雞魚骨哽。蓖麻子仁研爛。入百藥煎研丸。彈子大。井花水化。下。卽下。

⑩ 治惡犬咬傷。蓖麻子五十粒。去殼。以井花研膏。先以鹽水洗咬痛處。乃貼此膏。(村珍方)

⑪ 治齧嚼痰嗽。用九尖蓖麻葉三錢。入飛過白礬二錢。以猪肉四

十四畫 蓖

兩。薄批。摻藥在內。荷葉裹之。文武火煨熟。細嚼。以白湯送下。名九仙散。(儒門事親方) 又治咳嗽涎喘。不問年深日遠。用經霜蓖麻葉。經霜桑葉。御米殼。蜜炒各一兩。爲末。蜜丸。彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。(普濟方)

用重 八分至錢半
施用宜忌 凡非氣壯邪實者
禁用忌鐵
參攷資料 苗葉。似葎草而大厚。莖赤有節。如甘蔗。高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑。夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾用。(韓保昇) 蓖麻莖有赤有白。中空。其葉大如瓠葉。每葉凡五尖。夏秋間極裏抽出花穗。藥葉黃色。每枝結實數十顆。上有刺。撥簇如蠅毛而軟。凡三四子合成一顆。枯時劈開。狀如巴豆。殼內有子。大如豆殼。有斑點。狀如牛蟻。再去斑殼。中有仁。嬌白如蠟。隨子仁有油。可作印色及油紙。子無刺者良。子有刺者毒。(李時珍) 蓖麻產於亞細亞中國甚多。取其子。榨取油。每十四兩。可得油三兩。

其色金黃。其臭濃者有功力。能潤瀉。男女小兒皆可服。瀉後無關係。身虛弱欲令瀉者用此尤宜。初生嬰兒尿不出者可服。婦人產後大便難可服。痢證欲先瀉去宿物者可服。腹痛欲去燥屎者可服。大人每服五錢至一兩。小兒每服一錢至四錢。若嫌氣味。用雞蛋黃攪和同服。或八角油一二滴同服。(內科新說)

【蓖麻子油】

外國名詞 Oil of Ricini

(拉丁) (Castor Oil) (英) キャシオリチ子油 (日本)

性質 有毒
主治 灸熱髮塗額上。止鼻衄
大驗

國外學說 英美學說謂蓖麻子油從蓖麻子榨出。(蓖麻俗名大麻) 產中國。印度。美國。及亞非利加等處。而蓖麻葉亦可入藥。此油在印度。埃及。希臘。阿刺伯。各國古時卽多用之。蓖麻樹原產於印度。故蓖麻樹在印度爲最多。生田邊等處。高約一丈六尺至二丈。樹餘頗大。其油爲上等藥品。又能作

點燈之用。蓖麻子有大小二種。其小者含油更多。而成色亦最佳。西國常用之。蓖麻油。大半爲印度所產。俗名冷取蓖麻油。英國亦有用蓖麻子榨油之處。間有從北亞美利加與西印度運至英國出售者。色如淡稻柴色。臭淡味輕。如尋常之油。間有少穉者。此油雖較尋常。定性油更重。而較水則輕。並有黏性。第蓖麻油之由榨取者。其性略純。以火製成者。其性頗烈。藥肆中所出售之品。必列爲兩等。製法去盡蓖麻子之皮衣。以淨核入鐵鍋。用微火炒之。此鐵鍋須按以手。覺不甚炙痛。炒畢。以螺絲柱。絞榨。而取其汁。再將油加入水和煎。其渣滓雜物。卽由浮沫溢去。而成淨油。時油中有一層白物。隔在油水交界間。恍如衣沫一層。提油時。務須將衣撤去。勿令潤於油中。由是再將油隔淨。稍和以水。同熬。其水熱至化汽散盡。方爲純淨。(其所必數次和水煎熬者。以熱時。可以水食去油內雜質) 油既純淨。雖將油入小瓶。而搖動之。亦不起白衣。其色味清而稠。無臭味。羸

十四畫 菘

其作用爲輕瀉藥。瀉力速而平和。老幼均可服。治肚腸生炎。積滯。凡應用瀉藥而不可惹其腸者。用此油最合宜。故此油爲輕性穩妥微利藥。又如痢症初起。因腸內有不消化之雜質及粘質在內。阻塞并疼。欲下不下。服此油以滑利之。則自然輕鬆。大人每服四錢至六錢。小兒每服一二錢至三四錢。或加檸檬糖。或白糖同服。服後歷三四點鐘時。必輕瀉。况常服此油。可由漸減輕。與別藥之當由漸加多者相反。凡腹中有火。皆宜服此。處方以蓖麻油二錢。薄荷油一兩。鴉片酒二十滴。和勻。治肚疼。如疼甚者服之可止。蓖麻油鴉片酒方。又蓖麻油一兩。或二兩。水糖一兩。或雞蛋黃一個。攪勻。共調和。再加溫水足十兩。作一次射之。治大便秘燥。欲藥力速。則加洋肥皂少許。助之更妙。〔蓖麻油射水方〕如服承(二)綠(即甘承)之後。而猶未瀉。宜服蓖麻油四錢。以助之。綠滑利之劑。惟此油最爲上品。而亦惟此油最爲通行。若中國所製之蓖麻油。則不純淨。故不入服劑。日本

和漢藥考曰。蓖麻子榨去油後。其餘下之渣。不惟瀉下之作用。較蓖麻子油爲劇。甚有發胃腸炎。陷於虛脫之狀態者。即此可知。蓖麻子中。除脂肪油外。必尙存有瀉下作用之物質。一說係含有個利克歌特之里企嫩 Ricinon、亞爾加羅伊特之里企嫩 Ricinin、或有毒性蛋白質之里飲 Ricin。故有上述之作用云。又荷蘭藥鏡曰。蓖麻子有斑紋之殼皮與薄膜。其瀉下之作用。殊爲猛烈。去皮膜用仁。則瀉下之效減弱。故連皮膜者。則用爲峻瀉藥。或以之吐瀉。從前用以滌除腐敗膿液。黏穢留飲等。然在易感觸之人。則胃腸必發劇甚之嫩衝及腹痛。指製等症。因是晚近已廢而不用。間有壯實之症。可以峻瀉者。亦每用巴豆油代之矣。

【蓖麻子葉】

性質 有毒。主治 脚氣風腫不仁。煎搗裹之。日二三。易即消。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蓖麻子葉曰。治痰喘咳嗽。

【蓖麻仁】即蓖麻子之處方用名。詳「蓖麻子」條。

【蒼朮】

命名 朮者山之精。服之辟穀長生。故有山精仙朮之名號。又朮字。按六書本意。係篆文。象其根幹枝葉之形也。故名。

處方用名 泔製蒼朮。製茅朮。茅朮。

古醫別名 赤朮(別錄)山精(抱朴子)仙朮(綱目)山芥。山薊。天精。天薊。地葵。抱薊。馬薊。茅君薊。藜(和漢藥考)。

外國名詞 Atractylis ovata, Thunb. (拉丁)

基本 屬菊科。爲芥朮之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。蒼朮產湖北襄陽。鄖陽。馬山口。紫荊關。京山。縣。米河等處。俱由漢口運來。名內行雙朮。身細味香辛。有產河南直隸東西北山。身懸浮。大皮黃。名爲海船津雙朮。味淡。不如清明後出新。凡山林原野。往往自生。以茅山。嵩山。生者爲佳。形體 朮爲多年生草本。春日自宿根伸出嫩芽。多被以白色之

一五七四

軟毛。其莖愈長愈堅。下部變如木質。高可二三尺。葉橢圓。末端尖。邊緣有細鋸齒。皆互生。又分裂爲三。爲五。成複葉狀。缺刻極深。至秋梢頭開似薊之花。色白。或淡紅。花作筒狀。不分瓣。遠綴爲頭狀花序。萼苞爲葉狀。排列若覆瓦。而圍以似魚骨之刺。其嫩芽與葉根。山民嘗採而煑食之。入伏後結子。至秋苗枯。根似老薑。旁有細根。作蒼黑色。肉黃白色。有油膏。



蒼朮

種植 移植種植於田間者頗多。但其栽培要點。約分數項如下。①氣候及土地。蒼朮喜溫暖氣候。而忌寒冷。故栽培蒼朮。氣候須擇溫熱者。土地則以砂質之壤土爲最佳。純砂質土次之。黏實壤土。亦可栽培。惟品質較劣。是其短也。若栽於上三者土質之外。則不能生長也。②產地及種類。吾國栽培蒼朮地方。約有四省。如四川。廣西。貴

州。福建是也。品質以廣西產者為最佳。貴州、福建產者次之。至於四川所產者。又其次也。故四川地方栽培蒼朮之人。日見其少。廣西其產出之品質良好。得利豐厚。故栽培蒼朮者。日增一日。將來吾國蒼朮中之利益。必為所掌握矣。種類無可區別。惟依栽培之早晚。而分為早植種。晚植種之二種。早植種較晚植種為劣。故栽培蒼朮。宜取廣西之晚植種為佳。治地。擇定砂質之壤土。而後耕起土塊。使之細碎。乃作高畦。畦間二尺五寸至三尺。長短不拘。畦面肥平勻。均待其栽種可也。期節。分早晚二種。早植種於春季二三月之交。從事栽植。晚植種於夏秋七八月之交。栽植之可也。栽種。取蒼朮之根。劈破之。而後插植於畦上。插植之後。上覆以細土少許。並輕壓之。為要。施肥。肥料以人糞尿為主。他若堆肥等。則不宜也。若施與之。反妨其生長。施肥次數。約可四次。第一次在栽種後十餘日時。施之。第二次在除草後。施之。第三次在中耕後。施之。第四次在末次除草

後。施之。如是則於其生長大有利益也。除草。除草可不限定次數。又不宜尅期而行。蓋或時期未至。雜草叢生。若不刈除。其生長已過於蒼朮。而蒼朮為之枯死矣。故不可尅期而行。其次數亦不可拘定也。中耕。栽植後五六十日時。行之。自種至收穫。施行一次可也。當行中耕之際。不可失度。若耕失其度。則有害於蒼朮。收穫。早種自二三月栽種。至十一月間採取。晚種自七八月栽種。至翌年三四月收穫。收穫之法。用短柄之小耙。於其株之周圍。漸漸掘鬆。而後用手拔起之。乃去其莖葉。留其根。置於日光中曝乾之。再用木製之方箱或桶。藏於其內。並密閉其蓋。置於乾燥處。如是貯藏。不論何時取用。則與初無異也。計算。每畝收量。佳者可達七八百斤。次者四五百斤。最下者一二百斤。價格之高下。隨品質之良否而定。其市價又無定總之。每畝之利。約可得數十元。採取。每年二三月八月九月採根。曬乾。

泔浸一宿入藥。寇宗奭曰。蒼朮性烈。須米泔浸洗二日。去上粗皮。用李時珍曰。蒼朮性燥。故以糯米泔浸去其油。切片焙乾用。亦有用脂麻同炒以制其燥者。性質。苦溫。無毒。效能。發汗。燥溼。升陽。解鬱。用作健胃藥。及利水與解熱藥。主治。風寒溼痺。死肌癩疽。作煎餌。久服輕身延年。〔本經〕主頭痛。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下急滿。及霍亂吐下不止。暖胃消穀。嗜食。〔別錄〕

張仲景之發明。朮之一味。經張仲景之實驗。認為「主利水也。故能治小便利。不利。旁治身煩。疼。痰飲。失精眩冒。下利。喜睡」等症。

歷代記述攷證。〔南北朝〕陶弘景本草集註論蒼朮曰。除惡氣。弭災沴。〔唐〕甄權藥性本草論蒼朮曰。蒼朮主大風癩痺。心腹脹痛。水腫脹滿。除寒熱。止嘔逆。下泄冷痢。〔宋〕大明日華諸家本草論蒼朮曰。治筋骨軟弱。痿痺氣塊。婦人冷氣。癆瘵。山嵐瘴氣。溫疾。〔金〕張元素珍珠囊論蒼朮曰。明目。暖水。〔元〕李東垣用藥法象論蒼朮曰。除溼發汗。健胃安脾。治痿要藥。〔元〕朱震亨本草衍義補遺論蒼朮曰。散風益氣。總解諸鬱。〔明〕李時珍本草綱目論蒼朮曰。治溼痰。留飲。或挾瘀血成窠囊。及脾溼下流。濁瀝帶下。清瀉腸風。〔明〕李士材本草圖解論蒼朮曰。蒼朮甘而辛。烈性溫而燥。入脾胃二經。發汗而去風寒溼。下氣而消痰食水。開鬱有神功。腫脹為要藥。化一切積塊。除諸病吐瀉。善逐鬼邪。能弭災沴。寬中發汗。其功勝於白朮。補中除溼。其力不及白朮。大抵卑監之士。宜與白朮以培之。敦阜之士。宜與蒼朮以平之。〔明〕繆希雍本草經疏論蒼朮曰。蒼朮稟初夏之氣。以生。其味苦。其氣溫。無毒。其氣芳烈。其味甘濃。其性純陽。為除風痺之上藥。安脾胃之神品。本經主風寒溼痺。死肌癩疽者。正以風寒溼三者。合而成痺。痺者拘攣而痛者。是也。經曰。地之溼氣。感則害人皮肉筋骨。死肌者。溼毒侵肌肉也。癩者。風寒乘虛客於肝脾腎所致也。

痘者脾胃虛而濕熱滲滯也。如上諸病莫不由風寒濕而成。尤有除此三邪之功。故能祛其所致之疾也。止汗除熱消食者。濕熱盛則自汗。濕邪客則發熱。濕去而脾胃燥。燥則食自消。汗自止。熱自除也。又主大風在面者。尤氣芳烈而悍。純陽之物也。風為陽邪。發於陽部。故主之也。風眩頭痛目淚出者。陽虛則風客之而眩。痰厥則頭痛。風熱壅則目淚出也。消痰水。逐皮間風水。結腫。除心下急痛。及霍亂吐下不止者。濕客於胃則滯而生痰。客於脾則生水。脾虛濕勝。則為水腫。濕客中焦則心下急滿。脾胃俱虛。則中焦不治。而濕邪客之。則為霍亂吐下不止也。利腰膝間血者。血屬陰。濕為陰邪。下流客之。使腰膝血滯。而不得通利。濕去則諸證無不愈矣。益津液。煖胃消穀。嗜食者。溼去則胃強。而津液自生。寒溼散則胃自煖。邪去而脾胃健。則消穀而嗜食矣。煎餅久煎。輕身延年。不飢者。尤為陽藥。故善除陰溼。溼去則脾胃之氣旺。陽主氣。氣盛則身輕。脾主四肢。溼去則脾健。健則

四肢利。故能涉險負重也。仙經云。氣滿不思食。是以延年而不飢也。【清】黃宮繹本草求真論蒼朮曰。蒼朮甘苦辛烈。氣溫無毒。雖有升陽散鬱。發汗除溼。燥痰辟惡。治腫之功。然甘味少而辛苦重。不似白朮性稟中和。直固清陽中氣之為妙耳。故同香附。則為散鬱而氣平。同黃柏。則能治下部溼熱。同大棗。則能治腸下飲。同二陳。加白朮升柴。則可以治脾溼下流。腸風帶濁。然必稟體肥盛多溼者始宜。若形瘦多火切忌。至云服能輕身長生。不過因其溼去之謂。豈真能入仙境之地哉。出茅山。堅小。有砂點者良。糯米泔浸焙乾。同芝蔴炒。以制其燥。防風地榆為使。【清】張隱庵本草原論蒼朮曰。白朮性優。蒼朮性劣。凡欲補脾。則用白朮。凡欲運脾。則用蒼朮。欲補運相兼。則相兼而用。如補多運少。則白朮多而蒼朮少。運多補少。則蒼朮多而白朮少。品雖有二。實則一也。本經未分蒼白。而仲祖傷寒方中。皆用白朮。金匱方中。又用赤朮。至陶宏景別錄。則分而為二。須知赤白

之分。始於仲祖。非宏景始分之也。赤朮。即是蒼朮。其功用與白朮略同。故仍以本經朮之主治為本。但白朮味甘。蒼朮兼苦。白朮止汗。蒼朮發汗。故止汗二字。節去不錄。後人謂蒼朮之味苦。其實蒼朮之味甘而微苦。【清】楊時泰本草述鈞元論朮曰。朮之用。補中益氣。力優在自。除溼快氣。能專於蒼。所謂祛邪之功。勝而益陰之效。虧者。當以坐蒼。不得概敵之自。至於燥腎閉氣。又宜坐白。不能混及於蒼。凡病脾土虛者。無論溼邪之有無。白朮皆所急需。但不宜於胃有實熱者耳。【清】鄭樹本經疏證論蒼朮曰。朮氣溫味甘苦而辛。甘能補中。苦能降泄。辛能升散。於人身脾與胃。皆管稔。藉作甘之德。脾主升舉。清陽。胃主通降。濁陰。皆屬土。而畏溼。朮之為物。開花於初夏。結實於伏時。偏於溼氣。瀰漫之際。顯其有飲有為。確可知其入脾胃。能內固中氣。外禦溼侮矣。風寒溼痺。死肌痲瘰。不得盡謂脾病。而以朮為主劑者。則以溼為脾所主。溼能為患。固屬脾氣不治一也。脾主肌肉。介在

皮毛筋骨中。毋與瘰病。在肌肉內。死肌及瘰病。在肌肉外。勞病則膏取中二也。筋骨皮毛。均非駐溼之所。惟肌肉間。為可駐溼三也。知此。則凡痺死肌瘰瘰之係乎風寒溼者。皆朮主之矣。仲景治風寒溼痺。方多有不用朮者。則用朮者。當必有故矣。痺論風寒溼三氣雜至。合而成痺。其風氣勝者。為行痺。寒氣勝者。為痛痺。溼氣勝者。為著痺。白朮之效。於風勝溼勝者。為最宜。寒勝者。為差。何以知之。蓋風勝必煩。溼勝必重。檢金匱要略中。治痺諸方。共用朮者。非彙煩必重。如麻黃加朮湯下云。身煩疼。防已黃芪湯下云。身重。桂枝附子湯去桂。加白朮湯下云。身體疼煩。甘草附子湯下云。骨節煩疼。掣痛。或身微腫。甘乾芍朮湯下云。腹重如帶。五千錢。桂枝芍藥知母湯下云。肢節疼痛。脚腫如脫。附近效方。朮附湯下云。頭重。其他若麻黃杏仁薏苡甘草湯。烏頭湯。抵當烏頭桂枝湯。大烏頭煎等方。何嘗不治痺治痺。絕不用朮。雖然。謂朮功擅於風與溼。則可謂於寒有所忌。則不可傷

寒少陰篇附子湯。治身體疼。手足寒。骨節痛。不煩不重。亦用白朮。蓋溼流關節云。骨節痛。則未有不兼溼者。別風溼二者。必挾寒始成。痺不然則否。素問之旨可驗也。或問理中丸。以吐多去朮。乃五苓散。豬苓散。茯苓澤瀉湯。偏有吐而用朮。以下多而還用朮。乃桂枝附子去桂枝加白朮湯。偏以大便艱而用朮。其義何居。夫亦當察其所因也。金匱要略嘔吐篇云。先嘔卻渴者。此爲欲解。先渴卻嘔者。爲水停心下。此屬飲家。今云中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。曰嘔吐而病在膈上後思水者。解急與之。思水者。豬苓散主之。曰胃反吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。三證皆有渴。皆欲飲水。而理中丸條。則曰霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不欲水者。理中丸主之。夫熱多欲水而用五苓。中仍有朮。寒多不欲水而用理中。亦不離乎朮。惟因吐多而去之。可見嘔吐之於朮。渴是一大關鍵。必持是定其用舍。

十四 薑 苓

不然同爲霍亂證。何以五苓散下不曰吐多去朮耶。卽理中丸下亦云渴欲得水者。加朮可驗也。雖然用朮治渴。爲嘔吐者言之耳。朮究非治渴之物也。如桂枝附子去桂加白朮湯。曰傷寒八九日風溼相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澹者。桂枝附子湯主之。若其人大便艱。小便自利者。去桂加白朮湯主之。獨提不嘔不渴二者。與嘔而渴者。恰相對照。柯韻伯曰。風寒溼三氣雜至合而成痺。故身體煩疼。不能轉側。病只在表者。用桂枝附子湯。驅風散寒。三氣自平。營衛自和。若其人又兼裏氣不和。大便反艱。小便反利。此非胃家實。乃脾家虛也。蓋脾家實腐穢當自去。此溼流肌肉。因脾土失職不能制水。故大便反見燥化。不嘔不渴。是上焦之化源清。故小便自利耳。病本在脾。法當培土以勝溼。故以白朮代桂枝。夫脾虛則溼勝而不運。溼流於內。能使大便不實。溼流於表。更能使大便不濡。脾健則能制水。水在內。能使下輪膀胱。而大便實。水在外。能使還入胃中。

而大便濡。此理中丸所以下多還用朮。而桂枝附子湯。以大便艱小便自利而將朮易桂也。白朮治眩。非治眩也。治痰與水耳。有痰與水。何以能使人眩。蓋眩者神之動。神依於心。心惡水。水盛則心神搖曳。爲眩。譬如人在舟中。能發眩也。雖然人在舟中。未必盡眩。不在舟中。未必不眩。所以眩證。不必盡用朮。用朮之飲證水證。亦未必盡眩。夫亦各因乎其人耳。飲證水證之兼眩者。在傷寒論有心下逆滿。氣上沖胸。起則頭眩之苓桂朮甘湯證。有汗出不解仍發熱。心下悸。頭眩。身暈動。振振欲僻地之真武湯證。在金匱要略有胸脇支滿目眩之苓桂朮甘湯證。有支飲眩冒之澤瀉湯證。有瘦人臍下悸吐涎沫而顛眩之五苓散證。其有飲有水。不眩而用朮者。則指不勝屈。其有飲眩而不用朮者亦多。則係證與朮有忌耳。卽如卒嘔吐。心下痞。隔間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。則以心下痞。故正與理中丸下註云腹滿者去朮。同一理也。

國外學說 蒼朮白朮爲 *Az*

Artemisia 之根莖。大小不一。往往分枝如球根狀。上端多有殘莖。有副根或癭痕等處。皆隆凸不平。外面呈黃暗褐色。有皺紋。其破碎面不平坦。有橙黃色巨大之斑點。其質甚脆。以顯微鏡檢查時。其外部有褐色之胞層。其皮部則甚厚。約等於木部之半徑。在此皮部之外方。則有少數之圓形大油室(○) (Lacuna)。含有黃色之油點。依須田氏之檢查。謂此油室白朮多於蒼朮。故氏主張。曰如果此油室內含有之揮發油。爲朮之有效成分時。則白朮之效力當勝於蒼朮也。朮有一種特異之芳香性臭氣。並且如細切蒼朮。放置後。常在其表面上發生一種微細之白色粉末狀物質。從來中醫常以蒼朮發生此種物質之多寡。判斷其良否。而細檢此物質。則爲多數之細而柔軟之結晶。且具有特異之香氣。故 Shimoyama u. Shirano 氏遂得蒼朮搗碎。盛入瓶中。付以冷卻器。適以水蒸氣。蒸餾氣之得。有同樣臭氣之淡褐色之揮發油。謂其係一種 *Sesquiterpen*。

一五七七

十四畫 蒼

alcohol。放置數日後。則化為柔
顛之白色針狀結晶。依青井氏言
其含量之多寡。與蒼朮品質之良
否。有重大之關係。最上品約含七
乃至五%。下品之含量則極微。復
以此白色針狀結晶溶之於酒精。
後更加水至生白濁乃止。如是靜
置時。則生白色長針狀有光輝之
結晶。因其原植物為 Atractylis
遂命名為「Atractylol」。後經
Uono 氏之化學的試驗。定其化
學式為 $C_{12}H_{18}O_2$ 。至 1903 年
Gadamor u. T. Ame-nomyra
二氏以精細的化學的實驗。改其
化學式為 $C_{12}H_{18}O$ 。並因其不
能成 Escher 及 Droshan。謂其
屬於第三級之 Alcohol。又因
其如合蟻酸加熱時。則易分解其
水分。化為屬於有二個二重結合
Sequiorpon 之「Atractylon」
故推想為其屬於雙環性之化合
物。至 1921 年 S. Takagi u. G.
Hongo 二氏在割溫蒸餾蒼朮
揮發油中。又得一種性質甚合安
定之成分。命名為「Atractylon」
用木精精製時。得白色矩形版狀

之結晶。易溶於溫水。酒精。難溶於冷
水。精。具蒼朮特有之香氣。熔點
 $131-132^{\circ}$ 。沸騰點 $131-132^{\circ}$ 。如接觸
其少量於用濃鹽酸浸潤過之松
木片時。則呈極新鮮之紫色。又加
Atractylon 之少量於其加過
Vanilin, Erorotropin, An-
isaldelyd 之濃鹽中時。則呈極
美麗之櫻實紅色。而此等反應恰
如癩草中之 Keisayalalcohol
之呈色反應。氏又定其化學式為
 $C_{12}H_{18}O$ 。由是觀之。蒼朮中之
有效成分為 Atractylol ($C_{12}H_{18}O$)
及 Atractylon ($C_{12}H_{18}O$) 二者明矣。

行人相沿成習。牢不可破。其意殆與
西醫之免疫法相仿。雖然蛇蟲疾
病之來。常有定時。對於平日之清
潔衛生。漫不講求。而欲於平安無
事之一日。為此迂遠之預防。不亦
愚哉。入夏以後。天氣酷熱。蟲類繁
生。病毒流布。霍亂瘧疾。諸傳染症。
繼起疊出。故預防之道。應以夏初
為始。深秋為終。庶或近是。焚燒藥
品。為滋蕩空氣之一法。與西醫之
蒸氣消毒藥品消毒。其義略同。蓋
空氣初本純潔。自動植物發生
之氣。與人工造出之氣。混和於空
中。而空氣始不潔。空氣不潔。始影
響於接觸物者。其害甚大。如風瘴
之氣。病房臥室之氣。動植物腐敗
之氣。廢井廢坑之氣。花木之氣。均
足以敗壞生理。而發生當然之疾
病。惟藥品之氣。能補救之。綠藥品
之氣。之影響於接觸物者。其效亦
偉。故焚燒蒼朮白芷之氣。能辟除
空氣之穢惡。確有功效也。稱考蒼
朮之性味。本草註云。為除邪氣之
上品。又曰。辟一切風。瘴邪。惡鬼氣。
陰溼之處。焚之更佳。白芷芳香辛
燥。祛風氣。除穢溼。能解吐毒。蛇傷

一五七八

通竅辟惡。夫所謂邪惡鬼氣者。非
真有邪惡鬼氣之一物。實即空氣
中劇烈之病毒也。陰溼穢溼者。即
陽光不到之處。水分太濃。微生物
之出產地也。蒼朮。白芷。具此特性。
且價廉易得。不妨預為購置。設遇
時疫流行之際。藉此以消弭病毒。
詎不美善。並可摻入大黃。降香。雄
黃。砒石等。定以限制。將室內門戶
緊閉。煨燒若干時。俟煙消焰滅。方
可入內居住。則費省事簡。未始不
可於消毒法上。別創一格。願醫藥
界其研究之。⑤買九如曰。蒼朮味
辛。主散。性溫而燥。燥可去溼。專入
脾胃。主治風寒溼痺。山嵐瘴氣。皮
膚水腫。皆辛烈逐邪之功也。統治
三部之溼。若溼在上焦。易生溼痰。
以此燥溼行痰。溼在中焦。滯氣作
瀉。以此寬中健脾。溼在下部。足膝
痠軟。以此同黃柏治痿。能令足膝
有力。取其辛散氣雄。用之散邪發
汗。極其暢快。合六神散。通解春夏
溫熱病。佐柴葛解肌湯。表散瘧疾。
初起。若熱病汗下後。虛熱不解。以
此加入白虎湯。再解之一服。如神。
汗止身涼。總仲淳用此一味為末。

治脾虛羸脹妙絕。稱為仙朮。張山雷曰。本經別錄。皆無蒼朮白朮之分。而所言朮之主治。風寒溼痺云云。多屬蒼朮之功。陶隱居等且明言求以茅山為勝。是古人所用。即蒼朮也。但今既以蒼白二者分用。則蒼朮芳香。尤為雄厚。祛風逐溼。固以氣味見長。不比白朮沖和。尚在多守少走之例。專以補土為功也。輕用七八分。至一錢五分。如其溼濁瘧寒。舌苔垢厚者。可用至三錢。茅山朮味苦氣雄。芳香辟穢。微上徹下。除溼發汗最良。滋飲開痰。胸痞滿悶奇驗。舉脾家之清氣。助消化則可加餐。開蒙蔽之陰霾。振精神而醒倦意。勝四時不正之氣。解山嵐瘴癘之病。清頭目之昏蒙。健腰膝之重墜。願脹重滿。瀉利腸辟。辟穢為最積也。如屬溼濁。皆是專司。霍亂時行。夏秋痧閉。垢膩舌苔。無非主將。脚腫腰弱。痿痺胥胝。流注瘡癤。疥癬同治。又曰。蒼朮氣味雄厚。較白朮愈猛。能徹上徹下。燥溼而宣化。痰飲。芳香辟穢。勝四時不正之氣。故時疫之病。多用之。最能驅除穢濁惡心氣。陰霾

十四畫 蒼

之域。久曠之屋。宜焚此物而後居人。亦此意也。凡溼困脾陽。倦怠嗜臥。肢體痠軟。胸膈滿悶。甚至臌脹。而舌潤厚膩者。非茅朮芳香猛烈。不能開泄。而痰飲瀰漫。亦非此不化。夏秋之交。暑溼交蒸。溼溫病寒熱頭脹如裹。或胸痞嘔噦。皆須茅朮。馨香佩蘭葉等香燥醒脾。其應如響。而脾鬱熱溼。或為臌脹。或為腫滿。或為瀉泄瘧痢。或下流而足重附腫。或積滯而一便不利。及溼熱鬱蒸。發為瘡瘍流注。或寒溼互結。發為陰疽痲痛。但有舌濁不渴。見證。茅朮一味。最為必需之品。是合內外各病。皆有大用者。而庸俗每畏其燥烈。而不敢用。亦祇見其識證不清耳。蒼朮求以產茅山者為佳。故有茅朮之名。氣濃厚。其力尤弘。今所通用。皆茅朮也。

配合應用 ①朮為陽草。氣勝黃精。除溼祛寒。疎風辟惡。其功能也。單餌則延年輕身不飢。兼濟則觀所從何道。故同人參、茯苓、白芍、藥、甘草、橘皮、蓮肉、縮砂、則健脾開胃。消飲食。為壯脾胃之要劑。調中之正法。

①同蒼朮、橘皮、茯苓、人參、木瓜、豬苓、澤瀉、縮砂、則治霍亂吐瀉轉筋。
 ②同乾葛、防風、茯苓、炙甘草、車前子、豬苓、澤瀉、則治溼勝作泄若雷奔。
 ③同秦艽、革薢、木瓜、薏苡仁、桑寄生、石斛、黃耆、地黃、石菖蒲、桂枝、甘草、晚蠶沙、則治一切痛痺及關節不利。熱者去桂枝。加黃蘗。
 ④得黃蘗、牛膝、木瓜、石斛、能健步潛行。
 ⑤得苦參、牡蠣、治小兒胃家溼熱。飲食不生肌肉。
 ⑥君人參、芍藥、木瓜、薏苡、茯苓、桑白皮、赤小豆、車前、橘皮、佐以豬苓、澤瀉、能治一切水腫。日重則倍。人參、夜重則加地黃、芍藥、俱與朮倍。

⑦君枳實、橘皮、砂仁、半夏、人參、則除心腹脹痛。消宿食。開胃去痰。涎。除傷食發寒熱及泄瀉。
 ⑧同人參、橘紅、白茯苓、木瓜、薑香、治反胃吐逆。因於寒則加生薑。因於熱則加竹茹、枇杷葉、逆水煎根。
 ⑨君黃耆、生地黃、佐以黃蘗、治一切癰疽溼毒。攻注足腫成瘡。久不愈作丸餌良。
 ⑩倍茯苓修事。如經驗方。能烏髮駐顏。
 ⑪同麥門冬、石斛、黃蘗、白芍藥、木瓜、薏苡仁、五味子。為治癰要藥。
 ⑫同生薑、薑香、檳榔。能治山嵐瘴氣。
 ⑬同四物湯。麥門冬、荊芥、防風、地榆。能治腸風下血。
 ⑭同雄羊肝。治雀盲。
 ⑮同補骨脂、川椒、茴香、青鹽、川棟子、黃蘗。治疝。
 ⑯同熟地、桑椹修事。採日精月華。乾則蜜丸。日三服。可變白。
 ⑰為末。和芝麻研爛。入水攪勻。絞汁濾淨。曝乾。每三錢。空心酒服。能滋脾胃。
 ⑱服朮法。烏髮髮。駐顏色。壯筋骨。明耳目。除風氣。潤肌膚。久服令人輕健。蒼朮不計多少。採泔水浸三日。逐日換水。取出刮去黑皮。切片曬乾。慢火炒黃。細搗為末。每一斤。用蒸過白茯苓末半斤。煉蜜和丸。梧子大。空心臥時熱水下十五

十四畫 蒼

丸別用朮末六兩甘草末一兩并和作湯點之吞丸尤妙。忌桃李雀蛤及三百諸血(經驗方)

◎蒼朮膏。除風溼。健脾胃。變白。駐顏補虛損。大有功效。蒼朮新者刮去皮薄切。米泔水浸二日。一日一換。取出以井華水浸過二寸。春秋五日。夏三日。冬七日。流出以生絹袋盛之。放在一半原水中。揉洗津液出。扭乾。將渣又搗爛。袋盛於一半原水中。揉至汁盡。為度。將汁入大砂鍋中。慢火熬成膏。每一斤入白蜜四兩。熬二炷香。每膏一斤入水澄白茯苓末半斤。攪勻。瓶收。每服三匙。使早臨臥各一服。以溫酒送下。忌醋及酸物。桃李雀蛤。蒸菜青魚等物。(鄧才筆靈雜興方)

◎蒼朮膏。治脾經滯氣。少食足腫無力。傷食酒色過度。勞逸有傷。骨熱。用鮮白蒼朮二十斤。浸刮去粗皮。曬切。以米泔浸一宿。取出。同溪水一石。大砂鍋慢火煎半乾。去渣。再入石南葉三斤。刷去紅衣。積實子一斤。川當歸半斤。甘草四兩。切。同煎黃色。漉去渣。再煎如稀粥。乃入白蜜三斤。熬成膏。每服三五錢。空心好酒調服。(吳球活人心統方)

◎蒼朮丸。清上質下。兼治內外障。眼。茅山蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。用酒醋糯米泔各浸三日。一日一換。取出洗搗曬焙。以黑脂麻同炒香。共為研末。酒煮麵糊丸。梧子大。每空心白湯下五十九丸。(瑞竹堂方)

◎八制蒼朮丸。疎風順氣。養腎。治腰脚滯氣。痺痛。用蒼朮一斤。洗刮淨。分作四分。用酒醋米泔鹽水各浸三日。曬乾。又分作四分。用川椒紅茴香。補骨脂。黑牽牛各一兩。同炒香。揀去不用。只取朮。研末。醋糊丸。梧子大。每服五十九丸。空心鹽酒送下。五十歲後加沉香末一兩。(永類鈴方)

◎蒼朮散。治風溼。常服壯筋骨。明目。蒼朮一斤。粟米泔浸過。竹刀刮去皮。半斤以無灰酒浸。半斤以童子小便浸。春五。夏三。秋七。冬十日。取出淨地上。搗一坑。炭火煉赤。去炭。將浸藥酒傾入坑內。却放朮在中。以瓦器蓋定。泥封一宿。取出為末。每服一錢。空心溫酒或鹽湯下。

下。

◎六制蒼朮散。治下元虛損。偏墜。莖痛。茅山蒼朮淨刮六斤。分作六分。一斤倉米泔浸二日。炒。一斤酒浸二日。炒。一斤青鹽半斤。炒。黃去鹽。一斤小茴香四兩。炒。黃去苗。一斤大茴香四兩。炒。黃去苗。一斤用桑椹子汁浸二日。炒。取朮為末。每服三錢。空心溫酒下。(萬表積善堂方)

◎固真丹。燥溼養脾。助胃固真。茅山蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分青鹽一兩。炒。一分川椒一兩。炒。一分川棟子一兩。炒。一分小茴香。破故紙各一兩。炒。並揀朮研末。酒煮麵糊丸。梧子大。每空心米飲下五十九丸。又乾坤生意平補固真丹。治元臟久虛。遺精白濁。婦人赤白帶下。崩漏。金州蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分川椒一兩。炒。一分破故紙一兩。炒。一分茴香。食鹽各一兩。炒。一分川棟子一兩。炒。取淨朮為末。入白茯苓末二兩。酒洗當歸末二兩。酒洗麩糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十九丸。(瑞竹堂方)

◎固元丹。治元臟久虛。遺精白

一五八〇

濁五淋。及小腸膀胱疝氣。婦人赤白帶下。血崩。便血等病。以小便類數為效。好蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分小茴香。食鹽各一兩。同炒。一分川椒。補骨脂各一兩。同炒。一分川烏頭。川棟子肉各一兩。同炒。一分用醇醋。老酒各半斤。同煮乾。焙。連同炒藥。通為末。用酒煮糊丸。梧子大。每服五十九丸。男以溫酒。女以醋湯。空心下。此高司法祕方也。(百一選方)

◎少陽丹。蒼朮米泔浸半日。刮皮。曬乾。為末一斤。地骨皮。溫水洗淨。去心。曬研一斤。熟桑椹二十斤。入盆。揉爛。細袋壓汁。和末如糊。傾入盤內。日曬夜露。採日精月華。待乾研末。煉蜜和丸。赤小豆大。每服二十九丸。無灰酒下。日三服。一年變髮返黑。三年面如童子。(劉松石保壽堂方)

◎補脾滋腎。生精強骨。真仙方也。蒼朮去皮五斤。為末。米泔水漂澄。取底用脂麻二升半。去殼研爛。細袋濾去渣。澄漿并朮。曬乾。每服三錢。米湯或酒空心調服。(孫氏集效方)

③治面黃食少。男婦面無血色。食少嗜臥。蒼朮一斤。熟地黃半斤。乾薑炮。冬一兩。春秋七錢。夏五錢。爲末。糊丸。梧子大。每溫水下五十丸。(濟生投率方)

④治小兒疳疾。蒼朮四兩爲末。羊肝一具。竹刀批開。撒朮末。線縛入砂鍋。煮熟。搗作丸服。(生生編方)

⑤治男子婦人。因食生熟諸物。留滯腸胃。遂至生蟲。久則好食生米。否則終日不樂。至憔悴。痿黃。不思飲食。以害其生。用蒼朮米泔水。浸一夜。剉焙爲末。蒸餅丸。梧子大。每服五十丸。食前米飲下。日三服。(經驗方)

⑥治腹中虛冷。不能飲食。食輒不消。羸弱生病。朮二斤。麴一斤。炒爲末。蜜丸。梧子大。每服三十九丸。米湯下。日三服。大冷加乾薑三兩。腹痛加當歸三兩。羸弱加甘草二兩。(肘後方)

⑦治脾溼水瀉。注下。因弱無力。水穀不化。腹痛甚者。用蒼朮二兩。白芍藥一兩。黃芩半兩。淡桂二錢。每服一兩水。一盞半。煎一盞溫服。

⑧治頭微痛。去芍藥。加防風二兩。(保命集方)

⑨治暑月暴瀉。壯脾溫胃。飲食所傷。麴朮丸。用神麴炒蒼朮。米泔浸一夜。焙等分爲末。糊丸。梧子大。每服三五十九丸。米飲下。(和劑局方)

⑩治發瀉久痢。椒朮丹。用蒼朮二兩。川椒一兩爲末。醋糊丸。梧子大。每服二十九丸。食前溫水下。惡痢久者加桂。(保命集方)

⑪治脾溼下血。蒼朮二兩。地榆一兩。分作二服。水二盞。煎一盞。食前溫服。久痢虛滑。以此下桃花丸。(保命集方)

⑫治腸風下血。蒼朮不拘多少。以皂角按濁汁。浸一宿。煮乾。焙研爲末。麴糊丸。如梧子大。每服五十丸。空心米飲下。日三服。(婦人良方)

⑬治溼氣身痛。蒼朮泔浸切。水煎。取濃汁。熬膏。白湯點服。(簡便方)

⑭補虛明目。健骨和血。蒼朮泔浸四兩。熟地黃焙二兩爲末。酒糊丸。梧子大。每溫酒下三五十九丸。日

三服。(普濟方)

⑮治背盲雀目。用蒼朮四兩。泔浸一夜。切焙研末。每服三錢。豬肝三兩。批開。摻藥在內。扎定。入粟米一合。水一碗。砂鍋煮熟。煎服。臨臥食肝飲汁。不拘大人小兒皆治。又方。不計時月久近。用蒼朮二兩。泔浸焙搗爲末。每服一錢。以好羊子肝一斤。竹刀切破。摻藥在內。麻扎以粟米泔煮熟。待冷食之。以愈爲度。(聖惠方)

⑯治眼目昏澀。蒼朮半斤。泔浸七日。去皮。切焙。木賊各二兩爲末。每服一錢。茶酒任下。(聖惠方)

⑰治嬰兒目澀不開。或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。扎煮。將藥氣熏眼後。更嚼取汁與服。妙。(幼幼新書方)

⑱治風牙腫痛。蒼朮鹽水浸過。燒存性。研末。揩牙去風熱。(普濟方)

⑲治脾蟲怪病。腹中如鐵石。脾中水出。旋變作蟲。行邊身。屢難忍。攪持不靈。用蒼朮濃煎湯浴之。仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。(夏子益奇疾方)

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛有熱及燥結多汗者禁用。忌桃李、葱、菜、雀肉、青魚、防風、地榆爲之使。

著名方劑 ①三妙丸。治三陰血虛。足心如火。熱漸及腰膝。溼熱麻痺。疼痛。痿軟等症。(丹溪方) 蒼朮六兩。黃柏四兩。牛膝二兩。右爲細末。酒糊丸。②平胃散。治溼淫於內。脾胃不能。尅制。有積飲。痞膈。中滿者。(東垣方) 蒼朮四兩。陳皮二兩。厚朴三兩。甘草一兩。右選瓊水煎。易筒加茯苓、丁香、名六味平胃散。治胃寒嘔吐。加縮砂、香附。名八味平胃散。治中膈痞塞。加山查、神麴、麥芽。名加味平胃散。消宿食。加香附、枳殼、藿香、砂仁、木香。名香砂平胃散。治傷食。本方加砂仁、藿香。名神朮散。治時氣發熱。停食。吐瀉等症。③越鞠丸。治一切氣血痰火。溼食諸鬱。(丹溪方) 蒼朮、香附子、撫芎、神麴、梔子。各等分。右爲末。水丸。每服五十丸。

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

⑳參攷資料。蒼朮長如大母指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮篋促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

本經止言朮。未分言蒼白。只緣陶隱居言朮有兩種。自此人多貴白者。往往將蒼朮置而不用。如古方平胃散之類。蒼朮為最要藥。功效尤速。殊不詳本草原無白朮之名。積康曰。聞道人遺言。餌朮黃精。令人久壽。亦無白字。用宜兩審。寇宗奭曰。脾精不禁。小便瀉。濁淋不止。腰背酸疼。宜用蒼朮。以斂脾精。精生於穀。故也。弘景曰。白朮少膏。可作丸散。赤朮多膏。可作煎用。昔劉涓子採取其精丸之名。守中金丸。可作長生。楊士瀛曰。服食多單餌朮。或合白茯苓。或合石菖蒲。並搗末。但日水服。晚再進。久久彌佳。斷取生朮。去土水浸。再三煎。如飴糖。酒調飲之。更善。今茅山所造朮煎。是此法也。陶隱居言取其精而丸之。今乃是膏。煎恐非真也。蘇頌曰。梁庾肩吾答陶隱居書。朮煎。啓云。綠葉抽條。紫花標色。百邪外禦。六腑內充。山精見書。華神在錄。木榮火謝。盡採擷之難。啓曰。移中窮淋瀝之劑。又謝朮燕啓云。味重金漿。芳醴玉液。足使坐致延生。伏深銘感。又葛洪抱朴子內篇。

云。南陽文氏。漢末逃難。壺山中。饑困欲死。有人教之食朮。遂不饑。數十年。乃還鄉里。顏色更少。氣力轉勝。故朮一名山精神。農藥經所謂必欲長生。常服山精是也。唐慎微曰。按吐納經云。紫微夫人朮序云。吾察草木之勝。速益於己者。並不及朮之多驗也。可以長生。久視。遠而更靈。山林隱逸。得服朮者。五嶽比肩。又神仙傳云。陳子皇得餌朮要方。其妻姜氏得疫病。服之自愈。顏色氣力。如二十時也。李時珍謹按。已上諸說。皆似蒼朮。不獨白朮。今服食家亦呼蒼朮為仙朮。故皆列於蒼朮之後。李時珍曰。按中國二朮。顯然兩種。日本以二朮為一物。宿根如老薑。蒼色者為蒼朮。嫩根白色者為白朮。然藥肆皆誤以宿根為白朮。以嫩根為蒼朮。或蒼白相混。不可不擇。其苗高二二尺。一朵三葉。末作鋸齒。而有毛。四五月開花。青色。結子大如小豆。蓋生山中者。葉硬有微刺。人家栽種者。葉軟無刺。其葉及根形香氣。中日相似。獨花色為異。且白朮根形。不似鼓。唯似雲頭朮耳。出

備後。三原者良。伊豫。今治次之。武州。江戶。葛州。廣島。奧仙臺。又次之。和漢藥考曰。蒼朮春生苗。莖多白毛。體二三尺。葉似匕頭。而堅。青綠色。有細鋸齒。秋莖端開白花。似小菊花。或有紫赤色者。根如老薑。晚秋苗葉枯。冬日採根。古方藥品考曰。中日所產之蒼朮。其形狀微有不同。然亦僅根莖有大小耳。其上部皆留有餘莖。外面為黃褐色。有皺紋。被以白色之塵粉。內作黃白色。略似生薑。質頗堅。氣芳香。味甘苦。和漢藥考曰。蒼朮藏貯日久。則外面生白色之塵粉。試以顯微鏡檢視之。則見為結晶體。已故下山博士嘗將蒼朮蒸餾。得白色之結晶體。水不能溶解。酒精伊打始溶解之。與樟腦或第二酒精。相類似。惟樟腦之熔點。須百九十五度。沸騰點為二百十度。相差祇十五度。該結晶則不然。六十二度已溶解。必二百七十一二度始沸騰。藥學雜誌曰。中國運來之朮。有蒼白二種。而蒼朮為勝。形似老薑。皮茶褐色。肉黃赤色。味苦辛。氣芳烈而多膏。剉貯

則生白衣。是為上品。其輕嫩少膏者。下品也。白朮形如蒼朮。而磨小作極。皮褐色。味甘微苦。氣芳香。所謂雲頭朮是也。日本亦有數種。一種為佐渡蒼朮。形似中國產。而體重多膏。對貯便生白衣。味苦辛微甘。氣芳烈。此為佳品。出佐州。一種為唐種蒼朮。亦似中國產。而氣味不厚。是為中品。一種為和加根白朮。亦呼計豆里白朮。是採蒼朮嫩根。刮去粗皮製之。非白朮也。出和州。丹州。信州。奧州。又有唐種白朮。形味皆與中國產相似。乃享保中擺漢種栽成者。出和州。本經云。朮一名山薊。卽蒼朮也。詳見圖經。李時珍曰。張仲景時。一切驅氣用赤朮。赤朮卽蒼朮也。由是觀之。張仲景用蒼朮明矣。古方藥品考曰。中國產之蒼朮。氣味俱厚。為上品。日本產次之。蘇頌曰。古方所用之朮。皆白朮也。李時珍曰。古方二朮通用。後人始有蒼白之分。今日本藥舖所稱日本白朮。實皆蒼朮。非白朮也。日用藥品考曰。朮有蒼白之別。今藥舖以老根為蒼朮。嫩根為白朮。其實不論老嫩。皆是蒼

朮。文化年間。有種出中國稱嫩根者。下品也。所謂老根者。根形不一。切之則生白脂。嫩根則無白脂。並不潤澤。中國種嫩根。雖生宿根。不朽。日本產異是。日本種之老根。朮多山中自生。其根至二年。旁生嫩根。此時宿根漸變細長。莖葉俱抽。自嫩根。經三年後。宿根遂次第枯朽。此皆老根也。採之者往往以嫩根宿根並採混售。冀圖厚利。不論老嫩。均以甲州郡內所產為勝。白朮之大者。名雲頭朮。川州產也。別有一種。雖係川州之種。而質出白三好。名三好朮。此則無老根嫩根之別。(手板發蒙)

【蒼朮莖苗】

主治 去水。止自汗。作飲甚香。

【蒼石】即特生磐石之古籍別名。典見別錄。詳「特生磐石」條。

【蒼耳子】

原名 蒼耳子。命名 本品葉形如

蒼耳。故有蒼耳之稱。即爾雅所謂蒼耳。入藥有用其實者。故曰蒼耳子。

古醫別名 地葵子。胡亥子。(本經) 常思。桑子。菴子。羊真來子。

十四畫 蒼

(弘景)卷耳子。(詩經)爵耳子。耳瑤。(詩疏)緒耳子。喝起草子。野茄。繖絲草子。(綱目)道人頭。(爾雅)進賢菜子。(記事珠)瑤草子。隻刺。胡荽子。野落蘇。繖絲菜子。吐吐古个里。(和漢藥考)

基本 屬菊科。為雄蒼耳之子。實。

產地 各處多產之。陳仁山藥物生產辨云。蒼耳子。廣東各屬均有出。但以北江石潭清遠為多出。西江亦有出。

形態 蒼耳為一年生草本。溫帶地方多有之。自生原野間。莖高四五尺。葉互生。為卵圓形。末端帶尖。邊緣有缺刻及鋸齒。具葉柄。頗似茄葉。莖莖生有短毛。夏日。梢頭及莖端俱開小花。白而帶綠色。雌雄單性。雌花隱於總苞之底。雄花則密生末端。花後結實。長四分許。外面黃白色。兩端稍尖。被以無數之刺。熟則刺愈堅剛。能鉤著人之衣服。

採取 秋季實熟時採之。製法 大明曰。入藥炒熟。搗去刺。用或酒拌蒸過用。

性質 甘。溫。有小毒。效能 輕清發散。祛風化熱。用作發汗藥。及為鎮痙藥。

主治 風寒頭痛。風溼周痺。四肢拘攣痛。惡肉死肌。(本經) 膝痛。痰毒。久服益氣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蒼耳子曰。治肝熱明目。

【宋】大明諸家本草論蒼耳子曰。治一切風氣。填髓。暖腰脚。治癩瘰癧。疥。及痿癱。【明】李時珍本草綱目論蒼耳子曰。炒香浸酒服。去風

補益。【明】繆希雍本草經疏論蒼耳子曰。蒼耳。蒼耳也。味甘。溫。而別錄益之以苦。當是無毒。葉味苦辛。微寒。有小毒。苦以燥溼。甘以和血。溫則通暢。春氣發生而升。故主風

突頭痛。風溼周痺。四肢拘攣。惡肉死肌。膝痛。痰毒也。祛風療溼之藥。食療聖惠千金外臺祕要諸方。咸堪選用。【清】黃宮繡本草求真論

蒼耳子曰。蒼耳子味苦而甘。氣溫無毒。凡人風溼內淫。氣血阻滯。則

而上。腦項下而足。膝內而骨體。外而皮膚。靡不病症悉形。而致症見

疥癬。遍身周痺。四肢拘攣。骨節癱

腫。頂風痛。疔蟲溼。惡肉死肌。疔腫痔漏。腰重膝風。按此者能燥

溼。溫能通活。為祛風療溼之聖藥。或作膏。或作湯。浴自然風除溼祛

血活氣行。而症即愈。但此通頂速。腦下達。督脈。服此最忌猪肉。及風

邪觸犯。則遍身發出赤丹。而致病亦增甚耳。【清】張隱庵本草崇原

論蒼耳子曰。蒼耳本經名蒼耳。賅莖葉而言也。今時用實名蒼耳子

子。內仁。氣味甘。溫。外多毛刺。故

有小毒。花白實黃。稟陽明燥金之

氣。金能制風。故主治風寒頭痛。謂

頭受風邪。為寒為痛也。燥能勝溼。故主治風溼周痺。四肢拘攣。謂

風溼之邪。傷周身血脈。而為痺。淫

於四肢。而為拘攣疼痛也。夫周痺

則周身血脈不和。周痺可治。則惡

肉死肌亦可治也。四肢拘攣痛可

治。則膝痛亦可治也。久服則風溼

外散。經脈流通。故益氣。

近人學說 張山雷曰。蒼耳

子。溫和疏達。流利關節。宣通脈絡。

偏及孔竅肌膚。而不偏於燥烈。乃

主治風寒溼三氣痺者之最有功

而馴良者。又獨能上達頂。疏通

膺戶之風寒。為頭風病之要藥。而無辛香走竄。升泄過度。耗散正氣之慮。以視細辛。羌活等味。功用近似。而儒將風流。迥與鬚髯翁張。戟手怒目者。異其態度。即例以川芎。白芷等物之。以氣為勝者。猶難同日而語。但和緩有餘。恐未易尅日奏功耳。斗門方謂婦人血風攻腦。頭旋猝倒。不省人事者。用蒼耳草嫩心。陰乾為末。酒服甚效。此味善通頂門。達腦。能走脊蝦也。頃案頭旋猝倒。不省人事。確是氣血上升。激動腦經之病。斗門方能知是血風攻腦。其善悟誠不可及。但此是內動之風。正惟風陽陡動。所以猝然眩暈。便能傾仆。治法止有潛陽息風。抑之下降。則氣火平而風自息。腦神經不受震越。而其病可愈。斷不可雜以一味動風之藥。助其升騰。為虎傅翼。蒼耳治風。亦是疏泄外風。非安靜鎮定之質。對於此病。亦在禁例。况又助之以酒。為害後當如何。則論病是而用藥非。仍是古人續命湯之謬見。須知所謂通頂門達腦善走脊脈。皆升騰以泄外來寒風之法。真是蕩釐千里。

其誤甚大。雖然。二千年來治內風病者。幾於無一不誤。於斗門何尤。頗極佩其血風攻腦四字。頗似識得內風上攻為病。乃數百年醫家未知之奧義。故備論之。亦春秋責備賢者之意也。

配合應用 ●治久瘧不瘥。蒼耳子或根莖亦可。焙研末。酒糊丸。梧子大。每酒服三十丸。日二服。生者搗汁服亦可。(朱氏集驗方)

●治大腹水腫。小便不利。蒼耳子灰。葶藶末等分。每服二錢。水下。日二服。(千金良方)

●治風溼痺痺。一切風氣。蒼耳子三兩。炒為末。以水一升。半煎取七合。去滓呷之。(食醫心鏡方)

●治牙齒痛腫。蒼耳子五升。水一斗。煮取五升。熱含之。冷即吐去。吐後復含。不過一劑。莖葉亦可。或入鹽少許。(千金翼方)

●治鼻淵流涕。蒼耳子即綠絲草子炒。研為末。每白湯點服一二錢。(證治要訣方)

●治眼目昏暗。蒼耳實一升。為末。白米半升。作粥。日食之。(普濟方)

●治嗜酒不已。菘中蒼耳子七枚。燒灰。投酒中飲之。即不嗜。(陳藏器方)

用鹽 錢半至二錢。
施用宜忌 凡無風熱之邪者。禁用。忌猪肉。馬肉。米泔。

著名方劑 蒼耳散。治鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。(陳無擇方) 蒼耳子(炒)二錢。半。辛夷仁半兩。白芷一兩。薄荷五分。右為末。每服二錢。用葱茶清。食後調服。

參攷資料 ●蒼耳藥久服去風熱有效。最忌猪肉及風邪。犯之則通身發出赤丹也。按蘇沈良方云。蒼耳根苗莖實。皆洗濯陰乾。燒灰。湯淋取濃汁。泥連兩籠煉之。灰汁耗。即旋取傍釜中熱灰湯益之。一日夜不絕火。乃旋得霜乾。甕瓶收之。每日早晚酒服二錢。補煖去風。駐顏。尤治皮膚風。令人膚革清淨。每澡沐入少許。尤佳。宜州學昌從諫服此十餘年。至七八十。紅潤輕健。皆此藥力。斗門方云。婦人血風攻腦。頭旋。悶絕。忽死。倒地。不知人事者。用喝起草嫩心。陰乾為末。以酒服一大錢。其功甚效。此物善

通頂門連腦。蓋即蒼耳也。(李時珍) ●詩人謂之卷耳。爾雅謂之蒼耳。廣雅謂之莖耳。皆以實得名也。陸璣詩疏云。其實正如婦人耳。璣今或謂之耳瑤草。鄭康成謂是白胡菜。幽州人呼為爵耳。博物志云。洛中有人驅羊入蜀。胡菜子多刺黏。綴羊毛。送至中國。故名羊頁。來俗呼為道人頭。(蘇頌) ●其葉形如葶藶。又如茄。故有葶耳及野茄諸名。其味滑如葵。故名地葵。與地膚同名。詩人思夫賦卷耳之章。故名常思菜。張揖廣雅作常菜。亦通。(李時珍) ●今處處有之。陸氏詩疏云。其葉青白似胡荽。白華細莖。莖生可煮為茹。滑而少味。四月中生子。正如婦人耳瑤。郭璞云。形如鼠耳。叢生如盤。今之所有皆類此。但不作莖生。(蘇頌) ●按此周憲王救荒本草云。蒼耳葉青白。類黏糊菜葉。秋間結實。比桑椹短小。而多刺。嫩苗焯熟。水浸淘淨。食可救飢。其子炒去皮。研為麵。可作燒餅食。亦可熬油點燈。(李時珍) ●凡人風溼內淫。氣血阻滯。則上而頭眩。下而足膝。內而骨髓。外而皮

腐。原不受病。惟蒼耳子皆能治之。
(原稿悉) ①蒼耳子。治鼻淵鼻痔。
斷不可缺。能使清陽之氣上行。顛
頂也。(沈金熬)

【蒼耳子油】 本品係
用蒼耳子榨取
之油。

主治 瘋疾。

【蒼耳花】 主治 白痢。頑癩。

【蒼耳莖葉】 製法 雷斅曰。
凡採得去心。取
黃精以竹刀細切。并之。蒸。從已至
亥時。出去黃精。陰乾用。

性質 苦。辛。微寒。有小毒。
主治 中風。傷寒。頭痛。大風。癩
病。頭風。濕痺。毒在骨髓。腰膝風毒。
夏月採曝。爲末。水服一二七。冬月
酒服。或爲丸。每服二三十丸。日三
服。滿百病。出如癩疥。成汁出。或斑
駁。取甲錯。皮起皮落。則肌如凝脂。
令人省睡。除諸毒。殺蟲。疥。濕。癩。
久服益耳目。聰明。輕身。強志。

配合應用 ①萬應膏。治一切
癰疽。發背。無頭。惡瘡。腫毒。疔。癩。一
切風。痒。腫。瘡。杜。瘡。牙。疼。喉。痺。五。月

十四畫 蒼

五日。採蒼耳根葉數擔。洗淨。曬盡。
細剉。以大鍋五口。入水。煮爛。以篩
濾去粗滓。布粗。再濾。復入淨鍋。武
火煎。滾。文火熬。稠。攪成膏。以新罐
貯封。每以敷貼。即愈。牙疼。即敷牙
上。喉痺。敷舌上。或嚥化。二三次。即
效。每日用酒服一匙。極有效。(集
簡方)

①治一切風毒。并殺三蟲。腸痔。
能進食。若病。胃脹。滿。心悶。發熱。即
宜服之。五月五日午時。附地。刈取
蒼耳葉。洗淨。搗下。篩。每服方寸匕。
酒或漿水下。日二夜三。若覺吐逆。
則以蜜丸服。準計方寸匕數也。風
輕者。日二服。若身體作粟。或麻豆
出。此爲風毒出也。可以針刺。潰。去
黃汁。乃止。七月。七月。九月。九。亦可採
用。

①治一切風氣。蒼耳嫩葉一石。
切。和麥蘖五升。作塊。於蔞艾中。罨
二十日。成麩。取米一斗。炊作飯。看
冷。暖入麩。三升。釀之。封。二七日。成
熟。後。每日。空心。暖服。神驗。封。此酒
可。兩。重。布。不。得。令。密。密。則。溢。出。忌
馬肉。猪肉。(孟詵食療方)

末。每服一錢。酒調下。日三服。若吐
則以蜜丸。梧子大。每服二十九。十
日全好矣。(楊氏經驗方)

①治毒攻手足。腫痛。欲斷。蒼耳
搗汁。漬之。并以淨傳之。立效。春用
心。冬用子。(千金方)

①治卒中水毒。初覺。頭目。微痛。
惡寒。骨節。強急。日醒。暮劇。手足逆
冷。三日。則。蠱。蝕。下部。六七日。膿。潰。
食。至。五臟。殺。人也。搗。常。思。草。絞。汁。
服一二升。并以綿染。導。其。下部。也。
(肘後方)

①治毒蛇。溪毒。沙虱。射工。等所
傷。口。噤。眼。黑。手足。強。直。毒。攻。腹。內。
成塊。遠。巡。不。救。用。蒼耳。嫩。苗。一。握。
取。汁。和。酒。溫。灌。之。以。淨。厚。傅。傷。處。
(勝金方)

①疫病。不染。五月五日午時。多
採。蒼耳。嫩。葉。陰。乾。收。之。臨。時。爲。末。
冷水。服。二錢。或。水。煎。舉。家。皆。服。能
辟。邪。惡。(千金方)

①治風。痿。癱。瘓。身。痒。不。止。用。蒼
耳。莖。葉。子。等。分。爲。末。每。服。二錢。豆
淋。酒。調。下。(聖惠方)

①治面上。黑。斑。蒼耳。葉。精。爲。末。
食。後。米。飲。調。服。一錢。一。月。愈。(摘

女方)

①治赤白汗斑。蒼耳嫩葉。尖。和
青鹽。搗。爛。五。六。月。間。搽。之。五。七。次
效。(摘玄方)

①治大風。癩。疾。用。嫩。蒼耳。荷。葉
等。分。爲。末。每。服。二錢。溫。酒。下。日。二
服。(袖珍方) 又用。蒼耳。葉。爲。末。以
大。楓。子。油。和。丸。梧子。大。每。服。三。四
十。九。以。茶。湯。下。日。二。服。(乾坤生
意方) 又方。五。月。五。日。或。六。月。六
日。五。更。帶。露。蒼耳。草。搗。取。汁。熬。作
錠。子。服。半。斤。鯉。魚。一。尾。剖。開。不。去
肚。腸。入。藥。一。錠。線。縫。以。酒。二。盞。慢
火。煮。熱。令。喫。不。過。三。五。箇。魚。即。愈
也。忌。鹽。一。百。日。

①治卒。得。惡。瘡。蒼耳。桃。皮。作。屑
納。瘡。中。

①治反。花。惡。瘡。有。肉。如。飯。粒。破
之。血。出。隨。生。反。出。用。蒼耳。葉。搗。汁
服。三。合。并。塗。之。日。二。上。(聖濟總
錄方)

①治一切。丁。腫。危。困。者。用。蒼耳
根。葉。搗。和。小。兒。尿。絞。汁。冷。服。一。升。
日。三。服。拔。根。其。驗。(孟詵方) 又用
蒼耳。根。苗。燒。灰。和。醋。塗。之。乾。再
上。不。十。次。即。拔。根。出。(養生方) 又

十四 蒼 蒼 蒿 蓄 蓋 著

一五八六

蒼耳根三兩。烏梅肉五箇。連鬚葱三根。酒二鍾。煎一鍾。熱服取汗。(御真方)

① 治齒風動痛。蒼耳一握。以漿水煮入鹽含漱。(外臺秘要方)

② 治經候風病。蒼耳根一把。老薑一塊。研汁入酒服。(聖濟總錄方)

③ 治赤目生痛作痛。道人頭末二兩。乳香一錢。每用一錢。燒烟吸鼻。(聖濟總錄方)

④ 治鼻衄不止。蒼耳莖葉搗汁一小盞服。(聖惠方)

⑤ 治五痔下血。五月五日。採蒼耳莖葉搗爲末。水服方寸匕。甚效。(千金方)

⑥ 治赤白下痢。用蒼耳草不拘多少。洗淨。以水煮爛。去滓。入蜜。用武火熬成膏。每服一二匙。白湯下。(醫方摘玄方)

⑦ 治產後諸病。蒼耳葉搗絞汁。溫服半中盞。日三四服。(聖惠方)

⑧ 治誤吞銅錢。用蒼耳頭一把。以水一升。浸水中十餘度。飲水愈。(肘後方)

⑨ 治花狗蛛毒咬人。與毒蛇無

異。用野繅絲。卽道人頭搗汁一盞。服。仍以渣傳之。(摘玄方)
施用宜忌 忌猪肉馬肉米泔。伏砂。

【蒼耳蠶蟲】 基本 本品卽蒼耳草梗中狀如小蠶之蠶蟲。
古籍別名 麻蟲。(本草綱目)

採取 見梗上有大蛙眼者。以刀截去兩端。不蛀極多。取之。線縛掛榜下。其蟲在內。經年不死。用時取出三條。同用之。
主治 疔腫。惡毒。燒存性。研末。油調塗之。卽效。或以麻油浸死。收貯。每用一二枚。持傳卽時毒散。大有神效。

參攷資料 蒼耳治疔腫。腫毒。故蟲亦與之同功。古方不見。用近時方法。每用之。幸時珍。
古籍別名 冰片。

【蒼龍腦】 (本草綱目)
基本 爲龍腦之一種。
主治 風瘡。疥癩。入膏煎良。不可點眼。傷人。

【蒼鵝屎】 基本 本品爲鵝之黑羽者之糞便。

主治 傳蛇蟲咬毒。
【蒼礬石】 卽特生礬石之古籍別名。典見別錄。詳「特生礬石」條。
【蒼蠅翅】 卽小蒼草之別名。詳「金鎖銀開」條。

【蒼鷹】 卽鷹之原名。詳「鷹」條。
命名 本品常在商閱。故名。

古籍別名 蒼雀。
外國名詞 Emboriza poronaka T. (拉丁) (Tomminck's Japanese hunting) (英) アオシ或アラシ或ラシトド (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。
產地 出山林原野間。

形態 蒼雀爲原禽類之一種。其體小於黃雀。頭部橄欖綠色。頭黑色。嘴亦黑。背部赤褐。有黑條紋。翼赤褐。有暗綠條紋。體下概黃色。散布多數之暗色點。夏棲山林。遊原野。營巢於地。或草叢中。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。
主治 食之益陽道。補精髓。

【蒿雀腦】 主治 塗涼瘡。手足不脫。
【蒿豬】 卽蒿豬之古籍別名。典見唐本草。詳「蒿豬」條。

【蒿】 卽羊蹄之古籍別名。典見本經。詳「羊蹄」條。
【蒿果王】 卽枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【蒿果】 卽防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳「防葵」條。
古籍別名 鋸草。羽衣草。
【著】 (日本)
外國名詞 Achillea sibirica, Lodgeb. (拉丁) ノユギリサウハ。ゴロモサウ (日本)

基本 係菊科。著屬之實。
產地 多在山野間。

形態 著爲溼草類之多年生草本。體二三尺。葉互生。細長。作羽狀分裂。其形與鋸相類。秋月莖頭着花。白色。或淡紅色。作頭狀花序。甚小。周圍之花。舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。其莖生處如藪。作叢。莖多者一株有五十餘。莖形皆直立。古人用爲占筮。其葉可供藥用。

採取 八九月採實。日乾。

性質 苦。酸。平。無毒。

主治 益氣充肌膚。明目。聰慧。先知。久服不饑。不老輕身。

參攷資料 按班固白虎通

載孔子云。著之爲言者也。老人歷年多。更事久。事能盡知也。陸佃埤雅云。草之多壽者。故字從耆。博物志言著千歲而三百莖。其本老。故知吉凶。(李時珍) 著實生少室山谷。八月九月採實日乾。(別錄)

今蔡州上蔡縣白龜祠旁。其生如蒿作叢。高五六尺。一本二三十莖。至多者五十莖。生便絲條直。所以異於衆蒿也。秋後有花。出於枝端。紅紫色。形如菊花。結實如艾實。史記龜策傳云。龜千秋。乃遊於蓮葉之上。著百莖。共一根。所生之處。獸無虎狼。蟲無毒螫。徐廣註云。劉向言龜千歲而鬚。著百年而一本生百莖也。褚先生云。著滿百莖。其下必有神龜守之。上則常有青雲覆之。傳云。天下和平。王道得而著莖長丈。其叢生滿百莖。方今取著者。八十莖已上。長八尺者。卽已難得。但得滿六十莖以上。長六尺者。卽可用矣。今蔡州所上。皆不言如

此。則此類亦屬神物。故不常有也。(蘇頌) 著乃藟屬。神草也。故易曰。著之德圓而神。天子著長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。張華博物志言。以末大於本者爲主。次高次荊。皆以月望日浴之。然則無著。揲卦。亦可以荊蒿代之矣。(李時珍)

【著母】卽知母之古籍別名。典見本經。詳「知母」條。

【著葉】 主治 痞疾。

【著蒿】 卽茵陳蒿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵陳蒿」條。

【荻藜】 卽川椒之古籍別名。典見綱目。詳「川椒」條。

【蔞】 卽虎杖之古籍別名。典見爾雅。詳「虎杖」條。

【藟】 卽山韭之古籍別名。典見綱目。詳「山韭」條。

【藟】 卽酸模之古籍別名。典見綱目。詳「酸模」條。

【藟】 卽藜蘆之古籍別名。典見郭璞賦。詳「藜蘆」條。

【藟菜】 卽藟菜之古籍別名。典見綱目。詳「藟菜」條。

【藟木麩】 命名 本品藥離披。有白粉。水淋之似麩。故名。

古藥別名 藟木(本草綱目) 產地 出嶺南山野間。

形態 藟木爲喬木類之一種。幹高十餘丈。經四五圍。頂生葉。兩邊行列。如鳥張翼。其幹皮中有白麩。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 補益虛冷。消食。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論。藟木麩曰。溫補久食不飢。長生。

【蜘蛛】 卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「前胡」條。

【蜘蛛】 蜘蛛(本草綱目) 蟪蛄。 (揚雄方言) 外國名詞 Aranea (拉丁) (Spider) (英) クモ (日本) 基本 係節肢動物蜘蛛類。其蜘蛛類之蜘蛛。 產地 生家檐屋角。罐頭陋巷。

間多有之。


形態 蜘蛛爲卵生蟲類之一種。體形圓。或橢圓。或長。全體分頭。胸及腹三部。頭之前端有口。背面有單眼二至八。大頭分二節。末端爲鈎狀。能運動。尖端開一毒腺口。是謂毒鈎。下顯呈板狀觸鬚。分數節。胸部有脚四對。肚門前有瘤狀突起之物。由此抽絲製網。以捕食昆蟲。性殘忍。同類亦相食。其種類甚多。以懸網如魚罾者。及身小尻大者。與腹內有若黃膿者。可供藥用。

製法 雷斅曰。凡使去頭足。研

性質 微寒。有小毒。

主治 大人小兒瘡。及小兒大腹丁奚。三年不能行者。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蜘蛛曰。蜈蚣蟻



蜘蛛

十四畫 著

藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟

藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟 藟

蓋整人取置咬處。吸其毒。唐蘇恭新修本草論蜘蛛曰。主蛇毒。溫病。止嘔逆。雀亂。宋蘇頌綱經本草論蜘蛛曰。取汁塗蛇傷。燒灰治小兒腹疳。宋日華諸家本草論蜘蛛曰。斑者治瘡疾。疔腫。明李時珍本草綱目論蜘蛛曰。主口喎脫肛。痔腫。胡臭。齒齲。

施用宜忌 長芝青雄黃。

參攷資料 別錄言蜘蛛治瘡。張仲景治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下者。蜘蛛散主之。蜘蛛十枚。炒焦。桂半兩。為散。每服八分。日再。或以蜜丸亦通。蘇頌。蜘蛛能制蛇。故治蛇毒。而本條無此。蘇恭。鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣。以酒射之。節節斷爛。則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷。亦相伏爾。沈括筆談。載蛛為蜂螫。能嚼芋梗。磨創而愈。今蛛又能治蜂螫。何哉。又劉義慶幽明錄云。張甲與司徒蔡。謀有親。謾晝寢。夢甲曰。忽暴病。心腹痛脹滿。不得吐下。名乾雀亂。惟用蜘蛛生斷脚。吞之。則愈。但人不知。甲某時死矣。謾覺使人驗之。甲果死矣。後用此治乾雀亂。輒驗也。

按此說雖怪。正合唐註。治嘔逆。雀亂之文。當亦不謬。蓋蜘蛛服之。能令人利也。李時珍。凡五色者。及大身有刺。毛生者。并薄小者。並不入藥。晉敷。蜘蛛布網。其絲右繞。其類甚多。大小顏色不一。爾雅。但分蜘蛛。草土。及蟻。蟻四種。而已。蜘蛛嚼人甚毒。往往見於典籍。按劉禹錫傳信方云。列官張廷賞。為斑蜘蛛咬頭上。一宿有二赤脈。繞項下。至心前。頭面腫如數斗。幾至不救。一人以大藍汁入麝香。雄黃。取一蛛投入。隨化為水。遂以點咬處。兩日悉愈。又云。貞元十年。崔從實。員外。言有人被蜘蛛咬腹。大如孕婦。有僧教飲羊乳數日。而不平。又李絳兵部手集云。蜘蛛咬人。遍身成瘡者。飲好酒至醉。則蟲於肉中。似小米自出也。劉郁西域記云。赤水兒城。有蟲如蛛。毒中人。則煩渴。飲水立死。惟飲葡萄酒至醉。吐則解。此與李絳所言蜘蛛毒。人飲酒至醉。則愈之意。同。蓋亦蜘蛛也。鄭曉吾學編云。西域賽藍地方。夏秋間。草生小黑蜘蛛。甚毒。嚼為痛。聲散地。土人誦咒。以薄荷枝拂之。

或以羊肝。遍擦其體。經一日夜。痛方止。愈後。皮脫如蛻。牛馬被傷。輒死也。元稹長慶集云。巴中蜘蛛。大而毒。甚者。身運數寸。跗長數倍。竹木被網。皆死。中人。瘡痛。痒倍。常惟以苦酒。調雄黃。塗之。仍用鼠耳。鼠食其絲。則愈。不急救之。毒及心。能死人也。段成式酉陽雜俎云。深山蜘蛛。有大如車輪者。能食人物。若此。數說。皆不可不知。淮南萬畢術。言赤斑蜘蛛。食以猪肪。百日。殺以塗布。雨不能濡。殺以塗足。可覆水上。抱朴子言蜘蛛。水馬。合馮夷水。仙丸服。可居水中。皆方士幻誕之談。不足信也。李時珍。蜘蛛抱蛋。即蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「蜘蛛香」條。

命名 本品根鬚狀如蜘蛛。而氣極芳香。故名。又其根鬚團結似卵狀。遂有蜘蛛抱蛋之稱。

古醫別名 蜘蛛抱蛋。飛天蜈蚣。哈薩喇。一帆青。一葉。(植物學大辭典) 葉蘭。(日本)

外國名詞 Aspidistra olivacea (日本)

形態 蜘蛛抱蛋香為香草類之多年生常綠草本。葉闊大。長橢圓形。兩端尖。葉脈平行。葉柄長。其葉分狹葉與闊葉二種。狹葉直立。闊葉尖。頭傾斜。春月開花。花被暗紫色。單生於短花莖之頂上。花後結實。青色。如拇指大。其根。色青黑。如卵狀。周圍密根團結。

性質 辛溫。無毒。

主治 辟瘴疫。中惡。邪精鬼氣。尸疰。

參攷資料 蜘蛛香出對西茂州松潘山中。草根也。黑色。有粗鬚。狀如蜘蛛。及蕪本。莖。氣味芳香。彼人亦重之。或云貓喜食之。(李時珍)

【蜘蛛絲】即蜘蛛網。詳「蜘蛛網」條。

【蜘蛛黃】原名 蟻螯黃。命名 本品即蜘蛛

腹中之黃。故名。

製法 捕蜘蛛之小者。飼之大。久之復以珠砂飼大者。數十日後。漸至滿腹通赤。其腹中便有黃。可供藥用。

主治 去翳開音。

【蜘蛛蛻殼】

主治 蟲牙。綿裹塞之。牙疳研末傅之。

【蜘蛛網】

主治 喜忘。歷代記述攷證

【唐】蘇恭新修本草論蜘蛛網曰。以經梳貨。七日消落。有驗。【明】李時珍本草綱目論蜘蛛網曰。療瘡毒。止金瘡血出。炒黃研末。酒服。治吐血。

參攷資料

按侯廷賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網。搓成小團。米飲吞之。一服立止。此乃孫紹先所傳方也。又酉陽雜俎云。斐晏山行。見蜘蛛結網如疋布。引弓射殺。斷其絲數尺。收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。血立止。觀此則蛛網蓋止血之物也。(李時珍)

【蜘蛛膠】功用與網同。詳該條。

十四畫 蜘蛛

【蜘蛛】即蟬之俗名。詳「蟬」條。

【蠶蠶】即蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳「蜘蛛」條。

【蜚蠊】即蠹蟲之原名。詳「蠹蟲」條。

【蠶零】即土蜂之古籍別名。典見本經。詳「土蜂」條。

【蜚厲】基本 蜚厲為溼生蟲類之一種。可供藥用。

主治 婦人寒熱。

【蜚蠊】即蜚蠊。詳「蠹蟲」條。命名 本品以有廉蠶古籍別名。石蠶。虛蠶。負蠶。滑蟲。唐本草。蠶(爾雅)茶蠶。香螟子(綱目)蠶(綱目拾遺)

外國名詞 *Syriopyga conu-cina*, *Hugh*, 或 *Forplaneta americana* L. (拉丁) *ニキブ* 或 *アラムシ* (日本)

基本 係節肢動物昆蟲類直翅類蜚蠊科。

產地 多生於人家庖廚炊竈間。

形態 蜚蠊為化生蟲類之一種。體形橢圓。色黑褐。有油光。頭小。

種類 蜚蠊科。

蜚蠊

隱於前胸下。觸角長如絲。為線狀。前後翅皆為膜質。但前翅小而形長。後翅大而為扇狀。尾端有二長二短之小突起。脚側扁。有跗節五。大者體長一寸。晝伏夜出。盜食棲於庖廚陰暗諸處。觸之有一種惡臭。其尿尤臭。可供藥用。

採取 二月八月間採之。

性質 鹹寒有毒。

主治 瘀血凝滯寒熱。破積聚。喉咽閉。內寒無子(本經)通利血脈(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蠶蠶曰。食之下氣。

配合應用 ①拔疔。疔上蠶蠶。不拘多少。搗爛敷之。其疔根自出(集驗方) ②蠶蠶其黃紫色甚臭者。取數個。用患者自吐唾沫。澆口。研爛敷疔。四圍頂上。露孔使毒氣從孔出一日愈(疔子妙方) ③治疔疔。取蠶蠶大者七個。去頭足殼。將砂糖少許。同搗爛敷疔。四圍露出頭。晝夜即愈(邵仲達方) ④又藥性考。蠶馬拔刺。持塗有效。

⑤解諸疔毒。龜上紅蠶蠶五個。研爛熱酒沖服。取汗為度。(傳信方)

方)

①治紅絲疔。蠶蠶一個。去頭和青糖搗爛。搽上即效。(傳信方)

②白火丹。用蠶蠶瓦上焙乾。為末。白滾湯服一二個。立效。兼治疔瘡。(葉氏方)

③治對口。桂州荔枝肉二三枚。蠶蠶二三個。同搗如泥。敷露頭。數次即散。(活人書方)

④治無名腫毒。蠶蠶十個。鹽一撮。同搗爛敷之。留頭。(慈航活人書方)

⑤治諸毒惡疔。蠶蠶搗石灰敷之。(嚴氏家藏方)

⑥治癩症。活蠶蠶蟲二三個。用紙包。紙上焙乾。研細冷水和。澆或吐或瀉即愈(周廷國方)

⑦治吐血。取蠶蠶五個。止去翅淨。在火盆淨瓦上焙乾。為末。紙包安土上存性。用溼腐皮包一個。滾湯吞下。每日如此。吞五日不可間斷(徐靈生方)

⑧治氣虛中滿。以蠶蠶七個。為末。用地骷髓煎湯送服。效。(醫宗彙編方)

⑨治癩眼。蠶蠶一個。焙乾。蘿蔔

于一撮。共炒為末。好酒吞十日全愈。(家寶方)

治一切兒疳。凡小兒患疳疾。不拘何等疳垂死者皆效。取龜上焙燥。乾與之食。患者但聞其香。不知有腥臭之氣。猶中蠱者。食豆無辛。含馨不苦也。有患此症治之無不效。只須食一二次即愈。愈後體更肥白。且屢試屢驗。(集驗方) 兒疳初起。用蜂蠟去頭足翅。新瓦焙乾。常與食之。百個病愈。(百草鏡方)

參攷資料 蜜燉吳萸本草載神農云。主婦人癢堅寒熱。尤為有理。此物乃血藥。故宜於婦人。(李時珍)

【蜜丁】即瓦楞子之古籍別名。典見綱目。詳「瓦楞子」條。

【蜜父】即梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。

【蜜甘】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【蜜姑魚】命名。本品性喜食蜜故名。

古籍別名 蜜姑(綱目拾遺) 產地 出浙江鄞縣山溪間。

形態 蜜姑魚為鱗類魚屬之一種。其鱗光閃爍如千片碎金。雜珠顆中。狀隨風散灑。觀之莫不目眩。其內可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 生胃津。益肺氣。補血脈。增精髓。去熱除虛羸。壯筋骨。止咳嗽。定喘逆。功同燕窩。蛤蚧。

參攷資料 宦遊筆記。自光溪入四明二十餘里。有蜜巖。峭壁千尋。下臨深溪。竇洞無底。巖巔舊有蜂巢。聚蜂數百萬。其蜜滴下。溪魚食之。故魚味甘絕。曰蜜姑魚。性極喜苦。須懸崖下。有水衣演漾深碧而細者。剉以為餌。魚性暴。遇鈎則跳宕。卒不可制。而蜜巖下溪水清甚。用粗梗則恐魚之瞥見而驚遊也。用細絲則又恐不足以勝魚跳宕之力。釣者乃取絲長十餘丈。盤於竿上。遙望見深波中。魚翻翻鼓鬣而至。則取絲徐徐放之。如小兒之送紙鳶者。使得縱其所往。魚入鈎果一躍數尺。翻波跋浪。橫激溪面。久乃力倦取之。按此魚最深惟食苦蜜。苦寒而蜜溫。得水火既濟之力。大能補土生金。蒸窩性清

煎而下行。蛤蚧性和中而溫。此則故能兼之。真勞嗽虛羸之食品。上藥也。柳崖外編載。張方海浙人。少年讀書四明山。斷炊者數月。山洞谷多竹。峭壁有蜜。蜜入江化為魚名蜜姑。張遂搗笋釣姑而食。自言其味淡以清。蜜姑濃而美。有天台胡麻所不知者。嗣後遂輕身耐寒暑。不復思烟火味。據此則其功用信不誣也。(趙學敏)

【蜜風律】即棋榭子之古籍別名。典見廣記。詳「棋榭子」條。

【蜜房】即蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂房」條。

【蜜林檎】即林檎實之味如蜜者。功用詳「林檎」條。

【蜜果】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【蜜炙白前】即白前之處方用名。詳「白前」條。

【蜜炙桂枝】即桂枝用蜜焙炒成者之處方用名。詳「桂枝」條。

【蜜炙桔梗】即桔梗之處方用名。詳「桔梗」條。

【蜜炙蒼朮】即蒼朮之用蜜炙者之處方用名。詳「黃耆」條。

【蜜炙蒼朮】即蒼朮之用蜜炙者之處方用名。詳「黃耆」條。

【蜜炙馬兜鈴】即馬兜鈴之處方用名。詳「馬兜鈴」條。

【蜜炙款冬】即款冬花之處方用名。詳「款冬花」條。

【蜜炙葶藶】即生薑用蜜炙成者之處方用名。詳「生薑」條。

【蜜虎】即蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜂虎」條。

【蜜香】古籍別名 木蜜(內典)沒香。多香木。阿膠。

產地 出南方諸省。

形態 蜜香為香木類之一種。樹高丈餘。皮青色。白葉似槐而具花似橘而大。子黑色。大如山茱萸。甜酸可食。其木堅韌而香。乃沉香之類。可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 去臭。除鬼氣。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論蜜香曰。辟惡去鬼邪尸注心氣。

【蜜香】即沉香之古籍別名。典見南越志。詳「沉香」條。即木香之原名。詳「木香」條。

【蜜香草】即土常山之古籍別名。

與見國經本草詳「土常山」條。

【蜜栗子】產地 產金坑中。形態 蜜栗子爲石類之一種。狀如蛇。黃而有刺。有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類。可供藥用。

主治 金瘡折傷有效。
參攷資料 蜜栗子丹。燧家採作五金匱藥。制三黃(李時珍)。

【蜜草】即甘草之古籍別名。與見別錄詳「甘草」條。

【蜜酒】製法 用沙蜜一斤。糯米一升。麪麴五兩。熱水五升。同入瓶內。封七日。成酒。尋常以蜜入酒代之。亦良。

主治 風疹。風癩。
【蜜吸花】即忍冬藤之古籍別名。與見和藥漢考。詳「忍冬藤」條。

【蜜望】命名 本品蜜蜂望之而喜故名。
古籍別名 天桃(綱目)子名。一莽果。望果(綱目拾遺) 莽果(蘇慶志)。

產地 出粵中。
形態 蜜望爲喬木類之一種。高數丈。二月開花極繁。夏秋子實

成熟。黃色。其果實可供藥用。

性質 甘酸。無毒。

主治 益胃氣。療船暈嘔吐。

參攷資料 船駛北人謂之苦船。多嘔吐不食。登岸則已。胃弱人多有之。蜜望果甘酸益胃。能止之。故飄洋渡海者多購之。其類有天桃與相類。六七月熟。大如木瓜。味甜酢。以羹魚尤善。凡渡海者食之不嘔。滯。年歲荒。則結實愈多。粵語云。米價高。食天桃。故廣人貴望果。而賤天桃。費之故望之。蜂望其花。人望其果也(趙學敏)。

【蜜補藤】即忍冬藤之古籍別名。與見土宿本草。詳「忍冬藤」條。

【蜜棗】即棗之一種。以蜜糖拌蒸者。詳「大棗」條。

【蜜椿楸】即枳椇子之古籍別名。與見廣記。詳「枳椇子」條。

【蜜結】即伽楠香之味辛辣。嗅之香甜。柔嫩而體質輕者。爲伽楠香之上品。詳「伽楠香」條。

【蜜脾】即龍眼之古籍別名。與見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【蜜筒】即柏之古籍別名。與見綱目。詳「柏」條。

【蜜蜂】命名 本品尾有垂絲。因謂之蜂。其能採花釀蜜。故曰蜜蜂。

古籍別名 蠆蜂。蠆(綱目)。

外國名詞 Apis chinensis

(拉丁) (Boo) (英) ミツバチ (日本)

基本 係節肢動物。昆蟲類膜翅類爲蜜蜂之子。

形態 蜜蜂爲蜂類之一種。有雌蜂。雄蜂。職蜂三種。聚羣而居。雌雄蜂皆黑色。翅灰色而透明。雌者尾有毒針。以產卵管而兼禦敵之用。職蜂暗褐色。全體皆密生長毛。雌者每羣一頭。體長五分許。通稱蜂王。雄者亦少數。體較雌者爲短。而翅大。但營生殖作用。不事工作。亦稱遊蜂。職蜂最多。爲不完全之



蜂 蜜

雌體。專事營築巢窠。採蜜育兒等。並保護其羣。亦稱工蜂。雌者所產之子。可供藥用。其蜂蜜。蜜蠆。詳見各條。

採取 以頭足未成時。狀如白蛭者用。

性質 甘。平。微寒。無毒。

主治 治頭暈。除蠱毒。補虛羸。傷中。久服令人光澤。好顏色。不老(本經) 輕身益氣。治心腹痛。面目黃。大人小兒。腹中五蟲。從口吐者(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蜜蜂子曰。主丹毒風。癰腹內留熱。利大小便。澀去淨血。下乳汁。婦人帶下病。【明】李時珍本草綱目論蜜蜂子曰。治大風癩疾。

施用宜忌 長黃芩。芍藥。牡蠣。白前。

參攷資料 ①蜂子涼有毒。須以冬瓜。苦蕒。生薑。紫蘇。制其毒食之。【大明】②蜂子古人以充饌品。故本經別錄。著其功效。而聖濟總錄。治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足屬明大陰之藥也(李時珍) ③蜂

一五九一

十四畫 蜜 蜚 蠊 蟻

子以酒漬傳面令人悅白。(陶弘景)

【蜜蜂草】即香薷之古籍別名。與見綱目。詳『香薷』條。

【蜜銀花】即金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【蜜糖】即蜂蜜之處方用名。詳『蜂蜜』條。

【蜜粘】即蜜姑魚之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『蜜姑魚』條。

【蜜蘭】即建蘭之別名。詳『建蘭』條。

【蜜蠟】①即黃蠟之原名。詳『黃蠟』條。②即白蠟之原名。詳『白蠟』條。

【蟪】即貝子之古籍別名。與見綱目。詳『貝子』條。

【蜚蠊】 命名 本品深目高鼻。狀如羌胡。故名。

處方用名 蜚蠊。胡蜚蠊。古醫別名 蜚蠊。推丸(弘景)

推車客渠(本草綱目)黑牛兒鐵甲將軍。夜遊將軍。推車蟲(綱目)

推屎蟲(孫氏集效方)矢甲。弄丸。天仙子。天社蟲。俠客。蟬。馬。叱。同。仇。

火乃(和漢藥考)烏殼。稷。蟲。

外國名詞 Costrupes larvistratus, Motsch.

基本 屬化生類為甲蟲中之蜚蠊。

產地 凡池澤間恒多生焉。

形態 蜚蠊形似金龜子。長四五分。全身黑如漆。有光澤。背有剛甲。晝伏土中。夜見燈火則飛出。猝然受驚。則縮脚伏頭。作如死狀。徐徐仍飛去。

採取 五六月間採捕之。

製法 別錄曰。凡使蜚蠊。須是五月五日採取。蒸藏之。臨用去足。火炙。勿置水中。令人吐。

用法 恒以焙到研末。和作丸散。

性質 鹹。寒。有毒。

效能 破癥結。治癰疽。用治癆癩藥。

主治 小兒驚癇。腹脹寒熱。大人癲疾。狂陽(本經)手足增寒。肢滿。黃豚。搗丸。塞下部。引痔蟲。出。蠶。水。環(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權

藥性本草論蜚蠊曰。治小兒疳蝕。

【唐】陳藏器本草拾遺論蜚蠊曰。

燒末和醋傳蜂漏。【宋】日華諸家本草論蜚蠊曰。能墮胎。治疔疔。和乾薑。傳瘻。出箭頭。【明】李時珍

本草綱目論蜚蠊曰。治大小便不通。下痢赤白。脫肛。一切痔瘻。丁腫。附骨疽。瘡癩。瘡風。灸瘡。出血不止。鼻中息肉。小兒重舌。【明】李士材

本草圖解論蜚蠊曰。蜚蠊鹹寒。有毒。主小兒驚癇。疔瘻。腹脹寒熱。大人癲疾。狂陽。手足端寒。支滿。黃豚。搗丸。塞陰溼之氣。鹹寒。除肝胃大

勝三經邪熱。則諸證自瘳。古今方書以之治一切痔瘻。及疔腫疽瘡。出箭頭之。外用易臻厥功。內服非虛人所宜。非不得已。慎勿輕試。

【清】鄒澍本經疏證論蜚蠊曰。蜚蠊喜撲火。且善取糞為丸。包以土。推曳而埋之。坎中得毋以是二者。遂謂能息腸胃之火。去其宿滯。而巳。大人癲疾。狂易。耶。則於小兒驚癇。疔瘻。腹脹寒熱。又當作何解。諸

說者謂疔瘻與疔不其相遠。瘻之胸。滿口。味。臥。不著席。脚。變。急。愈。齒。者。可大承氣湯。與為癯瘻。腹脹寒熱。亦不甚相遠也。以病患有久暫之殊。正氣有盛衰之異。故有承氣

蜚蠊之別。然則承氣。蜚蠊。竟可混稱。豈視耶。不知承氣之汗出。小便自利。轉矢氣。皆用蜚蠊者。所無別錄。所云蜚蠊。治手足端寒。肢滿。黃豚。又為承氣證所不有。以是為別。猶不可乎。夫是亦豈不有理。第承氣與蜚蠊。為用懸殊。其可不相比。而證明之耶。瘡癩。癩。狂。神。識。必不慧。然必與陽明證語有別。腹脹。與腹滿。痛。有別。寒。與熱。與潮熱。又有別。所以然者。承氣證是邪傷陽明之陰。蜚蠊證是邪傷陽明之陽。傷其陰。故熱。濕。津。液。四。射。而。出。傷其陽。故。燥。道。泣。瀝。四。支。寒。滿。四。支。者。諸。陽。之。本。寒。則。非。火。滿。則。為。虛。自。與。四。支。實。能。登。高。者。有。間。也。蜚蠊者。味。鹹。氣。寒。果。至。不。潔。之。地。其性見火則怒。怒則飛。飛之力甚猛。撲火既息。猶不已也。必觸物乃墮。是其乘氣於陰。以追赴撲滅陰中之陽邪。仍折旋反覆。則生氣於腸胃。叢穢之中。不使決裂潰敗。又恰與久病結根於下。陰陽戰亂於上者。有似。故仲景於豨甲煎丸用之。其風溫被火。有為癯瘻。太陽被火。有為狂起。臥不安。皆非是物所

宜。正以其病在陽而不結根於陰故也。

國外學說 古方藥品考曰。蟻

蟻有數種。長四五分。形似金龜子。光黑者名胡蟻。蟻。真間有長寸許。在牛屎上者亦可用。其小甲無光者。下品也。又曰。蟻。味鹹寒。主治小兒驚癇。疳積。腹脹。寒熱。大人癩疾。狂陽。按蟻。蟻。晝伏。蠶土。間夜乃飛行。其性陰寒。有毒。故能解熱毒也。大和本草曰。蟻。蟻。為化生類。乃蠶中黑蟲也。一名蟻。莊子云。蟻之智在於蟻丸。轉丸者。乃以土包蠶而成丸也。

配合應用 治小兒驚風。不

拘急。慢用蟻一。枚。杵爛。以水一小盞。於百沸湯中。盪熱。去滓。飲之。

治小兒疳疾。土瘰。蟻。煨。熟。與食之。(韓氏醫通方)

傳舌上。(子母秘錄方)

治腸氣吐食。用地牛兒。二箇。

推屎蟲。一公。一母。同入罐中。待蟲食盡。牛兒。以泥。裹。煨。存。性。用。去。白。陳。皮。二。錢。以。巴。豆。同。炒。過。去。豆。將。陳。皮。及。蟲。為。末。每。用。一。二。分。吹。入。

十四畫 蟻

咽中。吐痰三四次。即愈。(孫氏集效方)

治赤白下痢。黑牛散。治赤白

痢。噤口痢。及。潰。瀉。用。黑。牛。兒。即。蟻。一名。鐵。甲。將。軍。燒。研。每。服。半。錢。或。一。錢。燒。酒。調。服。小。兒。以。黃。酒。服。立。效。(李延壽方)

治大腸脫肛。蟻。蟻。燒。存。性。為

末。入。冰。片。研。勻。搽。肛。上。托。之。即。入。(醫學集成方)

治大小便閉。經月欲死者。本

事。推。車。散。用。推。車。客。七。個。男。用。頭。女。用。身。土。狗。七。箇。男。用。身。女。用。頭。新。瓦。焙。研。末。用。虎。目。樹。南。向。皮。煎。汁。調。服。只。一。服。即。通。又。治。大。小。便。不。通。六。七。月。尋。牛。糞。中。大。蟻。蟻。十。餘。枚。線。穿。陰。乾。收。之。隨。時。取。一。箇。全。者。放。淨。磚。上。四。面。以。灰。火。烘。乾。當。腹。切。斷。如。大。便。不。通。用。上。裁。小。便。不。通。用。下。裁。各。為。細。末。取。井。華。水。服。之。二。便。不。通。全。用。即。解。(楊氏經驗方)

治大腸秘塞。蟻。蟻。炒。去。翅。足

為。末。熱。酒。服。一。錢。(聖惠方)

治小便轉胞。不通。用。死。蟻。蟻

二。枚。燒。末。井。華。水。一。盞。調。服。(千

金方) 治小便便血淋。蟻。蟻。研。末。水。服。(鮑氏方)

治痔漏出水。用。蟻。蟻。一。枚。陰

乾。入。冰。片。少。許。為。細。末。紙。擦。痔。末。入。孔。內。漸。漸。生。肉。藥。自。退。出。即。愈。(唐氏方) 又。用。蟻。蟻。焙。乾。研。末。先。以。鹽。湯。洗。過。貼。之。(袖珍方)

治一切漏瘡。不拘。蟻。蟻。風。癢

蟻。蟻。燒。末。醋。和。傅。(千金方)

治附骨疽漏。蟻。蟻。七。枚。同。大

麥。搗。傅。(劉涓子方)

治一切惡瘡。及。沙。虱。水。弩。惡

疽。五。月。五。日。取。蟻。蟻。蒸。過。陰。乾。為。末。油。和。傅。之。(聖惠方)

治丁腫惡瘡。楊。柳。上。大。烏。殼

硬。蟲。或。地。上。新。糞。內。及。泥。堆。中。者。生。取。以。蜜。湯。浸。死。新。瓦。焙。焦。為。末。先。以。燒。過。針。攪。開。用。好。醋。調。傅。之。(普濟方)

治無名惡瘡。忽。得。不。識。者。用

死。蟻。蟻。杵。汁。塗。之。(廣利方)

治炎瘡出血。不止。用。死。蟻。蟻

燒。研。猪。脂。和。塗。(千金方)

治大痔瘡疾。急。防。毒。氣。入。心

先。灸。後。用。乾。蟻。蟻。為。末。和。鹽。水。傅

四圍。如。韭。菜。開。日。一。上。之。(肘後方)

治癰毒風病。取。塗。中。死。蟻。蟻

杵。爛。搗。瘡。令。熱。封。之。一。宿。瘡。(外臺秘要方)

治鼻中息肉。蟻。蟻。十。枚。納。青

竹。筒。中。油。紙。密。封。置。廁。坑。內。四。十。九。日。取。出。晒。乾。入。麝。香。少。許。為。末。塗。之。當。化。為。水。也。(聖惠方)

治沙塵入目。取。生。蟻。蟻。一。枚

以。其。背。於。眼。上。影。之。自。出。(肘後方)

治下部惡瘡。瘡。膿。血。旁。生

乳。竅。蟻。蟻。七。枚。五。月。五。日。收。者。新。牛。糞。半。兩。肥。羊。肉。一。兩。炒。黃。同。搗。成。膏。丸。蓮。子。大。炙。熱。綿。裹。納。肛。中。半。日。即。在。大。便。中。蟲。出。四。度。永。瘳。(醫方集驗方)

用。蠶。三。分。至。八。分。

施用宜忌 凡。非。氣。壯。邪。實。者。禁。用。畏。羊。角。羊。肉。石。膏。

參攷資料 箭。鏃。入。骨。不。可

移。者。楊。氏。家。傳。方。用。巴。豆。微。炒。同。蟻。蟻。搗。塗。斯。須。痛。定。必。微。痒。忍。之。待。極。痒。不。可。忍。乃。搗。動。拔。之。立。出。此。方。傳。於。夏。侯。郭。郭。初。為。閩。州。有

十四蠶 蠶 蜥 蜨 蜈 蚣 蟻 螞 蟻 蟹 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻

一五九四

人額有箭痕。問之云。從馬侍中征田悅中箭。侍中與此藥立出。後以生肌膏傳之。乃愈。因以方付郭云。凡諸瘡皆可療也。郭至洪州。逆旅主人妻患瘡呻吟。用此立愈。又翰林遺記云。李定言石藏用近世良醫也。有人承瘡溜滂。手覺物入爪甲內。初若線髮。數日如絲。伸縮不能。始悟其為龍伏藏也。乃叩藏用求治。藏用曰。方書無此。以意治之。耳末。蟻蝨塗指。庶免震厄。其人如其言。後因雷火。遺身。急針挑之。果見一物躍出。亦不為災。附說亦載此事。(蘇頌) 莊子云。蝮蛇之智在於轉丸。喜入糞土中。取尿丸而推却之。故俗名推丸。(陶弘景) 崔豹古今注。謂之轉丸弄丸。俗呼推車客。皆取此義也。其蟲深目高鼻。狀如羌胡。背負黑甲。狀如武士。故有蝮蝦將軍之稱。(李時珍) 其類有三四種。以大而鼻頭扁者為真。(陶弘景) 蝮蝦有大小二種。大者名胡蝮蝦。身黑而光腹。翼下有小黄子。附母而飛。甞伏夜出。見燈光則來。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏。狐並喜食之。小者

不堪用。惟牛馬腹結以三十枚研水灌之。絕佳。(寇宗奭) 蝮蝦以土包煮轉而成丸。雄雌推置於坎中。覆之而去。數日有小蝮蝦出。蓋膠乳於中也。(李時珍) 蟻蟻一名渠略。似蝮蝦而小。大如指頭。身狹而長。有角。黃黑色。甲下有翅。能飛。夏月雨後。叢生糞土中。朝生暮死。猪好啖之。人取炙食。云美於蟻也。蓋蝮蝦。蟻蟻。腹結。天牛。皆蟻蟻所化。此亦蝮之一種。不可不知也。或曰。蟻蟻水蟲也。狀似蠶。朝生暮死。(李時珍)

【蝮蝦心】 委效資料 按劉禹錫纂柳州救三死方云。元和十一年。得丁瘡。凡十四日。益篤。善藥傳之。莫效。長慶買方伯。教用蝮蝦心。一夕百苦皆已。明年正月。食羊肉。又大作。再用如神驗。其法。用蝮蝦心。在腹下度取之。其肉稍白是也。貼瘡半日許。再易。血盡根出。即愈。蝮蝦長羊肉。故食之即發。其法。蓋出葛洪肘後方。(蘇頌)

【蝮蝦魚】 產地 出登南嶽仙湖中

形態 蝮蝦魚為介類之一種。狀如龜。殼青。其大如盤。無尾。腹白。有八足。可供藥用。

主治 食之辟瘴毒。

【蝮蝦蟲】 即蝮蝦之處方用名。詳「蝮蝦」條。

【蝮蝦轉丸】

基本 本品為蝮蝦所推之土。

正圓如人捺作者。

古醫別名 土消。(綱目)

性質 鹹。苦。大寒。無毒。

主治 湯淋。絞汁服。療傷寒時氣。黃疸。煩熱及發亂吐瀉。燒存性酒服。治項癭。塗一切瘰癧。

【蝮蝦】 即蝮蝦。見該條。

【蝮蟲】 即蝮蟲之古籍別名。典見「蝮蟲」條。

【蝮蟻】 即石龍子。見「石龍子」條。

【蝮】 即水蛙之古籍別名。典見別錄。詳「水蛙」條。

【蝮】 即田父之古籍別名。典見綱目。詳「田父」條。

【蝮】 即蝮蟻之別名。詳「蝮蟻」條。

【蝮】 即蝮之古籍別名。典見綱目。詳「蝮」條。

【蝮甲】 即蝮蟻之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蟻蟻」條。

【蝮】 即貝子在水中者之古籍別名。典見爾雅。詳「貝子」條。

【蝮】 即溪泉蟲之古籍別名。典見綱目。詳「溪泉蟲」條。

【蝮】 即蝮蟻之古籍別名。典見爾雅。詳「蝮蟻」條。

【蝮蟻】 即肥蟻。詳「肥蟻」條。

【蝮蟻】 即桑蟻。詳「桑蟻」條。

【蝮蟻】 即桑蟻。詳「桑蟻」條。

【蝮蟻】 即桑蟻。詳「桑蟻」條。

【蝮蟻】 即貝蟻之古籍別名。典見別錄。詳「貝蟻」條。

【蝮蟻】 即蝮蟻之古籍別名。典見爾雅。詳「蝮蟻」條。

【蝮蟻】 即蝮蟻之原名。詳「蝮蟻」條。

【蝮蟻】 即蝮蟻之別名。詳「蝮蟻」條。

【蝮蟻】 原名 蝮蟻。

【蝮蟻】 命名 本品尾好享而

挺故名。

古籍別名 蝮蟻。蝮蟻。蝮蟻。蝮蟻。

勞。爾雅。天雞。(綱目) 蝮蟻。蝮蟻。

乘。(陶弘景) 抄羊。赤者名赤卒。蟻

小。而黃者名胡梨。(古今注)


外國名詞 Anax partheno.

Pe. Solva. (拉丁) 下ノ水 (日本)

基本 係節肢動物昆蟲類脈翅類蜻蛉科之蜻蛉。

產地 生原野水澤間。

形態 蜻蛉爲卵生蟲類之一種。其體分頭、胸、腹三部。頭甚大。有複眼一對。口器甚強。便於咀嚼。胸背有膜質翅兩對。腹面有足三對。腹部細長分數節。各節形狀不同。性活潑。喜羣飛。雨時或夜間。則靜息而平披其翅。產卵時以尾蘸水。使附水草之莖。夏產卵。至秋孵化。秋產卵。至翌春孵化。捕得可供藥用。



蜻 蛉

採取 以青色大眼者。腰間有碧色者。及赤色者入藥用。

性質 微寒。無毒。

主治 強陰止精。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論蜻蛉曰。壯陽暖水厥。

十四畫 蜻

【蜻蛉草】即小背草之別名。詳『金銀銀開』條。

【蜻蛉】即蜻蛉之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蛉』條。

【雌】即果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【雌蟻】即全蟻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蟻』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見詩經。詳『蜈蚣』條。

用名。詳『厚樸』條。

【製天雄】即天雄製成者之處方用名。詳『天雄』條。

【製天蟲】即白附蠶之處方用名。詳『白附蠶』條。

【製玉竹】即玉竹之處方用名。詳『玉竹』條。

【製甘石】即煨甘石製成者之處方用名。詳『煨甘石』條。

【製沒藥】即沒藥之處方用名。詳『沒藥』條。

【製豆豉】即淡豆豉之處方用名。詳『淡豆豉』條。

【製乳香】即乳香之處方用名。詳『乳香』條。

【製於朮】即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【製金柑】即藥製柑橘餅之處方用名。詳『藥製柑橘餅』條。

【製茅朮】即若朮製過者之處方用名。詳『若朮』條。

【製軍】即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【製首烏】即何首烏之處方用名。詳『何首烏』條。

【製香附】即香附子之處方用名。詳『香附子』條。

詳『香附子』條。

【製茯苓】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【製側子】即側子製成者之處方用名。詳『側子』條。

【製捲朴】即厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【製硫黃】即硫黃之處方用名。詳『硫黃』條。

【製黃精】即黃精之處方用名。詳『黃精』條。

【製蜀漆】即常山之處方用名。詳『常山』條。

【製熟地】即熟地黃製成者之處方用名。詳『熟地黃』條。

【製磁砂】即磁砂製成者之處方用名。詳『磁砂』條。

【製薏仁】即薏仁製成者之處方用名。詳『薏仁』條。

【製錦紋】即大黃製成者之處方用名。詳『大黃』條。

【製膽星】即天南星製成者之處方用名。詳『天南星』條。

【製鎮陽】即鎮陽製過者之處方用名。詳『鎮陽』條。

【製肉】即豬肉之古籍別名。典見

綱目詳豨莨。

【豨首】即天名精之古籍別名。與見綱目詳天名精。

【豨椒】即蔓椒之古籍別名。與見本草集註詳蔓椒。

【豨菘草】命名 楚人呼豨為豨呼草之氣味辛毒者為菘。本品氣臭如豬而味菘。故名。

古籍別名 火杖草。豬脊母。虎脊狗脊。唐本草黏糊菜。一救荒本草。希仙。本草綱目。火杖。希賢。虎菘。類鼻。白花菜。羊屎菜。豨菘。符。和漢藥考。

外國名詞 Stigosephelia orientalis, L. (拉)

基本 屬菊科為豨菘之苗葉。產地 在山野田澤間。

形態 豨菘為一年生草本。山野多有之。春日生苗。至夏莖高二三尺。大者達五六尺。莖方有茸毛。葉為卵形。前端尖。邊緣有粗鋸齒。自其基部出三大葉。脈色淺綠。質柔軟而薄。有茸毛如莖。皆對生。入秋。枝梢開小黃花。排列為頭狀花序。在花序之周圍者為舌狀花冠。

在中央者為筒狀花冠。花下有苞五瓣。皆狹長如匙。亦生有茸毛。花後結瘦果。果有黏液。具一種臭氣。善附著他物以傳播其種子。

採取 三四月間採苗葉。曬乾。製法 蘇頌云。凡使豨菘。須用蜀人單服豨菘法。五月五日。六月六日。九月九日。採葉去根。莖花實淨洗。曝乾。入飯中。層層酒與蜜薰之。又曝如此。九過。則氣味香美。熬搗篩末。蜜丸服之。甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。又能行大腸氣。

性質 苦寒。有小毒。效能 祛風溼。治麻痺。用治散風燥溼藥。及作瘡毒藥。

主治 治熱濕煩滿不能食。生持汁三合服。多則令人吐。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論豨菘草曰。主久瘧疾。竅搗汁服。取吐。搗傳虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠅咬。蠟蜂刺。瘡。【明】李時珍本草綱目論豨菘草曰。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨痛。膝弱。風溼。諸瘡。【明】李士材本草圖解論豨菘草曰。豨菘苦寒入肝。主風氣麻痺。骨

痛。膝弱。風溼。諸瘡。按豨菘苦寒之品。且有毒。令人吐。以為生寒熱溫。理或有之。以為生熱補。未敢盡信。豈有苦寒搜風之劑。蒸煮便有補益之功耶。世俗見慎微本草。察之太過。遂誤認為風家至寶。余少時亦信之。及恪誠修事。久用無效。始知方書未可盡信也。古人所謂補者。亦以邪風去。則正氣昌。非謂其本性能補耳。酒蜜酒蒸。【清】黃宮繡本草求真論豨菘草曰。豨菘草味苦而辛。性寒不溫。故書載須蒸曬至九。加以酒蜜同製。則濁陰之氣可除。而清香之氣始見。是以主治。亦止宜於肝腎風溼。而見四肢麻木。筋骨冷痛。腰膝無力。風溼瘡瘍等症。以其苦能燥溼。寒能除熱。辛能散風故也。若使非為風溼。而見腰膝無力等症。則又屬於血虛。而不可用辛散之味矣。然熱用猶可。其性不甚傷正。若生用不製。則又令人作泄。不可不知。以五月五六月。六七月。七八月。八九月。九探者尤佳。至云服能益氣。止是風溼既除之驗。宋張詠表進輕身之說。亦是渾同腐席之語。非實證也。

去粗莖。留枝葉。花實。酒并蒸。豨菘丸。次蜜丸。搗汁熬膏。煉蜜三味。較之加以酒治。始可投服。

近人學說 張山雷曰。豨菘之草。微有臭味。故得豨名。豨者豕也。言此草之氣。其臭如豕。古人又有豨脊母之名。其義一也。唐本草始載之。言其氣味苦寒。治熱濕煩滿。不能食。生搗汁飲三合。多則令人吐。又謂豨脊母氣味辛苦。平。主金瘡。止痛。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散敷。並良。藏器謂主久瘧疾。搗汁服。取吐。又搗敷虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠅咬。蠟蜂刺。瘡。蘇頌謂蜀人單服豨菘。以五月五日。六月六日。九月九日。採葉淨洗。入飯中。層層酒與蜜蒸之。又曝。凡九次。氣味極香。搗末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸氣。安五臟。生毛髮。兼主風溼。肌肉頑痺。婦人久冷尤宜。又江陵節度成訥。及知益州張詠。皆有進豨菘丸表。極言其治中風大效。頗按此物。生時氣臭味。多服引吐。蓋性本寒涼。而氣猛烈。長於走竅開泄。故能

去粗莖。留枝葉。花實。酒并蒸。豨菘丸。次蜜丸。搗汁熬膏。煉蜜三味。較之加以酒治。始可投服。

治熱煩燥毒而吐痰。及其九次。蓋酒蒸曬。和蜜爲丸。則氣味已厚。而通利機關。和調血脈。尤爲純粹。凡風寒溼熱諸毒。多服均獲其效。洵是微賤藥中之良品也。

配合應用 治風寒泄瀉。火杖丸。治風氣行於腸胃。泄瀉。火杖草爲末。醋糊丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。(聖濟總錄方)

治癰疽腫毒。一切惡瘡。務菽草。端午採者一兩。乳香一兩。白礬燒半兩爲末。每服二錢。熱酒調下。發重者連進三服。得汗妙。(乾坤秘製方)

治發背疔瘡。務菽草。五葉草。(卽五爪龍)野紅花(卽小蘇)大蒜等分。搗爛。入熱酒一盃。絞汁。服得汗立效。(乾坤生意方)

治疔瘡腫毒。端午採務菽草。日乾爲末。每服半兩。熱酒調下。汗出卽愈。極有效驗。(集簡方)

治反胃吐食。用火杖草焙爲末。蜜丸。梧子大。每沸湯下五十丸。(百一選方)

用量 三錢至四錢。
應用宜忌 凡無風溼而屬陰

十四畫 豨

虛者禁用。忌錢。

著名方劑 豨菽丸。治口眼喎斜。偏風失音。不語。時時吐涎。久服。眼目清明。髭髮烏黑。筋骨強健。(本事方) 豨菽草。五月中取葉。及嫩枝。洗。九蒸。九曬。微焙爲末。煉蜜丸。桐子大。溫酒或米湯下。三四十丸。

參攷資料 蜀人單服豨菽法。五月五日。六月。九月。九月。九日。採葉。去根莖。花實。淨洗曬乾。入甑中。層層灑酒。與蜜蒸之。又曝。如此九過。則氣味極香。熟搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸氣。諸州所說。皆云性寒。有小毒。與唐本同。惟文州及高郵州。云性熱。無毒。服之補益。安五臟。生毛髮。蒙主風溼。肌肉頑痺。婦人久冷。尤宜。用須去粗莖。留枝葉。花實。蒸曬。兩說不同。豈單用葉則寒。而有毒。并枝花實則熱。而無毒乎。抑土地所產不同。而然歟。(蘇頌) 生搗汁服。則令人吐。故云有小毒。九蒸九曬。則補人去毒。故云無毒。生則性寒。熱則性溫。云熱

者非也。(李時珍) 按江陵府節度成。訪進豨菽丸方。裴略云。臣有弟。年二十一。中風。伏枕五年。百醫不瘳。有道人鍾針。因觀此。愚曰。可餌豨菽丸。必愈。其草多生沃壤。高三尺許。節葉相對。當夏五月。以來收之。每去地五寸。削刈。以溫水洗去泥土。摘葉及枝頭。凡九蒸九曬。不必太燥。但以取足爲度。仍熬搗爲末。煉蜜丸。如梧子大。空心酒溫。或米飲下。二三十丸。服至二千丸。所患愈。加不得憂慮。是藥攻之力。服至四千丸。必得復。至五千丸。當復丁壯。臣依法修合。令贈服之。果如其言。服後。須喫飯三五匙。歷之。五月五日。採者佳。奉勅宣付醫院詳錄。又知益州張詠。進豨菽丸表略云。竊以養石飲水。可作充腸之饌。餌松含柏。亦成救病之功。是以療飢者。不在於羞珍。愈病者。何煩於異術。倘獲濟時之藥。輒陳鄙物之形。不恥管窺。輒干天聽。臣因換龍興觀。掘得一碑。內說修養氣術。并藥方二件。依方差人訪問。採覓其草。頗有異。金錢銀線。素莖紫莖。對節而生。蜀號火杖。莖葉頗同。

若耳。不費登。高歷險。每常求少獲。多急採。非難。廣收甚易。倘動久服。旋見神功。誰知至賤之中。乃有殊常之效。臣自服至百服。眼目清明。卽至千服。髭髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。臣本州有都押衙羅守一。曾因中風。墜馬。失音不語。臣與十服。其病立痊。又和尙智殿。年七十。忽患偏風。口眼喎斜。時時吐涎。臣與十服。亦便得痊。今合一百劑。差職貢史元奏進。(唐慎微) 豨菽田野皆食之。一名火杖。葉似酸漿。而狹長。花黃白色。三月四月採苗。葉曬乾。又曰豨脊母。生平澤下。地所在。皆有一。名虎脊。一名狗脊。葉似蒼耳。莖圓有毛。(蘇恭) 豨菽處處有之。春生苗葉。似芥葉。而狹長。文粗。莖高二三尺。秋初有花。如菊。結實。頗似鶴虱。夏採葉曬乾。用(蘇頌) 按蘇恭。唐本草。謂豨菽似酸漿。結脊母。似蒼耳。列爲二種。而成訪進豨菽丸表。言此藥與本草所述相異。多生沃壤。高三尺許。節葉相對。張詠豨菽丸表。言此草。金錢銀線。素莖紫莖。對節而生。蜀號火杖。莖葉頗同。蒼耳。又按沈

十四畫 豪 狸 寶 趕 趙 輻

括筆談云。世人妄認地菴爲火杖。有草服火杖法者。乃是地菴。不當用火杖。乃本草名豬脊母者。後人不識。重復出條也。按此數說各異。而今人風靡多用豬莖丸。將何通從耶。時珍常聚諸草訂誤。則豬脊草素莖有直稜。兼有斑點。葉似蒼耳而微長。似地菴而稍薄。對節而生。莖葉皆有細毛。肥壤一株。分枝數十。八九月開小花。深黃色。中有長子。如同菴子。外萼有細刺黏人。地菴則青莖。圓而無稜。無斑無毛。葉似菴芥。亦不對節。觀此則似與成張二氏所說相合。今河南陳州採豬莖充方物。其狀亦似豬脊草。則沈氏謂豬莖即豬脊母者。其說無疑矣。蘇恭所謂似酸漿者。乃龍葵。非豬莖。蓋誤認爾。但沈氏言世間草服火杖。乃是地菴。不當用豬脊母。似與成張之說相反。今按豬莖豬脊母條。並無治風之說。惟本經地菴條。有去痺除熱。久服輕身耐老之語。則治風似當用地菴。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬脊母之豬莖者。復往往有效。

其地菴不見有服之者。則豬莖之爲豬脊丸。尤不必疑矣。(李時珍) 命名 說文云。豪。豕。豕。如猪脊者。能激毒射人。故名。

古籍別名 蒿豬(唐本草)山豬(通志)豚豬。通豬。鬃豬(綱目)箭豬(動物學大辭典)

外國名詞 Hystrix cristata L. 或 H. subcristata Swinhof (拉丁) (Common Porcupine 或 Porcupine) (英) ヤマアラシ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類超類豪豬科。產地 出廣西及印度諸地之山中。美洲亦有出。

形態 豪豬爲獸類之一種。頭大眼小耳短。口吻圓鈍。上顎具堅強之門牙。臂上有硬強之長鬚。四肢短。前肢四趾。後肢五趾。趾具短爪。背脊腿密生硬刺毛。毛色黑或蒼褐。長刺毛尖端。更有倒鈎。體長二三尺。穴居土中。晝伏夜出。覓樹皮木根及果實爲食。其肉可供藥用。



猪 豪

性質 甘。大寒。有毒。主治 多奔。利大腸。參攷資料 豪豬肉不可多食。發風令人虛羸。(蘇頌)

【豪豬肚及尿】 性質 寒。無毒。主治 水瀉。熱風。鼓脹。同燒存性。空心酒服。二錢。匕。用一具。即消。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論豪豬肚及尿曰。治黃疸。乾燒研服。【明】李時珍本草綱目論豪豬肚及尿曰。速尿燒研。酒服。治水腫。脚氣。奔豚。

參攷資料 此豬多食苦參。故能治熱風水脹。而不能治冷脹也。(孟詵) 【狸豆】 卽黎豆之古籍別名。典見綱目。詳【黎豆】條。

一五九八

【寶門】 卽檳榔之古籍別名。典見李氏藥錄。詳【檳榔】條。

【寶查】 卽查之古籍別名。典見綱目。詳【查】條。

【趙麥故】 卽粟米之古籍別名。典見綱目。詳【粟米】條。

【趙李】 卽鼠李子之古籍別名。典見新修本草綱目。詳【鼠李子】條。

【輕粉】 命名 本品山水銀升鍊而成。質輕如粉。故又名之曰水銀粉。

古籍別名 水銀粉(嘉祐)汞粉(日華本草)膩粉(本草綱目)水粉。銀粉。水銀。伊勞白粉(和漢藥考)不重(生煎辨)

外國名詞 Calomet 基本 係汞礦。爲水銀結晶性之疏鬆粉末。

形態 輕粉爲水銀升鍊。係結晶性之粉末。作板狀針狀。或錐狀之白色固體。而有光澤。其不甚純潔者。僅供外用。內服者須以純潔色白之輕粉末。

製法 李時珍曰。升鍊輕粉法。用水銀一兩。白礬二兩。食鹽一兩。同研。不見星。置於鐵器內。以小烏

益覆之。飾鐵灰。與水和封固盆口。以炭打二炷香。取開。則粉升於盆上矣。其自如雪。輕盈可愛。一兩可升粉八錢。又法水銀一兩。白礬七錢。白鹽五錢。同研如上升鍊。又法先以皂礬四兩。鹽一兩。煨硝五錢。共炒黃為粉。水銀一兩。又粉二兩。白礬一錢。研勻如上升鍊。

用法 到研和入內服外敷之丸散。

性質 辛。冷。無毒。

成分 輕粉為質地疎鬆之甘汞Hg₂O₂。

效能 殺蟲治疥瘡。規痰消積。服用作驅蟲藥。又作下劑。能治疥瘡。蠅蟲。便秘。外用有直接撲滅細菌及寄生蟲之功。且於局部無刺激性。內服能激腸之蠕動。增進及分泌。故有通便之功。且在腹內與綠蟲莖片蟲綠蟲相遇。略有撲滅而驅出之功。若佐以殺蟲劑。則功效尤顯。

主治 通大腸。轉小兒疳瘕。瘰癧。殺疥瘡。蠅蟲。及鼻上酒皸。風痞。瘰癧。

歷代記載致因 【明】李時珍

十四 輕

本草綱目論輕粉曰。治痰涎積滯。水腫鼓脹。毒瘡。【明】穆希雍本草經疏論輕粉曰。水銀粉升鍊水銀而成。其味本辛。氣冷無毒。煨體與水銀相似。第其性稍輕浮。大腸熱燥。則不通。小兒疳瘕。因多食甘肥。腸胃結滯所致。辛涼。除腸胃積滯熱結。故主之也。其主瘰癧瘡。疥癬蟲。及鼻上酒皸。風痞瘰癧者。皆從外治。無非取其除熱殺蟲之功耳。【明】李士材本草圖解論輕粉曰。輕粉辛溫有毒。治痰涎積滯。鼓脹。毒瘡。殺蟲搜風。輕粉乃鹽礬煉水銀而成。其氣燥烈。其性走竄。善規痰涎。消積滯。故水腫風痰。溼熱。楊梅毒瘡。服之。則涎從齒齦而出。邪壅漸開而愈。若服之過劑。及用之失宜。則毒氣發。竄入經絡。筋骨。莫之能出。變為筋掣骨痛。發為癰腫疔漏。經年累月。遂成廢疾。因而天枉。用者慎之。【清】黃宮繡本草求真論輕粉曰。輕粉係水銀加鹽礬昇煉而成。雖是化純陰而為辛燥。然陰毒之性猶存。故能殺蟲治瘡。規痰消積。烈毒之性走而不守。今人用治楊梅瘡毒。雖能規

以邪溼熱。從牙齦而出。暫得寬解。然毒氣竄入筋骨。血液耗散。久久發為結毒。遂成廢人。仍須用水銀升煉。入三白丹引拔毒之藥。同氣投逐。癰風。醉仙丹。通天再造散。用以搜剔毒邪。仍從齒齦而出。再以錢氏利驚丸。白餅子並用。取痰積從大便而出矣。【清】黃元御玉楸藥解論輕粉曰。輕粉辛冷毒烈。服之筋骨拘攣。齒牙脫落。庸工用治楊梅惡瘡。多被其毒。不可入湯丸也。本草謂其治痰涎積滯。氣喘水腫。良藥自多。何為用此。

國外學說 日本三重縣射和村為輕粉特產區。因該村朱中山產有一種土質。名朱色土。為製造輕粉不可少之原料。故輕粉之生產。祇限於該處。和漢藥考曰。精製水銀之法。以食鹽與朱色土。煉水銀使固。入鐵鍋中。烈火熱之。使之昇華。黏附於蓋。乃採取之。製造輕粉之原料有三。一水銀。二鹽之清汁。三赤土。拌和入鐵鍋內。並列爐上。共六十個。鍋內空隙處。以赤土滿填之。各鐵鍋均蓋以黏土製之。兜。令勿洩氣。兜面以水溼透。安置

既妥。徐徐加熱。俟溫度逐漸上升。水銀與清汁中之酸性鹽。及空氣中之酸。清汁中之食鹽。先後起化學反應。輕粉則成。美羅之結晶。黏附兜之內面。約一二時。提煉即可。皆以羽毛掃輕粉於紙上。隨即裝罐發售。其鐵鍋內餘剩之赤土。尚含有粗製之輕粉不少。於此再加水煎淘汁。便為二次製造輕粉之原料。依此所得之輕粉。係細小色白之鱗片。且有光輝。毫無雜質之質。又其輕。故其粉末易與他藥混和。以製散劑或丸藥。均極相宜也。又輕粉雖係結晶性之白粉。然用故大三百二十五倍之顯微鏡照之。則見為大小不同之板狀結晶。其質輕。有光輝。起脂肪狀之感覺。無臭無味。其反應呈中性。水及酒精伊打。俱不溶解。加安母尼亞水。則變黑色。若與苛性亞爾加里土類亞爾加里炭酸亞爾加里。煨製苦土。同以水為媒介。冷則變成黑色之亞酸。化汞。加沃度加里液少許。立即化生黃綠色之亞沃度汞。再加多量。即析出水銀之一分。溶解而為沃度加里與沃

度。又以輕粉和水。加食鹽。綠化。加里。綠化。安母。組。誤。煮。沸。之。亦。析。出。水。銀。若。與。有。機。質。之。砂。精。相。接。觸。以。溫。度。為。媒。介。則。水。銀。逐。漸。還。元。加。沸。騰。之。鹽。酸。則。析。出。水。銀。之。一。分。而。化。生。昇。汞。如。硝。酸。煮。沸。之。則。發。生。次。硝。酸。加。濃。厚。之。硫。酸。冷。時。無。變。化。煮。沸。之。則。發。生。亞。硫。酸。而。溶。解。因。分。平。次。郎。之。製。造。輕。粉。說。明。書。云。據。內。務。省。試。驗。輕。粉。之。成。績。其。一。以。射。和。所。出。之。輕。粉。實。行。化。學。試。驗。毫。無。可。溶。解。之。水。銀。化。合。物。又。可。完。全。昇。華。絕。不。混。雜。安。母。尼。亞。鹽。與。其。他。諸。鹽。更。試。其。醫。治。作。用。則。驅。蠱。及。瀉。利。之。功。堪。與。第。一。綠。化。汞。相。匹。所。異。者。輕。粉。結。晶。如。鱗。屑。耐。光。而。不。變。色。查。歐。洲。製。造。之。第。一。綠。化。汞。結。晶。頗。大。受。光。較。遲。故。大。率。皆。用。研。末。其。尋。常。者。恐。不。免。含。有。可。溶。性。之。水。銀。化。合。物。故。不。知。以。大。結。晶。之。第。一。綠。化。汞。和。水。研。末。洗。淨。夾。雜。物。用。之。較。為。穩。妥。惟。射。和。所。製。之。輕。粉。質。地。純。潔。無。異。本。國。製。之。第。一。綠。化。汞。用。於。醫。藥。特。許。發。賣。其。二。此。藥。為。鱗。屑。狀。無。色。有。光。澤。

遇水不溶解。遇硝酸。鹽酸始溶解。起第一鹽化水銀之諸反應。不含他質。故合用於醫藥。和漢藥考曰。輕粉之用量。與甘汞相同。內用為驅蠱藥。一日用〇・〇二至〇・〇五。為緩下劑。一日用〇・一至一・〇。丹波藥學博士。曾託橋田醫學士。用輕粉為下劑。透次試驗。其用量。據橋田報告如左。第一次。用量為〇・五瓦。服後小腹痛。經四時半。下瀉一次。第二次。用量仍係〇・五瓦。服後稍覺腹痛。四時中瀉兩次。第三次。用量如前。服後仍覺腹痛。經十時始瀉一次。第四次。用量如前。服後不覺腹痛。經七時瀉一次。和漢藥考曰。國分平次郎製輕粉。並著有說明書。詳述射和輕粉之歷史。摘錄如左。射和輕粉之製造。為自古異人傳授之奇法。綠我鄉之良位。有山名朱中山。天然產一種朱色土。俗呼質土。和以水銀。即可製成輕粉。相傳此土能解水銀峻烈之毒。他處竟不能做造此藥。因此射和輕粉。名聞遐邇。蓋他處無此質土也。當時發明之早。尙在持統天皇御極之際。距今已千二百餘年。若歐洲之綠化汞。發明在西曆千七百七十四年。距今幾百有餘年。誠我國特有之良劑也。當四百五十餘年前。即文安永錄年間。此藥最為盛行。時製造者有八十三家之多。國家恐有濫造之弊。嚴行限制。遂減至十六家。復嚴訂章程。以防之。故醫學博士。櫻村清德。曾試驗輕粉之醫治功用。詳見明治十二年十一月東京醫事新誌第八十四號。又藥學博士。丹波敬三。製造射和輕粉之意見書。詳見明治二十七年三月藥學雜誌第四百十五號。錄之如左。櫻村醫學博士。檢查輕粉效用之成績。和漢醫之應用輕粉。於蠱毒症也。亦已久矣。前人謂其成分中。不免摻雜猛汞。實不盡然。茲者日本大學醫學部教授。柴田承桂。精密檢查。始知其成分。為亞綠化汞。與甘汞相同。至是嚮日之疑團。乃一旦冰釋。今也余之檢查。則在輕粉之效力。是否與甘汞相同。抑有差異之處。故第一試其驅蠱之功效。第二試其瀉瀉之作用。爰臚舉其成績如左。輕粉治愈蠱

毒之醫案。(一)某男子年二十七。替養本不佳。良。二年前患蠱毒。至今不治。頭部有潰瘍數處。陰莖生疥瘡。侵蝕極深。龜頭腐脫。咽喉亦有潰瘍數處。嚙下困難。聲音嘶啞。某醫連用沃陳劑。外部潰瘍。塗布五十倍石炭酸油。經已數月。毫無寸效。試以輕粉〇・〇三。和白糖〇・三。投之。與灰白水銀軟膏塗擦法替換。外部潰瘍。則以輕粉一分。豚脂八分。調和攤貼。約三星期。諸症頓減。潰瘍幾於全愈。其間兼用綠酸加里液含漱。頻進滋養物。該病者自來食慾缺乏。消化不良。衰弱頗甚。齒隙微有紅腫。現惡液質之徵。後更投以規那煎。居然強健。異於常人。(二)某男子年二十。二體格中等。親屬向有神經系病。四年前始患蠱毒。一年前發腦蠱毒。由是諸症迭起。如神思不甯。頭痛。耳鳴。眩暈。健忘等。續續而至。又卒然昏倒。搐搦狀。若發癲。且兩眼失明。亦令服輕粉。一日三次。每次服〇・〇三。與灰白水銀軟膏塗擦法替換。頭痛及發癲症狀。俄而退。神思爽適。連服約十餘日。漸

起消化不良。齒酸酸腫。但不流涎。送即停服。約數旬後。前症又速發。三次。仍服輕粉。微毒果愈。惟兩目已昏。不能重明耳。

配合應用 ①小兒初生。浴湯中入鹽少許。拭乾。以膩粉少許摩其身。既不畏風。又散諸氣。(全幼心鑑方)

②治初生鎖肚。證由胎中熱毒。結於肛門。兒生之後。閉而不通。三日者。急令婦人啞兒前後心。手足心。并臍七處。四五次。以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時與少許。以通為度。(全幼心鑑方)

③治小兒涎喘。服藥不退者。用無雄雞子一個。取清。入輕粉抄十錢。并和銀器。置湯瓶上。蒸熟。三歲兒盡食。當吐痰或泄而愈。氣實者。乃可用。(活幼口議方)

④治幼兒乳不止。服此立效。膩粉一錢。鹽鼓七粒。去皮研。勻丸。麻子大。每服三丸。整香湯下。(活幼口議方)

⑤治小兒喫泥及臍肚。用膩粉一分。沙糖和丸。麻子大。空心米飲下。一丸。良久。泄出泥土。遂。(經驗

十四畫 輕

方)

⑥治大小便閉。脹悶欲死。二三日則殺人。膩粉一錢。生麻油一合。相和空心服。(聖惠方)

⑦治大便壅結。膩粉半錢。沙糖一彈丸。研。梧子大。每服五丸。臨臥溫水下。又方。膩粉二錢。黃丹一錢。為末。每米飲服一錢。(普濟方)

⑧治血痢腹痛。膩粉五錢。定粉三錢。同研。水浸蒸餅心少許。和丸。綠豆大。每服七丸。或十九丸。艾一枚。水一盞煎湯下。(孫用和秘寶方)

⑨治消中嗜食。多因外傷脾熱。內積憂思。嗜食鹹物及麪。致脾胃乾燥。飲食倍常。不生肌肉。大便反堅。小便無度。輕粉一錢。為末。薑汁拌勻。長流水下。齒浮是效。後服豬肚丸補之。(危氏得效方)

⑩治一切虛風。不二散。用膩粉一兩。湯煎五度。如麻脚。慢火焙乾。磨香半兩。細研。每服一字。溫水調下。(孫用和秘寶方)

⑪治水氣腫滿。赤粉一錢。烏雞子去黃殼粉。蒸餅包。蒸熟取出。苦荬煎炒一錢。同蒸餅杵丸。綠豆大。每車前湯下三五丸。日三服神效。

(醫聖元戎方)

⑫治痘瘡生。輕粉、黃丹等分。為末。左目患吹右耳。右目吹左耳。即退。(王氏痘疹方)

⑬治女人面脂。太真紅玉膏。輕粉、滑石、杏仁。去皮等分。為末。蒸過。入膩粉少許。以雞子清調勻。洗面。畢。傳之。旬日後。色如紅玉。(閩閩事宜方)

⑭治抓破面皮。生瘻自然汁。調輕粉末。擦之。更無痕迹。(救急方)

⑮治牙齦疼痛。輕粉一錢。大蒜一瓣。并餅安隔骨前陷中。先以銅錢隔之。用蠟殼蓋定。扎住一宿。愈。左疼安右。右疼安左。(摘玄方)

⑯治風蟲牙疳。膿血有蟲。輕粉一錢。黃連一兩。為末。搽之。(普濟方)

⑰治小兒耳爛。輕粉、葶子灰等分。研。油調傅。(摘玄方)

⑱治底耳腫痛。汁水不絕。輕粉一錢。麝香一分。為末。搽之。(簡便方)

⑲治爛弦風眼。膩粉末。口津和點。大昏。日三三次。(聖惠方)

⑳治小兒頭瘡。葱汁調膩粉塗之。又方。雞子黃炒出油。入麻油及膩粉末。傅之。(集簡方)

㉑治小兒生癩。豬脂和輕粉。抹之。(直指方)

㉒治牛皮癬。五更食炙牛肉一片。少刻。以輕粉半錢。溫酒調下。(直指方)

㉓治楊梅瘡。用黍粉、大風子肉等分。為末。塗之。即愈。(嶺南衛生方)

㉔用輕粉二錢。杏仁四十二個。去皮洗瘡。拭乾。擦之。不過三次。即愈。乾則以鷄膽汁調。(醫方摘玄方)

㉕治楊梅瘡。用輕粉一錢。雄黃、丹砂各二錢。半。槐花炒。龜版炙。各一兩。為末。糊丸。梧子大。每服一錢。冷茶下。日二服。七日愈。(醫學統旨方)

㉖又用輕粉、胡桃仁、槐花炒。研。紅棗肉各二錢。搗丸。分作三服。初日雞湯下。二日酒下。三日茶下。三日服盡。五日瘡乾。七日痂落。(得誠經驗方)

㉗一方用額豬腎一對。去膜批開。各珍輕粉一錢。扎定。麻油二兩。燒熱。傾食。不破口。腫牙。仍服金銀花藥。一方用大雞卵一個。去黃留白。入輕粉一錢。攪勻。紙

十四畫 輕 辣 遠

糊。飯上蒸熟食。

①治下疳陰瘡。輕粉末乾搽之。即結瘻而愈。(萬表積善堂方)

②治瘰癧不合。以蠶汁溫洗拭乾。用葱汁調輕粉傅之。一方輕粉五分。黃蠟一兩。以粉摻紙上。以蠟銷之。縛在瘡上。黃水出即愈。(永類鈴方)

③治癰疽惡瘡。梧梅諸瘡。水銀一兩。朱砂。雄黃各二錢半。白礬。綠礬各二兩半。研勻。燒盛。燈蓋蓋定。鹽泥固濟。文武火煉升。煨口掃收。每以三錢。入乳香。沒藥各五分。酒太乙符上貼之。絕效。名曰五寶霜。

用處 八分至錢半。
應用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏葱石。石黃。忌一切血。

參攷資料 ①輕言其質。峭言其狀。賦言其性。昔蕭史與秦穆公。鍊飛雲丹第一轉。乃輕粉。即此也。(李時珍) ②溫燥有毒。升也浮也。黃連。土茯苓。陳腐。黑鉛。鐵漿。可制其毒。(李時珍) ③水銀粉下。臨涎。并小兒。避潮。避燥。藥多用。然不可常服。及過多。多則損人。若兼寫。則危。須審之。蓋寫為心氣不足。不可

下。下之。寒虛。為氣入心。不可治。其

人本虛。更須禁此。慎之至也。(寇宗奭) ④水銀。乃至陰毒物。因火

煨丹砂而出。加以鹽礬。鍊而為輕粉。加以硫黃。升而為銀朱。輕飛。靈變化。純陰。為燥烈。其性走而不守。善劫痰涎。消積滯。故水腫。風痰。濕熱。毒瘡。被劫。從齒。而出。邪鬱

為之。暫閉。而疾。因之。亦愈。若服之。過劑。或不得法。則毒氣。被蒸。竄入。經絡。筋骨。莫之能出。痰涎。既去。血液。耗亡。筋失。所養。營衛。不從。變為。筋攣。骨痛。發為。癰腫。疔漏。或手足。皸裂。蟲蝨。頑痺。經年。累月。遂成。廢病。其害。無窮。親。丹。容。升。鍊。水。銀。輕粉。崩。器。稍。失。固。濟。鐵。石。懸。透。况。人

之。筋骨。皮。肉。乎。陳。文。中。言。輕。粉。下。痰。而。損。心。氣。小。兒。不。可。輕。用。傷。脾。敗。陽。必。變。他。證。初。生。尤。宜。慎。之。而。演。山。氏。謂。小。兒。在。胎。受。母。飲。食。熱

毒。之。氣。蓄。在。胸。膈。故。生。下。個。個。發。驚。宜。三。日。之。內。與。黃。連。去。熱。賦。粉。散。毒。又。與。人。參。朱。砂。蜜。湯。解。清。心。肺。積。毒。既。化。見。可。免。此。患。二。說。不。同。各。有。所。見。一。謂。無。胎。毒。者。不。可。輕。服。一。謂。有。胎。毒。者。宜。預。解。之。用

者宜審(李時珍)

【輕馬勃】即馬勃之處方用名。詳

【馬勃】條。

【辣子】即食茱萸楚地之俗名。詳

【食茱萸】條。

【辣米粥】即蕪菜之古籍別名。典

見綱目。詳『蕪菜』條。

【辣米粥】基本 本品係用辣

茄和米煮成之粥。

主治 治心腹疼痛。

【辣芥子】即芥子之處方用名。詳

【芥子】條。

【辣虎】即蕃椒之古籍別名。典見

龍柏藥性考。詳『蕃椒』條。

【辣茄】即蕃椒之原名。詳『蕃椒』

條。

【辣椒】即辣茄之俗名。詳『蕃椒』

條。

【辣蓼】即水蓼之古籍別名。典見

綱目。詳『水蓼』條。

【辣蕪】即蕪之日本名。詳『蕪』條。

【辣芥】即蕃椒製成醬者之處方

用名。詳『蕃椒』條。

【遠志】 命名 本品功能益智

強志。故有遠志之稱。

處方用名 遠志肉。炙遠志。

14011

古籍別名 辣蕪。蕪。蕪(本經) 蕪。苦蕪。餘糧。阿貝草(和漢藥考) 醒心杖(記事珠)

外國名詞 Polygala, tenuifolia, Willd.

基本 屬遠志科遠志之根與

葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

遠志產山西曲沃縣。河南禹州府。

形體 遠志為山野自生之常

綠草。一根抽數莖。高達七八寸。葉

互生。作卵圓形或橢圓形。夏月於

葉腋開花。有不整齊之紫色花冠。

酷似荻花。後結大二三分扁圓形

之實。中有小黑子。市上出售者。其

根有許多殘莖。且彎曲而有多數

歧根。長約七八寸。粗約三四分。外

面呈灰褐色。處處有副根之切痕。

及不正之皺縮。皮部粗糙。易剝去。

稍有苦味。



遠 志

採取 三四月間採根葉陰乾。

製法 雷敏曰。凡使遠志。須去心。否則令人煩悶。仍用甘草湯浸一宿。曝乾。或炒乾用。

性質 苦溫無毒。

效能 交通心腎而安神。散鬱化痰而消痞。治老年氣枝管炎。因其入胃後即與胃液起作用而將Gastrin析出。此質能刺激胃黏膜。使胃部覺煖感。至腸微能制腸之蠕動。使積糞不易排出。由腸壁吸入血中。能激血液之流動。令心跳強盛。血壓增高。氣管之四周黏膜亦均被激而增多分泌。且氣管之傳入系被激。從反應而起咳嗽。使痰沫混分泌液而咳出。故用為祛痰利尿藥。凡氣管枝炎喘息及其他痰咳皆用之。但古書則作強壯藥。

主治 咳逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘強志。倍力。久服輕身不老。(本經)利丈夫。定心氣。止驚悸。益精。去心下腸氣。皮膚中熱。面目黃。(別錄)

十四畫 遠

藥性本草論遠志曰。治健忘。安魂。魄令人不迷。聖壯陽道。宋日華諸家本草論遠志曰。長肌肉。助筋骨。婦人血燥失音。小兒客忤。(元)王好古湯液本草論遠志曰。治腎積奔豚。明李時珍本草綱目論遠志曰。治一切癰疽。明繆希雍本草經疏論遠志曰。遠志感天之陽氣。得地之芳烈而生。故無毒。亦陽草也。其高蒲之流乎。其味苦溫。兼微辛。為手少陰經君藥。兼入足太陰經。苦能洩熱。溫能壯氣。辛能散鬱。故主救逆傷中。補不足。養性全神明。故除邪氣。陽主發散。故利九竅。心氣開通。則智慧自益。經曰。心為君主之官。神明出焉。天君既定。五官自明。故耳目聰明。不忘強志。陽氣盛。則力增長。男子屬陽。故利丈夫。定心氣。止驚悸者。心驟得補而實。故心氣定而驚悸止也。心火不妄動。則陽不妄舉。精不搖矣。故益精。心下腸氣。是心氣鬱而不舒也。皮膚中熱。面目黃者。溼熱在上部也。苦以洩之。溫以暢之。辛以散之。則二證自去矣。久服輕身不老。好顏色延年者。心主血。心氣足

則血色華於面。君主強明。則十一官皆得職。故延年不老。陽氣日積。故身輕也。人之心腎。晝夜必交。心家氣血旺盛。則腎亦因之而實。腎藏精與志。腎實故志強也。明李士材本草圖解論遠志曰。遠志散溫味苦。腎經氣分藥也。強志益精。治善忘。蓋精與志。皆腎所藏者。精不足則志衰。不能上交於心。故善忘。精足志強。而善忘愈矣。壯陽固精明。目聰耳長。肌肉助筋骨。理一切癰疽。破腎積奔豚。主治雖多。總不出補腎之功。或以為心經藥。則未也。甘草湯浸一宿。去心焙。清黃宮繡本草求真論遠志曰。遠志辛甘而溫。入足少陰腎經。氣分強志益精。凡夢遺善忘。喉痺失音。小便赤澀。因腎水衰弱而致者。宜用是藥以補之。蓋精與志皆藏於腎。腎氣充則九竅利。智慧生。耳目聰明。邪氣不能為害。腎氣不足。則志氣衰。不能上交於心。故迷惑善忘。不能發閉封藏。故精氣不固也。昔人治喉痺失音作痛。遠志末吹之。涎出為度。非取其通腎氣而開竅乎。一切癰疽發背。從七情憂鬱而

得。單煎酒服。其渣外敷。投之皆效。非苦以泄之。辛以散之之意乎。小便赤濁。用遠志。甘草。茯苓。益智。為丸。煎湯服。非取遠志歸陰。以為嚮導之藥乎。但一切陰虛火旺。便濁遺精。喉痺癰腫。慎勿妄用。去心。用甘草水浸一宿。曝乾焙用。

國外學說 日本學說謂遠志為類於攝涅瓦之生藥。日本藥局方採用外國之攝涅瓦者。蓋因遠志之成分未詳故也。漢醫於祛痰利尿藥用之。遠志之成分。依藥學雜誌云。下山平野兩氏之研究。成績為血色結晶樣之粉末。而稱之為Oxanthone。與攝涅瓦之成分。Oxanthone。稍異。猪子氏以コイベルト教授之所謂鑄法。試驗遠志。得檢明Sonesol。云。又攝涅瓦根。據藥學雜誌第九十一號所記。云。凡二世紀以來。出現於藥物學上之生藥。今日尚占樞要之位置。雖蒙新藥之侵襲。亦不失其位置者。其不多。攝涅瓦根者。蓋藥物學上可敬愛之忠臣之一也。何則。今日尚有多數之局方採用之。可證其為有效。其為健胃劑。尤

數數稱用。就此生藥。始喚起世人之注意者。蘇格蘭之醫師テン子ツト也。『セチカ』之印度人種。屬爲『クラツベル』蛇所咀時。用之此爲其起因。千七百三十四年及千七百三十五年。攝溫瓦於胸膜炎及肺炎。爲必需之藥品。可山試驗證明之本根之成分。依從前散見於書籍者。列如左。(一)脂肪油及樹脂。(二)痕跡之揮發油。(三)糖分七%。(四)セチギン。(即サボニン)二至五%。(五)黃色素。(六)林檎酸鹽。澱粉全缺乏。而依某藥物學云。貼本品於黏膜。則麻痺局處之神經及筋質。內服大量。則一時甚興奮。後至麻痺而死。適量則刺戟氣道。而發咳嗽。更增加黏液之分泌。醫治作用爲祛痰藥。用於炎性不烈之氣管枝炎及肺炎。用量自三・〇至八・〇。(水一〇〇・〇煎出)英美學說謂遠志產中國之山西。河南及亞美利加等處。其根可入藥。此根爲英國醫士於雍正十三年。得之於亞美利加。以其能治蛇毒。即亞美利加之鱗尾蛇。故此草爲亞美利加

之本草。其大半得之於西南方。每年用此根之數甚多。尋常出售之遠志根。束縛成捆。每捆五十磅至四百磅不定。其形色與氣味。遠志根塊之小者。細如鷄毛管。大者則粗如小指。色棕黃。其臭頗奇。在新鮮之根則臭更甚。味初覺淡。後則變爲苦與辣。惹喉。令口內多生津液。其作用爲化痰藥。有行血氣之性。蓋釋味之物。大率如此。能令大牛津液多生。又能生口津。化痰。發汗。利小便。調經。食其大服。則爲吐藥。與消藥。藥品中多用以治咳嗽。處方以遠志一分細末。淡酒八分。先用酒六分浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。加餘酒漂淋。用絞盤絞渣。過淋紙。再加淡酒。仍足八分爲度。每服一錢至二錢。(遠志酒方)用量遠志末每服三分半至五分。二釐半。又和酒藥考曰。販賣品有數種。日用藥品考云。日藥舖呼內遠志或短遠志者。柔潤爲上品。呼鬼遠志者。硬而不潤。爲下品。呼朝鮮遠志者。大而硬。亦爲下品。間有售本國產者。其根細小。氣味極薄。實不堪用云。

近人學說 〇買九如曰。遠志味辛重。大能入心。開竅宣散之藥。凡痰涎沃心。壅塞心竅。致心氣實熱。爲昏憤神呆。語言蹇澀。爲睡眠不寧。爲恍惚爲健忘。爲夢驚。爲小兒客忤。暫以此豁痰利竅。使心氣開通。則神魂自寧也。又取其辛能醒發脾氣。治脾虛久困。思慮鬱結。故歸脾湯中用之。及精神短少。竟有虛痰作嘔。亦須量用。若心血不足。以致神氣虛怯。無痰涎可祛。即尋歸味辛。尚宜忌用。況此大辛者乎。諸本草謂味辛潤腎。用之益精強志。不知辛取暴悍。戟喉刺舌。與南星半夏相類。經曰。腎惡燥。烏可入腎耶。特爲訂誤。幸同志者辨之。〇張山雷曰。遠志味苦入心。氣溫行血。而芳香清冽。又能通行氣分。其專主心經者。心本血之總匯。辛溫以通利之。宜其振作心陽。而益人智慧矣。古今主治。無一非補助心陽之功效。而李瀕湖獨謂其專入腎家。未免故爲矯異。張石頑和之。非篤論也。本經主欬逆。則若泄溫通辛散。斯寒飲之咳逆自平。此遠志又有消痰飲止咳嗽之

功。別錄去心下脹氣。亦即此意。今東瀛醫者。專用以化痰止咳。頗有奇功。而中醫多未知之。可謂數典忘祖。能不令人尚冷。惟外臺載古今錄驗。胸痺心痛。一方中有遠志。頗合此旨。而張石頑疑本經欬逆爲誤字。蓋亦未達其苦能液化痰。最合溫通行血之義。而今之醫科。亦皆不知。幸員好方。大是可惜。頃恒用於寒濕氣滯。痰濕入絡。發爲癰腫等證。其效最捷。惟血熱溼熱之毒。亦不必一例亂投。無分彼此耳。又曰。遠志辛溫。能利血之運行。而以爲心家補益之品者。振動而流利之。斯心陽敷布而不凝滯。此補心之真旨也。然溫升之品。必不宜於實熱。如誤用於熱痰蒙蔽心包之證。得毋益誤其賊。又所謂安魂魄。定驚悸者。亦謂補助心陽。則心氣充而魂夢自寧。驚悸自定。非養液寧神以安宅之者可比。如因熱生驚。及相火擾攘。而亦與以溫升。其弊亦與痰熱相等。又有遠志能交通心腎之說。則心陽不振。清氣下陷。及腎氣虛寒。不能上升。

者以遠志之溫升。舉其下陷。而引
起腎陽。本是正治。然俗人不察。每
遇腎陽不藏。淫夢失精等證。亦曰
此屬坎離之不交。須以遠志引之。
使其水火交接。則相火愈浮。腎愈
不攝。利九竅者。適以滑精。益精
者。將反以失精矣。此不辨寒溫虛
實。而徒讀古書之善也。豈古人之
欺吾哉。

配合應用 ①遠志、茯神、人參、
地黃、酸棗仁、丹砂、爲鎮心定驚要
藥。

②治小兒心虛易驚。遠志、人參、
白芍藥、酸棗仁、茯神、炙甘草、天竺
黃、鈎藤、鈎加白檀香治一切驚及
慢驚。

③治小兒急驚。遠志、茯神、天竺
黃、鈎藤、鈎丹砂、金箔、真珠、琥珀、膽
星、犀角。

④治心氣弱。心血少。候怯易驚。
夢寐多驚。神不守舍。怔忡健忘。失
志陽痿。遠志、人參、柏子仁、酸棗仁、
麥門冬、五味子、當歸身、茯神、茯苓、
益智仁、生地黃、甘草、沈香。

⑤遠志、茯神、人參、白朮、龍眼、酸
棗仁、木香、炙甘草、能歸脾益智。

十四畫 遠

①入膏歸六黃湯。能止陰虛盜
汗。

②加甘草。治婦人血嘔失音。小
兒客忤。

③遠志一味煎酒。治一切癱疽。
發背。病從七情憂鬱惱怒而得者。
服之皆愈。

④遠志酒治一切癰疽發背。惡
寒。沒大有死血陰毒在中。則不痛。
傳之即痛。有憂怒等氣積怒。攻則
痛不可忍。傳之即不痛。或癰熱在
內。熱逼人手不可近。傳之即清涼。
或氣虛冷潰而不斂。傳之即斂。此
本韓大夫宅用以救人。方極驗。若
七情內鬱。不同虛實寒熱。治之皆
愈。用遠志不拘多寡。米泔浸洗。隨
去心爲末。每服三錢。溫酒一盞。調
澄少頃。飲其清。以滓敷患處。(陳
言三因方)

⑤治心孔惜塞。多忘善誤。丁酉
日密自至市買遠志。着巾角中。還
爲末服之。勿令人知。(肘後方)

⑥治喉痺作痛。遠志肉爲末。吹
之。涎出爲度。(直指方)

⑦治腦風頭痛。不可忍。遠志末
搗身。(宣明方)

⑧治吹乳腫痛。遠志焙研。酒服
二錢。以滓傳之。(袖珍方)

⑨治小便赤濁。遠志、甘草水浸
半斤。茯神、益智仁各二兩。爲末。酒
糊丸。梧子大。每空心漿湯下五十
丸。(普濟方)

用蠶一錢至錢半。

施用宜忌 凡虛而無滯。及有
實火者禁用。畏珍珠、麝、蠶、蟻、蟻、
蛤、忌鐵。得茯苓、冬葵子、龍骨、良
著名方劑 定志丸。治目不能
遠視。但能近視。(千金方) 遠志酒
蒲各二兩。人參、茯苓各一兩。蜜丸。
硃砂爲衣。

參攷資料 ①遠志生大山及
寬甸川谷。四月採根。葉陰乾。(別
錄) ②寬甸屬遼州濟陰郡。今此
藥猶從彭城北關陵來。用之去心。
取皮一斤。止得三兩。爾亦入仙方。
用小草。狀似麻黃而青。(陶弘景)

③今河陝洛西州郡亦有之。根形
如薔根。黃色。苗似麻黃而青。又如
畢豆葉。亦有似大青而小者。三月
開白花。根長及一尺。泗州出者花
紅。根葉俱大於他處。商州出者根
又黑色。俗傳夾門出者最佳。四月

採根曬乾。古方通用遠志小草。今
醫但用遠志。修用小草。(蘇頌) ④
按爾雅云。遠志。藜藿。郭璞注云。今
遠志也。似麻黃赤華葉。殺而黃。其
上謂之小草。(掌禹錫) ⑤遠志入
足少陰腎經。非心經藥也。其功專
於強志益精。治善忘。竇精與志。皆
腎經之所藏也。腎精不足。則志氣
衰。不能上通於心。故迷惑善忘。靈
樞經云。腎藏精。精合志。腎虛怒而
不止。則傷志。志高則喜忘。其前首
腰脊不可以伸。仰屈伸。毛悴色天。
又云。人之善忘者。上氣不足。下氣
有餘。腸胃實而心肺虛。虛則驚。驚
留於下。久之不以時上。故善忘也。
陳言三四方。遠志酒治癰疽。云有
奇功。蓋亦補腎之力爾。葛洪抱朴
子云。陵陽子仲服遠志二十年。有
子三十七人。能坐在立亡也。(李
時珍) ⑥遠志有大葉小葉二種。
陶弘景所說者小葉也。馬志所說
者大葉也。大葉者花紅。(李時珍)

⑦此草服之能益智強志。故有遠
志之稱。世說謝安云。虛則爲遠
志。出則爲小草。記事珠謂之醒心
杖。(李時珍) ⑧木樨甘治咳逆傷

十四畫 遠 酸

中。詳遠志性溫助火。非咳逆所宜。當是嘔逆之誤。別錄云。去心下膈氣。非嘔逆之類乎。按張氏之說。尙未完足。夫形寒飲冷則傷脾。人豈無寒咳。而須性溫助火之藥者乎。遠志於嘔逆固宜。而於咳逆亦合。且外國學說。遠志功用能化痰。可代西藥辛衣格。然則本經云主治咳逆。更可無疑矣。(張路玉)

【遠志肉】即遠志之處方用名。詳「遠志」條。

【遠志葉】 主治 益精。補陰氣。止虛損夢洩。

【遠近子】即菟麻子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟麻子」條。

【遠客】即茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳「茉莉花」條。

【酸母】即酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳「酢漿草」條。即酸模之古籍別名。典見綱目。詳「酸模」條。

【酸石榴】 原名 安石榴。命名 榴者病也。丹實垂垂如贅瘤也。故名。

古醫別名 若榴(廣雅)丹若。(古今注)金罍(綱目)三尸酒。

(道書) 基本 屬安石榴科。爲酸榴之果實。

形態 石榴爲落葉灌木。多自生暖地。或植於庭園。作賞玩之品。樹高七八尺至九尺餘。矮小者多作盆栽。葉作長橢圓形。全緣平滑。有光澤。皆對生。梅雨之時。梢端著花。色朱紅。其形如筒。末端五裂至七裂。萼亦鮮紅。其數多於花瓣。每枝開花一朵至三朵。果實爲蒴果。惟上端有萼緣。其大如橙。熟則果皮若革質。爲不規則之縫裂。種子充滿果實內。但有膜隔分。又略帶三角形。種子透明。色如石竹。有肉質多汁之外皮。味甘酸。供食用。此物變種頗多。花瓣有單瓣、重瓣之別。花色有紅、白、黃諸種。



酸石榴

採取 秋季採之。

用法 生搗取汁。或火煨存性。研末和藥。

性質 酸。溫。無毒。

成分 石榴根皮及其枝幹皮中含有配來推林 Peltolonia C. 卽 P. O. 一名普尼欽 Punica。爲一種植物鹽基。無色。或微黃。狀如油。有麻醇性臭氣。

效能 止瀉痢。療崩帶。專作收斂藥。

主治 赤白痢腹痛。連子搗汁。頓服一枚。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論石榴曰。止瀉痢。崩中帶下。【清】王士雄隨息居飲食譜論石榴曰。石榴甘酸溫澀。解渴析醒。多食損肺傷齒。助火生痰。最不宜人。但供親美而已。皮可染皂。

配合應用 治腸滑久痢。黑神散。用酸石榴一個。煨煙盡。出火毒一夜。研末。仍以酸榴一塊。煎湯服。神效無比。亦治久瀉不止。(普濟方)

治痢血五色。或膿或水。冷熱不調。酸石榴五枚。連子搗汁二升。每服五合。神妙。(聖濟總錄方)

治小便不禁。酸石榴燒存性。無則用枝燒灰代之。每服二錢。用

柏白皮切焙四錢。煎湯一盞。入榴灰再煎。至八分。空心溫服。晚再服。(聖濟方)

治燃髮令黑。酸石榴結成時。就東南枝上。揀大者一個。頂上開一孔。內水銀半兩於中。原皮封之。麻扎定。牛屎封護。待經霜結下。傾出壳內水。以魚鱗能指。蘸水擦髮。久久自黑也。(普濟方)

施用宜忌 凡瀉痢初起而有實邪者禁用。

參攷資料 榴受少陽之氣。而榮於四月。盛於五月。實於盛夏。熱於深秋。丹花赤實。其味甘酸。其氣溫澀。多食損肺傷齒。而生痰涎。酸者則兼收斂之氣。故入斷下崩中之藥。或云白榴皮治白痢。紅榴皮治紅痢。亦通。(李時珍) 博物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石榴。榴種以歸。故名安石榴。又按齊民要術云。凡種石榴者。須安礮石。枯竹於根下。卽花實繁茂。則安石之名義。或取此也。若木乃扶桑之名。榴花丹顏似之。故亦有丹若之稱。傳玄榴賦所謂灼若旭日。柄扶

桑者是矣。筆術云。五代吳越王錢鏐。改榴爲金罍。酉陽雜俎言榴甜者名天漿。道家書謂榴爲三尸酒。言三尸蟲得此果則醉也。故范成大詩云。玉池咽清肥。三彭遂如掃。(李時珍) ①石榴花亦可愛。故人多植之。尤爲外國所重。有甘酢二種。醫家惟用酢者之根。壳。榴子乃服食者所忌。(陶弘景) ②榴五月初花。有紅黃白三色。單葉者結實千葉者不結實。或結亦無子也。實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云卽山石榴也。酉陽雜俎言南詔石榴。皮薄如紙。瑣碎錄言河陰石榴。名三十八者。其中只有三十八子也。又南中有四季榴。四時開花。秋月結實。實方綻。隨復開花。有火石榴。赤色如火。海石榴。高一二尺。卽結實。皆異種也。按事類合璧云。榴大如盃。赤色有黑斑。點皮中如蜂巢。有黃膜隔之。子形如人齒。淡紅色。亦有潔白如雪者。潘岳賦云。榴者天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。掣飢療渴。解醒止醉。(李時珍) ③按諸花忌澆熱水。惟此花可以烈日中

十四畫 酸

澆。併宜以滾湯熱湯澆之。則益茂。但勿著鹹味耳。正月二十日分枝。則當年卽花。物性之難測如此。余幼時見業師王煥中先生善養此花。而人罕知其法。故附識以傳於世。(王士雄)

【酸石榴皮】 命名 本品卽酸石榴之皮。故名。

性質 酸。溫。濕。無毒。
效能 澀腸。染鬚。

主治 淚下(取汁點目)筋骨風。腰脚不遂。步行艱急疼痛。脫肛。瀉痢。漏精。下血。婦女崩中帶下。

【酸石榴根】 命名 本品卽酸石榴之根。故名。

性質 酸。溫。濕。無毒。
主治 口齒病。瀉痢。婦女帶下。染鬚。

【酸白芍】 卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【酸杖】 卽虎杖之古籍別名。典見綱目。詳『虎杖』條。

【酸草】 原名 酸草。產地 生名山禮泉之

陰崖間。形態 酸草爲雜草類之一種。莖有五葉。色青澤。根赤黃。可供藥用。

【酸迷迷草】 形態 酸迷迷草爲溼草類之一種。有赤白兩種。可供藥用。

主治 婦女赤白帶下。(赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁和紹酒煮服)

【酸桶】 卽鐵鈇子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鐵鈇子』條。

【酸桶草】 卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【酸梅草】 形態 酸梅草多生田隴間。春生莖。葉小色碧。可供藥用。

性質 酸。
主治 痰飲。(擦舌上取吐)

【酸惡】 形態 酸惡爲水草類之一種。狀如澤瀉。可供藥用。

主治 惡瘡去白蟲。
【酸惡俞】 卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【酸棗】 卽山查之古籍別名。典見百一選方。詳『山查』條。①卽酸棗仁。詳『酸棗仁』條。

【酸棗仁】 命名 本品形似棗仁。故名。

處方用名 炒棗仁。生棗仁。古籍別名 小者名酸實。(新修本草圖經) 棗仁(爾雅) 山棗仁(綱目) 調睡參軍(和漢藥考) 羊棗仁(新本草)

外國名詞 Rhamnus Sopaiflorus. (Zizyphus Vulgaris.) (Buckthorn.)

基本 屬具李科爲酸棗之子。產地 陝仁山藥物生產辨云。棗仁產直隸順德府。山東濟寧府。冬季出新。

形態 酸棗爲落葉灌木。生於山中。高四五尺。間達丈餘。處處有銳利之短刺。葉互生。爲卵圓形。或倒卵圓形。邊緣有鋸齒。葉柄短。葉脈現三大縱線。花作淡綠黃色。開五瓣似棗之小花。果實爲球圓形之核果。大於棗實。生綠熟紅。有酸

十四畫 酸

味。供食用。然不及飛遠甚。種子堅
硬。碎之中。藏有扁圓形之仁。採之
供藥用。

採取 八月採實。陰乾四十日
成。

製法 雷斅曰。凡使酸棗仁。以
葉拌蒸半日。去皮尖。後人有炒用
者。

性質 酸。平。無毒。

效能 補肝。寧心。斂汗。醒
脾。用為健胃。鎮靜。滋養。安眠藥。

主治 心腹寒熱。邪結氣聚。四
肢酸痛。溼痺。久服安五臟。輕身延
年。本經。煩心不得眠。躄上下痛。
血轉久洩。虛汗煩渴。補中益肝氣。
堅筋骨。助陰氣。能令人肥健。別
錄。

張仲景之發明 酸棗仁一味。
經張仲景之實驗。認為主治。胸
膈煩燥。不能眠也。茲考徵如下。
酸棗仁湯證曰。虛煩。不得眠。為
則按虛煩當作煩錄。以上一方。
酸棗仁用二升。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論酸棗仁曰。筋骨風。炒仁
研湯服。明。經希雍本草經疏論

酸棗仁曰。酸棗仁其實酸平。仁則
兼甘。氣味勻劑。其性無毒。為陽中
之陰。入足少陽。手少陰。足厥陰。太
陰之經。專補肝膽。亦復醒脾。從其
類也。然則芳香。香氣入脾。故能歸
脾。能補膽氣。故可溫膽。母子之氣
相適。故亦主虛煩。煩心不得眠。其
主心腹寒熱。邪結氣聚。及四肢酸
疼。酸痺者。皆脾虛受邪之病。脾主
四肢。故也。膽為諸臟之首。十一臟
皆取決於膽。五臟之精氣。皆稟於
脾。故久服之功。能安五臟。輕身延
年也。別錄主煩心不得眠。躄上下
痛。血轉久洩。虛汗煩渴。補中益肝
氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健者。
緣諸證悉由肝膽脾三臟虛而致。
膽主升。肝藏血。脾統血。三臟得補。
久而氣增。氣增則滿足。故主如上
功能也。明。李士材本草圖解論
酸棗仁曰。酸棗仁味酸性收。故其
主治多在肝膽二經。肝虛則陰傷。
而煩心不眠。肝藏魂。臥則魂歸於
肝。肝不能藏魂。故目不得眠。棗仁
酸味歸肝。肝受養。故熱寐也。其寒
熱結氣。痠痛溼痺。躄下痛。煩渴虛
汗。何一非東方之症。而有不療者

乎。世俗不知其用。誤以為心家之
藥。非其性矣。清。黃宮樞本草求
真論酸棗仁曰。酸棗仁甘酸而潤。
仍有生熱之分。生則能導虛熱。故
療肝熱。好眠神昏燥倦之症。然則
收斂津液。故療膽虛不眠。煩渴虛
汗之症。本肝膽二經要藥。因其氣
香味甘。故又能舒太陰之脾。按肝
虛則陰傷而心煩。而魂不能藏。是
以不得眠也。故凡傷寒虛煩。多汗
及虛人盜汗。皆炒熟用之。取其收
斂肝脾之津液也。歸脾湯用以滋
營氣。亦以營氣得養。則肝自藏魂
而安矣。血自歸脾而臥見矣。其曰
膽熱好眠可療。因其膽被熱淫。神
志昏冒。故似好眠。其症仍兼煩燥。
用此以療熱。熱退則神清氣爽。又
安有好眠之弊乎。但仁性多潤。滑
泄最忌。縱使香能舒脾。難免潤不
受滑矣。炒研用。清。鄭澍本經疏
證論酸棗仁曰。古來於大棗。酸棗
棘刺棗仁。紛紛聚訟。或以為酸棗
即大棗之酸者。或以為酸棗亦大
木。或以為酸棗能醒睡。或以為
服棗仁治不眠。殊不知皆是也。而
皆非也。夫喬生曰。棗生曰。棘是

一類二種。最使棗生。亦不得不
為棘。棘即養而大之。終不得為棗。
如橋年久則葉生刻而變為根。不
開根得培植亦可變為橋。物類之
性固如是耳。試以本經大棗主治
與酸棗主治較之。惟其喬生則氣
力厚。惟其叢生則氣力薄。厚則甘
薄則酸。陰陽應象大論云。辛甘為
陽。酸苦為陰。又曰。味薄則淡。厚則
通。氣薄則發洩。厚則發熱。故大棗
主心腹邪氣。是振其中而使之外
達。酸棗主心腹寒熱。邪結氣聚。是
疏其中而導之外洩。大棗主四肢
重。是助其經氣。使其轉接之間。阻
礙不生。酸棗主四肢痠疼溼痺。是
散其經氣。使其轉接之間。留著解
散。惟其力厚。則既助十二經之行
仍能使全氣內轉。故復補少氣。少
津液。身中不足。力薄則鼓薄經氣。
使外達。遂不能復歸。致衛氣行於
陽。不得入於陰。此則隱居謂嗽之
能醒睡。不為無故矣。由此觀之。本
經酸棗主治。是酸棗之功能。非酸
棗仁之功能。酸棗自醒睡。酸棗仁
自治不眠。故本經於酸棗氣味上
并不著仁字。而隱居亦不言嗽其

仁。可見別錄主治。乃酸棗仁之主治。即其味甘而不酸可證也。杏為心果。其仁入肺而宣氣。桃為神果。其仁入肝而宣血。則棗為脾果。其仁入腎而宣水決矣。雖然棗仁用酸棗之仁。不用大棗之仁何也。蓋大棗補而仁則洩。酸棗洩而仁則補。別錄云。陳棗核中仁味苦。燻之主腹痛。邪氣酸棗仁則甘。以是酸棗仁之用。廣於大棗仁矣。煩心不得睡。水不上濟於心也。躋上下痛。水不宣而停於所治也。血轉久洩者。肝無所藉而不藏。虛汗煩渴者。心無所資而不潤。水氣能頑木。木得通而筋骨送。堅筋骨堅而陰氣有所守。陰氣有所守則陽亦充於外。而肌肉豐氣力優矣。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。虛煩不得眠。酸棗仁湯主之。同是心煩。同是不寐。兩方無一味之同。豈不得臥不得眠有異耶。抑心中煩與虛煩固不同耶。夫寐謔也。靜謔無聲也。眠猶瞑也。混也。混混無知也。臥猶息也。息也是寐者能臥。而未必安靜。眠者且能熟寐。而無知不得臥。則或起或寢。并不能安於牀席矣。

十四畫 酸

於此見虛煩不得眠。雖亦靜謔。但時多擾亂也。心中煩不得臥。則常多擾亂。且不得靜謔矣。夫寐係心與腎相交。能靜謔而時多擾亂。乃腎之陰不繼。不能常濟於心。常多擾亂而不得靜謔。乃邪火燻盛。縱有腎陰相濟。不給其燥。况一為傷寒。本係急疾之病。且少陰病僅在二三日已上。其急疾抑又可想。一為虛勞。則本緩病。虛證。故其治法。瀉火滋陰。相去霄壤。一以阿膠雞子黃安心定血而外。并主以苦燥之芩連。開陰之芍藥。一以酸棗仁茯苓。啓水上滋而外。更益以甘潤之知母。開陽之芎藭。豈可同日語哉。故後世用酸棗仁諸方。始終只治不睡。并無他枝相攪。乃立異者。或以為生用能醒睡。是牽合陶隱居之說。以簡要濟衆一方為據。不知其方用酸棗仁止一兩。用蠶茶至二兩。且以生薑汁塗炙。是以茶醒睡。用酸棗仁為反佐。若據此為醒睡之典。則麻黃湯中有治中風自汗之桂枝。亦可謂為止汗耶。或以為酸棗仁治不寐。乃治邪結氣聚之不寐。是牽合本經之文。且謂

未有散邪結氣聚之物。能使衛氣入臟。而就安寢者。不思仲景用酸棗仁湯。明明著虛勞虛煩不得眠之語。虛煩不得眠。猶可目為邪結氣聚耶。虛勞亦豈邪結氣聚可成者耶。縱邪結氣聚。亦可成虛勞。則此不得眠。且將與梔子豉湯證相比矣。若謂衛氣不得歸臟。又與半夏秫米湯相比矣。仲景又何別用酸棗仁湯為哉。

近人學說 賈九如曰。棗仁仁主補。皮赤。類心。用益心血。其氣炒香。化為微溫。藉香以透心氣。得溫以助心神。凡志者傷血。用智損神。致心虛不足。精神失守。驚悸怔忡。恍惚多忘。虛汗煩渴。所當必用。又取香溫。以溫肝膽。若膽虛血少。心煩不寐。用此使肝膽血足。則五臟安和。睡臥自寧。如膽有實熱。則多睡。宜生用以平膽氣。因其味甘炒香。香氣入脾。能醒脾陰。用治思慮傷脾及久瀉者。皆能奏效。

配合應用 治驚悸。并一切膽虛易驚。酸棗仁。茯神。遠志。麥門冬。石斛。五味子。龍眼人參。

治病後膽虛不眠。用酸棗仁。

加入溫脾湯。

治脾家氣血虛。自汗不眠。驚悸不嗜食。酸棗仁加入歸脾湯。

治竹熱不眠。心煩。用酸棗仁一兩炒研。水二盞研絞取汁。煮粥。熱下地黃汁一合。再復勻食。(太平聖惠方)

凡服固表藥而汗不止者。用棗仁一兩炒研。同地黃。白芍藥。麥冬。五味子。龍眼肉。竹葉煎服。多服取效。汗乃心液故爾。

治膽風沉睡。膽風毒氣。虛實不調。昏沉多睡。用酸棗仁一兩。生用。全提蠶茶二兩。以生薑汁塗炙。殺魚為散。每服二錢。水七分煎六分。溫服。(簡要濟衆方)

治膽虛不眠。心多驚悸。用酸棗仁一兩炒香。搗為散。每服二錢。竹葉湯調下。加入人參一兩。辰砂半兩。乳香二錢半。煉蜜丸服。(和劑局方)

治振悸不眠。胡洽方。酸棗仁湯。用酸棗仁二升。白茯苓。生白朮。人參。生甘草各二兩。生薑六兩。水八升。煮三升。(綱經本草方)

治虛煩不眠。深師方。酸棗仁

十四畫 酸

湯。用酸棗仁二升。蟬母。乾薑。茯苓。芎藭。各二兩。甘草炙一兩。以水一斗。先煮棗仁。減三升。乃同煮。取三升分服。(圖經本草方)

①治骨蒸不眠。心煩。用酸棗仁一兩。水二盞。研絞取汁。下梗米二合。煮粥候熟。下地黃汁一合。再煮勻食。(聖惠方)

②治睡中汗出。用酸棗仁。人參。茯苓等分。為末。每服一錢。米飲下。(簡便方)

③治刺入肉中。酸棗核燒末。水煎立出。(外臺秘要方)

用益 三錢至四錢。

施用宜忌 凡有實邪鬱火者。禁用。惡防己。

參攷資料 ①本經用實。療不得眠。不用言仁。今方皆用仁。補中益肝。堅筋骨。助陰氣。皆酸棗仁之功也。(蘇恭) ②按五代史。後唐刊石藥驗云。酸棗仁睡多生使。不得睡。炒熟。陶云。食之醒睡。而經云。療不得眠。蓋其子肉味酸。食之使不思睡。核中仁服之。療不得眠。正如麻黃發汗。根節止汗也。(馬志) ③酸棗實味酸佳。故主肝病。寒熱

結氣。酸棗久泄。脾下滿痛之症。其仁甘而潤。故熱用。療虛不得眠。煩渴。虛汗之證。生用。療熱好眠。皆是。厥陰少陽藥也。今人專以為心家藥。殊昧此理。(李時珍) ④嵩陽子云。余家於滑臺。今酸棗縣。即滑之屬邑也。其樹高數丈。徑圍一二尺。木理極細。堅而且重。可為車軸及匙筋等。其樹皮亦細而硬。文似蛇鱗。其葉圓小而味酸。其核微圓而仁稍長。色赤如丹。此醫之所重。居人不易得。今市人賣者皆棘子也。又云山。棗樹如棘。其子如生棗。其核如骨。其肉酸滑。好食。山人以當果。(陳藏器) ⑤今近汴洛及西北州郡皆有之。野生。多在坡坂及城邊間。似棗木而皮細。其木心赤色。莖葉俱青。花似棗花。八片。結實紫紅。似棗而圓。小味酸。當月採實。取核中仁。孟子曰。養其棘。棘是也。嵩陽子言酸棗縣所出為真。今之貨者。皆是棘實。用者尤宜詳辨。(蘇頌) ⑥天下皆有之。但以土產宜與不宜爾。嵩陽子言酸棗木高大。今貨者皆棘子。此說未盡。蓋不知小則為棘。大則為酸棗。平地則

馬長。居崖壁則難生。故棘多生崖壁上。久不樵則成幹。人方呼為酸棗。更不言棘。其實一本也。此物糲及三尺。便開花結子。但科小者氣味薄。木大者氣味厚。今陝西臨澗山野所出者亦好。乃土地所宜也。(寇宗奭) ⑦日本之有酸棗。始於享保中。係得自中國。以其仁入藥用。其後日本亦種之。(和漢藥考) ⑧凡平地則易長。大居崖壁則難生。而其不長大者名白棘。白棘多生於崖壁上。及至成長。其刺亦多。(和漢藥考) ⑨酸棗樹高二三丈。枝葉頗似棗。而葉圓如龍眼大。其核亦似棗核而圓。中國產之酸棗。仁形似棗仁而扁圓者。真。日本所產。乃棗仁也。氣味形狀甚相近。無時。間以代用。(和漢藥考)

【酸棗仁粥】

基本 本品係以酸棗仁和米煮成之粥。

主治 治煩熱。益膽氣。

【酸筍】

性實 酸涼無毒。 主治 作湯食。止渴解醒。利膈。

參攷資料 酸筍出粵南。順珍

一六一〇

海程錄云。荷大如臂。精至。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。攪如絲。醃黃可食。好事者摺入中州成藥物云。(李時珍)

【酸模】

命名 本品味酸。以味而名也。

古鑄別名 山大黃(拾遺) 蕪蕪(爾雅) 蕪酸母(山羊蹄) 當藥(綱目) 蕪蕪(古今) 牛舌實(杜雞脚) 黃連(和漢藥考)

外國名詞 Parnassiosos, F(拉丁)

基本 屬堇科酸模之根。 產地 凡山野平原間恒有生焉。



(一) 酸模

形態 酸模為山野自生之多。年生草本。莖高三三尺。似草狀。羊蹄而小。葉為長卵圓形。末端尖銳。基部稍作箭形。抱莖而生。花蝶瓣

異株。色淡綠帶紅。小朵六瓣。莖葉而生莖葉俱帶赤色。有酸味。嫩莖堪食。小兒採而生食之。山民饑莖葉去其酸味。亦供食用。每株簇生細長之根。視羊蹄根為輕。色紅黃。乾則現黑褐色。



(二) 酸模

種類 羊蹄葉大而味苦。酸模葉小而味酸。

採取 葉茂時採葉。枯時採根。

性質 酸寒。無毒。

成分 含有羧酸鹽類、鞣質、糖等。

效能 殺蟲。治瘡。用治疥癬諸惡瘡。

主治 暴熱腹脹。生搗汁服。當下利。殺皮膚小蟲。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論酸模曰。治疥癬。【唐】韓保昇蜀本草論酸模曰。療病乃佳。【明】李時珍本草綱目論酸模曰。去汗斑。同紫萍搗擦。數日

十四畫 酸

即沒。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。須用生葉根及其絞汁。乾則失其酸味。便無效。根葉均有酸味。宜擇而採之。清涼收斂。止血液之沸騰。解壯熱。潤燥渴。止煩渴。制惡毒。收縮脈管。治血液腐敗諸病。故以之用於壯熱。微衝諸症。及膿液熱腐敗。良驗。此藥有酸涼。疏解清血之效。落滯血中之惡液。故以治惡液質諸病。及疥癬。惡瘡等。俱稱妙藥。當以生根葉水煎服。或作蔬菜食之。吐血。下血。痔血。赤痢。俱能止之。以其有涼解血熱之功也。絞生葉根汁。濾取上澄清者。或和入糖漿。白糖等。作熱病之清涼飲料。可以涼解壯熱。防護腐敗。

配合應用 瘰癧毒瘡。肉中忽生黯子。如粟豆。大者如梅李。或赤或黑。或青或白。其中有核。核有深根。應心腫。泡紫黑色。能爛筋骨。毒入臟腑。殺人。宜灸踏上百壯。以酸模葉。薄其四面。防其長也。內服藥根汁。其毒自愈。(千金方)

用量 八分至錢半。
參攷資料 ① 蕪蕪乃酸模之

音轉。酸模又酸母之轉。皆以味而名。與三葉酸母草同名。掌禹錫以蕪蕪為蕪蕪菜誤矣。李時珍曰。即是山大黃。一名蕪蕪。其葉酸美。人亦採食其英。爾雅食蕪蕪。郭璞注云。似羊蹄而稍細。味酸可食。一名蕪也。(陳藏器) ② 所在有之。生山岡上。狀似羊蹄葉而小。黃莖葉俱細。節間生子。若蕪蕪子。(大明) ③ 食魚介鳥獸肉中毒。絞酸模葉汁飲之立愈。(和漢藥考)

【酸漿】

古經別名 醋漿。(本草) 燈籠草。(唐本草)

苦蕪。苦耽。玉母珠。洛神珠。(圖經) 皮弁草。(食療本草) 天泡草。小者名苦蕪。(綱目) 姑嫂菜。(救荒) 黃蔴。(爾雅) 金燈籠草。(俗名) 蕪子。(古今注)

外國名詞 Physalis Alkekengi

Koenig, L. (拉丁) ホホソキ (日本)

基本 係茄科酸漿屬。藥用其苗葉莖根。

產地 在原野川澤間。

形態 酸漿為蕪草類之多年生草本。春自宿根生苗。高至二三

尺。葉卵形。葉端尖。夏月開花。合瓣花冠。白色。微帶綠。雄蕊五枚。與花冠裂片之數同。藥呈淡黃色。雌蕊一枚。結實為漿果。赤色。包被於萼內。此漿果赤色在花後。生長如繭狀。最為美觀。



漿 酸

性質 苦寒。無毒。
主治 酸漿治熱煩渴。定志益氣。利水道。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論酸漿曰。搗汁服。治黃病多效。【唐】蘇恭新修本草論酸漿曰。燈籠草。治上氣咳嗽。風熱明目。根莖花實並宜。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論酸漿曰。苦耽。苗子。治傳尸。伏連鬼氣。疰忤邪氣。腹內熱結。目黃。不下食。大小便澀。骨熱咳嗽。多睡勞乏。喉逆痰壅。瘧癘。瘡滿。小兒無辜。蝦子。寒熱大腹。殺蟲。落胎。去蟲毒。並養汁飲。亦生搗汁服。研膏。傅小兒閃鮮。【明】李士

材本草圖解論酸漿曰。酸漿味酸。平寒無毒。主熱除煩。通淋止崩。產難胎衣不下者。若吞其實即出。

近人學說 張山雷曰。酸漿之

苗葉形。頗與老鴉眼時草近。似李瀕湖謂本是一類二種。但龍葵莖光無毛。五月以後。開小白花。五出黃蕊。結子無壳。累累然數顆同枝。子有蒂蓋。生青熟紫黑。而酸漿則同時開小花。黃白色。紫心白蕊。其花如盃。無瓣。而有五尖。結一五稜之鈴壳。一枝一顆。懸如燈籠。壳中一子。生青熟赤。庚辛玉册謂燈籠草產於川陝者最大。葉似龍葵。結實有四葉盛之。如燈籠。河北呼為酸漿。陶弘景謂酸漿之子作房。房中有子。大如梅李。黃赤色者。蓋土宜不同。所產微異。嘉祐本草作苦耽。以其苗之味也。本經言其味酸辛平。主熱煩滿。定志益氣。利水道。產難吞其實立產。則亦寒涼。泄熱滑利之功用。弘景謂搗汁服。治黃病。唐本草謂燈籠草。治上氣咳嗽。風熱明目。根莖花實並宜。嘉祐本草謂苦耽苗子。治鬼疰邪氣。熱結目黃。大小便澀。骨熱勞乏。嘔逆

痰壅。痰癖痞滿。小兒無辜疳。瘰癧。大腹殺蟲。落胎去毒。並煮汁飲。井生搗汁服。丹溪謂苦能除濕熱。輕能治上焦。主熱咳咽痛。故此草治熱痰之咳嗽。佛耳草治寒痰之咳嗽。瀕湖謂寒能除熱。故清肺除咳。滑能利溼。故降氣化痰。蘇頌謂其子除熱治黃。嘉祐謂其治骨蒸勞熱。尸疰。疝瘦。痰癖熱結。與莖苗同功。然寒降滑泄。皆實熱者為宜。中氣虛寒。弗用。丹灶家以伏丹砂汞毒。亦清涼以制其剛烈也。

參攷資料 ●燈籠草苦能除

溼熱。輕能治上焦。故主熱咳咽痛。此草治熱痰咳嗽。佛耳草治寒痰咳嗽也。與片苓清金丸同用更效。(朱雙亭) ●酸漿利溼除熱。故清肺治咳。利溼。故能化痰治痘。一人病虛乏咳嗽有痰。愚以此加入湯中。用之效如神。(李時珍) ●方士取汁煮丹砂。伏白礬。煮三黃。煉消硫。(李時珍) ●爾雅苦耽寒漿也。郭璞注云。卽今酸漿。江東人呼為苦葷。小者為苦蕒。亦呼為小苦耽。崔豹古今注云。蕒一名蕒子。實形如皮弁。其子圓如珠。(陳藏器) ●

酸漿以子之味名也。苦葷。苦耽。以苗之味名也。燈籠。皮弁。以角之形名也。王母。洛神珠。以子之形名也。按楊慎眉言云。本草燈籠草。苦耽。酸漿皆一物也。修本草者。非一時一人。故重複耳。燕京野果名紅姑。外垂絲蕒。中含赤子如珠。酸甘可食。盈盈逸。與翠草同芳。亦自可愛。蓋姑。乃瓜瓞之說。古者瓜姑同音。瓞。瓞之音亦相近耳。此說得之。故今以本經酸漿。唐本草燈籠草。宋嘉祐本草苦耽。俱并為一焉。(李時珍) ●酸漿處處多有。苗似水茄而小。葉亦可食。子作房。房中有子如梅李。大者黃赤色。小兒食之。(陶弘景) ●苦耽生故墟垣。墾間。高二三尺。子作角如撮口袋。中有子如珠。熟則赤色。關中人謂之洛神珠。一名王母珠。一名皮弁草。一種小者名苦蕒。爾雅謂之黃葷。(章禹錫) ●龍葵。酸漿。一類二種也。酸漿。苦蕒。一種二物也。但大者為酸漿。小者為苦蕒。以此為別。敗蕒亦名苦蕒。與此不同。其龍葵。酸漿。苗葉一樣。但龍葵莖光無毛。五月入秋開小白花。五出黃蕊。結

子無殼。結數顆。同枝子有蒂。蓋。生青熟紫黑。其酸漿同時開小花。黃白色。紫心白蕊。其花如盃狀。無瓣。但有五尖。結一鈴殼。凡五稜一枝。一顆下懸如燈籠之狀。殼中一子。狀如龍葵子。生青熟赤。以此分別。便自明白。按庚辛玉册云。燈籠草四方皆有。惟川陝者最大。葉似龍葵。嫩時可食。四五月開花結實。有四葉盛之。如燈籠。河北呼為酸漿。據此及楊慎之說。則燈籠酸漿之為一物。尤可證矣。唐慎微以三葉酸漿附於酸漿之後。蓋不知其名同物異也。(李時珍)

【酸漿】即漿水之古籍別名。與見綱目。詳「漿水」條。

【酸漿子】性質 酸。平。無毒。主治 熱煩。定志。益氣。利水道。產難吞之立產。

歷代記述攷證 【宋】章禹錫嘉祐補註本草論酸漿子曰。治骨蒸勞熱。尸疰疝瘦。痰癖熱結。與苗莖同功。【宋】蘇頌圖經本草論酸漿子曰。食之除熱。治黃病。尤益小兒。

【酸漿草】卽醉漿草之古籍別名。

與見國經本草。詳『酢漿草』條。

【酸醋】即醋之處方用名。詳『醋』條。

【酸榴皮】即石榴皮之原名。詳『石榴皮』條。

【酸榴東行根】即石榴根之原名。詳『石榴根』條。

【酸栝】即地榆之古籍別名。與見別錄。詳『地榆』條。

【酸頭草】即石蒜之古籍別名。與見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【酸腎】即酸漿。詳『酸漿』條。

【銀牙】即銀之未經煉者之古籍別名。與見綱目。詳『銀箔』條。

【銀朱】命名。本品係用水銀煉成紅色。故名。

處方用名 銀珠。

古藥別名 猩紅。紫粉霜。(綱目)

外國名詞 Hydrazyni Sulphidum Bahrum Levigatum (拉丁)(Vermillion)(英)

基本 係礦石類爲水銀煉成之粉末。

形態 銀朱爲雙重質細色赤之粉末。

十四畫 酸

製法 胡波丹藥秘訣云。升煉銀朱用石亭脂二斤。新鍋內溶化。

次下水銀一斤。炒作青砂頭。炒不見星。研末。罐盛。石版蓋住。鐵線縛定。鹽泥固濟。大火燬之。待冷取出。

貼罐者爲銀朱。貼口者爲丹砂。今人多以黃丹及紫紅雜之。其色黃黯宜辨之。真者謂之水華朱。每水銀一斤。燒朱一十四兩八分。次朱三兩五錢。

性質 辛。溫。有毒。

效驗 劫伐。破積。殺蟲。治瘡。用作疥癬藥。又爲攻劫藥。

主治 破積滯。劫痰涎。散結胸。療疥癬癩瘡。殺蟲及虱。功同粉霜。

歷代記述攷證 【明】經希雍本草經疏論銀朱曰。銀朱乃硫黃同汞升鍊而成。其性燥烈。過服能使人癱爛筋攣。其味辛。氣溫有毒。亦能破積滯。散結。療疥癬癩瘡。殺蟲。不宜服食。今人多以黃丹雜紅雜之。不堪用。【清】黃宮繡本草求真論銀朱曰。銀珠與水銀同。煨煉成珠。性燥味辛。方書用以殺蟲治瘡。亦是以毒解毒而已。用以食服。古人切戒。謂其性悍烈。良非所宜。

且同蟹殼燒之。則臭蟲絕跡。和煎肉燕之。則瘡疥枯頓。於此可徵其概矣。

配合應用 ①治小兒內約多啼。銀朱半錢。乳香煨蒜。各一錢。爲末。研丸黍米大。牛歲五丸。薄荷湯下。(全幼心怪方)

②治男女陰毒。銀朱、輕粉各一錢。用五日獨蒜一枚。搗和作餅。貼手心。男左女右。兩手合定。放陰下。頃間氣回汗出即愈。但口中殺有氣即活。(唐瑤經驗方)

③治痰氣結胸。鶴頂丹。不問陰陽虛實。服炒過陷胸消心等藥。用銀朱半兩。明礬一兩。同礱。以炭斗燒火。瓦蓋盛藥。鎔化。急搗搗丸。每服一錢。真茶入煎汁。少許服之。心上隱隱有聲。結胸自散。不動臟腑。不傷真氣。明礬化痰。銀朱破積散也。(活幼全書方)

④治正水腫病。大便利者。銀朱半兩。硫黃煨四兩。爲末。麴糊丸。梧子大。每飲下三十九丸。(普濟方)

⑤治咽喉疼痛。銀朱、海蝶蛤末。等分。吹之取涎。(急救良方)

⑥治火爛丹毒。銀朱調雞子清塗之。(李樓怪症方)

⑦治湯火灼傷。銀朱研細。菜油調傅二次愈。(多能鄙事方)

⑧治疽疔發背。銀朱、白礬等分。煎湯溫洗。却用桑柴火遠熨之。日三次。甚效。(救急方)

⑨治魚鱗丁疔。四面赤。中央黑。銀朱水和丸。每服一丸。溫酒下。名走馬丹。(普濟方)

⑩治楊梅瘡。銀朱、茴香等分。爲末。以紙卷作捻。點燈。置桶中。以鼻吸煙。一日一作。七日愈。又方。銀朱二錢。孩兒茶一錢。龍掛香一錢。烏角子一錢。爲末。如上法用。又方。銀朱、輕粉各一錢。黃蠟清油各一兩。化開和收。以油紙攤貼瘡。自脫也。

⑪治筋骨疼痛。用猩紅三錢。枯礬四錢。爲末。作三紙捻。每旦以一盞熱油點火。薰脚。被覆臥之。取汗。(纂要奇方)

⑫治日久頑瘡不收者。銀朱一錢。干地地下石灰五分。松香五錢。香油一兩。爲末。化蠟紙上貼之。亦治膿瘡不斂。(應心良方)

⑬治血風腫痛。生脚股上。乃瀉

瀉之。

瀉之。

瀉之。

瀉之。

瀉之。

瀉之。

瀉之。

春成風也。黃蠟一兩。鎔化。入銀朱一兩。攪攤紙上。刺孔貼之。(簡便方)

①治黃水瘡。銀朱。鹽梅和搗傅之。(集玄方)

②治癬瘡有蟲。銀朱。牛骨。蒜。桐油調搽。(醫方摘要方)

③治頭上生虱。銀朱。浸醋。日日梳頭。包銀朱紙以盤覆燒之。茶清洗下。煙子搽之。包頭一夜。至且虱盡死。(積德堂方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無蟲積實結者禁用。

參攷資料 銀朱乃硫黃同汞升鍊而成。其性燥烈。亦能爛眼擊筋。其功過與輕粉同也。今庸人往往以之染色。供饌宜去之。(李時珍)

【銀池】即蜜陀僧之古籍別名。典見藥物生產辨詳『蜜陀僧』條。

【銀耳】即白木耳之處方用名。詳『白木耳』條。

【銀杏】即白果之原名。詳『白果』條。

【銀花】即金銀花之簡稱。詳『金

銀花』條。

【銀花炭】即金銀花焙炒成者之處方用名。詳『金銀花』條。

【銀花藤】即忍冬藤之處方用名。詳『忍冬藤』條。

【銀花露】即金銀露之處方用名。詳『金銀露』條。

【銀星石】即金星石上有銀花斑點者之古籍別名。典見本草衍義。詳『金星石』條。

【銀星礬石】即礬石上有銀星者之古籍別名。典見綱目。詳『礬石』條。

【銀柴胡】命名 本品係出於銀州而色白故名。

外國名詞 *Eupatorium*

產地 陝西富平鎮。山西大同府皆產之。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 勞熱。骨蒸。勞瘵。熱從髓出。小兒五疳。羸熱。

歷代記述攷證 【明】經希雍本草經疏論銀柴胡曰。柴胡有二種。一種色白黃而大者。名銀柴胡。一種色白黃而大者。名銀柴胡。

專用治勞熱。骨蒸。色微黑而細者。用以解表發散。本經並兼二種之

說。功用亦無分別。但云銀州者為最。則知其優於發散。而非治虛熱之藥。明矣。本草。銀柴胡。產銀夏者。色微白而轉。為銀柴胡。用以治勞

別。甘。蒸。以黃牯牛。溺。浸一宿。曬乾。治勞熱。減除。清。黃宮。結。本草。求

真。論。銀柴胡。曰。銀柴胡。味甘。微寒。無毒。功用。等於。石斛。皆能。入胃。而

除。虛熱。但。石斛。則。兼。入。腎。清。氣。固。筋骨。此。則。入。腎。涼。血。之。為。異。耳。故

和。劑。局。方。用。此。治。上。下。諸。血。及。於。虛。勞。方。中。參。入。同。治。如。肝。勞。之。必

用。此。為。主。且。不。類。於。北。胡。蓋。北。胡。能。升。少。陽。清。氣。上。行。此。則。氣。味。下

達。與。彼。迥。不。相。符。若。用。北。胡。以。治。虛。勞。則。咳。嗽。發。熱。愈。無。寧。日。可。不

辨。而。混。用。乎。出。銀。州。者。良。故。以。銀。胡。號。之。

近人學說 張山雷曰。銀柴胡。古以銀州產者為勝。宋之蘇頌已

有是說。陳承亦謂銀夏者最良。然雖有其說。而尚未分用。故瀕湖綱

目仍未顯為區別。仲醇經疏則已稱俗有二種。色白黃而大者。為銀

柴胡。以治勞熱。骨蒸。色微黑而細

標者。為北柴胡。以解表發散。然經

氏又謂其優於升散。而非治虛熱之藥。至張石頑。遂原。乃特出銀柴

胡一種。稱其甘而微寒。清熱而能涼血。銷和劑局方治上下諸血。龍

腦。蘇。丸。中。用。之。凡。入。虛。勞。方。中。惟。銀。州。者。為。宜。北。柴。胡。則。升。動。虛

陽。發。熱。喘。嗽。愈。無。寧。乎。不。可。混。用。且。又。謂。本。經。推。陳。致。新。明。目。益。精

皆。指。銀。夏。產。者。而。言。其。推。陳。銀。柴。胡。可。謂。極。至。今。之。二。種。分。用。者。豈

即。石。頑。提。倡。之。力。而。以。今。之。功。用。言。之。治。虛。熱。骨。蒸。自。有。實。效。斷。非

北。柴。胡。之。升。陽。泄。汗。可。比。然。則。古。人。謂。柴。胡。為。唐。勞。之。藥。者。亦。指。銀

柴。胡。言。之。也。趙。恕。軒。稱。目。拾。遺。謂。熱。在。骨。髓。非。銀。柴。胡。莫。療。用。以。治

虛。勞。肌。熱。骨。蒸。勞。瘵。熱。從。髓。出。及。小。兒。五。疳。羸。熱。蓋。退。熱。而。不。苦。澀

理。陰。而。不。升。陽。固。虛。熱。之。良。藥。苟。勞。怯。而。未。至。血。液。枯。絕。以。此。清。理

虛。火。之。燥。灼。再。合。之。育。陰。補。脾。尚。可。徐。圖。挽。救。非。北。柴。胡。之。發。散。者。所。可。同。日。語。也。

辨偽 鄭肯巖曰。銀柴胡味淡。蘆頭又大。不知何物。偽充。按銀

柴胡以銀州及富夏出者為勝。氣

味甘微寒無毒。莖長尺餘。色微白。力弱於北柴胡。即銀州之輭柴胡。專治骨蒸勞熱。不但清熱。兼能涼血。和劑局方治上下諸血。龍腦麝蘇丸中用之。凡入虛勞方中。最為相宜。用者須購真銀柴胡為要。○曹炳章曰。按銀柴胡。陝西富夏府甘肅州。及山西大同府皆產。選肥大堅實。色白。輭糯無沙心者為佳。為者尚無。又按經疏云。柴胡有二種。一種色白而大者。名銀柴胡。達原云。銀柴胡。野州者良。今延安五原城所產者。長尺餘。肥白而輭。百草鏡云。出陝西富夏鎮。二月採。葉名芸薹。長尺餘。根微白。即銀柴胡。藥辨云。銀柴胡。出富夏。形似黃香。參合諸說。與近今市肆所備。亦相符合。據余實驗。凡治虛勞肌熱。骨蒸勞熱。熱從髓出。及小兒五疳。羸熱。用之頗效。若用北柴胡。則升動虛陽。發熱喘咳。愈無寧乎。周一士云。熱在骨髓者。非銀柴胡莫痊。前人有不識藥品之形態。往往妄評銀柴胡為贗物。豈可不辨。以清惑後人。而使無從遊乎。

十四畫 銀

參攷資料 ○今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者為勝。二月生苗。甚香。莖青紫。葉硬。故有纏綿。葉似竹葉。而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花。根淡赤。似前胡而強。生丹州者結實。子與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨窠其者好。(蘇頌)○翁有良云。銀柴胡產銀州者佳。有二種。但辨形如鼠尾。與前胡相等。查前胡與柴胡相類。皆以西北出產者為勝。形既相同。當以湖廣古城柴胡為準。今銀柴胡粗細不等。大如拇指。長數尺。形不類鼠尾。又不似前胡。較本草不對。治病難分。兩用究非的確。用者詳之。○銀州柴胡。輭而白。北產亦有白色者。今人以充白頭翁。此種亦可謂銀柴胡。蓋銀指色言。不指地言。猶金銀花白色者。曰銀花。是也。銀柴胡原有兩產北產之分。不必定以銀夏者為銀柴胡也。然入藥以西產者勝。(金御藥)○元英談載云。張知閑久病。熱時如火。年餘骨立。醫用非附諸藥。熱益甚。召醫官孫琳診之。琳投柴胡

湯一帖。熱減十之九。三服脫然。琳曰。此名勞瘵。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。安得不瘦。蓋熱有在皮膚。在臟腑。在骨髓。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者力淡。服故三服乃效也。(李時珍)

【銀紅】即砂砂之別名。詳【砂砂】條。

【銀芽】即野苧麻之古籍別名。典見【拾遺】。詳【野苧麻】條。

【銀茄】即茄子之古籍別名。典見【經本草】。詳【茄子】條。

【銀屑】即銀箔之原名。詳【銀箔】條。

【銀桂】即木犀白花者之別名。詳【木犀】條。

【銀桃】即桃之古籍別名。典見【綱目】。詳【桃】條。

【銀箔】即銀箔之古籍別名。典見【綱目拾遺】。詳【銀箔】條。

【銀芽】即銀芽之古籍別名。典見【綱目拾遺】。詳【銀芽】條。

【銀粉】即輕粉之古籍別名。典見【和漢藥考】。詳【輕粉】條。

【銀葉匙】即菟耳一枝箭之古籍別名。典見【本草綱目】。詳【菟耳一枝箭】條。

【銀條葛里】即山藥之古籍別名。典見【和漢藥考】。詳【山藥】條。

【銀珠】即銀朱之處方用名。詳【銀朱】條。

【銀蛇】即金蛇之古籍別名。典見【綱目拾遺】。詳【金蛇】條。

【銀魚】即鱖魚之古籍別名。典見【綱目】。詳【鱖魚】條。

【銀貂】即貂鼠皮毛白色者之古籍別名。典見【綱目】。詳【貂鼠】條。

【銀翠】即白石英之古籍別名。典見【和漢藥考】。詳【白石英】條。

【銀粉】即銀粉之古籍別名。典見【綱目拾遺】。詳【銀粉】條。

【銀脚葛里】即望江青之古籍別名。典見【綱目拾遺】。詳【望江青】條。

【銀鼠】即鼯鼠作白色者之古籍別名。典見【綱目】。詳【黃鼠】條。

【銀箔】 原名 銀屑。 命名 本品生石鐘中。狀如硬錫。苦白生銀。採得生銀。以銷再三煎煉而成者曰熟銀。其以銀屑而製成箔。可以入藥者曰銀箔。

處方用名 紋銀。銀薄。

古籍別名 白金。銀。(附錄)銀。

十四畫 銀

阿路巴(說文)(梵書)銀牙(綱目)山嶽白衣白物白貴白銀白選丹精朱提金妃龍鬚女石下水(和漢藥考)

外國名詞 Argonturn. (拉丁) Silver. (英) Silber. (德)

形態 銀為有光輝白色之金屬。置空氣中不變化。然置於含有硫化水素之氣中。則逐漸變黑。富有引伸。延展兩性。入硝酸。即液解。

種類 自然銀。在古層之石脈中。如毛。如線。如苔。蘇。如樹枝。如板片。間有成結晶形者。為銀白色。或微帶他色。斷面作鋸齒狀。有引伸。延展兩性。硬度二·五。比重一·四。其中常含有銅。鐵。金等質。

輝銀鏡。一名光銀鏡。在火山岩及凝灰岩中。間有暗灰色之結晶。大半如毛。如線。如齒。如樹枝。條痕現灰黑色。延展性略減。硬度二·〇至二·五。比重七·〇至七·五。鏡中有銀及硫黃。As₂S₃。此採銀之佳鏡也。脆銀鏡。一名輝銀安鏡。為六角之板狀結晶。色黑。有金剛光澤。斷面作鋸齒狀。或貝殼狀。條痕現黑色。硬度二·〇至二·五。比重六·二。此鏡成於銀。安

貨母尼與硫黃 Ag₂S₂。S₂。紅銀鏡。此鏡有明暗二種。明者名淡紅銀鏡。為朱紅色之鑽石。條痕現紅色。或黃色。硬度二·五。比重五·五。成於銀。砒。硫黃 Ag₂S₂。S₂。暗者名深紅銀鏡。有黑色稜角。透過赤色之鑽石。條痕現紫黑色。硬度二·〇至二·五。比重五·八。成於銀。安貨母尼與硫黃 Ag₂S₂。S₂。二者皆謂之紅寶銀。角銀。南美及墨西哥為其主產地。為似蠟之鑽石。色灰。或灰綠。質如角。無光澤。成於銀與鹽素 Ag₂O。乃硫化銀之變體也。

一六一六

五。比重六·二。此鏡成於銀。安貨母尼與硫黃 Ag₂S₂。S₂。紅銀鏡。此鏡有明暗二種。明者名淡紅銀鏡。為朱紅色之鑽石。條痕現紅色。或黃色。硬度二·五。比重五·五。成於銀。砒。硫黃 Ag₂S₂。S₂。暗者名深紅銀鏡。有黑色稜角。透過赤色之鑽石。條痕現紫黑色。硬度二·〇至二·五。比重五·八。成於銀。安貨母尼與硫黃 Ag₂S₂。S₂。二者皆謂之紅寶銀。角銀。南美及墨西哥為其主產地。為似蠟之鑽石。色灰。或灰綠。質如角。無光澤。成於銀與鹽素 Ag₂O。乃硫化銀之變體也。

製法 陶弘景曰。醫方鎮心丸用之。不可正服。為屑。當以水銀研令消也。蘇恭曰。方家用銀屑。取現成銀薄。以水銀消之。為泥。合消石及鹽。研為粉。燒出水銀。淘去鹽石。為粉。極細用之。乃佳。不得只磨取屑耳。李時珍曰。入藥。只用銀薄。易細。若用水銀鹽消制者。反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有錫薄。可為宜辨之。

性實 辛。平。有毒。

效能 鎮心神。定驚悸。祛風熱。治癩痢。明目。安胎。用作解熱解毒藥。主治 安五臟。定心神。止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論銀屑曰。定志。去驚癩。小兒癩疾狂走。【唐】李珣海藥本草論銀屑曰。銀薄。堅骨。鎮心明目。去風熱。癩癩。入丸散用。

再用灰吹法。將鉛酸。復除去之。則得純銀。或將含銀鉛。焙化。候冷。鉛之精品較速。則反覆除去之。遺鉛所存無多。續用灰吹法。收採純銀。鍊角銀法。可和入鐵片。水銀。再用阿瑪爾加法。收採純銀。

配合應用 治妊娠腰痛。如折者。銀一兩。水三升。煎二升。服之。(子母秘錄方) 治胎動欲墮。痛不可忍。銀五兩。辛根二兩。清酒一盞。水一大盞。煎一盞。溫服。(婦人良方) 治胎熱橫痃。生銀五兩。葱白三寸。阿膠炒半兩。水一盞。煎服。亦可入糯米作粥食。(聖惠方) 治風牙疼痛。紋銀一兩。燒紅。淬燒酒一盞。熱飲之。立止。(集簡方) 治口鼻疳蝕。穿唇透頰。銀屑一兩。水三升。銅器煎一升。日洗三四次。(聖濟總錄方) 治身面赤疵。常以銀指令熱。久久自消。(千金方) 用鹽 銀箔三分。至八分。紋銀三錢。至八錢。施用宜忌 凡非實熱者禁用。

國外學說 新藥百品考曰。生銀(第五十六品)銀鏡。常含有銅或金。精鍊之法。有種種。或將酸化銀。或紅提鍊。或以硫酸。鐵分析。硫酸銀。其功用頗有可疑。有用之腹痛者。恐係混有銅質故也。專治癩毒。用法。以〇·〇一二。至〇·〇六。製為丸。或錠服之。外用。塗數舌上。每次用〇·〇一五。製造。輕膏。以銀〇·六至一·〇。和脂四錢。調製而成。又和漢藥考曰。精鍊銀質之法。有數種。近時將方鉛鏡。黃銅鏡。用電氣分解法。鍊得其中所含之銀。而以鉛。銅。為其副產物。於精鍊銀質之銀鏡中。和入鉛鏡。使在爐內一併焙化。製成含銀鉛。

使在爐內一併焙化。製成含銀鉛。

畏黃連、甘草、飛廉、石亭脂、磁石、羊血、馬目毒、公慈、石惡、錫、忌生血。

參攷資料

●銀屑、葛洪、肘後方、治癩腫、五石湯、申用之、(蘇頌)

●本草言銀屑有毒、生銀無毒、釋者略漏不言、蓋生銀已發於外、無蘊鬱之氣、是以無毒、鈔銀蘊於石中、鬱結之氣、全未敷暢、故有毒也、(寇宗奭) ●此說非矣、生銀初煎

出如綬理、乃其天真故無毒、鎔者投以少銅、則成絲文金花、銅多則反敗銀、去銅則復還銀、而初入少銅、終不能出、作偽者又制以藥石、鉛錫、且古法用水銀煎消、制銀薄、成泥入藥、所以銀屑有毒、銀本無毒、其毒則諸物之毒也、今人用銀器飲食、遇毒則變黑、中毒死者、亦以銀物探試之、則銀之無毒、可徵矣、其入藥、亦是平肝鎮怯之義、故太清服鍊書言銀、與西方辛陰之神、結精為質、性剛、服之能傷肝、是也、抱朴子言銀化水服、可成地仙者、亦方士謬言也、不足信、(李時珍) ●附雜白金謂之銀、其美者曰環、說文云、鑿、白金也、梵書謂之阿路巴、(李時珍) ●生銀出錢

十四畫 銀

州樂平諸坑、銀銚中狀如硬錫、文理粗錯、自然者真、(馬志) ●銀在銚中、與銅相雜、土人探得、以鉛再三煎鍊方成、故為熟銀、生銀則生銀銚中、狀如硬錫、其金坑中所得、乃在土石中、滲漏成條、若絲髮狀、土人謂之老翁鬚、極難得、方書用生銀、必得此乃真、(蘇頌) ●按南越志、波斯國有天生藥銀、用為試藥指環、又燒朱粉、墮下多年沈積、有銀、鑄為銀、光輝甚好、與波斯銀功力相似、祇是難得、今時燒鍊家、每一斤生銀、只得一二錢、山海經云、東北樂平郡、堂少山、出銀甚多、黔中生銀、體硬、不堪入藥、(李珣) ●閩浙、荆湖、饒信、廣、贛、貴州、交趾、諸處山中、皆產銀、有銚中鍊出者、有沙土中鍊出者、其生銀俗稱銀笋、銀牙者也、亦曰出山銀、獨孤酒、丹房、錢源、所謂銚坑中、出褐色石、形如笋、打破即白、名曰自然牙、曰自然銚、亦曰生銚、此有變化之道、不堪服食者是也、管子云、上有鉛、下有銀、地鏡圖云、山有窻、下有銀、銀之氣、入夜正白、流散在地、其精變為白雄雞、寶藏論云、銀有

十七種、又外國四種、天生牙、生銀坑內、石縫中、狀如亂絲、色紅者、上入火、紫白如草根者、次之、銜黑石者、最奇、生樂平、鄱陽、產銚之山、一名龍牙、一名龍鬚、是正生銀、無毒、為至藥根本也、生銀生石銚中、成片塊、大小不定、狀如硬錫、母砂銀生五溪、丹砂穴中、色理紅光、黑銚銀、得子母之氣、此四種為真銀、有水銀、銀草、砂銀、曾青銀、石線銀、雄黃銀、雌黃銀、硫黃銀、膽礬銀、蠟草銀、皆是以藥制成者、丹陽銀、銅銀、鐵銀、白錫銀、皆以藥點化者、十三種皆假銀也、外國四種、新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀、並精好、(李時珍) ●按方勺泊宅編云、黃銀出蜀中、色與金無異、但上石則自色、照火古翼、集云、黃銀絕少、道家言鬼神畏之、六帖載、唐太宗賜房元齡帶云、世傳黃銀、鬼神畏之、春秋運斗樞云、人君秉金德而生、則黃銀、見世人以銚石為黃銀、非也、銚石即藥成黃銅也、(李時珍) ●烏銀、今人用硫黃煎銀、再宿海之則色黑矣、工人用為器、養生者、以器煮藥、兼於一二丈處、夜承露

禮飲之、長年辟惡、(陳藏器)

【銀膏】

命名 本品係白錫和銀、與水銀合成之、光明如銀、凝硬如膏、故名。

性質 辛、大寒、有毒。

主治 熱風心虛、驚悸恍惚、狂走、隔上熱、頭面熱、風衝心上下、安神定志、鎮心明目、利水道、治人心風健忘、亦補牙齒、缺落。

【銀壺】即水仙之日本別名、詳「水仙」條。

【銀鋪】

古醫別名 銀粉、銀燭。基本 本品即銀鋪中鎔銀、罐底所餘之黑滓。

主治 療頑癬、取盤磁內安置、露天將盤微開、使銚沾露、有水、流下、拭取、塗之。

配合應用 ●治一切無名腫毒、癬疥、痔漏、發背、疔瘡、用銀鋪一斤、黑芝麻油二斤、先將銚浸油內、浸十日、敲碎、同油煎至四五分熱、以粗袋濾去銚、入炒過飛東丹一斤、熬成膏、一貼即愈、(內府萬應膏方)

●治馬刀瘻、及鼠瘻、已潰者。

十四畫 銀 銅

用銀鬪子四兩。鎚碎。黃丹八兩。飛淨。香油二十兩。用砂鍋盛油。待油溫熱。即入鬪子。將柳葉。槐花。五枝。攪之。俟起珍珠花。撈去渣滓。淨後。將油下鍋。慢慢將黃丹篩入油內。仍以五枝不住攪之。以滴水成珠為度。取出收貯。用時勿見火。於重湯炖化。攤貼用之。(五雲膏方)

參攷資料 凡銀入醃。必多用瑋及礪砂黃砂。以去鉛銅雜質。沉於罐底。其上則為十足之紋銀。罐底所餘之黑色滓渣。名謂鉛。有毒不可食。食則能墜人腸。急用黃泥水服二茶盞。可解。或每日用鉛糖四兩。作小丸。不時以芝麻油吞下。俱可瀉其毒。須服至百日外無患。或用烏梅湯灌之。即解。或用帶皮綠柿遠吃數十枚。冬日吃柿餅。蒸汁可解。(綱目拾遺)

【銀刺刀】即玉如意之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【銀箔】即銀箔之處方用名。詳「銀箔」條。

【銀匙】即老鴉蒜之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀髮】即髮之毛白色者之古籍別名。與見綱目。詳「髮」條。

【銀礫石】即礫石之處方用名。詳「礫石」條。

【銀鱗】即鱧魚之白色者。功用較尋常鱧魚為良。

【銅末】即銅屑之古籍別名。與見綱目。詳「銅屑」條。

【銅皮鐵骨】即昭參外皮青黃。內肉青黑色質堅重者之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「昭參」條。

【銅花】即銅屑之古籍別名。與見綱目。詳「銅屑」條。

【銅雲】即防風之古籍別名。與見本經。詳「防風」條。

【銅青】 命名 本品係銅鐵衣。色青綠。故名。

處方用名 銅綠粉。銅青末。

古醫別名 銅綠(綱目)。

基本 係礬石屬。為銅之鐵衣。

產地 陳仁山藥物生產辨云。銅青係由廢銅久貯潮濕地方。發霉而成。各處均有。銅青餅。由舊銅與酸醋製出之。顏料店均有沽。

形態 銅為金屬化學原質之一。色紅橙。若在含炭氣之潮濕空氣中。腐蝕之。則變生青綠色之鐵衣。成為炭酸銅。其鐵衣即名銅青。銅綠質鬆不堅。狀如粉末。

製法 或置銅於潮濕地。或塗醋於銅上。使生綠後。刮取。或淘取。晒乾。用。但市肆以枯礬和青藍而成。不可用。

用法 恒以對研和作丸散。

性質 酸。平。微毒。

效能 祛風痰。治瘰癧。明目。殺蟲。用作疥癬藥。又作祛痰鎮喘藥。

主治 婦人血氣心痛。合金瘡。止血明目。去腐赤息肉。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論銅青曰。主風爛眼淚出。【明】李時珍本草綱目論銅青曰。治瘰癧疔瘡。吐風痰。殺蟲。【明】李士材本草圖解論銅青曰。銅青酸走厥陰。主吐利風痰。明目。祛疔殺蟲。服之最能損血。宜酌之。【清】黃宮樞本草求真論銅青曰。銅青即俗所云銅綠者是也。與空青所產不同。銅青氣寒地陰。英華外見。藉醋結成。故味酸苦。清氣寒。能入肝膽二經。按酸入肝而斂。所以能合金瘡。止血。苦寒能除風熱。

所以能去腐赤及鼻肉。苦能洩結。所以醋醱喉中。則吐風痰。而使血氣心痛皆止。為散能療喉痺牙疳。醋調搽腋下。治胡臭。薑汁調點爛鼓風眼。去疔殺蟲。所治皆厥陰之病。

配合應用 ①治風痰卒中。碧林丹。治痰涎潮盛。卒中不語。及一身風癱。用生綠二兩。乳細水化去。石慢火結乾。再研。入麝香一分。糯米粉糊和丸。彈子大。陰乾。卒中者每丸作二服。薄荷酒研下。餘風痰砂酒化下。吐出青碧涎。瀉下惡物。大效。又治小兒用綠雲丹。銅綠不計多少。研粉。醋麵糊丸。炙子大。每薄荷酒化服一丸。須臾吐涎。(經方)

②治爛弦風眼。銅青水調塗。塗底。以艾熏乾。刮下塗爛處。(衛生易簡方)

③治赤髮禿落。油煎銅錢末塗之。即生。(普濟方)

④治面皴黑痣。以草刺破銅綠末。傅之。三日勿洗水。自落。厚者再上之。(聖濟總錄方)

⑤治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

...

等分爲末。搽之立愈。(邵真人經驗方)

①治口鼻疔瘡。銅青、枯礬、等分研傳之。又方。人中白一錢。銅綠三分研傳之。

②治楊梅毒瘡。銅綠、醋、麥、研末。燒酒調搽。極痛出水。次日即乾。或加白礬等分。研搽。(簡便方)

③治腫瘡頑癬。銅綠七分。研黃。煎一兩。化熬。以厚紙拖過。表裏別以紙隔貼之。出水妙。亦治楊梅瘡毒及蟲咬。

④治諸蛇螫毒。銅青傳之。(千金方)

⑤治百蟲入耳。生油調銅綠滴入。(衛生家寶方)

⑥治頭上生虱。銅青、明礬末搽之。(摘玄方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ①銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝臟。故吐利風痰。明目殺疳。皆肝臟之病也。抱朴子云。銅青塗木。入水不腐。(李時珍) ②生熟銅皆有青。即是銅之精華。大者即空綠。以次空青。

十四畫 銅

銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。(陳藏器) ①近時人以醋制銅生綠。敢取曬乾貨之。(李時珍) ②銅綠係酸水與銅相連而生。外用能殺毒。或用銅綠細末灑瘡上。殺浮肉良。(內科新說) ③銅綠不但有去腐之功。並有防腐之性也。(盧勳飛)

【銅青末】即銅青之處方用名。詳「銅青」條。

【銅砂】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳「銅屑」條。

【銅塊魚】即鱸魚之古籍別名。典見見臨海志。詳「鱸魚」條。

【銅屑】命名 銅與金同。故字从金而名銅。入藥用其屑。故名銅屑。

古語別名 銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。(綱目)

形態 銅爲金類金屬。原質之一。其色橙紅。性能伸展延長。又能傳熱及電。近時常以製錫及電線諸物。所謂銅屑者。即打赤銅時落下之細屑也。可供藥用。

鑿法 凡使或打銅落下之屑。或以銅火假淨水中。其屑亦自

銹

落下。以水淘淨用。好酒入沙鍋內炒。見火星取出。研末用。

性質 苦。辛。微毒。

主治 賊風反折。結使極熱。投酒中服五合。日三。或以五斤燒赤。納二斗酒中百迴。如上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下。取去血。封之神效。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論銅屑曰。明目治風。眼接骨。解瘰癧。女人血氣及心痛。【明】李時珍本草綱目論銅屑曰。同五倍子能染髮。

參攷資料 ①蒼朮能粉銅。巴豆牛脂能煉銅。慈姑乳香能啞銅。此物性熱也。(李時珍) ②赤銅屑主傷寒。能解人骨。及六畜有損者。細研酒服。直入骨損處。六畜死後。取骨視之。猶有銅痕可驗。打熟銅不堪用。(陳藏器) ③朝野僉載云。定州崔務墜馬折足。醫者取銅末和酒服之。遂瘥。及亡後十年改葬。視其腰骨折處。猶有銅末之痕也。(唐慎微)

【銅粉】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳「銅屑」條。

【銅勒】即磨之古籍別名。典見吳普本草。詳「磨」條。

【銅黃】即藤黃之說。詳「藤黃」條。

【銅落】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳「銅屑」條。

【銅鼓草】形態 銅鼓草爲雜瓜。可供藥用。

主治 瘡毒。

【銅錄】即銅青之古籍別名。典見綱目。詳「銅青」條。

【銅錄粉】即銅青之處方用名。詳「銅青」條。

【銅錢草】即金錢草之別名。詳金錢草條。

【銅礦石】命名 礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。即礦石之含有銅質者。故名。

形態 銅礦石爲礦類之一種。乃銅之天然生者。多與硫磺、砷、鐵等混合。狀如礬石。而有銅星。錫之可取純銅。其石可供藥用。

性質 酸寒。有小毒。

主治 丁腫惡瘡。爲末傳之。馬香瘡。臭酸。磨汁塗。

【銹皮】即鬼桃。詳「羊桃」條。

【銚芒】即羊桃之古籍別名。典見綱目。詳「羊桃」條。

【韶子】 韶子爲果類之一種。葉形態。韶子爲果類之一種。葉如栗色赤。其實夏日成熟。紅色。內如荔枝。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 暴痢。心腹冷氣。

【韶腦】即樟腦之古籍別名。典見綱目。詳「樟腦」條。

【頗兒必】即羊腰骨之別名。詳「羊腰骨」條。

【頗黎】即玻璃之古籍別名。典見綱目。詳「玻璃」條。

【領石】即結石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「結石」條。

【飴糖】即飴糖之處方用名。參見「飴糖」條。

【飴糖】 命名 饴之清者曰飴。稠者曰飴。如饴而濁者曰飴。

處方用名 膠飴。飴糖。古醫別名 饴。綱目。飴。軟飴。備錄。和漢藥考。

基本 蒸糯米。糯米。大麥。小麥。

粟。黃小米。玉蜀黍。薏苡仁等澱粉質。加麥芽子(麥芽)使之糖化即成。

產地 中國各地均有出產。今日本各地產此。其著名者。爲越後(高田水飴)肥後(朝鮮飴)讚岐(琴平飴)相模(浦賀水飴)等處所產。

形態 飴糖有硬軟之別。硬者爲淡黃色。富黏質之濃稠液體。硬者爲黃褐色塊。俱有甘味。將黏稠者牽引。使混入空氣。則成爲多孔質。變成缺乏黏性之白色塊。但一帶溼氣。則再發黏性。其精製品經數年亦不變壞。

種類 將糖化黏汁煎熬。第一次所得之飴糖。日本謂之一號飴。將殘餘納入布袋。擠出黏汁。再行煎熬。此第二次所得之飴糖。謂之二號飴。更類別之。有左列數種。一水飴。將糖化黏汁煎熬。使成濃稠者。膠飴。一名地黃煎。或呼朝鮮飴。即將水飴再煎熬。使成膏藥狀者。拔切飴。即膠飴之更熬硬者。概須用鑿斷之。餵。一呼白玉飴。即將膠飴牽引數十次。使生孔成

爲白色者。

製法 飴化有種種製法。今述其一。先將糯米一斗搗之。蒸成硬飯。加麥芽之去粹粉末一升。五合。善加攪拌。再注入溫湯一斗五升。保持約攝氏四十五度至五十五度之溫度二小時。則澱粉質受酵母之作用而糖化溶解。乃去其殘渣。將所得黏汁煎熬。使成適度之稠狀。凡穀之黏者。皆可製飴。漬過蒸熟。每一石。用大麥蘖一斗八升。和水磨汁。傾入其中。少假即生飴如蜜而稀。色如膠。所謂膠飴是也。其稍乾者。謂之餵。其熱令乾。硬而色白者。謂之餵。

用法 膠飴即可下嚥。或溶於溫湯中飲之。或沖入於湯藥中服之。

性質 甘。大溫。無毒。

成分 主成分爲麥芽糖。糊精。此外含有蛋白質。脂肪及少許鹽質。

效能 和中。潤腸。補虛。止痛。爲炭水化合物之可溶性物。易消化。向用作小孩產婦滋養物。又用以配合藥物製飴劑。

主治 補虛。止渴。去血。

張仲景之發明 飴糖一味。經茲考徵如下。小建中湯證曰。腹中急痛。又曰。寒急。又曰。婦人腹中痛。大建中湯證曰。上下痛。而不可觸近。黃者建中湯證曰。寒急。以上三方。膠飴各一升。能治寒急。夫腹中急痛。腹中痛。豈非寒急矣乎。故曰。膠飴之功。與甘草及蜜相似矣。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論膠飴曰。補虛冷。益氣力。止腸鳴。咽痛。治唾血。消痰。潤肺。止咳。【唐】孟詵食療本草論膠飴曰。健脾。胃補中。治吐血。打損。瘀血者。熬焦酒服。能下惡血。又傷寒大毒嗽。於葶藶汁中煮一沸。頓服之。良。【宋】寇宗奭本草衍義論膠飴曰。脾弱不思食。少用能和胃氣。亦用和藥。【元】王好古湯液本草論膠飴曰。乃脾經氣分藥也。甘能補脾之不足。【明】李時珍本草綱目論膠飴曰。解附子草烏頭等毒。【明】李士材本草圖解論膠飴曰。飴糖甘溫。補中健胃。潤肺止咳。消

痰止而解渴解毒。熱焦酒服。能下惡血。邪曹進飛矢中目。拔矢而鐵留於中。痛困俟死。一僧教以寒食餠點之。至夜瘡瘕一錯而出。旬日瘕【明】膠希雍本草經疏論膠餠曰。餠糖用麥蘖或穀蘖同諸米泔熬煉而成。故其味甘。氣溫無毒。入足太陰。亦入手太陰經。甘入脾。而米麥皆養脾胃之物。故主補虛。仲景建中湯用之是也。肺胃有火則發渴。火上炎迫血妄行則吐血。甘能緩火之標。則火之下降。而渴自止。血自去也。孫思邈又謂其有消痰潤肺。止咳。治咽痛吐血等功。【清】鄒樹本草疏證論膠餠曰。陶隱居云。酒與餠並米麥所爲。而品分中上。良緣餠以和潤而優。酒以醜亂而劣。愚謂麴蘖雖皆麥所爲。然麴先屑粉而後造。爲均折其生氣。蘖浸令生芽而後磨粉。爲引動其生機。然皆令消米質使成液也。酒醱久。方成餠。片時便就。久釀者。性反迅。速成者。性反緩。何歟。夫均折者。膠潤久而性益粗。生發者。萌旋速而氣已暢。故酒爲緩物之報使。餠實急劑之柔佐也。然虛煩

十四靈 餠

虛痞。虛腫。虛滿。俱有確證。可指其總統言之者。有虛勞。虛損。虛羸。虛弱。能知熾熱之爲勞。傳變之爲損。疔瘡之爲羸。疲輭之爲弱。則乏之爲乏。亦可擬議得之。夫行而無資。謂之乏。人身之行者。非氣血而何。夫反正爲乏。非氣血之當行不行。而何。人身一天地也。雖故納新。環周不休。氣之道也。十二經脈。十五大絡。血之道也。其資皆稟於脾。則虛乏者。不可謂非脾氣不給矣。脾氣不給。蓋其尤草。皆能資助之。此獨何藉於餠。夫補虛乏已下。遂繼之以止渴去血。則其尤者。皆與渴無干。且尤能去溼。不能滋燥。其能充外。不能充內。蓋草能充內。且滋燥矣。又與血無干。以是見此虛此乏。斷非蓋其尤草所能補矣。雖然。虛乏而氣不能行。且渴者固多。又何以知有當去不去之血。夫仲景用餠糖。多在建中湯。建中湯證。多有腹痛。此血當行不行之驗也。是故餠糖非能去瘀血也。能治血當行不行爲腹痛者耳。故傷寒論金匱要略。用建中甚多。然止云治腹痛。不云下瘀血。或謂本太陽

病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。則治腹痛者。芍藥之功。非餠糖之力也。此誠有辨焉。何則。傷寒陽微。陰絀。法當腹中急痛者。先與小建中湯。虛勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾。口燥。小建中湯主之。虛勞裏急。諸不足。黃芪建中湯主之。婦人產後。虛羸不足。腹中刺痛。吸吸少氣。或苦少腹中急。羸痛。引腰背內痛。當歸建中湯主之。婦人腹中痛。小建中湯主之。是知桂枝加芍藥湯所主是滿痛。小建中湯所主是急痛矣。桂枝加芍藥湯。卽小建中湯少餠糖耳。下後邪氣內傳。爲滿痛是實。虛勞產後。腹痛是虛。僅餠糖一味之轉移。治證遂虛實不侔。猶不可見餠糖善補虛乏耶。桂枝湯在傷寒所治證多矣。茲則吸吸少氣也。咽乾口燥也。裏急腹痛也。腹中刺痛也。少腹急摩也。皆非桂枝湯所曾治。自是知卽餠糖之功矣。蓋土滯以木而疏。土虛以木而固。故少氣。咽乾。口燥。是脾之穀氣。裏急腹痛。乃肝氣侮脾。餠糖之柔潤芳甘。正合脾家土

德。而卽以緩肝之急。以肝固罷極之本。虛乏之所從來也。是故桂枝加芍藥湯。無餠糖。卽不名建中。桂枝加黃芪湯。不加芍藥。不用餠糖。卽不名黃芪建中。而蜀椒乾薑人蔘。協以餠糖。卽名大建中。是知建中固以餠糖得名耳。然則其所謂大小者。究何義耶。夫以勢合勢。分大小。則小建中用芍藥桂枝。生薑得十五兩。又益大棗十二枚。大建中用人蔘乾薑僅五兩。止益以蜀椒二合。乃同用餠糖一升。則餠糖在大建中湯獨多。而勢合在小建中湯。體均而勢分。此一說也。若以力專力薄。分大小。則辛甘爲陽。酸苦爲陰。大建中純用甘辛。則力厚氣專。小建中兼用酸苦。則力微氣薄。此又一說也。總之兩建中。皆以餠糖爲君。君尊而臣從。命則爲大。君卑而臣擅。命則爲小。此實大小得名之確指歟。而餠糖之所以尊於此。益可徵悟矣。【清】楊時泰本草逸鈔元論膠餠曰。味甘。酸。氣大溫。脾經氣分藥。補虛冷。健脾胃。中治脾弱。不思飲食。潤肺消痰。止瀉。瘀吐血。由打損成癢者。熬焦酒

服。能下惡血。少用能和胃氣。解附子草烏毒。【清】黃宮楠本草求真論膠餉曰。餉精氣味甘溫。據書言能補脾潤肺。化痰止咳。並仲景建中湯。用此以爲補中經脾。蓋以米麥本屬脾胃之穀。而餉屬屬穀麥所造。凡脾虛而肺不潤者。用此氣味甘緩。以補脾氣之不足。兼因甘潤。以制肺燥之有餘。是以脾虛而痰不化。固可用此以除痰。脾虛而嗽不止。亦可用此以除嗽。即中虛而邪不解。亦得用此以發表。中虛而煩渴時見。亦得用此以除煩止渴。他如草烏毒中。其性橫裂。固可用此以爲甘緩。芒刺誤吞。痛楚異常。更可用此以爲柔輭。然精粹煉成。澀而且熱。其在氣虛痰盛。中虛火發。固可用此消除。若使中滿氣逆。實火實痰。非惟治痰。且更動痰。非惟治火。且更生火。至於小兒多食。尤易損齒生蟲。不可不慎。幸白者不入藥用。

因外學說 日本醫學士古川榮氏論用餉糖可製糖漿。(單舍利別)載東京醫事新誌第三百六十四號。今錄其一段如左。據聞

此次編其日本藥局方。有提議用餉製糖漿者。終恐患者不以爲藥。因而否決。其果然耶否耶。若果如此。雖曰民智尙未盡開。而現有之良佳代用品。仍不能舍糖漿而他求。誠爲憾事。倘告於衆曰。糖漿亦不過白糖之濃厚溶液耳。亦將即隨其信用耶。草野元養先生。根據醫士柏魯資氏處方。於餉中加二分之一至一%。乳酸鐵或磷酸鐵。(枸橼酸鐵及鐵金雞納霜。價高益少)特名之爲含鐵麻魯資越幾斯(Ex. maki ferratum)可謂妙矣。第一醫院所用。普通名稱雖爲含鐵麻魯資越幾斯。惟麻魯資並非餉。乃麥芽越幾斯。故毋寧名爲鐵餉前似較適當。

配合應用 治老人煩渴。寒食大麥一升。水七升。煎五升。入赤餉二合。湯即飲之。(奉親書方) 治蚊龍瘰癧。凡人正二月食芹菜。誤食蚊龍精者。爲蚊龍病。發則似痲面。色青黃。每服寒食餉五合。日三服。吐出蚊龍。有兩頭可驗。吐蛇者勿用。(金匱方) 治魚疔疔瘡。寒食餉塗之。良

乾者燒灰。(千金方)

治瘰癧毒瘡。臘月餉餉。晝夜塗之。數日則愈。(千金方)

治誤吞稻芒。白餉類食。(簡便方)

治魚骨梗咽。不能出。用餉餉丸。雞子黃大。吞之。不下再吞。(肘後方)

治誤吞錢釵及竹木。取餉餉一斤。漸漸食盡便出。(外臺祕要方)

治服藥過劑。悶亂者。餉餉食之。(千金方)

治草烏頭毒。及天雄附子毒。並食餉餉即解。(聖濟總錄方)

治手足癩瘡。炒臘月餅傳之。(千金方)

治火燒成瘡。白餉燒灰粉之。即燥易痊。(小品方)

用處 一匙至二匙。施用宜忌 有溼熱內鬱諸病者。禁用。少用補脾潤肺。過用有損無益。

著名方劑 小建中湯。虛勞寒急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢酸痛。手足煩熱。咽乾口燥。此湯主之。

(金匱)桂枝三兩。(去皮)甘草三兩。(炙)大棗十二枚。芍藥六兩。生薑三兩。膠餉一升。上六味以水七升。煮取三升。去渣。納膠餉。微火消解。溫服一升。日三服。黃者建中湯。虛勞寒急。諸不足者。主之。(金匱)即小建中湯內加黃耆一兩。中。餘依前法。

參攷資料

餉糖。即得是也。多食動脾風。今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳。餘不堪用。蜀黍米亦可造。不思食人。少食之。亦使脾胃氣和。唐白樂天詩。一棧較牙楊。者是此。(本草衍義)謂餉與酒。皆用米糜。而餉以和潤爲優。虛子由謂粟米作餉。宛似水穀入胃。醱釀作汁。而出入未定之會。夫五穀分養五臟。如稻之甘。自是脾穀。而爲脾益。乃從蒸鍊後。氣之溫者。更爲大溫。暢中土生發之氣。即從氣取汁。變化精微。和而潤。俾中土之生者能化。若痰之凝。血之凝。皆以液化。血者對待之液。能化。則氣益生。此胃所以和。而虛之所以能補也。(陶真自)內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。膠餉之甘。以緩

中也。(成無己)①膠飴之醫治作
用。酷似甘草之治念迫作用。二者
殆相伯仲。甘草性平。通用於表裏
陰陽虛實各症。本品藥性大溫。惟
可用於陽虛症。然陽實陰虛及寒
實證。不可用之。有適於寒症。而不
適於表症。又甘草無糖養分。而本
藥如上說。有豐富之滋養分。亦是
其別也。(皇漢醫學)②按劉熙釋
名云。饴之清名曰飴。形怡怡然也。
稠者曰飴。強硬如錫也。如飴而濁
者曰飴。方言謂之饴餈。音長。皇
楚辭云。和蜜餈用餈餈是也。(李
時珍)

【飴鹽】即食鹽產於戎地者之古
籍別名。與見綱目。詳「食鹽」條。

【餈】即飴之古籍別名。與見和漢
藥考。詳「醴」條。

【映櫻】即櫻之古籍別名。與見綱
目。詳「櫻」條。

【殼柏楠】即楠木之俗名。詳「楠
木」條。

【魃寶】即山葵之古籍別名。與
見別錄。詳「山葵」條。

【魁陸】即五楞子之古籍別名。與
見別錄。詳「五楞子」條。


十四畫 飴

【魁蛤】即五楞子之古籍別名。與
見別錄。詳「五楞子」條。

【魁圓】即龍眼之古籍別名。與見
和漢藥考。詳「龍眼」條。

【魂常】即木蠶之古籍別名。與見
本經。詳「木蠶」條。

外國名詞 *Cheilata punctata*



魚 鮓

性質 甘。平。熱。
主治 壯陽道固精髓。

參攷資料 雲南百夷中有
小孟貢江。產鮓魚。彼夷食之。曰御
百婦。故夷性極淫。資賤俱數妻。其
地亦產海邊。(瀛程記) 鮓魚產
孟貢江。牡者恒多。牝而遊。夷人常
食其肉。一日能御百女。入藥用雄
者。壯陽道固精髓。八十老翁服之
多子。(說略)

鮓 魃 殼 魁 魁 魂 鮓

【鳩鳩】 古籍別名。布穀。(列
子) 鳩鳩。獲穀。(爾雅)

郭公。(綱目)

外國名詞 *Cuculus canorus*

Land (拉丁) (Cuckoo) (英)
クワクコウ或カシノドリ或カ
ツボウ或カツユク或サシユド
リ或タチマキドリ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類變禽
類。杜鵑科爲鳩鳩之肉。

形態 鳩鳩爲原禽類鳩之一
種。形如杜鵑而大。又如鳩全身淡
黃綠色。穀雨後始鳴。夏至後乃止。
其鳴聲如呼割麥。插禾。性拙不能
築巢。多居樹穴及鷓巢中。其肉可
供藥用。



鳩 鳩

性質 甘。溫。無毒。
主治 安神定志。令人少睡。

鳩 鳩


【鳳仙子】 命名。本品花如鳳
狀。故名。

國方用名 急性子。

古籍別名 小桃紅子。夾竹桃
子。海蔘子。染指甲草子。(救荒本
草) 旱珍珠。羽客子。金鳳花子。菊
婢子。(綱目)

基本 屬鳳仙花科鳳仙花之
種子。

形態 鳳仙花爲一年生植物。
高尺餘。莖剛。葉爲長橢圓形。或披
針形。邊緣有細鋸齒。互生。頗密。夏
月葉腋開不整齊花。狀如飛鳥。其
色或紅或紫或白。頗爲美觀。後結
裂果。子皮有彈性。猛烈裂開。散放
細小種子。中國以此花染指甲。日
本肥前長崎及筑前等。亦有此俗。
故又有爪紅之名。



子 仙 鳳

種植 園圃間恒多栽植。二月
下種。五月可以再種之。
採取 八九月間採之。

一六二二

十四畫 鳳

性實 微苦。溫。有小毒。效能 消積塊。下骨哽。有通經之作用。用於月經不順。或月經困難與閉止。

至治 產難積塊。噎膈。下骨哽。透骨通竅。

【歷代記述攷】 【清】黃宮繡

本草求真論鳳仙子曰。鳳仙子又名急性。是俗所謂金鳳花子是也。其性急猛異常。味苦氣溫小毒。凡人病患頑痰積塊。噎膈骨哽。服之立刻見效。以其氣味急道。能於骨穴堅硬處所。極力搜治。是以勝金丹。用之以治狂癡。取其急領砒毒吐泄。同砒以點牙疼。即落。同獨蒜搗汁以塗瘡塊。即消。加麝香。阿魏。尤捷。投子以麥硬肉。即爛。但此生不蟲。蜂蝶不近。且多食則載人喉。似非無毒。用之當細審量可耳。

性最急。故有急性子之名。其氣味則瀕糊糊。目謂微苦。溫。有小毒。主治產難。催生。積塊。噎膈。下骨哽。透骨。取齒牙。皆取其迅速。直達為義。頭治外癩。墜塊。痲瘋。陰發大症。研末。熬膏。貼患處。極能軟堅。消腫如神。

配合應用 治產難催生。鳳仙子二錢。研末。水服。勿近牙。外以蓖麻子。隨年數搗塗足心。(集簡方)

治噎食不下。鳳仙花子酒浸三宿。曬乾。為末。酒丸。綠豆大。每服八粒。溫酒下。不可多用。即急性子也。(摘玄方)

治咽中骨哽欲死者。用白鳳仙子研水一大呷。以竹筒灌入咽。其物即軟。不可經牙。或為末吹之。(普濟方)

治牙齒欲取。金鳳花子研末。入砒少許。點疼牙根取之。(摘玄方)

治小兒疳積。急性子。水菘花子。大黃各一兩。俱生研末。每味取五錢。外用皮滑一兩。拌勻。將白鴿鷄一箇。或白鴨亦可。去毛尿。剖腹。

勿犯水。以布拭淨。將末裝入內。用線紮定。沙鍋內入水三碗。重重紙封。以小火煮乾。將鷄鴨翻調。焙黃色。冷定。早晨食之。日西時。疾頓。三日大便下血。病去矣。忌冷物百日。(孫天仁集效方)

用敷 八分至錢半。

施用宜忌 凡無積滯者禁用。參攷資料 鳳仙子其性急速。故能透骨。軟堅。瘡人烹魚肉。硬者投數粒。即易軟爛。是其驗也。緣其透骨。最能損齒。與玉簪根同。凡服者不可着齒也。多用亦載人咽。(李時珍)

其花頭翅尾足具翹然如鳳狀。故以名之。女人採其花及葉。包染指甲。其實狀如小桃。老則迸裂。故有指甲。急性。小桃諸名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒。花。張宛丘呼為菊婢。章房呼為羽客。(李時珍)

鳳仙人家多種之。極易生。二月下子。五月可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其大如指。中空而脆。葉長如尖似桃柳。葉而有鋸齒。極開闊。花或黃或白。或紅或紫。或碧或雜色。亦自變易。狀如飛禽。自夏初至秋盡。開謝相

一六二四

續。結實。巖然。大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟黃。犯之即自裂。皮卷如拳。苞中有子似蘿蔔子而小。褐色。人採其肥莖。淘醃。以充高筍。嫩華酒浸一宿。亦可食。但此草不生蟲。蜂蝶亦不近。恐亦不能無毒也。(李時珍)

【鳳仙花】 古籍別名 好女兒 花(綱目)



花 仙 鳳

性質 甘。滑。溫。無毒。

主治 蛇傷。搗酒服。即解。又治腰脇引痛。不可忍者。研餅曬乾。為末。空心每酒服三錢。治血消積。

【鳳仙根葉】 有小毒。性質 苦。甘。辛。

主治 雞魚骨哽。誤吞銅鐵。杖撲腫痛。散血。通經。輾壓。透骨。【鳳尾竹】 即竹之葉。細僅三分者。與見綱目。詳竹條。

【鳳尾松】 即無漏子之樹名。與見和漢藥考。詳無漏子條。

【鳳尾芳】即仙人掌之別名。詳「仙人掌」條。

【鳳尾金星】古籍別名 寶劍草。

形態 根類竹根。黃色有鬚。葉類建蕙而短。長不滿尺。春月發苗。背有點子兩行。相對有數十粒。極密。秋霜後。乃黃生石山下。其根莖生。

注實 涼。主治 吐血。咽喉火毒。諸丹毒。發背癰痛。

參攷資料 金星鳳尾。其葉細碎。形似鳳尾。三月發苗。葉背有星作細白點子。秋後乃黃生古牆石壁中。背日者佳。惟實熱症可用。又避瘟非陽毒。及非金石藥毒者。戒用。謝靈運云。性太涼。男女忌服。雖取效一時。但精血受寒。不能生育。為虞耳。(百草鏡) 治喉癢。金星鳳尾草。搗汁加米醋數匙。和勻用竹筒裏新棉花蘸汁。點患處。稠痰隨筋而出。亦治喉風。(家寶方) 【鳳尾草】 即金星草之古籍別名。與見綱目。詳「金星草」條。 翠羽草之古籍別名。與見綱目。拾

遺。詳「翠羽草」條。 即貫衆之別名。詳「貫衆」條。

【鳳尾蕉】命名 本品葉出細尖。瓣如鳳尾。故名。

古籍別名 香蕉。鐵樹。(綱目拾遺) 產地 贛國諸省。多生於鐵山間。

形態 鳳尾蕉為蕉類之一種。本粗巨。高丈餘。莖有鱗片被之。葉生莖頂。長四五尺。色深青。入冬不凋。作羽狀分裂。密如魚刺。雌雄異株。雌花叢生。雄花如松球。長二尺許。其葉可供藥用。

主治 平肝。療一切肝氣腫痛。水煎服。

參攷資料 鳳尾蕉又名香蕉。亦名鐵樹。以鐵樹葉形如芭蕉。其樹須墜以鐵屑乃盛。實則香蕉葉也。以其食鐵故亦名鐵樹。其性亦平肝。取其相制為用亦頗驗。謝靈運五雜俎。香蕉能辟火患。將枯時以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根。則復活。蓋金能生水也。種盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。三十年僅見兩度

花耳。花亦似芭蕉。而色黃不實。羣芳譜。鳳尾蕉一名香蕉。產於鐵山。如少萎以鐵燒紅穿之。即活。平常以鐵屑和泥壅之。則茂而生子。分種易活。江西遂州有之花鐵鳳尾蕉。一名香蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖。瓣如鳳尾之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黃。以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。以生鐵屑和泥壅之。自茂。且能生子。分種易活。極能辟火患。人多盆種庭中。以為奇玩。友人唐振聲。在東甌見鳳尾蕉。土人皆呼為鐵樹。則知今人所用及洋舶帶來之葉。皆香蕉葉。而非真正鐵樹葉也。(趙學敏)

【鳳尾蕉子】即海樓子之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「海樓子」條。

【鳳油刺】即伏牛花之古籍別名。與見和漢藥考。詳「伏牛花」條。

【鳳粟】即仙人掌之別名。詳「仙人掌」條。

【鳳凰衣】即雞卵殼中白皮之俗名。詳「雞卵殼中白皮」條。

【鳳凰退】即鳳凰蛻。詳該條。

【鳳凰椰子】即椰子之古籍別名。

典見植物學大辭典。詳「椰子」條。

【鳳凰蛻】即雞抱出卵殼之別名。與見綱目。詳「雞抱出卵殼」條。

【鳳眼草】命名 本品兩葉中心。秋後色白。儼如鳳眼。故名。

形態 鳳眼草為溼草類之一種。穀雨節後生苗。苗如薄荷。而葉微圓。長五六寸。立夏後枝極復生。二葉節皆生。芒種節後枝極復生。二小葉中心各起莖一枚。如人兩眼。細碎如石胡荽子。小暑後色轉紅黃。漸抽長。其花如鬚。長一二寸。紫黃色。自苗至老葉。皆有淡紅暈。可供藥用。其花上粉詳該條。

主治 活血祛風。療一切風痺。酒煎服。

配合應用 治室女乾血勞。用鳳眼草連根葉鮮者一兩。加紅花三錢。酒煎服。通經自愈。

治四日兩頭痛。用鳳眼草煮紅煎。飲汁自愈。婦女經閉不通。發熱勞症。鳳眼草為末一兩。紅花炒二錢。水三錢煎一鐘。入黑糖五錢。空心服三五劑。見血方止。(醫學指南方)

十四畫 鳳 鳴 鳶 鼻

●治遺精白濁。鳳眼草炒乾研末五錢。沖熱黃酒服。(醫學指南方)

參攷資料 按經驗廣集。治小便不通。有皂角湯煎法。方中用鳳眼草。乃臭椿葉別名。與此名同物異。又荔支草亦名鳳眼草。與此亦異。(趙學敏)

【鳳眼草】●即椿樗莢子之古籍別名。與見綱目。詳「椿樗莢子」條。●即荔枝草之古籍別名。與見草藥方。詳「荔枝草」條。

【鳳眼草花上粉】 主治 殺蟲定瘕。入藥用。

【鳳頭蓮】 命名 本品狀似鳳頭故名。

產地 出臺灣島內山間。
形態 鳳頭蓮為雜草類之一種。形如黃連。色紫而多細鬚。非然分枝如鳳頭。可供藥用。

性質 平。
主治 咽喉一切諸症。

【鳳頭草】即馬鞭草之古籍別名。與見綱目。詳「馬鞭草」條。

【鳳翼】即射干之古籍別名。與見

本草拾遺。詳「射干」條。
【鳴珂】即蚯蚓之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蚯蚓」條。

【鳶】即鸚之古籍別名。與見陸璣詩疏。詳「鸚」條。

【鳶尾】 古籍別名 烏園。(本經) 烏鳶(別錄) 紫蝴蝶。(植物圖考) 紫羅欄(花鏡) 扁竹。(俗名) 鸚尾草(日本)

外國名詞 Iris sibirica, Maxim. (拉丁) イチハツ(日本)

基本 係鳶尾科。藥用其根莖。產地 山野川谷間。

形態 鳶尾為毒草類之多年生草本。春月抽莖。高一二尺。葉劍狀。淡綠色。互生。各葉相擁抱。初夏花軸自葉間生。其上端常綴以三花。花大。淡青紫色。處處有紫色小點。又有白色者。花蓋大小六片。外屬三片較大。在其上面下端之中央。有一雞冠狀突起。花柱之上部扁平如花瓣。其與蝴蝶花相異者。因鳶尾之花軸單一或分枝。花蓋之片上無毛狀之鋸齒。蝴蝶花之花軸恒分數枝。花蓋之片上有毛

狀之鋸齒也。其根如鳶頭。可供藥用。



尾 鳶

性質 苦。平。有毒。

主治 蠱毒邪氣。鬼疰諸毒。破癥瘕積聚。去水。下三蟲。(本經) 殺鬼魅。療頭眩。(別錄)

參攷資料 ●此草所在有之。人家亦種。葉似射干而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃肉白。嚼之。或人咽喉。與射干全別。

射干花紅抽莖長。根黃有白。(蘇恭) ●草名鳶尾。根名鳶頭。亦謂之鳶根。葉似射干。布地生黑根。似高良薑而節大。數個相連。九月十月採根。日乾。(韓保昇) ●此即射干之苗。非別一種也。肥地者莖長根粗。瘠地者莖短根瘦。其花自有數色。諸家皆是強分。陳延之小品方言。東海鳶頭。即由敗者。亦訛也。東海出之故耳。(李時珍)

【鳶頭】即鳶尾。詳「鳶尾」條。

一六二六

【鼻淵因】即山查之古籍別名。與見百一選方。詳「山查」條。
【鼻淵蟲】即蛭蟪之俗名。詳「蛭蟪」條。

外國名詞 Pulvis Tabaci (Snuff)

製法 造鼻烟法。香白芷二分。北細辛八分。焙乾。醋牙皂角二分。焙乾。研。薄荷二分。冰片三釐。乾烟絲為君。乾絲一錢。必配福烟六七分許。右藥各為細末。酌量配合。不必拘分兩。以色如棧色者佳。

種類 鼻烟明綠者最佳。玫瑰色者次之。醬色者為下。陳久而枯者不堪用。

主治 通關竅。治鼻風。明目。定頭痛。辟疫尤驗。

參攷資料 ●近京師有製鼻烟者。可明目。尤有辟疫之功。以玻璃為瓶貯之。象牙為匙。就鼻嗅之。皆內府製造。民間不及。張王叔云。近有廣東來者。較內府造者尤勝。有五色以蘇果色為上。(香祖筆記) ●西洋出鼻烟。上品曰飛烟。稍次則鴨頭綠色。厥味微酸。謂之鼻烟。紅者為下。(澳門紀略) ●鼻

烟或冒風寒。或受穢氣。以少許引之。使燒。則邪穢疏散。故蕙亦解。若刻不少間。反有致疾者。烟有多品。總以洋烟爲上。取其滋潤不烈。所以爲佳。(常中丞筆記)

【齊女】卽輝之古籍別名。與見綱目。詳【輝】條。

【齊蛤】卽馬刀之古籍別名。與見吳普本草。詳【馬刀】條。

【齊頭蒿】卽杜蒿之古籍別名。與見唐本草。詳【杜蒿】條。

十五畫

【劇草子】卽馬蘭子之古籍別名。與見本經。詳【馬蘭子】條。

【劈砂】卽砂之處方用名。詳【砂】條。

【劉寄奴草】 命名 本品爲宋高祖劉裕所發明。其小字寄奴。故名。

古籍別名 金寄奴(大明)烏藤菜(綱目)鴨脚(九里光)六月雪(六月裏)大葉蕩子(和漢藥考)

外國名詞 Sonceio palma-cus, Pall.

基本 屬菊科。爲劉寄奴草之

十四畫 齊

莖葉與花子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。劉寄奴生廣東。但各屬山野原澤間。恒有生長。

形態 劉寄奴草爲自生或人家栽種之宿根草。春季抽苗。高四五尺。葉互生。作掌狀分裂。似艾葉而厚。粗糙。邊緣有細鋸齒。夏季莖端分枝。開大五六分之黃色單瓣花。類紫菀花。

採取 六七月間採之。

製法 雷斅曰。凡採得去莖葉。只用實。以布拭去薄殼。令淨。并酒蒸。從巳至申。曝乾。用。李時珍曰。莖葉花子皆可用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 破瘀。活血。通月經。療金瘡。用治產後餘疾及金瘡藥。

主治 下血止痛。治產後餘疾。止金瘡血極效。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論劉寄奴曰。破血下脹。多服令人下痢。【宋】大明諸家本草論劉寄奴曰。心腹痛。下氣水脹。血氣通。婦人經脈凝結。止。蠶亂水瀉。

【明】李時珍本草綱目論劉寄奴

十五畫 劇 劈 劉

曰。小兒尿血。新者研末服。【明】繆希雍本草經疏論劉寄奴曰。劉寄奴草。其味苦。其氣溫。揉之有香氣。故應兼辛。苦能降下。辛溫通行。血得熱則行。故能主破血下脹。然善走之性。又在血分。故多服則令人痢矣。昔人謂爲金瘡要藥。又治產後餘疾。下血止痛者。正以其行血迅速故也。【明】李士材本草圖解論劉寄奴曰。劉寄奴苦溫無毒。主破血下脹。多服令人痢。下血止痛。同骨碎補。延胡索等分。水煎。入酒及童便。頓溫服。治折傷瘀血在腹。通行走散。血分之性。凡病人氣血虛弱。胃弱。易作泄者。勿服。【清】黃宮繡本草求真論劉寄奴曰。劉寄奴因何而有是名。據書載是劉裕小字寄奴。曾射一蛇。目見童子搗藥。問之。答爲寄奴所傷。裕罵而收藥。故每遇金瘡。數之卽愈。故以寄奴爲名。但此雖非屬真。而藥味苦微溫。多能破瘀通經。除瘀下脹。及止金瘡血出。大小便血。湯火傷毒。緣血之在人身。本貴通活。滯而不行。則血益滯。而不。而癢。癢脹滿。愈甚。行而不止。則血亦滯。而不收。

而使血出益甚。寄奴總爲破血之品。故能使滯者破。而卽通。而通者破。而卽收也。古書止言治功。而不詳釋其義。殊覺疎漏。但性多走泄。不可過服。令人吐利不止。莖葉花子皆可用。

近人學說 張山雷曰。此草以劉裕小字得名。南史所謂搗藥治傷者也。其性苦溫。善於破瘀宣通。專爲逐血攻脹之用。并以外敷。止血定痛。治傷。亦治產後血瘀未淨。諸疾。及大小便血。心腹結痛。癢瘕。經閉。然專於攻破。非賢證不可妄用。

配合應用 治大小便血。劉寄奴爲末。茶調。空心服。二錢卽止。(集簡方)

治折傷瘀血。在腹內者。劉寄奴。骨碎補。延胡索。各一兩。水二升。煎七合。入酒及童子小便。各一合。頓溫服之。(千金方)

治血氣脹滿。劉寄奴。穢實。爲末。每服三錢。酒煎服。不可過多。令人吐利。此破血之仙藥也。(衛生易簡方)

治霍亂成痢。劉寄奴草煎汁

十五畫 劉 劍 墟 墨

飲。聖濟總錄方)

① 治湯火傷灼。劉寄奴搗末。先以糯米漿。雞翎掃上。後乃搽末。並不痛。亦無痕。大驗之方。凡湯火傷。先以鹽末搽之。護肉不壞。後乃搽之。藥妙。(本事方)

② 治風入指口腫痛。劉寄奴為末。搽之即止。(聖惠方)

③ 治小兒夜啼。劉寄奴半兩。地龍炒一分。甘草一寸。水煎。灌少許。(聖濟總錄方)

④ 治赤白下痢。陰陽交帶。不問赤白。劉寄奴。烏梅。白蔞等分。水煎服。亦加梅。白加莖。(艾元英如宜方)

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡非實症及無瘀滯者禁用。

參攷資料

① 按李延壽南史云。宋高祖劉裕。小字寄奴。徵時。伐荻新州。遇一大蛇。射之。明日往。聞杵臼聲。尋之。見童子數人。皆青衣。於榛林中搗藥。問其故。答曰。我主為劉寄奴所射。今合藥傳之。裕曰。神何不殺之。曰。寄奴王者。不可殺也。答此之。童子皆散。乃收藥而反。

每遇金瘡。傳之即愈。人皆以此故。因稱此草為劉寄奴草。鄧樵通志云。江南人因漢時謂劉為卯金刀。乃呼劉為金。或又謂金寄奴。江東人又謂烏藤菜。(李時珍)

② 劉寄奴草。生江南。莖似艾蒿。長三四尺。葉似山蘭草而尖長。一莖直上。有穗。葉互生。其子似稗而細。(蘇恭)

③ 今出越州。莖之類也。高四五尺。葉似菊。其花白色。其實黃白色。作穗。夏月收苗乾之。(韓保昇)

④ 今河中府孟州。漢中潞州亦有之。春生苗莖似艾蒿。上有四稜。高二三尺。以來。葉背似柳。四月開碎小黃白花。形如瓦松。七月結實似黍而細。根淡紫色。似高苣。六月七月採苗及花子通用。(蘇頌)

⑤ 劉寄奴一莖直上。葉似蒼朮。尖長。糙澀而深。背淡。九月莖端分開數枝。一枝攢簇十朵小花。白瓣黃蕊。如小菊花狀。花罷有白絮。如苦蕒花之絮。其子細長。亦如苦蕒子。所云實如黍稷者。似與此不同。其葉亦非蒿類。(李時珍)

⑥ 劉墟草。即天名精之古籍別名。真見綱目。詳「天名精」條。

【劍脊金星】即辟瘟草大者之別名。真見綱目拾遺。詳「辟瘟草」條。

【劍脊烏梢蛇】即烏梢蛇劍脊而尾細者之別名。真見綱目。詳「烏梢蛇」條。

【劍脊石】即朴硝之古籍別名。真見和漢藥考。詳「朴硝」條。

【墟草】即大菴之古籍別名。真見和漢藥考。詳「大菴」條。

【墨】命名 本品古以黑土為之。故字從黑土而名。

處方用名 墨汁。墨水。陳墨。古籍別名 烏金。陳玄。玄香。烏玉瑛。(綱目)

基本 係用松之煙灰和膠質凝成者。

產地 醫學大辭典曰。墨以安徽歙縣所產者最有名。京墨尤良。

形態 墨之原料。乃似輕細之塵末。製成錠後。則質堅硬。其色烏黑。亦有光澤如漆者。

製法 凡使須用年遠松煙。餘皆不堪入藥。而光澤如漆且香者。更勿用。

用法 磨汁和服。入丸散火煨。細研。或水浸軟。紙包煨用。

一六二八

性質 辛。溫。無毒。

效驗 止血。化瘀。

主治 止血。生肌。膚。合金瘡。治產後血暈。崩中。卒下血。醋磨服之。又止血。及小兒客忤。搗碎。溫水服之。又昧目物。芒入目。點。辟障子。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論墨曰。利小便。通月經。治瘰癧。【清】黃宮繡本草求真論墨曰。墨長能止血。以其色黑。味辛。氣溫。而止之也。蓋黑能勝紅。紅見黑而即止。以火不勝水者。故耳。辛能散血。血散則血歸經。而不外溢。是以遇辛而即止也。溫能行血。血行則血周流。經絡。而血不聚於所傷之處。是以得溫而即止也。故凡血熱過下。如感疫鼻衄。產後血暈。崩脫。金瘡。並絲線眼中。皆可以治。如止血。則以苦酒。送墨汁。投。消腫。則以醋。磨汁。隨醋。調。並眼有絲。則以墨。磨。雞。血。速。點。客忤。中。腹。則磨地漿汁。吞。各隨病症。所用。而治之耳。但。瘟疫。熱。病。初。起。速。用。此。以止血。則非所宜。

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

配合應用 治吐血不止。金

墨磨汁。同菜煎汁飲。或生搗黃汁亦可。(集簡方)

①治衄血不止。眩冒欲死。濃墨汁滴入鼻中。(梅師方)

②治熱病衄血。出數升者。取好墨爲末。麩子白丸。梧子大。用生地黃汁下一二十九。少頃再服。仍以葱汁磨墨。滴入鼻內即止。(外臺祕要方)

③治大小便血。用好墨細末二錢。阿膠化湯調服。熱多者尤相宜。(寇氏本草衍義方)

④治卒淋不通。好墨燒一兩爲末。每服一字。溫水服之。(蘇濟方)

⑤治赤白下痢。瘰癧丸。用乾蓮。好墨各五兩爲末。醋漿和丸。梧子大。每服三四十九。米飲下。日夜六七服愈。(肘後方)

⑥治崩中漏下。青黃赤白。使人無子。好墨一錢。水服。日二服。(肘後方)

⑦治墮胎血溢不止。墨三兩。火燒醋淬三次。出火毒。沒藥一兩爲末。每服二錢。醋湯下。(普濟方)

⑧治婦人難產。墨一寸。末之。水服立產。(肘後方)

⑨治胎死腹中。新汲水磨金墨服之。(普濟方)

⑩治胞衣不下。痛引腰脊。好墨溫酒服二錢。(肘後方)

⑪治癰腫發背。醋磨濃墨塗四圍。中以豬膽汁塗之。乾又上一夜即消。(趙氏方)

⑫治客忤中惡。多於道問門外得之。令人心腹絞痛。脹滿。氣沖心。胸。不即治。殺人。搗墨水和服二錢。(肘後方)

⑬治飛絲入目。磨濃墨點之。即出。亦治塵物入目。(千金方)

⑭治產後血暈。心悶氣絕。以丈夫小便研濃墨一升服。(子母祕錄方)

用墨 錢半至三錢。施用宜忌 凡溫疫熱病之吐衄初起者禁用。

參攷資料 ①古者以黑土爲墨。故字從黑土。許慎說文云。黑烟煤所成土之類也。故從黑土。劉熙釋名云。墨者晦也。(李時珍) ②墨松之烟也。世有以粟草灰偽爲者。不可用。須松烟墨方可入藥。年遠烟細者爲佳。粗者不可用。今高麗

國每貢墨於中國。不知何物。合不宜入藥。歸廷有石油。其烟甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。不可入藥也。(寇宗奭) ③上墨以松烟用椴皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以密突中墨烟。再三以麻油入內。用火燒過造墨。謂之黑烟。黑光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。(李時珍)

【墨水】即墨和水浸化者之處方用名。詳「墨」條。

【墨汁】即磨成汁者之處方用名。詳「墨」條。

【墨石子】即無食子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「無食子」條。

【墨克爾】即山穀根之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「山穀根」條。

【墨草蓮】即鱧腸含有黑汁者之處方用名。詳「鱧腸」條。

【墨荔】即荔枝實之產於廣西平樂縣之萬山中者。賀縣及荔浦。修仁二縣山中亦均有之。其皮肉俱黑如墨。味臭而苦辣。不可食。且有

大毒。誤食之。必致心腸腐爛而死。餘詳「荔」條。

【墨烏竹】即烏鯛竹之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「烏鯛竹」條。

【墨記草】即馬薺之古籍別名。典見綱目。詳「馬薺」條。

【墨魚骨】則烏鯛骨之古籍別名。典見綱目。詳「烏鯛骨」條。

【墨品】即水晶之雜有植物質而成。墨色者。功用與尋常水晶同。參看「水晶」條。

【墨菜】即鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳「鱧腸」條。

【墨煙草】即鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳「鱧腸」條。

【墨飯草】即南天燭之古籍別名。典見綱目。詳「南天燭」條。

【墨頭草】即鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳「鱧腸」條。

【墨蘭】即建蘭花之墨色者。風乾之可治辟日。能生精神。而治背背尤佳。餘詳「建蘭花」條。

【寬筋藤】 產地 出廣東龍門。從化博羅等處。

性質 味甘。平。

效能 除風溼。消腫滿。舒筋活絡。散熱。

【廣木香】即木香之處方用名。詳「木香」條。

【廣皮】即栝皮之處方用名。詳「栝皮」條。

【廣皮炭】即栝皮焙炒成炭者之處方用名。詳「栝皮」條。

【廣石】即白石英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白石英」條。

【廣東萬年青】即吉祥草之原名。詳「吉祥草」條。

【廣茂】即慈菰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「慈菰」條。

【廣參】即海參產於廣東省之別名。典見綱目拾遺。詳「海參」條。

【廣陳皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【廣黃】即牛黃之出於廣南者。藥力較薄。詳「牛黃」條。

【廣稻麩】即紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紅木香」條。

【廣栝皮】即栝皮之處方用名。詳「栝皮」條。

【廣藿香】即藿香之處方用名。詳「藿香」條。

【廣薷梗】即薷香之處方用名。詳「薷香」條。

【廣鬱金】即鬱金之處方用名。詳「鬱金」條。

【德兒】即杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杏仁」條。

【慶】基本 慶為雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。
主治 咳嗽。

【藏蕪】即井苦之古籍別名。典見別錄。詳「井苦」條。

【摩田選】即孔雀之古籍別名。典見綱目。詳「孔雀」條。

【摩娑石】即娑娑石之古籍別名。典見綱目。詳「娑娑石」條。

【摩勒香】即乳香之古籍別名。典見綱目。詳「乳香」條。

【摩廚子】產地 生西域。形態 摩廚子為果類之一種。二月開花。四五月結實。如瓜狀。汁味香美。肥潤可茹。又供藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 益氣。潤五臟。久服令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論摩廚子曰安神養血生肌久服輕健。

【摩斯略】即獼猴之古籍別名。典見梵書。詳「獼猴」條。

【摩澤樹】即無食子之古籍別名。典見百陽雜俎。詳「無食子」條。

【摩羅】即百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【摩羅迦隸】即瑪瑙之古籍別名。典見綱目。詳「瑪瑙」條。

【撮藍】即茄連之別名。典見綱目拾遺。詳「茄連」條。

【撮法郎】即番紅花之古籍別名。典見綱目。詳「番紅花」條。

【撮火杖】古籍別名 火柴頭。目拾遺

基本 本品即撮火用之木杖。暨燒殘之柴頭。

主治 療金瘡。刮取黑炭敷之。即蟾蜍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「蟾蜍」條。

【撫芎】命名 本品為芎藭之出於江西撫州者故名。

性質 辛。溫。無毒。
主治 開鬱。寬胸。通行經脈。

配合應用 治失血湧吐。因飢食用力或因持重。致傷脈絡。用當歸二兩或三兩。酒浸洗。用撫芎

一兩。微炒。水三碗。酒一碗。煎至八分。作二次服之。取其引血歸經。並治跌撲打而傷脈絡。令人大吐者。二症中如有瘀血或加大黃下之。或加桃仁紅花破之。或加鬱金黃酒行之。皆症酌加。其效更速。（不藥良方）

◎治一切熱鬱時毒腫痛。撫芎煨研。入輕粉麻油調塗。（普濟方）

用鹽 八分至二錢。

參攷資料 蜀產曰川芎。秦產曰西芎。江西為撫芎。綱目取川芎列名。而西芎撫芎僅於註中一見。亦不分其功用。蓋芎藭以蜀產為上。味辛而甘。他產氣味辛烈。遠不逮矣。殊不知西芎與川芎。性不甚遠。俱為血中理氣之藥。第西產不及川產者。力厚而功大。至撫芎則性專於開鬱。上升。迥然不同。故石頑於川芎下。另立撫芎一條。以明不可混。今從之。（翰思軒）

【播羅子】即胡桃之古籍別名。典見梵書。詳「胡桃」條。

【撮石合草】產地 生原野。形態 撮石合草為雜草類之

一種。莖高二尺餘。葉似葎葉。十二
月萌芽。二月有花。不結實。其苗可
供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 療金瘡。

【撲落酥】即大棗之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「大棗」條。

【搗搗活】即七葉黃荊之俗名。詳
「七葉黃荊」條。

【七葉黃荊】條。

【欽常】即螻蛄之古籍別名。典見
綱目。詳「螻蛄」條。

【數低】 產地 生西番北土。
形態 數低爲菜類之
一種。形如茴香。其子可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 冷風。冷氣。下宿食。消脹
滿。

【榭】 古經別名 榭椒。檨椒。(爾雅)大葉檨。檨椹子。金
雞樹。枹。綱目。檨。枹。(日本)

外國名圖 Quercus dentata,
[Thunb.](拉丁)カシハ ハハソ

モチガシハ コガシハ(日本)

基本 係殼斗科樹屬。藥用樹
之質。

產地 生山野森林間。

十五畫 撲

搗 敷 數 榭 槽 樂 榭



(一) 榭



(二) 榭



(三) 榭



(四) 榭

形態 榭爲喬木類之落葉木
本高二三丈。葉大長倒卵形。約四
五寸。邊緣有波狀之鋸齒。下面有
褐色之毛。葉柄短互生。春日隨新

葉開花。花單性。雌雄同株。其雄花
所成之穗狀。花序常下垂。結實爲
堅果圓形。大如拇指。有椗狀之殼
斗。其質仁可供藥用。

採取 採得則取淨仁。入藥用。

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 蒸煮作粉。澀腸止痢。功
同棗子。

【榭木皮】 別名 赤龍皮。(俗
名)

性質 苦。澀。無毒。

主治 煎服除蟲及瀉甚效。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論榭木皮曰。煎湯洗惡瘡。
良。【宋】大明諸家本草論榭木皮
曰。能吐痰癆。澀五臟。【明】李時珍
本草綱目論榭木皮曰。止赤白痢。
腸風下血。

【榭若】即榭葉之原名。詳「榭葉」
條。

【榭根】 別名 獨龍鬚根。
主治 除痔。止痛。

【榭葉】 原名 榭若。
製法 蘇頌曰。入藥須
微炙令焦用。

性質 甘。苦。平。無毒。

主治 療痔。止血。及血痢。止渴。
歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論榭葉曰。活血利小便。
除面上黧赤。

【榭椒】即榭之古籍別名。典見爾
雅。詳「榭」條。

【槽頭肉】即豬頭肉之原名。詳「
豬頭肉」條。

【樂山茶】 產地 鄂州樂山。
主治 食之。止頭痛。

參攷資料 鄂州東山出茶。點
色如韭。又云。出鄂州東山。名東山
茶。色黑如韭。性與韭相反。

【榭梅】 形態 榭梅爲梅之別
種。結實如杏。鬆脆適口。
核如桃。可供藥用。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 生津止渴。清神下氣。消
酒。

【榭榆皮】 產地 生山野中。
形態 榭榆爲雜木
之一種。狀如榆。秋八月生莢。如大
榆。其皮有滑汁。可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 下熱。利水道。令人睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍

十五畫 樊 榘 樓 榘 榘 榘 榘

本草綱目論榘楡皮曰。治見解頰。

【樊楡皮】即秦皮之古籍別名。與見本草集註。詳『秦皮』條。

【榘】產地 出安南及熱帶諸地。


形態 榘爲夷果類之一種。二月開花。連着子。結實如桃。五月熟。黃色。鹽藏。食之味酸如梅。可供食與藥用。

性質 酸。涼。平。無毒。

主治 清心潤肺。生津。止渴。制亢極之陽光。消炎蒸之暑氣。降三焦實火。療鼻衄。牙宣齒齦出血。遠核仁燒存性。調水含咽即止。

【樓活仁】即瓜蒌仁之古籍別名。與見和漢藥考。詳『瓜蒌仁』條。

【樓梯草】產地 生南安。形態 獨莖。高不盈尺。長葉略似枇杷葉。齒尖稍粗。紋橫斜而青。背黃綠。可供藥用。



草 梯 樓

主治 酒煎服。治風痛。跌打損傷。

【榘】詳『榘楡白皮』條。

【榘蒲魚】即海蛇之古籍別名。與見本草拾遺。詳『海蛇』條。

【榘雞】古籍別名 紅娘子。灰花螯(綱目)

產地 生川谷臭榘樹間。

形態 榘雞爲卵生蟲類之一種。扁方而扁尖。喙向下。六足四翼。全體黑色。長則始飛。翼灰黃有斑。下面五色相間。居樹上。布置成行。秋深產卵於榘皮上。捕得可供藥用。

採取 七月間採之。

製法 凡使去翅足。以糯米或用麵炒黃色。去米麵用。

性質 苦。平。有小毒。

主治 心腹邪氣。陰痿益精。強志。生子好色。補中輕身(本經)腰痛下氣。強陰多精(別錄)

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論榘雞曰。通血閉。行瘀血。【明】李時珍本草綱目論榘雞曰。生瘰癧。散目中結翳。辟邪氣。療劇犬傷。

參攷資料 ●榘雞不可近目。(別錄) ●榘雞方藥中稀用。惟大

方辟瘟殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥能行活血也。普濟方。治目翳。撥雲膏中。與羌青斑蝥同用。亦是活血散結之義也。(李時珍)

【榘木】即醉魚草之古籍別名。與見綱目。詳『醉魚草』條。

【榘子】命名 本品味酢澀而多渣。故名。

古籍別名 木桃(埤雅)和圓子(綱目)

外國名詞 Cydonia japonica, Pers. var. pygmaea, Maxim. (拉丁)クサボケ ノボケ

シドミ チナシ(日本) 基本 係薔薇科梨屬。爲榘之子實。

產地 生山野間。

形態 榘爲灌木類之落葉木。高一二尺。枝有刺。葉小倒卵形。有托葉。早春隨葉開花。黃赤色。或白色。結實類似木瓜。圓形有凹凸。較小而色微黃。蒂核皆粗入蜜湯。

一六三二

實。香美過於木瓜。亦可供藥用。



子 榘

性質 酸。澀。平。無毒。

主治 斷痢。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論榘子曰。去惡心。明酸。止酒痰。黃水。【唐】孟詵食療本草論榘子曰。煎汁飲治霍亂轉筋。功與木瓜相近。

參攷資料 榘子。乃木瓜之酢澀者。多食傷氣。損齒及筋。(綱目)

【榘】命名 本品木理多文章。故名。

外國名詞 Cinnamomum camphora, Nees (拉丁)クス

ノキ(日本) 基本 係樟科樟屬。爲樟之木材。

產地 出於蜀閩廣等處。

形態 樟爲香木類之常綠喬木。高五六丈。大者十圍。葉卵形。革質。有葉脈三條。甚顯著。葉端尖。葉

柄長。互生。初夏葉腋抽出長輪。較以小花。黃白色。結實黑色。球形。大如豌豆。其木材細密。灰白。老則堅。帶褐色。有香氣。可供雕刻與藥用。



樟

性質 辛溫。無毒。

主治 惡氣中惡。心腹痛。鬼疰。霍亂。腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒煮服。無藥處用之。煎湯浴脚氣。疥癬風癢。作履除脚氣。

參攷資料 霍亂及乾霍亂須吐者。以樟木屑煎濃汁吐之甚良。又中惡鬼氣卒死者。以樟木燒烟薰之。待甦乃用藥。此物辛烈香煎。能去溼氣。辟邪惡故也。(李時珍)

樟木皮 採取 以年久樹上者佳。採得去外面黑色。取內層用。

性質 辛溫。無毒。

主治 天行瘟疫。霍亂吐瀉中。

十五畫 樟

惡心痛。煎服之。溼毒流注。脚疥。瘡。浴洗之。

樟木油 基本 本品係用樟木榨取之油。

形態 樟木油。色淡紫中帶微黃。氣甚辛烈。作樟腦氣。能飽充丁香油。可供藥用。

性質 辛。

主治 辟汗。以洗衣或佩之。及為防臭藥。

樟木葉 主治 脚上生瘡。嚼爛敷之。

樟木瘤 原名 樟梨。命名 本品為千年樟樹枝極間所結之物。以形如梨故名。

古鑑別名 香樟子。(綱目拾遺)

產地 出浙江省舊處州府遂昌縣。羅瑪鳩仙人壩之周公園中。又廣東省清遠。從化等處亦均有出。

採取 八九月新。以大者為佳。入藥良。

主治 磨瘡腫毒。及心胃脘痛皆效。

樟木瘻節 主治 風疰。鬼邪。

樟皮 基本 本品即香樟樹之皮。

採取 以年久老樹者。入藥良。

性質 辛溫。無毒。

主治 天行瘟疫。溼毒流注。浴疥。洗脚氣。

配合應用 治心疼。香樟樹皮。取時去面上黑色者。用內第二層皮搗碎。煎湯服即止。永不再發。(玉局方)

●治利杖傷。樟樹皮用老酒燉出味。調老公雞冠血食。止痛散血。立效。(神錦方)

●治霍亂上吐下瀉。樟樹皮一。把。水煎溫服立止。(傳信方)

●治脚上生瘡。此瘡個個如小筆管大者。用樟樹葉牙咬熟。略搽拔毒丹。外貼樟樹葉。連換數次即愈。(家寶方)

參攷資料 樟木綱目言辛溫香。氣性能除溼。故山居人患病多宜之。象山縣志。萬歷中邑大疫。有一道人。教人取千年老樟樹皮。煎飲可愈。并言樹老久。飲霜雪。其性

轉清涼。可消疫氣。此即陳藏器所云。樟木能治惡氣。中惡鬼疰之意。(魏學敏)

樟冰 即樟腦之古籍別名。典見和漢藥考。詳樟腦條。

樟柳根 即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳商陸條。

樟梨 即樟木瘤之原名。詳樟木瘤條。

樟腦 命名 本品色白如雪。狀似龍腦。乃樟樹脂膏所凝成。故名。

處方用名 潮腦。

古鑑別名 韶腦(綱目)朝腦。樟冰(和漢藥考)

外國名詞 Camphora (拉丁) Camphor (英) Kampher (德)

基本 屬樟科。為樟樹之脂膏。

產地 陳仁山藥物生產辨云。樟腦中國各省均有產。但以福州為最。係用樟樹蒸煉而成。粗砂力

猛。東江增城。惠州。南江。羅定。廣西各屬。均用樟樹葉蒸煉。幼砂力弱。日本各國均有出。每年出新兩次。四月十一日出新。

十五盤樟

形態 樟樹為常綠喬木。高可十餘丈。周圍有四丈。外皮灰褐色。有裂。木質帶紅白色。紋理顯然。葉五生。形卵圓或如長披針。末端帶尖。其質似紙。又似皮革。有細長之葉柄。面作深綠色。無茸毛。背帶藍色。有似手之脈理三層或五層。花穗軸立。短於葉。其末枝有花一至五朵。花苞帶黃色。分六瓣。有鈍端。面無茸毛。內則雄蕊與雌蕊密布其間。雄蕊多數叢生。具有腺體。粉囊分為四房。雄蕊細而長。有圓板狀之柱頭。果實為漿果。有薄皮。形圓如球。大若豌豆。色紅黑。有光澤。惟樟樹為物。異於他樹。雖破葉亦有樟腦之香氣。全樹幾無有不合樟腦之處。惟含量之多少。隨樹之種類而異。葉芽與葉柄帶紅色者。謂之赤樟。樟腦最多。葉芽與葉柄現綠色者。次之。此外尚有臭樟。黃樟各種。全樹所含之樟腦。初非各處均平。有此少彼多者。大抵樹之下部。所含最多。有五。七。四。中部略少。約四。二。三。枝部三。七。〇。枝梢二。二。三。葉內三。至四。蓋愈下愈多。愈上愈少也。其精

製樟腦 (精製樟腦一名片腦)

Camphor 為白色透映之塊片或粗末。有脂肪光澤。質柔軟。不易成粉。加酒精研和。易成白色之粉末。置空氣中。則發散而不留餘滓。比重〇・九八至〇・九九五。溶解點約在百七十五度。沸騰點須二百零四度。試燃以火。則放明焰與煤煙而燃燒。水不能溶解。然浮於水面。有回旋運動之性。酒精。伊打。哥羅仿。硫。化。炭。素。冰。醋。酸。亞。搥。登。脂。肪。油。等。俱。能。溶。解。之。有。特。異。之。芳。香。味。初。如。灼。後。轉。有。清。涼。之。氣。於。分。極。光。線。具。有。旋。之。性。

製法 用樟樹之根。葉。枝。幹。為薄片。置器中。蒸之。蒸氣着於蓋上。冷之。即結為晶。更加石灰與酒精製之。則成白色之粉末。香氣甚烈。易化氣而散失。過火即燃。可製無煙火藥。與供藥用。

用法 恒以剉末和入外治藥用。

性質 辛熱。無毒。
成分 含有一種凝固之揮發油。
效能 殺蟲辟瘴。通散辟惡。祛

寒濕。治癰疥。用作與香回蘇藥。又治陰囊。霍亂。初期疥癬。

作用 入口內能刺激唾液神經。使唾液及口腔黏液之分泌增加。加入胃中。即誘起胃部之溫感。增加令人噁氣。然不與胃液變化。至腸始次第吸入。而至血中。一部分仍不變化。而由肺臟排出。一部分變為 A-and B-Camphoglyk-ironanure 及 Yranido-cam-phogly-k-ureanure 二種。使血液循環迅速。大腸神經被激。而興奮。全身體溫增高。精神活潑。尿汗之排泄亦同時增多。若服過量。則腦部被劇激。而麻醉。甚由昏睡而死。

主治 通關。致利滯氣。治中惡邪氣。霍亂。心腹痛。寒濕脚氣。疥癬風。瘙癢。菌殺蟲辟瘴。若髮中去脚氣。

歷代記述攷證 【明】穆希雍本草經疏論樟腦曰。得純陽之氣。其味辛。其氣熱。初時以水煎成。後得火則酸。熾不息。其稟龍火之性者乎。氣亦香。能通利關節。逐中惡邪氣。復能去溼殺蟲。凡一切疥癬。風。瘙。癢。毒。瘡。癩。等。證。皆。所。須。用。

一六三四

【清】黃宮繡本草求真論樟腦曰。樟腦性真龍火。辛熱香。能於水中發火。其味益熾。治能通利關節。凡中惡卒死者。可用樟木燒烟。薰之。并能除溼殺蟲。置鞋中。除脚氣。方書每和烏頭為末。醋丸。彈子。大置於足心。火烘汗出為效。且能薰衣篋。辟蛙蟲。出韶都諸山。以樟木煎汁。煎煉結成樟腦。升打得法。能亂冰片。

國外學說 英美學說謂樟腦原產中國之廣東。而臺灣等處亦產之。乃始由樟木提出。後經升煉而成者。樟樹高而大。經冬不凋。其樹無論切碎何處。皆發樟腦香。其木白色。略香。中國多用以作箱櫃等物。樟腦樹之葉與皮。均有樟腦之質。以木作片。浸水。即能成樟腦。然此猶未淨。必用法提淨之。樟腦一質。其產中國與日本者為真樟腦。樹。西國古人所知之藥料。向東方所取者。以印度為止。由印度而東而南之各國。向不知其有樟腦。而阿刺伯人則能知此質。前荷蘭與日本常有往來之時。在七年內。運入歐羅巴之樟腦。共三十一萬

五百二十磅。間有從噶羅巴運至英因。至今西國所用之樟腦。大半出於中國與日本國。本品之形色與氣味。質脆。色白。臭烈。別具一種氣息。其味辛。用水九百分能化一分。浸酒則五百分能化四分。哥羅方則一分能化四分。伊打則七分能化十二分。洋橄油則四分能化一分。松香油則三分能化二分。冰醋酸則一分能化二分。反酸類不化。若樟腦酒而入以少許之水。旋即變白。恍如牛奶。其餘各淡強水均能化之。惟濃強水則能敗是物。其作用能行氣。又能治小便秘疼。或閉。白濁。泄瀉。霍亂。宜少服。過服則頭昏困倦。受毒狀如風癩。面紫昏迷。小便不通等。急宜解救。其藥性大半從腦筋顯出。如服數不過大。能令人舒暢。而減腦筋之惹人自得。以安靜。初服令腹之內皮發熱。後則能入腦而壯腦力。間或發表。推不至令腦洪數。約服一二次。即能平腦安身。如食更大之服。能令心之動法平和。後從皮膚與肺散出。不從溺中而出。蓋此藥能令腦動加力。令人出汗。如身多著

十五 樟

衣服。或用厚被擁護。則多出汗。而能減發熱之病。此後能平火安心。如食其大服。則有寧睡性。或有毒性。尋常用此藥。治腦筋病。作安肚。腹腦筋與止痛藥。如婦女妄言笑。病用之有益。或因腦筋病而發熱。與虛發熱。用之最合宜。若過服則壞人。始則作嘔吐。繼則譫語神昏。至沉睡而死。務宜慎用。凡熱症。炎症忌服。如轉筋症則服之最驗。第必須先服涼劑。後服此藥。方妙。又如身弱四肢不安。及婦人月經不調。與酒醉過度。均宜服。又如以此藥久搽於皮膚細軟處。則為惹性藥。又如以此藥用酒調化。或用油亦可。外搽風溼頗效。若加鴉片酒少許。尤佳。又如神昏作悶。嗅樟腦或樟腦酒亦妙。至解藥之解此毒。須先服吐劑。或用抽水節。後服行氣藥。如酒及咖啡精等。均可。處方以樟腦一分。濃酒九分。化勻為度。加白糖或牛奶同服。每服一分。七釐半至五分二釐半。又方。樟腦三兩二錢。火酒二十七兩七錢二分。和化。每服五滴至三十滴。第此酒多用以外搽風溼跌打等症。內

服者甚少。又方。樟腦一分。濃酒十八分。浸藥酒二分。共和勻為度。治新肚瀉。每服八釐七毫半。每一刻鐘服一次。又方。樟腦四分。濃酒五分。化勻為度。加白樹膠藥和服。或滴於白槽內服之。治新肚瀉。每服三釐半至五釐二毫半。又方。樟腦二分。白蜂蠟三分。煉猪油四分。杏仁油三分。共入鍋鑄化。調至冷為度。止痛用之。又方。樟腦二兩四錢。橄欖油十兩零八分。攪和搽之。療治風溼骨疼。又方。樟腦二分。辣椒半分。研末。火酒二十分。共入瓶浸七天。過布去渣為度。治風溼疼。頭痛。用每服一釐七毫半至一分七釐半。加白糖。白樹膠。作勻水服之。日本學說謂樟腦者。為由樟樹製出之結晶物。夙輸出於泰西。為彼國藥局方所採用。西人稱之曰カンフェル。又曰。日本樟腦甚珍重之。其化學上及治療上之研究。已詳盡無遺矣。依日本藥局方云。樟腦與奮刺戟防腐之效。如為刺戟藥。而於使腐質斯。神經痛。外用之。如為興奮藥。用於皮下注射。或為防腐性繃帶水。間有內用者。

每一回〇・五至二・〇。日本從前製造樟腦。須選八十年以上之老樹。因樟腦最多也。迨後原料遞少。價值步漲。即四十年未滿之樟樹。亦伐之而充需用。洎乎近年。搜刮愈工。雖破葉亦收集而採取樟腦矣。

近人學說 張山雷曰。樟腦由樟木提鍊而成。味辛氣烈。瀉湖雖謂無毒。然古人從未以為內服之藥。惟西國醫家。謂能治泄瀉。霍亂。轉筋。蓋以氣用事。而性辛熱。觀其著火即燃。猛烈可知。故善治真寒之霍亂吐瀉。轉筋。西藥膏謂受其毒者。狀如風癩。面紫昏迷。則此藥較厲。尤其可見。西醫雖謂每服可用一林士至十林士。然十林士合中稱已一分七釐半。頗嫌太多。不如樟腦酒法。以樟腦一分。和濃酒二十分。每服五林士之合宜也。一方。樟腦一分。和淨沒藥二分。明乳香三分。研勻。茶調服三釐。治痧穢腹痛甚效。蘇頌自製蠶亂藥酒。亦用之。皆惟真寒為宜。溼熱症。弗用。

配合應用 治小兒禿瘡。翻腦一錢。花椒二錢。脂麻二兩。為末。

十五畫 樟 檳 檉 漿 潞 潭 潮 潼 澀 澄 瀕 熟

以退猪湯洗後搽之(簡便方)

⑤治牙齒痛。用韶腦、珠砂等分。擦之神效。(普濟方)又用樟腦、黃丹、肥皂、去皮核等分研勻。搽丸塞孔中。(余居士選奇方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非真寒及有濕熱者禁用。

參攷資料 ①樟腦純陽。與烟硝同性。水中生火。其焰益熾。今丹爐及烟火家多用之。辛熱香竄。稟龍火之氣。去濕殺蟲。此其所長。故燒烟薰衣。篋席簾。能辟壁虱。蟲蛀。李石續博物志云。脚弱病人。用杉木為桶。濯足。排樟腦於兩股間。用帛綳定。月餘甚妙。王履醫林集要方。治脚氣腫痛。用樟腦二兩。烏頭三兩。為末。醋糊丸。彈子大。每置一丸於足心踏之下。以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎為效。(李時珍)

②樟腦出韶州。漳州。狀似龍腦。白色如雪。樟樹脂膏也。胡演升錄方云。煎樟腦法。用樟木新者切片。以井水浸三日三夜。入鍋煎之。柳木類。待汁減半。柳上有白霜。即瀝去。滓傾汁入瓦盆內。經宿自然結

成塊也。他處雖有樟木。不解取腦。又鍊樟腦法。用銅盆以陳壁土為粉。塗之後。慘樟腦一重。又慘壁土。如此四五重。以薄荷安土上。再用一盆覆之。黃泥封固。於火上款款炙之。須以意度之。不可太過。不及勿令走氣。候冷取出。則腦皆升於上盆。如此升兩三次。可充片腦也。(李時珍)

【樟腦精】 製法 以樟腦溶於酒精中。加蒸水製之。即成無色澄明之液體。可供藥用。主治 麻痺及諸寒痛。塗擦之。基本 本品係石之生於樟樹內者。

【樟炭】 主治 治心痛。能通五經。假研煎酒服。【桐皮】 即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。【檉】 即檉之日本名。詳「檉子」條。【檉子】 即食菜黃之古籍別名。典見圖經本草。詳「食菜黃」條。

【漿水】 命名 本品乃炊粟米。熱投冷水中。浸五六日。味醇生白花色。類漿者故名。古籍別名 酸漿(綱目)

性質 甘酸。微溫。無毒。

主治 調中引氣。宜和強力。通關開胃。止渴。霍亂。洩利。消宿食。宜作粥。薄暮啜之。解煩。去睡。調理肺臟。煎令酸。止嘔。噴白。人膚體如粉席。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論漿水曰。利小便。參攷資料 ①漿水性涼善走。故解煩渴。而化滯物。(朱丹溪) ②漿水浸至敗者害人。(陳嘉謨) ③漿水不可同李食。令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之。失音。(寇宗奭)

【漿水瑪瑙】 即瑪瑙中之有淡水色花者。功用詳「瑪瑙」條。【漿瓣草】 即地錦草之古籍別名。典見庚辛玉冊。詳「地錦草」條。【蕪蕪參】 即蕪蕪參之處方用名。詳「蕪蕪參」條。【潭笋】 即冬笋之古籍別名。典見食菓。詳「冬笋」條。【潮煙】 即煙草之產於廣東舊潮州府境者。功能消食下氣。頗著神效。然性最猛烈。不可多服。體弱者

忌之餘。詳「煙草」條。

【潮腦】 即樟腦之處方用名。詳「樟腦」條。

【澀】 即醋之古籍別名。典見綱目。詳「醋」條。

【澀木通】 即木通之處方用名。詳「木通」條。

【澀沙苑】 即刺蒺藜之處方用名。詳「刺蒺藜」條。

【澀蒺藜】 即刺蒺藜之處方用名。詳「刺蒺藜」條。

【澀翁】 即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「訶子」條。

【澀水砂】 即珠砂經水中飛過者之別名。典見雷公炮炙論。詳「珠砂」條。

【澀】 即水銀之古籍別名。典見別錄。詳「水銀」條。

【熟女貞】 即女貞製熟者之處方用名。詳「女貞」條。

【熟女實】 即女貞之處方用名。詳「女貞」條。

【熟半夏】 即半夏煨熟者之處方用名。詳「半夏」條。

【熟皮硝】 即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「朴硝」條。

【熟石灰】即石灰之加水化合而成者。乃化學中所稱之輕養化鈣也。功用詳「石灰」條。

【熟地黃】 命名 本品係地黃蒸曬製熟者故名。

處方用者 大熟地製熟地。鹽水炒熟地。砂仁炒熟地。九製熟地。

基本 屬玄參科。為地黃之製熟者。

形態 地黃九經蒸曬而成。熟地則較生乾者不同。質地愈重而柔軟。色亦烏黑而光澤。味轉甘。性轉溫。

採取 二月八月採製之。

製法 蘇頌曰。作熟地黃法。取地黃三二十斤。淨洗。別以揀下瘦短者三二十斤。搗絞取汁。投石

器中。浸漬令液。飯上浸三四過時。時浸漉。轉漉訖。又曝。使汁盡。其地黃當光黑如漆。味甘如飴。須發器

取之。以其脂柔喜潤也。雷斅曰。採生地黃去皮。瓷鍋上柳木甑蒸之。

攤令氣歇。并酒再蒸。又出令乾。勿犯銅鐵器。令人腎消。并髮白。男根

替女損衛也。李時珍曰。近時造法。揀取沉水肥大者。以好酒入楮砂

仁末在內。拌勻。柳木甑於瓦鍋內。蒸令氣透。頭乾。再以砂仁酒拌蒸。頭如此九蒸九曬。乃止。蓋地黃性泥。得砂仁之香而實。合和五臟沖和之氣。歸宿丹田故也。今市中惟以酒蒸熟者。不可用。

十五 燻 熟

性質 甘微苦。微溫。無毒。效能 補精氣。養肝腎。明目。烏髮。髮用作滋養強壯藥。

主治 傷中逐血痺。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱。積聚。除瘴瘵。折跌絕筋。久服輕身不老。《本經》主

男子五勞七傷。女子傷中胞漏。下血。破惡血。消血。利大小腸。去胃中宿食。飽力。斷絕。補五臟內傷不足。通血脈。益氣力。利耳目。《別錄》

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論熟地黃曰。補血氣。滋腎水。益真陰。去脾胃急痛。病後腰股酸痛。【元】王好古湯液本草論熟地黃曰。坐而欲起。目眩。無所見。

【明】李時珍本草綱目論熟地黃曰。填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟內傷不足。通血脈。利耳目。黑髮。男子五勞七傷。女子傷中胞漏。經候不調。胎產百病。【清】黃宮繡本

草求真論熟地黃曰。熟地黃甘而微溫。味厚氣薄。專補腎髓。真水。兼培黃庭后土。土厚載物。諸臟皆受其陰。故又曰能補五臟之真陰。熟地功力甚鉅。在景岳謂其真陰虧損。有為發熱。為頭痛。為焦渴。為喉痺。為嗽痰。為喘氣。或脾胃寒逆。為嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而洩利。陽浮而狂燥。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熟地之守。不足以聚之。陰虛而火升者。非熟地之重。不足以降之。陰虛而燥動者。非熟地之靜。不足以鎮之。陰虛而剛急者。非熟地之甘。不足以緩之。陰虛而水邪上沸者。舍熟地何以自制。舍熟地何以歸元。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熟地兼散精。能發汗。以汗化於血。而無陰不作汗也。然地兼潤劑。能回陽。以陽生於下。而無陰不回也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熟地不多。難以收效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用於腎氣丸。而治痰浮。畏其滑瀉者。則仲景何以用於

八味丸而醫腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽者。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。內經曰。精化為氣。得非陰亦生陽乎。景岳尚論熟地。最為明確。獨中所論脾胃寒逆。為嘔。可用地黃以治。是亦千慮一失者耳。夫既脾胃虛寒。則脾胃已受寒累。正宜用以辛熱。以為掃除。如太陽既至。堅冰自解。乃復墜以霜雪。投以陰劑。不更使寒滋甚乎。讀景岳全書。見其所論語語透闕。字字箴規。可為法守。獨於所論地黃。有脾胃虛寒。尚有未及。雖曰熟地性溫。寒從溫散。然寒至上逆為嘔。則寒已甚。豈有熱地之溫。而可令寒外散乎。但或陽盛陰微。陽藉陰化。偶有感冒。用此雜於溫散之中。或有見效。若真純陰無火。既氣上逆則嘔。則此又為深忌。至於製用地黃。宜用好酒砂仁末。同入。久蒸久曬。使其轉苦為甘。變紫為黑。方能直入腎經。耳。出懷慶肥大者佳。【清】張景岳景岳全書論熟地曰。凡諸真陰虧損者。有為發熱。為頭疼。為焦渴。為喉痺。

爲嗽痰。爲喘氣。或辟腎寒。逆爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而泄利。或陽浮而狂躁。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熟地之守不足。以聚之。陰虛而火升者。非熟地之重不足以降之。陰而躁動者。非熟地之靜不足以鎮之。陰虛而剛急者。非熟地之甘不足以緩之。陰虛而水邪泛濫者。舍熟地何以自制。陰虛而真氣散失者。非熟地何以歸源。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熟地兼散劑。方能發汗。何以汗化於血。而無陰不作汗也。熟地兼溫劑。始能回陽。何以以陽生於下。而無復不成乾也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熟地非多。難以奏效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用腎氣丸。而治痰浮。有畏其滑澤者。則仲景何以用八味丸。而醫腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。故內經曰。精化爲氣。得非陰亦生陽乎。孰

謂陽之能生。而陰之不能長也。

近人學說 周立陞曰。熟地

黃氣味相同。畏惡急使。亦不少異。但假酒力曬蒸。稍除寒氣。則微溫而大補。入少陰腎經。大補血衰。滋培腎水。本經主填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟。內傷不足。通血脈。利耳目。黑髮髮。男子五勞七傷。女子傷中胞滿。經候不調。胎產百病。皆渾著於乾地黃之下。而時珍則別之於熟地黃。元素又云。熟地補血氣。滋腎水。益真陰。去脾腹急痛。病後腰股酸痛。王好古曰。坐而欲起。目眩視無所見。詳味厥旨。蓋皆以熟地黃能補腎水。益真陰。有養血填陰之義。血旺陰足。故悉如上功也。昔仲景製八味丸。真補腎中元氣。爲諸藥首。取天一所生之源也。東垣製四物湯。治藏血之臟。以此爲君。取癸水乙木同歸一治也。合而論之。生熱之劑。皆爲血家神藥。生者寒而涼血。血熱者須用。熱則溫而補腎。血衰者須用。故王易簡謂男子多陰虛。宜熟地黃。女子多血熱。宜生地黃。又云。生地黃能生精血。天門冬引入所生之處。熟地

黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。生地黃生血而性甘寒。氣弱者服之。恐以陰寒而妨食。熟地補血而氣滯。痰飲氣結者服之。恐泥

隔而滯痰。故不得已而必用者。生用酒炒。則妨胃。熟用姜製。則不泥。此皆得用之精微者也。買九如曰。熟地產於中州。獨受中央土戊土之色黃。故名地黃。藉酒蒸熟。製黑而爲純陰。味苦化甘。性涼變溫。專入肝臟補血。因肝苦急。用甘緩之。兼主溫膽。又心爲肝之子。能益心血。取色黑走腎。更補腎水。凡內傷不足。苦志勞神。憂思傷血。經然耗精。調經胎產。皆宜用此。安五臟和血脈。潤肌膚。養心神。寧魂魄。滋補真陰。封境骨髓。爲聖藥也。取其氣味濃厚。爲濁中濁品。以補肝腎。故凡生熟地黃。天麥門冬。炙龜板。當歸。身山。茱萸。枸杞。牛膝。皆黏膩濡潤之劑。用滋陰血。所謂陰不足者。補之以味也。張山雷曰。熟地黃。潔古補血氣。滋腎水。益真陰。去脾腹急痛。病後腰股痠痛。石頑謂脾下痛。屬腎臟精傷。腰股痠。係下元不足。頗按此脾腹急痛。及腰

股痠痛。皆以肝腎真陰久傷。下元欲竭之症而言。故宜於滋填。頗有捷效。總仲醇虛筆記之集靈膏。魏柳洲之一貫煎。皆治此等之最有驗者。非泛治諸般之腹痛。腰股痛。不可不知區別。寇宗奭謂血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱。若與生地。當慮其寒。故蒸熟曝之。則其功自別。海藏治腎水不足。目眩。無所見。潮湖謂填骨髓。長肌肉。益精血。補五臟。內傷不足。黑髮。女子傷中胞滿。經候不調。瘕瘕。謂熟地補血。而痰飲之人。恐其泥隔。宜用姜汁炒。治目眩。視如無所見。謂水虧不能變物。是腎所主之病。非熱地不效。又謂地黃本心家血藥。久經蒸曝。得水火既濟之功。變黃紫爲深黑。可直入腎臟。填補真陰。兼培中州脾土。則土厚載物。諸臟皆受其蔭。

用量 三錢至八錢。
施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。
參攷資料 ①地黃生則大寒而涼。血熱者須用之。熟則微溫而補腎。血衰者須用之。又脾下痛

而補腎。血衰者須用之。又脾下痛

屬腎經。非熱地黃不能除。乃通腎之藥也。(張元素)按王頌易簡

方云。男子多陰虛。宜用熱地黃。女子多血熱。宜用生地黃。又云。生地黃能生精血。天門冬引入所生之

處。熱地黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。虞搏醫學正傳云。生

地黃生血。而胃氣弱者服之。恐妨食。熱地黃補血。而痰飲多者服之

恐泥膈。或云。生地黃酒炒則不妨胃。熱地黃薑汁炒則不泥膈。此皆

得用地黃之精微者也。(李時珍)甘微苦寒。假酒力酒蒸。則微溫

而大補。味厚氣淳。陰中之陽沉也。入手足少陰厥陰之經。治外治上

須酒製。忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸。和血生血涼血。滋陰補髓

(張元素)【熟艾】即以陳久艾葉揉搗如棉。焙乾似熟。爲針科着火灸病之用

餘詳「艾葉」條【熟附子】即附子炮熟者之處方用名。詳「附子」條

【熱南星】即天南星製熟者之處方用名。詳「天南星」條

【熱結】即沈香及伽楠香之膏膩

十五畫 熱

凝結而自朽者。二者之功用各詳本條

【熱鐵】即生鐵復經鍛鍊而再三銷拍可製器具者。功用詳「鐵」條

【熱蠶蛾】即原蠶蛾之古籍別名。典見綱目詳「原蠶蛾」條

【熱湯】命名。本品係煎煮多沸之水故名。古籍別名。麻沸湯。(仲景)百沸湯。太和湯。(綱目)滾水。開水。(俗名)

性實 甘平。無毒。主治 助陽氣。行經絡。歷代紀述攷證 【宋】嘉祐補註本草論熱湯水曰。熨蜜亂轉筋入腹及客忤卒死

參攷資料 熱湯能通經絡。患風冷氣痺之人。以湯淋脚至膝上。厚覆取汗。周身然別有藥亦假陽氣而行。四時暴泄痢。四肢冷臍腹疼。深湯中坐浸。至腹上頰頰作之。生陽諸藥。無速於此。虛寒人始坐湯中。必頭仍常令人伺守之

(慈示爽)按汪穎云。熱湯須百沸者佳。若半沸者飲之。反傷元氣。作脹。或云熱湯漱口損齒。病目人

熱 焠 摩 熨 燻 瘡

勿以熱湯洗浴。連傷人勿以熱湯濯之。能脫指甲。銅瓶煎湯服。損人之聲。李時珍。服仲景治心下痞。按之濡。即上脈浮。大黃黃連瀉心湯。用麻沸湯煎之。取其氣薄而洩虛熱也。朱真人靈驗篇云。有人患風痰數年。掘坑令坐坑內。解衣以熱湯淋之。良久。以草蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常推此意。治寒濕。加艾煎湯。治風虛。加五枝或五加煎湯。淋洗覺效更速也。(李時珍)凡傷寒傷風。傷食傷酒。初起無藥。便飲太和湯。盤許。或酸澆汁亦可。以手揉肚覺恍惚。再飲。再揉。至無所容。探吐汗出則已。(張從正)

【焠燻】即發火之古籍別名。典見吳普本草。詳「發火」條

【摩牛】即摩牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳「摩牛」條

【犛牛】即獨峯駝之古籍別名。典見綱目。詳「獨峯駝」條

【犛牛】命名。犛者旄也。其鬣可爲旄旄也。故名。古籍別名。毛犀。(廣志)犛牛。(漢書)犀牛。牝牛。竹牛。(昨夢錄)

犛牛(綱目) 外國名詞 Bos grunniens 或 Poëphagus grunniens L. (Yak or Grunting ox) (拉丁)ヤク或ヤク(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類牛科之犛牛

產地 野生於西南徼外諸深山中

形態 犛牛爲獸類野牛之一種。其體大如牛。角長。殆爲圓筒狀。角端尖。表面滑。亦有彎曲者。其有家養而無角者。肩隆起。頸至脊上密生鬣狀柔毛。面部耳部及四肢下部之毛雖短。而體旁及四肢外側之毛密而長。垂下以被短矮之四肢。毛有絲光。或白。或黑。或黑白相混。尾長亦生長毛。狀與牦牛相同。但牦小而犛大有重至于餘觔者。其角可供藥用

性質 酸鹹。涼。無毒。

主治 驚癇熱毒。諸血病。

參攷資料 犛牛角可亂犀角。但無粟紋耳。(李時珍)

十五畫 聲

【犛牛酥】性質 甘平無毒。主治 去諸風濕痺。除熱利大便。去宿食。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論犛牛酥曰合諸香摩風腫。跪跌血瘀。

參攷資料 酥本乳液。潤燥調營。與血同功。按生編云。酥能除腹內塵垢。又追毒氣發出毛孔間也。(李時珍)

【犛牛黃】性質 苦平無毒。主治 癆瘵癩狂。

參攷資料 犛牛黃可亂牛黃。但堅而不香。功用相近也。(李時珍)

【瘞瘡】即瘡癤之古籍別名。典見本草拾遺。詳「瘡癤」條。

【瘞茶】即茶之產於福建舊稱寧府境者。以其治瘞疫最著。故名。

【瘞魚】即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱒魚」條。

【瘞帶】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳「何首烏」條。

【瘞草】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【瘞客】即月季花之古籍別名。典

瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞

見綱目。詳「月季花」條。

【瘞香煌】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【瘞香蟻】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【瘞子花】即木槿之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「木槿」條。

【瘞龜】地產 生高山石下。形態 瘞龜為介類龜之一種。扁頭大嘴。可供藥用。

性質 無毒。主治 老癩發作無時。名瘞瘡。俚人呼為妖瘡。用此燒灰。頓服二錢。當效。利用頭爛佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。

【瘞玉天漿】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【瘞皮葱】即荔枝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「荔枝草」條。

○即紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紫接骨」條。

【瘞面草】即天名精之古籍別名。典見綱目。詳「天名精」條。

【瘞面還丹】即人參之古籍別名。典見廣雅。詳「人參」條。

【瘞葉芥】即大芥之古籍別名。典

瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞 瘞

見綱目。詳「大芥」條。

【瘞梅條】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。

【瘞菜】即睡菜之古籍別名。典見綱目。詳「睡菜」條。○即睡蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「睡蓮」條。

【瘞玉砂】即合玉石之古籍別名。典見綱目。詳「合玉石」條。

【瘞石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【瘞米】命名 瘞字從禾從豎。豎聲也。故名瘞。

古籍別名 瘞。赤者名瘞。白者名芭。黑者名相。(綱目)黃米。瘞。高粱。蘆粟(俗名)

外國名詞 Panicum miliaceum, L. (拉丁)キビ(日本)

基本 係禾本科稷屬。為稷之子實。

產地 稷原產東印度。現各國均有出。

形態 稷為穀類之一年生草。本高四五尺。葉細長而尖。有平行脈。生粗毛。花有三雄蕊。作小穗狀。

採取 五六月或七八月採收。

製法 採得。曬乾去殼用。

性質 甘寒無毒。效能 和胃健脾。用作緩和滋養藥。

一六四〇

花序自一花成。復構成下垂之圓錐花序。果實為穎果。其中米粒。粗硬不黏供食用。



採取 五六月或七八月採收。

製法 採得。曬乾去殼用。

性質 甘寒無毒。效能 和胃健脾。用作緩和滋養藥。

主治 益氣補不足。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論稷米曰。治熱。歷丹石毒。發熱。解苦瓠毒。【明】李時珍本草綱目論稷米曰。涼血解毒。【清】黃宮繡本草求真論稷米曰。稷有蘆

稷黍稷之分。蘆稷者。其形高如蘆。實既香美。性復中和。所以為五穀

之長。而先王以之名官也。味甘氣平。故食可以益氣和中。宜脾胃。煎湯以治霍亂。吐瀉如神。用此燒

酒。可治腹中沉疴。啾唧若黍稷之

稷。形狀似粟。但粟聚則聚。稷散則散。黍稷之粒。則疎散成枝。黍與黍稷分別。則黏者爲黍。而不黏者爲黍稷之稷。昔人於此。紛紛置辨。而不遺。一是亦未分二稷之說矣。黍稷味甘性寒。作飯疎爽。香美可愛。服之可以清熱涼血。解暑止渴。故書載治癰疽發背瘰癧之症。但多食則有冷氣內發。燒黍稷則氣必死。忌同附子死。【清】王士雄隨息居飲食譜論稷米曰。稷米甘涼清胃。補氣養脾。稷者名秫。治陽盛陰虛。夜不得寢及食鴉鵂成癥。凡黍稷粟之稷者。皆可釀酒造傷。而南方稷米。但有不黏者耳。

近人學說 丁福保曰。稷爲黍之無黏者性者。含有多量糖分與水分。而爲無毒質之食品。其效力補胃涼血。有消暑之功。但能令腹中發冷。故不可多食。尤忌爲小兒之食料云。

配合應用 ①補中益氣。羊肉一腳熬湯。入河西稷米。葱鹽煮粥食之。【飲膳正要方】

②治卒嘔不止。菜米粉。并華水服之良。【肘後方】

十五畫 稷

③治癰疽發背。菜米粉熬黑。以雞子白和塗其上。剪孔貼之。乾則神效。【葛氏方】

④辟除瘴疫。令不相染。以稷米爲末。頓服之。【肘後方】

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡有宿癰者禁用。惡氣子附子。

參攷資料 ①作飯食。安中。利胃宜脾。【心鏡】②按孫真人云。稷脾之穀也。脾病宜食之。泥勝之云。燒黍稷則氣死。此物性相制也。稷米黍稷。能解苦瓠之毒。淮南萬畢術云。祠塚之黍。嗅兒令不思母。此亦有所厭耶。【李時珍】③稷從禾從粦。粦音卽諧聲也。又進力治稼也。詩云。粦粦良耜是矣。種稷者必粦。粦進力也。南人承北音呼稷爲稷。謂其米可供祭也。禮記祭宗廟。稷曰明粢。爾雅云。稷稷也。羅願云。稷稷稷皆一物。語音之輕重耳。赤者名糜。白者名粦。黑者名秬。【李時珍】④稷米人亦不識。書記多云。黍與稷相似。又註黍米云。黍米與黍米相似。而粒殊大。食之不宜人言發宿病。詩云。黍稷稻粱。禾麻

稻 穀

菽麥。此八穀也。俗猶莫能辨證。况芝英乎。【陶弘景】⑤呂氏春秋云。飯之美者。有陽山之糜。高誘註云。關西謂之糜。音糜。冀州謂之糜。音牽。去聲。廣雅云。糜。糜也。禮記云。稷曰明粢。爾雅云。稷稷也。說文云。稷乃五穀。長田正也。此乃官名。非穀號也。先儒以稷爲粟類。或言粟之上者。皆說其義。而不知其實也。按沮勝之種植書。有黍不言稷。本草有稷不載糜。糜卽稷也。楚人謂之稷。關中謂之糜。呼其米爲黃米。其苗與黍同類。故呼黍爲秬秠。陶言與黍相似者得之矣。【蘇恭】⑥稷在八穀之中。最爲下苗。黍乃作酒。此乃作飯。用之殊塗。【孟詵】⑦稷米出粟處皆能種之。今人不甚珍此。惟祠事用之。農家惟以備他穀之不熟。則爲糧耳。【蘇頌】⑧稷與黍一類二種也。黏者爲黍。不黏者爲稷。稷可作飯。黍可釀酒。猶稻之有稷與糯也。陳藏器獨指黑黍爲稷。亦偏矣。稷黍之苗似粟而低小。有毛。結子成枝而殊散。其粒如粟而光滑。三月下種。五六月可收。亦有七八月收者。其色有赤白黃黑

數種。黑者禾稍高。今俗通呼爲黍。子不復呼稷矣。北邊地寒。種之有補。河西出者。顆粒尤硬。稷熟最早。作飯疎爽香美。爲五穀之長。而屬土。故祀穀神者。以稷配社。五穀不可遍祭。祭其長以該之也。上古以厲山氏之子爲稷。主至成湯始易。以后稷皆有功於農事者云。【李時珍】

【稷根】卽稷稻根之簡稱。詳「稷稻根」條。

【稷稻根】古籍別名 爪龍。【綱目】

主治 心氣作疼。產難橫生。

【稻米】卽糯米之原名。詳「糯米」條。

【稻尾】卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「黍」條。

【稻稷】卽糯稻之原名。詳「糯稻」條。

【稻糜】卽穀芽之古籍別名。典見綱目。詳「穀芽」條。

【穀】卽精實子之古籍別名。典見爾雅本草。詳「精實子」條。

【穀玉】卽青玉之古籍別名。典見綱目。詳「青玉」條。

十五畫 穀

【穀芽】 原名 糜米。本品為稻穀初生之細芽故名。

【穀芽】 生之細芽故名。

【穀芽】 生之細芽故名。

【穀芽】 生之細芽故名。

古籍別名 稻蘗。(綱目)

性質 甘溫無毒。

主治 快脾開胃下氣和中消食化積。

食化積。

參攷資料 阿開美氏 (Ako-mino) 試驗穀芽所得之結果如下。

(一) 稻芽發生以三十至三十五(攝氏度)之溫度為適宜。倘高至四十度或低至十三度均無發生之望。(二) 稻能芽生於水中或空氣中。水中含養氣與否或穀殼之脫除與否均無關係。(三) 稻芽之發生於空氣中較於水中為速。

(四) 穀粒能吸收之水量等於其重量之二十五倍至三十倍。荷其吸收之水量不及其重量之二十五倍。稻芽不能發生。

【穀芽】 即茶之產於四川荊雅州府境者。功用詳「茶」條。

【穀芽露】 基本 本品即穀芽所蒸取之露。

性質 甘淡無毒。

主治 健脾消食開胃和中生津液益元氣。

津液益元氣。

參攷資料 凡病後脾胃不健津液未復者用以代茶頗宜。

【穀桑】 即楮實子之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「楮實子」條。

【穀菜】 即白英之古籍別名。典見別錄。詳「白英」條。

【穀實】 即楮實子之原名。詳「楮實子」條。

【穀精珠】 即穀精草之處方用名。詳「穀精草」條。

別錄。詳「白英」條。

【穀精草】 命名 本品為穀田之餘氣所生故名。

【穀精草】 命名 本品為穀田之餘氣所生故名。

詳「穀精草」條。

【穀精草】 命名 本品為穀田之餘氣所生故名。

【穀精草】 命名 本品為穀田之餘氣所生故名。

處方用名 穀精珠。

古籍別名 戴星草。(開寶文星草。流星草。(綱目)戴精草。巴斯草。鼓植草。(和漢藥考)

外國名詞 Eriocaulon Sex-angulare, L. (Eriocaulon Siboldianum, Steud.)

基本 屬穀精科。藥用其花。

產地 穀精產區甚廣。凡田野間恒有生長。

形態 穀精雜草也。自生於池沼。或水田之附近。雖為小草。頗饒風韻。故多作盆栽。或養於水盤。葉叢生一株。歧分數條。頭端尖似蘭草。長三四寸。入秋。葉間抽出數莖。長五六寸。頂著小球。為多數鱗片集合而成。每片之間。藏綠白色之小花。開則點點如星。花後結實。既熟。隨即墮落。此草在刈稻之後。生於水田。故有穀精草之名。

採取 九月採之。採得花似白星者良。陰乾用。

性質 辛溫無毒。

效能 散風熱。明眼目。用作解除翳膜之眼科藥。

主治 喉痺。齒風痛。諸瘡疥。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論穀精草曰。頭風痛。目盲翳膜。痘後生翳。止血。【明】李士材本草圖解論穀精草曰。穀精草甘平。陽明藥也。主頭風翳膜。痘後目翳。此草收穀後荒田中生之。得穀之餘氣。獨行陽明分野。明目退翳之功。似在菊花之上。【清】黃宮繡本草求真論穀精草曰。穀精草本穀餘氣而成。得天地中和之氣。味辛微苦氣溫。故能入足厥陰肝

一六四二

及足陽明胃。按此辛能散結。溫能通達。凡一切風火齒痛。喉痺血熱。疔瘡痛癢。肝虛目昏。流淚雀盲。至晚不見。並疔瘡傷目。痘後星障。服之立能有效。且退翳明目。功力駕於白菊。而去星明目。尤為專劑。試看望月砂。係兔所食此草而成。望月砂亦能治眼。則知此更為眼家要藥矣。取嫩秧花如白星者良。

近人學說 張山雷曰。穀精草生於稻田中。刈稻之後。得穀之餘氣。故名穀精。其質輕清。故專行上焦。直達巔頂。能疏散頭部風熱。治目疾頭風。并療風氣痺痛者。亦以輕清之性。善於外達也。又生於秋季。禾苗秀實之後。能開花結實。不長秋涼。是以性溫味辛。故能上升外散。非其他明目之藥。以涼降為功之比。則散風火而無寒涼遏抑之虞。尤為良劑。開寶本草。稱其辛溫。主喉痺。齒風痛。諸瘡疥。瀨湖謂主頭風痛。目盲翳膜。皆辛以散之之意。今人僅以治風熱目赤。尚未足盡其功用也。

配合應用 穀精草得決明子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

子。木賊草。甘菊花。密蒙花。生地黃。

專除目病障翳。

① 治腦痛眉痛。穀精草二錢。地龍三錢。乳香一錢爲末。每用半錢。燒煙筒中。隨左右熏鼻。(聖濟總錄方)

② 治偏正頭痛。用穀精草一兩爲末。以白麵糊調。攤紙花上。貼痛處。乾換。(集驗方) 又用穀精草末。細絲各一錢。硝石半分。隨左右啗鼻。(聖濟總錄方)

③ 治鼻衄不止。穀精草爲末。熟麩湯服二錢。(聖惠方)

④ 治目中翳膜。穀精草。防風等分爲末。米飲服之甚驗。(明目方)

⑤ 治痘後目昏。隱淚淚出。久而不退。用穀精草爲末。以柿或猪肝片蘸食。一方加蛤粉等分。同入豬肝內煮熟。日食之。(邵真人濟衆方)

⑥ 治小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肺一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。忌鐵器。如不肯食。炙熟。搗作丸。如綠豆大。每服三十九丸。茶下。(衛生家寶方)

⑦ 治小兒中暑。吐瀉煩渴。穀精

草燒存性。用器覆之。放冷爲末。每冷米飲服半錢。(保幼大全方)

用量 三錢至四錢。

應用宜忌 凡無風熱者禁用。忌鐵。

參攷資料 ① 穀精體輕性浮。能上行陽明分野。凡治目中諸病。加而用之甚良。明目退翳之功。似在菊花之上也。(李時珍) ② 處處有之。春生於穀田中。葉莖俱青。根花並白色。二月三月採花用。花白小圓似星。可饒馬令肥。主蟲類毛魚病。又有一種莖極長。有節根微赤。出秦隴間。(蘇頌) ③ 此草收穀後。荒田中生之。江湖南北多有一科。叢生。葉似嫩穀。抽細莖。高四五寸。莖頭有小白花。點點如亂星。九月採花陰乾。云二三月採者誤也。(李時珍)

【穀類】即糯穀芒之原名。詳「糯穀芒」條。

【箬竹】即箬葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「箬葉」條。

【箬葉】 古籍別名 箬葉。遠葉。綱目。箬竹。鬼箬。小箬。(植物學大辭典)

外國名詞 Bambusa Yatai, Ohi, Ohi (拉丁) ヤキバザサ, クマザサ, チマキザサ (日本) 基本 係禾本科山白竹屬。爲箬竹之葉。

產地 多在山野原澤間。形態 箬爲溼草類之多年生常綠草本。根莖似小竹。其節與葉皆類蘆荻。葉面背淡黃。柔而韌。新舊相代。四時常青。可供藥用。性質 甘寒。無毒。

主治 男女吐血。衄血。嘔血。咯血。下血。並燒存性。溫湯服一錢匕。又通小便。利肺氣。喉痺。消癰疽。

參攷資料 ① 箬若竹而弱。故名。其生疎遠。故又謂之遠。(李時珍) ② 箬生南方平澤。其根與莖皆似小竹。其節與葉皆似蘆荻。而葉之面背背淡。柔而韌。新舊相代。四時常青。南人取葉作箬。及製茶鹽。包米糗。女人以襯鞋底。(李時珍) ③ 箬爲山白竹類中之著名者。幹高五六尺。葉闊大。長七八寸。肥大者高及一丈。稱爲鬼箬。小者高尺餘。稱爲小箬。其幹細長。強

韌。需用甚多。有時結實。亦可食云。(植物學大辭典)

【箬葉魚】即比目魚之古籍別名。典見南方異物志。詳「比目魚」條。

【箬剛】即白芨之古籍別名。典見葷芳譜。詳「白芨」條。

【箬幹】即白井之古籍別名。典見別錄。詳「白井」條。

【箬搭草】即慈姑之古籍別名。典見救荒本草。詳「慈姑」條。

【箭豬】即菱豬之別名。典見動物學大辭典。詳「菱豬」條。

【箭頭風】 產地 出廣西西南寧府境山中。形態 箭頭風爲山草類之一種。花如箭。可供藥用。

主治 風疾。四肢骨節痛。煎水。澆洗之。愈。消痰定喘。同肉煨熟。去草。以肉淡食。忌鹽醬。

【箭頭草】即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳「紫花地丁」條。

【玉如意】即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【金不換】即金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金不換」條。

【箭鐵砂】即砂狀如箭鐵者之

十五 蠶 當箱節 筵簞 篆 椶 糊 細 線 綠 編 緬

古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「**砂砂**」條。

【**筵竹**】即竹之大至數圍而肉厚可為梁棟者。功用詳「**竹**」條。

【**箱根山椒魚**】即鮓魚之別名。典見和漢藥考。詳「**鮓魚**」條。

【**節人參**】即粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「**粉沙參**」條。

【**節分草**】即菟葵之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「**菟葵**」條。

【**節瓜**】**命名** 節瓜乃冬瓜中一種小者。白皮。蔓地生。一節生一瓜故名。

主治 止渴生津。健腦。利大小便。

【**節華**】**古籍別名** 山節。達節。通漆（別錄）

基本 節華為雜草類之一種。可供藥用。其皮詳見該條。

性質 苦。無毒。

主治 傷中。痿痺。溢腫。

【**節華**】即菊花之古籍別名。典見本經。詳「**菊花**」條。

【**節華皮**】**主治** 脾中客熱。

【**筵竹**】即百葉竹之佳澀可以錯

甲者。功用詳「**百葉竹**」條。

【**簞竹**】即竹之一尺數節者。功用詳「**竹**」條。

【**篆君**】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「**蝸牛**」條。

【**篆壁**】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「**蝸牛**」條。

【**椶心草**】即龍常草之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「**龍常草**」條。

【**糊椒**】即胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「**胡椒**」條。

【**細枝**】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「**荔枝**」條。

【**線香**】**古籍別名** 龍挂香。（綱目）

性質 辛。溫。無毒。

主治 熏諸瘡癬。

參攷資料 今人合香之法甚多。惟線香可入瘡科。用其料加減不等。大抵多用白芷。芎藭。獨活。甘

松。三奈。丁香。麝香。蘇本。高良。良薑。角茴香。速香。大黃。黃芩。柏木。兜婁香。末之類為末。以榆皮麵作糊和劑。以唧筒管成線香。成條如線也。亦或盤成物。象字形。用鐵網絲懸蒸

者。名龍挂香。（李時珍）

【**綠桑蠶**】**命名** 本品於小雨後。好採桑葉故名。

【**綠桑蠶**】**古籍別名** 桑牛。天螺。（綱目）
基本 係軟體動物腹足類有肺類椎實螺科之綠桑蠶。
形態 綠桑蠶為溼生蟲類之一種。形似蝸牛殼。色黃而小。可供藥用。
採取 諸木上皆有之。入藥獨取桑上者用。
主治 大腸脫肛。燒研。和豬脂塗之。

【**編笠百合**】即貝母之日本名。詳

【**貝母**】條。

【**緬豆**】**產地** 雲南。

形態 莖生如豆。子大如栗。斑文點點。

主治 咀之。傳惡疥良。

參攷資料 滇略云。緬豆性迅。惡。誤服之。吐瀉致死。五雜俎云。滇中有神黃豆。似五倍子。能令兒童稀痘。然亦不甚驗也。

【**緬茄**】**古籍別名** 沔茄。（高麗珍異藥品）

產地 滇南及緬甸。

形態 枝葉皆似家茄。結實形大如栗。色紫。上有單帽如畫皮樣。蒂圓。堅如石。

主治 水磨。治牙痛。抹眼。去火毒。又能解百藥毒。疔瘡走黃。

參攷資料 凡疔瘡走黃毒攻入內。不知人事。但有氣者可救。用

緬茄一枚。以磁碗盛黃酒。將茄放碗內。磨得下磨不下。只管於酒內磨。一類。約熟茶時。將酒裝入長頸

錫壺內。再入連鬚葱二根。牙咬不令斷。白頭七粒。如蕎麥開花時。加蕎麥七粒。別時不用。又用小麥

令衆人口嚼成麪。封固壺口。放

水鍋內煮一炷香。取出熱服。出汗即愈。(良朋葉集)

【練】即絹之古籍別名。典見綱目。詳「絹」條。

【練石草】即馬光蒿之古籍別名。典見別錄。詳「馬光蒿」條。

【練鵲】命名。本品尾如鶴而長。毛白如練帶。故名。

古籍別名 帶鳥(禽經)三光鳥(動物學大辭典)拖白練(俗名)

外國名詞 Torpsiphone

Phaeops Temm. Japanese-aradise Flycatcher (拉丁)或

Longtailed Flycatcher (英) サントリーチヨウ或サンクワウ

テウ或サンシヤク(日本) 基本 係脊椎動物鳥類鳴禽


類鶇科之練鵲。產地 出山林間。

形態 練鵲爲林禽類之一種。其體比雀稍大。雄者頭部喉部黑色。有紺藍色之光澤。嘴青色。口緣

有粗毛如髭。頭頂有長冠毛。背面紫黑。翼尾皆黑。尾翼中央有二羽。特長達尺餘。其雌者頭黑喉灰黑。

十五畫 練

背黃赤。翼尾皆暗褐。尾羽不及雄者之長。巢居山林。春遊原野。覓食蟲類及苔蘚等物。其肉可供藥用。



練 鶇

採取 冬春採之。以食槐子者良。

性質 甘。溫。平。無毒。

主治 益氣。治風疾。細剉炒香。袋盛。浸酒中。取酒飲之。

【羯羊肉】即羊肉之處方用名。詳「羊肉」條。

【羯肉】即羊肉之古籍別名。典見綱目。詳「羊肉」條。

【羯婆羅香】即冰片之古籍別名。典見本草衍義。詳「冰片」條。

【羴角】即羚羊角之古籍別名。典見山海經。詳「羚羊角」條。

【剪刀草】即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【剪口參】即以東洋參之尾。蒸熱乾之。大尾中尾細尾夾尾等類。皆

羯 羴 剪 翫 膚 膠

從船做參(即石鏡子扇剛參)傍枝剪下。以枝條之粗細。分大中細夾等尾名目。近今市售。僞名別條是也。又有別折一種。以扇剛參之形態不正者。剪去頭尾。名曰參頭。其中身名曰別折。皆爲側路。藉以混亂別直參也。若中虛者。誤服之。立時胸腹脹滿。醫者不可不知也。其種類甚多。如參頭。東條。別折。大尾。中尾。細尾。夾尾之類是已。所云剪口者。乃是閩地藥家之命名耳。

【剪春羅】古籍別名 剪紅羅(日本) 網目 松本仙翁花

外國名詞 Lychnis fulgens, Esch. var. Cognata, Maxim. (拉丁) マツモト マツモトセ

ンラウ(日本) 基本 係石竹科剪春羅屬。爲剪春羅之花葉。

產地 在山野平原間。

形態 剪春羅爲溼草類之宿根草。根莖葉俱似剪秋羅。高二尺許。葉卵圓作披針狀。無柄。微有毛。四月間莖梢開花。有紅白雜色。其莖葉可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 火帶瘡。透膿生者。採花或葉。搗爛。蜜調塗之。爲末亦可。

參攷資料 剪春羅二月生苗。高尺餘。柔莖綠葉。葉對生。抱莖。入夏開花。深紅色。花大如錢。凡六出。周迴如剪成可愛。結實大如豆。內有細子。人家多種之爲玩。又有剪紅紗花。莖高三尺。葉旋覆。夏秋開花。狀如石竹花稍大。四圍如剪色。紅。結穗似石竹。穗中有細子。方書不見用者。計其功亦應利小便。主癰腫也。(李時珍)

【剪紅羅】即剪春羅之古籍別名。典見綱目。詳「剪春羅」條。

【剪草】即剪草之原名。詳「剪草」條。

【翫月砂】即兔屎之古籍別名。典見集驗方。詳「兔屎」條。

【膚如】即大黃之古籍別名。典見吳普本草。詳「大黃」條。

【膠朮】即大朮產於山東膠縣者之別名。典見和漢藥考。詳「大朮」條。

【膠菜】即黃矮菜之俗名。詳「黃矮菜」條。

十五畫 蕞 蓬 蓬

【膠鉛】即鉛儲之處方用名。詳「鉛儲」條。

【蕞燻仁】即蕞燻之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蕞燻」條。

【蕞】即羊蹄之古籍別名。與見詩經小雅。詳「羊蹄」條。

【蕞甚】即商陸之原名。詳「商陸」條。

【蓬朮】即蓬朮之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蓬朮」條。

【蓬朮】古籍別名。詳「蓬朮」條。

【蓬朮】古籍別名。詳「蓬朮」條。

外國名詞 Borax (Borax) 基本 為硼礦無色透明柱狀之小晶塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓬朮原以四川產為正。近日少到。因洋礬砂多到價平。多由喇喇吉打來。產西藏、印度、南北亞美利加等處。以石榴子紫茶色為好。近日新到一種。色黃白。係化學製成。形如白礬。萬國藥方卷三十一篇。名為礬酸。又名月石。和漢藥考曰。中國、印度、波斯、意大利、秘魯等產此。

形態 蓬朮即化學上之硼酸 (Na₂B₄O₇·10H₂O) 為無色透明棱柱狀結晶體。於空氣中風化。能溶於水。味鹹微甘。熱之則失却結晶水。成為白色海綿狀物質。再加熱。則熔化成為透明玻璃狀塊。製法 凡使以白如明礬者。良研如飛塵用。

性質 苦。辛。暖。無毒。功效 去痰熱。消癥核。有殺菌消毒之效。用於喉病。創傷。疥癬。又有收斂之效。用於口內炎。齒齦炎。咽喉炎。更為黏滑保喉料。在胃中能激胃液之增加。至腸略有安撫作用。少量由大便排出。大半由胃中游離而達腎臟。能增進利尿之功。且可制止尿道及膀胱之炎症。外用有直接滅菌及寄生蟲之效。惟力頗緩弱。常用以治鼻炎與黏膜炎。及作防腐利尿通經等藥。

主治 消痰止咳。破癥結喉痺。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蓬朮曰。上焦痰熱。生津液。去口氣。消障翳。除噎膈。反胃積塊。結瘰肉。陰潰。骨哽。惡瘡。及口齒諸病。【明】穆希雍本草經疏論

蓬朮曰。蓬朮出於西南番。採取煎淋而結。亦如硝石礬砂之類。本經味苦辛。氣煖無毒。然詳其用。味應有鹹。氣亦微煖。色白而體輕。能解上焦胸膈肺分之痰熱。辛能散。苦能洩。鹹能饒。故主消痰止咳。喉痺及破癥結也。寇宗奭云。含化嚙津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初覺便治。不能成喉痺也。兼能去口氣。消障翳。除噎膈。反胃。積塊。瘰肉。陰潰。骨哽。惡瘡。折傷。及口齒諸病。【清】黃宮繡本草求真論蓬朮曰。蓬朮又名礬砂。辛甘微鹹。氣溫色白。質輕功專入上除熱。故云能除胸膈熱痰也。是以痰嗽喉痺。噎膈積聚。骨哽結核。眼目翳障。口齒諸病。凡在胸膈以上者。無不可以投治。况性能消金。豈有垢膩塊積。而不可以消導乎。第當審實而治。勿輕投也。出西番者。白如明礬。出南番者。黃如桃膠。甘草湯煮化。微火炒鬆用。

國外學說 英美學說謂礬砂產西藏、印度、及南北亞美利加等處。內含一酸。即硼酸。其生成而經煉者。結冰無色。過光。露空則微化。外成白散。西藏有數湖。於湖邊產此質。能凝結成塊。與麝香大黃等物並運至遠處出售。其運至印度國者。必過雪山。謂之丁乾。其又謂之生礬砂。如加熱則放水發腫。成鬆定質。謂之煨礬砂。加熱至紅。則熔如玻璃。謂之玻璃礬砂。此質可作鐸藥之用。又有一種礬砂。於工藝中用之。此藥不常含有雜質。故其色亦甚少。其形與珠相類。或作八面珠形。或作三角珠形。色白半過光。若夜同將兩珠互擦。則發生光亮。如用火烘去其所含之水。遂變為枯礬砂。礬砂之味始則略甜。繼則略酸。而苦。以冷水二十二分能化一分。甘油則一分能化一分。沸水則一分能化二分。濃酒則不能化。如用礬砂五釐。而以樹膠水一兩浸之。即能令溶化為膏。其作用微有收斂性。能洗去皮膚上污穢。又能利小便。調經。如婦人臨盆。服此藥則能令子宮發力。又如小兒口爛。並生白點。宜以此藥外搽內服。其功用又能解熱。令子宮收縮。外用能治皮膚病。治白屑風。及遠環癩。宜將此藥入水內。至沸而不化。然後洗之。方效。處方以礬

砂二分細末。煉蜂蜜十六分。甘油一分。共研勻爲度。治口瘡。又礪砂末及冰花糖或蜜糖各等分。研勻。如小兒口爛。外用此塗之。又礪砂一錢。蜂蜜二錢。水足五兩。共化爲度。治咽喉類病。又礪砂一分。甘油一分。番荳花汽水十六分。共化爲度。婦人洗面用之。又礪砂一分。豬油膏八分。研勻爲度。治凍瘡。外吹乳。又礪砂一錢。白醋一兩。六錢。八分。和勻。搽金錢癬。又礪砂八錢。末。甘油四兩。二錢。和勻。如瘡口瘡及皮膚癢症。卽以此塗之。又礪砂末調水。或以甘油相和。搽嬰兒吮乳而致乳頭爛勻妙。如潰爛瘡。則宜塗以礪砂水。又礪砂二分。末。清水二兩。五錢。二分。和化。如婦人白帶。則用水筒射入。其用量大人每服一分。至八分。至小兒則須量其大小用之。每服五釐至一分。半。以沸水調服。又有一種名礪砂。係從礪砂與鹽強水製煉而成。更有生成在火山中。後經煉而成。西國所用之礪砂。大半爲地產。如多斯加納與里伯利海島等處。地面有開裂之處。常噴水汽。汽中有礪

十五畫 蓬

酸。將開裂處四面挖深。以磚與灰作內面。引水入其中。則水汽噴入水內。令水漸沸。待水收礪砂飽足。隨取其水。熬至將乾。待冷。凝成顆粒。曬乾。則爲尋常出售之礪砂。其作用能去臭。殺除微細生物。止發霉腐變。搽爛瘡。止膿。與架波匿酸(石炭酸)略同。如打傷。割毒痛傷口。用此藥水洗之。能解毒去微細生物。免其發膿。(西國割症後所用。壓傷口之棉紗。可用礪砂沸水化至不能化。乃透溼其布。焙乾用之。)又如瘡。水皴癩。沸水傷。皮膚作癢。肛門作癢。用以或搽或洗。均效。又如熱症中喉內生假皮。以新筆蘸藥水搽之。能殺假皮之細蟲。至小兒亦可用。照冷水二十五分。化藥一分用之。則於喉內便無損礙。其功用又能治胃內發酸。外用能治火眼。及惡瘡。潰瘡等。如用此藥一分。沸水三分。化合。將麻絨布加入浸透。提出曬乾。敷患處。治瘡症最妙。

配合應用 ①治鼻血不止。礪砂一錢。水服立止。(集簡方) ②治勞瘵有蟲。礪砂。礪砂。兔屎

等分爲末。蜜丸梧子大。每服七丸。生甘草一分。新水一鍾。採汁送下。自朔至望。五更時令病人勿盲服之。(乾坤秘傳方)

③治木舌腫強。礪砂末。生薑片。蘸指少時卽消。(普濟方) ④治咽喉發腫。腫痛。蓬砂。牙消等分爲末。蜜和中錢。含噉。(直指方)

⑤治咽喉腫痛。破棺丹。用蓬砂。白梅等分搗丸。芥子大。每噉化一丸。(經驗方)

⑥治喉痺牙疳。益砂末吹並擦之。(集簡方)

⑦治小兒陰潰。腫大不消。礪砂一分。水研塗之。大有效。(集玄方)

⑧治飲酒不醉。先服礪砂二錢妙。(相感志方)

⑨治飲食毒物。礪砂四兩。甘草四兩。真香油一斤。瓶內浸之。遇有毒者。服油一小盞。久浸尤佳。及一切惡瘡。(瑞竹堂經驗方)

⑩治弩肉瘻突。南礪砂黃色者一錢。片腦少許。研末。燈草蘸點之。(直指方)

用量 八分至錢中。

施用宜忌 凡非有餘實症者禁用。

參攷資料 ①今醫家用礪砂治咽喉。最爲要切。(蘇頌) ②礪砂味甘微鹹而氣涼。色白而質輕。故能去胸膈上焦之熱。素問云。熱淫於內。治以鹹寒。以甘緩之是也。其性能柔五金。而去垢膩。故治噎膈。積聚。竹哽。結核。惡肉。陰潰。用之者。取其柔物也。治痰熱眼目障翳用之者。取其去垢也。洪邁夷堅志云。鄧陽汪友良。因食誤吞一骨。哽於咽中。百計不下。恍惚夢一朱衣人曰。惟南蓬砂最妙。遂取一塊。含化嚥汁。脫然而失。此藥堅之微也。日華言其苦辛。酸誤矣。(李時珍) ③礪砂出南海。其狀甚光瑩。亦有極大塊者。諸方稀用。可鑄金銀。(蘇頌) ④南番者色重稠。其味和。入藥其效速。西或者其色白。其味焦。入藥其功緩。(寇宗奭) ⑤礪砂生西南番。有黃白二種。西者白如明礬。南者黃如桃膠。皆是煉結成如礪砂之類。西者柔物去垢。殺五金。與礪石同功。與砒石相得也。(李時珍) ⑥製造之工。用礪砂以作

鏗藥。有人以為明砂與腸胃之內皮相遇。可以得益。小兒口內生白點。可將明砂一錢。蜜糖一兩。和勻。搽於患處。(儒門事親方)

【蓬活】即沙蟲之古籍別名。典見萬畢術。詳「蟲」條。

【蓬草子】古籍別名。飛蓬草。(綱目)大米。黃蓬草。

(本草拾遺) 產地 生田野間。

形態 蓬草為穀類之一種。種類甚多。莖高尺餘。葉如柳葉。有鋸齒。花甚小。色白。秋枯根拔。風捲而飛。其子可供藥用。

性質 酸。澀。平。無毒。

主治 療飢作飯食。

【蓬莖朮】 處方用名 莖朮。蓬莖朮。

古籍別名 蓬莖茂。蓬莖。蓬莖。茂。茂。茂。廣茂。波殺。青莖。蓬朮。蓬莖。破關符。(和漢藥考)

外國名詞 Nedouaria(拉丁) Nedoury(英) Nivvor(德)

基本 屬蕁荷科。藥用莖朮之根。 產地 陳仁山藥物生產詳云。

莖朮產南寧。田州。大粒光滑者佳。安南。東京。亦有出。

形態 莖朮春季自宿根抽莖。與葉俱類。莖黃。葉稍狹。有紫色斑點。夏季於莖旁開紅色花。與鬱金花相似。藥用為芋狀地下莖。曬乾者。外部黃褐色。內部暗色。大一二寸。中含澱粉頗多。其質亦作粉狀。味緩和。如樟腦而微苦。

種類 ①名蓬莖者。黑色。②名蓬莖者。黃色。③名波殺者。味甘。有大毒。④莖朮在根下。並生一好一惡。惡者有毒。西戎人取之。先飼羊食。羊不食者。棄之。⑤莖朮即南中薑黃根也。生海南者。名蓬莖莖。

採取 八九月間。採根削去粗皮。蒸熟或曝乾。

製法 雷斅曰。凡使莖朮。於砂盆中以醋磨令盡。然後於火畔曬乾。重篩過用。蘇頌曰。此物極堅硬。難搗。治時熱灰火中煨令透。乘熱搗之。即碎如粉。李時珍曰。今人多以醋炒。或煮熟入藥。取其引入血分也。

性質 苦。辛。溫。無毒。

成分 含有淡黃色濃稠揮發油。樹脂。澱粉等。

效能 破血瘀。散氣結。治癥瘕。瘰癧。疥癬。用芳性之健胃藥。治消化不良症。及作祛痰藥。亦有用作通經藥。

主治 心腹痛。中惡疰。忤鬼氣。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論莖朮曰。破癥瘕冷氣。以酒醋磨服。【宋】大明日華諸家本草論莖朮曰。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛。下血。及內損惡血。【元】王好古湯液本草論莖朮曰。通肝經聚血。【明】李士材本草圖論論莖朮曰。蓬莖莖苦辛而溫。專走肝家。破積聚惡血。疏痰食作痛。【明】繆希雍本草經疏論莖朮曰。蓬莖莖味苦辛。其氣溫。能破氣中之血。入氣藥。發諸香。主積聚諸氣。為最要之藥。與京三稜同用之。良。心腹痛者。非血氣不得調和。即是邪客中焦所致。中惡疰忤鬼氣。皆由氣不調和。臟腑滯滯。陰陽乖隔。則疫癘疰忤鬼氣。得以

惡之。茂氣香烈。能調氣通竅。破利則邪無所容而散矣。解毒之義。亦同乎是。其主潰亂冷氣吐酸水。及飲食不消。皆行氣之功也。故多用酒磨。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。入肝破血。行氣故也。多用醋磨。鬱金入心。亦入肝。專主血分。亦散肝鬱。茂與三稜專能行氣破積。薑黃行氣破血。入脾為多。【清】黃宮繡本草求真論莖朮曰。莖朮辛苦氣溫。大破肝經氣分之血。蓋人血氣安和。則氣與血通。血與氣附。一有所偏。非氣盛而血凝。即血壅而氣滯。三稜氣味苦平。既於肝經血分逐氣。莖朮氣味辛溫。復於氣分逐血。故凡氣因血窒而見。積痛不解。吐酸奔豚。痞癥癭瘕等症者。須常用此調治。俾氣自血而順。而不致閉結不解矣。但蓬莖莖雖屬磨積之味。若虛人服之。最屬可危。須得參朮補助為妙。大者為廣朮。灰火煨透。乘熱搗之。或醋磨酒磨。或煮熟用。

近人學說 ①賈九如曰。蓬莖莖色紫入肝。屬血分。以其味辛性烈。專攻氣中之血。主破積削堅。有星

移電閃之能。去積聚。解塊。經閉血。撲損疼痛。與三稜功用頗同。亦勿過服。張山雷曰。蓬莪茂。今作蓬蓬。亦作蓬莪。茂字從艸。從戊。而讀如朮。義不可曉。字書惟一見於字彙補。亦不詳其義。此藥生於根下。質極堅硬。味苦辛溫。故爲下氣除寒。消食逐飲。破積攻堅。通瘀行血。亦除癥瘕之藥。開寶本草謂治小腹痛。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。婦人血氣結積。丈夫奔豚。甄權謂破癥瘕。冷氣。海藏謂通肝經聚血。大明謂治一切氣閉胃滯。食通月經。消瘀血。止撲損痛下血。及內損惡血。並非一溫通攻剋作用。惟實症爲宜。故石頑謂虛人得之。積不去而真已竭。殊爲可慮。須得參朮健運。補中寓瀉。乃爲得力。

十五畫 蓬

湯下牛錢。(楊子建護命方)
 ① 治婦人血氣逆走作痛。及腰痛。莪同乾漆等分爲末。酒服二錢。腰痛核桃酒下。(普濟方)
 ② 治小兒盤腸內約痛。以莪半兩。用阿魏一錢。化水浸。遇時焙研。紫蘇湯下一字。(保幼大全方)
 ③ 治小兒氣痛。以莪泡熱爲末。熱酒服一錢。(十全普救方)
 ④ 治初生吐乳不止。用莪少許。鹽二釐。乳一合。煎三五沸。去滓。入牛黃二釐。服之甚效。(保幼大方)
 ⑤ 治渾身燎泡。每箇出水。有膿一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌肉。卽不可治。用莪同三稜各五錢。爲末。分三服。酒調。遠進。愈。(危氏得效方)
 ⑥ 治小腸臟氣非時痛不可忍。用蓬莪茂研末。空心葱酒服一錢。(楊子建護命方)
 ⑦ 治上氣喘急。蓬莪茂五錢。酒一盞。半煎八分。服。(衛生方)
 ⑧ 正元散。治氣不接續。兼治滑瀉。及小便秘。王丞相服之有驗。用蓬莪茂一兩。金鈴子去核一兩。爲

末。入蓬砂一錢。煉過研細。每服二錢。溫酒或鹽湯空心服。(孫用和祕寶方)
 用量 八分至錢半。
 施用宜忌 凡體虛有積者。禁。用。如欲用之。須與參朮同施。
 著名方劑 易簡紅丸。破癥消癥。又治小兒脾胃之症。極有神效。(古方新解)蓬莪。三稜。橘皮。青皮。胡椒。乾薑。阿魏。礬石。上水。泛爲丸。每服六十丸。鹽湯下。
 參攷資料 蓬莪茂古方不見用者。今醫家治積聚諸氣。爲最要之藥。與三稜同用之。良。婦人藥中亦多使。(蘇頌)蓬莪色黑。破氣中之血。入氣藥。發諸香。雖爲泄劑。亦能益氣。故孫尚藥用治氣短。不能接續。及大小七香丸。集香丸。諸湯散。多用此也。又爲肝經血分藥。(王好古)鬱金入心。專治血分之病。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬入肝。治氣中之血。稍爲不同。按王執中資生經云。執中久患心脾疼。服醒脾藥反脹。用香城所栽蓬莪。蓬莪。藥泡熱研末。以水與酒。隨煎服立愈。蓋此藥能破氣中之

血也。(李時珍)蓬莪朮得酒。良。(大明)今浙江或有之。三月生苗。在田野中。其莖如錢。大高二三尺。葉背白色。長一二尺。大五寸。以米。頗類蘆荷。五月有花。作穗。黃色。頭微紫。根如生薑。而莪在根下。似雞鴨卵。大小不常。九月採。削去粗皮。蒸熟。曝乾用。(蘇頌)蓬莪。茂生西戎及廣南諸州。葉似蘆荷。子似乾椹。(李時珍)蓬莪茂行氣破血。散結。是其功能之所長。若夫婦人小兒。氣血兩虛。脾胃素弱。而無積滯者。用之。反能損氣。使食愈不消。而脾胃益弱。卽有血氣凝結。飲食積滯。亦當與健脾胃。補益元氣藥同用。乃無損耳。(經希雍)日本藥局方曰。莪朮。採掘其球形之根。莖多從橫徑。或縱徑。切斷者。本品直徑二。五至四仙米。外面灰色。有多數根。橫切。斷面亦爲灰色。皮厚約二至五密米。作圓板形者。概現有凹陷。脈管束。筒。其柔韌組織中。含有巨大扁。平。呈。偏。心。性。層。紋。之。澱。粉。粒。本。品。氣。味。如。樟。腦。而。帶。苦。味。(和。漢。藥。考)莪朮原爲東印度產。日本

於明和年間從琉球傳入。(和漢藥考)

【蓬我茂】即蓬我朮之古籍別名。典見開寶本草。詳「蓬我朮」條。

【蓬我蓬】即蓬我朮之處方用名。詳「蓬我朮」條。

【蓬菜】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木天蓼」條。

【蓬菜花】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【蓬萊香】即沈香大如竺者之古籍別名。典見綱目。詳「沈香」條。

【蓬萊紫】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【蓬蓬】即蓬我朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓬我朮」條。

【蓬蒿】即蓬蒿之古籍別名。典見綱目。詳「蒿」條。即沙米之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「沙米」條。

【蓬蒿】即蘆花之原名。詳「蘆花」條。

【蓬菓】命名 本品藤葉繁衍。蓬蓬繁菓。故名。

處方用名 蓬菓。子蓬菓。菓。古稱別名 覆盆。陵藜。陰藜。

(別錄) 寒葍。(會編) 割田藪。(和日) 葍葍。(日名)

外國名詞 Pallas Thun. Borzj. S. of N. (拉丁) クサイ

チゴ ヤブイチゴ ワセイチゴ ナベイチゴ カンスイイチゴ(日本)

基本 係薔薇科。爲懸鉤子屬。藥用蓬菓之子實與莖葉。

產地 在山野川澤間。

形態 蓬菓爲多年蔓生草本。莖有倒刺。逐節生葉。葉有三小葉。作橢圓形。大如掌。面背皆白。有缺刻。莖與葉俱生細長之輻毛。夏秋間枝梢開五瓣之白花。花後就蒂結實成簇。與蛇莓相似。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。其狀亦似熟樞而扁。經冬不凋。

採取 八九月間採實。莖葉採無時。採得陰乾。

性質 酸平。無毒。

效能 補陰氣。益精力。用爲強壯藥。

主治 安五臟。益精氣。長陰。令人堅強志。倍力。有子。久服輕身不老。(本經) 療暴中風。身熱大驚。

老(本經) 療暴中風。身熱大驚。

老(本經) 療暴中風。身熱大驚。

老(本經) 療暴中風。身熱大驚。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蓬菓子曰。益顏色。長髮耐寒溼。

配合應用 長髮不落。蓬菓子榨油日塗之。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡有溼熱者禁用。

參攷資料 蓬菓與覆盆同類。故別錄謂一名覆盆。此種生於丘陵之間。藤葉繁衍。蓬蓬繁菓。異於覆盆。故曰蓬菓。陵藜即藤也。其實八月始熟。但人名割田藪。(李時珍) 蓬菓是根名。方家不用。乃昌容所服。以易顏者也。覆盆是實名。李當之云。是人所食葍子。以津汁爲味。其核微細。今藥中用覆盆小異。未詳孰是。(陶弘景) 覆盆蓬菓乃一物異名。本謂實非根也。李云葍子者近之矣。然生處不同。沃地則子大而甘。瘠地則子細而酸。此乃子有酸味。根無酸味。(蘇恭) 蓬菓乃覆盆之苗莖。覆盆乃蓬菓之子也。按切韻葍音茂。其子覆盆也。葍者藤也。則蓬菓明是蓬菓矣。陶言蓬菓是根。錄言是

子。一物異名皆非矣。(馬志) 蓬菓是覆盆苗。處處有之。葍與尤多。苗短不過尺。莖葉皆有刺。花白子赤黃。如中彈丸大。而下有蒂承之。如柿蒂。小兒多食之。五月採實。其苗葉採無時。江南謂之葍。然其地所生差晚。三月始有苗。八九月花開。十月實。用則同。(蘇頌) 今觀採取之家說。蓬菓似葍。葍子紅色而大。其味酸甘。葉似野薔薇。有刺。覆盆子小。其苗各別。諸家本草不識。故皆說蓬菓是覆盆子之根。(陳士良) 葍子是蓬菓子也。樹葍是覆盆子也。(大明) 蓬菓非覆盆也。別是一種。雖枯敗而枝梗不散。今人不見用此。(寇宗奭) 其類有三種。惟四月熟。狀如覆盆而味甘美者。爲是覆盆子。餘不堪入藥。(陳藏器) 蓬菓嶺人謂之寒葍。沿道作葍。莖生莖小葉密。多刺。其實四五十顆作一朵。一朵大如錢面。霜後始紅。蘇恭圖經以此註覆盆誤矣。江南覆盆亦四五月熟。何當差晚耶。覆盆莖粗葉疎。結實大而疎散。不似寒葍。莖細葉密。結實小而成朵。一則夏熟。一則秋

熟。豈得同哉。(汪機)此類凡五種。予嘗親採。以爾雅所列者校之。始得其的。諸家所說。皆未可信也。一種蔓藤繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。葉大如掌狀。類小葵。葉面背皆白。厚而有毛。六七月開小白花。就蒂結實。三四十顆成簇。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。狀如熟棗。而扁。冬月苗葉不凋者。俗名割田蔗。卽本草所謂蓬蘽也。一種莖小於蓬蘽。亦有鈎刺。一枝五葉。葉小而面背皆青。光薄而無毛。開白花。四五月實成。子亦小於蓬蘽。而疎稀。生則青黃。熟則烏赤。冬月苗凋者。俗名插田蔗。卽本草所謂覆盆子。爾雅所謂葇盆也。此二者俱可入藥。一種莖小於蓬蘽。一枝三葉。葉面背皆淡白。而微有毛。開小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃者。俗名得田蔗。卽爾雅所謂葇者。故郭璞註云。葇卽葇也。子似覆盆而大。赤色。酢耐可食。此種不入藥用。一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃。葉而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅爲異。俗亦名葇。卽爾雅所謂山葇。陳藏器本

十五畫 蓬

蓮

草所謂懸鈎子者也。詳見本條。一種就地生莖。長數寸。開黃花。結實如覆盆而鮮紅。不可食者。本草所謂蛇莓也。見本條。如此辨析。則蓬蘽覆盆自定矣。李當之。陳士良。陳藏器。寇宗奭。汪機。五說近是。而欠明悉。陶弘景以蓬蘽爲根。覆盆爲子。馬志。蘇頌以蓬蘽爲苗。覆盆爲子。蘇恭以爲一物。大明以樹生者爲覆盆。皆臆說。不可據。(李時珍)

【蓬蘽子】卽蓬蘽之處方用名。詳【蓬蘽】條。

【蓬蘽葉】卽蓬蘽之處方用名。詳【蓬蘽】條。

【蓬蘽】卽鹽之產於草上者。功用詳【食鹽】條。

【蓮子粉粥】 基本 本品卽蓮實粉和米煮成之粥。

主治 健脾。止洩痢。

【蓮子草】 卽鍾腸之古籍別名。典見唐本草。詳【鍾腸】條。

【蓮中葇】 卽蓮葇之處方用名。詳【蓮葇】條。

【蓮心】 卽蓮葇之處方用名。詳【蓮葇】條。

【蓮葇】條。卽雨前茶之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳【雨前茶】條。

【蓮肉】 原名 蓮實。稱實。命名 蓮者。連也。花實相連而出。故名。其實俗稱曰蓮子。處方用名 湘蓮肉。湘蓮。白蓮子。白蓮肉。建蓮。建蓮肉。

古醫別名 水芝。(本經) 葇。葇。(爾雅) 玉擊。玉鍾。蒼葱。荷。葇。葇。珠實。珠實。湖目。紫的。澤芝。藕子。(和漢藥考)

外國名 稱 Nelumbo nucifera Gaertn. (拉丁)


基本 屬睡蓮科。其所結之蓮蓬。中有子。供藥用。卽蓮肉也。

產地 陳仁山藥物生彙辨云。白蓮產江西玉山縣。原色者爲最。其餘浙江省金華府。安徽省。均有出。已上名白蓮。建蓮產福建。觀其外實似醜。漏皮色老紅。但實味之甘甜居首。湘蓮產湖南湘潭。肉實幼嫩。宮粉紅皮色。食諸喜用之。安南東京產者名東京蓮。類似湘蓮。但粒細小。岳州洞庭湖所產者。爲湖蓮。細粒皮嫩紅。且味甜。湖北省宋河。朱河。江西省都陽。饒州等蓮。羅所產者名蓮。與湘蓮同類。略

爲大粒。形態 蓮肉爲類殼斗之質。外呈綠色。未熟者柔嫩而味甘。破之。中有苦味之青芽。有至秋季成熟者。作褐黑色。堅硬如石質。謂之石蓮子。

種植 以蓮子種者生遲。以藕芽種者。最易生長。其芽穿泥成白藕。卽密也。蓄者乃莖下白藕在泥中者。

採取 紅花者蓮優藕劣。白花者蓮劣藕優。故採實宜紅花者。採藕宜白花者。各取其得氣之盛也。其子於六七月間採者。生食之。味頗脆美。老者。八九月採取。曬乾。製法 陶弘景曰。凡使蓮子。須八九月採。黑堅如石者。乾擗破。碎。頌曰。其帶至秋黑而沉水爲石蓮子。可磨爲飯食。李時珍曰。剝其黑殼。謂之蓮肉。以水浸去赤皮。青心。入藥須煮熟去心。或曬或焙乾用。



十五畫 蓮

亦有每一斤用積豬肚一個盛貯
煮熟搗焙用。

性質 甘平。瀉。無毒。

效能 補心益脾。治泄固精。用
作強壯滋養藥。

主治 補中養神。益氣力。除百
疾。久服輕身耐老。不飢延年。

歷代紀述攷證 【唐】孟詵食

療本草論蓮肉曰。主五臟不足。傷
中。益十二經脈血氣。【宋】蘇頌

嘉祐圖經本草論蓮肉曰。搗碎和
米作粥飯食。輕身益氣。令人強健。

【宋】大明日華諸家本草論蓮肉
曰。止渴去熱。安心止痢。治腰痛及

澀精。多食令人歡喜。【明】李時珍

本草綱目論蓮肉曰。交心腎。厚腸
胃。固精氣。強筋骨。補虛損。利耳目。

除寒溼。止脾泄。久痢赤白濁。女人
帶下崩中。諸血病。【明】陳嘉謨本

草蒙筌論蓮肉曰。安靖上下。君相
火邪。【明】繆希雍本草經疏論蓮

肉曰。藉實得天地清芳之氣。稟土
中冲和之味。故味甘氣平。別錄寒

無毒。入足太陰陽明。象入手少陰
經。土為萬物之母。後天之元氣。藉
此以生化者也。母氣既和。則血氣

生。神得所養。而疾病無由來矣。藉
實正稟稼穡之化。乃脾家之果。故

主補中養神。益氣力。除百疾。及久
服輕身耐老。不飢延年也。孟詵主

五臟不足。傷中益十二經脈血氣。
大明主止渴去熱。安心止痢。治腰

痛及洩精。多食令人喜。皆資其補
益心脾之功也。【明】李士材本草

綱解論蓮肉曰。蓮子甘平。補中養
神。清心固精。定瀉。除崩帶。止赤白

濁。安靖上下。君相火邪。使心腎交
而成既濟之妙。【清】黃宮繹本草

求真論蓮肉曰。蓮子香。能入心
脾腎三經。然稟氣清芳。味得中和

甘溫而瀉。究皆脾家藥耳。中和則
上下安養。君令臣恭。而無不交之

患矣。故書載能補心與腎。及通十
二經絡血脈。即是此意。且其味瀉。

則能使氣不走。而夢遺崩帶失血
等症可理。味瀉則腸胃亦固。而無

五更洞泄之虞。惟大便燥者勿服。
去心皮。蒸熟焙乾。用茯苓山藥。

白朮。枸杞。良。蓮心味苦性寒。能治
心熱。故產後血暈者最宜。石蓮色

黑。入水則沈。入鹵則浮。煎鹽用此
鹹味苦性寒。能除喉口熱毒淋濁。

果因熱成。亦可以解。然必本於蓮
實。老於蓮房。墜入汗泥。經久堅黑

如石者方佳。若使出自粵東。產於
樹上。大苦大寒。不宜入藥。【清】王

士雄隨息居飲食譜論蓮肉曰。藕
實（即蓮子）鮮者甘平。清心養胃。

治噤口痢。生熟皆宜。乾者甘溫。可
生可熟。安神補氣。鎮逆止嘔。固下

魚已崩帶遺精。厚腸胃。愈二便不
禁。可磨以和粉作饅。或同米煮為

粥飯。健脾益腎。頗著奇功。以紅花
所結肉厚而饒者良。但性澀滯氣。

生食須細嚼。熟食須開水泡。剝衣
挑心煨極爛。

近人學說 賈九如曰。蓮肉生
於水澤。長於夏令。凝純陽而結。得

天陽地陰。浹洽之氣。稟性和平。成
清芳之質。用之去衣。主醒脾和胃。

益肺厚腸。養精神。補元氣。利耳目。
長肌肉。止脾瀉。瀉痢後。宜倍用之。

若連衣色類於血。味澀能飲。諸失
血後。佐參苓。以補脾陰。使統血歸

經。妙甚。

配合應用 ①蓮子得川黃連、
白芍藥、白朮、乾葛、升麻、紅麴、橘

紅、甘草、滑石、烏梅為丸。治滯下如

神。 ②治下痢飲食不入。俗名噤口
痢。此證大危。用鮮蓮肉一兩。黃連

五錢。人參五錢。水煎濃。細細與呷。
服完思食便癒。

③治脾胃俱虛。五更瀉。蓮子、
菟絲子、五味子、山藥、山藥、車前

子、肉豆蔻、砂仁、檳榔、灰質、人參、補
骨脂、巴戟天。有肺熱者去人參、肉

豆蔻。

④治腹食不飽。石蓮肉熬熟去
心。為末。煉蜜丸。梧子大。日服三十

丸。此仙家方也。（孟詵食療方）

⑤補中強志。耳目聰明。用蓮實
半兩。去皮。心研末。水煮熟。以粳米

三合作粥。入末攪勻食。（聖惠方）

⑥補虛益損。水芝丹。用蓮實半
升。酒浸二宿。以牙豬肚一箇。洗淨。

入蓮在內。縫定。煮熟。取出曬乾。為
末。酒煮米糊丸。梧子大。每服五十

丸。食前溫酒送下。（醫學發明方）

⑦治小便頻數。下魚真氣虛弱
者。用上方醋糊丸服。

⑧治白精遺精。用蓮肉、白茯苓
等分為末。白湯調服。（普濟方）

⑨治眼赤作痛。用蓮實去皮研

末。一盞。煎米半升。以水煮粥常食。
(醫濟方)

◎治小兒熱渴。蓮實二十枚。炒浮萍二錢半。生薑少許。水煎分三服。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡大便燥結者禁用。

著名方劑 清心蓮子飲。治心虛有熱。小便赤澀。(局方)黃芩、麥冬(去心)地骨皮、甘草(炙)車前子各半兩。石蓮子(去心)茯苓(去皮)黃耆(蜜炙)人參各七錢半。上剉末為散。每服三錢。另用麥冬十粒。水煎八分。水中沉冷。空心服。發熱加柴胡、薄荷。(此以散作湯飲)

參攷資料 ◎蓮產於淤泥而不為泥染。居於水中而不為水沒。根莖花實。凡品難同。清淨濟用。草美兼得。自蒨莖而節。節生莖生葉。生花生藕。由蒨莖而生。蓮生蓮生。荷生慈。其蒨莖則始而黃。黃而青。青而綠。綠而黑。中含白肉。內隱青心。石蓮堅剛。可歷永久。慈厥生意。藕復萌芽。展轉生生。造化不息。故

十五畫 蓮

釋氏用為引譬。妙理具存。醫家取為服食。百病可却。蓋蓮之味甘氣溫。而性清稟清芳之氣。得稼穡之味。乃脾之果也。脾者。黃宮所以交媾水火。會合木金者也。土為元氣之母。氣既和。津液相成。神乃自生。久視耐老。此其權輿也。昔人治心腎不交。勞傷白濁。有清心蓮子飲。補心腎益精血。有瑞蓮丸。皆得此理。(李時珍)◎陳蓮子雖久。煮不糜者。取蓮根新出嫩芽同煮。則爛矣。(汪謝成)◎蓮子交心腎。不可去心。然能滯氣。單用心則大降心火。(玉乘衡)◎蓮子最補胃氣。而氣虛逆者。反胃由於胃虛。而氣衝不納者。但以乾蓮子細嚼而咽之。勝於他藥多矣。至痢症。噤口熱邪傷其胃中清和之氣。故以黃蓮苦泄其邪。即仗蓮子甘鎮其胃。今肆中石蓮皆偽。味苦反能傷胃。切不可用。惟鮮蓮子煎之清香。不淨。瀉胃之功。獨勝。如無鮮蓮。乾蓮亦可。(王孟英)◎藕生水中。其葉名荷。按爾雅云。荷。芙蕖。其莖茄。其葉薹。其水薹。其華菡萏。其實蓮。其根藕。其中蒨。蒨中慈。那昂註云。芙

蕖。總名也。別名芙蓉。江東人呼為荷蕖。蓮花也。蒨。蓮實也。慈。防中青心也。郭璞註云。菡。乃莖下白薹。在泥中者。蓮乃房也。蒨乃子也。慈乃中心苦慈也。江東人呼荷花為芙蓉。北人以藕為荷。亦以蓮為荷。蜀人以藕為菡。此皆習俗傳誤也。陸璣詩疏云。其莖為荷。其花未發為菡萏。已發為芙蓉。其實。蓮之皮青裏白。其子蒨。蒨之設。青肉白。蒨內青心。二三分為苦慈也。(韓保昇)◎爾雅以荷為根名。韓氏以荷為葉名。陸璣以荷為莖名。按莖乃莖葉者。也有負荷之義。當從陸說。蒨乃嫩蒨。如竹之行鞭者。節生二莖。一為葉。一為花。盡處乃生蒨。為花葉根實之本。顯仁藏用。功成不居。可謂退藏於密矣。故謂之密。花葉當偶生。不偶不生。故根曰藕。或云藕善耕泥。故字從耦。耦者耕也。蒨音加。加於密上也。慈音選。遠於密也。蒨音函。合未發之意。芙蓉數布容穢之意。蓮者連也。花實相連而出也。蒨者的也。子在房中。點點如的也。的乃凡物點註之名。慈猶意也。含苦在內也。古詩云。食

子心無葉。苦心生意存是矣。(李時珍)

【蓮房】 蓮房用名 蓮蓬殼。蓮殼。

基本 屬睡蓮科。為蓮實之果殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓮蓬中西各省各屬均有。

形態 蓮房形圓。極似蜂房。蒂部隆起。肉殼果實。生時色青。熟則色轉黃褐。

採取 七八月採之。

製法 凡使以陳久者良。入研用或焙用。

性質 苦。澀。無毒。

效能 化滯。止血。用作收瀉藥。

主治 治血脈腹痛。及產後胎衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野菌毒。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草論蓮房曰。破血。【明】李時珍本草綱目論蓮房曰。止血崩。下血。【清】王士雄隨息居飲食譜論蓮房曰。蓮房破血。亦能止血。

酒煮服治胎衣不下。水煎飲解野菌毒。

十五靈 蓮

配合應用 治經血不止。瑞蓮散。用陳蓮殼。燒存性。研末。每服二錢。熱酒下。(婦人經驗方)

治血崩不止。不拘冷熱。用蓮殼。荊芥穗各燒存性。等分。為末。每服二錢。米飲下。(聖惠方)

治產後血崩。蓮殼殼五箇。香附二兩。各燒存性。為末。每服二錢。米飲下。日二。(婦人良方)

治漏胎下血。蓮房燒研。麪糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。(朱氏集驗方)

治小便血淋。蓮房燒存性。為末。入麝香少許。每服二錢。半米飲調下。日二。(經驗方)

治天泡淫疔。蓮殼殼燒存性。研末。并泥調塗神效。(海上方)

參攷資料 蓮房入厥陰血分。消癥散血。與荷葉同功。亦急則治標之意也。(李時珍)

蓮花 處方用名 蓮花瓣。荷花瓣。

古籍別名 芙蓉。芙蓉。芙蓉。(古今注) 水華。荷葉。(綱目)

基本 屬睡蓮科。為蓮荷之花。

產地 凡栽蓮藕之池澤間恒有之。

採取 六七月間採之。陰乾用。性質 苦。甘溫。無毒。效能 利溼。貼瘡。用作溼瘡藥。主治 鎮心。益色。駐顏。輕身。

配合應用 服食駐顏。七月七日。採蓮花七分。八月八日。採根八分。九月九日。採實九分。陰乾。搗篩。每服方寸匕。溫酒調服。(太清草木方)

治天泡淫疔。荷花貼之。(簡便方)

難產催生。蓮花一瓣。書人字吞之。即易產。(肘後方)

治墜損嘔血。墜跌積血。心胃嘔血不止。用乾荷花為末。每酒服方寸匕。其效如神。(楊洪發方摘要)

用量 三分至八分。施用宜忌 忌地黃。葱蒜。

蓮花瓣 即蓮花之處方用名。詳「蓮花」條。

蓮華躑躅 即羊躑躅之日本名。詳「羊躑躅」條。

蓮實 即蓮肉之原名。詳「蓮肉」條。

條。

蓮蓬 即蓮房之處方用名。詳「蓮房」條。

蓮蓬殼 即蓮房之處方用名。詳「蓮房」條。

蓮蓬鬚 即蓮鬚之原名。詳「蓮鬚」條。

蓮薏 命名 薏。猶意。含意在內之義。乃蓮子中之青心。故名。

處方用名 蓮心。蓮中薏。

古籍別名 苦薏。(綱目)

基本 屬睡蓮科。為蓮實中心之仁。

性質 苦。寒。無毒。效能 清熱。解渴。主治 血渴。產後渴。生研末。米飲服二錢立愈。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論蓮薏曰。止霍亂。【明】李時珍本草綱目論蓮薏曰。清心去熱。【清】汪訥庵本草備要論蓮薏曰。蓮心為末。米飲下。療產後血渴。

【清】王士雄隨息居飲食譜論蓮薏曰。蓮子中青心也。苦涼。飲液止汗。清熱養神。止血固精。所謂能

培君相火邪也。

配合應用 治勞心吐血。蓮子心七個。糯米二十一粒。為末。酒服。(臨安張上舍方)

治小便遺精。蓮子心一撮。為末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。日二服。(醫林集要方)

一六五四

培君相火邪也。

配合應用 治勞心吐血。蓮子心七個。糯米二十一粒。為末。酒服。(臨安張上舍方)

治小便遺精。蓮子心一撮。為末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。日二服。(醫林集要方)

參攷資料 食蓮子不去心。令人作吐。(陳藏器) 蓮心。甘苦。鹹。倒生根。由心走腎。能使心火下通於腎。又回環上升。能使腎水上潮於心。(王履齋)

蓮藕 即藕之處方用名。詳「藕」條。

蓮鬚 原名 蓮蓬鬚。處方用名 白蓮鬚。淨蓮鬚。

古籍別名 佛座鬚。(綱目)

外國名 Lotus Stems。基本 屬睡蓮科。為蓮花中間之莖鬚。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓮鬚各省均有出。以廣東各屬為最好。安南。東京為最多出。

蓮鬚各省均有出。以廣東各屬為最好。安南。東京為最多出。

形態 蓮葉長僅寸餘。質輕如
綿。生時色黃。乾則色白。

採取 夏季開花時。晨早採之。
採得陰乾待用。

性質 甘。溫。無毒。

效能 固腎。清精。用作收清藥。
主治 清心通腎。固精氣。烏髮
髮。悅顏色。益血止血。血崩吐血。

歷代記載攷證 【明】程希雍

本草經疏論蓮葉曰。蓮葉一名
佛座鬚。味甘。氣溫。本經不收。而
古方固真補益方中。往往用之。詳
其主治。乃是足少陰經藥。亦能通
手少陰經。能清心入腎。固精氣。烏
髮。止吐血。療滑泄。同黃蘗。砂仁
沙苑。葵。藜。魚。膠。五味子。覆盆子。生
甘草。牡蠣。作丸。治夢遺精滑最良。

【明】李士材本草圖解論蓮葉曰。
蓮葉甘。清。清心止血。通腎固精。男
子腎泄。女子崩帶。【清】黃宮繡本
草求真論蓮葉曰。蓮葉甘。溫。而清。
功與蓮子略同。但清性居多。服之
能清心通腎。益血固精。烏髮黑髮。
止崩住帶。如三因固真丸。巨勝子
丸。並皆用之。凡慾勤精薄。而見滑
脫不禁。治當用此。秘濟。但不似龍

十五畫 蓮 菴 蓴 蓴 菴

骨寒清。有收陰定魂安魄之妙。壯
燥滅淫微寒。兼有化堅解熱之功。
金櫻徒有阻滯之力。而無清心通
堅之理耳。

辨偽 陳仁山曰。蓮葉有真有
偽。偽者葵花也。蓮葉身帶扁闊而
軟。葵花原來一球散開像蓮葉。但
條子幼而帶硬。若氣味則難分也。

配合應用 治久近痔漏三十
年者。三服除根。用蓮葉。黑牽牛頭
末各兩半。當歸五錢為末。每空心
酒服二錢。忌熱物。五日見效。(孫
氏集效方)

用量 八分至錢半。
應用宜忌 凡小便利者禁
用。忌地黃。葱蒜。

參攷資料 蓮葉溫而不熱。
血家清家。尊為上品也。(孫思邈)

蓮葉甘。清。清心而諸竅之血出
可止。固腎而丹田之精氣無遺。可
止洩瀉。能黑髮。(陳默齋)

【蓴】即肉蓴蓴之簡稱。詳「肉
蓴蓴」條。

命名 蓴字本作蓴。純乃
絲名。其莖似之。故名。
古稱別名 蓴菜。(別錄)芡水

葵。(詳疏)露葵。馬蹄草。歸帶。缺盆
草。嫩莖名稚蓴。舒長者名絲蓴。秋
老者名葵蓴。結蓴。現蓴。龜蓴。(綱
目)

外國名詞 Brasenia Purp.
pura, caesp. (拉丁) シンサ
イ ヌナハ (日本)

基本 係睡蓮科蓴屬。藥用蓴
菜之莖葉。
產地 生江浙湖澤中。
形態 蓴菜為水草類之多年
生草本。亦為蕨類植物之一種。其
嫩莖嫩葉。被以黏液。葉橢圓形如
盾狀。浮水面有長葉柄着生於葉
身下面之近中央處。夏月花生於
葉腋。萼三片。花冠三瓣。俱呈赤褐
色。雄蕊紫赤色而數多。結實如棠
梨。中有細子。其莖葉可供食與藥
用。



蓴

性質 甘。寒。無毒。
主治 消渴。熱痺。

歷代記載攷證 【唐】孟詵金
藥本草論蓴菜曰。和鯽魚作羹食。
下氣止嘔。多食屋丹石。補大小腸
虛氣。不宜過多。【宋】大明諸家本
草論蓴菜曰。治熱瘧。厚腸胃。安下
焦。逐水解百藥毒。并難氣。

參攷資料 蓴性冷而補下
氣。雜鱸魚作羹食。亦逐水而性滑。
服食家不可多用。(陶弘景) 蓴
久食大宜人。合鮓魚作羹食。主胃
弱。不下食者至效。又宜老人。應入
上品。故張翰臨秋風思吳中之鱸
蓴羹也。(蘇恭) 蓴體滑。常食發
氣。令關節急。嗜睡。脚氣論中令人
食之。此誤極深也。溫病後。脾胃不
能消化。食者多死。予所居近湖。湖
中有蓴。稱年中疫甚。飢人取蓴食
之。雖病瘥者。亦死。至秋大旱。人多
血痢。湖中水竭。掘蓴食之。罔境無
他。蓴之功。於斯見矣。(陳藏器)

蓴雖冷補。熱食及多食。亦擁氣
不下。甚損人胃。及齒。令人顏色益
損。毛髮和醋食。令人骨痿。(孟詵)

【蓴菜】即蓴之古籍別名。與見別
錄。詳「蓴」條。

【蓴】即白花益母草之古籍別名。

真見爾雅。詳與益母草條。

【藜根】 主治 血氣攻心。洗到浸酒飲。

【藜酒】 基本 本品為藜汁和麴米所釀之酒。

主治 久服。聰耳明目。健脾強胃。

【藜莖葉】 性質 辛溫。無毒。主治 歸舌。除大小腸邪氣。利中益志。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論藜莖葉曰。乾之醃酒。主治風冷。大良。【唐】陳藏器本草拾遺論藜莖葉曰。作生菜食。能入腰脚。煮湯浸脚。治霍亂轉筋。黃汁日飲。治痲痺。搗爛傅狐尿瘡。

【宋】大明諸家本草論藜莖葉曰。脚暴癢。赤藜燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸罨。立愈。【明】李時珍本草綱目論藜莖葉曰。殺蟲伏穢。

參攷資料 黃帝云。食藜過多。有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣。陰核痛求死。二月食藜。傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食藜。變為淋。與大麥類相宜。孫思邈。

【藜實】 命名 藜類皆高揚。故字從藜。高飛貌也。古人種藜為蔬。收子入藥。故名。

基本 屬藜科。藥用藜之子實。產地 湖澤水濱。間恒有生長焉。

形態 藜屬溼草類。中為一年之生草本。種類甚多。花色皆紅白。子大亦皆似胡麻。色黑而尖扁。採供藥用。

採取 秋季採實。尤以青紫香三者佳。採得陰乾用。

性質 辛溫。無毒。效能 明眼目。消癰腫。用作眼科藥。又為瘡毒藥。

主治 明目。溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫。癰瘍。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論藜實曰。歸鼻。除腎氣。去癰疽。止霍亂。治小兒頭瘡。

近人學說 張山雷曰。藜之種類不一。有宜於高燥之地。有產於下溼之旁。高者枝葉扶疏。迷離蔽障。小者莖條柔細。掩映水濱。然莖葉雖有巨細之分。而形式花穗。約略近似。雖有馬藜。水藜。葦草。水葦。花等名。要皆一類數種。無甚區別。

其味皆辛。生長極易。故皆善於走竄。為利水消腫之猛藥。又莖葉紫赤。花穗殷紅。則又入血分。而破瘀逐血。磨積消痞。本經止有藜實。別錄乃增以葦草。至瀕湖綱目。則羅列四五種。其氣味。本經謂之辛溫。所以後世有藜辣草之名。別錄以紅草為味鹹微寒。似不可據。本經藜實。稱其下水氣。治面浮腫癰瘍。甄權謂其治癰疽。止霍亂。弘景謂藜葉乾之。釀酒。主風冷。藏器謂藜葉治霍亂轉筋。黃汁日飲。治痲痺。

日華謂赤藜燒灰淋汁浸足。治暴癢。唐本草謂水藜葉。搗敷蛇傷。絞汁服之。解蛇毒。入腹心悶。又治脚氣腫痛。成瘡。水煎漬之。瀕湖謂水葦花。散血消積止痛。凡此主治。皆是通泄宣導。利水破血之用。石頑謂婦人月事來時。不可食藜及葦。易為血淋帶下。亦以辛泄過度。破氣傷血故也。又謂藜實水葦花子。破瘀消積。力量甚峻。最易墮胎。媿婦必不可犯。亦有血氣素虛。而月事清少。非因於瘀滯者。亦不可誤與也。

配合應用 ①治傷寒發後。因交後卵腫。或縮入腹痛。藜子一把。水按汁飲一升。【肘後方】

②治霍亂煩渴。藜子一兩。香薷二兩。每服二錢。水煎服。【聖惠方】

③治小兒頭瘡。藜子為末。蜜和雞子白同塗之。蟲出不作瘡。【藥性論方】

④治蝸牛咬毒。毒行偏身者。藜子煎水浸之。立愈。不可近陰令弱也。【陳藏器方】

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①藜實多食。吐水壅氣。損陽。【甄權】 ②此類多人所食。有三種。一是青藜。人家常用。其葉有圓有尖。以圓者為勝。所用即此也。一是紫藜。相似而紫色。一是香藜。相似而香。並不甚辛。好食。【陶弘景】 ③藜類甚多。有青藜。香藜。水藜。馬藜。紫藜。赤藜。木藜。七種。紫赤二藜。葉小狹而厚。青香二藜。葉亦相似。而俱薄。馬水二藜。葉俱闊大。上有黑點。水藜一名天藜。莖生。葉似柘葉。六藜花皆紅白。子皆大如胡麻。赤黑而尖扁。惟木藜花黃白。子皮青滑。諸藜並冬死。惟香藜宿根重生。可為生菜。【韓保昇】

○木薯亦有大小二種。皆蔓生。陶氏以青薯入藥。餘亦無用。三茅君傳有作白薯醫方。藥譜無白薯。疑即青薯也。(蘇頌)韓保昇所說甚明。古人種薯為蔬。收子入藥。故禮記烹雞豚魚鮒。皆實薯於其腹中。而和羹胎。亦須切薯也。後世飲食不用。人亦不復栽。惟造酒麴者。用其汁耳。今但以平澤所生。香薯。青薯。紫薯為良。(李時珍)薯實。即神農本草第十一卷中水薯之子也。彼言薯則用莖。此言實即用子。故此復論子之功。故分爲二條。春初以葫蘆盛水浸。高掛於火上。晝夜使煖。遂生紅芽。取以爲蔬。以備五辛盤。又一種水紅。與此相類。但苗莖高及丈。取子微炒。礮爲細末。酒調二三錢服。治瘰癧久則效。效則已。(慈宗爽)

【薯蕷】原名 山薯。產地 生平澤麥田間。形態 薯蕷爲菜類之一種。苗如葱韭。但葉比常蕷爲小。力較常蕷爲大。可供藥用。性質 辛溫。無毒。

主治 霍亂。腹冷脹滿。冷氣攻

擊。腹痛不調。婦人產後。血攻胸膈刺痛。兼服之。

【薯蕷】原名 薯蕷。本品味辛辣如刺。痛兼服之。

古籍別名 薯蕷。(本草拾遺)產地 生海中。形態 薯蕷爲蟲類之一種。其色紫有錦紋。肉可食與供藥用。性質 辛平。無毒。

主治 飛尸。遊蟲。生食之。或浸以酒醋食。彌佳。

【薯蕷】即藍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藍實」條。

【薯蕷】即薯蕷之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】即薯蕷之原名。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

十五畫 薯

【薯蕷】原名 薯蕷。本品味辛辣如刺。痛兼服之。

古籍別名 薯蕷。(本草拾遺)產地 生海中。形態 薯蕷爲蟲類之一種。其色紫有錦紋。肉可食與供藥用。性質 辛平。無毒。

主治 飛尸。遊蟲。生食之。或浸以酒醋食。彌佳。

【薯蕷】即藍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藍實」條。

【薯蕷】即薯蕷之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】即薯蕷之原名。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

薯

【薯蕷】原名 薯蕷。本品味辛辣如刺。痛兼服之。

古籍別名 薯蕷。(本草拾遺)產地 生海中。形態 薯蕷爲蟲類之一種。其色紫有錦紋。肉可食與供藥用。性質 辛平。無毒。

主治 飛尸。遊蟲。生食之。或浸以酒醋食。彌佳。

【薯蕷】即藍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藍實」條。

【薯蕷】即薯蕷之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】即薯蕷之原名。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

薯

【薯蕷】原名 薯蕷。本品味辛辣如刺。痛兼服之。

古籍別名 薯蕷。(本草拾遺)產地 生海中。形態 薯蕷爲蟲類之一種。其色紫有錦紋。肉可食與供藥用。性質 辛平。無毒。

主治 飛尸。遊蟲。生食之。或浸以酒醋食。彌佳。

【薯蕷】即藍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藍實」條。

【薯蕷】即薯蕷之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】即薯蕷之原名。詳「薯蕷」條。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

【薯蕷】原名 薯蕷。古籍別名 蛤蕷。棋聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)薯蕷(藏器)通撥(扶南傳)薯蕷(大明會典)

外國名詞 Piper longum 薯本 屬胡椒科。爲薯蕷之實。

一六五七

十五 薑 蓼 葶 藶

一六五八

氣也。

近人學說

張山雷曰。薑。亦作薑。原出波斯。蓋亦彼中方言。

故無正字。氣味辛溫。固亦脾腎虛寒之主藥。葶。謂溫中下氣。補腰

壯。消食。除胃冷。陰疝。則功用可知。

（葶。器別有。薑。勃沒一條。亦言辛溫。治冷氣。嘔逆。心腹脹滿。食不

消化。陰汗。寒疝。核腫。婦人內冷。無子。除腰腎冷云云。藥名主治皆同。

蓋本是復出之未及。則除者。而瀨湖亦引之。附入薑。之後。蓋亦失檢。

李珣謂。治水瀉。虛痢。嘔逆。痞心。臟腑虛冷。腸鳴。大明謂。治霍亂。

冷氣。心痛。其旨皆同。惟瀨湖謂。是頭痛。鼻淵。牙痛。要藥。取其辛熱。能

入陽明。而散浮熱。頗按頭痛。固有真寒一症之宜用。大辛大溫者。但

鼻淵。牙痛。本皆火症。古人偶用辛散之藥。蓋亦反佐之義。用作嚮導。

瀨湖。竟以為散浮熱。恐是誤會。石頭和之非也。

配合應用 治冷痰。惡心。薑一兩。為末。食前。用米湯。服半錢。

（聖惠方） 治暴瀉。身冷。自汗。甚則欲嘔。

小便清。脈微弱。宜已寒丸治之。薑

肉桂各二錢。牛高良薑。乾薑各三錢。牛為末。糊丸。梧子大。每服三

十九。薑湯下。（和劑局方） 治胃冷口酸。流清水。心下速

時痛。用薑。半兩。厚朴。薑汁。浸炙。一兩。為末。入熱鯽魚肉。研和。丸。綠

豆大。每米飲下二十九。立效。（余居士選奇方）

療氣成塊。在腹不散。用薑。一兩。大黃一兩。並生。為末。入麝香

少許。煉蜜丸。梧子大。每冷酒服三十丸。（永類鈴方）

治婦人血氣作痛。及下血無時。月水不調。用薑。鹽炒。蒲黃炒

等分。為末。煉蜜丸。梧子大。每空心溫酒服三十丸。兩服即止。名二神丸。（陳氏方）

治偏頭風痛。薑。為末。令患者口含溫水。隨左右痛。以左右鼻

吸一字有效。（經驗良方） 治鼻流清涕。薑。末吹之。有

效。（衛生易簡方） 治風蟲牙痛。薑。末搗之。煎

蒼耳湯。漱去涎。本草權度。又用薑。末。木槌子肉。研。化。開。隔。鼻。又

用薑。胡椒。等分。為末。化。蠟。丸。麻子大。每以一九塞孔中。（聖濟總錄方）

用量 八分至錢半。 施用宜忌 凡肺脾有實熱。火者禁用。

參攷資料 薑。走。胃。冷。氣。嘔。吐。心。腹。滿。痛。者。宜。之。多。服。走。泄。真。氣。令。人。腸。虛。下。重。（慈。不。爽）

按唐太宗實錄云。貞觀中。上以氣病久未痊。服名醫藥不應。因詔

訪求其方。有術士進黃牛乳煎薑。方。御用有效。掌禹錫亦記其事。

云。後累試於虛冷者必效。（蘇頌） 薑。撥。當。作。薑。出。南。方。草。木。狀。

番語也。陳藏器本草作畢勃。扶南傳作暹撥。大明會典作薑。撥。又段

成式酉陽雜俎云。摩伽陀國呼為薑。撥。梨。拂。森。國。呼。為。阿。梨。訶。陀。

李時珍。薑。撥。生。波。斯。國。叢。生。莖。葉。似。薔。薇。其。子。緊。細。味。辛。烈。於

薔。薇。胡。人。將。來。入。食。味。用。也。（蘇恭） 其根名畢勃。似柴胡而

黑硬。（陳藏器） 今嶺南特有之。多生竹林內。正月發苗。作叢。高三

四尺。其莖如筋。葉背圓。如蕺菜。闊

二三寸。如葉。面。光。而。厚。三。月。開。花。白色在表。七月結子。如小指大。長

二寸已來。青黑色。類。棋。子。節。長。九。月。收。米。曬。乾。南。人。愛。其。辛。香。或

取葉生茹之。復有舶上來者。更辛香。（蘇頌） 段成式言。青州防風

子。可。亂。薑。蓼。蓋。亦。不。然。薑。蓼。氣。味。正。如。胡。椒。其。形。長。一。二。寸。防。風。子

圓。如。胡。荽。子。大。不。相。侔。也。（李時珍）

【薑撥根】 原名 薑勃沒。 性質 辛溫。無毒。

主治 五分七傷。冷氣。嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗。寒疝。核腫。

婦人內冷。無子。治腰腎冷。除血氣。【薑澄茄】 即畢勃之古籍別名。

典見綱目。詳【畢勃茄】條。【薑】 即薑之古籍別名。典見別錄。

詳【薑】條。【薑花】 性質 滑。無毒。

主治 入藥。髮方。【薑殼】 亦止瀉痢。

【薑】 即薑之古籍別名。典見綱目。詳【薑】條。

【薑子】 即決明子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「決明子」條。

【蕤蕤仁】即瓜蒌仁之原名。詳「瓜蒌仁」條。

【葶菜】命名。本品味辛辣如火。越人故名。

古籍別名 葶菜。辣米菜。(綱目) 犬芥(日本)

外國名詞 Nasturtium montanum, Wall. (拉丁) イヌガラシ アセダイコン (日本)

基本 係十字花科葶菜屬。藥用葶菜之莖葉。

產地 野生田間。

形態 葶菜爲菜類之多年生。莖草本。其根深入於地。葉除頗難。莖隨土地之肥瘠大小不一。高二三寸至一二尺。葉長橢圓形。羽狀分裂。亦有不分裂者。葉緣有不齊之缺刻及鋸齒。春季開花。總狀花序。花小黃色。四花瓣。四強雄蕊。結實爲細角乾果。細而長。呈線形。約五六分。熟則裂。其莖葉可供食與藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 去冷氣。腹內久寒。飲食

十五畫 蕤

蕤 蔞 菘 蔓

不消。令人能食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葶菜曰。利胸膈。豁冷痰。心腹痛。

參攷資料 葶菜細切。以生薑洗拌。或略洩。食之爽口消食。多食發痲疾。生熱(李廷飛)

【蔞】即白蔞之古籍別名。典見綱目。詳「白蔞」條。

【菘母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【蔓子】即菘草之古籍別名。典見爾雅。詳「菘草」條。

【蔓女蘿】即松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「松蘿」條。

【蔓延】即王孫之古籍別名。典見吳普本草。詳「王孫」條。

【蔓芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【蔓荔枝】即苦瓜之日本名。詳「苦瓜」條。

【蔓荆子】命名。蔓荆苗蔓生。故名。

古籍別名 黃荆。大荆子。借法實。陸績丸(和漢藥考)

外國名詞 Vitex trifolia,

L. var. unifoliolata, Schauer. (拉丁)

基本 屬馬鞭草科。藥用蔓荆之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東。平縣爲多。各省均有。四月新。

形態 蔓荆屬灌木。高三四尺。枝皆蔓延地上。狀似葛藤。處處生有鬚根。葉形橢圓。大一二寸。面深緣。背灰白。夏月梢上開紫碧色之唇形花。酷似豇花。後則結實。形圓若小球。似胡椒子。始綠。終黑。有蒂。五瓣。子皮厚。中係白色之仁。

採取 每年六七月採實。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使去蒂。子下白膜。一重用酒浸一伏時。蒸之。從已至未熟乾用。李時珍曰。尋常只去膜打碎用之。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 散風熱。治頭痛。用作清涼強壯藥。

主治 筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荆實亦等(本經)風頭痛。腦鳴。目淚出。益氣。令人光澤。脂

微。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蔓荆子曰。治賊風。長髮髮(宋)大明日華諸家本草論蔓荆子曰。利關節。治痲疾。赤目(元)張元素珍珠論蔓荆子曰。太陽頭痛。頭沈昏。除昏暗。散風邪。涼諸經血。止目睛內痛。【元】王好古湯液本草論蔓荆子曰。搜肝風。

【明】櫻希雅本草經疏論蔓荆子曰。蔓荆實味苦。微寒。無毒。別錄加辛。平。溫。察其功用。應是苦溫。辛散之性。而寒則甚少也。氣清味薄。浮而升陽也。入足太陽足厥陰。兼入足陽明經。其主筋骨間寒熱。溼痺拘攣。風頭痛。腦鳴。目淚出者。蓋以六淫之邪。風則傷筋。寒則傷骨。而爲寒熱。其則或成溼痺。或爲拘攣。又足太陽之脈。夾脊循項。而絡於腦。自爲厥陰開竅之位。邪傷二經。則頭痛。腦鳴。目淚出。此藥味辛。氣溫。入二經。而散風寒溼之邪。則諸證悉除矣。邪去則九竅自通。痺散則光澤脂散。其生髮齒者。齒雖屬腎。而林屬陽明。陽明客風熱。則上攻。牙齒爲動。接腫痛。散陽明之風。

熱則齒自堅矣。去白蟲長蟲者。假其苦辛之味耳。益氣輕身耐老。必非風藥所能也。【明】李時珍本草綱目論葛荊子曰。葛荊氣輕味辛。體輕而浮。上行而散。故所主皆頭面風虛之症。【明】李士材本草圖解論葛荊子曰。葛荊子辛而微溫。足太陽經藥也。主太陽頭風頂痛。日痛。翳淚。亦能固齒。去白膜。酒炒打碎。【清】黃宮繡本草求真論葛荊子曰。葛荊子辛苦微溫。書言主治太陽筋脉。兼理足陽明胃。足厥陰肝。緣太陽本屬寒水之經。因風邪內客。而致巔頂頭痛。腦鳴。肝風。風既內犯。則風必挾肝木上侵。而致淚出不止。筋藉血養。則血亦被風犯。而致筋亦不禁。齒亦不堅矣。有風自必有溼。溼與風搏。則胃亦受溼。累而致肉痺筋掣。由是三氣交合。則九竅蔽塞。而病斯劇。葛荊輕體而浮。故既可治筋骨間寒熱。而令溼痺拘急。斯去。氣升而散。復能祛風除寒。而令頭面虛風之症悉治。且使九竅皆利。白蟲能殺。是亦風寒溼熱俱除之一驗耳。但氣虛血虛等症。用此禍必旋踵。

不可不知。

近人學說 賈九如曰。葛荊味苦象辛。能疏風涼血利竅。凡太陽經頭痛及頭風腦鳴。目淚目昏。皆血熱風溼所致。以此涼之散之。取其氣薄主升。佐神效黃芪湯。疏去障翳。使目復光。為肝經勝藥。

張山雷曰。葛荊枝條柔細。有似於葛。故得此名。蘇恭唐本草竟謂其苗葛生。微有誤會。李瀕湖謂其枝小弱如葛是也。本經稱其氣味苦而微寒。別錄則曰辛平。喜頤按凡草木之子。多堅實沈重。性皆下行。葛荊之質。雖不甚重。然其性必降。本經謂主治筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。固皆清泄降火之功用。別錄雖加以辛字。而主治風頭痛。腦鳴。目淚出。仍是內風升騰之病。用以清降。斷非疏散外風之品。日華子謂治赤目。張潔古謂治頭沈昏悶。止目睛內痛。王海藏謂搜肝風。皆是息風降火。其義甚明。獨甄權謂治賊風。潔古又謂治太陽頭痛。散風邪。則誤作疏散之藥。絕非本經別錄真旨。蓋內風外風。治法含渾。久為漢魏以來通

病。甄權等此說。實屬誤認。奈何瀕湖綱目。亦謂其氣清味辛。體輕而浮。上行而散。竟以甄權等之誤說。反加附會而為之證實。適以疑誤後學。而近三百年。更無人能知葛荊子之真質功用矣。然瀕湖亦謂所主者皆頭面風虛之證。則試問風而屬虛。豈有再用浮散主治之理。自矛盾盾。亦可謂不思之甚矣。千金方以一味葛荊子為末。浸酒服。治頭風作痛。亦是內風。非祛散外風之法。其用酒者。乃借酒力引之上行。使藥力達於頭腦之意。學者不可誤會。茲因世俗之見。無不謂此藥專散風熱。姑錄於此。而糾正之。如右。輕用一錢五分。重用可至三四錢。

配合應用 同甘菊花、荊芥、酒炒、黃芩、烏梅、芽茶、白蒺藜、川芎、羌活、黑豆、土茯苓。治偏頭風痛。目將損者。

令髮長黑。葛荊子、熊脂等分。醋調塗之。(聖惠方)

治頭風作痛。葛荊子一升為末。絹袋浸一斗酒中。七日。溫服。日三次。(千金方)

治乳癰初起。葛荊子炒為末。酒服方寸匕。流散之。(危氏得效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 頭目痛。不因風邪。而由於血虛有火者。忌之。張元素云。胃虛人。不可服。恐生痰疾。惡鳥頭。石膏。

著名方劑 益氣聰明湯。治中氣不足。清陽不升。則耳聾目障者。

(李東垣) 葛荊子、葛根各三錢。人參、黃耆各五錢。黃柏、芍藥各二錢。綠升麻錢半。炙草一錢。水煎服。

參攷資料 葛荊實諸家所解。葛荊荊粉。不一。經既言葛荊。明知是葛生。即非高木也。既言荊。則自是木上生者。况漢書郊祀志所言。以荊莖為幡竿。故知葛荊。即子大者。是何疑焉。後條有荊。此即便是荊也。子青色如茱萸。不合更立荊條。故文中云。本草不載。亦無別名。但有網花功用。又別。斷無疑焉。注中妄稱石荊。當之。其說轉見穿鑿。(慈宗爽)

葛荊生水漬。苗荊葛延長丈餘。春因舊枝而生。小葉五月葉成。似

香葉六月有花紅白色。黃花。九月有實黑斑。大如梧子而脆。冬則葉凋。今人誤以小莉為蔓荊。遂將蔓荊為杜荊也。〔蘇恭〕①近汴京及秦隴明越州多有之。苗莖高四五尺。對節生枝。葉類小楝。至盛茂有花作穗。淡紅色。蕊黃白色。花下有背莖。至秋結子。舊說蔓荊而今所有並非蔓也。〔蘇頌〕②其枝小弱如蔓。故名蔓生。〔李時珍〕

【蔓莖】即落葵之日本別名。詳「落葵」條。
【蔓紫】即落葵之日本別名。詳「落葵」條。

【蔓椒】 命名 本品蔓生。子葉皆似椒。故名。
古籍別名 豬椒。豕椒。豨椒。狗椒。〔別錄〕豨椒。〔內弘景〕金椒。〔圖經〕

產地 生山野林箬間。
形態 蔓椒為椒之一種。枝葉如蔓。子葉如椒。子實可供藥用。其根枝葉詳見各條。
性質 苦溫無毒。

主治 風寒溼痺。歷節痛。除四肢厥氣。膝痛。煎湯熱浴取汗。
【蔓椒枝葉】 性質 苦溫無毒。

主治 通身水腫。用枝葉煎如汁。熬如餅狀。每空心服一匙。日三服。

【蔓椒根】 性質 苦溫無毒。
主治 療痔疾。燒末服。并艾汁浸之。

歷代記述攷證 〔唐〕孟詵食療本草論蔓椒根曰。治賊風。墜急。【蔓菁】即蕪菁之古籍別名。典見唐本草。詳「蕪菁」條。

【蔓莖】即女萎之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「女萎」條。

【蔓蘿】即松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「松蘿」條。

【蔗汁】即甘蔗之地方用名。詳「甘蔗」條。

【蔗姑】 基本 本品係種蔗田中所出之蟲食蔗根。可食。味甚甘美。

主治 發痘。行氣。托毒。清毒。化痰。醒酒。和中。利小便。
【項麻】即苧麻之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「苧麻」條。

【蔚】即牡蒿之古籍別名。典見爾雅。詳「牡蒿」條。
【蔚金】即鬱金之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「鬱金」條。

【蔚草】 古籍別名 蔚菜。〔蘇恭〕蔚菜。〔綱目〕

產地 生於水濱。

形態 蔚草為水草類之一種。葉似澤瀉。而小花青白色。其莖可供藥用。

採取 五月六月間採之。曝乾用。

性質 甘寒無毒。

主治 暴熱喘急。小兒丹腫。

【蔚菜】即蔚草之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「蔚草」條。

【蔚菜】即蔚草之古籍別名。典見綱目。詳「蔚草」條。

【蕪】 古籍別名 蕪。〔綱目拾遺〕

形態 蕪為蔓草類藤樹之一種。葉尖而柔。葉中有汁。結子如桑椹。熱時色正青。作醬可和五味。其葉可製成油。以供藥用。

主治 疏積滯。消瘰癧。搽傅手足。紅腫作痛。刀傷刺傷。背癰癰毒。初起即敷。成則膿潰。潰亦可傅。並貼楊梅瘡。痔漏。滴耳止痛。

參攷資料 蕪菜嶺南人取其

葉合檟。糲食。今人名檟葉。用其葉封固。曬中。載收貯。待用。可留數十年。非獨疏積滯。消瘰癧。治病亦夥。〔趙學敏〕

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菜」條。

【蕪子】即蕪子之古籍別名。典見食療本草。詳「白蒿」條。

【蕪子】即蕪子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青葙子」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

【蕪菜】即蕪菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕪菜」條。

十五畫 蔓

蔗 葭 蔚 蔚 蕪 蕪 蕪

蔞 蔞 蔞 蔞 蔞 蔞

十五畫 蕨葎蕨萌 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟 蝟

一六六一

【蕨葎果】 主治 胎疝。
初生發疝。止見啼哭。不見病形。延至一周兩歲。始知是疝。諸醫不效。用蕨葎樹上之葎葎果一對。其果連樹皮取下。可辨真假。一對果可治三人。荔枝核七枚。杵碎。平地木三錢。同煎飲。即遂。亦不復發。(毛世洪)

產地 生湖澤池水中。
形體 蝟為青蛙蝦蟆之幼蟲。體圓。有側尾之大尾。狀如杓子。能搖尾游泳於水。始生後。脚隨生前脚。同時生脚。而蝟萎生肢。而尾脫。遂跳躍成蛙。其幼時可供藥用。

【蝟蝟】 即馬刀之古籍別名。典見綱目。詳「馬刀」條。
【蝟蝟】 即蝟之最大者之古籍別名。典見爾雅。詳「蝟蝟」條。
【蝟蝟】 即桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳「桑螵蛸」條。
【蝟蝟】 即蝟蝟之古籍別名。典見別錄。詳「蝟蝟」條。

暗障問。
形體 蝟蝟為原禽類之一種。實屬飛行於空中之小獸。頭小而略扁。吻鈍。耳殼短闊。呈三角形。常向內曲。具門牙。三趾。皆小而鈍。後肢細而短。有鈎爪。前後肢連尾間皆張飛膜。體被暗色柔毛。胸骨隆起。捕食蚊蠅。止息。以爪鉤物。而懸身。口吻飛膜感觸極敏。其內可供藥用。

【設】 即茶葉之古籍別名。典見綱目。詳「茶葉」條。
【蕨葎】 即蕨葎之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕨葎」條。
【蕨葎】 即蕨葎之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕨葎」條。

主治 火疔。熱瘡及疥瘡。並搗碎傅之。又染髮。取青胡桃子上皮。和搗為泥。染之一染不變也。
參攷資料 但俗三月三日皆取小蝟。以水吞之。云不生疥。亦解毒治瘡之意也。按危氏得效方。染髮。用蝟。黑桑椹各半斤。瓶密封。懸屋東百日。化泥。取塗髮。永黑如漆也。又响嘆神香云。三月三日。取蝟一合。陰乾。候極熱時。取汁一升。浸埋東壁下。俟百日。取出。其色如漆。以塗髮。永不白也。(李時珍)

【蝟蝟】 即蝟花之古籍別名。典見綱目。詳「蝟花」條。
【蝟蝟】 即蝟虎之古籍別名。典見綱目。詳「蝟虎」條。
【蝟蝟】 原名 伏翼。命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。

採取 十一月十二月採之。製法 留數日。凡使要置一斤者。先拭去肉上毛及其爪腸。留肉翅并嘴脚。以好酒浸一宿。取出。以黃精自然汁五兩。塗炙至盡。炙乾。用李時珍曰。近世用者。多假存性。性質 鹹。平。無毒。

【蕨葎】 即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。
【蝟蝟】 命名 本品狀如魚。其尾如針。并其頭尾觀之。有似斗形。故名。古籍別名 活師。(山海經)活東。(爾雅)玄魚。懸針。(古今注)蝟斗。蝦蟆。螭。蝦蟆青。蝟子。(綱目)水仙子。(俗名)蝦蟆兒。蝦蟆子。(本草拾遺)

【蝟蝟】 即蜈蚣之古籍別名。典見爾雅。詳「蜈蚣」條。
【蝟蝟】 即木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

【蝟蝟】 命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。



【蝟蝟】 命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。

【蝟蝟】 命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。

【蝟蝟】 命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。

【蝟蝟】 命名 本品身有翼。以其晝伏夜出。故名。古籍別名 天鼠。(本經)服翼。(爾雅)仙鼠。(唐本)飛鼠。(宋本)夜燕。(綱目)外國名 Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat) (拉丁) ヌーモリ 或 カハホリ (日本) 基本 保存推動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。產地 出山谷巖洞及諸古屋。

主治 目眩。瘧瘧。明目。夜視有精光。久服令人喜樂。媚好無憂。(本經) 療五淋。利水道。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蝠蝠肉曰。主女人人生子餘疾。帶下病無子。【明】李時珍本草綱目論蝠蝠肉曰。治久咳。上氣。久瘧。瘰癧。金瘡。內漏。小兒疝病。瀉風。

參攷資料 五月五日。取倒懸者。曬乾。和桂心。薰陸。香。燒烟。辟蚊子。夜明砂。隨甲。為末。燒烟。亦辟蚊。(陳藏器) 蝠蝠性能害人。故陳子真等服之。皆致死。觀後治金瘡方。皆致下利。其毒可知。本經謂其無毒。久服喜樂無憂。日華云。久服解愁者。皆誤後世之言。道足以增憂益愁而已。治病可也。服食不可也。(李時珍)

【蝠蝠血及膽】 主治 滴目。令人不睡。夜能見物。

【蝠蝠腦】 主治 瘰癧。疔內陷。服之令毒不攻心。入丸

十五蠹 蝠

劑用之。

參攷資料 塗面去女子面皰。服之令人不忘。(陳藏器)

【蝠蝠藤】 命名 本品葉形似蝠蝠。故名。

產地 附生於巖崖峭壁及喬木間多有之。

形體 蝠蝠藤為莖草類之一種。葉類葡萄而小。多歧。勁厚。青滑。其藤可供藥用。

主治 腰痛。瘰癧。酒服。

參攷資料 蝠蝠藤瘰癧痛。止痛。不可再服。多服。則腰反傾倒。不支。(滑察方)

【蝟刺香】 即沈香之上。有刺紋者。性質功用。詳「沈香」條。

【蝟油火】 基本 以刺蝟脂熬成。

效能 能縮人筋骨。燈照能縮。毒使小。

【蝟鼠皮】 即刺蝟皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刺蝟皮」條。

【蝟蚌】 古醫別名。撥掉子。痔(蘇頌)

形體 蝟蚌為介類之一種。即蟹之扁大而後足較闊者。可供藥

蝟 蝟 蝟 蝦

用。

性質 鹹寒。無毒。主治 解熱氣。治小兒痞氣。煮食之。

【蝟蟬】 即木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

【蝦】 即蝦之俗名。詳「蝦」條。

【蝦蟆】 原名 土蛙。命名 蝦者退也。蟆者草也。本品懷土。取置遠處一夕。復還復其所。雖或退之。常慕而返。故名。

古醫別名 螿蟆。蝦蟆。(綱目)

外國名詞 Reia. Fogs (巴丁) ツチガヘル(日本)

基本 保存推動物兩棲類無尾類蛙科之蝦蟆。

產地 出於深間。

形體 蝦蟆為蛙屬之一種。其體暗褐色。背有黑點。亦有恍如蟾蜍者。跳躍。鳴聲唧唧。捕得可供藥用。其肝。膽。詳見各該條。

製法 雷敬曰。凡使蝦蟆。先去皮并腸及瓜子。陰乾。每箇用真牛

酥一分。塗炙乾。若使黑成。即連頭尾。皮爪。並陰乾。酒浸三日。漉出焙

用。

性質 辛寒。有毒。主治 邪氣。破癥瘕。血癰腫。陰

瘡。服之。不愈。熱病。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蝦蟆曰。主百邪鬼魅。癰瘕腫。及熱結腫。(宋)日華諸家本草論蝦蟆曰。治熱狂。貼惡瘡。解煩熱。治犬咬。

參攷資料 古方多用蝦蟆。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾蜍為蝦蟆耳。今考二物。功用亦不甚遠。則古人所用。多是蟾蜍。且今人亦只用蟾蜍有效。而蝦蟆不復入藥矣。按張某醫說。載撰青雜說云。有人患脚瘡。冬月頓然無事。夏月臭爛。痛不可言。遇一道人云。爾因行草上。惹蛇交。遺澤。瘡中有蛇兒。冬伏夏出。故也。以生蝦蟆搗傅之。日三即換。凡三日一小蛇自瘡中出。以鐵鉗取之。其病遂愈。(李時珍)

●蝦蟆屬土。與水。味甘性寒。南人喜食之。本草言。服之不患熱病。由是病人亦喜食之。本草之意或矣。

十五畫 蝦 蟻 蟻

或乾。或燒入藥用之。非若世人煮羹入椒鹽。而嚼其湯也。此物本溼。化火能發溼。久則溼化熱。此乃土氣厚。自然生火也。(朱丹溪)

【蝦蟆子】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蟬蛻」條。

【蝦蟆肉蛆】 採取 端午日。取金眼大腹。不跳不鳴者之蝦蟆。越死置溺器中。俟生蛆食盡。取蛆。水漂淨焙用。

主治 治小兒諸疳。

【蝦蟆衣】即車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【蝦蟆肝】 主治 蛇螫人。牙入肉中。痛不可堪。搗傅之立出。

【蝦蟆兒】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蟬蛻」條。

【蝦蟆青齒】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目。詳「蟬蛻」條。

【蝦蟆草】 命名 本品葉面狀形如蝦蟆之背。故名。基本 係蝦蟆草科蝦蟆草屬。為蝦蟆草之莖葉根。

產地 多生溼地。各處多有之。形態 蝦蟆草為溼草類之二

年生草本。秋日或春日生苗。根出葉。平鋪地面。葉橢圓形。網脈。葉緣鋸齒。葉表凸凹不平。狀如蝦蟆之背。故名蝦蟆草。至夏由中心抽出方莖。高數寸。至尺許。其葉對生。由莖端及葉腋分枝。開小花。總狀花序。結實小。如車前子。成熟後。即枯死。

採取 夏月採之。採得陰乾。固藏勿洩氣。

性質 苦。無毒。

效能 利水。消腫。治陰痒。療風疹。

主治 楊亭華曰。溼熱。風疹。陰痒。腎囊風。消腫。利水。服洗皆有功效。女子如受溼熱在陰道外部。用此藥薰洗即愈。若接於陰道內。於洗方內。加枯礬約錢許。將藥汁煎好。過以布淋。柔熱薰於患處。待溫度適宜。用大水節。一端置於藥水內。一端置於陰道。射而洗之。如受孕後。患陰痒症。洗之尤效。幼女常患於大陰唇。小兒常於陽莖頭。腫(俗謂對蟻穴小便所致)以上幼女小兒。單用蝦蟆草數兩。煎洗約二次即愈。

用量 三錢至一兩。

參攷資料 車前又名蝦蟆衣。天名精又名蝦蟆藍。皆非蝦蟆草也。惟本草綱目有名。葉下紅者。植物圖考。言其形態與榆圓。頗與蝦蟆草相似。但蝦蟆草葉背不紅。或此物亦為蝦蟆草之一種。因產地不同。而形態稍異耶。則未敢肯定。今北方藥市。誤以本經之蓮蕪為蝦蟆草。沿襲多年。竟無正之者。亦醫藥界之遺憾也。考蓮蕪。係多年莖生草。莖生倒針。葉為羽狀複葉。自三小葉構成。每小葉如掌狀。葉緣缺刻及鋸齒。面青背白。密生絨毛。夏日枝端分枝。開小紫花。花冠五瓣。近世入藥用葉。其葉味澁。內含鞣酸。為收斂之劑。與蝦蟆草之利溼熱者迥異。故不得不詳細說明。以悉二藥之性大相悖謬。醫家不可不知。(楊亭華)

【蝦蟆腦】 主治 明目。治青盲。

【蝦蟆毒】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目。詳「蟬蛻」條。

【蝦蟆膽】 主治 小兒失音。不語。取汁點舌上。立愈。

一六六四

【蝦蟆藍】即天名精之古籍別名。典見本經。詳「天名精」條。

【蝦蟆】即蝦蟆之古籍別名。典見綱目。詳「蝦蟆」條。

【蝦蟇】 產地 粵語云。蝦蟇以記云。遼東大凌河。出蝦蟇。蝦蟇皆甘美。平海又出一種小蝦。名紅毛小。作蝦蟇尤佳。今浙江寧波及蘇皆有。味亦佳。

製法 製蝦蟇法。初醃時。每蝦百斤。用鹽三斤。封定缸口。俟蝦身潰爛。乃加至四十斤鹽。於是味大佳。可以久食。

主治 解毒樹蠹。因廣東有毒樹。其樹無花。結子如牛奶。食之立死。以蝦蟇解之。

【蕪建草】 形態 生山下溼地。高一二尺。葉似山丹而微赤。

性質 苦。無毒。

主治 搗汁服。治香蟻致病。接汁洗蟲瘡。殺蠅蟲。

【蠶胡麻】即胡麻之處方用名。詳「胡麻」條。

【蠶母】即加母之古籍別名。典見

本經詳知母昆。


【蝮蛇】 處方用名 蝮蛇肉。古籍別名 反鼻蛇。

本草綱目 反鼻地眉蛇（和漢藥考）

外國名詞 Viper (英、德)

基本 屬爬蟲類。為蛇類管狀毒牙族蝮蛇之內。

產地 凡南方之山野間恒有之。



蝮蛇

形態 蝮蛇為毒蛇之一種。其棲息於山野或樹中陰處。卵在胎內孵化。比無毒蛇小。體粗長達一尺五六寸。色灰褐。背有黑色或紅褐色之斑紋。其狀如錢。頭大口尖。上顎之左右兩側各生毒牙一枚。平時向內橫轉。一旦張口兩毒牙即突出咬噬他物。於時毒腺中之毒液即自牙前之孔透射而出。用以毒人。此蛇見人並不奔竄。

十五畫 蝮

若誤踐之。立躍起而噬人。其毒之猛烈世人盡知之。

採取 捕法。春夏入山。手製葛。蝮蛇聞聲來集。則壓其頸捕之。捕得剝去皮及內腸。風乾入藥。

性質 甘溫。有毒。

成分 勝呂清一嘗購市販刺皮風乾之蝮蛇三百條。一一試驗其成分。於其脂肪中。發見拍爾迷真及斯吉亞林之混合物。又用酒精浸之。於其浸出液中。檢得結晶體兩種。其一為塔烏林 (Taurocholic acid) 見藥學雜誌。

效能 療癩疾惡瘡。治頑痺惡風。用作驅除微菌惡毒藥。又為強壯藥。

主治 酸作酒。療癩疾。諸瘡。心腹痛。下結氣。除蟲毒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蝮蛇曰。五痔腸風瀉血。

【明】李時珍本草綱目論蝮蛇曰。大風諸惡風。惡瘡癩癧。皮膚頑痺。半身枯死。手足臃腫。間重疾。

國外學說 日本和漢藥考曰。以蝮蛇焙枯。名反鼻霜。亦名五八霜。其隱名曰五八草。又名十三草。

充藥用。能止血。治惡瘡。其以酒浸蝮蛇。為蝮蛇酒。以油漬之。為蝮蛇油。蝮蛇酒之製法。取蝮蛇活者一條。以醇酒一斗。浸封埋。為酒。周

年取開。蛇已消化。酒味猶存。不過飲一升。當覺身習習而病愈。最治癩病。此感天地燔殺之氣而成之。惡疾。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣。而生之惡物。乃以毒物攻毒病也。又法。蝮蛇去其首尾。剝腹除腸。到

浸油中。五十日後。微蒸取用。外塗。一般腫痛。善治創傷潰爛。雖久遠不治之外症。用此亦愈。

配合應用 治白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗。漬之。糠火溫令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂搗傅（肘後方）

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡非惡風癩疾者禁用。

參攷資料 取活蝮蛇一枚。着器中。投以醇酒一斗。封定。埋馬溺處。周年取開。蛇已消化。酒味猶存。有患諸症者。不過服一升。以來。當覺身習習而愈。然有小毒。不可頓服。他藥不復得力。又曰。生癩者。取

一枚。或他蛇亦可。燒熟。坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉。塞鼻中。

（陳藏器）癩疾感天地燔殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣。而生惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其類也。（李時珍）蝮蛇作地色。鼻反。口長。身短。頭尾相似。山南漢沔河同多有之。一名蛇。蛇無二種也。（蘇恭）蝮蛇形不長。頭扁。口尖。頭斑。身赤。文斑。亦有青黑色者。人犯之。頭足貼着。東閩諸山甚多。草行不可不慎。（蘇頌）

蝮蛇節文。亦有與地同色者。衆蛇之中。彼獨胎產。着足斷足。着手斷手。不爾全身糜爛。七八月。瘡發時。嚼樹以洩其毒。樹便死。又吐涎沫於草木上。着人皮膚。身腫。名曰蛇淚。濟卒難治療。方與蛇葉同。（陳藏器）

【蝮蛇皮】 主治 燒灰。療疥癩。

【蝮蛇肉】 即蝮蛇之處方用名。詳「蝮蛇」條。

【蝮蛇屎】 採取 以蝮蛇置器中。養取之。

主治 痔瘡。

蝮。無殺者名蝮蝮。即鼻溝蟲。

性質 蝮寒有小毒。

效能 用治小便不通。及作痔

漏脫肛藥。

主治 賊風喘傳。洩跌。大腸脫肛。筋急及癆癩。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蝮牛曰。生研汁飲。止消

渴。【明】李時珍本草綱目論蝮牛

曰。治小兒脾風撮口。利小便。消喉

痺。止鼻衄。通耳聾。治諸腫毒。痔漏。

制蝮蝮毒。研爛塗之。【明】李

士材本草圖解論蝮牛曰。蝮牛。蝮

蝮。蝮蝮。蝮蝮。皆寒陰溼之

氣而生。氣味相同。主療無別。惟形

稍異。蝮蝮無殺。蝮牛有殺耳。蝮蝮

總除諸熱。益陰潤燥。驅風。故治如

上諸證。蝮蝮性畏二物。不敢過其

所行之路。蝮蝮其身即死。故人取以

治蝮蝮毒。其氣大寒。非真有風熱

者不宜用。小兒羸弱多泄者忌用。

【清】黃宮繡本草求真論蝮牛曰。

蝮牛即帶殼大蝮蝮是也。生下溼

地。陰雨即出。其性至陰。味鹹小毒。

故古方用此以治真陰虧損。廢理

十五畫 蝮

不密。致風中於經絡。而見口眼喎

斜。筋脈攣拘。及風熱脫肛。痔瘡腫

痛。癰疽疔腫等症。皆能見效。

總以取其鹹寒。解其諸熱之性耳。

并解蝮蝮毒。取形尖小。綠桑木佳。

配合應用 ①治小便不通。蝮

牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少

許。更妙。【簡易方】

②治大腸脫肛。治大腸久積虛

冷。每因大便脫肛。用蝮牛一兩燒

灰。豬脂和傳立縮。又治上證及痢

後脫肛。用乾蝮牛一百枚。炒研。每

用一錢。以飛過赤汁磁石末五錢。

水一盞。煎半盞。調服。日三。【聖惠

方】

③治痔瘡腫痛。用蝮牛浸油塗

之。或燒研傳之。【丹溪方】又用蝮

牛一枚。入麝香少許。在內。碗盛。次

日取水塗之。【濟生方】

④治發背初起。活蝮牛二百箇。

以新汲水二盞。湯瓶中封一夜。取

涎水。入真蛤粉。旋調。搽傳瘡上。日

十餘度。熱痛止。則瘡便愈。【集驗

方】

⑤治瘰癧未潰。遠殼蝮牛七箇。

丁香七粒。同燒研。紙花貼之。【危

氏得效方】

⑥治瘰癧已潰。蝮牛燒研。輕粉

少許。用豬脊髓調傳。【危氏得效

方】

⑦治喉痺腫塞。用蝮牛綿裹。水

浸含嚙。須臾立通。又用蝮牛七枚。

白梅肉三枚。研爛。綿裹。含嚙立效。

⑧治喉風腫痛。端午日午時。取

蝮蝮十餘條。同鹽三四箇。小瓶內

封固。俟化成水。收水點之。【唐氏

方】

⑨治喉塞口燥。蝮蝮炙二七枚。

白梅肉炒二七枚。白礬半生半燒。

二錢。研爲末。每水調半錢。服。得吐

立通。【聖惠方】

⑩治耳腮腫。及喉下諸腫。用

蝮牛同麵研傳之。

⑪治面上瘡疔初起者。急尋水

蛭蝮一二條。用簪少許。共搗塗紙

上貼之。即退。紙上留一小孔。出氣

此乃發漢章祕傳極效方也。【談

藝翁試驗方】

⑫治赤白腎膿。生蝮牛一枚。搗

丹砂末於內。火上炙沸。以綿染汁

傳傳中。日二。【聖惠方】

⑬治鼻血不止。蝮牛爆乾一枚。

身賊骨半錢。研末吹之。【聖濟總

錄方】

⑭治撮口脾風。乃胎熱也。用蝮

牛五枚。去殼研汁。塗口。取效乃止。

又方。用蝮牛十枚。去殼研爛。入蔞

蘿末半分。研勻塗之。取效甚良。

⑮滴耳聾閉。蝮牛膏。用蝮牛一

兩。石鹽。乳粉各二錢。半爲末。瓷

盒盛之。火煨。亦研末。入片腦一字。

每以油調一字。滴入耳中。無不愈

者。【聖惠方】

⑯治蝮蝮入耳。蝮牛椎爛。置於

耳邊。即出也。【瑞竹堂方】

⑰染髮方。用蝮蝮四十條。以京

墨水養之三日。埋馬屎中。一月取

出。以白絲頭試之。如即黑到尾。再

入馬屎中埋七日。再取試之。性緩

乃以搗鬚。庶不致黑皮膚也。【尊

濟方】

⑱治消渴引飲不止。用蝮牛十

四枚。形圓而大者。以水三合。密器

浸一宿。取水飲之。不過一劑而愈。

【海上方】又用蝮牛焙半兩。蛤粉

龍膽草。桑根白皮。炒。各二錢。研

末。每服一錢。楮葉湯下。【聖惠方】

應用宜忌 畏鹽

十五畫 蝸

蝸 衝 褊 調 碗 隸 賜 賤 賣

參攷資料 ①蝸牛所主諸病。大抵取其解熱消滯之功耳。(李時珍)

②其頭偏長如喙。其形盤旋如渦。故有蝸過二者。不獨如瓜字而已。其行延引。故曰蝸。蝸。爾雅謂之蝸。孫炎註云。以其負殼殼而行。故名蝸。蘇(李時珍) ③蝸牛。生池澤草樹間。形似小螺。白色。頭有四黑角。行則頭出。驚則首尾俱縮入殼中。(韓保昇) ④凡用蝸牛。以形圓而大者為勝。久雨乍晴。竹林池沼間多有之。其城墻陰處。一種扁而小者。無力。不堪用。(蘇頌) ⑤蝸身有涎。能制蜈蚣。夏熱則自懸葉下。往往升高。莖枯則自死也。(李時珍)

【蝸舍】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸蟲】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸殼】即蝸牛之原形。詳「蝸牛」條。

【蝸牛殼】主治一切疴疾。歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論蝸牛殼曰。牙齦面上赤瘡。鼻上酒瘡。人利下脫肛。

【蝸舍】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸蟲】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸殼】即蝸牛之原形。詳「蝸牛」條。

【蝸牛殼】主治一切疴疾。歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論蝸牛殼曰。牙齦面上赤瘡。鼻上酒瘡。人利下脫肛。

【蝸舍】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸蟲】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸】條。①即蝸之古籍別名。典見山海經。詳「蝸牛」條。

【蝸蝨】即蝸蝨之古籍別名。典見別錄。詳「蝸蝨」條。

【蝸】即蝸蝨之古籍別名。典見本草集註。詳「蝸蝨」條。

【衝洞根】產地 生嶺南諸地。形態 衝洞為蔓草類之一種。莖根一似土瓜。其根可供藥用。

採取 採根陰乾用。

性質 苦平無毒。

主治 熱毒。蛇犬蟲毒。癩癧疔。水腫服。

參攷資料 衝洞根。功同陳家白藥(陳藏器)

【福苴】即苦菜之古籍別名。典見日用本草。詳「苦菜」條。

【調睡參軍】即酸漿仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「酸漿仁」條。

【碗豆】命名 本品莖苗柔弱。宛宛故名。

古籍別名 青豆斑。(別錄) 胡豆。水寒豆。(拾遺) 戎菽。(爾雅) 回菽豆。(逸志) 回回豆。(飲膳正要) 畢豆。(唐史) 畢豆。(崔實月令) 青

豆。

小豆(千金) 麻累。淮豆。國豆。(綱目) 小寒豆(俗名)

外國名詞 Pisum sativum, (拉丁) エンドウ エンドウ(日本) エンドウマメ(日本)

基本 係豆科豌豆屬。為豌豆之子實。

產地 在原野園圃間。

形態 豌豆為穀類豆屬之越年生蔓草本。莖長五六尺。葉為羽狀複葉。尖端有卷鬚。基部有托葉。三四月間。葉腋抽出花軸。着蝶形花。而色白。或淡紫色。結實為莢果。莢長寸許。中有種子。可供食與藥用。

參攷資料 豌豆多食發病。(吳瑞) ①豌豆屬土。故其所主病。多係脾胃。元時飲膳每用此豆。搗去皮。同羊肉治食。云補中益氣。今為日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺。洗面溲豆方。盛用畢豆麵。亦取其白膩耳。(李時珍)

【綠】即貓狸子之古籍別名。典見爾雅。詳「貓狸」條。

【賜紫櫻桃】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【賤婆】即木綿之古籍別名。典見梵書。詳「木綿」條。

【賣子木】古籍別名 買子木。(綱目)

外國名詞 Yoru chinensis, Yam. (拉丁) サンダングリ(日本)

基本 係茜草科賣子木屬。產地 生嶺南暖地山野中。

性實 甘平無毒。

主治 消渴。淡煮食之良。



豆 豌

然衛。益中平氣。煮食下乳汁。可作醬用。【明】李時珍本草綱目論豌豆曰。煮食殺鬼毒心病。解乳石毒。發研末。塗癰腫。瘡疔。作溲豆。去野。令人面光澤。

參攷資料 ①豌豆多食發病。(吳瑞) ②豌豆屬土。故其所主病。多係脾胃。元時飲膳每用此豆。搗去皮。同羊肉治食。云補中益氣。今為日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺。洗面溲豆方。盛用畢豆麵。亦取其白膩耳。(李時珍)

【綠】即貓狸子之古籍別名。典見爾雅。詳「貓狸」條。

【賜紫櫻桃】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【賤婆】即木綿之古籍別名。典見梵書。詳「木綿」條。

【賣子木】古籍別名 買子木。(綱目)

外國名詞 Yoru chinensis, Yam. (拉丁) サンダングリ(日本)

基本 係茜草科賣子木屬。產地 生嶺南暖地山野中。

性實 甘平無毒。

主治 消渴。淡煮食之良。

參攷資料 ①豌豆多食發病。(吳瑞) ②豌豆屬土。故其所主病。多係脾胃。元時飲膳每用此豆。搗去皮。同羊肉治食。云補中益氣。今為日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺。洗面溲豆方。盛用畢豆麵。亦取其白膩耳。(李時珍)

【綠】即貓狸子之古籍別名。典見爾雅。詳「貓狸」條。

【賜紫櫻桃】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【賤婆】即木綿之古籍別名。典見梵書。詳「木綿」條。

【賣子木】古籍別名 買子木。(綱目)

形體 實子木爲灌木類常綠

木本高五六尺。春生嫩枝。葉尖長約一二寸。青綠色。枝梢淡紫色。五六月開碎花百十枚。圍攔作大朵。深紅色。隨花結實。如椒目在花瓣中。黑色。光澤。其木可供藥用。

製法 雷斅曰。凡採得粗搗。每一兩用酥五錢。同炒乾入藥。

性質 甘微酸。平無毒。

主治 折傷。血內滯。續絕。補骨髓。止痛安胎。

【質汗】

命名 汗音寒。乃香語之譯音。

產地 出西番諸地。

製法 以檀乳。松淚。甘草。地黃等藥。同熱煎成用。

性質 甘溫無毒。

主治 金瘡。傷折。瘀血內損。補筋肉。消惡血。下血氣。婦人產後諸血結。腹痛內冷。不下食。並以酒消服之。亦傳病處。

參攷資料 番人試藥。以小兒斷一足。以藥納口中。將足踏之。當時能走者。良爲傷折之要藥。(陳藏器)

【輪迴酒】即童便之古籍別名。與

見綱目。詳「童便」條。

【鄭芥】即荊芥之古籍別名。與見和漢藥考。詳「荊芥」條。

【麻柿】

基本 本品爲柿之用。法修藏者。

製法 吳瑞曰。水藏者性冷。鹽藏者有毒。李時珍曰。麻柿也。水收鹽浸之外。又有以熟柿用灰汁。浸三四度。令汁盡。着器中。經十餘日即可食用。

主治 瀉下焦。健脾胃。消宿血。

【鮫魚】即鮫魚之以鹽漬成者。與見綱目。詳「鮫魚」條。

【醉仙桃】即曼陀羅之古籍別名。與見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【醉草】即睡菜之古籍別名。與見綱目。詳「睡菜」條。

【醉魚草】

命名 本品花葉可。以毒魚故名。

古鑄別名 闊魚花。魚尾草。機木。(綱目)

外國名詞 *Buddleia japonica*, *Homal.* (拉丁) *フヂウツ*

基本 係馬錢科醉魚草屬。爲醉魚草之花葉。

產地 生山野間及河澤邊。

形體 醉魚草爲藤草類之落葉灌木本。莖高三四尺。其節間有縱行之翅。葉對生。廣披針形。有鋸齒。夏月莖梢抽着花。花冠筒狀。不整齊如唇形。帶紫紅色。雄蕊四。其莖葉可供藥用。



醉魚草

性質 辛苦溫。有小毒。

主治 痰飲成胸。遇寒便發。取花研末。和米粉作糰。炙熟食之。即效。又治誤食石斑魚子中毒。吐不止。及諸魚骨鯁者。搗汁和冷水少許。蘇之。吐即止。骨即化也。久瘡成疔者。以花搗餅魚腹中。溼紙裹煨。熱空心食之。仍以花和海粉搗貼。便消。

【醉醒草】

產地 植池邊。

形體 醉醒草爲雜草類之一種。葉紫色而叢生。可供藥用。

主治 醒酒。摘草嗅之。

原名 米醋。

命名 醋者措也。能措腐食毒。故名。米醋比諸醋最醲。又名醲醋。

處方用名 酸醋。

古鑄別名 酢。醲苦酒。(綱目) 酢。花地左味。(和漢藥考) 醲醋。乾醋。(新本草)

外國名詞 *Acetum*, (*Vinegar*)

基本 係用米麥或果實以澱粉類或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋二三年者良。

產地 黃勞逸新中藥曰。醋產浙江杭紹二縣者爲最佳。實則以江蘇鎮江產爲最。

形體 醋爲澄明之液體。色淡黃或深黃。氣香味酸。比重一·〇〇五。至一·〇一二。水及酒精。不論多少。可溶解之。

製法 米醋三伏時用倉米一斗。淘淨蒸飯。攤冷。倉黃晒。銚水淋淨。別以倉米二斗。蒸飯和勻。入甕。以水淹過。密封。貯處。三七日成矣。糯米醋。秋社日用糯米一斗。

十五畫 質 輪 鄭 醲 醉 醋

十五 蠶 醋

淘蒸。用六月六日造成小麥大麴和勻。用水二斗。入麴封醱。三七日成矣。①粟米醋。用陳粟米一斗。淘浸。七日再蒸。淘熱入甕。密封。日夕攪之。七日成矣。②小麥醋。用小麥水浸三日。蒸熟。將黃入甕。水淹。七日成矣。③大麥醋。用大麥米一斗。水浸。蒸飯。將黃曬乾。水淋過。再以麥飯二斗和勻。入水封閉。三七日成矣。④餵醋。用餵一斤。水三升。煎化。入白麴末二兩。瓶封曬成。

用法 恒以外治塗傳。內服祇用少許和飲。

性質 酸。苦。溫。無毒。

成分 醋之主要成分為醋酸(C₂H₃O₂)。餘則略含醋酸伊打糖。分。澱。澱。色。素。灰。分。等。

效能 散瘀血。消癰腫。用為消散積塊。藥。及解魚肉蔬菜與諸蟲毒。又治腸室扶斯。結核性盜汗。

作用 入胃時。能刺激胃神經。使胃分泌稍強。然亦能制止 Po. poid 之醱酵作用。至腸內能刺激腸黏膜。使腸之欵性增加。同時又能凝固已消化之蛋白。由腸壁吸入血中。又能令血管收縮。汗液減

少。體溫略降。 主治 消癰腫。散水氣。殺邪毒。理諸藥消毒。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論醋曰。治產後血暈。除痰塊。堅積。消食。殺惡毒。破結氣。心中酸水。痰飲。【唐】孟詵食療本草論醋曰。醋磨青木香。止卒心痛。血氣痛。浸黃蘗舍之。治口瘡。調大黃末塗腫毒。煎生大黃服。治疔瘡甚良。【宋】日華諸家本草論醋曰。下氣除煩。治婦人心痛血氣。并產後及傷損。金瘡出血昏暈。殺一切魚肉菜毒。【元】王好古湯液本草論醋曰。散瘀血。治黃疸。黃汗。【明】繆希雍本草經疏論醋曰。醋惟米造者入藥。得溫熱之氣。故從木化。其味酸。氣溫。無毒。酸入肝。肝主血。血逆熱。壅則生癰腫。酸能飲壅熱。溫能行逆血。故主消癰腫。其治產後血暈。癰塊。血積。亦此意耳。散水氣者。水性泛濫。得收斂而寧。醋也。殺邪毒者。酸苦湧瀉。能吐出一切邪氣毒物也。日華子主下氣除煩。婦人心痛血氣。并產後及傷損。金瘡出血。送服。殺一切魚肉菜毒。取其

一六七〇

酸收而又有散瘀解毒之功也。故外科傳藥中多寶用。【清】黃宮繹本草求真論醋曰。米醋本溫熱之氣而成。味則酸苦。氣溫。酸主斂。故書多載散瘀解毒。下氣消食。且同木香磨服。則治心腹血氣諸痛。以火淬醋入鼻。則治產後血暈。且令外科藥散。則治癰結痰癖。疔黃癰腫。暨口瘡。以治舌瘡。麴塗以散損傷積血。及殺魚肉菜毒。至醋既酸。又云能散癰腫。以消則內散。潰則外散。收斂即是散。故耳。且多食傷筋。轉齒。以酸入筋。過飲則於筋有傷。過酸則木強水弱。而於齒多輟。米造。陳久者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論醋曰。醋酸溫。開胃養肝。強筋燉骨。醒酒消食。下氣辟邪。解魚蟹鱗介諸毒。陳久而味厚。氣香者良。性主收斂。風寒咳嗽。外感癰痢初病皆忌。續文獻云。獅子日食醋。醋各一餅。故俗謂獅吼為喫醋云。

國外學說 英美學說謂醋醋

又名乾醋。製法有粟米或果實及別物之不同。其濃淡則以酒精之多寡為定。英國藥肆中所售之醋

醋。每百分中計含酒精五分有奇。如百分中計含酒精三分至六分者。則為通行之品。醋醋之功用。能收斂。解熱。利小便。主治熱症。自汗。盜汗。乾濕。外用能治跌打損傷。閃腰。扭挫。石灰迷目。處方以醋醋一兩。荆芥。泡。水。一兩。共和勻。仰漱。治咽喉病。每服一錢。至一兩。加水用之。又和漢藥考曰。醋係酒變酸而成。其原料用米。麥。馬鈴薯。酒糟。敗酒等物。木醋亦可為原料。日本用以調味及入藥者。以用玄米作原料者為佳品。茲述各種製法於下。一用玄米製醋法。蒸玄米加白麴三倍。攪和。入新製桶中。以手壓緊。厚紙覆令平。徐徐注水。如麴之半。注水時勿令飯麴漂淨。如是靜置七八日。俟晴天。以竹竿攪拌之。依此每七日一次。至二十八日。桶加木蓋。且縛以繩。避暖處置之。忌近不潔之物。經七十五日。釀造告成。然亦可隨氣候之寒暖而遲速之。既熟之後。去滓密封。埋貯。濃處。地下。經年。香味俱烈。二用酒糟製醋法。酒糟水浸十五日。控器。攪其液汁。投釜中。一沸。試浸以手。

至不能堪爲度。隨移入桶中。加清醋。以榨取量三分之一爲準。然後密封其桶。靜置二十五日。換桶一次。連換四桶。釀造告成。又曰。醋之種類。有梅醋。萬年醋等。梅醋。卽梅汁也。六月製梅乾時。取之。用生梅黃熟者一斗。漬水一日。苦汁出。便取出。以鹽三升。摻梅。壓石一晝夜。梅汁出。取梅曬乾。至再三則梅乾成矣。取其梅汁。盛壺收用。便成梅醋。經年不敗。病人食之。亦良。惟不入藥用。萬年醋。夏月取變味之酒。與米醋。水三品等分。和合盛壺。投堅炭燻於內。取出炭。急封口。經月成醋。以後有變味酒。則加入其壺。民間簡便之法也。

配合應用 ④衍義云。產婦房中。常以火炭沃醋氣爲佳。酸氣能飲血使下也。

①治卒心痛。青木香以醋磨汁服。(孟詵食療方)

②治口瘡。醋浸黃蘗含之。

③治身體卒腫。醋和蚯蚓屎傅之。(千金方)

④治舌腫不消。以酢和釜底黑厚傅舌之上下。脫則更傅。須臾卽

十五畫 醋

消。(千金方)

⑤湯火傷灼。卽以酸酢淋洗。并以酢泥塗之。良。亦無癢痕。喉痺咽痛。以醋探吐之。(千金方)

⑥治風毒。以三年醱醋五升。煎五沸。切葱白三升。煎一沸。濾出。以布染乘熱裹之。痛止乃已。(外臺祕要方)

⑦治發亂吐利。鹽醋煎服甚良。(如宜方)

⑧治霍亂煩脹。未得吐下。以好苦酒三升飲之。(千金方)

⑨治足上轉筋。以故綿浸醋中。飯蒸熱裹之。冷卽易。勿停。取蹙止。(外臺祕要方)

⑩治出汗不滴。攪却腰脚。并耳聾者。米醋浸荊三稜。夏四日。冬六日爲末。醋湯調下二錢。卽蹙。(經後方)

⑪治腋下胡臭。三年醱酢和石灰傅之。(外臺祕要方)

⑫治癰疽風病。酢和硫黃末傅之。(外臺祕要方)

⑬治癰疽不潰。苦酒和雀屎如小豆大。傅瘡頭上。卽穿也。(肘后方)

⑭治木舌腫強。齋醱時時含漱。(普濟方)

⑮治牙齒疼痛。大醋煮枸杞白皮一升。取半升。含漱。卽蹙。(肘后方)

⑯治鼻中出血。酢和胡粉半瓖許服。又法。用醋和土塗陰囊。乾卽易之。(千金方)

⑰治寒耳治聾。以醇醋微火炙附子。削尖塞之。(千金方)

⑱治面黧雀斑。苦酒漬水。常常拭之。(肘后方)

⑲中砒石毒。飲醋得吐卽愈。不可飲水。(廣記方)

⑳治服硫發癰。酢和鼓研膏傅之。燥則易。(千金方)

㉑治食鷄子毒。飲醋少許卽消。(廣記方)

㉒治毒殺傷瘡。清醋急飲一二盞。令毒氣不散。然後用藥。(濟急方)

㉓治蚊刺螫人。酢磨附子汁傅之。(醫學心鏡方)

㉔治蜈蚣咬毒。醋磨生鐵傅之。亦治蜘蛛咬毒。(錢相公秘中方)

㉕治蠅螻屎疔。以醋和胡粉傅

之。(千金方)

①治諸蟲入耳。凡百節。蜘蛛。蟻入耳。以苦酒注入。起行卽出。(錢相公秘中方)

②治狼烟入口。以醋少許飲之。(祕方)

③治足上凍瘡。以醋洗足。研藕傅之。

④治胎死不下。月未足者。大豆黃醋服三升。立便分解。未下再服。(子母祕錄方)

⑤治胞衣不下。腹滿則殺人。以水入醋少許。噴面神效。(聖惠方)

⑥治鬼擊卒死。吹醋少許入鼻中。(千金方)

⑦治乳癰堅硬。以醋成醋。燒熱石投之。二次溫漬之。冷則更燒石投之。不過三次卽愈。(千金方)

⑧治疔腫初起。用麩圍住。以針亂刺瘡上。銅器煎醋沸。傾入圍中。令容一盞。冷卽易。三度根卽出也。用量 三錢至八錢。或一匙至三匙。

⑨施用靈藥 凡辟瘴胃藥。及服丹參。茯苓者。禁用。反蛤蜊。煑甘石。蜆殼。石灰。

十五畫 醋

著名方劑 苦酒湯治少陰病。咽中生瘡。聲不出者。金匱方。半夏(洗破)十四枚。鷄子(去黃納苦酒著殼中)一枚。上二味。納半夏著苦酒中。以鷄子殼置刀環中。安火上令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑服之。黃耆芍藥桂枝苦酒湯。治黃汗之爲病。身發腫。發熱汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如漿汁。脈自沉。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。此湯主之。金匱方。黃耆五兩。芍藥三兩。桂枝三兩。上三味。以苦酒一升。水七升。相和。煮取三升。溫服一升。當心煩。服至六七日。乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。一方以美生醴代苦酒。此病在表不在裏。參攷資料 米醋比諸醋最醇。入藥多用之。穀氣全也。故勝精醋。產婦房中常以火炭沃醋氣爲佳。酸益血也。以磨雄黃塗蜂毒。亦取其收而不散之義。今人食酸則齒酸。謂其水生木。水氣弱。木氣強。故如是。造鞣皮者。須得醋而較。故知其性收斂。不負酸收之意。(寇宗奭)按孫光憲北夢瑣言

云。一婢抱兒落炭火上燒灼。以醋泥傅之。旋愈無痕。又一少年眼中常見一鱗。趙卿謂之曰。來晨以魚鮪奉候。及期延至。從容久之。少年飢甚。見鱗上一甄芥醋。旋旋啜之。遂覺胸中豁然。眼花不見。卿云。君喫魚鱗太多。魚畏芥醋。故權詐而愈其疾也。觀此二事。可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也。大抵醋治諸瘡腫積塊。心腹疼痛。痰水血病。殺魚肉菜及諸蟲毒氣。無非取其酸收之意。而又有散癩解毒之功。李廷飛云。醋能少飲。辟寒勝酒。王戩自幼不食醋。年踰八十。猶能傳神也。(李時珍)醋酒爲用。無所不入。愈久愈良。亦謂之醴。以有苦味。俗呼苦酒。丹家又加餘物。謂爲華池左味。(陶弘景)劉熙釋名云。醋指也。能措置食毒也。古方多用酢字也。(李時珍)凡患熱病者。虛罷煩渴。津液燥竭。以醋一匙至二兩服之。頗佳。痘瘡。麻疹之帶腐敗者。以及爲狂犬咬。蛇等咬傷。用醋俱有速效。腐敗熱。痘瘡等。血液腐壞。溶崩。穿蝕血脈。因而患下血。吐血。血尿。血等症者。用此則能

阻遏腐敗。收斂血液。因血液運行怠慢而起之壞血病。(如航海之人。身體不運動。每發此病)醋能治之。醋之氣味寬透。性清涼。收斂。有鎮瘻之效。以蒸餾醋與糖漿。並密涅刺爾鎮痛液。少許混和。用於諸瘻變症。及上衝。頭痛。失眠。憂鬱病。狂癩殊驗。又有涼爽降鎮之效。凡用阿片難治之症。用此尤妙。醋橙汁及醋之製劑。並解酒醉。醋內加水服之。或塗鼻孔。皆良。服阿片眩眩者。飲醋亦奏速效。他如因服亞兒加里性辛熱醋。腐能令人麻痺。昏睡。發狂諸藥。或服雙鸚鵡。矢鳩。答顏茄。莖若諸藥。或誤食甲介等物。因而中毒者。醋能解之。惟中毒甚者。須先服吐劑。令得大吐。後再用醋。又爲烟氣所熏。致呼吸窒塞者。飲醋少許。立效。醋雖溶解凝血。然遇乳汁或脂油質。則立即凝結。故服乳汁者。及乳養之兒。不可服醋。飲則乳汁必凝結。胃中而不消化。停滯而爲酸敗之液。致起病。患頭眩。眩暈。或昏冒。卒倒。速令嗅醋。或以醋塗擦鼻孔。或以醋噴其面。便能醒解。此因醋性寬透故也。

醋中入銅青末少許。燃之。以不至沸騰爲度。入磁製之格兒。弗落。留之。則甚爲猛烈。以玻璃瓶收貯。密閉備用。凡腐蝕諸金用之。劇烈頭痛。以醋溫熱。使頻嗅之。或醋內加水。研和硝石。硝石各少許。布片蘸貼。或周匝頭部。有奇效。衄血。棉花蘸醋。深納鼻孔中。立止。或以布片蘸醋。縛頭上。亦佳。口中出血。醋水含漱。亦止。外傷。輕出血。以此貼之。良。婦人崩漏。孕婦及產後血崩。醋內加水沖淡。以水唧注入子宮。自愈。或產後子宮不收。縮。血崩不止。布片蘸冷醋。貼腹部。效。醋有溶解凝血之效。故跌打損傷。血絡破裂。其血汎溢。皮中發而爲青紫斑。及諸微腫者。用此自能消腫止痛。法於水中滴醋少許。微溫。布片溼透。貼。類類替換。或加燒酒。並研和硝石。硝石各少許。用之。亦妙。金瘡洗。醋中須多沖溫水。否則刺戟太甚。必發熱。醋能使骨變硬。硬骨變如軟骨。故骨傷者。外敷過久。骨遂失其堅剛之質。不能復元。患佝僂病之小兒。如給以酸味之飲食。物。諸骨倍形軟弱。而增加其疾病。


性類俱貯之硬。以此外敷。善能變軟而滑散。(骨爲土質所成。酸物能溶化土質。故魚骨等浸以醋即可變軟。燒酒則反之。能使纖維變硬。故軀肉可成肝。)醋中加苦味收積之藥品。用以外敷。善能防止腐敗。加規那末。其效尤甚。各種潰瘍有腐壞之慮者。宜以此防之。(或云。夏月醃肉加醋貯之。便不腐敗。其有防腐之效可知。一真珠。珊瑚。石。琥珀。螞蟥。卵殼等。浸以醋。亦即變軟。疫癘流行之時。燒石澆醋。以其蒸氣熏蒸居室。善能驅逐傳染之疫氣。(遠西醫方名物考)

十五畫 醋

可食食與藥用。採取 採得陰乾。速核用。性質 酸。溫。無毒。主治 久痢不痊。及痔漏下血。蚊咬心痛。小兒疳積。心膈脹滿。黃瘦。下寸白蟲。單搗爲末。酒服一錢。甚效。鹽醃藏者。食之生津液。醒酒。止渴。多食令人口舌粗拆也。【醋梨】即梨之以醋煮熟者。功用詳「梨」條。【醋荷草】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎杖」條。【醋漿】即酸漿之古籍別名。典見本經。詳「酸漿」條。【銷恨客】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白桃花」條。【銷根花】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白桃花」條。【銓草】即木賊草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木賊草」條。【透】即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳「銀箔」條。【銗】即白芍之古籍別名。典見別錄。詳「白芍」條。【靈龍根】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

銷 銗 透 銗 震 鞋 駝 駕 駝 髮 鬏

【鞋底魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。【駝】即駝之古籍別名。典見綱目。詳「駝」條。【駝】即駝之古籍別名。典見綱目。詳「駝」條。【駝】即駝之古籍別名。典見綱目。詳「駝」條。【駝脂】即駝駝脂之原名。詳「駝駝」條。駝駝條。【駝鳥】 命名 本品形如駝駝。古籍別名 駝駝雞。食火雞。骨托禽。(綱目)非洲駝。(動物學大辭典) 外國名詞 Struthio camelus L. (拉丁) Ostrich 或 Somali ostrich (英) Struthio molybdophanes (德) タチヨ一或タテウ或アフリカタテウ(日本) 基本 係脊椎動物鳥類走禽類駝鳥科。產地 出澳洲非洲及沙漠諸地。形態 駝鳥爲林禽類禽屬之最大者。嘴扁而短。似三角形。頭及頸探出淡紅色之皮膚。頸長頸幹短。翼短小而硬弱。長。腿部中骨出附喉部。表面粗糙具二趾。一具者有爪。一短者無爪。尾短。全體羽毛柔順。羽枝皆分離。更有缺羽枝爲捲髮狀者。體高七八尺。不能飛而善走。馬不及之。產卵沙漠中。其羽散人用以裝飾。屎可供藥用。



駝 鳥

性質 無毒。主治 人誤吞鐵石入腹。食之立消。【駝鹿】即鹿之極大而色蒼黃無斑者。詳「鹿角」條。【駝蹄雞】即駝鳥之古籍別名。典見綱目。詳「駝鳥」條。【駝鸚】即鸚鵡之古籍別名。典見綱目。詳「鸚鵡」條。【髮品】即水晶之雜有他石而成髮紋者。功用與尋常水晶同。詳「水晶」條。【鬏羊花】即羊鬏之古籍別名。

一六七三

採取 七八月間。花謝後半月內。昇粟結青苞時。午後以大針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮三五處。次晨津出。以竹刀刮收取之。入蒸器陰乾用。

用法 燒熟成泡。水化服。或剉和作丸散。

性質 酸。澀。溫。微毒。

成分 阿片含有主成分之嗎啡。此外尚有植物鹽基約十餘種。并護謨。樹脂。脂肪。蠟分。糖分。黏液素。蛋白質。灰分等。

效能 止瀉痢。定諸痛。為麻醉藥。有鎮靜腸蠕動機之功用。常用於下利。赤痢。霍亂。腸出血。急性腸閉塞諸症。又治腸結核。胃黏膜炎。

作用 入胃時。能刺激胃壁神經。令人發嘔。旋即被麻醉。疼痛等知覺。均行消失。胃分泌亦減少。至腸亦能刺激腸壁神經。使腸壁失去知覺。同時分泌減少。蠕動遲緩。及由腸壁次第吸入血中。已成為 Oxy-morphino $C_{17}H_{19}N_3O_5$ 。由末梢神經而達腦部。腦週先受其激。旋即被阻。蓋由 Oxy-morphino 直接行於腦血中。非自腦

十五靈 鴉

中之神經所致。其激腦功程所顯之狀。如令人感情隆重。志願暢達。幻想異常。敏銳過人。同時亦雜有紊亂之思想。性慾亦異常亢進。若服大量。或服時過久。竟能令大腦完全麻醉。全身知覺咸失。心跳緩慢。呼吸促進而死。

主治 瀉痢脫肛不止。能選丈夫精氣。

歷代記述致驗 【清】黃元御玉楸藥解論鴉片曰。鴉片煙收清飲固。治泄痢。脫肛。精滑夢遺。本草謂鴉片即罌粟未開。錢刺青苞。津出刮收。陰乾而成。名阿芙蓉。今洋船至國。多帶此物。國中無賴之徒。以及不肯子弟。宮宦長隨。優伶娼妓。以為服之添筋力。長精神。御淫女。抱嬰童。十倍尋常。但壽命不永。難逃五年。此煙非延年養生之品。斷宜戒之。【清】王士雄隨息居飲食譜論鴉片曰。亞片入藥。亦始前明。李漸湖本草綱目收之。清乾隆間。始有吸其烟者。初則富貴人吸之。不過自速其敗亡。繼則貧賤皆吸之。因而失業破家者衆。而盜賊滿天下。以口腹之欲。致毒流宇內。

塗炭生民。洵妖物也。智者遠之。亦有因衰病而誤。隨其中者。以吸之入口。直行清道。頃刻而遍一身。醫者能宣。醫者能舒。陷者能舉。脫者能收。凡他藥所不能治之病。間有一吸而暫效者。人不知其為劫劑。遂謬以為神丹。而日病吸此。尤易成引。迨引既成。臟氣已與相習。嗣後舊疾復作。必較前更劇。而烟亦不能奏效矣。欲罷不能。噬臍莫及。乃致遠死。余見實多。敢告世人。毋蹈覆轍。徐松齋云。天竺自六朝後。皆稱印度。今五印度為英吉利所轄。進口貨物。近以亞片為主。宇宙浮孽之氣。乃獨鍾於佛國。何其怪也。戒法。斷癮之方。驗者甚少。且用烟或烟灰者居多。似乎烟可少吸。一不服藥。癮即如故。惟此方日服。仍可吸烟。旬餘癮自漸減。又不傷身。蓋物性相制。此藥專制亞片之毒。故能斷癮。絕無他患也。方用鮮松毛數斤。略杵。井水熬稀膏。每晨開水化服一二錢。或每土一斤。用松樹皮半斤煎湯熬烟。如常吸食。癮亦漸斷。或以一味甘草熬為膏。調入烟內。初且少入。漸以加多。如

常吸之。斷癮極效。【清】黃宮繡本草求真論鴉片曰。阿芙蓉即罌粟花之津液也。一名鴉片。一名阿片。出於天方國。氣味與粟殼相似。而酸澆更甚。用阿芙蓉一分。糯米飯搗作丸。通治虛寒百病。凡瀉痢脫肛。久痢虛滑。用一二分。米飲送下。其功勝於粟殼。又痘瘡行漿時。泄瀉不止。用四五釐至一分。未有不止。但不可多服。忌酸醋。犯之斷腸。及忌葱蒜漿水。奈今有以房術為用。無論病症虛實。輒為輕投。縱慾以致腎火愈熾。吁誤矣。

國外學說 英美學說謂鴉片產中國。波斯。埃及。印度。土耳其等國。即白罌粟未熟者。割裂其殼。後流出汁液所成之乾膏。阿刺伯國名曰阿非恩。印度名曰鴉片末。自古以來。即有人能知其形性與功用。酒水。淡強水類。均能提出功力。歐羅巴尋常出售之鴉片。即土耳其國所產者。謂之土耳其鴉片。大半從土麥拿之口岸運出。間有帶至土耳其京師。發至歐羅巴各處。故英國藥品中之所用。係土耳其國之鴉片。又用埃及國之鴉片。率

十五畫 鴉

波斯國之鴉片。在英人幾不及知。其他如印度國所產之鴉片。多運至中國出售。第印度國所產之鴉片有二種。一作球形而大如柚。俗呼為公。一作餅塊而無皮。俗呼為白。中國之雲南所產者亦呼為白。然功力之峻。則究以公為最。藥品中必以乾者為合用。否則澱澱不能一定。惟鴉片膏則不必用其乾品。且鴉片以產土耳其者為上。其次為印度。中國若將業經取汁液之渣。熬水成膏。而用以攪入其品。最下鴉片內含十八精二酸。內惟膠精為最要之質。鴉片內所含之膠精。最多者為法國鴉片。與日耳曼國鴉片。每百分中計有膠精十六分至二十分。評論其品之高下。即以此內含膠精之多寡而定。膠精多則力峻而價昂。且鴉片每百分則以內含膠精六七分者。方可入藥。若過少便不足於用。其作用為寧睡藥之首。初服則大感動腦線。以後則減腦線之知覺。又能特意感動腦髓令睡。如為外科之用。初時能行血氣令其覺痛。即如用於眼睛。先覺痛後覺平火安心。

內科之用。食一小服。則先行血氣。令脈加數。皮膚加熱。不久則知覺減少。心中安穩。則欲睡而其痛減輕。身體內失生津液之功用。惟皮膚仍如故。如食過大之服。則為令人寧睡之毒藥。常用之為止痛令睡平火安心。或放出津液過限。然不免有頭痛煩渴便燥嘔吐等狀。如瀉瀉病與霍亂吐瀉病。能令其停止。常服則使人胃弱不化。呼吸短少。致血內養氣不足。又可用為發汗藥。治轉筋藥。治發熱藥。又酒狂病。食大服能得其益處。生炎病。可合於承(二)綠(甘承)或衣必格(吐根)服之。依尋常而論。生炎或發大熱。服鴉片為相反之治法。以鴉片為各種藥品中之最要。故較他種藥品用之更多。且如服各種瀉劑。而加鴉片少許。以鴉片能制其猛烈。如用承(二)綠承藍丸等作改血藥(變質劑)而必合鴉片同服。以鴉片能助其力。如用衣必格作表藥。而必借以鴉片。以鴉片能助其發汗。如用樟腦癩痛。而亦加以鴉片者。以鴉片能助其止痛。又如平人略服。則益腦提神。腦

快有力。迴體肌肉。皆覺收攏。惟腦則受功力最多。故至略醉。未幾則自覺心神舒暢。又劇痛之症。服之則可止痛。如疑肺發炎作痛。先用涼劑去炎。隨用鴉片止痛。甚驗。惟身尚有熱者。俟熱退方可服。如心痛肚疼。係由胃不消化者。須先服吐瀉等藥。後服鴉片。其痛可止。如膽淋及內腎淋等症作痛者。先以熱水浸身。次服鴉片。以止其痛。如小便痛及婦人經痛者。亦先以熱水浸下身。後亦加服鴉片。庶易全愈。如牙痛耳痛。服之亦佳。或用棉花蘸鴉片酒塞入患處。如初患風溼。時或作痛。服之可治。或用鴉片酒射入患門。如有等毒瘡。雖不可療治。當劇痛時。服之亦可緩痛。又如如有等不能安寢之症。服之能治。如或發酒顛。或發瘋顛。竟夕喧嘩。服之亦可就寢。又如抽筋一症。有由羊癲而發者。有因產後而起者。實係腦力妄發。服之即可平腦。又如紅白痢。須先服大黃等藥。以去其積滯。後服鴉片丸。或鴉片酒。或膠精。均效。又如咳嗽。凡乾咳無痰者。服之方合。如痰多用此。恐至

一六七六

痰塞氣管。宜佐以祛痰藥為安。如鴉片表散(托布兒私散)是也。其他如誤服過多。或求自殺者。始則頭昏。繼則不醒人事。或五六點鐘。或十一十二點鐘而氣絕。第鴉片除內服外。或取以化水。用水節射入肛門。或用小水節刺入皮內。以藥水射之。均能獲效。如止痛寧睡及治各症。以一釐或二釐為一服。有煙癮者宜重服。然或多服而仍不驗。則以藥水由肛門射入。即驗。如嘔吐不止及大腸痛。內腎痛。膀胱痛等症。亦宜以藥水射入。至解藥之解此毒。須先用吐劑。如膽礬一分七釐半。或白礬半兩。或芥末半兩。用溫水一碗。化服令吐。後再多飲溫水助嘔。至吐清水為止。後再飲咖啡茶或濃細茶。或服咖啡精。又扶助行走。勿寐。倘患者不能服藥。用抽水筒以抽淨其毒。次將濃咖啡茶或咖啡精送入胃內。若其狀仍昏迷。再用空針射了刀邊精水八釐七毫半。至一分七釐半。入皮內。以取其毒。外用冷水洗面及前後心。或用手巾蘸水拍打亦可。行此數法。如氣息仍不舒

展急將患者二臂向前後屈伸。以助呼吸（人工呼吸法）或用電機以震動其身。日本學說謂鴉片之主成分爲莫兒比涅（即麼啡）其主治爲麻醉止痛藥。於莫兒比涅之適症。間有用之者。鴉片之特效爲諸般下痢。如由感冒之下痢（於飲食不慎之下痢。當禁）虎列刺（霍亂）等。一日數回。○、○、○五至○、二（自一毫三絲。至二釐六毫）爲散丸與之。此外於腹膜炎。霍亂病（三消病）錯港便秘。某種精神病。酒客譫妄等亦適用。極量一回○、一五（三釐九毫）一日○、五（一分三釐）又和漢藥考曰。罌粟爲一年生或二年生草本。多栽種於園圃。作藥及賞玩之用。莖高四五尺。葉爲長橢圓或長卵圓形。邊緣有缺裂。或生鋸齒。葉面平滑。包以莖。無葉柄。花梗生長茸毛。花四瓣。大朵。色有白、紅、紫各種。皆鮮豔異常。有多數雄蕊。與莖狀之雌蕊。果實爲蒴果。形亦如蜜。頂端裁隆。莖頭之圓片。房室少者七。多者十五。中藏種子無數。種子色白或青黑。收採阿片之法。

十五畫 鴉

各國雖不一致。要亦大同小異。日本收採之法。大抵在花謝後七日。至十日。蒴果未熟之際。於其縱凸處。自下向柱頭部割破果殼。至不割斷爲度。則其內自有漿汁滲出。一受空氣。立即凝結。變黑如糊。乃以竹筴刮下。撲集煉合。盛以器。置室中陰乾。照法令獻諸政府。收穫之量。視罌粟之種類及栽種法。收採法而不同。大約每地十畝。可得阿片三十至四十兩。最多六十兩。又曰。阿片製劑有數種。如阿片越幾斯。阿片酒。阿片安息香酒。阿片吐根散。阿片吐根錠。阿片坐藥。芳香阿片酒。以上皆爲日本藥局方（第四版改正本）所收載者。阿片水。阿片糖漿。香紅花阿片酒。阿片糖膏。阿片硬膏。齒痛丸。狄里亞加。瓶劑。以上皆日本藥局方所未收載。

配合應用 ●治久痢。阿芙蓉小豆許。空心溫水化下。日一服。忌葱蒜藥水。若渴飲蜜水解之。（藥要方）

●治赤白痢下。鴉片、木香、黃連、白朮各一分。研末。飯丸。小豆大。壯

者一分。老幼半分。空心米飲下。忌酸物。生冷油膩茶酒。無不止者。口渴略飲米湯。

●鴉片。土十六兩。切薄片。汽水一百二十兩。先用水四十兩。浸鴉片一天。過布絞渣。再用水四十兩。製如前法。三次亦如之。共將三水合一。過呢布。入燙鍋散氣。廢八兩爲度。每服八毫七絲半。至一釐七毫半。此膏行氣之力。較鴉片土略小。惟用爲平火安心則最良。如人跌仆或被毆打痛劇。服此膏二三釐。能飲血止痛。不效則再服一二次。如發狂而不欲睡。每服此膏四五釐。服二三次。

●鴉片一分半粗末。淡酒二十分。浸七天。濾渣。用絞盤絞之。過淋紙。再加淡酒。仍足二十分爲度。能止痛寧睡。比鴉片略速。每服八釐七毫半。至七分（鴉片酒方）

●鴉片膏一兩。肉桂一錢半。搗爛。丁香一錢半。搗爛。白葡萄酒二十兩。共浸七天。間時搖動。過淋紙。再加酒淋渣。仍足二十兩爲度。與鴉片酒同用。第其力則較遜。每服一分七釐至七分。

●治新舊瀉痢新痢疾。鴉片八毫。研末。樟腦三釐。辣椒八毫。共研勻。加蜂蜜作一丸。

用量 五釐至一分。

施用宜忌 凡外有風寒實邪者禁用。

參攷資料 ●俗人房中術用之。京師傳一枚金丹云。通治百病。皆方技家之術耳（李時珍）●阿芙蓉前代罕聞。近方有用者。云是罌粟花之津液也。罌粟結膏。苞時午後以大針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮。或三五處。次早津出。以竹刀刮收入瓶。器陰乾。用之。故今市者。猶有苞片在內。王氏醫林集要。謂是天方國種。紅罌粟花。不令水淹頭。至七八月。花謝後。以大針刺其外面青皮而取之者。按此花五月質枯。安得七八月後尚有青皮在者。或方土不同乎（李時珍）

●鴉片止痢功勝粟殼。但忌常服。久反無驗。且耗陰液。雖提助精神。而損折人壽。切戒之（本草述）●阿片之入藥用。太古時已知之。洎於中古。又知其爲麻醉藥。繼此而吸食鴉片之風。漸播及於土耳其

十五畫 鴉 糜 廐 麩 麩 麩 麩

以及東亞諸國(和漢藥考)按
 破食阿片以其麻醇故有能使心
 神愉快之效故染之者多久則中
 嗎啡之毒因之志氣消沈精力喪
 失凡人有此嗜好則於國家之消
 長關係素重故各國皆禁止其貿
 易且防止吸食焉(和漢藥考)○
 鴉片為罌粟花結實時刺出之汁
 略含半乾如曬乾磨之則得黃棧
 色之粉凡身內有大痛則鴉片為
 最妙之止痛藥如病者不能安睡
 則鴉片為最妙之安睡藥如動筋
 時痛鴉片亦能治之凡發熱之病
 皮膚乾熱脈數皆有厚苔不可服
 鴉片因鴉片之性能補火凡中風
 腦炎等病亦不可服鴉片因鴉片
 能令血聚於腦也小兒之病切勿
 可用之因其性猛烈小兒不能當
 也(儒門事親)○鴉片以產土耳
 其者為上。次則印度。再次則中國
 功用能止痛補腦平腦每服一釐
 或二三釐(內科新說)
 【鴉目】即石硫黃之日籍別名。典
 見和漢藥考。詳「石硫黃」條。
 【鴉鳥】即烏鴉之古籍別名。典見
 爾雅。詳「烏鴉」條。

【鴉草】 產地 出河北各屬。
 採取 三伏後新採之。

性質 淡苦。辛。微溫。
 功用 祛風消腫。壯筋活絡。
 主治 風痰。

【鴉街草】即紫草之古籍別名。典
 見吳普本草。詳「紫草」條。
 【鴉磨子】即苦參子之處方用名。
 詳「苦參子」條。

【鴉鵲翻】 產地 生南安。
 形態 叢生。莖莖對
 葉。如地榆而尖。結小子成。攢。莖紫
 可愛。並可供藥用。



鴉鵲翻

性質 甘。溫。
 主治 陸發頭腫。頭風。(溫酒
 服) 並治跌打損傷。

【麩】即麩子之古籍別名。典見爾
 雅。詳「麩」條。
 【廐】即廐大者之別名。典見綱目。
 詳「廐」條。

【麩】即麥麩之原名。詳「麥麩」條。

【麩米】 基本 本品或以米。或
 以麥炒成。其味香。

古籍別名 糗。麩米。花。乾。糗。糗。
 (綱目)
 性質 甘。苦。微寒。無毒。
 主治 和水服。解煩熱。止洩。實
 大腸。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉
 祐圖經本草論麩米曰。麩米治寒
 中除熱渴。消石氣。【明】李時珍本
 草綱目論麩米曰。炒米湯。止煩渴。

參攷資料 ①麩。蒸米或麥蒸
 過。磨作之。(蘇恭) ②河東人以麥
 爲之。北人以粟爲之。東人以粳米
 爲之。炒乾飯磨成也。(陳藏器)

【麩米花】即麩米之古籍別名。典
 見綱目。詳「麩米」條。

【麩炒根殼】即根殼用麥麩焙炒
 成者之處方用名。詳「根殼」條。

【麩炒根實】即根實用麥麩焙炒
 成者之處方用名。詳「根實」條。

【麩金】即金之出水中而形如
 麩片者。功用詳「金」條。

【麩麥】即浮小麥之古籍別名。典
 見和漢藥考。詳「浮小麥」條。
 【麩木子】即檳榔子之古籍別名。

典見御覽記。詳「檳榔子」條。

【麩筋】 基本 本品即以小麥
 粉和水揉洗而凝結成
 團者。

性質 甘。涼。無毒。
 主治 解熱和中。分熱人宜食
 食之。

歷代記述攷證 【明】寧原食
 鑑本草論小麥麵筋曰。寬中益氣。
 參攷資料 ①麵筋以麵與麩
 水中揉洗而成者。古人罕知。今爲
 素食要物。養食甚良。今人多以油
 炒。則性熱矣。(李時珍) ②生嚼白
 麵成筋。可粘禽蟲。(寇宗奭)

【麩麩】 製法 三伏時。用白麵。
 綠豆以漿汁煮爛。辣葱
 末。杏仁泥和踏成餅。楮葉包懸風
 處。候生黃收用。

性質 甘。溫。無毒。
 主治 消食積。酒積。糯米積。研
 末酒服。立愈。餘功同小麥麩。

【麩糖】即糖之古籍別名。典見綱
 目。詳「糖」條。

【黎豆】 命名 黎亦黑色之稱。
 本品莢老則黑。煮汁亦
 黑。故名。

古籍別名 狸豆。虎豆。(綱目)

鼠豆。(滇南名)八升豆。(日本)

外國名詞 Mucuna capsi-

tata, W. of A. (拉丁)ハッシ

ヨウマメ オシヤラクマメ

フチマメ テンチクマメ (日

本)

基本 係豆科黎豆屬。爲黎豆

之子實。

產地 生山野田間。

形態 黎豆爲穀類豆屬之一

年生蔓草本。莖條引莖。葉如豇豆

但葉脈偏斜。夏秋間開花成簇。花

大呈紫色如蠶豆花。十餘莢同生

一處。長三四寸。大如拇指。有白茸

毛。老則黑而露筋。其種子大如刀

豆。淡紫色有斑點如狸文。可供食

與藥用。

性質 甘。微苦。溫。有小毒。

主治 溫中益氣。

參攷資料 黎豆煮去黑汁。同

豬雞肉再煮。食之味乃佳。但多食

令人悶。(綱目)

【黎椒】 別名 抱娃子椒。(俗

名)

性質 辛熱。

十五畫 黎

齒 十六畫 凝 噤 壁

主治 同川椒。

參攷資料 川椒故有名。產

自黎大所城隅者尤香冽。大小必

雙肉。理細密。瘰裂而子不墮。俗呼

抱娃子椒。(邊州聞見錄) 四川

志各州縣多出椒。惟茂州出者最

佳。其殼一開一合者尤妙。按黎椒

近日亦罕有真者。外方所得俱屬

彼土人以他產僞充。其功效亦僅

與川椒相埒。據劉少府挹清云。真

者含一二粒口中。可辟瘴毒解魚

蝦食毒。更可爲導淫具。彼土中有

一種生惡瘡。妓女不敢近。惟吞

黎椒三粒。與之接則無害。次日便

出。椒內盡包其毒。不入人臟腑也。

故真者彼土亦珍貴之。罕有出售

於外者。(趙恕軒)

【黎藤子】 卽宜母果之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「宜母果」條。

【齒壁】 卽人齒垢之原名。詳「人

齒垢」條。

十六畫

【凝水石】 卽寒水石之原名。詳「

寒水石」條。

【凝海菜】 卽石花菜之日本名。詳

「石花菜」條。

【噤】 卽無患子之古籍別名。典

見本草拾遺。詳「無患子」條。

原名 守宮。

【壁虎】 命名 本品善捕蠅。蠅

橫止壁間。故名。

古籍別名 壁宮。蠅虎。(蘇恭)

壁虎。蟬。 (揚子方言)

外國名詞 Platydaetylus

chinensis 或 Gecko chinensis

(Gecko)

基本 係脊椎動物爬蟲類蜥

蜴類守宮科之守宮。

產地 牆壁及樹木間。處處有

之。

形態 壁虎爲爬蟲類之一種。

形似石龍子而較扁。頭部扁。口大。

舌肥厚。吻被方鱗。鱗在上唇者有

十一枚。下唇九枚。頭大有五角鱗。

頭下鱗一對。兩鼻孔相隔。眼大

無。喉脊暗黑。有黑小點。多粟狀突

起。腹黃白。四肢短。各具五趾。除第


一趾外。多有鈎爪。趾有橫褶。藉

其排除空氣之作用。能爬行牆壁

等處。尾尖長。頗脆。易斷而亦易復

生。體長三四寸。捕食蜘蛛蚊蠅等。

有益於人。亦可供藥用。



壁 虎

性質 鹹寒。有小毒。

主治 中風癱瘓。手足不舉。或

歷節風痛。及風狂驚癇。小兒疳積。

血積成痞。癩風瘰癧。疥癬。蠅。

參攷資料 守宮。舊附見於石

龍下。云不入藥用。近時方術多用

之。楊仁齋言。痔瘡皆心血不足。其

血與心血相類。故治痔瘡。取其血

以補心。其說近似。而實不然。蓋守

宮食蠅。蠅乃治風要藥。故守

宮所治風。瘰癧。癩。亦猶蠅

之性能透經絡也。且入血分。故又

治血病瘡瘍。守宮。石龍利水。

功用自別。不可不知。(李時珍)

主治 聖濟總錄曰。

【壁虎糞】 胎赤爛眼昏暗。用活

者數枚。以醋盛黃土。按實入。蟻虎

在內。勿令損傷。以紙封口。穿數孔

一六七九

出氣。候有糞數粒。去糞上一點黑者。只取一頭白者。唾津研成膏。塗眼睫周圍。不得揩拭。來早溫漿水洗三次效。

【壁虱胡麻】即亞麻之古籍別名。典見綱目。詳「亞麻」條。

【壁宮】即壁虎之古籍別名。典見新修本草。詳「壁虎」條。

【壁魚】即衣魚之古籍別名。典見綱目。詳「衣魚」條。


【壁蝨】 古稱別名 蚌。(動物學大辭典) 臭蟲。壁虱。(綱目) 菱蝨。菱蚤。扁蝨。(綱目) 拾遺) 扁蝨。(俗名)

外國名詞 Ixod & ricinus, L. Cattle tick 或 Ticks Zooleo 或 Holzoock (拉丁) 天 = (日本)

基本 係節肢動物。屬蜘蛛類。壁蝨類。壁蝨科。

產地 產南方積溼之地。今江南北人家多有之。稍不潔即生此物。旅店驛舍中尤多。帶入衣被歸家。即生多藏。藏處中及壁內。或桌檯縫間。其身扁而易入。至冬則入糞。多藏壁隙。桌縫及泥沙山穴中。及古樹根下。交春皆啓。然而出

形體 壁蝨屬昆蟲類。體橢圓。色棕黑。皮為革質。現作紋。間有毛。或刺口。適於吮吸。及刺整。頸有鈎。觸角短小。腹大無環節。脚分七節。尖端具鈎爪。或有圓盤。無心臟。亦無脈管。脚四對。幼時三對。體長三分餘。細小如蟻。其生殖極速。頗易蕃育。白色卵生。雌雄異體。初生便習人生。一二月即能褪壳。愈褪愈大。漸漸而老。色由斑紅而轉棕黑。常隱伏於床褥隙中。晝伏夜出。吸血時。注入毒汁。故被吸者。痛痒赤腫。塊粒繁聚。搔則愈大。疼痛難禁。幼兒皮膚嬌嫩。其苦尤甚。捕得可供藥用。



壁蝨

製法 凡入藥須置溫水中。令臭氣洩盡用。
性質 氣腥。味微鹹。性平。在土者有毒。

主治 治明眼。小兒疳風。療眼生翳。針疔疥。癩瘡。

配合應用 治明眼。用壁蝨十枚。滴花燒酒浸服。(集驗方)

治疔瘡。用臭蝨同水龍竹搗。和麻油調敷。出盡黃水立愈。(西華藥鏡方)

治眼生翳針。臭蝨血點之即散。又方。治小兒疳風。用壁蝨於淨水中。漂去臭氣。焙乾入藥。(海上方)

拔疔。臭蝨同米飯搗勻。搽疔上。能立拔疔根外出。(楊氏經驗方)

治鮮魚刺刺。問谷苗香葉。使鹽花燒酒。搗糊。搗上。如口久爛。用臭蝨。剝去頭傳之。(醫宗彙編方)

毒效資料 壁蝨即臭蝨。狀如酸漿仁。啜人食血。與蚤皆為牀榻之害。古人多於席下置麝香。雄黃。或苜蓿。或藜香末。或棟花末。或麥末。或燒木瓜烟。黃蘗烟。牛角烟。馬蹄烟。以熏之也。

【壁虱胡麻】即壁虱胡麻。參見「亞麻」條。
【壁蝨】即壁蝨之古籍別名。典見

綱目。詳「壁蝨」條。

【壁錢】 命名 本品窠形如錢。故名。


古稱別名 壁錢。(綱目) 壁蝨。(俗名) 壁蝨。蟬子。

外國名詞 Tegonaria do, Hottica T (拉丁) ヒラタグモ 或ウチグモ (日本)

基本 屬節肢動物蜘蛛類。其窠詳見該條。

產地 牆壁屋角間多有之。

形體 壁錢為卵生蟲類之一種。其體扁。色灰褐。頭背具單眼四。分為二列。腹多小黑點。脚長而有四對。卵蘇色白而圓扁。固着於壁。間常守護之。夜間徘徊壁上覓食。捕得可供藥用。



壁錢

性質 無毒。

主治 鼻衄及金瘡出血不止。按取蟲汁。注鼻中。及點瘡上。亦療五野雞病下血。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論壁錢曰。治大人小兒急併。牙蝕腐臭。以壁蟲同人中白等分。燒研貼之。又主喉痺。

參攷資料 壁錢或云有毒。咬人至死。惟以桑柴灰煎取汁。調白礬末傳之妙。【李時珍】

【壁錢窠幕】

古籍別名 壁。南（綱目拾遺）

主治 小兒嘔逆。取二七枚。煮汁飲之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論壁錢窠幕曰。產後咳逆。三五日不止。欲死者。取三五個。煎汁呷之。良。又止金瘡諸瘡出血。不止。及治瘡口不斂。取兩頰貼之。止蟲牙痛。

【壁竇】即壁錢窠幕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【壁錢窠幕】條。

【壁蝨】即壁錢之別名。詳【壁錢】條。

【壁鏡】即壁錢之古籍別名。典見綱目。詳【壁錢】條。

【學木】

形體 學木為雜木類之一種。其核如蕤核。可供藥用。

採取 五月採之。陰乾用。

性質 甘寒。無毒。

主治 脇下留飲。胃氣不平。除熱。

【導河】即藜苔之古籍別名。典見和漢藥考。詳【藜苔】條。

【導河絲】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳【土茯苓】條。

【強仇】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳【百合】條。

【懸葱】即藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳【藜蘆】條。

【獨搖】即扶移之古籍別名。典見綱目。詳【扶移】條。

【攢劍】即蟹之古籍別名。典見綱目。詳【蟹】條。

【攢不歸】即淡芭菰。參見【烟草】條。

【擔羅】基本 擔羅為介類蛤類之一種。可供藥用。性質 甘平無毒。

主治 熱氣。消食。雜昆布作羹。主結氣。

【燻火】即燻火之古籍別名。典見吳普本草。詳【燻火】條。即景天之古籍別名。典見別錄。詳【景天】條。

【暹邏燕】即燕窩之處方用名。詳【燕窩】條。

【椹仁】即酸棗仁之古籍別名。典見爾雅。詳【酸棗仁】條。

【椹皮】即秦皮之古籍別名。典見別錄。詳【秦皮】條。

【椹核】即椹之古籍別名。典見爾雅。詳【椹】條。

【樹莓子】即懸鉤子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳【懸鉤子】條。

【樹梨】即鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳【鹿梨】條。

【樹蜜】即枳椇子之古籍別名。典見古今注。詳【枳椇子】條。

【樹頭酒】即椰子漿之別名。詳【椰子漿】條。

【樹雞】即木耳之古籍別名。典見韓文。詳【木耳】條。

【樹蠟】即蟲白蠟之處方用名。詳

【蟲白蠟】條。

【樺木】命名 本品蠟工以皮燒烟。黑紙作古蠟字。蓋本作蠟。俗省作為樺。

古籍別名 樺木。外國名詞 Betula alba, L. var. vulgaris, DC(拉丁)シラ

カンバ シラカバ(日本) 基本 係樺木科樺木屬。為樺木之皮。其脂詳見該條。

產地 出遼東及西北諸地。形態 樺木為落葉喬木。高三四丈。樹皮白色。有紫黑斑紋。厚而輕軟。易剝。葉卵形而尖。有長柄。互生。夏月開花。單性。雌雄同株。皆排

列為穗狀花序。結實如球狀。鱗間多細子。其皮古以製弓輪。鞍。鞍。刀把等物。亦可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 諸黃疸。濃麥汁飲之良。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器



木 樺

本草拾遺論樺木皮曰。煮汁冷飲。主傷寒。時行熱毒瘡特良。即今時豆腐也。【宋】寇宗奭本草衍義論樺木皮曰。燒灰。合他藥。治肺風毒。【明】李時珍本草綱目論樺木皮曰。治乳癰。

【樺木脂】 主治 燒之。辟鬼邪。

【橄欖】 即橄欖之古籍別名。與見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【橄欖】 處方用名 青果。橄欖。古籍別名 青果。(梅

聖俞集) 忠果(記事珠) 諫果(農書) 青子。次斯。忠臣。南威。栗果。味酸。橄欖。回甘子。詞梨子。翠顆。(和漢藥考) 綠橄。方橄。(綱目)

外國名詞 Canarium alburnum (拉丁) hinese Olive (英)

基本 屬橄欖科橄欖樹之果實。產地 凡岡、廣等省及熱帶地方之山野平原間。恒有產焉。其產於西藏者。名西藏青果。尤為珍品。和漢藥考曰。產安南及中國南部。形態 橄欖為落葉喬木。高丈餘。葉為奇數羽狀複葉。花攢簇成

穗狀。枝節間有脂如膠。子實為堅硬肉果。以帶白色者為上品。內有六稜紡錘狀核。頗堅硬。破之。有三房。房各有細長仁。謂之橄仁。

採取 八九月間採之。

製法 凡使須揀小者佳。並去尖。以火煨存性研制用。亦有切斷煎入湯藥。

性質 酸。甘。溫。無毒。

效能 生津。止渴。清咽解毒。用作緩和滋養藥。又解酒毒及魚鱉毒。

主治 生食煮飲。並消酒毒。解鱉魚毒。

歷代記載攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論橄欖曰。嚼汁嚥之。治魚鱉。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論橄欖曰。生啖煮汁。能解諸毒。【宋】大明諸家本草論橄欖曰。開胃下氣。止渴。【明】李時珍本草綱目論橄欖曰。生津液。止煩渴。治咽喉痛。咀嚼嚥汁。能解一切魚鱉毒。【明】繆希雍本草經疏論橄欖曰。橄欖本經味酸甘。今嘗之。先澀而後甘。得土中之陽氣。氣溫無毒。肺胃家果也。能生津液。酒後嚼之不渴。故

生津。消酒。甘能解毒。故療鱉魚毒也。馬志云。鱉魚即河豚也。人誤食此魚肝及子。必迷悶至死。惟橄欖汁者服之。必解。其木作橄欖。著魚皆浮出。故知物有相畏如此。不特味甘解毒之義也。【明】李士材本草圖解論橄欖曰。橄欖澆而甘平。生津止渴。清咽止咳。開胃下氣。止渴固精。解一切魚毒及酒毒。【清】黃

宮繡本草求真論橄欖曰。橄欖稟受土陽。其味先酸後甘。氣溫無毒。肺胃家藥也。性生津止渴。酒後嚼之最宜。故書載能解酒毒也。人服河豚魚肝及子。迷悶至死。取此

煮汁飲。即解。故書又載能解諸魚之毒。及治魚骨之鯁。至於痘瘡不起。並痘抓碎成瘡。腸風下血。耳足凍瘡。初生胎毒。鼻裂生瘡。牙齒風疳。下部疳瘡。陰腎癩腫等症。用此

無不皆效。以其具有溫行酸斂之性耳。但此性尚搜滲胎毒。過服則有嘔吐泄瀉之虞。性尚聚火。清氣寒嗽。用之得宜。熱嗽則不免有熱氣上蒸之弊也。【清】王士雄隨息居飲食譜論橄欖曰。橄欖酸甘平。開胃生津。化痰滌濁。除煩止渴。涼

以清香而小者為良。大而酸澀者不可食。其兩頭之尖端。食時宜切去。因其性熱也。又市上所售者。大都用礬水浸過。以其能保護其常

青之顏色也。但礬水性澀且燥烈。非徒無益。且又害之。而於喉痛等症。更有極大不利。故市上所售之物。宜細細辨之。其色稍黃有黑點者。即其日期已久。已經礬水浸過。不可食。即青者亦宜用水洗淨。方免危險。

配合應用 治河豚魚鱉諸毒。諸魚骨鯁。用橄欖攪汁。或煎濃湯飲。無橄欖以核研末。或磨汁服。

(隨息居方)

治腸風下血。橄欖燒存性。研

末。每服二錢。陳米飲調下。(直指方)

①治耳足凍瘡。橄欖核燒研。油調塗之。(乾坤生意方)

②治初生胎毒。小兒落地時。用橄欖一箇燒研。硃砂末五分。和勻嚼生脂麻一口。吐唾和藥。絹包如棗核大安兒口中。待嘔一個時頃。方可與乳。此藥取下腸胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少也。(孫氏集效方)

③治唇裂生瘡。橄欖炒研。豬脂和塗之。

④治牙齒風疳。膿血有蟲。用橄欖燒研。麝香少許貼之。(聖惠方)

⑤治下部疔瘡。用橄欖燒存性。研末。油調敷之。或加孩兒茶等分。(乾坤生意方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①按名醫錄云。吳

江一宮人食鱖魚。被鯁橫在胸中。不上不下。痛癢動隣。里半月餘。幾死。忽遇漁人張九。令取橄欖與食。時無此果。以核研末。急流水調服。骨送下而愈。張九云。我父老相傳。橄欖木作取魚棹。魚觸着即浮

十六畫 橄

欖

出。所以知魚畏橄欖也。今人煮河豚。園魚。皆用橄欖。乃知橄欖能治一切魚噎之毒也。(李時珍) ①味澀而甘。醇飽宜之。然性熱。多食能致上壅。(朱良亨) ②橄欖鹽過時不苦澀。同梨子食甚香。按延壽書云。凡食橄欖。必去兩頭。其性熱也。過白露摘食。庶不病疔。(李時珍) ③橄欖名義未詳。此果雖熟。其色亦青。故俗呼青果。其有色黃者不堪病物也。王禎云。其味苦澀。久之方回甘味。王元之作詩比之忠言逆耳。亂乃思之。故時人名為諫果。(李時珍) ④橄欖生嶺南。樹似木棉子。樹而高。端直可愛。結子形如生詞子。無稜瓣。八九月採之。又有一種波斯橄欖。生邕州。色類相似。但核作兩瓣。蜜漬食之。(馬志) ⑤其樹大數圍。實長寸許。先生者向下。後生者漸高。熟時生食。味酢。蜜漬極甜。(孟詵) ⑥按南州異物志云。閩廣諸郡。及綠海浦嶼間。皆有之。樹高丈餘。葉似檉柳。二月開花。八月成實。狀如長棗。兩頭尖。青色。核亦兩頭尖。而有稜。核內有三竅。中有仁可食。(李珣) ⑦按劉恂嶺

表錄異云。橄欖樹枝皆高聳。其子深秋方熟。南人重之。生咀嚼之。味雖苦澀。而芬香勝於含鷄舌香也。有野生者。子繁而樹峻。不可梯緣。但刻根下方寸許。納鹽入內。一夕子皆自落。木亦無損。其枝節間有脂膏如桃膠。南人採取和皮葉煎汁。熬如黑餒。謂之橄糖。用泥船隊。牢如膠漆。着水益乾也。(蘇頌) ⑧橄欖樹高。將熟時以木釘釘之。或納鹽少許於皮內。其實一夕自落。亦物理之妙也。其子生食甚佳。蜜漬鹽藏皆可致遠。其木脂狀如黑膠者。土人採取蒸之。清烈。謂之橄香。雜以牛皮膠者。即不佳矣。又有綠橄欖。色綠。烏橄欖。色青黑。肉爛而甘。取肉搗碎。乾放。自有霜。如白鹽。謂之橄糖。青橄核內仁乾小。惟烏橄仁最肥大。有文層疊如海蝶。蟬狀。而味甘美。謂之橄仁。又有一種方橄。出廣西兩江峒中。似橄欖而有三角或四角。即是波斯橄欖之類也。(李時珍)

【橄欖仁】 性質 甘平。無毒。主治 唇吻燥痛。研爛傅之。
【橄欖金】 即金之一種。性質功用。詳「金」條。
【橄欖核】 性質 甘。溫。無毒。主治 磨汁服。治諸魚骨鯁。及食鹵成積。又治小兒痘瘡倒靨。燒研服之。治下血。
【橄欖露】 效驗 清肺。開胃。下咽喉。解諸毒。及河豚毒。
主治 喉症。
【檉木】 古醫別名 檉木。檉筋。木(綱目) 產地 生江南山野中。形態 檉木為喬木類之一種。木質堅硬。葉厚而大。花白色。與葉可釀酒。其木煮汁。可染絳色。而木灰可供藥用。
性質 甘。溫。小毒。
主治 卒心腹絞痛。瀉瀉。淋汁八升。釀米一斗。待酒熱。每溫飲。半合。漸增至一二盞。即愈。
【檉筋木】 即檉木之古籍別名。典見綱目。詳「檉木」條。

十六畫 榴 棗 榕 橘

一六八四

【榴皮炭】即石榴皮之處方用名。詳「石榴皮」條。

【藜吾】即款冬花之古籍別名。典見本經。詳「款冬花」條。

【藜駝】即駝駝之古籍別名。典見漢書。詳「駝駝」條。

【藜簞尊師】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「淫羊藿」條。

【檜榲果】即甲搭果之別名。詳「甲搭果」條。

【橘子】原名 橘實。古籍別名 沙橘。(類目) 綿橘。(橘譜)

性質 甘酸。溫。無毒。

主治 甘者潤肺。酸者聚痰。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論橘實曰。止消渴。開胃。除胸中隔氣。【宋】王士雄隨息居飲食諸論橘實曰。橘子甘平潤肺。析醒解渴。閩產者名福橘。黃巖所產皮薄色黃者名蜜橘。俱無酸味而少核。皆為佳品。然多食生痰聚飲。風寒咳嗽及有痰飲者勿食。味酸者戀隔滯肺。尤不益人。豈可糖醃作脯名曰橘餅。以其速皮造成。故甘辛而溫。和中開隔。溫肺散寒。治

嗽化痰。醒酒消食。參攷資料 ●橘皮下氣消痰。其肉生痰聚飲。表裏之異如此。凡物皆然。今人以蜜煎橘充果食。甚佳。亦可醬菹也。(李時珍) ●多食戀隔生痰。滯肺氣。(寧原) ●同榜蟹食。令人患軟癱。(吳瑞)

【橘白】者。即橘皮之去紅者。性質 苦辛。溫。無毒。

主治 和胃化濁膩。處方用名 陳廣皮。廣橘皮。新會皮。廣橘皮。福橘皮。上廣皮。甜廣皮。上中廣皮。陳皮。桔皮。廣皮。炭。青鹽陳皮。參貝陳皮。梳橘皮。

古籍別名 紅皮。(湯液) 賁老。(和漢藥考) 外國名詞 Peel of apricot orange (英)

基本 係芸香科桔屬漿果之果皮。產地 陳仁山藥物生產辨云。陳皮產廣東新會為最。四會潮州四川所產者俱不適用。以十一月冬至前後收者為合宜。陳皮之名

稱最多。最好者頭紅皮。第二大紅皮。第三極紅皮。第四蘇紅皮。第五式紅皮。第六棟紅皮。第七旱水皮。第八青皮。形體 橘樹屬山果木。樹高丈許。枝多生刺。刺出莖間。與根無辨。其葉兩頭尖。色綠而光。大寸餘。長二寸許。四月開小白花。甚香。六七月間結實。至冬黃熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核。其皮紋細而薄。色紅。內多筋脈。味苦辛。

種植 園圃中恒有移植。採取 十月採皮。曝乾。製法 雷斅曰。凡使勿用桔皮。嫩子皮。二件用不得。凡修事須去白膜一重。剝細。以鯉魚皮裹一宿。至明取用。李時珍曰。凡橘皮入和中理胃藥。則留白。入下氣消痰藥。則去白。其說出於聖濟經。去白者。以白湯入鹽先潤透。刮去筋膜。曬乾。用。亦有煮焙者。各隨本方。

性質 苦辛。溫。無毒。成分 含有揮發油。效能 理氣化痰。燥濕。行滯。用作芳香健胃藥及發汗藥與祛痰藥。

主治 胸中煩熱。逆氣。利水。久服去矣。下氣通神。(本經) 下氣止嘔咳。治氣衝胸中。吐逆。霍亂。療脾不能消穀。止洩。除膀胱留熱。停水。起淋。和小便。去寸白蟲。(別錄) 張仲景之瀉胸 橘皮一味。經張仲景之實驗。認為主治呃逆也。勞治胸痺停痰。茲考徵如下。●橘皮竹茹湯證曰。噦逆。(噦者呃之謂也) (以上一方橘皮二斤) ●橘皮枳實生薑湯證曰。胸痺。(以上一方橘皮一斤) ●橘皮湯證曰。噦。(以上一方橘皮四兩) ●茯苓飲證曰。心胸中有停痰。(以上一方橘皮二兩半) 歷觀上諸方。橘皮之主治呃逆也明矣。胸痺者。停痰也。其有呃逆之證。則橘皮所能治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論橘皮曰。清痰涎。治上氣咳嗽。閉胃主氣。刺破癥瘕。皮膚癬。療嘔噦。反胃。嗜雜。時吐清水。痰痞。痰瘕。大腸閉塞。婦人乳癰。入食料。解魚腥毒。【明】李士材本草圖解論橘皮曰。陳皮苦辛而溫。入大陰

經。健脾胃。下氣消痰。消穀進食。定嘔止瀉。能補能消。能散能降。調中理氣。功在諸藥之上。辛宜於肺。香利於脾。肺為攝氣之齋。脾為元氣之母。陳皮理氣。故為二經要藥。同補藥。即補。同瀉藥。即瀉。同升藥。即升。同降藥。即降。故利用最弘。去白者。理肺氣。留白者。和胃氣。筋膜及蒂。並去之。芳香之品。不見火則力全也。【明】繆希雍本草經疏論橘皮曰。橘皮味辛苦。氣溫無毒。其主胸中痰熱逆氣。氣衝胸中。嘔咳者。以肺主氣。氣常則順。氣變則逆。逆則熱聚於胸中。而成癆。癆者。假也。如痞滿鬱悶之類也。辛能散苦。能泄。溫能通行。則逆氣下。嘔咳止。胸中痰熱消矣。脾為運動廢物之障。氣滯則不能消化。水穀為吐逆。霍亂泄瀉等證。苦溫能燥脾家之溼。使滯氣運行。諸證自瘳矣。肺為水之上源。源竭則下流不利。熱結膀胱。肺得所養。而津液貫輸。氣化運動。故膀胱留熱。停水五淋皆通也。去臭及寸白者。辛能散邪。苦能殺蟲也。通神輕身。長年者。利肺脾之極功也。【清】黃宮繡本草求真

十六畫 橘

論橘皮曰。橘皮味辛而溫。治雖歸主脾肺。調中快膈。導痰消滯。利水破癥。宜五臟。理氣燥溼。然同補劑。則補。同瀉劑。則瀉。同升劑。則升。同降劑。則降。各隨所配。而得其宜。且同生薑。則能止嘔。同半夏。則舒痰。同杏仁。則治大腸氣閉。同桃仁。則治大腸血閉。至其利氣。雖有類於青皮。但此氣味辛溫。則入脾肺。而宜整。不如青皮。尚入肝疎泄。而無入脾燥溼。入肺理氣之故也。然多服。亦能損氣。用補留白。下氣消痰。除白。即書所名橘紅。然亦寓有發明之意。核治疝痛。偏墜。葉散癰腫。取皮陳久者。良。治火痰。竟便製。寒痰。薑汁製。治下焦鹽水。製。核去皮。炒用。【清】王士雄隨息居飲食譜論橘皮曰。橘皮解魚蟹毒。化痰下氣。治咳逆。嘔噎。噎膈。脹悶。蟹亂。疝瘕。瀉痢。便秘。脚氣。諸病。皆效。去白者。名橘紅。陳久愈良。福橘皮。為勝。或論若時入一片。亦妙。惟化州無橘。俗尚化州橘紅。其色不紅。皆橘皮也。【清】賈九如辨藥指南論橘皮曰。陳皮留白。取其色白入肺。氣香入脾。因體大則緩。緩則遲下。故

主二部而和中。味辛則散。散則分解。故泄逆氣而快膈。用治膈痰。嘔逆。穀食酒毒。功在痰梗。枳殼之上。以其性溫。能補脾肺。須藉監制之藥。用之。助參苓。煖胃。佐白朮。健脾。和甘草。益肺。同半夏。溼。合青皮。去滯。參竹茹。治呃。且辛香。滲氣。如目痛。腸脹。盛怒。動氣。俱忌用之。因主至高之分。故曰陳皮。治高氣。青皮。治低氣。此旨大略。然亦通用。國外學說 英美學說謂苦陳皮產中國。呂宋及印度。法國。西班牙等處。該樹所結之果。其皮無論鮮乾。均可入藥。鮮苦陳皮。可配酒油等。乾苦陳皮。則可配酒。糟。泡。水等。其醫治作用。宜合他藥。同服。能助別藥。功力。其功用。能溫補。行血。開胃。暖胃。以助消化。治肚疼。及祛風。處方如下。乾苦陳皮一分。切搗。淡酒十分。浸七天。間時搖動。裝淋筒。淋乾。用絞盤。絞渣。過淋紙。再加酒。仍足十分為度。每服一錢至二錢。【陳皮酒方】至其所以能行血。祛風。溫補。開胃。暖胃。以助胃消化。治肚疼等症者。以其內尚含有油也。如該油。全行洩去。其功力。遂減。

凡用藥者。宜知之。日本學說謂苦柑皮。為中國所產。即廣東蜜橘。C. bigaradia. Dahan, var. Sinense, Call) 之果皮。由結繩拾聚。曬乾。俗呼廣皮。又有青皮。亦稱青橘皮。及黃皮。即剝取未熟。蜜橘之果皮。曬乾者。又柑皮。即蜜柑(C. nobilis, Lour.) 皮。為日本藥學雜誌。第二百零四號。載有谷井嘉太郎氏所著「柑皮中之歌司。祕里仁」一文。氏曾研究日本產橘。屬果皮中。是否亦如西洋橘。含有一種名歌司。祕里仁 (Gosipol) 之中性。無色。無味。結晶體之糖原質。由其試驗結果。確知日本橘。亦含有此物。因以公表。詳細可參閱該雜誌。辨偽 鄭育巖曰。蘇州宋公祠。創製陳皮。為理嗽化痰。妙藥。馳名天下。近上海。多有偽品。即福州。亦有偽製。假充。味辛辣。雖甜不潤。其色粗淡。不堪入藥。誤服之。反見咳嗽。勿用為是。曹炳章曰。按百草鏡。製青陳皮。即蘇州宋公祠之遺法也。能消痰降氣。生津潤。運脾調胃。解毒安神。方用陳皮

二斤。河水浸一日。竹刀輕刮去渣。白貯竹筐內。沸湯淋三四次。用冷水洗淨。不苦為度。曬之半乾。可得淨皮一斤。初次用甘草、烏梅肉各四兩。煎濃汁。并日曬夜露。俟酥捻碎如豆大。再用川貝母去心四兩。青鹽三兩。研為細末。拌勻。再曬露候乾。收貯。或名參貝陳皮。亦同此法。

近人學說 張山雷曰。新會皮。橘皮也。以陳年者辛辣之氣稍和為佳。故曰陳皮。市肆中有多種。以廣東化州產者為最佳。有茸毛。故曰毛橘紅。亦曰化州橘紅。今有所謂賴家園橘紅者。則化州賴氏所植者也。其通用者則新會所產。故通稱曰新會皮。味和而辛。不甚烈。其福州及浙衢之產。味苦而氣亦濁。且辛辣更烈。鄉僻市廛中多用之。非佳品矣。留白者。通稱陳皮。去白則曰橘紅。降氣和中。泄化痰飲。宜留白為佳。若專作疏散用。取其氣勝。則宜橘紅。連白者。用一錢。至一錢五。去白者。不當過一錢。以上。若刮下之白。無味無氣。實是廢材。今世俗上有以橘白作化痰降

氣用者。甚屬無謂。又凡用陳皮。無非取其芳香而味辛者。力能開泄。疏通。今俗子且有蜜炙之例。以黏膩減其芬芳。尤為可哂。

配合應用 橘皮留白。補脾胃和中。去白。消痰理肺氣。同白朮。則補脾。同甘草。則補肺。同補氣藥。則益氣。同泄氣藥。則破氣。同消痰藥。則能去痰。同消食藥。則能化食。各從其類以為用也。

治三日瘧寒多。橘皮、人參、何首烏、桂枝、當歸、蓮皮。

治胃家有寒痰。或偶感寒氣。傷冷食。嘔吐不止。用橘皮、白豆蔻、生薑、藿香、半夏。

治脾胃虛。飲食不化。或不欲食。食亦無味。用橘皮、人參、白朮、白茯苓、甘草、山藥、白豆蔻、藿香、麥芽、山查、白扁豆。

治上氣咳嗽。用橘皮、蘇子、貝母、枇杷葉、麥門冬、桑根白皮、沙參、栝樓根、五味子、百部。能消痰下氣。

治氣實。人暴氣壅脹。用橘皮、枳殼、烏藥、木香、草豆蔻、檳榔。

治胸中脹滿。用橘皮、枳朮、厚朴、甘草。為平胃散。

治脾胃溼痰。及寒痰飲。橘皮入二陳湯。

橘皮湯。治男女傷寒。并一切雜病。嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。即止。(仲景方)

治霍亂吐瀉。但有一點胃氣存者。服之即生。廣陳皮去白五錢。真藿香五錢。水二盞。煎一盞。時時溫服。(百一選方)

治脚氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少許。蜜搗和丸。如梧桐子大。每日食前米飲下三十九丸。(食療方)

大腸閉塞。陳皮連白。酒煮。焙乾。研末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。真橘皮去白切。生薑自然汁浸過一指。銀石器內重湯煮。焙乾。研末。每服三錢。用隔年青州棗十箇。去核。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。(適用方)

治婦人乳癰。未成者即散。已成者即潰。痛極者不痛。神驗不可

言。用真橘皮湯浸去白。曬乾。麩炒。微黃為末。每服一錢。麩香調酒下。初發一服見效。(張氏方)

治噎雜吐水。真橘皮去白為末。五更安五分於掌心。紙之即睡。三日必效。皮不真則不驗。(怪症奇方)

治反胃吐食。真橘皮以日照西壁土炒香為末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。(直指方)

治卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去鹽。焙為末。以水一大盞。煎半盞。熱服。(食醫心鏡方)

治諸氣呃噎。橘皮二兩。去鹽。水一升。煎五合。頓服。或加枳殼尤良。(孫尚藥方)

治痰隔氣脹。陳皮三錢。水煎熱服。(簡便方)

治卒然失聲。橘皮半兩。水煎徐呷。(肘後方)

治經年氣嗽。橘皮、神麩、生薑。焙乾。等分。為末。蒸餅和丸。梧子大。每服三五丸。食後。夜臥各一服。有人患此服之。兼舊患膀胱氣皆愈也。(衍義方)

●化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬爲末。水煎代茶。細細呷。(心鏡方)

●治下焦冷氣。乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸。梧子大。每食前溫酒下三十丸。(食療方)

●治途中心痛。食魚蟹毒。橘皮並湯飲之。甚良。(談林藥方)

●治風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛去渣。再煮至一盃。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐。加瓜蒂末。(摘玄方)

●治小兒疳瘦。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。一兩半。研末入麪三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。綠豆大。每服一二十丸。米飲下。(錢氏小兒方)

●治產後尿閉不通者。陳皮一兩。去白爲末。每空心溫酒服二錢。一服卽通。此張不斂方也。(婦人良方)

●治產後吹奶。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服卽散。

●治瘳耳出汁。陳皮燒研一錢。

十六畫 橘

麝香少許爲末。日搽。名立效散。

●治歇甲作病不能行履者。濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之卽安。(醫林集要方)

●治魚骨鯁咽。橘皮常含。呷汁卽下。(聖惠方)

●寬中丸。治脾氣不和。冷氣客於中宮。壅遏不通。是爲脹滿。用橘皮四兩。白朮二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每食前木香湯下三十丸。日三服。(指迷方)

用量 一錢至二錢。
施用宜忌 凡無溼。無滯。無痰者禁用。

著名方劑 ●二陳湯。治肥瘠之人。溼痰爲患。喘嗽脹滿者。(局方) 陳皮(去白)二錢。製半夏。茯苓各三錢。甘草一錢。上四味。姜三片。水煎服。●潤下丸。治溼痰。因火上泛。停滯胸膈。咳唾稠粘。(丹溪方) 陳橘皮半斤。鹽五錢。甘草二兩。(去皮蜜炙) 上以橘皮入砂鍋內。與鹽化水淹過。煮乾。同甘草共研淨末。蒸餅和丸。梧子大。每服百丸。白湯下。

參攷資料 ●橘皮氣薄味厚。陽中之陰也。可升可降。爲脾肺二經氣分藥。留白則補脾胃。去白則理脾氣。同白朮則補脾胃。同甘草則補肺。獨用則瀉肺損脾。其體輕浮。一能導胸中塞邪。二破滯氣。三益脾胃。加青皮減半用之。去滯氣。推陳致新。但多用久服。能損元氣也。(李杲) ●橘皮能散能瀉。能溫能補。能和化痰治嗽。順氣理中。調脾快腸。通五淋療酒病。其功當在諸藥之上。(尊原) ●橘皮苦。能泄能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣燥溼之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之籥。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮。枳殼。利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。皆取其通義也。詳見杏仁下。按方勺泊宅編云。橘皮寬腸降氣。消痰飲。極有殊功。他藥貴新。惟此貴陳。外舅莫強中。令豐城時得疾。凡食已。輒胸滿不下。百方不效。偶家人合橘紅湯。因取醬

之。似相宜。連日飲之。一日忽覺胸中有物墜下。大驚目眩。自汗如雨。須臾腹痛。下數塊如鐵彈子。莫不可開。自此胸次廓然。其疾頓愈。蓋脾之冷積也。其方用橘皮去穢一斤。甘草。鹽花各四兩。水五碗。慢火煮乾。焙研爲末。白湯點服。名二賢散。治一切痰氣特驗。世醫徒知半夏。南星之屬。何足以語此哉。珍按二賢散。丹溪變之爲潤下丸。用治痰氣有效。惟氣質人服之相宜。氣不足者。不宜用之也。(李時珍) ●橘皮療氣大勝。以東橘爲好。西江者不如。須陳久者爲良。(陶弘景) ●橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮。陳皮去白者。曰橘紅也。(王好古) ●本草橘。柚作一條。蓋傳誤也。後世不知。以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。此乃六陳之一。天下日用所須。今人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不苦。橘皮極苦。至熟亦苦。或以皮之緊慢分別。又因方土不同。亦互有緊慢也。(寇宗奭) ●橘皮紋細而滑。色紅內多筋脈。其味苦辛。柑皮紋粗而厚。色黃。內多白膜。其味辛甘。柚

十六畫 橘

皮最厚而虛。紋更粗。色黃。內多膜。無筋。其味甘多辛少。但以此別之。則不差矣。橘皮性溫。柑柚皮性冷。不可不知。今天下多以貯中來者為勝。江西者次之。然亦多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柚皮則懸絕矣。(李時珍) 橘皮味辛氣溫。能耗散真氣。中氣虛。氣不歸元者。忌與耗氣藥同用。胃虛有火嘔吐。不宜與溫熱香燥藥同用。陰虛咳嗽。生痰。不宜與半夏。南星等同用。瘧非寒甚者。亦勿施。(經希堯) 橘從商音。韻聲也。又雲五色為慶。二色為喬。喬雲外赤內黃。非烟非粉。郁郁紛紛之象。橘實外赤內黃。剖之香粉粉郁。有似乎喬雲。橘之從商。又取此意也。(李時珍) 橘之皮厚味甘。不似橘皮味辛苦。其肉亦如橘。有甘有酸。酸者名柑。柑今俗謂橙為柑。非矣。按郭璞云。橘似橙而實酢。大於橘。孔安國云。小曰橘。大曰柚。皆為柑也。(蘇恭) 橘。今江浙荆襄湖嶺皆有之。木高一二丈。與枳無辨。刺出莖間。夏初生白花。六七月成實。至冬黃熟。舊說小為橘。大為柚。今醫家乃用黃

橘。青橘。不言柚。豈青橘是橘之類乎。(蘇頌) 橘。柚自是兩種。本草云。一名橘皮。後人誤加柚字。妄生分別。且青橘黃橘。治療尚殊。況橘為別種乎。惟郭璞所言。乃真識橘柚者。若不知此分別。誤以柚皮為橘皮。是貽無窮之患矣。(寇宗奭) 橘。橘蘇恭所說甚。是蘇頌不知青橘即橘之未黃者。乃以為柚。誤矣。夫橘柚柑三者相類而不同。橘實小。其瓣味微酢。其皮薄而紅。味辛而苦。柑大於橘。其瓣味甘。其皮稍厚而黃。味辛而甘。柚大小皆如橙。其瓣味酢。其皮最厚而黃。味甘而不甚辛。如此分之。即不誤矣。按事類合璧云。橘樹高丈許。枝多生刺。其葉兩頭尖。綠色。光面。大寸餘。長二寸許。四月著小白花。甚香。結實至冬黃熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核。宋翰彥直著橘譜三卷。甚詳。其略云。柑。橘出蘇州。台州。西出荊州。南出閩廣。撫州。皆不知溫州者為上也。柑品有八。橘品十有。四多是接成。惟種成者氣味尤勝。黃橘扁小。而多香。乃橘之上品也。朱橘小而色赤如火。綠橘紺碧。

不待結後。色味已佳。隆冬採之。生。意如新。乳橘。狀似乳。柑皮堅。氣多。味酸。酸芳。橘狀大而扁。外緣心。紅。瓣巨多。液。經春乃甘美。包橘。外。薄。內。盈。其。膜。瓣。隔。皮。可。數。絲。橘。微。小。極。饒。美。可。愛。而。不。多。粘。沙。橘。細。小。甘。美。油。橘。皮。似。油。飾。中。堅。外。黑。乃。橘。之。下。品。也。早。黃。橘。秋。中。已。丹。涼。橘。八。月。開。花。冬。結。春。採。穿。心。橘。實。大。皮。光。而。心。虛。可。穿。荔。枝。橘。出。橫。陽。膚。理。緻。密。如。荔。子。也。俗。傳。橘。下。埋。鼠。則。結。實。加。倍。故。物。類。相。感。志。云。橘。見。戶。而。實。繁。涅。槃。經。云。知。橘。見。鼠。其。果。實。多。周。禮。言。橘。路。之。而。自。變。為。枳。地。氣。然。也。餘。見。柑。下。(李時珍)

仁。研碎入藥。性實。苦。平。無毒。主治。腎。疝。腰。痛。膀胱。氣。痛。腎。冷。炒。研。每。溫。酒。服。一。錢。或。酒。煎。服。之。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭。本草衍義。給橘核。曰。治酒。腹。風。鼻。赤。炒。研。每。服。一。錢。胡。桃。肉。一。箇。搗。酒。服。以。知。為。度。【明】李時珍。本草綱目。論橘核。曰。小。腸。疝。氣。及。陰。核。腫。痛。炒。研。五。錢。老。酒。煎。服。或。酒。糊。丸。服。甚。效。【明】經。希。堯。本。草。經。疏。論橘核。曰。橘。核。出。日。華。子。其。味。苦。溫。而。下。氣。所。以。能。入。腎。與。膀胱。除。因。寒。所。生。之。病。也。疝。氣。方。中。多。用。之。【唐】楊。時。本。草。通。串。元。論。橘。核。曰。橘。必。成。熟。之。實。乃。有。核。青。橘。裏。金。令。之。初。氣。取。其。極。小。者。入。藥。不。得。有。核。然。則。核。之。性。味。不。可。編。共。止。入。肝。經。日。華。子。故。有。腎。疝。腰。痛。膀胱。氣。痛。之。治。後。人。用。治。疝。疝。者。緣。疝。固。肝。病。亦。因。腎。與。膀胱。之。氣。化。以。病。乎。肝。也。

醫方方劑 橘核丸。治。四。種。疝。疝。卵。核。腫。脹。偏。有。大。小。或。堅。硬。如。石。疝。引。臍。腹。甚。則。膚。癢。腫。脹。成。瘻。

時出黃水。或避腫潰爛。(濟生方)
橋核(炒)海藻昆布海帶(各泡)
川棟肉(炒)桃仁(麸炒)各一兩
厚朴木通枳實(麸炒)延胡索
(炒)桂心木香各一兩上為細末
酒丸。桐子大。每服七十九。酒下或
鹽湯下。

參攷資料 橋核入足厥陰。與
青皮同功。故治腰痛痲疔在下之
病。不獨取象於核也。和劑局方治
諸疔痛。及內卵痲腫偏墜。或硬如
石。或腫至潰。有橋核丸用之有效。
品味頗多。詳見本方(李時珍)

【橋絡】

原命 橋上筋膜。
古醫別名 橋上絲。

(綱目拾遺)
主治 口渴。吐酒。炒熟煎湯飲。
甚效。

歷代記述攷證 【清】張隱菴

本草崇原論橋絡曰。能行胸中之
飲。而行於皮膚。故又能疏達絡氣。
【清】趙學敏本草綱目拾遺論橋
絡曰。通經絡滯氣。治衛氣逆於肺
之脈脹。驅皮裏膜外積痰。活血。
辨偽 鄭宥巖曰。橋絡即橋
上筋膜。日華子謂口渴吐酒煎

十六畫 橋

湯飲之甚效。貨缺之時。開價值甚
昂。射利之徒。用白萊菔細切如絲。
曬乾。以橋皮煎濃汁浸潤。再曬為
充橋絡色。香。幾無以辨。巧則巧矣。
如新喪天良何。曹炳章曰。按金
御乘云。橋絡能宜通經絡滯氣。予
屢用以治衛氣逆於肺之脈脹。甚
有效。趙恕軒云。通經絡氣滯脈脹。
驅皮裏膜外積痰。活血。此其效用
之實驗也。其種甚多。如出廣東者
名廣橋絡。色白。條細。薄。出浙江
衢州者。名衢橋絡。色白。條細。長。皆
佳。出四川者。色白。黃。條粗。略次。出
台州者。名台橋絡。條細。少。帶蒂。為
最次。

【橋葉】 形態 橋葉與柑葉同。
均為長卵形。
性質 苦平無毒。
主治 導胸膈逆氣。入厥陰。行
肝氣。消腫散毒。乳癰脇痛。用之行
經。

歷代記述攷證 【明】經希雍
本草經疏論橋葉曰。橋葉能散陽
明厥陰經滯氣。婦人妬乳。內外吹
乳癰。乳癰。用之皆效。以諸證皆二
經所生之病也。

橙

【橋實】即橋子之原名。詳「橋子」
條。

【橋餅】

命名 本品係以大稻
橋入紫糖醃製而乾之
餅故名。

古醫別名 出閩中漳泉者。名
麥芽橋餅(綱目拾遺)

形態 橋餅圓徑四五寸。面有
白霜。肉厚味重。以閩產者為第一。
其出浙省者。乃橋橋所作。圓徑不
及三寸。且皮色黝黑。而肉薄。味亦
苦劣。又出抗屬之塘樓者。味勝。俱
可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。
主治 下氣。寬中。消痰。逐食。黃
疸。膨脹。除隔。止痛。

配合應用 治諸色痢。用橋
餅一兩。圓眼肉五錢。冰糖五錢。水
二碗。煎一碗。露一宿。溫服。不露亦
可。至重者不過二三服。無不神驗。
(行僕檢秘方)

治瀉。夏月。瓜菓太多。以致
洩瀉不休。用漳州好橋餅一枚。細
切薄片。分作二次。放茶鍾內沖服。
(梁氏集驗方)

橋餅湯。治傷食。生冷瓜菓。泄

瀉不休。橋餅一個。切薄片。放碗內。
以沸湯澆。置住。泡汁出。即餘湯。連
餅食。一餅可作數次服。(經驗廣
集方)

百菓酒。香。佛手各二個。橫
橋肉。圓眼肉。蓮肉。橋餅各半。拍
子仁四兩。松子三兩。紅棗二十兩。
黑糖三觔。燒酒五十觔。浸。此酒補
虛益腎(李太守秘方)

【橋上筋膜】即橋絡之原名。詳
「橋絡」條。
【橋上絲】即橋絡之古醫別名。
與見綱目拾遺。詳「橋絡」條。

【橙子肉】

性質 酸寒無毒。
主治 洗去酸汁。切
和鹽。煎成。貯食。止嘔。心。能去胃
中浮風惡氣。

歷代記述攷證 【唐】陳士良
食性本草論橙肉曰。行風氣。解
氣。發瘧。殺魚蟹毒。
參攷資料 多食傷肝氣。
發虛熱。與肉同食。致頭眩。嘔心。
(陳士良) 橙乃水類之屬也。諸
家本草。皆作檳榔。誤矣。(李時珍)

【橙子核】 主治 面黧。粉刺。溼
研。夜夜塗之。

十六畫 橙 釋 橡

【橙皮】 命名 按陸佃埤雅云。橙。橘屬也。可登而成之。故字從登。又齋聲也。(李時珍)

古籍別名 金橙皮。鶴梨皮。(和漢藥考)

外國名詞 Cortex auranti

Fructus (拉丁) Orange peel

(英) Pomoranzschale. (德)

基本 爲芸香科柑屬橙之果皮。

產地 凡江浙、閩、廣諸省及印度、西班牙、法國均有出。

形態 橙爲適於暖地之常綠樹。高丈餘。嫩樹有刺。老樹則無。葉互生似革質。作尖卵圓形。有半透明小斑點。其柄具有翼葉。初夏開白色五瓣花。果實爲球形。上下稍扁。表面滑澤。熟則呈黃赤色。入藥係將成熟橙實之外皮縱斷剝下。使之乾燥者。外面呈黃褐色。有皺紋。四陷小點。生有油胞。內部爲肉。氣味芳香而苦。

採取 八月採皮日乾。
用法 水煎或浸酒用。
性質 苦辛溫無毒。
成分 含有發揮油及苦味越

幾斯等。

效能 專用作健胃藥。及胃弛緩症。急性胃加答兒。急性腸加答兒。

作用 刺激胃黏膜。使分泌增多。運動加速。而一部分之 HCl 經使大腸液而與蓄。全身血液流動因是而增進。

主治 作醬醋香美。散腸胃惡氣。消食下氣。去胃中浮風氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論橙皮曰。和鹽貯食。止惡心。解酒病。【明】李時珍本草綱目論橙皮曰。糖作橙丁。甘美。消痰下氣。利膈。寬中。解酒。

配合應用 治痔瘡腫痛。隔年風乾橙。子桶內燒煙薰之。神效。(摘要方)

香橙湯。寬中。快氣。消酒。用橙皮二斤。切片。生薑五兩。切焙。搗爛。入炙甘草末一兩。檀香末半兩。和作小餅。每嚼一餅。沸湯入鹽送下。(奇效良方)

用處 一錢至錢半。
應用宜忌 胃液溢。反南星。

參攷資料 橙餅主治消積痰降氣。和中開胃。寬胸健脾。解魚蟹毒。醒酒。若氣虛癩癧者。勿服。其製法擇半黃無傷損。橙子太青者。性硬難酥。將小刀切成段。入淨水。浸去酸澁水一二天。每日須換水。待軟取起。擠去核。再浸一二天。取起。將管脚插入每縫。觸碎內瓢。然後入鍋。用清水煮之。勿令焦。約有七八分爛。取出。拌上潔白洋糖。須乘熱即拌。即日曬之。待糖吃盡。再摻再曬。令糖吃足。將乾糖再塞入橙肚內。略壓扁之。入瓶貯用。亦可點湯服。(醫錄方)

橙樹似橘而葉大。形似大於橘而香。皮厚而膩。八月熟。(馬志) 橙產南土。其質似柚而香。葉有兩刻缺如兩段。亦有一種氣臭者。柚乃柑屬之大者。早黃難留。橙乃橘屬之大者。晚熟耐久。皆有大小二種。按事類合璧云。橙樹高。不甚類橘。亦有刺。其實大者如盤。頗似朱櫻。經霜早熟。色黃皮厚。饑餓如沸。香氣馥郁。其皮可以爲薰衣。可以老鮮。可以利菹醢。可以爲醬齏。可以蜜煎。可以糖製。爲橙丁。可以蜜製爲橙膏。嗅之則

香。食之則美。誠佳果也。(李時珍) 橙皮今比以爲果。或合湯待賓。未見入藥。宿酒未解者。食之速醒。(靈素爽) 第三版改正日本藥局方曰。橙皮係將成熟橙實之外皮剝離。而切斷乾燥者。本品外面呈褐色。現粗糙凹點。內面類於白色。氣味芳香而甚苦。用時浸冷水十五分鐘。待其軟化。取出去其水分。復將軟化海綿狀組織除去。乾燥用之。(和漢藥考) 第四版改正日本藥局方曰。橙皮應去內皮用之。(和漢藥考) 橙皮酸寒無毒。降氣。消積。殺疳積蟲。(和漢藥考)

【標木】 卽標木之古籍別名。典見綱目。詳【標木】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

香。食之則美。誠佳果也。(李時珍) 橙皮今比以爲果。或合湯待賓。未見入藥。宿酒未解者。食之速醒。(靈素爽) 第三版改正日本藥局方曰。橙皮係將成熟橙實之外皮剝離。而切斷乾燥者。本品外面呈褐色。現粗糙凹點。內面類於白色。氣味芳香而甚苦。用時浸冷水十五分鐘。待其軟化。取出去其水分。復將軟化海綿狀組織除去。乾燥用之。(和漢藥考) 第四版改正日本藥局方曰。橙皮應去內皮用之。(和漢藥考) 橙皮酸寒無毒。降氣。消積。殺疳積蟲。(和漢藥考)

【標木】 卽標木之古籍別名。典見綱目。詳【標木】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

【標木】 卽標實之古籍別名。典見說文。詳【標實】條。

察本草論楸斗殼曰。止腸風。崩中帶下。冷熱瀉痢。并染髮。

【橡木皮根皮】

性質 苦平。無毒。

主治 惡瘡。因風犯露致腫者。煎汁日洗。令膿血盡乃止。亦治痢。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楸木皮及根皮曰。止水痢。消蠱瘕。

【橡實】

原命 傑。古籍別名 楸斗。皂斗。

(說文) 傑。楸子。初(綱目) 萃。

外國名詞 Quercus ferrata, Thunb. (拉丁) クヌギ (日本)

基本

係殼斗科樹屬。楸樹之子實。

產地

山谷原野多有之。

形態

楸為落葉喬木。高數丈。樹皮灰褐色。粗而厚。縱裂甚深。葉與栗相似。披針形。嫩枝之葉倒卵形。有尖端。緣邊有鋸齒。新葉裏裏皆有白毛。老葉無之。初夏新葉間生花。花單性。雌雄同株。穗狀花序。雄者常下垂。結實為堅果。小而圓。大如拇指。頭在椗狀之殼斗內。其殼內之子實可供藥用。

採取 於霜後採之。製法 留數日。凡使去殼煎之。從已至未。剉作五斤。日乾用。周憲王曰。取子。換水浸十五次。淘去濕味。熱極熱。食之可以濟飢。

十六畫 橡

殼內之子實可供藥用。採取 於霜後採之。

製法 留數日。凡使去殼煎之。從已至未。剉作五斤。日乾用。周憲王曰。取子。換水浸十五次。淘去濕味。熱極熱。食之可以濟飢。

性質 苦微溫。無毒。主治 下痢。厚腸胃。肥健人。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楸實子曰。瀉腸。止瀉。養食。止飢。禦蠱瘕。

參攷資料 楸子。非果非殼。而最益人。服食未能斷穀。啖之尤佳。無氣而受氣。無味而受味。消食止痢。令人強健不飢。(孫思邈)

木實為果。楸蓋果也。徵歲人皆取以充飢。昔孽虞入南山。飢甚。拾楸實而食。唐杜甫客秦州。採橡栗自給。是矣。(李時珍)

【橫行介士】即殼之古籍別名。典見盤譜詳「盤」條。

【橫唐】即實子之古籍別名。典見本經。詳「實子」條。

【楸木】即楸木之古籍別名。詳「楸木」條。

【楸】即楸之古籍別名。典見左傳。

橫 檣 樹 欬 澤

【欬龍】即白朮之一種。產安徽歙縣之黃山脈中者。其根白而瘦小。功用較尋常白朮良。詳「白朮」條。

【欬黑】黑之一種。產於安徽歙縣者。詳「黑」條。

【澤小車】即狗舌草之日本名。詳「狗舌草」條。

【澤半支】形類 澤半支為山草類之一種。葉如鼠牙半支。生山澗處。葉皆對節。夏開黃花如瓦松。

主治 蛇咬。疔腫。

【澤乳】即礬石之古籍別名。典見吳普本草。詳「礬石」條。

【澤姑】即瓜蒌仁之古籍別名。典見別錄。詳「瓜蒌仁」條。

【澤芝】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤瀉」條。即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【澤芬】即白芷之古籍別名。典見別錄。詳「白芷」條。

【澤茹仁】即瓜蒌仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瓜蒌仁」條。

【澤敗】即敗醬之古籍別名。典見別錄。詳「敗醬」條。

別錄。詳「敗醬」條。

【澤葦】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大戟」條。

【澤漆】原名 大戟苗。本品生時搗葉。有白汁如漆。故名。

處方用名 澤漆葉。

古籍別名 漆草(本經) 鷓兒眼。漆草。綠葉。綠花。草。五風草。(綱目) 奶奶草。五苦頭。燈檠草。(俗名)

基本 屬大戟科。為澤漆之葉。

產地 凡山谷川澤間俱多生焉。

形態 澤漆為有毒草本植物。路旁澤地。往往自生。莖高尺許。有白汁。葉互生。作倒卵圓形。頗如蘭莖。五月間於莖端對生五葉。分五枝。間淡綠色。四瓣小花。狀頗燭蠟。故俗呼為燈檠草。

採取 三月七月間。採莖葉陰乾。

用法 水煎或剉末用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 通便利水。消腫。逐積。用

作水腫藥。及祛痰藥。

聖治。皮膚熱。大腹水氣。四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。(本草)利大小腸明目輕身。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論澤漆曰。主蠱毒。宋大

明日華諸家本草論澤漆曰。止癩

疾。消痰。清。鄒樹本經疏證論澤

漆曰。歷考澤漆治水。非不暫與防

己。大黃。芫。甘。遂。葶。相。合。成。方。而

決。壅。滯。實。然。終。共。人。落。白。朮。茯。苓。

桂。心。薤。白。等。治。因。虛。成。水。者。居。多。

如。干。金。與。鯉。魚。人。落。甘。草。生。薑。赤

小。豆。茯。苓。麥。冬。同。用。治。或。從。消

渴。或。從。黃。疸。致。內。虛。不。足。營。衛。不

通。血。氣。不。化。氣。實。皮。膚。中。偏。身。洪

腫。四。肢。無。堪。喘。息。不。安。腹。中。驚。悸

脹。滿。眼。不。得。視。崔。氏。與。白。朮。生。薑

橘。皮。桑。根。白。皮。元。滲。郁。李。仁。杏。仁

同。用。治。水。腫。盛。滿。氣。急。喘。咳。小。便

澀。如。血。古。今。錄。驗。與。鯉。魚。人。落。甘

草。茯。苓。麥。冬。同。用。治。水。在。五。臟

令。人。咳。喘。上。氣。腫。大。密。閉。兩。足。腫

目。下。臥。蠶。胸。滿。隱。痛。吸。吸。寒。熱。小

便。數。少。甚。至。古。今。錄。驗。與。鯉。魚。人

落。甘。草。茯。苓。澤。瀉。杏。仁。同。用。治。絲

三魚決漏。精液不通。水氣都行。致通身手足面目浮腫。食飲減少。且云年八十。病大困者。服此亦差。可見澤漆所治之大腹水氣。四肢面目浮腫。必兼喘咳上氣。小便不利者。澤漆誠行水中返顧根本之劑也。

配合應用 治心下伏瘕。大如盃。不得食。澤漆四兩。大黃。葶。三兩。搗。篩。蜜。丸。梧。子。大。每。服。二。丸。日。三。服。(肘。後。方)

治十種水氣。澤漆十斤。夏。月。取。嫩。莖。葉。入。水。一。斗。研。汁。約。二。斗。於。銀。鍋。內。慢。火。熬。如。稀。餛。入。瓶。內。收。每。日。空。心。溫。酒。調。下。一。匙。以。愈。為。度。(聖。惠。方)

治水氣蠱病。生鮮貓眼睛草。曬乾為末。煎肉丸。彈子大。每服二。丸。白。湯。下。日。二。服。覺。腹。中。噎。小。便。利。為。度。(乾。坤。祕。鑑。方)

治脚氣赤腫。行步脚病。貓兒。眼。睛。草。鷓。鴒。藤。蜂。窠。等。分。每。服。一。兩。水。五。碗。煎。三。碗。蕪。洗。之。(易。簡。方)

治牙齒疼痛。貓兒眼睛草一。兩。研。爛。湯。泡。取。汁。含。漱。吐。涎。(易。簡。方)

簡方)

治男婦瘰癧。貓兒眼睛草一。二。兩。井。水。二。桶。五。月。五。日。午。時。鍋。內。熬。至。一。桶。去。滓。澄。清。再。熬。至。一。碗。瓶。收。每。以。椒。葱。槐。枝。煎。湯。洗。瘡。淨。乃。擦。此。膏。數。次。愈。(便。民。圖。彙。方)

治瘰癧有蟲。貓兒眼睛草曬。乾。為。末。香。油。調。塗。之。(易。簡。方)

用費 錢半至三錢。 應用宜忌 惡瘰癧。小豆為之。使。

著名方劑 澤漆湯。治咳而脈。沉者。此湯主之。(金匱) 半夏。半。升。紫。參。一。作。紫。苑。五。兩。澤。漆。三。斤。(以。東。流。水。煮。取。一。斗。五。升) 生。姜。前。胡。各。五。兩。甘。草。黃。芩。人。參。桂。枝。各。三。兩。上。九。味。咬。咀。納。澤。漆。汁。中。煮。五。升。溫。服。五。合。至。夜。盡。

參攷資料 澤漆利水。功類。

大戟。故人見其莖有白汁。遂誤以。為。大。戟。然。大。戟。根。皆。有。毒。而。苗。皆。有。毒。洩。人。而。澤。漆。根。硬。不。可。用。苗。亦。無。毒。可。作。菜。食。而。利。丈。夫。陰。氣。盛。不。相。伴。也。(李。時。珍) 澤。漆。大。戟。苗。也。生。太。山。川。澤。三。月。三。日。七。

月七日。採莖葉陰乾。(別錄) 此。即。大。戟。花。川。澤。中。有。莖。梗。小。花。黃。色。葉。似。嫩。菜。五。月。採。之。(大明) 今。冀。州。州。州。明。州。及。近。道。皆。有。之。(蘇。頌) 別。錄。陶。氏。皆。言。澤。漆。是。大。戟。苗。日。華。子。又。言。是。大。戟。花。其。苗。可。食。然。大。戟。苗。能。洩。人。不。可。為。菜。今。考。土。宿。本。草。及。寶。藏。論。諸。書。並。云。澤。漆。是。貓。兒。眼。睛。草。一。名。綠。葉。綠。花。草。一。名。五。風。草。江。湖。原。澤。平。陸。多。有。之。春。生。苗。一。科。分。枝。成。叢。莖。如。馬。齒。莖。綠。葉。如。苜。蓿。葉。葉。圓。而。黃。綠。頗。似。貓。睛。故。名。貓。兒。眼。莖。頭。凡。五。葉。中。分。中。抽。小。莖。五。枝。每。枝。開。細。花。青。綠。色。復。有。小。葉。承。之。齊。整。如。一。故。又。名。五。風。草。綠。葉。綠。花。草。稍。莖。有。白。汁。黏。人。其。根。白。色。有。硬。骨。或。以。此。為。大。戟。苗。者。誤。也。五。月。採。汁。煮。雄。黃。伏。雌。乳。結。草。砂。據。此。則。澤。漆。是。貓。兒。眼。睛。草。非。大。戟。苗。也。今。方。家。用。治。水。蠱。脚。氣。有。效。尤。與。神。農。本。文。相。合。自。漢。人。集。別。錄。誤。以。為。大。戟。苗。故。諸。家。醫。之。留。用。者。宜。審。(李。時。珍) 澤。漆。藥。即。澤。漆。之。處。方。用。名。詳。澤。漆。條。

【澤葇】即小葇之古籍別名。與見王禎農書。詳「小葇」條。①即葇之生於澤畔者。與見和漢藥考。詳「山葇」條。

【澤麥】即水麥之古籍別名。與見綱目。詳「水麥」條。

【澤瀉】 命名 去水曰瀉。如澤水之瀉也。故名澤瀉。又夏禹治水。故又名禹孫。

處方用名 福澤瀉。澤瀉炭。古籍別名 水瀉。鶴瀉。(本經)及瀉。芒芋。(別錄)瀉。禹孫。禹瀉。澤芝。蘭江。牛耳菜。酸惡命。(和漢藥考)如意菜。(綱目)

外國名詞 Alisma Plantago. (拉丁) Waterplantain. (英)

基本 屬澤瀉科。藥用係取水澤瀉之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。澤瀉產福建省建寧府爲上。其次江西省四川省均有出。但甜味以四川爲濃厚。市上所用者。以福建爲多。

形態 水澤瀉爲生於水澤池沼之宿根草。葉叢生。作匙形。似車

十六畫 澤

前葉而大。有葉柄。夏末抽花莖。高三四尺。每節分三枝。每枝復三分。開三瓣白色小花。後結球形圓形瘦果。爲黃色。球形。根大四五分至寸許。有根鬚。味鹹。生根汁峻烈。

採取 九月採根。曬乾。製法 雷斅曰。不計多少。細剉酒浸一宿。取出曬乾。任用。

用法 與他藥水煎。或到糊作丸散。性質 甘寒。無毒。

效能 利溼熱。治瀉痢。消腫。通淋。川作利尿及治水腫中藥。主治 風寒溼痺。乳難。養五臟。益氣力。肥健消水。久服耳目聰明。不饑延年。輕身。面生光。能行水上。

(本經)補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴。淋瀝。逐膀胱三焦停水。(別錄)

張仲景之醫明 澤瀉一味。經張仲景之實驗。認爲主治小便不利。胃眩。勞治渴。茲考徵如下。①澤瀉湯證曰。心下有支飲。其人苦冒眩。②五苓散證曰。小便不利。微熱消渴。(以上二方。以澤瀉爲君藥。澤瀉湯。澤瀉五兩。五苓散。一兩六

銖半) ③茯苓澤瀉湯證曰。吐而渴。欲飲水。(以上一方。澤瀉四兩) ④八味丸證曰。小便不利。又曰。消渴。小便反多。(以上一方。澤瀉三兩) ⑤猪苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。(以上一方。澤瀉一兩)

⑥牡蠣澤瀉散證曰。從腰以下有水氣。(以上一方。用澤瀉與餘藥等分。茯苓澤瀉湯以下四方。以澤瀉爲佐藥也) 歷觀上諸方。澤瀉所主治。也不辨而明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論澤瀉曰。主腎虛。精自出。治五淋。宣通水道。【宋】大明日華諸家本草論澤瀉曰。主頭旋耳虛。鳴。筋骨痠痛。通小腸。止尿血。主難產。補女人血海。令人有子。【金】張元素珍珠簪論澤瀉曰。入腎經。去舊水。養新水。利小便。消腫脹。滲洩止渴。【元】李東垣用藥法象論澤瀉曰。去脾中留垢。心下水痞。【明】李時珍本草綱目論澤瀉曰。滲溼熱。行痰飲。止嘔吐。瀉痢。疝瘡。脚氣。

【明】李士材本草圖解論澤瀉曰。澤瀉甘鹹微寒。腎與膀胱藥也。利水道。通小便。補虛積。理脚氣。按本

經云。久服明目。而扁鵲云。多服病眼。何相反耶。蓋水道利。則邪火不于空竅。故云明目。水道過於利。則腎氣虛。故云病眼。又別錄稱其止遺瀉。而寇氏謂滋精者。不敢用。抑何相刺謬也。蓋相火妄動。而遺瀉者。得澤瀉清之。而精自藏矣。氣虛下陷。而精滑者。得澤瀉降之。而精愈滑矣。况滑疾之劑。腎虛失閉藏之職者。亦宜禁也。夫一藥也。一症也。而或禁。或取。變化殊途。自非博洽而神明者。未免對卷而疑。臨症而眩。若格於理者。變變化化。而不離乎宗。故曰。醫不執方。合宜而用。斯言至矣。【明】經希雍本草經疏論澤瀉曰。澤瀉味甘寒。別錄益之。以鹹。腎與膀胱爲表裏。鹹能入腎。甘能入脾。寒能去熱。蓋淡滲利較之藥也。其曰主風寒溼痺。乳難。消水。養五臟。皆以利水燥溼。則脾得所養。脾得所養。則五臟皆得所養。益氣力。肥健者。皆水利則溼去。溼去則脾強之功效也。又云。主腹痞滿。淋瀝。逐膀胱三焦停水。其能利水祛溼。益無疑矣。洩精者。溼熱下流。客腎與膀胱。是民火扇君火也。

故精搖而洩。病在脾胃。溼熱盡則洩精自止矣。止消渴者。單指溼熱侵脾。脾為邪所干。則不能致津液也。總之其性利水除溼。則因溼熱所生之病。靡不除矣。【明】黃宮繡本草求真論澤瀉曰。澤瀉甘淡微寒。能入膀胱氣分。以瀉腎經火邪。功能利水除溼。故五苓散用此以除溼熱。八味丸用此以瀉腎經溼火。俾其補不偏勝。則補始無礙耳。豈曰澤瀉補陰。功同於地黃之列哉。第其溼熱不除。則病症莫測。故有消渴嘔吐。痰飲腫脹。脚氣陰汗。尿血洩精種種等症。用此甘淡微鹹。以為滲泄。則濁氣既降。而清氣上行。所謂一除而百病與之俱除也。但小便過利。則腎水愈虛。而目必昏。此一定之理耳。鹽水炒。或酒拌忌鐵。【清】葉天士本草經解論澤瀉曰。澤瀉氣寒。甘味無毒。其主風寒溼痺者。風寒溼三者合而成痺。痺則血閉。而肌肉麻木也。澤瀉味甘益脾。脾溼去則血行而肌肉活。痺症瘳矣。其主乳難者。脾統血。血不化乳。所以難也。味甘益脾。脾溼行。則血運而乳適也。其主養五

臟益氣力肥健者。蓋五臟藏陰者也。而脾為之原。脾主肌肉而性喜溼。澤瀉瀉溼。溼去則脾健。脾乃後天之本。所以肌肉長而氣力益。陰氣充而五臟得所養也。其消水者。入膀胱氣寒下洩也。久服耳目聰明不飢。延年輕身者。腎與膀胱為表裏。膀胱水道通。則腎之精道固。精足則氣充。腎開竅於耳。所以耳聰。水之精為目瞳子。所以明目。腎者胃之關。關門固所以不饑。腎氣納所以延年輕身也。其言面生光。能行水上者。脾為溼土。溼則重。燥則輕。輕則能行水上。脾統血。血充則面有光彩也。蓋表其有利水固腎之功。燥溼健脾之效也。【清】徐洄溪本草經百種錄論澤瀉曰。澤瀉乃通利脾胃之藥。以其淡滲。能利土中之水。水去則土燥而氣充。脾惡溼故也。但溼氣必自膀胱而出。澤瀉能下達膀胱。故又為膀胱之藥。【清】黃元御玉楸葉解論澤瀉曰。澤瀉味鹹微寒。燥土泄溼。利水通淋。除飲家之眩冒。療經病之燥渴。氣鼓水脹皆靈。膈噎反胃俱效。【清】吳儀洛本草從新論澤瀉

曰。澤瀉甘鹹微寒。入膀胱。利小便。瀉腎經之火邪。功能利溼。行水治消渴。痰飲。嘔噎。海痢。腫脹。水痞。脚氣。疝痛。淋瀝。陰汗。尿血。洩精。一切溼熱之病。溼熱既除。則清氣上行。又能止頭旋。有聰耳明目之功。近人學說 ①賈九如曰。澤瀉色白微苦入肺。味鹹以利膀胱。凡屬瀉病。小水必短數。以此清潤肺氣。通調水道。下輸膀胱。主治水瀉。溼瀉。使大便得實。則脾氣自健也。因能利水道。令邪水去。則真水得養。故消渴能止。又能除溼熱。通淋瀝。分消痞滿。透三焦蓄熱停水。此為利水第一良品。金為腎水之母。故云水出高源。此能引肺氣從上順下。如雨露之膏澤。故名澤瀉。所以六味丸中。同茯苓。山藥。補肺金。導引於上源。降下而生腎水。用療精泄。退陰汗。去虛煩。又有熟地。山茱。丹皮。補肝木。以生心火。上下相生。陰陽交互。取易理。地天泰水火濟之義。如斯玄妙。非達造化之微者。孰能制此良方。味者誤為泄腎。滅之。若小便不通。而口渴者。熱在上焦。氣分。宜用澤瀉。茯苓以清肺

氣。滋水之上源也。如口不渴者。熱在下焦。血分。則用知母。黃柏以瀉膀胱。滋水之下源也。須分別而用。②張山雷曰。澤瀉產於水中。氣味淡泊而體質又輕。故最善滲泄。水道專能通利小便。本經氣味雖曰甘寒。兼以其生長水澤。因謂之寒。其實輕淡無味。甘於何有。此藥功用。惟在淡則能通。本經稱其治風寒溼痺。亦以輕能入絡。淡能導溼耳。云治風寒。殊非其任。其能治乳難者。當以媿後無乳者言。此能通絡滲泄。則可下乳汁。非產乳有病之通用品。故別錄亦言。葉主乳汁不出。若曰養五臟益氣力肥健。則以溼邪不容。而痺運自健。斯有養臟益氣之效。蓋已屬充分太過之辭。壽頤案本經此藥主治。太燥浮泛。殊無精當之義。恐已屬漢魏間敷淺之說。頗與本經辭旨不類。故原文更有久服耳目聰明。不饑。延年。輕身。面生光。能行水上云云。豈獨非藥理之真。抑亦怪誕太甚。雖本經諸藥。間亦有輕身延年等溢分之語。然從無如能行水上之荒唐者。其為方士屬雜。不問可知。瀨

湖謂經言面生光。能行水上。真術又云。久服身輕。日行五百里。走水上諸說。陶貞白。蘇恭信之。愚竊疑之。蓋澤瀉行水瀉腎。久服且不可安得有此神功云云。善頤謂瀉湖綱目。於古書最多篤信。時且失之穿鑿。而獨於此條能見其真。知荒誕不經之說。固不可為天下後世法也。別錄謂治五臟痞滿。蓋祇以溼阻之痞滿而言。止瀉精者。亦惟溼熱蘊於下焦。而相火妄行其疏泄之令者。乃宜此溼去溼熱而龍相自安。非可以概虛人之滑泄。而又謂補虛損。起陰氣。則大與溼泄傷陰之義矛盾矣。又曰。澤瀉味淡。性善滑泄。生長水中。故善利水運溼。此藥性情功用。即此兩言而已足。更無條義可言。其兼能滑痰化飲者。痰飲亦積水停滯為痛。惟其滑利。故可消痰。總之。溼泄滑瀉之藥。必無補養之理。本經發五臟。益氣力云云。已屬溢美太過。而甄權竟謂可治腎虛精自出。大明且謂補女人血海。令人有子。深古亦謂入腎經。去舊水。養新水。皆非藥理之真。徒眩初學耳目。殊堪

十六畫 澤

詫異。若仲景八味丸用之者。原為小水不利而設。金匱中屢有明文。後人妄謂六味專於補腎。則未學之謬見。非古人製方真意也。

配合應用 ①水腫晝劇夜平者。陽水也。澤瀉同猪苓。白茯苓。人參。白朮。白芍藥。赤小豆。桑白皮。橘皮治之多服必愈。夜劇晝平者。陰水也。同車前子。赤茯苓。生地黃。白芍藥。赤小豆。桑根白皮。木瓜。石斛。慈苡仁治之多服必愈。

②治一切溼熱。澤瀉入五苓散。四苓散。

③治陰虛病有溼熱者。澤瀉入六味地黃丸。

④治一切停飲停水。澤瀉同人參。白朮。半夏。茯苓。橘皮。紫蘇。猪苓。為治飲之要藥。

⑤仲景治心下支飲。澤瀉五兩。朮二兩。水二升。煎取半升。分溫再服。

⑥素問身熱解。汗出如浴。惡風少氣。名曰酒風。服之以澤瀉。朮各十分。麩衍五分。合以二指撮。食後服之。

⑦治飲證病甚欲眩者。用澤瀉

五兩。炒朮二兩。水三升。煮濃服。必效。

⑧仲景治水蓄渴煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。

⑨治水溼腫脹。白朮。澤瀉各一兩。為末。或為丸。每服三錢。茯苓湯下。(保命集方)

⑩治胃暑霍亂。小便不利。頭暈引飲。三白散。用澤瀉。白朮。白茯苓各三錢。水一盞。置五片。燈心十莖。煎八分溫服。

⑪治腎臟風。澤瀉皂莢水。煮爛。焙研煉蜜丸。如梧子大。空心溫酒下十五丸。至二十丸。(經驗方)

⑫治酒後怪症。口鼻中氣出。盤旋不散。凝如黑蓋。色過十日。漸至肩。與肉相連。堅勝金石。無由飲食。煎澤瀉湯日飲三盞。連服五日。愈。(夏子益奇疾方)

用量 二錢至四錢。
應用宜忌 肝腎虛而無溼熱者禁用。長海蛤。文蛤。忌鐵。

參攷資料 ①素問治酒風身熱汗出。用澤瀉。朮。深師方。治支飲亦用澤瀉。朮。但法小別耳。張仲景治雜病。心下有支飲。苦胃。有澤

瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散。皆用澤瀉。行利停水。為最要藥。(蘇頌) ②澤瀉乃除溼之聖藥。入腎經。治小便淋瀝。去陰間汗。無此疾服之。令人目盲。(張元素) ③澤瀉之功。長於行水。張仲景治水蓄渴煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。方用澤瀉。故知其長於行水。本草引扁鵲云。多服病人眼。誠為行去其水也。凡服澤瀉散人。未有不小便多者。小便既多。腎氣得復。實。今人止洩。精多。不敢用之。仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等歸就腎經。別無他意。(寇宗奭) ④本經云。久服明目。扁鵲云。多服昏目。何也。易老云。去浮中留垢。以其味鹹。能瀉伏水故也。瀉伏水。去留垢。故明目。小便利。腎氣虛。故昏目。(王好古) ⑤寇宗奭之說。王好古之竊。謂八味丸以地黃為君。餘藥佐之。非止補血。兼補氣也。所謂陽旺則能生陰血也。地黃。山茱萸。茯苓。牡丹皮。皆腎經之藥。附子。官桂。乃有腎命門之藥。皆不待澤瀉之接引而後至也。則八味丸之用此。蓋取其瀉腎邪。養五

既。益氣力。起陰氣。補虛損。五勞之
功而已。豈能滋腎。從於諸補藥輩
衆之中。則亦不能過矣。(王履) 澤
澤。氣平。味甘。而淡。能滲洩。氣
味俱薄。所以利水而洩下。脾胃有
溼熱。則頭重而目昏耳鳴。澤滲
去其溼。則熱亦隨去。而土氣得令
清氣上行。天氣明爽。故澤滲有養
五臟。益氣力。治頭眩。聰明耳目之
功。若久服。則降令太過。清氣不升。
真陰潛耗。安得不目昏耶。仲景地
黃丸。用茯苓。澤滲者。乃取其滲
脫之邪氣。非引接也。古人用補藥。
必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一開
一固。此乃玄妙。後世不知此理。專
一於補。所以久服。必至偏勝之害
也。(李時珍) 澤滲。生汝南池澤。
五月採葉。八月採根。九月採實。陰
乾。(別錄) 汝南郡屬豫州。今近
道亦有。不堪用。惟用漢中南鄭。青
州代州者。形大而長。尾間必有兩
歧。爲好。此物易朽。常須密藏之。
叢生淺水中。葉狹而長。(陶弘景)
今汝南不復採。惟以涇州。華州
者爲善。(蘇恭) 今山東河陝。江
淮亦有之。漢中者爲佳。春生苗多

在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋
時開白花作叢。似穀精草。秋末採
根。曝乾。(蘇頌) 肺金爲氣化之
源。伏火煎灼。則水道必淤。淤則金
氣不行。而金益病。且水停下流。則
中土濡溼。而奉上無力。故余治勞
嗽吐血之症。未有不以導水爲先
務者。古人每稱澤滲有神。禹治水
之功。夫亦嘗究其命名之義矣。蓋
澤者。澤其不足之水。滲者。滲其有
餘之火。惟其澤也。故能使生地。白
芍。阿膠。人參。種種補益之品。得其
前導。則補而不滯。惟其滲也。故但
走濁道。而不走清道。非若豬苓。木
通。腹皮等味之。削陰破氣。直走無
餘。要知澤滲一用。肺脾腎三部咸
宜。所謂功同神禹者此也。(理虛
元鑑)

【澤滲炭】即澤滲炒成炭者之處
方用名。詳「澤滲」條。

【澤滲葉】 性質 鹹。平。無毒。
主治 大風。乳汁不
出。產難。強陰氣。久服輕身。

歷代記載攷證 【宋】日華諸
家本草論澤滲葉曰。壯水臟。通血
脈。

【澤滲實】 性質 甘。平。無毒。
主治 風痺。消渴。益
腎氣。強陰。補不足。除邪溼。久服面
生光。令人無子。

歷代記載攷證 【明】李時珍
本草綱目論澤滲實曰。別錄言澤
滲實及實強陰氣。久服令人無子。
而日華子言澤滲實能生補女人血
海。令人有子。似有不同。既云強陰
何以令人無子。既能催生。何以令
人有子。蓋澤滲同補藥。能逐下焦
溼熱邪垢。邪氣既去。陰強海淨。謂
之有子可也。若久服則腎氣大洩。
血海反寒。謂之無子可也。所以鼓
書不可執一。

【澤蘭子】 性質 苦。微溫。無毒。
主治 婦人三十六
疾。

【澤蘭根】 原名 地笋。
性質 甘。辛。溫。無溫。
主治 利九竅。通血脈。排膿治
血。

歷代記載攷證 【宋】大明日
華諸家本草論澤蘭根曰。止鼻洪。
吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜
食佳。

【澤蘭葉】 命名 本品生於淺
水。沼澤旁。葉形如蘭。
故名。

古籍別名 虎蘭葉。龍葉。
木經(虎蒲葉)(別錄)水香葉。(吳
普)都梁香葉。(陶弘景)孩兒菊
葉。風葉。孤兒菊葉。(綱目)九响
菜。(和漢藥考)

外國名詞 Arctium japo-
nise, A. Cr.
基本 屬菊科澤蘭之葉莖。
產地 凡溪澗池澤間。俱多生
焉。陳仁山藥物生產辨云。澤蘭產
廣東清遠石潭等處。
形態 澤蘭爲草本植物。春抽
方莖。高二三尺。呈紫赤色。葉類薄
荷。枝節對生。四葉。秋季開白色或
淡紫色花。其根爲紫黑色。

採取 三月間採其莖葉。陰乾
用。
製法 雷斅曰。凡使澤蘭。須別
雌雄。大澤蘭莖葉皆圓。根青黃。能
生血調氣。與小澤蘭迥別。小澤蘭
葉上斑根頭尖。能破血通久積。須
採來細剉。以絹袋盛懸於屋南畔
角上令乾用。

用法 與他藥水煎。或剉末和作丸散。

性質 苦。微溫。無毒。

成分 澤蘭之成分為揮發油、單寧酸。

效能 行血。行水。用作婦人調經藥。及治水腫藥。並治月經過多。

作用 在胃中微能阻止消化之功用。入腸能激腸黏膜。使吸收力增加。并能減少黏膜之分泌。由腸壁而至血中。微能凝固血液。使進行緩慢。更能激子宮神經。使子宮四周之黏膜收縮。

主治 金瘡腫痛。瘡癤。(本經)產後金瘡內塞。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論澤蘭曰。產後腹痛。頻產血氣衰冷。成勞復羸。婦人血滯。腰痛。【宋】大明日華諸家本草論澤蘭曰。產前產後百病。通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。通小腸。長肌肉。消撲損瘀血。治鼻血吐血。頭風目痛。婦人勞傷。丈夫面黃。又藥性論云。澤蘭使味苦辛。主產後腹痛。頻產。血氣衰冷。成勞復羸。又治通身面目浮腫。主婦人血滯腰痛。總其洩熱和血行而微補之能也。【明】李士材本草圖解論澤蘭曰。澤蘭芳香悅脾。可以快氣。疎利悅肝。可以行血。流行營衛。暢達膚竅。遂為女科上劑。【清】黃宮楨本草求真論澤蘭曰。澤蘭苦甘而辛。即今婦人採置髮中除垢者是也。玩書所論澤蘭。與本經澤蘭草同為一體。其生澤旁。紫莖。葉枝。赤節。綠葉。對節生。有細齒。但蘭草則莖圓節長。葉光有歧。澤蘭則莖微短節方。葉有毛之為異。耳。二物並於嫩時。皆可刈佩。以其花葉皆香。置於髮中能辟邪者。

熱。甘能和血。酸能入肝。溫通營血。故又主癰腫瘡癤。及婦人吹乳乳結。止衄血。并中風餘疾。佐以養脾土之藥。而用防己為之使。則主大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。氣。日華子云。澤蘭通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。產前產後百病。通小腸。長肉生肌。消撲損瘀血。治鼻洪吐血。頭風目痛。婦人勞傷。丈夫面黃。又藥性論云。澤蘭使味苦辛。主產後腹痛。頻產。血氣衰冷。成勞復羸。又治通身面目浮腫。主婦人血滯腰痛。總其洩熱和血行而微補之能也。【明】李士材本草圖解論澤蘭曰。澤蘭芳香悅脾。可以快氣。疎利悅肝。可以行血。流行營衛。暢達膚竅。遂為女科上劑。【清】黃宮楨本草求真論澤蘭曰。澤蘭苦甘而辛。即今婦人採置髮中除垢者是也。玩書所論澤蘭。與本經澤蘭草同為一體。其生澤旁。紫莖。葉枝。赤節。綠葉。對節生。有細齒。但蘭草則莖圓節長。葉光有歧。澤蘭則莖微短節方。葉有毛之為異。耳。二物並於嫩時。皆可刈佩。以其花葉皆香。置於髮中能辟邪者。

頭。故雖呼為香草。俗則呼為孩兒菊。與於山蘭。其花雖香。而葉糙無氣者。迥不相同。蘭草莖圓葉光。其性專主入氣。雖書載有久服益氣。輕身。不老。膚語。然究止屬利水除痰。殺蟲辟惡。而為消渴良藥。即內經所謂數食肥甘。傳為消渴。治之以蘭。以除陳氣是也。澤蘭莖方葉毛。雖書載有和血舒脾。長養肌肉之妙。然究皆屬入脾行水。入肝治血之味。是以九竅能通。關節能利。宿食能破。月經能調。癥瘕能消。水腫能散。產後血淋腰痛能止。吐血衄血。目痛風癩癰毒。撲損能治。觀此則書所云舒脾和血。不過因其水消血除之意。豈真舒脾和血之味也乎。入補氣補血之味同投。則消中有補。不致損真。誠佳品也。

近人學說 張山雷曰。澤蘭產下臥大澤之旁。本與蘭草相似。故主治亦頗相近。本經大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。皆苦溫勝溼之功效。亦即蘭草利水道之意。其治金瘡癰腫瘡癤者。專入血分行行瘀排膿消腫也。惟本經所謂乳婦內衄。頗不可解。蓋即後世新產道瘵之意。別錄內塞。當亦以瘵釋不通言之。(廣義)甄權謂治瘵後腹痛。困苦溫行瘵之功。又謂治類產血氣衰冷。成勞復羸。婦人滯血腰痛。則以溫和能利血脈言之。然通利之品。能走未必能守。此當以愈逆之。而可知其非虛症。久服之藥矣。瀕湖謂澤蘭氣香而溫。味辛而散。陰中之陽。脾喜芳香。肝宜辛散。脾氣舒則三焦通利。肝體散則營衛流行。蘭草走氣道。故能利水道。除痰癖。殺蟲辟惡。而為消渴良藥。澤蘭走血分。故能治水腫。癰毒。破瘀血。消癥瘕。而為婦人聖藥。雖是一類。而功用稍殊。石頑謂入肝脾二經血分。專治產後血敗。流於腰肢。拘攣疼痛。破宿血。消瘕。皆散血之功。為產科要藥。

配合應用 澤蘭。婦人方中。最為急用。古人治婦人。澤蘭丸甚多。

澤蘭得炒黑豆。炮乾。薑。當歸。芍藥。乾地黃。牛膝。益母草。赤芍藥。蒲黃。五靈脂。治產後惡露不盡。少腹作痛。俗名兒枕痛。寒月加桂。多火及內熱。虛勞人。去桂加煎便去。

十六畫 澤

五穀脂加人參、鼈甲、香附、麥門冬。治產後諸虛百病。肺熱者去人參。
⑤ 治產後水腫。血虛浮腫。澤蘭防已等分爲末。每服二錢。酸酒下。
(張文仲備急方)

⑥ 治小兒厚瘡。嚼澤蘭心封之良。(子母秘錄方)

⑦ 治瘡腫初起。澤蘭封之良。亦治損傷癰腫。(集簡方)

⑧ 治產後陰翻。產後陰戶燥熱。送成翻花。澤蘭四兩煎湯。洗二次。再入枯礬煎。洗之即安。(集簡方)

用煎 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀血者禁用。

參攷資料 ① 蘭草。澤蘭氣香而溫。味辛而散。陰中之陽。足太陰厥陰經藥也。脾喜芳香。肝宜辛散。脾氣舒。則三焦通利而正氣和。肝鬱散。則營衛流行而病邪解。蘭草走氣道。故能利水道。除痰癖。殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。澤蘭走血分。故能治水腫。塗癰毒。破瘀血。消穢。而爲婦人聖藥。雖是一類。而功用稍殊。正如赤白茯苓。芍藥。補瀉皆不同也。雷斅言。雌者調氣生血。

雄者破血通積。正合二閉主治。大澤蘭之爲蘭草。尤可憑據。血生於氣。故曰調氣生血也。又荀子云。澤芷以養氣。謂澤蘭白芷之氣芳香。通乎肺也。(李時珍) 齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁香。今俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。(李時珍) ② 生地下水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉。相植支節間。(吳普) ③ 今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之。根紫黑色如粟根。二月生苗。高二三尺。莖幹青紫色。作四稜。葉生相對如薄荷。微香。七月開花。三月採苗。陰乾。荊湖嶺南人家多種之。澤州出者無花。子。此與蘭草大抵相類。但蘭草生水旁。葉光潤。根小紫。五六月盛。而澤蘭生水澤中及下澤地。葉尖微有毛。不光潤。方莖紫節。七月八月初採。微辛。此爲異爾。(蘇頌)

【澤蘭】即澤中結凝之鹽也。性質功用與海鹽同。詳【食鹽】條。

【澱花】即青黛之古籍別名。與見

和漢藥考。詳【青黛】條。

【澱沙】即礪砂之古籍別名。與見和漢藥考。詳【礪砂】條。

【燄窠】即石硫黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳【石硫黃】條。


【燈心草】處方用名。燈芯。燈草。辰燈心。

古籍別名 虎鬚草。碧玉草。(綱目) 燈草。席草。赤鬚。古乙心。(和漢藥考)

外國名詞 Juncus effusus, L. var. decipiens, F. Bu (拉丁)

基本 屬燈心草科。爲燈心之莖根。

產地 凡江南澤地。恒多叢生。陝西亦有出。



草 心 燈

形態 燈心爲多年生草。莖圓。作綠色細線狀。高達四五尺。中有白髓。葉在莖之基部。作鱗狀。夏月。於莖之上部。生多數花。梗開黃綠。

色小花。燈心草用以織席。莖中白髓。即入藥之燈心草。

採取 六七月採莖。取積日乾。製法 李時珍曰。凡用燈心草。雖研。以糯米粉漿。築過曬乾。研末。入水澄之。浮者是燈心也。曬乾用。

用法 水煎或到末用。

性質 甘寒。無毒。

效能 利水通淋。清熱安神。專作利尿劑。

主治 五淋生莖服之。敗席煮服更良。

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論燈心曰。消肺。治陰痰瀉不利。行水。除水腫。羅開【元】朱丹溪本草衍義補遺論燈心曰。治急喉痺。燒灰吹之。甚捷。燒灰塗乳上。飼小兒。止夜啼。【明】李時珍本草綱目論燈心曰。降心火。止血通氣。散腫止痛。燒灰入輕粉。辟香。治陰疝。【清】黃宮楨本草求真論燈心曰。燈草味淡而寒。體小氣微。諸書皆稱能降心火。以心治心也。心火清則肺金肅。心與小腸相表裏。則熱盡從小便而出矣。且熱去而血亦寧。故能止血通淋。清上焦。

伏熱。五淋之聖藥也。燒可治喉痺。

及以灰塗乳上。則兒飼不夜啼。縛把撥。則蟲從草出。淨水可見。且能斷根矣。氣虛小便不禁者。忌服。

【清】賈九如辨藥指南論燈心曰。燈心氣味俱輕。輕者上浮。專入心肺。其味最淡。淡能利竅。使上部鬱熱下行。從小便而出。主治咳嗽。咽喉赤目昏淋。閉水腫。小便不利。暑熱便濁。小兒夜啼。皆清熱之功也。世疑輕淡之物。以爲力薄。而忽之。不知輕可去實。淡生於滲。惟此能導心肺之熱。自上而下。通調水道。下輸膀胱。其力獨勝。

近人學說 張山雷曰。本經止有石龍芻。云一名龍鬚。卽今織蒲之草也。宋開寶本草。乃有燈心草。其形較之織蒲者爲粗。其質較鬆。今割其穗爲燈心。而以其壳爲囊衣。二草雖非一種。然是同類。皆生於下溼之地。味淡質輕。故專於通利。能泄溼熱而清導小水。亦降心肺之火。本經謂石龍芻。味苦微寒。主心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼。鬼瘧。惡毒。其所謂邪氣。惡毒者。卽以溼熱之邪言之也。治風溼者。亦

十六 燈 燈

取其利溼之意。別錄謂治痞滿。除莖中熱痛。仍是泄熱利水之義。陳藏器謂敗蒲治淋。及小便不通。開寶本草謂燈心草主五淋。織蒲

更良。潔古謂瀉肺。通瀉瀼瀼。閉行水治腫。丹溪謂治急喉痺。燒灰吹之。以灰飼小兒。止夜啼。瀨湖謂降心血。止血熱。通氣消腫。又無一非泄熱利水之用。又燈心之質。尤爲輕虛。故開肺泄水。尤其專長。以開喉痺。其義在此。但研末燒灰。其法甚難。以米粉漿之。則可研。塞於竹節中。糠火煨之。則成炭。要之質賤而味淡。除利水以外。無用。韓氏醫通有天丸。必以燈心爲末。合沿石二苓。猪苓。澤瀉。再用人參。芍藥。爲丸。其用亦不過通利小水而已。可謂矯揉造作。是亦醫界之變矣。

配合應用 治破傷出血。燈心草。燻爛傅之。立止。勝金丹方。

治衄血不止。燈心二兩。爲末。入丹砂一錢。米飲。每服二錢。聖濟總錄方。

砂末一錢吹之。一方燈心。箬一方燈心。箬葉。灰等分。瑞竹堂方。又用燈心草。紅花。燒灰。酒服一錢。卽消。高濟方。

治疔瘡。瘡煩喘。小便不利者。燈心一把。醋甲二兩。水一升。煎六合。分二服。應安常傷寒論方。

治夜不合眠。難睡。燈草煎湯代茶飲。卽得睡。集簡方。

治通利水道。白飛霞。白制天。一丸。用燈心十斤。米粉漿染。曬乾。研末。入水澄去粉。取淨者。曬乾。二兩五錢。赤白茯苓。去皮。共五兩。滑石。水飛五兩。猪苓。二兩。澤瀉。三兩。人參。一斤。切片。熬膏。和藥丸。如龍眼大。珠砂爲衣。每用一丸。韓氏醫通方。

治溼熱黃疸。燈草根。四兩。酒水各半。入瓶內。煮半日。露一夜。溫服。集玄方。

氣通。則血和而水漲。暢矣。其治喉瘖。最捷者。降心火。下肺氣。和血散氣之義也。劉濟江。

燈心草生江南澤地。叢生。莖圓細而長。直人將爲蔗。馬志。陝西亦有之。燕然待乾。折取中心。白穰。燈者。是謂熟草。又有不蒸者。但生乾。刺取爲生草。入藥宜用生草。冠宗爽。此卽龍鬚之類。但龍鬚緊小而潤實。此草稍粗而質虛白。吳人栽蒔之。取蠶爲燈。以草織席。及糞他處野生者。不多。外丹家以之伏硫砂。雷公炮炙論序云。礱過赤鬚。永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚草。煮貯住火。不知是否。卽此虎鬚也。李時珍。

燈芯 卽燈心草之處方用名。詳燈心草條。

燈心草 卽燈心草之處方用名。詳燈心草條。

燈盞殘油 古以麻油燃燈。所謂殘油者。指殘餘之麻油而言。若棉油。菜油。及近日之煤油。皆不在本條範圍之內。主治 吐風痰食毒。塗癰腫。

十六畫 燈

一七〇〇

熱毒。又治割火咬傷。潰瘡口甚良。

配合應用 ①治髮癢飲油。外

蓋云。病髮癢者。欲得飲油。用油一

升。入香澤煎之。盛置病人頭邊。令

氣入口鼻。勿與飲之。疲極眠睡。蟲

當從口出。急以石灰粉手捉取。抽

盡。即是髮也。又云。治胸喉同覺有

癢蟲上下。管開葱鼓食香。此乃髮

癢蟲也。二日不食。開口而臥。以油

煎葱鼓令香。置口邊。蟲當出。以物

引去之。必愈。

②治髮癢腰痛。南史云。宋明帝

宮人腰痛。奉心。發則氣絕。徐文伯

診曰。髮癢也。以油瀝之。吐物如髮

引之。長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸

之。滴盡。唯一髮爾。

③治吐解蠱毒。以清油多飲取

吐。(嶺南方)

④解河豚毒。一時倉卒無藥。急

以清麻油多瀝取吐。出毒物即愈。

(衛生易簡方)

⑤解砒石毒。用麻油一盞瀝之。

(衛生方)

⑥治大風熱疾。近效方云。婆羅

門僧。療大風疾。并熱風。手足不遂。

壓丹石熱毒。用消石一兩。生烏麻

油二大升。同納鑊中。以土壘蓋口。

紙泥固濟。細火煎之。初煎氣腥。藥

熱則香氣發。更以生脂麻油二大

升。和合微煎之。以意斟量得所。即

內不津器中。凡大風人。用紙屋子

坐病人外面。燒火發汗。日服一大

合。壯者日二服。三七日。頭面皴瘡

皆滅也。(圖經方)

⑦治傷寒發黃。用生烏麻油一

盞。水半盞。雞子白一枚。和攪服盡。

(外臺祕要方)

⑧治小兒發熱。不拘風寒飲食。

時行痘疹。並宜用之。以葱涎入香

油內。手指蘸油。摩擦小兒五心頭

面項背諸處。最能解毒涼肌。(直

指方)

⑨預解痘毒。時行痘。暖。恐發痘

疔。用生麻油一小盞。水一盞。旋旋

傾下油內。柳枝攪稠如蜜。每服二

三。規效。大人二合。臥時服之。三五

服。大便快利。瘡自不生矣。此扁鵲

油劑法也。(外臺祕要方)又或用

麻油。童便各半盞。如上法服。(直

指方)

⑩治小兒初生。大小便不通。用

真香油一兩。皮消少許。同煎滾。冷

定。徐徐灌入口中。嚥下即通。(蘭

氏經驗方)

⑪治卒熱心痛。生麻油一合。服

之良。(肘後方)

⑫治鼻衄不止。紙條蘸真麻油

入鼻。取嚏即愈。有人一夕。衄血盈

盆。用此而效。(普濟方)

⑬治胎死腹中。清油和蜜等分。

入湯頓服。(普濟方)

⑭治漏胎難產。因血乾澀也。用

清油半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。

溫服。胎滑即下。他藥無益。以此助

血為效。(胎產須知方)

⑮治產婦不收。用油五斤。煉熟

益盛。令婦坐盆中。飯久。先用阜角

炙去皮研末。吹少許入鼻。作嚏立

上。(斗門方)

⑯治癰疽發背。初作即服此。使

毒氣不內攻。以麻油一斤。銀器煎

二十沸。和醇醋二。分五次。一日

服盡。(直指方)

⑰治腫毒初起。麻油煎葱黑也。

趁熱通手。旋塗自消。(百一運方)

⑱治喉痺腫痛。生油一合。瀝之

立愈。(總錄方)

⑳治丹石毒發熱者。不得食

熱物。不用火為使。但著厚衣。暖臥。

取油一匙。含嚥。戒怒二七日也。枕

中記云。服丹石人。先宜以麻油一

升。蘆白三升。切納油中。微火煎黑。

去滓合酒。每服三合。百日氣血充

盛也。亦治身面瘡疥。

㉑治梅花禿癬。用清油一盞。以

小竹子燒火入內煎沸。漉豬膽汁

一箇。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。

勿令日曬。(普濟方)

㉒治赤禿髮落。用香油水分。

以銀錢攪和。日日擦之。髮生乃止。

(普濟方)

㉓治髮落不生。生胡麻油塗之。

(普濟方)

㉔令髮長黑。生麻油桑葉煎過。

去滓沐髮。令長數尺。(普濟方)

㉕治聾。生油日滴耳中三五次。

候耳中塞出即愈。(普濟方)

㉖治蝨蟻入耳。用胡麻油作煎

餅。枕臥。須臾自出。李元淳尚書在

河陽日。蝨蟻入耳。無計可為。腦隔

有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。因

發御醫。療之不驗。忽有人獻此方

乃愈。(劉禹錫傳信方)

㉗治蜘蛛咬毒。香油和鹽搽之。

（醫濟方）

①治冬月唇裂。香油類類抹之。（相感志方）

②治身面白癩。以酒服生胡麻油一合。一日三服。至五斗。忌生冷。豬雞魚蒜等百日。（千金方）

③治小兒丹毒。用生麻油塗之。（千金方）

④治打撲傷腫。熱麻油和酒飲之。以火燒熱地臥之。覺即疼腫俱消。松陽民相傳。用此法。經官驗之。了無痕迹。（趙葵行營錄方）

⑤治虎爪傷人。先吃清油一盤。仍以油淋洗瘡口。（趙原陽濟急方）

⑥治毒蜂螫傷。用清油擦之妙。（趙原陽濟急方）

⑦治毒蛇螫傷。急飲好清油一二瓊解毒。然後用藥也。（濟急良方）

參攷資料 ⑧大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精。發。發。發。困。脾。感。令人體重。損聲。（陳藏器）
⑨有牙齒疾及脾胃疾人。切不可吃。治飲食物。須逐日熬熟用之。若經宿。即動氣也。（陳士良）
⑩油生

十六蠶 燈

於麻。麻溫而油寒。同質而異性也。

（劉完素）①香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。（朱鷺亨）②張華博物志言。積油滿百石。則自能生火。陳

寔畢談言。衣相有油蒸熱。則出火星。是油與火同性矣。用以煎煉食物。尤能動火生痰。陳氏謂之大寒。珍意不然。但生用之。有潤燥解毒。止痛消腫之功。似乎寒耳。且香油能殺蟲。而病髮癢者。嗜油。煉油能自焚。而氣感則反冷。此又物之玄理也。（李時珍）

【燈蛾】原名 飛蛾。飛而喜撲燈火者。故名。

外國名詞 Arctia caja, L. (拉丁)



燈 蛾

形態 燈蛾為卵生蟲類。蠶蛾屬之一種。其體肥大。密生軟毛。前

燒

翅赤褐色。白色粗條。後翅赤。有黑紋。幼蟲白色。密生赤黑色長毛。有脚八對。夏月疾行路中。能為植物之害。長成便為飛蛾。捕得可供藥用。

主治 趙學敏曰。治痔管。法用蠶蠟一個。同拌燈蛾十個。放罐內。一宿。加麝香一錢。陰乾。為末。吹入管內。自能出水。水乾即愈。

【燈窩油】即燈盡殘油。詳「燈盡殘油」條。

【燈蠶草】即澤漆之俗名。詳「澤漆」條。

【燈籠花】即山慈姑之俗名。詳「山慈姑」條。

【燈籠草】即酸漿之古籍別名。與見唐本草。詳「酸漿」條。

【燒酒】 蒸本 本品係用糯米蒸熟。和麴。釀。中七日。以飯蒸取汁。所成之酒。故名。

古籍別名 火酒。氣酒。（約旦）
阿刺吉酒（飲屬正要）
性質 辛甘大熱。有大毒。

主治 李時珍曰。治冷積寒氣。燥溼痰。開鬱結。止水瀉。治霍亂。嘔疾。噎膈。心腹冷痛。陰毒欲死。殺蟲。辟毒。利小便。堅大便。洗赤目。腫痛。有效。

配合應用 ①治冷氣心痛。燒酒入飛鹽飲即止。

②治陰毒腹痛。燒酒溫飲。汗出即止。

③治嘔逆不止。真火酒一盃。新汲井水一杯。和服甚妙。

④治寒濕泄瀉。小便清者。以頭燒酒飲之。即止。

⑤治耳中有核。如斑核。大痛不可動者。以火酒滴入。仰之半時。即可搯出。（李機奇方）

⑥治風蟲牙痛。燒酒浸花椒。類煎之。

⑦治寒咳。咳嗽。用燒酒四兩。豬脂。蜜。香油。茶末。各四兩。同浸酒內。煮成一處。每日梳食。以茶下之。效。

參攷資料

⑧燒酒純陽毒物也。面有細花者為真。與火同性。得火即燃。同乎焔消。北人四時飲之。南人止暑月飲之。其味辛甘。升陽發散。其氣燥熱。勝濕祛寒。故能開

十六 燼 燒 燕

佛燼而消沉積。通膈噎而散痰飲。治泄瀉而止冷痛也。辛先入脾。和水飲之。則抑使下行。通調水道。而小便長白。熱能燥金耗血。大腸受刑。故令大便燥結。與葶藶同飲。即生痔也。若夫暑月飲之。汗出而膈快身涼。赤目洗之。淚出而腫消赤散。此乃從治之方焉。過飲不節。殺人頃刻。近之市沽。又加以礞石草烏辣灰香藥。助而引之。是假盜以方矣。善攝生者宜戒之。按劉克用病機賦云。有人病赤目。以燒酒入鹽飲之。而痛止腫消。蓋燒酒性走引。鹽通行經絡。使鬱結開而邪熱散。此亦反治却劑也。(李時珍) 過飲敗胃。傷脾。喪心損壽。甚則黑腸腐胃而死。與葶藶同食。令人生痔。鹽冷水綠豆粉解其毒。(李時珍) 燒酒非古法也。自元時始創。其法用濃酒和糟入甑蒸。令氣上。用器承取滴露。凡酸壞之酒。皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米或黍或秫或大麥蒸熟。和麴釀。燒中七日。以飯蒸取。其清如水。味極濃烈。蓋酒露也。(李時珍) 退羅酒以燒酒復燒二次。入珍寶異香。其

燼每個以檀香十數斤燒烟燼令如漆。然後入酒罈封。埋土中二三年。絕去燒氣。取出用之。曾有人攜至船。能飲三四盃即醉。價直數倍。也有積病。飲一二盃即愈。且殺蟲。予親見二人飲此。打下活蟲長二寸許。謂之魚蠱云。(汪穎)

【燒酒火】 性質 大熱。辛。甘。主治 溫中行氣。動血入十二經。

委致資料 酒本來麴之精華。屬陽。燒酒則又為酒之精華。乃陽中之陽。然之色綠。陽極陰生之象。與石硫性同。皆以陽為體。藏陰於用也。故其光照人面。皆作青灰色。照燄燄則不能遁形。以陰為用者。多含毒。今人率以此酒。冬月為火碗。用以燒物代炭火。久食則發癩毒。默受其毒而不覺。然維厥寒者。宜之。氣能透達骨髓。驅風燥溼。熏衣著之。能發骨節中汗。(趙恕軒)

【燒鹽】 命名 本品為鹽之燒過者。故名。 主治 入粥食。止血痢。


【燕】 古醫別名 乙鳥(說文) 玄鳥(禮記) 鷲鳥(古今

注) 鷲(莊子) 游波(炮炙論) 天女(易占)

外國名詞 Hirundo rustica gutturalis Scop. (拉丁) (East-orn chimney swallow 或 Swallow) (英) Schwalbe (德) ツバメ 或 ツハクロ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類燕科。

形態 燕為原禽類燕屬之一種。體大似雀。頭頂背及翼黑色。有青光。頸與喉栗色。胸有黑條紋。腹純白。形闊而圓。頸短。嘴短闊。腳細小。目之視力甚銳。甚長而狹。小。稍呈彎狀。尾羽十二枚。分枝為叉狀。亦黑色。每年春分前後。來自暖地。銜泥作巢於屋宇。秋分後復去。伏於窩中。其肉可供藥用。



燕

性質 酸。平。有毒。

主治 殺痔蟲。疥癩。 委致資料 燕肉不可食。損人神氣。(陶弘景)

【燕口香】 即沉香形如燕口者之古籍別名。與見綱目。詳「沉香」條。 【燕支】 即燕脂。詳「燕脂」條。

【燕卵】 即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【燕尾香】 即草蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳「草蘭」條。

【燕尾草】 即慈姑之古籍別名。典見大明本草。詳「慈姑」條。

【燕尿】 性質 辛。平。有毒。 主治 蠱毒。鬼疰。逐不詳邪氣。破五疔。利小便。熬香用之。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論燕尿曰。作湯浴小兒驚癇。唐蘇恭新修本草論燕屎曰。療痔。殺蟲。去目翳。唐孫思邈千金翼論燕屎曰。治口疳。瘰

疾。

【燕面】 即夏枯草之古籍別名。典見別錄。詳「夏枯草」條。

【燕胎子】 即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【燕脂】 即燕脂。詳「燕脂」條。

【燕脂】 即燕脂。詳「燕脂」條。

【燕脂菜】即落葵之古籍別名。與見綱目詳「落葵」條。

【燕草】即佩蘭之古籍別名。與見綱目詳「佩蘭」條。

【燕麥】即雀麥之古籍別名。與見唐本草詳「雀麥」條。

【燕窠】即燕窩詳「燕窩」條。

【燕窠中草】即燕窩草詳「燕窩草」條。

【燕窩】命名 本品係雨燕科中之金絲燕食海生物所化之唾液。吐出營造之窩巢。故名。

處方用名 上官燕。淨毛燕。暹羅燕。龍牙燕。牡丹毛燕。光燕。

古籍別名 燕窩菜。(綱目拾遺)

產地 產於閩廣漳泉沿海等處。南洋之婆羅洲。紐幾尼亞。馬達加斯加。蘇門答臘。馬來羣島。與爪哇。西伯里斯。暹羅。印度。日本。亦均有出之。

基本 屬脊椎動物鳥類鳴禽類雨燕科。爲金絲燕之窩。

形態 燕窩爲金絲燕以唾液及其他物質所釀成之窩巢。係營

十六畫 燕

於斷崖峭壁之上。形狀如兜。其純粹由唾液造成者。則爲內包纖維質。類如海綿珊瑚之着生。排列無序。其質白色之細條。侵水則柔軟。漲大。蘇門答臘產者。其色鮮白。不耐火。暹羅產者。稍間黃黴。最耐燬。大香。氣甚烈。爲貴重之補劑。並可供藥用。

種類 天然燕窩之品質不一。上品者曰頭水。暹羅燕。質白光潔。透明。囊厚。內有網絲。落水膨漲力甚強。一錢能漲至一兩七八錢。此爲第一次營巢。故曰頭水燕。其精力最足。第二三次營巢。則囊薄。色白黃帶灰色。或間有紅斑。雖亦產暹羅。質性已薄弱。膨漲力亦大減。每錢刺發至七八錢。產南洋爪哇各島巖穴者。曰洞燕。在飼養室營巢者。曰厝燕。洞燕。糙米色。質堅。間有細毛。厝燕。色白。質鬆。毛少。落水漲力。雖亦有以一分至十分可漲。然一煮即爛。其力不及天然頭水燕之強。歷歷產龍牙島者。曰龍牙燕。以囊厚。色白。有神。內有網絲。糊滿者爲優。福建泉漳沿海產者。夾毛者多。名曰毛燕。(外國格里斯

亦產之)亦以肉厚。色白。有神。紅根毛。輕。每隻有條。串眼者。曰牡丹毛燕。爲最佳。其他囊薄。毛重。色白。帶灰黑者。次。大抵探下之後。不加精製。亦不整齊。乃浸於水中。使其結合。除去羽毛及其他夾雜物。再乾燥之。他如天然燕窩。與日本人造燕窩。凡有經驗者。亦各有區別。若天然燕窩。色深較潤。有神光。雖夾雜有毛。出於自然。且有鯛魚味。人造燕窩。色呆白無神。質粗略堅。硬。有海藻氣。或全無氣味。以此分辨。一無道形。凡天然燕窩。以帶紅紫色者。爲最上品。白色者亦佳。帶黑色多毛者。最下也。

採取 ●採取時期。金絲燕爲維持自身生活之安寧計。營窩於斷崖絕壁。非常危險之海島上。約費三月之工作。方能成功。一窩。土人於其未產卵以前。採取之。而海燕再築第二窩。一月落成。復被採取。又再築第三次之窩。燕居窩中。產卵。不數日。孵化成雛。發育甚速。其產卵分早春。近冬二時期。俟雛燕完全成長之時。母子即離去。近海。羣南方暖陸飛去。採集者復攀

登絕壁。從事第三次之採集。動物學大辭典云。燕窩品質之高下。與該燕所棲之洞穴。及採取之時節。有關係。欲得上品。須於雛之羽毛未發育時。併窩中之卵而採取之。若雛已發育而飛去者。則呈黑色。且帶血痕。其或羽毛交雜。幾不可用。其採取期。概在四月八月十二月間。爲優。●採取方法。蓋餘錄云。燕窩產危巖絕壁。採取非易。樂此者。每尋鮑魚爲導線。蓋燕窩下必有鮑魚。自海岸起。相離數尺。則銜一介捕者。先持鐵錐。輕擊鮑魚。鮑即緊吸石壁。其功力甚大。乃足踐其一手。持其一。陸續緣之而上。燕窩既得。即順緣而下。隨下。隨將鮑魚割下。故燕窩所得。鮑魚值亦稱之。茶餘客話云。許肯巖方伯。語予云。燕窩產海島中。窮巖遠谷。足力繩竿之所不及。故舶養小猿猴。善解人意。至山島間。以小布囊繫猿背上。縱之往。升木深巖。盡刺穿。中而歸。猿之去也。若不得食。三數日始返。海客治果。餌充囊中。俾之遠出不餓。拙者出。即刺穿囊中。歸。即傾囊。不過數片。爲果餌與地也。

其黏者將果餌傾置質間。割塞滿。盡盡燕窩矣。空而復去。尤為便值。一值數百金。貨數倍於拙者云。張祿燕窩談云。南洋羣島土人常乘小舟。見巖礁絕壁。下有燕窩。即背掛網籃。腰帶長刀。用網之一端繫巖壁草木上。一端勝於腿。依繩上去。探得後。放背籃內。復依繩而下。但此法非常危險。偶不小心。即落於海中。而飽魚腹。如天然燕窩採取方法。雖各有不同。然營巢於危巖絕壁。則無異。採得不易。故更珍貴。不若飼養燕窩。隨時採取。無甚為難也。

製法 人造燕窩之原料及製法。日本島國四面環海。故海產植物亦不少。採用種種方法。為人造燕窩。所取原料。即海藻之屬。乃係海藻類之石花菜。烏足藻等。其法即以此類海藻。曬於海濱陸地。俟其將乾。以淡水酒之。如是一曬。一酒。約至七八次。則海藻變為淡黃色。俗名漂白。於是商人等買此漂白海藻。用水煮後。以布袋濾之。以所得濾液。冷却凝固。即成爲瓊脂質。(俗名洋菜)是質除做燕窩

輸入吾國外。且輸出法德等國。作絲織物之原料。每年出口值銀一百五六十萬元云。

性質 甘平無毒。

成分 據張祿燕窩談考得。自海燕之唾液分泌一種黏液。製成之天然燕窩。分析之結果。其成分為水分一〇・四〇%。一含窒素物質五七・四〇%。脂肪〇〇・〇〇%。纖維一・四〇%。一灰分八・七四%。又以水蒸氣處理之。溶解於水者。為有機物質七四・三〇%。一無機物質七・一四%。又據美國生物化學雜誌。載吾國王女士對於燕窩之研究。大要謂淨去燕窩之毛。加以試驗。其灰分之平均百分數。為二・五二。此灰分溶於鹽酸。其中有磷百分〇・〇三五。有硫百分之一・一〇。當燕窩起加水分解時。得還原性炭水化合物。至少百分之一七・四。其所含之蛋白質。有數種。其氮之分佈。約略如下。酪氨酸以〇・〇八%。肥蛋蛋白質以六・六八%。黏膠蛋白質以三・九五%。

尿酸蛋白質以二・三九%。單經基氮以五・一九%。水解乾酥蛋白質以二・四・六%。組織蛋白質以六・二二%。非經基氮以七・二二%。據研究所得。胃液酸質。及唾液酸質。解消化燕窩。惟不如消化煮過雞蛋白之易。用之以飼動物。實驗之結果。表示燕窩蛋白質。亦非佳滋養品。不足代替其他緊要之蛋白質。為食物之原料云。

主治 大養肺陰。化痰止咳。補而能清。為調理虛損勞瘵之聖藥。一切病之由於肺虛。不能清釀下行者。用此皆可治之。

近人學說 曹炳章曰。海燕御製螺海粉魚蟲小生物。經胃中甜肉汁酸汁。化為唾液。吐而作窩。得風日陽和之氣。其味甘淡微鹹。能使金水相生。俾腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。為食補品中之最馴良者矣。如養胃液滋肺津。潤燥澤枯。生津益血。止虛嗽虛痢。理隔上熱痰。病後諸虛。尤為妙品。治高年虛嗽虛癆。小兒胎熱。及痘疹元虛頂陷者。為最效。今人以之調

補虛損勞瘵。咳吐紅痰。每兼冰補。養食。往往見效。一切病由肺脾氣虛。肝陽上擾。不能清下行。皆可治之。久任斯優。若陰火方熾。血薄上奔。雖服無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。飲食辨錄云。性能補氣。凡脾肺虛弱。及一切虛在氣分者。宜之。又能固表。表虛漏汗。長風者。服之最佳。每枚可重在一兩以上。色白如銀。瓊州人呼為崖燕。力猶大。一種色紅者。名血燕。能治血痢。兼補血液。有表邪人切忌。從新云。今人用以煮粥。或用雞汁煮之。雖甚可口。然亂其清補之本性。豈能已痰耶。有與冰糖同煮。則甘壅矣。亦豈能助肺金清肅下行耶。此皆關於燕窩效用宜忌之發明大要也。服之者宜注意之。程登瀛曰。燕窩者小海燕所營之巢也。暹羅年產二百餘擔。大部分運銷於我國。顧文人學者。到暹遊歷者。罕有樂意到那懸崖絕壁去考察燕之形態。與吐窩狀況者。而本地人習見無奇。又以為細事。不值記錄。故書籍所載。都語焉不詳。不揣詞拙。爰就耳目所及。屑細誌之。使本品之

取實情。得以隨貨物報告於諸君之前。想亦醫藥界所樂聞也。燕鳥之種類。大別分爲吐窩與營窠二者。不吐窩者有烏燕。紅領燕二種。春分前後。遷至我國沿海各地。含泥草築巢。以營生。秋分後。回歸熱帶地。以是國人稱之爲季鳥。有種種神話傳說。吐窩者。舊稱金絲燕。究其羽毛。絕不像金絲。我暫時簡稱爲小燕。因爲牠是燕類中之最小者。小燕之外。另有土種燕。依其棲息地以區別。其窩大別有洞燕。厝燕。毛燕三種。細目繁多。另分述於後。小燕之形態。背灰黑色。腹部灰白或粉赤。大體上都不似烏燕之烏黑。青光。其翼不尖。飛時尾平圓如紙扇狀。尾椎部不列一行白星點。其性喜羣居。終年不遷居異地。雌者在吐窩前。最肥大約有二三錢重。雄較小。吐涎亦較少。但其性善飛。常飛翔於海空覓食。歸宿洞穴中。陰雨天亦飛入陸地。朝出夕歸。從不曾見其棲息於陸地或沙灘。舊說謂其食海粉。海藻。蟹類者。誤也。以其飛行空間所食。必是飛蟲之類。有時撲水亦僅能

得浮游之小魚。不能啄食植物。或固著之動物也。(燕屎似蠅屎。屎可確定其食蚊蟲之類。不食植物也。)至於何以能吐涎成窩。則非愚所能索解。矣。大概如蠶能吐絲。亦自然物之奇妙也。燕窠遍地。甚多。暹西勢兩海濱各島。年產二百五六十擔。暹羅海平常產額計。呈養單一百二十擔。萬崙。宋卡共七八十擔。西海岸臨印度洋。自馬里灣至寶突。約五六十擔。此項權利屬國有。由政府招商投承。以三年爲一期。現期爲萬興公司。以六十四萬投得南路東海收取。設總機關於曼略。分設收燕廳於呈養。卑。萬崙。宋卡。正月初卽用人守管燕窩。由公司船運送飲食。法禁森嚴。外船不得駛進其界內。出產地不零售。食已疲倦。其毛易於脫落。口涎未甚乾燥。便隱伏於其中。故細毛交錯。且必待新鳥出洞。才收取。經過日期較久。凡窩色灰黃。中心薄而邊厚者。細毛黏雜。有血絲狀者。卽爲第三水燕。卽通銷我國市肆所謂毛燕是也。至土種云者。所以別於正種之燕鳥也。其

形色與小燕稍異。另佔洞穴。啄小燕之毛。及自捋其毛。搗雜做成之窩。本地稱毛燕。烏燕。含唾涎之成份各地不同。呈養年產五六擔。毛草居大半。不堪食。只煨研調油。擦湯火灼。傷頗有效。宋卡十餘擔。下西勢活吞大年等地。出窩三十餘擔。幾全爲毛。其含涎成分較多。此種毛燕。概售與香港製燕廠。(據報由香港轉運之燕窩。十八年全年達五百三十擔)該製燕廠專收南洋各地之毛燕。將窩溶解。濾去粗毛。草。復以藥物消溶其細毛。加海菜粉類。做成塊曰燕餅。其色呆白。無毛。無纖維。國內市肆每謂有一種假貨。殆卽此物。抑另有不合燕涎之質。貨亦未可知。但稍留意。不難立辨真假。燕鳥皆棲息於海濱。但以距淡水港較遠者。曰鹹水燕。其質較佳。價值恒較昂。暹羅普吉省會曰暹扣。年產十餘擔。其地榜孟加拉灣。北與緬甸接壤。羣鳥錯列。離淡水地極遠。出品最佳。惟無適當之大洞穴。使鳥羣集於其中。故地方遼闊。出產無多。收獲管理殊不易。前幾年招

商投承。納餉萬餘。便能投得專賣權。設機關於沿海各地。無論何人。向其領取牌照。便可出島覓食。惟探得概以平價售與專買人。因收取時候不一致。故其燕窠新舊大小駁雜。此殆因地域廣闊使然。遇產之外。安南。緬甸亦有。但產量不若暹之多且良也。厝燕。就海濱築屋宇。使燕鳥集於其中。營窩於人家屋簷下。故曰厝燕。產日里。亞齊各地。荷屬亦採洞燕。燕之色。質與時價。蘇門答臘產者。以及日里阿齊之厝燕。其色鮮白。不耐火。食時。只以滾水泡浸。若煨煮二小時。則完全溶化。不知者或以爲假貨。其價較暹產爲低。暹產呈養色。稍黃。最耐煨。香氣甚濃。正開巖大燕一斤值百末。普通四五末。較石叻報紙所報荷屬之厝燕洞燕之行。情爲高。燕窩收入後。略吹曬。使乾燥。卽剪削盡蒂。及邊緣之尖突者。所剪下之燕腳。分赤角。白角二種。窩被鹹水淋溼。則變紅硬化。浸泡不開。赤角乃所貼之石。有鹹氣所致。窩鳥因未生羽毛之鳥。因味甘。微鹹。氣溫。功能補血生精。祛風勝

十六畫 燕

溼。為療治痛風。轉痺之要藥。燕之身有寄生物。曰燕虱。遺留於窩中甚多。嗜人能使紅腫。發寒熱。收高者多。祝髮如僧。以避其棲息。燕窩之本質無味。而有蛋香氣。含炭分平均二〇五。能全溶於鹽液中。加水分解時。發生還原性之炭水化合物。此化合物中含蛋白質最多。凡津液涸竭。對於多澱粉質之米穀類食難下咽者。胃燥惡食。以及肺炎乾咳。以此為食養。其滋陰養液之功。遠非無情草木所能比擬。蓋以鳥之唾液。故得有奇妙之特效也。燕所營窩之巖壁。極比蜂之窠。回各佔一窠。究其構成之原因。殆此巖壁初係灰土質。經鳥之爬挖。及歷次以鐵匙括窩所握成者。歷年既久。窟漸深而巖已成石。以是乃有種種傳說。以為天造地設之仙境。不足信也。

配合應用 ●治腸上熱。痰。燕窩入雅梨。加冰糖蒸食。(嶺南雜記方)

●治老年痰喘。秋白梨一個。去心。入燕窩一錢。先用滾水泡。再入冰糖一錢。蒸熟。每日早晨服下。

問斷神效。(文堂集驗方)

●治喉口刺。白燕窩二錢。人參四分。水十分。隔湯頓熱。徐徐食之。立效。(救生苦海方)

●治老年瘧疾。及久瘧小兒虛癆。胎熱。燕窩二錢。冰糖錢半。頓食數次。(試驗方)

●治翻胃久吐。服人乳。兼吃燕窩而愈。(文堂集驗方)

●治小兒氣液不足。痘頂凹陷。燕窩二錢。生黃著錢半。煎濃汁服。(經驗方)

參攷資料 ●遠海近番處有燕。名金絲燕。其尾似燕而甚小。毛如金絲。臨卵育子時。味蠶蝶而食土。番云。蠶蝶背上肉有兩筋。為風蠶絲。堅潔而白。可補虛損。已勞病。燕食之。肉化而筋不化。併津液嘔出。結為小窩。附石上。久之。燕離能飛。海人依時拾之。(嶺南雜記)

食小魚。吐涎液於巢。於巖石。故名燕窩。(湖海樓奇) ●崖州海中。石島有瓊瑤山。其洞穴皆燕所巢。大者如鳥。啖魚。輒吐涎沫。以備冬月退毛之食。土人皮衣皮帽。乘炬探之。是為燕窩。(崖州志) ●燕舍取小魚。黏之於石。久而成窩。有黑白紅三色。黑最下。紅最難得。能益小兒痘疹。白色能愈瘵疾。(閩小記)

●海燕拾海上無毒香蔬。結巢。燕去人取而食之。(庶物異名疏)

●海燕大如鳩。春日巢於危巖絕壁。其巢乃白海窩也。鳥夷伺其秋去。以修竿接。取而貯之。(華夷鳥獸訓考) ●燕窩乃燕窠。燕食海菜。吐而成窩。歲冬夏二收。如取蜂蜜。多收則敗矣。(海島逸志)

●金絲燕。燕之異種也。體小於燕。背褐色。尾腹間白色。產我國及印度。恒居巖穴中。營巢。即燕窩。(清科類鈔)

●海濱石上。有海粉積結之。昔燕啄食之。吐出為窩。巖巖壁間。鳥人俟其秋去。以竹竿接。取之。海粉性寒。而為燕所吞吐。則暖。海粉味鹹。而為燕所吞吐。則甘。其形質盡化。故可以清痰開胃云。

他如燕窩。錄。茶餘客話。亦云。燕窩壁。或云。窮以遠谷。均宜黏著石壁。或洞穴。不能移動。其間雖有云。啄或。或云。食海邊蟲。或云。食小魚。或云。食無毒香蔬。或云。採海菜。或云。食海粉。然皆屬海產小生物。皆經過海燕胃中消化。而吐出。確係分泌一種黏液所造成。皆然。巢於危崖絕壁。而為天然燕窩之生。誠無疑。然諸說中。猶以一二七八十五說。理由較為詳實。(粵錄)

●海際砂洲。生蠶蝶。背有兩筋。堅潔而白。燕啄食之。肉化而筋不化。并津液吐出。結為小窩。啣飛渡海。倦則漂水上。身棲其中。少頃。又含以飛。海人依時拾之以貨。王世懋閩部疏。亦云。燕窩。海燕所築。啣之飛渡。於海。潮倦則擲置海面。身坐其中。久之。復啣以飛。查浦輯聞云。海燕南海歸。海外水邊難遠。因啄小魚肉。作窩。口啣之。而飛。倦即投窩。水中。棲止其上。少息。復含之。而飛。故東南風。則飄掠近岸。人就取之。(威鏡窗牕)

●海燕營巢於沿海石壁。土人取其巢為食品。故原其始。燕窩實野生之物也。南洋燕窩。

既盛銷於中國。能售高價。以博厚利。故吾國人之僑爪哇。婆羅洲等處者。特建築適宜之屋宇。以飼養海燕。而取價於其所營之窩。爪哇之東有城市。曰格利斯者。人口約有一萬。飼養海燕之業。十分發達。欲參觀飼養屋。往往見拒於主人。一因海燕見生人。不免驚擾飛散。既逸之海燕。勢將不復歸巢。一因地方上有盜取海燕之惡習。為盜之人。間有借端入室。窺察路徑。使其盜劫之技。盡奪其燕窩者。有此二因。故不得當地人之介紹。不易入室參觀。海燕飼養室。大抵兩層樓房。樓下僅有入口。設以堅固之板門。四壁粉刷白。不設窗戶。亦無樓梯。僅於樓板上開一方四五尺之戶口。樓上亦無窗戶。開小孔一二。僅足容海燕之出入。故室內光線甚弱。所以防盜賊也。樓上下天花板之高度。約在一丈三四尺左右。天花板之下面。每格一尺二三寸之距離。側置木板。廣約五六寸。厚約七八分許。形如樓梯。供海燕營巢之基礎。一室之內。可營巢至三百以上。巢板之側。又處處支

十六畫 燕

以橫桿。為海燕息足之所。海燕之棲止於室中者。皆甚安靜。僅微動其首而已。據飼養海燕者之言。謂海燕皆盲其目。雖登梯採取其巢穴。亦不知逃避。設以海燕自甲巢移。至乙巢。當立足未穩時。必拍其兩翼。如欲下墜。由此觀之。似海燕之盲目。當屬非虛。但其目既盲。勢必無以覓食。是所謂盲目。必非真盲也。(顧紹衣)◎海濱涯岸。石窗壁。多洞窟。海燕千百成羣。巢於洞中。自萬丹。巴城。三寶壟。竭力石。南旺。馬辰。貓釐。把實。不下數十處。皆荷蘭之有力者。掌握焉。天然燕窩。營巢於海外斷崖絕壁。如暹邏。燕。毛燕是也。近來南洋爪哇等處。以天然採取甚艱險。有築室培養。營巢。如龍牙燕。大峙燕是也。其色白嫩質鬆。因不見天日故也。其產額。以婆羅洲為最多。後由此地方輸入我國。據十年前之統計。每年運入值銀有三百五十萬兩之多。(海島逸志)◎海燕為海濱所產之燕。巢於沿海之巖壁。故南洋羣島。土人見礁巖絕壁下有燕窩。即負簾帶刀。懸繩冒險採取。時

有落於海中。而飽魚腹者。是故爪哇一帶之華僑。多用人工設燕場。飼養海燕。安安逸逸。取其窩而販賣之。其法用堅牢煉瓦。作成倉庫形狀。周圍留有多數小窗。以便燕之出入。內部則甚陰暗。內壁以木材製成方格。海燕即於方格之隅。營巢育雛。至成飛而至此處。翌年復尋舊巢。聞爪哇地方。經營此業者。以華僑為最多。日人亦間有之。所產燕窩。每年由新嘉坡輸出。價值達四十萬元云。(張祿)◎燕窩乃海燕所營之巢。富於膠質之物也。非若普通燕巢。疊積柴草泥土而成。而此種海燕之巢。則從口內吐出唾液狀之物質而成。試觀燕窩之質物。色白而強韌。光澤甚顯。略如黏著牢固之纖維。可知燕窩之材料。決非直接採取於外界。而吐出於口中者也。考其膠質質之成因。有謂海燕能採海邊所生之海藻。如真珠苔等而成之者。先取藻類吞入胃中。經胃液醱酵後吐出。遂成膠質。或謂此乃該燕口中分泌之黏液也。或謂海燕嚼海藻等物質於口中而溶解之。復以

其瓊脂質混合他物而成。依此說。則燕窩純為海藻之瓊脂質所製成。然燕窩一物。經化學方法分析之結果。所得之成分。與海藻大不相同。亦有謂將燕窩染色。而觀察於顯微鏡之下。毫無細胞膜與細胞核等。可認植物之組織。惟有黏液之凝固物。全體均一成。所謂無構造之物而已。由前說則海燕之變為膠質物。依何作用。尚未明瞭。由後說則與質物之狀態相符。故燕窩可決其為海燕之唾腺分泌一種纖維黏液凝合而成。決無疑義。◎海燕在生殖期內。舌下亦唾腺特形發達。善於分泌黏液濃厚。如阿刺伯樹膠。能膠著紙片等物。設膠著此黏液於棒上。而迴轉之。能自其口中續續引出。不啻餡糖之卷繞指端。且此黏液。實自舌下唾腺之開口。分泌而出。要言燕窩乃海燕之自身產出物。略似蠶之吐絲以作繭。亦如蜂之釀蜜而營巢。當其營巢之際。先由其嘴之作。用塗著黏液於巖石或板上。然後引黏液於左右。漸次疊積。以成燕窩。亦有採集毛髮等物。混入唾

十六畫 燕 燂 獨

液之凝固物而成者。如巢之後壁。即草片毛髮較多之處也。此皆天然燕窩成因之原委耳。

【燕蓐草】 命名 本品即燕窠中之草。故名。

性質 無毒。

主治 眠中遺尿。亦止咳喘。研末水服。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論燕蓐草曰。治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窠中草。燒末酒服之。【明】李時珍本草綱目論燕蓐草曰。消渴。飲水一切瘡痕不滅。及浸淫瘡。出黃水。燒灰傳之。

【燕蔬菜】 即燕窩之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「燕窩」條。

【燕齒】 基本 燕窩為雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月五日採之。

主治 寒熱。小兒痲疾。

【燕奠】 即燕奠之古籍別名。典見毛詩。詳「燕奠」條。

【燕頰】 即燕之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「燕」條。

【燕覆子】 即木通子之古籍別名。典見綱目。詳「木通」條。

【燂豬湯】 基本 本品即洗豬刮毛之熱水。

主治 解諸毒蟲瘡。

歷代記述攷證 【明】汪機本草會編論燂豬湯曰。產後血刺心痛欲死。溫飲一盞。【明】李時珍本草綱目論燂豬湯曰。治消渴。澀淨飲一碗。勿令病人知。又洗諸疥良。

【燂雞湯】 基本 本品即洗雞之水。故名。

主治 消渴。飲水無度。澀澄服之。

【獨占釘子】 即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「決明子」條。

【獨用將軍】 基本 屬淫草之根葉。

產地 林野有出。

性質 辛。無毒。

主治 毒腫乳癰。解毒。破惡血。

毒發資料 生林野中。節節穿葉。心生苗。其葉似楠。不時採根葉用。(蘇恭)

【獨用藤】 形態 獨用藤為藤類之一種。野地蔓生。

四時有葉無花。葉有倒刺。其藤皮

可供藥用。

性質 苦。辛。熱。無毒。

主治 心氣痛。研末酒服。

【獨白草】 即草烏頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「草烏頭」條。

【獨行虎】 即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳「紫花地丁」條。

【獨行根】 即青木香之古籍別名。典見唐本草。詳「青木香」條。

【獨行散】 即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。

【獨角仙】 即天牛之一角者。典見綱目。詳「天牛」條。

【獨帶】 即地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳「地膚子」條。

【獨活】 命名 本品一莖直上。不為風搖。故曰獨活。

處方用名 川獨活。

古醫別名 羌活。羌青。護羌使者。(本經)獨搖草。(別錄)胡王使者。(吳普)長生草。(綱目)獨活。天名精。山前獨活。地頭乙戶邑。(和漢藥考)

外國名詞 Archangelica
Gmelini, DC. (拉丁)

學名 Coelopleurum Griseb.

lini, Ledeb. Angelica Celabona, Nakl.

基本 屬繖形科獨活之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。獨活產湖北興山縣。巴東縣。沙市內資。邱山為最。四川夔州府板橋山次之。有產廣東。東北。江。名為水活。全不適用。獨銷東京。安南人用之。

形態 獨活為山野自生之二年生草。春季抽苗。莖葉俱類土當歸。窩毛茸。夏月莖高達六七尺。葉柔輭。為分枝數回之羽狀複葉。作橢圓或卵圓形。前端尖。邊緣有鋸齒。其葉輪頗大。秋季於枝梢簇生多數小白花。作繖形花序排列。實作橢圓形。大二分許。根在生鮮時呈白色。臭氣甚烈。曬乾則外皮作灰黑色。內部淡黃色。其質輕虛。有辛味。

採取 二月八月。採根曬乾。

製法 曾敬曰。採得細剉。以淫羊藿拌搗二日。曝乾。去藥用。免煩人心。李時珍曰。此乃服食家治法。尋常去皮或焙用爾。

用法 與他藥水煎。或酒浸。或剉末和作丸散。

剉末和作丸散。

性質 苦甘平無毒。
效能 搜伏風。燥寒濕。專作風氣藥。

主治 風寒所擊。金瘡止痛。奔豚痲痺。女子疝瘕。久服輕身耐老。
(本經) 療諸賊風。百節痛風。無間久新。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論獨活曰。獨活治諸中風。溼冷。奔喘逆氣。皮膚苦痒。手足攣痛。勞損風毒。齒痛。【清】黃宮繡本草求真論獨活曰。獨活辛苦微溫。比之羌活。其性稍緩。凡因風于足少陰腎經。伏而不出。發為頭痛。則能善搜而治矣。以故兩足濕痺。不能動履。非此莫痊。風毒齒痛。頭眩目暈。非此莫攻。緣此有風不動。無風反搖。故名獨搖草。因其所勝而為制也。且有風自必有溼。故羌則療水溼遊風。而獨則療水溼伏風也。羌之氣清。行氣而發。散營衛之邪。獨之氣濁。行血而溫。養營衛之氣。羌有發表之功。獨有助表之力。羌行上焦而上理。則遊風頭痛。風溼骨節疼痛。可治。獨行下焦而下理。則伏風頭痛。兩足濕痺。可治。二

十六畫 獨

治雖屬治風。而用各有別。不可不細審耳。去皮焙用。

近人學說 賈九如曰。獨活氣香而濁。味苦而沉。能宣通氣道。自頂至膝。以散腎經伏風。凡頸項難舒。臂腿疼痛。兩足痿痺。不能動移。非此莫能效也。取其香氣透心。用為心經引藥。療赤眼痛。因其枝莖遇風不搖。能治風。風則勝溼。專疏溼氣。若腰背酸重。四肢攣痺。肌黃作塊。稱為良劑。又佐血藥。活血舒筋。殊為神妙。張山雷曰。獨活氣味雄烈。芳香四溢。故能宣通百脈。調和經絡。通筋骨而利機關。凡寒溼邪之痺於肌肉者。於關節者。非利用此氣雄味烈之品。不能直達於經脈骨節之間。故為風痺痿痺諸大證。必不可少之藥。惟古時羌活獨活。未嘗分別。故古書以獨活通治內外上下諸證。凡頭面肢體。無一不在獨活範圍之內。自宋以來。則羌活別為一條。而芳香之氣。尤為濃郁。則徹上旁行。合讓羌活占其優勝。而獨活之味較厚。則以專治腰膝足脛等證。雖古人尙未明言。而海藏已謂羌活氣雄。獨

活氣細。石頭亦稱其升中有降。皆隱然有上下之別。顧業師朱氏家法。恒以獨活治下。凡自腰及少腹以下。適用獨活。不僅風寒溼氣痿痺酸痛。可以立已。即痧證之發於陰分者。未潰易消。已潰易斂。功績顯然。確乎可信。此古人未嘗明言之真旨也。互詳下文羌活條。又曰。羌獨活皆辛溫之質。主治風邪。以外來之寒風言之。故所治皆寒溼之證。古恒以羌活治傷寒表病。井及四時不正之表邪。固皆指寒邪而言也。若大江以南。地氣溫暖。寒風恒少。昔人久稱南方無真傷寒病。而四時外感。又皆溫熱。雖有表邪。亦非羌活等之辛散溫升所宜。此荊防敗毒散。九味羌活湯。柴葛解肌湯等方。古書皆稱四時感冒之神劑。而江浙所不任用者。亦病情病證之使然也。且辛溫之不宜於東南。又非僅時病已也。即如羌獨本屬風寒溼邪。痺着痿躄之良藥。而在此邦之人。陰血素薄。即有是證。亦半由於血虛而來。果屬風寒。亦係血虛生風。氣虛生寒。與西北之風痺。悉因於賊風大寒者。證

情亦復大異。而一味辛溫剛燥之藥。又須隨時留意。不容信筆塗鴉。無所顧忌矣。而李東垣竟謂獨活治諸風掉眩。潔古亦謂與細辛同用。治少陰頭痛眩暈。海藏又謂搜肝風。瀉肝氣。則所述諸病。皆屬陰不瀉陽。肝腎不攝之證。明是內虛生風。非外來賊邪可比。潛藏鎮定之為宜。何乃以溫升之藥。助其狂肆。抱薪救火之禍。捷於影響。最宜慎用。然如若痺痿躄諸候。又多氣血虛寒。不得流利。苟非羌獨辛散。亦難速效。則病本雖屬血虛。又宜於養血滋液之中。參入宣絡溫運。徐圖奏績。而石頭逢原。又謂氣血虛者之痺痿肢節痛。禁用羌獨。又未免一偏之見。非通論矣。蓋羌獨治風。本治外邪侵入之寒風。非能治血虛內發之熱風。所以肝陽眩暈。必非辛溫升泄所能安治。若犯斯禁。則烈誠愈戾。燎原可畏。然氣血虛寒。而痿躄不仁。非吹以和煦之氣。亦不能振作有為。春回黍谷。所以滋調血液之劑。亦必以宣通溫養之藥。相輔而行。但佐使之功。止可少少參加。用作引導。不得喧

十六畫 獨

實奪主耳。石頑乃欲一例禁絕之何耶。

配合應用 君麻黃、甘草。主冬月卽病傷寒。太陽經頭疼。發汗解表。

君麥門冬、前胡、黃芩。佐以甘草。治春時痘疫。邪在太陽頭痛。

入葛根湯。治太陽陽明頭痛。兼通身骨痛。口渴煩熱。不得眠。若渴甚煩熱甚。頭痛甚。則加石膏知母。竹葉各兩許。

適發太陽經。頭痛者於治燧藥中加之。痛止則去之。

同白朮、蒼朮、秦艽、生地黃、慈苡仁、木瓜、石斛、黃蘗。治下部一切風溼溼熱。

同生地黃、赤芍藥、生甘草、牡丹皮、石膏等水煎。治風熱上攻牙腫痛。

治中風口噤。通身冷。不知人。用獨活四兩。好酒一升。煎半升服。(千金方)

治中風不語。獨活一兩。酒二升。煎一升。大豆五合。炒有聲。以藥酒熱投蓋之。良久溫服三合。未瘥再服。(陳廷之小品方)

治產後風虛。獨活、白鮮皮各三兩。水三升。煮二升。分三服。耐酒者入酒同煮。(小品方)

治風牙腫痛。用獨活煮酒熱漱之。(肘後方) 文潯公藥準用獨活地黃各三兩。爲末。每服三錢。水一盞。煎和滓溫服。臥時再服。

用量 八分至錢半。施用宜忌 凡血虛而無風寒。實邪者禁用。豚骨(卽鱈骨)爲之使。

著名方劑 獨活寄生湯。治風寒溼痺。偏枯脚氣。(千金方) 獨活三兩。桑寄生、秦艽、細辛、歸身、生地、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、甘草各等分。上十四味爲粗末。每服四錢。煎服。一方用防風。

參攷資料 療風宜用獨活。兼水宜用羌活。劉完素曰。獨活不搖風而治風。浮萍不沉水而利水。因其所勝而爲制也。(蘇恭) 風能勝溼。故羌活能治水溼。獨活與細辛同用。治少陰頭痛。頭暈目眩。非此不能除。羌活與川芎同用。治太陽少陰頭痛。透關利節。治骨脈爲病脊強而厥。(張元素) 羌活

一七一〇

獨活。皆能逐風勝溼。透關利節。但氣有剛劣不同。爾素問云。從下上者引而去之。二味苦辛而溫。味之薄者陰中之陽。故能引氣上升。通達周身而散風勝溼。按文系曰。唐劉師真之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者。浸酒服。便愈。師真訪問。皆不復夢。曉其母曰。胡王使者。卽羌活也。求而用之。兄疾遂愈。(李時珍)

獨活。是羌活母也。(大明) 獨活以羌中來者爲良。故有羌活。胡王使者。諸名一物二種也。正如川芎。撫芎。白朮。蒼朮之義。入用微有不同。後人以爲二物者。非矣。(李時珍) 獨活生雍州川谷。或隴西南。二月八月採根。曝乾。(別錄) 此州都縣。並是羌地。

羌活形細而多節。輾澀。氣息極猛。烈出益州。北部西川者爲獨活。色微白。形虛大。爲用亦相似。而小不如。至易蛀。宜密器藏之。(陶弘景)

獨活羌活。今出對漢者佳。養生苗藥如青麻。六月開花作叢。或黃或紫。結實時葉黃者是。夾石上所生。葉青者是。土脈中所生。本經云。二物同一類。今人以紫色而節密者爲羌活。黃色而作塊者爲獨活。而陶隱居言。獨活色微白。形虛大。用與羌活相似。今對中乃有大獨活。類精極而大。氣味亦不與羌活類。用之微寒而少效。今又有獨活。亦自蜀中來。類羌活。微黃而極大。收時寸解乾之。氣味亦芳烈。小類羌活。又有槐葉氣者。今京下多用之。極效驗。意此爲真者。而市人或擇羌活之大者爲獨活。殊未爲當。大抵此物有兩種。西對者黃色。香如蜜。隴西者紫色。秦隴人呼爲山前獨活。古方俱用獨活。今方既用獨活。而又用羌活。茲爲釋矣。(蘇頌)

本經獨活一名羌活。本非二物。後人見其形色氣味不同。故爲異論。然物多不齊。一種之中。自有不同。仲景治少陽所用獨活。必聚實者。李東垣治太陽所用羌活。必輕虛者。正如黃芩取枯蘗者名芩片。治太陰。條實者名子芩。治陽明之義同也。況古方俱用獨活。無羌活。今方俱用。不知病宜兩用耶。抑未之考耶。(汪機) 獨活羌活。乃一類二種。以中國者爲獨活。西羌者爲羌活。蘇頌所說頗明。按王

賜易簡方云。羌活須用紫色。有鼠頭。較節者。獨活是極大羌活。有口如鬼眼者。尋常皆以老宿前胡爲獨活者。非矣。近時江淮山中。出一種土當歸。長近尺許。白肉黑皮。氣亦芳香。如白芷氣。人亦謂之白芷。用充獨活。解散亦或用之。不可不辨。(李時珍)

【獨茅】即仙茅之古籍別名。典見開寶本草。詳「仙茅」條。

【獨豹】即鴉之古籍別名。典見綱目。詳「鴉」條。

【獨眼龍】產地 各處均有出。主治 跌打。

【獨吞屎】即五靈脂之古籍別名。典見綱目。詳「五靈脂」條。

【獨荷草】即鬼臼之古籍別名。典見土宿本草。詳「鬼臼」條。

【獨接】即白楊之古籍別名。典見綱目。詳「白楊」條。即扶移之古籍別名。典見綱目。詳「扶移」條。

【獨搖芝】即天麻之古籍別名。典見抱朴子。詳「天麻」條。

【獨搖草】即獨活之古籍別名。典見別錄。詳「獨活」條。

【獨棍】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

別錄。詳「黃耆」條。

【獨滑】即獨活之古籍別名。典見和漢藥考。詳「獨活」條。

【獨腳一枝蓮】形態 山間。苗發。生管芽。俗名乾青。叢中獨莖。無葉。高尺許。莖細強。青白色。莖端有一疙瘩。至晚秋時。疙瘩生花。類蓮。其根與黃麻根相似。

主治 疔腫。癰毒。流注。

【獨腳仙】產地 生山林間。或陰溼地亦多有之。

形態 獨腳仙爲雜草類之一種。春生苗。葉圓形。下有紫葉如腳。長三四寸。秋冬葉落。其根葉可供藥用。

採取 夏月採之。焙乾爲末用。

主治 婦人血塊。

【獨腳金雞】即辟瘟草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「辟瘟草」條。

【獨腳馬蘭】形態 此草生河澤邊。葉如柳對葉圓極。根下微紅。

主治 治發背。諸腫毒。熱癰。搗汁一杯。入酒二杯。服之。未成膿者即消。有膿者即出。重極者服中碗

或一碗。再劑渣。

【獨腳連】古籍別名 獨葉一枝。花(視氏效方)

產地 廣東。形態 根大如拳。春月發苗。經霜則死。若春歲過冬。則來年宿根復發。苗高丈許。葉大如杯。宛似荷葉。色綠柔厚。莖有細毛。六七月起莖。莖有白色。開花。花似山蘭而小。其色微紅。

主治 治疔腫癰疽。以根或醋酒煎塗。葉貼。癰腫能消。

配合應用 治蛇咬。用獨葉一枝。花。生溪灘淨土上。根如鼠竇。用根口嚼擦瘡上。(視氏效方)

退疔奪命丹。專治疔瘡。防風八分。青皮七分。羌活。獨活。黃連各一錢。赤芍六分。細辛八分。礞石一錢。蠅退四分。澤蘭葉五分。金銀花七分。甘草節一錢。獨腳連七分。紫河車。即金線。重樓七分。上到五錢。先服。倍金銀花一兩。澤蘭一兩。少用葉。生薑十片。同搗爛。好酒。燒熱泡之。去渣。熱服。不飲酒者。水煎亦可。然後用酒水各一半煎。生薑十片。熱服出汗。病退。減後。再加大黃

五錢。同煎。熱服。以利二三次。去餘毒。如有膿。如何首烏。白芷。檉。在脚加檉。木瓜。要通利。加青皮。木香。大黃。梔子。牽牛。(廣州回春方)

參攷資料 神農。鄒陽。山間生一種草。始萌芽時。便似蓮蓬。俗呼爲獨腳連。移植於房宅。墜地及圍中。蛇。不致過其下。王季光宅後。樓非。叢中有蛇穴。常出爲人害。乃掘此草。數本於穴外。自是其患不作。至暑月間。穴內臭甚。使園丁掘土。訪求。得死蛇十數。蓋爲草氣所薰。潰也。又一小蛇。來到草旁。立化爲水矣。粵西。偶記。生廣西。草如黃連。根極大。持入藥肆。則諸藥。香氣盡消。爲真。三脚。五脚。者。次之。按綱目。鬼臼。亦名獨腳連。無治疔之說。至集解。下註。形狀又小有異。同。故仍爲補之。庚戌。予在臨安。有醫士。盛天然。言其地。古城。與餘。枕接界。產獨葉花。生山坑。不見天日。其形一葉。中含紅花一朵。釐如蓮花狀。其花。從葉心。透出。下有根。作獨蒜狀。其花。葉。聞人聲。輒縮入根內。不可見。遇之者。記其處。掘之。亦止有根。其花。與藥。雖剖根。覓

十六畫 獨 獼 璽 瑤 盧

之亦無形迹。倘得之者。不論何等毒蛇咬。以根擦摩。蛇毒即盡。如有誤服。蛇變繁者。以少許煎湯服之。即痊。併能解一切毒蟲咬。一切毒草木毒。咽喉一十八症。皆驗。如神。凡人鼻發紅色。生痲癩。疥癩。異常者。名疥蟲食鼻。以此根磨塗立愈。此乃天生神物。有山行遇之者。不論持何物先擲之以鎖住。然後再掘。即不能遁形。凡生獨葉花地。四圍約尺許無草。其上不可手取。亦勿以鐵刀取。須用竹刀掘取。則不傷根。蓋此草蛇最喜蟠其旁。凡蛇咬人。亦中人毒。必退殺。若覓此物臥其旁一宿。則人毒解。可免退殺之患。大毒蛇都喜蟠其根旁。故土最毒。近人手則手爛。然得其根。反能解百種大惡蛇毒。巧者覓此以為得寶云。

【獨脚蜂】 塵地 出嶺南諸地。形態 獨脚蜂為蜂之一種。狀如小而蜂色黑。一足連樹根。不得去。亦不能動搖。可供藥用。

主治 疔腫。癰疽。燒研油塗。【獨脚蓮】 卽鬼臼之古籍別名。典

見土宿本草。詳「鬼臼」條。【獨脚蟾蜍】 卽金線釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金線釣蝦蟆」條。

【獨葉一枝槍】 卽八角連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「八角連」條。【獨脚連】之古籍別名。典見祝氏效方。詳「獨脚連」條。

【獨葉一枝鎗】 塵地 多生地。形態 獨葉一枝鎗為山草類之一種。清明時節發苗。長約二三寸。一莖二梗。一梗有葉。其葉如菟耳。又似箭頭。一梗細尖。如新抽竹芽。花如椎鑽。至穀雨便枯。可供藥用。

採取 四五月採之。性質 甘淡。無毒。主治 諸毒蟲咬。生擦之即愈。功與兔耳一枝箭同。【獨脚窠】 卽露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳「露蜂房」條。【獨龍鬚根】 卽樹根之別名。詳「樹根」條。【獼】 卽狼子之別名。典見爾雅。詳

「璽」條。命名 璽是衆珀之長。故號璽珀。璽亦作璽。卽琥珀之色。故名。

古醫別名 璽珀。綱目。木璽。形態 璽為琥珀之一種。狀如玄石。色潤而質輕。可供藥用。性質 甘平。無毒。主治 補心安神。破血生肌。治婦人痰癥。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論璽珀曰。小兒帶之辟惡。辟滴目翳赤障。參攷資料 古來相傳。松脂千年為茯苓。又千年為琥珀。又千年為璽。二物燒之。皆有松氣。狀似玄玉而輕。出西戎。而有茯苓。處無此物。今西州南三百黑嶺中。得者大則方尺。黑潤而輕。燒之腥臭。高昌人名為木璽。謂玄玉為石璽。共州土石間得者。燒作松氣。功同琥珀。見風折破。不堪為器。恐此二種及琥珀。或非松脂所為也。蘇恭

○梁公子傳奈公云。交河之間。平曠中掘深一丈。下有璽珀。黑逾純

一七二

漆。或大如車輪。末服。攻婦人小腸。癥瘕諸疾。唐慎微。璽卽琥珀之黑色者。或因土色漸染。或是一種木漆結成。未必是千年琥珀復化也。玉璽經言松脂千年作茯苓。茯苓千年作琥珀。琥珀千年作石。石膽千年作威喜。大抵皆是神異之說。未可深憑。李時珍。

【璽珀】 卽璽之古籍別名。典見綱目。詳「璽」條。【璽珀】之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「琥珀」條。

【瑤田草】 卽鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。【瑤枝】 卽石花菜之古籍別名。典見綱目。詳「石花菜」條。【瑤茅】 卽紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫草」條。【瑤漿】 卽玉泉之古籍別名。典見綱目。詳「玉泉」條。

【盧茹】 卽桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳「桔梗」條。【盧都子】 卽胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳「胡頹子」條。【盧會】 卽蘆薈之古籍別名。典見開寶本草。詳「蘆薈」條。

【盧精】 基本 盧精爲雜草類之一種。可供藥用。

性實 平。

主治 蟲毒。

【盧蠶】 卽蜚蠊之古籍別名。與見唐本草。詳「蜚蠊」條。

【盧橘】 卽金橘之古籍別名。與見漢書。詳「金橘」條。

【盧橘葉】 卽枇杷葉之古籍別名。與見文選。詳「枇杷葉」條。

【晉子草】 卽羅勒之古籍別名。與見綱目。詳「羅勒」條。

見綱目。詳「羅勒」條。

【礞砂】 原名 礞砂。本品性毒。服之令人嘔亂。故名。

處方用名 礞砂。製礞砂。

古籍別名 礞砂。狄鹽。日華。

北庭砂。四聲。氣砂。圖經。透骨將軍。土宿。神砂。戎鹽。戎焉。金賊。硝爛。粗砂。混沙。無情子。白海精。和漢藥考。

外國名詞 Sal ammoniac. Salmiac. (英) Salmiak. (德)

基本 係非金屬之鹽類。爲等軸系八面體之礦物。產地 陳仁山藥物生產班云。

十六鹽 盧

醫 礞

礞砂產廣東新安、平海。

形體 礞砂爲白色結晶性粉末。或纖維狀。堅硬。結晶塊。無氣味。在空氣中並不變化。熱之則發散。溶於三分之一水及等量之沸湯。酒精難溶。

製法 寇宗奭曰。凡用須水飛過。去塵穢。入瓷器中。重湯煮乾。則殺其毒。李時珍曰。今時人多用水飛淨。醋煮乾。如霜。刮下用之。

用法 恒以剉研和入外治藥。間有和作丸散用。

性質 鹹。苦。辛。溫。有毒。

效能 消癥瘕。解積。去目翳。擊肉。用作發汗。祛痰。及通經藥。又治氣管枝加答。急性喉頭炎。

作用 在胃中能解除胃黏液之滯積。而助消化。至腸中能激腸之蠕動。及分泌之增加。使積滯易於排出。入血中能促進血液之循環。使血壓增高。心跳有力。中樞神經興奮。而增加氣管管黏膜及汗腺之分泌。使積痰易於驅出。而腎臟亦被激而增進排泄之功。

主治 積聚。破結。止血。止痛。下氣。療咳嗽。宿冷。去惡肉。生好肌。爛胎。

亦入隨馬藥用。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論礞砂曰。主婦人丈夫羸瘦。積病血氣不調。腸鳴。食飲不消。腰脚痛冷。痲痺。痰飲。喉中結氣。反胃吐水。令人能食。肥健。【唐】甄權藥性本草論礞砂曰。除冷病。大益陽事。【宋】大明諸家本草論礞砂曰。補水臟。煖子宮。消瘀血。宿食不消。食肉飽脹。夜多小便。丈夫腰膝酸重。四肢不仁。婦人血氣疼痛。氣塊。疝瘕。及血崩帶下。惡瘡。息肉。傳金瘡。生肉。【宋】寇宗奭本草衍義論礞砂曰。去目翳。擊肉。【元】王好古湯液本草論礞砂曰。消內積。

【明】李時珍本草綱目論礞砂曰。治噎膈。癥瘕。積痢。竹哽。除瘰癧。疔贅。【明】繆希雍本草經疏論礞砂曰。礞砂乃鹵液所結。乘陰毒之氣。含鴆毒之精。其味極鹹。極苦。極辛。氣溫有毒。甄權酸鹹有大毒。能消五金八石。腐壞人腸胃。生食之化入心爲血。其毒之猛烈如此。可畏矣。其主積聚。結血。宿冷者。以鹹能入血。鹹堅。辛能散結。溫能除冷。故也。積聚散則痛自止。氣自下。因寒

以致頑痰。凝結。則咳嗽作。故暫用以散之。柔金化石之性。故能爛胎。及去惡肉也。金石見之卽化。其能生好肌乎。此前人之謬耳。【清】黃宮繡本草求真論礞砂曰。礞砂係鹵液所結而成。兼乘陰毒之氣。合陽毒之精。其味苦鹹與辛。其性大熱。五金八石。俱能消磨。硬肉。難化。入砂卽爛。其性猛烈。殆不可言。况人腸胃薄弱。其堪用此消導乎。第或藥與病對。有非峻迫投治。不能奏效。如穀不消。則必處以麩。藥魚鱉。不消。則必用以橘葉。紫蘇。生薑。菜葉。不消。則必用以丁香。桂心。飲水不消。則必用以牽牛。芫花。至於肉食不消。又安能令此阿魏。礞砂而不用乎。第當詳其虛實。審其輕重。緩急。以求藥與病當耳。如其毒症不明。妄爲投治。禍由指掌。不可不慎。山西。或如牙硝。光淨者。良用水飛過。醋煮乾。如霜。刮下用之。

國外學說 和漢藥考曰。埃及乏游炭。以腐屍爲燃料。因之煙突自然附有礞砂。卽綠化安母尼亞是也。【日】乃取而再製。運銷他國。日本昔時亦有運入。用

於醫藥及紆藥等。今則專從煤炭之煤黑油 (Coal Oil) 製造之。

辨偽 鄭育殿曰。李時珍曰。

礪砂性毒。服之使人礪亂。故名。蘇恭曰。礪砂出西戎。形似牙硝。光淨者良。蘇頌曰。西戎來者。顆塊光明。大者有如拳。重三四兩。小者如指而入。近有一種如秋石味鹹。又一種如豬肝色。有星點。不知是何石所混充。皆為贗品。不用為善。曹炳章曰。按石雅云。礪砂者。何即綠化阿麻尼亞是也。或作礪。方書一名狄鹽 (日華本草) 一名北庭砂 (醫病四聲) 又名氣砂 (圖經本草) 或作礪砂。礪砂古以出北庭為顯。故名北庭砂。北庭即西域火州。在漢為東師前王地。隋為高昌。唐置西州。宋時回鶻居之。元時始名火州。明史云。其地多山。青紅若火。故名火州。方輿紀要云。火砂山在柳陳城東。連五火州。是火州殆以火砂山得名也。高昌國傳云。北庭山中出礪砂。山中常有煙氣湧起。無雲霧。至日光燄若炬火。照見禽鼠皆赤。探者着木屐靴。取之。皮底者即焦。下有穴生青泥。出穴

外即變為砂石。土人取以治皮。蘇頌圖經云。今西涼夏國及河東陝邊州郡亦有之。西戎來者。顆粒光明。大者如拳。重三四兩。小者如指。邊界出者。雜砂如麻豆粒。彼土人為之。氣砂。方輿紀要謂蘭州南四十五里有礪砂洞。出礪砂。又太原府河曲縣西五里有火山。上有礪砂窟。下有氣砂窟。若然則礪砂亦出內地邊界矣。然而碎如麻豆。又雜砂石。則疑與西土來者。精粗或異矣。於今所見形塊粗末。色帶黃赤。味辛鹹。多孔。遇火白煙如雲起。古曰氣砂。洵可謂名符其實矣。新報礦產調查記云。礪砂產于蘭之魯村。達爾烏爾布孫山。及拜城礪砂山者。為紅礪砂。產於庫車者。為白礪砂。新報雜記云。礪砂產于蘭礪村。達爾烏爾布孫山。及拜城之礪砂山。庫車之大鶴山。徐星伯云。其山極熱。望之若列燈。取礪砂者。春夏不敢近。惟嚴寒時取之。入山採取。亦必去其衣服。著以衣包。僅露二目。至洞內擊之。不過二時。皮包已焦。取出砂石。每千斤得純砂石少許。著石上紅色星星。搗此必

用瓦罐盛之。但膠不可太滿。滿則受火氣薰蒸。致於破裂。礪砂善揮發。受風受溼。皆可發揮淨盡。故嚴藏必須密閉。買人在此時行數日。過天氣晴明無風時。則稍揭其封口。以出火氣。又云。還庫車時。曾搗數十毬。行抵伊犁。則石皆化為黃粉。而純砂不見矣。若口色成塊者。不易化。可以及遠。內地所謂礪砂。即此是也。以上所辨為上品之淡礪。內地不能可得。近今所通行者。皆鹹礪石礪。為不道地。亦有高下不同。如色如砂。或淡紅起鏡面。西土產者佳。如豬肝色者。名豬肝礪。或曰洋礪者。次之。山西出者。為石礪。亦次。陝西出者。為香礪。紅色者。亦佳。湖廣出者。為鹹礪。又名江砂。其色要白者佳。食鹽色者次。

配合應用 服食法 礪砂丸

礪砂不計多少。入罐子內。上面更坐罐子一箇。紙筋白土。上下通泥。壓乾。上面罐子內盛水。以蒼耳乾葉為末。鋪頭蓋底。以火燒之。火盡旋添水。水盡旋添水。從辰初起至戌止。一伏時。住火勿動。次日取出。研米醋糊和丸。梧子大。每服四

五丸。溫酒或米飲下。並無忌。久服進食無疾 (經驗方)

治元陽虛冷。氣攻脾胃疼痛。用礪砂一兩。以鐵箕草末二兩和勻。用小砂鑽不固濟。漫火燒赤。乃入礪在鏝內。不蓋口。加頂。待火盡。燄寒。取出。用川烏頭去皮。臍。生研末二兩。和勻。湯浸。蒸餅丸。梧子大。每服三丸。木香湯醋湯任下。日一服 (陳器方)

治腎臟積冷。氣攻心腹疼痛。面青足冷。礪砂二兩。桃仁一兩。去皮。酒一小盞。煎礪十餘沸。去礪砂。入桃仁泥。旋旋煎成膏。蒸餅和丸。梧子大。每熱酒下二十丸 (聖惠方)

治積年氣塊。脾胃疼痛。礪砂醋煮二兩。木瓜三枚切。須去瓢。入礪在內。飯盛置於日中。曬至瓜爛。研勻。以米醋五升。煎如稀餲。蜜收。用時旋以附子末和丸。梧子大。熱酒化下一丸 (聖惠方)

治瘧癘瘧塊。礪砂丸。治瘧癘瘧塊。煖水。殺三蟲。婦人血虛。子宮冷。臘月收桑條。灰淋去苦汁。日乾。每礪砂一兩。用水三兩。以水化

磚并灰乾溼得所。以瓶盛灰半寸。入硝於內。以灰填蓋固濟。文武火煨赤。冷定取出。研以箕。鋪紙三重。安藥於上。以熱水淋之。直待磚味盡。卽止。以鉢盛汁於熱灰火中。養之。常令魚眼沸。待汁乾入瓶。再煨一食頃。取出重研。以粟飯和丸。綠豆大。每空心酒下五丸。病去卽止。
(聖惠方)

⑤治噎膈反胃。郭才清興用北庭砂二錢。水和蕎麥麵包之。煨焦待冷。取中間溼者焙乾。一錢。入檳榔二錢。丁香二箇。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。愈卽止。後喫白粥半月。仍服助胃丸藥。又方。平胃散各一錢。入礞砂。生薑各五分。爲末。沸湯點服二錢。當吐出黑物如石。屢驗。

⑥治一切積痢。礞砂丹。用礞砂。朱砂各二錢。半爲末。用黃蠟半兩。巴豆仁三七粒。去膜。同入石器內。置湯煮一伏時。候豆紫色爲度。去二七粒。止將一七粒同二砂研勻。溶蠟和收。每旋丸綠豆大。或三九五丸。淡鹽湯下。(本事方)

⑦治月水不通。臍腹積聚疼痛。

十六畫 礞

礞砂一兩。烏角五挺。去皮子。剉爲末。以頭醋大一盞。熬膏。入陳橘皮末三兩。搗三百杵。丸梧子大。每溫酒下五丸。(聖惠方)

⑧治死胎不下。礞砂。當歸各半兩。爲末。分作二服。溫酒調下。如人行五里再一服。(瑞竹堂方)

⑨治喉痺口噤。礞砂。馬牙消等分。研勻點之。(聖濟方)

⑩治懸癭卒腫。礞砂半兩。綿裹含之。嚙津卽安。(聖惠方)

⑪治牙齒腫痛。老鼠一箇。去皮。以礞砂淹擦三日。肉爛化盡。取骨放瓦上焙乾。爲末。入樟腦一錢。蟾酥二分。每以少許點牙根上立止。(孫氏集效方)

⑫治偏頭風痛。礞砂末一分。水潤致心一分。搗丸。皂子大。綿包露出一頭。隨左右內鼻中立效。(聖惠方)

⑬治損目生瘰。赤肉翳出不退。杏仁百箇。蒸熟。去皮尖。研濾。取淨汁。入礞砂末一錢。水煮化。日點一二次。自落。(普濟方)

⑭治鼻中息肉。礞砂點之卽落。(白飛霞方)

⑮治鼻中毛出。晝夜可長一二尺。漸漸粗如繩。痛不可忍。搗去復生。此因食豬羊血過多所致。用生乳香礞砂各一兩。爲末。飯丸。梧子大。每空心臨臥各服十九丸。水下自然退落。(夏子益奇疾方)

⑯治魚骨哽咽。礞砂少許。嚼嚙立下。(外臺秘要方)

⑰治蝨入耳。礞砂。磨等分。爲末。每吹一字。蟲化爲水。(聖濟總錄方)

⑱治割甲肉。久不痊。礞砂。礬石爲末。裹之。以瘞爲度。(外臺方)

⑲治蠱毒疔。熬水調礞砂塗之。立愈。(千金方)

⑳治代指腫痛。唾和白礞砂。以麵作餅子。套指入內。一日遂。(千金方)

㉑治面上疣目。礞砂。礬砂。鐵燒。麝香等分。研搽三次。自落。(集效方)

㉒治疔瘡腫毒。好礞砂。雄黃等分。研。以銀篋刺破疔口。搗去惡血。安藥一豆入內。抵花貼住。卽效。毒氣入腹嘔吐者。服護心散。(瑞竹堂方)

⑳治疝氣卵腫。脹痛不可忍。念珠丸。用礞砂。乳香各二錢。黃蠟一兩。研淨和丸。分作一百單。丸。以綿縫。爲一夜。次日取出。始粉爲衣。每用一丸。乳香湯吞下。日二服。取效。(本事方)

用量 三分至八分。或〇・三至一・〇瓦。

施用宜忌 凡非邪實氣壯之惡疔等症。及內服藥中禁用。畏藥水。忌羊肉。反昆布。海帶。銀粉。錫。丹。密陀僧。

參攷資料 ①一飛爲酸砂。二飛爲伏翼。三飛爲定精。色如鷄兒黃。入諸補藥爲丸。服之有熱。熱(陳藏器) ②金銀有偽。投礞砂。中。爲物盡消化。况人腹中有久積。豈不腐潰。(寇宗奭) ③礞砂破堅。癖。不可獨用。須入羣陰藥中用之。(張元善) ④礞砂大熱有毒之物。噎膈反胃積塊內癥之病。用之則有神功。蓋此疾皆起於七情飲食所致。痰氣鬱結。遂成有形。妨礙道路。吐食痛脹。非此物化消。豈能去之。其性善爛。金銀銅錫。腐人。資硬肉。入礞砂少許。卽爛。可以類推矣。

十六畫 磨 磨 禦 稜 積 穉 質 質

所謂化人心爲血者。亦甚言其不可多服。張杲玉洞要訣云。北庭砂乘陰石之氣。含陽毒之精。能化五金八石。去穢益陽。其功甚著。力並硫黃。獨孤酒丹房鑄源云。礪砂性有大毒。爲五金之賊。有沉冷之疾。則可服之。疾減便止。多服則成擁塞癰腫。二說甚明。而唐宋醫方。乃有單服之法。蓋欲得其助陽以縱慾。而不慮其損陰以發禍也。其方唐慎微已收附本草後。今亦存之。以備考者。知賢(李時珍)伏礪藥甚多。牡蠣、海螵蛸、晚蠶沙、羊鬍骨、河豚魚膠、魚腥草、蘿蔔、獨帶、卷柏、羊蹄、商陸、冬瓜、羊躑躅、蒼耳、烏梅、抱朴子。礪砂性毒。服之使人腹痛。故曰礪砂。狄人以當鹽食。土宿本草云。礪性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。炳曰。生北庭者爲上。人呼爲北庭砂。(李時珍)礪砂出西戎。形如牙。滑以光淨者良。(蘇恭)今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之。然西戎來者。顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指。而入藥最緊。邊界出者。雜碎如麻豆粒。又

夾砂石。用之須水飛。澄去土石。迄亦無方。彼人謂之氣砂。(蘇頌)礪砂亦消石之類。乃由液所結。出於青海。與月華相射而生。附鹽而成。質。虜人採取。淋鍊而成。狀如鹽塊。以白淨者爲良。其性至透。用雞籠盛懸火上。則常乾。或加乾薑同收。亦良。若近冷及得溼。即化爲水。或滲失也。一統志云。臨洮蘭縣有洞。出礪砂。張匡鄩行程記云。高昌北庭山中。常有煙氣湧起。而無雲霧。至夕光焰若炬火。照見禽鼠。皆赤色。謂之火蝕山。採礪砂者。乘木展取之。若皮底即魚矣。北庭即今西域火州也。(李時珍)

【磨刀石】即羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀近】 命名 本品乃磨刀器水中澄下之澱。故名。

古籍別名 龍白泉粉。(綱目)

主治 傳蠟蝮尿瘡有效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論磨刀近曰。塗瘰癧結核。

【磨利花】 即茉莉花之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【磨沈香】 即沈香之處方用名。詳「沈香」條。

【磨盆草】 產地 南海屬。主治 跌打。

【磨羚羊角】 羚羊角之處方用名。詳「羚羊角」條。

【磨犀角】 即犀角之處方用名。詳「犀角」條。

【磨髮草】 產地 以南海大瀝多出。性質 甘平。效能 散風血熱。主治 跌打耳鳴耳聾。

【磨口梅】 即蠟梅花之已接者。典見綱目。詳「蠟梅花」條。

【磨兒梨】 即梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。

【磨】 即稷米之古籍別名。典見綱目。詳「稷米」條。

【積雪草】 即連錢草之古籍別名。典見本草。詳「連錢草」條。

【穉】 命名 穉乃不黏之稱。亦不實之貌。本品子粒似之。故名。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

一七二六

(綱目)龍爪稷(救荒本草)

外國名曰 Panicum urticoides (Roxb. (拉丁)) 五(日本)

基本 係禾本科稷屬。爲穉之子實。

產地 山東、河南諸地。田野間多有之。

形態 穉爲穀類之一。一年生草。本高三四尺。葉細長而尖。有平行脈。初秋生花。作圓錐。花序穗狀。彎曲有芒者。有無芒者。所結子實。如黍粒而細。赤色。稈其薄。味粗澀。可炊粥飯食。與供藥用。



性質 甘。清。無毒。

主治 補中益氣。厚腸胃。濟飢。

【質】 即竹之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「竹」條。

【質】 即筍之古籍別名。典見綱目。詳「筍」條。

【質】 即竹筍之古籍別名。典見竹筍。詳「竹筍」條。

【篤耨】即栗之古籍別名。典見梵書。詳「栗」條。

【篤耨香】基本 本品即篤耨樹之木脂。色白氣香。

古籍別名 黑色者名黑篤耨。

（綱目）

外國名詞 Pistacia Terebinthus, T. (拉丁) トクノウカ

ウ（日本）

基本 係漆樹科。爲篤耨樹之香脂。

產地 出真臘國。

形態 篤耨樹爲香木類之一種。樹形如松。其香脂老則溢出。色白而透明。盛夏不融。香氣清遠。可供藥用。

採取 採香後。夏月以火炙樹。令脂液再溢。至冬乃凝。復採取之。以瓠瓢盛置陰涼處。乃得。

主治 面皴野翳。同白附子。冬瓜子。白及。石榴皮。等分爲末。酒浸三日。洗面後傳之。久則面瑩如玉。

【糖結】即佛佛香木死木存。蜜氣存於枯根。潤若鴿片而質韌。色黑或黃。或黃黑相兼。或黑質白點者。其功用較佛佛香爲良。

【糖毯子】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【糖橘紅】命名 本品係蜜橘霜餼製而成之橘紅。故名。

採取 以產浙江杭州塘棲鎮者良。

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 理氣。快膈。消痰。止咳。

參攷資料 糖橘紅清香入肺。經性不峻削。消痰之功。不下化產。其效力與橘餅相同。南人體弱者宜之。（醫學大辭典）

【糖精】基本 本品即製糖劑下之渣滓也。

性質 甘。溫。無毒。

效能 益氣。緩中。暖脾胃。化食。

主治 反胃。吐食。

【稂】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【稂】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【稂】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【稂】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【稂】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【綠絲草子】即蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【綠絲菜子】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼耳子」條。

【縛木藤】即省藤之別名。詳「省藤」條。

【穀菜】即白英之古籍別名。典見別錄。詳「白英」條。

【羶羊】即山羊之古籍別名。典見綱目。詳「山羊」條。

【羶羊角】即羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羚羊角」條。

【羶草】即蒲公英之古籍別名。典見綱目。詳「蒲公英」條。

【瓜粉】即輕粉之古籍別名。典見綱目。詳「輕粉」條。

【鴛子】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【鴛草】即煙草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「煙草」條。

【鴛草】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【鴛草】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【鴛草】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【鴛草】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【鴛草】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

Berberis, S. et N. (拉丁) イラクサ イタイタグサ ムムシク (日本)

基本 係繭麻科繭麻屬。

產地 生山野間。

形態 繭麻爲毒草類之多年生草本。春月抽莖高二三尺。莖葉皆生毛。有刺戟性。觸之即毛端分泌液汁。能傷肌肉。如蜂螫。蠶瀝。灌以人溺即解。葉作卵形。端尖。緣邊有粗鋸齒。柄長對生。托葉互相結合。夏秋間葉腋綴以繖狀花序。單性。雌雄同株。花小。色白。無花瓣。萼有四片。有花無實。秋日剝取其皮之纖維。色白。有相光。可供織物原料。其葉可供藥用。

性質 辛。苦。寒。有大毒。

主治 蛇咬。搗塗之。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論繭麻葉曰。風藤初起。取汁點之一夜皆失。又投水中。能



繭麻

殺魚。

參攷資料 葶藶菜。不可服。令人吐利不止。(綱目)

【薄荷菜】即薄荷之古籍別名。與見食性本草。詳「薄荷」條。

【蕃椒】

原名 辣椒。

命名 本品莖葉花序

一似茄狀。而子味極辛辣。故稱辣椒。番人常帶殼喫之。故名蕃椒。

處方用名 辣椒。辣醬。

古藥別名 番椒。番姜。(范成

臺海府志) 番薑(綱目拾遺) 海

瘋藤(花鏡) 秦椒。辣虎。(龍柏藥

性考) 赤椒。海椒。臘茄。山珊瑚。地

珊瑚。海貝藤。南蠻胡椒。高麗胡椒

(和漢藥考)

外國名詞 Fructus Capsi-

ci (拉丁) Red Peppor. Capsi-

cuma Fruit. (英) Spaniechor

Pfeffere. (德)

基本 屬茄科蕃椒之實。

形態 蕃椒為一年生草。高有


至二三尺者。葉作卵圓形或長卵

圓形。略帶尖。有長葉柄。夏季開花

為淡黃色或白色合瓣花冠。有長

花梗。實極細長。初綠色。熟則呈赤

色而下垂。為長圓形莢果。粗如小指。有赤色或黃褐色薄膜。作革質狀。有光澤。莢中大半為空洞。中有無數黃色心臟形種子。新鮮者有惡臭。但乾後則消失。味辛烈如灼。貼於皮膚。則刺戟該部分而充血。多食則發諸瘡云。



椒 蕃

採取 臘月實熟時採之。其嫩者秋季採之。曬乾。

性質 辛苦。大熱。無毒。

成分 為辛味樹脂蠟質。色素。

鹽類等。為辛味樹脂。將蕃椒

用酒精及伊打混和液浸出。將液

蒸發。可得黃赤色或赤褐色之濃

稠液體。即此物也。放置空氣中。即

行凝結。逢水及醋稍溶。逢酒精。伊

打。松節油。奇性鹼液。善能溶解。熱

之則變為稀薄液體。再加熱。則發

煙揮散。

效能 溫中。散寒。殺蟲。擦癩。用於消化器衰弱。水腫。咽喉。喉。街。風

痛等。又用以代樟腦。藏置箱櫃中。空治 溫中下氣。散寒除溼。開胃去痰。消食殺蟲。治嘔逆。深覺腸止瀉痢。祛脚氣。

國外學說 英美學說謂辣椒

一名大椒。產中國。西國等處。其乾

熱之果。可為藥品。酒水。油類均能

提出功力。此草高約一二尺。果內

之子極繁。辣椒有數種。其原產地

在南亞美利加。從該處傳至歐羅

巴。亞西亞等處。因東方各國之

人。喜用辣味之實。故其傳布甚速

印度人雖多種辣椒。尚未特設一

名。故謂之紅椒。凡椒類必種於各

熱地。所以西國之種辣椒。常在玻

璃房內。有一種辣椒。俗名幾尼椒

產亞非利加。又有一種辣椒。名茨

椒。產印度與西印度列島各處。今

西國所用者。係產印度亞非利加

等處。其體小如豆粒。而其力則較

大。其形狀不等。有圓形。有橢圓形

有心形。有牛角形。色或紅或黃。入

藥。則用其尖長者。宜用酒及水浸

之。其嗅略香。味最辣者。有之。稱辣

者。亦有之。其作用為引火藥。又為

解性行氣藥。能開胃暖胃。治肚瀉

霍亂。黃熱症。吐黑水。積滯。最難。甜熱症。宜和金雞納霜同服。在熱地。則多用為加味之料。又如喉失音。則用為喉藥。又作糖片服之。置內服辣椒。能令腹暖。及能助胃消化。塗在皮膚。能發紅熱。久則並作水泡。又如外搽風溼骨疼。跌打等症。甚驗。處方以辣椒中分搗爛。濃酒四十分。先用酒三十分。浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。加餘酒。淋淋。用絞盤絞。過淋紙。再加酒。仍是四十分。為度。每服一分。七釐。半至三分。半。(辣椒酒方) (此酒不適口。宜加陳皮酒。或陳皮糖和服) 又方。辣椒酒五分。二釐。半至一錢。零五釐。玫瑰泡。水八兩。和勻。為度。治咽喉類症。(辣椒酒水方) 又方。辣椒一分。濃酒三分。浸七天。過淋紙。為度。治凍瘡。用呢子布蘸酒。擦患處。治牙痛。用棉花蘸酒。塞牙穴內。(辣椒擦酒方) 辣椒內含有精。而其功力。則全在此精。西醫之所謂。夾西先者。即係該精之名。如用法取出。則有異常之辣。若將半釐。放於座上。凡嗅其臭者。莫不嘔吐。日本藥局方曰。蕃椒係採取

本種植物之成熟果實曬乾者。本品呈赤色或赤褐色。作長圓錐形或紡錘形。有光澤。往往成曲。粗一仙米。長至十仙米。有附有萼及果梗者。果殼內面空洞。通常分爲二室。黃色扁平。粗至五密米。藏有多數種子。又和漢藥考曰。蕃椒製劑有蕃椒酒。用於室扶斯末期。惡性咽喉炎及衰弱諸病。日本向用以調味之七色蕃椒。(七色唐辛係用下方配成) 將蕃椒分爲二。一用炭火焙。一即用白搗碎爲末。另將陳皮。罌粟。胡椒。麝香。薄荷。苦用鐵鍋焙熟。然後搗碎篩過。每蕃椒末三匙。加前六味各二匙。入桶混和。納罌殼之。日本之有蕃椒。在慶長十年。與煙草同由南蠻傳入。故有南蠻胡椒之名。又豐臣太閤征朝鮮時。由加藤清正攜歸。故又有高麗胡椒之名。

配合應用 治外痔。以象牙辣茄紅熟者。剉細。甜醬拌食。(百草鏡方)

治毒蛇傷。用辣茄生嚼十一二枚。即消腫定痛。傷處起小泡。出黃水而愈。食此味反甘而不辣。或

十六畫 蕃

草 蓴 蕪 蕪 蕪 蕪

嚼爛敷傷口。亦消腫定痛。(百草鏡方)

祛臭蟲方。用羊頭骨一個。秦椒半斤。共入火盆內。同錫木屑燒之。門窗閉緊。勿令出烟。其蟲自死。敏按木屑用梓木者佳。(經驗廣集方)

治凍瘡。剝辣茄皮貼上。即愈。(蔡自雲方)

治痢積水瀉。用辣茄一個。爲衣。清晨以熱豆腐皮裹。吞下即愈。(醫宗彙編方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛有火者禁用。

參攷資料 人家園圃多種之。深秋山人多挑販入市貨賣。取以熬辣醬及洗凍瘡用之。所用甚廣。而綱目不載其功用。陳吳堯食物宜忌云。食菜蕪即辣茄。陳者爲良。其種類大小方圓黃紅不一。惟一種尖長者。名象芽辣茄。入藥用。(趙恕軒) 又一種木本者。名番蕪。范成臺海府志。番蕪木本。種自荷蘭。開花白瓣。綠實尖長。熟時朱紅奪目。中有子辛辣。番人帶殼啖

之內地名番椒。更有一種結實圓而微尖。似黍。種出咬嚼吧。內地無所出也。(趙恕軒) 辣茄一名臘茄。臘月熟。故名。亦入食料。苗葉似茄葉。而小莖高尺許。至夏乃花。白色五出。倒垂如茄。花結實青色。其實有如柿形。如秤錘形。有小如豆者。有大如橘者。有仰生於頂者。有倒垂葉下者。種種不一。入藥惟取細長如象牙。又知人指者。作食料皆可用。(藥檢) 食之走風動火。病目發瘡痔。(陳吳堯) 味辛。性大熱。入口即辣舌。能祛風行血。散寒解鬱。導滯止瀉。海探(藥檢) 蕪壁風。洗凍瘡。冷芥。蕪大腸寒滯。(百草鏡) 按花鏡。番椒一名海風。俗呼辣茄。木高一二尺。夏生白花。秋來結子。儼如秃筆頭。倒垂。初綠後朱紅。懸掛可觀。其味最辣。人多採用。研極細。冬月以代胡椒。蓋其性熱而散。能入心脾二經。亦能祛水滯。癸亥子在臨安。有小僕於暑月食冷水。臥陰地。至秋癩發。百藥罔效。延至初冬。偶食辣蕪。頗適口。每食需此。又用以煎粥。食未幾病自愈。良由胸膈積水變

爲冷痰。得辛以散之。故如湯沃雪耳。又名秦椒。李成符選載。秦椒一名番椒。形如馬乳。色似珊瑚。非本草秦地之花椒。即中土之辣茄也。(趙恕軒) 秦地乃草本辣茄。綱目諸註。誤爲秦地花椒。不知即今之辣茄。又名辣虎。性熱味辣。溫中散寒。除風發汗。去冷癖。行痰運滯。多食眩暈。動火故也。久食發痔。令人齒痛咽腫。(龍柏藥性考)

【蕪魚】即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳【海鰻魚】條。

【蕪蕪】即草麻之古籍別名。典見本經。詳【草麻】條。

【蕪】即蕪之一種。性質功效與蕪同。詳【蕪】條。

【蕪子】即芭蕉實之簡稱。詳【芭蕉】條。

【蕪】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳【澤瀉】條。

【蕪】即大戟之古籍別名。典見爾雅。詳【大戟】條。

【蕪麥】 命名 本品莖幹柔弱。而魁然。易長易收。其實。磨麩如麥。故名。處方用名 蕪麥粉。甜蕪麥。

十六畫 蕎

古醫別名 莠麥。烏麥。(吳瑞)

花蕎。甜蕎。(綱目)

外國名詞 Fagopyrum es-

culentum, Moench. (拉丁)ノ

八(日本)

基本 係麥科蕎麥屬。藥用其

子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

蕎麥產廣東東西江等處。植物學

大辭典曰。中央亞細亞及東印度

為原產地。

形態 蕎麥為麥類之一。年或

越年生。草本。莖高一二尺。葉為心

臟形。如三角狀。有長柄而互生。邊

緣生細毛。晚秋葉頂葉腋出花梗。

開小白花。列為錐圓花序。果實為

乾果。作三稜形。熟則色黑。其中澱

粉可供麵粉醬油等之原料。又與

莠葉俱可充藥用。



麥 蕎

採取 八九月採之。採得曝乾
去殼用。

用法 恒以磨粉和藥。

性質 甘平寒。無毒。

效能 下氣利腸。消積寬胸。用

作健胃消化藥。

主治 實腸胃。益氣力。續精神。

能鍊五臟滓穢。

歷代記述攷覽 【唐】蘇炳四

聲本草論蕎麥曰。作飯食。墜丹石

毒甚良。【明】吳瑞日用本草論蕎

麥曰。以醋調粉塗小兒丹毒。赤腫

熱瘡。【明】李時珍本草綱目論蕎

麥曰。降氣寬胸。除積滯。消熱腫風

痛。除白濁白帶。脾積洩瀉。以沙糖

水調炒麵二錢。服治痢疾。炒焦熱

水衝服。治絞腸痧痛。【清】黃宮繡

本草求真論蕎麥曰。蕎麥味甘性

寒。治能降氣寬胸。消積去積。凡白

帶白濁泄痢。痘瘡潰爛。湯火灼傷

氣盛溼熱等症。是其所宜。且炒焦

熱水衝服。以治絞腸痧腹痛。醋調

塗之。以治小兒丹毒赤腫亦妙。蓋

以味甘入腸。性寒瀉熱。氣動而降

能使五臟滓滯。皆鍊而去也。若使

脾胃虛弱。不堪服食。食則令人頭

眩。作麵和豬羊肉食。食則令人髮

屑脫落。又不可合黃魚以食。皆是

一七二〇

◎治禁口痢疾。蕎麥麵每服二

錢。糖水調下。(垣仙方)

◎治癩疽發背。一切腫毒。收麥

麵。硫黃各二兩。為末。井華水和作

餅。曬收。每用一餅。磨水傅之。痛則

令不痛。不瘡則令痛即愈。(直指

方)

◎治瘡頭黑凹。蕎麥麵煮食之。

即發起。(直指方)

◎治拉渣潰爛。用蕎麥粉類類

傅之。(拉渣論方)

◎治湯火傷灼。用蕎麥麵炒黃

研末。水和傅之。知神。(奇效方)

◎治蛇盤瘰癧。圍接項上。用蕎

麥炒去殼。海藻。白礬。炒去絲等

分為末。白梅浸湯。取肉。減中和丸。

綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥

米飲下。日五服。其毒當從大便泄

去。若與淡菜連服尤好。淡菜生於

海藻上。亦治此也。慈豆。腐。雞。羊。酒

麵。(阮氏方)

◎通仙散。治男子敗積。女人敗

血。不動氣。用蕎麥麵三錢。大黃

二錢。為末。臥時酒調服之。(多

能鄙事方)

◎治頭風長冷。李樓云。一人頭

其性動降之故。燒灰淋汁即驗。用
化石灰能去腐肉。【清】王士雄隨
息居飲食論論蕎麥曰。蕎麥甘溫
羅麵食開胃寬胸。益氣力。禦風
寒。鍊滓穢。除積滯。與煎煎同食良
以性有微毒。而發痢疾。煎煎能制
之也。而易長易收。尤為救荒極品。
各處皆宜。廣種為是。另有一種味
苦者。雖不堪食。亦可濟荒。
近人學說 丁福保曰。蕎麥含
一種之加里性。且有黏滑性。故為
一種疏泄劑。功能滑潤腸裏。因而
通大便。吸收於血中。則循行黏膜。
入腎而有利尿之效。
配合應用 ①治咳嗽上氣。蕎
麥粉四兩。茶末二錢。生薑二兩。水
一碗。順手攪干下飲之。良久下氣
不止即愈。(儒門事親方)
②治十水腫喘。生大戟一錢。蕎
麥麵二錢。水和作餅。炙熟為末。空
心茶服。以大小便利為度。(聖惠
方)
③治男子白濁。用蕎麥炒焦為
末。雞子白和丸。梧子大。每服五十
丸。鹽湯下。日三服。亦治赤白帶下。
(魏元君濟生丹方)

風。首髮重結三十年不愈。予以蕎麥粉二升。水調作二餅。更互合頭上。微汗即愈。(怪證奇方)

⑤頭風風眼。蕎麥作錢大餅。貼眼四角。以米大艾炷灸之。即效如神。

⑥染髮令黑。蕎麥針砂二錢。醋和。先以藥水洗淨塗之。荷葉包至一更洗去。再以無食子。訶子皮。大麥麩二錢。醋和塗之。荷葉包至天明洗去即黑。(普濟方)

⑦治絞腸痧痛。蕎麥麵一撮。炒黃水煎服。(簡便方)

⑧治小腸疝氣。蕎麥仁炒去尖。胡盧巴酒浸曬乾各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十九兩。兩月大便出白膿去根。(孫天仁集效方)

用錢 三錢至五錢。
施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 ①本草言蕎麥能鎮五臟滯積。俗言一年沉積在腸胃者。食之亦消去也。(王穎) ②蕎麥最降氣寬腸。故能鍊腸胃滯滯。而治濁帶。洩痢腹痛。上氣之疾。氣

十六畫 蕎

蕎 薯

盛有濕熱者宜之。若脾胃虛寒人食之。則大脫元氣。而落鬚眉。非所宜矣。孟詵云。益氣力者。殆未然也。按楊超簡便方云。肚腹微微作痛。出即瀉。瀉亦不多。日夜數行者。用蕎麥麵一味作飯。連食三四次。即愈。予壯年患此。兩月。瘳法尤甚。用消食化氣藥。俱不效。一僧授此。而愈。轉用皆效。此可徵其鍊積滯之功矣。普濟治小兒天疳。及腰節風方中亦用。(李時珍) ③酸微寒。食之難消。久食動風。令人頭眩。作麵和豬羊肉熱食。不過八九頓。即忽熱風。鬚眉脫落。還生亦希。溼邪以北多此疾。又不可合黃魚食。(孫思邈) ④蕎麥南北皆有。立秋前後下種。八九月收刈。性最畏霜。苗高一二尺。赤莖綠葉。如烏相葉。開小白花。繁密繁然。結實纍纍。如羊蹄實。有三稜。老則烏黑色。玉粒農書云。北方多種。磨而爲麵。作煎餅配蒜食。或作湯餅。謂之河漏。以供常食。滑細如粉。亞於麵麥。南方一種。但作粉餌食。乃農家居冬穀也。(李時珍)

【蕎麥粉】即蕎麥之處方用名。詳

【蕎麥】條。

【蕎麥葉】 性溫。作茹食。下氣。利耳目。多食即微洩。

參攷資料 蕎麥葉生食。動刺風。令人身痒。(千金)

【蕎麥】即雅之俗名。詳【雅】條。

【蕎麥糶】 性溫。燒灰淋汁。取蜜收。能爛癰疽。蝕惡肉。去腐毒。最良。穰作薦。辟瘴氣。

參攷資料 ①燒灰淋汁。洗六畜疔。并驅馬屎毒。(日華)

【蕎】即草薺之古籍別名。與見本經。詳【草薺】條。

【蒲子】 產地 出粵、桂、安南及熱帶諸地。

形態 蒲子爲莢果類之一種。藤緣樹木而生。正二月開花。四五個月實熟如梨。赤如雞冠。核如魚鱗。可供食與藥用。

性質 甘平無毒。
主治 中惡瘴邪。心腹卒痛。疫癘狂邪。心神顛倒不寧。昏冒如癡。以及驚癩恍惚。或言語不倫。歌笑不徹。燒研七枚。入硃砂少許。豈湯下。

【蒲根】即防風之古籍別名。與見別錄。詳【防風】條。

【蒲華】即連翹之古籍別名。與見和漢藥考。詳【連翹】條。

【蒲葦】 藥方用者 蒲葦葉。油菜。

古籍別名 寒菜。胡菜。(胡居士) 葦菜。(博雅) 葦芥。(清志) 油菜。油名菜油。(綱目) 眞菜。(和漢藥考)

外國名詞 Brassica chinensis, (拉丁)

基本 屬十字花科。爲葦葦之葦菜。



形態 葦葦爲二年生草。各地多栽培之。莖高四五尺。葉大而互生。作廣披針形。呈濃綠色。稍帶紫色。葉之基部包莖。四月梢上開黃色四瓣花。作繖狀花序。排列花後。結角實。熟則裂開。中有黑色小粒狀種子。榨其種子。得脂肪油。謂之

參攷資料

菜子油。

採取 二月間採之。

性質 辛。溫。無毒。

效能 散血消腫。消熱。治遊丹。用作發癩藥。

主治 風遊丹腫。乳癰。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論蕓曰。煮食。治腰脚痺。持葉傳女人吹奶。【宋】開寶重

定新本草論蕓曰。破癥瘕。結血

【宋】日華諸家本草論蕓曰。治

產後血風及瘀血。【明】李時珍本

草綱目論蕓曰。治癰疽。碗豆瘡

散血消腫。伏蓬砂。【清】王士雄隨

息居飲食譜論蕓曰。蕓蕓辛滑

甘。溫。烹食可。散血消腫。破結通

腸。子可榨油。故一名油菜。形似菘

而本削莖狹葉銳。俗呼青菜。以色

較深也。發風動氣。凡患脚口齒

諸病。及產後癆瘵。瘡家銅疾。目證

時感皆忌之。

配合應用 ●治天火熱瘡。初

起似癩。漸如水泡。似火燒瘡。赤色

急速能殺人。蕓蕓葉搗汁。調大黃

芒硝。生鐵衣等分塗之。〔近效方〕

●治風熱腫毒。蕓蕓苗葉根莖

菁根各三兩爲末。以雞子清和勻貼之。即消。無甚效。即以商陸根代之。亦甚效也。〔近效方〕

●治手足癩疽。此疽喜着手足。肩背累累如赤豆。剝之汁出。用蕓蕓葉汁服一升。并食乾熟菜數頓。少與鹽醬。冬月可用于研水服。〔千金方〕

●治異疽似癩。而小有異。膿如小豆汁。今日去。明日滿。用蕓蕓搗熟布袋盛。於熱灰中煨熟。更互熨之。不過三二度。無葉用乾者。〔千金方〕

●治豌豆斑瘡。蕓蕓葉煎湯洗之。〔外臺秘要方〕

●治血痢腹痛。日夜不止。以蕓蕓葉搗汁二合入蜜一合。溫服。亦治腸風下血。〔聖惠方〕

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及腸滑者禁用。

參攷資料 ●蕓蕓破血。故產

婦宜食之。〔陳藏器〕●貞觀七年

三月。子在內江縣。飲多。至夜覺四

體骨肉疼痛。至曉頭痛。額角有丹

如彈丸腫痛。至午通腫。目不能開。

經日幾斃。予思本草蕓蕓治風遊丹腫。遂取蕓蕓傳隨手即消。其驗如神也。亦可搗汁服之。〔孫思邈〕

●春月食之。能發肺痲疾。〔別錄〕●先患脚者。不可多食。食之加劇。又損陽氣。發瘡及口齒病。胡臭人不可食。又能生腹中諸蟲。道家特忌。以爲五單之一。〔玉房〕●此菜易起蠶。須採其莖食。則分枝必多。故名蕓蕓。而淮人謂之蕓芥。即今油菜。爲其子可榨油也。羌隴氏胡。其地苦寒。冬月多種此菜。能歷霜雪。種自胡來。故服虔通俗文謂之胡菜。而胡洽居士百病方謂之寒菜。皆取此義也。或云塞外有地名蕓蕓成。始種此菜。故名。亦通。〔李時珍〕●別錄云。蕓蕓乃人間所噴菜也。〔蘇恭〕●蕓蕓不甚香。經冬根不死。辟蠶於諸菜中。亦不甚佳。〔寇宗奭〕●蕓蕓方藥多用。諸家註亦不明。令人不識爲何菜。珍訪考之。乃今油菜也。九月十月下種生葉。形色微似白菜。冬春採蕓心爲茹。三月則老。不可食。開小黃花。四瓣如芥花。結莢收子。亦如芥子。灰赤色。炒過榨油。黃色。燃燈

其明。食之不及糜油。近人因有油利。積者亦廢云。〔李時珍〕

【蕓蕓子】 命名 本品易起蠶。須採其莖食。則分枝必多。故名。

處方用名 蕓蕓子。油菜子。

外國名詞 Rapeseed. (英)

基本 樹十字花科蕓蕓之種子。

產地 凡江浙諸省之田野間。恒有產焉。

採取 三四月間採之。採得曬乾用。

性質 辛。溫。無毒。

效能 行血。利產。消腫。治痔。用作利產下藥。

主治 風遊丹腫。乳癰。

歷代記載攷證 【唐】孫思邈

千金翼論蕓蕓子曰。夢中洩精。與鬼交。【唐】陳藏器本草拾遺論蕓蕓子曰。取油傳頭。令髮長黑。【明】李時珍本草綱目論蕓蕓子曰。行滯血。破冷氣。消腫散結。治瘰癧。瘰癧後心腹諸疾。赤丹熱腫。金瘡血痔。

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

配合應用 ●蕓蕓散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來機

遇胃寒踏冷。其血必往來心腹間。刺痛不可忍。謂之血母。并治產後心腹諸疾。產後三日。不可無此。用蜜莖子炒。當歸。桂心。赤芍藥等分。每酒服二錢。趕下惡物。(楊氏產乳方)

① 治產後血暈。蜜莖子。生地黃。等分爲末。每服三錢。煎七片。酒水各半盞。童便半盞。煎七分。溫服卽甦。(溫隱居海上方)

② 追氣丸。治婦人血刺。小腹痛不可忍。亦可常服。補血虛。破氣塊。甚效。用蜜莖子微炒。桂心各一兩。高良薑半兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每淡醋湯下五丸。(沈存中醫苑方)

③ 治腸風。下血。蜜莖子。生用。甘草炙爲末。每服二錢。水煎服之。(普濟方)

④ 治頭風作痛。蜜莖子一分。大黃三分。爲末。噉鼻。

⑤ 治風熱牙痛。蜜莖子。白芥子。角茴香。等分。爲末。噉鼻。左噉右。右噉左。(聖惠方)

⑥ 治小兒天釣。蜜莖子。生烏頭。去皮尖。各二錢。爲末。每用一錢水。

調塗頂上。名塗頂散。(聖濟總錄方)

① 治風疔不愈。陳菜子油同穿山甲末。熬成膏。塗之卽愈。(攝生衆妙方)

② 治熱毒腫毒。蜜莖子。狗頭骨。等分。爲末。醋和。傅之。(千金方)

③ 治傷損接骨。蜜莖子一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。爲末。醋調成膏。攤紙上貼之。(乾坤秘製方)

④ 治湯火傷灼。菜子油調蚯蚓屎。擦之。(楊起何便單方)

⑤ 治蜈蚣螫傷。菜子油傾地上。擦地上。油捲之。卽好。(陸氏積德堂方)

用釐 錢半至三錢。
應用宜忌 凡無瘀滯及腸滑者禁用。

參攷資料 蜜莖菜子葉同功。其味辛氣溫。能溫能散。其用長於行血滯。破結氣。故古方消腫散結。治產後一切心腹氣血痛。諸逆風丹。推熱腫。疔毒。諸藥成用之。經水行後。加入四物湯服之。云能斷產。又治小兒驚風。貼其頂顛。則引氣上出也。婦人方治產難。歐云。黃金

花結粟米。質細。研酒下十五粒。煎丹功效。妙如神。難產之時。能救急。(李時珍)

【莖】卽莖草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「莖草」條。

【莖草】 古籍別名 馬唐。馬飯。羊麻。羊粟。(別錄) 莖(拾遺) 莖子(爾雅) 軒子(綱目) 雁音草(日本)

外國名詞 Caryophorus sp. varicata, Maxim. (拉丁) カリガネサウ ホカケサウ マドリサウ ムラチドリ モチドリ(日本)

基本 係馬鞭科段菊屬。爲莖草之根葉。

產地 山野原澤間。



莖草

形態 莖草爲澤草類之野生雜草。有臭氣甚烈。莖方形。高至三四尺。葉卵形而尖。有鋸齒。對生。秋日枝梢分叉開花。萼形花冠。青紫

色。雌雄蕊突出於花外。花序比莖莖大數倍。若在疎散而不密。

性質 甘寒。無毒。
主治 胸中明耳目。

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。莖草。曰。煎取汁。明目潤肺。又曰。莖清水氣。消腫。脚氣。頑痺。瘡腫。小腹急。小便赤澀。並合赤小豆。煮食。勿與鹽。絞汁服。止消渴。搗葉。傅毒腫。

參攷資料 ① 馬食之。如餅如飯。故名馬唐。馬飯。(陳藏器) ② 羊亦食之。故曰羊麻。羊粟。其氣瘴臭。故謂之莖。莖者。瘴也。朽木臭也。此草莖。頗似葱而臭。故左傳云。一薰一蕕。十年尚猶有臭。是也。孫升談圃。以爲香。莖者。誤矣。卽別錄馬唐也。今并爲一。(李時珍) ③ 馬唐生於澤地。莖有節。生根。五月採。(別錄) ④ 生南方。廢稻田中。節節有根。著土。如結。積草。塊。飼馬。又曰。莖生水田中。狀如結。積草。而葉長。馬食之。(陳藏器) ⑤ 莖草與馬唐。本分列二種。本草綱目始併爲一。但考馬唐。係禾本科植物。與莖草。非一物也。(植物學大辭典)

十六畫 蕘 蕘 蕘

【蕘草】即甘草之古籍別名。與見別錄。詳「甘草」條。

【蕘花】 命名 蕘者饒也。其花繁饒。故名。

古籍別名 黃芫花。(和漢藥考)

外國名詞 Wilkstroemia japonica, Miq. (拉一)

基本 屬瑞香科。為蕘花之花。產地 凡山野川谷間恒多生焉。

形態 蕘花為落葉小灌木。山地自生之植物也。高三四尺。其樹皮為製紙之原料。故暖地亦栽種之。春季發芽。葉為橢圓形。末端尖銳。長五六分至寸許。枝葉皆對生。入秋枝梢與葉腋之間。俱抽花梗。開黃色四瓣之花。其狀如筒。長二分許。

採取 六月間採花陰乾。

性質 苦寒。有毒。

效能 利水。破積。用治水腫。及祛痰藥。

主治 傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕘蕘胸中留癖。飲食寒熱邪氣。利水道。(本經)療核

飲咳嗽。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蕘花曰。治咳逆上氣。喉中腫滿。疰氣蠱毒。痲痺氣塊。【清】黃宮繡本草求真論蕘花曰。蕘花雖與芫花形色相同。而究絕不相似。蓋芫花葉尖如柳。花紫似荊。蕘花苗莖無刺。花細色黃。至其性味。芫花辛苦而溫。此則辛苦而寒。若論主治。則芫花辛溫。多有遠表行水之力。此則氣寒。多有入裏走泄之效。故書載能治痢。然要皆屬破結逐水之品。未可分途而別視也。但藥肆混收。亦可見效。以其主治差同故耳。【清】鄒樹本經疏證論蕘花曰。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。若微利者。去麻黃。加蕘花。如雞子大。熬令赤色。注云。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。去麻黃。惡發汗。夫太陽與陽明合病。下利者。與葛根湯。其中未嘗無麻黃。不慮其脹滿何哉。蓋葛根湯所治證。其表但有風寒。風寒者。標在外。本亦在外。小青龍湯證。則本雖風寒。標已化水。風寒雖仍在外。水飲則已內連。若徒發其外。則在

外之風寒機散。內連之水氣必隨出於表。於是水入經隧為脹滿。不可與葛根湯同論也。雖然。治水之出於表者。有防已有大戟。治水之為咳喘者。有芫花。此則用蕘花者。何蓋防已主傷寒濕熱熱氣。此則未化為熱也。大戟治風與水在皮膚疼痛。此則不疼痛也。芫花治因水咳喘。僅能下氣。不能治利。故主以蕘花。然主治惟與芫花為近。故後世或有以芫花代者焉。於此見蕘花與芫花。功用略同。而芫花惟下氣行水。蕘花兼破飲食積聚。利水道。差有別矣。

用量 八分至錢半。

參攷資料 ●張仲景傷寒論

以蕘花治利者。取其行水也。水去則利止。其意如此。今用之當斟酌。不可過使與不及也。須有是證乃用之。(寇宗奭) ●蕘花生咸陽川谷。及河南中弁。六月採花陰乾。(別錄) ●中弁者。時從河上來。形似芫花而極細白色。(陶弘景) ●苗似胡荽。莖無刺。花細黃色。四月五月收。與芫花全不相似也。(蘇恭) ●所在有之。以雍州者為好。

生岡原上。苗高二尺許。(韓保昇)

●按蘇頌經首絳州所出。芫花黃色。謂之黃芫花。其國小。小花成簇。生恐即此蕘花也。生時色黃。乾則如白。故陶氏言粉白也。或言無蕘花。以桃花代之。取其利耳。(李時珍) ●蕘花形如芫花而小。色黃者是。又有白花者。藥舖無此。可以芫花代之。按其味甘辛。利水之功。一如芫花。(和漢藥考)

【蕘草】即假蘭之古籍別名。與見別錄。詳「假蘭」條。

【蕘蘭】即建蘭之古籍別名。與見綱目。詳「建蘭花」條。

【蕘車香】 性質 辛溫。無毒。 主治 鬼氣去臭。及蟲魚蛙蝨。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論蕘車香曰。治蠶亂。辟惡氣。薰衣佳。

參攷資料 ●蕘車香。氣味微寒。(李珣) ●蕘車香。廣志云。蕘車香。生徐州。高數尺。黃葉白花。爾雅。蕘車。乞與。郭璞云。香草也。(陳藏器) ●蕘車香。生海南山谷。齊民要術云。凡諸樹木蟲蛙者。煎此香

冷淋之。卽辟也。(李珣)①藕車香。楚詞。蛙留夷與藕車別。昔人常栽。薜之與今藕香零陵相類也。(李時珍)

【實】①卽羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羊蹄」條。②卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「益母草」條。

【薜】卽木槿之古籍別名。典見詩經。詳「木槿」條。

【蕤仁】原名 蕤核。命名 本品花實蕤蕤下垂。而藥用其核仁。故名。

處方用名 蕤核仁。製蕤仁。

古醫別名 白櫻仁。穢仁。(爾雅)

基本 爲蕤之核仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蕤仁產河南禹州。

形態 蕤屬灌木類之叢生小。木高數尺。莖多刺。虛狹而長。開白花。質附莖生。色紫赤。圓扁有紋。大如五味子。可供食用。

採取 五六月實熟時。採之日乾。

製法 雷斅曰。凡使蕤核仁。以

十六畫 蕤

蕤 蕤

湯浸去皮尖。皴作兩片。每四兩用芒硝一兩。木通草七兩。同水煮一伏時。取仁研膏入藥。

性質 甘。溫。無毒。效能 祛風熱。明目。專作眼科藥。

主治 心腹邪熱結氣。明目。目赤痛傷。淚出目腫。昏爛。久服輕身。益氣不飢。(本經)破心下結痰。痞氣。鼻。別錄。

歷代醫述攷證 【唐】吳普蜀本草論蕤仁曰。強志明耳目。【唐】甄權藥性本草論蕤仁曰。治鼻衄。

【唐】陳藏器本草拾遺論蕤仁曰。生治足腫。熱治不眠。【明】魏希雍本草經疏論蕤仁曰。蕤核神農味甘氣溫。別錄加微寒。無毒。氣薄味厚。入足厥陰經。厥陰爲風木之臟。開竅於目。風熱乘肝。則肝血虛而目爲之病。或爲赤痛腫傷。或爲淚出昏爛。此藥溫能散風。寒能除熱。甘能補血。肝氣和而目疾悉瘳矣。其主心腹邪結氣者。卽邪熱氣也。熱則生痰。痰凝中焦。氣爲之痞。甘寒除熱。溫主通行。熱邪去而痰自不生。痰結解而氣自通暢矣。鼻衄

者。熱在上焦。心肺之分也。甘寒總能除上下之熱。故亦主之。非養性益精之藥。而云輕身益氣不飢者。未必然也。【清】黃宮楠本草求真論蕤仁曰。蕤核眼科藥也。凡眼病多因風熱乘肝。以致血虛而目不得明。故病必見上下眼胞風腫。弦爛。左右皆熱障。得此溫能散風。寒能勝熱。甘能補血。俾火退淚止。而目疾瘳矣。赤筋在翳膜外者。得此則宜。湯浸去皮尖。皴作兩片。芒硝。木通。通草同煎一伏時。取出研膏入藥。

配合應用 ①春雪膏。治肝虛風熱上攻。眼目昏暗。痒痛隱澀。赤腫羞明。不能遠視。迎風有淚。多見黑花。用蕤仁去皮。壓去油二兩。罌子二錢半。研勻。生蜜六錢。和收點眼。(和劑局方)

②百點膏。治一切眼疾。蕤仁去油三錢。甘草。防風各六錢。黃連五錢。以三味熬取濃汁。次下蕤仁膏日點。(孫氏集效方)

③撥雲膏。取下翳膜。蕤仁去油五分。青鹽一分。豬膽子五錢。共搗二千下。如泥。搗收點之。又方。蕤仁

一兩。去油。入白蔘砂一錢。麝香二分。研勻。收之。去翳妙不可言。

④飛血眼。蕤仁一兩。去皮。細辛半兩。苦竹葉三握。洗水二升。煎一升。濾汁。頻溼洗之。(聖濟總錄方)

⑤治赤爛眼。用蕤仁四十九個。去皮。胡粉。煨如金色。一雞子大。研勻。入酥一杏仁許。龍腦。三豆許。研勻。油紙裝。收。每以麻子許。塗大小。背。上。頻用取效。(近效方)又用蕤仁。杏仁各一兩。去皮。研勻。入膩粉少許。爲丸。每用熱湯化洗。(經驗良方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡無風熱者。禁用。參攷資料 ①醫方惟以療眼。仙經以合守中丸也。(陶弘景)②按劉禹錫傳信方。所著治眼法。最奇。云眼風。或生翳。或赤。皆一切皆主之。宜州黃連末。蕤核仁。去皮。研膏。等分。和勻。取無神。乾薑二枚。剉下頭。去核。以二物填滿。却以割下頭。合定。用少薄綿包之。大茶盞盛。於銀器中。文武火煎。取一雞子大。以綿濾。收點眼。萬萬不失。前後試驗十數人。皆應。今醫家亦多

十六畫 蕨 蕨蕒 蕨

用得效也。(蘇頌) ① 爾雅。械。白樅。即此也。其花實蕨蕒下。故謂之。後人作蕨。柞木亦名械而物異。

(李時珍) ② 蕨核生兩山谷。巴西(別錄) ③ 今出彭城。大如烏豆。形圓而扁。有文理。狀似胡桃核。今人皆合殼用。此應破取仁。秤之。

(商弘景) ④ 今出雍州。樹生細葉。似枸杞而狹長。花白。子附莖生。紫赤色。大如五味子。莖多細刺。五月六月熟。採實日乾。(韓保昇) ⑤ 今河東并州亦有之。木高五七尺。莖間有刺。(蘇頌) ⑥ 郭璞云。白樅。小木也。叢生有刺。實如耳瑤。紫赤可食。即此也。(李時珍)

【蕨核仁】即蕨仁之原名。詳「蕨仁」條。

【蕨核仁】即蕨仁之原名。詳「蕨仁」條。

【蕨核仁】即蕨仁之原名。詳「蕨仁」條。

【蕨核仁】即蕨仁之原名。詳「蕨仁」條。

【蕨】 命名 本品初生無葉。狀如雀足之拳。又如人足之蹠。故名。

古醫別名 蕨。苗名蕨蕒。(綱目)

外國名詞 Peridium aquilinum, Kuhn. (拉丁)ワラビ

(日本) 基本 係羊齒科蕨屬。為蕨之根。產地 山野多有之。形體 蕨為菜類之多年生草。本莖長。匍匐於地。隨處生葉。葉大為數回複葉。長三四尺。小葉有缺刻。初夏葉之下面緣邊生繁殖器。根甚長。色紫。皮內有白色澱粉。搗爛澄取。謂之蕨粉。色淡紫。故根可供食與藥用。

性質 甘。寒。滑。無毒。

主治 燒灰。油調。傳蛇蟲螫傷。基本 本品為蕨苗與莖之乾者。

採取 春夏間採苗莖之嫩者。以灰湯煮。去涎滑曬乾。作蔬茹與藥用。

性質 甘。寒。滑。無毒。

主治 去熱。利水道。令人睡。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草論蕨蕒曰。補五臟不足。氣強經絡。筋骨間毒氣。

參攷資料 ① 蕨。久食令人目暗。鼻塞。髮落。又冷氣人食多腹脹。小兒食之。脚弱不能行。(孟詵) ②

參攷資料 ① 蕨。久食令人目暗。鼻塞。髮落。又冷氣人食多腹脹。小兒食之。脚弱不能行。(孟詵) ②

參攷資料 ① 蕨。久食令人目暗。鼻塞。髮落。又冷氣人食多腹脹。小兒食之。脚弱不能行。(孟詵) ②

蕨。多食消陽氣。故令人睡。別人脚四皓食芝而壽。夷齊食蕨而夭。因非良物。于寶神記云。鄒靈鎮丹徒。二月出獵。有甲士折蕨一枝。食之。覺心中淡淡成疾。後吐一小蛇。縣屋前。漸乾成蕨。遂明此物不可生食也。(陳藏器) ③ 蕨之無益。為其性冷而滑。能利水道。洩陽氣。降而不升。耗人真元也。四皓採芝而心逸。夷齊採蕨而心憂。其壽其夭。於蕨何與焉。陳公之計。可謂迂哉。然饑人溺死。賴蕨延活。又不無濟世之功。(李時珍)

【蕨部】即蕨魚之俗名。詳「蕨魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

【蕨魚】即杜父魚之別名。詳「杜父魚」條。

一七二六

產地 陳仁山藥物生藥辨云。蕨蕒產直隸西陵。乃何樹之花。開殘落地。即用該地之泥。築成片塊。曬乾是也。氣味臭而撲鼻。

形體 蕨蕒為落葉喬木。自生於山野川谷。其狀如榆。葉圓而厚。莖氣臭如狐。

採取 三月採實陰乾。

用法 凡使當用大者。蕨小者。榆蕒仁也。尤以陳久者良。炒去殼。用其氣煎。

性質 辛。平。無毒。

效能 散風。滑消。蟲積。用為小兒殺蟲消積藥。

主治 五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫濕行。去三蟲。化食。(本經) 逐寸白散。腸中嘔。嘔喘息。(別錄)

歷代記載攷證 【唐】韓保昇獨本草論蕨蕒曰。主積冷氣。心腹痠痛。除肌膚節中風。淫淫如蟲行。

【唐】孟詵食療本草論蕨蕒曰。五臟皮膚節節邪氣。長食。治五痔。殺中惡蟲毒。諸病不生。(唐)李珣海藥本草論蕨蕒曰。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。孩子疳瀉冷痢。得何

【唐】孟詵食療本草論蕨蕒曰。五臟皮膚節節邪氣。長食。治五痔。殺中惡蟲毒。諸病不生。(唐)李珣海藥本草論蕨蕒曰。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。孩子疳瀉冷痢。得何

子、豆、薏、良。【宋】大明諸家本草論
 蕪黃曰。治腸風痔瘻。及惡瘡疥癩。
 【明】經希雍本草經疏論蕪黃曰。
 蕪黃本經味辛氣平。無毒。甄權加
 苦李珣如溫。詳其功用。應是苦辛
 溫平之藥。非辛溫則不能散。五臟
 皮膚骨節中邪毒氣。非苦平則不
 能去。三蟲。化食逐寸白。瘰癧中阻
 阻。喘息。然察其所主。雖能除風淫
 邪氣之爲害。而其功則長於走腸
 胃。殺諸蟲。消食積也。故小兒疳積
 冷痢。爲必資之藥。【清】黃宮積本
 草求真論蕪黃曰。蕪黃味辛而苦。
 氣溫無毒。功專燥脾去風。化食殺
 蟲。緣蟲生於人腹。多口。滯爲之兆。
 滯爲之得。風爲之助。寒爲之成。直
 指方云。嗜酒人血入於酒爲酒熱。
 多氣人血入於氣爲氣熱。虛勞人
 敗血雜痰爲血熱。搖頭掉尾。如蟲
 之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇
 背。或隱胸腹。大則如蟹。小則如錢。
 治法惟當用此煎服。兼用煨胃益
 氣理中之類。乃可殺之。且不獨殺
 蟲如是。卽其皮膚骨節。濕熱內入。
 留連不解。以致穢垢不清。得以合
 其辛散等藥。亦能去風除濕。而使

十六畫 蕪

氣血調和。肢節安養。而無滯痰痲
 痺之候矣。奈世僅知掃蕪殺蟲。而
 不知此更散皮膚骨節。淫濕。其亦
 未遠本經之旨耳。形類論。陳久
 氣煎者良。
 配合應用 ①和豬脂搽熱
 瘡。和蜜塗濕癩。和羊牛醋或馬醋
 治一切瘡。
 ②同肉豆蔻、胡黃連、盧會、使君
 子、青黛、五穀蟲、雷丸、檳榔、橋皮。治
 小兒疳熱消痢。及腹大羸瘦。面黃
 好喫泥土。
 ③治脾胃有蟲。食卽作痛。面黃
 無色。以石州蕪黃仁二兩。和麴炒
 黃色研爲末。非時米飲服二錢七
 (千金方)
 ④制殺諸蟲。生蕪黃、生檳榔各
 四兩爲末。蒸餅丸梧子大。每服二
 十九丸白湯下。(本事方)
 ⑤治疳熱有蟲。瘦悴。久服充肥。
 用榆仁一兩。黃連一兩爲末。豬膽
 汁七枚。和入盤內飯上蒸之一日。
 蒸一次。九蒸乃入麝香半錢。湯浸
 蒸餅和丸。綠豆大。每服五七丸。至
 一二十九米飲下。(錢氏小兒方)
 ⑥治小兒蟲瀉。胃寒蟲上諸證。

危惡與潮相似。用白蕪黃、乾漆、燒
 存性。等分爲末。米飲調服。一字至
 一錢。(杜壬方)
 ⑦治結陰下血。蕪黃一兩。搗爛。
 紙壓去油爲末。以雄豬膽汁丸。梧
 子大。每服九丸。甘草湯下。日五服。
 三日斷根。(普濟方)
 ⑧治脾胃氣滯。久患不止。蕪黃
 五兩。搗末。飯丸。梧子大。每日空心
 午飯前陳米飲下三十九丸。久服去
 三尸。益神駐顏。(王紹祖傳信
 方)
 ⑨治膀胱氣急。宜下氣。用蕪黃
 搗和食鹽末等分。以棉裹如指大。
 納下部。或下惡汗。並下氣佳。(外
 臺聖方)
 ⑩肥兒丸。治嬰孩疳積。風後失
 疳。不能言。用蕪黃炒。神麴炒。麥蘖
 炒。黃連炒。各一錢爲末。豬膽汁打
 糊丸。黍米大。每服十九丸。木通湯下。
 黃連能去心腹惡血。(全幼心鑑
 方)
 ⑪治蟲牙作痛。以蕪黃仁安蛀
 孔中。及糖中其效。(危氏得效方)
 ⑫治腹中懸癢。不時嗜酒。血入
 於酒。則爲酒癩。平時多氣。血凝於

氣。則爲氣癩。虛勞積冷。敗血雜痰。
 則爲血癩。搖頭掉尾。如蟲之行。上
 侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱
 胸腹。大則如蟹。小則如錢。治法惟
 用蕪黃煎服之。或用暖胃益血理
 中之藥。乃可殺之。若徒事雷丸。錫
 氏之類。無益也。(仁寶直指方)
 用錢 錢半至二錢。
 施用宜忌 凡脾胃虛弱及無
 蟲積者禁用。
 著名方劑 蕪黃散。治蟲咬心
 痛。欲驗之大痛不可忍。或吐黃
 沫水瀉法。或吐蟲發有休止。(古
 方) 蕪黃散。丸各半兩。乾漆(研
 碎炒烟盡)一兩。上共爲末。每服
 三錢。調和服。
 考攷資料 ①按說文云。蕪。山
 竹筒也。有刺。實爲蕪黃。爾雅云。蕪
 枯。其實蕪。又云。蕪黃。蕪屬。則此物
 乃盛樹之實。故名也。(李時珍) ②
 以爲乃蕪屬二字之誤。(蘇恭) ③
 蕪黃生於山川谷。三月採實。陰乾。
 (別錄) ④今惟出高麗。狀如榆莢。
 氣臭如蕪。彼人皆以作糧食之性。
 能殺蟲。置物中。亦辟蛇。但患其臭。
 (陶弘景) ⑤今延州同州者甚好。

十六盡 蕪

〔蕪菜〕①河東河西。處處有之。〔馬志〕②近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小。其實亦早成。此榆乃大氣臭。郭璞爾雅注云。無姑。姑榆也。生山中。葉圓而厚。對取皮合讀之。其味辛香。所謂蕪菜也。採實陰乾用。今人又多取作屑。以芼五味。惟陳者良。人收藏之多。以鹽漬。則失氣味。但宜食品。不堪入藥。〔蘇頌〕③按廣州記云。生大秦國。是波斯蕪菜也。〔李時珍〕④蕪菜有大小兩種。小者即榆菜也。採取仁。醃為醬。味尤辛。人多以外物相和。不可不擇去之。入菜皆用大蕪菜。別有種。〔李時珍〕

性實 辛。溫。微臭。無毒。

主治 殺三蟲。功力強於榆仁。

參攷資料 蕪菜多食落。〔綱目〕⑤北人亦多食。乳酪酥。脂甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽。蕪菜。而汁殺九蟲之物也。〔張從正〕

古醫別名 蕪菁。〔唐本草〕九英蕪。〔食療〕

諸葛菜。〔綱目〕大芥。〔揚雄方言〕

外國名詞 Brassica oleracea

〔拉丁〕カブラ (日本)

基本 係十字花科。藝聖屬之蕪菁。

產地 園圃多有之。

形態 蕪菁為菜類之一。年或越年生。草本。根多肉。有扁圓或稍長者。葉大略似匙狀。緣邊微有缺刻。春開黃花。總狀花序似繖形。花結實為長莢。莢中有種子。其根可供藥用。



蕪菁

性質 苦。溫。無毒。

主治 利五臟。輕身益氣。可長食之。

歷代記述攷證 〔唐〕孟詵食療本草論蕪菁曰。消食。下氣。治嗽。止消渴。去心腹冷痛。及熱毒。風腫。乳癰。妬乳。寒熱。〔宋〕蘇頌圖經本草論蕪菁曰。常食通中。令人肥健。

參攷資料 蕪菁是芥屬。根長而白。其味辛苦而短。莖粗葉大而厚。夏初起莖。開黃花。四出如芥。結角亦如芥。其子均圓。宛似芥子。而紫赤色。蕪菜是蕪菜屬。根圓亦有長者。有紅白二色。其味辛甘而水。葉不甚大而隨。亦有花葉者。夏初起莖。開淡紫花。結角如蟲狀。腹大尾尖。子似胡盧。不均不圓。黃赤色。如此分之。自明白矣。其蕪菁六月種者。根大而葉蠶。八月種者。葉美而根小。惟七月初種者。根葉俱良。擬實者。純種九英。九英。根大而味短。削淨為菹。其佳。今蕪京人以瓶醃。謂之閉菹菜。〔李時珍〕

九英蕪出河西。葉大根亦粗長。和羊肉食甚美。常食都不見發病。冬日作菹。煮食。消宿食。下氣。治嗽。諸家商略其性冷。而本草云溫。恐誤也。〔孟詵〕⑥蕪菁多食動氣。〔寇宗奭〕

〔蕪菁子〕 性質 苦。辛。平。無毒。

主治 明目。

歷代記述攷證 〔唐〕蘇恭新修本草論蕪菁子曰。療黃疸。利小便。水麥汁服。主癢癢積聚。少少飲。

一七二八

汁。治霍亂。心腹脹。為末服之。主目暗。為油入百濟。去黑野。〔唐〕陳藏器本草拾遺論蕪菁子曰。和油。傳蜘蛛咬。〔唐〕孟詵食療本草論蕪菁子曰。壓油塗頭。能變髮。〔唐〕蕭炳四聲本草論蕪菁子曰。入丸藥。服令人肥健。尤宜婦人。

參攷資料 仙經言蕪菁子。

九英蕪。搗末長服。可斷穀。長生。蜘蛛咬者。恐毒入內。搗末酒服。亦以油和傳之。蕪菁園中無蜘蛛。是其相畏也。〔陳藏器〕⑦蕪菁子可升可降。能汗能吐。能下。能利小便。又能明目。解毒。其功甚偉。而世罕知用之。何哉。夏初採子。炒過榨油。同麻油錄熟。一色無異。西人多食之。點燈甚明。但烟亦損目。北魏祖珽因地窖中。因蕪菁子油燈。傷明。即此也。〔李時珍〕

〔蕪菁花〕 採取 三月間採之。

性質 辛。平。無毒。

主治 療虛勞。明眼目。久服長生。

〔蕪菁葉〕 性質 苦。溫。無毒。

主治 消食。下氣。利。

【蠶絲】治咳嗽。塗小兒頭禿。點飛絲入目。

【蠶節】即狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳『狼尾草』條。

【蒼折魚】即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【蒼纒】即紫纒之古籍別名。典見郭璞賦。詳『紫纒』條。

【項】即商麻之古籍別名。典見綱目。詳『商麻』條。

【蕪纒】即紫纒之古籍別名。典見爾雅。詳『紫纒』條。

【蕪藤】即木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【蕪】即三稜之古籍別名。典見呂枕字林。詳『三稜』條。

【蕪】即菴荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菴荷』條。

【蕪】即菴荷之古籍別名。典見詩經。詳『菴荷』條。

【蕪根】即蕪根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕪根』條。

【蕪骨】即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【蕪】即蝮蟲之古籍別名。典見爾雅。詳『蝮蟲』條。

【蝮蠶】即蠶之古籍別名。典見蟹譜。詳『蠶』條。

【蝮蠶】即斑蠶之古籍別名。典見本草拾遺。詳『斑蠶』條。

【蠶】即桑蠶之古籍別名。典見綱目。詳『桑蠶』條。

【蠶】即蠶之古籍別名。典見爾雅。詳『蠶』條。

【蠶】即寄居蟲之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『寄居蟲』條。

【蠶】即蠶之古籍別名。典見毛詩。詳『蠶』條。

【蠶】即蠶之古籍別名。典見王立人簡易方。詳『蠶』條。

【蠶】即水蛭之俗名。詳『水蛭』條。

【蠶火】古醫別名。夜光。(本經)燭燭。即燭。夜燭。景天。救火。擦火。挾火。(吳普)膏燭。(古今注)丹鳥(綱目)

外國名詞 Luciola Vibriolisa, Kites, Fire-fly (拉丁)ホタル或ケンジボタル或オホホタル(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類鞘翅類之蠶

翅類蠶科之蠶

產地 生原澤澤地間。

形態 蠶為化生蟲類之一種。其體狹長。長約三分。雄者體黃頭黑有複眼。翅鞘柔軟。點線密布。雌者無翅。其形如蛆。尾端皆有發光器。呼吸時空氣傳生發化作用。而發燐光。寶隱草。入夜飛出。約月許則化為蟲。蟲能食害蟲。亦為益蟲之一。又可供藥用。

種類 小而青飛。腹下光明。乃茅根所化。所謂腐草化為螢者是也。長如蛆。尾後有光。無翼不飛。乃竹根所化。一名蠶。俗名蠶。所謂腐草化為蠶者是也。居水畔池邊者。所謂水蠶是也。

採取 凡入藥須以飛蠶。七月七日採之。陰乾用。

性質 辛微溫。無毒。

主治 明目(本經)小兒火疳。傷熱。氣。毒。鬼。疰。通精神(別錄)

歷代記述 唐甄權藥性本草論蠶曰。療青盲。

參攷資料 蠶火能辟邪明目。蓋取其燭幽夜明之義耳。神仙感應篇。載務成蠶火丸。事蹟甚詳。而廣安常總病論。亦極言其效驗云。

曾試用之一家五十餘口。俱染瘦病。惟四人帶此者不病也。許叔微傷寒論亦稱之。予亦傾欲試之。因循未暇耳。願翁為錄黃器重友。想不虛言。神仙感應篇云。務成子蠶火丸。主辟疾病。惡氣。百鬼。虎狼。蛇。蝮。蠶。諸毒。五兵。白刃。盜賊。兇害。昔漢冠軍將軍。武威太守。劉子南。從道士尹公受得此方。永平十二年於北界與虜戰。敗虜。士卒略蠶于南。被圍。矢下如雨。未至子南馬數尺。矢輒墜地。虜以為神。乃解去。子南以方教子弟。為將。皆未嘗被傷也。漢末。青年道士得之。以傳安定。皇甫隆。隆以傳魏武帝。乃稍有人得之。故一名冠將丸。又名武威丸。用蠶火。鬼箭。羽。茨。桑。各一兩。雄黃。雌黃。各二兩。殺羊角。煨。存性。一兩半。礬石。火燒。二兩。鐵。鑊。入。鐵。處。燒。焦。一兩半。俱為末。以雞子黃。丹。雄。雞。冠。一。具。和。搗。于。下。丸。如。杏。仁。作。三。角。緋。蠶。五。丸。帶。於。左。臂。上。從。軍。繫。腰。中。居。家。掛。戶。上。可。辟。盜。賊。也。(李時珍)

【蠶休】即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

十六畫 蓋 蕭 萎 蒺 藜 薺 蓼 蔞 蔞 蠟 蠟 蟻 螞 蟻 蜂 蟹 蟬 蟬 蟬 蟬 蟬 蠶 蠶 蠶 蠶

十六畫 藪 衛

【藪】即藪蝓之古籍別名。典見本草經。詳「蝓蝓」條。

【衛矛】 命名 本品幹有直羽。如箭矛刃自衛之狀。故名。

處方用名 鬼箭羽。

古醫別名 鬼箭(別錄)神箭。


(廣雅)錦木(日本)六月發。(俚名)枸骨(綱目)

外國名詞 Eonymus ala-

g, K. Koch. (拉丁)ニシキギ マユミ(日本)

基本 係衛矛科。衛矛之枝幹。

產地 原仁山藥物生產辨云。鬼箭羽以廣東陽江、惠州、博羅等處產者為幼細。廣西各屬產者粗條。



衛矛

形態 衛矛為落葉灌木。高丈許。莖有羽狀突起。葉對生。橢圓形。邊緣有鋸齒。至秋葉色變紅。頗顯美。夏月開小花。黃綠色。作聚繖花

序。果為蒴果。至秋成熟則開裂。現出種子。外圍有赤色之被包。樹皮供製紙料。木材供細小工之料。亦充藥用。

採取 八月採之。陰乾。

製法 雷欒曰。採得只使箭頭。用拭去赤毛。以酥并緩炒。每一兩用酥二錢半。

性質 苦寒。無毒。

效能 破瘀。行血。用作通經藥。又為殺蟲辟惡藥。

主治 女子崩中。下血。腹滿。汗出。除邪。殺鬼。毒瘰。疔(本經)中。惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒腫。令陰中解(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論衛矛曰。療婦人血氣大效。【唐】甄權藥性本草論衛矛曰。破陳血。能落胎。主百邪鬼魅。【宋】大明諸家本草論衛矛曰。通月經。破癥結。止血崩帶。下殺腹臙蟲。及產後血咬腹痛。【明】李士材本草圖解論衛矛曰。衛矛即鬼箭羽。苦寒無毒。攻腹痛。破癥結。【清】楊時泰本草述鈞元論衛矛曰。本經鬼箭羽。似專功於女子之血分。蘇頌

所述古方。更似專功於惡瘕及中惡氣之毒。以病於血者。第方書治女子經閉。有牡丹皮散。而治男子腹滿。有見復丸。則固非專治女子血病也。大抵其功力專於血分。女子以血為主。較之取效於男子更為切中耳。

配合應用 ①治產後敗血。見枕塊。硬。疼痛發歇。及新產乘虛。風寒內搏。惡露不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸炒。鬼箭去心中木。紅藍花各一兩。每服三錢。酒一大盞煎七分。食前溫服(和州局方)

②治鬼瘧。日發。鬼箭羽。鯪甲。燒灰二錢半。為末。每以一字。發時。噓鼻。又法。鬼箭羽末一分。砒霜一錢。五蝦脂一兩。為末。發時冷水服一錢(聖濟總錄方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無癥瘕者禁用。

參攷資料 ①古方撰氏癩瘕注。在心。痛不可忍。有鬼箭羽湯。姚僧坦集驗方。療卒暴心痛。忽中惡氣。毒痛。大黃湯亦用之。並大方也。見外臺祕要千金諸書中(蘇頌)

②凡婦人產後血暈。血結。血聚於

胸中。或偏於少腹。或連於脇肘者。四物湯四兩。倍當歸。加鬼箭。紅花。玄胡索。各一兩。為末。煎服。(李時珍) ③衛矛生霍山山谷。八月採陰乾(別錄) ④葉如桃箭。如羽。正月二月七月採。陰乾。或生田野間。(吳普) ⑤山野處處有之。削取皮羽入藥。為用甚稀(陶弘景) ⑥今江淮州郡亦或有之。三月以後生莖。莖長四五尺許。其幹有二羽狀。如箭翎。葉似山茶。青色。八月十一月十二月採。條莖陰乾。其木亦名枸骨(蘇頌) ⑦所在山谷皆有。平陸未嘗見也。葉絕少。其莖黃褐色。若藥皮。三面如鋒刃。人家多燻之。遺藥方藥少用(寇宗奭) ⑧鬼箭生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽。如箭羽。視之若三羽耳。青。葉狀似野茶。對生。味酸澀。三四月開碎花。萎綠色。結實大如冬青子。山人不識。惟樵採之。(李時珍) ⑨衛矛湖南僅醫謂之六月發。又植物名實圖考。曲節草條下。謂鬼箭羽。湖南呼為六月冷。或恐一物。因本草綱目有曲節草一名六月發。六月發。故疑曲節草與衛

茅爲一物也。按本草綱目曲節草又有綠豆青蛇藍諸名。與衛茅分列。衛茅入木部曲節草入草部。植物名實圖考亦列衛茅入木類。曲節草入溫草類。徒以二物均有六月夜之名。故疑爲一物。實則二書所載曲節草。圖與衛茅之形態不同。當非同物也。(植物學大辭典)

【衛足】即蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【衛足葵】即蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【衛與】即茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵芋」條。

【得水簾】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【窠鼻蛇】即白花蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白花蛇」條。

【親辰粧】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白桃花」條。

【諫果】即橄欖之古籍別名。典見農書。詳「橄欖」條。

【諸乘】即蜻蜓之古籍別名。典見本草集註。詳「蜻蜓」條。

【諸葛菜】即蕪菁之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菁」條。

十六畫 衛

褥 褰 親 諫 諸 設 諾 豫 豬

【設草】即萱草之古籍別名。典見毛詩。詳「設草」條。

【諸藤斷】即續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「續斷」條。

【豫】即烏樟之古籍別名。典見綱目。詳「烏樟」條。

【豬心】

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 驚邪。憂。瘵。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬心曰。虛悸。氣逆。婦人產後中風。血氣驚恐。【唐】蘇恭新修本草論豬心曰。五臟。主小兒驚癇。【宋】蘇頌圖經本草論豬心曰。補血不足。虛劣。

參攷資料 豬心多食。耗心氣。不可合吳茱萸食。(蘇頌)豬水畜也。故心可以鎮恍惚。(劉元素)

【豬心血】

主治 驚癇。癩疾。調珠砂末服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豬心血曰。治卒癲死。及痘瘡倒靨。

參攷資料 古方治驚風。癩癩。痘疾。多用豬心血。蓋以心歸心。以血導血之意。用尾血者。取其動而不息也。豬爲水畜。其血性寒。而能

解滯制陽故也。韓飛霞云。豬心血能引藥入本經。實非其補。沈存中云。豬血得龍腦直入心經。是矣。(李時珍)

【豬毛】

主治 燒灰。麻油調塗。湯火傷。留竅出毒。則無痕。

【豬牙石】

命名 本品文理如。出西番諸地。

形態 豬牙石爲石類之一種。其色斑紅。可供藥用。
主治 明目。去翳。

【豬牙卓茨】即卓茨之小知豬牙者。詳「卓茨」條。

【豬牙草】即鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳「鱧腸」條。


【豬石子】即豬卵之古籍別名。典見別錄。詳「豬卵」條。

【豬耳子】即蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【豬耳垢】主治 蛇傷。狗咬。塗之。

【豬肉】命名 豕爲豬類之總稱。字象毛足而後有尾形。故名。本品爲豬之肌肉。

古籍別名 豕肉。豚肉。(本經)豕肉。豚肉。豚肉。(綱目)剛鬣肉。(禮記)參軍肉。(雀豹古今注)形態 豬爲家畜類動物。乃野豬之變種。其體肥滿。鼻長尾短。全身黑色。毛粗且硬。性喜不潔。恒在穢泥水溼之地而臥。伏取冷。每年生產二次。每次可產十餘頭。故繁殖甚速。肉供吾人食用。常品。其臟腑骨髓皮毛等。又可供藥用。



豬

製法 凡使豬肉。煮取清汁。或煮成膏用。

性質 酸。冷。無毒。
效能 益腎陰。補虛羸。用作滋養強壯藥。

主治 瘵。狂病久不愈。
歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論豬肉曰。歷丹石。解熱毒。宜肥熱人食之。【唐】孫思邈千

金翼論豬肉曰。補腎氣虛竭。【宋】日華諸家本草論豬肉曰。療水銀風。井中土坑蒸氣。【清】黃宮繡本草求真論豬肉曰。豬肉味雖雋永。食之能潤腸胃。生津液。豐肌體。澤皮膚。為補肉補形之要味。然性屬陰物。凡人氣氣純陽。火盛水衰。服則以水濟火。血脈周流。自有豐盈澤膚之妙。若使臟體純陰。少食或動風作溼之虞耳。况風寒初感。血脈有礙。其於豬肉固不可食。久病初愈。血後。其於豬肉更不宜食。雖曰先王教民。畜彘為先。非是厲民。又胡不開大易之頭有云。宜節飲食乎。

近人學說 丁福保曰。豬肉為亞於牛肉之貴重肉類。歐洲諸國消殺之類。平均之。每日每人當於二十八錢餘。日本則有嫌忌之風。而需用甚稀。蓋豬肉常因一種之寄生蟲而生怪蟲。食之殊為危險。其原因多由飼法之不熟練。或不注意之所致也。然豬肉最富於脂肪。食用以外。得其利益者頗多。分析之則其成分為水分五五。蛋白

質一四。脂肪二八。鹽類二六。比之牛肉雖稍劣。而亦不至遠下。最適於貯藏。為食肉中之第一等。又適於臘乾或鹽漬。外人之貴重豬肉。良有以也。其效能不獨供於食用。且其脂肪於器械上亦大有效用。屠一頭之豚。可得多量之肉骨腸皮毛等。可為特效之肥料。其他用途甚多。無用而廢棄者殊少。其飼育法甚易。人人得而為之。除金石以外。無不可為其食料。又因其為動物。故以廢棄物為飼料。已可世俗常言無家畜者無肥料。蓋農家肥料第一之製造者。實家畜也。惟對於豚肉之調理不得相宜。則與不消化物相同。無益於營養。而反有害。故食豚肉者宜選精良之品。於高度之熱而煮熟。注意以調理為要。飼料雖用廢棄物而已足。然亦不可不加選擇。凡脂肪質最强者。必因飼料之惡劣。其肉食之有害。最良而最適當者。以小麥。玉蜀黍粉。甘藷。馬鈴薯等為第一。魚獸肉之腐敗者。使多量食之。則僅增其脂肪分。而不能得良肉。於製造臘乾最不適宜。故以甘藷馬鈴薯

之塞根。蘇香。南瓜。醬油。渣之類。滷和於水而與食為良。其他富於澱粉者為最良。但煎胡椒之類。決不可與食。

配合應用 治禁口痢疾。臘肉煎煨熟食之妙。【李樓奇方】

治小兒刮腸。痢疾禁口閉目。至重者。精豬肉一兩。薄切炙香。以膩粉末半錢。鋪上令食。或置鼻頭聞香。自然要食也。【活幼口疳方】

治上氣咳嗽煩滿。用豬肉切作錢子。豬脂煎熟食之。【食醫心鏡方】

治浮腫脹滿不食。用豬脊肉一雙。切生以蒜雜食之。【食醫心鏡方】

治身腫攻心。用生豬肉以漿水洗壓乾。切胎。蒜雜食之。一日三次。下氣去風。乃外國方也。【張文仲方】

治破傷風腫。新殺豬肉。乘熱切片。貼患處。連換三片。其腫立消。【簡便方】

治風狂獸笑。行走不休。用臘豬肉一斤。煮熟切胎。和醬食。或羹粥炒任服之。【食醫心鏡方】

解丹石毒。發熱困篤。用肥豬肉五斤。煮爛。牛斤。糞食。或作臘食。必腹鳴。毒下。以水淘之。沙石盡。則愈。【千金方】

解鐘乳毒。下利不止。食豬肉則愈。【千金方】

服石莖法。白石莖一斤。袋盛。水三斗。煎四升。以豬肉一斤。鹽煎。麥食。一日一作。【千金方】

治傷損不食。凡打撲傷損。三五日。水食不入口。用生豬肉二大錢。打爛。溫水洗去血水。再搗爛。以陰陽湯打和。以半錢用雞毛送入咽內。却以陰陽湯灌下之。其食盡。聞香。發開。瘀血而上。胸中自然開解。此乃損血凝聚。心間。蟲食血。解他物。不來探故也。謂之驅蟲之法。【邵氏方】

治打傷青腫。用炙豬肉搗之。【千金方】

治小兒重舌。取三家屠肉。切指大。擦舌上。兒立啼。【千金方】

治小兒痘瘡。豬肉煮汁洗之。【邵氏方】

小兒火丹。豬肉切片貼之。治漆瘡作癢。宜煨豬肉嚼碎

敷塗之(千金方)

①治男女陰蝕。肥豬肉煮汁洗。不過二十斤瘰。(千金方)

②治山行辟姪。山中草木枝上

有石蛭着人足。則穿肌入肉中害人。但以鹽醋齊和鹽塗足。屢趾。即不着人也。(千金方)

③治竹刺入肉。多年爛肉。切片包裹之。即出。(救急方)

用置 一匙至二匙。

施用宜忌 凡有風熱痰火者。禁用。反烏梅。桔槎。黃連。犯之則瀉痢。

參攷資料 ①按錢乙法。小兒

疳病。磨香丸。以豬膽和丸。研肝湯服。疳渴者。以豬肉湯或燂豬湯服。其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶。(李時珍) ②豬爲用最多。惟肉不宜多食。令人暴肥。蓋虛風所致也。(陶弘景) ③豬肉滯氣。世俗以爲補誤矣。惟補陽爾。今之虛損者。不在陽而在陰。以肉補陰。是以火濟水。蓋肉性入胃。便作溼熱。熱生痰。痰生則氣不降。而諸證作矣。錢云。豬不寢食之。發大風。中年氣血衰。面發黑。野也。(朱震亨) ④凡

十六齋 豬

內有補。惟豬肉無補。人習之說也。

(韓悉) ①假豬肉治疾。凡豬肉能閉血脈。對筋骨。虛人肌。不可久食。

病人金瘡者尤甚。(別錄) ②他豬肉久食。令人少子。精發宿病。豚肉久食。令人體重。作臍少有腥氣。江

豬多食。令人體重。作臍少有腥氣。(孫思邈) ③久食殺藥動風。發疾。

傷寒瘧疾。痰癩痔漏。諸疾食之。必再發。(孟詵) ④按揚雄方言。曰。燕

朝鮮之間。謂豬爲殿。關東謂之冥。或曰。豕。南楚曰豨。吳揚曰豬。其實

一種也。禮記謂之剛鬣。崔豹古今注謂之豨。軍。(蘇頌) ⑤凡豬骨細

筋多高大。有重百餘斤。食物至寡。甚易畜養。甚易生息。(蘇頌) ⑥豬

雖天下畜之。而各有不同。生青兗。徐淮者耳大。生燕冀者皮厚。生梁

雍者足短。生遼東者頭白。生豫州者味短。生江南者耳小。謂之江豬。

生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生。在畜屬水。在卦屬坎。在禽屬室。

星。(李時珍) ⑦溫疫症邪火已衰。津不能回者。宜用鮮豬肉數斤。切

大塊。急火煮清湯。吹淨浮油。恣意涼飲。乃急救津液之無上妙品也。

(溫熱經緯) ⑧汪亦厓治張姓。夏

月。遂行受暑。醫藥半月。水漿不入。大便不通。唇焦舌黑。骨立皮乾。目

合肢冷。診脈澀。此因邪熱熾灼。津血已枯。形肉已脫。亡可立待。若

僅以草木根皮。滋養氣血。何能速生。囑市豬肉。與梗米煮汁。一晝夜

啣盡。目微開。手足微動。喉間略有些吟。如是者三日。唇舌轉潤。退去

黑殼一層。始開目能言。是夜下燥屎。脈稍應指。再與養陰。匝月而愈。

(名醫類案)

【豬舌】 主治 健脾。補不足。令人能食。和五味。煮汁食。

性質 鹹。平。無毒。

【豬血】 主治 生血。療貧。豚暴氣。及海外瘴氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論豬血曰。中風絕傷。頭風

眩暈。及淋瀝。【唐】孫思邈千金翼論豬血曰。卒下血不止。清酒和炒

食之。【明】吳瑞日用本草論豬血曰。歷丹石。解諸毒。【明】李時珍本草綱目論豬血曰。清油炒食。治疔

雜有蟲。

參攷資料 ①服地黃。何首烏

諸補藥者。惡之。云能損陽也。同黃

夏食滯氣。(李時珍) ②按陳自明云。婦人嗜雜。皆血液溼汗。變而爲

痰。或育是血。嗜多以豬血炒食。而愈。蓋以血導血。歸原之意爾。此固

一說。然亦有蛇蟲作嗜雜者。過得血腥。則飽而伏也。(李時珍)

【豬血丹參】 卽丹參用豬血拌成者之。處方用名。詳【丹參】條。

【豬卵】 基本 本品卽壯豬之外腎。

古醫別名 豚頰。(本經) 豬石子。(別錄)

採取 以幼豬者良。

製法 採得陰乾。成之。勿令收壞用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 驚癇。癩疾。鬼疰。癰毒。除寒熱。貫脈。五癆。邪氣。瘰癧。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬卵曰。除陰室中。補

【明】李時珍本草綱目論豬卵曰。治陰陽易病。少腹急痛。用熱酒吞二枚。卽瘳。

【豬尾】 主治 臘月者。燒灰水服。治喉痺。和豬脂。塗赤

禿髮落。

【豬肚】 原名 豬胃。性質 甘。微溫。無毒。

主治 補中。益氣。止渴。斷癆。痢。虛弱。

歷代記述攷證 【魏】吳普本

草論豬肚曰。消積聚。療癥。治惡瘡。

【宋】日華諸家本草論豬肚曰。補

虛損。殺勞蟲。醃黃糯米蒸搗為丸。

治勞氣。并小兒疳。蛇黃瘦病。【宋】

蘇頌圖經本草論豬肚曰。主骨蒸

熱。勞血脈不行。補羸助氣。四季宜

食。

配合應用 ①治水瀉不止。用

豬肚一枚。煮爛。入平胃散。搗丸。服

效。【普濟方】

②豬肚黃連丸。治消渴。用雌豬

肚一枚。入黃連末五兩。栝樓根。白

朮。各四兩。知母三兩。麥門冬二

兩。縫定。蒸熟。搗丸。梧子大。每服三

十九丸。米飲下。【仲景方】

參攷資料 ①豬水畜而胃屬

土。故方藥用之。補虛。以胃治胃也。

【李時珍】②豬胃。乃豬一身無害

之物。為補脾胃之要品。脾胃得補。

則中氣益。利自止矣。日華子主補

虛損。蘇頌主骨蒸勞熱。血脈不行。皆取其補益脾胃。則精血自生。虛勞自愈。根本固而後五臟皆安也。【櫻希雅】

【豬肝】 性質 苦。溫。無毒。

主治 小兒驚癇。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論豬肝曰。作生胎。以置

醋食。主脚氣。當微洩。若先利。即勿

服。【宋】蘇頌圖經本草論豬肝曰。

治冷勞。厥虛。冷洩。久滑。赤白帶下。

以一葉薄批。搗着。訶子末。炙之。再

搗。再炙。盡。未半兩。空腹細嚼。陳米

飲送下。【明】李時珍本草綱目論

豬肝曰。補汗。明目。療肝虛。浮腫。

參攷資料 ①肝主藏血。故諸

血病。用為嚮導。入肝。千金翼治痢

疾。有豬肝丸。治脫肛。有豬肝散。諸

眼目方。多有豬肝散。皆此意也。【

李時珍】②餌藥人不可食之。合

魚鱠。食生癰疽。合鯉魚腸。子食傷

人神。合鷄鴨食生面野。延壽書云。

豬蹄殺驚氣入心。絕氣歸肝。俱不

可多食。必傷人。【李時珍】

【豬肝赤】即赤豆之別名。詳「赤

小豆」條。

【豬乳】 擷取 李時珍曰。取法

後脚。念以手捋而承之。非此法不

得也。

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 小兒驚癇。及鬼毒。去來

寒熱。五癆。兩鳩吮之。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論豬乳曰。小兒天疳。大人

豬雞癩病。

參攷資料 小兒體屬純陽。其

驚癇。亦生於風熱。豬乳氣寒。以寒

治熱。謂之正治。故錢乙云。初生小

兒。至滿月。以豬乳。傾滴之。最佳。張

煥云。小兒初生。無乳。以豬乳代之。

出月。可免驚癇。痘疹之患。楊士瀛

云。小兒口噤不開。豬乳飲之。甚良。

月內胎驚。同珠砂牛乳少許。抹口

中。甚妙。此法諸家方書。未知用乎。

傳之東宮。吳觀察子病。此用之。有

效。【李時珍】

【豬兒牙皂】即皂莢之處方用名。

詳「皂莢」條。

【豬油】即豬膏之古籍別名。典見

綱目。詳「豬脂」條。

【豬肪】即豬脂之古籍別名。典見

綱目。詳「豬脂」條。

【豬肺】 性質 甘。微寒。無毒。

主治 補肺。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論豬肺曰。療肺虛咳嗽。

以一具。竹刀切片。麻油炒熟。同粥

食。又治肺虛嗽血。煮鹼。羅以仁末

食之。

參攷資料 豬肺得大麻仁良。

若與白花菜合食。令人氣滯發霍

亂。八月和飴食。至冬發痘。【蘇頌】

【豬臥草】即七葉黃荊之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」

條。

【豬咽舌】即豬鬃之古籍別名。典

見玉璽。詳「豬鬃」條。

【豬屎】 原名 豬糞。

性質 寒。無毒。

主治 寒熱。黃疸。瀉痢。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論豬屎曰。主蠱毒。天行熱

病。並取一升。浸汁。頓服。【明】李時

珍本草綱目論豬屎曰。燒灰。發瘰

疔。治驚癇。除熱。解毒。治瘡。【明】吳

瑞。日。用。本草論豬屎曰。血。瀉。出。血

不止。取新屎。壓之。

參攷資料 御藥院方。治瘡瘡

黑陷無價散。錢仲陽治急驚風。獨
惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也。

(李時珍)

【豬屎草】即玉淨瓶之古籍別名。
與見綱目拾遺。詳「玉淨瓶」條。

【豬胃】即豬肚之原名。詳「豬肚」
條。

【豬胞】即豬脬之古籍別名。典見
綱目。詳「豬脬」條。

【豬苓】 命名 本品塊黑而零
落似豬屎。故名。

處方用名 粉豬苓。

古籍別名 段豬屎。(本經)豕
屎。(莊子)地烏桃。(爾雅)荈。茶。荈。
朱荈。豬豨。豬零。導河椽。(和漢藥
考)

外國名詞 Pig tuber. (英)

基本 係生於楓樹根部之一
種茸類。但他樹根部亦生之。

產地 陳仁山藥物生藥辨云。
豬苓產於陝西省與安縣。漢中府

等爲上。四川亦可。雲南次之一。產
河北齊堂地方。乃山下之朽木變

化而生。俗云樹根菌也。
形態 爲不正圓塊。狀類豬屎。

十六畫 豬

質輕。外皮黑色。或深褐色。內部白
色。

採取 二月八月採。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使豬苓。採得
用鋼刀刮去粗皮。薄切。以東流水

浸一夜。至明漉出。細切。以升麻葉
對蒸一日。去葉曬乾。用。李時珍曰。

豬苓取其行溼。生用更佳。

性質 甘平無毒。

效能 行水。利溼。消腫。止瀉。專
作利尿藥。

主治 痰瀉。解毒。蠱毒不祥。利
水道。久服輕身耐老。

張仲景之發明 豬苓一味。經
張仲景之實驗。認爲「主治渴而

小便不利」。茲考徵如下。豬苓湯
證曰。渴欲飲水。小便不利。豬苓散

證曰。思水者。(以上二方。豬苓諸
藥等分。)五苓散證曰。小便不利。

微熱消渴。(以上一方。豬苓十八
銖。)歷觀此三方。豬苓所主治。渴

而小便不利也明矣。
歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論豬苓曰。解傷寒溫疫大
熱發汗。主腫脹滿。腹急痛。【金】張
元素珍珠囊論豬苓曰。治渴除溼。

去心中懊惱。【元】王好古湯液本
草論豬苓曰。瀉膀胱。【明】李時珍

本草綱目論豬苓曰。開腠理。治淋
腫脚氣。白濁帶下。妊娠子淋胎腫。

小便不利。【明】經希雍本草經疏
論豬苓曰。豬苓本經謂其味甘。應

苦。兼淡。其氣平而無毒。氣味俱薄。

其主痰瀉者。應必由壅。勢必兼溼。

淡以利竅。引壅溼之氣。從小便出。

所以分消之也。淡溼之性。故利水
道。溼勝則身重。溼去則身輕。利竅

之藥。必能走泄精氣。其日久服耐
老。必無是理矣。解毒蠱毒不祥。義

將安出。亦未可盡信也。【清】黃宮
繡本草求真論豬苓曰。豬苓甘淡

微苦。性平無毒。得楓根之餘氣。以
成形。如豬屎。故以豬名。凡四苓五

苓等方。並皆用此。性雖有類澤瀉。
同入膀胱腎經。解熱除溼。行竅利

水。然水消則脾必燥。水盡則氣必
走。澤瀉雖同利水。性亦類燥。然鹹

性居多。尚有潤存。澤雖治火。性亦
損氣。然潤能滋陰。尚有補在。故豬
苓必合澤瀉同用。則潤燥適均。而
無偏敗之患矣。至於茯苓雖屬溼
劑。有溼自可以去。然茯苓則入氣而

上行。此則入血而下降。且與澤瀉
利水消腫。治癰止痢等藥。皆屬暑

邪溼熱內閉。無不藉此以爲宣導
之需。古人已云。清利小便。無若此

藥。以故滋陰藥中。止有澤瀉。而不
用及豬苓。正謂此耳。但此專司引

水。津液易耗。久服多致損目。白而
實者良。去皮用。【清】鄒樹本經疏

證論豬苓曰。茯苓豬苓。得木氣而
生於地下。既不高挺。莖又不潰

腐消敗。是其卻溼可知。乃復久而
不變。則非特能卻溼。且能化溼氣

爲生氣矣。雖然。茯苓可利水道。豬
苓亦利水道。則凡木之苓。皆能利

水道。是豬苓不必定以生楓下者。
且茯苓豬苓。儘可混用。乃仲景書

中茯苓豬苓。各自爲功。又每相連
爲用。似若斷難相混者。何哉。蓋亦

可察物理而知之矣。夫松之槪。挺
拔勁正。楓之槪。柔弱易搖。松之理

應疎。楓之理。堅細。松之葉。至冬益
蒼翠而不凋。楓之葉。至冬遂鮮赤

而卽落。是其一柔一剛。顯然殊致。
茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陽化

者。豬苓屬陰。治鼓盪之水。不從陰
化者。是故仲景以豬苓名方者。其

所治之證曰陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之曰少陰病下利咳而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之曰諸病在臍欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與豬苓湯曰嘔吐而病在臍上後思水者豬苓散主之統而觀之莫不有渴者五苓散則其治有渴者有不渴者至茯苓入他方所治之病則不渴者居多蓋渴者水氣被陽逼迫欲得陰和而不能也與之豬苓使起陰氣以和陽化水譬之楓葉已丹遂能即落也

近人學說 賈九如曰豬苓味淡淡主於滲入脾以利水道用治水瀉瀉瀉通淋除溼消水腫療黃疸獨此為最捷故云與琥珀同功但不能為主劑助補藥以實脾領滲藥以理脾佐溫藥以燉脾同涼藥以清脾凡脾虛甚者恐泄元氣慎之

配合應用 ①入五苓散為除溼之要藥 ②佐白芍藥白茯苓人參橘皮朮澤瀉治水腫之屬陽分者 ③佐白芍藥生地黃桑寄生桑

根白皮茯苓澤瀉琥珀石斛慈苳仁肉桂治水腫之屬陰分者均為要藥其功長於利水故善除溼

①治傷寒口渴邪在臍也豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石附膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之 (張仲景方)

②治小兒祕結用豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立通 (外臺祕要方)

③治通身腫滿小便不利豬苓五兩為末熟水服方寸匕日三服 (楊氏產乳方)

④治妊娠腫滿從腳至腹小便不通微渴引飲方同上法 (子母祕錄方)

⑤治妊娠子淋方同上法日三夜二以通為度 (小品方)

用灶 二錢至四錢 施用宜忌 凡脾胃虛而無濕熱者禁用忌火及鐵氣

參攷資料 ①豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也 (李時珍) ②豬苓生衡山山谷及

濟陰宛旬二月八月採陰乾 (別錄) ③是楓樹苔其皮黑色內白而質者佳削去皮用 (陶弘景) ④今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也 (蘇頌) ⑤豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木為多耳 (李時珍)

【豬桃】即山梔子之古籍別名與見和漢藥考詳「山梔子」條

【豬氣子】即豬脬之古籍別名與見綱目詳「豬脬」條

【豬臍】即豬臍之古籍別名與見綱目詳「豬臍」條

【豬脂】命名 凡凝者為肪為脂釋者為膏為油木品乃豬腹中凝聚之脂肪故名

處方用名 煉豬油板油豬膏古籍別名 豬肪 (綱目) 豚脂家豬脂陰龍膏萬貞鹿 (和漢藥考) 熟豬油熟火油 (俗名) 豬臍項下膏名真革肪 (本草集註)

外國名詞 Adops Proopa. Zaus. (拉丁) Prepared Lard (英) 基本 屬偶蹄類為家腹網膜

及腎臟周圍之脂肪

形體 豬脂色純白有緩和之甘味比重約0.9三八熱至三十五至四十度即融解而為無色透明之油遇無水酒精伊打硫化炭素鹼蘇雷等俱溶解 採取 每年臘月煉淨收用者佳

製法 蘇恭曰十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名臘脂每升入雞子白十四枚更良陶弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之真革肪入道家煉五金用 性質 甘微寒無毒

成分 豚脂為三種成分構造而成一為沃來因 Olein C₅₇H₁₁₁(OC₁₇H₃₅O₂) 占百分之六十二二為瑪爾加林 Margarine C₅₇H₁₁₁(OC₁₇H₃₅O₂) 三為斯推阿林 Stearine C₅₇H₁₁₁(OC₁₇H₃₅O₂) 均

百分之三十八然因熔解點有高低各成分迥有多少故亦不定也 效能 殺蟲殺菌解毒益血脈用作製造膏藥之原料又為緩和滋養藥

空治 煎膏藥。解斑蝥、芫青毒。發背生髮悅面。

歷代紀述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論豬脂曰。胎產衣不下。以酒多服佳。【南北朝】陶弘景本草集註論豬脂曰。悅皮膚。作手膏。不皸裂。【唐】蘇恭新修本草論豬脂曰。治癰疽。【唐】孫思邈千金翼論豬脂曰。破冷結。散宿血。【宋】日華諸家本草論豬脂曰。殺蟲治皮膚風。塗惡瘡。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論豬脂曰。利血脈。散風熱。潤肺。入膏藥。主諸瘡。【明】李時珍本草綱目論豬脂曰。解地膽。亭長。野葛。硫黃毒。諸肝毒。利腸胃。通小便。除五疽水腫。生毛髮。【明】魏希雅本草經疏論豬脂曰。肪膏。即脂油也。味甘寒。性滑澤。能涼血。解毒潤燥。故主煎諸膏藥。及解斑蝥。芫青毒也。又能利腸胃。通大小便。能散風熱。療惡瘡。【清】王士雄隨息居飲食譜論豬脂曰。豬脂甘涼。潤肺。澤槁。活枯。滋液生津。息風化毒。殺蟲清熱。消腫散癰。通腑除黃。滑胎長髮。以白厚而不腥躁者良。

十六畫 豬

國外學說 英美學說謂煉豬

油係提淨之豬油。有醫士喜用近於腰子之油。因較他處之油堅固。至於板油與胰子油。亦有人用之。又有不用豬身之外層油者。尋常出售之豬油。大率含鹽。故不合於作藥品。必在沸水內化之。去其鹽方為合用。藥品內準用之豬油。為腹內之油。去其各膜質。融化而濾之。必加熱至一百二十度。持續多時。調之不停。方其融化時。能助蠟與松香之融化。又合於燻類。能變為肥皂。遇空氣則能變酸。味雜而臭。近時出售之豬油。謀利者常以異質加入。曾有人將數種出售之豬油。化分之二。每百分中計得小粉與麵等二十分。又有稱為美國豬油。其實則係英國之所作者。故凡用豬油作藥料。必先試其含異質與否。更不可含有鹽類。製法用鮮豬脂十四斤。將其胞膜除去。懸掛而風乾之。切成碎塊。入石臼搗勻。再入燙鍋（加熱不過一百三十度。或用磁盆浮開水鍋內亦可。）化透。過細呢子布為度。（照此製成以配藥最合宜。如加大熱則變

形。）其作用為潤外皮藥。與他種油類同。能為數種蠟質與油膏之本質。又有時用為外導瀉藥之配料。用數藥類。將此油攪上。易於取去。若擦髮際。其功用能藥虱。又和漢藥考曰。取豚體中脂肪最多之組織。細割。洗淨血液及黏液質等。入鍋中。與水同熱。熔之。脂肪即浮其上。因取而精製之。又日本藥局方云。豚脂得自壯健之豕。其大網膜及腎臟周圍之脂肪組織。可製出脂肪油。但須擇新鮮者。並宜洗淨。方可製之。製成之後。為色白柔軟。通體均勻之凝塊。臭氣微弱。毫無腐敗性。熱至四十三至五十一度。即熔融。變澄清之液。在厚一仙米以下之層。液即無色。其沃度數四十六至八十。酸度二以下。

- 配合應用 治傷寒時氣。發背如彈丸。溫水化服。日三次。（肘後方）
- 治五種瘧疾。黃疸。殺疽。酒疽。黑疽。女勞疽。黃汗如黃漿汁。用豬脂一斤。溫熱服。日三。當利乃愈也。（肘後方）
- 治赤白帶下。煉豬脂三合。酒五合。煎沸頓服。（千金方）
- 治小便不週。豬脂一斤。水二升。煎三沸。飲之立通。（千金方）
- 治腸格閉塞。豬脂。薑汁各二升。微火煎至二升。下酒五合。和服。（千金方）
- 治痘瘡便秘。四五日。用肥豬脂一塊。水煮熟。切如豆大。與食。自然腹脹滋潤。痲疔易落。無損於兒。（陳文中方）
- 治卒中五尸。仲景用豬脂一雞子。苦酒一升。煮沸澆之。（肘後方）
- 治中諸肝毒。豬膏頓服一升。（千金方）
- 治食髮成癪。心腹作痛。胸間如有蟲上下。嗜食與油者。是也。用豬脂二升。酒三升。煮三沸。服。日三次。
- 治上氣咳嗽。豬肪四兩。黃白湯以來。切和齏醋食之。（食醫心鏡方）
- 治肺熱暴疔。豬脂油一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉少頃。濾淨。冷定。不時挑服一匙。即愈。無疾常服。亦潤肺。（萬氏方）

①治小兒瘰癧。小兒百日內風。口中有物如蝸牛。或如黃頭白。蟲者。薄豬肪擦之即消。(聖惠方)

②治小兒疔疔。瘰癧。豬脊服之。(千金方)

③治產後虛汗。豬脊、姜汁、白蜜各一升。酒五合。煎五上五下。每服方寸匕。(千金方)

④治胞衣不下。豬脂一兩。水一盞。煎五七沸。服之。當下。(聖惠方)

⑤治吹奶寒熱。用豬肪冷水浸。搗熱即易之。立效。(子母秘錄方)

⑥治髮落不生。以酢泔洗淨。布搽令熱。以臘豬脂入生鐵。煮三沸。塗之。通生。(千金方)

⑦治冬月唇裂。煉過豬脂。日日塗之。(十便良方)

⑧治熱毒攻手。腫痛欲脫。豬脊和羊屎塗之。(外臺秘要方)

⑨治手足皴破。豬脂着熱酒中洗之。(千金方)

⑩治代指疼痛。豬脊和白墁土傳之。(小品方)

⑪治口瘡塞咽。用豬脊、白蜜一斤。黃連末一兩。合煎。取汁熬稠。每服半許。日五服。(千金方)

⑫治疥瘡有蟲。豬脊煎芫花塗之。(肘後方)

⑬治鼠瘻瘰癧。用豬脊淹生地黃。煮六七沸塗之。

⑭治漏瘡不合。以紙黏臘豬脂。納瘡中。日五夜三。(千金方)

⑮治漆瘡作痒。用豬脊類塗之。(千金方)

⑯治咽喉骨哽。吞脂脊一團。不瘥更吞之。(千金方)

⑰治身面疣目。以豬脂搽之。令血出少許。神驗。不可加。(千金方)

⑱治誤吞鐵釘。豬脂多食令飽。自然裹出。(普濟方)

⑲治雜物入目。豬脂煮取水。面如油者。仰臥。去枕。點目中。不過數度。與物俱出。(聖惠方)

⑳治蜈蚣入耳。炙豬肪掩耳。自出。亦治蟲蟻入耳。(梅師方)

㉑治發背發乳。豬脂切片。冷水浸。日易四五片。甚妙。(急救方)

用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡脾虛溼滯腹滿。便滑者禁用。反烏梅、梅子。

參攷資料 臘月煉之。設器收

藏。每油一斤。入豬脂一錢於內。經久不壞。暑月生豬脂。以精霜醃之。亦可久藏。此物性之相制也。外感諸病。大便滑瀉者均忌。(王士雄)

【豬退】即豬懸蹄甲之原名。詳「豬懸蹄甲」條。

【豬骨】 主治 中馬肝漏脯藥。菜諸毒。燒灰。水服。方寸七。日三服。頰骨燒灰。治痘陷。煎汁服。解丹藥毒。

【豬婆蛇】即石龍子之古籍別名。典見綱目。詳「石龍子」條。

【豬婆龍】即鼈之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「鼈」條。

【豬栳榔】即大腹皮之古籍別名。典見綱目。詳「大腹皮」條。

【豬脬】 古籍別名 豬胞。(綱目)

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 夢中遺溺。疝氣墜痛。陰囊溼痒。玉莖生瘡。

參攷資料 豬胞所主皆下焦病。亦以類從爾。蕪有一妓。病轉脬。小便不通。腹脹如鼓。數月垂死。一醫用豬脬吹脹。以翎管安上。插入陰孔。捻脬氣吹入。即大尿而愈。此

法載在羅天益衛生寶鑑中。知者頗少。亦機巧妙術也。(李時珍)

【豬莧】即野莧之古籍別名。典見嘉祐圖經。本草。見「莧」條。

【豬廩】即益母草之古籍別名。典見綱目。詳「益母草」條。

【豬椒】即荑椒之古籍別名。典見別錄。詳「荑椒」條。

【豬脰】 原名 豬膈。命名 本品生兩腎中間。似脂非脂。似肉非肉。乃人物之命門三焦發原處也。肥則多。瘦則少。蓋頤養賴之。故謂之頤。

古籍別名 豬腎脂。豬頤。

性質 甘。平。無毒。

主治 通乳汁。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論豬脰曰。肺痿。咳嗽。和棗肉浸酒服。亦治痲痺。鼠瘦。【宋】蘇頌圖經本草論豬脰曰。療肺氣乾脹。喘急。酒五服。去痰。飽。斷。殺。斑。蝥。地。膽。毒。治冷痢成瘧。【明】常效先食。醫心鏡論豬脰曰。一切肺病。咳嗽。膿血不止。以薄竹筒盛於

塘火中煨熟。食上。咳之良。

參攷資料 ①豬脰。男子多食

參攷資料 ②豬脰。男子多食

損陽。(蘇頌) ①豬豕爲甘寒滑澤之物。甘寒則津液生。滑澤則垢膩去。故主如上諸證也。男子多食損陽。薄大腸。其能專在去垢膩。可用以浣垢衣。(經希雍) ②豬爲食味中常用之物。臟腑腸胃。咸無藥焉。然其一身除肚背外。餘皆有毒。發病人習之而不察也。壯實者。或暫食無害。有疾者。不可不知其忌。故利其害於後。肉多食。令人虛肥。生痰熱。熱病後食之復發。不宜與蠶同食。食則發大風病。頭內有病者。食之生風發疾。驢食之損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。血能敗血損陽。服地黃。何首烏諸補藥者。尤忌之。多食耗心氣。不可合吳茱萸食。肝何藥人不可食。合魚鱸食。生癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神。廷壽書云。豬臨宰。驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人脾。孫思邈云。凡六畜脾。人一生莫食之。脾不可與白花菜合食。令人氣滯發瘋。八月和飴食。至冬發疽。腎久食。令人傷腎。少子。冬月不可食。損人真氣。兼發虛癰。腸多食。動冷氣。鼻鼻多食。動風。舌多食。損心。

十六盡 豬

(經希雍)

【豬脾】 原名 聯貼。 主治 脾胃虛熱。同陳橘紅。人參。生薑。葱白。陳米。煮羹食之。

參攷資料 凡六畜之脾。人宜一生莫食之。(孫思邈)

【豬腎】 原名 豬腰子。 性質 鹹冷無毒。

主治 理腎氣。通膀胱。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬腎曰。除冷氣。【宋】大明日華諸家本草論豬腎曰。補膀胱水臟。暖腰膝。治耳聾。【宋】蘇頌圖經本草論豬腎曰。補虛壯氣。消積滯。【明】李時珍本草綱目論豬腎曰。止消渴。治產勞虛汗。下痢崩中。

參攷資料 ①豬腎別錄謂其理腎氣。通膀胱。日華亦曰。補水臟。膀胱。暖腰膝。而又曰。雖補腎。久食令人少子。孟詵亦曰。久食令人腎虛。兩相矛盾。如此何哉。蓋豬腎性寒。不能補命門精氣。方藥所用。借其引導而已。別錄理字通字。最爲有理。日華暖腰膝。補膀胱水臟之

說爲非矣。腎有虛熱者宜食之。若腎氣虛寒者。非所宜矣。今人不達此意。往往食豬腎爲補。不可不審。又千金治消渴。有豬腎薤蕒湯。補腎虛勞損諸病。有腎瀝湯。方甚多。皆用豬羊腎。煮湯煎藥。俱是引導之意。(李時珍) ②豬腎味鹹氣冷。能滋腎氣。腎虛寒者不宜食。本經主理腎氣。乃借其同氣以引導之。耳。不言補而言理。其意有在矣。腎與膀胱爲表裏。故復能利膀胱也。今人誤認以爲補腎。恣意食之。大爲差謬。不親日華子云。久食令人無子。孟詵云。久食令人傷腎。其非補腎之物。明矣。(本草經疏)

【豬腎脂】 卽豬腎之原名。詳『豬脂』條。

【豬腎粥】 基本 本品係用豬腎和米煮成之粥。

主治 補腎虛諸疾。

【豬耳草】 卽耳草之別名。詳『耳草』條。

【豬苓】 卽豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。

【豬項肉】 原名 槽頭肉。 主治 酒積。面黃。腹

脹。以一兩切如泥。合甘遂末一錢。作丸。紙裹煨香食之。酒下。當利出酒布袋也。

參攷資料 豬項肉肥脆。能動風。(綱目)

【豬腦】 性質 甘寒。有毒。

主治 風眩。腦鳴。凍瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豬腦曰。主癰腫。塗紙上貼之。乾則易。治手足皸裂出血。以酒化洗併塗之。

參攷資料 ①禮記云。食豚去腦。孫真人食忌云。豬腦損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。廷壽書云。今人以鹽酒食豬腦。是自引賊也。(李時珍) ②喉痺已破。瘡口痛者。豬腦燻熱。入豆醋食之。卽愈。(普濟方)

【豬腰子】 命名 本品莖生。其子大。狀若豬之內腎。故名。

產地 出廣西諸地。

形態 豬腰爲灌木類之一種。其莖莖生。實爲莢。果中有子。長三四寸。色紫。肉堅白。可供食與藥用。

性質 甘。微辛。無毒。

十六畫 豬

主治 一切瘡毒。箭傷。研細酒服。并塗之。

【豬腰子】 卽豬腎之原名。詳『豬腎』條。

【豬腸】 性質 甘。微寒。無毒。主治 虛渴。小便數。補下焦虛竭。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬腸曰。潤腸。治潤腸挺出下血。【宋】日華諸家本草論豬腸曰。止小便。【宋】蘇頌圖經本草論豬腸曰。去大小腸風熱。宜食之。

【明】李時珍本草綱目論豬腸曰。潤腸治燥。調血痢。蠱毒。

【豬芩】 卽豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。卽豬尿之原名。詳『豬尿』條。

【豬膏】 卽豬脂之處方用名。詳『豬脂』條。

【豬膏母】 卽豬莖草之古籍別名。典見唐本草。詳『豬莖草』條。

【豬膏母草】 性質 辛。苦。平。有小毒。

主治 金瘡。止痛。斷血。生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬。散傳並良。

【豬鼻唇】 性質 甘。鹹。微寒。無毒。主治 上唇。治凍瘡。痛痒。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論豬鼻唇曰。煎湯。調封椒目末半錢。夜服。治盜汗。【明】李時珍本草綱目論豬鼻唇曰。鼻治目中風翳。燒灰水服。

參攷資料 豬鼻唇。多食動氣。【綱目】

【豬槽頭肉】 卽豬項肉之別名。詳『豬項肉』條。

【豬脬】 基本 本品卽豬膈草外之薄皮淺府。

性質 甘寒。無毒。主治 少陰下痢。咽痛。參攷資料 少陰下痢。咽痛。胸滿心煩者。豬脬湯主之。用豬脬一斤。水一斗。煮五升。取汁入白蜜一升。白粉五合。熬香。分六服。【張仲景】

【豬水畜】 其氣先入腎。解少陰客熱。加白蜜以潤燥除煩。白粉以益氣斷利也。【成無己】

【豬蔥】 卽蔥之古籍別名。典見綱目。詳『蔥』條。

【豬頭】 卽豬頭之別名。詳『豬頭』條。

【豬齒】 性質 甘。平。主治 小兒疳癩。五月五日。取燒灰服。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論豬齒曰。治蛇咬。【明】李時珍本草綱目論豬齒曰。中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治痘瘡倒陷。

【豬蹄】 性質 甘。鹹。小寒。無毒。主治 煮汁服。下乳汁。解百藥毒。洗傷。諸敗瘡。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論豬蹄曰。滑肌膚。去寒熱。【明】李時珍本草綱目論豬蹄曰。煮羹。通乳脈。托癰疽。壓丹石。煮清汁。洗癰疽。潰熱毒。消毒氣。去惡肉有效。

參攷資料 外科精要。洗癰疽。有豬蹄湯數方。用豬蹄煮汁。去油煎藥。藥洗也。【李時珍】

【豬頭肉】 採取 以假豬者良。積豬者亦可用。

性質 有毒。主治 寒熱。五癘鬼毒。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論豬頭肉曰。同五味子。煮食。補虛。足氣力。去癘癩。五疔。下丹石。亦發風氣。

參攷資料 豬肉毒惟在首。故有病者食之。生風發疾。【李時珍】

【豬膽】 性質 苦寒。無毒。主治 傷寒。熱渴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論豬膽曰。骨熱。勞極。消渴。小兒五疳。殺蟲。【宋】蘇頌圖經本草論豬膽曰。數小兒頭疳。治大便不通。以荜荷納入下部三寸。灌之。立下。【明】李時珍本草綱目論豬膽曰。通小便。敷惡瘡。殺疳。治目赤。目翳。明目。清心。厥。涼肝。脾。入湯沐。髮。去膩。光澤。

參攷資料 仲景以豬膽汁和醋。少許。灌穀道中。通大便神效。蓋酸苦益陰。潤燥而瀉便也。又治少陰下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。以白通湯加豬膽汁主之。若調寒熱之逆者。令熱必行。則熱物冷服。下噎之後。冷體既消。熱性便發。故病氣自愈。此所以和入尿。豬膽鹹苦之物。於白通熱劑之中。使其氣相從。而無拒格之患也。又云。霍

一七四〇

亂病吐下已斷。汗出而厥。四肢厥
急。脈微欲絕者。通脈四逆湯加豬
膽汁主之。蓋陽氣太虛。陰氣獨勝。
純與陽藥。恐陰氣格拒不得入。故
加豬膽汁。苦入心而通脈。寒補肝
而和陰。不致格拒也。(成無己) ⑤

朱奉議治傷寒五六日。燒出有豬
膽雞子湯。(汪機) ⑥方家用豬膽
取其寒能勝熱。滑能潤燥。苦能入
心。又能去肝膽之火也。(李時珍)

【豬膽皮】 主治 目翳如重者。
取皮曝乾。作兩股細
如筋大。燒灰出火毒點之。不過三
五度瘥。

【豬板榔】 卽大腹子之古籍別名。
與見新修本草圖經詳「大腹子」
條。

【豬藍子】 基本 豬藍子。爲雜
草類之一種。可供藥
用。

【豬懸蹄甲】 原名 豬退。
製法 孫思邈
曰。酒浸半日。炙魚用。

十六齋 豬

性質 鹹。平。無毒。
主治 五痔。伏熱在腹中。腸癰
內蝕。

參攷資料 豬懸蹄同赤木燒
烟。蒸辟一切惡瘡。(張仲景)

【豬鬃】 古籍別名 豬鬃子。
綱目 豬鬃舌(王璽)

形態 豬鬃在豬喉系下。肉團
一枚。大如棗。微扁。色紅者是。可供
藥用。

主治 項下瘰癧。瓦焙研末。每
夜酒服一錢。

【豬髓】 性質 甘。寒。無毒。
主治 撲損惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論豬髓曰。塗小兒解額
頭瘡及疥腫。眉疔癩疥。服之補骨
髓益虛勞。

參攷資料 按丹溪治虛損補
陰。凡多用豬脊髓和丸。取其通腎
命。以骨入骨。以髓補髓也。(李時
珍)

【豬糞】 原名 糞。
命名 糞圈也。其狀圓
肥。故名。

古籍別名 糞。 (本草拾遺)
基本 係脊椎動物哺乳類有
胎盤類有蹄類野豬科之糞。

產地 山野間處處有之。
形態 豬糞爲獸類之一種。其
形似蒜而味尖。足尾皆短。前肢有
銳爪。便以掘地。毛黃褐色。脊上有
黑毛一道。體肥行鈍。性甚敏捷。穴
土而居。夜出覓食小動物及瓜果
其肉可供食與藥用。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 水腫久不瘥。垂死者。作
羹食之。下水大效。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食
療本草論豬糞肉曰。服丹石動熱。
下痢赤白。久不瘥。煮肉露一宿。空
腹和醬食。一頓卽瘥。瘦人煮和五
味食。長肌肉。【明】吳瑞日用本草
論豬糞肉曰。治上氣虛乏。咳逆勞
熱。和五味羹食。

【豬糞胞】 主治 蟲毒。以臘月
乾者。湯摩如雞子許。
空腹服之。

【豬糞脂】 原名 豬油。
基本 本品卽豬糞
之脂肪油。

主治 塗一切內外痔瘡。和酒
服。止咳血。胸中硬。瘰癧。如蟲行。
及以火烤。擦頭上白禿。並煎服。拘
杷子湯。能生髮。入膏中用。能拔濕。
又解蟻蠅毒。

參攷資料 豬糞脂油。舊時煤
廠作地燈。非此不可。他油輒爲地
風吹滅。惟豬油作燈。能禦地風也。
(植學教)

【豬糞脂膏】 主治 蟻蠅
毒。胸中硬。瘰癧。
瘰如蟲行。咳血。以酒和服。或下或
吐。或自消也。

【豬糞骨】 主治 上氣咳嗽。多
痰。

【限肉】 卽豬肉之古籍別名。與見
綱目。詳「豬肉」條。

【限貝矢】 卽貝糞之地方用名。詳
「貝糞」條。

【限豬肉】 卽豬肉之地方用名。詳
「豬肉」條。

【限豬屎】 卽豬屎之古籍別名。與
見本經。詳「豬屎」條。
【糞】 卽豬糞之原名。詳「豬糞」條。
【糞油】 卽豬糞油之原名。詳「豬
糞油」條。

十六畫 貓

【貓】條。

命名 鼠害苗而貓捕之。故字從苗。而貓乃苗茅二音。其各自呼。故名。

古籍別名 家貓(綱目)

外國名詞 Felis domestica

Basic (拉丁)(Cat)(英)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂脚類貓科。

形態 貓為家畜類之一種。面略圓。軀幹長。四肢短。尾有長短之別。耳殼短小。末端尖。常向前。能自由轉動。以兜聲。故善聽。眼大。瞳孔能感光之強弱而收放。午則收縮如線。夜則放大而圓。鼻有鬚。舌面粗糙。密生逆鈎。適於舐食。鼻善嗅。前肢五趾。後肢四趾。皆有伸縮之銳爪。掌部有肉塊如墊。行走無聲。舉動輕捷。毛軟。色有白。黑。灰。褐。等。齒凡三十。犬齒及白齒均發達。善捕鼠。人多畜之。其肉可供藥用。

性質 甘酸。溫。無毒。

主治 勞瘵。鼠瘻。蠱毒。

參攷資料 本草以貓狸為一類。註解。然狸肉入食。貓肉不佳。亦不入食品。故用之者稀。胡淡易簡

方云。凡預防蠱毒。自少食豬肉。則蠱不能害。此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎。肘後治瘰鼠核腫。或已潰出膿血者。取貓肉如常作羹。空心食之。云不傳之法也。昔人皆以瘰子。為鼠涎毒所致。此乃淮南子所謂狸頭治瘰。及鼠腦人瘡。又云。狐目。狸腦。鼠去其穴。皆取其相制之義耳。(李時珍)

【貓牙】 主治 小兒痘瘡。倒靨。欲死。同人牙。豬牙。犬牙。燒灰。等分研末。蜜水服一匙。即便發起。

參攷資料 痘瘡歸腎。則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。(李時珍)

【貓牛】 即犛牛之古籍別名。與見漢書。詳「犛牛」條。

【貓古都】 即白頭翁之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「白頭翁」條。

【貓皮毛】 主治 瘰癧。諸瘻。癰疽。潰爛。

【貓舌】 主治 瘰癧。鼠瘻。生瘰。研敷。

【貓舌仙橋】 應地 多生水。深旁。

形態 貓舌仙橋為雜草類之一種。葉面生刺。塌地而生。花色青紫。可供藥用。

主治 疔瘡。理黃痘。及一切溼火。

【貓尾血】 主治 急驚風。崩破。貓尾。滴血。滾水沖下。

【貓尿】 採取 以薑或蒜擦牙。鼻。或生葱。紅鼻中。即遺出。

主治 蟻蝨諸蟲入耳。滴入。即出。煎塗。蚊毒。螫傷。及療偷窠。老鼠。和井底泥。圍之。立愈。

【貓肝】 主治 勞瘵。殺蟲。取黑貓肝一具。生曬。研末。每朔望五更。酒調服之。

【貓兒卵】 即白欬之古籍別名。典見綱目。詳「白欬」條。

【貓兒刺】 即枸骨之古籍別名。典見綱目。詳「枸骨」條。

【貓兒眼】 即貓睛石之別名。詳「貓睛石」條。

【貓兒眼睛草】 即澤漆之古籍別名。典見綱目。詳「澤漆」條。

【貓兒頭】 即毛笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「毛笋」條。

【貓屎】 採取 臘月收乾之。製法 凡使以泥固封。燒存性。研用。

主治 燒灰水服。治寒熱。鬼瀆。發無期度者極驗。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論貓屎曰。治痘瘡。倒靨。凍瘰。潰爛。惡瘡。蠱毒。蚊螫。鼠咬。

【貓胎】 主治 瘰癧。瘰癧。泥裏煨。研菜油調搽。

【貓胞衣】 採取 貓將產時。以為所食。取得焙乾。

主治 反胃吐食。燒灰。入硃砂末少許。壓舌下。甚效。

配合應用 治腸噎。用貓初生胞衣。以新瓦焙乾。研細末。每服一二分。好酒送下。口含竹箴管睡。恐咬牙及咳嗽。米不下者。五六服即愈。(同壽錄方)

治翻胃。貓胞衣三個。好酒洗。用豬肉四兩。淡煮熟。服之數年。立效。(鳳麟堂方)

施用宜忌 忌燒酒。

參攷資料 莫際華云。胃脘痛。非服貓胞不能除根。金御乘云。貓胞衣。凡患小產婦於產後。或為羹。或為末服。即不產。(綱目拾遺)

【貓涎】

主治 瘰癧。刺破塗之。

【貓眼睛】

主治 瘰癧。鼠瘻。燒灰。井華水服方寸匕。

日三。

【貓睛石】

產地 雲南。緬甸。寶井中多有之。

古籍別名 貓兒眼。

主治 解蟲毒。

參攷資料 宜和問外夷貢方物。有石圓如龍眼。實色若綠葡萄。號貓眼睛。能息火。燃炭方燬。投之即滅。按此即寶石中又一種。貓兒眼也。(墨莊漫錄)

【貓腦】

製法 於紙上陰乾。用。主治 瘰癧。鼠瘻。潰爛。

同養草等分。為末。納孔中。

【貓狸】

命名 本品形似貓。而穴居。狸伏之獸。故名。

古籍別名 野貓(綱目)其子名狸(爾雅)海狸(廣雅)虎狸(正字通)

十六畫 貓

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂腳類。貓科。為貓狸之肉。其骨。脂。肝。尿。陰莖。詳各條。

產地 生山林及原野。岡之土窟中。

形態 貓狸為獸類之二種。種類亦多。其體比狐稍小。頭圓。四肢皆短。口吻尖耳短而廣。尾長大。為總狀。達於足踵。毛褐帶淡黑色。有斑紋。目邊白色。性殘暴。晝伏夜出。捕食魚鼠。尤善竊食雞鶩。其肉可供藥用。

種類 大小如狐。毛雜黃黑。有斑如貓。而頭大。尾者為貓狸。善竊雞鶩。其氣臭。肉不可食。有斑如狸。而尖頭方口者。為虎狸。善食蟲鼠果實。其肉不臭。可食。似虎狸。而尾有黑白錢文相間者。為九節狸。皮可供裘。有文如豹。而作麝香氣者。為香狸。即靈貓。有白面而尾似牛者。為牛尾狸。亦曰玉面狸。專上樹木。食百果。冬月極肥。人多擄為珍品。大能醒酒。捕畜之鼠。皆帖伏不敢出。似貓狸而絕小。黃斑色。居澤中。食蟲鼠及草根者。名汎。海島上有狸頭而

魚尾者為海狸。

採取 以文如連錢及虎文者。入藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 諸症。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金要論。貓狸肉。曰。補中益氣。去遊風。【宋】蘇頌。圖經。本草論。貓狸肉。曰。作羹。屢治痔。及鼠瘻。不過三頓。甚妙。【明】李時珍。本草綱目論。貓狸肉。曰。治溫鬼毒氣。皮中如針刺。

施用宜忌 反麩蘆。

參攷資料 貓狸肉。正月勿食。食之傷神。(孟詵) 貓狸肉。宜留正。存食。去之不利人。(李時珍)

【貓狸肝】

主治 鬼瘡。

【貓狸尿】

採取 五月間。收乾。用。

主治 燒灰水服。主鬼瘡寒熱。歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金要論。貓狸尿。曰。燒灰和臘豬脂。傅小兒鬼紙頭瘡。

【貓狸脂】

主治 鼠咬人成瘡。用此摩之。并食狸

肉。

【貓狸骨】

採取 頭骨尤良。性質 甘。溫。無毒。

主治 風疰。尸疰。鬼疰。毒氣在皮中。淫瀝如針刺者。心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。貓狸骨。曰。炒末。治噎病。不通飲食。【唐】孟詵。食療本草論。貓狸骨。曰。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服。二錢。治尸疰。邪氣腹痛。及痔瘡。十服後見驗。【宋】寇宗奭。本草衍義論。貓狸骨。曰。炙骨和雄黃。辟香為丸。服治痔瘻。【明】李時珍。本草綱目論。貓狸骨。曰。殺蟲。治疥。瘰癧。及燒灰酒服。治一切遊風。

參攷資料 華陀治尸疰。有狸骨散。用其頭。(孫頌) 狸骨。性質相近。可通用之。衛生寶鑑。治諸風心癩。神應丹。用狸全身。燒過入藥。(李時珍)

【貓狸陰莖】

主治 女人月水不通。男子陰

癩。燒灰。東流水服。【貓頭花】即白頭翁之古籍別名。

與見植物名實圖考。詳「白頭翁」條。

【貓頭骨】 性質 甘。溫。無毒。主治 鬼疰。蟲毒。心腹痛。殺蟲。治疳。及痘毒變黑。癩瘰。鼠瘻惡瘡。

參攷資料 古方多用。程今人多用。貓雖是二種。性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡倒靨。用人貓頭骨。大四頭骨。方見人類(李時珍)。

【鷓鴣鷹】 即鷓鴣之俗名。詳「鷓鴣」條。

【葛藟】 即大藟之古籍別名。與見本草集註。詳「大藟」條。

【蜈蚣】 即蜈蚣之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蜈蚣」條。

【賴師草】 即荔枝草之古籍別名。與見草藥方。詳「荔枝草」條。

【蓮枝】 即藤脂之古籍別名。與見綱目。詳「藤脂」條。

【諸丹】 即鮮苔之古籍別名。與見和漢藥考。詳「鮮苔」條。

【藜魁】 命名 本品其根如魁。魁乃酒器。有汁如藜。故名。

產地 生山野間。

形態 赭魁為莖草類之一種。葉似蘿藦。根如魁。皮紫黑。肉黃赤。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。主治 心腹積聚。除三蟲。

【輭石膏】 即石膏之鬆柔易碎者。詳「石膏」條。

【辦佐匪酸】 即安息香之西名。詳「安息香」條。

【辨慶草】 即景天之古籍別名。與見和漢藥考。詳「景天」條。

【遺尿窩】 即桑螺蛤之古籍別名。與見和漢藥考。詳「桑螺蛤」條。

【遼參】 原名 遼東參。基本 本品即人參產於遼東各地者。

古籍別名 紅旗參。產地 出奉天。吉林等處。

形態 遼參形似人參。其根黃潤。纖長。子粒大如黃豆。根可供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。主治 補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服輕身延年。

近人學說 張山雷曰。遼參產

於遼瀋。即奉天。吉林等處。地屬北方陰寒之域。且其秉性背陽而向陰。氣味皆清。色淡黃或白。故稟陰凝之氣而微寒。功能養陰。而清虛火。今用之於陰虛有火。及吐衄失血後之宜於清養。或汗家。失精家。陰液耗損。虛陽偏熾者。甚有經驗。以遼參稟性向陰。味甘而微苦。確含有清淨性質。多見風日則易蛙。喜陰惡陽。尤其明證。故富有養液。而為補陰之最。脫血脫汗失精家。宜之固也。而肺燥乾咳。胃枯燥渴。或乾嘔呃逆者。皆賴以滋液生津。而無寒降戕伐。黏膩滯滯之弊。功在沙參。玉竹。二冬。二母之上。奚啻倍蓰。此其稟中和之氣。不升不降。不倚不偏。所以可貴。或以有為陽藥而補陽者。固非。即以爲補氣而能挽回元氣者。亦妄也。

【遼參類】 基本 本品即生遼參。參蘆上較其橫條而更細如鬚者。

性質 苦。無毒。主治 胃虛嘔逆。咳嗽。失血。

配合應用 治脚瘡溼爛。同芽茶等分。研末搽之。

◎同牙補腎。用生熟石膏各五錢。甘松。山柰。各三錢。細辛。三錢。寒水石。二錢。升麻。一錢五分。青鹽。參鬚。各三錢。北五味子。五十粒。單澄茄。四十五粒。共研末。每晨擦牙。漱口。甚效。(祝氏方)

參攷資料 遼參鬚性與參條相同。而力尤薄。(本草從新) 遼參鬚性喜下行。若久痢滑精。崩中下血。每至增劇。以其味苦降洩也。(逢原)

【遼葉】 即箭葉之古籍別名。與見綱目。詳「箭葉」條。

【遼蕪】 即蕪參之古籍別名。與見蕪參新研究。詳「蕪參」條。

【醒潮】 基本 本品出蘇中。乃蘇之精液。

製法 以好酥一石。熬之。可得醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

其性滑利。能透盛器。惟以鷄子殼及渣蕪盛之。乃不滲漏。凡使人藥。以重綿濾過。銅器煎兩三沸用。

性實 甘冷利無毒。

主治 風邪痺氣。通潤骨髓。可爲摩藥。功優於酥。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論醍醐曰。添精補髓。益中填骨。久服延年。百煉彌佳。【宋】日

華諸家本草論醍醐曰。主驚悸心熱。頭疼。明目。傅願頂心。【宋】寇宗

爽本草衍義論醍醐曰。治月蝕。瘡瀉。養瘡。最宜。

應用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 酥酪醍醐。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。【汪機】

【醍醐菜】

形態 醍醐菜爲菜類之一種。其莖搗之

有乳汁。氣香味甜。葉似蒼耳。根本如水芹。可供藥用。

製法 採得。以苦竹刀細切。入砂盆中。研如存用。或生絹接汁用。

性質 甘溫無毒。
主治 月水不利。搗汁。酒服之。

十六畫 醒

【昏醕】即杏仁膏之古籍別名。典見綱目。詳「杏仁膏」條。

【醒心杖】即遠志之古籍別名。典見記事珠。詳「遠志」條。

【醒酒花】即金盞草之古籍別名。典見救荒本草。詳「金盞草」條。

【醒頭草】即草蘭之處方用名。詳「草蘭」條。

【錫草】即著之日本名。詳「著」條。

【鋼鐵】原名 跳鐵。再經鍛鍊而成堅剛之鐵。故名。

形態 鋼鐵有黃褐鮮紫暗綠諸色。出火而急冷之者則堅脆。若緩冷之者則韌而有彈性。以供製造器械。亦入藥用。

性質 甘平無毒。

主治 金瘡。煩滿。熱中。胸膈氣塞。食不化。

參攷資料 鋼鐵有三種。有生鐵。夾熱鐵。鍊成者。有精鐵。百鍊成鋼者。有西南海山中生成狀如紫石英者。凡刀劍斧鑿諸刃。皆是鋼鐵。其鐵砂。鐵粉。鐵精。亦皆用鋼鐵者。按沈括筆談云。世用鋼鐵。以柔鐵包生鐵。泥封鍊。令相入。謂之團

醒 鋸 鋼 錄 錐 錢 錦 錫

鋼。亦曰灌鋼。此乃偽鋼也。眞鋼是鐵精百鍊至斤兩不耗者。純鋼也。此乃鐵之精純。共色明瑩。磨之黯然。青且黑。與常鐵異。亦有鍊盡無鋼者。地產不同也。又有地漫。萍柔鐵。二三次即成鋼。可切玉者。【李時珍】

【錄子】即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠李子」條。

【錐栗】即栗之古籍別名。典見綱目。詳「栗」條。

【錢箔箭】即馬鞭草之別名。詳「馬鞭草」條。

【錢葛】即連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連錢草」條。

【錢蒲】即首蒲之根葉俱短者。詳「首蒲」條。

【錦木】即衛矛之日本名。詳「衛矛」條。

【錦地羅】基本 係山草類。爲錦地羅之根。

性質 微苦平無毒。

主治 山嵐瘴毒。疥癬。并中諸毒。以根研生酒服一錢七卽解。

參攷資料 錦地羅出廣西度遠山巖間。鎮安。歸順。柳州皆有之。

錫

根似革。莖及行樓根狀。彼人頗重之。以充方物。【李時珍】

【錦江瑤瑤】即瑤瑤之色如錦者。性質功效。詳「瑤瑤」條。

【錦紋】即大黃之處方用名。詳「大黃」條。

【錦紋大黃】即大黃之處方用名。詳「大黃」條。

【錦荔枝】即苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳「苦瓜」條。

【錦帶】即尊之古籍別名。典見綱目。詳「尊」條。

【錦莊黃】即大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大黃」條。

【錦被花】即驅春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「驅春花」條。

【錦被堆】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【錦鳩】即斑鳩之古籍別名。典見范汪方。詳「斑鳩」條。

【錦雞】即鷩雉之古籍別名。典見禽經。詳「鷩雉」條。

【錦橘根】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【錫】古籍別名 白鑛。銅。錫。【綱目】

十六畫 錫

形體 錫為金類金屬原質之一種由天產之錫石內提取之白色。光如銀質。硬於鉛。但黏韌而易融解。置空氣中及水中皆不蝕。可供工業中之需用。以製器具。亦可供藥用。

性質 甘寒。微毒。
主治 惡毒。風瘡。

參攷資料 錫遇羚羊角。五靈脂則伏。遇伏龍肝。馬鞭草則稍。遇磁砂則硬。遇巴豆。蓖麻。薑汁。地黃則伏。(獨孤酒) 洪邁夷堅志云。汝人多病。地饑風沙。沙入井中。飲其水則生瘰。故金房間人家。以錫為井閘。皆夾錫錢填之。或沈錫井中。乃免此患。(李時珍)

【錫慘脂】 基本 本品乃波斯國之銀鍍也。

古籍別名 悉蘭脂(綱目)
主治 目生翳膜。用火燒銅針。輕點。乃傳之。不痛。又主一切風氣。及三焦消渴。飲水煎入丸藥用。
【錫蛇】 卽金蛇之古籍別名。典見綱目。詳「金蛇」條。
【錫銅鏡鼻】 卽古錢鼻之原名。詳「古錢鼻」條。

隨 霍 錠 頭 頰 類 餓 舖 餘 駱

【錫蘭椰子】 卽椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「椰子」條。
【隨肢伯】 卽白石脂之古籍別名。典見吳普本草。詳「白石脂」條。
【隨風子】 卽詞子。熱後隨風。隨者。典見嘉祐圖經本草。詳「詞子」條。

【隨脂】 卽麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳「麥門冬」條。

【隨湯給事中】 卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「甘遂」條。

【霍山石斛】 卽石斛之處方用名。詳「石斛」條。卽霍石斛之處方用名。詳「霍石斛」條。

【霍石斛】 處方用名 霍山石斛。風石斛。

產地 出江南霍山。
形體 較斛斛細小。色黃。而形曲不直。有成穗者。

性質 甘平。味鹹。無毒。

主治 清胃。除虛熱。生津。已勞損。疔瘡。瘰癧。能鎮涎痰。解暑。甘芳降氣。

辨偽 風斛真者甚少。市買每以風蘭根偽充。但風蘭形直不縮。色青黝。嚼之不黏齒。味微辛。石斛

則嚼之。微有漿黏齒。味甘微鹹。形縮者真。

參攷資料 石斛近時有一種形短。祇寸許。細如燈心。色青黃。咀之味甘。微有滑涎。係出六安州及穎州府霍山縣。名霍山石斛。最佳。咀之無涎者。係生木上。不可用。其功長於清胃熱。惟胃腎有虛熱者。宜之。虛而無火者。忌用。(百草鏡) 集驗良方。長生丹。用甜石斛。卽霍石斛也。范瑋初云。霍山屬六安州。其地所產石斛。名米心石斛。以其形如累米。多節。類竹。根乾之成團。他產者。不能米心。亦不成團也。(年希憲) 本草多言石斛。甘淡入脾。鹹平入胃。今市中金銀及諸斛。俱苦而不甘。性亦寒。且形不似金銀。當以霍斛為真。金銀斛(陳廷慶)

【霍石斛】 卽石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【霍花】 卽青黛之古籍別名。典見綱目。詳「青黛」條。

【頭痛花】 卽堯花之古籍別名。典見綱目。詳「堯花」條。

【頭黃】 卽煙草葉之次於蓋露者。

一七四六

性質功效與煙草葉同。詳「煙草葉」條。

【頭蘭甘】 卽天羅蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天羅蓋」條。

【頰蛇珠】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【類麥】 卽蘋果之古籍別名。典見綱目。詳「蘋果」條。

【餓馬黃】 卽鹿麋之俗名。詳「鹿麋」條。

【餓】 卽餓餅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「餓餅」條。

【餘子】 卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山藥」條。

【餘甘子】 卽菴摩勒之古籍別名。典見唐本草。詳「菴摩勒」條。

【餘泉】 卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【餘容】 卽白芍之古籍別名。典見別錄。詳「白芍」條。

【餘糧】 卽遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳「遠志」條。

【餘糧石】 卽馮餘糧之處方用名。詳「馮餘糧」條。

【駱駝】 原名 駝。 古籍別名 馱駝。(漢


音)

外國名詞 Camelus (拉丁)

Camel (英) ラクダ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類駱駝科。

產地 出亞洲中部之沙漠諸地。



駱駝

形態 駱駝為家畜類之一種。其體大頭較小耳亦小眼有重瞼鼻能閉閉開為大孔閉為裂。上唇中尖分裂下唇較長頸長上方彎形軀幹膨大胸肩膝有厚皮背有一或二之內峯四肢細長每肢具二蹄蹄不包趾趾有厚皮如墊趾相連便於履沙尾細長裸出端有叢毛毛色赤褐不長胃中有小囊果累可貯水以解渴故能數日

十六畫 駱

可不飲水。性剛力強能重負遠涉沙漠諸地人多養其肉可供藥用。

採取 入藥以野駝者良。

性質 甘溫無毒。

主治 諸風下氣壯筋骨潤肌膚。主惡瘡。

【駱駝毛】

主治 婦人赤白帶下最良。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論駱駝毛曰領毛療痔。

燒灰酒服方寸匕。

【駱駝乳】 性質 甘冷無毒。主治 補中益氣壯筋骨令人不餓。

【駱駝屎】 主治 乾研。嗜鼻止。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論駱駝屎曰燒煙殺蚊虱。

【駱駝脂】 原名 駝脂。主治 脂油也。此乃駝峯中之脂。

古醫別名 峯子油。【綱目】採取 入藥以野駝者良。

性質 甘溫無毒。

主治 頭暈風瘙癢疥癬。死肌筋皮癢。胸損筋骨。火炙摩之。取熱氣透內。亦和米粉作煎餅食之。療痔。

蛇 鯊 鮎 鮎 鮎

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論駝脂曰治一切風疾。皮膚痒急及惡瘡腫爛。並和藥傅之。【明】李時珍本草綱目論駝脂曰主虛勞風有冷積者以燒酒調服之。

參攷資料 家駝。舉蹄最精。

人多炙熱糟食。【冠宗爽】駱駝脂能柔五金。【經源】

【駱駝黃】 性質 苦平。微毒。主治 風熱驚疾。

參攷資料 駱駝黃似牛黃而不香。我人以亂牛黃而功不及也。【李時珍】

【鮎魚】 即鯪魚之古籍別名。與見爾雅。詳鯪魚條。

【鯪魚】 即鱒魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱒魚條。

【鮎魚】 即白魚之古籍別名。與見爾雅。詳白魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

【鮎魚】 即鱖魚之古籍別名。與見爾雅。詳鱖魚條。

形態 鮎魚類為莖色面起直紋。沿藤如豆葉。二丫。內生二葉。其根如竹鞭形狀。色白而粗。可供藥用。



鮎魚

主治 一切疔腫諸瘡。醫之立消。

命名 鮎即古之乾魚也。乃魚之可包者。故字從包。送名之曰鮎。

古醫別名 鮎魚。【禮記】鱸折魚。乾魚。漢隱為鮎者。名淡魚。鱸魚。以物穿風乾者。名法魚。鮎魚。以鹽漬成者。名醃魚。鹹魚。鱸魚。鱸魚。【綱目】

形態 鮎魚為無鱗魚類之一種。腹無鱗。有壳一面。附石。細孔。鱗。其數多至十二。其肉可供食與藥用。

性質 辛。臭。溫。無毒。

主治 疥癬。瘰癧。乾疥。脫折。瘰。

一七四七

血。直穿。在四肢不散者。女子崩中血不止。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鮑魚肉曰。煮汁治女子血枯。病傷肝。利腸。同蔞仁。葱豉。煮。通乳汁。

參攷資料 古言傳鮑魚爲人體重要之健康要素。日人白根敏郎氏。發見鮑魚對於不治之肺病。有非常之效果。此可怕之亡國肺病。謂有全愈之可能。是否鑿實可信。則未敢必。茲將其事實約略介紹於下。白根氏在廿年前。慨國產鮑魚有多量之營養素。而其極優劣之肉質。輸出甚少。憤發奮研究之決心。遂想單身視察中國及美國之沿岸。後因在大磯創立鮑魚研究所而作罷論。但其時偶然發見鮑魚中有名福鮑之一種。中含福壽。該物在人體中。助白血球之活動。有極大撲滅結核菌之作用。其結果。重態之肺病。可治愈於一個月左右。可怕之肺病。在此情形之下。可謂不足懼矣。未略血及下痢氣味之肺結核。極易治愈。此種症狀。即至二三期亦無妨礙。但血

腺血炎之程度至嗜血。及喉頭結核。腸結核。腎臟結核。膀胱結核。尿丸結核等。雖在初期。難在一月中治愈之。雖然。因體質之不同。自服用始。經四五日後。即現效果者。再越二十日。其效能始能顯著。此爲患者表面的簡單之作用。在殺菌程度。無甚變化。但因病症之驟然輕重。在全身有衰弱程度之差異者。全賴上當然有多少之差異。

【鮑魚頭】 主治 煮汁。治眼目。燒灰。療疔腫。瘋氣。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 古籍別名 石蕪。馬蕪。石結丹。(和漢藥考)

【鮑魚】 係牛馬腸內之結石。由生病或食物等關係而生者。

【鮑魚】 鮑魚不僅生於牛馬腸中。凡諸獸腸內亦往往生之。例如有鐵片等入腸內。則漸次重疊。生成一石質塊。和漢藥考曰。在習慣上則概稱爲馬蕪石者。即鮑魚也。形體 鮑魚形狀大小不一。小者如豆。大者如雞卵。更有大如西瓜者。其實質或重或輕。未有一定。

外觀作灰色。油色。褐色。黑色等。剖之。原有過文。輕虛者。中有褐色或黃色毛。謂之毛毳。

性質 甘。平。無毒。

成分 其無機質爲磷酸鎂。碳酸鈣。炭酸鈣。炭酸鎂等。

效能 用治疔癰。瘰癧。

主治 驚癇。瘰癧。

國外學說 增補手板發蒙曰。鮑魚來自淤泥。巴爾齊亞。亞帝亞等國者。謂之「柏賈亞魯斯典」。俗謂之「歌依沙拉末沙拉」。即植達石也。作黃褐色。而有光。刮而燒之。有香氣。乃駝羊腹中鮑魚。非出自牛馬腹中。原名「末沙魯」。誤呼「末沙拉」。又和漢三才圖會曰。自阿蘭陀來。其形如鳥卵。長寸許。淺褐色。潤澤。似石非石。重可五六錢。研磨之。有層層理。如卷成者。主治瘰癧。危症。解諸毒。俗傳云。溪爲獵人所傷。其疵痕成贅肉塊。實則此亦鮑魚也。俗說不可信。

參攷資料 鮑魚生走獸及牛馬諸畜肝膽之間。有肉蕪蕪之。多至升許。大者如鷄子。小者如栗。如樣。其狀白色。似石非石。似骨非骨。打破層層。嘉靖庚子年。嶺州侯屠殺一黃牛。得此物。人無識者。有番僧云。此至寶也。牛馬諸畜皆有之。可以祈雨。西域有密呪。則兼雨立至。不知呪者。但以水浸。擲弄亦能致雨。後考陶九成輟耕錄所載鮑魚。即此物也。其言曰。蒙古人。兩惟以淨水一盆。浸石子數枚。淘濾玩弄。密持呪語。良久。輒雨。石子名鮑魚。大者如雞卵。小者不等。乃走獸腹中所產。獨牛馬者最良。蓋牛黃狗寶之類也。又按京房易占曰。兵強主武。則牛腹生石。據此則鮑魚狗寶同一類也。但生於狗腹者。爲狗寶耳。(李時珍) 鮑魚即馬寶。真者難得。主治癰癧。(李士材)

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鮑魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮑魚】條。

【鰩】即瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳「瓦楞子」條。

【鮓】即比目魚之古籍別名。典見上林賦。詳「比目魚」條。

【鮮】即比目魚之別名。典見動物學大辭典。詳「比目魚」條。

【鮓魚】即鮓魚之古籍別名。典見類目。詳「鮓魚」條。


【鴛鴦】 命名 本品雄曰鴛。雌曰鴦。終日並游。有宛在水中央之意。故名。

古籍別名 黃鸞。匹鳥。(綱目)

外國名詞 Aix galericulata L. (拉丁) Mancaria duck (英) Brantsees (德) オシドリ或ラシドリ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨亞科。為鴛鴦之內。

形態 鴛鴦為水禽類之一種。形似鴨而小。嘴扁頸長。翼長能飛。趾有蹼。雄者羽毛美麗。頭有紫黑色毛冠。翼之上部有黃褐色飾羽。一對。形如銀杏葉。嘴紅。足黃。其雌者之羽毛不及雄者鮮美。全體蒼褐。腹胸間有白斑。常偶居池沼。其肉可供食與藥用。



鴛鴦

性質 鹹。平。有小毒。

主治 諸瘡。疥癬。以酒浸。炙令熱。傅貼瘡上。冷即易。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴛鴦肉曰。清酒炙食。治瘰癧。作羹。噉食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。即相愛。【唐】孫思邈千金翼論論鴛鴦肉曰。炙食。治夢寐思慕者。

參攷資料 鴛鴦肉多食。令人患大風。(孟詵)

【鴛鴦木菴】即天慈草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天慈草」條。

【鴛鴦梅】即梅花之一帶雙實者。功用詳「梅實」條。

【鴛鴦菊】即草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳「草烏頭」條。

【鴛鴦藤】即忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳「忍冬藤」條。

十六畫 鮓

鮓 鮓 鮓 鴛 鴛 鴛 鴛

典見綱目。詳「忍冬藤」條。【鴛鴦】即鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳「鴛鴦」條。

【鴛】 古籍別名 鳥鴞。土鳥。(爾雅) 山鴞。鴞鴞。(國史)

【鴞】 (漢書) 鴞鴞 (拾遺) 流離。(詩經) 鴞魂。幸胡。鳥。(綱目)

外國名詞 Strix uralensis PALL (拉丁) Owl or Ural owl (英) H. E. (德) フクロノ或フクロ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類猛禽類鴞科。

產地 山野及森林間多有之。

形態 鴞為山禽類之一種。形如鸞短。上嘴鈎曲。覆被下嘴。眼大。緣邊環生硬羽。鼻孔隱於粗毛間。頭頂濃褐。顏面灰色。體之上面。色灰而有褐色條斑。肩部各羽。亦有褐色細條紋。而外瓣白色。翼褐色。尖白。又有淡褐色條紋。尾羽淡褐色。不規則之斑點。其羽輕軟。飛時無聲。晝伏夜出。覓食昆蟲。小鳥。桑椹等物。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 鼠瘻。突食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鴞肉曰。風癩。噉食。取初生無毛者一對。黃泥固濟。燻存。作為末。酒服。

【鴞目】 主治 吞之。令人夜視。見物。

【鴞頭】 主治 瘰癧。黑陷。用臘月者一二枚。煨。灰。酒服之。當起。

【鴞】 命名 鴞字篆文形象。故名。

古籍別名 雀鷹。(詩疏) 鴞。(詩經) 鴞鴞。(爾雅) 擊正。雀。鴞。(綱目)

形態 鴞為山禽類之一種。其體巨嘴短而大。上嘴鈎曲。翼長大。頭至四尺許。飛時若靜懸空中。喜迴旋作大環。尾常開展。或不。傾側。以調節其勢。尖端頗廣。顏色稍白。有暗褐色條紋。背部赤褐色。部呈褐色。棲人家近處。常食蛇。鼠。雞。等。及腐敗之肉。其頭可供藥用。內詳見各條。

採取 入藥以雄者良。

製法 凡使須微炙用。

性質 鹹。平。無毒。

十六畫 鴉 鴉 鴉

主治 頭風。目眩。顛倒。癩疾。

【鴉肉】 主治 癩瘡。食之即愈。

李時珍本草綱目論鴉肉曰。食之消雞肉。鴉鷄成積。

【鴉尾草】 卽鴉尾之日本名。詳『鴉尾』條。

【鴉骨】 主治 鼻衄不止。取老鴉翅。大骨。微炙。研末吹之。

【鴉脚莎】 卽葦草之古籍別名。典見綱目。詳『葦草』條。

【鴉鴉】 命名 本品狀似鴉而有毛角。故名。

古籍別名 角鴉(說文)怪鴉。鴉老兔(爾雅)鈞鴉。鴉鷄。鴉鷄。鴉呼。鴉鷄。夜食。鴉。快扛鳥。車載板(綱目)鴉木。兔(動物學大辭典)鴉頭鴉(俗名)

外國名 鴉 Scops semitorques T. & S. (拉丁) Feathered food (英) ミミツク 或 オホユノハツク (日本) 基本 係脊椎動物鳥類猛禽類鴉科之鴉鴉。產地 出山野森林間。

形態 鴉鴉爲山禽類之一種。其頭圓。上嘴鈎曲。尖端銳。以覆下嘴。眼大。周圍有毛圈。頭之兩旁有角。羽突出如耳。頭形似貓。體色概淡褐。多黑斑。後頸有蒼色圓紋。足趾亦被羽毛。爪銳利。與嘴俱黑色。晝伏夜出。能於暗中視物。捕小鳥。兔。鼠。爲食。其肝法術家用之。肉可供藥用。

性質 酸。微鹹。有小毒。主治 瘧疾。去毛腸。油。燒食。風虛。眩暈。養食。以骨燒存性。酒服。參攷資料 鴉鴉肉。酒。煮。焙。乾。同大鐵鑊。攤。薄。荷。上。蒸。爛。和。翠。瀝。搗。碎。爲。細。末。空。腹。酒。下。能。治。傳。屍。勞。瘵。者。蓋。取。陰。毒。毒。味。以。殺。陰。毒。之。蟲。其。功。與。鴉。肝。仿。佛。古。方。罕。用。(醫學大辭典)

【鴉】 命名 本品鳴聲啾啾。故名曰鴉。古籍別名 鴉(別錄)舒鳥(爾雅)家鳥。鴉(廣雅)基本 係水禽類鴨屬之內。

形態 鴨爲禽類之一。有家野之分。家畜者其頸長。嘴扁平。尾脚皆短。兩翼皆小。拙於飛翔。趾有蹼。善游泳。恒棲於海川池沼。雄者頭綠。文翅。雌者黃斑。色。亦有純黑。純白者。性木鈍。產卵不擇地。其肉既可供食。亦可供藥用。採取 秋冬兩季採用之良。製法 凡藥用以老而白者。及白而烏骨者更佳。用法 煮取汁。或焙乾。研。剉。和藥。性質 甘。大寒。無毒。效能 滋陰。補虛。用作滋補強壯藥。主治 補虛。除客熱。和臟腑。及水道。療小兒驚癇。歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨肉曰。頭生瘡腫。和葱豉。煮汁飲之。去卒然煩熱。【宋】日華諸家本草論鴨肉曰。解丹毒。止熱痢。【明】李士材本草圖解論鴨肉曰。鴨味甘性平。主虛勞。骨蒸。惟白毛黑嘴者。方有其功。取金剛水寒之。象也。嫩者毒。老者良。【清】黃宮繡本草求真論鴨肉曰。鴨肉氣

味甘。溫。逼火而生。後水而長。未出卵時。先得火氣。故不懼冰雪。偏喜淫雨。而尾。臍。腹。最。甚。故。羣。雌。一。被。其。氣。皆。得。化。生。之。機。不。待。鳩。尾。之。逼。也。溫。中。補。虛。扶。陽。利。水。是。其。本。性。此。主。性。溫。而。言。者。也。有。言。其。性。微。冷。能。入。肺。腎。血。分。滋。陰。補。虛。除。痰。止。嗽。化。痰。利。水。消。腫。爲。要。服。之。陰。虛。亦。不。見。燥。陽。虛。亦。不。見。冷。非。其。性。平。烏。能。若。是。乎。但。雌。則。較。溫。而。雄。則。較。冷。不。可。不。辨。若。黑。骨。白。毛。者。爲。虛。勞。聖。藥。亦。金。水。相。生。之。義。耳。老。者。良。鴨。血。解。金。銀。丹。石。砒。霜。百。毒。及。中。惡。溺。死。者。【清】王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘。滋。滋。五。臟。之。陰。清。虛。勞。之。熱。補。血。行。水。養。胃。生。津。止。嗽。息。驚。消。痰。解。積。雄。而。肥。大。極。老。者。良。同。火。腿。海。參。煨。食。補。力。尤。勝。多。食。滯。氣。滑。腸。凡。陽。虛。脾。弱。外。感。未。清。痞。脹。脚。氣。便。溼。腸。風。皆。忌。之。

配合應用 ①白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐痰。咳血。火乘金位者。用黑嘴白鴨一隻。取血入溫酒。量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾。搗去毛。腸。下。開。竅。去。腸。

拭淨。入大瓊肉二升。參苓平骨散末一升。縛定。用沙囊一箇。置鴨在內。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次入之。酒乾爲度。取起食鴨及粥。類作取愈。(十藥神書方)

②治大腹水病。小便短少。百一方。用青頭雄鴨煮汁飲。厚蓋取汗。又治十種水病。垂死。用青頭鴨一隻。如常治切。和米。并五味煮作粥食。又方。用白鴨一隻。治淨。以鼓半升。同薑椒入鴨腹中。縫定。蒸熟食之。(食醫心鏡方)

參攷資料 鴨。水禽也。治水利小便。宜用青頭雄鴨。取水木生發之象。治虛勞熱毒。宜用烏骨白鴨。取金水寒肅之象也。(李時珍) 鴨通作木。性實木而無他心。故庶人以爲贊。曲禮云。庶人執匹。匹。雙也。匹夫。畢末。故廣雅謂鴨爲鴨。禽經云。鴨。鴨。其各自呼。鳥能高飛。而鴨舒緩不能飛。故曰舒鳥。(李時珍) 按格物論云。鴨雄者綠頭。文翅。雌者黃斑。色。但有純黑純白者。又有白而烏骨者。藥食更佳。鴨皆雄。雌鴨。重陽後乃肥。膾味美。清明後生卵。則內陷

十六畫 鴨

不滿。伏卵。則磨之。聲則響。而不成。無雌抱伏。則以牛屎。而使之。此皆物理之不可曉者也。(李時珍) ③黃雌鴨爲補最勝。(陶弘景) ④白鴨肉最良。黑鴨肉有毒。滑中發冷。利脚氣。不可食。目白者殺人。(孟詵) ⑤腸風下血。人不可食。(吳瑞) ⑥嫩者毒。老者良。尾膠不可食。見禮記。昔有人食鴨肉成瘕。用稭米治之而愈。(李時珍)

【鴨子】即鴨卵之古籍別名。典綱目。詳「鴨卵」條。
【鴨爪稗】即稭子之古籍別名。典見綱目。詳「稗」條。
【鴨汁粥】基本 本品係以鴨肉汁和米煮成之粥。
主治 消水腫。
【鴨舌】 主治 痔瘡。殺蟲。

【鴨舌草】即地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳「地膚子」條。
【鴨血】 性質 鹹冷。無毒。
主治 解諸毒。
歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨血曰。熱飲。解野葛毒。已死者。入咽即活。【明】李時珍本

草綱目論鴨血曰。熱血。解中生金。生銀丹。石砒霜。諸毒。射工毒。又治中惡及溺水死者。灌之。即活。蚯蚓咬瘡。塗之。即愈。
【鴨卵】 古醫別名 鴨子。(綱目) 鴨蛋。(俗名)
性質 甘。鹹。微寒。無毒。
主治 心腹。胸。膈熱。
參攷資料 鴨卵多食發冷氣。令人氣短。背悶。小兒多食脚軟。鹽藏食之。即宜人。(孟詵) ①生瘡毒者食之。令惡肉突出。(陳士良) ②鴨卵不可合蟹肉。李子食。害人合構食。令人生子不順。(陶弘景) ③今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒泄痢。夾鹹卵食之。亦間有愈者。蓋鴨肉能治痢。而炒鹽亦治血痢。故耳。(李時珍)

【鴨尿草】即常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「常山」條。
【鴨兒芹】即三葉之原名。詳「三葉」條。
【鴨肪】 原名 鴨肪。
命名 本品即鴨之脂肪。故名。
製法 凡使鍊過入藥用。

【鴨肺衣】 命名 本品即鴨肺內之皮。故名。
主治 諸骨哽。炙研。水服一錢。即愈。取其消導也。
【鴨背】即野鹼背之俗名。詳「野鹼背」條。
【鴨屎】 原名 白鴨通。
性質 冷。無毒。
主治 殺石藥毒。解結痔。散毒熱。
歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨屎曰。主熱毒。毒痢。又和雞子白塗熱瘡。腫毒。即消。塗蚯蚓咬。亦效。【明】李時珍本草綱目論鴨屎曰。絞汁服。解金銀銅鐵毒。

【鴨屎草】即常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「常山」條。
【鴨尿鱗】即明礬之有雜色如鴨屎者。性質功用。詳「明礬」條。
【鴨涎】 主治 小兒風。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蝎蛇吹小兒陰腫。取雄鴨抹之。即消。
【鴨蛋】即鴨卵之俗名。詳「鴨卵」

一七五一

條。

【鴨跖草】

古籍別名 茅雞舌草。碧竹子(拾遺)竹雞草。竹葉菜。淡竹葉。耳環草。碧輝花。藍姑草(綱目) 藍草。帽子花(日本)

外國名詞

Commelina co. minus, L. (拉丁) ッユクサ

バウシバナ(日本)

基本 係鴨跖草科。藥用其苗

莖。

產地 山野原澤及路旁水田間恒有出。



草 跖 鴨

形態 鴨跖草爲溼草類之多年生草本。莖高尺餘。質柔常傾臥於地面。葉廣披針形。與竹相似。較厚而柔闊。有平行脈。葉柄如鞘狀。圍於莖上。互生。夏日莖梢着花。花冠藍色。花瓣二片。不整齊。外部有大苞。呈佛焰狀。自晨開放。至午後即萎縮。此花所榨出之藍汁浸紙。

則爲藍紙。故可供繪具之顏料。花後結角如鳥喙。實在角中大如小豆。中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。其苗莖可供藥用。

性實 苦。大寒。無毒。

主治 寒熱瘧瘧。痰飲疔腫。肉癢。瀉滯。小兒丹毒發熱。狂癩。大腹痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬。癰疽等毒。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論鴨跖草曰。和赤小豆煮食。下水氣。溼痺。利小便。【明】李時珍本草綱目論鴨跖草曰。消喉痺。

參攷資料 ●鴨跖生江東淮南平地。葉如竹。高一二尺。花深碧

色。有角如鳥喙。(陳藏器) ●竹葉菜處處平地有之。三四月生苗。紫

莖。竹葉嫩時可食。四五月開花。如蛾形。兩葉如翅。碧色可愛。結角尖

曲如鳥喙。實在角中大如小豆。豆

中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。巧

匠採其花取汁。作畫色及彩羊皮

粉。青碧如黛也。(李時珍)

主治 凍瘡。取塗之良。

【鴨腦】

【鴨脚】即劉寄奴草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「劉寄奴草」條。

【鴨脚子】即白果之古籍別名。典見綱目。詳「白果」條。

【鴨脚皮】 產地 廣東各屬。以

性實 淡。甘。辛。溫。

主治 酒頂。洗爛脚。敷跌打。

【鴨脚金星】即辟瘟草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「辟瘟草」條。

【鴨脚青】 基本 鴨脚青爲雜

草類之一種。可供藥

採取 以如連珠者良。

主治 疔瘡。

【鴨脚葵】即葵之最下者。功用詳

「冬葵子」條。

【鴨得】即浮萍之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「浮萍」條。

【鴨頭】 主治 煮服。治水腫。通

利小便。

性實 苦。辛。寒。無毒。

【鴨胆汁】 主治 塗痔核良。又

點赤目初起。亦效。

【鴨鴨】即鴨之古籍別名。典見廣

雅。詳「鴨」條。

【鴨鷓】即鴨鷓之古籍別名。典見

周禮。詳「鴨鷓」條。

【登】即雞子之別名。典見綱目。詳

「雞」條。

【白蛇】即白花蛇之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「白花蛇」條。

【鼯鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見

廣雅。詳「鼯鼠」條。

【龍子皮】即蛇蛻之古籍別名。典

見別錄。詳「蛇蛻」條。

【龍子衣】即蛇蛻之古籍別名。典

見本經。詳「蛇蛻」條。

【龍井茶】即兩前茶之產於浙江

龍井者。功用詳「兩前茶」條。

【龍公竹】即竹之葉若芭蕉者。功

用詳「竹」條。

【龍手藤】 產地 生石間。

形態 龍手藤爲雜

草類之一種。葉如龍手。莖如藤狀。

可供藥用。

性實 甘。溫。無毒。

主治 傷風。口喎。手足攣緩。補

虛。益陽。去冷氣風痺。以醇酒浸。近

火令溫。空心服之。取微汗。

【龍月】即龍眼之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍爪粟】即稔子之古籍別名。典

見綱目。詳『龍』條。

【龍爪稗】即稗子之古籍別名。典見救荒本草。詳『稗』條。

【龍牙】即天生牙之別名。典見綱目。詳『天生牙』條。

【龍牙草】即馬鞭草之古籍別名。典見綱目。詳『馬鞭草』條。

【龍牙燕】即燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【龍仙石】即龍涎石之古籍別名。典見綱目。詳『龍涎石』條。

【龍仙草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目。詳『雷公藤』條。

【龍汁】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【龍白泉粉】即磨刀塗之古籍別名。典見綱目。詳『磨刀塗』條。

【龍目】即龍眼之古籍別名。典見吳普本草。詳『龍眼』條。

【龍石膏】產地 產杜陵。

形態 龍石膏爲石類之一種。狀如鐵脂。黃色。可供藥用。

性質 無毒。

主治 消渴。益壽。

【龍立】即續斷之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『續斷』條。

【龍吐珠】產地 以南海屬多。

主治 跌打。洗蛇。疔爛肉。散毒乾水。

【龍羊草】即麗春花之古籍別名。典見綱目。詳『麗春花』條。

【龍舌草】間。生地。澤湖泊。

形態 龍舌草爲水草類之一種。葉如大葉慈菜。或如芣苢狀。根生水底。抽莖出水。開白花。其根似胡蘿蔔根。而氣香。搗汁。能驅雞鴨卵。可供藥用。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 癰疽。湯火灼傷。搗塗之。

參攷資料 龍舌草根。可煮丹砂。煨白礬。制三黃。(李時珍)

【龍衣】即蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【龍沙】即麻黃之古籍別名。典見本經。詳『麻黃』條。

【龍角】性質 甘。平。無毒。

主治 驚癇。瘕瘕。身熱如火。腹中堅。及熱洩。久服輕身。通神明延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍角曰。小兒大熱。【宋】蘇頌綱目本草論龍角曰。心熱風癩。以爛角磨濃汁。二合。食上服。日二次。

施用宜忌 畏乾漆。對椒。理石。

參攷資料 竹齒。醫家常用。角則稀使。惟深師五邪丸用之。云無角用齒。而千金治心病。有角齒同用者。(蘇頌)

【龍豆】即續斷之古籍別名。典見別錄。詳『續斷』條。

【龍泄】即龍涎香之古籍別名。典見綱目。詳『龍涎香』條。

【龍芝】即青芝之古籍別名。典見別錄。詳『青芝』條。⑤即五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【龍花】即那者悉之古籍別名。典見綱目。詳『那者悉』條。

【龍芽草】即石打穿之古籍別名。典見綱目。詳『石打穿』條。

【龍挂香】即線香之古籍別名。典見綱目。詳『線香』條。

【龍泉粉】即龍白泉粉之簡稱。詳『龍白泉粉』條。

【龍胎】 古籍別名 龍胞。(綱目)

產地 出蜀中山澗。

形態 龍胎大類乾魚鱗。煎時氣甚腥臊。可供藥用。

主治 產後餘疾。婦女經閉。

參攷資料 ①龍胎治女經積年不通。同瓦松。景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓分二服。少頃腹中轉動。便下。按此物方家罕知。而昔人曾用。世當有識者。(蘇頌) ②龍胎。龍胞。俱出巴蜀。皆下血疾。蓋一物也。(李時珍)

【龍胞】即龍胎之古籍別名。典見綱目。詳『龍胎』條。

【龍修】即石龍芻之古籍別名。典見山海經。詳『石龍芻』條。

【龍涎】 命名 本品即龍所吐之涎沫。故名。

產地 出西南海洋島中。

形態 龍涎初出。形若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑。如五靈脂而光澤。其體輕飄。似浮石而腥臊。可供藥用。

性質 微酸。鹹。無毒。

主治 活血利水，助陽道，益精。通利血脈，治氣結，痞結，心痛，諸淋，辟精魅鬼邪，逐勞瘵尸疰。

參攷資料 龍涎可以製香。
(汪燧) 龍涎方藥鮮用，惟入諸香，能收腦脂，數十年不散，焚之則翠煙浮空。(李時珍)

【龍涎石】 古醫別名 龍仙石。
(綱目)

基本 龍涎石為石類之一種，可供藥用。

主治 大風，癩瘡。

【龍涎香】 古醫別名 龍涎。
(綱目拾遺) 鯨鯨(和

漢藥考) 龍腹香(新中藥)

外國名詞 Amborgris(英)

Ambra(德)

基本 屬游水類抹香鯨(真甲鯨)Physeter Macrocephalus。之腸及膀胱所分泌之凝結物。浮漾海上，為人所採取者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

龍涎香產南洋羣島之山邊，海嶺山打根亦有出，乃鯨魚鯨魚所吐之涎云。

形態 抹香鯨為鯨之一種，春

夏間羣集日本之太平洋沿岸，頭

位於其體之三分之一處，牡者大至十五尋，牝者約其半，噴潮不直

立，以四十五度傾向前方，與他鯨類異。其所謂龍涎香為不透明蠟狀固塊，大者有重至一百五十斤者，有白色，灰色，淡赤色，黑白相間者，有暗褐色，而有黑斑者，有各雜色層相疊作大理石狀者，質脆弱而輕，浮水上，嚼之如蠟，黏著齒牙。

不溶於水，逢溫湯酒精，則溶解過半，伊打善能溶解，無何氣味，摩擦之，或置掌中溫之，則柔軟如蠟，稍發甘味，狀香氣，投入火中則燃燒，發灰色煙，有佳香。

性質 味甘，氣腥，性瀉。效能 利氣和血，止痛，辟穢，效能與辟香無大異，惟較劣耳，多用作香料，又能治神經衰弱，陰痿等症。

主治 活血，益精髓，助陽道，通利血脈。

近人學說 程登瀛曰：龍涎香之藥效，尚有待事實來證驗者。據海濱漁人傳說，為海王或海和尚所吐之涎，究其所謂海王海和

尚者，形狀何若，乃泛指名稱無定，或稀有之海大魚而首，究竟是真甲鯨腹裏之脂肪，說為可拔，海人以旋風所捲起之水柱曰龍車水，鯨為水族之甚大者，於一定時間須浮水面呼吸，噴水如霧，或誤以為龍，因此而有龍涎之名，亦未可定，真甲鯨腹裏之脂肪，能如海燕之吐涎成窩，一機底自行吐出，漂

浮近岸與草木結合，拾得之是為龍涎，一堆有多至三五擔者，余昔年漫游南洋，得華僑之贈送者，凡五塊，色質各異，大別有二：(一)膏藥狀，灰黑色，質重，有膠黏性，恰似丹油膏藥一樣，灼使溶解，魚腥氣甚濃，以紙條拌燃之，有煙；(二)水波狀，黃褐色，似土塊，質輕，飄如海棉，以指壓之，成粉，取一塊大與杯等者，放杯中溶解之，約剩二分，之油液，不黏，無甚氣味，和鴉片煙吸之，之才能感覺其固有之臭氣，上述兩種色質不同，乃經過許久天然力所造成，得暹羅鹿哥港一炭，廓拾得之例證，可以推知其變化之原因，該炭處在海濱拾水流樹，燒炭，嘗發見一大堆黑而稠黏有

腥氣者，或以為龍涎，乃收拾純油部份，餘仍塞置溝濱，經日曝水澆數月之後，漸變乾硬，柴隙間較稀薄者，已成輕鬆質，準此可知龍涎受過日光海水之曬，澆分析，於是黏質腥氣逐漸減少，同時受太陽之適度溫熱(火熱灼之即溶解)，熱起微細泡沫，凝固而成為輕鬆的固體，前人或專以色質辨真偽者，明乎變化之歷程，可無須辨矣。

願拾得此物，所以不甚寶貴者，因摺出都市各藥行，大多託故不買，有時或以賤價售出少許，且純屬油質，氣腥不香，或謂可供製香料，想亦有名無實耳，故傳說其珍貴而實際上絕無價值可言，其所以無價值，不能通銷於市面者，因本品治瘰上無著明之效用故也，余嘗以之治哮喘，咳嗽，氣痛，諸病，毫無功效。

用量 一分至五分。

參攷資料 質品有用蠟加蘇合香，安息香及芳香油製成者，亦有於蘇合香，松脂，蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) 通雅龍涎有嶼，在花面國傍，獨立南海中，彼

蘇合香，安息香及芳香油製成者，亦有於蘇合香，松脂，蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) 通雅龍涎有嶼，在花面國傍，獨立南海中，彼

蘇合香，安息香及芳香油製成者，亦有於蘇合香，松脂，蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) 通雅龍涎有嶼，在花面國傍，獨立南海中，彼

蘇合香，安息香及芳香油製成者，亦有於蘇合香，松脂，蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) 通雅龍涎有嶼，在花面國傍，獨立南海中，彼

人言於樹收之最收香氣。今大內甜香用之。綱目拾遺。大食國產龍涎香。爲上西洋產。於伯西兒海焚之。則翠煙浮空。結而不散。坐客可用一翦以分煙縷。澳門記略。嶠南環記。龍涎香新者色白。久則紫。又久則黑。白者如百藥煎。黑者次之。似五靈脂。其氣近腥。和香焚之。則翠煙浮空不散。試法將結塊者。奮力投沒水中。須臾突起浮水面。即取一錢口含之。微有腥氣。經宿其細沫已礫。餘膠結舌上。取出。就秤之。仍重一錢。又乾之。其重如故。雖極乾枯。用銀簪燒極熱。投入枯中。乘暖抽出。其涎引絲不絕。驗此不分揭白揭黑俱真。海東札記。海翁魚大者三四千斤。小者千餘斤。即海鯨也。皮生砂石。刀箭不入。或言其魚口中噴涎。常自爲吞吐。有遺於海濱者。黑色淺黃色不一。即龍涎香也。聞上淡水有之。欲辨真贋。研入水攪之。浮水面如膏。以口沫擦成丸。擲案有聲。噲之通宵不耗分毫者爲真。每兩值數十金。廣志新安有龍穴洲。每風雨即有龍起。去地不數丈。朱熹

十六靈 龍

金鱗。兩目如電。其精華在浮沫時。噴薄如濤泉。如兩土人爭承取之。稍緩則入地中。是爲龍涎。或謂龍涎多積於海上枯木。如鳥遺狀。其色青紫。其香腥。雜百和焚之。翠煙千結。蜿蜒蟠空。經時不散。可以分香縷。然多不真。從番舶來者。出大秦波斯。於雨中焚之。膺膺有聲者真。坤輿圖記。龍涎香。黑人固與伯西兒兩海最多。有大塊重千餘斤者。望之如鳥。每爲風濤湧泊於岸。諸島獸喜食之。汪機本草。龍吐涎沫可制香。嶠南環記。龍涎香傳爲鯨魚精液。泡水面凝爲涎。能止心痛。助精氣。以淡黃色。嚼而不化者爲佳。出淡水者皆淡黃色。無黑色。范成憲府志。龍涎香出蘇門答臘國。西有龍涎嶼。峙南巫里大洋之中。羣龍交戲其上。遺涎焉。國人駕獨木舟伺探之。舟如龍形。浮水面。人伏其中。隨風潮上下。停亦用槳。龍過之亦不吞也。每一斤值其國金錢一百九十二枚。准中國銅錢九千文。嘉靖三十四年。下戶部取香百斤。遍市京師不得。下廣東藩司採買部文

至壘司集議。懸價每斤銀一千二百兩。僅得十一兩。上進內驗不同。姑存之。亟取真者。部文再至廣州。夷囚馬那那的。貯有一兩三錢。上之黑褐色。密地都密地山夷人。繼上六兩。白褐色。細間狀之黑者。採在水。白者採在山。皆真不贋。尋有密地山商再上。通前共得十七兩二錢五分。次年進入內辨驗是真。許留用。自後夷船開上。供稍稍挾來。市始定價。每一兩價百金。龍涎之爲用也。入香合和。能收斂腦。辟清氣。雖數十年。香味仍存。得其真者。和香焚之。翠煙曩空不散。涎沫有三品。曰汎水。曰滲沙。曰魚食。汎水則輕浮水面。善水者伺龍出。取之。滲沙則凝結。年久氣滲沙中。魚食。則化薰於沙。積。惟汎水者可食。香用。又言魚食亦有二種。海旁有花。若木芙蓉。春夏間盛開。花落。海大魚吞之。若腹腸先食龍涎。花味食。久即脹。昂頭向石上吐沫。乾枯可用。惟黃者不佳。朱國楨大政記。諸香龍涎最貴。市值每兩不下百千。次亦五六十。出大食國近海。有雲氣罩上。間知有龍睡

下。或半年一二載。土人守視。數則龍已去。必得其涎五七兩。或十餘兩。衆共分之。又大洋中有渦旋處。龍在其下。湧出之涎。日燦成片。風漂至岸取之。又嶺外雜記。龍枕石而睡。涎浮水積而堅。新者色白。久紫。甚久者黑。氣近腥。形如浮石而輕。賦理光澤。入香焚之。翠煙浮空。結而不散。又出沒海上。吐出涎沫。有三品。一汎水。二滲沙。三魚食。汎水輕浮水面。善水者伺龍出。隨取。滲沙凡風浪飄泊舟嶼。積年氣盡於沙土中。魚食涎作糞。散沙。噴氣腥穢。進貢亦不過四兩。嶺南雜記。按龍涎論色。則瑣記言有白與紫黑之分。而札記又有淺黃色。廣志有黑青色。辨真偽亦諸說互異。大抵不必論其色。總以含之不耗。投水不沒。雨中焚之。能爆者良。東璧綱目鱗部龍下。龍腦龍胎俱有主治。而於龍涎獨遺之。惟附其名云。龍涎。方藥鮮用。惟入諸香。云能收腦。歷數十年不散。出西南洋。春間羣龍所吐。涎沫浮出者。番人採貨之。亦有從大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾

一七五五

則成塊。黃黑色。如百藥煎而賦理。久則紫黑。如五蠟脂而光澤。其體細韌以浮石而腥。其說亦未確核。蓋所云魚腹中得者。卽札記所云海鯨魚之精也。亦名龍涎。出臺灣。不若大洋中產者佳。夫龍腦龍胎。世上所無。龍涎則閩粵貨售者多。東壁。何得於罕見者載之。於所有者反略之耶。則甚矣該博之難也。入藥用隔湯槓化。如膠精狀者佳。【綱目拾遺】龍涎過煙煤則不散。入藥忌鐵器。及石脊。【酉陽雜俎】在澳門見倭夷用合船硫。及他藥作種子丸。云漢時術士和丹用此。倭夷皆有其方。秘不傳中國。【陳良士】出淡水者。止心痛。助精氣。【札記】龍涎能生口中津液。凡口患乾燥者。含之。能津流。效頗微。若有腥氣。粵中夷人合龍涎丸。和以他藥。便不腥。入口亦不耗滅。一丸可用數十年。不敗。如單用龍涎入藥。須先用雞湯。將龍涎澆死。則入腹便化。否則入腹絲毫不損。蓋極難化者。方書云焚之。其煙能入水盂。予嘗試之。多不驗。【周鼎大】

【龍珠】 命名 本品卽龍葵子。之色赤者。象形也。故名。

古籍別名 赤珠。【綱目】

外國名 國外名 赤珠。【綱目】

基本 係茄科番椒屬。爲龍葵

之子實。

產地 山野有出。

形態 龍珠爲溼草類之一。年

生草本。葉長卵形。夏日開花。有花

柄。常二花叢生於葉腋。亦有兩花

以上者。花冠淡黃色。果實紅色。球

形而多汁。其子與根。俱可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 能變白髮。令人不睡。主

諸熱毒。石氣發動。調中解煩。

參攷資料 龍珠服之變白

令黑。耐老。若能生食。得苦者不食

他菜。十日後卽有蠟異也。不與葱

蒜同啖。根亦入藥用。【甄權】龍

葵赤珠者。名龍珠。揆去汁可食。能

變白令黑。【甄權】龍珠生道旁。

子圓似龍葵。但熱時正赤耳。【陳

藏器】龍珠龍葵。雖以子之黑

赤分別。其實一物二色。強分爲二

者也。【李時珍】

【龍珠子】 性質 苦寒。無毒。

主治 疔腫。【陳藏器】

【龍脊茶】 產地 出廣西。

主治 除瘴解毒。治

赤白痢。

【龍笏草】卽石龍笏之處方用名。

詳「石龍笏」條。

【龍荔】 命名 本品狀如荔枝。

而味似龍眼。其木及葉

亦似二果。故名。

產地 出嶺南諸地。

形態 龍荔爲果類之一種。三

月間開小白花。結實與荔枝同時

成熟。不可生啖。但可熟食。

性質 甘熱。有小毒。

參攷資料 龍荔實。生食之。令

人發癩。或見鬼物。【李時珍】

【龍耗】卽斑蝥之古籍別名。典見

綱目。詳「斑蝥」條。

【龍退】卽蛇蛻之古籍別名。典見

綱目。詳「蛇蛻」條。

【龍骨】 處方用名 煨龍骨。花

龍骨。

古籍別名 陸虎遺生。【和漢

藥考】那伽骨。【梵書】青花龍骨。

基本 爲象類動物之骨埋浸土中。化石者。往往從地下掘出。謂之龍骨。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

龍骨產直隸。山西。岱州。五臺山等

處。一經在山尋獲。全條。或在數十

擔之多。所謂在天成象。在地成形。

觀此。亦不謬也。和漢藥考曰。概產

四川。成都。山東。沂州。山西。太原等

處。

形態 其骨細文。廣者是雌。骨

粗文狹者是雄。亦有五色者。又有

白色。黃色。黑色者。其形有九形。頭

似鹿。角似鹿。眼似鬼。耳似牛。項似

蛇。腹似蟹。鱗似鯉。爪似鷹。象似虎。

背有八十一鱗。其聲如受鋼盤。口

旁有鬚鬚。頰下有明珠。喉下有逆

鱗。頭上有博山。

製法 雷斅曰。凡使龍骨。先煮

香草湯浴兩度。搗粉。絹袋盛之。用

燕子一對。去腸肚。安袋於內。懸井

面上一宿。取出研粉。入補腎藥中。

其效如神。【李時珍】近世方法。但

煨赤爲粉。亦有生用者。【蘇林廣記

云。用酒浸一宿。焙乾研粉。水飛三

度。用。如急用以酒煮焙乾。或云。凡

入藥須用水飛過曬乾。每斤用黑豆一斗。蒸一伏時曬乾。否則着人腸胃。晚作熱也。

性質 甘平無毒。

效能 斂心神。清浮陽。固精燥溼。鎮驚安寐。用作強壯藥。

主治 心腹鬼疰。精物老魅。咳逆洩痢膿血。女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣驚癇。(本經)心腹煩滿。悲怒氣伏在心下不得喘息。腸癰內疽。陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚。汗出。止汗。縮小便。溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐。洩精。小便洩精。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論龍骨曰。逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢。紛紜。止冷病。下膿血。女子崩中帶下。【宋】日華諸家本草論龍骨曰。懷孕漏胎。止腸風。下血。鼻洪吐血。止瀉痢。渴疾。健脾胃。【明】李時珍本草綱目論龍骨曰。益腎鎮驚。止陰瘧。收溼氣。脫肛。生肌斂瘡。【明】繆希雍本草經疏論龍骨曰。龍泉陽氣以生。而伏於陰。為東方之神。乃陰中之陽。鱗蟲之長。神靈之物也。故

十六畫 龍

其骨味甘平。氣微寒。無毒。內應乎肝。入足厥陰。少陽。少陰。兼入手少陰。陽明。經。神也者。兩精相合。陰陽不測之謂也。神則靈。靈則能辟邪。惡毒。變魅之氣。及心腹鬼疰。精物老魅。遇之則散也。咳逆者。陽虛而氣不歸元也。氣得斂攝而歸元。則咳逆自止。其性瀉以止脫。故能止洩痢膿血。因於大腸虛。而久不得止。及女子漏下也。小兒心肝二臟。虛則發熱。熱則發驚癇。驚氣入腹。則心腹煩滿。斂攝二經之神氣。而不平之。以清其熱。則熱氣散。其驚瀾及心腹煩滿皆自除也。肝氣賊脾。脾主四肢。故四肢痿枯。肝寧則熱退。而脾亦獲安。故主之也。汗者心之液也。心氣不收。則汗出。肝心腎三經虛。則神魂不安。而自驚。收斂三經之神氣。則神魂自安。氣得歸元。勿降利而喘息自平。汗自止也。肝主怒。肝氣獨盛。則善怒。魂返乎肝。則悲怒自除。小腸為心之腑。膀胱為腎之腑。二經之氣虛脫。則小便多而不禁。斂氣斂則腑亦隨之。故能縮小便。及止夢寐洩精。小便洩精。兼主溺血也。其主養精

神。定魂魄。安五臟者。乃收攝神魂。閉瀆精氣之極功也。又主癥瘕堅結。腸澼內疽。陰蝕者。以其能引所治之藥。黏着於所患之處也。【明】李士材本草圖解論龍骨曰。龍骨甘平性澀。澀可去脫。故能收斂浮越之氣。固大腸。止遺泄。下血定驚。止汗除崩帶。煨赤研細。水飛。稍不細。則沾着腸胃。晚年作熱。【清】黃宮繡本草求真論龍骨曰。龍骨甘瀉微寒。功能入肝斂魂。不令浮越之氣。遊散於外。故書載能鎮驚辟邪。止汗定喘。瀉可去脫。故書載能以治脫肛。遺精崩帶。瘡口不斂等症。功與牡蠣相同。但牡蠣鹹瀉入腎。有軟堅化痰清熱之功。此屬甘瀉入肝。有收斂止脫鎮驚安魂之妙。如徐之才所謂瀉可止脫。龍骨牡蠣之屬。白地錦紋。紙之粘舌者佳。【清】黃元御長沙藥解論龍骨曰。龍骨味鹹微寒。性瀉。斂神魂而定驚悸。保精血而收滑脫。傷寒桂枝甘草龍骨牡蠣湯。治太陽傷寒火逆下後。因燒鍼煩躁者。火逆之證。下之亡其表陽。又後燒鍼發汗。亡其表陽。神氣離根。因之煩躁不

安。龍骨斂神氣而除煩躁也。柴胡加龍骨牡蠣湯。治少陽傷寒下後。胸滿煩驚譫語。小便不利。一身盡重。不可轉側者。以下敗裏陽。騰氣拔根。是以驚生。膽水逆衝。是以胸滿。相火升炎。故心煩而語妄。水泛土溼。故身重而便難。龍骨斂魂而鎮逆也。

辨偽 白地錦紋。紙之粘舌者真。
配合應用 同牡蠣。入柴胡桂枝各湯內。取其收斂浮越之正氣。固脫而鎮驚。(張仲景方)

治勞心夢遺。同遠志等分為末。煉蜜丸。如梧子大。硃砂為衣。每服三十丸。蓮心湯下。睡即洩精。白龍骨四分。韭子五合。為散。空心酒服。方寸匕。(梅師方)

又方。治泄瀉不止。白龍骨。白石膏等分為末。水丸。梧子大。紫蘇木瓜湯下。大人小兒用。亦治久痢休息。

治久痢脫肛。白龍骨粉撲之。(姚和衆方)

龍齒同荊芥。澤蘭。牡丹皮。蘇木。人參。牛膝。紅花。蒲黃。當歸。童便。

治產後惡血撲心。妄語癡狂。如傷寒發狂者。切不可認作傷寒治。誤則殺人。

①同牛黃、犀角、鉤藤、丹砂、生地黃、茯神、琥珀、金箔、竹瀝、天竹黃、蘇合香。治大人小兒驚癇癩疾。

②治健忘。久服聰明益智。用白龍骨、遠志等分爲末。食後酒服方寸匕。日三(千金方)

③治勞心夢洩。龍骨、遠志等分爲末。煉密丸。如梧子大。硃砂爲衣。每服三十丸。蓮子湯下。(食醫心鏡方)

④暖精益陽。前方去硃砂。每冷水空心下三十丸。(經驗方)

⑤治遺尿淋瀝。白龍骨、桑螵蛸等分爲末。每鹽湯服二錢。(梅師方)

⑥治老瘧不止。龍骨末方寸匕。先發一時。酒一升半。煮三沸。及熱服盡。溫覆取汗。即效。(肘後方)

⑦治傷寒毒痢。傷寒八九日至十餘日。大煩渴作熱。三焦有痞。下痢。或張口吐舌。自爛。口舌生瘡。不識人。用此除熱毒。止痢。龍骨半斤。水一斗。煮四升。沉之井底。冷服

五合。漸漸進之。(外臺秘要方)

⑧治熱病下痢欲死者。龍骨半斤。研水一斗。煮取五升。候極冷。稍欲得汗。即愈效。(肘後方)

⑨治久痢休息不止者。龍骨四兩。打碎。水五升。煮取二升半。分五服。冷飲。仍以米飲和丸。每服十丸。(肘後方)

⑩治鼻衄眩冒欲死者。龍骨末吹之。(梅師方)

⑪治吐血衄血。九竅出血。並以龍骨末吹入鼻中。昔有人衄血一斛。衆方不止。用此即斷。(三因方)

⑫治耳中出血。龍骨末吹入之。(三因方)

⑬治男婦溺血。龍骨末水服方寸匕。日三(千金方)

⑭治小兒疳積。龍骨煨研傳之。(聖惠方)

⑮治陰囊汗癢。龍骨、牡蠣粉撲之。(醫宗三法方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡洩痢腸澼崩漏諸症。並屬於虛。而由於熱鬱積滯者。禁用。畏石膏、川椒、忌魚及鐵。得牛黃、人參良。

參攷資料 ①氣入丈夫腎臟中。故益腎藥宜用之。(雷斅) ②濕可去脫。故成氏云。龍骨能收斂浮越之正氣。固大腸而鎮寫。又主帶脈爲病。(李時珍) ③許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏也。其氣收陽中之陰。入手足少陰厥陰經。(李時珍) ④龍骨又名尺水龍。無尺水不能升天。呵氣成雲。既能變水。又能變火。陸佃埤雅云。龍火得濕則解。得水則燔。以人火逐之。則息。故人之相火似之。龍卵生思。抱雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。釋典云。龍交則變爲二小蛇。又小說載。龍性粗糲。而愛美玉空青。喜嗜燕肉。畏鐵及菌草。蜈蚣。棟葉五色絲。故食燕者忌渡水。祈雨者用燕。鎮水患者用鐵。激龍者用菌草。祭屋原者用棟葉。色絲裹棧投江。醫家用龍骨者。亦當知其性之愛惡如此。(李時珍) ⑤生晉地川谷。及火山巖。水岸土穴中死龍處。採無時。(別錄) ⑥剡州。滄州。太原者爲上。其骨細文。腹是雌。骨粗文。狹者是雄。五色具者上。白色黃色者中。黑色者下。凡經落不

淨。及婦人採者不用。(雷斅) ⑦龍骨色青白者良。(吳普) ⑧今河東州郡多有之。李暹國史補云。春水至時。魚登龍門。蛟骨甚多。人採爲藥。有五色者。龍門是管地。與本經合。豈龍骨即此魚之骨乎。又孫光憲北夢瑣言云。五代時。鎮州關殺一龍。解囊曹窺。取其雙角。角前一物如藍色。文如亂綿。人莫之識。則龍亦有死者矣。(蘇頌) ⑨諸說不一。終是隱度。曾有窟中崩出一副皮骨。頭角皆備。不知蛟耶。龍耶。謂之蛟。則有形之物。不得生。見死方可見。謂之化。則其形獨不可化。與(寇宗奭) ⑩經文首死龍之骨。若以爲蛟。終是隱說。(汪機) ⑪龍骨本經以爲死龍。陶氏以爲蛟骨。蘇寇諸說。皆兩疑之。竊謂龍神物也。似無自死之理。然觀蘇氏所引。闕死之龍。及左傳云。蔡龍氏。隨龍以食。沈異記云。漢和帝時。大雨。龍墮宮中。帝命作羹。賜羣臣。博物志云。張華得龍肉。鮮。得龍則生。五色等說。是龍固有自死者矣。當以本經爲正。(李時珍) ⑫東洋學藝雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

雜誌第三號。載有日本讀岐國小

豆島掘出俗所謂龍骨者。經東京大學教授布瑞恩氏之鑑定。實係漂積期中所棲息之牛族。一種名 *Bison Priscus*。者之頭骨。又手板發蒙亦載有小豆島所掘出者。當係大魚之骨云。

【龍常草】 古籍別名 萍。鼠莞。 (爾雅) 棕心草 (綱

目) 櫻心草 (植物學大辭典)

外國名詞 *Diarrhona japo-*

onica, *Cry. var. Koenigii*, *Hack. (拉丁) タツノヒゲ (日本)*

基本 禾本科龍常草屬。藥用其莖。

產地 凡山川河澤均有出。

形態 龍常草為溼草類之多。年生草本。莖初略臥地。自下部之節生根。高一二尺。葉頗長大。廣亦四五分。葉端尖銳。七八月間梢端抽穗。疎着長形之小穗。花作綠色。其莖冬夏俱生。如龍鬚。亦可織席。性質 鹹。溫。無毒。

主治 輕身。益陰氣。療瘴寒濕。參攷資料 ① 俚俗五月採繫角黍之心。呼為棕心草是也。(李

十六 龍

時珍) ① 生河水旁。狀如龍鬚。冬夏生。(李時珍) ② 按爾雅云。萍。鼠莞也。鄭樵解為龍鬚。郭璞云。纖細似龍鬚。可為席。蜀中出者好。恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾。故其功用亦相近云。(李時珍)

【龍眼】 命名 形象龍目。故名。 處方用名 桂圓肉。

古籍別名 龍目 (吳普) 圓眼。

(俗名) 益智。(別錄) 木彈。荔奴。(圖經) 亞荔枝。(開寶) 魁圓。比目。龍月。荔草。荔枝。細荔。益志。蜜脾。燕卵。皎溟。鬪珠。海珠。叢。海珠。龍眼。錦。龍眼巾。荔枝奴。川彈子。繡水園。(和漢藥考) 鬼眼 (俗名)

外國名詞 *Nephelium Loo-*

ngana, *Camb. (拉丁)*

基本 係屬無患樹科龍眼樹之果肉。

產地 產東印度、中國福建、廣

東諸省及臺灣、琉球等。陳仁山藥物生產辨云。桂圓肉。以廣西鬱林為最好。其次則廣東、廣利。三則廣州、北海。四則廣西北流、貴縣。五則江口。六則羅定、琼州。海口來者。選但其味最清甜。俱銷於北者。臺灣

來者味淡。水東陽江來者。亦溼而色黑。

形態 龍眼係產熱帶地方之常綠喬木。枝葉繁茂。高三四丈。葉互生。為羽狀複葉。小葉作革質卵圓形。五月間開白色五瓣花。有香氣。果實大四分至六分許。作帶赤色或紫紅色球圓形。表面有皺紋。乾燥則成褐色。破之空虛。正中有類似枇杷核之種子。其種子被其暗褐色柔似肉質。是為龍眼肉。味甘。類乾葡萄。其質外被有剛毛。種子具肉質之假種皮。其肉薄於荔枝。色白有漿凝。而結實作穗。每穗生實五六十顆。



龍眼

種類 販賣品中。大粒者謂之虎眼。中粒者謂之龍眼。小粒者謂之人眼。最小粒者謂之鬼眼。去核仁者。謂之桂圓肉。從臺灣打狗港輸出者。呼為福圓。

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

可採摘曬乾。

用法 剝去外殼及核。入水煎。或酒浸。或搗爛和丸。

性質 甘。平。無毒。

成分 水 〇・八四五。乾燥殘渣九九・一四五。(內可溶性成分七九・七七。不溶成分一九・三八五) 灰三・三六。(內得自可溶性成分者二・八七三) 葡萄糖二四・九一。蔗糖〇・二二。羥幾斯蘇林一・〇五三。纖維素二・一八五。醱類(假定作酒石酸等)一・二六。含淡物六・三〇九。脂肪二・四九四等。

效能 補心脾。療虛瀉。用作緩和滋養藥。又治神經衰弱。貧血。

作用 入胃後與胃酸化合。成為消化蛋白與澱粉之酵素。一部分仍不被化合。及至小腸。始漸次由腸壁吸而達血中。能增加血液之熱量。與酵素之作用。

主治 五臟邪氣。安志。厭食。除瘴毒。去三蟲。久服強魂聰明。輕身不老。通神明。

歷代記載攷圖 【明】李時珍本草綱目論龍眼曰。開胃。益脾。補

處。長智。【明】醫希雅本草經疏論龍眼曰。龍眼稟稟稔積之化。故其味甘氣平無毒。入足太陰。手少陰經。少陰為君主之官。藏神而主血。甘能益血補心。則君主強。神明通。五臟邪氣俱除矣。甘味補脾。脾得補則食自寡而飢。心得補則火下降而坎離交。故能安志。肝藏魂。主納血。心家血滿。則肝有所受而魂強。甘能解毒。故主去毒。久服聰明耳目。輕身不老。總之補益心脾之驗也。至於除蟲。非其所能。略之可也。【清】黃宮繡本草求真論龍眼曰。龍眼氣味甘溫。多有似於大棗。但此甘味更重。潤氣尤多。於補氣之中。又更存有補血之力。故昔載能益脾長智。養心保血。為心脾要藥。是以心思勞傷。而見健忘怔忡驚悸。暨腸風下血。俱可用此為治。蓋血雖屬心生。而亦賴脾以統思慮。而氣既耗。則非甘者不能以補。思慮而神更損。則非潤者不能以濟。龍眼甘而能潤。既能補脾固氣。復能保血不耗。則神氣自爾長養。而無驚悸健忘之病矣。按古歸脾湯。有用龍眼肉以治心脾傷損。義實

基此。非若大棗力專補脾。氣味雖甘。其性稍燥。而無甘潤和柔。以至於極之妙也。至書有言。久服令人輕身不老。百邪俱辟。豈止神智長養之謂。蠱毒可除。三蟲可殺。豈止氣血充足。而蠱不食之謂。但此味甘體潤。凡中滿氣滯。腸滑泄利。為大忌耳。桂產者佳。粵東者性熱。不堪入藥。【清】王士雄隨息居飲食譜論龍眼曰。龍眼甘溫。補心氣。定志安神。益脾陰。滋營充液。果中神品。老弱宜之。以核小肉厚味純甘者良。

國外學說 日本學說謂龍眼肉者。在漢藥中殊貴重。價亦不廉。為各種練藥類之主藥。習慣用之。又為緩和營養品。其用量自二。○至六。○。又謂龍眼內呈酸性。反應味甚甘。香味俱稍似梨與乾葡萄。依藥學士村山長之助氏及藥劑師伊藤禎次郎氏之試驗云。龍眼肉中含有之成分。為葡萄糖。蔗糖。澱粉。煙鹼。斯為林。纖維素。酸類。含窒素物。脂肪等。而舉其百分中所含之數。且有纖維素之定量試驗等。

配合應用 ①同生地黃、天麥冬、丹參、柏子仁、遠志、蓮實、五味子、茯神、人參、能補心保神。益氣強志。

②方外服龍眼法。五更將不見水。乾龍眼。以舌在齒上。取肉去核。即舌攪華池法。細嚼嚥至渣。知齊。連口中津。用嚼嚥之。如噫甚。秘物。舉又如前法。食第二枚。共服九枚。約一時許。服畢。方起。晨已二時。未申及臨臥。一日服四次。服時氣和心靜。且漱津納噫。是取坎納離之法。勞證動行一月自愈。

③玉環膏(一名代參膏)自製好龍眼肉盛竹筒式。裝揀內。每肉一兩入白洋糖一錢。蒸數多火者。再入西洋參片如糖之數。縮口。以絲綵一層。日日於飯鍋上蒸之。蒸至百次。凡衰弱老弱。別無痰火。便滑之病者。每以開水浴服一匙。大補氣血。力勝參香。諸婦隨盆服之尤妙。

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 外有感邪。內有鬱火。以及停飲脹滿等症。禁用。
著名方劑 歸脾湯。治思慮過度。勞傷心脾。健忘怔忡。虛煩不眠。

自汗驚悸。【濟生方】龍眼肉。酸棗仁(炒)炙黃耆。炒白朮。茯神各一兩。木香半兩。炙甘草二錢。右藥咬咀。每服五錢。薑三片。棗一枚。水二錢。煎一椀。溫服。

參攷資料 龍眼本經名曰益智。今專為果。未見入藥補。注不言。神農本草綱目入木部中品。果部中復不曾收入。今除為果之外。別無龍眼。若謂為益智子。則專調諸氣。今為果者。復不能也。矧自有益智條。這不相當。故知木部龍眼。即便。是今為果者。按今注云。甘味歸脾。而能益智。此說甚當。食品以荔枝為貴。而實益則龍眼為良。蓋荔枝性熱。而龍眼性和平也。最用和濟生方。治思慮勞傷。有歸脾湯。取甘味歸脾。能益人智之義。龍眼生者。沸湯滌過。食不動脾。李廷飛。荔枝繞過。龍眼即熱。故南人目為荔枝奴。又名木彈。曬乾寄遠。北人以為佳果。目為荔枝枝。蘇頌。今閩廣蜀道出荔枝處。皆有之。穉含南方草木狀云。木高二丈。似荔枝。而枝葉微小。凌冬不凋。春末夏初。開細白花。七月實

熟。殼青黃色。文作鱗甲。形圓大如彈丸。核若木。子而不堅。肉薄於莖。枝白而有漿。其甘如蜜。實極繁。每枝三二十顆。作穗如荔枝。漢時南海當貢之。大為民害。陸武長唐羌上書言狀。和帝感其言。下詔止之。(蘇頌) 龍眼正圓。其木性畏寒。白露後方可採摘。曬焙令乾。成朶。乾者名龍眼。錦按范成大桂海志。有山龍眼。出嶺中。色青。肉如龍眼。夏月實熟可噉。此亦龍眼之野生者與。(李時珍) 龍眼肉純甘而溫。大補血液。蒸透者良。(王秉衡)

【龍眼中】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍眼核】 主治 一切疥癬瘡。腸疝氣。毒刀斧損傷。臍漏。小腸疝氣。

配合應用 ①治臍漏。用腐東圓眼核。入銅爐內燒。煙起。將荷蕒入患鼻孔內。數次即愈。(黃氏醫抄方)

②治一切疥癬。用龍眼核煨存性。麻油調敷。即愈。(高只元傳世方)

十六畫 龍

③治癩。圓眼核二個。去外黑皮。搗碎。雄黃。硫黃。附骨。枯礬。川椒末各三分。共為細末。以生煎臘。擦患處。即愈。(祝氏效方) 又治患癩用龍眼核。去外黑殼。用內核。米醋磨搽。(集驗方)

④張觀齋云。桂圓核仁。凡人家有小子女者。不可不備。遇面上或破傷。及金刃傷。以此敷之。定疼止。血生肌。愈後無痕。若傷髮髮際。愈後更能生髮。不比他藥。愈後不長髮也。

⑤治小腸疝氣。荔枝核。龍眼核各七枚。俱燒灰。大茴二粒。炒。共為末。好酒調下。外用生薑搗爛。數腎即消。(不藥良方) 又治疝氣偏墜。小腸氣痛。神效。荔枝核炒。龍眼核炒。小茴香炒各等分。為細末。空心服一錢。以升麻一錢。水酒煮。送下。(經驗廣集方)

⑥念珠丸。治陰疝偏腫。囊中疼痛。難忍。乳香去油淨二錢。圓眼核三錢。黃蠟二兩。和藥末成丸。彈子大。分為一百零八丸。給粉為衣。用線穿起。晝一宿。收貯。遇症。每服三九。乳香湯下。(張氏必效方)

⑦治小便不通。用龍眼核。去外黑殼。打碎。水煎服。如通後欲脫者。以圓肉湯飲之。

⑧治足指癢爛。用桂圓核燒灰。搽之。立效。(藥方)

⑨治無名腫毒。桂圓核以水調塗。俱效。能止折傷出血。療金瘡。滅斑。(黃氏醫抄方)

⑩治煙筒傷喉。萬近遠云。凡煙管誤傷喉。出血不止者。用桂圓核去外黑皮。惟取內核仁。焙搗為極細末。看喉中傷處。用筆管安末吹之。即定疼止血而愈。屢試果驗。

⑪治刀傷出血。以龍眼核炒搗磨細。敷之。(殷仁趾傳方)

⑫治刀斧傷。桂圓核不拘多少。用火燒枯存性。研末。搽患處。即愈。(黃氏醫抄方) 按陳杰回生集。大興李振祖西平云。龍眼核末。敷金刃傷。昔在西秦及巴理坤軍營救愈多人。

【龍眼殼】 基本 本品即龍眼實裏肉之殼。

主治 敷湯泡傷。煨存性為末。桐油調塗。止痛。無癢痕。

參攷資料 龍眼實殼。本煎黃色。國人恐其易蛀。輒用薑黃末并之令黃。且易悅目也。廣中桂圓。多不用薑黃并。故今嶺中桂圓。猶存本色。入藥用殼。須先去外色黃者。

【龍眼核】 即龍眼肉燥乾之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍移草】 即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳「水英」條。

【龍蛇】 即斑蝥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「斑蝥」條。

【龍單葉】 即深蘭葉之古籍別名。典見本經。詳「深蘭葉」條。

【龍絲竹】 即竹之產於湖南衡辰州府境者。高不盈尺。細僅如針。其葉或細或大者。功用詳「竹」條。

【龍華】 即石龍芻之古籍別名。典見別錄。詳「石龍芻」條。

【龍睛】 即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【龍腦香】 即冰片之原名。詳「冰片」條。

【龍腦薄荷】 即雞蘇之古籍別名。典見日用本草。詳「雞蘇」條。

【龍腦薄荷葉】 即雞蘇之處方用名。詳「雞蘇」條。

【龍腦香】 即龍涎香之古籍別名。

身見新中藥。詳「龍涎香」條。
【龍葵】即烏蘇莓之古籍別名。與見爾雅。詳「烏蘇莓」條。

【龍葵】 古籍別名 苦菜。(唐本草) 苦葵。天茄子。老鴉眼時草。(圖經) 水茄。天泡草。老鴉酸漿草。(綱目) 大酸漿。牛酸漿。(日本)

外國名詞 Solanum nigrum, L. (拉丁) イヌホホツキ ヤマホホツキ ウシホホツキ (日本)

基本 係茄科茄屬。爲龍葵之苗。
產地 原野溼地恒多有出。



龍葵

形態 龍葵爲溼草類之一年生草本。春月萌生。高約二三尺。葉卵形。全邊或呈波狀。夏日梢葉之中間。抽出花莖。花小白色。花冠五裂。雄蕊之藥。近集於雌蕊花柱之周圍。作繖形花序。果實小爲漿果。

球形。生青熟黑色。大與豌豆之種子略等。此與龍珠相異者。以龍珠常以兩花集生於葉腋。果實紅熟爲不同耳。其子根莖葉。俱可供藥用。

性質 苦。微甘。滑寒。無毒。
主治 食之解勞少睡。去虛熱腫。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論龍葵曰。治風。補益男子元氣。婦人敗血。【明】李時珍本草綱目論龍葵曰。消熱散血。壓丹石毒。宜食之。

近人學說 張山雷曰。此草性質。亦寒涼滑利。故亦名葵。莖柔而嫩。似萑非萑。延引甚長。故以龍爲名。言其蜿蜒不已也。吾吳土俗。亦呼爲老鴉眼時草。結子渾圓。一簇數顆。生青熟黃。故有老鴉眼時之名。亦有生青熟紅者。其莖葉花莖皆同。蘇頌圖經謂之赤珠。陳藏器本草拾遺謂之龍珠。實卽一類二種。唐本草謂龍葵去熱退腫。蘇頌謂治婦人敗血。瀕湖謂治熱散血。壓丹石毒。療癰疽腫毒。跌仆傷損。孟詵謂搗敷疔腫火丹。蓋可服可敷。以清熱通利爲用。故非治跌仆血癰。尤爲外科退熱消腫之良品也。

參攷資料 龍葵實其性滑如葵也。苦以菜味名。茄以葉形名。天泡。老鴉眼時。皆以子形名也。與酸漿相類。故加老鴉以別之。五爪龍亦名老鴉眼時草。敗醬苦苣並名苦菜。名同物異也。(李時珍)

龍葵龍珠一類二種也。皆處處有之。四月生苗。嫩時可食。柔滑漸高二三尺。莖大如筋。似燈籠草而無毛。葉似茄葉而小。五月以後開小白花。五出。黃蕊。結子正圓。大如五味子。上有小蒂。數顆同綴。其味酸。中有細子。亦如茄子之子。但生青熟黑者爲龍葵。生青熟赤者爲龍珠。功用亦相彷彿。不甚遠也。

【龍葵子】 採取 七月採之。
主治 疔腫。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍葵子曰。明目。輕身。【宋】蘇頌圖經本草論龍葵子曰。治風。益男子元氣。婦人敗血。

【龍葵根】 主治 通利小便。同木通胡荽煎湯服。

【龍葵莖葉】 性質 苦。微甘。滑寒。無毒。
主治 搗爛。和土傅疔腫火丹瘡良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龍葵莖葉曰。療癰疽腫毒。跌撲傷損。消腫散血。

【龍窩石】 古籍別名 勝志。(綱目拾遺)
產地 廬山溪中。
性質 大寒。無毒。
主治 磨面。能滅癩氣。解熱瘡毒。煨粉撲。暑癘立消。

參攷資料 廬山有龍窩石。皆有一土人俟龍升去。乃跡而獲之。有五色。以透明者煨用。生用有毒。敲碎投醋中。片片能動。而相合者良。(王伯厚)

【龍術】 卽黃精之古籍別名。與見廣雅。詳「黃精」條。卽女青大者之別名。與見綱目。詳「女青」條。
【龍風團】 卽茶之產於福建建寧府境者。功用詳「茶」條。
【龍撫草】 卽川芎之處方用名。詳「川芎」條。
【龍腦香膏】 卽婆律香膏之原名。

詳「遠律香芥」條。

【龍虱】

形態 龍虱爲卵生蟲類甲蟲屬之一種。其體扁平如卵形。似小蟻及金龜子。長六七分。前翅小而色黑。後翅甚扁。雄者膨大而圓。性善游泳。常居水中。覓食小魚。夜出飛翔。亦能傷人。可供藥用。
主治 除面上黴野赤氣。美顏色。

【龍齒】

性質 涼。無毒。
主治 殺精物。大人驚癇。諸癲癩疾。狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五疳。十二癩。(本經)小兒身熱不可近。大人骨間寒熱。殺蟲毒。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論龍齒曰。鎮心安魂。魂

【宋】日華諸家本草論龍齒曰。治煩悶熱狂鬼魅。

施用宜忌 畏石膏。鐵器。得人參。牛黃。良。

參攷資料 龍者。東方之神。故其骨與角齒。皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。卽此義也。(李時珍)

【龍腦】卽香牙蕉之汁也。功用詳「香牙蕉」條。

【龍膽】

命名 本品葉如龍葵。味苦如膽。故名。
處方用名 龍膽草。
古稱別名 陵游。(本經)苦膽。龍草。靛音草。斜枝大夫。斜枝大士。(和漢藥考)笹龍膽。(日本)草龍膽。山龍膽。(俗名)

外國名詞 Radix Gentiano

Seabra, (拉丁) Japanese, gen-tian-root, (英) Japanese Gentianwurzel (德)

學名 Gentiana Seabra, Bge var. Burgeri, Maxim.

基本 屬龍膽科。爲龍膽草之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。龍膽西藥名眞仙。產安徽者。由漢口運來。一產江蘇鎮江府。由上海運來。一產吉林。奉天。滿南。由山東。煙臺。牛莊。營運來。各處出產味不相上下。春秋兩次出新。

形態 龍膽爲山野自生之宿根草。莖直立。高達一二尺。葉似竹葉。作廣披針形。或長卵圓形。對生

而無葉柄。十月間於莖之頂部及上部葉腋。開藍青色合瓣花三五朵。寬展而夜合。其根形如牛膝。

採取 每年八月、十一月、十二月。採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡使龍膽。採得陰乾。用時。削刀切去鬚。上頭子。到細甘草湯。浸一宿。漉出。曝乾。用龍膽苦寒。空腹。餌之。令人溺不禁。

性質 苦。澆。大寒。無毒。

成分 爲苦味。越棧斯質。黃色。脂肪油等。

效能 清肝火。清溼熱。用係瀉火。燥溼之健胃藥。又治慢性胃黏膜炎。

作用 助胃液分泌之不足。以促進消化之功能。并能激發精神。使腸之微血管收縮。且含有糖質。能助長酵素之作用。

主治 骨間寒熱。爲劑邪氣。續絕傷。定五臟。殺蟲毒。(本經)除胃中伏熱。時氣。濕熱。熱瀉。下痢。去腸中小蟲。益肝膽氣。止驚傷。久服益智。不忘。輕身耐老。(別錄)



(一) 龍膽



(二) 龍膽

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍膽曰。治小兒壯熱。骨熱。驚癇入心。時疾熱黃。癰腫口乾。【宋】大明日華諸家本草論龍膽曰。客忤疳氣。熱狂。明目。止煩。治瘡疥。【金】張元素珍珠囊論龍膽曰。去目中黃及睛赤。腫膜。瘳肉。高起。痛不可忍。【元】李東垣用藥法象論龍膽曰。退肝經邪熱。除下焦溼熱之腫。消膀胱火。【明】李時珍本草綱目論龍膽曰。療咽喉痛。風熱盜汗。【明】趙希慈本草綱目論龍膽曰。草龍膽其味大苦。澆。其性大寒。而無毒。足厥陰足少陰足陽明三經藥。入足少陰。除本經之熱。腎主骨。故主骨間寒熱。熱極生風。則發爲搐。重則變爲癇。瀉熱邪氣。

之中下二焦者。非此不去。熱去則諸證自解。五臟有熱則不安。熱除則五臟自定。苦澁而寒。故殺蟲毒。大苦大寒。故能滌除胃中所伏實熱。及時氣溫熱。熱洩下痢。去腸中小蟲。熱清則肝膽之氣亦清。故益肝膽氣而止驚惕也。久服益智不忘。輕身耐老。則非其任矣。【明】李士材本草圖解論龍膽曰。龍膽苦清大寒。肝膽經藥也。主肝經邪熱。下焦溼熱。目病赤腫。瘵肉。小兒客忤疳氣。去腸中小蟲。【清】黃宮繙本草求真論龍膽曰。龍膽草大苦大寒。性稟純陰。大瀉肝膽火邪。兼入膀胱腎經。除下焦溼熱。與防己功用相同。故書載治骨間寒熱。驚癇蟲隔。天行痘疫。熱利黃疸。寒溼脚氣。咽喉風痺。並酒炒同柴胡則治赤疔。肉。但此苦寒至極。馮兆張云。其等於嚴冬。黠淡慘重。萬草凋殘。苦寒伐標。宜暫而不宜久。如聖世不廢刑罰。所以佐德意之無窮。苟非氣壯質熱者。率輕投其敗也必矣。

暗灰褐色。有不整輪節。上面帶壘痕。間附有殘壘。兩側及下面簇生多數副根。橫斷面作暗褐色。其木心中有錯亂脈管束。副根則帶黃褐色。有縱橫橫斷面呈褐色。木部有暗色。其邊緣有作放射狀排列之脈管。本品不含澱粉。味甚苦。又依日本藥局方云。龍膽（即健實亞那根）者。為苦味健胃劑。於凝性的消化不良。無胃加答兒症狀。之消化不良。酒客之消化不良等。均用之一日數回。自〇・三至一〇。為浸劑到劑散劑。製劑如左。
一健實亞那根幾斯〇・五至二〇丸劑溶劑二健實亞那丁幾一〇至二〇水劑三苦味丁幾一〇至二〇水劑。英美學說謂龍膽草產中國之齊胸山谷。及歐羅巴之南方等處。該草高約三尺。其根可入藥。內含一精。即珍提昆靈。近藥肆中所出售者多為次等。惟切成大片者為上品。有數種常出售之龍膽草根。如紫色龍膽草。有點龍膽草。藍縷形龍膽草等。而植物學家或以為紫色龍膽草根。即藥肆中常出售之紅色龍

膽草根也。英國出售之龍膽草根。多從日耳曼與瑞士運至。而瑞士人喜用此為補胃藥。其作用為苦性補藥。如胃不消化。並病方退而欲補其精神。惟此為有名之藥。問有人用以治依時而作之病。並用為驅蟲藥。與他種苦性藥相同。用水泡酒泡均可。處方以龍膽草一分切片。沸汽水十分。泡兩點鐘。再加火熬一刻鐘去渣。用絞盤絞之。入玻璃瓶氣成膏為度。常用以配藥丸。每服四釐至二分。（龍膽草膏方）又方龍膽草膏。大黃末。番礱各等分。即以龍膽草膏。加水。和勻為丸。每服丸一二粒。如身弱胃不消化服之甚效。（龍膽草丸方）又方龍膽草二錢。柑皮五分末。大茴香五分末。火酒二兩。清水六兩五錢。先以火酒浸龍膽草。柑皮。大茴香。待兩點鐘後。然後將水加入。濾淨。每服四錢至八錢。能開胃補身。如虛弱神氣不足。胃不消化。及病後熱度太低。服之均妥。（龍膽草柑皮茴香方）

且味苦如膽。故專瀉肝膽之火。主治目痛頭暈。因腸痔痛。驚癇邪氣。小兒疳積。凡屬肝經熱邪為患。用之神妙。其氣味厚重而沉下。善清下焦溼熱。若寢癢便毒下疳。及小便澀滯。男子陽痿腫脹。或光亮出膿。或室中疼痛。女人陰癢作痛。或發瘡生瘡。以此入龍膽瀉肝湯治之。皆苦寒勝熱之力也。亦能除胃熱。止蛔蟲。蓋獨得苦即安耳。但脾胃虛者少用。【景山對曰】龍膽草亦大苦大寒之品。純以清熱見長。主骨間熱者。大寒能清骨熱也。主驚癇。止驚惕。皆清熱寧心之效。邪氣者。即邪熱之氣也。續絕傷。定五臟。則因其却熱除邪。而甚首之耳。蟲毒。是南方溼毒之厲氣。腸中之蟲。皆溼熱蘊生所生也。大苦大寒。燥溼勝熱。自能辟殺殺蟲。別錄主胃中伏熱。時氣溫熱。皆苦寒之用。主熱泄下利。亦善燥溼。寒勝熱。與芩連之治溼熱泄瀉。而并治積滯熱痢同義。益肝膽氣者。清其邪熱。即所以益其正氣。非謂苦寒之品。能補肝膽也。又曰。龍膽草大苦大寒。亦與連芩同功。但本經稱其味

國外學說 和漢藥考曰。龍膽根莖長約十仙米。粗約五密米。作

還。則其性能守而行之於內。故獨以治骨熱者。餘則清泄肝膽有餘之火。疏通下焦溼熱之結。足以盡其能事。而微瘡之毒。疔疔之毒。皆屬相火猖狂。非此等大苦大寒。不足以瀉其烈。是又疏泄下焦之餘義矣。

配合應用 ①草龍膽同白芍藥。甘草。茯神。麥門冬。木通。主小兒驚癇入心。壯熱。骨熱。時疾熱。黃口疳。

②同苦參。牛膽。治發痘。

③同苦參。蛆蟲灰。青黛。治小兒一切疳熱狂語及疥疥。

④治蛇蟲攻心如刺。吐清水。龍膽二兩。去頭到水二盞。煎取一盞。去滓。隔宿勿進食。平旦時一頓服之。即差。

⑤同生地黃等分。治溼熱傷血。分。侵大腸。以致卒下血。多服必效。

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛弱作瀉。與無溼熱實火者禁用。及空心餒之令人溺不禁。惡地黃。小豆。貫衆。爲之使。

著名方劑 龍膽瀉肝湯。治脇

十六畫 龍

痛。口苦。耳聾。耳腫。筋痿。陰溼。熱疔。陰腫。白濁。澀血。局方。龍膽三分。酒炒。黃芩。炒。梔子。酒炒。澤瀉。各一錢。木通。車前子。各五分。當歸。二分。柴胡。一錢。甘草。生地。各三分。酒炒。右十味水煎服。

參攷資料 ①龍膽味苦性寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。足厥陰少陽經氣分藥也。其用有四。除下部風溼一也。及溼熱二也。膝下至足腫痛三也。寒熱脚氣四也。下行之功。與防己同。酒浸則能上行外行。以柴胡爲主。龍膽爲使。治眼中疾。必用之藥。張元素。②相火寄在肝膽。有瀉無補。故龍膽之益肝膽之氣。正以其能瀉肝膽之邪熱也。但大苦大寒。過服恐傷胃中。生發之氣。反助火邪。亦久服黃連。反從火化之義。別錄。久服輕身之說。恐不足信。李時珍。③胃氣虛者。服之必嘔。脾氣虛者。服之必瀉。張石頑。

【龍膽草】即龍膽之處方用名。詳【龍膽】條。

【龍膽甲】即穿山甲之古籍別名。與見郭璞賦。詳【穿山甲】條。

【龍鬚草】綠柏草。鐵線草。鐵線人字草。梓植草。了雞草。鹿蹄草。綱目拾遺。草龍鬚。述異記。

【龍鬚草】多生山澤間。

【龍鬚草】形態 龍鬚草爲溼草類之一種。數雨後發苗。似扁苔而小。又似野席草相類。橫生布地。小滿時抽莖開花。色青細。可供藥用。

性質 溫。無毒。

主治 散風火。理溼熱。療一切疔疥。口咽諸毒。火疔。牙疔。

【龍鬚草】即野席草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳【野席草】條。

①即石龍鬚之處方用名。詳【石龍鬚】條。

【龍鬚菜】產地 生海邊石間。

【龍鬚菜】形態 龍鬚菜爲菜類之一種。叢生無枝。葉狀如柳根。數細如絲。長者尺餘。如髮菜而色白。可供藥用。

【龍鬚菜】即鹿角菜之古籍別名。與見益京誌。詳【鹿角菜】條。

【龍鬚草】即魚腥草之古籍別名。與見和漢藥考。詳【魚腥草】條。

【龍鬚藤】產地 出廣東東莞縣境。

【龍鬚藤】形態 龍鬚藤爲蔓草類之一種。其藤微細如髮。直起數丈。而無一節。飛越數樹。如千百游絲牽綴。或紅或紫。或具有五色。生無根。樹。長發蒂。其花與子可供藥用。

主治 補筋骨。祛風。解毒。能循經絡。無微不至。浸酒服。

參攷資料 龍鬚藤之液汁。和細土石灰。塗發瘡。其堅如鐵。雖猛火不裂。趙學敏。

【龍鬚香】即沈香之埋土中。日久不待削而成薄片者。功用詳【沈香】條。

【龍鬚草】即景天之古籍別名。與見和漢藥考。詳【景天】條。

【龍鬚蕩】即常春藤之古籍別名。與見日華諸家本草。詳【常春藤】條。

【龜甲】即龜版之原名。詳『龜版』條。

【龜肉】 性質 甘酸。溫無毒。 主治 養食。除溼痺。風痺。身腫。痿折。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論龜肉曰。治筋骨疼痛。及一二十年寒嗽。止瀉血。血痢。

參攷資料 龜肉作羹。大

補而多神。不可輕殺。書家所載甚多。此不具說。(陶弘景) 六甲日十二月。俱不可食。損人神。不可合豬肉。菘米。瓜。菹。害人。(孫思邈) 按周處風土記云。江南五月五日。煮肥龜入鹽豉。蒜。葱。食之名曰菹龜。取陰內陽外之義也。(李時珍)

【龜肉酒】 基本 本品係用水 龜肉和麴釀成之酒。

主治 多年咳嗽。大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆瘥。

【龜血】 性質 鹹寒。無毒。 主治 塗脫肛。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論龜血曰。治打撲傷損。和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。

【龜兒草】即天慈草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『天慈草』條。

【龜版】 原名 龜甲。 命名 說文龜頭與蛇

同。故從它。下象其甲足尾之形。故曰龜。(官古蛇字)藥用其甲。故俗名之曰龜版。

處方用名 元武版。敗龜版。炙坎版。生龜版。

古籍別名 玄衣督郵。神蜃。(本經)敗將。(日華)漏天機。(圖經)下甲。(和漢藥考)水馬兒。

外國名詞 Tortoise-shell (英)

基本 龜屬於爬蟲類之龜族。板者其甲殼也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。湖北安徽沿揚子江下游一帶均有出。江蘇鎮江府亦有出。三月新。又有一種產自暹羅。名為洋版。

形態 龜棲息於川澤池沼。以鱉蟲及小魚類為其食餌。亦脊椎動物之一也。(龜為兩棲動物。血溫頗低。較氣中溫度僅高約一二度)體軀扁平。略帶橢圓形。背腹

兩面。俱有堅甲。連結若匡。內具骨節。其背腹兩甲。係變性之皮膚所成。頭部形如圓錐。口無齒。而有如鳥之角嘴。四趾皆短。趾端有爪。便掘土之用。各趾間有蹼相連。便泅水之用。背甲有六角紋十三。分三行並列。周圍有六角紋二十五。繞其邊緣。腹甲有縱橫溝。作暗黑色。一旦遇敵。則其頭尾四肢。俱縮入甲中。故有六藏之名。性質愚鈍。運動亦甚遲緩。然生活頗強。雖數月斷食。亦可不死。且得保五百歲之長壽。(龜之長壽。與鶴相並。人皆重之。中國自古以龜占吉凶。謂之龜卜)春日掘穴地中。產卵其間。覆以落葉。更覆以砂。受太陽之熱。自然孵化。至冬則蟄伏不出。

採取 巖山諸谷。因風墜自敗者最佳。田池自敗者。次之。打壞者。又次之。近時恒在秋冬間採取之。

製法 以龜甲鋸去四邊。石上磨淨。更以灰火炮過。塗酥炙黃。用亦有酒炙。醋炙。豬脂炙。燒灰用者。

性質 甘平。有毒。

效能 養陰液。潛風陽。用作強壯藥。

主治 甲治漏下赤白。破癰。癩。疥。五痔。陰蝕。濕痺。四肢重。小兒顛。不食。久服。輕身。不飢。(本經)

驚。患氣。心腹。痛。不可。久。立。骨。中。寒。熱。傷。寒。勞。復。或。肌。體。寒。熱。欲。死。以。作。湯。良。久。服。益。氣。資。智。使。人。能。食。燒。灰。治。小。兒。頭。瘡。癩。癩。女。子。陰。瘡。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論龜版曰。殼主久嗽。斷遺。唐甄權藥性本草論龜版曰。燒灰治脫肛。宋日華諸家本草論龜版曰。版治血麻痺。元朱丹溪本草衍義補遺論龜版曰。下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血。刺。續。筋。骨。治。勞。倦。及。四。肢。無。力。

【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臍瘡。【明】程希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜為之長。稟金水之氣。故味鹹而甘。氣平。其性神靈。能變化。凡入藥。勿令中溼。中溼。則。遂。其。變。化。之。性。而。成。癰。瘡。於。腹。中。故。育。有。毒。也。氣。味。俱。陰。入。足。

【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臍瘡。【明】程希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜為之長。稟金水之氣。故味鹹而甘。氣平。其性神靈。能變化。凡入藥。勿令中溼。中溼。則。遂。其。變。化。之。性。而。成。癰。瘡。於。腹。中。故。育。有。毒。也。氣。味。俱。陰。入。足。

【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臍瘡。【明】程希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜為之長。稟金水之氣。故味鹹而甘。氣平。其性神靈。能變化。凡入藥。勿令中溼。中溼。則。遂。其。變。化。之。性。而。成。癰。瘡。於。腹。中。故。育。有。毒。也。氣。味。俱。陰。入。足。

【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臍瘡。【明】程希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜為之長。稟金水之氣。故味鹹而甘。氣平。其性神靈。能變化。凡入藥。勿令中溼。中溼。則。遂。其。變。化。之。性。而。成。癰。瘡。於。腹。中。故。育。有。毒。也。氣。味。俱。陰。入。足。

少陰經。方家多入補心藥用。以心藏神。而龜住有神。借其氣以相通。且得水火既濟之義。實非補心之正藥也。其主骨中寒熱。及傷寒分復。凡發寒熱欲死。痲瘧者。皆陰虛而邪熱為病。經曰。傷於濕者。下先受之。溼痺四肢重弱。亦腎陰虛而邪氣易犯。腎主骨。腎虛則小兒骨門不合。腎為五臟。陰中之陰。陰虛則火熱偏至。而為驚悸。氣。心腹痛。此藥補腎家之真陰。則火氣自降。而寒熱邪氣俱除矣。益陰除熱。輒堅。故主瀉下。赤白痢。五痔。陰蝕。陰瘡。及小兒頭瘡也。經曰。邪熱不殺。殺去故令人能食。能食則脾胃得所。養而能思。思作容。故資智之功也。【明】李士材本草圖解論龜版曰。龜甲鹹平。腎經藥也。冀北方純陰之氣而生。大有補水制火之功。故能強筋骨。益心智。止咳嗽。截久瘧。去瘀血。止新血。大凡滋陰降火之藥。多是寒涼損胃。惟龜甲益大腸。止瀉洩。使人進食。真神良之品也。龜鹿皆蠟而壽。龜首藏向腹。能通任脈。故取其甲以養陰。鹿

十六蠶 龜

鼻反向尾。能通督脈。故取其角以養陽。去腦用底。去黑皮。酥炙。【清】黃宮繆本草求真論龜版曰。龜版甘鹹微寒。冀北方之氣而生。乃陰中至陰之物。入足少陰腎經。兼龜性有神。故能入心以通腎。凡心虛血弱。而見分熱骨蒸。腰膝酸疼。老癆瘵。痿痺崩漏。瀉痢。五瀉難產。小兒顛門不合等症。服此皆能見效。李時珍云。龜鹿蠟而壽。龜首常踐向腹。能通任脈。故取其腹以通心。補腎補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命。補精補氣。皆養陽也。龜性治與鱉甲相類。但鱉甲色青。應木。走肝益腎。以除熱。龜甲色黑。應水。通心入腎。以滋陰。然皆至陰大寒。多用必傷脾土。龜大自死者良。酥炙。燻灰用。惡人參。龜尿。走竅透骨。染鬚髮。治啞聲。服板不宜中溼。中溼則板末變為癩瘕。

近人學說 賈九如曰。龜甲龜之性善靜。常居土中。近水澤。過陰兩則出行。其頭常縮。眼耳口鼻皆伏於地。得地之陰氣最厚。其底甲純陰。氣味厚濁。為濁中濁品。專入

腎臟。主治咽痛口燥。乾喘咳嗽。或勞熱骨蒸。四肢發熱。產婦陰脫。發燥。病後腎水虛。致相火無依。此非氣柔真靜者。不能息其炎上之火。古云至靜而能制羣動。誠為妙理。又取其汁潤滋陰。味鹹養脈。主治朝涼夜熱。盜汗遺精。神疲力怯。腰痛。腿酸。癱瘓拘攣。手足虛弱。久癆血枯。小兒顛門不合。病由真臟衰。致元陰不生。非此味潤純陰者。不能補其不足之陰。古云。寒養腎精。職此義耳。

配合應用 ①治瘧疾不止。龜版燒存性。研末。酒服方寸匕。(海上方)

②治抑結不散。用龜下甲酒炙五兩。附柏葉炒一兩半。香附童便浸炒一兩。為末。米糊丸。梧子大。每空心溫酒服一百丸。

③治胎產下痢。用龜甲一枚。醋炙。為末。水飲服一錢。日一。(經驗方)

④治難產催生。祕錄用龜甲燒末。酒服方寸匕。摘玄治產三五日不下。垂死。及矮小女子交骨不開者。用乾龜殼一個。酥炙。婦人頭髮

一握。燒灰。川芎。當歸各一兩。每服秤七錢。水煎服。如人行五里許。再一服。生胞死胎俱下。

⑤治腫毒初起。取龜甲一枚。燒研。酒服四錢。亦治婦人乳毒。(小品方)

⑥治小兒頭瘡。用龜甲燒灰數之。亦治月蝕耳瘡。又治口吻生瘡。(聖惠方)

⑦治瘰癧疔。生龜一枚。取殼醋炙黃。更煨存性。出火氣。入輕粉。麝香。葱湯洗淨。搽敷之。(急效方)

⑧治人咬傷。用龜版竹。豃肚骨各一片。燒研。油調搽之。(葉氏摘玄方)

⑨治豬咬成瘡。龜版燒研。香油調搽之。(葉氏摘玄方)

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 陰虛而無熱者。禁用。瘰癧。瘰癧。畏狗。貼。癩。凡入丸散藥中。須研極細。否則留滯腸胃。能生癩。並須勿令中溼。中溼即有毒。

著名方劑 ①大補陰丸。治陰虛火旺。骨蒸勞熱。耳聾耳鳴。脈洪大。不能峻補者。(丹溪方) 取龜版。

一七六七

(酒炙)熟地黃各六兩。黃柏、知母各四兩。右爲末。以猪脊鬃搗和爲丸。梧子大。每服百丸。空心溫酒或鹽湯下。①龜鹿二仙膠。大補精血。益氣養神。鹿角(血者)十斤。龜版(自敗者)五斤。甘杞子三十兩。人參十五兩。右用鉛線如法熬膠。初服酒化一錢五分。漸加至三錢。空心下。

參攷資料 ①龜版膠用自敗龜版洗淨搗碎。浸三日。以桑柴火熬煎二晝夜。其膏始成。(今人熬膏。止在釜中煎一晝夜。如何能成膠)夫龜之爲物。至靈多壽。蠶可供卜。壽至千年。其甲名敗龜版。以此入藥。大有補陰之功。常居水中。稟北方之氣。以生。故能補陰。治陰治勞也。凡有陰虛。血弱。寒熱。傷勞。癆瘵。痿痺。五痔。溼痺。以及婦兒一切虛勞。風痞。服之最宜。②秦龜即生於秦者。秦地山中多老龜。極大而壽。龜甲即非止秦地。有四方皆有之。但取秦地所出大者爲勝。今河北獨流釣臺甚多。取龜筒治療。亦入衆藥。止此二種。各逐本條。以其靈於物。方家故用以補心。然甚

有驗。(寇宗奭)自格物考云。天有先春之震。山多自死之龜。龜聞雷音。則口中所含以養者。便吐而昂首。因時令尚早。無蟲可食。多致餓死。血肉腐爛。滲入下甲。此其敗龜版也。故取水龜。當用下甲。(李士材)③龜髓二甲。本經所主大略相似。今人有喜用鼈甲。惡用龜甲者。有喜用龜甲。惡用鼈甲者。皆一偏之見也。二者咸至陰之物。鼈甲走肝。益腎以除熱。龜甲通心。入腎以滋陰。第鼈甲無毒。可多用。龜甲非千年自死者。則有毒。故方書所用。曰敗龜版者。取其長年。則得陰氣多。故有益陰之功用耳。若今新剖之甲。斷平有毒。不宜頻使用者。不可不詳辨也。(穆希雍)④龜版爲治痛風要藥。丹溪於陰火痛風。必用之。蓋因其多屬血虛。實取其能益陰氣。按丹溪更取龜版以治痿。觀於虎潛丸而益見。意龜版善滋肝腎之陰。故於筋骨之病。無不宜之歟。龜膠以龜版煎就。本草載版不如膠之說。以版炙酥。煨用。氣味尚淡。而膠之味較濃。故用版不如用膠耳。合鹿膠。名龜鹿二仙膏。

爲一陰一陽。鹿膠較補腎陰中之陽。龜膠較補腎陰中之陰也。(劉潛江)⑤龜鹿皆靈而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心補腎補血。皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命補精補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱。自可心解矣。(李時珍)

【龜背玄精石】即玄精石之處方用名。詳「玄精石」條。

【龜湯】採取 取龜置瓦盆中。淫發失尿。急以物收取之。又法以紙柱火。以點其尻。亦致失尿。但差緩耳。李時珍曰。今人惟以豬鬃或松葉刺其鼻。即尿出。似更簡捷也。主治 滴耳。治眼。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龜溺曰。點舌下。治大人中風。舌瘡。小兒驚風不語。摩胸背。治龜胸龜背。

參攷資料 龜尿走竅透骨。故能治瘡癰及龜背。染鬚髮也。按岫巖神書。言龜尿磨器。能令輓磨

黑書石。能入數分。即此可推知矣。(李時珍)

【龜筒】即鱗龜皮之原名。詳「鱗龜皮」條。

【龜膠】即石勳之古籍別名。典見綱目。詳「石勳」條。

【龜腳燈】即石勳之俗名。詳「石勳」條。

【龜殼】即殼之古籍別名。典見綱目。詳「水」條。

【龜膽汁】性質 苦寒。無毒。主治 痘後目腫。經月不開。取點之良。

十七畫

【優華】即芭蕉之古籍別名。典見梵語。詳「芭蕉」條。

【優鉢鉢】即無花果之古籍別名。典見廣州志。詳「無花果」條。

【歷鷲】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【歷鷲】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【膠汁】即人乳之古籍別名。典見綱目。詳「人乳」條。

【嫺孩兒】即樹蘭草之俗名。詳「

【罌粟草】條。

【罌孩草】即香草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「香草」條。

【烟耐草】古籍別名。香草。(俗名)綱目拾遺。罌孩兒。

【形庭】罌粟草為芳草類之一種。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開細花成簇。結子亦細。植於盆內。暑月探置髮際。芳香可辟鼠。亦供藥用。

性質 辛溫。無毒。

主治 辟惡行氣。和中活血。止霍亂吐瀉。去臭氣。發瘧者寒。鼻能令寒漸輕。

【罌古】即罌粟之古籍別名。典見廣雅。詳「罌粟」條。

【應條】即罌粟之古籍別名。典見吳普本草。詳「罌粟」條。

【懋角】即羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羚羊角」條。

【錢】即山韭之古籍別名。典見綱目。詳「山韭」條。

【擊正】即礪之古籍別名。典見綱目。詳「礪」條。

【擊李子】即李子熟而自裂者之

別名。典見綱目。詳「李子」條。

【擊藍】即甘藍之古籍別名。典見農政。詳「甘藍」條。

【楨】即楨之日本名。詳「楨子」條。命名 本品善木也。故字從豆。而名之曰楨。

【形庭】楨為喬木類之一種。有黃白兩色。皮青而澤。肌細而膩。質重而堅。狀與梓楡相似。惟無香氣。木材常為梓楸。槌器之用。其木皮可供藥用。

性質 辛平。有小毒。

主治 和楡皮為粉食。可斷穀救荒。

【檀香】原名 旃檀。命名 檀善木也。故字從豆。豆者善也。而氣芬芳。而郁故名。

處方用名 檀香片。

古籍別名 浴香。旃檀。(綱目)真檀。檳榔。白銀香。黃英香。旃檀。 (和漢藥考)

外國名詞 Santalum album, L. (拉丁) Lignum Santali album (英)

基本 屬檀香科。為檀之木質。

產地 陳仁山藥物生產辨云。檀香產美國屬地。們為正。英國雪梨等埠。次之。和漢藥考曰。無日本產。多係產生東印度及馬來半島。

【形庭】白檀樹為常綠喬木之寄生性植物。樹幹高二丈至三丈。葉作長卵圓形。末端尖銳。基部亦作銳形。具短葉柄。對生。花為裸花。有四裂或五裂之萼。果實為核果。檀香為四五寸粗之幹木。色黃褐或淡黃。質緻密。有一種芳香。販賣品中有橫斷薄片如煎餅狀者。最良品木質堅硬。色帶黃。燒之發一種異香。其爽適。

製法 宜以紙封收。不令洩氣。性質 辛溫。無毒。成分 為揮發油及樹脂等。效能 理氣。止痛。溫中。和胃。用作香。宜衝動藥。主治 消風熱。腫毒。



檀香

歷代記載攷因 【唐】陳藏器本草拾遺論檀香曰。治中惡鬼氣殺蟲。【宋】大明日華諸家本草論檀香曰。煎服。止心腹痛。霍亂。腎氣痛。水磨塗外腎。并腰腎痛處。【金】張元潔珍珠養神檀香曰。散冷氣。引胃氣上升。造飲食。【明】李時珍本草綱目論檀香曰。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭。令赤。磨汁塗之。其良。【明】程希樞本草經疏論檀香曰。本經無正文。弘景云。白檀消熱。驅毒。主心腹霍亂。中惡鬼氣。殺蟲。日華子云。檀香熱無毒。治心痛。霍亂。腎氣痛。腹脹。服水磨傳外腎。并腰腎痛處。詳其所主諸證。亦是芬芳開散。辟惡散結。除冷之藥也。今人多供燈。然非上藥。沈水者不入藥。【清】黃宮繡本草求真論檀香曰。白檀香氣味辛溫。薰之清爽可愛。凡因冷氣上結。飲食不進。氣逆上吐。抑鬱不舒。服之能引胃氣上升。且能散風。辟邪。消痛。作腫。功專入脾。與肺。不似沉香力專主降。而能引氣下行也。但此動火耗氣。陰虛火盛者。切忌。取白濕色白者佳。紫色為紫檀。氣

一七六九

十七畫 檀

寒味鹹。專入血分。

國外學說 貿易備考（日本大藏省記錄局藏版。明治十八年十月刊行）云。白檀為檀香之一種。檀香本有白檀黃檀二種。進口貨中。黃色者呼為白檀。油色者呼為黃檀。皆上品也。惟內黃外白者為下品。多供佛前燃燒用。又其輕而脆者曰沙檀。其下者曰星香。又曰破酒香。日本所稱之白檀木有二種。一種樹葉似椴。俗呼奇楠香。一種類似扁柏。幹必左撓。木理似白檀。微有香氣。然實非白檀。所謂左紐柏是也。白檀雖亦名檀香。其實與黃檀顯然不同。白檀專用木心。黃檀專用外層。其基本植物亦全異。以白檀木製出之油。不惟色澤香味有別。即其含有之成分亦各殊也。又日本藥局方曰。白檀為白檀樹致密堅硬之木材。以顯微鏡檢視橫斷面。見有細胞一二列構成之纖維。其細胞延長為半徑性。木纖維有堅厚之壁。賦管或單獨。或二三連合。內含黃色之油滴。木細胞中含有菱形之葑酸鹽單晶。受熱則發固有之芳香。又和漢藥考

曰。白檀油。以白檀木削片。與水一同蒸餾。遂得淡黃之濃稠液體。有特異之芳香。味奇烈稍苦。比重〇・九七五至〇・九八五。於分極光線為左旋性。水難溶解。酒精則易溶。現中性或弱酸性之反應。又荷蘭藥鏡載有檀香之產地。形態效能等錄之如左。（產地）檀香有二種。一種產印度之地木兒島最多。而印度南海之馬羅克諸島及爪哇島亦產之一種產美洲。（形態）產印度者。樹高如胡桃樹。數枝歧分。葉對生如十字。色綠如梨葉。長四指橫徑許。廣三指橫徑許。老樹則葉色帶黃。花單瓣。鐘狀。四出。色深紫黑。雄蕊八。雌蕊一。實如櫻子。又似杏子。初綠色。熟則青黑。味淡。產美洲者。樹高一丈五尺許。亦分枝。葉橢圓。末微尖。色暗綠。有光澤。長三指橫徑。花生葉底。攢簇如車輪。芳香可愛。花瓣六。雄蕊五。（一說雄蕊六）雌蕊一。萼六。出子圓。微有稜。色紫。有二室。仁圓如卵。樹幹之中心為黃檀。外層為白檀。黃檀質重實。有光澤。色淡黃。或帶微赤脈理。味微苦。有佳香。摩

擦或截斷之。氣尤麝郁。若合葑蘇。麝香。肉桂。諸香於一處者。或云根亦香者。方為上品。或云黃色如雞子黃。帶微赤之脈理。香氣烈者。乃稱上品。白檀白色。質亦重實。微有香氣。或無香氣。生樹及新伐者。皆無香氣。乾則生香。地木兒島所產之。嫩木色白。無香氣。經年。中心變黃。或云島北多產黃檀。運銷中國及印度。或云爪哇島所產皆白檀。下品為多。（效能）白檀黃檀俱用。黃檀尤效。欲稀釋血液。或令其發汗。宜製為泡劑用。以之解散胃寒及傷冷毒。微毒。宜製為煎劑用。兼治諸症。發汗。利小便。治頭眩。眩暈。心動悸。使頭腦健運。精神活潑。白檀有稀釋稠血之效。善治脾病及心氣病。煎劑。用錢半至二錢。散劑。為末。用一錢已足。此藥固有佳香。故多用為香料。以水與黃檀煎劑。而取其油。冷則稠厚。香氣似龍涎香。以燒酒蒸餾。則得有佳香之華爾斯。均以製香料用。

參攷資料 白檀調氣。引芳香之物。上至極高之分。故宜橙橘之屬。佐以葑蘇。輔以葛根。稍砂。益智。豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上。嗚咽之間。為理氣聖藥。（李杲）〇枋最輕云。白檀檀塗身。能除一切熱。儻今西南諸番。皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。所有菩薩師。妙醫術。作五香飲。濟人。沉香飲。檀香飲。丁香飲。澤蘭飲。甘松飲。皆以香為主。更加別藥。有味而止渴。兼補益人也。道書檀香。謂之浴香。不可燒。供上真。（李時珍）〇檀善木也。故字從真。真善也。釋氏呼為旃檀。以為湯沐。猶言離垢也。番人說為真檀。雲南人呼紫檀為旃。沉香即赤檀也。（李時珍）〇白檀出海南。其樹如檀。（陳藏器）〇紫真檀出崑崙盤盤國。雖不生中華。人間遍有之。（蘇恭）〇檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。即其類。但不香爾。（蘇頌）〇按大明一統志云。檀香出廣東。瓊南及古城。真臘。爪哇。渤泥。暹羅。三佛齊。回回等國。今嶺南諸地亦皆有之。

用宜忌 凡陰虛火盛者禁用。忌火。

用量 五分至八分。

樹葉皆似荔枝。皮青色而澤滑。葉延珪香譜云。皮實而色黃者為黃檀。皮潔而色白者為白檀。皮腐而色紫者為紫檀。其木竝堅重清香。而白檀尤良。宜以紙封收。則不洩氣。正佐格古論云。紫檀諸溪。扇出之性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文新者。以水浸之。可染物。真者指壁上。色紫。故有紫檀色。黃檀最香。俱可作帶。髹扇骨等物。(李時珍)

【檀香片】即檀香之處方用名。詳【檀香】條。

【檀香百合】即山百合之一種。詳【山百合】條。

【檀香油】性質 味苦。主治 除惡開胃。止吐逆。并治白濁。

【檀香泥】基本 檀香心中所含脂垢。

【檀香梅】即蠟梅花之香濃色如紫檀者。功用詳【蠟梅花】條。

【檀根皮】性質 辛平。有小毒。主治 塗疥疥。殺蟲。

【檉根】即黃柏根之原名。詳【黃柏】條。

【檉刺】即雲實之古籍別名。典見綱目。詳【雲實】條。

【檉乳】即檉柳脂之原名。詳【檉柳脂】條。

【檉柳】命名 本品為木之聖。故名。處方用名 西河柳。古醫別名 赤檉(日華)赤楊(古今注)河柳(爾雅)兩師(詩疏)三眠柳(衍義)兩絲。垂絲柳。蜀柳。人柳。觀音柳。長壽仙人柳。三春柳(綱目)御柳(日本)外國名詞 Tamarix chinensis, Lour. (拉丁)ギョリウ(日本)基本 係檉柳科檉柳屬。藥用其柔條。產地 陳仁山藥物生疏辨云。各省有出。廣東番禺。及河南多有種植。形態 檉柳為落葉喬木。高丈餘。皮色赤。枝細長。密生小葉如鱗

狀。夏月自枝梢抽出花軸。作穗狀。花序如穗狀。花小。萼片五枚。綠色。花瓣五枚。紫紅色。五雄蕊。一雌蕊。此植物更有特性。至秋能再開花。可供玩賞。

採取 夏秋間採得枝木葉。陰乾用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

效能 發疹。解毒。專作透發疹瘡藥。

主治 疎散。驅風。解表。發癩疹。瘡疥不出。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論檉柳曰。枝葉消痞。解酒毒。利小便。【明】李士材本草圖解論檉柳曰。檉柳即西河柳。甘鹹而平。治痧熱毒。消疥癩風。

近人學說 張山雷曰。檉柳似柳色赤。古名赤檉。爾雅謂之河柳。此吾吳俗所以皆名之為西河柳也。枝葉極細。垂垂如絲。輕揚之最

盛者。而輕霜不凋。其色轉綠。故性溫入血。而善於發汗。治瘡疹之不能透發者。其效乃瀾。潮欄目所未詳者。但透達之性極速。入煎劑不當過二錢。俗又以此煎湯。作薰蒸。指洗外治之法。則瘡疹既不透發。最忌感寒冒風。而乃脫衣露體。雖用熱湯。必有流弊。不可輕試。如在春冬天寒。尤為大忌。

配合應用 治腹中痞積。觀音柳煎湯。一。夜。五更空心飲數次。痞自消。(衛生簡易方)

治一切諸風。不問近遠。檉葉半斤。切枝亦可。荊芥半斤。水五升。煮二升。澄清入白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封。入煎湯。煮一伏時。每服一小錢。日三服。(普濟方)

治酒多致病。長壽仙人柳。嚼乾為末。每服一錢。溫酒調下。(衛生易簡方)

治癩疹瘡疥。或因風而閉者。俱用西河柳葉。同櫻桃核。煎湯洗之。即透出。(經驗方)

治小兒痧疹不出。喘嗽。煩悶。躁亂。用西河柳葉。風乾為末。水調



柳 檉

出。或赤或白。子若杜棠子。(韓保昇) 薺薇野生林壑間。春抽嫩莢。小兒搗去皮刺食之。既長。則成叢似莢。而莖硬多刺。小葉尖薄。有細齒。四五月開花。四出。黃心。有白色粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核有白毛。如金櫻子核。八月採之。根採無時。人家栽玩者。莖細葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數色。花最大者。名佛見笑。小者名木香。皆香豔。可人。不入藥用。南番有薺薇露。云是此花之露水。香韻異常。(李時珍) 禹功湯。行水之效最著。故以禹功湯名之。方用營實三錢。水一盞半。煎至一盞。空心頓服。大禹功湯。即於原方加大黃八分。大禹功丸。營實六錢。大黃一錢六分。研末糊丸。綠豆大白湯下。按營實新效方。經驗主治條云。百般水腫。屬實者。可悉用之。但脚氣衝心。病後產後。老幼諸腫。須斟酌。又微瘡結疥。毒癩。癩風。諸瘡。毒用之皆效。又諸瘡用外敷之藥。或製為藥湯洗浴。凡毒氣內攻。致腫滿。咳嗽。喘急。呼吸迫促。大小便不通。心腹脹悶。垂死者。非此湯不奏。

十七畫 營 燭 牆 猿 獲 盪 璫 環 璣 療 瘤 疝 磷 礞 筮

起死回生之效。又微毒。咽喉腐爛。久年不愈。男女膿血淋。下疳。痛癢無常。痔疾。翻花。疼痛。大便結。痔瘡。潰爛。疼痛。頭癩。白禿。當合諸藥用之。又男女諸疝。肩背胸脇強痛。自腰脚牽引小腹。變急。難於屈伸。烏附之劑。不能奏效者。用此殊有奇效。又婦人素有瘀血。或經水前後。熱入血室。或子宮熱腫。脫下。皆使小腹變急。疼痛。腰脚不伸。此症世俗誤認。為寸白。與此湯多。洩水。則子宮腫消。痛除。又婦人經閉。半年或一年。腹滿拘攣。用之妙不可言。又諸中毒症。腹脹。悶亂。或乾蠱亂。悉效。風眼。疼痛。天行赤眼。積年頭痛。欲裂。小便頻數。小兒遺尿。諸症。俱有效。又凡男婦身體壯實者。病係危急者。或徵家。或常服。洩藥。難消者。俱宜大禹功湯。稟賦虛弱者。疾病緩久者。宜禹功湯。患諸雜症。或須合諸藥用。不能煎湯者。宜大禹功丸。加減而用。其餘則隨時應變。酌用。(和漢藥考)

【營實葉】

主治 下疳。疥。烙。研洗。傳之。黃花者。更良。

【燭夜】即雞之古籍別名。典見綱

目。詳「雞」條。

【牆藤】即蛇牀子之古籍別名。典見別錄。詳「蛇牀子」條。

【猿】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳「水獺肝」條。

【獲留】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木天蓼」條。

【獲殼】即烏鴉之古籍別名。典見爾雅。詳「烏鴉」條。

【璫】即金之古籍別名。典見爾雅。詳「金」條。

【璣草子】即荷耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荷耳子」條。

【環兒花】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【環蛇】 產地 出三佛齊國。形態 環蛇形如環。大數圍。以至數十圍。逐獸則疾行。如轉車輪。若獸入環中。即斃。口眼俱生。環之半。與尻相對。其脂可供藥用。

主治 其皮可以禦刀劍。臨陣服之。刀劍不能傷。

【環腸草】 基本 環腸草為雜草類之一種。可供藥用。

主治 蠱脹。瀉乾水煎服。以小便利為度。

【環餅】即寒具之古籍別名。典見要術。詳「寒具」條。

【璣珠】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【璣珠粉】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【璣珠】即真珠之古籍別名。典見綱目。詳「真珠」條。

【瘡卵石】 主治 治瘡結。臨症。參攷資料 高陽民家子。方十餘歲。忽臂上生瘡。痛痒不可忍。醫皆不辨何症。一日忽潰。中有圓卵。取出。尋化為石。劉王部。錄以一金售之。用治。臨症如神。(池北偶談)

【磷石】即白磷之古籍別名。典見爾雅。詳「白磷」條。

【礞石】即礞母之古籍別名。典見綱目。詳「礞母」條。

【礞黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【筮竹根】 主治 作湯。益氣止渴。補虛下氣。(本經)

【筥竹葉】 性質 苦。平。無毒。

主治 咳逆上氣。發筋急。惡傷殺小蟲。本經除煩熱。風癩。喉痺。嘔吐。別錄。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論筥竹葉曰。煎湯熨瘡。亂轉筋。

【筥竹筍】 主治 消渴風熱。益氣力。消腹脹。蒸煮炒食皆宜。

【筥竹茹】 主治 勞熱。傷寒。勞復。衄血不止。婦女月水不調。小兒熱痛。

【筥竹瀝】 主治 風痙。

【筥竹】 卽百葉竹之柔。縵可爲繩索者。功用詳「百葉竹」條。

【糜御草】 卽鹿御草之古籍別名。與見本經。詳「鹿御草」條。

【糞金子】 命名 本品係糞壘中。不過數十粒。以其貴重。故名。採取 於枯時採之。有聲。收種子時。剖其中。幹內取出。形如鼠糞。而色黑。大小如麥粒。田種者尤佳。

主治 血症。炒研白湯下。並療小兒慢驚。神效。

【糞箱】 卽白秋霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「白秋霜」條。

【糞清】 卽金汁之原名。詳「金汁」條。

【糞蛆】 卽五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五穀蟲」條。

【糞藍】 基本 糞藍爲雜草類之一種。可供藥用。性質 苦。

主治 瘰癧疔白禿。洗漆瘡。見和漢藥考。詳「五穀蟲」條。

【糟底酒】 基本 本品卽經過三年。風精下之酒。主治 止嘔噦。摩風痙。腰膝疼痛。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論糟底酒曰。開胃下食。暖水臟。溫腸胃。治宿食。禦風寒。殺一切蔬菜毒。

【精油】 主治 摩風痙。腰膝痛。閉胃。煖臍。止嘔噦。解蔬菜毒。

【糟茄】 製法 以茄子切條。曬乾。淹於酒糟中。半月後。可以取用。主治 此茄燒灰存性。可塗痢口疳。

【精筍節中酒】 性質 鹹。平。無毒。主治 飲之。主療噦氣。嘔逆。或加小兒乳及牛乳同服。又摩擦湯風。

【蕪芎】 卽野芎之俗名。詳「野芎」條。

【蕪鳩】 卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳「斑鳩」條。

【縮砂仁】 卽砂仁之處方用名。詳「砂仁」條。

【縮砂殼】 卽砂仁之壳。性味較砂仁爲差。功用同於砂仁。

【縮砂薑】 卽砂仁之原名。詳「砂仁」條。

【縵華】 卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【縵露】 卽落葵之古籍別名。典見別錄。詳「落葵」條。

【縵絲湯】 主治 止消渴。殺腐瘰。

【鱖魚】 卽鱖魚之別名。典見動物學大辭典。詳「鱖魚」條。

【聯步】 卽鱖魚子之古籍別名。典見斗門方。詳「鱖魚子」條。

【聯貼】 卽豬脾之原名。詳「豬脾」條。

【膽八香】 產地 生安南諸地。形態 膽八爲香木類之一種。幹如椎木。葉鮮紅色。類檳榔。其質榨油。以和諸香。可供藥用。

主治 辟惡氣。

【膽星】 卽天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【膽草】 卽龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍膽」條。

【膽南星】 卽天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【膽瓶蕉】 卽芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【膽礬】 原名 石膽。命名 本品色味似膽。故名。俗因其狀似礬。遂呼爲膽礬也。

古醫別名 黑石。石礬。畢石。

本經(君石(當之)銅勒(吳普)立制石丹礬青石子(和漢藥考)

外國名詞 Sulfus cupricus.

(拉丁) Copper-vitriol, blue Vitriol. (英) Blauer Vitriol. (德)

基本 係銅礦中自然生成。或

藍青色玻璃狀光澤之結晶塊。或垂下作鐘乳狀。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

礬礬產德國爲上。架喇吉打來者亦可。日本來者次之。和漢藥考曰。日本各地銅山岩孔或洞穴中產此。

形態 礬礬即化學上之硫酸銅(Cu SO₄·5H₂O)爲藍青色透

映斜方柱稜柱狀結晶體。(煮礬礬或熟礬)放置乾燥空氣中。即漸漸風化。變爲白色(生礬)溶於冷水熱湯尤易。但不溶於酒精。味爲收斂性。

採取 春季採之。須採形似空青銅嘴色。磨鏡作銅色者良。昔時用天產品。現時概用金銀精鍊處副產物精製。供藥用。

十七畫 膽

性質 酸。辛。寒。有毒。

效能 吐風痰毒物。治喉痺咳嗽。外用作腐蝕藥。內服作催吐藥。及爲收斂性眼科藥。

主治 明目目痛。金瘡。諸癩癩。女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血。諸邪毒氣。令人有子。鍊餌服之。不

老。久服增壽神仙。(本經)散癥積。咳逆上氣。及風痰惡瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇頌新修本草論膽礬曰。帶下赤白。面黃。女子羸急。【宋】蘇頌嘉祐圖經本

草論膽礬曰。加入吐風痰藥最快。【宋】大明諸家本草論膽礬曰。治

蟲牙。鼻內息肉。【清】黃宮繡本草求真論膽礬曰。膽礬又名石膽。產

於銅坑之中。得銅精氣而成。味酸而辛。氣寒而澀。功專入膽。涌吐。風

熱痰涎。使之上出。蓋五味惟辛爲散。惟酸爲收。五性惟寒勝熱。風熱

盛於少陽。結於痰。垢汗之氣橫而不解。下之沉寒而益甚。凡因溼熱

淫火。見爲陰蝕崩淋。寒熱風痰。毒氣結聚牢固。見爲咽腐喉痺。乳蛾

風熱。痰垢結聚。見爲咳逆癰瘡。目痛難忍。及金瘡不愈諸毒。內閉膠

結。見爲癰疽牙疔。種種等症。服此力能涌吐上出。去其膠痰。化其結

聚。則諸症悉除。故古人之治喉痺。乳蛾。用米醋煮真鴨嘴。礬礬爲末。

醋調。探吐膠痰。即瘳。又治紫白癩。風。同牡蠣生研。醋調。服之。即愈。又

治胃脘蟲痛。以茶清調膽礬末。吐之。即除。又治馬牙疔。紅棗去核。入

膽礬煨赤。研末敷之。追去痰涎。即效。百蟲入耳。用膽礬和醋灌。即出。

按此功專涌吐。何書又言酸寒能收。不知昔言收斂。乃是取辛。收其

熱毒。上涌而出。非以收其入內。而不宜散出表之意也。凡書所論藥

性。每有以收爲散。以散作補。不爲剖析明白。多有意義難明。以致用

之者之誤耳。膽礬作銅色者。眞形似空青之色。爲上。【清】黃元御玉

楸藥解論膽礬曰。膽礬酸澀燥收。能化癥結。消散腫毒。治齒痛牙

疳。喉痺牙疔。鼻內陰蝕。癰疽疔瘡。楊梅金瘡。白癩。一切腫痛。痰帶下

崩中。治上氣。眼疼。弦爛。狗咬傷。百蟲入耳。腋下狐臭。吐風痰最捷。

國外學說 日本藥局方曰。礬礬爲藍色透映結晶。於乾燥空

氣中。徐徐風化。溶於三。五分之一水。及一分沸湯。現酸性反應。不溶於酒精。

近人學說 鄒爾凱曰。膽礬產地和製法。產于銅坑內。倘用人工

製法。可將銅與濃硫酸加熱。或使黃銅氧化而多量製出之。其成分

在化學上的記號是CuSO₄。故又稱爲硫酸銅。爲酸性反應。其性質和效能。係青藍色之結晶。味酸

而辛澀。極易溶于水。但不甚溶于酒精。普通多用爲催吐腐蝕收斂

諸劑。其作用(一)此物因能刺激胃之知覺神經。反射延髓而惹起

惡心。故爲催吐良劑。又因他種催吐藥。或使吐大久。常致腦呈不安

惟膽礬可免此弊。尤其對於服礬毒者。苟將膽礬四厘。溶溫水一碗

服之。則膽礬所含之銅質細末。包圍礬之表面。可妨礬之劇烈作用。

倘礬已吐出。可服松節油少許。和生雞蛋白四五枚。以解餘毒。此

爲救解礬毒最便利最簡便之法。附帶錄出。惟此法只宜於服毒之

最短期間。如遇時稍久。則不適用。當以瀉藥爲宜矣。(二)膽礬稀薄

十七畫 膽

溶液。則為收斂劑。因其能收縮細
胞及血管。消退炎症之效。故用於
注入白帶。淋病。慢性膀胱炎等。患
慢性瀉症者亦可以一服也。(三)
膽礬用濃厚溶液。則變為殺菌和
腐蝕作用。普通腐蝕用十倍至二
十倍之溶液。殺菌用百倍至千倍
之溶液。凡患顆粒性結膜尖惡性
潰瘍。及水痘贅等宜之。膽礬之配
合和適應症(一)治喉痺乳蛾。用
米醋煮真鴨嘴。膽礬為末。醋調。探
吐膠痰即痊。(二)治紫白癩風。膽
礬和牡蠣。生研醋調。厚磨之即愈。
(三)治走馬牙疳。用紅飛去核。入
鹽礬煨赤。研末敷之。追出痰即效。
(四)治胃脘痛。以茶清調膽礬
末吐之即除。(五)膽礬二分。開水
八十分。糖漿四十分。每隔五分鐘
服一匙。得吐即止。可解鴉片黃磷
各種毒藥。

配合應用 ●治老小風痰。膽
礬末一錢。小兒一字。溫醋湯調下。
立吐出涎。便自醒。(譚氏小兒方)
●治女人頭暈。天地轉動。名曰
心眩。非血風也。膽子礬一兩。細研。
用胡餅劑子一箇。按平一指厚。以
筍子勒成散子大塊。勿界斷。於瓦
上焙乾。每服一散子為末。燈心竹
茹湯調下。(許學士本事方)
●治喉痺喉風。二聖散。用鴨嘴
膽礬二錢半。白僵蠶炒五錢。研末。
每以少許吹之。立吐痰涎。(濟生
方)
●治齒痛及落。研細石膽以人
乳和膏擦之。日三四次。止痛復生
齒。百日後復故乃止。每日以新汲
水漱淨。(王濟外科秘要方)
●治口舌生瘡。聚療不差。膽礬
半兩。入銀鍋內火煨赤。出毒一夜。
細研。每以少許傅之。吐出酸涎水。
二三次。瘡(勝金方)
●治走馬牙疳。北環一枚去核。
入鴨嘴膽礬。紙包煨赤。出火毒。研
末傅之。追涎。(楊起簡便方)
●治小兒齒疳。鴨嘴膽礬一錢。
匙上煉紅。麝香少許。研勻傅於齒
上。立效。(活幼口議方)
●治小兒鼻疳。鴨嘴膽礬燒烟
盡。研末搽之。一二日愈。(簡要方)
●治風眼赤爛。膽礬二錢。燒研
泡湯日洗。(明目經驗方)
●治百蟲入耳。礬末和醋灌

之即出(千金方)
●治風犬咬毒。膽礬末敷之。立
愈。(濟急方)
●治一切諸毒。膽子礬末。糯米
糊丸。如雞頭子大。外以朱砂為衣。
仍以朱砂養之。冷水化一丸服。愈
(勝金方)
●治挑生蠱毒。胸口痛者。膽礬
二錢。茶清泡服即吐出。(嶺南衛
生方)
●治腋下胡臭。膽礬半生半熟。
入膩粉少許為末。每用半錢。以自
然蔗汁調塗十分熱痛乃止。數日
一用。以愈為度。(黎居士簡易方)
●治赤白癩風。膽礬牡蠣粉各
半兩。生研醋調厚之。(聖濟總錄
方)
●治甲疽腫痛。石膽一兩。燒烟
盡。研末傅之。不過四五度。瘡(梅
師方)
●治痔瘡熱腫。鴨嘴背膽礬煨
研。蜜水調敷。可以消脫。(直指方)
●治腫毒不破。膽礬雀屎各少
許點之。(直指方)
●治楊梅瘡毒。醋調膽礬末搽
之。痛甚者。加乳香。沒藥。出惡水一

一七七六
二上即乾。又方。膽礬。白礬各三錢
半。水銀三錢半。研不見星。入香油
津唾各少許。和勻。坐帳內。取藥塗
兩足心。以兩手心對足心。摩擦良
久。再塗再擦。盡即臥。汗出。或大便
去垢。口出穢涎為驗。每一次強者
用四錢。弱者二錢。連用三日。外服
疎風散。并浸洗。(劉氏經驗方)
用量 三分至五分
施用宜忌 凡非氣壯邪實者
禁用。長牡桂。茵桂。芫花。辛夷。白薇
水英為之使。
參攷資料 ●石膽氣寒味酸
而辛。入少陽膽經。其性收斂上行。
能消風熱痰涎。發散風木相火。又
能殺蟲。故治咽喉口齒瘡毒。有奇
功也。周密齊東野語云。密過南湖。
有老醫授治喉痺極速垂死方。用
真鴨嘴膽礬末。醋調灌之。大吐膠
痰。數升即痊。臨汀一老兵。患此。
絕水粒三日矣。如法用之。即痊。屢
用無不立驗。神方也。又周必大陰
德錄云。治蠱脹及水腫。祕方。有用
蒲州信州膽礬。明亮如翠。琉璃似
鴨嘴者。米醋煮。以君臣之藥服之。
勝於錢沙錢蛾。蓋膽礬乃剛之精

液。味辛酸入肝膽。制脾鬼故也。(李時珍) 石膽生秦州羌道山谷大石間。或羌里句青山。二月庚子辛丑採爲石也。青色多白文。易破。狀空青。能化鐵爲銅。合成金銀。(別錄) 仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有採者。色青綠。狀如玻璃而有白文。易破折。梁州信都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髮鬚。(陶弘景) 此物出銅處有之。形似層青兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是真者。出蒲州虞鄉縣。東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲真。向云似玻璃者乃綠礬也。比來人亦以有之。又以礬揉青礬爲之。並僞矣。(蘇恭) 今惟信州鉛山縣有之。生於銅坑中。採得煎煉而成。又有自然生者。尤爲珍貴。並深碧色。今南方醫人多使之。又著其說云。石膽最上。出蒲州大者如拳。小者如桃栗。擊之縱橫解皆成聲。文色青見。用久則綠。擊破其中亦青。其次出上饒曲江銅坑間者。粒細有糜稜。如飯粒米粒。本草言僞者以礬揉青礬爲之。全不然。但取粗惡石膽合消石

十七畫 膽

燥 舉 薤 葢 蒨 莫 薄

消澆而成之。塊大色淺。渾渾無脈。理擊之則碎。無糜稜者是也。亦氣扶石者。乃削取石膽。消澆時投消石中。乃凝則相著也。(蘇頌) 石膽出蒲州山穴中。鳴嚙色者爲上。俗呼膽礬。出羌里者。色少黑。次之。信州又次之。此物乃生於石。其經煎鍊者即多僞也。但以火燒之。成汁者僞也。塗於錢及銅上。燒之紅者真也。又以銅器盛水。投少許入中。及不青碧數日不異者真也。玉洞要訣云。石膽陽石也。出嵩岳及蒲州中條山。稟靈石異氣。形如瑟瑟。其性流通。精感入石。能化五金。變化無窮。沈括筆談載鉛山有苦泉。流爲澗。挹水熬之。則成膽礬。所熬之釜。久亦化爲銅也。此乃煎熬作僞。非真石膽也。不可入藥。(李時珍) 膽礬功力。能嘔能補。能收斂。外用殺浮肉。內服一釐至二釐。補而收斂。治發羊釣久痢。作嘔藥。每服七釐至一分。眼炎證。用膽礬四釐至八釐。配溫水八錢洗。(內科新說) 【燥陀】即鸚鵡之古籍別名。典見梵書。詳『鸚鵡』條。

【舉岸茶】即茶之產於浙江舊金華府境者。性質功用詳『茶葉』條。【舉薤古拜散】即薤芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薤芥』條。古醫別名 空心菜。外國名詞 Ipomeea aquatica, Eortic (拉丁) ヨウサイ (日本) 基本 係旋花科牽牛子屬。爲薤菜之莖葉。產地 水陸諸地多有之。形態 薤菜爲菜類之一種。性宜溼地。長霜雪。九月藏於土窖中。三四月取出。塗以糞。即節節生芽。一本可成一畦。幹柔如莖而中空。葉似菠薐。秋開白花。其菜可供蔬茹與藥用。性質 甘平。無毒。主治 解胡荽毒。野葛毒。養食之亦生痔瘡。歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論薤菜曰。搗汁和酒服治產難。【葢】即魚腥草之原名。詳『魚腥草』條。【蒨】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。【葢】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

見和漢藥考。詳『魚腥草』條。【葢菜】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。【葢菜】即魚腥草之處方用名。詳『魚腥草』條。【預菜】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。【黃李】即郁李仁之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『郁李仁』條。【薄】即芒之日本名。詳『芒』條。原名 菝葜。音訛。地方用名 薄荷葉。薄荷梗。薄荷。古醫別名 薄荷菜。吳茱門。(食性) 菝葜(楊雄)甘泉賦(菝葜)(呂忱)字林(南薄荷)(衍義)金錢薄荷(綱目)香荷(千金方)連錢草(天寶單方)英生(菝葜)薄荷(蘇)雞齊(石薄荷)冰喉尉(和漢藥考) 外國名詞 Folia mentha (拉丁) peppermint (英) Pfefferminz (德) 基本 屬唇形科薄荷之莖葉。

一七七七

產地 陳仁山藥物生產辨云。薄荷產江西吉安府。湖南九州府。河南禹州府。江蘇太倉州。夏季出新。

形態 薄荷為山野自生或栽種之宿根草。春從宿根生。莖方形。高一二尺。葉對生。作卵圓形而尖。有淺銳鋸齒。採揉嗅之。有辛涼香氣。表面深綠色。背面紫色。長則作綠色。秋季於葉腋叢生淡紫色唇形花。其葉作卵圓形或長橢圓形而帶尖。長一二寸。邊緣有銳鋸齒。有葉柄。莖莖有軟毛。有芳香及清涼味。



薄荷

種植 氣候及土質。凡溫帶溼潤之氣候。皆合其生育。而過溼亦不佳。又稍寒地方。亦可使其生育。土地以膏沃之黏質壤土。為最適其生長。無黏質壤土之處。而欲栽培。則土壤亦可。或者砂質之壤土。亦可使其生長。惟品質則必較

栽於黏質壤土者為劣。其餘土質。皆不適於栽培。產地及種類。產地極廣。僅以吾國言之。幾無省不有。吾國產出之品質。亦有上中下之分。產於南省者為最劣。產於外省者為最優。產於北省者次之。外國以美國產出者為最佳。法國產出者次之。其種類有赤質青質二種。赤質者。因莖帶赤色。油膩多而枝葉茂。為佳良種。青質者。因莖帶青色。枝葉雖茂。而品質不良。油膩較少。故栽培薄荷者。多取赤質種。而不取青質種。亦其宜也。吾國中省所產。雖較南北各省為佳。然亦有優劣之分。如四川。湖北。江西。浙江等所產出者為佳。餘若湖南。安徽。江蘇等所產出者次之。故欲栽培薄荷。當取四川或湖北或江西或浙江之赤質種而栽之為佳也。選擇品種既畢。乃可整理土地。擇定時期。而後栽植。未栽以前。當注意整理土地之事。且時期亦不可悞忽也。整地。耕起黏質之壤土。必須耕深至七八寸方可。而打碎土塊。使成粉細。並把平土面。再作畦。幅一尺五寸至二尺。作畦既

畢。可以擇時栽種也。期節。栽種有春秋二季之分。秋植與春植。各有不同。今分條述之。一春植者。於冬季即宜耕地作畦。畦之幅約一尺二寸至一尺五寸。每株距離約三寸。於三月下旬。可栽種其種。是為適期。二秋植者。畦稍闊於春植。約一尺七寸至二尺。每株距離約四寸。於七月下旬八月月上旬。是其適宜之種植期。以上二種春植為佳。欲栽薄荷。當栽春植種為要。栽植之法。取薄荷每隔四五寸處切斷之。而後栽植於既竣之畦上。俟其漸漸生長可也。施肥。肥料以人糞尿油粕堆肥為主。每畝地積。約需人糞尿七百餘兩。堆肥六七百斤。油粕八九百兩。油粕與堆肥。混和而堆積之。使之腐熟。而後於未植以前。施之。作為基肥。待既栽之後。施以稀薄之人糞尿。分作三次換之可也。中耕。中耕於栽後三四十日時行之為宜。除草。栽後二十日間。即宜除草。除草之際。見有根大之草。宜用手拔去。不可用器割除。蓋根大之草。其入土亦深。用器除之。則有害於薄

荷之根株。故用手拔之為佳。

採取 採取之期。因其供用之目的而不同。例如供食用者。當五六月之交。取其葉以供肉汁中之用。若充製油之用者。則分七月上旬與十月上旬二次採取。以上皆就春植者之採取而言。採取之法。專以銳鋸刈採。亦間有拔取者。採得陰乾用。

用法 與他藥水煎。或到末和作丸散。但入煎藥中宜後下數沸。則氣味全而功效足。與鈞藤同性質。辛。溫。無毒。

成分 含有一種揮發油。及單寧少許。

效能 發汗散風熱。解鬱治傷寒。為驅風防腐藥。用於腸之異常醱酵。又為清涼藥。用於夏日之中暑及霍亂。並可作眼藥。鎮痙健胃。通經藥。又治偏頭痛。肺支管炎。

作用 由腸壁吸入血中。能減少白血球之數。同時由交感神經而傳達大腦。使之麻醉。

主治 賊風傷寒發汗。惡氣。心腹脹滿。宿亂宿食不消。下氣。黃汗。腹之發汗。大解分乏。亦堪生食。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論薄荷曰。作藥久食。卻腎氣。辟邪毒。除勞氣。令人口氣香潔。煎湯洗淨疥。【唐】甄權藥性本草論薄荷曰。通利關節。發毒汗。去積氣。破血止痢。【唐】陳士良食性本草論薄荷曰。療陰陽毒。傷寒頭痛。四季宜食。【唐】孟詵食療本草論薄荷曰。杵汁服。去心臟風熱。【宋】日華諸家本草論薄荷曰。治中風失音。吐痰。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薄荷曰。主傷風頭腦風。通關節。及小兒風涎爲要藥。【元】李東垣用藥法象論薄荷曰。清頭目。除風熱。【明】李時珍本草綱目論薄荷曰。利咽喉。口齒諸病。治瘰癧瘡。疥。風癢癩。搗汁含漱。去舌胎。語澀。接葉塞鼻。止衄血。塗蜂螫蛇傷。【清】黃宮繡本草求真論薄荷曰。薄荷氣味辛涼。功專入肝與肺。故書載辛能發散。而於頭痛頭風。發熱惡寒則宜。辛亦能通氣。而於心腹惡氣痰結。則治涼能清熱。而於咽喉口齒眼耳。髮疹瘡疥。驚熱骨蒸。血則妙。是以古方逍遙。用此以爲開鬱散氣之具。小兒驚癇。用

十七畫 薄

此以爲宜風向真之能。腸風血痢。用此以爲疎氣清利之法。然亦不敢多用。所用不過二三分而止。恐其有泄真元耳。蘇產氣芳者良。貓傷用汁塗之最妙。【清】王士雄隨息居飲食譜論薄荷曰。薄荷葉辛甘苦溫。散風熱。清利頭目。咽喉口齒諸病。和中下氣。消食化痰。開音聲。舒鬱滯。辟穢惡邪氣。療鼠亂癩疥。醱酒蒸饅。糖造露均妙。惟虛弱多汗者忌之。

國外學說 日本學說謂薄荷各國皆有。藥中所用。即薄荷之乾燥葉也。其主治用。最爲健胃驅風。劑又能靜止胃痛。瀉痛。一日數回。自一、○至二、○爲劑散劑。浸劑。投之。製劑以薄荷油。薄荷水。薄荷精。各一滴至三滴。爲調味藥。又薄荷腦。爲鎮痛藥。齒痛時。入其結晶於齒腔內。偏頭痛時。塗擦其杆。又爲防腐藥。於肺結核等。爲丸劑或酒精劑。內服之一日數回。自○、○五至○、二又日本藥局方曰。薄荷葉係採取薄荷 (Mentha Arvensis L. var. Piperascens, Benth.) 之葉陰乾者。本品

爲卵圓形或披針形。長三至七仙米。上端尖銳。邊緣有不等銳鋸齒。葉面散有毛茸。附有多數腺鱗。本品氣味特異。芳香峻烈而清涼。又和漢藥考曰。日本之主要產地爲山形縣。岡山。廣島二縣次之。此外新潟。長野。愛知。千葉諸縣亦產之。惟不多。但日本產薄荷。有赤莖。青莖二種。赤莖所含薄荷霜量。較青莖爲多。

辨偽 ●鄭育巖曰。土薄荷色淡無香味。不若蘇州所蒔者佳。莖小氣芳。方堪入藥。故陳士良食性本草謂之吳菘藹。(菘藹音拔活) 可見薄荷當以吳產者爲上品。●曹炳章曰。按薄荷六七月出。蘇州學宮內出者。其葉小而茂。梗細短。頭有螺螄蒂。形似龍頭。故名龍腦薄荷。氣清香。味涼沁。爲最道地。太倉常州產者。葉略大。梗亦細。一莖直上。無龍頭形。氣味亦略淡。有頭二刀之分。頭刀力全。葉粗梗長。香氣濃厚。二刀乃頭刀割去後。留原根抽莖再長。故莖梗亦細。葉亦小。氣味亦略薄。尚佳。杭州葛橋產者。梗紅而粗長。氣濁臭。味辣。甚次。

山東產者。梗粗葉少不香。更次。二種皆爲側路。不宜入藥。

近人學說 ●顯子靜曰。薄荷爲唇形科植物薄荷之葉。有特異苛烈之香氣。味始如灼。後清涼。含一種揮發油。其內更含一種固體名薄荷腦。日本產之薄荷。含薄荷腦較多。於製得之薄荷油中。寒冷之後。即有薄荷腦析出。沉於器底。薄荷之醫療應用。以其葉一錢三分。沒於一茶杯之熱水中。分三次。一日服用。用以治胃痛痲痛。●張山雷曰。薄荷方莖。而色紫帶赤。可以子種。宿根亦能自生。氣味芳烈。頗與紫蘇相類。但葉不赤而無鋸齒。氣味雖澀。而入口清冽爲異。故孫星衍輯刻本草經。遂謂薄荷蘇類。確乎可信。唐本草謂爲辛溫。亦以蘇類例之。然冷冽之氣。能散風熱。決非溫藥。故潔古直謂之辛涼。其主治則唐本謂賦風傷寒。惡氣。心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。又皆與紫蘇大略相近。惟辛而涼降。微與溫散者不同耳。蘇頌謂主傷風。頭腦風。東垣謂清頭目。除風熱。瀨湖謂利喉。啞口齒諸病。石頑謂辛

能發散。專於消散風熱。涼能清利。故治咳嗽失音。性浮上升。能開鬱散氣。然所用不過二三。以其辛香伐氣。非久服多服之品。按外治風熱生瘡。黃汁和入消腫末。藥敷之。涼入肌膚。立能止痛。今西藥製精成錠。外擦頭痛。能泄外風。能抑肝陽。皆有捷驗。

配合應用 ●清上化痰。利咽。治風熱。以薄荷末煉蜜丸。如灰子大。每噉一丸。白沙糖和之亦可。(簡便單方)

●治風氣痿痺。用大薄荷。蟬蛻。等分爲末。每溫酒調服一錢。(永類鈴方)

●治舌胎語塞。薄荷自然汁。和白蜜薑汁擦之。(醫學集成方)

●治眼眩赤爛。薄荷以生薑汁浸一宿。晒乾爲末。每用一錢。沸湯泡洗。(明目經驗方)

●治瘰癧結核。或破未破。以新薄荷二斤。取汁。皂莢一挺。水浸去皮。搗取汁。同於銀石器內。熬膏入遠翹末半兩。連白青皮。陳皮。黑牽牛。半生半炒各一兩。皂莢仁一兩。同搗和丸。梧子大。每服三十九丸。

煎連翹湯下。(濟生方)

●治衄血不止。薄荷汁滴之。或以乾者水煮。綿裹塞鼻。(許學士本事方)

●治血痢不止。薄荷葉煎湯常服。(普濟方)

●治水入耳中。薄荷汁滴入立效。(外臺祕要方)

●治蜂螫整傷。薄荷葉按貼之。(外臺祕要方)

●治火毒生瘡如灸。火毒氣入內。兩股生瘡。汁水淋漓者。用薄荷煎汁類塗立愈。(張景賢說方)

用世 八分至錢半。

施用宜忌 凡氣虛血燥。及無外感風寒熱邪者禁用。

參攷資料 ●薄荷能引諸藥入營衛。故能發散風寒。(陳士良)

●小兒驚狂壯熱。須此引藥。又治骨蒸熱勞。用其汁與衆藥熬爲膏。貓食薄荷則醉。物相感爾。(寇宗奭)

●薄荷手足厥陰氣分藥也。能搜肝氣。又主肺盛有餘。肩背痛及風寒汗出。(王好古)

●薄荷辛能發散。涼能清利。專於消風散熱。故頭痛頭風。眼目咽喉口齒諸病。

小兒驚熱及瘰癧瘡疥爲要藥。戴原禮氏治貓咬。取其汁塗之有效。蓋取其相制也。(李時珍)

●薄荷貓之酒也。犬虎之酒也。桑椹爲之酒也。茵草魚之酒也。皆敗食醫心鏡云。薄荷煎鼓湯。燒酒和飲。煎茶生食並宜。蓋菜之有益者也。(陸農師)

●同種作鹽食相宜。新病瘥人勿食之。令人虛汗不止。瘦弱人久食之。動消渴病。(甄權)

●薄荷處處有之。莖葉似荏而尖長。經冬根不死。夏秋採莖葉曬乾。古方稀用。或與蘆作鹽食。近世治風寒爲要藥。故人家多蒔之。又有胡薄荷與此相類。但味少甘爲別。生江浙間。彼人多以作茶飲之。俗呼新羅薄荷。近汴洛僧寺或植一二本。部天寶單方所謂連錢草者是也。

又有石薄荷。生江南山石間。葉微小。至冬紫色。不聞有別功用。(蘇頌)

●薄荷人多栽蒔。二月宿根生苗。清明前後分之。方莖赤色。其葉對生。初蒔形長而頭圓。及長則尖。吳越川湖人多以代茶。蘇州所蒔者莖小而氣芳。江西者稍粗。川蜀者更粗。入藥以蘇產爲勝。物類

相感志云。凡收薄荷須隔夜以薄水澆之。兩後乃悉刈收。則性涼。不爾則不涼也。野生者莖葉氣味都相似。(李時珍)

【薄荷水】即由薄荷油而製成者。詳「薄荷油」條。

【薄荷油】基本 本品係用薄荷發油。

外國名詞 *Oilum menthae* (拉丁) *Peppermint oil* (英)

形態 薄荷油含有同質異性體二種。一爲液體。(薄荷油) 一爲固體。(薄荷精或呼薄荷圓) 薄荷油爲無色透明或淡黃色液。一般帶綠色。經久漸成黃色。有薄荷葉香氣。味初如灼。後變清涼。比重約

〇・九。不溶於水。逢酒精及冰醋酸等。則善能溶解。沸點爲二百〇四度至二百十度。薄荷精 *Menthol* $C_{10}H_{18}(OH)$ 爲無色針狀結晶體。氣味俱同薄荷油。稍溶於水。投入時。於水面旋轉。逢酒精伊打哥羅仿姆。冰醋酸等。善能溶化。又熱至四十三度則融化。二百十三度則沸騰。達此則呈藍紫色。

製法 以薄荷油可製為薄荷精、薄荷水、薄荷錠三種。

性質 辛涼無毒。

效能 油與霜俱作衝動藥。與驅風藥並為殺菌藥。

主治 散風熱、清頭目、治咽喉痛、牙痛、麻痺、皮膚風痒、及金瘡湯火傷、塗搽之。

參攷資料 據日本農商務省農務局調查輸出重要品要覽薄荷油薄荷霜部所載山形縣薄荷油製法云。於有水利之處。築窠安置大釜。上覆蒸桶。蒸桶長約四尺五寸。上部直徑約三尺五寸。底之中央有孔。於此桶裝積乾葉八貫至十二貫（每貫為六斤四兩）架置盛水大釜之上。更於其上置一底面作圓錐形之釜。滿盛冷水。然後燃火。使下釜之湯沸騰。則蒸氣經蒸桶。與薄荷質共達上釜底面。由其圓錐形尖端。流下受器。滴下另置於水槽中之磁製壺中。此壺口徑六寸。高約一尺。其底有小孔。上釜由貯水桶用管不斷補給冷水。使與溫水調和。蒸溜液已注滿壺中時。即用指頭塞住底孔。一面

注視壺中。徐徐從水槽中取上一面。放去指頭。則水從小孔流出。祇餘薄荷液留於壺中。再用指將孔塞住。移於他器。如此所得之液。為薄荷與油之混合物。日本名為取卸薄荷。將此取卸薄荷移於罐或壺。使接觸華氏溫度器四十五度以下之冷氣。經二小時。即開始結晶。用網杓子掬取此結晶。移於他器。一二次後。即於殘留之油中。再加取卸薄荷。稍用火焙化。再照前法冷卻。則再開始結晶。如此則可將薄荷與油分離。又法將取卸薄荷。置入銅製蒸溜器 (Retort) 中。通蒸氣蒸溜之。將溜出物。置入鉢製罐（高一尺五寸方一尺）中。復置入盛冰之大木箱（可置八罐）中。夏置寒冷處。冬置溫暖處。約經三日。則成結晶體。將此傾注別器。則油滴下。祇留結晶體。即薄荷霜也。再將餘留結晶體之罐。列置於有管之斜形樹上。斜置之。則油質自然流出。經管而滴下。受器結晶體由三層而成。上層斜立。中層直立。下層作綿狀。油質悉已流出。將罐取下。祇取其中層（即

十七畫 薄

薇

直立部分。盛於木製淺箱。放置空氣中。乾燥三日。則得純粹薄荷霜。又將殘餘上層及下層部分。再加入取卸薄荷。照前法為之。大約乾藥百貫。可得取卸薄荷一貫左右。取卸薄荷一貫。可得霜四十兩。油五十三兩。

【薄荷極】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷圓】即薄荷霜之別名。詳『薄荷霜』條。

【薄荷腦】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷條】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷葉】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷條】即由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷錠】即由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷霜】即薄荷油之固體者。詳『薄荷油』條。

【薄荷油】基本 本品係用薄荷梗及葉所蒸取之。

性質 辛涼無毒。

主治 清涼解熱。發散風寒。

【薄荷露】基本 本品係用薄荷梗及葉所蒸取之。

性質 甘寒無毒。

主治 久食不飢。調中。利大小便。

命名 本品似蠶。乃桑之微者故名。

古稱別名 垂水（爾雅）野豌豆。大巢菜（綱目）。

外國名詞 Osmunda regia.


Fig. 1. var. japonica, Miide.

(拉丁) センマイ (日本)

基本 係羊齒門羊齒類蕨科。為蕨之莖葉。

產地 原野田澤間多有之。

形態 蕨為菜類之一年生草。本高二三尺。無地上莖。其葉自地下莖發出。尖端卷曲如漩渦。葉有二種。一為綠色。二回羽狀複葉。由長卵形之小葉而成。一為褐色。由細長小葉而成。葉間着生多數胞子囊。其莖葉可供食與藥用。



薇

十七畫 薇 蕨 蕨 蕨 蕨

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論薇曰。利水道。下浮腫。潤大腸。

【薇草】即白薇之古籍別名。典見別錄。詳『白薇』條。

【薇御草】即鹿御草之古籍別名。典見本經。詳『鹿御草』條。

【薇衍】即薇衍子。詳『薇衍子』條。

【薇衍子】原名 廷壽果。古籍別名 蕨衍子。【綱目】無類。(吳普本草)

性質 甘。微溫。無毒。

主治 理血中邪。溫補下元。祛風痺。歷節痛。定小兒驚悸。

參攷資料 薇衍子不特有益老人。而嬰兒先天不足者。尤為上藥。惜乎南方罕得。(本草逢原)

【蕨蕪】即蕨蕪之古籍別名。典見別錄。詳『蕨蕪』條。

【蕨】即蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳『蓮肉』條。

【蕨】即香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【蕨】即蕨之短小中空。皮厚色青者。功用詳『蕨』條。②即小蒜之古籍別名。典見蜀本草。詳『小蒜』

條。

【慈米仁】即苡仁之處方用名。詳『苡仁』條。

【慈苡蕪】即苡蕪之原名。詳『苡蕪』條。

【慈珠子】即苡仁之古籍別名。典見圖經本草。詳『苡仁』條。

【慈黍】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【薑半夏】製法 用大半夏。照法半夏法製。復以生

薑自然汁漬焙乾用。

主治 寒痰者宜之。性質 辛溫。潤。無毒。

【薑汁】主治 噎膈反胃。救暴卒。療狐臭。搽手足凍瘡。貼風溼痺痛。

【薑皮】處方用名 薑衣。外國名詞 Zingiber officinale, Rosc. (拉丁)

性質 辛涼。無毒。主治 消浮腫。腹脹。痞滿。和脾胃。去翳。

歷代記述攷證 【明】李士材

本草圖解論薑皮曰。薑皮性涼。和脾胃。消水腫。除脹滿。去目翳。【清】

黃宮繡本草求真論薑皮曰。薑皮辛涼。和脾胃。利水。消腫。取其以皮行皮之義。

配合應用 蘇頌開經本草治拔白換黑方。用刮老生薑皮一大升。於久用油膩鍋內。不須洗刷。固濟勿令通氣。令精細人守之。文武火煎之。不得火急。自且至夕。即成矣。研為末。拔白後。先以小物點麻子。大入孔中。或先點鬚下。然後拔之。以指擦入。三日後。當生黑者。神效。季卿用之有驗。

用量 三分至五分。

著名方劑 五皮散。治風溼客於脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。兼治皮水。及妊娠胎水。(局方)生薑皮。五加皮。地骨皮。大腹皮。茯苓皮。等分。右五味。每用三錢。水煎熱服。一方加白朮。磨沉香。木香。

【薑石】命名 本品形似薑狀。故名。古籍別名 礞石。礞礞。(綱目)

產地 出土石間。形態 礞石為石類之一種。狀

似薑根。可供藥用。採取 以不見日光。色白而稠不墜者良。

性質 鹹寒。無毒。主治 熱疔瘡。疥癬等腫。

【薑汁炒山梔】即山梔子。經薑汁焙炒成者之處方用名。詳『山梔子』條。

【薑衣】即薑皮之處方用名。詳『薑皮』條。

【薑芥】即荊芥之古籍別名。典見別錄。詳『荊芥』條。

【薑根】即生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【薑酒】基本 本品係用薑塊浸成之酒。或以薑汁和麴釀者。主治 傷風。中惡。挂忤。心腹冷痛。

【薑黃】外國名詞 Curcuma longa, L. (拉丁)

處方用名 片薑黃。黃薑。古籍別名 莖。寶鼎香。嫩芽相連者。名子母薑黃。(綱目)

基本 屬薑科。為薑黃之根莖。產地 陳仁山藥物生產辨云。

基本 屬薑科。為薑黃之根莖。產地 陳仁山藥物生產辨云。

基本 屬薑科。為薑黃之根莖。產地 陳仁山藥物生產辨云。

基本 屬薑科。為薑黃之根莖。產地 陳仁山藥物生產辨云。

黃葶產四川、湖北老河口、廣東番
昌、高塘司等。西北江各屬均有出。
安南印度亦均有出。

形態 葶黃產於中國及東印
度地方。為多年生草本。有野生者。
有栽種者。葉形橢圓。有長柄。背生
軟毛。一窠生四五葉。四五月發芽。
花莖同生。高五七寸。下有二小葉
包之。全體互生。鱗狀之苞。苞內開
花兩朵。黃色。狀如喇叭。其根莖色
黃。楊。作橢圓或長橢圓形。長約一
二寸。微扁。外面被有塵粉。有如
榆之突起或結節。頗為緻密。內面
作黃色或橙黃色。似鬱金而色略
淡。味芳香而苦。然緩和。咀嚼之。唾
液亦變黃色。

採取 八月間採之。採得切片
曝乾。不宜見火。

性質 辛苦。大寒。無毒。

成分 為揮發油、脂肪、黃色素
等。黃色素名曰克兒克明。

效能 專行氣破血。治風痺臂
痛。用作風痛藥。

主治 心腹結積。疝忤下氣。破
血除風熱。消癥腫。功力烈於鬱金。
歷代記載攻墮。【宋】大明諸

十七畫 葶

家本草論葶黃曰。治癥瘕血塊。通
月經。治撲損瘀血。止暴風痛。冷氣
下食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論
葶黃曰。祛邪辟惡。治氣脹。產後敗
血攻心。【明】李時珍本草綱目論
葶黃曰。治風痺臂痛。【清】黃宮繡

本草求真論葶黃曰。葶黃味辛而
苦。氣溫。色黃。功用頗類鬱金。三稜
蓬朮。廷胡索。但鬱金入心。專治心
胞之血。莪朮入肝。治氣中之血。三
稜入肝。治血中之氣。廷胡索則於
心肝血分行氣。氣分行血。此則入
脾。既治氣中之血。復兼血中之氣
耳。陳藏器曰。此藥辛少苦多。性氣
過於鬱金。破血立通。下氣最速。凡
一切結氣積氣。癥瘕瘀血。血閉癱
疽。並皆有效。以其氣血兼理耳。若
血虛腹痛臂痛。而非瘀血凝滯者。
用之反劇。蜀川產者。色黃質嫩。有
鬚折之。中空有眼。切之分為兩片
者。為片子葶黃。廣生者。質粗形扁
如乾葶。僅可染色。不可入藥。服之
有損無益。

辨偽 鄭肯巖曰。子葶黃氣
味辛苦而溫。是經種三年以上老
葶所生。色黃入脾。兼治氣。匪特破

血除風。開有以黃北葶偽充。則貽
害多矣。曹炳章曰。按子葶黃。福
建邵武出者。色黃皮黃黑色。有節
皺紋者佳。四川產者。名川黃。略次。
江南北地產者。色深黃。作顏料用
之。廣西柳州產者。形似蟬肚。色深
黃。兼黑者次。作香料用之。鄭肯
巖曰。李時珍云。以扁如乾葶形者
為片子葶黃。治風痺臂痛有奇功。
今肆中有偽品。即葶黃假充。粒大
皮粗。味辣內不結潤。非片子也。勿
用為是。曹炳章曰。按片子葶黃與
子葶黃。大小塊色皆不同。片子葶黃
比子葶黃大六七倍。切厚片。色淡
黃兼黑。邊有鬚根。廣東潮州。浙江
溫州俱出。

近人學說

張山雷曰。葶黃始
見唐本草。稱其辛苦大寒。破器已
辨其非。謂辛少苦多。性熱不冷。則
唐本寒字。蓋亦傳寫之誤。石頑謂
有二種。川蜀生者。色黃質嫩。有鬚
折之。中空有眼。切之分為兩片者。
為片子葶黃。江廣生者。質粗形扁。
為乾葶。僅可染色。不入湯藥。藥肆
混市誤人。徒有耗氣之患。則無治
線之功。願按今市肆葶黃。確有兩

種。名片葶黃者。是本已切為厚片。
而後晒乾。形似乾葶。色不黃。質亦
不堅。治風寒溼者。即此。又一種則
堅實光亮。其色深黃。乃如鬱金。是
為染色之用。不入藥劑者。唐本謂
治心腹結積。疝忤。下氣破血。蓋辛
能散。溫能通。故可破結辟惡。消癥
下氣。是物功用。即在此數者之中。
然又謂除風熱。消癥腫。功力烈於
鬱金。則正以入血泄散。故癥瘍之
堅腫可消。傷科普通敷藥之如意
金黃散用之。即是此意。固非疎風
清熱之作用。而乃竟以為除風熱。
宜乎有辛苦大寒之誤矣。大明謂
治癥瘕血塊。撲損瘀血。通月經。止
暴風痛。冷氣。下食。蘇頌謂治氣脹。
產後敗血攻心。戴原禮謂片子葶
黃入手臂治痛。石頑謂血虛臂痛
者。服之必增劇。蓋辛溫本以祛寒
溼。而血虛者更得此。迅利流動。以
耗其氣。則非徒無益。而又害之矣。

合應用 葶黃得當歸。生
地。牛膝。廷胡索。肉桂。治一切積血
在腹中作痛。

治心痛難忍。葶黃一兩。桂三
兩。為末。醋湯服一錢。(經驗方)

十七 薑 薑

治胎寒腹痛。啼哭吐乳。大便色青。狀若驚搐。出冷汗。薑黃一錢。沒藥乳香二錢。為末。蜜丸。炙子大。每服一丸。鈎藤煎湯化下。(和州局方)

治產後血痛。有塊。用薑黃。桂心。等分。為末。酒服。方寸匕。血下盡。即愈。(晉殷產寶方)

治瘡癤初生。薑黃末。搽之。妙。(千金方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡無瘀滯及非氣壯邪實者。禁用。忌火。

參攷資料 薑黃、鬱金、蓬萊三物。形狀功用皆相近。但鬱金入心治血。而薑黃兼入脾。兼治氣。蓬萊則入肝。兼治氣中之血。為不同。古方五痺湯。用片子薑黃。治風寒溼氣。手臂痛。戴原禮要訣云。片子薑黃能入手臂。治痛。其兼理血中之氣可知。(李時珍) 薑黃根葉都似鬱金。其花春生於根。與苗並出。入夏花爛無子。根有黃青白三色。其作之方法與鬱金同。西戎人謂之蓬。其味辛少苦多。亦與鬱金同。惟花生異耳。(蘇恭) 薑黃

眞者是經種三年以上者。生花。在根際。一如薔薇。根節堅硬。氣味辛辣。種薑處有之。終是難得。西番亦有來者。與鬱金蓬萊相似。如蘇恭所說。即是蓬藥。而非薑黃。又言薑黃是蓬。鬱金是胡蓬。如此則三物無別。憑相連名。總稱爲蓬。則功效當不殊。而今鬱金味苦寒。色赤。主馬熱病。薑黃味辛溫。色黃。莖味苦。色青。三物不同。所用各別。(陳藏器) 海南生者。即蓬莖莖。江南生者。即爲薑黃。(大明) 薑黃今江廣蜀川多有之。葉青綠。長一二尺許。闊三四寸。有斜文。如紅燕莖。而小花紅白色。至中秋漸凋。春末方生。其花先生。次方生葉。不結實。根盤屈黃色。類生薑。而圓有節。八月採根。切片。曬乾。蜀人以治氣脹。及產後敗血攻心。甚驗。蠻人生嗽。云可以祛邪辟惡。按鬱金、薑黃、蓬藥三物相近。蘇恭不能分別。乃爲一物。陳藏器以色味分別三物。又言薑黃是三年老薑所生。近年汴都多種。往往有薑黃出賣。乃是老薑。市人買嗽。云治氣爲最。大方亦時用之。又有藤薑。亦是其類。而白是一物。(蘇頌) 近時以扁如乾溼形者。爲片子薑黃。圓如蟬腹形者。爲蟬肚鬱金。並可浸水。染色。莖形雖似鬱金。而色不黃也。(李時珍) 試嘗之。果辛多苦少。詳其功用。似辛勝者爲是。又曰。此味有云不宜見火者。良然。蓋此味之辛勝者。是其功用之微。見火則去其辛矣。(劉涓子) 有二種。蜀川生者。色黃實嫩。有發折之中。空有眼。切之分爲兩片者。爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁。如乾寬。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。(張石頑)

類。而白是一物。(蘇頌) 近時以扁如乾溼形者。爲片子薑黃。圓如蟬腹形者。爲蟬肚鬱金。並可浸水。染色。莖形雖似鬱金。而色不黃也。(李時珍) 試嘗之。果辛多苦少。詳其功用。似辛勝者爲是。又曰。此味有云不宜見火者。良然。蓋此味之辛勝者。是其功用之微。見火則去其辛矣。(劉涓子) 有二種。蜀川生者。色黃實嫩。有發折之中。空有眼。切之分爲兩片者。爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁。如乾寬。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。(張石頑)

類。而白是一物。(蘇頌) 近時以扁如乾溼形者。爲片子薑黃。圓如蟬腹形者。爲蟬肚鬱金。並可浸水。染色。莖形雖似鬱金。而色不黃也。(李時珍) 試嘗之。果辛多苦少。詳其功用。似辛勝者爲是。又曰。此味有云不宜見火者。良然。蓋此味之辛勝者。是其功用之微。見火則去其辛矣。(劉涓子) 有二種。蜀川生者。色黃實嫩。有發折之中。空有眼。切之分爲兩片者。爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁。如乾寬。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。(張石頑)

一七八四

【薑黃子】即鬱實之古籍別名。與見別錄。詳鬱實條。

【薔薇根】 性質 苦。溫。冷。無毒。主治 止瀉。痢。腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疝痛。諸惡瘡。金瘡。傷。生肉。復肌。

歷代記述攷圖 【唐】甄權藥性本草論薔薇根曰。治頭瘡。自禿。根曰。治熱毒風。除邪氣。止赤白痢。腸風。瀉血。通結血。治牙齦痛。小兒疳蟲。肚痛。瘰癧。疥癩。【明】李時珍本草綱目論薔薇根曰。除風熱。溼熱。縮小便。止消渴。

國外學說 英美學說謂薔薇花各國均有。取該花之瓣。可爲藥品。其功用能作汽水。配香水等用。取其味。美。處方以鮮薔薇花瓣一分。水五分。入瓶。蒸出一分。作洗水。類常用之。配他藥。取其臭香。每服一兩至二兩。(薔薇花汽水又名薔薇露方)

配合應用 治金瘡發熱。用薔薇根灰一方寸匕。日三。(葛洪方)

【薑葉】 性質 辛。溫。無毒。主治 食蝕。成瘕。搗汁飲。即消。

【薑露】 蒸取之露。 基本 本品係用生薑。 性質 味辛。性熱。 主治 辟寒。解中。殺毒。驅瘴。 消食化痰。 【薔】 卽水蓼之古籍別名。與見附

① 治骨鯁。薔薇根末。水服方寸七日三。(外臺秘要方)

② 治小兒睡中遺尿不自覺。以薔薇根到。以酒飲之。(外臺秘要方)

③ 治口瘡。以根煮濃汁。溫含冷易神驗。(肘後方)

④ 治消渴尿多。薔薇根一把。水煎日服之。(千金方)

⑤ 治小便失禁。用薔薇根煮汁飲。或為末酒服。野生白花者更良。(聖惠方)

⑥ 治小兒疳痢類。用生薔薇根洗切。煎濃汁。約飲之。以愈為度。(千金方)

⑦ 治口咽痛。語聲不出。薔薇根皮。射干一兩。甘草炙半兩。每服二錢。水煎服之。(普濟方)

⑧ 治小兒月蝕。薔薇根四兩。地榆二錢。為末。先以鹽湯洗過。傅之。(全幼心鑑方)

⑨ 治癰腫疔毒。潰爛疼痛。用薔薇皮更炙熨之。(千金方)

⑩ 治筋骨疼痛。因患梅毒。服輕粉毒藥成者。野薔薇根白皮洗三斤。水酒十斤。煮一炷香。每日任

飲。以愈為度。又用刺薔薇根三錢。五加皮。木瓜。當歸。茯苓各二錢。以酒二盞。煎一盞。日服一次。(御筆

峯雜興方)

⑪ 治管刺入肉。膿血不出。以薔薇根末。搽之。服鼠撲十日。即穿皮出也。(外臺秘要方)

【薔薇露】 基本 係薔薇花蒸取之露。

性質 氣芳香。味辛散。

主治 建中達表。解散風邪。驅除客熱。

【薔蕪仁】 即蕪蕪之古籍別名。典見綱目。詳「蕪蕪」條。

【薔蕪】 即酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳「酸模」條。

【薔蕪】 即木蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「木蓮」條。

【薔蕪】 即苜蓿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苜蓿」條。

【薔蕪】 即菱之古籍別名。典見爾雅。詳「菱」條。

【薔蕪子】 即決明子之古籍別名。典見爾雅。詳「決明子」條。

【薔蕪】 即酸模之古籍別名。典見爾雅。詳「酸模」條。

十七畫 薔

薔 薔 薔 薔 薔 薔 薔 薔

【薔】 命名 本品非類。故字從韭。藥用其白者之鱗莖。故名曰薔白。

處方用名 薔白。薔白頭。

古籍別名 菜芝(別錄)葛子。菘子。火葱(綱目)鴻菘(說文)天薔。野薔。薔葱(俗名)山薔(爾雅)辣薔(日本)

外國名詞 Allium Bakeri, (拉丁)ラツキヤウ キヤウシヤヒル(日本)

基本 係百合科葱屬。藥用薔之鱗莖。

產地 凡山野平原間。俱有生長。陳仁山藥物生產辨云。薔白以產江蘇浙江為正。廣東產者係薔頭耳。



薔

形態 薔為菜類之多年生草本。高尺許。葉細而長。梢為三角形。有平行脈。色深綠。葉莖均有臭氣。秋日葉間抽花。莖高尺餘。開紫色

花。作繖形花序。有六瓣。雄蕊比花稍長。其地下鱗莖叢生。其色白如指大者。即薔白頭也。入藥用。又可供食用。

採取 夏五月間採之。採得鮮根。去淨泥。陰乾用。

用法 與他藥水煎。或生搗取汁。亦可浸酒與焙對為末。

性質 辛苦。溫滑。無毒。

效驗 通腸瀉滯。利竅滑腸。開胸解結。氣。用作瘰癧及健胃藥。

主治 金瘡瘡敗。輕身不飢耐老。(本經)歸骨。除寒熱。去水氣。溫中散結。氣。作羹食。利病人。諸瘡中風寒水氣。腫痛。持塗之。(別錄)

張仲景之醫明 薔白一味。輕張仲景之實驗。認為主治「心膈痛而喘息咳唾也。勞治背痛。心中痞」。效考徵如下：括蕪薔白。白酒湯證曰。喘息。咳嗽。胸背痛。根實。薔白。桂枝湯證曰。胸膈。心中痞。(以上三方。薔白皆用半升)。

括蕪薔白。半夏湯證曰。心痛。散背

十七畫 薤

(以上一方。薤白三兩。)歷觀上列三方。則薤白所主治也。不辨而自明矣。

歷代配鏡攷圖 【唐】孟詵食

療本草論薤白曰。治女人帶下赤白。作羹食之。骨哽在咽不去者。食之即下。【唐】孫思邈千金翼論薤白曰。心病宜食之。利產婦。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薤白曰。補虛解毒。【宋】日華諸家本草論薤白曰。養食耐寒。調中補不足。止久痢。冷瀉。肥健人。【元】李東垣用藥法象論薤白曰。治洩痢下重。能泄下焦陽明氣滯。【明】李時珍本草綱目論薤白曰。治少陰病厥逆洩痢。及胸痺刺痛。下氣散血安胎。【清】黃宮繡本草求真論薤白曰。薤亦動滑藥耳。故書皆載調中助陽。散血疏滯。定喘安胎利產。及治陽火傷損。綠薤味辛則散。散則能使在上寒滯立消。味苦則降。降則能使在下寒滯立下。氣溫則散。散則能使在中寒滯立除。體滑則通。通則能使久痼寒滯立解。是以下痢可除。瘀血可散。喘急可止。水腫可敷。胸痺刺痛可愈。胎產可治。湯火及

中惡卒死可救。實通氣滑竅。助陽佳品也。功用有類於韭。但韭則入血行氣。及補腎陽。此則專通寒滯。及兼滑竅之為異耳。取白用。【清】王士雄隨息居飲食譜論薤白曰。薤辛溫散結。定痛。寬胸。止帶。安胎。活血。治痢。多食發熱。忌與韭同。

辨偽 ●鄭育巖曰。薤白氣味

辛溫無毒。根如小蒜。色白者辛而不苦。近有以鬼蒜偽充。壁開無瓣。噫。薤白為處虛皆有之藥。值亦甚賤。胡味良者。儲以偽亂真乎。曹炳章曰。按薤白各處皆產。生土壠上。即俗謂素葱之根。葉如細韭菜。色綠空心。根如小蒜。若採時去鬚莖。蒸熟曬乾。則質堅緊。不致脫皮。且晒之易燥。若生晒則質鬆。層層脫皮。且不易乾燥。故近今皆用蒸曬者多。惟偽者少見。

近人學說 ●謝安之曰。薤白

為菜類尋常之食品。用之利竅宣陽。泄瀉活血。頗奏奇效。敵縣諸醫棄之不用。甚可惜也。考仲景方用薤白者四。一為括葉薤白白酒湯。二為括葉薤白半夏湯。三為枳實薤白桂枝湯。四為四逆散。泄利下

重者。以薤白煮水調散服之。觀上四方。其氣味效能可想而知。但仲景對於胸痺。甚有發明。所謂胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脈沉而遲。關上小緊數。又曰。胸痺不得臥。心痛徹背。胸中氣塞。心下痞氣。氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。無不以薤白配合枳實厚朴桂枝。括葉白酒半夏等藥。以通積滯之氣。以散陰寒之結。心胸之氣得以調和。周身之血得以環轉。獨四逆散用之。治泄利下重者。阻滯於下。故加薤白以通之。是從治之法。不

可以其阻結而用攻下。惟錢氏對於四逆散之加味。疑為未必皆出於仲景。柯氏疑為叔和編輯之誤。恐二賢想像如是。實未試用。但鄙人累見胸痺及下重等症。按法煮服薤白。無不奏效也。本經主治金瘡之敗。輕身不饑。耐老。辛苦溫無毒。似韭而葉闊。黃帝云。薤不可共牛肉作羹。食之成瘕。又俗謂生用能引涕唾。杜甫詩云。衰年鬪腸冷。味暖並無憂。可見辛溫而散胸膈中之結氣。又陶弘景謂仙方。王孟英謂辛溫散結定痛寬胸止帶。

一七八六

安胎。活血。治痢等症。及服食家皆須之。張石頑謂諸瘡中風寒水腫。生搗敷之。能吐胃中痰食。蟲積。歷驗。金匱救卒死。搗汁灌鼻中效。薤葉治肺氣喘急。喻嘉言葉天士輩。讀其宜陽疏滯而不傷胃氣。亦為中風門左宜有之捷品。此外如王肯堂治產後胸中煩熱氣逆之薤白湯。沈金齋治嘔吐老人冷痢之薤白粥。王孟英治霍亂之獨行方。張文仲治傷寒下利如爛肉汁。赤滯伏氣腹痛之豉薤湯。(即仲景梔子豉湯加薤白一兩)儀禮士相見禮曰。薤之屬。食之止臥。韓維詩。薤葉照人呈。夏豎。魏文帝。培上行。念君常苦悲。夜夜不能寐。莫以魚肉賤。棄捐蕙與薤。說文。薤。鴻薤也。因薤似韭。故功用相類。總之薤白辛溫滑利。上能開胸痺。下能泄大腸氣滯。實肺與陽明藥也。然多食發熱。神昏目暗。能發宿疾。無滯者亦當禁用。俗謂補虛之說。尤是塗說。深望醫界同志。勿以尋常藥蔬之品。或因價賤。不足以治大病。棄之不用。並望吾縣醫家及病家。萬勿誤認薤字為韭字。以致

物品功用各殊。如起而研究。藥理昭然。病證亦待效。則幸甚矣。◎朱石華曰。神農嘗百草。而辨性之寒溫。質之浮沉。示人以大開節目。至其藥力之大小。藥品之複雜。以及性之果屬燥熱寒涼。質之果屬升降浮沉。病至幾分。脈至幾動。而可用麻黃大黃於分量適中。而能達其汗下之目的。不至蹈於過汗亡陽。過下亡陰之覆轍。總在吾人歷鍊揣摩。詳細研究。類悟心得之所從出。渾而言之。無論何種藥品。而一藥必有一藥之升降宣散。窺之以理想。證之以實驗。庶乎可耳。固古人有大匠使人規矩。不能使人巧之斷語。歷鍊研究。誠為萬世不易之定理也。僕於薤白三致意焉。夫薤白之功用。為利竅宣陽之妙品。疏竅活鬱之良藥。而世人竟不及察。以為薤菜木食料之品。烏能治大病。藥店置之敝屣。醫生視為無用。嗚呼。薤白何其不幸之甚也。僕在醫界中。每嘗詳細剖解。不敢研究一有用之品。抱為已得。而不公問者也。人間之有掩耳而走者。有不以理而駁者。謂草芥之類。豈

十七畫 薤

能療沉疴之病乎。豈不知仲景三用其方。曰括蕒薤白白酒湯。曰栝蕒薤白半夏湯。曰枳實薤白桂枝湯。而論胸痺之證。洞若觀火。詳解薤白之性。大有發明。故僕恪守金匱一隅三反。而於胸痺之外。奧斯症同源。而異流者。無論其為寒為火。無一病而不用之者。因寒而重用。因火而少用。寒之為患。每兼凝滯。故薤白氣味辛溫。其性又能從下而上。主助生陽之氣。上升者也。仲聖三用之。皆取自下而上。從陰出陽之義也。因火者亦用之。不過為寒劑之反佐。以作嚮導之義耳。百用而百效。誠為利竅宣陽活血潤澤之須臾不可缺少之良品也。有清葉天士亦有發明。謂其氣溫稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛苦滑無毒。得地西南金火之味。而有潤澤之性。入手太陰肺經。味升多降也。至若常用以應敵禦侮者。如王膏堂借用以治產後胸中煩熱氣逆。以成薤白湯。沈金鰲借用以治嘔。又借用以治老人冷痢。以成薤白粥。王孟英專用以治霍亂。名之曰獨行方。種種功用。不

待研究而後知。不第此也。明末大家喻嘉言。謂其宣陽疏滯而不傷胃氣。為中風門中左宜右有之捷品也。

配合應用 ①治胸痺刺痛。張仲景栝蕒薤白湯。治胸痺痛。數心背。喘息欬唾。短氣。喉中燥痒。寸脈沉遲。關脈弦數。不治殺人。用栝蕒實一枚。薤白半升。白酒七升。煮二分。分二服。千金治胸痺。半夏薤白湯。用薤白四兩。半夏一合。栝蕒半兩。生薑一兩。栝蕒實半枚。咬咀。以白蠟漿三升。煮一升。溫服。日三。治胸痛。瘧而復發。薤根五升。持汁飲之。立瘥。戴音在。酢漿也。(肘後方)

②治卒中惡死。卒死。或先病。或不居寢臥。奄忽而死。皆是中惡。以薤汁灌入鼻中便省。(肘後方)

③治霍亂乾嘔不止者。以薤一虎口。水三升。煮取一升。頓服。不過三作即已。(韋宙獨行方)

④治奔豚氣痛。薤白持汁飲之。(肘後方)

⑤治赤痢不止。薤同黃蘗煮汁服之。(葢器方)

⑥治赤白痢下。薤白一握。同米

煮粥日食之。(食醫心鏡方)

⑦治小兒疳痢。薤白生搗如泥。以粳米粉和。蜜作餅炙熟。與食。不過三兩服。(楊氏產乳方)

⑧治產後諸病。多煮薤白食。仍以羊腎脂同炒食之。(范汪方)

⑨治妊娠胎動。腹內冷痛。薤白一升。當歸四兩。水五升。煮二升。分三服。(古今錄驗方)

⑩治鬱肉腐毒。梓薤汁服二三升良。(葛洪方)

⑪治瘡犯惡露。甚者殺人。薤白搗爛。以帛裹煨熱。去帛。傅之。冷即易換。亦可搗作餅。以艾灸之。熱氣入瘡。水出即瘥也。(梅師方)

⑫治手指赤色。隨月生死。以生薤一把。苦酒煮熱。持爛塗之。愈乃止。(肘後方)

⑬治瘡疥痛癢。煮薤葉持爛塗之。(肘後方)

⑭治灸瘡腫痛。薤白一升。豬脂一斤。切以苦酒浸一宿。微火煎三上三下。去滓塗之。(梅師方)

⑮治手足癩瘡。生薤一把。以熱醋投入。以封瘡上取效。(千金方)

⑯治毒蛇螫傷。薤白搗傅。(徐

十七畫 薤 薦 薤 薩 蔞 蔞 蔞 蔞

玉方)

治虎犬咬傷。薤白湯汁飲之。并塗之。日三服。瘡乃止。(葛洪方)

治諸魚骨哽。薤白嚼柔。以繩繫中。香到哽處。引之即出。(葛洪方)

治誤吞銀錢。取薤白曬萎。煮熟切食一大束。銀即隨出。(葛洪方)

治目中風翳作痛。取薤白截斷安膜上。令徧痛作。復為之。(范汪方)

治咽喉腫痛。薤根醋搗。傅腫處。冷即易之。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡氣虛無滯者禁用。

參攷資料 薤性溫補。仙方及服食家皆須之。傷入諸骨。用不可生。單辛為忌。(陶弘景) 薤白色者最好。雖有辛不輩五。學道人長服之。可通神。安魂魄。益氣。攢筋力。(孟詵) 薤白之性冷。而補。又曰。薤子。麥與薤。結飲。易產。亦主脚氣。(蘇頌) 薤味辛氣溫。諸家言其溫補。而蘇頌謂經獨謂

其冷補。按杜甫詩云。東比青芻色。圓齊玉筋頭。衰年關腸冷。味暖並無憂。亦言其溫補。與經文相合。則冷補之說。蓋不然也。又按王禎云。薤生則氣辛。熟則甘美。種之不盡。食之有益。故學道人資之。老人宜之。然道家以薤為五葷之一。而諸氏言其不葷。何耶。薛用弱齊諧志云。安陸郭坦。凡得天行病後。遂能大食。每日食至一斛。五年家貧。行乞。一日大饑。至一園。食薤一畦。大蒜一畦。便閉極臥地。吐一物如籠。漸漸縮小。有人撮飯於上。即消成水。而病尋瘳也。按此亦薤散結。蒜消痰之驗也。(李時珍) 發熱病者不宜多食。三四月勿食生者。(孟詵) 生食引涕唾。不可與牛肉同食。令人作癩癩。(大明) 薤本文作薤。韭類也。故字從韭。從叢。音弊。諸聲也。今人因其根白。呼為薤子。江南人說為薤子。其葉類葱。而根如蒜。收種宜火煎。故俗人稱薤為火葱。羅願云。物莫美於薤。故薤為菜芝。(李時珍) 薤是韭類。葉似韭而闊。多白而無茸。有赤白二種。白者補而味美。赤者苦而無味。

(蘇頌) 薤處處有之。春秋分時。至冬葉枯。爾雅云。薤。山薤也。生山中。莖葉與家薤相類。而根差長。葉差大。僅若鹿葱。性亦與家薤同。今人少用。(蘇頌) 薤葉如金燈。葉差狹而更光。故古人言薤者。以其光滑難貯之義。(寇宗奭) 薤八月栽根。正月分時。宜肥壤。數枝一本。則茂而根大。葉壯似韭。韭葉中實而扁。有劍脊。薤葉中空。似細葱葉。而有稜氣。亦如葱。二月開細花。紫白色。根如小蒜。一本數顆。相依而生。五月葉青。則掘之。否則肉不滿也。其根煮食。芫酒糟。醋。浸皆宜。故內則云。切葱薤。諸醴以柔之。白樂天詩云。酥暖薤白酒。謂以酥炒薤。白投酒中也。一種水晶葱。葱葉蒜根。與薤相似。而不臭。亦其類也。按王禎農書云。野薤俗名天薤。生麥原中。葉似薤而小。味益辛。亦可供食。但不多有。即爾雅山薤是也。(李時珍) 薤白者補益。赤者療金瘡及風。生肌肉。與蜜同搗。塗湯火傷甚速。溫補助陽道。(李時珍) 薤葉光滑。露亦難貯。古方用治肺氣喘急。亦取其滑澀

之義。(寇宗奭)

【薤白】 即薤之白色鱗莖也。供藥用。詳「薤」條。

【薤白粥】 基本 本品係以薤白和米煮成之粥。

主治 老人冷利。

【薤白頭】 即白薤之處方用名。詳「薤」條。

【薤】 即蒲席之古籍別名。與見綱目。詳「蒲席」條。

【薤鱗】 即薤莖之俗名。詳「薤」條。

【薤魚】 即鮑魚之古籍別名。與見禮記。詳「鮑魚」條。

【薩摩薤】 即番薤之日本名。詳「番薤」條。

【薤】 即龍常草之古籍別名。與見爾雅。詳「龍常草」條。

【薤草】 即甘草之古籍別名。與見別錄。詳「甘草」條。

【薤休】 即蚤休之古籍別名。與見日華諸家本草。詳「蚤休」條。

【薤烈】 即石芸之古籍別名。與見別錄。詳「石芸」條。

【薤蟻】 古籍別名。顧當蟲。(拾遺) 蝮蟻。(爾雅) 蝮

母。土蜘蛛。(約目)

外國名詞 *Cteniza folicions*

Trap-door spider(拉丁) トタ

テダモ(日本)

基本 係節肢動物蜘蛛類之
蠶蟷蟲。

形態 蠶蟷為卵生蟲類之一種。體呈長橢圓形。頭胸部比腹部稍大。上面圓。色黑有光澤。胸中有溝。腹卵圓形。有白色橫紋七條。尾端有大小紡績突起二對。體長不足五分。營巢土中。為圓筒狀。上有橢圓形之蓋一方。達於筒壁。內面滿附蛛絲。甚光澤。蓋上附有苔蘚。與地面同平。時或仰開其蓋。伺他蟲誤入而攫食之。捕得可供藥用。

性質 有毒。

主治 一切疥腫。附骨疽蝕等。瘡。瘡肉贅癩。燒為末。和臘月豬脂。傅之。亦可同諸藥傅。并腫出根為上。


【蠶蟷】 命名 本品兩臂如斧。當敵不避。故有當耶之名也。

十七畫 蠶

(別錄)野狐鼻蟷。(百陽雜俎)髡羊七。(揚雄方言)當耶。數常。刀蟷。(綱目)天馬。天蟷。(和漢藥考)石蟷。(俗名)

外國名詞 *Tanodora aridi-folia, Stoll*

基本 屬直翅類之蠶蟷。
產地 凡原野樹木上恒多產焉。



(一) 蟷



(二) 蟷

形態 蟷蟷體細長。前胸頗長。腹部肥滿。脊有翅。前翅作角質。全體淡綠色。時或作褐色。頭小。作三角形。觸角為鞭狀。由多數之節而成。有六脚。前脚長。末端彎曲作鉗

蝶 蝶

狀。有鋸齒。為捕捉他蟲之具。中肢短。後肢長。適於跳躍。夏秋間潛伏樹葉下。捕食農家害蟲。

採取 三四月採之。
製法 採得焙乾用。但恒以到末用。

效能 定疔風。療創傷。用作創傷刺傷藥。

主治 小兒急驚風。搐搦。又出筋。生者能食。拭目。

配合應用 ①驚風定搐。中分散。用蟷一箇。斷腸一條。赤足蜈蚣一條。各中分之。隨左右研末。記定。男用左。女用右。每以一字吹鼻內。插之。吹左即左定。吹右即右定也。(普濟方)

②箭簇入肉。不可拔者。用蟷蟷一箇。巴豆半箇。同傅研傷處。殺痒且忍極痒。乃撼拔之。以黃連貫衆湯洗拭。石灰傅之。

用量 一個至三個。

施用宜忌 同桑蟷蟷。

參攷資料 ①蟷蟷俗名石蟷。逢樹便產。惟以桑上者為好。是葉得桑皮之津氣也。以連枝斷取者為真。偽者亦以膠着桑枝之上也。

(爾弘景)蟷蟷古方不見用者。惟普濟方治驚風。吹鼻定搐法中用之。蓋亦蟷蟷定搐之義。古方風藥。多用蟷蟷。則蟷蟷治風同一理也。又醫林要方出筋鐵亦用之。(李時珍)蟷蟷腹首。背修頸大腹。二手四足。善緣而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能野菜。捕蟬。或云術家取鬚作法。可以引形。深秋乳子作房。黏着枝上。即蟷蟷也。房長寸許。大如拇指。其內重重有隔房。每房有子如蛆。卵至芒種節後一齊出。故月令有云。仲夏蟷蟷生是也。(李時珍)

一七八九

【蟷蟷】即桑蟷蟷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。
【蟷巴】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。
【蟷兒青】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。
【蟷青】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。
【蟷蟷】原名 蟷蟷。命名 師衆多也。形似

十七畫 螺 螻

蝸牛其類衆多故名。

產地 生湖澤淡水。

形體 螺螻爲介類螺屬之一種。大如指頭。長寸許。殼色黑而厚。於田螺內可供食與藥用。其殼泥詳見各該條。

性質 甘寒。無毒。

主治 明目。下水。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論螺螻肉曰止渴。【明】

李時珍本草綱目論螺螻曰。醒酒

解熱。利大小便。消黃疸水腫。治反

胃痢疾。脫肛。痔漏。

參攷資料 螺螻於清明後發

中有蟲。不塊食用。【李時珍】

【螺螻泥】

採取 用螺螻一斗。水浸之。澄泥。晒乾用。

性質 涼。

主治 反胃吐食。酒服之。

【螺螻殼】

古鑑別名 鬼眼睛。

採取 以泥中及牆壁上年久

者良。

製法 凡使火煨過用。

性質 甘溫。無毒。

主治 痰飲積。及胃脘痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論螺螻殼曰。反胃。腦氣

痰嗽。鼻淵。脫肛。痔疾。疥癬。下疳。湯

火傷。

參攷資料 螺乃蚌蛤之類。其

殼大抵與蚌粉。蛤粉。蛭蛻之類同

功合而觀之。自可神悟。【李時珍】

【螺曆草】

命名 本品葉莖狀如螺曆。故名。

古鑑別名 錢面草。【綱目】

外國名詞 Drymoglossum

subcordatum, Foc. (拉丁) r

メツタ(日本)

基本 係羊齒門羊齒類水龍

骨科。螺曆草屬之螺曆草。

產地 莖生石間。

形態 螺曆草爲石草類之一

種。根莖爲絲狀而匍匐。有長達數

尺者。莖面有鱗片狀之暗褐色毛

葉有裸葉質葉。裸葉通常爲卵圓

形或圓形。實葉狹長。採得可供藥

用。

性質 辛。

主治 癰腫。風疹。脚氣腫。搗爛

傳之。亦煮湯洗腫處。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論螺曆草曰。治小便出

血。吐血。血崩。血齒痛。

參攷資料 按陳日華經驗方

云。年二十六。忽病小便後出鮮血

數點而不疼。如是一月。飲酒則甚

市醫張康。以草藥汁一器。入少鹽

水。連兩服而愈。求其方。乃錢面草

也。【李時珍】

【螻蛄】

命名 螻者臭也。本品氣臭。故得螻名。

古鑑別名 螻蛄。天蠶。殼。【本

經】螻蛄。【月令】仙姑。石鼠。【古

今注】梧鼠。【荀子】蝓鼠。土駒

【和漢藥考】土狗。【普濟方】

外國名詞 Mole-foot (英)

基本 屬直翅類中蟋蟀科之

螻蛄。

產地 凡平澤卑溼之地均產。

形態 螻蛄爲有害植物之昆

蟲。作巢於枯死植物之根間。全身

黑褐色。長一寸許。形似蝗。首圓而

長。其翅雖長。雌短。不能高飛。雄者

喜撲燈火。雌者則否。春秋善鳴。入

冬棲息土中。掘土而行。頗爲捷速。

此蟲於七月上旬產卵。土中。多至

二三百顆。同月中旬孵化。至翌年

一七九〇

四五月間。已全長成。

採取 夏至捕取。夜出者曬乾。

製法 大明曰。去翅足。炒。川水

煎。或到末。

性質 鹹寒。無毒。

效能 逐水邪。通二便。用作利

尿藥。

主治 產難。出肉中刺。潰癰腫。

下噎。噎。解毒。除惡瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論螻蛄曰。治水腫。頭面腫。

【元】朱丹溪本草衍義補遺論螻

蛄曰。治口瘡甚效。【明】李時珍本

草綱目論螻蛄曰。利大小便。通石

淋。治瘰癧。骨哽。【清】黃宮繡本草

求真論螻蛄曰。螻蛄氣味寒鹹。性

甚奇特。書將此分爲上下左右

四段。若以上段治腫。則腫即見上

消。下段治腫。則腫即見下消。左截

治腫。則腫即見左消。右截治腫。則

腫即見右消。又截自腰以上。以治

則能按水上行。而使二便皆消。自

腰以下。以治。則能使便立下。婦人

難產。亦可照此以治。而產即解。癰

腫瘰癧肉刺。若生搗汁以塗。則刺

與腫皆消。骨入喉不下。末吹即

能見愈。外此箭鐵入肉。用此塗貼患處。則箭即克見拔。究其治效。總因性善攻穴。其性急迫。故能如此取效也。味鹹氣寒。俗名土狗。凡用此藥。宜審其體質。方可割取。若使發虛氣薄。但見書載。治功任意妄施。其不傷人性命者鮮矣。此與草麻子等藥。同為一類。用時須當細審取雄。去翅足炒用。

配合應用 ①治十種水病。腹滿喘促不得臥。以蜈蚣五枚。焙乾為末。食前白湯服一錢。小便利為效。楊氏加甘遂末一錢。商陸汁一匙。取下水為效。忌鹽一百日。小便秘者。用蜈蚣下截。焙研。水服半錢。立通。(聖惠方) ②又用蜈蚣一箇。葡萄酒(保命集方) ③又用端午日取蜈蚣陰乾。分頭尾焙收。治上。身用頭末七箇。治中。用腹末七箇。治下。用尾末七箇。食前酒服。(乾坤秘傳方)

十七畫 蜈

葱蒜新瓦上焙之。待乾去翅足。每箇剪作兩半邊。分左右記。欲退左即以左邊七片。焙研。入前末二錢。以淡竹葉。天門冬煎湯。五更調服。候左遷。三日後服右邊。如前法。(普濟方)

①治嗜鼻消水。面浮甚者。用土狗一箇。輕粉二分。為末。每噴少許入鼻內。黃水出盡為妙。(楊氏家藏方)

②治小便不通。用大蜈蚣二枚。取小體。以水一升。漬飲。須臾即通。(葛洪方) ③又用土狗下截。焙研。調服半錢。生研亦可。(壽域方) ④又加車前草同搗汁服。(談楚翁方) ⑤又用土狗後截。和麝搗納臍中。縛定即通。(唐氏經驗方) ⑥又用土狗一箇。炙研。入冰片。麝香少許。翎管吹入莖內。(醫方摘要方)

⑦治大小便閉。經月欲死。用土狗。推車客各七枚。並男用頭。女用身。瓦焙焦為末。以向南穆皮煎汁。飲一服。神效。(普濟方)

⑧治胞衣不下。困極腹脹。則殺人。蜈蚣一枚。水煮二十沸。灌入下喉。即出也。(延年方)

①治疥風出汗。蜈蚣。甘草等分。並炙為末。傳之。(聖濟總錄方)

②治齒牙疼痛。土狗一箇。舊棉裹定。溼紙包煨。去棉研末。傳之。立止。(本事方)

③治髮髻裂痛。蜈蚣燒灰。傳之。(千金方)

④塞耳治聾。蜈蚣五錢。穿山甲炮五錢。麝香少許。為末。葱汁和丸。塞之。外用噀鼻藥。即通。(普濟方)

⑤治頭項瘰癧。用帶殼蜈蚣七枚。生取肉。入丁香七粒於殼內。燒過。與肉同研。用紙花貼之。(救急方)

⑥治箭鐵入肉。以蜈蚣汁滴上三五度。自出。亦能治鐵刺在咽。(千金方)

⑦治誤吞釣線。蜈蚣去身吞其頭數枚。勿令本人知。(聖惠方)

用忌 七隻或三對。
施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。

參攷資料 ①自腰以前甚深。能止大小便。自腰以後甚利。能下大小便。(陶弘景) ②今方家治石淋。導水。用蜈蚣七枚。鹽二兩。新瓦


上鋪。置焙乾研末。每溫酒服一錢。七即愈也。(蘇頌) ③今處處有之。穴地。糞壤中而生。夜則出外求食。荀子所謂。梧鼠五技而窮。糞壤所。謂。頭鼠五能不成一技者。皆指此也。魏詩。頭鼠乃大鼠。與此同名。而技不窮。固不同耳。五技者。能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能穴不能掩身。能走不能逐人。(蘇頌) ④此蟲。立夏後。至夜則鳴。聲如蚯蚓。月令。蠅。蠅者是矣。(寇宗奭) ⑤蜈蚣治水甚效。但其性急。虛人戒之。(朱丹溪) ⑥蜈蚣穴土而居。有翅翅四足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。數風食土。喜就燈光。入藥用雄。或云用火燒地。赤。置蠅於上。任其跳死。覆者。雄。仰者。雌也。類從云。層。鏡。致。汗。蠅。引。兔。物。相。感。也。(李時珍)

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見月令。詳「蜈蚣」條

【蠅斯】係蠅之同類。為草蠅之大者。體長色綠。或褐。觸角為鞭狀。複眼在觸角之基部。無單眼。大顯強壯。翅半透明。前翅有下左上。互相重疊。接合處成堅硬之發聲器。

十七畫 蟻 蝨 蠱 瘧

故能作聲。雌者長一寸許。色淺綠。微雜褐色。翅短於雄。尾端有產卵器。突出。性質效能。見『蟲書』條。



斯 盒

【蟻】即蟻。小而黃者之別名。與見崔豹古今注。詳『蟻』條。

【蝨】即白蝨之古籍別名。與見綱目。詳『白蝨』條。

【蠱】即蠱。之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蠱』條。

【瘧】即瘧。之古籍別名。與見綱目。詳『瘧』條。

【瘧】即瘧。之古籍別名。與見綱目。詳『瘧』條。

【瘧】即瘧。之古籍別名。與見綱目。詳『瘧』條。

【瘧】即瘧。之古籍別名。與見綱目。詳『瘧』條。

【瘧】即瘧。之古籍別名。與見綱目。詳『瘧』條。

瘧地 凡米糠及確白倉下。皆

脚。剪錦。油坊。並陰溼之地。恒有生焉。

形體 瘧蟲體長寸許。前狹後闊。色黑而亮。大小不等。頭小六足。背有橫紋。錯起。伏土而善攻隙穴。傷之不易死。

採取 十月間採之。

製法 採得用沸水泡洗。曬乾用。

性質 鹹。寒。有毒。

效能 破血瘀。消堅癖。專作通經藥。

主治 心腹寒熱。洗洗。血積。癥瘕。破堅下血。閉。生子大良。

張仲景之論明 瘧蟲一味。經張仲景之實驗。認為『主治乾血。故兼治少腹滿痛。及婦人經水不利。』茲考徵如下。下瘀血湯證曰。

產婦腹痛。土瓜根散證曰。帶下。經水不利。少腹滿痛。又曰。經一月再見者。有二者。皆以瘧蟲為主藥。似

為婦人血毒之證。然或云治瘧。或云內有乾血。肌膚甲錯。何必婦人血毒之治乎。由此觀之。則瘧蟲

及此三方。不啻治婦人血毒矣。雖男子亦可用之。但醫下有血毒者。

婦人最多。故仲景立此方法。以治婦人。是其遺法耳。凡一身之內。有血毒所著者。必見肌膚甲錯。證若著。膝下。則有兩目黯黑。羸瘦。腹滿。不能飲食。證後世不知此證。名曰五勞。為附申約。其審聽之。曰。七傷。曰。虛勞。曰。勞瘵。皆屬空談。理義。我們所不取也。是以如下。下瘀血湯。亦治男子少腹滿痛。小便不利。及淋瀝。或血自下者。此人當必有肌膚甲錯等證。又按此方服法。曰。頓服之。新血下。如豚肝。然亦謂腹中。有乾血著。膝下。則似言相矛盾。此方本為乾血而設之。今服此方。而其血下。謂之新血。可乎。凡用瘧蟲三方。皆為治乾血之方。蓋乾血。乃久瘀血也。若治新血。不下證。則別有桃仁承氣湯。大黃牡丹皮湯。大黃甘遂湯。若治蓄血。則有抵當湯。及丸。故治乾血。則有此方。及土瓜根散。大瘧蟲丸。是皆以瘧蟲為主藥。此為瘧蟲能破久瘀血之用也。由是觀之。則新血下。如豚肝者。是蓋蓄結之血。新下。如豚肝色之謂乎。土瓜根散證曰。經水不利。少腹

一七九二

乾血著。膝下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所為明矣。又曰。主陰癰腫。按丈夫陰器。速少。腹急痛。謂之疝也。此證亦瘀血所為也。此雖其證不具。然據少腹急痛。證則自有此方。證具矣。大瘧蟲丸。證曰。羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷。及緩中虛補散。證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草。瘧蟲附方。有之大黃瘧蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用瘧蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以

一丸。酒一升。煮取二合。溫服。當下血也。張仲景方云。按是下瘀血湯之方。而非大黃瘧蟲丸之方也。李時珍何以稱此方。而謂大黃瘧蟲丸乎。其文亦大同小異。蓋時珍所見金匱要略。有別所傳之本乎。又本草傳寫之謬誤乎。若夫本草

乾血著。膝下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所為明矣。又曰。主陰癰腫。按丈夫陰器。速少。腹急痛。謂之疝也。此證亦瘀血所為也。此雖其證不具。然據少腹急痛。證則自有此方。證具矣。大瘧蟲丸。證曰。羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷。及緩中虛補散。證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草。瘧蟲附方。有之大黃瘧蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用瘧蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以

一丸。酒一升。煮取二合。溫服。當下血也。張仲景方云。按是下瘀血湯之方。而非大黃瘧蟲丸之方也。李時珍何以稱此方。而謂大黃瘧蟲丸乎。其文亦大同小異。蓋時珍所見金匱要略。有別所傳之本乎。又本草傳寫之謬誤乎。若夫本草

乾血著。膝下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所為明矣。又曰。主陰癰腫。按丈夫陰器。速少。腹急痛。謂之疝也。此證亦瘀血所為也。此雖其證不具。然據少腹急痛。證則自有此方。證具矣。大瘧蟲丸。證曰。羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷。及緩中虛補散。證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草。瘧蟲附方。有之大黃瘧蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用瘧蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以

一丸。酒一升。煮取二合。溫服。當下血也。張仲景方云。按是下瘀血湯之方。而非大黃瘧蟲丸之方也。李時珍何以稱此方。而謂大黃瘧蟲丸乎。其文亦大同小異。蓋時珍所見金匱要略。有別所傳之本乎。又本草傳寫之謬誤乎。若夫本草

乾血著。膝下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所為明矣。又曰。主陰癰腫。按丈夫陰器。速少。腹急痛。謂之疝也。此證亦瘀血所為也。此雖其證不具。然據少腹急痛。證則自有此方。證具矣。大瘧蟲丸。證曰。羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷。及緩中虛補散。證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草。瘧蟲附方。有之大黃瘧蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用瘧蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以

之謬。則大黃廩蟲丸下。必脫金匱要略五勞以下法語。而本草治產婦腹痛條上。脫下瘀血湯四字矣。乎。大觀本草所引蘇頌圖經辨蠅條曰。張仲景治雜病方。大廩蟲丸中用辨蠅。以其主臍下堅滿也。由此觀之。則十二味方者。名大廩蟲丸。而大字之下無黃字。此非大黃廩蟲丸也。又廩蟲條曰。張仲景治雜病方。主久積積結。有大黃廩蟲丸。乃今下瘀血湯也。然則本是二方。而金匱要略十二味方者。蓋古名大廩蟲丸。猶大柴胡湯。大承氣湯。大青龍湯。大半夏湯。大建中湯。大陷胸湯之大也。當須別有小廩蟲丸之方矣。疑今下瘀血湯。蓋名大黃廩蟲丸。故以大黃廩蟲為主藥也。且今名下瘀血湯者。疑非方之名。而當須以下此瘀血之湯主之之意矣。後之錄方者。誤脫大黃廩蟲丸五字。而稱之曰下瘀血湯乎。又後之輯金匱要略者。遂謂之下瘀血湯。而名此方者矣。猶抵當烏頭桂枝湯。救逆湯。新加湯類乎。况此方是丸方。猶抵當丸。以水煮之。然則此方亦不可名湯也。由

十七蠶 廩

此觀之。下瘀血湯。宜稱大黃廩蟲丸。而十二味大黃廩蟲丸。宜稱大廩蟲丸矣。東洞翁嘗謂大黃廩蟲丸。乃十二味之方。說非疾醫之言。蓋指五勞遺極。及七傷緩中補虛之語乎。夫羸瘦腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。數語。可謂此方之證具矣。若按其腹狀。而內外諸證。診察相應。則此方當須奏其功耳。明者其謂之何矣。歷代記述攷證 唐甄極藥性本草論廩蟲曰。月水不通。破留血積聚。宋寇宗奭本草衍義論廩蟲曰。通乳脈用一枚。搗水半合。瀉服。勿令知之。明李時珍本草綱目論廩蟲曰。行產後血積。折傷瘀血。治重舌木舌。口瘡。小兒腹痛。夜啼。明繆希雍本草經疏論廩蟲曰。廩蟲生於下溼土壤之中。故其味鹹氣寒。得幽暗之氣。故其性有小毒。以刀斫之。中有白汁如漿。凌接即連。復能行走。故今人以之治跌撲損傷。續筋骨有奇效。乃足厥陰經藥也。夫血者身中之真陰也。瀝滲百骸。周流經絡者也。血若凝滯。則經絡不通。陰陽之用互乖。

而寒熱洗洗生焉。寒能入血。經堅。故主心腹血積。續血閉諸證。血和而營衛通暢。寒熱自除。經脈調勻。月事時至。而令婦人生子也。又治瘡母為必用之藥。清黃宮機本草求眞論廩蟲曰。廩蟲即屬地鼈。又名土鼈者是也。味鹹性寒。其物生於土中。伏而不出。善攻隙穴。以刀斫之。中有汁如漿。觸接即連。復能行走。故書載跌撲損傷。續筋接骨。義由此耳。真奇物也。且人陰血貫於周身。雖賴陽和。亦忌燥烈。若熱氣內鬱。則陰陽阻隔。而經絡不通。因而寒熱頓生。得此鹹寒入血。輒聖。則凡血聚積塊。癥瘕。瘰不。因是而除。而血脈調和。營衛暢達。月事時至。又安有血枯血閉。而不見其生育者乎。故又能治諸般血症。而使挾孕而有子也。是以古人用此。以治跌撲損傷。則多合自然。銅龍骨。血竭。乳香。沒藥。五銖錢。黃荊子。麻皮。灰。狗頭骨。以治下腹痛。血痛。血閉。則合桃仁。大黃。以治各隨病症。所因而用之耳。陰乾臨時研入。

辨偽 鄭肯巖曰。廩蟲本經

名地鼈。別錄名土鼈。形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。此物好生鼠。及屋壁地樹之下。氣味鹹寒。有毒。專破癥瘕。考仲景金匱蠶甲煎丸用之。殆病瘕日久。結為癥瘕。大黃廩蟲丸用之。治虛勞腹滿。內有乾血。下瘀血湯用之。治產後腹痛。內有瘀血。土瓜根散用之。治經水不利。少腹滿痛。以其治癥而破癥也。去冬因用廩蟲以備復漿。調查各藥舖。方知所製蠶甲煎丸。大黃廩蟲丸。皆用蔗蟲。以訛傳訛。皆由吾國藥劑師互相傳授。未讀方書。不明本草。以致貽誤匪少。堪發一嘆。不觀夫古人制字。屢字其下。從蔗字其上。從草。或作蔗旁。從木。足證蔗蟲由草木而化生。非如廩蟲之從溼土而出也。又按蔗蟲氣味甘微寒。為發痘行漿。托輝清毒之妙品。且能化痰醒酒。和中利小便。產廣東潮州。及福建漳泉。蔗田中。形如蠶蛹。食蔗根而化生。土名蔗姑。其味甘美。土人有用之。以佐酒席。考本草拾遺及南京醫學報。均有發明。可見蔗蟲與廩蟲。性味不同。形質亦異。古人定方用

十七 蠶 蟻

藥各有主義。胡得妄行配製。以失效用。伏望熱心同道與藥商知好者。特此通告。苦勤改良。幸勿再蹈故轍。是所企禱。◎曹炳章曰。按王士雄云。潮州蔗田接壤。食蔗之蟲。形如蠶而小。味極甘美。性涼。解熱毒。助復原。可與閉蟲並傳。施可齋園雜記云。漳泉各處。二三月間。市上賣生熟甘蔗蟲。甘蔗老根中生也。生者如蠶而細。灰白色。光潤無茸毛。熟者以油灼過。拳曲如蜂。淡黃色。味極鮮。佐酒尤佳。考甘蔗性寒。故王維詩賜櫻桃詩。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。此蟲既生蔗中。宜亦性寒矣。而吾鄉醫者。治小兒痘漿不起多用之。或有云性熱。本草不載。不能辨也。又據兩般秋雨庵隨筆。載姚承憲味甘蔗蟲詩。菴陸遠日賦蟲蟲。渴念寒漿解熱中。佳境不須愁有蠶。蔗生原可度斯齋。似誰折節吟腰細。笑彼含花蜜口空。畢竟冰心難共語。一樽愁緒對蠻風。玩詩次句。似亦謂其性寒。惟云菴陸遠日。則是夏月方有。詩在粵中所作。豈粵中夏月始賣。而漳泉獨早在二三月耶。

而鄭君出產時期。亦未辨明。惟氣味甘微寒。發痘行漿等效用。確與王施二君發明吻合。鄭君所言。可見皆從實驗。吾於斯益信。惟屢蟲確是地蠶蟲。即仲景大黃屢蟲丸等用之。以化療瘕去瘀血。端不能以甘蔗蟲代之。吾謂以後業藥者。暇時亦宜閱覽本草。參對方書。庶不致再誤人命矣。

配合應用 ①大黃屢蟲丸。治產婦腹痛有乾血。用屢蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩為末。煉蜜杵和。分為四丸。每以一九酒一升。煮取二合。溫服。即當下血也。
(張仲景方)

②治木舌腫強。塞口。不治殺人。屢蟲炙五枚。食鹽半兩為末。水二錢。煎十沸。時時熱含。吐涎。瘥乃止。
(聖惠方)

③治腫舌塞痛。地蠶蟲和生薄荷研汁。帛包捻舌下腫處。一名地蟬蟲也。(納氏方)
④治腹痛夜啼。屢蟲炙。芍藥。芍藟各二錢。為末。每用一字。乳汁調下。(聖惠方)

⑤折傷接骨。用土蠶焙存性為

末。每服二三錢。接骨神效。一方生者搗汁酒服。(楊拱樞要方)川芎。蚊即土蠶六錢。隔紙砂鍋內焙乾。自然銅二兩。用火煨醋淬七次。為末。每服二錢。溫酒調下。病在上。食後。病在下。食前神效。(補珍方)用土蠶陰乾一箇。臨時趁研入藥。乳香沒藥龍骨。自然銅火煉醋淬各等分。磨香少許為末。每服三分。入土蠶末。以酒調下。須先整定骨乃服藥。否則接挫也。此乃家傳秘方。慎之。又可代杖。(董炳集驗方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡有瘀滯積結者。禁用。畏皂莢。黃菊。屋遊。
參攷資料 ①生河東川澤及沙中。人家牆壁下土中。潛處。十月採曝乾。(別錄) ②形扁如蠶。有甲不能飛。小有臭氣。(陶弘景) ③此物好生鼠壤土中及屋壁下。狀似鼠婦而大者寸餘。形小似蠶。無甲而有鱗。小兒多捕捉以賣物為戲。
(蘇恭)

處方用名 將軍乾。
古籍別名 促織。(綱目拾遺) 同蠶。(俗名) 蟬。(類

一七九四

外國名詞 Grylodes bet-hollus, Sauss (拉丁) Crickets.
(英)

產地 多生原野陰溼諸地。
形態 蟋蟀為化生蟲類之一種。全體黑色。長約六七分。雄者能鳴。善跳。前翅翼左下右。上相重疊。連接處有剛強之聲器。末端有尾毛二。較長。雌者尾毛間又有產卵管。一能穿地穴居。捕得可供藥用。



採取 以成對者入藥。
性質 辛。鹹。溫。無毒。
主治 通小便。發痘瘡。解蟲毒。
配合應用 ①治小兒遺尿。取全蟋蟀一個。焙末。滾水下。照歲服。如兒十一歲者。每次服一個。服至十一個為止。(慈航活人書方)
②治男婦小水不通。痛脹不止。蟋蟀一個。陰陽瓦焙乾。為末。白滾湯下。小兒半個即通。(集驗方)

① 國蟲之數。蟋蟀最盛。其百戰百勝者。俗呼爲將軍。其蟲至冬必死。勿輕棄去。留以救產厄神驗。凡產不下。用乾者一枚。煎湯服。卽生。并無橫倒之患。(趙際昌)

◎ 促織可治水蠱。昔有人患水蠱。百治不效。一日偶飲開水。水中先有促織一對在內。其人倉卒一併吞之。越數日其病漸消。方知促織可治此症。後傳此方數人。無不驗者。一對不足。連服二三對自效。(朱煥齋任城日鈔方)

【螭螂】卽蜚蠊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜚蠊」條。

【螭螂花根】卽老鴉蒜之古籍別名。典見王都官方。詳「老鴉蒜」條。

【螭螭】卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳「桑螵蛸」條。

【衍菰草】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【謝婆菜】卽水苦蕒之古籍別名。典見圖經本草。詳「水苦蕒」條。

【鶩鷄】卽鶩鷄之古籍別名。典見說文。詳「鶩鷄」條。

【鶩鷄】 命名 本品鳴聲鶩鷄故名。

產地 出粵中。

形體 鶩鷄爲雞類之一種。雞頭鳥喙。色黃。腹毛純黑。尾長下垂。性嗜蛇。其哺子時。取雞折其兩足。乃以蛇飼之。三日卽復。屢折屢復。故可供藥用。

主治 骨節折傷。搗食之。

【豎豆】卽稽豆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「稽豆」條。◎ 卽鹿藿之俗名。詳「鹿藿」條。

【礪石】卽礪石之古籍別名。典見綱目。詳「礪石」條。

【狸狸】卽黃鼠之古籍別名。典見綱目。詳「黃鼠」條。

【賽牡丹】卽麗春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麗春花」條。

【賽空青】卽空青之處方用名。詳「空青」條。

【賽桂香】卽砂仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「砂仁」條。

【賽鷓鴣】卽鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【賽脂】卽車脂之古籍別名。典見綱目。詳「車脂」條。

【避役】卽壁虎之古籍別名。典見綱目。詳「壁虎」條。

【避驚風石】卽辟驚石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「辟驚石」條。

【還丹金】卽金之生於丹穴中。體含丹砂。色尤赤。可合丹服者。性質功用。詳「金」條。

【還元大品】卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【還元水】卽金汁之古籍別名。典見救急圖記。詳「金汁」條。


【還元湯】卽童便之古籍別名。典見綱目。詳「童便」條。

【還筒子】卽天麻子之原名。詳「天麻子」條。

【還精草】卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「望江青」條。

【還魂丹】 產地 以四川山中爲多出。

形體 還魂丹根如大蒜。黑褐色。葉似葶藶而更細密。可供藥用。



還魂丹

主治 跌打損傷。

【還魂酒】卽童便之古籍別名。典見和漢藥考。詳「童便」條。

見和漢藥考。詳「童便」條。

【還種子】卽青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青葙子」條。

【醴草】卽醴草之原名。詳「醴草」條。

【鍋底墨】卽釜底墨之古籍別名。典見綱目。詳「釜底墨」條。

【鍋尖】卽豆腐乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「豆腐乾」條。

【鍋焦】 原名 飯鍋焦。 基本 本品卽煮飯時。附着於鍋底之焦飯。

古籍別名 黃金粉。(綱目拾遺)

採取 以僧寺中米多爲厚者。入藥用良。

性質 苦。甘。平。無毒。

主治 補氣運脾。消食積。止泄瀉。入珍粉中用之。

配合應用 ① 鍋焦丸。小兒常用。健脾消食。用鍋焦炒黃三斤。神麴炒四兩。砂仁炒二兩。山查四兩。

蒸蓮肉去心四兩。雞臍皮一兩。炒共爲細末。加白糖米粉和勻。焙作餅用。(家寶方)

◎ 治老幼脾胃久不愈。鍋焦爲

十七畫 鍛

末四兩。蓮肉去心淨末四兩。白糖四兩。共和勻。每服三五匙。日三次。食遠下。(梁侯瀛集驗方)

①治白濁不止。乾飯搗粗二兩。松花二兩炒。臘肉骨頭五錢。烘脆。共為末。砂糖調。不拘時服。(種福堂方)

②治脾胃不健。鱈魚二斤。蓮肉一斤。白糖半斤。蜜一斤。丸如桐子大。每服數十丸。空心白湯下。(祝氏效方)

③玉露霜。治老人脾泄最效。白朮炒二兩。陳皮一兩五錢。蓮肉去心四兩。薏苡仁四兩炒。糯米一升炒。菘葢一升炒熟。陳米搗把一升炒。糟霜量加。共為末。每用二三錢。滾水調勻服之。(行篋檢祕方)

④治預稀痘疹。銀花陰乾。鍋裡每一升入銀花一兩。共研末。用洋糖或做糕餅。或開水調和。每日令小兒食之。(不藥良方)

【鍛石】即石灰之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「石灰」條。

【鍛樹】 產地 出吉林等處。

形態 鍛樹為喬木類之一種。其樹似杜仲。葉如烏柏柏

鍛

葉而大如團扇。邊有鋸齒。嫩時可裹餅餌蒸食。霜後鮮赤若丹。根照曬巖谷。其皮紅色。柔韌如麻。作繩可。燃作魚網入水不濡。可供藥用。

主治 小兒胎疝。及一切折傷。肉破骨斷。搗碎酒煎服。渣傳患處。參攷資料 有人取鍛樹皮包切肉數瓣。抵家啓視。則合成一片。始見其皮能合肉接骨。為治折傷要藥。(綱目拾遺)

【鍛樹葉】 主治 小兒胎疝。皮膚難忍。者貼之。參攷資料 幼兒患疝。由於胎中得者。亦能致命。此葉久貼皮膚。裂處自然復合。永無患矣。但非幼童之年。則不可治。方用鍛樹皮或搗爛。或削片。以油潤溼。黏布上貼患處。外以布牢繫腰間。或半年三個月方愈。(趙學敏)

【鍛石】即砒石之古籍別名。典見綱目。詳「砒石」條。

【鍛砂】 命名 本品乃鍛家磨鑪之細末。如砂。故名。基本 係金屬原質之一種。性質 酸。辛。無毒。

效 能 消水腫。治黃疸。用作利尿消腫藥。

主治 功同鐵粉。和沒食子染髮至黑。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鍛砂曰。消積聚。腫滿。黃疸。平肝氣。散瘰。(李時珍)

配合應用 ①治風溼脚痛。鍛砂。川烏頭為末。和勻炒熱。綿包熨之。(摘玄方)

②治風痺暖手。鍛砂四兩。晒砂三錢。黑脚白礬六錢。研末。以熱醋或米泔溼油紙裹。置袋內。任意執之。冷再拌。(聖濟總錄方)

③治脾勞黃疸。鍛砂四兩。醋炒七次。乾漆燒存性三錢。香附三錢。平胃散五錢。為末。蒸餅丸。梧子大。任湯使下。(摘玄方)

④治溼熱黃瘡。助脾去濕。鍛砂丸。用鍛砂不拘多少。搗盡。淘洗白色。以米醋於鐵鉢內。浸過一指。炒乾。再炒三五次。候通紅。取出。用陳粳米半升。水浸一夜。搗粉作塊。裹半熟。杵爛。入鍛砂二兩。半。百草霜炒一兩。半。搗干。下。梧子大。每服五十九丸。用五加皮。牛膝根。木瓜浸

一七九六

酒下。初服若泄瀉。其病源即去也。(乾坤生意方)

⑤治水腫尿少。用鍛砂醋煮炒。乾。豬苓生地龍各三錢。為末。蕪荊研和。傅脾中。約一寸厚。縛之。待小便多為度。日二易之。入甘遂更妙。(德生堂方)

⑥治泄瀉無度。諸藥不效。方同上之水腫尿少方。惟不用甘遂耳。(醫學正傳方)

⑦治虛寒下痢。腸滑不禁。鍛砂七錢。半。官桂一錢。枯礬一錢。為末。以涼水調。攤臍上下縛之。當覺大熱。以水潤之。可用三四次。名玉胞肚。(仁存方)

⑧治項下氣瘰。鍛砂入水缸中。浸之。飲食皆用此水。十日一換砂。半年自消散。(楊仁齋直指方)

⑨染白髮髮。鍛砂醋炒七次。一兩。詞子。白芨各四錢。百藥煎六錢。綠礬二錢。為末。用熱醋調。刷髮髮。菜葉包住。次早酸漿洗去。此不壞髮。亦不作紅。又方。鍛砂。蕎麥各一兩。百藥煎為末。茶調。夜塗。且洗。再以詞子五錢。沒石子醋炒一箇。百藥煎少許。水和塗。一夜。溫漿洗去。

黑而且光。

用量 三錢至四錢。

參攷資料 ●是作鍼家脾瀝

之細末也。須真銅砂乃堪用。人多

以柔鐵砂雜和之。飛爲粉。大其能

辨也。亦堪築皂。(陳藏器)●鍼砂

酸辛。是作鍼家磨鍼細末也。鍼砂

寒降。善治溼熱。爲消脾胃壅積黃

腫之專藥。丹溪溫中丸用之。(盧

飛鷗)

【關綠】即菘筍之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳「菘筍」條。

【困莫伽】即川芎之古籍別名。典

見金光明經。詳「川芎」條。

【隱上座】即郁李仁之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【隱忍葉】即薺危莖之原名。詳「

隱忍葉」條。

【隱展】即阿魏根之古籍別名。典

見綱目。詳「阿魏」條。

【隱鼠】古籍別名。假鼠。鼠母。

隱(綱目)王鼠。(本草

集註)

產地 出山林間。

形態 隱鼠爲獸類之一種。其

狀頭脚似鼠。口銳色蒼。大如水牛。

蹄脚類象而唇暗。毛色灰赤。胸部

及尾白色有力而鈍。肉可食。味如

牛肉。其脂可供藥用。

主治 瘰癧。惡瘡。

【霜】即冬霜水之簡稱。詳「冬霜

水」條。

【霜花】即朴硝之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「朴硝」條。

【霜桃】即桃之花開於冬霜時者。

功用詳「冬桃」條。

【霜桑葉】即輕霜桑葉之處方用

名。詳「桑葉」條。

性質 甘。苦。微

寒。無毒。

效能 去風。明目。清熱。潤燥。

主治 頭痛。咳嗽。消渴。盜汗。

參攷資料 桑葉經霜者得金

氣之全。故清燥救肺之功爲尤多。

【霞天半夏麴】基本 本品

爲半夏麴之

一種。係和牛汁製成者。

製法 用半夏爲末。和入霞天

苻。草置七日。待生黃衣。懸掛風乾。

入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療癩疾沈疔。

【霞天膏】即霞天膠之原名。詳「

霞天膠」條。

【霞天膠】原名 霞天膏。

製法 用嫩黃牛肉

三四十斤。洗極淨。水煎成糜。濾去

渣。再熬成膏用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 中風偏廢。口眼歪斜。痰

涎壅塞。五臟六腑留痰宿飲。癱塊。

手足皮膚中痰核。

配合應用 霞天膠。橘皮。白茯

苓。蘇子。白芷。薤仁。半夏。芥朮。爲麴。

治脾胃積痰。以橘皮。蘇子。貝母。栝

樓根及仁。蓮砂爲麴。治積熱痰結。

(本草經疏)

【霞天麴】製法 霞天麴爲麴

之一種。用霞天膏四

兩。川貝母八兩。將膏烱化。和入貝

母粉成餅用。

主治 健脾胃。消痰飲。

【霞片】即鴉片之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「鴉片」條。

【霞貝】即貝子之黃黑文相間者。

功能殺蛆蟲。餘詳「貝子」條。

【霞雀花】即金雀花之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「金雀花」條。

【韓信草】產地 出身省南海

採取 三四月新時採之。

性質 甘。辛。平。

效能 治跌打。祛風。散血。消腫。

壯筋骨。理蛇傷。

【韓國參】即高麗參之別名。詳「

高麗參」條。

【類凍】即款冬花之古籍別名。典

見爾雅。詳「款冬花」條。

【類塊】即硃砂之古籍別名。典見

綱目本草。詳「硃砂」條。

【類鹽】即鹽之出於池而未經煉

治者。其鹽爲類。其味鹹苦。餘詳「

食鹽」條。

【餛飩青】原名 餛飩。莖。

之產於嘉興而形似餛飩者。故名。

形態 餛飩青爲蕓實之一種。

較小於他蕓。而大於沙角。可供藥

用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 生食解積。暑。煩熱。生津。

養食健脾。和胃。益氣。

【餛飩莖】即餛飩青之原名。詳「

餛飩青」條。

【鮫魚膽】 採取 臘月採取之。主治 喉痺和白瘰。

【鮫魚】 即河豚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『河豚』條。

【鮫魚】 即鮫魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮫魚』條。

【鮫】 即魚子之古籍別名。典見綱目。詳『魚子』條。

【鮮大青】 即大青之處方用名。詳『大青』條。

【鮮子】 即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【鮮支】 即山梔子之古籍別名。典見綱目。詳『山梔子』條。

【鮮毛竄】 即骨碎補之處方用名。詳『骨碎補』條。

【鮮生地】 即生地黃之處方用名。詳『生地黃』條。

【鮮石斛】 即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮竹茹】 即竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【鮮竹葉】 即竹葉之處方用名。詳『竹葉』條。

【鮮沙參】 即沙參之處方用名。詳『沙參』條。

【鮮奇良】 即土茯苓之處方用名。詳『土茯苓』條。

【鮮金石斛】 即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮扁斛】 即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮首烏】 即何首烏之處方用名。詳『何首烏』條。

【鮮草果】 古籍別名 杜若。形體 粵志云。廣人多種之爲香料。即杜若。非藥中草果也。其苗似縮砂。三月開花作穗。色白。殺紅五六月結子。其根勝於葉。性質 辛溫。無毒。主治 除瘴氣。益精明目。

【鮮荷葉】 即荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【鮮菖蒲】 即菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【鮮菖節】 即菖節之處方用名。詳『菖節』條。

【鮮藜香】 即藜香之處方用名。詳『藜香』條。

【鮮藜香】 即藜香之處方用名。詳『藜香』條。

【鮮蘆根】 即蘆根之處方用名。詳『蘆根』條。

【鷓鴣】 即雉雞之古籍別名。典見爾雅。詳『雉雞』條。

【鷓】 即啄木鳥之古籍別名。典見綱目。詳『啄木鳥』條。

【鷓】 即雁之大者。其功用詳『雁』條。

【鷓頭】 即灰質之古籍別名。典見韓愈文。詳『灰質』條。

【鷓香】 即薤之古籍別名。典見說文。詳『薤』條。

【鷓藏】 即胡麻之古籍別名。典見別錄。詳『胡麻』條。

【鷓藟】 即葶草之古籍別名。典見類篇。詳『葶草』條。

【鷓母】 即鷓之別名。典見綱目。詳『鷓』條。

【鷓】 即鷓之古籍別名。典見綱目。詳『鷓』條。

【鷓】 即鷓之原名。詳『鷓』條。命名 禽經云。白鷓相睨而孕。本品交睛而孕。故名。

【鷓】 即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳『鷓』條。

外國名詞 Nycticorax prasa inosoles Swinh(拉) Chinese aquacoo heron(英) アカクビ

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類鷓科之鷓鴣。

產地 出南方池澤間。及印度等處。

形態 鷓鴣爲水禽類鷓屬之一種。其體之上面概白色。頭頸赤。胸背之雜毛混交。綠色。狀如野鴨。喙長。脚高。趾無蹼。翼與尾灰白色。腹白。脚灰黃。恒橫河川池畔。捕食魚蛙。其肉可供藥用。

性質 甘。微平。無毒。

主治 解諸魚蝦毒。炙食之。

【鷓鴣】 即鷓鴣之古籍別名。典見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓】 即鷓之古籍別名。典見禽經。詳『鷓』條。

【鷓】 即鷓之古籍別名。典見綱目。詳『鷓』條。

【鷓】 即鷓之古籍別名。典見綱目。詳『鷓』條。

【鷓】 係脊椎動物。喙乳類。有胎盤類。有蹄類。反芻類。鹿科之鷓。

一七九九

十七畫 麋

古籍別名 牡者名麋。牝者名殺。子名麋。沙鹿。

外國名詞 Alces machilis. Ello. 或 Moose. (拉丁) オホシカ (日本)

產地 出俄國、挪威、瑞典、及北美洲、亞洲之北方諸地。

形態 麋爲獸類鹿屬之一種。其體似鹿而大。高七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬚。胸及喉下密生長毛而下垂。牡者生後九月而生角。逐年脫換而生。枝短而粗。枝末分簇。目下有二竅。爲夜目。能夜視。常至叢林中食樹皮樹葉及嫩芽等。其肉可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣補中。治腰脚。

歷代記述攷證 【宋】掌禹錫補註本草論藥肉曰。補五臟不足氣。

參攷資料 ①麋肉不可合磁肉堆肉食。發痲疾。合蝦及生菜梅李食。損男子精氣。陶弘景。②多食令人弱房。發脚氣。妊婦食之。令子目病。(孟詵) ③按陸農師云。鹿

以陽爲體。其肉食之煨。藥以陰爲體。其肉食之寒。觀此則別錄麋脂令人陰痿。孟詵解多食肉令人弱房。及角肉不同功之說。亦此意也。(李時珍)

【麋皮】 主治 除脚氣。作靴襪著之。

【麋角】 製法 雷斅曰。麋角以兼勞生小尖色蒼白者爲上。孟詵曰。凡用麋角。可五寸截之。中破。炙黃爲末。入藥。李時珍曰。造藥角膠與麋角霜。並與鹿角膠。鹿角霜同法。又集靈方云。用麋角一雙。水浸七日。刮去皮。錯屑。以銀瓶盛。牛乳沒一日。乳耗再加。至不耗乃止。用油紙密封瓶口。別用大麥鋪鍋中。三寸上安瓶。再以麥四圍填滿。入水浸一伏時。水耗旋加。待屑軟如麩。取出。焙研成霜用。

性質 甘。熱。無毒。

主治 風痺止血。益氣力。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論藥角曰。刮屑。熬香酒服。大益人。【唐】孟詵食療本草論藥角曰。作粉常服。治丈夫冷

氣及風筋骨疼痛。若卒心痛。一服立瘥。漿水磨泥塗面。令人光華。赤白如玉可愛。【宋】日華諸家本草論藥角曰。酒服補虛勞。添精益髓。益血脈。暖腰膝。壯陽悅色。療風氣。偏治丈夫。【明】李時珍本草綱目論藥角曰。滋陰養血。功與茸同。

參攷資料 ①麋角常服大益陽道。不知何因。與肉功不同也。煎膠與鹿角膠同功。茸亦勝鹿茸。仙方甚重之。(孟詵) ②鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。藥之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古之微祕。前人方法雖具。而理未發出。故論者紛紜。又楊氏家藏方。治虛損有二至丸。兩角並用。但其藥性過溫。止宜於陽虛寒溼血痺者耳。於左腎無與焉。孫思邈千金方言。麋角丸凡一百一十方。惟容成子燕所服者。特出衆方之外。子燕服之羽化。(李時珍)

【麋角霜】 性質效能及製法。均與鹿角霜同。參見該條。補益陰血之功。則過之。詳【鹿角膠】條。

【麋角膠】 即取藥角煎熬製膠者。性質效能及製法。均與鹿角膠同。

一八〇〇

【麋脂】 古籍別名 官脂。(本經)

採取 十月間取脂。煉過收用。性質 辛。溫。無毒。

主治 癩腫惡瘡。死肌寒熱。風寒溼痺。四肢拘攣不收。風頭腫氣。通驗理。(本經) 柔皮膚。不可近陰。令痿。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藥脂曰。治少年氣盛。面生疥皰。化脂塗之。

施用宜忌 長大黃。忌橘李。

【鹿茸】 製法 詳鹿茸條。性質 甘。溫。無毒。

主治 陰虛勞損。一切血病。筋骨腰膝酸痛。滋陰益腎。

【鹿骨】 主治 虛勞至良。煮汁醃酒飲。令肥白。美顏色。

【鹿骨酒】 基本 本品係用藥骨。骨麥汁。同麴米如常釀成之酒。

主治 陰虛腎弱。久服令人肥白。【藥衍】 即微衍之古籍別名。典見本經。詳【薇衍】條。【藥鴉】 即鴉雞之古籍別名。典見

附錄詳「龍雞」條。

【聖】即鹿之古籍別名。詳「鹿」條。

【楚麥芽】即麥芽之古籍別名。典見新本草。詳「麥芽」條。

【黏子】即倒捻子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「倒捻子」條。

【黏糊菜】即稀莪草之古籍別名。典見救荒本草。詳「稀莪草」條。

【黏精】即桐骨之古籍別名。典見綱目。詳「桐骨」條。

【黛石】即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「代赭石」條。

【點椒】即川椒之古籍別名。典見綱目。詳「川椒」條。

【點蒼石】即理石。因產於大理之點蒼山。故名。功用詳「理石」條。

【龍】命名。本品為甲蟲類中之最大者。故字從元。元者大也。

產地 出江湖中。

形態 龍為介類龍屬之一種。其狀似龍而大。大者圍一二丈。頭大有磊塊。頸黃背青。腸屬於首。以鱗為鱗。其卵大如鷄子。每產有一二百枚。其肉有五色。而色白者多。可供藥用。甲脂詳見各該條。

性質 甘。平。無毒。

主治 食之補益。解溼氣。邪氣。諸蟲毒。

【龍甲】性質 甘。平。無毒。

主治 炙黃酒浸。治瘰癧。殺蟲逐風。惡瘡痔瘻。風頑疥癬。功同龍甲。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論龍甲曰。五臟邪氣。殺百蟲毒。百藥毒。續筋骨。【宋】蘇頌圖經本草論龍甲曰。婦人血熱。

【龍脂】主治 摩風及惡瘡。

性質 苦。寒。有毒。

主治 喉痺。以生薑薄荷汁化少許服。取吐。

【龍鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

十八畫

【龍柏葉】即柏葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「柏葉」條。

【龍蘭花】即麗春花之別名。詳「麗春花」條。

【龍蘭艾花】即麗春花之古籍別名。典見圖經本草。詳「麗春花」條。

【履】即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳「草鞋」條。

【戴文玉】形態 戴文玉為雜形如金釵。可供藥用。

主治 療血疾。

【戴星草】即穀精草之古籍別名。典見開寶本草。詳「穀精草」條。

【戴粉】即黃耆之古籍別名。典見綱目。詳「黃耆」條。

【戴樵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。即旋覆花之古籍別名。典見別錄。詳「旋覆花」條。

【戴精草】即穀精草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「穀精草」條。

【戴按】即黃耆之古籍別名。典見本經。詳「黃耆」條。

【斷草烏】產地 出粵中。

形態 斷草烏為烏蛇類之一種。大僅指許。長五六寸。頭如龍形而小。其身純烏。其行百草沾之立斷。人見斷草。得跡輒獲之。故蛇每雜地丈許。使身如矢。直以入穴不沾草。則人莫得其跡。而避人捕。捕得可供藥用。

主治 大風。煮酒服。

【斷腸花】即秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「秋海棠」條。

【斷腸草】即秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「秋海棠」條。即釣吻之古籍別名。典見綱目。詳「釣吻」條。

【斷鐘草】草本 斷鐘草為雜草類之一種。可供藥用。

主治 疔瘡。

【櫛】即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜仲」條。

【櫛芽】即杜仲嫩芽之原名。詳「杜仲嫩芽」條。

【檳榔】命名 資與耶。皆貴客之稱。南方草木狀言。廣人凡資勝族。客必先呈此為果。若選近不設。用相嫌恨。則檳榔名義蓋取於此耳。

處方用名 花檳榔。尖檳榔。連皮檳。心檳。煎兒檳。海南檳。

古經別名 賓門（李貴之）仁類。洗穢丹。橄欖子（綱目）仁。檳榔。和漢藥考。稿子（本草集註）

十七畫 停姪黏黛點龍盼 十八畫 叢屬戴斷櫛檳

十八畫 檳

外國名詞 Semen Arcoea.

(拉丁) Arcoea-nut Botel-nut.

(英) Arcoeanuss, Bokelnuss.

(德)

基本 屬棕櫚科。為檳榔之子

實。

產地 以廣東瓊州。海南產者

為最。名南尖。即鷄心檳也。小粒如


鷄心也。其次則印度。安南。南洋羣

島均有出。大粒名西尖。功力不及

南尖三分之一也。和漢藥考曰。產於

亞洲之熱帶地方。如東印度。馬來

半島。是臺灣之南方亦有之。



檳榔

形態 檳榔。喬木也。似椰子。細

而長。高至四五丈。無枝。梢端生類

似芭蕉葉之羽狀複葉。花為六片

花被。雌雄異株而生。葉底出花梗

三四相綴而為穗狀。果實為卵大

之漿果。外有帶黃色之薄殼皮包

之一穗。約結實三四百顆。每樹結

實最多者。自第五年至三十年而

止。其子形球圓或卵圓。長寸餘。直徑約五分。多附有纖維之毛冠。外面色灰褐。內堅實。有紋理。味甘而為收斂性。

種類 大腹檳榔。形扁圓。即母

檳榔。雞心檳榔。形細長。即

公檳榔。葉兒檳榔。梭身檳榔。即兩

頭尖如雞實者。亦四尖檳榔。檳榔

孫即檳榔之小者。亦曰蒜子。又即

所謂山檳榔。又有馬檳榔。一名紫

檳榔者。乃蔓生結實。大如葡萄。色

紫味甘。核仁亦甜。功用與此不同。

採取 五月採之。

製法 雷斅曰。凡使檳榔。頭則

矮吡者為榔。形尖紫文者為檳。檳

力小。榔力大。凡使用白檳及存坐

穩正。心堅有錦文者為妙。半白半

黑并心虛者不入藥。用以刀刮去

底細切之。勿令經火。恐無力。若熟

使不知不用。李時珍曰。近時方藥

亦有以火煨到用者。然初生白檳

榔。須本境可得。若他處者。必經煮

薰。安得生者耶。又檳榔生食。必以

扶留藤。古貢灰為使。相合嚼之。吐

出紅水一口。乃滑美不澀。下氣消

食。此三物相去甚遠。為物各異。而

相成相合如此。亦為異矣。俗謂檳榔為命賴扶留以此。古貢灰即蠟蚌灰也。貢乃蠟字之說。瓦屋於灰亦可用。

性質 苦。辛。溫。無毒。

成分 檳榔子中有阿萊可林

(Arcoena, C₁₅H₁₁NO₂)及阿萊

加茵(Arcoena, C₁₅H₁₁NO₂ + H₂O)

之植物鹽基。其構造有人發

明。為水分一三。三五。紫素總量

一。五三。咖啡涅二。〇八。伊打

製越幾斯一。三五。澱粉四五。

四四。鞣酸三。七九。木纖維七。

〇。一其餘無氮素物一八。二一。

無機物二。九〇。見藥學雜誌第

一百五十九號。

效能 瀉氣攻積。殺蟲行水。用

作消化及殺蟲藥。

作用 在胃中能激胃黏膜。使

分泌增加。至腸與糞蟲相遇。能殺

死之。或混於大便內排出。同時又

能刺激迷走神經。使腸之蠕動迅

速。入血中有縮小瞳孔之能。

主治 消穀逐水。除痰癖。殺三

蟲。伏尸寸白。

歷代記載攷證 【唐】蘇恭新

修本草論檳榔子曰。治腹脹。生搏末服。利水殺道。傳瘡。生肌肉。止痛。燒灰傳口的白瘡。【唐】甄權藥性本草論檳榔子曰。宜利五臟六腑。壅滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。【唐】李珣海藥本草論檳榔子曰。主貢豚膀胱諸氣。五臟氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。【宋】大明諸家本草論檳榔子曰。除一切風。下一切氣。通關節。利九竅。補五勞七傷。健脾胃。中除煩。破癥結。【元】王好古湯液本草論檳榔子曰。治衝脈為病。氣逆裏急。【明】李時珍本草綱目論檳榔子曰。治瀉痢後重。心腹諸痛。大小便氣。痰氣喘急。瘰癧。瘰癧瘻。【明】繆希雍本草經疏論檳榔子曰。檳榔味辛氣溫無毒。大明言。元素言。苦。入手足陽明經。夫足陽明為水穀之海。手陽明為傳道之官。二經相為貫輸。以運化精微者也。二經病則水穀不能以時消化。滯留而成痰癖。或滯熱停久。則變生諸蟲。此藥辛能散結破滯。苦能下泄殺蟲。故主如上諸證也。甄權宜利五臟六腑。壅滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。日

華子下一切氣。通關節。利九竅。健脾胃。中破凝結。李珣主賁豚氣。五臟氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。皆取其辛溫走散。破氣堅積。能下腸胃有形之物耳。清黃宮繡本草求眞論檳榔子曰。檳榔辛苦而溫。書何言其至高之氣。彼獨能瀉使之下行。以至於極。以其味苦主降。性如鐵石之重。故爾有墜下之力耳。是以無堅不破。無脹不消。無食不化。無痰不行。無水不下。無氣不降。無蟲不殺。無便不開。故凡痰急後重。風癱癱瘓。並水腫脚氣。酒醉不醒。無不因其苦溫辛澀之性。以爲開泄行氣破滯之地耳。至書所云。飽能使之餓。醉能使之醒者。以其能下氣也。饑能使之飽。醒能使之醉者。以檳榔必用芫葉裹嚼。芫葉氣味辛溫。得此能除中外之氣。以散癱瘓之邪也。然非瘴之地。不可常服。恐其能洩真氣耳。鷄心尖長。勞之作錦紋者良。清王士雄隨息居飲食譜論檳榔子曰。檳榔苦甘溫澀。下氣消痰。辟瘴殺蟲。析醜化食。除脹泄瀉。宜滯破堅。定痛和中。通腸逐水。制肥甘之毒。有梁家

十八畫 檳

宜之。尖長質較硬。色紫而香。俗呼飛兒檳榔者良。且能堅齒解口氣。惟虛弱人及澹泊家忌食。清賈九如辨藥指南論檳榔曰。檳榔體重而質味厚。而沈沈實主降。專壓諸藥。以導中焦下焦結滯之氣也。故能逐水氣。消穀食。除痰癖。削積塊。追諸蟲。攻脚氣。通痢疾。後重。數症之功。性若鐵石。驗如奔馬。東垣言之詳矣。但瀉至高之氣。較枳實青皮尤甚。不可過服。

國外學說 英美學說謂檳榔子一名仁類。產中國之交州。廣州。愛州等處。而印度國亦產之。樹高約五丈至七丈九丈不等。取該樹之子。可爲藥品。至其醫治作用。內能收斂驅蟲。治腹內蛔蟲。外則能燒成炭研末。以作刷牙散。每服半兩至一兩。日本學說謂近時獨逸ヤーンズ氏。分析本藥。檢明三種類鹽基。一稱爲「アレコリン」。一稱爲「アレカイン」。一甚少。而其性狀不明。右三種中。唯「アレコリン」有效。依コルメ氏之試驗云。其作用與「ペレチーリ」(石榴根皮之成分)或「ピ

ロカルベン」相髣髴。驅蟲劑之用量。檳榔子末或其流動越幾斯四・〇至六・〇止。一回內服。猪子氏和漢藥論。蓋檳榔子者乃驅除條蟲之藥也。前有中村俊士者。日本三河人。以檳榔浸(檳榔三・〇)三〇・〇。治惡阻病。一日分六次服。連服八日。惡心。嘔吐。全然消退。其治法。經過等。詳見明治二十七年十二月東京醫事新誌第八百七十二號。古方藥品考曰。檳榔有二種。來自中國者。形扁圓。味澀。斂。爲大腹檳榔。佳品也。大腹皮卽其殼。(形圓。通體白毛。宛如筆毫。味淡。)來自外番者。頭尖。微長。滋味不厚。此爲下品。又一本堂藥選曰。凡選檳榔子。以存坐穩正。心堅有文。白而新者爲佳。此乃輪船所來。祇此一種。本國絕無此物。其心虛及帶黑色者。皆非用。用時水洗到細。不用煨。熱麵煨。焙等法。此物到細。經七八日。必作酸氣。可惡。故須隨用方到。不可到置經日。又和漢藥考曰。檳榔子之細長者。曰鯉心檳榔。又名公檳榔。扁平而大者。曰大腹子。又名母檳榔。

亦呼豬檳榔。兩頭尖如樞實者。曰梭身檳榔。
配合應用 ①治食積。用檳榔。草果。枳實。橘皮。消一切堅硬肉食。及諸米麵生冷。食積成塊。作痛。如三稜。蓬蘽。礬石。紅麴。山查。麥麩。
②治滯下後重。檳榔。黃連。酒豆。薑肉。橘紅。白芍藥。紅麴。烏梅。葛根。枳殼。
③治小兒疳積。檳榔。雷丸。使君子。白蕪荑。蘆薈。肉豆蔻。胡黃連。
④治一切寸白蟲。用檳榔。棟根。鶴虱。錫灰。葱荑根。貫衆。烏梅。
⑤治山嵐瘴氣。發瘧。用檳榔。蒼朮。草果。青皮。甘草。
⑥治痰涎爲害。檳榔爲末。白湯每服一錢。(御藥院方)
⑦治嘔吐痰水。白檳榔一顆。煨熱。橘皮二錢。炙爲末。水一盞。煎半盞。溫服。(千金方)
⑧治醋心吐水。檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每服方寸匕。空心生蜜湯調下。(梅師方)
⑨治傷寒痞滿。陰病下早成痞。按之虛軟而不痛。檳榔。枳實。等分爲末。每服二錢。黃連煎湯下。(宣

明方)

①治傷寒結胸。已經汗下後者。檳榔二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。亦治魃厥腹痛。(肩安時傷寒論方)

②治心脾作痛。雞心檳榔。高良薑各一錢半。陳米百粒。同以水煎服之。(直指方)

③治膀胱諸氣。檳榔十二枚。一生一熟。為末。酒煎服之。良。此太醫秦鳴鶴方也。(海藥本草方)

④治本氣痛。雞心檳榔。以小便磨半箇服。或用熱酒調末一錢服之。(斗門方)

⑤治腰重作痛。檳榔為末。酒服一錢。(斗門方)

⑥治脚氣痿痛。以沙牛尿一盞。磨檳榔一枚。空心暖服。(梅師脚氣論方)

⑦治脚氣衝心。悶亂不識人。用白檳榔十二枚。為末。分二服。空心暖小便。五合。朝下。日二服。或入豉汁。溫酒同服。(廣利方)

⑧治脚氣脹滿。非冷非熱。或老人弱人病。此用檳榔仁為末。以檳榔殼煎汁。或茶飲蘇湯。或豉汁調

服二錢。甚利。(外臺祕要方)

⑨治乾霍亂病。心腹脹痛。不吐不利。煩悶欲死。用檳榔末五錢。童子小便半盞。水一盞。煎服。(聖濟總錄方)

⑩治大腸溼悶。腸胃有滯。大便秘塞。大檳榔一枚。麥門冬煎湯。磨汁。溫服。或以蜜湯調末二錢服。亦可。(普濟方)

⑪大小便閉。檳榔為末。蜜湯調服二錢。或以童子小便。葱白同煎服之。亦良。(普濟方)

⑫治小便淋痛。麴煨檳榔。赤芍藥各半兩。為末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。(十便良方)

⑬治血淋作痛。檳榔一枚。以麥門冬煎湯。細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。

⑭治蟲痔寒急。檳榔為末。每日空心以白湯調服二錢。

⑮治寸白蟲病。檳榔二七枚。為末。先以水二升半。煮檳榔皮。取一升。空心調末方寸匕服之。經日蟲盡出。未盡再服。以盡為度。(千金方)

⑯治諸蟲在腹。久不瘳者。檳榔

半兩。炮為末。每服二錢。以葱蜜煎湯調服一錢。(聖惠方)

⑰治金瘡惡心。白檳榔四兩。搗皮一兩。為末。每空心生蜜湯服二錢。(聖惠方)

⑱治丹從臍起。檳榔末醋調傅之。(本事方)

⑲治小兒頭瘡。木磨檳榔。曬取粉。和生油塗之。(聖惠方)

⑳治口吻生疳。檳榔燒研入輕粉。未傅之良。

㉑治耳出膿。檳榔研末吹之。(鮑氏方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣虛下陷。及無積滯者。禁用。忌火。

參攷資料 按羅大經鶴林玉露云。嶺南人以檳榔代茶。聚羣其功有四。一曰醒能使之醉。蓋食之久。則熱然頰赤。若飲酒然。蘇東坡所謂紅潮登頰。醉檳榔也。二曰醉能使之醒。蓋酒後嚼之。則寬氣下痰。餘醒頓解。朱晦菴所謂檳榔收得為祛痰也。三曰饑能使之飽。四曰飽能使之饑。蓋空腹食之。則充然氣盛如飽。飽後食之。則飲食

快然易消。又且賦性疏瀹而不洩。氣稟味最正。而更有餘甘。有是德。故有是功也。又按吳興輿乘傑。據說云。嶺表之俗。多食檳榔。日數十數。夫瘴癘之作。率因飲食過度。氣滯積結。而檳榔最能下氣消食去積。故人明於近利。而闕於遠慮也。夫嶺南地熱。四時出汗。人多黃瘠。食之則臟器疏洩。一旦病瘴。不敢發散。攻下。豈盡氣候所致。檳榔蓋亦為患。殆未思爾。又東陽盧和云。閩廣人常服檳榔。云能祛瘴。有瘴服之可也。無瘴而服之。弊不損正氣。而有開門延寇之禍乎。南人喜食此果。故備考諸說。以見其功過焉。又朱晦菴檳榔詩云。憶昔南遊日。初背面發紅。藥囊知有用。若登阻能同。痼疾收殊效。修真錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。(李時珍) 檳榔樹初生若筍竿。積硬引莖直上。莖幹頗似桃椰子。而有節。旁無枝柯。條從心生。端頂有葉如甘蔗。條派開破。風至則如羽扇掃天之狀。三月。葉中腫起一房。因自折裂出穗。凡數百顆。

大如桃李。又生刺重累於下。以護衛其質。五月成熟。剝去其皮。煮其肉而乾之。皮皆筋絲。與大腹皮同也。按漢命益期與韓康伯云。檳榔子既非常。木亦特異。大者三圍高者九丈。葉叢樹端。房棲葉下。華秀房中。子結房外。其摺穗似黍。其殼實似穀。其皮似桐而厚。其節似竹而概。其內空。其外勁。其屈如伏虹。其申如繩。本不大末不小。上不傾下不斜。調直亭亭。千百如一步。其林則寥朗。庇其陰則蕭條。信可長吟遠想。但性不奈霜。不得比植。必當選樹海南。遠然萬里。弗遇畏者之目。令人恨深也。又笠法真羅山疏云。山檳榔一名荔子。生日南樹似栝。而小。與檳榔同狀。一殼十餘粒。一幹十餘房。一房數百子。子長寸餘。五月採。味近苦甘。觀此則山檳榔即荔子。諸檳榔即大腹子也。蘇頌以味甘者為山檳榔。澀者為諸檳榔。似欠分明。(李時珍)此物與烟性略同。但烟性峻勇。用以散表逐寒。則煙勝於此。檳榔稍緩。用以和中緩胃。則此勝於烟。二者皆壯氣辟邪之要藥。故

十八登 檳

蘇 檳 歸 瀉 藥 爵

瀉藥中人。一日不可少也。(張景岳)檳榔是木之子。其性能沉。然沉降之性。自上而下。且性不烈。故降性亦緩。按此說似與張石頭不同。然彼以鐵石比其堅。非喻其速。則沉而降。降而緩。二說固未有參商也。(唐容川)嶺南人常食代茶。交州廣州人。凡有貴客。必先呈之。若遊道不設。往往銜恨。名曰檳榔。取義由此。蓋南方地溼。不食之。無以祛瘴癘也。生食味苦澀。與蠅蚌等灰同咀嚼。則柔輭甘美。(和漢藥考)暹羅交趾國俗。客來必先出檳榔食之。一若他處以煙草餽客者然。後乃出茶葉。因彼國於南方。檳榔能去溼熱。故也。本草云。嶺南人當作果食。嶺南者。中國之漳州福州等處也。該處人食檳榔法。以之與石灰或蜆灰同咀。則不覺澀。嘗以銀錫製小盒。貯剉碎之檳榔。出以敬客。見范石湖桂海志。(大和本草)東印度及馬來半島土人。常以檳榔細切。包以似胡椒之葉而食之。若嚼煙草然。故土人口中色鮮紅。齒則作黑色。以多食檳榔故也。中國人

亦有嗜之者。據云嚼此則呼吸清涼。齒牙堅固。胃及神經並強壯云。(和漢藥考)
 【檳榔孫】即檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳【檳榔】條。
 【蘇】即商麻之古籍別名。典見綱目。詳【商麻】條。
 【檳】即檳之古籍別名。典見集韻。詳【檳榔白皮】條。
 【歸尾】即當歸之處方用名。詳【當歸】條。
 【歸梢】即當歸梢之處方用名。詳【當歸】條。
 【歸澤麻】即五母麻之古籍別名。典見別錄。詳【五母麻】條。
 【歸藥】即當歸藥之處方用名。詳【當歸】條。
 【瀉利鹽】古醫別名。舍利鹽。(和漢藥考)
 外國名詞 *Epithel* (英)
 鹽地 瀉利鹽生於石灰洞中。附石面而如絲。有玻璃光澤。又或為土壤。自然出產之數甚少。今皆以人工製成之。
 形態 為稜柱狀之結晶體。無色透明。水能溶解。而不溶解於酒精。

精。
 製法 以苦土石入硫酸內。使起硫化作用。再以水溶解。繼續攪其溶液。而使結晶。復精製之。
 性質 味苦而鹹。
 成分 瀉利鹽。化學上謂之硫酸麻。溫度誤 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。
 效能 專用為緩下劑。
 國外學說 日本藥局方述曰。瀉利鹽一名硫酸苦土。為無色之稜柱狀小結晶。置空氣中。無何變化。味清涼苦鹹。以等分之水。并三分之一之熱能溶解之。現中性反應。酒精不能溶解。
 用量 四錢至八錢。
 【瀉葉】即香瀉葉之處方用名。詳【香瀉葉】條。
 【瀉】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳【貫衆】條。
 【爵耳子】即爵耳子之古籍別名。典見陸機詩疏。詳【爵耳子】條。
 【爵李仁】即郁李仁之古籍別名。典見本經。詳【郁李仁】條。
 【爵牀】古醫別名。爵麻。(吳普)香蘇。別錄)赤眼老母草。(唐本草)

十八畫 爵 壁 璫 瞿

外國名詞 Juskeia procu-

rhona, L. (拉丁) キツネノマゴ カグラサウ (日本)

基本 係爵牀科爵牀屬。藥用其莖葉。

產地 別錄云。出漢中川谷田野。蘇恭云。生平澤熱田近道旁。

形態 爵牀爲芳草類之一。生草本。莖高尺餘。節稍膨大。葉長橢圓形。或廣披針形。對生。葉與莖微有毛。夏日葉腋出小梗。開小花。集合如穗狀。長寸許。花冠淡紫色。呈唇形。下唇大。有三尖。雄蕊二枚。雌蕊一枚。



爵牀

性質 鹹。寒。無毒。

主治 腰脊痛。不得措牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論爵牀曰。療血脹下氣。治杖瘡。搗汁塗之。立瘥。

參攷資料 爵牀氣味微辛。

(李時珍) 此草生平澤熱田近道旁。似香葉。葉長而大。或如荏苒。細俗名赤眼老母草。(蘇恭) 原野甚多。方莖對節。與大葉香薷一樣。但香薷搓之氣香。而爵牀搓之不香。微臭。以此爲別。(李時珍) 爵牀莖葉之汁液。治充血之症。甚有功效。(植物學大辭典)

【爵梅】即雀梅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雀梅」條。

【爵犀】即鬼臼之古籍別名。典見本經。詳「鬼臼」條。

【爵麻】即爵牀之古籍別名。典見吳普本草。詳「爵牀」條。

【爵陸方】即防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳「防葵」條。

【璧玉】即玉之一種。性質功用詳「玉」條。

【翳珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【瞿陵花】即凌霄花之古籍別名。典見吳普本草。詳「凌霄花」條。

【瞿麥】 命名 本品之子。頗似麥子。故名。

地方用名 瞿麥草。瞿麥子。瞿麥穗。

古籍別名 巨句麥。(本經) 大爾。(別錄) 藹麥。莖麥。(廣雅) 大菊。(爾雅) 石竹。(日華) 洛陽南天竺草。(綱目) 地麵。龍鬚。大菊子。大蘭子。四時美。杜老草子。聖龍草子。南天竺草子。(和漢藥考)

外國名詞 Dianthus super-

bus, L. 基本 屬石竹科爲瞿麥之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。瞿麥產廣東北江。遠州等處。外省亦有出。實則凡山谷田野間恒多生焉。

一八〇六

採取 每年立秋節前後採。除乾。

製法 雷斅曰。凡使只用蒸。不用莖葉。若一時同使。即空心令人氣噎。小便不禁也。用時以葶竹瀝浸一伏時。漉曬。

性質 苦。寒。無毒。

效能 利水通淋。清熱破血。用作利尿通經藥。

主治 關格諸癢。小便不通。出刺。決癰腫。明目去翳。破胎墮子。下閉血。(本經) 養腎氣。逐膀胱邪逆。止霍亂。長毛髮。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論瞿麥曰。主五淋。月經不通。破血塊。排膿。【明】經希雍本草經疏論瞿麥曰。瞿麥稟陰寒之氣而生。故味苦寒。別錄兼辛無毒。苦辛能破血。陰寒而降。能通利下竅而行小便。均主關格諸癢。結小便不通。因於小腸熱甚者。寒能散熱。辛能散結。故決癰腫。除溼熱。故明目去翳。辛寒破血。故破胎墮子。而下閉血也。去腎家溼熱。故云養腎氣。逐膀胱邪逆者。亦洩溼熱。

形態 瞿麥爲宿根草。山野河碛。往往自生。莖高一二尺。葉作長披針形。旋節對生。夏季於梢上開淡紅色花。常二朵集生。花瓣五裂。邊緣復有複雜之深裂。結小圓形長角實。熟則角頂自綻。散落黑色扁平。類胡麻子之種子。謂之瞿麥子。



瞿麥

故也。溼熱客中焦。則清濁不分而為雀亂。通利溼熱。則雀亂自解矣。【明】李士材本草圖解論覆麥曰。覆麥之功用。惟破血利竅四字。可以盡其效能。非久任之品也。炒用。【清】黃宮繙本草求真論覆麥曰。覆麥味苦性寒。功專瀉心利水。故書載利小便。決腫癰。去癰閉。拔肉刺。下胎產。除目翳。然其氣稟純陽。必其小腸氣厚。服此疏泄之味。病始克除。若使小腸虛。經云。心屬有熱。不惟其熱不除。則虛而益虛。必致變生他疾矣。妊娠產後。小便不利。及脾虛水腫。均並禁焉。【清】鄒澍本經疏證論覆麥曰。蠶浮小便不利。微熱消渴者。五苓散主之。蠶浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。藜藜湯主之。小便不利。有水氣。其人若渴。栝樓覆麥丸主之。夫均用利水。則皆有水氣可知。且同為小便不利而渴。其用藥殊異。乃爾何也。然此固有傷寒雜證之分。亦即此可見藜藜湯。能治動而不化之水。覆麥則能治停而不行之水矣。夫五苓散證。其上有太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠

十八蠶 覆

之源。可見係胃乾求助於水。水不行而為患。病自寒來。仍不能離辛甘發散之旨。藜藜湯證。其上有陽明病。脈浮緊。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重之源。可見亦係胃熱飲水而停。特以陽明屬燥金。不比太陽寒水之化。故辛甘不用。改參入鹹味。湧洩以除熱也。栝樓覆麥丸證。固係水停為患。特其方下注云。以腹中溫為知。又可見其為本寒標熱矣。本寒標熱。用辛甘則嫌於助熱。用鹹湧又嫌其助寒。故別出清上溫下之法。以覆麥茯苓二味。挾作病之由。此固難與前兩證並言者也。以是知水之動而不定者。非覆麥所能治矣。

近人學說 張山雷曰。覆麥即今恒蒔之所謂洛陽花。花色紅紫斑爛。其性陰寒。泄降利水。除導溼逐熱外。無他用。本經謂其明目去翳。別錄謂其養腎。則邪熱清而真陰復。非通利之品。果能養陰也。出刺決癰。墮胎。其力猛矣。別錄又稱其主雀亂。則溼熱內阻。清濁不分者。以為分泄逐溼之用。非主陰寒之雀亂也。日華謂其主五淋。月經

不通。景岳謂合涼藥。亦消眼目腫痛。合血藥。則通經破血。下胎。宜導下焦溼熱。石頑謂利小便之君藥。日華又謂其葉主痔漏。瀉血。解丹石藥發。搗敷腫毒。浸溼瘡。無一非清熱利導之用。然必實有溼熱壅滯者為宜。寇宗奭謂專通小腸。若心經有熱。而小腸虛者。弗用。辨別最為清徹。石頑亦謂妊娠產後。小水不利。及脾虛水腫者。禁用。頤按。又有老人虛人。氣化不利。而為癰閉。瘦少等證。亦非溼熱癰積。治宜宣化氣分。五苓八正。徒耗津液。皆為禁藥。

配合應用 ①入八正散。利小腸實熱結閉。

②立效散。治下焦結熱。小便淋閉。或有血出。或大小便出血。覆麥穗一兩。炙甘草七錢五分。山梔仁炒半兩為末。每服七錢。連服葱白七箇。燈心五十莖。生薑五片。水二盞。煎至七分。時時溫服。(千金方)

③治小便石淋。宜破血。覆麥子搗為末。酒服方寸匕。日三服。三日當下石。(外臺秘要方)

④治小便不利。有水氣。栝樓蠶

麥丸主之。覆麥二錢半。栝樓根二兩。大雞子一箇。茯苓。山芋各三兩。為末。蜜和丸。梧子大一服。三丸。日三未知。益至七八丸。以小便利。腹中溫為知也。(張仲景金匱方)

⑤治子死腹中。或產經數日不下。以覆麥煮濃汁服之。(千金方)

⑥治九竅出血。服藥不止者。南天竺草。印覆麥。每指大一把。山梔子仁三十個。生薑一塊。甘草炙半兩。燈草一小把。大棗五枚。水煎服。(聖濟總錄方)

⑦治目赤腫痛。浸淫等瘡。覆麥炒黃為末。以鵝涎調塗。皆頭即開。或搗汁塗之。(魯濟方)

⑧治目生翳。其物不出者。生膚翳者。覆麥。乾蓮炮為末。井華水調服二錢。日二服。(聖惠方)

⑨治魚臍疔瘡。覆麥燒灰和油傅之。甚佳。(崔氏方)

⑩治咽喉骨哽。覆麥為末。水服一寸七。日二。(外臺秘要方)

⑪治竹木入肉。覆麥為末。水服方寸匕。或煮汁日飲三次。(梅師方)

⑫治箭刀在肉。及咽喉胸膈諸

隱處不出。酒服。嬰麥末方寸匕。日三服。(千金方)

用置 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛而無溼熱者禁用。惡蠶蝻。

著名方劑 括囊嬰麥丸。治小便不利者有水氣。其人苦渴。此湯主之。(金匱方) 括囊根二兩。茯苓三兩。薯蕷三兩。附子一枚。(泡) 嬰麥一兩。五味末之。煉蜜丸。梧子大。飲服三丸。日三服。不知增至七八丸。以小便利。腹中溫為知。八正散。治諸淋。(寶鑑方) 嬰麥。梔子。菴蓄。大黃。滑石。木通。車前子。甘草各一錢。加燈芯一錢煎服。

參攷資料 古今方通心經。利小腸為最要。(蘇頌) 八正散用嬰麥。今人為至要藥。若心經雖有熱而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。蓋小腸與心為傳送。故用此入小腸。本草並不治心熱。若心無大熱。止治其心。或制之不盛。當求其屬以衰之可也。(寇宗奭) 近古方家治產難。有石竹花湯。治九孔出血。有南天竺飲。皆取其破血利竅也。(李時珍)

伏丹砂。(徐之才) 嬰麥生太山山谷。立秋採陰乾。(別錄) 今出近道。一莖生細葉。花紅紫。赤色可愛。合子葉刈取之。子頗似麥子。有兩種。一種微大。花邊有叉。極未知何者是也。今市人皆用小者。復一種葉莖相似而有毛。花晚而甚赤。按經云。採實。其中子細。燥熱便脫。靈矣。(陶弘景) 今處處有之。苗高一尺以來。葉尖小。青色。根紫黑色。形如細蔓菁。花紅紫赤色。亦似映山紅。二月至五月開。七月結實。作穗。子頗似麥。河陽河中府出者。苗可用。淮甸出者。根細。村民取作刷帚。爾雅謂之天菊。廣雅謂之莖。莖是也。(蘇頌) 石竹葉似地膚。葉而尖小。又似初生小竹葉。而細窄。其莖纖細有節。高尺餘。梢間開花。田野生者。花大如錢。紅紫色。人家栽者。花稍小而嬌媚。有細白粉。紅紫赤斑。瓣數色。俗呼為洛陽花。結實如燕麥。內有小黑子。其嫩苗。燒熟。水淘過。可食。(李時珍)

【嬰麥子】即嬰麥之處方用名。詳「嬰麥」條。
【嬰麥草】即嬰麥之處方用名。詳「嬰麥」條。
【嬰麥葉】 主治 痔瘡。并瀉血。作湯粥食。又治小兒蛔蟲。及丹石藥發。并眼目腫痛。及腫毒。搗傅治浸淫瘡。并婦人陰瘡。
【嬰麥穗】即嬰麥之處方用名。詳「嬰麥」條。
【嬰麥帝肉】即牛肉之古籍別名。典見梵書。詳「牛肉」條。
【嬰廬折那】即牛黃之古籍別名。典見金光明經。詳「牛黃」條。
【礪砂】即礪砂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「礪砂」條。
【礪礪】即礪石之古籍別名。典見綱目。詳「礪石」條。
【禮鼠】即黃鼠之古籍別名。典見韓文。詳「黃鼠」條。
【繒】即帛之古籍別名。典見綱目。詳「帛」條。
【織女苑】即女苑之古籍別名。典見別錄。詳「女苑」條。
【織布娘】即草蠶之別名。功效與蠶同。詳「蠶」條。
【繒水團】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【繒蓮花】即荷花之開時如錦繡者。性質效能與蓮花同。詳「蓮花」條。
【繒羊】即黃羊之古籍別名。典見綱目。詳「黃羊」條。
【繒車】即翹搖之古籍別名。典見綱目。詳「翹搖」條。

【翹搖】 命名 本品莖葉柔嫩。有翹然飄搖之狀。故名。古籍別名 搖車。(爾雅) 野蠶豆。小果菜。君搖。翹車。(綱目) 紫雲英。(植物學大辭典) 元條菜。(東坡文集) 漂搖草。(陸放翁詩序) 外國名詞 *Antigonon chinensis* (拉丁) *ゲンゲ* (日本)

基本 係豆科紫雲英屬。為翹搖之莖葉。產地 原野田間多有之。



形態 翹搖為藥類之越年生草本。葉為羽狀複葉。小葉全邊脊。月抽出長花軸。翹然直立。頂端着

以短總狀花序。花冠紅紫色。實爲莢果。黑中有子。似豌豆。粒小。色綠。農家播種田間。翌年埋入土中。以爲肥料。其莖葉可供食與藥用。

性質 辛平無毒。
主治 破血止血。生肌。搗汁服之。療五種黃病。以瘥爲度。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論翹搖曰。利五臟。明耳目。去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。【明】李時珍本草綱目論翹搖曰。止熱瘧。活血平胃。

參攷資料 翹搖。食佳。生食令人吐水。(孟詵)

【翹搖子】 主治 活血明目。爲末。甘草湯下。

【翻山虎】 卽羊躑躅根之別名。詳『羊躑躅』條。

【翻白草】 古籍別名 雞腿根。(救荒)天藕。(野菜)

譜(湖雞腿。(本草綱目))

外國名詞 Potentilla discolor, Bge. (拉丁)ツチグリ

ツチナ プクレウサウ(日本)

基本 係薔薇科委陵菜屬。爲翻白草之根。

十八畫 翹

產地 生原野田澤間。

形態 翻白草爲菜類之多年生草本。地下有塊根。早春羽狀複葉布地叢生。各小葉邊緣有齒牙。

葉背及柄。白毛最多。初夏葉間抽莖。莖頭高達尺餘。莖端分枝。綴以散花。花冠黃色。花後結實。實中有細子。其塊根大如指。長數寸。皮赤。肉白。有粉。可供食與藥用。

性質 甘微苦。平無毒。
主治 吐血下血。崩中。瘧疾。癰瘡。

【翻翹雞】 卽反毛雞之別名。功效與反毛雞同。詳『反毛雞』條。

【翻胃木】 卽常山之古籍別名。典見和漢藥考。詳『常山』條。

【臍香】 卽臍香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『臍香』條。

【臍堂】 卽臍香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『臍香』條。

【臍帶】 命名 胎在母腹。臍連於胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既剪。一點眞元。屬之命門。丹田。臍乾自落。如瓜脫蒂。故臍者。人之命蒂也。以其當心腎之中。前直神關。後直命門。故謂之臍。臍之

翻 臍 舊 薯 蕷

爲言齊也。

古籍別名 命蒂。坎炁。(綱目)

主治 燒末飲服。止瘧。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論臍帶曰。解胎毒。傳臍瘡。

【舊坑砂】 卽硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【舊麻布】 命名 本品係麻質所織之舊布。故名。

主治 同旱蓮草等分。瓶內泥固煨研。日用揩齒。能固牙烏髮。

【薯蕷】 產地 國廣諸山中均有出焉。

形態 薯蕷爲蔓草類之一種。葉尖長節。節生小刺。根圓如芋子。又似柚。大小不一。有鬚叢生。皮紫黑。肉紅黃。其根可供藥用。

主治 活血浸酒服。

參攷資料 薯蕷。黃汁可染紗絹之屬。爲暑用之衣。謂之薯蕷網。亦謂之撈網。(醫學大辭典)

【薯藥】 卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【薯蕷】 卽山藥之原名。詳『山藥』條。

【薺芩】 命名 本品多有濟瀉之狀。濟瀉者。瀉露也。故以名之。

處方用名 空沙參。

古籍別名 杏參。(綱目) 蕪芩。(爾雅) 杏葉沙參。甜桔梗。(綱目) 白麵根。地參。(救荒) 土桔梗。(原始) 臭蘇。賊參。(和漢藥考)

學名 Adenophora remeifolia, Adenophora polymorpha, var. alternifolia.

基本 屬桔梗科。爲薺芩之根。

產地 凡山野平原恒有生焉。



薺芩

形態 薺芩爲多年生草本。春日生苗似桔梗。莖高三四尺。葉作橢圓或長卵圓形。末端帶尖。邊緣有粗鋸齒。長三寸許。有長柄。皆互生。傷其莖葉。則有白汁滲出。夏間梢頭開淡紫色喇叭花。連綴而爲穗狀花序。但多不開足。便已下垂。果實爲圓形之蒴果。根形似紡錘。

十八畫 薺

類沙參根。

採取 二八月間採根曝乾。

製法 凡採得水洗曬乾或蒸製之。

性質 甘寒無毒。

效能 利肺止咳嗽。解毒療瘡腫。專作解毒藥。

主治 解百藥毒。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論薺菀曰食之歷丹石發動。

【宋】大明諸家本草論薺菀曰殺蟲毒。治蛇蟲咬。熱狂濕疾。署毒筋。

【明】李時珍本草綱目論薺菀曰主咳嗽。消渴。強中。瘡毒。丁腫。辟沙蟲。短狐毒。

【清】黃宮繡本草求真論薺菀曰薺菀即甜桔梗。似人參而體虛無心。似桔梗而味甘不苦。按據諸書。有因味甘。能和中止嗽消渴。然力專主解毒。以毒性急迫。甘以和之故也。觀葛洪肘後方云。一藥而解衆毒者。惟薺菀汁。邊飲一升。或煮嚼之。亦可作散服。此藥在諸藥中。毒皆自解也。又張鷟野食載云。名醫言虎中藥。箭食清泥而解。野猪中藥。箭食薺菀而食。物猶知解毒。何況於人乎。觀

此洵爲解毒之最。且更能治強中精出。消渴之後。發爲癰疽之症。亦以其清熱解毒之功。無他義耳。但市肆多取此苗。以亂人參。不可不察。

近人學說 袁淑範曰。試驗液之調製法。取市中販賣之普通純良薺菀一〇〇。搗爲粗末。用蒸餾水再三溫浸之。集合其濾液。用電扇於蒸鍋上蒸發使之乾燥。然後再以五〇〇之水溶之。後乃更改爲中性液。以供試驗。以下稱之謂水製越幾斯。薺菀之毒力及作用。皆不鮮明。故簡略述之於左。讀者如能明其真相。亦云足矣。注射其溶液於蛙及小白鼠時。動物雖有時陷於安靜狀態中。然經數分後。無不恢復者。况其大多數。並不現何等之異常症候。如注射其極大量後。動物則先陷於痲痺狀態。經數小時後。乃死去。蓋薺菀對動物之毒性極微弱。用其大量後。對於中樞乃現麻痺之作用也。次乃檢查其對於心臟之作用。依費納氏 (Straub-Folner) 之方法。先將青蛙之心臟提出。用林格氏

(Ringer) 液灌養之。後乃加薺菀水製越幾斯時。用少量則不現何等作用。大量時則現心臟搏動慢而且小之作用。然於此時加阿刀冰 (Atropin) 時。搏動則即恢復。加 Ba Cl₂ 時。心臟搏動則即停止。如此得知薺菀對於心臟之作用。亦只攻擊其支配神經而已。後更檢查其對於血壓及呼吸之作用。此則用家兔試驗之。注射其溶液於靜脈內時。少則不現作用。多則亦不過血壓少少下降。呼吸微許增大而已。皆不堪令人注意者也。至其血壓下降之原因。恐因後述之血球溶解作用也。薺菀依上述之動物試驗。既知其毒性及作用皆極微弱。次乃更進而追求其成分。以各種之植物鹽基試藥 (Alkaloids reagens) 試驗。定其成分非屬於植物鹽基。因振盪其水溶液。易生泡沫。疑其爲一種配糖體。乃更用費林氏 (Fehling) 液檢其有無還元力時。則現陽性之反應。後將此水溶液加鹽酸煮沸後。更檢其還元力時。則比先更增大。故其成分爲一種配糖體之

一八一〇

證據愈多。次更檢查其有無赤血球溶解作用時。則現著明之血球溶解作用。因此吾人則思其有效成分。恐爲一種 Saponin Körper。故用次之方法提取之。取市中販賣之薺菀。研爲粗末。用熱水 (Hot Water) 浸出之。乘熱濾過。待濾液冷後。再用以脫 (Acetone) 沈澱之。後乃乾燥其沈澱。再溶之於 Methylalkohol 濾過。再以脫沈澱之。後乃乾燥其沈澱。再溶之於 Methylalkohol 濾過。再以脫沈澱之。如斯再三反復後。乃得白色無結晶之粉末。本粉末富於引溼性。易溶於水及酒精。不溶於以脫奔曹哥羅仿等。溶融點爲一六〇—一八〇度。本粉末之水溶液。有還元費林氏液之力。並且如加鹽酸煮沸後。其還元力亦更增加。本粉末依 Liebermann 氏法檢查時。並未含有甾素本品之水溶液與薺菀之水製越幾斯同樣。振盪易生泡沫。並能溶解赤血球。依以上之化學及物理的性狀。本粉末爲一種 Saponin Körper 似無疑意也。薺菀

先將青蛙之心臟提出。用林格氏 (Ringer) 液灌養之。後乃加薺菀水製越幾斯時。用少量則不現何等作用。大量時則現心臟搏動慢而且小之作用。然於此時加阿刀冰 (Atropin) 時。搏動則即恢復。加 Ba Cl₂ 時。心臟搏動則即停止。如此得知薺菀對於心臟之作用。亦只攻擊其支配神經而已。後更檢查其對於血壓及呼吸之作用。此則用家兔試驗之。注射其溶液於靜脈內時。少則不現作用。多則亦不過血壓少少下降。呼吸微許增大而已。皆不堪令人注意者也。至其血壓下降之原因。恐因後述之血球溶解作用也。薺菀依上述之動物試驗。既知其毒性及作用皆極微弱。次乃更進而追求其成分。以各種之植物鹽基試藥 (Alkaloids reagens) 試驗。定其成分非屬於植物鹽基。因振盪其水溶液。易生泡沫。疑其爲一種配糖體。乃更用費林氏 (Fehling) 液檢其有無還元力時。則現陽性之反應。後將此水溶液加鹽酸煮沸後。更檢其還元力時。則比先更增大。故其成分爲一種配糖體之

中醫藥以爲解毒利肺之要藥。然
依余之試驗其作用不其鮮明。似
不能謂之有特殊之利肺作用也。
然則中醫在昔之經驗。豈有謬乎。
是則不然。吾人欲強爲之解說時。
其解毒作用。因薺苳含有多量之
黏滑性物質。能緩和諸種刺激。並
能防礙諸種物質之吸收。故時現
解毒之作用。至其利肺之作用。因
薺苳含有多量之甘味物質。故如
一般糖質同。在矯正藥味之外。能
促進咽喉氣管之分泌。使咳嗽容
易。故如氣管支加管兒等。未嘗不
可用之。亦未嘗必不能奏效也。

十八薑 薺

薺苳各一兩。人參、沉香各半兩。爲
末。以豬肚治淨。煮爛。并和丸。梧子
大。每服七十丸。空心鹽湯下。(千
金方)

①治丁癩腫毒。生薺苳根。搗汁
服一合。以滓傅之。不過三度。(金
翼方)

②治面上軒腫。薺苳、肉桂各一
兩。爲末。每用方寸匕。酢漿服之。日
一服。又滅癩瘡。(聖濟總錄方)

③解諸蟲毒。薺苳根搗末。飲服
方寸匕立瘥。(陳延之小品方)

④解狗吻毒。狗吻藥與芹葉相
似。誤食之殺人。惟以薺苳八兩。水
六升。煮取三升。每服五合。日五服。
(金匱方)

⑤解五石毒。薺苳生搗汁多服
之。立瘥。(國經方)

用薑 八分至錢半。

參攷資料 ①薺苳根莖似人
參。而葉小異。根味甜。絕能殺毒。以
其與毒藥共處。毒皆自然歇。不正
入方家用也。又曰。魏文帝言薺苳
亂人參。卽此也。薺苳葉甚似桔梗。
但葉下光明。滑澤無毛爲異。又不
如人參相對耳。(陶弘景) ②人參

苗似五加而闊短。莖圓有三四棱。
極頭有五葉。陶引薺苳亂人參誤
矣。且薺苳桔梗又有葉互者。亦有
葉三四對者。皆一莖直上。葉既相
亂。惟以根有心爲別爾。(蘇恭) ③
今川蜀江浙皆有之。春生苗莖都
似人參而小異。根似桔梗。但無心
爲異。潤州陝州尤多。人家收以爲
果。或作脯。味甚甘美。兼可寄遠。
二月八月採根曝乾。(蘇頌) ④薺
苳苗似桔梗。根似沙參。故奸商往
往以沙參薺苳通亂人參。蘇頌
經所謂杏參。周憲王救荒本草所
謂杏葉沙參。皆此薺苳也。國經云。
杏參生潤州田野。根如小菜根。土
人五月採苗葉。治咳嗽上氣。救荒
本草云。杏葉沙參。一名白鷄根。苗
高一二尺。莖色清白。葉似杏葉。而
小。微尖而背白。邊有人牙。杪間開
五瓣白盤子花。根形如野胡蘿蔔。
頗肥。皮色灰黝。中間白毛。味甜微
寒。亦有開碧花者。嫩苗燻熱水。淘
油鹽并食。根換水煮亦可食。人以
蜜煎充果。又陶弘景註。桔梗言其
葉名隱忍。可煮食之。治蟲毒。謹按
爾雅云。莠。隱忍也。郭璞註云。似蘇

有色。江東人誤以爲藟。亦可瀘食。
葛洪肘後方云。隱忍草苗似桔梗。
人皆食之。搗汁飲。治蟲毒。據此則
隱忍非桔梗。乃薺苳苗也。薺苳苗
甘可食。桔梗苗苦不可食。尤爲可
證。神農本草經無薺苳。止有桔梗。一
名薺苳。至別錄始出薺苳。蓋薺苳
桔梗乃一類。有甜苦二種。則其苗
亦可呼爲隱忍也。(李時珍) ⑤
按神農本草經無薺苳。止有桔梗。一
名薺苳。至別錄始出薺苳。另爲一
種。是則可以形似相亂者。在桔梗
與薺苳也。第二味俱用根。乃桔梗
味苦辛。而薺苳味甘寒。因味以別
之。固易明也。卽就時珍所云。薺苳
根與沙參根相似。然亦就其味別
之。沙參甘淡而寒。且有茸其甘而
微苦者。若薺苳根。在弘景謂其根
味甜絕。能解毒。夫甘能解毒。而味
之甜甘而且寒者。更解百藥之毒。
是雖與沙參同有甘。而甘之各具
者亦大殊。蓋甘而微苦者。卽不能
解毒。此別錄之言解百藥毒。不爲
無據也。故細究其形似。而更精審
於味。則庶乎無誤。不致用而同功
矣。(劉潛江) ⑥李時珍本草綱目

薺菴釋名杏參。亦名杏葉沙參。言其根似沙參。葉似杏葉也。黃宮樞本草求真云。似人參而無心。似桔梗而味甘。今市上無薺菴。人亦少有。識者。吾鄉有草。葉似杏葉。花紫形如鈴鐺。根似萊菔。時人名之曰鮮沙參。採而曝乾入藥。名為南沙參。按本草載沙參。本無南北之別。綱目只云產於沙土者。根長而大。產於黃土者。根矮而小。蓋土性之懸壑使然也。吳儀洛本草從新。分南北兩種。復出一空沙參。註即薺菴。今人徒知有薺菴之名。無復能識薺菴之藥。豈不惑哉。余考諸本草。驗諸藥物為辨。今市上之南沙參。即古之薺菴。南北沙參功用同。毋須混分。人人繫諸口實。則藥陽與海南。非沙土產者。皆可稱之為南矣。

【薺菴】即桔梗之古籍別名。典見本經。詳「桔梗」條。

【薺菴莖】原名 隱忍葉。性質 甘苦寒。無毒。

主治 主腹臌風壅。咳嗽上氣。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論薺菴莖曰。蟲毒腹痛。

面目青黃。林露骨立。養汁一二升飲。

【薺菜】命名 本品濟濟而生。故名。

古籍別名 護生草。細小者名沙薺。莖梗有毛者名新薺。(綱目)

外國名詞 Cappella Bursa Pastoris, Moench. (拉丁) ナツナ ベンベングサ(日本)

基本 係十字花科薺屬。為薺菜之莖葉。其子。花詳見各條。

產地 原野間處處有之。

形態 薺菜為菜類之一。或越年生草本。莖高數寸至尺餘。下部葉叢生而作羽狀分裂。上部葉作箭形。無柄。有缺刻。春夏間開花。花小白。作總狀花序。結實為裂果。扁平。三角形。中有細子。其嫩莖葉有一種香氣。可供蔬茹與藥用。



薺 菜

性質 甘。溫。無毒。主治 利肝和中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論薺菜曰。根葉燒灰。治赤白痢極效。【宋】大明諸家本草論薺菜曰。利五臟。根治目痛。【明】李時珍本草綱目論薺菜曰。明目益胃。

性本草論薺菜曰。根葉燒灰。治赤白痢極效。【宋】大明諸家本草論薺菜曰。利五臟。根治目痛。【明】李時珍本草綱目論薺菜曰。明目益胃。

時珍本草綱目論薺菜曰。明目益胃。

胃。

【薺菜子】原名 薺實。採取 三月三日。四月八日。採之陰乾。

性質 甘。平。無毒。主治 明目。目痛。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論薺菜子曰。治腹脹。【唐】甄權藥性本草論薺菜子曰。補五臟不足。治青盲不見物。【唐】陳士良食性本草論薺菜子曰。去風毒邪氣。治瘡去翳。解熱毒。久服視物鮮明。

參攷資料 ①薺菜子水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。可充飢。(綱目) ②薺菜子患氣人食之。動冷痰。(甄權) ③薺菜子不可與麪同食。令人胸悶。服丹石人不可食。(孟詵)

【薺菜花】主治 療久痢。陰乾研末。搗湯下。

參攷資料 薺菜花布席下。辟

蟲。又辟蚊蠅。(陳士良)

【薺菜粥】主治 明目。利肝。

【薺萼】古籍別名 臭蘇。(日華) 青白蘇。(綱目)

外國名詞 Moila Frossera, Hata, Maxim. (拉丁) アンジ リミ ノカウジュ(日本)

基本 係唇形科薺萼屬。藥用其莖葉。產地 多出林野原澤間。

形態 薺萼為芳草類之野生草本。莖高尺許。單葉對生。有柄。葉身略作斜方形。葉腋分枝。秋日稍上開唇形花。複成穗狀。花淡紅色。有香氣。其香略似紫蘇。其莖葉可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 冷氣洩痢。生食除胸悶酸水。按碎傳蟻瘻。

參攷資料 ①薺萼。蘇恭江左名水蘇。為薺萼。按水蘇葉有脛齒。氣香而辛。薺萼葉稍長。其上有毛。氣臭。亦可為生菜。(陳藏器) ②薺萼處處平地有之。葉似野蘇而稍長。有毛。氣臭。山人茹之。法不甚

佳。(李時珍)自齊藥功用與莖同而發散力較多。(醫學大辭典)【藜藜】即藜蘆之古籍別名。詳『藜蘆』條。

【藜藜】即佩蘭之處方用名。詳『佩蘭』條。

【藜梅】即烏梅之古籍別名。典見綱目。詳『烏梅』條。

【藜金紙】即烏金紙之古籍別名。性質功效與烏金紙同。詳『烏金紙』條。

【藜萎子】即胡萎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡萎』條。

【藜陸香】即乳香之原名。詳『乳香』條。

【藜渠】即阿魏之古籍別名。典見唐本草。詳『阿魏』條。

【藜蒺】即火腿之古籍別名。典見東陽縣志。詳『火腿』條。

【藜】即香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【藜芥】即藜藜子之古籍別名。典見神志。詳『藜藜子』條。

【藜菜】即藜藜子之古籍別名。典見埤雅。詳『藜藜子』條。

【藜本】 命名 本品根上苗下而似禾藜。故名。本者根之謂也。

處方用名 川藜本。

古籍別名 鬼卿。鬼新。(本經)

微莖(別錄)藜藜(山海經)土芎地新。鬼神。兒卿。山菌。莖。保生叢。(和漢藥考)

外國名詞 *Notolozarygium japonicum*, Miq. (拉)

基本 屬繖形科。為藜本之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。藜本產廣東北江樂昌城口等處。實則凡山野川谷間恒多生焉。

形態 藜本為深山自生之草。

本高三四尺。形狀略類川芎。莖葉俱有疎毛。夏月開白色五瓣花。至秋季結平圓形一分餘之果實。藜本為經數年亦不枯死。大如箸之族生根。作角質狀。長六七寸。外面呈灰褐色。處處疣起。皮部之厚殆與木部同。內部呈黃白色。味有一種不快收斂性。此謂之真藜本。或當歸狀藜本。

採取 正二月間採根曝乾。三十日成。

製法 去蘆頭。水洗淨用。

性質 辛溫無毒。

效能 散風寒濕邪。療頭腦作痛。用作驅風燥溼藥。又為癰疽疥癬藥。

主治 婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。(本經)辟瘴。潤澤。療風邪。羸曳。金瘡。可作沐藥面脂。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論藜本曰。治一百六十種

惡風。鬼疰。流入腰。痛冷。能化小便。通血。去頭風。野炮。(宋)大明諸家

本草論藜本曰。治皮膚疵。疥。酒。癩。粉刺。癩疾。(金)張元素珍珠囊論

藜本曰。治太陽頭痛。嶺頂痛。大寒犯腦。痛速。齒痛。(元)李東垣用藥

法象論藜本曰。頭面身體皮膚風溼。(元)王好古湯液本草論藜本

曰。督脈病。脊強而厥。(明)李時珍本草綱目論藜本曰。治癰疽。排膿

內寒。(明)經希雍本草經疏論藜本曰。藜本味辛氣溫。別錄兼苦。從

火化也。無毒。入足太陽經。溫能通。苦能洩。大辛則善散。氣厚則上升。婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。皆

大陽經寒濕邪為病也。風頭痛者。風中於大陽經也。此藥正入本經。

故悉主之。凡癰瘡皆血熱壅滯。滲氣浸淫於肌肉。以致潰爛不收。辛散苦洩。則善解滯消。肌肉自長矣。

悅顏色者。即去風作面脂之義也。辟瘴。除風邪者。辛溫芬芳開發。升散之力也。羸曳。金瘡。及甄權治

一百六十種惡風。鬼疰。流入腰。痛冷。能化小便。通血。作沐藥面脂。日

華于去皮膚疵。疥。酒。癩。粉刺。元紫主太陽經頭痛。嶺頂痛。及大寒犯

腦。痛速。齒痛。東垣主頭面身體皮膚風溼。皆風邪溼氣。干犯太陽經

所致也。好古主督脈為病。脊強而厥者。督脈並足太陽經。夾脊而上

故也。(清)黃宮繡本草求真論藜本曰。藜本換善。親屬辛溫氣雄。能

治太陽風犯嶺頂。腦後俱痛。誠為是經要藥。且復言治脊強而厥。並

婦人疝瘕。急迫腫痛。此雖病屬下見。及係太陽本經寒溼所致。然非

風邪內犯。則病曷形。藜本氣味辛溫。性雖上行。而亦下達。非謂用此以治太陽嶺頂。頭齒痛。功止上

建。而於脊強而厥。竟不循經下行

也。且據書言。能治胃風泄瀉。又治粉刺酒醱。亦是風於太陽。連累而及。治則與之俱治。豈但治風頭痛而已哉。或謂其性頗有類於芎藭。皆能以治頭痛。然一主於肝膽。雖行頭目。而不及於顛頂。一主太陽及督。雖其上下皆通。而不兼及肝膽之為異耳。但春夏溫熱頭痛。及血虛火炎頭痛者。切忌。根紫色。似芎藭而輕虛。氣香味麻。

近人學說 張山雷曰。蕪本味辛氣溫。上行升散。專主太陽太陰之寒風寒溼。而能疏達厥陰鬱滯。功用與細辛。川芎。羌活近似。本經主婦人疝瘕。陰中寒。腫痛。腹中急。皆清陽不振。厥陰之氣。鬱塞不伸。為病。溫以和之。升以舉之。解結除寒。斯急痛可已。疝瘕可除。而陰虛內熱。肝絡結滯之疝瘕急痛。非其治也。除風頭痛者。升陽以散太陽之寒。正與細辛。芎藭之主頭痛同例。而肝膽陽邪。化風上升之頭痛。正是背道而馳。長肌膚者。亦寒溼除。而陽和敷布。氣血乃調。若血虛多火。而肌肉消瘦者。寧非燥毒。悅顏色者。作為外治敷藥。亦所以搜

肌表之寒溼。別錄所謂沐藥面脂。即是長肌膚之意。若多火而面色

紅潤者。又豈所宜。別錄謂辟霧露潤澤者。溫升助陽。能勝寒溼。此即仲景所謂清邪中上之病。亦即經言陽中霧露之氣也。又謂療風邪。輝曳。則風寒鬱絡。而經氣不仁。步履無力之症。庶幾近之。亦有陰虛與力。痿痺不用。而肢體痺曳者。則更非風藥所可妄試。此皆讀古書之不可死於字句間者。若不分虛實。不辨病因而昧然從事。亦何往而不為古人所誤耶。

配合應用 治寒邪鬱於足太陽經。頭痛巔頂痛。用蕪本。羌活。細辛。川芎。葱白。

治霧露。療清邪中於上焦。蕪本與木香同用。

治大實心痛。已用利藥。用此激其毒。蕪本半兩。蒼朮一兩。作二服。水二鍾。煎一鍾。溫服。(活法機要方)

乾洗頭屑。蕪本。白芷。等分為末。夜擦且梳垢自去也。亦可作面脂。(便民圖彙方)

治小兒疥癬。蕪本煎湯浴之。

并以浣衣。(保幼大全方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火炎。及無風寒實邪者。禁用。惡菌。茹。長青。菘子。

參攷資料 邵氏聞見錄云。

夏英公病泄。太醫以虛治不效。霍翁曰。風客於胃也。飲以蕪本湯而止。蓋蕪本能去風溼故耳。(李時珍)

俗中皆用芎藭根。其形氣乃相類。而桐君藥錄說芎藭苗似蕪本。論說花實皆不同。所生處又異。今東山別有蕪本。形氣甚相似。惟長大耳。(陶弘景)

蕪本莖葉根味與芎藭小別。今出宕州者佳。(蘇恭)

今西川河東州郡。及兗州。杭州皆有之。葉似白芷香。又似芎藭。但芎藭似水芹而大。蕪本葉細。爾五月有白花。七八月結子。根紫色。(蘇頌)

江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛。味麻。不堪作飲也。(李時珍)

蕪本於流行性腦脊髓膜炎。能緩解劇甚之頭痛。與頸部強直有特效。通常俱應用於婦人之頭痛。(日本漢醫學說)

頭腦之聖藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急。陰中寒等證。皆太陽經寒溼為病。亦屬客邪內犯之候。故用蕪本去風除溼。則中外之疾皆痊。豈特除風頭痛而已哉。(張石頑)

【蕪本實】 主治 風邪流入四肢。

【蕪本】 即蕪本之古籍別名。典見山海經。詳「蕪本」條。

【蕪姑】 即蕪姑之古籍別名。典見別錄。詳「蕪姑」條。

【蕪豆】 即白扁豆之原名。詳「白扁豆」條。

【藍布裙】 基本 藍布裙為雜草類之一種。可供藥用。

產地 出四川。主治 脚氣。壯筋骨。

【藍姑草】 即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【藍青】 即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。

【藍蛇】 古籍別名 藍藥。(綱目拾遺)

產地 出廣西蒼梧縣諸地。形態 藍蛇為蛇類之一種。狀

形如蛇。

如蚊蛇而有約。其尾可供藥用。探取 從約斷之。頭有毒。取尾用良。

主治 用頭合毒藥。毒人至死。以尾作脯。食之即解。

【藍菜】即甘藍之古籍別名。典見千金食治。詳「甘藍」條。

【藍葉】 原名 藍葉汁。製法 採葉搗汁用。

性質 苦。甘寒。無毒。

主治 殺百藥毒。解狼毒。射罔毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論藍葉曰。汁塗五

心。止煩悶。療蜂螫毒。【明】李時珍本草綱目論藍葉曰。斑蝥。羌青。楊雞毒。朱砂。砒石毒。

近人學說 張山雷曰。藍草味苦氣寒。為清熱解毒之上品。專治溼邪熱病。實熱癰結。及癰疽腫毒。諸證。可以內服。可以外敷。其用甚廣。又能殺蟲。療諸蟲毒。蓋百蟲之毒。皆由溼熱凝結而成。故凡清熱之品。即為解毒殺蟲之品。并能殺蟲者。蟲亦南方溼熱之毒。本為毒蟲之類。又凡苦寒之物。其性

十八畫 藍

多燥。苟有熱盛津枯之病。苦寒在所願忌。而藍之鮮者。大寒勝熱而不燥。尤為清火除中。剛良品也。

配合應用 治上氣咳嗽。哮喘息氣。喉中作聲。唾黏。以藍葉水浸搗汁一升。空腹類服。須臾。以杏仁研汁。煮粥食之。一兩日將息。依前法。更服。吐痰盡方痊。(梅師方)

治飛血赤目。熱痛。乾藍葉切二升。車前草半兩。淡竹葉切三握。水四升。煎二升。去滓溫洗。冷即再煖。以瘥為度。(聖濟總錄方)

治腹中蠶癩。藍葉一升。搗。以水三升。絞汁服一升。日二次。(千金方)

治天泡熱疔。藍葉搗傅之良。(集簡方)

治唇邊生瘡。連年不瘥。以八月藍葉一升。搗汁洗之。不過三度瘥。(千金方)

治小兒赤痢。搗青藍汁二升。分四服。(子母秘錄方)

治小兒中蠱。下血欲死。搗青藍汁類服之。(聖惠方)

治陰陽易病。傷寒初愈交合。陰陽必病。拘急。手足拳。小腹急熱。

頭不能舉。名陰陽易。當汗之。滿四日難治。藍一把。雄鼠屎三七枚。水煎服取汁。(聖惠方)

治驚癇發熱。乾藍。凝水石等分。為末。水調傅頭上。(聖惠方)

治應聲蟲病。腹中有物作聲。隨人語言。名應聲蟲。病用板藍汁一盃。分五服效。(夏子益奇疾方)

治卒中水毒。搗藍青汁。傅頭身令匝。(肘後方)

治服藥過劑煩悶。及中毒煩悶欲死。搗藍汁服數升。(肘後方)

治卒自縊死。以藍葉汁灌之。(千金方)

治毒箭傷人。藍青搗飲并傅之。如無藍。以青布漬汁飲。(肘後方)

治瘡疹不快。板藍根一兩。甘草一分。為末。每服半錢。或一錢。取雄雞冠血三二點。同溫酒少許調下。(錢氏小兒方)

治齒齲腫痛。紫藍燒灰敷之。日五度。(聖惠方)

治白頭禿瘡。搗藍煎汁類洗。(聖濟總錄方)

參攷資料 解毒不得生藍

以青襟布漬汁亦善。(陶弘景) 藍汁治蟲多傷。劉禹錫傳信方著其法云。取大藍汁一盤。入雄黃。磨香二物少許。以點咬處。仍細服其汁。神異之極也。張鷟員外住劍南。張廷賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上。一宿咬處有二道赤色。細如篋。纒項上。從胸前下至心經。兩宿頭面腫疼大如數升。肚漸腫。幾至不救。張公出錢五百千。并薦家財。又數百千。募能療者。詎一人應召。云可治。張公甚不信之。欲驗其方。其人云。不請方。但療人性命爾。遂取大藍汁一盤。以蜘蛛投之。至汁而死。又取藍汁。加麝香雄黃。更以一蛛投入。隨化為水。張公因其異之。送令點於咬處。兩日悉平。作小瘡而愈。(蘇頌) 諸藍形雖不同。而性味不遠。故能解毒除熱。惟木藍藥力似少劣。藍子則專用。藥藍者也。至於用溲與青布。則是刈藍浸水。入石灰澄成者。性味不能不少異。不可與藍汁一槩論也。有人病嘔吐。服玉壺諸丸不效。用藍汁入口。即定。蓋亦取其殺蟲降火爾。知此之類。不可不知。(李時珍)

十八畫 藍

【藍葉汁】即藍葉搗取之汁。詳『藍葉』條。

【藍實】 命名 本品莖葉可染碧色故名。

古籍別名 大青子。青黛實。和漢藥考) 藍(嘉祐圖經本草)

外國名詞 Polygonum tinctorium, Lour.

基本 屬蓼科為藍之實。



(一) 實藍



(二) 實藍

形態 藍為溼草類之一年生草本。栽植者頗多。莖高一二尺。葉互生。作橢圓或卵圓形。葉柄基部有膜狀鞘。特莖包擁。夏月於莖頂葉腋抽出長梗。開淡紅色小花。相覆作穗狀。花被為五裂花蓋花後

結赤褐色有光澤之小閉果。可供藥用。

採取 五月六月間採之。

製法 採得洗淨曬乾用。

性質 苦寒。無毒。

效能 清熱毒。消腫痛。專作解毒藥。

主治 解諸毒。殺蟲蚊疰鬼螫毒。久服頭不白。輕身。

歷代配製致證 【唐】甄權藥

性本草論藍實曰。填骨髓。明目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人強健少睡。益心力。【唐】蘇恭新修本草論藍實曰。療毒腫。

【明】繆希雍本草經疏論藍實曰。藍實味苦寒而無毒。其用主解諸毒。殺蟲蚊疰鬼螫毒。久服頭不白。頭白者血熱也。藍能涼血而解熱。故令髮不白也。熱去而血得所養。故身輕。其葉汁解百藥毒。解煩毒。射閉毒。藥性論云。藍實味甘。能填骨髓。益心力。汁止心煩躁。由此觀之。苦寒而象甘可知矣。日華子又云。治天行熱狂。疔瘡遊風。熱毒腫毒。風癩。除煩止渴。殺疔。解毒藥毒。商金瘡血悶排膿。小兒熱疔。小兒

丹熱。最為要藥。其功用之廣。具如本草所載。藍實最堪入藥。甘藍人食去熱黃。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無實熱火毒者禁用。

參攷資料 按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄盲恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁。制字從藍。以此故也。(李時珍) 藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。(別錄) 藍有三種。一種葉圍徑二寸許。厚三四分者。堪染青。出嶺南太常。名為木藍子。陶氏所說。乃是菘藍。其汁拌為澱其苗似麥而味不辛。為澱。惟作碧色爾。(蘇恭) 藍處處有之。人家蔬圃作畦種。至三月四月生苗。高二三尺許。葉似水蓼。花紅白色。實亦若蓼子而大。黑色。五月六月採實。但可染碧。不堪作澱。此名藍。即醫方所用者也。別有木藍。出嶺南。不入藥。有菘藍。可為澱。亦名馬藍。爾雅所謂箴馬藍是也。又揚州一種馬藍。四時俱有。葉類苦實菜。

士人連根採服。治敗血。江寧一種吳藍。二月內生。如蒿。葉青花白。亦解熱毒。此二種雖不類。而俱有藍名。且古方多用吳藍。或恐是此。故并附之。(蘇頌) 藍實即大藍實也。謂之藍者。非是。乃爾雅所謂馬藍者。解諸藥毒。不可闕也。實與葉兩用。(寇宗奭) 藍凡五種。各有主治。惟藍實專取藍莖者。藍葉如蓼。五六月開花成穗。細小。淺紅色。子亦如蓼。歲可三刈。故先王禁之。菘藍葉如白菘。馬藍葉如苦黃。即郭璞所謂大葉冬藍。俗中所謂板藍者。二藍花子並如蓼藍。吳藍莖如蒿。而花白。吳人種之。木藍莖如決明。高者三四尺。分枝布葉。葉如槐葉。七月開淡紅花。結角。長寸許。蟬蟻如小豆角。其子亦如馬蹄。決明子而微小。迥與諸藍不同。而作澱則一也。別有甘藍可食。蘇恭以馬藍為木藍。蘇頌以菘藍為馬藍。宗奭以藍實為大葉藍之實。皆非矣。(李時珍) 世上所熟知之藍。藍之外。尚有主要者四種如下。(一) 菘藍。(大青) 係屬十字花科之大青 (Barbarea)

loria, L.) 爲一年生或越年生草本。莖高二三尺。葉在下部者爲倒卵圓形有柄。在上部者爲披針形無柄。花爲黃色四瓣花。作總狀花序排列。果實爲扁平翅果。日本於享保年中始傳入云。(一)山藍係屬大戟科之山藍 (*Mecurialis Ljocarya*, S. et Z.) 產台灣及琉球。爲常綠草本。自生於陰地。莖高一二尺。葉對生。爲橢圓形。有長柄。花爲單性花。呈黃綠色也。(二)琉球藍 (馬藍) 係屬爵床科之琉球藍 (*Strobilanthes Placoidifolia*, Nees) 多產於熱帶地方。莖粗有節。葉對生。花爲紫色。(四)木藍係屬豆科之木藍 (*Indigofera Tinctoria*, L.) 適於熱帶地方。台灣產頗多。莖作灌木狀。葉爲倒卵圓形。小葉合成之羽狀複葉。類槐葉。花爲雜黃色。及赤色之蝶形花。俗呼印度藍顏料。卽從此植物葉採製之青色天然顏料。玉藍澱之製法。先刈取藍之莖葉。曬乾取葉。葉名揉藍。鋪置棧房中地板上。澀水。使之醱酵。經數週後。則葉中所含精原質分解生

十八畫 藍

藍

出藍素 (*Indigo*, n.) 名爲藍。將此和水共置白搗。使成一團。名爲藍球。染坊於藍或藍球。加石灰水。灰鈉及水。入藍。使起乳酸醱酵。則藍素受還元作用。變成白藍。以之溶於鹼液中。於液面浮上藍青色一塊者。卽謂之藍澱或藍花。其味辛苦。性寒無毒。並能解諸毒。小兒禿瘡。熱腫。止血殺蟲。又治噎膈。染坊藍液亦有解諸毒功效。如中河厥毒。服藍液一二碗。其毒卽解。(和漢藥考)

【藍澱】 命名 本品係以藍與石灰製成之澄澱物。故名。

性質 辛苦寒。無毒。

主治 解諸毒。傳熱瘡。小兒禿瘡。熱腫。

歷代紀述攷證 【明】李時珍本草綱目論藍澱曰。止血殺蟲。治噎膈。

配合應用 ●治時行熱毒。心神煩燥。用藍澱一匙。新汲水一盞服。(聖惠方)

●治小兒熱丹。藍澱傳之。(祕錄方)

●治口鼻急疔。數日欲死。以藍澱敷之。令徧日十度。夜四度。(千金方)

●治誤吞水蛭。青澱調水飲。卽消出。(普濟方)

參攷資料 ●澱。石殿也。其滓澱澱在下也。亦作澱。俗作澱。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至干下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪濁浮沫。掠出陰乾。謂之靛花。卽青黛。(李時珍)

●澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中絳州一僧病噎。不可食數年。臨終。命其徒曰。吾死後。可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視胸中。得一物。形似魚。而有兩頭。徧體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。戲投諸味。雖不見食。皆化爲水。又投諸毒物。亦皆消化。一僧方作藍澱。因以少澱投之。卽怖懼奔走。須臾化成水。世傳澱水能治噎疾。蓋本於此。今方上或以染水。願飲人治噎膈。皆取其殺蟲也。(李時珍)

【藍藤】 產地 出朝鮮半島。形態 藍藤爲蔓草類之一種。根如細辛。可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 冷氣咳嗽。煮汁服。

【藍葉】 卽藍蛇之古籍別名。與見本草拾遺。詳「藍蛇」條。

【藍藤】 卽青黛之古籍別名。與見和漢藥考。詳「青黛」條。

【藍草】 古籍別名 藍竹。(詩小雅) 藍蓍。(唐本草) 黃草。(吳普) 藍草。王芻。(爾雅) 藍草。(許氏說文) 鴟脚莎。(綱目)

外國名詞 *Araxxon chil-gae*, Beauv. (拉丁) *コフナクサ* ハチヂヤウカリヤス (日本)


基本 禾本科藍草屬。爲藍草之花葉莖根。

產地 山野川谷均有出。

形態 藍草爲蔓草類之越年或一年生草本。細莖布地。莖末豎立。分枝爲數枝。高一二尺。葉廣披針形。或長卵形。有尖端。九月間枝梢着花。集成長穗狀花序。約一寸許。與芒之穗相似。褐紫色。且數花

十八畫 藏 藐 齋 蟬 蟻 蟻 蟻

序常發生。其汁可作染料。花葉莖等亦可供藥用。



草 藏

性質 苦平無毒。

主治 久咳上氣喘逆。久寒驚悸。疥疥。白禿。瘡氣。殺皮膚小蟲。

歷代配述攷證 【魏】吳普本草論蓋草曰治身熱邪氣小見身熱【宋】大明諸家本草論蓋草曰洗一切惡瘡有效。

參攷資料 蓋草生青衣川谷。九月十月採取。可以染作金色。(別錄) 青衣縣名。在益州。今處烏平澤溪。潤潤皆有。葉似竹而細。莖亦圓小。今荊襄人麥以染黃色極鮮好。俗名綠蔴草。(蘇恭)

【藏紅花】 卽西藏紅花之處方用名。詳「西藏紅花」條。卽紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【藏香】 命名 本品出西藏而香故名。

古籍別名 吉吉香(拾遺)

製法 趙恕軒云。王景略曾製藏香。其方云得自拉藏。予求得其法。用速香二片。沉香。黃熟香。黃檀。香。廣木香各四兩。春花。甘松。三奈。玫瑰。瓣母丁香。細辛。檜皮。生軍。排草。乳香。金顏香。喃叭。攪油。蘇合油。伽楠。水安息各二兩。冰片一兩。右各爲極細末。以頂好榆麵二斤。火硝十兩。化水。加老醇酒調和爲香。

主治 殺邪治崇。透斑愈癩。催生明目。透發痘瘡。

參攷資料 出西藏作團成餅者。良如香炷者。次之色紫黃色。氣甚猛烈。焚之香聞百步外者佳。僞者名京香。不入藥用。又有出打箭爐者。不及西藏出者第一。有紅藏。黃藏。紫藏之分。藏香有紫黃二色。粗細二種。各處皆有。惟產於巴塘者爲最。(蘇恭)

藏香中有一種白色小丸子。焚之氣頗幽爽。亦係番僧所貢。不知何名。其氣香嗅之可治老人腸燥氣虛便閉。入廁時焚一二丸。最妙。亦可治痘。(葉明齊) 藏香有黑如墨者。燃之催生甚妙。(朱大駿) 藏香有綠色者。云最貴。焚之嗅其烟。可清

目。不知彼中何草合成。(聞人遠)

【藏棗】 命名 本品爲棗樹之產於西藏者。故名。

形態 藏棗爲棗類之一種。其實大者長二寸許。形味絕如南棗。核似蠶蛹形而無仁。其實可供藥用。

主治 補虛勞。定神志。療怯如神。益氣功同人參。

【藐】 卽紫草之古籍別名。典見爾雅。詳「紫草」條。

【齋】 卽雀麥之古籍別名。典見外臺。詳「雀麥」條。

【蟬王蛇】 卽蟬蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蟬蛇」條。

【蟬蛇】 古籍別名 王蛇。蟬王蛇。王字蛇。黑色者名烏蟬。(綱目拾遺)

產地 深山間處處多有之。

形態 蟬蛇爲蛇類之最大者。全體長達二丈餘。有鱗。背鱗小。頭部及眼部鱗大。背色黃褐。有褐色大斑。腹部白色。肛門兩側尙存後脚之跡。額部有天生王字。常蟠居樹間。以何食物。體大如麋鹿。亦能

絞殺而食之。其脂肪然取之。可供藥用。

製法 收蟬油。鋼鍋內熬熟。隨將黃蠟入油內攪勻。油紙攤膏用。

主治 潤膚貼之。

【蟬蛇草】 卽赤車使者之日本名。詳「赤車使者」條。

【蟻】 卽蠶繭之古籍別名。典見漢書。詳「蠶色」條。

【蟻】 卽蟻蚌之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「蟻蚌」條。

【蟻】 基本 本品卽蟹之生於陂池中。似蟻而大者。

外國名詞 Carapax sp.



蟻 蟻

性質 鹹冷有毒。

主治 取膏塗溼癬疽瘡。

【蟻】 卽蟹之古籍別名。典見綱目。詳「蟹」條。

【蟻】 基本 本品卽蟹之小。百無毛者。

主治 功同蟹

【蟾蜍】即蟹之古籍別名。典見綱目。詳「蟹」條。

【蟾桃草】即接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「接骨仙桃」條。

【蟻蝻】 古籍別名 蟻蝻。(爾雅) 頁。蟻蝻。蟻蝻。蟻蝻。

蟻蝻(本草綱目) 蟻蝻。(王立人簡易方) 小而色灰者名土蟻。(綱目拾遺)

外國名詞 Oxya yook.

Form.

形態 蟻蝻為卵生蟲類。蝗屬之一種。種類甚多。體長寸許。有深灰黃綠青黑等色。頭為三角形。翅為革質。能飛。後肢腿脚甚大。能跳。夏月卵化而出。長七八分。綠色。冬月蟄土產卵。好食禾稻穀類。實為農田之害蟲。可供藥用。

種類 ①在草上者名草蟻。一名頁蟻。②在土中者名土蟻。一名蟻蝻。③似草蟻而大者名蟻斯。一名蟻蟻。④似蟻斯而細長者名蟻蝻。一名蟻蝻。探取 以大而青黑者入藥用。

十八蠶 蟻

性質 辛。平。微毒。

主治 咳嗽驚風。破傷。癩折損。凍瘡。癩疹不出。

配合應用 ①治驚風。其症咳嗽不已。連作數十聲。類哮喘。非哮喘。非喘。小兒多患此。取穀田內

炸蟻十個煎湯服。三劑愈。(王氏效方) ②治驚風。小兒有之。其症如物哽咽。欲吐難出之狀。久之出痰少許。日久必死。治以乾炸蟻煎湯服。(百草鏡方)

③治破傷風。用霜降後稻田內收方頭灰色炸蟻。同穀裝入布袋內。曬乾。勿令受溼。致生蟲蛀。常曬為要。遇此症。用十數個。瓦上煨存性。酒下立愈。(救生苦海方)

④治疥癩。用炸蟻五六個。煎湯溫服。(養素園驗方)

⑤治凍瘡。用方頭黃色炸蟻。風乾。煨研。香油和搽。亦可。(養素園驗方)

⑥治小兒驚風。用炸蟻不拘多少。煨存性。砂糖和服。立愈。一方治急慢驚。量大小人多寡用之。煎服。(李氏表方) 用蟻蟻焙乾為末。薑湯調服少許。立愈。(王立人易簡

蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻

方)

⑦治產後冒風。乾炸蟻數十個。瓦上煨存性。好酒調服。(王良生救急方)

參攷資料 ①蟻蝻五月五日

候交時收取。夫婦佩之。令相愛媚。(陳藏器) ②蟻蝻得夏之氣以生。得秋之氣而繁。性煎烈。能開闢透竅。治暴疾氣閉。大抵取其竄捷之功。(趙學敏)

【蟻蝻】即蟻蝻之古籍別名。典見綱目。詳「蟻蝻」條。

【蟻子】即蜘蛛之長脚者。性質功效與「蜘蛛」同。詳「蜘蛛」條。即壁錢之別名。性質功效與「壁錢」同。詳「壁錢」條。

【蟻見草】即鏡面草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鏡面草」條。

【蟻蟻】即金龜子之別名。詳「金龜子」條。

【蟻蟻】即蟻蟻之古籍別名。典見本經。詳「蟻蟻」條。

【蟻蟻】即蟻蟻之古籍別名。典見本經。詳「蟻蟻」條。

【蟬】

古體別名 蟬(本經) 蟬齊女(本草綱目) 馬蟬。最大者名額馬蟬。(爾雅) 蟬蟬。(俗名)

基本 係節肢動物昆蟲類有吻類蟬科之蟬。

形態 蟬為化生蟲類之一種。種類甚多。體長頭短。觸角亦短。計有七節。複眼突出。單眼三。吻為針狀。長短不一。胸背多斑紋。腹部分七節。雄者腹部有鳴器一對。雌者無之。故不能鳴。稱為啞蟬。翅翼有透明者。有具五色者。前翅比後翅大。前肢腿粗大。下面有齒。可供藥用。其說詳見該條。



蟬

採取 五月間採之。蒸乾。勿令盡用。

性質 鹹。甘。寒。無毒。主治 小兒驚瀉。夜啼。癩痢。毒熱。(本經) 驚悸。婦人乳難。胞衣不出。能墮胎。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新
修本草論蟬曰。小兒癩絕不能言。
【唐】甄權藥性本草論蟬曰。小兒
驚哭不止。殺疳蟲。去壯熱。治腸中
幽幽作聲。

參攷資料 ●蟬腦麥汁服之。
主產後胞衣不下。自有正傳。(陳
藏器) ●蟬主產難下胞衣。亦取
其能退燒之義。聖惠治小兒發癩。
有蚱蟬湯。蚱蟬散。蚱蟬丸等方。今
人只知用蛻。而不知用蟬也。(李
時珍)

【蟬皮】即蟬蛻之古籍別名。典見
和漢藥考。詳『蟬蛻』條。
【蟬衣】即蟬蛻之處方用名。詳『
蟬蛻』條。

【蟬花】 命名 本品以其形象
花故名。

古籍別名 冠蟬。(禮記)胡蟬。
塘蟬。(毛詩)蟬。(綱目)

產地 出蜀中。
形態 蟬花為蟬類之一種。其
頭上有一角。如花冠狀。可供藥用。
性質 甘寒。無毒。
主治 小兒天疳。驚癩。癩癢。夜
啼。心忪。

歷代記述攷證 【明】李時珍
本草綱目論蟬花曰。功同蟬蛻。又
止癩疾。

【蟬退】即蟬蛻之處方用名。詳『
蟬蛻』條。
【蟬殼】即蟬蛻之處方用名。詳『
蟬蛻』條。

命名 蟬者。禪也。變化
相禪之謂。蓋蟬蟻化腹
蟻。腹蟻者蟬也。而蛻乃蟬之殼。故
名。

處方用名 蟬退。蟬衣。蟬殼。
古籍別名 枯蟬。腹蟻。(別錄)
金牛兒。(綱目)蠋甲。蟬皮。(和漢
藥考)

外國名詞 Cicada shell (英)
基本 屬昆蟲類中有吻類。為
幼蟬出地時脫下之皮殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
蟬蛻以浙江省金華府蘭溪縣等
為上。福建次之。惟黃背嶺產者亦
佳。

形態 蟬之種類極多。故形態、
大小。色彩等亦皆不同。大抵頭部
稍方。有一雙複眼與單眼。小觸角
口作吻狀。便於吸收液汁。胸部如

管。腹略作三角式。背部色茶褐或
黑。腹部作白粉狀。胸部有翅兩對。
足三對。翅透明如膜。而有黑色之
網眼與斑點。便於飛翔。止則疊翅
作屋脊狀。雄者胸腹間具有起鼓
發之小膜。依呼吸作用而發喧聲。
長鳴而使雌者知其所。雌者產
卵樹上。卵孵化為幼蟲。下樹而入
地中。幼蟲之期間。有長至數年者。
形狀類似蟬。頭大。觸角長。吸收
樹根之液汁而發育。幼蟲之將為
成蟲也。必出地上。至樹上一二尺
高處。首足具備。終自背部綻裂而
脫皮。此時呼為木蟬。其皮殼乾燥。
則現茶褐色。堅硬而黏有泥土。以
之入藥。下品也。又經數日。更上樹
三五尺。脫皮如前。且生翅而飛去。
此二次所脫之皮殼。較前所脫者
軟而且清淨。藥用乃為上品。

種類 夏月始鳴。大而色黑者
曰蚱蟬。曰蟬。曰馬蟬。頭上有花冠
者曰塘蟬。曰蟬。曰胡蟬。具五色者
曰蟬。此數種之皮殼皆可入藥。
小而有文者曰蟬。曰麥蟬。小而色
青綠者曰茅蟬。曰茅蟬。秋月鳴。而
色青紫者曰蟬。曰蟬。曰蟬。曰蟬。

製法 李時珍曰。凡用蛻殼。沸
湯洗去泥土。翅足。漿水煮過。曬乾
用。

性質 鹹。甘寒。無毒。
效能 散風熱。宣肺氣。發疹癩。
治窩癩。用作熱痢藥。及為小兒瘰
癧藥。

主治 鹹甘寒無毒。主治小兒
驚癩。婦人生子不下。燒灰水服。治
久疔。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥
性本草論蟬蛻曰。小兒壯熱驚癩。
止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論蟬
蛻曰。研末一錢。非華水服。治啞病。
【宋】寇宗奭本草衍義論蟬蛻曰。
除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒
瘡疹出不快甚良。【明】李時珍本
草綱目論蟬蛻曰。治頭風眩暈。皮
膚風熱。痘疹作癢。破傷風。及丁腫
毒瘡。大人失音。小兒驚風。天疳。驚

突夜啼。陰腫。〔清〕黃宮繡本草求
 眞論蟬蛻曰。蟬蛻止一蟲效。味甘
 氣寒。如何主治甚多。蓋蟬木木餘
 氣所化。飲風露而不食。其言能治
 肝經風熱者。因體氣輕虛。而味甘
 寒之意也。其言能治婦人生子不
 下。及退翳膜浸睛。努肉滿背者。因
 其性有善脫之意也。其言能治皮
 膚疥癬癢疹者。以其所取在殼之
 意也。其言能治中風不語者。以其
 蟬聲清響之意也。其言能治小兒
 夜啼者。以其晝鳴夜息之意也。古
 人立藥治病。何在不在有義存。惟在
 人細自審用耳。色黑而大者良。入
 藥洗去泥土翅足。漿水煮。曬乾用。
 近人學說。張山雷曰。蟬蛻亦
 作蟬退。一稱蟬衣。王充論衡謂蟬
 蟬化腹蟬。腹蟬析背。出而爲蟬。近
 之講昆蟲學者。謂蟬在土中約有
 二年之久。迨出土脫殼。生翼而飛。
 其生命不過二十日。蓋此蟲蟄土
 最久。得陰氣甚深。故其性寒涼本
 經謂蟬主小兒驚癇夜啼。癇病
 寒熱。別錄謂蟬主驚悸。蟬蛻主
 小兒驚癇。蓋幼科驚癇。內熱爲多。
 卽素問之所謂血與氣并交走於

上。則爲薄厥。〔薄音博。迫也。言氣
 血上壅。迫之爲厥。〕亦卽西學家
 之所謂血沖腦。治以寒涼。降其氣
 火。使不上沖。此所以能治癇癇之
 眞義也。甄權謂蟬蛻治小兒壯熱。
 其意亦同。宗爽謂除目昏障翳。治
 小兒瘡疹出不快。則以此蟲出土
 卽蛻。取其速脫之意。且目之膜。
 兒之痘瘡。實熱爲多。寒能勝熱。是
 以主之。按之古義。本無祛外風。療
 聲嘶之說。惟陳藏器始有治啞病
 一說。則是臆見。若謂詩稱鳴蟬。當
 能助人聲音。抑知蟬以翼鳴。豈能
 發人之聲。且蟬之有蛻。尚在未飛
 未鳴之時。而謂能治啞病。可笑孰
 甚。此未嘗研究物理之眞。而作半
 面理想。似是實非。最爲可哂。古人
 誤會。恒有此蔽。原不足異。今當開
 明之。世學者必須識得此中眞相。
 李氏瀕湖。更謂蟬之爲物。飲風吸
 露。其氣清虛。故主一切風熱。遂於
 蟬蛻主治條中加入頭風眩暈。皮
 膚風熱。破傷風。及大人失音。小兒
 喉風天吊云云。又是添出許多風
 病。豈知方其蛻時。風尙未發。露亦
 未吸也耶。惟蛻是外皮。而性則涼

若謂能療皮膚輕淺之風熱。庶乎
 近之。瀕湖又謂治痘疹作痒。則實
 熱有餘者宜之。如其氣虛作痒。不
 混用。迨至楊氏玉衡。竭力爲此物
 鼓吹。竟謂輕清透達。爲治血病聖
 藥。又謂蛻者退也。脫然無恙云云。
 措辭尤其鄙陋。究竟無氣無味。豈
 有能當大任之理。乃偏有以臭腐
 爲神奇。如楊氏者。不知何以窟障
 至此。要之不學無術。欺人適以自
 欺耳。質地極輕。止可偶作佐使之
 用。自二三至四五分而止。或用
 五六枚至十枚亦可。今人恒去嘴
 足用之。蓋惟取輕揚者耳。
 配合應用 ①治目盲障翳。用
 蟬蛻。羚羊角。蜜蒙花。白蒺藜。草決
 明。木賊草。穀精草。甘菊花。夜明沙
 生地黃。黃連。女貞實。
 ②治小兒風熱。急驚癇病。用蟬
 蛻。丹砂。茯神。真珠。牛黃。磁石。天竺
 黃。鈎藤。犀角。珀琥。全蝎。
 ③治痘瘡血熱。出不快。用蟬蛻。
 犀角。生地黃。紫草。麥門冬。連翹。金
 銀花。
 ④治大人小兒癆瘵。用蟬蛻。石
 膏。鼠黏子。赤檀木。薄荷。玄參。甘草。

葛根。栝樓根。麥門冬。
 ⑤治小兒夜啼。小兒一百二十
 日內夜啼。用蟬蛻四十九個。去前
 殼。用後殼爲末。分四服。鈎藤湯調
 灌之。〔心經方〕普濟蟬花散。治小
 兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下
 半截。爲末。一字。薄荷湯入酒少許
 調下。或者不信。將上半截爲末。煎
 湯調下。卽復啼也。古人立方。莫知
 其妙。
 ⑥治小兒驚啼。啼而不哭。煩也。
 哭而不啼。躁也。用蟬蛻二七枚。去
 翅足。爲末。入砂末一字。蜜調與
 吮之。〔活幼口議方〕
 ⑦治小兒天疳。頭目仰視。痰塞
 內熱。用金牛兒卽蟬蛻。以漿水煮
 一日。曬乾爲末。每用一字。冷水調
 下。〔衛生易簡方〕
 ⑧治小兒喉風。初生口噤不乳。
 用蟬蛻二七枚。全蝎去毒二七枚。
 爲末。入輕粉末少許。用乳汁調灌。
 〔全幼心鑑方〕
 ⑨治破傷風病發熱。用蟬蛻炒
 研。酒服一錢。神效。〔醫皇正傳方〕
 又用蟬蛻爲末。葱涎調塗破處。卽
 時取去。惡水立效。名追風散。〔醫

十八蠶 蟬

濟方)

①治頭風旋暈。用蟬殼一兩。微炒為末。不時酒下一錢。白湯亦可。(聖惠方)

②治皮膚風癢。蟬殼、薄荷葉、等分為末。酒服一錢。日三。(集驗方)

③治痘瘡作癢。蟬殼三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。(心鑑方)

④治痘後目翳。蟬殼為末。每服一錢。羊肝煎湯下。日二。(錢氏方)

⑤治聾耳出膿。蟬殼半兩。燒存性。麝香半錢。炒共為末。綿裹塞之。追出惡物效。(海上方)

⑥治小兒陰腫。多因坐地風襲。及蟲蟻所吹。用蟬殼半兩。煎水洗。仍服五苓散。即腫消痛止。(危氏方)

⑦治胃熱吐食。清腸散。用蟬殼五十個。去泥滑石一兩為末。每服二錢。水一盞。入蜜調服。(衛生家寶方)

⑧治丁瘡毒腫。不破則毒入腹。用蟬殼炒為末。蜜水調服一錢。外以津和塗之。(青囊雜案方)又用蟬殼、僵蠶、等分為末。醋調塗瘡四圍。候根出。拔去再塗。(醫方大成

方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無風熱者禁用。著名方劑 蟬花散。治肝經蘊熱風毒之氣。內搏上攻。眼目赤腫。翳膜疼痛。昏濁。內外障翳。咸治之。(局方) 蟬殼、穀精草、刺蒺藜、甘菊、防風、草決明、蜜蒙花、甘草、羌活、黃芩、蔓荊子、川芎、木賊草、荊芥、等分為末。每服二錢。茶清調。食後臨臥各一服。

【蟬蝟】即青蝟之古籍別名。典見綱目。詳「青蝟」條。

【蟲白蠟】命名 本品非蜂蜜。樹枝間之蠟質。故名。

處方用名 蟲蠟。樹蠟。白蠟。古籍別名 木蠟。(和漢藥考) 外國名詞 Cera Chinensis. (拉丁) (Chinese or Insect Wax) White Wax (英)

基本 屬漆樹科。為落葉喬木。冬青 (aduncodance) 之果實。漿液所成。

產地 凡四川、安徽、雲南、湖南諸省之山谷原野間。恒有生長。

形態 白蠟為黃白色。有光澤。之固塊。比重 〇·九七至 〇·九八。不溶於水及冷酒精。溶於沸騰酒精。伊打脂肪油等。逢五十二度至五十五度之溫度。熔化。一百五十度而沸騰。達苛性鹼則鹼化。

採取 採蠟之法。各國不同。但皆大同小異。今述其一。如左。冬青十月間葉落。果實成熟時。採取之。入白搗碎。用箕篩分粉與核。於釜中列置木材。上鋪蔗。將粉撒布其上。蒸之。次入麻袋。再蒸。用壓榨器壓榨。採收流出之蠟。入盆。冷成餅。謂之生蠟。再待其入鍋熔。化。另用大桶盛冷水。浮置小箱。箱下邊隅有孔。將熔化蠟傾入箱內。則蠟從箱孔流入水中。乃以手揉之。次將其蠟列置蔗上。置日光下曬乾。約二星期。即變為白色。謂之曬蠟。

(黃蠟之曬白者。亦呼曬蠟。不可與此混同。) 曬蠟曬白法中。有加灰汁法。

性質 甘。溫。無毒。

成分 概為軟脂 (Palmitine, $C_{15}H_{31}(C_{17}H_{33}O_2)$)。

效能 續筋。接骨。生肌。止血。專

作膏藥原料。治創傷出血。為外科要藥。

作用 有直接凝固血液之功。主治 生肌止血。定痛補虛。續筋接骨。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蠟白蠟曰。入丸散。服殺瘵蟲。

施用宜忌 凡無蟲積者禁用。參攷資料 ①白蠟為外科要藥。與合歡皮同入長肌肉膏中。用之神效。但未試其可服否也。(朱震亨) ②綠樹葉。亦治瘡腫。故白蠟為外科要藥。正如桑蠟。與桑木之氣相逆也。(李時珍) ③蟲白蠟與蜜蠟之白者不同。乃小蟲所作也。其蟲食冬青樹汁。久而化為白脂。黏於樹枝。人謂蟲尿著樹面。然非也。至秋刮取。以水煮。濾置冷水中。則凝聚成塊矣。碎之。文理如白石。膏而塗。徹人以和油。澆燭。火勝。蠟也。(汪機) ④唐宋以前澆燭。入藥所用白蠟。皆蜜蠟也。此蟲白蠟。則自元以來。人始知之。今則為日用物矣。四川、湖廣、滇、閩

則為日用物矣。四川、湖廣、滇、閩

則為日用物矣。四川、湖廣、滇、閩

則為日用物矣。四川、湖廣、滇、閩

嶺、吳越東南諸郡皆有之。以用漬
街永產者爲勝。蠟樹枝葉狀類冬
青。四時不凋。五月開白花成葇。結
實纒纒大如芫荽子。生青熟紫。冬
青樹子則紅色也。其蟲大如蚬虱。
芒種後則延綠樹枝。食汁吐涎。黏
於嫩莖。化爲白脂。乃結成蠟狀。如
凝霜。處暑後則剝取。謂之蠟渣。若
過白露。即黏住難刮矣。其渣煉化
潔淨。或飯中蒸化。溼下器中。待凝
成塊。卽爲蠟也。其蟲嫩時白色。作
蠟。及老則赤黑色。乃結苞於樹枝
初若黍米大。入春漸長。大如雞頭
子。紫赤色。纒纒抱枝。宛若樹之結
實也。蓋蟲將遺卵作房。正如蜜蟻
蟻始之類爾。俗呼爲蠟種。亦曰蠟
子。子內皆白卵。如細坑。一包數百
次年立夏日摘下。以箬葉包之。分
繫各樹。芒種後苞拆。卵化蟲乃延
出葉底。復上樹作蠟也。樹下要潔
淨。防蟻食其蟲。又有水蠟樹。葉微
似榆。亦可放蟲生蠟。甜檳樹亦可
產蠟。(李時珍) ①白蠟係從漆樹
科之黃樹樹 (Ehns Succed-
anea, L.) 及漆樹 (Ehns Ver-
nicifera, DC.) 實所採取之蠟

十八畫 蟲

蠟 蠟 覆

質。此外或從山漆樹 (Ehns Ly-
thodarpa, Mig.) 等樹實。亦可
採取。日本藥局方之白蠟。係黃蠟
曬白者。漆樹日本陸羽地方頗多。
爲落葉樹。老者高及三丈。葉爲
羽狀複葉。附有七葉至九葉。小葉
作卵圓形或橢圓形。六月間開花。
垂長穗。呈黃色。果實作扁圓形。大
三分許。作黃褐色。鏽傷樹皮。則有
漆汁滲出。黃樹蠟爲落葉樹。日本
九州及中國產此。老者高及三
丈。葉作羽狀複葉。小葉作長卵圓
形。附有九葉至十七葉。六月間於
梢頭下垂穗。開黃色小花。果實
作扁圓形。大二三分。作黃色。(黃
樹蠟或呼黃蠟漆。或呼蠟樹。) (和
漢藥考)

【蟲損】卽青雌之古籍別名。典見
別錄。詳「青雌」條。

【蟲積】卽青雌之古籍別名。典見
別錄。詳「青雌」條。

【蟲蟬】卽玉竹之古籍別名。典見
吳普本草。詳「玉竹」條。

【蟲蠟】卽白蠟之處方用名。詳
「白蠟」條。

【蠟】卽蠟之古籍別名。典見綱目。

詳「蠟」條。

【蠟蟬】卽青雌之古籍別名。典見
綱目。詳「青雌」條。

【覆盆】卽蓬蘽之古籍別名。典見
別錄。詳「蓬蘽」條。

【覆盆子】 命名 子似覆盆之
形故名。

古籍別名 葦子。缺盆子。(爾
雅) 西國草子。畢楞伽子。(圖經)
大麥葦子。插田蘆子。烏蘆子。栽秧
蘆子。馬瘞子。陸荊子。(綱目) 蘇密
那子。(藏書)

外國名詞 Rubus Toklena,
Step.

基本 屬薔薇科。其所結之果
實。卽覆盆子。

產地 凡山野向陽之林中。恒
多產焉。陳仁山藥物生產辨云。產
浙江寧波府。六月新。

形態 覆盆子爲亞灌木本。其
莖有刺。葉爲複葉。小葉作卵圓形。
其邊緣有鋸齒。花紫白色。五出。相
綴而爲覆繖狀。花雌雄全。果實
小而攢簇。形如圓錐。或若彈丸。初
時色綠。熟則暗紅。

種類 覆盆子。卽葦也。品類甚

夥。產於歐美者。凡百五十有餘種。
產於日本者。亦四十有餘種。或名
之曰蓬蘽。日本向入藥用。歐洲製
造之覆盆子。糖漿。覆盆子水。覆盆
子醋等。其原料係取成熟之新鮮
果實爲之。其母植物是否爲葦不
可知。學者往往譯作蓬蘽云。一
種藤莖繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。
葉大如掌。狀類小莢葉。面背皆白
厚而有毛。六七月開小白花。就蒂
結實。三四十顆成簇。生則青黃。熟
則紫黯。微有黑毛。狀如熱棍而屬
冬月苗葉不凋者。俗名插田蘆。卽
本草所謂蓬蘽也。一葦小於
蓬蘽。亦有鈎刺。一枝五葉。葉小而
面背皆青。光滑而無毛。開白花。四
五月實成。子亦小於蓬蘽而稀疎。
生則青黃。熟則烏赤。冬月苗凋者。
俗名插田蘆。卽本草所謂覆盆子。
爾雅所謂葦。缺盆也。此二種者。俱
可入藥。一葦小於蓬蘽。一枝
三葉。葉面青背淡白。而微有毛。開
小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃
者。俗名插田蘆。卽爾雅所謂葦者
也。故郭璞註云。爾雅所謂葦者
也。而大赤色。酢甜可食。此種不入

十八畫 覆

藥用。①一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃葉而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅為異。俗亦名蔞。即爾雅所謂山莓。陳藏器本草所謂懸鈎子者也。蓋懸鈎是樹生。而色紅赤。覆盆是藤生。而色烏赤故也。②一種就地引細莖。節節生根。每枝三葉。葉有齒刻。四五月開小黃花。五出。結實鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉並根也。仇遠釋史記作蛇纏草。言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

採取 每年四五月間採收。綠色未熟者。烈日曝乾。不爾易爛。若樹蔞則不可混採也。

製法 雷斅曰。凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂。取子以酒拌蒸一宿。以東流水淘兩遍。又曬乾方用。李時珍曰。採得搗作薄餅曬乾。蜜貯。臨時以酒拌蒸尤妙。

性質 甘平無毒。
成分 爲林檎酸、酒石酸、揮發油、糖分等。

效能 補肝腎。縮小便。強陽事。

療陰痿。用爲滋養強壯藥。

主治 益氣輕身。令髮不白。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論覆盆子曰。男子腎精虛竭。陰痿。能令堅長。女子食之有子。

【唐】陳藏器本草拾遺論覆盆子曰。食之令人好顏色。榨汁塗髮不白。【宋】馬志開寶新詳定本草論覆盆子曰。補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療勞損。風虛。補肝明目。並宜搗篩。每日水服三錢。【宋】寇宗奭本草衍義論覆盆子曰。益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。煎服。治肺氣虛寒。【明】繆希雍本草經疏論覆盆子曰。覆盆子得木氣而生。本經味甘氣平無毒。甄權微熱。寇宗奭酸甘。深得其義。入足少陰經。其主益氣者。言益精氣也。腎藏精。腎納氣。精氣充足。則身自輕。髮不白也。蘇恭主補虛續絕。強陰。建陽。悅澤肌膚。及和臟腑。甄權主男子腎精虛竭。陰痿。女子食之有子。大明主安五臟。益顏色。養精氣。長髮。強志。皆取其益腎添精。甘酸收斂之義耳。

【明】李士材本草圖解論覆盆子

曰。覆盆子甘平入腎。起陽治痿。固精攝溺。強腎而無燥熱之偏。固精而無凝滯之害。金玉之品也。【清】黃宮栢本草求真論覆盆子曰。覆盆子甘酸微溫。性稟中和。功能溫腎而不燥。固精而不凝。故服之陰痿能強。肌膚能澤。臟腑能利。髮髮不白。女子服之多孕。既有補益之功。復多收斂之義。名爲覆盆子者。服之能使溺益皆覆也。

辨偽 藥肆中恒以樹蔞代充。故多偽品。欲辨真偽。以酒浸之。其色紅者是真。

近人學說 張山雷曰。本經止有蓬蘽。而曰一名覆盆。至別錄乃別出覆盆子。雖氣味主治。與本經蓬蘽不同。而性情功用。可以相通。其爲一物。蓋無可疑。御覽引吳普本草。缺盆一名決盆。又引甄氏本草。覆盆子一名陸荊。考說文。藥木也。藥草也。二字有別。二物雖同爲蔓生。然草本藥本各異。覆盆屬蔓草類。則字當作蔓。而本草俱作蓬蘽。恐傳寫有僞。又說文。莖。缺盆也。廣雅。莖盆。陸荊。莖也。爾雅。莖。莖盆。郭注。莖盆也。毛詩。葛藟。之。陸璣

一八二四

詩疏。似燕與亦速。是覆盆。缺盆。陸英。陸荊。皆卽古之所謂藟也。李濒湖綱目。詳言一類五種。雖微有別。然亦自言覆盆蓬蘽功用相近。又實質是一類而二種。茲故以本經別錄二者。合爲一條。李氏綱目謂蓬蘽一名覆盆。出於別錄。茲據孫淵如問經堂輯刻本草經。則出於本經。蓋所據大觀本黑白字之白字。定爲本經也。長陰令堅。綱目引本經令下衍人字。遂不成句。茲據孫本無人字。又曰。覆盆爲滋養真陰之藥。味帶微酸。能收攝耗散之陰氣。而生精液。故寇宗奭謂益腎縮小便。服之當覆其溺器。語雖附會。尙爲有理。本經主安五臟。障者陰也。凡子皆堅實。多能補中。况有酸收之力。自能補五臟之陰。而益精氣。凡子皆重。多能益腎。而此又專入腎陰。能堅腎氣。故曰長陰令堅。強志倍力有子。皆補益腎陰之效也。久服輕身不老。則極言其功耳。別錄益氣輕身。令髮不白。仍卽本經之意。惟此專養陰。非以助陽。本經別錄。並未言溫。其以爲微溫微熱者。皆後人臆測之辭。一似

凡精者皆屬溫藥。不知腎陰腎陽。藥物各有專主。滋養真陰者。必非溫藥。讀本草者。必以本經為主。而別錄輔之。後人雜說。徒多紛亂。不可不分別觀之。

配合應用 治夢遺洩精。用覆盆子、黃蘗、沙苑、蒺藜、蓮鬚、五味子、砂仁、魚膠、山茱萸。

治男子精氣虧乏。中年無子。用覆盆子、車前子、五味子、菟絲子、蒺藜子。為五子衍宗丸。

加入巴戟天、鹿胎、補骨脂、鹿茸、白膠、山茱萸、肉蓯蓉。治陽虛陰痿。臨房不舉。或精寒精薄。

治陽事不起。覆盆子酒浸焙研為末。每日酒服三錢。(集簡方) 用薑 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陽強不倒。小便不利者禁用。

參攷資料 覆盆子。功用大抵相近。雖是二物。其實一類而二種也。一早熟。一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹蔕則不可混採者也。(李時珍) 佛說蘇密那花點燈。正言此花也。此花有

三種。以四月熟狀如覆盆。味甘美。

十八畫 覆

豐 獭 躡

者為是。餘不堪入藥。今人取芽毒

當覆盆誤矣。(陳藏器) 處處有之。秦州、永興、華州尤多。長條。四五

月熟。山中及時採來賣。其味酸甘。外如荔枝。大如櫻桃。軟紅可

愛。失時則就枝生蛆。食之多。熟時五六分熟。便可採。烈日曬乾。今

人取汁作煎為果。採時着水。則不堪煎。(寇宗奭) 蓬蘽子以八九月熟。故謂之割田蕪。覆盆以四五月

月採相合。二蕪熟時色皆烏赤。故能補腎。其四五月熟而色紅者。乃

覆盆也。不入藥用。陳氏所謂以芽毒當覆盆者。蓋指此也。(李時珍)

【覆盆根】 主治 痘後目翳。取根洗搗澄粉。日乾。蜜和少許。點於翳丁上。日二三次。自

散。百日內治之。久即難療。**【覆盆葉】** 性質 鹹平。微酸。無毒。

主治 按絞取汁。滴目中。去翳赤。出蟲如絲線。**歷代記述攷證** 【明】李時珍本草綱目論覆盆葉曰。明目止淚。

收濕氣。**參攷資料** 按崔元亮海上

集驗方。治目暗不見物。冷淚浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取西

國草一名華楞伽。一名覆盆子。日曬乾。搗極細。以薄棉裹之。用飲男

乳汁浸。如人行八九里。久用點目中。即仰臥。不過三四日。視物如少

年。禁酒麵油物。(蘇頌) 按洪邁夷堅志云。潭州趙大尉母病爛弦

疝眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入山取草。葉嚼留

汁。入筒中。還以草紗蒙眼。滴汁漬下弦。轉盼間。蟲從紗上出。數日下

弦乾。復如法滴上弦。又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。(李時珍)

【覆盆膠】 即阿膠之古籍別名。與見和漢藥考。詳「阿膠」條。**【覆盆】** 即覆荷之古籍別名。與別錄。詳「覆荷」條。

【覆蘆】 即卷蘆子之古籍別名。與見綱目。詳「卷蘆子」條。**【覆本】** 即韭之古籍別名。與見禮記。詳「韭」條。**【覆蘆】** 即蘆蘆之古籍別名。與見

吳普本草。詳「覆蘆」條。

【獭】 命名 本品皮為坐穩臥。得能消膜外之氣。故名。古稱別名 額(綱目)

外國名詞 Tapirus Tapir (拉丁) バク(日本) 基本 保存植物物哺乳類有胎盤類有胎類之奇蹄類獸科

產地 出印度、南美諸地之山林及水邊。形態 獭為獸類之一種。體形似豚。大小不一。四肢長短適中。前肢有四趾。後肢有三趾。皆有蹄。皮似厚而厚。毛短項粗。耳短眼小。尾亦小。鼻長向前突出為吻狀。能隨意伸縮。常夜出覓食草木嫩莖幼芽。性柔易馴。其皮可供藥用。

主治 瘧之可驅溫瘧。辟瘴氣邪氣。

【獭尿】 主治 吞銅鐵入腹者。水和服之。即化為水。

【獭膏】 主治 癰腫。能透肌膚。參攷資料 獭膏性利。銅鐵瓦器盛之。悉透。惟以骨盛則不漏。(李時珍)

【躡豆】 即躡豆之古籍別名。與見

崔實月令詳「豌豆」條。

【核醬】即大瓊之古籍別名。與見和漢藥考詳「大瓊」條。

【醫草】即艾葉之古籍別名。與見別錄詳「艾葉」條。

【醬】

命名 本品係用麥、麵、豆、米等磨黃。加鹽曝而成之調味品。其所以呼為醬者。以其能制食物之毒。如將之能不暴惡也。

種類

①用大豆三升水煮糜。以麵二十四斤并羆成黃。每十斤入鹽八斤。并水四十斤攪曬成油。收取之者。名豆醬油。②用豆炒磨成粉一斗。入麵三斗。和勻。切片。曬黃。曬之。每十斤入鹽五斤。并水淹過。曬成收之者。名大豆醬。③用豆磨淨。和麵羆黃。次年再磨。每十斤入鹽五斤。以臘水淹過。曬成收之者。名小豆醬。④用豆水浸蒸軟。曬乾。去皮。每一斗入小麥一斗。磨麵和切。蒸過。會黃。曬乾。每十斤入鹽五斤。水二十斤。曬成收之者。名豌豆醬。⑤用小麥蒸熟。羆黃。曬乾。磨碎。每十斤入鹽三斤。熱湯二十斤。曬成收之者。名熟醬。⑥用小麥麵和劑切片。蒸熟。會黃。曬乾。每十

斤入鹽三斤。熱水二十斤。曬成收之者。名甜麵醬。⑦用生麵水和布包。踏餅。黃。曬乾。每十斤入鹽五斤。水二十斤。曬成收之者。名小麥。⑧用黑豆一斗。炒熟。水浸半日。同煮爛。以大麥麵二十斤拌勻。篩下麵。用煮豆汁和劑。切片。蒸熟。會黃。曬乾。每一斗入鹽二斤。并水八斤。曬成黑甜而汁清者。名大麥醬。⑨用麻姑餅搗蒸。以麵和勻。會黃。如常用。用鹽水曬成。色味甘美者。名麻滓醬。

採取 入藥用以豆醬及陳久者良。
性質 鹹。冷。利。無毒。
主治 除熱。止煩滿。殺百藥及熱湯火毒。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論醬曰。殺一切魚肉菜蔬。蠶毒。并治蛇蟲蜂蠶等毒。【明】李時珍本草綱目論醬曰。醬汁瀝入下部。治大便不通。瀉耳中。治飛蛾。蟲蟻入耳。塗刺犬咬。及湯火傷。灼未成瘡者有效。又中砒毒。調水服。即解。【明】釋希雅本草經疏論醬曰。按醬之品不一。惟豆醬陳久者

入藥。其味鹹酸冷利。故主除熱止煩滿。及湯火傷毒也。能殺一切魚肉菜蔬。蠶毒。本經云。殺百藥毒者。誤也。聖人不得其醬不食。朱子云。食肉用醬。各有所宜。玩一宜字。則不宜者必有傷害於人。非特悅口而已。如食蟹用橙醬。或覆醬。煮魚用菜黃醬。取其能殺毒之義耳。又有榆仁醬。味辛美。殺諸蟲。利大小便。心腹惡氣。蕪夷醬。主療相同。菜黃醬作法。不用麵豆鹽。只以河水。益菜黃多少。稍稍加石灰。摻入。拌勻。曬乾。殺一切魚腥毒。用時洗去石灰。搗爛。煮水。族入之良。【清】黃宮繡本草求真論醬曰。醬本豆與麵熟。器加鹽與水曬成。雖曰經水。經日煎熱。然味鹹性冷。火不勝水。仍為解熱解毒。消火之劑耳。是以書載一切魚肉菜蔬。蠶毒。皆當用此。以調蛇蟲蜂蠶。犬咬。毒火。砒霜。蠶毒。皆當用此。以解。與夫手指。痛。癢。癩。風。駭。大便不通。飛蟲入耳。浸淫。疥。癬。輕粉毒中。身土。乾。燥。疔。下。血。尿。血。等症。無不當用。此以治。但此氣。鹹。性。冷。小兒。過。服。則。恐。生。痰。動。氣。妊。娠。合。雀。肉。以。食。則。恐。

令兒面黑。所當避也。取豆醬陳久者佳。【清】王士雄飲食譜論醬曰。醬。純。以。白。麵。造。者。鹹。甘。而。平。調。饌。最。勝。豆。醬。以。金。華。蘭。谿。造。者。佳。鹹。平。芻。油。則。豆。醬。為。宜。日。曬。三。伏。晴。則。夜。露。深。秋。第。一。撈。者。勝。名。秋。油。即。母。油。調。和。食。味。單。素。皆。宜。痘。痂。新。脫。時。食。之。則。嫩。黑。嘉。興。造。者。鹹。寒。以。少。日。曬。之。功。也。油。亦。質。薄。味。淡。不。耐。久。藏。對。犬。齧。及。湯。火。傷。未。成。瘡。者。以。醬。塗。之。中。砒。毒。豆。醬。調。水。服。胎。氣。上。衝。及。虛。逆。嘔。吐。好。醬。油。開。水。調。服。亦。解。雅。片。毒。

參攷資料

●小麥醬殺藥力不如豆醬。又有麩鹿兔雉及鱧魚醬。皆不可久食也。【孟詵】①聖人不得醬不食。意欲五味和五臟悅而受之。此亦安樂之一端也。【寇宗奭】②麵醬。鹹。豆。醬。甜。醬。豆。油。大。麥。醬。麩。醬。皆。鹹。甘。【李時珍】③多食發小兒無辜生痰動氣。妊婦合雀肉食之。令兒面黑。【孟詵】④麥醬和鯉魚食。生口瘡。【蘇頌】⑤【醬瓜】即越瓜之俗名。詳「越瓜」條。【醬瓜天麻】即天麻之古籍別名。

典見綱目。詳『天麻』條。

【鑿板豆草】即馬牙半支之古籍別名。典見家寶方。詳『馬牙半支』條。

【薺茄】 基本 此即人家薺中食茄也。陳年者佳。

主治 擠汁滴入耳內。治耳膜燒灰爲末。擦牙疼。燒灰和麝香輕粉。貼腹內瘰癧。

【醫癬半支】即馬牙半支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙半支』條。

【醫癬草】即醫癬半支之別名。詳『馬牙半支』條。②即地錦之別名。詳『地錦』條。

【鈔羊角】即鈔羊角之處方用名。詳『鈔羊角』條。

【鎖陽】 命名 本品功能與陽固精。故名。

處方用名 製鎖陽。

外國名詞 Balanophora

基本 爲菌類生化之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鎖陽山西、陝西、河南等省。均有出產。

形態 鎖陽發起如筍。上豐下

十八盤 薺

倫。其甲極比。筋脈達絡。狀類男子陽具。即肉蓯蓉之一類。

製法 搗取洗淨去皮。薄切。曬乾用。

性質 甘。溫。無毒。

效能 潤腸通便。補陽起陰。用作滋養強壯藥。

主治 大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之。可代菴蓉。黃粥。潤佳。不燥結者勿用。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鎖陽曰。潤燥養筋。治痿弱。【明】李士材本草圖解論鎖陽曰。鎖陽甘溫入腎。補陰益精。潤燥養筋。凡大便燥結。腰膝軟弱。珍

爲要藥。酒潤焙用。【清】黃宮繡本草求真論鎖陽曰。鎖陽本與菴蓉同爲一類。甘鹹性溫。潤燥養筋。凡陰氣虛損。精血衰敗。大便燥結。治

可用此以啖。并代菴蓉。黃粥。潤佳。則知其性雖溫。其體仍潤。未可云爲命門火衰必用之藥也。故書有

殺大便不燥結者勿用。益知性屬陰類。即有云可補陽。亦不過云其

陰補而陽自興之意。豈真性等桂附。而爲燥熱之品哉。但古人表著

藥功。多有隔一隔二立說。以致茫若觀火。究之細從藥之氣味形質考求。則孰陰孰陽。自爾立見。又奚必沾沾於書之治功是求者乎。狀類男陽。宜用酥炙。

鎊 鎖 鎮 雙 藟

藥功。多有隔一隔二立說。以致茫若觀火。究之細從藥之氣味形質考求。則孰陰孰陽。自爾立見。又奚必沾沾於書之治功是求者乎。狀類男陽。宜用酥炙。

用重 錢半至三錢。

施用宜忌 凡便溏不實及陽

易舉者禁用。

著名方劑 鎖陽丹。治脫精滑泄。【沈氏尊生方】桑螵蛸三兩。龍骨茯苓各一兩。共研末。煉蜜爲丸。梧子大。每服七十丸。鹽湯下。

【鎮山威】即鹿角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿角』條。

【鎮風石】即明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【鎮頭迦】即柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【雙珠草】即狗卵草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『狗卵草』條。

【雙鉤鈎】即鈎藤之處方用名。詳『鈎藤』條。

【雙頭蓮】(綱目) 古籍別名 僅生草。基本 雙頭蓮爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 搗貼牙疳。並利小便。消腫服。

【雙頭蓮】即草烏頭之日名。詳『草烏頭』條。

【藟】即羅摩之古籍別名。典見陸瓊詩疏。詳『羅摩』條。②即鴉鵂

之古籍別名。典見爾雅。詳『鴉鵂』條。

【藟符】即水楊之古籍別名。典見綱目。詳『水楊』條。

【藟菌】 命名 藟作雀。乃蘆葦之屬。本品生於其下。故名。

古籍別名 藟蘆。(本經) 產地 生蘆葦池澤中。鹹鹼地亦多有之。

形態 藟菌爲藻類菌類之一種。其菌色白。輕虛。表裏相似。與衆菌不同。秋雨時行。即生。天旱久雨。即稀。採得可供藥用。

採取 八月採之。陰乾。

性質 鹹。平。有小毒。

主治 心痛。溫中去長蟲。白癩。蝮蟲。蛇螫毒。癩癩諸蟲。(本經) 痘蝟。去蛇蟲。寸白。蠱毒。(別錄) 歷代記述攷證 【唐】甄權藥

主治 目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿咳逆。小兒下泄。婦人產難。胞衣不出。並生香之。醋浸一宿。療黃疸。破大煩熱。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論雞子白曰。產後血閉不下。取雞子白一枚入醋一牛攪。【明】李時珍本草綱目論雞子白曰。和赤小豆末塗一切熱毒。丹腫。顯痛神效。冬月以新生者。酒漬之密封七日取出。每夜塗面。去黧黯。鼓隨令人悅色。【清】黃元御長沙藥解論雞子白曰。雞子白味甘氣腥微寒。入手太陰肺經。療咽喉之腫痛。發聲音之暗啞。傷寒苦酒方。【方在苦酒】治少陰病。咽中生瘡。聲音不出。用之以其消腫痛而發聲音也。其諸主治塗鼻瘡。治發黃。傳腫痛。洗燒灼。

國外學說 英美學說謂雞蛋

青之質。不特卵屬有之。即精血乳內與動物植物汁內皆有之。血內所含者為血精。乳內所含者為乳精。蛋內所含者為蛋精。動物內所含者總稱動物精。植物內所含者總稱植物精。雞蛋青之功用。能作

十八畫 雞

潤劑。養生。解承絲及膽藥（一名藥毒）之毒。配水藥類之混濁者。若加以蛋青少許。即可變清。

配合應用 ●治時行發黃。醋酒浸雞子一宿。吞其白數枚。（肘後方）

●治下痢赤白。生雞子一個取白攤連紙上。日乾。摺作四重。包肥烏梅十個。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。梳裂冷定。研末。入水銀粉少許。大人分二服。小兒三服。空心井華水調下。如覺微利。不須再服。（類證方）

●治就過攻心。口吐清水。以雞子一枚去黃。納好漆入雞子殼中。和合。仰頭吞之。蟲即出也。（古今錄驗方）

●治五種遺尸。其狀腹脹。氣急冲心。或礫石。或起。或牽膜。脊以雞卵白七枚。頓吞之。良。（千金方）

●治咽塞鼻痛。及乾嘔頭痛。食不下。用雞子一枚。開一竅。去黃。留白。着米泔。燂火。燉沸。取下。更燉。如此三次。乘熱飲之。不過一二度。即愈。（普濟方）

●治面生皰瘡。雞子以三歲苦

酒浸之。三宿。待軟。取白塗之。（肘後方）

●治湯火燒灼。雞子清和酒調洗。動洗。即易生肌。忌發物。或生傳之亦可。（經驗秘方）

●治頭髮垢。雞子白塗之。少頃洗去。光澤不燥。（瀕湖方）

●面黑令白。雞子三枚。酒浸。密封。四七日。每夜以白傅面。如雪白也。（普濟方）

●塗面駐顏。雞子一枚。開孔。去黃。留白。入金華細粉及砂少許。紙封。與雞抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。（普濟方）

用燈 一枚至二枚。

施用宜忌 凡無風熱鬱火者禁用。

參攷資料 ●產後血暈。身暈直口。目向上牽。急不知人。取雞子一枚。去殼分清。以荊芥末二錢調服。即安。甚敏捷。烏雞子尤善。（寇宗奭） ●雞蛋清又名蛋精。西名阿布門。化名炭輕淡養礦。此質不但卵屬有之。精血乳內亦含之。且舉凡動物植物汁內皆有。香中所

云蛋清類者。即此。醫家所云此質血內所含者。為血精。乳內所含者。為乳精。蛋內所含者。為蛋精。動物所含者。為動物精。植物所含者。為植物精。功用詳萬國藥方卷五。一百零三篇（陳仁山）

【雞子芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳芋子條。

【雞子黃】原名 卵黃。雞卵黃中之黃。故名。

產地 各地咸有出。

形態 卵黃形圓如球。色黃質厚。煮熟則體尤膩重。

性質 甘溫無毒。

成分 雞卵之黃部。自五十四分之水。七十一分之蛋白質。二十九分之含酸脂肪。及刺蘇亞斯新鹽。磷酸鹽。酸化等而成。

效能 清熱補陰。用作解熱解毒藥。

一八二九

陰血。解熱毒。治下痢其驗。【清】黃元御長沙藥解論雞子黃曰。雞子黃味甘微溫。入足太陰脾。足陽明胃經。補脾精而益胃液。止瀉利而斷嘔吐。傷寒黃連阿膠湯。用之治少陰病。心中煩。不得臥者。以其補脾而潤燥也。金匱百合雞子湯。用之治百合病吐之後者。以其滋胃而降逆也。并膿散。用之以其補中。驗而生血肉也。

配合選用 ①治赤白下痢。雞卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。(葛氏方)
②治妊娠下痢絞痛。用烏雞子一枚。開孔。去白留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹定。泥固煨乾。為末。每服三錢。米飲下。一服愈。者是男。兩服愈。者是女。(三因方)
③治子死腹中。雞子黃一枚。薑汁一合。和服當下。
④治小腸疝氣。雞子黃。溫水服之。三服效。
⑤治小兒癩疾。乳子黃和乳汁攪服。不過三兩枚。自定。(普濟方)
⑥治小兒頭瘡。黃熟雞子黃。炒令油出。以麻油膩粉搽之。(事林廣記方)

廣記方)

①治風痲已潰。雞卵一枚。米下。蒸半日。取黃熬令黑。先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。(千金方)
②治脚上臭瘡。熟雞子黃一個。黃蠟一錢。煎油塗之。
③治湯火傷瘡。熟雞子一個。取黃炒取油。入膩粉十文。攪勻。掃上。三五日。永除瘡痕。(集驗方)
④治杖瘡已破。雞子黃熬油。搽之。甚效。亦治天泡水瘡。(唐瑤經驗方)
⑤治消滅癩痕。雞子五七枚。煮熟。取黃炒黑。拭塗。日三。久久自滅。(聖惠方)
⑥治妊娠胎漏。血下不止。血盡則子死。用雞子黃十四枚。以好酒二升。煮如餒服之。未連再作。以瘥為度。(普濟方)
⑦治耳疳出汁。雞子黃炒油塗之。甚妙。(談藝翁方)
用量 一枚至二枚。
施用宜忌 凡脾胃有滯滯者禁用。
參攷資料 ①雞子黃氣味俱厚。陰中之陰。故能補形。昔人謂其

與阿膠同功。正此意也。其治嘔逆諸瘡。則取其除熱引蟲而已。(李時珍) ②雞子入藥最多。而髮煎方特奇。劉禹錫傳信方云。亂髮雞子膏。治孩子熱瘡。用雞子五枚。煮熟去白。取黃。亂髮如雞子大。相和於鐵鉢中。炭火熬之。初甚乾。少頃即變焦。乃有液出。旋取置碗中。以液盡為度。取塗瘡上。即以苦參末粉之。頃在武陵生子。瘡內。便有熱瘡。塗諸藥無益。而日益劇。延牛身。晝夜號啼。不乳不睡。因問本草。髮髮條云。合雞子黃煎之。消為水。瘡小兒驚熱下痢。註云。俗中。媪母為小兒作雞子煎。用髮雜熬之。良久得汁。與小兒服。去痰熱。主有病。又雞子條云。瘡火瘡。因是用之。果如神效也。(蘇頌)

【雞內金】 原名 脫胚裏黃皮。 命名 脫胚音脾。 雞脫皮也。近俗諺之。脫內黃皮。為雞內金者。以其色黃。質韌如金。故名。
處方用名 雞脫皮。炙內金。
古籍別名 雞脫胚(綱目)
外國名詞 Inguvin(拉丁)

Gizzard Popain(英)

基本 為雞脾中之黃皮。
產地 各地均有出。
形態 雞內金色黃質韌而有皺紋。乾則堅硬。火焙之。其體胖發。且有臭穢之氣。
性質 甘平無毒。
效能 消水穀。治瀉痢。理脾胃。療腫脹。與胃酸相同。用作消化健胃藥。
主治 瀉痢。小便頻遺。除熱止煩。
歷代配賦攷驗 【宋】日華諸家本草論雞內金曰。止泄精。並尿血。崩中帶下。腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論雞內金曰。治小兒食積。瘵大人淋漓。反胃。消酒積。主喉閉乳蛾。一切口瘡及牙疳諸瘡。【明】繆希雍本草經疏論雞內金曰。脫胚即脫內黃皮。一名雞內金是也。隨是雞之脾。乃消化水穀之所。其氣通達。大腸膀胱二經。有熱則洩痢遺溺。得寒之氣。則熱除。而洩痢遺溺自愈矣。煩因熱而生。熱去故煩自止也。今世又以之治諸疳積多效。

配合應用 ①治小便遺失。用雞髓一具。并腸。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。(集驗方)

②治小便淋瀝。痛不可忍。雞髓內黃皮五錢。陰乾。燒存性。作一服。白湯下立愈。(醫林集要方)

③治隔消飲水。雞內金洗曬乾。枯椶根炒五兩。爲末。糊丸。梧桐子大。每服三十九丸。溫水下。日三。(聖濟總錄方)

④治反胃吐食。雞髓一具。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。(千金方)

⑤治消導酒積。雞髓、乾葛爲末。等分。麴丸。梧子大。每服五十丸。酒下。(袖珍方)

⑥治噤口痢疾。雞內金焙研。乳汁服之。

⑦治小兒瘡疾。用雞髓、黃皮燒存性。乳服。男用雌。女用雄。(千金方)

⑧治喉閉乳蛾。雞髓黃皮勿洗。陰乾。燒末。用竹管吹之。即破而愈。(青囊方)

⑨治一切口瘡。雞內金燒灰。傅之立效。(活効新書方)

⑩治鵝口白瘡。雞髓黃皮爲末。乳服半錢。(子母秘錄方)

⑪治走馬牙疳。經驗用雞髓黃皮。不落水者五枚。枯礬五錢。研搽立愈。心經用雞髓黃皮。燈上燒存性。入枯礬、黃柏末等分。磨香少許。先以米泔洗漱後貼之。

⑫治陰頭疳蝕。雞內金不落水。拭淨。新瓦焙脆。出火毒爲細末。先以米泔水洗瘡。乃搽之。亦治口疳。(經驗方)

⑬治殺道生瘡。久不愈。用雞髓。經燒存性爲末。乾貼之。如神。(聖濟總錄方)

⑭治脚腫生瘡。雄雞髓內皮洗淨。貼之一日。一易。十日愈。(小山奇方)

⑮治瘡口不合。雞髓皮日貼之。

⑯治發背初起。用雞髓黃皮。不落水者陰乾。臨時溫水潤開。貼之。隨乾隨潤。不過三五個。即消。(楊氏經驗方)

⑰治發背已潰。用雞髓黃皮同綿絮焙末。搽之。

⑱治金願瘡蝕。初生如米豆。久

則穿蝕。用雞內金焙研。金等分爲末。鹽漿漬了貼之。忌米食。(聖濟總錄方)

⑲治小兒疔目。雞髓黃皮擦之。自落。(集要方)

⑳治雞骨硬咽。活雞一隻打死。取出雞內金洗淨。燈草裹於火上。燒存性。竹筒吹入咽內。即消。不可見肉。(攝生方)

㉑用蠶 錢半至三錢。施用宜忌 凡脾胃無積者禁

用。

【雞公柴】 產地 江西山中皆有之。
形態 叢生。莖葉大。根深褐色。葉似鳳仙花葉。而寬。葉邊有鋸齒形。對生。梢結紅實。如天竹子而大。其根可供藥用。



雞公柴

主治 和酒煎服。治白濁。

【雞心】 別名 大煎。(和漢藥考)

主治 辟五邪。

【雞心核】 卽檳榔之處方用名。詳「檳榔」條。

【雞心核核】 卽大腹子之古籍別名。與見本草綱目。詳「大腹子」條。

【雞爪三稜】 卽三稜之古籍別名。與見開寶本草。詳「三稜」條。

【雞爪花】 卽雞脚草之古籍別名。與見汪遠仕探藥書。詳「雞脚草」條。

【雞爪蘭花】 卽珠蘭之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「珠蘭」條。

【雞汁】 卽雞之處方用名。詳「雞」條。卽雞露之原名。詳「雞露」條。

【雞汁粥】 基本 本品係以雞內汁和米煮成之粥。

【雞矢】 卽雞屎白之古籍別名。與見素問。詳「雞屎白」條。

【雞肉】 卽雞之處方用名。詳「雞」條。

【雞肋骨】 主治 小兒羸瘦。食不生肌。

【雞舌香】 命名 本品即丁香之雄者。質堅。破有順理。解而為兩。形如雞舌。故名。

性質 辛微溫。無毒。
主治 風水毒腫。齒亂心痛。去惡熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論雞舌香曰。吹鼻殺腦疳。入諸香中。令人身香。【唐】陳藏器本草拾遺論雞舌香曰。同薑汁塗。拔去白蟻。孔中即生黑者。

【雞舌香】 卽丁香之古籍別名。與見別錄。詳「丁香」條。

【雞血】 性質 鹹平。無毒。
主治 痿折骨痛及痿痺。中惡腹痛。乳難。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論雞血曰。治割馬被傷。及馬咬人。以熱血浸之。白癩風。癩瘡風。以雄雞翅下血塗之。【明】李時珍本草綱目論雞血曰。熱血服之主小兒下血及驚風。解丹毒。蠱毒。鬼排陰毒。安神定志。

【雞血藤】 命名 本品藤汁紅如雞血。故名。
產地 出自雲南順寧境。地。蔓

生山巖間。

形態 雞血藤為藤屬之一種。其莖編互。長達數十里。粗如椽。細如蘆。中空如竹。剖斷流汁。汁色赤如血。皮質細潔。而色淡黃。切開中起六角稜。紅色如菊花狀。四圍白色。乾之紅處輒突出二三分許。亦有中心作小紅點。乾之而不突起者。其藤可供藥用。膠詳見該條。

主治 補血。行血。通經。活絡。暖腰膝。已風濕。健筋骨。除痿痛。功遜於膠。

【雞血藤膠】 基本 本品係用雞血藤汁熬成之膠。

形態 雞血藤膠。於端午日搗芥入山。研藤取汁。一莖可得汁數升。熬膠。色如猩紅。成塊。儼如赤玉。光潤可愛。以供藥用。

採取 以少許入沸水中。有一線如鷄血走散者為真。入藥良。
主治 大補氣血。壯健筋骨。療手足麻木。癱瘓。男子遺精白濁。婦女經水不調。赤白帶下。乾血勞症。並男女不能生育。及跌打損傷。心

胃氣痛。痿痺。痠痛。虛損百病。

參攷資料 ①雞血藤膠。大補氣血。與老人婦女。更為得益。或不飲酒者。早晚用開水化服。亦能奏效。【雲南志】②按順寧刊傳藥單云。順寧府順寧縣阿度吾山產此。又云阿度吾里萬名山寺。龍潭所產。載於郡志有二種。其一種。樹而生。伐之中通細竅。汁凝如脂。黃之有香者。真。然云兩種。糯者為雌。故者為雄。【趙學敏】③雞血藤膠。治風濕。性活血舒筋。患在上部。飽食後。服在下部。空心酒服。不飲酒者。滾水調服。其色帶微綠。有清香氣。酒服亦能與陽。尤明府（佩蓮）云。此膠治跌打如神。其太夫人一日。偶因跌傷。臂痛不可忍。用山羊血。參三七治之。多不驗。有客教服此膠沖酒。一服。其疾如失。其性捷走血分可知。【滇志】④順寧土人加藥料煎熬雞血膏。統治百病。能生血。和血。補血。破血。又能通七孔。走五臟。宣筋絡。治婦人經水不調。四物湯。加減八珍湯。加元胡索為引。婦女勞傷氣血。筋骨酸

痛。轉筋。牛膝。杜仲。沉香。桂枝。佛手。乾木瓜。穿山甲。五加皮。沙仁。茴香。為引。大腸下血。椿根皮煎湯送下。男子虛弱。八味加減為引。服此膠。忌食酸冷。【趙學敏】

【雞卵殼皮】 命名 本品卽白皮。故名。
古醫別名 鳳凰衣。（俗名）
主治 久嗽氣結。得麻黃紫苑服。立效。

參攷資料 按仙傳外科云。有人偶舍刀在口。割舌已垂未斷。一人用鷄子白皮袋之。搽止血藥於舌根。血止。以蠟化蜜調沖和膏敷鷄子皮上。三日接住。乃去皮。只用蜜蠟敷數七日。全安。若無速效。以金鎖藥搽治之。此用鷄子白皮。無他。但取其柔。輒而薄。護舌而透藥也。【李時珍】

【雞尾毛】 主治 小便不禁。雄雞翎燒研酒服。
歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞尾毛曰。治刺入肉中。

和男子乳封當出【明】李時珍本草綱目論鷄尾毛曰解蜀椒毒燒煙吸之并水調灰服又治小兒痘瘡後生癩燒灰和水傅之

【雞杓子】即枳椇子之古籍別名與見和漢藥考詳「枳椇子」條

【雞肝】 性質 甘苦溫無毒 主治 起陰

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞肝曰補腎治心腹痛安瀾胎下血以一具切和酒五合服之【明】李時珍本草綱目論雞肝曰療風虛目暗治女人陰蝕瘡切片納入引蟲出盡良

【雞肝草】即兔肝草之古籍別名與見綱目拾遺詳「兔肝草」條

【雞肝粥】 基本 本品係以雞肝和米煮成之粥 主治 補肝虛明目

【雞豆】即茨實之古籍別名與見和漢藥考詳「茨實」條

【雞足】即茨實之古籍別名與見和漢藥考詳「茨實」條

【雞足草】即井口邊草之日本別名詳「井口邊草」條

【雞味兒】即茨實之古籍別名與見和漢藥考詳「茨實」條

【雞抱出卵殼】 命名 本品乃雞離脫脫之卵殼故名 古籍別名 混沌池鳳凰說（綱目）

主治 研末磨障翳

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論雞抱出卵殼曰傷寒勞復熱令黃黑爲末熱湯和一合服取汁出即愈【明】李時珍本草綱目論雞抱出卵殼曰燒灰油調塗瘡及小兒頭身諸瘡酒服二錢治反胃

【雞首草】即遍地金之古籍別名與見綱目拾遺詳「遍地金」條

【雞肪】 性質 甘寒無毒 主治 耳聾

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞肪曰治頭禿髮落

十八畫 雞

種。二月生苗其形如艾可供藥用。性質 辛溫無毒 主治 溫中益氣

【雞冠】即雞冠花之原名詳「雞冠花」條

【雞冠石】即雄黃之古籍別名與見和漢藥考詳「雄黃」條

【雞冠血】 處方用名 雄雞冠中之血液 基本 屬鷄類爲雄鷄頭冠採取 採無時以三年雄雞之冠血尤良外塗或內飲用 性質 鹹平無毒 效能 治中惡驚癇塗諸瘡蟲毒用作解毒藥 主治 烏鷄者主乳雞

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞冠血曰治目淚不止每日點三次良【宋】日華諸家本草論雞冠血曰丹雞者治白癩風

【明】李時珍本草綱目論雞冠血曰亦點暴赤目並療經絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒死飲之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤塗諸疥癬蜈蚣蜘蛛毒馬嚼

【配合應用】 治鬼擊卒死烏雞冠血澀口中令噤仍破此雞搗心下冷乃棄之道邊妙（肘後方）

治卒死癡死或癡臥奄忽而絕皆是中惡用雄雞冠血塗面上乾則再上仍吹入鼻中并以灰燻死人一周（肘後方）

治卒然忤死不能言用雞冠血和真珠丸小豆大納三四丸入

【雞侯菜】 命名 本品宜與雞羹食之故名 產地 生嶺南諸地 形態 雞侯菜爲雞草類之一

口中效。(肘後方)

⑤ 治卒絞垂死。心口猶溫者。勿斷。刺雞冠血滴口中。以安心神。或云男用雌。女用雄。(肘後方)

⑥ 治小兒卒驚。似有痛處。不知疾狀。用雄雞冠血少許。滴口中妙。(譚氏小兒方)

⑦ 治小兒解顛。丹雄雞冠上血滴之。以赤芍藥末粉之。甚良。(普濟方)

⑧ 治陰毒卒痛。用雄雞冠血入熱酒中飲之。暖臥取汗。(傷寒雜要方)

⑨ 治女人陰血。女人交接遠理。血出。用雄雞冠血塗之。(集驗方)

⑩ 治爛弦風眼。雞冠血點之。日三五度。(聖惠方)

⑪ 治對口毒瘡。熱雞血類塗之。取散。(普效方)

⑫ 治發背癰疽。用雄雞冠血滴疽上。血盡再換。不過五六雞。痛止毒散。數日自愈。(保壽堂方)

⑬ 治浸淫瘡毒。不早治。周身殺人。以雞冠血塗之。日四五度。(肘後方)

⑭ 治燥毒作疔。雄雞冠血類類

塗之。(汪范方)

⑮ 治馬咬成瘡。腫痛。可用雞冠血塗之。駁馬用雄雞。牝馬用雌雞。(肘後方)

⑯ 治蜈蚣咬瘡。雞冠血塗之。亦治蜘蛛咬瘡。(錢相公篋中方)

⑰ 治中蜈蚣毒。舌腹出口是也。雄雞冠血浸舌并咽之。(青囊雜纂方)

⑱ 治諸蟲入耳。雞冠血滴入即出。(勝金方)

⑲ 用量 一點至數點。
施用宜忌 凡無實邪者禁用。

【雞冠花】 命名 本品花狀如雞冠。故名。
外國名詞 Celosia cristata, 丁(拉丁)

基本 屬苋科。為雞冠之花與種子。
產地 雞冠花各處皆有。陳仁山藥物生產辨云。雞冠花分紅黃白各色。論雞冠花兩字。本成一球。乃為雞冠。以市上所賣插瓶之雞冠花為正。現藥肆所沽之雞冠花乃單尾直上。不成球體。焉得謂之雞冠花。查確此種係門青花。各處

海灘野生。無限之多。既錯於前。勿錯於後。
形態 雞冠為一年生草本。莖高達二三尺。葉互生。作長卵圓形。或廣披針形。花朵頗小。秋日開於梢頭。色有紅、白、黃三種。聚生為雞冠花序。種子色黑。粒甚微細。



雞冠花

種植 園圃間恒有栽植。以供玩賞者。

採取 七八月間採花曬乾。

製法 凡使花焙炙。子微炒用。

性質 甘涼無毒。

效能 治痔。止痢。用為痔疾及下痢藥。

主治 痔漏下血赤白。下痢崩中。赤白帶下。分赤白用。

歷代記載 隋 蘇頌 〔清〕黃元御 玉楸藥解論雞冠花曰。雞冠止九竅失血吐血崩漏淋瀝。諸血皆止。並治帶淋之證。花與子同功。

配合應用 治吐血不止。白

雞冠花。醋浸。煮七次為末。每服二錢。熱酒下。(經驗方)

① 治結陰便血。雞冠花。梓根白皮。等分為末。煉蜜為丸。梧子大。每服三十九。黃芪湯下。日二服。(聖濟總錄方)

② 治發後下血。白雞冠花并子。炒煎服。(聖惠方)

③ 治五痔紅腫。久不愈。變成瘡。用雞冠花。風眼草。各一兩。水二盞。煎湯頓洗。(衛生寶鑑方)

④ 治下血脫肛。白雞冠花。防風。等分為末。糊丸。梧子大。空心米飲。每服七十丸。一方白雞冠花炒。樓桐灰。羌活一兩為末。每服二錢。米飲下。(永類金方)

⑤ 治經水不止。紅雞冠花一味。乾曬為末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥豬肉。

⑥ 治產後血痛。白雞冠花酒煎服之。(李樓奇方)

⑦ 治婦人白帶。白雞冠花曬乾為末。每日空心酒服三錢。赤帶用紅者。(孫氏集效方)

⑧ 治白帶沙淋。用白雞冠花。苦葶藶。等分燒存性。空心火酒服之。

⑨ 治白帶沙淋。用白雞冠花。苦葶藶。等分燒存性。空心火酒服之。

〔摘玄方〕

赤用紅。白用白。〔集簡方〕

用薑 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非虛症而有積滯者禁用。

參攷資料 雞冠處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。矮者幾數寸。其葉青柔。頗似白莧菜。而窄稍有赤脈。其莖赤色。或圓或扁。有筋起。六七月梢間開花。有紅白三色。其穗圓長而尖者。儼如青稻子。穗扁卷而平者。儼如雄雞之冠。花大有圍一二寸者。層層卷出可愛。子在穗中。黑細光滑。與莧實一樣。其穗如秕麥狀。花最耐久。霜後始焦。〔李時珍〕

【雞冠花子】

性質 甘。涼。無毒。

主治 止腸風瀉血。赤白痢。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論雞冠花子曰。炒用治崩中帶下。

【雞冠花苗】

性質 甘。涼。無毒。

主治 疳疔及血痢。

【雞冠花子】即青稻子之古籍別名。典見綱目。詳「青稻子」條。

【雞屎白】

命名 本品即雞之屎。雄者色白。

古籍別名 雞矢。〔素問〕

基本 屬鴉鴉類。為雄雞排泄

之屎白。

採取 臘月收之。尤取白鷄鳥

骨者良。

製法 普濟方云。凡使雞矢。性

寒利小便。治臟脹。誠千金不傳之

寶也。用臘月乾雞矢白半斤。袋盛

以酒醱一斗。漬七日。溫服三盃。日

三。或為末服二錢亦可。

性質 微寒。無毒。

效能 利二便。消臟脹。用作利

尿藥。

主治 消渴。傷寒寒熱。破石淋

及轉筋。利小便。阻遺尿。滅癩痕。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論雞屎白曰。治賊風風

痺。破血。和黑豆炒酒浸服。亦治蟲

咬毒。〔宋〕日華諸家本草論雞屎

白曰。治中風失音。痰迷。炒服治小

兒客忤。蠱毒。兼治白虎風。貼風痛。

【明】李時珍本草綱目論雞屎白

曰。下氣。通利大小便。治心腹脹

消痰。癩。癩。破傷中風。小兒驚啼。以

水淋汁服。解金銀毒。以醋和塗蜈

蚣。蚯蚓咬毒。〔明〕繆希雍本草經

疏論雞屎白曰。雞屎白微寒。乃腸

胃所出之物。故復能走腸胃。治病

素問云。心腹滿。且食不能。善食。名

為臟脹。治之以雞矢。隨一劑。知二

劑已。王太僕註云。本草雞矢。並不

治蟲脹。但能利小便。蓋蟲脹皆生

於溼熱。溼熱脹滿。則小便不利。雞

屎能通利下泄。則溼熱從小便而

出。臟脹自愈。故曰治溼不利小便。

非其治也。本經主石淋。利小便。止

遺溺者。正此意耳。轉筋者。血熱也。

傷寒寒熱及消渴者。熱在陽明也。

癩癩者。血熱壅滯肌肉也。寒能總

除諸熱。故主之也。日華子炒服治

中風失音。痰迷。陳藏器和黑豆炒

酒浸服。治賊風風痺。蓋風為陽邪。

因熱而生。雞屎寒能除熱。雞本與

風木之氣相通。取其性本從類之

義也。〔清〕黃宮繡本草求真論雞

屎白曰。雞屎白性寒不溫。用之以

治臟脹。石淋。癩癩。風痺。亦以取其

消導利溼。清熱除風之義。

配合應用 治臟脹。且食不

能善食。由脾虛不能制水。水反勝

土。水穀不運。氣不宜流。故令中滿。

其賦則沉實而滑。宜雞矢。隨主之

〔普濟方〕諸腹脹大背屬於熱。精

氣不得滲入膀胱。別走於膀胱。於

皮裏膜外。故成脹滿。小便短澀。雞

矢性寒。利小便。試萬金不傳之寶

也。用臘月乾雞矢白半斤。袋盛。以

酒醱一斗。漬七日。溫服三盃。日三

或為末服二錢亦可。〔何大英〕又

用雞矢。桃仁。大黃各一錢。水煎服。

〔宣明方〕用雞矢炒研。沸湯淋汁。

調木香。檳榔末二錢服。〔正傳方〕

一方用雞矢。川芎。蜀等分。為末。酒

糊丸服。

●牽牛酒。治一切肚腹。四肢腫

脹。不拘臟脹。氣脹。溼脹。水脹。等。有

蛾眉一併。用此治人得效。其人牽

牛來。齒。故名。用乾雞矢一升。炒黃

以酒醱三椀。煮一椀。濾汁飲之。少

頃。腹中氣大轉動。利下。即自脚下

皮破消也。未盡。隔日再作。仍以川

蘆二枚。滾酒。食後。用白粥調理。

〔積善堂經驗方〕

●治小兒腹脹黃瘦。用乾雞矢

十八畫 雞

一兩。丁香一錢。為末。蒸餅丸。小豆大。每米湯下十丸。日三服。(活幼全書方)

②治心腹驚悸。及宿癥。并卒得癥。以飯飼白雞。取糞。同小便於瓦器中。熬黃為末。每服方寸匕。溫酒服之。日四五服。或雜飯飼之。以消為度。亦佳。(集驗方)

③治食米成癥。好食生米。口中出清水。以雞矢同白米各半。合炒為末。以水一鍾調服之。良久。吐出如米形。即瘥。昔慎菴道病。此飢復如勞。蜀僧道廣。處此方而愈。(醫說方)

④治反胃吐食。以烏骨雞一隻。與水飲四五日。勿與食。將五蒲蛇二條。竹刀切。與食。待雞下糞。取陰乾為末。水丸。米粟大。每服一分。桃仁湯下。五七服。即愈。(證治發明方)

⑤治中諸菜毒。發狂吐下欲死。用雞矢燒末。水服方寸匕。(葛氏方)

⑥治石淋疼痛。雞矢白。日中半乾。炒香為末。以酸漿飲服方寸匕。日二。當下石出。(古今錢方)

⑦治小兒血淋。雞矢尖白如粉者。炒研糊丸。菴豆大。每服三五丸。酒下四五服。效。

⑧治產後遺溺不禁。雞矢燒灰。酒服方寸匕。(產寶方)

⑨治轉筋入腹。其人臂脚直。其脈上下行。微弦。用雞矢為末。水六合。和方寸匕。溫服。(仲景方)

⑩治中風寒痺。口噤不知人。以雞矢白一升。炒黃。入酒三升。攪澄清飲。(葛氏方)

⑪治白虎風痛。鋪飯於患處。以丹雄雞食之。良久。取熱糞封之。取訖。使伏於患人牀下。(孟詵方)

⑫治破傷中風。腰脊反張。牙緊口噤。四肢強直。用雞矢白一升。大豆五升。炒黃。以酒沃之。微烹。令豆澄下。隨量飲。取汗避風。(經驗方)

⑬治產後中風。口噤。瘧癎。角弓反張。黑豆二升。同雞矢白一升。炒熟。入清酒一升。半。浸取一升。入竹瀝服。取汗。(產寶方)

⑭治角弓反張。四肢不隨。煩亂欲死。雞矢白一升。清酒五升。搗篩合。搗干。通。乃飲。大人服一升。少小五合。日二服。(肘後方)

⑮治小兒口。噤。而赤者。屬心。白者。屬肺。用雞矢白如棗大。綿裹。以水一合。煮。分二服。一方酒研服之。(千金方)

⑯治小兒驚悸。雞矢白研末。傅之。有涎。易去。(聖惠方)

⑰治小兒驚啼。雞矢白燒灰。米飲服二字。(千金方)

⑱治頭風痺木。用臘月烏雞矢一升。炒黃。為末。絹袋盛。漬三升酒中。類類溫服。令醉。(千金方)

⑲治喉痺腫痛。雞矢白含之。曬汁。(聖惠方)

⑳治牙齒疼痛。雞矢白燒末。搗。咬痛處。立瘥。(經驗方)

㉑治鼻血不止。雞矢取有白色半截者。燒灰吹之。(唐氏經驗方)

㉒治牙齒不生。不拘大人小兒。用雄雞矢。雌雞矢十五顆。焙研。入麝香少許。先以針挑破。出血。傅之。年高者。不過二十日。年少者。十日必生。(普濟方)但用烏雞雌雄糞。入舊麻鞋底。燒存性。等分。入麝香少許。三日。夜不住。擦令熱。為佳。

㉓治耳聾不聽。雞矢白炒半斤。烏豆炒一升。以無灰酒二升。乘熱

一八三六

投入。服。取汗。耳如鼓。擊。勿許。(外臺秘要方)

⑳治面目黃疸。雞矢白。小豆。米各二分。為末。分作三服。水下。當有黃汁出也。(肘後方)

㉑治子死腹中。雌雞糞二十一枚。水二升。五合。煮之。下來作粥食。(產寶方)

㉒治乳妬乳癰。雞矢白炒研。酒服方寸匕。三服。愈。亦治乳頭破裂。(產寶方)

㉓治內癰未成。取伏雞屎。水和服。即瘥。(千金方)

㉔治頭瘡白禿。雄雞屎末。和陳弊苦酒洗之。(千金方)

㉕消滅癩瘡。以豬脂三升。飼烏雞一隻。三日。後取矢。同白芷。當歸各一兩。煎十沸。去滓。入麝香。白中兩調。傅。(外臺秘要方)

㉖治耳中惡瘡。雞矢白炒研。傅之。(聖惠方)

㉗治瘰癧。瘻瘡。雄雞燒灰。矢。臘豬脂和。傅之。(千金方)

㉘治食金中毒未死。取雞矢半升。水淋取汁。一升。飲之。日三。(肘後方)

㉙治耳中惡瘡。雞矢白炒研。傅之。(聖惠方)

㉚治瘰癧。瘻瘡。雄雞燒灰。矢。臘豬脂和。傅之。(千金方)

㉛治食金中毒未死。取雞矢半升。水淋取汁。一升。飲之。日三。(肘後方)

①治瘰癧死未乾。雞矢白如灰。犬酒半盞和灌口鼻(肘後方)

②治尸腳拆裂。無冬夏者。雞屎煮湯。漬半日。取瘰乃止。(千金方)

③治射工溪毒。白雞矢白者二枚。以鶴和塗瘡上(肘後方)

④治骨疽不合。骨從孔中出。掘地作坑。口小。裏大。深三尺許。以乾雞屎二升。同艾及荊葉搗碎。入坑內。燒令烟出。以疽口就熏。用衣擁之。勿令洩氣。半日。當有蟲出。甚效。(千金方)

⑤治陰毒腹痛。雞糞。烏豆。地膚子。各一把。亂髮一團。同炒烟起。傾入好酒一椀。浸之。去滓熱服。即止。(生生編方)

⑥治小兒心痛。白鳥骨雞屎五錢。膠研。松脂五錢。爲末。葱頭汁和丸。梧子大。黃丹爲衣。每醋湯服五丸。忌生冷硬物。三四日立效。(嬰童百問方)

用蠶 錢半至三錢。
【雞屎草】即常山之古籍別名。典見諸家本草。詳「常山」條。
【雞屎礬】即礬石之有雜色如雞屎者。性質功效與礬石同。詳「礬石」條。

石」條。
【雞栖子】即皂莢之古籍別名。典見綱目。詳「皂莢」條。
【雞格】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。
【雞桐】產地 生嶺南山野間。形態 雞桐爲桐之一種。其葉如棟。可供藥用。
主治 足膝風溼痺痛。煮湯洗漂。

【雞神水】製法 擇大蘿藦一頭。開勿傷其根。方可活。孔內入雞蛋一枚。仍種地上。俟其發葉。取雞蛋內水。即雞神水。
性質 甘涼。
主治 明目去翳。

【雞桑】即桑之花葉俱薄者。性質功效與尋常桑葉同。詳「葉桑」條。
【雞翁藤】形態 雞翁藤爲蔓草類之一種。蔓延木上。有葉無花。其莖根可供藥用。
性質 辛溫。無毒。
主治 功同崖椒根。

【雞翅木子】即相思子之別名。詳「相思子」條。

【雞骨升麻】即升麻之皮細色青綠者。詳「升麻」條。
【雞骨香】即降真香之古籍別名。典見綱目。詳「降真香」條。
【雞蛋】外國名詞 Ovary cellinase. (拉丁)
基本 屬鵝鶩類。爲雌鵝所產之卵子。
產地 各地咸有出焉。
形態 卵之形狀。人所共知。卵殼之內。被以白膜。中存卵黃與卵白。卵黃俗呼雞子黃。卵白俗呼雞子白。卵殼色白。或作淡褐黃色。有無數細孔。孵化之際。由此流通空氣。若有微菌自此細孔侵入。即令全卵腐敗。卵殼內有一層白色強韌之膜。謂卵殼膜。卵自成自蛋白質。內部較外部易於流動。別有薄膜包之。謂之卵白膜。卵黃係白色。卵黃與黃色卵黃二種。重疊間層而成。因卵黃膜而爲球形。胚盤在卵黃中。爲原形質與核。孵化之際。核自分裂。漸化爲雛。以卵黃與卵白爲其養料。氣室在卵之鈍端。介

於卵殼與卵白膜之間。爲貯藏空氣之處。產卵後經時過久。其氣室愈增大。
製法 凡採得須密藏。以防壞變。入藥破殼去衣用。
性質 甘平。無毒。

成分 各種雞卵之成分。頗不一定。然大致相同。卵殼約含炭酸鈣九〇%。磷酸鈣五七%。膠質少許。卵白約含蛋白質一二至一四%。水分若干。卵黃約含卵黃素一五。七%。無磷之蛋白質及脂肪。鹽類各少許。青木清一曾取雞卵十六種。鴨卵兩種。各試驗其成分。檢定之結果。刻於藥學雜誌第二百二十號。茲摘錄如下。(各數字係指各卵之五量而言)甲種成分計水分三九。九二。蛋白質六。九三。脂肪五。〇五。灰分〇。四五。全卵共約五三。六五。乙種計水分三四。一七。蛋白質六。〇八。脂肪六。〇八。灰分〇。三五。全卵共約四七。六〇。丙種計水分三三。一七。蛋白質五。一八。脂肪四。三八。灰分〇。四四。全卵成分四四。一〇。丁種計水

一八三七

十八畫 雞

分二五·七六。蛋白質四·六四。脂肪四·八五。灰分〇三·二。全卵共約三六·一〇。戊種計水分一三·一五。蛋白質二·三五。脂肪三·一一。灰分〇·一六。全卵共約一九·三〇。

效能 鎮心定驚。潤肺寧嗽。用作滋養強壯藥。

主治 除熱火灼。爛瘡癩瘡。可作虎魄神物。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞子曰。小兒發熱。以白蠶一合。和三顆。攪服立瘥。【唐】陳藏器本草拾遺論雞子曰。益氣。以濁水煮一枚。連水服之。主產後痢。和蠶煎。止小兒痢。【宋】日華諸家本草論雞子曰。鎮心安五臟。止驚安胎。治妊娠天行熱疾。狂走。男子陰囊溼痒。及閉喉聲失音。醋煮食之。治赤白久痢。及產後虛痢。光粉同炒乾。止疳痢。及婦人陰疝。和豆淋酒服。治賊風麻痺。醋浸令爛。傳斑野。作酒止產後血暈。暖水臟縮。小便。止耳鳴。和蠶炒治耳鳴。及肝府。【明】經希雍本草經疏論雞子曰。雞子其生化最初之氣。如混

沌未分之形。故卵白象天。其氣清。其性微寒。卵黃象地。其氣濁。其性微溫。卵則象清濁而為體。其味甘。氣平無毒。丹癩瘡皆火熱為病。雞子之甘。能緩火之標。平即兼涼。能除熱。故主癩瘡。及火瘡。并治傷寒少陰咽痛神效。【清】黃宮繡本草求真論雞子曰。雞子性稟生化最。初之氣。兼清濁而為體。味甘氣寒。性專除熱。療火。為風熱癩瘡。及傷寒少陰咽痛必用之藥。卵清微寒。性專治熱解毒。為目痛赤痛。煩滿咳逆。小兒下洩。婦人難產。胞衣不出。難近敷腫必用之藥。卵黃微溫。性專利產安胎。但多食則滯。【清】

王士雄隨息居飲食譜論雞子曰。雞卵甘平。補血安胎。鎮心清熱。開音。止渴。濡燥。除煩。解毒。息風。潤下。止逆。新下者良。並宜打散。以白湯或米飲。或豆腐漿攪熟服。若因困。或食。性極難熱。雞可果腹。甚不易消。惟帶殼略煮之後。將殼擊碎。再入瓷罐內。多加粗茶葉同煨三日。茶汁既入。蛋亦熟透。剝殼食之。色黑而味香美。不甚阻滯也。多食動風阻氣。諸外感及癰疽疔瘡腫滿。肝鬱痰飲脚氣痘疹皆不可食。小兒產婦氣壯者幸食無恙。弱者多因此成疾。不可不知。

近人學說 丁福保曰。雞子為健康上有裨益之食物。然依母雞之種類與飼料及飼養法。常生種種之變化。則不免稍有差違。但雞子之有益於人身。而營養上效力甚多。為世人所確認。惟多食食之。則有妨消化。害胃部。誘起下痢。且其滋味縱豐。非牛生牛熟者。亦不能以有效。又曰。因自己之食用而飼養雌雞。使之產卵者。若待雌雞產二三月後而取出之。則不如產後即次第取出為宜。如斯取集之卵。雖久經日數。亦無腐敗之虞。蓋雌雞產卵之際。常有多量之熱度者也。又雞性善忤而多疑。產卵之際。疑怖益甚。往往倉皇奔走。選擇產所。故產卵時尤宜遠離其產所。使之絕無恐怖之念慮。否則致折角產卵而中止於中途。徐綸曰。雞蛋者。雞之卵也。故一名雞卵。在胎生學上屬於多黃卵子 (Dolicholepis Ei) 以其富有養卵黃 (Dolicholepis) 也。亦屬

於局在卵黃卵子 (Telocisthaleis Ei) 因其養卵黃偏在於一側也。雞卵分卵白與殼膜二種。被膜有三。在外者色淡紅而微帶黃色。質堅而脆。名曰卵殼 (Shell)。其百分之九十八。由石灰鹽類而成。細察之。見有無數之小孔。為交通內外。供給卵之呼吸而設。若以沙塗抹之。則卵之死亡。可立而待也。其次曰殼膜 (Chalazons) 為堅硬白色之膜。凡二層。常互相密結。惟在鈍端則分離。在外者曰殼膜外層。在內者曰殼膜內層。內外二層之間。蓄有空氣。為卵發育時呼吸之用。名曰氣室。內層最薄。曰蛋白。即俗所稱雞蛋清是也。由蛋白質、脂肪、鹽類與水而成。為無色透明。輾滑之流動體。中心之氣卵受其保護者也。卵于者。黃色柔軟之流動體。即俗所謂蛋黃是也。其兩端有紐狀之核。各一條。名曰殼帶 (Hillock) 亦名卵索 (Chalazons) 侵入於蛋白之內。以固定卵之位置。使不致旋轉傾覆也。卵子之上方有一核。名曰胚小胞 (Klein blöschon) 由Don-

toplasma 而成。猶人卵之胚小胞。乃雞之母細胞也。胚小胞之外為卵黃。名曰養卵黃 (Yolk)。由多數之卵黃小球而成。可以顯微鏡窺得之。取熟雞蛋切開。見養卵黃作黃色與淡黃色。層層相間而成。其淡黃色者。名曰白色卵黃 (White Yolk)。黃色者。曰黃色卵黃 (Yellow Yolk)。白色卵黃不甚凝固。黃色卵黃凝固甚堅。白色卵黃之在胚小胞之下者。形如電燈泡。深入卵于之中央。特名之曰隱宮 (Lashen)。隱宮與胚小胞之間。為狀略狹。名曰彭氏核 (Pander's cell Kern)。胚小胞即安置於其上。隱宮之周圍。有菲薄之膜。即由白色卵黃而成。其外即為黃色卵黃。黃色卵黃之外。再為白色卵黃。如此層層相間。而成養卵黃。當卵發育之時。以之為營養物者也。真卵與被膜之間。即蛋黃與蛋白之間。又有一皺裂膜。名曰卵黃膜。所以包圍真卵者也。

配合應用 ①治天行不解。已汗者。用新生雞子五枚。傾盞中入

十八畫 雞

水。一雞子攪渾。以水一升。煮沸。投入納少醬。噉之。令汗出愈。(許仁則方)

②治天行嘔逆。食入即吐。雞子一枚。水煮三五沸。冷水浸。少頃吞之。(外臺祕要方)

③治傷寒發狂。煩燥熱極。吞生雞子一枚。效。(食鑑方)

④治三十六黃急救方。用雞子一顆。速殺燒灰研。酢一合。和之。溫服。鼻中蟲出為效。身體極黃者。不過三枚神效。(外臺祕要方)

⑤治身面腫滿。雞子黃白相和塗腫處。乾再上。(肘後方)

⑥治年深哮喘。以雞子略敲損。浸尿缸中三四日。麥食能去風痰。(集成方)

⑦治心氣作痛。雞子一枚。打破。醋二合調服。(肘後方)

⑧治小兒疳積。肚脹。用雞子一箇。開孔入巴豆一粒。輕粉一錢。用紙五十重。裹於飯上。蒸三度。放冷去殼。研入麝香少許。糊和丸。米粒大。食後溫湯下二丸至三丸。(經驗方)

⑨治預解痘毒。用雞卵一枚。活

地龍一條。入卵內。飯上煮熟。去地龍與兒食。每歲立春日食一枚。終身不出痘也。(保和方) 李氏用雞卵一枚。童便浸七日。水煮食之。永不出痘。李捷用頭生雞子三五枚。浸坑內五七日。取出。煮熟與食。數日再食一枚。永不出痘。徐都司得於浙人之方。

⑩治痘瘡赤癩。雞子一箇。酒醋浸七日。白殭蠶二七枚。和勻。搗赤塗之。甚效。(聖惠方)

⑪治雀卵面皴。雞卵醋浸。取出傅之。(聖惠方)

⑫治妊娠時疾。冷胎不動。以雞子七枚。納井中。令冷。取出打破吞之。(子母祕錄方)

⑬病欲去胎。雞子一枚。入鹽三指撮服。(張文仲方)

⑭治胎動下血。雞子二枚。打破。以白粉和稀食之。(藏器方)

⑮治產後血多不止。烏雞子三枚。醋中升。酒二升。和攪。煮取一升。分四服。(拾遺方)

⑯治產後口乾舌縮。用雞子一枚。打破。水一盞。攪服。(經驗方)

⑰治婦人白帶。用酒及艾葉煮

雞卵。日日食之。(袖珍方)

⑱治頭風白屑。新下烏雞子三枚。沸湯五升。攪作三度。沐之。甚良。(集驗方)

⑲取下胡臭。雞子兩枚。煮熟去殼。熱夾待冷。棄之三叉路上。勿回顧。如此三次。效。(肘後方)

⑳治癰疽發背。初作。及經十日以上。腫赤熾熱。日夜疼痛。百藥不效者。用雞子一枚。新狗屎如雞子大。攪勻。微火熱。令稀稠得所。捻作餅子。於腫頭上貼之。以帛包抹。時時看視。覺餅熱即易。勿令轉動。及歇氣。經一宿。定如日多者。三日貼之一日。一易。至瘡乃止。(千金方)

㉑治蛛蚊蛇傷。用雞子一箇。輕敲小孔。合之。立瘡。亦治蠟蟻尿瘡。(兵部手集方)

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡消化不良。而有滯滯者。禁用。畏醇醋。

參攷資料 雞蛋油。最能殺蟲。諸瘡破爛。不可忍。或不收口者。搽之。大有神效。其法。用雞蛋數個。煮熟。剝去殼。及蛋白。用黃乾煎枯。

焦。以滾水半杯沖入。油浮水面。取出冷透用。

【雞項草】即大薊之古籍別名。典見圖經本草。詳『大薊』條。

【雞涅】 古籍別名。陰洛。(別錄)

基本 雞涅為雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補中。止洩痢。療女子白沃。明目。消水腫。祛風寒邪氣。

【雞翔瘦】即萎質之色碧狀如雞飛者。性質功效與萎同。詳『萎』條。

俗名 雞膜。

【雞腎】

主治 雞鼻作臭用一對。與豚前肉等分。入破七粒。新瓦剖研。以雞子清和作餅。安鼻前。引蟲出。

【雞苗】即雞埕之古籍別名。典見綱目。詳『雞埕』條。

【雞距子】即枳椇子之處方用名。詳『枳椇子』條。

【雞痲粘】即天芥菜之古籍別名。典見綱目。詳『天芥菜』條。

【雞嘔】 主治 小便不禁。及氣噎。食不消。

【雞腦】 主治 小兒驚癇。燒灰酒服。治難產。

【雞膜】即雞腎之俗名。詳『雞腎』條。

【雞脚草】 古籍別名。子名勝瓜子。(綱目拾遺)雞爪花。(汪連仕採藥書)

產地 多生澤畔間。

形態 雞脚草為雜草類之一種。赤莖對葉。狀似百合。其子可供藥用。根詳見該條。



草 脚 雞

效能 清肝。去星翳。明目。主治 赤白久痢成疳。

【雞脚草根】

效能 祛風。行血。主治 療大麻瘋。鶴膝癰。雞爪癩。

【雞脚菜】即石花菜稍粗如雞爪者之古籍別名。典見綱目。詳『石花菜』條。

【雞脚黃連】即黃連之形如雞爪者。詳『黃連』條。

者。詳『黃連』條。

【雞脚膠】 產地 出雲南雞足山近地土中。

形態 雞脚膠為土類之一種。狀如碎甗。入火即炸如膠。

主治 風疾。

【雞腸】 主治 遺溺。小便數不下。禁燒存性。每服三指酒。

下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞腸曰。止遺精白濁。消渴。

【雞腸】即雞腸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雞腸』條。

【雞腸草】 別名 附地菜。產地 原野溼地多有之。

形態 雞腸草為菜類之一種。三月生苗。莖高七八尺。葉帶紫色。而為橢圓形。四月開五出小紫花。作卷繖花序。花軸之端拳曲。至秋結小實。實中有細子。其苗可供蔬茹與藥用。

性質 微辛。苦。平。無毒。主治 毒腫。止小便利。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論雞腸草曰。療蠱螻溺疝。【唐】甄權藥性本草論雞腸草曰。主遺溺。洗手足。傷水爛。

【唐】孟詵食療本草論雞腸草曰。五月五日。作灰和鹽。療一切瘡及風丹。遍身痒痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食。益人。去脂膏毒氣。又燒傳疝。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。【宋】蘇頌圖經本草論雞腸草曰。研末或燒灰。搗齒。去宜露。

【雞腸草】即石胡荽之古籍別名。典見千金方。詳『石胡荽』條。

【雞蕪】即茨實之古籍別名。典見莊子。詳『茨實』條。

【雞埕】 命名 本品味似雞。故名。古籍別名 雞苗。丁單。(綱目)

產地 多生沙地間。

形態 雞埕為菜類匍匐之一種。高脚。繖頭。味勝香蕪。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。主治 益胃。清神。治痔。

【雞精】即姑活之古籍別名。典見別錄。詳『姑活』條。

別錄。詳『姑活』條。

【雞腿朮】即朮之產於孝豐境內。天目山脈之仙丈峯者。肉厚肥嫩。形似雞腿。效能勝尋常朮類。用之入藥最佳。典見西吳里語。詳「於朮」條。

【雞腿根】即翻白草之古籍別名。典見救荒本草。詳「翻白草」條。

【雞腿菱】即菱之產於浙江省德清縣境內者。性質功效與尋常菱同。詳「菱」條。

【雞腿蕪菰】即蕪菰之俗名。詳「蕪菰」條。

【雞腿鹿】即雞腿皮之古籍別名。典見綱目。詳「雞內金」條。

【雞芥根】即葛根之古籍別名。典見本經。詳「葛根」條。

【雞芥根】即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

【雞蟲草】產地 原野溼地多有之。

形態 雞蟲草為溼草類之一種。葉似苧麻而氣臭。深秋開紫花。結子如椒核。其草可供藥用。

主治 風毒流火疼痛。酒麥去渣服。

【雞壘】即芡實之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「芡實」條。

【雞橋子】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳「枳椇子」條。

【雞翻翎】主治 下血閉。左翅毛能起陰。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞翻翎曰。治婦人小便不禁。消陰癆。療骨哽。蝕癰疽。止小兒夜啼。安席下。勿令母知。

【雞蕉子】即芭蕉實之小於牛蕉。四季結實者。性質功效與芭蕉實同。詳「芭蕉實」條。

【雞頭】即芡實之古籍別名。典見本經。詳「芡實」條。

【雞頭菜】基本 本品即芡實之莖葉。

古籍別名 蓂菜(綱目)

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【雞頭菱】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【雞頭蓮】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【雞頭盤】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【雞鴨脚艾】命名 葉細多枝。間有闊者。雜之莖葉。如雞鴨脚然。故名。搗之作艾香。

主治 腳氣疝氣。

【雞膽】性質 苦。微寒。無毒。主治 目不明。肌瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞膽曰。月蝕瘡。遠耳根。日三塗之。【明】李時珍本草綱目論雞膽曰。燈心。點胎赤。眼甚良。水化。搽痔瘡亦效。

【雞頭鷓】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳「竹雞」條。

【雞鷓】即鷓之古籍別名。典見國史。詳「鷓」條。

【雞蘇】原名 水蘇。而好生於水旁。故名。

處方用名 水蘇葉。雞蘇葉。龍腦薄荷葉。

古籍別名 芥菹。芥其。(別錄)

香蘇(肘後)龍腦薄荷(日用)大胡麻(日本)

外國名目 Saehya aspora.

Niduk var. japonica, Maxim. (拉丁)イヌゴマ チヨロギ

タマシ(日本)

基本 係唇形科水蘇屬。為水蘇之莖葉。

產地 凡山野原澤間恒有出。

形態 水蘇為芳草類之生草。本高二三尺。春生苗。其莖方形。中空直立。密生粗毛。葉如蘇葉而粗糙。為箭鏃形。生皺紋。有鋸齒而色青。亦有毛。葉柄短而對生。氣甚辛烈。夏日莖端開唇形之花。花色淡紅。微紫。成穗。其花叢生於莖之上部。葉腋間如輪狀。凡數層。花穗中有細子如芥。

採取 六七月間採之。

製法 採得陰乾用。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 散風溼。止吐衄。用作解熱止血藥。



蘇 雞

主治 下氣殺穀。除飲食。辟口臭。去邪毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。(本經)主吐血。衄血。血崩。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論水蘇曰。醱酒清酒及酒。煮汁常服。治頭風目眩及產後中風。惡血不止。服之彌妙。【宋】日華諸家本草論水蘇曰。治肺痿血痢。崩中帶下。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論水蘇曰。主諸氣疾及脚腫。【明】李時珍本草綱目論水蘇曰。作生菜食。除胃間酸水。【清】黃宮繙本草求真論水蘇曰。雞蘇卽龍腦薄荷也。又名水蘇。係野生之物。味辛微溫。功有類於蘇薄。但蘇薄其性稍涼。水蘇其性稍溫。蘇薄其性主升。水蘇其性主降。蘇薄多於氣分疎散。水蘇多於血分溫利。故凡肺氣上逆。而見頭風目眩。與血脈血熱。而見肺痿血痢。吐衄崩淋。喉腥口臭。邪熱等病者。皆當用此。宜泄。俾熱除血止。而病自可以愈矣。但表疏汗出。其切忌焉。方莖中。虛似蘇葉而微長。齒面皺。氣甚辛烈。

配合應用 ①治漏血欲死。雞蘇煮汁一升服之。(梅師方)
②治吐血下血。雞蘇莖葉煎汁飲之。(梅師方)

③治吐血咳嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。
④治衄血不止。用雞蘇五合。同搗。搗如棗核大。納鼻孔中卽止。(梅師方) 用雞蘇二兩。防風一兩。爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。(聖惠方) 用龍腦薄荷。生地黄。等分爲末。冷水服。(普濟方)
⑤治腦熱鼻淵。肺壅多涕。雞蘇葉。麥門冬。川芎。藜蘆。白皮。炒。黃耆。炙。甘草。炙。生地黄。焙。等分爲末。煉蜜丸。梧子大。每服四十九丸。人參湯下。(聖濟總錄方)
⑥治風熱頭痛。熱結上焦。致生風氣。痰厥頭痛。用水蘇葉五兩。皂莢。炙。去皮子三兩。羌花醋炒。焦。一兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服二十丸。食後荊芥湯下。(聖惠方)
⑦治耳卒聾閉。雞蘇葉生搗。綿裹塞之。(孟詵方)
⑧沐髮冷香。雞蘇煮汁。或燒灰淋汁沐之。亦治頭生白屑。(普濟

方) ①治暑月目昏。多眵淚生。龍腦薄荷葉搗爛。生絹絞汁點之。(聖濟總錄方)
②治霍亂困篤。雞蘇三兩。水二升。煎一升。分三服。(聖惠方)
③治中諸魚毒。香蘇濃煮汁飲之良。(肘后方)

④治蛇蝎螫傷。龍腦薄荷葉研末。酒服并塗之。(易簡方) 用量 一錢至二錢。
施用宜忌 凡氣虛無實邪者禁用。
參攷資料 ①水蘇處處有之。多生水岸旁。南人多以作菜。江北甚多。而人不取食。又江左人謂雞蘇。水蘇是兩種。陳藏器謂雞蘇自是一物。非水蘇。水蘇葉有雁齒。氣香而辛。齊薺葉上有毛。稍長。氣臭也。又茵陳註云。江南所用茵陳。莖葉都似家茵陳。而大高三四尺。氣極芬香。味甘辛。俗名龍腦薄荷也。(蘇頌) ②水蘇氣味與紫蘇不同。辛而不和。然狀一如蘇。但面不紫。及周圍槎牙如雁齒耳。瑞曰。水蘇卽雞蘇。俗呼爲龍腦薄荷。(寇宗

爽) ③水蘇薺莖一類二種。爾水蘇氣香。薺莖氣臭。爲異。水蘇三月生苗。方莖中空。葉似蘇而微長。密齒面皺。色青。對節生。氣甚辛烈。六七月開花成穗。如蘇穗。水紅色。穗中有細子。狀如荊芥子。可種。易生宿根。亦自生。沃地者。苗高四五尺。(李時珍) ④大都逆上之血。用之得宜。的有殊效。似施於下行之血。不宜。在方書中治下血者亦少也。(劉潛江)

【雞蘇】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「薄荷」條。
【雞蘇葉】卽雞蘇之處方用名。詳「雞蘇」條。
性質 味甘。平。
主治 消痰。益血。助脾。長力。生津。明目。爲五損虛癆神藥。
【鞭筍】 命名 本品爲茅竹筍。之發於竹邊者。形如鞭故名。
古稱別名 邊筍。竹邊。四月生者名梅邊。(綱目拾遺)
形態 鞭筍爲筍類之伏生於地中者。非若筍之生長出於土上。故地屬者。較嫩。長者尺許。其淨白

色。味淡而鮮。氣香而藉。夏秋多有之。其於四月間感受梅雨溼蒸之氣而生。頗早者。爲之梅邊。味淡肉硬。不及秋生者佳。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 開胃利腸。治痰渴。

【題肩】即鵝之古籍別名。典見爾雅。詳「鵝」條。

【鵝】即鰓魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰓魚」條。

【藟草】即玄參之古籍別名。典見開寶本草。詳「玄參」條。

【或驛竭】即血竭之原名。詳「血竭」條。

【魏去疾】即阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿魏」條。

【魏蠶蛾】即原蠶蛾之古籍別名。典見唐志。詳「原蠶蛾」條。

【鮮鮓】即海豚魚之古籍別名。典見綱目。詳「海豚魚」條。

【鰓魚】即石首魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「石首魚」條。

【鮓魚】命名。本品形似鞭輪。故名。

產地 生江湖中。

形態 鮓魚爲無鱗魚類。狀若

十八畫 題

馬鞭。尾有兩歧。其肉可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 五痔下血。瘀血在腹。

【鮓魚】命名。本品即鮓魚之鹽漬而成者。

性質 鹹溫。無毒。

主治 小兒頭瘡。出膿水。以麻油煎熟。取油類塗。

【鮓魚】即鮓魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮓魚」條。

【鮓魚】即鮓魚之簡稱。詳「鮓魚」條。

【鮓魚】即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰻魚」條。

【鯉魚】命名。本品鱗有十字文理。故名。

古醫別名 赤鯉曰玄駒。白鯉曰黃鰻。黃鯉曰黃離。蘇頌曰烏鯉魚。

外國名詞 Cyprinus carpio

丁(拉丁) Carp(英)


基本 係水族動物。爲鱗屬之鯉魚。

產地 凡江湖池澤之淡水中。處處恒有出。

形態 本品大者長三四尺。體

錫 馥 騏 魏 鯉 鯢

扁而肥。鱗有黑點。其腦鱗一道。從頭至尾。爲數三十六。口之前端有觸鬚二對。背色蒼黑。腹淡黃。諸魚惟此供食最佳。其肉、脂、皮、骨等。俱可入藥用。



魚 鯉

性質 甘平。無毒。

效能 行水。消腫。理脚氣。治黃疸。用作利尿藥。

主治 煮食治咳逆上氣。黃疸。止渴。治水腫脚滿下氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鯉魚曰。作鱗溫補。去冷氣。痰癖氣塊。橫痃伏梁。結在心腹。宋曰。華諸家本草論鯉魚曰。治懷妊身腫。及胎氣不安。明李時珍本草綱目論鯉魚曰。煮食。下水氣。利小便。燒末能發汗。定氣喘。咳嗽。下乳汁消腫。米飲調服。治大

人小兒暴痢。用童便浸煨。止反胃。及惡風入腹。清黃宮繡本草求真論鯉魚曰。鯉魚氣味甘平。每於急流之水。跳躍而下。是鯉已有治水之功。且甘能入脾。故書載能下氣利水。凡因水氣內停。而見咳嗽。上逆。黃疸。水腫。脚氣等症。服此則能以消。河間云。鯉之治水。因其氣以相感。是以外產秘要。用赤小豆一升。水二升。煮作三升餘。搗去渣。頓盡服利。利盡即愈。又治孕婦水腫亦效。然性寒六陰。陽氣初生。故多食則能動風發熱也。魚鱗燒灰存性。可治產後血滯。鯉骨燒灰。可療魚骨哽。清王士雄隨息居飲食譜論鯉魚曰。鯉魚甘溫下氣。功專行水。通乳利小便。滌飲止咳。嗽。治妊娠子腫。傳癰腫骨疽。可鮮可脯。多食熱中。熱則生風。變生諸病。蓋諸魚在水。無一息之停。發風動疾。不獨鯉也。以鯉脊上有兩筋。故能神變而飛越江湖。爲諸魚之長品。雖拔萃。性不益人。枕俗以其爲聖子之諱。相戒勿食。最通。其兩筋及黑血皆有毒。天行病後及有宿穢者均忌。醉者尤甚。養余遊藝。見

十八鱉 鯉

寒此者必先抽去其筋。而他處不知也。甚以醉鯉為病人珍味。豈不誤人。

配合應用 ①治水腫。范汪用大鯉魚一頭。醋三升。煮乾食。一日一作(范汪方)又用大鯉一尾。赤小豆一升。水二斗。煮食飲汁。一頓服盡。當下利。盡即瘥。(外臺祕要方)亦治妊娠水腫。

②治水腫脹滿。赤尾鯉魚一頭。破開。不見水及鹽。以生礬五錢。研末入腹內。丸紙包裹。外以黃土泥包放窠內。煨熱取出。去紙泥。送粥食。頭者上消。食身尾者下消。一日用盡。屢試經驗。(醫方摘要方)

③治妊娠感寒。用鯉魚一頭。燒末。酒服方寸匕。令汗出。(祕錄方)

④治胎氣不長。用鯉魚肉同鹽。煮麥汁飲之。(集驗方)

⑤治胎動不安。及婦人數傷胎。下血不止。用鯉魚一箇。治淨。阿膠炒一兩。糯米二合。水二升。入葱。薑。橘皮。鹽各少許。煮糜食。五七日效。(聖惠方)

⑥治咳嗽氣喘。用鯉魚一頭。去鱗。紙裹炮熟。去刺研末。同糯米煮粥。空食。(食醫心鏡方)

⑦治久腫。惡風入腹。及女人新產。風入產戶內。如馬鞭。噓吸短氣。咳嗽者。用鯉魚長一尺五寸。以尿浸一宿。平旦以木篋從頭貫至尾。文火頓熟。去皮。空心頓食。勿用鹽醋。(外臺祕要方)

⑧治反胃吐食。用鯉魚一頭。童便浸一夜。炮焦研末。同米煮粥食之。(壽域方)

⑨治一切腫毒。無論已潰未潰者。用鯉魚燒灰。醋和塗之。以愈為度。(外臺祕要方)

⑩治積年骨疽。一捏一汁出者。蒸餾。餾上。仍破生鯉魚塗之。頃時刮視。蟲出。更洗。傳藥。蟲盡則愈。(肘後方)

⑪治小兒木舌。長大滿口。鯉魚肉切片貼之。以帛繫定。(聖惠方)

施用宜忌 凡有風熱諸病者。禁用。
參攷資料 ①鯉乃陰中之陽。其功長於利小便。故能消腫脹。黃疸。脚氣。喘嗽。溼熱之病。作鱸則性

溫。故能去痰結冷氣之病。燒之則從火化。故能發散風寒。平肺通乳。解腸胃及腫毒之邪。按劉河間云。鯉之治水。驚之利水。所謂因其氣相感也。(李時珍) ②鯉脊上兩筋。及黑血有毒。溪澗中者。毒在筋。俱不可食。凡鯉炙魚。不可使烟入目。損目光。則三日內必驗也。天行病後。下痢及宿瘕。俱不可食。服天門冬。砂砂人不可食。不可合犬肉及葵菜食。(孟詵)

鯉魚汁粥 基本 本品係用鯉魚汁和米煮成之粥。
主治 消水腫。

鯉魚皮 主治 癩疹。
歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鯉魚皮曰。燒灰水服。治魚鱗不出。

鯉魚目 主治 刺瘡。傷風。傷水作腫。燒灰傳之。汁出即愈。

鯉魚血 主治 小兒火瘡。丹腫瘡。塗之立瘥。

鯉魚脂 主治 食之療小兒驚悸諸癩。

一八四四

鯉魚骨 主治 女子赤白帶下。
歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論鯉魚骨曰。治陰瘡。魚腹不出。

鯉魚腦髓 主治 諸癩。
歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鯉魚腦髓曰。煮粥食。治暴熱。【明】李時珍本草綱目論鯉魚腦髓曰。和麩類點目。治青盲。

鯉魚腸 主治 小兒肌疳。
歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鯉魚腸曰。聾耳有蟲。同酢持爛。高裹寒之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。高裹之。坐俱以蟲盡為度。

鯉魚齒 主治 石淋為末。陳醋調服。卒淋酒服。

鯉魚鱗 性質 鹹。平。無毒。
主治 殺蟲。

參攷資料 鯉魚鱗。不可合豆。醬同食。令成消渴。(陶弘景)

鯉魚膽 性質 苦。寒。無毒。
主治 目熱赤痛。青盲明目。久服強悍。益志氣。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論鯉魚曰：點眼治赤腫翳痛。塗小兒熱腫。【唐】陳藏器本草拾遺論鯉魚曰：滴耳治聾。

【明】李時珍本草綱目論鯉魚曰：點雀目燥痛即明。【明】繆希雍本草經疏論鯉魚曰：凡膽皆苦寒走厥陰。故鯉魚膽亦主明目及目熱赤痛青盲也。肝為將軍之官，腎為作強之官。二經有熱則虛怯，志氣衰，苦寒除二經之熱，故久服強悍益志氣也。

【鯉魚鱗】主治：產婦滯血腹痛，燒灰酒服，亦治血氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鯉魚鱗曰：燒灰治吐血崩中，瀉下帶下，痔瘻魚鱗。

參攷資料 古方多以皮鱗燒灰，入崩漏痔瘻藥中，蓋取其行滯血耳。治魚鱗者，從其類也。【李時珍】

【鯉魚】即鱗魚之古籍別名。與見綱目詳「鱗魚」條。

【鯉魚】即鱗魚之簡稱。詳「鱗魚」條。

十八畫 鯉

【沙魚】命名：本品非海中之魚，因居沙溝中吹沙而游，唾沙而食，故名。

古籍別名：鮫魚（晉雅）吹沙。（郭璞）沙溝魚。沙鰻。阿浪魚。（綱目）

產地：生溪澗中。

形態：鯉魚為魚鱗類之一種。大者長四五寸，頭狀如鯉，體圓似鱈，厚肉重唇，口廣闊而鰓與鱗大，鱗細黃白色，有黑點斑紋，背有鱗刺甚硬，尾不分歧，腹鰭能吸附於他物，幼時腹內即有子，有時張口吹沙，故又名吹沙魚。其肉頗美，可供食與藥用。

性質：甘平，無毒。

主治：暖中益氣。

【鮫魚】即鯉魚之原名。詳「鯉魚」條。

【鰻】即魚鱗之小者。與見綱目詳「魚鱗」條。

【鰻鰻】即斑鰻之古籍別名。與見左傳詳「斑鰻」條。

【鰻鰻英】即蒞公英之古籍別名。與見庚辛玉冊詳「蒞公英」條。

鯉 鯪 鮫 鰻 鰻鰻 鰻

【鵓鴿】原名：鵓。命名：鵓者，其聲也。本品性淫而易合，故名。

古籍別名：飛奴（綱目）迦布德迦（梵書）

外國名詞：Columba Pigeon Pouter (拉丁) ハト (日本)

基本：係脊椎動物鳥類鴿類鴿科之鴿鴿。

形態：鴿鴿為原禽類之一種。種類甚多，即家鴿亦有多種。以家鴿之普通形狀而言，其足赤而短，小後趾與他趾相平，嘴亦短，體之上面灰黑，頸胸皆暗紅，體之下面黑色或灰黑，亦有純白茶褐及黑白交雜諸色。記憶力與生殖力皆強，故可傳書，而每月一孕，每孕二卵，其肉可供食與藥用。

採取：以白鴿之肉入藥用。

性質：鹹平，無毒。

主治：調精益氣，治惡瘡疥癬，風疔白癩，癩癬風，炒熟酒服，雖益人，食多恐減藥力。

歷代記述攷證 【宋】嘉祐補註本草論白鴿肉曰：解諸藥毒，及人馬久患疥，食之立愈。

【鵓鴿卵】主治：解瘡毒，痘毒。

【鵓鴿血】主治：解諸藥毒，蠱毒。

【鵓鴿屎】原名：左盤龍。命名：鴿屎皆左盤，故名。

採取：以野鴿者良。

性質：辛溫，微毒。

主治：人馬疥瘡，炒研傅之，馬和草飼之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鴿鴿屎曰：消瘰癧諸瘡，瘰癧傷風及陰毒垂死者，殺鳥。【明】汪穎食物本草論鴿鴿屎曰：消腫及腹中痞塊。

【鵓鴿】即繁雉之古籍別名。與見綱目詳「繁雉」條。

【鵓鴿】命名：凡鳥至秋毛必脫，本品頭禿如秋，故名。又如老人頭童及扶杖之狀，遂有諸名。

古籍別名：扶老（古今注）鵓鴿，鵓鴿禿鴿（綱目）

產地：出南方湖泊中。

形態：鴿鴿為水禽類之一種。

十八畫 鵝 鴨 鵝 鴨

乃水鳥之大者。其狀如鵝而大。背蒼色。翼展廣五六尺。頸舉高六七尺。長頸赤目。頸項無毛。頸有三寸許之紅皮如鵝項。喙深黃色而扁直。長尺餘。喉下亦有皮。髮如鵝狀。足爪如雞而黑色。性極貪惡。能與人鬥。好啖魚蛇及鳥糞等物。其肉可供藥用。餘味毛詳見該條。

性質 鹹。微寒。無毒。

主治 中蠱魚毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鵝為肉曰。補中益氣。甚益人。炙食尤美。作脯饑食。強氣力。令人走及奔馬。

【鵝鵝毛】

主治 解水蠱毒。

【鵝鵝髓】

性質 甘。溫。無毒。

主治 補精髓。

【鵝鵝喙】

主治 魚骨哽。

【鵝】即伯勞之古籍別名。典見孟子。詳「伯勞」條。

【鵝】即鵝鵝之簡稱。詳「鵝鵝」條。

【鵝鵝】

原名 翠鵝。

命名 山海經云。沙水

多翠鵝。其名自評。後人轉為鵝鵝。

也。 鴨 鵝 鴨

古籍別名 鵝鵝。遼河。洵。鵝。駝。鵝。(綱目)洵河。御藍鳥。(動物學大辭典) 鵝鵝(本草綱目)

外國名詞 Polocanus Ono-

crota us Polican 或 White

Pelican 或 Rosato Polican

Polikan カランテウ或ベリカ

ン或コンガラテウ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽

類鵝鵝科。

產地 出溫熱兩帶諸地之淺

海中。

形態 鵝鵝為水禽類鵝之

一種。體大翼長。嘴亦長。約尺餘。直

而闊。嘴下有與嘴長之大皮囊。伸

縮自如。體極白色。略帶赤。翼上撥

風羽色黑。好羣居。善游泳。常以嘴

淘水。脚魚。得魚則閉口而收縮嘴

下皮囊。以出水吞魚。其肉可食。味

不美。脂油可供藥用。

製法 李時珍曰。剝取其脂。熬

化。掠取。就以其噉盛之。則不滲漏

他物即透走也。

性質 鹹。溫。滑。無毒。

主治 塗癰腫。治風痺。透經絡。

通耳聾。

參攷資料 洵鵝油性走。能引諸藥透入病所。拔毒。故能治癰瘰。腫毒諸病。(李時珍)

【鵝鵝毛及皮】

主治 反胃

吐食。燒存性。

酒服。

【鵝鵝舌】

主治 疔瘡。

【鵝鵝嘴】

性質 鹹。平。無毒。

主治 赤白久痢。成

疔。燒存性。研末水服。

【鵝】

命名 鵝名自呼。故名。

古籍別名 家雁。舒雁。

外國名詞 Anser Comestis

Goose (拉丁) ガチョー或ガテ

ウ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽

類鵝鵝科之鵝。

形態 鵝為家畜類水禽類之

一種。種類甚多。乃雁之變種。故形

似雄而大。頸長。尾足皆短。嘴扁闊

嘴根有肉疣。雄者則較膨大。羽色


有蒼白兩種。嘴足肉疣亦有黃及

黑褐之分。脚大有蹼。體長約二尺

有餘。翼不能飛。足行亦拙。聽覺敏

一八四六

捷而性好鬥。人多養於河湖池畔。覓穀類及魚蟲為食。其肉可供餽。茹與藥用。



鴨

採取 以白鵝者良。

性質 甘。平。無毒。

主治 利五臟。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論鵝肉曰。解五臟熱。服丹

石人宜之。【唐】陳藏器本草拾遺

論鵝肉曰。煮汁止消渴。

參攷資料 ①蒼鵝食蟲。主射

工。為良。白鵝不食蟲。止渴為勝。

(陳藏器) ②鵝氣味俱厚。發風發

瘡。莫此為甚。火熏者尤毒。曾目擊

其害。而本草謂其性涼。利五臟。韓

悉醫通謂其疎風。豈其然哉。又葛

洪肘後方云。人家養白鵝。白鴨。可

辟食射工。則謂白鵝不食蟲。不發

病之說亦非矣。但比蒼鵝薄乎云

耳。若夫止渴。凡發胃氣者。皆能生津。豈獨止渴哉。便曰性涼乎。參半白朮散。乃治渴要藥。何嘗寒涼耶。
【李時珍】白鷄辛涼無毒。若鷄冷有毒。發瘡腫。【日華】鷄肉性冷。多食令人雀亂發痲疾。【孟詵】嫩鷄毒。老鷄良。【李廷飛】

【鵝毛】

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論鵝毛曰。治小兒驚癇。又治瘰癧。燒灰酒服。

配合應用 ●治癰毒。用鵝毛煨灰一兩。明礬二兩研末。麩糊爲丸。每服二錢。好酒下。【集驗方】

●參毛丸。治大麻風神效。苦參一斤。鵝毛八兩。煨存性爲末。陳米糊爲丸。桐子大。每服五十九丸。酒送下。一日二次。【赤水玄珠方】

●神功至寶丹。專治男婦濕癩。風疥。膿瘡。膿頭。遍身風癩。癢疹。疥癬。瘙癢異常。麻木不仁。諸風手足酸痛。皮膚破爛。陰囊癢極。井婦女陰瘡。淫癩。酒丸散擦藥洗貼。如神。隨病上下。茶湯送下。日進二

次。戒暴怒房勞。炙博發毒之物。苦參一斤爲末。鵝毛香油炒存性。六兩。黃米糊丸。砂礬爲衣。此方與元珠治大麻風所用大同小異。因並存之。【秋泉方】

●用血管鵝毛燒灰。百草霜。各一錢。行經後。以酒調下。終身無孕。【保和堂秘方】又用鵝毛一把。煨細茶煎湯。經後服。永不生。【周氏家寶方】又有受打不痛法。用血管鵝毛七根。地龍七條。煨過。同乳香白蠟爲丸。好酒送下。【寶生論】

●治癩癧初起。白鷄大者二隻。取週身毛翎并口脚黃皮。新瓦焙焦爲末。分作十服。每日食後服之。服完即愈。【傳信方】

●治腫毒。用血管鵝毛一握。銅鍋炒焦。麩皮包裹。酒吞下。即內消。初起者效。救生苦海方。諸腫毒痛甚。有膿即潰。無膿即消。用鵝毛燒灰一兩。雄黃三錢。川烏。草烏各錢半。黃蠟銕化入前藥爲丸。每服一錢。好酒送下。【嚴氏方】吳嗣宇

用鵝毛二個。炒蜈蚣十條。醋炒。穿山甲一兩炒。殭蠶一兩炒。全蝎五錢。洗。廣膠二兩炒。桑黃二兩炒。羊

角屑二兩炒。共爲末。每服三錢。砂糖調好酒下。以醉爲度。【諸毒內消方】

●治發背疔瘡。對口風毒。穿山甲。蛇蛻。蟬退。蜈蚣俱爲末。鵝毛全副。燒灰存性。全蝎。血管雞毛二翅。燒灰。人指甲用十分之一。敗龜板一個。碾碎俱爲末。每用一錢酒下。【醫宗彙編方】

●治喉香銅錢及鈎線。用鵝毛一錢。燒灰。磁石。皂角子火煨。象牙一錢。燒存性爲末。每服五分。新汲水下。【慈惠方】

●治艾火帶。乃灸火所傷。爛痛不可忍。用雉雞毛同鵝毛燒灰數之。效。【同壽錄方】

●治喉癢。用鵝毛灰三分。兒茶二錢。牛黃三厘。雄黃一錢。人中白一錢。煨存性。如吃深。加珍珠煨存性。一分爲末。先將生桐油探刷一番。後用藥吹入。如膽礬更妙。【傳信方】

●參攷資料 ●東川多溪毒。養鷄以時之。毛羽亦佳。井飲其血。鷄未必食射工。蓋以威相制耳。【陶弘景】 ●禽經云。鷄飛則賊沉。賊

即射工也。又嶺南異物志云。邕州蠻人。選鷄腹裏毛爲衣被絮。柔暖而性冷。嬰兒尤宜之。能辟癩癧。柳子厚詩云。鷄毛絮。臘山巖。即此蓋毛與肉性不同也。【李時珍】

【鵝毛藍】即鱈魚之睛者。與見鱈目。詳鱈魚條。

【鵝血】性質 鹹。平。殺毒。主治 中射工毒者飲之。井塗其身。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鵝血曰。解藥毒。性質 甘。溫。無毒。

【鵝卵】至治 補中益氣。多食發痲疾。

【鵝卵殼】至治 癰疽無頭。煨末。醋調傅。

【鵝兒腸菜】即紫樓之古籍別名。與見綱目。詳紫樓條。

【鵝抱】形態 鵝抱爲蔓草類之一種。附石而生。莖如大豆。其根形如菜蕒。小者如拳。可供藥用。

採取 二月八月間採根。切片陰乾用。

性質 苦。寒。無毒。

十八畫 鵝 鵝 鵝

主治 風熱上癩。咽喉腫痛。及解鬱滯藥毒。搗末酒服有效。亦消風熱結毒。酒厚塗之立愈。

【鵝屎】 主治 絞汁服。療小兒鵝口瘡。並傳狗咬傷。

【鵝涎】 主治 咽喉發賊。歷代記述攷證。【清】趙學敏本草綱目拾遺論鵝涎曰。小兒鵝口瘡甚效。

參攷資料 按洪邁夷堅志云。小兒誤吞稻芒。著咽喉中不能出者。名曰鵝賊。惟以鵝涎灌之即愈。蓋鵝涎化穀相制耳。(李時珍)

【鵝脚草】 即土荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土荊芥』條。

【鵝喉管】 主治 婦人赤白帶。煨末和冰片吹之。

【鵝掌上黃皮】 主治 燒研爛。焙研油調。塗凍瘡良。擦脚趾縫溼。

【鵝掌金星草】 即金星草之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『金星草』條。

【鵝菜】 即菜之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『菜』條。

【鵝頂草】 基本 鵝頂草為雜草類之一種。其花可供藥用。

主治 咽喉生瘡。同白芷。椒根皮。研末吹之。

【鵝腸菜】 即紫樓之古籍別名。典見千金食治。詳『紫樓』條。

【鵝管石】 即鐘乳石之處方用名。詳『鐘乳石』條。

【鵝腿骨】 主治 犬傷日久發者。煨末搽之。

【鵝膏】 原名 白鵝膏。命名 本品宜以白鵝者良。故名。採取 臘月煉收之。性質 甘。微寒。無毒。主治 灌耳。治卒暈。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論白鵝膏曰。潤皮膚。可令面脂。【明】李時珍本草綱目論白鵝膏曰。塗面急令人悅。白辱。滲手足皴裂。消癰腫。解石毒。

【鵝膏葦】 產地 生深山野間。形態 鵝膏葦為菜類香草屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

性質 甘。滑。主治 與香薷同功。

【鵝膽】 性質 苦寒。無毒。主治 解熱毒。及痔瘡初起。類塗抹之自消。

【鵝膠】 基本 本品乃鵝之尾肉。古籍別名 尾膠。(綱目)


主治 塗手足皴裂。搗耳中。治聾及聾耳。

【鵝】 命名 本品鳴聲時時。故名。古籍別名 天鵝。(綱目)黃鵝。(本草綱目)外國名詞 Cygnus bewicki Yarell Swan 或 Bewicks Swan Schwan ハクチヨ一或ハクテウ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨科鵝亞科之鵝。產地 河湖海濱間多有之。

形態 鵝為水禽類之一種。其形似鴨而體大頭長。嘴前橙黃色。嘴根有突起黑色之瘤狀。全體長三尺有餘。羽毛純白。脚尾俱短。而

脚黑色。鳴聲洪亮。飛翔極高。尤善行走。夏棲湖澤。冬居海濱。覓食水草昆蟲等物。其肉可供食與藥用。



鵝

性質 甘。平。無毒。主治 益氣力。利臟腑。融炙食之。

【鵝油】 基本 本品為鵝之脂肪油。採取 冬月取肋煉收之。主治 塗癰腫。治小兒疳耳。

【鵝殼皮】 即橙皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橙皮』條。

【鵝絨毛】 主治 刀杖金瘡貼之。

【鵝頭】 即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【鵝澇】 即澤瀉之古籍別名。典見本經。詳『澤瀉』條。

【鵝鴨】 即烏鴉之古籍別名。典見

十九畫 櫓 櫛 櫟 櫨 瀝 櫛 獸 瓊 瘰 瘰

一八五〇

【櫓罌】

產地 出廣西。形態 櫓罌為夷果類之一種。其果大如半升碗。數十房攢聚成穗。每房有縫。冬生色青。至夏紅熟。其子實可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 補脾胃。固元氣。壯精神。益血脈。寬痞。消痰。解酒毒。止酒後發渴。利頭目。開心。益智。婦人不孕。用櫓罌子浸入好酒內。三日。日日飲之。百日有效。又目生翳障。漸漸昏暗。視物不明。櫓罌子浸白蜜內。每日連蜜啖一枚。一月即退。

【櫚木】

古籍別名 花櫚木。(綱目)

產地 出安南及南海諸地。

形態 櫚木為喬木類之常綠。木本木質堅而色紫紅如紫檀。亦有花紋者。謂之花櫚。可為器。果凡亦可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白痢下。並煎服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論櫚木曰。破血塊。冷嗽。煮汁熱服。為枕令人頭痛。性熱故

也。

【櫛】即梳篦之古籍別名。典見綱目。詳「梳篦」條。

【櫛】即櫛之日本別名。詳「櫛」條。即櫛之原名。詳「櫛」條。

【櫛皮】即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【櫛椽】即椽實之古籍別名。典見綱目。詳「椽實」條。

【櫛椽子】即櫛實之古籍別名。典見綱目。詳「櫛」條。

【櫛】即櫛之古籍別名。典見綱目。詳「櫛」條。

【瀝茶】基本 茶葉之產於四川瀘州者。

性質 味辛。性熱。

主治 療風氣。

【瀝油】即松油之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「松油」條。

【瀝膏】即松脂之古籍別名。典見綱目。詳「松脂」條。

【櫛牛】即櫛牛之古籍別名。典見爾雅。詳「櫛牛」條。

【獸目】即茶葉之一種。產雲南。東川府境者。詳「茶葉」條。

【瓊珠】即荔枝之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「荔枝」條。

【瘰竹】即仙人杖之別名。詳「仙人杖」條。

【礬石】處方用名 白礬石。煨古籍別名 立制石。背介石。固羊石(本經)石鹽。太白石(別錄)澤乳。鼠糞。吳普本草。毒砂。肉羊石(和漢藥考)銀星礬石。金星礬石。(綱目)

外國名詞 Arsenopyrites.

基本 係金屬。為鐵礦類之磷礦鐵巖。

產地 凡四川、浙江、及英國之山谷間。恒多生焉。和漢藥考曰。日本石見。伊勢下野。信濃。越後等諸國產此。

形態 礬石係生於巖石間之銀白色或灰黑色粒狀或樹枝狀礦石。斷面不滑澤。硬度五·五。比重約六·〇。質脆。煨之發蒜臭。

採取 採無時。或十二月採之。製法 採得。以黃泥包。炭火燒之一日一夕。則解可用。

性質 辛。大熱。有毒。

成分 為砷硫化鐵之礬石。即山硫黃(二〇%)。砷(三四%)。鐵(四六%)而成。

效能 燥寒溼。消冷積。專作殺蟲殺鼠藥。並治癩疥。

作用 與細菌相遇。直接有致死之能。

主治 寒熱。鼠瘻。蝕死肌。風痺。腹中堅癖。邪氣(本經)除熱明目。下氣。除膈中熱。止消渴。益肝氣。破積聚。癩冷。腹痛。去鼻中息肉。久服令人筋變。火煉百日。服一刀圭。不煉服則殺人。及百獸(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論礬石曰。除胸膈間積氣。去冷溼風痺。痿痺積年者。

配合應用 治風冷脚氣。白礬石煨二斤。酒三斗。漬三日。稍飲之。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰枯陽亢者。禁用。羸羊血。馬目毒公。鷲屎。虎掌。細辛。長水。鉛丹。棘針。為之使。得火良。

參攷資料 常取生礬石。納水。令水不冰。如此。說則生者。性亦大熱矣。張仲景云。生用。破人心肝。

(陶弘景) 此藥攻擊積冷之病為良。若以餘物代之。療病無效。正為此也。(蘇恭) 治久積及久病腹冷功用。直須慎。其毒不可試也。(寇宗奭) 礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石礬石常相渾書。蓋二字相似故誤耳。然礬石性寒無毒。礬石性熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石之力十倍鐘乳。按洪容齋隨筆云。王子敬靜息帖言礬石深是可疑。凡喜散者輒發癢。蓋散者寒食散也。古人多服之中有礬石。性熱有毒。故云深可疑也。劉表在荊州與王粲登鄆山。見一罇。不生百草。王粲曰。此必古冢。其人在世服生礬石。熱不出外。故草木焦滅。表掘之。果有礬石滿罇。又今洛水不冰。下亦有礬石。人謂之溫洛是也。取此石安罇中。水亦不冰。文鶴伏卵。取石置巢中。以助溫氣。其性如此。豈可服。予見文安公鎮金陵。秋暑減食。醫者湯三益。教服礬石丸。已而飲。日進遂加。意服之。越十月而毒作。衄血斗餘。自是數數不止。竟至精液皆竭而死。李時珍竊謂洪文安之病。

十九畫 礬

未必是礬石毒發。蓋亦因其健味。自恃厚味。房勞縱嗜無忌。以致精竭而死。夫因感食而服石。食既進。則病去藥當止矣。而猶服之不已。特藥妄作。是果藥之罪與。(李時珍) 礬石義不解。許氏說文云。礬石也。西山經云。鳥塗之山有白礬石。其名白礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠鄉之意。以此(李時珍) 礬石生漢中山谷及少室。採無時。(別錄) 今蜀漢亦有。而好者出南康南野溪。及彭城界中。汝陽縣南。暨及湖東新寧。及零陵皆有。白礬石能柔金。以黃泥包炭火燒之一日。一夕。則解可用。丹房及黃白術多用之。(陶弘景) 此石能拒火。久燒但解散。不可脫其堅。今市人乃取潔白理石。當之燒。即為灰也。今漢川武當西邊坂名礬石谷。即是真出處。少室有粒細理。不如漢中者。(蘇恭) 今台州隋州亦有之。(蘇頌)

【礬石】

命名 本品之色深潔。然故名。

處方用名 青礬石。煨礬石。金

礬石。銀礬石。

基本 係石類為山石之一種。產地 陳仁山藥物生產辨云。金礬石各省有出。但以四川。湖北兩處來者為好。銀礬石各省有出。安南會安等亦有出。

形態 礬石質堅而細。體重擊碎。中有白星點。煨後則色呈黃如鉄金。其無星點者不入藥。入藥以青者為佳。故有青礬石之稱。蓋有青白兩種耳。

製法 李時珍曰。用大坩鍋一箇。以石四兩。打碎。入硝石四兩。拌勻。炭火十五斤。煨定。煨至消盡。其石色如金為度。取出研末。水飛去渣。曬乾用。

性質 甘。鹹。平。無毒。效能 治痰熱。破癥積。用作祛痰藥。又為鎮運藥。

主治 食積不消。留滯臍腹。宿食積塊。久不瘥。小兒食積。羸瘦。婦人積年食癥。攻刺心腹。得巴豆。礬砂。大黃。荆三稜。作丸服良。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論礬石曰。治積痰驚癇。咳嗽喘急。【明】經希雅本草經疏

論礬石曰。礬石稟石中剛猛之性。體重而降。能消一切積聚痰結。其味辛鹹。氣平無毒。辛主散結。鹹主軟堅。重主墜下。故本經所主諸證。皆出一貫也。今世又以之治小兒驚痰喘急。入滾痰丸。治諸痰怪證。【清】黃宮繡本草求真論礬石曰。礬石稟石中剛猛之性。沉墜下降。味辛而鹹。色青氣平。功歸入肝。平木下氣。為治驚利痰要藥。蓋風水太過。脾土受制。氣不運化。積氣生痰。壅塞膈上。變生風熱。治宜用此重墜下泄。則風水氣平。而痰積自除。今人以王隱君滾痰丸內用礬石。通治諸般痰怪症。殊為未是。不知痰因熱盛。風水挾熱而脾不運。故附痰積如膠如漆。用此誠為合劑。如其脾胃虛弱。食少便澀。服此泄利不止。小兒服之。多成慢症。以致束手待斃。可不慎歟。硝煨水飛研用。

配合應用 滾痰丸。通治痰為百病。惟水消雙娘者不可服。礬石煨砂各二兩。煨過。研飛。曬乾。一兩。大黃酒蒸八兩。黃芩酒洗八兩。沉香五錢。為末。水丸。梧子大。常服。

十九畫 礞 礞 礞 繩 繫 繭 羅

一二十九。欲利大便。則服一二百丸。溫水下。(王隱君養生主論方)

●金寶神丹。治一切虛冷久積。

滑澀久痢。癱塊。血刺心腹下痢。及婦人崩中漏下。青礞石半斤。爲末。消石末二斤。坩鍋內鋪頭蓋底。按實炭火二十斤。煨過取出。入赤石脂末二兩。滴水丸。炙子大。候乾。入坩鍋內。小火煨之。每服一丸。至二三丸。空心溫水下。少許。歷之久。病消。加至五七丸。(楊氏家藏方)

●奪命散。治急慢驚風。痰涎壅塞。咽喉。命在須臾。服此。墜下風痰。乃治驚利痰之聖藥也。真礞石一兩。煨消一兩。同煨過爲末。每服半錢。或一錢。急驚痰熱者。薄荷自然汁。入生薑調下。慢驚脾虛者。木香湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸。綠豆大。每服二三丸。(湯氏嬰孩寶鑑方)

●治小兒急驚。青礞石磨水服。(衛生方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡虛弱而非實症者禁用。

參攷資料 ●湯衛嬰孩寶鑑

言礞石乃治驚利痰之聖藥。吐痰在水上。以石末摻之。痰即隨水而下。則其沉墜之性可知。然止可用之。救急。氣弱脾虛者。不宜久服。楊士瀛謂其功能利痰。而非非胃家所好。如慢驚之類。皆宜佐以木香。而王隱君則謂痰爲百病。不論虛實寒熱。概用滾痰丸。通治百病。豈理也哉。朱丹溪言一老人忽病目盲。乃大虛證。一醫與礞石藥服。至夜乃死。此乃盲醫虛虛之過。礞石豈殺人者乎。况目盲之病。與礞石並不相干。(李時珍) ●礞石江北諸山往往有之。以盱山出者爲佳。有青白二種。以青者爲佳。堅細而青黑。打開中有白星點。煨後則星黃如鈇金。其無星點者不入藥用。通城縣一山產之。工人製爲器物。(李時珍) ●礞石必用火硝煨過。性始能發。乃能墜痰。不煨則石質不化。藥性不發。故必用煨。(唐容川)

【礞米】即苡仁之古籍別名。典見雷氏。詳「以仁」條。

【礞珠】即苡仁之古籍別名。典見本草集註。詳「以仁」條。

【繫繭】即廣蟲之古籍別名。典見本草衍義。詳「廣蟲」條。

【繫繩】即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳「蛇牀子」條。

【繫彌子】形態 狀圓而細。色赤如鞭麥。性質 味苦。甘平。無毒。主治 益五臟。去頭面諸風。產後痢疾不止。用此藥一合。酒水各半煎。空心服立效。

【繭耳羊】即黃羊之古籍別名。典見綱目。詳「黃羊」條。

【繭栗香】即沉香之一種。典見綱目。詳「沉香」條。

【繭鹵汁】基本 本品非鹹鹵。也。乃蠶繭中蠅汁。主治 百蟲入肉。醫蝕接疥。及牛馬蟲疥。爲湯浴小兒瘡疥。殺蟲以竹筒盛之。浸山蝨。山蝨入肉。蚊子諸蟲咬毒。亦可預帶一筒。取一蛭入中。并持乾海苔一片。亦避諸蛭。

【羅】即鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳「鹿梨」條。

【羅青】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。

【羅階】性質 甘平。氣香。主治 滋痰。止咳。清肺。除煩。消腹脹。

參攷資料 長興羅階。疑即古人願清紫笋也。介於山中。謂之峒。羅氏隱焉。故名。羅西吳枝乘湖。人於若不數願清而數羅階。願清之佳者。其風味已遜龍井。峒梢清。然葉粗而作草氣。嘉靖長興志。羅階在互通山西土地廟後。產茶最佳。吳人珍重之。凡茶以初生兩前者佳。惟羅階立夏開園。梗粗葉厚。微有齶箝之氣。還是夏前六七日。如雀舌者。最不易得。然則後山西向故稱佳。總不如洞山南向獨受陽氣。專稱仙品。只數十畝而已。凡茶產平地。多受土氣。故其質濁。羅茗產高山巖石。純是風露清虛之氣。故可尚。又長物志云。浙之長興者佳。價亦甚高。今所最重。荆溪稍下。採茶不必太細。細則芽初萌而味欠嫩。不必太青。青則茶已老而味欠嫩。惟成帶葉綠色而圓厚者爲上。不宜以日曬。炭火焙過。扇冷以箬葉覆。貯貯高處。蓋茶最喜溫燥。而忌冷溼也。(趙恕軒)

【羅晃】 古籍別名 九層皮果。
(綱目拾遺)

產地 出廣西山中。

形態 羅晃為夷果類之一種。結實狀似橄欖。又似蠶豆。至夏成熟。外有黑殼。連肉有皮七層或九層。肉味如栗。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 養肝膽。明目。去翳。止渴。退熱。解利風邪。消煩。降火。翻胃吐食。或食下即吐。或朝食暮吐。暮食朝吐。用七枚煨存性。每日酒調下。破癆生蟲。及小兒食泥土。腹痛。癆瘵積硬。腹中虻蟲。上攻心下。痛欲死。面有白斑。同牽牛子各七枚。水煎服。

【羅浮香】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

產地 產於羅浮。

【羅浮參】 形態 如山茅。葉細莖圓。有紫花。三葉一花者為仙茅。一葉一花者為人參。根如人字。色如珂玉。煮汁食。味與參無別。但微有膠漿耳。可供藥用。

性質 味甘。帶苦。無毒。
主治 生津。養胃。補虛羸。潤肺。

十九畫 羅

【羅勒】 古籍別名 蘭香。(嘉祐) 香菜。罌子草。(綱目)

外國名詞 Ocimum basilicum, L. (拉丁) ヲバウキ (日本)

基本 係唇形科羅勒屬。為羅勒之莖葉。其子詳見該條。

產地 生田野間。

形態 羅勒為菜類之一種。種有三。其葉有似紫蘇者。有葉大於二十步內。即聞香氣者。有堪作生藥者。其莖葉俱可供藥用。

性質 辛溫。微毒。

主治 調中消食。去惡氣。消水。氣。宜生食。療齒根爛瘡。使用之甚良。患嘔嘔者。取汁服半合。冬月用乾者。煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日用本草論羅勒曰。主辟飛尸。鬼疰。瘴毒。

參攷資料 羅勒不可多食。壅關節。濕營衛。令人血脈不行。又動風發脚氣。(孟詵) 按羅天益云。蘭香味辛。氣溫。能和血潤燥。而

掌禹錫言多食濕營衛。血脈不行。何耶。又東垣李氏治牙疼。口臭。神功丸中用蘭香云。無則以藿香代之。此但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。(李時珍) 香菜須三月莖葉生時種之。乃生。否則不生。常以魚腥水。米泔水。泥溝水澆之。則香而茂。不宜澆水。(李時珍)

【羅勒子】 形態 羅勒子大如蚕。而褐色不光澤。可供藥用。
採取 七月間採收之。
主治 目翳及墮物入目。以三五顆安目中。少頃當溼脹。與物俱出。又主風赤眵淚。

參攷資料 按普濟方云。昔廬州知錄彭大辨。在臨安暴得赤眼。後生翳。一僧用蘭香子洗曬。每納一粒入管內。閉目少頃。連膜而出也。一方為末點之。李時珍常取子試之。水中亦脹大。蓋此子得溼即脹。故能染惹。眵淚浮膜爾。然目中不可着一塵。而此子可納三五顆。亦不妨礙。蓋一異也。(李時珍)

【羅野梨】 卽鳳梨之古籍別名。詳「鳳梨」條。

【羅裙帶】 產地 出於廣西南寧府。


形態 葉滑嫩。長二寸許。似帶。可供藥用。

主治 折傷損手足者。取葉火煨。微熱。貼之即愈。

【羅漢松】 命名 本品結實熟之。服袈裟。故名。

古籍別名 金錢松。徑松。長者名長青。短者名短青。(綱目拾遺)

外國名詞 Podocarpus chinensis, Wall
產地 多生山野高地。



松 漢 羅

形態 羅漢松為松屬之一種。常綠喬木。高數丈。葉厚而狹長。互生。花單性。瓣闊。老則結實。長四五分。大者如雞子。小者如豆。底平上銳。色紫黑。熟則紅色。可供藥用。皮

詳見該條。

性質 甘。無毒。

主治 補腎。益肺。止心胃痛。

參攷資料 羅漢松實。味甘。氣香。能大補氣血。(趙學敏)

【羅漢松皮】

主治 一切血病。殺蟲。療癩。合

蘆香。香油調搽。

【羅漢柏】

外國名詞 Thojja-pais Dolabatu, S.

OSZ

基本 屬松杉科羅漢柏之葉。

形態 羅漢柏為常綠樹。生於

深山陰溼之地。幹高達十丈餘。徑

達二尺餘。葉類檜葉。作鱗片狀。但

粗大。表面呈深綠色。裏面類白色。

花為單性花。果實作毬形。

採取 採葉曬乾。

效能 用為黃疸藥。

用量 二錢至四錢。

【羅漢條】即普賢線之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「普賢線」條。

【羅漢菓】

產地 廣西桂林。

主治 止咳。清熱。

【鱒魚】即鱒魚之古籍別名。與見綱目本草詳「鱒魚」條。

【臘茄】即蕃椒之古籍別名。與見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【臘茶】即茶葉之陳久者。功用較尋常茶葉為良。

基本 本品乃冬至

【臘雪水】

後第三戌日臘月所

降之雪水。

性質 甘。冷。無毒。

主治 解一切毒。治天行時氣

溫疫。小兒熱癩狂啼。大人丹石發

動。酒後暴熱。黃疸。仍小溫服之。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日

用本草論臘雪水曰。煎茶煮粥。解

熱止渴。【明】李時珍本草綱目論

臘雪水曰。宜煎傷寒火喝之藥。抹

癩亦良。

參攷資料

●臘雪水。洗目退赤。(張從正) ●雪。洗也。洗除瘴癘

蟲蝗也。凡花五出。雪花六出。陰之

成數也。大宜菜麥。又殺蟲蝗。臘雪

密封陰處。數十年亦不壞。用水浸

五穀種。則耐旱不生蟲。酒几席間

則蠅自去。淹藏一切果食。不至蛀

蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。(李時珍)

●春雪有蟲。水亦易敗。所以不收。(陳藏器)

【臘菜】即芥子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「芥子」條。

【臘黃】即海藤花之樹採者之

古籍別名。與見郭義恭廣志。詳「

藤黃」條。

【菌藕】即真藕。詳「真藕子」條

命名 本品乃蓮之根。蓮

之花葉常偶生。不偶不生。

故其根名曰藕。藕者耦也。

地方用名 蓮藕。藕汁。

古籍別名 藕莖。藕絲菜。(桐

目)

基本 屬睡蓮科。為蓮之地下

莖。

產地 凡池澤間恒多生焉。

形態 藕色白。莖有孔而有絲。

大者如肱臂。長六七尺。凡五六節

每節生二莖。一為花。一為葉。莖處

乃生藕。大抵野生及紅花者。蓮多

藕劣。種植及白花者。蓮少藕佳也。

採取 冬春間採之。

製法 凡採得洗淨泥土用。

性質 甘平無毒。

效能 生用涼血散瘀。熟用補

心益胃。用作清涼解熱藥。

主治 熱渴。散留血。生肌。久服

令人心款。

歷代記述攷證 【南北朝】徐

之才雷公藥對論藕曰。汁解射罔

毒。蟹毒。【唐】陳藏器本草拾遺論

藕曰。止怒。止洩。消食。解酒毒及病

後乾渴。【唐】孟詵食療本草論藕

曰。生食治霍亂後虛渴。蒸食甚補

五臟。實下馬同蜜食。令人腹臌肥

不生諸蟲。亦可休糧。【宋】大明諸

家本草論藕曰。持汁服。止悶除煩。

開胃。治霍亂。破產後血悶。持膏罨

金瘡。并傷折。止暴痛。燕食食之。大

能開胃。【明】穆希雍本草經疏論

藕曰。藕稟土氣。以生。其味甘。生寒

熱。溫。入心脾胃三經。生者甘寒。能

涼血止血。除熱清胃。故主消散瘀

血。吐血。口鼻出血。產後血暈。醫金

瘡。傷折。及止熱渴。蟹亂。煩悶。解酒

等功。熟者甘溫。能健脾開胃。益血

補心。故主補五臟。實下焦。消食。止

洩。生肌。及久服。令人心懽。止怒也。

本生於污泥之中。而體至潔白。味

其甘脆。孔竅玲瓏。絲綸內隱。療血

止渴。補益心脾。真水果中之嘉品

也。又能解蟹毒。【清】王士雄隨息

居飲食譜論藕曰。藕性甘平。生食

生津。行瘀止渴。除煩開胃。消食析
 醒。治霍亂口乾。療產後悶亂。聖金
 瘡止血定痛。殺射罔魚蟹諸毒。熱
 食補虛。養心生血。開胃舒鬱。止瀉
 充飢。持暑凍瘡。亦可入饌。果中罕
 品。久食休糧。以肥白純甘者良。生
 食宜鮮嫩。煮食宜壯老。用砂鍋桑
 柴緩火煨極爛。入煉白蜜收乾。食
 之最補心脾。若陰虛。肝旺。內熱。血
 少及諸失血證。但日熬濃藕湯。飲
 之久久自愈。不服他藥可也。老藕
 搗浸澄粉。爲產後病後衰老虛勞
 妙品。但須自製。市物恐羅雜不真
 也。市中熱藕多雜穢物。故易糜爛
 最不宜食。諸病皆忌。藕節入藥。功
 專止血。

配合應用 治時氣煩渴。用
 生藕汁一盞。生蜜一合。和勻細服。
 (聖惠方)

治傷寒口渴。用生藕汁。生地
 黃汁。童子小便各半盞。煎溫服之。
 (唐安時傷寒論方)

治霍亂煩渴。藕汁一鐘。薑汁
 半鍾。和勻飲。(聖濟總錄方)

治霍亂吐利。生藕搗絞汁服。
 (聖惠方)

十九畫 藕

治上焦痰熱。藕汁。梨汁各半
 盞和服。(簡便方)

治產後悶亂。血氣上衝。口乾
 腹痛。用生藕汁三升飲之。(梅師
 方)用藕汁。地黃汁。童便等分煎
 服。(唐安時)

治小便便熱淋。生藕汁。地黃汁。
 蒲菊汁各等分。每服半盞。入蜜溫
 服。

治墜馬。血瘀積在胸腹。唾血
 無數者。乾藕根爲末。酒服方寸匕。
 日二次。(千金方)

治食蟹中毒。生藕搗汁飲之。
 (聖惠方)

治凍脚裂坼。蒸熟藕搗爛塗
 之。

治塵芒入目。大藕洗搗。綿裹
 滴汁入目中即出。(普濟方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡非血熱而有瘀
 滯者禁用。忌鐵器。

著名方劑 藕汁膏。滋養胃液。
 (沈氏尊生書方)藕汁。生地黃汁
 二味。加牛乳。黃連末。天花粉末。生
 薑汁。白蜜爲膏。用時挑取留舌上。
 徐徐熱湯送之。日三四次。

參攷資料 根入神仙家。宋
 時太官作血結。(音勳)庖人削

藕皮誤落血中。遂散換不凝。故醫
 家用以破血多效也。結者。血凝也。
 孟詵曰。產後忌生冷物。獨藕不同
 生冷者。爲能破血也。(陶弘景)

白花藕大而孔扁者。生食味甘。煮
 食不美。紅花及野藕。生食味澀。煮
 熟則佳。夫藕生於卑污。而潔白自
 若。質柔而穿堅。居下而有節。孔竅
 玲瓏。絲綸內隱。生於嫩弱。而發爲
 莖葉花實。又復生芽。以續生生之
 脈。四時可食。令人心歡。可謂根
 矣。故其所主者。皆心脾血分之疾。

與蓮之功稍不同云。(李時珍) 藕
 與蓮之功稍不同云。(李時珍) 藕
 藕熱澀汁服。既能補血。亦能通氣。
 故無膩滯之偏。(王秉衡) 陰虛
 肝旺。內熱血少及諸失血證。但日
 熬濃藕湯飲之。久久自愈。不服他
 藥可也。(王孟英) 相感志云。藕
 與鹽水共食。則不損口。同油燥麵
 米果食。則無渣。(李時珍)

【藕子】即蓮肉之古籍別名。與見
 和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【藕汁】即藕之處方用名。詳「藕」
 條。

【藕粉】 基本 本品係以老藕
 搗浸澄取之粉。

採取 冬日搗取老藕。搗汁澄
 粉乾之。以刀削片。潔白如鶴羽。或
 取粗藕。不限多少。洗淨截斷。浸三
 日夜。每日換水。看極淨。澆出渣如
 泥。以布絞淨汁。又將藕渣搗細。又
 絞汁。盡卸輕瀝去淨脚。以清水少
 和攪之。然後澄去清水。下即爲粉。
 曬乾收貯。和糯米粉自糖蒸食之。
 或以白糖開水沖服俱可。蒸粉夾
 粉。俱用此法。

性質 甘。平。無毒。
 主治 調中開胃。補髓。益血。通
 氣分。清表熱。常食安神。生智慧。解
 暑。生津。消食。止瀉。

配合應用 八仙藕粉。此粉
 滋胃保元。治一切虛勞雜症。白花
 藕粉。白茯苓。白扁豆。炒蓮肉。川貝
 母。山藥。白芨各等分。人乳另入滾
 水沖。不拘時食。(經驗廣集方)

人紅丸。專治童子勞怯。神疲
 之極。用人龍二十一條。(即蛇蟲。
 童便洗淨。瓦焙。勿令黑。研末)不
 破皮紅棗三十個。(飯上蒸熟去
 皮核) 藕粉一錢五分。(炒研)

十九畫 藕

大熟地五錢。(煮爛杵膏)真藕粉一兩五錢。(研)真川連六分。(酒拌炒研末)右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻。為丸如桐子大。每早以白滾湯送下七粒。逐日加增二粒。至二十一粒止。以後不必再加。服一料全愈。予多試皆效。切勿泛視。(濟世養生集方)

參攷資料 ●藕粉味甘。氣又芬芳。作食輕身延年。而其功用更

專益血止血也。凡一切症皆不忌。可服。(趙學敏)●淮以南皆澤國。居人嗜藕。暇則瀉為粉。淘汰既淨。去其渣滓。存其甘液。風吹日曝。漸成碎珠。以湯沃而食之。純任天然。別有風味。亦野物之可尚者矣。尤著名者曰片粉。擇藕之極佳者。淘曬人工十倍尋常。及其既成。則如白雲片片。纖塵不染。味亦絕勝。非大有力者。不能製也。(宦遊筆記)

【藕精菜】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【藕荷葉】即荷葉貼水之古籍別名。典見綱目。詳「荷葉」條。

【藕絲菜】原名 藕帶。採取 五月六月間

嫩時採茹之。老則為藕。不堪為蔬。性質 甘平無毒。

主治 生食。療霍亂後虛渴。煩悶。不能食。煎解酒食毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藕絲菜曰。功與藕同。

【明】汪穎食物本草論藕絲菜曰。解煩毒。下瘀血。

【藕絲菜】即藕之古籍別名。典見綱目。詳「藕」條。

【藕實】即蓮肉之原名。詳「蓮肉」條。

【藕節】 處方用名 鮮藕節。藕節炭。

基本 屬睡蓮科。為藕莖間之節。

產地 凡池澤間恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。各省各屬均有。出廣東以南。番順香山等處為多。

形態 藕節狀如竹節。而外國有無數細莖。

採取 採藕時採之。製法 採得洗淨。或曬乾。

性質 澀平無毒。

效能 止血。化瘀。

主治 搗汁飲。主吐血不止。及口鼻出血。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論藕節曰。消瘀血。解熱毒。產後血悶。和地黃研汁。入熱酒。小

便飲。【明】李時珍本草綱目論藕節曰。能止咳血。唾血。血淋。溺血。下

血。血痢。血崩。【清】唐容川本草問答論藕節曰。藕節中空能行水。故

用以行血分之滯熱而清瘀血。藕在水中。節又結束極細。而其中仍

能通水氣。淋是水竅通而不通。藕節在水中不通而通。且色能回紫

變紅。又入血分。以治淋症尤宜。

配合應用 ●治鼻衄不止。藕節搗汁飲。并滴鼻中。

●治卒暴吐血。雙荷散。用藕節。荷蒂各七箇。以蜜少許。搗爛。用水

二鍾。煎八分。去滓溫服。或為末丸服亦可。(聖惠方)

●治大便下血。藕節曬乾研末。人參白蜜煎湯調服二錢。日二服。

(全幼心鑑方)

●金鎖玉關丸。治遺精白濁。心虛不寧。用藕節。蓮花鬚。蓮子肉。茨實肉。山藥。白茯苓。白茯神。各二兩

一八五六

為末。用金櫻子二斤搗碎。以水一斗。熬八分。去滓再熬成膏。入少麩和藥丸。梧子大。每服七十九丸。米飲下。

●治鼻淵腦流。藕節。芎藭。焙研為末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

用蠶 錢半至三錢。

參攷資料 ●一男子病血淋。痛脹欲死。予以藕汁調髮灰。每服二錢。三日而血止痛除。按趙潛養

病漫筆云。宋孝宗患痢。衆醫不效。高宗偶見一小藥肆。召而問之。其人問得病之由。乃食湖蟹所致。遂

診脈曰。此冷痢也。乃用新採藕節。搗爛熱酒調下。數服即愈。高宗大喜。就以搗藥金杵白賜之人。遂稱

為金杵白。嚴防禦家。可謂不世之遇也。大抵藕能消瘀血。解熱開胃。而又解蟹毒故也。(李時珍)●藕

節性冷。伏硫黃。●藕節澀平。主吐血不止。及口鼻出血。(王孟英)●

經云。血者神氣也。又云。所育節者。神氣之所遊行出入也。即此可悟

藕節大療血證之義矣。(劉潛江)

【藕帶】即藕之古籍別名。典見綱目。詳「藕」條。●即藕絲菜之原

名。詳「藕」條。

名詳「蕪菁菜」條。

【蕪菁炭】即蕪菁焙成炭者之處方用名。詳「蕪菁」條。

【藕節粉】基本 本品係以藕節搗澄之粉。

性質 甘。微苦。平。無毒。

主治 開胃。補腰腎。和血脈。散一切瘀血。生一切新血。產後及吐血者。食之尤佳。

【蕪菁】即蕪菁。

【蕪菁】即蕪菁之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菁」條。

【蕪菁】即食茱萸之古籍別名。典見綱目。詳「食茱萸」條。

【蕪菁】即蕪菁之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菁」條。

古籍別名 離蕪。(別錄) 掘蕪。蕪菁。白者名草蕪菁。(綱目) 漆頭。(本草集注)

產地 凡山野川谷及原澤恒有出。

形態 蕪菁為蕪菁類之一。生草本。莖高二三尺。葉為長卵形。莖葉中有汁。折時甚白。旋即凝黑。如漆。春開淡紅或紫色小花。夏日結實如豆。一顆三粒。生青熟黑。中

十九畫 藕

蘆 蕪 蕪 蕪 蕪

有仁。其根可供藥用。

採取 四五月採之。製法 採得陰乾用。

性質 辛寒。有小毒。效能 破血。殺蟲。蝕惡肉。治瘡疥。用作腐蝕藥。又為疥癬頑瘡藥。

主治 蝕惡肉。敗瘡。死肌。殺疥蟲。排膿惡血。除大風熱氣。善忘不寐。(本經) 去熱痺。破癥瘕。除息肉。(別錄)

配合應用 ①緩疽腫痛。蕪菁一兩為散。溫水服二錢匕。(聖惠方)

②治傷寒咽痛。毒攻作腫。真蕪菁瓜甲大納口。嚼汁嚥之。當微覺為佳。(備急方)

③治中焦熱痞。善忘不禁。蕪菁二分。甘草二兩。消石為末。每服一錢。雞鳴時溫酒下。以知為度。(聖惠方)

④治疥瘡瘙癢。蕪菁末入輕粉香油調塗之。(多能鄙事方)

用量 八分至錢半。施用宜忌 凡無實邪者禁用。惡門冬。甘草為之使。

參攷資料 ①治馬疥。尤善服

食。方用至少。(寇宗奭) ②孟詵必效方。治甲疽生於脚趾邊腫爛。用蕪菁三兩。黃芪二兩。苦酒浸一宿。以豬脂五合合煎。取膏三合。日三塗之。即消。又聖惠方。治頭風眩。眩

鷓頭丸中亦用之。(李時珍) ③草高四五尺。葉圓黃。四四相當。四月花。五月實。根黃。有汁亦黃色。三月採葉。四月五月採根。(吳普) ④今第一出高麗。色黃。初斷時汁出。凝黑如漆。故云漆頭。次出近道。名草蕪菁。色白。皆燒錢鑽頭令黑。以常漆。非真也。(陶弘景) ⑤今河陽

淄齊州亦有之。二月生苗。葉似大戟。而花黃色。根如蘿蔔。皮赤黃。肉白。初斷時汁出。凝黑如漆。三月開淺紅花。亦淡黃色。不着子。陶隱居謂出高麗者此近之。又有一種草蕪菁。色白。古方兩用之。故楊僧垣治難疽生惡肉。有白蕪菁散。傅之。看肉盡便停止。但傅諸存藥。若不生肉。又傳黃芪散。惡肉仍不盡者。可以漆頭赤皮蕪菁為散半錢。和白蕪菁散三錢。和傅之。觀此則赤白皆可也。(蘇頌) ⑥范子計然云。蕪菁出武都。黃色者善。草蕪菁

出建康。色白。今處處有之。生山原中。春初生苗。高二三尺。根長大如蕪菁。莖著。壯。或有歧出者。皮黃赤。肉白色。破之有黃漿汁。莖葉如大戟。而葉長微闊。不其尖。折之有白汁。抱莖。有短葉相對。圓而出尖。葉中出莖。莖中分二三小枝。二三月開細紫花。結實如豆。大。一顆三粒。相合。生青熟黑。中有白仁。如檳榔子之狀。今人往往呼其根為狼毒。誤矣。狼毒似商陸。大黃。根無漿汁也。(李時珍)

【蕪菁根】即蕪菁之處方用名。詳「蕪菁」條。

【蕪菁草】即蕪菁之處方用名。詳「蕪菁」條。

【蕪菁子】即蕪菁子之處方用名。詳「蕪菁子」條。

【蕪菁子】即蕪菁子之處方用名。詳「蕪菁子」條。

古籍別名 菜。(詩疏) 紅心灰蕪。(玉册) 鷓頂草。(土宿) 騰脂菜。(綱目)

外國名詞 Chronopodium album, L. (拉丁) アカザ (日本)

蕪菁 係蕪菁科蕪菁屬。為蕪菁之葉。其莖詳見該條。

本

其莖詳見該條。

其莖詳見該條。

其莖詳見該條。

產地 生田野間。

形態 藜為菜類之一年生草。高五六尺。葉質柔而形闊。緣邊有少數之缺刻與鋸齒。葉面有粉狀之小點。葉柄長。夏初梢頭撥簇細花無瓣。具黃綠色之小形萼。其葉可供藥用。



藜

採取 八九月間。和子採取之。
性質 甘平。微毒。
主治 殺蟲。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論藜葉曰。煎湯洗蟲瘡。漱齒。搗爛塗諸蟲傷。去瘰癧風。

參攷資料 鷓頂。陰草也。搗汁。煮粉霜。燒灰淋汁。煎粉霜。伏礬石。結草砂。制硫。伏汞。及雌黃。砒石。李時珍。

【藜藟】即藜藟藜之古籍別名。典見山海經。詳『藜藟』條。

【藜莖】 主治 燒灰。和藜灰。煮灰等分。水和。蒸取汁煎。

存。點疣贅黑子。蝕惡肉。

【藜蘆】 命名 黑色曰藜。其蘆有黑皮裹之。故名。

古籍別名 山葱。葱菁。(別錄) 葱莖。葱葉。野蘆。(吳普本草) 葱蔥。鹿葱。(綱目) 山樓。鼠莖。烏莖。爰莖。朴草。藜蘿。棕欄草。朴烏伊。(和漢藥考)

外國名詞 Yontherum nigr.

基本 屬百合科藜蘆之地下

產地 陳仁山藥物生產辨云。藜蘆出北亞美利加。我國江蘇省鎮江縣亦有出。

形態 藜蘆為山地自生之多。年生毒草。春季自宿根叢生數葉。夏月抽生二三莖。高達二三尺。葉長。作細披針形。有平行脈。小葉互生。花為大三四分之紫黑色。六瓣。花。作圓錐花序排列。根莖被有類似櫻毛之細毛。故一名棕欄草。其根為肥短直行之地下莖。有許多鬚根。外部黃褐色。內部白色。無臭。有強烈辛辣味。若吸入此粉末。則發噴嚏甚烈。誤服少許。則立致嘔吐。

混於飯中。蠅食之即死。故一名蠅毒。



藜蘆

採取 二三月間。採掘陰乾。
製法 雷斅曰。凡採得去頭用。糯米泔汁煮之。從巳至未。曬乾用。

性質 辛寒。有毒。

成分 含有攝魯文 (Jolvin)、

梵拉萬洛伊仁 (Vestroidin)、梵拉萬拉魯濱 (Voratralbin)、塞凡仁 (Covadin)、澱粉等。

效能 吐風痰。療中風癱瘓。殺諸蟲。治疥癬惡瘡。用作催吐藥。又作殺蟲藥。

主治 蠱毒咳逆。洩痢腸辟。頭瘍。疥癬惡瘡。殺諸蟲毒。去死肌。(本經) 療噦逆。喉痺不通。鼻中息肉。馬刀爛瘡。不入湯用。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論藜蘆曰。主上氣。去積年膿血。泄痢。(宋)蘇頌嘉祐圖經本草論藜蘆曰。吐上膈風涎。暗風癩

病。小兒餒胸疾。【宋】寇宗奭本草衍義論藜蘆曰。研末治馬疥癬。

【明】經希雅本草經疏論藜蘆曰。藜蘆味辛氣寒。別錄苦微寒。有毒。入手太陰足陽明經。本經主蠱毒。咳逆。及別錄療噦逆。喉痺不通者。皆取其宜壅導滯之力。苦為滯劑。故能使邪氣痰熱。胸膈部分之病。悉皆吐出也。辛能散結。故主鼻中息肉。苦能泄熱殺蟲。故主洩痢腸辟。頭瘍疥癬。殺諸蟲毒也。疥瘍皆濕熱所生。濕熱不去。則肌肉潰爛。苦寒能消濕熱。則馬刀惡瘡爛瘡。死肌皆愈也。味至苦。入口即吐。故不入湯。【清】黃宮繡本草求真論

藜蘆曰。藜蘆能反五參細辛芍藥。及一服即吐。其意何居。蓋緣苦雖屬降。而亦善消。藜蘆辛少苦多。故能入口即吐。是以風痰膈結。而見咳逆上氣者。當用是藥以投。使其膈部之邪。悉從上出也。但此宜作散劑以投。切勿湯藥以服。至於腸

解泄痢。如何背載克治。亦是因吐除其實積。積去而利與瀉亦可止矣。吐雖等於常山。瓜蒂。烏附尖。萊菔子。但常山則吐瘧。瓜蒂則吐

除其積。積去而利與瀉亦可止矣。吐雖等於常山。瓜蒂。烏附尖。萊菔子。但常山則吐瘧。瓜蒂則吐

除其積。積去而利與瀉亦可止矣。吐雖等於常山。瓜蒂。烏附尖。萊菔子。但常山則吐瘧。瓜蒂則吐

熱痰。鼻附尖則吐涎痰。此則專吐風痰者也。况此氣善通頂。治喉痺及鼻中瘰肉。爲未吹效。然亦並非得已。卽有中蠱等毒。及或老痰積塊。止可借其宜泄。切勿沾口。以自損其津液耳。取根去頭。

國外學說 日本學說謂漢醫用爲解熱清涼藥。其用量自〇・一至〇・二。猪子氏曰。藜蘆雖爲吐藥。然含「ウエラトリン」或類似之鹽基。其性極劇烈。故不適於吐劑。亦非治療上必用之品。(中外醫事新報) 藜蘆根中之亞爾加魯乙度。依「アークレーメル氏」之定置云。用善良之根末五瓦。於浸出裝置之定置。可得成白色鱗屑。或細小柱之亞爾加魯乙度「エルグイン」及「ウエラトロイグイン」一・三五至一・五瓦。(藥學雜誌第九十號) 和漢藥考曰。藜蘆產日本高山。近江之伊吹山下野之日光山尤多。故一名日光閉。藜蘆有二種。一種爲黑藜蘆。卽今所述者。一種爲白藜蘆 (Album, L.) 產歐洲及亞洲北部。亦供藥用。又有一種曰木藜蘆。

十九畫 藜

者。係屬石南科。葉互生。作卵圓形。爲有毒植物。將此乾葉末少許吹入鼻孔。立發噴嚏。如用多量。雖至鼻孔出血。噴嚏仍不止。但飲冷水則立已。煎湯。則得淡褐色液。服之腹部突然膨脹。但經片時卽愈。藜蘆或呼萬年青草。有以萬年青根充藜蘆根者。非英美學說謂白藜蘆產中國。歐羅巴南方等處。高約三尺至四尺。其根可爲藥品。根內含有霜。西醫所謂匪肆地者卽此物。用法取出。其霜甚毒。故醫士鮮用之。英國藥肆中常出售之白藜蘆。多從日耳曼國運來。藜蘆根如指大。色白。嗅之令人掩鼻。惟乾者無臭。味初皆覺少甜。後最苦而辛。則掩其甜味。至其醫治作用則爲平脈藥。平脈藥。又爲惹胃毒藥。研末服之則吐瀉。前時用爲引水瀉藥。又用以治痛風。今用此以殺皮膚毛髮內之蟲。間用之爲取嚏藥。其用法。將此藥一二釐。合於小粉或白芷粉嗅之。其功用能去火除煩。與青藜蘆同。或代以醃酒亦可。其處方如白藜蘆酒方。用白藜蘆根八兩切碎。白葡萄酒二斤。浸七

天。濾渣爲度。每服十滴。每日服三次。合於鴉片酒少許服之。此爲吐藥。瀉藥。寧睡藥。間有痛風與風溼病用之。用量每一釐須分四十服。又青藜蘆英美學說謂亦產中國。及北亞美利加。加拿大等處。其言曰。此草所產之處。爲卑溼地。或溼草地。或河邊。高約三尺至六尺。形狀與白藜蘆同。惟白藜蘆則產於岡陵。此爲青藜蘆與白藜蘆之不同處。其根厚而軟。上半似有切斷形。下半厚而多白色小根。味苦而辛。嗅之令人噴嚏。可爲藥品。醫治作用。則食大服必嘔吐大作。間有服後作瀉。其平脈甚速。服少許。俟兩點鐘再服。可使脈弦數轉爲遲緩。如痛風。風溼。或腦氣筋疼。可用最小之服。又如心肌肉生厚。跳動逾常有力。服之可減緩略安。倘心扉門有壞。則不宜服。又如心跳症之或因飲濃咖啡。或因吸生熱煙而致者。服之可止。又如腦部肺肝各臟腑積血多。其未發炎之先。服之可以免其發炎。亦可佐別法以散其積血。既發炎則不宜服。又如跌血。宜用此藥以減少心力跳

動。兼以外治法療治之。(其外治法。須按定患在何處。或用線綁紮。或用拇指摘緊。或夾束以壓止之。若此則可以令血囊內之血。易於凝結而漸就見效。) 又如以此藥擦皮膚。則立見紅熱。嗅其霜能令人噴嚏不休。其功用能去火除煩。生津液。平脈。緩氣。治酒風脚。倘服此藥過多。可服鴉片。火酒等解之。處方如下。青藜蘆四分細末。濃酒二十分。先用酒十五分浸二天。同時搖動。裝淋前淋乾。加餘酒。淋用絞盤絞渣。過淋紙。再加酒。仍足二十分爲度。如服至作瀉。或服至寸脈已緩。宜停止勿服。至放血或瀉劑。欲減輕其血脈急迫之患。此藥皆足以佐之。每服八釐七毫。半至三分半。(青藜蘆酒方) 用量則每服七釐至一分半。釐多服則昏暈無力。不可妄用。研末或醃酒用。再者青藜蘆不可用爲吐藥。以其藥性過於猛烈。吐後必嘔服不堪也。

一八五九

配合應用 治諸風痰飲。藜蘆十分。鹽金一分爲末。每以一字溫藥水一盞。和服探吐。(經驗方)

①治中風不省。牙關緊急者。藜一兩去苗頭。煎防風湯浴過。焙乾切。炒微褐色為末。每服半錢。小兒減半。溫水調灌。以吐風涎為效。未吐再服。(簡要濟眾方)

②治中風不語。喉中如曳鋸。口中涎沫。取藜蘆一分。元南星一個。去浮皮。於臍上剗一坑。納入陳醋二椀。斗四面火逼黃色。研為末。生麵丸。小豆大。每服三丸。溫酒下之。甚效。(經驗方)

③治諸風頭痛。和州藜蘆一莖。日乾研末。入麝香少許。吹鼻。又方。通頂散。藜蘆半兩。黃連三分。喘鼻。(聖惠方)

④治久瘧。痰多。不食。欲吐不吐。藜蘆研末半錢。溫菴水調下。探吐。(保命集方)

⑤治痰壅積滯。藜蘆。皂莢。炙各一兩。巴豆二十五枚。熬黃研末。蜜丸。小豆大。每空心服一丸。未發時一丸。隨發時又服一丸。勿用飲食。(肘後方)

⑥治黃疸腫疾。藜蘆。灰中炮為末。水服半錢匕。小吐。不過數服。效。

⑦治胸中結聚。如痰。咳不去者。

巴豆半兩。去皮心。炒搗如泥。藜蘆炙研一兩。蜜和搗丸。麻子大。每服一二丸。取效。(肘後方)

⑧治身面黑。用藜蘆。灰五兩。水一大碗。淋汁。銅器重湯煮成黑膏。以針微刺破點之。不過三次。效。(聖惠方)

⑨治鼻中息肉。藜蘆三分。雄黃一分。為末。蜜和點之。每日三上。自消。勿點兩畔。(聖惠方)

⑩治牙齒痛。藜蘆末。內入孔中。勿吞汁。神效。(千金翼方)

⑪治白禿。蟲瘡。藜蘆末。豬脂調塗之。(肘後方)

⑫治頭生蟻。以藜蘆末。搽之。(直指方)

⑬治頭風。白屑。痒甚。藜蘆末。沐頭。搽之。緊包二日夜。避風。效。(本事方)

⑭治反花。惡瘡。惡肉。反出。如米。藜蘆末。豬脂。傅。每日三五上。(聖濟總錄方)

⑮治疥癬。蟲瘡。藜蘆末。生油。和塗。

⑯治羊疽。疔。瘡。藜蘆二分。附子八分。為末。傅之。蟲自出也。(陶隱

居方)

①治誤吞水蛭。藜蘆炒為末。水服一錢。必吐出。(德生堂方)

用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏葱白。反細辛。芍藥。人參。沙參。紫參。丹參。苦參。惡大黃。黃連。為之使。

參攷資料 ①藜蘆服錢七一字。則惡吐入。又用酒頂。令人嘔。別

本云。治噦逆甚效。(蘇頌) ②噦逆用吐藥。亦反胃用吐法。去痰積之熱痰。烏附尖。吐涎痰。萊菔子。吐氣痰。藜蘆。則吐風痰也。按張子和儒門事親云。一婦病風癩。自六七年得驚風後。每一二年一作。至五七年五七作。三十歲至四十歲則日作。或甚至一日十餘作。遂昏癡健忘。求死而已。值歲大飢。採百草食於野中。見草若葱狀。採歸蒸熟。飽食。至更忽覺心中不安。吐涎如膠。連日不止。約一二斗。汗出如洗。甚昏困。三日後。遂輕健。病去食進。百脈皆和。以所食葱訪人。乃葱。葱苗也。即本草藜蘆是矣。陶隱言能吐

風病。此亦偶得吐法耳。我朝荆和王妃劉氏。年七十。病中風。不省人事。牙關緊閉。羣醫束手。先考大醫吏。日月池翁診視。藥不能入。自午至子。不獲已。打去一齒。濃煎藜蘆湯灌之。少頃。噦氣一聲。遂吐痰而甦。調理而安。藥弗眩眩。厥疾弗瘳。誠然。(李時珍) ③藜蘆生太山山谷。三月採根陰乾。(別錄) ④所在山谷皆有。葉似鬱金。秦艽。藜蘆等根。若龍膽。莖下多毛。夏生冬凋。八月採根。(韓保昇) ⑤今陝西山西。東西州郡皆有之。遼州。均州。解州者尤佳。三月生苗。葉似初出櫻心。又似車前。莖似葱白。青紫色。高五六寸。上有黑皮。莖似椶皮。有花。肉紅色。根似馬腸根。長四五寸許。黃白色。二月三月採根陰乾。此有二種。一種水藜蘆。莖葉大同。只是生在近水溪澗石上。根鬚百餘莖。不中藥用。今用者名葱白藜蘆。根鬚甚少。只是二三十莖。生高山者為佳。均州土俗亦呼為鹿葱。范子計然云。出河東黃白者善。(蘇頌) ⑥真中風。痰涎壅盛。無汗。表實。用三聖散。即防風藜蘆瓜蒂吐之。甚

則用五元散。乃藜蘆赤小豆皂角白礬磨碎吐之。然則藜蘆乃救急之藥。不可不知而又不可不備者也。(盧國飛) 藜蘆擦外皮立見紅熱。其霜嗅之令人噴嚏不休。內服則嘔吐大作。間有服後作瀉者。其平脈甚速。服少許。俟兩點鐘再服。可使脈數者轉為遲緩。腦部肺肝各臟腑。積血多尚未發炎之先服此藥能免其成炎。亦可佐別法以散其積血。(西藥略釋)

【藜蘆】即藜蘆之古籍別名。與見和漢藥考詳「藜蘆」條。

【藤弘】即胡麻之古籍別名。與見張揖廣雅。見「胡麻」條。

【藤紙】命名 本品係用藤製成之紙。故名。

採取 陳舊者良。

主治 內熱衄血。破傷出血。餘與楮紙同。

【藤葉】即獨猴桃之古籍別名。與見閩寶本草。詳「獨猴桃」條。

【藤葉】即落葵之古籍別名。與見綱目。詳「落葵」條。

【藤葉子】即冬葵子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「冬葵子」條。

十九畫 藤

【藤黃】命名 本品乃海藤樹之膠質脂液結成。共色黃澤。故名藤黃。

古稱別名 海藤。(郭義恭廣志)

外國名詞 Guntzi (拉丁) Gamboge. (英) Gamraigunt.

(德) 基本 係將屬金絲桃科藤黃樹 (Garcinia Morella, desv.)

之幹皮。於開花前。取其滲出之濃稠乳狀液。曬乾之。結為膠質華爾斯。用以入藥。

產地 陳仁山藥物生產辨云。藤黃西藥名干藤折。產真臘。安南。暹羅等處。乃洋海藤樹脂結成。色黃。味辛。無臭。以暹羅出者為上。八九月新。

形態 藤黃樹為生於熱帶地方之喬木。高五六丈。枝分枝繁茂。作傘形。葉厚硬而對生。作尖卵圓形。花為黃赤色。單性。四瓣花。後結橙狀漿果。其脂液所結成之藤黃。作圓筒形或管狀。直徑六分至一寸五分許。時或作不正固塊。外面綠黃色。有縱紋。並被有黃色之粉

霜。質堅而脆。破碎而作貝殼狀。呈黃褐色。發類蠟之光澤。能溶於鹼液。伊打。酒精則不能完全溶解。用水研和。則成黃色乳劑。投火中則燃燒。本品無臭。咀嚼之初黏稠無味。後漸辛。口中似乾燥。

製法 以水蒸化。濾去渣。盛磁器內。隔水煮之。水少時再添。煮乾。以三炷香為度。以帛絮磁器口。埋土中七日。取出。如此七次。曬乾。用。

性質 酸。渣有毒。

成分 上品藤黃含有樹脂七

十至七十五%。及可溶性膠質三十至二十五%。

效能 用作峻下劑。用於綠蟲及水腫等。

作用 在胃時能刺胃壁神經。使胃液分泌增加。至腸中則腸黏膜被而腸分泌增多。膽汁亦因



藤黃

微增加。腸之蠕動亦驟然迅速。可使積糞急下。若服量稍多。則起腸胃炎。甚至腸出血。嘔吐腹痛頭昏而死。

主治 疔牙疔齒。點之便落。

歷代紀錄攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論藤黃曰。治癰疽。止血化毒。斂金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷及湯火傷。竹木刺入肉。一切諸傷。

國外學說 英美學說謂藤黃西名干藤折。為膠香類之質。原產安南。真臘。暹羅等國。係將洋海藤樹。斫其樹身。皮裂液流。接以竹筒。即凝結成條。原西國之得此物。曾

有西人由中國帶至西國。至西國之用藤黃代真大黃者。則不知始於何時。蓋自英國醫士遊歷西藏得此物。土人謂之大黃膏。尋常出售之藤黃有二種。一產暹羅。一產錫蘭。暹羅所產之藤黃。似錫蘭所產。原質與性情。亦復大略相同。其條成柱形。心或實或空不定。其所

以成爲圓柱形者。殆因其液收於竹內。比凝結時取出。故成此形。至錫蘭所產之藤黃。在印度街市出

一八六一

售。以此歐羅巴人不能多見。而加西尼亞等所產之藤黃。可代暹羅與錫蘭所產者。咸豐五年時。法國博物院中。存有印度買索爾所產之藤黃。亦屬甚佳。其質脆而易碎。長約六寸。徑約一寸。色橙黃。和水色亦黃。無臭。味頗辣。服後若干時。猶覺喉內痒而不適。又搗碎時。所成細粉。能惹鼻流涕。藤黃為重性水瀉藥。驅蟲藥。如大便久不通。經閉。水瀉等病。用此藥均能有益。然獨用則不及合於承(二)綠等藥用之。且不宜過服。過服則使人嘔吐肚疼。有大毒而危險。故在此項用途上最好避之。而代以他品。此其醫治外用之大概也。至用量則每服一釐七毫半至八釐七毫半。驅蟲。每服五釐二毫半至一分七釐半。過服使人嘔吐肚疼。故單服者少。又日本和漢藥考曰。藤黃係藤黃樹(Garcinia Hanburyi, Hook. et Th.)之膠質樹脂。大七仙米。為圓柱形或彎曲狀之熔合塊。帶綠黃色。易破碎為暗枸橼黃色。屑平貝殼狀之不透明片。用本品一分加水二分所磨之則成鮮黃

色之乳劑。其味如灼。再和以安母尼亞水一分。則變透明液。初呈鮮赤色。最後變褐色。將此混和液中之安母尼亞中和時。則液失色。而析出黃色絮狀物。藥舖所售藤黃有二種。甲種日本喉辨天印。係將脂液入竹筒硬固者。其狀如蛇之蟠屈。謂之竹管黃。為上品。乙種日本呼為盤樣。作不正塊狀。外面有竹籠紋。破碎面之色不一。恐係煎熬數種脂液所成之混和物。謂之沙黃。為下品。

近人學說 張山雷曰。瀕湖綱目謂藤黃點蛀牙自落。石頑謂性毒而能攻毒。點牙即落。毒能傷骨。傷骨可知。趙氏綱目拾遺謂三黃寶蠟丸。黎喇丸。俱用藤黃。以其善解毒也。中藤黃毒者。食海蜃即解。趙氏又引百草鏡。謂藤黃出外洋及粵中。乃藤指也。形似筆管者。良大塊者不佳。又引粵志。廣中產黃藤。熬汁即藤黃。性最寒。以青魚膽和之。治眼疾。治癰疽。止血。化毒。斂金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷。及湯火傷。有治一切諸傷神效。方金不換。治跌打刀傷方。治外科一筆

消之毒散等方。皆佳。詳見趙氏本草。茲不具錄。壽頤案藤黃雖曰有毒。然除寶蠟丸。黎喇丸外。本不入口。其能退消外癰癰腫。及止血定痛。斂金瘡。則粵志謂其性最寒者。是矣。且本是藤之脂膏。成性極黏膩。故能生肌止血。且原本蔓延。善入經絡。此又治跌打傷消癰腫之原理。究屬有毒。故又殺蟲。能療癬疥。

配合應用 ①風氣膏。治一切無名腫毒。藤黃四兩。白蠟八兩。小磨麻油十二兩。先將油煎熱。將成珠。入水不散。再加黃白攪勻。磁瓶收。面上仍以麻油養之。臨用攤貼。(不藥良方)

②一筆消。用大黃二兩。藤黃一兩。明礬。蟾酥各五錢。麝香。乳香。沒藥各二錢。用蝸牛搗爛作錠。遇小瘡毒。未出癰頭。以此醋磨。新筆蘸藥。圍外。愈則愈小。圍毒盡消而止。(視氏效方)

一八六二 藥塗毒四圍。數次即愈。(視氏一筆消方)

③消毒散。消癰疽。癰毒。及初生多骨疽。大黃一兩。芙蓉葉。曬乾。為末。五倍子各一兩。麝香。冰片各三分。藤黃三錢。生礬三錢。共為末。米醋調成如厚糊。塗於多骨疽之四週。中留一頭如豆大。以醋用鷄翎不時掃之。若不掃任圍。則無益。一日夜即內消。其餘癰毒。亦以此散之神效。又方。雄黃二兩。麝香三錢。藤黃一兩。人中白五錢。硃砂白芨。生白斂各二錢。蟾酥一兩。共研末。用廣膠三錢。烱化和藥末為錠。遇毒。將此藥磨醋水塗之。(良方彙選方)

④消毒方。治一切無名腫毒。及對口發背。用滴花燒酒。磨藤黃。敷。不住手敷之。不至半日即消。(救生苦海方)

⑤無回丹。治一切疔癰。癰疽。用鱸藤黃。雄黃。大黃各一兩。蟾酥。麝香各二錢。血竭。甲片炒各五錢。醋磨塗立效。(衆妙方)

⑥救生苦海云。如毒生在肢節。穴道險要處。不成漏症。即為難人。

須用此藥。只塗半圈。即移過一邊。用白芨、白蠟、三七、五倍子、大皂角、山茨菰、藤黃各等分。俱剉薄片。除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日。煎汁傾出。入水再煎。如此數次。濾淨。熬膏。以藤黃將水蒸烱。加入攪勻。再熬。入碗曬乾。用時以雞蛋清磨出。邊汁。新筆蘸塗。又方。藤黃、銀硃等分。醋和敷。趕毒至他處出膿。如用穀樹汁調。可搽。一二次即消。

(移毒方)

①大提藥方。圍毒初起。凡對口發背惡疽。四五日即消。雄黃、藤黃、麝香各一錢。硃砂三分。草麻肉三錢。紅昇丹一錢五分。先將草麻研如泥。後和各藥研爛。用象牙匣封。藏外以虎皮包之。方不泄氣。(良方彙選方) 治諸毒不起。敷之立起。藤黃、雄黃各三錢。蟾酥、紅藥各二錢。冰片、麝香各一錢。草麻肉一兩。先將草麻肉去皮。打如魚凍水。入諸藥。打成膏。磁罐收貯。勿令洩氣。或云宜紅藥三錢。冰片、蟾酥勿用。止加麝三分。辰砂一錢。(種福堂提藥方) 又方。鬱金、雄黃、藤黃各二錢。牛黃、蟾酥、硃砂、冰片各五

十九畫 藤

藥

分。巴豆肉八錢。草麻肉一兩。共搗爛。磁瓶貯。遇症放膏藥上少許貼之。治一切惡毒。未成可消。已成用之化腐。疔毒更妙。(黃提藥方)

①諸毒圍藥。用南星炒四兩。五倍子炒黑。白芨炒各二兩。藤黃、薑黃炒各一兩。共為細末。醋調塗。重者加牛黃一錢。鹿茸五錢。(祝氏效方) 又無膿即消。有膿即潰。五倍子一兩。白芷六錢。藤黃、百草霜各三錢。生半夏、生南星、白芨、陳小粉、飛麩各四錢。共為末。紅醋調敷。(種福堂方)

②箱毒。五倍子略焙一兩。藤黃四兩。銅青少許。小粉炒八兩。作錠。用時醋磨塗。(活人書方)

③治一切無名腫毒。藤黃五錢。五倍子二兩。白蜜。蔥頭各一兩。用米醋調圍患處。留頂勿敷。

④五色蟾酥墨。能立消腫毒。雄黃、銀硃、膽礬、韶粉、藤黃、銅綠、礞砂各一兩。麝香一錢。共為末。蟾酥為條。如筆管大。水磨塗。

⑤治疔瘡。銀硃、蟾酥、白甘菊、人中白、芫根、內白心、雄黃、藤黃、大黃。共搗敷上即退。(楊氏便易方)

⑥治坐板疔。藤黃搗碎。用雄豬網油。青布一長條。將藤黃摻在網油之上。青布捲成條子。用線紮緊。浸菜油內一夜。火燃取滴下油。杯積埋土中一夜。出火毒。塗疔即效。(仙遺拾珠方)

⑦五黃散。治一切頑癬。雞脚大黃、硫黃、雄黃、靈黃、藤黃各等分。為細末。菜油調塗患處。七日勿洗浴。全愈。

⑧金氏離洞膏。治癩瘡如神。萬應油五兩。藤黃一兩五錢。淨黃蠟二兩。共熬黑棧色。攤貼。熬萬應油法。香油六十兩。以十六兩官秤作準。浸桃枝一兩。柳枝一兩。槐枝一兩。桑枝一兩。葱一兩。男髮四兩。花椒五錢。草麻二兩。馬前四兩。蕁麻五錢。桂枝一兩。白芷二兩。夏浸三日。冬七日。春秋五日。然後熬至渣枯。去渣。每筋生油熬熱汁。得八折。此油凡一切疔藥。可作地子。

參攷資料 ①按郭義恭廣志云。出岳鄂等州諸山。崖樹名海藤。花有蕊。散落石上。彼人收之。謂之沙黃。就樹採者。輕妙謂之蠟黃。今人訛為銅黃。銅藤音謬也。此與石

溟採之無異。貴家及丹竈家時用之。(李珣) ②今畫家所用藤黃。皆經煎煉成者。紙之麻人。按周達觀真臘記云。國有畫黃。乃樹脂。香人。以刀斫樹枝滴下。次年收之。似與郭氏說微不同。不知即一物否也。(李時珍) ③藤黃性毒。而能攻毒。故治牙蟲。蛙齒點之。即落。毒能損骨。傷腎。可知。葉氏得宜本草云。服藤黃藥。忌吃烟。按三黃寶蠟丸。黎啊丸。俱用藤黃。以其善解毒也。有中藤黃毒者。食海蜃即解。(張石頑)

【藤葵】即落葵之古籍別名。典見食鑑本草。詳「落葵」條。

【藤詔子】即詔子之古籍別名。典見綱目。詳「詔子」條。

【藥子】即海藥子之簡稱。詳「海藥子」條。

【藥王草】形態 藥王草類。雜色。摘之有汁。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 解一切毒。止鼻衄。吐血。祛煩燥。

十九畫藥

藩 蘊 藪 蔭 薄 藹 藹 藹 蠲 蟾 蟹

一八六四

【藥果】即宜母果之古籍別名。與見綱目拾遺。詳「宜母果」條。

【藥芹】即川芎之古籍別名。與見和漢藥考。詳「川芎」條。

【藥珠】即真珠細碎可入藥者。詳「真珠」條。

【藥茶黃】即葵菜黃之古籍別名。與見和漢藥考。詳「葵菜黃」條。

【藥蜂針】命名 本品係以蜂針和藥製成者。故名。

製法 取黃蜂針。合硫煉。加冰片用。

主治 灸瘡。以溼紙覆瘡。其先乾處。即瘡頭。用針置瘡灸之。

【藥寶】即貝母之古籍別名。與見綱目。詳「貝母」條。

【藥製柑橋餅】命名 本品係柑之製成餅者。故名。

製法 用元明粉。半夏。青鹽。白朮。甘草。烏梅。去核。各二錢。糊砂。桔梗。各三錢。以上俱用雪水煎半乾。去渣。澄清。取湯。煮柑橋。炭火烘。候火快。

外國名詞 Solcoeurtus

基本 係蟬體動物。其翅類有管類。同緣類。竹蠶科之蠶。

【蠶】Constricta Tamarck (拉丁) アゲマキ(日本)

【蠶殼】日曬夜露。經年取下。色白如雪。持細水漂淨。末曬乾。入冰片固藏待用。

日翻二次。每次輕輕細捻。使藥味盡入皮內。如捻破則不佳。待乾入藥用。

主治 清火。化痰。寬中。降氣。

【藥藻】即貫衆之古籍別名。與見別錄。詳「貫衆」條。

【薄蘆草】即木槿之古籍別名。與見綱目。詳「木槿」條。

【蘆葦】即刺楸之別名。詳「楸白皮」條。

【藪柑子】即紫金牛之日本名。詳「紫金牛」條。

【蔭】即紅花益母草之古籍別名。與見附雅。詳「益母草」條。

【藪】即蔭釐之古籍別名。與見綱目。詳「蔭釐」條。

【藪】即海藻之古籍別名。與見綱目。詳「海藻」條。

【藪】即蘆根之古籍別名。與見新修本草。詳「蘆根」條。

外國名詞 Solcoeurtus

基本 係蟬體動物。其翅類有管類。同緣類。竹蠶科之蠶。

【蠶】Constricta Tamarck (拉丁) アゲマキ(日本)

【蠶殼】日曬夜露。經年取下。色白如雪。持細水漂淨。末曬乾。入冰片固藏待用。

產地 生海濱沙土中。

形態 蠲為介類。蚌屬之一種。其殼稍呈長方形。而膨大。前後開放。表皮薄。長二寸餘。右殼有主齒。二左殼有主齒三。殼頂有外殼。殼外淡茶褐色。內面白色。殼之一端有細長之水管二條。伸出殼外。棲於淤泥之海中。其肉似蠶。色白味美。可供食與藥用。



蠲

性質 甘。溫。無毒。

主治 補虛。主冷痢。煮食之。去胸中邪熱。煩悶。飯後食之。與服丹石人相宜。治婦人產後虛損。

參攷資料 蠲肉。天行時病後。不可食之。(孟詵)

製法 用蠲殼置瓦上。日曬夜露。經年取下。色白如雪。持細水漂淨。末曬乾。入冰片固藏待用。

主治 喉風。急痺。

【蠲殼】即蠲殼之古籍別名。與見綱目。詳「蠲殼」條。

【蠲殼】即蠲殼之古籍別名。與見綱目。詳「蠲殼」條。

【蠲殼】即蠲殼之古籍別名。與見綱目。詳「蠲殼」條。

與見綱目。詳「桑螵蛸」條。

【蟹】外國名詞 蟹爪。蟹殼。蟹肉。

古籍別名 螯蟹。橫行介士。(蟹譜) 郭索。(揚雄) 無腸公子。(抱朴子) 雄者名蝦蟇。雌者名博帶。化蟻。撥掉子。擽劍。築步。執火。蟾蟬。蟾蟬。(綱目)

外國名詞 Brachyura sp. (Crab) (拉丁)

基本 係昆蟲類節足動物類之蟹。

產地 凡池沼湖澤中恒有出。

形態 蟹為介類。棲息水岸穴窟。頭胸部甲甚闊。腹甲扁平。屈折於胸部之下。有橫紋。雄者小而尖。雌者大而圓。複眼在背甲前緣之深窩。有柄承之。大顯堅硬如齒。便於咀嚼。內臟在背甲下。脚五對。第



蟹

一對變形為螫。橫行甚速。探取 八九月採捕之。

製法 李時珍曰。凡蟹生烹鹽。糟收酒浸。醬汁浸。皆為佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腐。得皂莢或蒜及韶粉可免沙。腫得白芷則黃不散。得葱及五味子同煮。則色不變。

性質 鹹寒。有小毒。

效能 散血結。瀉諸熱。其殼用作疥癬漆瘡藥。

主治 胸中邪氣熱結痛。噎僻面腫。能敗漆。燒之致臭。《本經》解結散血。愈漆瘡。養筋益氣。《別錄》

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論蟹曰。散諸熱。治胃氣。理輕脈。消食。以醋食之。利胆筋。去五臟中煩悶氣。益人。【唐】陳藏器本草拾遺論蟹曰。能續斷絕筋骨。去殼同黃搗爛。微炒。納入瘡中。筋即連也。【宋】日華諸家本草論蟹曰。產前肚痛血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生搗炒碎之。【宋】寇宗奭本草衍義論蟹曰。小兒解頰不合。以熬同白及末搗塗。以合為度。【明】李時珍本草綱目論蟹曰。殺

十九畫 蟹

黃膏毒。解蠶魚毒。漆毒。治瘡。及黃疽。搗膏塗疥癬癩瘡。搗汁滴耳聾。

【明】繆希雍本草經疏論蟹曰。蟹味鹹氣寒。本經雖云有毒。然今人多食之。卒無害。其有毒者。大抵形質怪異。入足陽明足厥陰經。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。故主胸中邪氣熱結痛也。噎僻者。既陰風熱也。面腫者。陽明熱壅也。解二經之熱。則筋得養而氣自益。噎僻面腫俱除矣。鹹走血而軟堅。故能解結散血。漆得蟹則化為水。燒之可集鼠於庭。此物性之相感相制。莫能究其義也。愈漆瘡者。以其能解漆毒故也。爪性迅利。故能破胞墮胎也。

【清】黃宮繡本草求真論蟹曰。螃蟹最屬陰寒。故書所述利弊。大令人駭。如蟹與柿同食。則令人泄瀉。及發癢癩。與孕婦食。則能使胎即下。而爪尤甚。以蟹燒烟。則能集鼠於庭。同銀硃燒烟。則能使臭蟲即斃。蟹近於漆。則化漆而為水。筋骨損斷。用蟹搗爛微炒。納入瘡中。則能使筋即連。他如胸中熱積。噎僻面腫。及蓄血發黃。婦人乳癰硬腫。小兒頰解。凡因熱結熱滯而成者。

無不用之立效。其化血為水。逐熱消瘀。未有若是其神者矣。總原性屬鹹寒。外骨內肉。生背熱赤。陽包陰象。陰氣純佈。故克其迅利耳。若血因寒滯。及腹中疼痛。喜熱而惡寒者。其切忌焉。蟹宜入蒜頭。則不沙。中蟹毒者。宜搗蒜節熱酒調服。【清】張隱卷本草崇原論蟹曰。今外科多用蟹殼。搗細篩末。為鐵箍敗毒散。大抵蟹殼為攻毒散風消積行瘀之用。學者以意會之可也。【清】王士雄隨息居飲食譜論蟹曰。蟹甘鹹寒。補骨髓。利肢節。續絕復。滋肝陰。充胃液。養筋活血。治疽愈瘰。療跌打骨折筋斷諸傷。解鯉魚。莨菪。漆毒。殺主辟邪破血。爪可催產墮胎。種類甚繁。名號不一。以吳江烏程秀水嘉興海昌等處河中。所產。稍後大而脂滿者。勝和以鹽醋。風味絕倫。多食發風積冷。孕婦及中氣虛寒。時感未清。痰嗽便瀉者。均忌。別種更寒。尤不益人。中其毒者。紫蘇冬瓜蘆根。蒜汁皆可解之。反荊芥。又忌同柿食。誤犯則腹痛吐利。急以丁香木香解之。海產者黃堅滿而無脊不鮮。並

可鹽漬酒浸。積久。得皂莢則不沙。

配合應用 治濕熱黃疸。以蟹燒存性研末。酒糊丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。日服二次。【集簡方】

治骨節酸脫。生蟹搗爛。以熱酒傾入。連飲數椀。其渣塗之。半日內。骨內谷谷有聲。即好。乾蟹燒灰。酒服亦好。【唐瑤經驗方】

治中鯉魚毒。食蟹即解。【蘇炳驗方】

千金神造湯。治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出生者安。神驗方也。用蟹爪一升。甘草二尺。東流水一斗。以葶藶煮至二升。濾去滓。入真阿膠三兩。令烱頓服。或分二服。若人因不能服者。灌入即活。

下胎蟹爪散。治妊婦有病欲去胎。用蟹爪二合。桂心。覆麥各一兩。牛膝二兩。為末。空心溫酒服一錢。【千金方】

治崩中腹痛。毛蟹殼燒存性。米飲服一錢。【證治要訣方】

治蜂螫螫傷。蟹殼燒存性研

十九畫 蟹 螳 蟻 蟹 蟻

末。蟹調塗之。(證治要訣方)

●魚辟壁虱。用蟹殼燒烟薰之。(摘玄方)

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。不可與柿同食。食之損人。

參攷資料 ●仙方用之。化漆爲水。服之長生。以黑犬血灌之。三日燒之。諸鼠畢至。(陶弘景) ●未殺霜。甚有毒。云食水真所致。人中

之不療多死也。獨整。獨目。兩目相向。六足。四足。腹下有毛。腹中有骨。頭背有星點。足斑目赤者。並不可食。有毒害人。冬瓜汁。紫蘇汁。蒜汁。豉汁。薑根汁。皆可解之。(陶弘景)

●不可同柿及荊芥食。發發亂動。風。木香汁可解。(李時珍) ●按傳

底蟹譜云。蟹水蟲也。故字從蟲。亦魚屬也。故古人從魚。以其橫行。則

曰螃蟹。以其行聲。則曰郭索。以其外骨。則曰介士。以其內空。則曰無

腸。(李時珍) ●蟹類甚多。螳蟬。擁劍。蟬蟬。皆是不入藥。海邊又有

蟬蟬。似蟬而大。似蟹而小。不可食。蔡謨初渡江。不識蟬蟬。嘆之。幾

死。嘆曰。讀爾雅不熟。爲學者所誤也。(陶弘景) ●今淮海。汴京。河北

破深中多有之。伊洛乃反難得也。今人以爲食品佳味。俗傳八月一

日取稻芒兩枝。長一二寸許。束行輸送其長。故今南方捕蟹。差早則

有銜芒。須霜後輸芒。方可食之。否則毒尤猛也。其類甚多。六足者名螳。(音曉)四足者名蟻。皆有大毒。不可食。其殼闊而多黃者名蟻。生南海中。其螯最銳。斷物如芟刈也。食之行風氣。其扁而最大。後足闊者。蟬蟬。南人謂之撥掉子。以其後脚如掉也。一名蟬。隨潮退殼。一退一長。其大者如升。小者如莖。兩螯如手。所以異於衆蟹也。其力至強。八月能與虎鬪。虎不如也。一螯大一螯小者名擁劍。一名桀步。常以大螯鬪小螯食物。又名執火。以其螯赤也。其最小無毛者名蟬蟬。(音越)吳人詭爲彭越。爾雅云。蟬蟬小者螳。郭璞註云。卽蟬蟬也。(蘇頌) ●蟹橫行甲蟲也。外剛內柔。於卦象離。骨眼蜎腹。蜎蜎足。二螯八腕。利鉗尖爪。殼脆而堅。有十二星點。雄者脰長。雌者脰圓。腹中之黃。應月盈虧。其性多燥。引聲噴沫。至死乃已。生於流水者。色黃

而腥。生於止水者。色紺而紫。佛書言其散子後。卽自枯死。霜前食物。故有毒。霜後將蟹。故味美。所謂入海輸芒者。亦謬談也。蟬蟬大於螳。生於陂池田港中。故有毒。令人吐下。似蟬蟬而生於沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。似蟬蟬而生海中。潮至出穴而望者。望潮也。可食。爾螯極小如石者。蚌江也。不可食。生溪澗石穴中。小而殼堅赤者。石蟹也。野人食之。又海中有紅蟹。大而色紅。飛蟹能飛。善化國有百足之蟹。海中蟹大如錢。而腹下又有小蟹如榆莢者。蟹奴也。居蚌腹者。蟹奴也。又名寄居蟹。並不可食。蟹腹中有蟲。如小木髓子而白者。亦不可食。大能發風者也。(李時珍)

【蟹爪】 主治 破胞。墮胎。

日華諸家本草論蟹爪曰。能破宿血。止產後血閉。酒及醋湯煎服良。【明】李時珍本草綱目論蟹爪曰。隨生胎。下死胎。辟邪魅。【蟹肉】卽蟹之處方用名。詳【蟹】條。

【蟹殼】 主治 燒存性。蟹調。薄

婦人兒枕病及血崩腹痛消積。【蟬蟬】卽土蜂之古籍別名。典見本經。詳【土蜂】條。

【蟻埕土】 命名 蟻。高起也。本

品爲蟻所爬起之土。故名。【古籍別名】蟻封。(綱目)

主治 狐刺瘡。取七粒和醋搽。

又死胎在腹及胞衣不下。炒三升。盡盛。搗心下自出。【蟻封】卽蟻埕土之古籍別名。典見綱目。詳【蟻埕土】條。

【蟻蟻】卽白蟻之古籍別名。典見

綱目。詳【白蟻】條。【蟻蟻子】卽白蟻之古籍別名。典見和漢藥考。詳【白蟻】條。

【蟻蟻】卽蟻蟻之古籍別名。典見

綱目。見【蟻蟻】條。【蟻蟻】卽蟻蟻之簡稱。詳【蟻蟻】條。

【蟻酥】 命名 本品乃蟻蟻之

酥。故名。【古籍別名】月魄。(綱目)月魄。蟻寶。(和漢藥考)

外國名詞 Food-poison (英)

基本 爲蟾蜍分泌之白色乳狀毒液。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蟾蜍以產河北省北平東便之豐四。玉田兩縣者爲最好。亦多出山東產者次之。六七月收成和漢藥考曰。中國之江蘇。四川。皆其主產地。

形態 蟾酥爲蟾蜍分泌之毒汁。與麵粉泥和之煉合物。其形狀不一。惟外面稍覺滑澤。現黑褐色。其破碎片之尖端。透映而作褐色。味辛烈。其粉末如入眼內及鼻中。即發腫痛。水能次第溶解。市上出售者。多作扁圓形。大九分許。中心凹陷。有一小孔。此蓋串以麻線。令得風乾也。亦有爲半圓形。徑一寸高六七分。中亦穿孔。又或扁平。展延若板片者。製造處及品質俱各不同。故其形狀亦異。就中以香木甕子形者爲最佳。

採取 六月七月採治之。其法有三焉。一刺蟾蜍之眉間。使分泌白汁。二以蟾蜍入水缸中。覆以有孔之蓋。孔中插細竹枝。以刺蟾

十九畫 蟾

蟾。使其痛苦。蟾毒憤怒不勝。自皮膚分泌多量之毒液。乃從而收集之。三以蟾蜍置中央。四面架鏡。使起受困之感。因分泌多數毒液。以保護己之身體。吾人即利其所有。與麵粉混合煉製。前人不知爲外皮分泌之液汁。每誤以爲油。故有蝦蟆油之稱。

製法 寇宗奭曰。凡使蟾酥。須眉間白汁。謂之蟾酥。以油單紙裹眉裂之。酥出紙上。陰乾用。李時珍曰。取蟾酥不一。或以手捏眉稜取白汁。於油紙上及桑葉上。插背陰處一宿。即白乾。安置竹筒內。盛之。真者輕浮。入口味甜也。或以蒜及胡椒等辣物納口中。則蟾身白汁出。以竹筴刮下。麵和成塊。乾之。其汁不可入人目。令人赤腫。或以紫草汁洗點即消。

性質 甘辛溫。有毒。

成分 爲開梅因。但有毒。

效能 散風火癰毒。治發背疔腫。有強心之效。爲清涼性興奮藥。又外用消散疔癰腫毒藥。

主治 小兒疳疾。臍疳。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐嗣經本草論蟾酥曰。主疔牙。及小兒疳瘦。【宋】日華諸家本草論蟾酥曰。酥同牛酥。或吳茱萸苗汁調。摩腰眼陰囊。治腰腎冷。并助陽氣。又療蟲牙。【宋】寇宗奭本草衍義論蟾酥曰。治齒縫出血及牙疼。以紙紙少許按之立止。【明】李時珍本草綱目論蟾酥曰。發背疔瘡。一切惡腫。【清】黃宮繡本草求真論蟾酥曰。蟾酥味辛氣溫有毒。能拔一切風火熱毒之邪。使之外出。蓋邪氣着人肌肉。鬱而不解。則或見爲疔腫發背。陰疔陰蝕。疽癰。瘰癧。故必用此辛溫以治。蓋辛主散。溫主行。使邪盡從汗出。不留內入。而熱自可以除矣。性有毒。止可外治取效。即或用丸劑。亦止二三四厘而已。多則能使毒入。其用作丸。投服亦宜雜他藥內入。如牛黃。明礬。乳香。沒藥之類。毋單服也。故香載拔諸毒。只宜用酥一錢。白麵二錢。硃砂少許作錠。諒病輕重酌與。不可盡服。又治背發無名等毒。取酥三五分。廣膠水化。米醋入。銚火化。乘熱手刷不已。以散爲度。刻玉塗之。等於刻蠟。房術用之更善。總

皆外科奪命之功。輕用爛人肌肉。至若蟾蜍。氣味辛寒。凡癰癧。疔瘡。風火咬傷。小兒疳積。瘰癧。發背。瘡疽。發背。用之與酥略同。以其辛有發散之能。寒有逐熱之功。外服固見神功。內服除去頭足腸腹垢。亦能去積除熱。如風狗咬傷。用蟾蜍後足。搗汁生食。先於患人頂心。拔去血髮三四莖。於小便內見沫。其毒即解。發背初腫。用活蟾數個。裏易繫於腫上。則其毒亦散矣。總皆具有外拔內攻之力。勿輕用也。蟾酥以油單紙裹眉裂之。酥出紙上。陰乾。用蟾蜍焙乾。去皮爪。酒浸去肉用。

國外學說 日本藥學博士石津利作及上遠野與作兩氏。同將蟾蜍皮膚之分泌物。以化學研究之。遂名其毒分曰加瑪菌。並舉其生理作用如下。加瑪菌者。爲日本內地產蟾蜍皮膚分泌物之一種成分。其作用。極似質荳荖利斯。有使心臟作用強盛之效。用此藥後。脈搏減少。脈之容積加大。血液上昇。尿量增加。若其作用再稍加劇。即誘起心臟收縮性之休止。然

無使血球溶崩之作用。又動物對此毒質不能享受免疫性。其毒力遠不若質莖託扣希與地瑪林。此毒質三分之一約當質莖託扣希與地瑪林四分之一。而其有效量與中毒量之相差。又較他種強心藥為甚。即如質莖託扣希之製劑。雖奏強心之效。然常有蓄積作用。而此則無之。試投加瑪茵。其心臟作用尤為迅速。以其易於吸收故也。若夫局部之腫痛作用。必多用始然。設僅用治療之量。則決無誘起腫痛之弊害。說見衛生試驗藥報第十五號。

辨偽

鄧肯曰：蟾蜍生江湖池澤間。其眉間白汁謂之蟾酥。以油單紙裹眉裂之。酥出紙上陰乾。或以蒜及胡椒等辣物納口中。則蟾身白汁出。以竹筴刮下。麵和成塊。乾之。開有一種假酥。係麵粉及別藥偽造。萬不可用。曹炳章曰：按鮑叔真醫方約說云：蟾酥乃治諸毒之要藥也。製合得宜。傳服皆可用。蛤蚧皮即蟾皮也。大能收毒外貼。不可缺也。嘉興縣志云：官中用蟾酥。於每年端午日修

合。各坊車蝦蟇至醫院者億萬計。往時取用後率斃。蓋兩目俱廢。不能跳躍也。東山朱公典院事。命止刺其一偏。得甦者甚多。此事似微。然發念甚真。為德不淺。王文護碎金方。取蟾酥法。先將牙皂角三兩煎水三沸。旋候冷。用大口甕或缸盛水。將蝦蟇不拘多少入中。以稀物覆之。勿令跳出。過一宿其酥即浮水面。若未浮。其酥即在身上矣。可用竹刀刮下。用之。本草明辨云：端午日以大蛤壳未離帶者。合於蝦蟇眉上腫處。用力一捻。則酥出壳內。貯於油紙候乾。江南出者為杜酥。要無麴塊神色。起亮光者佳。無錫出者。中有竹節痕。浙江杭州出者。為片子酥。粉質少者亦佳。山東出者。為東酥。色黃黑。味麻辣。不上二層之貨。蓋酥本無定色。但驗其粉之輕重。以為銜。如看成色。以水一碗。將酥化開。放入水。如烏見水即變色。水面有泡沫者。真偽者見水不動。而粉質漸露矣。

配合應用

爛疔根。用蟾酥同錢糖、桑槿、麝香、牛黃、冰片。以金錢錢入疔根。抹入前藥。其疔根即

爛出

① 治疔丸。用蟾酥、硃砂、冰片、牛黃、明礬、白殭蠶、麝香、黃蠟溶化。作丸。麻子大。用葱頭白酒吞下。取汗。不過二、三小丸。

② 拔取疔黃。用蟾酥以麩丸。梧子大。每用一丸。安舌下。即黃出也。
(青囊雜纂方)

③ 拔取疔毒。蟾酥以白麩黃丹。搜作劑。每丸麥粒大。挑破納入。仍以水澄膏貼之。(危氏方)

④ 治一切疔毒。蟾酥一錢。白麩二錢。硃砂少許。井水調成小錠子。如麥大。每用一錠。葱湯服。汗出即愈。如疔勢緊急。用三四錠。(保命集方)

⑤ 凡癰疽發背。無名腫毒初起者。急取蟾酥三五分。廣膠一塊。米醋一二碗。入鍋內火化開。用筆蘸乘熱令人不住手周圍潤之。以散為度。(萬氏家抄方)

⑥ 治疔瘡惡腫。蟾酥一錢。巴豆四箇。搗爛。飯丸。錠子。如綠豆大。每服一丸。薑湯下。良久以薑黃根、黃荊子、研酒半碗服。取行四五次。以粥補之。(乾坤秘製方)

⑦ 治諸瘡腫。針頭散。用蟾酥、麝香各一錢。研勻。以乳汁調和。入罐中待乾。每用少許。津調傳之外。以膏護住。毒氣自出。不能為害也。
(保命集方)

⑧ 治喉痺乳蛾等證。用爛蝦蟇眉酥。和草烏尖末、豬牙皂角末等分。丸小豆大。每研一丸。點患處。神效。(活人心統方)

⑨ 治一切齒痛。疔蝕齒齦。腫用芎藭一枚。鞭其頭背。以竹筴刮眉間。即有汁出。取少許。點之。即止也。(類編方)

⑩ 治風蟲牙痛不可忍。用蟾酥一片。水浸軟。入麝香少許。研勻。以粟米大。綿裹咬定。吐涎愈。一方用胡椒代麝香。一方用蟾酥染絲綿。上剪一分。緝入齒縫根裏。忌熱物。半日效。乾者以熱湯化開。(聖惠方)

⑪ 治破傷風病。蟾酥二錢。湯化為糊。乾蠟酒炒。天麻各半兩。為末。合搗丸。綠豆大。每服一丸。至二丸。豆淋酒下。(惠聖方)

⑫ 用蠟 二錢至五錢。
應用宜忌 凡非實症者禁用。

【蟾蜍】 處方用名。乾蟾腹。蟾
蟾皮。炙乾蟾。

古俗別名。鼈龜(爾雅)鼈鼈。
(詩經)若蟹。蝮龍。若蟹。何蚊。類蝦
蟾(綱目)威施。(韓詩註)蟾諸。
(說文)

外國名詞 Bufa vulgaris
Laur (拉丁) Bullfrog. (英)
Kroco. (德)

基本 係兩棲類。無尾屬中之
尖指類之蟾蜍。

產地 凡江湖池澤及屋隅階
石之溼地間恒有生焉。

形態 蟾蜍各地皆產。多棲息
於人家之溼地。夏秋之交。薄暮或
黃昏。即出庭園。覓食昆蟲。蛙類
中此為最大。背暗褐或黑。常溼潤
有塊。具毒腺。腹肥大。色黃白。而
雜黑色之斑紋。眼放金光。較蛙類
略大口亦闊大。趾端無蹼。性愚鈍。
步行緩慢。不善跳躍。且不能鳴。平
時陸棲。非產卵期不入水中。入冬
則蟄伏穴內。

採取 五月間採之。

製法 蜀圖經曰。凡使蟾蜍。須
五月五日。取得日乾。或烘乾。用一

十九畫 蟾

法去皮。瓜子浸一宿。又用黃精自
然汁浸一宿。塗酥炙乾。用。李時珍
曰。今人皆於端午日。捕取風乾黃
泥。固濟。煨性存用之。永類鈴方云。
蟾目赤腹無八字者不可用。崔實
四民月令云。五月五日取蟾蜍。可
治惡瘡。即此也。亦有酒浸取肉者。
錢仲陽治小兒冷熱疔。如聖丸。
用乾者酒煮成膏丸。藥一法也。

性質 辛。涼。微毒。

效能 殺蟲。治驚疔。拔毒。療瘡
瘍。用作小兒五疳驚風藥。又為殺
蟲解毒藥。

主治 陰蝕疽瘡。惡瘡。獾犬傷
瘡。能合玉石。

歷代記述攷證 【南北朝】陶
弘景本草集註論蟾蜍曰。燒灰。傳
瘡立驗。又治濕病發斑。困篤者。去
腸生搗食一二枚。無不瘳者。(搗
爛絞汁飲。或燒末服) 【唐】甄權
藥性本草論蟾蜍曰。殺疔蟲。治鼠
漏惡瘡。燒灰。傳一切有蟲惡瘡。滋
胤瘡。【宋】日華諸家本草論蟾蜍
曰。治疔氣。小兒面黃。瘡氣。破癥結。
燒灰。油調。傳惡瘡。【宋】蘇頌嘉祐
圖經本草論蟾蜍曰。主小兒勞瘦

瘡疾最良。【明】李時珍本草綱目
論蟾蜍曰。治一切五疳。八疳。腫毒。
破傷風。病脫肛。【明】孫希雍本草
經疏論蟾蜍曰。蝦蟆。蟾蜍。本是二
物。經云一名蟾蜍者。蓋古人通稱
蟾為蝦蟆耳。經文雖名蝦蟆。其用
實則蟾蜍也。今世所用者皆蟾蜍。
而非蝦蟆。其功益可見矣。味辛氣
寒。毒在肩稜皮汁中。其主癰腫。陰
瘡。陰蝕。疽瘡。惡瘡。獾犬傷瘡者。皆
熱毒氣傷肌肉也。辛寒能散熱解
毒。其性急速。以毒攻毒。則毒易解。
毒解則肌肉和。諸證去矣。凡瘋疫
邪氣。得汗則解。其味大辛。性善發
汗。辛主散毒。寒主除熱。故能使邪
氣散而不留。邪去則胃氣安。而熱
病退矣。破癥。堅血者。亦以其辛寒
能散血熱。壅滯也。陶隱居云。其肪
塗玉則刻之如蠟。故云能合玉石。
近世治小兒疳疾多用。以其走腸
明而能消積滯也。

國外學說 日本學說謂蟾蜍
者。古來用於種種疾患。謂治內外
諸病。(蟲。便秘。胃病。水腫。恐水病。
惡性潰瘍)有效。又シールト
氏所著日本動物篇中。論其醫治

效用。頗有可觀者。(中略)自其皮
腺分泌之液。為白色乳糜樣。有
黏着性。其反應為弱酸性。於顯微
鏡下照之。見脂肪顆粒。及脂化上
皮。其效用全與寶多利斯(毛
地黃)相同。故欲以蟾蜍供治療
之用。宜用其皮膚。而其適症為血
行器病。(和漢藥論)又吾國人治
疔疾及疔毒惡腫等時。採收蟾蜍
之唾液與麵粉混合為小餅狀用
之。又日本廣橋正三郎氏。曾取蟾
蜍之表皮。試驗其毒性。將所得成
績載入藥學雜誌第三百五十八
號。一曰表皮所得之毒。與其水分
二曰表皮之毒。三曰腺液之毒。四
曰毒質之溶解性。五曰毒質之分
析法。六曰蟾蜍之血清與其毒質
之關係。中國醫書載有治瘋犬
病法。以蟾蜍肉為胎食之。因此水
戶醫官原克昌。著有瘋狗傷考。亦
載蟾蜍胎之說。此書於天保七年
印行。茲摘錄如左。小品方云。生食
蟾蜍胎。絕良。張翥曰。以蟾蜍一二
枚。搗汁服。肘後方云。治獾犬傷。每
七日一發。食蝦蟆胎。絕良。亦可炙
食。但勿令本人知之。後永不復發

也。楠珍云。治瘋犬傷。卽用蝦蟆後足搗爛。水調服之。昌克按。李中梓亦於蝦蟆條說。謂犬之效。又沈約宋書載張收(或作牧)爲獺犬所傷。人云宜噉蝦蟆胎。食之遂愈。實一奇方也。野呂玄亦有蝦蟆胎之說。又有療毒蛇咬。急取蝦蟆搗爛敷上。以帛繫之之法。如諸書所載。蝦蟆蓋卽瘡蝦蟆也。鄭樵道志云。蝦蟆類多。以蟾蜍爲上。昌克頃游久慈郡。訪慈雲寺。語次道及犬毒之事。上人語我曰。郡中遇其患者。乃作蛙胎食之。遂無至危篤者。因知此物善治毒。不必有蝦蟆。蟾蜍之分也。上人又曰。噉蝦蟆後。其頭上有發物如癩疥狀者。亦一奇也。經月餘便脫去。

配合應用 ①治腹中冷癖。水穀陰結。心下停痰。兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。大蟾蜍一枚。去皮腸支解之。芒硝強入一升。中人七合。病人五合。水七升。煮四升。頓服得下爲度。(肘後方)

②治小兒疳積。腹大。黃瘦骨立。頭生瘡。結如麥穗。用立秋後大蝦蟆。去首足腸。以清油塗之。陰陽瓦

炙熟食之。積穢自下。連服五六枚。一月之後。形容改變。妙不可言。

③治五疳八痢。面黃肌瘦。好食泥土。不思乳食。用大乾蟾蜍一枚。燒存性。鳧角去皮弦一錢。燒存性。蛤粉水飛三錢。麝香一錢爲末。糊丸。粟米大。每空心米飲下三四丸。日二服。名五疳保童丸。(全嬰方)

④治小兒疳泄下痢。用蝦蟆燒存性。研飲服方寸匕。(子母祕錄方)

⑤治走馬牙疳。侵蝕口鼻。乾蚬殼黃泥裹固。煨過。黃連各二錢。牛青黛一錢爲末。入麝香少許。和研傅之。(鄭氏小兒方)

⑥金鞭散。治疳瘡顯穿牙落。以抱退雞子軟白皮。包活土狗一箇。放入大蝦蟆口內。草縛。泥固煨過。取出研末貼之。以愈爲度。(普濟方)

⑦治小兒口瘡。五月五日。蝦蟆炙研末傅之。卽瘥。(子母祕錄方)

⑧治一切疳瘡。無問去處。皆能治之。蝦蟆燒灰。醋和傅。一日三五度。(梅師方)

⑨治陰蝕欲盡。蝦蟆灰。兔屎等分爲末傅之。(肘後方)

⑩治月蝕耳疳。五月五日。蝦蟆燒末。醋和傅。(外臺祕要方)

⑪治小兒唇疳。五月五日。取蟾蜍炙研末。傅之。卽瘥。(子母祕錄方)

⑫治小兒臍疳出汁。久不瘥。蝦蟆燒末傅之。日三甚驗。一加牡蠣等分。(外臺祕要方)

⑬治一切溼瘡。蟾蜍燒灰。豬脂和傅。(千金方)

⑭治小兒癬疥。蟾蜍燒灰。豬脂和傅。(外臺祕要方)

⑮治癩風蟲疥。乾蝦蟆一兩。炙。長肥皂一條。炙去皮。子。酒。再炙爲末。以竹管引入羊腸內。繫定。以麩鋪飯內。置藥麩上。蒸熟。入麝香半錢。去麩。同搗爲丸。如梧子大。每溫酒服二十一丸。(直指方)

⑯治附骨壞疔。久不瘥。膿汁不巳。或骨從瘡孔中出。用大蝦蟆一箇。亂頭髮一雞子大。豬油四兩。煎枯去滓。待凝如膏。先以桑根皮。烏頭煎湯。洗拭乾。蝦蟆骨末。搽四邊。以前膏貼之。(錦囊祕覽方)

⑰治發背腫毒未成者。用活蟬一箇。繫放疔上半日。蟬必昏憤。置水中。以救其命。再易一箇。如前法。其蟬必跟附。再易一箇。其蟬如舊。則毒散矣。累驗極效。若勢重者。以活蟬一箇。或二三箇。破開連肚。乘熱合疔上。不久必臭不可聞。再易二三次。卽愈。慎勿以物微見輕也。(醫林集要方)

⑱治腫毒初起。用大蝦蟆一箇。剝碎同炒。石灰研如泥。傅之。類易。(余居士方)

⑲治破傷風病。用蟬二兩。半切。剝如泥。入花椒一兩。同酒炒熱。再入酒二盞。半。溫熱服之。少頃通身汗出神效。

⑳治獺犬咬傷。每七日一發。生食蝦蟆胎。絕良。亦可燒炙食之。勿令本人知之。自後再不發也。(肘後方)

㉑治瘋犬傷。卽用蝦蟆後足搗爛。水調服之。先於頂心拔去血髮三兩根。則小便內見沫也。(袖珍方)

㉒治腸頭挺出。蟾蜍皮一片。瓶內燒烟燻之。并傅之。(孫真人方)

㉓假積瘰癧。五月五日。收大蝦

蟻。乾。紙封。懸貯之。男左女右。藥背上。勿令知之。(楊氏家藏方)

折傷接骨。大蝦蟆生研如泥。劈竹裹縛。其骨自痊。(奚養備急方)

治大腸痔疾。蟾蜍一箇。以磚砌四方。安於內。泥住火煨。存性爲末。以豬廣腸一錢。扎定兩頭。煮熟切碎。齋齋末食之。如此三四次。其痔自落。

用蠶 錢半至二錢。
施用宜忌 凡無蟲積熱毒者禁用。

參攷資料 別錄云。治獾犬傷。肘後亦有方法。按沈約宋書云。張收爲獾犬所傷。人云宜噉蝦蟆。喻食之遂愈。此亦治癰疽疔腫之意。大抵是物能攻毒拔毒。古今諸方所用蝦蟆。不甚分別。多是蟾蜍。讀者當審用之。不可因名遂實也。(李時珍) 此是腹大皮上多疣。其皮汁甚有毒。大嚼之。口皆腫。五月五日。取東行者五枚。反縛着密室中。閉之。明日親自解者。取爲術用。能使人縛亦自解。蕭炳曰。腹下有丹書八字。以足畫地者。真

十九畫 蟾

蟾 蟹 蠅

蟾也。(陶弘景) 今處處有之。別錄謂蝦蟆一名蟾蜍。以爲一物。非也。按爾雅。鼃。蟾也。郭璞云。似蝦蟆。居陸地。則非一物明矣。蟾多在人家下溼處。形大。背上多疣。行極遲緩。不能跳躍。亦不解噉。蝦蟆多在陂澤間。形小。皮上多黑斑點。能跳接百蟲。舉動極急。二物雖一類。而功用小別。亦當分而用之。蟾屎謂之上極禱。下溼處往往有之。亦能主疾。寇宗奭曰。世傳三足者爲蟾。人遂爲三足枯蟾。以罔衆。但以水沃半日。其偽自見。蓋無三足者也。(蘇頌) 蟾蜍。頭睛腹。促眉濁聲。上形有大如盤。自然論云。蟾蜍吐生鄭蕪。自其口出也。抱朴子云。蟾蜍千歲。頭上有角。腹下丹書。名曰肉芝。能食山精。人得食之。可仙。術家取用。以起務。祈雨。辟兵。解縛。今有技者。聚蟾爲戲。能聽指使。物性有靈。於此可推。許氏說文謂三足者爲蟾。而寇氏非之。似是。但龜蟹皆有足。則蟾之三足。非怪也。若謂入藥必用三足。則謬矣。响蟻神書載蟾寶之法。用大蟾一枚。以長尺鐵釘四箇。釘

脚四下。以炭火自早灸至午。去火。放水一盞於前。當吐物如皂莢子。大有金光。人吞之。可越江湖也。愚謂縱有此術。誰敢吞之。方技誑說。未足深信。漫記於此。以備祛疑耳。(李時珍)

【蟾蜍皮】 主治 貼大毒。能拔毒。收毒。

配合應用 治腸頭推出。用蟾皮一片。燒熟。并傳(千金方)。

指頭紅腫生毒。用活蟾一隻。生剝皮。將皮外面向患處包好。明日其毒一齊拔出。或發背對口等症。毒忽收內。如又起再貼。切記不可將其皮裏面着肉。即咬牢難揭。凡痘疹後回毒。亦可用此治。(黃汝良行懷驗秘方)

瘰癧飲口瘡。治瘰癧。膿已盡。腫已平。瘡口未斂。以此貼之。用蝦蟆皮二個。要活刺者。鼠皮二張。蛇退二條。蜂房大者一個。上四味俱煨灰。將水膠一兩。用井花水一酒鍾化開。後加蜜一兩。蜈蚣煎麻油一小鍾。攪勻。前四味灰。隨起入麝香一分。將絹攤來不溼爲度。

凡患癰疽瘡毒者。用土中大

蝦蟆一個。對全身剝皮。蓋貼瘡口。於蟾皮上。用針將皮刺數孔。以出毒氣。自覺安靜。且能爬住瘡口。不令長大。又可免蜈蚣開氣來侵。神妙。(靈秘丹云)

【蟾蜍皮】 即蟾蜍之處方用名。詳「蟾蜍」條。

【蟾蜍舌】 主治 拔疔瘡。研爛。傅瘡上。以蟾肚皮查貼。根自出。

【蟾蜍尿】 古醫別名 土檳榔。產地 卑溼處多有之。主治 瘰癧瘡。

【蟾蜍蘭】 即天名精之古籍別名。與見別錄。詳「天名精」條。

【蟾菽袴】 即砂菽草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「砂菽草」條。

【蟾寶】 即蟾酥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蟾酥」條。

【蟾龜】 即龜龜之細而長者。性質功用參詳「龜龜」條。

【蟾龜】 即乳龜之古籍別名。典見廣雅。詳「乳龜」條。

【蠅虎】 即蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蠅虎」條。

【離樓草】 基本 離樓草爲雜草類之一種。其實可供藥用。

採取 七月八月採之。

性質 鹹平無毒。

主治 益氣力。多子。輕身。長年。

【雞火蘭】

原名 菟絲子。(和漢藥考)

形態 雞火蘭爲雜草類之一種。狀如菟絲子而微長。可供藥用。

性質 酸溫無毒。

主治 冷氣風痺。閉胃。下食。消腹脹。明眼目。

【靉犬骨】

即虎骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎骨」條。

【靉茄】

即菘菘子之別名。典見新本草。教本。詳「菘菘子」條。

【靉茄子】

產地 各處均有。出筋。利小便。補陽。效能 止痛。發表。傳

主治

風癩。腦氣。筋痛。哮喘。咳嗽。風癩。便閉。遺尿。陽痿。遺精。風濕。

【靉勒】

即天門冬之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳「天門冬」條。

【靉棘】

即靉勒之古籍別名。典見爾雅。詳「天門冬」條。

十九畫 離

【靉當蟲】 即蟬之古籍別名。典見本草拾遺。詳「蟬」條。

【靉香】 即蠶繭香之古籍別名。典見綱目。詳「蠶繭香」條。

【類鼻】

原名 薜荔草。(和漢藥考)

主治 生田野高地。

形態 類鼻爲澤草類之一種。葉如天名精。其根可供藥用。

採取 五月採之。

性質 酸溫無毒。

主治 痿痺。

【餽餽】 即餽餽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「餽餽」條。

【餽李子】 即李子之肥黏如餽者。典見綱目。詳「李子」條。

【鱈魚】 命名 鱈色黑。故名。古籍別名 子魚。(綱目)

外國名 鱈 Mugi cephalus Linn. 或 Mugi our Forsk. (Grey mullet) (拉丁) ポラ 或 イナ 或 オボコ (日本)

基本 係脊椎動物魚類硬鱈類。科 鱈科 產地 生江海中。

難 霧 類 鱈 鮭 鱈 鯖 鯊 鯢

形態 鱈魚爲魚類之一種。體長側扁。腹底彎曲。頭部闊大。被鱗。口低。齒小。脊鰭四棘。後脊鰭二棘。七刺。背鰭亦存。鱈同數。鱈爲鱈狀。背色暗灰。側面有淡黑之條紋。腹白色。骨軟如蠟。有黃脂。長者達尺餘。其肉可供食與藥用。



魚 鱈

性質 甘平無毒。

主治 開胃。利五臟。令人肥健。與百藥無忌。

【鱈魚膽】 即青魚膽之古籍別名。典見綱目。詳「青魚膽」條。

【鯊魚】 即石首魚乾者之古籍別名。典見綱目。詳「石首魚」條。

命名 本品鯢聲如小兒。故名。又其全身分泌之一種黏液。臭如山椒。遂有山椒魚之稱焉。

古籍別名 人魚。(山海經) 鮪

【鯢魚】

【鮪魚】

【鮪魚】

【鮪魚】

【鮪魚】

【鮪魚】

魚。鮪魚。鮪。(綱目) 鮪魚。山生魚。山椒魚。箱根山椒魚。高山源黑魚。(和漢藥考)

基本 屬有尾兩棲類中蝶蟻族之鮪魚。

產地 凡山谷溪澗中。恒有產焉。和漢藥考曰。黑魚棲息於山澗溪流。水質清潔。日光不到之處。夜則上陸。日本產黑魚地方。爲箱根。日光。天城等處。而以箱根湖所產。最爲人所稱道。



魚 鮪

形態 鮪魚棲息於溪流。屬於有尾兩棲類中之魚形族。幼時頸旁有鰓。老則以肺呼吸。體似蛇。無鬚。長四尺許。大可七八尺。性愚鈍。運動遲緩。背有突起物。似疣。色灰褐。雜以黑斑。腹黃。口大。食蛙魚類。以生存。全身分泌一種黏液。臭似山椒。故又名山椒魚。此物生活

主治 折傷。斷骨。燒灰。每服二錢。酒下。在上食後。在下食前。骨即接如初。

參攷資料 鷹鴉。鴉骨。皆能接骨。蓋為鳥之力在骨。故以骨治骨。從其類也。(李時珍)

【鵝屎】 主治 諸鳥獸骨哽。燒灰酒服。

【鵝雞】 即鵝之古籍別名。典見陸璣詩疏。見「鵝」條。

【鵝】 命名 鵝字古文作鵞。而其鳴聲暗暗。故名。

古籍別名 飛駁馬。(陶弘景) 喜鵝。(食療) 乾鵝。(新語)

外國名詞 Pica Pica Sericea Goud Magpie Fistor (拉丁) カササギ或テウセンガラ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類鳥科之鵝。

形態 鵝為林禽類之一種。其形如鳥。嘴尖。尾長。羽色黑褐。而有青紫色之光澤。肩頭。腹及胸與冠毛之後。皆白色。尾闊則黑白相間。尾長六寸。與身相等。嘴根有剛毛。蔽於鼻孔。至秋則毛毳頭禿。飛

鳴聲如鴉而低。其肉可供藥用。



鵝

採取 以雌鵝者入藥用。

性質 甘寒。無毒。主治 石淋。消結熱。可燒作灰。以石投中。解散者是雄。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌綱經本草論鵝肉曰。治消渴疾。去風。及大小腸澀。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。【明】李時珍本草綱目論鵝肉曰。冬至埋鵝於園前。辟時疾溫氣。

參攷資料 凡鳥之雌雄難別者。其翼左覆右者乃雄。右覆左者乃雌。又燒毛作屑納水中。沉者是雌。浮者是雄。今云投石。恐止是鵝。餘鳥未必爾。(李時珍)

【鵝不踏】 即椴木之古籍別名。典見綱目。詳「椴木」條。

【鵝巢】 採取 以多年者良。主治 燒之水服。療頭

狂。鬼魅。及蟲毒。仍呼崇物名。亦傳療疔良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鵝巢曰。燒研服。治積年漏下。不斷。困篤者一月取效。並小便不禁。

【鵝腦】 採取 五月五日採之。主治 入搨藥。

【鵝白】 即烏柏之古籍別名。典見綱目。詳「烏柏木」條。

【鵝麻】 即亞麻之古籍別名。典見綱經本草。詳「亞麻」條。

【鵝勇】 即烏柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏柏木」條。

外國名詞 Coturnix Communis Bonn. Co. Imnon quail或Quail Wachtel (拉丁) ウヅラ或ウズフ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鵝雞類雷鳥科之鵝。

產地 多蕃殖於黑龍江等地之原野間。

形態 鵝為原禽類之一種。形似雞。而頭嘴皆小。額幹肥滿。尾短

全體茶褐色。背淺褐色。翼黃褐色。黑斑。腹色赤白。秋從北來。春向北去。夜則羣飛。雲伏草叢。至秋鳴聲悽愴。性馴。可以養。其肉可供食。與藥用。

性質 甘平。無毒。主治 補五臟。益中。續氣。實筋。骨。耐寒暑。消結熱。和小豆。生薑。煮食。止洩痢。酥煎食。令人下焦肥。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論鵝肉曰。小兒患疳。及下痢五色。且且食之有效。

參攷資料 四月以前未堪食。不可合豬肉食。令人生黑子。合菌子食。令人發痔。(華禹錫) 按董炳集驗方云。魏秀才妻。病腹大如鼓。四肢骨立。不能貼席。惟衣被懸臥。穀食不下者數日矣。忽思鵝食。如法造之。遂運劇。少頃。兩汗其能言。但有更衣狀。扶而聞。小便突

出白液。凝如雞脂。如此數次。下盡。遂起。此蓋中焦溼熱積久所致也。詳本草。鵝解熱結。療小兒疳。亦理固然也。董氏所說如此。時珍謹按。鵝乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟇皆解熱治疳。利水消腫。則鵝之消鼓

一八七五

十九畫 鶉鴉鶉鶉鶉鶉 麒麕麗麕麕麕 二十畫 寶

一八七六

【鶉鴉】亦同功云。(李時珍)

【鶉鴉英】即蒲公英之古籍別名。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。

【鶉鴉】即鶉鴉之別名。與見動物學大辭典。詳『鶉鴉』條。



花春麗

性質 辛。微溫。無毒。

主治 霍亂。腹痛。吐逆。心煩。

【麗春花】即麗春花。詳該條。①即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。②即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。③即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。④即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑤即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑥即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑦即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑧即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑨即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑩即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑪即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑫即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑬即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑭即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑮即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑯即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑰即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑱即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑲即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。⑳即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉑即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉒即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉓即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉔即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉕即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】即麗春花。詳該條。㉖即酸模之古籍別名。與見和漢藥考。詳『酸模』條。

採取 春三月。採花陰乾。

用法 水煎或到末用。

成分 含有列阿琪克酸 (protogallic acid) 苹果酸。軟性樹脂。固性油等。

效能 用作緩和腹痛。催眠藥。

主治 癆瘵。黃疸。

用量 三分至八分。

參攷資料 ①唐天寶中。潁川

鄆。楊正進方。名醫皆用。有效。其方

云。麗香草。因時感傷熱。變成癰

黃。遍身壯熱。小便黃赤。眼如金色。

面又青黑。心頭氣痛。遂心如刺。頭

旋欲倒。兼脇下有瘕氣及黃疽等。

經用有驗。其藥春三月採花陰乾。

一升。搗散。每平明空腹取三方寸

匕。和生麻油一盞。頓服。日一服。隔

五日再進。以知爲度。其根。按黃疽

搗汁一盞。空腹頓服。須臾。卽利三

兩行。其疾立已。一劑不能全愈。隔

七日。更一劑。永痊。忌酒。麪。魚。蒜。

粉。醋等。(蘇頌) ②麗春草。生。檀。嶼。

山川。谷。檀。嶼。山。在。高。密。界。河。南。淮

陽。郡。潁。川。及。譙。郡。汝。南。郡。等。並。呼

爲。龍。羊。草。河。北。近。山。鄴。郡。汲。郡。並

名。證。爾。艾。上。黨。藥。園。山。亦。有。名。定

名。證。爾。艾。上。黨。藥。園。山。亦。有。名。定

名。證。爾。艾。上。黨。藥。園。山。亦。有。名。定

名。證。爾。艾。上。黨。藥。園。山。亦。有。名。定

名。證。爾。艾。上。黨。藥。園。山。亦。有。名。定

參草。又名仙女蕪。今所在有之。蓋

療瘵。黃。人。莫。能。知。(蘇頌) ③此草

有殊功。而不著其形狀。今。野。梨。亦

名。麗。春。草。九。仙。子。亦。名。仙。女。嬌。與

此。同。名。恐。非。一。物。也。(李時珍)

【麗草】即玉竹之古籍別名。與見

和漢藥考。詳『玉竹』條。

【麗草】即小麥麩之原形。詳『小麥

麩』條。

【麗米春】即米酒之古籍別名。與

見和漢藥考。詳『米酒』條。

【麗】即田雞之原形。詳『田雞』條。

【麗】即杜梨之別名。與見爾雅。詳

『爾雅』條。

【麗】即麗之古籍別名。詳『麗』條。

二十畫

【寶豆】即呂宋果之古籍別名。與

見本綱拾遺。詳『呂宋果』條。

【寶珠】即山茶花。簇如珠者之古

籍別名。與見綱目。詳『山茶花』條。

【寶珠山茶】

形態 寶珠山

茶。爲。山。茶。類。之

千。葉。深。紅。者。其。花。四。瓣。大。瓣。之。中

又。生。碎。瓣。極。多。攪。簇。如。珠。可。供。藥

用。

用。

採取 二三月採。陰乾用之。若俱是大瓣千葉者。名洋茶。不入藥。單瓣者亦不入藥。

性質 甘。清。微辛。瀉寒。無毒。

主治 消癰腫。跌撲。斷久痢。腸風下血。崩帶。血淋。鼻衄。吐血。外敷灸。疥。均焙研七朶。空心酒服。

配合應用 治赤痢。用大紅

寶珠山茶花。陰乾爲末。加白糖拌勻。飯鍋上蒸三四次服。(救生苦海方)

治鼻中出血。千葉大紅山茶花。二三月採。陰乾。用時取五六朶煎服即止。(何明遠方)又鼻衄用寶珠山茶大紅者。焙研三五錢。砂管滾水和服。(張氏必效方)

治吐血咳嗽。寶珠山茶。瓦焙。黑色。調紅砂糖日服。不拘多少。又方。寶珠山茶十朶。紅花五錢。白茯苓。兩。紅棗四兩。水煎一盃服之。渣再服。紅棗不拘時亦取食之。(不藥良方)又山茶花。吐血。血。而。腸風下血之良藥。(藥儀藥鏡拾遺賦)又曾見有人患乳頭開花。欲墜。疼痛異常。有教以用寶珠山茶。焙研爲末。用麻油調搽。立愈。痔瘡。

二十靈寶

出血。(宋春暉方)又用寶珠山茶研末。沖服。(汪子明方)

參攷資料 寶珠山茶。涼血。

破血。止血。清劑也。(百草鏡)寶珠山茶可代鬱金。研末。麻油調塗。湯火灼傷。(羣芳譜)

寶珠山茶花 卽山茶花之處方用名。詳「山茶花」條。

寶鼎香 卽薑黃之古籍別名。典見綱目。詳「薑黃」條。

寶劍草 卽鳳尾金星之別名。詳「鳳尾金星」條。

寶薺 卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

懸刀 卽皂莢之古籍別名。典見綱目。詳「皂莢」條。

懸石 卽格石之古籍別名。典見別錄。詳「格石」條。

懸針 卽蛭蚌之古籍別名。典見古今注。詳「蛭蚌」條。

懸瓠 卽查盧之別名。詳「查盧」條。

懸堯 卽石龍芻之古籍別名。典見別錄。詳「石龍芻」條。

懸鉤子 命名 本品莖上有刺如懸鉤。故名。

懸

古籍別名 沿鉤子。(日用)箭子。山葶子。(爾雅)木葶子。(郭璞)樹葶子。(日華)

外國名詞 Rabus palmatu

S. Thunb. (拉丁)キイチヤ

基本 係薔薇科。爲懸鉤屬之子實。

產地 凡山野林澤間。恒有出。

形態 懸鉤爲落葉灌木。恒野生於山野。高四五尺。莖及葉皆有刺。葉作掌狀分裂。裂片自三至五。

如有缺刻狀之鋸齒。葉柄長而互生。初夏葉腋開花。花冠五瓣。色白。其大與棠棣花之花冠相近似。子實爲肉果。呈紅色。由多數之小核果合成。可供藥用。



懸鉤子

採取 四五月採實。

製法 凡採得陰乾或日乾。

性質 酸。平。無毒。

效能 醒酒。解毒。用作祛痰藥。

又爲解毒藥。

主治 醒酒止渴。除痰。去酒毒。

歷代記載攷證 「明」李時珍

本草綱目論懸鉤子曰。搗汁服。解

射工沙蟲毒。

用量 三錢至四錢。

參攷資料 生江淮林澤間。

莖上有刺。其子如梅。子酸。人多食之。(陳藏器)樹葶枝極柔軟。

有刺。頗類金櫻。四五月結實。如覆盆子。採之。葉蒂而中實。味酸。覆盆則蒂脫而中虛。味甘。爲異。(汪機)

懸鉤樹生。高四五尺。其莖白色。有倒刺。其葉有細齒。青色。無毛。背淡青。頗似櫻桃葉。而狹長。又似地棠花葉。四月開小白花。結實。色紅。今人亦適呼爲葶子。爾雅云。葶山葶也。郭璞注云。今之木葶也。實似葶苈而大。可食。孟詵大明並以此爲覆盆。誤矣。(李時珍)

懸鉤根皮 性質 苦。平。無毒。

主治 子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢。膿血腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。

配合應用 血崩不止。木毒

二十畫 懸 楷 榿 榿 榿 爐

根四兩。酒一盞。煎七分。空心溫服。
 (羅仙乾坤生意方)

◎治婦人崩中及下痢。日有數十起欲死者。以此入腹。即活。懸鈎根。發微根。枯根。發莖。各一斛。對入釜中。水淹上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。煎至可丸。丸梧子大。每溫酒服十九日。三服。(千金翼方)

【懸鈎葉】 主治 燒研水服。療喉中塞。

【懸榿】 卽馬肝之別名。詳「馬肝」條。

【懸莖】 卽瓜葉之別名。詳「瓜葉仁」條。

【懸榿】 卽蟬蛻之古籍別名。典見古今注。詳「蟬蛻」條。

【榿子】 古籍別名。麵榿。血榿。錢榿(綱目)榿榿(日本)

外國名詞 Quercus glauca, Thunb. (拉丁)カシ(日本)

基本 係殼斗科榿屬。爲榿之子仁。其葉。木皮詳見各該條。

產地 生暖地山野間。
 形態 榿爲常綠喬木類之一種。種類不一。高三四丈。葉廣披針

形。或長橢圓形。端尖。邊緣或有鋸齒。春夏開花。花爲穗狀花序。雌雄同株。結實爲堅果。有碗狀殼斗。大如菩提子。霜後殼裂實出。實中仁如杏仁。木材堅實難腐。可製器具。其子仁可供藥用。



(一) 子榿



(二) 子榿

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 食之不飢。令人健行。止洩痢。破惡血。止渴。

參攷資料 榿子酸甘微寒。不可多食(正要)

【榿木皮】 主治 煮汁飲。止產婦血。

【榿木葉】 主治 煮汁飲。止產婦血。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日

用本草論榿木葉曰。嫩葉貼腫瘡。一日三換良。

【榿皮】 卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【榿】 卽梧桐之古籍別名。典見綱目。詳「梧桐」條。卽木榿之古籍別名。典見爾雅。詳「木榿」條。

【榿子】 卽槐實之古籍別名。典見萃芳譜。詳「槐實」條。

【榿香】 古籍別名 兜婁婆香。(綱目)

產地 生山野間。

形態 榿香爲香木類之一種。幹高丈許。葉長。色青。有鉅齒之缺刻。似小蘗葉而氣香。對生。其根狀如枸杞根而大。煨燒之亦有香氣。可供藥用。

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 頭癩腫毒。碾末麻脂調塗。七日腐落。

【爐山生】 卽爐甘石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「爐甘石」條。

【爐甘石】 命名 本品爲爐火所重。其味甘。故名。

處方用名 製甘石。

古籍別名 爐先生。(土宿本)

一八七八

草) 爐石。爐山生。(和漢藥考) 外國名詞 Calamina(拉丁) Smithsonite or Calamine(英) Calmoi(德)

基本 係金屬銻礦類。爲白色或藍色之半透明。或不透明之固體礦石。

產地 陳仁山藥物生產辨云。爐甘石產廣西柳州容縣。長安壩等和漢藥考曰。日本產於岐阜縣吉城郡等處之硫化銻及銅礦脈中。

形態 爐甘石爲白色長方形。或六面形。或成雞冠形。或如葡萄狀。但團結成球。多作玻璃狀。或真珠狀。有光之殼子形。鐘乳形。塊形。物。又有作褐色。青色。而稍透明者。

製法 李時珍曰。凡使爐甘石。以炭火煨紅。童子小便淬七次。洗淨研粉。水飛過曬用。

性質 甘。溫。無毒。

成分 爲碳酸銻。中含有銻。鈣。鎂及鎘少許。

效能 散風熱。燥溼。治一切目疾。專作眼科藥。

作用 能驅局部之葡萄球菌。

并能阻止其繁殖。

主治 止血消腫毒。生肌。明目。去翳。退赤。收溼除爛。同龍腦點治目中一切諸病。

歷代記述攷證 【明】程希雍

本草經疏論爐甘石曰。爐甘石味應甘辛。氣溫無毒。其性帶溼。經曰營氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。甘溫能通暢血脈。則腫痛散。血自止。肌肉生也。又目得血而能視。風熱上壅。則目為赤爛。甘入脾而益血。辛溫能散風熱。性澀則能黏物。故點目翳。及治目中一切病也。【清】黃宮繡本草求真論爐甘石曰。爐甘石係金銀之苗。產於金銀坑中。狀如羊脂。鬆似石脂。能點赤銅為黃。甘辛而溼。氣溫無毒。其性喜入陽明胃。蓋五味惟甘為補。惟溫為暢。是能通和血脈。故脾得此則消。而血自能克止。肌亦自能克生也。辛溫能散風熱。性澀能黏翳膜。故凡目翳得此。即能撥雲也。有用此治下疳陰溼。並齒疎陷物者。亦此義耳。李時珍常用甘石煨飛。海螵蛸。硼砂等分為細末。硃砂依分減半。同入點諸目病皆妙。煨

用童便良。

配合應用 ●治目暴赤腫。爐甘石火煨尿滓。風化消。等分為末。新水化一粟點之。【御藥院方】

●治諸般翳膜。爐甘石。青礬。朴硝。等分為末。每用一字。沸湯化開。溫洗日三次。【宣明方】

●治一切目疾。真爐甘石半斤。用黃連四兩。剉豆大。銀石器內水二盞。煮二伏時。去黃連為末。入片腦二錢半。研勻。曬收。每點少許。頻用取效。又方。爐甘石煨一錢。盆清一錢。為末。用熱湯泡洗。

●治目中諸病。石連光明散。治眼中。五輪入廊。諸證神效。爐甘石半斤。取如羊脂。顏色者。以桑柴灰一斗。火煨赤。研末。用雅州黃連各四兩。切片。煎水浸石。澄取粉。曬乾。用銚粉二定。以二連水浸過。炒之。雄黃研末。每用甘石銚粉各三分。雄黃一分。片腦半分。研勻。點眼甚妙。【張氏方】

●治目暗昏花。爐甘石火煨。童尿滓七次。代諸石火煨。醋滓七次。黃丹水飛。各四兩。為末。白沙蜜半斤。以銅鑊鍊去白沫。更添清水五

六盞。熬淨下藥。文武火熬至一盤。滴水不散。以次紙濾入瓷器收之。

類點日用（衛生易簡方）

●治爛弦風眼。風眼流淚。爛弦。白爐甘石四兩。火煨童尿滓七次。放地上出毒。三日。細研。每用椒湯洗目後。臨臥點三四次。次早以茶湯洗去甚妙。又方。爐甘石一斤。火煨黃連四兩。煎水滓七次。為末。入片腦。每用點目。【劉長春方】用爐甘石。石芥各一錢。海螵蛸三分。為末。入片腦。麝香各少許。收點。【宣明眼科方】用爐甘石二兩。以黃連一兩。煎水。入童尿半盞。再熬下。朴消一兩。又熬成。以火煨石滓七次。洗淨。為末。入蜜陀僧末一兩。研勻。收點之。【衛生易簡方】

●治尋耳出汗。爐甘石。礬石各二錢。胭脂半錢。麝香少許。為末。微淨吹之。【普濟方】

●治齒疎陷物。爐甘石。煨寒水石。等分為末。每用少許。擦牙。忌用刷牙。久久自密。【集玄方】

●治漏瘡不合。童尿製爐甘石。牡蠣粉外塞之。內服滋補藥。【雜病治例方】

●治下疳陰瘡。爐甘石火煨。醋滓五次。一兩。孩兒茶三錢。為末。麻油調傅立愈。【通妙邵真人方】

●治陰汗溼痒。爐甘石一分。真蚌粉半分。研粉撲之。【直指方】

用鹽 八分至錢半。

參攷資料 ●爐甘石。陽明經藥也。受金銀之氣。故治目病為要藥。李時珍常用爐甘石煨。海螵蛸。硼砂各一兩。為細末。以點諸目病甚妙。入朱砂五錢。則性不黏也。【李時珍】●爐甘石所在坑治處。皆有。川蜀湘東最多。而太原澤州。陽城。高平。靈丘。融縣。及雲南者。為勝。金銀之苗也。其塊大小不一。狀似羊脂。鬆如石脂。亦黏舌。產於金坑者。其色微黃。為上。產於銀坑者。其色白。或帶青。或帶綠。或粉紅。赤銅得之。即變為黃。今之黃銅。皆此物點化也。造化指南云。爐甘石受黃金白銀之氣。薰陶三十年。方能結成。以大穰浸。及砒黃過。皆可點化。不減三黃。出叻外丹本草云。用銅一斤。爐甘石一斤。鍊之。即成。餘石一斤半。非石中物。取出乎。真鑄石生波斯。如黃金。燒水赤而不黑。

〔李時珍〕①爐甘石種類頗多。日本以名泡樣者爲上。質軟呈白色。其形如淨石。謂之羊脂爐甘。名茶碗樣者爲次。品質軟堅。白色微紅。作扁平狀。謂之片子爐甘。名石樣者亦次。品質尤堅。呈青白色。形狀不定。藥用大抵選質軟白色者。帶他色者不佳。〔和漢藥考〕

〔盧先生〕即爐甘石之古籍別名。與見土宿本草。詳「爐甘石」條。

〔爐底〕即蜜陀僧之古籍別名。與見綱目。詳「蜜陀僧」條。

〔爐眼石〕即爐甘石之古籍別名。與見和漢藥考。詳「爐甘石」條。

〔犍牛〕即犍牛之古籍別名。與見綱目。詳「犍牛」條。

〔犍雞〕即榜雞之說。詳「榜雞」條。

〔獼猴〕 古醫別名 沐猴。〔史記〕爲猴。〔說文〕胡孫。〔格古論〕王孫。〔柳文〕馬留。〔倦游錄〕狙。〔綱目〕摩斯吃。〔梵書〕

外國名詞 Macaus Monkey 或 Macaque (拉丁)サル或ヤ

エル(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類猿長類猿類狒狒類獼猴

科。

產地 出川廣之深山林野間。

形態 獼猴爲獸類猴屬之一種。頭稍圓。吻略突。眼並列向前。耳

後肢爲長。肢形如人手。尾短。體長

二三尺。性馴良可畜。其肉可供藥

用。



猴 獼

性質 酸。平。無毒。

主治 諸風勞。酸酒癩佳。作脯食治久瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論獼猴肉曰。食之辟瘴

【獼猴手】 主治 小兒疳癩口

【獼猴皮】 主治 辟馬疫。

【獼猴尿】 主治 小兒脾風。撮口急驚風。〔燒末和生蜜少許灌之。〕

【獼猴桃】 命名 本品形如梨。色如桃。而獼猴喜食故名。

古醫別名 獼猴梨。藤梨。〔開寶〕陽桃。〔日用〕木子。〔綱目〕

外國名詞 Actinidia argu- S. P. (拉丁)サルナシ シラ

クナツル ヤブナシ ヌクワ (日本)

基本 係獼猴科獼猴屬。爲獼猴桃之果實。其藤及葉。藤中

汁詳見各該條。

產地 生山野間。



桃 猴 獼

形態 獼猴桃爲灌木類之落葉莖生木本。木幹大。大者圍尺餘。

葉橢圓形或心臟形。葉端尖。緣邊有刺狀鋸齒。質硬。有光澤。而互生。

五六月間。葉腋出花。花五瓣。爲聚

繖花序。色綠白。蒴果黑色。其樹皮可製紙及繩。與繫袋之用。結實圓形如球。爲漿果。可供食與藥用。

性質 酸。甘寒。無毒。

主治 止暴瀉。解煩熱。墮丹石。下淋石熱癩。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論獼猴桃曰。調中下氣。主骨節風。權緩不遂。長年白髮。野

雞內痔病。

參攷資料 ①獼猴桃酸無毒。多食冷脾胃。動洩瀉。〔陳藏器〕

②獼猴桃有實熱者宜食之。太過則令人臟寒作洩。〔寇宗奭〕

【獼猴桃藤及葉】 主治 殺狗。療痲疥。

【獼猴桃藤汁】 性質 甘。滑。寒。無毒。

主治 反胃。和生薑汁服之。又下石淋。

【獼猴梨】 即獼猴桃之古籍別名。與見開寶本草。詳「獼猴桃」條。

【獼猴頭骨】 主治 療瘡。作湯浴。小兒疳癩。

鬼魅。寒熱。

【蔓草】即蔓草之古籍別名。與見爾雅。詳「蔓草」條。

【礦灰】即石灰之古籍別名。典見綱目。詳「石灰」條。

【礪石】形態 礪石爲石類。磨刀石之一種。細者爲砥。粗者爲礪。礪石即羊肝石之粗礪者。亦供藥用。

主治 破宿血。下石淋。除結痂。伏鬼物。惡氣。燒赤投酒中飲之。人言蹋之患帶下。未知所由。

【礪石】即羊肝石之古籍別名。典見綱目。詳「羊肝石」條。

【礪石半夏麴】原名 礪麴。命名 本品爲半夏麴之一種。係和礪水製成者。故名。

製法 用半夏入礪水煮透。合生薑草。尋七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 清水痰。

【礪石】即綠礪之古籍別名。典見綱目。詳「綠礪」條。

【礪石】即礪石半夏麴之原名。詳「礪石半夏麴」條。

二十畫 礪 礪 礪 礪 礪

【穞麥】命名 本品狀似大麥。而殼厚粗糲。故名。

產地 北省諸地多有之。

形態 穞麥爲穀類之一種。種有二。有似小麥而大者。有如大麥而小者。葉細長帶尖。有平行脈。結實繁密。芒長。其子實可供食與藥用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 輕身除熱。久服令人多力。健行。作藥溫中消食。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四聲本草論穞麥曰。補中。不動風氣。作餅食良。

參攷資料 穞麥暴食。似動冷氣。久乃益人。(大明)

【穞麥蘖】命名 本品係用穞麥製成之蘖芽。故名。

主治 見麥蘖條。

【穞豆】命名 本品即黑穞豆之簡稱。

古籍別名 黑小豆。黑料豆。黑細豆。(本草綱目)馬料豆。(俗名)細黑豆。(蓬原)細而扁者名零烏豆。(綱目拾遺)黑料豆。(本草綱目)黑細豆。(本草綱目)

二十畫 礪 礪 礪 礪 礪

產地 生田野間。

形態 穞豆爲穀類豆屬之一種。葉爲複葉。夏秋間放紫黑色花。結實爲莢果。長寸餘。稍後乃熟。熟則色紫。莢內有腎狀黑色之種子。可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 去賊風。風痺。婦人產後冷血。炒令焦黑及熱投酒中。漸漸飲之。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論穞豆曰。壯筋骨。止盜汗。補腎。活血。明目。益精。

參攷資料 穞豆入腎經血分。同青鹽。旱蓮草。何首烏。蒸熟。但食黑豆則髮不白。其補腎之功可知。今人以製何首烏。取以引入腎經也。炒焦淋酒。治頭風脚氣。以其直達腎經血分。煮汁服。解烏附丹石藥毒。又按雨蓑翁食記。小黑豆入鹽煮。久食大能補腎。(趙學敏)

【穞豆衣】命名 本品即穞豆之豆殼。非莢也。故名。

主治 解肌熱。止盜汗。

【穞豆葉】原名 穞米。詳蔚香草搗傳之。

【穞米】命名 穞者備也。本品性格柔黏。故名。

古籍別名 稔。(綱目)元米。占米。(飲食譜)

外國名詞 Oryza sativa, L var. glutinosa, Mats (拉丁)モチコメ(日本)

基本 係禾本科稻屬。為粉糯之子實。

產地 各省皆有出。

形態 糯稻為栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。中空有節。葉細長而尖。有平行脈。互生。秋外殼。六雄蕊。一雌蕊。果實為穎果。其殼顯較黑。性亦較黏。米粒等供食用。亦可充藥物。

採取 十月間刈收之。

製法 收得曬乾。除去殼。杵去糠用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 補肺。健脾。專作滋養強壯藥。

主治 作飯。溫中。令人多熱。大便堅。

歷代記載攷證 【唐】陳士良食性本草論糯米曰。能行營衛中血積。解羌青斑。蠶毒。【唐】孫思邈千金翼論糯米曰。益氣止泄。【唐】蘇炳四聲本草論糯米曰。以駱駝脂作煎餅食。主痔疾。【唐】陳藏器本草拾遺論糯米曰。作糜一斗。食主消渴。【宋】大明諸家本草論糯

米曰。補中益氣。止霍亂後吐逆。不止。以一合研水服。【明】李時珍本草綱目論糯米曰。暖脾胃。止虛寒洩痢。縮小便。收自汗。發痘瘡。【明】繆希雍本草經疏論糯米曰。糯米即今之糯米也。其味應甘。氣應溫。無毒。造酒必用之者。以其性近於熱也。為補脾胃益肺氣之穀。脾胃得補。則中自溫。大便亦堅實。溫能養氣。氣充則身自多熱。大抵脾肺虛寒者宜之。為其能益氣溫中也。故又有止泄利。縮小便。收自汗。發痘瘡等用。【清】黃宮繡本草求真論糯米曰。糯米味甘性平。據按諸書有言性溫性寒性涼之不同。然究此屬陰物。陰即寒聚。故性黏滯而不爽也。是以服之。使人多睡。身軟無力。四肢不收。發風昏昏。且使小腸食之。亦脚屈不能行。馬食之足重難移。妊婦雜肉食之。令子不利。使果性溫而熱。則食自有溫和通活之妙。何至陰凝風滯如此哉。如謂釀酒則熱。熬糖尤甚。且發癰疽瘡癤。何謂不溫。詎知性如大豆。生亦性溫。何以作鼓。則涼可知。稻非性溫。因於造釀而溫始有。至書

有云。食之補中益氣。及止虛寒泄瀉。並縮小便。收自汗。發痘瘡。皆是性黏不利。留滯在中。土壅不下之故。非如生者性主溫補。仍兼通活。而無如此陰滯之甚也。謂之粳中則可。謂之溫中而熱。豈其可乎。謂之中虛宜服則可。謂之虛寒宜服。亦烏見其可乎。凡老人小兒。久病均忌。【清】王士雄隨息居飲食譜論糯米曰。糯米甘溫補肺氣。充胃津。助痘漿。煖水臟。醱酒熱饒。造作餅餌。若煮粥飯。不可頻餐。以性大黏滯難化也。小兒病人尤當忌之。凍米（冬月所製）性不黏滯。止瀉補脾。炒米香燥助火。多食傷津。配合應用 ①治霍亂煩渴不止。用糯米三合。水五升。搗一合。研汁分服。或煮汁服。亦治消渴飲水。（楊氏產乳方）

②治三消渴病。梅花湯。用糯穀炒出白花。桑根白皮等分。每用一兩水二碗。煎汁飲之。（三因方）

③治下痢禁口。糯穀一升。炒出白花去殼。用薑汁拌溼。再炒為末。每服一匙。湯下。三服即止。（經驗良方）

④治久洩食減。糯米一升。水浸一宿。溼乾。慢炒熟。磨細。入懷慶山藥一兩。每日清晨用中鹽入砂糖二匙。胡椒末少許。以極滾湯調食。其味極佳。大有滋補。久服令人精神。有子。秘方也。（松靈經驗方）

⑤治鼻衄不止。服藥不應。獨聖散。用糯米微炒黃為末。每服二錢。以新汲水調下。仍吹少許入鼻中。（簡要濟衆方）

⑥治勞心吐血。糯米半兩。蓮子心七枚。為末。酒服。孫仲敬云。曾用多效。或以薑汁作丸服之。（濟案方）

⑦治自汗不止。糯米小麥銖同炒為末。每服三錢。米飲下。或煮粥肉點食。

⑧治小便白濁。白糯米。治入夜小便脚停白濁。老人虛人多此。謹令人卒死。大能耗人精液。主頭昏重。用糯米五升。炒赤黑。白芷一兩。為末。糯粉糊丸。梧子大。每服五十丸。木錢頭煎湯下。無此用扇方補腎湯下。若後生稟賦怯弱。房室太過。小便太多。水管壅澀。小便如膏。脂。入石首。清。牡蠣粉甚效。（經驗良方）

良方)

①治女人白淫。糯糯米、花椒等分炒為末。醋糊丸。梧子大。每服三四十九丸。食前階湯下。(楊起簡便方)

②治胎動不安。下黃水。用糯米一合。黃芩、芍藥各五錢。水一升。煎八合分服。(產寶方)

③治小兒頭瘡。糯米飯燒灰。入輕粉清油調傅。(普濟方)

④治癩蛇丹毒。糯米粉和鹽嚼塗之。(濟急方)

⑤治打撲傷損諸瘡。寒食日沒糯米。逐日易水。至小滿取出。日乾為末。用水調塗之。(便民國藥方)

⑥治金瘡癰腫。及竹木簽刺等毒。用糯米三升於端午前四十九日。以冷水浸之。一日兩換。水輕淘。轉勿令攪碎。至端午日取出。陰乾。精袋盛掛通風處。每月旋取炒熟為末。冷水調如膏藥。隨瘡大小。裨定瘡口。外以布包定。勿動。直候瘡痊。若金瘡犯生水作腫。腫甚者。急裨一二食久。即不作腫。腫也。若癰疽初發。縱解微腫。急貼之一夜便消。(靈苑方)

⑦治喉痺吐膿。用煎膏貼項下及腫處。一夜便消。乾即換之。當令溼為妙。

⑧治竹木簽刺。用煎膏貼之。一夜刺出在藥內也。

⑨治頭大咬傷。用糯米一合。斑蝥七枚。同炒蝥黃去之。再入七枚。再炒黃去之。又入七枚。待米出烟。去蝥為末。油調傅之。小便利下佳。(醫方大成方)

⑩荒年代糧。糯米一斗。淘汰。百蒸百曝。搗末。日食一粒。以水調之。服至三十日止。可一年不食。(肘後方)

⑪治虛勞不足。糯米入豬肚內蒸乾。搗作丸子。日日服之。

⑫治腰痛遺寒。糯米二升。炒熟。袋盛。控攤痛處。內以八角茴香研酒服。(談藝叢試驗方)

⑬施用宜忌 凡有溼熱痰火者禁用。

參攷資料 ⑭糯米性溫。釀酒則熱。熬餈尤甚。故脾肺虛寒者宜之。若素有痰熱風病。及脾病不能輸轉。食之最能發病成積。孟詵蘇頌或言其性涼。性寒者。謬說也。別

錄已謂其溫中。堅大便。令人多熱。是性豈寒涼者乎。今人冷洩者。炒食即止。老人小便數者。作藥糕或丸子。夜食亦止。其溫脾暖脾可驗矣。謹用之。亦取此義。(李時珍)

⑮糯米性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與豉。性不同也。(蘇頌) ⑯涼發風動氣。使人多睡。不可多食。(孟詵) ⑰久食令人身軟。緩人筋也。小貓犬食之。亦脚屈不能行。馬食之足重。妊婦雜肉食之。令子不利。(陳藏器) ⑱久食發心悸及癩疽疔毒中痛。合酒食之。醉難醒。(陳士良) ⑲糯性黏滯難化。小兒病人最宜忌之。(李時珍)

【糯米泔水】 性質 甘。涼。無毒。 主治 益氣。止煩渴。霍亂。解毒。食鴨肉不消者。頓飲一盞。即消。

【糯米粥】 性質 甘。溫。無毒。 主治 益氣。治脾胃虛寒。洩痢。吐逆。小兒痘瘡。白色。

【糯米糠】 性質 辛。甘。熱。無毒。 主治 齒黃。燒取白灰擦之。

【糯秫】 即秫之古籍別名。典見唐

本草。詳與秫。

【糯麥】 即大麥之有黏性者。典見綱目。詳大麥條。

【糯粟】 即秫之古籍別名。典見唐本草。詳與秫條。

【糯稻花】 性質 甘。涼。無毒。 主治 搯牙固齒。烏鬚。陰乾用。

【糯稻稈】 原名 稻稈。 性質 辛。甘。熱。無毒。 主治 黃病如金色。黃汁浸之。仍以穀芒炒黃為末。酒服。

歷代記述攷證 ①唐蘇頌新修本草論糯稻稈曰。燒灰治墜撲傷損。明李時珍本草綱目論糯稻稈曰。燒灰浸水飲。止消渴。淋汁浸腸痔。按稈稈轉轉暖足。去寒溼氣。

參攷資料 ②稻稈灰方。出劉禹錫傳信方。云湖南李從事墜馬損傷。用稻稈燒灰。以新熱酒連糟入鹽拌和。淋取汁。淋痛處。立痊也。

(蘇頌) ③稻稈煮治作紙。嫩心取以為紙。皆大為民利。其紙不可貼。瘡。能令爛肉。按江湖紀聞云。有人壁虱入耳。頭痛不可忍。百藥不效。

用稻稈灰煎汁渣入。即死而出也。

(李時珍)

【糯稻穎】即穀穎。參詳「糯穀芒」條。

【糯稻露】基本 本品爲鮮糯稻葉上之露水。

性質 甘平。

主治 養胃和脾。

參攷資料 俞佳士妙應方治瘡塊。八月白露後。收糯稻頭上露水。晚作二服。飲下立消。按諸草木皆需天露始潤。惟稻至酉時。其根上津潤之氣漸升。入夜乃達葉尖。至曉復自上而降於根。故無露之夜。稻葉獨潤。陳翠虛詞。一些珠露。阿誰運上稻花頭是也。(趙恕軒)

【糯稻稈】即稻稈。參詳「糯稻稈」條。

【糯穀芒】原名 穀穎。性質 辛甘熱。無毒。

主治 黃病。爲末酒服。又解毒毒。煎汁飲。

【器子桐】命名 本品質狀似器子故名。

古籍別名 虎子桐。(拾遺) 荏桐。(衍義) 油桐。(綱目)

ラギリ(日本)

基本 係大戟科器子桐屬。爲器子桐之子油。

產地 出暖地之山野間。園林中亦有之。

形態 器子桐爲落葉喬木類。桐屬之一種。幹高二丈。雌雄異株。雌樹之葉似楸。雄樹之葉有二尖及四五尖。五月開淡紅色花而聚梢頭。結實如球。內有種子三四粒。取子榨油。可作漆飾之用。並可供藥用。

採取 以篋筒蘸起。如鼓面者良。

性質 甘微辛。寒。有大毒。

主治 摩疥癬蟲瘡。毒腫。毒鼠至死。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論器子桐油曰。傳惡疥及



器子桐

有薄網之紋。其一面廣凹。胎芽彎曲作馬蹄形。味甘似油。



器粟子

製法 生搗或炒。

性質 甘平無毒。

成分 含脂肪油四十八至五十%。嗎啡0.06%。

效能 治反胃。療瀉痢。用治下痢及瘧疾。

主治 丹石發動。不下飲食。和竹瀝煮粥食極美。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論器粟子曰。行風氣。逐邪熱。治反胃。胸中痰滯。【明】李時珍本草綱目論器粟子曰。治瀉痢潤燥。【明】魏希雍本草經疏論器粟子曰。器粟其花至有千葉者。紅白紫黑色。有數種。一器內子凡數千萬粒。細如蠶子而色白。本經味甘平無毒。蘇頌性寒甘寒。除熱解毒。下氣和中。故主丹石發動。不下食。及圖經行風氣。逐邪熱。止

古米(和漢藥考)

【器粟子】原名 器子粟。命名 本品質狀如器子。其米如粟。乃象乎穀。而可以供御。故有諸名。

處方用名 御米。器粟米。

古籍別名 米囊子。御米。(開寶) 象穀。(綱目) 白米。羊古米。陽古米。(和漢藥考)

外國名詞 Scamou Papua-cris (拉丁)

基本 屬器粟科。爲器粟之種子。形態 器粟子爲黃白色或藍黑色之小種子。其形似腎臟。外皮

反胃。去胸中痰滯也。

國外學說 和漢藥考曰。罌粟

油 (Oleum Papaveris) 乃壓榨

罌粟子而得之脂肪油也。色黃性

燥。酒精能溶解之。比重〇・九二

四。可爲油畫家所用油料及製造

肥皂原料等。

配合應用 治反胃吐食。罌

粟粥。用白罌粟米三合。人參末三

大錢。生山芋五寸。細切研。三物以

水二升三合。煮取六合。入生薑汁

及鹽花少許。和勻分服。不計早晚

亦不妨別服湯丸。(圖經方)

治泄痢赤白。罌粟子炒。罌粟

殼炙等分爲末。煉蜜丸。梧子大。每

服三十九。米飲下。有人經驗。(百

一選方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 服石人研此水

煮。加蜜作湯飲。甚宜。(寇宗奭)

高陽子云。罌粟花有四葉。紅白色。

上有淺紅暈子。其葉形如蘭頭。箭

中有細米。(陳藏器) 處處有之。

人多時以爲飾。花有紅白二種。微

腥氣。其質形如餅子。有米粒極細。

國人隔年糞地。九月布子。涉冬至

春。始生苗。極繁茂。不爾不生。生亦

不茂。俟耕種黃乃採之。(蘇頌)

罌粟秋種冬生。嫩苗作蔬食。甚佳。

葉如白苣。三四月抽莖。結青苞。花

開則苞脫。花凡四瓣。大如仰盂。罌

粟在莖頭。長一二寸。大如馬兜

鈴。上有蓋。下有蒂。宛然如酒罌。中

有白米。極細。可煮粥和飯。水研濾

漿。用綠豆粉作腐食。尤佳。亦可取

油。其殼入藥甚多。而本草不載。乃

知古人之不用也。江東人呼千葉

者爲麗春花。或謂是罌粟別種。蓋

亦不然。其花變態。本白不常有白

者。紅者。紫者。粉紅者。杏黃者。半紅

者。半紫者。半白者。豔麗可愛。故曰

麗春。又曰賽牡丹。曰錦被花。詳見

游默齋花譜(李時珍) 性寒。多

食利二便。動膀胱氣。(寇宗奭)

罌粟米 卽罌粟子之處方用名。

詳「罌粟子」條。

罌粟泡 卽鴉片之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「鴉片」條。

罌粟花 性質功用與鴉片同。參

見「鴉片」條。

罌粟津液 卽鴉片之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「鴉片」條。

罌粟脂 卽鴉片之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「鴉片」條。

罌粟殼 原名 罌子殼。

處方用名 御米殼。

古籍別名 米殼。粟殼。米殼。芥

子殼。罌蒂殼。鴉粟殼。(和漢藥考)

外國名 罌粟殼 (Papaveris Cap-

sulae. (Capsules))

基本 罌粟科爲罌粟之果

殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

罌粟殼原產印度。後流入雲南。至

今各省無不有之。其汁卽鴉片

烟也。

形態 罌粟殼爲壺狀。蒴果之

皮殼。生者其色綠。乾則變灰綠。或

茶褐。外面有突出之縱紋十條。至

十五條。內亦相同。入藥多用果皮

已傷。阿片已盡之餘殼。間取成熟

之蒴果。除去種子用之。新鮮者有

麻醉性之臭氣。其味苦。

採取 入藥須採其未熟者。曬

乾。已熟者亦或取之。

製法 李時珍曰。凡用以水洗

滷。去蒂及筋脈。取外薄皮。陰乾細

切。以米醋拌炒。入藥。亦有蜜炒。鹽

炙者。

性質 酸。澆。微寒。無毒。

成分 與阿片含相同之成分。

但不多耳。

效能 斂肺。瀉腸。固精。止痛。用

作祛痰鎮痙藥。故有鎮痙鎮咳止

瀉之作用。但此爲劇藥。病初者忌

服。

主治 主止瀉痢。固脫肛。治遺

精。久咳。斂肺。瀉腸。止心腹筋骨諸

痛。

歷代記述攷證 【明】李士材

本草圖解論罌粟殼曰。粟殼酸澆

收斂。其性緊急。非久瀉久嗽者。不

可輕投也。世俗聞而畏之。概不肯

用。不知久痢滑脫者。非此不效。因

噎而廢食。良醫弗爲也。水洗滷。去

蒂及筋脈。取薄皮醋炒。【清】黃宮

繡本草求真論罌粟殼曰。御米殼

酸澆微寒。功斂肺瀉腸固腎。凡

久瀉久痢肛脫。久嗽氣乏。並心腹

筋骨諸痛者。最宜。若嗽痢初起。寒

熱未淨。用此以爲收瀉。致令邪留

不解。則殺人如劍。可不慎歟。洗去

帶膜。或醋炒蜜炒取用。得烏梅陳

皮良。罌中有米極細。書言氣味甘寒。煮粥能治反胃。亦須分臍偏純。及病症陰陽虛實以治。

國外學說 英美學說謂罌粟原產印度波斯等國。高約二尺至四尺。後漸流傳至中國之雲南山西四川等處。今則各處多栽植之。入藥用其已熟之殼。去盡其子。子無功力。更有於其殼未熟時。割裂而取其汁液。曬乾以成鴉片。為藥中要質。罌粟有二種。一為黑色。一為白色。而阿刺伯國與波斯國之醫書中。亦言有二種。近時印度大平原中。多種白色罌粟。而雪山則有一種黑色罌粟。即深紅色。鴉片大半為白罌粟所出。間有紅色與紫色者。惟軟白色之罌粟則更少。西國園內所種之罌粟。疑為波斯國初產。然在各國種植罌粟。已有多年。其子且易散至遠處。故所見野生之罌粟甚多。歐羅巴南方。恒見有野生之罌粟。罌粟在埃及國早已種之。而法國土耳其國並歐羅巴他處。亦種植罌粟。有法人言地中海東邊所產之罌粟。較法國所產者為更佳。而其功力亦

最大。其醫治作用。能配膏糖煮水等。而其方則較鴉片大遜。處方。罌粟殼二兩搗碎。汽水三十兩。共入鍋。煮嚴熱十分鐘。漉渣。加汽水淋之。足二十分爲度。用手巾蘸數處。治疼痛。跌打外傷。亦治皮類病。熱用方效。有潤皮寧睡之性。如身體有腫大處。或痛處。或生炎處。即如眼睛。肚腹。交節等處。俱可用之。
(罌粟殼煮水方)

配合應用 治熱痢便血。罌粟殼炙一兩。陳皮半兩爲末。每服三錢。烏梅湯下。

治久痢不止。罌粟殼醋炙爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。水一盞。煎三片。煎八分。溫服。又方。罌殼十兩。去膜。分作三分。一分醋炒。一分蜜炒。一分生用。並爲末。蜜丸。夾子大。每服三十丸。米湯下。又集要百中散。用罌殼蜜炙。厚朴薑製各四兩。爲細末。每服一錢。米飲下。忌生冷。

神仙救苦散。治小兒赤白痢。日夜百行不止。用罌粟殼半兩。醋炒爲末。再以銅器炒過。檳榔半兩。炒赤研末。各散。每用等分。赤痢蜜

湯服。白痢沙糖湯下。忌口味。(全幼心鑑方)

治水泄不止。罌粟殼一枚去蒂膜。烏梅肉。大棗肉。各十枚。水一杯。煎七分溫服。(經驗方)

治久嗽不止。殺氣數壯人用之。即效。罌粟去筋。蜜炙爲末。每服五分。蜜湯送下。(危氏方)

治久咳虛嗽。買同知百勞散。治咳嗽多年。自汗。用罌粟殼二兩。半去蒂膜醋炒。取一兩。烏梅半兩。焙爲末。每服二錢。臥時以白湯下。(宣明方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非真氣虧損而有實邪者禁用。

參攷資料 收斂固氣能入腎。故治骨病尤宜。(李杲) 今人虛勞咳嗽。多用罌殼止劫。及溼熱泄痢者用之。止澀。其治病之功。雖急。然殺人如劍。宜深戒之。又曰。治嗽多用罌殼不必疑。但要先去病根。此乃收後藥也。治痢亦同。凡痢

須先散邪行滯。豈可遽投罌殼。龍骨之藥。以閉塞腸胃。邪氣得補而愈。其所以變症作而淹延不已也。

(朱震亨) 酸主收斂。故初病不可用之。泄瀉下痢既久。則氣散不固。而腸滑肛脫咳嗽諸病。既久。則氣散不收。而肺脹痛劇。故俱宜此澀之固之收之斂之。按楊氏直指方云。罌殼治痢。人皆薄之固矣。然下痢日久。腹中無積痛。當止澀者。豈容不澀。不有此劑以治之。何以對治乎。但要有輔佐耳。又王頌易簡方云。罌殼治痢如神。但性緊澀。多令人嘔逆。故人畏而不敢服。若用醋製。加以烏梅。則用得法矣。或同四君子藥。尤不致閉胃妨食。而獲奇功也。(李時珍) 得醋烏梅。橘皮良。(李時珍)

【罌粟嫩苗】 性質 甘。平。無毒。

主治 作蔬食。除熱潤燥。開胃厚腸。

【罌殼殼】 卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳【罌殼殼】條。

【藤脂】 卽藤脂之說。詳【藤脂】條。命名 本品初產燕地。而以紅藍花汁凝作之。故名。

古籍別名 經紋。(綱目) 煎脂。

輕赤。經粉。(和漢藥考)

外國名詞 Carthaminum

(拉丁) Carthamin. (英) (德)

基本 屬於菊科之紅花。其花瓣中含有之紅色素。即以之製成燕脂也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。棉蘭脂。廣東廣州市製造而成。

形態 燕脂為血紅色之糊狀。或有光輝之塊。無臭味。水不溶解。但以水少許。十分混和。則現紅色。受空氣及日光溫熱。則次第分解。

製法 摘取紅花之花瓣。陰乾。浸以適宜之水。使之發酵。造成餅紅。再浸水中。除去可溶性之黃色素。以絞搾者入木灰水中。使紅色素得以溶出。乃於此溶出之液中。注入稀薄之有機酸液。則紅色素自然沈澱。遂採集而製成燕脂。茲更詳述如下。餅紅花之製法。欲以紅花製成餅塊。須將乾紅花入桶。灌水。兩足踏出黃汁。傾去。約四五次。此黃汁為花蕊與花瓣中所含之液。煎之。可為黃色染料。黃汁去後。即以竹筴入流水中振動。且置日中曬之。候紅花半乾時。捏成

二十畫 燕

徑一寸許。厚二分餘之堅塊。置於闊三寸長六尺之框中。框底須先墊溼水之席。然後累疊餅紅。約四五寸厚。蓋溼席一層。兩足在面上均勻踏緊。席上再疊餅紅。蓋席。足踏如前。至重疊五層而止。每層澆水少許。約三四日。聽其放置。候餅紅之花瓣變軟。手指捫之。覺現黑色。乃將上面覆蓋之溼席。與下墊之溼席替換。下墊之溼席。撤去不用。上蓋則易以乾席。既而併乾席亦撤之。餅紅曬乾收藏。如在陰雨之天。則載以闊三尺長六尺之竹篾或篋。置火上烘乾。亦有不

離。幸藤仍復其原有之白色。是為第二期。既而將此燕脂水傾入壺內。加入乾梅之醋。大約燕脂水一升。入乾梅醋一茶碗。隨工人之巧拙而自為加減。約二時後。燕脂悉數沈澱。乃徐徐撇淨上面之水。包以絹紗兩層。再徐徐擲去其水。是為第三期。至此燕脂始完成矣。其擲淨可為薰蚊之香。至燕脂所得之量。須視紅花之好否。與土地之若何而異。大抵餅紅花百分。可得燕脂七分至十分。最佳者得十五分云。

性質 甘。平。無毒。
效能 活血。解毒。用作活血止血藥。

主治 小兒聾耳。浸汁滴。
歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論燕脂曰。活血。解毒。【清】黃元御玉樹藥解論燕脂曰。燕脂味甘。氣平。入足厥陰肝經。治血行凝。消腫止痛。此紅蘭花所作。活血與花同。

餅紅而得之燕脂。(已除去水分者)謂之燕紅。乾燥之燕脂。謂之乾紅。磁酒杯中投一定之量。周圍抹刷。發綠色之光輝。專供婦人裝飾用者。謂之刷紅。燕脂加葛粉。調成糊狀。自來作糕餅類及錦繡等。著名用者。謂之細工紅。又名食料紅。又日本明治四十年間。宮城人山啓內者。提倡一種治病之法。謂之紅療法。以因脂與拉納林調和。製成藥膏。據云以之塗擦全身皮膚。能治百病。當時認為效驗極著。其明年且著紅療法講演錄一卷。歷述因脂之效。謂以因脂塗擦皮膚。則血液或組織所吸收之酸素。悉被分解而放出。且從而調整全身之營養機能。或奮起其能力。燕脂既有如此之功效。故祇須診查等病起因所在。並關聯之神經系等。即塗擦之。該病即可治愈。乃此紅療法。不久即聞為無聞。殆其效仍歸於泡影歟。

近人學說 張山雷曰。燕脂即紅藍花汁製成。因中以為面脂調色之用。製法不止一種。瀨湖綱目載之甚詳。皆以紅汁染成。以活車

爲用。仍與紅花同意。惟自海舶交通。西人所造各種顏料。盛行於時。豔麗絕勝土產。而皆含洋質。今之燕脂綿燕脂粉。又皆以洋色製成。萬不可爲入藥之品。不如仍用紅花。較爲穩妥。

配合應用 ①治乳頭裂破。燕脂給粉爲末傳之。(危氏得效方)

②治嬰孩鵝口。白厚如紙。用坯子燕脂。以乳汁調塗之一宿效。男用女乳。女用男乳。(集簡方)

③治漏瘡腫痛。用豬膽七箇。綿燕脂十箇。洗水和勻。搽七次即可。(救急方)

④防痘入目。用燕脂嚼汁點之。(集簡方)

⑤治痘瘡倒陷。乾燕脂三錢。胡椒燒存性一箇。研末。用胡荽煎酒服一錢。再服取效。(救急方)

參攷資料 ①按伏候中華古今注云。燕脂起自紂。以紅藍花汁凝作之。調脂飾女面。產於燕地。故名燕脂。或作煙紋。匈奴人名妻爲閼氏。音同燕脂。謂其顏色可愛。如燕脂也。俗作燕肢。脂支者。並謬也。(李時珍) ②燕脂有四種。一種以

紅藍花汁染胡粉而成。乃蘇鶚演義所謂燕脂。葉似薊。花似菊。出西方。中國謂之紅藍。以染粉爲婦人面色者也。一種以山燕脂花汁染粉而成。乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生。葉類藍。正月開花似薊。土人採含苞者爲燕脂粉。亦可染帛如紅藍者也。一種以山榴花汁作成者。鄭虔胡本草中載之一種。以紫鉞染綿而成者。謂之胡燕脂。李均南海藥譜載之。今南人多用紫鉞燕脂。俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病藥用。又落葵子亦可取汁。和粉助面。亦謂之胡燕脂。(李時珍) ③胭脂須貯於不受日光不觸空氣之處。故以密藏黑漆小箱。或罌漆壺中爲宜。(和漢藥考)

【燕脂花】即紫茉莉之古籍別名。典見本草花譜。詳「紫茉莉」條。

【燕脂藥】即燕之古籍別名。典見綱目。詳「燕」條。

【燕】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳「甘蔗」條。

【燕】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山藥」條。

【燕】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山藥」條。

【藿香】即山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳「山藥」條。

【藿香】即山藥之古籍別名。典見綱目。詳「山藥」條。

【藿香】即赤豆葉之原名。詳「赤豆葉」條。

【藿香】即藿香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藿香」條。

【藿香】即藿香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藿香」條。

【藿香】即藿香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藿香」條。

形態 藿香爲多年生草。莖方。高三四尺。香氣強烈。葉對生。作長心臟形。兩端尖。邊緣有鋸齒。夏月於莖頂叢生青紫色唇形花冠。花作穗狀。



藿香

種類 ①運來有葉嫩青者。稱青葉藿香。其芬香甚烈。用合香料。殆係採葉未黃者陰乾製之。②今有得真藿香種栽之者。稱後藿香。春生苗。高二三尺。節節生葉。似木芙蓉葉而小。長。開紫花。似夏枯草。花。其香有桂氣而烈。搗葉用糝泥一宿乾。武州多種之。與唐藿香無異。

種植 ①氣候及土質。寒冷而稍帶溫和之氣候。正適其生育。熱則不宜。土地以肥沃及排水適宜之砂質土爲最佳。次之則石灰土亦能生長也。其餘一切土地。皆不相宜。②產地及種類。藿香爲吾國最多之藥用作物。其產地有之。

種類無甚分別。惟有早晚之別。故曰早種晚種。自整地。下種栽培者。宜先作溫熱之苗牀。其內之土。必須細碎膨鬆。分切栽培者。作幅四五尺之畦。整地既畢。可以栽種也。自栽種。下種栽培。於三月間。下種於苗牀。上蓋蕘灰。待其生長。可以移植於他處。移植之期。以五月下旬至六月上旬為常。分切栽培。切其莖為數段。而後斜插於畦上。待其生長。可毋庸移植也。自灌溉。蠶香好溼潤。故當灌溉。栽植或播種之後。稍過三四日。即當灌溉一次。待其生長。或苗出時。尤宜灌以冷水。又過二十餘日。見其芽生長至一尺餘時。亦當灌水。以助其蒸發。蓋蠶香生長之時。正在天氣溫煖之時。其葉甚多。則蒸發甚烈。若此時不行灌溉。則所需水分不足。葉之蒸發益烈。遂不能免其枯萎之患。故栽培蠶香。以灌溉為必要。然行灌溉時。不可不定時間。以灌之。蓋灌水不定時間。則必有害。例如。灌水宜行於早晚時。若不依時間。而於日中灌溉之。不惟無益。反致枯死。故亦當注意也。自施肥。肥料

二十畫 菴

以人糞尿充之。當其施與時。將人糞尿與水混和至稀薄。人糞尿不可過多。當以適度為要。(水十擔和人糞尿二擔至二擔半為度)見其芽出。而後於早朝時施行之。可也。但不可行於日間。恐害及其全體。自種迄收。當施二次已足。不必多施也。自除草。雜草叢生。即當除去為要。勿使蔓延。致害蠶香生長。惟除時亦當注意於蠶香。勿使創斷。

採取 五六月間。隨時可以採取。或者見其花開葉大時。為止長期。乃採取之。正適其當。採取之法。用銳利之刀。割其莖葉。割取之後。曝日中乾之。而後或買或貯可也。收穫之量。每畝可得四百斤。二三百斤者。次之。一百餘斤者。為最下。總隨栽培之巧拙而分之。

用法 與他藥水煎。或剉末和作丸散。
性質 辛。微溫。無毒。
效能 醒脾和胃。辟惡。止嘔。用治霍亂吐逆要藥。
主治 風水毒腫。去惡氣。止蠶亂心腹痛。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蠶香曰。脾胃吐逆為要藥。【金】張元素珍珠囊論蠶香曰。助胃氣。開胃口。進飲食。【元】王好古湯液本草論蠶香曰。溫中快氣。肺虛有寒。上焦壅熱。飲酒口臭。煎湯漱。【明】繆希雍本草經疏論蠶香曰。蠶香稟清和芬烈之氣。其味辛。其氣微溫無毒。潔古辛甘。又曰甘苦。入手足太陰。亦入足陽明經。風水毒腫。病在於脾。惡氣內侵。亦由脾虛。邪入蠶亂。心腹痛。皆中焦不治之證。脾主中焦。香氣先入脾。理脾開胃。正氣通暢。則前證自除矣。蘇甄以為脾胃吐逆為要藥。潔古謂其助胃氣。開胃口。進飲食。海藏謂其溫中快氣。肺虛有寒。及寒鬱熱。壅於上焦。飲酒口臭。煎湯飲之。皆辛溫入脾。清上治中之功也。【清】黃宮繡本草求真論蠶香曰。蠶香辛香微溫。香甜不峻。但馨香氣正。能助脾醒胃。以辟諸惡。故凡外來惡氣內侵。而見蠶亂嘔吐不止者。須用此投服。俾其胸開氣寬。飲食克進。故同烏藥。順氣散。則可以利肺。同四君子湯。則

可健脾以除口臭。但因熱作嘔。勿服。

辨偽 鄧肯嶺曰。偽名大蠶香。氣味不香。不知何處所產。更有一種洋蠶香。佳味更別。蒸梗皆然。用之無益。而有害。按蠶香產於嶺南交趾為正地道。故近日由廣東辦來者為良。氣味芬香。功能醒脾和胃。宣氣開鬱。最得天地之正氣。且方莖有節。中虛。葉似柔而小。薄用者當明辨之。曹炳章曰。按蠶香本草名兜婁。香。產嶺南為最地道。在羊城西百里內之河南寶岡村及嶺慶者。五六月出。新方梗白。毫綠葉。揉之清香。氣穢鼻而濃厚。味辛淡者。名廣蠶香。廣東省垣各山貨行。收買揀淨發行。首推巨昌與泰昌為最地道。如雷州瓊州等處產者。名海南蠶香。即今所謂洋蠶香也。其氣薄而濁。味辛辣燥烈。葉細而小。梗帶圓形。莖長根重。為最次。其他如江浙所產之土蠶香。能乘鮮切片。烈日曬乾。貯於缸。使香氣收貯不泄。入藥效能亦甚強。不亞於廣蠶香也。
近人學說 張山雷曰。蠶香芳

一八八九

香而不嫌其猛烈。溫煦而不偏於燥熱。能祛除陰濕邪。而助脾胃正氣。為溼困脾陽。怠倦無力。飲食不甘。舌苔濁垢者。最捷之藥。亦辟穢惡。解時行疫氣。蓋癘疫以氣染入。無非溼濁穢腐之薰蒸。感之者由口鼻吸入。胃先受之。芳香得清氣之心。而藜香氣味和平。不嫌辛燥。故助脾胃而無流弊。但必以廣產為佳。雖以氣勝。而沖和可愛。今

江浙間遍地產之。則味苦澆而氣亦惡劣。石頑謂伐胃消食。且能耗氣。而世俗以為能解暑氣。論茶多飲。未盡善也。

配合應用 ①治霍亂。用藜香、縮砂蜜炒鹽。

②治吐瀉轉筋。霍亂。用藜香、人參、橘皮、木瓜、茯苓、縮砂蜜。

③辟惡氣。治中惡。心腹疴痛。用藜香、木香、沈水香、乳香、縮砂蜜。

④補肺。藜香入順氣烏藥散。補脾外入黃耆四君子湯。治中暑吐瀉入桂苓甘露飲。

⑤治暴中寒邪。吐逆不止。用藜香、木香、丁香、紫蘇葉、人參、生薑。

⑥治升降諸氣。藜香一兩。香附

炒五兩為末。每以白湯點服一錢。(經效濟世方)

①治霍亂吐瀉。垂死者服之。回生。用藜香葉、陳皮各半兩。水二盞。煎一盞溫服。(百一選方)

②治暑月吐瀉。滑石炒二兩。藜香二錢半。丁香五分為末。每服一二錢。浙米泔調服。(禹講師經驗方)

③治胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。用香附、藜香、甘草二錢為末。每服二錢。入鹽少許。沸湯調服之。(聖惠方)

④香口去臭。藜香洗淨。煎湯。時時噴漱。(摘玄方)

⑤治冷露瘡爛。藜香葉、細茶等分燒灰。油調塗葉上貼之。(應驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛無溼。及胃有鬱熱者禁用。忌火。

著名方劑 藜香正氣散。治外感四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐瀉。或發瘧疾。(局方) 厚朴、陳皮、桔梗、半夏各二兩。炙草一兩。大腹皮(換板榔亦可)

自芷、茯苓、蘇葉、藜香各三兩。上十味共研末。加薑棗水煎熱服。

參攷資料 ①芳香之氣助脾胃。故藜香能止嘔逆。進飲食。(李杲) ②按廣志云。藜香出海邊國。莖如都梁。葉似水蘇。可著衣服中。穢含南方草木狀云。出交趾。九真、武平、與古諸國。吏民自種之。叢生。五六月採日乾。乃芬香。(掌禹錫)

③藜香嶺南多有之。人家亦多種。二月生苗。莖梗甚密。作叢。葉似桑而小薄。六月七月採之。須黃色。乃可收。金樓子及俞益期牘皆云扶南國。人言五香。共是一木。其根是旃檀。節是沉香。花是雞舌。葉是藜香。膠是薰陸。故本草以五香共條。義亦出此。今嶺南中藜香。乃是草類。與稽含所說正相符合。范曄合香方云。零藜虛燥。古人乃以合香。即此扶南之說。似涉欺罔也。(蘇頌) ④藜香方莖有節。中虛。葉微似茄葉。潔古東垣惟用其葉。不用枝梗。今人併枝梗用之。因葉多偽。故耳。唐史云。頓遜國出藜香。插枝便生。葉如都良者是也。劉欣期交州記言。藜香似蘇合香者。謂其氣

相似。非謂形狀也。(李時珍) ⑤藜香入肺經。故古方治鼻淵。以之為君。以其能引清陽之氣。上通顛頂也。(沈金鰲) ⑥藜香廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉偽充。最難辨別。(失名) ⑦按藜香雖不燥烈。然究是以氣用事。惟舌有濁垢。而濃濛欲泛者。最佳。若舌燥光滑。津液不布者。咸非所宜。凡芳香行氣。醒脾勝溼諸芳草。皆有同情。不僅藜香木香一類為然也。(張山雷)

【藜香露】 基本 本品為藜香蒸取之露。

性質 涼。散。微辛。

主治 清暑。正氣。

【藜草】 古籍別名 藜麻。蠟子草。(綱目拾遺) 惡草羅

(墨莊漫錄)

產地 生田野間。

形態 藜草為毒草類之一種。蘆高四五尺。葉如麻。嫩時可供馬秣。經霜則辛。觸之螻人。腫痛不可忍。甚於蜂蟻咬。入肌肉即成瘡。浸淫潰爛。久不能愈。有花無實。雪下猶青。其子可供藥用。

下猶青。其子可供藥用。

下猶青。其子可供藥用。

主治 取汁塗蛇毒。點風疹。洗
瘋疾。亦可肥豕以飼之。

【藜蘆】即藜草之古籍別名。典見
綱目拾遺。詳「藜草」條。

【藜艾炭】即艾葉焙炒成者之處
方用名。詳「艾葉」條。

【藜艾葉】即艾葉之處方用名。詳
「艾葉」條。


【藜蘆】即蘆蕪之古籍別名。典見
爾雅。詳「蘆蕪」條。

【藜蛇】即白花蛇之古籍別名。典
見綱目。詳「白花蛇」條。

【藜蛇肉】即白花蛇之處方用名。
詳「白花蛇」條。

【藜棍】別名 豆艾。
產地 生建昌。

形態 高不及尺。圓莖長葉。白
毛如粉。葉厚而柔。兩兩下垂。惟直
紋兩三縱。亦不甚露。可供藥用。



效能 去風熱。
主治 腫毒。

二十畫 藜

藜 蘆

【藜藜香】即杜若之古籍別名。典
見植物學大辭典。詳「杜若」條。

【蘆巴】即胡蘆巴之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「胡蘆巴」條。

【蘆甘石】即蘆甘石。詳「蘆甘石」
條。

【蘆石】即鐘乳石之古籍別名。典
見別錄。詳「鐘乳石」條。

【蘆肥子】即胡蘆巴之古籍別名。
典見和漢藥考。詳「胡蘆巴」條。


【蘆花】原名 蘆蕪。
性質 甘寒。無毒。

主治 霍亂。水瀉。濃汁服。大驗。
歷代記述攷證 【宋】蘇頌
經本草論蘆花曰。煮汁服。解中魚
蠱毒。【明】李時珍本草綱目論蘆
花曰。燒灰吹鼻。止衄血。亦入崩中
藥。

【蘆根】命名 葦之初生曰葦。
未秀曰蘆。長成曰葦。本
品乃蘆之根莖。故名。

處方用名 活蘆根。鮮蘆根。活
水蘆根。
古籍別名 葦根。葦根。（毛萋
詩疏）蘇根。蘆根。（新修本草）葦
根。蘆根。蘆蘆根。葦子草根。（和漢

藥考）
外國名詞 Peed root（英）
Schilfural（德）
基本 屬禾本科蘆（葦）之根。
產地 各省各屬有產。
形態 蘆為草本。多生於水邊。
春從舊根生苗。高達丈餘。莖中空。
葉互生。類竹葉。秋季於梢上生白
色花穗。根為叢生。一株之纖維根
生根白色柔潤。稍有甘味。但曬乾
後。則成黃色。味淡。香氣亦失。故枯
敗輕虛之根。不能供藥用。



根 蘆

採取 二月八月採根。日乾。餘
者採掘無時。

製法 雷斅曰。蘆根須要逆水
生。并黃泡肥厚者。去髮節。并赤黃
皮用。

性質 甘寒。無毒。
成分 蘆根中含有糖質。膠質。
蛋白質及中性鹽類等。

效能 清胃火。止嘔噦。除煩熱。

發疹瘡。用為芳香性健胃藥。又為
解熱祛痰藥。

主治 消渴客熱。止小便利。
歷代記述攷證 【唐】蘇恭新
修本草論蘆根曰。療反胃嘔逆。不
下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。【唐】
甄權藥性本草論蘆根曰。解大熱。
開胃。治噎噎不止。【宋】大明諸家
本草論蘆根曰。寒熱時疾。煩悶瀉
痢人渴。孕婦心熱。【明】穆希雍本
草經疏論蘆根曰。蘆根味甘氣寒
而無毒。消渴者中焦有熱。則脾胃
乾燥。津液不生而然也。甘能益胃
和中。寒能除熱。降火。熱解胃和。則
津液流通而渴止矣。客熱者邪熱
也。甘寒除邪熱。則客熱自解。肺為
水之上源。脾氣散精。上歸於肺。始
能通調水道。下輸膀胱。腎為水臟。
而主二便。三家有熱。則小便頻數。
甚至不能少忍。火性急速。故也。肺
腎脾三家之熱解。則小便復其常
道矣。火升胃熱。則反胃嘔逆。不下
食。及噎噎不止。傷寒時疾。熱甚則
煩悶。下多亡陰。故瀉利人多渴。孕
婦血不足。則心熱。甘寒除熱安胃。
亦能下氣。故悉主之也。【清】黃宮

補本草求真論蘆根曰。蘆根治無他奇。惟清肺降火。是其所能。凡人胸中有熱。則火上升。嘔逆氣不下。脾肺熱起。則消渴便數。甚至不能少忍。故必得此苦寒以治。則諸症悉除。且解蝦魚中毒酒毒。然此止宜實熱。不宜虛寒。若誤用之。必致見害。取逆水土內甘美者效。若露出水面者。損人。去蘆節。

國外學說 荷蘭藥鏡卷五載

有蘆根 (Triphnum ropona) 之藥效。摘錄於下。蘆根有清涼、淨血、開達利水之效。和解酷厲液、稀釋黏稠液、疏解凝結、為解凝良藥。疏解內臟壅塞塊、開通肝、脾、腎、膀胱等壅塞。治肝之壅塞結腫、黃疸、脾病、依刺昆瑀兒。最有效。又能溶解膽液凝石。故用於間歇黃疸。有殊效。用於羸瘦病之兼內臟壅塞者。能津潤滋養。緩和酷厲液。但不適於下痢症。黏液壅塞頑固諸病。用此製根成蘆幾斯劑。日服五六盎斯佳。能抑制熱病毒之刺戟衝動。用於減損脈管纖維擴張力。諸症及熱病之稍傾厥衝症者。甚有效。用於間歇熱、稀釋黏液、疏開藥

塞。利小便。驅散病毒。用於間歇熱等之兼有內臟壅塞險重症最佳。用於胸肺咽喉諸症。有緩和、疏解、清涼功效。遷延病之有酷厲毒。而成刺戟症者。例如風痛、流走痛、傷冷痛及頑滯瘡腫疥癬類。或由黏稠液壅塞而發之黃疽等。用此根加於煎劑長服。有殊效。例如下方。排毒蘆根煎。用蘆根、山牛蒡根各六盎斯。加水適宜。煎成煎汁六十盎斯。再加後藥。按骨木傑列乙三盎斯。孕藥酒石(或霸王鹽)四錢。攪和。隨意飲服。大便閉者。加瀉藥。配合應用 ① 止因熱嘔吐。用逆水蘆根、竹茹、枇杷葉、麥門冬、烏梅、木瓜。 ② 除傷寒熱病。煩悶嘔吐。用蘆根、竹茹、麥門冬、大青、青黛。藥性論云。蘆根能解大熱。開胃。治噎噦不止。皆由甘寒除熱之力也。 ③ 治骨蒸肺痿不能食者。蘇遊蘆根飲主之。蘆根、麥門冬、地骨皮、生薑各十兩。橘皮、茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓。分五服。取汁乃瘥。(外臺祕要方) ④ 治勞復食復欲死。並以蘆根

養液汁類飲之(肘後方)

① 治嘔噦不止。厥逆者。用蘆根三斤。切。水煮。養液汁。類飲二升。必效。若以童子小便煮服。不過三升。愈。(肘後方)

(肘後方)

② 治五噎吐逆。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根五兩。剉。以水三大盞。煮取二盞。去滓。溫服下。(金匱玉函方)

③ 治反胃上氣。蘆根、茅根各二兩。水四升。煮二升。分服。(千金方)

④ 治霍亂煩悶。蘆根三錢。麥門冬一錢。水煎服。(千金方)

⑤ 治霍亂腹脹。蘆根一升。生薑一升。橘皮五兩。水八升。煎三升。分服。(太平聖惠方)

⑥ 治食狗肉毒。心下堅積。或腹脹口乾。忽發熱妄語。蘆根煮汁服。(梅師方) 治中馬肉毒(聖惠方)

亦治蟻蝕魚毒。亦治食蟹中毒。亦治中藥箭毒(千金方)

用量 五錢至一兩。

施用宜忌 凡中寒而無火者禁用。

著名方劑 葶藶湯。治咳。有微熱煩滿。胸中甲錯。是為肺癆。(千

金方) 葶藶二升。慈苳仁半升。橘仁五十粒。瓜瓣半升。上四味。以水一斗。煮葶藶。得五升。去滓。納諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

參攷資料 ① 按雷公炮炙論序云。益食加腸。須煎蘆朴云。注用逆水蘆根。并厚朴二味等分。煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。(李時珍) ② 按毛萇詩疏云。葶藶之初生曰葶。未秀曰蘆。長成曰葶。葶者偉大也。蘆者色虛黑也。葶者嘉美也。(李時珍) ③ 蘆根生下濕地。莖葉似竹。花若荻。花名蓬蘽。二月八月採根。日乾用。(蘇恭) ④ 今在處有之。生下隕陂深中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花自作穗。若茅花根。亦若竹根。而節疎。其根取水底味甘辛者。其露出及浮水者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葶即蘆也。葶即蘆之成者。葶藶似葶而小中實。江東呼為烏蘆。(音耶)或謂之蘆。即荻也。至秋堅成。即謂之葶。(音桓) 葶似荻而細長。高數尺。江東謂之葶。其花皆名芳。音藶。其萌皆名藶。堪食如竹笋。若然則蘆葶藶為一物也。所謂葶。乃

今作葦者是也。所謂葦者。今以當葦者是也。而人罕能別葦與蘆。葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下溼所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者皆名蘆。其幹差大深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。(蘇頌) 蘆有數種。其長丈許。中空皮薄色白者。葦也。蘆也。葦也。短小於葦。而中空皮厚色青者。葦也。葦也。莖也。莖也。其最短小。而中實者。葦也。莖也。皆以初生已成。得其名。身皆如竹。其葉皆長如箭葉。其入藥性味皆同。其未解葉者。古謂之紫葦。(李時珍) 入陽明。清熱下降。苟性更佳。能解河豚毒。按根亦能解魚蝦蟹河豚毒。葦莖形如肺管。甘涼清肺。葦莖。即蘆之莖也。(顧松園) 別錄止載蘆根。而不及葦莖。大率生水中者。多與水爲事。其根能啓水精上滋。治消渴客熱。則其莖必係導熱痰下流。而治肺癰矣。凡有節之物。能不爲津液隔閡者。於津液之隔閡而生患者。尤能使之通行。此千金所以有葦莖湯歟。(鄒潤安)

二十畫 蘆

【蘆莖葉】 性質 甘寒無毒。主治 霍亂嘔逆。肺癰。煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論蘆葦曰。穉治金瘡。生肉滅癩。

配合應用 治霍亂煩渴。腹脹。蘆葉一握。水煎服。又方。蘆葉五錢。糯米二錢半。竹茹一錢。水煎。入薑汁。蜜各半合。煎兩沸。時時呷之。(聖惠方)

治吐血不止。蘆荻外皮燒灰。勿令白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯服一二錢。三服可救一人。(聖惠方)

治肺癰。咳嗽煩滿微熱。心胸甲錯。葦莖湯。用葦莖切二升。水二斗。煮汁五升。入桃仁五十枚。慈苳仁。瓜瓣各半升。煮取二升服。當吐出膿血而愈。(金匱方)

治發背潰爛。陳蘆葉爲末。以葱椒湯洗淨。傅之神效。(乾坤秘韞方)

治癰疽惡肉。白炭灰。白荻灰。等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效。(肘後方)

治小兒禿瘡。以鹽湯洗淨。蒲灰傅之。(聖濟總錄方)

參攷資料 古方煎藥。多用勞水及陳蘆火。取其水不強。火不盛也。蘆中空虛。故能入心肺。治上焦虛熱。(李時珍)

【蘆粟】 即稷米之別名。詳「稷米」條。 即蜀黍之俗名。詳「蜀黍」條。

【蘆葦子】 即萊葦子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「萊葦子」條。

【蘆筍】 古籍別名 蘆(綱目) 性質 微苦。冷。無毒。主治 臨間客熱。止渴。利小便。解河豚及諸蠶毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蘆筍曰。解諸肉毒。施用宜忌 忌巴豆。

【蘆肥】 即萊葦之古籍別名。典見爾雅。詳「萊葦」條。

【蘆腦子】 即萊葦子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「萊葦子」條。

【蘆藜】 即蜀黍之古籍別名。典見食物本草。詳「蜀黍」條。 即稷

米之俗名。詳「稷米」條。

【蘆薈】 命名 蘆。黑色也。薈。紫色黑如飴。故名。俗呼爲象臍。以其味苦如臍也。

處方用名 眞蘆薈。洋蘆薈。 古籍別名 蘆薈。奴會。(開寶) 訥會。(拾遺) 象臍。(俗名) 鬼丹。(和漢藥考)

外國名詞 Aloe(拉丁)(德) Aloe(英)

基本 鑽刺百合科蘆薈族植物之葉。煎熬其所滲出之液汁。製成越幾斯質之蘆薈。

產地 蘆薈產索哥德拉。及巴巴豆。好望角等處。近日恒用者。以索哥德拉所產爲上品。功用 潤燥。殺蟲。調經。開胃。動膽汁。又名象臍。由架喇吉打運來。和漢藥考曰。亞拉伯之蘇哥葛拉島。西印度之巴魯篤巴多斯島。非洲之喜望峯等熱帶地方均產之。

形態 蘆薈爲香木類。係常綠灌木。木葉大而尖。肉質有銳鋸齒。花成穗狀。其葉分泌之脂色黑。有光爲透明。或半透明之固塊。其色

或黑或暗綠。質堅脆。研碎之。則成爲黃色或褐色之粉末。沸湯及溫酒精。均能溶解。熱灼之初。膨脹。繼放明網而燃燒。氣味頗惡。有苦味。



蘆 薈

性質 苦寒。無毒。

成分 爲蘆薈素 (Aloin) 幾斯。樹脂等。蘆薈素 (C₁₅H₁₉O₄) 爲蘆薈之有效成分。係淡黃色結晶體。有蘆薈特有之臭氣。味初甘而後苦。冷水難溶。熱湯及酒精易溶。

效能 清疴熱。殺蟲積。能興起大腸蠕動。故有瀉下功效。並能助胃之消化。故用作瀉劑及健胃苦味劑。此外又用作通經藥。並治習慣性便秘經閉。

作用 入胃後能促進胃液分泌。增加使消化增強。至腸能激腸之蠕動。加速黏膜之分泌。驟如令積滯。泄出由腸壁而達血中。則血

亦受激而循環迅速。而使子宮之充血。尤爲有效。故可治一切經閉及衰弱之症。

主治 熱風煩悶。胸膈間熱氣。明目。鎮心。小兒癩癩驚風。癩五疳。殺三蟲。及痔瘡疥癩。解巴豆毒。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論蘆薈曰。主小兒諸疳熱。

【唐】甄權藥性本草論蘆薈曰。單用殺疳。吹鼻殺腦疳。及除鼻癢。

【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蘆薈

曰。研末傳鬻齒甚妙。治溼癬出黃

汁。【明】繆希雍本草經疏論蘆薈

曰。蘆薈味苦。其氣寒。其性無毒。寒

能除熱。苦能泄熱燥溼。苦能殺蟲。

至苦至寒。故爲除熱殺蟲之要藥。

其主熱風煩悶。胸膈間熱氣。明目

鎮心。小兒癩癩驚風。癩五疳。殺三

蟲者。熱則生風。熱能使人煩悶。熱

除則風熱煩悶及胸膈間熱氣自

解。涼肝故明目。除煩故鎮心。小兒

癩癩驚風。熱所化也。五疳同爲內

熱脾胃停滯之證。三蟲生於腸胃。

溼熱痔瘡疥癩。亦皆溼熱下客腸

臟。致血凝滯之所生。故悉主之。能

解巴豆毒。亦除熱之力也。詳其功

用。是足厥陰足太陰二經藥。亦可

兼入手少陰經。【清】黃宮繡本草

求真論蘆薈曰。蘆薈大苦大寒。功

專殺蟲除疳。安心明目。最爲小兒

驚癩疳積上品。且能吹鼻殺腦疳

及除鼻癢。然苦雖能殺蟲。寒能燥

熱。而氣甚穢惡。僅可施之。藜蘆及

體質強健者。若胃虛少食。人得之

入口。便大吐逆。遂致奪食瀉泄。因

而羸瘦怯弱者。多多矣。如黑錫苦

色綠者真。

國外學說 日本學說謂蘆薈

者。產於喜望峯地方。Aloe 屬之

諸種也。日本藥局方亦記載之。本

品之主成分。爲「アロイン」下泄

通經。健胃之藥也。服少量。能增加

食物。促進消化。用爲下劑。則於六

時至十二時後奏效。有嘔氣胃部

壓重腹痛等。此際雖達於小骨盤

內之臟器。然不害消化。不留便秘。

常食亦無習慣之性。因是於慢性

便秘適用之。又爲通經藥。於月經

閉止。痔血閉止。以下劑量與之。爲

誘導下劑。於腦充血肺充血用之。

又或用少量。爲健胃藥。若用大量。則起嘔氣。嘔吐。腹痛。下利。直腸。子

宮。腎之充血。因是患子宮出血。痔

出血。尿意頻數。流產。吞嚥亢進等

症。亦有之。且能使膽汁。腸液。乳汁

之分泌增加。腸之蠕動亢進。甚有

發炎性者。本品若爲散布藥。則於

弛緩性潰瘍用之。又有於眼病用

之者。用量。健胃則用〇、〇一至

〇、〇五。爲下劑。則用〇、二至

一、〇。「アロイン」用量。內服〇

、一至〇、二四。可爲蘆薈之代

用品。爲皮下注入。亦有下劑之效。

卽以一分與個里設林(甘油)八

分之比例溶解者。注入一筒至二

筒。(日本藥局方藥物學綱要)又

和漢藥考曰。蘆薈種類甚多。其中

供藥用者。有巴倍屯昔斯蘆薈 (

Aloe barbadensis) 蘇哥萬里

那蘆薈 (Aloe secostria) 歐

巴吉加蘆薈 (Aloe hepatica)

加邊昔斯蘆薈 (Aloe capensis)

等。但普通則分爲透映蘆薈 (A-

loe lucida) 及肝蘆薈 (Aloe

hepatica) 二種。英美學說謂蘆

薈爲瀉藥。(喜望大腸) 如食小服

則爲補藥。食大服則爲瀉藥。醫士或以爲能感動肝。又如腸內功用

不礙。因膽汁太少之故。則可代膽汁之用。其力似能感動大腸而最易感動肛門。因此令大便能通。設或已有惹動或有痔瘡。則此為有效。依此法亦能感動其相近之各處。因此可為調經藥。又如讀書辛勞。頭痛便秘。婦人腰脊骨痛。月經不行。並宜服此藥。第不宜過服。過服則令肛門痛熱。至孕婦及生痔與大小腸有炎症。則不宜服。其功用又能驅蟲。開胃。治經脈不調。腸膜核疝。經閉便燥。飯不消化。外用能作射水。助瀉驅蟲。

近人學說 顧子靜曰。蘆薈有兩種。一為喜望峯地方所產。百合科植物蘆薈屬諸種肥厚肉狀之葉。榨取其汁。煎至濃稠。成暗褐色之塊。易於破碎。其碎面呈貝殼狀。有玻璃狀光澤。邊緣透映視之。呈類赤色或淡褐色。粉碎之成黃色無晶形粉末。有特異之臭氣。與極苦味。難溶解於冷水。入二倍之沸湯中。殆成透明之溶液。是所謂透明蘆薈也。主成分為阿路受。帶有強瀉下作用。并含多量弱瀉下性之蘆薈脂。此外更其沒食子

二十蠶 蘆

酸。蛋白質狀物質。脂肪等。二為東西印度地方所培植之蘆薈。植物製成不透明之塊。是稱肝狀蘆薈。含少量之阿路。因無光澤。色黃褐。乃至黑褐。粉末為橙黃色。乃至褐色。此外之性質及成分。與透明蘆薈無異。蘆薈之作用。其少量自三毫至一釐五毫。能與奮食慾。促進消化。但不甚確實。稍大量。自三釐至一分三釐。發生噁氣。胃部壓重。服用後經十時至十五時。排瀉狀暗色便數次。時或腹痛。其三倍量即四分。通利較速。排瀉液便腹痛極強。併發寒急後重。但瀉下量因人而異。瀉後毫無便秘之患。久用大量。則下腹臟器。易至充血。以腎臟與在小骨盤腔內之直腸。并生殖器之血管為甚。因此誘起子宮出血。尿意頻數。痔疾。痔出血等症。少量久用。亦直腸血管擴張。難於回復。成為痔疾。是由蘆薈之直接刺激直腸也。蘆薈之醫療應用。最常用者為瀉下藥。尤適於常習便秘。可以久服。以無須增大用量也。但有出血之傾向者。如痔疾。月經期。慢性子宮病。妊娠等。

皆當禁用。

配合應用 ●治小兒諸症。用蘆薈。厚朴。橘紅。甘草。青黛。蕪荑。百草霜。旋復花。為末。以砂仁湯吞。一歲一分。其效。

●治脾胃虛弱。使君子等分為末。每服一二錢。米飲調下。(衛生易簡方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡脾胃虛弱者禁用。

著名方劑 ●更衣丸。治津液不足。大便不通。(古方)蘆薈七錢。(研細)珠砂五錢。(研如飛麵)滴好酒少許。和丸。每服一錢。重至三錢。酒下。●當歸龍薈丸。治肝經實火。大便秘結。小便澀滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹等症。(古方)當歸。龍膽草。黃連。黃芩。梔子。仁。各一兩。大黃。蘆薈。青黛。各五錢。木香。二錢。半。麝香。五分。(另研)上為末。炒神麴糊丸。每服二十九。溫湯下。

參攷資料 ●唐劉禹錫傳信方云。予少年曾患癰。初在項間。後延上左耳。遂成瘻。瘻浸淫。用斑蝥。狗膽。桃根。諸藥。徒令蠶蠹。其瘻

轉盛。僑于楚州賈藥。人教用蘆薈。一兩。炙甘草。半兩。研末。先以溫漿水洗。洗淨。傳之。立乾。便速。真神奇也。(蘇頌) ●蘆薈生波斯國。狀似黑。乃樹脂也。(李珣) ●今惟廣州有來者。其木生山野中。滴脂淚而成。採之不拘時月。(蘇頌) ●蘆薈原在草部藥譜及圖經所狀。皆言是木脂。而一統志云。爪哇三佛齊諸國所出者。乃草樹。狀如蠶尾。採之以玉器搗成膏。與前說不同。何哉。豈亦木質草形乎。(李時珍) ●蘆薈為蘆薈族植物。種類頗多。其形狀亦因之而有差異。亞拉伯蘇哥萬拉島 (Arabia) 所產之蘆薈。莖作單圓柱狀。時亦有分歧者。高可四五尺。葉扁平。似肉質。叢生於莖之枝端。作藍綠色。披針形。上有白斑。邊緣有短刺棘。以鑽刺葉。則滲出苦味液汁。謂之蘆薈汁。第四版改正日本藥局方曰。蘆薈係從其葉採取液汁煎成。為暗褐色之固塊。質脆。易碎。碎片透明。作貝殼狀。現鏡下有類似玻璃之光澤。顯微鏡下觀之。見並非結晶。氣味特異。有苦

味。本品加哥羅仿姆 (Chloroform) 煮沸。或加伊打 (Fehling) 液稍呈類黃色。將其伊打液蒸發。則遺下少許黃色者黏性殘渣。又用熱湯溶化。加弱酸鈉濃液。則呈綠色之螢石光彩。(和漢藥考)

【蘆葶】

命名 即蘆葶外之皮。
性質 苦寒無毒。
效能 生肉。滅瘰。
主治 金瘡。

【蘆蠹蟲】

命名 本品即生於蘆葶節中之蠹蟲故名。
形態 蘆蠹蟲為化生蟲類之一種。狀如小蠶。可供藥用。
性質 甘寒無毒。

主治 小兒飲乳後。吐逆不入腹。取蟲二枚。煮汁飲之。嘔逆與乳不同。乳飽後現出者。為現乳也。

【蘇】即紫蘇之原名。詳「紫蘇」條。
【蘇子霜】即紫蘇子之處方用名。詳「紫蘇子」條。
【蘇方木】即蘇木之古籍別名。典見唐本草。詳「蘇木」條。

【蘇木】


原名 蘇方木。
命名 本品產於海島。

之蘇方國。故名。後世簡稱為蘇木。古籍別名 木中尊。綱目。蘇方木。(唐本草) 多邦。蘇枋。巴勝虎。(和漢藥考)

外國名詞 Sappanwood (拉丁) (Sappan wood) (英)

基本 屬荳科為蘇枋之樹幹。產地 陳仁山藥物生產辨云。蘇木產中亞美利加與西印度羣島等處。東印度。暹羅等處亦有出。

形態 蘇枋為熱帶地方所產之落葉喬木。高達五丈餘。葉作羽狀複葉。其小葉作長橢圓形。花為美麗黃色。蛾形。花後結黑實。藥用及顏料。去樹幹皮。取赤色堅實之木部用之。



蘇木

製法 雷斅曰。凡使去上粗皮并節。若得中心文橫如紫角者。號曰木中尊。其力倍常百等。須細剉重搗。并細梅樹枝蒸之。從已至申陰乾用。

用法 水煎。或酒浸。或剉末用。性質 甘鹹平無毒。
成分 含有 Tannic acid, C₁₅H₁₀O₅, Fixed Oil, 樹脂。纖維。糖素。
效能 祛瘀。止痛。和血。散風。用作清血藥。
作用 在胃時微有制醉之功。入腸能促進腸之欬性。同時又能減少腸之分泌。入血後能收縮發炎之微血管。

主治 破血。產後血脹。閉欲死者。水煮五兩。取濃汁服。
歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蘇木曰。雀亂嘔逆。及人常嘔吐。用水煎服。【唐】李珣海藥本草論蘇木曰。虛勞血癖。氣壅滯。產後惡露不安。心腹攪痛。及經絡不通。男女中風。口噤不語。並宜細研乳頭香末方寸匕。以酒煎蘇方木調服。立吐惡物。【宋】大明諸家本草論蘇木曰。婦人血氣心腹。痛。月候不調。及產後。排膿止痛。消癥。腫。撲損。瘀血。女人失音。血嘔。赤白痢。并後分急痛。【元】李東垣用藥法象論蘇木曰。破瘡。瘡。死血。

產後敗血。【明】繆希雍本草經疏論蘇木曰。蘇木味甘鹹氣平無毒。好古加辛。降多於升。陽中陰也。入足厥陰。兼入手少陰。足陽明。凡積血與夫產後血脹。閉欲死。無非心肝二經為病。此藥鹹主入血。辛能走散。敗濁瘀積之血行。則二經清寧。而諸證自愈。日華子主婦人血氣。心腹。痛。月候不調。及產後。排膿。止痛。消癥。腫。撲損。瘀血。女人失音。血嘔。海藥主虛勞。血癖。氣壅。滯。產後惡露不盡。心腹攪痛。及經絡不通。悉取其入血行血。辛鹹消散。亦兼有軟堅潤下之功。故能祛一切凝滯留結之血。婦人產後尤為所須耳。【清】黃宮繡本草求真論蘇木曰。蘇木甘鹹辛涼。功用有類。紅花。少用則能和血。多用則能破血。但紅花性微溫和。此則性微寒涼也。故凡病因表裏風起。而致血滯不行。暨產後血暈。脹滿。以死。及血痛。血癥。經閉。氣壅。癥腫。跌撲。損傷等症。皆宜相症合。以他藥調治。如疎風。則與防風。同用。行血。則與乳香。同用。但性本疎泄。產後惡露已盡。大便不實者。均應禁用。出蘇

二十八日為適宜。所以用白礬朴者。因不用白礬則半夏卸。全用白礬則製起半夏太實。是以用朴礬佐之。使半夏不太實。但朴礬入瀉類。不適於用。故將朴礬去。轉用生鹽三錢。佐白礬煎水浸之。生鹽亦有除痰之功。寧使其實。亦不如此朴礬之瀉也。

主治 除溼。化痰。止嘔。

【蘇伐羅】即金之古籍別名。典見綱目。詳「金」條。

【蘇合油】即蘇合香製成之油之處方用名。詳「蘇合香」條。

【蘇合香】命名 本品出自蘇合國故名。

處方用名 蘇合油。

古籍別名 合香（藿香亦一名合香）、帝香、蘇香、楓脂香。（和漢藥考）

外國名詞 Styrax (拉丁) (英) (德)

基本 係金縷梅科。為楓屬蘇合香樹幹內皮所煎出之香膏。

產地 概產於小亞細亞及波斯諸地。

形態 蘇合香樹為落葉喬木。

高達四丈餘。枝柯繁茂。葉作掌狀。邊緣有鋸齒。花為長圓形頭狀花。開於葉腋。果實為球形。中藏有扁平種子。蘇合油為柔軟膠質之濃稠液體。透明而褐色。但含有水氣時。則濁濁而作灰色。較水為重。溶於伊打哥羅仿姆。硫化炭等。清香如香膏。味辛辣。



蘇合香

製法 由蘇合香樹中膠汁製成。勿經火。

性質 甘。溫。無毒。

成分 為司吉諾兒 (Styrol)、司吉拉辛 (Styracin)、桂皮酸、樹脂等。

效能 通竅。解鬱。辟穢。祛痰。用作衝動性祛痰藥。又為疥癬塗藥。

作用 在胃中僅自行分解。然不起何等作用。至腸次第被吸入血中。能使血行增進。并能激發神經。使分泌液透出。

主治 辟惡。殺鬼精。溫病。癩瘡。去三蟲。除邪。令人無夢。久服通神明。輕身長年。

歷代記載攷證 【明】李士材

本草綱目論蘇合香曰。蘇合香甘溫。芳香氣。通達諸竅。流行百骸。故其主治能辟邪殺鬼。止癢截癩。

【清】黃宮繡本草求真論蘇合香曰。蘇合香味甘氣溫。出於天竺崑崙諸國。安南三佛齊亦皆有之。治能辟惡殺鬼。凡溫瘧毒癩。並痰積氣厥。山嵐瘴濕。屬於經絡。塞於諸竅者。非此不除。按香皆能辟惡除邪。此合諸香之氣。煎就而成一物。其通竅逐邪。殺鬼通神。除癢絕癩。祛穢。宜其然矣。以筋挑起。懸絲不斷者。真。但血燥氣弱者勿用。

國外學說 日本學說謂流動蘇合香。供藥用時。為褐色混濁之黏稠液。溶解於酒精中。於防腐殺下等動物之性。因刺激性少。且價廉。故與等分或倍量之阿列布油混和。或與百露拔爾母相混。治疥癬等甚效。或為防腐性被覆藥。於火傷凍傷潰瘍。外用之。又日本藥局方曰。流動蘇合香。係前蘇合

香樹 (Liquidambar orientalis)

(Liq. mill.) 內皮壓攪而得。為灰色黏稠液。有佳香。入水下沉。水面僅有無色油滴浮動。(中略) 精製之法。用流動蘇合香於重湯煎上。溫熱。除去水氣大半。乃溶於等量酒精。澆過蒸發。使成稠厚。越幾斯。本品為褐色黏稠物質。薄層透明。溶於等量酒精。澄明溶化。多量則變稠濁。逢伊打。硫化炭。偏蘇爾等。祇略留絮狀物質而溶化。又和淡藥

考曰。蘇合香有數種。一為外面黃赤色。作顆粒狀者。有脂氣。二為雜有前者之小塊。呈淡褐色。易磨碎。投入水中。其香稠佳。三為輕質巨塊。混有污物。品最下。四為蘇合香。即今之流動蘇合香。又曰司吉諾兒 (Styrol C₈H₈)。為無色揮發性液體。比重八〇・九二四。約於攝氏一百三十五度沸騰。蘇合香之香氣。即從此物發出。司吉拉辛 (Styracin C₁₅H₁₀O₂·C₁₅H₁₂)。通常為羽狀結晶體。時或為油狀。伊打善能溶解。酒精則稍能溶解。

辨偽 蘇合香色微綠如琥珀者。真。微黃者次之。紫赤者又次之。

以管挑起。徑尺不斷如絲。漸風起如鈎者爲上。以少許擦手心。香透手背者真。按蘇合香爲開透關。致與香機能辟惡達鬱之宜品也。

配合應用 治水氣浮腫。蘇合香。白粉。水銀等分。搗勻。煉蜜爲丸。小豆大。每服二丸。白湯下。當下水出。(肘後方)

用量 五滴至八滴。或一分至五分。

施用宜忌 凡陰虛火旺。及氣虛多痰者禁用。忌火。

著名方劑 蘇合香丸。療傳屍。骨蒸殘。瘵。肺痿。疰忤。鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴癘。赤白暴利。痰血。月閉。痲癩。丁腫。驚癇。小兒吐乳。大人狐狸等疾。(局方) 蘇合香油。五錢。(入安息香內) 安息香一兩。(另爲末。用無灰酒半斤熬膏) 丁香。青木香。白檀香。沉香。藁朮。香附子。訶子。(煨去肉) 烏犀角。硃砂。(水藏) 各一兩。薰陸香。片腦。(研) 各五錢。麝香七錢半。上爲細末。入安息香膏。煉蜜和劑。則如交質大。每四九空心用沸湯化下。溫酒下亦得。

二十畫 蘇

參攷資料

●蘇合香氣質能通諸竅臟腑。故其功能辟一切不正之氣。按沈括筆談云。大尉王文正公。氣脈多病。宋眞宗。賜藥酒一餅。令空腹飲之。可以調氣血。辟外邪。公飲之大覺安健。次日稱謝。上曰。此蘇合香酒也。每酒一斗。入蘇合香丸一兩。同煮。極能調和五臟。却腹中諸疾。每冒寒風。則宜飲一盃。自此臣庶之家。皆傲爲之比。方盛行於時。其方本出唐玄宗開元廣濟方。謂之白米丸。後人亦編入千金外臺。治疾有殊效。(李時珍) ●今從西域及崑崙來。赤紫色。與紫真檀相似。堅實。極芳香。性重如石。燒之灰白者好。(蘇恭) ●今廣州雖有蘇合香。但類蘇木。無香氣。藥中只用如膏油者。極芬烈。陶隱居以爲獅子矢者。亦是指此膏油者言之。爾。梁書云。中天竺國。出蘇合香。是諸香汁煎成。非自然一物也。又云。大秦國人。採得蘇合香。先煎其汁。以爲香膏。乃賣其滓。與諸國。買人是以展轉來達中國者。不大香也。然則廣南貨者。其經煎煮之餘乎。今用如膏油者。乃

合治成者爾。(蘇頌) ●按眞宇志

云。蘇合油出安南。三佛齊諸番國。樹生膏。可爲藥。以濃而無滓者爲上。葉廷珪香譜云。蘇合香油出大食國。氣味皆類。爲得者。沈括筆談云。今之蘇合香。赤色如堅木。又有蘇合油。如膠。人多用之。而劉夢得傳信方言。蘇合香多薄。葉子如金色。按之即少。故之即起。良久不定。如蟲動。氣烈者佳。如此則全非今所用者。宜精考之。竊按沈氏所說。亦是油也。不必致疑。(李時珍) ●蘇合香聚諸香之氣而成。能透諸竅臟。辟一切不正之氣。凡痰積氣厥。必先以此開導。治痰以理氣爲本也。凡山嵐瘴溼之氣。襲於經絡。拘急弛緩不均者。非此不能除。(張石頑) ●蘇迤米羅細。即草豆蔻之古籍別名。典見金光明經。詳「草豆蔻」條。

【蘇枋】即蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇木」各條。

【蘇枋木中沙】即蘇木中沙之原名。詳「蘇木中沙」條。

【蘇芳花】即紫荊花之日本名。詳

「紫荊」條。

【蘇香】即蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇合香」條。

【蘇家三七】即昭參之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「昭參」條。

【蘇密那子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【蘇梗】 主治 下氣。較蘇子稍緩。虛者宜之。

歷代記述攷證 【清】吳儀洛本草從新論蘇梗曰。順氣安胎。

辨偽 ●鄭肯巖曰。蘇梗即紫蘇旁枝小梗。崇原云。氣味辛平無毒。主寬中行氣。消飲食。化痰涎。治噎膈反胃。止心腹痛。通十二經。關竅脈絡。近市肆有一種白蘇梗。即白蘇之梗。既去白藥。無從辨識。葉色既殊。梗性自別。不堪入藥。用者慎之。●曹炳章曰。按蘇蘇江浙皆出。紫梗空心。葉雙面皆紫。有皺摺紋。如鷄冠者。故名鷄冠紫。味辛氣甚香。爲最佳。又一種綠方梗。葉上面綠。下面紫。香味較淡。薄俗名單面紅紫蘇。略次。又有一種野生田野。方梗綠葉。惟葉筋紫。氣微香而濁。俗爲野紫蘇。最次。不入藥。乃

蘇梗多屬野蘇之梗。蓋爲冠蘇梗在五月間。連葉帶梗嫩時割取。以作蘇葉。其梗未老已收。祇可作嫩蘇梗之用。惟野蘇其葉不採藥用。任其留存。至九月間收子。以作蘇子。拔根以作蘇梗。其實乃野蘇之梗。皆不道地。

【蘇梗】即紫蘇之處方用名。詳「紫蘇」條。

【蘇葉】即紫蘇之處方用名。詳「紫蘇」條。

【蘇鐵】即無漏子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無漏子」條。

【蘇菰】古籍別名。蘇菰。肉肚菜。俗名。

性質 甘寒。無毒。
主治 益腸胃。化痰理氣。

歷代記述攷證 【明】黃宮繡本草求真論蘇菰曰。蘇菰本於桑楮諸木。埋於土中。澆以米泔而生。味甘氣寒。色白柔輭中空。狀如未開玉簪花品。又有形如羊肚。蜂窠。鼠。故又有別其名曰羊肚菜。味甘如鷄。故又有別其名曰鷄腿菰。皆真香。實諸菰同爲一類。但香實色

白而平。磨菰則色白而寒也。香實能益胃氣不飢。及治小便秘。磨菰則能理氣化痰。而於腸胃亦有功也。然皆體潤性滯。多食均於內氣有阻。而病多發。不獨磨菰然也。【清】王士雄隨息居飲食譜論蘇菰曰。蘇菰甘涼。味極鮮美。葷素皆宜。開胃化痰。煖而無砂者勝。多食發風動氣。諸病人皆忌之。

參攷資料 ①磨菰有毒。動氣致病。不可多食。②正要 ③磨菰出山東淮北諸處。埋桑楮諸木於土中。澆以米泔。待菰生採之。長二三寸。本小末大。白色柔輭。其中空虛。狀如未開玉簪花。俗名雞腿磨菰。謂其味如雞也。一種狀如羊肚。有蜂窠眼者名羊肚菜。李時珍。

【磨菰】即磨菰之古籍別名。典見綱目。詳「磨菰」條。

古籍別名 芥菜。拾遺。

四葉菜。厄言。田字草。白蘋。破銅錢。綱目。水蘆。吳普。

外國名詞 Marsilia quadrifolia, L. (拉丁) テンシサウ ヨツパウキクサ(日本)

基本 係蘋科蘋屬。爲蘋莖菜。

產地 生池澤淺水間。
形態 蘋爲水草類。開花植物類之多年生草本。莖柔細長。深入水底。抽出長柄之葉。上浮水面。葉爲四片合成。狀如田字形。狀。夏開小白花。葉柄下部。特生小枝。着以囊狀體之胞子。大如豆而質堅。其莖葉可供藥用。



蘋

採取 三月間採之。日乾用。
性質 甘寒。滑。無毒。
主治 暴熱。下水氣。利小便。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蘋曰。搗塗熱瘡。搗汁飲。治蛇傷毒入腹。內曝乾。枳椇等分爲末。入乳和丸服。止消渴。

原名 奈。
命名 奈字篆文。象子綴於木之形。故名。

古籍別名 平婆。梵言。頰婆。色白者名素奈。色赤者名丹奈。朱奈。色青者名綠奈。冬熟者名冬奈。

外國名詞 Pyramalus, L. (拉丁) リンゴ(日本)

基本 係薔薇科梨屬。爲蘋果之果實。

形態 蘋果爲果類之落葉喬木。一似林檎。樹身筆直。而葉色青。其果實如梨而圓滑。生青。熟則紅色。或半紅。或半白。光潔可愛。香聞數步。其味甘鬆。未熟者食之。軟如棉絮。過熟則沙爛不堪。可供食與藥用。

性質 苦寒。有小毒。
主治 補中。焦諸不足。氣和脾。卒食飽。氣壅不通者。搗汁服。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論蘋果曰。益心氣。耐飢。

參攷資料 ①蘋果甘。無毒。生津止渴。②正要 ③蘋果多食。令肺癆。腫脹。有病入尤甚。別錄。

古籍別名 我蔞。羅漢。爾雅。抱娘藹。綱目。

性質 辛溫。無毒。
主治 破血下氣。煮食之。

參攷資料 ①陸農師云。覆之爲言也。高。我亦異也。我科高也。可

性質 甘平無毒。

效能 除熱止渴。

主治 心腹痛。反胃。霍亂。

【醴泉】即口津之古籍別名。典見綱目。詳「口津」條。

【鑄鐵衣】即鑄鐵之處方用名。詳「鑄鐵」條。

【鐘乳】即鐘乳石之簡稱。詳「鐘乳石」條。

【鐘乳石】命名 石之津氣鐘聚成乳。滴溜成石。故名。鐘乳蘆。形象鵝管而空中。又稱鵝管石。

處方用名 鐘乳粉。鵝管石。

古籍別名 石鐘乳（本經）留公乳。蘆石。夏石（別錄）虛中（吳普）黃沙石（藥性）小蠟石。乳公。竹乳（和漢藥考）滴乳石。

外國名詞 Stalactite（英）

Stalaktite（德）

基本 屬礦石類。為乳狀之石塊。

產地 和漢藥考曰。石鐘乳生洞穴中。仰視石脈涌出處。則有乳

狀。白如玉雪。石液融結成者。其乳

林下垂如倒數峯小山。峯端漸銳。

且長如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝

翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳

最精者。以竹管仰承取之。尤輕明

如雲母。有爪甲者為勝。中日各國

多產之。下垂於石灰石洞穴中。乃

一種極為可觀之鑽石也。世界產

此最聞名者。一為美國之孟母斯

洞。二為澳洲之亞台培克窟。三為

日本之武藏洞。陳仁山藥物生產

辨云。中國產廣東新安。平海。汕尾

等處。

形態 為白色或灰白之冰柱

狀。鑽石長短不一。其橫斷破碎面

有自中心向外作放射狀之條理。

透明。質重。有時中空。凡含有碳酸

垂於石。如木之有萌蘖。①殷蘖。一

名蘆石。生於石上。如木之蘖。亦盤

結如寶。此即孔公蘖之根也。但似

附石生而粗者。為殷蘖。接殷蘖而

生。由漸空通者。為孔公蘖。接孔公

蘖而生者。為鐘乳。蓋殷蘖如人之

乳根。孔公蘖如乳房。鐘乳如乳頭

也。②石牀。一名乳牀。或稱逆石。亦

作石筍。生石鐘乳掌中。鐘乳水滴

下。凝結而生。儼如竹筍。久則漸與

上乳相接為柱。③石花。一名乳花。

亦生鐘乳掌中。乳水滴石上。散如

霜雪。日久積成如花者是也。④土

殷蘖。一名土乳。即鐘乳石之生於

山崖土中者。南方名山多有之。人

山之乳者。其山遍生茅草。以茅津

相滋為乳。乳色稍黑而滑潤。其性

微寒。

採取 二三月間採取陰乾。

製法 雷斅曰。凡使石鐘乳。勿

用頭粗厚併尾大者。為孔公石。不

用色黑及經大火驚過。并久在地

上收者。曾經藥物製者。並不得用。

須要鮮明薄而有光潤者。以鷄翎

個子為上。有長五六寸者。凡修事

法。鐘乳八兩。用沉香。零陵香。藿香。

甘松。白茅各一兩。水煮過。再煮汁。

方用煮乳一伏時。漉出。以甘草。紫

背天葵各二兩同煮。漉出。拭乾。緩

火焙之。入臼杵粉。篩過。入鉢中。令

有力。少壯者二三人。不住研三日

三夜勿歇。然後以水飛澄。過。細

於日中曬乾。入鉢再研二萬遍。乃

以藥盒收之。唐慎微曰。太清經。鍊

鐘乳法。取好細末。置金銀器中。瓦

一片。密蓋。勿令洩氣。蒸之。自然化

作水也。

用法 研為細末。成為鐘乳粉。

水煎或糊丸散。

性質 甘溫無毒。

成分 化學上謂之碳酸鈣。

曹誠 CO₂

效能 助陽。溫肺。化痰。用為補陽藥。又用作眼科藥。

主治 咳逆上氣。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。(本經)益氣補虛損。療脚弱疼冷。下焦傷竭。強陰。久服延年益壽。好顏色。不老。令人有子。不鍊服之。令人淋。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論鐘乳曰。主泄精寒嗽。壯元氣。益陽事。通聲。【宋】日華諸家本草論鐘乳曰。補五勞七傷。【明】經希雍本草經疏論鐘乳曰。石鐘乳。稟石之氣而生。本經謂其味甘。氣溫無毒。吳普曰。神農辛。斯言近之。甄權以為有大毒。或是經火之故。應云味甘。辛。氣大溫。其性得火。則有大毒。乃為得之。其主咳逆上氣者。以氣虛則不得歸元。發為斯證。乳性溫而鎮墜。使氣得歸元。則病自愈。故能主之也。通百節。利九竅。下乳汁者。辛溫之力也。療脚弱疼冷者。亦是陽氣下行之驗也。甄權主寒嗽通聲者。辛以散邪。結溫以祛寒氣故也。其他種種補益之

二十畫 鐘

說。當是前人好事者。淫美之辭。夷考其性。恐無是理。未足信也。【清】

黃宮繙本草求真論鐘乳曰。石鐘乳。即鵝管石者是也。味辛而甘。氣溫質重。故凡咳氣上逆。脚弱冷痛。虛滑遺精。陽事不舉者。服此立能。有效。以其氣不歸元。墜墜鐵虛。得此火不上浮。氣不下脫。而病俱可以愈耳。且以辛溫之力。又兼色白。故能運竅利乳。昔人取名鐘乳。卽

是此意。但金石性悍。服之陽氣暴充。形體壯盛。飲食倍進。得此肆淫。則精竭火燥。發為癰疽淋濁。害不勝言。古有焚香透腦散。以治胸膈

勞嗽痞滿之病。然暫用則可。久用恐損人氣。出洞穴中。石液凝成。下垂如冰柱。通中輕薄。如鵝翎管。碎之。如爪甲。光明者。真。煉合各如本方。【清】黃元御玉楸藥解論鐘乳

曰。石鐘乳。燥溼悍疾。治脾胃溼寒。遺精吐血。腸滑。乳閉。喘。勞嗽。陽痿。聲啞。其功甚速。寒消溼去。真。氣充。恃此縱欲。傷精。陽根升泄。往往發為淋瀝。癰疽之證。固緣金石。標悍。亦因服者。恃藥力而離斷也。【清】張隱菴本草崇原論鐘乳曰。

石鐘乳乃石之津液融結而成。氣味甘溫。主滋中焦之汁。上輸於肺。故治咳逆上氣。中焦取汁。奉心化赤。而為血。故明目。流注於中。而為精。故益精。精氣盛。則五臟和。故安

五臟。血氣盛。則百節和。故通百節。津液滿於空竅。則九竅自利。滋於經脈。則乳汁自下。

配合應用 治瘡疔結毒。爛壞鼻梁。及陰蝕陽物。有神。石鐘乳得牛黃。白蠟。象牙末。真珠。乳香。沒藥。樟皮。灰。龜板。灰。俱存性。細研。枯白礬。蛙竹。屑。紅鉛。

鐘乳煎治風虛勞損。腰脚無力。補益強壯。用鐘乳粉煉成者。三兩。以夾絹袋盛之。牛乳一大升。煎減三之一。去袋飲乳。分二服。日一作。不吐不利。虛冷人。微瀉無所苦。一袋可煮三十度。力盡別作。每服訖。須潔淨。令通氣。其滓和麴。煨雞子食之。此崔尚書方也。(孫真人千金翼方)

焚香透腦散。治一切勞嗽。胸膈痞滿。用鵝管石。雄黃。佛耳草。款冬花。等分。為末。每用一錢。安香爐上。焚之。以筒吸煙入喉中。日二次。

(宣明方)

治肺虛喘急。連綿不息。生鐘乳粉。光明者。五錢。蠶三兩。化和。飯甑內蒸熟。研丸。如梧子大。每水下。一丸。(聖濟總錄方)

治乳汁不通。氣少血衰。服瀝不行。故少乳。煉成鐘乳粉二錢。濃煎。漏蘆湯調下。或通草等分為末。米飲服。方寸匕。日三服。(外臺秘要方)

李補剛服乳法。主治五勞七傷。咳逆上氣。治寒嗽。通聲音。明目。益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛損。療脚弱疼冷。下焦傷竭。強陰。久服延年益壽。不老。令人有子。取韶州鐘乳。無間厚薄。但顏色明淨。光澤者。卽堪入煉。惟黃赤二色。不在用。置於金銀器中。大鑊著水。沉器煮之。令如魚眼沸。水減。卽添。乳少。三日。三夜。乳多。七日。七夜。候乾。色變黃白。卽熟。如疑生。更煮十日。最佳。取出去水。更以清水煮半日。其水色清。不變卽止。乳無毒矣。入瓷鉢中。玉髓著水。研之。覺乾。清卽添水。常令如稀米泔狀。研至四五日。拈之光膩。如香中

一九〇三

白魚。便以水洗之。不隨水落者即熱。落者更研。乃澄取燥乾。每用一錢半。溫酒空腹調下。象和丸散用。其煮乳黃濁水。切勿服。服之損人咽喉。傷肺。令人頭痛。或下劑不止。共有犯者。但食豬肉解之。(千金方)

①鐘乳酒。安五醞。適百節。利九竅。主風虛。補下焦。益精明目。鐘乳煉成粉五兩。以夾練袋盛之。清酒六升。瓶封湯內。煮減三之二。取出添滿。封七日。日飲三合。忌房事。葱豉。生食硬食。(外臺祕要方)

②鐘乳丸。治丈夫衰老陽絕。肢冷少氣。減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。鐘乳粉二兩。菟絲子酒浸焙。石斛各一兩。吳萸湯泡七次。炒。半兩為末。煉蜜和丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。日二服。服訖行數百步。覺胸中熱。稍停。即食乾飯豆羹。忌食粗臭惡物。及聞尸穢等氣。初服七日。勿為陽事。過七日乃可行。不宜傷多。服過半劑。覺有功。乃續服。此曹公卓方也。(和劑局方)

③治吐血損肺。錄成乳粉。每服

二錢。糯米湯下立止。(十便良方) ④治大腸冷滑不止。鐘乳粉一兩。肉豆蔻煨半兩。為末。煮棗肉丸。梧子大。每服七十丸。空心米飲下。用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡陰虛有熱者禁用。反參。尤惡牡丹。玄石。牡蛎。忌羊血。葱。蒜。胡荽。畏石英。慈草。蛇床。為之使。

著名方劑 鐘乳丸。治丈夫衰老。陽絕肢冷。少氣減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。(局方) 鐘乳粉二兩。菟絲子(酒浸焙)石斛各一兩。吳萸(泡七次炒)半兩。上研末。煉蜜丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。忌食粗臭惡物。及勿聞尸穢等氣。初服七日。勿為陽事。

參攷資料 ①蕭炳云。石鐘乳如蟬翼。爪甲者為上。如繡管者下。經既言乳。今復不取乳。此何義也。蓋乳取其性下。不用如麝齒者。謂如烏頭附子。不用尖丫角義同。但明白光潤。輕鬆色如鍊消石者佳。服錄別有法。(寇宗奭) ②石鐘乳為燥悍之劑。內經云。石藥之氣悍。

仁哉言也。凡藥氣之偏者。可用於暫而不可久。夫石藥又偏之甚者也。自唐時太平日久。膏粱之家。惑於方士。服食致長生之說。以石藥體厚氣厚。習以成俗。迨宋至今。猶未已也。斯民何辜。受此氣悍之禍。而莫之能救。哀哉。本草謂其久服延年之功。柳子厚又從而述美之。予不得不深言也。(朱震亨) ③石鐘乳乃陽明經氣分藥也。其氣慄疾。令陽氣暴充。飲食倍進。而形體壯盛。味者得此自度。益肆淫泆。精氣暗耗。石氣獨存。孤陽愈熾。久之營衛不從。發為淋瀝。變為癰疽。是果乳石之過耶。抑人之自取耶。凡人陽明氣衰。用此合諸藥以救其衰疾。平則止。夫何不可。五穀五肉久嗜不已。猶有偏絕之弊。况石藥乎。種樹書云。凡果樹作穴。納鐘乳末少許。固密。則子多而味美。納少許於老樹根皮間。則樹復茂。信然。則鐘乳益氣。令人有子之說。亦可類推。但恐嗜欲者。未獲其福。而先受其禍也。然有稟賦異常之人。又不可執一而論。張杲醫說。載武帥雷世賢多侍妾。常餌砂母。鐘乳日

夜煎鍊。以濟其欲。其妾受苦寒洩。不嗜食。求丹十粒服之。即覺臍腹如火。少焉熱狂。投井中。救出。遍身發紫泡。數日而死。而世賢服餅千計。了無病惱。異哉。沈括筆談。載夏英公性奢侈。而稟賦異於人。纓睡。即身冷而僵如死者。常服仙茅。鐘乳。梳黃。莫知紀極。每晨以鐘乳粉入粥食之。有小吏竊食。遂發疽死。此與終身服附子無恙者。同一例也。沈括又云。醫之為術。苟非得之於心。未見能臻其妙也。如服鐘乳。當終身忌葷。尤能動鐘乳也。然有藥勢不能蒸。須要其動而激發者。正如火少。必借風藥鼓之。而後發火。盛則鼓之。反為害。此自然之理也。凡服諸藥。皆宜做此。又十便良方云。凡服乳人。服乳三日。即三日補之。服乳十日。即十日補之。欲飽食。以牛羊豕鹿等骨煎汁。在意作羹食之。勿食倉米臭肉。及犯房事。一月後。精氣滿溢。百脈流通。身體覺熱。遶臍肉起。此為得力。可稍近房事。不可頻數。令藥氣頓竭。彌更害人。戒之慎之。名之為乳。以其狀人之乳也。與神丹相配。與凡石迥

殊。故乳稱石。語云。上土服石。服其精。下土服石。服其滓。滓之與精。其力遠也。此說雖明快。然須真病。命門火衰者宜之。否則當審。(李時珍) ①柳宗元與崔遠州書云。草木之生也。依於土。有房山之陰。陽或近木。或附石。其性移焉。况石鐘乳直產於石。石之精粗疎密。尋尺特異。而穴之上下。土之厚薄。石之高下。不可知。則其依而產者。固不一性。然由其精密而出者。則油然而清。油然而輝。其致滑以夷。其肌廉以微。食之使人榮華溫柔。其氣宜流。生胃通腸。壽考康寧。其粗疎而下者。則奔突結澀。乍大乍小。色如枯骨。或類死灰。奄頓不發。澀齒積類。重濁頑璞。食之使人便澀。癆瘵。泄火生風。戟喉痒肺。幽關不聽。心煩喜怒。肝舉氣剛。不能平和。故君子慎取其色之美。而不必惟土之信。以求其至精。凡爲此也。(唐惲微) ②石鐘乳光潤而薄。如羅紋。故鳥翮。蟬翼。一切皆成白色。者可服。非若此者。慎勿服之。殺人甚於鳩毒。(孫真人) ③石鐘乳第一。出始興。而江陵及東境名山石洞。

二十畫 鐘

劉 露

亦皆有。惟適中輕薄如鷄翎管。碎之如爪甲。中無觸齒光明者爲善。長挺乃有一二尺者。色黃。以苦酒洗刷則白。仙經少用。而俗方所重。(陶弘景) ④石鐘乳第一始興。其次廣遠澄湖等州者。雖厚而光潤可愛。餌之並佳。今陝州青溪房州三洞出者。亞於始興。其餘非其土地。不可輕服。每發淋漓。止可搗篩白練裹之。合諸藥草浸酒服。合陶云。有一二尺者。謬說也。(蘇恭) ⑤按范成大桂海志所說甚詳。明云。桂林接宜融山洞穴中。鐘乳甚多。仰視石脈涌出處。卽有乳狀。白如玉雪。石液融結成者。乳狀下垂。如倒數峯。小山峯端。漸尖且長。如冰柱。柱端輕薄。中空如鷄翎。乳水滴溼不已。且滴且凝。此乳之最精者。以竹管仰承取之。鍊治家又以鷄管之端。尤輕明如雲母。爪甲者爲勝。(李時珍)

【鐘乳粉】卽鐘乳石之處方用名。詳「鐘乳石」條。

【斷木鳥】卽啄木鳥之古籍別名。典見爾雅。詳「啄木鳥」條。

【露甲】卽瑞香之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「瑞香」條。

【露花】 古籍別名。路頭花。寒花。(綱目拾遺)

產地 廣東番禺縣境。

形態 露花爲雜草類之一種。狀如菖蒲。其葉節邊有刺。葉落。根以火熅之。而成枝幹開花。花生叢葉中。瓣有大小。亦如葉而色瑩白。柔滑無芒刺。花抱蕊。心如穗。朝夕有露。在苞中。夏時成熟。以花覆盆。益益曬之。香落茶子油中。其氣馥烈。謂之露花油。其粉可供藥用。其露詳見該條。

主治 止汗。潤肌膚。

【露花露】 主治 解渴。

【露草】 卽鴨跖草之日本別名。詳「鴨跖草」條。

【露筋草】 形態 露筋草爲雜草類之一種。莖高三尺。春生苗葉。隨即開花。結子。碧綠色。四時不凋。其根可供藥用。

性質 辛。瀉。涼。無毒。

主治 蜘蛛。蜈蚣。咬傷。焙研。白礬水調貼之。

【露葵】 卽冬葵子之古籍別名。

典見綱目。詳「冬葵子」條。①卽草之古籍別名。典見綱目。詳「草」條。

【露蜂房】 卽露蜂房之原名。詳「露蜂房」條。

命名 本品係懸樹上。或屋簷間。得風露者之蜂巢。故名。

處方用名 蜂房。蜂巢。

古籍別名 蜂腸。(本經) 蜂動。百穿。(別錄) 獨蜂窠。石蜂窠。草蜂窠。紫金沙。草蜂窠。(綱目) 蜂家。蜜蜂。牛蜂家。金房。一寸樓臺。黃蠶蜂窠。(和漢藥考)

基本 卽虎頭蜂之蜂房。

產地 凡山野木石間。及寺院屋簷。恒有之。

形態 露蜂房爲茶褐色。球形。或瓢形之蜂巢。有褐色斑點。其狀如卷雲。大者周圍達一二丈。破其外皮。則見中有無數巢房。重疊。種類 ①名革蜂窠。卽山中大黃蜂也。其房重重如樓臺狀。大者一二丈。圍在樹上。內窠小。隔六百二十六箇。大者至一千二百四十箇。其窠黏木。蒂是七姑木汁。其蓋是牛糞沫。其隔是葉蔭也。②名石

蜂巢。只在人家屋上。大小如拳。色若黑。內有青色蜂二十一箇。或只十四箇。其蓋是石垢。其黏處是七姑木汁。其隔是竹蛀也。名獨蜂窠。俗名七里蜂。其毒最猛。其窠大小如鵝卵。皮厚。蒼黃色。是小蜂并蜂翅盛向窠。只有一箇蜂。大如小石燕子許。人馬被螫着立亡也。

名是草蜂窠也。草蜂石蜂。尋常所見之蜂也。又有一種小而色淡黃。窠長六七寸至一尺。闊二三寸。如蜜蜂。下垂一邊。多在叢木深林之中。謂之牛舌蜂。更有一種。多在高木之上。或屋之下。外面圍如三四斗許。或一二斗。中有窠如瓜狀。由此得名玄瓠蜂。其色赤黃。大於諸蜂。令人皆棄用之。

採取 七月間或十二月間。採窠陰乾。

製法 雷斅曰。凡使草蜂窠。先以鴉豆枕等同拌蒸。從已至未時。出鴉豆枕了曬乾。用大明曰。入藥並炙用。

用法 水煎內服。或剉末外治。亦有和作丸散者。性質 甘平。有毒。

效能 祛風。殺蟲。解毒。療瘡。用作殺蟲解毒藥。

主治 驚癇瘈瘲。寒熱邪氣。癩疾。鬼精蟲毒。腸痔。火熬之良。本經。療蜂毒。毒腫。合亂髮蛇皮燒灰。以酒日服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫。出丁腫。腫脈諸毒皆瘥。別錄。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論露蜂房曰。療上氣。赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主治陰癰。水黃洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論露蜂房曰。煎水洗熱病後毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。【宋】大明諸家本草論露蜂房曰。煎水漱牙。齒止風蟲疼痛。又洗乳癰。蜂疔惡瘡。【明】繆希雍本草經疏論露蜂房曰。蜂性有毒。螫人則痛極。蜂房味苦氣平。性亦有毒。別錄言鹹。當作辛鹹。辛散苦泄。鹹可輭堅。故主驚癇瘈瘲。寒熱邪氣。癩疾鬼精。蟲毒腸痔等證也。療蜂毒腫者。取其氣類相從。以毒攻毒之義也。蘇恭以亂髮蛇皮三物。合燒灰酒服。方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。

歷節腫。出丁腫。惡脈諸毒。大明煎水漱齒。止風蟲疼痛。洗乳癰。蜂疔惡瘡。皆取其攻毒散邪殺蟲之功耳。

配合應用 治小兒卒瀉。大蜂房一枚。水三升。煮濃汁。浴之日三四次佳。千金方。

治疔風濕腫。久不瘥者。蜂房燒末傅之。效。子母秘錄方。

治手足風癩。黃蜂窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一盞。百草霜一錢半。同搗傅上一時。取下埋。在陰處。忌生冷葷腥。乾坤秘授方。

治風氣瘰癧及癭瘰。蜂房炙。蠟蛻。等分。為末。酒服一錢。日三服。用露蜂房煎汁。入芒硝。傅之。日五次。梅師方。

治風熱牙腫。連及頭面。用露蜂房燒存性。研末。以酒少許。調嚙。嗽之。十便良方。

治風蟲牙痛。露蜂房煎醋熱。漱之。用草蜂房一枚。鹽貫孔內。燒過。研末。擦之。鹽湯漱之。或取一塊。咬之。祕方也。袖珍方。用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水。漱之。又同細

辛煎水。漱之。又露蜂房。全蠍同研。搽之。普濟方。用蜂房帶熱。包咬之。效。聖惠方。

治喉痺腫痛。露蜂房灰。白強。等分為末。每乳香湯服半錢。又用蜂房燒灰。每以一錢。吹入喉內。不拘大人小兒。食醫心鏡方。

治重舌腫痛。蜂房炙研。蒸酒塗。日三四次。聖惠方。

治舌上出血。竅如鍼孔。用紫金沙。即露蜂房。頂上質。處一兩。貝母四錢。蘆薈三錢。為末。蜜和丸。雷丸大。每一丸。水一盞。煎至五分。溫服。吐血。溫酒調服。亦治吐血。軀血。雷擊方。

治崩中漏下五色。使人無子。蜂房末。三指撮。溫酒服。神效。張文仲方。

治小兒下痢赤白者。蜂房燒末。飲服五分。子母秘錄方。

治小兒咳嗽。蜂房二兩。洗淨。燒研。每服一字。米飲下。勝金方。

治二便不通。以蜂房燒末。酒服二三錢。日二服。不拘大人小兒。子母秘錄方。

治陰痿不舉。蜂窠燒研。新汲

井水服二錢。可御十女。(灼燒神書方)

①治陰寒痿弱。蜂房灰夜俾陰。陰即熱起。(千金方)

②治陰毒腹痛。露蜂房三錢燒存性。葱白五寸同研爲丸。男左女右。若手中握陰臥之。汗出愈。

③治寸白蠱。蜂窠燒存性。酒服一匙。蟲即死出。(生生編方)

④治乳石熱毒。墮悶頭痛。口乾。便澀赤少者。用蜂房煮汁五合。服乳石末從小便下。大效。用十二分。炙。以水二升。煮八合。分服。(圖經方)

⑤如聖散。治藥毒上攻。用蜂房。甘草等分。麸炒黃色。去麸爲末。水二盞。煎八分。臨臥頓服。明日取下惡物。

⑥治鼻外痔瘡。膿水血出。蜂房炙研。酒服方寸匕。日三服。(肘後方)

⑦治頭上瘡。蜂房研末。臘豬脂和塗之效。(聖惠方)

⑧治蟻蟻類作。露蜂房二枚。燒存性。以巴豆二十一粒。煎清油二。三沸。去豆用油調傳。(唐氏得效

方)

①治女人妬乳。乳癥汁不出。內結成腫。名妬乳。用蜂房燒灰研。每服二錢。水一小盞。煎六分。去渣溫服。(濟衆方)

②治風癩不合。用露蜂房一枚。炙黃研末。每以一錢。臘豬脂和塗。(肘後方)

③治下部漏痔。大露蜂房燒存性。研搽之。乾以真菜油調。(唐氏經驗方)

④治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑤治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑥治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑦治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑧治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑨治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑩治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑪治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

⑫治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。(千金方)

形似鯉而身長。肉厚而鬆。又類青魚。有青白兩色。而白者味勝。其肉可供食與藥用。膽詳見該條。

性質 甘溫無毒。

主治 暖胃和中。

參攷資料 鱈魚肉多食。能發諸瘡。(李廷飛)

【鱈魚膽】 採取 臘月收取。陰乾用。

性質 苦寒無毒。

主治 喉痺。飛尸。水和攪服。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論鱈魚膽曰。一切骨鯉。竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫啣取吐。

【鯉魚】 即鯉魚之古籍別名。典見綱目詳「鯉魚」條。

【鯉魚】 即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「河豚」條。

【鯉魚】 即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「河豚」條。

【鱈魚】 即鱈魚之古籍別名。典見漢書詳「鱈魚」條。

【鱈魚】 命名 本品性喜暖魚。其目暖視。故名。

古籍別名 鱈魚(食療)

產地 生江湖中。

形態 鱈魚爲魚類之一種。其體圓厚而長。似鱈魚而腹稍起。鰓額長。口在額上。鱗細腹白。青色微黃。亦能噉魚。大者重有二十斤。其肉可供食與藥用。

性質 甘平無毒。

主治 補五臟。益筋骨。和脾胃。多食宜人。作鮓尤宜。曝乾香美。亦不發病。

【鮓魚】 命名 鮓魚相即相附而游。故名。

古籍別名 鮓魚(綱目)黃色者名金鮓魚。

基本 係水族動物。爲鱈屬之鮓魚。

產地 凡池澤淡水水中恒有出。

形態 鮓魚形似小鯉。色黑而體促。肚大而背隆。大者至三四斤。長數尺。其肉既可供食。又可入藥用。

用法 恒以調入五味。蒸煮供食。其入藥則焙剉用。

性質 甘溫無毒。

效能 益脾和中。行水。實腸。用作健胃藥。

主治 合蘇作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合莢首作羹。主丹石發熱。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鮑魚曰。合五味煮食主虛羸。【唐】韓保昇蜀本草論鮑魚曰。止下痢。腸痔。【唐】蘇恭新修本草論鮑魚曰。生搗塗惡核腫毒。不散及癰疽。同小豆搗塗丹毒。燒灰和醬汁塗諸疔。十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。【宋】大明諸家本草論鮑魚曰。溫中下氣。【明】李時珍本草綱目論鮑魚曰。合小豆煮汁服。消水腫。炙油塗婦人陰疔諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煨研釀五倍子煨研酒服。並治下血。釀茗葉煨服。治消渴。釀胡椒煨研飲服。治隔氣。釀綠礬煨研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。搗齒疼。釀當歸燒研。搗牙烏髭。止血。釀砒燒研。治急疔瘡。醃白鹽煨研。搗骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡。白禿。【明】繆希雍本草經疏論鮑魚曰。鮑魚稟土氣以生。故其味甘。其氣溫無毒。是以能入胃。治胃弱。不下食。入大腸。治赤

白久痢。腸癰。脾胃主肌肉。甘溫能益脾生肌。故主諸瘡久不瘥也。藏器主虛羸。大明主溫中下氣。孟詵云。調中益五臟。表其益脾和胃之功也。【清】黃宮繡本草求真論鮑魚曰。鮑魚氣味甘溫。諸魚性多屬火。惟鮑魚則性屬土。土能制水。故書載有和胃實腸行水之功。凡腸風下血。腸氣吐食。俱可用此投治。且性與厚朴反。朴則泄氣。鮑則益氣也。至於生搗。可塗核乳癰。堅腫。以豬油煎灰服。可治腸癰。合赤小豆煮汁食。則消水腫。炙油則治婦人陰瘡。同白礬燒煨。則治腸痢血痢。入綠礬泥固煨。則治反胃吐血。與胡椒煨。則治腸氣痞滿。皆以借其制水之意。但煨不可去鱗。以鱗有止血之功。烏背者味美。忌麥冬。芥菜。沙糖。豬肝。【清】王士雄隨息居飲食譜論鮑魚曰。甘平開胃。調氣生津。運食和營。息風清熱。殺蟲解毒。散腫愈瘡。止痢止疼。消疔消痔。大而雄者勝。宜蒸煮食之外。感邪盛時勿食。嫌其補也。餘無所忌。煎食則動火。

配合應用 ● 鶴突羹。治脾胃虛冷不下食。以鮑魚半斤。切碎。用沸豉汁投之。入胡椒。蒜。薑。菴蓀末。空心食之。【食醫心鏡方】

● 治卒病水腫。鮑魚三尾。去腸留鱗。以商陸。赤小豆等分。填滿扎定。水三升。煮糜。去魚。食豆飲汁。二日一作。不過三次。小便利愈。【肘後方】

● 治消渴飲水。用鮑魚一枚。去腸留鱗。以茶葉填滿。紙包煨熟食之。不過數枚即愈。【吳氏心統方】

● 治腸風下血。用活鮑一大尾。去腸留鱗。入五倍子末。填滿。泥固。煉存性。為末。酒服一錢。或飯丸。日二服。又用硫黃一兩。如上法煨服。亦效。【百一選方】

● 治酒積下血。酒煮鮑魚。常食最效。【便民食療方】

● 治腸痔滴血。常以鮑魚作羹食。【外臺祕要方】

● 治腸風血痔。用活鮑魚翅側穿孔。去腸留鱗。入白礬末二錢。以摺包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。亦治血痢。禁口。【直指方】

● 治反胃吐食。用大鮑魚一尾。

去腸留鱗。入綠礬末。令滿。泥固。煨存性。研末。每米飲服一錢。日二服。【本草方】

● 治腸氣吐食。用大鮑魚去腸留鱗。以大蒜片填滿。紙包十重。泥封。曬半乾。炭火煨熟。取肉。和平胃散末一兩。杵丸。梧子大。密收。每服三十丸。米飲服。【經驗方】

● 治小腸疝氣。每頓用鮑魚十個。同茴香煮食。久食自愈。【生生編方】

● 治妊娠瘧寒。時行者。用大鮑之頭。燒灰。酒服方寸匕。無汗。腹中緩痛者。以醋服取汁。【產乳方】

● 治熱病目暗。因瘦後食五辛而致。用鮑魚作曬食之。【集驗方】

● 治目生翳肉。鮮鮑魚取一斤。者中央開竅。貼於睛上。日三五度。【聖濟總錄方】

● 治婦人血崩。鮑魚一個。長五寸者。去腸。入血竭。乳香。在內。綿包。燒存性。研末。每服三錢。熱酒調服。【葉氏摘玄方】

● 治小兒胸喘。活鮑魚七個。以器盛。令兒自便尿養之。待缸煨熟。食。甚效。一女年十歲。用此水不發。

也。(集簡方)

●治小兒舌腫。鮮鱈魚切片貼之。類換(總微論方)

●治小兒丹毒。從髀起流下。陰頭赤腫出血。用鱈魚肉切五合。以赤小豆末二合。搗勻。入水和傅之。(千金方)

●治小兒禿瘡。鱈魚燒灰。醬汁和塗。一用鱈魚去腸。入皂礬燒研。搽(千金方)用大鱈去腸。入亂髮。填滿。燒研。入雄黃末二錢。先以鹽水洗拭。生油調勻。搽之。(危氏方)

●治小兒頭瘡。晝開出膿。夜即復合。可用鱈魚長四寸一枚。去腸。大附子一枚。去皮研末。填入炙焦。研傅。搗蒜封之效。(聖惠方)

●治走馬牙疳。用鱈魚一個。去腸。入砒一分。生地黃一兩。紙包燒存性。入枯白礬。麝香少許。為末。搽之。

●治牙疳出血。大鱈魚一尾。去腸留鱗。入當歸末。泥固燒存性。入煨過鹽。和勻。日用。亦治搽牙烏髮。(聖惠方)

●刮骨取牙。用鱈魚一個。去腸。入砒在內。露於陰地。待有霜刮下。

瓶收。以針搜開牙根。點少許。咳嗽自落。又方。用礬砂入鱈魚內。煨過。瓶收。待有霜。刮取如上法用。

●治諸瘡腫毒。鱈魚一斤者。去腸。柏葉填滿。紙裹泥包。煨存性。入輕粉二錢。為末。麻油調搽。(普濟方)

●治浸淫毒瘡。凡卒得毒氣。攻身。或腫痛。或赤痒。上下周匝。煩毒欲死。此浸淫毒瘡也。生鱈魚切片。和鹽搗貼。頻易。(聖惠方)

●治腫上便毒。鱈魚一枚。山藥五錢。同搗敷之。即消。(醫林集要方)

●治骨疽膿出。黑色鱈魚一個。去腸。入白鹽令滿。扎定。以水一盞。石器內。煮至乾。焦為末。猪油調搽。少痛勿怪。(危氏方)

●治手足瘰癧。累累如赤豆。剝之。汁出。大鱈魚長三四寸者。亂髮一雞子大。豬脂一升。同煎膏塗之。(千金方)

●治腫生瘡。用中鱈魚三尾。洗淨。穿山甲二錢。以長皂莢一挺。劈開。兩片夾住。扎之。煨存性。研末。先以井水洗淨。膿水。用白竹葉刺

孔貼之。候水出盡。以麻油輕粉調藥。傅之日一次。(直指方)

●治小兒撮口。出白沫。以艾灸口之上下四壯。鱈魚燒研。酒調少許。灌之。仍拍手足。見一歲半。則以魚糊洗水灌之。(小兒方)

●夏熱痢有益。冬月不宜。(本草綱目) ●和蒜食少熱。同沙糖食。生疳蟲。同芥菜食。成腫疾。同豬肝。雞肉。雉肉。鹿肉。猴肉。食。生癰疽。同麥門冬。食。害人。(張鼎) ●鱈喜俱泥。不食雜物。故能補胃。冬月肉厚。子多。其味尤美。屬道元水經注云。蕪州廣齊青林湖。鱈魚大二尺。而食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鱈魚。長數尺。食之宜暑。而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者。有洞庭之鱈。觀此則鱈為佳品。自古尚矣。(李時珍)

●鱈魚子 主治 調中。益肝氣。施用宜忌 忌豬肝。

●鱈魚骨 主治 醫瘡。燒灰。傅數次。即愈。

●鱈魚腦 主治 耳聾。以竹筒蒸過。滴之。

●鱈魚頭 主治 小兒頭瘡。口瘡。重舌。目醫。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鱈魚曰。燒研。飲服。療咳嗽。【明】李時珍本草綱目論鱈魚曰。燒研。飲服。治下痢。酒服。治脫肛。及女人陰脫。仍以油調搽之。醬汁。和塗。小兒面上。黃水瘡。

●鱈魚鮮 主治 瘡瘡。批片貼之。或同桃葉。搗傅。殺其蟲。

●鱈魚膽 主治 取汁。塗瘡。瘡。喉中。治骨節。竹刺。不出。

●鱈魚鱗 主治 久痢。赤白。腸毒。風眩。歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論鱈魚鱗曰。治脚風。及上氣。【明】李時珍本草綱目論鱈魚鱗曰。溫脾胃。去寒結氣。

●鱈魚 原名 魴魚。命名 魴者。方也。鱈者。寫也。其狀。方。其身。扁。故名。產地 生湖澤。淡水中。形態 魴魚。為魚類。鱗屬之一。

二十畫 鯪 鱈 鮫 鱈 鱈 鱈

種。頭小尾尖。頸縮鱗細。身扁。腹大。其色青白。腹中有筋。味頗腴美。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 調胃氣。利五臟。和芥食之。能助肺氣。去胃風。消穀。作鱈食之。助脾氣。令人能食。作羹。隱食宜人。功與鱈同。疴痢人勿食。

【鱈】即比目魚之古籍別名。與見綱目。詳「比目魚」條。即比目魚之古籍別名。與見爾雅。詳「比目魚」條。

【鱈】即泥鯉之原名。詳「泥鯉」條。

【鱈魚】即鱈魚之古籍別名。與見綱目。詳「鱈魚」條。

【鱈魚】 命名 本品能啼。聲如孩兒。故有鱈名。

古稱別名 人魚(陶弘景)孩兒魚(綱目)

產地 生江湖中。溪澗亦有之。

形態 鱈魚為無鱗魚類之一種。形色俱如鮎。腹趨如足。啼聲如兒。其肉可供藥用。

性質 甘有毒。

主治 療瘰疾食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鱈魚肉曰。治瘰疾。

【總草】即聚藻之別名。詳「水藻」條。

命名 蝦俗作蝦。以入湯則色紅如霞。故名。

基本 屬節肢動物甲殼類。胸甲類十脚類長尾類之蝦。

產地 凡江湖池澤中處處有出。

形態 蝦體分頭部。胸部。腹部。背甲為圓筒狀。色青黑。薄而透明。前端有長棘突出。觸角二對甚長。俗謂之鬚。腹部有子腸。屬於腸環節。第六兩側有游泳器。謂之棧足。其內等可供藥用。

種類 種類甚多。如龍蝦。斑節蝦。長臂蝦。沼蝦。糠蝦。磯蝦等。尋常食用之蝦。多屬長臂蝦及沼蝦。

性質 甘溫。有小毒。

效能 補陽氣。吐風痰。用作祛痰殺蟲藥。

主治 五野難病。小兒赤白遊腫。搗碎傅之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論蝦曰。作羹治瘰癧。托

痘瘡。下乳汁。法制壯陽道。麥汁吐風痰。搗背傳蟲痘。【清】黃宮繡本草求真論蝦曰。蝦味最甘。席品所尚。然性善跳躍。風火易動。是以書載小兒切勿妄食。恐其發瘡動氣也。陰虛火動者尤忌。以其性易潤陰也。惟乳汁不下。及風痰不吐。與制藥壯陽為差宜耳。海馬種亦蝦屬。雌雄勿離。頗類馬。身似蝦。浮於水面。亦主下胎催產。及佐房術之用也。【清】王士雄隨息居飲食譜

論蝦曰。蝦性甘溫微毒。通督壯陽。吐風痰。下乳汁。補胃氣。拓痘瘡。消腫。傳丹毒。多食發風動疾。生食尤甚。病人忌之。海蝦性味相同。大小不一。產東洋者尤佳。鹽漬曝乾。乃不發病。名式甚夥。既味皆鮮。開胃化痰。病人可食。其子可醃。可曝。味亦鮮美。

配合應用 ●治鼈瘕疼痛。類編云。陳拱病鼈瘕。隱隱見皮內痛。不可忍。外醫洪氏曰。可以鮮蝦作羹食之。久久痛止。明年又作。再如前治而愈。遂絕根也。

●補腎興陽。用蝦米一斤。蛤蚧一枚。茴香。蜀椒各四兩。並以青鹽

一九一〇

化酒。炙炒。以木香粗末一兩。和勻。乘熱收根。餅中密封。每服一匙。空心鹽酒嚼下甚妙。

●治瘰癧生蟲。用小蝦三十尾。去頭足殼。同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗罩之。一夜解下。挂看皆小赤蟲。即以蔥椒湯洗淨。用舊茶籠內白竹葉隨大小剪貼。一日二換。待汁出盡。逐日煎苦棟根湯洗之。以好膏貼之。將生肉。勿換膏藥。忌發物(直指方)

●治血風癩瘡。生蝦。黃丹。搗和貼之。日一換(集簡方)

施用宜忌 凡有瘡癩宿疾者禁用

參攷資料 ●江湖出者大而白。溪池出者小而青。皆礫殼。鱗鼻背有斷節。尾有硬鱗。多足而好躍。其腸屬鱗。其子在腹外。凡有數種。米蝦。糠蝦。以精粗名也。青蝦。白蝦。以色名也。梅蝦。以梅雨時有也。泥蝦。海蝦。以出產名也。嶺南有天蝦。其蟲大如蟻。秋社後。聚墮水中。化為蝦。人以作鮮食。凡蝦之大者。蒸曝去殼。謂之蝦米。食以滋補。饌品所珍(李時珍) ●以熱飯盛密器

中作鮮食。毒人至死。(陳藏器) 無蝦及腹下通黑并黃之色。白者並不可食。小兒及雞狗食之。脚風弱。(陶弘景)

【蝦】即鮑魚之大者。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【蝦子】 古籍別名 蝦春。(綱目拾遺)

性質 甘溫。無毒。

主治 助陽。通血脈。

參攷資料 蝦子恒在海濱潮退後。於江沙淺水處撈取之。鮮者味甘。醜者味鹹。甘人多以腐渣攪和。須取少許置銅鉢中。和鹽炒之。色純紅者乃真。以醃藏貯可供食用。(綱目拾遺)

【蝦米】 基本 蝦米即蝦之去殼曬乾而小者。可供食。

性質 甘平。無毒。

主治 宣逐風疾。

配合應用 ①胡潛法製編。有蛤蚧蝦製法云。食之補腎益陽。蝦米一斤。蛤蚧二枚。茴香。蜀椒各四兩。並以青鹽化酒炙炒。以木香末一兩和勻。乘熱收新餅中密封。每

服一匙。空心鹽酒嚼下。甚妙。 ②宜吐風痰。連殼蝦米半斤。入葱。薑。醬。黃汁先吃蝦。後吃汁。緊束肚腹。以雞翎探引取吐。(不藥良方)

③治赤白遊風。蝦米搗碎敷之。(不藥良方)

【蝦米酒】 主治 婦人無乳。及一切乳病。鮮蝦米一斤。取淨肉搗爛。黃酒熱服。少時乳至。再用豬蹄湯飲之一日幾次。其乳如泉。

【蝦姑】 即海馬之屬。形如蜈蚣。燒末服。能治夜遺。餘見「海馬」條。

【蝦春】 即蝦子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蝦子」條。

【蝦魚】 即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱈魚」條。

【蝦魚】 即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱈魚」條。

【蝦魚】 即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【蝦魚】 即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「河豚」條。

【鵝】 命名 鵝狀可愕。故名。 古籍別名 魚鷹。(禽經)

鵝雞。(詩疏) 鵝鳩。(周詩) 王雉。涉波下。鵝鳥。(綱目)

外國名詞 Pandion haliaetus Linn. Osprey 或 Fish-hawk Pluvsator (拉丁) = サト (日本)

基本 係脊椎動物鳥類猛禽類鵝科。

產地 海岸湖畔間多有之。



鵝

形態 鵝為林禽類鵝屬之一種。其翼長。伸出於尾端。嘴短。褐色。基部與邊緣藍色。中央有卵狀鼻孔。頭有冠毛。頭頂暗褐色。他部與頸上皆白色。嘴頭兩旁有暗褐色帶紋。頸下白而有褐色條紋。尾上有褐色條紋。腳長。被有六角形鱗爪。亦長而屈。色黑。往來湖海間。覓食魚蛇等物。營巢於樹間。或巖石凹處。其卵有紅色斑紋。肉腥臭不堪食。骨可供藥用。

用法 取鵝骨燒存性。以古銅錢一箇煨紅。醋淬七次。為末。等分酒服一錢。不可過多。病在下空心服。在上食後服。極有效驗。須先夾縛定。乃服此。

主治 接骨。

【鵝嘴】 主治 蛇咬。燒存性。研末。一半酒服。一半塗之。

【鵝龜】 形態 鵝龜為介類龜屬之一種。狀如龜。而體長二三尺。兩目在側。如鰻。可供藥用。

性質 無毒。

主治 婦人難產。臨月佩之。隨時燒末酒服。

【鵝鴨屎】 即五蝦脂之古籍別名。典見綱目。詳「五蝦脂」條。

【鵝雞】 命名 本品羽色黑黃。而褐。故名。

古籍別名 青黑羽色者名鵝。(綱目)

形態 鵝為原禽類雉屬之一種。其狀類雉而大。黃黑色。首有毛角如冠。性愛儂。有被儂者。直往赴門。雖死猶不置。其肉可供食。與

藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 炙食令人勇健。

歷代記述攷證 【明】汪穎食

物本草論鵝肉曰。炙食令人肥潤。

【鵝】即鵝之原名。詳「鵝」條。

【鵝肉】即鵝之處方用名。詳「鵝」條。

【鵝肪】即雁肪之古籍別名。與

見綱目。詳「雁肪」條。即鵝肪之

原名。詳「鵝肪」條。

【鵝翅】即杜鵑之古籍別名。與見

綱目。詳「杜鵑」條。

【鹹豆豉】性質 鹹寒。無毒。

效能 調中發汗。通

關節。解腥氣。

主治 寒熱。虛勞。傷寒。鼻塞。煩

熱。熱毒。

製法 用大豆水浸三日。淘蒸

攤置。俟上黃取出。絞淨。水淘。曬乾。

加鹽。薑絲。椒。橘。蘇。茴。杏仁。拌勻。入

甕。上面水浸。以箬蓋封口。曬一月

即成。

【鹹昆布】即昆布之處方用名。詳

「昆布」條。

【鹹秋石】即秋石之處方用名。詳

【秋石】條。

【鹹豉】即鹹豆豉之簡稱。詳該條。

【鹹魚】即鮑魚之別名。與見綱目。

詳「鮑魚」條。

【鹹菴蓉】即肉菴蓉之處方用名。

詳「肉菴蓉」條。

【懸角】即羚羊角之古籍別名。與

見綱目。詳「羚羊角」條。

【黨參】命名 本品出上黨地

方。而形如參。故名。

處方用名 潞黨參。西潞黨。文

元參。上黨參。

古籍別名 遼黨。臺黨。交黨。大

山黨。川黨。南黨。南山黨。野黨。澤

種黨。白黨。紅黨。獅子盤頭

黨。防風黨。趙香臣。防黨參。

外國名詞 Campanumae

pilosula

基本 屬莖科為雙子葉植物

部。離瓣花植物類。為黨參之根。

產地 凡山野間恒多生焉。趙

蕪臣黨。新研究云。黨參產中國

山西長治。長子。屯留。壺關。潞城。黎

城。襄垣。平順。和順。遼縣。交城。五臺

等縣。陝西終南山。四川各山。歸綏

大清山等處。

形態 黨參為山野自生及

栽種田園之多年宿根草。根長數

寸至數尺不等。鬚根多少不一。苗

由地下莖上端蘆頭處發生。多數

簇生。長柄。葉枝長三四尺不等。枝

葉繁盛。生長稠密。如豌豆之簇生

狀。柔枝細長如蔓。葉生時形如杏

葉而薄。小葉之主脈明顯。支脈不

甚分明。葉柄細長。全苗之葉皆係

對生。均呈綠色。微帶碧黃色。季夏

枝間開梅花色豆花形之小花。秋

季結莢角。長約寸餘。剖之內藏數

粒豆形種子。名曰黨參豆。初結莢

角呈青色。成熟時呈黃褐色。深秋

苗則乾枯。如白絲。來年春風一吹

又從宿根而生。大山黨參之鮮

者。肥白細膩。身長乳足而粗。皮

顯橫紋。而無順紋。內部少植物

纖維。味甘而淡。有土香之氣。其嫩

如白蘿蔔。用其鮮者入藥。其效最

著。陰乾用之。亦無不稱贊。適產量

極少。又不易得耳。其歸安等處之

鮮黨參。無論野生與種植。質粗味

微濁。均不甚好。野黨參之乾者。

其根自蘆至梢長五六寸至三四

尺不等。莖根至梢根圍徑八九分。

漸至梢漸細。至一二分大小不等。

近蘆處周圍有多數橫皺紋。其至

下梢有稀疏之深凹順皺紋。蘆頭

上有多數葉梢脫落之螺旋突起

蒂痕。全身周圍有寬一二分至四

五分之橫列隆起。此稜乃乾野

黨之極要點。全身色澤蒼老而瘦。

有含而不露之油潤氣象。外皮灰

白色。而又單黑色之薄薄一層土

繭。味甘。而土香之氣稍濁。種黨

參之乾者。根長三四寸至三四尺

不等。上粗下細之圍徑六七分至

一二分。近蘆處有少數橫皺紋。遠

蘆處有多數順皺紋及多數毛根。

質潤而肥。不甚密緻。外皮牙白色。

而又單灰土色之土繭。味甘。而微

有土香之氣。野生鮮黨之橫斷

面。質極軟而無空隙。為非真圓之

圓面。中心之白色小點。不甚顯明。

自中心之輻射紋。略顯白色之最

細縷紋。貼表皮之褐色環。其色極

淡。圓面全部之色澤。如燈光之黃

色。見燈光之色。如見其物之色也。

而順斷面之形色組織。及莢角之

剖面種子。種子之破面胚胎。可參

看圖釋。野生乾黨之橫斷面質

堅韌而微有空罅。或無之。為周圍有圓凹沿不規則之四面。自小心至表皮處。有直線形射紋。貼表皮裏附周圍。有不足寬一分之褐色一環也。而順斷之面。可想像而類推之。

種類 ①潞黨參。係產山西潞安府等處者。②遠黨。係產山西遼縣者。③靈黨。係產山西五臺縣者。④交黨。係產山西交城縣者。⑤大山參。係產中國北部歸綏區大青山野者。⑥川黨參。係產四川山野者。⑦南黨參。係由各商自河南彰德藥會販來者。⑧南山參。係產陝西終南山者。⑨野黨參。係山野自生。有生長數年而採得者。有生長數十年而採得者。⑩種黨參。係由人工栽種。有一二年而採收者。有三四年而採收者。⑪白黨參。為原來之皮色。而有牙白色者。有骨白色。又有土白色者。⑫紅黨參。係產山西黎城縣各處者。採收後。用紅色之土搓染紅色。非天然之色者。⑬獅子盤頭參。乃野生黨參之莖頭。生長數年。枝枯之蒂。數多至十餘個。其蒂上之皮紋。螺旋纏繞。

二十 靈黨

全蘆形狀。如見靈壁獅頭之毛蓬。蓬盤繞者。⑭防風黨參。係黨參全形之小者。如防風形狀也。⑮黨參各處所產。以山西上黨八縣野產者佳。五臺縣野產者尤佳。大青山野產者更佳。性產數極微。而人工種植者次之。

種植 ①土地之選擇。以依傍石山之土地。或砂土地為最善。②種植之方法。第一年為秧苗培養期。按各地氣候之寒暖。於植樹節前後。先灌濕土地。耕掘虛鬆。而使平坦。遂播種其種子。待參苗發生齊全。勿令土氣乾燥。寒地冬時。宜以草覆蓋之。可免凍傷之害。③翌年之分秧。第二年為栽秧期。挖取第一年之蘆秧。於另一土地。俟土地之優劣。相距四五寸或七八寸。各種一苗。隨時灌漑。所用肥料。宜以植物肥料。如豆餅類為最佳。不宜以動物肥料。如骨粉類為最忌。④另地之移植。第三年可以另地移栽。使生長茂盛。如洗澆。灌根莖。則堅實矣。生長經過數年後。方可採掘。⑤採掘之方法。採取之年。勿使開花結實。否則質液即不能充。

於根莖也。用人工剪去花實。則可更宜注意。詳記苗之發生。葉柄。花實。生長之節氣。以供藥用之研究。蓋因各地氣候不同。故生長亦不同。則不能預定故耳。

採取 ①人工栽培者。於八九月間。翌年之芽胞發時。或二三月間。苗未發生。而津液未充。苗葉時。採掘其地下根莖。陰乾。供藥用。②山野自生者。於春秋兩季。須入山採收。務選多年野生者最佳。欲知其歷年多少。須數地下莖之上端。近蘆處。橫列凹凸之皺紋。每皺紋有兩層者。必經一年。數得幾雙皺紋。便知經過幾箇春秋。此皺紋之生也。每年經氣候之寒暖兩次。因榮枯縮漲之理。必生兩層皺紋。為自然之理也。採時用錘。具掘取周圍之土。輕輕去其根莖。謹防鏟傷其莖。若傷其莖。失去莖間之白色乳汁。藥效必失大半。如誤斷其莖。宜用線繩繫其斷處。或可保留其乳汁之津液。採收回。遂陰而乾之。

若不用手揉捏。參身皮肉分裂。為兩層。則虛鬆而不堅實。不能耐久。必須揉捏至乾。紮分圓錐形之把。而收藏於乾燥之處。時值生蟲之際。宜時時晒。以防蟲蝕。而重保存。③黨參本年採收者。質柔而潤。藥效充足。出處則可。遠方多不易得。舊存咀片。或整把。放置於三年以上者。收藏妥當。雖不如新者力強。尚可入藥。若在五六年以上者。不問蟲蝕腐朽與否。均不堪入藥。而橋皮地黃之宜用陳者。豈可與黨參同日而語哉。例如藥市所售之黨參膏。其內攪雜其他藥品。質不純粹。用無效驗。猶其小者也。往往有蟲蝕腐壞。不能作湯劑用者。製成膏劑出售。妨礙治療。其害之大。不可不知也。

製法 凡使有用土炒者。有用米炒者。概因土氣入脾之義。並可去黨參內之油質也。

性質 甘。平。無毒。

成分 含有澱粉、糖質、及少量脂肪。

效能 補脾胃。生津液。用作藥壯健胃藥。用於一切衰弱症。有驅

健身體之效力。又治慢性腸如苔
兒。胃弱吞酸。及糖尿病之初期。
作用 能補助胃腸之消化。促
進乳糜之吸收。又對淋巴系及血
行系。能增進新陳代謝之功用。
主治 補中益氣生津。和脾胃。
除煩渴。中氣微虛。用以調補。甚為
平安。

歷代記述攷證 【清】張石頑
張氏醫通論黨參曰。黨參產山西
太行山者。却有甘平清肺之力。不
比人參甘溫。有峻補之功。亦不似
沙參性寒。專泄肺氣也。【清】黃宮
繙本草求真論黨參曰。人參而有
上黨之號。蓋緣隋文帝時。上黨有
人宅後。每夜聞人呼求之不得。去
宅一里許。見參異常。掘得人參一
如人體。四肢畢備。呼聲遂絕。又上
黨人參。根頗纖長。根下垂有芫一
尺餘者。或十歧者。其價與銀相等。
遼東高麗。伯濟諸參。均莫及焉。李
時珍云。上黨潞州也。民以人參為
地防害。不復採取。今所用者。皆是
遼參。觀此則知諸參惟上黨為最
美。而上黨既不可採。豈復別有黨
參之謂哉。近因遼參價貴。而世好

奇居異。乃以山西太行山出之苗。
及以防風。桔梗。薺。薺。薺。相繼混
行。詎知參有不同。性有各異。防風
桔梗。乃屬表散風寒。傷氣之味。人
參甘溫。乃屬補肺益氣之味。即山
西太行山新出之黨。考之張澂。亦
謂甘平清肺。並非等於真正黨參。
確有補益。今人但見參貴。而即以
此代參。不亦大相逕庭乎。且余嘗
見虛弱之症。亟當人參峻補。以致病
垂絕。而醫誤用黨參替代。以致病
卒不起。并令豪貴之家。朝夕代茶。
以致肺受剝削。病潛滋長。此皆誤
用之害。人但習而不察耳。附記以
為世之粗工。妄用黨參者戒。
辨偽 ●鄭肖巖曰。黨參種類
不一。綱目拾遺引翁有良辨誤云。
黨參功用可代人參。皮色黃而橫
紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽
州等處。呼為獅頭參。因獅頭大而
圓凸也。古名上黨人參。產於山西
太行山。潞安州等處為勝。百草鏡
有云。亦有白色者。摠以淨軟壯實。
味甜者佳。嫩而小枝。名上黨參。老
而大者。名防黨參。味甘平。補中益
氣。和脾胃。除煩懣。解渴。中氣微虛。

用以調補。甚為平安。今有川黨。蓋
陝西毗連。移種栽植。皮白味淡。有
類桔梗。無獅頭。較山西者迥別。入
藥亦殊劣。不可用。近肆中一種黃
色黨參。有用梔子煎汁染造者。服
之涌吐。更有一種小潞黨參。皮色
紅者。乃藥紅所染。味澀不甘。皆假
物也。用者宜明辨之。●曹炳章曰。
按前賢所謂人參。產上黨者。即今
黨參是也。考上黨。即今山西長子
縣境。舊屬潞安府。故又稱潞黨參。
其所產參之形狀。頭如獅子頭。皮
細起皺紋。近頭部皮當有方紋。體
糯糖黃色。內肉白潤。味甜鮮潔。為
黨參中之最佳品。其他產陝西者
曰介黨。亦皮紋細糯。性糯。肉色白
潤。味鮮甜。亦為佳品。如鳳黨。皮紋
雖略糙。性亦糯軟。味亦甜。產四川
文縣者。曰文元黨。皮直紋。性糯。味
甜。莖頭小於身條。皆佳。又一種川
黨。俗稱副文元。產川陝毗連處。性
梗硬。皮粗寬。紋粗。肉色呆白。味淡。
為次。產禹州者。曰禹黨。產紋窩者
曰紋窩黨。皆粗皮直紋。性梗。肉燥。
呆白色。味淡。皆次。產關東吉林者
曰吉林黨。皮寬粗而糙。頭甚大。如

獅子頭。肉白燥而心硬。味淡有青
草氣。價甚賤。為黨參中之最次者。
其餘種類甚多。未及細辨。總之以
皮紋細橫。肉白柔潤。頭小於身。氣
帶清香。味甜鮮潔者佳。若皮粗肉
堅。或氣味淡氣腥。如青草氣者。皆
為側路。以此分別。最為明晰。如鄭
君云。有用梔子煎汁染造者。及皮
紅以藥紅所染者。云云。此等假物。
我江浙未之見也。

近入學說 ●張山雷曰。黨參
之名。初不見於古書。僅於張氏之
逢原。吳氏之從新。及趙氏之拾遺
見之。今則南北通行。凡醫藥中應
用人參者。幾於無不用此。則以價
值尚廉。而功用堪信耳。惟市肆中
亦有數種。以西潞黨為最佳。枝不
必其巨。但以近黨。皮橫紋密。為
真。皮肉不必其白。但取其柔潤不
枯。生嚼之。甘味極濃。而多脂膏。無
渣滓者為上。其他稱潞黨者。尚有
數種。皆遠不逮也。力能補脾養胃。
潤肺生津。健運中氣。本與人參不
甚相遠。其尤可貴者。則健脾運而
不燥。滋胃陰而不瀉。潤肺而不犯
寒涼。養血而不偏滋膩。鼓舞清陽。

振動中氣，而無剛燥之弊。是稟坤土中正之氣，柔順之德，而無偏無害者。且較諸遼參之力量厚重，而少偏於陰柔。高麗參之氣味雄壯，而微嫌於剛烈者。尤為得中和之正。宜乎五臟交受其養，而無往不宜也。特力較為薄弱，不能持久。凡病後元虛，每服二三錢，止足振動其一日之神氣，則信乎和平中正之規模。亦有不耐悠久者。然補助中州而潤澤四隅，與坤土合德，亦可謂至德也已。故凡古今成方之所用人參，無不可以高麗參當之。即凡百證治之應用人參者，亦無不可以高麗參投之。不僅取其黨而不費，可以節用而隱為斯民造福。即論其功德及人，亦較彼遼參之價值連城者，又何嘗多讓。不謂張氏遂原、吳氏從新，既取之而所用不足以盡其所長，殆猶未免皮相之見耶。今世以茲參號名者，就余目前所見有六種：一防黨，二潯黨，三川黨，四湘黨，五文黨，六利黨。考參以黨得名，原由產自上黨郡。自參種移植於各地，而仍以黨名之，其實地已全非。參亦異樣。

二十黨 黨

今品其優劣，則防黨為粹。其餘五種，除潯黨外，每混充防黨，而實屬遠遜。潯黨形體細長，與防黨顯然易別，不致誤認。惟川黨、湘黨、文黨、利黨，與防黨形體相似，往往混充。余核驗防黨，色較黃赤，其獨有之特徵，則皮有橫紋，整然不紊。其餘四種，則無橫紋，祇有凸凹不平之直皺紋。而湘黨、文黨色皆晦，川黨、利黨色皆白。但製藥者可以赤糖水熬成黃色，防黨之味甜而純厚。川黨之味甜而淺薄，利黨、湘黨、文黨味亦淺薄，然皆可以糖水助之。須試其生藥，方有分別。余又切視各參橫斷面，中俱有一白心，旁俱為腺管。惟防黨之腺管極細，管孔分明可見。餘四種不及。其腺管皆模糊不辨。因此之故，防黨之外皮，良好端正。由於腺孔鬆，則外皮有。其他四種腺孔不鬆，則外皮不有。且防黨全體柔軟，其他四種雖大體亦軟，然比較之則不及。而川黨且硬脆亦折。余惟腺管為液道氣道，黨參之補，在液與氣。其液道氣道，分明端正者，其所行之液與氣，倍有力。味甜走胃腸與脾調和其

胃腸、腸、脾、脾，自然有效。古方以此物入四君子湯，不為無功。其他四種，未必有此氣力。然每用以混充防黨，則以其價賤較之防黨，不啻五與一，而以利為問題。則藥效不可問矣。○趙孟頫曰：黨參，黨是地名，即古上黨也。又黨所也。在於山上，其所最高，故曰上黨。上黨，再賈屬冀州，殷為魯國，春秋時為牟落氏地，後為晉有。七國時屬趙，亦屬魏。秦治上黨郡，屬并州。古上黨，闕楚漢之時，為西魏地。漢上黨郡十四城，後漢上黨郡十三城。三國魏因之，晉及後周北齊，仍為上黨郡。隋開皇年別置上黨縣。大業初年復為上黨郡。唐武德初改上黨郡為潯州。上黨縣如故。後復潯州為上黨郡。乾元又改為潯州。五代梁、唐、晉、漢、周，為潯州。宋金元互改為潯州。及上黨縣。明初省上黨縣入潯州。嘉靖八年并州為潯安府。又置潯南道於此。清康熙六年併潯安府於冀寧道。民國元年廢府道存縣治。今長治、長子、屯留、壺關、潯城、黎城、襄垣、平順、八縣，即古上黨也。按地理及山脈言，在山西省

東南部，太行山之南端也。隋文帝由上黨發見，故名曰黨。黨，即草名也。故從艸，聲聲，藥草名也。從灑，灑同沒，沒漸之意。即年久浸漸長成之意也。恐之名考。古本本草載有人蔘、玄蔘、沙蔘、丹蔘、苦蔘、紫蔘、六種。獨未載黨蔘。黨蔘為隋文帝時發明。相對無疑。考唐書地理志：太原府土貢人蔘，非黨蔘而何。所貢之蔘，既為人蔘，何以唐以前未聞太原有貢者。何以隋文帝發明時，不命名曰人蔘，而曰黨蔘。又曰自民因以來，研究蔘者夥矣。以西醫研究者，獨重人蔘，而不重黨蔘。以中國研究者，人蔘黨蔘多有混合為一物，而不分別之。夫人蔘為五加科植物，黨蔘為韮科植物，分明兩種，而不可混清。俗醫竟以一物而應用哉。考神農本草經：人蔘味甘微寒，主補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目，開心，益智，久服輕身延年。決不是指今日之韮科黨蔘而言。按人蔘之名詞，對五加科人蔘之根而稱呼也。偶而具成人形者，可謂之人蔘。不成人形者，只可謂之蔘。不可謂之人蔘。韮

科參。五加科參同一植物也。何時何地不可生長。在古代中國山西太行山一帶。潞安。遼縣等處。焉知不產五加科參。焉知其時。莫有豈科參。彼時就已有豈科參而偶成人形者。亦不能謂為五加科參而混沌稱呼也。以五加科參及豈科參比較。鑿然迥然不同。五加科參苗葉生數柄。每葉分五枝。根長數寸。豈科參苗生繁盛。簇生如豌豆。根長數尺。觀察植物形態。顯然兩種。不能認兩種為一物者一也。五加科參為與奮劑。豈科參為強壯健胃劑。實驗藥效成分。功用各異。不能認兩種為一物者二也。再以中國藥效言之。人參為溫補峻烈之劑。用以峻補五臟陽氣之君藥。黨參為平補和緩之劑。用以滋養脾胃之要藥。此又不能認兩種為一物者三也。若不以為然。可親採其藥苗而實驗之。自知言之不謬也。考本草所載。隋文帝時。上黨有人宅後。夜夜聞人呼。捕之不得。距宅里許。掘得人參。酷似人形。四肢畢具。呼聲送絕。在彼時是五加科參根而成人形者。抑是豈科參根

而成人形者。或云不敢決定。何以現在上黨所產之參。均為豈科參。未聞產一二株五加科參也。即是豈科參能成人形者。亦不稀奇。例如何首烏之根長成童形。枸杞之根長成大形。橘中二叟。草下一蟲。凡植物之根能成異形者。為極尋常之事實也。居今日之文明時代。又為科學進步時代。竟有醫界中人研究五加科參與豈科參而混為一物。良可嘆也。要知五加科參東西各國已研究分析。培養種植。每年得利若干。確有把握。中國不但不知種植而抵禦之人參。黨參。界限。尚且多未分別。歐美諸國。對於豈科參不知研究否。固無論矣。考中國本草。自古迄今。上下數千年。除張騫。吳遵程。黃宮繡。屠道和在應用上大略分別言之。再無醫界中人認黨參為另一種而詳細研究者。余有感於此。謹就豈科參各項研究。以補先進之缺點。而供醫藥界證明為二物及博物家之參考也。又曰。以中國研究黨參氣平味甘。為足太陰脾足陽明胃三經之要藥。而屠道和謂其甘平清

肺之藥。用作人參之代用品者。誤也。余在實驗上對於脾胃之虛弱等症。令其多服久服。雖則有效。病減甚緩。惟用於老年人或氣虛之體。下肢洩腫。及四肢面部水腫。配五皮飲。加焦冬朮。奏效甚速。總而言之。因其氣平與淡品藥物同用。最為相宜。尤宜虛寒虛症。不宜於實熱之病。而用量宜輕不宜重。寧可一日內多服數劑。不可一劑內用其大量。恐用大量致有變證也。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非虛寒而有實邪者禁用。忌鐵劑。賦品。

製法 黨參膏。藥市所製。黨參膏。現在只稠厚流膏一種。其內多配伍其他藥品。在商家用意。此藥比別家較好。在病家應用。不致有誤投之弊。而今以純品製成。分為流膏硬膏兩種。流動者便於病家服用。乾固者便於旅行攜帶。其功用與黨參同。

◎流動黨參膏之製法。取鮮黨參。壓榨其汁液。熬膏最佳。但非在原產地不可。如取乾黨參。製膏。切碎用熱水浸數日。煎數次。蓋布袋。壓榨其汁液。須用粗

紙過濾。取其汁液。熬至稠厚為度。貯瓶中供藥用。

◎硬固黨參膏之製法。取前項熬成之稠厚流膏。盛模型中。入乾燥器內。烘乾為度。貯藏供藥用。

參攷資料 按古本草云。參須上黨者佳。今真黨參久已難得。肆中所賣之黨參。種類甚多。皆不堪用。唯防風黨參。性味和平。足貴。根有獅子盤頭者。真。硬紋者。偽也。白黨味微甘而甚淡。功用遠不及爾。(吳遵程) 黨參一名黃參。黃潤者良。出山西潞安太原等處。有白色者。總以淨軟壯實味甘者佳。嫩而枝小者。名上黨參。老而大者。名防黨參。味甘性平。治肺虛。能益肺氣。(百草鏡) 白參即將黨參。黃晒而成。原汁已出不堪用。(吳遵程) 黨參功用可代人參。皮黃色而橫紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽州等處。呼為獅頭參。因莖頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山潞安州等處。為勝。陝西者次之。味甚甜美。勝如藥肉。近今有川黨。蓋西陝毗連移種。栽植。皮白味淡。類乎桔梗。無獅頭。

較山西者迥別。入藥亦殊劣不可用。其味甘平。補中益氣。和脾胃。除煩渴。解渴中氣。微瀉。用以調補。甚爲不妥。(翁有良)

【窟黃】卽爲之古籍別名。典見爾雅。詳『窟』條。

【鼯鼠】卽鼯鼠之古籍別名。典見爾雅。詳『鼯鼠』條。

【鼯鼠】卽鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼯鼠』條。

【鼯草】卽牛轆草之原名。詳『牛轆草』條。

二十一畫

【僊肉】卽水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【屬折】卽絞斷之古籍別名。典見本經。詳『絞斷』條。

【損香】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【攝石】卽慈石之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『慈石』條。

【攝龜】 古籍別名 呷蛇組。夾蛇龜(日華)陵龜(郭璞)春龜(陶弘景)蟻龜(抱朴子)

形態 攝龜爲介類龜屬之一

種。軀幹狹小。尾長。腹甲小。中心橫折。能自開閉。開閉處相傳能呷蛇。故好食蛇類。其肉可供藥用。尾甲詳各該條。

性質 甘寒。有毒。
主治 生搗毒蛇傷。

歷代記述攷證 【唐】陳士良食性本草論攝龜肉曰。生研。塗撲損筋脈傷。

參攷資料 攝龜啖蛇。故肉有毒。不可食。(孟詵)

【攝龜甲】 主治 人咬瘡潰爛。燒灰傳之。

【攝龜尾】 主治 佩之辟蛇。蛇咬刺未傳之。

【攝攝】 卽楓之古籍別名。典見爾雅。詳『楓香脂』條。

【疊伽結】 卽波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳『波羅蜜』條。

【樺】 命名 本品樹高如舉。故名。本品樹高如舉。故名。

古籍別名 樺柳。(衍義)鬼柳。(綱目)

外國名詞 Zelkova acuminata, Pl. (拉丁) ケヤキ (日本)

基本 保樹科樺屬爲樺之木

皮。其葉詳該條。
產地 出山野間。

形態 樺爲喬木類之落葉木。本高五六丈。樹皮堅硬。灰褐色。有粗皺紋。老者則如鱗狀而剝落。葉廣披針形。或長卵形而尖。有鋸齒。而互生。春隨新葉開花。花小。單性。雌雄同株。花色淡黃綠色。其木材堅韌。可供建築器具。木皮可供藥用。

製法 雷斂曰。凡使勿用三四年者。無力。用二十年以來者。心空。其樹只有半邊。向西生者良。剝下。去粗皮。細剝蒸之。從巳至未。出焙乾用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 時行頭痛。熱結在腸胃。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論樺木皮曰。夏日煎飲。去熱。【唐】蘇恭新修本草論樺木皮曰。俗用煮汁服。療水氣。斷



樺

劑。【宋】大明諸家本草論樺木皮曰。安胎。止妊。婦腹痛。山樺皮性平。治熱毒。風癩。疔毒。

【樺柳】 卽樺之古籍別名。典見本草衍義。詳『樺』條。

性質 苦。冷。無毒。
主治 按貼火爛瘡有效。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論樺葉曰。治腫爛。癩瘡。鹽搗。碎之。

【櫻桃】 命名 本品類如櫻珠。故名。


古籍別名 櫻桃。(禮注)含桃。(月令)荆桃。朱櫻。紫櫻。蠟櫻。櫻珠。(綱目)山櫻(日本)崖蜜(孫炎註解)

外國名詞 Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim (拉丁) ヤマザクラ (日本)

基本 保腎藤科櫻桃屬爲櫻桃之果實。其枝。葉。花。根。詳各該條。

形態 櫻桃爲果類之落葉喬木。乃櫻之變種。株高者七八尺。葉橢圓形而潤。有鋸齒。嫩葉嫩葉背

面密生毛茸。春夏間開小花。色白如梅花。後結小實如櫻。熟則紅。經雨則蟲自内生。目不能見。用水浸之。良久。蟲皆出。乃可食。亦供藥用。



櫻 櫛

性質 甘。熱。瀆。無毒。
主治 調中。益脾氣。令人好顏色。美志。

歷代記述攷證 「唐」孟詵食療本草論櫻櫛曰。止洩精。水穀痢。

參攷資料 櫻櫛食多無損。但發虛熱耳。有暗風人不可食。食之立發。(孟詵) 櫻櫛傷筋骨。敗血氣。有寒熱病人不可食。(李廷飛) 按張子和儒門事親云。舞水一富家有二子。好食紫櫻。每日

疾一二升。半月後。長者發肺癆。幼者發肺癰。相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。疑其嗜欲。取死是何。天耶。命耶。邵堯夫詩云。爽口物多終作疾。真格言哉。王維詩云。飽食不須愁內熱。

大官還有蔗漿寒。蓋謂寒物同食。猶可解其熱也。(李時珍)

【櫻桃水】 基本 本品係櫻桃中之流質。

性質 甘。辛。熱。
主治 凍瘡。瘡及疹發不出。參攷資料 春日鮮櫻桃。收貯磁瓶內。封口。放在涼處。爛過成水。濾渣。聽用。(趙恕軒)

【櫻桃枝】 主治 去雀卵斑點。同紫萍。牙皂。白梅肉。研和。日用洗面。

【櫻桃花】 主治 去面黑粉滓。

【櫻桃核】 卽山櫻桃之核。可供藥用。非尋常之櫻桃核。詳「山櫻桃核」條。

【櫻桃根】 採取 以東行者良。主治 煮汁服。立下寸白蟲。

【櫻桃葉】 性質 甘。平。無毒。主治 蛇咬。搗汁飲。并傳之。

參攷資料 櫻桃葉煮老鷄。則易軟熱。(綱目) 【櫻珠】 卽櫻桃之日本名。詳「櫻

桃」條。

【櫻額】 古籍別名 稠梨。(綱目拾遺)

產地 出關東烏喇口外。形態 櫻額爲夷果類之一種。其樹叢生。結實形如野葡萄。色黑而小。鮮時甚美。其果可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。
主治 補脾。止洩瀉。參攷資料 櫻額實曬乾爲末。可以致遠。暑月調水服之。更佳。(綱目拾遺)

【櫻】 卽柚之古籍別名。典見爾雅。詳「柚」條。

【櫻木】 卽杉木麩之古籍別名。典見綱目。詳「杉木麩」條。

【櫻檀】 卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

【灌草】 卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【灌草】 古籍別名 鼠肝。(別錄) 形態 灌草爲雜草類之一種。其葉滑而色清白。可供藥用。

【爛瓜】 卽枳椇子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【爛石草】 卽馬先蒿之古籍別名。典見別錄。詳「馬先蒿」條。

【爛茶葉】 基本 本品乃泡過發茶。積存磁罐內者。如乾則以茶汁浸入。愈久愈妙。效能 清火。解毒。

配合應用 治無名腫毒。犬咬及火燒成瘡。俱效如神。搗爛似泥敷之。乾則以茶汁潤溼。抹去再換。敷五六次全愈。(救生方)

治痘瘡。用泡過茶葉。曬乾爲末。同五倍子各等分。雞子清調敷。(家寶方)

治諸毒勞肉不退。硫黃研細末。敷上卽退。再用後收口藥。爛茶葉五錢。烏梅三個。燒灰。共爲末。敷上卽收。(保和堂秘方)

【爛砂星】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夜明砂」條。

【爛紫精】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夜明砂」條。

【爛腸草】 卽鈎吻之俗名。詳「鈎吻」條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【獲】①即獲之牡者。典見爾雅。詳『狼』條。②即狗獲之原名。詳『狗獲』條。

【獲種】即豬獲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豬獲』條。

【類漢指頭】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【類葡萄】即苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳『苦瓜』條。

【類蝦蟇】即蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。

【寇中黃土】即伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏龍肝』條。

【寇心土】即伏龍肝之原名。詳『伏龍肝』條。

【寇心黃土】即伏龍肝之處方用名。詳『伏龍肝』條。

【寇突墨】即百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【寇馬】古籍別名。寇雞。寇壁。雞(俗名)。

外國名詞 Diostrommona Japonica, Brum. (拉丁)カドウマ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類直翅類金斯科之寇馬。

二十一畫 獲 類 寇 獲 類 續

產地 生陰溼地及窟居間。

形體 寇馬爲化生蟲類之一種。其體裸出無翅。故無鳴器。亦無聽器。其背駝起。色赤褐。頭小。有絲狀之觸角。後肢強大。尾有長刺。善跳躍。可供藥用。

主治 療竹刺入肉。取一枚搗碎。

【寇煙煤】即百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【寇煤】即百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【寇壁雞】即寇馬之俗名。詳『寇馬』條。

【寇雞】即寇馬之俗名。詳『寇馬』條。

【寇額墨】即百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【獲】即竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

【獲草根】即甘松之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『甘松』條。

【續命筒】即乾漆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乾漆』條。

【續毒】即狼毒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼毒』條。

【續根草】即香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【續骨木】即接骨木之古籍別名。典見綱目。詳『接骨木』條。

【續絃膠】即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【續筋根】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳『旋花』條。

【續隨子】命名 本品葉中出葉數數相續而生。故名。冬月始長。故又名拒冬也。

處方用名 千金子。

古籍別名 拒冬(開寶)千兩金。菩薩豆(日華)聯步(斗門方)百兩金。白隨子。反時生。牛枝連。蜀隨子(和漢藥考)。

外國名詞 Semon Euphorbia Lathyris

基本 係屬大戟科續隨子之種子。

產地 馬志曰。續隨子蜀郡處處有之。

形體 續隨子爲一年生草。秋季抽圓莖。高達三四尺。葉初狹長。後變闊大。每節對生。作十字形。葉背及莖呈白色。夏季於葉腋開四

瓣黃紫色花。後結黑褐色扁圓形種子。大四五分。有三溝。成熟則三裂。中有種子三個。爲類似莖麻子之種子。大約一分五釐。表面呈淡褐色。有紋理。味辛有毒。

採取 八九月採實曬乾。

製法 李時珍曰。凡用去殼取色白者。以紙包。壓去油。取霜用之。

性質 辛。溫。有毒。

成分 東京化學會誌第十卷第八冊。載有藥學博士田原良純氏之漢藥續隨子所含結晶成分實驗一文。言該藥中含有二種結晶性物質。其一爲愛斯克列丁。約含有〇・九%云。

效能 下水破血。與大戟。甘遂功效相同。用作瀉劑。又治疥癬。或除疣黑子。

主治 婦人血結月閉。瘀血凝。痰癖。除蟲毒。鬼疰。心腹痛。冷氣。脹滿。利大小便。下惡滯物。

歷代記載攷證 【唐】韓保昇蜀本草論續隨子曰。積聚痰飲。不下食。嘔逆及腹內諸疾。碎研酒服。不過三顆。當下惡物。【宋】大明日華諸家本草論續隨子曰。宜一切

皆滯。治肺氣水氣。日服十粒。洩多。以酸漿水或薄醋粥喫即止。又塗疥癬瘡。明經希雍本草經疏論續隨子曰。續隨子味辛氣溫。而其性有毒。實攻擊尅伐之藥也。長於解毒毒鬼疰。以致腹痛脹滿。攻積聚。下惡滯物。及散痰飲。至於婦人月閉癥瘕。法癖瘵血。大小腸不利諸病。則各有成病之由。當求其本而治。不宜概施。蓋此藥之爲用。乃以毒攻毒之功也。

國外學說 日本緒子氏曰。續隨子與甘遂。大戟。共有峻下之效。其有效成分未詳。田原良純氏於續隨子中。雖檢出エスクレチン。而於治療上亦爲無效。(藥學雜誌第九十三號) 然漢醫用之爲下劑之外。治疥癬。或除疣黑子。稱爲有效。其用量自二、八至八、〇。又和漢藥考曰。續隨子者。俗云爲毒蟲所螫時。壓搗此實。而厚擦之。或於金瘡等用之。甚妙。又日本九州土人。中食毒時。食此實。可以吐瀉毒物。見農業雜誌。愛斯克列丁 Acetylcholine, C₅H₁₁O₄ 爲無色無臭之光澤針狀結晶。無味。稍

溶於冷水及冷酒精。逢熱湯與熱酒精。頗易溶化。但逢伊打哥羅仿姆。及硫化炭等。概不溶解。熱之約於攝氏二百八十度。漸次分解而溶化。本品溶液。由醋酸鉛而生黃色沈澱。(自東京化學會誌第十帙第八冊摘錄) 結晶性成分之愛斯克列丁。據已故醫學博士豬子吉人氏言。在治療上並無功效云。

配合應用 ●治小便不通。臍腹脹痛不可忍。用續隨子一兩。鉛丹半兩。同少蜜搗作團。瓶盛。埋陰處。臘月至春末取出。研蜜丸。梧子大。每服二三十丸。木通湯下。(聖濟總錄方)

●治涎積痰塊。用續隨子三十枚。膩粉二錢。青黛炒一錢。研勻。糯米飯丸。夾于大。每服一丸。打碎。以大棗一枚。燒熟。去皮核。同嚼。冷茶送下。半夜後取。下積聚惡物爲效。(聖濟總錄方)

●治蛇咬腫悶欲死。用重臺六分。續隨仁七粒。搗篩爲散。酒服方寸匕。衆睡和少許。用塗咬處。立效。(崔元亮海上方)

●治黑子疣贅。續隨子於熱時塗之自落。(普濟方)

●治水氣腫脹。聯步一兩。去殼研。歷去油。重研。分作七服。每治一人。用一服。丈夫生餅子酒下。婦人荊芥湯。五更服之。當下利。至曉自止。後以厚朴湯補之。類輿益善。忌鹽酸一百日。乃不復作。聯步卽續隨子也。(斗門方)

●治陽水腫脹。續隨子炒去油。二兩。大黃一兩。爲末。酒水丸。綠豆大。每服以白湯送下。五十九丸。以去陳莖。(持玄方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非氣壯邪實及脾虛便滑者禁用。

著名方劑 解毒萬病丹。治一切癩毒。疫死牛馬河豚等毒。及疽疫熱毒。癰疽發背等症。山茨菰(去皮洗淨焙) 二兩。川文蛤(錘破洗刮) 千金子(去壳研盡油) 二兩。麝香(細研) 三錢。大戟(洗焙) 一兩。上各研末。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合。如欲急用。辰日亦得。於木白中杵數百下。

參攷資料 ●續隨下水最速。然有毒損人。不可過多。(蘇頌) ●

續隨與大戟。澤漆。甘遂。莖葉相似。主療亦相似。其功皆長於利水。惟在用之得法。亦皆要藥也。(李時珍) ●續隨子生蜀郡。處處亦有之。苗如大戟。(馬志) ●今南中多有北土產少。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出葉。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實背有殼。人家園庭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀秋實。(蘇頌) ●莖中亦有白汁。可結水銀。(李時珍) ●續隨子仁最下痰飲。用白者十數粒。研碎去油服之。痰水卽下。又曰。續隨子仁。驅逐痰飲。亦良物也。(黃元御)

●續隨斷其莖極。則滲出乳液。觸於皮膚。則局部發疹。若誤食子實。則起刺衝而下痢。(和漢藥考) ●日本於天文年間。始由葡萄酒傳入續隨子。故俗有呼爲葡萄酒者。(和漢藥考)

【續隨莖】 主治 剝人面皮。去歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論續隨莖曰。傳白巖癩瘡。

【續隨葉】 主治 搗傳續整

【續斷】 命名 本品功能續折接骨故名。

處方用名 川斷。川斷內。

古籍別名 屬折(本經)接骨。

龍豆(別錄)南草(綱目)槐生。龍立。槐槐生。諸廢斷。續斷廢。(和漢藥考)馬齒根。(初以氏古今錄驗方)

外國名詞 Sonchus asper, VIII(拉丁)

基本 屬唇形科續斷之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。續斷產湖北省沙市內與山宜都資邱市等名曰川斷。實出自湖北味微苦而帶甘甜。又有一種產廣東樂昌。星子。連州。東陵等處。名曰西斷。實出自廣東。

形態 續斷為原野自生之多年生草。春季自宿根抽出方莖。高達一二尺。葉對生。具有長葉柄。作卵圓形或心臟形。前端尖。邊緣有鋸齒。花為白色或帶紫色。唇形花冠。開於葉腋。其根為赤黃色。長細根叢生於一莖。其乾燥者皮部呈

黃色。有皺裂。破折則發粉塵。

種類 中國產之續斷。根粗。類薊根。謂之南續斷。日本產之續斷。根細而長。謂之川續斷。

採取 七八月間採根陰乾。

製法 雷敦曰。凡採得根橫切對之。又去向裏硬筋。以酒浸一伏時。焙乾入藥用。

性質 苦。微溫。無毒。

效能 補肝腎。續筋骨。通血脈。利關節。為續筋骨跌折藥。又為金瘡癰瘍藥。

主治 傷寒補不足。金瘡癰瘍。折跌續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。(本經)婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛。生肌肉。及腕傷。腫血腹。痛。關節緩急。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論續斷曰。去諸溫毒。通宜血脈。【宋】大明諸家本草論續斷曰。助氣。補五勞。七傷。破癥結。療血消腫毒。腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄。精尿血。【明】經雅本草經疏論續斷曰。續斷本經味苦微溫。別錄益之以辛。曾得

對中者。昔之。其味帶甘。應云味苦。甘辛微溫無毒。使非味甘。焉能主傷中補不足。非辛焉能主金瘡癰。傷折跌續筋骨。婦人乳難。辛能潤苦溫能散。甘能益血。故別錄又主崩中漏血。金瘡血內漏。止痛。生肌肉。及腕傷。惡血腰痛。關節緩急。本經久服益氣力。傷去血生之效也。入足厥陰少陰。為治胎產。續絕傷。補不足。療金瘡。理腰腎之要藥也。【清】黃宮繡本草求真論續斷曰。續斷因何以續為名。蓋緣其味苦。其性溫。能入腎經以補骨。又緣其味辛。能入肝經以補筋。味兼甘。又入中州以補虛。凡跌撲折傷。癰腫。暨筋骨曲節。血氣滯之處。服此即能消散。止痛生肌。且審其味。滴故能止血。治血。並縮小便。固精安胎。久服能氣力培增。筋斷復續。故曰續斷。實疏通氣血。筋骨第一藥也。第四氣薄。而見精脫胎動。溺血失血等症。則又深忌。以性下流者。故耳。功與地黃。牛膝。杜仲。巴戟相等。但有溫補細微之別。不可不知。川產者。良。狀如雞脚。皮黃。皺節。節斷者。真。去裏硬筋。酒浸用。

近人學說 頁九如曰。續斷苦養血脈。辛養皮毛。善理血脈。傷損。接續筋骨。斷折。故名續斷。外消乳癰瘰癧。內清痔漏腸紅。以其氣和味清。胎產調經。最為穩當。且苦能堅腎。辛能潤腎。可療小便頻數。精滑夢遺。腰背酸疼。足膝無力。此皆腎經症也。若同紫菀用之。調血潤燥。治血枯便閉。大能宣通血氣。而不走泄。○張山雷曰。續斷莖延甚遠。味苦辛而微甘。其氣溫。和。氣味俱厚。故兼入氣血。能宣行百脈。通利關節。凡經絡筋骨血脈諸病。無不主之。而通痺起痿。尤有特長。又其味苦而澀。能行能止。則痰崩漏帶下血痢淋濁。而女科之胎產經帶。奇經八脈諸病。及傷科腕閃跌仆諸證。外痔瘰癧潰腐。支節痠疼。屈伸不利等病。類皆賴以成功。其效甚宏。其用頗廣。加以呈功頗捷。而性又柔和。無燥烈剛暴之弊。是真名將風流。雍容掄揚。以美府功而殲大敵。洵非猛將之偏鋒。陷陣者。所可同日語矣。

配合應用 行血理傷。用續斷。當歸。牛膝。肉桂。延胡索。

二十一畫 續

① 止血補不足。療崩中。用續斷、白膠、阿膠、地黃、麥門冬、杜仲、五味子、山茱萸、人參、枸杞子、黃耆。

② 安胎。續斷涼血補血。與順氣藥同用。

③ 療金瘡。續斷與金瘡藥同用。

④ 治小便淋瀝。生續斷搗絞汁。即馬薊根也。(初虞氏古今錄驗方)

⑤ 治妊娠胎動。兩三月墮。預宜服此。川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各用二兩為末。棗肉煮爛。杵和丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。

⑥ 治產後諸疾。血暈心悶。煩熱。厥厥。氣欲絕。心頭硬。乍寒乍熱。續斷皮一握。水三升。煎二升。分三服。如人行一里。再服無所忌。此藥救產後垂死。(子母秘錄方)

⑦ 治打撲傷損。閃肺骨接。用節骨草葉搗爛。罌之立效。(衛生易簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀阻及風寒溼滯者禁用。惡雷丸。地黃為之使。

參攷資料 ① 宋張叔潛秘書。知劍州時。其園下病血痢。一醫用

平胃散一兩。入川續斷末二錢中。每二錢水煎服。即愈。紹興壬子會稽時行痢疾。叔潛之子。以方傳人。往往有驗。小兒痢服之效。(李時珍) ② 按桐君藥錄云。續斷生莖。莖細。莖如荏大。根本黃白。有汁。七月八月採根。今皆用莖葉節節。纏皮黃皺狀如雞脚者。又呼為桑上寄生。時人又有接骨樹。高丈餘。許。葉似胡蘆。皮主金瘡。廣州又有續斷藤。一名諸藤。斷其莖以器承取汁。飲療虛損。絕傷。用沐頭長髮。折枝插地。即生。恐皆非真。李當之云。是虎薊。與此大乖。但虎薊亦療血。(陶弘景) ③ 所在山谷皆有。今俗用者。葉似苧而莖方。根如大薊。黃白色。陶說非也。(蘇恭) ④ 今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之。三月以後生苗。幹四稜。似苧麻。葉兩兩相對而生。四月開花。紅白色。似益母花。根如大薊。赤黃色。謹按范汪方云。續斷即是馬薊。與小薊葉相似。但大於小薊爾。葉似旁翁菜而小。兩邊有刺。刺人。其花紫色。與今越州所園者相類。而市之貨者。亦有數種。少能辨其粗良。

醫草茅根緣真相似。若誤服。令人筋軟。(蘇頌) ⑤ 續斷之說不一。桐君言是蔓生。葉似荏。李當人但以節節斷皮黃皺者為真。(李時珍) ⑥ 凡使忽用之。范汪並言是虎薊。日華子言是大薊。一名山牛勞。蘇恭蘇頌皆言葉似苧。根似大薊。而名醫別錄復出大小薊條。頗難依據。但自漢以來。皆以大薊為續斷。相承久矣。究其實則二蘇所云。似與桐君相符。當以為正。今人所用。以州中來。色赤而瘦。折之有烟塵起者為良焉。鄭樵通志謂范汪所說者。乃南續斷。不知何據。蓋以別川續斷耳。(雷斅) ⑦ 續斷。舉世用以安胎。而不知續斷味苦。專入血分。活血消腫。故乳癰癢結。腸風痔瘻。金瘡跌仆。一切血療之症。皆可用也。雖稍有泄性。行不至泄。然誤施於氣弱氣陷之婦女。則順流而下。奔迫莫禦。而有排山倒海之勢。豈區區滲味所能止其萬一者乎。夫胎墜本忌血行氣陷。則服此味亦有奏效者。以人身氣血。貴乎流通。胎墜之因不一。亦有因腎氣不溫。經血凝滯。而胞胎失墜者。得

此一味。則氣煎血滿。不滯不漏。而胎自安矣。止為下虛上實者設。故胎墜而尺強寸弱者。動作少氣者。表虛惡風。汗時出者。心下懸飢。得食則止者。一身之氣。盡欲下墜者。皆在禁例。(黃宮繡)

【續斷藤】即續斷之古籍別名。與見和漢藥考。詳「續斷」條。

【經木香】即乳香之古籍別名。與見和漢藥考。詳「乳香」條。

【經枝牡丹】即旋花之古籍別名。與見綱目。詳「旋花」條。

【薊荷】 古籍別名 覆菴。薊草。(別錄) 博苴。菖苴。(說文) 嘉草。(綱目) 茗荷。(日本) 陽薊。(植物圖考) 陽荷。(黔志)

外國名詞 Nangiber Mioga, Rosc. (拉丁) メウガミヨイガ (日本)

善本 係薊荷科。為薊荷之根。產地 凡山野原澤有出。

形態 薊荷為溼草類之多年生草本。高二三尺。葉呈長橢圓形。端尖類似蓮葉。長達尺餘。夏秋之間。花軸自地下莖抽出。着以多數之花。如穗狀。由瓣狀葉被包之花。

被淡黃色。不整齊。嫩莖及花序。有一種香氣。其根與葉可供藥用。



蕺菜

採取 八九月採根。

製法 雷斅曰。凡使勿用草牛草。真相似。其革牛草腥澀。凡使白蕺。以銅刀刮去粗皮一重。細切。入砂盆中。研如膏。取自然汁。鍊作煎。新器攤冷如乾膠狀。刮取用之。

性質 辛。溫。有小毒。

主治 中蠱及癩搗汁服。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蕺菜根曰。溪邊沙蟲蛇毒。【唐】蘇恭新修本草論蕺菜根曰。諸惡瘡根心。主稻麥芒入目中。不出。以汁注目。即出。【明】李時珍本草綱目論蕺菜根曰。赤眼澀痛。搗汁點之。

參攷資料 ●按于寶搜神記云。外姊夫蔣士先得疾。下血。盲中。其家密以蕺菜置於席下。忽大笑曰。蠱我者。張小小也。乃收小小。

二十一 蕺菜 蕺菜

小小亡走。自此解蠱藥多用之。往往驗也。周禮庶氏以嘉草除蠱毒。宗懷謂嘉草即蕺菜是也。陳藏器云。蕺菜苗根爲主蠱之最謂此。【蘇頌】●本草白蕺菜。而今人呼赤者爲蕺菜。白者爲覆蕺菜。蓋食以赤者爲勝。入藥以白者爲良。葉同。一種爾。【陶弘景】●蕺菜。荆襄湖江間多種之。北地亦有。春初生。葉似甘蔗。根蘗牙而肥。其葉冬枯。根堪爲蕪。其性好陰。在水下生者尤美。潘岳閑居賦云。蕺菜依陰。時馨向陽是也。宗懷荆楚歲時記云。仲冬以鹽藏蕺菜。用備冬儲。又以防蠱。史游急就篇云。蕺菜冬日藏。其來遠矣。然有赤白二種。白者入藥。赤者堪噉。及作梅果多用之。【蘇頌】●蕺菜。八九月間淹貯。以備冬月作蔬果。治病止用白者。【寇宗奭】●蘇頌謂經言荆襄江湖多種。今訪之。無復識者。惟楊慎丹鉛錄云。急就章註。蕺菜即甘蔗也。之本草。形性相同。甘蔗即芭蕉也。崔豹古今注云。蕺菜似芭蕉而白色。其子花生根中。花未敗時可食。久則消爛矣。根似蕺菜。宜陰翳地依

蔭而生。又按王昉山居錄云。蕺菜宜樹陰下。二月種之。一種永生。不須鋤耘。但加薰耳。八月初踏其苗。令死。則根滋茂。九月初取其傍生根。以爲蕪。亦可醬藏。十月初中以糠覆其根下。則過冬不至於凍死也。【李時珍】

【蕺菜草】 性質 苦。甘。寒。無毒。主治 溫瘧寒熱。酸嘶。邪氣。辟不祥。

【蕺菜木】 即黃柏之原名。詳「黃柏」條。

【蕺菜皮】 即黃柏之原名。詳「黃柏」條。

【蕺菜】 古籍別名 蕺菜。【毛詩】 嬰舌。【廣雅】 山葡萄。【唐註】 野葡萄。【俗名】 藤名木龍。【綱目】

外國名詞 Vitis Thunbergii, Soai N. (拉丁) エビツル

エビカツラ イヌエビ (日本) 蕺菜 係葡萄科葡萄屬。爲蕺菜之子實。其藤根詳各該條。

產地 生山野間。

形態 蕺菜爲果類之蔓生草本。狀如灌木。莖有卷鬚。攀緣樹木。葉掌狀。淺裂。有鋸齒。基部呈心臟形。表面平滑。背面密生淡褐色毛茸。如綿狀。夏間出花軸於莖。開總狀花序。花小。黃綠色。有五瓣。結實爲漿果球形。色紫黑。似葡萄而小。可供食與藥用。



蕺菜

性質 甘。酸。無毒。

主治 止渴。悅氣。益氣。

【蕺菜】 即干歲菜之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳「干歲菜」條。

【蕺菜根】 性質 甘。平。無毒。主治 下焦熱痛。淋瀝。消腫毒。

【蕺菜藤】 性質 甘。平。無毒。主治 嘔逆。傷寒後

嘔。搗汁飲之良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蕺菜藤曰。止渴。利小便。

【龍草】即烏蕨之古籍別名。典見本草集註。詳『烏蕨』條。

【蕨鼓】即蕨草之古籍別名。典見詩經。詳『蕨草』條。

【龍蕨】即馬蕨之古籍別名。典見綱目。詳『馬蕨』條。

【龍蕨】即羅麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羅麥』條。

【蕨麥】即羅麥之古籍別名。典見爾雅。詳『羅麥』條。

【蕨蕨】即麥和之古籍別名。典見綱目。詳『麥和』條。

【蕨】即白蕨之古籍別名。典見爾雅。詳『白蕨』條。

【蕨縷】命名 本品莖莖甚繁。而中有一縷故名。

古籍別名 蕨縷(爾雅)蕨(郭璞)滋草(千金)鷓腸菜(綱目)鷓腸草(千金食治)

基本 屬石竹科蕨縷之莖莖。產地 凡山野川澤及溼地間恒有生長焉。

形態 蕨縷為山野自生之一年生草或越年生草。莖細長。蔓延地上。接處有節。生根。葉對生。作卵圓形。四五月間。開白色二深裂

五瓣花。後結蒴果。種子破蒴之前端而散布。



縷 蕨

種類 鷓腸味甘莖空。有縷花白色。雞腸味微苦。咀之涎滑。莖中無縷。色微紫。花亦紫色。採取 五月間採之。

製法 凡使以葉青花白者。採苗曬乾入藥用。

用法 水煎飲。或生搗或剉末用。

性質 酸。平。無毒。效能 破血。治瘡。用治諸瘡藥。

主治 積年惡瘡。瘡不愈。歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論藥縷曰。破血。下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又曝乾為末。醋糊和丸。空腹服五十九。取下惡血。

國外學說 和漢三才圖會曰。凡瘡癬之藥。多用鷓腸菜汁傳之。和漢藥考曰。蕨縷。昔時用作牙

粉。云有保護齒牙功效。製法於端午日。採取莖莖絞汁。與鹽同煉。和後燒製。

配合應用 食治烏髭。蕨縷為藥。久久食之。能烏髭髮。(聖惠方)

治小便卒淋。蕨縷草滿兩手。水煮。常常飲之。亦治產婦有塊作痛。(范汪東陽方)

治丈夫陰瘡。莖及頭潰爛。痛不可忍。久不癒者。以五月五日蕨縷燒焦五分。入新出蚯蚓屎二分。入少水和研。作餅貼之。乾即易。禁酒。麪五辛及熱食等物甚效。(扁鵲方)

用量 錢半至二錢。參攷資料 此菜五月五日採曝乾。燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。(陶弘景)

治惡瘡有神效之功。搗汁塗之。作菜食。益人。須五月五日者。乃驗。又曰。能去惡血。不可久食。恐血盡。(孟詵)

此草莖莖甚繁。中有一縷。故名。俗呼鷓腸菜。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。為樂當及時。何能待來滋。滋乃草

名。即此也。(李時珍) 蕨縷五月五日中採乾用。(別錄) 蕨縷即蕨也。又恐白軟草是之。(孟詵)

即雞腸也。南中多有之。生於田野間。近林下溼地。亦或有之。葉似芥菜。而小。夏秋間生。小白黃花。其莖梗作莖。斷之有絲縷。又細而中空。似雞腸。因得此名。本草蕨縷雞腸作兩條。蘇恭以為一物。隨按郭璞註爾雅云。蕨縷一名雞腸草。實一物也。今南北所生。或肥瘠不同。故人疑為二物。而葛洪肘後方治卒淋云。用雞腸及蕨縷。如此。又似是二物。其用大概主血。故人宜食之。(蘇頌) 蕨縷即鷓腸非鷓腸也。下溼地極多。正月生苗。葉大如指頭。細莖引蔓。斷之中空。有一縷如絲。作蔬甘脆。三月以後漸老。開細瓣白花。結小實。大如神粒。中有細子。如粟。子。吳瑞本草謂黃花者為蕨縷。白花者為雞腸。亦不然。二物蓋相似也。(茲分明於種類耳) (李時珍)

【蘭江】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【蘭花】即白芨之古籍別名。典見

【葶藶】詳『白芨』條。

【蘭花結】即伽南香之色微綠而黑者。詳『伽南香』條。

【蘭花露】基本 本品係蘭花蒸取之露。

性質 氣薄味淡。

主治 明目舒鬱。

【蘭香】即羅勒之古籍別名。典見補註本草。詳『羅勒』條。

【蘭根】即白茅根之古籍別名。典見本經。詳『白茅根』條。

【蘭草】即草蘭之原名。詳『草蘭』條。

【蘭華】即遠翹之古籍別名。典見吳普本草。詳『遠翹』條。

【蘭槐】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【蘭蘇】即白芷之古籍別名。典見本草集註。詳『白芷』條。

【蘭蓀芷】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【蘭澤草】即草蘭之古籍別名。典見本草集註。詳『草蘭』條。

【蘭薰】即火腿之古籍別名。典見王士雄飲食譜。詳『火腿』條。

【薔薇】即天門冬之古籍別名。典見爾雅。詳『天門冬』條。

【薔薇實】即薔薇之原名。詳『薔薇實』條。

【蠟子】即寶石之色紫者。性質功效與寶石同。詳『寶石』條。

【蠟片】即鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【琥珀】即琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【蠟茶】即茶之別名。性質功效與茶同。詳『茶』條。

【蠟梅花】命名 本品形似梅相近。色似蜜蠟。故名。

古語別名 黃梅花。不經接者名狗蠟梅。已接者名碧口梅。色如紫檀者名檀香梅。(綱目)

外國名詞 Calycanthus

PROCOX, L. (拉丁) ラフバイ

カラウメ ナンキンウメ ナンキンムメ(日本)

基本 係蠟梅科蠟梅屬。為蠟梅之花。

形態 蠟梅為灌木類之落葉木本。高七八尺。大者丈餘。葉對生。

作卵圓。有尖端。冬月開花。花有香氣。花色外黃蠟色。內帶紫色。結實如垂鈴。尖長寸許。樹皮浸水磨墨。有光彩。其花可供藥用。



花梅蠟

性質 辛。溫。無毒。

主治 解暑生津。

【蠟魚】即鱈魚之古籍別名。典見御覽。詳『鱈魚』條。

【蠟鴉雀】即桑鴉之古籍別名。典見綱目。詳『桑鴉』條。

【蠟蜂】即蜜蜂之古籍別名。典見綱目。詳『蜜蜂』條。

【蠟蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【蠟樹】即女貞之古籍別名。典見綱目。詳『女貞』條。

【蠟櫻】即櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【蝨牛】即蝸牛之古籍別名。典見藥性。詳『蝸牛』條。

古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【鱈魚】即鱈魚之古籍別名。典見本經。詳『鱈魚』條。

【蠶實】即馬蘭子之原名。詳『馬蘭子』條。

【蠟蛤】即牡蠣之古籍別名。典見本經。詳『牡蠣』條。

【護火】即景天之古籍別名。典見綱目。詳『景天』條。

【護生草】即薺菜之古籍別名。典見綱目。詳『薺菜』條。

【護羌使者】即羌活之古籍別名。典見本經。詳『羌活』條。

活之古籍別名。典見本經。詳『獨活』條。

【最區】即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱈魚』條。

命名 鐵者。載也。剛可載物。故名。

古籍別名 黑金。烏金。(綱目)

基本 係金屬原質之一種。

產地 凡各省之山礦成有出。

形態 鐵質重色黑。狀類乎石。入爐煅煉者。或成條。或成塊。頗不

一致。且磁力甚強。易於傳電。置溼空氣中。遇三養化炭。輒生鐵。遂成紅褐色之養化鐵。其性狀恒因製煉之法而異。

種類 ①生鐵乃初煉去礦用以鑄器具者。②熟鐵乃生鐵再三鎔拍。可以作錄。亦謂之鑄鐵者。③鋼鐵乃生熟相雜和用。以作刀劍鋒刃者。④鐵落乃鍛家燒鐵赤沸粘上打下細皮屑。⑤鐵精乃鐵窟中飛出如塵。色紫而輕。虛可以塗磨鋼器者。⑥鐵砂乃作鐵家磨盤細末者。⑦鐵漿乃諸鐵浸水中。經久色青。沫出可以染皂者。⑧鐵華粉乃鐵塗醋鹽。使生衣。刮取成粉者。⑨鐵粉乃鐵經火飛鍊而成粉者。⑩鐵線粉乃溶鐵鍋中浮起之白沫。形如枯葉。色白。搗細而成粉者。⑪鐵鱗乃鐵上自生之赤衣。⑫鐵蕪乃以竹木蒸火。於刀斧刃上燒之。津出如漆者。

用法 水煎或水浸取汁入藥用。
性質 辛。平。有毒。
效能 墜痰。鎮驚。專作鎮逆藥。
主治 霍亂耐痛(本經)下部

及脫肛(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鐵曰。鎮心。安五臟。治癩疾。黑髮。髮。治癬及惡瘡。疥。蜘蛛咬。蒜磨生油調傅。【明】李時珍本草綱目論鐵曰。散瘀血。消丹毒。

配合應用 ①治脫肛歷年不入者。生鐵二斤。水一斗。煮汁五升。洗之日再(集驗方)

②熱甚耳聾。燒鐵投酒中飲之。仍以慈石塞耳。日易夜去之。(千金方)

③小兒丹毒。燒鐵滓水。飲一合。(陳氏本草方)

④治小兒燥瘡。一名爛瘡。燒鐵滓水中。二七遍。浴之。二三起作漿。(子母秘錄方)

⑤打撲瘀血。在骨節及腸外不去。以生鐵一斤。酒三升。煮一升服。(肘後方)

⑥熊虎傷毒。生鐵煮令有味洗之。(肘後方)

施用宜忌 畏慈石。皂莢。

參攷資料 ①諸藥療病並不入散。皆煮取汁用之。(蘇恭) ②鐵砂鐵精。並入丸散。(陳藏器) ③鐵

遇神砂。如泥似粉。(雷斅) ④鐵畏皂莢。豬犬脂。乳香。朴硝。礞砂。鹽。茵

藜。枝。藥。食。鐵。而。較。龍。畏。鐵。凡。諸。草。木。藥。皆。忌。鐵。器。而。補。腎。藥。尤。忌。之。否。則。反。消。肝。腎。蓋。肝。傷。而。母。氣。愈。虛。矣。(李時珍) ⑤經用辛平之鐵。

此柔鐵即熟鐵也。(蘇恭) ⑥鐵皆取礦土炒成。秦晉。淮。楚。湖。南。閩。廣。諸。山。中。皆。產。鐵。以。廣。鐵。為。良。甘。肅。土。錠。鐵。色。黑。性。堅。宜。作。刀。劍。西。番。出。寶。鐵。尤。勝。寶。藏。論。云。鐵。有。五。種。荆。鐵。出。當。陽。色。紫。而。堅。利。上。饒。鐵。次。之。寶。鐵。出。波。斯。堅。利。可。切。金。玉。

太原。蜀。山。之。鐵。頑。澀。副。鐵。生。西。南。瘴。海。中。山。石。上。狀。如。紫。石。英。水。火。不。能。壞。穿。珠。切。玉。如。土。也。土。宿。本。草。云。鐵。受。太。陽。之。氣。始。生。之。初。鹵。石。產。焉。一。百。五。十。年。而。成。慈。石。二。百。年。孕。而。成。鐵。又。二。百。年。不。經。採。鍊。而。成。銅。銅。復。化。為。白。金。白。金。化。為。黃。金。是。鐵。與。金。銀。同。一。根。源。也。今。取。慈。石。碎。之。內。有。鐵。片。可。驗。矣。

鐵。裏。太。陽。之。氣。而。陰。氣。不。交。故。燥。而。不。潔。性。與。錫。相。得。管子。云。上。有。精。下。有。鐵。(李時珍) ⑦凡鐵劑。難。然。濃。淡。不。同。收。斂。與。感。動。腸。胃。之。

性亦不同。但其功用則無異。血之紅色。恃鐵而得之。若血內之紅色。鐵料太少。則血虛之病。身弱而瘦。無病之時。每血重百分。內含血輪十二分。患血虛者。則少於此。比例。血輪內有鐵。能顯紅色。故凡服鐵劑。其意令血中多生血輪。人身更健。壯。凡有血虛之病。以鐵為要藥。然鐵劑雖為補藥。若面色不白。而血內之血輪未減。服鐵劑無益。凡服鐵劑者。雖耐心日久。多食養身之物。又令大便常通。否則不能得鐵之益。按此論鐵之作用。要自確當。不可不參考也。(儒門醫學) ⑧鐵礦於礦中鍊出者。謂之生鐵。鐵落斷而落者也。鑄鐵。鐵炒。熟鐵也。剛鐵。鍊鐵去滓者也。鐵精。針沙。鐵漿。已上三等取汁。各依經用。鐵華粉。鐵粉。已上二等。燒燬取。馬。啣。秤。錘。車。轄。并。錘。已。上。四。等。特。以。其。意。使。之。耳。其。生。鐵。既。自。火。中。煉。石。而。出。世。謂。之。生。鐵。亦。如。炒。脂。麻。取。油。謂。之。生。油。其。義。亦。同。白。油。麻。條。中。已。著。鐵。粉。以。生。薑。汁。調。擦。眉。上。生。眉。毛。銅。鐵。今。用。柔。鐵。風。餐。乃。以。生。鐵。陷。其。間。泥。封。煉。之。假。令。

相入。謂之圓錐。又曰鑽錐。此蓋草創之錐。亦不免偽也。蓋生鐵之堅。及三四鍊則生鐵亦自熱。却是柔鐵。而天下莫以爲非磁州鍊坊方。鐵真鋼。凡鐵之有鋼。如麵之有筋。澆洗揉麵既盡。筋乃見。鍊錐亦然。恒取精鐵一百餘斤。每鍛一火。稱之送輕。累鍛稱之。至於不減耗。此則純鋼也。實鐵之精純者。雖百鍊不耗矣。其色清明。磨瑩之則黝。而清且黑。亦有鍊之盡全無鋼者。繫地之所產精粗。前所謂鍊錐精者。其說有二。陶隱居言出鐵窰中。如塵紫色。輕者爲佳。亦以磨瑩。銅器用之。日華子又云。犁鐵尖浸水。名爲鐵精。本條既言化銅。則隱居所說是蓋鐵窰中塵紫磨錐。則明浸犁鐵尖水非是。(寇宗奭)

【鐵刀】 主治 始咬毒入腹。取兩刃於水中相摩。飲其汁。百蟲入耳。以兩刃於耳門上摩。敲作聲自出。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鐵刀曰。磨刀水服。利小便。塗脫肛。痔核。產腸不上。耳中卒痛。

二十一 鐵

【鐵刀環】 主治 產後。數日不出。燒赤洋酒。一盃頓服。

【鐵木子】 卽梳椰子之古籍別名。典見綱目。詳「梳椰子」條。

【鐵甲將軍】 卽蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳「蜈蚣」條。

【鐵皮石斛】 卽石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【鐵朱】 卽代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「代赭石」條。

【鐵色草】 卽夏枯草之古籍別名。典見綱目。詳「夏枯草」條。

【鐵色箭】 卽石蒜之古籍別名。典見綱目。詳「石蒜」條。

【鐵衣】 卽鐵鑄之古籍別名。典見綱目。詳「鐵鑄」條。

【鐵角孫兒】 卽楓上寄生之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「楓上寄生」條。

【鐵赤衣】 卽鐵鑄之處方用名。詳「鐵鑄」條。

【鐵花】 卽鐵精之古籍別名。典見綱目。詳「鐵精」條。

【鐵胤粉】 卽鐵華粉之古籍別名。典見日華諸家本家。詳「鐵華粉」條。

【鐵屑】 卽鐵落之處方用名。詳「鐵落」條。

【鐵指甲】 命名 本品形如指甲。故名。 古醫別名 佛指甲。佛甲草。寄生。(綱目拾遺) 產地 常生樹脚石隙間。 主治 諸瘡毒火丹。頭面腫脹。少入皮疳。搗卷之。牙痛。煨末擦之。

【鐵炭】 卽石炭之古籍別名。典見綱目。詳「石炭」條。 卽石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石灰」條。

【鐵胡蜂】 卽金頂龍芽草之古籍別名。典見百草鏡。詳「仙鶴草」條。

【鐵扇子】 命名 本品卽桑葉。之採過頭次後。其二葉至冬稍青。或乾枯在枝上。而又經霜雪壓過者。風吹作鐵器聲。故名。 採取 冬至後採者良。以線穿懸戶陰乾用。 主治 腸風。目疾。咳嗽。盜汗。 配合應用 洗一切天行時。風熱腫痛。目莖眩赤。取鐵扇子

二張。用無油茶碗一隻。要有蓋者。置鐵扇子於中。以滾水沖半盞。蓋好。候湯溫。其色黃綠如濃茶。棧爲出味。然後洗眼。拭乾。隔一二時。再以藥汁碗隔水頓熱。再洗。每日洗三五次。卽愈。此水一盞。可洗三四十人。(養素園驗方)

治中年眼目昏花。復明散。用輕霜雪桑葉。葉須臘月在樹不落者。同甘菊。側柏葉。荊芥穗。桑白皮。如有眵淚。加艾葉。蒼朮。發癢。加赤芍。川椒。爲粗末。等分和勻。煎湯熏洗。惟紅腫者不可洗。(眼科要覽方)

治風眼。下淚。臘月不落桑葉。煎湯。日日溫洗之。或加入芒硝少許。(不藥良方)

【鐵烏鈴】 古籍別名 鐵鈴草。 (綱目拾遺)

形態 鐵烏鈴爲雜草類之一種。其本色黑。莖硬堅實如鐵。其汁亦黑。可供藥用。汁詳見該條。

主治 楊梅瘡。瘡。風氣癱瘓。損折筋骨。俱煎酒服。

主治 烏鬚。

一九二七

【鐵秤錘】基本 本品即秤上之鐵錘。

性質 辛。溫。無毒。

主治 賊風。止產後血癥腹痛。及喉痺熱寒。燒赤浮酒熱飲。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鐵秤錘曰。治男子疝氣。女子心腹妊娠脹滿。漏胎卒下血。

【鐵粉】命名 本品係用鋼鐵入火飛鍊而成粉狀。故名。

外國名詞 Ferrum Pulver.

atum. (拉丁) Iron Powder (英) Isenpulver. (德)

基本 係金屬。為鋼鐵鍊成之粉末。

產地 凡有煅冶之處。或有出。

形態 鐵粉質重而色灰黑。過磁石即為吸引。遇稀硫酸或稀鹽酸即發水素瓦斯而溶解。於此鹽酸性溶液中。加水多量而稀釋之。再加以赤色血濁鹽溶液。則生深藍色之沈澱。百分中含有九十八分以上之純鐵。

製法 凡使以搗碎成粉用。

性質 鹹。平。無毒。

效能 安神。鎮心。平肝。定竅。用作鎮痙強壯藥。

主治 安心神。堅骨髓。除百病。變黑。潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人身重肥黑。合和諸藥。各有所主。

歷代記述攷證 【清】黃宮燾本草求真論鐵華粉曰。鐵粉氣辛性平。諸書所著治功。止載定驚療狂。治癰解毒數效。其所云定驚療狂。亦止就鐵重墜之意起見。故云可以定療。豈真救本求源之治哉。

配合應用 治驚癰發熱。鐵粉水調少許服之。(聖惠方)

治急驚涎潮。壯熱悶亂。鐵粉二錢。硃砂一錢。為末。每服一字。薄荷湯調下。(楊氏家藏方)

治傷寒陽毒。狂言妄語亂走。毒氣在臟也。鐵粉二兩。龍膽草一兩。為末。磨刀水調服一錢。小兒五分。(全幼心鑑方)

治頭痛鼻塞。鐵粉二兩。龍膽草一分。研勻。每新汲水服一錢。(聖惠方)

治腫毒疔瘡。鐵粉一兩。芙蓉

根三兩。搗如泥。封之。日二換。(集元方)

治風熱脫肛。鐵粉研。同白飯末。傅上。按入。(直指方)

用釐 五分至八分。施用宜忌 凡腎虛及氣陷者。禁用。畏磁石。皂莢。

參攷料查 化痰鎮心。抑肝邪特異。(許叔微) 乃鋼鐵飛鍊而成者。人多取雜鐵作屑飛之。其體重。真鋼者不附也。(蘇恭)

【鐵粉】即鐵華粉之處方用名。詳【鐵華粉】條。

【鐵拳頭】產地 生南安。形態 叢生柔莖。細綠。每枝三葉。葉如薄荷。中有赤紋。結實黃如小球。硬尖如蠟。略似石龍芮。惟葉無歧。可供藥用。



鐵拳頭

主治 和豬蹄煮服。治失血。

【鐵骨散】產地 生建昌。形態 叢生粗根似

竇。莖結色有節。對排比似接骨草。而嫩端亦寬。面綠背微黃。其根可供藥用。



鐵骨散

主治 同甘草煎洗脚腫。

【鐵掃帚】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【馬鞭草】條。

【鐵掃帚子】即馬蘭子之古籍別名。典見救荒本草。詳【馬蘭子】條。

【鐵掃帚子】即馬蘭子之古籍別名。典見和漢藥考。詳【地膚子】條。

【鐵掃帚子】即馬牙半支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【馬牙半支】條。

【鐵液】即鐵落之古籍別名。典見別錄。詳【鐵落】條。

【鐵連草】即鐵樹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【鐵樹】條。

【鐵筴草】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【馬鞭草】條。

【鐵筴筴】古籍別名。石打穿。千條針(綱目拾遺)。

外國名詞 *Lespedeza juncea*, pers, var. *boricoides*, Hom.

si. 形態 山間多有之。綠莖而方。上有紫線紋。葉似紫頂龍芽。微有白毛。七月開小黃花。結實似筍筍形。能刺人手。

主治 風痺血崩。黃疸吐血。跌撲鬼箭風如神。搗敷肩凝。鶴膝風。鮮者連根葉。如秋冬根老。取葉汁加飛麵調勻包紮。煎湯浴疥疥立愈。

配合應用 治黃疸。用此草乾者一兩白酒煎服四五劑即愈。(種福堂方)

治鶴膝風。石見穿草用根梗俱紅色者佳。連枝俱用。如秋冬根梗俱老。止用葉半分。但要當日取新鮮者。隔宿勿用。連同錢筍草一分。加飛麵少許。同打紫藤膠內。(種福堂方)

治面上斑疔。取錢筍草地上白落下葉并子。煎湯澄清洗面。三四次其斑自消。(朱子和方)

治腦症。石打穿草按月取草頭一個。如三月三個。四月四個。以

二十一 鐵

月分爲多寡之數。搗汁。同人乳羊乳汁攪勻服。立效。(蔣雲山傳方)

治跌打傷。用錢筍草三兩酒煎服。并治跌打瘋腫。錢筍草八角。金盤根白毛藤。蘇木。絡石。藤各一兩。酒浸十日用。(金居士選要方)

鐵結 卽伽楠香之色黑而質堅者。性質效能較伽楠香劣。遜。爲伽楠香之最下品。詳伽楠香條。

鐵華粉 命名 本品係以醋醃鐵生衣。刮取如粉狀者故名。

處方用名 鐵粉。鐵霜。古籍別名 鐵風粉(日華)鐵鹽粉(綱目)

外國名詞 *Iron powder* 基本 係金屬原質。爲鐵製成之衣末。

製法 馬志曰。作鐵華粉法。取鋼鐵作葉如笏或圓。平面磨錯。令光淨。以鹽水洒之於醋罏中。陰處埋之一百日。鐵上生。卽成粉矣。刮取細搗。篩入乳鉢。研如麵。和合諸藥爲丸散。此鐵之精華。功用強於鐵粉也。又大明曰。懸於罏瓶上。生霜者。名鐵風粉。淘去粗滓鹹味。

烘乾用。

性質 鹹。平。無毒。效能 治驚癇。療瘡瘍。用作鎮逆藥。又爲解毒藥。

主治 安心神。堅骨髓。強志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱和諸藥用。璣膏爲丸。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鐵華粉曰。止驚悸虛癩。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。疰瘵。瘰癧。脫肛痔漏。宿食等。及傳竹木刺入肉。

鐵菱角 卽菝葜之古籍別名。典見綱目。詳菝葜條。

鐵塔草 卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳茜草根條。

鐵脚威靈仙 卽威靈仙之處方用名。詳威靈仙條。

鐵脚凌羅門草 卽瓦松之赤者。古籍別名。典見綱目。詳瓦松條。

鐵脚梨 卽木瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳木瓜條。

鐵落 命名 本品乃鐵家燒鐵赤沸。粘上鐵落之皮。故名。處方用名 生鐵落。鐵屑。

古籍別名 鐵液(別錄)鐵燒(綱目)

基本 係金屬原質。爲鐵之細屑。

鹽地 凡爐冶砧旁恒有之。用法 水煎或研末用。

性質 辛。平。無毒。效能 降火。潛陽。用作鎮逆藥。主治 風熱。惡瘡。疔瘡。癩疥。氣在皮膚中(本經)除胸膈中熱。氣食不下。止煩去黑子。可以染皂。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鐵落曰。主鬼打鬼。疰邪氣。水漬沫出。澄清。暖飲一二盃。

【唐】蘇恭新修本草論鐵落曰。炒熱投酒中飲。療賊風。瘧。又裹以炭。賊下。療胡臭。有驗。【宋】大明諸家本草論鐵落曰。治驚邪癩。小兒客忤。消食及冷氣。並煎服之。【明】李時珍本草綱目論鐵落曰。平肝去怯。治善怒發狂。【明】繆希雍本草經疏論鐵落曰。鐵落是鐵家燒鐵赤沸。粘上煨之。如皮甲落下者。本出於鐵。不經金象。體重而降。故

裏間有生鐵落飲。以療病狂怒者。

云生鐵落下氣疾也。又狂怒屬肝氣暴升。故取金氣以制之也。其主熱在皮膚中。及除胸膈中熱氣。食不下止煩者。皆制木散熱之功也。本經又主風熱。惡疥癩。疽瘡癩疥者。皆肝心火熱所致。辛平能除二經之火熱。故主之也。蘇恭以之炒熱投酒中飲。療賊風瘧。大明治驚邪癩癩。小兒客忤。煎服之。悉此意耳。

配合應用 小兒丹毒。煎鐵屎研末。豬脂和傅之。

參攷資料 ①生鐵打錢。皆有花出。如蘭。如蛾。故俗謂之鐵蛾。今煙火家用之。鐵末浸醋。書字於紙。背後塗墨。如碑字也。(李時珍) ②

按素問病態論云。帝曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯曰。生於陽也。陽氣者。暴折而不流。故善怒。病名陽厥。曰何以知之。曰陽明者。常動。巨陽少陽不動。而動大疾。此其候也。治之當奪其食。則已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食。即已。以生鐵落為飲。夫生鐵落者。下氣疾也。此素問本文也。愚嘗釋之云。陽氣拂鬱。而不得疏越。少陽鬱木。按三焦

少陽相火。巨陽陰火。上行。故使人易怒如狂。其巨陽少陽之動脈可診之也。奪其食。不使胃火復助其邪也。飲以生鐵落。金以制木也。木平則火降。故曰下氣疾速。氣即火也。又李一甫永類方云。腫藥用鐵

蛾。及人砂入丸子者。一生須斷鹽。蓋鹽性濡潤。腫若再作。不可為矣。製法用上等醋。煮半日。去鐵蛾。取醋和蒸餅為丸。每晝湯服三四十丸。以效為度。亦只借鐵氣爾。故日華子云。煎汁服之。不留滯於臟腑。借鐵虎之氣。以制肝木。使不能尅脾土。土不受邪。則水自消矣。鐵精。鐵粉。鐵華粉。鐵漿。鐵砂。入藥皆同此意。(李時珍)

【鐵葛】

產地 生山峽間。
形態 鐵葛為蔓草類之一種。葉似枸杞。根如葛而黑色。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。
主治 一切風。血氣羸弱。久服療風。緩偏風。令人壯健。

【鐵葛藤】 即葛根之古籍別名。與見和漢藥考。詳「葛根」條。
【鐵蛾】 即鐵落之古籍別名。典見

綱目。詳「鐵落」條。

【鐵鈴草】 即鐵烏鈴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵烏鈴」條。

【鐵精】 命名 本品係鐵經鍛如塵。乃其精華。故名。

處方用名 鐵精粉。

古籍別名 鐵花(綱目)。

基本 係金屬原質。為鐵鍊成之塵末。

性質 平。微溫。

效能 解毒。療瘡。用作鎮逆藥。又作解毒藥。

主治 明目化銅。(本經)療驚悸。定心氣。小兒風癩。陰潰脫肛。

(別錄)

配合應用 ①下痢脫肛。鐵精粉敷之。(至寶方)

②女人陰脫。鐵精。羊脂。布裹炙熱熨之。(聖惠方)

③男子陰腫。鐵精粉敷之。(子母祕錄方)

④疔腫拔根。鐵渣一兩。輕粉一錢。麝香少許。為末。鐵餅十字口。點藥入內。醋調。麵糊傅之。神效。(普濟方)

⑤食中有蟲。腹內墜痛。面目青

黃。淋露骨立。病變無常。用爐中鐵精研末。鷄肝和丸。梧子大。食前酒下五丸。不過十日愈。(肘後方)

⑥蛇骨刺人。毒痛。鐵精粉豆許。吹入瘡內。(肘後方)

參攷資料 鐵精。鐵之精華也。出鍛爐中。如塵。紫色。輕者為佳。亦以磨盤鋼器用之。(陶弘景)

【鐵精粉】 即鐵精之處方用名。詳「鐵精」條。

【鐵棉草】 即葛藟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛藟」條。

【鐵漿】 命名 本品乃鐵浸水中。經久色青。沫出如漿者。故名。

處方用名 鐵漿水。

形態 鐵漿為紅黃色粘稠濁之液。略有酸敗之臭。味甘而有收斂性。遇草草質。則生黑色之沈澱。可供藥用。

製法 以酸敗酒或甘酒之稀薄液。或米屑和水入壺中。投以鐵器之破片。或被燒養化之鐵屑。暫置暖處。不久鐵繡自生。鐵漿。而溶解於醋酸中。凡用取其上層澄清之液水。

性質 鐵。無毒。

成分 爲第一醋酸 (H₂CO₃) 之酸性溶液。

效能 鎮驚癇。能解諸毒。用作收斂藥。

主治 鎮心明目。主癩癩。發熱急黃。狂走。六畜癩狂。人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等咬。服之毒不入肉也。兼解諸毒入腹。

配合應用 治時氣生疔。胸中熱鐵漿飲之。

治一切疔腫。鐵漿日飲一升。(千金方)

治發背初起。鐵漿飲二升取利。(外臺秘要方)

治蛇皮癩疔。用鐵漿類塗之。(談禁毒方)

治漆瘡作痒。用鐵漿類洗愈。(外臺秘要方)

參攷資料 鐵漿是以生鐵渣水。服餌者旋入新水。日久鐵上生黃膏。則力愈勝。唐太妃所服者。乃此也。(陳承) 鐵漿造法。取舊鐵入器中。和米屑少許。漬水。夏三日。冬七日。置暖處。則生鐵汁。作紅黃色。味微甘者佳。(和漢三才圖會)

二十一 鐵

【鐵漿水】即鐵漿之處方用名。詳【鐵漿】條。

【鐵線粉】 基本 鐵絲起錫。用所刮下之錫末。名鐵線粉。其色黃。另有錫鐵鍋中。浮起白沫。如枯礬者。其色白。均真。

主治 兩腿陰面溼癬。

外國名詞 Adian-
Hm, H (拉丁) カナクシヤク
シタ(日本)

基本 係水龍骨科石長生屬。爲鐵線草之根。



鐵線草

性質 微苦。平。無毒。

主治 療風。消腫毒。有效。

配合應用 治男女諸風。產後風。尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。爲末。以烏骨雞一斤。重者。水內淹死。去毛腸。砍作肉。生

入藥。剝勻。下麻油些少。炒黃色。隨人量。入酒煮熟。先以排風藤煎濃湯。沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗。即愈。如不沐浴。必發出風丹。乃愈。(滑伯仁櫻寧心要方)

參攷資料 生鏡州。三月採根。陰乾。(蘇頌)

【鐵線草】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【鐵線筒】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【鐵線透骨草】即透骨草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「透骨草」條。

古醫別名 鐵連草。(綱目拾遺)

外國名詞 Plectrantha sp.

產地 出閩粵諸地。

形態 鐵樹爲灌木類之一種。有數種。出廣西。馴象衛境者。樹黑色。高數尺。枝細。刀斫不斷。斧之乃折。葉類石楠葉。蓬丁卯年。開花四瓣。紫白色。形似瑞香。花圓小。累月不凋。色亦不輪。其花可供藥用。

種類 產瓊州島等處者。高一二尺。葉密生。花紅色。狀如鐵絲

燈。燈殼干葉。每各一花。枝皆綠。色。枝極穿格而生。植之盆中。可供玩賞。產廣東者。葉似蕁而紫。幹如密節菖蒲。

主治 止血。下痰。清痰。火。療一切心胃氣痛。煎湯服。

【鐵樹】即鳳尾蕪之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳳尾蕪」條。

【鐵樹開花】 產地 生建昌。

形態 一莖一葉。似馬蹄而尖。有微齒。與犁頭尖相類。而葉背白。細根。可供藥用。

主治 同猪肺麥治腸食症。

【鐵燈樹】 產地 江西。湖南。皆有之。



鐵燈樹

形態 鋪地而生。一莖一葉。葉似紫苑。而寬本圓。末尖。夏間中抽一葦。長五六寸。頗似枯蕪。秋深始從四面發小葉。隨作苞。開細瓣小白花。結蒂。長二三分。葉蒂攢密。青

精斑散。其根可供藥用。

效能 同酒煎服。能止痛活血。

【鐵箱】即鐵華粉之處方用名。詳

【鐵華粉】條。

【鐵葵】油。處方用名。鐵葵油。刀

古籍別名 刀煙（綱目）

基本 以竹木藝火於刀斧刃

上。燒之津出如津者是。江東人多

用之。

用法 恒以外塗用。

效能 殺蟲。治疥。用作腐蝕疥

毒藥。

主治 惡瘡蝕毀。金瘡毒物。傷

皮肉。止風水。不入水不爛。手足

駁折。瘡根結筋。癩癧毒腫。染髭髮。

令永黑。及熱未凝時。塗之少頃。當

乾硬。用之須防水。又殺蟲立效。

配合應用 治療瘰癧項邊瘰癧子

似桃核。於火上燒煙熏之。（陳氏

本草方）


【鐵楸】 產地 出南安。

形態 綠莖如蒿。有直

紋。旁多細枝。厚葉翠綠。背微紫。似

平地木葉。而齒圓長。可供藥用。

效能 活氣。行血。通絡。



鐵 鐵

【鐵葵油】即鐵葵之處方用名。詳

【鐵葵】條。

【鐵邊箕】即金鎖銀開之古籍別

名。典見百草鏡。詳「金鎖銀開」條。

【鐵槓】即槓子之古籍別名。典見

綱目。詳「槓子」條。

【鐵礬】即礬石之狀如赤石脂而

有金星者。詳「明礬」條。

【鐵鎊】 命名 本品係鐵之鑄

衣故名。

處方用名 鑄鐵衣。鐵赤衣。

古籍別名 鐵衣（綱目）

基本 係金屬原質。為鐵之赤

衣。

用法 恒以水浸汁。或刮研末

用。

性質 辛寒。無毒。

效能 解毒。治疥。用作外科瘡

毒藥。

主治 惡瘡疥癬。和油調塗。蜘蛛

蟲咬。蒜膠塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鐵鎊曰。平肝墜熱。消

瘡腫。口舌瘡。醋磨塗蜈蚣咬。【明】

穆希雍本草經疏論鐵鎊曰。鐵鎊

味應辛苦。氣應寒。惡瘡疥癬。溼熱

所生。蜘蛛蟲咬。毒氣傷血。辛苦能

除溼熱。寒能解熱毒氣。故主之也。

又祕法取礬天入土者研極細。同

礬酥腦磨。以金鐵刺入疔瘡中。令

至根。然後以藥塞入。能拔疔根。輒

效。蓋疔腫未有不因肝經風熱所

致。此藥屬金。善能平木。故有如是

之功。普濟方疔腫初起。多年土內

鑄釘。火煨醋淬。刮下鐵末。研細。每

用少許。人乳和挑破傳之。

配合應用 ①治風瘙癢疹。鐵

鎊磨水塗之。（集簡方）

②治湯火傷瘡。青竹燒油。同鐵

鎊擦之。（積德堂方）

③治疔腫初起。用多年土內鑄

釘。火煨醋淬。刮下鐵末。不論濕火。

癰取收之。每用少許。人乳和挑傳

之。仍炒研二錢。以鹽水煎滾。待冷

調服。（普濟方）

④治脚腿紅腫。熱如火炙。俗名

赤遊風。用鐵鎊水塗解之。（惠濟

方）

⑤治重舌腫脹。鐵鎊鎊燒紅。打

下鐵研末。水調二錢。噙咽。（生生

編方）

⑥治小兒口瘡。鐵鎊末水調服

之。（集簡方）

⑦治內熱遺精。鐵鎊末冷水調

服一錢。三服止。（活人心鏡方）

⑧治婦人難產。雜草燒。鐵鎊。白

芷等分為末。每服一錢。童尿米醋

各半。和服見效。（救急方）

【鐵籬篋】即籬篋之別名。典見植

物學大辭典。詳「籬篋」條。

【鐵鎊粉】即鐵華粉之古籍別名。

典見綱目。詳「鐵華粉」條。

【鎊墨】即鎊墨之古籍別名。典

見開寶本草。詳「鎊墨」條。

【鐵樹】即樹之古籍別名。典見綱

目。詳「樹」條。

【霹靂木】即雷公藤之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【霹靂酒】 基本 本品係以鐵

器用火燒赤所浸淫

之酒。

主治 疝氣偏墜。婦人崩中下

血。胎產不下。

【霹靂礎】 古醫別名。雷楔。
綱目(霹靂礎。霹靂礎。)
斧(博物志)

產地 廣東海康縣及河東山
澤間皆產之。

形態 霹靂礎係屬石類。為經
雷電交震之礫石。形似斧刀。色青
黑。有斑紋。堅硬如玉。上有二孔。取
之可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。
效能 安神定志。殺勞蟲。解蟲
毒。

主治 驚邪。恍惚。瘵疾。洩瀉。石
淋。癰疔。

【礎】即百合之古醫別名。典見別
錄。詳「百合」條。

【顧塚】即石芸之古醫別名。典見
別錄。詳「石芸」條。

【礁】即寒具之古醫別名。典見綱
目。詳「寒具」條。

【雲鳥】即燕之古醫別名。典見古
今注。詳「燕」條。

【驪】命名。驪。古文作驪。從馬
從龍。讀聲也。故名。

古醫別名 駃騠。駃騠。駃騠。駃
騠。(綱目)

外國名詞 Equus asinus
Mulus Mule (拉丁)ラバ(日
本)

基本 係脊椎動物哺乳類有
胎盤類。有蹄類。奇蹄類。馬科之驢。
產地 北省多產之。

形態 驢為獸類家畜類。馬
屬之一種。為驢父馬母所生之雜
種。其頭耳皆長。毛短。鳴聲如驢。而
體較大力。健於馬。尾根裸出。力強
於驢。毛色黑褐。或灰或赤褐。背上
有黑褐。食粗糲。能重負。運行以其
力在腰。背說尾後有鎖骨。故不羣
乳。實係其精子不成熟。不能傳種。
其肉有毒。不堪食。蹄可供藥用。

主治 難產。燒灰入麝香少許。
酒服一錢。

參攷資料 ①稷性頑劣。肉不
益人。孕婦食之難產。(寧原)②驢
古方未見用者。按呂氏春秋云。趙
簡子有白驢甚愛之。其臣陽城渠
胥有疾。醫云得白驢肝則生。不得
則死。簡子聞之曰。殺畜活人。不亦
仁乎。乃殺驢取肝與之。渠胥病愈。
此亦剪髮以救功臣之意。書之於
此。以備醫案。(李時珍)

【驪屎】 主治 打損。諸瘡。破傷。
中風。腫痛。炒焦。糞。之。
冷即易。

【驪】即驢之古醫別名。典見綱
目。詳「驢」條。

【薔華】即茉莉花之古醫別名。典
見和漢藥考。詳「茉莉花」條。


【鱖】即比目魚之古醫別名。典
見段氏北戶錄。詳「比目魚」條。
即比目魚之古醫別名。典見綱目。
詳「比目魚」條。

【鱖魚】 命名 本品初夏時有
之餘。月則無。故名。
古醫別名 鱖魚。鱖目。
外國名詞 Iijaha conqasta
Bonnot (拉丁)ヒラ或ヒラコ
ノシロ(日本)

基本 係脊椎動物魚類。喉鯉
類。鱖科之鱖魚。
產地 江河中多有之。

形態 鱖魚為鱗魚屬之一
種。其體側扁而長。下顎突出。齒生
兩顎骨及口蓋骨及舌上。微小如
鱗。有鱗十六刺。腹小。而背長。
尾鰭為叉狀。腹下有三角鱗。背蒼
色。而腹白色。體長約三尺許。肉多

細刺而富脂肪。可供食與藥用。



魚 鱖

性質 甘。平。無毒。
主治 補虛勞。

歷代記述攷證 【明】寧原食
鑑本草論鮮魚肉曰。蒸下油。以瓶
盛埋土中。取滄湯火傷。甚效。

【鱖魚鱗】 主治 疔瘡。胸臆瘡。
並貼之。

【鱖魚鱗】 採取 須乘活時拔
取。若死者便淡藥力。
主治 湯火傷。疔瘡。臆瘡。並下
疔。

配合應用 ①治湯火傷。用鱖
魚鱗香油熬塗。立效。茅集之云。鱖
魚鱗貼臆瘡。立效。(逢原方)
②治疔。疔瘡。用鱖魚鱗貼上。則瘡
聚。先須與酒飯吃飽。然後將魚鱗

邊略路揭起些須。用力急揭去。疔根便帶出也。但揭出疔根時。極痛無比。非醉飽即暈倒也。(陳氏傳方) 水疔。用鱈魚尾下近腹處有划水二瓣。辨間有長鱗。二瓣最佳。但難得。今人以背上大鱗代之。貼上即消。(傅氏方) 鱈魚鱗用手刮下。不可見水。陰乾收貯。此拔疔第一妙藥也。用時以銀針撥開疔頭。一片貼上。以清涼膏蓋之。俟一宿揭開。其疔連根拔出。後用生肌散收功。予治兩貴婦大脚趾患瘡。二三年不收功。將鱈一片。以銀花湯浸軟。拭乾貼之。不數日愈。(毛世洪經驗集方)

●治下疳。鱈魚鱗焙乾煨研。白色名白龍丹。敷之即愈。得此可包醫。(救生苦海方)

●治血毒。蔡雲白言。人生血毒。挑破。血出不止者。用鱈魚鱗貼之。即斂而愈。

【鱈魚】 原名 鱈魚。
古醫別名 鱈魚。黃煎魚。(綱目)

產地 生江湖間。
形態 鱈魚為鱈類魚屬之一

種。體如鯰而腹平。頭如鮫而口大。頰如鮎而色黃。鱗如鱗而稍細。大者三四十斤。性喜獨行。而喉同類。其肉可供藥用。

性質 甘平。無毒。
主治 止嘔。暖中。益胃。

【鰻魚】即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】即鰻魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】即烏藥之古籍別名。典見綱目。詳「烏藥」條。

【鰻魚】即海鰻之古籍別名。典見雅詳「海鰻」條。

【鰻魚】即鰻魚之古籍別名。典見爾雅。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】古醫別名。鰻魚。鰻魚。鰻魚。(爾雅) 麥雞。(綱目)

形態 鰻魚為水禽類之一種。狀如鵝而無丹頂。兩頰紅。羽色青蒼。亦有灰色者。頭長而脚高。常覓食於田澤洲渚之間。其肉可供藥用。

性質 甘溫。無毒。
主治 殺蟲解蟲毒。

性質 甘溫。無毒。

【鶯】 原名 鶯。
命名 鶯鳴嚶嚶。故名。

古醫別名 黃鳥。(詩經) 黃鸝。(說文) 鶯黃。商庚。(爾雅) 倉庚。(月令) 青鳥。(左傳) 黃伯勞。(綱目) 告春鳥。(動物學大辭典) 搏黍。楚雀。黃鸝。金衣公子。黃袍。(詩疏)

外國名詞 Cettia Cantans
E. & S. 或 Horeites Cantans
Eastern nightingale 或 Lango
Japanese bush-warbler (拉丁)
ウグイス 或 ハルツゲトリ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類鶯科。

產地 山林原野間處處有之。

形態 鶯為林禽類之一種。眼網。嘴短尖細。嘴色淡黃褐色。翼尾俱長。體之上面灰黃或帶綠褐色。腹部灰白或淡黃。脚細。色茶褐。有長爪。雌比雄較大。夏棲山林。冬遊原野。立春後即鳴。鳴聲圓滑如織機。至夏則不鳴。飛翔輕捷。覓食蟲類。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫。無毒。

性質 甘溫。無毒。

性質 甘溫。無毒。

性質 甘溫。無毒。

性質 甘溫。無毒。

性質 甘溫。無毒。

主治 補益腸氣助脾。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鶯肉曰。食之不妬。秦攻盜料。按山海經云。黃鳥食之不妬。楊慶止妬論云。梁武帝鄧后性妬。或言倉庚為膳療妬。遂令茹之。妬果減半。(李時珍)

【鶯爪】 基本 鶯爪為鵲之咽乾而大者。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。
主治 療疔去癬。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【鶯爪】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

(日本)

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類

類鵝科

產地 出東三省及西伯利亞諸地

形態 鵝爲水禽類候鳥之一種。生活最適宜於溫帶地方。冬則南來。春則北返。其形如鵝。嘴長而堅硬。色綠而頭頂赤色。頸幹亦極全體純白。尾端黑色。頸項咽喉及頸與翼尖亦黑色。高約三四尺。足及趾與頸皆長。趾無蹼。翼大飛翔甚捷。又好涉游。棲水濱。覓食魚介蟲物。其血可供藥用。



鶴

採取 以白鶴者良。

性質 鹹平無毒。

主治 益氣力補虛乏。去風益肺。

【鶴卵】

性質 甘。鹹平。無毒。

主治 預解痘毒。多者

令少。少者令不出。每用一枚。煮與

小兒食之。

【鶴肫中砂石】

主治 磨水服。解毒邪。

【鶴骨】

主治 酥炙入滋補藥。

【鶴翎草】 卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【鶴頂】 卽鶴頂之古籍別名。典見綱目。詳「鶴頂」條。

【鶴頂紅】 卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【鶴頂草】 卽藜之古籍別名。典見土宿本草。詳「藜」條。

【鶴腦】

主治 和天雄蕪實服之。令人目明。夜能書字。

【鶴糞】

命名 本品係天名精。形小而長。有刺。善整人衣。勢似於蟲。故名。

基本 屬菊科鶴蟲之子實。

產地 凡山谷川澤及原野間。恒多生焉。

形態 鶴糞爲山野自生之宿根草。莖高二尺餘。根生葉叢。生地上。形狀似煙草葉。邊緣稍有鋸齒。有絨毛。有一種強烈氣味。夏月於

葉腋開黃花。如野菊花。後結實。呈褐色。

採取 八月採之。

製法 凡使須微炒。香入藥用。

性質 苦辛。有小毒。

效能 殺蟲治疔。專作殺滅諸蟲之要藥。

主治 蚊蠅爲散。以肥肉臙汁。服方寸匕。亦入丸散用。

歷代記載攷證 【宋】開寶重定新本草論鶴蟲曰。蟲心痛。以淡醋和半匕服。立遂。【宋】大明諸家本草論鶴蟲曰。殺五臟蟲。止癰。傳

惡瘡。【清】黃宮繡本草求真論鶴蟲曰。鶴蟲氣味苦平。功專入肝除逆。故凡一身痰凝氣滯。得此苦以疎泄。則痰氣頓解。而蟲自無安身之地矣。况蟲得苦則伏。如小兒蚊

嘔腹痛。用以鶴蟲研末。納於肥肉汁中調服。其蟲自下。非其蟲因苦逐。曷克有是。但藥肆每以蒟蒻苗子代充。不可不辨。

配合應用 ●治大腸蟲出不斷。斷之復生。行坐不得。鶴蟲末水調半兩服。自愈。(怪疾奇方)

●療蚊咬心痛。取鶴蟲十兩。搗

篩蜜丸。梧子大。以蜜湯空腹吞四

五十丸。忌酒肉。草雲。患心痛十年。不瘳。於雜方內合服之。便愈。(初

虞世古今錄驗方)

●治小兒蚊蟲嘔心腹痛。亦單用鶴蟲研末。以肥猪肉汁下之。五

歲一服二分。蟲出卽止也。(李韓

兵部手集方)

用量 八分至錢半。

【鶴頭紅】 卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【鶴鳴】 卽鶴鳴之古籍別名。典見左傳。詳「鶴鳴」條。

【鶴鳴】

命名 凡鳥朝鳴曰朝。夜鳴曰鳴。鶴喜朝鳴。故名。

古籍別名 鶴。屬。屬。屬。(爾雅)

鶴。屬。(左傳) 鸛。屬。屬。(綱目)

產地 出深林間。

形態 鶴鳴爲林禽類之一種。形似山鶴。而小。尾短。有青毛。冠羽

色青黑。飛翔不遠。春來秋去。好食桑椹。其肉可供藥用。

性質 鹹平無毒。

主治 助氣。益脾胃。主頭風目

眩。發炙食之。頓盡一枚。至厥。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。與見爾雅。詳『鷓鴣』條。

和漢藥考。詳『射干』條。

【麝香】 性質 甘。溫。無毒。 主治 腹中癥病。

參攷資料 麝香。人常食之。似野肉而腥氣。云食之不畏蛇毒也。(孟詵)

【麝香】即甘松之古籍別名。與見和漢藥考。詳『甘松』條。

【麝香】 命名。本品之香氣能遠射。故名。麝形似麝。俗有香壁之稱也。

【麝香】 處方用名 原麝香。原寸香。當門子。

【麝香】 古籍別名 射父香。(爾雅)香。麝香。(綱目)最佳者名元寸香。麝香。麝香。麝香。麝香。四味。臭。拔萃。國。莫訶。婆伽。(和漢藥考)

【麝香】 外國名詞 Moschus。(拉丁) Muske。(英) Mosohus, Bism. (德)

【麝香】 基本 屬哺乳獸蹄類之麝。鹿。為牡獸。中與陰部間二腺囊分泌之香物。

【麝香】 產地 陳仁山藥物生產辨云。麝香產四川打箭爐為正地道。雲南亦可。西藏次之。乃麝狗之麝。出無定時。味清香。又有一種名北麝。

【麝香】 又名西麝。又名蘇麝。產強家口。為上。牛莊次之。身扁。氣味類像馬尿。比四川。雲南。西藏者大不如也。

【麝香】 形態 麝。體如尋常之鹿。但矮小似野羊。長三尺。高二尺許。全身灰褐色。生長毛。自頸至脚。有白斑二條。無角。無淚竅。耳長如兔。面頰長。上額之犬齒。突出吻外。而向下。長及三寸。晝間隱伏。不出。入夜始出。而覓食芳草。性懦弱。然善跳躍。雖六丈闊之溪崖。亦能一躍而過。逐之過急。則窘而隱。其者有一腺囊。在臍與陰部之中間。充滿分泌物。即名麝香。其囊謂之香腺。獵者捕獲此獸。立即割下腺囊。惟因香氣峻烈。須先以布帛遮蔽口鼻。然後採取。否則往往頭痛。甚者致死。故獵者割取腺囊之時。最須留意。萬不可誤損其囊云。其香腺為似囊之包皮腺。形卵圓或輪圓。小者如金橘。大者若雞卵。下扁平。上陷凹。有毛被之。中央有一小孔。毛密而迴旋。為放線狀。外皮似革。囊膜殊薄。剝之。有兩層。膜中藏有香液。新鮮之際。稠厚如蠟。乾則為大小不等之顆粒。於水可溶解。四分之三。於酒精祇溶解二分之一。近嗅之。發一種異常峻烈之臭氣。遠聞之。轉覺芳香可愛。味苦。遇硫黃。木炭。動物炭等。其臭即消矣。

【麝香】 種類 ①生香。即遺香。乃麝自別出者。蓋其香滿於臍。入脊。臍內。急痛。以自爪別出。著屎尿中。覆之。常在一處不移也。②臍香。乃獵人捕殺牡麝。取得者。③心結香。乃其被大獸捕逐。驚畏失心。狂者。墜死。被人覓得。破心見血。流出脾上。乾作血塊者。此品不堪入藥。④水麝香。乃臍中皆水。以針刺臍。滲一滴於斗水中。用酒衣物。其香不散。針臍後。捻以真雄。則臍復合。此品近不復有。或有之。人亦不識矣。

【麝香】 採取 每年春季。覓採生者。良。餘時。獲捕臍香者。次之。 製法 雷斅曰。凡使麝香。用當門子。尤妙。以子日開之。微研用。不必苦細也。 性質 辛。溫。無毒。 成分 成自揮發性未詳之有效成分。及脂肪。膠質。蛋白質。纖維質。無機鹽類。安母尼亞。水分等。 效能 通竅。辟穢。搜風。逐邪。用

作與香及回蘇藥。

作用 至腸被吸收而入血中。使血液流動增進。至腦而激大腦神經。令精神異常興奮。然時間甚短。萬不及香木燻之能延長數日之久也。

主治 辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲。蠱毒。溫瘧。驚癩。久服除邪。不夢寤。寤寐。本經。療諸凶邪。鬼氣。中惡。心腹暴痛。腹急痞滿。風毒。去面黧。目中府翳。婦人產難。墮胎。通神。仙。別錄。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論麝香曰。佩服及置枕間。辟惡夢。及尸注鬼氣。又療蛇毒。唐甄權藥性本草論麝香曰。熱水研服一丸。治小兒驚癇。客忤。鎮心安神。止小便利。又能蝕一切瘰癧。水。唐孟詵食療本草論麝香曰。除百病。治一切惡氣。及驚怖恍惚。宋日華諸家本草論麝香曰。治蛇鼠咬。沙蟲。溪瘴。辟瘴氣。殺瘴疔毒。治瘡疾。吐風痰。療一切虛損。惡病。劫子宮。暖水服。止冷帶下。元王好古湯液本草論麝香曰。療鼻窒。不開香鼻。明李

二十一畫 麝

時珍本草綱目論麝香曰。通諸竅。開經絡。透肌骨。解酒毒。消瓜果食積。治中風。中氣。中惡。痰厥。積聚。癥瘕。明繆希雍本草經疏論麝香曰。陶弘景云。麝常食柏葉。又啖蛇子。以其香必非因啖蛇而結。蘇頌乃云。夏月食蛇多。至寒則香滿。入春膈內急痛。自以爪剔出。陶云。五月得香。往往有蛇皮骨。豈有食蛇逾一年。而皮骨尚不化者乎。不知麝乃山獸。好食香木。芳草。如柏葉之類。故其氣聚於膈而結成是香。或遇蛇亦啖。但不結香耳。如必啖蛇多。而後有香。則此藥必大毒。難近之物。安得味辛氣溫無毒耶。甄權言苦辛。其香芳烈。為通關利竅之上藥。凡邪氣着人。淹伏不起。則關竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨節俱開。邪從此而出。故主辟惡氣。殺鬼精物。凶邪。瘴毒。溫瘧。中惡。心腹暴痛。腹急痞滿。風毒。諸證也。其主癩瘡者。借其氣以達於病所也。苦辛能殺蟲。故主去三蟲。辛溫主散。故能去面癩。及目中府翳。性能開竅。故主難產。墮胎也。走竅之性。而云久服除邪。不夢寤。

麝通神。仙者。凡香皆能辟除惡氣。而通神明。故有是功能也。日華子云。納子宮。煖水臑。止冷帶疾。藥性論主小兒驚癇。客忤。蝕一切癰疽。膿水。今人又用以治中風。中氣。中惡。痰厥。猝仆。兼入膏藥。傳藥。皆取其通竅。開經絡。透肌骨之功耳。清黃宮繡本草求真論麝香曰。麝香辛溫。芳烈。開關利竅。無處不到。如邪氣着人。淹閉不起。則閉竅閉塞。登時眼翻。手握。僵仆。昏地。故必用此辛香。自內達外。則毫毛骨節俱開。而邪始從外出。是以邪鬼精魅。三蟲諸毒。皆能治也。諸風諸氣。閉之關竅。而不用此驅除。則病安祛。但不可過為用耳。至於婦人難產。墮胎。尤善。小兒驚癇。客忤。鎮心安神。鼻塞。不聞香鼻。服此即開。目疾。內翳。點此即除。痔漏。惡瘡。面黑。斑疹。賢鼠咬。蟲傷。成瘡。用麝封固。即愈。瘡疔。開之亦腐。服之即發。藥之辛香。雖同冰片。然冰片入口。貼內即冷。稍頃熱性即發。不似麝香。香氣。慳烈。入耳與肉。而不冷耳。欲辨真偽。須於炭炭上有油滾出。而成焦黑者。此即肉類屬真。若假

則化白灰。而為木類也。所用。凡使麝香。用當門子。尤妙。惡毒。不可近鼻。防蟲入鼻。國外學說 日本學說謂內服少量。不呈作用。服大量。則心悸。亢進。精機能過敏。胃部起溫熱之感。且被壓迫。又能增多諸腺之分泌。及發汗利尿。甚或頭痛眩暈。據日本藥局方。為與膏藥。用於衰弱症。如熱性病之虛脫。宜用之一。回自。○。○五至○。五。和於白糖。或為丸劑。此外為芳香藥。又第四版改正日本藥局方載麝香為麝囊中之分泌物。新鮮者。稍柔。硬。乾。則為顆粒狀之境。色黑。褐。或深赤。褐。香氣異常。峻烈。以松節油浸之。用顯微鏡檢視。則見其碎片及塊片。大略均勻。質半透映。色褐。毫無他物夾雜其間。此物有安母尼亞臭。氣。但甚微。試燃燒成灰。其遺留之硬固性。百分中不至八分以上。又和漢藥考曰。麝香之品類。隨麝香鹿棲息地方之氣候。食物而異。象因麝香乾燥法。調製法等。而不同。雖未能一一辨別。總之品類頗多。在貿易上。則大概分為兩種。一

種名中國麝香。出自西戎者。皮囊及毛。俱作絳褐色。出自雲南者。品最佳。一種名俄國麝香。出於西伯利亞及俄國各地。皮囊及毛。俱作鼠白色。至日本所有之麝香。專仰給於中國。從前藥舖處理此物。所分品類極多。詳見遠西醫方名物考。摘錄如下。麝香之香囊與皮毛。之形色大小。種種不一。即係上品。香中尚有毛雜入。其氣味色質等。亦大有出入。由此觀之。香囊不免有以麝皮或他獸皮擬造者。一囊之香。雜以他物。亦竟可分作數十囊。皆見藥舖所賣之麝香。一斤須香囊三十個。每年運銷日本者。斤數已屬不少。其餘運銷印度及歐美各國者。歲更不知幾千萬斤。香囊亦不知幾萬億。此匪居深山幽谷之異獸。既非輕易可獲。縱令得之一囊。亦僅有一囊可採。其數烏得有若此之多。謂非夾雜贗造。其誰信之。姑懸此說。用資疑於來者。或謂中國禁令甚嚴。真品決不准輸入他邦。且其價貴。與銀對換。故真者絕少。按今日本藥舖所售之中國產麝香。核諸西說所述。大略

相符。因西說大可以鑑別真贗也。而樂只亨之說。亦足以備考證焉。樂只亨之言曰。麝香在有毛之皮囊中。完全無損。藥舖呼為麝香。其囊皮即為麝香皮。麝香在囊中時。形如碎粉。出囊則呼為麝香。藥舖出售者有三等。上等曰日本口。中等曰閩山下等曰白毛。本品囊圓。煤色。徑一寸二三。至一寸四五分許。小者約七八分。重四五錢至七八錢。側面有茶褐色之細毛。少許。於其無毛處。作十字式切開。內有麝香。如碎粉。色紫黑。如饅頭之細沙。餡一種作黑色。一種香氣極烈。以上碎粉中有大如黑豆之粒。切之。覺輾。是為當門子。此粒多者。為最上品。非本口無此物也。一種帶微赤色者。香氣較和。亦屬上等。然僅有碎粉。無當門子。一種黑色。輾而甚黏。如泥。香氣甚。雖可視為上品。然此必非當門子。是殆間山也。或謂此種多溼潤。其中有如無患子大之圓塊。指按之。則柔輾而扁。即非當門子。然以其香氣烈。可作上品。若囊乾。毫不溼潤。其中之麝香亦乾。而香氣甚者。亦屬上

等。有貯藏數十年之麝香。其囊圓而小。徑祇六分許。重不過一錢四五分。囊乾而硬。其中麝香如沙。又如白鹽。嚼之。亦如沙。香氣峻烈者。上品也。若嚼之。如沙而覺枯燥者。必係下品。又嘗見有極大者。囊徑有一寸七八分。重一兩一錢許。其麝香當是上品。近來此種已不多見。又囊中如有薄膜二三層。形如竹膜者。色如翠羽。有光澤。則膜內之麝香。亦必純良。近見囊中之麝香。往往雜有細毛或鉛子。雜鉛子者。如黑豆大。一囊有三五粒。一說。辨別之法。視其囊割下處。有無線縫。為斷有線縫者。屬本口。無則屬白毛。但此說亦不能拘定。白毛。囊扁而橢圓。大如中等之白柿。皮厚而硬。一側有白毛。較本口毛粗而多。且如將長毛剪短者。然一側無毛。皮作茶褐色。其中麝香。色紫黑。或純黑。如碎粉。無當門子。香氣甚弱。與諸藥調和。香氣立即消失。是白毛之極上品也。囊會見其尤佳者。一枚。囊之外面無毛。皮之包含處。有麻線縫合。形扁圓而大。去線視之。其中空虛。一側遍生白毛。長

三寸許。此乃翻轉有毛之皮而包者也。翻對其皮之底。則見皮裏膜。間有最上之麝香。皆小粒如當門子。色紫黑。香氣峻烈。又見一種。呼為高麗麝香。囊形如白毛。而毛長。所存麝香極少。問山。其囊與麝香之形色。一如本口。惟香氣弱而近。貓亦惡臭。不欲捕之。其香雖不似麝。而有麝香鼠之名。又瓊浦偶筆曰。長崎有異鼠。多穴。糞穢之旁。微有香似麝。以故上府署之屬。往往香襲人衣。相傳此鼠東嶺日觀嶺。便死。有中國人汪姓者。告余曰。此鼠一名臭鼠。唐山亦有之。生於陰溼糞污之地。其目不甚明。往往為人所攫。或云。見之則有喜事。柳條曰。貓亦惡其臭。而不欲捕之。是殆造物故與以臭。使為防身之具歟。一說。獵者割取麝香囊。如經兩三日。猶尚未風乾。則其氣之烈。尤勝於臭。近之不可當。即已乾者。或或過多。嗅之。且然。惟香氣漸減。倘加入他物。或放置遠處。則芬芳醜郁。誠令人愛不忍釋。或謂麝香脫氣者。掛劇中承塵上。數日。香如故。是麝香者。與蕙同性之物也。故凡食

鼠之禽獸。其所遺矢多有麝香氣。後此果捕獲鼠。定當剖其香囊。風乾試驗。究否與麝香有同一之效云。(錄明治十二年工業新報第六十六號)又和漢藥考曰。麝考云。竹內保德言。唐太鳥山中。有一種香囊。長二三寸。色黃黑。香氣如麝。囊中有毛骨。詢之土人。曰。貂鼠也。或謂是麝者。誤。按貂一名松狗。(爾雅)一名松鼠。(留青日札)此獸常食松實。(本草綱目)故其囊香。又好食華金鼠。(松浦弘說)故囊中多毛骨。詳保德所云。其香如麝。因考本草。藻疏。及日光志等所載之麝。又稱麝香者。其為貂鼠無疑。按麝香質品。如是之多。若多得。貂鼠製造。則賢於其他質品遠矣。又曰。日本及歐美各國。俱不產之。專產於東亞及中亞。如阿爾泰山脈之山中。及北緯三十度至四十度之中國。雲南。西藏等處。又曰。以化學法試驗麝香。投入沸湯。過半溶解。僅餘四分之一渣滓而已。此水溶液。遇硝酸及醋酸鉛。則生沈澱。遇昇汞。則否亦不潤濁。燒之。餘灰分百分

二十一 麝

之五六。灰作鼠白色。若雜有他物。多現褐色或黃色。灰分中主為加里。石灰。苦土。並鐵少許。又曰。相傳中國人偽造麝香。每以香鼠為混合物。此獸之應用。局部。今尚不明。茲錄宮崎柳條之說如左。長崎有物。名麝香鼠者。常宿於廚竈之砧板下。一日。為庖人捕三頭。試畜之。形同家鼠。惟目鼻與啖似鼠。目無睡。日中不明。目圓且極小。僅如粟子大。後有一穴。莫辨其吐食。蚯蚓。魚肉。或餌以米穀。長崎之東。有嶺曰日親。欲擄去。險此嶺即死。乃命工寫真。為圖。此鼠臭氣。鼠鼻。啼時尤甚。惟遠嗅之。略似麝香氣。臭入食器。立被傳染。雖屢淋。如故。啼聲似蝙蝠而大。如曰吉吉。故時陽俗謠。謂此鼠啼時必吉。不可殺之。

者最好。出隋都義陽晉溪諸蠻中者。亞之。出益州者。形扁多偽。凡真香一子。分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。今貨者又多偽。聞土人多以香豬腎偽充。考劉侗西域記。有云。黑契丹出香豬。糞爾皆香如麝氣。故有取其糞。用雜獸血膜。偽造為麝香。近又有以荔枝殼為灰。裝入真麝香皮袋中。混售。貽害不淺。凡入藥須辨真者用之。曹炳章曰。按麝為壯鹿類。而無角。其尾甚短。如山羊。吻上之稜牙。如野豬。其種大小不一。皮毛之色。生而數變。初鬻色與褐黑色。繼變紅褐。至白灰色。而老矣。全身生毛。惟吻無毛。鬣其旁。面有縱長之斑點。背多橫紋。然形狀雖笨。而腿力甚速。故獵捕甚難。腹下之臍。即名麝囊。割破其囊。即得麝香矣。其肉因香氣芬烈。土人視為美味。其囊之大小。關乎麝之年歲與強弱。產地首推西藏高山中。或喜馬拉亞山。以及雲貴等省之山內。東三省與蒙古亦產之。黃河以南。雖產似麝。其實本草所謂香狸。非麝也。羌海雜誌云。青海江拉

希拉之間。重巖複澗。產麝尤多。大抵山有香麝。必有香氣。遠聞之。香烈而略帶腥。忽隱忽現。若即若離。辟穴愈近。而其腥愈不可聞。循其氣味而尋之。百不失一。麝臍最積。常流血液。天日晴時。必仰臥於草地。而曝其臍。臍眼突出。大如鉢。腥臭異常。蚊蠅蟻蚋。飛集蝕之。臍眼突然縮入。微蟲碾如糞粉。一日數次。脂漸凝厚。此謂草頭麝。藥肆常用之品也。曾吸入蜂蝎蜈蚣毒蟲類者。臍有砂點。謂之紅頭麝。其品已高。最貴者曰蛇頭麝。毒蛇吮其臍。臍痛而力吸。跳躍狂奔。蛇身伸屈盤結。堅不可脫。須臾蛇身截然而斷。首即腐爛於內矣。臍有雙紅珠。是為蛇眼。得此配藥。其香經久不散。醫治毒症。功效無比。經仲淳云。香有三品。一曰遺香。是麝臍閉滿。自於石傍用蹄尖揮落者。為最佳。其地草木枯焦。二曰膝香。亦佳。三曰心香。被諸獸驚恐。遺落取得。見心流脾。結作一血塊。隔山間亦有香氣。此三者皆為佳品。今時以陝西哈密出者。其色黃。香味濃厚。者佳。山西五台山羊來出

一九三九

者其殼如磁膠亦佳。四川松盤山出。名蠟蟻香。皮厚有毛亦佳。雲南有一種無殼散香。色黑有磁氣者。次大抵聚於蜀之打箭爐者。名川香。聚於雲南者名雲香。陝西之蘭州者名芥州香。皆良。其形圓。香氣濃厚。歷久不散。產於張家口以外歸化城。以及內外蒙古者。名西口蠟蟻香。產於東三省聚於營口者。名東口蠟蟻香。其形皆扁。氣味微薄。而帶磁氣。略次。蓋麝香真色。乃紫紅與黑色。近世作偽者。將少許蠟蟻香。雜以多數之香料。屑末摻入。且加以相當之顏料。形似真者。彷彿。辨別真偽者。大抵鼻嗅香氣。芬烈與微薄。以香料之香。與麝香之香。顯能分別。况真者氣味不但襲人。且日久不散。偽者香不能襲人。稍久嗅之。已乏香氣。倘有試法。亦可主判真偽。以熾炭火上將香少許。彈於炭火上。真者如燃人髮。其質爆裂。奇香四溢。偽者不但無香。且質如灰。燼而爆裂。以此試之。立分真偽。麝香內結有團粒。或長扁形。外紋光滑質堅。碎之香氣逾常。印名當門子。其功力較散香勝

數倍。亦有人工造作者。亦可試之。將當門子泡滾水內。真者俟燃堅結。偽者即化開矣。和漢藥考曰。麝香偽製之品。自昔為多。業此者百計千方。苦心鑑別。正恐自誤而誤人也。已故藥劑師森島松兵衛者。與其祖俱精斯業。審察真贗。造詣最深。嘗出其多年之經驗。著為論說。演之講壇。俾藥業中人。驟獲參考之資料。茲錄其筆記如左。麝香之為用。入藥材。充香料。大抵粗劣之品。概作香品之原料。若入藥材。則物品之良窳。關係匪細。有人於此。奄奄欲斃。此時醫者處方。用麝香。龍腦。俾待其興奮之效力。得以回蘇。則藥舖之責任重大。果何如哉。此余所以不憚喋喋也。自實際上考察之一。為本口麝香。日本東京轉銷。一為薄皮麝香。亦在東京轉銷。與本口為相同之物質。惟薄皮者發育極盛。去其表皮。便無他異。一為雲南麝香。上海出口。為厚皮之物。乃一種同質異形者。一為括圓麝香。上海出口。以豬膀胱或油紙包裝。驟視之。與除去表皮之本口相仿。實則概係人工製造

品。歐美人呼此為東京產。白毛麝香。產於亞洲北部之西伯利亞。及俄國各地。出此香之獸非麝。乃犛也。如上海。高麗。烏拉港等。各口岸俱運銷之。計兩種。其一為白毛。表皮緣之一側。有硬白毛極多。其似膠之皮。內皮薄而軟。皮中充滿麝香。其一亦為白毛。又名麝香。香味與上一種相似。然有光澤。又或有當門子。品出前種之上。貴物也。其白毛又稱麝香者。囊中充滿白毛。品質粗惡。殆人造物也。要之雲南本口。薄皮。括圓四種。品物大有高下。雲南麝香。表皮與內皮之間。有線縫之。內外俱不能觸知。必割開方能見之。蓋縫於皮與皮之中心也。又有將皮之中心。仿其形狀。穿有薄而深之溝。流入泥土或鉛條者。從前囊中僅打進鉛子或鉛條。今則已不多見。此外尚有搗和酸化鉛。鐵粉並其他物質者。凡此作偽多端。均可以指探。而後知之。如皮之厚薄。重量。容積等。猶其顯然易知者也。更有一物不雜。而但使其溼潤者。按溼潤之弊有二。其一可使皮硬而薄。一若囊中麝香極多。

其二。可使重量增加。本口麝香。殆無上述諸弊。且本口與白毛。驟視之。雖易誤認。實則白毛。概有硬白毛。囊為長形。本口無白毛。外皮較圓。而且扁平。老練家一經寓目。便可斷定。其孰為劣品。孰為佳品。大抵皮多而麝香少者。約如雲南之半價。薄皮麝香。如雲南麝香之縫法。所異者。內尚有同質之皮。將麝香糊封其中。麝香之品位。在中上部。與下部之間。至括圓。則不問優劣。要皆係人造之麝香。外以豬膀胱或油紙包裝。粗劣愈甚。以刀割開其囊。往往有小蟲走出。狀似蠅而極細。以上諸種。有發異臭者。有作屎臭者。有於夏秋間。易流動者。有皮質非常肥厚。如海綿者。有皮薄而麝香實少。即老練家亦為所蒙者。要須視麝香之品位。與其多少。而定其貴賤耳。十年前學術膚淺。曾以麝香試驗。費至半兩之多。當時所得成績。頗為可觀。今已散失。無存。姑舉能記憶者如下。顯微鏡檢查所得最良之品。於黑褐色。不整齊如岩之處。每見有黃色或帶黃褐色。流動如樹脂之斑點。斑點

少者。品質必惡。或有偽造之疑。因如雜有澱粉類。或草根木皮之粉末等物。在顯微鏡下。一覽即可分明也。試藥溶解量。用伊打石油。伊打。偏陣酒精。稀酸類溶解。解。香。百分中。能溶解八分九至十八分。水溶解量。最良之品。可溶解百分之五十至六十。惡此。鑑別。精粗。最爲便利。灰分量。最良之麝香。亦多雜鎂。鎂。水。銀。珠。並其他金屬。若粗劣之品。金屑極微。至多不過在百分之三以上。此即可斷爲人工偽造物。質品。攪和之狀況。有屎臭。或異臭者。或祇攪皮粉。或加最良之麝香。使之適度。此等偽造物品。欲其色澤。適真。則以砂研和。或細碎。紫檀木屑。拌入。蓋紫檀木理。極密。既可加重。且現紅色。乃有益無害之品也。亦有攪和動物性細粉者。最多即用麝香皮。細到。炒爲粉末。或即用白毛皮。或鹿鞭。皮製之。誠匪夷所思矣。張澤霖曰。麝之性味。辛溫。寒症用以配合。固無妨礙。設熱症而純用一味。或配辛燥之品。則非但無益。而且有害。必也以其他涼性參合。如紫雪。牛黃之屬。

二十一 麝

庶乎無虞。考。麝。古書言其形狀甚多。特錄數則於下。說文云。『如小麝。麝有香。一名射父。』爾雅釋獸。則『麝父。麝足。』字林曰。『小。鹿有香。其足似麝。故云麝足。』字彙註。『獸如小麝。身有虎豹之文。麝有香。爲人所迫。即自投高巖。舉爪別出其香。就繁且死。猶拱四足保其臍。故象退齒。鹿退角。麝退香。皆輻掩覆。知其珍也。』今人以其價貴。每用。質品。混充。以香。豬。腎。囊。一個。攪和。辛。夷。荔。枝。核。等。末。辨別之法。『一。嗅其香氣。真者氣味。麝人。日。久不散。偽者不但不能。麝人。且。嗅之。稍久。而香氣已散。二。以火試之。真者彈於火上。如。燃。人。髮。奇。香。四溢。其質。燥。烈。偽者非。惟。無。香。更。且。如。同。灰。燼。亦。不。燥。烈。』

近人學說。鄭訓曰。中國麝香。爲各種麝香冠。以雲南產者爲尤佳。香氣佳良。其氣極烈。毫無尿臭。及阿姆尼亞臭氣。而有永留不散之特性。囊成圓形。接連腹筋之面。平坦無毛。外成凸面。有粗硬之毛。中央開口處。有微褐色旋結之毛。囊之本身。乃由二種筋皮及三層薄膜組成。中含褐色麝香。大如櫻桃。或豌豆樣。質極易破碎。白毛。麝香。產於蒙古及西伯利亞。經中國輸入。日本。經俄國輸入。歐洲。西人曰。西伯利亞麝香。或加排兒地麝香。Moschus Sibiricus S. Cap. arcticus。此品非採於麝。乃採自獐。白毛。非圓形。乃略橢圓形。二面之毛。帶白色。周邊之毛。類褐色。其內部麝香。柔。韌。帶。有。尿。臭。及。阿。姆。尼。亞。性。臭。氣。不。及。中。國。麝。香。遠。矣。東。京。麝。香。乃。在。日。本。販。賣。日。本。人。曰。日。本。麝。香。西。人。曰。東。京。麝。香。恐。即。西。藏。麝。香。經。中。國。輸。入。日。本。者。此。麝。囊。圓。形。或。略。橢。圓。形。其。上。而。向。中。央。微。伏。成。穹。隆。狀。下。面。平。坦。帶。類。黃。色。之。毛。邊。周。着。白。色。剛。強。之。毛。大。抵。帶。溼。氣。有。黏。着。性。其。內。部。麝。香。常。柔。韌。呈。膠。膏。樣。間。有。顆。粒。狀。者。香。氣。佳。良。略。帶。阿。姆。尼。亞。性。臭。氣。偏。加。兒。麝。香。外。觀。類。類。中。國。產。者。麝。囊。較。大。毛。棕。紅。色。香。氣。薄。弱。類。西。伯。利。亞。產。者。波。拉。哈。產。麝。香。乃。採。自。野。香。鼠。之。腺。名。爲。美。國。產。麝。香。亦。有。人。販。賣。之。但。用。途。不。廣。模。造。麝。香。貼。附。獸。毛。巧。伎。

麝囊。充入乾固血液土塊。而略加真正麝香若干。或加阿姆尼亞共研。之。或。真。正。麝。囊。取。出。麝。香。後。充。入。土。塊。乾。固。血。液。獸。糞。及。熟。麥。之。小。豆。末。等。此。外。尚。加。入。麝。塊。以。增。加。重。量。再。縫。合。破。口。出。售。於。市。此。等。質。品。亦。往。往。發。見。購。者。不。可。不。慎。人。工。麝。香。通。名。曰。托。苦。阿。兒。Fouquier。化學上稱之曰三硝基布體兒托兒阿兒。Tri-nitro-phenylol C₆H₃NO₂。乃波爾氏所發明。其法先添加哥羅兒阿兒密尼姆。An. C₆H₅。於第三級哥羅兒布體兒。O₂C₆H₃CO₂。使托兒托兒阿兒。C₆H₄CO₂作用之。則生成布體兒托兒阿兒。而後徐徐注入硝酸。比重一·五。一分及發烟硫酸。二分所成混合液。五倍量中。八乃至十時間水浴上加熱。由此生成三硝基布體兒托兒阿兒。注入水中析出。更加酒精結晶。精製之。此乃類黃色針狀結晶。遇九十六乃至九十七度之溫熔融。大有麝香之香氣。如溶解於酒精。加少量阿姆尼亞。其香氣更著。製造化糞。

品多食其廉而用之。惟此品由種
種物質消失或變化其香氣。醫藥
用質難代天然麝香也。

配合應用 ①治心氣虛怯。驚
邪癩癩。或夢寐紛紜。鬼交鬼疰。及
小兒急驚。大人中惡等證。用麝香
犀角。牛黃。琥珀。龍齒。遠志。丹砂。鉛
丹。金箔。菖蒲。真珠。茯神。天竺黃。

②傳一切癰疽疔腫有神。用麝
香。白及。白斂。紅白藥子。雄黃。烏雞
骨。煨乳香。沒藥。冰片為末。

③治中風不省。麝香二錢。研末。
入清油二兩。和勻灑之。其人自甦
也。(濟生方)

④治中惡客忤。項強欲死。麝香
少許。乳汁塗兒口中取效。醋調亦
可。(廣利方)

⑤治小兒驚啼。發歇不定。真麝
香一字。清水調服。日三。(廣利方)

⑥治小兒中水。單以麝香如大
豆三枚。奶汁調分三四服。

⑦治破傷風水。海腫痛不可忍。
麝香末一字。納疔中。出盡膿水便
效。(普濟方)

⑧治中惡蠱亂。麝香一錢。醋半
匙調服。(聖惠方)

①治諸果成積。傷脾作脹氣急。
用麝香一錢。生桂末一兩。飯和丸。
菘豆大。大人十五丸。小兒七丸。白
湯下。蓋水得麝則落。水得桂即枯
故也。(濟生方)

②治消渴飲水。因飲酒或食果
實過度。雖能食而口渴飲水數尿
以麝香當門子。酒和作十餘丸。枳
椇子煎湯送下。蓋麝香敗酒壞果
枳椇亦敗酒也。(濟生方)

③治偏正頭痛久不除者。晴明
時將髮分開。用麝香五分。皂角末
一錢。薄紙裹。置患處。以布包炒鹽
於上熨之。冷則易。如此數次。永不
再發。(簡便單方)

④治五種蠱毒。麝香。雄黃等分
為末。以生羊肝如指大。以刀割開。
裹藥吞之。(衛生方)

⑤治口內肉卷。有根如線。五寸
餘。如釵股。吐出乃能食物。捻之則
痛徹心者。麝香一錢。研水服之。日
三自消。(夏子益奇疾方)

⑥催生易產。麝香一錢。水研服
立下。(續千金方) 濟生。勝金散。治
人弱難產。麝香一錢。豆豉一兩。以
舊青布裹之。燒紅為末。以秤錘淬

酒服二錢即下。郭稽中云。婦人產
難及橫逆生者。乃兒枕破而敗血
裹子。服勝金散。逐其敗血自生也。
⑦治死胎不下。麝香當門子一
枚。桂心末二錢。溫酒服即下。(本
事方)

⑧治痔瘡腫毒。麝香當門子。印
城鹽等分塗之。不過三次。(外臺
祕要方)

⑨治鼠咬成瘡。用麝香封之妙。
(經驗方)

⑩治蠶咬成瘡。蜜調麝香傳之。
(廣利方)

⑪治山嵐瘴氣。水服麝香三分
解之。(集簡方)

⑫治蟲牙作痛。香油抹筋頭。蘸
麝香末。綿裹炙熱咬之。換二三次。
其蟲即死。斷根甚妙。(醫方摘要
方)

⑬五臟之風。不可入麝香。以滌衛
氣。口鼻出血。乃陰盛陽虛。有升無
降。當補陽抑陰。不可用麝。輕揚
飛竄之物。婦人以血為主。凡血海
虛而寒熱盜汗者。宜補養之。不可
用麝香之散。琥珀之燥。(朱震亨)

⑭中風不省者。以麝香清油灑之。
先通其關。則後免語蹇癱瘓之虞。
而他藥亦有效也。(嚴用和) ⑮嚴
氏言風。風必先用麝香。而丹溪謂
風病血病必不可用。皆非通論。蓋
麝香走竄。能通諸竅之不利。開經
絡之壅遏。若諸風諸氣。諸血諸痛。
驚癇癡瘖諸病。經絡壅閉。孔竅不
利者。安得不用為引導以開之通
之耶。非不可用也。但不可過耳。濟
生方治食瓜果成積作脹者用之。

⑯治飲酒成消渴者用之。云果得麝
則環。酒得麝則敗。此得用麝之理
者也。(李時珍) ⑰麝香不可近鼻。
有白蟲入鼻患癩。久帶其香透關
令人成異疾。(李廷飛) ⑱麝生中
壺山谷。及益州雅州山中。春分取
香。生者益良。(別錄) ⑲麝形似鼯
而小。黑色。常食柏葉。又啖蛇。其香
正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

空治 明目悅顏。開心益智。壯筋骨補腦髓。烏鬚黑髮。

參攷資料 有孫公者。年九十。強健如四五十歲人。自言生平惟服響豆。每歲槐子將熟時。輒令人守之。不令鳥雀啄落。既成。即收作二枕。夜聽其有聲者。即響豆也。因棄其餘。如是數月。而得響豆所在。每樹不過一枚。每歲不過服一粒。如是者數十年。無他術。(趙學敏)

顏氏家訓。庚肩吾常服槐實。年七十餘。目看細字。鬚髮猶黑。抱朴子云。槐子服之。令人補腦髮。不自而長生。殆即此歟。(趙學敏)

響豆者。槐實之夜中爆響者也。一樹祇一顆。不可辨識。其法槐始花時。即以絲網罩樹上。防鳥啄食。結子熟後。多縫布囊貯之。夜以爲枕。聽無聲者。即棄去。如是選枕。必有一囊作爆聲者。取此一囊。又多分小囊貯之。枕聽如初。得一響者。則又分二枕。如是漸分至僅存二顆。再分枕之。則響豆得矣。(紀曉嵐)

【蟻槐】即苦參之古籍別名。典見本經。詳「苦參」條。

【鱧魚】原名 鱧魚。命名 酒之美者曰鱧。魚之美者曰鱧。鱧魚好羣行。相與相連。故名。

古籍別名 白色者名白鱧。紅色者名紅鱧。(動物學大辭典)

外國名詞 Hypophthalmichthys moritrix C. & V (拉丁)

基本 係脊椎動物魚類喉類之鱧魚。

產地 生池澤淡水水中。

形態 鱧魚爲鱗類魚屬之一種。其形似鱧。頭小鱗細。口亦小。體側扁。脊骨兩節亦不大。尾節分叉。背青黑。腹白色。大者體長三四尺。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 溫中益氣。多食令人熱中發渴。又發瘡疥。

【鱧】即勒魚之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「鱧魚」條。

【鱧魚】命名 本品狀如條。故名。

古籍別名 白鱧。鱧魚。鱧魚。鱧魚。(本草綱目)

條魚。(本草綱目)

基本 係脊椎動物魚類喉類之鱧魚。

產地 生江湖淡水中。

形態 鱧魚爲鱗類魚屬之一種。其體狹長。側扁而薄。大者長尺許。狀如柳葉。頭小下顎比上顎稍長。肩微隆起。尾節分叉。鱗細。整而潔白。背色淡黑。微青。性好羣游。水面。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 煮食解癆瘦。胃止冷瀉。

【鱧魚】即鱧魚。詳該條。

【鱧鱧】命名 本品有雄無雌。以影漫於鱧魚。則其子皆附於鱧。善而生。故名。

處方用名 鱧鱧魚。鱧鱧肉。

古籍別名 白鱧。蛇魚。漫黎。金絲鱧。乾者名風鱧。(綱目)

外國名詞 Anguilla japonica Lesq. A. rostrata (拉丁)

基本 係水族動物。爲無鱗魚類之鱧鱧。

產地 凡溪澗湖澤之淡水中恒有出。

恒有出。

形態 鱧鱧體長爲圓柱形。皮膚甚厚。有膠質之黏液。鱗柔順。細不可辨。大者長至三尺。體色隨居處而異。有蒼黑茶褐等色。腹純白。味濃美。含有滋養料甚富。其肉可供藥用。脊骨血等。各詳該條。



鱧 鱧

用法 恒以水煮調入五味供食。其入藥用。炙研爲末。或以燒薰。

性質 甘平有毒。

效能 補虛羸。治瘡癢。用作祛風殺蟲藥。

主治 五痔瘡癢。殺諸蟲。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鱧鱧曰。淋瀝脚氣。腰腎間溼。風痺。常如水洗。以五味煮食。甚補益。患諸瘡癢。癩癩風人。宜是食之。【宋】日華諸家本草論鱧鱧曰。治惡瘡。女人陰瘡。蟲痔。治傳尸疰氣。勞損。暖肢膝。起陽。【明】李時

時

珍本草綱目論殺鱧曰治小兒疳勞及蟲心痛。【明】樞希羅本草經疏論鱧曰鱧魚味甘其氣寒其形類蛇常與水蛇同穴故其性有小毒甘寒而善能殺蟲故骨蒸勞瘵及五痔瘡癢入常食之有大益也。燒烟辟蚊。燕屋舍竹木斷蛀蟲。置骨於衣箱中斷蠹其殺諸蟲之驗可證矣。腹下有黑斑背上有白點者毒甚不可食。重三四斤及水行昂頭者不可食。妊娠食之令胎有疾。脾胃薄弱易泄者勿食。

配合應用 ①治諸蟲心痛多吐清水。鱧魚淡煮飽食三五度即差。(外臺秘要方)

②治骨蒸勞瘵。用鱧鰾二斤。治淨酒二盞。煮熱入鹽醋食之。亦治腸風下蟲。(聖惠方)

③治一切惡瘡。用蛇魚骨炙為末。入諸色膏藥中貼之。外以紙護之。(經驗方)

施用宜忌 凡有濕熱時病者禁用。

參攷資料 ①婦人帶下。療一切風毒如蟲行。又歷諸草石藥毒不能為害。(張鼎) ②鱧鰾所主諸

二十一畫 鰻 鱧 鱖 鱉

病。其功專在殺蟲去風耳。與蛇同類。故主治近之。稽神錄云。有人病瘵。相傳死者數人。取病者置棺中。棄於江以絕害。流至金山。漁人引起開視。乃一女子發活。取置漁舍。每以鱧鰾食之。遂愈。因為漁人之妻。張鼎云。燒烟熏蚊。令化為水。燕氈及屋舍竹木斷蛀蟲。置骨於衣箱斷諸蠹。觀此則別錄所謂能殺諸蟲之說。益可證矣。(李時珍)

③欲州溪潭中出一種。其背有五色文者。頭似蠖蛇。入藥最勝。江河中難得五色者。孟詵云。鱧鰾其狀如蛇背。有肉鬣連尾。無鱗。有舌。腹白。大者長數尺。脂膏最多。背有黃脈者。名金絲鱧。此魚善穿深穴。非若蛟蜃之攻岸也。或云。鮎亦產鰻。或云。鰻與蛇通。(李時珍)

④腹下有黑斑者。毒甚。與銀杏同食。患瘵風。(吳瑞) ⑤小者可食。重四五斤及水行昂頭者不可食。皆見舟人食之。七日皆死。(汪機)

【鰻鱧血】 主治 瘡疹入眼生翳。以少許點之。

【鰻鱧骨及頭】 主治 疔疔疔疔。入藥治疔疔。

腸風崩帶。燒灰敷惡瘡。燒熏痔瘻。殺諸蟲。

【鰻鰾魚】 即鰻鰾之處方用名。詳【鰻鰾】條。

【鰻鰾膏】 主治 諸瘡癩。歷代記述攷證。

【唐】蘇恭新修本草論鰻鰾膏曰。耳中蟲痛。【宋】寇宗奭本草衍義論鰻鰾膏曰。曝乾微炙。取油塗白。取風。即時色轉。五七度便差。

參攷資料 白駁生頭面上。浸淫漸長似癬者。刮令燥痛。炙熱。脂擦之。不過三度即差。(集驗方)

【鰻魚】 即泥鰻之古籍別名。典見爾雅。詳【泥鰻】條。

【鮎魚】 即鮎魚之古籍別名。典見綱目。詳【鮎魚】條。

【鰻】 原名 鱖鱖。命名 本品乃諸魚之白。浮。中空如泡。即魚白也。其所謂鱖者。昔漢武逐夷至海上。見漁人造魚腸於坑中。取而食之。遂因逐夷而得此名。

性質 甘。平。無毒。

主治 竹木入肉。經久不出者。取白傳瘡上。四邊肉爛即出。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論鱧曰。燒灰。傳陰瘡。瘡。月蝕瘡。【明】李時珍本草綱目論鱧曰。止折傷。血出不止。

參攷資料 沈括筆談云。鱧鱖烏賊魚腸也。孫愐唐韻云。鱧魚腸也。南史云。齊明帝嗜鱧。以蜜漬之。一食數升。觀此則鱧與腸皆得稱鱧矣。(李時珍)

【鱧膠】 基本 本品即以諸魚之鱧所作之膠。

古醫別名 魚膠。鱧膠。(綱目)

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 燒存性。治婦人產難。產後風搖。破傷風。瘧。止嘔。血散。瘀血。消腫毒。伏砂。

參攷資料 ①魚膠膠同沙苑。莢。藥服之。種子。蓋取其精血黏聚。不致疎泄也。其能治難產及散瘀消腫。或者魚得天一之氣。為先。而膠為水化之附。用以調陰中之氣。化有殊功歟。(本草述鈞元) ②諸鱧皆可以為膠。而海鱧多以石首鱧作之名。江鱧謂江魚之鱧也。黏物甚固。此乃工匠日用之物。而記籍多略之。今人以鱧糞凍作膏。切

片。以置醋食之。呼為魚膏者是也。

【鱧魚】

即海豚魚之古籍別名。典見綱目。詳「海豚魚」條。

【鱮魚】

即鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱧魚」條。

【鱠魚】

即河豚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「河豚」條。

【鱧魚】

即青魚之古籍別名。典見綱目。詳「青魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

食。別無功用。(陳藏器)鰻魚肉多食動風熱。發瘡疥。(李時珍)

【鰻魚】

即鰻魚之原名。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

主治 解嶺南野葛菌子毒。生金毒及溫瘧久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生搗汁服最良。

【鰻魚】

即鰻魚之原名。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

主治 塗手皸瘡。令不龜裂。

【鰻魚】

即鰻魚之原名。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】

之性。其黏液素之性質。尚不十分明瞭。似與纖維素及『阿拉敏』(阿拉伯樹膠之成分)有關。名之爲『巴魯阿拉敏』(Baranin)其含量約爲三〇%。黏液素究有顯效功與否。殊不敢必。假若有此功效。則如加拉健與寒天藻(涼菜)或亦有同一價值云。中外醫事新報載有田中醫士言。海人草含有名『格拉紐姆』植物鹽基。但慶松藥學士則云。不能因此卽認爲有機化合物云。和漢三才圖會曰。海人草生琉球海邊。多出於薩州。販於四方。黃色微黯。長一二寸。有歧。無根。莖而有微毛。茸。輕虛味甘微鹹。能消胎毒。(浸水一夜去土砂)小兒初生。三日中先用海人草。甘草二味。(或加落根)包烏浸湯令飲之。呼曰甜物。此方不知始於何時。本朝通俗必要之藥也。小兒吞之。卽吐涎沫。謂之吐穢汁。可以去腸上胎毒。

二十二畫 鷓鴣菜

二錢。蒲黃。大黃各三分。苦楝皮二分。上爲末。糊丸。煎服亦可。鷓鴣菜湯。治腸胃中蟲。(方同上)鷓鴣菜二錢。半。蒲黃五分。甘草二分。上水煎服。鷓鴣湯。俗呼『麻久里』(按鷓鴣菜。日俗稱麻久里)云。可下初生兒胎毒。(方同上)甘草十兩。積四錢。黃連二錢。海人草四錢。將軍四錢。上方若女子。則加紅花四錢。

參攷資料 鷓鴣菜生海石上。色微黑。連江志。鷓鴣菜散。碎花。微黑。出漳浦。(漳州府志)鷓鴣。卽鷓之古籍別名。典見綱目。詳『鷓』條。

【藥】 命名 鷓喜文章。故字從章。而性鷓。故名。古籍別名 鷓。牡者名鷓。牙。白毛者名銀鷓。化者名鷓。子名。大者名鷓。(綱目)

外國名詞 Moschus chinii. 100.

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。有蹄類。反芻偶蹄類。野科之屬。

產地 山野。破澤。及淺草叢中。

二十三畫 麝

有之。

形態 麝爲獸類。屬之一種。形似鹿。體較小。頭無角。雄者有牙。出口外。卽名牙。鬃。色黃黑。大者重二三十斤。秋冬居山。春夏居澤。四肢善馳。其皮細軟。勝於鹿皮。夏月毛毳而皮厚。冬月毛多而皮薄。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 補益五臟。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論。麝肉曰。益氣力。悅澤人面。【明】寧原食鑑本草論。麝肉曰。釀酒。又有祛風之功。

參攷資料 八月至十一月食之。勝羊。十二月至七月食之。動氣。多食令人消渴。苦瘦。惡者食之。發病疾。不可合鷓肉食。成瘕疾。又不可合梅李蝦食。病人(孟詵)俗云。白肉是麝。其膽白。易爲怖也。(陶弘景)

【藥骨】 性質 甘。微溫。無毒。主治 虛損。洩精。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論。麝骨曰。益精。悅顏色。參攷資料 千金治產後虛損。

一九四七

有壁骨湯。煮汁煎藥。(李時珍)

【壁髓及腦】 主治 益氣力。悅澤人面。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論。壁髓及腦曰。治虛風。參攷資料 千金治暗風之藥。預煎及治虛損之天門冬煎。並用之。(李時珍)唐方有壁髓與壁骨酒。並補下(蘇頌)

【壁腦】 卽壁蝮之古籍別名。典見詩經。詳『蝮蛇』條。

【壁鼠】 卽黃鼠之古籍別名。典見綱目。詳『黃鼠』條。

【壁鼠】 卽鼯鼠。詳『鼯鼠』條。

【壁鼠】 卽鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼯鼠』條。

二十三畫

【壁苔】 卽石耳之日本名。詳『石耳』條。

【壁香】 俗名 水碱。基本 巖洞壁上。有泉滴下。年久。其流水處。有水結。卽是壁香。

性質 寒。無毒。

主治 敷湯火傷。金瘡出血。用

水碱火燉醋滓。研末。同白果肉水浸搗汁。和服七分。可治白濁。亦入眼科用。

辨偽 以色白如鴛灰。置手中冷入骨者真。

【巖茸】即石耳之日本名。詳『石耳』條。

【巖蜜】即蜂蜜之古籍別名。典見綱目。詳『蜂蜜』條。

【欖枝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【欖茶】 參攷資料 范石湖集。脩江出欖茶。蓋石楠樹葉也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊桐汁作飯。則必採石楠芽作茶。乃能去風。

（趙恕軒） 主治 頭痛。

【藥荊】 古籍別名 頑荊。（圖經）

形態 藥荊為灌木類荊之一種。枝莖白色。葉圓青色。似榆葉而長。冬夏不凋。夏開紫白色之花。結實如大麻。其子可供藥用。

採取 八月採之。

性質 辛苦。溫。有小毒。

主治 大風。頭面手足諸風。癩

癩狂瘧。溼痺寒冷疼痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論藥荊子曰。四肢不遂。通血脈。明目益精光。【宋】蘇頌圖經本草論藥荊子曰。合柏油同熬。塗人畜瘡疥。

施用宜忌 惡石膏。次明為之使。

外國名詞 Koolhou.

【藥華】 forla paniculata, Lemn. (拉丁)モクゲンジ(日本)

基本 係無患子科藥樹屬。為藥樹之花。

產地 生山野間園圃亦或有之。

形態 藥樹為喬木類之一種。高丈餘。葉為奇數羽狀複葉。小葉卵形。有不整齊之缺刻。及重覆之齒牙而互生。狀如木槿葉而薄。上面平滑。下面有毛。夏開圓錐狀花序。花小黃色。似槐花而稍長。中心雜以紅色。結實實之子殼似酸漿子。實如熟豌豆。圓黑堅硬。可為數珠。其花可供藥用。

採取 五月六月間採收之。

主治 目痛淚出。傷骨。消目腫。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論藥花曰。合黃連作煎。療目赤爛。

【粟米】即粟芽之原名。詳『粟芽』條。

【穀芽】即穀芽之原名。詳『穀芽』條。

基本 本品為雜草類之一種。

主治 腎臟虛冷。氣攻臍腹痛。同硝砂。生烏頭。共研成末。將沙羅燒赤。傾入內煨之。不蓋罐口。至爐冷取出。再同烏頭末蒸餅為丸。如梧子大。醋湯送服。

【藟香】即大茴香之原名。詳『大茴香』條。

【杜衡】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【鼠李子】即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【白芷】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【薺蕪】(別錄)薺蕪(爾雅) 薺蕪。江應。

外國名詞 (Onioselinum univittatum, Turcz. (拉丁)七

ンキウ(日本)

基本 係織形科薺蕪屬。為薺蕪之葉莖。

性質 辛苦。無毒。

主治 咳逆。定驚氣。辟邪惡。除蟲毒。鬼疰。去三蟲。久服通神。(本經) 主身中老風。頭中久風。風眩。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薺蕪曰。作飲。止瀉瀉。

參攷資料 薺蕪一作薺蕪。其莖葉靡弱而繁蕪。故以名之。當歸名薺。白芷名薺。其葉似當歸。其香似白芷。故有薺蕪江薺之名。王逸云。薺草生江中。故曰江薺是也。(李時珍) 薺蕪葉名薺蕪。又曰薺蕪。一名江薺。薺蕪苗也。生雍州川澤及宛旬。四月五月採葉曝乾。(別錄) 今出歷陽處。人家多種之。葉似蛇牀而香。人借以為醫方藥。稀用。(陶弘景) 此有二種。一種似芹菜。一種似蛇牀。香氣相似。用亦不殊。(蘇恭) 別錄薺蕪一名江薺。薺蕪苗也。而司馬相如子虛賦。稱薺蕪為薺。江薺。薺

薺蕪一名江薺。薺蕪苗也。而司馬相如子虛賦。稱薺蕪為薺。江薺。薺

薺蕪一名江薺。薺蕪苗也。而司馬相如子虛賦。稱薺蕪為薺。江薺。薺

蘇，上林賦云。被以江蓠，揉以醴蕪。似非一物何耶。蓋椒苗未結根時，則爲醴蕪。既結根後，乃爲芎藭。大葉似芹者，爲江蓠。細葉似蛇牀者，爲醴蕪。如此分別自明矣。淮南子云：亂人者若芎藭之與蕪。本蛇牀之與醴蕪，亦指細葉者言也。廣志云：醴蕪香草，可藏衣中。管子云：五沃之土生醴蕪。郭璞贊云：醴蕪香草，亂之蛇牀，不損其真，自裂以芳。又海中芎藭，亦名江蓠，與此同名耳。（李時珍）

【藤蕪花】

主治 入面脂用。

【蕪蕪】即干歲蕪之古籍別名。與見別錄。詳「干歲蕪」條。
 【羅白子】即萊菔子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「萊菔子」條。
 【蘿爬子】即萊菔子之古籍別名。與見和漢藥考。詳「萊菔子」條。
 【藟藟】即藟藟之古籍別名。與見爾雅。詳「藟藟」條。
 【羅藟】即萊菔之古籍別名。與見爾雅。詳「萊菔」條。
 【羅藟三七】即早三七之別名。與見百草鏡。詳「早三七」條。

二十三畫 藤 蘿 蘿

【蘿藦】 原名 研合子。

軍士金匱。故名研合子。又其實嫩時有漿，裂時如瓢。故有雀瓢羊婆奶之稱。每一子有一條白絨。長二寸許。故俗呼婆娑鏡線包。及婆娑鏡袋兒等名。

古籍別名 蕪。荒蘭。（詩疏）白瓊簾（拾遺）實名雀瓢（詩疏）研合子（拾遺）羊婆奶（綱目）婆娑鏡線包（俗名）苦丸雞腸（和漢藥考）薰桑（陳藏器）

外國名詞 牧野富太郎氏定 藥學名爲 *Moeplepis japonica*, Makino
 基本 係屬蘿藦科蘿藦之種子及白絨。

產地 山野間多產之。
 形態 蘿藦爲山野自生之多。年生蔓草。春日從舊根生苗。纏繞他物而生。長葉爲長心臟形。纏而厚。有光澤。大者四寸許。傷葉莖則流出白汁。夏於葉腋生穗一二寸。叢生五瓣小花。花冠外面白色。內面淡紫色。中有白茸。花後結長圓形長三四寸之顆果。殼青紫色。

懸輓挑起。成熟則作舟狀。縱裂。中有似絹絲光澤之白絨。作針狀。長寸許。其針之根。附有一子。遇風立即飛散。



蘿 藦

種類 研合子。即蘿藦子也。有一種莖葉及花。皆似蘿藦。但氣臭根紫。結子圓大如豆。生青熟赤。爲異。此則蘇恭所謂女青似蘿藦。陳藏器所謂二物相似者也。蘇恭謂女青。葉似蘿藦。兩葉相對。子似瓊形。大如棗許。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。生平澤。別錄云。葉嫩時似蘿藦。圓端大莖。實黑。

種植 亦有植於園圃爲雜者。

採取 有採其葉。有收其子。

性質 甘辛溫無毒。

效能 種子用作強壯藥。絨用作止血藥。

主治 虛勞。補益精氣。強陰道。葉煮食。功同子。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論蘿藦曰。搗子傳金瘡。生肌止血。搗葉傳腫毒。【明】李時珍本草綱目論蘿藦曰。取汁傳丹毒赤腫。及蛇蟲毒。即消蜘蛛傷。頓治不愈者。搗封二三度。能爛絲。毒即化作膿也。

配合應用 治一切創傷。採實內棉貼之。則止血。

治蜘蛛咬傷。搗汁塗之。

治蛇咬。搗汁塗之。

用量 一錢至三錢。

著名方劑 蘿藦散。補益虛損。極益房勞。千金方。枸杞根皮。五味子。柏子仁。酸棗仁。乾地黃。各三兩。上共研末。每服方寸。酒化下。日三服。

參攷資料 蘿藦作藤。生搗之。有白乳汁。人家多種之。葉厚而大。可生啖。亦可蒸煮食之。詩云。去家千里。勿食蘿藦。枸杞。言其補益精氣。強盛陰道。與枸杞葉同也。（陶弘景）

蘿藦一名荒蘭。幽州謂之雀瓢。然雀瓢是女青別名也。

蘿藦葉似女青。故亦名雀瓢。（蘇恭）

蘿藦東人呼爲白瓊簾。生籬落間。折之有白汁。一名雀瓢。其

供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 暖胃和中。

參攷資料 鱈魚多食動風熱。

發疥癩(李時珍)

【鱈魚】

命名 本品腹黃。故世有黃鱈之稱。

處方用名 鱈魚肉。鱈魚血。

古籍別名 黃鮓。黃鱈。鱈魚。(綱目)

基本 係水族動物無鱗類。為鱈魚之肉。

產地 凡水岸泥窟中恒有出。形態 鱈魚形似鱈而細長。

亦似蛇而無鱗。體赤褐或背黃。多涎沫。長二三尺。頭部下有鰓孔二。腹中有肺。或謂之氣囊。其肉血等可供藥用。

性質 甘大溫。無毒。

效能 祛風溼。補虛羸。用作緩

和強壯藥。又為中風溼痺藥。

主治 補中益血。療瘡辱。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論鱈魚曰。補虛損。療婦人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦。止血。除腹中冷氣。腸鳴。及溼痺氣。

二十三畫 鱈

【唐】孟詵食療本草論鱈魚曰。補五臟。逐十二風邪。患溼風惡氣人

作腫。空腹飽食。暖臥取汗。出如膠。從腰脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴之。避風。三五日一作甚妙。【元】朱丹溪本草衍義補遺論鱈魚曰。善

補氣。婦人產後宜食。【明】李時珍本草綱目論鱈魚曰。專貼一切冷

漏痔瘻。腫疔引蟲。【明】釋希雅本草經疏論鱈魚曰。鱈魚味甘氣大

溫。甘溫具足。所以能補中益血。甘溫能通經脈。療風邪。故又主療溼

唇及今人用之以治口眼喎斜也。【清】黃宮繙本草求真論鱈魚曰。

鱈魚稟土陽氣以生。性善穿穴。力堅而銳。無足能竄。與蛇同性。故書

皆載通經達絡。能治十二經風邪。並耳目諸竅之病。如風中血脈。口

眼喎斜。用尾血同磨少許。右喎塗左。左喎塗右。止即洗去。耳痛鼻衄。

痘後目翳。用血滴點即愈。膿疥疔爛。用鱈打死。香油抹腹。繫於瘡上。

候痛取下。看鱈有蟲上入即去。產後惡露。淋漓腸鳴。溼痺。用此煮食。

即除。老人虛痢不止。用此燥乾。煨灰存性。調服即絕。且能通力壯筋。

故大力丸取此同煨筋。虎骨。當歸。人參等分以進。腸道不長。不能續

嗣。用此血同蛤蚧等藥以入。皆以借其性力相助。但此味甘性熱。其力能補。若病屬虛熱及時行病後

陰虛火燥。食則必有氣弱動風與氣之變。不可不慎。【清】王士雄隨

息居飲食譜論鱈魚曰。經甘熱。補虛助力。善去風寒溼痺。通血脈。利

筋骨。治產後虛羸。愈膿疥痔瘻。肥大腹黃者勝。宜與豬脂同煨。多食

動風發疥。患蠶亂損人時病前後。癩瘡腫滿諸病均大忌。黑者有毒。

更有蛇變者。項下有白點。夜以火照之。則通身浮水上。或過大者皆

有毒。不可不慎也。其血塗口眼喎斜。赤遊風。滴鼻止。腫滴目治疹後

生翳。配合應用 ●與黃耆同食。能益氣力。

●治火丹赤腫。生鱈血塗之效。●膿疥疔爛。用黃鱈魚數條打

死。香油抹腹。鱈上繫定。頃刻痛不可忍。然後取下。看腹有針眼。皆

蟲也。未盡更作。後以人脛骨灰油調搽之。(奇效方)

參攷資料 ●鱈魚。黑者有毒。(孫思邈) ●鱈魚。性熱能補。時行

病後食之多復。(陶弘景) ●鱈魚。動風氣。多食令人蠶亂。曾見一耶

宜。食此吐利變死也。(寇宗奭) ●鱈魚。黃質黑章。體多涎沫。大者長

二三尺。夏出冬蟄。二種蛇變者名蛇鱈。有毒害人。南人鱈鱈中。以

缸貯水畜數百頭。夜以燈照之。其蛇化者。項下必有白點。通身浮水

上。即棄之。或以蒜瓣投缸中。則鱈鱈跳不已。亦物性相制也。(李

時珍) ●鱈魚。作鱈當重煮之。不可用藥柴。亦蛇類也。(陳藏器)

【鱈魚皮】 主治 婦人乳核硬痛。燒灰。空心溫酒服。

【鱈魚肉】 即鱈魚之處方用名。詳【鱈魚】條。

【鱈魚血】 採取 在尾上取之。主治 塗瘡及癩。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鱈魚血曰。療口眼喎

斜。同磨香少許。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。治耳痛。滴數點入耳。治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生腎

點少許入目。治赤疵。同蒜汁墨汁

類後之又塗赤遊風。

【鱒魚頭】 採取 五月五日採收之。

性質 甘平無毒。

主治 燒服止痢。主治渴。去冷氣。除痞。食不消。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鱒魚頭曰。同蛇頭。地龍頭。燒灰酒服。治小腸癰有效。百蟲入耳。燒研。綿裹塞之立出。

【鱒魚】 即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱒魚」條。

【鱒魚血】 即鱒魚之處方用名。詳「鱒魚」條。

【鱒豚】 即鱒魚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「鱒魚」條。

【鰻魚】 命名 鰻者鰻也。本品體不能屈曲如鱒也。故名。

古籍別名 鰻魚。石桂魚。(開寶)水豚。(綱目)鰻魚。(動物學大辭典)鰻豚。(日華)

外國名詞 Helicolenus Sp.

基本 係脊椎動物魚類鰻鱺類之鰻魚。

產地 生江海中。

形態 鰻為魚鱗類之一種。體扁腹闊。口大鱗細。體色淡黃兼褐。腹白有黑斑。斑紋色明顯者為雄。稍晦者為雌。脊骨十二棘。總蓋骨亦有細棘。體長七八寸。小者三四寸。棲江湖。冬日潛伏岸穴中。其肉無細刺。可供食與藥用。

性質 甘平無毒。

主治 腹內惡血。去腹內小蟲。益氣力。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鰻魚肉曰。補虛勞。益脾胃。【唐】日華諸家本草論鰻魚肉曰。治腸風瀉血。

參攷資料 按張杲醫說云。越州邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鰻魚羹。遂愈。觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符。則仙人劉翹隱士張志和之嗜此魚。非無謂也。(李時珍)

【鰻魚尾】 主治 小兒癩癬。貼之良。

【鰻魚膽】 採取 臘月採收。懸北簷下。陰乾用。

性質 苦寒無毒。

主治 骨節竹木刺入咽喉。酒煎溫服。取吐之。

【鱗蛇】 產地 出雲南、安南諸地。

形態 鱗蛇為蟒蛇之大者。即所謂巨蟒也。長丈餘。有四足。鱗有黃黑二色。能食麋鹿。亦能傷人。春冬居山。夏秋居水。土人殺而食之。其膽可供藥用。

採取 以黃鱗者良。

性質 苦寒。有小毒。

主治 解藥毒。治惡疾及牙疼。見和漢藥考。詳「石斛」條。

【鱒魚】 命名 本品軀體延長。故名。本品軀體延長。故字從尋而名曰鱒。

古籍別名 鱒魚。鋪魚。王鮪。(爾雅)碧魚。(綱目)小者名叔鮪。更小者名鮪子。(郭璞)鮪魚。(毛詩疏義)鮪鱒。(漢書)乞里麻魚。(飲膳正要)

外國名詞 Peppinrus Sp.

基本 係脊椎動物魚類硬鱗類鱒魚科之鱒。

產地 生江河深水間。

形態 鱒魚為無鱗魚類之一種。體長似鱒。長達一二丈。背無硬鱗。鼻亦長。口在頰下。尾分叉。背色青。腹色白。頰有青斑。紋狀如梅花。肉色潔白。味亞於鱒。可供食與藥用。

性質 甘平無毒。

主治 補虛益氣。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鱒魚肉曰。煮汁飲。治血淋。

參攷資料 鱒魚肉有毒。味雖美而發諸藥毒。動風。發一切瘡疥。久食令人心痛腰痛。服丹石人忌之。勿與乾荷同食。發癩疾風。小兒食之成咳嗽及癩癢。作詐雖珍。亦不益人。(孟詵)

【鱒魚子】 主治 食之肥美。殺腹內小蟲。

【鱒魚鼻肉】 主治 補虛下氣。

參攷資料 鱒魚鼻肉作脯。名鹿頭。亦名鹿肉。蓋言其美也。(綱目)

【鱒魚】 即鱒魚之俗名。詳「鱒魚」條。

【鵝雞】 形態 本品為原禽類。秧雞科之一種。大如雞。

而脚長冠紅。雄者大而色褐。雌者稍小而色斑。鳴聲甚大。其肉可供藥用。性質功用。俱同秧雞。詳秧雞條。

【鷓鴣】即巧婦鳥之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「巧婦鳥」條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳「鷓鴣」條。

【鷓雉】 命名 鷓性慙急耿介。故名。

古籍別名 山雞。錦雞。(禽經) 采雞。(周書) 金雞。鷓鴣。(綱目)

產地 出諸南越山中。湖南湖北亦多有之。

形態 鷓雉爲原禽類。雉屬之一種。形似雉而羽色尤麗。雄者頭色青綠。有金黃色之毛冠。喉部黃色。而頸項間又有純白色之輪紋。胸腹紅銅色。甚光澤。背及尾色帶金黃色。全體羽如橄欖色。尾長。先端細。其雌者亦似雉。惟胸腹兩部之黑斑較爲少耳。其肉可供藥用。

性質 甘溫。微毒。

主治 食之令人聰慧。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鷓雉曰。養之灑火災。

【鷓雉】即鷓雉之大者。典見綱目。詳「鷓雉」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見山海經。詳「鷓」條。

外國名 鷓 Gallinago caelestis Frenzel Co.

onom Sulpo (拉) シキ或シキ(日本)

基本 係存推動物鳥類。涉禽類千鳥科之類。

產地 出北方諸地及西比利亞等處。



鷓

形態 鷓爲原禽類。鷓屬之一種。嘴長二三寸。比頭長。嘴根被棘皮。前額有顯明之淺黃色。三縱條紋。頸亦長。頭頸脊皆茶色。與黑色混合。胸腹白色。翼裏純白。脚與嘴長相等。跖蹠裸出。趾長無蹠。趾端有小爪。常棲水田中。捕食蟲魚。其

肉可供食與藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 補虛。甚暖人。

內可供食與藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 補虛。甚暖人。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見說文。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見綱目。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

【鷓】即鷓之古籍別名。典見爾雅。詳「鷓」條。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鷓雉曰。養之灑火災。

產地 深山林下土中有之。

形態 鼯鼠爲獸類鼠屬之一種。其體肥滿如鼠。而鼻端尖如錐。嗅覺敏銳。能嗅蟲類之所在。眼小。隱皮毛中。耳殼小。聽覺亦敏。體爲圓筒形。而扁平。長五寸許。柔毛密。生色灰黑。有光澤。四肢短而力強。各有五趾。趾具鉤爪。前肢大而闊。爪如鋤而向外。後肢稍小。便於掘土。性畏日光。常棲土中。覓食蚯蚓。昆蟲等物。性亦殘忍。時有鬥食同類。其肉可供藥用。



鼯鼠

性質 咸寒。無毒。

主治 婦之瘰癧。諸瘻。蝕瘻。瘻。陰爛。疥。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鼯鼠肉曰。久食去風。主瘡疥痔瘻。【宋】蘇頌圖經本草論鼯鼠肉曰。治風熱久積。血脈不

通。鼯鼠肉曰。治風熱久積。血脈不

一九五三

效驗 益脾和中。用作健胃藥。主治 快胃和臟腑。

歷代記載攷證 【明】經希雍本草經疏論蠶豆曰。蠶豆味甘微辛。無毒。能厚腸胃。和臟腑。萬表積善堂方言。一女子誤吞針入腹。諸醫不能治。一人教令煮蠶豆同葑菜食之。針自大便同出。今人有誤吞金銀物者。用之皆效。實救急之良方也。【清】黃宮繡本草求真論蠶豆曰。蠶豆味甘性溫。稷書載此服多滯氣。又曰誤吞鐵針。用此卽下。蓋緣人受穀食。必伏中氣以爲運行。若使中氣稍振。雖服有形之物。礙於腸胃。用此合以溫藥同投。卽能以解。如其中氣既餒。稍服濡滯。卽能作脹。况多食乎。此蠶豆之所以有通有不通之說也。但此既能通針。其性疎利。已見一斑。與於陰潤之物。過人則滯。絕不相同。惟在臨症相人體氣。及多食少食。以別耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論蠶豆曰。蠶豆甘平。類時刻爲蔬。饌味甚鮮美。老則煮食。可以代糧。炒食可以爲肴。性主健脾快胃。浸以發芽。更不壅滯。亦可煮糜作饌。

二十四蠶

何。肆中磨細攪入小粉。亦可燙皮。搽末。以混綠豆粉。

近人學說 丁福保曰。蠶豆爲多人之嗜食品。需用頗廣。其味稍甘。性平和微寒。爲無毒性之食品。其功有治胃之效能。但皮厚而硬。難以消化。故胃弱之人及小兒不宜食用。

參攷資料 ●蠶豆莢狀如老蠶故名。王楙農書謂其蠶時始熟故名。亦通。吳瑞本草以此爲豌豆誤矣。此豆種亦自西胡來。雖與豌豆同名同時種。而形性迥別。太平御覽云。張逵使外國。得胡豆種歸。指此也。今蜀人呼此爲胡豆。而豌豆不復名胡豆矣。【李時珍】●蠶豆南土種之。蜀中尤多。八月下種。冬生嫩苗。可茹。方莖中空。葉狀如匙頭。本圓末尖。面綠背白。柔厚。一枝三葉。二月開花如蛾狀。紫白色。又如紅豆。花結角連綴如大豆。頗似蠶形。蜀人收其子。以備荒歉也。【李時珍】

【蠶豆苗】 性質 苦。微甘。溫。主治 酒醉不醒。油鹽炒熟。煮湯灌之效。

【蠶豆苗】 卽蠶豆之處方用名。詳【蠶豆】條。

【蠶豆莢】 卽蠶豆之處方用名。詳【蠶豆】條。

【蠶豆殼】 主治 清火解毒。配合應用 ●治癰瘡。用油鹽蠶豆殼一錢。麻油浸一週時。取起。將豆殼瓦上焙研爲末。麻油調搽患處。立愈。（行貨檢秘方）

●治隔食。用蠶豆磨粉。紅糖調食。數次卽愈。（指南方）

●治小便日久不通。難忍欲死。豆殼三兩。煎湯服之。如無鮮殼。取乾殼代之。（活人書方）

●治黃水瘡。凡大人小兒頭面黃水瘡。流到卽生。蔓延無休者。用蠶豆殼炒成炭。研細。加東丹少許和勻。以真菜油調塗。類以油潤之。三日卽愈。（毛世洪經驗集方）

●治潮。用炒熟蠶豆殼磨末。每服三四錢。加沙糖少許調服。（種福堂方）

●治瘡疥。用鮮蠶豆搗如泥。塗瘡上。乾卽換之。三五次卽愈。如無鮮者。用乾豆以水泡胖。搗數亦效。

（張弼子外科方） ●治吐血。以新蠶豆殼四五年陳者。炒煎湯飲之。卽愈。（外科方）

●治天泡瘡。蠶豆黑殼燒灰存性。研末。加枯礬少許。菜油調敷。一次卽愈。

【蠶屎】 卽原蠶沙之俗名。詳【原蠶沙】條。

【蠶毒】 卽蛇毒之古籍別名。典見綱目。詳【蛇毒】條。

【蠶退】 卽蠶蛻。詳【蠶蛻】條。

【蠶退紙】 卽蠶蛻紙。詳【蠶連】條。

【蠶連】 命名 本品卽蠶種之紙。蠶蛾生卵於紙。常以線綴之。道作一連。故名。

原名 蠶蛻紙。古符別名 蠶子故紙。（千金方）

主治 吐血鼻衄。腸風瀉血。崩中帶下。赤白痢。傳疔腫痛。

歷代記載攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論蠶連曰。治婦人血露。

【明】李時珍本草綱目論蠶連曰。牙宣牙痛。牙齦牙疳。頭瘡喉痺。風癩狂祟。蟲毒藥毒。沙証腹痛。小便淋瀝。婦人難產及吹乳疼痛。

配合應用 ●治吐血不止。蠶紙燒存性。蜜和丸。交貨大。含化。蘇津。(集驗方)

●治牙宣牙癰及口瘡。並用蠶紙燒灰乾傳之。(集驗方)

●治風蟲牙疔。蠶紙燒灰擦之。良久。鹽湯漱口。(直指方)

●治走馬牙疳。蠶紙灰。入麝香少許。貼之。直指加白僵蠶等分。(集驗方)

●治小兒頭疔。蠶紙燒存性。入輕粉少許。麻油調傳。(聖惠方)

●治癢喉風疾。用蠶紙燒存性。煉蜜和丸。如灰質大。含化。蘇津。(集驗方)

●熏耳治壁。蠶紙作燃。入麝香二錢。入筆筒燒烟熏之。三次即開。

●治癲狂邪祟。凡狂發欲走。或自高貴稱神。或悲泣呻吟。此為邪祟。以蠶紙燒灰。酒水任下方寸匕。亦治風癩。(肘後方)

●治沙證壯熱。江南有沙證。狀如傷寒。頭痛壯熱。嘔惡。手足指末微厥。或腹痛悶亂。須臾殺人。先用蠶紙剪碎。安於瓷中。以碟蓋之。

滾湯沃之。封固良久。乘熱服。暖臥取汗。(活人書方)

●中蠶藥毒。雖面青脈絕。腹脹吐血者。服之即活。用蠶紙燒存性。為末。新汲水服一錢。(衛生方)

●治中諸藥毒。用蠶紙數張。燒灰。冷水服。(易簡方)

●治小便澀痛不通。用蠶紙燒存性。入麝香少許。米飲每服二錢。(博濟方)

●治熱淋如血。蠶種燒灰。入麝香少許。水服二錢。極效方也。(衛生家寶方)

●治崩中不止。蠶故紙一張。剪碎炒焦。槐子炒黃。各等分。為末。酒服立愈。(易簡方)

●治婦人斷產。蠶子故紙一尺。燒為末。酒服。終身不產。(千金方)

●治痔漏下血。蠶紙半張。蠶內燒灰。酒服自除。(備急方)

參攷資料 ●蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者。東方諸醫。用老蠶眠起所蛻之皮。功用相近。當以蛻皮為正。入藥微炒。為用。(蒙禹錫)

●蠶蛻常用眠起時所蛻皮。蠶連燒灰亦可用。(寇宗奭)

●馬明退。蠶連紙。功用相同。亦如蠶蛻。蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者。因其易得耳。(李時珍)

【蠶絲吐頭】功用性質。詳「蠶繭」條。

【蠶蛹】 古醫別名 小蜂兒。日用)

主治 炒食治風及勞瘵。研傳瘡疔惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】陳士良食性本草論蠶蛹曰。治消渴煩亂。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛹曰。為末飲服。治小兒疳瘦。長肌退熱。除乾蟲。煎汁飲。止消渴。

參攷資料 劉大瞻者。終身忘食。發則難免。(孫思邈)

基本 本品即蠶眠起所蛻之皮。

【蠶蛻】 古醫別名 馬明退。(嘉祐)佛退。(綱目)

性質 甘。平。無毒。

主治 血痢。益婦人。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論蠶蛻曰。治婦人血風。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛻曰。治目中翳障及疔瘡。

【蠶蛻紙】即蠶連之原名。詳「蠶連」條。

【蠶頭歸】即蠶頭歸。詳「蠶頭歸」條。

【蠶繭】 採取 以已出蛾者用。性質 甘。溫。無毒。

主治 燒灰酒服。治癰腫無頭。次日即破。又療諸疔瘡及下血。血淋血崩。煮汁飲。止消渴反胃。除乾蟲。

配合應用 ●治痘瘡疔蝕。膜水不絕。用出了蠶蛾繭。以生白礬末填滿。煨枯為末。擦之甚效。(陳文中小兒方)

●治口舌生瘡。蠶繭五個。包菴砂瓦上焙焦。為末。抹之。

●留黃散。治腸風大小便血。淋瀝疼痛。用留黃。蠶蛻紙。並燒存性。晚蠶沙。白僵蠶。並炒。等分為末。入麝香少許。每服二錢。用米飲送下。日三服。甚效。亦治婦人血崩。(聖惠方)

●治反胃吐食。蠶繭十個。煮汁。煮雞子三枚。食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以練絲湯煮粟米粥。食之。(惠濟方)

參攷資料 蘇南方書多用。而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼。用一枚即出一頭。二枚即出二頭。神效無比。煮湯治消渴。古方甚稱之。丹溪朱氏言此物屬火。有陰之用。能消膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止渴也。繆絲湯及絲綿黃汁。功並相同。(李時珍)

【蠶繭草】 外國名曰 Polyg. Meian(拉丁)サククラダ(日本)

基本 係蓼科蓼屬。爲蠶繭草之莖葉。產地 原野溼地均有出。



草 繭 蠶

形態 蠶繭草爲溼草類之多。年生草本。莖高二三尺。葉披針形。長而稍厚。互生。有托葉如輪狀。上緣生長剛毛。秋月葉梢抽出花軸。綴以稀疎之長穗狀花。花蓋白色。或帶紅色。五裂甚深。雄蕊八枚。突

二十四畫 蠶 衡 讓 釀 靈

出於花蓋之外。雌蕊一枚。此爲蓼類中之最大者。其莖葉供藥用。

性質 辛平無毒。

主治 諸蟲如蠶類咬人。悉毒入腹。煮服之。亦搗傳諸瘡。

參攷資料 蠶繭草生溼地。如藜大莖赤花白。東土有之。(陳藏器)

【蠶繭鹵汁】 命名 本品即蠶繭中蛹汁也。

故名。

效能 解毒。殺蟲。

主治 蠶蝨瘰癧。山蝨山姪入肉。蚊子及諸蟲咬毒。小兒疥瘡等。

(煮湯浴)

【蠶魚】 卽衣魚之古籍別名。典見綱目。詳「衣魚」條。

【衡筭乾】 基本 本品卽以竹筍用鹽湯煮熟。蒸乾而成者。

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 利膈化痰。

【讓實】 基本 讓實爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 十月採之。陰乾用。

性質 酸。

主治 喉痺。止洩痢。

【釀】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【羶羊】 卽大尾羊之古籍別名。典見唐書。詳「大尾羊」條。

【靈山柴】 卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天靈蓋」條。

【靈芝】 卽石耳之古籍別名。典見綱目。詳「石耳」條。

【靈砂】 命名 本品以至陽勾砂。至陰。脫陰反陽。故名靈砂。

書齋別名 二氣砂。青金丹。金鼎靈砂。九轉靈砂。老火靈砂。(綱目) 神砂。(求真) 氣砂。軒辰砂。(和漢藥考)

形態 靈砂爲鮮紅色針狀結晶。不溶於水及通常溶解劑。熱之則發藍色焰而燃燒。

製法 唐慎微曰。靈砂用水銀一兩。硫黃六銖細研。炒作青砂頭。後入水火既濟爐抽之。如束鍼紋者成就也。李時珍曰。按胡寅丹藥祕訣云。升靈砂法。用新鍋安道通爐上。蜜摺鍋底。文火下燒。入硫黃二兩。鎔化。投水銀半斤。以鐵匙急

攪作青砂頭。如有屑起。頃時解之。待汞不見星。取出細研。盛入水火鼎內。鹽泥固濟。下以自然火升之。乾水十二盞爲度。取出如束鍼紋者成矣。庚辛玉冊云。靈砂者。至神之物也。誠汞製而成形。謂之丹基。奪天地造化之功。竊陰陽不測之妙。可以變化五行。鍊成九還。其未升鼎者。謂之青金丹頭。已升鼎者。乃曰靈砂。靈砂有三。以一伏時周天火而成者。謂之金鼎靈砂。以九度抽添。用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日炒煉而成者。謂之醫家老火靈砂。並宜桑灰淋醋煮伏過。用乃良。

性質 甘溫無毒。

效能 調陰陽。交水火。安精神。定魂魄。專作鎮墜藥。

主治 五臟百病。養神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅。惡鬼氣。久服通神明。不老輕身神仙。令人心靈。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論靈砂曰。主上盛下虛。痰涎壅盛。頭眩吐逆。驚亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和

五臟。補助元氣。研末糯糊爲丸。煮湯服。最能鎮墜神丹也。〔清〕黃宮

樞本草求眞論靈砂曰。靈砂又名神砂。係水銀硫黃二物。同水火煨

煉而成。蓋水銀性乘最陰。硫黃性

專純陽。同此煎熬。合爲一氣。則水

與火交。火與水合。而無元騰飛越

之弊矣。故凡陽邪上浮。下不交。而

至虛煩狂燥。寤寐不安。精神恍惚

者。用此墜陽交陰。則精神鎮攝。而

諸病悉去。謂之曰靈。卽見扶危拯

急。若有神使之意。後人不明辰砂

卽屬丹砂。混以靈砂。入於益元散

內。詎知一神一靈。音同字別。一水

一火。天淵各列。烏可以此烹煉燥

烈之品。以代辰州甘寒之味耶。市

生煎湯調下。〔錢氏小兒方〕

●治脾疼反胃。靈砂一兩。蚌粉

一兩。同炒。赤丁香。胡椒各四十九

粒。爲末。自然煎汁。煮半夏粉糊丸

梧子大。煎湯下二十九。〔普濟方〕

●治冷氣心痛。用靈砂三分。五

靈脂一分。爲末。稀糊丸。麻子大。每

服二十九。食前石菖蒲。生煎湯下

〔直指方〕

●治九竅出血。因暴驚而得。其

脈虛者。靈砂三十粒。人參湯下。二

服愈。此證不可錯認。血得熱則流

妄用涼藥誤事。〔楊仁齋直指方〕

●養正丹。又名交泰丹。乃寶林

眞人谷伯陽方也。卻邪輔正。助陽

接眞。治元氣虧虛。陰邪交蕩。上盛

下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣

短。心怯膽悸。虛煩狂言。盜汗腹痛

腰痛。反胃吐食。霍亂轉筋。欬逆。又

治中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫

四肢厥冷。傷寒陰盛。自汗唇青。脈

沉。婦人產後月候不勻。帶下腹痛

用黑靈一隻。入黑餘溶汁。次下水

銀。次下朱砂末。炒不見星。少頃乃

下硫黃末。急攪。有焰。酒醋解之。取

出研末。糯米粉煮糊丸。綠豆大。每服

二十九。鹽湯下。四味皆等分。此藥

升降陰陽。既濟心腎。神效不可具

述。〔局方〕

用量 三分至五分

施用宜忌 凡非實邪暴病者

禁用忌火

參攷資料 ●靈砂卽化學上

之赤色硫化汞。〔和漢藥考〕●茅

亨客話載以靈砂餌胡孫。鸚鵡。鼠

犬等。變其心。輒會人言。丹之通爲

靈者。〔唐慎微〕●靈砂雖稱水火

既濟。陰陽配合。然而硫汞有毒。性

亦下墜。止可藉其墜陽交陰。卻病

於一時。安能資其養神益氣。通靈

於平日哉。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂

肺熱生痰。病屬於虛。非關驟發者

【靈通草】卽甘草之古籍別名。典見

記事珠。詳「甘草」條。

【靈通草】 主治 耳聾。

參攷資料 楚庭梓

珠。僧建公之徒參悟。患聾。建公謂

得羅浮靈通草始瘳。參悟來博館

入山。於玉女峯得此草。莖長三尺

如箸。而莖虛中。兩頭皆實。頂開七

葉。取葉煎水服。載其虛者。貫兩耳

中夜一聲若雷。聲遂開。〔趙恕軒〕

【靈黃】卽石硫黃之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【靈壽木】 古醫別名 扶老杖。

形態 靈壽木爲灌木類之一

種。高八九尺。圍三四寸。莖幹似竹

有節。可爲杖及馬鞭之用。其根皮

可供藥用。

性質 苦平。

主治 止水。

【靈貓】卽靈貓香之簡稱。詳「靈

貓香」條。

【靈貓香】 古醫別名 香狸香。

（雜俎）神狸香。（離

騷註）類香。（綱目）文狸香。狸狸

香。（和漢藥考）心月狐。（星禽眞

形圖(麝香貓)(別名)

外國名圖 Zibethum. (拉

丁) Civet. (英) Zibeth. (德)

基本 屬貓類之麝香貓。肛門與生殖器間開口腺所分泌之液汁。

產地 靈貓香產非洲諸國、美洲之巴西、秘魯、中國及其他亞洲諸國。穴居山野。多產子。以小獸諸鳥為食。缺則食果類菜草。

形態 靈貓香為類黃色。瘦弱狀物質。經久者變褐色。不溶於水。逢酒精能溶一部分。近嗅帶尿臭。遠嗅則類麝香。味苦。點火則發明焰燃燒。靈貓形似貓而大。自鼻端至尾端長二尺餘。頭短鼻長。眼稍長而小。耳小似貓耳。惟不尖。牙尖利如狗。脚短小。前脚尤短。約五指指橫徑有五趾。爪黑而尖。直全身之毛有二種。一種長而粗。一種黑白。茶楊三色。成黑斑及條紋。一種短而柔細。灰色帶褐色。捲縮而白於長毛中。頭之兩側有大黑斑。將眼圍住。在體頸、頰及尾之毛。皆長而粗硬。頭毛則短。灰色而間黑色。鼻灰白。其端黑色。耳外黑而內

二十四畫 靈

白。頸有黑白斑。吮與腹皆黑。尾之上面黑色。兩側及下面則雜白毛。或作黑白輪紋。脚毛短如頭毛。

採取 採無時。採香應由檻前將棍插入。逐至後邊。從檻後格子間。把住其尾。即插二板入檻中。夾其兩脇。使不能動。乃將其後足縛於格子。用小匙徐徐刮取溝內之液。惟液隨氣候之寒暖而有多寡。故或每日。或二日。或三日取一次。(大抵二日出一錢許)此獸在山野時。係自觸木石。別出其液云。

性質 辛溫無毒。

成分 靈貓香含有脂肪、揮發油、樹脂質等。

效能 宣散。辟惡。行氣。止痛。與麝香海狸香相同。能使情火熾盛。用作興奮精神藥。又為鎮痛等藥。並治陰痿偏頭痛。

作用 在胃中不起作用。至小腸及十二指腸始行分解而被吸入。即刺激中樞神經。使精神奮興。性熱神經亦同時被激發而亢進。如用大量。則神經反被麻醉而昏睡。甚至由血尿盜汗而死。

主治 中惡氣。飛尸。蠱。疰。心腹

卒痛。狂邪鬼神。鬼瘧疫氣。夢寐邪。驚。鎮心安神。

國外學說 和漢藥考曰。靈貓

性兇悍難馴。人觸之輒被抓咬。自幼畜檻中者。性稍馴。但稍怒亦動輒咬人。其外貌雖若柔弱懶惰。但其捕蟲鼠鳥類。則奔跳飛越。輕敏如貓。其食料以牛乳及雞卵為最佳。若用肉類及穀果蔬菜等畜之。則靈貓香之性能香氣。皆變劣弱。此獸雖輸出他國。若以良食畜之。亦善能生育。可取香。與產地無異。惟此獸本屬暖國產。荷運至寒地。或寒暖中和地。則精力稍減。不產子。其香質如蜜為似牛酪之稠厚液。新鮮上品為白色或黃白色。其氣烈如麝香。且帶有如琥珀油之氣味。味苦。上品為白色。但經久則漸變黃色。終成為褐色。亦有帶黃灰色。或帶赤色者。凡褐色愈多。則品愈下。將此勻攤平紙上。無粒塊。無如脂之腐敗臭氣者為上品。有於液內雜酪及脂類。假充出售者。用乳汁及雞卵者。其香白色。為上品。用肉類果菜畜者。其液褐色。香氣及功效俱劣。其主治以多油

氣揮發強。有鎮痛。解凝。緩和之功效。能使神經強壯。疝痛。小兒腹痛。子宮硬腫及衝逆等。用此擦臍。頗有奇效。惟婦女多不喜此香氣。多用於香料。取少許加於他香料中。則發佳香如麝香。此物逢燒酒不溶化。溶於油脂類。牝牡皆於陰具與肛門之間。有一披溝。內被短毛。其左右有膜囊(即香囊)隆起。皮上成爲溝唇。其囊約長三指指橫徑。闊約二指指橫徑。其中約可容鴿卵(或云此囊倍於牝)囊之內外。有腺頗多。溝內左右有二腺。俱分泌香液。藏於囊中。溝內之兩側。各有一孔。適於兩囊。將香液灌於溝。

用量 一分至三分。

參攷資料 靈貓生南海山谷。狀如狸。自爲牝牡。其陰如麝。功亦相似。按異物志云。靈貓一體自爲陰陽。列其水道。連囊以酒洒。除乾。其氣如麝。若雜入麝香中。罕能分別用之。亦如麝香(陳藏器)按段成式言。香狸有四肢。則自能化牡者。或由此也。劉侗西域記云。黑契丹出香狸。文似土豹。其肉

可食。薰滑皆香。如麝氣。楊慎丹鉛錄云。予在大理府見香貓如狸。其

文如金錢豹。此即楚辭所謂乘赤豹兮載文狸。王逸註為神狸者也。

南山經所謂竄爰之山有獸焉。狀如狸而有髦。其名曰類。自為牝牡。食者不妬。列子亦云。竄爰之獸。自孕而生曰類。疑即此物也。又星禽

真形圖心月狐。有牝牡兩體。其神程平。珍按劉楊二說。與異物志所說相合。則類即靈狸無疑矣。類狸字音亦相近也。(李時珍) ①靈貓

肉氣味甘溫無毒。(綱目)

【靈龜】即靈龜之古籍別名。典見郭璞賦。詳『螭龜』條。

【靈廂子】即枸杞子之古籍別名。典見與見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【靈磁石】即慈石之處方用名。詳『慈石』條。

【靈龜】即靈龜之古籍別名。典見漢書。詳『螭龜』條。

【鬪牛兒】即牻牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牻牛兒』條。

【鬪雪紅】即月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。

【鬪雞】即蟋蟀之俗名。詳『蟋蟀』

條。

【鱧魚】即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鰻魚』條。

【鰻】即魚子之古籍別名。典見綱目。詳『魚子』條。

【鰻帆】即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰻魚』條。

【鰻魚】命名 鰻者候也。鰻善候風。故名。

古籍別名 鰻帆。鰻鱈。小者名鬼鰻。(綱目)

外國名詞 Limulus longipinus V. D. Hoew Horseshoe Crab 或 King Crab Molukke-nches (拉丁) カブトガニ(日本)

基本 係節肢動物甲殼類腿口類劍尾類鰻科。

產地 生南海中及南洋羣島。

形態 鰻魚為介類之一種。全體深褐色。長二三尺。闊約一尺。頭胸部廣闊。前緣形圓。後緣形凹。頭上具無柄眼一對。中間又有小眼。下有口。口緣有脚六對。腹部為六角形。邊緣有針形突起。腹下具瓣狀肢五對。頭胸與腹部之間。有可

動之關節。甲殼堅硬。尾成劍狀。雄小雌大。雌常負雄以行。浮游水中。腹中有子如黍米。可為醃醬。皮殼甚堅。可為冠帽。其血碧色。肉白。可供藥用。



魚 鰻

【鰻魚膽】 主治 大風癩疾。殺蟲。

【鰻鱈】即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰻魚』條。

【鰻鱈魚】 命名 相傳昔吳王其殘餘於水。化為此魚。故名。

古籍別名 王爪魚。王餘魚。銀魚。(綱目)

產地 出蘇松浙江諸地。

形態 鰻鱈魚為無鱗類魚屬之一種。大者長四五寸。身圓如筋。潔白如銀。體無鱗。若已鱗之魚。日有兩黑點。其肉可供食與藥用。

性質 甘平無毒。

主治 作羹食。寬中健胃。

參攷資料 鰻鱈魚在清明節前有子。食之甚美。清明節後子散而瘦。可作鮓膳。曝乾亦佳。(李時珍)

【鱧魚】 命名 本品肥而不善游。有連如之象。故名。

古籍別名 黃魚(食療)鱧魚。(御覽)玉辰魚。含光片鱧。(綱目)鱧鱈魚(俗名)

外國名詞 Acipenser nika

基本 係節肢動物甲殼類腿口類劍尾類鰻科。

產地 生南海中及南洋羣島。

形態 鰻魚為介類之一種。全體深褐色。長二三尺。闊約一尺。頭胸部廣闊。前緣形圓。後緣形凹。頭上具無柄眼一對。中間又有小眼。下有口。口緣有脚六對。腹部為六角形。邊緣有針形突起。腹下具瓣狀肢五對。頭胸與腹部之間。有可

動之關節。甲殼堅硬。尾成劍狀。雄小雌大。雌常負雄以行。浮游水中。腹中有子如黍米。可為醃醬。皮殼甚堅。可為冠帽。其血碧色。肉白。可供藥用。

【鰻魚殼】 主治 積年呷嗽。

adoi Hilgd 或 A. Sturio Steur-
Goon (拉丁) チヨウザメ 或 テ
ウザメ (日本)

基本 係存桂動物魚類硬鱗
類鱈魚科之鱈魚。

產地 江淮黃河遼海深水處
有之。

形態 鱈魚爲魚鱗類之一種。
其體長形呈紡錘狀。似鱈。長至一
二丈。口小在頭下。位於鰓孔與吻
端之間。唇突出爲肉質。稍能伸
縮。下唇狹。上唇厚而膨起。中央有
裂痕。觸鬚橫列於口與吻端。眼小
鼻長。四孔在口之前排。水孔在鰓
端之上。頭部密被骨板。軀有斜方
形硬鱗。鱗與脊骨相對。胸骨狹
長。腹鱗小。背色茶褐。腹灰黃。脂色
黃與白色之肉層層相間。脊骨及
鰓蓋並皆脆硬可食。其肉亦可
供食與藥用。

性質 甘平。有小毒。

主治 利五臟。

參攷資料 鱈魚肉多食難
消化。服荊芥藥者不可食。(李時
珍) 鱈魚肉發氣動風。發疥疥。
和蕎麥食令人失音。(孟詵) 鱈

二十四畫 鱈 鱈 鱈

魚肉味極肥美。楚人尤重之。多食
生熱痰。(寧原)

鱈魚肝 性質 無毒。
主治 惡血疥癬。

參攷資料 鱈魚肝切勿以鹽
炙食之。(陳藏器)

鱈魚 即鱈魚之原名。詳「鱈魚」
條。

鱈魚 命名 本品首有七星。
夜朝北斗有自然之禮
故名。

處方用名 鱈魚肉。鱈魚膽。
古鑿別名 鱈魚。鱈魚。(本經)

黑鱈(圖經)玄鱈(埤雅)烏鱈。文
魚。七星魚。鱈目。黑魚(俗名)黑
火柴頭魚。(醫林集要)烏魚。

基本 係水族動物。爲無鱗類
之鱈魚。

產地 凡江湖池澤之淡水中
恒有出。

形態 鱈魚形長。體圓。頭尾相
等。細鱗。黑色有斑紋。腹背兩鱗均
連續至尾。

性質 甘寒。無毒。

效能 消熱。行水。用作利尿消
腫。溼痺藥。

主治 療五痔。治溼痺。面目浮
腫。下大水。(本經)有瘡者不可食。
令人癢白。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食
療本草論鱈魚曰。下大小便壅塞
氣作。鱈與脚氣風氣人食良。【宋】
蘇頌嘉祐圖經本草論鱈魚曰。主
妊娠有水氣。【明】李士材本草圖
解論鱈魚曰。鱈魚甘寒無毒。其功
專於去溼下水。他無所長。多食能
癩疾。【清】黃宮繡本草求真論鱈
魚曰。鱈魚膽即屬烏鱈。又名七星
魚者是也。其物伏土勝水。味甘性
寒無毒。凡人身患十種水氣垂死。
可用肉與冬瓜葱白以治。且煮湯
浴兒。可以稀豆。臍味書雖載甘。然
管之終苦。凡喉痺將死者。點入即
愈。病深者水調灌之亦可。

配合應用 治十種水氣垂
死。鱈魚一斤重者。煮汁。和冬瓜葱
白作羹食。(食醫心鏡方)

下一切氣。用大鱈一條。開肚。
入胡椒末半兩。大蒜片二顆。縫合。
同小豆一升。煮熱。下蘿蔔三五顆。
葱一握。俱切碎。煮熱。空腹食之。至
飽。并飲汁。至夜洩惡氣無限也。五

日更一作。(孟詵方)

治腸痔下血。鱈魚作鱈。以蒜
鹽食之。忌冷毒物。(外臺祕要方)

治一切瘡風。頑癬疥癩。年久
不愈者。不過二三服必愈。用黑火
柴頭魚一個。即烏鱈也。去腸肚。以
蒼耳葉填滿。外以蒼耳安鍋底。置
魚於上。少少着水。慢火煨熟。去皮
骨。淡食。勿入鹽醬。功效甚大。(醫
林集要方)

浴兒免痘。除夕黃昏時。用大
烏魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。
遍身七竅俱到。不可嫌腥。以清水
洗去也。若不信。但留一手或一足
不洗。遇出痘時。則未洗處偏多也。
此乃異人所傳。不可輕易。(楊拱
醫方摘要方)

參攷資料 鱈魚合小豆白
煮。療腫滿最效。(陶弘景) 鱈首
有七星。夜朝北斗。有自然之禮。故
謂之鱈。又與蛇通氣。色黑。北方之
魚也。故有玄鱈諸名。俗呼火柴頭
魚。即此也。其小者名鱈魚。蘇頌圖
經引毛詩。注謂鱈即鮫魚。未免
誤矣。(李時珍) 形長體圓。頭尾
相等。細鱗。玄色。有斑點。花文。頗類

鱧蛇。有舌。有齒。有肚。背腹有橫連尾。尾無歧。形狀可憎。氣息腥惡。食品所卑。南人有珍之者。北人尤絕之。道家指為水厭。齊錄所忌。(李時珍)

【鱧魚肉】即鱧魚之處方用名。詳【鱧魚】條。

【鱧魚腸及肝】 主治 以五 味炙香。貼痔 瘻及姓疥。引蟲盡為度。

【鱧魚膽】 採取 臘月收取陰 乾用。

性質 甘平。 主治 喉痺將死者。點入少許 即差。病深者水調灌之。

參攷資料 諸魚膽味苦。惟鱧 魚膽味甘可食為異也。(日華)

【鱧魚腸】即鱧魚之處方用名。詳 【鱧魚】條。

命名 鱧。烏頭也。其腸 亦烏。本品柔莖。斷之有 黑汁。如鱧之腸然。故名。

處方用名 鱧腸草。旱蓮草。墨 旱蓮。

古稱別名 蓮子草。(唐本)金 陵草。(圖經)詞孫頭。(必用)墨煙

草。黑頭草。墨菜。豬牙草。(綱目)

外國名詞 *Eclipta alba*, *田田草*。(拉丁)タカサブラウ (日本)

基本 係菊科鱧腸屬之鱧腸 草。

產地 凡道旁田畦及水隈濕 地間恒有出。

形態 鱧腸為溼草類之一。年 生草本。莖高一二尺。枝自葉腋對 生。更分小枝。葉對生。質稍厚。披針 狀。有鋸齒。葉面粗糙。生毛茸。八九 月間自小枝開小頭狀花。花小色 白。外圍之花。作舌狀花冠。中部之 花。作筒狀花冠。其果實成熟。即呈 黑色。實形如蓮房。斷之有汁。須臾 亦呈黑色。其莖葉等可供藥用。



鱧 腸

採取 二月八月間採之。 製法 凡採得陰乾用。

性質 甘酸。平。無毒。 效能 補腎陰。烏髮。用作緩

和滋養藥。又為止血藥。

主治 血痢。鍼灸瘡。發洪血。不 可止者。傳之立已。汁塗眉髮。生速 而繁。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四 弊本草論鱧腸曰。存點鼻中。添腦。

【宋】大明諸家本草論鱧腸曰。止 血排膿。通小腸。傳一切瘡。并瘰癧。

【明】李時珍本草綱目論鱧腸曰。 烏髭髮。益腎陰。【明】繆希雍本草 經疏論鱧腸曰。鱧腸其汁玄黑。其 味甘酸。平而無毒。純陰之草也。入

腎入肝。亦入胃與大小腸。善涼血。 鬚髮白者。血熱也。齒不固者。腎虛 有熱也。涼血益血。則鬚髮變黑。而 齒亦因之而固矣。故古今變白之 草。當以茲為勝。本經主血痢及鍼 灸瘡。發洪血不可止者。傳之立已。

塗眉髮。生速而繁。蕭炳又謂能止 血排膿。通小腸。傳一切瘡。并點鼻 中。添腦者。蓋以血痢由於血分。為 溼熱所傷。鍼灸瘡發洪血不止。亦 緣病人素有血熱。及加艾火則益 熾矣。血涼則不出。營血熱壅則生 膿。涼血則自散。小腸屬丙火。有熱 則不逆。營血熱解。則一切瘡自愈。

膿為髓之海。熱則消。火能消物。故 也。鼻竅通氣於腦。故以膏點鼻中。 使腦中熱散。無邪刺蝕。則腦自益 矣。之數者。何非涼血益血之功也。

【清】黃宮繡本草求真論鱧腸曰。 旱蓮草即書所云鱧腸草。金陵草 者是也。味甘而酸。性平色黑。功歸 入肝入腎。為止血涼血要劑。是以 血痢煎膏用之。其血即止。鬚白汁 塗。變白為黑。火瘡發紅。其紅即退。 齒牙動搖。擦之即固。合冬青子名 二至丸。以補肝腎。但性陰寒。雖善 涼血。不益脾胃。若不同以薑汁椒 紅相兼。修服者必腹痛作瀉。苗如 旋覆。實似蓮房。斷之有汁。須臾而 黑。熬膏良。

近人學說 張山雷曰。鱧腸 草折其莖汁出。須臾而黑。故以鱧 腸為名。言如鱧魚之腸也。產於下 溼地。結實如小蓮房。因有旱蓮之 名。古謂之金陵草。亦稱墨菜。汁黑 而黏。故入腎補陰而生長毛髮。又 能入血。為涼血止血之品。又消熱 病癰腫。但黑色之藥。純陰用事。非 陽盛之體。不應多用。脾虛泄瀉尤 忌。凡勞怯諸症。陰虛火旺者。不可

以此等陰藥。專治其標。須與補中健脾之劑相輔成功。乃為萬全無弊之策。若止知為熱。徒事寒涼。則虛火未必安潛。而脾胃之陽先敗。必有過中泄瀉不食之虞。且虛火縱以逆折得息。而反為純陰無陽之候。又將何以善其後耶。唐本草謂氣味甘酸而平。主血利。又鍼灸瘡發。血不可止者。傅之立止。汁塗眉髮。生遠而繁。日華謂通小腸。治瘡瘍。瀕湖謂烏髭髮。益腎陰。祝天一日。李時珍云。旱蓮有兩種。一是鱧腸。一是小連翹。今市上亦有兩種。一名黑旱蓮。一名紅旱蓮。黑旱蓮者。莖葉皆有毛。枝柔委地。葉對生如柳葉。斷之有黑汁。花白如小菊。實似覆盆。是鱧腸也。紅旱蓮莖葉皆紅。無毛。幹硬挺立。葉似莖葉。實房如石蓮子。破之中亦分。似芝蔴房。然而無裂紋。亦符李時珍所謂小連翹也。本草旱蓮。止一切血。烏髭髮。益腎陰。兼治瘡瘍。腫毒。鱧腸色黑氣腐。質弱味鹹。止一切血。而滋腎陰者。當取鱧腸也。瘡瘍為溼熱釀成。小翹色赤氣芳。實似心房。入替分而清熱。治瘡

二十四畫 鱧

瘡者。當取小翹也。古方二至丸註云。夏至採旱蓮。冬至採女貞。按夏至時。小翹始成熟。鱧腸尚嫩。當時也。嫩苗氣味不全。所云夏至採旱蓮者。似指小翹言也。愚以二至丸為滋補肝腎之藥。理當取鱧腸。其謂二至者。至到也。女貞至肝陰。旱蓮至腎陰。言兩物能益肝腎也。非夏至冬至採藥時之謂也。傷寒論瘡熱發黃。有麻黃連翹赤小豆湯方。方解云。連翹即連翹根非也。而李時珍宗之。連翹條云。根名連翹。下註仲景二字。不知方解者。後人解仲景之方。非仲景自解其方也。不得云仲景謂連翹即連翹根也。爾雅連翹。一名連苳。苳與翹通。詩云。苳之華。芸其黃矣。註云。陵苳。生下溼地。疑即翹也。蓋苳翹音同而義通。本草多同出異名。異出同名。致後人之滋惑者亦多矣。如大翹小翹。同出而異名。鱧腸小翹。異出而同名是也。本經又有翹根。陶弘景云。方藥不用。人無識者是矣。好古云。即連翹根。應斷也。而又以為連翹者益非矣。

變白為黑。金陵草一秤。六月以後收採。揀青嫩無泥土者。不用洗。摘去黃葉。爛搗。新布絞取汁。以紗絹濾過。入通油器。鉢盛之。日中煎。五日。又取生薑一斤。絞汁。白蜜一斤。合和。日中煎。以柳木篋攪。勿停手。待如稀餛。藥乃成矣。每日及午後各服一匙。以溫酒一盃化下。如欲作丸。日中再煎。令可丸。大如梧子。每服三十九。及時多合為佳。其效甚速。(千金方)

烏鬚固齒。七月取旱蓮草。連根一斤。用無灰酒洗淨。青鹽四兩。淹三宿。同汁入油鍋中炒存性。研末。日用擦牙。連津嚥之。又法。旱蓮取汁。同鹽煉乾。研末。擦牙。(攝生妙用方) 旱蓮散。烏髭固牙。溫財云。納合相公。用此方。年七十。鬚髮不白。懇求始得。後遇張經。始傳分兩也。旱蓮草一兩。牛麻。姑餅三兩。升麻。青鹽各三兩。半。訶子連核二十個。皂角三挺。晚蠶沙二兩。為末。薄醋。麩糊丸。彈子大。曬乾。入泥瓶。中火煨。令烟出。存性。取出。研末。日用擦牙。(奉親養老書方)

治偏正頭痛。鱧腸草汁滴鼻中。(聖濟總錄方)

治一切眼疾。腎膜遮障。涼腦。治頭痛。能生髮。五月五日。平日。含之。蓮子草一握。藍葉一握。油一斤。同浸。密封四十九日。每臥時。以鐵匙點藥。摩頂上四十九遍。久久甚佳。(聖濟總錄方)

緊臂截癩。旱蓮草。燒爛。男左女右。置寸口上。以古文錢壓定。帛緊住。良久。起小泡。謂之天灸。其癩即止。甚效。(王執中資生經方)

治小便血瀾。金陵草一名鱧頭草。車前草各等分。杵取自然汁。每空心服三盃。愈乃止。(醫學真傳方)

治腸風臟毒。下血不止。旱蓮子。草瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。(家藏經驗方)

治痔漏瘡。發。旱蓮草一把。連根洗淨。用石臼搗如泥。以極熱酒一盞。衝入。取汁飲之。痔傳惡處。重者。不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳。患此。杖方能移步。服之得瘡。瘡治有驗。(劉松石保壽堂方)

治疔瘡。腫。五月五日。收旱蓮草。陰乾。仍露一夜。收。遇疾時。嚼

一葉貼上。外以消毒膏護之。二三
日疔脫。(聖濟總錄方)

◎治風牙疼痛。翹頭草。入鹽
少許於掌心揉擦即止。(集玄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛無熱。胃寒
便溏者禁用。

參攷資料 ①鵞腸生下溼地。

所在坑渠間多有。苗似旋覆。二月

八月採陰乾。(蘇恭) ②處處有之。

南方尤多。此有二種。一種葉似柳

而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開

花細而白。其實若小蓮房。蘇恭謂

似旋覆者是也。一種苗梗枯瘦。頗

似蓮花而黃色。實亦作房而圓。南

人謂之遠翅者。二種折其苗。皆有

汁出。須臾而黑。俗謂之旱蓮子。亦

謂之金陵草。(蘇頌) ③旱蓮有二

種。一種苗似旋覆而花白細者是

鵞腸。一種花黃紫而結房如蓮房

者。仍是小遠翅也。爐火家亦用之。

(李時珍) ④鵞腸性冷陰寒之質

雖善涼血。不益脾胃。病人雖有血

熱。一見脾胃虛敗。飲食難消。及易

渣滓作泄者。勿輕與服。孫真人方

用葶汁和劑。蓋防其冷而不利於

腸胃故也。不用葶汁。椒紅相兼修
事服之者。必腹痛作瀉。宜詳審之。

(經希雅)

【鵞腸草】即鵞腸之處方用名。詳

【鵞腸】條。

【鷹】 原名 蒼鷹。

以鷹擊故名。本品簡稱爲鷹。鷹

古籍別名 角鷹。鷂。鷂。(綱目)

外國名詞 Astur palumbus

rus Linn Common goshawk

(拉丁) Eagle (英) 夕力或才未

夕力(日本)

基本 係屬脊椎動物鳥類猛

禽類鷹科。

產地 深山林野間多有之。

形態 鷹爲林禽類之一種。頭

扁。上嘴鈎曲。下嘴小。尖端呈截斷

狀。眼圓。視力頗強。頭頂黑色。頭後

具白色與褐色之雜斑。全體上暗

褐色。下面白色。羽軸暗褐。有淡褐

條紋。脛被毛。跗蹠黃色。趾皆具鈎

爪。羽翼有黑褐與灰色橫紋。互相

排列。盤翔天空。捕食小類生物。其

內可供藥用。

主治 食之。療野狐邪魅。

【鷹毛】 主治 斷酒。以水煮汁
飲。

【鷹吐毛】 基本 鷹食鳥雀。連

毛食之。內消而毛不

消。聚成一團。次早吐出。如大灰質。

主治 反胃噎膈。煨末服。

【鷹目】即石硫黃之別名。典

見和漢藥考。詳【石硫黃】條。

【鷹屎白】 性質 微寒。有小毒。

主治 傷癰。滅痕。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論鷹屎白曰。燒灰酒服。治

中惡。【唐】蘇恭新修本草論鷹屎

白曰。燒灰酒服。方寸匕。主邪惡。勿

令本人知。【明】李時珍本草綱目

論鷹屎白曰。消虛積。殺勞蟲。去面

皰野鷲。

參攷資料 單用不能滅癩。須

合殭蠶衣魚之屑。爲膏效。(陶弘

景)

【鷹骨】 主治 傷損接骨。燒灰

下。食前食後。

每服二錢。酒服。隨病上

下。食前食後。

【鷹睛】 主治 和乳汁研之。日

三注眼中。三日見碧翳
中物。忌烟蕪。

【鷹嘴及爪】 主治 五痔。狐
魅。燒灰水服。

【鷹嘴香】即特迦香之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳【特迦香】條。

【鷹頭】 主治 五痔。燒灰飲服。

歷代記述攷證 【明】

李時珍本草綱目論鷹頭曰。治痔

瘻。燒灰入辟香少許。酥酒服之。治

頭風眩暈。一枚燒灰酒服。

【鷲】即鷲鷲之原名。詳【鷲鷲】條。

【鷲鷲】即鷲鷲之別名。典見動物

學大辭典。詳【鷲鷲】條。

【鷲鷲草】即忍冬藤之古籍別名。

典見和漢藥考。詳【忍冬藤】條。

【鷲鷲】 原名 鷲。

命名 禽經云。鷲飛則

霜。鷲飛則露。故名。

古籍別名 絲禽。雪客。養鷲。白

鳥。(綱目)白鷲。鷲鷲。一杯鷲。(動

物學大辭典)

基本 係脊椎動物鳥類涉禽

類鷲科。

形態 鷲鷲爲水禽類之一種。

嘴長色黑。有直溝紋而端尖。頸細

長。全體白色。夏月頭後垂有數枚

細長之白冠毛。鈔鈔如絲。背有白

色疏鬆之毛。名爲毳毛。尾翼十二。脚長黑色。趾暗黃。有長爪。常在河沼池澤相近之林野間。而水食林棲。食魚蟲等物。其肉可供食與藥用。



鷺 鷺

性質 鹹。平。無毒。
主治 療虛瘦。益脾補氣。炙熟食。

【鷺鷥頭】 主治 破傷風。肢強。口緊。連尾燒研。以臘

豬脂調傅瘡口。

【鷺鷥藤】 卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。

【鷺】 卽鳥鷺之古籍別名。典見綱目。詳『鳥鷺』條。○卽山鷺之古籍別名。典見爾雅。詳『山鷺』條。

【鷺鷥】 卽鷺鷥之古籍別名。典見綱目。詳『鷺鷥』條。

【鷺鷥】 古籍別名 須臾。(爾雅)水鷺。(正要)鷺鷥。(日用)刁鴨。(食療)油鴨。(綱目)

二十四畫 鷺

鷺鷥 鷺鷥 鷺鷥 鷺鷥 鷺鷥

俗名)

外國名 鷺鷥 *Podiceps fuv-*
jaculis philippensis Bonnat
Chinese little grebe 或 Greb
Haubentaucher (拉丁) カイ
ツブリ 或 *ニホムグリ* (日本)
基本 係行推動物鳥類游禽
類鷺鷥科之鷺鷥。
產地 南方湖澤沼池間多有之。



鷺 鷺

形態 鷺鷥爲水禽類鷺鷥屬之一種。形似鷺。又似鴨。頭背及翼羽色蒼黑。有斑點。腹白胸黃。嘴短而黑。嘴根黃綠。頭上及頰有長毛。尾短小。趾扁闊無蹼。翼不能高飛。性巧潛水。故見人卽沉入水底。少頃仍浮游於水面。恒以蘆荻替菓。捕魚介爲食。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 補中益氣。五味炙食甚

美。

【鷺鷥膏】 主治 滴耳治聾。塗刀劍不鏽。

【鷺鷥】 古籍別名 鷺鷥。(綱目)

產地 山溪有深水處多有之。
形態 鷺鷥爲水禽類之一種。其狀如鴨而大。長頸。赤目。斑嘴。毛紫紺色。如鷓鴣。其毛及屎可供藥用。

主治 燒灰水服。治溪鳥毒。砂蠶水弩。射工蛾。短狐。蝦蟇等病。亦可將鳥近病人。卽能啖人身。訖以物承之。當有沙出。其沙卽含沙射人之箭也。

參攷資料 ①蝦蟇瘡最毒。十活一二。桂嶺獨名。但早覺時以芋及甘蔗葉風角入肉。勾出其根。如蝦蟇狀。則愈遲。則根入至骨。有如此腫。最惡。好著人隱處。(陳藏器) ②水弩。短狐。射工蛾。一物也。陳氏分爲四非矣。溪毒有氣無形。砂蠶沙中細蟲也。(李時珍)

【鷺鷥】 命名 本品專食短狐。在溪中勅逐害物。故名。 古籍別名 溪鴨。(異物志)紫

鷺鷥(綱目)鷺鷥(說文)

形態 鷺鷥爲水禽之一種。其形如鷺鷥而稍大。似鴨而較小。羽色有五彩。多紫色。頭有縷。尾羽甚如船舵。其肉可供藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 食之去驚邪。及解短狐毒。

【鷺】 卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。
【鷺鷥】 卽鷺鷥之古籍別名。典見日用本草。詳『鷺鷥』條。
【鷺鷥】 卽鷺鷥之古籍別名。典見莊子。詳『鷺鷥』條。

【鹼水】 卽石鹼之處方用名。詳『石鹼』條。
【鹽】 卽食鹽。詳『食鹽』條。
【鹽水】 卽食鹽溶於水中者之處方用名。詳『食鹽』條。
【鹽水炒杜仲】 卽杜仲用鹽水炒成者之處方用名。詳『杜仲』條。
【鹽水炒熱地】 卽熱地黃用鹽水炒成者之處方用名。詳『熱地黃』條。

【鹽石】 卽消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『消石』條。

【鹽豆豉】即鹽豉之原名。詳『鹽豉』條。

【鹽枕】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽根】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽笋乾】基本 本品即春笋和鹽湯煮鹽而成者。古籍別名 泥黃。烏尖。直脚。綱目拾遺。

性質 鹹。甘。平。無毒。主治 行氣消痰。

【鹽消】即鹽硝。詳『朴硝』條。

【鹽梅子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽棘子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽萎子】即胡萎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡萎』條。

原名 鹽豆豉。製法 用大豆水浸三日。淘蒸攤罨。候生黃。取出。絞淨。水。淘乾。加鹽。薑。絲。椒。橘。蘇。茴。杏。仁。拌勻。入甕。上面水浸。以箬蓋封口。鹽一月乃成。

主治 功同蒲州豆豉。詳見該

條。

【鹽肉】即鹽膽水之俗名。詳『鹽膽水』條。

【鹽湯】即食鹽溶於沸水中者之處方用名。詳『食鹽』條。

【鹽硝】即朴硝之古籍別名。典見綱目。詳『朴硝』條。

【鹽鹵】即鹽鹵。詳『鹽鹵水』條。

【鹽精石】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽綠】即綠鹽之古籍別名。典見綱目。詳『綠鹽』條。

【鹽膚子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽蓬】產地 出河北海濱鹽地。有之。

形態 鹽蓬為雜草類之一種。其葉似蕪而圓長。至秋時葉俱紅色。採之燒灰淋湯煎鹽。勝於海水者。可供藥用。

性質 鹹。涼。無毒。主治 清熱消積。

【鹽麩子】命名 本品味酸鹹。故名。

古籍別名 叛奴鹽。酸桶。綱目拾遺。五構。鹽膚子。鹽梅子。鹽

子。綱目。木鹽。通志。天鹽。續草篇。酢桶。本草拾遺。

外國名詞 Ehus somi-alata, Murr. var. osbeckii, DC. (拉丁) ヌルテ(日本)

基本 係漆樹科漆樹屬。為鹽木之子實。

產地 生山野間。

形態 鹽麩為喬木類之落葉木本。高二丈餘。葉為奇數羽狀複葉。長尺餘。有鋸齒。面青背白。小葉長卵形。總葉柄在小葉間有翼。其葉之面背有瘤狀之蟲巢。色赤褐。即五倍子。夏月梢頭開花。作圓錐花序。花小綠白色。七月結小核果。密生紫色或白色之短毛。熟則外附白色粉質。中有子。可供藥用。

上白屑。搗末服之。

歷代記述攷鹽 【明】李時珍本草綱目論鹽麩子曰。生津降火。化痰潤肺。滋腎消毒。止痢收汗。治風溼眼病。

參攷資料 鹽麩子之核外薄皮上有薄鹽。謂之鹽霜。可制汞硫。

【鹽麩樹白皮】主治 破血。止血。蠱毒。血痢。殺蛇蟲。并煎服之。

【鹽麩樹根白皮】主治 酒。淋。一宿。平旦空腹溫服一二升。

歷代記述攷鹽 【明】李時珍本草綱目論鹽麩樹根皮曰。諸骨頗。以醋煎濃汁時呷之。

參攷資料 按本草集議云。鹽麩子根。能輭雞骨。岑公云。有人被雞骨硬。項腫可畏。用此根煎醋。嚼至三椀。便吐出也。又彭醫官治骨。硬。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦鈞出骨也。李時珍。

【鹽龍】產地 生南蠻諸地。形態 鹽龍為爬蟲類。



鹽 子

性質 酸。微寒。無毒。主治 除痰飲。瘴癘。喉中熱結。喉痺。止渴。解酒毒。黃疸。飛尸。蟲毒。天行寒熱。咳嗽。變白。生毛髮。去頭

鱗屬之一種。長尺餘。飼以海鹽。則每罈中流出鹽質。可供藥用。

主治 與陽事。每以罈中鹽質。溫酒服。

【鹽膽水】 基本 本品即煮鹽。初熟時槽中溼下之。

黑水也。

古籍別名 鹽鹵。(俗名)

性質 鹹苦。大毒。

主治 痰咳不省。

用法 灌之即吐。

【鹽藕節】 命名 本品即取新。鮮藕節烘乾。用鹽醃。

過者。故名。

主治 喉痛。嚼汁嚥之。陰虛喉。

痛更佳。

【鹽藥】 產地 生山谷間。

形態 鹽藥為鹵石類。

之一種。形似芒硝末。入口極冷。可。

供藥用。

性質 鹹。冷。無毒。

主治 眼赤。皆爛風赤。細研。水。

和點之。又水研服。去熱煩。痰滿。頭。

痛。明目鎮心。又主蛇虺。惡蟲毒。藥。

箭。瘰癧。疥癬。瘰癧。並摩傅之。

其者。水化服之。又解獨自草箭毒。

【鹽蟹汁】 基本 本品即以鹽。醃蟹之鹵汁。

主治 喉風重痛。滿合細喉。即。

【鹽菴草】 即馬先蒿之日本名。詳。

【馬先蒿】條。

【鹽菴菊】 即馬先蒿之日本名。詳。

【馬先蒿】條。

【鹽爪】 主治 健忘。五月五日。

收葭衣。領中。

【鹽甲】 命名 鹽行蟹。故名。

【鹽甲】 處方用名 淡鹽甲。生。

【鹽甲】 古籍別名 團魚。(俗名)神守。

河伯從事。(古今注)上甲。孚乳甲。

黑龍衣。寇津甲。(和漢藥考)守神。

(淮南子)

基本 係團魚類為蟹之甲。

產地 陳仁山藥物生。產辨云。

以產暹羅。大隻厚甲為正。近日各。

熱藥店。所用小隻薄甲。乃水魚殼。

也。中國各省均有。以長江揚子江。

一帶為多出。功力不及厚甲之佳。

此乃利其質薄易炒。慳柴火耳。蟹。

屬一種。水魚另屬一種。不可不知。

形態 蟹殼類。龜水居陸生大。

者六七寸。小者四五寸。但頭尾四。肢。俱不能縮藏甲中。尾短而頭頭。長。鼻類象鼻。性喜堅。嚼他物。頗不。易脫。其脊甲帶褐黑色。多小裂。祇。中央部分硬。邊緣軟。作肉裙。俗稱。蟹裙。

製法 蘇頌曰。今處處有之。以。岳州沅江所出。甲有九肋者為勝。入藥。以醋炙黃。用陶弘景曰。採得。生取甲。剔去肉者為好。凡有連脈。及乾巖者。便真。若肋骨出者。是。煮。熱不可用。雷斅曰。凡使要綠色。九。肋多。重七兩者為上。用六一泥。固瓶子底。待乾。安甲於中。以物。指。起。若治癩塊。定心藥。用頭醋入瓶。內。大火煎盡三升。乃去裙。助骨。炙。乾。入用。若治勞。去熱藥。不用醋。用。童子小便煎盡一斗二升。乃去裙。留骨。石臼搗粉。以雞脂皮裹之。取。束流水三升。盆盛。關於盆上一宿。取用。力有萬倍也。李時珍曰。按。衛生寶鑑云。凡蟹甲。以煨。灰一斗。酒五升。浸一夜。煮令爛。如膠漆。用。更佳。桑柴灰尤妙。

性質 鹹。平。無毒。

效能 補陰氣。潛肝陽。消癥瘕。

除寒熱。用於女子血病及勞瘵等。主治 心腹癥瘕。堅積。寒熱。去。痞疾。息肉。陰蝕。痔核。惡肉。(本經)。療。溫瘧。血。癥。腰痛。小兒。腦下。堅。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥。性本草論鹽甲曰。宿食癥塊。癥。瘕。冷瘕。勞瘵。除骨熱。骨節間勞熱。結。實。壅塞。下氣。婦人。漏下。五色。下。崩。血【宋】日華諸家本草論鹽甲曰。去血氣。破癥結。惡血。墮胎。消瘡。腫。腸。癰。并。撲損。瘀血【元】朱丹溪本。草衍義補遺論鹽甲曰。補陰。補氣。【元】寇宗奭本草衍義論鹽甲曰。治勞瘵。除骨熱。極佳【明】李時珍。本草綱目論鹽甲曰。除老癩。瘡。母。陰。毒。腹痛。勞復。食復。斑。痘。煩。喘。小。兒。癩。癩。婦人。經。脈。不。通。難。產。產。後。陰。脫。丈夫。陰。瘡。石。淋。飲。漬。鹽【明】。繆希雍本草經疏論鹽甲曰。鹽甲。味。鹹。平。無。毒。潤。下。作。鹹。甲。主。消。散。者。以。其。味。兼。乎。平。平。亦。辛。也。鹹。能。軟。堅。辛。能。走。散。故。本。經。主。癥。瘕。堅。積。寒。熱。去。痞。疾。息。肉。陰。蝕。痔。核。惡。肉。別。錄。療。溫。瘧。者。以。瘧。必。暑。邪。為。病。類。多。陰。虛。水。衰。之。人。乃。為。暑。所。

深中邪入陰分。故出併於陽而熱甚。入併於陰而寒甚。元氣虛弱。則邪陷而中焦不治。甚則結為痞母。甲能益陰除熱而消散。故為治痞之要藥。亦是退勞熱在骨。及陰虛往來寒熱之上品。血癢腰痛。小兒脇下墜。皆陰分血病。宜其悉主之矣。勞復女勞復。為必須之藥。勞復骨蒸。非此不除。產後陰脫。資之尤急。【清】黃宮繡本草求真論髓甲曰。髓甲味鹹氣平色青。昔雖載屬補肝。與龜載屬補腎。各別然究皆屬除熱削肝之品。非真滋肝藥也。凡厥陰血分積熱。而見分嗽骨蒸。寒熱往來。溫瘧瘧母。及腰腹脇堅。血癢痔核。經阻產難。癆瘵瘧腫。驚癇痘疹等症。服無鹹平。能以消除。若肝虛無熱切忌。髓以七肋九肋者佳。以其得陽之數耳。其用必取乎肋。以助屬肝故耳。但食品中惟髓叵測。如三足兩頭。並項強腹赤。皆有大毒。能以殺入不可不慎也。【清】楊時泰本草述鈞元論髓甲曰。髓甲益陰。丹溪更云補氣。夫氣有陽氣陰氣之殊。其說本於內經。經曰陰虛則無氣。無氣則死。蓋惟

是真陰之氣。有化乃有生。有生即有化。故本經首主癆瘵堅積。而別錄甄權。日華子。並以溫瘧。血癢。宿食。冷塊。疝瘕。瘕結為言也。丹溪揭出補陰。補氣而言。可謂探其要矣。本經不言治勞。然虛勞多用之。蓋勞雖五臟皆有。而心腎為多。心主血。腎主精。精竭血燥。則勞生焉。所以清骨扶羸之除蒸熱必用。而麥煎散又以治少男室女。骨蒸黃瘦。口臭盜汗。七情為病也。又虛勞發熱。未有不由癆血者。癆血未有不由內傷者。凡心下引脇俱痛。皆滯血不消。新血無以養。故麥煎散中用髓甲。并同於乾漆以化積者。由茲味能以通壅為滋補也。髓甲之治瘧。尤專於瘧母。瘧母即邪之結為癥瘕者。可見諸本草無不以血癥瘕塊為言。固有見於茲味陰氣之專。即化以為生矣。其次更治脚氣。脚氣之起。惟是陰不升而陽不降耳。足為三陰所起之地。即三陽所歸之地。陰為陽之原。如三陰不足。不能上而召陽之歸。則三陽失守。不能下而和陰之滯。故陰壅於下。陽逆於上。脚氣所由病也。陰

不足而不能升。致陽失守而不能降。故大髓甲湯。以髓甲之補陰者為君。又髓甲散。木香散。皆治脚氣。心腹脹滿。一則并治小便不利。一則云治堅硬不消。夫心腹脹滿。非陰不升。以致陽不降乎。小便不利。非陽不得陰以歸而達於下乎。堅硬不消。非陰不得陽以化而暢於上乎。二證皆用髓甲以和陰陽之升降。則其專精於陰氣可知矣。至於積聚之治。蠶櫃言喜怒不節。則傷臟。臟傷則陰虛。虛則風雨。暴之病起於上而生積。清溼襲之病起於下而生積。此積所由生之要領也。方書治肝積肥氣。髓甲丸。心積伏梁。乾漆丸及半夏散。脾積痞氣。又髓甲丸。統以髓甲為之。君則積之本於陰虛而生者。固不能舍專於陰氣之味。以奏效也。又次而治嗽血。黃芪髓甲散。人參黃芪散。盜汗。麥煎散。黃芪散。凡虛勞之有客熱者。再如男子遺精。女子漏下。皆用髓甲療之。卻又以行瘀血。總由此味專補陰氣。如漏則陰氣虛。而不能固也。瘀亦陰氣虛。而不能流貫於經絡也。但就

女子經血一證以推所治。即可知其要以盡其變矣。
配合應用 ①治久癩。用髓甲、牛膝、當歸。佐以橘皮。何首烏。知母。麥門冬。
②治溫癩。熱甚渴甚。用髓甲、知母、石膏、麥門冬、貝母、竹葉。無肺熱病者。加人參。若癩發熱甚渴甚。又寒甚汗多。發時指甲。狀若欲死。并加桂枝。有神去桂枝。治癩瘰良。
③治骨蒸勞熱。用髓甲、青蒿、麥門冬、五味子、地黃、枸杞、牛膝。甚則加銀柴胡、地骨皮、胡黃連。
④肉主傷中益氣。補不足。腹中結熱。婦人漏下。陰虛羸瘦。性冷。補一切陰虛人宜常食之。
⑤治老瘧勞瘧。用髓甲醋炙研末。酒服方寸匕。隔夜一服。清早一服。臨時一服。無不斷者。入雄黃少許更佳。【肘後方】
⑥治奔豚氣痛。上沖心腹。髓甲醋炙三兩。京三稜煨二兩。桃仁去皮尖四兩。湯浸研汁三升。煎二升。入末煎良久。下醋一升。煎如餠。以餅收之。每空心酒服半匙。【聖濟方】

① 治血癩癩瘡。用鼈甲、琥珀、大黃等分作散。酒服二錢。少時惡血即下。若婦人小腸中血下盡即休服也。(甄權方)

② 治疥癬癩積。用鼈甲醋炙黃研末。牛乳一合。每調一匙。朝朝服之。(甄權方)

③ 治婦人漏下。鼈甲醋炙研末。清酒服方寸匕。日二。又用乾薑、鼈甲、訶梨勒皮等分爲末。糊丸。空心下三十九日再服。(甄權方)

④ 治婦人難產。鼈甲燒存性。研末。酒服方寸匕。立出。(梅師方)

⑤ 治勞復食復。爲病初起。受勞傷食致復欲死者。鼈甲燒研。水服方寸匕。(肘後方)

⑥ 治小兒癩疾。用鼈甲炙研乳服一錢。日二。亦可蜜丸服。(子母秘錄方)

⑦ 治卒得腰痛。不可僞仰。用鼈甲炙研末。酒服方寸匕。日二。(肘後方)

⑧ 治沙石淋痛。用九肋鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。日三。服石出瘕。(肘後方)

⑨ 治陰虛夢泄。九肋鼈甲燒研。

每用一字。以酒半盞。童尿半盞。葱白七寸。同煎去葱。日晡時服之。出臭汗爲度。(醫心元戎方)

⑩ 治吐血不阻。鼈甲、蛤粉各一兩。同炒色黃。熱地黃一兩。牛曬乾爲末。每服二錢。食後茶下。(聖濟總錄方)

⑪ 治癩痘煩喘。小便不利。用鼈甲二兩。燈心一把。水一升。煎六合。分二服。凡患大小便有血者。中壞也。黑厭無膿者。十死不治。(廣安時傷寒論方)

⑫ 治癩疽不斂。不拘發散一切瘡。用鼈甲燒存性。研搽甚妙。(李樓怪症奇方)

⑬ 治腸癰肉痛。鼈甲燒存性。研水服一錢。日三。(傳信方)

⑭ 治陰頭生瘡。人不能治者。鼈甲一枚。燒研。鷄子白和傳。(千金方)

⑮ 治瘡唇緊裂。用鼈甲及頭燒研傅之。(類要方)

⑯ 治人咬指爛。久欲脫者。鼈甲燒灰傅之。(葉氏摘玄方)

用量 三錢至四錢。

應用宜忌 凡陰虛而無熱。以

及脾弱而瀉。瀉禁用。能墜胎。孕婦亦忌。惡礬石。並不與鷄子、鴨肉、菹菜、猪、兔、同食。食之損人。

著名方劑 鼈甲煎丸治瘧邪結爲癥瘕。名曰瘧母。(金匱方) 鼈甲十二分。柴胡六分。黃芩三分。人參一分。半夏一分。桂枝三分。芍藥五分。阿膠三分。乾薑三分。大黃三分。厚樸三分。零蘆一分。石葶三分。覆麥二分。赤硝十二分。桃仁二分。丹皮三分。烏扇五分。紫葳三分。蟻

蟻六分。鼠婦三分。蜂窠四分。塵蟲五分。爲末。煨。鼈下灰一斗。清酒一斛。五斗。浸灰。候酒盡。一半。入鼈甲煎化。取汁。入諸藥中。煎爲丸。梧桐子大。空心服七丸。日進三服。

參攷資料 ① 鼈。水居陸生。脊連脇。其甲四圍有肉。謂之曰鼈。內裏甲無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及龜爲匹。夏日生卵於溼。液河隔水望之。卵自孕化而出。性畏隙光。暴之日中無恙。置隙光之下。輒死。又畏蚊。啣之。經夕則死。(李時珍) ② 鼈。蠕動之物。入肝經至陰之分。既能養陰。又能入絡搜邪。

(吳鞠通) ③ 金匱鼈甲煎丸。治病

瘧一月不差。結爲癥瘕者。以鼈甲行厥陰而消癥瘕也。升麻鼈甲湯。治陽毒陰毒者。以鼈甲排膿穢而行血瘀也。(黃元御) ④ 經中不言治勞。惟藥性論言治勞瘦骨熱。故虛勞多用之。然甚有據。但不可過劑耳。(寇宗奭) ⑤ 鼈。甲蟲也。與龜同類。四緣有肉。謂之曰鼈。甲裏肉。鼈肉裏甲。無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及龜爲匹。故萬學術云。燒隨脂。可以致鼈也。夏日孕乳。其抱以影。掉雅云。卵生思抱。其狀隨日影而轉。在水中上必有浮沫。名曰鼈津。人以此取之。今有呼鼈者。作聲。撫掌望津而取。百十不失。管子云。泗水之精。名曰鼈。以名呼之。可取魚鼈。正此類也。類從云。鼈一鳴而鼈伏。性相制也。又畏蚊。生鼈過蚊叮。則死。死鼈得蚊啣而爛。所以黑蚊者。復用鼈甲物。相報復如此。異哉。淮南子云。膏之殺鼈。類之不可推也。(李時珍)

【鼈肉】 性質 甘。平。無毒。主治 傷中益氣。補不足。

歷代記述攷鑑 [唐]陳藏器

本草拾遺論鼈肉曰熱氣溼痺。腹中激熱五味煮食。當激泄。唐孟助食療本草論鼈肉曰婦人瀉下五色。羸瘦宜常食之。宋日華諸家本草論鼈肉曰婦人帶下血。腹痛。宋蘇頌經本草論鼈肉曰去血熱補虛久食性冷。元朱丹溪本草衍義補遺論鼈肉曰補陰。明李時珍本草綱目論鼈肉曰作屬食治久痢長鬚髮作丸服治虛勞。疾癩脚氣。清王士雄隨息居飲食譜論鼈肉曰滋肝腎之陰。清虛勞之熱。主脫肛崩帶。瘰癧瘰癧。以湖池所產背黑而光澤。重約斤許者良。宜蒸煮食之。或但飲其汁則益人。多食滯脾。且鼈之陽聚於上甲。久嗜令人患發背。孕婦及中虛寒溼內盛時邪未淨者切忌之。又忌與葱同食。回回不食鱉。謂之無鱉魚。凡鼈之三尺者。赤腹者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字文者。過大者。在山上者。有蛇文者。並有毒殺人。或云薄荷煮鼈亦害人。其殼入藥。亦不可作丸散服。清黃宮繡本草求真論鼈肉曰鼈肉

止有雌無雄。與蛇與龜為匹。形多變幻。故書有言鼈有三足一足者不宜食。獨目者不宜食。頭足不縮者不宜食。目凹陷者不宜食。腹下有王字卜字文。蛇文者不宜食。生於山上者名旱鼈。不宜食。腹赤如血者名珠鼈。不宜食。此有毒殺人。不宜食。鼈之說也。又言鼈合鷄子。莧菜食。則令人生鼈。同猪兔鴨食。則能損人。同芥子食。則生惡瘡。與妊婦食。則生子項短。同薄荷食。則能殺人。此合他味同食之。有見害於人也。至於冷癆。食之則能發冷水病。須合葱與椒薑同煮。並到鼈甲少許。以入。可知鼈性冷。故須假以椒薑。以為之制。鼈肉聚。故須假以鼈甲之散。以為之佐耳。惟婦人素挾血熱症。見血竅血漏。並癩癩諸症。服之得宜。若使中氣有虧。謂可補中益氣。縱出別錄。亦屬膚語。不足信也。

參攷資料

禮記食鼈去醜。謂頭下有輓骨如龜形者也。食之令人患水病。凡鼈之三尺者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字文者。腹有蛇

文者。是蛇化也。在山上者名旱鼈。並有毒殺人。不可食。陳藏器。鼈肉不可合鷄子食。莧菜食。昔有人到鼈。以赤莧同包。置溼地。經旬皆成生鼈。又有製鼈甲屑。經五月皆成鼈者。陶弘景。鼈肉不可合猪兔鴨肉食。損人。不可合芥子食。生惡瘡。孫思邈。案三元參贊養。言鼈性冷發水病。有冷勞氣。癩癩人不宜食之。生生爛言鼈性熱。戴原禮言鼈之陽聚於上甲。久食令人生發背。似與冷性之說相反。蓋鼈性本不熱。食之者和以椒薑熱物太多。失其本性耳。鼈性畏葱及桑灰。凡食鼈者宜取沙河小鼈。斬頭去血。以桑灰湯煮熟。去骨甲。換水再煮。入葱醬作羹。膳食乃良。其膽味辣。破入湯中。可代椒而辟腥氣。李九華云。鼈肉主聚。鼈甲主散。食鼈到甲少許入之。庶幾稍平。又言薄荷煮鼈能害人。此皆人之所不知者也。李時珍。鼈血柴胡。即柴胡用鼈血拌成者之處方用名。詳柴胡條。主治。鹽藏煨食。止小兒下痢。

【鼈津甲】即鼈甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳鼈甲條。

【鼈珠】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳真珠條。

【鼈兒搗】即莖葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳莖葉條。

【鼈脂】主治。白髮。拔去之。塗孔中。

【鼈頭】主治。陰乾燒灰。療小兒諸疾。婦人產後陰脫下墜。尸注心腹痛。

歷代記述攷證。宋日華諸家本草論鼈頭曰。傳歷年脫肛不愈。

【鼈頭血】主治。脫肛年久不愈。收者塗之即愈。

歷代記述攷證。明李時珍本草綱目論鼈頭血曰。鼈頭血治風中血脈。口眼喎僻。及小兒疳勞潮熱。

參攷資料。按千金方云。目開。唇動。口喎。皆風入血脈。急以小續命湯服之。外用鼈血或雞冠血調伏龍肝散塗之。乾則再上。甚妙。蓋鼈血之性急縮走血。故治口喎脫肛之病。李時珍。

【龍膽】 性質 味辛。主治 開聲。除癥瘕痞積。息肉惡瘡。陰蝕痔核。

配合應用 治痔瘡痔漏。以龍膽一個。取汁磨香墨入麝香冰片少許。仆臥。乃用鷄毛蘸塗。(家寶方)

【腐鬍】即獬豸之古籍別名。典見山海經。詳「獬豸」條。

二十五畫

【椀醬】即烏椀肉搗碎。日久生霜如白鹽者。性質功用與烏椀同。詳「烏椀」條。

【蕒】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芷」條。

【蕒】即蘆笋之古籍別名。典見綱目。詳「蘆笋」條。

【蕒瓜】即絲瓜之古籍別名。典見本事。詳「絲瓜」條。

【蕒南瓜】即南瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「南瓜」條。

【蕒】即檳榔之古籍別名。典見通志。詳「檳榔」條。②即木瓜之

古籍別名。典見和漢藥考。詳「木瓜」條。

【蕒】即高良薑之古籍別名。典見綱目。詳「高良薑」條。

【觀音山】即土人參。詳「粉沙參」條。

【觀音柳】即檉柳之古籍別名。典見綱目。詳「檉柳」條。

【觀音粉】(綱目拾遺) 古醫別名 大士粉。性質 甘苦平無毒。

主治 解毒。逐水腫。明目。療溼黃。

參攷資料 雲和山中有白溼泥。以水攪可而取之。和糯米粉一半蒸食之。可以療飢。名為觀音粉。

(處州府志) ①生山土內。自如粉。絕細膩。歲荒。鄉人輒掘取之。和麥麩作餅餌以食。但不可多食。多食能令人便閉腹重。以其土性滯澀腸胃耳。生洞內。不可服。恐其有蛇蝎毒。(綱目)

【觀音草】即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍膽」條。

【觀音蓮】即海芋之古籍別名。典見綱目。詳「海芋」條。

【觀桂】即官桂。詳「肉桂」條。

【饒頭歸】即當歸頭大尾粗。色白而堅枯者。力稍劣。祇宜入發散藥用。

【鱈】即馬騮毛之古籍別名。典見綱目。詳「馬騮毛」條。

【鱈魚】 命名 本品形如劑物。裂蔑之刀。故名。古醫別名 鱈魚。鱈魚。鱈魚。魚。鱈魚。鱈魚。鱈魚。(綱目)

外國名詞 Colia naus T. (拉丁) エツ(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鱈類鱈科之鱈魚。

產地 生江湖中。

形態 鱈魚為鱈魚類之一種。其體狹長。側扁。至尾逐漸細狹。而甚薄。頭小口大。吻有二硬鬚。鰓下有長鬚。似麥芒。胸鱗有數箇長棘。脊鱗短。背鱗長而連尾。背黃褐色。腹銀白色。鱗細體長。大者尺許。其肉多細刺。骨雖可食。不益人。昨可供藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 貼痔瘻。合田土壁土。入苦酒浸燒紅貼之。

參攷資料 ①鱈魚肉發疥。不可多食。(孟詵) ②鱈魚肉助火動痰發疾。(寧原)

【鱈魚】即鱈魚之原名。詳「鱈魚」條。

【鱈魚】即鱈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱈魚」條。

【鱈魚】即泥鰍之小者。典見綱目。詳「泥鰍」條。

【鴛】即鴛之原名。詳「鴛」條。

【鴛桃】即櫻桃之古籍別名。典見禮注。詳「櫻桃」條。

【鴛雉】 命名 翟。美羽貌也。為雉居原野。鷄居山林。又有山雉之稱。

古醫別名 鴛鷄。山鷄。(禽經)

外國名詞 Phasianus scintillans Gld. Hondo copper Pheasant (拉丁) ヤードリ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鴛鷄類雉科之鴛雉。

產地 出山林及原野間。

形態 鴛雉為原禽類雉屬之

二十五畫 鷓鴣 鷓鴣 鷓鴣

一種。全體羽色銅赤。混雜黑斑而光澤。雌雄異色。雌者羽色不及雄者之美。背羽黑色。有褐色斑紋。尾較短。雄者面部裸出色赤。背部金黃。肩腰腹各有白斑。尾羽長於體之三倍以上。有黑白及栗茶諸色之橫條紋。體長一尺。覓食穀類昆蟲等物。其肉可供食與藥用。

【鷓鴣】山鷓有兩種。名同物異。似雉而尾長三四尺者。鷓雉也。似鷓而尾長五六尺。能走且鳴者。鷓雉也。俗通呼為鷓矣。其二即鷓雉。鷓雉是也。

性質 甘。平。有小毒。
主治 五臟氣喘不得息。作癆。癆食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鷓雉肉曰。炙食。補中益氣。

【鷓鴣】即鷓雉之古籍別名。典見禽經。詳【鷓雉】條。

【鷓鴣】即鷓雉之古籍別名。典見綱目。詳【鷓雉】條。

【鷓鴣】古籍別名 越王鳥。鷓鴣頂。鷓鴣(綱目)

產地 出安南諸地。

二十六畫 鱉 鱉 鱉

形體 鱉為水禽類之一種。大如孔雀。喙長尺餘。黃白黑色。光瑩如漆。腳長口勾。末如冠。質極堅。可作飲器。其莖香如薤。陸可供藥用。

主治 水和塗雜瘡。
【鱉】即鱉之古籍別名。典見綱目。詳【鱉】條。

【鱉】即鱉之古籍別名。典見綱目。詳【鱉】條。

原名 鼈龍。
命名 鼈字象其頭腹足尾之形。

古籍別名 鼈魚。(本經)土龍。(綱目)豬婆龍。(動物學大辭典)基本 係脊椎動物爬蟲類鱉科之屬。

產地 生江海湖澤中。
形態 鱉為鱗類之一種。體長一二丈。有四足。背尾俱有鱗甲。形似鱗魚。惟其後足祇生半蹠。性能橫飛。不能上騰。夜則應更鳴吼。其聲如鼓。故有鼈更鼈鼓之稱。舟人聞之而畏懼。俚人聽之以占雨。其力猛。其穴深。枕骨瑩淨。勝於魚枕。皮可冒鼓。涎沫最毒。其甲可供藥

用。

一九七二

藥肆多懸之。云能辟毒。亦殺蟲之意。(李時珍)

【鱉肉】 性質 甘。有小毒。
主治 少氣。吸吸足不立地。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鱉肉曰。溼氣邪氣。諸蟲腹內癢癢。惡瘡。

參攷資料 ①鱉肉色似鷄而發冷氣痲疾。(蘇頌) ②梁周興嗣嗜此肉。後為鼈所吸。便生惡瘡。此物不食更佳。其涎最毒。(陳藏器) ③鱉肉雖至補益。亦不必食。(陶弘景)

【鱉肝】 主治 五尸病。用一具炙熟。同蒜薑食。
主治 諸風及惡瘡。

【鱉脂】 主治 五尸病。用一具炙熟。同蒜薑食。

【鱉魚】即鱉之古籍別名。典見本經。詳【鱉】條。

【鱉龍】即鱉之原名。詳【鱉】條。

【鱉】即善菜之古籍別名。典見說文。詳【善菜】條。

【鱉】即白芷之古籍別名。典見綱目。

二十六畫

目。詳「白芷」條。

【鱧魚】即游鯨魚之古籍別名。典見綱目。詳「海豚魚」條。

【驢毛】 主治 骨頭中一切風。病用一斤炒黃。投一斗酒中漬三日。空心細飲令醉。暖臥取汗。明日更飲如前。忌陳倉米。麩。

歷代記述攷證 【唐】王翬外臺秘要論驢毛曰。小兒客忤。剪驢臆上旋毛。乳汁煎飲。【唐】孫思邈千金翼論驢毛曰。撥襟中風。取驢背交脊中毛。人麝香少許。和乳汁銅器慢炒為末。乳汁和灌之。

【驢皮】 主治 瘧疾。生皮覆之。中風。喘。骨疼。煩燥。蒸熟。入豉汁。和五味煮食之。牛皮風癬。以朴硝醃過。燒灰。油調搽之。

【驢皮】即羆之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「羆」條。

【驢皮膠】即阿膠之處方用名。詳「阿膠」條。

【驢耳垢】 主治 刮取塗皴瘡。

外國名詞 Equus (拉丁)

【驢肉】 採取 以烏驢者良。

性質 甘。涼。無毒。

主治 主風狂。憂愁不樂。能安心氣。同五味煮食。或以汁作粥食。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論驢肉曰。解心煩。止風狂。醃酒治一切風。【明】李時珍本草綱目論驢肉曰。補血益氣。治遠年勞損。麥汁空心飲療痔引蟲。

參攷資料 野驢肉功與家驢同。【正要】食驢肉。飲荊芥茶。殺人。妊婦食之難產。同燒苾食。令人筋急。病死。有毒。【吳瑞】驢肉食之動風。脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以為止一切風狂。未可慰也。【寇宗奭】

【驢血】 性質 鹹。涼。無毒。製法 李時珍曰。熱血以麻油一盞和攪。去沫。煮熟。即成白色用。

主治 利大小腸。潤燥結。下熱氣。

【驢尾軸垢】 主治 瘧疾。用法 水洗汁。和麩丸如彈子大二枚。作燒餅。未發前食一枚。發後食一枚。

【驢豆】即稱豆。詳「稱豆」條。

性質 甘。冷。利。無毒。

主治 小兒熱急黃。多服使利。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論驢乳曰。療大熱。止消渴。【唐】蕭炳四聲本草論驢乳曰。小兒熱急驚邪。赤痢。【唐】孟詵食療本草論驢乳曰。卒心痛。速服臍者。熱服三升。【唐】陳藏器本草拾遺論驢乳曰。蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蚰蜒及飛蟲入耳。滴之。當化成水。

【宋】日華諸家本草論驢乳曰。小兒癩疾。客忤天疳。風疾。【明】李時珍本草綱目論驢乳曰。類熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連取汁點風熱赤眼。

配合應用 治心熱氣癩。黑驢乳暖服三合。日再服。【廣利方】治小兒口瘡。驢乳。豬乳各二升。煎一升五合服。亦治重舌出涎。【千金方】

治撮口胎風。先灸兩孔中三壯。後用此方大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長十根。火煨一頭。出津拭淨。浸乳中。取乳滴口中。甚妙。【聖惠方】

主治 熬之。熨風腫。漏。

疥。絞汁。主心腹疼痛。諸疰。疥。癢。反胃不止。牙齒痛。治水腫。每服五合良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論驢屎曰。燒灰。吹鼻。止鼻甚效。和油塗惡瘡。溼癬。

【驢胞衣】 主治 斷酒。煨研酒服。 數盞瘡疥癬。及風腫。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論驢脂曰。和酒服三升。治狂。癩不能語。不識人。和烏梅為丸。治多年癩。未發時服二十九丸。又生脂和生椒搗熱。綿裹塞耳。治積年聾疾。【明】李時珍本草綱目論驢脂曰。和酒等分服。治卒咳嗽。和鹽塗身。體手足風腫。

配合應用 治滴耳治雙。烏驢脂少許。鯢魚膽一箇。生油半兩。和勻。納撲葱管中七日。取滴耳中。日二。【聖惠方】

治眼中瘰肉。驢脂。白鹽等分。和勻。注兩目。皆頭。日三次。一月。【千金方】

【鹽骨】

主治 煮湯。浴。歷節風。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鹽骨曰。牝驢骨。煮汁服。治多年消渴極效。

【鹽陰莖】

性質 甘。溫。無毒。主治 強陰壯筋。

【鹽溺】

性質 辛。寒。有小毒。主治 浸蜘蛛咬瘡良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鹽溺曰。治反胃噎病。狂犬咬傷。癰癤惡瘡。並多飲取。瘞風蟲牙痛。類含漱之良。

配合應用 ●治狐尿刺瘡。烏尿傾熱液之(千金方)

●治白疳風。驢尿。置汁等分。和勻類洗。(聖濟總錄方)

●治耳聾。人中白一分。乾地龍一條。爲末。以烏驢駒尿一合。和勻。瓷器盛之。每滴少許入耳。(聖惠方)

參攷資料 ●一婦病噎。用四

物加驢尿。與服。以防其生蟲。數十帖而愈。(朱丹溪) ●張文仲備急方。言幼年患反胃。每食羹粥諸物。須與吐出。貞觀中許奉御兄弟。及柴蔣諸名醫奉勅調治。竟不能療。

漸疲困。候括旦夕。忽一衛士云。服驢小便極驗。遂服二合。後食止。吐一牛。晡時再服二合。食粥便定。次日奏知。則宮中五六人患反胃者。同服。一時俱瘞。此物稍有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者。七日當效。後用屢驗。(李時珍)

【鹽溺下泥】

主治 敷蜘蛛咬傷。

【鹽頭肉】

主治 煮汁服二三升。治多年消渴。無不瘞者。又以漬麴酒服。去大風動搖不伏者。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論鹽頭肉曰。洗頭風。風屑。【明】李時珍本草綱目論鹽頭肉

曰。同煎蒸煮汁日服。治黃疸百藥不治者。【明】常效。先心鏡篇論驢頭肉曰。治中風頭眩。心浮熱。肢體骨痠。語蹇身顛。豉汁煮食。

【鹽頭骨】

主治 燒灰。和油塗小兒顛解。

【鹽懸蹄】

主治 燒灰。傅癰疽。散膿水。和油傅小兒解顛。以瘞爲度。

配合應用 ●治腎風下注生

瘡。驢蹄二十斤。燒灰。蜜陀僧。輕粉。各一錢。膠香半錢。爲末。傅之。(奇效方)

●治天柱瘡毒。生脊大椎上。大如錢。赤色。出水。驢蹄二片。胡粉熬一分。麝香少許。爲末。醋和塗之。乾則瘞之。(聖惠方)

●治飲酒穿腸。飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。削下。水煮。濃汁。冷飲之。襄州散。將藥小變。得此方有效。(經驗方)

●治鬼瘡不止。用白驢蹄。剉炒。批霜各二分。大黃四兩。菘豆三分。雄黃一分。硃砂半份。研丸。梧子大。未發。平旦冷水服二丸。卽止。七日忌油。(肘後方)

【鹽髓】

性質 甘。溫。無毒。主治 耳聾。

參攷資料 多年耳聾。重者用

三兩度。初起者。一上便效。用驢前脚。脛骨打破。向日中。溼出髓。以瓷盒盛收。每用綿點少許入耳內。側臥候藥行。其髓不可多用。以白色者爲上。黃色者不堪。(普濟方)

【鑊刀】卽鑊刀之訛。詳『鱧魚』條。

【鱧魚】

命名 本品味有一鹹故名。


古稱別名 姜公魚。針魚。(俗名) 銅鏡魚。(陸海志)

外國名詞 Hyporhamphus

Majori. H. S. (拉丁) サヨリ或ハリラ或サイヨリ或ナガイワシ(日本)

基本 係脊椎動物魚類鱧類。鱧魚科之鱧魚。

產地 出江海中。



魚 鱧

形態 鱧魚爲鱗魚類之一種。其體狹長而略側扁。鱗細小。腹裸出。眼大。下顎延長而尖如針。占體長七分之一。兩顎有細尖齒。牙齦。鱗近尾。背鱗與背鳍對生。背色淡黑。旁有深芥色之直線紋。腹白。全體長尺餘。常隱居於海灣靜水中。

其肉白味淡。可供食與藥用。

性質 甘平無毒。
主治 食之辟疫。

【鱒魚】即石首魚之古籍別名。與見綱目。詳「石首魚」條。

【鷺鼠】 命名 本品肉翅連尾。飛不能升。易致腐墜。故名。

古籍別名 鷺鼠(本經)鼯鼠。夷由(爾雅)飛生鳥(弘景)耳鼠。(山海經)類。(禽經)嵒稗。詳。

外國名詞 Sciuropforus

mononga Tomm或Pteromy's mononga Assapan (拉丁)モモンガ或ノブスマ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類超類松鼠之鷺鼠。

產地 深山杉林間有之。

形態 鷺鼠爲原禽類之一種。其形似鼯鼠。頭小。吻端與兩耳間較闊。腹旁及兩肢間有飛膜。能飛。背與飛膜皆灰色。腹白尾長。占體之半。作圓柱狀。密生長毛。體長七八寸。棲巢樹穴。或奪鳥巢居之。晝伏夜出。覓果實小鳥爲食料。捕得可供藥用。

性質 微溫無毒。
主治 墮胎。令易產。
參攷資料 ①人取其皮毛與產婦臨產時持之。令兒易生。而小品方乃入服藥用。飛生一枚。槐子故弩箭羽各十四枚。合持丸。梧子大以酒服二丸。即易產。(蘇頌)②鷺鼠能飛而且產。故寢其皮懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生方治難產金液丸。用其腹下毛爲丸。以服之。立效。(李時珍)

性質 微溫無毒。
主治 墮胎。令易產。
參攷資料 ①人取其皮毛與產婦臨產時持之。令兒易生。而小品方乃入服藥用。飛生一枚。槐子故弩箭羽各十四枚。合持丸。梧子大以酒服二丸。即易產。(蘇頌)②鷺鼠能飛而且產。故寢其皮懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生方治難產金液丸。用其腹下毛爲丸。以服之。立效。(李時珍)

【鷺鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

【鷺鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

【鷺鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

【鷺鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

【鷺鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳「鼯鼠」條。

二十七畫

【鰓魚骨】即烏鰂骨之古籍別名。典見諸家本草。詳「烏鰂骨」條。

【蠟蟪】即蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳「蜘蛛」條。

【醃醋】即醋之古籍別名。典見新本草。詳「醋」條。

【鑽冬】即款冬花之古籍別名。典見本草衍義。詳「款冬花」條。

【擊子木】即柞木之古籍別名。典見綱目。詳「柞木」條。

見綱目。詳「柞木」條。

【鱸魚】即鮭魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮭魚」條。

【鱸魚】 命名 黑色曰盧。本品白質黑草。故名。
古籍別名 四鰓魚(綱目)白色者名銀鱸。
外國名詞 Latolabrax
Common perch (拉丁)スズキ或セイゴ(日本)

基本 係脊椎動物魚類硬骨類鱸科。

產地 出海中及河流間。

形態 鱸魚爲鱈魚類之一種。體狹扁。口闊大。下顎突出。前鰓蓋之邊緣有針狀突起。脊鰭有前後二部。臀鰭與脊部後鰭相對。鱗刺堅硬。鱗甲細小。背色淡蒼。腹淡白。幼時體旁有黑斑。長成漸失。大者長二尺餘。小者長五六寸。春月溯河流而上。則棲淡水中。秋月仍入海居鹹水中。其有出於江蘇舊松江府者。其魚有四鰓。狀如土附。長祇數寸。其肉俱可供食與藥用。

性質 甘平有小毒。
主治 補五臟。益筋骨。和腸胃。

治水氣。多食宜人。作鮓尤良。曝乾甚香美。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食本草論鱸魚肉曰。安胎補中。作鮓尤佳。【宋】寇宗奭本草衍義論鱸魚肉曰。益肝腎。

參攷資料 ①鱸魚肉雖有小毒。不甚發病。(寇宗奭)②鱸魚肉多食發痲疥瘡。不可同乳酪食。李廷飛云。肝不可食。刺人面皮。(掌禹錫)③中鱸魚毒者。蘆根汁可解之。(孟詵)

【鱸魚】即杜父魚之俗名。詳「杜父魚」條。

【鷓鴣】 命名 虛與茲皆黑之稱。本品色深黑。故名。
古籍別名 鷓(爾雅)水老鴟。(衍義)烏鬼(杜甫詩)

外國名詞 Phalarocorax cepillatus F. & S. (拉丁)
Cormorant Temminck's cormorant (英)Kormorannt (德)ウ或シマツ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鷓鴣科。

產地 海濱及洲渚間多有之。

性質 甘平無毒。
主治 補五臟。益筋骨。和腸胃。

治水氣。多食宜人。作鮓尤良。曝乾甚香美。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食本草論鱸魚肉曰。安胎補中。作鮓尤佳。【宋】寇宗奭本草衍義論鱸魚肉曰。益肝腎。

參攷資料 ①鱸魚肉雖有小毒。不甚發病。(寇宗奭)②鱸魚肉多食發痲疥瘡。不可同乳酪食。李廷飛云。肝不可食。刺人面皮。(掌禹錫)③中鱸魚毒者。蘆根汁可解之。(孟詵)

參攷資料 ①鱸魚肉雖有小毒。不甚發病。(寇宗奭)②鱸魚肉多食發痲疥瘡。不可同乳酪食。李廷飛云。肝不可食。刺人面皮。(掌禹錫)③中鱸魚毒者。蘆根汁可解之。(孟詵)

形體 鷓鴣爲水禽類之一種。其狀似鴉。又似鴨形。上嘴鈎曲而尖。下嘴直扁。色暗黑。頭喉綠。黃色。眼有光輝。後頭部疏生短黑毛。狀如冠毛。頸與體之下。面概黑色。有綠光。腹部稍白。翼尾脚亦黑色。脚有爪蹠。四趾皆前向。性善潛水。捕魚。漁人恒多養之。其肉可供藥用。



性質 酸。鹹。冷。微毒。
主治 大腹鼓脹。利水道。
參攷資料 鷓鴣別錄不見功用。惟雷氏炮炙論序云。體寒。腹大。全賴鷓鴣。註云。治腹大如鼓。體寒者。以鷓鴣燒存性爲末。米飲服之。立愈。竊謂諸腹鼓大。皆屬於熱。衝氣並循於血脈。則體寒。此乃水鳥。其氣寒冷。而利水。寒能勝熱。利水能去溼。故也。又外臺云。凡魚骨硬者。但密念鷓鴣。不已卽下。此乃厭伏之意耳。(李時珍)

【鷓鴣羽】 採取 宜以翅羽燒灰用。

主治 魚骨哽噎。

【鷓鴣卵】 主治 墜胎。有不欲留孕者。取一個白水。煮服。胎卽化爲血水。從小便出。多則二服。無有不驗。

【鷓鴣涎】 主治 腎咳。趙學敏曰。俗呼顧陰。從小腹下逆上而咳。連嗽數十聲。少住又作。甚或咳嗽必嘔。牽擊兩脇。涕淚皆出。連月不愈者。是滾水沖服。下咽卽止。

【鷓鴣骨】 主治 下魚骨哽。燒灰水服。去雀面斑。燒研入白芷末。豬脂和。夜塗且洗。

【鷓鴣嗉】 命名 本品卽鷓鴣喉中受食之處。故名。主治 魚骨哽喉。吞之。便安。

【鷓鴣頭】 主治 噎及噎。燒研酒服。

【鷓鴣糞】 原名 野水花。性質 冷。微毒。主治 去面上黑黚。壓走。

主治 去面上黑黚。壓走。

綱目詳鷓鴣條。

【鷓鴣菊】卽浙烏頭之俗名。詳浙烏頭條。


【鷓鴣】卽鷓鴣之原名。詳鷓鴣條。

【鷓鴣】 原名 鷓鴣。猶嬰兒之學母語。故名。古籍別名 鷓鴣。乾鼻。龐客。(綱目) 摩陀。(梵書)

外國名詞 Paritacus 或 Paritaci (拉丁) Parrot (英) Papagai (德) オーム或アウム (日本)

基本 係屬脊椎動物鳥類羣禽類鷓鴣科。產地 出美。澳兩洲。及南方熱帶諸地。

形體 鷓鴣爲林禽類之一種。種類甚多。其頭圓。嘴強大。下嘴短。小上嘴鈎曲。舌肥大而軟。能効人。



綱目詳鷓鴣條。

綱目詳鷓鴣條。

語。羽色豔美。有白赤黃綠等色。脚具四趾。二前二後。能攀木握物。性伶俐。可馴養。巢於岩洞樹穴。覓食果實等物。其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 食之已虛嗽。

【鷓鴣菜】即海螺之一種。性質功效與海螺同。詳「海螺」條。

【羶羊角】即羚羊角之古籍別名。典見綱目。詳「羚羊角」條。

【鼯鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見本經。詳「鼯鼠」條。

二十九齋

【粳】即丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳「丹黍米」條。即黍之色赤者別名。典見爾雅。詳「黍」條。

【粳冬】即麥門冬之古籍別名。典見別錄。詳「麥門冬」條。即天門冬之原名。詳「天門冬」條。

【龍珠】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【鬱李仁】即郁李仁之古籍別名。典見別錄。詳「郁李仁」條。

二十八齋

鬱金

鬱金

鬱金

鬱金

原名 馬蓬。
命名 本品根形似莪蕪。而莪蕪病故名。又能解神金之毒。故名鬱金。

處方用名 廣鬱金。川鬱金。古鑿別名 乙金。玉金。深黃。蔚金。鬱金。金母。煨。和漢藥考。

外國名詞 Curcuma. (拉丁) Turmeric. (英) Kukulma. (德)

基本 屬薑荷科。為鬱金之地。下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鬱金產四川為正地道。好氣味。色金黃。有產兩廣者。名土金。色淡白。無味。不適用。和漢藥考曰。產東印度。中國臺灣。琉球。日本九州地方。

形體 鬱金為多年生宿根草。高二三尺。葉類蠶華。花稍似荊荷。而大多小苞。作鱗狀。其間有三四黃蕊。鬱金入香料。能使其香及遠。



(一) 鬱金

其根為半狀主根。長五分至一寸五分許。葉痕作輪狀。環繞周圍。外面灰褐色。內部暗褐色或黃色。作角質狀。有一種芳香。稍有苦味。



(二) 鬱金

製法 去鬚。切薄片。或原粒杵而用之。

性質 辛苦。寒。無毒。

成分 為黃色素 Curcumin (C₂₁H₂₀O₅)。揮發油。澱粉等。

效能 解鬱。行氣。涼血。破癥。用作血瘀金瘡藥。

作用 在胃時僅分解。至腸始被吸收。然半數仍由大便排出。由腸壁吸入血中。即能增進血液氣化之功。同時又能令子宮黏膜之充血。

主治 血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論鬱金曰。單用治女人宿血氣。心痛。冷氣結聚。溫醋摩傳之。

亦治馬腹。【金】張元素珍珠囊論鬱金曰。涼心。【元】李東垣用藥法象論鬱金曰。治陽毒入胃。下血。類痛。【明】李時珍本草綱目論鬱金曰。治血氣。心腹痛。產後敗血。衝心欲死。失心。顛狂。蠱毒。【明】繆希雍本草經疏論鬱金曰。鬱金味辛苦。其氣寒而無毒。辛能散。苦能洩。故善降逆氣。入心。肝。胃。三經。故治血積。氣降而和。則血凝者散。故主生肌止血。其破惡血。治血淋。尿血。主金瘡者。調氣行血之功也。單用亦治女人宿血。氣。心痛。冷氣結聚。溫醋摩服之。入心。涼血。故潔古用以涼心。入足。陽明。故治陽毒。入胃。下血。類痛。其性輕揚。能開鬱滯。故為調逆氣行於血之要藥。【清】黃宮繡本草求真論鬱金曰。鬱金辛苦。而平。諸書論斷不一。有言此屬純陰。其論所治。皆屬破氣。下血之說。有言性溫不寒。其論所治。則有療寒除冷之謂。究之體輕氣質。其氣先上行而微下。達。凡有宿血。凝積。及有惡血。不堪之物。先於上處而行其氣。若使其氣。其邪。其痰。其血。在於膈上。而難消者。須當宜溫宜

一九七七

涼同於他味。兼為調治之。如敗血衝心。加以薑汁童便。去瘋心。崩明礬為丸。砂砂為衣。與受毒。加以升麻之類。若使惡血。惡痰。惡瘰。惡癩。惡痔。在於下部而難消者。俟其辛氣既散。苦氣下行。即為疎泄。而無鬱滯難留之弊矣。此藥本屬入心散瘀。因瘀去而金得泄。故命其名曰鬱金。書云。此藥純陰而寒者。因性主下而言也。有云是藥性溫而言者。因氣味辛香。主上而言也。各有論說不同。以致理難盡一耳。因為辨論正之。出川廣圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。帶甘者。真市人多以蘆黃偽充。清陳修園本草經讀論鬱金曰。時醫尚名有二。誤。一曰生脈散。因共有生脈二字。每用之以救脈脫。入咽少頃。脈未生而人已死矣。一曰鬱金。因其命名為鬱。往往取治於氣鬱之症。數服之後。氣鬱未解。而血脫立至矣。醫道不明。到處皆然。而江浙閩粵。尤其甚者。又曰鬱金氣味苦寒者。謂氣寒而善降。味苦而善泄也。其云血積者。血不行則為積。積不去。則為惡血。血逆於上。從口鼻而出。

則為衄血吐血。血走於下。從便溺而出。有痛為血淋。無痛為尿血。即金瘡之瘀血不去。則血水不斷。不能生肌。此物所以統主之者。以其病原皆由於積血。特取其大有破惡血之功也。蓋血以氣為主。又標之曰下氣者。以苦寒大泄其氣。即所以大破其血。視他藥更進一步。解鬱二字。不見經傳。切不可惑此邪說。若經水不調。因實而閉者。不妨以此決之。若因虛而閉者。是其寇。且病起於鬱者。即內經所謂二陽之病發心脾。大有深旨。若錯認此藥為解鬱而頻用之。十不救一。至於懷孕。最忌攻破。此藥更不可以沾唇。即在產後。非熱結停瘀者。亦不可輕用。若外邪未淨者。以此擅攻其內。則邪氣乘虛而內陷。若氣血兩虛者。以此重虛其虛。則氣血無根而暴脫。此女科習用鬱金之害人。也。聖經灼然可據。雜書雜說。居然魚目混珠。甚為不解。昔人謂不讀人間非聖書。吾深有味乎斯言。

辨偽 ●鄭肯巖曰。鬱金辛苦。殺甘氣寒。其性輕揚。上行入心及包絡。兼入肺經。涼心熱。散肝鬱。破血下氣。出川廣體銳圓如蟬肚。皮黃肉赤。色鮮微香。折之光明脆徹。苦中帶甘者乃真。今市中所售者多是蘇黃。并有以蓬莪朮偽之者。俱峻削性烈。挾虛者大忌。用者慎之。况鬱金苦寒。色赤入心。姜黃辛溫。色黃入脾。莪朮味苦。色青入肝。胡得混售而貽害耶。曹炳章曰。按鬱金山草之根。野生也。兩廣江西咸有之。而以蜀產者為勝。上古不甚重。用以治馬病。故又名馬逐。因其形像莪朮也。自唐以後。始入藥料。治血症有功。本非貴重之品。清初吳亂未靖時。蜀道不通。貨少居奇。致價數倍。甚則以蘆黃聚偽之者。然其形銳圓如蟬腹狀。根杪有細鬚一縷。如菱臍之苗。長一二寸。市人因呼金線。甲蝦蟆。蟬肚。爵金是也。其皮黃白有皺紋。而心內黃赤。剝開儼然兩層。如井欄。產四川重慶。惟本年生者嫩小而黃。若遠地未採。逾年而收。則老而深黯。色如三七狀。為老廣鬱金。然老鬱金治血症化療削積之力。勝於嫩者。若開鬱散痛。即嫩黃者亦效。乃

近年傳黑者為野鬱金。黃者為假。并誤其為蘆黃。殊不知此物本是野生。若蘆黃皮有節紋。肉色深黃。無韋。蓬朮色黑無心。最易辨也。然老鬱金雖產四川。近今名稱廣鬱金。所謂川鬱金。乃温州產也。色黯黑。形扁亦有。心惟不香耳。

近人學說 ●張山雷曰。鬱金始見於唐本草。稱其辛苦而寒。石頑逢原已改作辛平。謂安有辛香而寒之理。又謂蜀產體圓尾銳。如蟬腹狀。發苗處有小孔。皮黃而帶黑。通身粗皺如梧桐子紋。每枚約重半錢。折開質堅色黃。中帶紫黑。嗅之微香。不烈者真。如大小不等。折之中空質柔。內外皆黃。其氣烈者。即片子蘆黃也。案今市肆鬱金有二種。川產廣產。形頗相近。但川產者形扁。切片亦深黃褐色。中心則紫。廣產形圓。切片則作淡黃色。中心略深。亦黃而不紫。今俗尚多用廣產。實則質堅而光潔。其性沈重。其氣極微。嗅之亦無甚香味。二者皆然。若色深香烈。而形較大。則蘆黃也。惟其質堅性重。色黃赤如血。故專入血分。能行血中之氣。下

氣行血。解開結止痛。是其專長。古稱解鬱。義亦如是。唐本草謂治血積下氣。破惡血。淋尿血。頸權謂治宿血。氣心痛。冷氣結。瀨湖謂治血氣。心腹痛。產後敗血。衝心欲死。丹溪謂治吐血。衄血。唾血。及經事逆行。並以鬱金末加非汁。薑汁。童尿同服。其血自清。痰中帶血者。加竹瀝。固無一非開泄沈降之功用也。又曰。丹溪謂鬱金之性。輕揚上行。古人以治鬱。過不能升者。命名因此。案此藥是根。質堅沉重。潔古謂其氣味俱厚。故純以下行為用。惟入血行氣。亦能破堅散結。所謂開鬱者。本以宣通解散為義。鬱不能升一層。大是誤會。况丹溪亦自謂其治吐血。衄血。及逆經諸症。則專以下行為長。當亦可於言外得之。反謂上行。寧不自矛盾。范石湖且謂一味為末。治蠱毒。服之即消出惡物。尤為明白了解。丹溪此說。恐出依託。而石頌和之。亦謂先升後降。不思之甚矣。王治華曰。市肆所售廣鬱金。卽川鬱金。體圓尾銳。外皮糙白。粗皺。折開質堅。黃色。光明脆嫩。其味苦中帶甘者真。

二十九畫 鬱

川鬱金卽溫州所產之鬱金。質堅色黑。香氣甚微。較遜。按鬱金入心與包絡肝胃四經。為降氣解鬱。涼血散瘀之品。日醫石原保秀氏用以治睡血。吐血。衄血。尿血。婦人經脈逆行。心腹痛諸症。但考其功用。與蓬朮。莖黃相似。惟蓬朮入肝。能治氣中之血。莖黃入脾。可治血中之氣。而鬱金則入心。專治心包之血。有破宿生新之功。為稍異耳。

配合應用 鬱金同非菜。香降香。當歸。生地黃。童便。能治怒氣傷肝吐血。又治鼻衄。唾血。喉中血腥氣。及經脈逆行。有痰方加竹瀝。

鬱金七兩。同明礬三兩。為細末。薄米糊為丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。昔人曾治婦人癲狂十年不愈。初服此藥。心胸間有物脫去。卽神氣洒然。再服而蘇。此驚憂痰血。總聚心竅所致。此藥入心去惡血。明礬化痰核故也。

痘疹始有白泡。忽搖入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜叫亂者。鬱金一枚。甘草二錢。半。水半碗。煮乾。去甘草。切片。微火烘燥。為末。入真片腦半錢。每用一錢。以生豬尾血五

七滴。新汲水調下。不過二服。甚者毒氣從手足心出。如雞狀。乃瘡。此乃五死一生之候也。(顧安常傷寒論方)

又范石湖文集云。嶺南有采生之害。其術於飲食中行厭勝法。致魚肉能反生於人腹中。而人已死。則陰役其家。初得覺胸腹痛。次日刺人十日。則生在腹中也。凡胸膈痛。卽用升麻或膽礬吐之。若膈下痛。急以米湯調鬱金末二錢服。卽消出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。李巽巖侍郎為雷州推官。鞠獄得此方。活人甚多。

治厥心氣痛不可忍。鬱金。附子。乾薑等分。為末。醋糊丸。梧子大。珠砂為衣。每服三十九丸。男酒女醋下。(奇效方)

治產後心痛。血氣上衝欲死。鬱金燒存性。為末二錢。米醋一呷。調灌卽甦。(袖珍方)

治自汗不止。鬱金末。臥時調塗於乳上。(集簡方)

治衄血吐血。川鬱金。為末。井水服二錢。甚者再服。(黎居士易簡方)

治陽毒下血。熱氣入胃。痛不可忍。鬱金五大箇。牛黃一皂莢子。為散。每服用醋漿水一盞。同煎三沸。溫服。(孫用和秘寶方)

治尿血不定。鬱金末一兩。葱白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。(經驗方)

治風痰壅滯。用鬱金一分。礬蘆十分。為末。每服一字。溫漿水調下。仍以漿水一盞。漱口。以食壓之。(經驗方)

治中祇霜毒。鬱金末二錢。入蜜少許。冷水調服。(事林廣記方)

治痔瘡腫痛。鬱金末水調塗之。卽消。(醫方摘要方)

治耳內作痛。鬱金末一錢。水調傾入耳內。急傾出之。(聖濟總錄方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡陰虛而無瘀滯者禁用。

參攷資料 鬱金其性輕揚上行。治吐血。衄血。唾血。血暈及經脈逆行。並宜鬱金末。加非汁。薑汁。童尿同服。其血自清。痰中帶血者。加竹瀝。又鼻血上行者。鬱金。非汁。

加四物湯服之。(朱良亨) 鬱金香生蜀地及西戎。苗似薺黃。花白質紅。末秋出莖心而無實。其根黃赤。取四畔子根。去皮火乾。馬藥川之破血而補。胡人謂之馬蓮。嶺南者有實。似小豆。不堪噉。(蘇恭) 今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。四月初生。苗似薺。如蘇恭所說。(蘇頌) 鬱金香不香。今人將染婦人衣。最鮮明。然不奈日炙。染成衣則微有鬱金之氣。(寇宗奭)

【鬱金香】 古籍別名 鬱香。(御覽) 草薺香。茶短摩。(佛書) 紅藍花。紫述香。(綱目)

外國名詞 Tulipa Gesneri-ana, L. (拉丁) ウツユンユウチウリツプ(日本)

基本 係百合科山慈姑屬。爲鬱金香之花。

產地 廣西羅城縣及諸山野間恒多有出。

形態 鬱金香爲芳草類之多。年生草本。高尺餘。葉廣披針形。帶白色。四五月間花大而美麗。單生於花莖之頂端。花蓋六片。有黃紅白等色。或爲重瓣花。花瓣可供香

藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 蟲野諸毒。心腹間惡氣。鬼疰。鴉鶴等一切臭。入諸藥香用。

參攷資料 許慎說文解字

云。鬱芳草也。十葉爲貫。百二十貫築以養之。鬱鬱乃百草之英。合而釀酒以降神。乃遠方鬱人所貢。故謂之鬱。鬱今鬱林郡也。(蘇頌) 漢鬱林郡。即今廣西貴州潯州羅城縣出鬱金香。即此也。金光明經謂之茶短摩者。此乃鬱金花香。與今時所用鬱金根名同物異。按趙古則六書本義。鬱字象米在器中。以匕扱之之意。鬱字從臼奉缶。置於几上。覆有三飾五體之意。俗作鬱。則鬱乃取花築酒之意。非指地言。地乃因此草得名耳。(李時珍) 鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月採花即香也。(陳藏器) 按鄭玄云。鬱草似蘭。楊孚南州異物志云。鬱金出罽賓。國人種之。先以供佛。數日萎。然後取之。色正黃。與芙蓉花裏嫩蓮者相似。可以香酒。又唐書云。太宗

時伽毗國獻鬱金香。葉似麥門冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根。二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。中有鬱金蘇合香者。是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊城。厥珍來尋。芳香酷烈。悅目怡心。明德惟馨。淑人是欽。

【鬱香】 即鬱金香之古籍別名。典見御覽。詳「鬱金香」條。

【鬱金苗】 即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「益母草」條。

【鬱臭草】 即益母草之古籍別名。典見圖經本草。詳「益母草」條。

【鬱芑】 即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鬱金」條。

【鬱雞】 形態 鬱雞爲雞類之一種。一種。棲在山野。多食鬱金苗葉。其肉鬆脆。可供藥用。

主治 解毒散結氣。

命名 鶴字。篆文象其形。

古籍別名 皂君。負釜。(詩疏) 黑尻。(綱目)


外國名詞 Ciconia boyol-ana (拉丁) 3 bokk(英) Storch

類鶴科。

基本 係脊推動物鳥類涉禽

產地 江湖池沼間有之。

形態 鶴爲水禽類之一種。其形似鷄。無丹頂。似鷄無冠毛。嘴長。色暗黑。眼裸出色赤。脚長亦赤。色。肩翼及翼白色。略帶黑。體之上部黑色。下部白色。雁以下無羽毛。被多角形鱗紋。爪短小而褐色。巢於高樹。以枝葉羽毛等構成。捕食魚蟲。性馴溫和。其骨可供藥用。



鶴

採取 以白色者佳。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 鬼蠱諸注毒。五尸。心腹

痛。

參攷資料 鶴骨有小毒。入沐

湯浴頭。令髮盡脫。更不生也。(陳

藏器)

【鶴卵】 主治 預解痘毒。水黃一枚。與小兒痰之令不出痘。或出亦稀。(李時珍)

【鶴屎】 主治 小兒天釣瘡風。發歇不定。炒研半錢。入牛黃。麝香各半錢。炒。蠟五枚。爲末。每服半錢。新汲水服。

【鶴脚骨及嘴】 主治 喉痺。飛尸。蛇虺咬。及小兒閃疔。大腹痞滿。並黃汁服之。亦燒灰飲服。

【鶴】 命名 本品性好浴水。其睛黑。然故名。

古醫別名 鴿鴿(周禮) 嘲嘲鳥(廣雅) 八哥(綱目俗名) 寒翠(萬華術)

外國名詞 Acridotho-rasco. risakellus Gm. (拉丁) ハハツチヤウ或ナシレン(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類白頭翁科之鴿鴿

形態 鴿鴿爲林禽類之一種。全體羽色純黑。兩翼下各有白點。背面稍帶紫光。頭後及腰稍帶綠。頭羽稍長。爲冠額羽。稍向嘴基而卷曲。嘴色淡黃。嘴根紅色。脚橙黃。

眼廉亦黃。捕雛者養之。修剔其舌尖。教以言語。能效人話。亦能巧擬禽獸之啼聲。其肉可供藥用。

採取 須於臘月採之。

性質 甘平無毒。

主治 五痔止血。炙食。或爲散飲服。

歷代記載攷證 【唐】孟詵食療本草論鴿鴿肉曰。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃炙食。作羹食。或搗散蜜丸服之。【宋】日華諸家本草論鴿鴿肉曰。炙食一枚。治呃噎。下氣通靈。

【鴿鴿目睛】 主治 和乳汁。研滴目中。令人目明。能見符外之物。

【鴿鴿】 即鴿鴿之古籍別名。與見綱目。詳「鴿鴿」條。

三十畫

【鸞豬】 即鸞豬之古籍別名。與見綱目。詳「鸞豬」條。

三十三畫

【麻桂枝】 即桂枝之處方用名。詳「桂枝」條。

二十九畫 鶴 鴿 鴿 三十畫 鸞 三十三畫 麻

編輯後記

中國藥學大辭典成於民國念二年六月。其間排印校對。歷時一年十月而始行出版。在此排校期間。續得珍貴之材料甚多。不忍割棄。因作編輯後記以容之。

一 日本化驗中藥之新報告

日本近年復興皇漢醫藥。已爲世人所共知。研求之精。成績之富。皆出國內人士之料想。近由日本醫學博士中尾方三集得中藥一百四十二種之成分報告。均係正式發表於醫藥雜誌者。誠皆中國藥學上之重大收獲。國人對此能不憬然驚惕。吾願同同志。勿再泥於舊說學派之空論。作無謂之自訟。當知國醫之唯一寶物。卽在效驗卓特之中國藥物。今後當盡力於研求國藥文獻。辨別道地真偽。改進泡製種植。化驗成分性質。判定藥效度量。此數端卽爲國醫造成萬世不滅之根基。亦爲國醫科學化之正確途徑。又願國內科學專家。西醫藥家。轉易研究標的。勿使國傳瓊寶。坐讓於人。是本書之所由作也。茲將中國藥品一百四十二種之成分化驗報告。記錄如下。

★發表者均用縮名見後面縮名索引

【甘草】 學名 *Glycyrrhiza Glabra, L. var Glandulifera, Reg. Et*

成分 *Glycyrrhizin C₄₂H₆₄O₁₆* 及蔗糖、葡萄糖、Mannit 林檎酸、Asparagin.

發表者 F.S.A.I.30 (1927)

【人參】 學名 *Panax Ginseng, O.A. Mey.*

成分 Panaqueinon $C_{22}H_{50}O_{14}$ (?) Panax Sapogenol $C_{27}H_{48}O_2$, Phytosterin $C_{26}H_{44}O$ (?) 等
發表者 (1) 藤谷京醫 2 (明 38 年) (2) 近藤天野藥誌 466 (大 9 年) 近藤田中藥誌 501 (大 4 年) (3) 近藤山口藥誌 440 (大 7 年)

【沙參】

學名 *Adenophora Varticillata*, Fisch. Var *Typica*, Regel.

成分 Saponin

發表者 F.S.A.I. 4 (1927)

【桔梗】

學名 *Platycodon Grandiflorum*, DC.

成分 Kikyoaponin $C_{29}H_{48}O_{11}$

發表者 (1) 松南磯義日藥總會 (48) (昭 3) (2) 梅辻京藥誌 26 (大 6) (3) 大鹿京醫 15 (大 7) 等

【朮】

學名 *Atractylis Ovata*, Thunb.

成分 精油 (主成分爲 *Atractylol* $C_{15}H_{24}O$ 其他 *Atractylon* $C_{14}H_{18}O$ 等)

發表者 (1) 上野藥誌 129 (明 25) 高木藥誌 473 (大 10) (2) 高木本郷藥誌 309 (大 13) (其他) 藤田藥誌 511 (大 13) 金鮮醫 83 (昭 2)

【貫衆】

學名 *Polystichum Falcatum*, Diels Var *Fortunei*, Baker.

成分 Oleoresin

發表者 F.S.A.I. 60 (1927)

【遠志】

學名 *Polygala Tenuifolia* Willd.

成分 Senegin, Resin. 脂肪油

發表者 F.S.A.I. 26

【地榆】 學名 *Sanguisorba Officinalis* L.

成分 (2) 單糖質 Sugar (2)

發表者 (1) 邦藥 213 (2) F.S.A. I. 35 (其他) 藤田醫誌(大12)附錄

【王孫】 學名 *Paris Tetraphylla* A. Gr. (?)

成分 Paridin, Paristyrphnin

發表者 F.S.A. I. 51

【紫草】 學名 *Lithospermum Officinale*, L. Var. *Erythrorhizon*, Maxim (?)

成分 Acetylshikonin $C_{18}H_{18}O_6$ (結晶性紫色素)

發表者 (1) 黒田化誌30(大7) (2) 上田朝試(大6) (3) 澤田東北醫29(明36)

【白頭翁】 學名 *Anemone Chinen* Sis, Runge.

成分 Anemonin

發表者 F.S.A. I. 41

【白及】 學名 *Bleilla Striata*, Reichb.

成分 黏液質

發表者 邦藥298

【黃連】 學名 *Coptis Chinensis*, Franch.

成分 Berberin $C_{20}H_{17}NO_6$, Palmatin $C_{21}H_{21}NO_4$ (1) Coptisin $C_{15}H_{15}NO_6$ (2) Worenin $C_{20}H_{15}NO_4$ (3)

發表者 (1)村山、篠崎、藥誌 530 (大15) (2)井里、Proc. Imp. Acad. Japan 2(1926) (3)北里、藥誌 542 (昭2)

【胡黃連】 學名 *Picrorhize Kurooa* Royl.

發表者 朝比奈、前田、藥誌 433 (大7)

【黃芩】 學名 *Scutellaria Baicalensis*, Georgi.

成分 Wogonin $C_{16}H_{12}O_4$ 及 Baicalin $C_{21}H_{18}O_{11}$

發表者 柴田、Acta. Phy. 1 (1923) 【其他】高橋、藥誌 109 (昭24)

【秦艽】 學名 *Gentiana Tiliatica*, King.

成分 Alkaloid.

發表者 F.S.A.I. 6

【柴胡】 學名 *Bupleurum Falcatum*, L.

成分 Saponin. (2) 揮發油、樹脂、澱粉粒

發表者 (1)惠澤、臺研 5 (大5) 【其他】藤田、木村、藥誌 553 (昭3) 近藤 (東) 日本藥物 7 (昭3) 等

【前胡】 學名 *Angelica Miqueliana*, Maxim. (?)

成分 Nodakenin $C_{20}H_{24}O_6$ (配糖體)

發表者 有馬化誌48(昭2)49(昭3)

【升麻】 學名 *Cimicifuga Foetida*, L.

成分 *Cimicifugin*. 蔗糖, 油, 樹脂, 鞣酸

發表者 F.S.A.140國本4

【苦參】 學名 *Sophora Angustifolia*, L. Fts.

成分 (根) *Martin* $C_{18}H_{24}N_2O_2$ (子) 脂肪油 *Cytisin* $C_{11}H_{14}N_2O$ (2)

發表者 (1)長井, 近藤, 藥誌280(明36) 近藤, 佐藤, 藥誌474(大10) 近藤, 貴志, 荒木, 藥誌478(大10) 近藤, 眞田, 藥誌488(大12) 近藤, 落合, 藥誌522(大15) 532(大15) 近藤, 落合, 相原, 藥誌524 近藤, 落合, 中村, 藥誌561 近藤, 落合, 西村, 藥誌561(昭3) (2)猪子, 藥誌330(明2) (其他)藤田, 藥誌555(大12) 石板, 東醫17(明36) 杜臺, 醫237(大13)

【白鮮】 學名 *Dictamnus Albus*, L.

成分 苦味質精油

發表者 F.S.A.137

【延胡索】 學名 *Corydalis Bulbosa*, DC.(?)

成分 *Protopin* $C_{20}H_{19}NO_2$ (1) *Bulbocapnin* $C_{19}H_{19}NO_2$ (2) *Tetrahydropalmatin* $C_{21}H_{25}O_2N$ 及融點228-230N) 一種 *Alkaloid*(3) *Dehydrocorydalin* Ber Berin(4)

發表者 (1)K.Makoshi: Arch Pharm. 274(1908) (2)朝比奈, 用瀬, 藥誌53(大9) (3)長田, 藥誌217

(昭2) (4) F. S. A. 137

【貝母】 學名 *Fritillaria Verticillata*, Willd var *Thunbergii*, Baker.成分 $\text{Fritillin } \text{C}_{25}\text{H}_{44}\text{NO}_2^{(2)}$ $\text{Fritillarin } \text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{NO}_2$ ve $\text{Reticin } \text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{NO}_2$ $\text{Verticillin } \text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{NO}_2^{(2)}$
發表者 (1) 八木京醫 10 (大2) (2) 福昌化誌 50 (昭4)【石蒜】 學名 *Lycoris Radiata*, Herb.成分 $\text{Lycorin } \text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{NO}_4^{(2)}$ $\text{Sekisamin } \text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{NO}_4^{(2)}$

發表者 (1) 森島藥誌 168 (明29) 東醫 9 (明28) 朝比奈、杉井藥誌 377 (大2) (2) 近藤、富村藥誌 55 (昭2) (其他) 外山藥誌 335 (明43) 江日新 10 年 8 號 (大10) 森島東醫專 2402 (大14) 江千醫 138 (大10)

【水仙】 學名 *Narcissus Tazetta*, L. Var. *Chinensis*, M. Roem.成分 $\text{Lycorin } \text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}^{(2)}$ $\text{Narcitine } \text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{NO}_4^{(2)}$

發表者 (1) 山内藥誌 243 (明35) (2) F. S. A. I. 50 (其他) 朝比奈、杉井藥誌 377 (大2)

【龍膽】 學名 *Gentiana Seabra*, Bunge.成分 $\text{Genticipicrin } \text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{O}_6$ (苦味配糖體) $\text{Gentianose } \text{C}_{18}\text{H}_{31}\text{O}_{16}$ (三糖體)

發表者 朝比奈、照山藥誌 382 (大2) 朝比奈、依田藥誌 390 (大3)

【細辛】 學名 *Asarum Sieboldi*, Mig.

成分 精油

發表者 近藤 (東) 鮮醫 88 (昭3)

【杜衡】 學名 *Asarum Maximum*, Hemsl.

成分 精油(主成分爲 Saffrol 及 Eugenol 少量)

發表者 朝比奈藥誌 302 (明40) 朝比奈化誌 28 (明40)

【拳參】 學名 *Polygonum Bistorta*, L.

成分 (一般成分) 灰分 4.35% 單寧酸 18.25% 還元糖 2.13% 護膜黏液質 2.23% 澱粉, 樹脂, 纖維表
66.74%

發表者 藥誌 471 (大10) 學彙

【當歸】 學名 *Angelica Sinensis*, Diels

成分 精油

發表者 酒井東醫 30 (大5) (其他) 藤田藥誌 493 (大12)

【芎藭】 學名 *Cnidium Officinale*, Makino

成分 精油(成分爲 Cnidium lacton $C_{12}H_{18}O_2$, Cnidiumsaur $C_{12}H_{20}O_2$, Cnidium Saure Ester $C_{12}H_{18}O_2$, $O-C_{10}H_{17}$, Sedanon Saure $C_{12}H_{18}O_{2.8}$ 等)

發表者 酒井東醫 30 (大5) 藥誌 335 (大8) 村山藥誌 477 (大10) 493 (大12) (其他) 藤田藥誌 514 (大13)

【蛇床】 學名 *Selinum Monnieri*, L.

成分 精油

發表者 中尾藥誌462(大9)

【藎本】 學名 *Ligusticum Sinensis*, Oliv.

成分 精油

發表者 高橋化誌49(昭3)

【白芷】 學名 *Angelica Anomala*, Lallen.

成分 精油 *Angelicasaure*之類似酸⁽¹⁾及 *Angelicozoin*⁽²⁾

發表者 (1)村山(長)藥誌152(明27) (2)酒井東醫31(大6)藥誌45(大8)

【芍藥】 學名 *Paeonia Albiflora*, Pall

成分 安息香酸⁽¹⁾精油⁽²⁾

發表者 (1)朝比奈、奥野藥誌309(明40) (2)F.S.A.I.15

【牡丹】 學名 *Paeonia Moutan*, Sims.

成分 *Paeonol* $C_9H_{16}O_2$ 安息香酸 *Phytosterin*

發表者 長井藥誌17.81(明17) 田原藥誌117(明24)同(明25) [其他]藤田藥誌509(大13)

【木香】 學名 *Inula Racemosa*, Hook, Fil.

成分 精油 (主成分爲 *Aplotaxen* $C_{17}H_{28}$ a-b-*Coste* $C_{15}H_{24}$ *Costus Lacton* $C_{15}H_{20}O_2$ *Dihydrocostus*

Lacton $C_{15}H_{22}O_2$ *Costussaure* $C_{15}H_{22}O_2$ *Costol* $C_{14}H_{24}O$ 等

發表者 (Ber. 471914)

【甘松香】 學名 *Nardostachys Jatamansi*, Royle.

成分 精油

發表者 朝比奈藥誌302(明40)化誌28(明40)

【山奈】 學名 *Kaempferia Rotunda*, L.

成分 精油(主成分爲 Methyl-p-cumar Saure Athyl Ester 及 Zimt-Saure Athyl Ester 其他含 Pentadecan 及少量之 Zimtaldehyd)

發表者 中尾澁江藥誌513(大13)

【蒟醬】 學名 *Piper Metle*, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.47

【肉豆蔻】 學名 *Myristica Fragrans*, Houtt.

成分 脂肪油, 揮發油, 澱粉,

發表者 下山生藥學399

【薑黃】 學名 *Curcuma Aromatica*, Salisb

成分 Curcumin (黃色素) 油澱粉

發表者 藥誌542(昭2)藥彙

【蓬莪草】 學名 *Kaempferia Pandulata*, Roxb.

成分 精油(主成分爲 Cineol)

發表者 邦藥³⁰⁴

【莎草】

學名 *Cyperus Rotundus*, L.

成分 精油(主成分爲 *Cyperen* $C_{15}H_{24}$ 及 *Cyperol* $C_{18}H_{34}O$) 脂肪酸及 Phenol 性物質

發表者 木杖(雄)大谷藥誌⁵⁶⁰(昭3)學彙藥誌⁵²⁷(大15)

【茉莉】

學名 *Jasminum Sambac*, Ait.

成分 香脂(主成分爲精油及蠟)

發表者 土橋臺研¹¹(大11)

【茅香】

學名 *Cymbopogon Nardus*, Rendl.

成分 精油

發表者 惠澤工化¹⁶(大2)篠崎(英)工化¹⁶(大2)賀田工化¹⁶(大2)加福工化¹⁹(大5)20(大8)

加福臺研⁹(大5)

【迷迭香】

學名 *Rosmarinus Officinalis*, L.

成分 揮發油

發表者 下山生藥學

【香薷】

學名 *Mosla* Sp.

成分 精油(主成分爲 *Eishotziaketon* $C_{10}H_{14}O_2$)

發表者 朝比奈、村山藥誌380(大2)388(大4)朝比奈、柴田(文)藥誌415(大5)朝比奈、利米31(大7)朝比奈、桑田藥誌485(大11)朝比奈、Acta, Phytocchim, vol. II, NI

【荊芥假蘇】 學名 *Ocimum Basilicum*, L.

成分 精油(主成分 D-Menthon 及非旋光性 Menton D-Limonen)

發表者 村山、板垣藥誌476(大10)村山、化誌32(明44)

【薄荷】 學名 *Mentha Arvensis*, L.

成分 精油(主成分爲 Menthol $C_{10}H_{16}O$)

發表者 學彙藥誌346(明44)學彙藥誌441(大7)學彙藥誌364(大11)篠崎(英)工化2(大8)18(大4)木村(惠)工化7(明37)

【積雪草】 學名 *Hydrocotyle* Spp.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.9

【蘇】 學名 *Perilla Ocimoides*, L, Var *Crispa*, Benth.

成分 精油(主成分爲 *Perilla Aldehyd* $C_{10}H_{14}O$)

發表者 吉木藥誌347(明44)〔其他〕吉川、富澤、工化23(大9)農業會報(大6)11月號)

【荏】 學名 *Perilla Ocimoides*, L.

成分 精油

發表者 木村(惠)工化7(明37)

【薺薇】 學名 *Salvia Plebeia*, R. Br.

成分 精油(主成分 Thymol)

發表者 村山藥誌59(大9)〔其他〕吉川,富澤,工化22(大8)

【菊】 學名 *Chrysanthemum Sinensis*, Sab.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.2

【野菊】 學名 *Chrysanthemum Indicum*, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.2

【艾】 學名 *Artemisia Vulgaris*, L, Var. *Indica*, Maxim

成分 精油(主成分爲 Cineol, α -Thujon $C_{10}H_{16}O$)

發表者 中尾,澁江藥誌510(大13)〔其他〕大橋,東北醫20(1927)時日本藥物2(大15)微生物誌20(大15)

【青蒿】 學名 *Artemisia Apiacea*, Hance.

成分 苦味質精油 Aprotanine.

發表者 F.S.A.I.1

【黃花蒿】 學名 *Artemisia Annua, L.*

成分 精油

發表者 F.S.A.I. 1 今田藥誌420(大6) 朝比奈, 吉富藥誌424(大6)等

【益母草】 學名 *Leonurus Sibiricus L.*

成分 Leonurin

發表者 久保田, 中島醫海1771(昭3)

【夏枯草】 學名 *Brunella Vulgaris, L.*

成分 全草含有水溶性無機鹽約3.5%其中約68%爲KCl所成又成有水難溶性之植物膠鹼樣物

質子中含脂肪油

發表者 久保田, 中島滿密9(昭3)

【雞冠花】 學名 *Celosia Cristata, L.*

成分 子中含脂肪油

發表者 F.S.A.I.42

【紅藍花】 學名 *Carthamus Tinctorius, L.*

成分 花中含Saflangelb $C_{24}H_{36}O_4$ 及 Carthamin $C_{21}H_{32}O_{10}$ (3) (紅色素) (2) 種子中有脂肪油

發表者 (1) Malin: Ann. 136(1863) (2) 德高化誌29(明39) 化誌31(明42) 黑田日藥例會(昭41月)

(其他) 羽根植研4(昭2)

【番紅花】 學名 *Crocus Sativus*, L.

成分 含有 α -Crocin. b-Crocin. 及 α -Crocin 色素)其他 Picrocrocin $C_{25}H_{46}O_7$ (苦味質) 脂肢油, 精油等

發表者 雜錄草誌557(昭3)

【續斷】 學名 *Dipradox Asper*, Wall.

成分 Lamine 及 Glycoside.

發表者 F.S.A.I.9

【惡質】 學名 *Arctium Lappa*, L.

成分 Inulin. 脂肪油

發表者 F.S.A.I.1

【菜耳】 學名 *Xanthium Strumarium*, L.

成分 Xanthostrumarin

發表者 學彙66(昭20)

【天名精】 學名 *Carpesium Abrotanoides*, L.

成分 Inulin(?)

發表者 F.S.A.I.2

【豨薟】 學名 *Siegesbeckia Pubescens*. Makino

成分 苦味質 Darutin

發表者 F.S.A.I.3

【甘蕉】 學名 *Musa Paradisiaca*, L. Var. *Sapientum*, Kuntze.

成分 糖質、有機酸、單寧、沒食子酸、脂肪、纖維素等

發表者 F.S.A.I.49

【麻黃】 學名 *Ephedra Sivea*, Stampf.

成分 Ephedrin $C_{10}H_{15}NO$ (1) Pseudoephedrin, (2) Non-Pseudoephedrin $C_{10}H_{15}NO$ (3) Methyleneephedrin

$C_{11}H_{17}NO$ (4) Imethylepseudoephedrin $C_{11}H_{17}NO$ (5)

發表者 (1)長井藥誌 120, 121, 127 (昭25) 130139(26) (2)E. Read & C. T. Feng: Chinese Jour.

Phy. I (1927) (3)Smith: J. Chem.Soc. (1928) 醫藥雜誌556(昭3)等

【木賊】 學名 *Equisetum Hyemale*, L.

成分 無水珪酸

發表者 邦藥360

【燈心草】 學名 *Juncus Effusus*, L. Var. *Decipiens*, Buch.

成分 水分7.15%脂肪6.55%粗纖維33.16%Protein1.73%無氮素抽出物42%灰分4.32%

發表者 大島 J. of Sapporo Agric. College 2(1906)

【地黃】 學名 *Rehmannia Lutea*, Maxim.

成分 Mannit及糖

發表者 大谷日藥總會(48)演講(昭3)

【牛膝】 學名 *Achyranthes Bidentata*, Blume

成分 灰分中富加里^(?)監黏液質

發表者 (1)河野藥誌561(昭3)〔其他〕藤田藥誌504(大13)

【紫苑】 學名 *Aster Tartaricus*, L.(?)

成分 Quercetin及融點150°之結晶性物質

發表者 中沖日藥45回總對(昭3)

【鴨跖草】 學名 *Commelina Communis*, L.

成分 Starch, Mucilage,

發表者 F.S.A.I.52

【黃蜀葵】 學名 *Abelmoschus Manihot*, Medic.

成分 黏質物

發表者 小澤工化25(大11)石津藥誌209(明32)

【龍葵】 學名 *Solanum Nigrum*, L.

成分 全草中含少量有散腫作用之 Alkaloid^(?)果實中含 Solanin^(?)及 Saponin^(?)

發表者 (1) Q. Schmidt. Schutte: Arch. Pharm 229 (1891) (2) Desfosses: J. Do Phar.6(1820)

(3)W aage: Pharm. Central. (1892)

【酸漿】 學名 *Physalis Alkekengi, L.*

成分 (全草) *Physalin* (無晶形苦味質)(果實) 枸橼酸及微量 *Alkaloid*, (2) (根中) *Hystonin* (1)
發表者 (1) *Dessaigue: et Chantard J. Pharm. 21 (1852)* (2) 溝口齋試藥24(大13) *X.F.S.A.I.S*

【迎春花】 學名 *Jasminum Mediflorum, Lindl.*

成分 葉中含 *Syringin* (一種 *Glycoside*)
發表者 *F.S.A.I.13*

【款冬花】 學名 *Fussilago Fartara, L.*

成分 (葉中) 配糖體 2.63% (花中) 二種 *Phytosterin*.
發表者 *W. P. 785; B. P. C. 1128 A.J.P. 1887(59) U.S.D. 1331*

【決明】 學名 *Cassia Fera, L.*

成分 *Emodin* 及配糖體
發表者 *Felborne: Phar. Jocer. Traus. 3(1829)*

【金盞草】 學名 *Calendula Arvensis, L.*

成分 全草中含水楊酸根中含 *Inulin*.
發表者 *W.P. 786 B.P.C. 251*

【車前】 學名 *Plantago Major, L. Var Asiatica, Decne.*

成分 全草中含配糖體 Aucubin $C_{15}H_{24}O_{10}$ (?) 及 Plantagin(?) 種子中除多量黏液外尚有 Plantan-olsaure $C_{15}H_{26}O_8$ (?) 琥珀酸(?) 等

發表者 (1)宿谷富藥誌(大13)藥誌490(大11) (2)高橋(統)岡醫385(大11) (2)緒方(草)西大藥誌514(大13)

【馬鞭草】 學名 *Verbena Officinalis*, L.

成分 Verbenalin $C_{17}H_{25}O_{10}$ (結晶性配糖體)

發表者 L.Bluradien: Chem. Ztg. 1908, Apr 藥誌316(明41)學彙

【連翹】 學名 *Hypericum Aseylon*, L.

成分 葉中含 Phyllirin.

發表者 Eijikman: Rec.5(1886)

【藍】 學名 *Polygonum Tinctorium*, Lour.

成分 Indican(配糖體)

發表者 W.P.176

【藍澱】 學名 Indigo(英名)

成分 Indigo

發表者 藥誌39(明18)雜錄

【蓼】 學名 *Polygonum Hydroper*, L.

成分 Polygonum Acid Tannin

發表者 F.S.A.I.43

【虎杖】

學名 Polygonum Reynoutria, Makino

成分 Polygonin

發表者 藥誌314(明41)學彙

【蕭菴】

學名 Polygonum Aviculare, L.

成分 糖、單寧、蠟

發表者 Lebbin:Med Woche.4(1908)

【蒺藜】

學名 Tribulus Terrestris, L.

成分 單寧

發表者 U.S.D. 1291 I.M.P. 229

【大黃】

學名 Rheum Tanguticum (Maxim.)

成分 Chrysophan Saure, Emodin, Isoemodin. Rhein. Rheochrysin. 其他 Aporetin, Erythroretin

及 Phaeoretia 大黃鞣酸 (Rheumgerbsaure) 鞣酸酶、澱粉等

發表者 下山, 生藥學114

【商陸】

學名 Phytolacca Esculenta, Houtt.

成分 硝石、脂肪油

編輯後記

發表者 (1)猪子,本田:東醫5(明24) (2)小倉:工化31(昭3) [其他]長井:藥誌98(明23)岩川:東醫28(大1)

【狼毒】 學名 *Aconitum Lycoctonum*, L.

成分 *Lycaconitin*, *Myoconin* *Euphorbon*, 樹脂, 葑

發表者 F.S.A.I. 40

【大戟】 學名 *Euphorbia* Spp.

成分 酸石灰及一種 Alkaloid

發表者 有馬:化誌252(昭3)

【續隨子】 學名 *Euphorbia Lathyris*, L.

成分 *Aesculetine* $C_9H_6O_4$

發表者 田原:化誌10(明22)藥誌93(明22)

【莨菪】 學名 *Hyoscyamus Niger*, L. Var. *Chinensis*, Malino.

成分 *Hyoscyamin* $C_{17}H_{23}NO_2$ *Atropin*, *Nor-Hyoscyamin* $C_{16}H_{21}O_2N$ *Nor-Atropin*. *Scopolamin* $C_{17}H_{21}NO$

發表者 邦藥58

【蓖麻】 學名 *Ricinus Communis*, L.

成分 子中含脂肪油, *Ricin* (毒性) *Lipase* (脂肪分解酵素)等蛋白質類, 及 *Renin* (Alkaloid)

發表者 猪口工化29(大14) 〔其他〕喜多、大角工化26(大12)田中工化15(明15)

【藜蘆】 學名 *Veratrum Nigrum*, L.

成分 Jervin (Alkaloid) $C_{26}H_{47}NO_6$

發表者 邦藥327

【木藜蘆】 學名 *Leucothae Grayana*, Mikm.

成分 Grayanotoxin $C_{27}H_{44}O_6$

發表者 久保東醫21(明40)22(明41)土居日新醫9年11號(大9) 〔其他〕佐佐木(秀)日本公衆保

健協會雜誌2(大15)

【烏頭】 學名 *Aconitum Fischeri*, Reichb.

成分 Japaconitin $C_{27}H_{44}NO_6$ (A.B.O.)

發表者 邦藥253

【虎掌天南星】 學名 *Arisaema Heterophyllum*, Bl.

成分 Saponin (尙未精査)多量澱粉

發表者 邦藥332

【葛藜】 學名 *Amorphophallus Konjac*, K. Koch.

成分 Konjak-Manvan

發表者 辻鶴 Bull. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 2 (1894)前田東醫31(大6)

【半夏】 學名 *Pinellia Ternata*, Breit.

成分 精油^(?)揮發性 Alkaloid.^(?)

發表者 (1)中山(卜)藥誌509(大13) (2)八木第四回藥理學會(昭5) [其他]江馬中外醫新
238號

【蚤休】 學名 *Paris Polyphylla*. Sm.

成分 Paridin

發表者 F.S.A.I.51

【鳶尾】 學名 *Iris Tectorum*, Maxim.

成分 脂肪油及配糖體 Tectoridin $C_{22}H_{22}O_{11}$

發表者 柴田(文)藥誌543(昭2) 朝比奈,柴田(文),小川藥誌561(昭3)

【曼陀羅花】 學名 *Datura Alba*, Nees.

成分 (子) Scopolanin, Hyoscyamin Atropin 及脂肪油

發表者 長田藥誌504(大13)

【羊躑躅】 學名 *Rhododendron Molle* G. Don.

成分 Andromedutxin

發表者 F.S.A.I.14

【莽草】 學名 *Illicium Anisatum*, L.(?)

成分 揮發油, 樹脂, 脂肪油, 單寧, 糖分。

發表者 藥考

【茵芋】 學名 *Skimmia Japonica*. Th. (?)

成分 *Skimmianine* *Skiminin*

發表者 F.S.A.I.27

【石龍芮】 學名 *Ranunculus Sceleratus*, L.

成分 *Anemonin*

發表者 朝比奈 Acta. Phytoc. 1922 (No.5) 朝比奈, 藤田藥誌 507 (大10)

【蕁麻】 學名 *Urtica Thunbergiana*, Sieb. et. Zucc.

成分 *Urticin*

發表者 藥邦 285

【鈎吻】 學名 *Rhus Toxicodendron*, L. Var. *Radicans*, M.

成分 樹皮滲出物中含 *Laccol* $C_{12}H_{18}O_2$ 及酸化酵素 *Laccase*.

發表者 邦藥 155

【菟絲子】 學名 *Coscuta Chineseis*, Lam.

成分 樹脂配糖體等

發表者 佐野京藥誌 28 (大6)

編輯後記

【使君子】 學名 *Quisqualis Indica, L. Var Villosa, Clarke*

成分 脂肪油⁽²⁾及少量性狀不明之結晶性物⁽³⁾

發表者 (1)於藥誌420(大6) (2)猪子藥誌331(明2) (其他)鶴田長醫2(大13)

【木鼈子】 學名 *Momordica Cochinchinensis, Spreng.*

成分 脂肪油二種 Saponin 及一種複糖體

發表者 攝陽主人藥誌13(明16)中尾藥誌43(大8)

【番木鱧子】 學名 *Strychnos Nux-Vomica, L.*

成分 Strychnin, Brucin

發表者 下山生藥學363

【槿藤子】 學名 *Entada Scandens, Benth.*

成分 Entadasaponin

發表者 F.S.A.I.31

【牽牛子】 學名 *Pharbitis Nil, Choisy.*

成分 Pharbitin(樹脂配糖體)⁽¹⁾脂肪油⁽²⁾

發表者 (1)朝比奈,寺田藥誌452(大8) (2)朝比奈,清水藥誌479(大11) (3)朝比奈,中西藥誌520

(大14)

【旋花】 學名 *Calystegia Sepium, R. Br.*

成分 全草中含水溶性物質30.7%葡萄糖17.5%灰分4.3%及 Saponine
發表者 桑田播磨藥誌548(昭2)鶴田實驗消化器病學1(大15)

【薔實】 學名 *Rosa Multiflora*, Thunb.

成分 Auceretin, Multiflorin

發表者 安藤京醫9(大1)近藤岩本口羽藥誌535(昭4)

【月季】 學名 *Rosa Chinesis*, Jacq.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.34

【栝樓】 學名 *Trichosanthes Kirilowii*, Maxim.

成分 (根)澱粉(子)脂肪油

發表者 津田九藥1(昭2)

【王瓜】 學名 *Thladiantha Dubia*, Runge.

成分 根中含澱粉

發表者 邦藥30

【葛】 學名 *Pueraria Triloba*, Makino

成分 (根)澱粉(葉) Adenin, Asparagin Glutamin Saure, Butter Saure 及融點185°C之黃色結晶
性物質

發表者 佐佐木(林)農化3(昭2)

【百部】 學名 *Stemone Japonica*, Miq.

成分 全草中含 *Stemonin* 及融點 116°C 一種 Alkaloid.⁽¹⁾ 根中有 *Hodorin* $\text{C}_{19}\text{H}_{31}\text{O}_2\text{N}$.⁽²⁾

發表者 (1)鈴木(衡)化誌82(明中)鈴木藥誌352(明中)長井古屋藥誌162(明29) (2)古屋藥誌368(大11)〔其他〕猪子東醫2(明22)

【何首烏】 學名 *Polygonum Multiflorum*, Thunb.

成分 四川品之一般成分爲總窒素1.1%澱粉45.2%脂肪3.1%礦物4.5% Lecitin. 3.7%
Oxymethy Lanthrachinon 化合物1.78%水可溶性物總量26.4%

發表者 衣笠辰濃藥誌480(大11)〔其他〕高木(重)藥誌472(大10)

【白藥子】 學名 *Trichosanthes Kirilowii*, Maxim(?)

成分 *Trichosanthin Pigments*

發表者 F.S.A.I.5

【茜草】 學名 *Rubia Cardifolia*, L.

成分 *Purpurin*

發表者 近藤藥誌208(明22)

【防己】 學名 *Sinomeninum Acutum*, Rehd. Et Wil.

成分 *Sinomenin*, $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{NO}_4$, *Disinomenin*, $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_5$ 及無晶形之 *Diversin*, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{NO}_6$

發表者 近藤、落合、中島、藥誌 497 (大2) 近藤、落合、藥誌 503 (大13) 石割、中外醫事新報 955等

【通草】 學名 *Saunteria chinensis*, DC (?)

成分 (子) 脂肪油 (2) (木部) 結晶性配糖體 Alkibin (C₅₅H₈₆O₁₀ (2)).

發表者 (1) 内田、工化 19 (大5) (2) 有馬、高橋、化誌 8 (昭2) 49 (昭3) (其他) 石戶、谷、鮮藥 3 (大14)
河野、藥誌 561 (昭3)

【鉤藤】 學名 *Uncaria sinensis*, Oliv.

成分 *Rhinchophyllin* C₂₂H₂₈N₂O₄ 或 C₂₁H₂₇N₂O₄

發表者 近藤、福田、富田、藥誌 554 (昭3) 赤松、國香、長醫 6 (昭3)

【忍冬】 學名 *Lonicera japonica*, Thunb.

成分 單寧質

發表者 邦藥 34

【藤黃】 學名 *Garcinia morella*, Desv.

成分 *Gambogiassaure*, Gummigutigelb.

發表者 下山、生藥學 397

【羊蹄】 學名 *Rumex japonicus*, Melsn

成分 *Chrysophansaure* 及 *Frangulaemodin*

發表者 村山、藥誌 375 (大2) 村山、板垣、藥誌 470 (大10)

【菖蒲】 學名 *Acorus Gramineus*, Soland.

成分 精油(主成分 $\text{Asaron } \text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$)

發表者 木村(雄)藥誌513(大15)

【白菖】 學名 *Acorus Calamus*, L. Var. *Angustatus*, Bess.

成分 精油

發表者 朝比奈藥誌295(明30) 朝比奈, 今井藥誌393(大3)

【香蒲蒲黃】 學名 *Lyppha Latifolia*, L.

成分 脂肪油及 $\text{Iso-Rhammetin } \text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_7$ (配糖體)

發表者 Masao Fukuda: Bull Chem. Soc. Jap. 3 (1928)

【金星草】 學名 *Polypodium Normale*, Don. (?)

成分 *Cumarin*

發表者 鈴木(衡)藥誌557(昭3)

【石松】 學名 *Lycopodium Clavatum*, D.

成分 脂肪油(鍾子中)⁽¹⁾ $\text{Lycopodin } \text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_8$ ⁽²⁾

發表者 (1) A. Langer: Arch. Pharm. 227, 208(1880) (2) K. Bodeker: Ann. 208(1881)

中藥產地。以四川、廣東、浙江爲大宗。廣東方面之藥品產地。本書記載特詳。四川、浙江二處之產地。今據得之實地調查報告。錄記如下。

甲、四川方面 此項材料，係四川之中國銀行重慶分行所集。記述鑿確，頗不易致。

川藥產量以川芎、當歸、白芍、薑四種爲最多。年達百萬觔以上。

其次爲大黃、半夏、枳殼、天雄、陳皮、黨參、白薑、巴豆、羌活、白芷、杜仲、澤瀉、麥冬、黃芪、紅梅、使君子、谷齒、木香、鬱金、枳實、丹參等二十一種。年產十萬觔以上。

其次爲貝母、牛膝、甘松、鹿角、天麻、鮮石斛、天門冬、川棟子、秦艽、故紙、赤芍、黃柏、橘絡、吳茱、黃連、常山、薄荷、五加皮等十八種。年產萬觔以上。

再次爲冬蟲夏草、豬苓、雷丸、牙皂、通草、南星、佛手片、川烏、菊花、厚樸、龍骨、豹骨、九香蟲、紅花、參葉等十五種。年產在千觔以上。

再次爲茅慈姑、蟬花二種。年產百觔以上。

再次僅麝香一種。爲十觔以上。

每年出口總值。共達三四百萬之鉅。

重慶中國銀行之調查。精切逾恆。其有利於治藥學者殊鉅。各藥花名等級產地並錄於此。

【大黃】 產階州、文縣、南坪、岷州、秦州、葉塘等。有刁支、混莊、伏頭、通底、頂底、刁王、統獨、枯枝、服子、歸尾等花名。以秦州所產皮微紅，紋細，苗小，味麻而甜者爲最佳。

【川芎】 產灌縣石羊場。分貢芎、芎王、統芎、撫芎四種等級。

【羌活】 產中壩，瀘縣。分特羌，羌王，附羌三級。以羌心如菊花色黃有香味者爲佳。

【白芷】 產遂寧，崇慶，渠河。以根條不壯皮紅內黃爲最劣。根條粗壯內外色白者爲最優。

【附子】 產中壩，河東與河西。分鹽附子，泥附子兩種。銅皮黃色者爲優。

【半夏】 產渠縣，營山，合川，遂寧，敘府。分蛋夏，貢夏，棟夏，揀夏四等。以身乾色白子大圓熟者爲佳。

【澤瀉】 產瀘縣，石羊場。以個頭大身乾色白無枯坑者爲佳。

【牛膝】 產雅安，天全。以根粗如指者爲優。

【黃連】 產雅安，石柱，雲南。分雅連，毛連，刁支連，味連四級。以根條粗短者爲佳。

【貝母】 產松潘，雅安。分真貝，沖貝，熟貝，黃貝，提貝，干貝，等數級。以羅漢肚狀平頂閉口者最佳。

【鬱金】 產崇慶，瀘縣，敘府。分出號，頭號，二號，魁貢，頂貢五級。以子粒圓熟內色黃形如麻雀卵者爲最佳。

【吳萸】 產綏定，敘府，貴州。以子粒大開口無枝幹者爲最佳。

【巴豆】 產納溪，合川。分巴豆，米兩種。以納溪產子粒大滿倉者最佳。

【枳實】 產江津，綦江。分鵝眼枳實，片枳實，鎗枳實三級。以身乾色黃子粒與片子均細者爲最佳。

【川棟子】 產合川，寧渡河。以身乾色黃個頭大者爲最佳。

【杜仲】 產貴州，秦州，中壩，巴中。分厚仲，行仲二級。以身乾皮張寬大者爲最佳。

【黃柏】 產嘉定。以身乾色黃塊大身厚者爲最佳。

【厚樸】 產宣漢。分靴兜子，萬卷書，羊耳三級。以皮張厚有油氣，味帶辛辣者爲最佳。

【通草】 各地皆產。以色白身乾者爲最佳。

【紅花】 產蓬溪。分片紅花大市紅花兩級。以色氣鮮紅花鬚長而淨者爲最佳。

【麝香】 產西康及四川邊境。以有原皮內色黃氣味香而長具有「黑豆瓣」者爲最佳。（未散之香形如黑豆瓣故名。）

乙、浙江方面 此項材料。係由國民政府實業部所編中國實業誌稿所錄出。據云。浙省所產藥材極多。最著者如貝母，麥冬，白朮。貝母種植面積達六千畝。產量達八千數百擔。價值達五十萬元。麥冬面積達萬畝。產量達二萬擔。價值達一百二十萬元。白朮面積凡三萬五千五百餘畝。產量達七萬一千餘擔。價值達一百三十三萬餘元。他如玄胡，茯苓，芍藥，冬桑葉，桑椹，桃仁，枇杷葉，萊菔子，冬瓜子，白芥子，荊芥，夏枯草，蘇根，苦參子，牛蒡子，百芥子，黃麻子，澤蘭，玄參，地黃，薄荷，決明，千金子，白芷等。多所在皆有。

浙江貝母。卽統稱象貝。較川省之貝母爲大。產於象山縣。寬橋，鄞縣亦有。以漳村，大雷二處爲最多。

貝母爲草本植物。秋種夏收。幹高尺餘。分作二枝。葉對生。花白色。普通每株結實二枚。多則三枚。以元寶貝爲佳。

白朮產於新昌爲最多。他如溫嶺，仙居，東陽，永康，遂昌，於潛，各有出產。以於潛爲最佳。

麥冬產於杭州之寬橋及餘姚二處爲最多。

元參以寬橋爲最有名。番司及艮山門外亦佳。

地黃，決明，白芷，荊芥均以寬橋爲名產。

三 本書內專門名詞之解釋

中國藥物學中。有常用之專門名辭甚多。每非通常學者所習知。茲分釋其意義如後。以備檢閱此書者之參考。

【咬咀】嚼也。古人於藥物無刀剉法。但以口嚼細。近世用咬咀二字。可作爲以藥切成飲片解。

【君】方劑中之主要藥。如治寒病則熱藥爲君。治熱病則寒藥爲君。

【臣】方劑中之輔助藥。因主要藥之力量尙有不足。故加他藥以輔助之。

【佐】方劑中之監制藥。如寒病治以熱藥。而恐熱藥過甚之爲害也。則少用寒涼藥以監制之。

【使】方劑中之引導藥。臟腑經絡各有引導專品。能使藥與病相遇而奏效易著。

【方寸匕】古方中量名。其七正方抄散藥末以不落一寸爲度。其容量猶今之一茶匙也。

【字】古方中權名。古以銅錢抄藥末。依世相沿稱一銅錢所抄藥末之量。曰一錢。錢面共有四字。故又稱一錢之圖。分之一曰一字。二字則五分也。

【陰陽水】生水與熱水相和也。又井水與河水相和亦稱陰陽水。

【文武火】文火卽火力之緩而慢者。武火卽火力之猛而烈者。

【製】裁製藥性之偏者。猛者使之就於範圍也。

【等分】謂諸藥分量相同也。

【刀圭】卽十分方寸七之一。

【泡】水製法之一。暫置藥品於水中。以解其烈性也。

【炒】置藥物於火下使之黃而不焦。以祛其寒性也。

【炮】置藥物於火上。以烟起爲度。

四 古方權量之考證

關於古方引用權量。均係古制。與今時全不相同。大抵古之一兩。約當今三錢。古之一七。約當今二錢四分。今爲檢閱者參考起見。特將章太炎先生所作古方權量考附錄於次。（以下均太炎先生稿。）

古權衡之難定者。在其自有盈肭。宋世如歐陽永叔沈存中諸公。各以古器與今之權量比勘。亦種種不同。夫謂一兩當今之三錢者。此惟王莽貨泉爲然。據志貨泉重五銖。今平得貨泉十枚重六錢三分五釐。則一銖當今一分二釐七毫。二十四銖爲成兩。當今三錢另四釐八毫也。若漢五銖錢以今稱平之。一枚適重八分。十三枚則重一兩另四分。以唐開通元寶十枚互平略相當。（沈冠雲云。開通元寶十枚重一兩另三分。比今之所平得者正同。然則今之一錢。不逮開通元寶一枚也。）是一銖當今一分六釐。二十四銖當今三錢八分四釐也。五銖錢存者最多。除梁女錢隋鐵錢易辨外。以五字交服漢錢。而其重悉如此。殆可以爲定法矣。昔人謂十六五銖錢。當十開通元寶錢。實不然也。又上考武帝三銖。以三枚平之。重一錢八分八釐。是一銖當今二分另八八八不盡。又考王莽貨布。貨布重二十五銖。今以二枚平之。重九錢二分。是一銖當今一分八釐四毫。且三國晉宋權衡未改於漢也。今以宋四銖四枚平之。重二錢七分。是一銖當今一分六釐八毫七秒五忽。雖非能斟如畫一。然一銖之重。未有在一分六釐以下者。更以黃金驗之。漢志稱太公作九府圓法。黃金方寸重一斤。劉徽九章注亦有是說。而清康熙雍正兩朝所核黃金重量。積營造尺一立方寸重十六兩八錢。則欲求權衡之差。又當先知尺度之差矣。漢尺在者。有建初銅尺。孔尙謂當今量地官尺六寸六分。所謂量地官尺者。未知卽營造尺否也。今以莽大泉比營造尺一枚得七分九釐。積十枚得七寸九分。據漢志稱大泉徑一寸二分。是漢一寸。當今六分五釐八毫三秒三忽不盡也。然劉歆尺卽晉前尺所本。據宋王厚之所舉者。晉前尺實得營造尺六寸九分。現積十大泉者爲長。莽泉在者。貨布最爲完好。漢志稱貨布廣一寸。今以營造尺度之得七分一釐。然則王厚之所圖者。與貨布尺相近矣。與大泉尺相遠。以大泉寸法自乘再乘。得今二百八十五分所積黃金

重。今平四兩七錢八分八釐。卽漢時十六兩。是漢一兩當今二錢九分九釐二毫半也。以貨布寸法自乘再乘。得今三百五十七分九百一十一釐。所積黃金當重今平六兩一分二釐九毫強。卽漢時十六兩。是漢一兩當今三錢五釐八毫有奇。以大泉寸法計一銖之重略與貨泉相當。以貨布寸法計一銖之重略與漢五銖相當。則漢代權衡本有出入。然爲孔氏同度記謂漢一兩祇當今二錢五分有奇。則歷驗未有其徵也。（徐氏謂漢一兩當今二錢更謬。）

漢量在者。清宮有王莽銅斛。然宋時范鎮已不見是器。蓋依著隋志仿造者爾。若依大泉寸法。漢時立方一寸。當今二百八十二分一斗。積一百六十二立方寸。當今四十六寸一百七十分。以清康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升四合四勺強。以清雍正斗法三百十六立方寸以除。得一升四合六勺強。若依貨布寸法。漢時立方一寸。當今三百五十七分九百一十一釐。一斗積一百六十二立方寸。當今五十七寸九百八十一分四百九十二釐。以清康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升八合一勺強。以清雍正斗法三百十六方寸除之。得一升八合三勺強。二者相差。如徐氏所稱古一斗當今二升者。則於貨布寸法爲近。（周禮中年人食三鬴。謂一月之食也。依古一寸。今一升八合一勺。粟一升一合五勺。粟率五十。稗米二十七。則爲米六合二勺也。若依一升四合六勺計。則太少矣。）藥物重輕。礦植既異。植物之根莖葉實復有不同。漢時散藥一錢七者。謂以五銖錢鈔之不落爲度。然則積藥既厚。無過三倍於錢爾。而植物與銅重量殊絕。木中重者。無爲烏木紫檀。視銅祇六分之一。其餘或十五分之一矣。以之作散重者亦輕。大抵草木散藥。積與五銖錢等。其重無過十分之一。積五銖銅三倍其重。無過十分之三。今據五銖銅重八分之三。則二錢四分以十除之。得二分四釐。是草木散藥一錢七之重也。石質重於草木。然以玉較銅。若一與二六比。糜碎作散。化堅爲壤。其重當減三方之一。以較銅若一與三九比。然則石藥作散體積三倍五銖錢者。得重六分一釐五毫也。金質又重於石。以黑鉛較銅。若三與三比。以水銀較銅若九與五比。丹砂輕於水銀。亦與鉛相等。糜碎作散。其重當減三分之一。

是故鉛丹丹砂積與五銖錢等。其重亦等。若三倍錢積而成一七。則得二錢四分也。

五 近世權度之折合

向來國醫開方藥鋪配藥所用權度。悉依營造尺庫平制。近自民國十八年公布中華民國度量衡法。另定一種市用制以來。嚴厲推行。全國幾完成劃一。藥鋪已廢除營造尺庫平制。而改用市用制。惟市用制之斤兩較庫平為輕。不及庫平八四折。而市用制之升亦較營造尺制之升為小。不及舊升九七折。此後如國醫仍照舊制開方。而藥鋪乃依新制配藥。在輕病已覺見效稍緩。在重病必致貽誤不淺。與病家極有關係。茲將新舊制之分量比較如下。

(一) 新舊制重量比較表

重 量	庫平合市秤	市秤合庫平
一 釐	一釐一毫九絲	八毫三絲八忽
五 釐	五釐九毫七絲	四釐一毫九絲
一 分	一分一釐九毫	八釐三毫八絲
二 分	二分三釐九毫	一分六釐八毫
三 分	三分五釐八毫	二分五釐一毫
四 分	四分七釐七毫	三分三釐五毫
五 分	五分九釐七毫	四分一毫九毫
一 錢	一錢一分九釐	八分三釐八毫
一 錢五分	一錢七分九釐	一錢二分六釐
二 錢	二錢三分九釐	一錢六分八釐

編輯後記

二錢五分	二錢九分八釐	二錢零九釐
三錢	三錢五分八釐	二錢五分一釐
三錢五分	四錢一分八釐	二錢九分三釐
四錢	四錢七分七釐	三錢三分五釐
五錢	五錢九分七釐	四錢一分九釐
一兩	一兩一錢九分	八錢三分八釐
二兩	二兩三錢九分	一兩六錢八分
三兩	三兩五錢八分	二兩五錢一分
四兩	四兩七錢七分	三兩三錢五分
五兩	五兩九錢七分	四兩一錢九分
一斤	一九兩零九分	一三兩四錢

(二)新舊制容量比較表

容 量	舊制合市用制	市用制合舊制
一 勺	一勺〇·三六撮	九·六六撮
一 合	一合零三·六撮	九勺六·六撮
一 升	一升零三勺六撮	九合六勺六撮

例如方書某藥用一錢五分即知合市秤一錢七分九釐。又如依市秤某藥用二錢五分。即知僅合舊制庫平二錢另九釐。

- 慶醫——慶應醫學
- 東醫——東京醫學會雜誌
- 邦醫——邦產藥用植物
- 臺醫——臺灣醫學會雜誌
- 千醫——千葉醫學會雜誌
- 醫海——醫海時報
- 植研——植物研究雜誌
- 國本——國譯本草綱目
- 長醫——長崎醫學會誌
- 朝鮮——朝鮮醫學會雜誌(鮮醫同)
- 藥誌——藥學雜誌(學彙雜誌附錄)
- 朝試——朝鮮總督府中央試驗所報告
- 臺研——臺灣總督府中央研究所報告
- 富藥誌——富山藥專校友會雜誌
- 衛試彙——衛生試驗所彙報
- 京藥誌——京都藥學校藥留誌
- 東北醫——東北醫學會報
- 中外醫新——中外醫事新報
- 微生物誌——日本微生物學會雜誌
- 日本藥物——日本藥物學雜誌
- Acta. Phy. Acta. Phytoclimica (Tokyo)
- 臨床——臨床醫學
- 京醫——京都醫學雜誌
- 化誌——日本化學會誌
- 日新——日新醫學
- 工化——工業化學會誌
- 滿醫——滿洲醫學雜誌
- 岡醫——岡山醫學會雜誌
- 藥考——和漢藥考
- 農化——農藝化學雜誌

編輯後記

- | | |
|---------------------|---|
| A.T.P. | American Journal of Pharmacy. |
| Ann. | Annalen der Chemie(Liobig's) |
| Arch. Pharm. | Archiv der Pharmacie. |
| Ber. | Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. |
| Berlin. Klin. Woch. | Berliner Klinische Wochenschrift. |
| B.P.C. | British Pharmaceutical Codex, London. |
| Chem. Ztg. | Chemiker zeitung. |
| Chinese Gour. Phy. | Chinese Journal of Physiology (Peking) |
| F.S.A.I | Flora Sinensis, Series A, volume I |
| I.M.P. | Indian Medicinal Plants. |
| J. Dophar | Journal le Pharmacie et de Chimie(Paris) |
| J. Chem. Soc. | Journal of Chemical Society of London. |
| J. Exp. Pharm. | Journal of Experimental Pharmacology and Therapeutia. |
| Med. Woche. | Medicimische Wochenschrift |
| Pharm. Central | Pharmaceutische Centralhalle. |
| Rec, | Recueil des Travaux Chimique des Pays-bas. |
| U.S.D. | United States Dispensatory. |

出版年號(爲便於購買及查閱,用日本原來年號,不改西曆。)

明卽明治——四十年止

大卽大正——元年(民國元年)

緒卽昭和——二年(民國十六年)

檢圖索引

本圖影有彩色版與照相版兩種。故所列頁碼。前後參差。惟均注明於每一藥名之下。俾檢查者得以前後對照。

二靈	丁香	人中白	人中黃	人參	刀豆	十姊妹	三靈	三七	三稜	千年紅	千年健	千里光	土茯苓	土黃草
大青葉	大胡麻	大麻	大麻仁	大麥	大戟	大黃	大腹皮	大蒜	大薊	女貞子	小茴香	小蒜	小麥	小薊
山奈	山查	山茶花	山梔子	山慈菇	山藥	山躑躅	川芎	川椒	川槿皮	四靈	丹參	五加皮	五味子	五倍子
六月霜	升麻	天仙藤	天竹黃	天門冬	天花粉	天南星	天麻	天雄	天漿殼	太子參	孔雀	巴豆	巴戟天	文蛤
三七	一四二	一四二	一四七	一四二·一四七	一〇一·一〇九	一〇一·一〇九	一六九	一五〇	七三	二〇九	一五〇·一五六	一五〇	一四二·一四七	七三
七三	一四二	一四二	一四七	一四二·一四七	一〇一·一〇九	一〇一·一〇九	一六九	一五〇	七三	二〇九	一五〇·一五六	一五〇	一四二·一四七	七三
五四	一六三	二〇一	二〇一·二〇九	一八·四一	一五一·一五六	一〇七	五四·六六	一七二·一七三	二〇二	三一·四九	二〇三	一一五·一二六	二一九	二二九
九〇	一九·四二	一二六	二一八	一一四·一一五	一二〇·一三〇	一〇二·一〇九	一八·四一	一〇二	一六二	一六	二三五	一八八	一九·四一	二二八
一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六	一二六

檢圖索引

木香	五五·六六	代代花	二〇三	甘松香	六七	白疾藜	八六
木通	一一六	代赭石	五·一〇	甘枸杞	二一〇	白槿花	二一〇
木犀	一七七	冬瓜子	一五一·一五七	甘草	二五·四四	白頭翁	二四·四三
木賊草	七三·九〇	冬瓜皮	一五一	甘遂	一〇三	白薇	二二·四三
木綿子	二〇九	冬青	二〇九	生地	七五	白鮮	二三·四四
木蝴蝶	二一七·二一八	冬蟲夏草	二四	生苡仁	一四八	白殭蠶	二二〇
木蘭	一八三	北沙參	二六	白丁香	二三三·二三五	白藥子	一二八
木鼈子	一二七	半夏	一〇二	白及	二二·四三	白蘇	六四·七二
水蛭	二一九·二二三	半夏麴	一四四	白木耳	一五六	白蘇	一一六·一二七
水銀	一〇	功勞子	二〇二·二一〇	白朮	二〇·二一·四二	白蠟	二二二
水獺肝	二四〇	功勞葉	二〇二·二一〇	白石英	一·三	石木耳	一五六
牛蒡子	七四·九〇	巨勝子	一四七	白芍藥	五八	石灰	四
牛膝	七四·九〇	平地木	二一〇	白芷	五六·六七	石決明	二二八·二三二
王不留行子	九〇	玄參	二六·四五	白芥子	一五七	石柱參	四五
五靈		玄精石	一三	白果	一六三	石南葉	二一一
仙人掌	一三九	玉竹	二五·四四	白花蛇	二二五	石斛	一三七
仙茅	二四	瓦松	一三九	白前	二三	石硫黃	八
仙鶴草	七五·九一	瓦楞子	二二八	白茅根	二三·四三	石菖蒲	一三四·一三六

地錢	地膚	地榆	地骨皮	地栗	合歡皮	全蠋	伏龍肝	六靈	石鐘乳	石碱	石蟹	石燕	石榴花	石榴皮	石榴	石蒜	石葦
五七	七六	二五·四五	二〇五·二一一	一七四	一八九·一九六	二一九·二二二	二四六		八·一三	二四七	四·一〇	四	一六八	一六四	一六二	四四	一三九
血竭	血見愁	艾葉	艾	自然銅	肉菴蓉	肉桂	肉果	肉豆蔻	老鶴草	羊躑躅	羊	百藥煎	百部	戎鹽	戊腹米	安息香	地鼈
一八三	一三九	七六	九一	一·三	二六·四六	一七八·一八四	六七	五六	一四一	一〇七·一〇九	二四〇	二一九	一一七	九	二四〇	一八三	一五三
沒藥	沒石子	沉香	杜仲	杏仁	早蓮草	忍冬藤	延胡索	呂宋果	吳茱萸	佛耳草	佛手	何首烏	七靈	西洋參	西河柳	西瓜	血餘
一七七	一八八	一四四·一七九 一八三·一八四	一九〇·一九六	一六〇	七七	一一九·一二八	四六	一八八	一七二	九二	一六四	一一七·一二八		一七·四〇	一八九·一九六	一七四	二四五
兔	使君子	佩蘭	乳香	八靈	防風	防己	辛夷	車前草	赤芍藥	赤小豆	貝齒	貝母	豆蔻花	豆蔻	牡蠣	牡丹皮	沙參
二三九·二四〇	一一八	五八·六九	一七七		二七·四六	一一八·一二八 一二九	一七七·一八四	七七·九二	五七·五八·六八	一四三	二二九	二八	五六·六七	五六	二二九·二三二	五七·六八	二六·二七·四六

芙蓉花	二〇四	芙蓉	二一一	羌活	三五·五二	知母	二八	玫瑰花	二〇四	狗脊	二八·四六	狗牙半支蓮	一四一	河白草	一三〇	枇杷葉	一六五	枇杷	一六八	板藍根	七八	松針	一七九·一八五	明黨參	一七·四一	昆布	一三四	夜明砂	二二三	夜交藤	一一七·一二八	卷柏	一三八·一四〇	刺猬皮	二三七·二四〇
阿魏	一八〇	阿膠	二三七	金櫻子	二〇五·二二一	金錢白花蛇	二二六	金鎖匙	二九·四七	金精石	六·一一	金銀花	一一九·二二八	金鈴子	一九二	金絲草	四七	金雀花	二〇六	金鈎子	一九七	金柑	一六五	金牛草	四七	虎	二四〇·二四一	花蕊石	四	芭蕉	九二	芫花	一〇六	芥	一五二
紅花	七九	孩兒茶	二四六	威靈仙	一一九·一三〇	厚樸	一九〇·一九一 一九七	南沙參	二七	南瓜蒂	一五二	南燭子	二一一	南天燭	二〇七	前胡	三〇·四七	九靈		青礫石	五	青蒿	七八	青葙子	七八·九三	青娘子	二二二	青果	一七〇	青皮	一六四	青木香	五五·六六	附子	一〇三
穿山甲	二二五	秋葵子	七九·九三	禹餘糧	六	砒石	五·一一	砂仁	五九·六九	珍珠母	二二二	珊瑚	二·三	玳瑁	二三一·二三二	炮薑	一五五·一五九	柴胡	二九·三〇·四七	枸橘	二二二	枸骨	二二二	枸杞	二〇五	柿子	一六六	枳殼	二〇七	枳椇子	一六九	紅娘子	二二二	紅花子	九三

風茄花	一〇六・一二三	桔梗	三一・四八	秦艽	三一・四九	馬勃	一三八・一四〇
風茄葉	一〇六	桑螵蛸	二二四・二二三	秦皮	一九七	草烏	一一〇
韭菜子	一五七	桑葉	二〇六	神麴	一四四	草果	五九
降香	一八六	桑寄生	二二四・二二六	益智仁	六一・七〇	草河車	一〇五・一一〇
郁李仁	二〇五・二二二	桑枝	二〇六・二二二	益母草	八〇	草決明	九四
虻蟲	二二二	桃樹	一六二	珠兒參	一六	荊芥	六〇
茉莉花	六九	桃仁	一六〇	狼毒	一〇四・一〇九	芫薺子	八〇
茅針花	二三・四三	桂枝	一八二・一八六	烏藥	一八二	茵陳	八一・九四
茅朮	二一・四一	栝蒌	二二〇・一三〇	烏頭	一〇四・一一〇	茴香	一五〇
茄子	一五二・一五七	栗	一六〇	烏梢蛇	二二六	茯神	二一五
苧麻	八〇	射干	一〇三・一一一	烏柏	一九二	茯苓	二一六・二二四
苦參	三〇・四八	夏枯草	九三	海藻	一三五	菱白子	一三六
苡仁	一四三	十鬘		海龍	二二六	茜草	一一一・一三一
胡黃連	三四・五一	香櫟皮	一六五・二六八	海馬	二二六	荔枝草	一七〇
胡椒	一六九・一七二	香櫟	一六五	海桐	一九七	臭蕪夷	一九八
胡荽子	一五七	香薷	六〇	海狗腎	二四一	臭梧桐	一九二・一九八
胡桐淚	一八六	香樟木	一八〇・一八五	海金沙	八二・九四	粉萆薢	一三一
胖大海	一七〇	香附	五九・六九・七〇	浮海石	六・一一	穉米	一四三・一四七

馬兜鈴	一二一・一三一	常山	一〇五	犀角	二四四	蛇含石	一二
馬鞭草	九四	排草香	七〇	甜瓜	一七四	蛇蛻殼	二二六
馬蘭花	九五	掛金燈	七八・九三一	甜瓜子	一七三・一七四	貫衆	三五
馬寶	二三八・二四一	敗醬	八三・九六	畢澄茄	一七二・一七三	透骨草	一四一
馬蘭	七〇	旋覆花	八四	礪砂	九	通天梗	一七四
骨碎補	一四〇	望月砂	二三九	紫石英	二・三	連翹	八三
高良薑	六一・七〇	望江南	九五	紫花地丁	九六	野料豆	一四五
鬼臼	一一一	梅	一六一・一六二	紫荊	二一三	陳皮	一六六
鬼箭羽	二二二	梗通草	一二三	紫金牛	五〇	魚腥草	一一二
十一畫		梧桐	一九二・一九三 一九八	紫苑	九六	烏不宿	二一三
乾漆	一九一	淡竹葉	八二・九六	紫草茸	三三・五〇	鹿角	二四二・二四三
乾薑	一五八	淡豆豉	一四三	紫蘇	七二	鹿角霜	二三八
側柏子	一八七	淡秋石	七	細辛	三二・五〇	鹿茸	二四三・二四四
側柏炭	一八二	淫羊藜	四九	羚羊角	二三八・二四二	鹿啣草	九七
側柏葉	一八一	清水豆卷	一三四	荷花	一七三・一七五	麥芽	一四八
商陸	一〇五・一一一	清風藤	一二二・一三一	荷葉	一七六	麻黃	八二・九五
密陀僧	一・三	牽牛	一二四	蚯蚓	二二〇	十二畫	
密蒙花	二二三	犀牛角	二三九	蛇牀子	六一・七〇	壺蘆	一五八

蛤蚧	萊菔子	葶藶	菴藎草	菴絲子	菴藎	菊	絲瓜絡	絲瓜子	番瀉葉	番木鱉	琥珀	猴棗	無花果	無名異	款冬	斑蝥	寒水石
二二六	一五三・一五八	一二三	九七	一二三・一三二	一三二	八四・八五・九七	一五三	一五八	一一二	一二三・一三二	二二七	一二	一九八	一二	八四	二一九・二二二 二二三	八・一三
椿樗皮	櫻櫚	十三釐	黑芝麻	黑大豆	黃蘗	黃藥子	黃精	黃魚膠	黃耆	黃連	黃芩	雲實子	雲母石	雄黃	雁來紅	象皮	訶子
一九三・一九九	一九四・一九九		一四二	一四五	一九四	一三三	三四・五一	二二七	三一・三三・五〇	三四・五一	三三・五一	一一二	二・三	七・一二	九八	二四四	一九三・一九九
雷丸	雌黃	補骨脂	蜂房	蜀葵	葶藎子	葱白	葡萄	葛根	蔞蓄	萱草	萬年青	當歸	煙膠	煙草	滑石	楮實子	楓實
二二七・二二八	七	六一	二三四	九九	九八	一五〇	一七三	一二四・一三三	八六	九八	八五	六二・七一	二四五	一一〇	七・一二	二〇八・二二三	一八七
葶萍草	蒲黃	蒲公英	綠豆衣	綠豆	綠毛橘紅	瑪瑙	熊膽	漏蘆	槐角炭	槐	榧子	榕樹根	葛頭回	十四釐	鼠婦	鼠屎	預知子
一三六	一三四・一三六	一五四・一五九	一四五・一四八	一四五	一六九	二	二四五	八七・九九	一九五	二〇〇	一七一	一九九	一四一		二二三	二四四	一三三

樟腦	一八〇・一八五	獨活	三五・五二	龍齒	二二七	翻白草	一五九
廣膠	二四四	壁錢幕	二二三	龍涎香	二二七	瞿麥	一〇〇
廣木香	五五・六六	十六畫		龍骨	二二七	檳榔	一七一
劉寄奴	八八	醉魚草	一一三	豬苓	二一五・二一七	十八畫	
十五畫		華撥	六一・七一	蕤仁	二〇七	麋茸	二四五
鳳尾金星草	一四一	蓮鬚	一七五	薯蕷	一五四	蟋蟀	二二四
鳳仙花	一〇七・一一三	蓮房	一七五	蕎麥	一四二・一四八	螻蛄	二二三
銅絲	一・三	蓮芯	一七三・一七五	燕窩	二三四・二三六	螺螄	二二三
銀杏	一六八	蓮子	一七五	燈芯草	九九・一〇〇	薤白頭	一五九
酸棗仁	二〇七	蓬莪朮	六三・七一	澤蘭	五八	薔薇	二〇八・二二三
遠志	三六・五二	蓬砂	九・一三	澤瀉	一三五	葶黃	六三・七二
輕粉	一三	翦草	一三二	澤漆	二〇六	葶皮	一五五
豨薟草	八七	穀精草	八八・九九	橘核	一六九	薄荷	六四・七一
蟋蟀	二二三	穀芽	一四四	橘紅	一六七	薇	一五三
蜘蛛	二二三	稻根鬚	一四四	橘白	一六六	十七畫	
蒼朮	八六・九九	磁石	一二	橘子	一六六	龜板	二三〇・二三二
蒼朮	二二・四二	熟地	七五	樺木皮	二〇〇	龍鬚草	一〇〇
蓖麻子	一〇八・一二二	潼蒺藜	八六	樸樹	二〇〇	龍膽草	三六・五三

薺菜花	五三	薺節	一七六	蘇方木	一九五・二〇〇	二十四畫	
薺本	一五五・一五九	藜蘆	一〇八・一二三	鱗鱒	二三四	蠶豆	一四五
蟬蛻	六三・七二	蟾蜍	二二一・二三四	櫻桃	一六七	蠶豆花	一四九
覆盆子	二二一	二十畫		續斷	八九	鶯鶯	二三五
雞內金	一二五・一三三	稽豆	一四五・一四八	蠟梅花	二〇八・二二三	龍甲	二三一・二三二
雞血藤	二三四	罌粟	一四六・一四九	鶴	三三五	二十六畫	
雞冠花	一二五	蒼香	六五・七二	鶴虱	八九・一〇〇	贛皮	二四五
銷陽	八九	蕪蛇	二二七	麝香	二九九	二十九畫	
鴉	三六・五三	蘆根	一〇〇	二十二畫		鬱金	六五
十九畫	二三五	蘆蒼	一八二	蜜蟲	二二一・二二四		
		蘇	六四・六五				

本書參攷書目

周 秦 兩 漢

神農本草經三卷
秦皇本草七卷

南 北 朝

神農本草五卷
神農本草屬物二卷
神農明堂圖一卷

名醫別錄七卷

陶隱居本草十卷

隋寶本草九卷

本草六卷

本草經三卷

本草病源合藥要鈔五卷

四家體療雜病本草要鈔十卷

小兒用藥本草

遮道耳眼本草要鈔

本草集註七卷

本草經

本草經綱行本草經利用各一卷

新集藥錄四卷

參 考 書 目

藥草錄六卷

藥法四十二卷

藥性藥對各一卷

神農探藥經二卷

藥忌一卷

雷公藥對二卷

雷公泡炙論三卷

隋

本草二卷

本草經類用三卷

本草集錄二卷

本草雜要訣無攷

本草錄藥性三卷

芝草圖一卷

入林探藥法二卷

太常探藥時月一卷

四時採及合月錄四卷

藥錄二卷

諸藥異名八卷

諸藥要性二卷

種植藥法一卷

徐之才

雷斅

徐大山

姚勗

甘澗之

甘澗之

原平仲

李暉

行矩

參考書目

唐

唐本草(即唐新修本草又名英公本草)五十三卷李勣大尉趙國公長

孫無忌及蘇恭等二十三人

新修本草附經四十卷

新本草四十卷

蜀本草二十卷

本草拾遺十卷

藥性本草(又名藥性論)四卷

本草性事類一卷

南海藥譜(即南海本草)六卷

湖本草七卷

藥錄纂要(載千金翼)

千金食治

食療本草三卷

食性本草十卷

本草音義廿卷(一作二卷)

本草音義七卷

四聲本草五卷

劇繁本草五卷

海藥本草

本草經方

開寶新詳定本草廿卷

嘉祐補註本草廿卷

開寶重定新本草……(簡稱開寶本草廿一卷)

經史證補備急本草(簡稱證類本草)三十二卷

嘉祐圖經本草廿卷

大觀本草二十卷

政和新修經史證類本草(簡稱政和本草)

重廣補註神農本草及圖經廿三卷

本草衍義二十卷

日華諸家本草二十卷

本草括要詩三卷

證類本草單方三十五卷

本草外類五卷

本草辨誤一卷

本草會編

本草補遺

馬志

欽禹錫等

劉翰馬志等

唐慎微

蘇頌

孫集賢

曹孝忠

陳承

寇宗奭

日華子大明序

張文懿

王慤

鄭辨

崔源

靳起蛟

龐安時

金元

珍珠囊一卷

潔古本草二卷

重修大觀本草三十二卷

用藥法象一卷

珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷

東垣藥性賦

張元素

張元素

張存惠

李杲

李杲

李杲

宋

本草衍義補遺

湯液本草

本草證類

瘵癰疽耳眼本草要鈔

本草歌括

日用本草八卷

明

本草經疏三十卷

本草品彙精要

本草綱目五十二卷

本草乘雅半偈十卷

本草述三十二卷

本草發揮三卷

丹溪藥要一卷

本草集要八卷

庚辛玉冊

本草蒙筌二十卷

本草會編二十卷

救荒本草四卷

食物本草二卷

食鑑本草

本草證治辨明一卷

本草單方八卷

朱丹溪

王好古(海藏)

沈好問

王好古

胡仕可

吳瑞

繆希雍

內府孤本朱啓鈴藏

李時珍

盧之頤

劉若全

徐彥純

趙良仁

王綸

履仙著

陳嘉謨

汪機

周憲王

王穎

寧原

徐彪

王履

本草單方八卷

本草單方八卷

本草古方講意

藥性準繩一卷

藥性對答一卷

藥性標本十卷

藥性賦補遺一卷

藥性辨疑一卷

藥品徵要

藥鏡四卷

本草發明纂要

本草彙言

本草輯要

本草類方

本草性能

方藥宜忌攷十卷

本草鈔一卷

清

校正神農本草三卷

本草崇原三卷

神農本草經讀三卷

本草三家註四册

本草經疏輯要十卷

繆希雍

李時珍

甄良

賀岳

甄良

吳文獻

熊宗立

姚能

姚濟

蔣儀

劉默

倪朱謨

邢增捷

黃良佑

王安翰

繆希雍

方有執

孫星衍

張隱庵志聰等

陳念祖

葉天士等

吳世燧

參考書目

參考書目

本草綱目拾遺十八卷	鄒樹
藥性元解(利濟十二種之一)四卷	趙學敏
奇藥備攷(利濟十二種之一)六卷	趙學敏
本草話(利濟十二種之一)三十卷	趙學敏
本草類方十卷	年希堯
本草萬方鍼線八卷	蔡烈先
本經遙原(在張氏醫道中)四卷	張潞(石頑)
本草備要四卷	汪昂
本草從新十八卷	吳儀洛
神農本草經百種錄一卷	徐大椿
本草原始十二卷	李正宇
本草便讀一卷	黃鈺
本草通元二卷	李中梓
本草主治二卷	黃宮繡
本草求真十卷	黃宮繡
得宜本草一卷	王子接
本草經贊一卷	葉志純
藥性賦音釋一卷	余萍高
藥品辨義三卷	尤乘
藥證忌宜一卷	陳澍
本草問答二卷	唐容川
要藥分劑十卷	沈半綠
花藥小名錄	

四

百草鏡	仲卽庭
本草崇原集說三卷	袁桂生
本草會通	顧金壽
本草必用	黃元御
長沙藥解四卷	黃元御
玉楸藥解八卷	郭章宜
本草匯十八卷	黃宮繡
本草綱目求真十二卷	葉天士
本草經解	何克諒
食物本草備考二卷	
本草詩箋四冊	楊時泰
本草述鈞元十二冊	
本草分經審治一冊	王士雄
隨息居飲食譜二冊	李東垣
李東垣註雷公藥性賦二冊	唐秉鈞
重刻人參攷一冊	
光論人參攷(靈鷲閣叢書中)一冊	
本草圖解三冊	李中梓
本草衍語(三三醫書中)一冊	編者失名
植物名實圖攷一巨冊	吳其濬
本草纂要	龍方毅
本草新編	陳士鐸
本草時義一冊	陳葆善

民國

- 規定藥品之商標二冊
- 偽藥條辨四卷
- 中華藥學源流考(紹興醫藥學報)
- 中國藥物學史綱一冊
- 藥物學講義二冊
- 中國醫學史一冊
- 本草正義七冊
- 新中藥一冊
- 英譯本草綱目藥學植物第一卷
- 藥物出產辨一冊
- 中國醫學大辭典二冊
- 中國藥物新辭典一冊
- 中華藥典一冊
- 中藥大辭典一冊
- 中國藥物學一冊
- 中外藥名對照表一冊
- 方藥攻論類編一冊
- 中國醫藥問題一冊
- 藥飲啓秘一冊
- 中國實用藥物學一冊
- 製藥指南(又名國醫製藥學)一冊

參考書目

- 曹炳章
- 鄭育岩
- 曹炳章
- 曹炳章
- 何梅籍
- 秦伯未
- 陳賢邦
- 張山雷
- 黃勞逸
- 英人伊博思
- 華人劉汝強
- 陳在枚
- 謝利恒
- 江忍庵
- 衛生騷
- 趙公尙
- 季愛人
- 萬鈞
- 張贊巨
- 王一仁
- 許中龍
- 趙賢齊
- 張仲岩

- 藥物游記錄一冊
- 衷中參西錄(第四期藥學)一冊
- 草藥圖考四卷
- 中國藥物形態學一冊
- 藥物名彙一冊
- 中國植物圖譜二冊
- 藥性提要一冊
- 家庭新本草一冊
- 化學實驗新本草一冊
- 本草思辨錄四冊
- 新本草攷本一冊
- 辨藥指南一冊
- 藥用作物學一冊
- 藥物辨異一冊
- 本草辨錄一冊
- 要藥選一冊
- 新本草圖誌二冊
- 用藥禁忌書一冊
- 藥物學集說二卷
- 藥性輯要一冊
- 參苗大觀一冊
- 藥物大成一冊
- 黨參新研究一冊

- 李春芝
- 張錫純
- 裘吉生
- 沈嘉徵
- 華鴻
- 中英對照
- 秦伯未
- 丁福保
- 丁福保
- 周伯度
- 顧子靜
- 賈九如
- 方堯章
- 陸晉笙
- 趙燭黃
- 陸晉笙
- 紹興醫報社
- 趙蓋臣

參考書目

各地中醫學校講義

- 藥物學講義 廣東中醫藥學校 李嘉繼仲恒原編 四册
- 藥物學綱要 蘭谿中醫學校 盧朋著補編 一册
- 實驗藥物學講義 杭州中醫專門學校 張山雷著 一册
- 藥物學講義 山西中醫專門學校 時逸人編 一小册
- 藥物學講義 上海國醫學院 章成之編 四册
- 藥物學講義 上海中醫專門學校 丁甘仁編 二册
- 藥物學講義 上海中醫專門學校 徐訪儒編註 八册
- 藥物學講義 上海中國醫學院 盛心如編 二册

日本之部

- 和漢藥考 小泉榮次郎 有中譯本 二册
- 和漢藥物學 日野五七郎 一色直太郎 二册
- 民間藥及其利用法 九山房雄 一册
- 漢方醫藥全書 粟原廣山 一册
- 藥草與特效藥研究 藥草研究所 一册
- 藥草與毒草 篠田平三郎 張落霞譯 二册
- 重修本草綱目 吉益東潤 有中文本二種 四十册
- 續藥徵 村井大年氏 有中文本二種 一册
- 氣血水藥徵 吉益南涯氏 一册
- 黑燒之研究 小泉榮次郎 一册
- 日本草木圖說二十卷 一册

本草啓蒙四卷

本草名疏三卷

本草和名深根輔仁十卷

扶桑採藥輯要

安南藥品攷

本草圖補

古方藥品圖攷

高麗人參圖說

毒草圖說

瘴府圖說

藥經太素二卷

康賴本草二卷

東華本草

藥治通義十二卷

一本堂藥選附錄續編三卷

藥治通義

和漢藥寶典

和漢藥之常識

和漢藥良否鑑別

和漢藥治療要解

皇漢醫學

漢藥寫真集 二輯

食療本草之攷察

藥用植物寫真集

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

一册

二册

二册

一册

和氣廣世著

丹波康賴

香川修德太冲和

丹波元堅

岡本幸一郎

古木仁

一色直太郎

鶴飼禮堂

湯本求真

中尾万三 木村康一

中尾万三

利米達夫

藥用植物及其用途 和漢藥研究所 一册
 有毒植物及其注意 全 上 一册
 本草圖譜 本岩崎常正氏 一册
 藥用植物五彩圖(計單片二十四幅繪圖者無致) 一册

近代各雜誌藥學稿件

瘰子頸草之採訪與識別 俞鳳賓 中西醫學報九卷一號
 肺形草之採訪與識別 俞鳳賓 中西醫學報九卷三號
 麻黃之研究 丁名全 中西醫學報九卷三號
 大蒜之研究 晉陵下工 中西醫學報十卷十號
 藥籠小品 黃退庵 現代國醫雜誌一期至四期
 瓜蒂攷 王錫光 現代國醫雜誌第二期
 漢藥寫真集成專號第一輯 中尾萬三 木村康一 自然科學研究
 漢藥寫真集成專號第二輯 中尾萬三 木村康一 自然科學研究
 食療本草之攷察 中尾萬三 自然科學研究所彙報第一卷第三期
 藥物研究 王治華 浙省中醫月刊第三期
 羚羊與犀角 王治華 浙省中醫月刊第三期
 逐浪把草 張若霞 浙省中醫月刊第三期
 龍齒治效之徵驗 王治華 浙省中醫月刊第四期
 和漢生藥之藥理研究 蘇錦全 浙省中醫月刊第四期
 鹿茸治神經衰弱之特效 許勤勛 浙省中醫月刊第七期

參考書目

垂絲柳 盧顯著 廣東光漢醫藥月刊第一期
 食鹽 余照溥 廣東光漢醫藥月刊第一期
 藥學論文十九篇 張梅庵 上海中國藥報第一期
 發展中國藥的入手辦法 黃勝白 同德醫藥學五卷五期
 麝香 鄭 則 同德醫藥學五卷五期
 川芎之成分 張天放 同德醫藥學六卷五期
 漢藥麻黃之醫治效用 袁淑節 同德醫藥學六卷五期
 中國藥科分類表 俞鳳賓 同德醫藥學五卷一期
 本草綱目今釋 趙燭黃 同德醫藥學五卷五期起六卷一期止
 科學的國產藥物研究之第一步 余雲端 同德醫藥學六卷三四期 (又學藝雜誌二卷四期)
 漢藥目錄 趙燭黃 同德醫藥學七卷一期
 茯苓 邵公佑 同德醫藥學七卷一期
 漢藥治病之成績 孫祖烈 同德醫藥學七卷三期
 大蒜治療之成績報告 丁濟華 同德醫藥學七卷三期
 藥物學之研究法 秦伯未 中醫指導錄第二卷十三期
 蛤蚧與 LIZARD 程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十一期
 石膏功用卓著與煨煉 羅美東 新嘉坡醫藥月刊第十三期
 石蓮子有長圓二種 羅美東 新嘉坡醫藥月刊第八期
 黨參 章存之 新嘉坡醫藥月刊第六期
 羚羊山羊毛白角片之來源 程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十二期
 蛙之種類及入藥部分 程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十期
 燕窩之種類 程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第六期

參考書目

全蠟及蛤蚧

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十三期

談犀

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第五期

金鷄納霜栽培應當注意的

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第四期

胃痛特效藥

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第四期

辨茸

何心餘 新嘉坡醫藥月刊第三期

藤鹽土鹽之製法

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第三期

龍草之藥效問題

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第三期

芭蕉葉水萍糖新用法

凌館清 新嘉坡醫藥月刊第二期

石膏攷驗

黎百概 新嘉坡醫藥月刊第十一期

討論冬虫夏草之種類及效用

曹炳章 紹興醫藥報

藏紅花栽培法

張若假 紹興醫藥報

藥物與產地之關係

裘吉生 紹興醫藥報

蓖麻油中西異性說

裘吉生 紹興醫藥報

地頭

裘吉生 紹興醫藥報

青黛宜用土說

張汝偉 紹興醫藥報

肉桂之栽培及製造法

曹炳章 紹興醫藥報

燕窩

長青 自然界雜誌六卷七期

人參真偽和類別淺說

丁智伯 杭州三三醫報二卷二期

麥門冬之研究

謝安之 上海中醫世界雜誌第一年

論淡豆豉

陸成一 上海中醫世界雜誌第一年

論慈苡仁之滋養力

鍾廉 新刊紹興醫藥月刊三卷四期

丁香 黃連 巴戟天 齊尼

朱守眞 舊刊紹興醫藥月刊十卷十期

牛膝紫貝天葵草河東等

馬叔眉 紹興醫藥月刊十卷十一期

石存論

張錫純 上海中醫雜誌第二期

貝母

崔眞吾 上海中醫雜誌第二期

辨中藥之真偽

王萃生 上海中醫雜誌第四期

藥品道地錄

葉勁秋 上海中醫雜誌第七八期

藥性類編

徐子石 上海中醫雜誌第七期

論柴胡

高思潛 上海中醫雜誌第八期

石膏不可煨煉用

張錫純 上海中醫雜誌第九期

藥物之真偽辨

祝天一 上海中醫雜誌第九期

柴胡治瘧之我見

祝天一 上海中醫雜誌第九期

蓮白解

朱不羣 上海中醫雜誌第九期

本草選旨

閻立陞 上海中醫雜誌第十一期廿三期

藥物索隱

祝天一 上海中醫雜誌第十一期至十九期

鹽金之研究

王慎軒 上海中醫雜誌第十一期

楮石解

張錫純 上海中醫雜誌第十二期

羚羊角解

張錫純 上海中醫雜誌第十二期

芍藥之研究

王慎軒 上海中醫雜誌第十四期

本草分類詩

胡仿西 上海中醫雜誌第十四期

本草分類詩

胡仿西 上海中醫雜誌第十五期

甘草說

沈仲圭 上海中醫雜誌第十六期

石膏煨用即同清水論

張錫純 上海中醫雜誌第十八期

牡蠣記實

王陽春 上海中醫雜誌第十九期

草果之功用

孫秉公 上海中醫雜誌第十九期

薊芥之研究

陳亦毅 廣東醫林一謂雜誌第一期

番瀉葉之研究

程登瀛 廣東醫林一謂雜誌第二期

龍涎香之討論

程登瀛 廣東醫林一謂雜誌第六期

石膏之研究

張澤霖 廣東醫林一謂雜誌第六期

長圓形石蓮子不可用

程登瀛 廣東醫林一謂雜誌第六期

防己之研究

葉橋泉 廣東醫林一謂雜誌第六期

麻黃底討論

趙倚江 中醫雜誌廿九三十期

藥學研究方法

孫家驥 中醫雜誌廿九三十期

中國藥之研究

袁淑範 奉天民醫醫學雜誌

犀角(一卷一期)

黃茂(二卷二期) 桔梗(二卷七期)

防風(五卷一期)

獨活(五卷二期) 土當歸(五卷三期)

都管草(五卷四期)

升麻(五卷五期) 苦參(五卷六期)

白蘇(五卷七期)

延胡索(五卷八期) 貝母(五卷九期)

山慈菇(五卷十期)

石蒜(五卷十一期) 水仙(五卷十二期)

白茅(六卷一期)

龍胆(二) 細辛(三)

杜衡(四)

及已(五) 鬼督郵(六)

徐長卿(七)

白薇(八) 白前(九)

草犀 釵子君 吉利草(十) 百兩金(十一) 硃砂(十二)

辟虺雷 錦地羅

紫金牛(第七卷第一期)

拳 參 鐵線草

金絲草(第七卷第二期)

大黃之研究

郭紹庭 江都醫學月刊第一期

中國醫藥衛生常識

葉橋泉 醫界春秋五十四期五十六期五十七期

蝦蟇草考證

楊華亭 醫界春秋五十七期

仲敷用附子之研究

謝安之 醫界春秋五十七期

麝香之研究

張澤霖 醫界春秋五十七期

藥物學研究之方法

楊野鶴 醫界春秋五十七期

黃連之研究

時逸人 醫界春秋三十九期

革薢不可治淋

張錫純 醫界春秋三十九期

牡蠣攷

趙式訓 醫界春秋三十九期

白頭翁之研究

許小士 醫界春秋三十七期

阿膠之研究

李健頤 醫界春秋三十七期

麻黃攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

石膏治病無分南北論

張錫純 醫界春秋五十六期

烏頭攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

山茱萸攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

黃連攷證

葉橋泉 醫界春秋五十六期

附子柴胡

章次公 中國醫學月刊一卷五期

燕窩談

顧紹衣 上海東方雜誌十五卷八號

當歸確有調經種子之功

荆武諒 中西醫學報十卷十期

犀牛全身多入藥

吳乘璋 現代名醫驗案第五期

冬虫夏草考

楊百城 山西醫學雜誌三十一期

元明粉之神效治驗談

呂子厚 山西醫學雜誌五十九期

峨眉山游記

克士 自然界雜誌五卷八期

藥用植物

洛文 自然界雜誌五卷九期

參考書目

參考書目

有毒植物摘要 張祿有 武昌博物學會雜誌一卷二期
 類似植物博異 錢城 武昌博物學會雜誌三卷二期
 植物目錄 張亨 武昌博物學會雜誌四卷一期
 藥學概言 區若平 廣東醫藥雜誌一卷一期
 生草藥之損發 李仲守 廣東醫藥學報一卷七期
 斷腸草之研究 李仲守 廣東醫藥學報一卷七期
 蠶豆壳的功用 沈壽鵬 廣東醫藥學報一卷六期
 胡滿即斷腸草辨 李仲守 廣東醫藥學報一卷六期
 記金錢草治驗膀胱石三則 繆永祺 廣東醫藥學報一卷六期
 金錢草與胡滿樹 李仲守 廣東醫藥學報一卷六期
 三七有殊異之功能 張錫純 廣東杏林醫報一卷二期
 三七有殊異之功能 張錫純 廣東杏林醫報一卷三期
 龜是痔瘡的靈藥 沈玉書 廣東杏林醫報一卷九期
 蟲虫辨 張錫純 廣東杏林醫報一卷九期
 崇旋覆 張體元 廣東杏林醫報一卷十期
 巴豆 沈仲圭 廣東杏林醫報一卷十期
 續隨子治水腫之宜忌 沈仲圭 廣東杏林醫報一卷十五期
 萊菔之功用 張體元 廣東杏林醫報一卷十五期
 經驗生草藥性 劉琴仙 廣東杏林醫報一卷十八期
 垂絲柳解 盧朋著 廣東杏林醫報一卷廿四期
 論中國藥學 楊百城 山西醫學雜誌第一期
 葎之研究 趙盡臣 山西醫學雜誌第三期
 地黃之研究 趙盡臣 山西醫學雜誌第四期
 朴硝 趙盡臣 山西醫學雜誌第四期

答人參問 陳公澤 山西醫學雜誌第四期
 辨東人參豬子氏論人參 張錫純 山西醫學雜誌第五期
 石膏論 張錫純 山西醫學雜誌第六期
 塘牛黃之研究 董鑑叔 山西醫學雜誌第十期
 車前草 薄桂堂 山西醫學雜誌第十一期
 紅升白降丹之煅煉法 相里柱 山西醫學雜誌第十二期
 人參之成分與功效 高思潛 山西醫學雜誌第十三期
 元寶草治血病 張龍芝 山西醫學雜誌第十四期
 三春柳之研究 喬尙謙 山西醫學雜誌第十四期
 藥物學之研究 高思潛 山西醫學雜誌第二十期
 麻黃 章飛仙譯 山西醫學雜誌第十八期十
 九期二十期
 高嶺土與礬石之研究 王熾 山西醫學雜誌第二十一期
 麻黃去沫之研究 徐世長 山西醫學雜誌第二十一期
 防己之成分及效驗 黃國材 山西醫學雜誌第二十一期
 藥炭與木炭之研究 王熾 山西醫學雜誌第二十二期
 國產藥物專號 社會醫報第一八四期
 化州橘記 劉筱雲 山西醫學雜誌第二十四期
 馬錢子毒質不去之研究 王熾 山西醫學雜誌第二十五期
 化橘記書後 張錫純 山西醫學雜誌第二十七期
 論大黃功用 劉前英 山西醫學雜誌第二十八期
 點草考古 許小士 山西醫學雜誌第三十三期
 記蘆薈之功用 趙意空 山西醫學雜誌第三十三期
 貝母半夏之研究 米煥章 山西醫學雜誌第三十五期

丁跋

國醫釋藥之書。炎帝本經爲最古。繼之者爲陶隱居之別錄。宋金元明代有作者。雖皆指實課虛。推闡盡致。而博大詳明。要以李時珍之本草綱目爲最備。海通以來。舟車便利。縮萬里於咫尺。萃萬國於一堂。奇卉異草。不期而咸集。藥類愈繁。用舍愈宏。居今日而視李氏之綱目。猶李氏當日之視隱居別錄矣。其爲隘狹。何能深諱。陳君存仁。好學深思士也。深慨藥典之未備。應用之未宏。乃集合醫藥研究社同人。廣羅舊籍。博采新說。成爲中國藥學大辭典一書。每一藥。先正名。分處方之名。古籍之名。外國之名。產地之名。及市中隱名。正名而外。則標其產地。詳其形態。分其種類。弁種植栽培之要。採取之法。炮製之方。無不詳哉言之。至於性質。功用。主治。亦較他書爲備。而歷代名醫之藥論。外邦醫家之論述。尤采輯無遺。誠中國藥籍中空前之巨著也。兼附精圖千四百幅。內則攝影以顯其真。彩繪以著其色。工筆以狀其形。全書凡三百二十萬言。迭易寒暑。數經易稿。成書豈易言哉。陳君年甚少。吾不意其力學之精。竟若是也。此書出而嘉惠醫林。功豈在時珍下。余對於藥籍。愧未有所發明。因中國藥學大辭典之成。樂而爲之跋。

中華民國二十二年一月二十三日武進丁仲英跋

王跋

醫道至邃。病形而藥用。其爲用也。古簡而今繁。要歸於適當而已。余家世業醫。閱本草諸書。知藥類至夥。未易殫述。今觀陳氏中國藥學大辭典。旁徵博引。可謂詳且盡矣。雖然。藥無盡。學亦無盡也。出吾國門。西探美洲之大陸。東攬海邦之富士。轉歷五印度之叢山疊嶂。其間熾熾鬱鬱。含英蘊奇。莫可名狀者。無限也。是猶以國外者言之也。卽吾國中而言。若能西上峨岷。東登泰岱。北涉恆鎮。南入羅浮。其間所採之飛潛動植。或有出乎古今中外書目所錄之外者。亦無限也。綜而觀之。則彌六合者皆藥也。皆吾學之所存者也。今陳氏之用心。則主以中國之本草。輔以他邦之載籍。慇懃選輯。取資對鏡。蓋知所先也。若非然者。則將犇走舟車。皇皇然如徐霞客之徧游名山。某氏之經卅餘國。行六十萬里。恐不勝其煩。猶無當於藥學耳。爲藥學者。或創獲一物。遠符千金之古方。或專精一科。近摘十步之芳草。或遵呂氏之萬變。通都僻壤。市之咸宜。或宗司命之二書。以咀酌量。投之亦效。是亦吾學之所存。吾儕所當勉者也。余更有說焉。皇甫坦之禁諸欲。是藥之於未病之先。扁鵲之調陰陽。乃藥之於既病之後。皆非學而通乎道者。不爲功也。讀是編者。請勿銜國外之藥。而試考國中之藥。能療他人之病。必自治一己之病。知所先

王跋

後。取精而用宏。則庶幾進道也夫。

民國二十二年二月皖歙王仲奇撰於海上之畸廬

呂跋

吾國醫藥。發明最古。藥學專著。代不乏人。逮近世以來。俗尚歐西。中藥已漸有式微之慨。祇以國人不加整理。僅圖墨守。難與維新。匪獨吾國藥物。勢將退化。卽古代先哲發明之藥理。歷千百禩而不朽者。亦將隨世界之潮流。以俱去。有心人所爲。惘惘然悲也。今觀陳存仁先生主撰中國藥學大辭典一書。其殆先得我心者矣。不佞研究醫藥。垂二十年。每以不能振興中藥爲憾。嘗有志於改良或整理。而力未之逮。今得先生搜集成書。對於中藥之產地。形狀。種類。與夫性質。功用。栽植。炮製。種種方法。言之綦詳。使吾國人無老無幼。無賢愚不肖。皆能明瞭吾國藥物功能之大。卽吾人類之生於天地間。凡有一病。自有一藥物以愈之。不假外求。自知其要。其有裨於吾人生活之康健。豈曰小補之哉。况今國外人士。研求吾國文化。咸竭力注重於藥物之一途。年中搜羅吾國藥材。再加化驗。而又轉售於吾國者。數亦不尠。禮失而求諸野。則奚若保持其勿失。而惟自己。是求。然則中國藥學大辭典一書。亦保持中藥之干城也矣。是爲跋。

中華民國廿四年春二月新會呂哲公撰於僑港國醫聯合會

夏跋

嘗稽歷來本草圖籍。得百六十種。益以近賢所著。近二十種。發明增補。糾訛訓詁。衡之他國。可謂富矣。然各本所學。言成一家。鮮有邏輯蔚爲大觀。有之。吾於古得李東壁氏之本草綱目。於今得陳存仁君主纂之中國藥學大辭典二書而已。李氏以草木分部。從其類也。陳君以筆劃爲次。便於檢也。李氏以本經爲正。旁采宏景張李諸家。而古義完矣。陳君以綱目爲主。增續東西國內時人。而新說備矣。就人參言。李氏先釋名。次集解。次修治。次氣味。次主治。次發明。次正誤。次附方。陳君於釋名中。更分別名。西名。學名。處方。用名等。主治中。分功用效能。仲景發明。歷代考證。國外研究學說等。復增基本。成。分。形態。栽培。採取等。或詳其略。或補其闕。兩相比觀。其精密宏博。實多突過前人之處。夫學問之道。隨時隨地。俱在進化。故不厭其詳。不賤其新。惟其詳。斯能深切瞭解。惟其新。斯能逐步推進。陳君蓋知其要矣。方今國外人士。竭力注意於吾國藥物。英人伊博思氏之繙譯本草綱目。駭爲珍寶。德人湯姆斯氏之蒐集中藥標本。陳列化驗。美人威爾遜氏之赴四川峨嵋。採取大黃黃連。日人宮島幹之助氏之組織漢藥特委會。其彰明較著者也。據此推測。國人而再不能加以整理。外人將越俎而代庖矣。國人而再不能從事改進。

外人將借箸而代謀矣。然則陳君此舉。又無殊中流之砥柱也哉。至於陳君年少多才。早已名馳於海內。書成付槩。定看紙貴乎洛陽。可預卜云。是爲跋。中華民國二十三年孟春之月夏紹庭應堂敘於九芝山館

曹跋

淮南子曰。神農嘗百草滋味。一日而七十毒。由是醫方興焉。蓋上古之世。未著文字。師學相傳。謂之本草。張華輩始因古學。附以新說。通爲編述。本草由是見於經錄。掌禹錫曰。舊說本草經三卷。神農所作。而不經見。漢書藝文志亦無錄焉。唐李世勣等以梁七錄。始載神農本草三卷。又疑其所載後漢郡縣。有後漢地名。似張機元化輩所爲。其實亦不然也。寇宗奭云。漢書雖言本草。不能斷其何代所作。淮南子言神農嘗百草以知藥。亦無本草之名。惟王世紀云。黃帝使歧伯嘗味草木。定本草經。造醫方以療衆疾。乃知本草之名自黃帝始。陶弘景曰。軒轅以前。文字未傳。藥性所主。嘗以組織相因。至於桐雷。乃著在編簡。而此書因與素問同類。考本草經三卷。分上中下三品。搜採藥三百六十五種。是本草之始也。桐君著有藥錄二卷。說其花葉形色。採藥時日。又採藥別錄二卷。乃後訪採藥物續編。雷公亦著藥對二卷。論佐使相須。蓋上古聖賢具生知之智。故能辨天下品物性味。合世人疾病所宜。後世賢智之士。從而知之。代有發明。如梁之陶弘景。增漢魏以下。名醫所用之藥。三百六十五種。合本草經爲七百二十種。首敘藥性之源。次分玉石草木。菓菜米食。有名未用。以朱書爲本經。墨書爲別錄。又著藥像口訣一卷。論藥

品五味寒熱之性。採蓄時月之法。以定主療疾病。補別錄之未備。至唐高宗命英國公李勣等。修陶隱居所著本草經。增加七卷。名英公唐本草。頗有增益。至顯慶中。右監蘇恭。重加評註。表請修定。復命太尉趙國公長孫無忌等。與公詳定。增藥一百一十四種。分爲十一部。凡二十卷。別爲藥圖二十五卷。圖經七卷。世謂之新唐本草。後如甄權著本草音義七卷。藥性論四卷。增新藥四種。分藥品之性味。君臣佐使。主治各病之效能。又孟詵著食療本草三卷。祇採食養療病藥二百四十種。至開元中。陳藏器。以神農本經。雖有陶蘇補集之說。遺漏尙多。博極羣書。精竅物理。訂正訛誤。搜羅幽隱。撰有序例一卷。拾遺六卷。解分三卷。總曰本草拾遺。增藥三百六十九種。他如李珣著海藥本草七卷。搜集海藥。頗多發明。又鄭虔著胡本草七卷。皆詳胡中所產藥物。今已失傳。後蜀主孟昶。命韓保昇與諸醫士。取唐本草參校。增補注釋。別爲圖經。昶自爲序。其圖說藥物之形狀。較詳於陶蘇也。宋太祖開寶六年。命尙藥奉御劉韓道士馬志等九人。取唐蜀本草。及諸家相參校正。并取陳藏器拾遺參校。訂正別名。增藥一百三十三種。馬志爲注。名曰開寶本草。計二十一卷。新舊合藥九百八十三種。廣頌天下。是時日華子姓大名明。著日華諸家本草二十卷。集諸家本草所用藥。各分以性味寒溫。花實蟲獸分類。其言功用甚悉。宋仁宗嘉佑二年。詔光祿卿掌禹錫。尙書祠部郎中林億等。同

諸醫官重修開寶本草。新補入十二種。新定一十七種。統計一千〇八十二種。謂之嘉佑補注本草。共二十卷。雖有增補。無大發明。後又詔天下郡縣所產藥物。命太常博士蘇頌撰述圖經本草二十一卷。考證詳切。頗有發明。但圖與說異。是其缺點耳。宋哲宗元祐中。醫士陳子丞合本草及圖經爲一。謂之重廣補注神農本草。并圖經二十三卷。間綴數語。無所發明。徽宗大觀二年。蜀醫唐慎微取嘉祐補注本草。合爲一書。復述諸家本草所遺者。五百餘種。增新藥八種。附入各部。又採古今單方。並經史百家之書。有關藥物者。亦附之。名經史證類本草。計三十一卷。上之朝廷。改名大觀本草。諸家說藥之書。能垂千古。不致湮沒。皆其功也。政和二年。醫官寇中奭編撰圖經集註衍義本草五卷。又圖經衍義本草四十二卷。以補註圖經之書。參考事實。覈其物理。援引辨正。發明良多。其書刊入正統道藏中。惜是書校刊不精。訛誤脫落甚多。政和六年。復命醫官曹孝忠將大觀本草。增附寇氏衍義。校正刊行。名曰政和新修本草三十一卷。（一名政和新修經史證類備用本草。）後高宗紹興二十九年。復命醫官王繼先校正。別刊紹興校定經史證類備用本草十二卷。皆淺俚。無高論。其他如靳霖六之本草會編。詹瑞芳之本草類要十卷。龐安時之本草補遺一卷。沈括之藥儀一卷。各有實驗發明。金元朝諸家藥性本草。得兩章所見者。計一十四種。無大改革發明。故從略之。明孝

宗弘治十六年。奉敕命施欽等撰本草品彙精要四十二卷。各藥別爲十類。每藥分「名」「地」「苗」「時」「收」「用」「質」「色」「味」「性」「氣」「臭」「主」「行」「助」「反」「製」「治」「合」「禁」「戒」「忌」「解」「膺」爲二十四項。附以彩圖。其書中生產方土。皆漢地名。今復加以考正。附載卷末。爲本草之別開生面者也。嘉靖時陳嘉謨撰本草蒙筌十二卷。首附熊宗立歷代名醫圖考一卷。及製藥總論。藥性歌二百四十首。搜採藥七百四十二種。依王綸集要部次。每種別氣味。產地。收採。治療方法。撰成對語。以便記誦。同時許希周撰藥性粗評四卷。取常用藥品。撰成俚句。附以發明單方。其藥物形態。辨悉尤詳。最合初學之用。同時李時珍撰本草綱目五十二卷。列爲一十六部。類凡六十。蒐羅百家。訪採四方。始于嘉靖壬子。終於萬曆戊寅。稿凡三易。增新藥三百七十四種。新舊列藥一千八百九十二種。附方八千一百六十。廣收博採。集其大成。厥後盧子繇著本草乘雅半偈十一卷。以神農本經所錄。凡三百六十五種。古有今無者。刪去一百四十五種。採掇別錄以下適用之藥。如其數補足之。考辨詳明。繆氏希雍。亦著本草經疏三十卷。分本草爲十部。每藥皆有發明。故謂之疏。冠以序例二卷。論三十餘篇。亦多深義。清康熙十一年。何鎮撰本草綱目類纂必讀十二卷。集李氏之要。有裨於檢考。康熙三十九年。命王道純。奉敕重修本草品彙精要四十二卷。附續集十卷。四言舉要

二卷。較之弘治原本。更爲詳備。惜未刊行。乾隆三十年。錢塘趙恕軒。撰本草綱目拾遺十卷。本草話三十卷。花藥小名錄四卷。藥性元解四卷。奇藥備考六卷。足補諸家本草所未備。正李氏之訛誤及遺漏。乾隆時奉敕撰圖書集成。內有草木典二百二十卷。禽虫典一百九十二卷。關於藥用動植物。搜採豐富。且一物一圖。效用主治。收採時日。以及經史詩文之考正。能補正本草。缺略者甚多。道光朝之吳其濬。撰植物名實圖考三十八卷。又長編二十二卷。其搜集經史百家。各地志書。有關藥用植物。有說無圖者曰長編。發明效用。辨識形態。有圖有說者曰圖考。共列藥一千七百十四種。彙集衆說。闡幽發微。有裨益於後學。趙吳二公。爲有清以來之藥學發明家。其他明清本草。不下三百餘種。雖各有獨到處。亦各有訛誤處。非可以與趙吳二公相並列。現代上海陳君存仁。爲余神交友也。學問淵博。經驗豐富。其著作已風行海內。有口皆碑。毋容贅述也。近年著有中國藥學大辭典一書。以科學體例。博採經驗學說。考察藥物標本。繪以彩色精圖。爲便利檢查計。仿普通辭典體例。以藥名首字筆劃多少。以分部次。注重實際理論。不尙玄學空談。每列一藥。分別命名。基本。產地。形態。種植。性質。效能。成分。主治。歷代記述考證。辨僞。近人學說。（如歐美日本新學說）配合。應用。用量。等項。條分縷析。綱舉

目張。蒐集四千餘年藥物學之大成。清代趙吳二公之後。陳君能繼趙吳未竟之志。成此巨帙。不愧爲現代藥學大家。際此國粹醫學。主用科學整理期間。國藥建設。尤爲整理藥學之發軔。陳君此編。不僅爲國醫藥界謀福利。更且爲國產挽利權。農村謀生計。一舉而數善備矣。今是書出版在即。囑跋於余。爰述國藥之沿革。及陳君編輯是書之意旨。是爲跋。

中華民國二十四年二月四日明曹炳章謹跋



揮跋

民元以降。吾國醫學。日處於風雨飄搖之中。所以千鈞一髮維繫不做者。斷賴治療有實驗。藥物有功效。然則謂吾國醫學。建築於藥物也可。故藥書於醫籍中。實占重要位置。

自神農嘗百草以迄於今。藥書汗牛充棟。其間搜羅最廣博者。唯李頰湖之本草綱目。積古人之經驗以成書。其所記述。自是實錄。然繁重而不切實用。蕪雜而不便檢查。狀述事物。畫影圖形。悉皆模糊影響。此為時代所限。誠不足為古人病。以今視之。自然不合時代化。殆已成過去之陳列品矣。

今者世界書局所印中國藥學大辭典。其繁重精詳。倍蓰綱目。而編述復分門別類。檢查良便。博采新知。發皇古義。影印圖本。為往古所罕見。遂可免模糊影響之弊。解剖成分前人所未知。遂可為科學化之張本。至於訂正別名。詳考產地。嚴定製法。發明功用。應有盡有。博大精純。可謂空前巨著矣。

嘗聞一國文化之進步。常與辭書相比例。辭書聚各種學說而理解之。用科學方法編輯之。誠為學者重要之工具。吾國醫學。在此風雨飄搖之時。其有否極泰來之望乎。吾將於此書之出而占之。

中華民國二十三年十月揮鐵樵跋

謝跋

藥爲醫之利器。無藥不能成方。或以中醫之處方嫌其緩。殊不知中藥特性。苟能配合切用。未有不立卒見影。矧藥有根莖花實草石骨肉之分。更有單行並行。相須相使。相畏相惡。相得之妙。醫生立方。有如遣將。方中選藥。有如用兵。將與兵相合。則一戰而勝。兵與將相離。則一蹶不振。有如先主連營。破于陸遜。兵固在精而不在多。關公困守於孤城。見欺呂蒙。將因需兵而不可少。故善將將者。莫如漢高。善將兵者。首推韓信。此中性質不同。所以取效各殊。論方用藥。亦猶是耳。一方之立。須認定君臣佐使。蓋君明則臣良。而佐使乃得指揮之益。君暗則臣暴。而佐使亦縱專橫之形。未見此病之向安。又見彼病之繼起也。故有熱因寒用者。如用附子而監以鼈甲。用肉桂而監以白芍是也。有寒因熱用者。如用黃連而制以吳萸。用石膏而制以薄荷是也。此皆相須相使之妙用也。獨聖散之一味甘草。獨參湯之一味人參。此皆有單刀出入。如汾陽直入回紇之力量。此單行法之神妙也。黃龍湯之人參大黃並用。六味丸之加附桂。此宣慰攻勦並行之法也。三拗湯之不去節尖。甘遂甘草湯之相反相承。皆能取效如響應。猶廉藺之刎頸。始怨而終好。適其病之所宜也。故相畏相惡之利用。亦不可不知。麻黃湯之必用杏仁。敗毒散

之必用防風。相得則益彰也。參有太子珠兒之別。附有烏頭天雄之稱。此氣味雖同。力量較異。卽母子兄弟。難同面目也。麻黃身發汗而根止汗。防風身疎風而根熄風。白頭翁一莖直上。有風不動。無風獨搖。則用其莖。當歸身養血而尾通血。此用根用莖之宜別也。玫瑰代代花。取其芳香。鮮蓮子紅棗肉。用以補中。此花取輕宣。實主滋補之例也。用草務取新鮮。而葡萄櫻桑葉。又貴經霜。用石藥務取沉降。而味薄難出。又必多煎。豬脊髓。鹿角膠。用骨以補骨。豬膚湯。霞天縞。用肉以補肉。此草石骨肉之用。各有不同也。故醫者苟理路既明。用藥自能執簡御繁。設方自能措施週到。而昧者每謂中醫之藥。陳舊腐敗。不及西藥之簡單而取效速。殊不知西醫善治單獨之對症。不能治複式之雜症。提其精者。只能責成一味。安能復分根莖須使之妙用。而得配合畏惡之相助哉。陳君存仁。年少英俊。奮發有爲。知中藥之亟宜提倡也。亟宜整理也。爰搜集古今中外。關於醫藥之書數百部。條分縷晰。綱舉目張。廢四五年之光陰。經多數人之勘校。始克成中國藥學大辭典一書。偉哉是舉也。茲書一出。可以爲中藥之砥柱。可以並日月而爭輝。嗣後人手一編。立方選藥。瞭如指掌。其有功社會。造福後世。直空前絕後之創著也。利恆樂觀厥成。故又將處方選藥之餘緒。贅於書末。諒陳君亦首肯也夫。是爲跋。

民國二十三年國歷九月中浣武進謝利恆謹跋

萬病內科外感病 自療

陸清潔編 一冊 定價七角

本書述每病之〔病源〕〔病狀〕〔變症〕〔療法〕〔調養〕五項，羅列清楚，使毫不知醫者，一翻是書，即知病源及其治療法，證驗靈效，如求良醫。

萬病內科內傷病 自療

陸清潔編 一冊 定價一元二角

本書將內科內傷各症之〔病源〕〔病狀〕〔變症〕〔療法〕〔調養〕根據古方，明確指示，使對於醫藥毫無知識者，亦能自行療治。

世界書局

中 醫 驗 方

中 醫 醫 案

全圖 華陀 驗方 新編	葉天士 手集 祕方	增註 徐洄溪 古方 新解	本祕 丹方 大全	本祕 單方 大全	薛生白 醫案	吳鞠通 醫案	分類 王孟英 醫案
一册	一册	二册	一册	一册	一册	一册	二册
一	五	八	四	六	三	四	六
角	角	角	角	角	角	角	角

世 界 書 局

中 醫 醫 案			中 醫 專 著				
葉天士幼科醫案	葉天士女科醫案	增補葉天士醫案	萬病自療全書	批葉溫熱經緯	評增溫病條辨	廣註素問靈樞類纂	醫學南針
一冊	一冊	一二冊	一冊	一二冊	一二冊	二三冊	續初集
四角	四角	一元二角	五角	六角	六角	一元	各八角

世 界 書 局

字大版活 圈加註廣

華精部四

註增生先翔 陸 本選生先藩國生滌會

經史子集 浩如煙海 讀者從何入手！

本書留四部之精華 集各家之名著

已替讀者——

打開門路 闢成大道 世

由此推進，不特國學得其捷徑，即整理國故，亦能抓住中心。數千年道術，學藝，文章之精華盡萃於斯。

國學之大觀 國故之匯海

編者將四部書約繁為簡，汰
蕪留精，而篇篇仍為國學之
重心，歷代之名著，使讀者

節時……省錢

三大厚冊
價洋四元
特價二元

分三角二費寄

行發局書界世

詩
詞
精
選

▼中國三千年來詩詞之精品。盡萃於斯。

首首是大家手筆——闕闕是代表作品

蘇淵雷編

一唱
三嘆
百讀
不厭

自近代詩起
直至詩經止
精裝一冊價洋一元八角
特價祇售九角
(寄費掛號一角五分半)

目 要

1. 新詩與譯詩
2. 近代詩
3. 元明清詩詞散曲
4. 唐五代兩宋詞
5. 唐詩
6. 魏晉南北朝隋詩
7. 樂府古詩
8. 楚辭
9. 詩經

世界書局發行

中華民國二十四年四月初版

中國藥學大辭典 中國藥物標本圖影

(全三冊)

定價大洋二十元

(外埠酌加運費)

編輯者 中國醫藥研究社


主編者 陳存仁

發行者 陸高誼

印刷者 上海大遠路
世界書局

發行所

上海及各省 世界書局



版權所有
不准翻印

