

周伯度
本草思辨錄



中華民國二十六年六月初版

周伯度本草思辨錄（全一冊）

實價國幣三角
(外埠酌加運費匯費)



主編者 陸士謨

世界書局有限公司代表人
上海大連濱路
高占詒

發行者 陸士謨

世界書局有限公司代表人
上海大連濱路
高占詒

發行所 上海各及省 世界書局



目錄

查治平訪醫于南京
元至一年十一月

卷首

緒說

一

卷一

石膏

一九

赤石脂

一四

消石

一五

芒消

一五

甘草

一八

黃芪

三二

人參

三七

沙參

四三

桔梗

四四

知母

四六

白朮

四七

黃連

五三

黃芩

五六

柴胡

五六

白鮮皮

五九

龍膽

五九

芍藥

五九

牡丹

六二

荆芥

六五

薄荷

六六

青蒿

六七

夏枯草

六八

漏蘆

六八

麻黃

六八

麥門冬

七五

瞿麥

七五

葶苈

七六

車前子

七七

萹蓄

七七

大黃

七八

附子

八一

天雄	八一
烏頭	八一
半夏	八五
蕘花	八六
菟絲子	八七
五味子	八七
栝樓根	八九
栝樓實	八九
葛根	九〇
何首烏	九一
草薢	九二
防己	九三
澤瀉	九四
菖蒲	九六
水萍	九六

石斛	九七
骨碎補	九八
胡麻	九九
大麻仁	九九
粳米	一〇〇
薏苡仁	一〇〇
綠豆	一〇〇
蘿豆	一〇〇
淡豆豉	一五五
餡餚	一〇〇
韭子	一一一
蔥白	一一一
卷三	一一一

薤白	一一二
生薑	一一三
乾薑	一一五
苦瓠	一一八
桑耳	一一九
杏仁	一二一
烏梅	一二二
桃仁	一二五
大棗	一二七
木瓜	一二九
枇杷葉	一三六
蜀椒	一三七
吳茱萸	一三八
雞頭實	一四四

柏實	一四二
桂枝	一四二
卷四	
沈香	一六五
烏藥	一六五
黃檗	一六五
厚朴	一六六
杜仲	一六七
棟實	一六八
阜莢	一六九
阜莢子	一六九
訶黎勒	一六九
桑根白皮	一七〇
楮實	一七一

枳殼	一七三
梔子	一七三
山茱萸	一七五
酸棗仁	一七四
女貞實	一七六
衛矛	一七六
五加皮	一七六
枸杞	一七七
蔓荆實	一七八
茯苓	一七九
猪苓	一八三
竹茹	一八四
蜂蜜	一八五
白殼蠶	一八六
水蛭	一八六

鱉甲	一九一
龍齒	一九〇
鰓鯉甲	一九〇
烏賊魚骨	一九〇
鱉甲	一九二
牡蠣	一九三
文蛤	一九三
雞矢白	一九四
雞子白	一九四
雞子黃	一九四
豬膽汁	一九五
豬膚	一九七
羊肉	一九七

阿膠.....一九八

犀角.....一九九

兩頭尖.....二〇四
亂髮.....二〇四

人尿.....二〇五

白 紋

醫可易言乎哉。在聖門曰小道。在史家曰方伎。顧所謂小道者。特視大學之道。位天地。育萬物。爲小焉耳。神聖作之於前。賢哲述之於後。李唐而降。斯道寢微。非實有至精。至神。方可與斯之一境。胡爲史冊所載。代不數人。若倉公。扁鵲。華元化。一流。則更無代興。而特起江氏良庭。有云。孔子聖無不通。焉有不知醫者。自牖執手。切其脈也。而孔子教人游藝。如禮記疏所稱夫子脈訣。卒未聞傳之其人。豈真以方伎而賤之。蓋其慎也。憶余幼時。曾以春溫誤服麻黃。致舉室怔營。迨咸豐丙辰。以副車入貲。爲比部主事。留滯京邸。又以寒痢爲醫。投涼劑而誤。更醫復然。危狀迭見。賴友人檢方書。鑒前弊。而拯之。得以無虞。余於是始有志於醫。恆詣廠肆購書。寘之几案。朝夕披覽。雖至困甚。亦冀鬼神來告。不悟徹不已。久之爲人療病。時或倅中。謬竊虛譽。然自甲子改官邑令。所宰督廊院。皆地當孔道。差務絡繹。又不用門丁一人。事無鉅細。靡不親裁。計束醫書。高閣者。凡十八年。洎王午調任盱眙。自分無治劇才。甫捧檄。卽勾疾而歸。戢影蓬門。無以遣日。則復取羣籍。擊求加達。乃喟然曰。余向之於醫。猶門外漢耳。今其或者可與入門矣。而夫學問之道。不外致知力行兩端。醫何獨不然。致知之書。如素問。靈樞。本草經。尙矣。而

傷寒論金匱要略。則又南陽先師本致知以爲力行之書。靈素本經。悉括其中。學者能即是而寢饋篤好之。積以歲月。真可引伸觸長。施用無窮。然而談何易也。人知辨證之難。甚於辨藥。孰知方之不效。由於不識證者半。由於不識藥者亦半。證識矣。而藥不當。非特不效。抑且貽害。竊怪古來注仲聖書者。無慮數十百家。獨於方解鮮精確澄澈。其故在本草之學。自來多不深求。識本草如是。遂視方義亦當如是。於古人因證施治之微旨。去而千里矣。讀仲聖書而不先辨本草。猶航斷港絕潢。而望至於海也。夫辨本草者。醫學之始基。實致知之止境。聖人列明辨於學問思之後。其功自非易致。讀劣如余。何足語此。然而遐軌勉躡。樂豈辭疲。秉燭之明。歲有增益。自戊戌春。有六氣感證要義之刻。嗣於藥用有心得者。卽徵諸方。方義有見及者。并印以藥。弗明弗措。惟竭吾才。今又六更裘葛。取所著稽之。得藥百二十八味。聊依綱目編次。釐爲四卷。大抵援據仲聖兩書。而間附以他說他藥。隨手劄記。殊無體例。余老矣。值時局之艱虞。念儒冠之多誤。是惟弓冶。可得蟬娟。爰命孫兒智榕錄付剞劂。以垂來許。并問世焉。若云臧否人物。以自表異。斯醫工之故習。而非余之所敢蹈爾。光緒三十年甲辰夏四月鹿起山人周巖自敍於徵尙室。時年七十有三。

本草思辨錄

山陰周巖伯度甫著

緒說

本草思辨錄甫授梓。適有客以彼都近事醫會相告。竊不自揆爲發其蔀。而余夙嘗欲辨不果者。至是亦縱言及之。名之曰緒說。列爲卷首。欲學者知審擇端趨向也。醫雖藝術。而深詣甚難。西醫挾形質之說。蔑視我中醫。而中醫之厭苦其難者。得彼說則大喜。相與揚西而抑中。不思古聖垂示氣化。實由洞明形質。而西醫解剖形質。何從焉。嘗窺見氣化。故西醫之在中國。能療內證。大證爲遐邇傳頌者。不少概見。乃求醫者並不羨慕乎。西而業醫者。反欲自棄其學。今且狂瀾特起。有訾黃帝內經。神農本草。南陽先師傷寒論。金匱要略。爲謬爲荒誕。爲羌無故實者矣。此等妄談。豈足撼數千載而上懸板。滿倒。而實萬無不驗者。已數千載奉之爲圭臬。豈辭嗜耶。抑別有所希耶。非人愚而我獨

諸日月不刊之聖經。而獨惜夫相將入火坑者之甘爲衆盲也。

素問九卷。有王太僕補足者一卷。靈樞一經。或疑卽王氏竊取素問爲之。近人何西池嘗靜坐數息。每刻約得二百四十息。以靈樞日夜計一萬三千五百息爲不經。此類固間有僞託。靈不如凜。難經又不如靈。素要在人分別觀之。而其中淵理不可思議。體之人而實萬無不驗者。已數千載奉之爲圭臬。豈辭嗜耶。抑別有所希耶。非人愚而我獨

智。蓋彰彰明矣。今不商量加邃。而徒以風會所趨。創爲喪心病狂之舉。誠世道之隱憂。可爲太息者矣。

傷寒論金匱要略。直可上擬聖經。不當與諸醫書同論。醫書汗牛充棟。大抵下駟十之七。中駟十之二。上駟十之一。上中駟之書。無不由研求內經與仲聖書而出。今賤中醫貴西醫。而治病則仍以中醫。上中駟之書。已爲彼所唾棄。其將於下駟書求進步乎。必不能矣。

醫家故習。每好議前人之失。而已亦不能無失。然皆其人勇於衛道。矯枉過直。或隱與之義。所見不同者有之。未有毫無學問。醫亦走方者流。因得見藏府。遂謂道即在是。敢以無理之詬爭。上侮古帝昔聖。如箸醫林改錯之王清任者。可謂謬妄之至矣。試歷舉寧術有不足取。乃其與內經並舉。概稱古人。其胸中無黑白可知。謂古人錯誤者不一而足。而無其文。尤可笑者。謂黃帝慮生民疾苦。平素以靈樞之言。下問岐伯鬼臾區。故名素問。尤可忿者。謂二公如知之的確。可對君言。知之不確。須待參考。何得妄對。遺禍後世。莊子有言。哀莫大於心死。其殆言未出而心先死者歟。第二篇會厭。左氣門。右氣門。衛總

管榮總管氣府血府記。按此篇記其所見。不爲不詳。謂出氣入氣吐痰飲津涎。與肺毫無干涉。古人誤以欬嗽等證爲肺病。肺管兩旁有左右氣門兩管。下至肺管前半截處。歸併一根入心。從心左後下行至肺左。過肺入脊。復下行至衛總管。衛總管有對背心兩管。有對腰兩管。有腰下兩管。腰上對脊正中有十一短管。痰飲在管中。由管中之氣上攻行過心。由肺管前出左右氣門。按衛總管之下氣管之多如是。痰飲究竟從何管上至兩氣門。何者從左出。何者從右出。其不言者。是仍不知也。謂衛總管俗名腰管。腰上長兩管。一管通氣府。氣府是抱小腸存元氣之物。元氣卽火。元氣足則食易化。虛則難化。然則元氣在小腸外能化小腸內之食。氣管在肺外。肺不能化氣管內之痰飲。有是理耶。經言藏者藏精氣而不寫。惟肺管清虛。故能運管外之痰飲。否則肺管已爲痰飲塞滿。何問痰飲清任不知此理。宜其以肺爲無用之死藏也。**第三篇津門津管遮食總提攏管出水道記**。按第一篇飲食由小腸化糞一段。宜併入此篇。與第四篇腦髓說。余俱有論列下。第五篇氣血合脈說。人之有脈與脈之可以驗病。斷不出內難經所言。清任謂人身氣管出氣血管藏血。脈從氣出。無與血事。手腕肉厚者脈短。薄者脈長。大小人皆知醫。又謂古人論脈二十七字。余不肯深說者。非謂古人無容足之地。恐後人對

證無談脈之言。此蓋掩其短而適自暴其短。書中證治數十條。所以無一字言脈也。第六篇心無血說。西醫謂心內有左右四房。皆有管竅。爲生血迴血之用。正與內經說合。而清任以心爲氣出入之路。其中無血。又云猪心刺破。則腔子內血流入於心。不刺破之心。內並無血。是以盈盜之盛水比心。心非府焉能盛血。清任於圖內肝下亦注絕不能藏血五字。古書豈得歎看。經不又云脾藏肉乎。吾知清任必更駭之矣。卷末附辨方效經錯之源論。血化爲汗之誤一篇。仲聖麻黃桂枝兩湯。清任改其文爲麻黃湯治頭疼身痛項強發熱惡寒乾嘔無汗。桂枝湯治證如前而有汗。謂傷寒初得頭疼身痛項強發熱惡寒。未有兩胳膊兩手不疼痛發熱惡寒者。用麻黃湯亦未有周身皆愈而獨不愈兩胳膊兩手者。豈不是方雖效而經絡實錯之明證。改仲聖文而又坐仲聖以過。不的方的對而病竟愈。亦往往有之。庸醫所得以售技者在是。自矜者亦在是。要知仲聖何便宜乃爾。按項強爲陽明病。四肢煩疼爲太陰病。斷非初得時所兼有。時疫則有之。方不的對而病竟愈。亦往往有之。庸醫所得以售技者在是。自矜者亦在是。要知仲聖爲天下後世立法。不能爲庸醫詭遇也。謂有汗是傷風。從未見桂枝湯治愈一人。傷風豈定是有汗。桂枝湯不能治傷風。近世醫者多有此論。而不知其故。由本領不濟乎。清任以桂枝湯不效。因頭疼身痛發熱有汗非傷風證。此與桂枝湯別一條頭痛發熱汗出惡風者。桂枝湯主之。似乎無異。而非無異也。仲聖不言脈者。以太陽病汗出惡風者。

脈自浮也。爲問果太陽病乎。脈浮惡風乎。不言身痛者。以太陽病頭痛發熱汗出惡風而加身痛。則桂枝湯宜加減也。何爲而不加減乎。已不細審而遽責效於桂枝。可乎不可。又有奇者。清任用桂枝湯而尙不知爲何證。曰非傷寒證也。乃吳又可所論之瘟疫也。又教其姪曰。欲明傷寒。須看吳又可論。是清任固嘗讀又可書者。又可因其時疫氣流行。時師多以傷寒法誤人。故箸瘟疫論一書。清任時亦疫氣流行。胡爲以桂枝湯治疫氣。夫疫氣與疫氣不同。其殆用又可法不應而用仲聖法。用仲聖又不應而復用又可法乎。若然。則無往不誤矣。謂目痛鼻乾不得眠。是邪熱上攻頭腦之證。仲聖以葛根湯治之。又是方效經錯之明證。按傷寒論葛根湯證。何嘗如是。內經有陽明主肉。其脈俠鼻絡於目。故身熱目痛鼻乾不得眠之文。活人書二問亦有之。並不言宜葛根湯。葛根湯治此證。則是陶節菴全生集於葛根湯加白芷升麻云。卽葛根解肌湯。其證尙有發熱頭痛微惡寒無汗脈微洪等字。清任既不知陽明病之脈證爲何。而又張冠李戴。妄託仲聖昏蒙殆無其比。謂人生氣血兩管。氣管通皮膚有空竅故發汗。血管通皮膚無空竅故不發汗。是知汗非血化。汗固非卽是血。然汗爲心液。亦血中之熱氣所蒸而成。故奪汗者無血。奪血者無汗。試無不驗。夫血旣蒸爲汗。則已由靜之動。故能透毛孔而出。若汗出而血亦出。或無汗而血自出。則血應靜而不靜。不爲陽之守也。其義皆

在內經。精在何足以知是。

泰西一切藝術。竭其智能。孜孜不已。無廢於半途。其醫於內證。雖未見擅場。苟參以中國經訓。探本窮源。亦必有登峰造極之詣。如中國盧扁其人者。吾中國醫流。有恒者鮮。每讀一書。旨趣未得。輒生疑畏。故往往古籍遺亡。不可復見。至內科之有器。更未之前聞。而不知古固有之。其在宋重醫學之日也。四庫全書提要。載周密齊東野語曰。嘗聞舅氏章叔恭云。昔倅襄州日。嘗獲試鍼銅人。全像以精銅爲之。府藏無一不具。其外臉穴。則錯金書穴名於旁。凡背面二器相合。則渾然全身。蓋舊都用此以試醫者。其法外塗黃蠟。中實以水。俾醫工以分折寸。案穴試鍼。中穴則鍼入而水出。稍差則鍼不可入矣。亦奇巧之器也。後趙仲南歸之內府。叔恭嘗寫二圖刻梓以傳焉。今宋銅人及章氏圖。皆不傳。按此則西洋蠟人形。不過具有體質。而茲並臉穴用鍼之法。悉寓其中。智巧亦何遜西人。今雖不可見矣。然吾中國近年傑士奮興。創制奇器者。亦頗有之。苟其挽醫學之頽波。復銅人之巧制。施之證治。用彰明效醫林之幸。正不獨醫林之幸也。

唐氏容川所著中西匯通醫經精義一書。持中西之平闡。造物之祕。洵爲有功醫學。余復何贅。茲讀中西書。若有所得。有可以翼唐氏書者。敢抒其一得焉。陰者藏精而起亟。故腎之精華。必聚於上。上爲末。而下爲本。西人謂腦主知覺。心不主知覺。是但見其上。

消 化 與 排 泄

之精華而不見其下之蘊蓄也。是不知陰爲陽守。陽爲陰使也。陰陽動靜之理。吾中醫亦豈能測識。所幸者有神聖之遺經耳。醫至今日可謂逸矣。西醫自中國周烈王時。卽有解剖之學。至今析極毫釐。何如其勞。而不知猶是迹象也。內料理法云。凡人愈留心。則知覺之事愈明。又云。凡能留心者。視物較清。後亦易記。不曰留腦而曰留心。可見主權自屬於心。又全體通考云。腦筋由心叢而來。其叢乃脊髓百結兩根之所爲。腦筋旣根於心叢。自屬心主知覺。腦髓聽命於心。此可譬之電綫。心發電。脊過電。而腦其至所也。蓋腎生精化髓而輸於腦。心以陽而爲腎之使。理固如是。必泥迹象以求。則所謂銅山西崩洛鐘東應者。西醫必更斥其誕矣。飲食入胃。分清濁兩路而出。非經中閒泌別者。全體通考論胃與小腸篇。皆中有糜粥字。是胃與小腸明係水穀雜居。外受相火之蒸化。說較勝矣。而於水穀之納入輸出與泌別若何。則一字不題。殆未能了了也。此當以我中國聖經爲斷。曰。五穀入胃。其糟粕精液宗氣。分爲三隧。又曰。中焦亦並胃口出上焦之後。此所謂受氣者。泌糟粕。蒸精液。化其精微。上注於肺。按泌別在中焦。當卽西醫之謂連網。正清任之謂津門者。是水不盡散膜膈者。爲其分三隧也。夫水穀經胃與小腸蒸化而後。所餘皆棄物。其揚帆直下可乎。而清濁有異也。又烏得不泌別。此又聖

經明告之矣。曰。水穀者常并居於胃中。成糟粕而俱下於大腸。濟泌別汁。循下焦而滲入焉。楊上善注云。下焦在臍下。當膀胱上口。主分別清濁而不內。自來醫家從不言有兩泌別者。聖經實嘗言之。理亦誠然。然則泌別在下焦何處乎。西醫謂腎主生溺。其圖將腎豎割之。內有方錐漏斗腎蓋等名。下有溺管。腎之外廓亦無進溺之口。溺固爲腎生矣。然余不能無疑焉。凡人飲水多者溺多少者溺少。明係溺由飲來。一也。所飲之水若全不化溺。必將有腫脹泄瀉等病。二也。溺待腎生。勢必不給。三也。腎生之而旋瀉之。竟無所用。四也。西醫因何致誤。殊不可曉。唐氏謂左右兩腎系有竅最深。貫脊骨通三焦。復有兩管下接膀胱。若然。則水從中焦下焦而下者。皆歷腎系抵膀胱。腎系實爲泌別之處。經言少陽屬腎。腎上連肺。故將兩藏是合三焦與肺之力以施其伎巧。故知此處泌別最有關係。內科理法云。肺與皮膚出氣多則溺少。出氣少則溺多。此卽內經氣化斯出之理。膀胱惟無上口。所以溺出必待氣化。乃西醫言有上口。而王清任曾諦視者。又言無上口。其殆有上口亦在包膜中。非氣化不出者歟。

全身主
著說
自西醫腦髓司知覺之說行於中國。而中國人不察。信之者衆。試更論之。腎精生髓。由脊入腦。猶草木果實之結於項上。余考西醫每云。腦筋從某來者。多是上來至下。以本爲末。以末爲本。其弊實由於是。然卽其說還叩之。亦有可正其非者。腎有髓質。西醫言

之不一。他處無有。腎上核則言腦筋極多。非髓由腎生而何。中國謂心系貫脊屬腎。而西醫亦謂心叢乃脊髓百結兩根之所爲。非心與腦相通而何。西醫言腦有透明之密質。心房之裏膜。亦言薄滑透明。非腦之明根於心之明而何。此皆見於全體通考者。抑內科理法不云乎。背脊髓不通於腦髓。卽不知覺。是又隱以腦髓爲不司知覺矣。大凡西人之性。最長於化學。其習醫亦無非化學。詰以陰陽五行之理。人身十二經脈。奇經八脈。營衛谿谷之游行出入。則茫然無知。卽告亦不信。中外天資之限人若是。所不可解耳。

不專議全體通考德貞氏自序。以中醫爲守舊。爲妄作。實乃坐井觀天之見。善守舊者。其舊皆解剖。是不可變之天道。惟篤守而精研之。新義斯出。今日之中醫。非守舊乃棄舊耳。棄舊故妄以醫學作。非德貞氏之所謂妄作。吾慨夫以西人之智。而惟斤斤守解剖之學也。解剖至此。形尚有可議。乃德貞氏不信。而轉疑帥氣之無物。蓋剖胸則止見胸。剖腹則止見腹。局守形質之弊。必至於此。自序又極詆中醫脾動磨胃之說。脾磨曰動。此中醫之謬談。不出於古經。脾傷不磨。則有之。脾若不能磨食。則消化之具。何以脾列其內。非彼之所自爲者乎。德貞氏憫中國之無良醫。而欲中國立剖驗之館。用心良厚。不知中國古昔未嘗

不行此術。太素有云。若夫八尺之士。皮肉在此外。生可度量。切循而得。死可解剖而視。下文卽繼之。以人之所以參天地而應陰陽。不可不察。古聖惟不專講解剖。是以醫學得詣於至極。西醫之短。卽在其守舊不變。吾知西醫居中國。待多歷年。所必有讀中書。而翻然改計者矣。

人身陰陽。無判然各具之理。陰陽雖分左右。而左亦有陰。右亦有陽。故經言左右者。陰陽之道路。不言左者陽之道路。右者陰之道路。大抵肝木自左生心火而上升。心火剋右之肺金。協胃而下降。胃亦金也。管子左者出者也。右者入者也。正與此合。水生其木。而腎之真陰偏位乎左。以坎爲陰中之陽也。火生其土。而腎之真陽偏位乎右。以離爲陽中之陰也。蓋生土者命火。而剋土以腐熱水穀者。少陽之木火。肝與膽皆木也。故弦爲肝膽兩經之脈。而皆見於寸口左關。近世西醫有肝右之說。而中醫亦從而和之。於義實無所取。且肝亦何嘗居右也。肝居脊之正中。而膽藏其右葉。則左葉自當爲肝之正體。天地之道。左陽而右陰。肝得少陽生氣。亦必左出而右入。診肝脈於右關。則謬矣。周慎齋主肝右者也。云一人病左脇痛。後傳之右。當不起。痛傳於右。邪入藏矣。噫。豈其然乎。脇痛在右者比比。未聞一痛卽死。此必其人肝病已深。移右而并戕其膽。生機全滅。故卽不起。傷寒論循衣摸牀。微喘直視。云脈弦者生。濇者死。非以弦爲有生機乎。又

有以右脇痛爲肺病者。肺居膈上。脇非其部。亦未聞小柴胡湯不治右脇痞軟也。鄭氏康成駁說文云。今醫病之法。以肝爲木。心爲火。脾爲土。肺爲金。腎爲水。則有謬。若反其術。不死爲劇。鄭氏以儒而知醫。此可爲醫者當頭棒喝矣。

民非水火不生活。人身五行亦惟水火尤貴。經云。一水不勝二火。所謂一水者。先天腎藏之水也。坎中一畫爲陽。火卽生於其中。與後天木火爲二。水陰也。火陽也。陰靜而陽動。人之動作云爲全賴乎火。經所以有君火相火之名也。自來醫家於此二義各執一說。紛紜莫定。或以君火屬命門。或以相火屬心包絡。或以君火專屬肝腎。或以相火專屬三焦。或謂君火生右尺相火。或謂相火爲元氣之賊。不知其於經旨實悖也。經云。君火以明。相火以位。注謂君火在相火之右。不主歲運。相火守位以稟命。君相二字。本不費解。蓋猶人君端拱而無爲。相臣協贊以宣力。故一主歲運。一不主歲運。然則君火果何指也。經云。聖人南面而立。前曰廣明。後曰太衝。太衝之地。名曰少陰。以南面與太衝之義揆之。少陰自當謂足經。相火果何指也。經云。少陽之上。相火主之。少陽亦當謂足經。雖然。腎爲坎水。而其所藏之火。實與心之離火相應。心以腎爲體。腎以心爲用。君火實兼手少陰心。視守位稟命之相火。則大有不同。故少陰之上。熱氣主之。不言火氣主之。火氣以少陽主之者。明乎其爲臣也。非火與熱有二也。夫君火兼有兩經。未嘗專

屬心。相火亦兼有兩經。自以三焦配膽。或疑六經惟三焦不言何木。心包絡不言何火。心包絡非君火。三焦安得爲相火。曰。三焦主出納。主腐熱水穀。皆火之所爲。其火即少陽木火也。心包絡乃心之宮城。專於衛心。主權不屬。然其託體甚高。亦不下儕相火。故君火相火兩無所與也。前人惟張載人識此意。曰。人之心腎爲君火。三焦膽爲相火。王宇泰採入證治準繩。消瘴門。不知戴人尙有論否。趙養葵偏見之重。與戴人同。其識高之處。亦有可節取者。趙以命門火爲水中之火。君主之火。謂應事接物者。心棲眞養息者。腎腎尤重於心。趙雖未知手足少陰。皆爲君主之義。論亦前後不符。而此數語。卻暗與經合。試更爲引伸以足之。先天之火。有南面之尊。安得不爲君火。惟恃有應務接物之心。故得以棲眞養息。火則同出一源。故同爲君火。至趙用八味丸治多病。不可爲訓。而八味丸補水中之火。則是正方。蓋水中之火。不宜偏用陽藥。有桂附必得有萸地。若腎中中有寒邪。則宜以薑附驅邪。如四逆湯之類。恐水中之火出而相拒。則加膽汁人治。準繩發熱門。腎虛火不歸經。用十全大補湯。吞八味丸一段。王氏謂水中之火。不可以水折。故巴蜀有火井焉。得水則熾。得火則熄。桂附固治相火之正藥也。以桂附爲正藥。而譬之巴蜀火井。則其於水中之火之治法。猶未深知。豈忘乎十全大補之有歸地。

八昧之有模也乎。相火關乎人身之重。猶國之重賴乎相。蓋其秉東方甲木之氣。人身得之則四時皆春。生機不息。經之言少火卽此火。肝則非其比也。肝爲厥陰。厥陰乃陰之盡。主疏洩而下降。人或以相火屬之。由其視相火爲腎火也。夫陰陽之道誠難言耳。君火所以屬少陰者。照四方而神蘊乎內也。相火所以屬少陽者。生萬物而功普於外也。經之所已言者。吾以文繹之。經之所未言者。吾以意逆之。庶乎其不至逞臆說而失真理也。

素問以工不知標本爲妄行。而標本之屬不一。自啓元子注天元紀大論。以三陰三陽爲標。寒暑燥溼風火爲本。而後世奉爲金科玉律。實乃大誤。不容不辨也。夫陰陽者無形之六氣。六氣者有形之陰陽。絕無分於上下。安得別之爲標本。經之言曰。寒暑燥溼風火。天之陰陽也。三陰三陽上奉之。明明以寒暑燥溼風火。指爲三陰三陽。對下下應而言。故曰上奉。又曰。積陽爲天。積陰爲地。天地且陰陽之所積。若論標本。陰陽不更爲本乎。竊嘗統覽全經。凡言標本。皆判若兩物。敢以經文一言蔽之。曰不同。腎與肺。病與工。先病與後病。其不同之顯著者。不具論。少陽之右陽明治之云云。此申明左右有紀。以不同之間氣爲標也。少陽之右火氣治之云云。此申明上下有位。以不同之六承氣。

爲標也。按此兩言氣之標。皆不同於本。故下結以本標不同氣應象異兩語。若空說本不同標。標不同本。何至有此駢枝。不同二字。自須著眼。其次一氣之標。詞句佶屈。罕得其旨。高士宗素問直解。以六氣爲上一位。中見爲中一位。三陰三陽爲下一位。陰陽六氣。本屬一家。乃擘分兩下。雜入中氣於中。可發一噱。亦足徵王注之誤人。其弊必至於此。玩所謂木也一句。不著於中見陽明之上。而著於其下。尙得撇中氣於本外乎。著氣之標一句。於見之下。尙得謂標氣不在中見之下乎。中見與本。因互爲表裏。故俱得爲本。不能無表裏之分。故中見爲本之下。本之下中之見兩句。義蓋如是。在見之下者。則舍六承氣而奚屬。觀新校正以此與六承氣一節。均引六元正紀大論爲證。亦隱然見及之矣。或曰厥陰之上風氣主之。風氣在厥陰之上。故厥陰爲標。不知此上字。猶蔡邕獨斷所謂上者尊位所在也。與上下之上有別。不然子午之歲。上見少陰。何以不云下見少陰。子午之上少陰主之。何以不云熱氣主之。觀所謂本也是謂六元兩句連下。厥陰之上風氣主之等句。亦兩句連下。本字兼頂三陰三陽。玩味之。即見王氏惟誤認標本。故其注至真要大論也。強名其標本之同異。以陰爲寒陽爲熱。有本末同本末異之說。天地造化之機。其陰陽錯綜。難以迹求。少陽太陰。看似本末同矣。而甲木與乙木同氣。厥陰非陽。己土與戊土同氣。陽明非陰。同之中暗藏有異。少陰太陽。看似本末異矣。

而腎水亦陰。小腸火亦陽。異之中兼寓有同。況經有六而以寒熱概之。標本多寡相懸。且絕無界畫可守。恐無此顛頽之經文。歷考醫集以表裏先後之類分標本者。皆燦若列眉。不稍淆混。依王說列六經標本。則皆意爲分隸。按之各家互有出入。信乎王說之不可爲典要也。然則六氣標本所從不同者何謂也。曰。此一語是冒下總綱。下卽申明不同之故。與所從之何氣。又繼之以從本者化生於本云云。明乎其從之爲化生。非病之化生。下文百病之起一節。乃是說到病生。經文何等明顯。蓋本猶主也。中猶賓也。標則亦本亦主而未有定分者也。是故從本則中氣從本。從中則本氣從中。推之從標亦然。猶主賓之相爲酬酢。而他人不與焉者也。自專以人身之病言。而論者偶觸一事。遂翻心得。並不統會全文。如劉潛江以葛根起陰氣爲從太陰行化。合陽明從中氣之義。是葛根之從。非本文之所謂從。陸九芝以溼溫爲陽明生於中氣之病。治以蒼朮白虎。不特仲聖溼溫無此說。卽許叔微之論。賊邪亦不然。至他病之從生律以此而不合。與厥陰亦當有中氣病。則兩家皆置不議矣。素問言從言化生。不可勝數。而此一節論者咸以病求。總緣未明標義。余蓋於此又得一標本相反之旨焉。相反者不同之極。亦不同也。何以言之。六氣中從本從標者。止少陰太陽。少陰一藏。兼具水火。自反者也。而中氣太陽之水。又與少陰之火反。太陽水也。而中氣少陰兼具水火。自反者也。其火與太

陽之水又反。其餘四氣。則皆木火相生。土金相生。欲不以反爲標義得乎。且此義經又明告之矣。曰。病反其本。得標之病。治反其本。得標之方。按所從以化生言。故從標者止。少陰太陽。此以病言。統乎六氣。故反乎本。卽爲標。如閒氣六承氣皆是。乃王注言少陰太陽二氣。餘四氣標本同。旣以二氣爲反。獨不思二氣之反。是水火本具之反。非恍惚無憑之反。王氏意中。惟橫一懸擬之標本。故旣不知反之概乎六氣。而將四氣除去。又并二氣之本相反者。而故昧之。處處欲伸其說。實處處自貢其瑕。顧除則因而參考前後。得以四通六闢。亦王氏之啟除也。其木火相生。土金相生。而一則從母。一則從子者。奈何。陳修園謂木從火化。燥從水化。是矣。但天氣不加君火。而相火稟君之命以守位。不能爲木所化。土位中央。有面南之尊。不能爲金所化。要之皆相從而後生者也。其從標而有取於相反者。奈何。水與火勢均力敵。而不容偏廢。壯水之主。則陽光以鎮。益火之原則。陰翳以消。相反之中。實有相濟之妙。故進則爲主。亦退則爲賓。不能專從標。而或則從本。或則從標。經文又煞有斟酌如是。或曰。王氏訓標爲末。本諸說文。不當創爲別解。曰。未者名也。不同則徵以實。反又不同之所推而極之。皆未之一義所引伸也。豈反古哉。抑王氏尤有誤者。本標不同。氣應象異之下。王注標者。病之始。本標不同。所以氣應象異。下句方以病言。標有何病。本又何以不病。況先病爲本。後病爲標。經之明訓。

何反以病始爲標。阮氏經籍纂詁引之。亦未之深考矣。素問之有訓詁。權輿於全元起。而今不復見。學者多宗王氏。王氏釋經之功。自不可沒。而其躊躇。則亦往往而有。自宋而後。注家每有是正。獨標本無疵之者。不揆樸昧。竊擬斯篇。願與學者共商之。(此余舊作素問標本注注辨今覆加研覈似尚無漏義故錄存之)

徐洄溪陳修園。皆尊信本經與仲聖之至者。徐謂神農爲開天之聖人。實能探造化之精窮萬物之理。仲聖諸方。悉本此書。藥品不多。而神明變化。已無病不治。又其所著百種錄。自謂探本溯源。發其所以然之義。所箸傷寒論類方。自謂於方之精思妙用。一一注明。發其所以然之故。陳謂藥性始於神農。不讀本草經。如作制藝。不知題在四書。仲聖集羣聖之大成。卽儒門之孔子。又其所著本草經續。自謂透發其所以然之妙。求與仲聖書字字脗合。今按二家之書。於本經皆止順文敷衍。於仲聖方皆止知大意。徐雖較勝於陳。而不能實踐其言。則一也。試姑舉人參一物以明之。小柴胡湯。胸中煩而不嘔者。去半夏人參。加栝樓實一枚。徐注云。不嘔不必用半夏。煩不可用人參。栝樓實除胸痹。此小陷胸之法。按心煩喜嘔爲少陽本證。或煩而不嘔。則方有加減。觀心煩喜嘔之用。參卽可知。參之去。爲煩而不嘔。不嘔自無需半夏。故以去半夏人參並言之。蓋嘔則胸中之邪。不至於窒。若不嘔而用參。則更閉其邪。故去參而加以蕩胸之栝樓實。徐

以不嘔與煩拆講。又但知冽錄栝樓質主胸痹。而不知證之何以胸痹。故其注語全不中肯。況柴胡加龍骨牡蠣湯。煩而有嘔。柴胡桂枝乾薑湯。煩而不嘔無嘔。不可參觀而得之耶。揀謂桂枝加生薑芍藥新加湯。特提出沈遲二字。以辨身痛不是餘邪。乃營血凝滯作痛。故以人參借薑桂之力。增芍藥領入營分以通之。不知仲聖云。沈者營氣微也。又云。遲者營氣不足。血少故也。人參入營生脈有專能。故以脈沈遲明加人參之故。豈以爲營血凝滯之故。又謂四逆湯通脈四逆湯俱不加參。慮陰柔之品反減薑附之力。而論中有四逆加人參湯者。以其利止亡血而加之也。茯苓四逆少佐以人參者。以煩躁在汗下之後也。按二方之證。兼有外熱而利。故雖脈微不加人參。四逆加人參湯。惡寒脈微而身不熱。故加之。夫利止脈不出者。加人參。仲聖固明言之。是其加參爲脈微。非爲利止亡血。至茯苓四逆湯。乃少陰陽虛上擾其心。故煩躁。以四逆扶陽而平躁。茯苓入腎而抑陰。人參入心而去煩。各味俱有實義。何得以顛倒了之。二家之論方辨。藥大率類是。又不獨二家爲然。語有之。儒學醫菜作虧。噫。豈易言哉。(集中人參未言治煩故補論之)

卷一

石膏

鄒氏云。石膏體質最重。光明潤澤。乃隨擊卽解。紛紛星散。而絲絲縱列。無一縷橫陳。故其性主解橫溢之熱邪。此正石膏解肌之所以然。至其氣味辛甘。亦兼具解肌之長。質重而大寒。則不足於發汗。乃別錄於杏仁曰解肌。於大戟曰發汗。石膏則以解肌發汗連稱。豈以仲聖嘗用於發汗耶。不知石膏治傷寒陽明病之自汗。不治太陽病之無汗。若太陽表實而兼陽明熱鬱。則以麻黃發汗。石膏洩熱。無舍麻黃而專用石膏者。白虎陽治無表證之自汗。且戒人以無汗勿與。卽後世發表經驗之方。亦從無用石膏者。所謂發表不遠熱也。然則解肌非歟。夫白虎證至表裏俱熱。雖尙未入血成府實。而陽明氣分之熱已勢成連衡。非得辛甘寒解肌之石膏。由裏達表。以散其連衡之勢。熱焉得除。而汗焉得止。是則石膏解肌。所以止汗。非所以出汗。他如竹葉石膏湯。白虎加桂枝湯。非不用於無汗。而其證則非發表之證。學者勿過泥別錄可耳。

又庄海歲謂石膏發汗。朱丹溪謂石膏出汗。皆以空文附和。未能實申其義。竊思方書石膏主治。如時氣。肌肉壯熱。煩渴喘逆。中風。眩暉。陽毒。發斑等證。無一可以發汗而愈者。病之倚重石膏。莫如熱疫。余師愚清瘟散。毒散。一劑用至六兩八兩。而其所

著疫證一得。則諄諄以發表致戒。顧松園以白虎湯治汪續功陽明熱證。每劑石膏用至三兩。兩服熱頓減。而徧身冷汗肢冷發呃。羣醫譁然。阻勿再進。顧引仲聖熱深厥深。及喻氏陽證忽變陰厥。萬中無一之說。與辯勿聽。迨投參附回陽之劑。而汗益多體益冷。復求顧診。顧仍以前法用石膏三兩。而二服後即汗止身溫。(見陸定圃
醫話)此尤可爲石膏解肌不發汗之明證。要之顧有定識定力。全在審證之的。而仲聖與喻氏有功後世。亦可見矣。

本經中風寒熱四字。劉潛江鄒潤安皆作兩項看。甚是。惟鄒以下文心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息。爲卽中風與寒熱之候。強爲牽合。殊不切當。劉謂陽不足而陰有餘者風之虛也。陰不足而陽有餘者風之溼也。茲味之陰有餘。真對待陽有餘之證而治其風溼。講石膏治中風極眞。講寒熱則以五蒸湯內三焦之乍寒乍熱用石膏釋之。而五蒸湯卻不僅恃石膏除寒熱也。竊思中風用石膏。如金匱風引湯古今錄驗續命湯皆是。寒熱用石膏。當以外臺石膏一味。治陽邪入裏。傳爲骨蒸。今人先寒後熱。漸成羸瘦。有汗而脈長者爲切。又白虎加人參湯。治太陽中熱汗出惡寒身熱而渴。亦可爲石膏治寒熱之據。然此二證。與陽虛之寒。陰虛之熱。傷寒有表證之惡寒。皆迥乎不同。未可漫施而不細辨也。

石膏甘淡入胃。辛入肺。體重易碎。亦升亦降則入三焦。以清肅之寒。滌蒸鬱之熱。祇在三經氣分而不入於血。其爲胃藥非脾藥亦由於是。然則腹中堅痛必苦寒入血。如大黃方克勝任。卽枳朴芍藥亦祇堪用爲臣使。石膏斷不能攻擊而止痛。本經腹中堅痛四字必是後世傳寫舛誤。原文甯有是哉。

仲聖方石膏麻黃並用。與大黃協附子變其性爲溫藥相似。更設多方以增損而軒輊之。覺變幻紛紜。令人目眩。然祇認定麻黃散寒發汗。石膏泄熱止汗。相爲制還相爲用。推此以求。何方不可解。何方不可通。大青龍湯咸以爲發汗之猛劑矣。竊謂發汗之猛。當推麻黃湯。不當推大青龍。麻黃湯中桂枝杏仁皆堪爲麻黃發汗效力。而無石膏以制麻黃。大青龍麻黃受石膏之制。六兩猶之三兩。杏仁又少廿枚。用於脈浮緊身疼。痛則曰中風。用於傷寒則曰脈浮緩身不疼但重。中風自較傷寒爲輕。身不疼但重。自非但取解表。柯韻伯謂大青龍方後之汗出多者溫粉撲之。一服汗者停後服。汗多亡陽。遂虛惡風。煩躁不得眠也。宜移列麻黃湯後。蓋從溫服八合。並後煩躁與未汗煩躁悟出。可謂讀書得閒。諸家震於青龍之名。念有汗多亡陽之戒。汗遂以麻黃得石膏。譬龍之興雲致雨。其於白虎非驅風之方。小青龍無石膏亦名青龍。越婢石膏之多。如大青龍而不言取汗。皆有所難通則不顧也。然則名大小青龍。

何哉。蓋龍者屈伸飛潛。不可方物。能召陽而化陰者也。麻黃能由至陰以達至陽。而性味輕揚。得石膏芍藥則屈而入裏。得桂枝杏仁則伸而出表。石膏寒重之質。復辛甘津潤而解肌。並堪爲麻黃策應。故名之曰大青龍。小青龍心下有水氣。以石膏寒重而去之。麻黃可任其發矣。而麻黃三兩。芍藥亦三兩。麻黃雖發亦純。其辛夏諸味。又皆消水下行。蓋龍之潛者。故名之曰小青龍。越婢湯之麻黃亦制於石膏者。而故制之而故多之。則越婢之證使然也。風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。種種皆麻黃證。惟裏熱之續自汗出。則不能無石膏。有石膏故用麻黃至六兩。石膏因有麻黃。故雖無大熱而用至半斤。其不以石膏倍麻黃者。化陰尤要於退陽也。或問越婢以汗出。用石膏。大青龍以煩躁用石膏。(別有說詳麻黃)無陽明熱邪者。宜不得而用矣。乃傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時。大青龍湯主之。徐洄溪謂此條必有誤。其信然乎。寒脈浮緩者多熱。傷寒邪在表則身疼。此正合青龍屈伸飛潛之義也。尤在涇云。經謂脈緩者。不爲拘急。故身不疼而但重。而其脈猶浮。則邪氣在或進或退之時。故身體有乍重乍輕之候也。不曰主之而曰發之者。謂邪欲入裏。而以藥發之。使從表出也。詮解之精。諸家不及。夫邪欲入裏。而以藥發之。非麻黃。得石膏寒重之質。如青龍出而復入。入而復出。何能如是。若視石膏爲汗藥。麻黃

不因石膏而加多。（諸家多坐此誤）則此條真大可疑矣。越婢石膏多於麻黃止二兩，即不以龍名。不以汗多示禁。大青龍石膏斷不至如雞子大一塊。（別有說詳麻黃）且石膏多則不能發汗。又有可證者。麻杏甘膏湯之石膏倍麻黃是也。麻黃四兩雖不及大青龍之六兩。而較麻黃湯之三兩尙多一兩。卽杏仁少於麻黃湯廿枚。而麻黃一兩。則非杏仁廿枚可比。此湯何不用於無汗之證而反用於汗出應止之證。則以石膏制麻黃更甚於越婢耳。（方解別詳麻黃）石膏止陽明熱熾之汗。亦止肺經熱壅之喘。既有麻黃原可不加杏仁。因麻黃受制力微。故輔以杏仁解表閒餘邪。無大熱而用石膏至半斤。其義與越婢正同。乃柯氏不察。改汗出而喘無大熱爲無汗而喘大熱。反謂前輩因循不改。不知用石膏正爲汗出。若無汗而喘。乃麻黃湯證。與此懸絕矣。更證之桂枝二越婢一湯。大青龍謂脈微弱汗出惡風者不可服。此云脈微弱此無陽也。不可更汗。豈猶以麻黃發之。石膏寒之。夫不可更汗。必先已發汗。或本有自汗。觀其用桂枝湯全方而不去芍藥可見。至又加以石膏。則非與桂枝麻黃各半湯互參不明。按桂枝麻黃各半湯發熱惡寒。多寒少與此同。而彼如瘡狀脈微緩。有邪退欲愈之象。若脈微非緩而惡寒。面反有熱色。則以桂枝麻黃各半湯微汗之。此脈微弱而惡寒。陽微之體。亦無自愈之理。桂枝湯所以和陽。協麻黃則散餘寒而

解表邪法已備矣。加石膏何爲者。爲熱多耶。乃熱多不過較多於寒。若脈非微弱。亦將如桂枝麻黃各半湯之欲愈而何熱之足慮。然則加石膏者專爲陽虛不任麻黃之發。而以石膏制之。化峻厲爲和平也。藥止七味。皆傷寒重證之選。而各大減其分數。遂爲治餘邪之妙法。用石膏而不以泄熱。如大黃之用以瀉心用以利小便。同工巧也。生薑多於他味者。以能輔性甘生陽。又爲石膏防弊也。

○赤石脂

石脂揭兩石中取之。鄒氏云。兩石必同根歧出而相並。脂者黏合兩石之膠。故所治皆同本異趨而不相浹之病。得此乃匯於一處。專力以化之。仲聖所用石脂四方。固與鄒說符合。劉潛江不以東垣海藏瀕湖仲醽專主收濇爲然。就本經補髓益氣鬯。發其義。雖不如鄒氏之親切證明。而所見自超。抑愚竊有以伸之。別錄於赤石脂曰。補髓好顏色。則其補髓確是腦髓。與白石脂之補骨髓有別。本經且主頭瘡。何東垣但以爲性降乎。夫髓生於精。精生於穀。穀入氣滿津澤。注於骨。骨屬筋。仲泄澤補益。腦髓是中土者。生精化髓之源也。而石脂味甘大溫。補益脾胃。質黏能和胃陰。性燥復扶脾陽。其所以上際。則辛入肺爲之。所以至腦。則酸入肝爲之。(外鑒述刪繁論凡體虛實之應主於肝膽)石脂確有補腦髓之理。千金赤石脂散。治冷飲過度。致令脾胃氣

弱。痰飲吐水無時。本事方云試之甚驗。蓋卽鄒氏所謂聯合其涣散者。謂石脂爲胃藥。非脾藥可乎。夫下之精祕。則上之髓盈。石脂補髓。亦半由於祕精。祕精易而補髓難。故本經別錄皆於補髓上冠以久服字。千金羌活補髓丸不收石脂。而無比山藥丸。曰此藥通中入腦。鼻必酸痛勿怪。入腦自指石脂。而石脂未嘗專任。可知虛損之難療而無近效也。

○消石(卽火硝亦名焰硝)芒消(消之經煎煉而凝底成塊者爲朴硝亦名皮硝在上生細芒如鋒者爲芒硝均卽水硝)

李瀕湖謂朴消下走。火硝上升。火硝得火則焰生。與樟腦火酒之性同。本經言其寒。別錄言其大寒。實乃大溫。劉氏引伸其說。謂水消治熱之結。熱結多屬血分。所謂陰不降。陽不化者也。能行陰中之陽結。則陰降。陽自化矣。火消治熱之鬱。熱鬱多屬氣分。所謂陽不升。陰不暢者也。能達陽中之陰鬱。則陽化陰自暢矣。鄒氏又以火消爲性向陽。解自陰而陽之盛熱。冰消爲性向陰。故逐伏在陽之實結。斯三家可謂發前人所未發矣。雖然愚竊有未安焉。陰陽之理。至爲微妙。就物論物。易圓其說。以物合證與方而論之。則難於確當。難於瑩澈。渾言之而深。何如切言之而淺也。火消固上升而散。固在氣分。然其升散者爲陰中熱鬱之氣。非陽中熱鬱之氣。病在陰經陰藏。

爲陰。病有陰邪亦爲陰。蓋其辛溫際上鹹苦入下。凡在上在下之病胥治之。而總歸於解陰中之熱鬱。劉氏達陽中陰鬱一語。得毋猶有可商。試覈之證。來復丹。二氣丹。玉真丸。皆陰邪中有伏熱。金匱消石礬石散尤彰彰者。惟大黃消石湯用以下奪。不與升散之旨相戾歟。乃其證爲黃癰。腹滿小便不利而赤。熱爲陽邪。得溼而鬱。且獨在裏。裏實而表和。是亦陰中之邪也。陰中之邪。非鹹苦何以得入。舍芒消用消石者。以表雖汗出而表閒之溼熱自在。消石辛溫勝於鹹苦。故於大黃蘖梔下奪之中。加茲一味。以達表而散邪。夫火消之不易明者。爲其以溫治熱耳。若水消以寒治熱。曰走血。曰潤下。曰更堅。曰破結。固宜古今無異詞。然亦何嘗易明哉。大承氣調胃承氣桃核承氣。洵可謂去血中熱結矣。獨大陷胸湯丸用芒消至一升半升。而其所治爲結胸。縱云破結更堅。非多不濟。獨不慮下降之物。用之多不愈速其降耶。是則有故矣。芒消乃煎消時結之於上者。細芒如鋒。質本輕於朴消。味復兼辛甯。無上升之性。寧不入氣分。後世且以治口舌咽喉諸熱證。謂芒消不能實際上治上可乎。由斯以觀。劉氏陰中陽結之說。恐亦有未然者。仲聖有言。病發於陽而反下之。熱入因作結胸。中有陰有陽。然則行陰中陽結者。乃消石非芒消。芒消者。逐陽證之熱結者也。芒消據此自非陰中之陽結。又凡仲聖用芒消之方。皆陽證無伏陰。用消石之方。則一證

鹹寒勝於苦辛。多煮則下益速。下速則遺上邪。故仲聖必後內微煮而少揚之。消石辛溫勝於鹹苦。微煮則升之亟。升亟則不入下。故仲聖於二升中煮取一升而少抑之。此似二物正相對待。劉氏於二物亦似以對待釋之。而不知非也。鹹與寒皆陰也。其微辛不過挾有升性。並不能治陰邪。鹹與溫則陰陽異趣矣。溫而兼辛。辛溫而兼鹹潤。則必陰中有陽邪之證。始克任之。其中奧旨。猝不易悟。故曰非對待也。抑劉氏以入血分爲陰中乎。血分爲陰。則大承氣當曰太陰病。不當曰陽明病。桃核承氣當曰少陰病。不當曰太陽病。芒消蓋血藥而亦不專入血者。與大黃頗有似處。大黃味苦入心。能開胸膈之熱結。若與芒消皆不宜於氣病。胸膈之閉。其能堪此重劑哉。鄒氏以火消向陽。水消向陰。爲藏病移府。府病移軀體之所以然。此尤不可不辨者。本經積熱曰五藏。豈悉能入胃使脹閉。病曰百病。豈盡在於軀體。謂火消性向陽。解自陰而陽之盛熱。向陽自卽入陽。何以先入於陰。寧得謂非其所向。謂水消性向陰。遂伏在陽之實結。所逐在陽。所向亦必在陽。反是則有異謀。人固有之。物所必無。此等近似之談。並無真理可求。徒眩人目耳。鄒氏更有誤者。謂已椒蘚黃丸加芒消以治渴。是去其痼癖。正使津液流行。外柴胡湯加芒消以止利。是去其積聚。正所以止下利。噫。是亦不深思矣。已椒蘚黃丸之證。原非固癖。若固癖。大黃決不止用一兩。(有方)

解詳大黃。芒消亦不後加。況方後云。先食飲服一丸。日三服。稍增。口中有津液。渴者加芒消半兩。是無芒消。津液非不能生。豈加芒消之津液與此有異耶。除氏尤氏皆云渴是胃熱。故加芒消。鄭氏坐泥本經太過耳。柴胡加芒消湯云。潮熱者實也。熱實無不下之理。以柴胡加芒消湯主之。卽所以治熱實云。內芒消更煮微沸。分溫再服。不解更作。加芒消非欲其解而何。鄭氏之說。何與相反。殆誤會今反利句耳。不知仲醒明云。微利明云。下非其治。下之而仍潮熱。安得不以對證之下藥繼之。此讀古書所以貴細心尋繹也。

甘草

炙用者 甘草中黃皮赤。確是心脾二經之藥。然五藏六府皆受氣於脾。心爲一身之宰。甘草味至甘性至平。故能由心脾以及於他藏他府。無處不到。無邪不祛。其功能全在於甘則補。甘則緩。凡仲聖方補虛緩急必以炙用。瀉火則生用。雖瀉亦兼有緩意。如治咽痛肺痿。火在上焦者爲多。以其爲心藥也。甘草瀉心湯。是瀉心痞非瀉心火。瀉痞有黃連芩夏。甘草特以補胃。故炙用。炙用而以甘草瀉心名湯者。甘草之奏績可思也。

李東垣謂甘草生用瀉心火。熟用散表寒。散表寒之方。無如桂枝麻黃二湯。自汗者

表虛。故桂枝湯以桂芍救邪風。蘆棟和營衛。無汗者表實。故麻黃湯以麻桂散寒。更加杏仁。然解表而不安中。則中氣一匱。他患隨生。故二湯皆有炙甘草以安中。表實與表虛不同。故二湯甘草亦分多寡。可見用炙甘草者。所以資鎮撫。非以資摧陷也。

凍頃不加分辨。非示學者以準的之道。

東垣又云。心火乘脾。腹中急痛。腹肉急縮者。甘草宜倍用之。按小建中湯治裏急腹痛。甘草炙用。病非心火乘脾。生甘草瀉心火。而不治心火乘脾之腹痛。本經廣連主腹痛。治心火乘脾之腹痛。卽仲聖黃連湯是。東垣之說殊有未合。劉潛江發心火乘脾之義而深贊之。鄒氏又引東垣此說。以證梔子甘草散。鍼之虛煩不得眠。不得眠豈是脾病。三君皆名家。而於甘草不細辨如是。真爲不解。

王海藏謂附子理中湯用甘草。恐其僭上。調胃承氣湯用甘草。恐其速下。按傷寒論無附子理中湯。理中湯之附子。腹滿則加。腹滿而加附子。蓋以其爲中宮藥不可缺也。若恐附子僭上。則白通湯乃少陰下利用附子。何以反無甘草。至生用而不炙用。則固有義在。寒多之霍亂。非全不挾熱。溫中補虛。既有乾薑參朮。故加以生甘草之微涼。卽別錄除煩滿東垣養陰血之謂。以是湯用於胸痹。則生甘草亦因氣結在胸。不欲其過守也。調胃承氣湯。是治胃氣不和之內實。以調胃爲下。是下法之元妙者。

舍枳朴而取炙甘草。以與黃消一補一攻。適得調和之義。非止防其速下也。
海藏又謂鳳髓丹用甘草。以緩腎急而生元氣。竊謂亦非也。是方不知制自何人。名
醫方論云。治夢遺失精及與鬼交。醫方集解云。治心火旺盛。腎精不固。易於施泄。其
方義之精微。則未有見及之者。夫元陰聽命於元陽。元陽聽命於天君。故心火熾而
感其腎。腎感之而陽動。陰隨有必然者。黃柏靖腎中之火。防腎中之水。火不作則陽
蟄。水不泛則陰堅。砂仁攝火土之氣於水而使腎得藏密。然心腎二家交通最易。治
腎而不治心。未善也。生甘草瀉心火。寧心氣。大甘爲土之正味。且能止腎水越上之
火。(洄溪語)集解治心火旺盛一語。實卽用甘草之意。若稍能去莖中痛。則可謂之緩
腎急。而甘草身不與也。

甘草與人參。皆能補中氣調諸藥。而仲聖用於方劑。則確有分別。不稍通融。姑舉二
方以明之。厥陰病有嘔吐。則兼少陽。仲聖法轉少陽之樞。多以乾薑黃連並用。余已
著其說於乾薑。乾薑黃連人參湯。是以小柴胡湯加減。乃舍甘草而用人參。幾不可。可
曉。夫不曰食入口卽吐乎。少陽上升之氣。得食卽拒。難緩須臾。甘草甘壅。詎能任受。
人參甘與苦均。爲和少陽之專藥。樞機利則食自下。甘草所以非其匹也。其舍人參
而用甘草者。梔子豉湯治虛煩不得眠。若少氣則梔子甘草豉湯主之。此在粗工必

以人參益氣矣。庸詎知人參益氣而亦升氣。梔豉湯之吐。由二物一升一降之相激。得人參則升不成升降不成降。挾其補性。反足窒邪。夫懊憹者反覆之甚。少氣者懊憹之甚。非元氣之有虧。乃鬱熱之傷氣。梔豉能吐去其邪。不能安定其氣。此仲聖所以有取於甘平清心火之甘草。而人參亦不得躋其列也。

鄒氏以黃芪桂枝五物湯爲治下。治下制方宜急。急則去甘草而多其分數。桂枝加黃芪湯爲治上。治上制方宜緩。緩則加甘草而減其分數。於是於血痹則但摘尺中小緊句爲病在下。且別引本篇首條以證其治下之說。不思尺中小緊下句身體不仁。謂爲非病。寧有是理。本篇首條本與本病不屬。況有關上小緊句。豈尺中小緊爲病在下。關上小緊亦病在下乎。於黃汗則摘腰以上汗出句爲病在上。且別引本篇第二條以證其治上之說。不思腰以上汗出下句腰臍弛痛小便不利。謂非下體。寧有是理。本篇第二條非本條之病而引之。則他條又有黃汗之爲病。身體腫汗露衣等句。亦得謂但指上體乎。血痹篇尤注闡發宜鍼引陽氣句。致爲精審。黃芪桂枝五物湯尤云和營之滯助衛之行。亦鍼引陽氣之意。經所謂陰陽形氣俱不足者。勿刺以鍼而調以甘藥也。引經語解此方。亦正切合。夫血痹者。痹在表不痹在裏。以甘藥代鍼。亦調其表非調其裏。芪桂薑棗甘與辛合。所以補虛而宣陽。芍藥佐桂。則能入

營而調血。去甘草且加多生薑者。不欲其中守而欲其解表也。甘草中又有斟酌如此。以非桂枝湯加減。故不曰桂枝加黃芪湯。然則桂枝加黃芪湯可不於桂枝湯一致思乎。愚於黃芪已詳著此方之義。甘草自是桂枝湯不可少之物。安得去之。桂芍減而甘草不減。則陽虛之與邪風有異也。鄒氏不悟仲聖制方之所以然。而肆其臆說。疵類叢生。無謂甚矣。

黃芪

營氣始手太陰而出於中焦。衛氣始足太陽而出於下焦。營奉胃中水穀之精氣以行於經隧。衛奉胃中水穀之悍氣以行於肌表。黃芪中央黃。次層白。外皮褐。北產體虛鬆而有孔。味甘微溫。葉則狀似羊齒。明係由胃達肺。向外而不中守。有外皮以格之。卻又不泄出。獨莖直上。根長二三尺。故能由極下以至極上。凡其所歷皆營衛與足太陽手太陰經行之境。論其致用。則未易一二明也。

劉潛江疏黃芪。以治陽不足而陰亦不利之病。不治陽有餘而陰不足之病。與陽不得正其治於上。陰卽不能順其化於下四語。最爲扼要。其解內經陽者衛外而爲固。陰者藏精而起亟。雖稍落寬廓而理固如是。乃鄒氏以陽不勝陰。則五藏氣爭。九竅不通。與衛外起亟。強爲牽合。不知衛生總微論。以黃芪一味治小便不利。乃提陽於

上而陰自利於下也。卽經所謂起亟。劉氏所謂順其化於下也。五藏氣爭之九竅不通。則是陰之爭而非陰之不利。與此蓋毫釐之差耳。

黃芪與牛膝皆根長二三尺。別錄皆言利陰氣。惟牛膝一莖直下而味苦酸平。黃芪一莖直上而味甘微溫。故牛膝利陰氣。是下利其陰氣。黃芪利陰氣。是從陰中曳陽而上。又自上而下。鄒氏謂黃芪能升而降。能降而升。此蓋黃芪疏營衛之後。營衛則然。黃芪無此狡猾也。

凡藥之用宏而不專主於一者。辨之不精。卽致貽誤。如黃芪補表而不實表。不實表故不能止汗。如人參之屬。疏表而不解表。不解表故不能發汗。如麻黃之屬。其亦能止汗發汗者。則藉黃芪疏通營衛調和陰陽之力也。金匱方黃芪無不生用。後世多以蜜炙。然遇中虛之證。炙使向裏。尙無不可。陳脩園乃更分爲鹽水酒醋諸炒法。則大拂其性矣。

繆仲醗謂黃芪功能實表。有表邪者勿用。豈知黃芪惟不實表。故表邪亦有用之者。如本經之排膿止痛。金匱之治風溼風水。黃汗。皆堪爲不實表之據。若傷寒之邪。宜從表泄。黃芪雖不實表。而亦無解表之長。且有補虛羈邪之患。斷非所宜也。

足太陽脈上額交顱。黃芪入太陽經。故能上至於頭。膀胱與腎爲表裏。故亦能益腎氣以化陰而上升。凡方書治尿血等證皆是。汪訥菴云。陰虛者宜少用。恐升氣於表而裏愈虛。斯言得之矣。

試以金匱用黃芪諸方言之。小建中湯尤在涇詮解之精。實勝諸家。惟黃芪建中湯加黃芪兩半。第視爲充虛塞空。則失之泛矣。諸不足三字所該者廣。營衛二氣。豈能升降無愆。芍藥用至六兩。意在斂裏破脾結。加黃芪則爲疏營衛之氣。俾胃中津液。得輸於營衛而無阻。核之黃芪桂枝五物湯。黃芪與生薑俱較此加倍。且減芍藥去甘草。顯爲宣通血痹而然。豈建中加黃芪。是徒取補塞乎。桂枝加黃芪湯之黃芪。則尤非徒補之謂矣。黃汗與中風汗。自出之汗。同爲邪汗。同宜化邪汗爲正汗。桂枝湯正的對之方。然黃汗由於陽虛。與桂枝證之但須泄邪者。差有不同。故減少桂芍而加疏表補虛之黃芪。以泄邪而化氣。至腰腹痛。身重小便不利。則由陽不下通。尤非黃芪不能下疏其衛。黃疸脈浮亦用之者。正以黃芪爲太陽藥也。然則芪芍桂酒湯。何爲抑之以苦酒哉。蓋黃汗同而身腫不同。渴亦不同。腫則陽微表虛。不任汗解。渴則水氣鬱於三焦。腎陰不得上朝。自當以通陽化氣瀉水爲亟。芪芍桂枝。取以通陽而化氣。苦酒則泄熱瀉水而下達。三物得之。由三焦一氣直下也。去生薑者。不使橫

擴也。去甘棗者。恐其中停也。用黃芪特多。則因其虛。以補劑驅邪。故須六七日乃解。無速效也。

防己黃芪湯治汗出惡風。而不以桂枝湯加減者。以彼無溼此有溼也。風水亦用此方。以與風溼無異也。風溼例用麻桂。而此不用者。蓋彼爲身痛。此則身重。身痛者風盛而喜動。身重者溼盛而喜靜。脈浮則邪仍在表。表可不解乎。然汗已出而虛虛可慮。溼可不驅乎。然溼卽去而風必愈溼。惟防己解肌表之風溼。直泄而不橫泄。黃芪宣營衛之壅蔽。疏表而亦補表。脾土強則能勝溼。故佐以朮甘。薑棗多則妨身重。故減其分數。又以後坐被上。被繞腰下。助下焦溫化之氣。而邪得以微汗而解。視夫徒知發汗利水補虛而不能與病機相赴者。真有霄壤之別。

皮水例宜發汗。而防己茯苓湯雖水氣在皮膚中而脈不言浮。四肢則聾聾動而腫。經云肉蠕動名曰微風。是水侵其脾。脾陽不能達於四肢而又爲微風所搏。故動而腫。動而不痛脈不浮。則發汗非宜。防己爲風水要藥。偶以茯苓使直泄於小便。病在皮膚。非黃芪不能益氣疏表。故加之。辛甘合而生陽。加桂草者。又兼以治其本也。汗出表虛而宜止汗之證。如四逆加人參與茯苓四逆諸湯。仲聖用人參不用黃芪。以參能實表。芪不實表也。感傷風寒而宜發汗之證。如桂枝與麻黃諸湯。仲聖絕不

加芪。以表有邪。非表之虛也。表有邪而挾虛者。則參不宜而芪爲宜。然芪能直疏不能橫解。且性味甘溫。驅邪豈其所勝。故風溼風水黃汗等證。仲聖用黃芪。亦祇爲防己茯苓之輔而已。惟補虛通痹。則芪之專司。故黃芪建中湯。黃芪桂枝五物湯。皆以黃芪統率全方。仲聖之辨藥。可謂精矣。後世用黃芪爲表劑。而至當者。無如唐書許允宗之治柳太后病風。以黃芪防風煮數十斛。於牀下蒸之。藥入腠理。一周而瘳。此必尚有外證可憑。故開手卽以解散風邪爲治。經云。邪之所湊。其氣必虛。又云。大氣一轉。邪氣乃散。夫補虛散邪法。亦多端。而黃芪防風收效若是。之捷者何也。病者脈沈口噤。自屬經絡機竅爲風邪所中。陽虛而陰壅。大可想見。黃芪非風藥。而補陽利陰。通其氣道。厥有專長。防風得之。乃克由陽明達表。大驅其風。此其得訣。在認定脈沈可任黃芪。否則遇中風脈浮汗出而用之。不愈助其虛乎。宋人許叔微。醫學至深。而其用黃芪。則似不如允宗之當。本事方載邱生病傷寒。尺脈遲弱。叔微謂未可發汗。而以黃芪。建中加當歸。先調其營血。極爲有見。然尺弱宜兼益腎陰。而用由太陽上升之黃芪。不無可商。好在黃芪兩半。而芍藥則倍之。故服至五日。而尺部亦應也。陸定圃冷廬醫話。載許辛木部曹。謂其嫂吳氏。患子死腹中。渾身腫脹。氣喘身直。兄珊林觀察。檢名人醫案。得一方。以黃芪四兩。糯米一酒鍾。水煮與服。卽便通脹消。

已爛之胎成十數塊逐漸而下。一無苦楚。又山陰王某患腫脹。自項至踵皆偏。氣喘聲嘶。大小便不通。許亦告以前方煎一大碗。服盡而喘平。小便大通。腫亦隨消。繼加祛溼平胃之品。至兩月後。獨腳面有錢大一塊不消。更醫痛詆前方。迭進驅溼猛劑。竟至危殆。仍以前方挽回。用黃芪至數觔。腳腫全消而愈。黃芪治腫脹有此大效。得不詫爲異事。然此亦仲聖早有以示人者。金匱凡水溼之證。身重身腫。皆不禁用黃芪。皆使水溼下行。許氏所治亦是水腫。內經三焦爲水道。膀胱爲水府。黃芪從三焦直升至肺。鼓其陽氣。疏其壅滯。肺得以通調水道。陰氣大利。此實黃芪之長技。其腳面之不易消。與用芪至數觔。蓋由僅仗此一味。而制方之道。猶有所歉也。

人參

一物而毀譽交集者。惟人參爲最。好補之家多譽。好攻之家多毀。其譽者復有補陰補陽之各執。而不知皆非也。除洞溪鄒潤安。則能得是物之性用矣。餘氏云。人參得天地精英純粹之氣。補氣而無剛燥之病。又能入於陰分。鄒氏云。凡物之陰者。喜高燥而惡卑溼。物之陽者。惡明爽而喜陰翳。人參不生原隰汙下。而生山谷。是其體陰乃偏生於樹下而不喜風日。是爲陰中之陽。人身五藏之氣。以轉輸變化爲陽。藏而不洩爲陰。人參兼變化藏守之用。且其色黃味甘氣涼質潤。合乎中土脾藏之德。所

由入後天而培先天也。至論病之何以需參。參之何以愈病。則二家猶未得其當。而陶隱居功同甘草之說爲有見矣。蓋甘草者。春苗夏葉秋花冬實。得四氣之全。而色黃味甘。迥出他黃與甘之上。故能不偏陽不偏陰。居中宮而通經脈。和衆藥與人參有相似之處。竊謂得此一言。可以測參之全量。雖然。病之非參不治者。詎能代以甘草。甘草自甘草。人參自人參。欲知人參之真。非取仲聖方融會而詳辨之。庸有冀乎。少陽爲三陽之樞。少陰爲三陰之樞。凡言樞者。皆一經中有陰有陽。入則爲陰。出則爲陽。猶樞機之轉移。少陰水藏而寓君火。固陰陽兼具矣。少陽似有陽無陰。然藏於肝葉。是一陽初生而尙不離乎陰。故二經相感極易。肝病有熱。卽挾膽火。膽病有寒。卽挾肝風。肝氣之上逆。卽膽氣之下降。卽肝往來寒熱。雖少陽病。卻非全不涉肝。以陽之稿。不能竟遠乎陰。而有出入相爭之象也。爭則宜解。宜和。人知小柴胡湯爲少陽和解之劑。不知柴芩專解邪。參乃所以和之。病兼陰陽。何以解之。第有寒藥。蓋此固少陽勢重。退少陽則厥陰自靖。且有人參調停其閒。何患寒熱之不止。參爲少陽藥。有鑿鑿可據者。瀉心陽心煩無參。而脇下有水氣則用之。胸痹諸方無參。而脇下逆搶心則用之。卽小柴胡湯有加減法。而獨於嘔於渴於脇下痞鞭不去。參此可知。人參爲和少陽之專藥矣。

少陰之貴於和者躁是也。煩出於心。躁出於腎。故梔子豉湯。黃連阿膠湯治煩無參。煩不必兼躁。躁則必兼有煩。煩與躁兼。則有陽證有陰證。陽證乃太陽表實陽明府實之下侵及腎。非腎自病。故大青龍湯。大承氣湯治煩躁無參。陰證則爲腎病上干及心腎陽幾亡。腎陰豈能獨善。故吳茱萸湯。茯苓四逆湯治煩躁有參。又可知人參爲和少陰之專藥矣。

用參於和。有和其本府本藏之陰陽者。少陽少陰是也。若乾薑黃連黃芩人參湯。則以證有寒熱而和之。木防已湯。則以藥兼寒熱而和之。桂枝人參湯。所以聯表裏之不和。生薑鴉心湯。所以聯上下之不和。大建中湯。又以椒薑之溫燥而化之使和。和之道不一。而不善用之。則有不如甘草驅使之易者矣。

心爲牡藏。煩而補之。則煩彌甚。然小柴胡湯。煩而兼嘔不忌。(煩而不嘔去半夏人參謂煩而嘔則不去也。徐氏傷寒類方注誤)白虎加人參湯。煩而兼渴不忌。以嘔渴皆少陽木火爲之。生其津以和之。而煩亦自己也。

胸脇滿鞭嘔吐。各有正治之藥。用參。特以和陰陽耳。然生津止渴。則參有專長。不必定用於少陽。故津爲熱劫之陽明證。白虎加人參湯亦用之。土虛而津不生之太陰證。理中丸亦用之。若渴飲而有水蓄於中小便不利者。參則不過問也。

止渴有不需參之證。生脈則惟參獨擅。蓋脈生於營。營屬心。心體陰而用陽。惟沖和煦育之參能補之。故白虎加人參湯之暑病脈虛。(脈不虛者必有兼證非正暑病也)四逆加人參湯之脈微。通脈四逆湯之脈不出。厥甘草湯之脈結代。皆必得有參。參之力入腎者輕。入心者重。故足少陰得其和。手少陰得其補。亦可爲陰中之陽之一證矣。

參之功在補虛。雖止渴亦補。然止渴與生脈第證狀之顯著者耳。參之補豈止是哉。其色黃。其味甘。其全神自注於脾。由脾而擴之。又能無處不到。故建中湯之名在飴不在參。以參之不可以一得名也。今試約舉仲聖方之用爲補者而言之。補脾如理中丸。黃連湯。(參治腹中痛)補胃如大半夏湯。甘草瀉心湯。(許氏內臺方有人參)補肺胃如竹葉石膏湯。補肝如烏梅丸。吳茱萸湯。補心已列如右。他如薯蕷丸。溫經湯之補。殆不勝其指數。參之補可不謂廣也乎。

心痞最不宜參。然以參佐旋覆蘆薈。則參可用於散痞矣。腹脹最不宜參。然以參佐厚朴薑復。則參可用於除脹矣。參能實表止汗。故有表證者忌之。若汗出後煩渴不解。於寒劑中用之何妨。參能羈邪留飲。故欬證忌之。若肺虛而津已傷。於散邪蠲飲中用之何妨。參治往來寒熱。似瘧皆可用參矣。然外有微熱。卽去參。外臺於但寒但

熱寒多熱少之瘡。亦俱無滲。惟瘡病發渴者用之。蓋補虛則助邪。寒熱不均。則不可以遽和。人參止渴。輔芩恬之不逮也。參惟益陰。故能生津。利不止。雖脈微欲絕。亦不加參。以利則陰盛而參復益之也。然下與吐兼。或吐下之後。其中必虛。津必傷。滲又在所必需。蓋中土有權。則上下悉受其範。而不敢違戾也。

徐洄溪以邪正之分合定人參之去取。鄒闇安更指小柴胡湯之去滲爲邪合之據。桂枝新加湯之有滲。爲邪分之據。論似精矣。而實有不然也。身有微熱。邪尙在表。若又加以實表之滲。則邪益膠固而不解。故必須去之。新加湯發汗後。其表已虛。不慮滲之實表。脈沈遲。尤宜滲之生脈。以身疼痛之表邪未盡。故尙需桂枝湯驅邪。惟不能斂外散之氣。振內陷之陽。加芍藥則散者斂。加生薑則陷者振。更加以參。則脈不沈不遲。表不虛。合內外同歸於和。此二方去參。加參之所以然。而徐氏。鄒氏未見及此。不知參者。善和陰陽。專用以和正。不用以驅邪。於驅邪之中。而加以參。稍一不當。害即隨之。故必得如新加湯。驅邪之他藥。不致以人參墮其功。和正之人參。且能爲他藥弭其隙。始爲真知滲而用之無誤。況邪正之分合。當以去某經入某經。及病氣之進退衰旺爲言。不當以一證一脈。判邪正定分合。傷寒之邪。不與正俱陷。而終駐於表者。未之有也。何鄒氏之疏耶。

傷寒溫熱兩證。參之出入關係極重。仲聖之法亦極嚴。後人得之則效。失之則不效。竟有彰彰難掩者。試更詳之。傷寒有表證者。仲聖絕不用參。不特麻黃大青龍桂枝等湯。絲毫不犯也。卽小柴胡湯。外有微熱。亦且去之。瀉連湯。有桂枝而並無表證。桂枝人參湯。有表證而參不以解表。柴胡桂枝湯。表裏之邪俱微。故表裏兼治。表裏兼治。故用參以和之。此傷寒定法也。溫熱病。仲聖不備其方。而要旨已昭然若揭。廣苓湯。後世奉爲溫病之主方。未嘗有參。白虎湯。治陽明熱盛。效如桴鼓。亦未嘗有參。必自汗而渴且無表證者用之。此溫熱定法也。迨自隋唐而降。仲聖法漸置不講。相傳之方。如活人書之人參順氣散。獨活散。未見有宜用參之候。許叔微以白虎湯爲治中喝而不加參。皆誠有可議。然其他變仲聖方而不失仲聖法者。不可勝舉。如以羌防取傷寒之汗。葛根取溫熱之汗。俱不佐參。其佐參者。五積散邪兼表裏。攻其邪復和其正。活人根湯則以渴甚。參蘇散則以脈弱。升麻葛根湯則以脈弱而渴。至瀉欬。欬治風熱項強急痛四肢煩熱。參似不宜矣。而以葛根散外。萎欬清裏。因風熱燥津。故加入參以和表裏而生津。凡襲用之佳方。未有能出仲聖範圍者。至敗毒散。方喻西昌以治其時大疫。倍加入參得效。則非法之法。仍以仲聖方爲根據。何以言之。乃書有無人參者。其原方本有人參。無表裏上下應和之故。而欲扶正以驅邪。過矣。

蓋值饑饉兵燹之餘。正氣既敗。幸其虛非勞損之虛。又用之於羣隊表藥。補之所以有功。仲聖以白虎湯治中暯。因虛而加滻。正是此意。然傷寒有表證之虛。與溫熱身熱之虛不同。爲禍爲福。消息甚微。審辨不易。彼於原方刪人參者。其亦有見於此矣。以上所言人參之治。惟真正大參。試之甚驗。若今之黨參。有甘無苦。何能與人參比烈。卽別直等參。亦未足言沖和煦育之功。要其爲補。皆與人參相近。故防誤用之弊。亦當與人參並視也。

沙參

本經沙參主血積驚氣除寒熱。血積二字。惟徐氏最爲得解。云沙參爲肺家氣分中理血之藥。色白體輕。疏通而不燥。潤澤而不滯。血阻於肺者。非此不能清之。曰理血。曰血阻。曰清之。恰合沙參治血之分際。與桃仁爲肺藥而主瘀血之閉者。大有不同。熱傷其氣。斯氣阻而血亦阻。心以擾亂而有驚氣。營衛愈其度而有寒熱。非甚重之證。故得以沙參主之。溯錄演之爲療胸痹。則失其實矣。

沙參生於沙磧而氣微寒。色白而折之有白汁。莖抽於秋。花開於秋。得金氣多。味微甘。則補肺中之土。微苦。則導肺氣而下之。金主攻利。寒能清熱。復津潤而益陰。故肺熱而氣虛者得之斯補。血阻者得之斯通。驚氣寒熱。咸得之而止。

肺惡寒。欬嗽由肺寒者多。故徐氏戒用沙參。然衛生方用沙參一味治肺熱欬嗽。曰肺熱則有風寒外感與素有內寒者。自不相宜。若用於肺熱何害。

○桔梗

桔梗能升能降。能散能洩。四者兼具。故升不違升柴。降不違枳朴。散不違麻杏。洩不違硝黃。蓋其色白味辛氣微溫。純乎肺藥。(肺惡寒惡熱)而中心微黃。味又兼苦。則能由肺以達腸胃。辛升而散。苦降而洩。苦先辛後。降而復升。展轉於咽喉胸腹腸胃之間。本經所以主胸腹痛如刀刺。腹滿腸鳴幽幽。別錄所以主利五藏腸胃咽喉痛也。

桔梗實不入腎。仲聖桔梗湯治少陰病咽痛。是腎家邪熱循經而上。肺爲熱壅。以桔梗開提肺氣。佐甘草以緩之。自然熱散痛止。並非治腎。鄒氏之論極是。氣爲血帥。氣利則血亦利。故桔梗湯並主血癆。推之排膿與治肺癰治結胸。仲聖諸方無不與本經吻合。卽肘後方治腸內瘀血。丹溪治痢疾腹痛。亦祇如其分以任之耳。物理至微。古聖何能盡言。得其旨而擴之。方爲善讀古書。陽老舟楫之劑載藥不沈之說。大爲張隱菴所訾。其實桔梗降而復升。性與肺比。不易下沈。外科於上焦癰瘍。所以非此不可。洞溪評外科正宗無異言。且陽老以爲舟楫之劑者。與甘草同用也。

桔梗得甘草。自更羈留於上。名之爲舟楫何害。至備要表散寒邪一語。桔梗豈勝發汗之任。驟閱之不無可詫。然古方表劑固多用之。蓋其開提氣血。通竅宣滯。與羌防橘半等爲伍。殊有捷效。鼻塞尤宜。惟屬以偏裨之任則可。若竟恃爲表劑。則不能無弊。又徐氏謂欬證用桔梗。是宋以後法。升提究非所宜。不知肺苦氣上逆。而氣逆之因不一。若肺感風寒。氣不得宣而逆而欬。非開肺鬱而提出之。曷云能瘳。況桔梗白散治欬而胸滿。載在外臺。洄溪蓋嘗譏糜氏未閱外臺者。何遂忘之。而謂是宋後法也。

桔梗與芍藥。皆能治痢疾腹痛。惟桔梗是治肺氣之鬱於大腸。散而上行。芍藥是治脾家血中之氣結。破而下行。若非滯下之痢。二者皆不相宜。傷寒金匱兩書。凡云利者。卽是瀉。非今之所謂痢。痢則必加下重字以別之。故真武湯若下利者去芍藥。四逆散治泄利下重不去。通脈四逆湯治下利清穀本無芍藥。腹中痛始加之。以其爲腹附之佐。於裏寒無傷也。咽痛去之者。芍藥不能散上結之陽也。桔梗之加。全爲咽痛。雖不治利而利時不去。與芍藥不去之意正同。利不止。無怪脈之不出。利止而脈不出。則桔梗之散。大有妨於生脈。與芍藥之有妨咽痛亦同。故必須去之。而加生脈之人參。此仲聖或去或加之所以然也。鄒氏不達。而謂芍藥止腹痛下利。桔梗亦止。

腹痛下利誤之至矣。

○知母

知母爲肺胃腎三經清氣熱之藥。潔古東垣丹溪咸以知母與黃柏爲滋陰之品。後人遂視爲補劑。知母之潤雖不似黃柏之燥。然寒滑下行使熱去而陰生則有之。究無補性能益陰之不足。卽以瀉邪火亦當適可而止。否則降令太過。脾胃受傷。真陽暗損。誠有如李漁所言者。

知母本經主消渴。千金外臺固恒用之。仲聖則更有精焉。止渴如五苓散。猪苓湯。次蛤散皆無知母。白虎湯有知母而無渴證。加人參乃始治渴。蓋以陽明熱盛。清熱誠要。然膚知無益陰生津之能。於清熱之中再加以人參。則病去而正卽復。其用意之周。市千金外臺且遜之。況他人乎。

桂枝芍藥知母湯。仲聖之用知母。卽本經所謂除邪氣肢體浮腫下水者。鄒氏解之。但以知母爲治火阻於下。則未免膚淺。試歷引他說以補之。張隱庵云。知母皮外有毛。故除皮毛之邪氣。肉厚皮黃。兼得土氣。故治肢體浮腫。張石頤云。除邪氣肢體浮腫。是指溼熱水氣而言。葉香巖云。腎惡燥。燥則開闔不利。而水反蓄。知母寒滑。滑利關門而水自下。合觀三說。而此方之用知母。可曉然矣。

白朮

鄒氏云。脾主升舉清陽。胃主通降濁陰。皆屬土而畏溼。朮開花於初夏。結實於伏時。偏於溼熱瀰漫之際。顯其有猷有爲。確知其入脾胃能力固中氣。外禦溼侮矣。劉氏亦脾胃同論。而以爲先胃而後及脾。張隱菴則專主益脾而不及胃。竊思胃爲陽明燥金。脾爲太陰溼土。土必名溼者。即隱菴所謂土有溼氣。始能灌漑四旁。如地得雨露而後發生萬物也。白朮味甘多脂。有似溼土。非脾之正藥而何。其肉白老則微紅。味復帶辛。故能由脾及胃而達肌表。別錄云。煖胃潔古云除胃熱。皆是除溼土之或過功效所及。非主治其胃也。

白朮除脾溼。固中氣。爲中流之砥柱。其散表邪。非輔以麻黃桂枝附子之屬。不能由肌肉而透皮毛。蓋其味厚而甘。擅長於守也。麻黃桂枝附子爲走表散風寒之劑。加以白朮除溼。則爲治風溼治寒溼。無溼不加。故麻黃桂枝附子多用於傷寒太陽病。而朮惟有水氣始用之。鄒氏云。仲景治風寒溼痹方。多有不用朮者。以朮於風勝溼勝者爲最宜。寒勝者差減。蓋風勝必煩。溼勝必重。金匱中治療用朮諸方。非兼煩必兼重。或云身煩疼。或云身體疼煩。或云骨節煩疼掣痛。或云身重。或云腹重。或云頭重。或不煩不重。而云身體疼手足寒骨節痛。是析風與溼與寒而三之矣。不知仲聖

方言煩者未嘗不兼溼。言重者未嘗不兼風。言寒者未嘗不兼風與溼。覈諸本經。主風寒溼痹。無不脗合。鄒氏徒泥於字面。而不知細審。遂並白朮性用。而胥失之矣。凡仲聖方用桂至四兩。必爲利小便與下腎邪。桂枝附子去桂加白朮湯。又明云大便鞭小便自利去桂。大便不鞭小便不利。當加桂。是桂枝之能利小便無疑矣。乃尤氏解此方云。大便鞭小便自利。知其人在表之陽雖弱。而在裏之氣自治。則皮中之溼。所當驅之於裏。使水從水道而出。不必更出之表。以危久弱之陽。故去桂枝之辛散。加白朮之苦燥。合附子之大力健行者。於以並走皮中逐水氣。夫去桂以小便利也。今去桂而猶欲驅溼從水道出。不知其意何居。況旣云當驅之於裏。不必更出之表。而又云加白朮合附子。以並走皮中逐水氣。不仍出之於表乎。是尤氏於本條語意。全未體會。鄒氏之說。差勝於尤。而亦未見其當。其解去桂加朮也。曰。脾健則能制水。水在內能使下輸膀胱而大便實。水在外能使還入胃中而大便濡。夫謂使在內之水下輸膀胱。實非朮之能事。仲聖加朮。正取其不利小便。謂使在外之水還入胃中。則殆以大便鞭而更崇其土。理不可曉。作此當然之想耳。按仲聖云。三服盡其人如蝟狀勿怪。此以朮附並走皮中逐水氣未得除。故使之耳。可見朮附並用。是使水從表除。不從裏泄。卽水不還入胃中之據。或謂如大便鞭何。曰。小便數者大便必鞭。

此小便自利卽小便數也。皮中之水不當留而留。水府之水當留而不留。脾不舉其職而腸胃與膀胱之傳化咸乖矣。去桂加朮則小便節而本有之津液不隨之而亡亦脾職復而後致之津液可由是而裕。水溼外除津液內蒸誰謂白朮之加不足以濡大便哉。

白朮大明主反胃利小便潔古主生津止渴殆不善會仲聖方而致誤耳。五苓散藥止五味而交相爲用。中多奧旨。夫所謂脈浮發熱者表證也。煩渴小便不利者裏證也。太陽表邪化熱傳本因而渴飲因而水蓄不化因而小便不利解表止桂枝一味治裏亦第利水而不滌熱且利水用至四味不更助燥增熱乎。要知表未全解尙屬陽中有陰不似陽明病可任寒藥。水爲陰邪非辛甘溫不化桂枝雖不以利水而化氣必藉桂枝。豬苓茯苓亦太陽藥協桂枝則利水而亦解表五味分兩皆甚少且以散服多飲煖水爲出汗計者至矣而治裏之法卽具於其中桂枝最少欲其達表澤瀉最多取其鹹降更以白朮一味益中氣收水溼安靖上下而後表無不解水無不行表解水行則熱自撤渴自止若謂朮能止渴利小便則實非其所長茯苓澤瀉湯治胃反吐而渴欲飲水胃反是脾傷不磨並挾飲邪故以白朮健脾勝水非以止胃反生薑半夏爲治嘔吐之專藥方有生薑無半夏者以渴忌半夏也白朮味甘多脂

原能生津。觀桂枝附子去桂加白朮湯之治大便鞭可見。然其性燥。用於有水溼之證。誠能使脾運而津生。若陰虛津枯。責效於白朮。則白朮謝不敏矣。

朮之或去或加。見於理中丸者爲多。欲明用朮之道。於此求之。思過半矣。曰。臍上築者腎氣動也。去朮加桂四兩。腎氣動。是欲作奔豚之徵兆。以桂四兩降而泄之。原有成法。見於傷寒金匱兩書。加桂可矣。去朮何爲。夫土能制水。故干金以白朮治髓溢。似此證正宜崇土。然朮能禦之不能泄之。不去朮。則朮橫亘於中。足以掣桂之肘。此加桂所以必去朮也。曰。吐多者去朮加生薑二兩。下多者還用朮。豬苓湯五苓散茯苓澤瀉湯。皆有吐不去朮。生薑瀉心湯黃芩湯四逆湯白通湯。皆有下利不用朮。茲何爲不然。不知此爲寒霍亂言耳。吐多者吐多於下。下多者下多於吐。吐多於下。則裏溼尚輕。而胃逆爲甚。加生薑是以辛散之。去朮爲甘壅也。下多於吐。則脾溼重矣。健脾除溼。非朮不可。故吐多去之。而下多必還用之。曰。渴欲飲水者加朮。足前成四兩半。朮非治渴之物。此不特不去而更加於前數何故。蓋理中所以溫中。所以治寒。多不用水之霍亂。今渴欲飲水。自非燥熱之渴。乃因吐利重喪其津。而脾弱不振也。是雖有參以生津。而參以氣勝。朮以味勝。培中土而滋化源。朮爲得力。故不加參而加朮也。曰。腹滿者去朮加附子一枚。洄溪謂陽虛。尤氏謂氣滯。鄒氏謂脾實。

按證是脾寒。金匱有腹滿爲寒之文。又觀所加爲附子。其爲陽虛無疑。若是脾實。則當與以厚朴七物。大柴胡大承氣之屬。與此懸絕矣。四逆溫腎用薑附。此溫脾亦用薑附。蓋腎寒陽虛必侵及脾。故以薑輔附。脾寒陽虛其源由腎。故以附輔薑。其必去尤者。陽虛必氣滯。白朮甘壅。去之爲宜。是則尤說爲尙得其半也。

別錄尤除心下急滿一語。須連上消痰水看。然尤不能獨任其責。亦惟中虛者宜之。金匱云。病痰飲者當以溫藥和之。苓桂朮甘湯。四味皆相協以成功。無一味可缺。用於傷寒。則茯苓增一兩以急下其水。白朮減一兩以微損其壅。爲其氣衝故也。而要非吐下之後。未必以尤補虛。桂枝人參湯。證兼心下鞭痞。而其用尤也。以數下之後利下不止。虛亦甚也。惟桂枝去桂加茯苓白朮湯。表證未罷而去桂。心下滿痛而加朮。幾令人不解。然服桂枝湯或下之。雖不切中病情。而病氣亦已衰矣。頭項強痛翕翕發熱。而脈不浮。亦不惡寒惡風。翕翕乃微開微闔之象。是未可與頭痛發熱並論者。獨水停心下滿而微痛無汗而小便不利邪。無從出。爲是證之關鍵。蓋太陽爲寒水之府。頭項乃太陽經脈之所至。若非水停心下。前服桂枝湯卽強痛可除。其不除者。半由寒水之不行也。桂枝一味無汗固忌。不治表亦無需乎。桂。故去之。利小便當首推茯苓。故加之。水氣因陽氣不充而停。不益其氣。病機不轉。尤益氣而除溼。

故加之。雖然。甘壅之尤。非滿痛之心下所宜。其所以得收其效者。獨賴有芍藥以斂之耳。況尤爲脾家準對之藥。得芍藥自疾趨而入脾。得茯苓又相協而利水。水行則滿痛必除。太陽之微邪。何至仍踞於表。甘草乃白尤補虛之佐使。薑棗調營衛。使邪無所容。亦足代桂枝而實力。尤固不能獨治心滿也。

別錄尤主大風在身面。其所謂風。卽海藏謂尤補肝風虛之風。劉氏云。陽虛陰蓄。久而陰不化。則陽從之而化風。是謂風虛。又云。陽蓄陰中。則氣虛。氣虛則生溼。是尤之治風。仍不離乎溼。金匱附近效尤附湯一方。卽治風虛之證也。別錄又主風眩頭痛目淚出。下句接以消痰水。蓋以風眩本於痰水。消痰水卽所以治風眩。鄒氏謂溼與水與飲是一源三歧。歷舉金匱治眩與治溼治水各方以證之。並謂本經止汗除熱。多係風溼相搏之證。如五苓散防己黃芪湯甘草附子湯。皆止汗除熱之驗。而不得用於溫熱之汗出身熱。洵屬確論。然其於金匱有不得其解者。謂小半夏加茯苓湯。治飲眩而不用尤。以心下痞故。夫小半夏湯治嘔吐之方也。藥止三味。而必以小半夏加茯苓名之。明乎此。以止嘔吐利水爲治也。雖然。嘔吐因膈閒有水。因膈閒有水而眩悸。皆尤所宜從事。卽心下痞因飲而得者。亦何嘗忌尤。乃絕不許尤闌入其間。誠不可解。愚蓋細思而得其故焉。仲聖下字皆極有斟酌。嘔吐而曰卒。卒字詎容忽

過。嘔吐由於卒致。則必膈閒本無宿水。或因清陽偶弛。飲停不化。遂胃逆而爲嘔吐。脾固無恙。無慮其虛。以薑夏宣陽降逆於上。茯苓利水於下。足以療之而有餘。若再以甘瀉之尤。橫於膈閒。則非徒無益而又害之矣。枳實薤白桂枝湯之治胸痹也。曰人參湯亦主之一。證而虛實不同。藥即攻補相反。尤之宜與不宜。不益可見設。

○黃連

王海藏云。黃連瀉心實瀉脾。劉氏釋之。謂中土爲心之用。心之用病卽病乎心。是以心病統歸之脾病矣。脾病固能傳心。心病豈不能傳脾。夫苦入心火就燥。黃連苦燥而寒。誠爲手少陰除溼熱之藥。而其花黃實黃根黃。脾與腸胃亦皆其所司。特氣味俱厚。惟治血熱不治氣熱。故其功用首在心脾。次及腸胃。腸胃所治。亦屬血中之熱。肝腎亦得以黃連治者。蓋其莖葉隆冬不凋。根則狀如連珠。稟寒水之氣而直抵極下也。其爲入血更不待言矣。

本經黃連主腹痛。黃芩不主腹痛。顯以黃連爲足太陰藥。金匱小柴胡湯腹中痛去黃芩。黃連湯腹中痛不去黃連。正與本經適合。然黃連湯是以乾薑人參治腹痛。黃連半夏治嘔吐。(說詳大棗)嘔吐爲胃病。而胃熱必侵其脾。故腹痛亦非純寒之證。兼有藉於黃連。黃連所以標方名者。以病由胃中有邪氣。明黃連之所獨擅也。

氣痞

諸瀉心湯。大黃黃芩或用或否。黃連則無不用。心痞固非黃連不治。與乾薑並用。則爲除胃熱之心痞。倚任之重厥。由於是。乃大黃黃連寫心湯。附子瀉心湯。名爲瀉心。而加以大黃蕩實。幾令人疑。然而無庸疑也。二物同能瀉心。同能除胃熱。惟黃連燥而不走。協大黃則走。瀆以麻沸湯而不煎。且須臾絞汁。不使藥力得盡。正是攻氣痞之妙法。他處用以蕩實者。曾有是乎。尤在涇云。陽經之寒變爲熱。則歸於氣。陰經之寒變爲熱。則歸於血。陽經之熱。或有歸於血者。陰經之熱。則必不歸於氣。此卽陰經方與論。固兩相讎對矣。至附子瀉心湯。寒熱互治。人所易曉。獨又加黃芩何耶。蓋附子氣藥。浮中沈無所不至。劉河間所謂烏附氣暴能衝開道路者。以大黃黃連攻痞而下泄。附子扶陽而上行。譬之剝匪。夾擊之後。保無有餘匪之竄逸者。加黃芩。所以除氣熱之由夾擊而致者也。凡仲聖方計慮之周。類多如是。何見及者之鮮哉。以大黃輔黃連之不逮。推其法以治滯下。變瀆爲煎。亦屬大妙。張潔古製芍藥湯。用黃連木香於芍藥大黃之中。頗得仲聖之意。直指之香連丸。則少遜矣。蓋黃連苦燥。木香苦溫。皆氣味俱厚。二物並用。未足以相濟而不免於實腸。劉氏甚贊此方。謂氣

虛而有熱者。舍寒涼無以爲治。但寒涼必益其虛。和以木香。則寒涼更得奏功。竊謂木香固能調氣。然不能調氣虛有熱之氣。卽寒涼藥。黃連與大黃亦殊不同。繆氏論木香云。肺虛有熱者慎毋犯之。劉氏何不審之甚。抑黃連丸在直指。不得謂無深慮也。黃連二十兩。以吳茱萸炒令赤去。吳茱萸不用。木香四兩八錢。不見火。醋糊丸。配合炮製。悉有法度。總不欲以苦燥苦溫之性滯於腸間。後人紛紛加減。大失其旨。粗工又於病者初起而用之。閉門逐賊。鮮有不蒙其害者矣。

昔人以芍藥治腹痛爲土中瀉木。余主鄒氏破陰結之說。獨謂以木疏土。(說詳芍藥)

若黃連治腹痛。眞乃土中瀉木矣。夫肝與膽爲表裏。熱必屬膽。寒必屬肝。熱而不上衝。則爲肝陽乘脾。腹乃作痛。左金丸治脇痛之方也。而以治腹痛極效。抑清丸亦然。一以吳茱萸一兩佐黃連六兩。一以吳茱萸湯浸黃連一宿。蓋肝主疏泄。二味合用。使肝熱下泄而脾土得安。此固爲土中瀉木矣。卽就黃連思之。黃爲燥金。苦能達下。亦具有制木之義。第以吳茱萸佐之。更開其去路耳。

黃連之用。見於仲聖方者。黃連阿膠湯瀉心陽。治心也。五瀉心湯黃連湯乾瀉黃連黃芩人參湯。治胃也。黃連粉治脾也。烏梅丸治肝也。白頭翁湯葛根黃芩黃連湯治腸也。其制剂之道。或配以大黃芍藥之泄。或配以半夏桔梗實之宣。或配以乾瀉附

子之溫。或配以阿膠雞子黃之濡。或配以人參甘草之補。因證制宜。所以能收苦燥之益而無苦燥之弊也。

黃芩

人知黃芩爲少陽藥而不識其所以然。竊思其色青勝於黃。得甲膽之氣。又中空似膽府。氣寒能清膽熱。膽屬少陽相火。相火者佐君而行其令者也。人賴此火以動作云爲。故氣分之熱。少陽爲多。治氣熱之藥亦惟黃芩爲方中易見。

金以黃爲貴而黃屬土。黃其土金相兼之德。故黃芩亦入肺胃與大腸。表裏之熱無不能解。本經所以主諸熱黃疸腸澼泄利也。

黃連入心脾而心脾皆主血。黃芩入膽肺而膽肺皆主氣。鄒氏三耦之說全然未當。即如黃芩湯是用黃芩清少陽氣熱。其加芍藥亦非用以入血。說詳芍藥。

本經黃連主腸澼腹痛。黃芩主腸澼不主腹痛。觀仲聖黃芩湯黃連湯之治正相符合。蓋腹痛爲太陰病。或寒或熱。必涉於血。黃連入脾清血熱而兼入心胃。故治腹痛亦治腸澼。廣芩爲膽經氣藥。能由肺達腸胃而不能入統血之脾。故治腸澼不治腹痛。潔古以爲治脾溼者未之詳審也。

柴胡

人身生發之氣全賴少陽。少陽屬春。其時草木句萌以至鬯茂。不少停駐。然當陰盡生陽之後。未離乎陰。易爲寒氣所鬱。寒氣鬱之。則陽不得伸而與陰爭。寒熱始作。柴胡乃從陰出陽之藥。香氣徹霄。輕清疏達。以治傷寒。寒熱往來。正爲符合。鄒氏所謂鬯鬱陽以化滯陰也。

凡證之涉少陽者。不獨傷寒也。如嘔而發熱。嘔屬少陽也。熱入血室。寒熱有時屬少陽也。（論凡三條惟此用小柴胡湯）大柴胡湯下用柴胡。心下滿痛屬少陽也。至治勞用柴胡。寇氏執定虛損而受邪熱。有熱者始可瀕湖駁之。則以勞在少陽與他經有熱者悉宜之。鄒氏又以二家之說皆似勞非勞。如金匱所謂五藏虛熱之熱。其虛勞之宜柴胡與否。仍置不論。竊謂虛勞而用柴胡。仍當以少陽爲斷。少陽與厥陰離合。祇在幾微。熱則爲少陽。寒則爲厥陰。有寒有熱。則爲少陽兼厥陰。虛勞有損及肝者。其脈必弦。弦脈亦屬少陽。仲聖薯蕷丸有柴胡。何嘗不治虛勞。何嘗有發熱之外證。再核之保命集之柴胡四物湯。局方之逍遙散。一治虛勞寒熱。一治血虛寒熱。皆病之涉少陽者。薯蕷丸何獨不涉少陽。卽四時加減柴胡飲子。退五藏虛熱。虛鄰於寒。虛熱與盛熱自殊。正少陽之分際。盛熱則不可以柴胡治矣。

孫琳以柴胡治勞瘧熱從髓出。雖骨髓爲肝腎所隸。而瘧發於膽。膽與肝爲表裏。故

少陽之氣治。則骨髓之熱已。推之聖濟總錄治小兒骨熱潔古謂產後血熱必用。皆有少陽相關之理。蓋小兒之陽。陽而稚者也。產後之血傷及肝膽者也。扶其生氣。正惟柴胡爲當。特不善審證製劑而第恃此物。則失之遠矣。

昔人用柴胡之方。不勝枚舉。不必皆柴胡知已。而用之而有效者。非無故也。試卽東垣補中益氣湯言之。少陽之火。卽氣食少火之火。少火者。不寒不熱。脾得之而升。肺得之而降。過寒過熱。皆能犯胃作嘔。胃豈可升。其氣之陷者。實少火之不足也。柴胡升少陽而使適於中。則少陽自遂其生生之性。而脾肺悉受其蔭。此卽十一經取決於膽之謂也。東垣以柴胡爲升陽明之清氣。而後人遂沿其誤。治本草者。盡深究之。本經柴胡去腸胃中結氣。謂大柴胡湯用柴胡卽去腸胃中結氣。原非不是。然諸承氣湯何以俱不用柴胡。本經所主。亦非專屬腸胃。夫大柴胡湯之爲治也。在金匱曰。心下滿痛。在傷寒曰。嘔不止。心下急鬱鬱微煩。曰。熱結在裏。復往來寒熱。其用柴胡。豈祇爲腸胃中有結氣。洄溪疏柴胡。謂本經治效皆主腸胃。已不善會本經。而又以爲腸胃藥非少陽藥。則尤可異之至。洄溪不旣云木能疏土乎。柴胡惟能達少陽之木氣。而後少陽得於腸胃。疏其頑土。本經蓋就愈病之所言之。非謂柴胡不入少陽也。洄溪亦自相徑庭矣。

白鮮皮

白鮮之根作羊羶氣。羶屬風。宜治在下之風矣。而其根於四五月花開之後。卽虛無用。是未花之前。其氣上注必力。且採於二月風木司令。自於治頭風極合。至味苦化燥。氣寒已熱。又能於溼熱大展其用。治淋瀝陰腫者。根走極下之驗也。治黃疸溼瘍者。皮走肌肉之驗也。治四肢不安。腹中大熱飲水者。皮黃白入肺胃之驗也。用之於溼熱。不必挾風。用之於風。不必挾溼。而必挾熱。否則於是物無當矣。

龍膽

黃芩主少陽之經熱。竹茹主少陽之府熱。龍膽則主由少陽入厥陰之熱。其味苦中有濇。苦主發濇。主收。卽發卽收。其用在少陽者少。在厥陰者多。故用龍膽者皆取其瀉肝。凡肝之熱。有本藏挾膽而熱者。有爲膽所侵侮而熱者。龍膽治膽侮肝之熱。能內極於骨間。謂之治肝無愧。以其未全離少陽。故瀉肝之氣熱不瀉肝之血熱。龍膽之名所由來也。

芍藥

芍藥十月生芽。正月出土。夏初開花。花大而榮。正似少陽漸入陽明。故得木氣最盛。根外黃內白。則爲具木氣於土中而土生其金。金主攻利。又氣味苦平。故能入脾破

血中之氣結。又能斂外散之表氣以返於裏。凡仲聖方用芍藥不越此二義。以此求之方得。

芍藥別錄酸微寒。隱晦輩多議其非。今取嚼之。卻帶微濁。濁者酸辛之變味。況同一物而氣質有厚薄。安知古之不異於今。卽本經之苦平與酸微寒並體之。皆不外斂之與破。識得芍藥之用。而無謂之吹求可已矣。

鄒氏於仲聖方之有芍藥。處處以破陰結解之。支離殊甚。桂枝湯因衛氣外洩。不與營和。故於桂甘溫經驅風之中。用芍藥攝衛氣就營氣。營氣本未嘗結。何待於破。此斂之義也。當歸芍藥散治腹中痞痛。此破之義也。桂枝加芍藥湯治腹滿時痛。此斂與破兼者也。（滿須斂。痛須破）何可執破陰結一說。以概諸方。

腹痛爲太陰血中之氣結。芍藥以木疏土而破結。故爲腹痛專藥。（謂於土中瀉木者猶屬隔膜之論）下利乃陰氣下溜。土德有慚。豈堪更從而破之。故下利斷非所宜。若滯下之利。則正宜決其壅滯。芍藥又爲要藥。糜古芍藥湯用之而以名方可謂得仲聖心法矣。

仲聖黃芩湯治下利何以有芍藥。蓋太少合病邪已近裏。無用葛根湯之理。治之宜從裏和。黃芩清少陽之熱。而其氣輕。加芍藥以斂之。甘草以固之。則裏和而利止。且

太少合病。則病氣未肯驟下。欲其裏和。焉得不斂。芍藥之不可少如是。

甘遂半夏湯證。曰脈伏。欲自利。利反快。雖利心下續。堅滿。脈伏者。有留飲在內。欲自利。利反快者。利不卽利。旣利則快。心下續。堅滿者。利後滿減。過時又續。顯係內有停阻。與滯下無異。芍藥能破堅積。正其所宜。且以甘遂逐在上之留飲。而又以芍藥斂而降之。則上下之邪盡去。用芍藥之妙有如此。而注家從未見及。可異也。

芍藥甘草附子湯證。曰發汗病不解。反惡寒者虛故也。虛者陽虛。汗後氣已外散。故以附子扶陽。以甘草補中。芍藥斂其外散之氣。方義易見。而鄒氏以芍藥甘草爲得桂枝湯之半。盡太陽未盡之風邪。此與桂枝湯何涉。且以芍藥甘草當桂枝湯之用。不可謂非妄矣。

芍藥爲太陰血中之氣藥。不能破血中之血結。且味濁則破而不洩。故凡下瘀血之方。芍藥得廁其閒者。皆偏裨之任也。

芍藥若用爲補劑。必配合得宜。如四物湯之類。方能獲益。辛祐之患消渴九年。止而復作。蘇朴授以芍藥甘草等分。爲末。煎服。七日頓愈。陳日華謂古人處方。殆不可曉。實則無不可曉也。殆善師成無己酸以收之。甘以緩之。酸甘相合。用補陰血。斂逆氣。除肺燥之意耳。此最得用補之妙法。單用詎能卽補。古謂入脾經補中焦。東垣謂

色在西方故補。皆足貽誤後人。洄溪又但以爲養肝之聖藥。其亦昧之至矣。古有減芍藥以避中寒之說。寇氏然之。謂氣虛禁用。此亦仲聖早有以示人者。傷寒太陰篇云。太陰病脈弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者宜減之。以其人胃氣弱易動故也。以芍藥與大黃並稱。即可知芍藥之爲芍藥。胃弱宜減。更可知應用而尙不可多用。何後人直以爲補劑而不加深考耶。

胃弱旣宜慎矣。乃防己黃芪湯下云。胃中不和者加芍藥三分。則何以解之。夫芍藥者。能斂外散之氣以返於裏者也。風溼脈浮身重汗出惡風氣之外散爲何如。故其證有兼喘者。有兼氣上衝者。和胃非他。斂胃氣使下降耳。豈芍藥而有和胃之專長。又肺與腸胃皆一氣直下。芍藥能斂氣入裏。卽能下歸腸胃。故芍藥爲脾藥而兼爲肺藥爲胃藥也。

牡丹

心爲牡藏主血脉。牡丹色丹屬心。氣味辛寒。故能通血脉除血熱。辛寒兼苦。直抵下焦。故又瀉腎藏陰中之火及肝熱之由腎而致者。本經除癥堅瘀血留舍腸胃。蓋丹皮非腸胃藥。而腸胃有癥堅瘀血留舍則治之。義至精而至確也。

丹皮與大黃桃仁芒消。皆能治下焦血分之病。而仲聖方或四物並用。或有大黃桃

仁芒消而無丹皮。或有丹皮而無大黃桃仁芒消。或有大黃桃仁而無丹皮。芒消用舍之間。詎無深意。竊嘗玩索而得之矣。大黃桃仁芒消。是治客熱傳入之血結。病之驟得者。丹皮是治陰虛生熱之血結。病之漸致者。大黃芒消丹皮並滌血熱。而大黃下奪而厲。芒消鹹降而濡。丹皮去瘀生新而養陰。堪入於補劑。桃仁獨不涼血。而破由氣入血之閉滯。此四物功用之同而不同也。大黃牡丹湯。癰膿在大腸。丹皮冬瓜仁。乃治此證之專藥。大黃桃仁芒消。則因發熱惡寒。必其始有外邪入裏。用以下奪而加之。故四物皆不可少。桃核承氣湯。表證未解而熱結膀胱。宜大黃桃仁芒消。亟攻其邪。而無庸丹皮之養陰。溫經湯。病屬帶下而血瘀少腹。治以化氣調經爲主。丹皮兼疏其瘀。而無取大黃桃仁芒消之傷正。桂枝茯苓丸。大意與溫經湯無異。而下癥以止漏。下癥爲重。故用丹皮又加桃仁。二物性皆柔緩。不傷胎氣。若大黃芒消之鹹苦下泄。則非所宜也。下瘀血湯。產婦有瘀血著臍下。非陰虛血熱之比。無需乎丹皮芒消。旣服枳實芍藥散而不愈。自非大黃不能下奪。桃仁驅蟲逐瘀而不峻。於產婦最宜。雖用大黃而蜜丸酒煮。用緩其性。仍所以顧產後之虛也。知此五方用舍之道。而餘如鼈甲煎丸腎氣丸。可類推矣。

卷二

木香

用木香者多取其調氣。顧其氣味辛溫而厚。不無重濁之嫌。黏牙而苦。亦少宣泄之力。故必陰中伏陽之證。如本經所謂毒疫溫鬼者。最爲相宜。否則一切純寒無熱之氣滯等證。佐以生薑橘皮。亦收殊效。世有以香連丸治病而害卽隨之者。非木香之過。而用木香者之過也。

木香非血藥。而有時血亦蒙其利者。則於歸脾湯見之。歸脾湯證爲脾氣虛寒。不能攝血。其方用心肝脾三臟之藥。不爲不多。獨有統率全方者三物。遠志醒心之陽。棗仁斂肝之陰。足爲血之前導。然導之至脾。而脾之閉拒如故。則亦徘徊門外耳。木香者。能於脾中行陽。陽一動而薰然以和。血乃歸於其經。是木香者啓脾之鑰也。其能溫氣以蔭血者如是。

補骨脂

按開寶補骨脂主治。以五勞七傷冠首而踵以風虛冷。是風虛冷由五勞七傷而致也。再繼之以骨髓傷敗腎冷精流。又由風虛冷而致也。夫腎家之風。有因熱而生者。

如天麻丸之用草薢。元參生地黃也。此則因虛冷而生風。故宜以味辛大溫之補骨脂拯之。虛冷生風之候。喻西昌所謂兩腎空虛。有如烏風洞。慘慘黯黯。漫無止息者是也。

○薑黃 鬱金

唐本草於鬱金曰。辛苦寒甚。是於薑黃曰。辛苦大寒。其實溫而非寒。惟以爲大寒。故云除風熱。鄒氏不察。亦沿其誤。並以薑黃主心腹結積。爲治在上。鬱金主血淋尿血。爲治在下。意在求精求切。而不知其實非也。

薑黃辛苦溫而色黃。故入脾治腹脹。片子薑黃兼治臂痛。是爲脾家血中之氣藥。鬱金辛苦寒而外黃內赤。性復輕揚。故入心去惡血。解心包絡之熱。其治淋血尿血。與婦人經脈逆行。皆相因而致之效。是爲心家之血藥。此皆歷試不爽者。唐本草可不必過執矣。

○荆芥

考古治頭項風強。一切偏風中風口噤。及吐血衄血下血。多重任荆芥。是其所司。總不離血中之風。能於血中散風。卽係於血中行氣。海藏故謂之肝經氣藥。但肝經之氣。不能不涉及少陽。本經所主鼠瘻瘍瘻。卽少陽病也。

荆芥散血中之風爲產後血運第一要藥。其芳溫之性。又足以療癰瘍瘡疥。然無非利血脈去風毒而已。

謂荆芥爲溫升則兼涼降。爲涼降則兼溫升。要其溫勝於涼。氣亦帶濁。於外感風寒用之。必涉血分頭目昏眩者始得。永類鈐方治風熱頭痛。與石膏辛涼之味等分爲末茶調下。製劑亦妙矣。

薄荷

薄荷。唐本草治賊風傷寒發汗。食性本草治陰陽毒傷寒頭痛。蘇頌王好古亦皆謂治風寒。外此諸家則皆謂治風熱。究將何從。考古方多用於風熱。鮮用於風寒。煮汁飲之。則潔古所謂去高巔及皮膚風熱者甚驗。氣味辛涼而不似荆芥之溫。終當以治風熱爲斷。

鄒氏解賊風傷寒。謂夏之賊風乃北風。定是夏令傷北風之寒。此於薄荷之治亦尚有合。但鄒氏專主此說而於風熱不推及之。且以薄荷根不畏寒。苗不畏暑。爲消息之所在。則泥之至矣。惟其根不畏寒。所以苗不畏暑。不畏暑。正辛涼之金氣足以當日。與麻黃所產之地。冬不積雪。可對觀而明。鄒氏又謂薄荷發寒汎之覆。與荆芥香薷等。試思香薷何物。而可與之等量耶。

薄荷於頭目肌表之風熱鬱而不散者。最能效力。若配合得宜。亦可治上中焦之裏熱。涼膈散龍腦雞蘇丸。以除胃熱膽熱腎熱。可謂用逾其分矣。逍遙散合環壇。又能變涼風爲溫風而治骨蒸勞熱。彼存膠柱之見者。得毋聞而驚怖耶。

青蒿

青蒿有二種。一黃色。一青色。生苗於二月。其深青者。更異於常蒿。至深秋猶碧。其氣芳香疎達。與柴胡相鬱鬱。非少陽藥而何。所以柴胡治瘡。青蒿亦治瘡也。

青蒿芳香疏達。則能升。開花結子於七八月。得金氣多。則能降。升與降互爲牽制。故升降皆不得逞。而力微。但其主留熱在骨節間。則更有至理焉。青蒿至立秋後。便節節生蟲。既生蟲。仍開花結子。其蟲不噬梗。不潰出。循梗而下。入土化他物。若青蒿之力。有以抑之者。然。是。則。以。治。勞。熱。骨。蒸。可。謂。恰。如。其。當。矣。

夏枯草

夏枯草或謂稟純陽之氣。或謂稟純陰之性。以劉醫江陰在下能生陽。陽在上能化陰之說衡之。似乎劉說爲長。但人身之陰陽。猶天地之陰陽。劉所謂陰在下。陽在上者。自指陰始生陽極盛而言。陽之生陰之化。亦必指夏枯草而言。不知一陰生於下而草枯矣。何陽生之有一陰生於下而草枯。其所感者在下之陰。非在上之陽。又何

得謂陽在上而化陰。其理似精非精。仍不得據此爲準。竊謂夏枯草生於一陽始生之時。當爲陰退陽進。陰中透陽之物。迨交夏至陰進而上。則陽退而下。此草透陽之生意亦卽至此而盡。惡得不枯。謾全善因其治目珠夜痛。點苦寒藥不效之證。遂反揣之以爲稟純陽之氣。夫目珠夜痛爲陰中陽結之證。夏枯草若氣稟純陽。其於陰中之陽必鉏鋸而難入。惟其爲陰中透陽之物。以治陰中陽結之證。乃得如飢渴渴飲。適償其欲。就是思之。尙有毫釐未合否耶。至洄溪謂性稟純陰。故一交盛陽。陰氣將盡。卽成熟枯槁。竟以夏至陰生之時。爲陰氣之將盡。疎失至此。尤令人不解矣。

漏盧

漏盧亦蒿類。而青蒿治瘡瘍癩。熱在骨節間。此治溼瘻之惡瘍。熱在肌膚。

青蒿芳香苦寒。合溼熱而并除之。故宜於由溼轉燥之瘍。漏盧色黑鹹寒。熱散於肌表而溼使下滲。故宜於溼壅熱熾之瘍。

古方治發背以漏盧湯爲稱首者。背爲太陽寒水部分。漏盧鹹寒而有白茸。正與相合。且熱退卽住服。明乎越境之不過問也。

漏盧下乳汁。是下熱結而不下之乳汁。能消乳內脹痛。非下乳汁之通劑也。

麻黃

鄒氏疏麻黃云。麻黃之實。中黑外赤。其莖宛似脈絡骨節。中央赤。外黃白。實者先天。莖者後天。先天者物之性。其義爲由腎及心。後天者物之用。其義爲由心及肺。所以分布心陽。外至骨節肌肉皮毛。使其間留滯無不傾囊出也。故栽此物之地。冬不積雪。爲其能伸陽氣於至陰中。不爲盛寒所凝耳。此論麻黃性用。致爲精審。遠勝諸家。按靈樞本藏篇云。腎合三焦膀胱。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。麻黃雖入腎而中空輕揚。故爲太陽傷寒泄表發汗之要藥。肺之合皮毛。入太陽卽入肺。入肺入心卽入榮衛。麻黃莖並不白。鄒氏謂其入肺而有意裝飾之。未免蛇足。又葉天士陳修園咸謂肝主疏洩。以麻黃發汗爲疏洩爲入肝。不知肝能下洩不能外洩。其亦武斷之至矣。

與麻黃相助爲理之物。其最要者有六。曰杏仁。曰桂枝。曰芍藥。曰石膏。曰葛根。曰細辛。得其故而後知彼知己。百戰百勝矣。今具論如左。

杏仁者。所以爲麻黃之臂助也。麻黃開肌腠。杏仁通肺絡。麻黃性剛。杏仁性柔。麻黃外擴。杏仁內抑。二者合而邪乃盡除。如麻黃湯治風寒。麻黃杏仁薏苡甘草湯治風溼之類皆是。

桂枝者。所以補麻黃之不足也。麻黃洩榮衛之邪。桂枝調榮衛之氣。桂枝得麻黃。不

至羈汗。麻黃得桂枝。卽能節汗。二者合而正不受傷。此麻桂並用之方皆然。蓋有視證候之重輕。暨他藥之離合以爲權衡者矣。

芍藥者。一方之樞紐也。一徵之小青龍湯。外寒與內飲相搏。乾嘔發熱而欬。是證之必然。非或然。麻桂散外寒。辛夏蠲內飲。薑味止欬逆。甘草合諸藥以和之。寒則以汗解。飲則隨便去。惟麻黃入太陽而上行膀胱之氣亦因之而不下行。小便不利少腹滿。固意中事。加芍藥者。所以馴麻黃之性而使水飲得下走也。若小便本不利。則麻黃直去之矣。全方蠲飲重於散寒。故名之曰小青龍湯。再徵之烏頭湯。麻黃氣輕驅風寒在肌膚者多。烏頭氣重驅風寒在藏府者多。麻黃除溼。是溼隨風寒而去。烏頭除溼。是風寒外散而溼則內消。麻黃伸陽而不補。烏頭補陽而卽伸。此治歷節不可屈伸疼痛。二物所以必並用之故。雖然。二物皆出汗而少內心關節之病。非可一汗而愈者。故又以芍藥從而斂之。使宛轉於肢節而盡去其疾。黃芪疏榮衛之氣。則爲芍藥之前驅。甘草則培中土以和之者也。以其有芍藥能使麻烏下達。故亦治腳氣。舉此二方。而他之用芍藥者可推矣。

傷寒太陽病將入陽明。則石膏爲必用之藥。大青龍湯中風二字。是與小青龍湯傷寒二字爲互舉之文。麻黃湯治傷寒。曰脈浮緊無汗。此亦浮緊無汗。大青龍別一條

曰傷寒脈浮緩。浮緩有傷寒。浮緊豈反無傷寒。況傷寒一日太陽受之。脈若靜者爲不傳。頗欲吐。若躁煩脈數急者爲傳。此之煩躁。自因表實而邪不得泄。傳入陽明所致。沈堯封以煩躁爲內伏之喝熱。不知陽明非府實不至煩躁。安有內已府實而外尙發熱惡寒之理。以石膏治煩躁。謂之治太陽傳入陽明之煩躁。與仲聖諸說無不脗合。復有何疑。且煩躁在心腎而治則在陽明者。非無謂也。太陽本寒。標熱上與心下與腎爲緣。太陽熱閉。則心腎皆爲之擾。太陽不治。則陽明亦所必傳。是煩躁非心腎之自病。而陽明乃去路之宜肅。泄其熱於表。清其熱於裏。則煩躁不治而自治。抑石膏者。洩肺卽所以洩太陽也。太陽衛外之氣。從皮毛而合肺。而石膏亦輕亦重。泄肺清胃。兩擅其長。故獨用治汗出之熱。佐麻黃又治不汗出之熱。若離太陽入陽明。而成府實之證。則石膏非所克任矣。

太陽將入陽明。葛根亦爲必用之藥。仲聖文義多有參觀互勘而後明者。葛根湯之證。曰太陽病項背強。几無汗。惡風。病云太陽而方則以葛根標名。葛根者。太陽陽明交嬗藥也。何以言之。陽明病身熱多汗。而葛根治大熱不治多汗。且更解肌出汗。雖出汗而非散太陽初入之寒。所以爲治太陽將入陽明之藥。太陽寒邪化熱。熱爍其液。則項背爲強。葛根起陰氣以滑澤之。則變強爲柔。與麻黃治無汗惡風可稱伯

仲然則是證二物足了之矣。複以桂枝湯何爲。蓋汗出表必虛。以和陽化陰之藥繼其後。則卽攻卽補。元氣不過傷而易復。此用藥操縱之法。仲聖方類如是也。細辛與杏仁。皆所以爲麻黃之臂助。而有大不侔者在。杏仁佐麻黃而橫擴。是爲柔一剛。細辛佐麻黃而直行。是爲一專一普。麻黃驅陰邪發陽氣。不僅入少陰而用甚普。細辛則色黑入腎。赤入心。(或云赤黑或云深紫紫卽赤黑相兼之色也)一莖直上。氣味辛烈。故其破少陰之寒沴。銳而能專。考仲聖方佐細辛以治上者不一。如小青龍湯治水飲。厚朴麻黃湯治欬逆。桂甘薑棗麻辛附子湯治氣分。皆所易曉。獨麻黃附子細辛湯治少陰病用細辛。則此義塵封久矣。試詳言之。少陰與太陽爲表裏。藏若中寒。必始得之。卽吐利厥逆。不至發熱。今有但欲寐之少陰證。而反發熱。是無少陰之裏證。而有外連太陽之表證。自應以麻黃發汗。脈沈者急溫之。自應以附子溫經。至細辛一味。柯韻伯謂散浮陽。鄒氏謂無細辛爲微發汗。則有細辛爲大發汗。唐容川更以脈沈爲陽陷。用細辛以升之。實於細辛性用。與仲聖因證制方之意。未經窺見。夫細辛與麻黃同能徹上徹下。第麻黃中空輕揚。用以下行。非藉他藥之力不可。細辛無發表出汗之能。(本經麻黃發表出汗細辛無之)而於風寒之在上在下。附於骨節九竅者。則專力以去之。絕不旁騖。故防己黃芪湯曰。下有陳寒者加細辛。可見細

辛散少陰經氣之寒。厥有專長。非麻黃可及。然則麻黃附子甘草湯無細辛。而此何以有細辛。彼無裏證。而此何嘗有裏證。仲聖用麻黃必曰取微汗。此豈堪取大汗。則當於始得之與。得之二三日。及麻黃煎法之不同。詳究其義矣。經云逆冬氣則少陰不藏。腎氣獨沈。腎氣沈則脈無不沈。卽仲聖所云脈微細。但欲寐之脈亦未始非沈。此單言沈者。以其沈之甚耳。脈沈自係少陰病本象。茲不云少陰病脈沈反發熱。而云反發熱脈沈。蓋少陰病不應發熱而反發熱。發熱則當由太陽而外達矣。乃發熱而兼脈沈。豈能無二三日變爲裏證之虞。於是以附子專溫其經。細辛佐麻黃。銳師直入以散在經之邪。麻黃先煮減二升者。欲其氣之下注。不加甘草者。恐其緩三物而中停。此發熱脈沈始得時之治法。若至二三日而無裏證。則不至或有裏證。不當以細辛先開其隙。故以麻黃附子治發熱脈沈。而以甘草易細辛。且先煮麻黃。祇一二沸。以節其裏入之勢。而和其散邪之氣。此正合得之二三日之分際。彼不言無裏證。此不言發熱脈沈者。互舉之文也。仲聖之斟酌病機。可謂精矣。

更以仲聖用麻黃杏仁石膏而治法迥異者言之。大青龍湯三物並用。爲發汗之峻劑。麻杏甘膏湯亦三物並用。偏治汗出而喘無大熱者何也。此節文義。是將汗出二字倒裝在不可更行桂枝湯下。惟其汗出。疑可行桂枝不可行麻黃。不知汗出而喘

無大熱。非桂枝證之汗出而爲發汗後表已解之汗出。表已解故無大熱。喘則尙有餘邪。桂枝湯不可行。而大青龍不變其法亦不可行。夫是故變峻爲和。以麻黃四兩石膏倍之。俾麻黃之性不得逞。而餘邪適因之而盡。且石膏倍用。不特制麻黃之悍。泄汗出之熱。卽杏仁亦必抑其外達之勢。以下氣而止喘。止喘非麻黃事耶。而汗出無大熱之喘。則其喘爲氣逆多而表鬱少。故麻黃減之而杏仁增之。信乎藥物多寡之所關。非細故也。

石膏以兩計者。與麻黃多寡易見。麻杏甘膏湯。石膏多麻黃一倍。核之治法正合。若大青龍湯石膏亦多於麻黃。則麻黃受制已甚。何至有汗多之慮。洄溪云。大青龍湯一劑。除大棗約共十六兩。以今稱計之。亦重三兩有餘。則發汗之重劑矣。雖少加石膏。終不足以相制也。夫所謂十六兩者。已將石膏併計在內。所謂三兩有餘者。以古一兩今二錢零計之。不知雞子大一塊。洄溪究作今稱幾何。余將石膏碎爲雞子大膏。總不在三兩之下。而洄溪謂一劑共三兩有餘。真令人不解。王樸莊精於算學。謂傷寒方一兩準今七分六釐。則更無洄溪二錢零之多。今姑卽二錢零爲一兩計之。麻黃六兩。亦不過有今稱兩半。而石膏雞子大一塊。則有今稱三兩。是多於麻黃一倍矣。恐雞子大一塊字。不免有誤。世有博雅。盍考訂之。

麥門冬

麥冬形象合之本經主治。自是胃家正藥。徐氏云。麥冬甘平滋潤爲純補胃陰之藥。後人以爲肺藥者。蓋土能生金。肺氣全恃胃陰以生。胃氣潤。肺自資其益也。鄒氏云。麥冬之功。在提曳胃家陰精。潤澤心肺。以通脈道。以下逆氣。以除煩熱。若非上焦之證。則與之斷不相宜。觀此可以正李東垣但謂入手太陰而不及足陽明之非。

前人謂麥冬復脈通心者不一。大都其胸中先有本經胃絡脈絕之見。而更徵之以復脈。湯生脈散。竊謂胃之大絡。內通於脈。脈絕乃胃絡之不貫。非真脈絕。麥冬補胃陰以通絡。而脈得所資。則有之。亦能徑復其脈者。厥惟人參。熟玩蕩寒金匱兩書。自知且心腹結氣傷中。傷飽若非胃絡脈絕。亦豈麥冬所能治。下文之羸瘦短氣。卽胃絡脈絕之徵。本經無一字虛設。而又上下相照應如此。願與治本經者一質之。

徐氏極詆以麥冬治咳嗽。然千金外臺治咳嗽諸方多有之。而實權輿於仲聖之麥門冬湯。麥門冬湯。汗金卽列於咳嗽門。遇津枯火逆者。又何嘗不是要藥也。

瞿麥

瞿麥本淋藥。而恬樓瞿麥丸之小便不利。與淋證有間。何以用瞿麥。乃是方之微旨。

則有可窺見者在焉。小便不利而有水氣。其爲下焦陽虛。顯然易見。陽虛於下而熱浮於上。所以又渴。薯蕷附子能溫腎補虛而不能止渴。導水故輔以栝樓根之生津。茯苓之化氣。然小便不利而用薯附。豈無封蟄之虞。栝樓又和緩有餘而勇健不足。然則排決之任。自當屬之瞿麥。此以淋藥治小便不利而恰如其當。仲聖真神化無方矣。

葶苈

大黃洩血閉而下熱。葶苈洩氣閉而逐水。凡水氣堅留一處有礙肺降者。葶苈悉主之。惟洩肺而亦傷胃。故葶苈大棗湯以大棗輔之。

甘遂味苦甘。所治在中與下。能利水穀之道。故治留飲宿食。葶苈味苦辛。所治在上與表。但利水道。故主結氣飲食寒熱。試以大陷胸湯丸證之。大黃蕩滯熱。上中下咸到。性極峻厲。故湯丸皆以爲君。爲陷胸之主藥。陷胸加芒硝甘遂。而一則煮一兩沸。一則內末者。以二物皆下趨極易。欲其回翔胸膈。化水食而軟堅也。陷胸丸之證。曰項亦強。如柔瘻狀。項強二字。實此證之主腦。按素問太陰在泉項似拔。項似拔者。溼上衝也。此強而非拔。爲水結在肺無疑。曰如柔瘻狀。則與柔瘻相似而不同可知。然則何以治之。夫結胸由於誤下。誤下故正虛邪入。水飲宿食。遂互結而不下。要

其所入之邪。太陽病未解之陽邪也。陽邪劫液。故筋失所養而項強。是宜洩其爲患之水濡以柔筋之液。而大逐其心胃之熱實。故用大黃消逐無二致。而法則有變。藥亦宜加矣。杏梢合研。所以潤液而柔項。遂蜜同煮。所以安正而化結。葶藶瀉肺水。爲是方水結之專任。變湯爲丸者。以項強不可以急圖也。葶藶與甘遂可同年語乎哉。

車前子

車前卽芣苢。神仙服食經云。善療孕婦難產及令人有子。陸機云。嫩苗作茹。大滑。今人不復噉之。苗滑如是。其子治難產。自亦取其滑胎。惟令人有子。似未足信。要知虛弱之婦。無子貴補衝任。否則反是。車前子非他。蓋爲治難產之令人有子也。車前子爲輸洩膀胱溼熱之藥。本經主氣癃止痛利水道小便。別錄明目療赤痛。其功用已盡於是。若以治腎虛目暗。則須如加減註景丸制剂爲得。原方尙不及之。昔人謂車前子利水竅而固精竅。似卽補腎之謂。然茯苓利水不必有熱。車前子則非熱不治。茯苓尙伐腎邪。則車前子之固精竅爲何如之固精竅。可深思矣。

萹蓄

萹蓄葉綠莖赤。稟木火之氣。而引蔓促節。氣味苦平。能通利三焦。搜抉隱微。溼熱之病。故本經主浸淫疥瘡疽痔殺三蟲。別錄療女子陰蝕。

金匱要略云。浸淫瘡從口流向四肢者可治。從四肢流入口者不可治。蓋口爲脾竅。流向四肢則溼熱不致侮脾。脾土有權而可治。驕鬪引蔓促節。復節節開花。可不謂溼熱流向四肢之象歟。

大黃

鄒氏以大黃黃中通理。狀如絲紋。質色深紫。爲火貫土中。極服盧芷園行火用一語。竊思盧氏論素問承制生化之義固精。但淺學不易領悟。夫大黃火貫土中。或當能扶脾陽矣。然此其質耳。味則大苦。氣則大寒。且於黃色中貫赤紋。則於脾中血分錮土之火。自當之輒息。錮土之火息。而心君生土之火。豈有不因之而行其用。此所以行君令。戡亂拓土地而有將軍之號也。

大黃色黃臭香。性與土比。故用於脾胃病極合。其能行火用上下表裏咸到。則人多忽之。然有一言可以蔽之者。曰蕩實滌熱而已。熱與實兼者。如大小承氣湯下燥屎。大陷胸湯丸治結胸。抵當湯丸下瘀血。大黃附子湯治脅下偏痛。其但熱不實者。如荳甘五味加薑辛半杏。大黃湯治面熱如醉。茵陳蒿湯治穀疸。瀉心湯治心氣不足。此二者之顯有區別者。推是以求。則如鼈甲煎丸治癰瘕。大黃蘆蟲丸治虛勞羸瘦。大黃牡丹湯治腸癰。大黃黃連瀉心湯治氣痞。非熱實而同於熱實。亦惟假盪滌之。

性功擴神奇之妙用。而仲聖制剂之道。抑更有進者焉。已椒蓼黃丸。曰腸間有水氣。水者虛軟之物。大黃能蕩實不能攝虛。且瀉水已有己椒蓼。更益以大黃何爲。或謂泄血閉而下熱。或謂從大便而分消。皆意爲揣摩。未足徵信。獨近人唐容川云。三焦者。決瀆之官。水道出焉。三焦卽膈膜油網。水從胃中四面微竅滲入油網。從油網入膀胱。若水走腸間則爲停水。水停而不行於三焦。則水不化氣而津不生。是以口舌乾燥。治法宜將未入腸間之水。引之走三焦故道。旣停腸間之水。從腸間而下奪。此據西醫油網之說。徵以內經三焦核之是證。是方無不脗合。實勝舊解。蓋防已紋如車輻。內黃外白。有從肺肺幹旋三焦水道之能。椒目溫腎以蒸發其脾陽。除腹滿而利水。猶腎氣丸之有附桂。如是而三焦之故道可復矣。腸間之水。將遂施大黃以下奪乎。抑未也。夫大腸者。糟粕所居。大腸有水。下卽與糟粕俱下。雖非燥屎。大黃固與有責。特其所司全在腸胃。力不及肺。肺合大腸。非肺出治節。不能使水食俱下。蓼爲從肺至脾之藥。(一本都氏疏證)利水道兼破積聚。故加之以輔大黃之不逮。且椒得大黃。庶寒溫相濟。而腸胃之疾。亦必火用行而後已。此大黃之治腸間水氣。有如此曲折微義。不可不知者也。

夫大黃之爲物有定。而用大黃之法無定。不得仲聖之法。則大黃不得盡其才而負

大黃實多。否則爲大黃所誤而大黃之被誣亦多。素問至真要大論論制方之法甚備。而其間緩急奇偶復極之氣味厚薄制小制大數少數多參伍而錯綜之實有無窮之用。仲聖則正本此旨以制方而不容以一端測焉。大黃氣味俱厚。本峻下之物。因其峻下而微變其性以用之。則如大承氣抵當湯之大黃酒洗酒浸。以兼除太陽餘邪也。大黃黃連瀉心湯之大黃。以麻沸湯漬之而不煮。欲其留戀心下也。大黃附子湯大黃與附子並用。則變寒下爲溫下。茵陳蒿湯大黃與茵陳梔子並用。則不走大便而走小便。大黃用法之不同也。如是更以方劑言之。尤氏謂小承氣無芒消而但有枳朴。下趨之勢緩。故曰小。不知小承氣雖有枳朴無芒消。而枳朴分兩亦較大承氣甚少。此制之大小卽承氣大小所由名。豈在芒消有無之別。且芒消並不專取其下趨。調胃承氣芒消與甘草並用。則能調胃。大陷胸芒消與甘遂並用。則能陷胸。大承氣芒消止三合。而調胃承氣大陷胸轉用至半升一升。調胃陷胸有芒消而抵當湯丸轉無芒消。芒消之功不專在下趨亦明矣。柯韻伯謂藥之生者氣銳而先行。熟者氣純而和緩。故大承氣以芒消專化燥屎。大黃繼通地道。而後枳朴除其痞滿。鄒氏體之其實似是而非也。芒消之不取乎速下。上已言之。夫多煮者味厚。少煮者味薄。味厚則下之早。味薄則下之遲。枳朴先煮。欲其徑下。消黃則兼資以滌熱。非故

操之不可。故大黃後內。芒消止一兩沸。小承氣所以同煮者。枳朴既少。又無芒消。且大承氣以水一斗煮枳朴取五升。內大黃後尙取二升。小承氣則僅水四升煮取一升二合。大黃雖與枳朴同煮。力亦不厚。何必再分先後。鄒氏謂大陷胸湯用甘遂芒消之銳。猶恐其暫通復閉。故大黃先煮。使當善後之任。置全方配合之道不講。而但於先後煮討消息。不知芒消甘遂專治胸閒熱結水結。故芒消止一兩沸。甘遂內末而不煮。大黃本腸胃藥。用以爲消遂前驅。故先煮之。鄒氏又謂茵陳蒿湯。大黃梔子爲前茅。茵陳爲後勁。不知茵陳發揚芳郁。稟太陽寒水之氣。善解肌表之溼熱。欲其驅邪由小便而去。必得多煮以厚其力。與桂枝利小便非多用不可。正復相同。大黃止二兩而又後煮。則與茵陳走肌表之氣相浹。且能促之使下也。茵陳梔子皆走小便。大黃自亦不走大便矣。此仲聖制方之意。與素問相印合者也。可執一說而不究其所以然哉。

附子 天雄 烏頭

鄒氏論附子天雄烏頭之性用頗精。爲節其說曰。烏頭老陰之生育已竟者也。天雄孤陽之不能生育者也。附子卽烏頭天雄之種。含陰包陽者也。老陰生育已竟者。其中空。以氣爲用。孤陽不能生育者。其中實。以精爲用。氣主發散。精主斂藏。發散者能

外達腠理。斂藏者能內入筋骨。附子則兼備二氣。內充實。外強健。且其物不假系屬。以氣相貫而生。故上下表裏無乎不到。惟其中蓄二物之精。斯能兼擅二物之長。其用較二物爲廣爾。

本經附子主風寒欬逆邪氣。後世緣此多以爲治風之藥。其實經文深奧。義別有在也。夫風有傷與中之分。傷者傷於營衛。中者中於經絡藏府。傷營衛者。寒鬱於表而易化熱。宜麻桂決不宜附子。中經絡藏府者。寒根於裏而陽本虛。用麻桂又貴用附子。附子非風藥。而本經之主風寒。蓋指中風之風寒言。非指傷風之風寒言也。外臺謂中風多從熱起。故中風有寒亦有熱。風引湯治熱之方也。熱不用附子。固不得言。小續命湯治寒之方也。若附子卽以驅風。何以附子外不少風藥。其有附子無風藥。如近效尤附湯治風虛者有之。未聞能散外入之邪風也。

鄧氏謂附子之治風寒。是陽氣不榮。風寒侵侮。陽振而風寒自退。似非不知附子治風寒之理者。乃又謂仲聖用生附子之方。皆兼有表證。而其所引白通湯附子湯。則並無未解之表邪。夫白通所以用葱白者。因少陰下利一往不返。失地道上行之德。葱白能入少陰而升之。非以表汗。附子湯證。是少陰受寒。而陽氣不能四周。表何嘗有風。脈沈固不當汗。且其方伍以參朮之補。苓芍之降。又豈足勝解表之任。至仲聖

附子生用。非屬汗後。即是下利脈沈。汗後宜補表陽。下利脈沈宜挽其氣。生用自勝熟用。此仲聖生用之意也。

或難予曰。惡風加附子。越婢湯非明證乎。何說之儻也。曰。大青龍汗出惡風者不可服。越婢湯加附子。則證爲汗出惡風。若附子又從而汗之。獨不畏厥逆筋惕肉瞶耶。蓋加附子正以其汗出。趙氏云。惡風者陽虛。故加附子以入陽。然則舍附子則有亡陽之禍。豈果爲驅風哉。

用附子於中風風寒。原可不過分。故三生飲無風藥。以陽氣一充而邪卽自消也。若他風寒證。則定須分治。鄒氏亦頗以附子與表藥對舉。暗中逗出。足見附子外尙有表藥。其所引桂枝加附子湯等八方皆是也。惟其中桂枝附子。白朮附子。甘草附子。則爲治風溼之方。桂甘薑棗麻辛附子。則爲治氣分之方。夫風爲陽邪。附子陽藥。以其人陽虛而寒重。非扶陽則風不能以徒驅。故扶陽與驅風並行。寒爲陰邪。溼亦爲陰邪。風溼之風。與傷風之風。亦致不同。非陽虛不爾。故亦需附子氣分者。水寒之氣。結於心下。證由少陰陽虛而來。故麻辛附子。溫少陰而發汗。桂甘薑棗。化上焦之陽。而開結。此從表解。枳朮湯則從中泄。病同而治不同。水飲所作四字。趙氏本上下條。皆有之。極是。又麻黃附子湯。以麻黃發表而少陰脈沈用之。正賴有附子溫少陰也。

否則脈沈無發汗之理矣。

附子爲溫少陰專藥。凡少陰病之宜溫者。固取效甚捷。然如理中湯治腹滿。黃土湯治下血。附子瀉心湯治心痞。甚至薏苡附子敗鹽散治腸癰。如此之類。亦無往不利。惟其挾純陽之性。奮至大之力。而陰寒遇之輒解。無他道也。

天雄。仲聖惟天雄散一方。附於桂枝加龍骨牡蠣湯後。不言所主何病。按此與上節離合之間。必有竄亂。今細繹其文。自夫失精家。至爲清穀亡血失精。當是以天雄散主之。下以桂枝加龍骨牡蠣湯主之。正爲合宜。何以言之。兩方於失精家原可通用。但脈爲極虛芤遲。證見清穀亡血失精。則已腎損及脾。不補脾則生精之源絕。故白朮用至八兩。少腹弦急陰頭寒目眩髮落。種種腎病。自非他補腎藥所能勝任。故選用精氣充實不外洩之天雄。而以天雄名方。至其佐使之桂枝龍骨。尤微妙難言。桂枝湯桂枝止三兩。而此乃倍之。欲其於太陽之經府俱到。以化氣。其證陰既下洩。陽自上浮。而脾腎咸虛之陽。不當潛以鹹寒之牡蠣。得龍骨。則引火歸土。而亦不損其陽。且桂枝輔天雄則入腎。釋陰。輔白朮則入脾。溫土。龍骨輔天雄則固腎。濟精。輔白朮則固脾。祐溼。以天雄散隸於是證。義實至精至確。若脈得諸芤動微緊。雖天雄散亦可服。要不如桂枝加龍骨牡蠣湯爲尤中窓。蓋脈芤動爲陽。微緊爲陰。陰陽氣爭

則表裏失利。治之以此湯。桂枝生薑甘棗爲陽。芍藥爲陰。龍骨爲陽。牡蠣爲陰。於祛邪濬精之中。有表裏相得。陰陽互維之妙。此二方是於小建中湯。腎氣丸外。又別出良法者。就天雄散思之。則天雄所謂孤陽不能生育。其中實以精爲用者。不於此可見其概也乎。

烏頭治風。亦惟陽虛而挾寒挾溼者宜之。以其中空以氣爲用。開發腠理。過於附子。故古方中風證用烏頭較多於附子。抉壅通痹。亦過於附子。故仲聖治歷節不可屈伸疼痛。及逆冷手足不仁。身疼痛灸刺諸藥不能治。皆用烏頭不用附子。烏頭與附子同爲少陰藥。而補益以附子爲優。發散以烏頭爲勝。故腎氣丸有附子無烏頭。大烏頭煎有烏頭無附子。因烏頭氣散不收。故不解表之方。皆去滓內蜜更煮。以節其性。仲聖之用烏頭附子。可謂各極其妙矣。乃烏頭赤石脂丸更二物並用。以治心痛徹背。背痛徹心。取其母子相感。以除内外之邪。此豈尋常思議所及哉。

半夏

半夏味辛氣平。辛則開結。平則降逆。爲治嘔吐胸滿之要藥。嘔吐胸滿者少陽證也。故小柴胡湯不能缺此。推之治心痞。治腹脹。治欬。治咽喉不利。一皆開結降逆之功。要其所以結與逆者。由其有停痰留飲。乘陽微以爲患。半夏體滑性燥。足以廓清之。

也。

用半夏者。率以二陳湯能潤大便。半硫丸能治虛祕冷祕。謂潤而非燥。究亦何嘗不燥也。遇津虧無溼之人投之。立貽禍殃。惟仲聖取其長而棄其短。胃反爲脾傷不磨。非有滯濁。乃佐之以人參。益之以白蜜。俾半夏之燥性盡失。而胃中之穀氣以行。又竹葉石膏湯。麥門冬湯。溫經湯三證。亦未可以半夏劫液者。乃其所伍者爲竹葉石膏。人參。麥門冬。甘草。粳米。阿膠。丹皮之屬。是亦化半夏之燥而展其開降之能。所謂化而裁之存乎變也。

小青龍湯曰渴者去半夏。小柴胡湯曰渴者去半夏。此可爲半夏非不燥之明徵。然半夏之燥。燥而滑者也。能開結能降逆。與燥而濁者不同矣。

蕘花

小青龍湯若微利者去麻黃加蕘花。蓋利則水氣不徑趨膀胱。更以麻黃升太陽。則水道益清。水氣必泛而爲脹滿。太陰篇所謂下利清穀不可攻表。汗出必脹滿也。蕘花本經主蕩滌腸胃。留癖利水道。則微利不至成滯下。而在上之水氣亦去。且其用在花。走裏兼能走表。故本經並主傷寒溫瘧。飲食寒熱邪氣。若以茯苓澤瀉治微利。則表邪亦從而陷之矣。此仲聖所以有取於蕘花也。

○菟絲子

菟絲子汁去面野。徐氏不解。葉香巖謂升少陰。徐氏復不信。不知此最易曉耳。菟絲延草木則根斷。子中脂膏最足。故補腎精而主升。面爲陽明之脈。而菟絲甘辛而溫。能由陽明經上入於面。以施其滑澤之功。面野焉得不去。竊願以此釋徐氏之疑。

脾主肌肉。菟絲以寄生根斷之性。補益其脾。故能充衛氣而肥健。老學庵筆記謂久服生疽。其氣之溫可知矣。

他物補腎。補之而已。此能於補中寓升。故其治精自出。溺有餘瀝。不得以濁劑目之。治消渴。則是化腎中之陰。以升其液。亦非滋陰之謂。

五味子

喘與欬皆肺病。其有腎氣逆而爲喘欬者。則不得獨治肺。五味子斂肺氣攝腎氣。自是要藥。然但能安正不能逐邪。有邪用之。須防收邪氣在內。仲聖以五味伍桂枝。則云下衝氣。去桂加乾薑細辛。則云治欬滿。可見欬滿之任在薑辛不在五味。然而去桂不去五味。其他治欬逆諸方。又無不三物並用。其故何也。曰。足太陽手太陰同爲一身之衛。二經之病。往往相通。小青龍湯。傷寒太陽病也。而雜證肺病。亦恒用之。推之。荳甘五味湯。厚朴麻黃湯。皆肺中有寒飲。皆以小青龍出入加減。小青龍係

外寒與內飲相搏。故欬逆。若兼外寒。方中必有麻桂。無外寒者無之。至三物並用。則非分疏不明。肺中冷必眩多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。此乾薑溫肺之據。用乾薑者。肺寒非乾薑不溫也。張隱菴之疏細辛也。曰氣味辛溫一莖直上色赤黑稟少陰泉下之水氣而上交於太陽。審乎是而謂細辛不能發汗耶。則細辛辛溫而烈。實能由少陰達表。謂細辛能發汗耶。則細辛細碎之體。那得勁力。所以發少陰之汗。必與麻黃並用。而散肺中寒飲。則正其所優爲。二物一溫一散。肺邪已足了之。而必加以五味。且數多於薑辛。幾令人不解。此則治病卽以善後。仲聖蓋慮之周也。肺苦氣上逆。欬則逆。喘則且至於脹。旣張之肺。欲翕不得。有邪雖去而欬猶不止者。謂五味可無乎。不可無乎。或曰。煩躁而喘者加石膏。胃熱熏面者加大黃。得毋三物亦治熱欬。不知飲自寒而挾自熱。三物所治仍屬寒飲。不得因是致疑。或又曰。三物治欬。惟細辛關繫最重。而小柴胡湯欬加乾薑五味。獨不加細辛。豈傳寫有脫佚耶。夫寒飲迫肺而欬者。可從表解。可從下洩。少陽在半表半裏。間有欬者。殆陽不勝陰。而以微寒侵肺耳。無飲可蠲。何需乎細辛。此傷寒太陽少陽之分。斷不容忽過者也。尤氏曰。五味子治嗽。新病惟熱傷肺者宜之。若風寒所客。則斂而不去矣。久病氣耗者。非五味子不能收之。然熱痰不除。則留固彌堅矣。(見金匱翼)按所論甚是而不

免於語病。肺爲熱傷。固非斂不救。如孫真人生脈散之以五味治暑病。然方中必重任人參麥冬生津止渴之品。卽尤氏所引治熱欬諸藥不效者方。亦何嘗無清滌肺熱如石膏知母枇杷葉之類。雖新病不得重任五味。有邪應兼除邪。治法與寒嗽不殊。未便故爲軒輊也。

桔樓根（卽天花粉）桔樓實（卽瓜蒌仁）

桔樓根實本經俱苦寒。李氏謂根甘微苦酸微寒。實甘寒。辨之致審。

草木之根荄。其性上行。實則性復下降。桔樓根能起陰氣上滋。故主燥熱之煩渴。實能導痰濁下行。故主黏膩之結痛。此張氏之說至允。用二物者當作如是想。桔樓根與葛根同主消渴身熱。而仲聖治瘧。則一用葛根。一用桔樓根。何故。蓋無汗而小便反少。氣衝口噤。是風寒溼之邪。相搏於太陽陽明之交而不解。用葛根則能隨麻黃輩散之於外。桔樓根無解表之長。而證是身體強几几然。俾與桂芍諸物養筋脈則適相當。此其所以攸異也。

桔樓根本治熱治渴。乃杜鵑澤鳩散並不言渴。而其所伍者爲瀉水之物。是大病差後。虛熱不免。而水去則陰陽傷。以桔樓根潤液而補虛。除病卽兼善後也。桔樓瞿麥丸。上雖爲渴而下則有寒。下寒故膀胱不利而水蓄。水蓄於下則陽浮於上。是渴爲

標寒爲本。故以葛附溫肺腎而化氣。桔梗洩下行之水。桔梗根止陽浮之渴。不用膏知者。以渴非實熱也。

桔樓實之長在導痰濁下行。故結胸胸痹非此不治。然能導之使行。不能逐之使去。蓋其性柔。非濟之以剛。則下行不力。是故小陷胸湯則有連夏。桔樓薤白等湯則有薤酒桂朴。皆伍以苦辛迅利之品。用其所長。又補其所短也。

葛根

葛根與桔樓根。本經皆主消渴。而葛根起陰氣。桔樓根不言起陰氣。張隱菴以桔樓蔓延結實之時。根粉盡消。結實既成。根復成粉。又凡草木根荄。性必上行。遂謂桔樓根能起陰氣上滋。鄒氏亦踵之。愚竊以爲不然。用葛根者皆知爲升陽明之藥。桔樓根無用之爲升者。雖凡根皆寓有升意。而用根之藥不盡屬能升。且以粉消爲升。則有粉方掘。正在升力已退之時。蓋其所以主消渴者。爲其性濡潤而味苦寒。皮黃肉白。能卻肺胃之熱。潤肺胃之燥耳。別名天花瑞雪。亦正取寒潤下降之意。葛根則異乎是矣。味甘平。爲陽明之正藥。內色潔白。則能由胃入肺。外色紫黑。則又由肺達太陽。味甘兼辛。則擅發散之長。層遞而升。復橫溢而散。升則升胃津以滋肺。散則散表邪以解肌。故桔樓根治身熱。是以寒勝熱。葛根治身熱。是以辛散熱。桔樓根止渴。是以

增益其所無。葛根止渴。是挹彼以注茲。用葛根而過。有竭胃汁之虞。胃陰下溜。亦能起陰氣。以止利也。

葛根陽以桂枝湯加麻黃。詎不足發太陽之邪。而猶必重用葛根者。蓋麻桂二方之證。均無項背。強几几太陽病。而至項背不柔。則風寒已化熱燥液。將入陽明。麻桂皆燥藥。未足專任。能入陽明。起陰氣。滑澤其骨節。而又能化肌表之熱者。舍葛根奚屬。此葛根所以爲一方之冠也。

凡寒阻於經。欲化未化而有表熱之證。葛根能外達而解之。若已化熱入裏。或其熱不應外解。則葛根無能爲役。奔豚湯竹葉湯之用葛根。不得謂無表熱應外解也。

何首烏

何首烏種分赤白。故氣血兼益。藤夜交晝疏。故具闔闢之長。味厚入腎。潛入肝。苦則堅。溫則補。陳修園但知其爲苦澁。而於益氣血。具闔闢之所以然。則未之見。其必有施之不當。而爲所誤者矣。

修園於首烏能止久瘡久痢。則韙之。而一歸於少陽。則知猶未知。夫久瘡不止。勢必損及於肝。肝病腎亦病。腎者三陰之樞也。欲樞轉而止瘡。自當補肝與腎。肝主疏泄。久痢則疏洩太過。腎亦失蟄封之職。亦必以補肝腎爲要。修園既以首烏苦澁而短

之。安得更有直折之威生發之氣。如彼云云者。稱驥以力而不免於鹽車之辱。此可爲太息者也。

劉晉江以開寶主瘰癧癰腫頭面風瘡五痔心痛爲效在氣血之結而經脈爲壅。黑鬚髮悅顏色長筋骨益精髓爲效在氣血之劣而形器有損。二者證絕相懸而首烏並建厥功。正與闔闢之理相合。可知開寶非浪許也。

首烏之用生熟迥殊。其已久瘡消腫毒皆是用生者。又消腫毒用赤不用白。補肝腎則以黑豆拌蒸。赤白各半。皆法之不可不講者。

張石頤云。今人治津血枯燥。大腸風祕。鮮首烏數錢煎服即通。其滋水之速。與肉蔻潤燥通大便相彷彿。此亦修園所思議不到者。要之生熟之異用。所關甚鉅。必不容忽耳。

○草薢

草薢用根。取其入腎。莖葉俱青葉作三叉則入肝。根黃白色則入肺胃。根多節而虛軟。則能化陰伸陽而治療。風寒溼之在腰背骨節而痛強者。陰不化也。以草薢達之而陰化。風寒溼之爲陰痿爲失溺爲老人五緩者。陽不伸也。以草薢導之而陽伸。後世以草薢爲分清濁之劑。亦由陰化陽伸而後清升濁降。卽止小便數除莖中痛。均

不出是義耳。

化陰非能益陰。伸陽非能助陽。蓋**萆薢**者。所以驅風寒溼也。
**萆薢味苦則發。氣平則降。力能外拓而性復下趨。故驅風寒溼而解之於至卑。此所
以謂**萆薢**也。**

○防己

**防己之根。外白內黃。有黑紋如車輻解。氣味辛平。故治由腎以抵脾肺風溼之疴。肺
主皮毛。將母從皮毛而散乎。然車能圜轉不能外溢。故**防己**絕不發汗而第直洩於
小便。如**金匱已叔巒黃丸**（義見大黃）。**千金三物木防己湯**可按也。**

陶隱居云。防己是療風水要藥。水與飲皆溼類也。故防己黃芪湯**治風溼。**防己茯苓
湯**治水。木**防己湯**治飲。名雖有三理。無少異。惟風水二字。誠有不得而析者。風陽邪
而風從外入。令人振寒。風寒初受。卽宜汗解。**防己**非其責也。內伏之風。若內無陰邪。
亦未能獨存。故水飲溼悉其所因依。水飲溼去。則風與俱去。如此之風。方可治以防
己。然**苓朮**不能而**防己**獨能之者。以黑紋如車輻解。正有風水相隨之妙致也。
或云**防己地黃湯**治病如狂狀妄行獨語不休。無寒熱。其脈浮。豈亦有水飲溼也。而
顧以防**防己**治耶。曰。此仲聖別出手眼之方。未可與他並論者也。趙氏謂血虛從邪。邪**

并於陽而然。按本篇固以脈浮爲血虛。素問陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂。固可爲如狂之據。此注允矣。而不言邪爲何邪。徐氏則謂風邪并入於心。心火熾盛。故如狂妄行獨語不休。較趙注爲明晰矣。而於是方用藥之所以然。則皆未發出。竊細玩之。四物酒漬取汁。自非陽邪表邪不爾。生地黃獨多。自非補血涼血不爾。有表邪而用桂枝防風。可知是外入之風邪。以生地黃偶桂枝防風。可知治不以汗解。不以汗解而有酒行藥勢以搜之。則邪不至或遺。四物取生汁而地黃取蒸汁。則陰陽得以分理。旣所以退陽而安陰矣。然而風無出路。則風仍不息。陰不復位。則陰仍羈陽。欲并者而使之分。仲聖所以有取於防己也。夫防己者。走表而亦下行者也。操運轉之技。則表閒之風自隨之得息。具返本之能。則被擾之陰亦因之得靜。或謂防己治風溼不治風燥。不知風藥中用地黃至數倍。則風亦轉燥爲潤。正與防己相宜。可謂以人巧奪天工矣。

澤瀉

猪苓茯苓澤瀉。三者皆淡滲之物。其用全在利水。仲聖五苓散猪苓湯。三物並用而不嫌於複。此其故愚蓋得之本經與內經矣。本經猪苓利水道。茯苓利小便。澤瀉消水。內經三焦爲水道。膀胱爲水府。腎爲三焦膀胱之主。合二者觀之。得非猪苓利三

焦水。茯苓利膀胱水。澤鴉利腎水平。諸茶者。楓至秋杪。葉赤如火。其無風自動。天雨則止。遇暴雨則暗長二三尺。作用與少陽相火正復無異。膀胱藏津液。非氣化不出。茯苓色白入肺。能行肺氣以化之。凡水草石草皆屬腎。澤鴉生淺水而味鹹。入腎何疑。三物利水。有一氣輸瀉之妙。水與熱結之證。如五苓散。猪苓湯。若非三物並投。水未必去。水不去則熱不除。熱不除則渴不止。小便不通。其能一舉而收全效哉。

消渴上中焦皆有之。或陰虛津虧而渴。或津被熱爍而渴。或熱與水結而渴。三物第利水以除熱。何嘗如人參栝樓根有生津補陰之能。李氏謂淡滲之物。其能去水。必先上行而後下降。以仲聖用三物稽之。正不必過高其論也。

雖然。於三物中求止渴。惟澤鴉其庶幾耳。何則。本經無澤鴉起陰氣之文。而別錄固有之。澤鴉起陰。雖不及葛根。挹胃汁以注心肺。而得氣化於水。獨莖直上。卽能以生氣朝於極上。仲聖又不啻明告我矣。凡眩悸顛眩。多歸功於茯苓。而澤鴉湯治冒眩。偏無茯苓。冒眩者。支飲格於心下。下之陰不得濟其上之陽。於是陽淫於上。如覆冒臂助耳。大明之主頭旋耳鳴。殆得仲聖此旨也。又腎氣丸治消渴。皆腎藥。雖用茯苓。

亦祇藉以協性附化腎陽。萸地益陰而不能升陰。腎陰不周於胸。則渴猶不止。此諸藥可不加。而澤瀉不得不加。故曰止渴惟澤瀉爲庶幾也。

○菖蒲

鄒氏云。人身靈明。猶火蓄石中。人身軀體。猶石能蓄火。假使軀體爲寒水所蒙。靈明爲疾涎所壅。則運動不周。視聽不協。外之不化。由於內之不出。惟菖蒲生水石閒。而辛溫芳烈。有陽畢達。有陰悉布。故凡水液渾濁。爲神明之翳者。悉主之。疏極精審。準是以用菖蒲。始克有當。

菖蒲用以開心孔發音聲甚效。然須審定病之宜辛溫者。王孟英昌陽瀉心湯。以菖蒲偶竹茹枇杷葉等味亦妙。內用仲聖瀉心湯三物。而以菖蒲代生薑。蓋義各有當也。

○水萍

水萍浮於水面。而味辛氣寒。能發皮膚中溼熱之邪汗。故本經主暴熱身癢。傷寒論云。不得小汗出身必癢。其身癢爲有風寒之邪。宜以麻桂取微汗。此則溼熱不汗出而癢。故水萍主之。水萍亦汗藥也。而與麻桂有霄壤之殊。丹溪謂發汗勝於麻黃。不加分別。後遂有視水萍爲峻劑。而不敢用者矣。

本經以下水氣止消渴。兩許冰萍。蓋以其狀外帖水面。內含血絡。水不能濡。則水氣自下。日不能燦。則陰液固充。此效之所以並呈也。

本經未嘗言風。而後世以風藥推之。要知其所治爲風熱之風。非風寒之風。如古今錄驗以冰萍與牛蒡子薄荷治風熱癰瘍。則藥病相當矣。

石斛

石斛爲腎藥。爲肺藥。爲脾藥。爲腸胃藥。諸家論說紛如。而咸未親切。兼有疏漏。茲節採諸說。補其不足。仍卽本經別錄之旨。以疏通而證明之。石斛藉水石而生。若石挹水以溉斛。斛因石以吸水。石屬金。內應乎肺。氣平亦入肺。水則內應乎腎。其爲引腎陰以供肺。肺得之而通調下降無惑矣。斛之生不資纖土。而味甘淡。則得中土之正色。黃又主五金之貴。合乎胃爲戊土。而屬陽明燥金。與肺皆職司下行。故其爲用。每以肺胃相連而著。惟旣稟土德。何能於脾無與。肺胃與大腸皆一氣直下。又何能於大腸無與。此石斛入腎入肺。入胃而兼入脾。入大腸之所以然也。石斛得金水之專精。本經強陰二字。足賅全量。所謂陰者。非寒亦非溫。用於溫而溫者寒。用於寒而寒者溫。別錄逐皮膚邪熱。痹氣是溫者寒也。療腳膝疼冷。痹弱是寒者溫也。要不出本經除痹補虛兩端。痹何以除。運清虛之氣。而使腎陰上濟。肺陰下輸也。虛何以補。布

黏膩之汁。而使據者遂定。豁者遂彌也。是故肺胃得之則下氣平氣。脾得之則長肌肉。腸得之則厚腸。腎得之則益精。大凡證之恰合夫斛者。必兩收除癆補虛之益。若專以之除癆。專以之補虛。則當棄短取長。而制剂之有道可矣。

寇宗奭曰。治胃中虛熱。有功。雷敷曰。濇丈夫元氣。玩此二說。則知有實熱與當利小便者。皆不得用。粗工以內傷外感。悉可倚仗。搖筆輒至。不知施於內傷而誤。其失祇在寡效。施於外感而誤。則不免於閉邪矣。

骨碎補

骨碎補。開竅主破血止血。補傷折。其所破之血。乃傷折之瘀血。所止之血。乃傷折之好血。非謂其於他處能破血復能止血也。

傷在皮血曰傷破。在筋脈曰傷斷。在骨曰傷折。骨碎補寄生樹上或石上。多在背陰處。其根有黃赤毛。所抽之葉。則有青綠黃白赤紫各點。宛似效力於骨碎之處而調其血脈。又寸寸折之。寸寸皆生。處處折之。處處有汁。氣味苦溫。故能入腎堅腎補傷折。且無花無實。力專而不分也。

李氏謂以骨碎補研末入猪腎中。煨熟空心食。治久泄頓住。其補腎之功。自不可沒。則他方書治耳鳴牙疼。亦必不虛。要知其爲苦溫之劑。勿施於陽勝之體而可耳。

胡麻

胡麻味甘臭香。合乎土德。且結角上聳。飽含脂液而不俯。又與脾職之上升無異。故主傷中虛羸填髓腦。補中而亦補上。功在增液。則潤肌膚澤骨節。烏鬚髮益乳汁。皆效有必至。陳士良云。初食利大小腸。久食卽否。可知其力能下及而性復上注矣。

大麻仁

仲聖麻仁丸證。是脾受胃強之累而約而不舒。於是脾不散精於肺。肺之降令亦失。肺與脾胃俱困而便何能下。麻仁甘平滑利。柔中有剛。能入脾滋其陰津。化其燥氣。氣但脾至於約。其中之堅結可知。麻仁能擴之不能破之。芍藥乃脾家破血中之氣藥。氣合施之。而脾其庶幾不約矣乎。夫脾約由於胃強。治脾焉得不兼治胃。胃不獨降。有資於肺。肺亦焉得不顧。故又佐以大黃枳朴攻胃。杏仁抑肺。病由胃生。而以脾約標名者。以此爲太陽陽明也。兼太陽故小便數。小便數故大便難。治法以起脾陰化燥氣爲主。燥氣除而太陽不治自愈。故麻仁爲要藥。治陽明府病非厚氣不可。故取少承氣之大黃枳朴而復減少其數也。不可。故取少承氣之大黃枳朴而復減少其數也。復派陽用之。則佐薑桂以通陽。佐膠地麥冬以益陰。與後世取汁煮粥以治風治淋。總取乎潤燥扶壅。柔中有剛也。

粳米

稼穡作甘。爲土之正味。不似他物之甘。猶有所偏。粳米平調五藏。補益中氣。有時委頓乏力。一飯之後。便舒適異常。眞有人參不逮者。可以想其功能矣。

粳米得金水之氣多。於益氣之中。兼能養陰。故補劑寒劑。無不可贊助成功。穀爲人生至寶。而霍亂癰脹。與夫欲吐不吐。欲瀉不瀉之證。周時內嚥米飲一口。卽不可救。蓋暑溼穢惡之邪。充斥隧絡。而米飲入胃輸脾歸肺。又適以恢張之。使無一隙之餘。所以告危如是之速。

薏苡仁

李灝湖云。薏苡仁屬土。陽明藥也。故能健脾益胃。劉氏駁之。則云胃爲五藏六府之海。其清氣上注於肺。所以能注於肺者。實由於脾。脾氣合於腎。以至肺。肺氣合於心。以歸腎。此三陰之氣。謂之元氣。卽中氣也。然若胃陽虛。則脾之地氣不升於天。勢必溼盛化熱。湊於胃脘之陽。以傷氣。胃陽亢。則肺之天氣不降於地。亦必熱盛化溼。還迫於脾藏之陰。以傷血。傷氣者。肺受之。爲胸痹偏緩。甚或肺陰大損。爲肺痿肺癰。更因傷氣而病乎藏血之肝。爲筋急拘攣。傷血者。脾受之。爲腸胃不利。甚或脾氣大虛。爲水腫。爲久風溼痹。且移患於下部。爲痛。凡此皆胃氣之病。於上下者也。薏苡生於

平澤氣寒味甘。水土合德。乃實結於盛夏。則潤下之氣還就炎上。而採實在於秋末。則熱浮之氣又歸涼降。有合於胃達地氣而不病於溼之化熱。更合於胃達天氣而不病於熱之化溼。舉前證胥能治之。夫中氣不病於溼。卽不病於熱。除溼而卽能清熱者。非胃之專功。而胃第爲之樞也。如李氏言。泛泛與燥溼健脾者同論。將所謂清熱療痿和血潤筋者。歸於何地乎。然薏苡爲益中氣之要藥。而其味淡。其力緩。如不合羣以濟。厚集以投。亦不能奏的然之效。又云此言筋攀。乃溼熱傷血而病於筋膜乾者。經所謂大筋纏短是也。肝藏血而主筋。溼熱固血分之病也。按李說固未中肯綮。而劉氏張皇幽眇。致多委折。微論藏府陰陽升降出入。不盡如其言。而卽其言覈之。實亦有自呈其闕者。不能爲諱焉。傷氣之內。插入更因傷氣一句。是以筋急拘攀。爲盡屬傷氣之傳變。傷血寧無真正血證。而猥以腸胃不利等四項當之。皆意爲牽合。無與實理。薏苡能使胃陽不虛。胃陽不亢。又能使脾合腎以至肺。肺合心以歸腎。宜乎用處至廣。如四物四君子之類。何以古方選入者。如晨星之落落。況云須合羣以濟。厚集以投。則固知薏苡不能兼攬衆長。而又何爲濫許之乎。薏苡能使溼不化熱。熱不化溼。自是除溼而亦清熱。乃又云除溼而卽能清熱。豈并薏苡之氣寒而亦忘之乎。旣以薏苡爲除溼。而又云薏苡潤筋。是視薏苡與牛膝無二矣。牛膝治筋膜

乾之四肢拘攣不可屈伸。以其根柔潤而中有白汁也。潤筋者不能除溼。除溼者不能潤筋。理固然也。肝藏血而主筋。然筋病不得竟指爲血病。此亦不容不辨者矣。本經一書原有漢人羼入之句。其精奧處則字字金玉。決非聖人不作。如薏苡仁主筋急拘攣不可屈伸久風溼痹下氣數語。眞萬世矩矱。自千金外臺以及後相傳之佳方。凡用薏苡仁者必兼有筋急拘攣不可屈伸之證。寒攣用爲佐使。亦取其能舒筋。古方小續命湯注云中風筋急拘攣語。遲脈弦者加薏苡仁。李氏以加薏苡爲扶脾益肝。不知其有舒筋之妙。可謂憒憒。又薏苡仁丸治脇痛。脇痛非肝病耶。妊娠禁服薏苡。非以其瀉肝墮胎耶。然則肝之合筋。薏苡安得非肝藥。不解金元以來竟無一人闡及。天門冬主暴風溼痹。薏苡仁主久風溼痹。久字固大有義在。蓋風溼痹非寒藥所宜。風溼久而不解。則寒將化熱。如金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯。汗出當風久傷。取冷是寒發熱。日晡所劇是寒化之熱。麻黃所以驅寒。薏苡所以除熱。無熱非薏苡責也。凡此所治悉與本經符合。再以薏苡體之。綱目載馬志云。薏苡取青白色者良。蘇頌云。薏苡結實青白色。雷敷云。薏苡顆小色青味甘。據此。薏苡決非純白。苗發於仲春與色青。得木氣爲多。實採於九秋與色白。得金氣亦多。色青兼白。則爲金木相媾。味甘而淡。則入胃不入脾。主疏泄者。肝司肅降者。肺胃亦傳化下行之府。是肺

肝挾金木之威。直走而下。由胃而小腸而膀胱。皆其所順由之路。且氣寒復歸於腎。溼何能不去。後人以利小便治疝。皆深得此意。劉氏以實結盛夏。爲潤下之氣還就炎上。不知實結盛夏。是水不畏火。不畏火則制火。水自就水。奚肯就火。本經下氣二字。又包有至理如此。

劉氏以此之筋攣爲筋膜乾。余旣略駁之矣。考劉氏此篇宗奭曰一段加注云。受溼則筋緩。然溼卽化熱。溼合於熱則傷血。血不能養筋則又攣縮。筋攣固有因血虛者。而此則不然。鄒氏云。筋之爲物。寒則堅勁。堅勁則短縮。熱則緩緩。緩緩則弛長。此爲不挾溼者言也。若挾溼則大筋橫脹。橫脹則續短。小筋縱伸。縱伸則弛長。凡物皆然。特能短而不能勁。與因寒而縮者有異。按橫脹之說。未經人道。較劉氏自勝。然靈樞溼熱不攘。大筋續短。小筋弛長。是續短時。溼已化熱。蓋初雖橫脹。不致短縮。惟化熱之後。所謂食氣入胃。散精於肝。溼氣於筋者。遂漸被其燦。筋爲之縮。云不攘。則熱由溼化。已非一日。與本經之言如出一轍。薏苡止泄熱驅溼。而筋卽舒。試之屢驗。若傷血而待養血。則不能如是易矣。

本經久風溼痹。系於筋急拘攣不可屈伸之下。明其病之屬筋。而上下文若斷若續。幾索解不得。金匱胸痹緩急一條。正爲本經點睛。胸痹卽風溼痹。在乎足爲不可屈

仲在胸爲一緩一急。皆久而後成。皆筋病也。緩急二字。前人注多支吾。惟鄒氏於靈素之言。陰蹻陽蹻與足陽明頬筋推類以求。并繹巢元方之論。胸痹謂五藏六府之寒氣。因虛而上衝胸膈者。寒衝於左。則逼熱於右。寒衝於右。則逼熱於左。寒者急。熱者緩。可謂今日發矇曠然已昭矣。或問寒溼熱溼各有專藥。溼既化熱。乃舍治熱。溼之專藥而用薏苡。不名之爲熱溼。其亦有說乎。曰。痹無熱痹。溼化之熱。終不離寒。故不曰溼熱風熱。而曰久風溼痹。證爲熱中有寒。緩急自非專由於熱。此理惟寇宗奭見及之。曰。受寒使人筋急。寒熱使人筋攣。若但受熱不曾受寒。則不至筋攣。雖與鄒說微異。然緩急實惟薏苡一物治之。何則。寒即是溼。溼去寒亦去。薏苡治筋有專長也。然則仲聖何爲又加附子乎。曰。胸痹由於陽虛。本非辛溫藥不治。用附子不用薤桂者。以薏苡有損陽之虞。附子足以敵薏苡而舍短取長。非以薏苡治熱。附子治寒也。

李氏謂薏苡健脾益胃。虛則補母。故肺痿肺癰用之。劉氏謂治痿獨取陽明。陽明溼熱盛則成肺痿肺癰。大腸與胃之溼熱散。則肺痿肺癰自愈。噫。二家之言。粗疎甚矣。夫治痿獨取陽明者。爲痿躄言之也。與肺痿之痿。詎得同論。且薏苡肺藥。而肺痿不治。肺痿而至吐膿成肺癰。則治之。肺癰之中。又以胸中甲錯爲最宜。何則。胸中甲錯。

乃肺熱燉液所致。雖在肌膚而與筋膜聯屬。肝與有責。薏苡洩肺熱而能疏筋膜中乾濇。故爲妙藥。如千金葦莖湯可徵也。肺痿何以不治。肺痿之因有二。屬虛冷者無論矣。卽肺由熱燉而津液已枯。筋膜無故。薏苡不能潤液而且竭液。奚藉此爲。腸癰何以治之。則亦以身甲錯故。甲錯雖不在胸。而其爲癰膿則一。癰膿亦不能專任薏苡。而因癰膿而甲錯。則非薏苡不任。與胸痹之專治緩急無二義。尤氏謂此腸癰爲小腸癰。與余薏苡由胃而小腸而膀胱之說適合。或疑肺藥多入大腸。薏苡何獨不然。曰。此正金木相媾。肝主疏泄而薏苡爲肝藥之據也。薏苡之主治。肝居首。肺次之。胃以下皆其所遞及。方書胃病無治以薏苡者。蓋其補土止補肝中之土。所謂五藏皆有土也。前人惟視薏苡爲補中土之藥。故謂其力和緩。然用之中的爲效極速。何和緩之有哉。

○綠豆

豆本脾家中宮之物。而綠豆皮寒肉平。是爲由中達外以解熱。故外科護心散用綠豆粉使毒氣外出。若肌膚之熱毒。但須治肌膚者。更其所宜矣。

世以綠豆解藥誤。不知綠豆能壓熱解毒。非能於無熱毒之誤藥。亦化爲烏有也。

○蘿豆

蘿豆葉

蘿豆花白實白。實間藏芽處。別有一條。其形如眉。格外潔白。且白露後實更繁衍。蓋得金氣之最多者。凡豆皆甘而入脾。故能於夏令溼盛脾弱之時。布清肅之令。復敦阜之氣。此千金與局方治霍亂所以用實也。然其補脾之力極厚。必得脾受溼困而不腹痛不鬱悶者。方與之宜。是則別錄主霍亂吐下不止。不屬之實而屬之葉。固甚有道矣。夫霍亂者。陰陽清濁二氣相干。蘿豆當盛熱蘊隆。花尙未有。而其枝葉愈盛。立不撓。是陰森之葉。與酷烈之日。各不相下。絕無妨害。用於清濁不調之霍亂。自然清者歸清濁者歸濁。然則唐本草吐利後轉筋生搣一把入少醋絞汁服立瘥者。可以證別錄之不誣矣。

俗稱避暑蘿豆棚下能作瘧。甚至嬾豆亦多不以充蔬。此亦有故。蘿豆以陰森之葉。禦酷烈之日。而花白實白。全具金氣。其不畏暑明矣。不相畏則相爭。瘧爲邪正相爭之病。故有所忌。豆壅脾氣。更何以解。仲聖所以謂患寒熱者不可食也。

淡豆豉

淡豉別錄苦寒。李氏謂黑豆性平。作豉則溫。既經蒸署。故能升能散。竊謂仲聖用作吐劑。亦取與梔子一溫一寒一升一降。當以性溫而升爲是。別錄主煩躁。而仲聖止以治煩不以治躁。若煩而兼躁。有陽經有陰經。陽經則用大

青龍湯大承氣湯。陰經則用四逆湯甘草乾薑湯吳茱萸湯。皆無用淡豉者。蓋陽經之煩躁宜表宜下。陰經之煩躁宜亟回其陽。淡豉何能勝任。別錄以主煩躁許之。殊有可商。

煩有虛有實。虛者正虛邪入而未集。故心中懊憹。實者邪塞胸間。故心中結痛。雖云實。卻與結胸證之水食互結不同。故可以吐而去之。證係有熱無寒。亦於腎無與。所以用豉者。豉苦溫而上涌。梔洩熱而下降。乃得吐去其邪。非以平陰逆也。

張氏謂淡豉主啓陰精上資。而鄒氏遂以此爲治傷寒頭痛及瘴癘惡毒之據。不知其有毫釐千里之失。蓋傷寒初起。與瘴癘惡毒。雖身發熱。實挾有陰邪在內。故宜於葱豉辛溫以表汗。或協人中黃等以解毒。何資於陰藏之精。且淡豉亦何能啓陰藏之精者。試煎淡豉嘗之。便欲作惡。可恍然悟矣。

淡豉溫而非寒。亦不治躁。確然可信。鄒氏過泥別錄。遂致詮解各方。忽出忽入。自相徑庭。黑大豆本腎穀。蒸署爲豉。則欲其自腎直上。因其腎穀可以治腎。故千金崔氏諸方。用以理腎家虛勞。因其爲豉不能遽下。故與地黃擣散與地黃蒸飯。鄒氏謂於極下拔出陰翳。誠是。乃其解葱豉湯。旣謂宜於病起猝難辨識。又謂是熱邪非寒邪。不知葛稚川立方之意。以初起一二日頭痛恐寒犯太陽。脈洪又恐熱發陽明。投以

葱豉。則邪解而陰陽兩無所妨。正因難辨而出此妙方。宜後世多奉以爲法。煎成入童便者。以葱豉辛溫少加童便。則陰不傷而與藏氣相得。如淡豉本寒。更加以童便之寒。葱白雖辛而亦寒。外達之力必致大減。恐無此制劑之理也。

鄒氏又以素問氣寒氣涼治以寒涼。行水漬之。注家謂熱湯浸漬。則寒涼之物能治寒涼。於是引傷寒論用豉諸方。皆不以生水煮。爲合以寒治寒之旨。金匱梔子大黃湯。不以治寒。則四味同煮。不分先後。噫。鄒氏誤矣。所云注家。殆近世不求甚解者耳。按氣寒謂北方。氣涼謂西方。跟上節西北之氣句來。治以寒涼行水漬之。跟上節散而寒之句來。上言其理。此明其治。王太僕注云。西北方人皮膚腠理密。人皆食熱。故宜散宜寒。散謂溫浴。使中外條達。行水漬之。是湯漫漬。張隱菴云。西北之氣寒涼。人之陽熱遇鬱於內。故當治以寒涼。行水漬之者。用湯液浸漬以取汗。合二說觀之。經所謂漬定是浴以取汗。今西北方人慣用此法。並非以熱湯漬寒藥。若謂以熱湯漬寒藥。即可以治寒病。則藥物不勝用矣。然則梔子豉湯。先煮他藥後煮淡豉何故。蓋此與瀉心用麻沸湯漬之絞汁無異耳。豉本腎穀。欲其上達。故不多煮。大凡用豉以至一升。而煮則一二沸無妨也。梔子大黃湯四味同煮。則以不取吐不取汗。自宜多

煮。豉用一升。亦以所偶爲大黃枳實。而豉尙欲其治上也。他若金匱瓜蒂散。則以生水煮取吐矣。但豉用七合。不云下水若干。以生水任煮而不爲之限。可見必欲竭豉之力。味厚則下趨易。或疑此與吐法不悖乎。不知吐宿食與吐寒飲不同。吐宿食自當少抑其上浮之性。雖抑之。而以苦溫之淡豉。偶苦寒之瓜蒂。甘酸之赤豆。終必激而上行。且苦寒甘酸者。杵爲散。苦溫者。煮取汁。皆有一升一降。故拂其性以激發之義。安在不爲吐法。鄒氏於經旨方意。咸未澈悟。強爲扭合。不免自誤以誤人矣。

飴餗

土爰稼穡。稼穡作甘。飴餗乃稼穡精華中之精華。脾土位居中央。若虛乏而當建中。建中而不旁驚者。惟飴餗爲然。故仲聖方凡名建中。必有飴餗。否則不與以是名。補脾之物有五。曰人參。曰大棗。曰梗米。曰甘草。曰飴餗。皆能治脾虛之腹痛。而皆有宜有不宜。虛而挾寒。則必君以驅寒之品。如大建中湯之以參飴協椒薑是也。寒在下焦不宜。如當歸生薑羊肉湯。烏頭桂枝湯之無此五物是也。附子梗米湯治腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿嘔吐。何嘗不是下焦之寒。何以有梗米甘草大棗。又何以無參飴。曰此無味不確切。須就其證細審之耳。寒在腹中而痛。實由下焦濁陰上泛。致胸脇逆滿嘔吐。附子所以溫腎。半夏所以止嘔。脾虛宜補。而有嘔吐之虛。則中不

宜滯。陰則宜益。米棗甘草。所以補虛而益陰。人參嫌其升氣。飴餗嫌其滯。故避之。小建中甘草用炙。而此不炙。亦以其滯故也。脇鞭當去棗。而此不避。以其脇滿而非鞭也。可謂頭頭是道矣。

鄒氏謂桂枝加芍藥湯主腹滿痛。小建中湯主腹急痛。蓋芍藥酸而破陰。飴餗甘而緩急。此言是矣。然小建中治急痛。而芍藥仍在者有故也。徐氏云。桂枝湯外證得之。爲解肌調營衛。內證得之。爲化氣和陰陽。桂薑協草棗。所以化陰。芍藥協草棗。所以化陽。芍藥不止治腹滿。故小建中於虛勞裏急悸衄等證皆主之。惟以治滿痛。則於桂枝湯原方加一倍。而飴餗則擣之耳。

鄒氏於建中大小之分。創爲勢合勢分。力專力薄二說。而斷之以君尊而臣從命。君卑而臣擅命。實則終無一當也。何以言之。小建中所治不一。而其扼要在建中。以云建中。猶建中之小者耳。若大建中。則專治中藏虛寒。不兼顧他經之證。腹中寒句是主。餘皆腹寒之所波及。周揚俊云。中氣虛則陽氣不布。故所積者爲寒飲。所衝者爲寒氣。尤在溼云。陰凝成象。腹中蟲物乘之而動。二說極當。溫脾無過乾薑。補脾無過人參膠餗。椒能由脾達腎。以消飲而殺蟲。亦溫脾之要藥。此四物大溫大補。不出中宮。建中有大於是者乎。觀於大建中。惟入腹滿一門。小建中則分隸於傷寒論。與金

匱之血癆黃癆婦人雜病各門。仲聖制剂標名之意。更灼然可見。自來注家無論及此者。殊足怪也。

○韭
（根葉同用）韭子

素問食氣入胃。濁氣歸心。韭味辛臭濁。故歸心尤易。以其歸心。故素問謂心病宜食韭。葉然必心爲陰壅。陽不能達。藉韭以達之。非可療一切心病也。

胃院有瘀血作痛者。飲韭汁極效。蓋韭以入胃之濁氣歸心。卽以留胃之濁質治胃。推此以治胸痹吐衄膈噎諸證。亦卽下氣散瘀之功。

別錄韭子主夢中洩精溺白。鄭氏以素問陰藏精而起亟。陽衛外而爲固。釋之極是。蓋陽不維陰則陰不起亟。而藏精。陰不維陽則陽不爲固。而衛外。夢中洩精者。陽不維陰也。溺白者。陰不維陽也。韭豐木而子又入腎。甘溫足以起亟。酸溫足以爲固。兼斯二長。所以爲夢中洩精與溺白之妙品。此但陰陽兩不相維。若虛甚而患是證。則韭子無能爲役。或當更加以溫固之劑矣。

●葱白

葱之爲物。莖則層層緊裹而色白。氣涼。葉則空中銳末而色青。氣溫。凡仲聖方用葱無不是白。其層層緊裹之中。卽含有欲出未出之青葉。是爲陽涵於陰。猶少陰寓有

真陽。其生氣上出。含有青葉。則又似厥陰。色白又似肺。信乎其爲肝腎爲肺藥矣。通脈四逆湯證。面色赤者。陰格陽也。陰既格之。必當使陰仍向之。薑附能扶陽驅陰。而不能聯陰陽之睽隔。惟蔥白升陰以爲之招。陽乃飄然而返。陽返而面不赤。然則白通陽證無面赤。何爲亦升其陰。夫陽在上宜降。陰在下宜升。少陰下利一往不返。失地道上行之德。薑附能扶陽而不能升陰。以通陽。陽不通。則陰下溜而利不止。故以蔥白冠首而名之曰白通。通非通脈之謂也。旋覆花湯治肝著欲人蹈其胸上有上下不交之象。以旋覆散結而降陽。蔥白升陰而上濟。新絳佐旋覆。並能通陰陽之路。俾上下交而成泰。至婦人半產漏下。肝腎之陰已下沈矣。非通其血中結滯之氣。與挽之使上不可。旋覆新絳所以通之。蔥白所以挽之。玩此三方。蔥白之用於肝腎者悉見矣。特是本經主出汗。後世亦多用於表劑。義又安在。蓋心與腎手足少陰相通者也。汗爲心液。蔥白升腎陰卽入心營。色白味辛。則又能開肺衛之鬱。此汗之所以出也。

卷三

藥之辛溫而滑澤者。惟薤白爲然。最能通胸中之陽與散大腸之結。故仲聖治胸痹用薤白。治泄利下重亦用薤白。但胸痹爲陽微。病則有冷有熱。第藉以疏利壅滯。故外臺於冷痢熱痢。皆有治以薤白者。

生薑

生薑是老薑所生之子薑。乾薑則老薑造成者。故乾薑得秋氣多。功兼收斂。生薑得夏氣多。功主橫散。乾薑溫太陰之陰。生薑宣陽明之陽。一藏一府。亦治分母子。

生薑氣薄發洩。能由胃通肺以散邪。凡外感鼻塞與噫氣嘔吐。胸痹喉閉。凝痰結氣皆主之。惟不能治欬。小柴胡湯欬去生薑。痰飲門凡言欬者。亦皆無生薑。以生薑純乎辛散。適以傷肺。不能止欬。太陽病表不解而有欬。如小青龍湯尙不用生薑。何論他經。乃肺痿門之欬有用之者。肺家邪實。非太陽之表病比。正不妨與麻黃同洩肺邪。厚朴麻黃湯有麻黃而不用生薑者。以脈浮則外達自易。已有麻黃散表。石膏清熱。便當以乾薑溫而斂之。澤漆湯無麻黃而卽用生薑者。脈沈則有伏飲在裏。澤漆紫參輩之苦寒。所以驅之於下。生薑桂枝等之辛甘。所以和之於上。用麻黃則失之上散。用乾薑則嫌於中守也。

然曰。小青龍湯射干麻黃湯真武湯。皆有水飲而欬。而一用乾薑。一用生薑。一生薑

乾薑並用。何治之不侔若是耶。曰。此正方義之當尋究者矣。小青龍湯外寒與內飲相搏。麻黃桂枝所以散外寒。細辛半夏所以蠲內飲。以芍藥輔辛夏。則水氣必由小便而去。此內外分解之法。不宜重擾其肺。使內外連橫。故溫肺之乾薑斂肺之五味。則進之。而劫肺之生薑則退之也。射干麻黃湯喉中水雞聲。乃火吸其痰。痰不得下。而作聲。其始必有風寒內邪。襲入於肺。故欬而上氣。與小青龍相似而實有不同。彼用麻黃爲發太陽之表邪。必得加桂。此用麻黃但搜肺家之伏邪。不必有桂。彼以辛夏蠲飲。法當溫肺。溫肺故用乾薑。此以辛夏蠲飲。法當清肺。清肺故用射干。彼導心下之水走小便。故加芍藥。此散上逆之痰在喉中。故加生薑。蓋乾薑不獨增肺熱。而亦非肺家散劑也。眞武湯因發汗太過。引動腎水上泛。爲悸爲眩爲身瞶。非真陽本虛。不至於是。方名眞武。是表熱不足慮。而寒水必當亟鎮。附子補陽。白朮崇土。所以鎮寒水者至矣。驅已泛之水以歸於壑。則荅芍不可無。散逆氣逐陰邪。以旋轉其病機。則生薑尤不可缺。若水寒射肺而有欬。亦卽治以肺欬之藥。加細辛乾薑五味欬非主病。與小青龍有闘。故小青龍細辛乾薑各三兩。而此止各一兩。生薑乃證中要藥。不以有乾薑而去之也。

生薑瀉心湯。有生薑又用乾薑。以生薑治乾噫食臭。乾薑治腹鳴下利也。

通脈四逆湯。有乾薑。又加生薑。以乾薑止利通脈。生薑散寒治嘔也。

生薑去臭氣通神明。其用全在於肺胃。而胃與脾以膜相連。故脾家氣分有治之者。如厚朴生薑甘草半夏人參湯治腹脹是也。血分亦有治者。如當歸生薑羊肉湯治腹痛是也。驅使之妙。不在一物而在全方。是故制方尤難於識藥。乾薑調營衛。與薑多於棗之義。詳見大棗。其有生薑無大棗者。仲聖每與桂枝半夏橘紅等物並用。重在鬯陽。故不取大棗之甘壅。

乾薑

乾薑以母薑去皮依法造之。色黃白而氣味辛溫。體質堅結。爲溫中土之專藥。理中湯用之。正如其本量。其性散不如守。故能由胃達肺而無洩邪出汗止嘔行水之長。炮黑亦入腎。而無附子烏頭之大力。凡仲聖方用乾薑。總不外乎溫中。其故可玩索而得也。

通脈四逆湯。卽四逆湯倍加乾薑。脈不出又加入參。似乾薑與人參皆能通脈。功不止於溫中矣。不知壅遏營氣令無所避。是謂脈營出中焦。中焦泌糟粕蒸津液。下利則中焦失職焉。得不脈微欲絕。欲脈之出自非溫中止利不可。必利止而脈不出。則其故不在中焦而在主脈之心。然後加以補心通血脉之人參。非乾薑不通脈。非通

脈不關溫中也。

肺痿有得之燥熱。有得之虛冷。虛冷之痿。以甘草乾薑湯治之。謂乾薑溫肺。是固然矣。豈知金生於土。土不溫者上必虛。上虛則不能制下。其頭眩多涎唾者上虛也。遺尿小便數者下虛也。而皆由於中之不溫也。然則乾薑非不溫肺。惟不越脾以溫肺耳。

或曰。傷寒誤攻其表。服甘草乾薑湯。便厥愈足溫。則乾薑不獨溫中。且更溫下矣。曰。乾薑詎能溫下。惟炮之而後能耳。然雖炮用。其溫下之氣猶不畢貫。更進以芍藥甘草湯。而不貫者始貫。腳始伸而不攀。此其旨甚微。非一二言所得罄焉。夫脈浮自汗出心煩微惡寒者邪在表也。小便數腳攀急者太陽寒邪襲入少陰。或先有伏寒。因而致劇也。醫以桂枝湯但攻其表。內有芍藥酸寒入裏。反增下寒。於是得之卽厥。始而心煩微惡寒者茲更腎寒而躁。陰中之陽。又隨桂枝外發之勢而欲越。故咽乾與吐逆並作。此時自汗之表邪已受治於桂枝。但以炮薑溫下。炙草和中。未有不陽復而自愈者。而足溫而攀急如故。甯非溫下之力猶有歉哉。然非真陽虧損。附子可無用也。前爲芍藥所誤者。今乃以芍藥伸腳矣。芍藥何以能然。正惟炮薑以芍藥抑之。而後能盡復其陽也。肺痿何以不更進芍藥甘草湯。以但遺尿小便數而腳不攀急。

且炮薑並欲其溫肺也。則謂乾薑若不炮。溫中而不溫下可也。

諸四逆湯治少陰病而用乾薑似乾薑亦所以溫下不知少陰寒甚必上侮及脾。用附子以斬將搴旗。猶當佐乾薑以儲糧堅壁。理中丸乾薑用三兩。以溫中固乾薑責也。四逆湯乾薑用兩半。以溫少陰有附子任之。乾薑爲附子後殿也。更觀腎著湯病屬下焦。而方中有脾藥無腎藥。益以見溫下之必當溫中矣。

四逆湯重在厥逆。下利是兼證。有乾薑不必有葱白。白通湯治少陰下利。是正病無兼證。不升其陰氣以與陽通。則利終不止。故君葱白而協以薑附。桃花湯乾薑止一兩。則少而又少矣。且無附子無葱白。何以爲解。曰此非少陰純寒之證也。以石脂梗米固下和中。略施乾薑。使就溫化。不利其便不清其血而但止其利。法之至超至妙者也。若赤石脂禹餘糧湯。利在下焦而治以中焦藥不應。則桃花湯之有乾薑。不尙於中宮有涉哉。

乾薑溫脾而上及肺。以治肺欬而下連脾。正爲相當。如小青龍湯以乾薑治寒欬而用至三兩。微利亦不去乾薑是也。

本經乾薑主止血。仁齋直指云。血遇熱則宣行。故止血多用涼藥。然亦有氣虛散。非陰陽不相爲守。營氣虛散。血亦錯行者。竊謂血統於脾。營出中焦。營氣虛散之證。非

溫中土不可。金匱膠艾湯無乾薑而千金方有之。黃土湯雖無乾薑而竈中黃土。其用與乾薑無二。乾薑溫中自有止血之理。雖然不能無佐使之品也。大抵吐血而至不止。則在上者宜抑之。漏血而至不止。則在下者宜舉之。凡用柏葉阿膠之類爲佐使者。所以導血歸經。用黃芩童便之類爲佐使者。所以養陰和陽。非能抑之能舉之也。獨柏葉湯之用馬通。有匪夷所思者。馬之氣最盛者。能使血隨汗出。而一身之物。非性寒卽有毒。惟通溫而無毒。雖穢淖乎。固化氣化血行脈絡之餘。而性能下行者也。此佐乾薑以抑爲止者也。婦人陷經漏下黑不解。膠薑湯主之。黑多由於熱。而虛寒之人。血出絡而凝。漸變紫變黑。亦未嘗無之。膠薑湯之薑。其爲乾薑無疑。乃陳修園以此二味治是證。一再用之不差。後易乾薑爲生薑。並加阿膠大棗。煎服立止。謂生薑散寒升氣。合陷者舉之之義。此與馬通一抑一舉可爲對待。然先服之乾薑未必無功。或如仲聖法以生乾並用。當收效尤捷耳。

仲聖方乾薑黃連並用之證。必兼有嘔。嘔屬少陽。故方中必有黃芩人參少陽專門之藥。蓋少陽爲三陽之樞。以黃連降胃陽。乾薑升脾陰。脾升胃降。少陽乃得轉樞。此少陽無往來寒熱之治法。治在此而效見於彼者也。

大水面目四肢浮腫。因在內而證在外也。以苦瓠之瓢與子治之。則棄其外而取其內也。瓢與子爲一瓠之津液所儲。迨其漸乾漸斂。氣迺力厚。鍊津液爲精華。以此馭人身梗化之水。自無不歸命投誠。一遵約束。然則瓠其何以處之。其氣味則苦寒也。性則就下也。瓠既就下。而他有不就下者乎。此本經所由殿之以下水也。

桑耳(木耳之生於桑者雖有五色今但論黑)

桑爲箕星之精。迨其朽也。經盛夏溼熱之蒸騰。結而爲耳。猶腎液之上朝。故色黑。具好風之本性。故入肝。是以於血分之溼熱。最能效力。血分之溼熱。惟女子爲易成病。漏下赤白汁者。陰爲陽迫而下洩也。血病癥瘕積聚者。陰爲陽遏而致壅也。陰痛陰傷寒熱者。陰爲陽負而思競也。此陰之不足。非陽之有餘。但當化陰以升陰。不必抑陽以損陽。桑耳性涼潤而蒸騰上出。所以能化陰以升陰也。

杏仁

杏有脈絡爲心果。仁則主通脈絡之氣而爲肺果。其性直降而兼橫擴。橫擴與直降。互相牽制而不得逞。故非加他藥不能橫擴。不能直降。然用杏仁於橫擴。有兼取其直降者。用杏仁於直降。有兼取其橫擴者。證若兩有所需。杏仁亦兩呈其技也。麻黃湯者。傷寒之汗劑也。旣用麻黃。何以又加杏仁。則以杏仁兼能下氣止喘也。表

實而邪不得解。固喘邪解而氣不得下亦喘。杏仁既走表而復入裏。則外散之氣亦相與由中道而下。是故麻杏甘石湯有麻黃又有杏仁。則爲治喘。葛根湯有麻黃無杏仁。則證本無喘。然而麻黃非不治喘。小青龍湯云喘去麻黃加杏仁。又何以有宜不宜之別耶。蓋麻黃者。上發心液亦下通腎氣。小青龍心下之水已與腎藏之水相吸引。若再以麻黃動其腎氣。喘將愈不能止。杏仁肺藥非腎藥。故去彼加此。所謂用杏仁於橫擴兼取其直降者此也。

大陷胸丸者。傷寒之下劑也。結胸而云項亦強如柔痉狀。是項強外與大陷胸湯無異。而證則較重。故彼可速攻而愈。此必變丸而緩攻。杏仁一味專爲項強而設。項強由陽邪燥液所致。杏仁研之如脂而性兼橫擴。再佐以芒消之津潤。白蜜之和甘。何難化強爲柔。然結胸之項強。非下不和。亦非下不陷。杏仁固大黃之功臣。葶苈甘遂之益友也。所謂用杏仁於直降兼取其橫擴者此也。

傷寒發汗。以麻黃爲主。杏仁爲輔。治喘以杏仁爲主。麻黃爲輔。故二物並用。其效始捷。夫喘在傷寒。爲表實肺鬱。在雜證。則有熱喘。有虛喘。有飲氣喘。不止一端。小青龍喘去麻黃加杏仁。卽非治傷寒之喘。故其方亦多用於雜證。然而仲聖用藥之道。但於配合異同分數多寡之中。一爲轉移。便大不相侔。大青龍傷寒最要之方也。麻杏

並用。豈爲治喘。其故則在麻黃加麻黃湯一倍。杏仁減七十箇爲四十。又得生薑之升。石膏之寒。杏仁自隨麻黃而橫擴。不致馳思於直降。推此以求。麻杏並用。而非爲治喘者。又得四方焉。一曰麻黃加朮湯。溼家身煩疼。爲寒溼之氣鬱於肌表。麻黃湯正與相宜。病由於溼。故加白朮以收溼。而中氣既固。則杏仁亦祇爲利肺氣之用而已。一曰麻黃杏仁薏苡甘草湯。傷於風溼而至發熱。日晡所劇。非麻杏所能獨治矣。薏苡清熱去溼。治久風溼痹。故加之。但其分數。則麻黃止用麻黃湯六中之一。杏仁七中之一。薏苡亦與麻黃相埒。此小制治上之法。杏仁所以無直降之權也。一曰文蛤湯。此卽大青龍去桂枝加文蛤貪飲。由於熱甚。故用文蛤石膏特多。麻黃減大青龍一半者。以表邪微而不欲其過汗也。若無蛤膏之鹹寒。則麻黃恐尙不用至三兩。然則用麻黃而復佐以生薑杏仁。自無不汗之理。杏仁雖兼有直降之長。制之以蛤膏。其與麻黃比而與蛤膏遠者。勢固然也。一曰厚朴麻黃湯。此卽小青龍加減而治亦大異。曰欬而脈浮而不詳其證。則試以本方藥味測之。乾薑五味細辛治寒欬之藥也。而欬因於寒可知。麻杏與厚朴並用。厚朴亦溫散之藥也。而表有寒邪。宜發可知。有細辛又加半夏。則必以之蠲飲。有五味又加小麥。則旣治欬自當安肺。此必因肺痿已見一斑。故加石膏以存津而化燥。與小青龍加石膏之意頗同。然彼爲肺脹

已成。故驅寒飲使下行。此爲肺痿始萌。故乘脈浮之際。亟解其表邪。桂枝芍藥。所以用於彼而不用於此。厚朴用至五兩。又無芍藥。則杏仁又何能效其直降之職。是爲去杏仁之直降而取其橫擴。

杏仁直降橫擴。雖同無很力。有藉於他藥。而以二者權之。直降之力。差優於橫擴。故甄權主發汗。而本經不主發汗。主下氣。荳蔻杏仁甘草湯。注家多以杏仁爲散結。愚獨以爲下氣。何以言之。胸痹。胸中氣塞短氣。看似甚劇。實則較前條用枳實薤白桂枝湯爲輕。此蓋痰飲爲患。陽尙不虛。無取薤桂稀飲治以是湯。膠痰則主橘枳生薑湯。稀飲而致氣塞短氣者。必因小便不利而飲停於胸。胸膈或素不舒。飲停則痹。本經茯苓主胸脇逆氣心下結痛利小便。可知散停飲之結。茯苓實司其職。茯苓淡滲散結。是有形之飲。杏仁苦溫下降。是無形之氣。二者合而痹者斯開塞者斯通。然他方治胸痹無甘草而此有之者。以二物皆下行。非以甘草載之。則勢不少駐而去疾不盡耳。外臺走馬湯。下劑也。中惡心痛腹脹大便不通。徐忠可謂客忤。沈目南謂絞腸烏疝。按方用巴豆。自當有惡毒之邪。壅塞藏府。須臾卽斃之勢。故以巴豆逐有形之實邪。杏仁下無形之虛氣。爲急救之策。與茯苓杏仁甘草湯之用杏仁。取資無異。是爲去杏仁之橫擴而取其直降。

有以杏仁輔麻黃發汗而可用於寒劑者。傷寒論治黃疸之方凡三。茵陳蒿湯使溼熱從小便去。以小便不利腹微滿。陽明病之宜下解者也。梔子檗皮湯身黃發熱非太陽發熱比。檗皮爲陽明經府之藥。故以清肌表之溼熱。（別錄療肌膚熱亦起鄒氏謂檗皮之用正在表裏之間）而佐以梔子甘草亦下行利小便之輕劑也。此皆於杏仁無與者。麻黃連翹赤小豆湯云瘀熱在裏身必發黃。而無小便不利與發熱等證。則其裏爲太陽之裏。（說本柯氏）太陽瘀熱非汗不解。但發表不遠熱。而陽黃之溼熱。則非熱藥所宜。惟以連翹梓皮赤小豆散熱利溼。當治裏之鉅任。而後麻黃杏仁散之於表。溼熱得以汗解。此治太陽瘀熱發黃。非治頭痛發熱身疼骨痛。故麻黃杏仁散視麻黃湯減少其數。而用於寒劑。亦不以掣寒劑之肘也。

有以杏仁治腫而正取其不發汗者。水去嘔止其人形腫一條。（痰飲篇）尤氏謂胃氣已和而肺壅未通。麻黃可以通之。甚是。惟於不用麻黃用杏仁之故。則疏之未當。夫麻黃發陽猶之發汗。以血虛而不敢發汗。猶之奪血者無汗。蓋形腫必通血絡。麻黃與杏仁所同有是能也。麻黃發汗而杏仁不發汗。則麻黃不宜而杏仁正宜。杏仁不獨發汗。此非其明徵歟。

有以杏仁治喘而不用於汗劑者。桂枝加厚朴杏仁湯。太陽病誤下。無結胸下利諸

變證而但微喘。喘既微。則表實之不解者亦僅矣。桂枝湯固不解表實。以麻黃施於微實之表邪。又豈得爲當。惟厚朴溫散勝於桂枝。與桂枝湯協以解表。則不至有大汗之虞。然不大汗。表固已解。而表解而氣不下。則喘猶不止。夫優於下氣而解表亦兼有所資者。杏仁是也。退麻黃而進杏仁。殆以是夫。

杏仁研之如脂。以濡潤之物而擅橫擴直降之長。故於傷寒雜證皆多所資藉。麻仁丸用杏仁。則於濡潤中兼取其直降也。麻仁與杏仁皆能潤液化燥。而麻仁擴脾之約。杏仁抑肺使下。(說詳大麻仁)不可謂無通便之功矣。大黃驅蟲丸用杏仁。則於濡潤中兼取其橫擴也。是方種種治法。無非爲補虛緩中之計。惟引地黃入脈絡。以行滋柔之化者。非杏仁而何。雖桃杏亦祇與驅蟲輩比烈矣。抑有但取其濡潤以佐他藥。而橫擴與直降兩無所見者。礬石丸是也。子藏中有堅癖。乾血。縱以桃杏乾漆。驅蟲輩爲坐藥。未必遂能去之。況橫擴直降。第恃有杏仁乎。夫曰經水閉不利者。有閉時有不閉時。不閉時亦不如平人之利也。藏堅癖不止。中有乾血下白物者。有宗金鑑不止不去也。子藏中有堅癖。不可去之物。實爲乾血。而不能如乾血急治也。有乾血。則經之蓄洩不以時。而溼熱釀爲白物。則自下也。此當置乾血而先治其白物。有礬石卻溼除熱。劇者不過再內而愈。然非佐杏仁白蜜以緩之和之。未必收效。如是

之捷。蛇牀子散亦坐藥也。彼治陰寒但任蛇牀子。佐白粉爲以柔濟剛。此治白物但任礬石。佐杏仁爲以潤濟燥。杏仁潤而不膩。不致減礬石之力。則有之。若云協以散結。豈伸聖意哉。

杏仁橫擴不及麻黃之峻。而於風虛之證。卻正相宜。又最宜於頭面之風。潔古云治上焦風熱。東垣云除肺中風熱。石頑云氣下則熱自解。風自散。竊謂風散則熱自解。並非以熱藥治熱風。攷千金杏酥治風虛頭痛。杏仁搗膏塗頭面風腫。治頭中痛。身熱風熱。治頭面上風。治頭中風癩。白屑各方中。皆有杏仁。又薯蕷湯薯蕷丸亦皆有杏仁。其所治之證。皆有頭目眩冒。由是推之。卽金匱薯蕷丸風藥頗多。何嘗不以杏仁治頭面風。所謂風氣百疾者。固無一不慮之周也。

烏梅

梅花苞於盛冬。梅實成於初夏。得木氣之全。而味酸。謂爲肝藥。夫何待言。然非專入肝。不兼走他經也。其氣平屬金。其味酸中有濇。濇爲辛酸之變。亦屬金。實熟則色黃。而味帶甘。烏梅乃半黃時所薰。則亦入脾胃。瀕湖謂舌下有四竅。兩竅通膽液。故食梅則津生。不知膽液上潮。口中必苦。觀素問味過於酸。肝氣以津。可知津生是生於肝。不生於膽。津生亦不是肝升。譬之手巾。用熱湯浸過。絞之。則熱氣四出。巾已就斂。

酸斂之能生津。理亦如是。肝何至升。且得之而復其下行之常矣。夫膽主動主升。肝主靜主降。梅實薰黑。味酸而苦。雖是由肝歸腎。然能激肝中之津以止渴。不能壯腎中之水以減火。素問酸苦涌泄爲陰。覈之於梅。涌卽津生之謂。泄則氣爲之下。熱煩滿爲之除。氣下熱煩滿除而心以安。本經固貼切之至。至止肢體痛偏枯不仁之方。宜連下死肌讀。爲治此等之死肌。竊謂止字疑有誤。或卽下文去字而複出一字耳。肢體痛偏枯不仁。不過血絡凝瘀。雖死肌尙有可爲。故與青黑瘡並足以去之也。諸家之論。有與愚相反者焉。有可以印證者焉。試臚舉之。張隱菴云。其味酸。其氣溫平而濡。濡附於酸。主下氣者。得春。生肝木之味。生氣上升。則逆氣自下。除熱煩滿者。稟冬令水陰之精。水精上滋。則煩熱除而胸膈不滿。烏梅無生木氣起腎陰之能。上已言之。張氏執是以用烏梅。必有爲所誤者。其弊在溫平酸濡之用。全置不講。而徒以空談爲超妙也。陳修園拾張之唾餘。別無所見。盧子繇則以本經主治。一歸之生津。至謂吮腎液以潤筋膜。鄒氏所見又與盧同。以生津爲吸寒水以制火。不知本經之除熱。是泄熱非制熱。(葉氏亦云烏梅泄熱見臨證指南) 酸苦涌泄之義不明。便無處不窒。其論烏梅丸治蛇厥也。曰吐蛇爲陽氣燥津。致蛇無所吸受而上出。則梅生津於上。豈是養蛇於上。腎陰虛不能

上濟者。不得用梅。則蛻本在下。何以有腎陰而不知吸。此既窒滯鮮通矣。又謂蛻厥非藏寒。卽氣上撞心心中疼熱之現據。不知厥陰病多陰陽錯雜。沈堯封云。厥陰於卦爲震。一陽居二陰之下。病則陽泛於上。陰伏於下。而下寒上熱之證作。蛻上入膈。是下寒之據。消渴心中疼熱。是上熱之據。凡吐蛻氣上撞心。皆是厥陰過升之病。治宜下降其逆上之陽。烏梅丸。無論黃連烏梅黃檗爲苦酸鹹純陰下降之藥。卽附子直達命門。亦何非下降。可謂精審之至矣。鄒氏於厥非藏寒句。自注云從醫宗金鑑。不知金鑑於林氏主藏寒之論。仍列於下。並未刪駁。又尤在涇解心中疼熱食則吐蛻。統謂之邪熱。姑無論於烏梅丸之治不合。卽厥陰病之陰陽錯雜。亦似有未察者。惟唐容川以西人空氣冷熱發明厥陰之道。足以上契聖心。下迪學者。空氣非愚所知。不具述。其析疼熱吐蛻爲下寒上熱也。曰消渴氣上撞心心中疼熱飢句。爲厥陰包絡挾心火之熱發動於上。不欲食食則吐蛻下之利不止。爲厥陰肝氣挾寒水之寒相應而起。夫吐蛻一也。知此條非純熱。卽知彼條亦非純寒。烏梅丸所以寒熱並進。而非藏寒蛻不上而入膈。尙何疑乎。

桃仁

桃有皮毛爲肺果。仁則主攻瘀血而爲肝藥。兼疏膚腠之瘀。惟其爲肝藥。故桃核承

氣湯抵當湯。抵當丸治在少腹。鼈甲煎丸治在脇下。大黃牡丹湯治在大腸。桂枝茯苓丸治在癥瘕。下瘀血湯治在臍下。惟其爲肺果兼疏膚腠之瘀。故大黃麴蟲丸治肌膚甲錯。千金葦莖湯治胸中甲錯。王海藏以桂枝紅花湯加海蛤桃仁治婦人血結胸。桃仁之用盡於是矣。

本經桃仁主瘀血血閉癥瘕邪氣。(鄒氏本經疏證無癥字)張隱庵以邪氣單項癥瘕。謂血與寒汁沫留聚於腸胃之外。凝結爲癥瘕。鄒氏則連上主瘀血血閉爲句。知釋以他處文法。如紫葳主癥瘕血閉之寒熱非主癥瘕血閉等例。有所不可。特變其說。以邪氣爲瘀血血閉病之因。噫。鄒氏之不知闕疑亦甚矣。其援仲聖方以自解也。曰用桃仁之外候有三。一表證未罷。一少腹有故。一身中甲錯。若三者一件不見。必無用桃仁之事。夫少腹有故身中甲錯。是著其證非溯其因。於邪氣何與。至表證未罷。如桃核承氣湯抵當湯抵當丸。則以表證雖未罷。而傷寒至熱結膀胱。則不當解表惟當攻裏。其方豈半治裏半治表哉。桃仁若與桂枝解表。則抵當何以無桂枝哉。仲聖用藥殊有分寸。抵當治瘀血之已結。故純用血藥峻攻。桃核承氣治瘀血之將結。(已結將結說本洄溪)故兼以桂枝甘草化氣。桂枝茯苓丸。下癥之方也。血病非得氣藥不化。故逐瘀止丹皮桃仁。而以荅芍約桂枝入病所。爲下癥之前導。何嘗有

一毫表證。鄒氏於藥用方義。往往得其偏端。謬爲穿鑿。實足誤人。學者不可不察也。綱目引典術云。桃乃西方之木。五木之精。味辛氣惡。能辟邪氣制百鬼。本草中如孟詵於桃膠。則云主惡鬼邪氣。陳藏器於桃櫼。則云辟邪惡氣。卽桃仁能治尸疰鬼疰。亦見於肘後諸方。然則本經此處邪氣二字。或指邪鬼氣言之。未可知也。

大棗

大棗色赤味甘。爲火土合德。甘中帶辛。其木多刺。則微兼乎金。故能安中潤液而通九竅。通九竅之效。非如細辛木通速而易見。以火金之用爲土德所掩也。生薑味辛色黃。由陽明入衛。大棗味甘色赤。由太陰入營。其能入營。由於甘中有辛。惟甘守之用多。得生薑乃不至過守。生薑辛通之用多。得大棗乃不至過通。二物並用。所以爲和營衛之主劑。

太陰溼土貴乎溼潤。溼潤太過則宜白朮。溼潤不及則宜大棗。大棗肉厚含津。不能擠泌而分。正有似乎溼土。故本經主安中養脾少津液。然其甘壅之弊亦伏於是。故腹滿最忌。胸滿心滿不忌。脇下者。少陽厥陰往來之路。而肝血脾實統之。棗補脾而性膩。亦能滯肝。故脇下至於痞鞕亦忌之。但滿不忌。

覶在心下。非脇下比矣。然脾之支脈從胃注心。棗不能無忌。而較脇下則次之。仲聖

法。和營衛以生薑三兩。大棗十二枚爲相當之數。生薑瀉心湯。旋覆代赭湯。大柴胡湯。皆心下鞭也。棗如常數。而生薑用至四兩五兩。以鞭不在脇下。故棗不去。棗之弊宜杜。故生薑加多也。

然則甘草瀉心湯何以心下鞭而生薑且無之。是則有故也。下利日數十行穀不化。腹中雷鳴。脾之虛甚矣。棗乃脾家專藥。脾虛自捷趨於脾。何至上拂其心。此與半夏瀉心湯皆病屬下後。非若生薑瀉心旋覆代赭之爲汗後。大柴胡之有往來寒熱。宜和營衛而生薑必不可去也。

腹滿必不宜棗。然亦間有用者。厚朴七物湯之腹滿是實滿。實則當下。棗尤大忌。不知病不止腹滿也。發熱十日脈浮數。表亦有邪。治兼表裏。故合小承氣桂枝兩湯而微變之。厚朴治腹滿專藥。既以爲君。又加生薑至五兩。減棗爲十枚。何患乎棗之甘壅。仲聖所以不去之者。桂枝湯爲解肌和營衛之劑。解肌不能無桂枝。和營衛不能有薑無棗。芍藥所以去之者。病本無汗。不當斂其衛氣。況有小承氣更加芍藥。則是脾約之治法。桂枝生薑。尙何望其解肌。是則腹滿之有棗。爲與生薑和營衛。又有層層顧慮之精心。寓乎其間。非苟焉者也。

有和營衛而薑棗之數加多者。竹葉湯是也。風之中人。每帶嚴寒肅殺之氣而來。適

逢產後陽虛。遂至發熱頭痛面赤而喘。是邪發太陽兼真陽上越之證。喘非衛實。故祇以桂枝桔防開太陽而不用麻杏。若面赤而頭項亦強。則爲邪入陽明。將欲作癰。故以葛根起陰氣而柔筋。附子用大。與甘草安中驅寒而回陽。此表裏之法已備矣。而赤雖爲陽越。亦由風邪化熱所致。在上之風熱。惟竹葉能散之。故以竹葉標方名。明非他中風之比。藥具陰陽。故又加人參以和之。且參能偕葛根生津協附草固裏也。然則薑棗之加多何爲。產後本已汗出表虛。此復取汗以解邪。豈尋常和營衛之數。能勝其任者哉。

有和營衛而薑棗之數加少者。柴胡桂枝湯是也。柴胡桂枝兩方。皆取微似汗。此合兩方爲一方。不在取汗而在化太少兩經之邪。使藥力微偏於裏。故雖和營衛而薑棗特減其數也。

有薑棗並用。而數不相當。卽非和營衛者。一爲吳茱萸湯。嘔加生薑。寒多加生薑。內有久寒加吳茱萸生薑。仲聖固恆言之矣。蓋吳茱萸辟厥陰之寒邪。生薑散陽明之嘔逆。生薑治寒。是散而上之。吳茱萸治寒。是辟而下之。吳茱萸湯二物並用。所治皆寒證之重者。故生薑用至六兩。胃受肝邪。其虛已甚。故以棗與人參大補其中。非與生薑和營衛也。一爲當歸四逆加吳茱萸生薑湯。當歸四逆之用棗。說具於下。此加

茱薑。因內有久寒。非茱薑不足以除之。其數更多於吳茱萸湯者。以此兼脈細欲絕之血寒也。一爲橘皮竹茹湯。橘薑並用之方。有橘枳生薑湯。有橘皮湯。胸中氣塞短氣。祇肺胃之氣結。乾嘔噦手足厥明。係噦由乾嘔而作。視單嘔者輕。乾嘔而噦故氣不行於四肢。亦祇須利肺脾之氣。宣陽明之陽。蓋以橘皮辛溫而苦能利水穀。爲脾肺之散藥泄藥。生薑辛而微溫。爲肺胃之散藥升藥。二物有相須之益。故常並用。此噦逆而用橘薑。意亦如是。徐氏以橘皮與竹茹一寒一溫爲對待。釋之失其旨矣。夫胃逆總由於肝逆膽逆。肝逆則寒。以吳茱萸逐肝寒。膽逆則熱。以竹茹泄膽熱。此天然對待之藥。方用竹茹。是爲膽逆而噦。惟橘皮用至二斤。生薑用至半斤。熱除氣平而中亦愈矣。大棗參草。所以補中而善後也。一爲黃芪桂枝五物湯。桂枝湯外。證得之爲解肌和營衛。內證得之爲化氣調陰陽。(徐忠可語)此治血痹陰陽俱微。故於桂枝湯中重加生薑以宣陽。加黃芪以開痹。棗得芍藥則化陰。得桂枝則化陽。雖安中而仍能走表。若再加甘草。則守之太過。故大棗不可無而甘草必去之一。爲射干麻黃湯。證屬肺家邪實。用生薑是與麻黃同洩肺邪。肺洩則傷。卽宜安中生金而杜後患。故入大棗爲隨劑隨撫之策。以無桂枝杏仁。故麻黃生薑俱用至四兩。大棗祇綠麻薑多而佐之。故減爲七枚。一爲炙甘草湯。病至脈結代心動悸。不止營衛之不

和矣。治以益營補中。則脈復而悸平。生薑與參桂麻麥膠地清酒並施。所以益營而通脈。營出中焦。中不治則血不生。故用棗草以補中而數較生薑爲多也。有薑棗並用。而數相當。亦非和營衛者。黃芩加半夏生薑湯是也。黃芩湯之用棗。說具於下。此加夏薑。專爲治嘔。薑不加多者。多則於自利有妨也。薑棗之數相當者。適然之事也。(桂枝湯內外證皆治小建中湯即桂枝湯加饴糖。故不以薑棗之數相當列入此條)

試更舉有棗無薑之方疏之。以畢其義。一爲當歸四逆湯。厥陰血虛中寒。用桂枝湯內四物加當歸細辛通草。所以溫血散寒而通脈。散不宜過。故生薑去之。棗加多者。以能補中而隨當歸輩生血液也。一爲黃芩湯。太陽少陽合病。下利。與太陽陽明合病。下利。何以治法迥異。蓋太陽去陽明最近。雖下利而太陽之邪在表者。曾不少衰。故以葛根從陽明達太陽之藥。協麻桂解之於表。加芍藥者。約三物峻發之性。而使之迴旋兩經也。太陽去少陽較遠。旣下利則熱氣內淫。不能挽少陽之邪。轉從太陽而出。故以黃芩清少陽之藥。專治其利。加芍藥者。恐病邪猶戀太陽而不使之合也。或曰。葛根湯發汗必虛其表。不可無薑棗和營衛。黃芩湯之不用薑。固其宜矣。獨棗液。非清不治。何敢再犯溫燥。惟利則脾虛。補脾而復能潤液者。舍大棗莫屬。况燮柴

胡湯而仍用和法。棗與甘草皆不得無之。若陽明下利之宜大小承氣者。棗草又大忌矣。一爲黃連湯。凡病有但熱無寒。據脈證一二可斷爲少陽者。如嘔而發熱者。小柴胡湯主之。傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽。所謂有柴胡證。但見一證便是。不必悉具也。如寒熱兼有之少陽病。在表者爲往來寒熱。在裏者爲喜嘔爲腹中痛。其有表無寒熱而但裏有寒熱者。如黃連湯。腹中痛者寒也。欲嘔吐者熱也。寒在脾熱在胃。乃不曰脾胃病而以爲少陽病者何也。(方中行條辨列少陽篇金鑑亦依之)蓋少陽居半表半裏。出表挾陽而犯胃。則欲嘔吐。入裏化陰而侮脾。則腹中痛。胃既熱則胸不能獨寒。胸中有熱。胃中有邪氣也。胃中之邪。卽少陽之邪也。病屬少陽。自當以小柴胡湯增減治之。表無寒熱。故去柴胡。腹中痛。故去黃芩。治欲嘔之胃熱。故以黃連佐半夏。治腹痛之脾寒。故以乾薑佐人參。胃治則降。脾治則升。脾升胃降。少陽可不治而自治矣。而猶有慮焉者。藥兼寒熱。不和其在裏之陰陽。則少陽之氣未必肯抑然而自下。故又加桂枝協甘草以化氣而和之。有桂枝若不去生薑。則桂枝趨重於表。用之何益。且表無寒熱。營衛無待於和。棗則補中而能滋熱耗之液。故生薑不可有。而大棗不可無也。一爲甘麥大棗湯。藏燥或主五藏。或主心藏。或主肺藏。或主子藏。竊於數說中衡之。似以子藏爲當。子藏卽子宮悲。

傷欲哭諸端。雖見於心肺腎三經。而總由於子宮燥氣乘之而致。子宮之燥。則由胃家陰液不足以滋之也。(略參唐容川說)甘麥甘涼。所以益陰清熱。大棗甘而微溫。復响其中宮之氣。藏陰之受蔭者大矣。治在滋燥而屏血藥不用。豈血虛勞損者比乎。一爲十棗湯。芫花甘遂大戟皆毒藥。而並用之以逐飲。且不下不止。飲隨下去。則脾傷而液虧矣。藥之足以補脾潤液而禦毒者。無過大棗。若云培土以制水。則峻逐之際。何藉於制。夫三物走駛而大棗遲重。相反而適相濟。蓋與和營衛之偶生薑。瀉肺滿之偶夢塵。又初無二致也。一爲茯苓桂枝甘草大棗湯。發汗後。仲聖每以薑棗和營衛。此發汗後而臍下悸欲作奔豚。則腎氣正思上乘。不得兼顧其表矣。茯苓桂枝。所以洩腎水驅腎寒。不用薑者。慮其與桂枝升表也。甘草大棗。則補中宮以禦之。一爲附子粳米湯。說具飴餗。

木瓜

木瓜味酸氣溫而質津潤。皮始青而終黃。肉先白而後赤。爲肺胃肝脾血分之藥。津潤之物。似溼證非宜。然風以勝之。土以制之。溫其氣以行之。溼之挾寒者。詎不能療。肝主風木。木得溼則盛。既卻溼而平木。故風亦自息。其味酸。能收而不能散。能下抑不能上升。故所主爲筋轉筋弛之證。在下焦者多。在上中焦者少。用是物者。能於仲

聖風溼寒溼諸方之所以不用而轉求其可用。則思過半矣。

轉筋由於霍亂。霍亂而不轉筋者。非木瓜所司。其證有寒有熱。治法天淵。不得稍存偏見。至於轉筋。愚則謂縱屬熱證。亦必微兼冷氣。蓋筋屬肝。肝就溼而拒冷。亦就亦拒。斯足筋爲轉。足脾屬陽明。木瓜入陽明筋轉之所以溫之潤之。兩適其性。若非溺祕邪無出路。必無不愈之理。且木瓜溫而非熱。潤而非燥。雖熱證何至有害。要在制剂配合之有道耳。

攷古方用木瓜之證。如腳氣腳癰腹脇脹滿。多與辛溫藥爲伍。不外驅寒溼之邪。輯浮散之氣。雖功在降抑。而終不離乎斂。故其治筋病於轉戾爲宜。拘攣則非其所長。獨許叔微以木瓜治項強筋急。謂少陰之筋從足至項。爲肝腎受邪所致。是病雖在上。而因仍在下。其以乳香沒藥爲佐使。則其以伸筋任乳沒。不以責木瓜。亦可見矣。

枇杷葉

枇杷葉背有黃毛。黃入胃而毛屬肺。其味苦平。故能和肺胃而降氣。別錄主卒嘔不止。鄒氏不言嘔爲何病。而但以陰和陽陽入陰釋之。似精而實泛矣。夫卒嘔者。嘔逆之謂。不。止者連續之謂。嘔逆多卒發而連續。其所以主之者何故。蓋胃爲肝干則逆。胃逆而肺欲降則呃。枇杷葉青翠不彫。煮汁則冷。有抑肝陽之能。且使肺胃咸循其

降納之職。陶隱居云。若不暇煮。但嚼汁咽亦瘥。其效之速如是。然則
蜀椒所以治冷
呃。枇杷葉所以治熱呃。非天然對待之劑耶。
用枇杷葉者。於熱嗽。熱嘔多有之。熱呃少見。但能認定枇杷葉爲降氣除熱之物。則
以之治嗽治嘔治呃。皆發無不中。

蜀椒

蜀椒爲足太陰及右腎氣分之藥。祛脾腎之寒溼而不治風寒風溼。若但寒無溼。亦
有不宜。治寒溼無分脾腎。而補火則獨在腎。何以言之。性溫燥而下行。足以祛寒溼
而不足以祛風。皮紅膜白。闌以黃肉。極裏之子則黑。爲由肺歷脾入腎之象。故能使
水中泛出之火。仍歸水中。然則肺病宜不相涉矣。而何以亦兼隸之。肺有寒飲無寒
溼。寒飲之病。從不以椒治。但寒之病。亦未嘗以椒治。惟脾腎之寒溼上沖而爲肺病
挾火者。以椒引而下之。始爲恰當。脾腎病在本藏。肺病則由脾腎連及。所治雖同而
本末攸異。此愚所以不以手太陰藥並提之也。

椒旣由肺抵腎。勢不中停。自當以溫腎爲首功。故他物溫脾寒除脾溼。效惟在脾而
已。椒則歸宿在腎。不第供職於脾。雖然。脾居中宮。不能飛渡。有腎病。脾不病。而可以
椒治者乎。則試取仲聖方覈之。烏頭赤石脂丸。邪在上焦。而用烏附乾薑石脂中下。

焦之藥。非脾腎有寒溼不爾。更佐以蜀椒。非引火下歸不爾。白朮散。尤氏謂治寒溼之劑。朮芎與椒牡並施。意自在於溫下。他如大建中湯烏梅丸。一爲嘔痛腹滿。一爲厭嘔煩。皆病在脾腎而陰中有陽。則其用蜀椒也。又豈有二道哉。

吳茱萸

吳茱萸樹高丈餘。皮青綠色。實結梢頭。其氣躁。故得木氣多而用在於肝。葉紫花紫。實紫。紫乃水火相亂之色。實熟於季秋。氣味苦辛而溫性且烈。是於水火相亂之中。操轉旋撥反之權。故能入肝伸陽戢陰而辟寒邪。味辛則升。苦則降。辛能散。苦能堅。亦升亦降。亦散亦堅。故上不至極。上下不至極。下第爲辟肝中之寒邪而已。

嘔吐有寒有熱。不因少陽干胃。卽屬厥陰干胃。少陽干胃。則如心煩喜嘔與嘔而發熱。皆是厥陰干胃。則如嘔而胸滿與乾嘔。吐涎沫頭痛。皆是仲聖小柴胡湯。吳茱萸湯分主甚明。雖然。有嘔吐主以吳茱萸湯。而曰陽明病少陰病者。人必謂於厥陰無與矣。而不知實厥陰病之見於陽明少陰也。何以言之。食穀欲嘔者。肝受寒邪。上攻其胃。不食穀。則肝氣猶舒。食穀。則肝不能容。而欲嘔。與胃虛之有胃反迴殊。故非吳茱萸湯不治。夫肝邪上攻。則胃病爲木乘土。下迫則腎病爲子傳母。迨子傳母。則吐利交作而不止一吐矣。少陰自病。下利已耳。未必兼吐。吐而利矣。未必兼逆冷煩躁。

吐利而且手足逆冷煩燥欲死。非肝邪盛極而何。此時療之。舍吳茱萸湯亦無別法也。吳茱萸湯方義詳大棗。

愚既以吳茱萸爲肝藥。夫血藏於肝。溫肝自當溫血。而不知吳茱萸能散血中之氣寒。非能溫血中之血寒也。厥陰病至於吐利手足逆冷煩躁欲死。若是血病。何得無當歸。當歸四逆湯脈細欲絕。血寒之證也。何以反無吳茱萸。及知有久寒而後加之。卽其非胃藥腎藥亦有可證者。在陽明乃兩陽合明。寒不易受。仲聖言胃中虛冷者不一。無用吳茱萸之方。縱云吳茱萸兼治胃寒。夫豈不聞乾嘔吐涎沫頭痛之厥陰病。非吳茱萸不治乎。吳茱萸既爲肝寒要藥。以移治胃寒。肝不寒之病。甯能無誤。故仲望恐人誤用。又申之曰得湯反劇者屬上焦。然則治上焦之藥何在。半夏乾薑散。正治乾嘔吐涎沫之胃寒也。他如甘草瀉心湯。黃連湯。中有乾薑。亦所以治胃寒。愚於此又悟乾薑吳茱萸與黃連黃芩爲對待矣。本經黃連主腸澼腹痛。黃芩主腸澼不主腹痛。故小柴胡湯腹痛去黃芩。而黃連湯腹痛則用黃連。同一寒藥。不能通用。如是。豈有同一熱藥可漫無區別。愚不以吳茱萸爲腎藥者。蓋亦以別有腎藥。與吳茱萸分疆而治者也。溫腎者爲附子。溫脾者爲乾薑。太陰藏寒曰宜四逆輩。以四逆湯非溫脾之正方也。溫脾正方爲理中丸。理中丸固有乾薑無附子。而四逆湯

治腎有附子又有乾薑。則又何也。蓋腎寒必上侮其脾。乾薑在脾爲中權。在腎爲前茅。故薑附不可缺一。吳茱萸豈其比乎。夫腎藏者真陽所寓。有扶陽以抑陰。無辟陰以傷陽。吳茱萸得屬名於少陰者。非能治腎寒也。治肝寒之流及於腎者也。就是數者反覆覈之。尙何疑。吳茱萸之非血藥。非胃藥。非腎藥哉。

溫經湯有瘀血在少腹。而以吳茱萸爲君。非以其能行瘀也。婦人年五十所而病非新得。宜緩圖。不宜峻攻。故不用下瘀血湯抵當湯。而以桂枝芍藥丹皮三味行瘀。卽以三味協參草芎歸膠麥薑。夏補中調氣。和血濡燥。爲之綢繆者。已無微不至矣。更何需苦溫辛烈之吳茱萸哉。不知婦人之病。多因虛積冷結氣瘀。瘀血在少腹不去。其爲有久寒可知。衝任之血。肝實主之。肝中積結之氣。非吳茱萸詎能辟去。此實是證之樞紐。曰溫經者。紀其實也。

吳茱萸上不至極上。下不至極下。然吳茱萸湯之厥陰頭痛。溫經湯之瘀血在少腹。何非極上極下。要皆爲辟肝寒之效所及。非能徑抵頭與少腹也。由是推之。吳茱萸之用。亦禁廣矣。胃主降。脾主升。脾之所以升。實得風水制化之益。故肝病者脾必病。吳茱萸能入肝驅邪。化陰凝爲陽和。脾何能不溫。腹痛腹脹。何能不治。其性苦過於辛。降多而升少。肝主疏泄。肝平則氣自下。此所以又利大腸壅氣治滯下也。

抑有用之爲反佐者。古方左金丸治肝臟火實。左脇作痛。似非吳茱萸熱藥所宜。顧其方黃連多於吳茱萸五倍。肝實非吳茱萸不泄。連多茱少。則不至助熱。且足以解鬱滯之熱。肝脾兩獲其益。故腹痛用之。亦每有神驗。活法在人。未可爲膠柱鼓瑟者道也。

藕 雞頭實

藕始終以生以長。以穿穴於水中。而孔竅玲瓏。絲綸內隱。故能入心所主之血。又味甘入脾而氣則寒。故爲心脾二經涼血散瘀之藥。

雞頭植於水與藕同味。甘平補中亦同。惟藕始終不離水而善穿泥。雞頭則取苞中之實。而苞有青刺。結必向陽。藕氣寒而雞頭氣溫。藕性潤而雞頭性燥。藕所以爲血藥者。以其在水中穿穴也。雞頭所以爲氣藥者。以向陽而得天氣也。藕氣寒性潤善穿。故能散血除熱。雞頭氣溫性燥有刺。故能除溼通痹。

雞頭主溼痹。取其能通。然其通以濇爲通。故本經又以益精氣繼之。後世用於遺精帶濁小便不禁之方頗多。則濇精之功較勝於通脾之功效矣。

土寄旺於四時。而人身之土亦然。天地生補土之物以爲人用亦然。白朮補土爲補土之本宮。固醫無不知矣。竊謂補心中之土者蓮實也。補肝中之土者薏苡也。補肺

中之土者山藥也。補腎中之土者雞頭實也。白朮而外。四物皆飲饌之常品。可見心肝肺腎土有所歉。亦賴飲食以補之。偶有所見。附誌於此。

柏實

柏爲百木之長葉獨西指。是爲金木相媾。仁則色黃白而味辛甘氣清香。有脂而燥。雖潤不膩。故肝得之而風虛能去。脾得之而溼痹能通。肺得之而大腸虛祕能已。竹皮大丸喘加柏實者。肺病亦肝病也。蓋婦人乳中煩嘔。是肝氣之逆。逆則不下歸腎而上衝肺。柏實得西指之氣。能降肺以輯肝。喘甯有不止。此與他喘證不同。故用藥亦異也。

桂枝

素問辛甘發散爲陽。此固不易之至理。然亦看用法何如。桂枝甘草湯純乎辛甘。反能止肝。以甘過於辛也。辛若兼苦。發汗斯峻。桂枝辛而不苦。且與甘埒。色赤氣溫。有條理如脈絡。質復輕揚。故祇能於營衛之間。調和其氣血。俾風寒之邪無所容而自解。木經如麻黃羌活防風。葛白川芎等。皆主發表出汗。而桂枝無之。桂枝所優爲在溫經通脈。內外證咸宜。不得認桂枝爲汗藥也。麻黃桂枝兩湯。一治無汗。一治有汗。分別甚明。且云桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊發熱汗不出者。不可與也。申繩何等。

嚴切。果證與方合。如法服之。未有不汗出而愈者。否則謬欲取汗。害乃大矣。

桂枝湯一方。論者紛紛。就愚所見。惟成無己尤在涇劉潛江三家。最爲允當。三家之中。又以劉爲勝。特方用芍藥爲臣。其所以然之故。皆未盡發出。芍藥分數。不減於桂枝。自來佐芍藥以解表者。古方有之乎。無有也。然則芍藥誠是方之關鍵矣。劉說載本經疏證麻黃下。鄒氏疏麻黃第二條。自昔人泥於傷寒脈法篇。至不爲虛設矣。眞洞見兩方精奧。惟潛江云。桂枝發於陽。入於陰。且助以芍藥之通營。乃能遂其由陽和陰之用。不知桂枝兼入營衛。氣惟外揚而不內向。仲聖用桂枝解表之方頗多。非概佐以芍藥。此所以加芍藥者。太陽中風。風傷其衛。衛曳營氣以外洩。故陽脈浮而發熱。陰脈弱而出汗。衛由是而強。營由是而弱。是衛不與營和。非營不與衛和。桂枝能和兩弱之營衛。而不能和衛不就營之營衛。能由陰達陽。而不能由陽返陰。芍藥正與相反。斂之以芍藥。則衛不外泄。而入裏以就營。又歎粥以充其胃。溫覆以遏其表。桂芍並用。爲一散一斂。粥覆並行。爲一充一遏。法如是之密者何也。非此而營衛不和。則邪汗不去。正汗不生也。潛江惟看芍藥尙不甚眞。故覈之方證。皆微有隔閡。餘則矢穿七札矣。

天地間凡名陰名陽之物。皆陰中有陽。陽中有陰。非判然各出。始名之爲陰爲陽者。

風與衛皆陽也。風自傷衛。寒與營皆陰也。寒自傷營。但中風豈是有風無寒。傷寒豈是有寒無風。仲聖文多前後詳略互見。與夫言外之旨要在人潛思而得之。昔人泥於仲聖風則傷衛。寒則傷營之言。柯氏以下多非之。今唐氏容川又謂太陽寒水之氣發於至陰而充於皮毛。皮毛爲衛所居。故寒當傷衛。厥陰風木屬肝。肝主營血。故風當傷營。無汗用麻黃。明是治衛氣之藥。有汗用桂枝。明是治營血之藥。桂枝證。嗌惡寒者。是言皮毛一層。自汗皮毛開。故遇寒則欲閉而作嗌嗌之狀。因皮毛開。衛氣無守。故惡寒也。淅淅惡風者。是言肌肉一層。汗既漏出如淅米之狀。故曰淅淅。風來乘之。直入肌肉。則營血受傷。故惡風也。噫。容川旣謂西法與仲景書字字符合。何以論仲聖之方。絕不顧仲聖之論。斯亦可異之甚矣。桂枝湯方義。愚已列前。茲再就容川之言明辨之。麻黃桂枝兩方。祇受邪淺深之分。無風寒各病之別。故麻黃治傷寒亦曰惡風。桂枝治中風亦曰惡寒。乃容川視兩證若風馬牛不相及。又以桂枝之中風爲風中厥陰。直入肌肉。此金匱要略之中風。出入甚鉅。鳥得不審。汗自出者。不藥而汗自出之謂。正風傷衛之證據。容川謂自汗皮毛開。無故插入雜證之自汗矣。否則風不傷衛。何以皮毛自開汗自出。衛分毫不作主。一是任風邪飛渡。內汗漏出。豈有表閒藩籬盡撤。而仲聖尙思以桂枝湯治之之理。况傷

衛者爲寒爲麻黃證。而麻黃湯內之桂枝。容川則謂從血分外達筋節。寒不傷營。何以加此無干之血藥。凡此揆之仲聖本論。悉多枘鑿。實不能爲容川解也。

容川之論桂枝湯全方也。曰邪在營分。用甘棗補脾。從脾之膏油外達以托肌肉之邪。用白芍行肝血。從肝膈透連網外達肌肉。以行營血之滯。用生薑宣三焦少陽之氣。從連網達腠理以散外邪。尤重在桂枝一味能宣心陽。從小腸連網以達於外。使營血充於肌肉。閒而邪不得留。然則此方正是和肌肉治營血之方。正是小腸血分之方。若不知水火合化之理。則此方之根源不明也。按仲聖桂芍並用之義。愚已具前薑棗爲和營衛。亦詳大棗。蓋桂芍和營衛爲解表。薑棗和營衛爲補表。炙甘草則安內攘外司調人之職者。以仲聖書統攷之。自知鄙說之非妄。容川以甘棗爲托邪。則薑棗之義亡。而桂芍爲無功矣。芍藥何能外達。營弱何嘗營滯。論經絡。則三焦。小腸與膀胱原屬貫通。論病證。則六經各有界址。未便牽混。且五物非合以散邪之藥。縱如其言。豈不取汗甚捷。而何以汗不出者反不可與。吾恐容川所謂根源者。非此方之根源矣。

容川之於內經仲聖書。宜活看者。偏板看之。宜合看分看者。偏分看合看之。自相齟處。亦往往有之。傷寒六經。沿張令韶陳修園之誤。不分手足。夫六經配六氣。主足

不主手。有礪不可易之理。不能意爲合併。試問小腸丙火。可以膀胱寒水之方桂枝麻黃治之乎。容川以風屬厥陰。便謂太陽中風卽中厥陰。不知寒水乃風水之母。風從皮毛而入。母先受之。病自在太陽不在厥陰。又誤以心主營血爲肝主營血。桂枝證爲風傷營非風傷衛。展轉淆混。胡可爲後世訓諸。厥陰爲陰之盡。多純寒之證。其有寒熱錯雜者。以內包少陽相火也。故風有寒有熱亦當兼少陽言之。震爲東方之卦。東爲生風之方。少陽甲水。正符易之震卦。震不言木而言雷者。明陽動之時。甲木之所由生也。一陽在下。陽之所以稊也。巽爲木爲風。易則明示之矣。風木自屬厥陰。厥陰陰已盡。故一陰居下。巽以厥陰而位東南。非東南不生風木。亦足見風之爲陽邪也。由是觀之。風之寒者厥陰之本氣。熱者少陽之兼氣。其在內經所謂厥陰不從標本從乎中也。容川又泥之至矣。謂中氣爲化。是指沖和之陽而言。不指火熱而言。不知厥陰總不離乎少陽。有化時亦有不化時。譬之夫婦。倡隨時是夫婦。反目時非夫婦乎。且容川第以陽言沖和。則少陽一經宜無時不沖和。何以竟有火熱之證。此理不易曉乎。容川又於厥陰病分肝與包絡爲二。言寒則舍包絡。謂肝挾腎水而生寒。言熱則舍肝。謂包絡挾心火而生熱。夫肝至挾腎。包絡至挾心。旗鼓各建。必有非常之寒熱病。執是說以治寒熱兼有之肝病。庸有當乎。西醫考究形質。至細至精。原

非欺人。特人身陰陽消息。與病氣出入之機。有未可以形質印定者。若太陽病以厥陰擬方。厥陰病以包絡與腎擬方。漫謂於古法有合。則於談中西醫也。何容易焉。容川於修園書謂非攻修園欲襄其不逮。愚於容川亦云。

醫不講內經。不講形質。則已。講內經。講形質。而於仲聖方。仍枘鑿而不入。何裨於醫。張令韶。唐容川。其彰彰者矣。姑舉太陽一經言之。太陽病下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯方。誤下無不邪陷。邪陷而氣衝。是下藥激動其太陽之府氣。經所謂是動則病衝也。表病仍在。故可與桂枝湯。或疑氣衝何竟不治。不知膀胱受寒。下之累。惟辛溫能止其衝。桂枝乃下衝妙藥。仲聖屢用之。既下衝而復能解表。孰有善於桂枝湯者。不曰宜桂枝湯。而曰可與桂枝湯方。是用其方。而猶有斟酌之意。在或桂枝加重。或外加茯苓。固可揣而知者。用前法三字。洞溪謂指誤治極是。否則服湯後。自應不上衝。而又云不可與何耶。愚之解是方。如是修園則否。而又引張令韶云。太陽之氣。由至陰而上於胸膈。由胸膈而出於肌腠。由肌腠而達於皮毛。愚不知其所指。殆爲氣衝而發。夫太陽之脈動。則病衝。不能不涉及衝脈。然其所以然。亦祇得付之蓋闕。如令韶言。則是行身之前矣。令韶論傷寒。不分手足經。豈因手太陽脈有循咽下膈。一

語耶。若然。則以經文計之。當由小腸至胃。由胃至膈。由膈至咽。亦不從皮毛而出。於足太陽之治。實去而千里。雖然。其所言手太陽也。其所用之藥。則不知非手太陽也。石勒所謂賴有是者也。胸脇爲少陽厥陰兩經經脈之所至。故胸滿脇痛爲傷寒少陽病。若脇中痞癢。則加牡蠣厥陰藥。何經見何經之病。與靈樞經脈篇毫髮不爽。而容川論太陽病十日已去脈浮細而嗜臥一節。謂脈浮爲外已解。脈細嗜臥。則是病及少陰。元陽不得外出。當用附子細辛湯治之。考少陰篇無此方。必是謂麻黃附子細辛湯。而佚去麻黃二字。乃其於少陰篇解麻黃附子細辛湯。則云邪從表入。合於太陽經。仍當從表以汗解之。且於發熱上加惡寒字。茲擬移治脈浮細嗜臥之太陽病。以脈浮爲外已解。豈用於彼爲解外。用於此則否耶。又有奇者。於胸滿脇痛之下。小柴胡湯之上。添入脈細嗜臥。豈脈細嗜臥無兼證。則應用麻黃附子細辛湯。有兼證。則脈細嗜臥可全然不顧耶。於脈但浮之下。麻黃湯之上。添入嗜臥。嗜臥非少陽仲聖之麻黃湯也。豈麻黃湯不妨治少陽病耶。至謂胸滿脇痛。是因三焦之膈膜不暢。致腎氣不得外出。則視手足少陽全無區別。而不知有大不可者在。容川旣尊內經尊仲聖矣。試問靈樞足少陽口苦胸脇痛等證。手少陽有之乎。小柴胡湯之爲治。

足少陽。尙何疑乎。容川所謂中西匯通者。大率類是。其全書豈勝指摘。(傷寒淺注補正
金匱淺注補正)偶有所觸。附誌於此。願以質世之深於長沙學者。

傷寒六經不分手足。已屬大謬。而容川更於形質可通之處。悉力推演其說。勢不至
茫無畔域。盡失古聖分經之旨。不止。而容川不自知也。此其弊蓋自其治本草始矣。
於桂枝湯論桂枝。曰桂枝宣心陽。從小腸連綱以達於外。於麻黃湯論桂枝。曰桂枝
從肝之血分外達筋節。宣之使出於五苓散論桂枝。曰導心火下交於水以化氣。於
桂枝去桂加茯苓白朮湯論五苓散。曰用桂枝以宣太陽之氣。氣外達則水自下行
而小便利。於本草問答論桂枝。曰桂枝色赤味辛。亦是入心肝血分之藥。而五苓散
桂苓五味甘草湯。均取其入膀胱化氣。非桂枝自能化氣。實因苓澤利水。引桂枝入
於水中以化水爲氣。按其說紛然殼亂。茫無眞見。旣以桂枝爲心藥肝藥矣。又云亦
是入心肝血分之藥。不知究是何藥。旣云宣太陽之氣。氣外達則水自下行矣。自應
不入膀胱。又云取其入膀胱化氣。旣云入膀胱化氣矣。又云非桂枝自能化氣。得苓
澤而後化水爲氣。水旣化而爲氣。其尙有不化之水走小便否耶。以其說還叩之容
川。當亦有啞然笑者。夫桂枝非不入心入肝也。知其入心入肝。而不知其爲中風自
汗之太陽藥不可也。惟知其爲太陽藥而不達皮毛以泄汗。則桂枝湯不止治自汗

之邪。桂枝亦不止爲太陽之藥。此其法備見於仲聖方。今具論如左。

桂枝用一分之方。曰竹皮大丸。乳子之婦。煩亂嘔逆。此陽明熱熾。中氣大虛之候。鎮中宮而甯天君。惟甘草爲補虛之選。故非多其數不爲功。然補虛不先之以拯亂。必無益而有害。石膏白薇皆陽明藥。所以平嘔逆而召浮陽。陽明之熱由膽而來。竹茹所以清膽火。以寒藥於病爲宜。而扶生氣非宜。甘藥於虛爲宜。而有胃熱非宜。故甘草生用則不致過守。略加桂枝。則與甘草辛甘相合。以化氣。如是而拯亂之藥皆得。有補虛之益。故名之曰安中益氣竹皮大丸。

桂枝用二分之方。曰蜘蛛散。桂止二分。勢不能入下焦。妙在以蜘蛛十四枚炒焦引之。故蜘蛛得桂而升。桂得蜘蛛而降。狐疝時上時下。蜘蛛協桂。亦時上時下。所以能洩肝邪而治狐疝也。曰五苓散。汗出而津虧。胃燥則消渴。膀胱之氣不化。則水蓄而小便不利。脈浮微熱。則表邪猶在。二苓澤瀉。所以導水利小便。白朮所以補脾生津。桂枝少用。所以解表。且與四物共以散服。多飲緩水。則太陽經府之氣俱化。此蓋表裏分治而又欲其和衷共濟也。

桂枝用三分之方。曰土瓜根散。四物皆止三分。杵爲散而酒服。取其清疏通降。能行瘀而澤枯。其中又有分有合。桂與酒橫行脈絡。麤與芍下入少腹。土瓜根則合上

以聯貫之。所以爲治經水似通非通之良劑也。

桂枝與他藥各等分之方。曰桂枝茯苓丸。桂枝無下癥之能。下癥而用桂枝。似非多不濟矣。然妊娠之時。宜漸磨不宜急攻。逐瘀止丹皮桃仁。而以桂苓化氣。爲血藥之前驅。芍藥行陰。爲氣藥之管束。五味各等分蜜丸。原非溫經湯。下瘀血湯之比。桂枝奚嫌其少。少用而無處其不下趨者。則又藉苓芍之力也。曰半夏散及湯。此必少陰寒邪。挾痰涎壅於咽中作痛。不然三物辛甘溫燥。而甘草且以炙用。於熱痛決非所宜。不得以從治爲解。可見桂枝少而服散。並能上治咽痛。君以半夏。協以炙草。皆所以化氣而和解之也。

桂枝用一兩之方。曰桂枝甘草龍骨牡蠣湯。煩燥由於燒鍼。是心腎胥爲之震懾矣。龍牡所以鎮腎陽。桂甘所以安心陽。因無他證。故亦不加他藥。桂枝特少者。不使隨龍牡以下趨。甘草倍桂枝者。並益中氣而和三物也。曰枳實薤白桂枝湯。胸痹是病名。下乃詳言其證。以胸痹有不同也。氣至於結。胸至於滿。薤括力有不逮矣。故更以桂枝佐薤白散結。厚朴佐栝樓泄滿。枳實用爲君者。所以平脇逆也。曰竹葉湯。此中風由寒化熱。將由太陽入陽明而真陽適虛之證。桂枝解表化氣。以剷寒邪之根。止用一兩者。以病本無汗。多則侵葛防發散之權也。

桂枝用二兩之方。曰麻黃湯。桂枝所到之處。皆麻黃所到之處。既用麻黃又加桂枝。愚於麻黃已略著其說。試更申之。傷寒之邪。錮閉營衛。至於頭痛身痛腰痛骨節痛。發之既暴而所及復廣。非得橫厲無前之麻黃。不足以戡定禍亂。非得從容不迫之桂枝。不足以搜捕餘孽。且麻黃性剛。桂枝性柔。以剛遇柔。並能少節其性。不致直前不顧。桂枝止二兩者。以倚重在麻黃也。曰桂枝加黃芪湯。此段敍黃汗之證甚雜。注家亦頗顛預。大抵營衛之閒。水與熱交蒸而滯其行度。非挾寒挾虛不爾。欲溫經化氣以泄黃汗而取正汗。自惟桂枝湯爲當。第桂枝湯所治爲衛強。此則衛弱。故加黃芪益衛氣而疏之。更減桂芍以節其內向而外交於衛。斯邪不能容而正乃復矣。桂芍黃芪三味。爲黃汗必需之藥。彼芪芍桂酒湯。多其數而又重加苦酒者。以脈沈非此不能泄邪也。曰厚朴七物湯。桂止二兩而生薑用至五兩。則散寒之力優。不致因桂留邪矣。表裏兼治。故以大棗安中。甘草和之。草不炙者。以有小承氣攻裏。不宜過守也。薑多棗少者。病非自汗。不以補表也。曰茯苓甘草湯。傷寒汗出而渴者。五苓散主之。汗出屬表邪未盡。渴則太陽之邪已由標傳本。以五苓散表裏兩解之。其小便不利可知。此與脈浮小便不利微熱消渴與五苓散者。正復無異。下云不渴者。茯苓甘草湯主之。是明指尙有表邪而言。不渴則胃不熱而水停於上。又與真武湯及茯

苓桂枝白朮甘草湯之汗出液虛。腎水上救相似。不過有微甚之分耳。彼甚此微。故但以茯苓一味消心下之水。桂甘生薑解其表邪。卽無他慮。桂甘少用者。並欲其扶心陽治悸也。無芍藥者。邪已傳本。若再斂之。則表不解也。無大棗者。茯苓少。則腎不傷。不必滋液也。曰茯苓澤瀉湯。胃反由胃中虛冷。桂枝協生薑散寒。協甘草溫中。以治在上焦。故止用二兩。餘詳茯苓。曰桃核承氣湯。此於外解後用之。桂枝豈爲解表而設。太陽傳本。熱與血結而爲少腹急結。桃仁黃消。皆所以攻之。氣爲血帥。氣行而血乃行。故以桂枝入膀胱化氣。甘草則甘以緩急也。桂止二兩。何以能入膀胱。以大黃輩得之。則與俱下。且多則助膀胱之熱也。曰桂枝加葛根湯。葛根治項背強几几。義詳葛根。葛根湯與此祇麻黃一味。有無之分。以彼爲無汗惡風。此爲汗出惡風也。太陽病汗出惡風。桂枝湯正其所宜。惟加葛根以治項背強几几。則以解肌起陰氣爲重。和營衛次之。故桂芍減桂枝湯各一兩。曰溫經湯。桂枝少。則疏通經脈。約以芍藥。則能入下焦化氣。用薑不用棗者。不以補表也。餘詳吳茱萸。曰本防己湯。膈屬肺。胃腎三焦之脈所歷。支飲橫於膈間。滯其肺胃之氣。則喘則滿。則心下痞堅。下與腎相感召。則腎氣上乘。而面色黧黑。脈得沈緊。病固不獨在上也。防己外白內黃。有黑紋如車輻。氣味辛平。能行膈間之水。由三焦以下輸於腎。腎得之。則氣平。佐以桂枝。

一苦一辛以散結。則心下之痞堅去。然停飲至數十日之久。肺胃已鬱而成熱。非泄熱則喘滿不止。故又佐以石膏。吐下之後。中氣與津液大虧。故又佐以人參。又云虛者卽愈。實者三日復發。虛與實皆指腎氣而言。腎虛則肺降而腎安。實則非鹹寒以利之。淡滲以伐之。氣必復上。注家不知其證之關腎。好爲影響之談。那得於藥證有合。

桂枝用二兩半之方。曰薯蕷丸。風氣百疾。蓋卽風虛之證。久踞於肌肉筋節間。而非初感之可以汗解者也。虛勞諸不足。乃其病根所在。方以補虛爲主。驅風次之。薯蕷人參白朮甘草地黃麥冬阿膠大棗。填補者也。餘十三味。疏瘀鬱調陰陽。以補虛而驅風者也。其真正風藥。祇防風一味耳。填補中兼能驅風者。以薯蕷爲最。故君之。

桂枝用三兩之方。曰桂枝生薑枳實湯。心中痞懸痛。與胸痹痛有別。故不用栝樓薤白。懸痛由下有逆上之氣。使痛不得下。如物之空懸。其爲心陽不布。陰邪得以竊據無疑。故用薑桂各三兩。以伸陽而散邪。諸逆不離乎肝。枳實酸入肝而苦降逆。逆降則痛除而心陽得復矣。曰防己茯苓湯。桂枝得防己黃芪。則能行皮膚之水。重加茯苓者。引三物下降。使由小便去也。水在皮膚下之速。則有遺邪。故加甘草以緩之。曰苓桂朮甘湯。痰飲者寒飲也。心陽不足。痰飲得以竊據膈閒。故胸滿。木得水而風動。

土不能爲之防。故脇滿而目亦眩。滿曰支者。明滿之由肝來也。以桂甘益心陽而化氣。白朮崇脾土而燥溼。茯苓則自心下導飲而洩之。此治寒飲之主方也。曰桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。此與桂枝龍骨牡蠣湯治無大異。惟驚狂起臥不安。較煩躁尤重。故桂甘龍牡皆倍增之。彼無表邪。而此則脈浮。故加蜀漆協桂枝以散邪。既解其表。必補其表。故加薑棗以和營衛。用桂枝湯而必去芍藥者。以不汗出也。曰栝樓桂枝湯。仲聖於桂枝加葛根湯。云反汗出惡風。此云脈反沈遲。反字自宜著眼。蓋太陽證備必身熱頭痛汗出。脈不應沈遲而沈遲。故云反柔痺原有沈遲之脈。故又以此爲痺而申明之。證皆桂枝湯所有。故用桂枝湯全方。身體強几。然則非痺不爾。加栝樓不加葛根者。卽體強與項強之別。其濡養筋脈以治強直。則二物一也。曰烏頭桂枝湯。寒痛腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛者及也。非或然之詞。以身疼痛爲表證。故加一若字以別之。此表裏傷於寒邪之重者。烏頭驅表裏之寒。桂枝湯化表裏之氣。互相爲用。烏頭以蜜煎。則毒解而性和。桂枝湯用治腹痛亦散表邪。故芍藥不再加。桂枝湯與烏頭均濃煎。而得蜜之甘潤。則補中緩急。處處皆彌綸無閒。故其知也。如醉狀而邪則吐之。豈灸刺諸藥所能及歟。曰黃芪桂枝五物湯。血痹陰陽俱微。桂枝湯調陰陽有餘而通痹不足。故加黃芪以疏衛。增生薑以宣陽。義

主理虛而守補太過。則非血痹所宜。故甘草去之。無表邪。故不取汗。不溫覆。與桂枝加黃芪湯似同而實異者此也。曰澤漆湯。此與厚朴麻黃湯皆外寒與內飲相搏而欬者。脈浮者表邪方盛。故重與解表。此欬而脈沈。非無表邪。但輕微耳。彼用麻杏。此用桂薑。猶麻黃湯桂枝湯之分傷寒中風也。飲亦彼重此輕。故彼用半夏六升。此用半升。彼熱邪在肺。故加石膏。此熱邪較下。故加黃芩。彼治欬用薑辛五味。卽小青龍成法。水停在上。此水不上乘。故但以澤漆紫參白前降逆導飲而欬亦止。鄒氏釋澤漆至精。謂能使水氣還歸於腎。是用澤漆亦與用五味有微似之處。然則彼無人參何爲。彼所治皆一氣外散。五味乃止欬善後之策。於散寒蠲飲無與也。此則表裏分投。上下背馳。安得不以人參調和之。曰白虎加桂枝湯。尤氏釋此方極當。惟以桂枝爲因。而達之。頗涉顛頽。不如趙氏療骨節痹痛之說。然不發明伏氣。亦猶之泛也。蓋寒邪伏於腎藏。至春夏發出。雖已無寒但熱。而骨節煩疼。則仍是根株未拔。肝主筋。諸筋皆屬於節。桂枝亦肝藥。故加桂枝以搜骨節煩疼之伏邪。否則但以白虎治熱。瘧終不服也。曰侯氏黑散。大風有菊花防風輩任之。桂枝是與川芎當歸治心中惡寒。曰當歸四逆湯。厥陰病血虛而寒中之。故手足厥寒脈細欲絕。當歸爲君。補其血盡。桂枝通草。所以散寒而通脈。大棗甘草。所以益中而培脈。脈細欲絕。邪已及腎。故

加細辛以驅腎寒。猶少陰病之兼肝藥也。用桂枝湯而無薑者。惡其發散以傷陰也。曰炙甘草湯。脈結代。是營血虛衰。心主營而生脈。故動悸。地麥膠麻。所以養營陰。桂枝甘草。所以扶心陽。人參。所以生脈。薑棗。所以和營衛。然甘草協參棗。則又能補中。生薑協桂草。則又能宣壅。棗草皆多於薑者。不使過散以傷神也。清酒煮者。欲引諸藥以通絡也。曰桂枝加附子湯。此與桂枝去芍藥加附子湯。祇爭芍藥一味之出入。彼去芍藥。爲下後脈促胸滿。加附子爲微惡寒。此四肢微急。難以屈伸。亦陽虛之象。不可無附子。汗漏不止。小便難。則表邪未盡。而津液又虧矣。桂枝湯主治自汗。和營衛之方。芍藥極要。何可去之。曰桂枝加厚朴杏仁湯。說詳杏仁。曰防己地黃湯。說詳防己。曰桂枝加芍藥湯。此條注家泥於太陽病醫反下之句。又但以桂枝湯爲太陽病解表之方。或云非脾藏之寒。或云和太陰之經。或云發太陽之邪。或云越外入之邪。或云舉誤陷之邪。皆於是證。是方不關痛癢。太陽病誤下之後。至於腹滿時痛。是已入太陰之藏矣。太陰爲陰之至。決無升理。就證論證。焉得不先救其藥誤。夫桂枝湯之爲用甚多。或以本方略爲增減。或止選二三味。或止用桂枝。以及桂枝湯再加他藥之或多或少。卽證治懸殊。不得執太陽表邪爲例。況以桂枝解表。遇無汗者概不用芍藥。今以芍藥爲少。而再加一倍。豈尙存解表之見耶。大痛實者。於此湯再加

大黃一兩。甯非太陽病之陷入者。而得謂舉邪使出耶。然則桂枝加芍藥湯。斷不必於解表致思。更有可比例以明之者。小建中湯比桂枝加芍藥湯。祇多飴餽一味耳。千金再加當歸。名內補當歸建中湯。其芍藥亦仍是此數。前聖後賢。心心相印。未聞此兩方亦發其表邪。夫太陰者陰藏也。統血者也。爲下藥所苦。致陰氣結而不舒。腹滿時痛。芍藥雖寒。而能破脾家血中之氣結。善治腹痛。然結固破矣。非有桂枝。則黍谷之春。終不得回。以桂枝有外心無內心。重加芍藥以斂之。則能入脾而不走表。且桂枝得生薑則散寒。得甘草大棗則補中。皆賴芍藥爲之前導。故非用加一倍不可。結破中補而陽亦復。腹滿時痛。惡能不愈。此滿痛之治法。急痛非小建中不可以飴能緩急。亦能助滿。方劑自各有當也。徐忠可謂自究心金匱。用桂枝取效。變幻出奇。不可方物。旨哉言乎。曰桂枝加龍骨牡蠣湯。愚以此爲專治脈得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交之方。已於解天雄略及之。按用桂枝湯原方。必於桂枝湯所治有脗合之處。脈芤動微緊。有陰陽乖迕之象。桂枝湯正所以和陰陽。陰陽乖迕。則精不守。神不藏。龍牡能召陽斂陰。瀆精安神。故加之也。

桂枝用四兩之方。曰桂苓五味甘草湯。此支飲。潰肺而欬。引動腎氣。從下上衝。復從上下流陰股。其多唾口燥及小便難時。復冒諸端。皆因是而致。治以茯苓消飲。桂枝

下衝。甘草培中土以杜腎水之上乘。五味攝腎陰以召肺氣之不降。證甚繁而藥甚簡。所謂握要以圖也。凡仲聖治寒飲之欬無不以薑辛五味並用。茲有五味無薑辛也。迨服之而衝氣果低反更欬胸滿。正當以桂枝治胸滿矣。而轉去桂加薑辛曷故。蓋薑辛與五味本不能偏廢。欬而胸滿。欬治則胸滿亦治。加薑辛爲與五味治欬也。面熱本不宜桂枝。衝氣低則去之便也。若茯苓蠲肺飲伐腎邪。則斷無可去之理矣。曰桂枝附子湯。傷寒至八九日。風寒之邪未盡。適遇陽虛之體。裏溼與外風相搏。遂致身體疼煩不能自轉側。脈浮爲風濇。與虛爲陽虛挾溼。陽虛而無別因。故不嘔不渴。此桂枝湯爲解表必需之劑。陽虛則非附子扶陽不可。協桂枝又足以並驅風溼。故加之。脈浮無汗則不宜斂。故去芍藥。桂枝加桂枝湯一兩者重。則能達下利小便也。曰甘草附子湯。桂枝與附子皆風寒風溼並治。惟附子尤能扶陽。此風溼相搏。陽虛之甚。非附子不勝其任。故方名隱桂枝而標附子。以甘草冠首者。溼不宜人參。身腫又不宜薑棗。甘草補中緩外功不可沒也。附子化溼而不能禦溼。加白朮者。崇土以禦溼也。小便不利。并以桂枝利小便。故多其數也。曰桂枝人參湯。此理中湯加桂枝也。理中爲治霍亂寒多之方。此數下致虛。雖挾熱而利。脈必微弱。(說本金鑑)當

以寒多論治。乾薑甘朮溫中補虛。卽理中之成法。彼兼嘔吐。故甘草生用以和胃。此利下虛甚。宜於守補。故甘草炙之而又多其數。桂枝後煎而必用四兩者。欲其解表而並散心下痞鞕也。霍亂爲上下不和。此爲表裏不和。故均用人參以和之。曰桂枝甘草湯。發汗過多。傷其心氣。致叉手冒心心悸欲按。與真武湯汗後腎水上乘有他證者不同。祇須補其心氣。桂枝湯桂甘二味卽屬妙法。桂枝不以利小便而亦用四兩者。心氣虛甚。非多不濟。且輕揚之性。上虛則卽歸上勢。固然也。曰茯苓桂枝甘草大棗湯。桂枝甘草湯爲汗後心悸欲按。此爲汗後臍下悸。因同而證不同。彼必心氣素虧。此必腎氣易動也。腎病治腎。桂枝自應四兩。而亦用炙草二兩者何哉。桂甘無他藥。則辛甘合化。心受其益。此以茯苓半觔先煮。大瀉腎水。桂枝亦多自隨茯苓以入腎。伐腎邪而化氣。棗草皆中宮物。此際必協以禦腎。無待言者。有甘草而又加大棗者。陰傷之後。宜以甘潤益陰。且不助腎也。曰桂枝芍藥知母湯。是條尤氏誤於知母一味。祇知其能除熱。遂謂溫溫欲吐。(金鑑云溫溫當是嘔嘔)是溼熱從下上衝。生薑多用。是止嘔降逆。唐容川則以是條與下條合看。全歸之於虛。其解方亦全屬理虛。又云凡仲聖所稱欲吐。多是火逆。不知寒逆更多。溫溫欲吐四字。卽見之少陰病。何以忘之。又以知母爲清血中鬱熱。知母豈是血藥。似此武斷杜撰。令人駭絕。就愚

所見之書。惟趙氏以德風寒溼痺其營衛。與知母治脚腫之說。實勝諸家。惜未發其所以然耳。夫風寒溼三氣合而成痺。非各佔一所。今約略指之。頭眩者。風淫於上。短氣者。溼阻於中。欲吐者。寒逆其胃。溼易下流。故腳腫如脫。三氣固結不解。致三焦失其統御。水穀不能化精微而充肌肉。故諸肢節疼痛身體尪羸。其爲虛甚。不待言矣。失然風則陽受。痺則陰受。痺病未有能一汗而愈者。補則助邪。補亦未可以易言者。按桂枝等九味。皆仲聖屢用之藥。麻黃附子。有不以除寒者乎。白朮有不以除溼者乎。以防風有不以除風者乎。桂枝湯有不以調陰陽和營衛者乎。附子除寒。卽屬補陽。尤陳溼。卽屬補土。不專爲補計。亦可見矣。凡桂枝湯所主之證。必有自汗無汗用之。必非解表。麻黃湯有桂枝。麻多於桂也。此桂多於麻。且約之以芍藥。蓋欲使諸治邪之藥。以桂芍引之。甘草和之。留連於營衛經絡肢節。以成潛移默化之功夫。復何疑。去大棗者。潤液則羈溼也。生薑加多者。以能助尤附升陽。爲桂芍促駕。且性味與四物相得也。然則桂苓之功固不在小。知母何爲而亦與之同標方名也。夫知母者。趙氏所謂治腳腫。卽本經所謂除邪氣肢體浮腫下水者也。功豈出桂芍下哉。桂枝用五兩之方。曰桂枝加桂湯。此與茯苓桂枝甘草大棗湯。皆所以制奔豚。而桂枝有四兩五兩之分者。彼爲臍下悸而尙未上衝。且已多用茯苓伐腎邪。故四兩不

爲少。此則重傷於寒。腎氣從少腹上衝至心。桂枝散寒而更下其衝。故於桂枝湯再加桂枝二兩。仲聖用桂枝是桂枝。蓋卽一物而加之減之。便各有功效不同。以諸方參考之自見。不必疑此之加桂爲肉桂也。

桂枝用六兩之方曰天雄散。桂枝用至六兩僅見是方。蓋以天雄益腎精。更以桂枝化腎氣。以龍骨召自下上越之陽。更以桂枝扶自上下濟之陽。以白朮培土而守之。更以桂枝溫土而發之。是桂枝足以輔三物之不逮。非用之至多。則輕揚之性治上不能治中下也。

仲聖用桂枝之廣大精微。愚已備陳其法。試更以桂枝湯推類言之。夫桂枝湯不獨治太陽病也。治陽明病亦有之。如陽明病脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也可。發汗宜桂枝湯。是桂枝湯用之於陽經外證。總以汗出爲斷。太陽表實者。不汗出。汗出必表虛。故可以桂枝湯調營衛。陽明病本自汗出。而汗出之證則有不同。汗出而惡熱不惡寒。與得之一日不發熱而惡寒。二日寒自罷而發熱者。陽明熱病也。此汗出且多。脈復遲。則非熱蒸之汗出。而爲表虛有寒邪之汗出。微惡寒而非背微惡寒。又無燥渴心煩之裏證。則非解後之餘邪。而爲表邪之未解。雖陽明之邪較深於太陽。而宜以桂枝湯生正汗而發邪汗。則理實無二也。謹按金鑑云。汗出多之下。當有發熱。

二字。若無此二字。脈遲汗出多微惡寒。乃是表陽虛。桂枝附子湯證也。豈有用桂枝湯發汗之理乎。竊思仲聖此條。確切桂枝湯證。似無佚脫之字。至桂枝附子湯以芍藥易附子。正是汗出與不汗出分別緊要之處。風溼相搏之宜。以附子扶陽。與陽明中風之表虛祇須用桂枝者。似亦有異。然歟非歟。姑謹誌之。

用桂枝湯而非自汗出者亦有之。如太陰病脈浮者可發汗。宜桂枝湯。按太陰之爲病一條。是太陰藏病提綱。此脈浮是經病。斷無腹滿而吐等證。然則太陰病三字。從何着落。竊謂他條太陰中風四肢煩疼。卽屬太陰經病之提綱。邪中陰經。詎能汗解。桂枝湯是和劑。亦非汗劑。注家不究桂枝湯發汗之所以然。而第執可發汗三字。模糊以辛甘發散釋之。柯氏更誤認脈浮爲風熱。不思桂枝湯之發汗。是何等發汗。必其先表虛汗出。服湯後再歎粥溫覆。然後邪汗去而正汗以生。今太陰中風本不能有汗。陰經之表證。本不能以麻黃葛根等發汗。舍桂枝湯解肌調營衛。尙有宜於是者乎。王宇泰云。陰不得有汗。故不言無汗。三陰兼表病。俱不當大發汗。非深明於仲聖法者。不能爲此言。

用桂枝湯而但身體疼痛者亦有之。下利腹脹滿身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯一條。金匱亦載入。竊疑本係雜證。而複出於傷寒論。

者。下利之下。金匱多一後字。蓋太陰所受寒溼。下利之後。脾陽式微。腹故脹滿。外則經氣亦虛。風邪乘之。與裏溼相搏。體爲之痛。然經藏並治非法。以四逆湯先溫其裏。則寒溼去而表邪亦孤。後以桂枝湯解肌散風而和營衛。自易如反掌。不云發汗者。卽金匱所謂但微微似欲汗出者。風溼俱去也。

更有用桂枝湯於婦人妊娠者。金匱婦人妊娠篇第一條。妊娠至六十日不能食。自屬阻病。阻病用桂枝湯似有未合。徐氏謂桂枝湯內證得之爲化氣調陰陽。差勝諸家。而終未親切。竊思仲聖於病證。但標數字。而卽云宜某方者多有之。此或尙有的對之證。欲人就其方思之而自得耳。按太陰中風四肢煩疼。太陰病脈浮者。宜桂枝湯。而千金半夏茯苓湯治妊娠阻病。爲後世所宗。卻有四肢煩疼惡寒汗出等證。方中橘薑辛夏。與桂枝湯亦頗有似處。就是測之。妊娠阻病必得有太陰外證者。以桂枝湯治之。方不致誤。雖然。不知強解儒者所戒。宜金鑑謂有脫簡而不加注也。絕之是絕其醫藥。婁全善治一婦。卽遵此法而愈。又女科輯要載一老婦。勸人停藥。後如其言。然則以絕之爲絕其病根。勿泥於安胎。治之而逆。是絕其妊娠者。當爽然失矣。

沈香

腎中陽虛之人。水上泛而爲痰涎。火上升而爲喘逆。沈香質堅色黑而沈。故能舉在上之水與火。悉攝而返之於腎。其氣香性溫。則能溫腎以理氣。卽小便氣淋。大腸虛閉。亦得以通之。而要非以宣洩爲通也。

沈香之用。以氣雖功在降攝。而凡氣分中之病。仍能運轉於中而不留滯。若滾痰丸。以沈香佐礞石。大黃。廣岑。治實熱老痰。則其知沈香也深矣。

烏藥

烏藥色黑味辛。氣溫而香。其主膀胱腎閒冷氣攻衝背膂宜矣。而寇宗奭謂與沈香同磨作湯點服。治胸腹冷氣甚穩。當者何故。蓋其根如車轂紋橫生。非降亦非升。故凡病之屬氣而涉寒者。皆可治。所謂空通者轉氣機也。

縮泉丸治小便頻數。溫腎固氣。惟恃益智山藥佐烏藥。則以散冷氣耳。

黃檗

廣藥爲五藏腸胃清溼熱之藥。表裏上下俱到。表有熱可治。表不熱而裏熱亦可治。色黃入腸胃皮入肺。微辛亦入肺。氣味俱厚。性寒而沈。入肝腎。入胃則亦入脾。入腎則亦入心。本經所以主五藏腸胃中結熱也。性寒已熱。燥則除溼。故本經所列黃疸。

腸痔洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡皆屬溼熱之疴。別錄又補出驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡則所謂五藏腸胃者悉備矣。大抵溼下溜而火上出。別錄所主雖不屬溼而其因未始非溼。觀仲聖梔子糜皮湯大黃消石湯治黃疸爲陽明病。白顧翁湯治熱痢。烏梅丸治嘔吐久痢爲陽明兼厥陰病。外臺大黃湯更治天行壯熱。廣臘一味實賅五藏腸胃故其用頗廣。若以治少陰與謨地知母爲伍則腎中不必有溼。否則如其分以施之必得如仁炒散爲當。蓋苦燥之物無不劫陰以黃臘爲滋陰之劑者非也。

厚朴

厚朴苦溫散溼滿其氣向表。枳實苦寒洩堅滿其氣向下。二物皆胃家氣藥。陽明病胃中燥結在血分自宜以滌熱逐實之大黃血藥爲君然非氣藥爲之前驅則不能銳師直入此三物並用之故大承氣又加芒消者芒消亦血藥而微兼治上猶厚朴氣藥而微兼治表。餘邪不至少留而鹹寒尤能速下不止如小承氣之和胃已也。枳朴主治多在中焦故爲承氣要藥然枳實薤白桂枝湯枳朴並用其證爲胸痹與脇下逆搶心則又何說蓋二物雖有溫散寒洩之不同而皆苦中有辛苦多辛少惟其爲氣藥而兼辛故心肺之部亦其所到苦多則不能久停心肺而可倚以散逆下。

氣。枳實又爲脇痛要藥。與厚朴先煮多煮。所以平胸脇之逆滿。內蘿白等數沸。所以開心胸之陽癆。分之各盡厥職。合之則同建奇勳。方名出枳實。不出厚朴者。以脇逆非厚朴所主也。

夫厚朴非所云氣向表者歟。雖非表藥而表證亦兼有可資。如厚朴麻黃湯治欬而脈浮。以厚朴能隨麻黃輩外散寒邪。偕薑覆輩內消寒飲。方名以是冠首。固無媿爾。然則半夏厚朴湯治婦人咽中如有炙鬱。非胸滿非腹滿亦無表邪。又何以用厚朴哉。夫咽中者心肺之部。千金此證。又點出胸滿心下堅五字。非心胸閒有溼痰凝阻不至如是。半夏苓薑有蠲飲之能。擅瀉心之用。佐以蘇葉之宣氣理血。心胸閒可由是曠然矣。不知千金謂咽中帖帖吐之不出。吞之不下。其竊據之勢。豈易遽拔。夫厚朴者。消痰下氣。力厚氣雄。於四物外別樹一幟。蓋四物以巧勝而厚朴以力勝。合以成劑。奏效乃神。此厚朴所以匹半夏而並標之歟。

杜仲

本經杜仲主腰脊痛。脊有誤作膝者。注家卽以腰膝釋之。不知杜仲辛甘色黑。皮內有白絲纏聯爲肝腎氣藥。非血藥。其溫補肝腎之功。實在腰脊。性溫化溼而甘能守中。不特腰脊痛可止。卽陰下癢溼小便餘瀝何不可已。別錄謂腳中酸疼不欲踐地。

不欲之故。自在腰脊。與不能有異。總當以主腰脊痛爲用是物之主腦。卽後世治頻
慣墮胎亦豈爲腳膝事哉。

○棟實

棟實苦入心。酸入肝。寒入腎。爲心肝腎三經之藥。苦寒清熱下行而酸復迫之。故導
上中之熱。由小便水道而出。其勢甚捷。

本經主溫疾。傷寒大熱煩狂。溫疾傷寒卽溫病。大熱而至煩狂。是熱無所洩。緩則生
變。故以此亟洩其熱。非謂溫病可全恃棟實也。

心痛腹痛之爲熱痛者。用之靡不奏效。卽牙宣出血不止。以棟實末裹塞齒齦卽止。
其導熱下行之速。真有可立待者矣。

病有熱有寒。史記太倉公治疝用火齊湯。熱痛也。金匱治疝用大烏頭煎。寒痛也。棟
實爲治疝要藥。則於寒鬱熱者爲宜。蓋肝腎內寓真陽。陰錮之而陽不得達。則寒亦
釀熱。棟實酸苦。能入而涌泄之。卽劉氏所謂導氣達陽也。病本屬寒。不能舍巴豆散
紙等藥而獨建其功用。棟實治疝者須識此義。

昔人治遺精如固陽丸。鹿茸益精丸。旣濟固真丹。治真陽上越氣喘痰鳴如黑錫丹。
皆其中有棟實。皆用棟實爲從治。然其證陰中有陽。溫其陰不得不退其陽。雖從治

亦正治也。

○阜莢 阜莢子

陽在上不與陰化而爲風。陰遂變爲痰涎。阜莢以金勝木。通氣利竅。風無不搜。斯溼無不去。故凡痰涎湧塞而爲中風爲喉痺者。胥倚以奏功。陽在下不與陰化而爲風。陰遂被劫而生燥。阜莢氣浮而子較沈。故子能祛在下之風。風去則陰得伸。其津潤之權。而大腸之燥結以通。凡風藥必燥。而阜莢以多脂爲佳。阜子之仁又黏而韌。其能利大便。亦兼得辛潤之力也。

訶黎勒

訶黎勒苦溫能開。酸濇能收。開則化痰涎。消脹滿。下宿食。發音聲。收則止喘息。已瀉痢。然苦多酸少。雖濇腸而終洩氣。古方用是物皆極有斟酌。仲聖訶黎勒散治氣利。氣利者。氣與矢俱失也。必有痰涎阻於腸中。訶黎勒既濇腸而又化痰涎。最於是證相得。又以粥飲和服。安其中氣。是訶黎勒之洩。亦有功無過矣。千金訶黎勒丸治氣滿閉塞不能食。喘息不能食。喘息由於氣滿閉塞。氣滿閉塞非有痰涎宿食不爾。然去其痰涎宿食。而既逆在上之氣。豈能卽返。訶黎勒能一物而兩治之。兩治之物。無沖和之性。蜜丸又所以和之也。與仲聖用訶黎勒之意。正復無異。若訶子清音湯治

中風不語。是但用其洩矣。協以甘桔。則不至過洩而音可開。真人養藏湯治久痢脫肛。是但用其濇矣。協以參朮歸芍諸藥。則不至徒濇而痢可止。肛可收。凡此皆用藥之權衡。不可不知者也。

桑根白皮

桑根白皮甘辛入肺脾。而氣寒復入膀胱。能驅脾肺中之水氣從小便出。故水腫腹滿臍脹晉治之。欬嗽惟肺有水氣及伏火者宜之。肺虛無火。因風寒而嗽者。服之則錮閉邪氣而成久嗽。此仲聖於王不留行散。所以謂風寒勿取也。

楮實

本經與陶隱居抱朴子皆甚言楮實之功。而方書用於補劑者。楊氏還少丹外不多見。大抵以其物賤。而修真祕旨又言久服成骨軟。與濟生祕覽治骨哽。遂不復重。諸家亦未有發明其所以然者。竊思補益與軟骨並不相背。特其義殊奧耳。種楮必雜以麻。冬則賴麻作煖。春又燒麻以肥楮。三年卽成大樹。而枝葉皆有白汁。皮可爲紙。可爲布。實則色深紅而煎之如飴。夫是故具陰體而得陽用。爲手足少陰之藥。遇腎陰不足而陽常畜縮者。用之以充腎液伸腎權。最爲切合。若腎中陽虛而陰有餘。陰虛而陽易升。與陰陽並虛之證。皆非所宜。此本經主陰痿之旨也。夫補陰而又能伸

陽者。其所補之陰。未始不隨陽以俱伸。與純陰填補有別。水腫者。陰不與陽化而水聚也。肌膚不充者。陽不得陰濟而氣乏也。目不明者。陰不升而陽無光也。本經所臚。楮實皆足以任之。然則其能轉骨何故。骨屬腎。甘能損腎。腎傷於溼者。腰腳爲之痠。轉溼亦陰也。楮實甘寒益陰而不能益陽。久服骨何能不轉。此審證制劑之不善。於楮實乎何尤。識此義而用於喉痹骨哽。則正見其功。至吳廷紹治烈祖食飴而噎。以楮實具陰體而得陽用。足釋少陰壅蔽之氣。又以甘導甘。宜其效矣。惟大明謂壯筋骨。則似是實非。不免於誤人爾。

枳實

別錄枳實破結實。消脹滿。是其滿爲堅滿。破結實卽下宿食之謂。似不如厚朴之散溼滿。兼可治上矣。然枳實氣藥而味苦酸。胸脇之堅滿。亦其所司。故別錄於胸脇。曰除痰癖。不曰除痰飲。水者柔物亦動物。然水至於停。則與腸胃之水穀相比爲奸。而非可以滲之利之者。故別錄於除胸脇痰癖下。又繼之以逐停水而不隸於胸脇。蓋卽堅滿之在腸胃。有需於枳實者矣。大小承氣湯與枳實薤白桂枝湯用枳實之義。已詳厚朴不贅。

更以別錄心下急痞痛逆氣脇風痛繹之。夫瀉心諸湯治心痞。大小陷胸治結胸。枳

實宜可用矣。而皆不捨入曷故。蓋痞爲虛邪。宜輕散不宜實攻。結胸雖屬實邪。而滌熱洩水別有專藥。小陷胸則與瀉心不殊。但以連夏瀉心加桔梗降痰濁而已。得皆無俟枳實代籌。枳實所司維何。曰胸痹。胸痹與結胸皆按之而痛。其所以異者。一則爲熱結而一則爲陽微也。雖然。枳實不氣向下乎。氣向下則胸膈非停駐之所。非寒藥乎。寒藥則於陽微有妨。不知仲聖有因材而使之妙焉。橘枳生薑湯。以橘薑化氣於上。枳實從而洩之。桂枝生薑枳實湯。以桂薑化氣於上。枳實從而洩之。要非氣塞與懸痛有堅滿可洩。亦不用枳實。方名不以冠首者。以枳實爲佐理也。大柴胡湯。柴胡芩夏能治胸滿。不能治心中痞。鞭心下滿痛。得枳實則痛鞭除。以枳實能洩堅滿也。按全方爲表裏兼治之劑。大黃枳實芍藥。所以攻裏。柴胡芩夏薑棗。所以解表。生薑加多。又使與枳實化心中之痞鞭。卽橘枳生薑湯治胸痹之法。是枳實於諸藥皆與有功。而方名顧不之及者何也。抑知其往來寒熱之爲少陽病乎。柴胡乃少陽主藥。且能去腸胃中結氣。自當推以冠軍。曰大者。以非小柴胡之常法也。枳朮湯。以白朮消水飲。枳實洩心下堅大。枳實氣向下。而以味甘而厚之白朮載之使不速下。既回翔於心。遂漸及於腹。至腹更而收功。此以枳實治心下之又一法也。別錄所言。殆亦由仲聖諸方紬繹而得之者歟。

枳殼

枳殼乃枳實之老而殼薄者。既名枳殼，須去穰核用之。殼實古原不分，性用亦無所異。若治胸膈痞塞，枳殼較枳實少勝。然何如以枳實協辛溫輕揚之橘皮桂枝爲奏功尤大乎。惟本經主大風在皮膚中，如麻豆苦癢除寒熱結，則惟去穰核之枳殼爲宜。蓋癢爲風寒熱結爲癥，於皮膚中除風除癥，用枳實則易走裏，難與枳殼爭能。此證類本草枳殼所以主風癢麻痹也。

梔子

梔子花白蕊黃仁赤。其樹最喜灌漑，意在條達其性體。爲心肺肝胃三藏一府之藥。惟花時不採，而採者爲黃赤之實。體輕入氣而性陰，又入血。其治在心肝胃者多，在肺者少。苦寒滌熱，而所滌爲瘀鬱之熱。非浮散之熱，亦非堅結之熱。能解鬱不能攻堅，亦不能平逆。故陽明之腹滿有燥屎，肺病之表熱欬逆，皆非其所司。獨取其秉肅降之氣以敷條達之用。善治心煩與黃疸耳。心煩或懊憹或結痛，黃疸或寒熱不食，或腹滿便赤，皆鬱也。心煩心下濡者爲虛，胸中窒者爲實。實與虛皆汗吐下後餘邪留踞，皆宜吐去其邪。梔子解鬱而性終下行，何以能吐？協以香豉，則一升一降，邪不任受，則吐。黃疸之瘀熱在表，其本在胃。梔子入胃滌熱下行，更以走表利便之茵陳

輔之。則瘀消熱解而瘧以愈。然則梔子於肺無與乎。仲聖云。凡用梔子湯病人舊微
溏者不可與服之。肺與大腸相表裏。服梔子則益其大腸之寒。此可爲秉金氣之一
證。至治肝則古方不可勝舉。總不離乎解鬱火。凡肝鬱則火生。膽火外揚。肝火內伏。
梔子解鬱火。故不治膽而治肝。古方如瀉青丸涼肝湯越鞠丸加味逍遙散之。用梔
子皆是涼膈散有梔子以治心也。瀉黃散有梔子以治胃也。而瀉白散不遽入。則以
肺中氣熱而不涉血者。梔子不與也。本經主胃中熱氣。朱丹溪謂最清胃脘之血。究
梔子之治。氣血皆有而血分爲多。然不能逐瘀血與丹皮桃仁分功。其解血中之鬱
熱。祇在上中焦而在下焦。亦不入足太陽與手足少陽。不入足太陽。故不利小便。
茵陳蒿湯所以必先煮茵陳。許學士之治酒皏鼻。朱丹溪之治熱厥心痛。集簡方之
敷折傷腫痛。皆屬血中鬱熱。其餘之治。悉可類推。

○酸棗仁

酸棗叢生而氣薄。氣薄則發洩。味酸亦洩。斂之使陽不得入於陰。故醒睡。仁則甘平。
甘平由酸而來。性故微斂而微守。酸棗肝藥。仁不能大戾乎棗。亦必入肝皮赤則入
心內黃則入脾。酸棗仁自當爲心肝脾三經之藥。心得之則神安。肝得之則魂藏。脾
得之則思靖。其治不得眠。尙有何疑。獨是酸棗仁湯治虛勞虛煩不得眠。則更有進

焉。按施子政陽證亦爲虛煩不得眠。而彼爲有傷寒餘邪。此由於虛勞。故加虛勞二字以別之。勞之爲病。其脈浮大手足煩陰寒精自出。瘦削不能行。此云虛煩不得眠。脈必浮而微數。蓋陽上淫而不下。則煩陰下虧而不上。則不得眠。其責在腎。非酸棗仁收攝浮陽。不能使心肝脾咸循其職。故推酸棗仁爲君。而臣以知母滋腎之液。茯苓洩腎之邪。擾心之煩可不作矣。而心腎不交。猶未足以成寐。後世醫者必將以達志配棗仁爲一降一升之法。不知遠志乃陰中升陽之藥。此非陽不升而實陰不升。既以棗仁攝之。知母滋之。茯苓洩之。陰中之陰。自有能升之理。特三物皆下行。而腎陰向上之機不能無滯。故又加菖蒲通陰陽以利之。甘草居中宮以和之。標之曰酸棗仁湯者。以酸棗仁爲首功也。

山茱萸

今人用山茱萸。惟取其強陰益精。原非不是。但其木高丈餘。二月開花。一交冬令。即便結實。是全稟厥陰木氣。而實酸溫。足以溫肝祛風宣竅。故又治鼻塞耳聾目黃面皰。至主心下邪氣寒熱與出汗之文。或疑其無是能矣。不知其色紫赤兼入心包。且秉風木疏蕩之姿。汗爲心液。焉得不滌滌以出汗。汗出則寒熱之邪亦去。凡此又當於補益之外。詳究其義者。然則腎氣丸用之。蓋不第強陰益精之謂已。

女貞實

本經女貞主治。張石頤謂咸指拘骨諸家誤列於此。觀鄒氏之疏。則知張氏實誤矣。女貞當春夏秋生長之會。被蠍蟲蝕肌吮血。身無完膚。仍不廢開花結果而其所成之蠍。非他膏脂可及。是故中之所以補。五藏之所以安。精神之所以養。百疾之所以除。皆人於熱氣耗敗之餘之大效。非本經無端加以隆譽。然則用女貞者。當知苦平非溫補之品。而功與溫補埒者。其故自有在矣。

衛矛

衛矛以甄權破陳血落胎。與日華子通月經破癥結兩說。按之。自屬善敗惡血。故和劑局方用以治產後敗血。但其三面如箭羽。古惟燔之以遺崇。方藥少用。則用之於除邪殺鬼。乃爲合宜。考千金外臺諸方。療惡疰心痛。卒暴心痛。忽中惡氣毒痛。鬼瘡。日發。及務成子螢火丸。非善取其長者歟。

五加皮

五加莖柔皮脆。用在於根。宜下焦風溼之緩證。若風溼搏於肌表。則非其所司。古方多浸酒釀酒。及酒調末服之以行藥勢。心疝少腹有形爲寒。肺熱生痿躄爲熱。本經並主之。劉潛江云。腎肝氣虛。故病於溼。

溼者陰之淫氣也。陰淫則陽不化而爲風。風者陽之淫氣也。陽淫則陰愈不化而更病於溼。至病溼固已陰錮陽。陽蝕陰而成溼熱矣。按此論甚精。五加皮辛苦而溫。惟善化溼耳。化其陰淫之溼。卽驅其陽淫之風。風去則熱已。溼去則寒除。卽別錄之療囊溼陰癢。小便餘瀝腰腳痛。痹風弱五緩。皆可以是揆之。鄒氏以本經之益氣別錄之堅筋骨強志意。爲身半以上事實。則腎肝受治之益。不必析之爲兩事也。

枸杞

本經別錄。枸杞不分子皮苗葉。而就其文體會之。本經之五內邪氣熱中消渴周痹。風溼。別錄之下胸脇氣客熱頭痛。是枸杞皮與苗葉之治。本經之久服堅筋骨耐寒暑。別錄之補內傷大勞。噓吸強陰利大小腸。是枸杞子之治。此沈括綠之言。分別頗當。按陶隱居本經序。於地骨皮下列熱中消渴字。千金治虛勞客熱虛勞苦渴。皆用地骨皮。地爲陰。骨爲裏。皮爲表。氣味甘淡而寒。故所治爲肺肝腎三藏虛熱之疴。藏陰虧。則熱中消渴。胸脇氣逆。頭爲之痛。周痹乃風寒溼客於分肉之間。今日周痹風溼。必周痹由寒變熱之候。靈樞所謂神歸之則熱者也。千金而外。後人又以地骨皮退內潮外潮。治骨蒸骨槽風吐血下血目赤口糜小兒耳疳下疳等證。然係益陰以除熱。有安內之功。無攘外之力。雖表裏兼治。而風寒之表熱。非所能解也。枸杞子內

外純丹飽含津液。子本入腎。此復似腎中水火兼具之象。味厚而甘。故能陰陽並補。氣液驟增而寒暑不畏。且腎氣實則陰自強。筋骨自堅。嘸吸之一出一入。自適於平。液枯之體。大小腸必燥。得之則利。惟多用須防其滑。而純丹又能增火也。後世之方。如金髓煎四神丸。枸杞酒。可謂竭枸杞之才矣。竊意本經之主周痹風溼耐寒暑。非皮與子同用之。不能有此效。俟明者政之。

蔓荆實

蔓荆實別錄主風頭痛腦鳴。用者往往鮮效。蓋人知蔓荆爲辛寒之藥。而不知其苦溫。乃過於辛寒也。本經味苦微寒。微字本有斟酌。別錄補出辛平溫。則全體具見。便當於此切究其義。巢氏病源云。頭面風者。是體虛陽經脈爲風所乘也。諸陽經脈上走於頭面。運動勞役。陽氣發洩。腠理開而受風。謂之首風。夫曰體虛。曰陽氣發洩。明係陽虛之受風。非內熱之搏風。陽虛之證。其標在上。其本在下。然或宜治標。或宜治本。因雖一而證則殊。宜治本者。陽氣弱而不振。根柢將摧。宜治標者。陽氣弛而偶傾。輕翳竊據。治本雖灰。雖可與。治標則蔓荆適宜。試思頭痛非陽虛有風。何至腦鳴。風爲陽。陽虛腦鳴爲陰。蔓荆生於水濱。實色黑斑。宜其入腎。然氣味辛寒而兼苦溫。又得太陽本寒標熱之氣化。用能由陰達陽。以陽化陰。其體輕虛上行。雖本經所謂筋

骨間寒熱溼痹拘攣者。亦能化溼以通痹。而搜逐之任。性終不耐。故古方用之者少。惟風頭痛腦鳴。則確有專長。其不效者。人自不察耳。愚又思蔓荆知已。少不自今始也。除之才謂散陽明風熱。竟視與薄荷牛蒡無二。張潔古謂陽中之陰。實則陰中之陽。謂涼諸經之血。實則氣藥非血藥。其尙有知者。則李瀕湖之主頭面風虛。張石頤之血虛有火禁用。而其所以然仍未之闡發也。藥物之難明甚矣哉。

茯苓

茯苓結於土中。久而不變。宜其得陰氣多。與猪苓埒矣。然楓擅召雨之能。松挺不彫之概。一毗於陰。一毗於陽。毗於陽者。能耗陰不能起陰。不能起陰即不能止渴。故五苓散治汗出而渴。不渴則主以茯苓甘草湯。栝樓瞿麥湯治渴。有茯苓不能無栝樓。小柴胡湯渴加人參。小青龍湯渴加栝樓。皆獨不加茯苓。此可徵茯苓之非渴藥。栝樓起陰以止渴者。莫如葛根栝樓。以葛根栝樓起陰而不利小便也。起陰而兼利小便。則止渴之力必減。故猪苓澤瀉次之。茯苓又次之。然五苓散猪苓湯偏以之治渴。非葛根栝樓所能代者何哉。蓋其渴非他脈浮發熱飲水而小便不利耳。不去其病。更起陰奚濟。茯苓與猪苓澤瀉洩水。則小便利。茯苓猪苓與桂枝滑石達表。則表邪解。去其蔽陰灼陰而陰自升。陰自升者渴亦止。此茯苓之於渴。所以得廁名其閒也。

雖然。其中又甚有故不得不辨者焉。二苓澤瀉之治渴。是治飲水而小便不利之渴。以其水爲渟瀉之水。不受胃變則嘔。格其腎陰則渴。故得以洩水利小便而愈。若是痰飲。胃亦賴之以養。其濃厚者。且無走小便之理。將毋水能致渴。飲不能致渴耶。而仲聖謂嘔家本渴反不渴者。心下有支飲。又謂胸中有留飲。其人短氣而渴。二說相反曷故。夫飲而曰支。謂其如支流不正出也。不正出則腎陰猶得以上潮。故不渴。留飲是正留於胸中。氣焉得不短而渴焉得不作。是則痰與飲宜分者也。水與飲有分有不分者也。以渴不渴定茯苓與猪澤之去取可矣。

抑又思之。仲聖用此三物之證。多渴與嘔兼。豈非治渴而亦治嘔。不知嘔吐之專藥爲半夏生薑。猶葛根桔梗爲消渴之專藥。仲聖之以苓甘五味薑辛湯治飲滿也。曰嘔者復內半夏。既有茯苓又內半夏。以茯苓不治嘔也。不內猪澤。以猪澤不治嘔也。乃嘔吐篇之猪苓散。明明治嘔吐思水。茯苓澤瀉湯。明明治胃反吐而渴欲飲水。今必曰不治嘔。其誰信之。然必曰治嘔與小半夏湯等。此何以多思水欲飲水之證。獨是洩水以止渴者。其義易曉。洩水以止嘔。則嘔已自去其水。何待藥爲。是則仲聖之言爲甚可味也。猪苓散思水者三字。是對上後思水而言。此思水爲先思水。先思水而後嘔吐。所謂先渴卻嘔者爲水停心下也。水停心下者。愈渴亦愈飲。嘔不能有裨。

故其用二苓也。所以洩水用白朮也。所以生津。茯苓澤瀉湯特提胃反吐三字。胃反者。胃虛且寒。不至有渴。今渴欲飲水。是陰中有陽之證。故於吐下加一而字以折醒之。與他胃反不同。與他嘔吐亦不同。蓋桂甘朮。所以溫胃而止吐。茯苓澤瀉。所以洩水而止渴。證既兼見。藥亦分理。有生薑無半夏者。渴忌半夏也。無猪苓者。無表證者也。洩水而兼能止渴者。以澤瀉爲優。故入澤瀉。至茯苓。協澤瀉洩水。協生薑平逆。協桂枝化氣。協甘草白朮補中。爲益良多。故以標方名冠首。以茯苓與猪澤較。雖同不治嘔。而以茯苓爲猶有參贊之功。何則。甘先入脾。淡主養胃。茯苓甘淡。非猪澤可比。是其於嘔也。不用剝而用撫者也。

外此茯苓以洩水奏績者。又於仲聖方得三事焉。曰眩曰悸曰欬。必別其近似而真始出。則與嘔渴無二也。眩有肺痿上虛而眩。失精下損而眩。穀疸因食而眩。茯苓詎可漫施。心下有支飲。其人苦冒眩。茯苓宜可用矣。不知澤瀉湯無渴而用澤瀉。以其於冒眩有專長也。且使輔以茯苓。則澤瀉方欲至極。上治冒。而茯苓偏從而抑之。全功必墮。白朮則蠲飲而守中。足爲澤瀉策應。故甯退茯苓而進白朮。然則冒與非冒。何別乎。蓋冒者。上之陽爲水飲所格。而不得入於陰。則淫於上。如覆冒。是眩在陽。盛以澤瀉洩其水。而濟以陰。眩乃得息。若水飲上凌而上之陽不能與陰爭。則陰與水

相比爲患而眩亦生。是眩在陰盛。惟茯苓稟陽和之性。擅化氣之長。水遇之而自卻。陽得之而卽伸。仲聖似此治眩之方不一可不煩枚舉。

水停心下而眩者。亦水停心下而悸。眩在外。悸在內。惟派別而源同。故眩定者悸亦定。心下悸者。水侵其心。臍下悸者。水發自腎。似不能悉主以茯苓矣。然上中下之水。應皆從小便出者。舍茯苓其奚屬。且始而臍下悸者。後必心下亦悸。所謂水在腎心下悸也。其悸非茯苓得治者。如小建中湯。桂枝甘草湯。炙甘草湯。非溫養中氣。補益心陽不可。茯苓淡滲。適傷其正。故擯之也。

欬之因亦致多矣。茯苓所司爲痰飲之欬。然有痰飲而不宜者。半夏麻黃湯。有痰飲而悸。以麻黃發心陽而洩之於表。徐忠可謂之老痰。老痰非滲得去。甘遂半夏湯。有留飲而利。以甘遂甘草加白芍。就其利而下之。必欲使走小便則謬。此外有痰飲而宜辛散宣苦降者。無論矣。夫欬者肺病。茯苓下滲。則肺邪不解。故欬證用之頗鮮。惟欬而衝氣挾痰飲而上。胸滿由痰飲而得者。以茯苓下之洩之。厥效甚捷。然則茯苓非能治欬。治痰飲耳。非能治痰。實治飲耳。苓桂朮甘湯治痰飲如神。而其推茯苓爲君也。在使微飲從小便去也。痰飲之有需於茯苓可知矣。

抑其治飲治水。能使上中下統洩之於小便者有故。茯苓甘淡。爲胃之正藥。色白而

純。則兼入肺。肺主皮毛而太陽爲之應。故又入太陽。淡滲則又從皮毛而入太陽之府。肺胃職司下降。膀胱氣化則出。其利小便。蓋有高屋建瓴之勢焉。仲聖於小便不利而必曰加茯苓者。職是故也。

夫利小便者。仲聖之明文。實本經之遺訓。斷不必以止消渴滋學者之惑。顧謂利小便足盡其長乎。而不然也。試更卽仲聖方覈之。腎氣丸主小便不利並消渴小便反多。蓋小便不利者。腎中陰氣之壅也。以茯苓與桂附消其陰。則由壅得通。小便反多者。腎中陽氣之弱也。以茯苓與桂附扶其陽。則轉弱爲強。且用以祛表溼。如防己茯苓湯。用以解咽塞。如半夏厚朴湯。用以開胸痹。如茯苓杏仁甘草湯。用以下癥痼。如桂枝茯苓丸。用於補劑。如薯蕷丸。用於風劑。如侯氏黑散。蓋惟茯苓以甘淡之味。溫和之性能於氣中消水。水中化氣。隨他物而膺繁劇者。胥不出乎此旨。若非制劑得宜。則茯苓之眞不見。而亦未必無害矣。

猪苓

本經猪苓利水道。不云止消渴。而仲聖以猪苓名方者。必渴而後與之。惡得無故。鄒氏謂猪苓起陰氣以和陽化水。譬之楓葉已丹。遂能卽落。雖本經別錄無起陰之文。然考爾雅正義述異記。一統志。南方草木狀物類相感志。荀伯子臨川記。所載楓樹

諸靈異。確與陰氣相感。猪苓生楓樹下。其皮至黑。氣味俱薄。未必不能起陰。況水道既利。三焦得通。腎氣之由三焦而上者。自亦滋潤於其胸。(釋名消渴者腎氣不周於胸也)消渴奚能不止。此與澤瀉之止消渴。有相侔之處。然有不如澤瀉者焉。澤瀉形圓。一莖直上。能起極下之陰。以濟極上之陽。平極上之陽淫。猪苓甘淡。不能直上至頭。故澤瀉湯治冒眩。而猪苓不與。然猪苓之陰。陰中有陽。能開腠理達表。與猪苓爲伯仲。而澤瀉亦不與。五苓散猪苓湯。所以治脈浮發熱者。以其有猪苓。猪苓也。夫以猪苓視茯苓。所同者爲太陽陽明藥耳。猪苓究何足與茯苓比例。茯苓結於土中。猪苓亦結於土中。茯苓肉白。猪苓亦肉白。茯苓甘淡。猪苓亦甘淡。而茯苓之白。光潔而純。猪苓之白。幽暗而獘。猪苓甘淡。得土味之正。猪苓甘淡。得土味之偏。此茯苓所以主治廣。猪苓所以主治狹也。

竹茹

竹青而中空。與膽爲清淨之府。無出無入相似。竹茹甘而微寒。又與膽喜溫和相宜。故黃芩爲清少陽經熱之藥。竹茹爲清少陽府熱之藥。古方療膽熱多用竹茹。而後人無知其爲膽藥者。喊逆之因不一。胃虛而膽熱乘之。亦作喊逆。橘皮竹茹湯。以參棗甘草補胃養陰。橘

皮生薑和胃散逆。竹茹除膽火則爲清蟻之源。橘皮湯無竹茹者。以手足厥爲肝逆也。婦人乳子之時。中虛膽熱。膽熱必犯其胃。嘔逆而至煩亂。熱亦甚矣。竹皮大丸。以石膏白薇除胃熱而斂浮陽。竹茹涼膽而清其源。恐中虛難任寒藥。故加桂枝之辛甘以導之。藥兼陰陽。故加甘草以和之。喘則以柏實轉肝氣。又所以輔竹茹之不逮也。

○蜂蜜

蜂蜜生性涼能清熱。熟性溫能補中。甘而和故解毒。甘而滑故潤燥。甘緩可以去急。故止心腹肌肉瘡癆諸痛。甘潤可以洩澤養正。故通三焦除衆病和百藥。

仲聖以蜜煎導通大便。蜜當爲下利之所忌矣。然下利有用之者。一爲猪膏湯。少陰伏邪內發。陰下洩而陽上乘。致下利咽痛胸滿心煩。液傷而脾亦困矣。以猪膏從陽引陰而平邪熱。陽不至上乘矣。白粉扶脾而止利。陰不至下洩矣。白蜜則佐猪膏潤液。助白粉安中。故加之。一爲甘遂半夏湯。脈伏者有留飲在內。欲自利利反快者。利不卽利。旣利則快。心下續堅滿者。利後滿減。過時又續。是爲飲在上而腸則燥。致飲欲去不去。幾與滯下無異。故以半夏白芍。消飲於上而降之。甘遂甘草。借其相反之勢以激之。白蜜則潤液化燥以速其去。猶滯下之用阿膠。此二方用蜜之意也。

白殭蠶

蠶者食桑之蟲。桑能去風。蠶性故近之。且感風而殭。更於感風之病爲宜。味辛氣溫而性燥。故治溼勝之風痰而不治燥熱之風痰。朱丹溪謂從治相火。散濁逆結滯之痰者正合。汪訏菴刪去從治字。而以爲散相火逆結之痰。則其視蠶蠶爲何如藥矣。小兒驚癇夜啼。是肝熱生風。又爲痰溼所痼。而陽不得伸。是以入夜彌甚。殭蠶劫痰溼而散肝風。故主之。至男子陰瘻。女子崩中。赤白產後餘痛。無非厥陰之風溼爲患。無他奧義。鄒氏謂蠶食桑而有津液留於中。又解之爲釋泥淖塞漏卮。不特於殭蠶燥溼去風之義背據其所言。亦不免自相矛盾。

水蛭

水蛭蟲蟲。同爲吮血之品。能逐瘀破結。而仲聖抵當湯抵當丸。必二味並用。桃核承氣湯下瘀血湯。又二味並不用。其所以然之故。有可得而言焉。成氏云。鹹勝血。血蓄於下。勝血者必以鹹爲主。故以水蛭爲君。苦走血。血結不行。破血者必以苦爲助。故以蟲蟲爲臣。張隱菴張令韶云。蟲蟲水蛭。一飛一潛。在上之熱。隨經而入。飛者抵之。在下之血。爲熱所瘀。潛者當之。按此論水蛭蟲蟲精矣。而抵當湯所佐之大黃桃仁。亦非泛而不切。蓋四物皆血藥。而桃爲肺果。桃仁氣微向表。協蟲蟲爲走表逐瘀。大

黃滌熱下行。協水蛭爲走裏破結。而同歸於抵少腹下血。抵當丸之證。與抵當湯盡同。惟少腹滿則尙不至於鞭矣。小便本不利而今反利。則畜血必暫而未久矣。用湯方減少其數。又擣丸煮服者。以隨經之熱留於表分者多。用峻藥輕取之法。使熱邪盡入網羅。而瘀不復聚。正不少傷也。若桃核承氣湯證。則與抵當懸絕矣。太陽病不解至下者。愈爲一截。言畜血而血自下者不必攻也。血自下者亦自愈也。其外不解者。至當先解外爲一截。言血不自下則宜攻。然太陽傳本有表邪未罷者。當先解其外。未可以下有畜血而遂攻之也。外解已至。宜桃核承氣湯爲一截。外解曰已。少腹急結曰但。可見表證已無。不必顧表。少腹急結而非鞭滿。其人亦不如狂。洄溪所謂瘀血將結之時也。桃核承氣湯。卽調胃承氣湯加桃仁桂枝。加桃仁桂枝而仍名承氣。明示此證之有關於陽明。蓋太陽病汗解之後。原有陽明府實之慮。今不府實而少腹急結。未始非腸胃之熱下迫膀胱。以桃仁協調胃承氣。則下逐膀胱之血瘀。亦上清陽明之熱。追加桂枝者。膀胱寒水之府。熱結初萌。驟以黃消折之。氣必先鬱。故以桂枝化膀胱之氣。且桂枝協甘草。能散結緩急。又爲少腹急結之要藥。觀桂枝茯苓丸之下癥。溫經湯之瘀血在少腹不去。土瓜根散之少腹滿痛。皆用桂枝。即可知此之非爲解表矣。彼用桂枝斂以芍藥。此用桂枝引以黃消。桂枝所以能抵少腹也。

下瘀血湯。瘀血在臍下不在少腹。不曰畜而曰著。是其血瘀未久。腹痛亦新著之故。況在產後。豈宜峻攻。既服枳實芍藥散而不愈。其爲血被熱灼而不行無疑矣。治以大黃桃仁滌熱逐瘀。蠭蟲導血通絡。蜜丸和藥而不傷液。酒煮行藥而不疾下。合之則其成臍下去著之功。此與抵當湯丸之用蠭蛭。顧可以同年語乎。

桃核承氣湯之治。愚旣辨之詳矣。惟此條熱結膀胱四字。前人多看作太陽傳本之公共語。謂熱邪隨經入於膀胱。有水結。有血結。五苓散所以治水結。桃核承氣湯抵當湯丸所以治血結。不知熱結膀胱。但有血結。並無水結。蓋膀胱爲津液之府。氣化則能出。故小便不利。是氣病非血病。按巢氏病源。淋病至於熱甚。則變尿血。何嘗非膀胱之熱由氣入血。而外臺治血淋諸方。無用桃仁蠭蛭者。以尿血而非畜血也。血不蓄。則熱可謂之盛。不可謂之結。且五苓散之不治膀胱熱結。固顯有可證者。觀仲聖用五苓散諸證。不曰脈浮微熱。則曰水逆。須末服而又多飲煖水出汗。是欲使邪從表解。若熱結膀胱。何能逆挽而出。其所以渴與小便不利者。太陽之標。爲寒邪所迫。勢將傳本。遂與少陰水藏均不得施化。卽三焦之水道亦滯而不鬯。於是上不濟以腎陰。而渴下則水欲洩而不利。服五苓散而諸弊俱祛。以熱不在膀胱也。且五苓之利小便。烏得與滑石亂髮白魚戎鹽瞿麥之屬。等量齊觀。爲問桂枝利小便乎。而

桂枝非四兩不利小便。今止半兩。桂枝茯苓合而利小便乎。而防己茯苓湯桂苓並用。則治水氣在皮膚。桂枝茯苓澤瀉合而利小便乎。而茯苓澤瀉湯桂苓澤瀉並用。則治胃反吐。茯苓猪苓白朮合而利小便乎。而猪苓散二苓白朮並用。則治思水嘔吐。白朮澤瀉合而利小便乎。而澤瀉湯朮瀉並用。則治支飲苦冒眩。善夫柯氏之論。五苓散也。曰重在脈浮微熱。不重在小便不利。真得仲聖立方之旨矣。

○龍骨

鱗螬生於糞壤。糞壤猶人身之惡血。迨其變蟬。則吸風飲露。最爲清潔。猶人身之目不容纖塵。故其破瘀血。則鱗螬之出於糞壤也。主目中淫膚。青翳白膜。則鱗螬之變蟬。化穢濁爲清潔也。仲景蠶蟲丸。正以其兩目黯黑而用之。然虛勞而非有血瘀者不宜。

○龍骨

龍骨非無真者。特不易得耳。藥肆所售。乃龍蟄土中。至春啟蟄上膳。其所伏處。土遂黏埴似石而形似龍。故其用與真龍爲近。

龍爲東方之神。而骨黏舌。其用在心肝二經爲多。能收斂浮越之正氣。安魂魄。鎮驚癇。至主心腹鬼疰精魅。則以神物能辟邪惡也。治洩精瀉利漏下。則以味甘歸土。清

可去脫也。

○徐氏謂龍骨斂正氣而不斂邪氣。故傷寒邪氣未盡者亦用之。鄆氏謂龍骨牡蠣推挽空靈之陰陽與他發斂著物之陰陽者異。故桂枝柴胡兩湯可以會合成劑。龍骨攝陽以歸土。牡蠣據陰以召陽。二說皆極精。

○龍齒

龍骨以白者爲上。齒以蒼者爲優。生則微黑。煅之則如翡翠色可愛。較白者功用更捷。許叔微云。肝藏魂能變化。故遊魂不定者。治之以龍齒。古方如遠志丸。龍齒清魂散。平補鎮心丸。皆收攝肝氣之劑也。

○鱗鯉甲(卽穿山甲)

穿山甲主五邪驚啼悲傷。其可驚啼之邪。無論五藏何邪。自屬非分之來。難以驟當。而後發爲驚啼。由驚啼而悲傷。邪則乘肺虛而并之。此時通氣道之留阻而先解其邪。斯則穿山甲所克任者。若調其偏駁。安其神志。則更有他藥宜酌劑以善其後也。後人用穿山甲。多見於瘡瘍兩門。蓋瘍必有風痰溼濁瘀其經絡。瘍則肌腠壅滯。非性銳善穿之物。不能疏排而發之。若瘍涉於虛瘍。至潰後。則非其所能爲矣。

○鳥賊魚骨

烏賊魚由寒鳥入水而化。其骨白。骨爲腎之合。而色白則屬肺。是爲攝氣入血。故能化血中之氣。肉腴潤而骨獨燥。又能燥血中之溼。血閉癥瘕。驚氣入腹。腹痛環臍者。血爲氣鬱也。漏下赤白。陰蝕腫痛。瘡多膿汁者。血爲溼亂也。治以烏賊魚骨。如磁石之引鉞。琥珀之拾芥矣。

再以驚氣入腹之旨繹之。驚則氣亂。入腹則氣下趨而靡所止。烏賊魚能於水中下研黏石。又何患驚氣之不止哉。

龜甲

水族離水則殞。陸蟲沒水輒斃。惟龜常湛於水固生。終令居陸亦生。所以能治水火相齧之病。輕狡者遲重則殆。遲重者不能輕狡。惟龜腹背自遲重。首尾四肢自輕狡。所以能治中外不相應之病。衷甲者。以其堅爲蔽。以其裏爲衛。惟龜雖有甲。而縱橫成理。片片可據。雖可據而上下緊裹。無少罅隙。所以能治當開不開。當闔不闔。并開闔參爭之病。漏下赤白。小兒頭瘡難燥。非水火之相齧乎。溼痹四肢重弱。非中外之不相應乎。蓋五痔陰蝕。小兒頭瘡難燥。非水火之相齧乎。溼痹四肢重弱。非中外之不相應乎。蓋人之一身。無不以水火爲樞機。水與火相違。則氣張而體不隨之。張氣翕而體不隨之。翕此能助之張。助之翕。火無水養者。此能滋其水。水爲火格者。此能熄其火。以至

水停幽隱而火之途徑難通。火善萌動而水之滋溉不及。均藉此以增損維繫之。此鄒氏之論。自來注家無此精當。爲略更數字而存之。

龜甲所治之水。非流動之水。所治之火。非披猖之火。鄒氏所論之水火。正須善會。張氏云。龜甲能引陽氣下歸。復通陰氣上行。可與鄒說並參。惟陰陽以理言。水火以證言耳。

凡人靜則明生。龜居四靈之一而靜鎮不擾。故能收攝囂浮而靈明白溶。諸家謂爲滋陰。原非不是。要不如別錄資智二字品題之妙。

○鼈甲 ○ 牡蠣

鼈甲牡蠣之用。其顯然有異者。自不致混於所施。惟其清熱更堅。人每視爲一例。漫無區分。不知此正當明辨而不容忽者。甲介屬金。金主攻利。氣味鹹寒。則入陰。此二物之所同。清熱更堅之所以並擅。而其理各具。其用亦因而分。鼈有雌無雄。其甲四圍有肉裙。以肉裹甲。是爲柔中有剛。陰中有陽。蠣有雄無雌。硯礪相連如房。房內有肉。是爲剛中有柔。陽中有陰。鼈介屬而卵生。色青則入肝。而氣沈向裏。蠣介屬而化膽。本經於鼈甲主心腹癥瘕堅積。於牡蠣主驚恚怒氣拘緩。仲聖用鼈甲於鼈甲煎

丸。所以破癥瘕。加牡蠣於小柴胡湯。所以除脇滿。所謂向裏連腎向外連膽者。正卽此可推。其更堅不能無鈍鈍之差。清熱亦大有深淺之別也。由斯以觀。凡鱗甲之主陰蝕瘡核骨蒸者。豈能代以牡蠣。牡蠣之主盜汗消渴瘡癰頸核者。豈能代以鱗甲。鱗甲去惡肉而亦斂潰癰者。以陰既益而陽遂和也。牡蠣治驚恚而又止遺洩者。以陽既戢而陰卽固也。

文蛤

考仲聖文蛤散文蛤湯。渴不用桔梗之屬。有表邪不用桂枝之屬。而獨用文蛤。幾莫明其故。迨卽所治之三證細究之。而後知宜文蛤不宜他藥者。固自有至精至切之義焉。蛤者雀所化。具自外飛入水之概。殼有文彩。又其精氣所注。用在殼而味鹹。則爲由表以入裏。氣寒性燥。則能清熱而勝溼。其清裏熱。祇清上焦心肺之熱。以鹹平無深入之能。氣復走表。又分其勢也。活人書治血結胸。李防禦治痰嗽面腫。皆治在心肺之明徵。而仲聖又有精者焉。病在陽。應汗解而不汗解。則熱邪遺留於表。以冷水瀝之灌之。內心煩而外粟起。則其寒爲外附之寒。不必治寒而止。須治熱。治溼。文蛤治表間熱溼。恰與證合。若不差。必熱已退而鹹寒不克任之。與五苓散者。取其淡辛化氣而表邪得盡也。吐後渴欲得水而貪飲。貪飲由心肺熱熾。渴飲在於吐後。必

表閒尙有餘邪。故以麻杏發汗。卽以文蛤協石膏清熱。甘草和之於中。蠶沙調之於表。麻杏祇三兩而蛤膏各用至五兩。意自在於清熱。麻杏力微。故兼主微風。此湯實非爲風寒設也。至渴欲飲水不止。亦主以文蛤散。不止卽貪飲之謂。而無吐後之餘邪。則止其熱渴已足療病。文蛤治表熱不必有渴。治心肺之裏熱。則正能止渴。蓋其渴非津虧與小便不利也。

雞矢白 雞子白 雞子黃

雞屬酉金。又爲巽木。具金木之氣。本有伐土之長。用其水穀所化之矢白。則尤能化滯消積。領濁下趨。故脾土職復。則鼓脹以消。風木氣平。則轉筋自止。利小便並止遺溺者。以遺溺故小便不利也。用白者。取其得金氣多。無白亦可不拘。

聖惠方用原蠶沙治霍亂轉筋。是從雞矢白散脫胎。亦以蠶沙能勝風去溼。領濁下趨耳。

卵白爲陽黃爲陰。白氣輕而黃氣重。故白能解散浮陽。療目熱赤痛。與咽中生瘡。黃能涵育真陰。主心中煩不得臥。與百合病吐後。孩子熱瘡。妊娠胎漏。本經卵白止小兒下洩一語。最宜體會。小兒熱洩。祇以氣清微寒之卵白治之。卽效。若丈夫則宜於苦寒矣。今人治洩。不知有熱壅經隧。水穀不能化赤而直趨大腸。一

證。概從事於淡滲溫燥。讀此能無惘然。

猪膽汁

傷寒論少陰病下利脈微者與白通湯。利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之。是膽汁明爲乾嘔煩而加乾嘔煩者。少陽木火上衝心胃所致。若但寒則不煩不乾嘔也。霍亂下利清穀裏寒外熱汗出而厥者。通脈四逆湯主之。吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者。通脈四逆加猪膽汁湯主之。於四肢拘急下又益之曰不解。必已依法治之而猶不解也。以白通加猪膽汁湯之例推之。其所先與當卽爲通脈四逆湯。服之而汗出肢厥如故。更見拘急不解。脈微欲絕。非治之不得其當也。蓋四肢爲諸陽之本。陰邪充斥於四肢。則陽被陰縛。欲伸不得。投以薑附熱藥。則陽拒於內。陰爭於外。拘急何自而解。夫拘急乃筋脈之收引。筋屬肝。肝與膽爲表裏。其薑附之不任受者。膽爲之也。相火不治。君火何能獨治。故或爲嘔煩。或爲拘急。此猪膽汁所以並加之也。膽汁苦寒。施於垂絕之微陽。豈尙能堪此。不知其陰中之火。憤而思競。正非膽汁不靖。故從治亦卽正治。抑仲聖用此爲至慎矣。少陰寒邪直中。乃陽氣暴虛。非本虛。且內寓元陽。故當其下利而嘔煩。可加膽汁。霍亂亦吐亦下。正中氣散亂之際。膽汁甚忌。故必拘急不解。並吐已下斷而後加之。且不解者如

故之謂拘急之始。何嘗不宜膽汁。而仲聖不遽用者。又有可旁通以見之者焉。在桂枝加附子湯曰四肢微急。在四逆湯曰內拘急。在芍藥甘草湯曰微拘急。皆不用膽汁。獨拘急而至不解。則用之。非以其苦寒傷正而慎之乎。乃張隱菴謂膽汁能起腎藏之汁。資心主之血。果爾。則仲聖方當不止一二見矣。何不察之甚哉。膽藏肝葉。病每相連。醫家亦多連稱。否則偏注於肝。動云肝氣肝陽。鮮有別之爲膽病者。然肝爲陰經。膽爲陽經。肝爲風木。膽爲相火。凡見上升與火之證。肝必挾膽。或竟屬膽病。李瀕湖謂豬膽去肝膽之火。此卽余從治亦正治之說。第與肝並舉之耳。成無己則謂通脈四逆加膽汁。是補肝而和陰。又稱肝而不及膽。以兩說權之。李自較勝於成。劉潛江卻揚成而抑李。曰。予見一醫治或瀉或止。每以豬膽汁炒黃連柴胡和他藥用之。遂止。不以膽汁炒則不應。若不有以補肝。令血和而風靜。僅如時珍所云平肝膽之火。則黃連輩何以鮮功。甚矣劉氏之闇也。膽汁與蠶附並用。語人以膽汁是主治膽火。人固未必肯信。今以膽汁與柴連偶去膽汁。卽不應。則不啻膽汁自表其功矣。何則。膽汁苦寒而滑。極利大便。若是肝瀉。自應加膽汁而瀉作。何以無膽汁。則瀉反不止。非所謂肝病挾膽者歟。治肝以連。是以寒勝熱。以苦燥溼也。治膽以膽。則平膽中壯火以扶生氣。不使隨肝下走也。治肝而不治膽。所以無效。況柴胡

爲少陽藥。顯係相協以挽少陽之氣。成氏之說。鑿空無據。劉氏輒從而和之。醫道誠難言爾。

豬膚

少陰之熱。上爲咽痛。以少陰同氣之物而留連於上。以除熱。非豬膚莫任。故醫家多用此取效。而仲聖豬膚湯實開其先。今試以鄙說備一解焉。下利咽痛心煩皆少陰病。惟胸滿疑涉少陽。不知少陰脈之支別。從肺出絡心注胸中。下利既泄其腎陰。其虛陽之上乘者。遂得因中土無權。紛擾於經氣所到之處。而致咽痛與胸滿心煩。以其虛而非實。故胸滿不至於痛。不必用攻陷之劑。此時伏邪初發。尙未由血及氣。亦無事於苦寒傷正。豬水畜而膚甘寒輕浮。自能從上引下而客熱以平。然下利非溼也。非加白蜜。不足以潤燥益陰。患見於上下。則宜建中。非加白粉熬香。不足以悅脾振困。此證無與於少陽固矣。而鄒氏更以疰病用大承氣湯。有胸滿字。爲涉陽明之據。又豈足爲訓歟。

羊肉

羊之爲物。古說至蹟。或謂火畜。(禮月令及周官庖人注)或謂土畜。(淮南子時則訓及呂覽孟春注)或謂西方之牲。(賈子胎教篇)或謂土木之母。(淮南子時則訓)五行已占

其四。而自愚思之。卽謂之水畜亦何憇焉。羊以西北方產者爲美。有長髯可當長髯主簿之目。（古今注）又好登歷山崖傾仄處。略無怖意。其腎氣之充固。非他畜比。惟於五行咸具中。以得火土之氣爲尤多。故仲聖用治寒疝腹痛與產後腹中疼痛。取其氣熱味甘。足以溫脾緩中。而藥之能溫脾緩中者。尙有之。茲何以非羊肉不可。則以證不獨在脾。羊肉正不獨治脾也。素問病名心疝。少腹當有形。又任脈爲病。男子內結七疝。寒疝卽七疝之一。何能於腎無與。卽仲聖之大烏頭煎抵當烏頭桂枝湯。皆治寒疝腹痛。皆用烏頭。烏頭者。外驅寒溼。內溫腎陽者也。外臺烏頭湯。且以治寒疝發作時。令人陰縮。況脇痛裏急。明是寒襲厥陰。產後血虛。無不下寒。小建中湯。雖治腹痛。豈能愈此大證。兌爲羊。兌卦二陽在下。一陰居上。羊蓋具剛狠之性。（易大壯疏）而能於陰中化陽者。寒疝乃肝腎之陰。同受寒累。羊肉溫脾緩中。而肝腎之虛寒。亦得其溫補之益。故用之是證。最爲切當。其必與歸薑協力以成功者。羊肉能於陰中化陽。不能散陰中之寒邪。此歸薑辛溫之能事。謂爲羊肉之前驅可也。

阿膠

阿膠爲補血聖藥。不論何經。悉其所任。味厚爲陰。阿膠之味最厚。用必以補。不宜補者。勿用。白頭翁湯加阿膠。則曰下利虛極。內補當歸湯。則曰去血過多加阿膠。仲聖

孫真人皆有明訓。然非填補比。不得與熟地山藥同論也。阿膠以濟水黑驢皮煎鍊而成性。易下行。且滑大腸於下利非宜。何以白頭翁加甘草阿膠湯治下利。不知此乃滯下之熱痢。正藉其滑利之功。故張潔古加減平胃散治熱痢。以膿多而用之。渴者非熱燥其液。卽下焦陰液不上朝。阿膠不能清熱而性下行。何能止渴。乃豬苓湯治發熱而渴。又治下利而渴。證不宜阿膠。而偏佐以阿膠。不知此皆因熱而渴而利。水畜於中而熱與水得液既大傷。更與以豬苓輩淡滲燥劫之物。液不幾涸矣乎。佐阿膠所以潤液而救豬苓輩之偏。非治其渴與利也。推之黃土湯燥溼。鼈甲煎丸破結溫經湯行瘀。大黃甘遂湯下血逐水。亦斷非滋柔濁膩之阿膠所能爲力。蓋其補血潤液而下行。不致掣燥溼破結行瘀下血逐水之肘。且能輔其不逮。故有需於阿膠。若執黃土湯諸方。而以燥溼各事責阿膠。則何異捫燭扣槃之見矣。

犀角

犀角一物。或謂胃藥。或謂心藥。或謂性升。或謂性降。或謂取汗最捷。或謂治血與經旨不合。夫毒物入土卽化。牛屬土而犀角黑中有黃花。黃中有黑花。雖水畜未嘗不秉土德。謂爲胃藥無媿。釋名心纖也。所識纖微無不貫也。犀角中有白星徹端。夜視光明。謂爲心藥無媿。其角長而且銳。空而通氣。氣味苦酸而兼鹹寒。故能至極上極。

下亦能至極內極外。其實非升非降。不發汗。不逐實。心胃藥而不專走心胃。血藥而不泛治血證。觀千金外臺兩書用犀角之證。在上者有之。在中在下者有之。在表者有之。在裏者有之。無分於上下表裏。而總惟血熱而有毒者宜之。諸家之說。不免皆有所偏。

論犀角之精者。必首推鄒氏。然謂用犀角必外有表證而兼肌膚有故。乃其所引外臺諸證。則並無表證。夫表證者。有表邪宜發汗之謂。犀角與麻黃並用有之。不能專任以發汗。鄒氏又以金匱升麻鼈甲湯無犀角爲無表證。外臺治喉痛有犀角爲有表證。而升麻鼈甲湯證非無喉痛。不解何以疏舛若是。

鄒氏引魏培之犀角是倒大黃之戲語。鬯發大黃治火之自中及下。犀角治火之下及上。義至精矣。而猶有未盡者。本經大黃主下瘀血。犀角主解百毒。就此繹之。大黃除血分之熱結。是逐而下之。犀角除血分之熱毒。是解而散之。大黃不言解毒。是熱結於虛處。致用多在腸胃。犀角不言下瘀。是熱淫於實處。致用多在肌膚。大黃之味至苦。色至黃。性復猛厲。自能逐物而下。犀角靈異之品。無論何處。遇毒輒赴。謂其自上而降。自下而升。則舉之不當矣。

陸九芝世補齋醫書犀角升麻辨。看似精詳。細覈之。則疏舛殊甚。升麻代犀角。孫真

人千金方已有此語。不始於朱奉議活人書。二物皆中空通氣入陽明經。味苦能發。故本經皆主解百毒。然升麻主氣。犀角主血。升麻升陽氣而解毒。犀角清血熱而解毒。原有不同。似未可以相代。不知孫真人用犀角之方不一。獨於傷寒雜治門。木香湯。則云熱毒盛者加犀角。無犀角以升麻代之。蓋其所治瘡煩疼。是陽氣爲陰邪所鬱。故方中用木香等辛溫宣陽之藥。熱盛則有毒。升麻能解毒而升陽亦無所妨。故可以代犀角。朱奉議以此法施於犀角地黃湯等方。固宜見譏。於陸而陸實亦不能無誤。提邪外出引邪內陷之說。由來已久。愚何敢闢以臆見。獨是仲聖傷寒金匱兩書。發表攻裏。分別甚嚴。卽在陰經而用汗法。非兼見太陽脈證。則必邪在於表。在於上。若邪離本經入他經。則治以他經之藥。邪得藥而自解。非提出之使他徙而後解也。其邪雖不在裏而不得用汗法者。仲聖又當反覆叮嚀以致意。此皆鑿鑿可證者。陸氏亦知提邪外出之非發汗不外出乎。可以發汗之邪。邪本在表。在上。未聞有從裏從下。提而出之。以發其汗者。或謂升麻之名。以升得之。自屬以升爲治。不知所謂升麻者。爲能升陽氣於至陰之下也。周慎齋云。凡生病處。皆爲陰爲火。爲陽氣不到。升麻升陽氣以愈病。非提邪氣以離病。不得併爲一談。至於引邪內陷。祇可謂之致。不可謂之引。凡無病之處。先爲藥傷。邪因乘虛而入。是爲藥誤所致。非如物交物之

得以相引。若寒藥治寒病。熱藥治熱病。可謂邪爲藥引矣。然此是滋蔓以益其本病。非陷入而別有變病。陸引喻氏論趙某室人誤用犀角領邪攻心一案。以明犀角非胃藥之據。夫犀角誤用爲禍誠烈。謂犀角非胃藥。則其測犀角何淺。又以犀角治熱入血室。爲能從至幽。至隱拔邪外出。故謂之升。微論犀角之治邪。非拔邪也。從至幽至隱。以升拔其邪。亦無此治理。仲聖治熱入血室。用小柴胡湯。似乎升矣。不知傷寒金匱兩書論此證諸條。惟續得寒熱發作有時一條。主小柴胡湯。且將發作有時句複沓言之。明示人以非有此證。不用此湯。蓋肝膽二經互相爲用。熱雖入於肝藏。寒熱如瘧。則邪不離乎少陽。以小柴胡湯和解之。最爲合拍。是柴胡尙屬和法。犀角更何足言升。乃活人書謬於仲聖經水適來。晝日明了暮則讖語。如見鬼狀爲熱入血室一條。增加宜小柴胡湯五字。竟視小柴胡湯爲治熱入血室之通劑。可謂蠭疏之至矣。

或詰余曰。子言提邪外出之證。必邪之在表在上者。乃寓意草載周信川患休息痢。喻氏以逆流挽舟之法。提內陷之邪。從表出而愈。何子之執滯也。余曰。逆流挽舟之說。後人多非之。其實非提邪出表。且與仲聖有暗合之處。可兩下研覈而知也。喻氏痢疾論云。下痢必從汗先解其外。後調其內。此治痢初起之要訣。學者所宜切記。至

失表而成久痢。邪已深入。云用逆流挽舟之法。引而出之於外。則不知其挽從何處。
若從極下逆挽而上。顯犯少陰。病在裏不可發汗之戒。引喻過當。不無流弊。金匱下利脈反弦發熱。身汗者自愈一條。喻氏以此下利爲久痢。非用逆挽之法。無以得此。
夫弦爲少陽之脈。寒利得之。自屬病氣將退。陽氣來復之徵。喻氏強題就我。憑空結撰。實不可爲訓。然則以此法治周信川休息痢而愈者何也。病者年已七十有三。面目浮腫。肌膚晦黑。別無他狀。非陽虛陰盛而何。痢有冷熱兩種。此當是冷痢而溼重。熱輕。因其陽氣下陷。與溼熱相搏。故脈沈數而有力。喻氏謂陽邪陷入於陰者非也。病在腸胃。與少陰無涉。以仲聖陽明病與小柴胡湯取汗之法。比例求之。彼爲上焦不通。津液不下。胃因不和。故不大便。此爲邪壅腸胃。津液不布。傳化無權。故久痢不止。彼以小柴胡湯和解其外。而濺然汗出。此以人參敗毒散升散其裏。而皮閒得潤。小柴胡湯本方無取汗之文。服之而汗出者。其上焦通也。休息痢本不能發汗。服人參敗毒散而亦似有汗者。升陽以化溼。陰陽和而穀味熏膚充身也。因人參敗毒散雖有人參。究屬劫劑。故改用補中益氣湯而始收全功。方中柴胡參草薑棗。即小柴胡湯去芩夏。彼爲挾熱。此爲挾寒。彼宜通。此宜固。故芩夏無所用之。又凡仲聖治寒痢之方。不雜一下走之藥。甚或用石脂餘糧以固下。葱白以升陰。(義詳葱白)喻氏

則外以布捲摯定肛門。使氣不下洩。內服湯以升舉之。得仲聖意而不默用仲聖之方。非明哲那能如是。雖然。仲聖亦逆流挽舟以治利耳。而喻氏出之。謂爲提邪出表。得毋有不察者存乎。

兩頭尖（卽牡鼠屎）

鼠善穿而屎爲下輸之穢物。頭尖則銳。故藉以導穢濁之邪有奇效。別錄同葱豉煎服。治時行勞復。夫時行病愈之後。熱邪之未盡者。必伏於陰分。隨人氣壯而消氣乏而作。緣勞復病無不發熱。治宜散宜洩而不宜補。葱豉所以散之於表。鼠屎所以洩之於裏。政以腎穀蒸譽而成。其用爲由陰達陽。鼠屎則降濁以升清也。仲聖枳實梔子豉湯治勞復。以枳梔瀉上中之熱。使下行。淡豉搜下伏之熱。使上解。別錄意亦猶是。初無大異。活人書更以葱豉鼠屎與枳梔合併成方。則慮之惟恐不周矣。仲聖燒罷散治傷寒陰陽易。導其熱從前陰而出。活人書師其意立綏鼠糞湯。以出黏汗。取效。蓋韭根臭濁入心氣辛達表。與鼠糞同用而多於鼠糞。則能使陰分感受之邪悉舉而洩之於表。治陰易不治陽易者。以二者皆陽藥。能消陰不能瀉陽也。葉香巖治淋濁用兩頭尖。亦從此脫胎。

髮亦名血餘。古以男子年近二十無疾病者。翦項心髮燒研入藥。故本經名髮髮。功用與亂髮無異。亂髮乃梳櫛下髮也。以阜角水洗淨曬乾。入罐固濟。煅存性用。水出高原。故腎華在髮。髮者血之餘。血者水之類。此滑櫻甯注素問語也。而本經髮鬚主五癃關格不通利小便水道。若移滑語作此疏。亦確不可易。仲聖豬膏髮煎治黃疸與陰吹正喧。以豬膏潤燥。亂髮引入下焦血分。消瘀通關格利水道。滑石白魚散。乃利小便之重劑。病不專在氣分。滑石利竅驅溼熱。不輔以白魚亂髮。血中之氣藥。則膀胱之水道猶不得利。凡仲聖用血餘與本經正如符節之合。後世因本經有自還神化一語。不得其解。遂附會其說。或謂補真陰。或謂益水精。骨是通關格之物。而能有補益之實者耶。別錄合雞子黃煎之消爲水。療小兒驚熱百病。雞子甘溫育陰。本治小兒虛熱之妙品。血餘得之。則變峻逐爲宣鬯。而陰分之積熱以解。痰逆以平。以此法塗熱瘡。小兒及產婦亦俱宜。古方元精丹。則以血餘配入首烏等一切補腎之藥。爲便後脫血之良方。此皆得製劑之道。而血餘乃有功而無過。非血餘之本能然也。鼻衄以血餘燒灰吹之立止。卽齒血便血與諸竅出血。燒灰送服。亦無不止。此蓋色黑止血。而血餘更以血入血。故應如桴鼓。要不可忘其爲消瘀之厲劑也。

人尿（童男者尤良）

李瀕湖謂人尿入胃輸脾歸肺。下通水道入膀胱。皆其舊路。是當爲利水之妙品。而方書俱不主利水。良以鹹寒入血。不兼走氣。能益陰清熱消瘀。而不能利水。不能利水。故於益陰清熱消瘀愈顯其用。寇宗奭謂此物性寒。不宜多服。朱丹溪則力闡其非。至引八十老婦常服人尿而健以爲證。不知人之稟賦不齊。遇陽有餘。而陰不足之人。原得其益。若陽虛與血虛無熱者。豈能相宜。仲聖白通加豬膽汁湯。內有人尿。所以平嘔煩。瀉陰中之陽。葛稚川蔥豉湯。內有人尿。所以防溫邪之傷陰。或陰分之寒已化熱。皆取其鹹寒清熱。惟係曾經府藏輸化之物。與人身陰氣相得。非他物鹹寒可比。故治產婦血暈。與夫勞嗽。血滲入肺。吐血衄血。骨蒸發熱。中喝昏悶。折傷跌撲。致有靈驗。余親串中有一婦。曾於產後血暈。飲童尿而瘥。後乃以童尿隕命。蓋此婦本陽虛之體。迨體肥於前。陽虛亦更甚於前。家人狃於前效而用之。適以取禍。寇氏性寒之說。顧可忽乎哉。

本草綱目

李時珍撰

本書係就吳毓昌刻本影印而成。其校勘之精細。繪圖之工緻。當時有海內第一善本之稱。茲將原版影印。公諸同好。舊刊諸本。檢查頗感困難。本書新編藥品索引一種。綱目分類。拾遺分部。以首字筆劃爲先後。檢查非常便利。

▼全書二千餘頁 精裝二冊 一元六角 (寄費二角三分)

世界書局發行