

宣明論方下

劉守真醫書二

積聚論

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

素問曰：積聚留飲。滯隔中滿濕積。霍亂吐下。瘕癥堅硬。腹滿皆太陰濕土。乃脾胃之氣。積聚之根也。
積者不散。聚者不化。留者不行。飲者停滯。宿者不通。隔者阻也。斯疾迺五臟六腑陰陽變化興衰之制也。亢則害。承迺制。極則反矣。

謂水得燥則消散。而得濕則不消。乃為積飲也。謂人形精神與榮衛。血氣津液出入流通。謂夫腠理開密。乃為痞也。謂腸胃隔絕。傳化失常。而乃滯也。土主形體。腹滿於中央。乃曰中滿。以傳化失度。故甚則霍亂吐瀉也。癥者。腹中主硬。按之應手。然水體柔順。而今乃堅硬如此者。亢則害。承乃制也。瘕者。中雖硬。而忽聚忽散。無其常。故其病未及癥也。經曰。血不流而滯。故血內凝而乃瘕也。小腸移熱於大腸。乃為處瘕。大腸移熱於小腸。謂兩熱相搏。則血溢而為伏瘕。血溢不利。月事沉滯。結不行。故行為處瘕。謂處與伏同。瘕與疝同。為傳寫誤也。世傳冷病。然瘕病亦有熱。或陽氣鬱結。怫熱壅滯。而堅硬不消者。世傳為寒癥瘕也。或堅痞。腹滿急痛。寒主痛。急主縮。寒極血凝泣而反兼土化制之。故堅痞之腹滿。或熱鬱於內。而腹滿堅結痛不可忍者。皆可為寒誤矣。誤矣。

何不以脉證辨之。凡諸疾病。皆有陰陽寒熱。宜推詳之。五臟六腑。四季皆有積聚。心之積名曰伏梁。在於臍上。大如臂。上至於心。橫於心下。如屋梁。故曰伏梁。肝之積名曰貴。音。氣在左脇下。覆如杯。有頭足。久不愈。令人瘦瘧。脾之積名曰痞。氣在胃腕。覆大如杯。久不愈。令人四肢不收。發黃疸。食不為膚。肌肺之積名曰息。貴。音。氣在右脇下。覆大如杯。久不愈。令人灑淅寒熱。喘咳發為肺癰。腎之積名曰貴。音。氣在小腹。上至心下。如廄。貴走往來無定。久不愈。令人喘逆。發為骨痿。少氣之力。此為五藏之積也。常究斯義。未可悉也。

傳其所勝者。死傳不勝者可治。假令肺病傳肝。肝病傳脾。脾病傳腎。腎病傳心。心病傳肺。皆傳所勝。

五藏之氣虛而內外諸邪所侵。故留稽不行。遂成積聚。其脉沉細而微者是也。

木香三稜丸 治一切氣悶。胸膈痞滿。榮衛不和。口吐酸水。嘔逆惡心。飲食不化。肋脇疼痛。無期久新。

青木香

破故紙

茴香

黑牽牛

甘遂

荆三稜

蓬莪术

川練子

葫蘆芭

芭戟

巴豆

陳米

大戟

荆三稜

蓬莪术

川練子

右件十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末。

醋糊和丸如菜豆大每服五七丸食後加減者虛實隨湯水下。

導氣枳殼丸

治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述。

枳殼

去穰
麸炒

木通

剉炒

青皮

去皮

陳皮

去白桑白皮

炒蘿蔔子

剉白牽牛

炒黑牽牛

炒荳蔻

茴香

炒

荆三稜

煨各等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如桐子大每服二十九煎橘皮湯下不計時候。

透膈寬腸散

治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛

一兩

芒硝

三兩

川大黃

二兩

甘遂

半兩

右為細末

食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止。

密補固真丸

治脾胃真元損虛泄痢痰嗽噦痞水穀酸臭飲食無味脅腹疼痛肢體麻痺下虛痰厥上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面黧身悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣

一切脾胃虛證常服補養宣通氣血

天南星

半兩

半夏

製

神曲

麥蘖

茴香

炒

荆三稜

炮各一兩

白附子

乾生薑

川烏頭

生各一兩

芭豆

七箇

牽牛

三兩

代赭石

二兩

官桂

一分

右為末

水和丸小豆大每服十九加至五十九溫水下除泄瀉外並加大黃一兩。

木香丸

治利肺胃寬胃膈消炎逆止嘔吐進益美飮食

官桂 乾薑各半 木香一分 大黃 蓬莪茂 芫花 醋拌溫炒茺朶殼去穰陳皮各半 半夏二兩

牽牛半斤取末四兩 苗香炒一兩 芭豆四箇

右為末滴水為丸如小豆大。每服二三十丸。溫水下。

軟金丸 治心胸腰腹急痛。或淋閑。生產後經病。血刺痛。

當歸半兩 乾漆二錢 紅花一錢半 河水煎用 輕粉 磃砂 粉霜各一錢 三稜二錢

右同研匀。棗肉為膏。和丸菜豆大。新水下一丸。病甚者。加得利後減。

泥金丸 治心腹急痛。取久新沉垢積滯。推陳致新。

黃藥 大黃 芭豆 五靈脂各半 猪牙皂角一分 輕粉 粉霜 磃砂各一分 乾漆一分

右研匀。煉蜜拌得所杵千下。丸菜豆大。新水下一丸。未利更加服。

狀元丸 治膈氣。酒膈酒積。涎嗽腹痛。吐逆痞滿。

芭豆五十粒 取霜 神麴半兩 洗一兩 雄黃 白麴炒一兩

右研匀。酒水丸。小豆大。細米糠炒變赤色。食後溫瀝汁下。止嘔吐。生薑湯下。

玄胡丸 治積聚癥瘕。解中外諸邪所傷。

玄胡索 青皮去白 陳皮去白 當歸 木香 雄黃別研 荆三稜 生薑各一

右為末。酒麴糊為丸。如小豆大。每服五七丸。生薑湯下。

又一方 無陳皮 生薑 有黃芪一兩 槟榔分兩

大延胡索散 治婦人經病。產後腹痛。腹滿喘悶。癥瘕癖塊。及一切心腹暴痛。

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦練 蓬莪朶 官桂 厚朴 木香 川芎各一

桔梗 黃芩 大黃各半 甘草一兩 檳榔二錢

右為釐末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三稜湯

治癰瘕瘻瘍。積聚不散。堅滿痞膈。食不下腹脹。

荆三稜

二兩白朮一兩蓬莪朮半兩當歸半兩

培

檳榔

木香三錢

右為末。

每服三錢沸湯點服。食後每日三服。

消飲丸

治一切積聚。瘻瘍氣塊及大小便結。胸痛不能仰。

天南星

半夏

芫花

自然銅等分生用

右為末。

醋煮麪糊為丸。如桐子大。每服五七丸。食前溫水下。良久葱粥投之。相虛實加減。

除濕丹

治諸濕客搏。腰膝重痛。足胫浮腫。筋脉緊急。津液凝滯。便溺不利。赤癰瘍。疽癰發背疥癬。

走注脚氣無首尾。瘡癰功效不可盡述。

檳榔

甘遂

去白

炒

二兩

陳皮

四兩

去白

歲靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶

二兩

各乳香

沒藥

刷研

黑牽牛

半兩

大戟

右為末。麪糊為丸。如桐子大。每服五十九。至七八十九。溫水下。後食。如服藥前後。忌酒一日。藥後忌濕。可食溫粥補暖。

保安丸

治癥積心腹內結。如拳漸上不止。搶心疼痛。及邊臍腹痛。不可忍者。

川大黃

三兩新水浸一宿蒸熟切片子焙乾薑炮

一兩

大附子

半兩去

皮膚

去

鱉甲

一兩半

好醋

一升

右為末。取三年米醋

一大升先煎四五合然後和藥丸

如桐子大

每服十

丸

至二十九

空心醋

或酒米飲下。後取積如魚腸。膿血爛肉汁青泥當下。

開結妙功丸

治怫熱內盛。瘻瘍堅積。腸結癰瘕。積聚疼痛。脹悶作發有時。三焦壅滯。二腸閉結。胸悶煩心。不得眠。咳喘噦逆。不能食。或風濕氣兩腿為腫脹黃瘦。眼澁昏暗。一切所傷。心腹暴熱。肝

麻木不通氣血

荆三稜 炮茴香各一川烏頭四神麩

大黃各一兩好醋半升熬成稠膏
麥芽 大黃各一兩不破堅殼不須熬膏水丸 乾薑二錢

巴豆二箇破堅精用四箇半夏半兩桂二錢牽牛三兩

右為木膏丸小豆大生薑湯下十九十五九溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力緩性却減丸數以加至快利三五行以意消息病去為度

木香分氣丸 治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛捨刺如覆杯狀

陳皮去白檳榔各一兩破故紙炒二兩木香一兩黑牽牛十二兩炒香熟取

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十丸生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰水宿食不消咳嗽儲肋刺痛寬中開胃進飲食

桂心一兩生姜一斤切作片子鹽三青皮去白陳皮去白甘草炙各縮砂仁四十九箇廣蔴

當歸各半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯化下

導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒木香各一錢桂一錢巴豆八個出油為度

右為末後入芭豆霜研匀醋漿糊和丸如菜豆大朱砂為衣每服五丸至十九淡鹽湯下
積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無力癥瘕積聚百吐酸水

檳榔去節芫花一兩硝砂二錢芭豆二錢青皮去白陳皮各三錢蓬莪藶雞爪黃連京三稜
章柳根牛膝各一肉豆蔻三箇大戟川大黃甘遂白牽牛乾薑青礞石乾漆

各半
木香二錢
石菖蒲三錢
雨

右為末。醋麪糊和丸。如桐子大。每服一丸。臨卧燒棗湯下。每夜丸服後。有肚內作聲。病退為度。

金露紫苑丸

治一切脾積。兩肋虛脹。臍疼。痛。

草烏頭去皮尖黃連半兩

官桂桔梗

乾地黃

乾生姜

川椒蕪荑紫苑去皮柴胡

防風厚朴

甘草人參

川芎

鱉甲酒浸

貝母枳殼

甘遂各一
豆半日出油

入硇砂三生

右為末。水煮麪糊為丸。如桐子大。每服五丸。空心臨卧。米飲湯下。或微疏動。詳虛實加減。
信香十方青金膏灌頂法。王子所傳。十二上願云。藥師瑠璃光如來。應當供養。正偏知明行足。善游世間。解無上土。調御丈夫天人師。

佛世尊方境授治。周身中外陰陽不調。氣血壅滯。變生百病。乃至虛羸困倦。偏攻酒食。內傷心腹。瘦或消渴。多飲而數廁也。小便或腸風下血。痔瘻冷痛。或胃癰疹。或偏身癱瘓惡瘡。或瘡毒已入於裏。腹滿嘔吐。或成瀉痢。或出惡瘡疳肉。或下痢腹痛。或一切風氣肢體疼痛。及中風偏枯。或痰逆生風。痰涎嗽。兼產後腹痛。及小兒疳疾。諸風潮搐。但平人常服。補養宜行。榮衛調飲食。
信砒乳香輕粉粉霜芭豆以上各一
兩同研龍腦半字麝香半字青黛二錢同研黃蠟三錢
右研細末。鎔蠟入蜜半錢。就搓圓。旋丸菉豆至小豆大。先服小丸。病在上食後。在下食前。在中不計時候。面東頂禮一丸。淨器盛水送下。如合藥。即淨處面東。每一丸念密。呴三遍。或病人不能。呴請人呴。

或師氏呴過 呑曰

信香十方青金膏。藥師圓成蜜遍拋。普濟有緣除百病。仰存一粒體堅牢。

密呪曰

但言八金剛。莫說十方佛。五蘊六根俱不道。十二上願自然成。

金黃丸 治酒積食積諸積面黃痘積硬塊。

荆三稜 香附子 半兩 澤瀉二錢半 芒豆 四十九粒出油
黍米粉 章牛 二錢半

右為末用施子煎湯和丸如菜豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋湯下七丸逆氣丸 治心胸滿悶。腸肋刺痛。不思飲食。常服寬膈進美飲食。

薑黃四兩 香附子 四兩 磷砂 甘草 廣戎各二兩 丁皮 甘松 木香 荆三稜各一兩
白檀 半兩 薑香葉 半兩

右為末入菉豆粉二兩用湯浸蒸餅為丸如桐子大每服二三十丸細嚼白湯下食後日進三服

丁香散 治痃癖氣脇下痞滿息而不消積而不散元氣在胃不妨食者

好丁香 二十五個

白丁香 七十箇 密陀僧 舶上硫黃 黃鸝調各五分

右為細末每服一字兒子煎湯調下不計時候治肚內生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無間久新者

大黃三兩 黑牽牛頭末 一兩 磷砂 三錢 山施子 半兩 輕粉 二錢

右為末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之虛實加減

無憂散一名萬病散 治風痰瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯氣結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃內有

癥瘕氣并常有疳蟲蛇蟲攻心腹俱痛忍中傷寒頭痛不忍狀若山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥宣通三五行立瘥或中風口渴語多蹇澁睡後口中涎出不限時節不問男子女人但五日一服不過三服永瘥人患腰膝疼痛脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒痘瘡胎胚者量大小

與服。和三五行自瘥。大人久泄氣痢。狀若休息痢。有時俱一服取下。冷脹一二升。當日見效。藥無四時冷熱。老幼衣弱病患。悉皆除之。任服他藥無妨。若常服時。蓋緣搜出臟腑中。精滯蟲腹故也。無孕婦人。久患血虛氣弱。痿黃無力者。亦可依方服。宣通氣候。殊不困倦。無妨此藥。凡有百病。並皆治之。其功不可具載。有孕婦人。或遇陰晦時。即不可服。天道晴朗。可進。雖若復疾而未愈者。可再服。

黃耆 木通 桑白皮 陳皮各一兩 胡椒 白朮 木香合半兩

白朮牛

四兩炒頭末

右七味為細末。每服二錢。牽牛末二錢。生薑二錢。切作片子。煎生薑湯一大盞。調藥須臾。又用生薑湯。或溫湯送下。平明可行三五次。快利無妨。如病瘥後。以白粥補之。痊矣。

五積丹 治心腹痞滿。嘔吐不止。破積聚者。

白芍一錢。一尺二寸火燒存性淨盆合。面土壅合勿令出煙。芭豆十二箇。白麪一兩五錢同炒。令黃色為度。

右為末。醋麪糊為丸。菜豆大。每服十九。鹽湯下。食後加減。

水濕門

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

夫諸濕者。濕為土氣。火熱能土濕也。故夏熱則萬物濕潤。秋涼則濕物燥乾也。濕病本不自生。因生於大熱。怫鬱水液不能宣通。即停滯而生水濕也。凡病濕者。多自熱生。而熱氣尚多。以為兼證云。濕熱亦猶風熱義同。雖病水寒不得宣行。亦能為濕。雖有此異。亦以鮮矣。或跗腫體寒而有水者。以畜熱入裏。極深非病寒也。

三花神祐丸。治中滿腹脹。喘嗽淋悶。一切水濕腫滿。濕熱腸垢。沉積變生疾病。久病不已。黃瘦困倦。氣血壅滯。不得宣通。或風熱燥鬱。肢體麻痺。走注疼痛。風痰涎嗽。頭目旋運。瘧疾不已。癥瘕積聚。堅滿痞悶。酒積食積。一切痰飲嘔逆。及婦人經病不快。帶下淋瀝無間赤白。并男子婦人傷寒濕熱。腹滿實痛。久新瘦弱。俗不能辨別。或汎常只為轉動之藥。兼瀉久新腰痛。并一切下痢。及小兒驚癇。疳積。熱乳癖滿。並宜服之。

甘遂 大戟 芫花各半錢。醋拌濕炒。牽牛二兩 大黃一兩為細末。輕粉一錢

右為末。滴水為丸。如小豆大。初服五丸。每服加五丸。溫水下。每日三服。加至快利。利後却常服。病去為度。設病愈後。老弱虛人。平人常服。保養宜通氣血。消進酒食。病癖悶極。甚者便多服。則頓攻不開。轉加痛悶。則初服兩丸。每服加兩丸。至快利為度。以意消息。小兒丸如麻子大。隨強弱增損。三四歲者。三五丸。依前法。

崔宣武神祐丸

加黃柏一兩。牽牛四兩。大黃二兩。輕粉二錢。甘遂 大戟 芫花各一分。依前法

劉庭瑞神祐丸

用此藥治水氣當得効。

賈同知稱之不已。乃神仙奇絕之藥也。

葶藶木香散

治濕熱內外甚。水腫腹脹。小便赤澁。大便滑洩。

葶藶

茯苓去皮。猪苓去火白术各一錢。

木香半錢。

澤瀉二錢。木通二錢。

甘草各半錢。辣桂三分。

滑石三錢。

右為末。每服三錢。白湯調下。食前。

此藥下水濕。消腫脹。止洩瀉。利小便。若小便不得通利。而

反轉泄者。此乃濕熱痞悶極熱而攻之。不開。是能反為注泄。此正氣已衰。而多難救也。慎不可攻之。而無益耳。

白术木香散

治喘嗽腫滿。欲變成水病者。不能卧。不敢食。小便闊者。

白术

木猪苓去皮。赤茯苓。甘草。

澤瀉各半錢。

木香。檳榔。陳皮。去皮官桂。滑石。

三錢。

右為末。每服五錢。

水一盞。生薑三片。同煎至六分。

食後去滓溫服。

大橘皮湯

治濕熱內甚。心腹脹滿。水腫。小便不利。大便滑洩。

橘皮

一兩。木香一錢。茯苓一錢。

去皮。木猪苓去皮。澤瀉。

白术。官桂。甘草。

二錢。

右為末。每服五錢。

水一盞。生薑五片。煎至六分。去滓溫服。

大便秘。先服十乘湯。

二三日後再服此藥。

葦薢膏

治水腫腹脹。

牛黃

麝香一分。龍腦一分。昆布。

海藻。牽牛。桂心。八椒目。三分。葶藶。炒六分。

右為末。別搗。葶藶熬成膏。丸如桐子大。每服十丸。日再服。稍利小便為度。詳虛實加減。

茯苓散

治諸般氣腫等疾。

芫花

一分。澤瀉。郁李仁。

甜葶藶。漢防己。各二錢。

陳皮。去白檳榔。瞿麥。各半錢。

滑石

三分。大戟。炒三分。

右為細末。每服一錢。取桑白皮濃煎湯。空心調下。取下碧綠水。如爛羊脂。即瘥。如未盡。隔日又

服。腫消如故不用。服忌鹽百日。

調胃散 治胸膈痞悶。不思飲食。脇肋硬痛。消腹脹。

半夏製 半草炭 厚朴皮陳皮去白蔻香各等分

右為末。每服一錢。生薑三片。棗二枚。水一盞。同煎溫服。食前。

一氣散 治水氣脹滿。

白牽牛 黑牽牛各二錢

右為末。用大麥麴四兩。同一處。為燒餅。臨卧用茶湯一杯。下降氣為驗。

雄黃神金散

雄黃 蕃慈炒一兩。用糯米和澤瀉二兩。甘遂。桑白皮各一兩。上各用熟米不用澤瀉。雨後日午。大戟

芭戟去黑皮。天花粉五升。凌沙一日。沙凌

右為末。從發時加減一分。空心用井花水調下。每服一錢。加至五錢。以利為度。忌鹽醋。生冷。毒物油膩血。

從脚腫根在心。加葶苈。從肚腫根在腹。加目椒。從陰腫根在胸。加澤瀉。從膝腫根在肝。加芫花。從面腫根在肺。加桑白。從心腫根在肋。加雄黃。從肢腫根在脾。加甘遂。從口腫根在小腸。加芭戟。從腰腫根在腎。加大戟。從四肢腫根在肋。加茯苓。

萬勝散 治十種水氣不可愈者。

海帶 海藻 海蛤 芫花炒浸

甘遂 大戟 甜葶苈

樟柳根 繢隨子

芭戟各等分

心去

右為末。每服三錢。至五錢。溫酒調下。臨卧問其再服。

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾。

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等分

右為細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減。

梔子蘖皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服。

大梔子箇十五 黃藥半兩 甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一日服溫喫不計時候。

大戰九 治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶背項拘急膀胱繫腫於小腹小便不通反轉大便溏泄不能坐卧。

大戰 芫花炒醋 甘遂 海帶 海藻 郁李仁 繢隨子各半兩 樟柳根一兩已為末每料炒藥末七錢 一粉霜各一 粉霜各一 水銀砂子一錢子大 龍腦半錢
芭豆二十一箇主用去皮 輕粉錢

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菜豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實加減。

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進飲食。

粉霜 硼砂 海蛤 寒冰石燒 玄精石 白丁香 頭白麵各一錢 輕粉錢 海金砂一錢
右研勻着紙裹數重上使麵裹又紙裹冷酒煎了桑柴火燒麵熟為度宿餌餅和丸如桐子大每服三丸生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以補之妙。

苦薑庵丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者。

人參二兩 苦草庵四兩 炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前此藥恐君子不信試驗之。

肉豆蔻丸 治水濕脹如鼓不食者病可下。

肉豆蔻 檳榔 輕粉各一
右為末 麵糊為丸如菉豆大。每服十九至一十九。煎連翹湯下。食後日三服。

肉豆蔻

檳榔

輕粉

各一

黑頭牛

一兩

取頭末

半

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 檄

痰飲門

痰飲論

夫嗽者。五臟皆有嗽。皆因內傷脾胃。外感風邪。皮毛屬肺。風寒隨玄府而入。湊理開張。內外相合。先傳腑而入。遂成咳嗽。迺肺熱也。寒化熱。熱則生痰。喘滿也。經云喉中介介如梗狀。甚則嗽血也。胸滿氣喘。盛稠粘。皆肺氣熱也。

大人參半夏丸 治化痰墜涎。止嗽定喘。諸痰不可盡述。嘔吐痰逆。痰厥頭痛。風氣偏正頭疼。風壅頭目昏眩。耳鳴鼻塞。咽膈不利。心腹痞滿。筋脉拘倦。肢體麻痺。疼痛。中風偏枯。咳唾稠粘。肺痿勞虛人。保養宜通氣血。調和臟腑。進飲食。

大人參 一錢去
茯苓皮 天南星 薄荷葉各半
半夏 乾生薑 白礬生 寒水石各一

蛤粉一錢香葉一分

右為末。麵糊為丸。如小豆大。生薑湯下。二三十丸。食後溫水亦得。一法加黃連半兩。黃蘖二兩。米丸取効愈妙。治病酒調和。藏尤宜服之。

新添半夏瓜蒌丸 治遠近痰嗽。煩喘不止者。

半夏生薑製瓜蒌 杏仁去皮尖麻黃 白礬枯秤款冬花各等

右為末。生薑汁打。麵糊為丸。如梧子大。每服二十九。煎生薑湯下。不計時候。

白术厚朴湯 治痰嘔不散。利胸膈除寒熱。美飲食。

白术 甘草 炙葛根各一
葛根錢 厚朴半兩

右件為末。每服一二錢。水一大盞。生薑五片。煎至六分。去滓。食前服。顯仁丸。仙術芎散。大人參半夏丸。

橘皮半夏湯 治痰壅。涎嗽。久不已者。常服養液潤燥。解肌熱。止咳嗽。

橘皮半兩 去皮
半夏 二錢半湯
七次洗

右為末。分作二服。每服水一盞半。入生薑十片。同煎至七分。去滓。溫服。

知母淡芩湯 治肺痿。喘咳不已。往來寒熱。自汗。

淡芩 去皮甘草各一

知母 五味子 人參 薄荷 半夏 次洗

柴胡 白朮 款冬花

桔梗 麥門冬 黃岑 半兩川芎各三錢

阿膠 炒三錢

右為末。每服三錢。水一大盞半。生薑十片。同煎至七分。去滓。稍熱服。

人參潤肺湯 治肺氣不足。喘急咳嗽不已。并傷寒。一頭疼。增寒。增壯熱。四肢疼痛。

人參 桔梗 白芷 麻黃 去節乾葛

白朮 甘草各一錢白薑半兩

甘草 炙白薑半兩

杏仁半夏湯 去皮桔梗 治肺痿。涎喘不定。咳嗽不已。及甚者。往來寒暑。

杏仁 去皮

桔梗 陳皮 去皮

淡芩 去皮

漢防已 去皮

白朮 甘草各三錢

薄荷 甘草各一錢

白朮 甘草各一錢

白朮 甘草各一錢

白朮 甘草各一錢

白朮 甘草各一錢

白朮 甘草各一錢

桔梗 甘草各一錢

防已丸 治肺不足。喘嗽。久不已者。調順氣血。消化痰涎。

防已 二錢 杏仁 三錢 木香 二錢

右為末。煉蜜為丸。如小豆大。每服二十丸。前桑白皮湯下。如大便闊。加葶藶一兩。食後服。

葶藶散 治肺氣喘滿。痰嗽。眠叶不安。不思飲食。

苦葶藶 蛤粉 各三錢

桑白皮

山梔子

人參

荆芥穗

薄荷葉

赤茯苓 去皮陳皮

桔梗

桔梗

桔梗

右為末。每服三錢。水一大盞。入生姜三片。煎至六分去滓。溫服食後。

保安半夏丸。治久新諸嗽。止上逆。涎溢。短氣痰鳴。咽乾煩渴。大小便澁滯。肺痿勞劣。心腹痞滿急痛。中膈氣上竄。下虛酒食積聚不消。補養氣血。宣行榮衛。

半夏

天南星

牽牛

大黃

黃芩

一兩

蛤粉

一兩

芭豆

四箇

右為末。水為丸。如小豆大。每服十九丸。十五丸。溫水下。食後日三服。孕婦不可服。又方無芭豆。有乾薑一錢半。

人參保肺湯

治五勞七傷。喘氣不接。涎痰稠粘。骨蒸潮熱。

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃耆

紫苑

荆芥

地骨皮

各一兩

茯苓

去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷

各半兩

甘草

桔梗

錢各一兩

石膏

滑石

寒水石

半兩

右為末。每服三錢。水一大盞。生薑三片。煎至七分。去滓溫服。泄者去大黃。同人參半夏丸服。

神應丹

治涎嗽喘滿。上攻心腹。卒痛及利下血。兼婦人帶下病。一切肋脇痛滿。

薄荷葉

甘草

錢四兩

芭豆

燈心

盆硝

各二錢

輕粉

二兩

豆蔻

大炒慢火

五靈脂

二兩

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服一丸。溫瀝汁下。續後空嚥。律三五次。禁飲食。少時覺咽喉微

緩効。心腹急痛。溫酒下二丸。未効再服。得利尤良。帶下以溫酒下二丸。或大便流利再服。

人參散

治身熱頭痛。積熱黃瘦。肌熱惡寒。畜熱發戰。膈熱嘔吐。煩渴。濕熱瀉利。或目赤口瘡。咽喉腫痛。或風昏眩虛汗。肺痿勞嗽不已者。

石膏

甘草

各半兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右為末。每服二錢。溫水調下。早晚食後兼服。梔子金花丸

一名既濟解毒丸

右為末。每服二錢。溫水調下。早晚食後兼服。

梔子金花丸

一名既濟解毒丸

寧神散 治一切痰嗽不已者。諸藥無効。世傳極驗。

御米囊一斤生
醋炒

烏梅兩

右為末。每服二三錢。沸湯點常服。食後日三服。

賈同知方 御米殼炒兩 依前法服之。康少尹傳。煎烏梅湯尤妙。

桂林白术丸 治消痰逆。止咳嗽。散痞滿。壅塞開堅結痛悶。推進飲食。調和臟腑。無悶寒濕。濕熱嘔吐瀉痢。皆能開發。以令遍身流濕潤燥。氣液宣平而愈。解酒毒。療肺痿勞嗽。水腫腹漲。泄瀉不能者。服之利止為度。隨證調之。

擗桂 乾生薑各分 瓢芩去半夏一兩 白术 紅皮白澤萬兩半

右為末。麵糊為丸如小豆大。生薑湯下二三十丸。日三服。病在膈上。食後。在下。食前。在中。不計時候。或一法。更加黃連半兩。黃蘖二兩。水丸取効。愈妙。

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽。痰喘甚者。久不癆者。

瓜薑實一枚去子用

右為末。以寒食麵和為餅子。炙黃為末。每服一錢。溫水化乳糖下。日三服。効乃止。

又方 治寒嗽 麻黃四兩 官桂一兩 蟬二錢

右為末。以蟬同煎。每服一二錢。溫服。

寧肺散 治一切寒熱痰盛。久新咳嗽不止者。

御米殼四兩 木瓜三兩 御米殼一處用蜜

化同煎微黃 五味子一兩 人參一兩 皂角二兩

右為末。每服二錢。烏梅同煎。臨卧食服。大効。

鱉甲丸 治吐血咳嗽神効。

鱉甲一箇九助者

柴胡一兩酒浸一宿

杏仁一兩童子小便浸炒

甘遂一兩

人參半兩

右為末。煉蜜為丸如桐子大。每服十九至十五丸。煎生薑湯下。

又方 用厚朴一兩生薑製

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏一兩甘草半兩炙

右為末。每服三錢。新汲水下。又生薑汁蜜調下。

人參半夏丸 治一切痰飲。喘嗽不已。

白礬 天南星 半夏各半錢 甘草二錢 人參二錢 赤小豆四十粒 杏仁四十粒 猪牙兒角一錢

右為末。秫米三升。醋一升。熬粥和丸如桐子大。每服十五丸。炒蘿卜子湯。臨卧下。

仙人肢丸 治遠年勞嗽。不問寒熱。痰涎喘滿。先服松花膏。下過多服此藥無不効。

人參 沙參 玄參 紫圓參 丹參 白朮 牡礦 知母 甘草各二錢

文武火黃色。右為末。用麻黃十五去銀枸杞子三錢。成膏丸如彈子大。研盦舌內。盛臨卧煎。生姜自然汁化下一丸。小兒量數加減。

松花膏 治二三十年勞嗽。預九月間。宣利一切痰涎。肺積喘嗽不利。

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘草 蒼术 黃精

右為末。取黃精根。熬成膏子。和藥末。丸如彈子大。每服細嚼一丸。冷水化下。臨卧不喫夜飯。服

藥一粒。

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實。咳嗽喘急。胸膈痞滿。公煩悶。涎痰不利。呀呷有聲。

半夏半夏 草慈水研成膏。杏仁各半兩炒 朱砂 五靈脂各一兩

右為末。更研勻。生薑汁煮麵糊為丸如桐子大。每服十五丸。生薑湯下。

大百勞散 治一切勞疾。肌劣喘息。不卧。痰涎不食。

蛤蚧一對 蜜炙 元州鱉甲一隻 醋炙附子一兩 入參 柴胡 川乾薑 白茯苓去白朮 茴香 青皮

去杏仁去皮知母

貝母陳皮去官桂

甘草生半夏製

蒼朮湯浸各一兩

生薑龍膽草各半兩

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎

粒不用鐵煎。烏梅二枚同煎空心稍熟服有汗加小麥二十

小百勞散治勞嗽不已自汗者。

御米殼少炒

右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服。

五味子湯

治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣。

五味子

良薑一兩紅皮去皮炒各一兩乾薑一兩甘草七兩鹽炒

右為細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者自進三服。

安神散治遠年近日喘嗽不已。

御米殼蜜炒

人參陳皮去白甘草一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服。

勞門

白术黃耆散治五心煩自汗四肢疲劣飲食減少肌瘦昏昧。

白术黃耆當歸

黃芩皮芍藥各半兩石膏甘草各

茯苓寒水石略一官桂一分

人參川芎各三分

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服。

人參白术湯方在消渴門第一方是也

此乃為同不復錄耳。

黃連丸治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目。

黃連好者不拘多少

右為末。酒麴糊丸如小豆大。每服二十丸。溫水下。不計時候。日三服。

必効散 治五勞七傷。勞役肌瘦。不思飲食。喘嗽不已。

川烏頭一兩生

天南星半兩生

右為末。每服二錢。薤根八地。如母指大。以水煮熟。去滓。食後服。噙。

當歸地黃湯 治嗽血衄血。大小便血。或婦人經候不調。月水過多。喘嗽者。

當歸

芍藥

川芎

白朮

染槐子

黃藥子

各半兩生

地黃

茯苓皮

黃芩

白龍骨各

一兩 甘草一兩

右為末。每服三錢。水一大盞。煎至七分。去滓。溫服。食前。

紫苑散 治勞體熱。心寒。脉滑短咳。婦人多有此疾。口乾眼澀。骨痠短氣。皆因腸胃燥滯。榮衛不能開發。玄府閉塞。熱鬱內餘。可以開發陰陽。宣通濕滯。和榮衛。順三焦。煎服。人參白朮湯。

紫苑

桑白皮

桔梗

續斷

甘草

五味子各一兩

赤小豆一合

右為末。水一大盞。藥末五錢。青竹茹彈子大。同煎。至七分。溫服。去滓。

枳實飲子 治婦人手足煩熱。夜卧多汗。肌肉黃痺。經候不調。四肢煩倦。心腹滿悶。狀似勞氣。

枳壳一兩

吳茱萸一兩

湯洗七次

以生薑汁

紅芍藥

柴胡各一兩

黃芩一兩

浸三日火炒

黃色用半夏

紅芍藥

柴胡各一兩

右為末。每服二錢。水一大盞。生薑三片。棗二枚同煎。至八分。去滓。溫服。及治五心煩熱。及身體壯

熱潮熱。續服桃仁煎丸。又治月經不調。阻滯不通。

桃仁二兩

火炒

川大黃

川朴硝各二兩

蟲蟲去頭足

右為末。用醋五升。入金銀鑄內。以慢火熬成膏。可丸如桐子大。當日晚不食。夜飯。溫酒下一丸。

不嚼。破午際取下。赤小豆汁似雞肝。小蝦薑衣末。再服候鮮紅。即住服。

盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急。

右為末。每服二錢。水一大盞。煎至七分。去滓。溫服。

欵冬花 井泉石 鵝管石 鐘乳石 官桂 甘草 白礬 佛耳草各等分

右為末。每服一錢。竹筒子吸喫。日三服立効。

焚香透膈散 治一切勞咳。壅滯胸膈痞滿。

雄黃 佛耳草 鵝管石 款冬花各等分

右為末。每服用藥一錢。安在香爐子上焚着。以開口吸烟。在喉中立効。

黨粟神聖散 治男子婦人久新。日夜咳嗽不止者。

御米殼一兩用蜜炒 烏梅肉 捣人參 呵子肉 草慈

桑白皮各半兩

右為細末。每服二三錢。百沸湯潑。臨卧調下。

新添三黃丸 治五勞七傷。流濕潤燥。消渴煩熱甚者。

大黃 黃芩 黃連各等分

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二三十九。加至五十九。生薑湯下。不計時候。日三服妙。

當歸木香湯

治婦人血氣虛勞。令人頭目昏眩。讒語聲沉重。舌根強硬。言語蹇澁。口苦不思飲食。

白日閒睡。夜發虛汗。神思恍惚。夢寐狂言。面色痿黃。頻發喘咳。遍身疼痛。骨節氣走注。四肢沉重。

背脾拘急。發寒熱。五心煩躁。唇乾多渴。胸膈不利。咽喉噎塞。尪羸瘦弱。經曰脉大為勞。宜服此藥。

青皮

五加皮

海桐皮

桑白皮

陳皮

地骨皮

丁香皮

牡丹皮

棕櫚皮

為反末用
十大錢秤

當歸

一兩

木香

紅芍藥半兩

桑白皮半兩

陳皮

地骨皮

丁香皮

牡丹皮

棕櫚皮

藥全燒

右為細末。每服一錢。水一盞。入小油二點錢。一大。同煎。至七分溫服。如婦人血脈。脣下冷痛。似刀攬。遍身腫滿。室女經脉不通。通用斑蝥一兩。大黃一兩。炒剉二味為末。用黃狗膽汁。以溫酒調下一錢。如脣下痛止。心間痰未止。不服。二味。

燥門

消渴論

燥乾者。今肺之本燥。金受熱化以成燥溢也。兼火熱致金衰。耗液而損血。鬱而成燥者。由風能勝濕。熱能耗液。故經云。風熱火同陽也。寒濕燥同陰也。又燥濕小異也。金燥雖屬秋陰。而其性異於寒濕。而反同於風熱火也。又加大便乾渴。乃大腸受熱化成燥溢。經云。諸溢枯渴。又如癰瘍中風。皆因火熱耗損血液。玄脈閉塞。不能浸潤。金受火鬱。不能發聲。經云。肺主聲。肢痛癉疾者。風熱濕相致。而遂以偏枯。語音澁。手足不隨也。然中寒吐瀉。亡液而成燥。亦以鮮矣。亦有寒濕相鬱。榮衛不能開發。貴注多成偏枯。經曰。諸溢枯涸乾勁。皴揭屬於燥也。又加胃膈痺。熱煩滿饑。不欲食。或痺成消中。善食而瘦。或燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數小便。或因熱病或恣酒飲誤服熱藥。以致脾胃真陰陽損虛。肝心衰弱也。狂陽心火燥其三焦。陽胃燥溢。佛鬱而水液不能宣行也。則周身不得潤澤。故痺憊黃黑也。而燥熱消渴。然雖多飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外。湯不能止而便注。為小便多出。俗未明妄為下焦虛冷。誤人多矣。又如周身熱燥鬱。故變為雀目。或內障。癰疽瘡瘍。止為咳嗽喘下。為痔瘻。或停積而濕熱內不甚能傳化者。變為水腫濕脹也。世傳消渴病。及消瘦弱。或小便有脂液者。為消腎也。此為三消病也。消渴消中。消腎經意。但皆熱之所致也。

人參白朮湯。治胃膈痺。熱煩滿飢。不欲食。痺成為消中。善食而瘦。燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數小便。兼療一切陽實陰虛。風熱燥鬱。頭目昏眩。中風偏枯。酒過積毒。一切腸胃燥溢。倦悶壅塞。瘡疥瘻。并傷寒雜病。產後煩渴。氣液不得宣通。

人參 白朮 當歸 茜藥

大黃 山梔子 荆芥穗 薄荷 桔梗

知母 澤瀉 各半

茯苓去皮連翹 瓜蔞根

乾葛各二兩 乾葛各二兩

藿香葉 青木香

官桂各一分

石膏四兩

寒水石二兩

滑石半斤

漢防已

桔梗實各等分

澤瀉各半

葛根

大黃芒硝內甚自利者去了大黃芒硝

右為細末。每服抄五錢水一茶盞。入盆硝半兩。生薑三片。煎至半盞。絞汁。入蜜少許溫服。漸加至十餘錢。得臟腑流利。眼効如常。以意加減。兼服。清瘡丸散。以散腸胃結滯。熱內甚自利者去了大黃芒硝。

絳雪散 治消渴飲水無度。小便數者。大有神効。

黃芩

黃丹 漢防已

桔梗實各等分

右為細末。每服二錢。湯漿水調下。臨卧併進三二服。即止。

人參散 治消腎善飲而食。後數小便溺者。

人參三錢

白朮

澤瀉

瓜蔞

桔梗

梔子

連翹各半

葛根

黃芩

大黃

石膏

寒水石

滑石

各三兩

甘草半兩

石膏

各半

葛根

黃芩

大黃

右為末。入宿砂仁三錢。每服五錢水一盞。煎至七分。入蜜少許。再煎二三沸。去滓食前食後服。消痞丸。

大黃甘草子 治男子婦人一切消渴。不能止者。

大豆五升

淘苦水再煮

一桶

將前藥同煮

三五時

如稠糰水少更于豆

敷于盆中

故冷令病人食豆

渴食不論無時。時食。食後消渴如若不止。再煮。藥不三

病門

病者。五臟邪毒而不散者。感冷物或胃寒。暑失。不能開發。久傷冷熱等食。更或服暖藥過極。鬱

總論

化成利。自古入三口白利為寒。赤利乃熱。其三口悞也。亭入瘡節。初發刺開。乃血多日成膿。何為先熟而後寒也。

叔和云。濕多成五泄。腸走若雷奔。愚醫不悟三口。黃者乃熱。青利是寒。大素曰。五泄有溏泄。驚泄。飧泄。濡泄。滑泄也。此乃五泄。五泄者。青是感肝木之象。其色青。赤者受心火之氣。其色赤。白者得西方金肺之氣。色白。黃者脾土之色。蒼者土氣之下。與水隨之。其色蒼也。三口蒼曰寒。黃赤熱。其三口非也。若下利極。頻并窘迫。或久不愈。諸藥不能止者。須下之。以開除濕熱。痞閉積滯。而使氣液宣行者。宜以逐之。兼宣利積熱也。

益元散 治身熱。吐痢泄瀉。腸僻下痢。亦白。陰閉淋痛。利小便。偏主石淋。乃服金石熱藥多待為砂石從小便林出者也。腸胃中積聚寒熱。宣積氣通丸竅。六府生津液。去留結消蓄。水止渴寬中。除煩熱。心躁腹脹痛悶。補益五藏。太養脾胃之氣。比腎木之藏。非理內傷陰痿。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。主癆瘍。屋篤悸。其季初動貌健忘。止煩滿短氣。藏傷咳嗽。飲食不下。肌肉疼痛。并口瘡牙齒疳蝕。明耳目。壯筋骨。通經脈。和血氣。消水穀。保元真解百藥酒食邪毒。耐勞役。饑渴。宣熱。辟中外諸邪所傷。久服強志。輕身注顏延壽。及解中暑傷寒。疫癘。饑飽勞損。憂愁思慮。恚怒驚恐傳染。并汗後遺熱。勞復諸疾。并解兩感傷寒。能令遍身結滯。宣通氣和而愈。及婦人下乳催生。產後損益血衰。陰虛熱甚。一切熱證。兼吹妳乳癰。此神驗之仙藥也。惟孕婦不宜服滑胎也。

桂府臘白滑石

六兩

甘淡一兩

炙

右為末。每服三錢。蜜少溫水調下。無蜜日三服。欲冷飲者。新汲水調下。解利傷寒發汗。煎豆豉湯調下。四錢。每服水一盞。葱白五十粒。煮取汁一盞。調下。併三服效為度。此藥是寒涼解散鬱熱。若病甚不解。多服此藥無害。但有益而無損。俗惡性寒。兼易得之。賤物。而不明素問造化之理。故不取本草。神驗之言。而多不用焉。若以隨證驗之。此凡人之仙藥也。不可闕之。傷寒當汗而不可下。當下不可汗者。且如誤服此

藥則汗出自愈裏熱便得宣通而愈或半右裏半在表可和解而不發汗吐下者若服上藥多愈亦復小効是解散耕鬱邪熱甚者小加減涼膈散和解為佳或人加蒼朮末三分同葱豉煎湯服滑石麻黃桂枝當發汗即用甘草兩蒼朮錢二兩同爲末每服四錢半更加入葱白五豆豉五十枚同煎至六分去滓服非孕婦大通毒散或解利兩感京膈散調益元散四錢或下孔用猪內羹或酒之類御醫不下皆由風熱燥滯累欬結滯不能舒絞是致產戶不得自然開也可其無力至則熱結頭閉而明治法前服世云神白散或追加麻黃蒼朮各等分濟衆云青龍散或青龍散欲更加入滑石與蒼朮倍最爲發汗之妙藥也唯粥催產以溫油漿調下三錢併二三服三一承氣湯一服調下五錢須臾更頤用溫湘漿調面善此常多用蘇葉大氣虛寒溫補或明素問造化故不識證候陰陽反以妄爲產後諸虛百損便爲虛氣損之常多用蘇葉本同辨之未一分研末主療並但以回避之也令黃丹是以桃仁色紅玉散若加輕粉則神旺氣亂則陰陽開而明治服之亦復慢耳

玄青丸 治下痢勢惡頻并窘迫久不愈。諸藥不能止。須可下之。以開除濕熱。痞悶積滯而使液氣宣行者。宣以逐之。兼宣利積熱。酒食積黃瘦中滿水脹腹脹。兼療小兒散疳積熱。乳癖諸證。唯泄瀉者勿服。

黃連 大黃 甘遂 芫花
醋拌大戟各半牽牛四兩取已上同細末 輕粉錢

青黛一兩

右爲末。勻水九小豆大。初服十九。每服加十九。空腹日午臨卧三服。以快利爲度。後常服十五。二十九數日後得食。久病未痊除者。再加取利。利後却常服。以意消息病去爲度。後隨證止之。小兒丸如黍米。或麻子大。退驚癇熱積。不下者。須常服十九。

阿膠梅花丸 治下痢無間久新赤白青黑疼痛諸證。

金井阿膠淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉去核

研細

黃連

當歸

白芍藥

乾薑炮

赤茯苓半兩各等分

右為末。入阿膠研勻。水丸桐子大。溫米飲下十九。食前兼夜五六服。小兒丸如菉豆。忌油膩肥諸物也。

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢。無間久新。赤白諸色。或渴或不渴。小便澁或不澁。并小兒驚。

疳積痘癬。兼積腹滿硬痛作發。往來亦能寬膈消食。

輕粉

粉霜

硇砂

以上別稱雄黃研朱砂信硃研

芭豆去皮一錢各

黃丹

蠟三錢

右先研粉霜。次旋入礮砂研細。下雄黃朱砂信硃。再研下丹粉研勻。別研芭豆蠟為油。與前藥研勻近火上炙控熱。別研蠟軟入藥。勻搓作劑。旋丸小豆大。新水下一丸。小兒黍米麻子大。或止吐瀉痢疾。調甘露散桂苓甘露散是桂苓散或益元散得。甘露飲或益元散亦得。

芍藥檗皮丸 治一切濕熱惡刑。頻年瘡痛無間。膿血並宜服之。

芍藥

黃蘖各半兩各等分

黃連各半兩各等分

當歸

右為末。水丸如小豆大。溫水下三四十丸無時。兼夜五六服。忌油膩脂發熱等物。

二勝丸 治泄痢虛損。不問久新者。右同杵為膏丸如桐子大。每服元至五丸米飲湯下。如未愈及赤白痢腹滿腸痛更與杏仁丸

鹽政

紫蒜去皮各等分

杏仁丸 治一切赤白瀉痢。腹痛。裏急後重者。

杏仁

巴豆四十個去皮各等分

右以藥同燒存性。研細如泥。用蠟鎔和。旋丸如桐子大。每服一二丸。煎大黃湯。間日一服。

白术聖散子

治一切瀉痢久不瘥。并婦人產後痢。亦治

御米殼二兩炒去皮

當歸

肉豆蔻

石楠皮

訶子

乾薑炮

陳皮去白术

白术

甘草

芍藥各等分

縮砂仁

石榴皮

訶子

乾薑炮

陳皮去白术

右為細末。每服二錢。水一大盞。入乳香。同煎和滓服。

勝金膏 治一切泄瀉痢。不已。胃脉洪浮者。反多日不已者。微小者。立止。

芭豆皮

楮實葉同燒存性

右為末。鎔蠟丸。如菉豆大。每服五丸。煎甘草湯下。

大聖金真散

治一切寒熱。赤白瘻泄等。痢疾。

御米殼炒半斤

甘草一兩
炙

乾薑炮半兩

當歸

醋石榴皮一兩
炒

陳皮去白

白茯苓去皮一兩

右為末。每服二錢水

一盞。小兒半盞。乳香同煎至七分。食前忌油膩生冷毒物等。

車前子散一名斷刺散能治一切痢不止。

車前子不以多少
炒香

右為末。每服二錢。米飲調下。食前空心。

象骨散 治脾胃虛熱。心腹脹滿。水穀不消。噫氣不消。食輒嘔吐。霍亂泄瀉。膿血。四肢沈重。臍腹疼痛。裏夜起頻併。不思飲食。皆可治之。

象骨四兩
炒

訶子二兩
取肉

豆蔻一兩
取肉

枳殼兩兩

甘草二兩
炮

乾薑半兩
炮

右為末。每服三錢水

一盞半。煎至八分。和滓熟服。食前日三服。

海蛤玉粉散 治血痢解藏中積毒熱。

海蛤不以多少

右為末。每服二錢。入蜜少許。冷水調下。不計時候。

黃帝素問宣明論方卷之十

河間 劉守真 撰集

安吳學勉 人校

婦人門

總論

素問曰。目得血而能視。耳得血而能聽。指得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。藏得血而能液。腑得血而能氣。然血所通流則氣亦然也。氣血宣行。其中神自清利。而應機能用矣。故

素問血氣人之神也。不可不謹調護。然婦人以血藏為基本也。夫婦人之病乎太陽。足少陰。小腸。之經絡為裏。表起自任衝之脉。於經脉之下。以上毛際循腹裏。闢元上至咽喉。顧循面目。過帶脉。貫臍而止。以婦人月水一月一來。如期謂之月信。其不來。則風熱傷於經血。故血在內不通。或內受邪熱。脾胃虛損。以能飲食。食既不克。榮衛凝滯。肌膚黃燥。而不光澤。或大腸虛變為下痢。流入闢元。致絕子嗣。為子藏冷。虛勞顧而病帶下。起與胞內。○夫帶下之造化。但分經絡。釋本殊異。為病之本氣也。其病所發。正在過帶之分。而淋瀝以下。故曰帶下也。赤白之說無定也。法曰頭目昏眩。口苦舌乾。咽喉不利。小便赤色。夫小便秘澁。滯脈實而數者。皆熱證也。凡白帶下者。亦多有之。為病寒。豈能然乎。素問亢則害。承迺制。謂亢過極而反。兼已勝之化制其勝也。則如火煉金。熱極則反化為水。及六月熱極。則物反出液。而濕潤林木流津。故肝熱則哭泣。脾熱則出涕。肺熱則出涕。腎熱甚則唾。○大庄俗論。已前熱湯煮。極則沸。熟甚。熱氣重蒸於物。而生津液也。故下部任脉濕甚。熱者。津液涌而溢已。為帶下。見俗醫白帶下者。但依方論。而用辛熱之藥。雖有誤中。致令鬱結熱聚。不能宣通。晉病轉加。世傳誤之久矣。

人參白朮散 治偏身燥濕相搏。玄府緻密。遂令忪憐發渴。飲食減少。不為肌膚。

人參三錢白朮七錢薄荷半錢砂仁三錢生地黃

茯苓皮甘草各半黃芩一錢滑石兩錢藿香半錢

石膏雨

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日進二三服。

白朮湯 治妊娠血液虛衰。瘦弱難以運動。氣帶連。痺麻禁衛不能通宣。常服養液潤燥。開通結滯。

令血 昌盛

白朮三錢寒水石

當歸

黃芩 芍藥

人參

石膏

乾葛

防風

縮砂

藿香

甘草

茯苓一兩

木香二兩

崔宣武方

用白朮一兩

白朮一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎五六分去滓溫服食前日三服。

二氣湯

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦虛弱不美食有燥熱以柴胡飲承相參服之。

大黃四兩

升慢火熬成膏子

別為末

醋一兩

當歸二兩

白芍二兩

大黃二兩

右為末以膏子和丸如桐子大每服二十九

淡醋湯下

食前日進三服

如月水不

通加入乾膝三錢炒

出大滷

炒

本草云

沒藥半兩

硇砂三錢

官桂二錢

斑蝥三錢

此用熬不可生用則吐

肚瀉

去足炒熟用

此用熬不可生用則吐

肚瀉

無間久新亦白諸證

并產後惡物不止或孕婦

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多及帶下淋漓無間久新亦白諸證

並產後惡物不止或孕婦

當歸龍骨丸

當歸一錢芍藥一錢黃連一錢染槐子一錢艾葉炒各半兩

龍骨一錢黃蘖各一錢

茯苓半兩木香一分

右末滴水為丸如小豆大溫米飲下三四十九食前日三四服

當歸人參散 治產後虛損瘦弱難以運動疼痛胸滿不思飲食

當歸一錢

白朮一錢

黃芩一兩

芍藥一兩

大黃一兩

茯苓皮一兩

陳皮一兩

人參半兩

黃耆一錢

川芎一錢

厚朴去皮

官桂各一錢

甘草一兩

枳殼一兩

麸炒去

右為末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至六分。去滓。不計時服。溫服。如大便閼。以此散下。和中九。

增損四物湯

治月經不調。心腹疼痛。補血臟。溫經注顏。

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

白朮

牡丹皮

各半兩

地骨皮

一兩

右為末。每服五錢。水一盞。煎至六分。去滓。溫服。食前。

當歸川芎散

治風壅頭目昏眩。痛悶。筋脉拘倦。肢體麻痺。保護胎氣。調和榮衛。

當歸

川芎

各半兩

甘草

二兩

黃芩

四兩

薄荷

一兩

縮砂仁

一分

辰砂大紅丸

治產後寒熱。運悶。血氣塊硬。疼痛。立止。

朱砂

一兩

一半入附子炮

沒藥

半兩

海馬

半錢

乳香

一錢

沒藥

半錢

乳香

一錢

茯苓

肉桂

玄胡

一錢

薑黃

一錢

三聖散

治產後下血。痢不止。

烏魚骨炒

燒綿灰

血餘灰

汗脂者

右為細末。每服煎

石榴皮湯調下。熱服

一錢。

沒藥丹

治產後惡血不下。月候不行。血刺腰腹急痛。或一切腸垢沈積堅滿。痞痛作發。往來或操

熱煩渴。喘急悶亂。肢體痛倦。大小人心腹暴痛。孕婦自利。惡物過多。不宜服。燥熱極甚。血液衰竭。不可强行。宜調氣養血。細詳證用。

沒藥

一錢

當歸

大黃

一兩

牽牛

二兩

輕粉

一錢

宮桂

一分已上

同研末

硝砂

一錢

右研勻。錯麵糊為丸。如小豆大。每服五丸。至十九丸。溫服。下以快利取積病。下為度。雖利後病未

痊者。後再加取利。止心腹急痛。煎乳香下。未止取大便利。

黃藥子散 治月事不止。煩渴悶亂。心腹急痛。肢體困倦。不美飲食。

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參 白朮 知母 石膏各一 川芎

桔梗各一

分

甘草一

兩

紫苑

槐花子

柴胡

右為麌末。

杪三錢水一盞。

煎至七分。

濾汁

食前

但一服。

大延胡索散

治婦人經病。并產後腹痛。或心中煩悶。或癥瘕癖塊。及一切心腹暴痛。

延胡索

當歸

赤芍藥

京三棱

川練子

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎各一

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草一

兩

檳榔

一錢

右為末。

每服三錢水一盞。

煎至六分。

去滓熱服。

食前日三服。

惡物過多去

大黃

官桂

加入黃藥

枳實檳榔丸

治安養胎氣。調和經候。癥瘕痞塊。有似妊娠。可以久服。血氣通和。兼實膈。美食。

枳實檳榔

黃連

黃藥

黃芩

當歸

阿膠

研細各半兩

木香

各半兩

右為末。

小如小豆。

大溫米飲下。

三十九不計時候。

日進三服。

軟金花丸 治心胸腹腰急痛。或淋痛。并產前後。經病刺痛。乾嘔氣勞。往來寒熱。四肢困倦。夜多盜

汗。兼治血積食積。

當歸

半兩

乾漆

生二錢

輕粉

斑蝥

全用

硇砂

粉霜

各一

芑豆

二錢去油

右為末。

同研細。

桑肉為膏。

旋丸如菉豆大。

每服一丸。

新水下。

病甚者加服。

看虛實。

大紅花丸 治婦人血積聚。癥瘕經絡注滯。

川大黃

紅花

各二錢

醋

熬成膏。

和藥丸如桐子大。

每服五七丸。

溫酒下。

食後日三服。

黃芩湯 治婦人孕胎不安。

白术

黃芩各等分

右為末。每服三錢水。二盞當歸一根。同煎至一盞。稍溫服。

海蛤丸 治婦人小便濁敗。赤白帶下。五淋。腰股疼痛。寒熱口乾。舌濶。不思飲食。

海蛤

半夏

芫花醋炒

紅娘子足去翅

調子炒

玄胡索

川練子去皮裏

膽

茴香炒各

乳香錢

硝砂半

硃砂半入藥

沒藥兩研

當歸一兩

右為末。醋煮麵糊為丸。如小豆大。每服五丸至十九丸。醋湯下。量入病虛實加減。

烏金散 治婦人諸疾。寒熱頭痛。一切等疾。

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸

蟲蠅

血餘灰

小蛭

鯉魚灰

木香

青皮

皂角

大者火
各半兩

芍藥半

芫花

浸醋三兩

芭豆一錢

出油朱砂少許

棕皮灰

紅花一兩

川頭半兩

右為末。每服半錢。加至三錢。煎生姜湯調下。空心食前。忌油膩物。

伏龍肝散 治婦人血崩不止者。或結作片者。

芎藭一兩

生地黃分

阿膠八錢

當歸一錢

斷續分

地榆

刺薊根一錢

伏龍肝七錢

青竹茹八錢

右為末。每服三錢水。一盞半。煎至一盞。溫服。日五服。不計時候。後服補藥。

阿膠丸

麝香少許 杏仁不炒多
少 烧存性 治婦人陰瘡。

阿膠 鱉甲分續斷五分

龍骨一兩 芎藭大分

地膽四分 鹿茸五分

烏魚骨八錢

丹參六錢

龜甲一錢

右為細末。如瘡口深用。小有袋子二箇。盛藥滿。繫口。臨上藥。火臨安。在陰內立愈。

硃砂斑蝥丸 治婦人產後。喫硬食。變作血氣食塊。無問久新。

皂角末一錢。芭豆四箇。去皮。朱砂一錢。硼砂大塊。右為細末。蜜和丸。分作十五丸。每服一丸。至二丸。三丸。溫酒下。初更喫平明取下。血化水。十年之病皆治之。或大便或小便不多出也。

黃帝素問宣明論方卷之十二

河間間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

補養寒論

補養寒論

素問云。諸寒收引。皆屬於腎。腎者少陰也。少陰者。至陰也。至者為極也。少陰者。冬脉所旺。居此而屬水為寒。為歸藏。為周密。寒中收引拘縮。寒之用也。其病上下所生。水澄澈冷清者。不濁其氣。寒冷水穀不消化。吐利清冷為病。則如天氣寒而水自清也。

素問云。太陽受寒。血凝為瘕。太陰受寒。氣聚為疝。但昧急而寒之象也。急主於痛。故緊急也。又內經云。數則為熱。遲則為寒。諸陽為熱。諸陰為寒。脉當遲緩。寒毒內鬱。洪數為熱。所養心之脉也。寒氣生清。水清就於濕。故以下利清白。此乃腸胃寒化。物失常熱。則壅滯不通。寒勝則火衰。火衰金旺。吐利腥膾腥者。金肺之屬也。熱則喜酸。寒則水腥。只如四肢逆冷。堅疼腹滿。屈伸不便。禁固戰慄。謂陰水主之舒倦。不便診其脉沈伏而遲。病之證也。若身涼不渴而寒。嗜足而卧。惡聞人聲。不欲言。皆陰證也。陰陽停。則和偏則病。如陽氣暴絕。陰氣獨勝。則為寒證。陰氣暴絕。陽氣獨勝。則為熱證。經曰。陽盛陰虛。汗之而死。陰勝陽虛。下之而死。若陽實外熱。陰虛內寒。陰實內熱。陽虛外寒。陽實伐其陽。當涼膈散。承氣湯主之。陰實伐其陰。當白水散。四逆湯主之。

論曰

大凡治病。必求標本。受先者為本。次者為標。此為兼證。故知逆與從上行。無問知標本者萬舉萬當。不知標本者。是謂妄行也。本病相傳。先以治其急。六氣為本。三陰三陽為標。故病氣為本。受病經絡藏府謂之標也。

補養類

防風當歸飲子 治脾腎真陰損虛。肝心風熱鬱其陽。勝陰衰。邪氣上逆。上實下虛。怯弱不耐。或表熱而身熱。惡寒。或裏熱而燥熱煩渴。或邪熱半在表半在裏。進退出入不已。而為寒熱往來。或表多則惡寒。裏多則發熱。或表之陽分。陽和正氣與邪相助。并甚於裏。畜熱極深。而外無陽氣。裏熱極甚。陽極似陰。而寒戰。腹滿煩渴者。或裏之陰分。正氣反助。邪氣并甚於表。則躁熱煩渴。而汗出也。或邪熱壅塞者。或煩熱痛者。或熱結極甚。陽氣不通。而反覺冷痛。或中外熱鬱。煩躁甚。喜涼畏熱者。或熱極閉寒。不得宣通。陽極似陰。中外喜熱。而反畏寒者。或躁熱煩渴者。或濕熱極甚。而腹滿不渴者。或一切風熱壅滯。頭目昏眩。暗風眼黑。偏正頭疼。口乾鼻塞。耳鳴及聾。咽嗌不利。或目赤腫痛。口瘡舌瘽。或上氣痰嗽。心脇鬱痞。腸胃燥滯。小便澀淋閼。或是皮膚癩痒。手足麻痺。又或筋脉拘急。肢體倦怠。或渾身肌肉跳動。心忪驚悸。或口眼喎斜。語言蹇澁。或狂妄昏惑。健忘失志。及或腸胃燥熱。佛鬱而飢。不欲食。或濕熱內餘。而消穀善飢。然能食。而反瘦弱。或誤服燥熱毒藥。所使者。並宜宣通氣血。調順飲食。久服之。舊病除去。新病不生。設虛人常服。補益功驗。自可知矣。

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥各

一滑石

六兩

右停每服三錢至五錢。水一大盞。生薑三片。同煎至七分。去渣溫服。

補枝

此方未為至當。恐當芍傳寫之誤。

雙芝丸

治補精氣。填骨髓。壯筋骨。助五臟。調六腑。久服。注顏不老。

熟乾地黃後取末

炒

石斛

根五味子

焙黃者

到

肉蓯蓉

酒浸牛膝

酒浸杜仲

蜜水浸炮

鬼絲子

酒浸沉香

三錢

麝香二錢

人參

三日炒

麋鹿角霜半斤

沉香

三錢

麝香

二錢

人參

薏苡仁二兩

炒

白茯苓

桂皮

覆盆子

乾山藥

木瓜

天麻

酒浸

秦艽

已上各一兩

薏苡仁二兩

炒

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二十丸。至三四十丸。溫酒下。鹽湯米飲亦可。

歲已上叶入黑

附子以青鹽湯煎泡鹿角二大對去角。頂三指去皮。用以上用些油。釜中以水同者。令微沸。勿大急。其水耗只旋添溫水。須用以備添也。煉令角膠汁出盡。其角如霜。以手捻如膩粉。乃盛之取用。勿令穢污也。

內固丹 治諸補養腎氣調和脾臟。壽高者常服筋骨勁健。渾如壯士。

肉蓯蓉酒浸茴香兩
兩。破故紙。 胡蘆色炒色。去心黑附子炮川練子。胡桃仁各四兩。右為末。研桃仁為膏。餘藥末和勻。酒麪糊為丸。如桐子大。每服十丸至三十丸。溫酒鹽湯下食。前虛者加至五七十丸。此藥明目補腎。烏鬚進美食空心。

大補丸 治男子脾胃不足。不間久新者。

陳芷子 陳蘿蔔子已上炒。 蔴仁去皮各半兩。

川山甲七片用酒浸

麝香少許

右為細末。用蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。溫酒送下。食前空心。

蛤蚧散 治脾胃氣攻心。刺痛者。

蛤蚧一對。酒浸乳香。

木香

白茯苓 丁香 茴香各一錢

川山甲錢

右為細末。每服一錢。好溫酒調下。空心食前。

金繅丹 治男子本藏虛冷。夜夢鬼交者。

龍骨水飛兔絲子各一錢。破故紙。

蕷子 澤瀉

牡蠣各半錢。麝香少許。

右為細末。滴水和丸。如桐子大。每服三十丸。溫酒下。空心食前。日三服。

調中丸 治脾胃虛止嘔吐。寬利胸膈。

青皮 紅皮各一兩。大黃一兩。牽牛三兩。

右為細末。滴水和丸。如桐子大。每服三二十丸。溫水空心食前下。

水中金丹 治元藏氣虛不足。夢寐陰人走失精氣。

陽起石 研

乳香 研

青鹽各一
茴香炒

骨碎補炒 杜仲各半兩去皮
生薑炙絲盡

白龍骨一兩

茱萸者砲碎絹袋盛入
豆蒸熟取焙乾研

黃戌腎一對酒一升煮

熟切作片子焙入白茯苓一兩與
腎存末

和氣地黃湯

治沉積氣結不散。調養榮衛。
補順陰陽。常服以代湯茶酒果。

木香一

棟桂去皮 茯苓去皮 白芥子各半錢

甘草半兩

白术

乾山藥 川芎

當歸各半培

桂花

縮砂仁各半錢

甘草半兩

白术

乾山藥 川芎

當歸各半培

白术調中湯

治中寒痞悶急痛。寒濕相搏。吐瀉腹痛。

上下所出水液澄澈清冷。穀不化小便清白。身涼不渴。本末不經。有陽熱證者。其脉

運熱內作。他此因飲食令物過多。陰勝陽衰而為中寒也。或冷熱相擊而反陽。氣鬱不能宣散。佛

見諸陰脈也。當以標本之不可治或熱證誤服此白無害。無問寒熱久新。並宜服之。誠如瘡目疾孕
求調中湯溫藥亦能開發陽氣一通而愈。別無加害。當生胃中虛熱。飲水無力也。當生胃中津液。多服此藥。

分三服。

白朮

茯苓去皮 紅皮去白澤瀉各半

乾薑炮

官桂去皮 縮砂仁

藿香各一

甘草一兩

人參白朮散

此方證同調中湯治法。

人參

白朮

茯苓

甘草

橘皮

葛根

澤瀉

滑石

藿香各半

右為末。每服三錢。水一盞。煎至六分。溫服。妊娠加蒼朮三五片。熱服。

白朮散

治傷寒下後餘熱。以藥下之。大過胃中虛熱。飲水無力也。當生胃中津液。多服此藥。

人參 白朮 木香

白茯苓 甘草 制炙藿香葉 乾葛

一兩

右為末。每服一錢至二錢。水一盞。煎至五分。溫服。如飲水者。多煎。與之無時也。

丁香附子散

治脾胃虛弱。胸膈痞結。吐逆不止。

附子一兩

母丁香四十九個

生薑半斤取自

然汁半碗

右用附子鑽孔四十九。以丁香刺上面填內。將生薑汁。用文武火熬盡。又用大蘿蔔一個。取穴子。入附子。又填內。將蘿蔔蓋之。又用文武桑柴火燒。香熟為度。取出切附子。作片子。焙乾搗為細末。每服一錢。米湯一盞。調下。日進三服。

何首烏丸

治男子元藏虛損。髮白再黑。填精。

何首烏

肉蓯蓉六牛膝四兩

右將何首烏半斤。用棗一層。何首烏。甑內蒸棗軟。用切焙。同為末。棗肉和丸。如桐子大。每服五七丸。嚼馬練子服。酒送食。前一服加一丸。日三服。至四十九即止。却減至數。効如神妙。

煅腎丸

治男子腰膝疼。夜多小便者。

川練子

馬練花

破故紙

胡蘆巴

茴香炒各等分

右除茴香外。四味酒浸同為末。煮麩糊為丸。如桐子大。每服十九。至二十九。溫酒下。空心食前。神仙楮實丸。治積冷氣衝心胸。及背有蛇蟲疼痛。瘡痏癰癧。氣塊心腹脹滿。兩肋氣急。食不消化。上逆氣奔於心。并疝氣下墜。飲食不得。吐水嘔逆。上氣咳嗽。眼花少力。心虛健忘。令風偏風等疾。坐則思睡。起則頭眩。男子令氣腰疼膝痛。令瘧風。陰汗盜汗。夜多小便。洩利。陽道衰弱。婦人月水不通。小便冷痛。赤白帶下。一切冷疾。無問大小。能明日益力。輕身補髓益精。

楮實子一升淘去

沈微炒

官桂四兩

去皮牛膝浸三日

酒浸三日

乾薑三兩

右為末。酒麩糊為丸。如桐子大。每服二十丸。溫酒空心食。前鹽湯亦得。

補中丸 治一切氣疾。心腹疼痛。嘔吐氣逆。不思美食。

厚朴

生薑
製青
乾薑
炮

陳皮去白
白茯苓去皮
甘草

炙紫各等分

右為末。煉蜜為丸。如櫻桃大。每服一丸。空心白湯化下。細嚼亦得。

華澄茄丸

半良薑
二兩
神麪炒

青皮去白

官桂一兩
去皮各

阿魏半兩
裹煨熟
醋麪

華澄茄丸 治中焦痞塞。氣逆上攻。心腹疼痛。土逆湯下。痢美飲食。

右為末。醋麪糊為丸。如桐子大。每服二十九。生薑湯下。不計時候。

黃帝素問宣明論方卷之十三

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

諸痛門

總論

夫痛者。經脉流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。血泣凝而不行。客於脉外。血少客脈中。氣不通。故卒然而痛。其痛者。卒然而止。或痛甚而不休。或痛甚而可按。或按之而痛止。或按之而無益。或喘痛動應手。或與心背相引。而痛。或脇肋與少腹相引。而痛。或腹痛。或引陰股。宿昔而成積。或卒然而痛。不知人。而少間復生。或痛而閉。不通者。諸痛各不同形。經曰。寒氣客於脉外。則脉寒。脉寒則蜷縮。蜷縮則脉絀。督脈絀急。則外引小腹。衛氣不得通流。故卒然而痛。得足則痛止。寒氣客於經脈之中。相薄則脉滿。滿則血氣亂。故痛而不可按。寒氣客於腸胃之間。膜原之下。血不得散。小腹急引。故痛。按之血氣散。痛乃止也。脇肋痛者。寒氣客於厥陰之絡脉也。背與心相引。痛者。寒氣客於背俞之脉。注於心。相引。痛。寒氣客於陰股。血泣在小腹。相引痛。卒然而痛死者。寒氣客於五藏。厥逆上壅。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死。氣復反則生矣。視其色。色黃赤為熱。白青則為寒。青黑為痛。經曰。感虛乃陷下。其留於筋骨之間。寒多則筋骨痛。熱則骨弛肉消。但痛痒瘡癰。痛腫血聚者。皆屬心火也。不可一例傷寒。凡治痛者。先察本次明經絡皮部虛實。用藥無悞矣。

神砂一粒丹

治一切厥心痛。小腸膀胱痛。不可止者。

附子一兩

炮鬱金

橘紅

等附子停用

右為末。醋麪糊為丸。如酸棗大。以硃砂為衣。每服一丸。男子酒下。婦人醋湯下。服罷。又服散子。神聖代鍼散。

乳香 沒藥 當歸 香白芷

川芎各半兩

元青足

翅去

右為細末。更研。每服一字。病甚者半錢。先點好茶一盞。次擦藥末在茶上。不得吹攪。立地細細急之。心驚欲死者。小腸氣搐得如角弓。膀胱腫硬。一切氣刺虛痛。并婦人血癥。血迷血暈。血刺。血衝心胎。衣不下。難產。一切痛疾。服之大有神效。只是要詳疾證用藥。

茴香丸 治男子婦人臍腹疼。痛刺胸膈不止者。

茴香炒 良薑

官桂各半兩

蒼木一兩

汁浸

右為末。酒煮麪糊和丸。如桐子大。每服十丸。生薑湯止痛。溫酒下。空心食後。

趕痛丸 治一切走注疼痛。婦人經脈住滯。水腫腹脹。

甘遂 大戟 芫花 黑牽牛各等分

分

右為末。以蕎麥同末。和作餅子。杆切為棋子。煮熟服之。得利為度。每服一錢。加減相虛實。

六合散 治一切燥結。汗後餘熱。宣轉不通。亦名金鑰匙散。并治小腸氣結。心腹滿。胸中結痞。走疰

疼痛。

大黃一兩紙裏煨

白牽牛半兩生

黑牽牛微

炒各半兩

甘遂各半兩

檳榔三錢

輕粉一錢

右為細末。每服一錢。密水調下。服量虛實加減。

定痛丸 治打撲損傷。筋骨疼痛等。如打撲骨損者。先整骨。定用竹夾。然後先用好酒下。麻黃三錢。然後服藥大効。

乳香一分 川椒 當歸 沒藥

赤芍藥 川芎

自然銅

玄胡

右為末。鎔蠟為丸。如彈子大。細嚼酒下一丸。骨碎者。先用竹夾夾定。三五日依舊。小可與服。

香殼散 治小腸氣。臍腹攬痛。急陰股中疼悶。不省人事。

舶上茴香川鹽炒

枳殼略

一沒藥

半兩

右為末。每服一錢。溫熱酒下。不計時候。併二三服。

金鍼丸

亦名陸神丸

治陽絕。痞氣心腹不忍者。

丁香

木香

乳香

阿魏

輕粉

骨碎補

去檳榔

官桂

桂心

芭豆

去皮杏仁去皮

不灰木

肉豆蔻

陽起石

硃砂

分等

右為細末。水麪糊為丸。如小豆大。每服一丸。針穿作孔子小油內。裹過燈焰內。燎遍於油中。醞死嚼生薑下。不計時候。日三服。虛實加減。

一粒金丹 治腰膝走注。疫痛如虎噦。

草烏頭

五靈脂各一斤

木蠶子

四兩白膠香拌地龍四兩去土炒

細墨一兩乳香一兩

當歸

二兩培培。二兩沒藥二兩麝香一錢

右為末。再研一千下。糯米麪糊和丸。如桐子大。每服一丸至二丸。溫酒下。喫藥罷。遍身微汗。有驗。

沒藥散 治一切心腫疼痛。不可忍者。

沒藥

乳香別研。乳香各三錢。

川山甲

五錢。炙

木蠶子

四錢

右為細末。每服半錢。一錢酒大半盞。同煎溫服。不計時候。

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者。所發乎太陰。手陽明經。以應動脈。謂肺與大腸為表裏。主為傳道。以行糟粕。腸風痔病有五種。其證亦異。蓋因陽氣虛。而玄腑疎。風邪乘而熱。自三風濕邪熱攻於腸中。致使大便溢而燥熱鬱。血熱散而流溢。衝浸凌腸裏。故以先血後便。熱在下。先便後血。熱在上。血後便久而不愈。乃作痔。

素問云。因而飽食。動脈橫解。房室勞傷。腸癖為痔。風熱不散。穀氣流溢。傳於下部。故令肛門腫滿結如梅李核。甚者而變成瘻也。五臟切宜保養勿令受邪。

香豉丸

治濕熱內甚。因而飽食。腸癖成痔。久而成瘻。速服悉愈之。

木香

黃藥各三錢。枳殼去皮。厚朴半兩。黃連一兩。蝟皮燒一箇。當歸四錢。荆芥穗三錢。

右為末。麪糊為丸。如桐子大。每服二三十丸。溫水食前日三服。

檳榔子丸

治腸風瀉血。濕熱內甚。因為諸痔久而不治。乃變成瘻。

黃耆

枳實

槐花

荆芥穗

鳳眼草各二兩

檳榔子一對炙

皂子三百箇炙

右為細末。麪糊為丸。如桐子大。每服二三十丸。空心酒下。米飲亦得。忌油膩令。猪魚臭血物等。

烏荊丸

治腸風痔疾。大腸閟澁。

川烏頭

二兩炮

荆芥穗四兩

黃耆葛花丸

治腸中久積熱。痔瘻下血。疼痛。

黃赤小豆花各一

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸各三錢

一

黃耆

葛花

黃赤小豆花各一

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸各三錢

一

檳榔

白蒺藜

皂角子仁炒各半兩

生地黃各一

黃芩

當歸各三錢

一

右為末。棟密和丸。如桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎桑白皮湯下。食前槐子煎湯下亦得。

黃連散一治腸風下血。疼痛不止。

雞冠花

黃連

貫眾

川大黃

烏梅各一

甘草三分

右為末。每服二錢。用溫米飲調下。日三服。不計時候。

乳香沒藥散

治五種腸風痔瘻。無問久新。

宣黃連

白礬各一

穀精草。碎石榴。將黃連白礬碎內入石榴內。用元蓋子合用。次

右以濕紙一張裹了後用膠泥拍作餅子裏石榴以炭火燒通赤為度。取出去濕紙次將殺精草於銚子內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下日三服。

木香厚朴湯 治痔瘡脫肛腸胃間冷腹脹虛脹不思飲食。

木香

桂心

桃仁

陳皮

厚朴各一兩

肉豆蔻

赤石脂各半兩

皂角子

一兩去子
醋炙黃

大附

三分

炮

右為末每服二錢溫粥飲調下食前。

瘧門

瘧疾總論

素問云。瘧疾皆生於風。其蓄作有時。何氣使然。夫陰陽上下交爭。虛實相移也。陽併於陰。陰實陽虛。寒慄鼓領。此皆夏傷於暑。熱氣藏於皮膚之內。腸胃之外。腠理開得。秋氣汗出。遇風得之。與衛氣僥幸。氣盡行陽。夜行陰氣。得陽外出。得陰內薄。外內相薄。是以日作也。其有間日者。氣深內薄。於陰陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽爭。不得出。是以間日作也。其作晏與早者。邪氣客於風府。循督而下。衛氣一日一夜。大會於風府。其日下一節。先客於脊背。每至風府。則腠理開。腠理開邪氣入。邪氣入則病作晏也。

夫寒者。陰氣也。風者。陽氣也。先傷寒。而後傷風。故曰先寒而後熱。名曰寒瘞。先傷於風。後傷寒。故曰先熱而後寒。名曰溫瘞。其熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨勝。少氣煩冤。手足熱。欲吐。名曰虛瘞。有餘則瀉。不足補熱。為有餘寒為不足。已得火不能溫熱。已水不能涼氣。陰勝。併於陽。陽勝併於陰。陰勝則寒。陽勝則熱。故瘞者。陰陽風寒。虛實邪氣。不常之所作也。

辟邪丹 治嵐嶂鬼瘞。食瘞。併月頻日者。

菜豆

雄黑豆各四十粒

信砒半錢

黃丹一錢
別研為衣硃砂二粒

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒已用東南桃心取七枚研汁將井花水早辰日欲出不出向日吞之醋湯亦得已發日服

斬邪丹 治諸般瘧疾無時不止者。

菜豆

小豆三十粒退皮再入口

硃砂

信砒各一錢

右為末同研細滴水和丸勻分作十丸每服丸已早辰服夜間於北斗下香水獻至草晨用新倒流水送下。

斷魔如聖丹

信砒一錢蜘蛛三個雄黑豆四十粒

右為末滴水和丸如豌豆大如米日發於今晚夜北斗下獻於早晨紙裏於耳內扎一丸立見愈神聖一粒可醫三人。

辰砂丸 治一切脾胃虛瘧邪熱毒者。

信砒甘草各一錢砂二錢大豆四十粒

右為末滴水和丸勻分作四十九服發日早晨日欲出煎桃心湯下忌熱物。

瘧神丹 治諸般瘧疾。

信砒一兩雄黃一錢

右以於五月重五日用鎌子尖拌勻研三千下日未出不令雞犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東冷水下一丸。

趣鬼丹 治一切瘧疾神効。

信砒一錢大豆七錢雄黃

輕粉

荷葉各半甘草一寸

右為末。滴水為丸。如小豆大。重午日未出。不見雞犬婦人。脩合。每服一丸。無根水下。平日夜視北斗。來日服忌熱物。

空
明
一
之

黃帝素問宣明論方卷之十四

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

眼目門

眼科總論

素問云。目得血而能視。手得血而能握。其證足厥陰之經絡所主。肝臟受虛而即補。腎實而即瀉心。夫人之眼目者。似天地之日月也。若人無雙目。豈能別辨賢愚。天無日月。萬物安能照耀。是以眼通五臟。氣貫五輪。外應肝候。肝臟虛而風邪鬱。風邪鬱而熱蘊。衝火炎上行。故攻目昏。滲溢疼痛。赤絲皆發。榮衛實。則能視。榮衛虛。則昏暗。凡人多食熱物。或嗜五辛坐濕。當風凌寒。冒暑。將息失度。皆喪目之源也。

黃連膏 治一切眼目。瘻肉攀睛。風痒淚落不止。

朴硝淨去土以水半升淘乾用

黃連半斤

白丁香五升以水一斗淘淨去土攪細用

右取水入硝。香。釜內熬至七分。淘出。令經宿水面浮牙者。取出。挖乾。以紙袋子盛。風中懸至風化。將黃連細末。熬清汁。曬乾。硝用豬羊膽和氣蜜妙。點之效矣。

滌昏膏 治一切風眼疼。痛不可忍者。洗之妙矣。

好崖蜜一斤黃連一兩

沒藥半兩黃丹一兩炒

右入蜜同熬黑煎。黃連成稠汁。入二味藥內。煎熬。更入沒藥末。同熬數沸。滌去滓。洗甚妙。後更用通天散。噙鼻。

通天散 治偏正頭疼。并夾腦風。通一切壅滯。明日。

赤芍藥

川芎

黃連

黃芩

玄胡索

草烏頭

當歸

右為細末。每服少許。紙燃子。蘸藥任之。鼻噴神妙。

神芎散 治風熱上攻。頭目眩痛。上壅。鼻塞眼昏。并牙齒悶痛。

川芎
鬱金各二錢 荆芥穗分薄荷葉二錢 硝二錢 紅豆一錢已上為細

右研勻。鼻內噙三兩劑。耳力慢加藥。病甚者。兼夜噴之。凡熱多風火隨證選用諸藥。

金絲膏 治一切目疾。昏暗如紗羅所遮。或疼或痛。

宣黃連半兩對碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞蜜一兩

山梔子二錢尹者梔碎黃連滓同煮五十沸取

蓋力子去滓與前黃連汁一處入篩藥

右用銀簪器內同熬。十餘沸。用生絹。上細紙數重。再濾過。用時常點。

白藥子散 治一切疳眼赤爛。目生翳膜。內外瘡疾。并小兒吐痢。

白藥子一廿草半兩

右為末。用豬肝一葉。批開。移藥五錢。水一大盞者。熟食後服。

胡黃連散 治一切久新赤目疼痛。不能坐卧。并大小人口瘡。

胡黃連 檳榔各半兩麝香少許

右為細末。研細點之。如口瘡。每服半錢。麝香一字。勻口瘡大小。貼之。忌食魚猪油膩物。

碧霞丹 點一切惡眼。風赤者。

龍膽 麝香 硼砂各二錢

右為末。研細點之。如口瘡。每服半錢。麝香一字。勻口瘡大小。貼之。忌食魚猪油膩物。

菩薩散 治遠年近日。一切眼疾。

右為末。滴水和丸。如桐子大。每服一丸。新水化開。點之立効。

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 大陽石 雨餘石 河洛石 磬礦石 雲母石

盧甘石

井泉石 白滑石

紫英石 寒水石 陽起石 猪牙石 代赭石

碧霞石

烏魚骨 青鹽 各一兩

硝砂半兩 蜜陀僧一兩 銅青一兩 黃丹四兩 麝香

腦子一錢

輕粉一錢 鵬砂三錢 乳香二錢 雄膽一斤 白砂蜜二力

半

兩

右為細末。以井花水九大碗熬就作四碗點水內。落下錢許。大不散。可如散者。再熬。濾淨。過露旋點。

石膏羌活散

治久患雙目不覩光明。遠年近日。內外氣障。風昏暗。拳毛倒睫。一切眼疾。

羌活

治體熱頭風

蜜蒙花

治羞明

木賊

退翳障

香白芷

清利頭目

細辛

乾菜子

二味起倒睫

荆芥穗

治目中生瘡

黃芩

洗心退熱

石膏

二味

藁本

治偏正頭暈

甘草

解諸藥毒

各等分

甘菊花

重明散 治一切風熱。內外障氣眼疾。

川獨活

川羌活

川芎 吳射干

仙苓脾

防風

甘草

井泉石

蒼朮

各半兩

丹參

白朮

石決明

草決明各三分

右為末。每服二錢。水一盞半煎至一盞。溫服。日進三服。食後。

雷巖丸 治男子婦人。肝經不足。風邪內來。上攻眼暗。淚出羞明。怕日。多見黑花。主障。翳膜遮睛。臉生風粟。或痒或痛。隱澁難開。兼久患偏正頭疼。牽引兩目。漸覺細小。視物不明。皆因腎水不能溉濟於肝水。此藥久服。大補腎藏。添目力。

肉蓯蓉

一牛膝

一兩

芭豆一兩浸去皮心

宿菊花

二兩

黑附子

晴鹽

一錢

以河水三升同煮為度。去皮臍一兩

枸杞子

二兩

川椒

去目三兩

右為末。元浸藥酒。煮麪糊為丸。如桐子大。每服十九。空心酒下。世人服藥。不知多少根源。往往不効耳。

丁香復光丸 治一切遠近目疾。

丁香二錢 芒硝一錢 去皮油

半夏二兩 烏梅半兩 南鵬砂三錢 腦子二百 盆硝半兩

縮砂仁二錢半

甘草半兩 荆芥穗二錢

右為末。醋煮麪糊為丸。如菜豆大。每服十九。至十五丸。米泔下。食後日三服。

已上諸方。係先生親驗可錄。

小兒門

小兒科論

素問云。身熱惡寒。戰慄驚惑。皆屬熱證。為少陰君火。暴強。直支經戾。裏急筋縮也。皆屬風證。為厥陰風木。大小兒六歲之上。為小兒。十八歲已上。為少年。其六歲已下者。諸經不載。是以乳下嬰兒。有病難治。無可定也。然小兒與大人不可一例。各異治之。雖小兒誕生襁褓之後。骨肉脆軟。腸胃細微。可以乳食調和臟腑。乃得平安。肌膚滋潤。筋骨輕嫩。以綿衣之。故生壅滯。內有積熱。熱乘於心。心受。乃發為驚。驚不止。返為潮搐。則為病也。大藥小小病者。純陽熱多。冷少。故引。○素問少陰厥陰證。以小兒病驚風熱多矣。小兒驚風者。皆由心火暴甚。而制金不能平木。故風火相搏。而發冒。驚悸潮熱。此證皆謂熱甚而風生。○素問驚駭驚慄少陰君火也。

小兒脾疳痢者。皆熱甚。急瀉。渴利。色多青。為熱證明矣。痢色黃者。何為火甚。則水衰。而脾土旺。故痢色黃也。痢色紅赤者。為心火熱甚深也。痢色黑者。為火熱過極。則反兼水化制之。故色黑也。五臟皆言熱證。無寒冷證亦有。謂瀉痢。小便青白。不瀉為寒。水穀不化。而色不變。吐痢。腥穢澄澈清。冷白不瀉。身涼不渴。脉遲細而微者。寒證也。

穀雖不化而色變。非白煩渴。小便赤黃而澁者。為之熱證。世傳大人小兒吐痢霍亂。乳食未及消化。而痢尚白。便言論為寒證。誤矣。向不脉候別之仲景邪熱不化穀。豈為寒也。大人亦同

小兒方類

龍腦地黃膏○治小兒急慢驚風。痰涎上潮心胸。天吊驚。纏喉風。小兒胸膈不利。一切熱毒。大有神效。如病不已。與分肢散一二服。吐利得快。常服此藥。

川大黃別搗甘草橫文者別搗麝香二錢

雄黃水窟者一別研

生腦子別研一錢

右五味各修製了。再入乳鉢白同研細。煉蜜為膏油單裏。如有前病。煎薄荷湯下。旋丸如皂子大化下。如小兒大人睡驚。及精神恍惚。煎金銀湯下一丸。常服新汲水下。大解暑毒。如孕婦人常服。新生男女。永無疾病。如有大人陽毒傷寒。加輕粉二厘龍腦少許。水化下一丸。杏核大小。小兒看年紀大小。加減服立効。

分肢散○治小兒卒風。大人口眼喎斜。風涎畏心。驚癇天吊。走馬喉閉。急驚。一切風熱等疾。

芭豆半兩不出油川大黃一朴硝半兩

右大黃為末。後入芭豆霜。朴硝一處細研。用油貼起。如有前患。每服半錢。熱茶下。吐下頓涎立愈。如小兒胃喉驚吊等。先服龍腦地黃膏一服。次服此藥一字。茶下時。上吐下瀉。以吐利得快為效。大人半錢。小兒一字。看虛實加減。只是一兩服見効。不宜頻服。如吐瀉不定。以葱白湯立止。

珍珠丸○治小兒虛中積熱。驚癇等疾。

芭豆霜二錢滑石二錢

天南星一錢半

蝎梢二十節續隨子二十四箇去皮

粉霜半錢

右為末。研令極細。以糯米粥為丸。如黃米大。小兒一歲已下。每服三丸。至一丸。十五歲每服五丸。點茶湯下。荆芥湯亦得。虛實加減。

牛黃散○治小兒上焦壅熱諸眼疾。

肉桂

鬱金各一

馬牙硝四兩

甘草半兩

並牛

右為末。如患眼三五年。喫三五兩便瘥。每服一錢。新汲水調下。垂枕卧片時。若是小兒十歲。服半錢。五歲已下。服一字。永無驚瘡癇風。患服之立効。

硃砂丸○治小兒急慢驚風及風熱生涎。咽喉不利。取驚積。

硃砂

天南星

芭豆霜各一錢

右為末。麪糊和丸。如黍粒大。看病虛實。大小。每服二丸。或天吊戴上眼。每服四五丸。薄荷水下。立愈。

鬱金散○治小兒急慢驚風等疾。

鬱金一枚

芭豆七箇去皮不出油

右研為細末。每服一字。煎竹葉湯。放溫下。把藥抄蓋唇上。放以湯充下。喉咽為妙。

澤瀉散

○治小兒齁膈脛上壅熱涎潮

澤瀉分蟬殼全者二個

黃明膠手掌大一

右為細末。每服一錢。溫米湯調下。日進二服。未愈再服。

鎮庭散○治小兒一切驚喘。肚脹咳嗽。

鬱金

大黃各半兩。甘草三錢。輕粉一錢。

右為末。每服半錢。用薄荷汁。硃砂細研。冷水以木題瀝下。定命散○治小兒天吊驚風不能哭泣。

梨蘆

川芎

蔚金各等分

右研為細末。鼻噴。之如哭可醫。

金肺散○治小兒諸般喘嗽。急驚風神効。

錫灰一錢

漢防已二錢

鬱金一錢

研黃二錢

半夏半錢

洗七次

水湯

右為細末。每服半錢。加一錢。小兒加減。煎豬肉湯下。日進二服。食後。

厚朴散○治小兒虛滑。瀉痢不止。

厚朴
阿子皮
研
史君子
首
揀丁香
升
竹
茯苓

吳白朮
青皮
錢
甘草
炒

右為末。每服一字。一歲加減。用清米湯下。

人參散○治小兒虛熱煩渴。因吐瀉煩渴不止。及疎轉後服之。

人參半兩
茯苓二兩
半犀半錢
甘草半兩
乾葛半兩
桔梗二錢

右為末。每服三錢。水一大盞。入燈心五莖。同煎至六分。放溫不計時候。煩渴者。以新竹湯下。量

年紀加減。

碧雲散○治小兒驚風有涎。

瞻攀
研
銅青
分
粉霜

輕粉各一
錢

右為細末。每服一字。薄荷湯下。中風將水下。如吐多不定。煎葛白湯。投之。立止効。

桃符丸○治小兒風熱。

大黃
郁李仁
黃柏

宣連

蔚金

洛一色豆

二七個去皮

出油為霜

輕粉

右為細末。滴水為丸。如菉豆大。以硃砂為衣。每服二丸。用桃符煎湯下。看大人小兒加減。

大明書卷十四

黃帝素問宣明論方卷之十五

河間 刘守真 撰集
新安 吳勉學 校

雜病門

雜論

素問云。痛痒瘡瘍。癰疽痘疹。瘤氣結核。怫鬱其者。皆熱五臟不和。九竅不通。六腑不和。留結為癰。近於火氣微熱。則痒。熱甚則痛。附近則灼。而為瘡。皆火之用也。

人之瘡腫。因內熱外虛所生也。為風濕之所乘。則生瘡腫。然肺主氣候。於皮毛。脾主肌肉氣虛。則膚腠開。為風濕所乘。脾氣溫而內熱。即生瘡也。腫者。皆由寒熱。毒氣客於經絡。使血溢而不通。壅結成腫。風邪內作。即無頭無根。氣血相搏。作者即有頭有根。結壅盛則為膿。赤核腫則風氣流瀆也。瘡以痛痒。痛則為實。痒則為虛。非謂虛為寒也。正謂熱之微甚也。痒者。美疾也。故火旺於夏。而萬物蕃鮮。榮美也。炙之以火。潰之以湯。而其痒轉甚者。微熱之所使也。痒去者。謂熱今皮膚縱緩。腠理開通。陽氣得泄。熱散而去。或夏熱皮膚痒。而以冷水沃之。其痒不去。謂寒收斂。腠理閉密。陽氣鬱結。不能散越。佛熱內作故也。瘡痒皆為火熱。而反腐出膿水者。猶穀肉果菜。熟極則腐爛而潰。為污水也。潰而腐爛者。水之化也。癰淺而大。疽深而惡熱。勝血則為癰。膿也。瘡有頭小瘡也。疹浮而小。癰疼也。瘤氣赤瘤。丹熛熱勝。氣火之色也。

如意散 治疥癬無時。痛痒愈發。有時不問久新者。

吳茱萸 牛蒡子 荆芥各一

壯蠟半兩 輕粉 分

錢信研二錢

右為細末。研勻。每卧抄一錢。油調偏身搓摩上一半。如後有痒不止。更少許塗之。股髀之間。聞香悉愈。

信効散 治風熱上客陽明之經。牙齒疳齦斷宣腐臭出血。色黃氣腐。注悶。動搖疼痛。作發有時。兼解。

中金石一切毒藥。

信砒 一錢 苗丹 二錢 千古石灰如無但以陳久

細研四錢

右研細末。入青鹽一分。麝少許。如無此二味亦得。每上抄三兩大豆許。先洗漱淨。以手指蘸藥。擦上下牙齒。斷泄涎勿嚥。之須臾漱淨。或已蝕處。再上少許。二三次常用如意。一上以為妙。或服金石藥致病。便一日三四上。更不上牙齒如神。或已上牙齒者。傳之即愈。或平人常用頗能清利頭目。寬膈美食。使鬚髮遲白。久用亦能固牙齒。便遲老人氣於面。而手足陽明經絡貫注。憂思則氣結。而血液不行燥。佛鬚而血衰。不能榮養臟府。故早蒼黃而斑白也。此藥能使陽明氣血宣通。故効能然也。又方使龍骨。不用石灰。

神聖餅子 治一切打撲傷損。金石刀刃血出不止者。立効。此藥上無膿。退癰便愈。

烏魚骨

前先准備下
一兩五月五日

萬苣菜

握青蘿草

手取圓是也

人

石灰 四兩

右以五月五日未出。本人不語。將取三味同杵爛次後下餘藥味杵得所搏作餅子。曬乾用時旋刮敷之。

芙蓉膏 治偏滿頭面。大小諸膿子。或身體者。

料炭灰 桑柴灰 蒜芥灰 各半升

右反用熱湯淋取二升。熬至五分。又用

獨角仙 一個 不

用角 紅娘子 去翅足 半錢不

糯米 四十

石灰 一兩
化者 風

右為末。將前項灰沾調如麪糊相似。在蓖合子內。於土底埋五七日。取出使用。取瘻痕屬同刺破。用細竹簽子點之。放藥用濕紙揩藥。再點至三上。見瘻痕時冷水淋洗。忌薑醋魚馬肉。鉛白霜散 治大小人口瘡。牙齒腐蝕。氣臭血出者。

鉛白霜一錢銅錄二錢白藥一塊

大許

右為末。以翎羽埽上。瘡以溫漿水漱之。

麝香散 治大小人口蟲蝕腐。出血斷根宣爛者。

上好鹹土不以多少 麝香少許 真好者

右熱湯淋取汁去滓。用清汁銀石器中熬乾刮下。再與麝香同研。勻擦於瘡上。以紙貼神効。

乳香散 治一切瘰癧瘡。新久遠近不已者。

黃丹半錢

右為末。糯米粥和作餅子。如折三錢厚小銅錢裏捲。大破瘡上。白鷄糊。如不破者。火柴炷大者。不過一月。其瘰癧核自下。

後斂瘡生肌藥。 黃藥不以多少

為細末。鷄糊塗患處甚妙。

五香丸 治一切亞瘡。瘰癧結核。無首尾。及諸瘡腫。

沉香 木香 雜古香各一兩

薰陸香

麝香各三連翹半兩

右研為細末。每服二錢。水一盞。煎至六分。不拘時。

紫參丸 治熱毒瘰癧腫痛。已內消。瘡已破。出膿水。服此藥。

紫參 苦參各一錢 丹參二兩 半 脩粉三錢麝香三錢滑石二兩

右為末。別用玄參一斤搗碎。以酒三碗浸三日。擣取汁去滓。用皂角子三伯枝。煨熟。搗為末。用玄參酒熬皂子未成膏。和前藥。如桐子大。每服一丸。以黃耆湯下。一日加一丸。至患人歲數即止。如四十。則二十。每日却減一丸。瘡自乾。有結內消。

麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人。及瘡腫者。

麝香 雄黃 乳香 硼砂

硼砂 鎏土蜂窩 露蜂窩燒灰

右研為細末。以醋調少許塗咬着處。或不辨認得。多疑是惡瘡。三五日不癒。即毒入心難瘥。忌
雞魚油膩物。

硼砂散 治一切疔瘡。

硼砂 雄黃 天南星 破霜各等分 麝香少許

右研為細末。用竹針針開。用藥到黃水出。瘡已

聖力散 治諸疔瘡腫

草烏頭 白及 白斂

木鱉子皮 地龍

金毛狗脊各二錢半 麝香三錢 黃丹少許

右研為細末。用針針到生肉痛者。用藥黃水出為度。

川山甲散

治一切通氣破瘡腫。行膿血。如神妙。

川山甲

木鱉子 烏龍角各等分

守瘻丸 治瘻瘤結硬。

右為末。每服一錢半。空心熱酒調下。至中午。瘡破膿血便行。

通草二兩 杏仁一錢去皮尖研

牛蒡子油一合出

吳射干 昆布去鹹 呵梨勒

海藻各四兩去

研

右為末。煉蜜為丸。如彈子大。含化咽津下。日進三服。

鬼代丹 治打着不痛。

無名異研沒藥研

乳香研 自然銅醋淬研

地龍去土 木鱉子去殼各

右為末。煉蜜為丸。如彈子大。溫酒下一丸。打不痛。

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛。

黃丹一兩 蜜陀僧半錢 輕粉一錢 麝香半兩 龍膽一字
右為細末。擦藥在瘡上。用青白子塗之。內留一眼子。

香藥丸 治癰瘡。

硇砂 乳香

沒藥 半夏 輕粉

赤石脂各等

右為末。糯米粉為丸。如桐子大。每服十九丸。加至二十九丸。皂角子臨卧。

紅玉挺子 治一切牙疳。

硫霜一塊。皂角子大。黃丹煅過魯土。

右為細末。餽餅和作劑子。任牙。

桃花散 治一切瘡生肌藥。

白及 白斂

黃柏 黃連

乳香別研。麝香別研。黃丹各等。

右為細末。擦於瘡上。二三日生肌肉滿。

追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂。

螺旋青 捣甘草各一兩

白礬二錢半

右為細末。每服一錢。新汲水調下。立吐。

膽礬丸 治男子年少而髮髮斑白。

土馬驥燒存性

半夏各一兩。生薑一兩。胡桃十個。真膽礬半兩。

川五倍子一兩

右為末。和作一塊。絹袋子盛。如彈子大。熱酒水各少許。浸下。藥汁淋洗頭髮。一月神效。

伏神散 治膽熱多睡。神思不安。昏悶。

伏神去皮麥門冬 地骨皮 茯苓 酸棗仁 沙參

甘草各半

右為末。每服三錢水一盞。煎至六分。去滓食後服。

鐵脚丸 治大小便不通。

皂角

炙去皮不以
多少去根子

右為末。酒糊為丸。如桐子大。每服三十九。酒服。

全聖散

治小腸膀胱氣痛不忍者。

地膽

半兩去足

炒微炒滑石一兩 硫砂半錢

右為末。每服二錢。用苦杖酒調下。食前服。

琥珀散

治五淋。

滑石二兩 木通

當歸

木香 尉金

扁竹各一兩

琥珀二兩

右為末。每服三五錢。用蘆葦葉同煎。食後日三服。

葵子散

治小便不通。

葵子 茯苓

去黑皮
各等分

右為末。每服四錢水一盞。煎三沸食前。

倒換散

治無間久新癰閼不通。小腹急痛。肛門腫疼。

大黃

通減半

荆芥穗

半兩等分

右件藥味各別為末。每服一二錢。溫水調下。臨時加減服。

敗毒散

治男子往來寒熱。婦人產後骨蒸血運。

大黃

黃藥子 柴胡車 赤芍藥 甘草各等分

右為末。每服一錢。如發熱。冷水下。如發寒。煎生薑茶湯同調下。此藥偏治婦人。

補真丹

治男子元藏虛冷。興陽固腎。不虛。

黑附子一兩

火燒酒

陽起石

淬火燒酒三錢

海馬二錢

乳香

雄黃為衣

血竭各三錢

麝香一分

石蓮子去殼皮心

黑錫炒去砂子半兩

石鷺子燒以醋淬

麝香一分

右為細末。麪糊為丸。每服二十丸。用五香湯空心下。

五香湯

沉香 篓香

乳香 麝香

檀香各等

右為細末。每服半錢。煎湯下。

新添

醉烏法。治頭髮白再黑方。

訶梨勒去核不取汁者三個大

醋石榴

碌礬五分 生地黃汁一升

硝砂研

硫黃研

右藥同入甕瓶內用二味汁浸密封勿令透氣。至四十九日後取出。其訶子狀若黑梅。至夜臨

卧含一枚。喫津到曉爛嚼。以酒一盞下之。三二日後再服。忌葱大蒜蘿蔔。