

萬氏女科

下

婦人科

產后章

產后專以補虛爲主其有他疾以未治之今併催生之法設爲問答以盡病源以著治法臨產之工庶有所憑司命之寄亦可無負

○難產

問難產者何也曰前章已備矣多因產母倉皇坐艸太蚤或胞裏雖破見身未轉或轉未順被母用力勢責以致足先來者謂之逆產手先來者謂之橫產或滯其肩與耳與額者謂之側產

或被勝帶纏絆不得下者謂之碍產倉卒之間一命所係不可無法而隘爲仁之術也

○救逆產

令其產母正身仰卧務要定心定神不可驚怖却求惜熟穩婆勇去手甲以香酒潤手將兒足輕輕送入又再推上兒身必轉百待身轉頭正然後服前催生之藥滑則飲以蜜水饑則食以薄粥然後扶掖起身用力一送兒卽生矣此在穩婆之良否粗率蠢人不可用也切不可使針刺足心及鹽塗之法兒痛上奪

母命難存

○救橫產

萬家編

法半如上仍將兒手輕輕送入再推上摸定兒肩漸漸扶正令頭順產門后進催生之藥飲食之物一切如上扶正兒卽小矣  
忌用針刺

○救側產

亦令母仰卧法如上穩婆用灯審視或肩或額或左或右務得其真以手法輕輕扶撥令正仍服藥食如前法起身用力兒卽下矣

○救礙產

令母仰臥穩婆用燈審視着臍帶絆着兒之何處仔細以手法輕輕取脫服藥食如前法扶起用力一送卽下矣

○盤腸生

問云 者何曰當產之時子腸先出盤露于外子隨後下產後

而腸不卽收此謂盤腸生也若不忍見蓋由平日氣虛不能收

束血熱易于流動下元不固關鍵不牢致如此若救治之法于

于下衣來之后却令產母仰臥穩婆先將子腸盪水洗淨惹帶

之物然后托起輕輕送入推而上之却令產母兩足交緊穀道

其腸自收上也或取草麻子日十九粒去壳搗爛付在頭心待

腸收盡而急去之次也或用水和醋令人噴面一噴一止  
漸收之又其次也欲免其苦者宜于此後無孕時多服地黃  
加五味子兩肉桂兩以固下元之關鍵及有孕時多服胡連丸  
加人參兩以補氣又服三補丸以涼血如渴胎瘦胎之藥不可  
輕服于八月之時再服八物湯加訶子 瞿麥 粟壳服十餘  
刺庶可免矣

○產子氣絕不啼

問三  
云者何日子欲下時并護其痛偃後傾側兩足不開扭夾  
兒頭氣不得伸故生下悶絕不啼謂之寤生救法待胎衣來切

勿斷臍急取小鍋燒水以胎衣置湯中頻頻用水澆臍帶須臾氣煖入腹鬼氣卽回啼聲發出矣若倉卒斷其臍帶不可救也

○子死腹中

問云者何曰兒當欲下之時被母護疼兩足不開夾其頭而死者或因產母痛悶忍耐當事之人不善扶掖緊抱其腰以致傷胎而死者或因產難胞漿已乾生路漸塞于不得出氣閉而死者或因生路不順若逆側等症穩婆蠢厲用手莽揮友傷其子而死者以被臍帶纏頸氣絕而死者其候但觀其母口青手指青臍下冷日中有臭氣者子死腹中尚矣急用炆味五苓散

奪命丹取去死胎以保其母  
穩婆善取者尤妙如母唇面重  
則難救矣

○胎衣不下

問云者何曰或因產母力之氣不轉運或因血少乾澀或因  
子宮空虛吸貼而不下者急服加味五苓散甚快若倉卒無藥  
可尋路土破艸鞋一隻近陰處軟繫臍帶敷道而下務宜仔細  
繫束繫定然後斷其臍帶洗見收卷產母任其坐卧行立胎衣  
自下有過旬日而爛下者屢試有驗若不斷帶使子氣貫入衣  
中衣轉浮脹而不得出矣夫寒之時猶不便于子也惟懼熱細



卷之三  
婦人科  
善取胎衣者甚不勞力

○產後血暈

問云者何曰新產婦昏眩平倒不省人事口噤氣冷謂之血暈此惡候也不可救者多若誤作暗風庸醫殺之耳蓋由血暈之時不知用前防血暈等方所以有此其症有三當分治之如血來太多卒然昏仆者此氣血兩虛也急用茱萸酒法以待其醒清魂散主之

澤蘭葉

人參

各一

荆芥

穗

川芎

歸身

各一

茶華水

酒各事盡煎一盞入重便一鍾同服

如血去少惡露未尽腹中有痛而昏眩

者因<sub>之</sub>上法令醒黑神散

主之

黑豆

一合炒

熟地

當歸

桂皮

乾

薑

炙艸

白芍

酒炒

黃各二

如上述法服

○產後子宮脫山

問云者何曰其人素虛產時用力努

責太過以致脫出白不

能收也宜用補中益氣湯外用洗法劑

芥穗

藿香葉

梟椿

樹白皮炙等分剉細煎水無時洗之

子宮即入

○產後年見鬼神

問云者何曰心主血血去太多心神恍惚睡卧不安言謬失

度如見鬼神俗醫不知呼為邪祟誤人多矣茯神散主之

茯神 栢子仁 遠志 人參 當歸 生地 炙艸各一

桂心五分 積猪心一個 法如上煎服調辰砂一分 食后服

如心下脹悶煩燥昏乱狂言妄語如見鬼神者此敗血停積上

干于心心不受觸便成此症昔當鴻心湯主之

歸稍 川芎 玄胡索 蒲黃 牡丹皮各 桂心七分 煎

調五灵脂另研末一錢食后服

○產后心痛

問云者何曰心者血之主其人宿寒內伏因產后虛寒血凝不行上衝心之絡脉故心痛也但以大果蜜湯治之寒去則血脉行而經絡通心痛自止若誤以芫散血攻之則虛極寒益其漸傳心之正經變為真心痛而死矣

生地 當歸身

獨活

吳茱萸

白芍

酒炒

乾薑

炒

炙艸

桂心

小艸

各一分

細辛

五分

水煎

熱服

○產後腹脹滿悶嘔吐惡心

問云

云

者何曰敗血散干脾胃受則

不能運化津液而或腹

脹胃受則不能受水穀而生嘔逆若以

平常治脹治嘔之劑則

藥不對症反增其病宜用抵聖湯主之

赤芍 半夏製 澤蘭葉 陳皮去人

參各二 炙艸一 生薑五

分水煎服

亦有傷食而腹脹嘔逆者以脉辨之因于血則脉弦澹不惡食

而嘔多血腥因于食則脉弦滑而嘔多食真加味乎胃散下之

蒼木米泔水浸焙 厚朴薑炒 陳皮 香附醋炒 人參各一 炙艸 生薑

倍名神麴炒 水煎熱服或用見曉

九赤崔

眼脫丸

良薑炒 薑黃炒 葶苈炒 陳皮去人

木 煨三稜 煨人參各等

分其不羸日溫火煮熟研爲末和藥

白湯下

加味六君子湯治產後傷食嘔吐腹脹

六君加枳實

去加五分

川查

五分

薑黃

引水

○產後口乾痞悶

問云

者何曰由氣血大虛中氣未足

更經大早之脾胃不能消

化麩毒結聚于胃土燻胸中是以有此

也頓勿下之見曉先

三之

若其臍氣本虛宿夾積冷胸展脹痛嘔

吐惡心飲食減少亦因

新產血氣暴虛風冷乘之以致寒邪內勝宿疾益加吳茱萸湯  
主之

吳茱萸炒 枳椇 乾薑炒 灸艸 半夏湯洗 細辛 當歸酒洗

白茯苓 杜心 陳皮 薑引水煎熱服

若因胎衣未下惡露不來肚腹脹大細急如鼓嘔吐黃水等

腥臭加喘者死

若因產后多疾安接湯丸重虛其內則

頭昏精神疲用少

氣之乾嘔者死

○產后咳嗽

四

問云云者何曰產後或有惡露上攻滯  
入肺經乃成咳嗽其症

脆肺脹悶宜服二母湯主之

知母 貝母 白茯苓 人參各一 杏仁 桃仁各一 水煎食

後溫服

又曰肺主氣也為衛所以充皮毛密腠理也產後氣虛衛虛皮  
毛不充腠理不密風寒在表之先入于肺也成咳嗽其症癸執強  
寒鼻塞声重或多噴嚏身流清涕旋厥化湯主之

旋覆花 赤芍 前胡 半夏 荆芥穗 甘草 白茯苓

五味 麻黃去根 杏仁 各等分 薑 葱 三引 煎服如前



有汗者去麻黃加桂枝如汗久不止涕唾稠帶加味其桔  
湯至之

甘州 桔梗 蘇冬 貝母 前胡 枳壳 白朮 五味

麥冬 各等分 燒竹葉十五片煎服 如產后吃換

早者難治

口產後喉中氣 逆喘

問云三者何曰榮者血也衛者氣也六

血下過多榮血暴竭衛氣無毛獨聚肺

絕陰最爲難治也取鞋底灸熱于小腹

熟附子

五系

牡丹皮

乾漆

炒烟凡各一兩

共末用醖醋一升大

黃耆

一兩

同熬成膏和末

為凡梧子大每服五十九温酒下

又問產后血入于肺面赤

發喘欲死者參蘇飲主之

人參

為末二兩

蘇木

二兩

益冀

一盞

去木人參末隨時加減服效

難足迷

○產后腰疼

問云者何曰女之人腎

胞脉所係產后丁血過多則胞脉虛

脉虛則腎氣虛腎主腰故令腰疼補腎地黃湯主之

其症在七痛

熟地 煇身 杜仲青塩木 獨活 桂心 續斷 各一 生薑

三片 棗二枚 水煎空心服

又曰敗血流入腎經帶脉阻塞有腰疼者其症眼痛如刺時作時止手不可近加味復元 通氣散主之

当歸身 川芎 小茴炒 故脂炒 玄胡 牛膝 桂心各一

丹皮一 水煎木香五分 磨水和之更調乳香沒藥末五分 服如上

有因產時起伏開闔挫開 腎氣及帶脉者亦或腰疼用上散方

口 產後遍身疼痛

問云 三者何曰產時骨節開張血脉流散遇氣衰弱則經絡肉

人之問血多凝滯骨節不利筋脉不舒故腰背不能轉側  
不能屈伸而痛也勿作風寒用汗之劑宜趁痛散主之

當歸 桂心 白木 牛膝 黃芪 獨活 生薑 各一錢

神 薤白 各五分 水煎服

有因新產氣虛久坐多語運動用力遂致頭目昏眩四肢疼

痛寒熱如瘧自汗各曰羸 勿作傷寒誤投汗劑 白茯苓散 主之

白茯苓 煨身 川芎 桂心 白芍 酒炒 黃芪 蜜炙 人參 熟地

各一 獾猪腰子一对去脂膜切片煎湯一盞去腎薑三匙二

引同藥煎服

子按尊步之症或因燎產一時生理不順憂恐思慮內傷其神

展轉關闔外傷其形內外以傷形神皆廢或因新產之後氣血

未復飲食未充起居無度嗔言不止調折失宜情欲失禁外成

風寒內傷欲食漸成羸瘦有病併作苟非良工妙劑未有不戾

勞瘵而斃者必宜常服十王夫補湯又早用地黃片加情子

牛膝 肉苁蓉酒五味 栢子仁各二兩 日服人參白朮散作

丸服之常煮腰子粥以功之大效煮粥法取猪腰子一對

去脂膜薄切如柳葉大用鹽酒拌合一時亦三盞粳米三合

瓦罐煮粥葱花椒末和得宜食之

○產後腹痛

問云

云者何曰女人之血未有胎時則爲經水經水不行則病

產時則爲惡露惡露不來則病故產婦中氣多虛不能行血也

斯凝滯或閉而不來或來而不止改血入腹故爲腹痛年作乍

止其痛如刺手不可近黑神散主之蓋敗血隨其所止之処

無不成病

或產后血虛外受風冷之氣內傷寒冷之物以致腹痛者得人

按摩畧止或熱物熨之即止者是也當用建中湯主之

婦身 白芍 桂心 灸艸各二錢 生薑 大棗 三水煎飲

湯三匙攪勻熱服

或小腹痛者脐下胞胎所係之処血之所聚也產后血去不民  
即成痛症其症無時刺痛痛則有形須更痛止又不見形黑神  
散至之

又有因產時寒氣客于子門入于小腹或坐卧不謹使風冷之

氣乘虛而入此寒症也但不作脹且無形影為異金鈴子散之

川練去核 小茴 骨脂 桂心各一錢 木不引水煎 薑引水煎入木

香汁食煎熱服

○產后暈枕痛

問三 者何曰腹痛有塊上下時動痛不可忍此由瘀前聚血  
產后氣虛惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒枕痛前  
血癥之類也當歸玄胡索湯主之

歸身尾 玄胡索 各半 五靈脂 蒲黃 各一 赤芍 桂心 各

分 紅花 五 水酒 各一 煎一盞入童便一盞同服

又羊肉湯通治上腹痛小腹痛鬼枕痛之神方也專治虛羸

精羊肉 西 當歸 川芎 各五 生薑 十 艾葉 三 艾分四服

口產後頭痛

問 者何曰人身之中氣為陽血為陰陰陽和暢斯無病益

婦人科 卷之三



產后去血過多陰血已虧陽氣失守頭者諸陽之會上痿于頭  
頭為頭痛但補其陰血則陽氣得從而頭痛自止芎歸湯主之  
川芎各五當歸各五俱不洗炒連鬚葱白五生薑五焙乾水煎食服  
又有敗血停留子宮厥陰之位其脉上貫頂巔作頂巔痛者早  
神芎主之

○產後發熱

問云 云者何曰產后血虛則陰虛陰虛生內熱其症心胸煩滿  
呼吸氣短頭痛悶亂日晡轉平與大病後虛煩相似人參當歸

散主之

人參 歸身 熟地 肉桂 白芍 酒炒各 麥冬 水二盞

先以粳米一合淡竹葉十支煎至一盞去米葉入藥併內三

一煎七分溫服熱甚加炒乾薑和

產后大熱必吐乾薑何也曰此非有餘之熱乃陰虛生內熱也故以補陰藥大劑服之且乾薑能入肺和服氣入肝引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙惟天下至神可以語此

產後乍寒乍熱似瘧

問云者何曰敗血未盡陰陽不和皆能發寒熱也何以別之

因敗血為病一小腹刺痛此為異耳故敗血未盡者以去滯為至陰陽不和者以補虛為主若作瘡治誤矣

問敗血未盡乍寒乍熱者何曰敗血留滯則經脈皆閉榮衛不通閉于榮則血甚而寒閉于衛則陽甚而熱榮衛俱閉則寒熱交作榮衛氣行則即解矣惟黑神散卷荷散為去滯血之要藥也

卷荷散

初出絲荷焙乾紅花歸尾蒲黃丹皮各一錢生地一錢生薑

童便水許乾龍

則陰陽不和乍寒乍熱者何曰瘧后氣血虧損陰陽俱虛陰虛則陽勝而熱陽虛則陰勝而寒陰陽似虛則乍寒乍熱增損入物湯主之

婦身酒洗白芍酒洗川芎 乾薑炒焦 人參各一錢 炙艸五分 薑片三 棗

三水煎服寒多熱少者加桂錢 熱多寒少者加柴胡一錢 薑

減半煩湯者加知母麥冬各一錢 食少者加陳皮白朮各一錢 虛

倦甚者加黃芪錢

間似瘧真瘧何以別之曰似瘧寒不凜也熱不蒸也發作無時亦不甚苦此正氣虛而無和氣也真瘧者寒則湯火不能禦熱

則水水不能解發作有時煩苦困頓此正氣虛而喘氣相搏者也

○產後瘧疾

問云者何曰氣血俱虛柴衛不固脾胃未復或外感風寒內

傷飲食皆能成瘧又有治前病瘧產后未愈者產后之瘧最難

調理只以補虛扶正為主正氣勝則邪氣自退不可輕用截藥

重虛正氣為害甚大增損柴胡四物湯主之

北柴胡 人參 半夏 炙艸 婦身炒 川芎 乾薑 桂

薑三三 水煎不物時服入瘧加黃芪白 鱉甲一錢 醋炙各

○產后渴

問云 者何曰胃者水穀之海津液之府也產后去血甚多津

液內耗胃氣暴虛頓生內熱故口燥咽乾而渴也加人參麥冬

湯主之

人參 麥冬 生地 括樓根 灸艸名二 先取淡竹葉十

梗米合煎湯 去米藥加生薑三 棗二 煎七分服

○產后汗出不止兼變症

云 何曰血為榮行乎脉中氣為衛行乎脉外如須為守者

產後去血過多榮血不足衛氣失守不能斂皮毛腠理故

而洩易出也宜急止之恐風寒乘虛而入變生他疾宜麻黃

根湯主之

婦身酒黃芪蜜麻黃根 人參 炙艸研牡礪煨另水二盞

以浮麥一合煮至一盞去麥入藥再煎至七分調牡礪粉研

服之

如眩暈汗出者此名胃汗虛極也急用黃芪炙人參炙艸各

錢附子製一水煎幹開口灌之 大抵此危症多不可救

如汗不止風邪乘之忽然闕則口眼喎斜手足攣曲如角弓之

張者此危病也急用桂枝 葛根 白芍 炙艸 炙底 煨

身各二熟附五分幹開口灌之此亦危症不治者多



○產后中風

問云三者何曰產后正氣暴虛百節開張風邪易入調理失宜  
風即中之不省人事口目蠕動手足攣曲斗如角弓此風外中  
者也愈風湯主之

羌活 防風 當歸酒 川芎 白芍酒 桂枝 黃芪 天麻

秦艽各二 薑朮引水煎熱服

又曰諸風振掉皆屬肝木肝為血海胞之主也產后去血過多  
肝氣暴虛內則不能養神外則不能養筋以致神昏氣少汗出  
膚冷眩暈卒倒手足痠癱此肝虛生風風自內生者也用當歸



建中湯加黃芪 人參各一 熟附五分 薑棗引不用飲湯

如痰迷心竅神氣不清恍惚昏眩者用琥珀壽星丸人參煎湯

口產后傷寒

問云者何曰氣血俱虛榮衛不守起居失節調養失宜傷于

風則漸受之傷于寒則榮受之而成傷寒也只以補虛為主隨

証以未治之五物湯

人參 當歸身 川芎 白芍酒 炙艸等分 姜三 蘇白三引水

有汗曰傷風木方加桂枝防風 無汗曰傷寒木方加 麻黃

蘇葉 寒熱往來木方加柴胡 頭痛木方加藹木 細辛

通身痛本方加羌活 獨活 柴胡 葛根

發熱而渴加知母 麥冬 淡竹葉

○產后尿血

問云者何曰小腹痛者乃敗血流入膀胱小腹不痛但尿時  
澀痛者乃內熱也並用小薊湯主之

小薊根 生地 赤芍 木通 蒲黃 甘艸稍 淡竹葉各

滑石二 煨心四十 水煎 敗血加歸稍 紅花各一 兼內

熱加黃芩 麥冬各一

○產后小便數及遺尿不禁

問云 云者何曰下焦如瀆所以主滯洩也 產后氣血虛脫崩瀉 决裂滯蓄不固水泉不止故救而遺也下者舉之脫者澁之宜 用升陽調元湯合桑螵蛸散主之

人參

黃芪

炙

炙艸

升麻

益智子

去壳炒各 五五分

薑棗引水

煎調桑螵蛸散服

真桑螵蛸

白龍骨

煨

牡礪

左顧者煨 各等分

細研末每服

三入湯

响服

又有生前穩婆用手誤損胞破者以致小

不葉宜用參朮湯

至之

人參下 白木二 桃仁 陳皮 茯苓

炙芪五分

分借地或羊胞一個洗淨水二戈煮至

去胞入藥煎

分食前多服乃佳

○產后咳逆

問云不者何曰此氣從胃中出上冲噴門吃忒而作声也有胃

氣震寒者有中氣不足衝任之火直犯清道而土者有飲水過

多水停而逆者有大小便閉下焦不涌其氣上逆者有胃絕者

大約產后咳逆乃胃虛氣寒症也加味理中湯主之

人參 白木 灸艸 乾薑炮 陳皮各 丁香 乾柿二

承煎有熱去丁香加竹茹和如虛羸太甚飲食減少多遊者

胃絕也難治

口產后浮腫

問云云者何曰新產之後敗血不盡乘虛流入經絡與氣相雜

凝滯不行腐化為水故令四肢浮腫乍寒乍熱勿作水氣治之

輕用滲利之劑但服調經湯便氣血流行其腫自消調經湯

婦身酒

赤芍

丹皮

桂心

赤茯苓

炙艸

陳皮

各一細

辛

乾薑

炒各五分

薑引水煎服

又有產后虛弱勝理不密調理失宜外受風濕面目虛浮四肢

腫者加味五皮湯主之

桑白皮 陳皮 生薑皮 茯苓皮 大腹皮 漢防已

根壳炒 猪苓 炙艸 薑引水煎服

○產后惡露不止

者何曰產后衝任損傷氣血虛憊舊血未足新血不斂

下日久不止漸成虛勞者大補氣血使舊血得行析血

可輕用同澁之劑使敗血凝聚變為咳痰反為終身之

大補湯主之 如小腹刺痛者四物湯加 玄胡 蒲

草薑炒 各等分

○產后惡露不下

問云者何曰此有二症治各不同或因子宮素冷停滯不行

者黑神散主之此必小腹脹滿刺痛無時也或因脾胃素弱中氣本虛敗血亦少氣乏血阻不能尽下其症乍痛乍止痛亦不甚加減八珍湯主之

人參 日木 日莢 炙艸 煖身 川芎 赤芍 熟地

立胡索 香附 薑棗引水煎食前服

○產后眼見黑花昏眩

問云者何曰惡露未尽敗血流入肝經肝開竅于目故眼見

黑花諸風掉振皆屬肝木始為昏眩用前清魂散加牛黃末煎服如前

○產后脇痛

問者何曰此亦敗血流入肝經厥陰之脈循行脇肋故為脇痛症有虛實宜分治之不可悞也如脇下脹手不可按是瘀血也宜去其血芍藥湯肝湯主之

痛尾

川芎

青皮

枳壳

香附

便

紅花

桃仁

各二

水

煎入童便一鐘酒一鐘服

如脇下痛喜人按其氣閉動肋骨狀若奔豚者此去血太多耶



虛也當歸地黃湯主之

歸身 白芍 熟地俱酒洗 人參 甘州 陳皮 桂各 薑各

蔥引水煎

○產后不語

問云者何曰人心有七孔三毛產后虛弱敗血停積閉于心

竅神志不能明了故多昏瞶又心氣通于舌心氣閉則舌強不

語也 七珍散主之

人參 石菖蒲 生地 川芎各一 細辛三 防羊五 長羊五

研水煎調辰砂食后服

有語言不清含糊蹇澀者益心王血血去太多心血虛弱  
乃心之苗其血不能上榮于舌萎縮卷短語之不出也加味參  
麥散主之

人參 麥冬 歸身 生地 炙艸 石菖蒲 各一 五味子

十二粒 猪心一個劈開水二盞煮至一盞半去心入藥煎七分

食后服 又治怔忡有效

○產后暴崩

問云 者何日產后衝任已傷氣血未復或恣情慾勞動胞脉

或食辛熱鼓動相火或因惡露未盡固澁太速以致停畱一旦

復行須要詳審先用四物湯倍加芎 芩再加人參作天劑服之  
扶其正氣然後隨其所傷加減調治

房勞者本方加黃芪

炙艸

阿膠

炒

艾葉同服

熱者本方加白朮

白茯苓

甘艸

黃連

炒

因于劫澁者本方加香附

桃仁

崩久不止只用本方調十

灰散服之蓋崩本非輕病產婦得之是謂重虛尤不可忽也

○產后痕塊

問云

云

者何曰此惡露不盡之害也蓋由新婦惡露不來或來

不盡或產婦畏藥雖有痛苦強忍不吉或主人與醫堅執產后

虛補之說不可輕月去血之藥以致敗血停留久而不散若聚成塊依附于官防碍月水阻絕嗣息天其天年欲治此者必用丸藥以漸磨之非湯散旬日之力

熟地一兩 香附醋四兩 山茱萸去核一兩 牡丹皮去木五錢 桂一兩 婦身二兩

川芎一兩 三稜 莪木七醋煮煨各三兩 丸助驚甲去助醋炙二兩 桃仁一兩

五灵脂一兩五錢 玄胡索 破故紙炒各一兩 木香一兩 蜜丸每空心服

五十九丸白朮陳皮湯下此症惟坐馬丹方見效如神瓦龙子

破癡聖藥也方氏未註 此二方或者奇方駭眾故不註耶

○產后王戶不缺

問云老何曰女子初產身體纖柔胞戶窄小子出不悅乃至折裂浸浮煩爛日久不欲宜用十全大補湯外又用敷藥

白芨 白龙骨 訶子 爛烽壳 黃桔炒等分爲細末先

用野紫蘇洗拭乾以此藥搽之即効 又烏龜壳入乾夜合

艸于丙塞滿燒烟熏之自合

○產后乳汁不通

問云者何曰或初產之婦則乳方長乳脉未行或產多之婦

則氣血虛弱乳汁短少並用加味四物湯 婦身 人參 川

芎 赤芍 生地 桔梗 甘肅 麥冬 白芷各一

如乳不行身外壯熱胸膈脹悶頭目昏眩者加水通 潤石

末 水煎食后服更煮猪蹄湯食之則 乳汁自通 猪蹄一對

洗盡煮爛入葱調和並汁食之又云 要入香油炒過穿山甲

共者去田食之神效

○產后霍亂吐瀉

問云 者何曰脾胃者氣血之本也產 后血去氣損脾胃亦虛

風冷易乘飲食易傷少失調理即有霍 亂心腹絞痛手足逆冷

吐瀉並作加味理中湯主之

- 人參
- 白朮
- 炙艸
- 乾薑
- 陳皮
- 藿香
- 厚朴
- 薑片

水奠瀉服無時

○產后泄瀉

問云 三者何日產后中氣虛損寒邪易侵若失調理外傷風寒

內傷生冷以致脾胃疼痛泄瀉不止理中湯主之如泄不止者

再加肉桂 豆蔻 煨 共末蜜丸水飲下

○產后痢疾

問云 云者何日濕多成泄暴注下迫皆屬於熱赤白痢者乃濕

熱所致也故赤者屬熱自小腸而來自者屬濕從大腸而來俗

云赤為熱白為寒非也無積不成痢蓋由產時平日不節忌口

傷于飲食停滯于中以致中氣虛損不能消化宿積發動而為  
病也亦有因于下之時說腹中空虛多食鷄卵與鷄之例以補  
虛殊不知食飲自倍脾胃乃傷脾胃傷遂致難以消化停滯而  
成病也務宜詳審斟酌以施治法度不誤人

如果新產之時飲食過傷者其症腹中脹痛裏急窘迫身熱口  
渴六脈數實宜下之加味小承湯主之

枳實

厚朴 薑炒各

二枚

酒炒

五分

榔

半

炙

刺

下 生薑

煎服以快便為度中病即止后用四君子湯加陳皮和之

如新產后未有所傷其脈其症與上却同者此宿食為病也宜



清而去之枳實湯

枳實蠶木香

炙甘草

厚朴

檳榔

生薑

厥快利為度后以四君子湯和之

如無新舊食積下痢赤白腹痛窘迫脈沉數者此是痢也宜行

氣和血為主當歸芍藥湯主之

歸身 人參

白芍

白朮

炙甘草

木香

煨石膏

分 黑乾薑

陳皮

烏梅

水煎食則服

如久痢不止者此氣虛血少腸滑不共也宜四君子加 白朮

烏梅 煨石膏 主之

又有產后惡露不下以致敗血入大腸而利解血者腹中刺  
痛裏不急后不重是也 枳壳 炒 芥穗 畧炒二分 水煎神效

○產后大便閉澀不通

問云 者何曰人身之中腐化糟粕運行腸胃者氣也滋養津  
液漑溝瀆者血也產後氣虛而不運故糟粕壅滯而不行血虛  
一而不潤故溝瀆乾涸而不流大便不通乃虛秘也不可謂用不  
劑反加閉澀宜潤燥湯主之

人參

甘州

各五分

歸身稍

生地

枳壳

各一分

火麻子

去壳槌碎

二

桃泥

五分

枳殼

五分

先將上六味煎後入桃泥末又枳殼汁

大服

更用蘇麻粥 真蘇子一合 火麻子三合共搗爛以水一盞

搗汁又搗取汁渣盡為度用汁和梗米煮粥食之甚妙老人虛

秘尤宜常服

口產后小便不通或短少

問云 若何口勝脫者州都之官津液藏焉氣化則能出矣產

後氣虛不能運化流通津液故使小便不通雖通而亦短少也

勿作淋秘輕用滲利之藥其氣益虛病益甚宜加味四君子湯

五之

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 麥冬 車前子 桂心

薑三片水煎食前服

又有惡露不來敗血停滯閉塞水瀆小便不通其症小腹痛滿  
刺痛乍寒乍熱煩悶不安加味五苓散主之

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 桂 各一 桃仁 紅花 各二

一水煎

○產后淋

云者何日此亦血去陰虛生內熱症也蓋腎為至陰主行

水道去血過多真陰虧損一水不足二火更甚故生內熱小

歲淋而澀痛也加味導赤散主之

生地 赤芍 木通去皮 甘草稍 麥冬 黃蘗 知母 桂

心各一 燈心四十 水煎調益元散服

問前言小便不通后言淋悶二症何別曰不通者屬氣虛不通淋屬內熱澀痛以此別之



尚有所缺製法湯引亦未講明余特為詳述之列方於左

西生丹

錦紋大黃

三斤 蘇木

三兩 爛打碎用

何水

大黑豆

三升

浸取

不用將浸酒乾其汁留用 紅花

三兩

五

去卷存引聽用

米醋

九斤 陳者佳

將大黃末一筋入淨鍋下水醋三筋文火熬之以長末第

不住手攪之成膏再加醋三筋熬之又加醋三筋次第加

畢然後下黑豆汁三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁務

成大黃膏取八瓦盆盛之大黃鍋把亦燒下入後藥同煎

八  
川芎一斤 香附一斤 玄明粉一斤 蘇合香一斤

熟地一斤 蒲黃一斤 茯苓一斤 桃仁一斤 川牛膝五錢 甘草一斤

地榆五斤 羌活五斤 廣橘紅五斤 白芍藥五錢 木瓜三斤 青皮三斤

三錢 白木三斤 烏藥二斤 且一斤 麥四錢 木香四斤 乳香二斤

沒藥仁二斤 益母草二斤 馬鞭草五斤 秋葵子三斤 熟地一斤 稜五斤

五靈脂五斤 山茱萸肉五斤 未人石白內下 大黃膏

右三十味并前黑豆殼其晒乾為末入石白內下大黃膏

拌勻再下煉熟蜜一筋其搗干并取起為丸每斤重二錢

七八分靜室陰乾須二十餘日不可日晒不可火烘乾後

備人土



只重二錢有累寧蠟護之所謂蠟丸也用時去蠟殼調服  
其湯又各有所宜開列於左

盛產用參湯服一丸則分娩全不費方如無參用淡淡炒  
湯論曰凡胎已成子食母血足月血成塊謂之兒腕將產兒  
枕先破血裏其子故難產服此丹逐去敗血須臾自生橫生  
逆產同治 亦有因氣血虛損難治者宜多服人參

子以腹中因產母染毒病所致用車前子一錢煎湯調服一  
丸或二丸至三丸無不下者皆因血下次早服一丸用人參車  
前子各一錢煎湯服如無參用陳酒少許煎車前湯

胎衣不下用炒鹽少

勿調服一丸或二三丸即愈

產後血暈用薄荷湯

一丸即醒

已上四條乃臨產緊

頭一卅卽有名醫措手不及起死

回生此冊必須預備

一產後三日血氣未定

選走五臟奔流於肝血暈起止不得眠

凡黑花以滾水調服

此冊即愈

一產後七日氣血未定

因食物與血結聚胸中口乾心悶煩渴

滾水下此冊愈

一產後虛羸血入於心

肺熱入於脾胃寒熱似瘧實非瘧也滾

水脈此冊愈

一產後敗血走淫五臟

轉滿四肢停蓄化為浮腫渴而渴發依

寒乃血腫非水腫也

服此冊愈

一產後敗血熱極中心

煩躁言語癡狂非風邪也滾水服此冊

愈

一產後敗血流入心孔

閉塞失音用甘菊花三分桔梗三分煎

湯調服

一產未滿月懷食酸寒

堅便之物與物相搏流入大腸不行

化此煎服血用山查

煎湯調服

生產時百節開張血八經絡停留日人上延展酸爽非滯滯

用蘇椶三三分煎湯調服此丹愈

產後月事飲食不得應時兼致怒氣餘血流入小腸附塞水

道小便澀結弱血似鴉肝用木通四分煎湯調服此丹又或

流入大腸開却肛門大便澀難有瘀而成塊如雞肝者用積

皮三分煎湯調服此丹

一產後惡露未淨飲食不進不得調和以致痛滿形如唇色漸

熱煩悶背膊拘急用白朮三分麩皮三分煎湯兼用調服

一產後敗血入五臟六腑并走肌膚四肢面黃口乾鼻中流血

偏身斑點危症也陳酒化服此丹可愈

一產後小便澀大便閉下寒乍熱如醉如癡滾水調服此丹

已上十三條皆產後敗血為害也故此丹最有奇功至產後

一切異症醫所不識人所本經但服此丹無不立安一九未

慮二九三九必効無疑

胎前常服此丹壯氣養胎滋陰順產調和臟腑平理陰陽更

為神妙室女經閉月水不調參疾並効