

醫國學三字經

分陳醫酒錄五種

069432

4.207

000300

A8.8.058



卷一

源流

中風

虛癆

欬嗽

瘧疾

痢疾

心痛

腸痛

胸痺

隔食

反胃

氣喘

血證

水腫

脹滿

卷二

蠱脹

暑證

泄瀉

眩暈

嘔吐

癩

狂

癩

五淋

癃閉

渴病

遺精

疝氣

痰飲

消渴

傷寒

瘟疫

婦人

小兒

卷三

藥方

藥方

陰陽

識一字便可為師說

臟腑官十二

心說

肝說

脾說

肺說

腎說

胃說

膽說

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經欲其便誦也識途也學醫之始未定先授何書如大海茫茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也前曾託名葉天士取時俗所推崇者以投時好然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之技可廢謝退谷於註韓書室得繕本惠書千餘言屬歸本名幸有同志今付梓而從其說而仍名經而不以為僭者採集經文還之先聖海內諸君子可因此一字而共知所遵且可因一字而不病余之作

嘉慶九年歲次甲子人日陳念祖自題於南雅堂

閩吳航陳念祖修園著

成都龍萬育變堂訂梓男元犀道照靈石同校

醫學源流第一

醫之始 本岐黃黃帝也岐伯也君臣問答以前而神經絡藏府運氣仍始於內經也

靈樞作 素問詳靈樞九卷素問九卷通謂之內經即業儒之五經也黃

難經出 更洋洋經不合者其時去古未遠別有考據也秦越人號扁鵲戰國人也著難經內

越漢季 有南陽張機字仲景居南陽官長沙漢人六經辨 聖道彰 內經詳於針灸至伊尹有湯液治病之法扁

為治具方俱原本於神農黃帝相傳之經方而集其大成 傷寒著 金匱藏 王肯堂謂傷寒論義理如神龍出沒首尾相

也具方非此方所能治此病非此藥不能成此方所謂經方是也其藥悉本於神農本經非此方所能治此病非此藥不能成此方所謂經方是也其藥悉本於神農

垂方法 立津梁 仲而求道醫者豈能外仲師之書以治療

李唐後 有千金 唐孫思邈華原人隱居太白山著千金翼方各三十卷宋仁宗命高保衡林億校正後列

外臺繼 重醫林 唐王焘著外臺秘要四十九卷較金匱雖有淨泛偏僻之處而用意之奇用藥之巧亦自成一

後作者 漸浸淫 等而下之不足 紅紫色 鄭衛音 靡音忘倦

迨東垣 重脾胃 金李果字明之號東垣老人生於世宗大定二十年金亡入元十七年乃終年七十二

溫燥行 升清氣 羌活獨活木香陳皮葛根之類量喜用之

雖未醇 亦足貴 雜之謂東垣不可藥如韓信將兵多益善然敬

若河間 專主火 金史劉完素字守真河間人始自河間

遵之經 斷自我 原病式升明九條俱太過曰赫曦火之不及曰伏明其虛實之辨若冰炭之反也

一二方 奇而妥 類皆奇而不離於正也 丹溪出 罕與傳 元朱震亨字彥修號丹溪金華

陰宜補 陽勿浮 以丹溪心法以補陰為主謂陽常有餘陰常不足諸家俱辨其非

雜病法 四字求 血謂氣血痰鬱是也一切雜病只以此四字求之氣血皆其化生也

若子和 主攻破 張子之類 意在驅邪 多則正安 不可畏攻 而養病

中病良 勿太過 止若太過 則元氣隨邪 氣散挽無及矣

四大家 聲名噪 劉河間張子和李東垣朱丹溪為金

必讀書 錯名號 李士材醫宗必讀 四大家論 以張為張仲景

明以後 須酌量 言醫書充棟 汗牛可著 皆善本也 詳而備 王肯堂 雖無所採擇 亦醫林之備考也

薛氏按 說騎牆 明薛己號立齋 吳縣人 著薛氏醫按 十六種大抵以四

士材說 守其常 李中梓號士材 國朝人也 著醫宗必讀 士材

景岳出 著新方 明張介賓字會卿 景岳 陰人 著類經 曾疑錄 全書所用之方 不外新方 八陣其實不足 以名

附祛寒 苓連除熱 隨粘幾味 皆可名 方何必定 為某方乎

獻可論 合二張 明命門與張石頑 張景岳之法 相同 旨董

診脈法 瀕湖昂 明李時珍字東璧 瀕湖 著本草綱目 五十二卷 雜收諸

數子者 各一長 擇知其所長 揆諸古 亦荒唐 景理不本於內經 法未易矩矱

長沙室 尚傍徨 堂有人而私室者 少矣 惟韻伯 能憲章 翼大有功 於仲景而內經之人 崇禎中以

徐尤著 本喻昌 徐彬號愚庵 高士 計所註內經 本草經 傷寒論 金匱等書 各出手眼 以發前人 所未發 為漢後

大作者 推錢塘 張志聰號隱庵 高士 計所註內經 本草經 傷寒論 金匱等書 各出手眼 以發前人 所未發 為漢後

第一書 今醫畏其 難而不敢談及 齊鑑馮氏錦囊 景岳全書 薛氏醫按 等書 為捷徑也 今之醫輩 於

中風第二

人百病 首中風 內經云 風為百病之長也 昔醫云 中風則口眼喎斜 中風則半身不遂

驟然得 八方通 中風者 謂然昏倒 不省人事 或痰湧掣搦 偏枯等

宜疏通為先寒風急
見脫證宜溫補為急
命湯是也或開其裏如三化湯是也或
開其壅滯之痰如希延散一兩加人參一兩
則為標本並治之法正虛邪盛必遵此法

若舍風 非其治 舍風而別治也
火氣痰 三子備 故劉河間舉五志過極動火而卒中皆因引甚
朱丹溪源以東南氣溫多濕有病風者非病風也濕生痰痰生熱熱生風故主乎濕大法以二陳湯加蒼術白朮竹
之瀝薑汁

合而言 小家伎 虞天民云古人論中風言其證也三子論中風言其因
瘖喎斜 昏仆地 瘖者不能言也喎者口歪斜也或上視撒手遺尿鼻鼾汗出如油者不治

急救先 柔潤次 加柔潤六君子湯資壽解語湯甚妙
填竅方 宗金匱 外而新風不復入矣喻嘉言曰仲景取藥積腹中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以

虛癆病 從何起 夢遺吐血五心煩熱目眩耳鳴口爛鼻乾氣急食不知味羸瘦驚悸
七情傷 上損是 病發心脾有不得隱曲為女子損肺二損心三損胃過於胃則不可治其說本於內經五臟主藏精

歸脾湯 二陽旨 養神法六味丸為補精法高鼓峯並用之
下損由 房幃適 也謂傷其陰自下而無氣無氣則死矣按精生於五臟而統於元陽也元陽傷為困倦食少便溏腰膝痛

損至極而失守無氣 則下極而上矣 傷元陽 虧腎水 陽痿等證元陽也元陽傷為困倦食少便溏腰膝痛

吐血便血遺精等症 腎水虧 六味擬 歸脾丸亦妙推之為三才湯八仙長壽丸都氣丸左

王補心丹皆 元陽傷 八味使 為佳氏腎氣丸後補養元陽明薛立齋及趙養原

始用此溫補命穴時醫遂奉為溫補腎命之主方景岳右歸飲白朮湯

皆本諸此如火未大衰者以還少丹代之極虛者宜近效白朮湯

各醫書 伎止此 六苦味歸脾胃何嘗非流俗之套法耶

虛癆第三

是其風究竟竅空而新風不復入矣喻嘉言曰仲景取藥積腹中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以

是通真字所撰不知其姓名然則無名下士煽亂後人見聞非所謂一盲引眾盲耶

甘藥調 回生理 不能生血 針藥治者 調以甘藥 仲景因之 俞嘉言云 壽命之本 積精自剛 然補生於 穀而節其 勞則

積血漸高 大命不傾 五元血生 精而復其 真陰之不足 但用稼穡 作甘之本 味而酸辛 苦鹹在 所不用 蓋

舍此別無 良法也 按矣甘 草湯即此 湯化為潤 劑喻氏清 燥湯即此 湯化為涼 劑

薯蕷丸 風氣弭 虛勞諸 不足風氣 百疾 虛勞諸 不足風氣 百疾 勞傷內 有乾血 肌膚甲 錯

二神方 能起死 則足以 留新血 而灌漑 不足周 以賊正 氣而生 長不榮 以醫輩 能夢見 二此方 否

效嗽第四 氣上嗆 效嗽生 內經云 五臟六 腑皆令 人嗽不 止於肺 而亦不 離於肺 也諸氣

肺最重 胃非輕 而內轉 耗諸臟 只是留 精於胃 中隨熱 氣而化 為痰隨 肺寒氣 而化為 痰胃中 既為痰 飲所帶 則輸肺

為諸咳亦 必不清而 之則嗆而 咳矣肺亦 得只受 臟腑之 清氣受 不得臟 腑之病 氣使病 氣干

風寒入 外撞鳴 於肺云 微寒微 嗽可見 後註雖 言多因 於風寒 也風從 皮毛而 入於肺 寒從背 俞而入

癆損積 內撞鳴 癆傷於 肺咳嗽 失音是 內也後 註雖言 多因於 風寒也 風從毛 皮而行 亦必入 於肺寒 從背俞 而入

誰治內 虛癆程 宜於虛 癆門擇 其對證 之方審 是房勞 兼鬱火 小柴清 大棗生 姜加乾 姜五味 治之

挾水氣 小龍平 肺柯韻 伯除痰 定喘不 攘外安 內各盡 其妙蓋 以肺中 有沉寒 痛冷非 效方中 驅風散 寒解肌 逐水利

安能奏 效也 兼鬱火 小柴清 大棗生 姜加乾 姜五味 治之 不肯輕 去即面 熱

薑細味 一齊烹 如醉加 大黃以 清胃熱 及加石 膏杏仁 之類總 不去此 三味學 者可不 深思其 故也徐 忠可金 匱

有辨論 長沙法 細而精 治法宜 熟讀之 嗽

瘧疾第五

瘧疾第五

瘧疾第五

瘧疾第五

寒與熱 若迴翔期寒熱必應 日一發 亦無傷邪深則一日一作

三日作 勢猖狂 三陰流連難愈 治之法 小柴方 參以胡為去之主加青皮一忌人

熱偏盛 加清涼 膏黃連之類宜用粉石 寒偏重 加桂薑 者乾薑桂甚

邪氣盛 去參良 二錢服後食熱粥溫覆取微汗 常山入 力倍強 用常山以截之不知常山非俗云邪未淨不驅

單熱瘴 白虎詳 虎單熱無寒名曰瘴瘴或先熱後寒名曰熱瘴俱宜以白 大虛者 獨參湯 五更久極效貧者以白木一兩生薑五錢水煎

法外法 辨微茫 外以法不可不辨而治之 消陰翳 制陽光 寒之不熱是無火也益火之原以制陽光

太僕註 慎勿忘 味丸益火之原六味丸壯水之主久瘧多以此法收功以

痢證第六 濕熱傷 赤白痢 欲便不膿血穢濁或白或赤或白相半 白痢墜 為白痢也濕勝於熱則傷胃之氣血而

熱勝濕 赤痢清 勝於濕則傷胃之血分而為赤痢濕勝熱 熱勝餌 為藥湯調氣行血雖為初

調行歲 須切記 行血則膿血自愈調氣則後重自 芍藥湯 熱勝餌 為藥湯調氣行血雖為初

平胃加 寒濕試 猪苓木香治之久而不愈送下香連丸 痢門方 皆所忌 凡痢證初起即發熱非肌表有邪即經絡不

熱不休 死不治 熱不書休者不治 痢門方 皆所忌 凡痢證初起即發熱非肌表有邪即經絡不

以為熱開手即用痢門 套方多有陷入變劇者 桂葛投 鼓邪出 若頭痛發熱惡寒有汗宜用桂枝湯法無汗也

宜用葛根湯法鼓邪 外疏通 內暢遂 此二句是解痢所以發汗之故也張飛疇云當

湯葛根黃連黃芩甘草湯口 嘉言書 獨得秘 喻嘉言醫門法

寓意存 補金匱 喻嘉言寓意草中如麻黃附子細辛湯及 外疏通 內暢遂 此二句是解痢所以發汗之故也張飛疇云當

心腹痛胸痺第七 心胃疼 有九種 絡及胃腕痛也今所云心痛者皆心胞

心胃疼 有九種 絡及胃腕痛也今所云心痛者皆心胞

心胃疼 有九種 絡及胃腕痛也今所云心痛者皆心胞

心胃疼 有九種 絡及胃腕痛也今所云心痛者皆心胞

辨虛實 明輕重 虛者喜按得食則止脈無力二證各有輕重

痛不通 氣血壅 血壅則不通氣

上逆者使之下行中結者使之旁達亦通也虛者助之使通

寒者溫者使通無非運之之法也若必以下洩為通則妄矣

一蟲痛 烏梅圓 愈痛時痛時止唇舌上有白點得食

二注痛 蘇合研 小兩山林古廟及見非常之物脈乍大乍

三氣痛 香蘇專 七因大怒及七情之用氣痛宜香蘇飲三錢水煎服

四血痛 失笑先 瀉瘀血便痛如刀割或有積塊脈五悸痛 妙香詮 悸痛即虛痛也痛有作止喜按得食稍止之

六食痛 平胃煎 之食積而痛再加葛根三錢砂仁一條然新傷吐之平胃散加山查穀芽主

七飲痛 二陳咽 加停飲白濁瀉時吐之甚者十棗湯之水聲亦可暫服

八冷痛 理中全 子冷肉桂主之兼細口中和宜理中湯加附

九熱痛 金鈴痊 錢熱痛身熱脈數口熱宜金鈴子元胡索各二兩研末薑酒送下二

腹中痛 照諸篇 厥陰之交地宜少陰之然其大意與上相同

金匱法 可回天 皆死證略生之法 諸方論 要拳拳 而中下利者虛也吐瀉而痛太陰證也宜理中

湯雷鳴 切痛嘔吐者寒氣也宜附子梗米湯此以下利而和其虛也腹滿痛發熱痛連脇下脈緊弦者宜大黃附

宜厚朴 三物湯 攻其裏閉痛而兼發熱者宜厚朴七物湯兼通表裏閉痛發熱痛連脇下脈緊弦者宜大黃附

子湯温 峻不並行 此以便閉而生薑羊肉湯之妙更不可不講也

又胸痹 非偶然 胸膈之上人身之太空也 薤白酒 妙轉旋 括萹薤白桂枝湯之類皆轉旋妙用

虛寒者 建中填 故心胸大寒痛上焦不能飲食飴糖以建立中氣而又加椒性之下行降逆上之氣復下焦之陽為所補

藥主

隔食反胃第八

隔食病 津液乾 食物不隔者以病在膈上也是也又名隔者以 左歸餐 趙養法 用六刺 加味 湯主之 高鼓 峯仿 趙養

左歸飲去茯苓加當歸生地以左歸飲中有甘草引之為入陽明也

胃陰展 貴門寬 如青如脂登積胃底即胃陰也久隔之入胃陰亡矣高鼓門滋潤則二使不開而隔證愈矣

啟膈飲 理一般 之啟膈飲亦是和胃養陰之意但此方泄肺氣

推至理 衝脈干 得降者皆衝脈上行逆氣所作也 加蜜安 逆即白蜜潤陽明之仲景加人夏降脈之

津液用甘瀾水以降逆上之用水 金匱秘 仔細看 為戒毀明聖之說倡自何人君子惡之

若反胃 實可嘆 反出名為反胃 朝暮吐 分別看 隔食證宜分辨而藥之

之火化 屬虛寒 是無火也此證屬中焦有火也食入反出 吳萸飲 獨附子 湯妙在吳萸鎮厥陰配入四甘溫令震坤合德土木不害生附子湯以百沸湯俟溫浸去鹽日換

製之大抵一斤附子配一斤薑汁以薑汁 六君類 俱神丹 附子理中湯加薑附及

氣喘第九 喘促證 治分門 氣急而上奔宜 元甘所以緩之常服調養之劑非急救之劑也今醫遇

陰靈盛 龍雷奔 和喘證多屬飲病逆為陰邪非離照當空羣陰馬能退避若以地黃之類附

實喘者 痰飲援 為喘之證則實者風寒不喘證有痰飲而 葶藶飲 十棗湯 肺氣實而氣路閉塞為喘者以葶藶大棗瀉

以十棗湯主之 虛喘者 補而溫 為喘者有以不能接續脈虛細無力溫補二字宜串看有以溫

桂苓類 腎氣論 之桂景云氣短有微飲者宜從小便去 青龍輩 撤其藩 內外合邪以兩撤之

平衝逆 泄奔騰 動衝氣久則逆宜小半夏加茯苓桂枝甘草大棗湯以安之

真武劑 治其源 真武湯為治喘之源也 金水母 主諸坤 肺屬金而主上腎屬水而主下

而位乎天水之中者坤土也况乎土為金 六君子 妙難言 六君子湯加杏仁面熱如醉加北細辛為治喘神劑

母金為水母危篤之證必以脾胃為主 他標劑 忘本根 如蘇子降丹鎮納元氣為喘證必用此法時醫聞

者始知子言之不謬也

者始知子言之不謬也

者始知子言之不謬也

是害人之物

血證第十

血之道 化中焦 經曰中焦受氣取汁

溫肌腠 外道遙 血而充肌腠散於脉

宜表散 麻芍條 法外傷宜表散東垣補治一人內蘊虛熱外感大寒而吐血

七情病 溢如潮 則火動者喜怒則血隨火而溢然五志受傷既久則火為虛火宜以甘溫之法治之

引導法 草薑調 歸脾之說謂引血歸脾即是歸經試問脾有多能容離經之血成斗成盆盡返而歸於內而不

裂破乎市醫固無論矣而以名醫自用此方血得煖則循行必用此法出仁齋直指

涼瀉法

令瘀銷

大勢盛脈洪有力寒涼之劑原不可廢但令

寒以瀉之致留瘀不散治以咳喘虛廢之基金匱瀉心湯大黃一倍於苓連為

赤豆散 下血標 真前下血為近血金

若黃土

實翹翹

真後下血為速血

一切血 此方饒 黃土湯不獨真後以此方煖中宮土臟又以寒熱之品互佐之步步合法也

五臟有血六腑無血觀剖諸獸腹心下夾脊包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六腑無血近時以吐血

多者謂為吐胃血皆耳食昔醫之誤凡吐五臟血必死若吐血衄血下血皆是經絡散行之血也

水腫第十一

水腫病 有陰陽 腫皮膚腫大初起目下有形如卧蠶後漸及於一身按之即起為水腫按之盲而不起為氣腫景

別為分

便短縮 陽水傷 屬熱為陽水

五皮飲

元化方

以皮治皮不傷中氣

陽水盛 加通防 已赤小豆之類

陰水盛

加桂薑

肉桂附子之類

知膏腫 蘿枳商 腫病驟起其脈實者加蘿藦子枳實之類

兼喘促

真武湯

腫甚小便不利氣喘尺脈虛者宜真武湯

知虛腫 參朮良 老弱病久腫漸成脈虛

兼喘促

真武湯

腫甚小便不利氣喘尺脈虛者宜真武湯

十餘劑而不知其補助陰氣反益其熱不可輕服也

從俗好 別低昂 不踰先法之矩 亦可從俗而 五水辨 金匱詳其邪已入感而成者不在表而在裏者名皮水

病有不因於風 由三陰結而成 水者名正水 病有陰邪多而沉於下者名石水 病有因風因水傷

補天手 十二方 越婢湯防己茯苓湯越婢加黃耆湯桂枝甘薑棗麻辛附子湯枳實湯附方外臺防己黃耆湯

肩斯道 勿炎涼 羣言散異衷於聖以斯道為已

醫學三字經卷二

脹滿盡脹第十二 水腫

脹為病 辨虛實 脹者脹之於內也 虛脹誤 氣驟滯 七氣疏 疏通滯氣

滿拒按 七物祛 小腹滿拒按宜全 實厚朴七物湯 實厚朴七物湯 實厚朴七物湯

脹閉痛 三物鋤 中腹滿而痛若大便實者宜金匱厚朴七物湯行氣

若虛脹 且躄躄 勿輕細下藥 中央健 四旁如 運四旁千古格言

參竺典 大地輿 持大地無餘於此 悟到治脹之源 輪頭單腹脹 實難除 腹大如鼓而

山風卦 指南車 周易卦象 易中旨 費居諸 剛上柔下上情高亢而不下 接下情退縮而

不上交兩情不相通也 卦德下巽上止 在下巡畏縮而無故為之心在上因循止息而無必為之志 庶事日以

不日言治三日終則有始 天行以濟之 註當壘壞之日 有人以治之 以至於元亨而天下治也 利涉大川 主有事也 先甲三

言治三日終則有始 天行以濟之 註當壘壞之日 有人以治之 以至於元亨而天下治也 利涉大川 主有事也 先甲三

言治三日終則有始 天行以濟之 註當壘壞之日 有人以治之 以至於元亨而天下治也 利涉大川 主有事也 先甲三

暑證第十三

傷暑病 動靜商 靜者說本東垣 動而得 熱為殃 面垢體倦口渴脈洪而弱

六一散 白虎湯 暑傷元氣也 加蒼朮者治身熱足冷以暑必挾濕也

靜而得 起貪涼 貪涼於受陰暑之氣 惡寒象 熱逾常 惡寒與傷寒倍盛

上海醫學書局印

心煩辨 切莫忘 且雖同傷寒而心煩以別之

香薷飲 有專長 月不可用香薷則香薷將用於何時也

大順散 從證方 治暑也此舍時從證之方非

生脉散 久服康 此非治月常服也

東垣法 防氣傷 暑傷元氣益氣湯頗超

雜說起 道弗彰 以上皆諸家之臆說而先聖之道反為之

若精蘊 祖仲師 仲景傷寒論全要暑症

太陽病 旨在茲 俱認謂大陽中不可不熟記之以資顧問

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

經脈辨 標本歧 師云太陽中陽通體之發熱

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

臨證辨 法外思 愚按借用麻杏石甘湯治中暑

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

陰利濕 俱從小 便而出此法外

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

師有白 虎加人 參之法如陰臟多濕暑即伏於

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

冷有水 行皮膚 所致指暑病以濕為病治以一物

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

濕瀉第 十四 成書五世

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

濕氣勝 五瀉成 成書五世

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

濕而熱 連苓程 熱甚去桂枝加乾葛

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

濕挾積 麴查迎 麴查積加山查根

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

脾腎瀉 近天明 五鼓以信後瀉者腎虛也瀉有定時者

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

四神服 勿紛更 四神丸加白朮人參乾薑附子茯苓

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

臟腸說 得其情 精義張石頑頗得其解

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

眩暈第 十五 內經云諸風掉

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

風火動 兩動搏 兩風與火皆屬陽而主動

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

虛痰火 各分觀 中景主痰飲虛則頭重高推說謂無痰不眩轉耳鳴諸說不同如此

暑皆為 外邪中 於陽而陰證總之邪中之熱

究其指 總一般病則其聚液而成故仲景以痰飲立論而痰火立論也究之腎為肝木腎主藏精精虛則腦

空腦空則旋轉而耳鳴言實者言其病象其實一以貫之也

痰火亢 大黃安 寸脈滑按之益堅者為末茶調下二錢

上虛甚 鹿茸餐 兩酒煎去滓入麝香少許服或用補中益氣湯及香木膏之類相從且入督脈而通於腦每用半

使可為 欲下取 求其端 必灌其根古人有上病下取法其上

左歸飲 正元丹 細辛甚效正元丹亦妙

嘔噦吐第十六 附 逆 嘔吐噦 皆屬胃 食並出也噦者口中出而無食也嘔字從土土者食也口中乾嘔也噦而無水也噦者氣衝有聲聲短

而類也其病 皆屬於胃 二陳加 時醫貴 香砂仁熱如黃連鮮竹茹石斛之類

玉函經 難彷彿 寒熱攻補 小柴胡 少陽謂 寒熱往來而嘔

吳茱萸 平酸味 煩燥欲死又治乾嘔吐涎沫者又治少陰證吐利手足逆冷

食已吐 胃熱沸 復入兩熱相衝不得停留 黃草湯 下其氣 可下之又云食已即吐者大黃甘草湯下之

何也曰病在上而欲吐不宜因越之若逆之使下則必 黃連湯 為經緯 喻嘉言用進退黃連湯柯韻伯用乾姜黃連

食不入 火堪畏 得入是火也 若呃逆 伐楮朮 為胃氣將絕用人參一兩乾薑附子各三錢

湯為 經緯 丁香柿蒂各一錢 可救十中之一錢

癲狂癩第十七 靜陰象 動陽宣 癲者笑哭無時言語無序其人常

重陽狂 重陰癲 狂內經云重陽者 癲者笑哭無時言語無序其人常

狂多實 痰宜蠲 蠲除頑痰滾痰丸加烏梅砂治 石補天 磁石內經拾遺用溫膽湯

忽搐搦 癩病然 忽手足抽掣倒無名曰癩 五畜狀 吐痰涎 牛吼腎如猪叫每發必口角流涎如

有生有 歷歲年 由來之新病也內經拾遺用溫膽湯柯韻伯用磁珠丸

醫學三字 癲狂癩第十七

癲狂癩第十七

火氣亢 蘆薈平 劑以氣亢必以大苦大寒之

痰積錮 丹礬穿 丹礬丸能穿入心胞絡導其痰涎從

三證本 厥陰愆 逆則諸氣皆逆氣逆則火發火發則風生風生則挾木勢而害土土病則聚液而成痰痰成必歸

體用變 標本遷 其體熱 其本陰 或收或散或逆或

以上諸證

伏所主 所因先 伏其所主

收散互 逆從連 從隨所利而行之

和中氣 妙轉旋 調其氣使之和平 自伏所主至此其小註俱內經本文轉旋言心手靈活

悟到此 治立痊 證雖無可治而任之不

五淋癃閉赤白濁遺精第十八

五淋病 皆熱結 淋者小便痛澀淋瀝欲去不去欲

膏石勞 氣與血 而得氣下如沙石膏淋下如膏脂勞淋從勞力

蓄莖中 割痛

五淋湯 是秘訣 研末膏淋合草薈分清飲氣淋加荊芥香附

生麥芽不愈再加升麻或用吐法勞淋合補中益

敗精淋 加味啜 過服金石藥與老人陽已痿思色以降其精

氣湯血淋加牛膝鬱金桃仁入麝香少許溫服

外冷淋 腎氣咽 飲熱湯宜加味腎氣丸其證外惡湯咽下

點滴無 名癃閉 小便短縮不通與

氣道調 江河決 若決江河化氣之藥或吞滋腎丸多效孟子云

多也

上竅通 下竅泄 也去其水之閉而水自通宜服補中益氣湯再

服以手 探吐

外竅開 水源鑿 通陽氣於外陰之即下肺其內竅補中益氣湯再

以降氣下達州都導水必自高原之義也以前飲加此二味甚效夏月不飲用麻黃以

濁又殊 竅道別 濁出精竅 濁出精竅 濁出精竅

分利多 醫便錯 閉愈利愈

腎套談 理脾恪 濕熱下注則小水渾濁濕勝於熱則為白濁

前飲投 精愈涸 腎愈虛矣

分清飲 佐黃栢 加黃栢苦以燥濕寒以除熱

熱勝於濕則為赤濁 濕熱去則濁者清矣

心腎方 隨補綴 加味湯丸加龍牡腎藥也四君子湯

若遺精 另有說 與蜀病 有夢遺 龍膽折 有夢而遺相火旺也余每以龍膽瀉肝湯送

注於內魂不明陽氣發動之時可以悟矣妙香散甚佳

無夢遺 十全設 加無龍骨而遺是氣虛不能攝精宜十全大補湯

坎離交 亦不切 子時醫遇此證未中病情皆不切之套方也

疝氣第十九

疝任病 歸厥陰 經云任脈為病外結七疝女子帶下痲聚

寒筋水 氣血尋 寒疝水疝筋疝 狐出入 癩頑麻 癩疝大如升斗頑麻不出腹

崑治氣 景岳箴 熱氣濕有濕而曰氣者病在氣也寒有寒氣熱有

五苓散 加減斟 別錄以此方通治諸疝 茴香料 著醫林 年三層茴香丸治久疝雖三十

痛不已 須洗淋 兩陰腫核中痛千金翼用雄黃一兩礬石二

痰飲第二十

痰飲源 水氣作 成飲然水逆得於陽煎熱則稠而成痰得陰凝聚則稀而

燥濕分 治痰略 參方書支離不可聽只或以燥濕為辨燥痰宜潤肺痰宜溫脾握要之法也宜

四飲名 宜斟酌 下金匱云其引痛謂之懸飲走腸間之飲飲流即歸於四肢當汗出而不飲後水流出身體疼

參五臟 細量度 金匱曰水在飲心邪下堅築短氣惡水不欲飲水在肺而飲吐涎沫欲飲水不及胸者肺屬陽在腑則行矣

十六方 各鑿鑿 澤瀉湯 厚朴大黃湯 葶藶大棗瀉肺湯 小半夏湯 已椒苳湯 小半夏湯 防己湯 木防己湯 五苓散 附子湯

飲茯苓 補而受制於脾欲水由地中行而歸其壅者非用溫藥以化氣不可也欲水之類皆溫藥也即如十棗湯之十枚大棗甘遂半夏湯

以補脾不可也 於攻下之法不過一時之權宜而始終不可離溫之旨也

陰靈除 陽光灼 散餘陰邪必使離照當空而羣陰方能退

滋潤流 醫時錯 逆方中若飲邪滲天莫救矣即腎氣丸亦宜慎用

至於攻下之法不過一時之權宜而始終不可離溫之旨也

以補脾不可也 於攻下之法不過一時之權宜而始終不可離溫之旨也

滋潤流 醫時錯 逆方中若飲邪滲天莫救矣即腎氣丸亦宜慎用

真武湯 水歸壑 行之中 以茯苓之苦 以導之 得附子 本經之 藥領之 以歸其 壑

消渴第二十一

消渴證 津液乾 口渴不止 為上消 治以人參 白虎湯 食入即 飢為中 消治以 調胃承 氣湯 飲一

七味飲 一服安 味趙養 葵云治 消證無 分上中 下但見 大渴而 燥須六 味丸料 一斤肉 桂一兩 五

金匱法 別三般 氣能食 而渴者 重在水 直下趨 腎以手 太虛不 能蒸動 則水不 陽上濟 也

論消渴 開胃即 揭此旨 以補內 經之未 及不必 疑其錯 簡也

二陽病 治多端 勞傷榮 衛漸鬱 而為熱 者交甘 草湯可 用喻嘉 言清燥 陽即此 湯變甘 寒而為 甘平之 用也

當歸本 草人參 可用妙 在滋液 之中以 濟渴只 緣胃中 堅燥全 不受水 如以浸 潤轉從 火熱之 勢急走 膀胱故 小便數

愈此論 本俞嘉 言最精 消之氣 一洩中 無火化 可知腎 氣逆上 之故用 腎丸

事矣故 此丸為 厥陰證 之總劑 收之以 還其曲 直外作 酸之本 惟則率 性而行 無所

變通妙 燥熱飧 肺惡寒 不能試 觀世瀉 瀉者必 渴此因 水精不 能上輸 而為下 泄故爾 以知燥 脾之藥 治之而 不液上 升即不

傷寒病 極變遷 之變也 一身之 表或三 陽或三 陰或凡 病自外 來者皆 謂傷寒 非寒熱 異

傷寒瘟 疫第二十二

傷寒病 有真傳 表裏之 界所謂 陽樞也 編中備 發汗諸 法陽明 燥金其 純陰而 主寒編 中備攻 裏溫諸 法少陰 君火標

六經法 本寒熱 不同所 謂陰樞 也編中 備發汗 諸法陽 明燥金 其純陰 而主寒 編中備 攻裏溫 諸法少 陰君火 標

頭項痛 太陽編 發熱惡 寒主表 而太陽 為宜桂 枝湯無 汗承氣 湯法若 無頭痛 惡寒但 鼻乾目 赤自汗 口渴為 病若惡 寒

胃家實 陽明編 頭痛為 表中之 裏主裏 實證宜 承氣湯 法若無 頭痛惡 寒但鼻 乾目赤 自汗口 渴為病 若惡寒

陽家實 陽明編 頭痛為 表中之 裏主裏 實證宜 承氣湯 法若無 頭痛惡 寒但鼻 乾目赤 自汗口 渴為病 若惡寒

陽家實 陽明編 頭痛為 表中之 裏主裏 實證宜 承氣湯 法若無 頭痛惡 寒但鼻 乾目赤 自汗口 渴為病 若惡寒

湯苦寒熱互搏於中嘔吐腹痛宜黃連湯逆於胃利又兼嘔宜半夏瀉心湯格食不入宜乾薑黃連人參湯若邪全入膽腑下攻於脾為自利宜黃芩湯上逆於胃利者多從熱化者少此經主寒證而宜溫理中湯四逆湯

吐利痛 太陰編 為太陰主第原本為純陰之叔和所亂耳論以腹中滿吐食自利不渴手足自溫腹時痛為提綱

但欲寐 少陰編 湯麻黃附子甘草湯及白通湯通脈四逆湯熱論以脈微細黃連雞子黃湯及大承氣湯附子細辛

吐衄渴 厥陰編 厥陰欲食陰則吐瀉下利不止為屬風木中逆有熱論以脈微細黃連雞子黃湯及大承氣湯附子細辛

發表法備之厥陰一切寒熱兼用法備之陽明一切陰此仲景傷寒論之六經一切宜重飲水者白頭翁湯主之凡一切宜

長沙論 歎高堅 鑽仰之彌高 存津液 是真詮 如存津液是全書宗旨善讀書者請於無字處

入毛皮不蓋之辛熱藥之甘壅從外治外不傷氣亦養液也承氣湯急下之使邪火灼陰養液也即麻黃湯直

於中焦取水穀之津而為汗毫傷陰更養液也推之理中湯五苓散麻黃附子甘草湯以甘草湯以甘草湯以甘草湯

汗吐下溫清懸 宜在表宜汗在胸膈宜吐在裏 補貴當 方而圓 虛則補之合上為六法曰方而

規矩廢 甚於今 今自王叔和而後論家何物規矩亦是非參半 圓者言一部傷寒論全是活法

二陳尚 九味尋 證人皆曰二陳湯為發汗平穩之劑而不知茯苓之滲半夏之澀皆能留邪生熱變成謔語不便等

寒虛不能內固 變苦寒遂漏不止陰變時脈沉喜用此方之流弊害人不淺也

香蘇外 平胃臨 消導蘇飲劑仲景從無燥藥發汗之法且外邪未去更無先攻其內法

汗源涸 耗真陰 甘草與不啜粥亦是保陰之芍藥汗源景岳誤認其旨每用汗源麻黃湯之少

邪傳變 病日深 過治之無不愈之證皆誤治所致也 實痛心 學利口以此病者少死於藥者多今行道人先

也吾知其 殃在子孫 醫醫法 腦後鍼 蕭前輩云醫人計耳救一醫便救千萬人救

千萬醫便救天下後世無量恆河沙數 若瘟疫 治相侷 成病則為瘟疫雖有從經絡入從口鼻入之

人耳余所以於醫者腦後痛下一針 通聖散 兩解求 溫病是遵內經人傷於寒則為熱病冬傷於

分而見證亦以六 經為據與傷寒同 承氣湯及太陰之茵陳蒿湯少陰之黃連阿膠湯猪苓湯厥陰之初時用麻杏石甘湯在經用白虎加

承氣湯及太陰之茵陳蒿湯少陰之黃連阿膠湯猪苓湯厥陰之初時用麻杏石甘湯在經用白虎加

吐黃涎者邪從口出鼻入用藿香正氣散為惡寒者邪從法惟防風通聖散毒散為匡正起未必內實而方中之

黃別有妙用無不咋舌而不知其有利無弊也

六法備 汗為尤 目為準 如七日無汗再候七日以汗之法中惟取汗為要以瘟疫得汗則生不得汗則死所以求其

汗也詳於時 方妙用中

司命者 勿逐流 醫為人之司命熟讀仲聖書而兼臨證

婦人經產雜病第二十三

婦人病 四物良 與男子同惟經前產後異耳濟陰綱目以此出入加減

月信準 體自康 故經水一月一經調則體自康

漸遲至 重桂薑 加乾薑有寒也宜加味四物湯

歸脾法 主二陽 得內經云二陽之病發心脾有不

種玉者 即此詳 他種子必調經以歸脾湯治其源

經閉塞 禁地黃 閉塞脈宜去地黃之需帶恐其護蓄血不行也加醋炒大黃四物湯為婦科所不禁而經閉及積瘀

孕三月 六君嘗 知仲師三月之內多有嘔吐不食名惡阻宜六君子湯俗疑半夏食之胎上藥

安胎法 寒熱高 木大抵胎氣不安虛寒者多庸醫以胎火二字惑人誤人無算

難產者 保生方 橫生倒養漿水太早交骨

血大下 補血湯 胎猶舟也血猶水也欲氣旺而推送有力加附子者取其性急加酒所以速者歸湯加附子三錢欲氣

散治漿水未行 胎衣阻 失笑匡 胎衣阻失笑散三錢醋下

產後病 生化將 則時醫相傳云生化湯加減治產後百病若非由於停瘀而誤用之

合諸說 俱平常 可以愈上相治之套法輕病

精而密 長沙室 金匱要略第二十卷義精而法密

以圖之法 桂枝湯 列第一 此湯調陰陽令入為解肌和榮衛內證得之為

長篇列為第一方以渴醒千百庸醫之夢亦即是法師云婦人得此平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名曰產後

達原飲 味其由 方創異說以欺人實未具病由也

漸早至 藥宜涼 如續斷地榆黃芩黃連之類

錯雜至 氣血傷 亂也宜前湯加人參白朮黃耆之類

兼鬱結 逍遙長 宜加味逍遙散也

川芎香附為凡

雖四物湯為婦科所不禁而經閉及積瘀

黃二錢桂枝一錢桃仁二錢服五六劑

疑半夏食之胎上藥

誤人無算

歸芍鄉 也宜加味歸湯

加味歸湯

歸芍鄉 也宜加味歸湯

失笑匡 胎衣阻失笑散三錢醋下

亦勿忘 高治時反為其所笑

丸散七 此湯調陰陽令入為解肌和榮衛內證得之為

列第一 此湯調陰陽令入為解肌和榮衛內證得之為

此湯調陰陽令入為解肌和榮衛內證得之為

扶上焦得上下本無病因胃氣子室有礙氣上焦之溢下氣充故但能禦相侵之陰氣足矣未嘗治病正所以治也

附半薑 功超軼 門時醫以半夏胎附子墜胎不用乾薑亦疑其熱而罕用之易長俗子不知補命

內十方 皆法律 桂枝湯治懷妊胎中痛乾薑人參半夏丸治吐不止當歸貝母苦參丸治胎小腹痛當歸

產後篇 有神術 共九 小柴胡 首特筆 為第一方即此是法 新產婦人有小柴胡湯

竹葉湯 風痙疾 有金匱云產後三字中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯加薑桂之類殺人之無算

陽旦湯 功與匹 湯即桂枝湯若數日之久惡寒證尚在則為寒風宜此湯二湯為一寒一熱之對子 師云產後風續數

羊肉湯 疔痛謚 痛者音絞腹急也為虛證 痛滿煩 求枳實 散二味不得臥裏實也宜枳實芍藥

著臍痛 下瘀吉 腹中有瘀血著於臍 痛而煩 裏熱室 非停痰專證也血因熱裏而不日行非煩燥語

雜病門 還熟讀 金匱為婦人雜病以經阻之始大概屬寒氣結則為弦寒甚則為緊以此為主而參之兼脈可也

二十方 效俱速 隨證詳 難悉錄 草有大有承氣湯金匱云病解能食七八日更發熱

惟溫經 帶下服 之說也溫經湯治婦人年五六十前陰下血暮發熱手掌煩熱腹痛口乾云云其功實不止此也

甘麥湯 臟燥服 靈所云婦人臟燥悲傷欲哭象如神 藥到咽 效可卜 讀本之諸醫因余用此數方奇效每錄於

道中人 須造福 小兒第二十四 小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

小兒病 多傷寒 汗筋脈牽動人事昏沉熱已極於本經誤藥即死無由見其傳經所以謂其無傷寒也俗云驚風

是皆

凡發熱

太陽觀

項強發熱惡寒等小兒發熱受邪其證頭痛

熱未已

變多端

其脊強背反也而頭搖手痛也而立抽掣之名造出種種不通名目謂為驚風而用攻痰鎮驚清熱之藥投

湯之立死

矣不知

太陽之脈起於目內眦則變為瘧症無汗用桂枝加葛根湯有汗用桂枝湯

陽明之治也

抑或寒熱

往來多嘔以桂枝湯治之

太陽外

仔細看

有耐得去而傳他經者亦有時見他經之證者宜耐細認之

遵法治

危而安

求之詳於傷寒論而

吐瀉甚

變風淫

吐瀉不止則土虛而木邪乘之左傳云風

慢脾說

即此尋

世謂慢脾風多死而不知即抽掣急之象

後冷汗

欲死

手足厥逆而吐瀉不止者宜用桂枝湯

中陰不

得時

宜黃連用阿膠湯

之熟傷

寒論者

自知

而提綱

不在此

也

厥陰為

三陰

即痘疹 此傳心 起時用桂枝湯

乎則造

孽無極

矣

說則留

自無一

切鬱熱諸證何用服連翹紫草牛旁生地犀角石膏苓連諸藥以成脫如之寒中變證乎及至報氣化則

後莫不

其漿滿

易於結痂而愈當求之太陰用理中湯等補中宮土氣以為連諸藥以成脫如之寒中變證乎及至報氣化則

山堂類

辨微露

其機於言外殆重其道而不敢輕淺歟疹證視痘證稍輕亦須知此古法高士宗醫學真傳有桂枝

湯加金銀

花紫草

法

稚陽體 邪易干

時醫以稗陽為純陽 生死關頭開手便錯

誰同志 度金鍼

附敷藥拔風害人說

金匱云人得風氣以生長此一語最精風即氣也人在風中而不見風猶魚在水中而不見水鼻息出入頃刻離風

流涎皆風動之象即風之乖也醫者宜化邪風為和風即所以除邪氣而匡正氣聞中市醫遇小兒諸病及驚癇危證以草麻子巴豆南星萊菔子全蝎大黃急性子皂角為末加糯米皮冰片麝香以香油或白蜜或薑葱汁調敷於顛門以及胸中臍中足心為拔風法秘其方以射利十數十死既死而仍不歸怨之者以為外敷之法不妨姑試俟未效而即去之似不為害而不知一敷之後元氣為其拔散即揭去其藥而既散之氣永不能使之復聚矣况顛門為元陽之會胸中為宗氣之宅臍中為性命之根足心為腎脈之本皆不可輕動昔人以附子海狗腎補藥敷於臍中而蒸之名醫猶且戒其勿用况大傷人之物乎凡以保赤為心者宜共攻此法而又有惑於急驚慢驚食積之說慣用羌活獨活防風秦艽前胡赤芍鈎藤鈎荊芥天麻厚朴神麩山查蒼朮膽星葶藶子羅麻子貝母牛黃硃砂天竺黃枳殼杏仁石菖蒲甘草或合為一方或分為二三方者亦五十步笑百步耳

醫學三字經卷三

中風方

小續命湯針中風總方

麻黃法根

人參

黃芩

川芎

白芍

炙草

杏仁

防己

桂枝

防風銘一

附子五分

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯入諸藥

煎八分服

古今錄驗續命湯

治中風風痺身體不能自收持口不言昏冒不知痛處或拘急不能轉側方出全續命方

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草銘三

川芎錢五分

杏仁剉五粒取三分之一

水三杯取一杯溫服當小汗薄覆脊憑几汗出則愈不汗更服無所禁

勿當風並治但伏不得卧效逆上氣面目浮腫

三化湯 治熱風中臍大便不通

大黃

羌活

枳殼銘二

水二杯煎八分服

稀涎散 治中風口噤並治單蛾雙蛾

巴豆六枚每枚兩片牙皂三錢

明礬一兩

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末每用三分吹喉中痰盛

者燈心湯下五分在喉即吐在膈即下

參附湯 元氣暴脫以此方急回其陽可救十中一二

人參一兩

附子五錢

水二杯半煎八分服 此湯治腎氣脫

以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫

換黃耆名耆附湯治衛氣脫 換當歸名歸附湯治榮氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭二錢

生南星三錢

生附子三錢

木香五分

生薑五片

水二杯煎七分

薛氏用

人參一兩煎湯半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中而經絡手足痲痺內而臟腑二便閉塞用此兩解之較之三化湯較妥亦為類中風

實火治法所用表藥火鬱發之之義也所用下藥釜下抽薪之義也

防風

荊芥

連翹

麻黃

薄荷

川芎

當歸

白芍

白朮

山梔

大黃

芒硝各五

黃芩

石膏

桔梗錢一

甘草二錢

滑石三錢

水三杯加生薑三片煎八分服

自利去硝黃

自汗去麻黃加

桂枝 涎嗽加半夏五味

地黃飲子 治類中風腎虛火不歸源舌強不能言足廢不能行

熟地

山茱肉

遠志

巴戟天

石斛

石菖蒲

五味子

肉蓯蓉洗

肉桂

麥冬

附子

茯苓錢一

加薄荷葉七葉水二杯煎八

分服此方法在輕煎不令諸藥之性盡出其性厚重以鎮諸逆其氣味輕清速走諸竅也

補中益氣湯 治勞役饑飽過度致傷元氣氣虛而風中之

此類中風氣中虛證更有七氣上逆亦名氣中宜越

鞠丸之類

白朮炒

當歸各一

炙甘草

陳皮各五

升麻

柴胡各三 加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯 痰飲通劑

陳皮五錢 半夏 茯苓各三 炙草一錢 加生薑三片水三杯煎七分服 加白朮一錢蒼

朮二錢竹瀝四湯匙生薑汁二湯匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦名濕中以濕生痰也 加枳實膽南星

竹茹名滌痰湯

加味六君子湯附見 治中風王道之劑

加麥冬三錢為君附子一錢為使再調入竹瀝五錢生薑汁二錢以行經絡之痰久服自愈

資壽解語湯論嘉 治中風脾緩舌強不語半身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此重在脾

防風 附子 天麻 棗仁各一 羚羊 肉桂各八 羌活

甘草各五 水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五分服 喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏生地

菊花天冬石菖蒲元參

侯氏黑散論金 治大風四肢煩重心中惡寒不足者 外臺治風癩

菊花兩四 白朮 防風各一 桔梗八錢 細辛 茯苓 牡蠣

人參 礬石 當歸 川芎 乾薑 桂枝各三 黃芩五錢

右十四味杵為散酒服方寸匕約有八分餘每 日二服溫酒調服忌一切魚肉大蒜宜常冷食六十日止熱即下矣

風引湯論金 除熱癰癩 治大人風引小兒驚癇瘈瘲日數十發

大黃 乾薑 龍骨各二 桂枝五兩 甘草 牡蠣各一 寒水石

赤石脂 滑石 紫石英 白石脂 石膏各三 右十二味研末粗篩以韋布盛之

取三指約六七 井花水一杯煎七分溫服按乾薑宜減半

附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方 風證以攻痰為戒凡人將死之頃皆痰聲漉漉不獨中風一證元陽無主一身之津血俱化為痰

欲攻盡其痰是欲攻盡其心血也故錄此以為戒

膽南星

寒膩大傷胃氣且能引痰入於心包肝膽以成痼疾製一二次者力尚輕若九製即為害愈酷

枳殼

耗散元氣痰盛得此暫開湧而中氣大傷痰涎如湧

石菖蒲

能開心竅

開則痰涎直入

半夏

此藥雖能降逆開結但與星同用未免助紂為虐

秦艽

羌活

鈎藤鈎

天麻

羚羊角

防風

雖風證所

亦徒成糟粕無用之物

天竺黃

治火者難得然亦痰之標品

殭蠶

雖祛風之正藥但力薄不足恃

牛黃

雖為風痰之妙藥然與膽星同用則

反引痰入於心

竹瀝

以薑汁和之雖能驅經絡之痰而與膽星等

甘草

雖為元老之才但與諸藥同用則

以上諸品或作一方或分作二三方患者誤服之輕者致重重者即死即幸免於死亦必變為癡呆及偏枯無用

之人矣戒之戒之

虛癆方

歸脾湯 此方為補養後天第一藥 治食少不眠怔忡吐血下血大便或澹或秘妄夢健忘七情所傷遺精帶濁

及女子不月等證

災者 三錢

人參

白朮 蒸

棗仁 炒黑

當歸身

茯神

龍眼肉 各二錢

木香 五分

災草 一錢

遠志 去心 五分

水三杯煎八分溫服

高鼓峰去木香加白芍一錢五分甚妙

欬嗽加麥冬三錢五味七分

鬱氣加貝母二錢

脾虛發熱加丹皮梔子

六味地黃丸

壯水之主以制陽光凡一切吐血下血欬嗽不眠骨蒸遺精淋濁屬陰虛者無不統治之

熟地 八兩

山茱肉

淮山藥 略四

丹皮

茯苓

澤瀉 略三

研末鍊蜜丸如梧

子大曬乾每服三錢淡鹽湯送下一日兩服

加五味子名都氣丸

加麥冬名八仙長壽丸治欬嗽本方改兩

為錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸

益火之源以消陰翳治腰膝無力飲食不進腫脹疝瘕陽痿遺精帶濁屬於元陽虛者無不統治之

本方去附子加五味子名加減八味丸治

即六味丸加附子肉桂略

本方去附子名七味丸能引火歸源

本方減兩為錢水煎服名八味湯

大渴不止

本方加牛膝車前子名濟生腎氣丸俗名金匱丸治水腫喘促

本方減兩為錢水煎服名八味湯

小建中湯

此方為治虛勞第一方今人不講久矣凡癆證必有蒸熱此方有薑桂以扶心陽猶太陽一出則燭

火無光即退熱法也凡癆證必飲食日少此方溫脾即進食法也凡癆證必效嗽此方補土以生金即治嗽法也凡癆證多屬腎虛此方補脾以輸精及腎所謂精生於穀也今人不能讀仲景書反敢侮謗聖法徒知生脈六味八味歸脾補中及款冬貝母玉竹百合蘇陳醬地黃之類恒服至死誠可痛恨

生白芍三錢 桂枝五錢 炙草一錢 加生薑一錢五分大棗二枚水二杯煎八分入飴糖三錢五分烱服 加黃耆二錢名黃耆連中湯治虛癆諸不足飽悶者去大棗加茯苓二錢氣逆者加半夏一錢五分 此方人參當歸白朮俱隨宜加之

金匱炙甘草湯 肺燥肺痿咽痛脈代等證

生地四錢 桂枝木一錢 阿膠五錢 炙草二錢 人參一錢 麥冬二錢 棗仁原方火麻

分 加生薑一錢大棗二枚水二杯酒半杯煎八分服

喻嘉言清燥救肺湯 治燥氣鬱而成癆

桑葉經霜者去蒂三錢 人參一錢 石膏二錢三分 杏仁錢二分 甘草一錢 麥冬一錢 枇杷葉去毛蜜炙

黑芝麻一錢五分 水二杯半煎八分熱服 痰多加貝母三錢 或加梨汁半盞

金匱薯蕷丸 治虛癆諸不足風氣百疾

薯蕷分三十 當歸 桂枝 麩 乾地黄 豆黃卷各十 甘草八分

人參 阿膠各七 芍藥 白朮 麥冬 杏仁

防風各六 柴胡 桔梗 茯苓各五 乾薑三分 白斂二分 大棗百枚 右

二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一九一百丸為劑錢半為一分

金匱大黃廔蟲丸 治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌肉甲

錯目黯黑緩中補虛

大黃蒸十分 黃芩二兩 甘草三兩 杏仁一升 桃仁一升 芍藥四兩 乾漆一兩

乾地黄十兩 廔蟲一升 水蛭百個 蟻螬一升 廔蟲半升 右十二味末之煉蜜丸如小豆大

酒服五丸日三服愚按以菟血之品為補血之用仿於內經四烏鯁骨一蘆茹丸張路玉以此丸藥料及鮑魚入絨毛雞腹內黃酒童便煮爛汁乾將雞去骨取肉同諸藥懸火上烘乾為末加鍊蜜為丸每服二錢以黃酒送下日三服代塵蟲丸甚妥

效嗽諸方

六安煎景岳 治外感效嗽

半夏二錢 陳皮五錢 茯苓二錢 甘草一錢 杏仁二錢去 白芥子炒研 加生薑七片水

煎服 寒甚加細辛七分 愚每用必去白芥子加五味子乾薑細辛

小青龍湯 治一切效嗽

方見傷寒 方中隨寒熱虛實加減惟細辛乾薑五味三藥不去讀金匱者自知

加減小柴胡湯 治發熱效嗽

柴胡四錢 半夏二錢 黃芩 炙草各五分 乾薑一錢 五味子八分 水二杯半煎一

杯半去滓再煎八分溫服一日二服

五味子湯針 治傷燥效唾中有血牽引胸脅痛皮膚乾枯

五味子研五分 桔梗 甘草 紫苑茸 續斷 竹茹 桑根皮各一

生地黄二錢 赤小豆一撮即赤豆之細者 右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙 愚按赤豆易生扁豆五錢圖不

忌之 歲難門冬乾薑細辛亦妙

麥門冬湯針 治大病後火熱乘肺效唾有血胸膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而便秘

麥門冬去心 桔梗 桑根皮 半夏 生地黄 紫苑茸 竹茹各一

麻黃七分 甘草五分 五味子研十粒 生薑一片 右十一味水煎空心服

瘧疾方

小柴胡湯傷方見 一切瘧病俱治

芍藥湯 行血則膿血自愈調氣則後重自除三日內俱可服

白芍

當歸各一錢

黃連

黃芩各一錢

桂四分

檳榔一錢

木香六分

甘草四分

大黃一錢虛人不用

厚朴一錢

枳殼一錢

青皮五分

水二杯煎八分溫服

小便不利

加滑石澤瀉

滯濕難出虛者倍歸芍實者倍大黃

紅痢加川芎桃仁

人參敗毒散

喻嘉言最重此方令微汗則陽氣升而陷者舉矣此法時醫不講余每用此方加陳倉米四錢或加

黃芩黃連屢用屢效

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

茯苓

桔梗

人參以上各一錢

甘草五分

水二杯加生薑三片煎七分服

加倉米名倉廩湯治噤口痢心

腹痛及胸痺方

烏梅丸傷寒方見

治蟲痛

蘇合香丸

治注痛 拙著從眾錄有方論

又鬼注不去宜虎骨鹿茸羚羊角龍骨各三錢以羊肉湯煎入麝香

少許服取腥羶之味引濁陰之氣從陰而泄此喻嘉言寓意草法也

香蘇飲

治氣痛 一切感冒俱佳

香附二錢製研

紫蘇葉三錢

陳皮

甘草一錢

加生薑五片水二杯煎八分服

心痛加元胡索

二錢酒一盞

七氣湯亦名四

治七情之氣鬱逆

半夏

厚朴

茯苓各三錢

紫蘇葉一錢

加生薑三片水二杯煎八分服

百合湯 治心口痛諸藥不效

亦屬氣痛

百合一兩

烏藥三錢

水三杯煎八分服

此方余自海壇得來

失笑散 治一切血滯作痛如神

五靈脂醋炒 蒲黃各一兩 共研末每服三錢以醋湯送下日二服

桃仁承氣湯 治心腹痛大便不通其人如狂屬死血

桂枝二錢 桃仁十七枚 去皮尖 大黃四錢 芒硝七分 甘草七分 水二杯煎八分去滓入硝二沸溫服

丹參飲 治心胸諸痛神驗婦人更宜 亦屬血痛 亦可通治諸病

丹參一兩 白檀香要真者極香的切片 砂仁各一錢 水二杯煎八分服

妙香散遺精

平胃散 治一切飲食停滯

蒼朮 厚朴炒 陳皮各二錢 甘草一錢 加生薑五片水二杯煎八分服 肉積加山查

麵積加麥芽菜菔子 穀積加穀芽 酒積加葛根砂仁

二陳湯方見中風

十棗湯 治水飲作痛峻劑不可重用

大戟 芫花炒 甘遂各等分 用大棗十枚水二杯煎七分去滓入藥方寸匕約有七分服次早當

下未下再一服服後體虛以稀粥調養

理中湯方見傷寒 治冷痛

吳茱萸湯仲景 治冷痛 通治食穀欲嘔頭痛欲破煩躁欲死者及大吐不已之證

吳茱萸湯錢五分 人參一分 大棗五枚 生薑五片 水二杯煎八分溫服

金鈴子散 治心口痛及脅痛腹痛如神

金鈴子去核 元胡索各二兩 每服三錢黃酒送下

厚朴三物湯金 治心腹實痛大便閉者

厚朴四錢 大黃二錢 枳實五錢 水二杯煎八分溫服

厚朴七物湯金 即前方知

桂枝

甘草五分

生薑五分

大棗二枚

水二杯煎八分服

嘔者加半夏一錢寒者多加

生薑一錢五分

附子粳米湯治腹中寒氣雷鳴切痛胸脅逆滿嘔吐

附子二錢

半夏四錢

炙草一錢

粳米五錢

大棗二枚

水三杯煎八分溫服日夜作三服

大黃附子湯治下偏痛發熱脈緊弦者

大黃

附子各三錢

細辛二錢

水二杯煎八分服

當歸生薑羊肉湯治心腹諸痛虛極諸藥不效者一服如神及脅痛裏急婦人產後腹中疝痛

當歸七錢

生薑一兩二錢五分

羊肉四兩去筋膜用藥戩秤方準

水五杯煎取二杯溫服一杯一日兩服

若寒多者加

生薑五錢 痛多而嘔者加橘皮五錢白朮二錢五分

括蕒薤白酒湯治胸痺喘息欬唾胸背痛寸沉遲關上小緊

括蕒連皮子搗五錢

薤白如乾者用三錢生者用六錢

白酒三杯煎八分服

加半夏二錢名括蕒薤白半夏湯治胸痺不得

卧心痛徹骨

大建中湯治胸大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近

川椒炒出汗二錢微

乾薑四錢

人參三錢

水二鍾煎一鍾去滓入膠飴四錢煎取八分溫服如一炊頃可食

熱粥半碗

隔食反胃方

左歸飲即六味湯去丹皮澤瀉加枸杞炙草

啟隔飲治食入即吐

川貝母切一錢五分不研分

沙參三錢

丹參二錢

川鬱金五分

乾荷蒂五個

砂仁殼四分

杵頭糠三錢布包

茯苓五分

石菖蒲四分

水二杯煎一杯服

大半夏湯治胃反

人參 二錢

半夏 俗用明礬製者不可用只用薑水浸二日一日一換清水浸三日一日一換撈起蒸熟切片曬乾四錢

長流水入蜜揚一百四十遍取二

杯半煎七分服

吳茱萸湯 腹方見心

六君子湯 此方為補脾健胃祛痰進食之通劑百病皆以此方收功

人參

白朮 炒

茯苓

半夏 錢二

陳皮

炙草 錢一

加生薑五片大棗

二枚水二杯煎八分服 治反胃宜加附子二錢丁香藿香砂仁各一錢

附子理中湯 治反胃 即理中湯加附子三錢 治反胃宜加茯苓四錢甘草減半

附隔食方法

人鏡經曰內經云三陽結謂之隔蓋足太陽膀胱經水道不行手太陽小腸經津液枯槁足陽明胃經燥糞結聚所以飲食拒而不入縱入太倉還出喉嚨夫腸胃一日一便乃常度也今五七日不便陳物不去新物不納宜用三一承氣湯節次下之後用脂麻飲啜之陳腐去而腸胃潔癥瘕盡而榮衛昌飲食自進矣

三一承氣湯

大黃

芒硝

甘草

厚朴

枳實 錢一

水二杯煎八分服

按此方太峻

姑存之以備參攷

氣喘方

蘇子降氣方 治上盛下虛氣喘等證

紫蘇子 微炒

前胡

當歸

半夏

陳皮

厚朴 錢一

沉香

炙草 各五 加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

葶藶大棗瀉肺湯 治支飲滿而肺氣閉氣閉則呼吸不能自如用此苦降以泄實邪

葶藶子 隔紙炒研如泥 二錢

水一杯半大棗十二枚煎七分入葶藶服之

貞元飲 陰血為陽氣之依歸血虛則氣無所依時或微喘婦人血海常虛多有此證景岳方意在濟之緩之四字濟之以歸地緩之以甘草頗有意議今人加紫石英黑鉛之重鎮則失緩之之義加沉香白芥子之辛苦則失濟之之義矣且此方非為元氣奔脫而設時醫每遇大喘之證必以此方大劑與服氣升則火升偶得濡潤之藥氣亦漸平亦昉旋而陰柔之氣與飲水混為一家則胸膈間純是陰霾之氣其人頃刻歸陰矣吾鄉潘市醫倡此法以局人神智無一人悟及誠可痛恨

熟地黄 一五七錢或一二兩

當歸身 錢三四

炙草 三錢二

水三四杯煎八分服

苓桂朮甘湯 金

治氣短 喻嘉言云此治呼氣短

茯苓 四錢

白朮

桂枝 錢各二

炙草 五分

水二杯煎八分服

腎氣丸 金

治氣短 喻嘉言云此治吸氣短即入

茯苓甘草大棗湯 神

治氣喘臍下動氣欲作奔豚味地黄丸但原方係乾生地黃桂枝

茯苓 六錢

桂枝

甘草 二錢各

大棗四枚用甘瀾水三杯半先煎茯苓至二杯入諸藥煎七分服

作甘瀾水法取長流水揚之數百遍或千遍愈妙

真武湯

鎮水逆定痰喘之神劑 方見傷寒 宜倍茯苓 欬嗽甚者去生薑加乾薑一錢五分五味細辛各一錢

黑錫丹

治脾腎虛冷上實下虛奔豚五種水氣中風痰潮危急 喻嘉言曰凡遇陰火逆衝真陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此方再無他法可施予每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲吾身元氣溫養其藥藉手效靈

厥功歷歷可紀即痘證倒痛逆候服此亦可回生

沉香

附子 炮

胡蘆巴

肉桂 錢各五

小茴香

補骨脂

肉豆蔻

木香

金鈴子 去核各一兩

硫黃

黑鉛 與硫黃炒成砂子各三兩

右為末酒煮麩糊丸梧子大陰乾以布袋

擦令光瑩每服四五十九薑湯送下

血證方

麻黃人參芍藥湯 煉

治吐血外感寒邪內虛蘊熱

桂枝五分補表虛 麻黃去外 黃耆益衛表 炙甘草補脾 白芍安太 人參益元氣 麥冬補肺氣

五味子五粒安肺氣 當歸五分和血養血 水煎熱服 按此方以解表為止血是東垣之巧思倖中非有定識也觀其每

味自註藥性俱悖聖經更知其陋

甘草乾薑湯金

炙甘草 四錢 乾薑 炮二錢 水二杯煎八分服

柏葉湯金 治吐血不止

柏葉生用三錢無生者用乾者二錢 乾薑 一錢 艾葉生用二錢如無生者用乾者一錢 水四杯取馬通二杯煎一杯服如無

馬通以童便二杯煎八分服

黃土湯金 治先便後血為遠血 亦治衄血吐血不止

灶心黄土八錢原方四錢 生地 黃芩 甘草 阿膠 白朮

附子炮各一錢五分 水三杯煎八分服

赤小豆散金 治先血後便為近血

赤小豆浸令出芽曬乾一兩 當歸 四錢 共研末每服三錢漿水下即洗米水三日後有酸味是也

按凡止血標藥可隨宜作引血餘灰煎可用一二兩同 梔子 茜草 乾側柏 治上血 槐花生地 榆烏梅 續斷 治血崩

凡下血及血痢口渴後重脈洪有力者為火盛可用苦參子去殼仁勿破外以龍眼肉包之空腹以倉米湯送下

九粒一日二三服漸加至十四粒二日效

水腫方

五皮飲 此方出華元化中藏經以皮治皮不傷中氣所以為治腫通用之劑

大腹皮 酒洗 桑白皮生各二錢 雲苓皮 四錢 陳皮 二錢 生薑皮 一錢 水三杯煎八分溫服上腫宜發汗

加紫蘇葉 荊芥各二錢 防風 一錢 杏仁 一錢 五分 下腫宜利小便加防己 二錢 木通 赤小豆各一錢 五分 喘而

腹脹加生萊菔子 杏仁各二錢 小便不利者為陽水加赤小豆 防己 地膚子 小便自利者為陰水加白朮 二

錢蒼朮川椒各一錢五分 熱加海蛤三錢知母一錢五分 寒加附子乾薑各二錢肉桂一錢 嘔逆加半夏
生薑各二錢 腹痛加白芍二錢桂枝一錢炙甘草一錢

導水茯苓湯 治水腫頭面手足遍身腫如爛瓜之狀按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘瀉溺
出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此即漸利而愈

澤瀉 赤茯苓 麥門冬去心 白朮各三兩 桑白皮 紫蘇 檳榔

木瓜各一兩 大腹皮 陳皮 砂仁 木香各七分 右咬咀每服一二兩水二杯燈

草三十根煎八分食遠服 如病重者可用藥五兩又加麥冬及燈草半兩水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下

小銚內煎至一銚五更空心服

加減金匱腎氣丸 治脾腎兩虛腫勢漸大喘促不眠等證

熟地四兩 雲茯苓三兩 肉桂 牛膝 丹皮 山藥 澤瀉

車前子 山茱肉各一兩 附子五錢 研末煉蜜丸如桐子大每服三錢燈草湯送下一日兩服

以兩為錢水煎服名加減金匱腎氣湯 但附子必倍用方效 如川椒目一錢五分巴戟天二錢治脚面腫

風水因風而病水也

防己黃耆湯金匱 治風水脈浮身重汗出惡風

防己三錢 炙草五錢 白朮二錢 黃耆三錢 生薑四片 大棗一枚 水二杯煎八分服

服後如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗瘥 喘者加麻黃 胃中不和者加芍藥

氣上衝者加桂枝 虛汗自出故不用麻黃以散之則用防己以驅之服後身如蟲行及腰下如冰云云皆濕下

行之徵也然非耆朮甘草焉能使衛氣復振而驅濕下行哉

越婢湯金匱 治惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者

麻黃六錢 石膏八錢 甘草二錢 生薑三錢 大棗五枚 水四杯先煮麻黃至三杯去沫入

諸藥煎八分服日夜作三服 惡風者加附子一錢 風水加白朮四錢 前云身重為濕多此云一身悉腫為

風多風多氣多熱亦多且屬急風故用此猛劑

杏子湯 脈浮者為風水發其汗即已方闕或云即甘草麻黃加杏仁

皮水水行於皮中也其脈浮外證附腫按之沒指曰不惡風者不兼風也曰其腹如鼓者 皮水外有脹形內不堅滿也曰不渴者病不在內也曰當發其汗者以水在皮宜汗也

防己茯苓湯治四肢腫水在皮中聶聶動者

防己 桂枝 黃耆各三錢 茯苓六錢 炙草一錢 水三杯煎八分服日夜作三服

藥亦同防己黃耆湯但去朮加桂苓者風水之濕在經絡近內皮水之濕在皮膚近外故但以苓協桂滲周身之

濕而不以朮燥其中氣也不用薑棗者濕不在上焦之榮衛無取乎宣之也

蒲灰散厥而為皮水者此主之 腫甚而潰之逆證

蒲灰半斤 滑石一斤 為末飲服方寸七日三服 愚按當是外敷法然利濕熱之劑亦可內服外滲也

越婢加朮湯裏水此主之 甘草麻黃湯亦主之 按裏水當是皮水筆誤也或水在皮裏即皮水之重者亦未

可知 方見風水

甘草麻黃湯

甘草二錢 水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入甘草煮七分服重覆汗出不汗再服慎風寒

二藥上宣肺氣中助土氣外行水氣

正水水氣相調水氣格陽而喘也其目窠如蠶兩腫大諸證金匱未言無不俱見 正水水之正狀也其脈遲者水屬陰也外證自喘者陰甚於下不復與胸中之陽

愚按正水金匱未出方然提綱云脈沉遲外證自喘則真武湯小青龍湯皆正治之的方越婢加附子湯麻黃附

子湯亦變證之備方桂甘麻辛附子湯加生桑皮五錢黑豆一兩為窮極之妙方此正水之擬治法也

石水謂下焦水堅如石也其脈 石水沉外證少腹滿不喘

麻黃附子湯

麻黃三錢 炙草二錢 附子一錢 水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入諸藥煎七分溫服日作三服

此方之妙在於溫經散寒之法變為溫經利水之妙

黃汗汗出而內結則鬱熱而黃其脈沉而遲外證身發熱四肢頭面腫久不愈必致癰膿因具

黃者桂枝芍藥苦酒湯治身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗出沾衣色正黃如藥汁脈自沉黃汗脈沉以

汗出入水中浴水從毛孔入得之水氣從毛孔入而傷其心故水相侵而色黃水氣搏結而脈沉也凡看書宜

是水凡脾胃受濕濕久生熱濕熱交蒸而成黃色皆可以汗出入水之意悟之

黃者五錢芍藥五錢桂枝錢各三苦酒一杯半水一杯煎八分溫服當心煩至六七日乃解汗出於

止之太急故心煩至六七日正復而邪自退也

桂枝加黃耆湯金匱黃汗之病兩脛自冷盜汗出汗已反發熱久久身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出

已輒輕者久久必身濼濼即胸中痛又從腰以上汗出下無汗腰臍弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重

煩躁小便不利以上皆黃汗之變證師備擬之以立此為黃汗所致變證雖多而其源總由水氣傷心治法茲因集隘不能全錄只輯其要此為黃汗所發結此一句見治法不離其宗

桂枝錢各三芍藥錢各三生薑錢各三甘草錢各二黃耆錢各二大棗四枚水三杯煮八分溫

服須臾啜熱粥一杯餘以助藥力溫服取微汗若不汗更服前方止汗是治黃汗之正病法此方令微汗是治

黃汗之變證法

脹滿蠱脹方

七氣湯方見心治實脹屬七情之氣者

胃苓散消脹行水

蒼朮錢五分白朮錢五分厚朴錢五分桂枝錢一陳皮錢一澤瀉錢一豬苓錢五分

炙草錢七分茯苓錢四分加生薑五片水三杯煎八分服去桂草以煨半熟蒜頭搗為丸陳米湯下三四

錢一日兩服更妙

三物厚朴湯七物厚朴湯二方俱見腹痛

桂甘薑棗麻辛附子湯金匱治氣分心下堅大如盤邊如旋杯

桂枝錢各三生薑錢各三甘草錢各二麻黃錢各二細辛錢各二附子錢一大棗三枚

醫學三字經

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥煎八分溫服日夜作三服當汗出如蟲行皮中即愈 此證是心腎交病
上不能降下不能升日積月累如鐵石難破方中桂甘薑棗以和其上而復用麻黃附子細辛少陰的劑以治其
下庶上下交通而病愈所謂大氣一轉其氣乃散也

枳朮湯金 治心下堅大如盤如盤而結雖堅大而不邪尚散漫水飲所作與氣分有別也氣無形以辛

枳實二錢 白朮四錢 水二杯煎八分服日夜作三服腹中軟即止

禹餘糧丸因 治十腫水氣脚膝腫上氣喘急小便不利但是水氣悉皆主之此藥治鼓脹之要藥

蛇含石大者三兩以新鐵銚盛入炭中候冷取出研極細 禹餘糧石三兩 真針沙糧一兩先用米醋二升就銚內

煮醋乾為度後用銚並藥者入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細 以三物為主其次量人虛實入下項乾水妙在轉輸此方三物既非大持故虛人老人亦可服

羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝酒浸 桂心 蓬朮

附子炮 乾薑 青皮 白豆蔻 大茴香炒 京三稜炮 白茯苓

當歸酒浸一宿各半兩 右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下

三十九丸至五十九丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服

兼以溫和調補氣血藥助之真神方也 此方昔人用之屢效以其大能暖水藏也服之丸更以調補氣血藥助之不為峻也

暑證方

六一散河 治一切暑病

滑石六兩 甘草一兩 研末每服三錢并花水下或燈草湯下

白虎湯仲 治傷暑大渴大汗之證 方見傷寒 加人參者以暑傷元氣也 加蒼朮者治身熱足冷以暑必挾

濕也

香薷散 治暑發熱身重口燥舌乾吐瀉

甘草一錢 厚朴五分 扁豆二錢 香薷四錢 水二杯煎八分冷服或溫服 瀉利加茯苓白朮
嘔吐加半夏 暑氣發搖加羌活秦艽

大順散 治陰暑即畏熱貪涼之病

乾薑炒一錢 甘草炒八分 杏仁六分去皮炒 肉桂六分 共為末每服三錢水一杯煎七分服如煩躁并

花水調下一錢半

生脈散 却暑良方

人參一錢 麥冬三錢 五味一錢 水一杯半煎七分服

清暑益氣湯垣

炙者五分 人參 白朮 蒼朮 青皮 陳皮 麥冬

猪苓 黃柏各五 乾薑 澤瀉各一 神麴八分 五味 炙草各三

升麻三分 加生薑三片大棗二枚水二杯煎七分服

一物瓜蒂湯金

瓜蒂二十 水二杯煎八分服

泄瀉方

胃苓散 方見脹滿 加減詳三字經小註

四神丸 治脾腎虛寒五更泄瀉

補骨脂酒炒 肉豆蔻炒 吳茱萸泡 五味炒 用紅棗五兩生薑五兩同煮去薑將棗去皮核搗

爛為丸如桐子大每日五更服三錢臨卧服三錢米湯下 加白朮附子罌粟人參更效

生薑瀉心湯 黃連湯 甘草瀉心湯 半夏瀉心湯 乾薑黃芩黃連人參湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯以上六方俱見傷寒論讀

按以上諸法與內經中熱消瘴則便寒寒中之屬則便熱一節揆脈證而擇用甚驗張石頑醫通載之甚詳但古

調不彈久矣余新悟出一方有瀉心之意上可清痞下可止瀉腸熱胃寒能分走而各盡其長非有他方即傷寒厥陰調之烏梅丸也屢用屢驗

醫學三字經卷四

眩暈方

一味大黃散 鹿茸酒 二方見上三字經小註

加味左歸飲 治腎虛頭痛如神並治眩暈目痛

熟地七八錢 山茱萸 懷山藥 茯苓 枸杞銘三 肉蓯蓉酒洗切片三四錢

細辛 炙草銘一 川芎二錢 水三杯煎八分溫服

正元丹秘 治命門火衰不能生土吐利厥冷有時陰火上衝則頭面赤熱眩暈惡心濁氣逆滿則胸脇刺痛臍肚

脹急

人參三兩用附子一兩 黃耆一兩五錢用川芎一兩 山藥一兩用乾薑三錢 白朮二兩用陳

汁收入 茯苓二兩用肉桂六錢酒洗汁 甘草一兩五錢用烏藥一兩 右六味除茯苓文武火緩緩焙乾勿炒

傷藥性杵為散每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚擘煎數沸入鹽一捻和滓調服服後飲熱酒一杯以助藥力

嘔噦吐方

二陳湯

半夏二錢 陳皮一錢 茯苓三錢 炙草八分 加生薑三片水二杯煎八分服 加減法詳三字

經小註

小柴胡湯傷寒方見 吳茱萸湯方見隔食反胃

大黃甘草湯金匱 治食已即吐

大黃五錢 甘草五分 水二杯煎八分服

乾薑不炒

黃芩

黃連

人參各一錢五分

水一杯半前七分服

進退黃連湯

黃連炒薑汁

乾薑炮

人參一錢乳非桂枝一錢

半夏薑製五分

大棗二枚

進法用本方七味

俱不製水三茶杯煎一杯溫服退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同但空朝服崔氏八味丸三錢半飢服前劑耳

癲狂癇方

滾痰丸王隱

治一切實痰異證孕婦忌服

青礞石鐵線三兩研如米大同煨硝三兩入新磁罐內封固以鹽泥封固煨過研末水飛二兩實

沉香另研

川大黃酒蒸

黃芩炒各共

為末水泛為丸菜豆大每服一錢至二錢食遠沸湯下

生鐵洛飲 治狂妄不避親疏

鐵洛取一錢用水六杯煮

石膏一兩

龍齒

茯苓

防風各七

黑參

秦羌各五鐵洛水三杯煎一杯服一日兩服

當歸承氣湯秘傳方

治男婦痰迷心竅踰牆越壁胡言亂走

歸尾一兩

大黃酒洗

芒硝

枳實

厚朴各五

炙草三錢

水二杯煎八分服

溫膽湯 駱氏內經拾遺云癲狂之由皆是膽涎沃心故神不守舍宜理溫膽亦治癇病 即二陳湯加枳實鮮竹

茹各二錢或調下飛礬分半

當歸龍薈丸 治肝經實火大便秘結小便濕滯或胸膈疼痛陰囊腫脹凡屬肝經實火皆宜用之

葉天士云動怒驚觸致五志陽越莫制狂亂不避親疎非苦降之藥未能清爽其神識也

當歸

龍膽草

梔子仁

黃柏

黃連

黃芩各一

大黃

蘆薈

青黛各五

木香二錢五分

麝香五分

共為末神麩糊丸每服二十九薑湯下

丹礬丸通

治五癇

黃丹一兩 白礬二兩 二味入銀罐中煨通紅為末入臘茶一兩不落水猪心血為丸硃砂為衣每服三十丸茶清下久服其涎自便出半月後更以安神藥調之按諸心血不粘宜加煉蜜少許合搗

磁硃丸 治癲狂癇如神

磁石 二兩 硃砂 一兩

六神麩生研 三兩

共研為末另以六神麩一兩水和作餅煮浮入煎藥加鍊蜜為

丸如麻子大沸湯下二錢 解見時方歌括

五淋癰閉赤白濁遺精方

五淋湯

赤茯苓 三錢

白芍

山梔 各二錢

當歸

細甘草 各一錢 四分

加燈心十四寸水煎服解見

時方歌括

滋腎丸 又名通關丸治小便點滴不通及治衝脈上逆喘呃等證

黃柏

知母 各一兩

肉桂 一錢

共研末水泛丸桐子大陰乾每服三錢淡鹽湯下

補中益氣湯方見中風

治一切氣虛下陷

草薺分清飲 治白濁

川草薺 四錢

益智仁

烏藥 各一錢 五分

石菖蒲 一錢

一本加甘草梢一錢五分茯苓二錢水二杯煎

八分入鹽一捻服一日兩服

四君子湯

方見時方歌括

歌曰白濁多因心氣虛不應只作腎虛醫四君子湯加遠志一服之間見效奇

龍膽瀉肝湯 治脅痛口苦耳聾筋痠陰濕熱癢陰腫白濁溲血

龍膽草 三分

黃芩

梔子

澤瀉 各一錢

木通 五分

車前子 五分

當歸

甘草

生地 各三錢

柴胡 一錢

水一杯半煎八分服

五倍子精燻者茯苓略二 為末煉蜜丸桐子大每服二錢鹽湯下日兩服

懷山藥二兩 茯苓 茯苓神 龍骨 遠志 人參各一 桔梗五錢

木香三錢 甘草一兩 麝香一錢 硃砂二錢 共為末每服三錢蓮子湯調下

疝氣方

五苓散仲景 本方治太陽證身熱口渴小便少 今變其分兩借用治疝

猪苓 澤瀉 茯苓略二 肉桂一錢 白朮四錢 水三杯煎八分服 加木通川棟

子各一錢五分橘核三錢木香一錢

三層茴香丸 治一切疝氣如神

大茴香五錢同鹽五錢 川棟子一兩 沙參 木香略一 為末米糊丸如桐子大每服三錢

空心溫酒下或鹽湯下纔服盡接第二料 又照前方加華撥一兩檳榔五錢共五兩半依前丸服法若未愈再

服第三料 又照前第二方加茯苓四兩附子炮一兩共前八味重十兩丸服如前雖三十年之久大如栲栳皆

可消散神效

千金翼洗方 治丈夫陰腫如斗核中痛

雄黃末一兩 礬石二兩 甘草七錢 水五杯煎二杯洗

消渴方

白虎湯 調胃承氣湯 理中丸 烏梅丸四方俱見傷寒 腎氣丸 六味湯 炙甘草湯三方俱見虛勞

麥門冬湯

麥門冬四錢 半夏五錢 人參二錢 粳米四錢 炙甘草二錢 大棗二枚 水二杯煎八分溫服

麻仁丸

火麻仁二錢 芍藥 枳實略五 大黃 厚朴略一 研末煉蜜丸如桐子大每服十丸

醫學三字經 卷四

米飲下以知為度

痰飲方

王節齋化痰丸 治津液為火薰蒸凝濁鬱結成痰根深蒂固以此緩治之

香附童便浸炒五錢 橘紅一兩 瓜蒌仁一兩 黃芩酒炒 天門冬 海粉各一兩 青黛三錢

芒硝三錢另研 桔梗五錢 連翹五錢 共為研末煉蜜入生薑汁少許為丸如彈子大每用一丸噙化或

為小丸薑湯送下二錢

苓桂朮甘湯治胸脅支滿目眩 並治飲邪阻滯心肺之陽令呼氣短

腎氣丸 治飲邪阻滯肝腎之陰令吸氣短 二方俱見喘證方

甘遂半夏湯治飲邪流連不去心下堅滿

甘遂大者三枚 半夏湯洗七次十二枚以水一中杯煮取半杯去滓 芍藥五枚約今三錢 甘草如指一枚炙約今之一錢三分 水二杯煎六分去滓入

蜜半盞再煎至八分服 程氏曰留者行之用甘遂以決水飲結者散之用半夏以散痰飲甘遂之性直達恐其

過於行水緩以甘草白蜜之甘堅以芍藥之苦雖甘草甘遂相反而實以相使此苦堅甘緩約之之法也靈樞經

曰約方猶約囊其斯之謂與 尤氏曰甘草與甘遂相反而同用之者蓋欲其一戰而留飲盡去因相激而相成

也芍藥白蜜不特安中亦緩毒藥耳

十棗湯治懸飲內痛 亦治支飲方見腹痛

大青龍湯治溢飲之病屬經表屬熱者宜此涼發之

小青龍湯治溢飲之病屬經表屬寒者宜此溫發之 以上二方俱見傷寒

木防己湯人膈中清虛如太空然支飲之氣乘之則滿喘而痞堅面色黧黑脈亦沉緊得之數十日醫者吐之

下之俱不愈宜以此湯開三焦之結通上下之氣

木防己三錢 石膏六錢 桂枝二錢 人參四錢 水二杯煎八分溫服

木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯前方有人參吐下後水邪因虛而結者服之即愈若水邪實結者雖愈而三

日復發又與前方不應者故用此湯去石膏之寒加茯苓直輸水道芒硝峻開堅結也 又此方與小青龍湯治
吼喘病甚效

木防己 二錢 桂枝 二錢 茯苓 四錢 人參 四錢 芒硝 五分 水二杯 煎七分去滓入芒硝

微煎溫服微利自愈

澤瀉湯 支飲雖不中正而迫近於心飲邪上乘清陽之位其人苦胃眩冒者昏冒而神不清如有物冒蔽之也

眩者目旋轉而乍見眩黑也宜此湯

澤瀉 五錢 白朮 二錢 水二杯煎七分溫服

厚朴大黃湯 治支飲胸滿 支飲原不中正飲盛則偏者 不偏故直驅從大便而出

厚朴 二錢 大黃 三錢 枳實 五分 水二杯煎七分溫服

葶藶大棗瀉肺湯 治支飲不得息 方見氣喘

小半夏湯 治心下支飲嘔而不渴

半夏 四錢 生薑 八錢 水二杯煎八分溫服

己椒藶黃丸 治腹滿口舌乾燥腸間有水氣

防己 椒目 葶藶 熬 大黃 各一 共為細末煉蜜丸如梧子大先飲食服一丸日三

服稍增之口中有津液渴者加芒硝半兩 程氏曰防己椒目導飲於前清者從小便而出推飲於後濁者從大

便而下此前後分消則腹滿減而水飲行脾氣轉而津液生矣

小半夏湯加茯苓湯 治卒然嘔吐心下痞膈間有水氣眩悸者 即小半夏湯加茯苓四錢

五苓散 治臍下悸吐涎沫而顛眩此水也

澤瀉 六錢 猪苓 茯苓 白朮 各十八錢 桂枝 半兩 為末白飲和服方

寸七日三服多煖水汗出愈 應七錢五分也方寸七者七匙也作匙正方一寸大約八九分也余用二錢愚按臍

下動氣去朮加桂理中丸法也今因吐涎沫是水氣勝必得苦燥之白朮方能制水顛眩是土中濕氣化為陰靈

上彌清竅必得溫燥之白朮方能勝濕證有兼見法須變通

附外臺茯苓飲 治積飲既去而虛氣塞滿其中不能進食此證最多此方最妙

茯苓 人參 白朮各一錢五分 枳實一錢 橘皮一分五釐 生薑二錢 水二杯煎七分服

一日三服 徐忠可曰俗謂陳皮減參力此不惟陳皮且加枳實之多補瀉並行何其妙也

三因白散 滑石五錢 半夏三錢 附子炮二錢 共研末每服五錢加生薑三片蜜三錢水一杯半煎七分服

傷寒方 太陽 桂枝湯 桂枝 白芍各三錢 甘草二錢 生薑切片三錢 大棗四枚 水二杯煎八分溫服服後少頃啜

粥一杯以助藥力溫覆微似汗若一服病止不必再服若病重者一日夜作三服

麻黃湯 麻黃三錢去根節 桂枝二錢 杏仁去皮尖三枚 甘草一錢 水三杯先煮麻黃至二杯吹去上沫納諸藥煎八

分溫服不須啜粥餘將息如前法

大青龍湯 麻黃六錢去根節 桂枝二錢 甘草二錢 杏仁去皮尖二枚 生薑切片三錢 大棗四枚 石膏碎以棉裹四錢五分

水四杯先煮麻黃至三杯半去上沫納諸藥再煎八分溫服溫覆取微似汗汗出多者以溫粉撲之龍骨研末

若汗多亡陽者以渴救之

小青龍湯 麻黃去根 白芍 乾薑不炒 甘草 桂枝各一錢 半夏三錢 五味子一錢

麻黃節 乾薑 甘草 桂枝各一錢 半夏三錢 五味子一錢

若渴者去半夏加栝蒌根二錢 若噎

若噎

若噎

若噎

若噎

若噎

若噎

者去麻黃加附子五分小便不利小腹痛滿去麻黃加茯苓四錢若喘者去麻黃加杏仁二十一枚按論云若微利者去麻黃加薏花今薏花不常用時法用茯苓四錢代之即猪苓澤瀉亦可代也但行道入當於方後註明桂枝加葛根湯即桂枝湯加葛根四錢水三杯半先煮葛根至二杯半吹去沫入諸藥煎至八分溫服不須啜粥葛根湯

葛根 四錢

麻黃 三錢

生薑 二錢

甘草 二錢

桂枝 二錢

大棗 四錢

白芍 二錢

水三鍾半先煮麻黃葛根至二杯去沫入諸藥煎八分溫服微似汗不須啜粥

陽明

白虎湯

石膏

八錢碎
棉裹

知母 三錢

炙草 一錢

粳米 四錢

水三杯煎一杯服

調胃承氣湯

大黃 四錢清酒潤

炙草 二錢

芒硝 三錢

水二杯半先煮大黃甘草取一杯去滓入芒硝微煮令沸少少溫服之

服之

小承氣湯

大黃 四錢

厚朴

枳實 各二錢

水二杯煎八分服初服當更衣不爾者再煮服若更衣勿服

大承氣湯

大黃 酒潤

厚朴 四錢

枳實

芒硝 各二錢

水三杯先煮枳實厚朴至一杯半去滓納大黃煮

一杯去滓納芒硝微火煮一二沸服得下勿再服

少陽

小柴胡湯

柴胡 四錢

人參

黃芩

炙草

生薑 各一錢五分

半夏 二錢

大棗 二枚

水

三鍾煎一鍾去滓再煎八分溫服一日夜作三服胸中煩而不嘔者去半夏人參加括藎二錢渴者去半夏

加人參七分括蕒根二錢 腹中痛者去黃芩加芍藥一錢半 脅下痞硬去大棗加牡蠣二錢 心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二錢 不渴外有微熱者去人參加桂枝一錢五分溫覆取微似汗愈 效者去人參大棗生薑加五味子一錢乾薑一錢五分

大柴胡湯

柴胡四錢 半夏二錢 黃芩 芍藥 枳實各錢 生薑二錢五分 大棗二枚 一

本有大黃五分 水三鍾煎八分溫服一日夜作三服

太陰

理中丸湯

人參 白朮 乾薑 甘草各三 共研末蜜丸如雞子黃大研碎以沸湯服一丸日

三四服服後啜粥以腹熱為度或用各三錢水三鍾煎八分溫服服後啜熱粥 若臍上築者去朮加桂 吐多者去朮加生薑二錢下多者還用朮 悸者加茯苓渴欲飲水者加朮 腹痛者加人參 寒者加乾薑 腹滿者去朮加附子 服湯後如食頃飲熱粥微自溫勿揭衣被

四逆湯

甘草四錢 乾薑三錢 附子生二錢 水三鍾煎八分溫服

通脈四逆加人尿猪膽湯

乾薑六錢 甘草四錢 附子生二錢 水三鍾煎八分加猪膽汁一湯匙人尿半湯匙溫服

桂枝加芍藥湯

桂枝 生薑各三 大棗四枚 芍藥六錢 炙草二錢 水三杯煎一杯服

桂枝加大黃湯

桂枝 生薑各三 大棗四枚 芍藥六錢 炙草二錢 大黃七分 水三杯煎八分服

麻黃附子辛細湯

麻黃去根

細辛各三

附子五分錢

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥煎七分溫服

麻黃附子甘草湯

麻黃去根

甘草各三

附子五分錢

煎法同上

通脈四逆湯

乾薑六錢

炙草四錢

附子二錢

水三杯煎八分溫服

白通湯

乾薑三錢

附子三錢

葱白二根

水三杯煎八分溫服

吳茱萸湯

吳茱萸湯三錢

人參五分錢

大棗四枚

生薑六錢

水煎服

猪苓湯

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠各三

水一杯先煎四味至一杯去滓入

膠煎化服

黃連阿膠雞子黃湯

黃連四錢

黃芩一錢

芍藥二錢

阿膠三錢

雞子黃一枚

水二杯半煎一杯半去滓入膠

烱盡小冷入雞子黃攪令相得溫服一日三服

大承氣湯 方見陽明

厥陰

烏梅丸

烏梅九枚

細辛六錢

乾薑一兩

當歸四錢

黃連一兩

附子六錢

蜀椒炒四錢

桂枝

人參

黃柏各六

各另研末合篩之以苦酒浸烏梅一宿去核飯上蒸之搗成泥入

煉蜜共搗千下丸如梧子大先飲食白飲服十九日三服漸加至二十九
當歸四逆湯

當歸

桂枝

白芍各三

甘草炙

木通

細辛各二

大棗八枚又一枚取三分

二服

水三杯煎八分温服

寒氣盛者加吳茱萸二錢半生薑八錢以水二杯清酒二杯煮取一杯半温分

白頭翁湯

白頭翁一錢

黃連

黃柏

秦皮各一錢五分

水二杯煎八分温服

餘詳於時方妙用附錄

傷寒門

瘟疫方

人參散毒散

方見痢疾

防風通聖散

方見中風

藿香正氣散

治外受四時不正之氣内停飲食頭痛寒熱或霍亂吐瀉或作瘧疾

藿香

白芷

大腹皮

紫蘇

茯苓各三兩

陳皮

白朮

厚朴

半夏炒

桔梗各二

甘草一兩

每服五錢加薑棗煎

神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚一炷四季保平安

此歌出昌久吾景函

羌活

獨活

白芷

香附

大黃

甘松

三柰

赤箭

雄黃各等分

蒼朮倍用

右為末麵糊為丸彈子大黃丹為衣曬乾正月初一侵晨焚一炷

辟瘟

婦人科方

四物湯 統治婦人百病

當歸身

熟地

白芍酒炒各三錢

川芎一分

水三杯煎八分服

加製香附二錢研碎炙草一

錢加減詳三字經

歸脾湯方見虛癆

逍遙散景岳 治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脈不調者

當歸 三錢 芍藥 五錢 熟地 五錢 棗仁 炒 錢 茯神 五錢 遠志 五分 陳皮 八分

炙草 一錢 水三杯煎八分服 氣虛加人參 經滯痛加香附按方雖庸陋能滋陽明之燥故從俗附錄之地黃生用佳

當歸散金 瘦而有火胎不安者宜此

當歸 黃芩 芍藥 芎藭 白朮 半斤 共研末酒服方寸匕今用一錢日

再服 妊娠常服即易產胎無疾苦產後百病悉主之

白朮散金 肥白有寒胎不安者此能養胎

白朮 川芎 川椒 牡蠣 為末酒服一錢匕今用一錢日三服夜一服但苦痛加

芍藥心下毒痛加川芎心煩吐痛不食加細辛半夏服之後更以醋漿服之復不解者小麥汁服之已後渴者大

麥汁服之病雖愈服勿置

保生無憂散婦人臨產先服一二劑自然易生或遇橫生倒產連日不生服二三劑神效

當歸 分酒洗 川貝母 一錢 黃耆 生用 艾葉 九分 酒芍 冬月一錢二分 兔絲子 四分 厚朴 薑汁炒

荆芥穗 八分 枳殼 麩炒 川芎 三錢 羌活 甘草 各五 加生薑三片水二杯煎八分空心

服 此方全用撐法當歸川芎白芍養血活血者也厚朴去瘀血者也用之撐開血脈俾惡露不致填塞羌活荆

芥疏通太陽將背後一撐太陽經脈最長太陽治則諸經皆治枳殼疏理結氣將面前一撐俾胎氣斂抑而無阻

滯之虞艾葉溫暖子宮撐動子宮則胞胎靈動貝母免絲最能滑胎順氣將胎氣全體一撐大具天然活潑之趣

矣加黃耆者所以撐扶元氣元氣旺則轉動有力也生薑通神明去穢惡散寒止嘔所以撐扶正氣而安胃氣甘

草協和諸藥俾其左宜右有而全其撐法之神也此方人多不得其解程山齡註獨超故全錄之

加味歸芎湯

川芎 三錢 當歸身 五錢 龜板 生 三錢 婦人生過男女頂門髮燒如雞子大 水三杯煎八分服如人行五

上海錦章書局石印

里路即生

當歸補血湯

當歸 三錢

炙耆 一兩

水煎服

加附子三錢神效或加桂一錢

失笑散 方見心

生化湯

當歸 五錢

川芎 二錢

乾薑 五分

桃仁 一錢五分 去皮尖 甘草 一錢

水二杯煎八分服

產後風口噤

角弓反張者宜加荆芥穗三錢

又方中風口噤用華陀愈風散即荆芥穗一味焙為末勿焦黑以童便和酒送

下口噤藥不下者用一兩零以童便煎好從鼻孔灌下

當歸生薑羊肉湯 方見心

竹葉湯 方見心 治產後中風病瘕發熱面正赤喘而頭痛

鮮竹葉 四十片

葛根 三錢

防風 一錢

桔梗

桂枝

人參

附子 炮

甘草 各一錢

大棗 五枚

生薑 五錢

水三杯煎八分溫服溫覆使汗出日夜作三服

頭項強加附

子五分前藥揚去沫嘔者加半夏二錢

愚按自汗者去葛根加括蕁根三錢附子五分 產後瘕證十中只可

救一除此方外無一善方

甘麥大棗湯

甘草 三錢

小麥 一兩 六錢

大棗 十枚

水三杯煎一杯服日作三服

金匱方只錄五首餘見拙著金匱

淺說金匱讀內二書即欲梓行集隘不能盡登

小兒科方

小兒無專方以上諸方折為小劑用之今兒科開口即曰食曰驚曰風曰疳所用之藥大抵以鈎藤秦羌防風羌活

獨活天麻前胡全蝎殭蠶為祛風之品硃砂牛黃膽星石菖蒲天竺黃代赭石青黛赤芍金銀煎湯為定驚之品以

杏仁葶藶酒芍藥白皮半夏麩蘇陳皮貝母天花粉之類謂為通用調氣化痰之善藥父傳子師傳徒其方殺人
之具也錢仲陽以金石之藥為倡猶有一二方近道處至鐵鏡采薇湯則亂道甚矣近日兒科只用以上所列諸藥
任意寫來造孽無已實堪痛恨

鏘陰陽

識一字便可為醫說

客有問於余曰醫之為道乃古聖人洩天地之秘奪造化之權起死回生非讀破萬卷書參透事事物物之理者不
能今非通儒而業此亦能療人病獲盛名何也余曰天地間有理有數理可勝數則有學問之醫遠近宗之遂得以
盡其活人之道然仲景為醫中之聖尚未見許於當時觀傷寒論之序文可見猶宣聖以素王老其身天之意在萬
世不在一時也仲景之後名賢輩出類皆不得志於時閉門著書以為傳道之計而喻嘉言柯韻伯二先生書尤感
憤而為不平之鳴此理數之可言而不可言者矣今之業醫者無論不足為通儒而求其識字者則為良醫矣無論
其識多字也只求其識一字者亦可以為良醫矣客曰此何字也得毋所謂丁字乎余曰亦其類耳不必他求即人
字是也人乃陰精陽氣合而成之者也左為陽左邊一人陽之位也右為陰右邊一人陰之位也作書者遇一人處自
然輕手揮之陽主乎氣輕清之氣也遇一人處自然重手頓之陰主乎精重濁之象也兩畫不相離陰陽互根之道也
兩畫各自位置陰陽對待之道也人在左者不可使之右人在右者不可使之左陰陽不雜之道也左人由重而輕
萬物生於水即男女媾精萬物化生之義由陰而陽也右人由輕而重形生於氣即大哉乾元乃統天至哉坤元乃
順承天之義陽統乎陰也二者合之則成人合之之義醫書謂之曰抱周易名之曰交交則為泰矣試以形景淺言
之人之鼻下口上水溝穴一各人中取人身居乎天地中之義也天氣通於鼻地氣通於口人居其中故曰人中
人中而上目鼻耳皆兩竅偶自人中而下口與二便皆單竅奇上三畫偶而為陰下三畫奇而為陽取地天之義合
成泰卦也形景主外猶必合陰陽之象而成人况人之所以生之理乎人之為義大矣哉子若遇醫者問此一字恐
高車駟馬誦誦以名醫自負者亦一字不識也客聞予言亦大笑而去

臟腑

十二官

靈蘭秘典論云心者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣按此以脾胃合為一官恐錯簡耳刺法補遺篇云脾者諫議之官知周出焉胃者倉廩之官五味出焉採此補入方是十二官之數

心說

心火臟身之主神明之舍也小篆當言心字篆文只是一倒火字耳蓋心火也不欲炎上故顛倒之以見調燮之妙也祝無功曰庖氏一畫直豎之則為ノ左右倚之則為ノ為ノ縮之則為ノ曲之則為ノ圓而神一ノ方以直世間字變化浩繁未有能外一ノノ結構之者獨心字欲動欲流圓妙不居出之乎一ノノ之外更索一字與作對不得正以心者新也神明之官變化而日新也心主血脈血脈日新新新不停則為平人否則病矣其合脈也其榮色也開竅於舌

肝說

肝木臟魂所藏也肝者幹也以其體狀有枝幹也又位於東方而主生氣時醫昧其理反云肝無補法宜涼宜伐只泥木尅土之一說而不知後天八卦配河圖之象三八為木居東即後天震巽之位巽上坤下則為觀易曰觀天之神道而四時不忒上坤下震則為復易曰復其見天地之心乎為義大矣哉其合筋也其榮爪也開竅於目

脾說

脾為土臟藏意與智居心肺之下故從卑又脾者裨也裨助胃氣以化穀也經云納穀者曰其在此乎其合肉也其榮唇也開竅於口

肺說

肺金臟魄所藏也肺者沛也中有二十四孔分布清濁之氣以行於諸臟使沛然莫禦也內經曰肺惡寒又曰形寒飲冷則傷肺勿只守火尅金之一說也其合皮也其榮毛也開竅於鼻

腎水臟藏精與志華元化謂為性命之根也又腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓危言曰腎者神也妙萬物而言也其合骨也其榮髮也開竅於二陰

胃說

胃屬土脾之腑也為倉廩之官五穀之府故從田田乃五穀所出以為五穀之市也又胃者衛也水穀入胃游溢精氣上出於肺暢達四肢布護周身足以衛外而為固也

膽說字從詹不從旦胆音檀乃口指澤也與膽不同今從胆者乃傳襲之訛也

膽屬木肝之腑也為中正之官中清之府十一經皆取決於膽人之勇怯邪正於此詹之故字從詹又膽者擔也有膽量方足以擔天下之事肝主仁仁者不忍故以膽斷膽附於肝之短葉間仁者必有勇也

大腸小腸說

大腸傳道之官變化出焉屬金為肺之腑小腸受盛之官化物出焉屬火為心之腑人納水穀脾氣化而上升腸則化而下降蓋以腸者暢也所以暢達胃中之氣也腸通暢則為平人否則病矣

三焦說

三焦者上中下三焦之氣也焦者熱也滿腔中熱氣布護能通調水道也為心包絡之府屬火上焦不治則水泛高源中焦不治則水留中脘下焦不治則水亂二便三焦氣治則脈絡通而水道利故曰決瀆之官

手心主說包絡

心乃五臟六腑之大主其包絡為君主之外衛相火代君主而行事也所以亦有主名何以繫之以手蓋以手厥陰之脈出屬心包手三陽之脈散絡心包是手與心主合故心包絡稱手心主五臟如此一臟實六臟也

膀胱說

膀胱屬水為腎之腑經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣言其能得氣化而津液外出滋潤於皮毛也若水道之專司則在三焦之腑故經云三焦者決瀆之官水道出焉言其熱氣布護使水道下出而為溺也內經兩出字一為外出一為下出千古罕明其旨茲特辨之又膀胱者光也言氣海之元氣足則津液旁達不窮而

肌腠皮毛皆因以光滑也

命門說

越人指右腎為命門諸家非之余攷內經太陽根於至陰結於命門命門者目也靈樞結根篇衛氣篇素問陰陽雜
含論三說俱同後讀黃庭經云上有黃庭下闕元後有幽門前命門方悟其處凡人受生之初先天精氣聚於臍下
當闕元氣海之間其在女者可以手捫而得俗名產門其在男者於泄精之時自有闕闕知覺此北門鎖鑰之司人
之至命處也又攷越人七衝門之說謂飛門唇也戶門齒也吸門會厭也賁門胃之上口也幽門大腸下口也闕門
小腸下口也魄門肛門也便溺由氣化而出又增溺竅為氣門凡稱之曰門皆指出入之處而言也况身形未生之
初父母交會之際男之施由此門而出女之受由此門而入及胎元既足復由此門而生故於八門之外重之曰命
門也若夫督脈十四椎中有命門之穴是指外腧而腧如五臟六腑一理非謂命門即在此也

經絡

經絡歌訣

汪訥菴本草備要後附此宜熟讀之毋庸再著

四診

望色

春夏秋冬長夏時

青黃赤白黑隨宜

左肝右肺形呈頰

心額腎頤鼻主脾

察位須知生者吉

審時若遇尅堪悲

更於黯澤分新舊

隱隱微黃是愈期

又有辨舌之法舌上無胎為在表鮮紅為火淡白為寒胎之淡白也

若有白胎為半表半裏黃胎為在裏黑胎

病入少陰多死胎潤有液為寒胎燥無液者為火舌上無胎如去油腰子為亡液不治

聞聲性傳自

肝

怒聲呼

心

喜笑

脾

為思念發為歌

肺

金憂慮形為哭

腎

主呻吟恐亦多

又法氣衰言微者為虛氣盛言厲者為實語言首尾不相顧者神昏狂者怒罵者實熱痰聲漉漉者死久病聞呃

為胃絕大抵語言聲音以不異於平時者吉反者為凶

問證出景岳全書張

一問寒熱二問汗 三問頭身四問便 五問飲食六問胸 七聲八渴俱當辨 九問舊病十問因

再兼服藥參機變 婦人尤必問經期 遲速閉崩皆可見 再添片語告兒科 天花麻疹度占驗

切脈

微茫指下最難知條緒尋來悟治絲結代準動細為九道李瀕湖李士林以沉微遲緩濡伏弱瀟為八裏以長短虛促

必得其頭緒如治三部分持成定法候高右關外以候心內以候胃內以候脾兩尺外以候肺內以候腎內以候胸中左關外以候肝內以

俱在其中前以候前後以候後上竟上者胸喉中事也八綱易見是良規見也遲主寒數主熱二脈於指下輕重辨之易

下竟下者小腹腰股膝脛中事也此照內經分配之法也

分之易見也大主邪實細主虛二脈以形之闊窄分之易見也長主素盛短主素弱二脈以息之至數分

根本受氣於胃而肺土具衝和脈委蛇氣不堅直而和緩也脈得中土之生臟氣全憑生剋驗審臟氣之生剋為第二要

是則洪火剋金也反天時且向逆從窺推天運之順逆為第一要如春氣屬木肺宜弦陽為浮數形偏亢仲景以浮

為陽凡脈之陰則沉遲勢更卑仲景以沉瀟弱弦遲為陰凡脈病之無力者皆是此又提外感陰來非吉兆外感之證

而反細弱則內虛陽陷實堪悲脫血之後脈宜靜細而諸凡偏勝皆成病而細弱皆病也忽變非常即弗醫舊訣

咳屋漏魚翔蝦遊彈石解索釜沸七怪只此數言占必應脈經鋪叙總支離病之名有萬而脈象不過數十種且一

病耶脈種之脈無不書欺人之語最不可聽

張飛疇運氣不足憑說

諺云不讀五運六氣檢遍方書何濟所以稍涉醫理者動以司運為務曷知天元紀等篇本非素問原文王氏取陰

陽大論補入經中後世以為古聖格言孰敢非之其實無關於醫道也况論中明言時有常位而氣無定然猶諄諄

詳論者不過窮究其理而已縱使勝復有常而政方南北四方有高下之殊四序有非時之化百步之內晴雨不同

千里之外寒暄各異豈可以一定之法而測非常之變耶若熟之以資顧問則可苟奉為治病之法則執一不通矣

附刊上朱濟生論壽世保元書一條

此書蜀地廣行余客蜀目覩時醫開方動引此書為據又有極稱此書婦科可用者而實不然如所載胎產一門謂產後十八證只有二方第一方共治十七證第一味為棕皮灰攷本草藥性棕皮濇可收脫燒灰黑能止血治吐血崩帶失血過多之證血證之初起尚云未可遽用乃所載十八證盡是惡露不下瘀血不行而乃用棕皮灰濇以收脫黑以止血有是理乎凡用藥者須細查本草藥性切勿率意照方服藥至近來不經之方書每多由勢利名目希圖廣售射利即如此太醫院等名目是也然此書選擇多有本之方其好處正不敢沒當擇用之

又議產後驚風證一條

此乃傷寒論太陽經證中剛痙柔痙之證也婦人新產去血過多陰虛陽盛其感冒發熱與小兒之血脈未充陽則有餘陰則不足易於傷寒者無別故有小兒驚風因有產後驚風之名但非感冒治而用解表解肌之藥多有得生者一作驚風治而用金石牛黃等藥則萬無生理嗟乎婦人小兒何不幸而屈死於此二字也前明喻嘉言先生有醫門法律一書甚得其解謹錄其寓意草中與門人問答一段以告世之業醫者

門人問曰驚風一證雖不見於古典然相傳數百年吾師雖闢其謬頑鈍輩不能無疑講明辨之以開聾瞶嘉言答曰此問亦不可少吾為子輩大破其惑因以破天下後世之惑蓋小兒初生以及童幼肌肉筋骨臟腑血脈俱未充長陽則有餘陰則不足不比七尺之軀陰陽交盛也惟陰不足陽有餘故身內易至生熱熱盛則生痰生風生驚勢所必然設有當日直以四字立名曰熱痰風驚則後人不無認因四字不便立名乃去其二字只以驚字領頭風字領尾遂以為奇特之病且謂此病有八候以其頭搖手緊也而立抽掣之名以其卒口噤腳攣急也而立目邪心亂搖擗之名以其脊強背反也而立角弓反張之名稱名不一不知其妄造遇見此等證出無不以為奇特而不知小兒之腠理未容易於感冒風寒風寒中人必先中入太陽經太陽之脈起於目內眥上額交顛入腦還出別下項夾脊抵腰是以筋脈牽強因筋脈牽強生出抽掣搖擗角弓反張種種不通名目而用金石藥鎮墜外邪深入臟腑千中千死萬中萬死間有體堅證輕得愈者又詫為再造奇功遂至各守專門雖日殺數兒不自知其罪矣百年之間千里之遠出一二明哲終不能一一盡剖疑闕如方中有云小兒八歲以前無傷寒此等胡言竟

出自高明偏足為驚風之說樹幟曾不思小兒不耐傷寒初傳太陽一經早已身強多汗筋脈牽動人事昏沉勢已極於本經湯藥亂投死亡接踵何由見其傳經解散耶此所以誤言小兒無傷寒也不知小兒易於外感易於發熱傷寒獨多世所妄稱為驚風者即是也小兒傷寒要在三日內即愈為貴若待傳經而解必不能耐矣又剛瘧無汗柔瘧有汗小兒剛瘧少柔瘧多世醫見其汗出不止神昏不醒往往以慢驚風立為名而用參耆朮附等藥閉其腠理熱邪不得外越亦為大害但比金石之藥為差減耳所以凡治小兒之熱但當徹其出表不當固其入裏仲景原有桂枝法若舍而不用從事東垣內傷為治毫釐千里最宜細詳又新產婦人去血過多陰虛陽盛其感冒發熱原與小兒無別醫者相傳稱為產後驚風尤堪笑破口頰要知吾聞驚風之說非謂無驚病也小兒氣弱神怯凡遇異形異聲驟然跌仆皆生驚怖其候面青糞青多煩多哭嘗過於分別不比熱邪塞竅神志昏迷對面撞鐘放銃全然不聞者細詳勘驗自識驚風擊空之謬子輩既遊吾門日引光明勝義洗濯肺腸忽然靈悟頓開便與飲上池無二若但於言下索解則不能盡傳者多矣

外附刻膏藥方一九藥方二

仲傳三妙膏專治癰疽發對口疔瘡無名腫毒濕痰流注楊梅結毒瘰癧馬刀婦人乳疽小兒丹毒湯火燒灼蝎螫蜂叮金刃所傷出血不止或跌撲打損疼痛難禁或風寒濕痺龍入經絡以致骨痛筋攣或濕熱橫入脈絡抵腰挫氣舉動難伸並大人小兒之五積六聚男婦之痞塊癥瘕皆宜用之此膏貼未成即消已成即潰潰而即斂故名之三妙真濟世之良方也藥列後

紫荆皮

獨活

白芷

赤芍

石菖蒲

大黃

黃柏

黃芩

千金子

黃連

當歸

桃仁

天花粉

紅花

蘇木

肉桂

金銀花

防風

荊芥

羌活

牛蒡子

麻黃

細辛

半夏

猪牙皂

烏藥

貝母

黃耆

川山甲

連翹

柴胡

苦參

白附子

僵蠶

鼈甲

全蝎

刺蝟皮

草烏

大戟

天麻

葶麻子

巴豆

防己

良薑

川牛膝

白芨

白欬

甘草

海風藤 血餘以上各五錢 蜈蚣三條 蛇退一條 右藥各切片用香油二百兩入大鍋內浸藥七日夜再入

桃柳桑槐枝各二十一一段每段寸許慢火熬至藥黑枯色濾去渣將鍋拭淨再以密絹仍濾入鍋內務要清潔為

美再用文武火熬至油滴水成珠大約淨油止得一百六十兩為准離火入上好飛丹八十兩以一手持槐木棍

以一手下丹不住手攪勻而膏自成再入預製細末藥

乳香去油八錢 沒藥去油八錢 血竭五錢 雄黃五錢 此四味另研先入攪勻再入後十味香珍亦預

木香 沉香 檀香 降香 楓香 丁香 藿香

麝香以上各五錢 珍珠一錢 冰片一錢 此十味徐入攪極勻再入樟腦五錢成膏收貯聽用

神驗疔毒丸 屢試屢驗救人無算

雄黃三錢 大黃三錢 巴豆三錢去心皮生用 右三味共合一處用石臼杵舂爛如泥以飛羅麵陳醋煮

糊同藥搗極細爛為丸如梧桐子大病重者二十三九輕者二十一九再輕者十九九單數為度放在舌上熱水

送下服後打噎則愈如泄更好俟泄三四次即以新汲水即井水飲之則止如病重不省人事將二十三九用滾

水和開從口角邊灌入服後將病人扶起端坐藥入腹中片刻即便甦醒至輕者可以不服初服藥時勿吃涼物

冷水恐不泄瀉忌雞魚葱蒜牛馬大肉并炙烤辛熱飲酒行房至七日方好不可疏忽按疔瘡乃外科迅速之病

有朝發夕死隨發隨死有三五日而不死至一月半月而終死者其瘡最惡其毒最烈治之方雖多而應手奏

效者實少此藥獨有起死回生之功真可謂之神授諸疔皆治但疔有數種部位既殊形色亦別其發甚微人多

疎忽不能盡述只以生黃豆令病人嚼之不覺其味即是速服此藥百無一失

二色丸

治痢及水瀉腸風

吳茱萸二兩 黃連二兩 湯泡七次同炒香各煉出各自為末以百草霜二兩同黃連作丸以白芍藥二

兩同茱萸作丸各用飯丸梧子大各收每服五十九赤痢烏梅湯下連霜丸白痢米飲下芍藥丸赤白痢各半服

此藥曾經試驗故附錄於此蜀東朱菊史識

