





C 6.9

R41277

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21901272_0002

FLORA BRITANNICA.

VOL. II.

-Ex libris Coll. R. J. Moore

FLORA BRITANNICA,

AUCTORE

J. E. S.

JACOBO EDVARDO SMITH, M.D.

SOCIETATIS LINNÆANÆ PRÆSIDE,

REGIÆ LONDINENSIS, HOLM. UPSAL. TAURIN. OLYSSIP.

PHILADELPH.—PHYSIOGR. LUND. BEROLIN. PARIS.

ALIARUMQUE SOCIETATUM SOCIO.

“ Nullius addictus jurare in verba magistri.”

HOR.

V O L. II.

L O N D I N I :

TYPIS J. DAVIS, CHANCERY-LANE :

VENEUNT APUD J. WHITE, FLEET-STREET.

MDCCC.

Classis X.

DECANDRIA.

Stamina 10.

MONOGYNIA.

Stylus 1.

* *Fl. polypetali.*

201. MONOTROPA. *Pet.* decem, quinque exteriorá basi gibba.
 204. PYROLA. *Pet.* quinque. *Anth.* poris duobus.

* * *Fl. monopetali, æquales.*

202. ANDROMEDA. *Cor.* ovata. *Capſ.* quinquelocularis.
 203. ARBUTUS. *Cor.* ovata, basi pellucida. *Bacca* quinquelocularis.

Vaccinium Myrtillus et uliginosum.

DIGYNIA.

Styli 2.

207. SCLERANTHUS. *Cor.* nulla. *Cal.* monophyllus. *Sem.* duo.
 205. CHRYSOSPLENIUM. *Cor.* nulla. *Cal.* coloratus. *Capſ.* birostris, polysperma.

206. SAXIFRAGA. *Pet.* quinque. *Cal.* quinquepartitus. *Caps.* birostris, polysperma.
 208. SAPONARIA. *Pet.* quinque. *Cal.* monophyllus, basi nudus. *Caps.* oblonga.
 209. DIANTHUS. *Pet.* quinque. *Cal.* monophyllus, basi squamosus. *Caps.* oblonga.

TRIGYNIA.

Styli 3.

213. ARENARIA. *Caps.* unilocularis. *Pet.* integra, patentia.
 212. STELLARIA. *Caps.* uniloc. *Pet.* bipartita, patentia.
 214. CHERLERIA. *Caps.* uniloc. *Gland.* nectarif. quinque ad basin staminum. *Pet.* nulla?
 210. CUCUBALUS. *Bacca* uniloc. *Pet.* bifida, unguiculata.
 211. SILENE. *Caps.* semitrilocularis. *Pet.* bifida, unguiculata. *Cal.* monophyllus.

PENTAGYNIA.

Styli 5.

215. COTYLEDON. *Caps.* quinque, squamâ nectariferâ ad basin. *Cor.* monopetala.
 216. SEDUM. *Caps.* quinque, squamâ nectariferâ ad basin. *Cor.* pentapetala.

217. OXALIS. *Caps.* quinquelocularis, angulata. *Sem.* bina, arillata. *Pet.* basi conexa.
219. LYCHNIS. *Caps.* quinque: vel uni-locularis, polysperma. *Cal.* tubulosus, membranaceus.
218. AGROSTEMMA. *Caps.* unilocularis. *Cal.* tubulosus, coriaceus.
220. CERASTIUM. *Caps.* unilocularis. *Pet.* bifida. *Cal.* pentaphyllus.
221. SPERGULA. *Caps.* unilocularis. *Pet.* integræ. *Cal.* pentaphyllus.

X. DECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

201. MONOTROPA. *G. Pl. 214. Juss. 430.*

*Cal. nullus. Petala 10; horum quinque exte-
riora basi excavata, mellifera. Capsula su-
pera, quinque-valvis. Quinta pars numeri qui-
busdam excluditur.*

Hypopi- 1. MONOTROPA floribus lateralibus octandris :
tys. terminali decandro.

Monotropa Hypopithys. *Sp. Pl. 555. Huds. 175.
With. 398. Sibth. 136. Abbot. 92. Engl.
Bot. t. 69. Fl. Dan. t. 232.*

Hypopitys lutea. *Raii Syn. 317.*

Orobanche hypopytis lutea. *Menz. Pugill. t. 3.
Moris. sect. 12. t. 16. f. 13.*

O. verbasculi odore. *Pluk. Phyt. t. 209. f. 5.
Angl. Yellow Bird's-nest.*

In fagetis vel pinetis, parasitica ad radices arborum.
Frequent in the counties of Oxford, Bedford, Buck-
ingham and Berks. *Huds.* In Stoken-church
woods. *Ray.* In Sussex, and near Tring, Hert-
fordshire. *Dill.* Near Uley, Gloucestershire.
Rev. Mr. Baker. In a fir wood at Shottisham,
near Stoke, Norfolk. *Mr. Crowe.*

Perennis. Fl. Junio.

Radix parasitica, carnosa, squamosa, fibris tenuissimis.
Herba succulenta, straminei coloris, marcescens odo-
rata, et demum nigricans. Caulis simplex, teres, fo-
liosus, apice racemosus. Folia squamiformia, sparsa.
Flores pedicellati; laterales octofidi, subinde sexfidi.
Bracteæ solitariæ, foliis conformes. Petala inæqualia,
decidua. Antheræ incumbentes. Stigma peltatum.

202. ANDROMEDA. *G. Pl. 219. Juss. 160.*
Gærtn. t. 63 & 178.

Cal. quinquepartitus. Cor. ovata, ore quinquefido. Capsula supera, quinquelocularis; dissepimentis e medio valvularum. Antheræ poris duobus.

1. ANDROMEDA pedunculis aggregatis terminalibus, foliis alternis lanceolatis revolutis subtus glaucis. *polifolia.*

Andromeda polifolia. *Sp. Pl. 564. Fl. Lapp. t. 1. f. 2. Hudſ. 176. With. 398. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 4. Fl. Dan. t. 54. Pallas. Roff. t. 71.*

Ledum palustre nostras Arbuti flore. *Raii Syn. 472.*

Erica humilis rosmarinifolia, unedonis flore, capsula cistoide. *Pluk. Phyt. t. 175. f. 1.*

Angl. Marsh Andromeda, or Wild Rosemary.

In paludibus turfosis.

On most peat bogs in the north of England and lowlands of Scotland.

Frutex. Fl. Junio.

Fruticulus humilis, ramosus, glaber. Folia sempervirentia, alterna, subpetiolata, lanceolata, acuta, revoluta, venosa, latitudine varia, subtus glauca. Pedunculi terminales, aggregati, subumbellati, basi bracteati, uniflori. Flores nutantes, carnei. Calyx ruber. Antheræ superne biaristatae. Capsula erecta, quinquesulcata. Semina plurima, exigua.

203. ARBUTUS. *G. Pl. 220. Juss. 160.*
Gærtn. t. 59.

Cal. quinquepartitus. Cor. ovata, ore quinquefido, basi pellucida. Bacca supera, quinquelocularis. Antheræ poris duobus.

Unedo. 1. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris obtusè serratis, paniculâ terminali, baccis polyspermis.

Arbutus *Unedo.* *Sp. Pl.* 566. *Suppl.* 238.
Huds. 177. *With.* 399. *Dicks. H. Sicc.*
fasc. 13. 16. *Mill. Ic.* t. 48.

Arbutus. *Raii Syn.* 464. *Ger. em.* 1496.
Camer. Epit. 168.

Angl. Strawberry-tree, or Arbutus.

In rupibus calcareis Hiberniæ occidentalis.

About the lake of Killarney plentifully. *Mr. Crowe.*

Fruter. Fl. Septembri.

Arbuscula formosa, sempervirens. Folia elliptico-lanceolata, obtusa, obtusè serrata, glaberrima, petiolata, alterna. Paniculæ terminales, nutantes, multifloræ, bracteolatæ, glabræ. Calycis laciniæ obtusæ. Corolla albida, interdum rubicunda. Stamina subulata, subcomplanata, hirsuta. Antheræ rubræ, inflexo-pendulæ, obtusæ, basi biafristatæ et poris duobus dehiscentes. Germen globosum, granulatum. Stylus cylindricus. Stigma peltatum. Baccæ fragariæformis, tuberculata, rubra, subdulcis, polyspermæ.

alpina. 2. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis rigosis serratis.

Arbutus *alpina.* *Sp. Pl.* 566. *Huds.* 177.
With. 399. *Lightf.* 215. t. 11. fig. a. b.
Fl. Dan. t. 73.

Vaccinia pannonica sive Vitis Idæa. *Ger. em.* 1416.

Vitis Idæa. *Clus. Hist.* v. 1. 61.

Angl. Black-berried alpine Arbutus.

In petrosis aridis alpinis.

On mountains to the south of Little Loch Broom
 in Ross-shire, and between that lake and Loch
 Mari

Mari abundantly, as well as on other highland mountains. *Lightf.*

Frutet. Fl. Maio.

Caules lignosi, ramosi, prostrati, cortice deciduo. Folia alterna, obovata, acuta, ferrata, reticulato-venosa, rugosa, glabra; basi in petiolum attenuata, et utrinque ciliata. Flores racemosi, terminales, albi; pedunculi basi bracteati, bracteis concavis, ciliatis. Baccæ globosæ, nigræ, umbilicatæ, pentaspermæ.

3. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis *Uva ursi*. integerrimis.

Arbutus Uva ursi. Sp. Pl. 566. Fl. Lapp. t. 6. f. 3. Huds. 177. With. 399. Lightf. 216. t. 11. fig. c. d. Fl. Dan. t. 33. Woodw. Med. Bot. t. 70.

Vaccinia rubra foliis myrtinis crispis. Raij Syn. 457.

V. ursi, sive *Uva ursi* apud Clusium. Ger. em. 1416.

Uva ursi, folium. Pharmac. Lond.

Angl. Red-berried trailing Arbutus.

In petrosis et ericetis aridis alpinis.

Common throughout the highlands and western isles; also at the top of East-Common-Wood, near Hexham, Northumberland. *Lightf.*

Frutet. Fl. Junio.

Caules lignosi, procumbentes, ramosi, cortice lœvi. Folia alterna, petiolata, obovata, obtusa, integerrima, reticulato-venosa, glabra, sempervirentia. Racemi terminales, breves, recurvi, subpubescentes, bracteolati. Flores incarnati. Baccæ depressæ, rubræ, pentaspermæ, austerae.

204. PYROLA. G. Pl. 221. Jiff. 161.

Gærtn. t. 63.

Cal. quinquepartitus. Petala 5. Capsula supra, B 4.

pera, quinquelocularis, angulis dehiscens, polysperma. Antheræ poris duobus.

rotundi-folia. 1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato, racemo multifloro.

Pyrola rotundifolia. *Sp. Pl.* 567. *Huds.* 175. *With.* 400. *Engl. Bot.* t. 213. *Fl. Dan.* t. 110.

Pyrola. *Raii Syn.* 363. *Ger. em.* 408. *Camer. Epit.* 723. *Baub. Hist.* v. 3. p. 2. 535.

P. vulgarior. *Clus. Hist.* v. 2. 116. *Moris. sect.* 12. t. 10. f. 1.

Limonium. *Fuchs. Hist.* 467.

L. sylvestre. *Trag. Hist.* 707.

Angl. Round-leaved Winter-green.

In dumetis, præcipue montosis, rariūs.

On a common at Bradwell, near Gorlestone, Suffolk. *Mr. Wigg.* In some woods in Scotland. *Mr. Donn.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules angulati, breves, foliosi. Folia alterna, petiolata, subrotunda, obsoletè ferrata, glaberrima. Pedunculus terminalis, spithameus, bracteis sparsis vestitus. Racemus terminalis, erectiusculus, multiflorus. Pedicelli alterni, basi bracteâ lanceolatâ. Flores nutantes, albi. Stamina adscendentia ad latus floris superius. Antheræ inflexo-dependentes, quadrisulcatæ, muticæ, poris ad basin duobus, subtubulosis. Germen depresso, quinquesulcatum. Stylus declinatus, apice recurvus, staminibus longior. Stigma rotatum, quinque-tuberculatum.

minor. 2. PYROLA staminibus pistilloque rectis, floribus racemosis dispersis.

Pyrola minor. *Sp. Pl.* 567. *Huds.* 176. *With.* 401. *Sibth.* 136. *Abbot.* 92. *Engl. Bot.* t. 158. *Fl. Dan.* t. 55. *Dill.* in *Raii Syn.* 363.

Angl.

Angl. Lesser Winter-green.

In nemorosis montosis muscosis.

In several parts of Scotland and the north of Yorkshire; also in Stoken-church woods, Oxfordshire. This is the species found in most of the places of growth mentioned for the *P. rotundifolia*, as Hackfall woods, according to the observations of Mr. Dawson Turner; Ray, Lightfoot, Curtis, Bobart and others having confounded it with that species.

Perennis. Fl. Julio.

Habitus præcedentis, sed minor. Pedunculus ferè nudus, vel bracteâ solitariâ tantùm munitus. Racemus erectus. Flores minores, sæpè rubicundi. Stamina undique patentia. Pori antherarum dilatati, nec tubulosi. Stylus brevissimus, rectus. Stigma peltatum.

3. PYROLA racemo unilaterali.

secunda.

Pyrola secunda. Sp. Pl. 567. Huds. 176.

With. 401. Dicks. H. Sicc. fasc. 5. 8. Engl. Bot. l. 517. Fl. Dan. t. 402.

P. folio mucronato ferrato. Raii Syn. 363.

P. folio ferrato. Bauh. Hist. v. 3. p. 2. 536.

P. secunda tenerior. Clus. Hist. v. 2. 117. Gerem. 408.

Ambrosia montana. Dalech. Hist. 1148.

Angl. Serrated Winter-green.

In sylvis alpinis muscosis.

In fir or birch woods in the highlands of Scotland in many places. Near Moffat. Rev. Dr. Walker. Forest of Darnway on the hill of Dunnairn near Brodie-house. J. Brodie, Esq.

Perennis. Fl. Julio.

Caules ramosi, procumbentes, ramulis erectis, foliosis.

Folia petiolata, ovata, acutiuscula, ferrulata, reticulato-venosa,

venosa, glabra. Pedunculi terminales, solitarii, palmates, bracteis paucis, sparsis, muniti. Racemi multiflori. Flores secundi, virescenti-albi, nutantes, pedicellis basi bracteatis. Calyx parvus. Petala oblonga, concava. Antheræ ut in *P. minore*. Stylus longus, rectus, persistens. Stigma peltatum, gibbosum.

uniflora, 4. PYROLA pedunculo unifloro.

Pyrola uniflora. *Sp. Pl.* 568. *Engl. Bot.* t. 146.

With. 401. *Fl. Dan.* t. 8.

P. quarta minima. *Chus. Hist.* v. 2. 118. *Ger.* em. 408.

P. minima alpina. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2. 536.

Angl. Single-flowered Winter-green.

In sylvis alpinis, saepius ad fontes muscosos.

In fir woods near Brodie-house in Moray, Scotland.

Mr. James Hoy. On the islands of Harris and Bernera among the Hebrides, gathered there about the year 1783 by Mr. James Hoggan.

Mr. Gotobed.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules breves, simplices, angulati, foliosi. Folia obovata, obtusa, ferrulata, glabra, petiolata. Pedunculus solitarius, folia superans, erectus, uniflorus. Flos nutans, albus, in hoc genere maximus, fragrans, odore Convallariae majalis, subinde rubro lineatus. Antheræ tubis ad basin binis, quibus pollen emittitur, Stylus rectus. Stigma quinqueradiatum.

II. DIGYNIA.

205. CHRYSOSPLENIUM. *G. Pl. 222.*

Juss. 309. Gærtn. t. 44.

Cal. quadrifidus seu quinquefidus, coloratus. *Cor-*
nulla. *Capsula* birostris, unilocularis, semi-
inserus, seinibivalvis, polysperina.

1. CHRYSOSPLENIUM foliis alternis.

Chrysosplenium alternifolium. *Sp. Pl. 569. folium*

Huds. 179. With. 401. Engl. Bot. t. 54.

Fl. Dan. t. 366. Dicks. H. Sicc. fasc. 3. 13.
Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis insiden-
tibus. *Raii Syn. 158.*

S. aurea Dodonæi. *Bauh. Hist. v. 3. p. 2. 707.*
Sedum rotundifolium palustre, foliis pediculis
longis insidentibus. *Morif. sect. 12. t. 8. f. 8.*

Long' Golden Saxifrage. *Pet. H. Brit. t. 6.*
f. 10.

Angl. Alternate-leaved Golden Saxifrage.

Ad scaturigines umbrosas, solo spongioso, rariūs.

On Poringland heath near Norwich. In several
 places in Yorkshire, and other parts of the north
 of England. Below Polton-house opposite to
 Laffwade, 5 miles south of Edinburgh.

Perennis. Fl. Maio.

Radix fibrosa, repens. Herba succulenta, fragilis. Cau-
 lis triqueter, simplex, basi densè foliosus, medium ver-
 sus folio solitario. Folia alterna, petiolata, reniformia,
 duplicato-crenata, subpilosa. Corymbus terminalis,
 dichotomus, foliosus. Flores aurei, plerumque qua-
 drifidi, centralis tantum quinquefidus decandrus.

2. CHRY-

- oppositi-* 2. **CHRYSOSPLENIUM** foliis oppositis.
folium. Chrysosplenium oppositifolium. *Sp. Pl.* 569.
Huds. 178. *With.* 402. *Sibth.* 137. *Ab-*
bot. 93. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t. 27.* *Engl.*
Bot. *t. 490.* *Fl. Dan.* *t. 365.*
Saxifraga aurea. *Raii Syn.* 158. *Dod. Pempt.*
316. *Ger. em.* 841. *Lob. Ic.* 612.
Sedum palustre rotundifolium, flore luteo. *Mo-*
rif. sect. 12. *t. 8. f. 7.*
Golden Saxifrage. *Pet. H. Brit.* *t. 6. f. 9.*
Angl. Opposite-leaved Golden Saxifrage.

Ad scaturigines umbrosas.

Perennis. Fl. Maio.

Habitus præcedentis, sed pallidior. Caulis subinde ra-
mosus. Folia opposita, subcordata, repanda, nec du-
plicato-crenata. Flores omnes sæpius quadrifidi, oc-
tandri.

206. SAXIFRAGA. *G. Pl.* 223. *Juss.* 309.
Gærtn. *t. 36.*

Cal. quinquefidus, persistens. *Cor.* pentapetala.
Capsula birostris, unilocularis, polysperma,
inter rostra dehiscens.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

- stellaris.* 1. **SAXIFRAGA** foliis ferratis, caule nudo ra-
moso, petalis acutis, capsulâ superâ.
Saxifraga stellaris. *Sp. Pl.* 572. *Huds.* 179.
With. 402. *Engl. Bot.* *t. 167.* *Fl. Dan.*
t. 23. *Jacq. Coll.* *v. 1. 202. t. 13.* *Scop.*
Carn. *v. 1. 292. t. 13.*

Geum palustre minus, foliis oblongis crenatis.
Raii Syn. 354.

Saniculæ alpinæ aliquatenus affinis. *Bauh. Hist.*
v. 3. p. 2. 708.

Angl.

Angl. Hairy Saxifrage.

Ad rivulorum margines in umbrosis alpinis.
On the mountains of Wales, Scotland, and West-
moreland abundantly.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa, cæspitosa. Caules basi foliosi et subradi-
cantes, supernè nudi, erecti, teretes, pilosi, apice pani-
culati. Folia congesta, obovato-cuneiformia, apice in-
ciso-ferrata, margine præcipue pilosa. Panicula pau-
ciflora. Bracteæ lanceolatæ, seu trifidæ. Calyx re-
flexus. Petala ovata, unguiculata, trinervia, alba, ma-
culis binis, transversis, flavis. Stamina subulata, basi
connexa. Germen omnino superum, ovatum. Cap-
sula membranacea, nervosa, glabra. Semina lineis ele-
vatis, tuberculatis, longitudinalibus, scabra.

2. SAXIFRAGA foliis obovatis serratis, caule *nivalis*,
nudo, floribus congestis, capsulâ semiinferâ.

Saxifraga nivalis. Sp. Pl. 573. Fl. Lapp. t. 2.
f. 5. Hudf. 180. With. 403. Lightf. 221.
t. 12. Engl. Bot. t. 440. Dicks. H. Sicc.
fasc. 1. 7. Fl. Dan. t. 28.

S. foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus com-
pactis. Raii Syn. 354. t. 16. f. 1.

Angl. Clustered Alpine Saxifrage.

In summis alpibus Scoticis et Cambro-britannicis.
North Wales. Mr. Griffith. Clefts of rocks on
the top of Ben Lomond.

Perennis. Fl. Julio.

Habitus præcedentis, sed folia latiora, magisque carnosa.
Caulis nudus, apicem versus piloso-viscidus. Flores
congesti, basi bracteâ lanceolatâ. Calyx semisuperus.
Petala viridi maculata.

Variat caule subinde unifloro, frequentius tamen ramoso,
floribus paniculatis; at semper a præcedente certo cer-
tius distinguenda germine semiinfero, nec supero.

umbrosa. 3. SAXIFRAGA foliis obovatis subretusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato, capsula superâ.

Saxifraga umbrosa. *Sp. Pl.* 574. *With.* 403.
Hull. 92. *Engl. Bot.* t. 663.

Geum folio subrotundo minori, pistillo floris rubro. *Magnol. Hort.* 88. t. 14. (majori)
Mill. Ic. t. 141. f. 2. *Dill. in Raii Syn.* 355.
Angl. London Pride. None-so-pretty.

In montibus.

On a mountain called the Mangerton, two miles from Killarney. *Dr. Molyneux.* Mountains near Sligo. *Mr. Lhwyd.* On Croagh Patrick in the county of Mayo, 2666 feet above the level of the sea. *A. B. Lambert, Esq.* In Thorp Arch woods near Wetherby. *Sir T. Frankland* and *Dr. White.* Betwixt Arncliffe and Horton in Craven, Yorkshire. *Mr. Bingley.*

Perennis. Fl. Junio.

Folia plurima, aggregata, patentia, petiolata, obovata, obtusa, in petiolum decurrentia, cartilagineo-crenata vel serrata, lævia, glaberrima. Scapus spithameus, erectus, ruber, pilosus, paniculatus. Flores erecti. Bracteæ parvæ, alternæ. Calyx demùm reflexus. Petala obovato-lanceolata, alba, sanguineo flavoque punctata. Germen omnino superum, roseum. Capsula ventricosa, apice purpurea.

* * *Foliis indivisis, caule folioso.*

oppositi- 4. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis : summis ciliatis.

Saxifraga oppositifolia. *Sp. Pl.* 575. Fl. *Lapp.* t. 2. f. 1. *Huds.* 180. *With.* 404. *Engl. Bot.* t. 9. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 2. 6. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 27. *Fl. Dan.* t. 34.

S. alpina ericoides flore cæruleo. *Raii Syn.* 353.
Sedum

Sedum alpinum ericoides cæruleum. *Baub.*

Hist. v. 3. p. 2. 694. Moris. sect. 12. t. 10.

f. 36.

Angl. Purple Saxifrage.

In rupibus et petrofis alpinis.

On the west side of the summit of Ingleborough hill, Yorkshire. *Dr. Richardson.* On Snowdon plentifully. *Mr. Lhwd.* On Ben Lomond, and other Scottish mountains.

Perennis. Fl. Aprili.

Caules longissimi, prostrati, cæspitosi, vel e scopolis præruptis penduli, ramosi, foliosi, ramulis floriferis erectis. Folia opposita, imbricata, obtusa, carnosæ, concava, cærinata, ciliata; floralia remotiora. Flores terminales, solitarii, purpurei, formosi. Petala nervosa, obovata. Germen semiinferum.

5. SAXIFRAGA foliis caulinis lanceolatis alternis *Hirculus* inermibus, caule erecto, germine ovato sulcuso.

Saxifraga Hirculus. Sp. Pl. 576. Hud. 181.

With. 404. Curt. Lond. fasc. 6. t. 26. Fl. Dan. t. 200.

S. n. 972. Hall. Hist. v. 1. 417. t. 11.

S. angustifolia autumnalis, flore luteo guttato. Breyn. Cent. 1. 48.

Geum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. Dill. in Raii Syn. 355.

Sedum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. Moris. sect. 12. t. 8. f. 6.

S. palustre Nardi Celticæ foliis flore luteo. Ibid. f. 5.

Chamæcistus Frisicus. Ger. em. 1284:

Angl. Yellow Marsh Saxifrage.

In paludibus turfosis rarissimè.

On

On Knutsford moor, Cheshire; Dr. Kingstone.
Dill.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix fibrosa. Caules erecti, spithamæi, teretes, foliosi, pilosi, basi ramosi, ramulis brevibus, decumbentibus. Folia alterna, lanceolata, obtusa, integerrima, utrinque glabra, margine subinde pilis mollibus ciliata. Panicula subtriflora, terminalis. Calyx reflexus. Petala obovata, nervosa, aurea, basi appendiculata, ad medium usque croceo maculata. Germen ovato-oblongum, omnino superum.

aizoides. 6. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis dentato-ciliatis, caule basi decumbente, germe depresso semiinfero.

Saxifraga aizoides. Sp. Pl. 576. Hudſ. ed. 1. 158. With. 404. Engl. Bot. t. 39.

S. autumnalis. Hudſ. 180. Lightf. 222. Fl. Dan. t. 72. Scop. Carn. v. 1. 293. t. 14.

S. alpina angusto folio, flore luteo guttato. Raii Syn. 353.

Sedum alpinum primum. Chys. Pann. 485. Ger. em. 516.

S. alpinum flore pallido. Moris. ſect. 12. t. 6. f. 3.

S. parvum montanum luteum. Baub. Hist. v. 3. p. 1. 693.

Angl. Yellow Mountain Saxifrage.

Ad rivulc alpinos copiosè.

On most the Westmoreland and Scottish mountains.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules aggregati, basi decumbentes atque ramosi, foliosi, teretes, glabriuscui, apice erecti, paniculati. Folia alterna, fessilia, lineari-oblonga, obtusa, margine plerumque dentato-ciliata. Panicula vel simplex pauciflora, vel ramosa multiflora, foliosa. Calyx, etiam in fructu, erecto-

erecto-patens. Petala lingulata, enervia, aurea, rubro punctata. Germen depresso. Capsula ovata, semi-infera.

* * * *Foliis lobatis.*

7. SAXIFRAGA foliis reniformibus lobatis, caule granulato paniculato, radice granulata, germine semi-infera:

Saxifraga granulata: Sp. Pl. 576. Huds. 182.

With. 405. Relb. 166. Sibb. 137. Abbot. 93. Curt. Lond. fasc. 1. t. 30. Dicks. H. Sicc. fasc. 5. 5. Engl. Bot. t. 500. Freeman. Ic. t. 1. Woodv. Suppl. t. 232.

S. rotundifolia alba. Raii Syn. 354.

S. alba. Ger. em. 841.

S. major seu alba. Fuchs. Hist. 747.

Saxisfragia. Brunf. Herb. v. 1. 185.

Angl. White Saxifrage.

In pratis et pascuis, solo imprimis glareoso.

Perennis. Fl. Maio.

Radix granulata. Caulis erectus, teres, pubescens, foliosus, subviscosus, paniculatus, rubicundus. Folia reniformia, subcarnosa, lobata et incisa; caulina alterna, subsessilia; radicalia petiolata. Calyx erectus, pilosoglandulosus. Petala obovata, nervosa, nervis ramosis, alba, impunctata. Germen semiinferum.

Flore pleno in hortis vulgaris est.

8. SAXIFRAGA foliis palmatis petiolatis, caule *cernua*, bulbifero, germine supero, petalis retufis.

Saxifraga cernua. Sp. Pl. 577. Fl. Lapp. t. 2.

f. 4. Dicks. Tr. of Linn. Soc. 10. 2. 290.

With. 405. Hull. 93. Engl. Bot. t. 664.

Saxifraga. Fl. Dan. t. 390.

Angl. Drooping bulbous Saxifrage.

In rupibus irriguis alpinis.

On the summit of Ben Lawers. Mr. Dickson.

Pereennis. Fl. Julio.

Radix squamata. Caulis spithameus, erectus, teres, foliosus, glabriusculus, plerumque simplex uniflorus, interdum ramosus. Folia petiolata, alterna, reniformia, palmato-lobata, subcarnosa, glabriuscula; superiora indivisa et sessilia, axillis gemmiparis. Flos terminalis, solitarius, nutans, albus. Calycis laciniæ ellipticæ, erectæ, pilosæ. Petala unguiculata, retusa et subemarginata, trinervia, nervis basi connatis, superne ramosis et evanescentibus. Germen omnino superum. Talis est planta nostra, quæ iconi et descriptioni in Flora Lapponica optimè respondet. Fl. Dan. t. 22 alia species videtur, cui petala acutiuscula sunt, caulis nunquam non simplex, uniflorus.

rivula- 9. SAXIFRAGA foliis palmatis petiolatis; summo spatulato, caule paucifloro, radice fibrosâ, germine semiinfero.

Saxifraga rivularis. Sp. Pl. 577. Fl. Lapp. n. 174. t. 2. f. 7. ed. 2. p. 142. Fl. Dan. t. 118.

Angl. Alpine Brook Saxifrage.

In rivulis, et rupium fissuris irriguis, alpinis.

On Ben Nevis, Scotland. Dr. Townson.

Pereennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Caulis plerumque solitarius, biuncialis, erectus, simplex, biflorus, interdum quinqueflorus. Folia longè petiolata, alterna, subreniformia, palmata, tri- vel quinque-loba, glabra; summa spatulata, indivisa. Flores erecti, parvi, albi. Calyx basi piloso-viscidus. Petala acuta, uninervia. Germen ovatum, semiinferum.

tridaeby- 10. SAXIFRAGA foliis cuneiformibus trifidis
lites. quinquefidiisve alternis: summis indivisis, caule paniculato, germine infero.

Saxifraga tridaebylites. Sp. Pl. 578. Hudf. 182. With. 406. Relb. 166. Sibth. 138. Lightf. 224. Abbot. 93. Curt. Lond. fasc. 2. t. 28. Dicks.

Dicks. H. Sicc. fasc. 8. 10. Engl. Bot. t. 501.

S. verna annua humilior. Rau Syn. 354.

Paronychia rutaceo folio. Ger. em. 624.

Angl. Rue-leaved Saxifrage.

In muris, tectis, et aridis incultis:

Annuo. Fl. Maio.

Radix fibrosa. Herba succulens, pubescens, viscosa, rubicunda, magnitudine maximum varia. Folia palinata, basi angustata. Panicula erecta, foliolosa. Flores parvi, albi. Petala obovata, uninervia. Germen omnino inferum, urniforme.

11. SAXIFRAGA foliis radicalibus aggregatis cæspitosa. carnosis linearibus integris trifidisve subtus sa. nervosis, caule nudiusculo subbifloro.

Saxifraga cæspitosa. Sp. Pl. 578. Scop. Carn.

v. 1. 293. t. 14.

Angl.: Tufted Alpine Saxifrage.

In rupibus alpinis.

On alpine rocks above lake Idwell in Carnarvonshire, rare. *J. W. Griffith, Esq. in Herb. Soc. Linn.*

Perennis. Fl. Junio.

Radix cæspitosa. Caulis biuncialis, erectus, parum foliosus, teres, pilosus, subbiflorus. Folia radicalia congesta, numerosa, carnosa, ciliata, linearia, obtusa, integra vel trifida, subtus triplinervia; caulina alterna, saepius indivisa, subinde tripartita. Flores terminales, pedunculati, erecti, flavecentes. Calyx hemisphaericus, pilosoviscidus, laciniis obtusis, denudatis. Petala obovata, integerrima, triplinervia. Capsula omnino ferè infera.

12. SAXIFRAGA foliis radicalibus aggregatis moschata. membranaceis linear-lanceolatis integris trifida.

C 2

fidisve

fidisve triplinerviis, caule nudiusculo subbifloro.

Saxifraga moschata. *Murr. in Linn. Syst. Veg. ed. 14.* 414. *Jucq. Misc. v. 2.* 128. *t. 21.* *f. 21?* *With. 406.*

S. cæspitosa. *Huds.* 181?

S. n. 985. *Hall. Hist. v. 1.* 421.

Saxifragia pyrenaica, foliis partim integris, partim trifidis. *Hall. Opusc. It. Helvet.* *t. 1.* *Angl.* Musky Alpine Saxifrage.

In rupibus alpinis.

Mountains above Ambleside, Westmoreland?

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Habitus præcedentis, sed folia longè tenuiora, omnia ferè indivisa, ultra medium triplinervia. Petala flaveola, triplinervia. Germin inferum. Herba odorata, viscosa. Exemplaria spontanea nunquam yidi. Locus in Flora Britannicâ e Cl. Witheringii auctoritate pendet. Figura apud Jacquinum minus quam Halleriana placet, et mihi dubia videtur.

palmata. 13. **SAXIFRAGA** foliis pilosis palmatis quinfidis trifidisve, caule folioso paniculato, petalis subrotundis.

Saxifraga palmata. Engl. Bot. t. 455.

S. petræa. Wih. 890.

S. Fl. Dan. t. 71.

Angl. Palmate Saxifrage.

In rupibus alpinis.

Rocks of Cwm Idwell, Carnarvonshire. J. W. Griffith, Esq.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix cæspitosa. Caulis palmaris, erectus, teres, pilosus, parum foliosus, paniculatus, sionibus ad basin erectisculis, foliosis. Folia palmata, basi angustata et elongata, pilosa; radicalia quinquefida, rariùs septemfida, congesta;

congesta; caulina alterna, trifida, laciniis omnibus sub-ellipticis, nec linearibus. Panicula erecta, terminalis, minus patula, 5—7-flora. Bracteae trifidae, vel indivisa. Calyx pilosus, viscidus. Petala flavescenti-albida, subrotunda, parum acuta, triplinervia. Germen semiinferum.

14. SAXIFRAGA foliis linearibus integris tri-*hypnoi-*
fidisve, stolonibus procumbentibus, caule nu-*des.*
diusculo, petalis elliptico-oblongis.

Saxifraga hypnoides. Sp. Pl. 579. Huds. 182.

With. 407. Lightf. 224. Fl. Dan. t. 348.

Engl. Bot. t. 454. Freeman. Ic. t. 2.

S. muscosa, trifido folio. Raii Syn. 354.

Sedum alpinum trifido folio. Moris. sect. 12.
t. 9. f. 26.

Tridaetylites alpina. Baub. Hist. v. 3. p. 2.

754.

Angl. Mossy Saxifrage, or Ladies' Cushion.

In rupibus alpinis.

On the mountains of Derbyshire, Westmoreland,
Scotland and Wales in many places.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. Stolones cæspitosæ, procumbentes, implexæ, foliosæ, pilosæ. Caulis solitarius, erectus, teres, nudiusculus, paniculatus. Folia alterna, linearia, acuta, subciliata; inferiora semitrifida, laciniis divaricatis; caulina indivisa. Panicula laxa, pauciflora, viscida. Bracteæ lanceolatæ. Calycis laciniæ lanceolatæ, acutæ. Petala alba, elliptico-oblonga, obtusa, triplinervia, nervo centrali subinde ramoso. Germen semiinferum.

207. SCLERANTHUS. G. Pl. 224. Juss. 314.
Gærtn. t. 126.

Cal. monophyllus, inferus. *Cor.* nulla. *Semina*
duo, calyce inclusa.

annuus. 1. SCLERANTHUS calycibus fructūs patulis acutis, caulis patentibus.

Scleranthus annuus. Sp. Pl. 580. Huds. 178.
With. 407. Relh. 165. Sibth. 138. Engl.
Bot. t. 351. Fl. Dan. t. 504.

Polygonon, Germanis Knawel. Trag. Hist. 393.

Polygonum felinoides, sive Knawel. Ger. em. 566.

Knawel. Raii Syn. 159.

Upright Knawell. Pet. H. Brit. t. 9. f. 6.

Angl. Annual Knawel.

In arvis arenosis frequens.

Annua. Fl. Julio.

Radix fibrosa, parva. Caules plurimi, patentissimi, teretes, subpubescentes, foliosi, supernè ramosi. Folia opposita, connata, linearia, acuta, basi ciliata. Capitula terminalia, foliosa. Calyx decemcostatus, semiquinquiescens, lacinias acutis, patentibus, margine submembranaceis. Stamina calyce breviora, inæqualia, quandoque numero incompleta. Germen ovatum, superum. Styli patentes. Stigmata pubescentia. Seminum rudimenta certè duo, quorum alterum sæpius abortit.

perennis. 2. SCLERANTHUS calycibus fructūs clausis obtusis, caulis procumbentibus.

Scleranthus perennis. Sp. Pl. 580. Huds. 178.
With. 407. Engl. Bot. t. 352. Fl. Dan.
t. 563.

Knawel incanum flore majore, perenne. Raii
Syn. 160. t. 5. f. 1.

Alchimilla gramineo folio, flore majore. Vail.
Par. t. 1. f. 5.

Saxifraga anglica alsinifolia. Ger. em. 567.
Spreading Knawell. Pet. H. Brit. t. 9. f. 7.
Angl. Perennial Knawel.

In campis elatis arenosis.

About

About Elden and Bury in Suffolk. Found near Snettisham in Norfolk by Mr. Crowe. *With.*

Perennis. Fl. Octobri, Novembri.

Habitus præcedentis, sed caules prostrati, color totius herbæ glaucus et submicans, demum rubicundus. Folia quandoque pubescentia. Calyx margine dilatatus, albus, dentibus obtusis, incurvis. Stamina vix omnia perfecta.

208. SAPONARIA. G. Pl. 224. Juss. 302.
Gærtn. t. 130.

Cal. monophyllus, nudus. *Petala* quinque, unguiculata. *Capsula* supera, oblonga, subunilocularis.

1. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis elliptico-lanceolatis. officinalis.

Saponaria officinalis. Sp. Pl. 584. Huds. 183.
With. 408. Relb. 167. Sibth. 138. Curt.
Lond. fasc. 2. t. 29. Fl. Dan. t. 543. Woodv.
Suppl. t. 251.

Saponaria. Ger. em. 444.

Lychnis Saponaria dicta. Raii Syn. 339.

β. L. Saponaria dicta, folio convoluto. Raii Syn.
339.

Saponaria concava anglicana. Moris. sect. 5.
t. 22. f. 53.

Gentiana concava. Ger. em. 435.

G. folio convoluto. Bauh. Hist. v. 3. 521.
Angl. Scapwort.

In pratis et ad sepes,

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Radix longissima, ramosa, stolonibus repentibus. Caules sesquipedales, teretes, foliosi, glabri, apice paniculati. Folia opposita, connata, elliptico-lanceolata, integerima, trinervia, glabra. Panicula hemisphærica, multi-

flora, bracteolata. Flores rosei, suaveolentes. Petala integra, fauce coronata.
Variat floribus plenis.

209. DIANTHUS. G. Pl. 225. Juss. 302.
Gærtn. t. 129.

Cal. cylindricus, monophyllus, basi squamatus,
Petala 5, unguiculata. Capsula cylindrica,
supera, unilocularis.

* *Flores aggregati.*

Armeria. 1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis,
squamis calycinis lanceolatis villosis tubum
æquantibus.

Dianthus Armeria. Sp. Pl. 586. Huds. 183,
With. 409. Sibth. 139. Engl. Bot. t. 317.
Fl. Dan. t. 230. Dicks. H. Sicc. fasc. 16. 8.

Caryophyllus latifolius barbatus minor annuus,
flore minore. Raii Syn. 337.

C. pratensis. Ger. em. 594.

Viola barbata angustifolia. Dalech. Hist. 810.
Baub. Hist. v. 3. p. 2. 335.

Angl. Deptford Pink.

In pascuis et ad sepes, solo glarcoso.

Annuæ. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva, fusiformis. Caulis pedalis, teres, foliosus,
pubescens, superne ramosus, ramis strictis. Folia
lineari-lanceolata, carinata, integerrima, pubescentia;
infima spatulata. Flores terminales, congesti, erecti,
inodori. Calyx gracilis, pubescens, squamis quaternis,
longitudine tubi, apice subpatentibus, basi connatis.
Petalorum limbus ellipticus, ferratus, ruber, albo punc-
tatus.

prolifer. 2. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis,
squamis calycinis ovatis obtusis muticis sca-
riosis tubum superantibus.

Dianthus prolifer. *Sp. Pl.* 587. *Huds.* 184.
With. 409. *Fl. Dan.* t. 221.

Caryophyllum sylvestris prolifer. *Dill.* in *Raii Syn.* 337. *Seguier. Veron.* t. 7. f. 1.

Armeria prolifera. *Ger. em.* 599. *Lob. Ic.* p. 1. 449.

Betonica coronaria squamosa sylvestris. *Baub.* *Hist.* v. 3. p. 2. 335.

Angl. Proliferous Pink.

In pascuis glareosis rariū.

In Selscy island, Sussex; Mr. Manningham. *Dill.*

In the borders of a field opposite the mill out of St. Austin's gates, Norwich. *Mr. Humpfrey.*

In a marle pit at Landridge hill, Hanley Castle, Worcestershire, Mr. Ballard. *With.*

Annua. Fl. Julio.

Radix parva, attenuata. Caulis erectus, strictus, vix ramosus, foliosus. Folia linearia, margine scabra. Capitulum terminale, multiflorum, squamis calycinis communibus maximis, scarioris, quaternis; propriis binis, angustioribus, compresso-carinatis. Flores parvi, inodori, pallide purpurei, ephemeri. Petala emarginata.

* * *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

3. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subrhombaeis brevissimis, petalis crenatis phyllus imberibus,

Dianthus Caryophyllum. *Sp. Pl.* 587. *Huds.* 184. *With.* 410. *Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 299. *Engl. Bot.* t. 214.

Caryophyllum simplex flore minore pallide rubente. *Raii Syn.* 336.

C. sylvestris simplex. *Ger. em.* 591.

¶. *Dianthus arenarius.* *Huds.* 185, synonymis erroneis, *Conf. Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 296.

Caryo-

Caryophyllum rubrum, flos. Pharmac. Lond., Angl. Clove Pink, or Carnation; β Pheasant's-eye Pink.

In muris antiquis.

On Rochester, Deal, Sandown and other castles plentifully. *Huds.* and *Engl. Bot.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix sublignosa. Herba glauca. Caules erecti, ramosi, paniculato-multiflori. Folia linearia, canaliculata; supra basin denticulata; apicem versus integerrima, lævia. Flores terminales, solitarii, erecti, carnei, odori. Calyx striatus, squamis quaternis, tubo quadruplo brevioribus, rhombatis, mucronulatis, nervosis; interioribus latissimis, et ferè cuneiformibus. Petala inæqualiter crenata, ore lævia.

Var. β humilior est, floribus albis, magis acutè crenatis, ad os circulo atro-purpureo notatis.

deltoides. 4. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subbinis, foliis obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis.

Dianthus deltoides. Sp. Pl. 588. *Huds.* 184. *With.* 410. *Rehb.* 167. *Abbot.* 94. *Engl. Bot.* t. 61. *Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 300. *Lightf.* 225. *Fl. Dan.* t. 577.

Caryophyllum minor repens nostras. *Raii Syn.* 335.

\mathcal{C} . *montanus purpureus.* *Ger. em.* 593.

β . *Dianthus glaucus.* Sp. Pl. 588. *Lightf.* 225. *Tunica ramosior,* flore candido cum corollâ purpureâ. *Dill. Elth.* t. 298. f. 384.

Angl. Maiden Pink.

In pascuis et marginibus herbidis agrorum, solo glareoso vel sabuloso.

β . In the King's Park at Edinburgh. *Lightf.*

Perennis.

Perennis. Fl. Julio ad Octobrem usque.

Radix sublignosa, cæspitosa. Caules plurimi, adscendentes, subramosi, foliosi, leviter pubescentes. Folia linear-lanceolata, subpubescentes, margine scabra. Flores solitarii, parvi, rosei vel carnei, ore circulo purpureo. Calyx striatus, subpubescens, squamis binis, ovato-lanceolatis, mucronatis, tubo duplo brevioribus. Petala inæqualiter crenata, fauce glabra.

Var. β gaudet foliis magis glaucis, squamis calycinis sæpius quaternis, petalis albis nec roseis, circulo purpureo nihilominus notatis.

* * * *Caule unifloro, herbaceo.*

5. DIANTHUS caulis unifloris, squamis caly-~~cæsius~~, cinis subrotundis brevibus, petalis crenatis pubescentibus, foliis margine scabris,

Dianthus cæsius. Engl. Bot. t. 62. Tr. of Linn. Soc. v. 2. 302. With. 411.

D. virginicus β . Sp. Pl. 590.

D. glaucus. Huds. 185. Hill. Fl. Brit. t. 26. f. 1.

Armeriæ species, flore in summo caule singulari. Raii Syn. 336.

Tunica rupestris, folio cæsio molli, flore carneo. Dill. Hort. Elth. 401. t. 298. f. 385.

Angl. Mountain Pink.

In rupibus siccis rarissimè.

On Chedder rocks, Somersetshire. Mr. Brewer.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix lignosa. Herba glauca. Caules plures, spithamei, erecti, simplices, glabri, subquadraguli, foliosi, uniflori, vix unquam biflori. Folia linear-lanceolata, obtusiuscula, margine scabra. Flores odoratissimi, carnei. Calyx sulcatus, squamis quaternis, tubo triplo brevioribus, ovato-subrotundis, obtuse mucronatis, striatis. Petala duplicato-crenata, ore lineata atque barbata, villis purpureis.

III. TRIGYNIA.

210. CUCUBALUS. *Gærtn.* t. 77.
Tournef. t. 176.

Cal. monophyllus, inflatus. *Petala* 5, unguiculata. *Bacca* supera, unilocularis, polysperma.

Baccifer. 1. CUCUBALUS. *Gærtn.* v. 1. 376. t. 77. f. 7.
Cucubalus bacciferus. *Sp. Pl.* 591. *Huds.* 185.
With. 411. *Dicks. H. Sicc.* fasc. 4. 9.
C. Plinii. *Dalech. Hist.* 1429. *Mill. Ic.* t. 112.
Dill. in Raii Syn. 267. *Tournef. Inst.* 339.
Silene baccifera. *With. ed.* 2. 452.
S. fissa. *Salisb. Prod.* 302.
Lychnanthos volubilis. *Gmel. in Act. Petrop.*
Ann. 1759. v. 14. 225. t. 17. f. 1. Linn, Mis,
Viscago n. 912. *Hall. Hist.* v. 1. 396.
Alpine baccifera. *Ger. em.* 614.
Angl. Berry-bearing Chickweed.

In umbrosis pinguioribus rarissimè.

Gathered in hedges in Anglesea, by Mr. Fowlkes
of Llanbeder near Ruthin, and communicated
to Dr. Richardson. *Dill.*

Perennis. Fl. Junio, Julia.

Radix repens. Caules debiles, tripedales, ramosissimi,
teretes, pubescentes, foliosi; ramulis oppositis, divaricatis,
apicee floriferis. Folia opposita, petiolata, paten-
tissima, ovata, acuta, integerrima, pubescentia, pallide
viridia, margine scabra. Flores terminales, solitarii,
pedunculati, nutantes, albido-virentes, ebracteati. Ca-
lyx campanulatus, membranaceus, quinquesfidus, pu-
bescens, persistens. Petala distantia, limbo semibifida,
inepta, fauce denticulis ineisis, obsoletis, coronatâ.
Stanina.

Stamina filiformia, petalis et receptaculo alternatim inserta. Germen pedicellatum, globosum, glabrum. Styli lineares, intus longitudinaliter villosi. Bacca globosa, nigra, nitida, cortice pulpoſo, unilocularis, non dehiscens, polysperma. Semina reniformia, receptaculo centrali inserta.

211. SILENE. *G. Pl.* 226. *Juss.* 302.

Gærtm. t. 130.

Cucubalus. *G. Pl.* 225. *Juss.* 302.

Cal. monophyllus, ventricosus. *Petala* 5, unguiculata. *Capsula* supera, semitrilocularis, apice dehiscens, polysperma.

1. SILENE hirsuta viscosa, petalis emarginatis, *anglica*, floribus lateralibus erectis alternis, fructibus inferioribus divaricato-reflexis.

Silene anglica. *Sp. Pl.* 594. *Huds.* 187.

With. 413. *Relb.* 169. *Curt. Lond. fasc.* 4.

t. 30. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 13. 18.

S. arvensis. *Salisb. Prod.* 301.

Viscago Cerastei foliis, vasculis pendulis, *anglica*.

Dill. Hort. Elth. 417. t. 309. f. 398.

Lychnis sylvestris, flore albo minimo. *Raii Syn.* 339.

Angl. English Catchfly.

In arvis arenosis.

About Coombe in Surrey. *Huds. Curt. Cambridgeshire. Ray. Relhan.* Between Dundee and St. Andrews, and near Perth. *Mr. Mackay.* At Lakenham and Cossey near Norwich.

Annua. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Herba hirsuta, viscosa. Caulis ramosus, patulus, flexuosus, teres, foliosus, ramis subspicatis, erectis. Folia linear-lanceolata, acuta. Flores axillares, solitarii, pedunculati, erecti; albi. Calyx nervosus, hirsutus, cylindricus, demum ventricosus. Petalorum limbus ellipticus, emarginatus, subinde maculâ carnæ.

carneâ notatus. Capsulæ ovatæ, rigidæ; inferiores divaricato-reflexæ, superiores plerumque erectæ.

quinque-vulnera. 2. **SILENE** hirsuta, petalis subrotundis integerimis, floribus lateralibus alternis fructibusque erectis.

Silene quinquevulnera. Sp. Pl. 595. Huds. 188. With. 413. Engl. Bot. t. 86.

Lychnis hirta minor, flore variegato. Dodart. Mem. 99, cum icono.

Angl. Variegated Catchfly.

In arvis arenosis.

Near Wrotham in Kent. Huds.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva, fibrosa. Herba hirsuta, minus viscosa. Caulis ramosissimus, patulus; subdecumbens, debilis, foliosus. Folia elliptico-lanceolata, acuta. Flores erecti. Petalorum limbus rotundatus, integerrimus; albus, macula centrali sanguineâ, pulcherriâ, dentatâ. Capsulae omnes plerumque erectæ, inferiores interdum reflexæ.

nutans. 3. **SILENE** floribus paniculatis secundis cernuis, petalis bipartitis: lacinias linearibus, foliis lanceolatis pubescentibus.

Silene nutans. Sp. Pl. 596. Huds. 188. With. 413. Engl. Bot. t. 465. Fl. Dan. t. 242.

Lychnis sylvestris alba nona Clusii. Raii Syn. 340. Ger. em. 470. Deering. Nott. 137.

Angl. Nottingham Catchfly.

In rupibus calcareis.

On the walls of Nottingham castle, and thereabout.

Ray. On rocks in Dovedale. Mr. Woodward.

Near North Queen's ferry, Scotland. Mr. Mac-
kay. In Caernarvonshire. Mr. Pennant. On
rocks about Knaresborough, Yorkshire. Rev.
Archdeacon Peirson.

Perennis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix sublignosa: Caules plures, simplices, pedales, erecti, foliosi, teretes, pubescentes, paniculati, basi geniculati. Folia lanceolata, acuta, integerima, utrinque pubescentia; radicalia obovata, congesta. Panicula dichotoma, secunda, nutans. Flores cernui, albi. Câlyx decemcostatus, semiuncialis, leviter pubescens, quandoque purpureo-pubescentia. Petala vesperi expansa, limbo ad basin ferè bipartita, lacinis linearibus, obtusis. Corona bifida, acuta. Stamina quinque longiora, exserta; quinque breviora, petalis adnata. Styli pubescentes, longitudine varii. Capsula ovata. Semina reniformia, rugosa.

4. SILENE floribus paniculatis secundis cernuis, *par-*
petalis obcordato-emarginatis, foliis linear- *dorsa,*
lanceolatis glabris.

Silene paradoxa. Sp. Pl. 1673. Jacq. Hort.
Vind. v. 3. t. 84.

Cucubalus viscosus. Huds. 186.

Lychnis major noctiflora Dubrensis perennis.
Ruij Syn. 340.

L. viscosa peregrina noctiflora odorata. Zanon.
Hist. t. 109. Linn. Ms.

Angl. Dover Catchfly.

In montosis cretaceis.

On Dover cliffs; Mr. Newton. Ray.

Perennis. Fl. Julio.

Habitus præcedentis, sed duplo triplò major. Folia longè angustiora, lineari-lanceolata; glabra. Calyx uncialis, densius pubescens. Petalorum limbus obcordatus, haud semibifidus, lacinis dilatatis, rotundatis; nequaquam ad basin usque in lacinias lineares divisus.

Quanta apud auctores de hâc plantâ confusio!

5. SILENE floribus paniculatis cernuis, petalis *infusa-*
semibifidis subnudis, calycibus glabris reticu-
lato-venosis, caule erecto.

Cucu-

- Cucubalus inflatus. *Salisb. Prod.* 302.
 C. Behen. *Sp. Pl.* 591. *Huds.* 186. *With.* 412.
Rellb. 168. *Sibth.* 139. *Engl. Bot.* t. 164.
Fl. Dan. t. 914. *Dreves. Bilderb.* t. 50.
 Lychnis sylvestris, quæ Ben album vulgo. *Raii*
Syn. 337.
 Behen album. *Ger. em.* 678.
 Viscago n. 913. *Hall. Hist.* v. 1. 397.
Angl. Bladder Campion, or Catchfly.

In arvis, pascuis, et ad vias vulgaris.

Perennis. Fl. Julio.

Radix cæspitosa. Caules erecti, sesquipedales, ramosi,
 teretes, glabri, glauci. Folia ovato-lanceolata, acuta,
 integerrima, subcarnosa, glauca, lævia, rariùs ciliata et
 subhirsuta; radicalia aggregata, spatulata. Panicula
 dichotoma. Flores nutantes, albi. Calyx albidus,
 purpureo viridique reticulatus. Petala semioblonga, fauce
 oninino plerumque nuda, at ex observationibus nuper-
 rimè institutis, interdum coronatam inveni. Antheræ
 cinereo-virides. Germen violaceum. Capsula ovata,
 apice sexdentata.

mariti- 6. SILENE floribus subsolitariis terminalibus, pe-
ma. talis bifidis coronatis, calycibus glabris reti-
 culato-venosis, caule decumbente.

Silene maritima. *With.* 414.

S. amœna. *Huds.* 188. *Lightf.* 227.

Cucubalus Behen β. *Sp. Pl.* 591. *Fl. Dan.*
 t. 857.

Lychnis maritima repens. *Bauh. Pin.* 205. *Raii*
Syn. 337.

L. marina anglicana. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2. 357.
Ger. em. 469. *Lob. Ic.* 337.

Angl. Sea Campion, or Catchfly.

In maritimis arenosis vel petrosis haud infrequens;
 etiam ad fluvios alpinos.

Common

Common on most parts of the coast. In the bed of the river at Hafod, Cardiganshire, near the kitchen gardens.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Facie præcedenti proximè accedit, at plurimis notis discrepat. Radix repens. Caules cæspitosi, basi decumbentes, quandoquè omnino prostrati, ramosi, foliosi, pauciflori, vix paniculati. Folia angustiora, linearilanceolata, subinde angustè spatulata, glaberrima, margine denticulata. Flores terminales, solitarii vel terni, nutantes, albi. Petala ultra medium bifida, fauce semper coronata. Styli interdum quatuor vel quinque. Germen violaceum. Capsula subrotunda, nec ovata.

7.S ILENE floribus paniculatis dioicis, petalis li- *Otites*, nearibus indivisis nudis.

Cucubalus *Oties*. Sp. Pl. 594. Huds. 186.

With. 412. Relb. 168. Engl. Bot. t. 85.

Fl. Dan. t. 518.

Lychnis viscosa flore muscoso. Raii Syn. 340.

Sesamoides Salamanticum magnum. Ger. em.

493.

Muscipula muscosa flore, sive *Ocymoides belliforme*. Bauh. Hist. v. 3. p. 2. 350.

Angl. Spanish Catchfly.

In campis aridis fabulosis, vel glareofisis, rariùs.

Between Swaffham and Narford, Norfolk, on the grassy ridges of the road. Also about Thetford, Barton-mills, and Bury.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa, flavicans. Caulis erectus, foliosus, superne viscidus, paniculatus, multiflorus, pedunculis subverticillatis, dichotomis. Folia petiolata, spatulata, acuta, integerrima, pilis brevissimis, densis, curvis, utrinque vestita, subviscida. Flores abortu dioici, luteo-virides, parvi, bracteolati. Petala lincaria, indivisa,

fauce nuda, aliquando abortiva. Calyx nervosus, pubescens. Styli numero variant a duobus ad quinque.

conica. 8. SILENE caule dichotomo, petalis bifidis coronatis, foliis mollibus, calycibus fructus conicis striis triginta.

Silene conica. Sp. Pl. 598. With. 416. Jacq. Austr. t. 253.

S. conoidea. Huds. 189.

Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis. Dill. in Raii Syn. 341.

L. sylvestris altera incana, caulinis (caliculis) striatis. Lob. Ic. t. 338.

L. sylvestris incana Lobelii. Ger. em. 470.
Angl. Corn Catchfly.

In arvis arenosis.

A little to the north of Sandown castle plentifully.
Sherard and Rand. Opposite the Warren house at New Romney, Kent. Rev. Mr. Stacey.

Annua. Fl. Julio.

Radix parva, subramosa. Caulis erectus, teres, pubescens, foliosus, dichotomus. Folia linear-lanceolata, acuta, integerrima, utrinque mollissime pubescentia. Flores e dichotomiâ caulis, solitarii, pedunculati, erecti, rosei, suaveolentes. Calyx conico-cylindricus, membranaceus, costis triginta viridibus pubescentibus, basi obtusus, apice dentibus 5, rectis, acuminatis. Petala bifida. Capsula ovata.

noctiflo- 9. SILENE caule dichotomo, petalis bifidis obtusè coronatis, calycibus decem-angularibus: dentibus tubum subæquantibus.

Silene noctiflora. Sp. Pl. 599. Huds. 189.
With. 416. Relb. Suppl. I. 13. Sibth. 140.
Abbot. 95. Engl. Bot. t. 291.

Ocy-

Ocymoides noctiflorum. *Camer. Hort.* 109.

t. 34.

Lychnis noctiflora. *Moris. sect.* 5. *t. 20. f. 12.*

Raii Syn. 340.

Angl. Night-flowering Catchfly.

In arvis arenosis.

In Cambridgeshire. *Ray. Relh.* Oxfordshire. *Sibth.*

Very common about Wetherby. *Sir T. Frankland.* Not rare in Norfolk, especially on the west side of Norwich.

Annua. Fl. Julio.

Radix fibrosa, parva. *Caulis erectus,* ramosus, patens, foliosus, dichotomus, teres, pubescens. *Folia lanceolata,* acuta, mollia et pilosa, saturatè viridia; inferiora obovata. *Flores e dichotomiâ caulis,* pedunculati, erecti, carnei, nocte expansi et odorati. *Calyx pilosus,* viscidus; costis decem, viridibus, ramosis; dentibus linearibus, longitudine ferè tubi. *Petala semibifida,* fauce denticulis obtusis coronata. *Capsula ovata.*

*10. *SILENE paniculis dichotomis fastigiatis* *Armeria.*
multifloris, petalis emarginatis acutè coronatis, foliis superioribus cordatis glabris.

Silene Armeria. *Sp. Pl.* 601. *Huds.* 189.

With. 415. *Fl. Dan.* t. 559.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lœvis. *Dill.*
in Raii Syn. 341.

L. sylvestris prima. *Clus. Hist.* p. 1. 288.

Muscipula Lobelii. *Ger. em.* 601.

Angl. Common, or Lobel's Catchfly.

In arvis, aggeribus, et muris antiquis, rariùs.

On the banks of the river half a mile below Chester; Dr. Richardson. *Dill.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. *Caulis ramosus,* foliosus, teres, glaber, sub geniculis viscidus. *Folia amplexicaulia,* ovata,

glaucescens, glabra; superiora cordata. Paniculae terminales, aphyllæ, bracteolatae, multifloræ, dichotomæ, fastigiatae. Flores erecti, rosei. Calyx clavato-linearis, decem-angulatus, laevissimus, glaucus, dentibus parvis, rotundatis, purpurascens. Petala rotundata, emarginata, acutè coronata. Capsula elliptica, pedicellata.

- a caulis.* 11. SILENE acaulis, foliis linearibus basi ciliatis, pedunculis solitariis unifloris, petalis coronatis.
Silene acaulis. Sp. Pl. 603. Lightf. 227. t. 12. f. 1. Wiltb. 416. Fl. Dan. t. 21. Dickf. H. Sicc. fasc. 1. 8. Allion. Ped. t. 79. f. 1. Cucubalus acaulis. Huds. 187. Lychnis alpina minima. Raii Syn. 341. L. alpina pumila, folio gramineo. Dill. Hort. Elth. 206. cum tab. Caryophyllus pumilio alpinus. Ger. em. 593. Angl. Moss Campion.

In alpibus.

On the highest mountains of Wales, Scotland and Devonshire. Near the summit of Ben Lomond.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix cæspitosa, multiceps, longissimè descendens. Folia congesta, vaginantia, patentia, linearia, subcarinata, subciliata. Pedunculi terminales, solitarii, erecti, uniflori, nudi, obsoletè quadranguli, glabri, post florescentiam elongati. Flores erecti, rosei, pulchelli. Calyx campanulatus, semi-quinquefidus, quinquecostatus, glaber. Petala subemarginata, sauce coronata. Capsula cylindrica, calyce duplo longior.

212. STELLARIA. G. Pl. 226. Juss. 301. Gærtn. t. 130.

Cal. pentaphyllus, patens. *Petala* 5, bipartita. *Capsula* supera, unilocularis, polysperma, apice sexdentata.

1. STEL-

1. **STELLARIA** foliis inferioribus cordatis petiolatis; superioribus ovatis sessilibus, paniculâ dichotomâ.

Stellaria nemorum. *Sp. Pl.* 603. *Huds.* 190.

With. 417. *Engl. Bot.* t. 92. *Fl. Dan.* t. 271.

Alpine montana, folio Smilacis instar, flore lacinato. *Dill. in Raii Syn.* 347.

A. montana latifolia, flore lacinato. *Moris.* *sect.* 5. *t. 23. f. 2.*

A. hederacea montana maxima. *Column. Ec-*
phr. 290. *f. 2.*

Angl. Wood Stitchwort.

In nemorosis humidis, ad fontium rivos umbrosos.

In the mountainous parts of the north of England, and the south of Scotland. By Casterton mill near Kirkby Lonsdale, Westmoreland, and in other parts of that county. Found by Mr. Robinson near Darlington.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix repens. Caules debiles, tripedales, ramosi, cavi, teretes, foliosi, undique subpilosii. Folia opposita, pallidè viridia, fragilia et subsucculenta, integerrima, parum pilosa; inferiora cordata, petiolata; superiora ovata, sessilia. Panicula terminalis, dichotoma, multiflora, foliolosa, divaricata, pubescens. Flores erecti, albi. Calyx basi hirsutus, foliolis margine scarioso-albis. Petala patentissima, ad basin ferè bipartita, laciniis linearie-ellipticis, divaricatis. Styli tres, nunquam plures. Pedunculi fructiferi reflexi. Capsula elliptica, ore sex-dentato.

2. **STELLARIA** foliis ovatis, caulis proeum-media bentibus lineâ laterali pilosâ alternâ.

Stellaria media. *With.* 418. *Engl. Bot.* t. 537.

Alpine media. *Sp. Pl.* 389. *Huds.* 131. *Rehb.* 128. *Sibth.* 105. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t. 20.* *Fl. Dan.* *t. 438. et t. 525.*

- A. vulgaris, seu Morsus gallinæ. *Raii Syn.* 347.
 A. minor sive media. *Ger. em.* 611.
 A. major. *Fuchs. Hist.* 21.
Angl. Common Chickweed.

In cultis et ruderatis ubique.

Annua. Fl. toto ferè anno.

Radix fibrosa, tenacissima. Caules prostrati, ramosi, fragiles, foliosi, teretes, geniculati, lineâ pilosâ, longitudinali, ad genicula interruptâ, notabiles. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima, glabra, petiolis ciliatis. Pedunculi axillares vel terminales, solitarii, uniflori, lineâ laterali pilosâ. Flores albi, inconspicui, Calyx pilosus, petalis longior. Petala ad basin usque bipartita. Stamina a deinceps ad quinque, rariùs tria, basi glandulosa. Capsula ovata, ore sexdentato. Semina tuberculato-scabra.

holostea. 3. STELLARIA foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis, calyce enervi.

Stellaria holostea. Sp. Pl. 603. Huds. 190. Willd. 417. Relb. 170. Sibth. 140. Curt. Lond. fasc. 2. t. 30. Dicks. H. Sicc. fasc. 7. 6. Engl. Bot. t. 511.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber, flore majore. *Raii Syn.* 346.

Gramen. *Fuchs. Hist.* 136. ,

G. leucanthemum. *Ger. em.* 47.

Angl. Greater Stitchwort.

In nemorosis siccis, et dumetis.

Percnnis. Fl. Maio.

Radix repens. Caules basi gracillimi, decumbentes, dein erecti, quadranguli, geniculati, foliosi, angulis superne scabris. Folia sessilia, lanceolata, acuminata, margine scabra, subrevoluta, acutè carinata, glabra, glaucescens. Panicula dichotoma, foliolosa. Pedunculi longissimi, erecti, scabri. Flores formosi, nivei. *Calycis foliola*

foliola lanceolata, omnino enervia, margine alba. Petala obcordata. Capsula globosa.

4. **STELLARIA** foliis linear-lanceolatis integer-*graminifloris*, paniculâ terminali divaricatâ, calyce *neae*. trinervi petalis subæquali.

Stellaria graminea. *Sp. Pl.* 604. *Huds.* 190. *With.* 419. *Rehb.* 170. *Sibth.* 140.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore minore. *Raii Syn.* 346.

Gramini Fuchsii leucanthemo affinis et similis herba. *Baub. Hist.* v. 3. p. 2. 361.

Angl. Lesser Stitchwort.

In pascuis et vepretis, præsertim solo arenoso, vel glareoso.

Perennis. Fl. Maio.

Præcedente minor. Folia margine integerrima, vix scabra, minusque glauca. Caulis omnino lœvis, ut et pedunculi. Calycis foliola albida, membranacea, acutè trinervia, nervis viridibus. Petala bipartita, calyci æqualia, subinde longiora.

5. **STELLARIA** foliis linear-lanceolatis integer-*glaucæ*. *rimis glaucis*, pedunculis erectis, calyce trinervi petalis breviore.

Stellaria glauca. *With.* 420.

S. media. *Sibth.* 141. *Abbot.* 96.

S. graminea *β.* *Huds.* 190.

Caryophyllus holosteus arvensis medius. *Raii Syn.* 347.

Alsine floribus (foliis) gramineis, petalis bipartitis. *Gmel. Sib.* v. 4. 145. t. 61. f. 2. *Herb. Linn.*

Angl. Glaucous Marsh Stitchwort.

In aggeribus fossarum pratisque humidis.

In the Isle of Ely, and near Oxford. *Ray*. About Edinburgh. *Mr. Mackay*. On St. Faith's Newton bogs near Norwich.

Perennis. Fl. Junio, Julio,

Præcedenti proximè affinis, sed folia glauca, margine omnino lœvia. Caulis etiam lœvis. Pedunculi erecti, axillares et terminales, alterni, subinde paniculati. Flores præcedente duplò ferè majores. Calyx acuminatus, minus acutè trinervis. Petala obcordata, calyee duplò ferè longiora. Antheræ xerampelinæ.

Fl. Dan. t. 414, ab Hudsono citata, nostram minime refert stirpem.

uliginosa. 6. STELLARIA foliis elliptico-lanceolatis integræ, gerrimis apice callosis, floribus subpaniculatis lateralibus, petalis calyce brevioribus.

Stellaria uliginosa. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 28.*
With. 420. Sibth. 141.

S. graminea γ. *Huds. 190. Linn. Fl. Suec. 150.*
Reh. 170. Fl. Dan. t. 415.

S. hypericifolia. *Wiggers. Holsat. 34.*

S. dilleniana. *Leers. 107.*

S. aquatica. *Pollinch. v. 1. 429.*

S. fontana. *Jacq. Coll. v. 1. 327.*

Alsine fontana. *Ger. em. 613.*

A. longifolia, *uliginosus* proveniens locis. *Baub. Hist. v. 3. p. 2. 365. Raii Syn. 347.*

A. n. 881. Hall. Hist. v. 1. 387.

Angl. Bog Stitchwort.

In rivulis, fossis, inundatis, et ad fontes.

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa, parva. Caules numerosi, debiles, ramosi, quadranguli, lœves, foliosi. Folia elliptico-lanceolata, integerrima, multivenosa, pallidè glaucescentia, margine subundulata, lœvia, apice callosa. Pedunculi axillares et terminales, sèpius terni, quorum duo paniculato-

niculato-triflori, tertius uniflorus, omnes bracteolati, divaricati, glabriusculi. Flores parvi. Calyx trinervis, foliolis exterioribus ciliatis. Petala calyce breviora.

Variat stylis 4 vel 5. Stokes.

7. STELLARIA foliis elliptico-oblongis obtusis, *ceraflor*-caulibus subbifloris, calycibus uninervibus des. pubescentibus.

Stellaria cerasoides. Sp. Pl. 604. Sm. Pl. Ic. ex Herb. Linn. t. 15. Dicks. in Tr. of Linn. Soc. v. 2. 290. H. Sicc. fasc. 2. 11. With. 421. Fl. Dan. t. 92. Jacq. Coll. v. 1. 254. t. 19. Retz. Obs. fasc. 1. 18.

S. n. 951. Gunn. Norv. p. 2. t. 6. f. 2.

Angl. Alpine Stitchwort,

In alpibus Scotiæ.

On Ben Nevis. Mr. Dickson and Mr. Mackay.

Perennis. Fl. Junio.

Radix repens. Caules diffusi, basi ramosi, superne foliosi, teretiusculi, glabri, apice uniflori vel biflori, rarius triflori, pubescentes et viscidii. Folia elliptico-oblonga, obtusa, integerrima, glabra, recurva, subsecunda. Flores erecti, albi. Calyx foliola obtusa, uninervia, basi pubescenti-viscida, margine scariosa. Petala calyce duplo ferè longiora, semibifida. Germen ovatum. Capsula oblonga, dentibus numero duplicato stylorum.

Variat stylis 4 vel 5. Wulffen apud Jacq. Quatuor etiam vidi.

213. ARENARIA. G. Pl. 226. Juss. 301.
Gærtn. t. 130.

Cal. pentaphyllus, patens. Petala 5, integra.
Capsula supera, unilocularis, polysperma.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis, caly-*peploides*, cibus obtusis crenatis.

Arenaria peploides. Sp. Pl. 605. Huds. 191.
With.

With. 421. *Engl. Bot.* t. 189. *Fl. Dan.* t. 624. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 10. 10.
Alsiné marina, foliis portulacæ. *Loef. Pruss.* 12.
t. 2. *Raii Syn.* 351.
Anthyllis lentifolia, sive *Alsiné cruciata marina*.
Ger. em. 622.
Angl. Sea Chickweed or Sandwort.

In littoribus maritimis arenosis frequens.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens, longissima, flagelliformis. *Caules prostrati*, ramosi, foliosi, angulati, glaberrimi. *Folia opposita*, sessilia, ovata, acuta, recurva, integerrima, carnosa, glabra, carinata, avenia. *Flores e dichotomiâ caulis*, subsessiles, solitarii, parvi, albi. *Calycis foliola elliptica*, obtusa, carnosa, avenia. *Petala obovata*. *Capula subrotunda*, trivalvis. *Semina magna*, obovata, punctata, nigra.

triner-
-vis. 2. **ARENARIA** foliis ovatis acutis petiolatis nervosis, calycibus carinâ scabris obsoletè trinervibus.

Arenaria trinervis. *Sp. Pl.* 605. *Huds.* 191.
With. 421. *Relb.* 171. *Sibth.* 141. *Abbot.* 97. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t. 31.* *Fl. Dan.* *t. 429.*
Alsiné Plantaginis folio. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2.
363. *Raii Syn.* 349.
Angl. Plantain-leaved Chickweed or Sandwort.

In sylvis et nemorosis humidis.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. *Caulis debilis*, erectus, spithameus, ramosus, teres, undique pilosus, foliosus. *Folia petiolata*, ovata, acuta, tri- vel quinque-nervia, ciliata. *Pedunculi e dichotomiâ caulis*, uniflori, elongati, demum deflexi. *Flores albi*, parvi. *Calycis foliola lanceolata*, acuta, carinata, obsoletè trinervia, margine membranacea,

cea, ciliata, dorso scabra. Petala longitudine vix calycis, obovata. Capsula ovata, ore sexfido. Semina parva, glabra, nigra.

3. ARENARIA foliis ovatis subsessilibus scabris, *serpyllis-*
calycibus hirsutis subquinquenervibus. *folia.*

Arenaria serpyllifolia. *Sp. Pl.* 606. *Huds.* 191.

Wib. 421. *Relb.* 171. *Sibth.* 142. *Ab-*
bot. 97. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 32. *Fl. Dan.*
t. 977. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 16. 3.

Alpine minor multicaulis. *Raii Syn.* 349.

A. petræa. *Ger. em.* 612.

Angl. Thyme-leaved Sandwort.

In aridis, arenosis, et ad muros, vulgaris.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa, parva. Caules plurimi, palmates, patuli, adscendentes, rigidi, ramosi, foliosi, teretes, pubescentes, paniculato-dichotomi. Folia parva, ovata, integrerrima, obsoletè nervosa, scabra, superiora acutiora. Pedunculi semper errecti. Flores parvi, albi. Calycis foliola ovata, acuta, hirsuta, margine scariosa; tria exteriæ quinquenervia, interiora trinervia. Petala calyce breviora. Capsula ovata, ore sexfida. Semina fulva, subrugosa.

4. ARENARIA foliis linearibus mucronulatis, *rubra.*
stipulis scariosis vaginantibus, seminibus com-
pressis angulatis scabriusculis.

Arenaria rubra. *Sp. Pl.* 606. *Huds.* 192.
Wib. 422. *Relb.* 172. *Sibth.* 142. *Ab-*
bot. 98.

A. campestris. *Allion. Pedem.* v. 2. 114.

Spergula purpurea. *Raii Syn.* 351. *Baub. Hist.*
v. 2. p. 2. 719. 2. f. 3.

Polygonum foliis gramineis, Spergulæ capitibus.
Loef. Pruss. 203. *t.* 63.

Angl. Purple Sandwort.

In arvis arenosis frequens.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva, subfusiformis, ramosa. Caules prostrati, divaricati, ramosi, foliosi, teretes, glabri. Folia plana, linearia, angustissima, acuta, mucronulata, glauca, subincana, longitudine ferè internodiorum. Stipulae extrafoliaceæ, oppositæ, amplexicaules, scariofæ, albæ, acutæ, laceræ. Paniculæ terminales, foliosæ, dichotomæ, racemosæ, pubescentes. Flores cæruleo-incarnati. Calycis foliola lanceolata, hirsuta, enervia, margine scariosa. Petala calyce breviora. Capsula longitudine calycis, ovata, trivalvis. Semina plurima, fusca, angulata, subcuneiformia, extùs tuberculis acutis scabriuscula.

marina. 5. ARENARIA folijs semicylindricis carnosis muticis, stipulis scariosis vaginantibus, semi-nibus compressis marginatis glabris.

Arenaria marina. Fl. Dan. t. 740.

A. rubra C. Sp. Pl. 606. Lightf. 230. Huds. 193 (media).

A. media. With. 422.

Spergula maritima flore parvo cæruleo, semine vario. Dill. in Raii Syn. 351. Dill. Giff. app. 30.

B. Arenaria media. Sp. Pl. 606. exclusis synonymis.

A. marina. With. 422. Allion. Ped. v. 2. 114.

A. rubra γ (marina). Huds. 193.

Alfina Spergulæ facie media. Raii Syn. 351.

A. Spergula marina. Moris. sect. 5. t. 23. f. 15.

Spergula marina. Dalech. Hist. 1385.

S. marina nostras. Bauh. Hist. v. 3. p. 2. 720.

Angl. Sea Spurrey-Sandwort.

In pascuis et arenosis maritimis.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis. Caules prostrati, glaberrimi. Folia

femini-

femicylindrica, carnosæ, mutica, glabra. Stipulae ut in præcedenti. Flores duplò majores, pallidè incarnati, vel purpurascentes. Capsula calyce longior, trivalvis. Semina complanata, glabra, marginata; margine in β dilatato, membranaceo, albo, striato.

Ambigunt hæc duæ species inter Arenariam et Spergulam.

6. ARENARIA foliis subulatis acutis, caule pani- *tenuifo-*
culato, capsulis erectis trivalvibus, petalis lan- *lia.*
ceolatis calyce brevioribus.

Arenaria tenuifolia. *Sp. Pl.* 607. *Huds.* 192.

With. 423. *Relb.* 172. *Sibth.* 142. *Ab-*
bot. 98. *Engl. Bot.* t. 219. *Dicks. H. Sicc.*
fasc. 10. 11. *Fl. Dan.* t. 389.

Alsine tenuifolia. *Raii Syn.* 350. *Vaill. Paris.*
t. 3. f. 1. *Seguier. Veron.* t. 6. f. 2.

Angl. Fine-leaved Sandwort.

In campis arenosis sterilibus, et ad muros.

In corn-fields in several parts of Cambridgeshire.

Ray and *Rev. Mr. Hemsted.* At Oxburgh, Nor-
folk. *Mr. Pitchford.* Worcestershire. *Mr. Bal-*
lard. Oxfordshire. *Sibth.*

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa, parva. *Caules erecti,* teretes, foliosi, ple-
rumque glabri, supernè paniculati, dichotomi. *Folia*
subulata, trinervia, glabra, mutica, basi connata et di-
latata. *Pedunculi capillares,* erecti. *Flores parvi,* albi.
Foliola calycina lanceolata, acuminata, trinervia, mar-
gine membranacea. *Petala exigua,* lanceolata, obtusa,
calyce duplò breviora. *Stamina omnino decem,* bre-
vissima. *Germen globosum.* *Styli tres.* *Capsula cy-*
lindrica, calyce longior, trivalvis. *Semina minuta,* re-
niformi-subrotunda, compressa, scabriuscula, figurâ ferè
A. rubræ.

7. ARENARIA foliis subulatis obtusiusculis, caule *verna.*
paniculato, petalis obovatis calyce longioribus,
calyce trinervi: nervis remotis æqualibus.

Arenaria

- Arenaria verna.* *Mant.* 72. *Huds.* 191. *With.* 423. *Lightf.* 231. *Engl. Bot.* t. 512. *Dicks.* *Dr. Pl.* 6. *H. Sicc. fasc.* 13. 17. *Jacq. Austr.* t. 404.
A. saxatilis. *Huds. ed.* 1. 168. *Penn. Tour in Wales.* tab.
Alsine pusilla pulchro flore, folio tenuissimo nostras. *Raii Syn.* 350.
A. alpina glabra, tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. Parad.* 12. t. 12. malè, ob petala acuta.
A. caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato. *Pluk. Phyt.* t. 7. f. 3.
A. saxatilis et multiflora, capillaceo folio. *Vaill. Paris.* t. 2. f. 3. opt.
β. A. juniperina. *With.* 424.
γ. A. laricifolia. *With.* 424.
Angl. Vernal Sandwort.

In montibus quartzosis vel spatosis.

About the mouths of lead mines in Derbyshire; also on Arthur's seat near Edinburgh. On several mountains in the North, and in Wales.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix teres, longa, infernè ramosissima. Caules numerosissimi, cæspitosi, erectiusculi, palmares, foliosi, tereetes, subpubescentes et aliquantulum viscidii, basi ramosi, supernè paniculati. Folia erecto-patentia, subulata, obtusiuscula, subtùs trinervia, basi dilatata et connata, supernè canaliculata, plerumque glabra. Bracteæ ovatae, trinerves, breves. Pedunculi erecti, pubescentes. Foliola calycina ovata, acuta, pilosa, trinervia, nervis æqualibus et subremotis, margine membranacea. Petala calyce longiora, obovata, obtusa. Antheræ carneæ. Capsula calyce longior, cylindrica, trivalvis. Semina subreniformia, compressa, scabra, omnino ut in *A. rubra*.

214. CHERLERIA. *G. Pl. 227. Juss. 301.*

Cal. pentaphyllus. Petala nulla? Glandulæ nectariferæ 5, bifidæ, ad staminum basin. Capsula supera, trivalvis, unilocularis, polysperma.

1. CHERLERIA. *Hall. Opusc. 300. t. 1. Segu. sedoides. Veron. Suppl. 180. t. 6. f. 3.*

Cherleria sedoides. Sp. Pl. 608. Hudf. 193. With. 424. Lightf. 232. Dicks. H. Sicc. fasc. 1. 9. Jacq. Austr. t. 284.

Cherleria, n. 859. Hall. Hist. v. 1. 381. t. 21. Lychnis alpina, muscosis foliis densius stipatis, floribus parvis, calyce duriore. Pluk. Phyt. t. 42. f. 8.

Sedum montanum perpusillum luteolis floribus. Park. Theatr. 737. Morf. sect. 12. t. 6. f. 14. Angl. Dwarf Cherleria. Mossy Cyphel.

In summis alpibus Scotiæ. *Hope. Lightf.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix longa, sublignosa, multiceps. Caules cæspitosi, unciales, densè foliosi. Folia triquetro-subulata, obtusa, subtùs trinervia. Pedunculus solitarius, axillaris, apicem versùs caulis, uniflorus, medio bracteis binis, connatis. Flores viridi-lutei, erecti. Folia calycina obtusa, carinata. Stamina calyce breviora. Capsula ovata, calyce duplò longior, trivalvis, certè unilocularis, polysperma. Semina angulata.—Petala 5, viridia, lingulata, invenit Seguier, nobis necdum obvia.

IV. PENTAGYNYIA.

215. COTYLEDON. *G. Pl.* 229. *Juss.* 307.

Cal. quinquefidus. *Cor.* monopetala. *Squamæ nectariferæ* 5 ad basin germinis. *Capsulæ* 5, superæ.

Umbili- 1. **COTYLEDON** soliis peltatis crenatis, caule spicato subsimplici, floribus pendulis, radice tuberosâ.

Cotyledon Umbilicus. *Huds.* 194. *With.* 425. *Sibth.* 143. *Engl. Bot.* t. 325. *Sp. Pl.* 615 β .

C. rupestris. *Salisb. Prod.* 307.

C. vera, radice tuberosâ. *Raii Syn.* 271.

C. Umbilicus Veneris. *Chus. Hist.* v. 2. 63.

Umbilicus Veneris. *Ger. em.* 528. *Camer. Epit.* 858.

Angl. Common Navelwort.

In rupibus umbrofis irriguis, murisque antiquis humidis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix tuberosa. *Herba* succosa, fragilis, lœvis, pallide virens. *Caulis* spithameus, teres, rubicundus, basi foliosus, superne spicatus, subinde ramosus. *Folia* petiolata; *inferiora* umbilicato-peltata, crenato-repanda; *superiora* minora, vix peltata, dentato-crenata. *Braétæ lanceolatæ, integræ.* *Flores* congesti, pedicellati, cernui, tubulosi, flavescentes, ore virides. *Stamina brevissima, fauce inserta.*

Lutea.

2. **COTYLEDON** soliis crenato-dentatis; *infimis* subpeltatis, caule spicato subsimplici, floribus erectis, radice repente.

Cotyledon lutea. *Huds.* 194. *With.* 426.

C. Um-

C. Umbilicus. *Sp. Pl.* 615 α :

C. flore luteo, radice tuberosâ repente. *Dodart.*
Mem. 73, cum iconē.

C. radice tuberosâ longâ repente. *Raii Hist.*
1878.

Sedum luteum umbilicatum spicatum, radice
repente majus. *Morif.* v. 3. 471.

Angl. Greater Yellow Navelwort.

In rupibus et muris humidis rariūs.

In the west riding of Yorkshire. *Mr. Tofield.* So-
mersetshire. *Huds.* Cultivated in Chelsea garden.

Perennis. Fl. Junio.

Radix carnosa, repens. Caulis pedalis et altior. Folia
infima tantum peltata; cætera obovata, profundè den-
tata. Flores numerosissimi, erecto-patentes, flavi. Brac-
teæ plerumque integræ.

216. SEDUM. *G. Pl.* 230. *Juss.* 307.
Gertn. t. 65.

Cal. quinquefidus. *Cor.* pentapetala. *Squamæ*
nectariferæ 5, ad basin germinis. *Capſulæ* 5,
superæ.

* *Planifolia*.

1. SEDUM foliis planiusculis ferratis, corymbo *Telephi-*
folioso, caule erecto. *um.*

Sedum *Telephium*. *Sp. Pl.* 616. *Huds.* 195.
With. 426. *Relb.* 173. *Sibth.* 143. *Ab-*
bot. 98. *Curt. Lond. fyc.* 3. t. 25.

Telephium purpurascens. *Fuchs. Hist.* 801.

Anacampseros, vulgo *Faba crassa*. *Raii Syn.* 269.

A. purpurea. *Bauh. Hist.* v. 3. 682.

Crassula, sive *Faba inversa*. *Ger. em.* 518.

2. *Telephium album.* *Fuchs. Hist.* 800.

Angl. Orpine or Live-long.

In agris, dumetis, et ad sepes, solo glareoso vel calcaro.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix tuberosa, carnosa, alba. Caules bipedales, erecti, simplices, foliosi, teretes, glabri, purpurascens. Folia sparsa, sessilia, ovata, carnosa, plana, dentato-serrata, glaucescentia, lœvia. Corymbi terminales, multiflori, congesti, foliosi. Flores purpurei, rarius albi.

* * *Teretifolia.*

dasy-
phyll-
lum.

2. SEDUM foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infirme, paniculâ glutinosâ.

Sedum dasyphyllum. Sp. Pl. 618. Huds. 197. With. 428. Relb. 179. Sibth. 144. Abb. bot. 98. Curt. Lond. fasc. 3. t. 26. Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 153. Engl. Bot. t. 656.

S. minus circinato folio. Dill. in Raii Syn. 271. Moris. sect. 12. t. 7. f. 35.

Aizoon Dasypodium. Dalech. Hist. 1133. Angl. Thick-leaved Stone-crop.

In muris et petrosis.

Plentiful about London, as at Hammersmith, Kew and Chelsea. On walls at Malton, Yorkshire.

Rev. Archdeacon Peirson. At Clifton near Bristol. Mr. T. W. Dyer.

Perennis. Fl. Junio.

Radix perennis, fibrosa. Caules decumbentes, repentes, ramosi, cæspitosi, debiles, teretes, subviscidi, foliosi; ramis floriferis erectis. Folia plerumque opposita, imbricata, ovata, obtusa, gibbosa, valde succosa, integerima, glauca, rubicunda. Panicula terminalis, patens, pauciflora. Flores sœpè sexfidi, dodecandri. Calyx pubescens, viscidus. Petala alba, carinâ purpureâ. Antheræ atro-sanguineæ.

angli-
cum.

3. SEDUM foliis subalternis ovatis carnosis gibbis adnato-sessilibus, cymâ bifidâ lœvi.

Sedum anglicum. *Huds.* 196. *With.* 428.

Engl. Bot. t. 171.

S. annuum. *Huds. ed.* 1. 172.

S. rubens. *Lightf.* 235. *Fl. Dan.* t. 82.

S. minimum non acre, flore albo. *Raii Syn.* 270.
t. 12. f. 2.

Mild White Stonecrop. *Pet. H. Brit.* t. 42. f. 10.

Angl. English Stonecrop.

In maritimis arenosis et scopulosis; etiam in montibus.

On the sandy downs of the Norfolk and Suffolk coast plentifully; as well as in Devonshire, Cornwall, Wales and Scotland. On the mountains of Westmoreland.

Annua. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Caules cæspitosi, basi decumbentes, glabri, rubicundi, foliosi. Folia sæpius alterna, vel subopposita, carnosæ, ovata, obtusiuscula, subglauca, basi producta et libera. Cymæ terminales, solitariæ, bifidæ, ferè aphyllæ, racemosæ. Flores erecti, quinquefidi. Calyx obtusus, lævis. Petala acuminata, alba, carinâ rubrâ, subinde apice rubro punctata. Capsulæ membranaceæ, læves.

4. SEDUM foliis alternis subovatis carnosis gibbis *acre.*
adnato-sessilibus, cymâ trifidâ foliosâ.

Sedum acre. Sp. Pl. 619. *Huds.* 196. *With.*
427. *Relh.* 174. *Sibth.* 144. *Curt. Lond.*
fasc. 1. t. 32. *Woodv. Suppl.* t. 231.

S. parvum acre flore luteo. *Bauh. Hist.* v. 3. 694.
Raii Syn. 270.

Vermicularis, sive Illecebra minor acris. *Ger.*
em. 517.

Sempervivum minimum. Camer. Epit. 856.
procudubio.

Stonecrop, or Wall Pepper. *Pet. H. Brit.* t. 42.

f. 9.

Angl. Biting Stonecrop. Wall Pepper.

In muris, tectis, et aridis fabulosis vulgaris.

Perennis. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Caules cæspitosi, ramosi, decumbentes, glabri, teretes, foliosi. Folia alterna, imbricata; carnosâ, ovata, obtusa, subcomplanata, erecto-patentia, basi gibbosa et libera. Cymæ terminales, solitariæ, subtrifidæ, paucifloræ, foliosæ. Flores erecti, aurei. Calyx obtusiusculus, lævis. Petala acuta. Capsulæ membranaceæ, læves. Herba acris.

sexangu- 5. *SEDUM* foliis subternis teretiusculis obtusis
lare. carnosis adnato-sessilibus patentibus, cymæ
trifidâ foliosâ.

Sedum sexangulare. *Sp. Pl.* 620. *Huds. ed.* 1.

171. *Witb.* 428. *Relb.* 175. *Curt. Lond.*

fasc. 4. *t.* 33.

S. acre *B.* *Huds.* 196.

Sempervivum minimum. *Lob. Ic.* 379?

Angl. Insipid Stonecrop.

In fabulosis aridis et ad muros, minus frequens.

Near Northfleet, Sheerness, and in the Isle of Shepey. *Huds.* On Greenwich park wall near the western corner. *Curt.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Habitus præcedentis, sed parùm major. Folia subcylin- drica, nec ovata, subterna, dupli ordine digesta, hinc sexfariam imbricata, patentissima, basi libera, vix gib- bosa. Cyma foliosa. Flores aurei. Herba non acris.

villosum. 6. *SEDUM* foliis alternis linearibus planiusculis pedunculisque subpilosis, caule erecto.

Sedum villosum. *Sp. Pl.* 620. *Huds.* 197.
Witb.

With. 426. *Engl. Bot.* t. 394. *Fl. Dan.* t. 24.

S. purpureum pratense. *Baub. Hist.* v. 3. 692.
Raii Syn. 270.

S. minus palustre. *Ger. em.* 516.
Angl. Hairy Stonecrop.

In pascuis montosis irriguis, rupiumque fissuris
humidis.

In several rocky parts of the northern counties.

In Scotland not uncommon. In a watery place
near Linlithgow.

Perennis. *Fl. Junio, Julio.*

Radix fibrosa, ex observationibus Nob. Marchionis de
Blandford certè perennis. Caulis erectus, foliosus,
superne pubescens, basi ramosus. Folia alterna, linea-
ria, obtusa, complanata, carnosa; superiora præcipue
pubescentia. Panicula cymosa, terminalis, pubescens,
viscida. Calyx etiam piloso-viscidus, obtusus. Petala
albida, nervo purpureo. Capsulæ acuminatæ, scabræ,
purpurascentes.

7. *SEDUM* foliis oblongis teretibus obtusis pa- *album.*
tentibus glabris, paniculâ ramosissimâ.

Sedum album. *Sp. Pl.* 619. *Huds.* 196.
With. 427. *Relb.* 174. *Abbot.* 99. *Curt.*
Lond. fasc. 1. t. 31. *Fl. Dan.* t. 66.

S. minus teretifolium album. *Dill.* in *Raii Syn.*
271.

S. minus, folio longiusculo tereti, flore candido.
Baub. Hist. v. 3. 690.

S. minus officinarum. *Ger. em.* 512.
Angl. White Stonecrop.

In rupibus, muris et tectis, rariùs.

At Kentish-town and Bromley, Middlesex. *Curt.*
On rocks above Great Malvern, Nash. *With.*
Walls at Peterborough. *Mr. Woodward.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Caules spithamei, teretes, foliosi, ramosi, glabri, basi decumbentes. Folia sparsa, horizontaliter patentia, cylindrica, obtusissima, glabra, subglaуca, carnosa. Panicula terminalis, alternatim ramosa, subcymosa, multiflora, glabra. Flores albi, vel rubicundi. Calyx obtusus, lаvis.

reflexum. 8. SEDUM foliis subulatis sparsis basi solutis : inferioribus recurvatis, floribus subcymosis.

Sedum reflexum. Sp. Pl. 618. Huds. 195.
With. 429. Relb. 173. Sibth. 144.

S. minus luteum ramulis reflexis. Raii Syn. 270.
Bauh. Pin. 283.

Aizoon scorpioides. Lob. Ic. 377. Ger. em.
513.

Crooked Yellow Sengreen. Pet. H. Brit. t. 42.
f. 6.

β. Sedum minus hæmatoides. Ger. em. 512. Raii
Syn. 269.

S. minus flore luteo. Bauh. Hist. v. 3. 692.

S. minus mas. Fuchs. Hist. 33.

Common Yellow Sengreen. Pet. H. Brit. t. 42.
f. 5.

Angl. Yellow Stonecrop.

In muris et tectis vulgaris.

Perennis. Fl. Julio.

Præcedente duplo majus. Caules teretes, foliosi, basi ramosi, sаpe dependentes, apice erecti. Folia sparsa, alterna, adnato-fessilia, basi soluta et producta, superne erecta, subulata, compressa, acuminata, glaucescentia ; inferiora reflexa, decidua. Panicula subcymosa, ramis multifloris, plerumque recurvatis. Flores erecti, aurei, sаpe sexfidi. Calyx acutus, ad basin ferè divisus, glaber.

rupestre. 9. SEDUM foliis subulatis erectis quinquesariam confertis basi solutis, floribus subcymosis.

Sedum

Sedum rupestre. *Sp. Pl.* 618. *Huds.* 195.

With. 429. *Engl. Bot.* t. 170.

S. rupestre repens, foliis compressis. *Dill. Hort.*

Elth. v. 2. 343. t. 256. f. 333.

S. minus e rupe Sancti Vincentii. *Raii Syn.* 270.

Angl. Rock Stonecrop.

In rupibus rariūs.

On St. Vincent's rocks, Bristol, also on Cheddar rocks, Somersetshire, and in Wales. *Dill.* On walls about Darlington. *Mr. Robson.*

Perennis. Fl. Julio.

Præcedente parùm minus. Folia quinquefariàm vel sexfariàm densè imbricata, glauca, subcomplanata, acuminata; in caule florifero remotiuscula, ut in *S. reflexo*; omnia erecta, nec reflexa. Panicula subcymosa, multiflora, ramulis vix reflexis. Flores aurei, sæpe sexfidi. Calyx obtusiusculus, glaucus, rubicundus, basi monophyllus.

217. OXALIS. *G. Pl.* 231. *Juss.* 270.

Gærtn. t. 113.

Cal. pentaphyllus. *Petala* 5, unguibus connexa.

Capsula supera, quinquelocularis, angulis dehiscentes, pentagona. *Semina* arillo elastico tecta.

i. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis pilosis, radice squamoso-articulatâ. *Acetosella.*

la.

Oxalis Acetosella. *Sp. Pl.* 620. *Huds.* 198.

With. 430. *Relb.* 176. *Sibib.* 144. *Abbot.* 100. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 31. *Woodv.* *Med. Bot.* t. 20. *Fl. Dan.* t. 980. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 17. 10.

Oxys alba. *Raii Syn.* *281. *Ger. em.* 1201. *Merr. Pin.* 90.

g. Trifolium acetosum vulgare, flore purpureo.

Dill. in Raii Syn. *281.

Lujula, folium. Pharmac. Lond.

Angl. Common Wood-Sorrel.

In nemorosis vulgaris.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix horizontalis, squamoso-dentata, carneus. Folia radicalia, longius petiolata, ternata; foliolis sub-petiolatis, obcordatis, integerrimis, pilosis, subtus purpurascenscentibus. Scapi uniflori, ultra medium bracteati, folia superantes. Flores subnutantes, tenelli, carnei, rubro lineati. Capsula membranacea, loculis dispermis.

cornicu- 2. *OXALIS* caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis, petiolis basi stipulatis.

Oxalis corniculata. Sp. Pl. 623. Berk. Outl. v. 2. 127. Wth. 430. Jacq. Oxal. 10. t. 5.

O. pusilla. Salisb. Tr. of Linn. Soc. v. 2. 243. t. 23. f. 5.

Oxys flavo flore. Clus. Hist. v. 2. 249.

O. lutea. Ger. em. 1202.

Angl. Yellow procumbent Wood-Sorrel.

In ruderatis umbrosis vel subhumidis Devoniæ.

In several places about Exeter, Mr. J. Turner; Berk. At Dawlish, Devonshire, and in several other places in the same county, Mr. Martin. Wth.

Perennis. Fl. Maio—Octobri.

Radix fibrofa. Caules procumbentes, radicantes, teretes, rubicundi, ramosi, foliosi, subinde pilosi. Folia alterna, ternata, pilosa, stipulis petiolo adnatis. Pedunculi axillares, solitarii, umbellati, pauciflori. Flores parvi, flavi. Capsularum loculis polyspermis.

218. *AGROSTEMMA. G. Pl. 231. Juss. 302.*
Gærtn. t. 130.

Cal, monophyllus, coriaceus. Petala 5, unguiculata;

culata; limbo obtuso indiviso. *Capsula* supera, unilocularis, ore quinquedentata.

1. AGROSTEMMA hirsuta, calyce corollam *Githago*. superante, petalis integris nudis.

Agrostemma Githago. *Sp. Pl.* 624. *Huds.* 198.
With. 431. *Relb.* 176. *Sibth.* 145. *Curt.*
Lond. *fasc.* 3. *t.* 27. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 105.
Fl. Dan. *t.* 576. *Dreves. Bilderb.* *t.* 22.

Lychnis segetum major. *Raii Syn.* 338.

Pseudomelanthium. *Ger. em.* 1087. *Bauh.*
Hift. *v.* 3. 341. *Camer. Epit.* 554.

Lolium. *Fuchs. Hift.* 127.

Angl. Corn Cockle.

Inter segetes vulgaris.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva. Herba hirsuta, fetis erecto-adpressis, canef-centibus. Caulis bipedalis, teres, ramosus, foliosus. Folia opposita, linear-lanceolata. Flores terminales, purpurei, speciosi. Calyx decemcostatus, dentibus linear-lanceolatis, foliaceis, patentibus, corollâ duplò longioribus, demùm deciduis. Petala fauce nuda, limbo obcordato. Capsula ovata, rigida, polysperma.

Genus vix distinctum a Lychnide.

219. LYCHNIS. G. Pl. 231. Juss. 302. *Gærtn.* *t.* 130.

Cal. monophyllus, oblongus. *Petala* quinque, unguiculata; limbo saepius diviso. *Capsula* supera, ore quinquedentata, 1—5-locularis.

1. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subro-tundo uniloculari. *Flos-Cuculi*.

Lychnis Flos-Cuculi. *Sp. Pl.* 625. *Huds.* 199.
With. 432. *Relb.* 177. *Sibth.* 145. *Curt.*
Lond.

Lond. fasc. 1. t. 33. Fl. Dan. t. 590. Engl. Bot. t. 573.

L. plumaria sylvestris simplex. Raii Syn. 338.

Armoraria pratensis mas. Ger. em. 600.

Angl. Ragged Robin. Meadow Lychnis.

In pratis humidis.

Perennis. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Caulis erectus, pedalis vel bipedalis, angulatus, foliosus, setis deflexis scaber, supernè viscidus, basi interdum ramosus, ramis decumbentibus, radicantibus. Folia connata, lanceolata, integerrima, læviula. Panicula dichotoma, erecta, foliolosa. Calyx cylindraceus, costis atropurpureis. Petala semiquadrigifida, coronata, rosea, flaecida. Capsula subrotundocylindracea, unilocularis. Semina pedicellata.

Variat flore pleno, subinde albo.

Viscaria. 2. LYCHNIS petalis indivisis, fructu quinqueloculari.

Lychnis Viscaria. Sp. Pl. 625. Huds. 199.

With. 433. Lightf. 239. Fl. Dan. t. 1032.

L. sylvestris viscosa rubra angustifolia. Raii Syn. 340.

Muscipula angustifolia. Ger. em. 601.

Odontidi five flori cuculi affinis Lychnis sylvestris. Bauh. Hist. v. 3. 348.

Angl. Red German Catchfly.

In fissuris rupium rariū.

On the rocks of Edinburgh park, T. Willisel; and on the sides of Craig Wreidhin hill in Montgomeryshire, Mr. Lhwyd. *Ray.* On the rocks by the Hermitage, a mile south of Edinburgh, in tolerable plenty.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix lignosa, caespitosa. Caulis pedalis, angulatus, sulcatus, foliosus, glaber, sub geniculis viscidus. Folia con-

connata, linear-lanceolata, glabra. Panicula subspicata, ramis dichotomis. Flores conferti. Calyx membranaceus, incarnatus, subpilosus. Petala rosea, obsoletè emarginata, coronata. Capsula ovata, brevis, quinquelocularis, dissepimentis e medio valvularum. Semina plurima, reniformia, scabra.

3. LYCHNIS floribus dioicis, fructu uniloculari. *dioica*.
Lychnis dioica. *Sp. Pl.* 626. *Huds.* 199.
With. 431. *Abbot.* 101.

- α . *L. dioica*. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t. 32*.
L. aurina. *Sibth.* 145. *Sym. Syn.* 112.
L. sylvestris rubello flore. *Raii Syn.* 339. *Ger. em.* 469.

- β . *L. dioica*. *Fl. Dan.* *t. 792*. *Relb.* 177.
L. vespertina. *Sibth.* 146. *Sym. Syn.* 112.
L. sylvestris albo flore. *Raii Syn.* 339.
Angl. α Red Campion. β White Campion.

In nemorosis humidis, sepibusque, vulgaris. β in sepibus et arvis frequens.

Perennis. Fl. Maio—Septembri.

Radix fusiformis. Herba pilosa, subviscida. Caulis erectus, teres, foliosus, paniculatus, subdichotomus. Folia integririma, lanceolata vel ovata. Flores pedicellati, bracteati. Calyx decem-costatus. Petala semibifida, coronata. Capsula ovata, unilocularis.

α fructu minore dignoscenda est, caule infirmiore, foliis ovatis, mollioribus, floribus roseis, inodoris, plerumque dioicis, rarissime hermaphroditicis, calyce in utroque sexu decemcostato, omnino ferè cernvi.

β gaudeat fructu majore, caule firme, altiore, foliis lanceolatis, floribus albis, nocte sanguineolentibus, dioicis, rarius hermaphroditicis; calyce maribus elliptico-clavato, decemcostato, cernvi; fœmineis ovato, nervis intercostalibus solitariis.

Differentiam specificam inter hæc varietates vix inveni, cum figura fructus ne minimam præbet distinctionem. Varietas carnea, subinde hermaphroditica, quandoque invenitur,

220. CERASTIUM. *G. Pl.* 232. *Juss.* 301.
Gærtn. t. 130.

Cal. pentaphyllus. *Petala* bifida. *Capsula* supera, apice dehiscentia, ore decemdentata, unicellularis.

vulga-
tum.

1. CERASTIUM hirsutum viscidum cæspitosum, foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, floribus pedunculo longioribus.

Cerastium vulgatum. *Syst. Nat.* ed. 10. v. 2. 1039 A, *Herb. Linnaeana Fl. Suec.* ed. 2. 158. *Sp. Pl.* 627. *Lightf.* 240.

C. viscosum. *Huds.* 200. *With.* 433. *Rehbg.* 178. *Sibth.* 147. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 35.

Alſine hirsuta major, foliis subrotundis dilutè virentibus. *Moris.* v. 2. 551. *sect.* 5. t. 23. f. 10. *Herb. Moris.*

A. hirsuta Myosotis latifolia præcocior. *Raii Syn.* 348.

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore. *Vaill.* *Par.* t. 30. f. 3.

Angl. Broad-leaved Mouse-ear Chick-weed.

In pascuis, ruderatis, muris, aggeribus, vulgaris.

Anneæ. Fl. Aprili, Maio.

Radix fibrofa. *Herba* pallidè virens, hirsuta, viscida. *Caules* plurimi, spithamei, cæspitosi, teretes, foliosi, paniculato-dichotomi, multiflori; exteriore basi diffusi, dein erecti. *Folia* latè ovata, vel elliptica, obtusa. *Flores* e dichotomia caulis, pedunculati, errecti, pedunculis calvæ brevioribus, minus viscidis, superiores conferti. *Calyces* foliola lanceolata, acuta; interiora marginæ searioſo albo. *Petala* oblonga, emarginata, alba, calycem vix superantia. *Stamina* decem, omnia fertilia, basi glandulosa. *Germen* ovatum. *Capsula* cylindracea, calyce duplo longior, parùm incurvata. *Semina* lineata, tuberculata, fulva.

2. CE-

2. *CERASTIUM hirsutum viscidum diffusum, viscosum,*
foliis lanceolato-oblongis.
Cerastium viscosum. *Sp. Pl. ed. 1. 437. n. 2.*
Herb. Linn.—ed. 2. 627. Fl. Suec. ed. 2. 158.
Lightf. 240.
C. vulgatum. *Huds. 200. With. 433. Relb.*
178. Curt. Lond. fasc. 2. t. 34. Wade
Dubl. 125.
Al sine hirsuta altera viscosa, foliis longis satura-
tiūs virentibus. *Moris. v. 2. 551. sect. 5.*
t. 23. f. 11. Herb. Moris.
A. hirsuta Myosotis. *Raii Syn. 349.*
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Vaill. Par.*
t. 30. f. 1.
Angl. Narrow-leaved Mouse-ear Chick-weed.

In pratis, pascuis, muris et ruderatis vulgaris.

Perennis. Fl. Maio—Septembri.

Radix fibrosa, parva, perennis. Herba saturatè virens,
 hirsuta, magis vel minùs viscida. Caules plurimi, lon-
 gitudine varii, diffusi, in pratis erecti, teretes, foliosi,
 paniculato-dichotomi. Folia lanceolato-oblonga, ob-
 tuseuscula. Flores e dichotomiā caulis, pedunculis vis-
 cidis, calyce duplò ferè longioribus. Calycis foliola
 omnia ferè margine scariosa. Petala calyce plerumque
 longiora, obovata, apice bipartita. Stamina omnina fer-
 tilia. Capsula cylindracea, calyce duplò serè longior,
 parùm incurvata. Semina rugosa.

3. *CERASTIUM hirsutum viscidum, floribus semi-*
pentandris, petalis emarginatis. *decan-*
Cerastium semidecandrum. *Sp. Pl. 627. Huds. drum.*
200. With. 435. Relb. 179. Sibth. 147.
Abbot. 101. Curt. Lond. fasc. 2. t. 33.
Dicks. H. Sicc. fasc. 8. 11.
C. hirsutum minus, parvo flore. *Dill. in Raii*
Syn. 348. t. 15. f. 1.

Myosotis arvensis hirsuta minor. *Vaill. Par.*
t. 30. f. 2.

β. *Cerastium pumilum.* *Curt. Lond. fasc. 6. t. 30.*
With. 435. Abbot. 102.

Angl. Little Mouse-ear Chick-weed.

In ruderatis, arenosis; et ad muros, frequens.

β. On dry banks near Croydon, Surrey. *Mr. Dickson.*

Annua. Fl. Martio, Aprilii.

Radix fibrosa. Herba faeie præcedentis, sed minor, sæpe rubicunda. Caules erecti, basi tantum decumbentes; hirsuti, supernè visei-li. Folia ovato-oblonga; infima sæpius glabrata. Pedunculi calyce longiores, post florifcentiam refracti, demum erecti. Calyx viscidus, margine dilatato, albo. Petala plerumque calyee breviora, emarginata. Stamina 5, rarius plura. Capsula calyce duplo fere longior, incurva. Semina fulva, granulata, compressa.

ε parùm discrepat nisi petalis calyci æqualibus, profundiùs incisis, capsulis seminibusque aliquantulum majoribus; sed hæc omnia variabilia sunt. Plantam ex amieissimo Dicksono jamdudum viventem habui. Structurâ partium, etiam seminum, cum *C. semidecandro vulgari* tam arctè convenit, ut, me saltèm judiee, separari nequeunt.

tetrandrum.

4. **CERASTIUM** hirsutum subviscidum, floribus quadrifidis tetrandris, petalis bisidis calyce brevioribus.

Cerastium tetrandrum. *Curt. Lond. fasc. 6.*
t. 31.

Sagina cerastoides. *Trans. of Linn. Soc. v. 2.*
343. Engl. Bot. t. 166. Dicks. H. Sicc.
fasc. 10. 4. Dryandr. Cat. v. 3. 244.

Angl. Tetrandoous Mouse-ear Chick-weed.

In arenosis maritimis, muris et ruderatis Scotiæ. This I first observed on walls about Edinburgh, as well.

well as on the Calton hill and Arthur's seat, in 1782, and communicated it to Dr. Hope. It has since been found by Mr. Dickson on Inch Keith and Inch Combe in the Frith of Forth, and also on the beach below Preston-pans.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa ramosa. Herba lätè virens, multicaulis, ramosa, hirsuta, subviseida. Caules diffusi, foliosi, dichotomi, vix paniculati. Folia elliptico-oblonga; summa ovata. Pedunculi calyce triplò ferè longiores, erecti, demùm refracti. Calycis foliola hirsuta, acuminata, quaterna; quorum duo interiora angustiora, margine scariosa. Petala quatuor, calyce breviora, obcordata, alba. Stamina quatuor, rariùs quinque. Capsula cylindracea, calyce parùm longior, apice octodentata. Semina extùs scabriuscula.

Flores in plantâ spontaneâ semper quadrifidi tetrandri, in cultâ subinde quinquesidi pentandri. C. pentandrum Linnæi habitu et calyce quam maximè refert, at differt partium numero, petalis majoribus, bifidis, pedunculisque fructiferis quintuplò longioribus.

5. CERASTIUM foliis linear-lanceolatis obtusis *arvense.*
basi ciliatis, petalis calyce duplò longioribus.

Cerastium arvense. Sp. Pl. 628. Hudf. 201.
With. 434. Relb. 179. Sibth. 147. Abbot. 102. Curt. Lond. fasc. 6. t. 29. Engl. Bot. t. 93. Fl. Dan. t. 626.

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore. Raii
Syn. 348.

C. Holostius. Ger. em. 595.

Myosotis arvensis hirsuta flore majore. Vail. Par. t. 30. f. 4. etiam M. polygoni folio canescente. Ibid. f. 5. ni fallor, confirmante Hallero.

M. n. 889. Hall. Hist. v. 1. 389.

Angl. Field Chick-weed.

In

In arvis, aggeribus, et montosis, solo glareosa vel cretaceo.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix repens. Caules decumbentes, implexi, cæspitosi, pubescentes. Folia linear-lanceolata, plerumque dense pubescentia, subinde basi tantum ciliata. Panicula dichotoma, pauciflora, pubescens, subviscida. Flores magni, speciosi, nivei. Foliola calycina ovata, obtusa, margine scariosa. Petala obcordata, calyce duplo longiora. Capsula cylindracea, recta, longitudine calycis, ore decedentato.

alpinum. 6. CERASTIUM foliis ellipticis nudis pilosissime, paniculâ dichotomâ pauciflorâ bracteatâ, capsulâ oblongâ recurvâ.

Cerastium alpinum. Sp. Pl. 628. Hudf. 201.

With. 434. Engl. Bot. t. 472. Fl. Dan. t. 6.

C. latifolium. Lightf. 242. t. 10.

Alsius Myosotis facie, Lychnis Alpina, flore ampio niveo, repens. Raii Syn. 349. t. 15. f. 2.

Angl. Alpine Chick-weed.

In alpibus Scoticis et Cambro-britannicis, locis irriguis.

On the sides of Snowdon. Mr. Lbwyd. On a mountain near Llanberris. Lightf. Herb. On Ben Lomond, near the top, in a dry situation.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens. Caules subcæspitosi, erecti, palmares, simplices, teretes, foliosi, apice dichotomi, pauciflori, subinde uniflori. Folia elliptica, obtusiuscula, latitudine varia; in aquosis ut videtur glabra; in apricis verò pilis longis, mollibus, articulatis, adscendentibus, obsita. Pedunculi subterni, uniflori. Bracteæ oppositæ, lanceolatæ. Flores magni, albi, formosi. Foliola calycina margine scariosa. Petala obcordata, calyce sesquilongiora. Germen ovatum. Capsula cylindracea, calyce longior, recurva.

5. CERASTIUM foliis ellipticis scabris, pedunculis terminalibus simplicibus subsolitariis, lumen capsula ovata.

Cerastium latifolium. *Sp. Pl.* 629. *Huds.* 202.
With. 434. *Jacq. Coll.* v. 1. 256. t. 20. *Engl. Bot.* t. 473.

C. tomentosum. *Huds. ed.* 1. 176.

Alpine Myosotis lanuginosa Alpina grandiflora.
Raii Syn. 349.

Angl. Broad-leaved rough Chick-weed.

In alpibus Cambro-britannicis et Scoticis.

On Clogwyn y Garnedd, a very high mountain near Llanberis, Carnarvonshire. *Dr. Richardson.*

Mr. Griffith. On the Highland mountains.

Mr. Mackay.

Perennis. Fl. Junio.

Caulis cæspitosi, quam in præcedente longè humiliores, densè foliosi, scabri, uniflori. Folia elliptica, vel subovata, pilis brevibus, rigidis, porrectis; crebrius articulatis, scabra. Pedunculi terminales, solitarii, longitudine ferè eaulis, ebraeati, scabri, uniflori. Flos ferè præcedentis. Capsula ovata, brevis.

8. CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, pedunculis lateralibus solitariis: fructiferis reflexis, cum capsula ovata ore quinquedentato.

Cerastium aquaticum. *Sp. Pl.* 629. *Huds.* 202.
With. 436. *Relb.* 180. *Sibth.* 147. *Abbott.* 102. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 34. *Engl. Bot.* t. 538.

Alpine major repens perennis. *Raii Syn.* 349.
A. major. *Ger. em.* 611. *Camer. Epit.* 851.
Dalech. Hist. 1232.

Angl. Water Chick-weed.

In aquosis et ad ripas fluviorum:

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules bipedales, debiles, ramosi, foliosi, teretes, undique pilosi. Folia sessilia, cordata, acuminate, undulata, pilosa; insima saepe petiolata. Pedunculi laterales, intrafoliacei, solitarii, uniflori, erecti, demum refracti. Calycis foliola ovata, pilosa, viscosa. Petala longitudine ferè calycis, subinde longiora, profundè bipartita, alba; laciniis sublinearibus. Staminæ semper 10. Styli 5. Capsula ovata, ad medium usque quinquesida, sive quinque-dentata. Semina reniformia, scabra.

221. SPERGULA. G. Pl. 232. Juss. 301.
Gertn. t. 130.

Cul. pentaphyllus. *Petala* 5, integra. *Capsula* supera, ovata, unilocularis, quinquevalvis.

arvensis. 1. SPERGULA foliis verticillatis, pedunculis fructiferis reflexis, semenibus reniformibus.

Spergula arvensis. Sp. Pl. 630. Huds. 202.
With. 436. Rebb. 181. Sibtb. 148. Curt.
Lond. fasc. 5. t. 31. Fl. Dan. t. 1033.

Spergula. Dod. Pempt. 537. Bauh. Hist. v. 3.
719, 2.

Altine Spergula dicta major. Raii Syn. 351.
Duhamel Cult. v. 6. 149. t. 1.

Saginæ Spergula. Ger. em. 1125.
Angl. Corn Spurrey.

In arvis arenosis.

Annuæ. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrofa, parva. Caules crebro-patentes, subramosi, teretes, glabri, foliosi, geniculati, geniculis tumidis; supernè pilosi, viscidi, paniculati. Folia verticillata, linearia, obtusa, subinde pilosa. Panicula dichotoma, divaricata, multiflora. Pedunculi uniflori, pubescentes, viscidi, basi bracteati, post florescentiam refracti. Calycis foliola ovata, obtusa, concava, pilosa, margine scariosa. Petala ovata, alba. Capsula calyce duplo longior.

giōr. Semina reniformia, gibbosa, marginata, demūm tuberculato-scabra.

Variat rariū floribus pentandris.

† 2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pen-^{pentan}
tandris, seminibus depresso^a alatis. ^{dra.}

Spergula pentandra. Sp. Pl. 630.

S. annua, semine foliaceo nigro, circulo membranaceo albo cincto. Dill. in Raii Syn. 351.
Giff. 46. Eph. Nat. Cur. Cent. 5 & 6. 275.

t. 4. f. 1.

Alsine Spergula dicta, semine membranaceo fusco. Raii Syn. ed. 2. 210. Conf. Moris.
Hist. v. 2. 551. n. 16 & 17.

A. Spergulae facie minima. Magn. Monsp. 14.
Angl. Little Corn Spurrey.

In arvis arenosis.

Observed in Ireland by W. Sherard, M. D. Dill.

Annua. Fl. Junio.

Habitus praecedentis, sed minor. Folia pauciora, magis que carnosa. Calycis margo vix scariosus. Stamina 5. Semina complanata, lævia, marginē dilatato, membranaceo, albo.

Hanc speciem nondum inveni, sed ex Dillenii fide admisi.
E Loeflingio accepit Linnæus.

3. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus: ^{nodosa;}
superioribus fasciculatis, calyce enervi.

Spergula nodosa. Sp. Pl. 630. Hudſ. 203.
With. 437. Relb. 181. Sibtb. 148. Ab-
bot. 103. Curt. Lond. fasc. 4. t. 34. Fl.
Dan. t. 96.

Alsine palustris foliis tenuissimis, seu Saxifraga
palustris anglica. Raii Syn. 350.

Saxifraga palusiris Alsinefolia. Goodyer in Ger.
em. 567.

Arenaria. Baub. Hist. v. 3. 720.

Polygonum foliis gramineis alterum. *Lvij.*

Pruss. 204. t. 64.

Angl. Knotted Spurrey.

In arenosis humidis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caules cæspitosi, patentes, palmares, subramosi, foliosi, glabri, pauciflori. Folia connata, subulata, glabra, basi subinde obsoletè ciliata; superiora in axillis fasciculata. Flores pedunculati, subterminales, albi. Calycis foliola ovata, obtusa, carinata, enervia, glabra. Capsula calyce sesquilongior.

faginoides. 4. **SPERGULA** foliis oppositis subulatis muticis nudis, pedunculis solitariis longissimis glabris.

Spergula faginoides. *Sp. Pl.* 631. *Swartz:*

Aët. Holm. Ann. 1789. 44. t. 1. f. 2?

Alfine floribus (foliis) gramineis, sæpè fasciculatis, glabris, pedunculis longis nudis unifloris. *Gmel. Sib.* v. 4. 157.

Angl. Smooth Awl-shaped Spurrey.

In alpibus Scoticis.

On Ben Lawers, where it was discovered by Mr.

J. Mackay in 1794.

Perennis. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Herba omnino glabra. Caules decumbentes, subramosi, sesquiunciales, foliosi, teretes, geniculati, apice erecti. Folia connata, subulata, acuta. Pedunculi plerumque terminales, solitarii, erecti, uniflori, teretes, nudi, glaberrimi, longitudine ferè caulum. Flores cernui, albi. Calycis foliola ovata, obtusa, levia, ferè enervia, basi gibbosa. Petala subrotunda, obtusa, integerrima, calyce breviora. Stamina decem, petalis vix longiora. Capsula ovata, calyce duplò longior, quinquevalvis. Semina reniformia, fusca, non marginata.

Stamina tantum 5 invenit Cel. Swartz.

5. **SPER-**

5. SPERGULA foliis oppositis subulatis aristatis *subulata*.
ciliatis, pedunculis solitariis longissimis sub-
pilosis.

Spergula subulata. *Wittb.* 436. *Swartz. Act.*
Holm. Ann. 1789. 45. *t. 1. f. 3.*

S. lericina. *Huds.* 203. *Lightf.* 244. *Fl. Dan.*
t. 858.

S. saginoides. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t. 35.*

Sagina procumbens β . *Sp: Pl.* 185.

Saxifraga graminea pusilla, foliis brevioribus cras-
sioribus et succulentioribus. *Raii Syn.* 345.


Angl. Ciliated Awl-shaped Spurrey.

In ericetis arenosis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caules basi procumbentes, radicantes,
dein erecti, ramosi, foliosi, teretusculi, glabri. Folia
connata, subulata, aristata, ciliata pilis glandulosis. Pe-
dunculi terminales et axillares, solitarii, uniflori, magis
vel minus pilosi. Flores subcernui, albi. Calycis fo-
liola ovata, obtusa, subcarinata, pilosa, subviscida. Pe-
tala obtusa, longitudine calycis. Stamina quinque, ra-
rius decem. Capsula calyce parum longior, quinque-
valvis. Semina reniformia, compressa, pallidè fusca,
lineâ nigrâ cincta, vix marginata.

Hanc cum *Saginâ* procumbente proculdubio confudit
Linnæus.



Classis XI.

DODECANDRIA.

Stamina 12—20.

MONOGYNIA.

Stylus 1.

222. ASARUM. *Cor.* nulla. *Cal.* trifidus, superus, *Caps.* sexlocularis.
223. LYTHRUM. *Pet.* sex, *Cal.* duodecimfidus, inferus.

DIGYNIA.

Styli 2.

224. AGRIMONIA. *Pet.* quinque, calyci inferta. *Sem.* in fundo calycis.

TRIGYNIA.

Styli 3.

225. RESEDA. *Pet.* multifida. *Caps.* unilocularis, hians.
226. EUPHORBIA. *Nectaria* peltata. *Caps.* tricocca, pedicellata.

TETRAGYNIA,

Styli 4.

Tormentilla officinalis.

DODECAGYNIA.

Styli 12.

227, SEMPERVIVUM. *Pet.* duodecim. *Cal.*
duodecimpartitus. *Caps.* duodecim,

XI. DODECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

222. ASARUM. *G. Pl.* 235. *Juss.* 73.
Gærtn. t. 14.

Cal. trifidus, germini insidens. *Cor.* nulla.
Stamina 12. *Capsula* coriacea, sexlocularis,
coronata. *Stigma* sexfidum.

1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. *europe-*
Asarum europaeum. *Sp. Pl.* 633. *Huds.* 205. *um.*
With. 440. *Woodv. Med. Bot.* t. 86. *Fl.*
Dan. t. 633. *Dicks. Dr. Pl.* 7.
Asarum. *Raii Syn.* 158. *Ger. em.* 836. *Fuchs.*
Hift. 10. *Brunf. Herb.* v. 1. 71. *Mattb.*
Valgr. v. 1. 33. *Cord. Hift.* 112. 1.
Asarum, folium. *Pharmac. Lond.*
Angl. Asarabacca.

In nemorosis Angliæ borealis rariūs.

In several woods in Lancashire. *Ray.* Near
Kirkby Lonsdale, Westmoreland. *Dr. Batty.*

Perennis. Fl. Maio.

Radix repens. Caulis brevis, simplex, uniflorus, et plé-
rumque bifolius, teres, pubescens. Folia opposita, lon-
giūs petiolata, reniformia, integrerimā, subpubescentia.
Flos pedunculatus, terminalis, urceolatus, atro-purpu-
reus, villosus.

223. LYTHRUM. *G. Pl.* 240. *Juss.* 332.
Gærtn. t. 62.

Cal. duodecimfidus, inferus. *Petala* sex, calyci
inserta. *Capsula* bilocularis, polysperma.

Salicaria. 1. LYTHRUM foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.

Lythrum Salicaria. *Sp. Pl.* 640. *Huds.* 205.

With. 441. *Relb.* 182. *Sibth.* 149. *Curt.*

Lond. fasc. 3. t. 28. *Fl. Dan.* t. 671.

Salicaria vulgaris purpurca foliis oblongis. *Raii*
Syn. 367.

Lysimachia purpurea spicata. *Ger. em.* 476.

Angl. Purple Loosestrife.

In palustribus, et ad ripas fluviorum.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Formosa planta. Radix lignosa, ramosa, multiceps. Caules tripedales, erecti, virgati, quadranguli, subinde hexagoni, foliosi. Folia opposita, rariūs terna, etiam quaterna, sessilia, lanceolata, basi cordata; suprà glabra; subtùs margineque pubescentia. Flores verticillatospicati, purpurei, dodecandri. Calyx ruber. Petala oblonga, undulata. Stamina alterna longiora, inflexa. Capsula elliptica, parva.

hyssopifolium. 2. LYTHRUM foliis alternis lincari-lanceolatis, floribus axillaribus solitariis hexandris.

Lythrum hyssopifolium. *Sibth.* 149. *Engl. Bot.*
t. 292. *With.* 441. *Abbot.* 104.

L. Hyssopifolia. *Sp. Pl.* 642. *Huds.* 206.
Relb. 183. *Jacq. Austr.* t. 133. *Dicks. H.*
Sicc. fasc. 16. 2.

Salicaria Hyssopi folio latiore et angustiore. *Raii*
Syn. 367. *Rupp. Jen. ed. Halleri* 147. t. 6.
f. 2.

Gratiola angustifolia. *Ger. em.* 581.

Angl. Hyssop-leaved Loosestrife, or Grass-poly.

In aquosis, et ubi aquæ per hyemem stagnârunt,
sed rariūs.

On Hounslow heath. *Huds.* In Cambridgeshire
and

and Huntingdonshire. *Relb.* *With.* Oxfordshire. *Sibth.* Near Bedford. *Rev. Mr. Abbot.*

Annua. Fl. Augusto.

Radix attenuata, simplex. Caulis spithameus, basi ramosus, erectus. Folia linearis-oblonga, glabra, latitudine varia; inferiora tantum opposita. Flores axillares, subsessiles, solitarii, parvi, purpurei, hexandri, regulares, interdum quinquefidi pentandri.

II. DIGYNIA.

224. AGRIMONIA. G. Pl. 241. Juss. 336.
Gærtn. t. 73.

Cal. quinquedentatus, calyculatus. *Petala* quinque, calyei inserta. *Semina* duo, in fundo calycis.

AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis: impari *Eupatoria*, petiolato, fructibus hispidis. *riza.*

Agrimonia Eupatoria. Sp. Pl. 643. Huds. 206.
With. 443. Relb. 183. Sibth. 150. Curt.
Lond. fasc. 5. t. 32. Mart. Fl. Rust. t. 37.
Fl. Dan. t. 588. Woodv. Suppl. t. 258.

Agrimonia. Raii Syn. 202. Ger. em. 712.

Eupatorium. Matth. Valgr. v. 2. 362.

Angl. Common Agrimony.

In dumetis et ad margines agrorum.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix ramosa, non repens. Caulis bipedalis, foliosus, angulosus,

angulosus, pilosus. Folia alterna, interruptè et impari pinnata, sublyrata, pilosa; foliolis obovatis, acutis, inciso-ferratis; impari petiolato; intermediis minimis, integris trifidisve. Stipulae lunatæ, incisæ. Spica terminalis, multiflora, erecta, pilosa. Flores breviùs pedicellati, aurei. Calyx persistens, induratus, sulcatus, setis uncinatis muricatus. Herba aromatica, tonica.

III. TRIGYNIA.

225. RESEDA. *G. Pl.* 242. *Juss.* 245.
Gærtn. *t.* 76.

Cal. monophyllus, partitus. *Petala* laciniata,
Capsula supera, apice hians, unilocularis, poly sperma.

Luteola. 1. RESEDA foliis lanceolatis integris planis, calyce quadrifido.

Reseda Luteola. *Sp. Pl.* 643. *Huds.* 207.
Witb. 445. *Relb.* 184. *Sibth.* 150. *Mart.*
Fl. Rust. *t.* 40. *Engl. Bot.* *t.* 320.

Luteola. *Raii Syn.* 366. *Ger. em.* 494.

2. L. minima Polygalæ folio. *Dill.* in *Raii Syn.*
367?

Angl. Dyer's-weed, Yellow-weed, or Weld.

In ruderatis, arvis requietis, et ad muros.

Common about Norwich.

3. Cornfields on Mount Ephraim, Tunbridge Wells.
Mr. Du Bois.

Annua. Fl. Julio.

Radix

Radix fusiformis. **Caulis** virgatus, striatus, bipedalis, ramosus, foliosus, striatus. **Folia** linear-lanceolata, integerrima, plana, glabra, saepius denticulo utrinque ad basin. **Spicæ terminales**, erectæ, multifloræ, bracteolatæ. **Flores** ochroleuci. **Calyx** quadrifidus. **Petalum superius** impar, quadrifidum; **lateralia** trifida, subinde linearia, indivisa. **Nectarium** crenatum, ad basin petali superioris. **Stamina** declinata.

2. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus lutea.
pinnatis, calyce sexfido.

Reseda lutea. Sp. Pl. 645. Huds. 207.
With. 446. Relb. 184. Sibth. 151. Engl.
Bot. t. 321. Dicks. H. Sicc. fasc. 8. 12. Jacq.
Austr. t. 353.

R. vulgaris. Raii Syn. 366.

Base Dyer's Weed. Pet. H. Brit. t. 37. f. 11.

3. *Reseda crispa gallica.* Dill. in Raii Syn. 366.
Bocc. Sic. 76. f. 3.

Angl. Wild Mignonette, or Base Rocket.

In arvis collibusve cretaceis.

Annuæ, vel Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix sublignosa. **Caules** plures, ramosi, foliosi, teretes, striati, glabri. **Folia** trifida vel pinnatifida, inferiora saepe bipinnatifida, laciniis linearibus, canaliculatis, glabris, magis vel minus undulatis. **Spicæ terminales**, erectæ, multifloræ, bracteolatæ. **Flores** ochroleuci. **Calyx** sexfidus. **Petala** sex, variè lobata. **Nectarium** fimbriatum. **Stamina** declinata.

226. EUPHORBIA. G. Pl. 243. Juss. 385.

Cal. monophyllus, ventricosus, inferus. *Nectaria* 4 vel 5, calyci insidentia. *Capula* pedicellata, tricocca.

* *Dichotomæ (umbella bifida aut nulla).*

2. EUPHORBIA foliis subintegerrimis semicor- Peplis.
datis,

datis, floribus solitariis axillaribus, caulis, procumbentibus, capsula lœvi.

Euphorbia Peplis. *Sp. Pl.* 652. *Huds.* 207.
With. 446.

Tithymalus maritimus supinus annuus, Peplis dictus. *Raii Syn.* 313.

Peplis. *Mattb. Valgr.* v. 2. 599. *Camer. Epit.*
970. *Ger. em.* 503.

P. Matthioli, et Peplion. *Dalech. Hist.* 1659.
Angl. Purple Spurge.

In maritimis arenosis australioribus.

Between Pensaus and Marketjeu in Cornwall plentifully. *Ray.* In the loose sand near Exmouth, Devonshire. *Huds.*

Annuæ. Fl. Julio, Augusto.

Radix longissima. Caules prostrati, divaricati, alternatim ramosi, foliosi, quadranguli, glabri, rubicundi. Folia opposita, petiolata, semicordata, obtusa, glabra, purpureo-glauea, uninervia, basi apiceque subinde denticulata. Stipulae intrafoliaceæ, parvæ, multifido-setaceæ. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori. Flores parvi, lutescentes. Nectaria 4. Capsula deflexa, lœvis.

* * *Umbella trifida.*

Peplus. 2. EUPHORBIA umbellâ trifidâ : dichotomâ, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis.

Euphorbia Peplus. *Sp. Pl.* 653. *Huds.* 208.
With. 447. *Relb.* 185. *Sibb.* 151. *Curt.*
Lond. fasc. 1. t. 35.

Tithymalus parvus annuus, foliis subrotundis non crenatis, Peplus dictus. *Raii Syn.* 313.

Peplus, sive Esula rotunda. *Ger. em.* 503.

P. Matthioli. *Dalech. Hist.* 1658.

Peplus. *Camer. Epit.* 969.

Angl. Petty Spurge.

In cultis paſſim.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva, fibroſa. Herba lætē virens, glabra. Caulis erectus, ramosus, teres, foliosus, trifidus, ramis dichotomis. Folia caulinā ſparſa, petiolata, obovata, integrifolia. Involucella, ſeu folia ramea, oppofita, ſeffilia, ovata, baſi inaequalia. Flores parvi, lutei, nectariis 4, bicornibus. Capsula glabra. Semina angulata, excavato-punctata.

3. EUPHORBIA umbellā trifidā : dichotomā, *exigua*, involucellis lanceolatis, foliis linearibus.

Euphorbia exigua. Sp. Pl. 654. Huds. 208.

With. 447. Relb. 185. Sibth. 151. Curt.

Lond. fasc. 4. t. 36. Dicks. H. Sicc. fasc. 9. 6.

Fl. Dan. t. 592.

Tithymalus leptophyllum. Raii Syn. 313. Camer. Epit. 966.

Esula exigua Tragi. Ger. em. 503.

Peplis minor. Dalech. Hist. 1659.

3. Tithymalus ſegetum longifolius. Raii Syn. 312 ?

Angl. Dwarf Spurge.

Inter ſegetes.

Annua. Fl. Julio.

Herba ſpithamea, glabra. Folia ſeffilia, linearia, acuta, integrifolia. Flores exigui, flavi. Nectaria 4, bicornia. Capsula laevis. Semina quadrangula, corrugata.

Variat umbellā quadrifidā, ſubinde quinquefidā. Curtis, Relhan.

* * * Umbella quinquefida.

4. EUPHORBIA umbellā quinquefidā : dichotomā, involucellis ſubcordatis concavis, foliis linear-i-ovatis acutis glabris patentibus. Portlan-

Euphorbia Portlandica. Sp. Pl. 656. Huds. 208.

With. 448. Engl. Bot. t. 441.

Tithy-

Tithymalus maritimus minor, Portlandicus.
Dill. in Raii Syn. 313. t. 24. f. 6.
Angl. Portland Spurge.

In maritimis australioribus.

On Portland island, and on the coasts of Devonshire and Cornwall. Near Caernarvon, Wales.
Huds. On the warren near Exmouth, plentifully. *Rev. Dr. Goodenough.*

Perennis. Fl. Augusto.

Radix ramosa, longa. Herba glauca. Caulis setè pedalis.
Folia obovato-linearia, mucronulata. Umbella quinquesida, pedunculis aliquot sparsis ex axillis foliorum superiorum. Involucrum foliis conforme, pentaphyllum. Involucella sub-rhombea, vix cordata, acuminate. Nectaria quatuor, flava, lunata. Capsula angulis scabra.

Paralia. 5. *EUPHORBIA umbellâ subquinquefidâ : bifidâ, involucellis cordato-reniformibus, foliis sursùm imbricatis concavis.*

Euphorbia paralia. Engl. Bot. t. 195.

E. Paralias. Sp. Pl. 657. Huds. 209. With. 448. Jacq. Hort. Vind. t. 188.

Tithymalus paralius. Raii Syn. 312. Ger. em.

498. Cumr. Epit. 962. Dalech. Hist. 1647.

Angl. Sea Spurge.

In maritimis arenosis, haud vulgaris.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Radix sublignosa. Herba cæsia, lœvissima. Caules erecti, pedales. Folia imbricata, obovata, concava. Umbella magis vel minus ordinatum quinquefida, ramulis bifidis, vix dichotomis. Involucella reniformia, concava. Nectaria 5, lunata, fulva. Capsula lœviuncula.

6. EUPHORBIA umbellâ quinquefidâ : trifidâ : dichotomâ,

dichotomâ, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis.

Euphorbia helioscopia. *Sp. Pl.* 658. *Huds.* 209.
With. 449. *Relb.* 185. *Sibth.* 152. *Curt.*
Lond. fasc. 1. *t.* 36.

Tithymalus helioscopius. *Raii Syn.* 313. *Ger.*
em. 498. *Camer. Epit.* 963. *Dalech. Hist.*
1648. *Fuchs. Hist.* 811.

Angl. Sun Spurge, or Wart-wort.

In cultis passim.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fusiformis. Caulis sæpius basi ramosus. Folia cuneiformia, vèl obovata, apicem versus ferrata, glabra. Umbella quinquefida, ramis basi patentibus, trifidis et dichotomis. Involucra, ut et involucella, foliis ferè conformia. Flores lutei. Nectaria 4, integra. Capsula omnino lævis, glabra.

7. EUPHORBIA umbellâ subquinquefidâ : tri-*platy-*
trifidâ : dichotomâ, involucellis ovato-rhom-*phylla*.
beis carinâ pilosis, foliis ferrulatis, capsulis
verrucosifusis.

Euphorbia platyphyllea. *Sp. Pl.* 660. *Huds.* 209.
With. 449. *Abbot.* 106.

Tithymalus platyphyllos. *Raii Syn.* 312. *Fuchs.*
Hist. 813. *Baub. Hist.* v. 3. 670.

T. arvensis annuus latifolius Germanicus. *Mo-*
rif. sect. 10. *t.* 3. *f.* 1.

Pityusa sive *Esula minor*. *Dalech. Hist.* 1653.

2. *Euphorbia stricta*. *Syst. Nat. ed.* 10. 1049.
Engl. Bot. t. 333. *With.* v. 4. 404.
E. verrucosa. *Huds.* 209. *With.* 449. *Relb.*
186.

Tithymalus verrucosus. *Raii Syn.* 312, nec
Bauhini.

Angl. Warty Spurge.

In arvis.

At Black Notley, Essex. *Ray.* Near Harefield.
Blackstone, and *Rev. Mr. Lightfoot*. Near
 Northfleet, Kent. *Huds.*

β. On the north side of Eversden wood, Cam-
 bridgehire. *Rev. Mr. Relhan.* Near Ripton,
 Huntingdonshire. *Mr. Woodward.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrofa, parva. Caulis erectus, teres, glaber. Fo-
 lia sessilia, obovato-lanceolata, acuta, glaucescentia, sub-
 pilosa; basi cordata, integerim; e medio ad apicem
 ferrulata: inferiora subpetiolata. Umbella plerumque
 quinquefida, radiis trifidis, dichotomis; ramis axillari-
 bus pluribus, per caulem sparsis, dichotomis. Involu-
 cella ovato-rhombea, acuta, ferrulata, flavescentia, sub-
 undulata, carinâ pilis albis ciliatâ, subinde undique pi-
 losa. Calyx interdum apice pilosus. Nectaria subro-
 tunda, mutica, flava. Capsula tuberculato-scabra, an-
 gulis rariâ lineâ lævi notatis. Semina lenticularia,
 lævissima.

§ nullo discrimine dignoscenda, nisi quod minor et tenuior
 est, umbellâ saepe quadrifidâ, subinde trifidâ. Pubef-
 centia in utrâque varietate variat, at carinæ involucel-
 lorum pilis nuncquam planè destituuntur.

* * * * *Umbella multifida.*

Esula. 8. *EUPHORBIA* umbellâ multifidâ: bifidâ, in-
 volucellis subcordatis, nectariis bicornibus,
 ramis sterilibus foliis uniformibus.

Euphorbia Esula. *Sp. Pl.* 660.

Esula. *Rivin. Tetrapet.* irreg. t. 116. f. 1.

E. minor. *Dodon. Pempt.* 374. *Dalech. Hist.*
 1653.

Tithymalus pineus. *Ger. em.* 499. *Lob. Ic.* 357.
Angl. Leafy-branched Spurge.

In nemorosis Scoticis,

In a wood near a rivulet at Abercorn, 13 miles west of Edinburgh, 1792. *Mr. J. Mackay.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix lignosa. Caules pedales, vel sesquipedales, erecti, glabri; ramis axillaribus inferioribus foliosis, sterilibus, plurimis. Folia linearis-ovata, integerrima, late viridia, glabra, omnia uniformia. Umbella 6—8-fida, subdichotoma, ramis axillaribus paucioribus, caulis apicem versus, subunifloris. Involucella cordata, integerima, glabra. Nectaria lunata, bicornia, fulva. Capsula lœvis.

9. EUPHORBIA umbellâ multifidâ: dichoto-*Cyparissias.*
mâ, involucellis subcordatis, ramis sterilibus *fias.*
foliis setaceis, caulinis lanceolatis.

Euphorbia Cyparissias. Sp. Pl. 661. With. 451.
Jacq. Austr. t. 435.

Tithymalus cupressinus, sive humi pinus. Lob.
Ic. 356. Ger. em. 499.

T. cyparissias. Matth. Valgr. v. 2. 592. Da-
lech. Hist. 1644. Bauh. Pin. 291.

T. cyparissias repens. Moris. sect. 10. t. 2. f. 29.
Angl. Cypress Spurge.

In nemorosis et campis sterilibus.

Woods at the Earl of Stamford's at Enville, Staf-
fordshire. With.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix repens. Caules pedales; ramis inferioribus foliosis,
sterilibus; superioribus floriferis, ut in præcedente. Fo-
lia integerrima, linearis-lanceolata, acuta; ramea an-
gustissima, et ferè setacea. Umbella 7—15-fida, di-
chotoma, ramis umbellæ subiectis etiam dichotomis.
Involucella cordato-reniformia, integerrima, glabra, lu-
teo-viridia, demum miniata. Nectaria lunata, bicor-
nia, fulva. Capsula lœvis.

10. EUPHORBIA umbellâ sexfidâ: dichotomâ, *hyberna.*
invo.

involucellis ovalibus, foliis obtusis integrifinis, ramis nullis, capsulis verrucosis.

Euphorbia hyberna. *Sp. Pl.* 662. *Huds.* 210. *With.* 450.

Tithymalus hybernicus. *How. Phyt.* 121. *Raii Syn.* 312.

T. hibernicus, vasculis muricatis erectis. *Dill. Hort. Elth.* 387. *t.* 290.

T. platyphyllos. *Clus. Hist. v.* 2. 190. *Dalech. Hist.* 1649. *Ger. em.* 500.

Angl. Irish Spurge. Makinboy.

In arvis.

In Ireland. *Ray.* About Twickenham. *Doody.*

Between Faversham and Sittingbourne in Kent. *Huds.*

Perennis. Fl. Junio.

Radix fusiformis. Caulis simplex, bipedalis, basi subinde ramosus. Folia uniformia, obovata, vel subelliptica, obtusa, integrifina, glabra. Umbella saepius sexfida, radiis dichotomis, paucifloris. Involucella elliptica, integrifina, flava. Nectaria reniformia, fulva. Capsula erecta, brevius pedicellata, subrotunda, muricata.

amygdala- II. *EUPHORBIA* umbellâ multifidâ : dichotomoides. mâ, involucellis perfoliatis, foliis obtusis pilosif, capsulâ glabrâ.

Euphorbia amygdaloides. *Sp. Pl.* 662. *Huds.* 210. *With.* 452. *Relb.* 186. *Sibth.* 152. *Engl. Bot.* t. 256.

Tithymalus characias amygdaloides. *Raii Syn.* 312.

Angl. Wood Spurge.

In nemorosis et dumetis, vulgaris.

Perennis. Fl. Martio, Aprili.

Caules simplices, rubicundi, pilosi, infernè nudi, suffructicosi.

ticosi. Folia obovato-lanceolata, integerrima, pilosa, ferè sempervirentia. Umbella 5—8-fida, dichotoma, ramulis subjectis axillaribus, dichotomis. Involucella connato-perfoliata, reniformia, obtusa, pallida, subpilosa. Nectaria lunata, acuminata, citrina. Capsula glabra.

Euphorbia sylvatica Linnæi, species reverà distincta, discrepat foliis lanceolatis, mucronulatis, glabris, nectariis bicornibus. Icones antiquiores hanc speciem potius quam *E. amygdaloidem* referunt.

12. EUPHORBIA umbellâ multifidâ : dichoto- *Charac-*
mâ, involucellis persfoliatis, foliis lanceolatis *cias.*
mollissimè pubescentibus, capsulâ pilosâ.

Euphorbia Characias. *Sp. Pl.* 662. *Huds.* 211.
With. 451. *Engl. Bot.* t. 442. *Jacq. Ic.*
rar. v. 1. t. 89.

Tithymalus Characias. *Matth. Valgr.* v. 2. 588.
T. Characias Monspeliensium. *Raii Syn.* 312.
Ger. em. 499.

Angl. Red Spurge.

In montosis et dumetis rariùs.

In the forest of Needwood, Staffordshire, in great
plenty, undoubtedly wild. *Mr. Whately.*

Frutex. Fl. Martio, Aprili.

Caules fruticosi, simplices, tripedales, pubescentes. Fo-
lia lanceolata, integerrima, utrinque mollissimè pubes-
centia, subitus pallida, sempervirentia. Umbella mul-
tifida, dichotoma, ramulis subjectis axillaribus, subdi-
chotomis, villosis. Involucella connato-perfoliata, re-
niformia, acutiuscula, pallida, villosa. Nectaria lunata,
mutica, atro-purpurea. Capsula pilosa.

IV. DODECAGYNIA.

227. SEMPERVIVUM. *G. Pl.* 244. *Juss.* 307.
Gærtn. t. 65.

Cal. inferus, duodecim-partitus. *Petala* 12.
Capsulæ 12, polyspermæ.

tectorum. I. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patentibus.

Sempervivum tectorum. *Sp. Pl.* 664. *Huds.* 211,
With. 452. *Rehb.* 187. *Sibth.* 153. *Abbot.* 106. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 29. *Fl. Dan.* t. 601.

S. majus. *Raii Syn.* 269. *Ger. em.* 540. *Cam-*
mer. Epit. 854.

Sedum majus. *Fuchs. Hist.* 32.
Angl. Common Houseleek.

In tectis et ad muros vulgaris.

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa, propaginibus foliosis, rosaceis, plurimis. Caulis erectus, pedalis, teres, carnosus, pubescens, foliosus, apice corymbosus, multiflorus. Folia maximè carnosa, carinata, acuta, ciliata; radicalia obovata; caulina alterna, lanceolata, tenuiora, rubicunda. Flores pallidè carnei, pubescentes. Petala lanceolata, basi connata. Stamina petalis breviora. Partium numerus maximè variat.

Classis XII.

ICOSANDRIA.

Stamina plura, calyci inserta.

MONOGYNIA.

Stylus 1.

228. PRUNUS. *Cal.* inferus, quinquefidus. *Pet.* quinque. *Drupa* nucleo integro.

Mespilus Oxyacantha.

(DIGYNIA.)

Styli 2.

Mespilus Oxyacantha. *Pyrus terminalis, hybrida, et Aria.*

(TRIGYNIA.)

Styli 3.

Mespilus Oxyacantha. *Pyrus terminalis, aucuparia, hybrida, et Aria.*

(TETRAGYNIA.)

Styli 4.

Pyrus torminalis, aucuparia et Aria.

(PENTAGYNIA.)

Styli 2 ad 5.

229. MESPILUS. *Cal.* superus, quinquefidus.
Pet. quinque. *Drupa* nucibus 2 ad 5, di-
 spermis.
230. PYRUS. *Cal.* superus, quinquefidus. *Pet.*
 quinque. *Ponum* loculamentis 2 ad 5, di-
 spermis.
231. SPIRÆA. *Cal.* inferus, quinquefidus. *Pet.*
 quinque, *Caps.* bivalves, polyspermæ.

POLYGYNIA.

Styli plures.

232. ROSA. *Cal.* quinquefidus, urceolatus, de-
 mūm baccatus, polyspermus.
233. RUBUS. *Cal.* quinquefidus. *Bacca* supera,
 composita, acinis monospermis.
236. TORMENTILLA. *Cal.* octofidus. *Pet.*
 quatuor. *Sem.* nuda, mutica.
238. DRYAS. *Cal.* octo- vel decem-fidus. *Pet.*
 quinque vel octo. *Sem.* caudata, plumosa.
234. FRA-

234. FRAGARIA. *Cal.* decemfidus. *Sem.* nuda, lævia, receptaculo deciduo, baccato, affixa.
235. POTENTILLA. *Cal.* decemfidus. *Sem.* nuda, rugosa, mutica.
237. GEUM. *Cal.* decemfidus. *Sem.* arista geniculata. *Recept.* columnare.
239. COMARUM. *Cal.* decemfidus. *Sem.* nuda, lævia, receptaculo ovato, spongioso, villoso, persistenti, affixa.

Spiræa Filipendula et Ulmaria.

XII. ICOSANDRIA.

I. MONOGYNIA.

228. PRUNUS. *G. Pl.* 249. *Juss.* 341.

Gærtn. t. 93.

Cerasus, *Juss.* 340.

Cal. quinquefidus, inferus. *Petala* 5. *Drupæ*
nux futuris prominulis.

Padus. 1. PRUNUS floribus racemosis : racemis pendulis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis.

Prunus Padus. *Sp. Pl.* 677. *Huds.* 213. *With.*

455. *Fl. Dan.* t. 205.

Cerasus Avium nigra et racemosa. *Raii Syn.* 463.

Ger. em. 1504.

Angl. Bird Cherry,

In sylvis et sepibus,

Common in the north of England, and in some parts of Norfolk, as about Watton and Dereham.

Arbuscula. Fl. Maio.

Rami teretes, laeves. Folia alterna, petiolata, obovata, acuminata, ferrata, ferraturis inflexis, venosa, glabra, subglaucescentia, odore acri rutaceo. Stipulae intrafoliaceæ, binæ, lineares, subciliatæ, deciduae. Racemi e basi ramorum novellorum, solitarii, simplices, nutantes, multiflori, glabri, basi foliosi. Flores albi. Petala ferrulata. Fructus niger, nauseosus,

Cerasus. 2. PRUNUS umbellis subsessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis.

Prunus Cerasus, *Sp. Pl.* 679. *Huds.* 213. *With.* 455. *Relb.* 189. *Sibth.* 155. *Abbot.* 107.

Cerasus sylvestris fructu rubro. *Raii Syn.* 463. *C. vul-*

- C. vulgaris. *Ger. em.* 1502.
 C. sativa, fructu rotundo rubro et acido. *Duhamel, Arb. v.* 1. 148. t. 56.
 β. C. sylvestris, fructu minimo cordiformi, *Raii Syn.* 463.
 γ. C. sylvestris septentrionalis, fructu parvo serotino. *Raii Syn.* 463.
 δ. *Prunus avium.* *Sp. Pl.* 680? *With.* 456.
 Sibth. 154. *Abbott.* 107.
 P. *Cerasus γ,* *Huds.* 213.
Cerasus sylvestris, fructu nigra. *Raii Syn.* 463.
 C. nigra. *Ger. em.* 1505.
 ε. *Corone or Coroun Cherry.* *Mill. Dict.*
 Angl. Cherry-tree,

In sylvis et sepibus,

- β. In Lancashire, Cheshire and Westmoreland.
 Ray.
 γ. On the banks of the Tees near Barnard-castle
 plentifully. *Ray.*
 δ. In the midland and eastern counties.
 ε. About Bergh-Apton in Norfolk, and in Hertfordshire.

Arbor. Fl. Maio.

Rami cinerei, nitidi, teretiusculi. Folia petiolata, ovata
 vel ovato-lanceolata, acuminata, inæqualiter ferrata,
 venosa; juniora conduplicata, subtus magis vel minus
 pubescentia. Stipulae dentatae, glandulosæ. Umbellæ
 aphyllæ, paucifloræ, nutantes. Calyx reflexus. Petala
 alba. Drupa rubra, acida, in δ & ε nigra, subdulcis,
 in ε major.

- * 3. PRUNUS pedunculis subsolitariis, foliis lan- *domesti-*
 ceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *ca.*
 Prunus domestica. *Sp. Pl.* 680. *With.* 456.
 Ger. em. 1497. *Woodv. Med. Bot.* t. 85.
 P. communis δ. *Huds.* 212.
 P. sativa.

P. sativa. *Fuchs. Hist.* 403.

Prunus gallica, fructus. *Pharmac. Lond.*

Angl. Plum-tree.

In sepibus, vix indigena.

Arbor. Fl. Aprili.

Arbor mediocris. Rami mutici. Folia breviūs petiolata, ovata, ferrata, glabra; juniora convoluta et subtūs pubescentia. Pedunculi breves, plerumque solitarii. Calyx erectus. Petala alba, obovata. Drupa elliptica,

infinitia. 4. PRUNUS pedunculis geminis, foliis lanceolato-ovatis convolutis subtūs villosis, ramis spinescentibus.

Prunus infinitia. *Sp. Pl.* 680. *With.* 456.

Relb. 188. *Sibth.* 154.

P. sylvestris major. *Raii Syn.* 462.

β. *P. sylvestris, fructu majore albo.* *Raii Syn.* 462.

γ. *P. sylvestris, fructu rubro acerbo et ingrato.* *Raii Syn.* 163.

Angl. Bullace-tree,

In sepibus et nemorosis.

Arbor. Fl. Aprili.

Arbor humilis. Rami plerumque spinā terminati. Folia breviūs petiolata, ovata, basi attenuata, ferrata, subtūs villosa. Pedunculi gemini. Calyx cretiusculus. Petala alba, obovata. Drupa subrotunda.

spinosa. 5. PRUNUS pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis.

Prunus spinosa. *Sp. Pl.* 681. *Huds.* 212.

With. 457. *Relb.* 189. *Sibth.* 155. *Fl. Dan.* t. 926. *Woodv. Med. Bot.* t. 84.

P. sylvestris. *Raii Syn.* 462. *Ger. em.* 1497. *Trag. Hist.* 1016. *Fuchs. Hist.* 404.

Prunus sylvestris, fructus. *Pharmac. Lond.*

Angl. Sloe-tree. Black-thorn.

In

In sepibus et dumetis vulgaris.

Fruter. Fl. Martio, Aprili.

Rami divaricati, spinis terminati. Folia petiolata, obovato-lanceolata, ferrata, glabra. Flores ante folia enata expansi, nivei, pedunculati, solitarii. Calyx patens. Drupa nigra, subrotunda, valde austera.

II. PENTAGYNIA.

(Styli 2 ad 5).

229. MESPILUS. G. Pl. 251. Juss. 335.
Gærtn. t. 87.

Crataegus. G. Pl. 250. Juss. 335.

Cal. quinquefidus. Petala 5. Drupa infera.
Nuces 2 ad 5, dispermæ.

1. MESPILUS spinosa, foliis obtusis subtrifidis *Oxyacantha*-
ferratis glabris, floribus subdigynis. *cantha-*

Mespilus Oxyacantha. Gærtn. v. 2. 43. t. 87.

M. Apii folio sylvestris spinosa, five Oxyacantha.

Raii Syn. 453.

Crataegus Oxyacantha. Sp. Pl. 683. Huds. 214.

With. 459. Relb. 189. Fl. Dan. t. 634.

C. monogyna. Sibth. 156. Abbot. 108. Jacq.
Austr. t. 292.

Oxyacanthus. Ger. em. 1327.

2. Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, folio et
fructu majore. Dill. in Raii Syn. 454.

γ. Glas-

γ. Glastenbury Thorn. *With.* 459.

Angl. Hawthorn. White-thorn. May.

In campis elatis, sylvis et sepibus.

Arbustula. Fl. Maio, Junio.

Lignum durum. Rami glabri, rigidi, spinosi. Folia pétiolata, alterna, trifida, incisa, apice ferrata, glabra, stipulis lunatis, dentatis, magnitudine variis, “in γ maximis;” *Withering.* Corymbi terminales, glabri. Flores albi, quandoque rosei, suaveolentes. Styli 1 ad 3. Drupa sanguinea, pulpâ farinosâ. Nuces 1 ad 3, osseæ, sæpius monospermæ. Variat fructu luteo, vel albido. Frutex ad sepes vivas præstantissimus.

germani- * 2. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis sub-tomentosis, floribus solitariis sessilibus terminalibus pentagynis.

Mespilus germanica. *Sp. Pl.* 684. *Huds.* 217.

With. 461. *Gærtn.* v. 2. 43. t. 87.

Mespilus. *Dill. in Raii Syn.* 453.

M. sativa. *Ger. em.* 1453.

M. vulgaris. *Camer. Epit.* 154.

M. altera. *Matth. Valgr.* v. 1. 230.

Angl. Common Medlar.

In sepibus.

In all the hedges about Minshull, Cheshire. *Du Bois.*

Arbor. Fl. Maio.

Rami patent. Folia oblonga, apice serrulata, subtùs præcipue tomentosa. Flores terminales, subsessiles, solitarii. Calycis dentes longissimi, persistentes. Petala alba. Styli 5. Drupa pubescens, apice concava. Nuces 5, osseæ, compressæ, angulatæ. E specimine hortensi hanc descriptionem confeci.

230. PYRUS. *G. Pl.* 251. *Juss.* 335. *Gærtn.* t. 87.

Sorbus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.

Crataegus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.

Malus. *Juss.* 334.

Cal. quinquefidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum,
2 ad 5-loculare. *Semina* bina.

1. PYRUS foliis simplicibus serratis, pedunculis *communi-*
corymbosis.

Pyrus communis. *Sp. Pl.* 686. *Huds.* 216.

With. 462. *Relb.* 191. *Sibth.* 156.

P. Achras. *Gærtn.* v. 2. 44. t. 87.

P. sylvestris. *Ger. em.* 1458.

Pyraster, seu *Pyrus sylvestris.* *Raii Syn.* 452.

Angl. Pear-tree. Iron Pear-tree.

In sylvis et sepibus.

Arbor. Fl. Aprili.

Arbor excelsa, ramis erectis, ramulis dependentibus. *Folia* elliptica, obtusa, ferrata; juniora subtus margine-
que tomento deciduo vestita. *Stipulæ* lineares. *Corymbi* terminales, villosi. *Flores* nivei, pentagyni.
Pomum basi productum, durum, acerbum. *Locula-*
menta quinque, singula bivalvia, disperma.

2. PYRUS foliis simplicibus serratis, umbellis *Malus.*
simplicibus sessilibus.

Pyrus Malus. *Sp. Pl.* 686. *Huds.* 216. *With.*
462. *Relb.* 191. *Sibth.* 157. *Engl. Bot.*
t. 179.

Malus sylvestris. *Raii Syn.* 452. *Ger. em.* 1461.
Angl. Apple-tree. Crab-tree.

In sylvis et sepibus.

Arbor. Fl. Maio.

Arbor patula, ramis ramulisque tortuosis, magis quam in
priore horizontalibus. *Folia* ovata, ferrata; juniora
subtus pubescentia. *Stipulæ* lineares. *Umbellæ* ter-
minales, sessiles, villosæ. *Flores* albi, extus rosei, pen-
tagyni.

tagyni. Pomum subrotundum, basi umbilicatum, acidum. Loculamenta ut in præcedente.

- tormina-* 3. PYRUS foliis simplieibus subcordatis serratis septemlobatis: lobis insimis divaricatis.
lis. Crataegus torminalis. *Sp. Pl.* 681. *Huds.* 214.
With. 458. *Sibth.* 156. *Engl. Bot.* t. 298.
Fl. Dan. t. 798. *Jacq. Austr.* t. 443.
Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, seu
Sorbus torminalis. *Raii Syn.* 453.
Sorbus torminalis. *Ger. em.* 1471. *Camer.*
Epit. 162. *Trag. Hist.* 1010. *Matth. Valgr.*
v. 1. 239. *Cord. Hist.* 176. 1.
Angl. Wild Service Pear-tree.

In sylvis et sepibus.

Arbor. Fl. Aprili, Maio.

Arbor mediocris, ligno duro, cortice lævi. Folia longius petiolata, subcordata, inæqualiter septemloba, acuminata, ferrata, glabra, exstipulata. Corymbi terminales, ramosi, tomentosi, multiflori. Flores albi. Styli 2 ad 5. Pomum punctatum, fuscum, austерum, demum, pruinatum, emollitum, grātē aceſcens et pulposum.

- domeſti-* 4. PYRUS foliis pinnatis; foliolis æqualibus subtus villosis anticè serratis, floribus paniculatis.
ca. *Pyrus domestica.* *Engl. Bot.* t. 350.
P. sorbus. *Gærtn.* v. 2. 45. t. 87.
Sorbus domestica. *Sp. Pl.* 684. *Huds.* 215.
With. 460. *Crantz.* *Stirp. fasc.* 2. 48. t. 2.
f. 3. *Matth. Valgr.* v. 1. 237. *Jacq. Austr.*
t. 447.
Sorbus. *Raii Syn.* 452. *Ger. em.* 1471.
Angl. True Service-tree.

In sylvis montosis rariū.

In the mountainous parts of Cornwall and Staffordshire. *Ray.* In the middle of Wire forest near Bewdley,

Bewdley, Worcestershire. Mr. Pitts. Lord Viscount Valentia.

Arbor. Fl. Maio.

Arbor mediocris, tardè crescens, nec nisi grandæva fructifera. Folia impari-pinnata, 6—9-juga, foliolis sessilibus, oblongis, æqualibus, a medio ad apicem serratis, subtùs villosis, autumno denudatis. Paniculæ terminales, subcorymbosæ, tomentosæ. Flores albi. Styli 5. Pommum obovatum, rubicundum, quinqueloculare, loculamentis bivalvibus monospermis, demùm pulposa et edule. “Seminum rudimenta in germine constantè bina.” Gærtn.

5. PYRUS soliis pinnatis; foliolis æqualibus ser-^{aucuparia}
ratis glabriusculis, floribus corymbosis subtri-^{ria}
gynis.

Pyrus aucuparia. Gærtn. v. 2. 45. t. 87.

Sorbus aucuparia. Sp. Pl. 683. Hudſ. 215.

With. 460. Relb. 190. Abbot. 109. Engl.

Bot. t. 337. Fl. Dan. t. 1034.

S. sylvestris, foliis domesticæ similis. Rait Syn.
452.

S. sylvestris, sive Fraxinus bubula. Ger. em.
1473.

S. sylvestris. Camer. Epit. 161. Matth. Valgr.
v. 1. 238.

Angl. Mountain Ash. Quicken-tree.

In sylvis montosis, sepibusque.

Arbor. Fl. Maio.

Formosa arbor, lentè crescens, ligno tenaci. Folia impari-pinnata, ferrata, glabra; juniora subtùs pubescens. Corymbi terminales, pubescentes, ramosissimi, multiflori. Flores albi. Styli 3 vel 4. Pommum magnitudine pisi majoris, coccineum, acidum, amaricans, loculamentis subdispermis.

hybrida. † 6. PYRUS foliis semipinnatis subtūs tomentosis, floribus corymbosis subtrigynis.

Sorbus hybrida. Sp. Pl. 684. Huds. 216.

With. 461. Linn. Fil. fasc. 1. t. 6. Fl. Dan. t. 302.

Angl. Bastard Mountain Ash.

In montofis.

On the walls of Castel Dinas brân, Denbighshire.

Mr. Waring. Huds. Mr. Griffith. A specimen gathered theie by Dr. Prattinton is most certainly only P. Aria.

Arbor. Fl. Maio.

Arbor mediocris. Folia anticè lobata, basi pinnata, serrata, exstipulata; suprà glabra; subtūs tomentoso-alba. Corymbi terminales, tomentosi, multiflori. Flores albi. Styli tres, subinde tantùm bini. Pomum ut in præcedente sed paulò majus. Seminibus propagatur, quamvis ex mente Linnæi hybrida sit, matre Pyro aucupariâ, patre P. Ariâ. Ex horto.

Aria. 7. PYRUS foliis simplicibus ovatis incisis serratis lineatis subtūs tomentosis, floribus corymbosis subdigynis.

Cratægus Aria. Sp. Pl. 681. Huds. 214.

With. 458. Sibth. 155. Fl. Dan. t. 302.

Mespilus Alni folio subtūs incano, *Aria Theophrasti* dicta. Raii Syn. 453.

Aria Theophrastii. Ger. em. 1327.

Sorbus alpina. Bauh. Hist. v. 1. 65.

Angl. White Beam-tree. White Wild Pear-tree.

In montofis solo calcarco, vel fissuris rupium.

Arbor. Fl. Maio.

Arbor mediocris, ramis junioribus tomentosis. Folia simplicia, subovata, duplicato-serrata, subinde incisa; suprà glabra, venis parallelis lineata; subtūs tomentoso-alba. Corymbi terminales, tomentosi, multiflori. Flores albi. Styli 2 ad 4. Pomum coccineum, parvum,

vum, farinosum, astringens. Loculamenta coriacēa,
2 ad 4, disperma.

231. SPIRÆA. *G. Pl.* 253. *Juss.* 339.
Gærtn. t. 69.

Cal. quinquefidus. *Petala* 5. *Capsulæ* superæ,
bivalves, polyspermæ.

1. SPIRÆA foliis lanceolatis obtusis serratis gla-*salicifō-*
bris, racemis terminalibus compositis. *ia,*

Spiræa salicifolia. *Sp. Pl.* 700. *With.* 463.
Pallas. Roff. t. 21.

Spiræa. *Gmel. Sib.* v. 3. 183. t. 39.

S. Theophrasti forte. *Clus. Hist. p.* 1. 84. *Ger.*
em. 1601.

Angl. Willow-leaved Spiræa.

In nemorosis humidis subalpinis rariūs.

In moist hedges in Westmoreland, and on the borders of Winandermere. Mr. Gough. By the road between Pool bridge and Colthouse, near Hawkshead, Cumberland. Mr. Dalton. *With.* In a wood at Hafod, Cardiganshire, near a gate in the eastern approach to the house; but it scarcely appears to be wild.

Frutex. Fl. Julio.

Frutex quadripedalis, virgatus, glaber, ramis lutescentibus. Folia alterna, subsessilia, lato-lanceolata, inæqualiter ferrata, utrinque glabra. Racemi terminales, solitarii, erecti, decompositi, obtusi, multiflori, bracteati, bracteis linearibus, solitariis. Flores rosei.

2. SPIRÆA foliis interruptè pinnatis; foliolis *Filipen-*
uniformibus serratis glabris, caule herbaceo, *dula.*
floribus cymosis polygynis.

Spiræa Filipendula. *Sp. Pl.* 702. *Huds.* 217.
With. 463. *Relb.* 191. *Sibth.* 157. *Ab-*
bat.

bot. 110. *Fl. Dan.* t. 635. *Engl. Bot.* t. 284.

Filipendula. *Raii Syn.* 259. *Ger. em.* 1058.

Camer. Epit. 608. *Matth. Valgr.* v. 2. 217.

Angl. Common Dropwort.

In pascuis clatis, solo calcareo vel glareoso.

Perennis. Fl. Julio.

Radix lignosa, tuberibus ellipticis. Caulis pedalis, vel sesquipedalis, angulatus, glaber, foliosus, superne parum ramosus. Folia alterna, interrupte pinnata, ferrata et incisa, glabra, multijuga, foliolo terminali trilobo, hastato. Stipulae adnatæ, dentatæ, rotundatae. Panícula cymosa, erecta, multiflora. Flores lactei vel rubicundi. Styli 8 ad 12. Variat flore pleno.

Ulmaria. 3. SPIRÆA foliis interrupte pinnatis subtus tomentosis; impari majori lobato, floribus cymosis polygynis.

Spiræa Ulmaria. Sp. Pl. 702. Hud. 217. With. 464. Relh. 192. Sibth. 157. Abbot. 110. Fl. Dan. t. 547. Curt. Lond. fasc. 5. t. 33.

Ulmaria. *Raii Syn.* 259.

Regina prati. *Ger. em.* 1043.

Angl. Meadow-sweet.

In pratis humidis, et ad ripas fluviorum vulgaris.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Caules 3—4 pedales, fulcati, foliosi. Folia interrupte pinnata, foliolis maximè inæqualibus, lobatis, serratis, subtus tomentoso-albis, venosis; impari tripartito. Stipulae subrotundæ, distinctæ, venosæ, dentatæ. Cyma ramosissima, multiflora. Flores albi, parvi, suaveolentes. Styli 6 ad 8. Capsulæ contortæ.

III. POLYGYNIA.

232. ROSA. *G. Pl.* 254. *Juss.* 335.
Gærtn. t. 73.

Cal. urceolatus, quinquefidus; carnosus, collo coarctatus. *Petala* 5. *Semina* plurima, hispida, calycis lateri interiori affixa.

* *Fructibus subglobosis.*

1. ROSA fructibus globosis pedunculisque gla-*spinosissi-*
bris, aculeis caulinis numerosissimis rectis se-*ma-*
taceis, foliolis subrotundis glabris.

Rosa spinosissima. *Sp. Pl.* 705. *Huds.* 218.
With. 465. *Lightf.* 260. *Fl. Dan.* t. 398.
Engl. Bot. t. 187.

R. pimpinellifolia. *Syst. Nat. ed.* 10. 1062.

R. pumila spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris,
flore albo. *Raii Syn.* 455. *Baub. Hist.*
v. 2. 40.

R. campestris odorato flore. *Chuf. Hist. p.* 1.
116.

2. *R. Ciphiana*, seu *R. pimpinellæ* foliis minor
nostras, flore elegantè variegato. *Sibb. Scot.*
p. 2. 46. t. 2.

γ. Pedunculis aculeatis. *With.* 465.
Angl. Burnet Rose.

In ericctis, dumetis, vel ad agrorum margines, solo
arenoso.

Frutex. Fl. Julio.

Caules vix bipedales, aculeatissimi, ramosi, erecti; aculeis
rectis, gracillimis, inæqualibus. Foliola 7 vel 9, sub-
rotunda, obtusa, ferrata, glabra, parva. Petioli subinde
aculeati. Pedunculi terminales, solitarii, uniflori, gla-
bri, rariùs aculeati. Germen ferè hemisphaericum,

H 3 læve.

læve. Petala alba, basi lutea. Fructus atro-purpureus, demùm niger, globosus, interdùm subspinosus.

arvensis. 2. ROSA fructibus globosis pedunculisque iner-
mibus, aculeis caulinis petiolorumque adun-
cis, floribus subcymosis.

Rosa arvensis. *Mant.* 2. 245. *Huds.* 219.
With. 464. *Relb.* 193. *Sibth.* 159. *Engl.*
Bot. t. 188. *Abbot.* 111.

R. sylvestris altera minor, flore albo nostras.
Raii Syn. 455.

R. sylvestris folio glabro, flore planè albo.
Bauh. Hist. v. 2. 44.

Angl. White Dog-rose,

In sepibus et dumetis,

Frutex. Fl. Junio, Julio.

Rami flagelliformes, longissimi, arcuati, implexi, rubi-
cundi, aculeis sparsis, aduncis. Foliola 5 vel 7, ovata,
acuta, glabra, subtùs glaucescentia. Petioli aculeati.
Pedunculi terminales, 3 ad 5, subcymosi, rariùs solita-
rii, glandulofo-scabri, inermes, uniflori. Germen ob-
longum, læve. Petala nivea. Styli basi in columnam
simplicem coaliti. Fructus globosus, atro-sanguineus,
glaber.

villosa. 3. ROSA fructibus globosis pedunculisque hispi-
dis, aculeis caulinis rectiusculis, foliolis ellip-
ticis utrinque tomentosis.

Rosa villosa. *Sp. Pl.* 704. *Huds.* 219. *With.*
466. *Lightf.* 261. *Engl. Bot.* t. 583.

R. sylvestris pomifera major nostras. *Raii Syn.*
455.

R. pomifera spinoso, folio hirsuto. *Bauh. Hist.*
v. 2. 38.

R. pomifera major. *Park. Parad.* 418. f. 7.

R. R. sylvestris folio mollitèr hirsuto, fructu ro-
tundo

tundo glabro, calyce et pediculo hispidis. *Dill.*
in Raii Syn. 478?

Angl. Apple Rose.

In nemorosis et dumetis montosis.

Plentifully in Westmoreland, Cumberland and the north of Yorkshire. *Ray.* *Huds.* *With.* In the way from Edinburgh to Ravelston wood.

Frutex. Fl. Junio.

Frutex quadripedalis, erectus, ramosus, ramis erectis, brevibus. Aeulei caulinii rariusculi, parvi, subulati, ferè recti. Foliola septena, elliptica, obtusiuscula, utrinque mollissimè villosa, ferraturis glandulofo-ciliatis. Petioli tomentosi, aculeati, glandulosi. Pedunculi terminales, plerumque solitarii, uniflori, setis rigidis, apice glandulosis, muricati. Germen globosum, muricatum. Calyeis laeiniæ elongatæ, tomentosæ, dorso muricatae. Petala saturatè rubentia. Fructus globosus, maximus in hoc genere, calyce coronatus, sanguineus, muricatus, rarius inermis.

* * *Fructibus ovatis.*

4. ROSA fructibus ovatis pedunculisque hispidis, tomento-aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis utrinque tomentosis.

Rosa villosa β. *Huds.* 219. *With.* 466.

R. villosa. *Rehb.* 194? *Sibth.* 159?

R. sylvestris fructu majore hispido. *Raii Syn.* 454.

R. sylvestris alba, cum aliquo rubore, folio hirsuto. *Bauh. Hist.* v. 2. 44.

Angl. Downy-leaved Dog-rose.

In sepibus et dumetis haud infrequens.

About London. *Huds.* At St. Faith's, Catton, and other places near Norwich. Common in Shropshire and Wales.

Frutex. Fl. Junio, Julio.

Præcedente omnibus partibus minor est, et habitu cum

R. caninâ convenit, nisi quòd folia undique pubescunt, et subcinerea videntur. Rami erecto-patentes, subflexuosi. Aculei caulinis aduncī, basi dilatati. Foliola 5 vel 7, suaveolentia, elliptico-ovata, utrinque mollissimè tomentosa, ferraturis glandulosé ciliatis. Petioli tomentosi, muricati. Pedunculi terminales, subsolitarii, setis rigidis glandulosis muricati. Germen etiam muricatum, ellipticum. Calyx glanduloso-hispidus. Petala basi albida, supernè pulcherrimè rosea. Fructus ovatus, coccineus, muricatus, magnitudine et formâ *R. caninæ* proximus.

- rubiginosa.* 5. *ROSA* fructibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis aduncis, foliolis ellipticis subtus glanduloso-rubiginosis.

Rosa rubiginosa. *Mant.* 2. 564. *With.* 466. *Relh.* 193. *Sibth.* 158. *Abbot.* 110. *Jacq.* *Austr.* t. 50. *Web.* *Gott.* 15.

R. eglanteria. *Huds.* 218.

R. suavifolia. *Lightf.* 262. *Fl. Dan.* t. 870.

R. sylvestris odora. *Raii Syn.* 454. *Ger. em.* 1269. f. 1.

Angl. Sweet-briar. Eglantine.

In ericctis et montosis solo glareoso.

Frutex. Fl. Junio, Julio.

Habitus præcedentis. Aculei caulinis aduncī, flavi. Foliola septem, valdè fragrantia, elliptica vel subovata; suprà glabra, rugosa; subtus atomis resinosis rubiginosa; ferraturis glandulosis. Petioli glandulosi, aculeati. Pedunculi terminales, corymbosi, muricati. Germen ovatum, muricatum. Calyx glandulosus. Petala rosea, bafi alba. Fructus ovatus, miniatus, muricatus, interdùm glaber, farinosus, insipidus.

- canina.* 6. *ROSA* fructibus ovatis pedunculisque glabris, aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis acuminate glaberrimis.

Rosa canina. Sp. Pl. 704. Huds. 219. With. 467.

467. *Relb.* 194. *Sibth.* 158. *Abbot.* 111.
Curt. Lond. fasc. 5. *t.* 34. *Fl. Dan.* *t.* 555.
R. sylvestris inodora, seu canina. *Raii Syn.* 454.
R. sylvestris alba cum rubore, folio glabro.
Baub. Hist. *v.* 2. 43.
R. sylvestris prima. *Camer. Epit.* 99.
Cynosbatus, fructus. *Pharmac. Lond.*
Angl. Common Dog-rose, Wild-briar, or Hep-
tree.

In sepibus et dumetis passim.

Frutex. Fl. Junio.

Rami elongati, erecto-patentes. Aculei caulinii conico-
adunci, compressi, rubicundi. Foliola septem, inodora,
ovata, acuminata, utrinque nuda et glaberrima. Peti-
oli aculeati. Pedunculi subcorymbosi, subinde solita-
rii, laeves. Germen ovatum, glabrum. Calyx intus
marginaque pubescens. Petala dilutè carnea, odorata,
sæpè alba. Fructus ovatus, coccineus, glaber, grata-
cescens.

“Variat fructu hispido.” *D. C. Sutton.*

. 233. RUBUS. *G. Pl.* 254. *Juss.* 338.
Gærtn. *t.* 73.

Cal. quinquefidus. *Petala* 5. *Bacca* supera,
composita acinis monospermis.

I. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque sub- *idæus.*
tus tomentosis, petiolis canaliculatis, caule
aculeato.

Rubus idæus. *Sp. Pl.* 706. *Huds.* 220. *With.*
468. *Sibth.* 159. *Abbot.* 111. *Fl. Dan.*
t. 788. *Woodv. Med. Bot.* *t.* 138. *Ger. em.*
1272. *Matth. Valgr.* *v.* 2. 357.

R. Idæus spinosus fructu rubro. *Raii Syn.* 467.
Baub. Hist. *v.* 2. 59.

Rubus idæus, fructus. *Pharmac. Lond.*

Angl.

Angl. Rasp-berry.

In sylvis montosis et dumetis.

Plentiful in Wales and the north of England. On hills between Norwich and Thorpe.

Frutex. Fl. Maio, Junio.

Caules fuscrueticosi, biennes, erecti, teretes, aculeato-hispidi. Folia pinnata; superiora ternata; foliolis rhombico-ovatis, acutis, lincatis, inaequaliter ferratis, subtus tomentoso-albis. Petioli pubescentes, aculeati, supra canaliculati. Flores paniculati, albidi. Calyx patens, tomentosus, acuminatus, persistens. Petala parva, obtusa, plana. Fructus sanguineus, odoratus, gratissimus, deciduus, stylis persistentibus setosus.

cæsius. 2. *RUBUS* foliis ternatis subtus pilosis: lateralibus bilobis, caule aculeato prostrato glauco.

Rubus cæsius. Sp. Pl. 706. Huds. 220. With. 468. Relb. 194. Sibtb. 160. Abbot. 111.

R. minor fructu cœruleo. Raii Syn. 467. Baub. Hist. v. 2. 59.

R. minor. Dod. Pempt. 742.

Angl. Dew-berry.

In nemorosis, sepibus et ad margines agrorum.

Frutex. Fl. Junio, Julio.

Caules prostrati, flagelliformes, radicantes, teretes, aculeati, rorc cæsio glauci. Folia ternata, ineifa et ferrata, subtus pilosa, nec ineana; foliolis lateralibus sessilibus, extus saepius lobatis, figurâ variis. Stipulae lanceolatæ. Petioli pubescentes, aculeati, supra obsoletè canaliculati. Paniculae terminales, paucifloræ, tomentosæ, subaculeatæ. Calyx sericeus, longè acuminatus, patens. Petala alba, undulosa. Fructus niger, rore cæsio, gratae acercent, ex acinis paucioribus, majusculis, compositus.

corylifo- 3. *RUBUS* foliis subquinatis subtus pilosis: lateralibus sessilibus, aculeis rectiusculis, calycibus fructus inflexis.

Rubus

Rubus fruticosus major. *With.* 469.

R. major fructu nigro. *Schmidel.* *Ic. t. 2.*

Angl. Hazel-leaved Bramble.

In sepibus frequens.

Frutex. *Fl. Julio.*

Caules flagelliformes, fragiliores, longissimi, arcuato-patentes, rubri, teretiusculi, aculeis rectiusculis. Folia quinata, vel ternata, inæqualitèr ferrata et incisa; suprà lœtè viridia, glabriuscula; subtùs pilosa, nequaquam incana; foliolis lateralibus sessilibus; in folio ternato extùs lobatis. Stipulæ formâ variæ, setaceæ vel lan-ceolatæ. Petioli pilosi, aculeati. Panicula multiflora. Calyx villoſus, patens, matureſcente fructu inflexus, monente acutissimo viro D. Wigg. Petala alba. Fructus fuſco-fanguineus, rore cæſio, acidus, acinis rarioribus.

Hanc speciem indicare voluit, ut videtur, Dillenius in *Raii Syn.* 467. Persuasu et inductu amicissimi D. Jacobi Crowe, observationibus iteratis confirmati, a fe-quente separavi. Foliola folia Coryli interdùm tam exactè referunt ut vix distinguenda.

4. RUBUS foliis subquinatis subtùs tomentosis : *frutico-*
foliolis petiolatis, aculeis aduncis, caule angu- *fus-*
lato, calyce reflexo.

Rubus fruticosus. *Sp. Pl.* 707. *Huds.* 220.
With. 469. *Relb.* 195. *Sibth.* 160. *Ab-*
bot. 112. *Mill. Illustr.* t. 45.

R. major fructu nigro. *Raii Syn.* 467. *Bauh.*
Hift. v. 2. 57.

Rubus. *Ger. em.* 1272. *Camer. Epit.* 751.
Blackw. Herb. t. 45.

β. *R. vulgaris major fructu albo.* *Raii Syn.* 467.
Angl. Common Bramble.

In sepibus, dumetis, et sylvis vulgaris.

Frutex. *Fl. Julio, Augusto.*

Caules ut in præcedente, sed magis angulati, tenacissimi,
aculeis

aculeis omnino aduncis. Folia quinata, subindè ternata, duplicato-serrata, acuta; suprà saturatè viridia, nitidiuscula; subtùs tomentoso-alba, rariùs pilosa tantum et pallidè virentia. Foliola omnia petiolata, petiolis aculeatis. Stipulae setaceæ. Panicula multiflora, subracemosa, tomentosa. Calyx brevis, reflexus, concavus, tomentosus. Petala dilutè purpurea, vel alba. Fructus violaceus, subdulcis, acinis numerosis.

saxatilis. 5. RUBUS foliis ternatis glabriusculis, flagellis reptantibus herbaceis, paniculâ pauciflorâ.

Rubus saxatilis. Sp. Pl. 708. Huds. 221.

With. 470. Fl. Dan. t. 134. Ger. em. 1273.

R. alpinus humilis. Baub. Hist. v. 2. 61.

Chamærubus saxatilis. Raii Syn. 261.

Angl. Stone Bramble.

In petrofisis umbrosis subalpinis.

In Scotland, Wales, and the north of England, but not very common.

Perennis. Fl. Junio.

Radix fibrosa, flagellis longissimis, prostratis, reptantibus, nudis vel foliosis, sterilibus. Caules erecti, simplices, spithamei, subangulati, villosi, foliosi, inermes. Folia ternata, inferiora rariùs quinata, pallidè viridia, tenuia, duplicato-serrata, acuta, subtùs subpilosa; foliolis lateralibus sessilibus. Panicula terminalis, pauciflora, pubescens. Calycis laciniæ lanceolatæ, planæ, subpubescentes. Petala alba, lanceolata, erecta. Fructus ruberrimus, acidus, ex acinis paucis, plerumque tribus vel quatuor, majusculis.

arcticus. 6. RUBUS foliis ternatis glabris, caule inermi unifloro.

Rubus arcticus. Sp. Pl. 708. Fl. Lapp. n. 207.

t. 5. f. 2. Fl. Dan. t. 488. Curt. Mag. t. 132.

Angl. Dwarf Crimson Bramble.

In petrosis alpinis.

In the Isle of Mull. *Rev. Dr. Walker.*

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix repens, flagellis nullis. Caules palmares, erecti, simplices, angulati. Folia ternata, inæqualitèr ferrata, omnino ferè glabra. Flos solitarius, pedunculatus, terminalis, saturatè roseus, petalis interdùm laciniatis. Calyx pilosus. Fructus purpurascens, dulcis et fragrans, gratissimus, gustu Rubum idæum atque Fragariam referens.

7. RUBUS foliis simplicibus lobatis, caule inermi *Chamæ-*
unifloro, laciiniis calycinis ovatis. *morus.*

Rubus Chamæmorus. Sp. Pl. 708. Fl. Lapp.
n. 208. t. 5. f. 1. Huds. 221. With. 471.
Lightf. 266. t. 13. f. 2. Fl. Dan. t. 1. Dicks.
H. Sicc. fasc. 2. 8.

Chamæmorus. Raii Syn. 260. Ger. em. 1273.

Morus Norvagica. Tillands. Ic. 159.

Angl. Mountain Bramble, or Cloud-berry.

In paludibus turfosis alpinis.

On the highest mountains of Scotland, Wales, and the north of England. On Axedge near Buxton. A. B. Lambert, Esq. Between Patterdale; and Keswick, Cumberland. Mr. Salt.

Perennis. Fl. Junio.

Radix repens. Caules erecti, spithamei, simplices, uniflori. Folia petiolata, cordata, quinqueloba, plicata, rugosa, inæqualitèr ferrata, glabra. Flos terminalis, pedunculatus, albus. Calyx extus pilosus. Stamina in flore foemineo abbreviata, abortiva, sicut pistilla in masculino; at plantam foemineam cum masculinâ radicibus connexam invenit Cel. Solander. Fructus fulvus, acidus, mucilaginosus, nec ingratus, ex plurimis acinis compositus.

234. FRAGARIA. G. Pl. 255. Juss. 338.
Gærtn. t. 73.

Cal. decemfidus, inferus. Petala 5. Receptaculum seminum ovatum, baccatum, deciduum. Semina laevia.

vesca. 1. FRAGARIA flagellis reptantibus.

Fragaria vesca. Sp. Pl. 708. Huds. 221. With. 471. Relb. 195. Sibth. 160.

Fragaria. Raii Syn. 254. Ger. em. 997. Camer. Epit. 765. Brunf. Herb. v. 2. 35.

Common Strawberry. Pet. H. Brit. t. 40. f. 7.

2. *Fragaria fructu hispido. Raii Syn. 254. Ger. em. 998.*

Angl. Wood Strawberry.

In nemorosis et ad sepes frequens.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa, flagellis longissimis, radicantibus. Caules breves, erecti, subsimplices. Folia longius petiolata, ternata, obtusa, lineata, æqualiter ferrata, pubescentia. Flores erecti, subcymosi, albi. Petala subrotunda, calyce breviora. Fructus nutans, ovatus, carnosus, odoratus, gratissimus, saturatè ruber, seminibus denudatis granulatus.

sterilis. 2. FRAGARIA caule decumbente, ramis floriferis laxis subbisfloris.

Fragaria sterilis. Sp. Pl. 709. Huds. 222. With. 472. Relb. 196. Sibth. 160. Curt. Lond. fasc. 3. t. 30. Raii Syn. 254.

F. minime vesca. Ger. em. 998.

Angl. Barren Strawberry. Pet. H. Brit. t. 40. f. 8.

In pascuis sterilibus passim.

Perennis. Fl. Martio, Aprili.

Radix sublignosa. Caules diffusi, nec repentes. Folia subtus

subtus sericea. Rami floriferi erecto-patentes, subdiphylli, saepius biflori. Flores longius pedunculati, alba. Calyx villosus, longitudine petalorum. Fructus parvus, exsuecus, vix deciduus. Semina laevia, nee rugosa.

Planta habitu, potius quam structurâ fructus, Fragariæ congener; ambigit inter Fragariam, et Comarum. A Potentillâ diserepat feminibus laevibus.

²35. POTENTILLA. *G. Pl. 255. Juss. 338.*

Pentaphyllum. *Gærtn. t. 73.*

Cal. decemfidus, inferus. Petala 5. Semina subrotunda, nuda, saepius rugosa, receptaculo parvo, exsucco, affixa.

* *Foliis pinnatis.*

1. POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoso. *fruticosa.*

Potentilla fruticosa. *Sp. Pl. 709. Huds. 222.*

With. 472. Engl. Bot. t. 88. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 12.

Pentaphylloides fruticosa. *Raii Syn. 256. Cat. ed. 2. 228. t. 1.*

P. fruticosa elatior, minus hirsuta. *Annan. Ruth. 88. t. 17.*

Angl. Shrubby Cinquefoil.

In montosis dumosis, sed rariis.

About the river Tees plentifully, as mentioned by Ray. *Mr. Robson.*

Frutex. Fl. Junio.

Caulis fruticosus, erectus, ramosissimus, tripedalis. Folia alterna, petiolata, quinato-pinnata, subrevoluta, integerrima, subtus pilosa, superiora ternata. Stipulae amplexicaules. Flores terminales, solitarii, pedunculati, aurei, formosi. Calyxis laciniæ quinque exteriores foliaceæ, patentes. Petala subrotunda, vel obcordata.

2. POTENTILLA foliis interruptè pinnatis sericeis. *anserina.*

ratis subtus sericeis, caule repente, pedunculis unifloris.

Poten-

Potentilla anserina. *Sp. Pl.* 710. *Huds.* 222:
With. 473. *Rehb.* 196. *Sibth.* 161. *Curt.*
Lond: fasc. 3. *t.* 31. *Fl. Dan.* *t.* 544:
Potentilla. *Matth. Valgr.* *v.* 2. 364. *Camer.*
Epit. 758.
Pentaphylloides Argentina dicta. *Raii Syn.* 256.
Argentina. *Ger. em.* 993.
Angl. Silver-weed. Wild Tansey.

In pratis humidis spongiosis, vel salicetis, frequens.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Formosa planta. Caules prostrati, flagelliformes, repentes,
foliosi, pilosi, rubicundi. Folia interruptè pinnata, sub-
lyrata, foliolis obtusis, inciso-ferratis, subtùs argenteo-
nitidissimis. Pedunculi solitarii, axillares, uniflori. Ca-
lyx sericeus, ineisus. Petala aurea. Variat foliis nu-
dis; at frequentius verò utrinque sericeis.

rupestris. 3. **POTENTILLA** foliis lyrato-pinnatis septena-
tis quinatis ternatisque: foliolis ovatis ferratis
pilosis, caule erecto.

Potentilla rupestris. *Sp. Pl.* 711. *Huds.* 223.
With. 473. *Jacq. Austr.* *t.* 114.

Pentaphylloides erectum. *Raii Syn.* 255. *Mo-*
rif. sedl. 2. *t.* 20. *f.* 1. *Baub. Hyst.* *v.* 2.
398. d.

Pentaphyllum fragiferum. *Ger. em.* 991.

Upright Welch Cinquefoil. *Pet. H. Brit.* *t.* 41.
f. 6.

Angl. Strawberry-flowered Cinquefoil.

In rupibus umbrosis alpinis.

On the sides of Craig Wreidhin in Montgomery-
shire. Mr. Lhwyd. *Ray.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Caulis ferè pedalis, erectus, ramosus, foliosus, striatus,
pubescens. Folia lyrato-pinnata; foliolis subovatis,
obtusis, inciso-ferratis, venosis, pilosis, nec incanis, in
radicalibus

radicalibus et caulinis inferioribus 5 vel 7, in superioribus 3. Stipulae radicales lineares, acutae; caulinæ rhombeo-subrotundæ. Pedunculi subpaniculati, uniflori, villosi. Calyx basi villosus. Petala obcordata, alba. Styli rubicundi. Semina lævia, nec rugosa, hinc forsitan ad Fragariam amandanda, cui facie affinis est.

* * *Foliis digitatis.*

4. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus *argentea*.
incisis subtus tomentosis, caule erecto.

Potentilla argentea. *Sp. Pl.* 712. *Huds.* 223.
With. 474. *Relh.* 197. *Sibth.* 161. *Abbot.*
113. *Engl. Bot.* t. 89. *Fl. Dan.* t. 865.

Pentaphyllum erectum, foliis profundè seclis
subtus argenteis, flore luteo. *Raii Syn.* 255.
Baub. Hist. v. 2. 398. c.

P. album. *Matth. Valgr.* v. 2. 367.

Quinquefolium Tormentillæ facie. *Ger. em.* 988.
Angl. Hoary Cinquefoil.

In pascuis solo glareoso.

Perennis. Fl. Junio.

Caules patentæ, spithamæi, lanati. Folia petiolata, quinata, incisa; supra viridia, glabra; subtus niveo-tomentosa, sicut pedunculi et calyces. Flores numerosi, parvi, aurei. Semina læviuscula.

5. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis ob- *aurea*.
ovatis inciso-serratis pilosis submembranaceis;
caulinis ternatis, caule erectiusculo.

Potentilla aurea. *Sp. Pl.* 712. *With.* 475.
Fl. Dan. t. 114. *Engl. Bot.* t. 561.

Fragaria n. 1122. *Hall. Hist.* v. 2. 49. t. 21.
f. 4.

Pentaphyllum alpinum splendens aureo flore.
Baub. Hist. v. 2. 398.

Quinquesolium minus flore aureo. *Ger. em.*
990.

Angl. Golden Cinquefoil.

In alpibus Scoticis.

On Ben Lawers and other mountains in Bredalbane. *Mr. J. Mackay.*

Perennis. Fl. Julio.

Caules spithamæi, ferè erecti, ramosi, foliosi, pilosi. Folia tenuia et quasi membranacea, nitidiuscula, parùm pilosa, inciso-ferrata, subtùs pallidiora; radicalia longissimè petiolata, quinata, foliolis obovatis, obtusis; caulinis subfessilia, ternata; summa sæpiùs opposita. Pedunculi axillares et terminales, solitarii, longissimi, uniflori, pilosi, erecti. Calyx pilosus, laciniis omnibus longitudine subæqualibus, alternis angustioribus. Petala obcordata, calyce longiora, saturatè aurea et ferè aurantiaca. Semina longitudinaliter corrugata.

verna. 6. **POTENTILLA** foliis radicalibus quinatis cuneatis ferratis lineatis ciliatis subcoriaceis; caulinis ternatis, caule declinato.

Potentilla verna. Sp. Pl. 712. Huds. 224.

With. 475. Relb. 197. Engl. Bot. t. 37.

Lightf. 270. Dicks. H. Sic. fasc. 13. 19.

Fragaria verna. Crantz. fasc. 2. 12. t. 1. f. 1.

Pentaphyllum parvum hirsutum. Rui Syn. 255.

Angl. Spring Cinquefoil.

In pascuis elatis sterilioribus.

In Yorkshire and Lancashire. Ray. Huds. With.

Near Kippax. Rev. Mr. Wood. About Bury.

Sir T. G. Cullum, Bart. In the King's Park, Edinburgh.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Caules palmates, ferè prostrati, divaricati, ramosi, foliosi, pubescentes. Folia rigida, subcoriacea, glabriuscula, lineata,

lineata, margine carinâque ciliata; radicalia longius petiolata, quinata, foliolis cuneiformibus, subretusis; caulina subsessilia, ternata, trifida; summa simplicia, et sèpius integra. Pedunculi subterminales, uniflori, pubescentes, erecti. Calyx tomentosus et pilosus, lacinias subæqualibus. Petala emarginata, aurea. Semina minus quam in præcedente rugosa.

7. **POTENTILLA** foliis quinatis subtus sericeis *alba*.

apice conniventi-serratis, caulis filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutissimis.

Potentilla alba. *Sp. Pl.* 713. *Huds.* 224.

With. 474. *Jacq. Austr.* t. 115.

Quinquefolium sylvaticum majus flore albo.

Ger. em. 989.

Q. majus candidum. *Fuchs. Hist.* 623. *Ic.* 357.

Q. Tragi. *Trag. Hist.* 507.

Q. album. *Camer. Epit.* 761.

Pentaphyllum album. *Baub. Hist.* v. 2. 598. d.

Angl. White Cinquefoil.

In alpibus.

In Wales, Mr. Haviland. *Huds.* I know of no other authority.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules procumbentes, filiformes, ramosi. Folia radicalia longè petiolata, quinata, foliolis lanceolatis, obtusiusculis, subtus sericeo-villoso, apicem versus conniventi-serratis; caulina ternata, parva. Pedunculi longissimi, filiformes. Calycis laciniae acuminatæ, sericeæ. Petala alba. Receptaculum setis longis, densis, villosum. Semina obsoletè rugosa.

8. **POTENTILLA** foliis quinatis obovatis ferratis, *reptans*, caule repente, pedunculis unifloris.

Potentilla reptans. *Sp. Pl.* 714. *Huds.* 224.

With. 474. *Relh.* 198. *Sibib.* 161. *Curt.*

Lond. fasc. 1. t. 37. *Woodw. Medd. Bot.* t. 59.

Pentaphyllum vulgatissimum. *Raii Syn.* 255.

Quinquefolium. *Matth. Valgr.* v. 2. 365.

Q. majus. *Ger. em.* 987.

Q. majus luteum. *Fuchs. Hist.* 624.

β. Pentaphyllum aureum minus, sylvaticum, nostras, foliis tripartito-divisis, ex caulinorum geniculis radiceſcens. *Dill. in Raii Syn.* 255?

Pentaphyllum, radix. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common creeping Cinquefoil.

In pratis pascuis et ad semitas passim.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix fibroſa. Caules prostrati, flagelliformes, repentes, foliosi. Folia petiolata, erecta, quinata, foliolis obovato-cuneatis, ferratis, pilosis. Pedunculi ſolitarii, foliis longiores, uniflori. Calyx pilosus. Petala aurea.

236. TORMENTILLA. *G. Pl.* 256. *Juss.* 337.

Cal. octofidus, inferus. Petala 4. Semina subrotunda, nuda, rugosa, receptaculo parvo, exſucco, affixa.

officina- 1. *TORMENTILLA* caule eretliſculo ramoso, *lis.* foliis ſeſſilibus.

Tomentilla officinalis. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 35. *With.* 476.

T. erecta. *Sp. Pl.* 716. *Huds.* 225. *Rehb.* 198. *Woodv. Med. Bot.* t. 9. *Fl. Dan.* t. 589.

Tomentilla. *Raii Syn.* 257. *Ger. em.* 992. *Camer. Epit.* 685. *Matth. Valgr.* v. 2. 297. *Brunf. Herb.* v. 1. 85.

Potentilla Tomentilla. *Sibth.* 162. *Abbot.* 114.

Tomentilla, radix. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common Tormentil, or Septfoil.

In pascuis ſeſſilibus, ericetis et dumofis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix

Radix lignosa. Caules ramosi, erecti, diffusi, vel proeumbentes, teretes, foliosi. Folia ferè sessilia, ternata, lanceolata, lineata, ineiso-ferrata, pilosa. Stipulae ineisæ. Pedunculi oppositifolii, solitarii, capillares, uniflori. Calycis laevisæ ovatæ, pilosæ. Petala aurea, obcordata. Semina rugosa, pauea.

Variat rariùs floribus quinquefidis. Interdum flore pleno gaudet. *Miss Johnes.*

2. **TORMENTILLA** caule prostrato simplici, *reptans*.
foliis petiolatis.

Tomentilla reptans. *Sp. Pl.* 716. *With.* 476.
Raii Syn. 257.

Potentilla procumbens. *Sibth.* 162.

Pentaphyllum reptans alatum, foliis profundiùs ferratis. *Plot. Oxf.* t. 9. f. 5.

Plot's Tormentil. *Pet. H. Brit.* t. 41. f. 10.

Angl. Trailing Tormentil.

Ad sepes, vel margines agrorum.

In several places in Oxfordshire. *Ray.* Lakenham near Norwich. *Mr. Crowe.* Hertfordshire. *Mr. Woodward.* Surrey. *Herb. Lightf.* At Brighouse near Halifax, Yorkshire.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Caules pauci, prostrati, simplices, bipedales, flagelliformes, pubescentes, foliosi, non radieantes. Folia longius petiolata, ternata, foliolis obovatis, ineiso-ferratis, pilosis. Stipulae lanceolatae, saepius indivisæ. Pedunculi solitarii, foliis longiores. Calyxis laciniæ ovato-lanceolatae, inæquales, pilosæ. Petala obeordato-subrotunda, aurea. Semina rugosa.

Variat floribus inferioribus subinde quinquefidis. Distinctissima species a præcedente, ut et ab omnibus *Potentillis* Linnæanis.

237. GEUM. *G. Pl. 256. Juss. 338.*
Gærtn. t. 74.

*Cal. decemfidus, inferus. Petala 5. Seminum
 aristata geniculata. Receptaculum columnare.*

*urba-
 num.*

1. GEUM foliis ternatis, stipulis rotundatis in-
 cisis, floribus erectis, aristis uncinatis nudis.

Geum urbanum. *Sp. Pl. 716. Huds. 226.*
With. 477. Relb. 199. Sibth. 162. Curt.
Lond. fasc. 2. t. 36. Fl. Dan. t. 672. Woodv.
Suppl. t. 259.

Caryophyllata. *Raii Syn. 253. Ger. em. 994.*
Camer. Epit. 725. Matth. Valgr. v. 2. 333.
Brunf. Herb. v. 2. 22.

C. hortensis. *Fuchs. Hist. 384.*

2. **C. vulgaris** majore flore. *Bauh. Pin. 321. Raii*
Syn. 253.

C. sylvestris. *Fuchs. Hist. 385.*

Great-flowered Avens. *Pet. H. Brit. t. 40. f. 2.*
 Angl. Common Avens. Herb Bennet.

In sylvis et ad sepes frequens.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix fibrosa. Caulis bipedalis, teretiusculus, pilosus, fo-
 liosus, superne ramosus, erectus. Folia petiolata, ter-
 nata, foliolis subcuneatis, incisis et serratis, pilosis;
 summa simplicia, trifida, acuminata. Stipulae maxi-
 mæ, rotundatae, lobatae, serratae. Flores terminales,
 solitarii, erecti. Petala plerumque calyce breviora, lu-
 teæ, patentia. Semina subpilosa, aristis purpureis, nu-
 dis, apice uncinatis et geniculatis.

rivale. 2. GEUM foliis radicalibus lyratis, stipulis ovatis
 acutis incisis, floribus nutantibus, aristis plu-
 mosis tortis.

Geum rivale. *Sp. Pl. 717. Huds. 226. With. 478.*
Relb.

Relb. 199. *Sibth.* 163. *Abbot.* 114. *Engl.*

Bot. t. 106. *Fl. Dan.* t. 722.

Caryophyllata montana purpurea. *Raii Syn.* 253.

Ger. em. 994.

C. aquatica. *Camer. Epit.* 726.

$\beta.$ Var. 2. *With.* 478. *floribus flavis.*

$\gamma.$ Var. 3. *With.* 478. *floribus plenis, interdum proliferis.*

Childing Avens. *Pet. H. Brit.* t. 40. f. 4.

Angl. Water Avens.

In pratis et nemorosis humidis, præcipue submontosis.

Not rare in the north of England, Scotland, Wales, nor even Norfolk. See *Engl. Bot.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix horizontalis, sublignosa. Caulis pedalis, erectus, subfoliosus, apice ramosus, nutans. Folia radicalia lyra-ta, interrupte pinnata, plicata, incisa, ferrata, pilosa; caulina ternata, vel simplicia. Stipulae ovatae, acutae, integræ vel incisæ. Flores cernui. Calyx extus fusco-purpureus, campanulatus. Petala erecta, cuneiformi-obcordata, luteo-purpurascens. Aristæ medio geniculato-flexuose, pilosæ, apice uncinatæ.

β videtur hybrida, patre G. urbano, cui habitu similis est.
 γ solo sicco sterili originem suam debet.

238. DRYAS. *G. Pl.* 256. *Juss.* 338.

Gærtn. t. 74.

Cal. 8- vel 10-fidus, inferus. *Petala* 5 vel 8.

Seminum cauda plumosa. *Receptaculum de-*
pressum.

i. DRYAS octopetala, foliis simplicibus ferratis. *octopeta-*
Dryas octopetala. *Sp. Pl.* 717. *Huds.* 226. *la.*

With. 478. *Lightf.* 274. *Engl. Bot.* t. 451.
Fl. Dan. t. 31.

Caryophyllata alpina, Chamædryos folio. *Raii*
Syn. 253.

Chamædrys montana. *Dalech. Hist. 1164.*

C. montana durior. *Lob. Ic. 495.*

Teucrium alpinum Cisti flore. *Ger. em. 659.*
Angl. Mountain Avens.

In campis petrosis alpinis.

In the highlands of Scotland, the north-west part of Yorkshire, and in Ireland.

Perennis: Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa. Caules decumbentes, implexi, lignosi; ramulis foliosis, erectis. Folia petiolata, ovata, subrevoluta, ferrata; supra glabra, rugosa, nitida; subtus tomentoso-nivea. Pedunculi solitarii, erecti, longissimi, uniflori, tomentosi, apice glandulosi-hispidi. Flores erecti, formosi, albi. Calyx glandulosus, pilosus, laciniiis octo, subæqualibus. Petala octo, patentia, subelliptica. Semina pilosa, aristis sesquiuncialibus, rectis, plumosis.

239. COMARUM. G. Pl. 257. Juss. 338.
Gertn. t. 73.

Cal. decemfidus, inferus. *Petala 5*, calyce minor. *Receptaculum* seminum ovatum, spongiosum, villosum, persistens. *Semina* lœvia.

palustre. 1. COMARUM.

Comarum palustre. Sp. Pl. 718. Huds. 227.
With. 479. Relb. 200. Dicks. H. Sicc. fasc. 2.
16. Engl. Bot. t. 172. Fl. Dan. t. 636
Abbot. 115.

Pentaphylloides palustre rubrum. *Raii Syn. 256.*

Pentaphyllum rubrum palustre. *Ger. em. 987.*

P. palustre. *Cord. Hist. 96. 1.*

Quinquefolium palustre. *Camer. Epit. 762.*

ꝝ. Pentaphyllum palustre rubrum, crassis et villosis foliis,

foliis, Succicum et Hibernicum. *Raii Syn.*


256. *Phuk. Phyt.* t. 212. f. 2.

Angl. Marsh Cinquefoil.

In palustribus spongiosis et cœnosis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens. Caules basi decumbentes, teretes, foliosi, glabri. Folia longius petiolata, quinato-pinnata, oblonga, ferrata, subtus incana; in 3 utrinque villosa. Flores subpaniculati, atro-purpurei. Calycis laciniæ alternæ valde inæquales, acutæ. Petala parva, acuta. Fructus ovato-conicus, seminibus numerosis, lœvibus, fragariæformis.



Classis XIII.

POLYANDRIA.

Stamina plura, receptaculo inferta.

MONOGYNIA.

Stylus 1.

* *Tetrapetali.*

243. PAPAVER. *Cal.* diphyllo. *Caps.* unilocularis, poris sub stigmate dehiscens.
241. CHELIDONIUM. *Cal.* diphyllo. *Siliqua* unilocularis. *Sem.* cristata.
242. GLAUCIUM. *Cal.* diphyllo. *Siliqua* bilocularis. *Sem.* punctata.
240. ACTÆA. *Cal.* tetraphyllo. *Bacca* unilocularis. *Semina* plana, bifaria.
Cistus marifolius.

* * *Pentapetali.*

246. CISTUS. *Caps.* trivalvis, apice dehiscens. *Cal.* pentaphyllo; foliolis duobus minoribus.
245. TILIA. *Caps.* quinquevalvis, basi dehiscens, coriacea. *Cal.* quinquepartitus, deciduus.
Delphinium Consolida.

* * * *Polypetali.*

244. NYMPHÆA. *Bacca* multilocularis, corticosa. *Cal.* petalis major.

TRI-

TRIGYNIA.

Styli 3.

247. DELPHINIUM. *Cal.* nullus. *Pet.* quinque; supremo cornuto. *Nect.* bifidum, sessile.

Reseda Luteola. *Helleborus.*

PENTAGYNIA.

Styli 5.

248. AQUILEGIA. *Cal.* nullus. *Pet.* quinque. *Nect.* quinque, infernè cornuta.

HEXAGYNIA.

Styli 6.

249. STRATIOTES. *Spatha* diphylla. *Perianthium* superum, trifidum. *Pet.* tria. *Bacca* sexocularis,

POLYGYNIA.

Styli plures.

252. THALICTRUM. *Cal.* nullus. *Pet.* 4—5. *Sem.* ecaudata.

251. CLEMATIS. *Cal.* nullus. *Pet.* 4—6. *Sem.*
caudata. *Recept.* capitatum.
250. ANEMONE. *Cal.* nullus. *Pet.* 5—9. *Sem.*
plurima.
256. HELLEBORUS. *Cal.* nullus. *Pet.* quinque,
persistentia. *Necl.* tubulata, bila-
biata.
257. CALTHA. *Cal.* nullus. *Pet.* quinque.
Nect. nulla.
255. TROLLIUS. *Cal.* nullus. *Pet.* quatuor-
decim. *Necl.* complanata.
254. RANUNCULUS. *Cal.* pentaphyllus. *Pet.*
quinque, unguibus nectariferis. *Sem.* plu-
rima, nuda.
253. ADONIS. *Cal.* pentaphyllus. *Pet.* 5—10,
nectario destituta. *Sem.* plurima, nuda.
-

XIII. POLYANDRIA.

I. MONOGYNIA.

240. ACTÆA. G. Pl. 261. Juss. 235.
Gærtn. t. 114.

Cal. tetraphyllus. *Petala* 4. *Bacca* supera,
unilocularis, polysperma. *Semina* plana.

spicata. 1. ACTÆA racemo ovato.

Actæa spicata. Sp. Pl. 722. Huds. 228. With.
483. Fl. Dan. t. 498.

Christophoriana. Raii Syn. 262. Ger. em. 979.
Clus. Hist. v. 2. 85. Tillands. Ic. 148.

Napellus racemosus. Dalech. Hist. 1747.

Angl. Herb Christopher. Bane-berries.

In nemorosis subalpinis rariis.

In the north-west corner of Yorkshire, as about
Malham Cove, Clapham, Aiskrig, and upon the
lower part of Ingleborough hill. Ray. Huds.
Curt. and Woodward. About Thorpe Arch.
Rev. Mr. Wood.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Herba sesquipedalis, glabra, foliis triternatis, acuminatis,
inciso-ferratis. Racemi terminales, solitarii, ovati, ob-
tusi, pedicellis unifloris, pubescentibus, basi bracteatis.
Bracteæ oblongæ, concavæ. Calyx deciduus. Petala
alba. Stamina filiformia, longitudine petalorum.
Germen ovatum, glabrum. Stigma capitatum, sessile.
Bacca purpureo-nigra, succosa, venenata.

241. CHELIDONIUM. G. Pl. 262. Juss. 236.
Gærtn. t. 115.

Cal. diphyllus. *Petala* 4. *Siliqua* supera, bi-
valvis, unilocularis, linearis. *Semina* plurima,
cristata.

1. CHE-

I. CHELIDONIUM.

*majus,**Chelidonium majus. Sp. Pl. 723. Huds. 228.**With. 483. Relb. 201. Sibth. 164. Fl. Dan.**t. 542. Woodv. Suppl. t. 263. Ger. em. 1069.**Fuchs. Hist. 865. Trag. Hist. 107.**C. majus vulgare. Mill. Ic. t. 92. f. 1.**Papaver corniculatum luteum, Chelidonia dic-tum. Raii Syn. 309.*β. *Chelidonium majus foliis quernis. Dill. in Raii**Syn. 309. Mill. Ic. t. 92. f. 2. Fl. Dan.**t. 676.**C. majus, folio magis dissecto. Ger. em. 1069.**Angl. Celandine.**In ruderatis, vel umbrosis solo calcareo.**Perennis. Fl. Maio, Junio.**Radix fusiformis. Caulis bipedalis, ramosus. Folia pin-nata, lobata, lævia, subglauca, lobis rotundatis, crenatis. Umbellæ axillares, pedunculatæ, solitariæ. Ca-lyx subpilosus, deciduus. Petala aurea. Siliqua toru-lofa. Semina nigra, nitida, cristâ albâ.**Herba tota succo croceo scatet. Folia et petala in β la-ciniata sunt.*242. GLAUCIUM. *Tournef. t. 130. Juss. 236.**Gærtn. t. 115.**Chelidonium. G. Pl. 262.**Cal. diphyllus. Petala 4. Siliqua supera, bi-locularis, linearis, bi- vel tri-valvis. Semina plurima, punctata.*I. *GLAUCIUM caule glabro, foliis caulinis re-luteum.*
*pandis, siliquâ tuberculato-scabriuscûlâ.**Glaucium luteum. Gærtn. v. 2. 166. Scop. Carn.*
*v. 1. 369.**Chelidonium glaucium. Sp. Pl. 724. Huds. 229.**With. 484. Engl. Bot. t. 8. Fl. Dan. t. 585.**Papaver*

- Papaver corniculatum. *Fuchs. Hist.* 520.
 P. corniculatum luteum. *Raii Syn.* 309. *Bauh.*
Hist. v. 3. 398.
 P. cornutum flore luteo. *Ger. em.* 367.
Angl. Yellow Horned-Poppy.

In arenosis maritimis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Herba glauca. Caulis ramosus, patens, lævis. Folia radicalia lyrato-pinnatifida, scabra; caulina alterna, amplexicaulia, rotundata, repanda vel sinuata. Pedunculi axillares et terminales, uniflori. Calyx hispidus, deciduus. Petala rotundata, magna, aurea. Siliqua longissima, ferè pedalis, curva, sæpius tuberculato-scabra, subinde lævis, bilocularis, dissepimento spongioso. Semina numerosa, excavato-punctata.

Phœnici um. † 2. GLAUCIUM caule hispido, foliis caulinis pinnatifidis incisis, siliquâ setosâ.

Glauçium phœnicium. *Gærtn. v. 2.* 165. t. 115.
Allion. Ped. v. 1. 290.

G. corniculatum. *Curt. Lond. fasc. 6.* t. 32.

Chelidonium corniculatum. *Sp. Pl.* 724. *Huds.*
229. *With.* 484.

Papaver corniculatum phœnicium, folio hirsuto.
Baub. Hist. v. 3. 399.

P. cornutum phœniceo flore. *Clus. Hist. v. 2.* 91.

P. cornutum flore rubro. *Ger. em.* 367.

Angl. Red Horned-Poppy.

In arvis arenosis; dubia civis.

Sent from Norfolk by Mr. Stillingfleet. *Huds.* It has never been found by any person since.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis. Folia piloso-hispida, glauca; radicalia lyrato-pinnatifida; caulina pinnatifida, dentato-incisa, amplexicaulia. Petala phœnicea, fugacia, præcedente duplo minora. Siliqua setis adpressis scabra. Semina excavato-punctata.

In hortis tantum vidi, neque spontaneum habuit Curtisius dum in Florâ Londinensi describeret.

3. **GLAUCIUM** foliis bipinnatifidis linearibus *violaceo*-
glabris, caule lævi, siliquis trivalvibus. *um.*

Glaucium violaceum. *Juss. Gen.* 236.

Chelidonium violaceum. *Lamark. Franc.* v. 3.
169.

C. hybridum. *Sp. Pl.* 724. *Huds.* 229. *With.*
485. *Relh.* 201. *Engl. Bot.* t. 201.

Papaver corniculatum violaceum. *Raii Syn.* 309.
Bauh. Hist. v. 3. 399.

P. cornutum flore violaceo. *Ger. em.* 367.
Angl. Violet Horned-Poppy.

Inter segetes rariūs.

Between Swaffham and Burwell, Cambridgeshire.

Ray. About four miles from Aylsham towards Cromer, Norfolk. *Mr. Rose.*

Annua. Fl. Maio, Junio.

Caulis lævis, ramosus, viridis. Folia bipinnatifida, linearia, saturatè viridia, glabra, interdum tripinnatifida. Petala pulcherrimè violacea, caduca. Stigma trifidum. Siliqua apicem versùs subaculeatum, trivalvis, unilocularis; receptaculis tribus, valvulis affixis. Semina excavato-punctata.

Omnibus his speciebus nomina specifica antiqua restitui, prout optima, et Linnæanis longè præferenda.

243. **PAPAVER.** *G. Pl.* 263. *Juss.* 236.
Gærtn. t. 60.

Cal. diphyllo. *Petala* 4. *Stigma* radiatum.

Capsula supera, sub stigmate persistente poris dehiscens.

* *Capsulis hispidis.*

1. **PAPAVER** capsulis subglobosis torosis hispidis, *hybridum.*
— caule folioso multifloro.

VOL. II.

K.

Papaver.

Papaver hybridum. *Sp. Pl.* 725. *Huds.* 230.
With. 485. *Relb.* 202. *Sibth.* 165. *Ab-*
bot. 116. *Engl. Bot.* t. 43.

Papaver laciniato folio, capitulo hispido rotun-
diore. *Raii Syn.* 308.

Argemone capitulo torulo. *Ger. em.* 373.

A. capitulo breviore hispido. *Bauh. Hist.* v. 3.
 396.

Angl. Mongrel Poppy.

In arvis rariūs.

At Wells, Norfolk. *Mr. Crowe.* Out of St. Be-
 nedi&t's gates, Norwich. *Mr. Pitchford.* About
 Durham. *Mr. Robson.* At Darent near Dart-
 ford. *Mr. Lewin.*

Annua. Fl. Julio.

Caulis gracilis, ramosus, foliosus, hispidus, setis adpresso-
Folia tripartita, pinnatisida, laciniis linearibus, aristatis,
hispidis. Rami uniflori, nudi. Calyx setis fulvis mu-
ricatus. Petala punicea, basi saepius violacea. Sta-
mina lineari-lanceolata, violacea. Pollen cyaneum,
Stigma 6—8-radiatum. Capsula obovata, sulcato-to-
rosa, aculeis areoato-adscendentibus muricata.

Argemo- 2. **PAPAVER** capsulis elavatis hispidis, caule fo-
 ne. lioso multifloro.

Papaver Argemone. *Sp. Pl.* 725. *Huds.* 230.
With. 486. *Relb.* 202. *Sibth.* 165. *Curt.*
Lond. fasc. 5. t. 38. *Fl. Dan.* t. 867. *Engl.*
Bot. t. 643.

P. laciniato folio, capitulo hispido longiore. *Raii*
Syn. 308.

Argemone capitulo longiore. *Ger. em.* 373.

β. Papaver maritimum. *With.* 486. caule uni-
 floro.

Angl. Long-rough-headed Poppy.

In arvis,

Annua.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Habitus prioris, sed foliorum laciniis plerumque latioribus.

Setæ caulinæ minus arctè adpressæ. Petala pallidè coccinea, fugacia. Stamina apicem versùs latissima. Antheræ pedicellatæ. Stigma quadri- vel quinque-radiatum. Capsula linearis-clavata, subpentagona, minime torosa, apice præcipue setosa.

Variat rariùs flore pleno.

* * *Capsulis glabris.*

3. PAPAVER capsulis glabris oblongis, caule *dubium*, multifloro piloso, setis pedunculariis adpressis, foliis bipinnatifidis.

Papaver *dubium*. Sp. Pl. 726. Huds. 230.

With. 487. Relb. 203. Sibth. 165. Curt.

Lond. fasc. 5. t. 37. Fl. Dan. t. 902. Engl. Bot. t. 644.

P. laciniato folio, capitulo longiore glabro. Raii Syn. 309.

Argemone capitulis longioribus glabris. Moris. sect. 3. t. 14. f. 11.

Angl. Long-smooth-headed Poppy.

In arvis, imprimis solo fabulofo.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Caulis bipedalis, pilosus, pilis patulis. Foliorum laciniæ latiores quam in præcedentibus. Pedunculi elongati, hispido; setis arctè adpressis. Petala pallidè coccinea. Stamina linearia. Pollen flavum. Stigma 6—8-radiatum. Capsula glaberrima, clavato-oblonga, sulcata, subinde obovata.

4. PAPAVER capsulis glabris subglobosis, caule *Rhœas*, multifloro hispido; pilis omnibus patentibus, foliis pinnatifidis incisis.

Papaver *Rhœas*. Sp. Pl. 726. Huds. 230.

With. 486. Relb. 203. Sibth. 165. Curt.

Lond. fasc. 3. t. 32. Woodv. Med. Bot. t. 186. Ger. em. 371. Engl. Bot. t. 645.

P. laciniato folio, capitulo breviore glabro, annum, Rhœas dictum. Raii Syn. 308.

P. erraticum primum. Fuchs. Hist. 515.

P. erraticum. Matth. Valgr. v. 2. 404.

Papaver erraticum, flos. Pharmac. Lond.

Angl. Common Red Poppy. Corn Rose.

Inter segetes vulgaris.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Caulis et pedunculi undique pilosi, setis horizontaliter patentibus. Folia pinnatifida, ferrata, vel incisa, saepe bipinnatifida, pilosa, subinde glabra. Petala saturatè punicea, magna, speciosa. Stigma multiradiatum. Capsula ovata, truncata, glaberrima.

*somnife- * 5. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, for- rum.* liis amplexicaulibus incisis glaucis.

Papaver somniferum. Sp. Pl. 726. Hudf. 231. With. 487. Relb. 204. Sibth. 166. Woodv. Med. Bot. t. 185,

P. sylvestre. Raii Syn. 308. Ger. em. 370.

P. album. Baub. Hist. v. 3. 390.

Papaver album, capsula. Pharmac. Lond.

Angl. White Poppy.

In arvis et ruderatis, vix indigena.

By the Roman road from Cambridge to Ely. Rev. Archdeacon Peirson.

Annua. Fl. Julio.

Herba glauca, Caulis tripedalis, inferne laevis, supernè hispidus, pilis patentibus. Folia simplicia, amplexicaulia, obtusa, lobata et crenata. Calyx glaber. Petala alba. Stigma multiradiatum. Capsula subrotunda, glaberrima.

cambris- 6. PAPAVER capsulis glabris oblongis rostratis, cum. caule

caule multifloro lœviusculo, foliis pinnatis incisis.

Papaver cambricum. *Sp. Pl.* 727. *Huds.* 231.
With. 488. *Engl. Bot.* t. 66.

P. luteum perenne, laciniato folio, Cambro-britannicum. *Raii Syn.* 309.

P. Cambricum perenne, flore sulphureo. *Dill.*
Elth. v. 2. 300. t. 223.

Argeomone lutea Cambro-britannica. *Park. Theatr.*
atr. 369. *Moris. sect.* 3. t. 14. f. 12.
Angl. Yellow Poppy.

In montofis umbrosis petrosis.

In several places in North Wales. *Ray.* About Kendal, Westmoreland, plentifully. *Huds.* Near Kirkby-Lonsdale.

Perennis. Fl. Junio.

Caulis pedalis, subpilosus, nec omnino lœvis, pilis erectiusculis. Folia pinnata, rachi alatâ, foliolis subovatis, acutis, incisis, glabris, teneris, fubtus glaucis. Flores suaveolentes. Calyx pilosus. Petala amœnè citrina. Stigma subquinque-radiatum, stylo brevi elevatum. Capsula glabra, clavato-oblonga, costata, stylo persistente rostrata. Herba succo luteo scatet more Chelidoni majoris, cui habitu quodammodo affinis est.

244. NYMPHÆA. *G. Pl.* 264. *Juss.* 68.
Gærtn. t. 19.

Cal. 4—5-phyllus. *Cor.* polypetala. *Stigma* radiatum, sessile. *Bacca* supera, multilocularis, polysperma.

i. NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce *lutea*: pentaphyllo petalis majore, stigmate integerimo.

Nymphaea lutea. *Sp. Pl.* 729. *Huds.* 234.
With. 488. *Rehb.* 205. *Sibth.* 167. *Engl.*
K 3 *Bot.*

*Bot. t. 159. Fl. Dan. t. 603. Raii Syn. 368.
Ger. em. 819. Camer. Epit. 635. Fuchs.
Hist. 536. Matth. Valgr. v. 2. 246.
Angl. Yellow Water-Lily.*

In fluviis et stagnis frequens.

Pereunis. Fl. Julio.

Radix sublignosa. Folia radicalia, longè petiolata, nantaria, cordata, obtusa, integerrima, lævia. Scapi teretes, uniflori. Flores lutei, odore vinoſo aquæ vitæ vulgò dictæ. Calycis foliola quinque, rotundata, concava, colorata. Petala calyce triplò breviora, obtusa, carnosa, fulva. Stamina linearia, recurva, ferè uniformia, receptaculo inserta. Fructus ovatus, subrostratus, lævis. Semina luteo-margaritacea.

alba.

2. *NYMPHÆA* foliis cordatis integerrimiſ, calyce tetraphyllo, staminibus germini insertis, stigmate lobato.

*Nymphæa alba. Sp. Pl. 729. Huds. 234.
Wittb. 489. Relb. 206. Sibth. 167. Engl.
Bot. t. 160. Fl. Dan. t. 602. Raii Syn. 368.
Ger. em. 819. Camer. Epit. 634. Matth.
Valgr. v. 2. 245.*

*N. candida. Fuchs. Hist. 535.
Angl. White Water-Lily.*

In fluviis et stagnis purioribus.

Pereunis. Fl. Julio.

Præcedente major. Flores formosi, albi, subinde rubi- cundi, soli meridiano expansi. Calycis foliola quatuor, oblonga; supra colorata, complanata. Petala lanceolata, sensim diminuta, et in stamina mutata, interiora germini basi inserta. Stamina exteriora dilatata, petalis sensim assimilata, omnia germini inserta, flava. Stigma margine multifidum. Fructus cicatricosus, obtusus. Semina præcedentis minora.

245. TILIA. *G. Pl.* 267. *Juss.* 292.
Gærtn. t. 113.

Cal. quinquepartitus. *Petala* 5. *Capitula* su-
 pera, coriacea, obovata, angulata, quinquelobata,
 cularis, quinquevalvis, basi dehiseens.

1. TILIA floribus nectario destitutis, foliis cor- *europaea*.
 datis; ramificationibus venarum subtus vil-
 losis.

Tilia europaea. *Sp. Pl.* 733. *Huds.* 231.
With. 490. *Relb.* 204. *Sibth.* 166. *Fl.*
Dan. t. 553. *Engl. Bot.* t. 610.

T. vulgaris platyphyllus. *Raii Syn.* 473. *Baub.*
Hift. v. 1. p. 2. 133.

T. fœmina. *Ger. em.* 1483. *Fuchf. Hift.* 862.
 Tilia. *Trag. Hift.* 1110.

Lime Tree. *Hunt. Evel. Sylv.* tab. ad p. 201.

♂. T. folio minore. *Raii Syn.* 473. *Baub. Hift.*
 v. 1. p. 2. 137.

γ. T. foliis molliter hirsutis, viminibus rubris,
 fructu tetragono. *Raii Syn.* 473.

δ. T. ulmifolia, semine hexagono. *Dill. in Raii*
Syn. 473.

Angl. Lime-tree. Linden-tree. γ Red Lime-
 tree.

In sylvis et sēpibus.

♂ frequent in Essex, Sussex and Lincolnshire. *Ray.*

γ in Stoken-church woods. *Ray. Sibth.*

δ in Surrey. *Merret.*

Arbor. Fl. Julio.

Rami lèves. Folia alterna, petiolata, cordata, acuminata;
 ferrata, vix lobata, venosa, glabra, basi obliqua, subtus
 ad venarum origines villosa. Pedunculi axillares, soli-
 tarii, corymbosi vel umbellati. Bractea oblonga, ob-
 tusa, membranacea, pallida, integerrima, pedunculo ad-
 nata. Flores suaveolentes, luteo-albidi. Calyx mar-
 gine

gine lanatus. Petala obtusa, concava. Stamina filiformia. Stigma quinquesfidum. Germen villosum, depresso. Capsula glabra, angulis 4 ad 8, inaequilibus, saepius unilocularis, monosperma, intus spongiosa, loculamentis pluribus abortientibus. Semen subrotundum.

246. CISTUS. G. Pl. 271.

Helianthemum. Juss. 294. Gærtn. t. 76.

Cal. pentaphyllus: foliolis inaequalibus. *Petala* 5. *Capsula* supera, angulata, trivalvis, polysperma.

* *Exstipulati, suffruticosi.*

marifo- 1. CISTUS suffruticosus exstipulatus, foliis oppo*lius.* sitis petiolatis oblongis planis subtus tomentosis.

Cistus marifolius. Sp. Pl. 741. Berk. Outl. ed. 1. v. 2. 150. Engl. Bot. t. 396. Sym. Syn. 126.

C. hirsutus. Hudf. 232.

C. anglicus. Linn. Mant. 245. With. 490.

C. canus. Jacq. Austr. t. 277.

Helianthemum alpinum, folio Pilosellæ minoris Fuchsii. Raii Syn. 342. Baub. Hist. v. 2. 19.

H. serpilli folio incano, flore minore luteo, inodoro. Dill. Elth. v. 1. 177. t. 145. f. 173.

Chamaecistus luteus, Thymi durioris folio. Barrel. Ic. 441.

Angl. Hoary Dwarf Cistus.

In rupibus alpinis rariis.

On some rocks in Westmoreland and Lancashire.

Ray. Gloddæth near Conway, Carnarvonshire.

Herb. Lightf.

Fruticulus. Fl. Maio, Junio.

Radix

Radix lignosa. Caules lignosi, palmares, teretes, foliosi, ramosi, basi decumbentes. Folia opposita, pectiolata, patentia, ovato-oblonga vel lanceolata, plana; supra viridia, fetis depresso-hispida; subtus tomentoso-incana. Stipulae nullae. Racemi terminales, pauciflori, pubescentes, bracteolati. Flores aurei, parvi, inodori. Calyx villosus. Petala 4 vel 5, obovata, integerrima. Germen glabrum, lineis pilosis. Stylus geniculatus.

* * *Exstipulati herbacei.*

2. **CISTUS** herbaceus exstipulatus, foliis oppo-*guttatus*.
fatis lanceolatis trinervibus, racemis sub-
nudis.

Cistus guttatus. Sp. Pl. 741. Huds. 232.

With. 491. Curt. Lond. fasc. 6. t. 33. Dicks.

H. Sicc. fasc. 9. 7. Engl. Bot. t. 544.

C. flore pallido, puniceante maculâ insignito.
Raii Syn. 342.

C. annuus, flore maculato. Ger. em. 1281.

C. annuus, flore guttato. Bauh. Hist. v. 2.
p. 1. 14.

Helianthemon flore maculofo. Column. Ecphr.

p. 2. 78. t. 77. f. 1.

Angl. Spotted-flowered Cistus.

In pascuis arenosis rariùs.

In Jersey. Sherard. In the Isle of Man, Mr. Brewer.
Huds.

Annuæ. Fl. Jurio, Julio.

Radix parva, fibrosa. Caulis ferè pedalis, erexitus, sim-
plex vel raniosus, foliosus, tetragonus, pilosus, pilis al-
bis, patulis. Folia opposita, exstipulata, lanceolata,
obtusiuscula, integerrima, subtrinervia, utrinque pilosa,
subviscida. Racemi terminales, simplices, secundi, pi-
losi, saepius ebracteati; interdum bracteis lanceolatis,
solitariis, ad basin pedicellorum. Calyx glandulosus,
turgidus. Petala inæqualiter crenata, flava, maculâ san-
guineâ ad basin. Stigma sessile. Capsula ovata, tri-
locularis,

locularis, dissepimentis e medio valvularum, feminiferis.

* * * *Stipulati herbacei.*

ledifoli- 3. *CISTUS* herbaceus exstipulatus pubescens, foliis lancicolatis, pedunculis erectis calyce brevioribus.

Cistus ledifolius. Sp. Pl. 742.

C. salicifolius. Huds. 233. Witb. 491.

C. annuus. Ger. em. 1280. Clus. Hist. v. 1. 76.

C. annuus longifolius Lobelii. Ger. em. 1280.

C. humilis annuus, folio Salicis humilis. Lob.

Obs. 552. Ic. p. 2. 118. f. 1.

C. annuus folio Ledi. Lob. Obs. 552. Ic. p. 2. 118. f. 2. foliis nimis acutis.

C. annuus 1 Clusio, folio rotundiore. Baub. Hist. v. 2. p. 1. 13.

C. annuus folio Ledi flore luteo. Ibid. 14.

Angl. Ledum-leaved Cistus.

In pascuis arenosis rariūs.

On Brent downs, Somersetshire. *Huds.*

Annuas. Fl. Junio, Julio.

Radix parva, parūm ramosa. Caulis suberectus, simplex, basi interdum ramosus, teres, hirsutus, foliosus, pauciflorus. Folia opposita, lanceolata, obtusa, integerrima; basi angustata, utrinque pubescentia. Stipulae binæ, lanceolatæ, acutæ, folio triplò breviores. Flores oppositifolii, solitarii, erecti, breviūs pedunculati. Calycis foliola acuminata, nervosa, hirsuta. Petala lutea, calyce breviora, fugacissima. Capsula longitudine fere calycis, glabrata, unilocularis.

Hanc stirpem ad *C. ledifolium* Linnæi retuli, ex exemplario hortensi e feminibus indigeris enato. *C. salicifolius* discepit magnitudine duplò minore, caule ramosiore; pedunculis horizontalibus, calyce sesquilocularibus. Confer *Segu. Veron. Suppl. t. 6. f. 3*; et etiam *Cistum minimum* folio subrotundo. *Baub. Hist. v. 2. 14.*

* * * * *Sti-*

* * * * *Stipulati suffruticosi.*

4. CISTUS suffruticosus procumbens stipulatus, *surrejanus*
foliis ovato-oblongis subtus pilosis punctatis, nus.
petalis lanceolatis.

Cistus surrejanus. Sp. Pl. 743. With. 492.

Hill. Fl. Brit. t. 27. f. 1.

C. Helianthemum δ. Huds. 233.

Helianthemum vulgare, petalis florum peran-
gustis. Dill. in Raii Syn. 341. Hort. Elth.

177. t. 145. f. 174.

Angl. Dotted-leaved Cistus.

In montofisis calcareis rariūs.

Near Croydon in Surrey. Mr. Edward Du Bois.

Fruticulus. Fl. Julio, Augusto.

Caules prostrati, simplices, foliosi, teretes, hirti, pilis de-
pressis, implexis. Folia petiolata, ovato-oblonga, vel
lanceolata, obtusa, plana, integerrima; supra nudius-
cula; subtus pilosa et excavato-punctata; utrinque vi-
ridia, nec ineana. Stipulae binæ, lanceolatae, ciliatae.
Racemi terminales, solitarii, simplices, multiflori, re-
curvati, pubescentes, bracteati. Flores erecti. Calyx
pilosus, nervis rubicundis. Petala lanceolata, angusta,
acuta, flava, calyce longiora, interduni breviora. Sta-
mina brevissima, vix germen superantia. Capsula uni-
locularis, vel obsoletè trilocularis.

Foliorum puncta optimè notavit D. Lightfoot in Herba-
rio suo.

5. CISTUS suffruticosus procumbens stipulatus, *Helian-*
themum canis.

Cistus Helianthemum. Sp. Pl. 744. Huds. 233.

With. 492. Relb. 205. Sibth. 167. Curt.

Lond. fasc. 5. t. 36. Fl. Dan. t. 101.

Helianthemum anglicum luteum vel *album*.

Ger. em. 1282.

Chamæ.

- Chamæcistus vulgaris flore luteo. *Loef. Pruss.*
 43. t. 8.
Panax Chironium, five flos Solis. *Camer. Epit.*
 501.
Angl. Common dwarf Cistus.

In pascuis montosis, solo calcareo, vel glarcoso.

Fruticulus. Fl. Julio, Augusto.

Caules procumbentes, subsimplices, teretes, foliosi, hirti ut in præcedente. Folia minora, elliptica, obtusa, magnitudine varia, subrevoluta; supra pilosa; subtus tomentoso-alba. Stipulæ lanceolatæ, ciliatæ, utrinque virides. Racemi pauciflori. Calyx ad nervos præcipue pilosus. Petala aurea, subrotunda, interdum crenata. Stamina longitudine styli, erecta, tactu statim decumbentia. Capsula obsoletè trilocularis.

Variat rarissimè floribus albis. *Raius.*

polifoli- 6. *CISTUS suffruticosus* procumbens stipulatus,
us. pubescentiâ stellari, foliis oblongis revolutis
 subtus tomentoso-incanis.

Cistus polifolius. Sp. Pl. 745. Huds. 234.
 With. 492.

C. humilis alpinus durior, Polii nostratis folio
 candicante. *Pluk. Phyt.* t. 23. f. 6.

Helianthemum montanum, polii folio incano,
 flore candido. *Dill. Elth.* 175. t. 145. f. 172.

Chamæcistus montanus Polii folio. *Raii Syn.*
 342. *Hill. Fl. Brit.* 274. t. 27. f. 2.

Angl. White mountain Cistus.

In collibus saxosis, auræ marinæ expositis, rarius.
 On Brent downs, Somersetshire. *Pluk. Dill.*

Fruticulus. Fl. Junio, Julio.

Habitus præcedentis, at plurimis notis differt. Caules
 tomentosi, pilis arctè adpressis. Folia oblonga, revo-
 luta; supra viridia, pilis stellatis sparsis tecta; subtus
 alba, densè tomentosa, tomento etiam stellato, nervo
 maximè

maximè prominente. Calyx ad nervos præcipue hirtus, pilis fasciculatis vel stellatis. Petala alba, sæpiùs crenulata. Capsula obsoletè trilocularis.

Cum *C. marifolio* in Mant. 245 sub *C. anglico* confundit Linnæus. A *C. apennino*, pubescentiâ foliorum et calycum stellari, præcipue discrepat.

II. TRIGYNIA.

247. DELPHINIUM. *G. Pl.* 274. *Juss.* 234.
Gærtn. t. 65.

Cal. nullus. *Petala* 5, suprema calcarata. *Nectarium* bifidum, postice calcâratum.

1. DELPHINIUM capsulâ solitariâ, nectario monophyllo, caule subdiviso. *Consolida*.

Delphinium Consolida. *Sp. Pl.* 748. *Huds.* 235.
With. 494. *Rehb.* 206. *Abbot.* 118. *Fl. Dan.* t. 683.

D. segetum, flore cæruleo. *Dill. in Raii Syn.* 273.
Consolida regalis sativa. *Ger. em.* 1082.

C. regia. *Trag. Hist.* 569.

Chamemælum cranthemon. *Fuchf. Hist.* 27.

Cuminum sylvestre secundum. *Matth. Valgr.* v. 2. 118.

Angl. Field Larkspur.

In arvis solo arenoso.

In several places in Cambridgeshire. *Rehb.* Swaffham field, Cambridgeshire. *Sherard.* Fields between Blackheath and Eltham. *Dill.* About Feltwell

Feltwell near Brandon. *Mr. Francis Smith,*
Near Bury. *Rev. Dr. Goodenough.*

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Herba subpubescens. Caulis erectus, bipedalis, alternatim ramosus, foliosus. Folia linearimultipartita. Racemi terminales. Flores violacei, calyci adscendente, subincano.

III. PENTAGYNIA.

248. AQUILEGIA. G. Pl. 275. Juss. 234.
Gærtn. t. 118.

Cal. nullus. *Petala* 5. *Nectaria* 5, corniculata, inter petala. *Capsulæ* 5, distinctæ.

vulgaris. 1. AQUILEGIA nectariis incurvis vix petalis æqualibus, caule foliisque glabris.

Aquilegia vulgaris. Sp. Pl. 752. Huds. 235. With. 495. Relb. 207. Sibth. 169. Abbott. 118. Engl. Bot. t. 297. Fl. Dan. t. 695.

A. flore simplici. Raii Syn. 273. Bauh. Hist. v. 3. 484.

Aquilegia. Fuchs. Hist. 102.

A. cærulea. Ger. em. 1093.

β. A. alpina. Huds. 235.

Angl. Common Columbine. .

In pratis pascuis et dumetis, præcipue montosis.

Perennis. Fl. Julio.

Radix tuberosa. Herba glabra, levis. Caulis erectus, bi-

bi- vel tripedalis, parùm ramosus, foliosus, teres. Folia radicalia longius petiolata, bibernata, foliolis petiolatis, subcuneatis, lobatis, crenatis, subtus glaucis; caulina ternata, summa foliolis integerrimis. Flores teruiniales, subpaniculati, cernui, pallidè violacei. Nectararia obtusa, adunca.

Herba in β minùs luxuriat, nectariis attenuatis, parùm incurvis. Omnipotè distincta ab A. alpinâ Linnæi.

IV. HEXAGYNIA.

249. STRATIOTES. G. Pl. 277. Juss. 67.
Gærtn. t. 14.

Spatha diphylla. *Perianthium* superum, trifidum.
Petala 3. *Bacca* sexlocularis.

STRATIOTES foliis ensiformi-triangulis acu- *aloides*.
leato-ferratis.

Stratiotes aloides. Sp. Pl. 754. Huds. 236.
With. 496. Relb. 207. Fl. Dan. t. 337.
Engl. Bot. t. 379. Mill. Illustr. t. 50. Dicks.
H. Sicc. fasc. 17. 11.

S. folijs Aloes, semine longo. Raii Syn. 290.
Militaris aizoides. Ger. em. 825. Lob. Ic.
v. 1. 375.

Angl. Water Aloe. Water Soldier.

In fossis et stagnis.

Plentiful in the Isle of Ely, and in the marshy parts
of Lincolnshire and Norfolk. In Cheshire and
Yorkshire. With,

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Herba sobolifera, natans. Folia conferta, ensiformia, acutè carinata, nervosa, aculeato-serrata, glabra, vasculosa, fragilia, atro-viridia. Pedunculi foliis breviores, erecti, ancipites, aculeato-serrati, uniflori. Flores albi, abortu plerumque dioici.

Genus Hydrocharidi quam maximè affine.

V. POLYGYNIA.

250. ANEMONE. G. Pl. 279. Juss. 232.
Gærtn. t. 74.

Cal. nullus. *Petala* 5—9. *Semina* plura.

Pulsatil- I. ANEMONE scapo involucrato unifloro, petalis rectis, foliis bipinnatis incisis, seminibus caudatis.

Anemone Pulsatilla. Sp. Pl. 759. Huds. 237.
With. 498. Relb. 208. t. 3. Fl. Dan. t. 153.
Engl. Bot. t. 51. Abbot. 118.

A. pratensis. Sibth. 169. With. 498.

Pulsatilla folio crassiore et majore flore. Raii
Syn. 260.

P. vulgaris. Ger. em. 385.

Pulsatilla. Matth. Valgr. v. 1. 568.

Angl. Pasque Flower. Pet. H. Brit. t. 40. f. 10.

In pascuis elatis calcareis.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix sublignosa. Folia omnia radicalia, bipinnata, vel potius bipinnatifida, incisa, pilosa, laciniis ferè linearibus,

bus, acutis, sulco exaratis. Scapus spithameus, erectus, uniflorus, teres, pilosus, apicem versus involucratus, involucro multifido. Petala sex, violacea, lanceolata, recta, patentiuscula, extus sericea. Semina caudata, plumosa.

A. pratensem Sibthorpii ex auctoritate Amicissimi D. Williams, Bot. Prof. Reg. Oxoniensis, ad A. Pulsatilam revocavi.

2. ANEMONE scapo involucrato unifloro, invenientia nemorosa lucro triphylio petiolato foliaceo, seminibus na. ecaudatis, foliolis incisis.

Anemone nemorosa. Sp. Pl. 762. Huds. 236.
With. 499. Relb. 209. Sibth. 170. Curt.
Lond. fasc. 2. t. 38. Fl. Dan. t. 549. Engl.
Bot. t. 355.

A. nemorum alba. Raii Syn. 259. Ger. em. 383.
Ranunculi quarta species lactea. Fuchs. Hist.
161.

Herba sylvestris ignoti nominis. Brunf. Hist.
v. 2. 80.

Angl. Wood Anemone.

In nemorosis, dumetis et ericetis frequens.

Perennis. Fl. Aprili.

Radix tuberosa, horizontalis. Folia petiolata, ternata, foliolis subtripartitis, lobatis et incisis, subpilosis. Scapus foliis longior, omnino uniflorus, erectus. Involucrum foliis conforme, triphyllum, petiolatum, ternatum, incisum, patens. Petala saepius sex, elliptica, alba, subinde extus purpurea. Semina mucronata, ecaudata.

3. ANEMONE scapo involucrato unifloro, invenientia apennina lucro triphylio petiolato foliaceo, seminibus na. ecaudatis, petalis lanceolatis numerosis.

Anemone apennina. Sp. Pl. 762. Huds. 237.
With. 500. Curt. Lond. fasc. 6. t. 35.

A. geranifolia. *Ger. em.* 377.

Ranunculus nemorosus, flore purpuro-cæruleo.

Dill. in Raïi Syn. 259.

R. nemorosus flore cæruleo, duplex, Apennini
inontis. *Mentz. Pugill.* t. 8.

Angl. Blue Mountain Anemone.

In nemorosis rariis.

In Wimbledon woods. *Rand.* Near Harrow. *Dic
Beis.* Near Luton-hoe, Bedfordshire. *Knowl-
ton.* Near Berkhamstead, Herts, Mr. Goodall.
With.

Perennis. Fl. Aprili.

Radix quam in præcedente crassior. Foliola latitudine varia. Petala 12 ad 16, lanceolata, obtusiuscula, cyanea. Distinctissima species, in Italiam vulgaris, uti apud nos *A. nemorosa*. Conf. *Tour on the Continent*, v. 2. 145.

ranuncu- 4. ANEMONE scapo involucrato subbisfloro, in-
bides. volvulo triphylio subsessile foliaceo, feminibus
ecaudatis, petalis ellipticis quinis.

Anemone ranunculoides. *Sp. Pl.* 762. *Huds.*
237. *With.* 499. *Fl. Dan.* t. 140.

A. nemorum lutea. *Ger. em.* 383.

Ranunculi quarta species lutea. *Fuchs.* *Hist.*
162.

Angl. Yellow Wood Anemone.

In nemorosis.

Near King's Langley, Herts, and Wrotham in Kent. *Huds.*

Perennis. Fl. Aprili.

Radix ut in *A. nemorosa*. Folia pauca, subinde quiñata. Involucra ferè sessilia, foliolis lanceolatis, incisis. Scapus infra involucrum glaberrimus. Pedicelli pilosi, sœpius binati, foliolis binis, minutis, integris, subinde interstinctis. Petala aurea, latè elliptica, quina ut in

Flora

Flora Suecicâ descripta Linnæus, nec sene ut apud Cl.
Witheritgium.

A Cl. Hudsono exemplaria spontanea accepi.

251. CLEMATIS. G. Pl. 280. Juss. 232.
Gærtn. t. 74.

Cal. nullus. *Petala* 4—6. *Semina* caudata.
Receptaculum capitatum.

i. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis: *Vitalba*.
petiolis scandentibus.

Clematis Vitalba. Sp. Pl. 766. Huds. 238.
With. 500. Relb. 209. Sibth. 170. Curt.
Lond. fasc. 4. t. 37. Jacq. Austr. t. 308.
Engl. Bot. t. 612.

C. latifolia seu *Atragene* quibusdam. Raii Syn.
258.

C. tertia. Camer. Epit. 697.
Viorna. Ger. em. 886.

Vitis nigra. Fuchs. Hist. 97. Ic. 53.

Angl. Traveller's Joy. Pet. H. Brit. t. 40.
f. 11, 12.

In sepibus, imprimis solo calcareo.

Frutex. Fl. Julio.

Caulis perennes, flagelliformes, ramosi, foliosi, sulcati,
petiolis contortis scandentes. Folia opposita, impari-
pinnata, foliolis quinis, petiolatis, ovatis, acutis, irre-
gulariter incisis integrifve, glabriusculis. Paniculæ ax-
illares, dichotomæ, foliolosæ, pubescentes. Flores al-
bi, odorati. Petala 4, coriacea, utrinque villosa. Se-
minum caudæ plumosæ, sericeæ.

252. THALICTRUM. G. Pl. 280. Juss. 232.
Gærtn. t. 74.

Cal. nullus. *Petala* 4—5. *Semina* ecaudata.

alpinum. 1. **THALICTRUM** caule simplicissimo subnudo,
racemo simplici terminali.

Thalictrum alpinum. *Sp. Pl.* 767. *Huds.* 238.
With. 500. *Lightf.* 286. *t.* 13. *f.* 1. *Fl. Dan.*
t. 11. *Engl. Bot.* *t.* 262.

T. minimum montanum atro-rubens, foliis splen-
dentibus. *Raii Syn.* 204. *Boerb. Ind. Alt.*
v. 1. 44. *t.* 1.

T. minimum præcox, foliis splendentibus. *Mor-*
ris. sect. 9. *t.* 20. *f.* 14.

Angl. Alpine Meadow-rue.

In turfosis irriguis alpinis.

On most of the highest mountains in Wales and
Scotland.

Perennis. Fl. Junio.

Radix e fibris simplicibus. Folia radicalia longius petiolata, biternata, subpinnata, foliolis subrotundis, crenato-incisis, glaberrimis, nitidis, subtus glaucis. Caulis nudus vel monophyllus, spithameus, erectus, simplex. Racemus terminalis, simplex, bracteatus, nutans. Flores pedicellati. Petala 4, acuta, albida. Stamina 8—10, capillaria. Antheræ verticales, oblongæ, flavæ. Germina vix ultra 4. Stigmata sessilia, lanceolata, divaricata, pubescentia. Semina laeviuscula.

minus. 2. **THALICTRUM** foliis tripinnatis: foliolis trifidis glaucis, floribus paniculatis cernuis.

Thalictrum minus. *Sp. Pl.* 769. *Huds.* 238.
With. 501. *Relb.* 210. *Lightf.* 285. *Fl.*
Dan. *t.* 732. *Engl. Bot.* *t.* 11. *Raii Syn.* 203.
Mor. sect. 9. *t.* 20. *f.* 12. *Ger. em.* 1251.

Æ. T. montanum minus, foliis latioribus. *Raii Syn.*
204.

Angl. Lesser Meadow-rue.

In pasuis calcareis, præcipue submontosis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix

Radix fibrosa. Caulis erectiusculus, pedalis, flexuosus, fulcatus, rore cæfio glaucus, foliosus, paniculatus. Folia inferiora maxima, patula, e basi ferè tripinnata, foliolis cordatis vel cuneatis, trifidis, subinde incisis, glabris, glaucis. Panicula patens, composita. Flores pedicellati, cernui. Petala 4, elliptica, purpureo-glaucia. Semina sulcata.

3. *THALICTRUM* foliis tripinnatis : foliolis lobatis, paniculæ ramis confertis subumbellatis, floribus cernuis.

Thalictrum majus. *Jacq. Austr. t. 420. Murr. Syst. Veg. Linn. ed. 14. 513. Willb. 502. Engl. Bot. t. 611.*

Angl. Greater Meadow-rue.

In dumetis submontosis.

On a bushy hill at Baydales near Darlington; also on the margin of Ulls-water, Cumberland. *Mr. Robson.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Præcedente duplò vel triplò majus. Folia atro-viridia, subtùs glauca. Caulis purpurascens. Lobi foliorum inferiorum rotundati, superiorum acuti. Paniculæ rami inferiores axillares, binati vel ternati; ramuli umbellati, vel alterni. Flores longius pedicellati, cernui. Petala 4, viridi-purpurea. Antheræ luteo-virescentes, pendulae.

Icon apud Dodonæum 58 f. 1, et Ger. em. 1251. f. 1. huic potius quam *T. flavum* respondet.

4. *THALICTRUM* foliis bipinnatis : foliolis trifidis, caule sulcato, paniculâ ramosissimâ coarctatâ, floribus erectis.

Thalictrum flavum. *Sp. Pl. 770. Huds. 239. Willb. 501. Relb. 210. Sibth. 171. Engl. Bot. t. 367. Fl. Dan. t. 939.*

T. nigricans. *Jacq. Austr. t. 421.*

T. seu Thalietrum majus. *Raii Syn.* 367. vix
Gérardi.

T. nigrius, caule et semine striato. *Baub. Hist.*
v. 3. 486.

β. T. majus, foliis rugosis trifidis. *Moris. sect.* 9.
t. 20. f. 3.

Angl.: Common Meadow-rue,

In pratis humidis, et ad ripas fluyiorum.

Perennis. Fl. Julio.

Radix flava. Caules tripedales, erecti, foliosi, angulato,
fulcati, parum ramosi, apice paniculati. Folia bipin-
nata, vix tripinnata, foliolis subcuneatis, saepius trifidis,
latitudine variis, subtus glaucis. Panicula erecta, ra-
mosissima, coarctata, parum foliosa. Flores erecti, och-
roleuci. Petala 4. Stigmata cordata, brevia.

253. ADONIS. G. Pl. 281. Juss. 232:
Gærtn. t. 74.

Cal. pentaphyllus. *Petala* 5—8, vel plura, nec-
tario destituta. *Semina* nuda.

*autum-
nalis.* i. ADONIS petalis suboctonis concavis emargin-
atis, fructu ovato.

Adonis autumnalis. Sp. Pl. 771. Huds. 239:
With. 503. Sibth. 171. Curt. Lond. fasc. 2.
t. 37. Engl. Bot. t. 308. Wade Dubl. 147.
Flos Adonis. Raii Syn. 251. Park. Parad. 293.
f. 5. Ger. em. 387. Pet. H. Brit. t. 39.
f. 8.

Angl. Corn Adonis, Pheasant's-eye,

Inter segetes rariū.

About London. Huds. Curt. Near Denver sluice,
Norfolk. Mrs. Pleslow. Gloucestershire. Miss
Lysons. About Dublin. Dr. Wade.

Annua. Fl. Maio—Octobri.

Radix

Radix subfusiformis. Caulis erectus, ramosus, foliosus, teres, striatus, subinde pubescentis. Folia alterna, sessilia, tripinnatifida, laciniis linearibus, acutis. Flores terminales, solitarii, erecti, nitidi, saturatè phœnicei, inodori. Calycis foliola decidua, sive purpurascens, concava, glabriuscula, interdum pubescentia. Petala 6—10, saepius 8, late obovata vel obcordata, concava, nervosa, emarginata vel erosa, calyce parum longiora. Stamina violacea, petalis duplo breviora. Fructus aggregatus, subovatus, vix uncialis. Semina corrugato-ferobiculata.

A. æstivalis Linnæi, (flammea fortè Jacquinii,) discrepat petalis angustioribus, miniato-fulvis, parum concavis, numero quidem variis at saepius quinque; fructu duplo longiore, omnino cylindrico; calyce interdum basi villosa. Hæc Italiæ, vix Angliæ, indigena est.

254. RANUNCULUS. G. Pl. 281. Juss. 233;
Gærtn. t. 74.

Cal. pentaphyllus. Petala 5—8, intra unguis poro mellifero. Semina nuda.

* *Foliis simplicibus.*

i. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis obtusis, petiolatis, caule declinato. *Flammula.*

Ranunculus Flammula. Sp. Pl. 772. Hud. 239.
With. 504. Relb. 211. Sibth. 171. Abbot. 120. Curt. Lond. fasc. 6. t. 37. Engl. Bot. t. 387. Fl. Dan. t. 575.

R. flammeus minor. Raii Syn. 250. Ger. em. 961.

β. R. flammeus serratus. Ger. em. 962.

Small Spear-wort. Pet. H. Brit. t. 39, f. 6.

γ. R. flammeus, latiori plantaginis folio, marginibus pilosis. Dill. in Raii Syn. 251. non vidi.

δ. R. reptans. Sp. Pl. 773. Lightf. 289. With. 505. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 10. Fl. Dar. t. 108.

Angl. Lesser Spear-wort.

In paludosis vulgaris. ♂ ad margines lacuum alpinorum.

Petennis. Fl. Junio—Septembri.

Radix e fibris simplicibus, longissimis. Caulis patuli, subdecumbentes, ramosi, foliosi, teretes, lèves. Folia alterna, lanceolata, acuta, nervosa, glabra, integerrima vel ferrata, inferiora longius petiolata, petiolis canaliculatis, basi dilatatis. Flores terminales, solitarii, penduculati, erecti, aurei, nitidi. Pedunculi teretes. Calyx reflexus, glabriusculus. Nectarium minutum. Semina lèvia.

♂ magnitudine minori, cauleque radicante differt.

Lingua. 2. RANUNCULUS foliis lanceolatis acuminatis, caule erecto multifloro.

Ranunculus Lingua. *Sp. Pl.* 773. *Huds.* 242. *Wittb.* 504. *Relb.* 211. *Sibtb.* 172. *Abbott.* 120. *Engl. Bot.* t. 100. *Fl. Dan.* t. 755.

R. flammeus major. *Raii Syn.* 250. *Ger. em.* 961.

Angl. Great Spear-wort. *Pet. H. Brit.* t. 39. f. 5.

In paludosis et fossis minus frequens.

In the Isle of Ely, Norfolk, and several parts of the north of England. In Duddingston Loch near Edinburgh.

Perennis. Fl. Julio.

Habitus præcedentis, sed triplò major. Caulis erexitus, quadripedalis. Folia minus petiolata, acuminata, nec obtusiuscula. Calyx pilosus. Pili totius ferè herbæ adpressi, ut etiam in præcedente.

gramineus. 3. RANUNCULUS foliis linear-lanceolatis multinervosis

tinervosis sessilibus, caule erecto paucifloro
glaberrimo.

Ranunculus gramineus. *Sp. Pl.* 773. *With.* 505.

R. angustifolius bulbosus. *Baub. Hist.* v. 3. 850.

R. phœniceus Myconi. *Dalech. Hist.* 1036.

Angl. Grassy Crowfoot.

In pratis aridis alpinis.

Brought from North Wales by Mr. Pritchard,
With.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix bulbosa, *tuberosa*, *cylindracea*, *apice fibrosa*, *fibras radiatim exserens*. *Caulis pedalis*, *erectus*, *teres*, *glauber*, *pauciflorus*, *parum foliosus*. *Folia petiolis vaginantibus*, *lanceolata*, *integerrima*, *multinervosa*, *glaуca*. *Flores terminales*, *magnitudine ferè præcedentis*, *aurei*. *Calyx glaberrimus*, *patens*, *nec deflexus*.

Phœniceum dicitur e foliis palmæ (*Phœnici*) similibus.
Dalech.

4. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis peti- *Ficaria*. olatis, petalis numerosis.

Ranunculus Ficaria. *Sp. Pl.* 774. *With.* 503.

Relh. 211. *Sibth.* 172. *Abbot.* 121. *Curt.*

Lond. fasc. 2. t. 39. *Mart. Fl. Rust.* t. 21.

Fl. Dan. t. 499. *Engl. Bot.* t. 584.

Ficaria. *Brunf. Herb.* v. 1. 215.

F. verna. *Huds.* 244.

Chelidonium minus. *Raii Syn.* 246. *Ger. em.*
816. *Fuchs. Hist.* 867.

Angl. Pilewort. Lesser Celandine.

In pratis, nemorosis, et ad sepes vulgaris.

Perennis. Fl. Aprili.

Radix tuberosa, *tuberibus pyriformibus*, *carnosis*, *annuis*.

Caulis erectissimuli, *palmates*, *foliosi*, *subuniflori*, *glaibri*. *Folia longè petiolata*, *cordata*, *angulata*, *nitida*, *glabra*. *Flores pedunculati*, *erecti*, *soltarii*, *aurei*, *lucidissimi*.

cidi, supra demum dealbati. Foliola calycina saepius tria, interdum quinque. Petala 8—10, elliptico-lanceolata.

* * *Foliis dissectis et divisis.*

surico- 5. **RANUNCULUS** foliis radicalibus reniformi-
nus. bus tripartitis crenatis; caulinis digitatis line-
aribus, caule multifloro, calyce colorato.

Ranunculus auricomus. *Sp. Pl.* 775. *Huds.*
242. *With.* 505. *Relb.* 212. *Sibth.* 172.
Abbot. 121. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 41. *Engl.*
Bot. t. 624. *Fl. Dan.* t. 665. *Ger. em.* 954.
R. nemorosus dulcis, secundus *Tragi.* *Raii*
Syn. 248.

R. prima species sylvestris. *Fuchs. Hist.* 156.
Dalech. Hist. 1029.
Angl. Wood Crowfoot. Goldilocks.

In nemorosis, et ad sepes umbrosas; “rarius in
palustribus.” *Curt.*

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix fibrosa. *Caules* pedales, ramosi, foliosi, superne
villososeuli. *Folia* subpubescentia; radicalia longius
petiolata, reniformia, saepius tripartita, inciso-crenata,
subinde quinquepartita; caulinia sessilia, ad basin usque
multifida, lacinii linearibus, plerumque integerrimis et
indivisis. *Flores* terminales, solitarii, aurei. *Calyx*
vilosus, luteus, haud reflexus. *Nectaria* nuda. *Herba*
non acris.

Variat floribus apetalis, calyce dilatato, margine petali-
formi.

sceler- 6. **RANUNCULUS** foliis inferioribus palmatis;
tus. summis digitatis, fructibus oblongis.

Ranunculus sceleratus. *Sp. Pl.* 776. *Huds.* 241.
With. 505. *Relb.* 212. *Sibth.* 173. *Curt.*
Lond. fasc. 2. t. 42. *Fl. Dan.* t. 571.

R. palustris. *Raii Syn.* 249.

R. pa-

R. palustris rotundifolius. *Ger. em.* 962.

R. secundi species. *Fuchs. Hist.* 159.

R. primus. *Camer. Epit.* 380.

Angl. Water Crowfoot. Celery-leaved Crow-foot.

In aquosis vulgaris.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Radix fibrosa. Herba pallida, levigata. Caulis rectus, crassus, ramosus, succosus, foliosus. Folia inferiora petiolata, minus profundè incisa; superiora sessilia, ad basin usque dissecta. Flores numerosi, pedunculati, exigui, lutei. Calyx villosus. Fructus ovato-oblongus, seminibus, numerosissimis.

7. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedun- *bulbosus*
culis sulcatis, caule erecto multifloro, foliis
compositis, radice bulbosâ.

Ranunculus bulbosus. *Sp. Pl.* 778. *Huds.* 241.

Wittb. 508. *Rehb.* 213. *Sibth.* 173. *Curt.*

Lond. fasc. 1. t. 38. *Mart. Fl. Rust.* t. 28.

Engl. Bot. t. 515. *Fl. Dan.* t. 551. *Mill.*

Illustr. t. 51. *Raii Syn.* 247. *Ger. em.* 953.

Lob. Ic. 666.

R. tertia species. *Fuchs. Hist.* 160.

Angl. Bulbous Crowfoot. Butter-cups,

In pratis et pascauis ubique.

Perennis. Fl. Maio.

Radix bulbosa, solida, supernè prolifera. Caules erecti, pedales, ramosi, foliosi, teretes, pilosi, multiflori, sarmientis destituti. Folia petiolata, ternata, trisida, varie incisa, magis vel minus pilosa. Flores terminales, solitarii, pedunculati, aurei, nitidi. Pedunculus sulcatus, angulatus, pilosus. Calyx ad pedunculum reflexus, extus hirsutus. Nectarium squamâ emarginatâ operculatum.

8. RANUN-

hirsutus. 8. **RANUNCULUS** calycibus retroflexis acuminatis, caule erecto multifloro hirsuto, foliis ternatis, radice fibrosâ.

Ranunculus hirsutus. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 40.*

With. 508. Relb. 213. Sibth. 173. Abbott. 122.

R. bulbosus β . *Huds. 241.*

R. rectus, foliis pallidioribus, hirsutis. *Baub.*

Hist. v. 3. 417. Raii Syn. 247.

Angl. Pale hairy Crowfoot.

In cultis, ruderatis et ad vias, locisque inundatis.

Annua. Fl. Junio—Octobri.

Radix fibrosa. **Caulis** erectus, sesquipedalis, ramosus, foliosus, hirsutus, pilis patentissimis. **Folia** ternata, hirsuta, pallida; superiora incisa, laciniis saepe linearibus. **Pedunculi** sulcati, hirsuti. **Calyx** acuminatus, hirtus, pilis basi glandulosis, demum retroflexus. **Petala** aurea. **Nectarium** squamâ operculatum.

repens. 9. **RANUNCULUS** calycibus patulis, pedunculis sulcatis, farmentis repentibus, foliis compotitis.

Ranunculus repens. *Sp. Pl. 779. Huds. 240.*

With. 509. Relb. 214. Sibth. 173. Curt.

Lond. fasc. 4. t. 38. Mart. Fl. Rust. t. 29.

Engl. Bot. t. 516. Fl. Dan. t. 795.

R. pratensis *repens.* *Raii Syn. 247.*

R. pratensis etiamque *hortensis.* *Ger. em. 951.*

Angl. Creeping Crowfoot. *Pet. H. Brit. t. 38. f. 7, 8.*

In pratis, pascuis, et umbrosis humidiisculis.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix fibrosa. **Caulis** ut in præcedentibus, sed farmentis radicantibus, foliosis, diversus. **Folia** ternata, trifida et incisa; summa integerrima. **Calyx** hirsutus, patens,

nec

nec retroflexus. Petala aurea, saepius emarginata. Nectarium squamâ obcordatâ operculatum.

10. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis : summis linearibus.

Ranunculus acris. *Sp. Pl.* 779. *Huds.* 241.
With. 506. *Reh.* 214. *Sibth.* 174. *Curt.*
Lond. fasc. 1. t. 39. *Mart. Fl. Rust.* t. 30.
Woodv. Suppl. t. 246. *Engl. Bot.* t. 652.

R. pratensis erectus acris. *Raii Syn.* 248.

R. surrectis caulinis. *Ger. em.* 951.

Angl. Upright Meadow Crowfoot. *Pet. H.*
Brit. t. 38. f. 3.

In pratis et pascuis vulgaris.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix tuberosa, fibris longis, simplicibus. Caulis erectus, bipedalis, teres, pilosus, pilis adpressis, parum foliosus, supernè ramosus. Folia tripartita et quinquepartita, multifida; radicalia longius petiolata; summa subsessilia, linearia. Pedunculi teretes, nec sulcati, pilosi. Calyx patens, hirsutus. Petala aurea. Nectarium squamâ emarginatâ operculatum.

In hortis flore pleno frequens est.

11. *RANUNCULUS* seminibus tuberculatis, foliis hirsutis trilobis incisis, caule erecto paucifloro.

Ranunculus parvulus. *Linn. Mant.* 79.

R. parviflorus. *Gouan. Fl. Monsp.* 270. *ex Herb.*
Gouan.

R. arvensis parvus folio trifido. *Magnol. Monsp.*
 217.

R. minimus saxatilis hirsutus. *Bauh. Prod.* 96.

R. minimus Apulus. *Column. Ecphr.* 314. t. 316.
 f. 1.

Angl. Little upright Crowfoot.

In

In pratis uliginosis.

In a low meadow on the banks of the Avon below Bristol Hot-wells plentifully. Mr. T. W. Dyer.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva, fibris longis, simplicibus. Caulis erectus, vix spithameus, subramosus, foliosus, pauciflorus, hirsutus, pilis erecto-patentibus. Folia inferiora petiolata, tripartita, incisa, utrinque pilosa; superiora trifida, vel indivisa. Stipulae membranaceae, pilosae, petiolis adnatæ. Flores terminales, solitarii, erecti, praecedentibus minores. Calyx reflexus, pilosus, foliolis margine scariosus. Petala rotundata; suprà aurea, nitida; subtùs pallidiora, opaca. Nectarium squamâ cuneatâ, retusâ, operculatum. Semina lenticulata, compressa, marginata, punctata, utrinque muricata tuberculis irregulâribus, acutis.

arvensis. 12. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis trifido-decompositis: laciniis linearibus.

Ranunculus arvensis. Sp. Pl. 780. Huds. 242.

With. 509. Relb. 215. Sibth. 174. Engl.

Bot. t. 135. Curt. Lond. fasc. 6. t. 36. Mart.

Fl. Rust. t. 56. Fl. Dan. t. 219. Brugnon.

Mem. de l' Acad. de Turin, v. 4. 108. t. 3.

R. arvorum. Raii Syn. 248. Ger. em. 951.

Angl. Corn Crowtoot. Pet. H. Brit. t. 38. f. 10.

Inter segetes.

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Caulis erectus, ramosissimus, teres, fere glaber. Folia tripartita, laciniis linearibus; inferiora decomposita. Flores oppositifolii, pedunculati, parviflori. Calyx patens, hirtus. Petala obovata. Semina maximæ, compressa, aculeis numerosis, rigidis, lateralibus, utrinque muricata.

parviflorus. 13. RANUNCULUS seminibus aculeatis: aculeis

leis aduncis, foliis simplicibus laciniatis acutis hirsutis, caule diffuso.

Ranunculus parviflorus. *Sp. Pl.* 780. *Huds.* 242.
With. 506. *Relb.* 215. *Sibth.* 174. *Engl. Bot.* t. 120.

R. hirsutus annuus flore minimo. *Raii Syn.* 248. t. 12. f. 1. *Pluk. Phyt.* t. 55. f. 1.

R. hirsutus flore omnium minimo luteo. *Moir. sect. 4.* t. 28. f. 21.

Ray's hairy Crowfoot. *Pet. H. Brit.* t. 38. f. 9.
Angl. Small-flowered Crowfoot.

In arvis et ad sepes solo glareoso.

In several places about London. On Malvern hill, Worcestershire, Mr. Ballard; and in the south-west part of England. *With.* Near Norwich. *Mr. Pitchford.*

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrofa. Caules prostrati, ramosi, foliosi, teretes, pilosi. Folia longius petiolata, pilosa, reniformia, inciso-crenata; superiora triloba; summa lanceolata, integerrima. Flores oppositifolii, pedunculati, exigui, flavi. Calyx patens. Petala oblonga, saepe imperfecta. Stamina pauca. Semina compressa, aculeis densis, uncinatis, lateralibus, muricata.

14. *RANUNCULUS* foliis reniformi-subrotundis *bedera-*
trilobis quinquelobisve integerrimis laevibus,
caule repente.

Ranunculus hederaceus. *Sp. Pl.* 781. *Huds.* 243. *With.* 507. *Relb.* 215. *Sibth.* 175. *Abbot.* 123. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 39. *Fl. Dan.* t. 321. *Dalech. Hist.* 1031.

R. aquatilis hederaceus albus. *Raii Syn.* 249.
Angl. Ivy Crowfoot. *Pet. H. Brit.* t. 38. f. 12.

In aquis vadosis, et locis inundatis; ad scaturigines et ad fossas.

Perennis.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix fibrosa. Caules prostrati vel natantes, radicantes, ramosi, divaricati, glabri. Folia longè petiolata, reniformia, obsoletè triloba vel quinqueloba, integrerrima, subcarnosa, lævia. Flores parvi, albi, oppositifolii. Stamina 5—10. Semina subrotunda, corrugata.

aquati- 15. *RANUNCULUS* foliis submersis capillaceis; *lis.* emersis subpeltatis.

Ranunculus aquatilis. Sp. Pl. 781. Huds. 243.
With. 507. Relb. 216. Engl. Bot. t. 101.
Ger. em. 829. Raii Syn. 249.

R. aquatilis albus. Baub. Hist. v. 3. 773.
R. heterophyllum. Wigg. Holsat. 42. Sibth. 175.
Abbot. 123.

β. *R. aquatilis omnino tenuifolius.* Raii Syn. 249.
Baub. Hist. v. 3. 773.

R. aquatilis. Sibth. 175.

Millefolium sive *Maratriphyllum*, flore et semine
Ranunculi aquatici hepaticæ facie. Ger. em.
827.

γ. *Ranunculus aquaticus albus*, circinatis tenuis-
simè divisis foliis, floribus ex alis longis pedi-
culis innixis. Raii Syn. 249. Pluk. Phyt. t. 55:
f. 2.

R. circinatus. Sibth. 175.

δ. *Ranunculo* sive *Polyanthemo aquatili* albo af-
fine; *Millefolium Maratriphyllum* fluitans.
Raii Syn. 250. Baub. Hist. v. 3. 774. Fl.
Dan. t. 376.

R. fluviatilis. Wigg. Holsat. 42. Sibth. 176.
Abbot. 123.

Angl. Water Crowfoot.

In fossis et stagnis vulgaris; δ in fluviis.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. Caules natantes, submersi, elongati, tere-
tes,

tes, foliosi. Folia petiolata, glabra; superiora plerumque subpeltata, triloba, incisa, natantia; inferiora tripartito-multifida, supradecomposita, laciñis linearibus, angustissimis, acutis: in var. ♂ folia aquæ impetu elongantur. Flores pedunculati, oppositifolii, natantes, albi, medio lutei. Stamina numerosa. Semina corrugata.

255. TROLLIUS. *G. Pl.* 282. *Juss.* 233.
Gærtn. t. 118.

Cal. nullus. *Petala* circiter 14. *Nectaria* circiter 9, complanata. *Capsulæ* plurimæ, oblongæ, polypermæ.

i. TROLLIUS corollis conniventibus, *nectariis europæ-*
longitudine staminum. *us.*

Trollius europaeus. *Sp. Pl.* 782. *Huds.* 244.
With. 510. *Lightf.* 295. *Engl. Bot.* t. 28.
Fl. Dan. t. 133.

Ranunculus globosus. *Raii Syn.* 272. *Ger.*
em. 955.

R. sextus. *Camer. Epit.* 385.

Globe Crowfoot. *Pet. H. Brit.* t. 43. f. 2.

Angl. Globe-flower.

In umbrosis montosis subhumidis.

Not rare in Westmoreland, Cumberland, Durham,
Wales, and the lowlands of Scotland.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. Caulis erectus, bipedalis, teres, glaber,
superne ramosus. Folia multipartita, pinnatisida, in-
cisa, glabra; radicalia longius petiolata; caulinæ sub-
sessilia, alterna. Flores terminales, solitarii, formosi,
globosi, aurei. Petala concava, ferè clausa. *Nectaria*
lineari-spatulata, staminibus vix æqualia, petalis duplo
breviora. Staniina linearia. Antheræ incurvæ. Cap-
sulæ plurimæ, subcylindricæ. Semina numerosa, ni-
gra, nitida.

256. HELLEBORUS. *G. Pl.* 282. *Juss.* 233.
Gærtn. t. 65.

Cal. nullus. *Petala* 5, five plura. *Nectaria* tubulata, bilabiata. *Capsulæ* compressæ, erctiusculæ, polyspermæ.

viridis. 1. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digitatis, petalis patentibus.

Helleborus viridis. *Sp. Pl.* 784. *Huds.* 245.
With. 510. *Relb.* 217. *Sibth.* 176. *Abbot.* 124. *Engl. Bot.* t. 200. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 34. *Jacq. Austr.* t. 106.

H. niger hortensis, flore viridi. *Raii Syn.* 271.

Helleborastrum. *Ger. em.* 976.

Elleborus niger adulterinus hortensis. *Fuchs. Hist.* 274.

Elleborum nigrum alterum. *Matth. Valgr. v. 2.* 961. *Camer. Epit.* 941.

Angl. Green Hellebore.

In sylvis et dumetis, solo cretaceo.

In Oxfordshire, Cambridgeshire, Sussex, and other chalk countries, but not common. Near Harefield, Middlesex. *Miss Jane Baynes.*

Perennis. Fl. Aprili.

Radix carnoса, nigra, fibris longis, plurimis. Caulis erectus, sesquipedalis, apice dichotomus, foliosus, glaberrimus. Folia glaberrima, nitida, digitata, inciso-ferrata; foliolis exterioribus saepius ad medium usque connatis; radicalia petiolata; caulina sessilia. Flores pauci, terminales et axillares, solitarii, pedunculati, cernui, virides. Petala patula, persistentia. Nectaria et stamina decidua. Germina, et capsulæ, 3 vel 4, vix plura.

fætidus. 2. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis, petalis conniventibus.

Helleborus foetidus. *Sp. Pl.* 784. *Huds.* 245.

With. 510. *Relb.* 218. *Sibth.* 177. *Woodv.*

Med. Bot. t. 19. *Engl. Bot.* t. 613.

Helleboraster maximus. *Raii Syn.* 271. *Ger. em.* 976.

Elleborus niger adulterinus sylvestris. *Fuchs. Hist.* 275.

Helleboraster, folium. *Pharmac. Lond.*

Angl. Stinking Hellebore. Bear's-foot. Setter-wort.

In pascuis et dumetis, solo cretaceo.

In chalk countries more common than the last.

On the castle hill at Castle-Acre, Norfolk.

Perennis. Fl. Martio, Aprili.

Præcedente altior et ramosior. Caulis multiflorus, paniculatus. Folia pedata, æqualiter ferrata, atro-viridia; floralia integra, pallida. Flores cernui. Petala erecto-conniventia, viridia, margine atro-purpurea, persistenta. Capsulæ 3 vel 4.

257. CALTHA. G. *Pl.* 283. *Juss.* 234.
Gærtn. t. 118.

Cal. nullus. *Petala 5.* *Nectaria nulla.* *Cap-sule plurimæ, polyspermæ.*

1. CALTHA.

palustris.

Caltha palustris. *Sp. Pl.* 784. *Huds.* 245.

With. 511. *Relb.* 217. *Sibth.* 176. *Curt.*

Lond. fusc. 1. t. 40. *Engl. Bot.* t. 506. *Fl.*

Dan. t. 668.

C. palustris major. *Ger. em.* 817.

Populago. *Raii Syn.* 272.

Tussilago altera sive *Farfugium.* *Matth.* *Valgr.* v. 2. 200. *Camer. Epit.* 594.

Angl. Marsh Marigold.

In palustribus et ad rivos paſſim.

Perennis. Fl. Maio.

Caules fesquipedales, erecti, parum ramosi, sulcati, glabri.

Folia cordata, venosa, glaberrima, aente crenata. Flores
pedunculati, erecti, magni, speciosi, aurei.

Classis XIV.

DIDYNAMIA.

Chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll

CYANOCERATE.

Conium maculatum

* *Culicoides subignatus* Seitz

293. LIPSTICK. Anthaea polyphemus. *See also*

1889. CALIFORNIA. Arch. 1900-1901.
1890. April 1890. Filamentous, yellow, green. Grows
in tufts.

Aug. 18, 1910. A. C. M. 10000-13
10000-13

19. 11. 1900. On the 19th of November
the 1870 "The Great Flood" was

Wednesday, 21st, 1891. Sun 77°
Cloudy, 60°.

John L. M. B. C. W. 1888-1892.

11. 1888. 10. 23. San Francisco.

63. *Calostoma* (L.) Schlecht. *Calostoma* (L.) Schlecht.
64. *Calostoma* (L.) Schlecht.

For us Islam, as far as we can judge,
is the best.

Book Mary, 1960, 100

269. **BALLOTA.** *Cal.* decemstriatus. *Cor.* lab.
superius fornicatum.
 270. **MARRUBIUM.** *Cal.* decemstriatus. *Cor.*
lab. superius rectum, bifidum.
 261. **VERBENA.** *Cal.* unico dente truncato,
Cor. subæqualis, curva.

* * *Calyces bilabiati.*

276. **SCUTELLARIA.** *Cal.* fructiferus opercu-
latus.
 274. **THYMUS.** *Cal.* fauce villis clausus.
 277. **PRUNELLA.** *Filamenta omnia apice bi-
furca.*
 273. **ORGANUM.** *Strobilus calyces colligens,*
 272. **CLINOPODIUM.** *Involucrum multifidum
calyces colligens.*
 275. **MELITTIS.** *Cal.* tubo corollæ amplior.
Cor. lab. superius planum. *Anth.* cru-
ciatæ.

ANGIOSPERMIA.

Semina pericarpio inclusa.

* *Calyces quadrifidi.*

282. **LATIRRÆA.** *Caps.* unilocularis. *Glan-
dula sub germine.*
 278. **BARTSIA.** *Caps.* bilocularis. *Sem.* angu-
lata.
 279. **RHINANTHUS.** *Caps.* bilocularis. *Sem.*
compresso-plana, imbricata.
 281. **MELAMPYRUM.** *Caps.* bilocularis. *Sem.*
bina, gibba, lævigata.
 280. EU-

280. EUPHRASIA. *Caps.* bilocularis. *Sem.*
striaata. *Anth.* spinosæ.

* * *Calyses quinquefidi.*

289. LIMOSELLA. *Caps.* semibilocularis. *Cor.*
campanulata, subæquális.

285. SCROPHULARIA. *Caps.* bilocularis. *Cor.*
resupinata. *Lab.* segmento intermedio in-
terno.

288. SIBTHORPIA. *Caps.* bilocularis, dissep-
imentis transversis. *Cor.* subrotata. *Stam.*
per paria approximata.

286. DIGITALIS. *Caps.* bilocularis. *Cor.* cam-
panulata, subtùs ventricosa.

284. ANTIRRHINUM. *Caps.* bilocularis. *Cor.*
personata, subtùs nectario prominente.

283. PEDICULARIS. *Caps.* bilocularis. *Sem.*
mucronata. *Cor.* personata ; galea com-
pressa.

287. LINNÆA. *Bacca* trilocularis, sicca. *Cor.*
campanulata. *Cal.* superus.

* * * *Calyses subdiphylli.*

290. OROBANCHE. *Cal.* foliola lateralia, lo-
bata. *Caps.* unilocularis.

XIV. DIDYNAMIA.

I. GYMNOSPERMIA.

* *Calyces subregulares.*

258. AJUGA. *G. Pl.* 287.
Bugula. *Juss.* 112.

Corollæ labium superius minimum, emarginatum. Stamina labio superiore longiora.

reptans. 1. AJUGA glabra, caule solitario, stolonibus reptantibus.

Ajuga reptans. *Sp. Pl.* 785. *Huds.* 248. *With.* 517. *Rehb.* 220. *Sibth.* 180. *Curt. Lond.* fasc. 2. t. 43. *Engl. Bot.* t. 489. *Fl. Dan.* t. 925.

Bugula. *Raii Syn.* 245. *Ger. em.* 631.

Consolida media. *Fuchs. Hist.* 391.

Angl. Common Bugle.

In nemorofisis, et pascuis humidis.

Perennis. Fl. Maio.

Radix fibrosa. Caulis solitarius, erectus, pedalis, quadrangulus, foliosus, purpurascens, subpilosus, basi stolonibus flagelliformibus, prostratis, reptantibus, foliosis. Folia opposita, elliptica vel obovata, obtusa, crenato-repanda, in petiola lata decurrentia, ferè glabra, lucida. Verticilli multiflori, densi, foliolosi. Calyx pilosus. Corolla cærulea, fauce albo picta. Labium inferius quadrilobum.

Variat in montosis aridis caule rotundiore, stolonibus abbreviatis, herbâ totâ hirsutâ; monente D. Gough.

alpina. 2. AJUGA caule simplici, foliis glabriusculis inæqualiter dentatis subuniformibus, verticillis remotiusculis multifloris.

Ajuga

Ajuga alpina. *Mant.* 80. *Engl. Bot.* t. 477.

A. pyramidalis. *Huds.* 248. *Lightf.* 302?

A. genevensis. *With.* 516. *Scholl. Barb.* 135.

Bugula cærulea alpina. *Pluk. Phyt.* t. 18. f. 3.

Raii Syn. 245.

Mountain Bugle. *Pet. H. Brit.* t. 34. f. 4.

Angl. Alpine Bugle.

In montosis.

In Carnarvonshire. *Ray.* Durham. *Mr. Robson.*

On the summit of a mountain near Castleton,
Derbyshire. *Mr. Dawson Turner.*

Perennis. Fl. Julio.

Caules plures, stolonibus destituti, erecti, ferè pedales,
simplices, subhirsuti, foliosi. Folia subæqualia, obo-
vata, inæqualiter dentata, pilosiuscula: floralia incisa;
superiora integra, colorata. Verticilli multiflori. Ca-
lyx dentibus præcipue pilosus. Flores cærulei, lineis
saturatioribus, labio inferiore trifido.

3. AJUGA caule diffuso ramoso, foliis trifidis *Chamæ-*
linearibus integrerrimis, floribus axillaribus pitys.
solitariis.

Ajuga Chamæpitys. *Engl. Bot.* t. 77. *With.*

517.

A. sive Chamæpitys. *Camer. Epit.* 679.

Teucrium Chamæpitys. *Sp. Pl.* 787. *Huds.*
247. *Relh.* 220. *Dicks. Dr. Pl.* 9.

Chamæpitys vulgaris. *Raii Syn.* 244.

C. mas. *Ger. em.* 525.

Bugula n. 284. *Hall. Hist.* v. 1. 124.

Angl. Ground Pine.

In arvis arenosis.

In Cambridgeshire and Kent. *Ray.*

Annua. Fl. Aprili, Maio.

Radix fibrosa, parva. Herba pilosa, viscida, aromatica,
amara.

amara. Caulis raniosus, quadrangulus, foliosus, rubicundus. Folia ad medium usque trifida, linearia, integerrima, subrevoluta; insima indivisa. Flores axillares, solitarii, oppositi, subsessiles, flavi, rubro punctati. Labium inferius trifidum, lobo centrali maximo, obcordato.

259. TEUCRIUM. G. Pl. 287. Juss. 112.

Corolla labium superius (nullum) ultra basin bipartitum, divaricatum. *Stamina* exserta.

Scorodo- 1. *TEUCRIUM* foliis cordatis ferratis petiolatis, *nia.* racemis lateralibus secundis, caule erecto.

Tcuerium Scorodonia. Sp. Pl. 789. Huds. 248.

With. 518. Relb. 220. Sibth. 180. Curt.

Lond. fasc. 5. t. 40. Fl. Dan. t. 485.

Scorodonia. Cord. Hist. 91. 1. Rivin. Irr. Mon.
t. 12.

S. seu *Salvia agrestis. Raii Syn. 245. Ger. em.*
662.

Scordion alterum Plinii. Lob. Ic. 497.

Salvia sylvestris. Trag. Hist 15.

Angl. Wood Germander. Wood Sage.

In sylvis, dumetis, et ericetis.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules sesquipedales, tetragoni, pilosi, foliosi, paniculato-racemosi. Folia opposita, rugosa, ferrata, pilosa, subglutinosa, graveolentia, amara. Flores pedicellati, secundi, flavi, staminibus violaceis.

Scordi- 2. *TEUCRIUM* foliis oblongis sessilibus dentato-
um. ferratis, floribus axillaribus geminis peduncu-
latis, caule diffuso.

Tcuerium Scordium. Sp. Pl. 790. Huds. 247.

With. 519. Relb. 219. Sibth. 180. Woodv.

Med. Bot. t. 57. Fl. Dan. t. 593.

Scordium.

Scordium. *Raii Syn.* 246. *Ger. em.* 661. *Fuchs.*

Hist. 776. *Rivin. Irr. Mon.* t. 11.

Scordium, herba. *Pharmac. Lond.*

Angl. Water Germander.

In palustribus.

In the Isle of Ely plentifully. *Ray.* In several places about Cambridge. *Relb.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrofa. Caules procumbentes, parùm ramosi, quadranguli, fulcati, pilosi, foliosi. Folia sessilia, elliptico-oblonga, dentato-ferrata, subvillosa. Flores axillares, utrinque sàepius gemini, purpurei, calyce villoso.

3. **TEUCRIUM** foliis subovatis petiolatis inciso-*Chamæ-*
crenatis, floribus axillaribus pedunculatis ter-*drys.*
nis, caule tereti piloso.

Teucrium Chamædrys. *Sp. Pl.* 790. *Huds.* 247.
With. 518. *Sibth.* 179. *Abbot.* 125. *Woodv.*
Suppl. t. 243.

Chamædrys. *Tourn. Inst.* t. 97. *Rivin. Irr.*
Mon. t. 10. f. 2. *Cord. Hist.* 126.

C. vera mas. *Fuchs. Hist.* 869.

C. major latifolia. *Ger. em.* 656.

C. vulgaris seu sativa. *Raii Syn.* 231.

Angl. Wall Germander.

In muris antiquis.

On the ruins of Winchelsea castle. *Sherard.* On the walls of Norwich near Magdalen gates.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules erectiusculi, ramosi, teretes, foliosi, pilosi. Folia subovata, incisa, crenata, pilosa, basi attenuata. Flores axillares, utrinque subterni, purpurei, calyce piloso.

260. NEPETA. G. Pl. 289. Juss. 113.

Corolla labium inferius lacinula intermedia cre-
natâ : faux margine reflexo. *Stamina* ap-
proximata.

cataria. 1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedi-
cellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-
serratis.

Nepeta cataria. Sp. Pl. 796. Huds. 249. With.
519. Relb. 221. Sibth. 181. Engl. Bot.
t. 137. Fl. Dan. t. 580.

N. major vulgaris. Raii Syn. 237.

Nepeta. Rivin. Irr. Mon. t. 52.

Mentha felina, seu Cattaria. Ger. em. 682.

Herba Gattaria. Matth. Valgr. v. 2. 79.
Angl. Nép, or Cat-mint.

In aggeribus sepium, imprimis solo calcareo.

Perennis. Fl. Julio.

Herba mollissimè tomentosa, incana, odore aromatico,
pungente, felibus gratissimo. Caulis tripedalis, erectus,
tetragonous. Folia petiolata, deflexo-patentia, cordata,
acuta, æqualiter serrata, rugosa. Spica obtusa, verti-
cillata, multiflora; florum fasciculis inferioribus pe-
dunculatis, foliolosis. Calyx nervosus, dentibus seta-
ceis, subæqualibus. Corolla alba, labio rubicundo,
panctato.

261. VERBENA. G. Pl. 14. Juss. 109.
Gærtn. t. 66.

Cor. infundibuliformis, subæqualis, curva. *Ca-*
lycis unico dente truncato. *Stamina* 2 five 4.
Semina 2 five 4, tenuissimè arillata.

officina- 1. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus pani-
culatis, foliis multifido-laciatiis, caule sub-
solitario.

- Verbena officinalis.* *Sp. Pl.* 29. *Huds.* 249.
With. 520. *Relb.* 221. *Sibth.* 181. *Ab-*
bot. 127. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t. 41.* *Fl. Dan.*
t. 628. *Woodv. Suppl. t. 218.* *Dreves. Bil-*
derb. *t. 45.*
- V. vulgaris.* *Raii Syn.* 236.
- V. communis.* *Ger. em.* 718.
- V. mascula.* *Brunf. Hist.* *v. 1.* 119.
- Verbena.* *Rivin. Irr. Mon.* *t. 56.*
- Verbenaca.* *Matth. Valgr.* *v. 2.* 399.
- Angl.* Common Vervain.

In pascuis, ruderatis, et ad vias.

Perennis. Fl. Julio.

Radix lignosa, ramosa. Caules sparsi, saepe solitarii, erecti, aculeis sparsis scabri, basi curvati. Folia petiolata, lyrate-pinnatifida, incisa, crenata, scabriuscula. Spicæ terminales, paniculatæ, filiformes, multifloræ. Flores parvi, pallide purpurei. Corolla fauce coarctatâ. Stamina brevissima, tubo inserta, inclusa, quorum duo superiora.

262. MENTHA. *G. Pl.* 291. *Juss.* 113.

Cor. subæqualis, quadrifida; laciñiâ latiore emarginatâ. *Cal.* quinquefidus. *Stam.* erecta, distantia.

ii. MENTHA spicis villosis subcontinuis, foliis *sylvestris*, dentato-ferratis subtùs præcipue tomentosis, *tris-* braœteis subulatis.

Mentha sylvestris. *Tr. of Linn. Soc.* *v. 5.* 179.
With. 521. *Relb.* 222.

z, foliis lanceolatis, acutis.

M. sylvestris. *Sp. Pl.* 804. *Huds.* 250, α .
Hull. 125.

M. spicata β , longifolia. *Sp. Pl. ed.* 1. 576.

M. spicata α , longifolia. *Gouan. Hort.* 279.
M. lon-

M. longisolia. *Huds. ed. 1.* 221. *Herb. Rose,*

M. villosa prima. *Sole Menth. 3. t. 1.*

M. n. 227. *Hall. Hist. v. 1.* 99.

M. n. 1. *Hort. Cliff. 306.* *Herb. Cliff.*

M. sylvestris, longiore folio. *Baub. Pin. 227.*

Menthastrum. *Dod. Pempt. 96.* *Ger. em. 684.*

M. spicatum, folio longiore candicante. *Raii*

Syn. 234. *Baub. Hist. v. 3. p. 2.* 221.

β, foliis ovatis, acutis.

Mentha sylvestris. *Fl. Dan. t. 484.*

M. villosa secunda. *Sole Menth. 5. t. 2.*

M. villosa. *Hull. 126.*

Menthastrum. *Riv. Monop. Irr. t. 51. f. 1.*

Fuchs. Hist. 292. *Camer. Epit. 479.*

γ, foliis brevioribus, spicis obtusioribus.

Mentha candicans, foliis spicis et odore vulgari
sativæ similis. *Doody in Raii Syn. ed. 2.* 341.
Herb. Bobart.

δ, foliis ellipticis, latis, obtusis.

M. rotundifolia. *Sole Menth. 9. t. 4.*

M. alopecuroides. *Hull. 126.*

M. sylvestris, rotundiore folio. *Baub. Pin. 227.*
ex side Herb. Baub. *Haller.*

M. hortensis secunda. *Fuchs. Hist. 289.*

Menthastrum sylvestre foliis latis. *Hort. Est.*
Est. ord. 7. t. 3. f. 2.

Angl. Horse Mint.

In ruderatis humidiuseculis.

γ. Plentiful in Kent. *Rand. Buddle.* δ. In Kent
and Felix, but rare. *Sole.* Eleven miles from
Norwich in the road to Hingham. *Mr. Crowe.*
At Thorpe near Norwich, and in other parts of
Norfolk.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Radix repens, ut in omnibus hujus generis. Caules sub-
tripedales,

tripedales, ercti, foliosi, quadranguli, villosi, pilis deflexis. Folia opposita, sessilia, dentato-ferrata, venosa, suprà incana, subtùs villosa, figurâ et latitudine varia. Spicæ terminales, paniculatæ, acutiusculæ, villosæ, densæ, multifloræ. Pedicelli verticillati, fasciculati, hirti, pilis arctè deflexis; verticillis inferioribus remotiusculis. Bractæ subulatæ, villosæ, floribus duplò longiores; inferiores latiores. Calyx parvus, undique hirtus, dentibus setaccis, tubo longioribus. Corolla calyce duplò longior, incarnato-purpurea, extùs hirsuta. Stamina plerumque inclusa. Odor totius herbæ aromaticus, acris, parùm gratus.

2. MENTHA spicis subhirsutis interruptis, foliis *rotundi-*
ellipticis obtusis rugosis crenatis subtùs villo- *folia.*
fis, bracteis lanceolatis.

Mentha rotundifolia. *Sp. Pl.* 805. *Tr. of Linn.*
Soc. v. 5. 183. Hudſ. 251. Witb. 522.
Hull. 126. Engl. Bot. t. 446.

M. crispa. *Sp. Pl. ed. 1. 576.*

M. sylvestris. *Sole Menth. 7. t. 3.*

M. n. 226. *Hall. Hist. v. 1. 99.*

Menthastrum anglicum. *Riv. Monop. Irr. t. 51.*
f. 2.

M. folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore
spicato, odore gravi. *Raii Syn. 234. Herb.*
Buddle. Baub. Hist. v. 3. p. 2. 219.

Mentastrum. *Tabern. Krauterb. 729.*

β. Menthastrum niveum Anglicum. *Ger. em. 684.*
M. spicatum, folio crispo rotundiore, colorc
partim albo, partim cinereo vel virente.
Baub. Hist. v. 3. p. 2. 219.

M. cinereum vel niveum Anglicum, variegatis
foliis. *Hort. Eyst. Aest. ord. 7. t. 3. f. 2.*
Angl. Round-leaved Mint.

In ruderatis humidis et paludosis, rariùs.

By the river side at Lydbrook near Ross, Here-
fordshire,

fordshire, also in Essex. *Ray*. Near Hally, Kent, plentifully. *Doody*. On the edge of an old moat at Shingham, Norfolk. *Rev. Mr. Forby*.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Caules 2—3-pedales, erecti, pilosi seu villosi, pilis sub-deflexis. Folia sessilia, elliptico-subrotunda, acutè crenata, rugosa, suprà subpilosa, subtùs villosa; inferiora elliptico-oblonga; superiora minora, inciso-serrata. Spicæ paniculatæ, obtusiusculæ, hirsutæ, interruptæ, verticillis ferè omnibus remotiusculis. Bracteæ lanceolatae, hirsutæ, floribus duplò longiores, sæpiùs deflexæ; inferiores ovatæ. Pili pedicellorum deflexi. Calyx parvus, campanulatus, undique hirtus, dentibus lancicolatis longitudine tubi. Corolla ferè prioris. Stamina exserta. Odor acris, peculiaris, et ingratus. Herba subviscida, minus incana.

- viridis*. 3. *MENTHA* spicis interruptis, foliis sessilibus lanceolatis acutis nudis, bracteis setaceis dentibusque calycinis subhirsutis.
- Mentha viridis*. *Sp. Pl.* 804. *Tr. of Linn. Soc.* v. 5. 185. *Huds.* 250. *With.* 521. *Hull.* 126. *Woodv. Med. Bot.* t. 170. *Sole Menth.* 11. t. 5.
- M. spicata* α , *viridis*. *Sp. Pl. ed.* 1. 576.
- M. n.* 229. *Hall. Hist.* v. 1. 100.
- Mentha*. *Camer. Epit.* 477.
- M. romana officinarum*, sive præstantior angustifolia. *Lob. Ic.* 507. *Herb. Buddl.*
- M. romana*. *Ger. em.* 680.
- M. hortensis* tertia. *Fuchs. Hist.* 290.
- β . *M. angustifolia* spicata. *Raii Syn. ed.* 1. 79.
- M. angustifolia* spicata glabra, folio rugosiore, odore graviore. *Raii Syn. ed.* 2. 123. *ed.* 3. 233. *Herb. Sherard.*
- M. spicata nostras*, cardiacæ sativæ formâ et odore æmula, folio rugosiore. *Pluk. Mant.* 129.
- γ . *M. spi-*

γ : M. spicata angustifolia glabra, spicâ latiore. *Dill.*
in Raii Syn. 233. Dale in Herb. Sherard.

M. sylvestris, longioribus, nigroribus, et minus
incanis foliis: *Bauh. Pin. 227. Sherard.*

δ . M. spicata glabra, latiore folio. *Dill. in Raii Syn.*
234. Dale in Herb. Sherard.

Mentha sativa, herba. Pharmac: Lond:
Angl. Spear Mint.

In palustribus.

Near Exmouth, Devonshire, and on the banks of
the Thames. *Huds. Somersetshire. Sole.*

β . By the river fide at Bocking, Essex. *Dale.* On
the river Medway near Maidstone, Kent. *Pluk-*
net. At Babergh near Norwich. *Mr. Pitchford.*

γ . In a meadow at Bocking, Essex. *Dill.* and *Dale.*

δ . In a meadow by Manwood bridge, on the right
hand of the road from Mersey-island to Col-
chester. *Dill.* and *Dale.*

Perennis. Fl. Augusto.

Caules 2—3-pedales; èrecti, glabri, acutanguli; ramosi,
sæpè purpurascentes. Folia sessilia, lanceolata, acuta,
ferrata, glabra, quandoque subtus subhirsuta; in β , γ
et δ latiora et breviora, magisque aliquantulum rugosa.
Spicæ paucilatæ, elongatæ, acutæ, verticillæ ferè om-
nibus remotiusculis. Bractæ setaceæ; floribus duplo
longiores, magis vel minus ciliatæ; inferiores subinde
lanceolatæ. Pedicelli omnino glabri. Calyx gracilis,
fulcatus, in α glaber, in β , γ et δ dentibus ciliatis, pilis
longitudine variis. Corolla græcilis; pupurea; glabra.
Stamina longitudine varia. Herba aromatica, aeris et
calida, nec ingrata.

Hæc species diognoscitur pedicellis sempèr glaberrimis.
Dentiūm calycinorum atque bracteārum ciliæ in β et δ
breviores, in γ longiores et copiosiores sunt.

4. MENTHÀ spicis obtusis infernè interruptis, *piperitis.*
foliis petiolatis subovatis glabriusculis, calyce
basi glaberrimo.

Mentha piperita. *Tr. of Linn. Soc. v. 5.* 189,
nec Linn.

α, foliis ovato-lanceolatis, spicis elongatis.

M. piperita. *Huds.* 251. *With.* 523, var. 2.
Woodv. Med. Bot. t. 169.

M. piperita officinalis. *Sole Menth.* 15. t. 7.

M. officinalis. *Hull.* 127.

M. aquatica nigricans, servido sapore. *Herb.*
Buddl.

Eales' Pepper-mint. *Pet. H. Brit.* t. 31. f. 10.

Mentha piperitis, herba. *Pharmac. Lond.*

β, foliis ovatis, spicis abbreviatis, scè capitatis.

M. piperita. *Hull.* 127.

M. piperita vulgaris. *Sole Menth.* 19. t. 8.

M. spicis brevioribus et habitioribus, foliis Men-
thæ fuscæ, sapore servido Piperis. *Raii Syn.*
ed. 2. 124. *ed. 3.* 234. t. 10. f. 2.

M. servida nigricans, breviore folio et spicâ.
Herb. Sherard.

M. aquatica sive Sisymbrium. *Bauh. Hist.* v. 3.
p. 2. 223?

γ, foliis cordato-ovatis, spicis acutioribus.

M. piperita sylvestris. *Sole Menth.* 53. t. 24.

M. hircina. *Hull.* 127.

Angl. Pepper Mint.

In aquosis.

α. In Hertfordshire. *Dr. Eales.* In a swampy
place on Lansdown, near Bath, called the Wells;
also by the side of the Avon in Newton mead.
Mr. Sole. In a rivulet in Bonsall dale near
Matlock.

β. In Essex. *Dale.* By Wandsworth river. *Herb.*
Sherard. About Bath, and between Wells and
Glastenbury; also in Chiltern-bottom, Wilts.
Mr. Sole.

γ . At Lyncomb Spa, and various other wet places about Bath. *Mr. Sole.* In a little peninsula at the south-west corner of Saham meer near Watton, Norfolk.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Caules erectiusculi, 2—3-pedales, in γ 4-pedales, ramosi, purpurascentes, subhirsuti, pilis recurvis. Folia omnia petiolata, ovata, acutiuscula, ferrata, atro-viridia; suprà glabriuscula; subtùs pallidiora et hirsutiora, venis albidis vel purpurascensibus: in α angustiora, et ferè lanceolata; in β breviora et subelliptica; in γ latiora, cordato-ovata, sæpiùs glabra. Spicæ terminales, solitariæ, obtusifuscæ, infernè interruptæ, verticillo infimo, in α et γ , remotissimo, pedunculato; in β abbreviatæ, obtusiores et ferè capitatae. Bracteæ lanceolatæ, ciliatæ. Pedicelli vel omnino glabri, vel supernè hirsuti, pilis rarís, recurvis. Calyx gracilis, sulcatus, glandulosopunctatus; basi omnino denudatus, nitidus, et glaberrimus; dentibus atro-purpureis, ciliatis; quandoque in γ apicem versus undique hirsutus, pilis adscendentibus. Corolla purpurascens. Stamina inclusa.

Odor pungens, subcamphoratus, gratissimus. Sapor aromaticus, fervidus, demum refrigerans, amaricans; in γ virosus et ingratus.

5. MENTHA spicis capitatis obtusissimis, foliis *odorata*.
petiolatis cordatis utrinque nudis, calyce pedicellisque undique glaberrimis.

Mentha odorata. *Sole Menth.* 21. t. 9. *Tr. of Linn. Soc.* v. 5. 192.

M. rubra. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 9. descr. erronea.

M. rotundifolia rubra, aurantii odore, (rotundifolia spicata altera C. B.) *Moris.* v. 3. 369.
sect. 11. t. 6. f. 3, glabra.

Angl. Bergamot Mint.

In aquosis rariis.

Very common by the sides of rivers and brooks in
N. 2 Cheshire,

Cheshire, especially about Ashton house; Mrs. Walmesley: also in a small brook or ditch near Capel-Carey, between Llanroost and Llanberis, North Wales. *Mr. Sole.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba undique glaberrima, rubicunda, odore suavi, aromatico, ferè Monardæ didymæ. Caules bipedales, erecti, ramosissimi, patuli. Folia petiolata, latè cordata, obtusifuscula, ferrata. Spicæ terminales, brevissimæ, ferè hemisphæricæ, densæ, verticillo insimo remoto, axillari, subpedunculato. Bracteæ setaceæ, omnino glabræ. Pedicelli teretes, glaberrimi, atro-purpurei. Calyx gracilis, sulcatus, glanduloso-punctatus, atro-purpureus, tubo dentibusque omnino glaberrimus. Stamina inclusa.

Distinctissima à *M. aquatica* Linnæi, quæ sequentis varietas est.

hirsuta. 6. *MENTHA* floribus capitatis verticillatisve, foliis petiolatis ovatis, calyce undique hirsuto, pedicellis retrorsum hispidis:

Mentha hirsuta. *Tr. of Linn. Soc.* v. 5. 193.

M. sativa. *Tr. of Linn. Soc.* v. 5. 199.

α. *M. hirsuta.* *Mant.* 81. *With.* 522. *Huds.* ed. 1. 223. *Hull.* 127. *Abbot.* 127. *Engl. Bot.* t. 447.

M. aquatica. *Huds.* 252, α et β. *Hull.* 127. *Relb.* 223. *Sibth.* 182. *Abbot.* 127.

M. aquatica major. *Sole Menth.* 25. t. 11.

M. aquatica minor. *Sole Menth.* 23. t. 10.

M. aquatica sive *Sisymbrium.* *How. Phyt.* 74. *Merr. Pin.* 76. *Raii Syn.* 233. *Ger. em.* 684.

M. aquatica sive *Sisymbrium hirsutius.* *Bauh.* *Hist.* v. 3. p. 2. 224.

M. rotundifolia palustris. *Moris. sect.* 11. t. 7. f. 6.

M. palustris spicata. *Riv. Monop.* *Irr.* t. 49.

M. n. 4.

M. n. 4. *Hort. Cliff.* 306.

Sisymbrium hirsutum. *Raii Syn.* 233.

S. hirsutum, folio angustiore et acutiore, minimè ramosum; D. Rand. *Herb. Buddl.*

S. sylvestre. *Dalech. Hist.* 677.

Origanum vulgare. *Fl. Dan.* t. 638!

β. *Mentha Sisymbrium* dicta *hirsuta*, *glomerulis ac foliis minoribus ac rotundioribus.* *Dill. in Raii Syn.* 233. t. 10. f. 1.

γ. *M. piperita.* *Sp. Pl.* 805. *Berg. Mat. Med.* 516.

δ. *M. palustris.* *Sole Menth.* 13. t. 6.

M. aquatica. *Mill. Diet. ed.* 8. n. 5.

M. aquatica, folio oblongo viridi glabro, saporis fervidissimi. *Herb. Buddl. et Herb. Bobart.*

Menthastrum aquatici genus *hirsutum*, spicâ latiore, *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2. 222. *Raii Syn.* 234.

Menthastrum minus spicatum *Lobelii.* *Dalech. Hist.* 674. *How. Phyt.* 74.

M. minus. *Ger. em.* 685.

Calamintha *tertia* *Dioscoridis*, *menthastrifolia aquatica hirsuta.* *Lob. Ic.* 510. *Dill. in Herb. Sherard.*

ε. *Mentha paludosa.* *Sole Menth.* 49. t. 22.

ζ. *M. sativa.* *Sp. Pl.* 805, exclusis synonymis, *Huds.* 253. *Engl. Bot.* t. 448.

M. verticillata. *Syst. Nat. ed.* 10. 1099. *Huds. ed.* 1. 222.

M. rivalis β, γ et δ, nec α. *Sole Menth.* 45.

M. verticillatæ varictas, *hirsutiæ* foliorum discrepans. *Raii Syn. ed.* 2. 124. 6. *ed.* 3. 232. *Herb. Bobart.*

M. Sisymbriæ facie et odore, *hirsuta* et *verticillata*; D. Rand. *Herb. Buddl.*

Calamentha arvensi *verticillatæ* similis, sed multò elatior. *Herb. Buddl.*

- η . *Mentha aquatica verticillata glabra, rotundiore folio.* *Dill. in Herb. Sherard.*
- ϑ . *M. verticillata minima, odore fragrantissimo.* *Herb. Buddl.* Sub *M. aquaticâ exiguâ*, *Dill. in Raii Syn. 232.*
Angl. Hairy Mint.
- In aquosis vulgaris.
- β . In the parish of East Borne, Sussex, in the road to Pevensey. *Dill.*
- γ . A native of England. *Herb. Banks.*
- δ . Near Bocking. *Dale.* Somersetshire. *Mr. Sole.* On the south-west shore of Saham meer, Norfolk.
- ε . In Holt fen at Streatham near Ely; also in a rivulet by the side of Awdry causeway, near Hadingham in the Isle of Ely. *Mr. Sole.*
- ζ . About rivulets on the side of Shotover hill near Oxford; Mr. Tilleman Bobart. *Herb. Bobart.* On the banks of the river Lca near Hackney. *Mr. E. Forster.* At Saham and Ashill in Norfolk; also eleven miles from Norwich in the Hingham road, and in many other places.
- η . In a ditch on the left hand of Chalk's green, going from Braintree to Leez house. *Dill.*
- ϑ . Found by Mr. Buddle and Mr. F. Dale sen. by the side of the new-river near the upper end of Stoke Newington. *Herb. Sherard.* On Skoulton common near Hingham, Norfolk, but with only the usual smell of the species.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Planta polymorpha, magis vel minus hirsuta, sæpè purpurascens, odore variabili, plerumque acri et aromatico, subinde camphorato, interdùm suavi. Caules erexit, sæpius ramosi. Folia petiolata, ovata, ferrata, magnitudine varia. Flores in α , β , et γ capitati; in δ spicati vel capitati; in ϵ spicato-verticillati; in reliquis verticillati,

cillati, axillares. Bracteæ sæpiùs lanceolatæ, hirsutæ. Pedicelli undique hirsutissimi, pilis reflexis, albis, subinde arctè depresso. Calyx tubulosus, sulcatus, purpurascens, glanduloso-punctatus, undique hirsutus, pilis fursùm curvatis, longitudine variis. Corolla dilutè purpurascens, extùs hirsuta. Stamina longitudine varia. Verticilli inferiores sæpiùs pedunculati.

7. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovato-*acutifo-*
lanceolatis utrinque acutis, calyce undique *lia*.
hirsuto, pilis pedicellorum patentibus.

Mentha acutifolia. Tr. of Linn. Soc. v. 5. 203.

M. verticillata. Mill. Diet. ed. 8. n. 17. Herb.
Miller.

M. verticillata aromatica, folio longiore et acu-
tiore. Rand. Mss.

M. aquatica verticillata odoris grati. Herb.
Buddle.

Angl. Fragrant Sharp-leaved Mint.

Ad fluviorum margines rariùs.

On the river Medway, Kent. *Rand.* Between
Rochester and Chatham. *Miller.*

Perennis. Fl. Septembri?

Herba hirsuta, odore suavi, aromatico. Caules erecti, bipedales, subsimplices, pilis arctè deflexis. Folia breviùs petiolata, patentia, ovato-lanceolata, utrinque acuta, inæqualitè et acutè serrata, basi apiceque integerima. Verticilli numerosi, omnes sessiles, denfi, petiolis ferè æquales, multiflori. Bracteæ linear-lanceolatæ, vel subulatae. Pedicelli hispidi, pilis horizontaliter patentibus, longitudine variis, subinde recurvatis. Calyx tubulosus, undique hirsutus, imprimis ad basin, pilis adscendentibus. Corolla extùs fauceque pilosa. Stamina inclusa.

Præcedenti valdè affinis.

8. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis, *rubra.*

N 4

caule

- caule erecto flexuoso, pedicellis calycibusque
glaberrimis; dentibus hirsutis.
Mentha rubra. *Tr. of Linn. Soc. v. 5. 205.*
M. sativa. *Sole Menth. 47. t. 24.*
M. verticillata. *Raii Syn. 232. Riv. Monop.*
Irr. t. 48. f. 1?
M. crispa. *Hort. Eyſt. Aſt. ord. 7. t. 5. f. 1.*
M. crispa verticillata. *Bauh. Pin. 227. Moris.*
ſect. 11. t. 7. f. 2. Herb. Bobart.
M. crispa verticillata, folio rotundiore. *Bauh.*
Hift. v. 3. p. 2. 215. Raii Syn. ed. 2. 124,
Herb. Buddl. et Herb. Sherard.
M. prima. *Dod. Pempt. 95.*
M. sativa rubra. *Ger. em. 680.*
M. cruciata. *Lob. Ic. 507.*
Menta. *Brunf. Herb. v. 2. 76.*
Angl. Tall Red Mint.

In fossis et ad fluviorum margines.

By Hackney river at the ferry-house. *Herb. Sherard.* Peckham fields. *Dill.* North Wales and Shropshire. *Mr. Sole.* By the road side between Edmonton and Enfield; also near Walthamstow. *Mr. E. Forster.* Under a wet hedge in the road from Watton to Saham church, Norfolk.

Perennis. Fl. Septembri.

Herba glabriuscula, odore forti congenerum. Caulis
4—6-pedalis, erectus, flexuosus, parum ramosus, rubi-
cundus, glaber. Folia petiolata, latè ovata, inciso-fer-
rata, saturatè viridia, lucida; subtùs pallidiora, venis
subhirsutis: superiora minorà, breviora et subrotunda,
interdùm crispa. Verticilli numerosi, pedunculati, mul-
tiliori. Bracteæ linearis-lanceolatæ, apice subciliatæ;
interiores setaceæ. Pedicelli teretes, purpurei, lucidi,
glaberrimi. Calyx tubuloso-campanulatus, resinoso-
punctatus, glaberrimus, dentibus ciliatis, quandoque
dorsig

dorso hirsutis. Corolla majuscula, purpurea, glabra, resinoso-punctata. Stamina longitudine varia.

9. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis, *gentilis*, caule ramosissimo patulo, calycibus basi pedicellisque glabris.

Mentha gentilis. *Sp. Pl.* 805. *Tr. of Linn.*
Soc. v. 5. 208.

M. rubra. *Sole Menth.* 41. t. 18.

β. M. rivalis α. *Sole Menth.* 45. t. 20.

γ. M. variegata. *Sole Menth.* 43. t. 19.

M. arvensis verticillata versicolor. *Morris. sec.*
11. t. 7. f. 5. *Herb. Buddl.*

M. crispa verticillata. *Herb. Cliffort.*

Angl. Bushy Red Mint.

In aquosis et ruderatis rariūs.

α. In pools and brooks between Mole and Llanroost, North Wales. *Mr. Sole.*

β. In Lock's brook between Weston and Twerton, Somersetshire. *Mr. Sole.*

γ. About towns, but scarcely to be found truly wild.

Perennis. Fl. Augusto.

Herba subhirsuta, in solo sicciorē grātē aromaticā. Cau-
lis erectus, pedalis, in β tripedalis, scaber, ramosissimus,
ramis elongatis, patentibus. Folia petiolata, ovata,
obtusiuscula, serrata, lātē viridia, utrinque subhirsuta,
pilis sparsis, brevibus, venis subtūs albidis, omnia ferē
conformia; in β longiora et subelliptica; in γ luteo
variata. Verticilli subsessiles, multiflori; in γ interdūm
longiūs pedunculati. Bracteæ lanceolatæ, magnitu-
dine variæ. Pedicelli teretes, purpurei, saepiūs glaber-
rīni; in γ interdūm, sed rarissimè, parūm hirsuti,
pilis deflexis. Calyx tubuloso-campanulatus, superne
hirsutus, pilis adscendentibus; basi glaber; undique
resinoso.

resinosa-punctatus. Corolla pallidè purpurascens. Stamina inclusa.

gracilis. 10. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolatis subsessilibus, caule ramosissimo erecto, calycibus basi pedicellisque glaberrimis.

Mentha gracilis. *Tr. of Linn. Soc.* v. 5. 210.

α. M. gracilis. *Sole Menth.* 37. t. 16. *Hull.* 129.

M. gentilis. *Engl. Bot.* t. 449. *With.* 524.

M. rubra. *Huds.* 252.

M. fusca sive vulgaris. *Raii Syn.* 232. *Herb. Buddl.*

M. verticillata glabra, odore M. sativæ (viridis). *Herb. Sherard.*

Balsamita officinarum. *Hort. Eyst. Æst. ord.* 7. t. 3. f. 3.

β. Mentha pratenfis. *Sole Menth.* 39. t. 17. *Hull.* 129.

*γ. M. gentilis. *Sole Menth.* 35. t. 15.

M. hoertenfis verticillata, Ocymi odore. *Morris. sec.* 11. t. 7. f. 1. *Herb. Buddl.*

M. verticillata minor, acuta, non crispa, odore Ocymi. *Baub. Hist.* v. 3. p. 2. 216, ex descr.

M. cardiaca. *Ger. em.* 680, ex iconc.

Angl. Narrow-leaved Mint.

In aquosis, pratisve humidis.

α. At Bocking and Stoke Newington. *Herb. Sherard.* Near Walthamstow. *Mr. B. M. Forster.*

Near Bradford, Wilts. *Mr. Sole.* At Saham and Oxborough, Norfolk.

β. In the New Forest, Hants. *Mr. Sole.*

γ. Frequent in ditches and waste places near towns and villages, but scarcely wild. *Mr. Sole.*

Perennis.

Perennis. Fl. Augusto.

Herba subhirsuta. Caulis erectus, pedalis aut sesquipedalis, scaber, rubicundus, medio præcipue ranoſiſſimus. Folia ſubſeffilia, uniformia, lanceolata, acuta, ferrata, baſi angustata, lætē viridia, utrinque pilis brevibus ſubhirsuta; in β deflexa. Verticilli multiflori, ſæpius ſeffiles, interdūm pedunculati. Bracteæ lanceolatae, hirsutæ. Pedicelli teretes, purpurei, omnino glaberrimi. Calyx tubuloſo-campanulatus, purpureus, refinoſo-punctatus; baſi glaberrimus; apice dentibusque hirsutus, pilis albis, erectis. Corolla purpurea, apice barbata. Stamina inclufa.

α gaudet odore M. viridis, β M. piperitæ; γ Ocymum redolet.

ii. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis, *arvensis*. caule ramoſiſſimo, calycibus campanulatis undique hirsutis pilis horizontalibus.

Mentha arvensis. Sp. Pl. 806. Tr. of Linn.

Soc. v. 5. 213. Huds. 253. With. 524.

Hull. 128. Relb. 224. Sibth. 182. Abbot.

127. Sole Menth. 29. t. 12. Fl. Dan. t. 512.

M. n. 5. Hort. Cliff. 307. Herb. Cliff.

M. verticillata hortensis, odore Ocymi C.B. Pin.

Herb. Cliff. nec Bauhini.

M. aquatica. Raii Syn. ed. 1. 78.

M. seu Calamintha aquatica. Raii Syn. ed. 2.

123. ed. 3. 232.

M. arvensis verticillata procumbens. Moris.

ſect. ii. t. 7. f. 5.

Calamintha aquatica. Ger. em. 684. How. Phyt.

18. Merr. Pin. 18.

β . Mentha arvensis major, verticillis et floribus amplis, foliis latioribus, staminibus corollâ longioribus, odore grato. Sole Menth. 29, γ .

γ . M. præcox. Sole Menth 31. t. 13. Hull. 128.

δ . M. gentilis. Mill. Dic^t. ed. 8. n. 15. Herb. Mill.

M. ver-

M. verticillata, rotundiore folio, odore Ocyti.
S. Dale Mss.

M. verticillata glabra, foliis ex rotunditate acuminatis, Buddle. *Herb. Buddl.* et *Herb. Babant.*

M. arvensis verticillata, folio rotundiore, odore aromatico. *Raii Syn. ed. 2. 123?* *ed. 3. 232?*

ε. M. agrestis. *Sole Menth. 33. t. 14.*
Angl. Corn Mint.

In arvis inundatis, præcipue arenosis, frequens.

γ. In moist meadows. *Mr. Sole.*

δ. On the right hand of the road from Bocking to Gossfield, Essex. *Dale.* At Shelford, Cambridgeshire; Mr. Wigmores, *Ray?*

ε. Common in corn-fields and neglected gardens about Mendip hills, Shepton-Mallet, and Frome, Somersetshire. *Mr. Sole.*

Perennis. Fl. Junio—Septembri.

Herba magis vel minus pilosa, pallida, odore fortis, siuepius peculiariter ingrato. Caulis ramosissimus, plerumque diffusus; in γ et ε erectus. Folia petiolata, ovata, seu elliptico-ovata, obtusiuscula, varie ferrata; in ε rugosa, et ferè eordata. Verticilli multiflori, subsessiles. Bracteæ lanceolatae, subtilis hirsutæ. Pedicelli teretes, apice purpurascentes, saepè glaberrimi, interdum plus minus hirsuti, pilis sparsis, subreflexis, pedicelli apicem versus numerosioribus. Calyx brevis, campanulatus, obsoletius suleatus, resinoso-punctatus, undique pilosus, pilis horizontaliter patentibus. Corolla purpureo-caerulea, extus pilosa. Stamina in α et β exserta, in γ, δ, et ε, inclusa.

Dignoscitur calyce brevi, campanulato, pilis horizontaliter patentibus,

Pulegi- 12. *MENTHA* floribus verticillatis, foliis ovatis, caule prostrato, pedicellis calycibusque undique tomentosis: dentibus ciliatis.

Mentha

Mentha Pulegium. *Sp. Pl.* 807. *Tr. of Linn.*
Soc. v. 5. 216. *Huds.* 254. *With.* 525. *Hull.* 130.
Relb. 224. *Sibth.* 182. *Woodv. Med. Bot.*
t. 171. *Sole Menth.* 51. *t. 23.*
Pulegium. *Raii Syn.* 235. *How. Phyt.* 99.
Merr. Pin. 99. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2. 256.
Fuchs. Hist. 198. *Riv. Monop. Irr.* t. 23. f. 1.
Brunf. Herb. v. 1. 227.
P. regium. *Ger. em.* 671.
Pulegium, herba, flos. *Pharmac. Lond.*
Angl. Penny-royal.

In ericetis inundatis et pascuis irriguis.

Perennis. Fl. Septembri.

Herba præcedentibus longè minor, odore acri, aromatico.
 Caules prostrati, ramosissimi, repentes, pilosi, angulis obtusiusculis. Folia parva, petiolata, ovata, obtusa, crenato-serrata, subtùs præcipue subhirsuta. Verticilli sessiles, pro foliorum ratione magui, numerosi, multiflori. Bracteæ nullæ. Pedicelli tomentoso-incani, seu pilis brevissimis, densissimis, undique tecti. Calyx tubulosus, gracilis, sulcatus, resinoso-punctatus, pilis densis, brevibus, porrectis, undique vestitus, dentibus ciliatis, acutis, inæqualibus, fauce villis albis, conniventibus, clausâ, ut in Thymo. Corolla calyce duplò longior, purpurea, basi alba, extùs villosissima, Stamina exserta.

Variat flore albo.

263. GLECHOMA. *G. Pl.* 291. *Juss.* 113.

Cal. quinquesfidus. Antheræ per paria in crucem conniventes.

1. **GLECHOMA** foliis reniformibus crenatis. *hederæ-*
Glechoma hederacea. *Sp. Pl.* 807. *Huds.* 254. *cea.*
With. 526. *Relb.* 225. *Sibth.* 183. *Curt.*
Lond. fasc. 2. *t. 44.* *Mart. Fl. Rust.* *t. 61.*
Woodv. Med. Bot. *t. 28.* *Fl. Dan.* *t. 789.*
Calæ-

Calamintha humilior, folio rotundiore. *Raii*
Syn. 243.

Hedera terrestris. *Ger. em. 856.* *Brunf. Hist. v. 1. 167.*

Chamæcissos. *Fuchs. Hist. 876.* *Trag. Hist. 799.*
Angl. Ground-Ivy. *Gill. Ale-hoof.*

In nemorosis et ad sepes ubique.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Herba pubescens, grātē aromaticā. Caules repentes, ramis floriferis erectis. Folia petiolata, cordato-reniformia, crenata, patentissima. Flores verticillati, utrinque sub-terni, cāerulei. Calyx striatus. Antheræ albæ.

264. LAMIUM. G. Pl. 292. Juss. 113.

Cal. quinquefidus, dentibus setaceis patentibus.

Cor. labium superius integrum, fornicatum; inferius bilobum; faux inflata, utrinque margine dentata.

album. 1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis petiolatis, verticillis vigintifloris.

Lamium album. Sp. Pl. 809. Huds. 255.

With. 526. Relb. 226. Sibth. 183. Curt.

Lond. fasc. 2. t. 45. Mart. Fl. Rust. t. 26.

Fl. Dan. t. 594. Raii Syn. 240. Ger. em. 702.

Angl. White Archangel. White Dead-nettle.

In ruderatis et ad vias paſſim.

Perennis. Fl. Maio, Junio; etiam Septembri.

Radix repens. Caules erecti. Folia subhirsuta, cordato-elongata, profundè ferrata. Flores verticillati, utrinque sub-deni, erecti, albi, galeâ villosâ, fauce utrinque bidentatâ. Antheræ nigræ. Calyx campanulatus, lævis, dentibus setaceis, ciliatis.

purpure- 2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis:
um. superioribus confertis.

Lamium

Lamium purpureum. *Sp. Pl.* 809. *Huds.* 255.

With. 527. *Rehb.* 226. *Sibth.* 183. *Curt.*

Lond. fasc. 1. *t.* 42. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 25.

Fl. Dan. *t.* 523. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 16. 20.

L. rubrum. *Raii Syn.* 240. *Ger. em.* 703.

3. *L. rubrum minus,* foliis profundè incisis. *Raii Syn.* 240. *Pluk. Phyt.* *t.* 41. *f.* 3.

L. dissectum. *With.* 527.

Red cut-leaved Archangel. *Pet. H. Brit.* *t.* 33.

f. 3.

γ. *Lamium rubrum,* foliis per ambitum nec serratis
nec crenatis; flore minore. *Prof. Mart. Mss.*
Angl. Red Archangel.

In ruderatis et cultis ubique.

γ. Near Sudbury. Mr. Joseph Andrews. *Martyn.*

Annua. Fl. Maio.

Radix fibrosa, tenax. Caules glabri, basi ramosi, medio nudi scutuli, apice dense foliosi. Folia cordata, subreniformia, obtusa, inæqualiter crenata; in β laciniata; in γ integerrima. Flores purpurei, interdum albi. Antheræ rubræ. Calycis dentes ciliati.

Varietas γ Lamio molli. *Ait. H. Kew.* maximè affinis est, sed differt foliis omnibus cordatis, nequaquam dentatis.

3. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaule. *caule.*

Lamium amplexicaule. *Sp. Pl.* 809. *Huds.* 255.

With. 527. *Rehb.* 226. *Sibth.* 184. *Curt.*

Lond. fasc. 2. *t.* 46. *Fl. Dan.* *t.* 752.

L. folio caulem ambientē majus et minus. *Raii Syn.* 240.

Alfine Hederula altera. *Ger. em.* 616.

Angl. Henbit Archangel. Great Henbit.

In arvis fabulosis.

Annua. Fl. Februario—Junio.

Habitus

Habitus præcedentis, sed folia superiora sessilia, amplexicaulia, rotundata, incisa et crenata, basi pallida. Flores pulcherrimè rosei; primordiales corollâ abortivâ. Calyx densè villosus.

265. GALEOPSIS. *G. Pl.* 292. *Juff.* 114.

Cal. quinquefidus, aristatus. *Cor.* labium superius crenatum, fornicatum; inferius supra bidentatum.

- Ladanum.* 1. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus, foliis lanceolatis subserratis hirtis, corollæ gæleæ obsoletè crenatâ.

Galeopsis Ladanum. *Sp. Pl.* 810. *Huds.* 256.
With. 528. *Rehb.* 227. *Sibth.* 184.

Ladanum segetum. *Riv. Monop. Irr.* t. 24. f. 3;
L. segetum flore rubro. *Bauh. Hist.* v. 3. 839.
Sideritis arvensis rubra. *Raii Syn.* 242.

Narrow Iron-Wort. *Pet. H. Brit.* t. 33. f. 11.

- β. Var. 2. *With.* 528, calyce lanato.
Angl. Red Hemp-Nettle.

In arvis siccioribus, præsertim solo calcareo.

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Radix tortuosa. Caulis pedalis, brachiatus, ramosissimus, hirsutus, pilis deflexis, geniculis supernè vix incrassatis. Folia petiolata, pateritia, laticeolata vel ovato-lanceolata, subserrata, interdum integerrima, lineata; supra hirsuta, pilis adpressis; subtus villosa. Flores verticillati, rosei, albo purpureoque picti. Calyx campanulatus, hirsutus, dentibus erectiuseulis, mucronato-pungentibus. Corollæ labium superius obsoletè et obtuse crenatum.

Exemplaria Linnæana a nostratis paullulam discrepant foliis latioribus, omnibus æqualiter serratis, ferè ut in sequente; dentibus calyciniis brevioribus; at nullam differentiam specificam inveni.

Variat flore terminali hypocraferiformi ut in *G. Tetral. St.*
D. Forby.

2. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus, *villoſa*, foliis ovato-lanceolatis serratis villosis, corollæ galeâ crenato-incisâ.

Galeopsis villosa. *Huds.* 256. *Relb.* 227. *Dicks.* *H. Sicc. fasc.* 10. 15.

G. grandiflora. *Gmel. Syst.* 905. *With.* 528.

Betonica hirta. *Huds. ed.* 1. 220. nec *Linn.*

Sideritis arvensis latifolia hirsuta lutea. *Raii Syn.* 242.

Ladanum segetum folio latiore. *Riv. Monop.* *Irr. t. 24. f. 2.*

Yellow Iron-Wort. *Pet. H. Brit.* t. 33. f. 10.

3. Cannabis spuria, flore albo magno, staminibus luteis. *Merr. Pin.* 19.

Angl. Downy Hemp-Nettle.

In arvis arenosis.

Frequent in Yorkshire and Lancashire; near Newark, Nottinghamshire; and about Bangor in Wales. *Huds.*

Annuo. Fl. Julio, Augusto.

Præcedentē major. Internodii caulinī omnino æquales.

Folia ovata, vel ovato-lanceolata, omnia æqualiter et regulariter serrata, lineata, sericea, subtus præcipue dense villosa. Calyx villosus, dentibus rectis, pungentibus. Corolla calyce quadruplicè longior, lutea, pallido saturatiore, labio superiore recto, acutè crenato vel inciso. Stamina flava.

3. GALEOPSIS caule hispidō: internodiis sū-*Tetrahit*, pernè incrassatis, corollâ calyce duplō longiore, galeâ rectiusculâ.

Galeopsis Tetrahit. *Sp. Pl.* 810. *Huds.* 257. *With.* 529. *Relb.* 228. *Sibth.* 184. *Engl. Bot.* t. 207.

Lamium cannabino folio vulgare. *Raii Syn.* 240.

Cannabis spuria. *Ger. em.* 709. *Riv. Monop.* ·
Irr. t. 31.
Angl. Common Hemp-Nettle.

In arvis frequens.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Caulis undique hispidus, setis pungentibus, subdesflexis, geniculis præcipue inferioribus supernè gibbosis. Folia ovata, acuta, serrata, utrinque hispida. Calyx hispidus, dentibus aculeato-pungentibus. Corolla calyce duplò circiter longior, tubo attenuato, albido; galea porrectâ, conveximculâ, creuatâ, purpureâ; labio inferiore trifido, albo purpureoque variato. Interdum corolla tota alba est.

Variat flore terminali regulari, quadrifido, hypocrateriformi, staminibus æqualibus; confer *Fl. Lapp.* ed. 2. 201.

*verfico-
lor.* 4. **GALEOPSIS** caule hispido: internodiis supernè incrassatis, corollâ calyce triplò longiore: galeâ ventricosâ.

Galeopsis verficolor. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t. 38.*
Engl. Bot. t. 667.

G. cannabina. *With.* 529. *Pollich. v.* 2. 148.
Fl. Dan. t. 929.

G. Tetrahit ♂. *Sp. Pl.* 810. *Lightf.* 310.
♂. *Huds.* 257.

Lamium cannabino folio, flore amplio luteo, labio purpureo. *Raii Syn.* 241.

L. cannabinum aculeatum, flore specioso luteo, labiis purpureis. *Phuk. Phyt.* *t. 41.* *f. 4.*

Cannabis spuria flore majore. *Riv. Monop. Irr.*
t. 32.

ξ. *Lamium cannabinum* floribus albis, verticillis purpurascensibus. *Raii Syn.* 241.

γ. *Cannabis* spuria flore albo magno eleganti. *Merr.*
Pin. 19. *Dill. in Raii Syn.* 240.

Angl.

Angl. Large-flowered Hemp-Nettle. Bee Nettle.

In arvis arenosis.

Not rare in the north of England. Plentiful near Norwich and at Watlington, Norfolk; also about Moffat and near Edinburgh. Observed by Sir T. G. Cullum at Gretna green very abundantly. At Ashill, Norfolk. *Rev. Mr. Watts.*

Annuæ. Fl. Julio, Augusto.

Habitus omnino præcedentis, sed foliis pallidioribus, latioribus. Corolla maxima, calyce triplò vel quadruplò longior, lutea, labio inferiore lineis fulvis picto, maculâque centrali violaceo; galea dilatata, ventricosâ, inciso-crenata.

Varietates ex descriptionibus in Raii Syn. hue retuli, nondum mihi obviæ sunt.

266. GALEOBDOLON. *Huds.* 257.

Galeopsis. *G. Pl.* 292. *Juss.* 114.

Cal. quinquefidus, inæqualis, aristatus. *Cor.* labium superius integerrimum, fornicatum; inferius trifidum, lacinias omnibus acutis.

1. GALEOBDOLON.

luteum.

Galeobdolon luteum. *Huds.* 258. *With.* 530. *Abbot.* 129.

G. *Galeopsis.* *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 40. *Rehb.* 228. *Sibth.* 185.

Galeopsis Galeobdolon. *Sp. Pl.* 810. *Dreves.* *Bilderb.* *t.* 20.

Lamium luteum. *Raii Syn.* 240. *Ger. em.* 702. *Riv. Monop. Irr.* *t.* 20. *f.* 2.

Yellow Archangel. *Pet. H. Brit.* *t.* 33. *f.* 6.

Angl. Yellow Dead-Nettle. Weasel-snout.

In umbrosis humidiusculis.

O 2

Perennis.

632 DIDYNAMIA—GYMNOSPERMIA.

Perennis. Fl. Maio.

Habitu et formâ omnino Lanium est, sed corollâ fauce integerrimâ, nec dentatâ, calyceque aristato, spinoso, diserepat. Radix subrepens. Caules erecti, simplices, foliosi, pilosi, pilis deflexis. Folia petiolata, ovata, sub-pilosa, inciso-ferrata, latitudine varia. Verticilli numerosi, multiiflori, bracteis linearibus, acutis. Calyx basi tubulosus, lavigatus; dentibus inæqualibus, patulis, pilosis. Corolla erecta, lutea, fauce rubro maculata.

267. BETONICA. G. Pl. 293. Juss. 114.

Cal. quinquefidus, aristatus. *Cor.* labium superius adscendens, planiusculum, inferius trifidum: tubus cylindricus.

officina- 1. BETONICA spicâ interruptâ, corollarum lacinia labii intermedîa emarginatâ.

Betonica officinalis. Sp. Pl. 810. Huds. 258.
With. 530. Relb. 229. Sibth. 185. Curt.
Lond. fasc. 3. t. 33. Fl. Dan. t. 726. Woodv.
Suppl. t. 241.

Betonica. Ruij Syn. 238. Ger. em. 714. Brunf.
Herb. v. 1. 88. Fuchs. Hist. 350.

Angl. Wood Betony.

In sylvis et dumetis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba tota setis rigidis, adpresso, scabra. Caules simplices. Folia cordato-oblonga, obtusa, latè ferrata; inferiora longè petiolata. Spica terminalis, obtusa, interrupta, foliolosa, bracteolata. Calyx lœvis, marginè setosus. Corolla purpurea, extùs villosa, rariùs alba.

268. STACHYS. G. Pl. 293. Juss. 114.

Cal. quinquefidus, aristatus. *Cor.* labium superius fornicateum; inferius lateribus reflexum;

lacinia intermedia major, emarginata. *Stamina* deflora*ta* versus latera reflexa.

1. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis *sylvatica*^{ca.} petiolatis.

Stachys sylvatica. *Sp. Pl.* 811. *Huds.* 259.
Witb. 531. *Relb.* 229. *Sibth.* 186. *Curt.*
Lond. fasc. 3. *t. 34.* *Engl. Bot.* *t. 416.* *Riv.*
Monop. Irr. *t. 26. f. 2.*

Galeopsis legitima *Dioscoridis.* *Raii Syn.* 237.
G. vera. *Ger. em.* 704.

2. Lamiu*m* sylvaticum spicatum foetidum, folio angulo*so*, minus. *Dill. in Raii Syn.* 237.

Angl. Hedge Woundwort.

In sepibus et nemorosis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix subrepens. Herba pilosa, foetida, saturatè virens. Caules simplices, bipedales. Folia cordato-ovata, serrata. Spica interrupta, basi foliosa, supernè bracteata. Calyx hispidus. Corolla fusco-sanguinea, labio inferiore albo purpureoque picto, tubo basin versus infra gibbo.

2. STACHYS verticillis sexfloris, foliis linear-i-palustris, lanceolatis semiamplexicaulibus.

Stachys palustris. *Sp. Pl.* 811. *Huds.* 259.
Witb. 532. *Relb.* 230. *Sibth.* 186. *Curt. Lond.*
fasc. 3. *t. 35.* *Riv. Monop. Irr.* *t. 26. f. 1.*
Dicks. H. Sicc. fasc. 15. 8.

Sideritis anglica strumosâ radice. *Raii Syn.* 242.

Panax Coloni. *Ger. em.* 1005.

Angl. Marsh Woundwort.

In palustribus, et ad ripas fluviorum.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix repens, stolonibus demum tuberosis. Caules bipedales, stricti, scabri, setis deflexis. Folia linear-i-lanceolata,

ceolata, acuta, ferrulata; supra sericeo-pilosa; subtus lanata, reticulato-venosa; basi dilatata, amplexicaulia; inferiora subpetiolata. Spica longa, densa; basi interrupta, foliosa. Calyx villosus. Corolla purpurea, labio inferiore variegato.

germanica. 3. STACHYS verticillis multifloris, foliis crenatis, caule lanato.

Stachys germanica. *Sp. Pl.* 812. *Huds.* 259.

With. 532. *Sibth.* 186. *Fl. Dan.* t. 684.

Jacq. Austr. t. 319.

Stachys. *Fuchf. Hist.* 766,

S. Fuchsii. *Raii Syn.* 239. *Ger. em.* 695.

S. montana. *Riv. Monop. Irr.* t. 27. f. 1.

S. alba latifolia major. *Barrel. Ic.* t. 297.

Angl. Downy Woundwort.

In arvis, sepibus, et ad vias, solo calcareo.

In several parts of Oxfordshire, especially towards Woodstock and Witney. In the corn-fields at Brizenorton, Oxfordshire, plentifully. *Rev. Dr. Goodenough.*

Perennis. Fl. Julio.

Caules densè lanati, mollissimi. Foliæ ovata, crenata, reticulato-venosa; suprà sericea; subtus lanata. Verticilli multiflori, superiores ferè in spicam foliosam approximati. Bracteæ et calyces densissimè villosi. Flores purpurascentes, labii inferioris laciniæ centrali maximâ, galeâ extus villosissimâ.

arvensis. 4. STACHYS verticillis sexfloris, caule debili, foliis cordatis obtusis crenatis subpilosis.

Stachys arvensis. *Sp. Pl.* 814. *Huds.* 260.

With. 532. *Rehb.* 230. *Sibth.* 187. *Curt.*

Lond. fasc. 4. t. 41. *Fl. Dan.* t. 587. *Dicks.*

H. Sicc. fasc. 15. 7.

S. arvensis minima. *Riv. Monop. Irr.* t. 27. f. 2.

Sideritis humilis lato obtuso folio. *Raii Syn.* 242.

Round Iron Wort. *Pet. H. Brit.* t. 33. f. 12.

Argl.

Angl. Corn Woundwort.

In arvis glareosis vel calcareis vulgaris.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. Caulis erectusculus, ramosus, subpilosus. Folia petiolata, basi trinervia, cordata, obtusa, latè crenata, utrinque subpilosa. Flores omnes verticillati. Calyx pilosus, dentibus ciliatis. Corolla vix calycem excedens, dilutè purpurascens.

269. BALLOTA. G. Pl. 294. Juss. 114.

Cal. hypocrateriformis, decemstriatus, quinque-dentatus. *Cor.* labium superius crenatum, concavum.

1. BALLOTA foliis ovatis indivisis serratis, caly- *nigra*. cibus supernè dilatatis subtruncatis : dentibus patentibus.

Ballota nigra. Sp. Pl. ed. 1. 582. Huds. 260. With. 533. Relb. 231. Sibth. 187. Engl. Bot. t. 46.

Mentha aquatica. Fl. Dan. t. 673!

Ballotc. Raii Syn. 244. Fuchs. Hist. 154. Matth. Valgr. v. 2. 180. Tourn. Inst. 185. t. 85. f. 3. Vaill. Par. 20.

Marrubium nigrum. Ger. em. 701.

M. vulgare. Clus. Hist. v. 1. 34.

Stinking Horehound. Pet. H. Brit. t. 32. f. 4.

3. Ballota alba. Sp. Pl. ed. 2. 814. Fl. Suec. 206. B. nigra β. Huds. 260. With. 533. Relb. 231. B. flore albo. Tourn. Inst. 185. Vaill. Par. 20.

Ballote. Camer. Epit. 572.

Angl. Black or Stinking Horehound.

Ad sepes et in ruderatis vulgaris.

β. Near Hammersmith. Mr. Woodward. Stafford, Dr. Stokes. Weston supra mare, Somersetshire.

setshire. *Herb. Lightf.* Between Norwich and Hellefdon.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba tota pubescens, odore aeri, pungente. Caulis bival vel tri-pedalis, erectus, ramosus, pilis recurvis. Folia petiolata, ovata vel subcordata, æqualiter ferrata. Verticilli omnes axillares, multiflori, pedunculati, foliolosi, bracteati. Bracteæ setaceæ, ciliatæ, calyce duplo breviores. Calyx tubulosus, hirsutus, decemcostatus, pliato-fulcatus, margine dilatato, infundibuliformi, obtusè quinquelobo, venis reticulato, dentibus brevissimè aristatis, patentibus. Corolla obscurè purpurascens, (in β alba); labio superiore emarginato, fornicato, extus piloso, pilis magis vel minus sursum connivenibus; inferiore trilobo, venis albis, lobo centrali obcordato.

Cum hâc, quæ B. nigra Sp. Pl. ed. 1 omniumque auctorum est, aliam speciem, Sueicæ indigenam, quæ B. nigra Sp. Pl. ed. 2 et Fl. Succicæ, forsitan Marrubium rivini t. 65. f. 1, postmodò eonfudit Linnæus; hinc in errorem, apud Engl. Bot. 46, de B. albâ incidi,

270. MARRUBIUM. G. Pl. 294. Juss. 114.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, decemstriatus.

Cor. labium superius bifidum, lineare, rectum.

vulgare. 1. MARRUBIUM dentibus calycinis decem stellatis uncinatis.

Marrubium vulgare. Sp. Pl. 816. Hud. 261.

With. 533. Relb. 232. Sibth. 187. Woodv.

Med. Bot. t. 97. Engl. Bot. t. 410. Fl. Dan. t. 1036.

M. album. Raii Syn. 239. Riv. Monop. Irr. t. 66. f. 1.

Marrubium. Fuchs. Hist. 590.

Marrubium album, herba. Pharmac. Lond. Angl. White Horehound,

In ruderatis et ad vias,

Perennis,

Perennis. Fl. Julio.

Hērba aromatīea, amara. Caules sesquipedales, dēnsē lanati. Folia petiolata, rotundata, crenata, rugosa, albida, subtūs præcipue lanata. Verticilli multiflori, sesfiles, villosissimi. Bracteæ setaceæ, aristatæ, aduncæ. Calyx sulcatus, dentibus decem, setaceis, apiee reuncinatis. Corolla alba.

271. LEONURUS. G. Pl. 295. Juss. 114.

Cal. pentagonus, quinquedentatus. *Cor.* labium superius concavum, villosum, integrum. *Antheræ* punctis nitidis adspersæ.

1. LEONURUS foliis superioribus lanceolatis *Caracteris* trilobis integrisve. *ca.*

Leonurus Cardiaca. Sp. Pl. 817. Huds. 261.

IWith. 534. Relb. 232. Abbot. 131. Engl. Bot. t. 286. Fl. Dan. t. 727.

Cardiaca. Raii Syn. 239. Ger. em. 705. Dorst. Bot. 65. Riv. Monop. Irr. t. 20. f. 1. Fuchs. Hist. 395. Camer. Epit. 864.

Angl. Motherwort.

Ad sepes solo glaroso vel calcareo.

Near Chichester; and between Tickhill and Worksop. Huds. Monmouthshire. Herb. Lightf. In a lane near Combe wood, Surrey. Mr. Sowerby. In several parts of Norfolk and Suffolk, especially about Bungay.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba amara, odore pungente, ingrato. Caulis tripedalis, purpureus, pubescens, villis brevissimis, deflexis. Folia numerosa, petiolata, patentia, acuta, subtūs tomentosa, venosa; inferiora palmato-incisa; superiora trifida, subdentata; summa plerumque integra. Verticilli multiflori. Calyx rigidus, dentibus patulis, pungentibus. Corolla extūs lanata, alba; intūs sanguineo-variegata. Semina

Semina tetragona. Antheræ punctis albis, nitidis, prominentibus adspersæ, quibus a Phlomide dignoscitur.

* * *Calyces bilabiati.*

272. CLINOPODIUM. *G. Pl.* 296. *Juss.* 115.

Cal. bilabiatus. *Involucrum* multifidum verticillo subjeclum.

vulgare. I. CLINOPODIUM verticillis hispidis, bracteis setaceis, pedicellis ramosis, foliis obsoletè serratis.

Clinopodium vulgare. *Sp. Pl.* 821. *Huds.* 261.
With. 535. *Rehb.* 233. *Sibth.* 188. *Fl. Dan.* t. 930.

C. origano simile. *Raii Syn.* 239.

Clinopodium. *Riv. Monop. Irr.* t. 43. f. 1.
Camer. Epit. 563.

C. vulgare. *Matth. Valgr.* v. 2. 169.

Acynos. *Ger. em.* 675.

Angl. Wild Basil.

In dumetis et ad sepes, præsertim solo calcareo vel glareoso.

Perennis. Fl. Augusto.

Caules sèpè subflexuosi, pilosi, angulis obtusis. Folia ovata, obtusifusa, obsoletè ferrata, hirsutissima, venis subtus subpectinato-pilosis. Verticilli terminalis et axillares, pauci, multiflori. Pedicelli ramosi, pilosi. Involucra angustissima, pilosa, calyce breviora. Calyx multinervosus, hirsutus, dentibus duobus insimis porrectis. Corolla calyce duplo longior, purpureo-rosea, fauce hirsutâ, lacinias rotundatis. Herba aromatica,

273. ORIGANUM. *G. Pl.* 297. *Juss.* 115.

Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.

I. ORI-

i. ORIGANUM spicis subrotundis paniculatis *vulgare*.
conglomeratis glabris, involucris ovatis calyce
longioribus.

Origanum vulgare. *Sp. Pl.* 834. *Huds.* 262.
With. 535. *Relb.* 234. *Sibth.* 188. *Curt.*
Lond. fasc. 5. t. 39. *Woodv. Med. Bot.* t. 164.
Matth. Valgr. v. 2. 62. *Camer. Epit.* 469.

O. vulgare spontaneum. *Raii Syn.* 236.

O. anglicum. *Ger. em.* 666.

O. sylvestre seu vulgare. *Fuchs. Hist.* 552.

Origanum, herba. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common Marjoram.

In dumetis et ad sepes, solo calcareo, vel glareoso.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Caules concinnè tetragoni, hirsuti, purpu-
rascentes, paniculati. Folia ovata, integerima, subpi-
losa, ciliata, pellucido-punctata. Spicæ terminales,
congestæ, erectæ, ovatæ, multifloræ. Involucra ovata,
glabra, purpurea. Calyx subæqualis, lævis, fauce cili-
atus. Corolla rosea. Herba aromatica, fragrans, pun-
gens et calida.

(Origanum Onites Linn. nequaquam in Britanniâ nasci-
tur. O. Onites Dill. in Raii Syn. videtur vulgaris va-
rietas, et fortè in loco indicato non spontanea.

274. THYMUS. *G. Pl.* 297. *Juss.* 115.

Cal. bilabiatus, faux villis clausa, *Cor.* labium
superius planum, emarginatum.

ii. THYMUS floribus capitatis, caulis deum- *Serpyl-*
bentibus, foliis planis ovatis obtusis basi cili- *lum.*
atis.

Thymus Serpyllum. *Sp. Pl.* 825. *Huds.* 262.
With. 536. *Relb.* 234. *Sibth.* 188. *Curt.*
Lond. fasc. 2. t. 47.

Serpyllum

- Serpyllum vulgare. *Raii Syn.* 230. *Ger. em.*
 570. *Vaill. Par. t. 32. f. 9.* etiam *f. 7.*
B. Huds. 262.
 S. vulgare flore albo. *Tourn. Inst.* 197.
γ. S. vulgare flore ampio. *Raii Syn.* 230. *Vaill.*
Par. t. 32. f. 8.
 Large-flowered Mother of Thyme. *Pet. H.*
Brit. t. 31. f. 2.
δ. Serpyllum vulgare majus. *Dill. in Raii Syn.* 231.
 Upright Broad Thyme. *Pet. H. Brit. t. 31.*
f. 3.
ε. Serpyllum citratum. *Raii Syn.* 231. *Ger. em.*
571.
 Lemon Thyme. *Pet. H. Brit. t. 31. f. 4.*
ζ. Serpyllum angustifolium glabrum. *Dill. in Raii*
Syn. 231.
 Thymus Serpyllum. *Woodr. Med. Bot. t. 110?*
η. Serpyllum vulgare hirsutum. *Raii Syn.* 231.
Ω. S. hirsutum minus, repens, inodorum. *Dill. in*
Raii Syn. 231.
ι. S. villosum fruticosius, floribus dilutè rubenti-
 bus. *Raii Syn.* 231.
Angl. Wild Thyme. Mother of Thyme. & Lemon Thyme.

In ericetis et montosis ubique.

- δ.* In Okey ho'e, Somersetshire. *Petiver.* & In
 Kent, but rarely. *Ray.* At Downton castle,
 Shropshire, in a wood on the north bank of the
 river. *Ω.* In Ireland. *Pluk.* *ι.* On the Welch
 mountains. *Lhwyd. Sherard.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules suffruticosi, procumbentes, ramosi, foliosi, pubes-
 centes, saepius rubicundi. Folia petiolata, elliptica vel
 ovata, obtusa, integerrima, pellucido-punctata, basi ci-
 liata, subinde undique hirsuta. Capitula terminalia,
 foliolosa.

foliolosa. Flores pedicellati. Calyx costatus, punctatus; dentibus duobus insimis profundè incisis, angustioribus, acutis, ciliatis; fauce villis albis, conniventibus, clausâ. Corolla purpurea; labio superiore erecto, subreflexo; inferiore tripartito. Stamina divaricata.

Varietates β , γ et η haud raræ sunt: δ ex auctoritate Petiveri pendet; figura ejus plantam a Serpylo vulgari longè alienam facie refert: ϵ odore citreo omnibus familiaris est: cæteras ex auctoribus citatis inferui.

2. THYMUS verticillaris sexfloris, pedunculis simplicibus, caule adscendente ramoso, foliis acutis ferratis, calyce gibboso. *Acinos*

Thymus Acinos. Sp. Pl. 826. Huds. 263.
With. 537. Relb. 235. Sibth. 189. Abbot. 132. Curt. Lond. fasc. 1. t. 43. Dicks. H. Sicc. fasc. 11. 8. Engl. Bot. t. 411.

Acinos. Riv. Monop. Irr. t. 43. f. 2.

A. multis. Raii Syn. 238.

Ocimum sylvestre. Ger. em. 675.

Ocimastrum. Fuchs. Hist. 896.

Small Wild Basil. Pet. H. Brit. t. 32. f. 10.

Angl. Basil Thyme.

In arvis, præsertim arenosis vel cretaceis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. Caules villosi, ramosi. Folia ovata, acuta, plerumque ferrata, subrevoluta, scabra. Flores verticillati. Calyx hispidus, subtus gibbosus. Corolla dilutè violacea, labio inferiore albo nigroque vario. Herba longè minùs quam præcedens aromatica.

3. THYMUS verticillaris pedunculatis multifloris *Calamintha*-dichotomis, foliis subserratis, villis calycinis *mintha*-inclusis.

Melissa Calamintha. Sp. Pl. 827. Huds. 263.
With. 538. Relb. 235. Sibth. 189. Abbot. 133.

Calamintha.

- Calamintha.** *Matth. Valgr. v. 2. 76. Riv. Monop. Irr. t. 46. f. 2.*
C. vulgaris. *Raii Syn. 243.*
C. vulgaris officinarum. *Ger. em. 687.*
C. montana. *Dod. Pempt. 98. Lob. Sc. 513. f. 1.*
Angl. Common Calamint. *Pet. H. Brit. t. 34. f. 1.*

In agrorum marginibus, aggeribus, et ad vias, imprimis solo glareoso, sparsim:

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules erecti, ramosi, villosi. Folia petiolata, ovata, obsoletè ferrata, venosa, utrinque subhirsuta, pellucido-punctata, subtùs pallidiora. Pedunculi axillares, oppositi, solitarii, multiflori, subdichotomi, pubescentes; pedicelli longitudine varii, erecti, uniflori, foliis inferioribus breviores, superioribus (sensim diminutis) longiores. Bracteæ setaceæ, ciliatæ, ad basin pedicellorum. Calyx suleatus, subpubescens, resinoso-punctatus, costis hirsutis; subtùs ventricosus; fauce pilis albis, inclusis, nec prominentibus; dentibus ciliatis; duabus inferioribus duplò longioribus porrectis; tribus superioribus erectis, subdivaricatis, minimè fastigiatis. Corolla calyce duplò longior, dilutè violacea, pilosa; galea subfornicata, margine erecto, subreflexo, emarginato.

Herba grata aromatica, odore suavi.

Nepeta. 4. **THYMUS** verticillis pedunculatis multifloris dichotomis folio longioribus, foliis serratis, villis calycinis prominentibus.

Melissa Nepeta. *Sp. Pl. 828. Huds. 263. With. 538. Relb. 235. Sibth. 190. Curt. Lond. fasc. 6. t. 40.*

Calamintha odore Pulegii. *Raii Syn. 243. Ger. em. 687.*

Angl. Lesser Calamint.

In collibus, et ad margines viarum, solo calcareo, copiosè.

Perennis.

Perennis. Fl. Augusto.

Habitus præcedentis, sed distincta species, charactere licet difficulti. Differt odore fortiori, acri, quo Pulegium redolit; caulis minùs erectis; foliis minoribus, latè ferratis; pedunculis omnibus folio proximo longioribus, saepe repetito-dichotomis; dentibus calycinis longitudo minùs inæqualibus, superioribus recurvatis; pilis e fauce prominentibus, conspicuis, albis.

Synonyma cautè citavi, cum species extraneas plures, hisce affines, haud satis investigavi.

De harum genere ne minimus quidem mihi scrupulus restat; villi enim coarctati in calycis fauce, dentesque superiores haud fastigiati, Thymo proprii sunt, nec in Melissâ verâ (officinali) inveniuntur.

275. MELITTIS. G. Pl. 299. Juss. 116.

Cal. inæqualis, tubo corollæ amplior. *Cor.* labium superius planum; inferius trilobum, crenatum. *Antheræ* cruciatæ.

1. MELITTIS calyce trilobo.

Melittis Melissophyllum. Sp. Pl. 832. Huds. phyl-
264. With. 539. Jacq. Austr. t. 26. Engl. lum.
Bot. t. 577.

Melissophyllum. Riv. Monop. Irr. t. 21. f. 2.

Melissâ Fuchsii. Raii Syn. 242. Lob. Ic. 515.
Camer. Hort. 99. t. 30. benè.

M. Fuchsii flore purpureo. Ger. em. 690.

Lamium Pannonicum primum, versicolore flore.

Clus. Hist. v. 2. 37.

Angl. Reddish Bastard-Balm.

In sylvis et sepibus Angliæ occidentalis.

About Totnes in Devonshire, and Haverfordwest in Pembrokeshire. Ray. New Forest, Hampshire. Huds. Specimens in the Physic-garden, Chelsea, brought from Devonshire by Mr. Hudson. Mr. Fairbairn. St. Leonard's Forest, Sussex;

sex; and near Netley Abbey, Hampshire. *Herb. Lightf.*

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrofa. Caules erecti, sesquipedales, simplices, foliosi, quadrifolii, pilosi. Folia petiolata, ovata, serrata, pilosa. Flores axillares, pedunculati, secundi, utrinque subterni. Calyx campanulatus, pilosus, tubo corollæ multò amplior, coloratus, margine trilobus; lobo superiore impari, longiore, acuto, utrinque saepius unidentato; lateralibus æqualibus, vel acutis vel emarginatis. Corolla calyce diplò vel triplò longior, pubescens, carnea, labio inferiore maculâ sanguineâ bisidâ. Herba exsiccata odore Asperulæ vel Anthoxanthi gaudet.

- grandi-
flora.* 2. *MELITTIS* calyce quadrilobo.
Melittis grandiflora. *Engl. Bot.* t. 636.
M. Melissophyllum. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 39.
Mill. Illustr. t. 52.
Melissophyllum. *Riv. Monop. Irr.* t. 21. f. 1.
Fuchs. Hist. t. 498.
Melissa Fuchsi flore albo. *Ger. em.* 690.
Lamium Pannonicum primum albo flore. *Clus.*
Hist. v. 2. 37.
Angl. Purple and White Bastard Balm.

In sylvis et sepibus Angliae occidentalis.

By the road side at Hall near Barnstaple, Devonshire. *Curt.* A mile from Ashburton in the road to Plymouth, in great plenty; also at Lefkards, Cornwall. *Mr. D. Turner* and *Mr. Sowerby*, 1799.

Perennis. Fl. Maio.

Habitus et folia ferè præcedentis, at floribus abundè differt. Calyx quadrilobus, lobis utrinque duobus lateralibus, subequalibus, interdum erosis. Corolla quam in præcedente major, luteo-alba, labii inferioris laciniæ mediâ violaceâ, margine albâ; galea subemarginata.

276. SCUTELLARIA. G. Pl. 301. Juss. 117.

Cal. ore subintegro: post florescentiam clauso operculato.

i. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis *galericula-*
lata.

Scutellaria galericulata. Sp. Pl. 835. Huds. 265.
With. 540. Relb. 236. Sibth. 190. Curt. Lond.
fasc. 3. t. 36. Fl. Dan. t. 637. Engl. Bot.
t. 523.

Scutellaria. Riv. Monop. Irr. t. 77. f. 1.

Cassida palustris vulgarior, flore cæruleo. Raii
Syn. 244.

Lysimachia galericulata. Ger. em. 477.

Hood-mint. Pet. H. Brit. t. 34. f. 10.

Angl. Common Skull-cap.

In aquofis, fossis, et ad ripas fluviorum.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Caulis erectus, pedalis vel bipedalis, medio ramosus, foliosus, acutè quadrangulus, scabriuscuslus. Folia brevissimè petiolata, patentia, cordato-lanceolata, a basi ad apicem ferè æqualiter crenata, rugosa, venosa, pilis brevissimis pubescentia, subtùs pallidiora. Flores axillares, utrinque solitarii, subseffiles, per paria secundi, subnutantes, cærulei. Calyx pilosus, emarginatus, supra squamâ fornicate munitus, delapsâ corollâ clausus, et squamâ (demùm auctâ) operculatus. Corolla infundibuliformis, ringens, clausa. Stigma simplex.

ii. SCUTELLARIA foliis cordato-ovatis subinte- *minor,*
gerrimis, floribus axillaribus.

Scutellaria minor. Sp. Pl. 835. Huds. 265.
With. 540. Curt. Lond. fasc. 4. t. 43. Dicks.
H. Sicc. fasc. 5. 6. Engl. Bot. t. 524.

Cassida palustris minima, flore purpurascente.
Raii Syn. 244. Lind. Alsat. 216. t. 9.

Gratiola latifolia. *Ger. em.* 581.

Small Hood-mint. *Pet. H. Brit.* t. 34. f. 11.

Angl. Lesser Skull-cap.

In ericetis humidiusculis, solo glareoso.

Perennis. Fl. Augusto.

Præcedente quadruplò minor. Caulis basi ramosus; Folia latiora, minus rugosa, plerumque integerrima, interdum basi dentata, et subinde hastata. Flores rubieundi, vel purpureo-incarnati; labio albo, punctis sanguineis.

277. PRUNELLA. *G. Pl.* 301. *Juss.* 116.

Filamenta bifurca, altero apice antherifera. Stigma bifidum.

vulgaris. I. PRUNELLA foliis omnibus ovato - oblongis petiolatis.

Prunella vulgaris. *Sp. Pl.* 837. *Huds.* 264.

With. 541. *Rehb.* 236. *Sibth.* 190. *Curt.*

Lond. fasc. 4. t. 42. *Mart. Fl. Russ.* t. 137.

Fl. Dan. t. 910.

Prunella. *Raii Syn.* 238. *Ger. em.* 632. *Fuchs.* *Hist.* 621.

Consolida minor. *Camer. Epit.* 703.

Angl. Self-heal.

In pratis et pascuis vulgaris.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caulis scapius ramosus, pilosus, pilis erectis, albis. Folia ovato-oblonga, obtusiuscula, pilosa, subdentata vel repanda. Spicæ terminales, solitariæ, obtusæ, basi diphylleæ. Bracteæ reniformes, acuminatæ, ciliatæ, nervosæ. Calycis labium superius dilatum, tridentatum; inferius bifidum, mucronatum. Corolla violacea; galea concava; labii laciniæ media dentata.

II. ANGIOSPERMIA.

* *Calyces quadrifidi.*

278. BARTSIA. *G. Pl.* 303. *Juss.* 100.

Cal. quadrilobus, subcoloratus. *Cor.* ringens, fauce clausâ : *labium superius* concavum, longius; *inferius* æqualiter trifidum, reflexum. *Capula* ovata, compressa, bilocularis. *Semina* plurima, angulata.

i. BARTSIA foliis oppositis cordato-ovatis obtusè *alpina*. ferratis, antheris hirsutis.

Bartsia alpina. *Sp. Pl.* 839. *Huds.* 267. *With.* 542. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 10. 14. *Engl. Bot.* t. 361. *Fl. Dan.* t. 43.

Euphrasia rubra Westmorelandica, foliis brevibus obtusis. *Raii Syn.* *285.

Clinopodium alpinum. *Ger. em.* 676. *Pon.* *Bald.* 207.

C. alpinum hirsutum. *Phuk. Phyt.* t. 163. f. 5.

Red Eye-bright. *Pet. H. Brit.* t. 36. f. 8.

Angl. Alpine Bartsia.

Ad rivulos alpinos rariùs.

Near Orton, Westmorland. *Ray.* *Huds.* Near Middleton in Teesdale, Durham. *Rev. Mr. Harriman* and *Mr. Oliver*. Among rocks to the east of Malghyrdy in the highlands of Scotland. *Dicks. Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 290.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens. Caules spithamæi, erecti, simplices, foliosi, sub-quadranguli, pilosi. Folia opposita, sessilia, ovata vel cordata, serrata, rugosa, subtus pilosa; summa colorata. Spica terminalis, purpurea, foliosa. Calyx viscidus, pilosus, purpureus, laciniis ferè æqualibus, acutis.

acutis. Corolla purpureo-violacea, galeâ vix emarginatâ; labii laciniis æqualibus, integerrimis. Antheræ hirsutæ, bilobæ, subtûs acuminatae. Stylus hirsutus. Capsula ovata, pubescens, dissepimentis e medio valvularum. Semina numerosa, angulata, angulis membranaceis, striatis.

- viscosa.* 2. BARTSIA foliis serratis : superioribus alternis, floribus lateralibus distantibus, antheris hirsutis. Bartsia viscosa. *Sp. Pl.* 839. *Huds.* 267. *With.* 541. *Lightf.* 321. t. 14. *Dicks. Dr. Pl.* 72. Euphrasia major lutea latifolia palustris. *Raii Syn.* *285. *Pluk. Phyt.* t. 27. f. 5. pessimè. Alectorolophos Italica luteo pallida. *Barrel. Ic.* t. 665. benè.
Angl. Yellow Viscid Bartsia.

In palustribus, imprimis Angliæ occidentalis.
In several parts of Cornwall and Devonshire. *Huds. F. Borone.* Plentiful near Ormskirk, Lancashire. *Huds.* In Argylshire. *Lightf. Mr. J. Mackay.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caulis plerumque simplex, nec, nisi valde luxurians, raniosus, altitudine varius, erectus, teres, pubescens, foliosus. Folia sessilia, ovato-lanceolata, ferrata, nervosa, scabra; inferiora tantum opposita. Flores axillares, subsessiles, solitarii. Calyx tubulosus, pilosus, regularis, basi albidus. Corolla calyce duplo longior, flava, galeâ integrâ; labii laciniis obtusis, subæqualibus. Antheræ hirsutæ, subtûs acuminatae. Stylus hirsutus. Capsula ovata, teretiuscula, apice hispida, dissepimentis e medio valvularum. Semina numerosissima, parva, subangulata, nec marginata.

- Odontites.* 3. BARTSIA foliis lanceolatis serratis : superiores alternis, floribus racemosis secundis, antheris glabris.
Bartsia Odontites. *Huds.* 268.
Euphrasia Odontites. *Sp. Pl.* 841. *With.* 543. *Reb.*

Relb. 239. *Sibth.* 192. *Curt. Lond. fasc.* 1.
t. 44. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 42. *Fl. Dan.* *t.* 625.
E. pratensis rubra. *Raii Syn.* *284.
Odontites. *Riv. Monop. Irr.* *t.* 90. *f.* 2.
Cratæogonon Euphrasina. *Ger. em.* 91.
Angl. Red Bartsia.

In pratis et pascuis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caulis ramosus, quadrangulus. Folia sessilia, lanceolata, ferrata, scabra; inferiora opposita. Racemi terminales, multiflori, foliosi. Flores secundi. Calyx purpureus, hirsutus, interdum quinquefidus. Corolla rosea, galea integrâ; labii laciniis obtusis, aequalibus. Antheræ glabræ, subtus acuminatae, neque longius aristatae. Stylus plerumque hirsutus. Capsula subcompressa, pilosa. Semina numerosa, parva, striata.

279. RHINANTHUS. G. Pl. 304. Juss. 101.

Gærtn. *t.* 54.

Cal. ventricosus, quadridentatus. *Cor.* galea compressa. *Caps.* bilocularis, obtusa, compressa. *Semina* imbricata, compresso-plana.

1. RHINANTHUS corollæ labio superiore fornicato, calyce glabro, foliis lanceolatis serratis. *Crista-galli.*
Rhinanthus Crista-galli. *Sp. Pl.* 840. *Huds.* 268.

With. 542. *Relb.* 238. *Sibth.* 192. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 43. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 148. *Fl. Dan.* *t.* 981. *Engl. Bot.* *t.* 657.

Pedicularis, seu Crista galli lutea. *Raii Syn.* *284.

Crista galli. *Ger. em.* 1071. *Lob. Ic.* 529.

β. Pedicularis major angustifolia ramosissima, flore minore luteo, labello purpureo. *Dill. in Raii Syn.* *284.

Angl. Yellow Rattle. *Pet. H. Brit.* t. 36. f. 2.

In pratis et pascuis.

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Caulis ramosus, lœvis, saepè maculatus. Folia sessilia, opposita, lanceolata, acutè ferrata, scabra, basi cordata. Spica terminalis, foliacca. Flores subalterni, breviùs pedicellati, lutei. Calyx inflatus, compressus, nervosus, reticulatus, coloratus, glaber, persistens, ore quadridentato, contraëto. Corolla calyce duplò longior; labio superiore areuato, compressio; inferiore trifido, laciniis æqualibus. Antheræ muticæ, valde hirsutæ. Capsula scariosa. Semina membranaceo-alata.

280. EUPHRASIA. G. Pl. 304. Juss. 100.

Gærtn. t. 54.

Cal. cylindricus, quadridentatus, æqualis. *Cor.* labium superius bifidum; inferius trilobum, laciniis bifidis. *Antheræ* spinis inæqualibus aristatæ. *Caps.* ovato-oblonga. *Semina* striata.

officina- 1. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argutè dentatis.

Euphrasia officinalis. Sp. Pl. 841. Hudf. 269. With. 543. Relb. 238. Sibth. 192. Curt. Lond. fasc. 5. t. 42. Fl. Dan. t. 1037. Woodv. Suppl. t. 220.

Euphrasia. Raii Syn. *284. Riv. Monop. Irr. t. 90. f. 1. Ger. em. 663. Fuchs. Hist. 246. *Angl.* Eye-bright.

In ericetis et pascuis.

Annua. Fl. Julio—Septembri.

Radix parva, fibrosa. Caulis palmaris, ramosus, hirtus, purpurascens. Ramæ erecti, subfastigiati, racemosi, foliosi. Flores alterni, axillares, sessiles, pulcherrimi, albi, purpureo lineati, palato flavo. Antherarum lobi omnes

omnes subtus spinâ armati, infimâ longiore. Capsula obovata, emarginata. Semina pauca, subangulata, striata, parva.

281. MELAMPYRUM. *G. Pl.* 305. *Juss.* 101.
Gertn. t. 53.

Cal. tubulosus, quadrifidus. *Cor.* labium superius compressum, margine replicato. *Caps.* bilocularis, obliqua, hinc dehiscens. *Semina* bina, gibba.

i. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus : cristatae cordatis imbricatis compactis denticulatis.

Melampyrum cristatum. *Sp. Pl.* 842. *Huds.* 269. *With.* 544. *Relb.* 240. *Engl. Bot.* t. 41. *Riv. Monop. Irr.* t. 81. f. 2. *Abbot.* 135.

M. cristatum, flore albo et purpureo. *Raii Syn.** 286.

M. villosum, spicâ purpureâ quadratâ. *Morris.* *seeet.* 11. t. 23. f. 2.

Angl. Crested Cow-wheat. *Pet. H. Brit.* t. 36. f. 10.

In nemorosis, interdùm et inter segetes.

Plentiful in Cambridgeshire and Bedfordshire.
Huds.

Annua. Fl. Julio.

Caulis scaber, quadrangulus, ramosus, brachiatus. Folia linearia, integerrima, scabra. Spicæ terminales, solitariæ, tetragonæ, imbricatæ, multifloræ. Bracteæ cordataæ, compressæ, colorataæ, pectinato-dentataæ; inferiores apice foliaceo, reflexo. Calyx inæqualis, bracteis brevior. Corolla lutea, galeâ purpurascente, palato fulvo. Antheræ atro-purpureæ, subtus acuminataæ. Capsula lunata, compressa, scariosa, dissepimentis

mentis transversis. Semina in utroque loculamento certè duo, elliptica, obtusa, lœvigata.

arvense. 2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis : bracteis lanceolatis pinnato dentatis.

Melampyrum arvense. *Sp. Pl.* 842. *Huds.* 270.
With. 545. *Engl. Bot.* t. 53. *Dicks. Dr.*
Pl. 74. *Fl. Dan.* t. 911. *Riv. Monop. Irr.*
t. 80.

M. purpurascente comâ. *Dill. in Raii Syn.*
*286.

M. cœruleum. *Ger. em.* 90.

Triticum vaccinum. *Trag. Hist.* 663.

Angl. Purple Cow-wheat.

In arvis, solo glareoso.

Near Lymham, Norfolk. *Sherard.* In the common field at Sporle in the same county, especially among wheat. *Rev. Mr. Edwards* and *Rev. Mr. Watts.* At Costesey and Bixley near Norwich.

Annua. Fl. Julio.

Caulis bipedalis, erectus, ramosissimus, scaber. Folia lanceolata, acuminata, integerima, seabra. Spicæ terminales, laxæ, forniosæ, multifloræ. Bracteæ lanceolatæ, patentæ, dentato-pinnatifidæ, purpureæ. Corolla clausa, flava, apice purpurascente. Capsula ovata, compressa. Semina lœvigata, flavescens, Tritici similima, utrinque bina.

pratense. 3. MELAMPYRUM floribus secundis lateribus : conjugationibus remotis, corollis clavis labio porrecto.

Melampyrum pratense. *Sp. Pl.* 843. *Lightf.*
324. *With.* 545. *Engl. Bot.* t. 113. *Sibth.*
193. *Abbot.* 135.

M. sylvaticum. *Huds.* 270. *Riv. Monop. Irr.*
t. 81. f. 1. *Wade Dubl.* 168.

M. sylva-

M. sylvaticum flore luteo, sive Satureia lutea
sylvestris. Raii Syn. *286.

Common Cow-Wheat. Pet. H. Brit. t. 36. f. 9.
β. Melampyrum latifolium flore albo, labio infe-
riore duabus maculis luteis distincto. Dill. in
Raii Syn. *286.

M. pratense. Huds. 270.

Angl. Common Yellow Cow-wheat.

In nemorosis et dumetis frequens, imprimis solo
argillaceo.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Caulis ramosus, patens, laevis. Folia lancolata, laevia,
interdum basi dentata. Bracteæ pinnatifidæ, saepius
purpurascens. Flores ex axillis foliorum et bracte-
arum, solitarii, oppositi, per paria secundi. Calycis la-
ciniæ lineares, elongatæ. Corolla flava, ore clauso,
labio inferiore porrecto, horizontali, palato elevato, bi-
lobo, fulvo. Capsula ovata, mucronata, obliqua. Se-
mina utrinque bina.

Varietatem β, monente Witheringio, huc retuli.

4. MELAMPYRUM floribus secundis latera- *sylvati-*
libus : conjugationibus remotis, corollis bian- *cum.*
tibus labio deflexo.

Melampyrum sylvaticum. Sp. Pl. 843. Lightf.

325. With. 546. Fl. Dan. t. 145.

Angl. Wood Cow-wheat.

In sylvis alpinis rariis.

On the road side going from Taymouth to the
hermitage, July 1775. Herb. Lightf. Wick
Cliffs, Mr. Swayne. With. Near Middleton in
Teesdale. Mr. Robson.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Habitus praecedentis, at species distincta. Caulis scabri-
uscus. Folia parum latiora, exsiccatione minus atra,
omnia plerumque integerrima. Flores duplo minores.
Calycis

Calycis laciniæ basi latiores. Corolla fulva, fauce hiante, labio deflexo, galea elevatâ. Capsula reticulato-venosa. Semina utrinque bina, interdum solitaria.

282. LATHRÆA. *G. Pl.* 305. *Juss.* 102.
Gaertn. t. 52.

Cal. quadrifidus. *Glandula* depresso ad basin futuræ germinis. *Caps.* unilocularis, receptaculis fungosis lateralibus. *Semina* globosa.

Squama- 1. LATHRÆA caule simplicissimo, floribus pendulis, labio inferiore trifido.

Lathræa Squamaria. *Sp. Pl.* 844. *Huds.* 266. *With.* 547. *Engl. Bot.* t. 50. *Fl. Dan.* t. 136. *Dicks. H. Sicc.* fasc. 10. 13. *Abbot.* 136.

Anblatum. *Cord. Hist.* 89.

A. Cordi, sive Aphyllo. *Raii Syn.* *288. *Bauh.* *Hist.* v. 2. 783.

Squainaria. *Riv. Monop. Irr.* t. 89. f. 2.

Dentaria. *Matth. Valgr.* v. 2. 313.

D. major. *Camer. Epit.* 705.

D. major Matthioli. *Ger. em.* 1585.

Orobanche radice dentatâ major. *Rudb. Elys.* v. 2. 230. f. 7.

Angl. Greater Tooth-wort.

In nemoribus siccis, sæpius ad radices Corylorum.

In several places in Kent. *Ray.* In a shady lane leading from Haresfield town to the river, plentifully. *Blackstone.* In Westmoreland. *Huds.* At Exton, near Stamford. *Earl of Gainsborough.* Newburgh woods, Yorkshire. *Rev. Archdeacon Peirson.*

Perennis. Fl. Aprili.

Radix parasitica, carnosa, albida, e squamis cordatis, densè imbricatis. Caules erecti, simplices, spithamei, racemosi,

mosi, carnosæ, teretes, purpurei, pubescentes, aphylli. Bracteæ ovatæ, carnosæ, albidae, glabræ. Flores pedicellati, secundi, nutantes. Calyx magnus, albidus, glaber. Corolla purpurea, tubo albo; labium superius bisidum; inferius trisidum. Antheræ hirsutæ. Stigma emarginatum.

* * *Calyces quinquefidi.*

283. PEDICULARIS. G. Pl. 307. Juss. 101.
Gærtn. t. 53.

Cal. subquinquefidus, ventricosus. *Cor.* galea emarginata, compressa. *Caps.* bilocularis, mucronata, obliqua. *Semina* pauca, angulata, mucronata.

1. PEDICULARIS caule solitario ramoso, calyce *palustris*. ovato piloso costato bilobo inæqualiter inciso.

Pedicularis palustris. Sp. Pl. 845. Huds. 270.

With. 548. Relb. 241. Sibth. 193. Engl. Bot. t. 399.

P. palustris rubra elatior. Raii Syn. *284.

Tall Red Rattle. Pet. H. Brit. t. 36. f. 3.

Angl. Marsh Lousewort.

In paludibus, et pratis humidis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix parva, fibrosa. Caulis erectus, pedalis vel sesquipedalis, ramosus, angulatus, pilosus, foliosus. Folia sparsa, rarius opposita, bipinnatisida, incisa, subrevoluta, glabra. Flores axillares, solitarii, subsessiles, speciosi, purpurei. Calyx subcompressus, verticaliter bilobus, lobis inæqualiter crenato-incisis, subfoliosis. Corollæ labium superius fornicateum, compressum, parvum emarginatum; inferius trilobum, lobis rotundatis, ciliatis, centrali minore. Stamina basin versus tubi inserta. Antheræ subtus acutæ, nec aristatæ. Stigma simplex. Capsula ovata, compressa, obliqua, acuta, bilocularis, dissepimentis e medio valvularum. Semina utrinque 5 vel 6, vix tunicata.

2. PE-

- sylvatica.* 2. **PEDICULARIS** caulis pluribus simplicibus patentibus, calyce oblongo angulato glabro inæqualiter quinquelobo inciso.
Pedicularis sylvatica. *Sp. Pl.* 845. *Huds.* 271.
With. 548. *Relb.* 241. *Sibth.* 194. *Engl.*
Bot. t. 400. *Abbot.* 136. *Fl. Dan. t.* 225.
Pedicularis. *Ger. em.* 1071.
P. pratensis rubra vulgaris. *Raii Syn.* *284.
Angl. Pasture Lousewort.

In pascuis et cricetis montosis humidiusculis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix subfusiformis. Caules palmatae, simplicies, foliosi, angulati, subpilosæ; centralis erectus; reliqui patentes, subinde decumbentes. Folia radicalia simplicia, ovata, crenata; caulinæ ferè præcedentis, at floralia minus composita. Flores axillares, solitarii, magni, rosei, formosi. Calyx parùm inflatus, glaber, angulis alternis minoribus, margine inæqualiter quinquefido, erinato. Corollæ labium inferius æqualiter trisido, margine glabro.

284. **ANTIRRHINUM.** *G. Pl.* 309. *Juss.* 120.
Gærtn. t. 53.

Cal. quinquepartitus. *Corollæ* basis deorsum prominens, nectarifera. *Caps.* bilocularis.

* *Foliis dilatatis, caulis laxis.*

- Cymbalaria.* *1. **ANTIRRHINUM** foliis cordatis quinquelobis alternis glabris, caulis procumbentibus.

Antirrhinum Cymbalaria. *Sp. Pl.* 851. *Huds.* 271. *With.* 549. *Relb.* 242. *Sibth.* 194. *Abbot.* 137. *Curt. Lond. fasc. 1. t.* 45. *Engl. Bot. t.* 502.

Cymbalaria. *Riv. Monop. Irr. t.* 86. f. 2. *Cambr. Epit.* 860. *Matth. Valgr. v. 2.* 468.
C. italica.

C. italica. *Ger. em.* 529.

Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria.

Dill. in Raii Syn. *282.

Umbilicus Veneris Officinarum. *Lonic. Kreuterb.* 95.

Angl. Ivy-leaved Snapdragon.

In muris antiquis, ex Italia olim advecta.

On walls about the shores of the Thames, also at Oxford, Cambridge, &c. On the walls of Windsor Castle. *Rev. Dr. Goodenough.*

Perennis. Fl. Maio—Novembri.

Radix fibrofa. Caules prostrati, radicantes, ramosi, implexi, teretes, glabri, foliosi. Folia alterna, petiolata, cordata, quinqueloba, glabra, subcarnosa, subtus purpurascens. Flores axillares, pedunculati, solitarii. Calyx glaber. Corolla violacea, palato bilobo, elevato, flavo, pubescente, calcari brevi, acuto. Capsula didyma, apice utrinque lacera. Semina rugosissima.

2. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, cau-*spurium.* libus procumbentibus.

Antirrhinum spurium. *Sp. Pl.* 851. *Huds.* 272. *IWith.* 549. *Rehb.* 242. *Sibth.* 194. *Abbot.* 137. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 37. *Fl. Dan.* t. 913.

Linaria Elatine dicta folio subrotundo. *Raii Syn.* *282.

Veronica foemina. *Matth. Valgr.* v. 2. 55. *Camer. Epit.* 462. *Fuchs. Hist.* 167. *Ger. em.* 625.

Angl. Round-leaved Fluellin.

In arvis.

About London rare. *Curt.* In Suffolk frequent.

Mr. Woodward. In Hampshire. *Sir J. Banks.*

At Seething, Norfolk. *Mrs. Kett.*

Annua. Fl. Julio—Septembri.

Radix parva. Caules demum procumbentes, ramosi, teretes, pilosi, foliosi. Folia brevius petiolata, alterna, ovato-subrotunda, mucronulata, integerrima, utrinque pilosa. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, pilosi, foliis longiores. Flores lutei, galea violacea, calcari elongato, acuto. Calycis laciniæ ovatae, acutæ, hirtæ. Varietatem floribus regularibus, quinquesidis, invenit D. Johannes Cullum, Baronettus.

Elatine. 3. **ANTIRRHINUM** foliis hastatis alternis, caulis procumbentibus.

Antirrhinum Elatine. *Sp. Pl.* 851. *Huds.* 271. *Wittb.* 549. *Reh.* 242. *Sibth.* 195. *Abb.* 137. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 46. *Fl. Dan.* t. 426.

Linaria Elatine dicta folio acuminato. *Raii*
Syn. *282.

Elatine. *Camer. Epit.* 754. *Matth.* *Valgr.* v. 2. 360.

E. altera. *Ger. em.* 625.

Angl. Sharp-pointed Fluellin.

In arvis.

Annua. Fl. Julio—Septembri.

Habitus præcedentis, sed parùm tenuior. Folia hastata, integerima, pilosa; insima subrotunda. Pedunculi capillares, glabri. Calycis laciniæ lanceolatae, pilosæ. Corolla lutea, galea violacea, calcari elongato, attenuato, pallido. Semina valde rugosa.

Variat etiam floribus regularibus.

* * *Foliis angustioribus, caulis erectis.*

repens. 4. **ANTIRRHINUM** foliis linearibus glaucis verticillatis sparsisve, caule paniculato, calyce glabro longitudine calcaris.

Antirrhinum repens. *Sp. Pl.* 854. *Huds.* 272. *Wittb.*

With. 550. *Sibth.* 414. *Dicks. Dr. Pl.* 75.

H. Sicc. fasc. 17. 18.

A. monspessulanum. *Sp. Pl.* 854. *With.* 550.

Linaria odorata Monspessulana. *Raii Syn.* *282.

Baub. Hist. v. 3. 459?

L. cærulea, foliis brevioribus et angustioribus.

Raii Syn. *282.

L. angustifolia, flore cinereo striato. *Dill. Elth.* 198. *t.* 163. *f.* 197.

L. minor repens et inodora. *Vaill. Par.* 118.

Blueish Sweet Toadflax. *Pet. H. Brit.* *t.* 35.

f. 6.

Angl. Creeping pale-blue Toadflax.

In aggeribus, imprimis solo calcareo, sed rariū.

In Cornwall near Penryn. *Ray. F. Borone.* On the chalk hill going down to Henley, Oxfordshire, plentifully.

Perennis. Fl. Julio—Septembri.

Radix repens, albida, latè extensa. Caules numerosi, erecti, teretes, foliosi, glaberrimi, apiee paniculati, basi subinde deeumbentes. Folia lineari-lanceolata, aeuta, integerrima, glaberrima, glauca, erecta, sèpiùs verticillata, quaterna vel quina, superiora opposita vel alterna; interdum omnia alterna vel sparsa. Panieulæ rami alterni, spieati, multiflori. Flores pedieellati, erecti, interdum suaveolentes. Calycis laeiniæ laneeolatae, glabræ. Corolla cinereo-albida, labio superiore purpureo-striato, caleari obtusiusculo, foliolis ealyeinis longitudine æquali. Capsula globosa, utrinque suleata. Semina angulata, rugosa, nigra.

In Floribus odorem suavem aromaticum faeilè, nee tamen omnibus horis, pereepi; variat ut in aliis pro cœli vel temperiei diversitate.

Antirrhinum repens Dillenii fide in *Sp. Pl.* deseripit Liunæus, nec in herbario habuit, nisi sub nomine *A. monspessulanum*, eujus ne quidem varietas est, sed omnino eadem planta.

Antirrhinum arvense nunquam in Angliâ, me sane judicee, inventum

inventum est. Hudsonus ut videtur Dillenium in Horto Elthamensi male intellexit, qui hanc plantam in “locis spontaneis” se vidisse dieit, nec tamen in Britanniâ.

Linaria. 5. **ANTIRRHINUM** soliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto spicato, calycibus glabris calcari brevioribus.

Antirrhinum Linaria. *Sp. Pl.* 858. *Huds.* 273. *With.* 551. *Relb.* 243. *Sibth.* 195. *Curt.* *Lond.* fasc. 1. t. 47. *Mart. Fl. Rust.* t. 93. *Dicks. H. Sicc.* fasc. 7. 12. *Fl. Dan.* t. 982. *Woodv. Suppl.* t. 221. *Engl. Bot.* t. 658.

Linaria. *Riv. Monop. Irr.* t. 83. f. 1.

L. lutea vulgaris. *Raii Syn.* *281. *Ger. em.* 550.

Osyris. *Fuchs. Hist.* 545.

2. *Peloria.* *Linn. Am. Acad.* v. 1. 55. t. 3. *Curt.* *Lond. fasc.* 6. t. 41. *Engl. Bot.* t. 260.
Angl. Common yellow Toadflax.

In scipibus et ad margines agrorum, solo sterili.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens, sublignosa. Caules erecti, subsimplices, teretes, glabri, foliosi. Folia linear-lanceolata, integrifolia, sparsa, patentia, glabra, viridia, parum glauca. Spiae terminales, erectae, dense, multiflorae. Flores pedicellati, magni, speciosi, aurei, palato fulvo, villoso, calcari subulato, acuto, foliolis calycinis quintuplo longiore.

Var. β gaudet corollâ regulari, quinquesidâ, ore contracto, ut in A. spurio aliquo.

minus. 6. **ANTIRRHINUM** soliis plerisque alternis lanceolatis obtusis pubescentibus, caule ramosissimo patulo, calycibus calcari longioribus.

Antirrhinum minus. *Sp. Pl.* 852. *Huds.* 272. *With.* 551. *Relb.* 243. *Sibth.* 195. *Curt.* *Lond.*

*Lond. fasc. 5. t. 41. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 17.
Fl. Dan. t. 502.*

A. minimum repens. Ger. em. 549.

*A. tertium. Matth. Valgr. v. 2. 539. Camer.
Epit. 922.*

*Linaria Antirrhinum dicta. Raii Syn. *283.*

*L. arvensis minima. Riv. Monop. Irr. t. 85.
f. 2.*

Angl. Least Snapdragon.

In arvis arenosis.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Radix parva. Caulis erectus, ramosus, interdum ramosissimus et diffusus, teres, pubescens, foliosus. Folia alterna, linear-lanceolata, obtusa, pubescentia, viscosa; infima saepius opposita et subspatulata. Pedunculi axillares, uniflori, pubescentes, longitudine foliorum. Flores parvi. Calycis laciniæ inæquales, spatulatæ, pilosæ. Corolla violacea, labio inferiore albo, palato flavo, calcari acuto, brevi. Capsula ovata, obtusa; compressa, apice dehiscens.

* * * *Corollis ecaudatis.*

*7. *ANTIRRHINUM* corollis ecaudatis, floribus *majus.*
spicatis, calycibus obtusis villosis.

*Antirrhinum majus. Sp. Pl. 859. Huds. 274.
With. 552. Relb. 243. Sibth. 196. Engl.
Bot. t. 129.*

Antirrhinum. Riv. Monop. Irr. t. 82. f. 1.

A. purpureum sive album. Ger. em. 549.

A. primum. Matth. Valgr. v. 2. 537.

Angl. Great Snapdragon.

In muris antiquis et clivis cretaceis, vix indigena.

Most common about London, in Kent and the southern counties, particularly on the walls of several old towns.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

VOL. II.

Q

Radix

Radix perennis, sed frigoris acrioris impatiens. Caules erecti, subsimplices, foliosi, teretes, superne pilosi. Folia lanceolata, glabra, sparsa. Spica terminalis, densa, multiflora, bracteolata. Calycis laciniæ ovatæ, obtusæ, villosæ, viscidæ. Corolla maxima, rosea, palato luteo, calcari brevissimo, obtuso. Capsula ovata, gibba, apice obliqua.

Orontium. 8. *ANTIRRHINUM* corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digitatis corollâ longioribus.

Antirrhinum Orontium. *Sp. Pl.* 860. *Huds.* 274. *With.* 552. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 45. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 11. 9.

A. *angustifolium sylvestre.* *Raii Syn.* *283.

A. *minus.* *Ger. em.* 549.

A. *arvense.* *Riv. Monop. Irr.* *t.* 82. *f.* 2.

A. *quartum.* *Matth. Valgr.* *v.* 2. 540. *Camer. Epit.* 923.

Angl. Lesser Snapdragon.

In arvis arenosis vel calcareis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. Caulis erectus, ramosus, teres, pilosus. Folia alterna, lanceolata, glabriuscula. Spicæ terminales, foliosi, laxi, multiflori. Flores subsessiles. Calycis laciniæ lineari-lanceolatæ, inæquales, pilosæ, corollam superantes, demùm elongatæ. Corolla carnea, labiis roseis, palato flavo, calcari brevissimo obtuso. Capsula ovata, gibba, punctata, pilosa, bilocularis, apice nihilominus poris tribus dehiscentia, stylo persistente mucronata.

Varietatem corollâ albâ labiis violaceis misit D. Forby, Soc. Linn. Socius.

285. *SCROPHULARIA.* *G. Pl.* 312. *Juss.* 119.
Gærtn. *t.* 53.

Cal. quinquefidus. *Cor.* subglobosa, resupinata.
Capf. bilocularis.

i. SCRO-

1. SCROPHULARIA foliis cordatis acutis basi *nodosâ*, trinervibus, caule acutangulo.

Scrophularia nodosa. *Sp. Pl.* 863. *Huds.* 274.
With. 553. *Relb.* 244. *Sibth.* 196. *Ab-*
bot. 138.

S. major. *Raii Syn.* *283. *Ger. em.* 716.

Scrophularia. *Riv. Monop. Irr.* t. 107. f. 1.
Matth. Valgr. v. 2. 474. *Camer. Epit.* 866.

Brown Figwort. *Pet. H. Brit.* t. 35. f. 9.

Angl. Knotty-rooted Figwort.

In nemorosis et sepibus.

Perennis. Fl. Julio.

Radix tuberosa, granulata. Caulis tripedalis, erectus, simplex; acutè quadrangulus, glaber, foliosus. Folia opposita, petiolata, cordata, acuta, ferrata, glabra, venosa, basi ad venas laterales excisa et quasi trinervia. Racemus terminalis, erectus, pedunculis oppositis, di-chotomis, bracteolatis. Flores atro-sanguinei. Capsulae ovatæ, acutæ.

Hujus varietas videtur *S. major*, caulibus foliis et floribus viridibus, *Bobart in Raii Syn.* *283.

2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis *aquatica*. decurrentibus obtusis, caule alato.

Scrophularia aquatica. *Sp. Pl.* 864. *Huds.* 275.
With. 554. *Relb.* 244. *Sibth.* 196. *Curt.*
Lond. fasc. 5. t. 44. *Fl. Dan.* t. 507.

S. aquatica major. *Raii Syn.* *283.

Betonica aquatica. *Ger. em.* 715.

Angl. Water Figwort. Water Betony.

In aquosis et ad ripas fluviorum. In Scotiâ rarissimè.

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Caulis tri-quinquepedalis, angulis alatis. Folia opposita, petiolata, cordato-ovata, obtusa, ferrata, glabra, venosa, basi in petiolam decurrentia. Race-

mus terminalis, plerumque solitarius, erectus, pedunculis ut in priore. Flores atro-sanguinei. Capsula subrotunda, acuminata.

Scorodonia. 3. **SCROPHULARIA** foliis cordatis duplicato-ferratis subtus tomentosis, racemo folioso.

Scrophularia Scorodonia. *Sp. Pl.* 864. *Huds.* 275. *With.* 553. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 15. 9. *S. Scorodoniae folio*. *Raii Syn.* *283. *Moris. sect.* 5. *t. 35.*

Sage Figwort. *Pet. H. Brit.* *t. 35. f. 11.*
Angl. Balm-leaved Figwort.

In aquosis et ad sepes rarissimè.

Between the port and St. Hilary, Jersey. *Sherard.*
About St. Ives in Cornwall plentifully. *Dill.*
Huds.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caulis quadrangulus, pilosus. Folia cordato-oblonga, acuta, duplicato-ferrata, venosa, subtus mollissimè tomentosa, basi exciso-trinervia. Racemus terminalis, foliosus, pedunculis decompositis, superioribus alternis. Flores pallidiores. Calyx pubescens. Capsula glabra, subrotunda, acuminata.

vernalis. 4. **SCROPHULARIA** foliis cordatis duplicato-ferratis pubescentibus, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis foliolosis.

Scrophularia vernalis. *Sp. Pl.* 864. *Huds.* 275. *With.* 554. *Engl. Bot.* *t. 567.* *Fl. Dan.* *t. 411.*

S. flore luteo. *Ger. em.* 717. *Riv. Monop. Irr.* *t. 107. f. 2.* *Baub. Prodr.* 112.
Angl. Yellow Figwort.

In aquosis et ad sepes rariùs.

About Bury in Suffolk. *Sir T. G. Cullum, Bart.*
Near Mitcham, Surrey. *Huds. Rev. Mr. Lysons.*
About

About Newburgh, Yorkshire. *Rev. Archdeacon Peirson.*

Biennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix fibrosa. Caulis quadrangulus, interdum pentagonus, pilosus. Folia opposita, sæpc terna, petiolata, cordata, acuta, acutè et duplicato-ferrata, venosa, subtùs præcipue pilosa. Pedunculi longitudine foliorum, axillares, solitarii, dichotomi, multiflori. Flores conferti. Calyx pubescens. Corolla ventricosa, flava, ore contracto. Capsula ovata, acuta.

286. DIGITALIS. *G. Pl.* 313. *Juss.* 120.
Gærtn. t. 53.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* campanulata, quinquefida, ventricosa. *Caps.* ovata, bilocularis, polysperma.

1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acutis, *purpurea*—corollis obtusis: labio superiore integro, foliis *rea*. pubescentibus.

Digitalis purpurea. *Sp. Pl.* 866. *Huds.* 275.
With. 555. *Sibth.* 197. *Curt. Lond. fasc.* 1.
t. 48. *Fl. Dan.* t. 74. *Woodv. Med. Bot.*
t. 24. *Fuchs. Hist.* 893. *Raii Syn.* *283.
Ger. em. 790. *Dreves. Bilderb.* t. 46.

Digitalis. *Riv. Monop. Irr.* t. 104.

Campanula sylvestris seu Digitalis. *Trag. Hist.*
889.

Digitalis, *herba*. *Pharmac. Lond.*
Angl. Purple Foxglove.

In pascuis et ad sepes, solo glareoso vel arenoso,
arido.

Biennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Caulis erectus, 3 vel 4-pedalis, virgatus, teretiusculus, pubescens, foliosus. Folia alterna, petiolata, subdecurrentia, ovata, crenata, rugosa, venosa, subtusa.

subtus præcipue pubescentia. Spica terminalis, erecta, multiflora, speciosa. Flores nutantes, purpurei; intus albidi, pilosi, sanguineo guttati. Capsula ovata, acuta. Semina numerosa, parva.
Variat flore albo, sed rarius.

287. LINNÆA. G. Pl. 319. Juss. 211.

Cal. duplex: fructus diphyllus; floris quinque-partitus, superus. *Cor.* campanulata. *Bacca* fissa, trilocularis.

borealis. I. LINNÆA.

Linnæa borealis. Sp. Pl. 880. Fl. Suec. 219. t. 1. Fl. Lapp. ed. 2. 214. t. 12. f. 4. Ait. H. Kew. v. 2. 358. Lamarck. Fl. Franc. v. 3. 368. Hoffm. Fl. Germ. 221. Fl. Dan. t. 3. Ehrb. Phyt. 5. Tr. of Linn. Soc. v. 3. 333. With. 556. Engl. Bot. t. 433.

Linnæa, n. 299. Hall. Hist. v. 1. 131.

Campanula serpyllifolia. Bauh. Prodr. 35. Rudb. Act. Suec. Amo 1720, 96. t. 1.

Angl. Two-flowered Linnæa.

In sylvis petrofis siccis alpinis.

In an old fir wood at Inglismaldie on the borders of Mearns-shire. Prof. James Beattie jun.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. Caules prostrati, repentes, perennes, lignosi, teretes, foliosi, subramosi, longissimi; juniores pilosi. Folia opposita, petiolata, subrotunda vel ovata, venosa, anticè crenata; suprà subpilosa; subtus pallidiora, nuda. Rami floriferi erecti, palmares, biflori, parùm foliosi. Pedicelli pilosi, viscidi, æquales, uniflori. Bracteæ oppositæ, lanceolatae. Flores nutantes, albo rubroque variegati. Calyx exterior inferus, diphyllus, rarius tetraphyllus, foliolis concavis, subrotundis, pilosis, germen amplectentibus; interior superus, pentaphyllus, foliolis lanceolatis, acutis, æquali-

bus. Corolla campanulata, tubo gracili, limbo quinquefido, regulari. Stylus filiformi-subclavatus, declinatus. Stigma obtusum. Baccia sicca, trilocularis. Semina solitaria, vel bina.

“Flores nocte fragrantes, odore Spirææ Ulmariæ.” Linn.

288. SIBTHORPIA. G. Pl. 320. Juss. 99.
Gærtn. t. 55.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* quinquefida, irregularis. *Stam.* per paria approximata. *Caps.* compressa, obcordata, bilocularis; dissepimentis transversis.

1. SIBTHORPIA foliis reniformibus subpeltatis *europaea*. crenatis.

Sibthorbia europaea. Sp. Pl. 880. Huds. 276. With. 556. Dicks. Dr. Pl. 76. Engl. Bot. t. 649.

S. prostrata. Salisb. Ic. 11. t. 6.

Alfine spuria pufilla repens, foliis Saxifragæ aureæ. Raii Syn. 352. Pluk. Phyt. t. 7. f. 6.

Cornwall Pennywort. Pet. H. Brit. t. 6. f. 11. Angl. Cornish Moneywort. Sibthorpia.

In umbrosis humidis, et ad scaturigines Cornubiæ et Devoniæ.

Plentiful in Cornwall and Devonshire. Prof. J: Sibthorp, M. D.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caules prostrati, repentes, ramosi, longissimi, implexi, filiformes, pilosi, foliosi. Folia alterna, petiolata, horizontalia, reniformia, latè crenata, pilosa. Pedunculi axillares, solitarii, breves, uniflori, pilosi. Calyx hispidus. Corolla luteo-purpurascens. Stamina brevissima. Stigma peltatum. Semina pauca.

289. LIMOSELLA. G. Pl. 320. Juss. 96.
Gærtn. t. 50.

Cal. quinquefidus. *Cor.* quinquefida, subæqualis. *Stam.* per paria approximata. *Caps.* ovata, unilocularis, bivalvis, polysperma.

aquatica. 1. LIMOSELLA.

Limosella aquatica. Sp. Pl. 881. Huds. 276.
With. 557. Relb. 245. Sibth. 197. Engl.
Bot. t. 357. Fl. Dan. t. 69.

Plantaginella palustris. Raii Syn. 278. Rupp.
Jen. ed. Hall. 23. t. 6. f. 3. Moris. sect. 15.
t. 2.

Spergula perpusilla lanceatis foliolis: Loef. Pruf.
261. t. 81.

Angl. Mudwort.

In inundatis limosis exsiccatis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa, stolonibus repentibus. Folia radicalia, longius petiolata, erecta, lanceolata, integerima, glabra. Pedunculi radicales, uniflori, foliis breviores, demum deflexi. Flores exigui, carnei. Calyx parum irregulär, acutus, glaber. Corollæ tubus ventricosus; limbis quinquefidus, laciniis duabus superioribus saepe inflexis, insimâ angustiore. Stamina brevia. Germen ovatum, “biloculare.” Gærtn. Stigma globosum, subfessile. Capsula ovata, semilibocularis, dissepimento ad basin obsoleto. Semina plurima.

* * * *Calyses subdiphylli.*

290. OROBANCHE. G. Pl. 321. Juss. 101.

Cal. e foliolis duobus, lobatis, lateralibus. *Cor.* ringens. *Caps.* unilocularis, bivalvis, polysperma. *Glandula* sub basi germinis.

* Brac.

* *Bracteis solitariis.*

1. OROBANCHE caule simplici, corollâ inflatâ : *major*, labii laciniis acutis æqualibus, staminibus glabris, stylo pubescente.

Orobanche major. *Sp. Pl.* 882. *Huds.* 265.

With. 557. *Rehb.* 237. *Sibth.* 191. *Curt.*

Lond. fasc. 4. *t.* 44. *Engl. Bot.* *t.* 421. *Sutton Tr. of Linn. Soc.* *v.* 4. 175.

O. *major* *Garyophyllum olens.* *Raii Syn.* *288, nec *Bauhini*.

Angl. Greater Broom-rape.

In dumetis, solo steriliore, in Spartio vel Ulice parasitica.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix carnosa, sub-bulbosa, parasitica, squamosa. Caulis simplicissimus, erectus, pedalis, carnosus, angulatus, squamosus, pubescens, fuscescens. Spica terminalis, simplex, multiflora: *Bracteæ* solitariæ, lanceolatæ, acutæ, fuscæ, vel rubiginosæ. Flores sessiles, colore tristi, purpureo-rubiginoso, inodori. Calycis foliola semibifida, laciniis lanceolatis, acutis, subæqualibus, colore bractearium. Corolla calyce duplò longior, ventricosa, dorso carinata; labio superiore integro, margine reflexo, repando; inferiore trisido, deflexo, laciniis æqualibus, acutis, undulatis, subinde crenatis. Stamina tubo breviora, basi dilatata, canaliculata, glaberrima, supernè glandulosò-pubescentia. Antheræ subtus acuminatæ, bilobæ, glabræ. Germen superum, ovatum, pubescens. Stylus pubescens, staminibus vix longior. Stigma deflexum, bilobum, obtusum, divaricatum, flavum. Capsula ovata, membranacea. Semina numerosissima.

2. OROBANCHE caule simplici, corollâ tubulosâ : labii laciniis acutis æqualibus, staminibus pubescentibus, stylo glabro.

Orobanche elatior. *Sutton Tr. of Linn. Soc.*

v. 4. 178. *t.* 17. *Engl. Bot.* *t.* 568.

Angl. Tall Broom-rape.

In

In agris et eorum marginibus, solo glareoso, haud infrequens. *D. Sutton.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Habitus præcedentis, sed elatior, magisque flavescens. Radix Trifolio pratensi vel Centaureæ Scabiosæ plerumque adhærens. Flores numerosissimi. Calycis foliola antice basi connata. Corolla minus ventricosa, limbo fimbriato-erispo; labio superiore subinde emarginato. Stamina tubo supra basin inserta, intus ad medium usque pubescentia, apice glabra. Germen stylusque glaberrimus. Stigma obovatum, flavum.

minor. 3. OROBANCHE caule simplici, corollâ tubulosâ : labii laciniâ mediâ lobatâ, flaminibus ciliatis, stylo glabro.

Orobanche minor. *Engl. Bot. t. 422. Sutton Tr. of Linn. Soc. v. 4. 179.*

O. flore minore. *Dill. in Raii Syn. *288.*

Angl. Lesser Broom-rape.

In agris, imprimis ad radices Trifolii prætensis.

In clover fields in Norfolk very plentifully. Found by Mr. Jacob Rayer in Kent. In clover fields near Crickhowel, Brecknockshire. *Rev. Dr. Goodenough.*

Annua? Fl. Julio, Augusto.

Prioribus minor, colore pallidè purpureo-sens.

Caulis subsflexuosus. Flores pauciores quam in O. elatiori. Calycis foliola plerumque inæqualiter divisa, interdum integra, basi distincta. Corolla minimè ventricosa; labio superiore suberenato; inferiore trifido, undulato, laciniâ mediâ majori, saepius trilobâ. Stanina ciliata, nec undique pilosa. Stylus glaber. Stigma dilatatum, emarginatum, purpureum.

* * *Bracteis ternis.*

cærulea. 4. OROBANCHE caule simplici, bracteis ternis, corollæ labio superiore bisido inciso.

Oro-

- Orobanche cærulea. *Villars. Dauph. v. 2. 406.*
Engl. Bot. t. 423. Sutton Tr. of Linn. Soc,
v. 4. 182.
- O. laevis. *Lamarck. Fl. Franc. v. 2. 327. Reichenbard. Syst. v. 3. 183.*
- O. purpurea. *Jacq. Austr. t. 276.*
- O. n. 294. *Hall. Hist. v. 1. 129.*
- O. ramosa β. *With. 558.*
- O. purpurascens. *Gmel. Syst. 954.*
- O. quarta. *Lob. Ic. v. 2. 269.*
- O. secunda. *Clus. Hist. v. 1. 271.*
- O. flore obsoleto majore. *Moris. sect. 12. t. 16.*
f. 2.
- O. flore majore. *Ger. em. 1312.*

Nidus avis flore et caule violaceo-purpureo colore. *Goodyer. in Ger. em. 228, ex descr. nec icon.*

Angl. Purple Broom-rape.

In pascuis montosis graminosis maritimis.

At Sheringham, Beefton, and North Reps, Norfolk. *Rev. Mr. Sutton. Mr. Skrimshire.*

Perennis. Fl. Julio.

Caulis rectus, vix flexuosus, ferè pedalis, minus pubescens, squamisque rarioribus, colore cærulefcenti. Spica pauciflora, laxa, obtusa. Bracteæ ternæ, quarum duæ interiores minoræ. Calycis foliola connata, bifida, lacinii attenuatis, acutis. Corolla tubulosa, calyce triplò ferè longior, cæruleo-violacea, dorso carinata; labio superiore erecto, bilobo, denticulis intermediis; inferiore trilobo, lacinii acutis, æqualibus, integrerimis; palato albo pubescente. Stamina filiformia, glabra. Germen glabrum. Stylus filiformis, pubescens. Stigma capitatum, bilobum, flavescentis.

5. OROBANCHE caule ramoso, bracteis ternis, *ramosa.*
corollâ quinquefidâ lacinii obtusis integerimis.

Oro-

Orobanche ramosa. *Sp. Pl.* 882. *Huds.* 266.

With. 558. *Sutton Tr. of Linn. Soc.* v. 4. 185.

Engl. Bot. t. 184. *Dill. in Raii Syn.* *288.

Ger. em. 1312.

Orobanche. *Camer. Epit.* 311.

Angl. Branched Broom-rape.

In arvis, solo fertili humidiusculo, ad Cannabis radices parasitica.

In hemp fields at Brome, Norfolk, and at Mettingham, near Beccles, Suffolk. *Mr. Woodward.* At Outwell, Norfolk. *Rev. Mr. Sutton.*

Near Wisbech, Rev. Mr. Relhan. *With.* Near Beccles. *Sherard.*

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Caulis magis vel minus ramosus, subpubescens, feret pedalis, parum squamosus. Spicæ acutæ, multifloræ. Flores minores quam in præcedentibus, purpureo-cyanei, tubo flavescente. Bracteæ ternæ, quarum duæ interiores minores, exterior remotiuscula. Calycis foliola connata, bifida, breviora, laciniis basi dilatatis, acutis. Corolla tubulosa, basi demum ventricosa; labio superiore erecto, bilobo, laciniis integerimis, obtusis; inferiore trilobo, laeiniis æqualibus, rotundatis; palato flavescente, villoso. Stamina basi subciliata. Germen globo-so-subquadratum, glabrum. Stylus filiformis, glabriusculus. Stigma retusum, dilatum, albidum.

Classis XV.

TETRADYNAMIA.

Stamina 6, quorum 4 longiora.

SILICULOSA.

Pericarpium subrotundum.

- 293. DRABA. *Silicula* integra, valvis planiusculis, dissepimento parallelis.
- 292. SUBULARIA. *Silic.* integra, valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis.
- 291. VELLA. *Silic.* dissepimento exerto, valvulis duplò longiore.
- 300. ISATIS. *Silic.* decidua, bivalvis, monosperma.
- 302. CRAMBE. *Silic.* decidua, evalvis, monosperma, coriacea.
- 301. BUNIAS. *Silic.* decidua, evalvis, acutè quadrangula.
- 294. ALYSSUM. *Silic.* subintegra, marginata, valvulis concavis, dissepimento parallelis.
- 297. COCHLEARIA. *Silic.* subintegra, turgida, rugosa, bivalvis, polysperma.
- 298. CORONOPUS. *Silic.* subintegra, compressa, corrugata, evalvis, disperma.
- 295. LEPIDIUM. *Silic.* emarginata, elliptica; valvulis carinatis.
- 296. THLASPI. *Silic.* emarginata, obcordata; valvulis marginato-carinatis.

299. IBERIS. *Silic.* emarginata, obcordata. *Pet.*
duo exteriora majora.

SILIQUOSA.

Pericarpium longissimum, polyspermum.

- * *Calyx clausus, foliolis longitudinaliter conniventibus.*
- 313. RAPHANUS. *Siliqua* torosa, subarticulata.
- 306. ERYSIMUM. *Siliqua* tetragona.
- 307. CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque glandulâ notatum. *Sem.* plana.
- 308. HESPERIS. *Glandulæ* intra stamina breviora. *Petala* obliqua.
- 309. ARABIS. *Gland.* quatuor, reflexæ. *Siliqua* linearis, torulosa.
- 310. TURRITIS. *Siliqua* striata, subangulata.
Cor. erecta.
- 311. BRASSICA. *Siliqua* teretiuscula. *Sem.* globosa.
- 303. DENTARIA. *Siliqua* elasticè diffiliens, valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum.

* * *Calyx hians, foliolis supernè distantibus.*

- 304. CARDAMINE. *Siliqua* elasticè diffiliens, valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* subhians.
- 305. SISYMBRIUM. *Siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *Cal.* patulus.
- 312. SINAPIS. *Siliqua* teretiuscula, dissepimento prominente. *Cal.* horizontaliter patens.

XV. TETRADYNAZIA.

I. SILICULOSA.

291. VELLA. *G. Pl.* 331. *Juss.* 241.
Gærtn. t. 141.

Silicula dissepimento valvulis duplò longiore,
exerto, extùs ovato.

1. VELLA foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. *annua.*
Vella annua. *Sp. Pl.* 895. *Huds.* 278. *With.*
564.
Nasturtium sylvestre, Eruca affine. *Raii Syn.*
304.
N. sylvestre Valentimum. *Clus. Hist.* v. 2. 130.
Bauh. Hist. v. 2. 920.
Eruca nasturtio cognata tenuifolia. *Ger. em.* 247.
Valencia Cress. *Pet. H. Brit.* t. 50. f. 5.
Angl. Annual Cress-rocket.

In arvis arenosis rariùs.

On Salisbury Plain near Stonehenge, Mr. Lawson.
Ray.

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa, parva. Cotyledones obcordatæ, glabræ.
Caulis ramosus, foliosus, hispidus, setis deflexis. Folia
alterna, bipinnatifida, hispidiuscula. Spicæ terminales,
multifloræ. Flores pedicellati. Calyx tubulosus, clau-
sus, foliolis longitudinaliter conniventibus, nitidis, pur-
pureis. Petala obovata, integra, ochroleuca, venis
violaceis, unguibus tenuissimis. Silicula deflexa, ellip-
tica, hispida, dissepimento exerto glabro, dilatato.
Semina utrinque tria vel quatuor, subrotunda.

292. SUBULARIA. G. Pl. 332. Juss. 240.

Silicula integra, ovata : valvulis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. *Stylus* siliculâ brevior.

aquatica. I. SUBULARIA.

Subularia aquatica. Sp. Pl. 896. Huds. 277.

With. 564. Dicks. H. Sicc. fasc. 5. 9.

Lightf. 337. Fl. Dan. t. 35.

S. erecta, junci foliis acutis mollibus. Raii Syn. 307.

Graminifolia aquatica, Thlaspeos capitulis rotundis, septo medio siliculam dirimente. Pluk.

Phyt. t. 188. f. 5.

Gramen junceum Hibernicum, Thlaspeos capitulis Sherardi. Moris. sect. 8. t. 10. f. 29.

Irish Rush Cress. Pet. H. Brit. t. 48. f. 8.

Angl. Awl-wort.

In lacubus alpinis immersa, solo fabuloso.

In Lough Neagh, Ireland. Sherard. Lough Carran, Scotland; Dr. Hope. Huds. Loch Tay, Rev. Mr. Stuart. Lightf. In several lakes in North Wales. Huds. Mr. Griffith, and Mr. Bingley.

Annua. Fl. Julio.

Herba pusilla, tota cum floribus aquâ immersa.

Radix fibrosa, alba. Folia subulata, glabra, radicalia. Scapi foliis duplò longiores, glabri, racemosi. Flores pedicellati, exigui, albi, petalis conniventibus. Silicula elliptica, integra, valvulis navicularibus, vix carinatis, glabris, dissepimento contrario, pellucido. Semina parva, ovata, compressa, utrinque subterna.

293. DRABA. *G. Pl.* 333. *Juss.* 240.
Gærtn. t. 141.

Silicula *integra*, ovali-oblonga : valvulis planiusculis, dissèpimento parallelis. *Stylus* vix ullus.

1. DRABA scapis nudis, petalis bipartitis, foliis *verna*. lanceolatis subincisis hirtis.

Draba verna. *Sp. Pl.* 896. *Huds.* 278. *With.* 565. *Rehb.* 246. *Sibth.* 198. *Curt. Lond.* fasc. 1. t. 49. *Fl. Dan.* t. 983. *Engl. Bot.* t. 586.

Paronychia vulgaris. *Raii Syn.* 292. *Ger. em.* 624.

Angl. Common Whitlow-grass.

In muris, aggeribus, et pascuis aridis, *vulgaris*.

Annua. Fl. Martio, Aprili.

Radix fibrosa, longa. *Folia omnia radicalia*, lanceolata, *integra* vel irregulariter dentata, hirta, pilis simplicibus vel furcatis. *Scapi subpalmates*, erecti, *simplices*, *corymboso-racemosi*, teretes, aphylli, subpilosii. *Calyx patens*. *Petala alba*, semibifida. *Silicula elliptica*, *plana*, *glabra*, *polysperma*, *stigmata* *fessili*, *persistente*.

2. DRABA scapo subfolioso, petalis integris, *filis hirta*, culis lanceolatis, foliis subdentatis ciliatis pilis simplicibus.

Draba hirta. *Sp. Pl.* 897.

D. stellata. *Dicks. Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 288.
Crypt. fasc. 2. 29. *With.* 565.

D. pyrenaica. *Fl. Dan.* t. 143. nec *Linn.*

Angl. Simple-haired Whitlow-grass.

In rupibus alpinis Scoticis.

Found on Ben Lawers by Mr. Dickson, from whom I received a specimen.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix cæspitosa. Folia omnia ferè radicalia, lanceolata, obsoletè dentata vel repanda, ciliata, interdum subtus pilosa, pilis simplicissimis, adseendentibus. Scapus palmaris, erectus, simplex, corymboso-racemosus, teres, subpilosus, basin versus submonophyllus, folio radicibus conformi. Flores parvi, albi. Calyx patens, hirtus. Petala vix emarginata. Silicula lanceolata, pedicello parùm longior, erecta, planiuscula, stylo brevissimo mucronata, hirta, pilis brevissimis, divaricatis, furcatis, interdum glabra.

Bursa pastoris alpina hirsuta, Baub. Prod. 51, differre videtur foliis caulinis pluribus, palmato-dentatis. Draba stellata Jacquinii plurimis notis a nostrâ diserepat, imprimis pilis foliorum stellatis, siliculis ellipticis, brevibus, stylo elongato, floribus triplò majoribus.

- incana.* 3. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, pilis implexis stellatis, siliculis oblongis obliquis.
Draba incana. Sp. Pl. 897. Hudf. 279. With. 566. Lightf. 338. Engl. Bot. t. 388. Fl. Dan. t. 130.
Lunaria contorta major. Raii Syn. 291.
Wreathed Cress. Pet. H. Brit. t. 48. f. 3.
β. Paronychiæ similis sed major, perennis alpina repens. Raii Syn. 292.
Small Wreath Cress. Pet. H. Brit. t. 48. f. 4.
Angl. Twisted-podded Whitlow-grass.

In rupibus calcareis alpinis.

In Wales, Westmorland and Scotland. On the top of Ingleborough. Mr. Woodward.

Biennis. Fl. Maio, Junio.

Radix longissima, ramosa. Herba magnitudine insigniter variabilis, tota ineana, pilis brevissimis, stellatis, implexis. Caulis simplex vel supernè ramosus, teres, undique foliosus. Folia alterna, sessilia, ovata, integra vel ineiso-dentata, nervosa. Flores corymboso-racemosi, numerosi, albi. Calyx hirtus. Petala emarginata. Silicula

TETRADYNAMIA—SILICULOSA. 679

Silicula elliptico-oblonga, tortuosa, glabra, stylo brevissimo mucronata. Pedicelli brevissimi.

4. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis *muralis*, hirtis, siliculis ellipticis obtusis planis.

Draba muralis. *Sp. Pl.* 897. *Huds.* 278. *With.* 566.

D. minima muralis discoides. *Column. Ecphr.* 274. *t.* 272.

Bursa pastoris major, loculo oblongo. *Raii Syn.* 292. *Baub. Prodr.* 50.

Speedwell Cress. *Pet. H. Brit.* *t.* 48. *f.* 5.

Angl. Speedwell-leaved Whitlow-grass.

In umbrosis ad latera montium.

In several parts of Craven, Yorkshire. *Ray.* About Malham Cove. *Richardson.* *Curt. With.* At Old Malton on walls. *Rev. Archdeacon Peirson.*

Annua. Fl. Maio:

Radix fibrosa, parva. Caulis a basi ramosus, foliosus, teres, scaber, pilis stellatis. Folia alterna, cordata, amplexicaulia, dentata, hirta, pilis simplicibus et furcatis. Flores corymboso-racemosi, numerosi, exigui, albi, racemo fructifero longissimo, pedicellis patentibus, siliculâ duplò longioribus. Petala obovata, integra. Silicula plana, obovato-elliptica, glabra, stylo brevissimo.

294. ALYSSUM. *G. Pl.* 335. *Juss.* 240.

Gærtn. *t.* 141. *Hall. Hist.* *v.* 1. 212.

Silicula subintegra; marginata, stylo mucronata: valvulis concavis, dissepimento parallelis. *Filamenta* duo (in quibusdam) denticulo notata.

- *1. ALYSSUM caule herbaceo, foliis lanceolatis *sativum*. sagittatis, siliculis obovatis inflatis.

Alyssum n. 489. *Hall. Hist. v. 1. 212.*

Alysson segetum, foliis auriculatis acutis. *Tourn. Inst. 217.*

Myagrum. *Raii Syn. 302. Ger. em. 273.*

M. sativum. *Sp. Pl. 894. Huds. 277. Fl. Dan. t. 1038.*

Moenchia sativa. *Gmel. Syst. v. 2. 971. Wth. 562.*

Camelina sativa. *Crantz. Austr. fasc. 1. 17.*

Pseudo-myagrum alterum. *Camer. Epit. 902.*

Sesama. *Trag. Hist. 655.*

Angl. Gold of Pleasure. *Pet. H. Brit. t. 48. f. 11.*

In agris inter Linum, quandoque et ad vias, vix indigena.

In Hezlington field near York. *Sir T. Frankland.*

Out of St Giles's gates, Norwich, by the road side.

Annua. Fl. Junio.

Radix parva. Caulis erectus, sesquipedalis, teres, subpubescens, foliosus, apice paniculatus. Folia alterna, lanceolata, obsoletè dentata, seabriuseula, basi sagittata, amplexicaulia. Corymbi terminales, multiflori, demum racemosi, longissimi. Flores parvi, lutei. Calyx patens. Petala obtusa, integra. Filamenta simplicia. Siliculæ erectæ, obovatæ, integræ, inflatæ, glabræ, compresso-marginatæ, stylo siliculâ dimidio breviore mueronatæ, utrinque polyspermæ. Semina obovata, vix angulata, neque marginata.

Planta genere obscura, a *Myagris veris*, si quæ alia, distincta. Cum *Alyssis Linnæanis* pluribus, siliculâ inflatâ, optimè convenit, quamvis filamenti dentieulis non notantur, quod aliis etiam speciebus accedit; neque profectò hæc naturalem præbent differentiam genericam.

295. LEPIDIUM. *G. Pl.* 333. *Juss.* 241.
Gærtn. t. 141.

Silicula emarginata, elliptica, polysperma: valvulis carinatis, dissepimento contrariis.

1. LEPIDIUM foliis pinnatifidis integerrimis, *petræum*.
petalis calyce brevioribus, siliculis elliptico-oblongis.

Lepidium petræum. *Sp. Pl.* 899. *Huds.* 280.
Witt. 567. *Engl. Bot.* t. 111. *Jacq. Austr.*
t. 131.

L. *Linnæi*. *Crantz. Austr.* fasc. 1. 7. t. 2.
f. 4, 5.

Nasturtium montanum annuum tenuissimè
divisum. *Raii Syn.* 304.

Cardamine pusilla saxatilis montana discoides.

Column. Ecphr. 274. t. 273.

Fine Cres. *Pet. H. Brit.* t. 50. f. 4.

Angl. Mountain Pepper-wort.

In apriis calcareis Angliæ australioris.

On St. Vincent's Rocks, and other places about
Bristol. *Sherard. Huds. Dr. John Ford.* At
Uphill, Somersetshire. *Huds.* On a limestone
wall near Pembroke. *J. Adams, Esq.*

Bianis. Fl. Martio, Aprili.

Radix exiguæ, fibrosa. Caules vix triunciales, patuli, ramosi, foliosi, teretes, subpubescentes. Folia alterna, impari-pinnatifida, multijuga, glabra, laciinis ellipticis vel spatulatis, integerrimis, oppositis. Corymbi terminales, multiflori, demùm racemosi. Flores parvi, albi, hexandri. Calycis foliola elliptica, obtusa, patula, margine scariosa. Petala calyce breviora, vix emarginata. Silicula elliptico-oblonga, compressa, glabra, obsoletè emarginata, stigmate sessili, dissepimento contrario, lanciolato. Semina utrinque bina, subrotunda.

latifoli- 2. **LEPIDIUM** foliis ovato-lanceolatis integris serratis.

Lepidium latifolium. *Sp. Pl.* 899. *Huds.* 279.
With. 567. *Raii Syn.* 304. *Engl. Bot.* t. 182.
Fl. Dan. t. 557.

L. majus. *Cord. Hist.* 124. 2.

Lepidium. *Fuchs. Hist.* 484.

Raphanus sylvestris officinarum. *Ger. em.* 241.

Angl. Broad-leaved Pepper-wort.

In pratis humidis subsalsis, clivis maritimis.

In several parts of Essex. *Ray.* Yorkshire. *Richardson.* *With.* Sheringham Cliffs, Norfolk. *Mr. Humphrey.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix ramosa, longissima. Caules tripedales, erecti, ramosi, foliosi, teretes, glabri, paniculati, multiflori. Folia alterna, ovato-lanceolata, basi attenuata, medio præcipue ferrata, glabra, glaucescentia, acuta. Flores hexandri, parvi, albi. Petala calyce longiora, integra. Silicula elliptica, stigmate sessili.

ruderale. 3. **LEPIDIUM** floribus diandris apetalis, foliis inferioribus pinnatifidis dentatis; superioribus linearibus integerrimis.

Lepidium ruderale. *Sp. Pl.* 900. *Huds.* 279.
With. 568. *Relb.* 247. *Fl. Dan.* t. 184.

Nasturtium sylvestre, *Osyridis* folio. *Raii Syn.*

303.

Thlaspi minus. *Ger. em.* 262.

T. angustifolium. *Fuchs. Hist.* 307.

Thlaspidii genus. *Trag. Hist.* 83.

Narrow Wild Cress. *Pet. H. Brit.* t. 50. f. 1.

Angl. Narrow-leaved Pepper-wort.

In ruderatis maritimis.

At Yarmouth, Cley and Lynn, Norfolk, plentifully.

At Truro, Cornwall, and Maldon, Essex. *Ray.*

Below

Below Bristol. *With.* By the side of the Severn above Worcester. *Dr. Stokes.*

Biennis. Fl. Junio.

Radix ramosa. Caulis pedalis, erectus, ramosus, foliosus, divaricatus, flexuosus, teres, incanus. Folia carnosa, glabra; inferiora pinnatifida, laciniis anticè dentatis; superiora linearia, obtusa, integerrima, subrevoluta. Flores exigui, apetali, diandri. Racemi fructiferi longissimi. Silicula elliptico-subrotunda, emarginata, glabra. Semina subsolitaria, pendula, obovata.

Petala nunquam inveni, nec stamina plura quam duo; Witheringius se flores saepius corollatos, et stamina interdum quatuor vidisse memorat, quæ et Gouanus & Scopolius affirmant.

296. THLASPI. *G. Pl.* 334. *Juss.* 241.
Gærtn. t. 141.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma : valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

i. THLASPI siliculis orbiculatis compressis lævi-*arvense.* bus, foliis oblongis dentatis glabris.

Thlaspi arvense. *Sp. Pl.* 901. *Huds.* 281. *With.* 568. *Relb.* 247. *Sibth.* 199. *Curt. Lond.* fasc. 6. t. 43. *Fl. Dan.* t. 793.

T. Dioscoridis. *Raii Syn.* 305. *Ger. em.* 262.

T. secundum. *Matth. Valgr.* v. 1. 519. *Cammer. Epit.* 337.

Angl. Penny Cress. Smooth Mithridate Mustard.

In arvis solo lutoso, subinde glareoso, rariùs.

In Essex, Suffolk and Staffordshire. *Ray.* Oxfordshire. *Rev. Dr. Goodenough.* On the shooting-ground, Norwich. *Mr. Rose.*

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva. Herba glabra. Caulis pedalis, supernè ramosus, teres, foliosus. Folia oblonga, dentata, basi fagittata,

sagittata, amplexicaulia. Flores albi, parvi. Petala integra. Silicula maxima, cordato-orbiculata, compressa, glabra, polyspernia, margine dilatato latissimo.

campes- 2. THLASPI siliculis subrotundis glanduloso-tre. punctatis supernè marginatis, foliis sagittatis dentatis incanis.

Thlaspi campestre. *Sp. Pl.* 902. *Huds.* 281. *With.* 569. *Sibth.* 199. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 45.

T. vulgaris. *Raii Syn.* 305.

Common Cow-cress. *Pet. H. Brit.* *t.* 50. *f.* 7.

β. Thlaspi Vaccariæ folio glabrum. *Raii Syn.* 305.

T. vulgarissimum. *Ger. em.* 262, ex icono.

Smooth Cow-cress. *Pet. H. Brit.* *t.* 50. *f.* 8.

γ. Thlaspi hirtum. *Huds.* 281.

Angl. Common Mithridate Mustard.

Inter segetes,

β. Near Warrington. *Mr. D. Turner.*

Annuæ. Fl. Junio.

Herba magis vel minus pubescens. Caulis pedalis, paniculato-ramosus. Folia sagittata, amplexicaulia, alterna, dentata, quandoque integerrima. Flores exigui, albi. Petala spatulata, calyce parùm longiora, integra. Silicula subrotunda, gibba, margine apice latissimo, emarginata, utrinque glanduloso-punctata, saepius glabra, interdùm pilosa. Semina solitaria.

hirtum. †3. THLASPI siliculis elliptico-oblongis pilosis impunctatis supernè marginatis, foliis caulinis sagittatis villosis.

Thlaspi hirtum. *Sp. Pl.* 901.

T. Vaccariæ incano folio perenne. *Raii Syn.* 305. *ed.* 2. 175.

T. villosum, capsulis hirsutis. *Bauh. Prod.* 47.

T. villosum. *Matth. Bauh.* 430.

Hoary Cress. *Pet. H. Brit.* *t.* 50. *f.* 10.

Angl.

Angl. Hairy Mithridate Mustard.

In montosis Cambrobritannicæ et alibi. *Raius.*

Biennis? Fl. Junio.

“Flores triplò etiam majores quam præcedentis, capsulae longiores et hirsutiores.” Ita descripsit Raius, quod exemplaribus in Herbario Linnæano conservatis apprimè respondet. Hinc summi viri auctoritatem servare non possum quin inter nostrates stirpes hanc speciem lubens enumerem, et si revera Thlaspi hirtum Hudsoni nil nisi campestris varietas sit. Planta Linnæana certo certius dignoscitur siliculis magis oblongis, parum gibbis, hirsutis, nequaquam glandulofo-punctatis.

4. THLASPI siliculis obcordatis, foliis caulinis *perfoliatum*, sagittato-cordatis amplexicaulibus, caule ramoso, stylo brevissimo.

Thlaspi perfoliatum. *Sp. Pl.* 902. *Huds.* ed. 1. 246. *Witb.* 569. *Sibth.* 199. *Jacq. Austr.* t. 337.

T. alpestre. *Huds.* 282. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 6. 5.

T. arvense perfoliatum minus. *Raii Syn.* ed. 2. 176. *Bauh. Pin.* 106.

T. arvense perfoliatum majus. *Bauh. Pin.* 106.

T. perfoliatum minus. *Raii Syn.* ed. 3. 305.

T. alterum mitius rotundifolium, Bursæ pastoris fructu. *Column. Ecphr.* 278. t. 276. f. 2.

T. cordatum minus, flore albo, insipidum. *Barrel. Ic.* t. 815.

T. tertium pumilum. *Cluf. Hist.* v. 2. 131.

T. minus Clufii. *Ger. em.* 268.

T. rotundifolium. *Ger. em.* 266. opt.

Small Thorow Cress. *Pet. H. Brit.* t. 50. f. 12.

Angl. Persoliate Shepherd's Purse.

In pascuis calcareis petrosis.

Among the stone-pits between Witney and Burford,

ford, Oxfordshire. *Bobart.* Also on Burford downs. *Sibth.*

Annua. Fl. Aprili, Maio.

Radix sibrosa. Caulis undique ramosus, nec nisi solo sterili simplex, spithameus, patens, teretiusculus, striatus, glaber, foliosus. Folia glabra, glauca, obsoletè dentata; radicalia petiolata, ovata, obtusa: caulinæ alterna, amplexicaulia, cordata, subsagittata, obtusiuscula. Corymbi terminales, parvi, densi, demùm racemosi, longissimi. Calyx patens, rubicundus. Petala alba, calyce duplò longiora, obtusa, integra. Silicula glabra, obcordata, lobis stylum brevissimum longè superantibus. Stigma capitatum. Semina utrinque plurinia.

Magnitudine variat, hinc duplex apud auctores exstat, ut optimè suspicatus est Raius. *Syn. ed. 2. 176.*

alpestre. 5. THLASPI siliculis obovatis retusis polyspermis, foliis caulinis sagittatis, caulis simplicibus, stylo porrecto.

Thlaspi alpestre. *Sp. Pl. 903. Engl. Bot. t. 81. With. 570.*

T. montanum. *Huds. 282. With. 570. Curt. Cat. (in Fl. Lond. v. 1.) n. 85.*

T. foliis Globulariæ. *Raii Syn. ed. 2. 175. ed. 3. 305. Bauh. Hist. v. 2. 926.*

T. montanum secundum. *Clus. Hist. v. 2. 131.*

T. albi supini varietas. *Ger. em. 268. f. 2.*

T. præcox. *Wulf. in Jacq. Coll. v. 2. 124. t. 9? Angl. Alpine Shepherd's Purse.*

In pascuis montosis.

Pastures about the ebbing and flowing well near Settle, Yorkshire (where I also have gathered it), and between Settle and Malham. *Ray.* On limestone rocks, and about the Lead mines, at Matlock, Derbyshire, growing with *Arenaria verna*, as Mr. Curtis observed it near Settle.

Perennis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix longissima, ramosa, multiceps. Caules plurimi, eretiusculi, spithamei, simplices, vix unquam divisi, teretes, glabri, foliosi. Folia glabra, glauca, integerima, vix dentata; radicalia numerosa, cæspitosa, petiolata, ovata, vel obovata, obtusa; caulina alterna, sessilia, subamplexicaulia, sagittata, acutiuscula. Corymbi ut in præcedente. Petala magnitudine varia, alba. Silicula vix obcordata, sed potius obovata, retusa, gibba, stylo elongato, longè ultra lobos prominente, mucronata. Semina utrinque plurima.

Siliculæ in Engl. Bot. nimis aliquantulum cordatæ.

6. THLASPI hirsutum, siliculis deltoideo obcordatis, toliis radicalibus pinnatifidis. *Bursa-Pastoris.*

Thlaspi Bursa-Pastoris. *Sp. Pl.* 903. *Huds.* 283.

With. 571. *Relb.* 248. *Sibth.* 200. *Curt.*
Lond. fasc. 1. *t.* 50.

Bursa Pastoris. *Raii Syn.* 306. *Ger. em.* 276.
Matth. Valgr. v. 1. 521.

Pastoria Bursa. *Fuchs. Hist.* 611.

Sheaperd's Purse. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 4—7.
Angl. Common Shepherd's Purse.

In ruderatis, cultis, et ad vias passim.

Annua. Fl. Martio, Aprili, totoque ferè anno.

Radix fibrosa. Herba hirsuto-scabra. Caulis ramosus, teres, foliosus. Folia radicalia pinnatisida, dentata; caulina oblonga, basi cordato-amplexicaulia. Corymbi ut in aliis. Flores albi. Siliculæ glabræ, deltoideo-obcordatæ, marginè non dilatato, stylo brevi terminatæ. Semina numerosa.

Variat in solo sterili cretaceo foliis omnibus cauleque simplicibus. Conf. *Pet. f.* 7.

297. COCHLEARIA. *G. Pl.* 334. *Juss.* 240.

Silicula turgida, rugosa, polysperma: valvulis gibbis, obtusis.

I. COCH-

- fficina-*
lis.
1. **COCHLEARIA** foliis radicalibus subrotundis ; caulinis oblongis subfinuatis, siliculis globosis. *Cochlearia officinalis. Sp. Pl. 903. Huds. 283. With. 571. Engl. Bot. t. 551. Fl. Dan. t. 135. Woodv. Med. Bot. t. 29.* *Cochlearia. Raii Syn. 302. Baub. Hist. v. 2. 942. Camer. Epit. 271.* *C. rotundifolia. Ger. em. 401.* *Garden Scurvy-grass. Pet. H. Brit. t. 49. f. 1.* *β. Cochlearia minor rotundifolia nostras. Raii Syn. 303.*
 - γ. *C. groenlandica. With. 573. nec Linn.* *C. rotundifolia. Dill. in Raii Syn. 302.* *Cochlearia hortensis, herba. Pharmac. Lond. Angl. Common Scurvy-grass.*

In littoribus maritimis cœnosiis vel petrofisi, interdum et in irriguis alpinis:

γ. Common on the mountains about Llanberis.
Huds. Mr. Bingley.

Annua. Fl. Maij.

Herba glabra, subcarnosa, magnitudine varia. Caulis angulatus, corymboso-ramosus, foliosus. Folia radicalia longius petiolata, reniformi-subrotunda, subdentata vel repanda ; caulina sessilia, amplexicaulia, alterna, oblonga, angulata vel sinuata. Corymbi terminales, multiflori, demum racemosi, ebracteati. Calyx obtusus, patulus, conçavus. Petala obovata, integra, alba. Silicula globosa, stylo brevissimo coronata, non emarginata, parum rugosa, obsoletè venosa. Semina utrinque 5 vel 6.

Var. β nondum vidi ; γ vix differt ab α nisi magnitudine minori, styloque parum elongato. Distincta a C. groenlandica Linn.

- anglica. 2. COCHLEARIA* foliis radicalibus ovatis integris ; caulinis lanceolatis dentatis, siliculis ellipticis reticulato-venosis.

Cochlearia

- Cochlearia anglica. *Sp. Pl.* 903. *Huds.* 284.
Wth. 574. *Engl. Bot.* t. 552. *Fl. Dan.*
 t. 329.
 C. folio sinuato. *Raii Syn.* 303.
 C. britannica. *Dod. Pempt.* 594. *Ger. em.* 401.
Dalech. Hist. 1320.
 Sea Scurvy-grass. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 2.
Angl. English Scurvy-grass.

In littoribus maritimis cœnōsis.

Annua. Fl. Maio.

Herba magnitudine et foliorum formâ variabilis, glabra, subcarnosa. Præcedente plerumque minor. Folia radicalia longè petiolata, ovata, integra, rariūs subdentata, vel repanda; caulina lanceolata, nec ovata, amplexicaulia, dentata, vix sinuata. Flores præcedentis. Silicula duplò major, elliptica, turgida, et subinde ferè globosa, venis numerosis, prominentibus, reticulato-corrugata, stylo longiusculo coronata.

3. COCHLEARIA foliis omnibus deltoideis pe- *danica.*
 tiolatis, siliculis ellipticis reticulato-venosis.
 Cochlearia danica. *Sp. Pl.* 903. *Huds.* 284.
Wth. 573. *Fl. Dan.* t. 100.
 C. marina, folio anguloſo parvo. *Raii Syn.* 303.
 Thlaspi hederaceum. *Lob. Ic.* 615. *Ger. em.*
 271. *Bauh. Hist.* v. 2. 933.
 Ivy Scurvy-grass. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 3.
Angl. Danish Scurvy-grass.

In maritimis cœnōsis rariūs.

In the isle of Walney, Lancashire. *Ray.* Near
 Llanbadrick church, Anglesea. *Mr. Lwyd.*
 At Wells, Norfolk. *Mr. Crowe.*

Annua. Fl. Maio, Junio.

Præcedentibus minor. Caules palmares, parùm ramosi.
 Folia omnia ferè petiolata, magnitudine æqualia, et
 quasi uniformia, deltoidea, triloba, quinqueloba, sub-
 dentata.

dentata. Coty়mbi vix in racemum elongati. Flores albi, parvi. Silicula omnino elliptica, minus turgida, reticulato-venosa, stylo breviore coronata. Semina utrinque sex.

armorae 4. COCHLEARIA foliis radicalibus oblongis cre-
natis; caulinis lanceolatis incisis integrifve.

Cochlearia Armoracia. *Sp. Pl.* 904. *Huds.* 284.
With. 575. *Rehb.* 249. *Sibth.* 200. *Woodw.*
Med. Bot. t. 150.

Raphanus rusticus. *Raii Syn.* 301. *Ger. em.*
241.

R. sylvestris. *Fuchs. Hist.* 660.

R. major, seu Armoracia radix. *Trag. Hist.* 734.
Broad Horse-radish. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 11.

E. Jagged Horse-radish. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 12.

Raphanus rusticus, radix. *Pharmac. Lond.*
Angl. Horse-radish.

In aquofis, præcipue subalpinis.

About Alnwick, and other parts of Northumber-
land. *Ray.* Upon the banks of Skipton-beck,
and elsewhere in Craven. *Dr. Lister.* Common
in waste ground from the outcasts of gardens.

Perennis. Fl. Maio.

Radix alba, teres, longissima, vivacissima, acris. Caules
bipedales, erecti, corymbosi, foliosi. Folia radicalia
petiolata, maxima, oblonga, crenata, interdum pinna-
tifida, venosa; caulina sessilia, lanceolata, incisa vel in-
tegerrima. Flores albi. Silicula elliptica, stylo bre-
vissimo, stigmate maximo. Fructus plerumque abortit.

298. CORONOPUS. *Gærtn.* t. 142.

Silicula reniformis, compressa, corrugata, loculis
evalvibus, monospermis.

Ruellii. t. CORONOPUS siliculis integris cristato-muri-
catis, stylo porrecto, corymbis paucifloris.
Coronopus

TETRADYNAZIA—SILICULOSA. 691

Coronopus Ruellii. *Gærtn.* v. 1. 293. t. 142.
f. 5. *Ger. em.* 427. *Dalech. Hist.* 670.

C. n. 502. *Hall. Hist.* v. 1. 217.

Cochlearia Coronopus. *Sp. Pl.* 904. *Huds.* 284.
With. 574. *Rehb.* 248. *Sibth.* 200. *Fl. Dan.*
t. 202. *Mart. Fl. Rust.* t. 92.

Nasturtium supinum, capsulis verrucosis. *Raii*
Syn. 304.

Pseudambrosia. *Camer. Epit.* 596.

Wart or Swine's-cress. *Pet. H. Brit.* t. 50. f. 6.
Angl. Common Wart-cress. Swine's Cress.

In ruderatis et ad vias frequens.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Caules ramosi, omnino prostrati, depresso, foliosi, glabri.
Folia alterna, glabra, subglauciflora, pinnatifida,
lacinias saepius anticè dentato-pectinatis. Corymbo
oppositifolii, sessiles, breves, pauciflori, demum race-
mosi. Flores exigui, albi. Silicula reniformis, com-
pressa, corrugata, margine cristato-muricata, apice ne-
quaquam emarginata, sed stylo porrecto, pyramidato,
brevi, mucronata; loculamenta hemisphaerica, coriacea,
non dehiscentia, monosperma.

2. *CORONOPUS* siliculis emarginatis didymis *didyma.*
reticulato - rugosis, styllo obsoleto, corymbis
multifloris.

Lepidium didymum. *Mant.* 92. *Dickf. Dr.*
Pl. 11. *With.* 567. *Engl. Bot.* t. 248.

L. anglicum. *Huds.* 280.

Angl. Lesser Wart-cress. Procumbent Pepper-
wort.

In ruderatis Angliae occidentalis.

At Dale near Milford Haven. *J. Adams, Esq.*
About Exeter. *Mr. Newbery.* About Truro
and Penryn in Cornwall. *Huds.*

Annua. Fl. Julio.

Præcedente

Præcedente minor. Caules procumbentes, teretes, pilosi, ramosi, foliosi. Folia pinnatifida, lacinias anticè dentatis. Corymbi suboppositifolii, vel subinde axillares, multiflori, demum in racemum longissimum extensi. Flores exigui, petalis albis, minutis. Silicula didyma, utrinque emarginata, reticulato-rugosa, nec muricata, stylo exigu, lobis breviore, terminata. Stamina 2 vel 4. vix plura.

299. IBERIS. G. Pl. 335. Juss. 240.
Gærtn. t. 141.

Cor. irregularis : petalis duobus exterioribus majoribus. *Silicula* polysperma, emarginata.

amara. 1. IBERIS herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus spicatis.

Iberis amara. Sp. Pl. 906. Huds. 285. With. 575. Sibth. 201. Engl. Bot. t. 52.

Thlaspi amarum. Ger. em. 263.

T. umbellatum arvense amarum. Baub. Hist. v. 2. 925.

Thlaspidium foliis nasturtii. Riv. Tetrap. Irr. t. 108.

Angl. Bitter Candy-tuft.

In arvis cretaceis rariùs.

About Henley and other places in Oxfordshire.

Huds. About Wallingford, Berkshire, plentifully, and undoubtedly wild.

Annuæ. Fl. Julio.

Herba glabra, amara. Caules diffusi, ramosi, foliosi. Folia alterna, lanceolata, subcarnosa, supernè dilatata, et saepius dentata. Corymbi spicati, multiflori. Flores nivei, speciosi. Silicula acutè emarginata, valvulis latè carinatis, dissepimento contrario.

nudicaulis. 2. IBERIS herbacea, foliis lyrato-sinuatis, caule centrali nudo simplici; lateralibus foliosis.

Iberis

Iberis nudicaulis. *Sp. Pl.* 907. *Huds.* 285.

With. 575. *Rehb.* 249. *Curt. Lond. fasc.* 6.

t. 42. *Dicks. H. Sicc. fasc.* i. 10. *Engl. Bot.*
t. 327.

Nasturtium petræum. *Raij Syn.* 303.

Bursa pastoris minima. *Ger. em.* 276.

Shepherds Cress. *Pet. H. Brit.* *t.* 50. *f.* 2.

Angl. Naked-stalked Candy-tuft.

In glareosis sterilibus,

About London, Norwich and Bury. *Ray* and *Engl.*

Bot. In Worcestershire and Cumberland. *With.*

In old quarries on Crooks-moor near Sheffield.

Mr. Salt. Cornfields near Easingwold, York-shire. *Rev. Archdeacon Peirson.*

Annuæ. Fl. Maio.

Caulis centralis erectus, strictus, simplex, omnino aphyllus; laterales saepius plures, adscendentes; magis vel minus foliosi. Folia radicalia depressa, lyrato-pinnatifida, margine subinde pilosa. Corymbi capitati, demum racentosi. Flores parvi, albi. Silicula obcordata, obtusa, emarginata, superne dilatato-carinata, stylo brevissimo coronata.

Synonyma cautiùs eruenda, ob summam ejus cum Lepidio nudicauli affinitatem.

300. ISATIS. *G. Pl.* 344. *Juss.* 242.

Gærtn. *t.* 142.

Silicula lanceolata, unilocularis, monosperma, decidua, bivalvis: valvulis navicularibus.

i. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis *sa-tinctoria*. gittatis, siliculis obtusisculis glabris.

Isatis tinctoria. *Sp. Pl.* 936. *Huds.* 299.

With. 564. *Rehb.* 259. *Mart. Fl. Rust.*

t. 41. *Engl. Bot.* *t.* 97.

I. *sylvestris*. *Fuchs. Hist.* 333. *Matth. Valgr.*
v. 1. 582. Camer. Epit. 410.
Glastum sativum. Raii Syn. 410. *Ger. em.* 491.
Waidte. Schreb. Monogr. t. 1—3.
Angl. Woad.

In arvis et ad margines agrorum, sed rariūs.

New Barnes near Ely. *Rehb.* Near Durham. *Mr. Robson.*

Biennis. Fl. Julio.

Caulis teres, glaber, foliosus, paniculatus. Folia glauca; radicalia petiolata, lanceolata, crenata; caulinis alterna, amplexicaulia, sagittata. Flores aurei. Calyx coloratus. Silicula pendula, fusca, nitida, glabra, obtusifuscula, valvulis intus suberosis. Semen ellipticum.

301. BUNIAS. *G. Pl.* 343. *Juss.* 241. *Gærtn.* t. 142.
Cakile. Gærtn. t. 141.

Silicula decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus, acutis, non dehiscens.

Cakile. I. BUNIAS siliculis ovatis ancipitibus lœvibus monospermis, foliis carnosis.

Bunias Cakile. *Sp. Pl.* 936. *Huds.* 298. *With.* 562. *Engl. Bot.* t. 231.

Cakile Serapionis. *Gærtn.* v. 2. 287. t. 141. *Lob. Ic.* 223.

C. quibusdam, aliis Eruca marina & Raphanus marinus. *Raii Syn.* 307.

Eruca marina. *Ger. em.* 248.

Angl. Sea Rocket. *Pet. H. Brit.* t. 46. f. 6.

In maritimis arenosis frequens.

Annuæ. Fl. Junio—Septembri.

Herba lœvis, carnosa, subglauca. Caulis ramosissimus, patentí-decumbens, tortuosus, flexuosus, teres. Folia alterna, dentato-pinnatisida. Flores dilutè purpurei, ornosi. Calyx basi gibbosus. Silicula subfuscata, glabra.

302. CRAM-

302. CRAMBE. *G. Pl.* 344. *Juff.* 242.
Gærtn. *t.* 142.

Silicula coriacea, globosa, evalvis, decidua, monosperma. *Filamenta* quatuor longiora bifurea, altero apice antherifera:

- i. CRAMBE foliis sinuatis undulatis glaucis cau- *mariti-*
 leque glabris. *ma*
Crambe maritima. *Sp. Pl.* 937. *Huds.* 299.
With. 563. *Fl. Dan.* *t.* 316.
C. maritima *Brassicæ* folio. *Raii Syn.* 307.
Brassica marina *anglica.* *Ger. em.* 315.
B. monospermus *anglica.* *Bauh. Hist.* *v.* 2. 830.
 Sea Grape Colewort. *Pet. H. Brit.* *t.* 48. *f.* 12.
Angl. Sea Kale.

In maritimis arenosis:

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix multiceps. Herba lævis, glauca, subcarnosa. Caulis bipedalis, ramosus. Folia alterna, petiolata, ellipticas oblonga, vel subrotunda, undulata, sinuata, dentata. Paniculæ terminales, thyrsoidæ, multifloræ. Flores albi. Silicula carnosæ, globosa, lævissima. Stigma fessile, peltatum.

II. SILIQUOSA.

303. DENTARIA. G. Pl. 337. Juss. 239.

Siliqua clasticè diffiliens, valvulis revolutis, diffēpimento brevioribus. Stigma emarginatum. Cal. longitudinaliter connivens.

bulbifera. 1. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis: summis simplicibus.

Dentaria bulbifera. Sp. Pl. 912. Huds. 285. With. 576. Engl. Bot. t. 309. Fl. Dan. t. 361. Ger. em. 984. Loh. Ic. 687.

D. quarta baccifera. Clus. Hist. v. 2. 121.

Coralloidis alia species. Cord. Hist. 151. 2. Angl. Bulbiferous Coral-wort.

In umbrosis rariūs.

Near Maysfield, Sussex. Parkinson. Old Park Wood at Haresfield. Blackst. Woods between Beaconsfield and Wickham, plentifully. Huds.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix repens, dentata, carnosa, albida. Caules erecti, sesquipedales, simplices, foliosi, basi nudi. Folia alterna, glabra, serrata; inferiora impari-pinnata, foliolis subseptenis; superiora simplicia, in axillis bulbifera. Bulbi squamosi, atropurpurei, decidui, ad novam propagandam progeniem. Corymbus terminalis, solitarius. Flores magni, dilutè purpurei. Stigma capitatum, obtusum, emarginatum. Siliqua plerumque abortit.

304. CARDAMINE. G. Pl. 338. Juss. 239.
Gærtn. t. 143.

Siliqua clasticè diffiliens, valvulis revolutis, diffēpimento

pimento æqualibus. *Stigma integrum. Cal.*
subhians. Glandula utrinque solitaria inter
stamina breviora et cálycem.

* *Foliis simplicibus.*

1. CARDAMINE foliis simplicibus ovatis inter *bellidi-*
gerriniis petiolo triplò brevioribus. folia.
Cardamine bellidifolia. Sp. Pl. 913. Fl. Lapp.
ed. 2. 222. t. 9. f. 2. With. 577. Fl. Dan.
t. 20. Jacq. Misc. v. 1. 148. t. 17. f. 2.
Angl. Daisy-leaved Ladies'-smock.

In graminosis irriguis excelsis alpinis.

Gathered wild in Scotland by Mr. Milne. *With.*

Perennis. Fl. Augusto.

Radix parva, sublignosa, multiceps. Caules vix biunciales, erecti, simplices, paucifolii, glabri. Folia ovata, integerrima, glabra; radicalia longissimè petiolata; caulina plerumque ferè sessilia. Corymbus terminalis, pauciflorus. Petala alba, erecta, calyce duplò longiora. Siliqua linearis, obtusa, glabra.

* * *Foliis pinnatis.*

2. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis lanceolatis incisis integrisve, stipulis ciliatis. *tiens.*
Cardamine impatiens. Sp. Pl. 914. Huds. 294.
With. 577. Engl. Bot. t. 80.
C. impatiens, vulgo Sium minus impatiens. Raii
Syn. 299.
Sium minus impatiens. Ger. em. 260.
Sisymbrii Cardamines species quædam insipida.
Bauh. Hist. v. 2. 886.
Angl. Impatient Ladies'-smock.

In umbrosis humidis petrosis subalpinis.

Under the rocks by the river side at Matlock bath,

Derbyshire, and in many parts of Westmoreland, Cumberland, &c.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix parva. Caulis erectus, sesquipedalis, foliosus, sæpius ramosus, subflexuosus, angulatus, glaber. Folia alterna, impari-pinnata, multijuga; foliolis lanceolatis, plerumque incisis, glabris, pallidis. Stipulæ amplexicaules, ciliatæ. Flores exigui, albi, interdum apetali. Racemi fructiferi longissimi, multisiliquosi. Siliqua elasticè diffiliens, ad semina latè spargenda.

hirsuta. 3. CARDAMINE foliis pinnatis exstipulatis: foliolis rotundato-oblongis incisis petiolatis.

Cardamine hirsuta. Sp. Pl. 915. Huds. 295. With. 578. Sibth. 205. Curt. Lond. fasc. 4. t. 48. Lightf. 348. Engl. Bot. t. 492.

C. flexuosa. With. 578.

C. parviflora. Lightf. 1104. With. ed. 2. 686.

C. impatiens. Fl. Dan. t. 735.

C. impatiens altera hirsutior. Raii Syn. 300.

Sisymbrium aquaticum alterum. Camer. Epit. 270.

Hairy Cress. Pet. II. Brit. t. 47. f. 4.

Angl. Hairy Ladies'-smock.

In ruderatis et cultis, umbrosis, humidis, frequens.

Annua. Fl. Martio—Junio.

Radix fibrosa, alba. Herba magnitudine varia, magis vel minùs hirsuta. Caulis ramosus, angulatus, foliosus. Folia impari-pinnata, foliolis petiolatis, quandoque alternis, elliptico-subrotundis, incisis. Stipulæ nullæ. Flores albi, parvi, interdum tetrandri. Siliqua angusta, pilosa.

C. parviflora Linn. nondum in Britannâ inventa est. Dignoscitur filiquâ latiore, foliolis sessilibus, lanceolatis, integris, glabris.

4. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radica-*pratensis*. libis subrotundis dentatis; caulinis lanceolatis.

Cardamine pratensis. *Sp. Pl.* 915. *Huds.* 294. *Wittb.* 579. *Rehb.* 255. *Sibtb.* 205. *Curt.* *Lond.* fasc. 3. t. 40. *Mart. Fl. Rust.* t. 95. *Woodw. Med. Bot.* t. 30. *Fl. Dan.* t. 1039.

Cardamine. *Raii Syn.* 299. *Ger. em.* 259.

Nasturtium agreste. *Fuchs. Hist.* 325.

N. pratense. *Trag. Hist.* 83.

Hiberis. *Fuchs. Ic.* 185.

Cardamine, *flos.* *Pharmac. Lond.*

Angl. Meadow Ladies'-smock. Cuckow Flower.

In pratis et pascuis humidiusculis vulgaris.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix tuberosa, subdentata. Caulis erectus, strictus, pedalis, simplex. Folia pinnata; radicalia longius petiolata, sublyrata, foliolis rotundatis, dentatis, subhirsutis; caulina ferè sessilia, alterna, foliolis lanceolatis, glabris, canaliculatis, plerumque integerrimis. Corymbus terminalis, speciosus. Flores magni, purpurascentes, sæpè albi.

Folia radicalia gemmipara interdum vidi in umbrosis, unde affinitatem quandam cum Dentariis suspicatus sum. Hanc confirmant radicis structura, stylus elongatus, florumque facies et color.

5. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radi-*amara*. calibus subrotundis; caulinis dentato-angulis, caule basi radicante.

Cardamine amara. *Sp. Pl.* 915. *Huds.* 294. *Wittb.* 580. *Sibtb.* 206. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 39.

C. flore majore clatior. *Raii Syn.* 299.

Bitter Cresc. *Pet. H. Brit.* t. 47. f. 1.

Angl. Bitter Ladies'-smock.

In aquosis umbris et ad rivulos, minus frequens.
In several places about London. *Huds.* On the banks of the Thames between Kew and Mortlake. *Rev. Dr. Goodenough.* In King-street meadows, Norwich.

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

Radix dentata. Caules basi sæpius decumbentes et radicantes. Folia ferè glabra; radicalia foliolis subrotundis; caulina elliptico-oblongis, repandis, dentatis. Flores albi. Antheræ violaceæ. Siliqua, monente Curtissio, obliqua.

305. SISYMBRIUM. G. Pl. 338. Juss. 239.

Siliqua dichiasens valvulis rectiæsculis. Cal. patens. Cor. patens.

Nasturtium. 1. SISYMBRIUM filiis declinatis, foliis pinnatis: foliolis cordato-subrotundis.

Sisymbrium Nasturtium. Sp. Pl. 916. *Huds.* 296. *With.* 580. *Rehb.* 256. *Sibth.* 206. *Abbot.* 143. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 44. *Woodv. Med. Bot.* t. 48. *Fl. Dan.* t. 690.

S. Cardamine, seu *Nasturtium aquaticum*. *Raii Syn.* 300.

S. Cardamine. *Fuchs. Hist.* 723.

Nasturtium aquaticum, sive *Cratevæ Sium*. *Ger. em.* 257.

β. *N. aquaticum*, foliis minoribus, præcocius. *Raii Syn.* 301.

Early Water Cress. *Pet. H. Brit.* t. 47. f. 3.

γ. *Nasturtium aquaticum*, pinnulis paucioribus. *Dill. in Raii Syn.* 301.

Nasturtium aquaticum, herba recens. *Pharmac. Lond.*

Angl. Water Cress.

In rivulis, piscinis, et ad scaturigines frequens.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Caules declinati, vcl natantes, basi radicantes. Folia alterna, lyrato-pinnata, glabra, lucida, dentato-subrepanda; inferiora foliolis rotundioribus et ferè cordatis. Flores albi. Siliquæ breves, pedicellis patentissimis, apice sursùm recurvæ. Stigma subseffile.

2. **SISYMBRIUM** filiis declinatis, foliis pin-*sylvestre*, natis: foliolis lanceolatis inciso-serratis.

Sisymbrium sylvestre. Sp. Pl. 916. Huds. 296. With. 581. Relb. 256. Sibth. 206. Abbot. 143. Curt. Lond. fasc. 3. t. 41.

Eruca aquatica. Raii Syn. 297. Ger. em. 248.

E. sylvestris. Fuchs. Hist. 263.

Water Rocket. Pet. H. Brit. t. 46. f. 5.

Angl. Creeping Water Rocket.

In palustribus et ad ripas fluviorum, solo glareoso.

In Tothill fields, and other places about the Thames, Huds. Curt. On Bungay Common, Suffolk, Mr. Woodward. Below Leeds, Rev. Mr. Wood; and near Worcester, Dr. Stokes; With. Bedfordshire frequent. Abbot.

Perennis. Fl. Junio—Septembri.

Radix valde repens. Caules erexit, foliosi, flexuosi, angulati, sulcati, scabriuscui, subpaniculati. Folia alterna, pinnata, glabra; inferiora foliolis decurrentibus, elliptico-oblongis, dentatis; superiora angustioribus, subpetiolatis, inciso-serratis. Petioli canaliculati. Flores aurei. Racemi demum longissimi, flexuosi. Stylus parum elongatus. Siliqua brevis, plerumque abortiva.

3. **SISYMBRIUM** filiis declinatis turgidis, fo-*terrestre*.

liis pinnatisidis inæqualiter dentatis, radice simplici, petalis calyce brevioribus.

Sisymbrium terrestre. Curt. Lond. fasc. 5. t. 49.

With. 582. Sibth. 207. Abbot. 143.

S. palustre. Pollich. v. 2. 230.

S. amphi-

S. amphibium α . *Huds.* 296.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. *Baub. Prodr.* 38. *Dill. in Raii Syn.* 301. *Fl. Dan.* t. 931.

Small Jagged Water Radish. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 9.

Angl. Annual Water Rocket.

In inundatis, et ad fossarum margines.

Plentiful about London. *Curt.* Bungay Common.

Mr. Woodward. Bedfordshire, but rare. *Abbot.* Oxfordshire. *Sibth.* On the banks of the Cam, Isle of Ely. *Rev. Dr. Goodenough.*

Annua. Fl. Junio—Septembri.

Radix simplex, fusiformis, parva. Caulis saepius erectus, ramosus, pedalis, foliosus, fulcatus, glaber. Folia alterna, lyrato-pinnatifida, glabra, inaequaliter et obtuse dentato-ferrata. Flores exigui, flavi, petalis calyce brevioribus, subinde emarginatis. Racemi fructiferi longissimi. Siliquæ omnes ferè fertiles, horizontaliter patentes, subincurvæ, breves, turgidæ, obtusæ, laeves, polyspermæ, stylo brevissimo.

Hanc speciem, a Linnæo forsitan ignotam, cum sequente confudit Hudsonus.

amphibi- 4. SISYMBRIUM filiis declinatis pedicellatis, um. foliis oblongis pinnatifidis serratis, petalis calyce longioribus.

Sisymbrium amphibium. *Sp. Pl.* 917. *With.* 581. *Relb.* 257. *Sibth.* 207. *Abbot.* 143. *Fl. Dan.* t. 984.

S. amphibium β . *Huds.* 296, et forte γ . 297.

Radicula sylvestris seu *palustris*. *Raii Syn.* 301.

Raphanus aquaticus alter. *Baub. Prodr.* 38.

R. aquaticus. *Ger. em.* 240.

Broad Water Radish. *Pet. H. Brit.* t. 49. f. 8.

Great Jagged Water Radish. *Ibid.* f. 10.

Angl.

Angl. Great Water Rocket or Radish.

In fluviis et rivis, quandoque ad ripas raro inundatas.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix fibrosa. Caules elongati, radicantes, subflexuosi, foliosi, sulcati, parum ramosi. Folia alterna, oblonga, vel serrata, vel pinnatifida; superiora ferè integerrima; radicalia petiolata; et, cum extra aquas crescunt, subinde pubescentia. Flores lutei, petalis ealyce longioribus. Germen pedicellatum, globosum. Siliquæ breviflora, stylo elongato terminatae.

5. *SISYMBRIUM* siliquis erectis, foliis glabris *tenuiflorum*, subintegerrimis pinnatifidis bipinnatifidisque: *limum*, supremis integris.

Sisymbrium tenuifolium. Sp. Pl. 917. Engl. Bot. t. 525.

Brassica muralis. Huds. 290. With. 592. Curt. Lond. fasc. 3. t. 38.

B. Erucastrum. Huds. ed. 1. 253.

Eruca sylvestris. Raii Syn. 296. Ger. em. 246.

E. sativa. Fuchs. Hist. 262.

E. tenuifolia perennis, flore luteo. Bauh. Hist. v. 2. 861.

E. n. 461. Hall. Hist. v. 1. 200.

Angl. Wall Rocket. Pet. H. Brit. t. 46. f. 8.

In muris antiquis, et ruderibus.

About London and Westminster, Windsor, Chester, Bristol, Yarmouth, and other old towns.

Perennis. Fl. Julio usque ad Octobrem.

Radix fusiformis, albida, sublignosa. Caulis ramosissimus, sesquipedalis, foliosus, teres, laevis, glaucus, interdum pilis raris conspersus. Folia subcarnosa, laetitia, glaucescentia, pinnatifida, quandoque bipinnatifida; summa sepius indivisa; omnia margine integerrima, vel rassisimè dentata. Flores magni, citrini, speciosi, odore acer,

aci. Calyx patens, apice plerumque hirtus. Siliqua erecta, oblonga, glabra, teres, lineâ utrinque elevata. Semina elliptica, compressa. Stylus brevis.—Herba sapore et odore acris.

monense. 6. **SISYMBRIUM** siliquis erectisculis, foliis pinnatisidis subpilosis, caulis simplicissimis nudisculis glabris.

Sisymbrium monense. Sp. Pl. ed. 1. 658.
Lightf. 353. t. 15. f. 1. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 17. 13.

Brassica monensis. *Huds.* 291. *With.* 593.

Eruca monensis laciniata lutea. *Raii Syn.* 297.

E. monensis laciniata, flore luteo majore. *Dill. Eth.* 135. t. 111. f. 135.

Man Rocket. *Pet. H. Brit.* t. 46. f. 7. malè.

Angl. Dwarf Sea Rocket.

In arenosis maritimis rariùs.

In the isles of Bute and Arran, and several parts of the western coast of Scotland. *Lightf.* In the isle of Man and in Cumberland. *Ray.* In Anglesea. *Dill. Rev. H. Davies.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix lignosa, crassa. Caules plures, spithamei, patuli, simplicissimi, teretes, laeves, plerumque aphylli. Folia numerosa, omnia ferè radicalia, petiolata, subcarnosa, glaucescentia, pinnatifida, laciinis subæqualibus, plerumque integris, subinde inciso-ferratis, setis rariss adspersis. Flores magni, citrini. Calyx apice hirtus, nimirū quam in præcedente patulus. Petala venosa. Siliqua erecto-patens, obsoletè tetragona, laevis. Herba odore ferè præcedentis.

Sisymbrium n. 8. *Ger. Gallopr.* 360, in Sp. Pl. ed. 2 descriptum, venis petalorum obsoletis floribusque minoribus differre videtur.

Sophia. 7. **SISYMBRIUM** foliis pinnato-decompositis subpilosis, petalis calycē minoribus.

Sisym-

Sisymbrium Sophia. *Sp. Pl.* 920. *Huds.* 297.
With. 582. *Rehb.* 258. *Sibth.* 208. *Ab-*
bot. 143. *Mart. Fl. Rust.* t. 57. *Fl. Dan.*
t. 528.

Erysimum Sophia dictum. *Raii Syn.* 293.
Sophia Chirurgorum. *Ger. em.* 1068.
Seriphium Absinthium. *Fuchs. Hist.* 2.
Angl. Flix-weed.

In ruderatis, maceriis, et simetis frequens.

Annua. Fl. Julio.

Radix fusiformis, parva. Caulis bipedalis, erectus, ra-
mosus, foliosus. Folia alterna, pinnata, pinnis pinna-
tifidis, quandoque bipinnatifidis, laciinis decurrentibus,
inæqualibus, lanceolatis, acutis, subpilosis. Flores
exigui, flaveoli. Siliquæ numerosæ, erectæ, læves.

8. SISYMBRIUM foliis runcinatis dentatis nudis, *Irio.* caule lævi, siliquis erectis.

Sisymbrium Irio: *Sp. Pl.* 921. *Huds.* 297.
With. 583. *Sibth.* 207. *Curt. Lond. fasc.* 5.
t. 48. *Jacq. Austr.* *t. 322.*

Erysimum latifolium Neapolitanum. *Raii Syn.*
298.

E. latifolium majus glabrum. *Baub. Pin.* 101.
Moris. sect. 3. *t. 3. f. 3.*

Irio lævis Apulus, *Erucæ folio.* *Column. Ec-*
pbr. 264. *t. 265.*

Broad Hedge Mustard. *Pet. H. Brit.* *t. 46.*
f. 4.

Angl. London Rocket.

In ruderatis, aggeribus, et muris antiquis.

About London in various places. *Ray. Curt.* At
Faulkourn, Essex, and on the walls of Berwick
upon Tweed. *Ray.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Herba

706 TETRADYNĀMIA—SILQUOSA.

Herba perpetuò glaberrima, acri Sinapeos sapore. *Curt.*
Radix fusiformis, parva. Caulis erectus, subbipedalis,
foliosus, subflexuosus, teres, supernè ramosus. Folia
alterna, runcinato-pinnatisida, acuta, anticè imprimis
dentata. Flores exigui, flavi, petalis calyce longioribus.
Siliquæ numerosæ, erectæ, longissimæ, teretiusculæ.

306. ERYSIMUM. *G. Pl. 339. Juss. 239.*
Gærtn. t. 143.

Siliqua recta, columnaris, exactè tetraedra. Cal.
clausus. Stigma capitatum.

officina- 1. ERYSIMUM filquis rachi adpresso, foliis run-
le. cinatis.

Erysimum officinale. *Sp. Pl. 922. Huds. 286.*
With. 583. Relb. 250. Sibth. 201. Ab-
bot. 144. Curt. Lond. fasc. 5. t. 50. Fl. Dan.
t. 560. Woodv. Suppl. t. 244.

E. Dioscoridis Lobelii. *Ger. em. 254.*

Eruca hirsuta, siliquâ cauli appressâ, Erysimum
 dicta. *Raii Syn. 298.*

Verbena recta sive mas. *Fuchs. Hist. 592.*

Angl. Common Hedge-mustard. *Pet. H. Brit.*
t. 46. f. 3.

In ruderatis et ad vias.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva. Herba pilosa. Caulis bipedalis, ramosus,
 foliosus, teres, ramis patentibus. Folia lyrato-runci-
 nata, dentata. Flores parvi, citrini. Siliquæ erectæ,
 pedunculo communi, valde elongato, adpresso, breves,
 apice subulatæ, styloque mucronatæ.

Barba- 2. ERYSIMUM foliis inferioribus lyratis: lobo
rea. terminali rotundato; superioribus obovatis
 dentatis.

Erysimum Barbarea. *Sp. Pl. 922. Huds. 286.*
With.

With. 584. *Rehb.* 250. *Sibth.* 202. *Abbot.* 144. *Engl. Bot.* t. 443.

Eruca lutea, seu *Barbarea*. *Raii Syn.* 297.

Barbarea. *Ger. em.* 243. *Bauh. Hist.* v. 2. 868.

Sanctæ Barbaræ herba. *Fuchs. Hist.* 746. *Trag. Hist.* 101.

Winter Cress. *Pet. H. Brit.* t. 46. f. 1.

Angl. Yellow Rocket. Bitter Winter Cress.

In ruderatis, palustribus, vel ad sepes, vulgaris.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix fusiformis, sublignosa. Caulis bipedalis, erectus, strictus, subramosus, foliosus, angulatus, sulcatus, glaber. Folia atro-viridia, nitida, glabra, dentata; inferiora lyrata; superiora sensim simpliciora, amplexicaulia; summa indivisa. Flores aurei, numerosi, densi, in hortis saepius pleni. Calyx subcoloratus. Siliquæ breves, erecto-patentes.

Herba amara, mucilaginosa, nauseofa.

3. *ERYSIMUM* foliis inferioribus lyratis; superiores pinnatifidis: lacinias linearis-oblongis integeriinis.

E. Barbaræ L. Sp. Pl. 922?

Barbarea foliis minoribus et frequentius sinuatis.

Dill. in *Raii Syn.* 297.

Sisymbrium Erucae folio glabro, minus et præcocius: Tourn. Infl. 226.

Angl. Early Winter Cress. *Pet. H. Brit.* t. 46. f. 2.

In herbidis irriguis, vel ad fossas.

This is inserted upon the authority of Petiver only, the Rev. Mr. Wood having assured me the plants I found near Leeds (see *E. Bot.* 443) were planted there.

Biennis. Fl. Aprili—Octobri.

A præ-

A præcedente satis discrepat foliis superioribus pinnatifidis, laciniis oppositis, lineari-oblongis, integerrimis; floribus pallidioribus; foliolis calycinis latioribus; siliquis triplò longioribus.

Herba in acetariis grata, gustu omnino Sifymbrii Nasturtii.

Alliaria. 4. ERYSIMUM foliis cordatis.

Erysimum Alliaria. *Sp. Pl.* 922. *Huds.* 286.

With. 584. *Relb.* 251. *Sibth.* 201. *Abot.* 144. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 48. *Fl. Dan.* t. 935. *Woodv. Suppl.* t. 245.

Hesperis Allium redolens. *Raii Syn.* 293.

Alliaria. *Ger. em.* 794. *Fuchs. Hist.* 104. *Camer. Epit.* 589. *Matth. Valgr.* v. 2. 197.

Angl. Garlick Hedge-mustard. Jack by the hedge. Sauce alone.

In sepibus et umbrosis vulgaris.

Biennis. Fl. Maio.

Herba lœvis, nitida, odore gravi alliaceo. Caulis erectus; striatus, foliosus, subsinplex. Folia petiolata, cordata, dentata. Flores albi. Siliquæ longissimæ, subulatæ.

cheiran- 5. ERYSIMUM foliis lanceolatis subdenticulatis, *thoides*. siliquis erectis, pedicellis fructiferis patentibus.

Erysimum cheiranthoides. *Sp. Pl.* 923. *Huds.* 287. *With.* 585. *Relb.* 251. *Sibth.* 202. *Fl. Dan.* t. 731 et 923. *Jacq. Austr.* t. 23.

Cheiranthus erysimoides. *Huds.* 287.

Myagro affinis planta, siliquis longis. *Raii Syn.* 298. *Baub. Hist.* v. 2. 894.

Camelina. *Ger. em.* 273.

Treacle Worm-seed. *Pet. H. Brit.* t. 45. f. 2.

Angl. Treacle Hedge-mustard.

In arvis, salicetis, et ad sepes, rarius.

In

In the isle of Ely, and near Ashbourne, Derbyshire.

Ray. Osier holts near Godstow, Oxfordshire.

Sibth. Common in turnep fields near Bungay, Suffolk, *Mr. Woodward.* By the road near Ipswich leading towards Norwich.

Annua. Fl. Julio.

Radix parva. Caulis sesquipedalis, erectus, strictus, deinceps foliosus, angulatus, fulcatus, undique scaber, setis arctè adpressis, supernè ramosus. Folia alterna, lanceolata, basi apiceque attenuata, integerrima, vel obsoletè denticulata, scabra, setis exiguis, albidis, arctè adpressis, sèpè furcatis. Flores numerosi, aurei, calyce pallido. Racemi fructiferi longissimi, pedicellis horizontaliter patentibus, filiisque erectis, omnino tetrangularis. Stigma parvum, subsessile, haud emarginatum.

307. CHEIRANTHUS. G. Pl. 339. Juss. 238.

Gærtn. t. 143.

Germen utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus; foliolis duobus basi gibbis. *Senina* plana.

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis sub-*fruticetosus*, canescens, pubescentia simplicissimâ lusus. adpressâ, caule fruticuloso, ramis angulatis.

Cheiranthus fruticulosus. Mant. 94.

C. Cheiri. Huds. 287. With. 586. Relb. 252.

Sibth. 202. Abbot. 144. Ait. Hort. Kew.

v. 2. 395 &c.

Leucojum luteum, vulgo Cheiri, flore simplici.

Raii Syn. 291.

L. luteum, minus, fruticans. Barrel. Ic. t. 1228.

Viola petræa lutea. Tabern. Krauterb. 688.

Angl. Wild Wall-flower.

In muris antiquis.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Caulis fruticulosus, ramosissimus, ramis erectis, foliosis, angulatis, subincanis, apice floriferis. Folia conserta, petiolata, lanceolata, acuta, plerumque integerrima, viridia, subtus praeceps setis simplicissimis adpressis testa, et ferè canescens; inferiora subserrata. Flores lutei, odori, calyx purpureo-roseo, petalis emarginatis. Siliquæ erectæ, terciifolæ, canescentes. Stylus brevis. Stigma emarginatum. Semina non alata.

A C. Cheiri hortorum differt foliis acutioribus, subtus canescens, floribus minoribus, luteis, nec ferrugineo-sanguineis; modo haec sufficiant.

sinuatus. 2. **CHEIRANTHUS** foliis tomentosis obtusis sinuatis: rameis integris, siliquis muricatis.

Cheiranthus sinuatus. Sp. Pl. 926. Huds. 288. With. 586. Engl. Bot. t. 462.

C. tricuspidatus. Huds. ed. 1. 250.

Leucojum marinum majus. Raii Syn. 291.

L. marinum purpureum Lobelii. Ger. em. 460.

L. maritimum magnum latifolium. Baub. Hist. v. 2. 875.

Angl. Sea Stock.

In littoribus maritimis, imprimis Cambriæ.

In many parts of Wales; also on the coast of Cornwall. Ray. Near Pembroke. J. Adams, Esq.

Biennis. Fl. Augusto.

Herba tota incana, pilis stellatis, arcte intricatis. Caulis bipedalis, ramosus, patens, foliosus, teres. Folia alterna, oblonga, obtusa, sinuata, basi attenuata; superiore plerumque integra. Flores magni, dilute violacei, speciosi, vsq; odoratissimi. Petala emarginata. Stigma parvum quadrisidatum. Siliquæ longissimæ, incanæ, apicem versus praeceps muricatae. Semina marginato-alata.

308. HESPERIS. G. Pl. 340. Juss. 238.

Petala obliquè flexa. Glandula intra stamina breviora. Siliqua stricta. Cal. clausus; foliolis duobus basi gibbis.

†1. HESPERIS caule erecto, foliis ovato-lanceo-*inodora*, latis dentatis basi subhastatis, petalis obtusis.

Hesperis *inodora*. Sp. Pl. 927. Huds. 288. With. 586. Fl. Dan. t. 924. Jacq. Austr. t. 347.

H. *sylvestris inodora*. Dill. in Raii Syn. 293. Hall. Rupp. Jen. 78. t. 1.

H. *tertia*. Clus. Hist. v. 1. 297.

Angl. Scentless Dame's-violet.

In pascuis ad rivulos.

On the banks of the rivulets about Dale-head, Cumberland, and Grassmere, Westmoreland, Mr. Nicolson. Dill. About Falmouth. With. Near the old castle of Airly, Angus-shire. Mr. J. Mackay.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Hesperidi matronali adeò affinis ut vix dignoscenda, neque stirpem nostram indigenam satis examinavi ut quicquam in hoc discrimine prosum. Exemplar Linnæanum, a Jacquinio missum, gaudet foliis basin versus latius dentatis, et inde quasi hastatis. Flores inodoratos esse accepiimus; quod etiam H. matronali, nisi vespere, convenit. Stigma in hisce speciebus basi sagittatum est, apice connivente, at non in omnibus.

309. ARABIS. G. Pl. 341. Juss. 238.

Glandulæ nectariferæ quatuor, oblongæ, squamiformes, reflexæ. Cal. clausus; foliolis duabus basi gibbis. Stigma simplex. Siliqua linearis, torulosa.

thaliana. 1. ARABIS foliis pilosis subdentatis: radicalibus petiolatis, caule ramoso, siliquis adscendentibus.

Arabis thaliana. *Sp. Pl.* 929. *Huds.* 292. *With.* 587. *Relb.* 254. *Sibth.* 205. *Abbot.* 145. *Curt. Lond.* fasc. 2. t. 49. *Pollich. Palat.* v. 2. 243. t. 4. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 17. 12.

Turritis vulgaris ramosa. *Raii Syn.* 294.

Thale Cress. *Pet. H. Brit.* t. 48. f. 1.

β. *Turritis minor foliosa*. *Raii Syn.* 294.

Broad Thale Cress. *Pet. H. Brit.* t. 48. f. 2. *Angl.* Common Wall-Cress.

In muris, tectis, et arenosis aridis.

Annua. Fl. Aprili.

Radix ramosa, fibrosa. Caulis erectus, striatus, ramosus, foliosus, teres, striatus, hirtus. Folia lanceolato-oblonga, dentato-serrata, saepe integerrima, pilosa; radicia petiolata, depressa; caulina alterna, sessilia, angustiora. Flores parvi, albi. Petala erecta. Glandulae nectariferæ minutæ, vix exsertæ. Pedicelli fructiferi patentes. Siliquæ curvato-adscendentes, obsoletè quadrangulæ.

striata. 2. ARABIS foliis dentatis obtusis hispidis: radicalibus sublyratis, caulis hispidis, petalis erectis.

Arabis striata. *Huds.* 292. *With.* 587. *Vell. ley Pl. Marit.* t. 5. *Engl. Bot.* t. 614. *Shier-cliff, Bristol Guide*, 83, cum icone.

A. *hispida*. *Ait. Hort. Kew.* v. 2. 400, nequamam Linn.

A. n. 453. *Hall. Hist.* v. 1. 197. *Nomencl.* 42.

Turritis Raii. *Villars. Dauph.* v. 3. 326, t. 38.

Hesperis alpina minor, flore albo, siliquis longis. *Raii Syll.* 296.

Cardamine

Cardamine pumila, bellidis folio, alpina. *Raii*
Syn. ed. 2. 172. ed. 3. 300?
Angl. Bristol Rock-Cress.

In rupibus Angliae temperatarioris.

On St. Vincent's rocks near Bristol. *Huds. Vellej.*

On the south side of the river, about a mile below the hot-wells, but sparingly. *Mr. W. Clayfield, and Mr. Dyer.*

Perennis. Fl. Maio.

Radix fibrofa, certè perennis. Caules sæpiùs plures, cæspitosi, erecti, subramosi, teretes, foliosi, basi versus hispidi. Folia radicalia plurima, lyrato-dentata, obtusa, hispida, pilis plerumque simplicibus, rariùs bifurcatis; caulinis pauca, alterna, oblonga, obtusa, margine nervisque ciliata; omnia saturatè viridia et nitiduscula, subtùs rubicunda. Corymbi pauciflori, erecti. Flores albidi, exficatione ochroleuci. Calyx obtusus, glaber. Petalorum limbus erectus, obtusus, integer. Siliquæ breviùs pedicellatae, erectæ, strictæ, compressæ, vix torulosæ.

ARABIS foliis radicalibus runeinato-lyratis hispida.
 pidis; caulinis lanceolatis, pilis furcatis, caulis glabris ramosis.

Arabis hispida. *Suppl. 298. Synt. Veg. ed. 13. 501. ed. 14. 600.*

Sisymbrium arenosum. *Fl. Suec. 233?* nec *Sp. Pl.*

Cardamine petræa. *Huds. 293. With. 577.*
Fl. Dan. t. 386.

C. petræa cambria, Nasturtii facie. *Dill. Elth. 70. t. 61. f. 71.*

Nasturtium petræum Johnsoni. *Raii Syn. 300.*
Pluk. Phyt. t. 101. f. 3.

Welch Rock-Cress. *Pet. H. Brit. t. 50. f. 3.*

Cardamine hastulata. *Engl. Bot. t. 469.*

C. petræa. *Lightf.* 347. *t.* 15. *f.* 2.
Angl. Alpine Rock-Cress.

In excelsis rupibus alpinis.

In North Wales. *Ray.* *Mr. Bingley.* In Scotland. *Mr. Lindsey.* *Lightf.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix sublignosa, cæspitosa. Caules plures, spithamæi, adscendentes, ramosi, teretes, sulcati, parùm foliosi, undique sæpius glabri. Folia radicalia plurima, petiolata, lyrato-pinnatisida, subruncinata, lobis acutis, hispida, pilis omnibus furcatis divaricatis; caulina pauca, alterna, lanceolata, obtusa, subdentata, plerumque glabra. Flores subindè purpurei, sæpius albi ore purpurascentes. Calyx obtusus, glaber. Petalorum limbus horizontalis, obtusissimus, integer. Pedicelli fructiferi divaricato-patentes. Siliquæ erectiusculæ, compressæ, torulosæ, apice primùm dehiscentes, valvulis reætiusculis.

Cardamine hastulata nostra, collatis exemplaribus variis a D. Bingley communicatis, haud discrepat, nisi foliis ferè glabris minùsque lobatis.

Sisymbrium arenosum Linn. *Fl. Suec.* nec *Sp. Pl.* huic quam maximè affine est, sed radix videtur simplex et forsitan annua, caulis strictus, pilosus, pilis patentibus.

Descriptionem in *Syst. Veg.* ab editore, nescio quo animo, truncatam, e manuscriptis Cl. Mygundi sic restauravit amicissimus D. Jacquinus filius. “Flores thalianæ majores;...calyx patulus; caulis palmatis”...

Turrita, 4. *ARABIS* foliis amplexicaulibus, filiisque decurvis planis linearibus margine incrassatis.

Arabis Turrita. *Sp. Pl.* 930. *Huds.* 293. *With.* 588. *Rehb.* 255. *Sibth.* 205. *Engl. Bot.* *t.* 178. *Jacq. Austr.* *t.* 11.

Turritis major. *Ger. em.* 272.

Turrita major Plateau. *Clus. Hist.* v. 2. 126.

Brassica sylvestris albido flore nutante siliquâ.

Bocc. Mus. 81. *t.* 72. *Barrel. Ic.* *t.* 353.

Great Tower Mustard. *Pet. H. Brit. t. 47. f. 11.*

Angl. Tower Wall-Cress.

In muris antiquis.

On the walls of Trinity and St. John's Colleges, Cambridge. *Dr. Martyn.* On Magdalen College-walls, Oxford. *Sibth.*

Biennis. Fl. Maio.

Radix lignosa. Caulis pedalis vel sesquipedalis, erectus, subsimplex, teres, foliosus, pilosus. Folia dentata, scabriuscula; caulinis amplexicaulia. Corymbus simplex, terminalis. Flores ochroleuci. Siliquæ brevius pedicellatæ, deflexæ, longissimæ, torulosæ, compressæ, margine incrassatæ.

Foliis haud acuminatis, pedicellis crassioribus et quadruplicè brevioribus, filiis denique margine incrassatis, ab A. pendulâ abunde differt.

310. TURRITIS. G. Pl. 341. Juss. 238.

Gærtn. t. 143.

Siliqua longissima, stricta, sub-angulata. Cal. connivens, erectus. Cor. erecta.

Obs. Genus vix a præcedente distinguendum.

1. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis; *glabra.* caulinis integerrimis amplexicaulibus.

Turritis glabra. Sp. Pl. 930. Hudf. 291. With. 588. Sibth. 204. Curt. Lond. fasc. 4. t. 47. Fl. Dan. t. 809.

Turritis. Raii Syn. 293. Ger. em. 272.

Tower Mustard. Pet. H. Brit. t. 47. f. 10.

Angl. Smooth Tower-Mustard.

In aggeribus et pascuis glareosis.

Between Norwich and Yarmouth (*Ray*); in many places; also in the road to Coltishall. Near Charlton and Lewisham, Kent, and near Col-

chester. *Huds.* In Derbyshire. *Dr. Stokes.* Near Bath, and on St. Vincent's rocks, Bristol. *With.* About Darfield near Barnsley, Yorkshire. *Mr. Salt.*

Annuæ. Fl. Maio, Junio.

Radix fusiformis. *Caulis* *virgatus*, *simplex*, *erectus*, *bi-pedalis*, *teres*, *glaber*, *foliosus*. *Folia radicalia* *petiolata*, *lanceolata*, *dentata*, *scabra*; *caulina* *numeroſa*, *alterna*, *sensim minora*, *ſeffilia*, *amplexicaulia*, *fagittata*, *integerrima*, *lævissima*, *subglaucā*. *Corymbus* *sæpius* *solitarius*, *demùm* in *racemum* *longissimum*, *strictum*, *productus*. *Flores* *albidi*. *Petala* *erecta*, *demùm* *patula*. *Siliquæ* *pedicellatæ*, *erectæ*, *arctè* *cauli* *approximatæ*, *lineares*, *planæ*, *glabræ*, *margine* *haud* *incrassatae*, *basi* *dehiscētes*.

Hirsuta. 2. *TURRITIS* *foliis omnibus hispidis*, *caule hirsuto*, *pilis simplicibus patentibus*, *siliquâ quadrangulari*.

Turritis hirsuta. *Sp. Pl.* 930. *Huds.* 291. *With.* 589. *Rehb.* 254. *Sibth.* 204. *Dicks.* *H. Sicc. fast.* 9. 8. *Engl. Bot.* t. 587. *Jacq.* *Coll. v.* 1. 70. *Ic. rar. v.* 1. 126. *Fl. Dan.* t. 1040.

T. n. 456. *Hall. Hist.* v. 1. 198.

T. muralis minor. *Raii Syn.* 294.

Erysimo similis hirsuta alba. *Bauh. Prod.* 42.

Barbaræa muralis. *Bauh. Hist.* v. 2. 269.

Daisy Tower Mustard. *Pet. H. Brit.* t. 47. f. 12.

Angl. *Hairy Tower-Mustard.*

In *saxofis*, et *muris antiquis*.

In the western and northern counties. *Ray.* *Sussex.* *Doody.* In *Switham bottom* near *Croydon*. *Huds.* On the walls of *Lakenham churchyard*, near *Norwich*. *Mr. Crowe.* cot and. *Dicks.*

Peregrinis.

Perennis. Fl. Maio.

Radix lignosa. Caules erecti, pedales, ramosi, foliosi, teretes, pilosi, pilis omnibus simplicibus, patulis, albis; superne glabri. Folia dentata, magis vel minus hirsuta, pilis simplicibus furcatis; caulinis sessilia. Flores albi. Siliquæ erectæ, demum nutantes, subquadrangulæ, torulosæ, glabræ, nitidæ, obtusifusculæ, stigmate subsessili.

Aliam speciem præcociorem misit amicissimus Davall, pilis caulinis furcatis depresso, siliquis omnino planis; quæ *T. hirsuta*, Ger. *Gallopr.* 367, est, & a Linnæo in herbario suo cum nostrâ confusa, ut ex exemplaribus certæ fideli patet.

311. BRASSICA. G. Pl. 342. Juss. 238.
Gærtn. t. 143.

Cal. erectus, subconnivens. *Semina* globoſa. *Siliqua* teretiuscula; dissèpimento prominente, subulato. *Glandulæ nectariferæ* quatuor.

I. BRASSICA foliis elliptico-cordatis obtusis amplexicaulibus glabris; radicalibus obovatis integris, siliquis tetragonis, *orientalis*.

Brassica orientalis. Sp. Pl. 931. Huds. 290. With. 589. Pollich. Palat. v. 2. 247. Jacq. Austr. t. 282.

B. campestris. Huds. 290?

B. campestris perfoliata flore albo. Dill. in Raii Syn. 293.

B. campestris prima. Clus. Hist. v. 2. 127.

Perfoliata siliquosa. Ger. em. 536. Baub. Hist. v. 2. 835.

White Thorow Colewort. Pet. H. Brit. t. 45. f. 5.

Angl. Perfoliate Cabbage.

In arvis et clivis maritimis.

In Essex, rare, Petiver; near Harwich, and also at

Bardsey (Bradley?) near Orford, Dale. *Dill.* Fields near Godstone and Marshfield, Sussex. *Huds.*

Annua. Fl. Junio.

Radix fusiformis, parva. Caulis e basi plerumque ramosus, foliosus, teres, laevis, glaucus. Folia omnia laevia, glauca, integerrima, obtusa; radicalia obovata; caulina alterna, amplexicaulia, elliptico-cordata. Flores parvi. Petala angusta, alba vel ochroleuca. Siliquæ longissimæ, graciles, erectæ, tetragonæ.

B. austriaca, *Jacq.* t. 283, vix specie differre videtur..

campes- 2. **BRASSICA** radice cauleque tenui, soliis cordatis acuminatis amplexicaulibus; inferioribus lyratis dentatis subhispidis.

Brassica campesiris. *Sp. Pl.* 931. *Huds.* 290? *With.* 590? *Scholl. Barb.* 153. *Fl. Dan.* t. 550 haud bene.

B. tertia. *Fuchs. Hist.* 415?

B. rubra minor. *Baub. Hist.* v. 2. 833?

Angl. Field Cabbage.

In agris.

At Harwich, and very plentifully between Cropredy and Morlington, Oxfordshire. *Rev. Dr. Goodenough.* Near Broadford, Isle of Skye; and in fields near Forfar. *Mr. Mackay.* In the Physic-garden at Cambridge from Scotland. *Mr. Donn.* In fields below Kirkby Lonsdale, Westmoreland, if I be not mistaken.

Annua. Fl. Junio.

Radix fusiformis, parva. Caulis eretus, ramosus, foliosus, teres, glaber, subglaucus. Folia caulina superiore alterna, amplexicaulia, cordata, acuminata, integerrima, laevia; inferiora subinde dentata; infima, et præcipue radicalia, lyrata, dentata et repanda, subtus ad venas hispida; omnia glaucescentia, subtus pallidiora. Calycis foliola vix cohærentia, patentiuscula. Petala

Petala lutea, quam in præcedente triplò latiora. Siliquæ erectæ, teretes, obsoletè quadrangulæ, reticulato-venosæ, torulosæ, biunciales, rostro subulato, basi quadrangulo, striato.

A præcedente omnino distincta; etiam dissimilis est, nequaquam confundenda, at synonyma utriusque apud auctores malè intelliguntur.

3. BRASSICA radice caulescente fusiformi, fo- *Napus*.
liis lævibus: superioribus cordato-lanceolatis
amplexicaulibus: inferioribus lyratis denta-
tis.

Braffica *Napus*. *Sp. Pl.* 931. *Huds.* 290.
With. 590. *Relb.* 253. *Sibth.* 204. *Abbot.*
145. *Mart. Fl. Rust.* t. 103.

Napus sylvestris. *Raii Syn.* 295. *Bauh. Hist.*
v. 2. 843.

N. Bunias sylvestris. *Fuchs. Hist.* 177.

Bunias sylvestris Lobelii. *Ger. em.* 235.

Wild Navew. *Pet. H. Brit.* t. 45. f. 9.

Angl. Rape, Navew, or Cole-seed.

Inter segetes, et in aggeribus fossarum.

Biennis. Fl. Maio.

Radix fusiformis, apice incrassata, caulescens. Caulis
erectus, ramosus, foliosus, teres, striatus, glaber. Folia
lævia, subtùs præcipue glaucescentia; caulina superi-
ora alterna, amplexicaulia, cordato-lanceolata, paten-
tissima, ferè integerrima; inferiora latiora, obtusiora,
dentata; radicalia lyrata. Calycis foliola patentiuscu-
la, colorata. Petala aurea. Siliquæ demùm patentes
vel deflexæ, torulosæ, teretes, rostro angulato.

4. BRASSICA radice caulescente orbiculari de- *Rapa*.
pressa carnosa, foliis radicalibus lyratis scabris;
caulinis integerrimis lævibus.

Braffica

Brassica Rapa. *Sp. Pl.* 931. *Huds.* 289. *With.* 591. *Rehb.* 253. *Sibth.* 203. *Abbot.* 145. *Mart. Fl. Rust.* t. 49, 50.

Rapa sativa rotunda. *Raii Syn.* 294.

Rapum. *Trag. Hist.* 728. *Camer. Epit.* 218.

R. sativum. *Fuchs. Hist.* 212.

R. majas. *Ger. em.* 232.

B. Rapa sativa oblonga, seu fœmina. *Raii Syn.* 294.

Rapum radice oblonga. *Ger. em.* 232.

R. longum. *Camer. Epit.* 219.

Angl. Turnep.

In arvis et ad margines agrorum.

Biennis. *Fl. Aprili.*

Radix orbicularis vel obovata, carnoſa, cauleſcens. Cau-
lis erectus, ramoſus, folioſus, teres, lœvis. Folia radica-
lia lyrata, inæqualiter dentata, ſcabra, saturatè virentia;
caulinæ cordato-lanceolata, amplexicaulia, lœvia, inte-
gerrima, glauceſcentia. Flores aurei. Siliquæ cylin-
draceæ, venofæ.

•leracea. 5. *BRASSICA* radice cauleſcente tereti carnoſa,
 foliis omnibus glabris glaucis repandis lobatiſive.

Brassica oleracea. *Sp. Pl.* 932 α . *Huds.* 289.
With. 591. *Hull.* 148. *Freeman. Ic.* t. 4,
 5. *Engl. Bot.* t. 637. *Dicks. H. Sicc. fas.*
 17. 14.

B. maritima arborea, seu procerior, ramosa.

Raii Syn. 293.

Angl. Sea Cabbage.

In clivis maritimis.

On Dover cliffs and other ſimilar places. *Ray.*

On the Welch and Corniſh coast. *Huds.* On
 the

the sea cliffs at Staiths, Yorkshire, abundantly.
Mr. Robson.

Biennis. Fl. Maio, Junio.

Radix caulescens, teres, spithamæa vel pedalis, cicatricosa. Folia glauca, glabra, repanda et sinuata, formâ varia, sublyrata. Flores magni, citrini. Siliquæ torulofæ.

312. SINAPIS. G. Pl. 821. Juss. 238.
Gærtn. t. 143.

Cal. patentissimus. Cor. unguis recti. Glan-
dulae nectariferæ quatuor. Siliqua teretiuscu-
la, dissepimento prominente.

1. SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis *arvensis.*
 rostro ancipiti longioribus, foliis ovatis sublyratis.

Sinapis arvensis. Sp. Pl. 933. Huds. 298.
 With. 594. Relb. 258. Sibth. 208. Abbot.
 146. Curt. Lond. fasc. 5. t. 47. Fl. Dan.
 t. 753.

Rapistrum arvorum. Raii Syn. 295. Ger. em.
 233.

Irion. Fuchs. Hist. 257.

Angl. Charlock. Wild Mustard.

Inter segetes ; vitium summum.

Annua. Fl. Maio.

Radix fusiformis, parva, rigida. Caulis teres, striatus, hispidus, setis subdeflexis. Folia petiolata, ovata, scabra, inæqualiter dentata; inferiora sublyrata; summa sessilia. Flores lutei. Calycis foliola linearia, viridia. Siliquæ patentes, suboctangulæ, torosæ, hispidæ, quandoque glabræ, rostro ensiformi, brevi, compresso, sulcato.

2. SINAPIS siliquis hispidis torosis rostro ancipiti *alba.*
 brevioribus, foliis pinnatifidis.

Sinapis

Sinapis alba. *Sp. Pl.* 933. *Huds.* 298. *With.* 594. *Rell.* 258. *Sibth.* 208. *Abbot.* 146. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 46. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 70.

Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo vel ruffo. *Raii Syn.* 295.

S. album. *Ger. em.* 244.

S. primum genus. *Fuchs. Hist.* 538.

Angl. White Mustard. *Pet. H. Brit.* *t.* 45. *f.* 10.

In arvis et ad vias.

Annua. Fl. Junio.

Radix et caulis ferè prioris. Folia inferiora profundè pinnatifida; superiora sublyrata; omnia erosa, dentata, scabra. Flores flavi. Calycis foliola linearia, viridia. Siliquæ patentes, pedunculis ferè horizontalibus, breves, subtetraspermæ, torosæ, costatæ, hispidæ, rostro longissimo, ensiformi, complanato, virenti, scabro. Semina maxima.

nigra. 3. **SINAPIS** siliquis glabris tetragonis racemo adpresso, foliis summis lineari-lanceolatis integrimis glabris.

Sinapis nigra. *Sp. Pl.* 933. *Huds.* 297. *With.* 595. *Rell.* 259. *Sibth.* 209. *Abbot.* 146. *Woodv. Med. Bot.* *t.* 151. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 51.

Sinapi sativum secundum. *Raii Syn.* 295. *Ger. em.* 244.

S. siliquâ latiusculâ glabrâ semine ruffo, sive vulgare. *Baub. Hist.* v. 2. 855.

Sinapi, semen. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common Mustard.

In arvis, aggeribus, et ad vias.

Annua.

Annua. Fl. Junio.

Radix parva. Caulis ramosissimus, patens, teres, lœvis. Folia petiolata, variè lobata et dentata; radiealia feabra; caulinæ glabra; summa deflexa, integerrima, angustata. Flores flavi, parvi. Calyx coloratus. Siliquæ erectæ, rachi adpressæ, breves, quadrangulæ, parum torulosæ, plerumque glaberrimæ, polyspermæ, rostro brevi, quadrangulo.

Primo intuitu à congeneribus, foliis ramulorum pendulis, dignoscenda. *D. Goodenough.*

313. RAPHANUS. G. Pl. 343. Juss. 238.
Raphanistrum. Gærtn. t. 143.

Cal. clausus. *Glandulæ nectariferæ* quatuor.
Siliqua teres, torosa, subarticulata.

1. RAPHANUS siliquis articulatis lœvibus unilocularibus. *Raphanistrum.*

Raphanus Raphanistrum. Sp. Pl. 935. Amœn. Acad. v. 6. 451. Hudſ. 289. With. 596. Relb. 252. Sibth. 203. Abbot. 147. Curt. Lond. fasc. 4. t. 46. Mart. Fl. Rust. t. 71. Fl. Dan. t. 678.

R. sylvestris. Ger. em. 240.

Raphanistrum siliquâ articulatâ glabrâ, majore et minore. Raii Syn. 296.

Rapistrum flore albo striato. Bauh. Hist. v. 2. 851.

White Charlock. Pet. H. Brit. t. 46. f. 10.

β. Rapistrum flore luteo, siliquâ glabrâ articulatâ. Raii Syn. 296.

γ. Raphanus maritimus, flore luteo, siliquis articulatis, secundum longitudinem eminentè striatis. Raii Syn. 296.

Raphanistrum siliquâ articulatâ striatâ maximâ. Moris. v. 2. 266. Raii Hist. v. 1. 806.

Great

Great White Charlock. *Pet. H. Brit.* t. 46.

f. II.

Angl. Wild Radish. Jointed Charlock.

Inter segetes copiosè; γ in maritimis. *D. Stone-street.*

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva. Caulis supernè ramosus, teres, glaucus, hispidus, setis porrectis. Folia lyrata, scabra. Flores majusculi, flavi, vel ochroleuci, venis violaceis, demum albi. Calyx linearis, clausus, hispidus. Silique moniliformes, rostro ensiformi.

Varietas γ nondum mihi obvia fuit.

Classis XVI.

MONADELPHIA.

Filamenta inferne in unum corpus
coalita.

PENTANDRIA.

Stamina 5 perfecta.

314. ERODIUM. Monogyna. *Fructus* pentacoccus, rostratus : rostra spiralia, introrsum barbata.

Linum. *Geranium pusillum.*

DECANDRIA.

Stamina 10.

315. GERANIUM. Monogyna. *Fruct.* pentacoccus, rostratus : rostra recurva, nuda.

Oxalis. *Spartium.* *Genista.* *Anthyllis.* *Ulex.*
Ononis.

POLYANDRIA.

Stamina plurima.

318. LAVATERA. Polygyna. *Cal.* exterior trifidus. *Caps.* verticillatæ, monospermæ.
317. MALVA. Polygyna. *Cal.* exterior triphyllus. *Caps.* verticillatæ, monospermæ.
316. ALTHÆA. Polygyna. *Cal.* exterior novemfidus. *Caps.* verticillatæ, monospermæ.

XVI. MONADELPHIA.

I. PENTANDRIA.

314. ERODIUM. *L'Herit. Geraniol. ined...*

Ait. H. Kew. v. 2. 414. Sibth. 211.

*Geranium. G. Pl. 350. Juss. 268. Gærtn.
t. 79. moschatum.*

*Cal. pentaphyllus. Cor. pentapétala. Glandulæ
nectariferæ 5. Filamenta 5 sterilia. Fructus pen-
tagoccus, rostratus: rostræ spiralia, introrsum
barbata.*

11. ERODIUM pedunculis multifloris, foliis pin- *cicuta-*
natis: foliolis sessilibus pinnatifidis incisis. rium.

*Erodium cicutarium. L'Herit. in Ait. H. Kew.
v. 2. 414. Sibth. 211. Abbot. 147.*

*Geranium cicutarium. Sp. Pl. 951. Huds. 300.
With. 609. Relb. 260. Curt. Lond. fasc. 1.
t. 51. Fl. Dan. t. 986.*

*G. eicutæ folio inodorum. Raii Syn. 357. Ger.
em. 945.*

G. primum. Fuchs. Hist. 204.

Herba Roperti. Brunf. Herb. v. 2. 37.

3. *Geranium inodorum album. Raii Syn. 357.*

17. *G. Pimpinellæ folio. Dill. in Raii Syn. 358.*

Erodium pimpinellæfolium. Sibth. 211.

Angl. Hemlock Stork's-bill.

In ruderatis et arenosis frequens.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Radix fusiformis, albida. Caules plures, procumbentes,
divaricati, longitudine varii, saepius ramosi, foliosi, te-
retes, pilosi. Folia alterna, pinnata, pinnis plerum-
que alternis, sessilibus, pinnatifidis, acutè incisis, pilosis.
Stipulæ ovatæ, acutæ, scariosæ. Pedunculi oppositi-
folii,

folii, umbellati, multiflori, foliis longiores. Flores purpurei, petalis duobus vel tribus in varietate γ basin versus viridi maculatis. Capsulæ obconicæ, monospermæ, verticales, sursum hispidæ, singulæ rostro longissimo, demum spirali, intus pilis patentibus barbato.

- moscha-* 2. **ERODIUM** pedunculis multifloris, foliis pinnatis: foliolis subpetiolatis ellipticis inæquilater incisis.

Erodium moschatum. *L'Herit. in Ait. H. Kew.*
v. 2. 414.

Geranium moschatum. *Sp. Pl. 951. Huds. 300.*
With. 609. Raii Syn. 358. Jacq. Hort. v. 1.
t. 55. Ger. em. 941. Cavan. Diff. 227. t. 94.
f. 1.

Angl. Musky Stork's-bill. Muscovy.

In pascais montosis.

Shotover hill near Oxford. *Rev. Dr. Goodenough.*
Truly wild in the mountainous pastures of Yorkshire and Westmoreland.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Habitus præcedentis, at foliis majoribus, odoreque ambrosiaco dignoscitur. Herba pilis viscosis vestitur. Foliola pauciora, elliptica, lata, vix pinnatisida. Flores minores et pedicelli breviores quam in E. cicutario.

- mariti-* 3. **ERODIUM** pedunculis subtrifloris, foliis cordatis incisis crenatis scabris, caulis depresso.

Erodium maritimum. *L'Herit. in Ait. H. Kew.*
v. 2. 416. Engl. Bot. t. 646.

Geranium maritimum. *Sp. Pl. 951. Huds. 301.*
With. 606. Dicks. H. Sicc. fasc. II. II.
Cavan. Diff. 218. t. 88. f. 1.

G. pusillum supinum maritimum, Althææ aut Betonicæ

Betonicæ folio nostras. *Raii Syn.* 356. *Pluk.*

Phyt. t. 31. f. 4.

G. iniuimuin anglicum procumbens, Betonicæ folio. *Morif. sect.* 5. t. 35.

Angl. Sea Stork's-bill.

In arenosis maritimis.

Perennis. Fl. Maio—Septembri.

Caules latè sparsi, depresso-ramosi, foliosi, pilosi. Folia longius petiolata, simplicia, cordato-ovata, incisa, crenata, hispida. Flores exigui, carnei, subterni, sèpè folitarii.

Stylus in omnibus speciebus simplex, stigmate quinque-partito, ut in Geranio.

II. DECANDRIA.

315. GERANIUM. G. Pl. 350. Juss. 268.

Gærtn. t. 79. *prutense.*

Cal. pentaphyllus. Cor. pentapetala. Glandulæ nectariferæ 5. Fructus pentacoccus, rostratus : rostra recurva, nuda.

i. GERANIUM pedunculis bifloris paniculatis *pbæum.* erectis, calyce subaristato, capsulis carinatis : basi hispidis : apice corrugatis.

Geranium *phæum.* Sp. Pl. 953. Huds. 301.

With. 605. Relh. Suppl. 2. 13. Abbot. 149.

Engl. Bot. t. 322. Fl. Dan. t. 987.

G. montanum fuscum. Dill. in Raii Syn. 361.

G. batrachoides pullo flore. *Ger. em.* 942.
Angl. Dusky Crane's-bill.

In dumetis montosis rariūs.

Found by Mr. Drayton, apothecary, of Maidstone, at Tovel in the valley by the old fulling-mill. *Dill.* About Clapham and Ingleton, Yorkshire. *Huds.* In Lancashire, Cambridgeshire, and Bedfordshire. *Engl. Bot.* On a bank at Ash-Bocking, Suffolk. *Mrs. Cobbold.* About Newburgh, Yorkshire. *Rev. Archdeacon Peirson.*

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix lignosa. Caules herbacei, erecti, bipedales, foliosi, teretes, pilosi, paniculati, multiflori. Folia palmato-multifida, incisa, pilosa, subtus reticulata, venis anastomosantibus; radicalia longius petiolata; summa sessilia, parva, trisida. Pedunculi alterni, oppositifolii, erecti, biflori. Bracteæ parvæ, scarioræ, fuscæ. Calycis foliola elliptica, incana, pilosa, obsoletè aristata. Petala atro-sanguinea, lurida, undulata, ungue albo. Stamina atro-purpurea, ferè æqualia, recurva. Antheræ flavæ, deciduæ, omnes fertiles. Stylus simplex, stigmate quinquefido, ut in congeneribus. Capsulæ obovatæ, carinatæ, fuscæ; basin versus hispidæ, pilis albis erectis; apice transversim corrugatæ, rugis repandis.

nodosum. 2. *GERANIUM* pedunculis bifloris, foliis oppositis trilobis ferratis, capsulis undique pilosis æqualibus.

Geranium nodosum. *Sp. Pl.* 953. *Huds.* 301. *With.* 601.

G. nodosum Plateau. *Raii Syn.* 361. *Cluf. Hist.* v. 2. 101. *Ger. em.* 947.

G. magnum, folio trifido. *Baub. Hist.* v. 3. 478. *Angl.* Knotty Crane's-bill.

In montosis Angliæ borealis, rariūs.

In

In Cumberland, Mr. Archegen. *Ray.* Confirmed by Mr. Woodward. *With.*

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix tuberosa. Caules patuli, angulato-compressi, geniculis tumidis rubicundis. Folia opposita, petiolata, lucida, triloba, acuta, ferrata. Pedunculi laterales et terminales, solitarii, erectiusculi, biflori, longissimi. Bracteæ lineares, acuminatae. Flores majusculi, purpurei, speciosi. Calycis foliola elliptico-oblonga, incana, aristis purpureis, obtusis. Capsulæ ellipticæ, vix carinatæ, undique pilosæ, superficie æquali.

3. GERANIUM pedunculis bifloris subcorymbo-*sylvaticum*, foliis subseptemlobis inciso-ferratis, capsulis undique pilosis, staminibus subulatis.

Geranium sylvaticum. Sp. Pl. 954. Huds. 302. With. 602. Engl. Bot. t. 121.

G. palustre? Rose Elem. App. 441. t. 1.

G. batrachoides montanum nostras. Raii Syn. 361.

G. batrachoides alterum. Ger. em. 942.

Angl. Wood Crane's-bill.

In dumetis et pascuis montosis, præsertim Angliæ borealis et Scotiæ.

At Spixworth, Norfolk. Mr. Humphrey. Near Lynn. Mr. Crowe. Common in the mountainous counties.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix sublignosa. Caules bi- vel tri-pedales, erecti, teretiussculi, foliosi, corymbo-paniculati, pilosi, pilis deflexis. Folia opposita, petiolata, quinqueloba vel septemloba, mollia, pilosa, acuta, inciso-ferrata, venosa, subtus pallidiora. Pedunculi erecti, biflori. Bracteæ lanceolatae. Calyx aristatus. Petala purpurea, venis sanguineis, saepius emarginata, basi pilosa. Stamina subulata, membranaceo-alata, ultra medium ciliata. Capsulæ carinatæ, pilosæ, apicem versus utrinque

nervo solitario fusco notatæ, nec corrugatæ. Semina punctata.

pratense. 4. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subseptempartitis inciso-serratis, capsulis undique pilosis, staminibus basi deltoideis.

Geranium pratense. *Sp. Pl.* 954. *Huds.* 302.

With. 606. *Hull.* 153. *Relb.* 261. *Sibth.*

212. *Abbot.* 148. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 49.

Engl. Bot. *t.* 404. *Cavan. Diff.* 210. *t.* 87.

f. 1. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 16. 18.

G. batrachoides. *Raii Syn.* 360. *Ger. em.* 942.

G. quintum. *Fuchs. Hist.* 208.

Angl. Crowfoot-leaved Crane's-bill.

In pratis, dumetis, et pascuis humidioribus, præcipue montosis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Praecedente major. Caulis tomentoso-incanus, pilis recurvis, superioribus glandulosis. Folia usque ad basin ferè divisa, lobis subpinnatifidis, rugosis; inferiora obsoletè peltata. Flores maximi, cærulei. Stamina setacea, glabra, basi maximè dilatata et deltoidea. Capsulae undique pilosæ, æquales. Semina punctata,

robertia- 5. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subnum. pedatis pinnatifidis quinquangularibus, ealyculis decangularibus, capsulis rugosis.

Geranium robertianum. *Sp. Pl.* 955. *Huds.*

305. *With.* 608. *Hull.* 153. *Relb.* 263.

Sibth. 215. *Abbot.* 149. *Curt. Lond. fasc.* 1.

t. 52. *Fl. Dan.* *t.* 694. *Raii Syn.* 358. *Ger.*

em. 939. *Cavan. Diff.* 215. *t.* 86. *f. 1.* ..

G. quintum. *Camer. Epit.* 603. .

G. tertium. *Fuchs. Hist.* 206.

β. *G. lucidum saxatile*, foliis Geranii robertiani. *Raii Syn.* 358. .

Angl.

Angl. Stinking Crane's-bill. *Herb Robert.*

In ruderatis, muris, et ad sepes. $\beta.$ in maritimis.

Annua. Fl. Maio—Octobri.

Radix fibrosa. Caules patuli, decumbentes, fragiles, ramosi, rubieundi. Folia petiolata, ternata, subpedata, circumscriptione quinquangularia, foliolis pinnatifidis, subpilosis, nitidis. Pedunculi laterales et terminales. Flores purpurei. Calyx pilosus, deeangularis. Petala integra. Stamina glabra. Capsulæ tereti-oblongæ, simpliciter carinatæ, undique reticulato-eorrugatæ, interdum pubescentes. Semina lœvissima.

Herba autumno saturatè rubet. Variat petalis albis. Folia in β maximè lucida, magisque aliquantulum carnosa.

(6.) GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quin-*lucidum*, quelobis rotundatis, calycibus transversè corrugatis, capsulis multicarinatis.

Geranium lucidum. Sp. Pl. 955. Huds. 304. With. 607. Hull. 153. Relb. 262. Sibth. 214. Abbot. 150. Engl. Bot. t. 75. Fl. Dan. t. 218. Bauh. Hist. v. 3. 481. Cavan. Diff. 214. t. 80. f. 2.

G. saxatile. Raii Syn. 261. Camer. Harcyn. 44. t. 5.

Angl. Shining Crane's-bill.

In muris, tectis, rupibusve roridis inter muscos, præsertim in montofisis.

Annua. Fl. Maio—Augusto.

Radix parva, fibrosa. Herba lucida, ferè glabra, demùm rubieunda. Caules debiles, fragiles, decumbentes, lœvigliati, ramosissimi. Folia longius petiolata, reniformia, rotundata, quinqueloba, ineifa. Flores parvi, rosei. Calyx pyramidatus, quinquangularis, transversè corrugatus, glaber. Petala integra, angusta. Capsulæ oblongæ, eompressiufculæ, utrinque reticulatæ, apice pilosæ, dorso multisulcatæ. Semina lœvissima.

molle. 7. **GERANIUM** pedunculis bifloris alternis oppositifoliis, foliis rotundatis lobatis tomentosis, capsulis corrugatis glabris.

Geranium molle. Sp. Pl. 955? Huds. 303. With. 604. Hull. 153. Relb. 261. Sibth. 213. Abbot. 150. Curt. Lond. fasc. 2. t. 50. Cavan. Diff. 203. t. 83. f. 3. El. Dan. t. 679.

G. columbinum. Raii Syn. 359.

G. alterum. Camer. Epit. 600.

Angl. Dove's-foot Crane's-bill.

In pratis, pascuis et ruderatis paucim.

Annua. Fl. Aprili—Augusto.

Radix fusiformis, parva, ramosa. Caules plures, patentes, basi decumbentes, parùm ramosi, teretes, pilosi, plurimque pedales. Folia petiolata, alterna, rotundato-reniformia, lobata, incisa, utrinque mollissimè pubescentia. Pedunculi solitarii, alterni, oppositifolii; pedicelli deflecti, apice adscendentes. Flores erecti, parvi, purpurei. Calycis foliola ovata, plana, tomentosa, pilosa. Petala obcordata. Capsulae ellipticæ, transversè corrugatæ, glabræ. Semina lævissima.

pusillum, 8. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliis reniformibus palmatis incisis, capsulis æqualibus hirsutis, seminibus lævibus.

Geranium pusillum. Sp. Pl. 957. Huds. ed. 1. 266. With. ed. 2. 733. Hull. 152. Relb. 262. Cavan. Diff. 202. t. 83. f. 1. Dicks. Dr. Pl. 78. Engl. Bot. t. 385.

G. molle β. Huds. 303.

G. parviflorum. Curt. Lond. fasc. 6. t. 46. Sibth. 213. Abbot. 151.

G. malvæfolium. With. 603. Scop. Carn. v. 2. 37.

G. malvaceum β. Burn. Ger. 25.

G. alterum. Fuchs. Hist. 205.

G. columbinum majus, flore minore cœruleo.

Vaill. Par. t. 15. f. 1. nec Raii.

$\beta.$ G. humile. *Cavan. Diff.* 202. *t.* 83. *f.* 2.

G. columbinum humile, florc cæruleo minimo.

Dill. in Raii Syn. 359. *t.* 16. *f.* 2. Herb. She-rard.

G. pusillum, *Burm. Ger.* 27.

Angl. Small-flowered Crane's-bill.

In ruderatis et ad sepes, imprimis solo glareoso.

Annua. Fl. Junio—Septembri.

Præcedente plerumque minor, foliis sæpius oppositis, pro-fundiisque lobatis. Flores parvi, cærulescetes, pen-tandri, petalis emarginatis, calycem vix excedentibus.

Calyx muticus. Capsulæ carinatæ, superficie æquales, nec corrugatæ, undique hirsutæ, fetis ẽrecto-adpressis, Semina lævissima.

Var. β non nisi magnitudine minori differt,

9. GERANIUM pedunculæ bifloris, petalis calyce *tyrena-*
duplò longioribus, foliis reniformibus lobatis, *cum.*
capsulis æqualibus subpubescentibus.

Geranium pyrenaicum, Mant. 97 et 257. *Burm.*
Ger. 27. *Huds.* 302. *With.* 601. *Hull.* 152.
Sibth. 212. *Abbot.* 149. *Lightf.* 367. *Curt.*
Lond. fasc. 3. *t.* 42. *Engl. Bot.* *t.* 405. *Ca-van. Diff.* 203. *t.* 79. *f.* 2.

G. n. 12. *Ger. Gallopr.* 434. *t.* 16. *f.* 2.

G. columbinum perenne pyrenaicum maximum,
Tourn. Inst. 268. Herb. Tournef.

Angl. Mountain Crane's-bill.

In pratis et pascuis.

On the bank of a river between Bingley and Keigh-ley in Yorkshire; near Enfield; about Brompton, Chelsea and other places in the neighbour-hood of London. *Huds.* In mountainous pas-tures and waste places near Edinburgh; Dr. Parsons. *Lightf.* In a lane leading from the south-

south-east part of Edinburgh to the King's Park abundantly.

Perennis. Fl. Julio.

Radix tuberosa, perennis. Caules bi- vel tri-pedales, erecti sculi, ramosi. Folia opposita, reniformia, palmata, lobata, hirsuta. Flores purpurei, magni. Calyx aristatus. Petala obcordato-biloba, calyce duplo longiora, basi hirsuta. Staminum quinque exteriōra sēpe abortiva. Capulæ carinatæ, superficie æquales, juniores undique pubescentes, ætate ferè glabratæ. Semina lœvia.—Variat flore albo.

A duabus præcedentibus discrepat omnium partium magnitudine duplo majori, radiceque perenni, præter characteres c petalis capulifive desumendos. Hanc cum penultimâ olim confudit Linnaeus.

rotundi-folium. 10. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris, foliis reniformibus incisis tomentosis, capsulis hirsutis, seminibus reticulatis.

Geranium rotundifolium. Sp. Pl. 957. Huds. 303. With. 607. Hull. 153. Sibth. 213. Engl. Bot. t. 157. Cavan. Diff. 214. t. 93. f. 2.

G. columbinum majus, flore minore cœruleo. Raii Syn. 358. nec Vaillantii.

G. columbinum. Ger. em. 938, ex iconc.

G. malvaceum ♂. Burm. Ger. 24.

G. alterum. Matth. Valgr. v. 2. 208.

Angl. Round-leaved Crane's-bill.

In ruderatis, aggeribus, pasturis sterilibus, minus vulgaris.

About Bath, Bristol, and several places near London. Huds. Also in Northamptonshire. Mr. E. Forster. Common in Suffolk. Mr. Woodward.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Habitus trium præcedentium. Caules ramosissimi, patuli. Herba tota mollissime tomentosa. Folia minus profunde

profundè lobata. Flores parvi, rosei. Petala integerima. Capsulæ carinatæ, colorc plumbeæ, undique hirsutæ, pilis patentibus. Semina pulcherrimè reticulata, nec lævia; quibus notis haud dubiè determinatur.

11. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis emarginatis, foliis quinquepartitis laciniatis, capsulis hirsutis, seminibus reticulatis.

Geranium dissectum. Sp. Pl. 956. Huds. 304.

With. 603. Hull. 152. Relb. 263. Sibth.

214. Abbot. 150. Curt. Lond. fasc. 6. t. 45.

Fl. Dan. t. 936. Cavan. Diff. 199. t. 78. f. 2.

G. columbinum majus, dissectis foliis. Raii Syn.

359.

G. columbinum majus, foliis imis usque ad pedunculum divisis. Vaill. Par. t. 15. f. 2.

¶. G. columbinum maximum, foliis dissectis. *Raii Syn. 360.*

Angl. Jagged-leaved Crane's-bill.

In ruderatis et sterilibus glareosis, nec non arvis requietis.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Caules ramosi, diffusi, hirsuti, pilis deflexis. Folia ad basin ferè quinquepartita, subhirsuta, lobis trisidis pinnatifidissimæ, interdum indivisis. Pedunculi breves. Calyx aristatus, tricostatus. Petala purpurea, emarginata. Capsulæ vix carinatæ, fuscae, subrugosæ, undique hirsutæ, pilis patentibus. Semina pulcherrimè reticulata ut in præcedente.

12. GERANIUM pedunculis bifloris folio triplò *columbi-* longioribus, foliis quinquepartitis multifidis, *num.* capsulis glabris, seminibus reticulatis.

Geranium columbinum. Sp. Pl. 956. Huds.

304. With. 603. Hull. 152. Sibth. 214.

Abbot.

Abbot. 150. *Engl. Bot.* t. 259. *Cavan. Diff.* 200. t. 82. f. 1.

G. columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis. *Raii Syn.* 359.

G. dissectis foliis, pedunculis florum longissimis. *Vaill. Par.* t. 15. f. 4.

Angl. Long-stalked Crane's-bill.

In arvis, aggeribusque, solo glareoso vel calcareo, sparsim.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Herba gracilis, diffusa, scabriuscula, setis caulinis depresso, cæteris adpressis. Folia quinquepartita, lobis pinnatifidis, acutis. Pedunculi et pedicelli longissimi. Flores rosei, majusculi. Calyx aristatus, tricostatus, pyramidalis, scaber. Petala emarginata. Capsulæ carinatae, lèves, glaberrimæ. Semina reticulato-punctata.

sanguineum. 13. **GERANIUM** pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis rotundatis, capsulis apice setosis.

Geranium sanguineum. *Sp. Pl.* 958. *Huds.* 305. *With.* 600. *Hull.* 152. *Rehb.* 263. *Engl. Bot.* t. 272. *Cavan. Diff.* 195. t. 76. f. 1. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 16. 19.

G. hæmatodes. *Raii Syn.* 360.

G. sanguinarium. *Ger. em.* 945.

G. sextum. *Fuchs. Hist.* 209.

Sanguinaria radix. *Trag. Hist.* 348.

β. *Geranium hæmatodes* foliis majoribus, pallidioribus et altius incisis. *Raii Syn.* 360.

γ. *G. hæmatodes* Lancastriense, flore eleganter striato. *Raii Syn.* 360. *Dill. Elth.* 163. t. 136.

G. lancastriense. *With.* 600. *Hull.* 152.

G. prostratum. *Cavan. Diff.* 196. t. 76. f. 3.

Angl.

Angl. Bloody Crane's-bill.

In dumetis montosis petrosis, rupibusve calcareis.

On the sandy coast of the isle of Walney, Lancashire.

Perennis. Fl. Julio—Septembri.

Radix lignosa. Caules debiles, divaricati, geniculati, pilosi. Folia quinque- vel septem-partita, lobis trifidis vel pinnatifidis, pilosa, circumscriptione rotundata. Pedunculi longissimi, pedicello solitario, unifloro. Flores maximi, sanguinei. Calycis foliola aristata, pilosa, plerumque quinquenervia. Capsulæ carinatæ, læves, apice setosæ, interdum dispermæ. Semina minutissime corrugata.

vix differt nisi caule prostrato, ramis floriferis erectis, petalis carneis purpureo-venosis. Huic caulem erectum Witheringius, prostratum Cavanilles, tribuit.

varietatem pedunculis quandoque bisoris ex Helvetia misit amicissimus Davallius.

III. POLYANDRIA.

316. ALTHÆA. G. Pl. 353. Juss. 272.
Gærtn. t. 136.

Cal. duplex; exterior sub-novemfidus. *Caps.* plurimæ, monospermæ, in orbem dispositæ.

ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis sub-
quinqüelobis. officinalis.

Althæa officinalis. Sp. Pl. 966. Hud. 306.
With. 611. Hull. 155. Relb. 264. Engl.
Bot. t. 147. Woodv. Med. Bot. t. 53. Fl.
Dan. t. 530.

A. vulgaris. Raii Syn. 252.

A. Ibiscus. Ger. em. 933.

Althæa.

Althæa. *Fuchſ. Hist.* 15. *Matth. Valgr.* v. 2.
276.

B. A. vulgari ſimilis, folio retuſo brevi. *Raii Syn.*
252.

Althæa, radix, folium. *Pharmac. Lond.*
Angl. Marsh Mallow.

In paluſtribus maritimis copioſè.

Perennis. Fl. Julio—Septembri.

Radix fusiformis. Caules errecti, ferè tripedales; simplices; teretes, viminei, foliosi. Folia alterna, petiolata; cordata, acuta, subquinqueloba, plicata, ferrata. Paniculæ axillares, denſæ, multifloræ, petiolis breviores. Calyx exterior ſampè decemfidus, etiam duodecimfidus; interior quinquefidus. Corolla et stamina purpureo-carnea. Stigmata numeroſa. Capsulæ compressæ. Herba tota mollifimè pubefcens, pilis ſtellatis, intertextis.

317. MALVA. *G. Pl.* 354. *Juff.* 272.
Gærtn. t. 136.

Cal. duplex; exterior subtriphyllus. *Capſ.* plurimæ, monospermæ, in orbem dispositæ.

Sylveſtris. I. MALVA caule erecto lierbageo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilofis.

Malva sylvestris. *Sp. Pl.* 969. *Huds.* 307. *With.* 613. *Hull.* 155. *Reh.* 265. *Sibth.* 215. *Abbot.* 151. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 51. *Woodv. Med. Bot.* t. 54. *Ger. em.* 930. *Engl. Bot.* t. 671.

M. vulgaris. *Raii Syn.* 251.

M. sylvestris elatior. *Fuchſ. Hist.* 509.

M. equina. *Brunf. Herb.* v. 2. 71.

Malva, folium, flos. *Pharmac. Lond.*
Angl. Common Mallow.

Ad ſepes et ſemitas, inque ruderatis et cultis.

Perennis.

Perennis. Fl. Maio—Augusto.

Radix fusiformis, ramosa, albida. Caulis plerumque erectus, ramosus, teres, pilosus, multiflorus. Folia alterna, petiolata, cordata, plicata, septemlobata, scabriuscula, crenata; superiora ferè palmata. Pedunculi aggregati, pilosi, uniflori. Flores purpurei. Petala obcordata, calyce triplò longiora. Calyx hispidus.

2. MALVA caulibus prostratis, foliis cordato-orbiculari quinquelobis, pedunculis fructiferis decurrentibus, clinatis.

Malva rotundifolia. *Sp. Pl.* 969. *Huds.* 307.
With. 612. *Hull.* 155. *Relh.* 265. *Sibth.*
 215. *Abbot.* 151. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 43.
Fl. Dan. t. 721.

M. sylvestris minor. *Raii Syn.* 251.

M. sylvestris puinila. *Ger. em.* 930. *Fuchs. Hist.*
 508.

Malva. *Brunf. Herb.* v. 2. 70.

3. M. pusilla. *Engl. Bot.* t. 241. *With.* 612.
Hull. 155.

M. parviflora. *Huds.* 307.

M. minor, flore parvo cæruleo. *Dill. in Raii*
Syn. 251.

Angl. Dwarf Mallow. β . Small-flowered Mal-
 low.

In ruderatis et ad vias.

β . Near Hithe in Kent. *Sherard. Huds.*

Annuæ. Fl. Junio—Septembri.

Radix ramosa, albida. Caules plures, prostrati, subsimplices. Folia minora quam in priore, quinque- vel septem-lobata. Flores carnei.

β vix differt nisi petalis minoribus, haud calyce longioribus.

3. MALVA foliis radicalibus reniformibus incisis; *moschata*-caulinis *ta*.

caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis, calyce piloso.

Malva moschata. *Sp. Pl.* 971. *Huds.* 308. *With.* 613. *Hull.* 155. *Rehb.* 266. *Sibth.* 216. *Abbot.* 151. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 50. *Fl. Dan.* t. 905.

M. sicc Alcea montana. *Column. Ecphr.* 147.

Alcea tenuifolia crispa. *Bauh. Hist.* v. 2. 1067. *Dill. in Raii Syn.* 253.

A. vulgaris. *Raii Syn.* 253, synonymis omnino erroneis.

Angl. Musk Mallow.

In agrorum marginibus et ad vias, solo glareoso.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix sublignosa, tenax. Herba piloso-scabra, ambrosiaca. Caules erectiusculi, subramosi. Folia inferiora cordato-reniformia, lobata; superiora quinquepartita, lacinii pinnatifidis, incisis, canaliculatis. Flores magni, speciosi, rosei.

A *M. Alcea Linnæi*, nequaquam Britanniæ indigenâ, differt foliis laciñiatis, odoratis; calyce piloso, nec densè tomentoso, foliolis exterioribus linearì-lanceolatis, nec ovatis.

318. LAVATERA. *G. Pl.* 354. *Juss.* 272.

Gærtn. t. 136.

Cal. duplex; exterior trifidus. *Caps.* plurimæ, monospermæ, in orbem dispositæ.

arborea. 1. **LAVATERA** caule arboreo, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis axillaribus confertis unifloris.

Lavatera arborea. *Sp. Pl.* 972. *Huds.* 306. *With.* 614. *Hull.* 154. *Lightf.* 374. *Carvan.* *Diff.* 86, et 282. t. 139. f. 2.

Malva arborea marina nostras. *Raii Syn.* 252. *Angl.*

Angl. Sea Tree-Mallow.

In petroſis maritimis, rariūs.

On the Bass and other islands on the Scottish coast; also in Portland island, and at Hurſt castle opposite to the iſle of Wight. *Ray.* In Cornwall and Devonshire. *Huds.* In Pembrokeshire. *Mr. Adams.*

Biennis. Fl. Julio—Octobri.

Caulis arborescens, sexpedalis, teres, nudus, apice foliſus. Folia longiūs petiolata, cordata, angulato-lobata, plicata, tomentosa. Flores numerosi, axillares, subterni, pedunculati, purpurei, ore violacei, formosi, nitidi. Calyx exterior maximus, foliaceus, trilobus; interior quinquesfidus, lanatus.

Classis XVII.

DIADELPHIA.

Filamenta in duo corpora connexa.

HEXANDRIA.

Stamina 6.

319. FUMARIA. *Cal.* diphyllus. *Cor.* ringens,
basi gibbosa nectarifera. *Filam.* antheris
tribus.

OCTANDRIA.

Stamina 8.

320. POLYGALA. *Cal.* laciniæ 2 alæformes.
Cor. vexillum cylindricum. *Legumen* ob-
cordatum, biloculare.

DECANDRIA.

Stamina 10.

* *Stamina omnia connexa, seu monadelpha, tubo*
superne sœpiùs fisco.

321. SPARTIUM. *Filam.* germini adhærentia.
Stigma adnatum, villosum.

322. GENISTA. *Pistillum* deprimens carinam,
vexillo reflexo.
323. ULEX. *Cal.* diphyllo. *Legumen* vix ca-
lyce longius.
325. ANTHYLLIS. *Cal.* turgidus, legumen in-
cludens.
324. ONONIS. *Cal.* quinquepartitus. *Legumen*
rhombeum, sessile. *Vexillum* striatum.
- ** *Stigma pubescens.* (nec priorum notæ.)
327. OROBUS. *Stylus* linearis, teretusculus, su-
pra villosus.
326. PISUM. *Stylus* supra carinatus villosusque.
328. LATHYRUS. *Stylus* supra planus villo-
susque.
329. VICIA. *Stylus* sub stigmate barbatus.
330. ERVUM. *Stigma* capitatum, undique pu-
bescens.
- *** *Legumen sub-biloculare.* (nec priorum notæ.)
334. ASTRAGALUS. *Legumen* biloculare, gib-
bum.
- **** *Legumen submonospermum.* (nec priorum
notæ.)
335. TRIFOLIUM. *Legumen* vix calyce longius,
i five polyspermum, non dehisces, deci-
duum. *Florcs* capitati.
- ***** *Legumen subarticulatum.* (nec priorum
notæ.)
333. HEDYSARUM. *Legumen* articulis mono-
spermis, compressis. *Carina* obtusissima.
331. ORNITHOPUS. *Legumen* articulatum, ar-
cuatum.
332. HIPPO-

332. HÍPOCREPIS. *Legumen compresso-membranaceum, alterâ suturâ pluriè emarginatum, curvum.*

337. MED!CAGO. *Legumen spirale, compresso-membranaceum. Pistillum carinam deflectens.*

***** *Legumen uniloculare, polyspermum. (nec priorum notæ.)*

336. LOTUS. *Legumen teres, fæcum. Alæ sursum longitudinaliter conniventes:*

XVII. DIADELPHIA.

I. HEXANDRIA.

319. FUMARIA. *G. Pl.* 362. *Juss.* 237. *Gærtn.*
t. 115.

Capnoides. Gærtn. t. 115.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* duo,
membranacea, singula *antheris* tribus.

solida. 1. FUMARIA caule subsimplici erecto, soliis bi-
ternatis, bracteis palmatis pedunculo longiori-
bus.

Fumaria solidia. Linn. Mff. in Sp. Pl. Curt.
Mag. t. 231.

F. bulbosa γ. Sp. Pl. 983.

F. minor. Gmel. Syst. 1080.

F. intermedia. With. 620. t. 29.

F. bulbosa, radice non cava, major. Baub. Pin.
144.

Angl. Solid Bulbous Fumitory.

In nemorosis.

About Kendal and in other parts of Westmoreland;
also at Perry Hall near Birmingham. *With.*

Perennis. Fl. Aprili, Maio.

*Radix bulbosa, solida. Caulis erectus, spithameus, ple-
rumque simplex, rarius bifidus, teretiusculus, foliosus,
glaber. Folia alterna, pauca, petiolata, biernata, læ-
via; foliolis subcuneatis, apice incisis. Spica termina-
lis, solitaria, simplex. Bracteæ palmato-quinquesidæ,
pedunculis longiores. Flores basi pallidi, apice purpu-
rei. Calcar pedunculo æquale, cylindraceum, obtusif-
uscum. Siliqua brevis, bivalvis, polysperma, basi de-
hiscens.*

2. *FUMARIA* siliquis terciuseculis pedunculo brevioribus, caulis angulatis, bracteis minutis, calceari brevissimo rotundato.

Fumaria lutea. *Mant.* 2. 258. *Bauh. Pin.* 143.

Mill. Ic. t. 136. f. 1. *Mill. Illustr.* t. 60. *Gmel.*

Syst. 1080. *Ait. H. Kew.* v. 3. 2. *Engl. Bot.*

t. 588. *Ger. em.* 1088.

F. capnoides. *With.* 620.

F. corydalis: *Matth. Valgr.* v. 2. 503. *Camer. Epit.* 892.

F. lutea montana. *Dalech. Hist.* 1293.

F. tingitana, radice fibrosâ, perennis, flore ex albo flavescente, siliquis curtis. *Pluk. Phyt.* t. 90. f. 2.

Capnoides lutea. *Gaertn.* v. 2. 163.

Pseudo-*Fumaria* flore luteo. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 75. f. 1.

Angl. Yellow Fumitory.

In muris antiquis.

On old walls near Castleton, Derbyshire, far from any garden; Mr. Robson. *With.* Near Fountain's Hall, by Fountain's Abbey. *Mr. W. Bruntton, jun.*

Perennis. Fl. Maio.

Radix fibrosa. Caules ferè pedales, erecti, subramosi, trianguli, glabri, rubicundi, foliosi. Folia triternata; foliolis latè euneatis, trifidis, glaberrimis, glaucescentibus. Spica terminalis. Bracteæ minutæ, ovatæ, acutæ, serratæ. Flores flavi, apice fulvo. Calcar brevissimum, rotundato-ineuryuin. Siliqua teretiuseula, pedunculo brevior.

A *F. capnoide* Linn. differt radicee perenni, florum colore saturationi, calceari brevissimo rotundato, nee subulato, siliquis duplò brevioribus, teretiuseulis, nee triquetris.

Officina- 3. **FUMARIA** spicis laxis, siliquis monospermis globosis emarginatis, caule diffuso, foliorum laciniis dilatatis.

Fumaria officinalis. *Sp. Pl.* 984. *Huds.* 309, α .
With. 620. *Rehb.* 267, α . *Sibth.* 217. *Abbot.* 152. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 52. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 68. *Woodv. Med. Bot.* *t.* 88. *Engl. Bot.* *t.* 589. *Fl. Dan.* *t.* 940. *Dreves. Bildeb.* *t.* 16.

F. vulgaris. *Raii Syn.* 204.

F. purpurea. *Ger. em.* 1088.

Fumaria. *Riv. Tetrap. Irr.* *t.* 1.

Fumus terræ. *Brunf. Herb.* *v.* 1. 99.

Angl. Common Fumitory.

In arvis, hortis, et ad sepes vulgaris.

Annua. Fl. Maio—Augusto.

Radix parva, fusiformis. Herba glauca, lœvis. Caulis ramosissimus, diffusus, angulatus, foliosus. Folia bipinnata; foliolis cuneatis, lobatis, dilatatis. Spicæ oppositifoliæ, solitariæ, laxæ, multifloræ. Bracteæ exiguae. Flores rosei, apice sanguinci, petalorum carinâ viridi. Calcar breve, obtusum. Siliqua ferè globosa, lœvis, apice retusa et scrobiculata. Semen solitarium, globosum.

parviflo- 4. **FUMARIA** spicis laxis, siliquis monospermis globosis acuminatis, caule diffuso, foliorum laciniis linearibus canaliculatis.

Fumaria parviflora. *Lamarck. Encycl.* *v.* 2. 567.
Engl. Bot. *t.* 590.

F. spicata β . *Syst. Veg. ed.* 14. 637.

F. tenuifolia. *Sym. Syn.* 200. *Synonymis omnibus, ni fallor, erroneis.*

F. foliis tenuissimis, floribus albis, circa Monspe- lium nascens. *Vaill. Par.* 56. *t.* 10. *f.* 5.

Angl.

Angl. Small-flowered Fumitory.

In arvis Angliae australioris.

In the corn-fields about Woldham, near Roehes-
ter. *Mr. Jacob Rayer.* Near Epsom. *Mr. T. F.
Forster jun.*

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Habitus præcedentis, sed foliorum laciniae angustissimæ,
lineares, canaliculatæ, subtus convexæ, nequaquam di-
latatæ vel cuneatae; flores duplò ferè minorcs, palli-
diiores. Siliqua subglobosa, acuminata, nec scrobicu-
lato-emarginata.

F. spicata Linnæi dignoscitur siliquâ ellipticâ, compressâ,
utrinque excavato-punctatâ, margine incrassatâ.

5. **FUMARIA** spicis laxis, siliquis monospermis *capreolata*
globosis, caule petiolis contortis scandente,
foliolis cuneatis lobatis.

Fumaria capreolata. Sp. Pl. 985. With. 621.

t. 30. Sibth. 217. Curt. Lond. fasc. 6. t. 47.

Dicks. H. Sicc. fasc. 9. 9. Lightf. 380.

F. officinalis B. Huds. 309. Relb. 267.

F. major scandens, flore pallidiore. Raii Syn.
204.

Angl. Ramping Fumitory.

In arvis, imprimis Angliae australioris.

Rarely about London; more plentiful about Barn-
staple, Devonshire, and elsewhere. *Curt.*

Annua. Fl. Junio—Septembri.

Caulis ramosissimus, saepe tripedalis, scandens petiolis cir-
rhorum modo contortis. Folia bipinnata, foliolis la-
tioribus quam in F. officinali, minusque glaucis. Spicæ
laxæ, paucifloræ. Flores dilutè carnei, apice atrosan-
guinei, formosi, majores. Siliqua subglobosa, nitida,
apice retuso biseptuplicata.

- clavicu-* 6. FUMARIA filiquis lanceolatis lœvibus subtri-lata. Fumaria clavicularia. *Sp. Pl.* 985. *Huds.* 309. *With.* 621. *Engl. Bot.* t. 103. *Fl. Dan.* t. 340. F. alba latifolia. *Raii Syn.* 335. clavicularia. *Ger. em.* 1088. Capnos alba latifolia. *Lob. Ic.* 758. Dalech. *Hist.* 1295. *Angl.* White Climbing Fumitory.

In dumetis roridis, solo glareoso vel petroso.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix parva, fibrosa. Herba lœvis, tenerima, succosa. Caulis ramosus, foliosus, rubicundus, hinc complanatus. Folia pinnata, cirrhifera, foliolis ternatis vel pedatis, ellipticis, acutis, integerrimis, subtus præcipue glaucis. Spicæ paucifloræ. Flores albidi. Siliqua lanceolata, acuta, lœvis. Semina duo vel tria, reniformia.

H. OCTANDRIA.

320. POLYGALA. G. Pl. 364. Juss. 99.
Gærtn. t. 62.

Cal. pentaphyllus : foliolis duobus maximis, alæformibus, coloratis. Legumen obcordatum, biloculare.

vulgaris. 1. POLYGALA floribus crista-tis racemosis, cau-libus

libus herbaceis simplicibus procumbentibus,
foliis linear-lancéolatis.

Polygala vulgaris. *Sp. Pl.* 986. *Huds.* 310.
With. 622. *Hull.* 158. *Relb.* 268. *Sibth.*
218. *Abbot.* 153. *Engl. Bot.* t. 76. *Fl. Dan.*
t. 516. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 16. 17.

Polygala. *Raii Syn.* *287. *Ger. em.* 563. f. 3, 4,
et 564, f. 5.

Polygalon. *Trag. Hist.* 571.

Angl. Milkwort.

in pascuis et apricis glareofisis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix lignosa. Herba glabra. Caules decumbentes. Folia lanceolata, integerrima, latitudine et longitudine varia. Flores sæpius cyanei, interdum albi, incarnati, vel vio-lacei. Calyx corollæ concolor, demùm virescens.

III. DECANDRIA.

321. SPARTIUM. *G. Pl.* 368. *Gærtn.* t. 153.
Genista. *Juss.* 353.

Stigma longitudinale, supra villosum. *Filamenta* monadelpha, germini adhærentia. *Cal.* deorsum productus.

SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis *scoparium*-
inerribus angulatis.

Spartium scoparium. *Sp. Pl.* 996. *Huds.* 310.
With. 623. *Hull.* 158. *Relb.* 268. *Sibth.*
218.

218. *Abbot.* 153. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 5. *Woodv. Med. Bot.* t. 89. *Fl. Dan.* t. 313. *Dreves. Bilderb.* t. 48.

Genista. *Ger. em.* 1311. *Camer. Epit.* 950. *Fuchs. Hist.* 218.

G. *angulosa trifolia.* *Raii Syn.* 474.

Genista, cacumen, semen. *Pharmac. Lond. Angl.* Common Broom.

In campis et dumetis siccioribus.

Frutex. Fl. Maio, Junio.

Rami numerosi, striati, angulati, sempervirentes, glabri, foliosi. Folia ternata, parva, glabra; superiora frequenter simplicia. Flores axillares, solitarii, pedunculati, nutantes, magni, speciosi, papilionacei, aurei, interdum extus fulvi, rarissime toti citrini. Calyx subcampanulatus, bilabiatus, hians, laevis, purpurascens, apice quinquedenticulatus. Stamina omnina basi in tubum connexa. Germen villosum. Stylus demum intortus. Legumen compressum, fuscum, ciliatum, polyspermum. Semina compressa, nitida.

Hoc genus sequensque in unum coegerunt Lamarckius et Jussieus, nec forsitan immerito.

322. **GENISTA.** G. Pl. 368. Juss. 353.
Gærtn. t. 151.

Cal. bilabiatus; labio superiore bidentato, inferiore tridentato. *Vexillum oblongum*, a pistillo staminibusque deorsum reflexum.

tinctoria. 1. **GENISTA** foliis lanceolatis glabris, ramis teretibus striatis erectis inermibus.

Genista tinctoria. Sp. Pl. 998. Huds. 311. With. 624. Hull. 159. Relb. 269. Sibth. 219. Abbot. 153. Engl. Bot. t. 44. Dicks. H. Sic. fasc. 3. 11. Fl. Dan. t. 526.

Genistella tinctoria. Raii Syn. 474. Ger. em. 1316.

Tinctorius

Tinctorius flos. *Fuchs. Hist. 808.*

Angl. Dyer's Green-weed. Wood-waxen.

In pascuis, dumetis, et ad margines agrorum.

Frutex. Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa. Rami erecti, vel adscendentes, rarius procumbentes, striati, coarctati, angulato-teretes, fulcati, glabri, foliosi. Folia alterna, sessilia, simplicia, lanceolata, glabra, interdum subtus marginaque pilosiuscula. Flores axillares, solitarii, subsessiles, auricui. Calyx angulatus, dentibus lanceolatis, acutis. Legumen teretiusculum, polyspermum.

2. GENISTA foliis obovato-lanceolatis obtusis *pilosa*, subtus pilosis, caule tuberculato decumbente inermi.

Genista pilosa. *Sp. Pl. 999.* *Huds. 311.* *With. 625.* *Hull. 159.* *Engl. Bot. t. 208.* *Dicks. H. Sicc. fasc. 16. 16.* *Jacq. Austr. t. 208,* ex ipsius herbario.

Chamægenista prima. *Chuf. Pann. 50.* *Hist. v. 1. 103.*

C. pannonica. *Ger. em. 1313.*
Angl. Hairy Green-weed.

In ericetis campisve arenosis elatioribus.

On high sandy ground about Bury, Suffolk. *Mr. Dickson.* At the foot of Cader Idris, North Wales; Mr. Griffith. *With.* On soap rocks near the Lizard point. *Sir T. G. Cullum, Bart.*

Frutex. Fl. Maio.

Radix lignosa. Caules prostrati, ramosi, striati, tuberculati. Folia fasciculata, simplicia nec (ut apud *Engl. Bot.* ex errore memoravi) ternata, petiolata, magis vel minus angustè lanceolata, obtusissima; supra glabra; subtus sericea. Flores solitarii, axillares, pedunculati,

flavi, extus sericei. Calyx sericeus. Legumen hirtum, compressum, subdispermum.

anglica. 3. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis ovato-lanceolatis.

Genista anglica. *Sp. Pl.* 999. *Huds.* 311. *With.* 625. *Hull.* 159. *Rehb.* 269. *Sibth.* 219. *Abbot.* 154. *Engl. Bot.* t. 132. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 3. 12. *Fl. Dan.* t. 619.

G. minor aspalathoides, sive Genista spinosa anglica. *Raii Syn.* 475.

G. aculeata. *Ger. em.* 1320.

Angl. Needle Green-weed. Petty Whin.

In ericetis humidis, solo spongioso.

Frutex. Fl. Maio, Junio.

Radix lignosa. Caules erectiusculi, ramosi, spinosi, spinis simplicibus, patentibus, subulatis, valde pungentibus, junioribus basi foliolosis. Rami floriferi inermes, Folia alterna, ovata, acuta, glabra. Flores axillares, solitarii, brevius pedunculati, citrini, vexillo aureo. Calyx glaber. Legumen glabrum, turgidum, polyspermum.

3²3. ULEX. *G. Pl.* 379. *Juss.* 35².
Gærtn. t. 151.

Cal. diphyllus. Legumen vix calyce longius. Stam. omnia connexa.

europeæ- 1. ULEX dentibus calycinis obsoletis conniventibus, bracteis ovatis laxis, ramulis erectis.

Ulex europaeus. *Sp. Pl.* 1045. *Huds.* 312. *Forst. in Sym. Syn.* 160. *With.* 626. 1. *Tulit.* 159. *Rehb.* 269. *Sibth.* 220. *Abbot.* 154. *Fl. Dan.* t. 608.

U. grandiflorus. *Pourr. Act. Tolos.* v. 3. 333.
Genista

Genista spinosa vulgaris. *Raii Syn.* 475. *Ger.*
em. 1319.

Genistellæ spinosæ affinis, Nepa quibusdam.
Bauh. Hist. v. 1. p. 2. 400.

Scorpius primus. *Clus. Hist.* v. 1. 106.
Angl. Common Furze, Whin or Gorse.

In sabulosis sterilibus, et ericetis, vulgaris.

Frutex. Fl. Maio—totoque ferè anno.

Rami densissimi, fulcati, hirsuti, spinosissimi. Spinæ porræctæ, compositæ, angulatæ, maximè pungentes, glabrae, sempervirentes, foliolosæ, saepè floriferæ. Folia ad basin spinarum et spinularum, solitaria, subulata, pungentia, scabriuscula, saepè hirsuta, decidua. Pedunculi axillares, solitarii vel binati, uniflori, villosi. Bracteæ calyci approximatæ, laxæ, nec adpressæ, subinde patentes, ovatæ, concavæ, tomentosæ, calyce quintuplo ferè breviores. Calyx tomentosus, foliolo superiori apice bidentato, inferiore tridentato, dentibus exiguis, obtusis, conniventibus. Corolla calyce sesquilongior, aurea, odore mellino. Stamina monadelpha, tubo superne fisso. Legumen oblongum, pubescens, subtertraspermum.

2. **ULEX** dentibus calycinis lanceolatis distantibus, bracteis minutis adpressis, ramulis decumbentibus.

Ulex nanus. *Forst. in Sym. Syn.* 160.

U. europæus B. Sp. Pl. 1045. *Huds.* 312. *Rehb.* 270. *With.* 626. 2. *Hull.* 159. 2.

Genista spinosa minor. *Raii Syn.* 475.
Angl. Dwarf Furze.

In ericetis elatioribus.

Frutex. Fl. Augusto—Octobri.

Præcedente longè humilior, ramis decumbentibus, spinis brevioribus, floribus minoribus. Bracteæ exiguæ, saepè vix manifestæ, calyci adpressæ, monente anicissimo D.

Stackhousio. Calyx sericeus, minusque tomentosus, dentibus maximè conspicuis, altè incisis, ac distantibus. Corolla calyce parùm longior, colore minus quam in priore fulgenti. Legumen hirtum.

324. ONONIS. *G. Pl.* 370. *Juss.* 354.
Gærtn. t. 154.

Cal. quinquepartitus; laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum, rhombicum, sessile. *Filamenta* monadelpha absque fissurâ.

arvensis. 1. ONONIS caule villoso, ramulis demùm spinescientibus, floribus subsolitariis, foliis subsimplicibus posticè integerrimis.

Ononis arvensis. *Lights.* 386. *Relb.* 270. *Engl. Bot. t.* 682.

ꝝ. O. inermis α . *Huds.* 312.

O. arvensis. *With.* 627. *Hull.* 160. *Sibth.* 220. *Abbot.* 155.

Anonis non spinosa, purpurea. *Raii Syn.* 332.

ꝝ. Ononis spinosa β . *Sp. Pl.* 1006..

O. spinosa. *Syst. Veg. ed.* 14. 651. *Huds.* 312. *With.* 627. *Hull.* 160. *Sibth.* 220. *Abbot.* 155. *Retz. Prod.* 169. *Obs. Bot. fasc.* 2. 218. *Fl. Don. t.* 783. *Mart. Fl. Rust. t.* 129.

O. antiquorum. *Sp. Pl.* 1006, vix differt.

Anonis. *Fuchs. Hist.* 60.

A. spinosa, flore purpureo. *Raii Syn.* 332.

A. sive Resta bovis. *Ger. em.* 1322.

ꝝ. Ononis repens. *Sp. Pl.* 1006. *Syst. Veg. ed.* 14. 651. *Lights.* 387.

O. arvensis β . *Huds.* 313. *With.* 628, var. 2. *Hull.* 160.

Anonis procumbens maritima nostras, foliis hirsutie pubescentibus. *Raii Syn.* 332.

A. maritima procumbens, foliis hirsutie pubescentibus. *Dill. Eth. 29. t. 25.*
Angl. Rest-harrow. Cammock.

In pascuis sterrioribus agrorumque marginibus, et ad vias. γ in maritimis arenosis.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix lignosa, multiceps, nigricans. Caules erecti sculi vel procumbentes, annui, teretes, lignosi, ramosi, foliosi, pilosi, ramulis in stirpe annosiori, præcipue solo sterili, spinescentibus. Folia alterna, petiolata, cuneato-elliptica, lineata, scabriuscula, basi integerrima, apicem versus denticulato-ferrata, inferiora sœpè ternata. Stipulae maximæ, connatæ, ovatae, amplexicaules, dentatæ. Flores axillares, solitarii, pedunculati, rosei. Calyx pilosus, dentibus linear-lanceolatis, acutis, adscendentibus, maturecente fructu dilatatis, persistentibus. Vexillum alis carinâque duplo longius. Legumen calycem vix excedens, pilosum. Semina tuberculato-punctata.

Var. α præcipue hircum olet.

Folia in β minora, floribus breviora; in α , longiora sunt. Ramuli in γ etiam frequentè spinescunt.

Diversa species videtur *O. hircina*, *Jacq. Hort. v. 1. t. 93.* *Syl. Veg. ed 14. 651.* *Ait. Hort. Kew. v. 3. 21*, cui folia omnino elliptica sunt, sœpius ternata, undique ferè ferrata, caules erecti, altiores, flores frequentius binati. Hæc est vera *Ononis spinosa* mitis, *Sp. Pl. 1006*, *O. arvensis*, *Retz. Obs. fasc. 2. 21. Prodr. 169*, *Anonis mitior prima*, *Clus. Hist. v. 1. 99*, *A. non spinosa purpurea*, *Ger. em. 1322*; neendum, quantum scio, in Britanniâ inventa fuit.

325. ANTHYLLIS. *G. Pl. 37t. Juss. 355.*
Gærtn. t. 145.

Cal. ventricosus. *Legumen subrotundum, calyce tectum.* *Stamina monadelpha.*

ii. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæ. *vulneraria.*
 qualibus, capitulo duplicato.

Anthyllis vulneraria. *Sp. Pl.* 1012. *Huds.* 313.

With. 629. *Hull.* 159. *Rehb.* 271. *Sibth.*

221. *Abbot.* 155. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 3. 10.

Engl. Bot. t. 104. *Fl. Dan.* t. 988.

A. leguminosa. *Ger. em.* 1240.

Vulneraria rusticaria. *Raii Syn.* 325. *Baub. Hist.* v. 2. 362.

B. V. supina, flore coccineo. *Dill. in Raii Syn.* 325.

H. Elth. 431. t. 320.

Angl. Kidney-vetch. Ladies'-finger.

In pascuis cretaceis et arenosis.

§. In Pembrokeshire. *Mr. Lhwyd.*

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix lignosa. Caules decumbentes, parùm ramosi, foliosi, teretes, hirti, pilis adpressis. Folia lyrato-pinnata, integriflora, glaucescentia, subtùs pilosa; inferiora latiora. Capitula terminalia, gemina, multiflora, bracteata, bracteis palmatis. Flores aurei; in β punicei. Calyx membranaceus, albidus, pilosus.

326. PISUM. *G. Pl.* 374. *Juss.* 360.

Gærtn. t. 152.

Stylus triangulus, supra carinatus pubescens.
Calycis laciniæ superiores duæ breviores.

maritimum. 1. *PISUM petiolis supra planiusculis, caule angustato, stipulis sagittatis, pedunculis multifloris.*

Pisum maritimum. *Sp. Pl.* 1027. *Huds.* 313.
With. 629. *Hull.* 160. *Sm. Spicil.* 8. t. 9.
Fl. Dan. t. 338.

P. marinum. *Raii Syn.* 319.

P. spontaneum perenne repens humile. *Moris.*
scit. 2. t. 1. f. 5.

Pisum sponte nascentia. *Caii Opusc. lib.* 2. 29. 2.
Ger. em. 1250.

Angl.

Angl. Sea Pea.

In maritimis petrofis.

On the pebbly beach near Orford, Suffolk, abundantly, and near Hastings, Sussex. *Ray.* On the west side of Denge-ness, near Lyd in Kent. *Cambden.* In Lincolnshire. *With.* On the sharp ridge running from Portland island to Bridport. *Mr. Stackhouse.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens, ramosa, longissimè descendens. Caules procumbentes, simplices, foliosi, quadranguli, subcompressi, flexuosi, glabri, rubicundi. Folia abruptè pinnata, cirrhosa, foliolis suboctonis, alternis, ellipticis, integeriimis, glabris, reticulato-venosis. Petioli communes supra complanati. Stipulae reflexæ, sagittatæ, basin versus dentatæ. Racemi axillares, solitarii, pendunculati, multiflori. Flores pedicellati, cernui, speciosi. Calyx glaber. Vexillum magnum, emarginatum, purpureum, venis dorsoque sanguineis. Alæ et carina cæruleo-incarnatæ. Stamina diadelpha. Stigma adscendens. Legumen compressum, lave, polyspermum.

327. OROBUS. G. Pl. 374. Juss. 360.
Gærtn. t. 151.

Stylus linearis, teretiusculus, supra villosus. Cal.
basi obtusus; laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.

1. OROBUS foliis pinnatis elliptico-lanceolatis, tubero-stipulis semifagittatis basi dentatis, caule simplici.

Orobus tuberosus. Sp. Pl. 1028. Hud. 314.
With. 631. Hull. 160. Sibth. 221. Abbot.
155. Lightf. 388. Curt. Lond. fasc. 1. t. 53.
Dicks. H. Sicc. fasc. 1. 11. Fl. Dan. t. 781.

O. sylvaticus, foliis oblongis glabris. Raii Syn.

324.

Astragalus sylvaticus. *Ger. em.* 1237. *Sibb.*

Scot. t. 1. *Camer. Harcyn.* 7. *t. 1.*

Angl. Common Orobos. Heath Pea.

In pascuis, dumetis et nemorosis, præcipue montanis.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix tuberosa, extus nigra. Caules pedales, erecti, simplices, foliosi, angulati, striati, glabri. Folia alterna, bi- vel tri-juga, petiolo communi complanato, cirrho destituta; foliola sessilia, opposita, elliptico-lanceolata, mucronulata, nervosa, atroviridia, glabra. Stipulae utrinque acutæ, contra insertionem dentatæ. Racemi 2 vel 3, caulis apicem versus axillares, solitarii, pauciflori. Flores magni, cernui, amœni, purpureo sanguineoque varii, demum cærulefcentes. Calyx atropurpureus, glaber. Legumen pendulum, teretusculum, nigrum, polyspernum. Stylus anticè canaliculatus, persistens.

sylvati- 2. *OROBUS* caulis decumbentibus hirsutis ramosis, foliolis numerosis.

Orobos sylvaticus. *Sp. Pl.* 1029. *Huds.* 314.

With. 630. *Lightf.* 390. *t. 16.* *Hull.* 160.

Engl. Bot. *t. 518.* *Dicks. H. Sicc. fasc.* 1. 12.

O. sylvaticus nostras. *Raii Syn.* 324.

Vicia castubica. *Fl. Dan.* *t. 98.* nec Linn.

Angl. Wood Orobos or Bitter-Vetch.

In sylvis et dumetis montosis.

In several parts of Wales, and the lowlands of Scotland; also at Gambleby, Cumberland, where Ray observed it. *Engl. Bot.*

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Radix sublignosa. Caules plurimi, patentes et saepius decumbentes, angulati, striati, flexuosi, pilosi, foliosi, demum ex axillis ramosi. Folia alterna, impari-pinnata, multijuga, cirrho terminali, abortivo; foliola ovato-lanceolata,

lanceolata, mucronulata, subtus pilosa. Stipulae semi-sagittatae, pilosae, utrinque acutae, extus denticulo solitario notatae. Racemi axillares, multiflori, longius pedunculati, secundi. Flores ochroleuci, purpureo lineati. Calyx pilosus. Legumen ovatum, compressum, glabrum, pallide fuscum, subtrispernum.

328. LATHYRUS. *G. Pl.* 375. *Juss.* 359.—
Gærln. t. 152.

Stylus planus, supra villosus, supernè latior. *Cal.* laciniæ superiores duæ breviores.

* *Pedunculis unifloris.*

I. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis *Aphaca*, aphyllis, stipulis sagittato-cordatis.

Lathyrus Aphaca. *Sp. Pl.* 1029. *Huds.* 315.
Wth. 632. *Hull.* 160. *Relb.* 271. *Sibth.*
222. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 51.

Aphaca. *Raii Syn.* 320. *Ger. em.* 1250.
Angl. Yellow Lathyrus or Vetchling.

In arvis arenosis vel glareosis, haud frequens.

In Cambridgeshire. *Relb.* Near Oxford. *Sibth.*
About Tottenham and Enfield. *Curt.* About
a gravel-pit in the road to Brooke, Norfolk. *Mrs.*
Kett.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Radix exigua. Caulis subsequipedalis, basi ramosus,
cirrhis scandens, foliosus, angulatus. Folia nulla, nisi
in plantâ nuperium enatâ, eaque statim emarcida.
Cirrhi alterni, simplices, nudi. Stipulae maximæ, folia
referentes, sessiles, oppositæ, cordato-sagittatae, integer-
rimæ, nervosæ, glaucescentes. Pedunculi axillares, so-
litarii, uniflori, apicem versus bracteolati, subpilosæ.
Flores parvi, citrini, cernui. Dentes calycini lanceolati,
acuti, corollam serè æquantes. Legumen compressum,
glabrum.

Nissolia. 2. LATHYRUS pedunculis subunifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis.

Lathyrus Nissolia. *Sp. Pl.* 1029. *Huds.* 315.
With. 632. *Hull.* 160. *Rehb.* 271. *Sibth.* 222.
Abbot. 156. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 51. *Engl. Bot.* *t.* 112.

Nissolia parva, flore purpureo. *Buxb. Cent.* 3.
t. 45. *f.* 1.

Catananche leguminosa quorundam, *Raii Syn.* 325. *Bauh. Hist.* *v.* 2. 309.

Ervum sylvestre, *Ger. em.* 1249.

Angl. Crimson Lathyrus or Grass-vetch.

In agrorum marginibus, et inter vepres.

Annua. Fl. Maio.

Radix parva. Herba glabra, graminea. Caulis erectus, bipedalis, striatus. Folia alterna, sessilia, simplicia, linear-lanceolata, acuta, nervosa. Stipulae binæ, subulatæ, exiguæ. Pedunculi axillares, folio breviores, uniflori, rariūs biflori. Flores pulcherrimi, vexillo sanguineo, alis carinâque albidis, purpureo variegatis. Calyx glaber. Legumen pendulum, lineare, teretiusculum, glabrum.

** *Pedunculis bifloris.*

Hirsutus. 3. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis linear-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris.

Lathyrus hirsutus, *Sp. Pl.* 1032. *Huds.* 315.
With. 633. *Hull.* 160.

L. filiquâ hirsutâ. *Raii Syn.* 320. *Bauh. Hist.* *v.* 2. 305. *Rivin. Irr. Tetrap.* *t.* 42.

Angl. Rough-podded Lathyrus.

In arvis rariūs.

In several parts of Essex. *Ray.* *Dale.* Between Bath and Bristol, Mr. Swayne. *With.*

Annua.

Annua. Fl. Julio.

Caules scandentes, alati, pilosi. Folia petiolata, binata; cirrho trifido; foliolis linear-lanceolatis, glabris. Stipulae semifagittatae, linear-lanceolatae, acutae, pilosae. Pedunculi foliis triplò longiores, saepius biflori, interdum uni- aut tri-flori. Flores purpurei, cernui, pedicellis calyceque pilosis. Legumen compressum, hirsutum, scabrum. Stigma persistens, obtusissimum,

*** *Pedunculis multifloris.*

4. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis *pratensis*.
diphyllis subsimplicibus: foliolis lanceolatis.

Lathyrus pratensis. Sp. Pl. 1033. Huds. 317.
With. 633. Hull. 161. Relb. 273. Sibth.
223. Abbot. 157. Curt. Lond. fasc. 3. t. 44.
Mart. Fl. Rust. t. 52. Fl. Dan. t. 527. Engl.
Bot. t. 670.

L. luteus sylvestris dumetorum. Raii Syn. 320.
Bauh. Hist. v. 2. 304.

L. sylvestris flore luteo. Ger. em. 1231.

Angl. Yellow Lathyrus. Meadow Vetchling.

In pratis, pasuis, et dumetis, vulgaris.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens, tuberosa. Caules ramosi, debiles, cirrhis scandentes, tripedales, foliosi, glabri, acutanguli, vix alati. Folia petiolata, binata; cirrho plerumque simplicissimo; foliolis elliptico-lanceolatis, acutis, glabris. Stipulae inæqualiter sagittatae. Pedunculi longissimi, apice multiflori. Flores aurei. Calyx pilosus, dentibus setaceo-acuminatis. Legumen erectusculum, nigrum, glabrum,

5. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis *sylvestris*.
diphyllis: foliolis ensiformibus, caule alato.

Lathyrus sylvestris. Sp. Pl. 1033. Huds. 316.
With. 634. Hull. 161. Relb. 272. Sibth.

222. *Abbot.* 156. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 52.
Cluf. Hist. v. 2. 129.

Lathyri majoris species, flore rubente et albido
 minore, dumetorum. *Raii Syn.* 319. *Baub.*
Hist. v. 2. 302.

Ervum sativum (*rectius sylvestre*). *Fuchs. Hist.*
 572.

Angl. Narrow-leaved *Lathyrus* or Everlasting
 Pea.

In nemorosis et sepibus subhumidis.

Between Castle-Campes and Bartlow, Cambridgeshire. *Dale.* In a copse under Shotover hill, Oxfordshire. *Sibth.* Common in Bedfordshire. *Abbot.* In several parts of Kent. *Curt.* Between Bath and Bristol abundantly, and near Conway in Wales. *Huds.* On the south of Brundle church, Norfolk. *Mr. Humphrey.* In moist hedges between King's Weston and the New Passage plentifully.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix ramosa. Caules sexpedales, cirrhis scandentes, ramosi, quadranguli, glabri, internodiis latè alatis. Folia petiolata, binata; cirrho plerumque trifido; foliolis ensiformibus, acutis, nervosis, glabris. Stipulae semifagittatae, utrinque linearis-lanceolatae, acutae, angustissimæ, integerrimæ. Pedunculi foliis longiores, 4—10-flori. Flores cernui, purpurei, alis violaceis, carinâ virenti. Calyx glaber, dentibus setaceis. Legumen declinatum, glabrum, xerampelinum.

latifolius. 6. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ellipticis, caule alato.

Lathyrus latifolius. Sp. Pl. 1038. *Huds.* 316.
With. 634. *Hull.* 161. *Rehb.* 272. *Abbot.*
 156. *Mart. Fl. Rust.* t. 8. *Mill. Illustr.* t. 62.
Garid. Prov. 271. t. 108.

L. Fl.

L. Fl. Dan. t. 785, synonymis erroneis.

L. major latifolius. *Raii Syn. 319*.

L. major latisolius, flore majore, purpureo, speciosior. *Baub. Hist. v. 2. 303*.

Clymenum. *Matth. Valgr. v. 2. 320*. *Ed. Baub. 690*. *Camer. Epit. 712*.

Angl. Broad-leaved Lathyrus or Everlasting Pea.

In sylvis et nemorosis rariūs.

In Madingley and other woods in Cambridgeshire.

Ray. Mart. On the rocks by Red Neese, near Whitehaven; Mr. Lawson. *Ray.* In Severn Stoke copse, Worcestershire; Mr. Ballard.

With. Bedfordshire, rare. *Abbot.*

Perennis. *Fl. Julio, Augusto*.

Radix ramosa. *Habitu præcedentis, sed major*. *Foliola latè elliptica, multinervia*. *Cirrhi sæpiùs quinquefidi*. *Stipulæ supernè ovatæ, caule latiores*. *Flores numerosi, maximi, formosi, rosei*.

7. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis *palustris*, polyphyllis, stipulis lanceolatis acuminatis.

Lathyrus palustris. *Sp. Pl. 1034*. *Huds. 317*.

With. 635. *Hull. 161*. *Rehb. 273*. *Engl. Bot. t. 169*. *Fl. Dan. t. 399*. *Dicks. H. Sicc. fasc. 16. 15*.

L. viciæformis, seu *Vicia Lathyroides nostras*.

Raii Syn. 320. *Pluk. Phyt. t. 71. f. 2*.

Angl. Marsh Lathyrus or Everlasting Pea.

In pratis et dumetis humidis.

In Peckham fields; T. Willisel. *Ray.* In a wood near Abingdon, Berkshire. *Blackstone*. In Leicestershire. *Dr. Pulteney*. In some parts of Lancashire and Yorkshire. *Huds.* Near Ranaugh, Norfolk. *Mr. Humphrey*. At Burgh, near Yarmouth. *Mr. D. Turner*.

Perennis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules cirrhis scandentes, quadripedales, alati, parum ramosi. Folia petiolata; foliolis bijugis vel trijugis, elliptico-lanceolatis, venosis; cirrhis bisidis. Stipulae semiagittatae, linear-lanceolatae, setaceo-acuminatae. Pedunculi foliis duplo longiores, 3—6-flori. Flores cernui, cæruleo-violacei. Legumen pendulum, glabrum.

329. VICIA. G. Pl. 376. Juss. 360.
Gærtn. t. 151.

Stigma latere inferiori transversè barbatum.

* *Pedunculis elongatis, multifloris.*

Sylvatic-
ea.

i. VICIA pedunculis multifloris, foliolis ellipticis, stipulis lunatis dentatis.

Vicia sylvatica. Sp. Pl. 1035. Huds. 318. With. 635. Hull. 161. Lightf. 393. Relb. Suppl. 3. 5. Sibth. 223. Abbot. 157. Engl. Bot. t. 79. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 14. Fl. Dan. t. 277.

V. sylvatica multiflora maxima. Raii Syn. 322.

V. n. 426. Hall. Hist. v. 1. 185. t. 12. f. 2.

V. multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus, lineis cæruleis striatis. Pluk. Phyt. t. 71. f. 1.

Angl. Wood Vetch.

In sylvis et sepibus, præcipue montosis.

In several woods and thickets in Westmoreland, Cumberland, Worcestershire, and the north of Yorkshire, as well as in Wales and Scotland. On hedges behind Matlock bath. In a wood near Newmarket, found by the Rev. Mr. Hemsted.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Planta formosa. Radix ramosa, multiceps. Caules ramosissimi,

mosissimi, cirrhis altè scandentes, foliosi, sulcati, glabri. Folia multijuga, cirrho ramoso, foliolis ellipticis, mucronulatis, glabris. Stipulæ lunatæ, crebrò profunde et acutè dentatæ. Pedunculi axillares, erexit, multiflori, foliis longiores, quadranguli, sulcati. Flores sparsi, cernui, pedicellati, albidi, purpureo vel cœrulco venosi ac variegati. Legumen lanceolatum, glabrum, pallide fuscum, subtetraspermum.

2. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis semisagittatis subintegris. *Cracca*,

Vicia Cracca. *Sp. Pl.* 1035. *Huds.* 317. *With.* 636. *Hull.* 161. *Relb.* 274. *Sibth.* 223. *Abbot.* 157. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 54. *Mart.* *Fl. Rust.* t. 117. *Fl. Dan.* t. 804.

Cracca. Raii Syn. 322. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 50. *Angl. Tufted Vetch.*

In dumetis, nemorosis, sepibus, pratisve.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Caulcs debiles, cirrhis scandentes, bi- seu tri-pedales, foliosi, sulcati, subpubescentes. Folia multijuga, utrinque scriceo-villosa, cirrho ramoso, foliolis lanceolatis, mucronulatis. Stipulæ semisagittatæ, villosæ, saepius integerimæ, interdum subdentatæ. Pedunculi longitudine foliorum, angulati, pilosi. Flores numerosissimi, arctè imbricati, deflexi, secundi, dilutè violacci. Calyx subcoloratus, nudiusculus. Legumen glabrum, fuscum.

Stylus undique pilosus. *Curt.*

** *Floribus axillaribus, subseffilibus.*

3. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis eret-sativæ. usculis, foliis inferioribus retusis, stipulis dentatis notatis, seminibus lævibus.

Vicia sativa. *Sp. Pl.* 1037. *Huds.* 318. *With.* 636. *Hull.* 161. *Relb.* 274. *Sibth.* 224. *Abbot.*

- Abbot.* 147. *Engl. Bot.* t. 334. *Mart. Fl.*
Rust. t. 116. *Fl. Dan.* t. 522.
 Vicia. *Raii Syn.* 320. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 55.
Ger. em. 1227. *Lob. Ic.* v. 2. 75. *Camer.*
Epit. 320.
 V. vulgaris sativa. *Baub. Hist.* v. 2. 310.
 β. V. sylvestris, sive Cracca major. *Raii Syn.* 321.
Ger. em. 1227.
 V. lathyroides. *Huds.* 318, α. *Dicks. H. Sicc.*
fasc. 4. 12:
 V. angustifolia. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 56?
 V. vulgaris sylvestris, semine parvo et nigro, fru-
 gum. *Baub. Hist.* v. 2. 312.
 Aracus, Araca et Cracca major. *Lob. Ic.* v. 2. 75.
 γ. Vicia sylvestris flore ruberrimo, siliquâ longâ ni-
 grâ. *Raii Syn.* 321.
 V. angustifolia. *Sibth.* 224. *Abbot.* 158.
 V. folio angustiore, flore rubro. *Dill. Giff. App.*
 47.
 Angl. Common Vetch.

In agris et inter segetes. β In sepibus dumctis et
 graminosis, solo sterili, arenoso. γ In cretaceis et
 glareosis, minus frequens.

γ On Shotover hill. *Babart.* At Weymouth. *Sir*
T. G. Cullum. Among short grass in Richmond
 gardens.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Caules magnitudine variis, scandentes vel prostrati. Her-
 ba magis vel minus pubescens. Folia tri-multijuga,
 cirrho elongato, bisido vel trifido, foliolis oppositis al-
 ternisve, mucronulatis, saepius retusis, latitudine variis.
 Stipulae semifagittatae, magis vel minus dentatae, macu-
 la impressâ nigrâ, pallidâve, extus notatæ. Flores ax-
 illares, solitarii vel binati, subsessiles, purpureo varii.
 Legumen compressusculum, fuscum, seabbrum. Semina
 plurima, paululum compressa, levissima.

γ gaudet

γ gaudet flore aliquantulum majore, speciosiore, sanguineo,
leguminibus longioribus, nigris.

4. Vicia leguminibus sessilibus solitariis glabris, *lathy-*
roides, foliis subtrijugis : inferioribus retusis, stipulis
integris, seminibus tuberculatis.

Vicia lathyroides. *Sp. Pl.* 1037. *Jacq. Misc.*
Austr. v. 2. 299. t. 18. *Fl. Dan.* t. 58. *Engl.*
Bot. t. 30. *Lightf.* 396. *With.* 638. *Hull.*
161. *Abbot.* 158. *Huds.* 319, γ.

V. minima præcox Parisiensium. *Dill. in Raii*
Syn. 321. *Tourn. Inst.* 397. *Herb. Tournef.*

V. minima. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 56.

V. pratensis verna sive præcox, semine hexaedro.
Morif. sect. 2. t. 3. f. 14. pessima.

Ervum solonense. *Sp. Pl.* 1040. *Huds. ed.* 1.

279.

Angl. Spring Vetch.

In arvis requietis, solo glarcoso, campisque cre-
taceis.

About Norwich ; and in the King's Park, Edin-
burgh.

Annua. Fl. Aprili, Maio.

Caules procumbentes, divaricati. Herba pubescens. Fo-
lia bijuga vel trijuga, cirrho simplici, sæpius brevissimo
et ferè abortivo, foliolis oppositis, obcordatis, caulis
apicem versus quandoque lanceolatis et angustatis.
Stipulæ semifagittatæ, plerumque integerrimæ, im-
punctatæ. Flores subsessiles, solitarii, parvi, cæru-
lescentes. Legumen erectum, glaberrimum, polysper-
num. Semina cubica, tuberculato-scabra.

Variat flore albo.

Ab omnibus præcedentis varietatibus dignoscitur legumi-
nibus lævibus, semiuibus tuberculato-scabris, ne di-
cam cirrhis nunquam ramosis, nec foliolis pluribus
quam sex.

lutea. 5. *VICIA* leguminibus sessilibus solitariis reflexis.
pilosis, caulibus diffusis, stipulis coloratis, vexillo glabro.

Vicia lutea. *Sp. Pl.* 1037. *Huds.* 319. *With.*
639. *Hull.* 161. *Engl. Bot.* t. 481.
Angl. Rough-podded Yellow Vetch.

In petrosis maritimis.

At Orford, Suffolk. *Mr. Humphrey.* At Aldborough. *Rev. Mr. Burroughes.* At Weymouth. *Huds.* Mearns-shire, North Britain. *Professor Beattie.* Certainly found in a chalk-pit on the side of Glastenbury Tor-hill, by Mr. D. Turner in 1799.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix repens, multieeps. Caules diffusi, parum ramosi; glabri, angulati, striati, subflexuosi, foliosi, longitudine varii. Folia multijuga, cirrho ramoso, foliolis elliptico-lanceolatis, quandoque retusis, subtus pilosis. Stipulae parvae, deltoideae, subsagittatae, plerumque atro-sanguineae. Flores solitarii, serè sessiles, sulphurei, cinereo lineati, interdum toti cinerae fentes, quandoque albi. Calyx tubulosus. Vexillum omnino glabrum. Legumen reflexum, latum, compressum, undique piloso-hispidum. Semina 5 vel 6, subrotunda, glabra.

hybrida. 6. *VICIA* leguminibus sessilibus solitariis reflexis
pilosis, vexillo villoso, foliolis emarginatis.

Vicia hybrida. *Sp. Pl.* 1037. *Jacq. Hort.* t. 146.
Engl. Bot. t. 482. *Hull.* 162.

V. luteo flore sylvestris. *Raii Syn.* 321?
Angl. Hairy-flowered Yellow Vetch.

In dumetis, at rarissime.

On Glastenbury Tor-hill. *Mr. Sole, and A. B. Lambert, Esq.* It could not be found there by Mr. D. Turner in 1799.

Perennis.

Perennis. Fl. Junio.

Facies præcedentis, sed caulis erectior et altior. Foliola plerumque obtusiora, magisque emarginata. Flores citrini, saepe purpureo-lineati, vexillo extus piloso, basi rubicundo. Stipulæ virides, nec sanguineæ. Legumen piloso-hispidum, pentaspermum.

7. VICIA leguminibus sessilibus solitariis reflexis *lævigate*-
glabris, caulis erexitculis, foliis glaberri-
mis.

Vicia *lævigata*. *Engl. Bot.* t. 483. *Hull.* 162.

V. *hybrida*. *Huds.* 319. *With.* 639.

Angl. Smooth-podded Sea Vetch.

In petrosis maritimis.

At Weymouth. *Rev. Mr. Baker.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Habitus V. luteæ, sed caules breviores et ferè erecti, ramosi. Tota planta glaberrima. Foliola elliptico-lanceolata, mucronulata, vix unquam retusa. Stipulæ virides, vel subfuscæ. Dentes calycini subæquales. Flores cinereo-flavescentes, interdùm dilutè purpurei. Legumen pentaspermum, fuscum, undique lave atque glaberrimum.

8. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis *sepium*,
erectis glabris, foliolis ovatis obtusis : exter-
oribus minoribus.

Vicia *sepium*. *Sp. Pl.* 1038. *Huds.* 320. *With.* 637. *Hull.* 161. *Relb.* 275. *Sibth.* 224. *Abbot.* 158. *Fl. Dan.* t. 699. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 57.

V. *sepium perennis*. *Raii Syn.* 320. *Baub. Hist.* v. 2. 313.

V. *maxima dumetorum*. *Ger. em.* 1227.

Aphace. *Fuchs. Hist.* 110.

β. Vicia folio subrotundø, brevi, obtusè mucronato,
VOL. II. Z pediculo

pediculo brevi insidente flore Viciæ sepium
sæc dumetorum vulgaris. *Raii Syn.* 321.
Angl. Bush Vetch.

In dumetis et sepibus vulgaris.

Perennis. Fl. Maio, Junio.

Caules cirrhis scandentes, bipedales, sulcati, parùm ramosi. Folia multijuga, cirrhis ramosis, foliolis ovatis, obtusis, quandoque emarginatis, subpilosis, exterioribus sensim minoribus. Stipulæ lunatæ, acutè dentatæ. Flores axillares, sæpius quaterni, brevius pedicellati, secundi, purpuro-cyanei. Calyx pilosus. Legumen erectiusculum, fuscum, punctatum, glabrum. Semina globosa, lævia.

Variat flore albo. *Raii Syn.* 478.

bithyni- 9. *VICIA* leguminibus pedunculatis solitariis erec-
-tis scabris, foliolis bijugis elliptico-lanceolatis,
stipulis dentatis.

Vicia bithynica. *Sp. Pl.* 1038. *Huds.* 320.
With. 639. *Hull.* 162. *Jacq. Hort.* t. 147.
Allion. Ped. v. 1. 325. t. 26. f. 2.

Cracca floribus albis, folijs circa caulem denticu-
latis. *Buxb. Cent.* 3. 25. t. 45. f. 2.

Angl. Rough-podded Purple Vetch.

In arvis glarcofis et ad sepes.

Near Doncaster. *Mr. Tofield*; upon the autho-
rity of his herbarium, now in the hands of Dr.
. Younge of Sheffield. In woods near Clifton upon
Teme, Worcestershire. *Dr. Stokes*. In a field
half way between Weymouth and Portland ferry,
near the sea. *A.B. Lambert, Esq.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix ramosa. Caules plures, cirrhis scandentes, ramosi,
angulati, sulcati, glabri. Folia bijuga, cirrhis elongatis,
ramosis, foliolis magnis, elliptico-lanceolatis, acutis,
subtus pilosiusculis. Stipulæ magnæ, semifagittatae,
inæqualiter dentatae, dentibus divaricatis, acutis. Flores
axillares,

axillares, solitarii, pedunculati, pedunculis longitudine variis; rarissimè bifloris. Calycis dentes ciliati. Vexillum magnum, purpureo-plumbeum. Alæ carinaque albida. Legumen erectum, badium, piloso-scabrum. Semina 5 vel 6, globosa, glabra, nigro cinereoque variegata.

330. ERVUM. *G. Pl.* 376. *Juss.* 360.

Stigma capitatum, undique pubescens.

1. ERVUM pedunculis bifloris, leguminibus gla-
bris polyspermis. *tetrasper-*
mum.

Ervum tetraspermum. *Sp. Pl.* 1039. *Huds.* 320.

With. 639. *Hull.* 166. *Relb.* 275. *Sibth.*

225. *Abbot.* 159. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 55.

Fl. Dan. t. 95.

Craeca minor, siliquis singularibus, flosculis cæruleofuscantibus. *Raii Syn.* 322.

C. minor, siliquis gemellis. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 54.

Vicia minor segetum, siliquis paucis glabris.

Moris. seet. 2. t. 4. f. 16.

Angl. Smooth Tare.

In arvis, sepibus et dumetis, præcipue humidiufculis.

Annua. Fl. Junio.

Radix fibrosa. Caules debiles, cirrhis scandentes, ramosi, angulati, pilosi. Foliola plurima, alterna, linearilanceolata, obtusa, subtus pilosa. Cirrhi bifidi. Stipulae semihaftatæ. Pedunculi filiformes, longitudine foliorum, pubescentes, saepius biflori. Flores pallidè purpurei, vexillo striato. Calyx pilosus, corollâ duplo brevior. Stylus filiformis, glaber, inflexus. Stigma parvum, capitatum, undique tomentosum. Legumina plerumque binata, pendula, compressa, glabra, parùm torulosa. Semina quatuor, rariùs plura.

Varietatem floribus parùm majoribus, seminibus 5 ad 7, in solo glareoso sicco invenit D. Woodward.

hirsutum. 2. *ERVUM* pedunculis multifloris, leguminibus hirsutis dispermis.

Ervum hirsutum. *Sp. Pl.* 1039. *Huds.* 321.
Wth. 640. *Hull.* 166. *Rehb.* 275. *Sibth.*
 225. *Abbot.* 159. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 54.
Dicks. H. Sicc. fasc. 8. 13. *Fl. Dan.* t. 639.
Cracca minor. *Raii Syn.* 322. *Riv. Tetrap.*
Irr. t. 54.

Vicia sylvestris, seu *Cracca minima.* *Ger. em.*
 1228.

V. minor segetum, siliquis pluribus hirsutis.
Morif. sect. 2. t. 4. f. 15.

Angl. Hairy Tare.

In arvis, sepibus, et pratis ; segetum pestis.

Annua. Fl. Junio.

Habitus præcedentis, sed caules glabriusculi, foliola pa-rum latiora, magisque retusa. Stipulae semihastatae, lype dentatae. Pedunculi multiflori. Flores purpureo-albidi. Calyx paulò longior, dentibus angustioribus quam in priore, nequaquam tamen corollæ æqualis. Stylus brevior, stigmate præcedentis. Legumina 5—7, pendula, brevia, torulosa, hirsuta. Semina bina.

Ervii genus apud Linnæum confusum admodum atque obscurum est, charactere erroneo, qui non nisi priuæ speciei convenit, designatum. At hæc prima species, *Ervum Lens*, omnibus notis, et imprimis calyce, Cicer nancupanda est, et revera stigmate imberbi gaudet. E. solonense jamjam ad Viciam lathyroidem, haud dubitandâ inductus auctoritate, revocavi. E. monanthos et *Ervilia*, e stylo superne villoso, Orobi vel Lathyri species mihi videntur.

331. *ORNITHOPUS.* G. *Pl.* 381. *Juss.* 361.
Gærtn. t. 155.

Legumen articulatum, teres, arcuatum.

1. OR-

1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus in- *perpusil-*
curvis. *lus.*

Ornithopus perpusillus. *Sp. Pl.* 1049. *Huds.*
321. *With.* 640. *Hull.* 165. *Relb.* 276.
Sibth. 225. *Abbot.* 159. *Curt. Lond. fasc.* 6.
t. 53. *Engl. Bot.* t. 369. *Dicks. H. Sicc. fasc.*
16. 14.

Ornithopodium radice nodosâ. *Raii Syn.* 3. 6.
O. minus. *Ger. em.* 1243.
Angl. Common Bird's-foot.

In pascuis arenosis et glareofisis.

Annua. Fl. Maio.

Radix fibrosa, interdùm tuberculis carnosis propagata.
Caules prostrati, ramosissimi, longitudine varii, sulcati,
pubescentes. Folia impari-pinnata, foliolis numerosis,
oppositis, ellipticis, pilosis, subcarnosis. Capitula pe-
dunculata, axillaria, foliosa, pauciflora. Flores exigui,
vexillo alisque albo rubroque pulcherrimè variegatis,
carinâ virente. Legumen moniliforme, subcompre-
sum, pilosum, polyspermum, mucronulatum.

332. HIPPOCREPIS. *G. Pl.* 381. *Juss.* 361.

*Legumen articulatum, compressum, alterâ su-
turâ pluries emarginatum, curvum,*

1. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis con- *comosa.*
fertis arcuatis margine exteriore repandis.

Hippocrepis comosa. *Sp. Pl.* 1050. *Huds.* 321.
With. 641. *Hull.* 165. *Relb.* 276. *Sibth.*
226. *Abbot.* 159. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 8. 14.
Engl. Bot. t. 31.

Ferrum equinum Germanicum, siliquis in sum-
mitate. *Raii Syn.* 325.

F. equinum capitatum. *Column. Ecphr.* 301.
Moris. sect. 2. t. 10. f. 3.

Angl. Tufted Horse-shoe Vetch.

In collibus cretaceis, interdum in montibus calcareis.

Plentiful in Kent, Cambridgeshire, at Marham in Norfolk, and most chalky countries.

Perennis. Fl. Maio—Augusto,

Radix lignosa. Herba glabra. Caules prostrati, sulcati, ramosi. Folia impari-pinnata, foliolis numerosis, obovatis, emarginatis. Stipulae lanceolatae. Pedunculi axillares, longissimi, umbellati, multiflori. Pedicelli breves, hirsuti. Calyx campanulatus, glaber. Corolla lutea. Legumina recurva, glanduloso-scabra, articulis seminibusque reniformibus.

333. HEDYSARUM. G. Pl. 382. Juss. 362.
Gærtn. t. 155.

Legumen articulis monospermis. *Cor.* carina transversè obtusa.

Onobrychis. I. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis longitudine calycis, caule elongato.

Hedysarum Onobrychis. Sp. Pl. 1059. Hudf. 322. With. 642. Hull. 165. Relb. 277. Sibth. 226. Abbot. 160. Mart. Fl. Rust. t. 47. Dicks. H. Sicc. fasc. 7. 9. Engl. Bot. t. 96.

Onobrychis, seu Caput gallinaceum. Raii Syn. 327. Ger. em. 1243.

Onobrychis. Riv. Tetrap. Irr. t. 2.

Polygalon Gesneri. Baub. Hist. v. 2. 335.
Angl. Saint-foin.

In collibus pascuisve cretaceis.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Caules decumbentes, bi- vel tri-pedales, teretes, sulcati, ramosi. Folia impari-pinnata, multijuga, foliolis ellipticis, glabriusculis, æqualibus. Stipulae ovatae, acuminatæ, scariosæ. Pedunculi axillares, adscendentes, longissimi,

longissimi, spicati, multiflori, pilosi. Flores imbricati, bracteolati. Calycis dentes subulati. Corolla saturatè rosea, striata. Legumen cristatum, reticulatum, pilosum, coriaceum, non dehiscens. Semen reniforme, glabrum.

334. ASTRAGALUS. *G. Pl.* 385. *Juss.* 358.
Gertn. t. 154.

Legumen biloculare, gibbum.

1. ASTRAGALUS caulescens prostratus, legumi-glycyphyllos subtriquetris arcuatis, foliis pedunculo *phyllos*. longioribus; foliolis ovatis.

Astragalus glycyphyllos. *Sp. Pl.* 1067. *Huds.* 322. *With.* 643. *Hull.* 162. *Relb.* 277. *Sibth.* 227. *Abbot.* 160. *Dicks. H. Sicc. fusc.* 7. 11. *Engl. Bot.* t. 203.

A. luteus perennis procumbens, vulgaris sive sylvestris. *Raii Syn.* 326.

Hedysarum glycyrrhizatum. *Ger. em.* 1233.

Fænogræcum sylvestre. *Trag. Hist.* 599.

Angl. Sweet Milk-vetch. Wild Liquorice.

In dumetis ad latera montium, marginibusque agrorum, et ad vias, imprimis solo calcareo.

Perennis. Fl. Junio.

Radix ramosa, longa. Caules prostrati, flexuosi, teretes, sulcati, pilosiusculi. Folia impari-pinnata, multijuga, lætè viridia, glabra; foliolis ovatis seu ellipticis. Stipulae ovatae, magnæ, subdentatae. Pedunculi foliis breviores, spicati, multiflori. Calyx campanulatus, obliquus, glaber, dentibus superioribus brevissimis. Corolla sulphurea. Legumen incurvum, triquetro-cylindricum, glabrum, polyspermum.

2. ASTRAGALUS caulescens prostratus, floribus *hypoglossi*-capitatis, leguminibus ovatis dorso canaliculatis pilosis: apice aduncis.

- Astragalus hypoglottis.* *Mant.* 2. 274. *Sibth.* 227. *Engl. Bot.* t. 274. *With.* 643. *Hull.* 162.
- A. arenarius,* *Huds.* 323. *Rehb.* 278. *Fl. Dan.* t. 614.
- A. Danicus.* *Retz. Obs. fasc.* 3. 41.
- A. epiglottis.* *Dicks. H. Sicc. fasc.* 1. 13. sed perperam.
- A. incanus parvus purpureus nostras.* *Raii Syn.* 326. t. 12. f. 3.
- Angl.* Purple Mountain Milk-vetch.

In campis elatis cretaceis, vel arenosis.

On Newmarket heath and Gogmagog hills, also about Doncaster. *Ray.* *Richardson.* Swaffham heath, Norfolk. *Mr. Crowe and Mr. Woodward.* On several parts of the sea coast in Scotland. *With.* On the shore beyond New-Haven near Edinburgh.

Pereanis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens, sublignosa, ramosa. Caules flexuosi, parum ramosi, prostrati, longitudine varii, plerumque vix biunciales. Folia impari-pinnata, foliolis numerosis, parvis, ovatis, subtus pilosis. Pedunculi vix foliis longiores, capitati. Bracteæ calyce triplò breviores. Flores purpureo alboque varii. Calyx tubulosus, hirtus, pilis atris, cum paucis albis immixtis. Legumen ovatum, turgidum, pilosum, dorso canaliculatum, apice acuminatum, aduncum. Variat corollâ albâ.

uralensis. 3. **ASTRAGALUS acaulis**, scapo erecto foliis longiore, leguminibus oblongis inflatis villosis erectis.

Astragalus uralensis. *Sp. Pl.* 1071. *Huds.* 323. *Lightf.* 401. t. 17. *With.* 644. *Engl. Bot.* t. 466.

A. n. 410. *Hall. Hist.* v. 1. 179. t. 14. f. 3.

Angl.

Angl. Hairy Mountain Milk-vetch.

In alpibus scoticis, solo arenoso.

Perennis. Fl. Julio.

Radix lignosa. Folia radicalia, multijuga, sericea, petiolo communii persistente, indurato, denudato. Stipulae scar- riosae. Scapi foliis longiores, erecti, capitati, deinceps spicati. Bracteæ longitudine calycis, linear-lanceolatæ. Calyx tubulosus, hirtus, pilis nigris albiflue. Corolla violacea. Legumen erectum, cylindraceo-oblongum, turgidum, nigrum, pilosum, pilis adpressis.

335. TRIFOLIUM. G. Pl. 387. Juss. 355..
Gærtn. t. 153.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius.
non dehiscent, deciduum.

* *Meliloti. Leguminibus nudis, polyspermis.*

I. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis *officinale*.
dispermis rugosis acutis, caule erecto.

Trifolium Melilotus-officinalis. Sp. Pl. 1078.
Huds. 323. With. 645. Hull. 162. Rehbe.
278. Sibth. 227. Abbot. 161. Mart. Fl.
Rust. t. 72. Fl. Dan. t. 934.

T. odoratum, sive Melilotus vulgaris, flore luteo.
Bauh. Hist. v. 2. 370.

Melilotus vulgaris. Raii Syn. 331.

Melilotus. Riv. Tetrap. Irr. t. 6.

Saxifraga lutea. Fuchs. Hist. 749.

Angl. Common Melilot.

In duinetis et sepibus, interdum et inter segetes.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Caulis erectus, bipedalis, ramosus, sulcatus. Folia, ut in toto genere, ternata. Foliola lanceolato-ovata, serrata, glabra. Spicæ axillares, pedunculatæ, densæ, multifloræ. Flores parvi, cernui, auriculati, campanulati,

latus, pilosus. Stigma capitatum. Legumen pendulum, ellipticum, utrinque acutum, transversè rugosum, pilosum.

Herba exsiccata odore suavi gaudet, Anthoxanthi quodammodo simili.

ornitho- 2. **TRIFOLIUM** leguminibus nudis octospermis
podoides. subternis calyce duplò longioribus, caulis declinatis.

Trifolium Melilotus-ornithopodioides. Sp. Pl.

1078. *Huds.* 324. *With.* 645. *Hull.* 162.

Curt. Lond. fasc. 2. t. 53. Fl. Dan. t. 368.

T. siliquosum Loto affine, siliquis Ornithopodii.

Pluk. Phyt. t. 68. f. 1.

Fœnugræcum humile repens, Ornithopodii siliquis brevibus crestis. *Raii Syn.* 331. t. 14. f. 1.

Angl. Bird's-foot Trefoil.

In herbidis glareofis sterilioribus.

On several heaths about London. *Curt.* In Oxfordshire, and on sandy banks by the sea side in Essex. *Ray.* On Marshold heath near Norwich. *Mr. Pitchford.*

Annua. Fl. Junio, Julio.

Caules prostrati, breves, divaricati, vix ramosi, glabri. Foliola obcordata, ferrata, glabra. Stipulae lanceolatae, acuminatae, connatae. Pedunculi axillares, petiolis breviores, saepius brevissimi, triflori, umbellati. Dentes calycini setacei. Flores graciles, rubicundi. Legumen calyce longius, obtusum, transversè rugosum, pilosum, suboctospermum.

Folia in Herb. Linn. obsoletius ferrata.

** *Lotoidea. Leguminibus tectis, polyspermis.*

repens. 3. **TRIFOLIUM** capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente.

Trifolium

- Trifolium repens.* *Sp. Pl.* 1080. *Huds.* 324.
Witb. 646. *Hull.* 163. *Relb.* 279. *Sibth.*
228. *Abbot.* 161. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 46.
Mart. Fl. Kust. t. 34. *Fl. Dan.* t. 990. *Riv.*
Tetrap. Irr. t. 14. f. 2.
T. pratense. *Ger. em.* 1185, *ic. nec descr.*
T. pratense album. *Raii Syn.* 327.
Trifoliastrum. *Mich. Gen.* t. 25. f. 3, 4.
Melilotus Parisiensis humifusus, foliis ferratis
glabris. *Vaill. Par.* t. 22. f. 1.
Angl. White Trefoil. Dutch Clover.

In pratis et pascuis vulgaris.

Perennis. Fl. Maio—Septembri.

Radix fibrosa. Caules prostrati, repentes, latè extensi,
basi ramosi, foliosi, glabri. Folia longius petiolata.
Foliola obcordata, dentieulata, glabra, sæpe fusco al-
boque maeulata. Pedunculi adscendentibus vel erecti,
longissimi, multiflori, umbellati. Flores albi, interduni
carnei, errecti, post anthesin penduli. Calyx decemner-
vis, glaber. Corolla persistens. Legumen corollâ tec-
tum, oblongum, glabrum, tri- vel tetra-spermum.

Variat in solo fertiliori humido caule erecti sculo, rami-
fiore, attamen a *T. hybrido Linnaei* semper distinctissi-
mum.

*** *Lagopoda.* *Calycibus sæpius villosis.*

4. **TRIFOLIUM** capitulis villosis subquadrifloris, *subterra-*
involucro centrali reflexo rigido stellato fruc- *neum,*
tum obvolvente.

Trifolium subterraneum. *Sp. Pl.* 1080. *Huds.*
328. *Witb.* 647. *Hull.* 163. *Relb.* 279.
Sibth. 228. *Abbot.* 161. *Curt. Lond. fasc.* 2.
t. 54. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 14. f. 1.

T. pumilum supinum, flosculis longis albis. *Raii*
Syn. 327. t. 13. f. 2.

T. sub-

T. subterraneum tricoccum Gastonium. *Morif.*
seet. 2. t. 14. f. 5.

T. pratense supinum χαλωστός, seu capite humi
merso. *Barel. Ic. t. 881.*

Angl. Subterraneous Trefoil.

In pascuis et ericetis sterilioribus glareosis.

Annua. Fl. Maio.

Radix fibrosa. Caules prostrati, depresso-divaricati, terete,
tes, pilosi. Foliola obcordata, utrinque pilosa. Pe-
dunculi tri- aut quadri-flori, floriferi erecti, fructiferi in
terram deflexi. Calyx tubulosus, glaber, purpurascens,
dentibus capillaribus, pilosus. Corolla gracilis, nivea.
Legumen calyce testum, monospermum, involucro
centrali, ramentaceo, stellato, conofo, reflexo, albo,
demum indurato, obvolutum.

Ochroleuc- 5. *TRIFOLIUM* capitulo villoso, caule erec-
cum. to, pubescente, foliolis insimis obcordatis, dente
calycino insimo longissimo.

Trifolium ochroleucum. *Syst. Nat. ed. 12. v. 3.*
283. *Syst. Veg. ed. 14. 689.* *Huds. 325.*
With. 653. *Hull. 164.* *Reh. 281.* *Abbot.*
162. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 49.* *Mart. Fl.*
Rust. t. 35. *Dicks. H. Sicc. fasc. 3. 9.* *Afzel.*
in Tr. of Linn. Soc. v. 1. 229. *Jacq. Austr.*
t. 40.

T. pratense hirsutum majus, flore albo-sulphureo. *Raii Syn. 328.*

T. pratense album. *Fuchs. Hist. 818.* bene.
Ic. 472.

Angl. Sulphur-coloured Trefoil.

In pascuis et dumetis siccioribus glareosis vel cal-
careis.

Percennis. Fl. Junio, Julio.

Radix ramosa. Caules erecti, pedales vel sesquipedales,
parum ramosi, teretes, pilosi. Folia distantia; summa

opposita, foliolis linearis-oblongis; infima foliolis brevibus, obcordatis; omnia integerrima, pilosa. Stipulae lineares, connatae, amplexicaules, nervosae, nervis simplicibus, villosae, apice subulatae. Capitulum terminale, pedunculatum, solitarium, erectum, multiflorum. Calyx gracilis, sulcatus, pilosus, dentibus setaceis, infimo reliquis triplò ferè longiore. Corolla ochroleuca, monopetala, vexillo elongato, recto. Legumen membranaceum, monospermum, calyce tectum.

6. TRIFOLIUM spicis densis, caulibus adscen- *pratense*:
dentibus, corollis inæqualibus, dentibus ca-
lycinis quatuor æqualibus, stipulis aristatis.
Afzel.

Trifolium pratense. *Sp. Pl.* 1082. *Huds.* 325.
With. 651. *Hull.* 163. *Rehb.* 280. *Sibth.*
228. *Abbot.* 162. *Afzel. in Tr. of Linn.*
Soc. v. 1. 240. *Matth. Valgr. v.* 2. 189. *Trag.*
Hist. 586.

T. pratense purpureum. *Raii Syn.* 328. *Fuchs.*
Hist. 817.

Trifolium. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 11. f. 1.

(3.) *T. pratense.* *Fl. Dan.* t. 989. *Mart. Fl. Rust.*
t. 3.

T. purpureum majus sativum, pratensi simile.
Raii Syn. 328.

flore albo. *Afzel. loc. cit.* 243. *With.* 652.

*Trifolium pratense purpureum minus, foliis cor-
datis.* *Dill. in Raii Syn.* 328. t. 13. f. 1.

Angl. Common Purple Trefoil, or Clover. Honey-suckle Trefoil.

in pratis et pascuis vulgaris.

perennis. Fl. Maio—Septembri.

radix ramosa. Caules adscendentes, pedales et ultra,
subramosi, supernè subvillosi. Foliola elliptica, ple-
nrumque integerrima, glabriuscula. Folia superiora
frequentiùs opposita. Stipulae latè ovatæ, connatæ,
breviæ

brevius aristatae, pallidæ, nervosæ, nervis purpureis, marginem versus ramosis, anastomosantibus. Spicæ terninales, sessiles, solitariæ, ovatae, obtusæ, densæ, multifloræ, odoratæ. Calyx pilosus, decemnervis, dentibus subulatis, insimo reliquis æqualibus duplo longiore. Corolla purpurea, monopetala, vexillo alis longiore.

medium. 7. **TRIFOLIUM** spicis laxis, caulis flexuosis ramosis, corollis subæqualibus, stipulis subulato-linearibus.

Trifolium medium. *Faun. Suec.* ed. 2. 558.
Huds. ed. 1. 284. *Afzel. in Tr. of Linn. Soc.* v. 1. 237. *Engl. Bot.* t. 190. *With.* 650. *Hull.* 163. *Sibth.* 229. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 4. 10.

T. flexuosum. *Jacq. Austr.* t. 386. *Retz. Prodr.* 174.

T. alpestre. *Huds.* 326. *Rehb.* 281.

T. purpureum majus, foliis longioribus et angustioribus, floribus saturationibus. *Kaii Syn.* 328. *Angl. Zigzag Trefoil.*

In pascuis clatis calcareis, vel glarcosis argillâ substratis.

Perennis. Fl. Julio.

A præcedente differt caule ramosiori, flexuoso, stipulis longioribus, linearibus, dentibus calycinis duobus superioribus brevioribus, spicâ laxiore. Foliola elliptica, subtus glaucescentia, margine pilosa.

A *T. alpestri* abunde differt. Confer *Afzel. loc. cit.* et *Jacq. Austr.* t. 433.

mariti- 8. **TRIFOLIUM** spicis pilosis globosis, dentibus *mum.* calycinis foliaceis demum patentibus, stipulis lanceolatis, foliolis obovatîs.

Trifolium maritimum. *Huds.* ed. 1. 284. *Engl. Bot.* t. 220. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 7. 8. *With.* 633. *Hull.* 164.

T. stel-

T. stellatum. *Huds.* 326.

T. stellatum glabrum. *Raii Syn.* 329. *Ger. em.*
1208. *Pluk. Phyt.* t. 113. f. 4.

T. spicatum minus, flore minore dilutè purpu-
reo. *Moris. sect.* 2. t. 14.

Angl. Teasel-headed Trefoil.

In palustribus cœnōsis, præcipuè maritimis.

In Norfolk, Essex, Kent, Dorsetshire, Somerset-
shire, in various parts of the coast.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Caules plures, patentes, sæpè decumbentes, plerumque
ferè pedales, ramosi, teretes, striati, pilosissimi. Folia
summa opposita. Foliola obovata, subintegerrima, sa-
turate viridia, pilosa. Stipulæ lineares, angustæ, apice
subulato, elongato, piloso. Spica terminalis, solitaria,
sæpius pedunculata, parva, densa, brevis, obtusa, mul-
tiflora. Calyx tubulosus, apice tubi præcipuè pilosus,
dentibus post anthesin elongatis, foliaceis, trinervibus,
demum patentibus, persistentibus. Corolla pallidè pur-
purea, subæqualis. Legumen turbinatum, menosper-
mum.

9. TRIFOLIUM spicis villosissimis subcylindra- *arvense*
ceis, dentibus calycinis setaceis corollâ longi-
oribus, foliolis obovato-linearibus.

Trifolium arvense. *Sp. Pl.* 1083. *Huds.* 326.

With. 649. *Hull.* 163. *Relb.* 281. *Sibth.* 229.

Abbot. 162. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 50. *Dicks.*

H. Sicc. fasc. 3. 8. *Fl. Dan.* t. 724.

T. arvense humile spicatum, seu Lagopus. *Raii*
Syn. 330.

Lagopus. *Fuchs. Hist.* 494. *Riv. Tetrap.* Irr.
t. 16. *Camer. Epit.* 724.

Lagopodium, Pes leporis. *Ger. em.* 1193.

10. Lagopus perpusillus supinus perelegans mariti-
mus. *Dill. in Raii Syn.* 330. t. 15. f. 2.

Angl.

Angl. Hare's-foot Trefoil.

In arvis pratisque arenosis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. Caulis erectiusculus, ramosissimus, teres, villosus. Foliola angusta, obovato-linearia, pilosa, in maritimis sericea. Stipulae lineares, connatae, apice subulatae. Spicæ terminales, cylindraceæ, obtuse, longitudine variæ, densæ, multifloræ, villosofimæ, cænescientes. Calycis dentes subulati, æquales. Corolla calyce brevior, alba vel incarnata. Legumen exiguum, tenui, monospermum.

scabrum. 10. TRIFOLIUM capitulis sessilibus lateralibus ovatis, dentibus calycinis inæqualibus persistentibus rigidis recurvis.

Trifolium scabrum. *Sp. Pl.* 1084. *Huds.* 327. *With.* 648. *Hull.* 163. *Rehb.* 282. *Sibth.* 229. *Abbot.* 162. *Curt. Lond. fusc.* 6. t. 48.

T. flosculis albis, in glomerulis oblongis asperis caulinulis proximè adnatis. *Raii Syn.* 329. *Vaill. Par.* t. 33. f. 1.

T. minus, capite subrotundo parvo albo et echinato. *Barrel. Ic.* t. 270.

Angl. Rough Trefoil.

In campis cretaceis vel arenosis.

On Newmarket heath. *Rav.* Between Northfleet and Gravesend. *Dill.* About Croydon. *Curt.* Near Bungay. *Mr. Woodward.* On Caister common near Norwich. *Mr. Crowe.* Wick cliffs; Mr. Swayne. *With.* On Cromer cliffs, Norfolk.

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa. Caules prostrati, rigidi, teretes, scabri. Foliola obovata vel obcordata, denticulata, pilosa. Stipulae scariosæ, lanceolatae, connatae, pilosæ. Capitula axillaria, solitaria, sessilia, ovata, multiflora, densa, pilosa.

pilosa.. Calyx sulcatus, dentibus post florescentiam re-curvato-patentibus, rigidis, pungentibus. Corolla alba, calyce longior. Legumen membranaceum, albidum, Semen solitarium, ellipticum, nitidum, flavescens.

- ii. TRIFOLIUM capitulis hemisphæricis sessili-*glomerat-*
bus lateralibus glabris, dentibus calycinis cor-*tum,*
datis reflexis venosis.

Trifolium glomeratum. *Sp. Pl.* 1084. *Huds.*
327. *With.* 648. *Hull.* 163. *Curt. Lond.*
fasc. 4. *t.* 51.

T. cum glomerulis ad caulinum nodos rotundis.
Raii Syn. 329. *Pluk. Phyt.* *t.* 113. *f.* 5.

T. arvense supinum verticillatum. *Barrel. Ic.*
t. 882.

Angl. Round-headed Trefoil.

In pratis et pascuis glareosis, minus frequens.

About Saxmundham, Suffolk, and about London.

Ray. In the isle of Sheppey. *Huds.* On Kew Green, and Hanwell heath, Middlesex. *Rev. Dr. Goodenough.* On the Bath hills near Bungay, Suffolk. *Mr. Woodward.* In a pasture adjoining to Mackerel's tower, Norwich.

Annua. Fl. Junio.

Planta glaberrima. Radix fibrofa, parva. Caules prostrati, longitudine varii, parum ramosi, striati. Folia remota. Foliola obovata, denticulata. Stipulae scariorae, late ovatae, connatae, acuminatae. Capitula axillaria, solitaria, sessilia, hemisphærica, multiflora, omnino glabra. Calyx campanulatus, sulcatus, pallidus, dentibus cordatis, foliaceis, viridibus, aristatis, reticulato-venosus, reflexis, tubo duplo brevioribus. Corolla rosea, recta, calyce duplo longior. Legumen exiguum, subrotundum, inonospermum.

striatum. 12. TRIFOLIUM capitulis sessilibus lateralibus terminalibusque ovatis, calycibus ellipticis hirsutis sulcatis: dentibus setaceis.

Trifolium striatum. *Sp. Pl.* 1085. *Huds.* 327. *With.* 649. *Hull.* 163. *Rehb.* 282. *Sibth.* 230. *Abbot.* 163.

T. parvum hirsutum, floribus parvis dilutè purpureis, in glomerulis mollioribus et oblongis, semine magno. *Raii Syn.* 329. t. 13. f. 3. *Vail. Par.* t. 33. f. 2.

Angl. Soft knotted Trefoil.

In pratis et pascuis siccioribus, sterilioribus.

Annua. Fl. Junio.

Caules procumbentes, ramosi, teretes, villosi. Foliola obovata, vel obeordata, pilosa. Stipulae latè ovatae, acuminatae, nervosae, seariosae. Capitula plerumque terminalia, ovata. Calyx ellipticus, subventricosus, decemfalcatus, villosus, dentibus subulatis, viridibus, demum elongatis, patentibus, ciliatis. Corolla vix longitudine calycis, purpurascens. Legumen membranaceum. Semen ellipticum compressum, praecedente triplò majus.

suffocatum. 13. TRIFOLIUM capitulis sessilibus lateralibus subrotundis glabriusculis, dentibus calycinis lanceolatis acutis recurvis corollâ longioribus.

Trifolium suffocatum. *Mant.* 2. 276. *Tr. of Lim. Soc.* v. 2. 357. *With.* 656. *Hull.* 164. *Jacq. Hort. Ind.* t. 60.

T. minimum supinum, floscularum et seminum globulis plurimis confertim ad radicem nascentibus. *Raii Hist.* v. 1. 942.

Angl. Suffocated Trefoil.

In arenosis maritimiis.

In the loose sand on the beach at Yarmouth. *Mr*

Wigg. At Lowestoft. *Miss Temple.* Plentiful about Landguard fort. *Sir T. G. Cullum, Bart.*

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrofa. Caules breves, tortuosæ, glabri, subterranei. Folia longissimè petiolata, foliolis obovatis, obtusis, denticulatis, glabris. Stipulæ membranaceæ, latissimæ, mucronibus divaricatis. Flores glomerati, sessiles, axillares, arenâ mobili immersi et suffocati. Calyx tubulosus, sulcatus, subvillosus, dentibus lariccolatis, acutis, recurvis, immutatis. Corolla parva, albida, calyce brevior. Legumen oblongum dispermum. Semina lenticularia, margine scabra.

T. suffocatum ad hanc sectionem proculdubio pertinet, inter T. glomeratum et uniflorum inferendum, nec ullo modo lupulinis associandum.

**** *Vesicaria.* *Calycibus inflatis, ventricosis.*

14. **TRIFOLIUM** capitulo subrotundis, calycibus *fragiferis*, inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. *rum.*

Trifolium fragiferum. *Sp. Pl.* 1086. *Huds.* 328.

With. 654. *Hull.* 164. *Relb.* 283. *Sibth.* 230.

Abbot. 163. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 55. *Dicks.*

H. Sicc. fasc. 4. 11. *Fl. Dan.* t. 1042. *Raii*

Syn. 329. *Ger. em.* 1208.

T. fragiferum folio oblongo. *Vaill. Par.* t. 22. f. 2.

Angl. Strawberry-headed Trefoil.

In pratis et pascuis humidis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Habitus ferè T. repentis. Caules prostrati, radicantes. Pctioli ut et pedunculi longissimi. Foliola obovata, denticulata, glabra. Capitula globosa, multiflora. Corolla incarnata, gracilis, calyce longior. Calyx demum hinc maximè ventricosus, feariosus, reticulato-venosus, rubicundus, pilosus, apice bidentatus, deflexus. Legumen in fundo calycis, dispermum.

***** *Lupulina. Vexillis corollæ reflexis, demum scariosis.*

procum- 15. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus sulcatis, caulis procumbentibus, foliolis obovatis.

Trifolium procumbens. *Sp. Pl.* 1088. *With.* 654. *Hull.* 164. *Sibth.* 230. *Abbot.* 163. *Fl. Dan.* t. 796.

T. agrarium. *Huds.* 328. *Relb.* 283. *Curt.* *Lond. fasc.* 3. t. 45. *Mart. Fl. Rust.* t. 121.

T. pratense luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium. *Raii Syn.* 330.

T. lupulinum. *Riv. Tetrap.* *Irr.* t. 10. f. 1.

Melilotus, qui Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium. *Vaill. Par.* t. 22. f. 3.

Angl. Hop Trefoil.

In pratis et pascuis glareofisis, siccioribus.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix erassiuscula, brevis, fibrosa. Caules procumbentes, latè diffusi, parùm ramosi, pilosi, apice adscendentes. Foliola obovata, denticulata, sub-glaucouscentia, glabra. Stipulae semiovatæ, integerrimæ, nervosæ, ciliatæ. Spikeæ axillares, solitariæ, pedunculatæ, folium æquantes, interdùm superantes, ovales seu ellipticæ, obtusæ, dense, multifloræ. Pedunculi imprimis apice villosi. Dentes calycini subulati, inæquales, pilosi. Corolla aurea. Flores imbricati, demum deflexi, corollâ persistente, scariosâ, fuscescentiæ, vexillo longitudinaliter sulcate, inflexo, dilatato, ferè obcordato. Legumen ellipticum, utrinque acutum, monospermum.

filiforme. 16. TRIFOLIUM spicis capitatis hemisphæricis, vexillis deflexis persistentibus lævibus, caulis procumbentibus, foliolis obcordatis.

Tri-

- Trifolium filiforme.* *Sp. Pl.* 1088. *Huds.* 329.
With. 655. *Hull.* 164. *Rehb.* 284. *Sibth.*
 231. *Abbot.* 164.
T. lupulinum minimum. *Dill. in Raii Syn.* 331.
t. 14. f. 4.
 $\beta.$ *T. procumbens.* *Huds.* 328. *Rehb.* 283. *Curt.*
Lond. fasc. 5. *t. 53.*
T. dubium. *Sibth.* 231. *Abbot.* 163.
T. lupulinum alterum minus. *Raii Syn.* 330.
t. 14. f. 3.
T. luteum minimum. *Ger. em.* 1186.
Angl. Lesser Yellow Trefoil.

In pascuis arenosis vel glareosis subhumidis. β in solo fertiliore, vulgaris.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Radix parva, fibrosa. Caules prostrati, filiformes, subpilosæ. Foliola obcordata, dentata, striata. Stipulæ subovatæ, nervosæ, ciliatae. Pedunculi axillares, capillares, pilosi; in α vix quadriflori, in β multiflori, floribus erectis, subcapitatis, pedicellatis, flavis, demum deflexis. Calyx glaber, dentibus inæqualibus. Corolla persistens, scariosa, fuscescens, vexillo carinato, quam in præcedente angustiori, nec inflexo, neque sulcato. Legumen ellipiticum, pedicellatum, monospermum.

336. *LOTUS.* *G. Pl.* 388. *Juss.* 356.
Gærtn. *t. 153.*

Legumen cylindricum, strictum. Ale sursùm longitudinaliter conniventes. Cal. tubulosus.

i. *LOTUS capitulis depresso-multifloris, caulibus corniculato-decumbentibus, leguminibus teretibus patentibus.*

Lotus corniculatus. *Sp. Pl.* 1092. *Huds.* 329.
With. 656. *Hull.* 166. *Rehb.* 284. *Sibth.*
 231. *Abbot.* 164. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t. 56.*
 Aa 3 *Mart.*

*Mart. Fl. Rust. t. 53. Fl. Dan. t. 991. Dicks.
H. Sicc. fasc. 17. 7.*

- L. corniculata glabra minor. *Raii Syn. 334.*
- Trifolium filicosum minus. *Ger. em. 1190.*
- Melilotus germanica. *Fuchs. Hist. 527.*
- β. Lotus pentaphyllos minor, angustioribus foliis, fruticosior. *Raii Syn. 334.*
- γ. Loti corniculatæ major species. *Raii Syn. 334.*
Bauh. Hist. v. 2. 355.
- δ. Lotus pentaphyllus medius pilosus. *Dill. in Raii Syn. 334.*
- ε. L. corniculata minor, foliis subtùs incanis. *Dill. in Raii Syn. 334.*
Angl. Common Bird's-foot Trefoil.

In pratis, pascuis, et ericetis, vulgaris... γ et δ in pratis et sepibus humidis, vel salicetis. ε in clivis cretaceis.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Herba polymorpha. Radix lignosa. Caules decumbentes, ramosi. Folia alterna, ternata, brevius petiolata, foliolis acutis integrerrimis, subtùs glaucis, sèpè ciliatis, exterioribus obliquis. Stipulae magnæ, ovatae, foliaceæ. Pedunculi axillares, solitarii, folia longissimè superantes, capitati, multiflori, bracteâ ternatâ, foliacea. Flores depresso-patentes, subpedicellati, aurei, vexillo fulvo, calyce glabro, interdùm dentibus pilosis. Legumina patentia; cylindracea, lævia, æqualia, fusca, nitida, polysperma, intùs cellulosa. Semina reniformia. Varietates γ et δ magnitudine majori, caule vepribus suffulto cretiusculo, floribus saturatè fulvis dignoscuntur, at charactere specifico distincto vix gaudent.

diffusus. 2. LOTUS pedunculis subunifloris, caule ramosissimo decumbente, foliis calyceque pilosis, leguminibus teretibus strictis gracillimis.

Lotus diffusus. Soland. in Herb. Banks.

L. pentaphyllos minor hirsutus, siliquâ angustissimâ.

simâ. Baub. Pin. 332. *Sauvages. in Herb.*
Linn.

Trifolium corniculatum minus, pilosum. Baub.
Prod. 144. Deser. opt.
Angl. Slender Bird's-foot Trefoil.

In rupibus maritimis australioribus.

Amongst the rocks near Hastings. Mr. Dickson.
At Kingsteington and Bishopsteington, Devonshire. Rev. Mr. Becke.

Perennis? Fl. Maio, Junio.

Præcedente minor. Caules procumbentes, rufescentes, pilosi. Foliola utrinque pilosa. Pedunculi uniflori, rariū biflori, longitudine varii. Flores aurei. Calyx pilosissimus. Legumen comppresso-teres, angustissimum, calyce sextuplo longius, fuscum, glabrum, polyspernum, intus eellulosum. Semina orbicularia.

Distinctus a Loto angustissimo Linnæi, Baub. Hist. v. 2. 356. f. 2. siliquis longioribus duplòque tenuioribus, foliis pilosis, floribus colore saturatioribus.

337. MEDICAGO. G. Pl. 389. Juss. 356.
Gærtin. t. 155.

Legumen compressum, coeruleatum, carinam collæ a vexillo deflectens.

*1. MEDICAGO pedunculis racemosis, legumi-sativa. nibus contortis, caule erecto glabro.

Medicago sativa. Sp. Pl. 1096. Hudf. 330. With. 658. Hull. 165. Abbot. 164. Mart. Fl. Rust. t. 48.

Medica squalata sativa, siliquâ cornutâ magis tortili, flore violaceo. Moris. seet. 2. t. 16. f. 2.

M. legitima. Clus. Hist. v. 2. 242.

Trifolium Burgundiacum. Ger. em. 1189.
Angl. Lucerne. Purple Medick.

In pratis, pascuis, et ad sepes, haud indigena.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix sublignosa. Caules erectiusculi, bipedales, ramosi, angulato-teretes, glabri. Folia alterna, petiolata, ternata, foliolis cuneato-oblongis, apice serratis, mucronulatis, subtus pilosis. Stipulae semiovatae, longius acuminatae, nervosae, rarius subdentatae. Racemi pedunculati, axillares, multiflori, erecti. Flores pedicellati, bracteate solitariâ setaceâ ad basin pedicelli, violacei. Calyx pilosus, dentibus subulatis. Legumen spirale, anfractibus duobus, tribus, pluribusve, remotis, polyspermum, glabrum.

Anne sequentis varietas?

falcata. 2. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule procumbente.

Medicago falcata. Sp. Pl. 1096. Huds. 330.

With. 658. Hull. 165. Relb. 285. Mart. Fl. Rust. t. 86 et 87. Fl. Dan. t. 233.

Medica sylvestris. Raii Syn. 333.

M. flavo flore. Clus. Hist. v. 2. 243.

Trifolium luteum, siliqua cornuta. Ger. em. 1191.

Angl. Yellow Medick.

In versuris agrorum, aggeribus, murisve antiquis.

Between Watford and Bushy-hill, by the foot-way,

Doody. Common about Norwich in dry gravelly fields, and on the city walls in many places; also at Bury.

Perennis. Fl. Julio.

Habitus praecedentis, sed caules omnino decumbentes, subpilosii. Folia angustiora. Flores plerumque lutei, saepè violacei, vel, e colore violaceo cum flavo coniuncto, virentes. Imprimis discepunt leguminibus recurvato-falcatis, pilosis, mihiimè cochleatis. Semina 4—8. Stylus compressus, stigmate capitato, ut in priore.

lupulina. 3. MEDICAGO spicis ovatis, leguminibus reniformibus

formibus venoso-corrugatis monospermis, caule procumbente.

Medicago lupulina. *Sp. Pl.* 1097. *Huds.* 330.
With. 659. *Hill.* 165. *Relb.* 286. *Sibth.*
 232. *Abbot* 165. *Curt. Lond. fasc.* 2 *t* 57.
Mart. Fl. Rust. *t.* 19. *Fl. Dan* *t.* 992.

Trifolium luteum lupulinum. *Raii Syn.* 331.
Ger. em. 1186.

T. pratense luteum. *Fuchs. Hist.* 819.

Melilotus minima. *Riv. Tetrup. Irr.* *t.* 8.

Medica polycarpos, fructu minore compresso scabro. *Raii Syn.* 333.

Angl. Black Medick or Nonesuch.

In arvis, pratis, et pascuis, frequens.

Annuæ. Fl. Maio—Augusto.

Radix fibrosa. Caules prostrati, longitudine varii, angulati. Foliola obovata, subinde rhombea, glabriuscula, apice dentata. Stipulæ dentatæ. Spicæ longius pendulatæ, ovatæ. Flores parvi, aurei. Raeemi fructiferi cylindrici. Legumen coeruleato-reniforme, monospermum, reticulato-venosum et corrugatum, nigrum, interdùm pilosuscum.

Var. β non ipse vidi. Icon apud *Moris. sect.* 2. *t.* 15. *f.* 14, vix huie speciei respondet.

4. MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis polymorpha. subdentatis, caule diffuso.

α . *Medicago polymorpha arabica*. *Sp. Pl.* 1098, η . *Huds.* 331. *Relb.* 386. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 47. *Mart. Fl. Rust.* *t.* 76.

M. arabica. *With.* 660. *Sym. Syn.* 167. *Hill.* 165.

M. maculata. *Sibth.* 232.

Medica arabica. *Camer. Hort.* 97. *t.* 27.

Trifolium cochleatum, folio cordato maculato.

Raii Syn. 333.

T. cor-

- T. cordatum. *Ger. em.* 1190.
 $\beta.$ minima. *Sp. Pl.* 1099, $\mu.$ *Fl. Dan.* t. 211.
 Medicago miniima. *With.* 660. *Hull.* 165.
 Medica echinata minima. *Raii Syn.* 333. *Bauh.*
Hift. v. 2. 386.
 $\gamma.$ muricata. *Sp. Pl.* 1098, $\zeta.$
 Medicago muricata. *With.* 661. *Hull.* 165.
 Trifolium cochleatum, modiolis spinosis. *Raii*
Syn. 333. *Phuk. Phyt.* t. 113. f. 6.
 $\delta.$ Medica marina supina nostras, foliis viridibus, ad
 summos ramulos villosis. *Dill.* in *Raii Syn.*
 334.

Angl. Heart Medick, or Claver.

In pascuis glarcosis vel arenosis, in primis mariti-
 mis.

$\beta.$ At Narburgh, Norfolk. *Mr. Woodward.* $\gamma.$ On
 the sea bank at Orford, Suffolk. *Ray.*

Annua. Fl. Maio, Junio.

Radix fibrosa, tuberculosa. Caules prostrati. Foliola den-
 tata. Stipulæ in omnibus varietatibus magis vel minus
 dentatae, etiam in $\beta.$ Pedunculi axillares, subtriflori.
 Flores flavi. Legumen subrotundum, anfractibus nu-
 merofosis, extus spinosis, polyspermum. Semina reni-
 formia, compressa, laevissima.

α dignoscitur foliolis obcordatis, glabris, maculâ nigrâ in
 medio, spinis leguminum undique patentibus, rectius-
 culis; β foliolis obovatis, sericeis, spinis fructûs adun-
 cis; γ foliolis obovatis, pilosis, spinis fructûs brevisili-
 mis, depresso-radiantibus.

Var. γ et δ nondum spontaneas vidi.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA.

Filamenta in tria, vel plura, corpora
connexa.

POLYANDRIA.

Stamina numerofa.

338. HYPERICUM. *Cal.* quinquepartitus, in-
ferus. *Petala* 5. *Filamenta* in 3 vel 5
phalanges basi connata. *Capsula* poly-
sperma.

XVIII. POLYADELPHIA.

I. POLYANDRIA.

338. HYPERICUM. G. Pl. 392. Juss. 255.
Gærtn. t. 62.

Cal. quinquepartitus, inferus. *Petala* 5. *Filamenta* multa, in 3 vel 5 phalanges basi connata. *Capsula* polysperma.

Androsænum. 1. HYPERICUM floribus trigynis, capsulis bac-
catis, caule fruticoso ancipi. t.

Hypericum Androsænum. Sp. Pl. 1102. Huds. 332. With. 663. Sibth. 233. Curt. Lond. fasc. 3. t. 48.

H. maximum, Androsænum vulgare dictum.
Raii Syn. 343.

Clymenon Italorum. Ger. em. 543. Lob. Ic. 632.

Angl. Tutsan. Park leaves.

In sylvis et nemorosis humidiusculis, haud vul-
garis.

About North Walsham, Norfolk. Rev. Mr. Hep-
worth. At Field Dalling, Norfolk, and very
plentifully at Ashridge, Hertfordshire. Mr.
Woodward.

Percnnis. Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa. Caules suffruticosi, erecti, ramosi, subdi-
chotomi, foliosi, teretiusculi, ancipites, glabri. Folia
opposita, sessilia, patentissima, ovata, integerrima, ve-
nosa, glabra, exstipulata. Cymæ terminales, ereætae,
pedicellis teretibus. Flores aurei. Calyx inæqualis,
persistens, deflexus, demum coloratus. Petala obliqua.
Stamina parùm connexa. Styli apice recurvi, basi
persistentes.

persistentes. Capsula baccata, elliptica, nigra, trilocularis.

2. HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrangulari herbaceo, foliis pellucido-punctatis, gulum foliolis calycinis lanceolatis.

Hypericum quadrangulum. Sp. Pl. 1104. Huds. 334. Witb. 663. Relb. 289. Curt. Lond. fasc. 4. t. 52. Engl. Bot. t. 370. Fl. Dan. t. 640.

H. quadrangulare. Syst. Veg. ed. 14. 701. Sibth. 235.

H. Ascyon dictum, caule quadrangulo. Raii Syn. 344.

Ascyon. Ger. em. 542. Camer. Epit. 676. Matth. Valgr. v. 2. 287.

Angl. Square St. John's Wort. St. Peter's Wort.

In pratis et dumetis humidis, et ad fluviorum ripas,
vulgaris.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix sublignosa, repens. Caules erecti, stricti, ramosi, foliosi, acutè quadranguli, laeves. Folia opposita, per paria decussata, elliptica vel ovata, integerrima, nervosa, glabra, punctis numerosis, pellucidis, sparsis, margine nigris. Flores terminales, subpaniculati, oppositi, lutei. Calycis foliola lanceolata, acuta. Petala obliqua, rariū purpureo maculata.

3. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipitatum, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis.

Hypericum perforatum. Sp. Pl. 1105. Huds. 333. Witb. 664. Relb. 288. Sibth. 234. Curt. Lond. fasc. 1. t. 57. Woodw. Med. Bot. t. 10. Engl. Bot. t. 295. Fl. Dan. t. 1043.

Hypericum. Raii Syn. 342. Ger. em. 539.

Matth. Valgr. v. 2. 286. Fuchs. Hist. 831.

Hypericum, fls. Pharmac. Lond.

Angl. Perforated St. John's Wort.

In dumetis et nemorosis, et ad sepes, vulgaris.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Caules cresti, bipedales, foliosi, teretes, obsoletè ancipites. Folia elliptico-oblonga, obtusiuscula, nervosa, glabra, punctis pellucidis, sparsis, numerosis, margine nigris. Panicula terminalis, brachiata, foliosa. Flores aurei. Calycis foliola angustè lanceolata, acuta. Petala purpureo maculata et lineata, hinc crenata. Antheræ glanduliferæ. Stigmata albida.

dubium. 4. HYPERICUM floribus trigynis, caule obsoletè quadrangulo, foliis obtusis epunctatis, foliolis calycinis ellipticis.

Hypericum dubium. Leers. 165. Engl. Bot. t. 296. With. 664. Abbot. 167. Roth. Fl. Germ. v. 2. p. 2. 230.

Angl. Imperforate St. John's Wort.

In dumetis et nemorosis submontosis.

About Sapey, near Worcester. Dr. I. Seward.

Found at Luton, Bedfordshire, by Mr. Vaux.

Abbot. At Downton Castle near Ludlow, and at Hafod, Cardiganshire, plentifully.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Statura præcedentiis, at differt turionibus vividè coccineis; caule supernè quadrangulo; foliis vel omnino impunctatis, vel margine tantum puncto uno sive altero notatis; præcipue verò foliolis calycinis quadruplicè latioribus, ellipticis, obtusis. Distinctissima species est, a nomine ante Leersium detecta.

humifusa- 5. HYPERICUM floribus trigynis subcymosis, sum. caule ancipiti prostrato, foliis ellipticis glabris.

Hypericum

- Hypericum humifusum.* *Sp. Pl.* 1105. *Huds.*
332. *With.* 665. *Relb.* 287. *Sibth.* 233.
Curt. Lond. fasc. 3. *t.* 50. *Fl. Dan.* *t.* 141.
H. minus supinum. *Raii Syn.* 343.
H. supinum glabrum. *Ger. em.* 541.
H. exiguum. *Trag. Hist.* 72.
Angl. Trailing St. John's Wort.

In pratis pascuis et nemorofisis.

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Caules plures, prostrati, filiformes, obsoletè ancipites, foliosi, glabri. Folia elliptica, obtusa, margine nigro punctata. Panicula dichotoma, deinde racemosa, foliosa. Flores pedieellati, aurei, quam in praecedentibus minores. Calycis foliola magna, petalis plerumque longiora, foliis conformia.

6. **HYPERICUM** floribus trigynis, calycibus ser-monta-rato-glandulosis, caule erecto tereti glabro, num. foliis ovatis nudis.

Hypericum montanum. *Sp. Pl.* 1105. *Huds.*
333. *With.* 666. *Sibth.* 235. *Engl. Bot.*
t. 371. *Fl. Dan.* *t.* 173.

H. elegantissimum non ramosum, folio lato.
Raii Syn. 343. *Baub. Hist.* v. 3. p. 2. 383.
Androsænum campoclarense. *Column. Ecpr.*
73. t. 74. f. 1.
Angl. Mountain St. John's Wort.

In dumetis montofisis.

Perennis. Fl. Julio.

Radix subrepens. Caules bipedales, erecti, stricti, simplices, teretes, glabri, foliosi. Folia ovata, glabra, nervosa, punctis pellucidis sparsis, margine nigris. Panicula terminalis, dichotoma, coarctata. Calycis foliola lanceolata, acuta, glandulis resinosis, nigris, pedicellatis, ciliata, uti bracteæ. Petala lanceolata, citrina.

hirsutum. 7. **HYPERICUM** floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule erecto tereti, foliis ovatis pubescentibus.

Hypericum hirsutum. *Sp. Pl.* 1105. *Huds.* 333. *With.* 666. *Relh.* 288. *Sibth.* 234. *Curt.* *Lond. fasc.* 3. *t.* 49. *Fl. Dan.* *t.* 802.

H. *Androsænum dictum.* *Raii Syn.* 343. *Bauh.* *Hist.* v. 3. *p.* 2. 382.

Androsænum alterum hirsutum. *Column. Ecphr.* 75. *t.* 74. *f.* 2.

Angl. Hairy St. John's Wort.

In dumetis et sepibus, imprimis solo calcarco.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Caules bipedales, erecti, stricti, subramosi, teretes, densè hirsuti, foliosi. Folia quam in præcedente minoria, ovata, nervosa, subtus præcipue hirsuta. Panicula thyrsoidæ, multiflora, foliosa, hirsuta. Calyx et bracteæ ferrato-glandulosæ. Flores aurei, floribus H. montani duplò minores.

pulchrum. 8. **HYPERICUM** floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris.

Hypericum pulchrum. *Sp. Pl.* 1106. *Huds.* 332. *With.* 667. *Relh.* 287. *Sibth.* 234. *Curt.* *Lond. fasc.* 1. *t.* 56. *Fl. Dan.* *t.* 75. *Trag. Hist.* 74. *Dicks. II. Sicc. fasc.* 16. 13.

H. *pulchrum Tragi.* *Raii Syn.* 342.

Angl. Small Upright St. John's Wort.

In sylvis et dumetis frequens, solo argillaceo.

Perennis. Fl. Julio.

Caules erecti, stricti, sesquipedales, teretes, glaberrimi, rubundi, foliosi, ramis oppositis, axillaribus, sterilibus. Folia amplexicaulia, cordata, glabra, punctata, subtus glauca. Panicula strigosa, ramis subtrifloris. Calycis foliola

foliola elliptica, obtusa, ferrato-glandulosa. Flores aurei, extus rubri.

9. HYPERICUM floribus trigynis, caule tereti *elodes*.
repente foliisque villosis subrotundis, paniculâ pauciflora.

Hypericum elodes. *Sp. Pl.* 1106. *Huds.* 334.
With. 665. *Rehb.* 289. *Dicks. H. Sicc. fasc.*
2. 13. *Engl. Bot. t.* 109.

H. tomentosum. *Lob. Ic.* 400. *Ger. em.* 540.


Aescyon supinum villosum palustre. *Raii Syn.*
344.

Angl. Marsh St. John's Wort.

In paludibus spongiosis submontosis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caules procumbentes, radicantes, teretes, foliosi, spongiosi, superne præcipue villosi. Folia ovato-subrotunda, obtusa, nervosa, nervis omnibus e basi ortis, utrinque villosa. Panicula terminalis, demum lateralis, dichotoma, pauciflora, pubescens. Calycis foliola basi connata, ovata, nervosa, glabra, ciliata. Petala citrina, nervis virefcentibus. Glandulæ nectariferæ tres inter staminum phalanges insertæ.



Classis XIX.

SYNGENESIA.

Antheræ in tubum connatæ. Flores
compositi.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

Flosculi omnes hermaphroditici,
fertiles.

* *Semiflosculosi* *Tournefortii*; *corollulis ligulatis omnibus.*

349. HYPOCHÆRIS. *Receptaculum* paleaceum.
Pappus plumosus. *Cal.* subimbricatus.

351. CICHORIUM. *Recept.* subpaleaceum. *Pappus* paleaceus, semine brevior. *Cal.* calyculatus.

347. CREPIS. *Recept.* hispiduscolum. *Pappus* simplex, substipatitus. *Cal.* calyculatus, squamis deciduis, demùm torulosus.

346. HIERACIUM. *Recept.* nudiusculum, punc-tatum. *Pappus* simplex, sessilis. *Cal.* im-bricatus, ovatus.

345. HEDYPNOIS. *Recept.* nudum, punctatum. *Pappus* plumosus, sessilis, inæqualis. *Cal.* imbricatus, calyculatus.

340. PICRIS. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus.
Semina transversim fulcata. *Cal.* duplicatus ;
interior æqualis ; exterior laxus.
339. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Pappus*
stipitatus, plumosus. *Cal.* simplex, polyphyllus.
344. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Pappus*
stipitatus, simplex. *Cal.* imbricatus, squamis laxiusculis.
342. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Pappus* stipitatus, simplex. *Cal.* imbricatus, cylindraceus, margine membranaceo.
343. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Pappus* subseffilis, simplex. *Cal.* calyculatus. *Flocculi* simplici serie.
341. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Pappus* seffilis, simplex. *Cal.* imbricatus, ventricosus.
348. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex vel obsoletus. *Cal.* subæqualis.
350. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* calyculatus ; foliolis interioribus æquilibus, canaliculatis.

** *Capitati.* *Corollulae* omnes tubulosæ, apice divaricato-patule.

356. CARLINA. *Cal.* ventricosus ; squamis exterioribus spinosis ; interioribus coloratis scariosis radiantibus. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus.
352. ARCTIUM. *Cal.* globosus ; squamis apice hamatis, inflexis.
354. CARDUUS. *Cal.* ventricosus, imbricatus ; squamis spinosis. *Recept.* pilosum. *Pappus* deciduus.
355. ONOPORDUM. *Cal.* ventricosus ; squamis

mis patentibus, spinosis. *Recept.* favosum, subpaleaceum.

353. SERRATULA. *Cal.* subcylindricus, imbricatus; squamis inermibus. *Pappus* persistens.

Centaurea nigra.

- *** *Discoidei.* *Corollulæ omnes tubulosæ, erecto-paralleli, apice planifluti, densi.*

358. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* scaber. *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, exsertus.

357. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* retrorsum scaber. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* subinde radiata.

359. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus.

Tanacetum. *Senecio vulgaris.* *Aster Tripolium.*
Anthemis nobilis.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

Flosculi disci hermaphroditici; radii fœminei; omnes fertiles.

* *Discoidei.* *Corollulæ radii obsoletæ.*

360. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Sem.* coronata. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus. *Flosc.* radii trifidi, obsoleti, interdum nulli.

363. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* scaber. *Cal.* imbricatus, subrotundus. *Flosc.* radii trifidi.

362. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* scaber aut plumosus. *Cal.* imbricatus, squamis scariosis coloratis. *Flosc.* radii subulati.
361. ARTEMISIA. *Recept.* nudum, aut villosum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, squamis rotundatis, conniventibus. *Flosc.* radii subulati, integerimi.
Tussilago hybrida et Petaites.
- ** *Radiati. Corollulæ radii ligulatæ.*
372. BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, squamis æquilibus. *Sem.* obovata.
375. MATRICARIA. *Recept.* nudum, cylindraceo-conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* planiusculus, imbricatus, squamis margine scariosis.
373. CHRYSANTHEMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus, squamis margine dilatatis, membranaceis.
374. PYRETHRUM. *Recept.* nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus, squamis acutiusculis, margine scariosis.
371. DORONICUM. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Sem.* radii mutica. *Cal.* squamæ duplii ordine, æquales, disco longiores.
369. INULA. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* imbricatus. *Cor.* radii numerosissimæ, lineares. *Antheræ* basi bisetæ.
364. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* imbricatus. *Cor.* radii lineares, angustissimæ, numerosæ.
- SOLIDAGO. *Recept.* nudum, scrobiculatum. *Pappus* simplex. *Cal.* imbricatus, squamis.

- squamis conniventibus. *Flosc.* radii cír-
citer 5.
367. ASTER. *Recept.* nudum. *Pappus simplex.*
Cal. imbricatus, squamis inferioribus patulis.
Flosc. radii plures quam 10.
366. SENECHIO. *Recept.* nudum. *Pappus sim-
plex.* *Cal.* cylindricus, polyphyllus, æqua-
lis, calyculatus, squamis apice sphacelatis.
365. TUSSILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus sim-
plex.* *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis,
submembranaceus, basi ventricosus.
370. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus sim-
plex.* *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis,
cylindraceus.
376. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus*
submarginatus. *Cal.* hemisphæricus, squa-
mis subæqualibus. *Flosc.* radii plures quam
5, oblongi.
377. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus*
nullus. *Cal.* ovatus, imbricatus, inæqualis.
Flosc. radii 5 ad 10, obcordato-subrotundi.
Bidens cernua.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

*Flosculi disci hermaphroditici; radii
neutri, steriles.*

378. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Pappus*
simplex. *Cor.* radii infundibuliformes, lon-
giores, irregulares.

XIX. SYNGENESIA.

I. POLYGAMIA AEQUALIS.

* *SEMIFLOSCULOSI*. *Flosculi ligulati.*

339. TRAGOPOGON. G. Pl. 398. Juss. 170.
Gærtn. t. 159.

Receptaculum nudum. Cal. simplex, polyphyllus. *Pappus* stipitatus, plumosus.

pratensis. 1. TRAGOPOGON calycibus corollarum radium subæquantibus, foliis integris carinatis acuminatis; basi dilatatis, pedunculo tereti.

Tragopogon pratensis. *Engl. Bot.* t. 434. *Hull.* 172.

T. pratense. *Sp. Pl.* 1109. *Huds.* 335. *With.* 672. *Relb.* 290. *Sibth.* 236. *Abbot.* 168. *Fl. Dan.* t. 906.

T. luteum. *Raii Syn.* 171. *Ger. em.* 735.

Tragopogon. *Fuchs. Hist.* 821. *Mattb. Valgr.* v. 1. 490.

Barbula Hirci. *Trag. Hist.* 280.

Hirci Barba. *Cord. Hist.* 156.

Narrow and Common Goat's-beard. *Pet. II.* *Brit.* t. 15. f. 6, 7.

Angl. Yellow Goat's-beard.

In pratis et pascuis graminosis.

Biennis. Fl. Junio.

Radix fusiformis, lactescens, dulcis. *Herba* glabra, laevissima. *Caules* ramosi, foliosi, teretes, sesquipedales, saepè purpurascentes. *Folia* alterna, amplexicaulia, carinata, acuminata, indivisa, integerrima; basi dilatata, ventricosa, et subundulata; apice flaccida. *Pedunculi* terminalis, solitarii, uniflori, exactè cylindracei. *Flores* magni, aurei, inatutini, nec ultra meridiem, nisi subnebuloso

nebuloso et caliginoso cœlo, expansi. Foliola calycina lanceolata, acuminata, plana, dupli serie digesta, æqualia. Flosculi quinquedentati, exteriores maximi, longitudine varii, at plerumque calyci æquales vel longiores. Antheræ fuscescentes. Germen apice penicillatum. Receptaculum punctatum. Semina curvata, sulcata, scabra. Pappus radiatus, plumosus, stipe subulato.

2. TRAGOPOGON calycibus corollarum radio porrifofesquilongioribus, foliis integris strictis, pedunculo superne incrassato.

Tragopogon porrifolius. *Jacq. Coll.* v. 1. 99. *Ic. rar.* v. 1. t. 159. *Engl. Bot.* t. 638.

T. porrifolium. *Sp. Pl.* 1110. *Huds.* 335. *With.* 672. *Hull.* 172. *Fl. Dan.* t. 797.

T. purpureum. *Raii Syn.* 171. *Ger. em.* 735.

T. alterum. *Matth. Valgr.* v. 1. 491.

Angl. Purple Goat's-beard. *Pet. H. Brit.* t. 15. f. 8.

In pratis humidiusculis.

On the banks of the Chalder near Whalley, Lancashire. *Gerarde.* In many parts of Cornwall; Dr. Gunthorp. *Merret.* Fields about Carlisle and Rose Castle, Cumberland; Mr. Nicholson. *Dill.* Marshes below Woolwich, and near Edmonton; Blackstone. *Huds.* Meadows below St. Vincent's rocks, Bristol. *Mr. Sowerby* and *Mr. D. Turner.*

Biennis. Fl. Maio, Junio.

Radix fusiformi-teres, lactescens, dulcis. Herba glabra, glauca, quadripedalis. Folia vix undulata, apice rectiuseula. Pedunculus apice incrassatus. Foliola calycina linear-lanceolata, flosculis duplo ferè longiora. Corolla fuso-violacea. Antheræ nigræ.

340. PICRIS. *G. Pl.* 399. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 159.
Helmintia. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 159.

Recept. nudum. *Cal.* duplicatus; interior æqualis; exterior laxus. *Pappus* plumosus. *Semina* transversim sulcata.

echioides. 1. PICRIS calyce exteriori pentaphyllo maximo aculeato, pappo stipitato, foliis repandis.

Picris echioïdes. *Sp. Pl.* 1114. *Huds.* 342. *With:* 673. *Hull.* 172. *Relb.* 297. *Sibth.* 240. *Abbot.* 168. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 51.

Helmintia echioïdes. *Gærtn. v.* 2. 368.

Hieracium echioïdes, capitulis Cardui benedicti. *Raii Syn.* 166. *Baub. Hist.* v. 2. 1029.

Buglossum luteum. *Ger. em.* 798.

Ox-tongue Hawkweed. *Pet. H. Brit.* *t.* 12. *f.* 12.

Angl. Bristly Ox-tongue.

In agrorum marginibus, aggeribusve, imprimis solo argillaceo.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix ramosa. Herba spinulis pungentibus, porrectis, undique horrida. Caulis bipedalis, erectus, ramosus, foliosus, sulcatus, teres. Folia repanda, lætè virentia, lucida; radicalia obovata; caulina acuta, basi cordata, amplexicaulia, patentissima. Pedunculi subpaniculati, uniflori, apice demum incrassati. Flores aurei. Calyx exterior pentaphyllus, maximus, laxus, foliolis cordatis; interior suboctophyllus, foliolis lanceolatis, æquilibus, conniventibus, nec imbricatis, aristâ pinnatâ, parum infra apicem insertâ, purpureâ. Flosculi calyce longiores. Semina teretiuscula, transversim pulcherrimè corrugata. Pappus plumosus, stipite filiformi, ipso semine parum longiori.

bieraci- 2. PICRIS calyce exteriori polyphyllo abbreviato,
oides. pappo

pappo sessili, foliis undulatis; radicalibus dentatis.

Pieris hieracioides. Sp. Pl. 1115. With. 673.
Hull. 172. Relb. 297. Sibth. 240. Abbot. 168.
Engl. Bot. t. 196.

Hedypnois hieracioides. Huds. 342.

Hieracium asperum, majori flore, in agrorum limitibus. Raii Syn. 167. Baub. Hist. v. 2, 1029.

H. asperum. Ger. em. 298.

Angl. Hawkweed Ox-tongue.

Ad agrorum viarumque margines, solo glareoso vel calcareo.

Biennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba scabra ramosissima, bipedalis. Folia undulata, margine præcipuè aculeata; radicalia lanceolata, inæquilaterè dentata; caulinæ amplexicaulia, recurva, acuta. Panicula subcorymbosa, foliolosa. Pedunculi parùm incrassati, subsquamati. Flores flavi. Calyx exterior e foliolis pluriinis, lanceolatis, laxè patentibus, inæqualibus, abbreviatis, scabris; interior polyphyllus, foliolis triplò longioribus, lanceolatis, æqualibus, conniventibus, nequaquam imbricatis, villosis, scabris, muticis. Flosculi calyce duplò longiores. Semina sulcata, transversim rugosa. Pappus plumosus, sessilis, æqualis.

341. *SONCHUS.* G. Pl. 400. Juss. 169.
Gertn. t. 158.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, ventricosus.
Pappus simplex, sessilis.

1. *SONCHUS* pedunculis calycibusq[ue] hispidis cæruleus, racemosis, foliis sublyratis: lobo terminali deltoideo maximo.

Sonchus cæruleus. Camer. Epit. 281.

S. canadensis. Sp. Pl. 1115. With. 674. Hull.
177.

S. alpinus.

816 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

S. alpinus. *Huds.* 336. *Fl. Dan.* t. 182.

S. n. 20. *Hall. Hist.* v. 1. 9.

S. cæruleus latifolius. *Baub. Hist.* v. 2. 1005.

S. flore cæruleo. *Ger. em.* 294.

Angl. Blue Sow-thistle.

In pascuis montosis et alpinis.

On the borders of corn fields about Willington and Howden-pans, Northumberland; Wallis. *Huds.*

Perennis. *Fl. Julio, Augusto.*

Radix carnoſa, ramoſa, cæſpitoſa. Caules erec̄ti, tripedales, ſimplices, folioſi. Folia alterna, amplexicaulia, runcinato-lyrata, denticulata, lævia, ſubtūs glauca, lobis acutis, terminali maximo, deltoideo : ſuperiora linearia, ciliata. Racemus terminalis, ſolitarius, erec̄tus, hispidus, pilis porreſtis, rubris, glanduloſo-viſcidis. Bracteæ lineares. Calyx hispidus, rubicundus. Corolla purpuro-cærulea, calyce duplo longior. Antheræ rubræ. Semina compreſſa. Pappus ſcaber, nec plumoſus. Exemplaria indigena nondum mihi obvia fuere.

Nomen *S. canadensis* huic plantæ, Alpium omnium Europæarum incolæ, minime convenit ; antiquissimum proinde restitui. A *S. alpino* Linnei quam maximè diſcrepat. Confer *Pl. Ic. ex Herb. Linn.* t. 21.

palustris. 2. **SONCHUS** pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis bafi ſagittatis margine ſcabris.

Sonchus palustris. *Sp. Pl.* 1116. *Huds.* 337.

With. 674. *Hull.* 177. *Kelb.* 292. *Curt. Lond.* fasc. 5. t. 59. *Fl. Dan.* t. 606.

S. tricubitalis, folio cuspidato. *Raii Syn.* 163.

S. arboreſcens alter. *Ger. em.* 294.

Angl. Tall Marsh Sow-thistle. *Pet. H. Brit.* t. 14. f. 7.

In paluſtribus ad ripas fluviorum.

About

About Greenwich and Blackwall. *Ray.* *Curtis.*
Near Streatham ferry, isle of Ely. *Rehb.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix ramosa, “minimè repens.” *Curt.* Caules erecti,
6—8 pedales, subsimplices, foliosi, angulati, fistulosi.
Folia runcinata, acuta, glabra; basi sagittata, am-
plexicaulia; margine denticulato-scabra. Panicula ter-
minalis, subumbellata vel cymosa, multiflora, hispida,
pilis densis, glandulosis, atris, uti calyx. Corolla flava,
calyce duplò longior. Semina sulcata. Pappus lævis.

3. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis *arvensis.*
subumbellatis, foliis runcinatis denticulatis
basi cordatis, radice repente.

Sonchus arvensis. *Sp. Pl.* 1116. *Huds.* 337.

With. 674. *Hull.* 177. *Rehb.* 291. *Sibth.* 237.

Abbot. 169. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 53. *Engl.*

Bot. t. 674.

S. repens, multis *Hieracium majus.* *Raii Syn.*
163.

S. arborescens. *Ger. em.* 294.

Hieracium majus. *Fuchs. Hist.* 319.

Angl. Corn Sow-thistle. *Pet. H. Brit.* t. 14.
f. 6.

In arvis et ad fæpes, solo argillaceo.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix repens, carnosæ, lactescens. Caulis 3-4 pedalis,
erectus, subsimplex, terciusculus, foliosus, fistulosus.
Folia runcinata, acutiuscula, glabra; basi cordata, am-
plexicaulia; margine denticulato-spinulosa. Panicula ter-
minalis, pauciflora, subcymosa, hispida, pilis glandu-
losis, fuscis. Calyx etiam hispidus. Corolla maxima,
aurea. Semina sulcata, Pappus lævis.

4. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus *oleraceus.*
lævibus, foliis runcinatis dentatis.

Sonchus

- Sonchus oleraceus.* *Sp. Pl.* 1116. *Huds.* 336.
With. 675. *Hull.* 177. *Relh.* 291. *Sibth.* 237.
Abbot. 169. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 58.
S. laevis. *Raii Syn.* 162. *Ger. em.* 292. *Camer.*
Epit. 279. *Matth. Valgr.* v. 1. 452.
Smooth jagged Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14.
f. 9 et 10.
- β. Sonchus oleraceus.* *Fl. Dan.* t. 682.
S. laevis minor, paucioribus laciniis. *Raii Syn.*
163.
S. laevis latifolius. *Ger. em.* 292.
Smooth broad Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14.
f. 8.
- γ. Sonchus asper laciniatus.* *Raii Syn.* 163.
S. asperior. *Ger. em.* 291.
Prickly jagged Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14.
f. 5.
- δ. Sonchus asper non laciniatus.* *Raii Syn.* 163.
S. asper. *Ger. em.* 291.
Broad Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14. f. 2.
Prickle-dented Sowthistle. *Ibid.* f. 4.
- ε. Sonchus subrotundo folio nostras.* *Dill. in Raii*
Syn. 163. *Pluk. Phyt.* t. 61. f. 5.
Round-leaved Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14.
f. 1.
- ζ. Sonchus aphyllocaulis angusto et oblongo folio*
nostras. *Dill. in Raii Syn.* 163. *Pluk. Phyt.*
t. 62. f. 4.
Narrow Sowthistle. *Pet. H. Brit.* t. 14. f. 3.
Angl. Common Sowthistle.

In cultis et ruderatis nimis frequens.

Annua. Fl. Julio—Septembri.

Radix fusiformis. Herba polymorpha. Caulis ramosus, teres, glaber, fragilis, foliosus. Folia laevia, runcinata, lobis acutis, magis minusve dentatis vel spinosis. Pedunculi

axillares et terminales, subcymosi, lanugine albâ, mol-lissimâ, (statim deciduâ) tomentosi, deinde glabri. Ca-lyx glaber. Corolla lutea. Semina angulata, sulcata, crepulata. Pappus lævis.

342. LACTUCA. G. Pl. 400. Juss. 169.
Gærtn. t. 158.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, cylindraceus, margine membranaceo. *Pappus* simplex, sti-pitatus.

1. LACTUCA foliis horizontalibus denticulatis *virosa*, carinâ aculeatis.

Lactuca virosa, Sp. Pl. 1119. Huds. 337. With. 677. Hull. 175. Relb. 292. Sibth. 237. Lightf. 429. Woodv. Suppl. t. 250.

L. Sylvestris major, odore opii. Raii Syn. 161. Ger. em. 309.

L. sylvestris hirsuta, odore viroso opii simili. Moris. sect. 7. t. 2. f. 16.

Cut Lettuce. Pet. H. Brit. t. 15. f. 2.

2. Lactuca sylvestris, folio non laciniato. Raii Syn. 162.

Broad Lettuce. Pet. H. Brit. t. 15. f. 2.

Angl. Strong-scented Lettuce.

Ad sepes, muros, et agrorum margines, solo cal-careo.

About Norwich in many places. Common in all chalk countries. Dr. Goodenough has observed it on dry banks in the neighbourhood of Lon-don, as at Acton, Ealing, Brentford, &c.

Biennis. Fl. Augusto, Septembri.

Herba lactescens, succo viroso, acri, somnifero. Caulis erectus, virgatus, teres, paniculatus, parùm foliosus. Folia glabriuscula, denticulata; radicalia plurima, obo-vata, indivisa; caulinæ minora, sœpè lobata, amplexicaulia,

caulia, costâ pectinato-spinosâ. Bracteæ cordatæ, acutæ. Pedunculi squamati. Calyx glaber, pauciflorus. Corolla sulphurea, vix calyce longior. Semina elliptica, compressa, striata, nigra. Pappus stipitatus, scaber.

Scariola. 2. LACTUCA foliis verticalibus sinuatis denticulatis carinâ aculeatis.

Lactuca Scariola. Sp. Pl. 1119. Huds. 338. With. 677. Hull. 175. Relb. 293. Engl. Bot. t. 268.

L. sylvestris, costa spinosa. Raii Syn. 161.

L. sylvestris, foliis dissectis. Ger. em. 309.

L. sylvestris. Fuchs. Hist. 301. Matth. Valgr. v. 1. 476. Camer. Epit. 300.

Angl. Prickly Lettuce.

In ruderatis et ad agrorum margines petrosos.

In the isle of Ely. Relb. Hemsted.

Biennis. Fl. Augusto.

Herba glauca, lactescens, minus virosa. Caulis erectus, foliosus, apice paniculatus. Folia pinnatifida, verticalia, nec horizontalia, variè denticulata, costâ pectinato-spinosâ. Bracteæ cordatæ, amplexicaules, acutæ, integerrimæ. Pedunculi breves, squamati. Calyx glaber. Corolla parva, citrina. Semina elliptica, sulcata, pallida. Pappus stipitatus, scaber,

faligna. 3. LACTUCA foliis hastato-linearibus pinnatifidisque sessilibus carinâ aculeatis.

Lactuca faligna. Sp. Pl. 1119. Huds. 338. With. 678. Hull. 175. Relb. 293. Jacq. Austr. t. 250. Dicks. H. Sicc. fasc. 17. 16.

L. sylvestris minima. Raii Syn. 162.

L. sylvestris altera, angusto faligno folio, costâ albicante. Rupp. Jen. ed. Hall. 207. t. 4.

Small Jagged Lettuce. Pet. H. Brit. t. 15. f. 4.
Angl.

Angl. Leaſt Lettuce.

In aggeribus et ruderatis, ſolo calcareo.

About Pancras. *Ray.* *Sir J. Banks.* In shady lanes
in Dorfetshire, but rare. *Dr. Pulteney.*

Biennis. Fl. Augufto.

Herba viminea, glauca. Caulis ramosus, foliosus. Folia
ſeffilia, linearia, integerrima; baſi haſtata; quandoque
pinnatifida. Flores ſubracemosi. Bracteæ ſagittatæ.
Calyx laevis. Corolla luteola, calyce longior. Pap-
pus articulato-feaber.

Variat foliorum coſtâ aculeatâ et inermi.

343. PRENANTHES. G. Pl. 401. Juff. 168.
Gærtn. t. 158.

Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus sim-
plex, subſeffilis. Floſculi ſimplici ſerie.

i. PRENANTHES floſculis quiniſ, foliis runci- muralis.
natiſ.

Prenanthes muralis. Sp. Pl. 1121. Huds. 338.

With. 678. Hull. 174. Relb. 293. Sibth. 238.

Curt. Lond. fæſc. 5. t. 58. Engl. Bot. t. 457.

Fl. Dan. t. 509.

Laſtuca ſylveſtris murorum flore luteo. Raii
Syn. 162. Baub. Hift. v. 2. 1004.

Sonchus laevis muralis. Ger. em. 293.

Angl. Ivy-leaved Lettuce.

In nemorofis ſolo cretaceo, vel ad muros.

Perennis. Fl. Julio.

Radix ſublignosa. Herba gracilis, laevis, fragilis, lac-
teſcens. Caulis teres, foliosus, erectus. Folia runci-
nata, amplexicaulia, rubicunda; radicalia petiolata.
Panicula diwaricata, flexuosa, bracteolata. Calyx gra-
cilis, laevis, purpurascens. Floſculi quini, citrini, patuli,

Vol. II.

C e

calyce

calyce longiores. Pappus parùm e femine elevatus,
articulato-scabriuscus.

Variat foliis superioribus indivisis.

344. LEONTODON. *G. Pl.* 402. *Gærtn.* t. 158.
Taraxacum. *Juss.* 169.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, squamis lax-
iusculis. *Pappus* simplex, stipitatus.

Taraxa- 1. LEONTODON squamis calycinis exterioribus
cum. reflexis, foliis runcinatis dentatis glabris.

Leontodon Taraxacum. *Sp. Pl.* 1122. *Huds.*
339. *Reh.* 294. *Abbot.* 169. *Curt. Lond.*
fasc. 1. t. 58. *Woodv. Med. Bot.* t. 3. *Engl.*
Bot. t. 510. *Mill. Illustr.* t. 66. *Fl. Dan.*
t. 574. *Dreves Bilderb.* t. 4.

L. officinalis. *With.* 679. *Hull.* 173.

Taraxacum officinale. *Sibth.* 239.

Dens leonis. *Raii Syn.* 170. *Ger. em.* 290.

Hedypnois. *Fuchs. Hist.* 680.

Common Dandelion. *Pet. H. Brit.* t. 11. f. 7.

Æ. Dens leonis angustioribus foliis. *Raii Syn.* 171.

Narrow Dandelion. *Pet. H. Brit.* t. 11. f. 8.

Taraxacum, radix, herba. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common Dandelion.

In pratis, pascuis, ruderatis, et cultis ubique.

Perennis. Fl. Aprili—Julio.

Radix fusiformis, nigra. Folia radicalia, runcinata, den-
tata, lætè viridia, glabra. Scapi erecti, foliis altiores,
simplices, nudi, glaberriini, teretes, fissulosi, fragiles,
lactescentes, uniflori. Flos terminalis, magnus, au-
reus, vespere clausus. Calyx glaber, squamis exterio-
ribus (parùm brevioribus) laxè reflexis. Flosculi nu-
merosissimi. Receptaculum sphæroideum, excavato-
pinctatum. Semina obovata, sulcata, fuscescentia. Pap-
pus radiatus, scabriuscus, longissime stipitatus.

LEONTODON squamis calycinis exterioribus *palustre*,
brevioribus erectis ovatis, foliis sinuatis dentatis
glabriusculis.

Leontodon palustre. *Lyons. Fast. 48. Engl.
Bot. t. 553.*

L. Taraxacon. *With. 679. Hull. 173. Huds.
339, δ. Relb. 294, γ.*

Hedypnois paludosa. *Scop. Carn. v. 2. 100.
t. 48.*

Angl. Marsh Dandelion.

pratis humidis, et paludibus.

In Hinton Moor, Cambridgeshire. *Relb.* On
the lower common at Heydon, Norfolk. *Rev.
Mr. Bryant.*

irrennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis. Folia minus runcinata, quandoque subpubescentia. Scapi longitudine foliorum vel breviores, interdum decumbentes. Calyx undique imbricatus, squamis exterioribus sensim minoribus, ovatis, acutis, omnibus erectis. Flosculi aurei, exteriores dorso purpurei. Semina et pappus ferè prioris.

345. HEDYPNOIS. *Huds. 340.*

Leontodon. *Juss. 170.*

Virea. *Gærtn. t. 159.*

Recept. nudum, punctatum. Cal. imbricatus,
calyculatus. Pappus plumosus, sessilis, inæqualis.

HEDYPNOIS scapis unifloris, foliis dentatis, *bispida*.
scabris, flosculis ore pilosis apice glandulosis.

Hedypnois hispidum. *Huds. 340. Engl. Bot.
t. 554.*

Leontodon hispidum. *Sp. Pl. 1124. With. 681.
Hull.*

824 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Hull. 174. *Reh.* 295. *Sibth.* 239. *Abbot.*
170. *Curt.*, *Lond.* fasc. 5. t. 56. *Fl. Dan.*
t. 862.

Dens leonis hirsutus leptocaulis, *Hieracium*
dictus. *Raii Syn.* 171.

Hieracium dentis leonis folio hirsutum. *Ger.*
em. 303.

Angl. Rough Hedypnois.

In pascuis, præcipue solo calcareo vel cretacco.

Perennis. Fl. Julio.

Radix fusiformis, gracilis, tortuosa, fusca. Folia radicalia,
oblonga, varie dentata vel subpinnatisida, hispida, pilis
plerumque furcatis, quandoque trisidis. Seapi erecti,
simplices, uniflori, teretes, hispidi. Flos ante expan-
sionem cernuus, dein erectus, flavus sive aureus.
Squamæ calycinæ erectæ, inæquales, irregulares, his-
pidæ. Flosculi ore pilosi, pilis longis erectis flavis;
apice quinquedentati, dentibus subtus fasciculo glandu-
larum fuscescentium notatis, monente amicissimo Sow-
erbæo. Semina uniformia, gracilia. Pappus sessilis,
plumosus, inæqualis.

hirta. 2. **HEDYPNOIS** scapis unifloris, foliis dentatis
scabris, calyce glabriusculo, seminibus exte-
rioribus pappo destitutis.

Hedypnois hirtum. *Engl. Bot.* t. 555.

H. hispidum, β . *Huds.* 340.

Leontodon hirtum. *Sp. Pl.* 1123. *With.* 682.
Hull. 174. *Sibth.* 238. *Abbot.* 170. *Curt.*
Lond. fasc. 6. t. 59.

Hieracium pumilum saxatile asperum, præ-
morsa radice. *Raii Syn.* 167.

H. dentis leonis folio, hirsutie asperum, minus.
Baub. Prod. 63.

Angl. Deficient Hedypnois.

In pascuis et cricetis glarcosis.

Perennis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix præmorsa. Folia lanceolato-oblonga, dentata, quandoque integra, pilis simplicibus vel furcatis, etiam tricuspidatis, ut in priore. Scapi foliis duplò altiores, hispidae. Flos præcedente duplò minor, ante explicacionem cernuus, dein erectus, flavus sive aureus, extùs sanguineus. Calyx ferè glaber. Floreuli ore imberbes, apiceque eglandulosi. Semina oblonga, sulcata, pappo plumoso; exteriora imberbia, squamis brevibus, erosis, quasi abortivis, coronata, monente D. Dawson apud Curt. Fl. Lond.

3. HEDYPNOIS scapis subunifloris, foliis runci-nato-dentatis, glabris, calyce piloso.

Hedypnois Taraxici. Villars. Dauph. v. 3. 80.
t. 26.

H. autumnale ε. Huds. 341.

Hieracium Taraxici. Sp. Pl. 1125. With. 683.
Hull. 175. Lightf. 435. Retz. Obs. fasc. 4.
t. 2. Dicks. H. Sicc. fasc. 17. 15.

Picris Taraxici. Allion. Ped. v. 1. 211. t. 31.
f. 1.

P. n. 27. Hull. Hist. v. 1. 12.

Lcontodon pyrenaicum. Gouan. Obs. 55. t. 22.
f. 1, 2.

Angl. Alpine Hedypnois.

In locis irriguis alpinis.

In the isle of Skye, Lightf. On many Highland mountains. Mr. Mackay. In Wales as well as Scotland. Huds.

Perennis. Fl. Angusto.

Planta polymorpha. Radix præmorsa, fibris longis, simplicibus, rectis. Folia glabra, saepius lanceolata, runcinata; interdum ferè linearia, dentata. Scapus adseendens, foliis longior, plerumque uniflorus, rarius biflorus; medium versus bracteolatus, bracteâ subulatâ; apice incrassatus, pubescens, uti calyx, pilis patentibus,

tibus, atris. Corolla calyce duplò longior, aurea.
Pappus sessilis, plumosus.

Distincta species proculdubio est, nec hybrida. Calyce quodammodo cum Hieracio alpino convenit, at pappo plomo abundè differt.

- autumnalis.* 4. **HEDYPNOIS** scapo ramoso, pedicellis squamosis, foliis lanceolatis dentato-pinnatifidis glabriusculis.

Hedypnois autumnale. *Huds.* 341.

Leontodon autumnale. *Sp. Pl.* 1123. *With.* 680. *Hull.* 173. *Relb.* 295. *Sibth.* 238. *Abbot.* 170.

Hieracium minus præmorsâ radice. *Raii Syn.* 164. *Baub. Hist.* v. 2. 1031.

H. minus. *Fuchs. Hist.* 320.

H. minus sive *leporinum.* *Ger. em.* 296.

Common Hawkbit. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 1.

- β. *Hieracium præmorsum laciniatum.* *Dill. in Raii Syn.* 164.

Jagged Hawkbit. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 2.

- γ. *Hieracium folio acuto minus.* *Dill. in Raii Syn.* 164.

Small jagged Hawkbit. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 3.

- δ. *Hieracium folio obtuso minus.* *Dill. in Raii Syn.* 164.

Dandelion Hawkbit. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 4.
Angl. Autumnal Hedyphnois.

In pratis et pascauis vulgaris.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix præmorsa, fibris longissimis. Folia omnia ferè radicalia, lanceolata, dentata vel pinnatifida, plerumque glabra, interdum scabra vel hispiduscula. Scapus ramosus, patens, sulcatus, scabriusculus, quandoque basin versus subfoliosus. Pedunculi arcuato-adscendentes, elongati,

elongati, squamosi, squamis sparsis, subulatis, apice incrassati, subvilloso. Calyx pubescens. Flosculi aurei, extus apiceque rubicundi. Semina gracillima, sulcata. Pappus sessilis, plumosus.

Varietatem floribus e receptaculo proliferis invenit amicissimus D. H. Bryant.

346. HIERACIUM. *G. Pl.* 402. *Juss.* 169.
Gærtñ. t. 158.

Recept. nudiusculum, punctatum. *Cal.* imbricatus, ovatus. *Pappus* simplex, sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

1. HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, *alpinum*.
scapo nudiusculo unifloro, calyce piloso.

Hieracium alpinum. *Sp. Pl.* 1124. *Huds.* 343.
With. 683. *Lightf.* 434. *t.* 18. *Hull.* 175.

H. villosum alpinum, flore magno singulari,
caule nudo. *Dill.* in *Raii Syn.* 169. *t.* 6.
f. 2.

H. alterum pumilum. *Column. Ecphr.* v. 2. 29.
t. 30. *f.* 2.

Welsh Mouse-ear. *Pet. H. Brit.* *t.* 11. *f.* 2?
Angl. Alpine single-flowered Hawkweed.

In petrosis alpinis Cambricis et Scotieis.

On the mountains about Llanberis, North Wales.

Huds. On many inmountains in the Highlands.
Lightf.

Perennis. Fl. Julio.

Radix sublignosa. Herba undique pilosa, pilis canis basi fulvis. Folia radicalia, obovato-lanceolata, indivisa, saepius denticulata. Scapus solitarius, palmaris, erectus, simplex, uniflorus, teres, superne nigricans, medium versus foliolo solitario, lanceolato, integerrimo. Flos erectus, magnus, aureus. Calyx undique imbricatus, niger, villosissimus, pilis canescens. Semina

castanea, angulata, punctulata. Pappus simplex, sessilis, scaber.

Pilosella. 2. **HIERACIUM** foliis ellipticis integerrimis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro nudo.

Hieracium Pilosella. *Sp. Pl.* 1125. *Huds.* 343. *With.* 682. *Hull.* 175. *Rehb.* 298. *Sibth.* 241. *Abbot.* 170. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 54. *Dreves. Bilderb.* *t.* 17. *Fl. Dan.* *t.* 1110.

Pilosella repens. *Raii Syn.* 170. *Ger. em.* 638. *P. major*. *Fuchs. Hist.* 605.
Angl. Mouse-ear Hawkweed.

In pascuis fuccioribus vulgaris.

Perennis. Fl. Maio—Julio.

Radix sibrosa. Stolones foliosi, pilosi, repentes. Folia elliptica, obtusa, integerrima, basi angustata; suprà latè viridia, hispida, setis rigidulis, sparsis; subtus tomentoso-nivea atque pilosa. Scapus solitarius, palmaris, erectus, simplex, uniflorus, tomentosus, aphyllus. Calyx hirsutus, pilis albis nigrisque. Corolla citrina, flosculis exterioribus subtus purpureo elegantè vittatis. Semina fusca, striata. Pappus scaber.

** *Scapo nudo multifloro*.

dubium. 3. **HIERACIUM** foliis elliptico-lanceolatis sub-integerrimis pilosis, siolonibus repentibus, scapo multifloro.

Hieracium dubium. *Sp. Pl.* 1125? *Huds.* 344. *With.* 684. *Hull.* 176.

H. Auricula. *Fl. Dan.* *t.* 1111.

H. n. 53. *Hall. Hist.* v. 1. 22, ex descr.
Angl. Branching Mouse-ear Hawkweed,

In montosis humidiusculis. *Huds.*

On Fairfield mountain, near Rydall, Westmoreland,

land. *Huds.* North of England. *Mr. Woodward.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caules et stolones procumbentes, repentes, foliosi. Folia elliptico-lanceolata, obtusiuscula, plerumque integerrima, rarius obsoletè dentata, utrinque hispida, setis sparsis, subtus lanata. Scapi 2—6 flori, pedicellis alternis, tomentosis, glandulosis. Calyx tomentosus, scaber, setis brevibus, glandulosis, nigricantibus. Corolla utrinque citrina. Pappus scaber.

Ad exemplarium à D. Woodwardio benevolè communitatum descriptionem elaboravi. In herbario Linnæano desideratur.

† 4. HIERACIUM foliis lanceolatis integerrimis, *Auricula* stolonibus repentibus, scapo nudiusculo multifloro umbellato.

Hieracium Auricula. Sp. Pl. 1126. *Huds.* 344.
With. 684. *Hull.* 176.

H. dubium. Fl. Dan. t. 1044.

Angl. Umbelled Mouse-ear Hawkweed.

In montosis. *Huds.*

On Dalehead, not far from Grassinere, Westmoreland, but sparingly. *Huds.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

“ Radix præmorsa, radiculis numerosis, simplicibus. Stolones repentes, foliosi. Scapus erectus, nudus, subpilosus, pilis rarissimis, vix semipedalis. Folia lanceolata, subintegerrima, acuta, nuda. Flores paniculati, a tribus ad sex, lutei. Calycis foliola linearia, pilosa.”
Huds.

Stirpem ab Hudsono descriptam nondum vidi.

H. Auricula (*Herb. Linn.*) e monte Ceniso, gaudet foliis lanceolatis, acutis, vix dentatis, magis minusve seto-hispidis; scapo erecto, tomentoso, subinde piloso, medium versus foliolum solitarium plerumque gerente; umbellâ pauciflorâ; calyce nigro, piloso; corallâ aureâ;

reâ ; pappo scabro. Huic omnino pertinet H. dubium.
Fl. Dan. t. 1044.

*** *Caule folijs.*

muronum. 5. **HIERACIUM** caule paniculato, foliis radicibus ovatis dentatis majoribus.

Hieracium murorum. *Sp. Pl.* 1128. *Huds.* 344. *With.* 686. *Hell.* 176. *Reth.* 298. *Sibth.* 241. *Abbot.* 171.

H. murorum, folio pilosissimo. *Raii Syn.* 168. **Pulmonaria gallica** sive aurea latifolia. *Ger. em.* 304.

Pilosella major quibusdam, aliis **Pulmonaria** flore luteo. *Baub. Hist.* v. 2. 1033.

Cochchorus. *Dalech. Hist.* 565.

French Hawk-lung. *Pet. H. Brit.* t. 13. f. 4.

6. **Hieracium macrocaulon** hirsutum folio rotundiorc. *Raii Syn.* 169.

Round Hawk-lung. *Pet. H. Brit.* t. 13. f. 2.

7. **Hieracium leptocaulon** hirsutum folio longiore. *Raii Syn.* 169.

H. sylvaticum. *Fl. Dan.* t. 1113.

Angl. Wall Hawkweed. Golden Lungwort.

In sylvis, muris antiquis, et aggeribus agrorum.

7. In Westmoreland. *Ray. Mr. Crowe.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. **Herba** piloso-scabra. **Caulis** erectus, altitudine varius, paniculatus, basi præcipue foliosus. **Folia** inferiora petiolata, ovata, vel ovato-lanceolata, dentata, basin versus sinuata, vel subpinnatisida; superiora pauciora, minora, ferè sessilia; omnia maculis atro-purpureis subinde contaminata. **Petioli** hirsuti. **Pedunculi** incani. **Braœteæ** subulatæ. **Flores** aurei. **Calycis** foliola linearia, acuta, dorso glanduloso-hispida, corollâ duplò breviora. **Semina** angulata, sulcata. **Pappus** scaber.

Variat

Variat caule aphylllo, quandoque unifloro.

Varietas γ gaudet foliis frequentiūs maculatis, longioribus, caule tripedali, folioso, nec (ut Raius e memorâ scripsit) aphylllo. Hanc vix refert icon apud Petiv. *H. Brit. t. 13. f. 3.* e J. Bauhino mutuata.

6. **HIERACIUM** caule paniculato folioso, foliis *sylvaticum* radicalibus ovatis utrinque acutis subdentalis.

Hieracium sylvaticum. *Gouan. Obs. 56.* *With.* 687. *Hull. 176.*

H. murorum. *Allion. Ped. v. 1.* 215. *t. 28.* *f. 1.* *Huds. 345,* β (*nec Linn.*) etiam ε.

H. Pulmonaria dictum angustifolium. *Raii Syn. 168.*

Pulmonaria Gallica, sive aurea, angustifolia. *Ger. em.* 304.

Pilosellæ majoris, sive Pulmonariæ luteæ species angustifolia. *Baub. Hist. v. 2.* 1034.

Narrow Hawk-lung. *Pet. H. Brit. t. 13. f. 5.* *Angl.* Wood Hawkweed.

In dumetis et montosis subalpinis.

In a Roman camp at Sidmonton, near Newberry; Mr. William Coote. *Ger. em.* In Wales. *Richardson.* On Dudley Castle hill. *With.*

Percunis. Fl. Augusto.

Præcedente major, cauleque magis folioso. Folia radicalia basi attenuata, et per petiolos quasi decurrentia, obsoletè dentata, nunquam pinnatifido-laciñiata; caulinæ sessilia, ovata. Flores aurei. Calyx incanus. *Gouan. With.* Hanc speciem nondum ipse vidi.

7. **HIERACIUM** caule paniculato fistuloſo, foliis *paludosum* cordato-amplexicaulibus dentatis glabris, *sum.* lycibus hispidis.

Hieracium paludosum. *Sp. Pl. 1129.* *Huds. 345.* *With.*

With. 686. *Hull.* 176. *Lights.* 4; 8. *Fl. Dan.* t. 928. *Allion. Ped.* v. 1. 216. t. 28. f. 2. t. 31. f. 2.

H. montanum Cichorei folio nostras. *Raii Syn.* 166.

H. montanum latifolium minus. *Ger. em.* 300.

H. latifolium glabrum. *Baub. Hist.* v. 2. 1033.

H. Britannicum. *Cluf. Pam.* 643, ex descr.

Angl. Succory-leaved Mountain Hawkweed.

In umbrosis irriguis alpinis.

In the alpine parts of Yorkshire. *Richardson.* Not unfrequent in Westmoreland, as at Kirkby Lonsdale just below the bridge, and between that town and the lakes ; also in marshy places near Moffat, and other parts of the lowlands of Scotland.

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa, certè perennis. Herba glabra, intènsè amara. Caulis erectus, bi- vel tri-pedalis, angulatus, sulcatus, foliosus, apice paniculatus, intùs cavus. Folia ovata, acuminata, dentata, basi cordata amplexicaulia ; infima quandoque sublyrata. Flores subcorymbosi, saturatè citrini. Bracteæ ciliatæ. Calyx hispidus, pilis nigris. Semen pallidè fuscum, sulcatum. Pappus scaber.

molle. 8. **HIERACIUM** caule paniculato fistuloso, foliis lanceolatis obsoletè dentatis pilosis amplexicaulibus ; inferioribus petiolatis.

Hieracium molle, *Jacq. Austr.* t. 119. (*Herb. Linn.*) *Dicks. Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 288.

H. Sicc. fæse. 11. 13. *With.* 688. *Hull.* 176.

Angl. Soft-leaved Hawkweed.

In sylvis.

Woods in the south of Scotland. *Dickson.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix

Radix fibrosa. Herba pilosiuscula, pilis brevibus, sparsis. Caulis sesquipedalis, erectus, angulatus, foliosus, apice paniculatus, intus cavus. Folia lancicolata, obtusiuscula, obsoletè denticulata; inferiora petiolata; superiora sessilia, basi cordata et semiamplexicaulia. Pedunculi glanduloso-pubescentes. Flores saturatè auric. Calyx pilosus et subtomentosus. Semen flavescens, striatum. Pappus scaber.

9. **HIERACIUM** caule folioso subramoso, foliis *villosum*, hirtis repandis dentatisque: radicalibus lanceolatis; caulinis ovatis amplexicaulibus.

Hieracium villosum. Sp. Pl. 1130. With. 687.

Hull. 176. Dicks. Tr. of Linn. Soc. v. 2. 288.
Jacq. Austr. t. 87.

H. n. 44. Hull. Hist. v. 1. 18. Enum. rar. 54.
n. 971.

H. quintum villosum. Clus. Hist. v. 2. 112.
Pann. 644. Ger. em. 301. Bauh. Hist. v. 2.
1027. f. 2.

Pet. H. Brit. t. 13. f. 6, nomine erroneò.

Angl. Shaggy alpine Hawkweed.

In rupibus humidis alpinis.

Ben Nevis. Mr. Dickson. Near Meer Gill at the foot of Ingleborough, Yorkshire; Mr. Caley. With.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix sublignosa, fibrosa. Caulis crectus, foliosus, piloso-scaber, saepius spithameus, simplex, uniflorus; quandoque bipedalis, ramosus, multiflorus. Folia radicalia lanceolata; caulina alterna, amplexicaulia, cordato-ovata; omnia repanda sive dentata, subglaucescens, utrinque villossima, pilis rigidulis, flavescentibus, basi bulbosis. Flos terminalis, magnus, citrinus. Calyx nigricans, pilis albidis, corollâ duplo brevior. Pappus basi imprimis scaberrimus.

sabau- 10. *HIERACIUM* caule erecto multifloro, foliis
dum. ovato-lanceolatis dentato-serratis subamplexi-
caulibus subtus scabris.

Hieracium sabaudum. *Sp. Pl.* 1131. *Fl.*
Suec. 274. *Huds.* 345. *With.* 685. *Hull.* 176.
Relb. 298. *Sibth.* 241. *Abbot.* 171. *Engl.*
Bot. t. 349. *Fl. Dan.* t. 872. *Bauh. Hist.*
v. 2. 1030, *varietas secunda.*

H. n. 35. *Hall. Hist.* v. 1. 15.

H. fruticosum latifolium hirsutum. *Raii Syn.*
167.

Broad hairy Hawk-lung. *Pet. H. Brit.* t. 13.
f. 7.

β. *Hieracium fruticosum latifolium glabrum.* *Raii*
Syn. 168.

Broad smooth Hawk-lung. *Pet. H. Brit.* t. 13.
f. 9.

γ. *Hieracei seu Pilosellæ majoris species humilis,*
foliis longioribus rariis dentatis plurimis si-
mul, flore singulari nostras. *Raii Syn.* 170.
Pluk. Phyt. t. 37. f. 3.

Plukenet's Mouse-ear. *Pet. H. Brit.* t. 11.
f. 6.

Angl. Shrubby broad-leaved Hawkweed.

In dumetis et nemorosis.

β. Near Ullswater lake, Westmoreland. *Ray.*

Perennis. *Fl. Augusto, Septembri.*

Caulis erectus, strictus, tripedalis, foliosus, teres, fulca-
tus, scaber, intus spongiosus, vix fistulosus, apice pani-
culatus, multiflorus. Folia sparsa, numerosa, subse-
filia et ferè amplexicaulia, ovata, acuminata, dentata,
plerumque hirsuta, subtus præcipue scabra et pallidi-
ora; radicalia lanceolata, longiora. Panicula ramosa,
pilosa. Bracteæ integerrimæ. Calyx fusco-virens,
pilosus, squamis insimis laxis. Corolla aurea. Semen
angulatum,

angulatum, castaneum, seahirsatum. Pappus scaber.
Receptaculum favosum, subhirsipidum.

11. *HIERACIUM* caule erecto multifloro, foliis *prenanthoides*, elliptico-lanceolatis denticulatis laeviusculis *tboides*. ciliatis amplexicaulibus subtus glaucis.

Hieracium prenanthoides. *Villars. Dauph. v. 3.*

168. *With. 685. Sym. Syn. 173. Hull. 176.*

H. spicatum. *Allion. Ped. v. 1. 218. t. 27.*

f. 1 et 3. Dicks. Tr. of Linn. Soc. v. 2. 288.

H. Kalmii. Sym. Syn. 173. Hull. 176.

H. n. 43. Hall. Hist. v. 1. 18.

H. montanum Mali cottonæ folio. *Bocc. Mus.*

t. 53.

Angl. Glaucous-leaved Hawkweed.

In sylvis montosis Scotiæ.

In woods in the south of Scotland. *Mr. Dickson* and *Mr. Donn.* In Rannach, Perthshire. *Mr. John Mackay.*

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Caulis erectus, tripedalis, foliosus, teres, striatus, subpilosus, intus spongiosus, subsistulosus, apice paniculatus, multiflorus. Folia numerosa, alterna, plerumque amplexicaulia, latè elliptico-lanceolata, acuta, raro denticulata, tenuia, laeviuscula; subtus glauca et subpilosa; margine ciliata, pilis brevibus, æqualibus. Panicula ramosa, patens, pilosa, subviscida. Bractæ integerimæ, parvæ. Calyx fusco-virens, piloso-muricatus, tomentosus, subviscidus. Corolla aurea. Semen angulatum, fuscum, laevissimum. Pappus scaber.

12. *HIERACIUM* caule erecto subumbellato, foliis linearibus subdentatis sparsis. *umbellatum.*

Hieracium umbellatum. Sp. Pl. 1131. Huds.

346. *With. 683. Hull. 177. Relb. 299.*

Sibth. 242. Abbot. 171. Curt. Lond. fasc. 6.

t. 58. Fl. Dun. t. 680.

H. fruticosum angustifolium majus. *Raii Syn.*
168.

H. intybaceum. *Ger. em.* 298.

H. rectum rigidum, quibusdam *Sabaudum.*
Bauh. Hist. v. 2. 1030.

Long hairy Hawklung. *Pet. H. Brit.* t. 13.
f. 8. and Narrow hairy Hawklung. *Ibid.*
f. 10.

3. *Pulmonaria angustifolia glabra.* *Dill. in Raii*
Syn. 168.

Narrow smooth Hawklung. *Pet. H. Brit.* t. 13.
f. 11.

γ. *Pulmonaria graminea.* *Dill. in Raii Syn.* 168.
Grass Hawklung. *Pet. H. Brit.* t. 13. f. 12.
Angl. Narrow-leaved Hawkweed.

In nemorosis et dumetis petrofisis.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Caulis erectus, bi- vel tri-pedalis, foliosus, teres, obsoletè
striatus, apice paniculatus, subumbellatus. Folia nu-
merosa, sessilia, sparsa, linearia, seu linear-lanceolata,
obsoletè dentata, vel denticulata, utrinque viridia. Pe-
dunculi apice aliquantulùm incrassati, squamati, pu-
bescentes, erecti. Calyx atro-virens, saepius glaber.
Corolla aurea, majuscula. Semen angulatum, casta-
neum, oculo armato punctulatum. Pappus scaber.
Receptaculum subhispidum.

Variat foliis et caule scabris, vel omnino lèvibus. Folia
in γ angustissima, integerrima. Panicula vix, nisi præ
insectorum injuriâ, umbellata est.

347. CREPIS. G. Pl. 403. Juss. 169.
Gærtn. t. 158.

Recept. hispiduscum. *Cal.* calyculatus, squa-
mis deciduis, demùm torulosus. *Pappus* sim-
plex, subslipitatus.

1. CREPIS

1. CREPIS foliis runcinato-pinnatifidis hirtis, petiolis dentatis, caule piloso, calyce tomentoso.

Crepis foetida. Sp. Pl. 1133. Huds. 339. With. 689. Hull. 174. Relb. 296. Engl. Bot. t. 406.

Hieracium Castorei odore Monspeliensium. Raii Syn. 165.

H. flore externè croceo, amygdalas amaras olens. Moris. sect. 7. t. 4. f. 4.

Castor Hawkweed. Pet. H. Brit. t. 12. f. 8.

Angl. Stinking Hawk's-beard.

In pascuis siccis cretaceis, sed rariùs.

In Cambridgeshire. *Ray. Relb.* In Charlton chalk-pits, Kent. *Petiver.* At Barton, Norfolk. *Rev. Mr. Forby, and Mr. Pitchford.*

Biennis. Fl. Junio, Julio.

Radix parva. Caules diffusi, ramosi, foliosi, teretes, pilosi; centralis erectus. Folia runcinato-pinnatifida, dentata, pilosa, lobo terminali maximo, subdeltoideo. Pedunculi terminales, elongati, sursùm incrassati, subsquamosi, uniflori. Calyx pilosus vel tomentosus, foliolis subæqualibus, carinatis, semina marginalia demùm amplectentibus, squamis subulatis, Iaxis, brevibus, ad basin. Corolla citrina, dorso rubicunda. Receptaculum favosum, scrobiculis margine ciliatis. Semina gracilia, flavecentia, fulcata, scabriuscula. Pappus stipitatus, scaber nec plumosus, stipite aspero; in feminibus marginalibus subsefilis. Herba odore Opii.

2. CREPIS foliis radicalibus runcinatis; caulinis *tectorum*, amplexicaulibus lanceolatis dentatis, caule glabro.

Crepis tectorum. Sp. Pl. 1135. With. 689.

Hull. 174. Relb. 295. Sibth. 240. Abbot. 172.

Curt. Lond. fasc. 5. t. 55. Fl. Dan. t. 501.

Hedypnois tectorum. Huds. 341.

838 SYNGENESIA—POLYGAMIA AEQUALIS.

Hieracium luteum glabrum, sive minus hirsutum. *Raii Syn.* 165.
H. aphacoides. *Ger. em.* 297.
H. secundum. *Tabern. Kreuterb.* 491.
Hawkbeard. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 5, 6, 7.
Angl. Smooth Hawk's-beard. Smooth Succory-Hawkweed.

In pratis et pascuis siccioribus, muris, teclisive, vulgaris.

Annua. Fl. Junio—Septembri.

Planta polymorpha. Radix fusiformis. Caulis erectus, ramosus, sulcatus, glaber, purpurascens; rarius subpilosus. Folia glabriuscule, saepius glaberrima, late viridia; radicalia runcinata; caulinata lanceolata, dentata vel subpinnatifida, basi sagittata, amplexicaulia. Panícula terminalis, subcorymbosa, foliolosa, scabriuscule. Flores parvi, lutei. Calyx muricato-scaber. Receptaculum favosum. Semina sulcata, crenulata, fuscæ, Pappus omnino sessilis, scaber.

Biennis. 3. **CREPIS** foliis runcinato-pinnatifidis scabris: lobis antice dentatis, calyce muricato subtomentoso.

Crepis biennis. *Sp. Pl.* 1136. *Witb.* 690. *Hall.* 174. *Reh.* 296. *Engl. Bot.* t. 149.

C. n. 30. *Hall. Hist.* v. 1. 13. *Davall.*

Hedypnois biennis. *Huds.* 342.

Hieracium maximum, Chondrillæ folio, asperum. *Raii Syn.* 166.

H. crucifolium hirsutum. *Bauh. Hist.* v. 2. 1025.

Tall Succory Hawkweed. *Pet. H. Brit.* t. 12. f. 10.

β. *Hieracium Cichorei folio minus.* *Dill. in Raii Syn.* 165.

Small

Small Succory Hawkweed. *Pet. H. Brit.* t. 12.

f. 9.

Angl. Rough Hawk's-beard.

In pascuis cretaceis.

Plentiful in several parts of Kent. *Ray. Hudſ.* Near Bury. *Mr. Mathew.*

Biennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis. Caulis erectus, 3- vel 4-pedalis, foliosus, sulcatus, muricato-scaber, basi purpurascens. Folia radicalia et caulina inferiora pectiolata, runcinato-pinnatifida, lobis anticè dentatis; superiora lanceolata, basi pinnatisida, amplexicaulia; summa integra; omnia scabra, nervis sulcatis pilosis. Flores corymbosi, magni, lutei. Foliola calycina, ut et squamæ, dorso plus minus muricata, subtomentosa. Receptaculum favosum, scrobiculis ciliatis. Semina fusca, sulcata, crenulata, apice subulata. Pappus sessilis, scaber.

348. HYOSERIS. *G. Pl.* 405. *Juff.* 169.

Arnoſeris. *Gærtn.* t. 157.

Recept. nudum. *Cal.* subæqualis. *Pappus* simplex, vel obfoletus.

HYOSERIS caule diviso aphylo, pedunculis *minima*, incrassatis ventricosis.

Hyoseris minima. *Sp. Pl.* 1138. *Hudſ.* 346.

With. 690. *Hull.* 198. *Relb.* 300. *Abbot.* 172.

Engl. Bot. t. 95. *Fl. Dan.* t. 201.

H. mascula. *Ger. em.* 288.

Arnoſeris pusilla. *Gærtn.* v. 2. 355. t. 157. f. 3.

Hicracium minimum Clufii, *Hyoseris Tabernamontani* et *Gerardi.* *Raii Syn.* 173.

Small Swine's Succory. *Pet. H. Brit.* t. 15.

f. 9.

Angl. Swine's Succory.

In arvis glareofis sterilioribus.

About Hampton court. *Doody*. Walthamstow.

Sir W. Watson and *Mr. E. Forster jun.* In Dorsetshire. *Dr. Pulteney*. Near Arminghall wood, Norwich.

Annua. Fl. Junio.

Radix parva, fusiformis. Folia omnia radicalia, depresso-oblunga, dentata, subindè integerrima, margine præcipue scabra. Caules erexit, vix spithamæi, aphylli, simplices vel ramosi, teretes, glabri, basi rubicundi. Pedunculi adscendentes, basi attenuati, purpurascentes, atque bracteati, superne incrassati, cavi, uniflori. Calyx glabriusculus, vix calyculatus; foliola æqualia, acuta, acutè carinata. Corolla parva, citrina. Receptaculum punctatum, nudum. Semina costato-angulata, margine obsoleto coronata, pappo destituta.

349. HYPOCHÆRIS. G. Pl. 405. Juss. 170.

Gærtn. t. 160.

Recept. paleaceum. Cal. subimbricatus. Pappus plumosus.

maeula- 1. HYPOCHÆRIS caule solitario nudiusculo subsimplici, foliis ovato-oblongis integris dentatis.

Hypochæris maculata. Sp. Pl. 1140. Huds. 346. With. 691. Hull. 172. Relb. 300. Engl. Bot. t. 225. Fl. Dan. t. 149.

Hieracium primum latifolium. Raii Syn. 167. Ger. em. 301.

Angl. Spotted Cat's-ear.

In pascuis montosis calcareis.

On Newmarket heath and Gogmagog hills. Ray.

Relhan. On Bernuk heath, Northamptonshire.

Ray. On Ompherhead by Cartmel Wells, Lancashire, very plentifully; Mr. Hall; and near Settle, Yorkshire; Mr. Caley. With.

Perennis.

Perennis. Fl. Julio.

Radix teres, crassa. Folia omnia radicalia, patentia, sessilia, elliptico-oblonga, dentata, scabra, sæpiùs purpureo maculata. Caulis vel scapus solitarius, erectus, striatus, hirtus, plerumque uniflorus. Bracteæ 2 vel 3, sparsæ, parvæ, lanceolatæ, adpressæ. Flos terminalis, magnus, aureus. Calyx muricatus, pilosus. Pappus plumosus.

2. HYPOCHÆRIS glabriuscula, calycibus ob-*glabra*.
longis imbricatis, caulis ramosis subfoliosis,
foliis dentato sinuatis.

Hypochæris glabra. Sp. Pl. 1140. Huds. 347.
With. 692. Hull. 172. Abbot. 173. Curt.
Lond. fasc. 3. t. 53. Engl. Bot. t. 575. Fl.
Dan. t. 424.

Hieracium parvum in arcnosis nascens, seminum
pappis densius radiatis. Raii Syn. 166.

Angl. Smooth Cat's-ear.

In ericetis et campis glareofis; interdùm et in cul-
tis, solo arenoso.

On the gravelly grounds near Middleton, War-
wickshire. Ray. Bedfordshire. Abbot. Cawston
heath, Norfolk. Rev. Mr. Bryant. Turnep-fields
about Norwich. Mr. Crowe. Under Greenwich
Park wall on Blackheath. Curtis.

Annua. Fl. Junio—Augusto.

Herba undique ferè glabra, magnitudine varia. Radix fusiformis. Caules plurimi, erecto-patentes, ramosi,
teretes, parùm foliosi; primordialis simplicissimus,
strictus, uniflorus, nudus. Folia radicalia plurima,
sublingulata, dentato-sinuata, nitida, rariùs ciliata et
subpilosa; caulina alterna, sessilia. Flores terminales,
solitarii, erecti, parvi, citrini, matutini. Calyx graci-
lis, imbricatus, lœvis, glaucus, foliolis planis, apice
purpurascensibus. Receptaculum paleaceum, paleis
lanceolatis, acutis, deciduis, longitudine calycis. Se-

mina fulcata, scabra. Pappus stipitatus, scaber, plumosus; in seminibus marginalibus sessilis.

radicata, 3. HYPOCHÆRIS foliis runcinatis obtusis scabris, caulibus ramosis nudis lœvibus, pedunculis squamosis.

Hypochæris radicata, Sp. Pl. 1140. Huds. 347. Witb. 692. Hull 172. Relb. 301. Sibth. 242. Abbot. 172. Curt. Lond. fasc. 3. t. 52. Fl. Dan. t. 150.

Hieracium longius radicatum. Raii Syn. 165. Ger. em. 298.

Rough Branched Dandelion. Pet. H. Brit. t. 11. f. 11.

Angl. Long-rooted Cat's-car.

In pratis et pascuis ubique.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix fusiformis, longissimè descendens. Caules plurimi, divaricato-patentes, ramosi, teretes, glabri, glaucescentes, superne flores versùs squamati. Folia omnia radicalia, depressa, oblonga, obtusa, runcinata, dentata, piloso-hispida. Flores terminales, solitarii, magni, aurei. Calyx imbricatus, foliolis carinâ muricatis. Receptaculum paleaceum, paleis lanceolatis. Semina sulcata, granulata. Pappus stipitatus, scaber, plumosus,

350. LAPSANA. G. Pl. 405. Gærhi. t. 157.
Lampsana. Juss. 168.

Recept. nudum. Cal. calyculatus; foliolis interioribus æqualibus, canaliculatis. Semina multica.

communis. 1. LAPSANA calycibus fructu angulatis, caule paniculato, pedunculis filiformibus.

Lapsana communis. Sp. Pl. 1141. Huds. 347. Witb.

With. 693. *Hall.* 178. *Relb.* 301. *Sibth.* 242.
Abbot. 173. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 59. *Dicks.*
H. Sicc. fasc. 11. 12. *Fl. Dan.* t. 500.
Lampsana. *Raii Syn.* 173. *Ger. em.* 255.
Angl. Nipple-wort. *Pet. H. Brit.* t. 14. f. 12.

In ruderatis et cultis frequens.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix ramosa, fibrosa. Caulis erexitus, tripedalis, foliosus, paniculato-ramosus, teretiuseulus, sulcatus, glabriuseulus. Folia dentata, molliuseula, subpilosa; radicalia lyrata; caulina ovata, acuta, alterna. Pedunculi alterni, teretes, tenues, glabri, basi bracteati. Bracteæ linear-lanceolatæ, acutæ. Flores parvi, lutei. Calyx glaber. Semina rectiuseula, angulata, omnino muricia.

351. CICHORIUM. G. Pl. 406. Juss. 171.

Gærtn. t. 157.

Recept. subpaleaceum. Cal. calyculatus. Pappus paleaceus, semine brevior.

I. CICHORIUM floribus geminis sessilibus, foliis *Intybus.* runcinatis.

Cichorium Intybus. Sp. Pl. 1142. Huds. 348.
With. 693. *Hall.* 172. *Relb.* 302. *Sibth.* 243.
Abbot. 173. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 56. *Mart.*
Fl. Rust. t. 144. *Woodv. Suppl.* t. 248. *Engl.*
Bot. t. 539. *Fl. Dan.* t. 907.

C. sylvestre. *Raii Syn.* 172. *Ger. em.* 284.

Intubum sylvestre. *Fuchs. Hist.* 679.

Angl. Wild Succory.

Ad agrorum margines et vias, imprimis solo, gla-
reoso vel calcareo, frequens.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fusiformis, carnosa, alba. Caulis sedē tripedalis,
 erexitus, strietus, tenax, supernè angulatus, scaber, so-

liosus, ramosus, ramis divaricatis, multifloris. Folia scabriuscula; radicalia runcinata; caulina cordata, amplexicaulia, acuminata. Flores gemini, sessiles, axillares, per paria alterni, magni, speciosi, cyanei, quandoque albi. Foliola calycina dorso muricata, demum reflexa. Receptaculum punctatum, subpilosum. Semina angulata, pappo paleaceo, brevi, dupli serie coronata.

** *CAPITATI. Floculi tubulosi, apice divaricatopatuli.*

352. ARCTIUM. G. Pl. 407.

Lappa. Juss. 173. Gærtn. t. 162.

Cal. globosus; squamis apice hamatis inflexis.

- Lappa.* 1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. Arctium Lappa. Sp. Pl. 1143. Huds. 348. With. 694. Hull. 178. Relb. 302. Sibth. 243. Abbot. 174. Curt. Lond. fasc. 4. t. 55. Woodv. Med. Bot. t. 15. Fl. Dan. t. 642. Lappa n. 1—6. Raii Syn. 196, 197. Brunf. Herb. v. 2. 61. Burdock. Pet. H. Brit. t. 23. f. 1—6. Bardana major. Ger. em. 809. Personatia. Fuckf. Hist. 72. Ic. 41. Personata. Camer. Epit. 887. Matth. Valgr. 497 et 498. Bardana, radix. Pharmac. Lond. Angl. Burdock. Clot-bur.

In ruderatis et ad vias.

Biennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fusiformis. Caulis subquadripedalis, erectus, ramosus, ramis patentissimis, foliosus, teres, sulcatus, scabriusculus. Folia alterna, petiolata, cordata, ampla, margine undulata, subdenticulata, scabriuscula. Flores paniculati, terminales, globosi, demum decidui, vestibus,

bus, seu animalium velleri, squamis uncinatis calycum arctè adhærentes, vel sibi invieem conglomerati. Corolla purpurea, flosculis omnibus uniformibus, tubulofis, quinquefidis, regularibus, fertilibus. Receptaculum punctatum, multifetosum. Semina quadrangula-ria. Pappus fetosus, scaber.

Variat floribus (seu capitulis) majoribus vel minoribus, calyce glabro vel squamis lanâ bombycinâ intertextis. Hinc tot species et varietates apud auctores.

353. SERRATULA. *G. Pl.* 408. *Juss.* 174.
Gærtn. t. 162.

Cal. subcylindricus, imbricatus; squamis iner-
mibus. *Pappus* scaber vel plumosus, per-
sistens.

1. SERRATULA foliis ferratis subciliatis lyrato-*tinctoria*.
pinnatifidis: lobo terminali maximo, flosculis
uniformibus, pappo scabriuscule.

Serratula *tinctoria*. *Sp. Pl.* 1144. *Huds.* 349.
With. 695. *Hull.* 180. *Relb.* 303. *Sibth.* 243.
Abbot. 174. *Engl. Bot.* t. 38. *Fl. Dan.*
t. 281.

Serratula. *Raii Syn.* 196. *Baub. Hist.* v. 3. 23.
Ger. em. 713. *Matth. Valgr.* v. 2. 295. *Ca-
mer. Epit.* 682.

Angl. Common Saw-wort.

In nemorosis, dumctis et sepibus.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix sublignosa. Caulis erectus, strictus, bipedalis, fo-
liosus, angulatus, glaber. Folia alterna, lyrata, seu
variè pinnatifida, quandoque (monente amicissimo D.
Wood) indivisa; radicalia saepius integra; omnia
acutè ferrata, et minutè ciliata, rigida, utrinque gla-
bra. Flores corymbosi, purpureo-sanguinei, interdùm
albi. Calycis squamæ fusco-purpureæ, subinde villosæ,
exteriores sensim minores. Receptaculum fetosum.
Semina striata. Pappus inæqualis, flavus, hinc scaber,
apice recurvus.

2. SER-

alpina. 2. **SERRATULA** calycibus subpilosis ovatis, foliis indivisis subtus lanatis, pappo plumoso.

Serratula alpina. *Sp. Pl.* 1145. *Huds.* 349. *Wittb.* 696. *Hull.* 180. *Lightf.* 448. *t.* 19. *Engl. Bot.* *t.* 599.

Cirsium humile montanum, *Cynoglossi* folio, *polyanthemum*. *Raii Syn.* 193. *Dill. Elth.* 82. *t.* 70.

C. n. 179. *Hall. Hist.* v. 1. 77. *t.* 6.

Carduo-Cirsium minus Cambrobritannicum, *flo-*
ribus plurimis summo caule congestis. *Pluk.*
Phyt. *t.* 154. *f.* 3.

Carduus mollis, *foliis Lapathe*. *Ger. em.* 1184.

β . *Serratula alpina*. *Fl. Dan.* *t.* 37.

Cirsium montanum polyanthemum, *Salicis folio*
angusto denticulato. *Raii Syn.* 193.

Angl. Alpine Saw-wort.

In fissuris rupium alpinarum.

On Snowdon and other high mountains in North Wales. *Ray*. In several parts of the highlands of Scotland. *Lightfoot*.

Pereennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa, extus nigra. Caules simplices, erecti, foliosi, teretes, siriati, lanati, altitudine varii. Folia sparsa; radicalia et caulina inferiora petiolata, superiora sessilia; omnia lanceolata vel ovata, (in β linear-lanceolata, elongata.) denticulata, supra nudiuscula, subtus tomentolo-alba. Flores corymbosi, terminales, erecti, purpurei, antheris cæruleoscentibus, formosi. Calyx squamæ obtusæ, fusco-purpureæ, pilis albis ferriceæ. Pappus æqualis, eleganter plumosus.

Ab hâc *Cirsium alpinum Boni Henrici* folio *Tournefortii* malè distinxit *Dillenius*.

354. CARDUUS. *G. Pl.* 408. *Juss.* 173. *Gærtn. t.* 162.

Silybum. *Gærtn. t.* 163.

Cal. ventricosus, imbricatus; squamis spinosis.

Recept. pilosum. Pappus deciduus.

* *Foliis decurrentibus.*

1. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis : laciiniis divaricatis, calycibus ovatis villosis, caule piloso.

Carduus lanceolatus. Sp. Pl. 1149. *Huds.* 350.

Witb. 699. *Hull.* 179. *Relb.* 304. *Sibth.*

244. *Abbot.* 175. *Mart. Fl. Rust.* t. 131.

Engl. Bot. t. 107. *Fl. Dan.* t. 1173.

C. lanceatus. Raii Syn. 195. *Ger. em.* 1174.

C. lanceolatus sive sylvestris Dodonæi. Baub.

Hyst. v. 3. 58.

β. *C. lanceatus, flore et capite minoribus. Merr.*

Pin. 2. Dill. in Raii Syn. 195.

γ. *C. lanceatus major. Dill. in Raii Syn.* 195.

Angl. Spear Thistle.

In ruderatis, aggeribus, et ad vias, vulgaris.

Biennis. Fl. Junio—Septembri.

Radix ramosa. Caulis quadripedalis, erectus, validus, ramosus, foliosus, sulcatus, pilosus. foliis decurrentibus alatus, multiflorus. Folia alterna, pinnatifida, hispida, subtilis lanata, lobis pinnatifidis, vel basi palmatis, laciiniis alternatim divaricatis, mucronato-spinosis, spinis flavis, nitidis. Flores terminales, erecti, magni. Calyx ovatus, squamis acutè spinosis, adscendentibus, villo albo intertextis. Flosculi uniformes, purpurei, antheris flavis. Receptaculum pilosum. Semina obovata, nitida. Pappus plumosus, demum e semine deciduus.

Varietates, a Dillenio memoratae, nondum mihi obviæ fuere.

nutans. 2. **CARDUUS** foliis interruptè decurrentibus spinosis, floribus cernuis, squamis calycinis lanceolatis supernè patentibus.

Carduus nutans. *Sp. Pl.* 1150. *Huds.* 350.
With. 699. *Hull.* 179. *Relb.* 304. *Sibth.*
244. *Abbot.* 175. *Fl. Dan.* t. 675. *Raii*
Syn. 173. *Bauh. Hist.* v. 3. 56.

C. muscatus. *Ger. em.* 1174, descr. nec icon.
Angl. Musk Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 1.

In ruderatis et arvis requietis, præcipuè solo gla-
reoso vel calcareo.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fusiformis. *Caulis* bi- vel tri-pedalis, quandoque
pedalis tantùm, erectus, subramosus, striatus, glabrius-
culus, foliis decurrentibus interruptè alatus. *Folia*
sinuata, lobis spinosis, utrinque viridia, subpilosa, ne-
quaquam hispida. *Flores* terminales, solitarii, pedun-
culati, nutantes, purpurei, moschati, pedunculo la-
nato. *Calyx* ovatus, squamis lanceolatis, subfoliaceis,
patentibus, acutè spinosis, sublanatis. *Semina* nitida,
punctulato-striata, compressa. *Pappus* deciduus, pilo-
sus, scaber, nec plumosus.

acanthoi- 3. **CARDUUS** foliis decurrentibus sinuatis spinosis,
des. calycibus globosis subpedunculatis ; squamis
linearibus recurvatis.

Carduus acanthoides. *Sp. Pl.* 1150. *With.* 698.
Hull. 179. *Sym. Syn.* 176. *Kelb.* 304. *Jacq.*
Austr. t. 249.

C. crispus. *Huds.* 350. *Lightf.* 452.

C. polyacanthos. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 54.
Sibth. 245. *Abbot.* 175.

C. caule criso. *Raii Syn.* 194. *Bauh. Hist.*
v. 3. 59.

Polyacanthos. *Ger. em.* 1173. *Dalech. Hist.*
1473.

Gray Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 3.

Angl. Curled or Welted Thistle.

In ruderatis et ad sepes.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis, albida. Herba virens. Caulis tripedalis et ultra, erectus, ramosus, sulcatus, parum pilosus, foliis decurrentibus subinterrupte alatus; rami elongatis, patulis. Folia quam in praecedentibus minora, sinuata, spinosa, utrinque viridia et glabriuscula. Flores terminales, plerumque pedunculati, erectiusculi, saturatè purpurei. Calyx globosus, squamis linearibus, apice recurvatis, tenuè spinosis, parum lanatis. Semina ferè praecedentis. Pappus deciduus, pilosus, scaber.

4. **CARDUUS** foliis decurrentibus sinuatis spino-*tenuiflorus*.
tomentofisis, calycibus subcylindricis aggregatis sessilibus; squamis lanceolatis erectiusculis.

Carduus tenuiflorus. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 55.
With. 698. *Sym. Syn.* 176. *Hull.* 179. *Sibth.*
244. *Abbot.* 175. *Engl. Bot.* t. 412. *Pulten.* *Dorset.* 80.

C. acanthoides. *Huds.* 351. *Lightf.* 451. *With.*
ed. 2. 871. *Bauh. Hist.* v. 3. 56.

C. spinosissimus capitulis minoribus. *Raii Syn.*
194.

Welted Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 2.

Angl. Slender-flowered Thistle.

In aggeribus et ad vias, minus frequens.

Common about London. *Curtis.* Near the sea-side frequent. *Rev. Dr. Goodenough.* *Dr. Pulteney.* Between Edinburgh and Leith.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix fusiformis, parva. Herba tomentoso-albida. Caulis quadri-

850 SYNGENESIA—POLYGAMIA AEQUALIS.

quadripedalis, erectus, strictus, minus ramosus, sulcatus, foliis decurrentibus latè alatus. Folia sinuata, spinosa, subtus præcipue lanata. Flores terminales, congesti, sessiles, pallidè purpurei. Calyx ferè cylindricus, gracilis, pallidus, vix lanatus, squamis lanceolatis, planis, lœvibus, erectiusculis, subnervibus, acutè spinosis. Pappus deciduus, pilosus, seaber.

Distinctissimus a C. crispo Linnæi, cuius iconem apud Loeselium, t. 5, videoas.

palustris. 5. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis dentatis spinosis sebris, calycibus ovatis aggregatis spinulosis, pappo pluinoso.

Carduus palustris. Sp. Pl. 1151. Huds. 352.
Witb. 697. Hull. 179. Relb. 305. Sibth. 245.
Abbot. 176. Curt. Lond. fasc. 6. t. 56. Raii
Syn. 194.

β. C. palustris mitior, Bardanæ capitulo summo caule singulari. Phuk. Alm. 82. Dill. in Raii
Syn. 194. nondum vidi.

Angl. Marsh Thistle. Pet. H. Brit. t. 21. f. 4.

In pratis et pascuis humidis vulgaris.

Biennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix ramosa. Caulis erectus, strictus, tri- vel sex-pedalis, ramosus, angulatus, foliis interruptè decurrentibus unidique alatus; rami pateentes. Folia pinnatifida, saturatè viridia, scabra, lobis sinuatis, dentatis, spinosis. Flores terminales, aggregati, plerumque sessiles, saturatè purpurei, sœpè albi. Calyx ovatus, vel ferè globosus, squamis lanceolatis, adpreffis, brevissimè mucronato-spinosis, parè lanatis. Semina lœvissima, exstriata. Pappus deciduus, plumosus.

** *Foliis sessilibus*.

arvensis. 6. CARDUUS foliis sessilibus pinnatifidis spinosis, caule paniculato, calycitus ovatis spinulosis, pappo pluinoso.

- Carduus arvensis.* *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 57.
Sibth. 245.
- C. vulgatissimus viarum.* *Raii Syn.* 194. *Ger.*
em. 1173.
- Serratula arvensis.* *Sp. Pl.* 1149. *Huds.* 349.
With. 696. *Hull.* 180. *Relb.* 303. *Abbot.*
174. *Mart. Fl. Rust.* t. 132.
- Ceanothos Theophrasti.* *Column. Ecphr.* v. 1. 46.
- Common Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 5.
Angl. Creeping Thistle.

In arvis et ad vias vulgatissimus.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens, flagelliformis, ramosa, profundè descendens, vivacissima, et difficillimè extirpanda. Caules erecti, tripedales, foliosi, teretes, læves, supernè paniculati, multiflori. Folia sessilia, vix ac ne vix decurrentia, alterna, pinnatifida, glabriuscula, lobis inæqualibus, ciliatis et spinosis. Flores terminales, subpedunculati, purpurei, rariùs albi. Calyx ovatus, squamis latè lanceolatis, adpressis, margine lauatis, brevissimè mucronato-spinosis, spinis patentibus. Pappus plumosus, deciduus.

Hujus generis proculdubio est, et structurâ fructificationis
C. palustri proximus, optimè monente Curtisio.

7. *CARDUUS* foliis amplexicaulibus repandis spino-nosis; radicalibus pinnatifidis, squamis calycinosis foliaceis refractis margine aculeatis.

Carduus Marianus. *Sp. Pl.* 1153. *Huds.* 353.
With. 700. *Hull.* 179. *Relb.* 306. *Sibth.*
246. *Abbot.* 176. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 54.

C. Mariæ. *Raii Syn.* 195. *Ger.* *em.* 1150.
Trag. Hist. 850.

C. lacteus. *Matth. Valgr.* v. 2. 38. *Camer.*
Epit. 445.

Silybum Marianum. *Gærtn.* v. 2. 373.

S. n. 181. *Hall. Hist.* v. 1. 78.

Spina

852 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Spina alba hortensis. *Fuchf. Hist.* 56.
 β. *Carduus Mariæ hirsutus non maculatus.* *Raii Syn.* 195.
Angl. Milk Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 9.

In aggeribus fossarum et ruderatis.

β. About London, but not common.

Annuæ. Fl. Augusto.

Radix fusiformis. *Caulis erectus, ramosus, 4—6-pedalis, foliosus, teres, sulcatus, glaber.* Folia radicalia pinnatifida; caulina alterna, recurva, oblonga, acuta, repanda, basi cordato-amplexicaulia; omnia saturatè viridia, nitida, venis albis anastomosantibus pulcherrimè picta, plerumque glabra, margine spinis inæqualibus ciliata. Flores terminales, solitarii, magni, purpurei, pedunculo nudo. Calyx ovatus, glaber, squamis basi orbiculatis, ciliato-spinosis, arctè adpressis, apice appendiculatis, foliaceis, refractis, lanceolatis, canaliculatis, spinâ validâ flavescente pungentibus. Semina nigricantia, nitida. Pappus scaber, deciduus.

Folia in β unicolora, nec albo variegata.

eriophorus. 8. *CARDUUS* foliis sessilibus bisariam pinnatifidis spinosis scabris: laciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis.

Carduus eriophorus. *Sp. Pl.* 1153. *Huds.* 354. *With.* 700. *Hull.* 179. *Relb.* 307. *Sibth.* 246. *Abbot.* 176. *Engl. Bot.* t. 386. *Mill.* *Ic.* t. 293. *Jacq. Austr.* t. 171.

C. tomentosus, corona fratum dictus. *Raii Syn.* 195.

C. eriocephalus. *Ger. em.* 1152.

Fryar's Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 8.

Angl. Woolly-headed Thistle.

In ruderatis montosis, et ad vias, solo calcareo.

In Worcestershire, Huntingdonshire, Oxfordshire, Warwickshire, Berkshire, Somersetshire, and Cornwall.

Cornwall. *With.* In a gravel-pit at North Pickenham, Norfolk. *Rev. Mr. Watts.* Between Stamford and Grantham plentifully, also at Matlock-bath about the zigzag walk.

Biennis. Fl. Augusto.

Radix fusiformis. *Caulis erectus, tripedalis, ramosissimus, ramis patentibus, foliosus, teres, sulcatus, glabriusculus, multiflorus.* *Folia patentia, alterna, pinnatifida, seu bipinnatifida, laciniis bifariam divaricatis, apice marginatae spinosis, supra scabris, subtus lanatis.* *Flores terminales, solitarii, erecti, maximi, purpurei, pedunculo folioso.* *Calyx globosus, demum depresso, arachnoideo-lanatus, pulcherrimus, squamis linearibus, patentibus, apice foliaceis, coloratis, ciliatis, glabratis, mucronato-spinosis.* *Pappus plumosus, deciduus.*

9. *CARDUUS* foliis amplexicaulibus lanceolatis *heterociliatis integris laciniatisque subtus tomentosis, phyllus.* flore sub-solitario pedunculato.

Carduus heterophyllus. Sp. Pl. 1154. Fl. Dan. t. 109. Engl. Bot. t. 675.

C. helenioides. Huds. 352. Lightf. 457. *With.* 702. *Hull.* 179.

Cirsium n. 180. *Hall. Hist.* v. 1. 77. t. 7.

C. anglicum secundum. Clus. *Hist.* v. 2. 148. Ger. em. 1183, icon Pennei.

C. Britannicum Clusii repens. Raii Syn. 193. Bauh. *Hist.* v. 3. 46. Mill. Ic. t. 94.

Northern Thistle. Pet. H. Brit. t. 22. f. 2. Angl. Melancholy Thistle.

In pastuis alpinis humidioribus.

In the mountainous parts of Yorkshire and Westmoreland; also about Snowdon, Wales. Ray. In all parts of the inland highlands of Scotland not unfrequent. Lightf. A little way up Ben Lomond.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens, nodosa, nigra. Caulis tripedalis, erectus, subsimplex, uni- aut bi-florus, foliosus, teres, sulcatus, lanatus. Folia lanceolata, acuta, suprà lævia, glaberrima, subtùs tomentoso-nivea, margine spinulis duplicato-ciliata, interdùm pinnatisida; radicalia petiolata; caulina numerosa, alterna, basi cordato-amplexicaulia. Flos terminalis, nutans, demùm erectus, magnus, purpureus, pedunculo elongato, tomentoso, nudo, vel ad apicem tantùm, sub flore, foliolum gerente. Calyx ovatus, minutè pubescens, squamis lanceolatis, erectis, apiee denudatis, carinatis, fuscecentibus, spinulâ brevi aut obsoletâ terminatis. Antheræ albidæ. Stigma lineare, exsertum, purpureum, emarginatum. Pappus seminum marginalium scaber, interiorum plumosus. C. helenioides Linnæi abundè discrepat, caule duplò altiori, foliis numerosioribus, omnino indivisis, floribus in summo caule sessilibus, quatuor pluribusve, duplòque minoribus. Hanc speciem nondum in Britannia neque spontaneam neque cultam vidi.

pratensis. 10. **CARDUUS** soliis sessilibus lanceolatis subdennatis ciliatis subtùs lanatis, caule nudiusculo unifloro, calyce villoso.

Carduus pratensis. *Huds.* 353. *With.* 701. *Hull.* 179. *Sibb.* 246. *Engl. Bot.* t. 177, excluso synonymo Jacquinii. *Pulten. Dorset.* 80.

C. difficilis. *Huds. ed.* 1. 307. nec Linn.

C. heterophyllus. *Relb.* 306. *Lightf.* 456.

Cirsium Anglicum. *Raii Syn.* 193. *Lob. Ic.* 583. *Obs.* 314. f. 4. *Dalech. Hist.* 584.

C. montanum Anglicum. *Ger. em.* 1183.

C. pannonicum primum pratense. *Chrys. Hist.* v. 2. 148.

C. anglicum, radice Hellebore nigri modo fibrosâ, folio longo. *Baub. Hist.* v. 3. 45.

Peckham Thisle. *Pet. H. Brit.* t. 22 f. 1.

Angl. Meadow Thisle.

In pratis et pascuis humidioribus, imprimis nemorosis,

Perennis. Fl. Junio.

Radix fibrosa, fibris simplicibus, carnosis. Caulis erectus, pedalis aut sesquipedalis, simplex, uniflorus, rarius biflorus, teres, sulcatus, lanatus, paucifolius. Folia lanceolata, inæqualiter dentata, quandoque sinuata, ciliato-spinosa, scabriuscula, subtus arachnoideo-lanata, nec tomentoso-nivea; radicalia tria vel quatuor, petiolata; caulinis duo vel tria, minora, remota, cordato-amplexicaulia. Flos terminalis, solitarius, nutans, demum erectus, pallidè purpureus, præcedente parùm minor, pedunculo apice aliquantulum incrassato, niveo. Calyx ovatus, arachnoideo-lanatus, squamis lanceolatis, erectis, mucronulato-pungentibus. Pappus ut in præcedente. Distincta species Linnæo ignota.

II. CARDUUS acaulis, calyce glabro. *acaulis.*

Carduus acaulis. Sp. Pl. 1156. Huds. 354.

With. 703. Hull. 180. Relb. 307. Sibth. 247.

Abbot. 176. Engl. Bot. t. 161. Jacq. Ic. rar. v. 3. t. 579. Fl. Dan. t. 1114.

Carlina acaulis minore purpureo flore. Raii Syn.

195.

C. acaulos minor flore purpureo. Ger. em. 1158.

Chamæleon exiguum. Trag. Hist. 852. Baub. Hist. v. 3. p. 1. 62.

Angl. Dwarf Thistle. Pet. H. Brit. t. 21. f. 6.

In pratis et pascuis solo glareoso vel calcareo.

But too common in many fields and upland grounds in Dorsetshire. Dr. Pulteney. Very frequent on commons in Norfolk and other counties.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix lignosa, nigricans. Caulis nullus. Folia depressa, radiato-patentia, numerosa, petiolata, glabra, pinnatifida, laciniis subpalmatis, spinosis. Flos magnus, sa-

E e 2 plus

piùs solitarius, ferè sessilis, purpureus. Calyx ovatus, glaber, squamis lanceolatis, vix carinatis, apice subciliatis, mucronulato-pungentibus. Styli longius exserti. Pappus plumosus.

Planta in hortis culta formam demum alienam induit, floribus tribus vel quatuor in caule palmari; quod aliis syngenesiis acaulibus pariter accidit.

355. ONOPORDUM. *G. Pl.* 409. *Juss.* 173.
Gærtn. t. 161.

Cul. ventricosus; squamis patentibus, spinosis.
Recept. favosum, subpaleaceum.

Acanthi- 1. *ONOPORDUM* calycibus squarrosis: spinis
um. subulatis, foliis ovato-oblongis sinuatis utrinque lanatis.

Onopordum Acanthium. *Sp. Pl.* 1158. *Huds.*
354. *With.* 704. *Hult.* 180. *Relb.* 307.
Sibth. 247. *Abbot.* 177. *Curt. Lond. fasc.* 5.
1. 57. *Fl. Dan.* t. 909.

Carduus tomentosus, *Acanthium dictus*, *vulgaris*.
Raii Syn. 196.

C. muschatus. *Ger. em.* 1174, icon, nec descr.

Acanthium. *Matth. Fulgr.* v. 2. 34.

A. album. *Ger. em.* 1149.

Spina alba sylvestris. *Fuchs. Hist.* 57.

Angl. Cotton Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 10.

In ruderatis et ad vias, solo glareoso, frequens.

Biennis. Fl. Julio.

Radix fusiformis. Herba tomento niveo facile abradendo undique vestita. Caulis erectus, quinquepedalis, ramosus, foliis decurrentibus alatus. Folia ovato-oblonga, sinuata, spinosa. Flores terminales, solitarii, erecti, purpurei. Calyx globosus, demum depresso-squamis subulatis, undique divaricato-patentibus, tomento albo intertextis, apice denudatis, spinâ flavâ simplici terminatis. Receptaculum favosum, dissepimentis in paleas acutas

acutas elevatis. Semina obovata, nitida. Pappus in-
æqualis; scaber, deciduus, rubicundus.

356. CARLINA. G. Pl. 410. Juss. 172.
Gærtn. t. 163.

Cal. ventricosus; squamis exterioribus spinosis;
interioribus coloratis, scariosis, radiantibus.
Recept. paleaceum. *Pappus* plumosus.

1. CARLINA caule multifloro corymboso, flori- *vulgaris*.
bus terminalibus, squamis calycinis exteriori-
bus pinnatifidis; interioribus albidis.

Carlina vulgaris. Sp. Pl. 1161. Huds. 355.
With. 704. Hull. 178. Relb. 308. Sibth.
247. Abbot. 177.

C. sylvestris quibusdam, aliis *Atractylis*. Raii
Syn. 175. Baub. Hist. v. 3. 81.

C. sylvestris. Ger. em. 1159.

Carduus. Brunf. Herb. v. 2. 65.

C. vulgaris. Matth. Valgr. v. 2. 32.

Atractylis mitior. Fuchs. Hist. 121.

Angl. Common Carline. Pet. H. Brit. t. 15.
f. 10.

In pratis et pascuis aridis sabulosis.

Biennis. Fl. Junio.

Radix fusiformis. *Caulis* rigens, erectus, pedalis, foliosus,
fulcatus, lanatus, corymbosus. *Folia* alterna, oblonga,
sinuata, subtus præcipue lanata, subinde glaberrima,
marginé spinosa, spinis divaricatis, flavescens inibus. *Flo-*
res terminales, solitarii. *Calyx* extus spinosissimus, fus-
cus; squamis interioribus duplo longioribus, linear-
ibus, inermibus, patentibus, scariosis, luteo-albidis. *Co-*
rolla purpureo-albida. *Palcae* receptaculi canaliculatæ,
apice laciniatæ. *Semina* sericea. *Pappus* plumosus, de-
ciduus. *Herba* tota, perfectis seminibus, dealbata,
exsueca, per hyemem sœpè persistit.

§58 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

*** *DISCOIDEI*. *Flosculi tubulosi*, *erecto-paralleli*, *apice planisculi*.

357. BIDENS. *G. Pl. 412.* *Juss. 188.*
Gærtn. t. 167.

Recept. paleaceum. Pappus aristis retrorsum scabris. Cal. polyphyllus. Cor. subinde radiata.

tripartita. 1. BIDENS foliis trifidis, calyeibus basi foliosis, seminum aristis erectis subternis.

Bidens tripartita. *Sp. Pl. 1165.* *Huds. 355.*
With. 706. *Hull. 181.* *Relb. 308.* *Sibth. 248.* *Abbot. 177.* *Curt. Lond. fasc. 4. t. 57.*

Verbesina seu Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior et magis frequens. *Raii Syn. 187.*

Eupatorium Cannabis fœmina. *Ger. em. 711.*

Angl. Trifid Bur Marygold. *Pet. H. Brit. t. 20.*
f. 7.

In inundatis, et ad fossarum margines, frequens.

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Radix fusiformis. Caulis erectus, bi- vel tri-pedalis, ramosus, patens, foliosus, obtusè quadrangularis, fulcatus, glaber. Folia opposita, glabra, inciso-ferrata, trifida seu pinnatifida. Flores terminales, solitarii, erectiuseculi, foliis indivisis patentibus obvallati. Calycis foliola subæqualia, plana, lævia, fuscō striata. Flosculi uniformes, tubulosi, flavi. Semina compressa, bi- seu tri-angulata, angulis retrorsum scabris, aristis binis ternis, terminalibus, erectiuseculis, fulvis, triquetris, retrorsum aculeatis. Paleæ receptaculi foliolis calycinis conformes, sed angustiores.

cernua. 2. BIDENS foliis lanceolatis serratis, floribus cernuis basi foliosis, seminum aristis erectis subquaternis.

Bidens cernua. *Sp. Pl. 1165.* *Huds. 356.* *With. 705.*

705. *Hull.* 181. *Relb.* 309. *Sibth.* 248.
Abbot. 177. *Curt. Lond. fusc.* 3. t. 55. *Fl.*
Dan. t. 841.

Verbesina pulchriore flore luteo. *Raii Syn.* 187.
Baub. Hist. v. 2. 1074.

Bur Marygold. *Pet. H. Brit.* t. 20. f. 6.

β. *Coreopsis Bidens.* *Sp. Pl.* 1281.

Chrysanthemum cannabinum bidens, foliis inte-
gris. *Moris. sect.* 6. t. 5. f. 22.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Bar-*
rel. Ic. t. 1209.

Conyza palustris, foliis ferratis. *Loef. Pruss.* 54.
t. 11.

γ. *Bidens minima.* *Sp. Pl.* 1165. *Huds. ed.* 1.
310. *Fl. Dan.* t. 312. *Abbot.* 178.

β. *tripartita* β. *Huds.* 355.

Verbesina minima. *Dill. in Raii Syn.* 188. t. 7.
f. 2. *Giff.* 167. app. 66.

Angl. Nodding Bur Marygold.

In fossis et stagnis. γ in paludibus exsiccatis.

β frequent in Ireland. *Sherard.* Cheshire. *Huds.*
Norfolk, but not common. *Mr. Woodward.*
In Thorpe meadows, Norwich.

Annua. Fl. Septembri.

Radix ramosa. Caulis erectus, teretiusculus, scabrinse-
lus, foliosus, ramosus, bipedalis; in γ simplex, palma-
ris. Folia amplexicaulia, simplicia, lanceolata, acu-
minata, ferrata. Flores terminales, solitarii, foliolis
involucrati, cernui, aurei, interdùm radiati, unde Co-
reopsis evadit. Seminum anguli rare et inæqualiter spi-
nulosi; aristæ sæpius quaternæ.

358. EUPATORIUM. G. Pl. 413. *Juss.* 178.
Gærtn. t. 166.

Recept. nudum. *Pappus seaber.* *Cul.* imbrica-
tus, oblongus. *Stylus semibifidus,* exsertus.

cannabi- 1. EUPATORIUM foliis digitatis.

- num.* Eupatorium cannabinum. *Sp. Pl.* 1173. *Huds.* 356. *With.* 706. *Hull.* 181. *Reh.* 309. *Sibth.* 249. *Abbot.* 178. *Raii Syn.* 179. *Engl. Bot.* t. 428. *Fl. Dan.* t. 745.
E. cannabinum mas. *Ger. em.* 711.
E. adulterinum. *Fuchs. Hist.* 265.
β. *E.* cannabinum folio integro, seu non digitato.
Dill. in Raii Syn. 180.
Angl. Hemp-agrimony.

In aquofis spongiosis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Catiles tripedales, erecti, ramosi, foliosi, teretes, sulcati, scabri. Folia opposita, tri- vel quinque-partita, serrata, scabra, subtus pallidiora; superiora in β simplicia. Corymbus terminalis, multiflorus, pubescens, dilutè purpureus. Calycis foliola oblonga, obtusa; exteriore parva. Flosculi 5 vel 6, uniformes, regulares, tubulosi. Stigmata exserta, linearia, divaricata, pubescentia. Receptaculum convexum, nudum. Semina angulata, gracilia. Pappus scaber, haud plumosus.

359. SANTOLINA. *G. Pl.* 416. *Juss.* 185.

Gærtn. t. 165.

Gnaphalium. *Gærtn.* t. 165.

Recept. paleaceum. *Pappus nullus.* *Cal. imbricatus,* hemisphæricus.

marii- 1. SANTOLINA pedunculis corymbosis, foliis oblongis obtusis crenatis densè lanatis.

Santolina maritima. *Linn. Mss. in Sp. Pl.* 1182. *Huds.* 356. *With.* 707. *Hull.* 181. *Dicks.* *H. Sicc. fasc.* 6. 11. *Engl. Bot.* t. 141. *Pullen. Dorset.* 80.

Athanasia maritima. *Sp. Pl.* 1182. *Mant.* 2. 464; *Hull.* 181.

Filago

Filago maritima. *Sp. Pl. ed. 1. 927.* *Mill. Ic. t. 135.*

Gnaphalium. *Camer. Epit. 605.*

G. maritimum. *Raii Syn. 180.* *Baub. Hist. v. 3. p. 1. 157.*

G. legitimum. *Gærtn. v. 2. 391.*

G. marinum. *Ger. em. 640.* *Lob. Ic. 480.*

Angl. Sea Cotton-weed.

In arenosis maritimis rariūs.

In Anglesea and in Cornwall. *Ray.* In Dorsetshire and the isle of Shepey. *Huds.* *Pulteney.* On the beach just above high-water mark, one mile north of Landguard fort, Suffolk.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Radix longissimè descendens, ramosa. Herba tomento niveo, denso, undique vestita. Caules decumbentes, fragiles, teretes, ramosi, foliosi, ramis erectis. Folia numeroſa, alterna, patentia, oblonga, obtusa, plana, crenulata, enervia. Flores terminales, corymbosi, flocculosi, aurei. Calyx imbricatus, multiflorus, extus tomento obductus, foliolis intus concavis, nitidis. Collullæ regulares, basi utrinque productæ ad latus germinis, compressæ. Stigmata exserta, retusa. Receptaculi paleæ apice lanatæ. Semina mutica,

II. POLYGAMIA SUPERFLUA.*** *DISCOIDEI.***

360. **TANACETUM.** *G. Pl.* 417. *Juss.* 184.
Gærtn. t. 165.

Recept. nudum. *Sem.* coronata. *Cal.* imbricatus,
heimisphæricus. *Flosculi* radii trifidi, obsoleti,
interdùm nulli.

vulgare. I. **TANACETUM** foliis bipinnatidis inciso-serratis nudis.

Tanacetum vulgare. *Sp. Pl.* 1184. *Huds.* 357.
With. 708. *Hull.* 182. *Relb.* 310. *Sibth.*
249. *Abbot.* 179. *Woodv. Med. Bot.* t. 115.
Fl. Dan. t. 871.

Tanacetum. *Raii Syn.* 188. *Ger. em.* 650.
Matth. Valgr. v. 2. 259. *Camer. Epit.* 650.
Brunf. Herb. v. 1. 250. v. 2. 87.

Artemisia monoclono. *Fuchs. Hist.* 46.

β. **Tanacetum** foliis crispis. *Dill. in Raii Syn.* 188.
T. crispum anglicum. *Ger. em.* 650.
Angl. Common Tansy.

In montosis, ad vias, et agrorum margines.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Herba amara, odore gravi, aromatico.—
Caules erecti, bipedales, foliosi, teretes, striati, vix pilosi. Folia alterna, bipinnatifa, acutè incisa, glabra, vel subtilis subpilosa, basi auriculata, amplexicaulia. Flores corymbosi, terminales, aurei, planiusculi. Calyx foliola obtusa, margine scariosa. Flosculi numerosissimi, plerumque quinquefidi; marginales tantum fœminei, trifidi. Semina uniformia, coronâ membranacea, pentagonâ, æquali.

361. ARTEMISIA. *G. Pl.* 418. *Juss.* 184.*Gertn.* t. 164.*Absinthium.* *Gertn.* t. 164.

Recept. nudum, aut villosum. *Sem.* mutica. *Cal.* imbricatus, squamis rotundatis, conniventibus. *Flosc.* radii subulati, integerriuni.

1. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, cau- *campeſ-*
libus procumbentibus *virgatis.* *tris.*

Artemisia campestris. *Sp. Pl.* 1185. *Huds.* 357.

With. 709. *Hull.* 182. *Engl. Bot.* t. 338.

A. tenuifolia, sive leptophylios, aliis Abrotонum
sylvestre. *Baub.* *Hist.* v. 3. p. 1. 194.

Abrotanum campestre. *Raii Syn.* 190. *Ger. em.*
1106.

A. inodorum Lobelii. *Dalech. Hist.* 939.

Wild Southernwood. *Pet. H. Brit.* t. 20. f. 4.

Angl. Field Southernwood.

In ericetis aridis sabulosis, ad vias, rariūs.

About Barton Mills and Elden, Suffolk; T. Wil-
lis. *Ray.* About a mile north of Thetford,
Norfolk. *Mr. Crowe.* On Icklingham heath
near Bury, Suffolk. *Sir T. G. Cullum.*

Perennis. Fl. Augusto.

Radix fusiformis. Herba omnino ferè inodora. Caules prostrati, demum erecti, bipedales, virgati, paniculati, angulati, glabri, rubicundi, foliosi. Folia irregulariter bipinnatifida, subcarnosa, linearia, subtus subpi-
losa; radicalia depressa, longius petiolata; caulina al-
terna, minusque composta. Flores numerosi, race-
mosi, cernui, parvi, fusco-virides. Calycis foliola cari-
nata, margine scariosa. Flosculi discei circiter quinde-
cim, quinquefidi, flavi, apice purpurei; radii paucissi-
mi, (2 vel 3,) tenuissimi, subulati, clausi, integerrimi.
Receptaculum convexum, nudum, rugosum. Semina
parva, mutica.

2. ARTE-

- mariti-
ma.* 2. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis,
racemis cernuis, receptaculo nudo, flosculis
fœmineis ternis.
Artemisia maritima. *Sp. Pl.* 1186. *Huds.* 358.
With. 709. *Hull.* 182. *Rehb. Suppl.* 2. 14.
Woodv. Med. Bot. t. 122.
Absinthium marinum album. *Raii Syn. ed. 2.*
94. ed. 3. 188. *Ger. em.* 1099. *Camer. Epit.*
455.
A. maritimum nosiras. *Dill. in Raii Syn.* 189.
Raii Hist. v. 3. 231, ex descr.
B. A. maritimum, Seriphio belgico simile, latoire
folio, odoris grati. *Raii Syn. ed. 2.* 94. *ed. 3.*
188.
A. maritimi species latoire folio D. Dale. *Raii*
Syn. ed. 2. 94. *ed. 3.* 189.
γ. A. seriphium tenuifolium marinum Narbonense.
Dill. in Raii Syn. 189. *Baub. Hist. v. 3. p. 1.*
177.
Absinthium maritimum, cacumen. *Pharmac.*
Lond.
Angl. Sea Wormwood.

In maritimis.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix sublignosa. Herba tomentoso-alba, aromatica, ama-
ra. Caules paniculati, erecti vel decumbentes, foliosi,
fulcati. Folia inferiora pinnata, pinnis tripartitis; su-
periora variè divisa; summa simplicia; omnia marginè
integerim, utrinque nivea. Racemi plus minus nu-
tantes. Flores ovati, cernui. Calyx extus lanatus,
margine scariosus. Receptaculum nudum. Flosculi
radii paucissimi.

Foliola latitudine variant.

- Absin-*
thium. 3. ARTEMISIA foliis multipartitis sericeo-inca-

nis,

nis, floribus hemisphæricis pendulis, receptaculo piloso.

- Artemisia Absinthium.* *Sp. Pl.* 1188. *Huds.* 358.
With. 710. *Hull.* 182. *Relb.* 310. *Sibth.*
 250. *Abbot.* 179. *Woodv. Med. Bot. t.* 120.
Absinthium. *Camer. Epit.* 452. *Trag. Hist.*
 335. *Matth. Valgr. v. 2.* 47.
A. vulgare. *Raii Syn.* 188. *Dalech. Hist.* 943.
A. latifolium sive *Ponticum.* *Ger. em.* 1096.
Absinthium vulgare, herba. *Pharmac. Lond.*
Angl. Common Wormwood. *Pet. H. Brit. t.* 20.
f. 1.

In ruderatis et ad pagos frequens.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix sublignosa, ramosa. Herba sericeo-incana, intensè amara, aromatica. Caules erecti sculi, ramosi, angulati, sulcati, apice paniculati. Folia inferiora bipinnatifida; superiora pinnatifida, vel digitata; laciniis elliptico-oblongis, obtusis, integerrimis. Racemi erecti. Flores pedicellati, nutantes, flavescentes, hemisphærici. Flosculi disci numerosi; radii pauci. Receptaculum pilosissimum.

4. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisis: *vulgaris.*
 subtùs tomentofisis, racemis simplicibus, floribus ovatis, receptaculo nudo.

- Artemisia vulgaris.* *Sp. Pl.* 1188. *Huds.* 359.
With. 710. *Hull.* 182. *Relb.* 311. *Sibth.*
 250. *Abbot.* 179. *Woodv. Med. Bot. t.* 121.
Raii Syn. 190. *Baub. Hist. v. 3. p. 1.* 184.

Artemisia. *Matth. Valgr. v. 2.* 202. *Brunf.*
Herb. v. 2. 83 (41).

A. mater herbarum. *Ger. em.* 1103.

A. latifolia. *Fuchs. Hist.* 44.

Angl. Mugwort. *Pet. H. Brit. t. 20. f. 5.*

In ruderatis et ad sepes vulgaris.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix lignosa. Caules quadripedales, erecti, ramosi, paniculati, sulcati, glabri, foliosi, purpurascentes. Folia alterna, petiolata, pinnatifida, incisa; suprà glabra, atro-viridia; subtùs tomentosa, nivea. Racemi erecti, simplices, foliosi. Flores sessiles, erecti, ovati, lanati. Receptaculum nudum. Flosculi radii, rectè notante Linnæo, quini.

cæruleſ- †5. ARTEMISIA foliis incanis: caulinis lanceolatis integris; inferioribus multisidis, floribus cylindricis, receptaculo nudo.

Artemisia cærulescens. Sp. Pl. 1189. Hudſ. 359. With. 711. Hull. 182.

A. marina. Ger. em. 1104.

Absinthium marinum. Matth. Valgr. v. 2. 49.

A. maritimum Lavendulæ folio. Bauh. Pin. 139. Moris. ſect. 6. t. 1. f. 5. Dubam. Arb. v. 1. 24. t. 5.

Absinthium latifolium, Artemisiæ folio. Column. Ecphr. v. 2. 76.

Angl. Blueish Mugwort.

In maritimis. Hudſ. Civis dubia.

Near Boston in Lincolnshire; Mr. Tosfield. Hudſ.

Not found there by any one else.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix fibroſa. Caules erectiſculi, teretes, sulcati, pubefcentes, glaucescentes, foliosi, paniculati. Folia alterna, petiolata, utrinque incana; superiora lanceolata, integra; inferiora variè lobata, quandoque pinnatifida. Racemi erecti, simplices. Flores erecti, ovato-cylindracci, parvi, lanati. Receptaculum nudum, exiguum. Flosculi radii (ex Linnæo) terni. Descriptionem plantæ hortensis accipe.

362. GNAPHALIUM. *G. Pl.* 419. *Juss.* 179.

Elichrysum. *Gærtn.* t. 166.

Antennaria. *Gærtn.* t. 167.

Filago. *G. Pl.* 450. *Juss.* 179. *Gærtn.*
t. 166.

Recept. nudum. *Pappus* scaber, aut plumosus.

Cal. imbricatus, squamis scariosis coloratis.

Flosc. radii subulati. *Flosculi* aliquot disci sub-indè abortivi.

* *Chrysocoma.*

1. GNAPHALIUM herbaceum, foliis semiam- *luteo-album*, plexicaulibus ensiformibus repandis utrinque *bum*. tomentosis: inferioribus obtusis, floribus con-gloreratis.

Gnaphalium luteo-album. *Sp. Pl.* 1196. *Huds.* 359. *With.* 712. *Hull.* 183. *Dicks. H. Sicc. fasc.* 5. 13.

G. ad Stœchadem citrinam accedens. *Bauh.* *Hist.* v. 3. p. 1. 160.

G. Plateau secundum. *Clus. Hist.* v. 1. 329.

G. majus, lato oblongo folio. *Pluk. Phyt.* t. 31. f. 6.

G. oblongo folio. *Ger. em.* 643.

Elichrysum sylvestre latifolium capitulis conglobatis. *Raii Syn.* 182.

Jersey Live-long. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 5.

Angl. Jersey Cud-weed.

In muris et aridis arenosis sub cœlo mitiore.

On dry banks and walls in Jersey very common.

Sherard. *Mr. Gosseline.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva. Herba undique tomentosa-alba. Caules basi diffusi, dein erecti, simplices, foliosi, teretes, apice corymbosi, multiflori. Folia alterna, integerrima, erecto-

erecto-patentia; inferiora apice dilatata, obtusa. Flores terminalis, conglomerati, basi dense lanati. Calycis foliola acutiuscula, scariosa, glabra, nitida, pallidè citrina. Flosculi hermaphroditici pauci, centrales, infundibuliformes, quinquesidi, flavescentes; fœminei numerosissimi, gracillimi, subulati, stigmate exerto, bisido, sanguineo. Receptaculum papilloso-tuberculatum, glabrum. Semina omnia fertilia, parva. Pappus tenuissimus, scaber.

** *Argyrocoma.*

margari- 2. **GNAPHALIUM** herbaceum, foliis linear-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis.

Gnaphalium margaritaceum. *Sp. Pl.* 1198.
Huds. 360. *With.* 712. *Hull.* 183. *Dicks.*
H. Sicc. fasc. 8. 15.

G. americanum. *Raii Syn.* 182. *Ger. em.* 641.
Bauh. Hist. v. 3. p. 1. 162.
American Live-long. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 3.
Angl. American Cudweed. Pearly Everlasting.

In pratis humidis.

Near Bocking, Essex, but scarcely wild. *Ray.* On the banks of Rymny river (North Wales?) for at least twelve miles; Mr. Llwyd. *Dillenius.*

Perennis. Fl. Augusto.

Radix subrepens. **Caules** bipedales, erecti, foliosi, teretes, lanati, apice corybofo-ramosi, multiflori. **Folia** alterna, linear-lanceolata, acuminata, parùm revoluta; supra virientia, tomento deciduo; subtùs densissimè lanata, alba. **Flores** corynobosi, conglomerati, globosi. **Calycis** squamæ conniventes, concavæ, niveæ, opacæ nec nitidæ. **Flosculi** hermaphroditici numerosi, quinquefidi, lutescentes; fœminei paucissimi, marginales, subligulati. **Receptaculum** papillosum. **Semina** uniformia, sàpè abortiva. **Pappus** obtusus, scaber. Ex exemplario hortensi.

3. GNAPHALIUM sarmen^{tis} procumbentibus, *dioicum.*
caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis.

Gnaphalium dioicum. *Sp. Pl.* 1199. *Huds.* 360.
Wib. 712. *Hull.* 183. *Relb.* 311. *Sibib.*
250. *Engl. Bot.* t. 267. *Lightf.* 470. t. 20.
f. 1.

G. montanum album. *Raii Syn.* 181. et *G. longiore folio et flore.* *Dill. in Raii Syn.* 182.

G. montanum purpureum et album. *Ger. ent.*
640.

Antennaria dioica. *Gærtn. v.* 2. 410. t. 167.

Cat's-foot. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 4.

Angl. Mountain Cudweed.

In pascuis montosis aridis.

On Newmarket heath; and on Stratton Strawles heath near Norwich. Frequent in the mountainous counties.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix repens. Sarmenta procumbentia, foliosa, radicans, lanata. Caules solitarii, simplices, erecti, palmates, foliosi, lanati. Folia supra nudiuscula; subtus dense tomentosa; radicalia spatulata; caulina lanceolata; omnia vero formâ et latitudine varia. Corymbus simplex, terminalis. Flores dioici. Squamæ calycinæ nitidae, in masculinis plerumque albæ, in foemineis roseæ, magisque elongatae. Pappis in masculinis apice incrassatus, plumosus, niveus; in foemineis simplex, scaber. Receptaculum scrobiculatum.

Varietatem majorem ex insulâ Skye misit D. Johannes Mackay, foliis latioribus, utrinque lanatis; at in hâc lana paginam superiore tandem deficit. Hæc ad *G. plantaginifolium* Linnæi quodammodo accedit, sed distincta videtur.

*** *Filaginoidea.*

4. GNAPHALIUM caule simplici erecto, *f. ori-sylvaticus cum.*
VOL. II. F f

bus spicatis, foliis lanceolatis basi angustatis utrinque lanatis.

Gnaphalium sylvaticum. *Sp. Pl.* 1200. *Lights.* 472, varietas. *With.* 713. *Hull.* 183.

Gnaphalium. *Fl. Dan.* t. 254.

G. norvegicum. *Retz. Prod.* 193.

Angl. Highland Cudweed.

In pascuis vel dumetis alpinis.

On mountains to the north of Blair in Athol, above Loch Erruch, and Ben Wyvis in Ross-shire, but not in woods. *Mr. J. Mackay*.

Perennis. *Fl. Augusti*.

Radix e fibris simplicibus, nigris. Caulis solitarius, simplex, palmaris, vix spithameus, tomentosus, foliosus. Folia alterna, lanceolata, acuta, utrinque lanata, basi elongata et attenuata. Spica terminalis, parum ramosa, densa, foliolosa, multiflora. Flores cylindracci. Squamæ calycinæ nitidæ, coarctatæ, apice nigricantes, obtusiusculæ. Flosculi hermaphroditici pauci, quinquesidi; fœminci numerosi, subulati, gracillimi; omnes fertiles. Pappus scaber. Receptaculum subfavosum.

Caulis inter vespes altior evadit, et in hortis paniculato-ramulosus.

rectum. 5. **GNAPHALIUM** caule crebro paniculato multifloro, foliis linear-lanceolatis suprà denudatis.

Gnaphalium rectum. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 1. 160. *Engl. Bot.* t. 124. *With.* 713. *Hull.* 183. *Sibth.* 251. *Abbot.* 179.

G. sylvaticum. *Huds.* 360. *Lights.* 472. *Rell.* 312. *Retz. Prod.* 193.

G. anglicum. *Raii Syn.* 180. *Ger. em* 639. English Live-long. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 6.

Angl. Upright Wood Cudweed.

In nemorosis, dumetis et pascuis, solo arenoso, interdùm et inter segetes.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix sublignosa, fibris simplicibus, nigricantibus. Cau-
lis erectus, bipedalis, teres, tomentosus, foliosus, pani-
culato-multiflorus. Folia superiora linearia, angusta; [;]
inferiora linear-lanceolata, parùmque latiora; omnia
subtùs tomentoso-alba; suprà denudata, viridia. Pani-
cula stricta, foliosa, composita, plerumque pedalis.
Squamæ calycinæ incarnato-fuscæ, minùsque nigri-
cantes. Flosculi et pappus ut in præcedente, cui reverà
nimis affinis est.

6. GNAPHALIUM caule decumbente simplicis-*supinum*.
simo racemoso paucifloro, foliis linear-lanceo-
latis utrinque subtomentosis.

Gnaphalium supinum. *Syst. Nat. ed. 12. v. 3.*
234. Huds. 361. With. 714. Hull. 183.
Dicks. H. Sic. fasc. 2. 17.

G. alpinum. *Lightf. 470. t. 20. f. 2. Fl. Dan.*
t. 332.

G. fuscum. *Scop. Carn. v. 2. 152. t. 57.*

G. alpinum nanum, seu pumilum. *Bocc. Sic.*
40. t. 20. f. 1.

Elichrysum alpinum minimum, capillaceo folio.
Tournef. Inst. 454. Herb. Tourn.

Angl. Dwarf Cudweed.

In alpibus Scoticis, solo micaceo.

Near the top of Ben Lomond in abundance.

Perennis. Fl. Julio.

Radix repens, nigra. Caules palmates, decumbentes vel
erectiuseuli, simplicissimi, filiformes, lanati, foliosi,
racemosi, pauciflori; interdùm vix biunciales, uniflori.
Folia alterna, linear-lanceolata, angustissimæ, utrinque
magis vel minùs tomentosa. Flores erecti, alterni;
superiores sessiles; inferiores pedicellati. Squamæ ca-
lycinæ fuscæ, ferè unicolores, acutiusculæ, patentius-
culæ.

culæ. Flosculi hermaphroditici pauciores, infundibuliformes, quinquefidi; fœminei magis numerosi, etiam infundibuliformes, sed gracillimi, quinquedentati; omnes fertiles. Semina obovata, compressa, nitida. Pappus scabriuscus. Receptaculum parvum, scrobiculatum.

Distinctissima species a præcedentibus.

uliginosum. 7. **GNAPHALIUM** caule ramosissimo diffuso, floribus confertis terminalibus.

Gnaphalium uliginosum. *Sp. Pl.* 1200. *Huds.* 361. *With.* 715. *Hull.* 183. *Relb.* 312. *Sibth.* 251. *Abbot.* 180. *Dicks. H. Sicce. fasc.* 2. 18. *Fl. Dan.* t. 859.

G. longifolium humile ramosum. *Raii Syn.* 181.

G. vulgare. *Ger. em.* 639.

Long Cudweed. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 7.

Angl. Marsh Cudweed.

In arenosis uliginosis, ubi per hyemem aquæ stagnaverint.

Annuæ. Fl. Augusto.

Radix ramosa. Caulis spithameus, e basi ramosissimus, undique diffusus, tomentoso-niveus. Folia alterna, hæneari-lanceolata, basi attenuata, utrinque lanata. Corymbi terminales, densi. Squamæ calycinæ lanceolatæ, acutæ, fusco-citrinæ. Flosculi hermaphroditici pauci; fœniinei plurimi, filiformes; omnes fertiles. Pappus scaber. Receptaculum scrobiculatum.

gallicum. 8. **GNAPHALIUM** caule erecto ramoso, foliis linearibus revolutis acutis, floribus subulatis confertis axillaribus.

Gnaphalium gallicum. *Huds.* 361. *With.* 715. *Hull.* 183. *Dicks. H. Sicce. fasc.* 11. 10.

G. parvum ramosissimum, foliis angustissimis, polyspermon. *Raii Syn.* 181. *Pluk. Phyt.* t. 298. f. 2.

Filago gallica. *Sp. Pl.* 1312.

Graſſ Cudweed. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 12.

Angl. Narrow-leaved Cudweed.

In arvis glareofis, ſed rariūs.

Among corn in sandy grounds about Castle-Heveningham, Essex. *Dale.*

Annua. Fl. Julio, Augufto.

Radix attenuata, parva. Caulis erectus, spithamæus, teres, Janatus, foliosus; baſi strictus et simplex; ſuperne ramosiſſimus, patentiusculus. Folia ſparsa, linearifubulata, acuta, revoluta, utrinque pluſ minus lanata. Flores axillares, ſeſiles, plerumque aggregati, ſubulati, baſi gibbi, extuſ lanati. Squamæ calycinæ ſubulatæ, carinatae, dorſo virides, apice ſcariosæ. Fleſculi hermaphroditici circiter tres, tubulofi, apice fulvi; fœminei plures, ſubulati, tenuiſſimi. Germina omnia, ut mihi videtur, fertilia. Pappus oculo armato ſeabriuſculus. Receptaculum convexum, parvum, tuberculatum,

9. **GNAPHALIUM** caule erecto ramoso, foliis *minimum*.

lanceolatis acutis planis, floribus conicis ſubconfertis lateralibus terminalibusque.

Gnaphalium minimum. *Lob. Ic.* 481. *Baub.*

Hift. v. 3. p. 1. 159. *Raii Syn.* 181.

G. montanum. *Huds.* 362. *With.* 715. *Gull.*
183.

G. minimum erectum. *Morif. ſect.* 7. t. 11. f. 3.

Filago montana. *Relb.* 327. *Sibth.* 262. *Abbot.* 189. nec Linn.

F. minor. *Ger. em.* 641.

Angl. Leafy Cudweed. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 11.

In arenofis et glareofis frequens.

Annua. Fl. Julio.

Radix parva. Caulis erectus, palmaris vel spithamæus, variè ramosus, teres, ſublanatus, foliosus. Folia al-

terna, erecto-adpressa, lanceolata, vel ovato-lanceolata, acuta, brevia, plana, utrinque lanata. Flores conferti vel solitarii, sessiles, axillares et terminales, pyramidato-conici, minores quam in praeedente, extus lanati. Squamæ calycinæ subulatæ, carinatæ, intus fuscæ, extus lanatæ, apice seariosæ. Flosculi hermaphroditie circiter quatuor; fœminei plures, subulati, tenuissimi; omnes, ut optimè descripsit Stokesius, fertiles. Pappus scaber. Receptaculum tuberculosum.

Filago montana vera Linnæi discrepat magnitudine, imprimis foliorum et florum, duplò majori; totâque herbâ, at præcipue squamis calycinis, longè magis lanatâ; floribus omnibus confertis, nunquam solitariis.

F. arvensis Linnæi nobis extranea omnino est.

germani- 10. **GNAPHALIUM** caule erecto dichotomo,
cum. foliis lanceolatis, capitulis globoſis multifloris
lateralibus terminalibusque.

Gnaphalium germanicum. *Huds.* 362. *With.* 716. *Hull.* 184. *Baub. Hist.* v. 3 p. 1. 158.
G. minus, seu *Herba impia*. *Raii Syn.* 180.
G. vulgare. *Matth. Valgr.* v. 2. 214. *Camer.* *Epit.* 606.

Filago germanica. *Sp. Pl.* 1311. *Relb.* 327.
Sibth. 262. *Abbot.* 189. *Fl. Dan.* t. 997.
Leers. 186.

F. sive *herba impia*. *Ger. em.* 642.

Childing Cudweed. *Pet. H. Brit.* t. 18. f. 9, 10.
Angl. Common Cudweed.

In pascuis, arvis, et ad vias, solo glareoso sterili,
vulgaris.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix parva, ramosa. Caulis pedalis aut sesquipedalis,
erectus, demum patulus, dichotonius, seu prolifer, foliosus, teres, sublanatus. Folia alterna, semi-amplexicaulia, erecta, lanceolata, acuta, subrepanda, utrinque lanata. Capitula terminalia, solitaria, demum axillaria seu lateralia, globosa, multiflora. Flores undique patentes,

patentes, cylindrici, fusco-nitidi. Squamæ calycinæ lanceolatæ, acuminatae, planæ, scariosæ, carinâ medio viridi, glabræ. Flosculi hermaphroditici duo vel tres; fœminei plurimi, tenuissimi; omnes fertiles. Pappus scaber. Receptaculum parvum, tuberculatum.

Obs. In plurimis speciebus semina extima, inter squamas calycinas sita, pappo orbata sunt. In omnibus germina centralia quandoque, neque infrequenter, abortiunt, rariùs quæ disci marginem occupant.

363. CONYZA. *G. Pl.* 422. *Juss.* 180.
Gærtn. t. 166.

Recept. nudum. *Pappus* scaber. *Cal.* imbricatus, subrotundus. *Flosc.* radii trifidi.

1. CONYZA foliis ovato-lanceolatis pubescenti-*squarro-*
bus, caule herbaceo corymboso, squamis caly-*fa-*
cinis squarrofis foliaceis.

Conyza squarrosa. *Sp. Pl.* 1205. *Huds.* 363.
With. 717. *Hull.* 183. *Relb.* 312. *Sibth.*
251. *Abbot.* 180. *Fl. Dan.* t. 622.

C. major. *Mattb. Valgr.* v. 2. 222. *Camer.*
Epit. 612. *Baub. Hist.* v. 2. 1051.

Baccharis monspeliensium. *Raii Syn.* 179. *Ger.*
em. 792.

Angl. Plowman's Spikenard.

In pascuis montosis et ad vias, solo calcareo.

Common in chalky or limestone countries, and in
woods in Norfolk on a marly soil. Plentiful
about St. Vincent's rocks, Bristol.

Biennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix ramosa, magna. *Herba* undique molliter pu-
bescens, amara, subaromatica. *Caulis* bi- vel tri-peda-
lis, erectus, angulatus, foliosus, parùm ramosus, apice
corymbosus, multiflorus. *Folia* lanceolata, alterna, in-
tegerrima vel subcrenata; radicalia majora, ovata, pe-
tiolata, crenata. *Flores* congesti, ovati, flavescentes.

Squamæ calycinæ exteriores apice recurvato-patentes, foliacæ; interiores rectæ, ciliatae. Flosculi disci numerosi, quinquesidi; marginales trifidi, subligulati, fœminei. Semina angulata, sulcata. Pappus scaber. Receptaculum tuberculatum.

** RADIATI.

364. ERIGERON. G. Pl. 422. Juss. 180.
Gertn. t. 170.

Recept. nudum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii lineares, angustissimæ, numerosæ. *Cal.* imbri-catus.

*canadense.** 1. ERIGERON caule hirto floribusque paniculatis, foliis lanceolatis; inferioribus dentatis.

Erigeron canadense. Sp. Pl. 1210. Huds. 363. With. 718. Hull. 185. Dicks. H. Sicc. fasc. 10. 16.

Conyza canadensis annua, acris, alba, Linariæ foliis. Ruii Syn. 175. Bocc. Sic. 86. t. 46.

C. annua acris alba, Linariæ folio. Moris. sect. 7. t. 20. f. 29.

White Golden Rod. Pet. H. Brit. t. 16. f. 12. Angl. Canada Flea-bane.

In cultis et ruderatis, sed non indigena. Rarius.

About London frequent, Ray. Huds. On St. Vincent's rocks, Bristol. With.

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Caulis erectus, virgatus, paniculato-ramosus, foliosus, suffractus, pilosus, pedalis aut bipedalis, multiflorus. Folia sparsa, acuta, margine præcipue scabra; superiora linearis-lanceolata, integrerrima; inferiora lanceolata, apicem versus dentata. Flores paniculati, parvi, luteoli. Calycis squamæ linearis-lanceolatae, acutæ, glabriusculæ, demum patentes. Flosculi marginales erecti, vix calycis longiores, albidi, tenuissimi. Semina ob-ovata,

ovata, angulata, subsericea, albida. Pappus scaber. Receptaculum convexum, scrobiculatum, scabriuscum.

2. ERIGERON caule racemoso, pedunculis sab- *acre.*
unifloris, foliis lanceolato-linguatis sessilibus.

Erigeron acre. *Sp. Pl.* 1211. *Huds.* 363. *With.*
718. *Hull.* 185. *Rehb.* 313. *Sibth.* 252. *Ab-*
bot. 181. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 60. *Dreves.*
Bilderb. t. 27.

Aster arvensis cæruleus acris. *Raii Syn.* 175.

Conyza cærulea acris. *Ger. em.* 484.

Amellus montanus. *Column. Ecphr.* v. 2. 26.
f. 2.

Angl. Blue Flea-bane. *Pet. H. Brit.* t. 16.

f. 4.

In pascuis glareosis vel calcareis aridis.

Biennis. Fl. Julio, Augusto; quandoque primo vere.

Radix sublignosa, ramosa. Caulis erectus, strictus, peda-
lis vel bipedalis, foliosus, teres, striatus, scaber, rubi-
cundus, pilosus, racemosus, multiflorus. Folia sparsa,
sessilia, oblongo-lanceolata, scabriuscula, plerumque in-
tegerrima; radicalia petiolata, obovata, ferrata. Pe-
dunculi alterni, superius uniflori, erecti, foliolosi. Calyx
hirsutus. Flosculi radii cærulei, erecti, discum supe-
rantes. Semina fusca, pilosa. Pappus scaber, rufus.
Receptaculum scrobiculatum, et subfayosum,

3. ERIGERON caulibus subunifloris, calyce sub- *alpinum.*
hirsuto, radio patente.

Erigeron alpinum. *Sp. Pl.* 1211. *Dicks. in*
Tr. of Linn. Soc. v. 2. 288. *With.* 718. *Hull.*
185. *Engl. Bot.* t. 464. *Fl. Dan.* t. 292.

Asteri montano purpureo similis, vel Globu-
lariæ. *Bauh. Hist.* v. 2. 1047.

Angl. Alpine Flea-bane.

In rupibus irriguis alpinis Scotiæ.

On Ben Lawers. *Mr. Dickson* and *Mr. Mackay.*

Perennis. Fl. Julio.

Radix fibrosa. Caules plures, palmares, erexit, angulati, foliosi, plerumque simplices, uniflori, rarius tri- aut quadri-flori, supernè imprimis pilosi. Folia alterna, sessilia, lanceolata, obtusa, nervosa, ciliata; radicalia majora. Flores solitarii, terminales, erexit. Calyx subhirsutus, nec, ut in E. unifloro, lanatus. Flosculi radii numerosi, purpurei, patentes, disco duplò longiores. Semina setosa. Pappus rufus, scaber.

365. TUSSILAGO. *G. Pl.* 423. *Juss.* 181.

Gærtn. t. 170.

Petasites. *Gærtn.* t. 166.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis, submembranaceus, basi ventricosus.

Farfara. I. TUSSILAGO scapo unifloro squamoso, foliis cordatis angulatis denticulatis.

Tussilago Farfara. *Sp. Pl.* 1214. *Huds.* 364. *With.* 719. *Hull.* 187. *Relb.* 314. *Sibth.* 261. *Abbot.* 181. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 60. *Dreves.* *Bilderb.* t. 49. *Fl. Dan.* t. 595. *Woodv. Med. Bot.* t. 13. *Engl. Bot.* t. 429.

Tussilago, *Raii Syn.* 173. *Ger. em.* 811. *Matth.* *Valgr.* v. 2. 198. *Camer. Epit.* 590, 591. *Fuchs. Hist.* 140.

Ungula caballina. *Trag. Hist.* 418.

Tussilago, herba. *Pharmac. Lond.* *Angl.* Colt's-foot,

In umbrosis humidis calcareis.

Perennis. Fl. Martio, Aprili.

Radix longè latèque repens. Scapi aphylli, erexit, palmares, simplices, uniflori, tomentosi, bracteis sparsis, adpressis, glabris, squamati. Flos inapertus nutans, demum

demùm erectus, aureus. Squamæ calycinæ, lineares, crinerves; planæ, glabræ, purpurascentes, longitudine disci, æquales, uniformes, demùm reflexæ. Flosculi radii numerosi, patentes, lineares, disco duplò longiores, stigmate tenuiori. Semina glabra, sæpiùs abortiva, imprimis in disco. Pappus omnino sessilis, scaber, albus, nitens. Receptaculum scrobiculatum, demùm convexum. Folia post florem oriuntur, radicalia, petiolata, erecta, cordata, angulata, dentata; suprà lævia; subtùs lanato-alba, venosa.

2. TUSSILAGO thyrso oblongo, flosculis fœmi- *hybrida*.
neis plurimis; hermaphroditicis paucissimis,
antheris diseretis.

Tussilago hybrida, *Sp. Pl.* 1214. *Huds.* 364.

With. 721. *Hull.* 188. *Engl. Bot.* t. 430.

Petasites major, floribus pediculis longis infi-
dentibus. *Dill. in Raii Syn.* 179. *Hort.*
Elth. 309. t. 230.

P. major et *vulgaris prima*. *Rupp. Jen. ed.* 1.
180. *ed. Hall.* 190.

Angl. Longer-stalked Butter-bur.

In pratis humidis cum sequenti, sed longè minùs
frequentèr.

In several parts of Leicestershire; also about Man-
chester. *With.* and *Engl. Bot.* Oxfordshire. *Dill.*
and *Mr. Woodward*.

Perennis. Fl. Aprili.

Radix crassa, carnosa, repens, *Scapus* erectus, sesqui-
pedalis, multiflorus, teres, lanatus, bracteis sparsis,
lanceolatis, apice sæpè foliaceis. *Thrysus* terminalis,
erectus, ovatus, elongatus, demùm cylindricus, pedi-
cellis uni- aut bi-floris, subindè tri-floris, bracteolatis.
Flores carnei, radio orbati. *Calyx* glabriusculus, apice
purpurascens. *Flosculi* numerosissimi, omnes tubulosi;
centrales 2 vel 3 hermaphroditici, rubri, antheris vel
omnino

330 SYNGENESIA—POLYGAM. SUPERFLUA.

omnino distinctis, vel levissimè connexis, stigmate obtuso, clavato, emarginato, germine semper abortivo; cæteri fœminci, corollâ graciliore, albida, stigmate bipartito, acuto, germine naturaliter fertili, sæpè verò, ob radices præter modum propagatas, abortivo. Semen obovatum. Pappus scaber, argenteo-albus. Receptaculum serobiculatum. Folia radicalia, petiolata, cordata, acuta, inæqualiter dentata, venosa; iubitus lana-ta; basi ad venas excisa; deinum maxima. Petioli erexit, carnosí, teretes, suprà canaliculati.

An vera sequentis fœmina?

Petasites. 3. TUSSILAGO thyrso' ovato, flosculis omnibus ferè hermaphroditicis syngenesiis.

Tussilago Petasites. *Sp. Pl.* 1215. *Huds.* 364.

With. 720. *Hull.* 187. *Rehb.* 314. *Sibth.*

261. *Abbot.* 181. *Curt. Lond. Jasc.* 2. t. 59.

Engl. Bot. t. 431. *Fl. Dan.* t. 842.

Petasites. *Raii Syn.* 179. *Ger. em.* 814. *Fuchs.* *Hist.* 644.

Tussilago major. *Mattb. Valgr.* v. 2. 199. *Ca-mer.* *Epit.* 592.

Butter-bur. *Pet. II. Brit.* t. 15. f. 11, 12.

Angl. Common Butter-bur.

In pratis humidis spongiosis, et ad fluviorum mar-gines, vulgaris,

Perennis. Fl. Aprili.

Radix et folia præcedentis. Scapus vix pedalis, thyrso post florescentiam minùs elongato. Flores majores; calyce duplo longiori. Flosculi omnes plerumque her-maphroditici, uniformes, tubulosi, antheris coalitis, stigmate incrassato, emarginato, germine omnino abor-tivo. Hinc mas præcedentis mihi videtur. Flosculos fœmineos duos vel tres aliquando invenerunt Linnæus filius, atque Hallerus, sed vix alius.

366. SENEPIO. *G. Pl.* 424. *Juss.* 181.*Gærtn.* t. 166.*Jacobæa.* *Gærtn.* t. 170.

Recept. nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* cylindricus, polyphyllus, æqualis, calyculatus, squamis apice sphacelatis.

* *Floribus flosculosis.*

1. SENEPIO floribus radio destitutis sparsis, foliis *vulgaris*, pinnato-sinuatis amplexicaulibus dentatis.

Senecio vulgaris. *Sp. Pl.* 1216. *Huds.* 365.

With. 721. *Hull.* 186. *Rehb.* 315. *Sibth.*

252. *Abbot.* 182. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 61.

Fl. Dan. t. 513. *Dreves.* *Bilderb.* t. 26. *Raii*

Syn. 178.

Senecio. *Matth.* *Valgr.* v. 2. 476. *Fuchs. Hist.* 276.

Erigerum. *Ger. em.* 278.

Verbena fœmina. *Brunf. Herb.* v. 1. 120, opt.

Angl. Common Groundsel. Simson.

In cultis et ruderatis ubique.

Annua. Fl. toto ferè anno.

Radix fibrosa. *Caulis* erectus, ramosus, foliosus, subpanniculatus, angulato-teres, glabriuseulus. *Folia alterna*, pinnatifido-sinuata, obtusa, dentata, vel omnino glabra, vel subtus laxè lanata; radiealia petiolata; caulinæ alterna, sessilia, auriculato-amplexieaulia. *Flores terminales*, sparsi, vel subpaniculati, aurei, pedunculis striatis, parùm bracteolatis. *Calyx* conico-cylindraeus, glaber; squamis linearibus, acutis, æqualibus, conniventibus, apice sphacelato-nigris; basi calyeulatus squamulis plurimiis, brevibus, lanceolatis, adpressis, apice etiam nigris. *Floceuli* numerosi, omnes uniformes, hermaphroditici, atque fertiles, eorollulâ tubulosâ, quinquesfidâ, longitudine ealvcis. *Stigma* bipartitum, demum exsertum. *Semina* sulcata, pubescentia. *Pappus*

pus sessilis, scaber. Receptaculum torulosum, punctatum, glabrum.

** *Floribus radiatis, radio statim revoluto.*

viscosus. 2. SENEPIO radio revoluto, foliis pinnatifidis viscidis, calyculis laxis perianthio subæqualibus, caule ramosissimo patulo.

Senecio viscosus. Sp. Pl. 1217. Huds. 365, α .
With. 722. Hull. 186. Relb. 315. Sibth.
253. Lightf. 479. Engl. Bot. t. 32.

S. hirsutus viscidus major odoratus. Raii Syn.
178. Bauh. Hist. v. 2. 1042.

S. hirsutus viscidus graveolens. Dill. Hort. Elth.
347. t. 258. f. 336.

Angl. Stinking Groundsel.

In ruderatis solo calcareo vel arenoso.

On the fen banks in the Isle of Ely. Ray. At
Gamlingay, Mepole and Chatteris, Cambridgeshire. Relb. Near Baldon, Oxfordshire. Sibth.
By the sea side at New Haven, in the King's Park Edinburgh, and about the chalkpits at Dartford, Kent.

Annua. Fl. Julio—Octobri.

Herba pilo-viscida, fœtens. Caulis pedalis, ramosissimus, patulus, sulcatus, foliosus. Folia alterna, sessilia, vix amplexicaulia, pinnatifida, erosa, subdentata. Pedunculi uniflores, terminales, subsolitarii. Flores aurei, majores quam in præcedente, radiati. Calyx hirsutus, viscidus, squamis ad basin paucis, linearibus, laxis, hirsutis, longitudine ferè perianthii vel duplo brevioribus. Flocculi disci numerosi, tubulosi; radii pauciores, ligulati, lineares, quinquedentati, statim revoluti; omnes fertiles. Pappus oculo armato sebriuscus.

sylvaticus. 3. SENEPIO radio revoluto, foliis pinnatifidis lobatis

batis denticulatis, calyculo brevissimo, caule erecto stricto corymboso.

Senecio sylvaticus. *Sp. Pl.* 1217. *With.* 722.
Hull. 186. *Sibth.* 253. *Abbot.* 182. *Lightf.*
 480.

S. viscosus *B.* *Huds.* 365.

S. minor, latiore folio, five montanus. *Dill. in Raii Syn.* 178. *Hort. Eltb.* 347. *t. 258.*
f. 337.

Jacobæa Senencionis folio incano perennis. *Rupp.*
Jen. ed. Hall. 177. *t. 3.*

Angl. Mountain Groundsel.

In sylvis cæduis et ericetis, solo glareoso vel arenoso.

Annua. Fl. Julio.

Caulis tripedalis, erectus, strictus, foliosus, sulcatus, subpilosus, apice corymbosus, multiflorus. Folia numerosa, sparsa, lyrato-pinnatifida, lobata, denticulata, subpilosa, ingratè odorà, sed parùm viscida. Flores duplò minores quam in præcedente, flavescentes. Calyx gracilis, subpubescens, squamis ad basin parvis, brevibus, adpressis. Corollulæ radii parvi, revoluti; disci gracillimi, filiformes. Pappus oculo armato scaber. Receptaculum parvum.

Omninò a præcedente distincta.

*** *Floribus radiatis, radio patente; foliis pinnatifidis.*

4. SENEPIO radio patente: flosculis ellipticis in-squali-tegerrimis, foliis pinnatifidis: laciniis sublimis. nearibus distantibus.

Senecio squalidus. *Sp. Pl.* 1218. *Engl. Bot.*
t. 600.

S. n. 3. *Linn. Hort. Ups.* 265.
Angl. Inelegant Ragwort.

In muris Oxoniæ.

Very plentiful on almost every wall in and about Oxford.

Annua. Fl. Junio—Octobri.

Caulis erectus, ramosus, patentiusculus, glaber vel subindè pilosus. Folia sessilia vel auriculato-amplexicaulia, profundè pinnatisida, laciinis angustis, ferè linearibus, acutis, remotis, denticulatis, planis, glabriusculis, lævibus, subtùs sàpè violaceis. Corymbus terminalis, laxus, pauciflorus, bracteolatus. Flores aurei. Calyx ferè hemisphæricus, glaber, squamis ad basin paucis, laxis, parvis. Flosculi disci numerosissimi; radii plures, patentes, elliptici, lati, apice integerrimi, demùm subrevoluti. Semina tomentosa. Pappus scaber.

tenuifo- 5. *SENECIO* radio patente, foliis pinnatifidis sub-
lius. revolutis: subtùs pallidioribus pubescentibus,
caule erecto villoso.

Senecio tenuifolius. *Jacq. Austr.* t. 278. (*Herb.*
Jacq.) *With.* 723. *Syn. Syn.* 181. *Hull.* 187.
Sibth. 253. *Engl. Bot.* t. 574.

S. erucifolius. *Huds.* 366. *Rehb.* 316. *Abbot.* 182.
Curt. Lond. fasc. 5. t. 64.

Jacobaea Senecionis folio incano, perennis. *Raii*
Syn. 177.

Groundsel Ragwort. *Pet. H. Brit.* t. 17. f. 3.
Angl. Hoary Ragwort.

In sylvis, sepibus, et ad vias, imprimis solo calcaro.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix subrepens. Caulis erectus, strictus, sulcatus, foliosus, lanatus, apice corymbosus. Folia numerosa, alterna, amplexicaulia, pinnatisida, hinc indè dentata, subrevoluta, magis vel minus lanata, præcipue ad paginam inferiorem, quæ sàpè tomentoso-nivca est. Corymbus terminalis, bracteolatus. Flores aurei. Calycis squamae dilatatae, subpubescentes, marginé membranaceæ;
calyculo

calyculo exiguo, laxo. Flosculi radii patentes, lineariori-oblongi, obtusi, tridentati, demum revoluti. Semina pilosa. Pappus scaber.

6. SENEPIO radio patente, foliis lyrato-bipinnati-*Jacobaea*, fidis divaricatis dentatis glabris, caule erecto:

Senecio *Jacobaea*. *Sp. Pl.* 1219. *Huds.* 365: *With.* 724. *Hull.* 187. *Relb.* 316. *Sibth.* 254. *Abbot.* 182. *Mart. Fl. Rust.* t. 85.

S. major, sive *Flos Sancti Jacobi*. *Mattb.* *Valgr.* v. 2. 477.

Jacobaea. *Ger. em.* 280.

J. vulgaris: *Raii Syn.* 177. *Baub. Hist.* v. 2. 1057.

Sancti Jacobi herba. *Fuchsj. Hist.* 742. *Brünf.* *Herb.* v. 2. 56.

Angl. Common Ragwort.

In pascuis, ruderatis, et ad vias passim.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa. Caulis erectus, raniosus, striatus, glabriusculis, foliosus, corymbosus, multiflorus. Folia lyrato-bipinnatifida, plerumque glabra, atro-viridia, laciniis subcuneatis, divaricatis, dentatis, planis; basi amplexicaulia, multifida. Corymbi terminales, multiflori, bracteolati, glabri. Flores aurei. Calyx glaber, sulcatus, cylindricus, brevis; squamis ad basin paucis, laxis, subulatis. Flosculi radii patentes, lineariori-oblongi, tridentati, demum revoluti. Semina pilosa. Pappus scaber.

Variat floribus radio destitutis in arenosis. *Sherard.*

7. SENEPIO radio patente: flosculis ellipticis, *aquaticus*. foliis lyratis serratis; inferioribus obovatis integratis, seminibus glabris.

Senecio *aquaticus*. *Huds.* 366. *With.* 725.

Hull. 187. *Relb.* 316. *Sibth.* 254. *Abbot.*

182. *Fl. Dan.* t. 784.

Jacobæa latifolia. *Baub. Hist. v. 2. 1057.*

Angl. Marsh Ragwort. *Pet. H. Brit. t. 17. f. 2.*

In paludosis et aquosis ubique.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Herba plerumque glaberrima; in locis exsiccatis quandoque sublanata. Caulis erectus, ramosus, foliosus, basi sœpè purpurascens, ut in priori; etiam corymbosus, sed floribus majoribus et longè paucioribus. Folia latè, nec atro, virentia; inferiora petiolata, obovata seu elliptica, indivisa, et ferè integerrima; superiora sessilia, vel amplexicaulia, lyrato-pinnatifida, serrata, apice integerrima. Flores aurei, speciosi. Calyx brevis, et ferè hemisphæricus, glaber, vix calyculatus. Flosculi radii patentes, elliptici, tri- vel quadri-dentati, latitudine varii, demùm revoluti; disci plurimi. Semina glaberrima, quâ nötâ certò certius a S. Jacobæa discrepat. Pappus scaber.

Variat floribus radio orbatis. *D. Woodward.*

***** *Floribus radiatis; foliis indivisis.*

aludo. 8. **SENECIO** radio patente, floribus corymbosis, foliis ensiformibus acutè serratis subtus subvillosis, caule stricto.

Senecio paludosus. *Sp. Pl. 1220. Hud. 366.*

With. 725. Hull. 187. Relb. 317. Engl. Bot. t. 650. Fl. Dan. t. 385.

Virgæ aureæ, sive Solidagini angustifoliae, affinis, Lingua avis Dalechampii. *Raii Syn. 176.*
Baub. Hist. v. 2. 1063.

Lingua major. *Dalech. Hist. 1037.*

Conyza aquatica maxima serratifolia. *Camer. Flareyn. 21. t. 3.*

C. palustris serratifolia. *Ger. em. 483.*

Marsh Golden-rod. *Pet. H. Brit. t. 16. f. 8.*

Angl. Marsh Groundsel. Bird's tongue.

In fossis et paludosis rarissimè.

Near

Near Streatham ferry in the isle of Ely. *Ray.* In Lakenheath fcn near Wangford, Suffolk. *Rev. Mr. Hemsted.* On the banks of ditches near Bradford water, half a mile from Lincoln. *Rev. Mr. Woollaston.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa, subrepens. Caules erecti, stricti, tri—sex-pedales, simplices, foliosi, teretes, striati, fistulosi, tomento laxo, deciduo, vestiti. Folia numerosa, sparsa, sessilia, lanceolata, acuta, acutè ferrata, basi angustata et integerrima; suprà glabra; subtùs pallidiora, et plerumque pubescentia. Corymbus terminalis, pauciflorus, pedunculis inferioribus axillaribus. Bracteæ subulatæ. Flores aurei, magni. Calyx glabriusculus, squamis ad basin linearibus. Floreuli radii patentes, lineares, longi, apice quinquedentati. Semina pilosa. Pappus minutè scaber. Receptaculum pilosiusculum.

9. SENEPIO radio patente, floribus corymbosis, *saracenicus.*
foliis lanceolatis serratis glabriusculis.

Senecio saracenicus. Sp. Pl. 1221. Huds. 367.
Willb. 726. Hull. 187. Jacq. Austr. t. 186.

Virga aurea maxima, radice repente. Raii Syn.
177.

V. aurea angustifolia ferrata, sive Solidago saracenica. Baub. Hist. v. 2. 1063.

Solidago sarracenica. Fuchs. Hist. 728. Trag.
Hist. 487.

Angl. Broad-leaved Groundsel.

In pratis et pascuis subhumidis.

Plentifully by the side of a small river between Wells and Glastenbury. *Bobart.* Near Halifax; Mr. Newton. *Dill.* Very common at Salkeld, Cumberland; Mr. Nicholson. *Ray.* In a moist lane near Preston hall, between Kirkby Lonsdale and Kendal, Westmoreland, 1782; also in

the King's Park, Edinburgh, but probably planted in the place last mentioned.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix repens. Caules erexit, stricti, tripedales, subinde quinquepedales, angulati, foliosi, glabri, apice corymbosi. Folia alterna, sessilia, lanceolata, acuta, serrata vel denticulato-serrata, laeviuscula, vel minutè pubescentula, superiora sensim minora. Corymbus multiflorus. Bracteæ linear-lanceolatae, acuminatæ. Pedicelli angulati, pubescentes. Flores lutei. Calyx sublanatus, squamis ad basin lanceolatis. Flosculi radii patentes, elliptici, longinis unguiculati, apice vix dentati. Semina glabra. Pappus minutè scaber.

367. ASTER. G. Pl. 424. Juss. 181.
Gertn. t. 170.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus, squamis inferioribus patulis. Flosculi radii plures quam decein.

Tripolium. 1. ASTER herbaceus corymbosus, foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris subtrinervibus, squamis calycinis subincibrancis obtusis.

Aster Tripolium. Sp. Pl. 1226. Huds. 368. With. 726. Hull. 188. Relb. 318. Engl. Bot. t. 87. Fl. Dan. t. 615.

A. maritimus cæruleus, Tripolium dictus. Raii Syn. 175.

Tripolium vulgare majus et minus. Ger. em. 413. Baub. Hist. v. 2. 1064.

Great and small Sea Star-wort. Pet. H. Brit. t. 17. f. 10, 11.

Angl. Sea Star-wort.

In maritimis uliginosis, et paludibus salmis, copiosè.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Herba laevis, subglauca, magnitudine insigniter varians.
Radix

Radix fibrosa. Caulis teres, cavus, striatus, foliosus, corymbosus; plerumque erectus, multiflorus. Folia carnosa, lanceolata, integerrima, alterna; inferiora petiolata. Flores speciosi, disco luteo vel aurantiaco, radio cœruleo, interdùm albo. Squamæ calycinæ ovatæ, obtusæ, planæ, submembranaceæ, obsoletè ciliatæ. Flosculi radii numerosi, patentes, elliptico-lineares, nunquam revoluti, apice dentati. Semina compressa, margine setis erectis ciliata. Pappus scabrinuscus, rubicundus.

Variat floribus radio destitutis.

368. SOLIDAGO. *G. Pl.* 425. *Juss.* 181.

Gærtn. t. 170.

Recept. scrobiculatum, nudum. *Pappus simplex.*

Cal. imbricatus, squamis conniventibus. *Flo-*
culi radii circiter quinque.

1. SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, race- *Virga-*
mis paniculatis erectis confertis. *rea.*

Solidago Virgaurea. *Sp. Pl.* 1235. *Huds.* 367.

With. 727. *Hull.* 186. *Relb.* 317. *Sibth.*

254. *Abbot.* 183. *Engl. Bot. t.* 301. *Fl.*

Dan. t. 663.

Virga aurea. *Raii Syn.* 176. *Ger. em.* 430.

Matth. Valgr. v. 2. 354. *Camer. Epit.* 748
et 749.

V. aurea vulgaris latifolia. *Bauh. Hist. v. 2.*
1062.

Common Golden Rod. *Pet. H. Brit. t.* 16.
f. 10.

β. *Virga aurea, vulgari humilior.* *Raii Syn.* 176.

Dill. Hort. Elth. 414. Exemplar Sherar-
dianum nondum examinavi.

γ. *Solidago cambrica.* *Huds.* 367. *With.* 728.
Hull. 186.

Virga aurea montana, folio angusto subincano,
flosculis conglobatis. *Raii Syn.* 177.

- V. aurea cambrica, floribus congregatis. *Dill.*
Hort. Elth. 413. t. 306. f. 393.
δ. V. aurea montana biuncialis pumila, foliis acuminatis. *Pluk. Phyt.* t. 235. f. 7, et fol. obtusis. f. 8. *Conf. Dill. H. Elth.* 413,
Angl. Common Golden-rod.

In nemorosis, dunctis, cricetis, et montosis.

Perennis. Fl. Julio—Septembri.

Radix e fibris longis, simplicibus. Caulis altitudine valde varius, saepius ramoso-paniculatus, magis minusve flexuosus, nunquam omnino strictus, foliosus, angulatus, pubescens; basi teres ac saepè purpureus. Folia elliptico-lanceolata, scabriuscula, rigidula; radicalia latiora, longius petiolata, latiusque ferrata; caulinis plerumque obsoletè crenato-ferrata, subinde fere integerrima, magnitudine varia, saepe recurva; summa in bracteas sensim diminuta: omnia subhirsuta, imprimis in varietate. Panicula terminalis, multiflora, foliolosa, pubescens, ramulis racemosis, vel subcorymbosis; in solo sterili vel in montosis brevior, densior, minusque composita. Flores aurei. Foliola calycina demum patula, sed omnia recta, imbricata, lanceolata, ciliata, quandoque dorso scabra, margine membranacea. Flosculi radij 5 ad 9 vel 10, patentes, elliptico-oblongi, apice dentati. Semina pubescentia. Pappus scaber.

Petiveri icon t. 16. f. 11 e Camerario mutuata, nullius auctoritatis est ad Cambriæ stirpem designandam.

Collatis exemplaribus Cambro-britannicis et Eboracensisibus, in solo natali decerpitis, cum Solidagine vulgari, ne minimam differentiam specificam inveni. S. lapponica Witheringii ad eandem speciem pertinere mihi etiam videtur.

369. INULA. *G. Pl.* 426. *Juss.* 181.
Gærtn. t. 170.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus. Cor. radii numerosissimæ, lineares. Antheræ basi bisetæ.

i. INULA

1. INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugosis *Heleni-*
subtūs tomentosis, calycum squamis ovatis. *um.*

Inula Helenium. *Sp. Pl.* 1236. *Huds.* 368.
With. 730. *Hull.* 185. *Relb.* 318. *Sibth.*
255. *Abbot.* 183. *Woodv. Med. Bot.* t. 108.
Fl. Dan. t. 728.

Helenium. *Raii Syn.* 176. *Ger. em.* 793. *Mattk.*
Valgr. v. 1. 65. *Camer. Epit.* 35.

Enula campana, radix. *Pharmac. Lond.*

Angl. Elccampane. *Pet. H. Brit.* t. 16. f. 1.

In pratis et pascuis humidis, haud vulgaris.

Frequent in Essex; about St. Ives in Cornwall, and Bugden, Hertfordshire; also between Denbigh and St. Asaph. *Huds.* In several parts of Norfolk and Suffolk. *Mr. Woodward.* Near Dalton, Lancashire. *Mr. Atkinson.* Between Worcester and Ludlow, and between Bishop's Castle and New Town, 1795.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix crassa, ramosa, intūs mueilaginosa, aromatica et amara. Caulis erēctus, tripedalis, foliosus, teres, sulcatus; supernè ramosus et pubescens. Folia ovata, ferrata, venosa, subtūs tomentoso-alba; radicalia petiolata; caulina alterna, amplexicaulia. Flores terminales, solitarii, magni, aurei. Calycis squamæ interiores angustæ, lineares, æqualcs, seariosæ; exteriores imbricatæ, ovatæ, magnæ, extūs tomentosæ. Flosculi radii numerosi, patentes, calyce duplò longiores, lineares, apiee tridentati. Antheræ basi in fetas duas productæ. Semina quadrangularia, glabra. Pappus oculo armato scabriuscus. Receptaculum reticulatum, papillosum.

2. INULA foliis amplexicaulibus cordato-oblongis *dysente-*
tomentosis, caule villoso paniculato, squamis *rica.*
calycinis setaccis hirtis.

Inula dysenterica. *Sp. Pl.* 1237. *Huds.* 368.
Gg 4 *With.*

With. 731. *Hull.* 185. *Relb.* 319. *Sibth.* 256. *Abbot.* 184. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 56. *Fl. Dan.* t. 410.

Conyza media. *Raii Syn.* 174. *Ger. em.* 482. *Matth. Valgr.* v. 2. 224.

C. tertia. *Camer. Epit.* 614.

Calaminthæ tertium genus. *Fuchſ. Hist.* 436.

Angl. Common Fleabane. *Pet. H. Brit.* t. 16. f. 2.

In aquosis et ad rivos vulgaris.

Perennis. Fl. Augusto.

Radix repens. Caulis erectus, pedalis aut sesquipedalis, ramosus, corymbosus, foliosus, angulatus, sulcatus, lanatus. Folia alterna, amplexicaulia, patentia, oblonga, repanda, denticulata, subtus præcipue tomentoso-albida. Flores numerosi, terminales, solitarii, aurei. Calycis squamæ omnes subæquales, numerosæ, linearisetaeæ, pilis longis albidis hispitateæ. Flosculi radii numerosissimi, patentes, calyce duplo longiores, lineares, apice tridentati, demum revoluti. Antheræ basi longius bisetæ. Semina hispida. Pappus scaber. Receptaculum subfavosum.

Herba subviscida, odore acidulo, aromatico, forti, malo persico haud absimili, sed ingratiore.

pulicaria. 3. INULA foliis amplexicaulibus undulatis, caule ramosissimo piloso, floribus hemisphæricis : radio brevissimo.

Inula pulicaria. *Sp. Pl.* 1238. *Huds.* 369. *Relb.* 319. *Abbot.* 184. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 57. *Dickf. H. Sicc. fasc.* 7. 13. *Leers.* 180. *Fl. Dan.* t. 613.

I. uliginosa. *Sibth.* 256.

I. cylindrica. *With.* 731. *Hull.* 185. *Sym. Syn.* 183.

Aster n. 80. *Hall. Hist.* v. 1. 33.

Conyza minor. *Raii Syn.* 174. *Matth. Valgr.* v. 2.

v. 2. 223. Camer. Epit. 613. Trag. Hif. 166, *cum icon.*

C. minima. Dod. Pempt. 52. Ger. em. 482.

C. mediae minor species, florc vix radiato. Bauh. Hif. v. 2. 1050, descr. nec icon.

Angl. Small Fleabane. Pet. H. Brit. t. 16. f. 3.

In pratis vel ericetis arenosis, hyeme inundatis.

Annua, Fl. Septembri.

Radix fusiformis, tortuosa, ramosa. Caulis ramosissimus, subflexuosus, foliosus, multiflorus, angulatus, pilosus, saepius erectus, quandoque diffusus. Folia sparfa, subamplexicaulia, lanceolato-oblonga, undulata, recurva, utrinque pilosa, margine rarius denticulata. Flores solitarii, terminales, demum laterales, hemisphaerici, tristè luteoli. Calycis squamæ omnes ferè æquales, numerosæ, linearis-setaceæ, hirsutæ. Flosculi radii saepius numerosi, patentes, recurvi, brevissimi, tridentati. Antheræ basi bifidæ. Semina hispidula. Pappus e radiis sex vel septem, acutis, scabriusculis, semine haud longioribus. Receptaculum papillosum.

Variat radio paucifloro, vel omnino nullo.

Specimen Linnæanum cum pluribus in Angliâ lectis sedulò contuli, nec ullam differentiam inveni. Florum forma in omnibus eadem est, ac tota facies. Caulis apud nos quandoque etiam decumbit.

4. INULA foliis linearibus carnosis subtricuspidata—*crithmoides*, calyce glabro.

Inula crithmoides. Sp. Pl. 1240. Hudf. 369.

With. 732. Engl. Bot. t. 68. Pulten. Dorset. 81.

I. crithmifolia. Hull. 185.

Aster maritimus flavus, Crithmum chrysanthemum dictus. Raii Syn. 174.

Crithmum chrysanthemum. Ger. em. 533.

C. tertium. Matth. Valgr. v. 1. 446.

Golden Sampire. Pet. H. Brit. t. 17. f. 9.

Angl. Samphire-leaved Fleabane.

In maritimis cœniosis.

In a marsh near Hurst castle over against the isle of Wight plentifully; at Llandwyn in Anglesea; and on the bank of the river just above Fullbridge at Maldon, Essex. *Ray.* In Shepey island; J. Sherard. *Dill.* Portland island. *Rev. Mr. Baker.*

Perennis. Fl. Augusto.

Radix repens. Caules erexit vel decumbentes, subsimplices, dense foliosi, glabri, apice corymbosi. Folia conferta, carnosa, glabra, linearia, apice vel integra, vel trifida. Pedunculi corymbosi, terminales, squamati, uniflori. Flores magni, speciosi, disco fulvo, radio patent, aureo, calyce longiori. Calyx imbricatus, squamis exterioribus laxis, ut in *Astere*. Antheræ vix bisetæ. Semina pilosa. Pappus scaber, rubicundus. Receptaculum serobiculatum.

Taleis facilè propagatur. *D. Goodenough.*

370. CINERARIA. G. Pl. 426. Juss. 181.
Gærtn. t. 179.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis, cylindraceus.

palustris. 1. CINERARIA floribus corymbosis, foliis latolanceolatis dentatis sinuatissimè, caule villoso folioso.

Cineraria palustris. Sp. Pl. 1243. Huds. 369.
With. 729. Hull. 186. Relb. 320. Engl.
Bot. t. 151. Fl. Dan. t. 573.

Solidago n. 131. Gmel. Sib. v. 2. 158. t. 72.
Conyza foliis laciniatis. Ruii Syn. 174. Ger. em.
483.

Marsh Fleabane. Pet. H. Brit. t. 16. f. 5; and
Jagged Fleabane. *Ibid.* f. 6.

Angl. Marsh Flea-wort.

In fossis et paludosis.

In the Isle of Ely, Lancashire and Wales. *Ray.*

Near Acle, Norfolk. *Sherard.* Near Haddiscoe, and on St. Faith's Newton bogs. *E. Bot.*

In Skoulton meer near Hingham, Norfolk. *Mr. Crowe.*

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa. Caules tripedales, erecti, simplices, foliosi, crassi, fistulosi, angulati, villosi. Folia alterna, lanceolata, nervosa, pallida, pilosa, dentata, sæpè pinnatifidolaciniata et undulata. Flores corymbosi, terminales, aurei, numerosi. Pedunculi villosi. Calyx cylindraceus, villosus, lutescens, nunquam basi ventricosus; squamis marginè membranaceis. Flosculi radii squamis calycinis numero circiter æquales, parùmque longiores, subelliptici, apice dentati, patentes; disci numerosi, fulvi; omnes fertiles. Semina sulcata, glabra. Pappus scaber. Receptaculum serobiculatum, nudum. Pubescentia omnis pellucida et articulata.

2. CINERARIA foliis oblongis obsoletè denticulatis villosis, umbellâ simplici involucratâ. *folia.*

Cineraria integrifolia. *With.* 729. *Hull.* 186.

Sibth. 255. *Engl. Bot.* t. 152.

C. integrifolia β , pratensis. *Syst. Veg.* ed. 14. 764. *Jacq. Austr.* t. 180. *Herb. Linn.*

C. alpina. *Sp. Pl.* 1243, γ . *Huds.* 370. *Relb.* 320. t. 4.

Jacobaea Pannonica, folio non laciniato. *Raii* *Syn.* 178. *Baub. Hist.* v. 2. 1056.

J. angustifolia. *Ger. em.* 280.

Cambridge Ragwort. *Pet. H. Brit.* t. 17. f. 4.

β . *Cineraria alpina.* *Allion. Ped.* v. 1. 203. t. 38. f. 2.

Angl. Mountain Flea-wort.

In pascuis cretaceis editioribus, vel clivis calcareis.
On Gogmagog hills, Newmarket heath, and other
like places. *Ray. Relb.* Near Basingstoke and
Andover. *Huds.*

On cliffs near Holy-head, Anglesea. *Rev. H. Davies.*

Perennis. Fl. Maio, Julio.

Radix fibrosa. Herba tomento albo, deciduo, vestita.
Caulis simplicissimus, spithameus, sulcatus. Folia ellip-
tico-oblonga, subrevoluta, rariūs et obsoletè denticula-
ta; radicalia depressa, majora, et saepius obtusiora;
caulina alterna, erecta, angustiora. Umbella terminalis,
pauciflora, pedunculis singulis bracteâ lanceolatâ, brevi,
ad basim. Flores aurei. Calyx cylindraceo-hemisphæri-
cus, glabratus, basi lanatus, squamis margine membra-
naceis. Flosculi radii plures, calyce duplo longiores,
elliptico-oblongi, apice tridentati, patentes. Semina
sericeo-villosa. Pappus scaber.

Caulis in β pedalis, foliis omnibus (at præcipue caulinis)
majoribus, suprà magis denudatis, radicalibus quando-
que latè dentatis,

371. DORONICUM. G. Pl. 427. Juss. 182. Gærtn. t. 173.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Calycis squamæ*
duplici ordine, æquales, disco longiores. *Sem.*
radii mutica.

Pardali- 1. *DORONICUM* foliis cordatis denticulatis:
anches. radicalibus petiolatis; caulinis amplexicau-
libus.

Doronicum Pardalianches. Sp. Pl. 1247. Lighf.
485. Huds. 650. With. 732. Hull. 185. Engl.
Bot. t. 630. Scop. Carn. v. 2. 174. Jacq.
Austr. t. 350. Mill. Ic. t. 128.

D. majus officinarum. Ger. em. 759.

D. latifolium. Clus. Hist. v. 2. 16.

D. tertii

D. tertii varietas. *Lob. Ic.* 649.

Angl. Great Leopard's-bane.

In pratis et pascuis montosis.

Gathered in the cold mountains of Northumberland, by Dr. Penny. *Gerarde.* In several places in the lowlands of Scotland, but always near houses. *Lightf.* On the banks of the Severn below Bridgnorth. *With.* By the road side near Saling hall, Essex. *T. Walford, Esq.*

Perennis. Fl. Maio.

Radix tuberosa, repens, apice lanata. Caulis erectus, bival tri-pedalis, ramosus, foliosus, teres, sulcatus, pilosofaber, supernè subviscidus. Folia cordata, dentato-repanda, pilosa, molliuscula; radicalia magna, petiolata; caulinæ alterna, amplexicaulia, minora; summa lanceolata. Flores terminales, solitarii, magni, aurei. Calycis squamæ lineares, acutæ, pilosæ, disco duplo longiores. Flosculi radii numerosissimi, lineares, patentes, calyce longiores, apice quinquedentati. Semina fulcata; radii glabra, pappo destituta; disci pilosa, pappo scabro coronata. Receptaculum convexum, scrobiculatum.

372. BELLIS. G. Pl. 429. Juss. 183.
Gærtn. t. 168.

Recept. nudum, conicum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus, squamis æqualibus. Sem. obovata.

1. BELLIS scapo nudo, radice repente. *perennis.*

Bellis perennis. Sp. Pl. 1248. Hudf. 370. With.

733. Hull. 184. Relb. 320. Sibth. 256. Abbot. 184. Curt. Lond. fasc. 1. t. 62. Engl. Bot. t. 424. Fl. Dan. t. 503.

B. sylvestris minor. Raii Syn. 184. Ger. em. 636. Fuchf. Hist. 147.

B. minor. Matth. Valgr. v. 2. 263.

Primula

*Primula veris. Trag. Hist. 161.
Angl. Common Daisy.*

In pratis et pascuis ubique.

Perennis. Fl. toto ferè anno.

Radix repens, ramosa, fibris longis. Folia radicalia, depresso-ovalia, obovata, crenata, pilosa. Scapi erexit, simplices, uniflori, teretes, nudi. Flos pulchellus, disco conico, aureo, radio albo vel saepius rubicundo. Floreuli radii linearior-ovali, plani, emarginati, numerosissimi, patentibus. Semina compressa, pilosa. Receptaculum conicum, acutum, punctatum, concavum.

373. CHRYSANTHEMUM. G. Pl. 432.
Juss. 183. Gærtn. t. 168.

Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. hemisphaericus, imbricatus, squamis margine dilatatis, membranaceis.

* Radio alio.

Leucanthemum 1. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis obtusis incisis basi pinnatifidis; radicalibus obovatis petiolatis.

Chrysanthemum Leucanthemum. Sp. Pl. 1251.
Huds. 371. Wits. 733. Hull. 184. Relb. 321. Sibth. 257. Abbot. 185. Curt. Lond. fasc. 5. t. 62. Mart. Fl. Rust. t. 109. Engl. Bot. t. 601. Fl. Dan. t. 994.

Leucanthemum vulgare. Raii Syn. 184.

Belli major. Ger. em. 634. Matth. Valgr. v. 2. 261. Camer. Epit. 653. Fuchs. Hist. 148.

Buphtalmon. Brunf. Herb. v. 1. 258.
Angl. Great White Ox-eye.

In pascuis, arvis, et ad vias, vulgaris.

Perennis.

Perennis. . Fl. Junio, Julio.

Radix sublignosa, fibrosa. Caules erecti, bipedales, subramosi, fulcato-angulati, angulis rubris, pilosiusculi, foliosi. Folia saturatè viridia, nitida, glabriuscula, incisa; insima petiolata; superiora alterna, amplexicaulia, basi pinnatisida. Flores solitarii, terminales, magni, formosi, disco aureo, radio albo. Calyx hemisphærico-depressus, glaber, squamis numerosis, imbricatis, marginie scariosis, interioribus præcipue apice dilatato-membranaceis. Flosculi radii calyce triplò longiores, numerosi, patentes, elliptico-oblongi, nitidi, apice erosi, dentati. Semina cylindracea, omnino mutica, fulcata, nigra, costis albis. Receptaculum convexum.

** *Radio luteo.*

2. *CHRYSANTHEMUM* foliis amplexicaulibus *segetum.*
glaucis supernè laciniatis basi dentatis.

Chrysanthemum segetum. Sp. Pl. 1254. Huds.
371. With. 735. Hull. 185. Relb. 321. Sibth.
257. Abbot. 185. Dicks. H. Sicc. fasc. 6. 13.
Curt. Lond. fasc. 6. t. 60. *Mart.* Fl. Russ.
t. 110. Engl. Bot. t. 540. Raii Syn. 182.
Ger. em. 743. Fl. Dan. t. 995.

Corn Marygold. Pet. H. Brit. t. 19. f. 6.

3. *Chrysanthemum segetum* nostras, folio glauco
multiscissò majus, flore minore. Raii Syn. 183.
Angl. Yellow Ox-eye. Corn Marigold.

Inter segetes vulgaris, præcipue solo fabulofo.

Annuæ. Fl. Junio—Augusto.

Radix fusiformis, parva. Herba glauca, lævis. Caulis pedalis-bipedalis, ramosus, angulatus, foliosus. Folia amplexicaulia, oblonga, variè dentata aut pinnatisidolaciniata, rariùs integra. Flores terminales, solitarii, toti aurei, speciosi, magni; in β minores. Calycis squamæ undique latè membranaceæ. Flosculi radii breviores quam in præcedente, obcordati, patentes.

Semina

900 SYNGENESIA—POLYGAM. SUPERFLUA:

Semina sulcata, mutica; ex errore apud Engl. Bot. corona descripta.

Variat stigmate trifido in flosculis radiis. With:

374. PYRETHRUM. Gærtn. t. 169.
Haller. v. 1. 40.

Recept. nudum: *Pappus marginatus*. Col. hemisphaericus, imbricatus, squamis acutiusculis, margine scariosis.

Partbum. 1. PYRETHRUM foliis petiolatis compositis planis: foliolis ovatis incisis; pedunculis ramofolis corymbosis; caule erecto.

Matricaria Parthenium. Sp. Pl. 1255. Huds. 371. With. 735. Hull. 184. Relb. 322. Sibth. 258. Abbot. 185. Woodv. Suppl. t. 249. Fl. Dan. t. 674.

Matricaria. Raii Syn. 187. Ger. em. 652.

Parthenium seu Matricaria. Matth. Valgr. v. 2. 258. Camer. Epit. 649.

Angl. Common Feverfew. Pet. H. Brit. t. 19. f. 5.

In ruderatis et ad sepes.

Perennis. Fl. Junio, Julio.

Radix fibrosa, ramosa. Herba amara, aromaticæ. Caules erecti, bi- vel tri-pedales, ramosi, sulcati. Folia petiolata, pinnata vel bipinnata, foliolis dilatatis, incisis, subincanis. Pedunculi terminales, ramosi, corymbosi, sulcati, pubescentes. Flores albi, radio brevi, subdeflexo, quatuorque nullo. Calyx pubescens, hemisphaericus, squamis apice scariosis, laceris. Semina sulcata; margine membranaceo proculdubio coronata. Receptaculum planum, nudum.

inodo-
rum. 2. PYRETHRUM foliis sessilibus pinnatis capil-
laceo-

laceo-multifidis, caule ramoso patulo, coronâ
seminum integrâ.

Pyrethrum inodorum. *Engl. Bot. t. 676.*
Chrysanthemum inodorum. *Sp. Pl. 1253. With.*
734. Hull. 184. Reib. Suppl. 1. 14. Sibth. 257.
Abbot. 185. Fl. Dan. t. 696.

Matricaria inodora. *Huds. 372.*

Chamæmelum inodorum annuum humilius, foliis
obscure virentibus. *Dill. in Raii Syn. 186.*

C. inodorum, sive Cotula non foetida, *Bauh.*
Hist. v. 3. 120.

Buphthalmum. *Fuchs. Hist. 144.*

May-weed. *Pet. H. Brit. t. 19. f. 12.*

Angl. Corn Feverfew. *Scentless May-weed.*

In arvis et ad vias, imprimis solo glareoso.

Annua. Fl. Augusto, Septembri.

Radix fusiformis. Herba ferè inodora. Caulis ramosus,
diffuso-patulus, foliosus, angulatus, glaber. Folia sessilia,
lyrato-pinnata, foliolis linearis-multifidis, angustissimis,
subrevolutis, micronulatis, glabris. Flores terminales,
solitarii, majusculi, pedunculis nudis. Discus luteus,
convexus. Flosculi radii patentibus, albi, elliptico-oblongi,
obtusi, tridentati. Calycis squamæ glabræ,
margine tenui, nigricante, submembranaceo, æquali,
undique cinctæ. Semina apice margine membranaceo,
integro, coronata. Receptaculum conicum, obtusum,
omnino nudum.

Variat radio multiplicato. *D. Crowe.*

Chamæmelum majus, folio tenuissimo, caule rubente,
Dill. in Raii Syn. 186, nondum vidi, nec e descriptione
ad hanc vel aliam speciem referre ausus sum.
Annè sequentis varietas?

3. PYRETHRUM foliis bipinnatis carnosis mu- *mariti-*
ticis : suprà convexis : subtùs carinatis, coronâ *mum.*
seminum lobatâ.

Matricaria maritima. *Sp. Pl.* 1256. *Lightf.* 491.
With. 736. *Hull.* 184.
M. inodora γ. *Huds.* 373.
Chamæmelum maritimum perenne humilius, foliis brevibus crassis, obscurè virentibus: *Dill.* in *Raii Syn.* 186. t. 7. f. 1;
Angl. Sea Feverfew.

In maritimis arenosis vel petrofisis.

On the Sussex coast at Cockbush, 7 miles from Chichester, in plenty. *Dill.* At Weymouth. *Rev. Archdeacon Gooch.* At Whitburn, Durham. *Mr. Robson.* In the isle of Bute, and on the western side of Cantire. *Lightf.* On the rocks at Doun near Bamff.

Perennis. Fl. Julio.

Radix lignosa. Caules cæspitosi, decumbentes, palmares vel spithamei, parùm ramosi, foliosi, glabri, fusco-purpurascentes, nitidi. Folia sessilia, lyrato-bipinnata, laciniis brevibus, obtusiusculis, muticis, glabris, crassis et carnosis, nitidis, subtus carinatis. Flores terminales, solitarii, magnitudine ferè præcedentis. Calyx glaber, squamis margine tenuissimo, nigricante, cinetis. Discus aureus, duplò latior quam in *P. inodoro*, convexus. Flosculi radii patentēs, albi, obtusè tridentati, nec (ut ex descriptione Dillenianâ intelligitur) integri. Semina margine membranaceo trifido aut quadrifido coronata. Species toto cœlo a præcedente distingue.

375. MATRICARIA. *G. Pl.* 432. *Juss.* 183. *Gærtn.* t. 168.

Recept. nudum, cylindraceo-conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* planiusculus, imbricatus, squamis margine scariosis.

Chama- 1. MATRICARIA foliis glabris pinuatis: foliolis *milla*.

linearibus

linearibus integris laciñatiſque, radio patente,
ſquamis calyciniſ dilatatiſ.

Matricaria Chamomilla. *Sp. Pl.* 1256. *Huds.*
372. *With.* 736. *Hull.* 184. *Relb.* 322. *Sibth.*
258. *Abbot.* 185. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 63.
Mart. Fl. Rust. t. 74.

Chamomilla vulgaris. *Trag. Hist.* 148.

Chamæmelum. *Raii Syn.* 184. *Ger. em.* 754.

C. leucanthemon. *Fuchs. Hist.* 25.

Anthemis sive *Chamæmilla.* *Matth. Valgr.* v. 2.
256.

Bitter Camomile. *Pet. H. Brit.* t. 19. f. 9.

Angl. Wild Chamomile.

In arvis et ad vias, vel in fimetiſ.

Very common about London; rare in Norfolk.

Annua. Fl. Maio—Julio.

Radix fibroſa. *Caulis* pedalis, erectus, ramosiſſimus, foliosus,
ſtriatus, glaber. *Folia* ſeffilia, lyrato-bipinnata, ſaturate
viridia, glabra, laciniis linearibus, obtuſis, mucromula-
tis. *Flores* numeroſi, terminales, ſolitarii, magnitudine
Anthemidis nobilis, quâcum etiām odore quodammodo
conveniunt. *Calyx* planiusculus, glaber, ſquamis ex-
tūs dilatatiſ, ſcarioſis, albidis. *Discus* luteus, conicus.
Floſculi radii patentes, albi, retuſi, tridentati, noctu
deflexi. *Semina* angulata, obliqua, glabra, omnino
mutica. *Receptaculum* conico-cylindraceum, acutum,
punctulatum, glabrum.

Matricaria suaveolens Linnæi diſtincta species est, nun-
quam in Britanniâ inventa, cui flores duplo minores
ſunt quam *M. Chamomillæ*.

376. ANTHEMIS. G. *Pl.* 434. *Juff.* 185.
Gærtn. t. 169.

Recept. paleaceum. *Pappus* submarginatus, *Cal.*
hemisphæricus, ſquamis ſubæqualibus. *Floſ-
cuſi* radii plures quam quinque, oblongi.

* *Radio discolor, sive albo.*

maritima. 1. ANTHEMIS foliis bipinnatisidis acutis carnosis subpilosis, caule prostrato, calycibus subtomentosis.

Anthemis maritima. *Sp. Pl.* 1259. *Huds.* 374.
With. 740. *Hull.* 188.

A. maritima annua odorata præcox, flore albo,
caule purpurascente. *Mich. Gen.* 33.

Chamæmelum maritimum latifolium ramosissimum, flore albo. *Dill. in Raii Syn.* 186.

C. maritimum odoratum præcox, flore albo,
caule purpurascente. *Till. Pis.* 39. t. 19. f. 3.

C. maritimum. *Dalech. Hist.* 1394.

C. maritimum. *Baub. Hist.* v. 3. 122.

Angl. Sea Chamomile.

In maritimis petrofisis.

At Sunderland, Durham. *Mr. Robson.*

Annua. Fl. Julio.

Caules prostrati, spithamæi, foliosi, angulati, piloso-incani, multiflori. Folia sessilia, bipinnatisida, carnosa, subtus præcipue pilosa; laciniis acuminatis, suprà planis, subtus convexis. Flores solitarii, terminales, pedunculis nudis, apice incrassatis, villosis. Calyx hemisphæricus, arachnoideo-pilosus, squamis lanceolatis, apice plumoso-laciniatis. Discus aureus, planus. Flocculi radii albi, patentes, elliptico-oblongi, apice subdentati. Semina margine membranaceo, integro, coronata. Receptaculum planum, paleaceum; paleæ flocculis disci duplo longiores, basi lanceolatæ, carinatae, membranaceæ, fuscescentes, apice subclavatae, acuminatae, flavæ.

Flores Tanacetum, folia Artemisiam vulgarem redolent.

nobilis. 2. ANTHEMIS foliis pinnato-decompositis filiformibus acutis subpilosis, paleis receptaculi scariofisis vix longitudine flocculorum.

Anthemis nobilis. *Sp. Pl.* 1260. *Huds.* 373.
With.

With. 739. *Hull.* 188. *Sibth.* 258. *Woodv.*

Med. Bot. t. 103.

Chamæmelum odoratissimum repens flore simplici. *Raii Syn.* 185. *Bauh. Hist.* v. 3. 118.

C. romanum. *Ger. em.* 755.

Sweet Camomile. *Pet. H. Brit.* t. 19. f. 10.

Chamæmelum; flos simplex. *Pharmac. Lond.*

Angl. Common Chamomile.

In pascuis apricis glareosis.

In Cornwall very plentiful. *Ray.* At Oatlands, Surrey. *Mr. Woodward.* Staffordshire; Mr. Pitt. *With.* On Hounslow heath in abundance, and in several parts of Norfolk.

Perennis. Fl. Augusto, Septembri.

Radix lignosa. Caules prostrati, spithamæi, subramosi, foliosi, villosi. Folia bipinnata, pilosa, foliolis filiformibus, acutis, integris, laciniatissime. Pedunculi terminales, solitarii, elongati, uniflori, nudi, striati, pubescentes. Calyx pilosus, squamis marginé membranaceis. Discus luteus, convexus, demum conicus. Flocculi radii albi; patentè, elliptico-oblongi, tridentati, demum deflexi. Semina obsoletè coronata. Receptaculum conico-convexum; paleæ lanceolatæ, scariosæ, muticæ, flosculos haud superantes.

Herba intènsè amara, gratae aromatica. Variat radio multiplicato, pleno; interdum verò radius planè deest, monente Bobartio.

3. ANTHEMIS receptaculo conico; paleis lan- *arvensis.* ceolatis acutis carinatis exsertis, foliis bipinnatifidis pilosis.

Anthemis arvensis. Sp. Pl. 1261. *Huds.* 373.

With. 737. *Hull.* 188. *Relb.* 323. *Sibth.*

259. *Abbot.* 186. *Engl. Bot.* t. 602.

Chamæmelum inodorum. *Dill.* in *Raii Syn.* 185.

White Ox-eye. *Pet. H. Brit.* t. 19. f. 8.

Angl. Corn Chamomile.

In arvis et ruderatis, imprimis solo glareoso.

About London. *Dill.* Walthamstow. *Mr. B. M.*

Forster. In various parts of Norfolk occasionally.

Mr. Crowe.

Annua, vel Biennis. Fl. Junio, Julio.

Radix parva, tortuosa. Caulis ramosissimus, erectus, foliosus, multiflorus, piloso-inecanus. Folia bipinnatifida, plana, pilosa, cinereo-virentia. Pedunculi nudi, elongati, terminales, uniflori, tomentosi. Calyx pilosus, squamis apice scariosus, nitidis, fuscis. Discus luteus, convexus. Flosculi radii numerosi, albi, patentes, demum deflexi, apice tridentati. Semina coronato-marginalia. Receptaculum conicum; paleae flosculis longioribus, lanceolatae, membranaceae, carinatae.

Herba ferè inodora; flores suaveolentes.

Cotula. 4. ANTHEMIS receptaculo conico; paleis setaceis, seminibus muticis, foliis bipinnatifidis glabriusculis.

Anthemis Cotula. Sp. Pl. 1261. Huds. 373.

With. 738. Hull. 188. Relb. 323. Sibth. 259.

Abbot. 186. Curt. Lond. fasc. 5. t. 61.

Chamæmelum foetidum. Raii Syn. 185.

C. foetidum, sive *Cotula foetida.* Bauh. Hist. v. 3. 120.

Cotula foetida. Brunf. Herb. v. 1. 255. Ger. em. 757.

Stinking Camomile. Pet. H. Brit. t. 19. f. 11.

Angl. Stinking Mayweed or Chamomile.

In arvis vulgaris.

Annua. Fl. Junio, Julio.

Radix tortuosa. Caulis ramosissimus, errectus, foliosus, multiflorus, glaber. Folia bipinnatisida, plana, incisa, latè viridia, vix pilosa. Calyx pilosus, minus scariosus.

Disens

Discus aureus, convexus. Flosculi radii albi, tridentati, patentes, noctu deflexi. Semina obovata, sulcata, omnino mutica, interdum tuberculato-scabra. Receptaculum cylindraceo-conicum; paleæ omnino setaceæ, flosculis breviores.

Herba, et præcipue flores, ingrati odoris. Variat flore pleno. *Dill.*

** *Radio concolore, sive luteo.*

5. ANTHEMIS foliis bipinnatifidis serratis subtus *tinctoria*.
tomentosis, caule corymboso erecto.

Anthemis tinctoria. *Sp. Pl.* 1263. *Huds.* 374.

With. 740. *Hull.* 189. *Dicks. H. Sicc. fasc.*
17. 17. *Fl. Dan.* t. 741.

Buphthalmum. *Matth. Valgr.* v. 2. 260. *Camer.*
Epit. 651. *Trag. Hist.* 152.

B. vulgare. *Raii Syn.* 183. *Ger. em.* 747.

Chamæmelum chrysanthemon. *Fuchs. Hist.* 26.

Yellow Ox-eye. *Pet. H. Brit.* t. 19. f. 7.

Angl. Ox-eye Chamomile.

In petrosis et apricis montosis, rariùs.

On a bank near the river Tees not far from Sogburn, Durham. *Ray.* Not now to be found there; Mr. Robson. *With.* In Essex. *Dicks. H. Sicc.*

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caulis erectus, sesquipedalis, corymbo-ramosus, foliosus, angulatus, tomentosus. Folia bipinnatifida, serrato-incisa, plana, subtus tomentosa, laciniis mucronatis. Pedunculi terminales, solitarii, elongati, uniflori, lanati. Calyx ferè A. maritimæ. Flores omnino aurei, speciosi. Discus hemisphæricus. Flosculi radii numerosi, patentes, apice integri, bifidi vel trifidi. Semina tetragona, coronâ membranaccâ, integrâ. Receptaculum convexiusculum; paleæ longitudine floscularum, basi lato-lanceolatæ, carinatæ, margine scariosæ, apice subulatæ, flavescentes.

377. ACHILLEA. *G. Pl.* 435. *Jyff.* 186.
Gærtn. t. 168.

Recept. palmaceum. *Pappus nullus.* *Cal.* ovatus, imbricatus, inæqualis. *Flosculi* radii quinque ad decem, obcordato-subrotundi.

Ptarmitica. 1. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argutè ferratis.

Achillea Ptarmitica. *Sp. Pl.* 1266. *Huds.* 375.
With. 741. *Hull.* 189. *Relb.* 324. *Sibth.* 260.
Abbot. 187. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 60. *Fl. Dan.* *t.* 643.

Ptarmitica. *Raii Syn.* 183. *Ger. em.* 606. *Matth.*
Valgr. *v.* 1. 535. *Camer. Epit.* 354.

Sneez-wort. *Pet. H. Brit.* *t.* 19. *f.* 3.

Angl. Sneecze-wort Yarrow. Goose-tongue.

In nemorosis et ad scpes humidas.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Radix maximè repens. Caules erecti, bipedales, foliosi, glabri, apice corymbosi. Folia simplicia, lanceolato-linearia, acuta, argutè et concinnè ferrata, utrinque glabra. Flores pedunculati, terminales, albi. Calyx sub-hemisphaericus, pilosus, imbricatus. Discus planus. Flosculi radii 8 vel 10, latè obcordati, plani, apice trifidi. Scmina mutica, compresso-alata. Receptaculum planum; paleæ longitudine flosculorum, lineari-lanceolatæ, obtusæ, apice villosæ.

Variat flore pleno.

Millefo- 2. ACHILLEA foliis bipinnatifidis pilosis: laciniiis linearibus dentatis mucronatis, caulis sulcatis.

Achillea Millefolium. *Sp. Pl.* 1267. *Huds.* 374.
With. 742. *Hull.* 189. *Relb.* 324. *Sibth.* 259.
Abbot. 186. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 61. *Mart.*
Fl. Rust.

Fl. Rust. t. 123. *Woodv. Med. Bot.* t. 64.

Fl. Dan. t. 737.

Millefolium vulgare. *Raii Syn.* 183.

M. terrestre vulgare. *Ger. em.* 1072.

Stratiotes millefolia. *Fuchs. Hist.* 727.

Yarrow or Nose-bleed. *Pet. H. Brit.* t. 19. f. 4.

Angl. Common Yarrow. Milfoil.

In pratis et pascuis vulgaris.

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix repens, farmentosa. Caules pedales, erecti, angulati, sulcati, pilosi, foliosi, corymbosi, multiflori. Folia bipinnatifida, laciniis cuneato-linearibus, numerosissimis, incisis, mucronatis, subtus magis minusve pilosis. Flores congesti, albi vel rubicundi, parvi. Calyx ovatus, squamis apice pilosis. Discus convexus. Flosculi radii circiter quinque, rotundati, tridentati. Semina mutica, undique subalata. Receptaculum planum; paleæ foliolis calycinis conformes.

III. POLYGAMIA FRUSTRANEA.

378. CENTAUREA. G. Pl. 442.

Jacea. *Juss.* 173.

Cyanus. *Juss.* 174. *Gærtn.* t. 161.

Seridia. *Juss.* 173.

Calcitrapa. *Juss.* 173. *Gærtn.* t. 163.

Recept. setosum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

* *Cal.*

910 SYNGENESIA—POLYGAM. FRUSTRANEA.

* *Cal. squamis apice ciliatis.*

nigra.

1. CENTAUREA squamis calycinis ovatis : ciliis capillaribus erectis, foliis inferioribus lyrato-angulatis ; superioribus ovatis.

Centaurea nigra. *Sp. Pl.* 1288. *Huds.* 375. *With.* 743. *Hull.* 189. *Relb.* 325. *Sibth.* 260. *Abbot.* 187. *Engl. Bot. t.* 278. *Mart. Fl. Rust. t.* 130. *Fl. Dan. t.* 996.

Jacea n. 184. *Hall. Hist. v.* 1. 80.

J. nigra. *Raii Syn.* 198. *Ger. em.* 727 ?

J. cum squamis ciliis instar pilosis. *Bauh. Hist.* v. 3. 28.

Common and Jagged Knapweed. *Pet. H. Brit.* t. 22. f. 8, 9.

2. Floribus radiatis. *Raii Syn.* 199. *Huds.* 376. *var. γ.* *With.* 744. *var. 2.* *Sibth.* 261.

γ. Jacca nigra minor tomentosa laciniata. *Dill. in Raii Syn.* 199. Nondum vidi.

Angl. Black, or lesser, Knapweed.

In pascuis et ad vias ubique.

3. Common in the west of England. *Ray.* *With.* Near Oxford. *Dill.* *Sibth.* γ. Four miles on this side Malton in the road to York, in stony ground near a rivulet. *Dr. Richardson.*

Perennis. Fl. Junio—Augusto.

Radix lignosa, subrepens. Herba rigida, dura, scabra. Caulis ramosus, angulatus. Folia inferiora præcipue lyrato-angulata vel dentata ; superiora ovata, sæpius integræ. Flores terminales, solitarii, sessiles, purpurei. Calyx globosus ; squamæ nigræ, ovatæ, ciliis erectis, setaceis, fuscis, interiores unguiculatæ. Flosculi omnes plerumque æquales, regulares, hermaphroditici et fertiles ; radii interdùm, quandoque etiam omnes disci, monente Raio, radiantes, ampliati, steriles. Semina pilosa. Pappus brevis, multisquamulosus.

SYNGENESIA—POLYGAM. FRUSTRANEA. 911

2. CENTAUREA squamis calycinis ferratis, fo- *Cyanus.*
liis linearibus integerrimis; inferioribus den-
tatis.

Centaurea Cyanus. *Sp. Pl.* 1289. *Huds.* 375.
With. 742. *Hull.* 189. *Relb.* 325. *Sibth.*
260. *Abbot.* 187. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 62.
Mart. Fl. Rust. t. 111. *Engl. Bot.* t. 277.
Fl. Dan. t. 993.

Cyanus. *Raii Syn.* 198. *Baub. Hist.* v. 3. 21.

C. vulgaris. *Ger. em.* 732.

C. minor. *Matth. Valgr.* v. 1. 463. *Camer.*
Epit. 289.

Papaver Heraclcum. *Column. Phytop.* 92.

Angl. Corn Blue-bottle.

Inter segetes vulgaris.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Radix fibrosa, nigra. Caulis erectus, ramosissimus, folio-
sus, sublanatus, multiflorus. Folia linear-lanceolata,
acuminata, sublanata; inferiora pinnatifida aut den-
tata; superiora integerrima. Flores terminales, soli-
tarii, pedunculati, flocculis disci purpurascensibus, re-
gularibus, antheris nigris; radii cyaneis, neutris. Calyx ovatus, squamis lanceolatis,
ferratis. Semina lœvia, pappo polyphyllo, inæquali-
scabro, rubicundo.

3. CENTAUREA squamis calycinis ciliatis ova- *Scabiosa*,
tis, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis sub-
dentatis pilosiusculis.

Centaurea scabiosa. *Sp. Pl.* 1291. *Huds.* 376.
With. 744. *Hull.* 189. *Relb.* 326. *Sibth.*
261. *Abbot.* 188. *Engl. Bot.* t. 56.

Jacea major. *Raii Syn.* 198. *Ger. em.* 727.

Matsellon. *Pet. H. Brit.* t. 22. f. 7.

Angl. Greater Knapweed.

In arvis, marginibusve agrorum, et ad vias.

Perennis.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caulis bi- vel tri-pedalis, erectus, ramosus, sulcatus. Folia pinnatifida, utrinque subpilosa, saturatè viridia, lacinis lanceolatis, sæpiùs dentatis. Flores terminales, solitarii, pedunculati, magni, speciosi, purpurei, florculis radii elongatis, lacinis linearibus, angustis. Papus inæqualis, scabriuscus.

** *Cal. squamis palmato-spinosis*.

Isnardi. 4. CÉNTAUREA squamis calycinis palmato-spinosis, foliis lyrato-dentatis scabriusculis subamplexicaulibus, floribus sessilibus terminalibus.

Centaurea Isnardi. Sp. Pl. 1295. Dicks. H. Sicc. fasc. 16. 10.

Calcitrapoides procumbens, Cichorii folio, flore purpurascente. *Isnard*. in Act. Paris. ann. 1719. ed. german. 378. t. 19.

Angl. Jersey Star-thistle.

In pratis australioribus.

In Jersey. Dicks. H. Sicc.

Perennis. Fl. Julio, Augusto.

Caules procumbentes, ramosi, foliosi, angulati, sulcati, glabriusculi. Folia lyrato-pinnatifida, margine imprimis scabra, lobis spinulosis; superiora sæpiùs integra, subdentata. Flores terminales, solitarii, sessiles, dilutè purpurei, radiantes. Calyx ovatus, glaber, squamis apice palmato-quinquesidis, patentibus, spinosis. Toto cœlo a C. pullatâ distincta est.

*** *Spinis calycinis compositis*.

Calcitrapa. 5. CÉNTAUREA floribus sessilibus, calycibus duplicato-spinosis, foliis pinnatifidis dentatis, caule divaricato-patente piloso.

Centaurea Calcitrapa. Sp. Pl. 1297. Hud. 376. Will.

SYNGENESIA—POLYGAM. FRUSTRANEA. 913

With. 745. *Hull.* 189. *Rehb.* 326. *Abbot.*
188. *Engl. Bot.* t. 125.

Carduus stellatus. *Raii Syn.* 196. *Ger. em.* 1166.
C. stellatus, sive *Calcitrapa*. *Baub. Hist.* v. 3. 89,
Hippophæsum. *Column. Phytob.* 107.

Polyacantha. *Cord. Hist.* 91. 2.

Star-thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 11.

Angl. Common Star-thistle.

In ruderatis glareosis, vel arenosis maritimis.

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Caulis humilis, ramosissimus, divaricato-patens, foliosus,
fulcatus, pilosus. *Folia sparsa*, inaequaliter pinnatifida,
dentata, latitudine varia, dentibus spinulosis, sub floribus
aggregata. *Flores laterales*, sessiles, solitarii, rosei.
Calyx ovatus, squamarum spinis divaricatis, flavescentibus,
glabratibus, ipso calyce triplo longioribus; basi pal-
mato-spinulosis. *Flosculi radii disco vix longiores*, sub-
regulares. *Semina obovata*, variegata, nitida, mu-
tica.

6. *CENTAUREA* floribus solitariis terminalibus, *solstitialis*.
calycibus duplicato-spinosis, foliis decurrenti-
bus inermibus lanceolatis; radicalibus ly-
ratis.

Centaurea solstitialis. *Sp. Pl.* 1297. *Huds.* 377.

With. 745. *Hull.* 189. *Tr. of Linn. Soc.* v. 2.
236. *Engl. Bot.* t. 243.

Carduus stellatus luteus, foliis Cyani. *Raii Syn.*
196.

C. solstitialis. *Ger. em.* 1166.

Spina solstitialis. *Baub. Hist.* v. 3. 91.

S. solstitialis mitior apula. *Column. Ecphr.*
v. 1. 31.

Yellow Thistle. *Pet. H. Brit.* t. 21. f. 12.

Angl. St. Barnaby's Star-thistle.

In arvis et ad sepes rarius.


By

By the hedges not far from Cirencester, Gloucestershire. *Bobart.* Near Northfleet, Kent. *Huds.*
At Arminghall near Norwich. *Mr. Crowe.*

Annua. Fl. Julio, Augusto.

Herba lanato-ineana, subviseida, intensè amara. Caulis ferè bipedalis, ramosus, alatus, foliosus, multiflorus. Folia radicalia lyrato-pinnatifida, acuta, denticulata; caulina laneeolata, integerrima, acuminata, decurrentia. Flores terminales, solitarii, aurei, vix radiati. Calyx ovatus; squamis interioribus apice seariosis; mediis spinosis, spinis flavis, subulatis, divaricatis, calyce duplò longioribus, basi palmato-spinulosis; exterioribus palmato-spinulosis, spinis subæqualibus.

END OF THE SECOND VOLUME.



INDEX GENERUM

VOL. I. ET II.

	Pag.		Pag.
A CER	-	A quilegia	-
Achillea	-	421	578
	-	908	711
Acorus	-	373	441
Actaea	-	562	844
Adonis	-	586	477
Adoxa	-	432	863
<i>Aegilops</i>	-	151	144
Aegopodium	-	333	509
Aethusa	-	323	369
Agrimonia	-	511	220
Agrostemma	-	492	172
Agrostis	-	77	838
Aira	-	83	779
Ajuga	-	604	303
Alchemilla	-	189	215
Alisma	-	400	139
Allium	-	355	251
Alopecurus	-	72	
Althaea	-	739	635
Alyssum	-	679	647
Anagallis	-	229	897
Anchusa	-	214	387
Andromeda	-	441	279
Anemone	-	580	632
Anethum	-	329	858
Angelica	-	311	219
Anthemis	-	903	717
Anthericum	-	367	168
Anthoxanthum	-	31	175
Anthyllis	-	759	191
Antirrhinum	-	6,6	694
Apium	-	333	201
		J i	Bupleurum

INDEX GENERUM VOL. I. ET II.

		Pag.		Pag.
Bupleurum	-	292	Crepis	-
Butomus	-	436	Crithmum	-
			Crocus	-
Callitriches	-	8	Cucubalus	-
Caltha	-	599	Cuscuta	-
Campanula	-	234	Cyclamen	-
Cardamine	-	696	Cynoglossum	-
Carduus	-	847	Cynosurus	-
Carlina	-	857	Cyperus	-
Carum	-	330	Dactylis	-
Caucalis	-	296	Daphne	-
Centaurea	-	909	Datura	-
Centunculus	-	185	Daucus	-
Cerastium	-	496	Delphinium	-
Chaerophyllum	-	325	Dentaria	-
Chara	-	4	Dianthus	-
Cheiranthus	-	709	Digitalis	-
Chelidonium	-	562	Dipsacus	-
Chenopodium	-	272	Doronicum	-
Cherleria	-	483	Draba	-
Chironia	-	257	Drosera	-
Chlora	-	413	Dryas	-
Chrysanthemum	-	898	Echinophora	-
Chrysosplenium	-	447	Echium	-
Cichorium	-	843	Elatine	-
Cicuta	-	322	Elymus	-
Cineraria	-	894	Epilobium	-
Circæa	-	13	Epimedium	-
Cistus	-	572	Erica	-
Clematis	-	583	Erigeron	-
Clinopodium	-	638	Eriophorum	-
Cochlearia	-	687	Erodium	-
Colchicum	-	399	Ervum	-
Comarum	-	556	Eryngium	-
Conium	-	302	Erysimum	-
Convallaria	-	310	Euonymus	-
Convolvulus	-	232	Eupatorium	-
Conyzæ	-	875	Euphorbia	-
Coriandrum	-	320	Euphrasia	-
Cornus	-	187	Exacum	-
Coronopus	-	690	Festuca	-
Corrigiola	-	338	Flagæ	-
Cotyledon	-	284		
Crambe	-	695		
Crataegus	-	529, 531		
			Fragaria	

INDEX GENERUM VOL. I. ET II.

	Pag.		Pag.
Fragaria	546	Imperatoria	327
Frankenia	387	Inula	890
Fraxinus	12	Iris	41
Fritillaria	360	Isatis	693
Fumaria	748	Juncus	374
Galanthus	352	Lactuca	819
Galeobdolon	631	Lagurus	143
Galeopsis	628	Lamium	626
Galium	173	Lapsana	842
Genista	754	Lathraea	654
Gentiana	284	Lathyrus	763
Geranium	729	Lavatera	742
Geum	554	Leontodon	822
Glaucium	563	Leonurus	637
Glaux	268	Lepidium	681
Glechoma	625	Leucojum	352
Gnaphalium	867	Ligusticum	309
		Ligustrum	12
Hedera	257	Limosella	668
Hedypnois	823	Linnæa	666
Hedysarum	778	Linum	342
Helleborus	598	Lithospermum	213
Heracleum	306	Lobelia	242
Herniaria	271	Lolium	148
Hesperis	711	Lonicera	260
Hieracium	827	Lotus	793
Hippocrepis	777	Lychnis	493
Hippuris	4	Lycopsis	220
Holcus	88	Lycopus	29
Holosteum	161	Lysimachia	227
Hordeum	155	Lythrum	509
Hottonia	226		
Hyacinthus	366	Malva	740
Hydrocotyle	290	Marrubium	636
Hyoscyamus	254	Matricaria	902
Hyoseris	839	Medicago	795
Hypericum	800	Melampyrum	651
Hypochæris	840	Melica	91
		<i>McIlffia</i>	641, 642
Jasione	241	Melittis	643
Iberis	692	Mentha	609
Ilex	192	Menyanthes	225
Illecebrum	267	Mespilus	529
Impatiens	243	Meum	308
		Liz	Milium

INDEX GENERUM VOL. I. ET II.


		Pag.			Pag.		
Milium	-	-	75	Polygonum	-	-	423
Monotropa	-	-	440	Potamogeton	-	-	193
Montia	-	-	161	Potentilla	-	-	547
<i>Myagrum</i>	-	-	680	Prenanthes	-	-	821
Myosotis	-	-	212	Primula	-	-	222
Myosurus	-	-	348	Prunella	-	-	646
				Prunus	-	-	526
Narcissus	-	-	353	Pulmonaria	-	-	217
Nardus	-	-	61	Pyrethrum	-	-	900
Narthecium	-	-	368	Pyrola	-	-	443
Nepeta	-	-	608	Pyrus	-	-	531
Nymphaea	-	-	569	Radiola	-	-	201
Oenanthe	-	-	317	Ranunculus	-	-	587
Ononis	-	-	758	Raphanus	-	-	723
Onopordum	-	-	856	Reseda	-	-	512
Origanum	-	-	638	Rhamnus	-	-	261
Ornithogalum	-	-	362	Rhinanthus	-	-	649
Ornithopus	-	-	776	Ribes	-	-	263
Orobanche	-	-	668	Rosa	-	-	537
Orobus	-	-	761	Rotbollia	-	-	151
Oxalis	-	-	491	Rubia	-	-	181
				Rubus	-	-	541
Panicum	-	-	64	Rumex	-	-	390
Papaver	-	-	565	Ruppia	-	-	198
Parietaria	-	-	189				
Paris	-	-	431	Sagina	-	-	199
Parnassia	-	-	339	Salicornia	-	-	2
Pastinaca	-	-	328	Salsola	-	-	279
Pedicularis	-	-	655	Salvia	-	-	30
Peplis	-	-	389	Sambucus	-	-	335
Peucedanum	-	-	304	Samolus	-	-	259
Phalaris	-	-	62	Sanguisorba	-	-	186
Phellandrium	-	-	321	Sanicula	-	-	291
Phleum	-	-	68	Santolina	-	-	860
Phyteuma	-	-	240	Saponaria	-	-	459
Picris	-	-	814	Saxifraga	-	-	448
Pimpinella	-	-	331	Scabiosa	-	-	170
Pinguicula	-	-	26	Scandix	-	-	323
Pisum	-	-	760	Schoenus	-	-	42
Plantago	-	-	182	Scilla	-	-	364
Poa	-	-	95	Scirpus	-	-	48
Polemonium	-	-	234	Scleranthus	-	-	457
Polycarpon	-	-	162	Scrophularia	-	-	662
Polygala	-	-	752	Scutellaria	-	-	645
						-	Sedum


INDEX GENERUM VOL. I. ET II.

	Pag.		Pag.
<i>Sedum</i>	485	<i>Thalictrum</i>	583
<i>Selinium</i>	303	<i>Thesium</i>	269
<i>Sempervivum</i>	522	<i>Thlaspi</i>	683
<i>Senecio</i>	881	<i>Thymus</i>	639
<i>Serratula</i>	845	<i>Tilia</i>	571
<i>Sesleria</i>	93	<i>Tillæa</i>	201
<i>Sherardia</i>	171	<i>Tofeldia</i>	397
<i>Sibbaldia</i>	345	<i>Tordylium</i>	294
<i>Sibthorpia</i>	667	<i>Tomentilla</i>	552
<i>Silene</i>	465	<i>Tragopogon</i>	812
<i>Sinapis</i>	721	<i>Trientalis</i>	406
<i>Sison</i>	315	<i>Trifolium</i>	781
<i>Sisymbrium</i>	700	<i>Triglochin</i>	398
<i>Sium</i>	312	<i>Triticum</i>	157
<i>Smyrnium</i>	328	<i>Trollius</i>	597
<i>Solanum</i>	256	<i>Tulipa</i>	361
<i>Solidago</i>	889	<i>Turritis</i>	715
<i>Sonchus</i>	815	<i>Tusfilago</i>	878
<i>Sorbus</i>	531		
<i>Spartium</i>	753	<i>Ulex</i>	756
<i>Spergula</i>	502	<i>Ulmus</i>	281
<i>Spiræa</i>	535	<i>Utricularia</i>	28
<i>Stachys</i>	632		
<i>Staphylea</i>	337	<i>Vaccinium</i>	414
<i>Statice</i>	340	<i>Valeriana</i>	37
<i>Stellaria</i>	472	<i>Vella</i>	675
<i>Stipa</i>	138	<i>Verbascum</i>	249
<i>Stratiotes</i>	579	<i>Verbena</i>	608
<i>Subularia</i>	676	<i>Veronica</i>	15
<i>Swertia</i>	284	<i>Viburnum</i>	334
<i>Sympytum</i>	218	<i>Vicia</i>	768
		<i>Vinca</i>	269
<i>Tamarix</i>	338	<i>Viola</i>	244
<i>Tanacetum</i>	862		
<i>Teucrium</i>	606	<i>Zostera</i>	7


ERRATA ET CORRIGENDA.

- Pag. 11, ad calcem inseratur *Bromus diandrus*.
13, lin. 22, cedens, lege cedentia.
15, — 27, 274 lege 282.
33, ad calcem inseratur *Juncus conglomeratus*.
34, lin. ult. dele *apetalo*.
166, lin. ult. adde *Cuscutæ*.
350, lin. ult. adde *Polygona*.
392, lin. 7, lege *Surlingham*.
455, — 8, succulens lege succosa.
574, — 4, exstipulatus lege stipulatus.
809, — 8, lege *parallelæ*, apice *planifculæ*, *densæ*.
810, lin. penult. præfigatur num. 368.









RB 7.12.1979



24ColorCard CameraCalibra.com

