


畜牧淺說第六種

養兔淺說

四川省家畜保育所編印

養兔淺說

養兔是農家可獲厚利的副業之一，因為養兔不要很多本錢，飼養管理又極簡單，這種工作，就是婦女和兒童也能做的。兔子飼料消耗很少，成熟的時間很短，繁殖很快，資本的周轉因此靈活，所以能夠獲得厚利。兔的用途很廣，兔肉可供食用，皮毛可以製造各種用品，不愁沒有銷納的市場；單就四川說，出口的兔皮可值七十萬元，為農村經濟着想，養兔實有提倡的必要。現在把關於養兔的一切



應注意的事項，簡明的寫在下面，以供農友們的參考：

(一)種兔的選擇(就是做種用的兔子應如何選擇)。

(1)種兔無論公的或母的，必須身體強健硬大才可以生長健全不易感染疾病。

(2)種兔須生長迅速，成熟較早。

(3)骨格須細緻，皮要細要薄，毛的長短須全體一致，兔毛要純白而不雜，兼有光澤。

(4)種兔須能在飼料不好的環境中，也能生長不受阻礙。

(5) 雌兔必須馴善溫和，具有母性而能哺養多數之小兔。

(二) 繁殖上應注意的事項：

(1) 交配的年齡：大概總要在五個月以上的兔才可以交配。過早則母兔因為本身還沒有發育完全，不但小兔產後容易死亡，母兔的身體也要受損害。

(2) 繁殖的次數：一年最好繁殖四次，太多則母體一天一天地疲弱下來，也會使生下來的小兔不容易長大。

(3) 每次所產生的小兔不要超過母兔乳頭的數目，因

爲小兔太多，則乳量不足，很容易死亡。遇到這種小兔比乳頭數多的情形，最好以後把這個母兔淘汰，不要讓她再育小兔。

(4) 交配的季節：使兔交配時，要注意產生小兔時天氣不會太冷或太熱，另一方面，還要注意小兔產生後，便於飼養。所以交配時期最好在陽曆三月上旬，四月下旬，六月中旬，九月下旬，這幾個時間。

(5) 交配前後一小時，不要喂飼料，在每日上午十時左右交配最佳，因爲此時種兔精神最好。

(6) 種兔身體不健康，切不可讓其交配。

(7) 公兔每天只可交配一次，不要多配。

(三) 飼養上應注意的事項：

(1) 除普通野草及青食外，還應喂少許好的飼料，如豆，麥，包谷，麩皮等。

(2) 穀類須磨碎或浸漬後，然後再喂，因為這樣才容易消化。

(3) 多汁的根菜類飼料，如萊菔，須經過一晝夜，俟其水份減少才喂。

(4) 凡是附有露水或雨水泥土的飼料，或凍過的青飼料，腐敗及發酵發黴的飼料，均不可喂。

(5) 殘餘的飼料不可留存在兔籠內。

(6) 不要驟然變換飼料種類，應漸漸變換。

(7) 每日最好喂兩次，不要做一次喂。

(8) 飼料不要喂熱的，煮熟了的食物如豆腐渣之類，須冷卻後才喂。

(9) 食鹽和水也是兔子的最重要的飼料，應常常給與。

(四) 管理上應注意的事項：

(1) 兔舍要常常打掃清潔，最少每日一次。

(2) 兔舍建築儘可簡單，但須日光充足，空氣流通。容易打掃，容易搬運，這幾點是建築兔舍的基本條件。

(3) 小兔到了三個月的時候，雌雄可以分辨得清楚，這時候，就應該分開飼喂，防其亂交和早配。

(4) 勿使狗入兔舍內，以免母兔和小兔受無謂的驚擾。


(5) 捉兔時應以一手提頭部的鬆皮，一手支持臂部，

切不可提其耳部。

(6) 每日至少須巡視兔舍一次，觀察兔之健康情形，若有疾病，應立即隔離，以免傳染和蔓延。

(7) 每月應用石灰水將兔舍充分消毒一次，並且要留一二間空的，以備隔離病兔之用，用石灰水係每石灰五斤沖水百斤。

養兔雖然很簡單，很容易，但如果飼養不得法，不特無利可獲，往往會遭受疾病和死亡的損失，倘能照着我們所說的辦法做去，一定可以得優良而滿意的結果。



非賣品

出版者 四川省家畜保育所

電話：三三二號

本所所址：成都南門外漿洗街

華陽實驗區：華陽縣中和場

榮昌實驗區：燒酒房三聖宮

三峽實驗區：北碚文星灣

南充實驗區：南充蓮花池公園

新都實驗區：新都北門外

代印處 祥記彬明印刷社

社址：湖廣館街第一七號

本所主要工作

防治家畜病

製造獸疫血清及預防液

研究家畜疾病之病理及防治方法

調查家畜獸疫流行情形

檢驗各種病理標本

特製預防獸疫預防液及血清

增進家畜生產效率

改良畜種

改進家畜營養

改進家畜管理方法

提倡民間畜牧事業

提倡家畜及畜產品衛生運動