

詳校官助教臣李巖

臣紀昀覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十六

痔漏門

方

明周王朱楠

撰

比聖丸 治榮衛不調腸癖下血及藥五痔下血不止

消散一部毒不拘時日二

椿莢十兩 生葦二兩 甘草二兩
炒 細剉 炙令赤色

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九空心米飲下
療諸痔及下血不止轉症羸者服無不效

黃著綿州者枳實商州者各兩半黃礬石一大兩炭

復時仍數翻轉令勻著
火冷訖細搗去砂礫

右搗黃著枳實篩訖然後和礬石更搗勻蜜丸空心
以酒下之二十九加至三十九日再服忌蕎麩猪肉

蒜魚勞事

療五痔桃葉蒸痔

桃葉二斛細糠 胡麻各一斗熬

右合為蒸之取細糠熟為度內小口瓮中將肛門坐
氣薰入肛門

獨聖散 治枯痔

明礬用四兩淨信二錢半硃砂一錢

右各研為末先將信安瓶內次用白礬蓋之用火煨
令烟盡候冷為末包下臨用旋入硃砂以香油調敷
日三次第二日用溫水洗去再用藥痔焦黑漸加硃

砂末後用荆芥煎湯洗蓋硃砂能解信毒故漸加也
用此藥須用水澄膏先護好肉

水澄膏護肉

出永類
鈴方

鬱金

白芨

各一
兩

右為末水和蜜用篦子桃藥塗肛門四圍仍用紙貼
然後枯痔藥凡治內痔須候登廁翻花用溫水洗淨
不須坐廁卧床然後用藥敷之後大便閉結服潤腸
丸方見大腸門大便閉澁類

治痔瘡

蔥

搗

猪膽汁

蜜

等分

右和勻先木鱉子煎湯洗之方用藥敷之

痔瘡方 用馬齒莧煎湯薰洗後用

白礬

五倍子

黃丹

各等分

右末用桑葉不語唾敷上

治五痔必效方

枳椇

二兩麩
黃去穰

炒

葫荑子

一錢
炒

皂莢

去皮子
焙一根

右末蜜丸桐子大每服食前黃耆湯下三十九

熨藥方出聖惠方治五痔

桃葉切二升 槐花一升 胡麻一升

右合搗蒸之以熱熟為度旋取一升以綿裹熨痔上冷即頻換熨之

淋瀝藥出御藥院方歲靈仙散

治大腸痒痛或腫悶

歲靈仙 枳椇各一兩

右為粗末每用一兩水二碗煎一碗半澄去滓葉熱

蒸隨手浴不拘時淹乾貼蒲黃散

淋瀝藥雞冠散 治五痔肛邊腫痛或生鼠乳或穿穴

或生瘡久不愈變成漏瘡

雞冠花 鳳眼草各一兩

右為粗末每用半兩水一碗半煎三五沸熱淋瀝患處

烏荊丸出宣明論 治腸風痔疾大腸悶澁風病擊搐頭領

抽掣風下血

川烏頭三兩 炮
荊芥穗四兩

右為末醋糊丸每服二三十丸如桐子大溫水下日三

淨固散

當歸半兩 蜜陀僧二錢

右末酒調下

勝金散

草烏一個 白薑一指

右為末每服用半錢病人津唾調毒在黑瘤上自然

脫落遂用洗藥

蝸牛膏出聖生方

蝸牛一枚 麝香

右用小沙合子盛蝸牛以麝香摻之次半取汁塗痔

洗法 木槿花無花用葉連根不妨加朴硝

右煎木槿花泡入朴硝令溫洗日三次極妙

熊膽膏出危氏方

熊膽 腦子各研

右各少許用井花水調以雞毛搽痔上

枯礬散

枯礬 腦子

右為末先用魚腥草則是戢茶濃煎汁放溫洗次用

少許敷痔上

洗痔 出百一選方

野苧根 一斤 橡斗子殼

右共搗細用水一斗煮及七分乘熱以盆盛先薰患

處候湯冷熱得所通手洗之冷則止藥汁可屈煖用

三五次甚妙

丹石散 一百一

黃丹 滑石

右等分為末用新汲水調塗日三五上

洗痔方 危氏

木鱉子 柏葉煎

右等分為末每服一掬布裹煎湯以柏盛之蓋上穴

一竅先以藥氣薰蒸候通手洗之嘗有一婦人患已
成漏瘡脫肛用此而愈

必效丸

一名散結丸
出經論良方

治五痔結核

黃耆

去蘆
枳椇炒去

右等分為末蜜丸桐子大空心米飲下三十九氣痔

用飯丸

治諸乳痔不問年深不愈者

出經
驗方

生薑

不去皮
二兩

杜牛膝

一兩

右搗爛酒半盞炒令熟再用酒半升煮數沸去滓空
心服如痔不入却用五倍子為細末用蜜調塗乳痔
上即收用單紙塗藥敷之

寬腸丸

出危
氏方

以五炎膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通

黃連

枳椇
分等

右為末糊丸如桐子大每服五十九空心米飲送下

治痔方

猪牙皂角

右燒灰為細末每服二錢空心熱酒下

治痔取蟲方

甘遂 一錢半生 瞿麥穗 一錢
一半炒

右為末用捷猪腰子六個批作四五片作一重摻藥
在內止用紙裹用米泔水浸濕文武火燒熟用無灰
酒下空心服之忌冷物甘草

治痔瘡

五倍子 紅色者 蛇蛻 燒灰末
末八錢 一兩

右勻先以滴滴金煎湯薰候冷洗了却敷雌痔係翻
花痔用雌蛇蛻乃低處就地者雄痔係牛疔痔用雄
蛇蛻乃高蛻者

治諸痔

甘草 鳳尾草

右各等分搗碎先用瓶酒井水空微畧呷三兩口即
用此湯乘熱薰洗了却用柳樹蛀末千年草多年爛
厦上草也亂頭髮皂角燒烟薰之再用煎藥薰之洗之

洗痔妙方

五倍子一錢 枳椇四錢
炒

右咀用布袋盛藥瓶煎湯薰通手洗之冷住手復傾
在瓶內熨熱再薰洗每日如此數次除根藥袋常浸
瓶中如未效再修合治之

治痔瘡并枯瘤

桑柴灰 火灰 各二升

右用水十碗淋灰汁煎成膏稍塗患處

治痔瘡方

川百藥煎三兩一塊 乾胭脂五分
不要碎者

右研為末分作七服每日五更用無灰酒調下一服

面朝東南方服

治痔下腫痛出本

枳椇一兩 陳粟米同炒
令黃赤米不用

右為末每服二錢飯下

秘方

白礬

右用少許於新瓦上煨過為末再入硃砂少許以新汲井水調成膏用舊傘紙上藥隨瘡大小貼之先鬱金國丹末以鷺翎刷於瘡四畔圍護恐傷好肉仍用大青根晚殘砂煎水洗後再上藥服槐角丸皂角丸臟腑結熱秘甚八正散加燈心枳椇薄荷葉煎再用大黃葉莽草荆芥穗防風煎水洗效

治痔穀道中蟲癢不止及正發疼痛

出肘後方

水銀

棗膏

各二錢

右研和如棗核大絲綿裹納下部明日蟲出若痛加韶粉三大分作丸內之

雞子膏

出聖濟

沒藥

半兩

麝香

一分

右用雞子一枚畧取破頂頭出卻用雞子黃入雞殼內續入藥末同黃一處調勻用紙糊合頂於飯上炊令熟為度分作四服細嚼麥門冬湯下食前

能消丸 聖濟

歲靈仙 淨洗火炒 蟬殼 去土淨洗足去焙乾各一兩

右為末醋糊丸桐子大每服二十九至三十九米飲下

苦練散 聖濟 貼痔

苦練子 二枚 白礬 一兩

右炒焦為散入麝香研勻臨卧貼空心喫嫩猪肥肉

一頓永瘥

薰痔丸 聖濟

白鱧骨 韭子 等分

右末糊丸彈子大火燒薰之

瘰癧散 聖濟

瘰癧 皂莢子

右不拘時多少每服一瘰癧子眼七個每眼子內安皂子一枚每放在藏瓶內燒存性取出於土內培出火每一宿細研入麝香少許食前米飲下一錢七

枸杞散 聖濟

枸杞根 地龍

右枸杞根施取新者刮去薦赤皮只取第二重薄白皮暴乾搗羅為末每稱一兩別入地龍末一錢和勻先以熱菴汁洗燥患處藥摻日三次

治痔肛門腫破癢痛不可忍 出經驗良方

百藥煎 白礬 各一兩

右研細末用童子小便一盞化藥洗

治痔下部蟲齧 出肘後方

小豆 一升 好苦酒 五升

右煮豆令熟出曝乾復內令酒盡止搗末以酒服方寸七日三

又方

猪椒子 二升 酒 一升

右漬經五日稍稍飲一日令盡佳

酒蒸黃連丸 出得生堂 治諸痔瘡及便血不止

黃連 一升 酒 一升 苦參

右為末黃連餘酒麩糊丸桐子大每服五七十九飯
水不時下

治痔瘡

蒼耳

薄荷

各等分

右藥煎服滓再服薰洗之

療痔神方

肘後

麝香

一字熊膽

一枚

右和勻井花水每日一服一錢七唯忌雞魚一方熊

膽一味津唾調塗瘡上未差再塗又塗真熊膽取瘡

不過三四塗取愈秦太師兄弟皆病此即安然

治藥方

出傳信
適用方

連翹

枳椇

麩炒

右等分為粗末煎薰洗

槐黃散

出聖
惠方

治五痔

槐黃

二兩
微炒

附子

一箇六
皮臍

右為散每服食前以溫粥飲調下一錢

治五痔聖惠

槐根五兩 艾葉三兩

右以水一斗煎五升去滓冷煖得所洗下部二

又方一名龍骨膏方 見本門割痔類

洗貼藥出經 驗方

豆豉 朴硝各等分

右用罌子煮滾即用數重紙裹瓶口於桶內却紙上

取一孔透氣薰痔自焦自實

敷痔方出直 指方 治腸口熱腫

朴硝二錢半 硼砂半錢

右為末乾摻

又方出直 指方

大黃 滑石

右為末井水調敷

又方同前

朴硝 五倍子

右為末敷之

硝石散危氏

寒水石 朴硝等分

右末以津潤手指點藥敷瘡上

治五痔悉主之

蛇蛻皮二兩 麝香一錢

右末每服二錢七粥飲調下空心

又方出千金

右用白槐皮十兩熟搗丸彈圓綿裹內下部中此病宜常食扁竹葉及煮羹粥大佳一方槐根煮洗

治痔方出千金

用槐甘赤雞一斤即是槐糯為米飲服方寸七日三

治穀道痛肘後

用兔絲子熬黃黑用雞子黃和以敷之日二

苦葫蘆方禦藥院 治諸痔痛不可忍

用苦蘆子每每一錢水一升煎十沸瀝去滓薰瘡冷

熱得所淋洗隔一二日一次

薰痔散

用葳靈仙三兩水一斗半煎七八沸去火就盆上坐
令氣薰通手洗冷再煖

治諸痔上海

用蒼朮二兩剉碎烟薰之後使溲藥

溲藥上海

用垂柳葉乾煎湯淋洗之

槿花散出百一選方

治脫肛痔病等

用木槿花不拘多少採時不得用手以竹筋就窠子
摘以細篾串眼在風頭令乾每用時以水煎沸數滾
用盆盛先以氣噓候通手洗方花殼又各骷髏子七
箇經霜雪者妙燒灰為末空心酒或米湯飲下一方
木槿花為末塗之

治痔出百一選方

雲川一醫賈此藥甚神驗沈仁父司理傳

用雄雞一隻籠罩餓三日令腹空移就別處切稍肉

餵之收其糞入乾鍋子焙煨通紅存性入麝香少許
瘡用生麻油輕粉調敷濕即乾摻蘇韜光家方用烏
雄雞仍須眼足俱黑者又入腦麝外用乳香少許赤
為二色更當以問醫者

治痔立效丸

用百藥研末每服三錢煮稀白粉攪勻食之糊丸米
飲湯下亦得

又方一百一

用鴨脚草俗呼甘還草又名碧蟬兒花手挪軟納患
處即愈

又方出百一合肥陳學諭行之說呂應渠親取效

用川山甲自尾根盡處數除三鱗不用取第四第五
第六鱗橫三行燒存性為末用麝香少許臘茶一匙
同調空心服以證下膿却敷之瘡處其冷如水即不
痛無不取效

烏金散

出經驗良方

治痔及赤白帶長風

用胡桃殼燒存性為末每服二錢秤鐸燒紅淬酒調藥

又方

用羊屎八十一枚燒存性末入麝香少許以鹽湯洗了以滓液調塗即效

洗法

用水鰲去殼爛研白礬細研檳榔末等分湯一大碗浸放盆內坐薰通手淋洗一方鰲仁研土礬末水煎薰兩三次

治翻花痔

用生木瓜為末鮎魚身上涎調貼以紙榻上三兩次即消鮎魚放則效殺之則不效

立效散 治熱痔

用皂角火煨去黑炭弦子淨取半斤加沉香少許為末醋糊為丸每服三十九空心鹽湯下一方去皮弦蜜塗炙酥地上出火毒蘭茱搗和丸桐子大茶湯下五十九或百丸

又方

用韭菜不以多少先燒熱湯以盆盛湯在內盆上用器具蓋之止留一竅即以韭菜於湯內泡之以穀道坐竅上令湯氣薰蒸候湯溫冷卻以韭菜輕輕洗瘡上如此數次自然脫體

洗貼藥

用烏柏根濃煎湯服之加玄參同煎湯洗煎服

治痔瘡

用茄花不以多少陰乾為末空心每服三錢無灰酒下

治痔瘡

用辣芥茶煮薰洗

治痔方

用黃葵不經手入缸則爛次用綿喪子蘸藥成餅子如膏藥相似先以甘草湯或蔥湯洗淨貼上不一二日全消神效

治痔除根方

用拒霜花煎湯薰洗卻用柳蛀末燒烟薰之

治乍生痔瘡

用荊芥濃煎湯下白青州白丸子一服使可

治痔瘡

用丸夫菴麻葉揉碎煎湯薰洗立效

治脫肛痔病等

用蔥鹽湯先洗却將薄荷煎細研蔥白瀝汁去滓入
密調煎貼患處用油單紙敷上貼之坐卧以可

治痔良方一名止痛膏

用大皂莢針七箇燒存性白礬一塊大如指飛過並
為末入腦子少許面油調勻敷患處日兩次易大效
不可忍

治五痔

用蒼耳根藥乾為末水調服方寸匕立效清粥飲調
下亦得五月五日採為上一方用子又用葉子作四
片菜油脚煎油搽之

又方

用枳實為末蜜丸桐子大空米飲下二十九

又痔方

用韭菜自然汁一碗蒼耳子葉汁一碗調勻日曬洗

除根

又痔方

用磨刀水澄清放溫洗

痔方

用神香明者燒灰多燒烟坐身於瓶口上薰三五次
除根

又方

用降真香燒香薰妙

蠟礬丸 治諸痔諸癰惡瘡便毒

用明礬煨為末鎔蠟丸桐子大每服七十九溫水送下

猪甲散

用猪後蹄垂甲不拘多少燒存性為末陳米飲二錢

空心服一方燒灰敷

青蛙丸

用青色蛙長脚者取一箇燒存性為末雪羔丸桐子大每服十五丸空心先喫飯二匙次以胡桃肉切細煎湯調枳椇散下若產婦發痔裡急作痛用黑豆百粒陳米一合煎湯下亦先喫飯二匙

通用方

用鴨嘴青蟾礬煨為末青蜜調筆敷可以消脫

又方

用雞子一箇煮熟去黃取白切焙明礬煨白欵各一切同末敷有孔用紙摵投入

薰洗方

用藩薤草根煎湯先薰後洗藩薤花似小芙蓉

又方

用蝟皮如指許艾葉團如燒香法置長桶中坐薰三次凡痔發於肛內者須用薰洗若腸口腫熱朴硝末

新汲水調常常淋之

治諸痔方

用明白礬泡湯溫洗仍以蔥湯再沃次用桐殼灰穿山甲尾閣炙焦地膽去足翅林米炒各一分為細末入膽礬少許研和酒調以筆敷之頃痛以蔥湯沃去準一時許前藥又增此膽礬若痛又以蔥湯沃之久等一時藥中又增些膽礬並如前法一日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第一日後日三次用前藥

其膽礬又以漸加多於第二日痛則沃之蔥湯三日以還更不用藥只是明礬泡湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀無膽礬以絲礬代之

治痔方

直指

用紫金皮新水煎食前服

又方

直指

用一蜈蚣焙乾為末如腦以津唾調敷青沙上貼或

厚硝來摻亦得

又方 直指

用五倍子焙黃剉碎每用一兩井水三大碗煎乘熱薰洗拭乾爛石膏燒紅碗覆地出毒細末敷一方為米飲下五十粒五更服之又五倍子日乾如燒香法置長桶內坐薰患處自然收縮一方用五倍子雌雄各一枚為末洗後用井水調敷痔上五倍子看裡面紅者為雄赤者為雌

秘方

危氏

用川白芷煮白苧作線快手緊急痔上微疼不妨其痔自然乾癢而落七日後安一方白芷末用米飲調下

蝸牛散

出危氏方

治痔瘡腫脹作熱如火

用蝸牛螺一箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器內乘頓瓦逼半日自化成水以少許點瘡上立愈一方無麝香用玉器盛為水羊尾筆塗

治痔病

用蚨蝥殼燒作末服之

香膽丸 治牛痔及痔漏脫肛

用九捷牛兒膽蝟各一箇以膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四四九日熟旋取為丸如麥急却送入瘡內後追退出惡物是驗瘡口漸合生面蓋瘡內一遍出惡物

薰洗方 出肘後方 治痔下部齧

用掘地作小坑燒令赤以酒沃中杵吳茱萸三升內

中極熱復開小孔子以下部坐上冷乃下不過三度良又方 治五痔不以年月遠近

用枳椇為末蜜丸桐子大空心服二十九又為末方寸七

治痔方

用駱駝脂作煎餅空腹食之勿令病人知一方領下

毛燒灰拌雞子酒服

治久野雞痔下血不止肛邊痛

用野猪肉二斤切著五味炙空心服作羹亦得

治痔方 肘後

用鴈月牛皮一具熟食之盡瘡勿與鹽醬未瘡再服

鼃皮方 治腸痔疾甚者

用鼃皮及骨燒灰研末米飲服又入紅雞冠花末白

礬灰末和之空腹服便瘡今醫方鮮用鼃鼃甲者

又方 出千金方 治五痔下血不止者及痔穀道痛

用杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾取汁煎減半

投米煮粥停冷空心食之杏仁熬薰杵膏敷之

治痔有蟲咬穀道癢或下膿血 一名槐白皮方見本門脈痔類

虎骨膏 治五痔下血

用虎骨膏內下部

治患五種痔

用山豆根水研服之

治痔

用狸骨頭燒灰和酒服二錢七

治痔病

用茱萸根濃煮水洗痔有驗燒末服之

治痔發疼痛肘後

用狸內作羹作脯食不過三頓烝此肉甚妙

治痔疼痛下血不止

用坑月沙不限多少慢火燒令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日三四服瘥砂即兔糞是也

治痔方

用連翹煎湯洗訖刀上飛礬入麝香貼之

治五痔及大便卒痛如鳥啄千金

用桑耳作羹空心下飯飽之待卒痛如鳥啄取大小豆各一升合搗作兩囊烝之及熱更互坐即瘥羹飯須日三服之一方桑耳為散每服二錢粥飲調下

百中散 治痔

用畢解不拘多少搗為散每服二錢七精羊肉四兩

批作四片摻藥却合如餛子於炭火上炙熟細嚼以酒半升送下候腸痛如人行五七里方上廁取下膿血及蟲只一服

瘰癧散

聖濟

用瘰癧不拘多少瓷瓶子一枚紙數重磚一片壓口次用炭火籠作火屋燒瘰癧候烟去瓦分存性只置瓶內不以紙并埽子壓口次用候冷為細散每服二錢七麝香溫酒或陳米飲下

小黃連丸

出聖濟

治五痔有頭如雞冠者

用黃連麩炒黃色不拘多少為末以雞子清和丸桐子大陰乾每服十五丸於雞鳴聲未絕間溫酒下十服取效一方為末敷之更加赤小豆

地膚子散

出聖濟

治痔

用地膚子不拘多少新瓦上焙乾為末每服三服七陳米飲調下日三

駝糞薰洗方

出聖濟

治痔

用駝糞不拘多少陰乾不得見日慢火煨成烟薰後
癢甚別後方洗

淋瀝方

出聖濟

治痔

用惡石一名牛蒡子不拘多少淘去浮者每用一兩
水二碗濃煎乘熱薰候通手淋瀝

神白散

出聖濟

治痔下部發腫如梅子李大痛礙不能行者

用半夏齊州者一枚研令極細入龍腦一錢皂子少
許研勻用津唾於手心調令稀稠得所攤軟紙上貼

之冷如水良久清水出漸消如未全愈再貼去根本
為妙

立效散

出聖濟

治痔疾薰敷

用蠅蝗七枚夜飛撲落者尤妙入瓷合子固濟文火
煨存性為末先以溫水洗之用藥末燒薰畢復以藥
末摻之用薄紙貼上一方搗為末塞下部蟲出瘡

治痔瘡痛

用驢肉一塊煮熟搗爛去脂膜肥皂角八箇去黑皮

焙乾為末以平胃散末五錢米湯打糊為丸如桐子大每服四五十丸空心米湯下

治野雞痔下血腸風明目

肘後

用嫩槐葉一片蒸如皂灸法取藥作末法煎呷之

治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者

肘後

用槐木上耳取末服方寸米飲下

治腸風鼠疔痔

聖惠

用蝟皮可燒灰和酒服及灸令黃煮汁飲方一方細

剉瓶內燒烟薰痔瘡

獺灰方 治腸風鼠痔

方見本門腸痔類

療五痔有氣痔溫寒溫勞即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鯨甲主之牡痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮煮之腸痔更挺出血蜂房主之方久乃縮牡猪左懸蹄甲主之脈痔更衣出青血蜂房主之方用生藥背下篩等分隨病倍其所主藥為三分且早以井花水方寸七旦

暮服可至四五服忌冷食猪肉生魚菜房室唯得食
乾白肉病瘥之後百日乃通房又用藥內下部有瘡
內中無瘡內孔中

又方

用野葛燒末以刀圭內藥中服五日知二十日瘥三
十日愈

療痔下血方

用蛇不問多少煎煮內消盡去滓用汁和染羅粥著

少鹽食之大效亦無所忌

療痔方

用雀林草一大握麤切水二大升煮一服頓服盡三
日重作一劑

治痔頭出或疼痛不可忍

用麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人
著一佳其痛不可忍不過度永瘥

又方

用二十年鍼線黛衣口燒作灰分和水服瘰
瘰瘵正發疼痛

用薑屑二兩小稱以水三大碗合煮之去滓煖空腹
服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

用已死竺色黑者取之折斷燒為灰篩和薄飲服之
方寸匕忌獨寄牛肉

瘰瘵

聖惠

用掘地一尺深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去黑以
薄魚著口上取菘若子一合內坑中燒烟出瘵人坐
上以被擁當汗出密屋內作之以烟盡更著一合菘
若子薰避風如法汗發則瘵一方水淘去浮者生為
末錫和丸如蓮子大綿裹之內下部中日三四度易
之一用根中脂大濕紙裏煨熟去紙蜜塗內下部

瘰瘵方

千金

用鯉魚腸可半升擇淨仍新鮮取一方板可濶二尺

以來厚二寸當中作孔深一寸半圓如醬盞口大布魚腸於其內以好麝香碎末摻魚腸取厚蘊二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以被擁之數食可至兩次久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入魚腸中蟲可長一二寸許細如網絲斑作五色每出不過十餘枝不勒度數蟲盡即止一方將魚腸炙令香綿裹內穀道中蟲出食魚腸數數易之盡三俱瘥

治痔有外痔有內痔但辨血下即有內外之異外痔下部有孔每便血從孔中出內痔每便即有便血下血甚者下血擊地成恐出血過身身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥用生槐子一斗候莫堅硬時採搥碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾搥篩為散和槐子煎作丸以飲服十九日再加至三十如梧桐子大兼以煎搥作丸如棗核大內下部中日夜三四變亦可搥苦參末代膽草一方地膽作地脈

草藥中無地脈惟有地麥

黃芪十味散生槐子煎不覺可宜合此散

黃耆五兩 苦參 玄參各六兩 附子炮 大黃各三兩 乾薑

二兩 蝟皮灸二兩 黃連四兩 槐子六兩 猪懸蹄甲一具

右搗篩為散空腹以飲服方寸七日再服漸加至二

七忌猪肉

治大便孔卒痛如鳥啄方千金

以大小豆各一斗和搗內兩袋中蒸令熟更互坐之瘥

療痔下部癢痛如蟲齧

用溫溺令熱內少礬石以洗之良

療痔及諸蟲

用石榴東引根深者取一握勿令見風拭土挫又取

鹿脯四指大一片灸兩畔令熟追細劈水三升煮一

升適寒溫空腹頓服其患甚發者服即定諸蟲無問

赤白出病瘥

薰洗痔方本

用枳椇不拘多少為末每服二錢水一大碗砂瓶內煎百沸先薰後洗一方塘灰中煨熟蒸熨七次立定

療一切痔肘後

用浸石英酒內鹿角膠服之

枳椇丸 治內痔

用好枳椇不拘多少去穢細切麩炒黃為末每末一兩入胡桃肉一塊研勻以蜜丸如彈子空心細嚼一丸米飲或溫酒下兼用井花水淋洗

治五痔悉主之出聖惠方

用牛角腮二兩炙令黃焦搗羅為散每服食前以溫粥飲調一兩二錢溫酒下亦得

又方出聖惠方

用槐子捏作丸半束天每日內下部中不過十上瘡

扁竹方出肘後方 治外痔

用搗扁竹絞取汁漉麩餽空心喫日三度常喫一方扁蓄葉搗汁服根葉亦可

治痔瘡才覺痲腫及久年痔疾出千金方

用熊膽為末先以熱水調化用手蘸抹上不住手數
十次後用藥水溫熱洗蒸後如數次可除根又治五
痔十年者塗熊膽

又方

用真膽礬雄黃輕粉各分兩為細末用蝸牛二十一
箇連殼搗爛研如泥用末和作膏子如軟不可入瘡
口却將烏龍得生膏捏作小挺子和蝸牛膏一處填

入痔漏瘡內又用黑膏藥貼蓋之庶不透出

治痔瘡

用防風荆芥枳椇朴硝杉木各等分入鹽少許薰洗
即不痛

犀角方 治密熱頭痛及五痔諸血痢

用犀角為末服之若食過多令人煩即取麝香少許
和水服之即效也

治野雞痔病方出肘後方

王及郎中充西川安撫判官乘驛入洛谷數入而痔
 病因是大作如葫荈貫於腸頭其熱如塘煨火至一
 宅僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐
 柳湯洗荈上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣入腸
 中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡
 荈所在

治痔內有柿核痔牛乳痔生於穀道四邊名連子痔若
 根頭小者如治瘰子同平頭生者用瘤法治之若去

後必有黃水出如桐油直粘人手待三四日出盡將
 麝香散摻之口合即愈

黃耆四君子湯 出朱氏集驗方 治五痔下血

四君子湯加黃芪白匾豆薑棗煎服細末丸佳

又方 出朱氏集驗方

橄欖核細末陳米飲調二錢服

吊腸丸 出朱氏集驗方 治脫肛痔

石灰炒熟入熱湯內薰痔後湯溫洗數次却服沉香

流氣飲吞吊腸丸蘆陵姚留原用之有效

劉寄奴湯 出朱氏集驗方

劉寄奴 五倍子

右各等分研細末空心酒下仍用其末敷乳上遂愈

黑雪膏 出朱氏集驗方 治痔頭熱腫痛不可忍睡卧不安

蜒蚰蟲一箇 腦子一撮

右件放在硯上用金墨同磨成水塗上隨手無事

又方 出朱氏集驗方

丁香 二粒 腦子 一箇 黃白皮 不拘多少

右為末津液調塗上

倍香膏 出朱氏集驗方 治痔疾

五倍子 燒存性 乳香 少許 降真香 少許

右為末用津液少許搽痔上其疼立止

木鱉散 出衛生堂寶方 治痔不以外洗藥

木鱉子 去殼切作片搗爛 地骨皮 紫金皮 當歸 枳

殼 各半兩

右先以黑豆煮軟水五升煮四升去滓乘熱薰通手
淋洗可用四次易之如身體生瘡紫黑添樟木皮或
葉同煎洗

落痔膏 出衛生家寶方 治男子婦人十三般痔萬不失一

灰菟灰 一斗 純白炭灰 一斗

右各淋取灰汁五升共一斗以薄紙數重筍箕內盛
了淋七度取醞清灰汁入鐺內煎一二合却用風化
石灰入細絹羅子內羅過三五度臨時旋將汁少許

調風化石少許篋子桃藥點痔頭少時拭去又點如
數度如黑色其痔自焦落更看落後裡面以石榴子
內平便用鹽湯洗不得出風後用封瘡木槿散

立效散 出衛生家寶方 治翻花痔瘡及一切久不差諸惡毒

瘡

鼠粘子草根 三兩碎 大柏皮 一兩

右為末臘月猪脂封貼立瘥猪膽和藥勻

紫金膏 出衛生家寶方 治一切翻花等痔妙方

鍾定四庫全書

卷二百九十六

穿山甲 一兩 煨過 乳香 半錢 細研如粉 沒藥 二錢 細研如粉

右研勻每用少許以津調塗瘡上即瘥

半夏散 出衛生家寶方 治諸般痔疾初生急以此藥治之

半夏生為末先以生薑汁浴穀道次以半夏米泡湯

洗不過三兩日即自消

夏枯草散 出衛生家寶方 洗痔妙方

夏枯草 一兩 荆芥 一兩 枳椇 半兩 龍膽草 半兩 朴硝 兩

一燈心 握

右為麤末用水七碗煎至三碗先乘熱薰通手洗之

冷即止

蟬退散 出衛生家寶方 薰痔方

蟬退 蛇床子 穿山甲 皂角刺 木鱉子

右等分為麤末不拘多少燒薰痔再用洗藥

礬硝散 出衛生家寶方 治痔疾痛不可忍屢試立效

朴硝 白礬 五倍子 各等分 為細末

右以朴硝先煎湯薰候溫即洗用軟帛滲乾却以水

調二藥末為膏塗痔上

妙應散

出衛生家寶方

治五痔結核癢痛時有膿血遠年不

瘥並皆治之

胡荽子

用紙盛鍋內慢火炒令香熟

芸薹子

用紙盛鍋內炒黃色破故紙

生用

右件各等分搥羅為末每服抄三錢煨核桃一箇爛嚼後用米飲調下空心服此藥服一月永絕根本但忌酒麪毒物一月次用洗者

一井金散

金居士選奇方

治痔瘡毒氣潰作膿血久不止或

結硬赤腫痛不可忍者

露蜂房

四兩 蜜陀僧 二兩 別研

右件將露蜂房剉碎安一磁罐子內用黃泥固濟炭火煨令通紅為度放冷取蜜蜂房研末同蜜陀僧和勻每用乾貼瘡口如瘡口小以紙摵之點入瘡口內如結硬不消用甘草湯調敷之日三次用

黃耆湯 淋洗痔疾

黃耆 地骨皮 防風 三味等分焙乾

右件吹咀每用半兩水三升煎三五沸瀝去滓通手淋洗

礬石散 治痔

白礬 二兩 硃砂 二錢 辰沙 半錢 麝香 五十文 綠礬 半兩

右件為細末每用少許點在痔上即化作水出上藥五七日了便使後藥

土朱 五文 牡蠣 五文 白芨 三文 白欬 五文

右為細末敷在痔上自然乾脫落即愈

痔藥五礬散 治諸般痔

青黑礬 即黑礬南礬 白礬 一兩即南礬 明礬 一兩 紅礬 一兩 此礬

信 半兩

右六味研細入乾鍋內用白炭火煨紅烟盡為度取出安地上用大碗蓋定去火毒半日取出研細用香油調敷一痔瘡上半日後惡臭水流日五六日敷藥在痔頭上焦黑色乾焦數日內自落

又方 治外痔

桑樹皮灰 桐子殼灰 白炭灰 雜紫灰 石
灰 厲殼灰

右等分用沸湯洗過各碗入鍋內煎取半碗了却入
石灰為度

膽礬丸 治痔下膿血

礬 膽礬 一斤用黃泥裹 皂子 一升煮
炭火煨令通赤 雞冠花 一斤
去皮

荆三稜

四兩

右為細末錯糊丸菜豆大每服二十九米飲下

淋洗藥

天仙子 荆芥 小椒 蔓荆子 各等分

右以水煎洗

槐花枳椇散 治諸種痔瘡便血等證

槐花 黃連 枳椇 炒 百藥煎 各二兩

右為末每服三錢飯水空心調服

角煎丸 治痔病下血

黃連四兩枳椇 當歸尾 牙皂 香附子各二兩

右為末糯米為丸每服三十九空心米湯下又方加木香半兩又宜煮脾如常食之尤妙

荊芥散 洗薰痔疾

荊芥 熟艾 木鱉子去殼各半兩 寒水石煨三錢一作軟石膏

右吹咀每服用半兩入橘葉四十九皮同煎令香熟却以有蓋橘子於蓋子上開口傾藥汁在內乘熱薰稍溫則以手盛水畧畧洗之仍留汁更可用一次有效

又方

荊芥水洗用明礬為末以米醋調時復自手指調塗然不可太多後用橘葉燒乾去水氣煎湯薰洗更好

厚朴丸 治痔

厚朴剉 生薑各五兩切片水兩碗同煮乾炒 白朮 麥蘖炒 神曲炒各一兩

右為細末麩糊為丸空心米飲下三十五丸

二妙散 治痔

四君子湯 黃耆建中湯

右各一貼加白匾豆縮砂同煎

槿藤子丸 治痔瘡久不斂者

刺蝟皮 草烏頭 川烏頭 附子一兩 白礬 猪

牙皂角 槿藤子 皂角刺 枳椇七味各半兩

右件並剉碎入沙罐內灰火燒留性為末酒煮麩為

丸如梧桐子大每服二十九丸酒送下日進二服不拘

時候

消毒散 治腸風外痔結核或癢或痛消毒定痛令結

核自散

黃耆一兩半蜜塗慢火炙 荆芥穗一兩 枳椇三兩湯浸去穢切作片子炒黃色

薄荷葉去土半兩 槐花一兩燒赤 皂角子仁一兩令香熟 蝸牛十四枚各去殼焙乾

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至七

七丸清茶送下食後

透肌散 治痔疾

欽定四庫全書

山慈菘

宜用根不
用葉焙

白礬

生

白芨

地茄兒
開紫花
結子下

垂瓣如御米相似如春月寒食
前後採焙已上四味各二兩

右件為細末入飛羅麪伴勻每用少許冷水調稀稠

得所貼患處癰疽皆腫滿以藥傳瘡周違留病處頭

腦次用紙蓋貼之

四效散 治外痔成瘡疼痛

蜜陀僧

二錢
別研

麝香

半錢

片白腦子

半錢

銅綠

一字

右件同研極細先以醬水浴瘡拭乾次用藥少許貼之

連藥散 貼痔定疼痛

黃鬚

一兩

黃蘗

去麤皮
二兩

膩粉

一錢

右件為細末先用醬水洗瘡後看瘡大小用藥貼之

日三次

五靈脂散 療一切痔疾疼痛腫脹坐卧不安

穿山甲

六十片用
前膊上者

五靈脂

去沙石
一兩

黃丹

一兩

白礬

一兩

輕粉

十箇
子

右件藥用乾鍋子一隻入藥在內用瓦片蓋定瓦片

上鑽小竅子鹽泥固濟只留竅子用炭火五斤煨之
 烟出盡為度碾為細末空心先嚼胡桃肉一枚酒一
 盞調下時辰再嚼胡桃肉一枚酒一盞調下藥末一
 錢如人行三五里間又嚼胡桃一枚酒一盞藥前服之
 蒜餅子 治瘋冷結滯成痔疼痛難忍

獨頭蒜 一兩 白膠香 三錢

右件於沙盆內爛搗如泥捻作小餅子如當三錢用
 大瓶一隻化炒灰火上燒令藥出在瓶上薰之

治痔疾方

草撥 乾薑 人參 茯苓 各一兩 胡椒 官桂 各一

兩 訶子 一兩半
炮去核

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下十九
 婦人積年冷病並宜服之

勝金丸 治諸般痔疾

貫衆 葶藶

右件等分為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服

四十九丸空心食前熱水送下或入麝香少許作散子
每服二錢阿膠湯調亦或酒調下得出穢濃血生肌
為效

定痛散 治五痔及內外痔疾疼痛不可忍

防已 不以多
少灸

右件為細末每用半兩濃煎瓦松湯三升調藥置桶
中慢慢薰滌患處候通手淋洗日一二次

椿花散 淋滌痔疾

臭橘 雞冠花 椿花 三味各
等分

右件吹咀每用藥末二兩水三升煎至五七沸乘熱
淋滌

治痔三黃丸

雄黃 一兩 硫黃 一兩 黃丹 二兩

右件研細末入盞內以黃丹蓋定用濕紙封却火燒
候青烟出為度取出候冷研細以軟柿乾和為丸如
菜豆大每服十九丸若大腸出血有竅或糞前出以木

通湯下若糞後有血其草湯下甚者加至十五丸

空心服

紅花桃仁湯 治痔疾經年因飽食筋脈橫解腸澀為

痔當去其筋脈橫解破血絡是也治法當補北方瀉

中央

生地黄一錢 當歸尾半錢 桃仁十箇 紅花半錢 漢防己半錢 黃

藥一錢 猪苓半錢 澤瀉八分 防風半錢 麻黃不去根二分 蒼朮

六分

右件剉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去滓食前熱服之忌風處大小便

枳椇除痔丸

大枳椇四兩去穰別為末 大草烏四兩不去皮尖別為末

右以草烏細末入猪大臍內用醋四五斤煮乾如末爛更加醋煮十分爛為度餘醋些小搵候臍爛却入前枳椇末再搵勻丸如梧桐子大每服二三十丸溫米飲送下空心臨卧時忌熱飲食片時仍以臭椿皮

煎湯洗或謂審是熱毒者氣者合減草烏增入黃連
槐花之類當各有斟酌

又方 治痔

川烏炮 古石灰分等

右為細末燒飯為丸梧桐子大每服三十九食前酒
或米飲下

龍腦散出楊氏家藏方 痔瘡熱痛

鯽魚一枚破開去腸肚入穀精草填滿燒留性

右件為細末入腦子并蜜同調敷之

治痔出行義

取蜣螂合穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半末子
空心肚熱米飲調二錢服之

治腸風痔疾甚者出本草方

以鮑皮骨燒灰研末入雞冠花末白礬灰末和之空
腹服便瘥

治痔頭收斂即可服

用十宣散以生氣血又骨老湯生耳草湯治痔本藥也煎水薰洗生肌解石毒瘡極癢亦治之

洗法

用魚腥草煎湯溫洗又本事枳椇末沙瓶煎百沸先薰蒸而後洗又馬屎莧煎湯洗

濟生枯礬散洗滲

用鹽湯頻洗亦效木鱉子三箇搗如泥入小盆中百沸湯泡薰之却洗效木槿花炒作茶或煎湯洗用桃

皮葉漬水濃研濾清者於盆中洗之即有蟲出

薰洗

馬兜鈴并根雄黃 北艾 川山甲 雷丸 蝟皮

木鱉子 百藥煎

右等分吹咀有嘴瓶中燒薰

檳榔散出鮑氏方治痔疾如翻花更衣則出穀道外發即痛

楚或下血

檳榔一錢半 黑牽牛三錢

右為細末宿不晚食早起食白煮肉六兩少須以汁調藥飲之至午下針頭白蟲等不數行自止食軟飯三日以葳靈仙煎湯洗痔自乾脱落

厚朴煎

出永類
幹方

本方云腸胃本無血緣氣虛腸薄自

榮衛滲入

厚朴

五兩

生薑

五兩二味漬
炒金紫色

白朮

一兩

麥蘖

神曲

各一

兩同炒
紫色

右為末以麩糊丸梧桐子太疾空心米飲下百丸平

時三十九丸厚朴和腸胃藥麩消酒食白朮道水血自不作也五痔諸下血論不及是亦以脾胃為主也

治五野雞病

出本
草方

以蛇溲灸食亦燒末每服一二錢七

治腸風痔疾

出本
草方

以鮑皮及骨燒灰研末米飲服

治野雞痔

出經
驗方

用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯以知為度

治野雞病 出本
草方

以枳樹根皮末服方寸七

治五野雞病 出本
草方

以狨獸脂敷瘡亦食其肉血亦坐其皮積久其病皆
瘥也

治五野雞病 出本
草方

用粟米酸泔服

治五野雞病

取本通花上粉內瘡中良

治野雞病下血不止腸疼痛 出本
草方

以鯉魚一頭如食法作繪蒜齏食之

治外野雞病下血 出本
草方

以壁錢蟲汁點瘡上

治五野雞病脫肛下血 出本
草方

以益奴草炙令香浸酒服之

治五野雞病 出本
草方

以新綿紙一兩燒為末以酒調下

治五痔 出本
草方

以槐皮煎湯浸洗

治五痔 出本
草方

以槐花炒服

治五野雞病 出本
草方

以蕪茂作醬食之其氣羶者良

治五痔 出本
草方

用胡荽子煮汁冷取服

治外野雞病及瘡有根者 出本
草方

取烏爛死蠶敷瘡上在簇上烏臭死者

治五臟痔瀉血 出本
草方

以艾醋煎服之

去痔疾瀉血 出本
草方

服胡桃初旦一顆五日加一顆至二十顆止常服能

養一切老痔疾

治痔 出本
草方

取鰻鱧魚燒薰下部痔蟲盡死

治痔穀道痛 出千
金方

取杏仁熬薰杵膏敷之

治痔方 出本
草方

以木鱉子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐薰之至通手即洗一日不過三二次

治痔瘡 出本
草方

以仙人杖為末服方寸匕

治痔血 出本
草方

用向東者柳根一把擣絞汁三升服之

治痔 出本
草方

用柿子根濃煮浸洗有驗或燒末服之亦可

治痔疾有頭如雞冠者 出本
草方

用黃連末敷之即瘥更加赤小豆末尤良

治痔穀蟲 出本
草方

以乾苔煮汁服

治五野雞病 出本
草方

以鯽魚作繪服之

療五痔陰蝕濕痺 出本
草方

以龜甲煮汁浴漬之良

治野雞病穀蟲 出本
草方

以山茵子煮汁服之

治五痔病 出本
草方

以鹿肉煤出薑醋進大有效

治五痔止血 出本
草方

以鴿鴿炙食之或為丸散飲食之

治五痔 出本
草方

以槿藤燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作

藥瓢垂腰間

治五痔 出本
草方

以樞實常如果食之愈過多則滑腸

治五野雞病

出本
草方

以象豆子中仁碎為粉微熬水服一二七一升合搗
作兩囊蒸之及熱更互坐之蓋瘥

治五痔肛脫

出本
草方

以死蛇一條指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔反
覆坑坐上蟲盡出

治痔疾

用糯粉和駱駝脂作煎餅服之空腹與服勿令病人知

治五痔

出本
草方

取鷹爪及背燒為末和飲服之一方鷹之頭燒灰和
米飲服之

烏木丹

治臟毒腸風痔漏瀉血

右楮子纔熟上生紅子者用醞醋浸七日取出焙用
四兩蒼朮米泔浸五日取出去黑皮焙二兩草烏頭
炮二兩同為末醋為丸如梧桐子大每服十五粒酒

空心吞下米飲亦得

治五痔漏瘡

出本草方

用棘針根煮汁洗棘針乃小棗刺也

又方

用鴛鴦一隻治如食法煮令極熟切以五味食之或

作羹食亦得

又方

用蟻螳搥爛敷上

欽定四庫全書

普濟方

夫

普濟方卷二百九十六

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十七

明 周王朱橚 撰

痔漏門

痔漏 附論

夫五痔之疾或出鼠乳或發寒熱或生瘡或痒痛或下血其證不一治之不早勞傷過度則毒氣浸潰肌肉穿穴瘡口不合時有膿血故成痔漏經曰痔久不差變為

漏是也腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈
 謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔疾有
 五種其證亦異蓋陰陽氣虛而臟腑踈風邪乘而熱自
 生氣濕邪熱攻於腸中至使大便澀而燥熱鬱血熱散
 而流溢衝浸滲腸裏故以先血後便熱在下先便後血
 熱在上先血後便久而不愈乃作痔素問云因而飽食
 筋脈橫解房室勞傷為痔風熱不散穀氣流溢傳於下
 部故令肛門腫滿結如梅李核甚者變成漏也

方

蝟皮丸 出濟生方 治五種痔漏

猪左足懸蹄 燒灰存性 蝟皮 一枚燒灰存性 黃牛角鯁 燒灰存性 買

衆 槐角子 炮 雷丸 雞冠花 槐花 炒 油髮灰

黃耆 去蘆 香白芷 當歸 去蘆酒浸 枳殼 去穰生用 玄參 黃

連須防風 去蘆 鱉甲 醋煮各半兩 麝香 別研半錢

右為末米糊丸梧桐子大每服七十九加至一百九
 空心米飲下年高虛熱寒濕痔疾不宜服之

麝香蝟皮丸

治腸風痔漏疼痛不止大便下血時舉

發

雞冠花八兩微炒存性 牛角鯁燒存性 管仲去毛淨 槐花微炒 油

髮灰 香白芷 當歸 枳殼去穢 玄參 黃連

黃耆 防風去蘆半兩 鱉甲一錢灸黃色 麝香半錢別研 蝟皮燒存

性用 訶子去核半兩淨微炒 猪左懸蹄五個燒存性

右入麝香和米為丸梧桐子大每服三十九至四十九空心米飲下忌動風發病之物

內補丸出聖惠方 治痔漏積年不差

黃耆二分剉 槐花一兩微炒 苦參半兩剉 白桐葉三分 龍骨三分

狸睛一對微炙 漏蘆半兩 蝟皮一兩煮黃焦 篇蓄半兩 敗醬半兩

續斷半兩 木香半兩 厚朴一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟 硫黃一兩細研

猪後懸蹄甲一兩灸黃焦

右搗羅為末煉蜜和為丸梧桐子大每服食煎粥飲

下二十九

寸金錠子藥院方 治一切痔漏經久不可忍者

麝香 輕粉 硫黃 雌黃 藤黃 砒霜 粉

霜 黃丹 各二錢 別研 黃漆 牡蠣 紅藤根 各一兩

右為末燒陳米飯和勻捏如大棗子核每用一錠子
絛在肛門內可深二寸許用定新磚毬兒兩個燒赤
醋內蘸過綿裏肛門外熨冷即易一個次日大便取
下惡物立効

黃耆 葛花丸 出宣明論 治腸中久積熱痔漏下血疼痛

黃耆 葛花 生地黃 焙 黃赤子 小豆花 各一兩

大黃 赤芍藥 黃芩 當歸 各三兩 蝟皮 一個 檳榔

白蒺藜 皂角子仁 炒各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九至三十九桑
白皮下食前槐子煎湯下赤得

內補散治痔

人參 黃耆 當歸 各二兩 白芷 桔梗 川芎

厚朴 官桂 防風 甘草 各一兩

右為末木香同上藥為丸內痔外痔比白治一方用

第勝藥煎湯洗患處

雞峯烏金散 指出直指方 治痔漏

穿山甲 刺蝟皮 猪牙皂角 黄牛角心 各碎炒黃

槐子 皂莢刺 枳殼 貫衆 牛角 阿膠 各等

分再 蝟皮 山甲 同炒

右為末每一錢半用胡桃肉研爛併調酒食前服大腸有熱荆芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

代赭石丸 指出直指方 治痔變為漏膿血不止

代赭石 煨醋碎研 磁石 煮米醋數沸 牡蠣灰 龍骨 研

蝟皮 煮焦 皂角刺 赤石脂 川椒 焙 猪後蹄垂甲

燒各存性 木賊 焙 防風 炒 白礬 煨

右等分細末神麩糊丸小豆大每服五十九丸食前艾

并生姜湯下漏血處以熟艾麩和血竭塞日三換

二礬丸 一名鈞腸丸 治痔漏傍穿數穴膿不止并腸風脫肛

等

黃連 黃芩 荆芥 蛇麻子 各二兩 側柏葉 生四兩

槐條 鏡面草 蚶蚞草各一握 黑豆半 甘草對兩

蔥連鬚一握

右新汲水熟煎傾盆內熏後通手洗

黃耆九一名黃耆枳殼煎丸出本事方 治遠年近日腸風痔漏腫痒結

核成瘡諸藥不効

黃耆蜜炙 枳殼去白夫炒 歲靈仙各二兩 續斷 槐角子去蘆

比礬枯 當歸炒 乾姜一方作良姜 附子炮 生地 熟地黃

酒浸連翹炒半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大米飲下三十九進三服

枳殼荆芥散 治腸風痔漏并臟毒下血或肛疼痛

荆芥 防風 芫荽 木通 當歸 皂角刺

甘草 陳皮 茯苓 枳殼各等分

右為末每服半兩水一盞煎七分和滓空心溫服後

用

淋洗藥

甘松 鳳眼草 蒴藿用根葉 華蔥各等分

普濟方

六

右為麤末每服用藥一兩水二碗煎三五沸痒痛時
澡洗

烏玉丹 一名黑玉丹 出直指方 治丈夫婦人腸風痔漏着床大腸

頭疼不可忍者服此藥不拘三四次見効初得此疾
發痒疼痛敷道四周多生梗核此是痒如破是漏只
下血是腸風皆因酒色滯氣風毒飲食五事過度即
成此疾人多以外醫塗痔病在腸自有蟲若不去根
本其不除此藥的有神効

棕櫚 皂角水淨 亂頭髮 洗各二兩 雷丸 各一兩 芝麻 各一兩 苦練

根 二兩 蝟皮 三兩製 牛角腮 三兩製 乳香 各半 麝香 各半

猪蹄甲 後脚者四十個洗淨

右除乳麝外用箴瓶或沙合盛鹽泥固濟周回用火
煨烟盡存性不可以大過便去火入乳麝再研細用
酒打糊丸如梧桐子大空心食前胡桃酒下二三十
丸楊氏方名棕櫚丸添不蛀皂角一兩半牛角腮四
兩猪蹄甲用二十五個麝用二錢芝麻乳麝雷丸苦

練根槎藤子不燒外餘藥各燒灰不用箴瓶每服五十粒荆芥茶或酒米飲任下

秦艽蒼朮湯

出衛生寶鑑

腸風痔漏者總辭也分別異若破

者謂之痔漏大便不澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸下而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥熱之氣勝附熱而來是濕熱風燥因氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也作大硬燥結者主病兼受火邪也去此四者其西

方肺主諸氣其體收下一助病為邪須常破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神

秦艽

一錢

當歸

三錢

澤瀉

二錢

蒼朮

七分

防風

半錢

黃蘗

五分

檳榔

二分

皂角

燒存性去皮一錢

桃仁

湯洗去皮一錢

右將檳榔桃仁皂角仁另為末外吹咀都作一服水五碗去滓入檳榔等三味再煎去滓空心服一方青皮半錢木香三分同煎病大者再服而愈生冷硬物冷茶之類及酒食大麩料乾姜之類犯之其藥不効

如有白膿加白葵花去萼青皮半錢不去白入正藥
中同煎又用木香三分為細末同檳榔等三味再上
火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此
藥一服立愈若病大者再服而愈

槿藤子丸 出禦藥院方 治風癖下血痔漏結核疼痛

槿藤子丸 一個重七錢 酥炙和皮用 茴香 炒 皂角刺 燒存性 蝟皮

燒存性 枯白礬 白附子 炮 枳殼 夫炒去穢 樗皮 焙乾名

乳香 二錢

右為末醋面糊丸梧桐子大每服四五丸温酒食前
服如有痔瘡疼痛醋研五七丸津唾塗患處

木香厚朴湯 出宣明論 治瘡漏脫肛腸胃冷腹脇虛脹不思

飲食

木香 陳皮 桂心 桃仁 厚朴 各一兩 肉苳蔻

赤石脂 各半兩 大附 三兩炮 皂角子 二兩去皮子酥炙黃

右為末每服二錢温粥飲調下食前

神丹 出危氏方 治腸風痔漏

刺胃皮 一個製鐵器中 皂角刺 半兩燒 硫黃 一磚

猪牙角 半兩去黑 白礬 灰塗蜜炙 枳殼 剉碎 黃耆 蜜炙 附

子 除去皮 白雞冠花 各半兩

右為細末酒煮糊為丸梧桐子大每服七丸至十九
空心食前溫酒下不飲酒米飲下久年漏痔服至三
四十日肉滿平安諸痔服之即自消外痔用藥十九
同硃砂細碾蜜調塗之常服永除根本若服藥覺熱
加白雞冠子一兩半或二兩更加三五丸服之臟腑

自調勻也

治痔漏翻花瀉血 出驗良方

狐狸手足 一副 川山甲 陰乾 蝟皮 各三兩 川芎 黃明

膠 乳香 白附子 川烏頭 五靈脂 各二兩

右為麤末沙鍋固濟疾乾用煨通炭火赤去火開窩
研為末入麝香研園姜酒調下二錢日三服

黑丸子 出危氏方 專治久年痔漏下血

乾姜 百草霜 一兩 木饅餒 二兩 烏梅 敗醬 百葉

油髮各五錢

以上各燒灰存性却入後藥

桂心三錢 白芷五錢 各不見火

右為末醋糊為丸梧桐子大空心米飲下三十九

治腸風痔漏不問有頭無頭定三日安出本

藜蘆燒灰 皂角針只用針不用皮条炒二錢 天麻半兩 乾姜半兩 蓮

子草一兩 真麝半錢 橘子硫黃一兩 苦瓜萋一個 明礬一兩

右將瓜萋開一孔如小錢大入礬并硫黃在內却將

原掩合定藤紙糊却九罐子盛坐磚上炭火煨令烟

盡為度瓶內悶死後冷取研細同前六味藥末和勻

煉蜜丸梧桐子大每服十九至十五丸空心温酒下

日三服三日効油面醃葺牛馬肉魚腥生冷行房行

遠勞力一切忌之

紫金丸出王氏博濟方 治痔漏久不瘡肛邊牙血時出膿血

龍腦 麝香 乳香 雄黃 蜜蛇僧並研各炒一兩 砒

霜半兩 丹砂 阿魏 安息香各一錢

右先將乳香安息香阿魏熟水浸令通軟研如膏次將龍腦麝香丹砂蜜陀僧雄黃各研為末砒霜如菜豆粉二錢同研細更用巴豆三粒去皮心膜壓出油亦研細與前藥一處研勻却入前乳香等膏和丸菜豆大每服一九空心茶清下兼治腸風等疾婦人心痛血氣當歸酒下一九心痛水瀉生姜湯下一九食癥面湯下氣痛溫酒下一九

韭根湯 治諸痔漏出膿水疼痛不止

韭根 暴乾 蜀椒 去目并閉口炒出汗 蛇床子 續斷 蕪荑仁

野李根 皂莢白皮 松子 各一兩 白礬 半兩

右細末每度二兩用水三碗煎二碗濾去滓乘熱於盆內先熏後洗日三

香殼丸 出宣明論 治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而

成痛漏速治悉愈之

木香 黃蘗 各三錢 枳殼 去穰炒 厚朴 各半兩 黃連 各一兩

蝟皮 一個燒灰 當歸 四錢 荊芥穗 三錢

右為末麵糊九梧桐子大每服二三十九溫水食前

日三服

八寶散 治腸風痔漏

大附子一個去皮 南乳香二錢 蝟皮一個燒灰 皂角針一兩

燒榼藤子一個去皮 猪牙皂一兩去皮 白礬半兩 硫黃二錢

半

右為末醋糊九小豆大每服七丸溫酒下日進一服

二日進二服止假令十日進三次忌諸發毒物

乳香丸出聖濟總錄 治一切治漏反花瘡等疾

乳香研半兩 雄黃研 生乾地黄瓦上煨醋浸焙乾 黃蠟各一兩

麝香研 龍腦研 丹砂研 沒藥研各一錢

右為末鎔蠟九梧桐子大每服十九麥門冬熟水下

留少藥末貼欲貼時先用橘葉蔥湯洗之

螺皮丸出聖濟總錄 治五痔連年不瘥漸成痔漏

螺皮炙 龍骨各二兩 黃耆細剉 當歸剉焙 枳殼去瓤炒 乾姜

炮各艾葉 附子炮製去皮

普濟方

十三

右為末煉蜜九梧桐子大每服三十九食前黃耆湯

下

黑聖散 出直指方 治腸風臟毒痔漏及諸下血

當歸 川芎 茯苓 地榆 槐花 敗棕 艾

葉 燒存性 百草霜

右等分為末每服二錢食前陳米飲下

愈痔散 出禦藥院方 治男子婦人一切腸風痔漏無問新久

皆可服之

南乳香 另研 槐花 微炒 木香 商枳殼 去穰炒 鶴虱 葶

澄伽 去帶 白蕪荑 各一兩

右為末如服時先嚼桃核一個次用熱酒一盞調藥

二錢空心日進二服忌發熱風動氣痔等物

榼藤子丸 出宣明證 治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而

不治乃變成漏

黃耆 枳實 槐花 荆芥穗 鳳眼草 榼藤

子 一個 皂角 三百個

右為末麵糊九梧桐子大每服二三十丸空心酒下

米飲亦得忌油膩生冷猪魚臭血等物

乳香沒藥散出宣明論治五種腸風痔漏無問久新

宣黃連 白礬各一兩 穀精草半兩 醋石榴一個用刀子割下蓋

子裏面取子三停一停次將黃連白礬碎都入石榴內用元蓋子合用濕紙一張裹子後用膠泥拍作餅子裏石榴以炭火燒通赤取出去泥紙次將穀精草銚子內炒焦黃與石榴同極研碎却入

麝香一錢 乳香二錢 沒藥一錢研碎半勻

右每服一錢熱酒小半盞調下日三服

香黑散出聖惠方治痔漏下膿血不止

香墨三分 枳實一兩麩炒微黃 黃耆一兩對 代赭一兩 當歸一兩對微炒

麝香一分 白芍三分

右搗羅為散入麝香更研令勻每服食前以粥飲調

下一錢

硫黃丸出聖惠方治痔漏腫痛膿血不止

香墨三分 枳實一兩麩炒微黃 黃耆一兩對 代赭一兩 硫黃一兩細研

水非 白礬一兩燒灰 附子一兩炮去皮臍 皂莢一兩燒為灰 麝香一兩

細研 蝟皮一兩 皂莢一兩去黑皮塗酥焦黃炙去子

右搗為末入麝香研令勻以醋煮麵糊九梧桐子大每服食前溫粥飲下十五丸

治痔漏疼痛腫硬不消用此熏方出聖惠方

菘荈子 韭子 雄黃 吳茱萸 猪牙皂角已上

並生用

右搗為末黃蠟為丸彈子大用小口瓶子內燒一九熏痔漏上日可兩度用之

槐角丸出直指方治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後

有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如妳名鼠痔頭上有孔名漏並皆治之此藥治腸風痒內小蟲裏急下膿血不止痒痛消腫聚驅濕毒久服永除病原

槐角去梗枚炒一兩 地榆 當歸酒浸宿焙 防風去蘆各八兩 黃芩

枳殼去穰麩炒各半斤

右為末酒糊丸梧桐子大每服三十九米飲下不拘

時

槐荆丸

藥院方

治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便血

槐花

微炒

荆芥穗

去土

枳殼

麩炒去穰各一兩

白礬

生

薄荷葉

鬱金

各半兩

右為末水麵糊丸梧桐子大每服六七十丸空心粥

飲下日進二服

淋瀝藥

藥院方

治腸風痔漏經久不瘥痔以成漏瘡口膿

汁涓涓不絕及瘡內有蟲痒痛不止並宜淋洗之如

瘡不破者用後方乾上藥塗貼衛生突鹽

葳靈仙

去土

荆芥穗

去土

商枳殼

去穰炒

乳香

各一兩

細辛

二錢半

鳳眼草

二兩

右為麤末每服用藥三兩水一大升半煎一升濾去

滓消熱淋洗患處如冷再溫熱再洗遍不用如洗罷

用綿或白絹揩乾上藥如瘡破後不須上藥只淋洗

乾上藥

藥院方

如瘡不破用前方淋瀝訖用此藥塗之

馬牙硝

別研

馬勃

各半兩

輕粉

三錢半

右為末如瘡痒痛不破者覷瘡大小用藥多少津液調成膏擦如患處日用三五次

六神丸 治痔漏膿血不止

鯪鯉甲燒 皂莢刺燒 雄黃 鶴虱 硫黃研各等分

右為一處研勻麝香水煮麵糊丸梧桐子大每服十五丸空心煎湯酒或湯下加至二十九

蝟皮丸出千金方 治痔亦痔漏

蝟皮具一 礬石 當歸 連翹 乾姜 附子炮 續

斷 黃耆各二兩 槐子三兩 乾地黄五兩

右為末蜜丸梧桐子大每服十五丸日再加至四十九一方無礬石地黄肘後方用黃連無連翹

葛花黃連丸出德生堂 治凡受治漏便血之證者皆富貴人

也蓋因嗜慾恣情酒色無厭或食煎燂之肉大腸受熱毒之深故有斯疾或痔如鼠妳連珠翻花雞冠之狀其形不一或在大腸頭上糞門左右重痛流膿出血紅黑又有長絲縷之血起卧艱難並宜服之

黃連 一斤酒蒸浸 枳殼 半斤去穰炒 乾葛 四兩 葛花 四兩

以乾葛代之 槐花 四兩 木香 三兩

右為末留浸黃連酒作麵糊丸如梧桐子大每服五

十七十九飯水下酒亦可不拘時日進三服

奧樗皮散 出聖惠方 治漏下血不止及膿

奧樗皮 一兩微炒 醋石榴皮 一兩地榆 一兩 黃連 一兩

艾葉 三分微炒 阿膠 一兩搗碎炒令黃

右搗羅為散每服食前粥飲下二錢

蝟皮丸 出聖惠方 治痔漏膿血不止發歇疼痛

蝟皮 一兩燒灰 白礬 半兩燒令汁盡 皂莢刺 一兩燒灰 硫黃 半兩細研

附子 半兩炮製去皮臍 槿藤子 一個去殼

右為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服食前溫粥飲下

二十九

治一切痔漏不論深淺必驗方名大革薺丸 出聖惠方

黃耆 二兩剉 枳實 一兩半麩炒微黃 革薺 三兩剉 白蒺藜 三兩微炒

去刺兔絲子 一兩酒浸三日曝乾炒搗末 烏蛇 三兩酒浸去皮骨微炙

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心及晚食前溫粥飲下十五丸

神驗散

出神效方

治腸風痔漏及五種腸風下血糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四邊有努肉如亂頭名鼠妳痔有穴腸出血名漏並皆治之

牛頭角鯢

一隻酌中者

猪牙皂角

七疋

穿山甲

四十九片或完取或

四方取或一自取

蝟皮

一兩

蛇退皮

一條

右搥碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中曬乾瓶口微露出烟用文武火燒紅赤烟為少取出放冷為細末如服藥日先一日臨卧細嚼胡桃仁半個如糊用溫醇糯酒一盞送下不語便睡先引出蟲至次日交五更服藥驗病年月遠近或秤三錢五七錢用水半大盞醇糯酒半大盞相合令熟煎藥服之至辰時更服一服再依前服藥不須用胡桃仁久病不過七服忌油膩魚鱉鴉兔猪犬等物

鶴虱丸 治痔漏膿血不止經年不瘥亦殺蟲

鶴虱炒 雷丸 白礬灰各一兩 皂莢刺 硫黃研等分各半兩

右研為末醋煮為丸如桐子大雄黃為衣每服二十

丸麝香溫酒下空心服之

如聖餅 治痔漏膿血不止臟毒下血

寒食麵 鉛舟研 白礬燒令汁盡研 輕粉研 硫黃研等分

右研勻用倒流水和作餅如錢大每服發時以慢火

炙黃熟一餅分四服用溫熱水嚼下日日午時夜服

麝香散 治痔漏

麝香三錢 槐花半生半炒 荆芥穗各一分 干鍼草去皮根半兩 硃

砂研三錢

右研為散每服二錢溫酒調下臨卧時服

牽牛丸 治腸風痔漏

里牽牛生熟各半 猪牙角皂去皮 何首烏 香附子 草

烏頭切破冷水浸秋冬七日夏三日等分

右為末醋打麵糊為丸如桐子大令患人勿食晚飯

次日五更飽食燒熟猪肉一頓少時酒送下五七丸
藥行息時用冷水飯頻頻壓之大忌熱物後用熟熱
烏頭於瘡上時時換灸之

麝香丸

出聖惠方

治痔漏瘡腫疼痛膿血不止

麝香

半兩研細

蝸牛子

二兩炒令黃

竈突墨

二兩

道人頭

二兩

椒

二兩去目及閉口者微炒

右為末煉密九梧桐子大每服三十九食前粥飲下

黃礬丸

出聖惠方

治痔漏腫痛膿血不止

黃礬

三兩烏蛇骨皮炙令黃

黃耆

三兩

枳殼

三兩麩炒微黃去穰

駱駝胸前毛

三兩半燒灰

右為末煉密和九梧桐子大每服二十九煎黃耆湯

食前下

熊膽散

御藥院方

治痔漏瘡口不合膿汁清稀腫硬不消

熊膽

一錢

雄黃

各半錢

麝香

一錢

右件研為細末乾糝藥瘡口上

治遠年痔漏不瘥

木香 丁香 黑牛末 白牛末 各一錢

右為末用雞子二個打開取黃同前藥一處調勻再用雞子殼盛藥在內紙封口同煮熟分作四服空心溫酒下

治痔漏

附子 一個 腦子 麝香 沒藥 各一錢

枳殼散 治腸風痔漏

枳殼 木鱉子 防風 草薺 各二錢

右為末每用藥半兩水三升煎至三五沸盪三五次

効

異功散 治腸風痔漏便血登廁糞前血為外痔糞後血為內痔大腸不收名脫肛有努肉為鼠妳痔頭有孔名漏方見本門諸痔漏

治痔漏此因大腸感風熱而生 出本

生砒 一字 木銀 一粒如米大 真麝 一粒如小豆大 膩粉 一字

右件並乳入鉢內研令極細如痔或有珠子者將白

礬盪洗淨拭乾用手撚藥背在痔內上皆得瘡時便是藥行一日二次又洗去五日後住藥見効如或有孔即用紙撚引藥送入令徹其內更用紙貼孔前一日兩次使藥自然生合

治腸痔漏 出本 事方

當歸 川者 苦參 牙皂 去皮

右等分末醋糊丸梧桐子大每服二十九空心酒溫下

當歸湯 一名清涼飲 出直指方

當歸 切 焙 大黃 煨 剉 赤芍藥 甘草

右為麤末每服二錢七水一盞煎八分去滓稍熱服微利一行為効一方用乳香一錢硃砂半錢訶梨勒皮半兩同研為末以大棗二枚去核加藥末二錢七棗肉紙裏煨熟分作四服茶清嚼下與前藥相間服亦得

槎藤散 出聖濟 總錄 治諸痔漏膿血不絕羸瘦

榼藤 三個生油塗

續斷

雞冠花

烏賊魚骨

去甲

炙各一兩

右為末每服二錢七空心溫酒調下日晚再服

丹粉散

出聖濟總錄

治痔漏有瘡成竅膿血不止

鉛丹

鹽豉

各一兩

膩粉

半兩

大蒜

一顆去皮切

右先搗蒜令爛後入餘藥搗作薄餅焙乾為細末少

許貼之日三五次

痔瘡漏

猪牙皂角

七個燒灰

胡桃肉

七個燒灰

樺皮

七塊燒灰

瓜蒞

一個燒灰

存性

右為細末好酒調二服空心喫二服

痔瘡未破者

乳香

錢一

硼砂

錢一

雄黃

錢一

信

錢一

右為細末用猪膽調塗

硃砂丸

出聖惠方

治痔漏下血不止肌體黃瘦四肢無力

硃砂

一兩

黃丹

一兩

砒霜

半兩

硃砂

一兩

右都細研入次瓦盆子內歇口小火燒令烟出為度
停冷又細研用火燒七遍了入麝香一分同研令細
麵糊和丸梧桐子大每服食前枳殼湯下五丸忌熱
物

麝香散

御藥院方

治下部脫血或瘡痔漏久不差

麝香

血竭

各半兩

蝟皮

一兩

右先研蝟血謁為末次日麝香拌勻每服半錢溫酒
一盞調勻食前日二服

枳殼散

御藥院方

治腸風痔漏便血無數疼痛不可忍者

枳殼

麩炒去穰

槐子

微炒黃色

荊芥穗

各半兩

右為末每服三錢粟米粥調下如人行一二里地再
用粥壓之空心日進三二服

治脫肛痔漏

出神効方

胡荽

一升

乳香

炒許

粟糠

半升或一升

右先泥成爐子留一小眼可抵肛門大小不令透烟
火熏

治痔漏下血不止 出神效方

紫皮蒜 十個獨科者炒 大椒 六十顆 豆豉 四兩

右搗爛為泥九彈子大空心細嚼一九鹽湯下日三

服

薰漂藥 出神效方

鳳眼草 赤皮蔥 椒 各等分

右同漿水攘過坐盆令熱氣薰痔但通手漂之如次不過三次愈

治痔漏乳子 出經驗良方

側栢葉 二兩 乳香 二兩 枳殼 去白一兩

右為末二錢空心飯飲調下

洗藥 出經驗良方 治痔漏下血

荆芥 枳殼 各等分 馬鞭草 多使

右焙乾為麤末煎湯薰洗

治腸風痔漏

京三稜 用黑豆炒切作片子 馬兜苓 穀精草 各等分

右為散水同煎熏洗効

枳殼丸 治腸風痔漏久不瘥者

先穗子

三兩

皂角

一兩去皮 酥炙黃

枳殼

二兩去穰生

右為末煉蜜丸梧桐子大空心五十九

二聖散 治腸風痔漏不問有喫塔破不破者治之

枳殼

二兩用麥去炒過去穰用

黃耆

二兩破故紙

二兩微炒

右一處為細末空心好酒調下三大錢如不飲米湯

調下忌食燒肉熱麵雞鮓牛馬肉蔥蒜韭并動風之

一月

治腸風痔漏

出本 事方

赤芍藥

官桂

去皮

甘草

炙等分

右吹咀每服二錢生薑二片白糖一塊水一盞煎七

分去滓空心服之

丹砂塗方 治諸痔漏疽瘡

丹砂

麝香

蛇蛻

燒灰各一錢

右研令細以鹽湯洗瘡拭乾後塗敷日三二度

療痔漏疽瘡

光明砂

別研

麝香當門子

別研

蛇皮五月五日炙

右等分研先以鹽湯洗拭乾瘡少蜜以散敷上瘡

治痔瘡

荆芥

木鱉子

朴硝

各等分

右煎湯入於瓶內熏後湯溫洗之立効

治痔漏涓涓出膿血疼痛日夜不止漸加羸瘦宜服

出聖

惠方

磁石

二兩

白礬

二兩

綠礬

四兩

右搗細入瓦瓶子內盛大火燒令通赤候冷將出紙襯攤於地上經宿細研如粉煮棗瓢和丸菜豆大每

服食前粥飲下二十九丸

木賊丸

出聖惠方

治痔漏痛不可忍者

木賊

一兩

榿藤子仁

二枝塗酥炙黃

烏賊魚骨

二兩

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服不拘時候溫

粥飲二十九下

治痔漏久不瘥宜服此方

出聖惠方

蛇床子

半兩末

荆芥

半兩末

蝸牛

三七枝

右一處研爛塗在紙上每發時先用白礬熱水洗痔

頭了後用被褥上安藥紙上三兩上瘥

露蜂房散

出聖惠方

治痔漏出膿血不止

露蜂房

半兩炙黃

蝟皮

半兩炙

麝香

一錢

右細研令勻每日三五度半錢敷之

管仲散

出御藥方

治腸風痔漏

管仲

紅藤

各四兩上等好者

右為麤末分作四分服用綿紙包作四裹每服一包

上好酒一升煎至五沸用小口器溫服藥滓收着候

四服藥滓一處用水碗半煎至五沸用小口器盒盛

放被兒內熏着瘡門就熱通手洗如蟲子死後不便

瘡痛

治痔漏

出儒門事親書

白牽牛

頭末四兩

沒藥

一兩

普濟方

右細末如欲服藥先一日不食晚飯明日空心積豬
精肉四兩燒令香熟薄批散藥在內哀之漸漸細嚼
食盡然後宿蒸餅壓之眇下膿血為効量病大小虛
實加減服之忌油膩濕麵酒色三日外不忌一服見
効或用淡水煮肉熟用上法亦可又用服前一日不
食午飯并夜飯明日空心用之

淨固丸

出儒門
事親書

治痔漏下血癢痛

槐花

炒

枳殼

去穰各
一兩

右為末醋糊丸梧桐子大每服二十九米飲下空心

十服見効

槐荆丸

出儒門
事親書

治痔漏

槐花 荆芥

右等分為末每服一兩水煎空心下

蒲黃散

出儒門
寶鑑

治下部痔漏

蒲黃

一兩
兩 血竭

右為細末每用少許貼於患處

治痔漏瘡方 出本

雞子一枚 煮熟去黃 白礬 明此如皂角子大 匙上枯過用三分

右為末用溫湯淨洗拭乾用紙撚占藥入瘡孔內立

効一日二易

治男子婦人諸船痔漏 出本

黃牛角 狼毒 等分

右為細末翻花漏每服一錢甘草湯下合官漏姜湯

下半錢腸風米飲一錢酸醋調一錢滴珠漏山梔子

三個煎湯下

蜀椒榼藤丸 治痔漏不限年月深淺腫痛穿穴膿血

不止

蜀椒 去日并閉口炒出汗 榼藤子 大者一個 擘破炙

右為末棗肉丸梧桐子大每服十五丸空心溫酒下

麝香散 出聖 治諸漏痔有頭因穿破後成膿水經年不

乾

麝香 研半 鴿糞 一

右將鴿糞於淨地上火煨烟盡候冷與麝同研為散
每服二錢七空心米飲下晚再服一方銷黑錫二兩
和捏作餅子當於瘡上貼之神効

鯪鯉甲散

出聖濟總錄

治諸痔漏有瘡膿出楚痛

鯪鯉甲

灸焦五兩

麝香

研一分

右為散每服二錢空心煎黃耆湯下日晚再服一方
飯湯下

熏漏瘡

蒼耳

枳殼

各等分

右件藥搗麤末水一碗裝磁瓶內煮汁濃坐在上熏
妙

治痔漏下膿血不止

出聖惠方

木賊

一兩

蝟皮

一兩

右搗為散每於食前粥飲下一錢

又方

出聖惠方

遠志

一兩

椶櫚

二兩燒灰

右搗為散每於食前粥飲下一錢

治痔漏膿血有瘡竅疼痛宜服此方 出聖惠方

砒霜 半分研如粉 黃臘 半分

右銚子先鎔臘作汁後為砒霜攪和勻看瘡大小撚入條子下部每發時用綿裹內瘡竅子中良久却取或未有竅子即內中良久却脫出日三兩度用即効

砒黃敷方治下部漏瘡

砒黃 研 虬蟲 陰乾為末各半兩

右研令勻敷瘡口中以帛裹定日二次

治痔漏 出神効力

用黑白牽牛一合炒黃為末猪肉四兩切碎炒熟與末藥攪勻作一服用新白米飲三二匙壓之取下

蟲為効

又坐藥 出神効力

用鮫鯉魚二三甲以傅綿璽裏如棗核樣內之痛即止

治痔漏青蔥散 出危氏方

用蔥青內刮涎對停入密調勻先以木鱉子煎湯熏然後敷藥其冷如水唐仲舉云嘗有一吏人若死渠族弟親合與之早飯前敷午後以榜子來謝拜於廷下云疾已安矣

又方 出經驗良方

用死鱉頭燒灰研末塗腸頭上便能縮入

又方 出危氏方 治痔瘡肛門周匝有孔十數諸藥不効

用狗肉蘸藍汁空心食如不食狗肉驃肉蘸汁亦可七日自安

治痔漏有蟲 出肘後方

用草薺細剉貫衆去土等分為末湯酒下二錢食前溫服

一方治有蟲下血

用大棗肉一個去皮用水銀少許以唾研開和棗肉令蒸熟納下部

治腸風痔漏

用訶子不以多少和皮於灰火內炮黃色為末先用槐枝煎湯洗瘡將藥末貼次日再用鳳眼草煎湯洗貼藥次用地蓬毛貼令病人自用津唾調搽如瘡有青水出速洗如膿出難醫仍用紙撚入瘡內用藥仍服勻腸丸

治痔漏

用取向東生芭蕉根搗爛炒熟鋪於軟凳上候令坐

又易不過三上其疾立除莫犯鐵器一方取汁熱酒浸空心服

又方

用衮麻不以多少將甌兒盛水於火上煎百沸將衮於甌內水中蘸過如法熱將衮麻於瘡上如法緊坐衮麻熱日取好如此次數即愈瘡破者好治

治痔漏

用茄花為末油油調敷或燒灰用亦好

又方

用肥皂去子劈開安密於內火灸內令密乾如此三次研為末空心酒調服四十日愈痔除漏孔自滿

治漏方

初覺糞門腫痛者及以舊綉刀磨水洗之

又方

用槿花半開者不把手採煎湯熏之

治五船惡痔漏瘡

用黑虎丸如棗核樣隨大小入穴再用膏藥貼上仍

用甘草漏蘆煎湯下

治腸風痔漏

出本
事方

用鯽魚一尾破開盡去腸入白礬令滿瓦上燒過並為細末用雞毛捲藥敷治立効一方敗棕皮包紙裏煨香熟去紙熨斗內燒帶生存性為末每服一錢空心米飲下一方瓦上燒為灰軟飯丸桐子大每服二十九丸粥飲下

河水方出本 治痔漏下血不止反花痔

用城市河中水一桶脫衣坐水中頻洗即止痔亦可
不過三五次立効

治腸風痔漏出本

右用雞冠花不以多少濃煎湯洗每服一盞空心下
井水亦得久患者皆瘥并與數人用皆然神妙可驚
不類他藥

治諸瘡中毒痔漏等骨蒸彌良

用羊屎熏瘡

治瘡疥痔下血者

用水蘇煮汁服之

治癰疽痔漏瘡及小兒丹方

用水煮棘根汁洗之

治痔漏瘡

用馬兜苓於瓶中燒熏病處入藥灸用

啄酒散出聖 治痔漏有頭出膿水不止

用啄木鳥一隻燒灰酒下二錢七膽治瘡蟲立死

治五痔漏瘡殺蟲方

出肘後方

用鰻魚一頭治如食法切作片炙着椒鹽醬調和

食之

治大腸痔漏并脫肛

出肘後方

用虎脰骨兩節蜜二兩炙令黑搥末蒸餅丸如桐子

大每服清晨温酒下二十九隔夜先和大服後方服

此藥

狸骨丸 治痔及漏

用狸骨炙和麝香雄黃為丸服之糞燒灰治鬼虐

如意膏 治痔漏有頭或如鼠乳

用芫花根不許多少洗淨陰乾木臼內搥水少許絞取汁於銀石器內慢火燒成膏將絲綿就膏內度過以綿繫痔頭初時微痛心躁後落以紙摵子膏藥於竅內永除根本未落不得使水

潤腸丸

李方御傳科治痔丸方朝貴用之屢効蓋其用藥簡
 要有次第製造有法無若楚而收効甚速凡痔出外
 或翻若蓮花復便血疼痛不可坐卧甚者用下藥早
 上藥一次午一次晚一次至夜看痔頭出黃水恙如
 泉當夜不可再上藥一二日為好若年高人應外腎
 牽引疼痛可以人用火烘熱手於大小便開熨之其
 痛自安黃水未盡可再敷一日藥仍須勤晚外科人
 人早晚有照黃水流至盡是病根已去也

大黃 枳殼 當歸 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九白湯或蜜湯
 下老竹人宜麻仁丸或三黃丸痔漏敷雙金散

雙金散

黃連 鬱金 等分

龍骨散

龍骨 煨 白芷 黃丹 寒水石 煨各等分

右為末搽瘡口上小便赤色服薄赤散

遵赤散

生地黄 木通 甘草 等分

右為末每服三錢白湯下將好服內補散方見在前

痔漏有頭疼痛下膿血不止 出聖方

用桃根煮汁日二三上洗之

灸漏法 出千金方

用葶藶子二合豉一升和搗熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作艾炷如小指大灸餅上三

炷一易餅三九炷隔三日復一灸之外臺灸瘰癧古

今緣劔云不灸頭瘡葶藶氣人腦殺人

又灸漏法 出千金方

用搗生商陸根稔作餅子如錢厚三分安漏上以艾灸餅上乾易之灸三四升艾瘥外臺灸瘰癧

又方

七月七日未出取麻花五月五日取艾等分搗作注

用灸瘡上百壯

血竭散 出楊氏家藏方 治痔漏疼痛不可忍者

血竭 須真好者

右件為細末用唾津調塗頻用為妙

玉屑散 治腸風痔漏

用葫蘆殼燒灰出火氣研極細清晨飲湯調下

治腸風痔漏

用沙糖打却將樣子蘸糖惹芥細末空心服之

側金散 出楊氏家藏方 治痔漏竅下血疼痛

乾黃蜀葵花 黃蘗 去麤皮 黃丹 飛過 韶粉 以上四味各半兩

麝香 一錢別研

右件前二味搗羅為末同後三味研勻每用如患處

乾貼之

降真散 出楊氏家藏方 治痔漏有竅子者

銅綠 別研 白礬 別研 蜜陀僧 別研 降真香 楮葉 各等分

右件為細末每用少許以紙縫蘸藥摻入痔漏竅中

三黃散 出楊氏家藏方 治痔瘡

黃丹 二兩 飛

黃蘗皮 去麤皮

黃連 去須二味各四兩

白礬 一兩 枯

右件為細末津唾調下

交藤丸 出楊氏家藏方

血竭 半兩 別研

馬欄根 一斤

川烏頭 炮去皮研

人參 去蘆頭

何首烏 二兩 兩

甘草 二兩 炙

右件為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸鹽湯或酒送下空心食前後服藥了用茵陳湯洗

之如瘡乾無膿血後用三黃散貼

黑神散 出楊氏家藏方 治痔瘡

硫黃 蜜陀僧 碎

右件同炒令烟絕細研為末用少許摻之日兩次用

二香散 出楊氏家藏方 治遠年冷漏

香鼠 一枝 令 炙焦 麝香 少許 同研

右為細末和勻每用少許乾摻瘡口先以溫湯洗之

過拭乾次用上件藥摻如瘡口深濃出藥下能入血

者用紙撚蘸藥紙在瘡內自膿出少從裏生肉面外

有脚底被簽破及百日瘡不合口貼此藥遂瘥

鯽魚散 出楊氏家藏方 治痔瘡

鯽魚 七枚長二寸者 茵荷子 三錢

右件將鯽魚取去腸肚淨洗了用茵荷子均入在七

枚魚肚內以線繫子文武火上慢慢炙令通裏黃并

骨焦研細每服一錢温酒調下空心

千金散 出楊氏家藏方

鼠狼一枝自死者不拘大小置砂瓶弱葉包定瓶口

口次用鹽泥因濟用硬炭一十斤簇瓶火煨通紅七

分盡取出藥瓶在地上出火毒一宿研為細末每服

二錢入麝香少一許熱酒調下食空服如藥十日之

後用刺蝟皮一枚燒作灰細末入麝香少許每服一

錢温酒調下食前千金散服

立驗膏 出楊氏家藏方 治痔漏止發忽腸頭不止血者貼之永

除其根

用活黃鱔魚一條以刀斷其首瀝熱血於掌中研蚘

蛛為度急以大活蜘蛛一枚以手指只就掌中研蜘蛛為度去蜘蛛皮刮於磁瓦器內收於發時塗敷不過三二次瘥

狐骨散

出楊氏家藏方

治痔漏

狐骨 皂角不蛀者

右件各等分咬咀每服一兩如香燒熏

二白散

出余居士選寄方

治痔漏膿汁逗流疼痛不止

寒水石

火燒赤放令冷

白滑石

細研

右件各等分同研勻用新綿搵藥撲瘡口頻用

抵聖湯

出家藏經驗方

治痔漏

用躑躅花十文俗號蜘蛛花煎湯後一兩滾熟入朴

硝十文在滾的脚桶內其上用板一片蓋令密當中

穿一穴坐在上熏之旋將五文荆芥細研入臘茶二

錢點飲盡之候湯冷即起昔曾有夫婦俱病因得此

方知其効也

玉粉散

治痔漏

牡蠣燒煨入地坑出火氣為末濕即乾摻如乾即以津調治紹興桂真官用此療友有劉葉効

秦艽白朮丸 治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍者也

秦艽 一兩 去蘆 當歸 半兩 酒製 桃仁 一兩 湯浸去皮 地榆 三錢 枳

殼 麩炒 半兩 皂角仁 一兩 燒存性 去皮 澤瀉 半兩 白朮 半兩

右同為細末和桃仁泥子研勻煎熟湯白麵糊為丸如雞豆仁大令藥光滑焙乾每服二丸白湯送下空

心宿食消盡服之待少時以美膳壓忌生冷硬物冷

水菜之類并濕麵酒及五辣辛熱大科勻之類犯之

則藥無驗矣數眼而愈痔漏之病乃風熱濕燥也以

秦艽當歸尾辛溫和血涼燥踈風止痛桃仁潤血以

皂角仁除風燥以地榆破血為下使以枳殼之苦寒

補腎以下泄胃實以澤瀉之淡摻使風歸於前陰以

補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣不

足其甘未泄火兒益元氣也故曰乾寒瀉火乃假枳

實之寒也故人為藥為下焦續又曰在下者引而竭之多為大便必澀以大雄黃去之其津血亦不足以當歸和血及油潤之劑則大便自然軟利也宜作剉湯以與之是下焦有以急治之法也以地榆惡人而槐胃故宿食消盡空心作丸服之

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛非痔漏也此藥治之

秦艽 防風 當歸身 白朮 黃蘗 橘

以上各一錢半

皮 三錢 甘草 六分 桃仁 三十個 大黃 三錢 升麻 二分 柴胡

二分 澤瀉 六分

右件剉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去滓燒熱空心服之避寒寒忌房事勿食酒麪辛熱物及當風寒處大便

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努肉大便下垂多血苦痛不能忍

皂角仁 前另為細末 郁李仁 一錢 麻子仁 半錢 秦艽 半錢

煎成調服

蒼朮錢半 當歸尾錢半 澤瀉分三 大黃煨三分 生地黄錢半 枳

實七分

右件咬咀水三大盞煎至一盞去滓空心宿食消盡服之忌風寒處大小便

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂極疼不任其癢

升麻錢半 柴胡錢半 黃耆錢一 炙甘草錢半 防風分七 蒙本分三

細辛許少 紅花許少 羌活一分 秦艽錢一 麻分半

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞空心

服之忌禁如前

秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦艽錢一 當歸尾錢半 桃仁二十個 紅花許少 枳實錢一 煨大

黃錢四 澤瀉錢半 白朮錢半 皂角仁錢半

右件剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱服食前

小烏玉丹 治痔漏瘡

乳香研半兩 麝香研二錢 芝麻生用一兩 苦練根皮生一兩去 槐

角子 一兩半 生用 雷丸 一兩 生用 亂油頭髮 三兩 剪碎 燒存性 黃

牛角腮 三兩 生用 生豬前甲 四十九個 內燒灰存性 南星 一兩 生用

穿山甲 四兩 鹽固 濟煨存性 白礬 一兩 飛過 半夏 一兩 生用 枳殼 一兩 燒

右件各依法過度為細末用好酒醋糊為丸如梧桐

子大每服二十九空心用飲吞下日進二服如菜豆

大亦得可服三十九忌雞鵝肉新姜豆腐潦藏毒物

枳殼散 熏洗痔漏

枳殼 二兩 貫眾 二兩 荆芥 一兩 大白皮 一兩 黃連 半兩 蛇床子 兩

半兩 蒼耳根 一把 生姜 半兩 炮 栢枝 一把 薤頭 一把 黑豆 半升 無

名異 半兩 冬青葉 一把 地骨皮 半兩

五倍散敷賠痔漏瘡

海螵蛸 二錢 半 五倍子 三錢 瓦焙乾 乳香 一錢 半 蕪荑 半兩 豆

粉 一兩 炒 黑色 白鱈頭 一對 燒存性 龍骨 一分 麝香 半字

右為細末先用煎藥洗候乾如破有水乾摻如無水

用津唾調塗瘡

烏蛇丸 治腸風五種痔漏 方見本門 諸痔類

胃衆散 治痔漏

貫衆 一個大者 三個搥碎 草薺 二兩 白芷 二兩 好者

右搥羅為細末每服二錢用桃酒調下陳米飲亦得

空心食服十年患者服之立効

五聖丸 治腸風痔漏子母痔內痔翻花痔

肥皂角 三挺慢火燒存 性一分去子 青橘皮 半兩去穢炒 白礬 半兩 枯

乾薄荷 兩半 乳香 一分 雷丸

右一處搥羅為末麵糊為丸如菉豆大每服十七丸

用薄荷茶送下日進三服忌毒物

平肌散 治痔瘡久不合者

黃狗骨頭 燒灰 亂髮 燒灰 穿山甲 燒灰 各等分

右件同研令勻如瘡已乾自用津唾調塗如濕即乾

敷日三四次

兆亭散 治腸風痔漏積年膿不乾

白礬 別研 乳香 別研 黃連 去須已上三味 各一兩取末

右件用大鯽魚一枚去腸并鱗入藥末在內濕紙裏

麻皮纏鹽泥因濟文武火煨熟去泥紙却用炭火炙焦同為細末每服二錢空心粟米飲調下

皂角子散 治腸風痔漏下血經久不瘥者

皂角子

一百枚燒留性研末

楸藤子

一枚全者去殼研不可搗

右件為細末每服二錢七分熱酒下如人行一二十五里再飲熱酒一盞投之

天聖年間知濠州馬忠賢家有溫病漏瘡已十年一日老兵掃廷下且言前數日過市有醫自遠來諸漏瘡

可治頃刻之力媪曰吾更醫多矣不信也其黨有以白忠肅公者即為召醫視之可治無殺需活鱗竹針五六與之醫乃擲鱗因屈槃以竹針貫之覆瘡良久取視有白蟲數十針著鱗因即鈴置杯中如動如線復覆之又得十餘如是五六醫者曰蟲固盡未然其餘皆小蟲竟請以常用藥敷之時家有檳榔黃連散敷之明日以乾艾湯投白礬三二錢洗瘡然後敷藥蓋老人血氣冷必假艾葉以作陽而艾性亦能殺蟲也

如是者再即生肌不一月加愈如其言醫曰瘡一月不治即有蟲蟲而蠕動氣血一隨之病漏不可遂合合則結痛實蟲所為也醫無名於世而治疾有效亦良醫也醫說

抵金膏 治諸船痔漏久不愈者

花藥石

火煨過醋滓研碎

生硫黃

細研

黃丹

細研如粉

蜂粉

細研已上五味各二兩

自然銅

一兩火煨醋滓研碎

已上六味同研勻用清油三十二兩入銅鍋內用炭

火熬去油十兩次入後藥

草烏頭

一兩連皮尖生用

骨碎補

去毛

漢防已

龍骨 烏

藥 虎骨

如無用敗皂五味各二兩

已上六味並為細末入前油鍋內熬成稠膏次入後

乳香

沒藥

血竭

白膠香

安息香

已上五味各二

兩並為細末

右件同入前鍋內急將枝子攪勻少時取出以合子盛之不得蓋收三日後火力定每服一小匙溫酒下

不計時候

茶藟散 治諸船痔漏下血疼痛

黃牛角腮 二兩 蛇蛻

猪牙皂

刺蝟皮

椶櫚皮

判牛鼠狼皮

茶藟葉

剪碎已上六味各半兩

穿山甲

七十片

貫衆 一兩 乳髮 一兩

右件拌勻入磁罐內以鹽泥固濟了曬乾用炭火煨通紅為度候冷取出研細末每服二錢先嚼胡桃肉半枚次以溫酒調藥同下臨卧至五更初又服一服

至辰時又服一服如此服三日永除根本

烏金散 治一切痔漏瘡

烏金子

枳殼

葳靈仙

去土

五倍子

紫河車

用煨

者黃牛角腮

已上六味各一兩同為細末

皂角子

猪啼甲

用猪

蹄向後小爪不着地者甲

右件入磁罐子內以瓦蓋定用雄白雞糞及黃土對停入鹽少許和作泥固濟罐子用木炭七斤煨火盡為度碾為末每服二錢入鹽少許空心溫酒調下

地骨皮 治諸風痔漏下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用懸崖中者好去土不用

右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒調服忌油膩勿食

萬靈丸 治五種痔漏凡穀道生瘤似鼠竅時時發動

或出血者名曰酒痔又曰冷痔若生核子者曰腸風痔發時熱大便難下脫肛良久不入名曰及痔大便或出清血名曰血痔此冷搏結得之

硫黃 二錢 別研 白礬 二錢 猪牙皂角 半兩 附子 一兩 炮 去皮臍 皂

角刺 一兩 燒 存性 刺蝟皮 一兩 燒 存性 槎藤子 一兩 生 廣中丸者色如肥皂子

右件為細末煮稀麵糊為丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫酒送下如已有頭者用硃砂少許同一二

五丸一處研細塗於頭上旬日自落又用米醋調藥

三五丸敷瘡上即愈如瘡在裏面即將米醋和糟拌

藥三兩九燒熏之

萬金丸 治一切痔漏久不瘥者

地骨皮 治諸風痔漏下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用懸崖中者好去土不用

右二味各等分同炒微黃色搥為細末每服三錢空心溫酒調服忌油膩勿食

萬靈丸 治五種痔漏凡穀道生瘤似鼠竅時時發動

或出血者名曰酒痔又曰冷痔若生核子者曰腸風痔發時熱大便難下脫肛良久不入名曰及痔大便或出清血名曰血痔此冷搏結得之

硫黃 二錢 別研 白礬 二錢 猪牙皂角 半兩 附子 一兩 炮 去皮臍 皂

角刺 一兩 燒 存性 刺蝟皮 一兩 燒 存性 槎藤子 一兩 生 廣中丸者色如肥皂子

右件為細末煮稀麵糊為丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫酒送下如已有頭者用硃砂少許同一二

五丸一處研細塗於頭上旬日自落又用米醋調藥

三五丸敷瘡上即愈如瘡在裏面即將米醋和糟拌

藥三兩九燒熏之

萬金丸 治一切痔漏久不瘥者

木賊 何首烏 荊芥穗 防風去蘆頭 雞冠花 焙

枳殼去穰炒 五倍子 黃耆 槐花 槐角已上一

兩同為末 皂角子 猪蹄甲用猪蹄向後小爪不着地 皂角刺

麝香皮子 槿藤子 百藥煎 刺蝟皮七味各一兩入

磁罐鹽泥固濟了候乾用炭火煨至青烟出與前藥末同研細次入麝香二錢

右件為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九食前米飲下病久者當常服即去根本

艾葉散 熏漏瘡

鶴虱 艾葉 槿藤子 白膠香

右件各等分剉為散丸瓶內燒烟熏患處

治痔漏

以海狍魚皮肪中摩瘡此魚生大海中

治痔漏瘻及肿肝

取鱧魚腸以五味灸貼患處良久蟲出即去之一方

灸香綿裏內穀道中一食頃當蟲出魚數易之盡三

枚瘡鱧魚即鱻魚

治痔瘻 出本

用桐皮水煎服之

治痔漏 出本

單用醋林子搗為末酒調一錢七分之甚効

治痔瘻 出本

以蜚蝗搗為丸塞下部引痔蟲出盡永瘥

治痔瘻 出本

并瀉血以瞿麥作湯粥食并得

膽礬散 出楊氏家藏方

治附漏瘡焮腫疼痛侵潰濃水不絕久

不生肌

膽礬 一兩煨

龍骨 半兩白

黃丹 二兩

蛇蛻 一條全者燒灰別研

麝香 半錢

右件除蛇蛻麝香末外四味研為細末同蛇蛻麝香

和勻先用蔥椒湯洗淨搵乾次用藥少許乾搽瘡口

如瘡口小用紙撚子點藥入瘡口內日三次用

治五痔漏瘡

捷牛兒膽 一個 蝟膽 一個 膩粉 四錢 麝香 少許

右四味先將蝟膽汁調膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如麻子大送於瘡口後追出惡物是驗瘡口漸合生面蓋瘡內一遍出惡物効

治痔漏腸風方

用芸薹子四兩為末用好用酒麵糊丸梧桐子大每服三十九至五十九溫酒送下日進一服

治痔漏有頭疼痛下膿血

用吐出烟蟲二枝炙乾搗羅為末貼漏頭上當斷膿血貼五七度瘡

又方

用硫黃末少許內瘡口中以艾熏之瘡

治痔漏疔蝕惡瘡

用端午日取蟾酥以硃砂麝香為丸如麻子大內孔

中

治血漏瘡 出本

用雄黃末如大豆許內瘡中又服五錢七血皆止

痔漏疼痛不可忍 附論

夫痔漏蓋緣寒濕與夫房室醉飽間得之其作也肛邊腫癢甚則疼痛不可忍或蔓生數處或似螺蛳膿血與肛汁綿綿而有孔不合故謂之痔漏昔人論燒蟲居銅腸間多則為痔方論有用熏法及化蟲之藥不可不察

方

萬金丸 出聖濟總錄

治腸風疾遠年不瘥疼痛不可忍者

安息香 乳香 丁香 木香 沉香 對 無食子

肉豆寇 當歸 麒麟竭 沒藥 蜜蛇僧 阿

魏 各半 巴豆 去皮心 砒霜 入菜豆半兩

右件將乳香安息香阿魏麒麟竭沒藥等細剉水少許浸一宿來日細研如膏餘藥搗羅為末如膏同研

如米黃大每服一丸空心冷茶燕之

北金丸 出聖濟總錄 治痔疾疼痛不可忍及下血

楛藤子

附子

炮製皮濟

硫黃

白礬

燒令汁盡

螺皮

焦

枳殼 去穢炒

猪牙皂角

醋炙各半兩

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服十九米飲或酒

下不拘時候服

淋瀝湯

出聖濟總錄

治痔漏不可忍

黃芩 去黑心

木通 剉

梔子仁

甘草

炙

太陰玄精石

篇蓄

朴硝 一兩

右搗篩每用七錢七水三碗煎沸傾盆內先坐熏之

內候通手節淋泄上即止熏時令密覆勿泄藥氣

能消丸

出聖濟總錄

治痔漏疼痛如錐刀刺不可忍

葳靈仙

去黃土四兩一名能消

卷栢

去根

防風

去叉

蝟皮

燒灰存性

阿膠

炙燥各半兩

糯米

炒一合

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九加二十九人

參湯下日三服不拘時

括蕒散

出聖濟總錄

治痔漏疼痛行履不得

大括蕒

一枚開口

猪牙皂角

白礬

各半兩

鯉魚皮

鱉

皮去裙刺蝟鍼各一分

右除括萋外為麤末入在括萋內用鹽泥固濟候乾用炭五斤煨全通赤放冷取出搗羅為末每服二錢七研胡桃酒調下

荆蘭湯 治五痔痛不可忍

荆芥穗 貫衆 甘草 蜀椒去目 澤瀉 芍藥各二

右搗篩每服用三匙水三碗煎沸傾盆內先坐熏之

復令密勿泄出藥氣即淋滌

試蟲散 治五痔痛甚

臭椿根 地骨皮

用精猪肉一大片糝藥三錢七在肉上就肉上一二時起看有蟲即看去無即已

薰洗方出聖濟總錄 治諸痔有頭疼痛不可忍

地松一斤 蝟皮二 蔥根一 韭根一

右剉細以水五升盆內盛先坐乘熱熏通手淋洗日

三次用

荊芥湯

出聖濟總錄

治五痔疼痛連陰濕癢

荊芥穗

臭橘

厚朴

去麤皮各半兩

右搗篩每用二兩水五升煎三升避風處淋漂

血竭散

出危氏方

治痔漏疼痛不可忍

血竭

牡蠣灰

髮灰

各等分

右細末入麝香少許自以津唾調敷如更痛研杏仁

膏調藥敷之

祛痛散

治痔疾疼痛不可忍及腸風下血

皂角子

不蛀者一千枚麩二升同炒麩焦黑去麩

薄荷乾

者三

右為散每服二錢米飲調下空心服

枳殼散

出聖濟總錄

治諸痔有頭疼痛不可忍

枳殼

四兩

訶梨勒皮

二兩

右粗搗篩同炒令熟以綿熱熨之冷即再炒

烟熏方

出聖濟總錄

白鱈魚骨

熟艾

等分

右剉碎和勻用新盆子一個盛藥在內以火燒藥候烟出盆上熏之烟盡即愈

白礬散 一名礬香膏

治痔漏出膿血不止不可忍者

方見本門壯毒類

止痛膏

出聖惠方

治腸風痔瘻有頭下膿血疼痛不可忍

菘蓂子 合一牛皮膠一兩

右先研菘蓂子後用膠清調成膏攤紙上貼之有頭

者自消

歲靈仙丸

出聖濟總錄

治腸風痔漏肛邊鼠乳疼痛不可忍

者

歲靈仙 淨洗焙乾二兩 木香 一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九加至三十九不拘時煎荊芥湯下服藥後忌茶半日恐冷節復痛

男子婦人皆服

治大腸痔瘻脫肛疼痛 出聖濟總錄

用虎脚指二節以蜜二兩炙冷搗羅為末飲并丸如

梧桐子大每服空心温酒下二十九

北金散

出敷信 通用方

治久新痔痛如神

先用獨行虎散洗 次用白金散敷貼

用螺蛳去麤皮不拘

多少為細末每用二三錢生麻

油成膏以鵝翎拂上

每日夜用之久瘡自消是藥極

如不消服藥獨能見效

治痔瘡疼不可忍宜用治之

出德生 堂方

菜豆粉一斤 蝸牛一百五十個

二味一處炒鍋內文武火炒黃去蝸牛灘在地上出火

加毒後 沒藥 乳香

輕粉三錢 菜豆一兩


與沒藥等一味各三錢同研細末每用少許凉水敷

貼瘡上即住疼痛

治痔疾肛門邊腫硬癢痛不可忍救急熨之

右白礬三分 碾以童子熱小便二盞化白礬以洗痔上

二日立効



普濟方卷二百九十七

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官學錄臣謝登雋

謄錄監生臣趙應鐔